

廣陵醫籍叢刊

痢疾目錄

內經錦囊痢疾原論

自論痢症由

痢疾論治

痢症論脈

治痢各方

和瘡清痢飲

暢肝清痢湯

解暑清痢飲

清金止痢湯

固陰清痢煎

附論

救痢悞治壞症方

奪命救痢飲

治痢救陰煎

濟陰回春飲

溫脾清痢飲

溫腎止痢煎

清胃除痢湯

救陰清痢飲

補氣清痢湯

補陰清痢飲

祛痢飲

清痢飲

除濕清痢飲

養陰化濕除痢湯

陳遠公治痢引胃湯

又靖亂湯

又治痢啓關散

又止脫救痢湯

溫中救痢飲

新附

清中救痢飲

六味地黃湯

附丸

補血保胎清痢湯

治孕婦之痢

孕婦痢後調理方

產後補血化痢湯

養陰培元煎

產後痢愈調理方

小兒痘疹後痢疾論

附方

補脾清痢飲

養陰解毒清痢湯

調理健脾丸方

附久痢應驗單方

休息久痢不愈方

治久痢紅多方

治久痢白多方

治久痢紅白方

陳遠公治長年累月痢不愈方

又煎方

又治痢氣逆不舒下痢不止方

又消瘀神丹方

治久痢不止下如清涕如油內有紫黑血絲方

新方鐵甲散

又廣濟痢疾方

又烏金治痢丸方

痢後調理諸方

理陰益氣煎

治痢後氣血兩虛

調中益氣煎

治痢後氣虛怕冷

補脾和肝飲

治痢後肝燥脾虛作瀉

培土分消飲

治痢後脾虛頭面四肢虛腫腹脹

起脾湯

治痢後四肢痿無力

安神飲

治痢後陰虛不寐

又附初生小兒調護論并備各症諸應驗方

治臍風撮口方

又方治症同上

又方治症同上

傷風發熱方

治小兒禁口不乳方

治臍內有瘡出水方

又方治症同上

治小兒目赤紅腫眼不開方

治小兒小便不通方

治小兒大便不通

五福化毒丹

治胎火毒方

青金丸

治小兒胎熱化痰鎮驚邪方

天麻丸

治胎風神效方

鉤藤飲

治小兒天癇目睛上視四肢痠痿方

天竺黃散

治症同上

治小兒盤腸氣神方

又方

治同上

木香丸

治驚風內癇肚痛驚啼

乳香丸

治症同上

琥珀丸

治急慢驚風痰涎潮熱昏冒目睛內翳搐搦反張腹痛夜啼不安

萬金丸

治小兒臟冷腹痛夜啼手足作冷如神

又煎方

治小兒面赤心家有熱夜啼

蟬花散

治小兒夜啼不止如見鬼狀

雄麝散

治小兒客忤卒然心口刺痛腹大脹滿啼叫欲絕危急之致

至寶丹

治小兒大人卒中惡客忤諸癘急驚

惺惺散

治小兒變蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

定驚神丹

治小兒急慢驚風

水鑑仙方

治百日内小兒寒熱吐乳諸藥不效此方如神

又治小兒吐乳方

又方治小兒先受熱後受暑發熱方

又治小兒赤遊丹方

又治小兒天泡瘡方

又治小兒膿耳紅腫耳底疼痛神方

又治小兒口內瘡方

又預解小兒稀痘方

又方同上

又方同上

以上諸方皆余常治小兒應驗神方

慈航集 三元普濟方

古欵王於聖纂著

京都史蘭圃叅訂

內經錦囊痢疾原論

痢者古名滯下、內經謂之腸澼、潔古云壯盛之人無積、虛人則有之、可見積由虛召、皆因脾胃既虛、飲食不節、七情不適、腸胃怫鬱、氣血壅滯、釀成膿血而爲滯下也、然卒成有五、積漸有七、有因飲食不調、脾胃驟傷者、有因受暑濕而發者、有因風寒相感而發者、有因吐瀉失調而成者、有因誤食毒物冷物與驚恐相乘而得者、此爲乍成五症、其七症者、有因食積日

久而成者有因氣虛夾寒而成者有因脾氣久傷不能統血而下血者有因濕熱傷脾而成者有因陽氣下陷積成脾敗而成者有因膏粱博炙太過燥熱蘊積者有因疫氣時行穢毒相感者凡傷氣則白傷血則赤氣血俱傷赤白并出黃是食傷綠是傷濕然總因濕熱寒暑積滯而成者其虛實各有不同以痢之數有八曰冷曰熱曰疴曰驚曰寒熱不調曰休息曰瀼痢曰蟲毒其冷痢色白熱痢色赤疴痢黃白下無時度驚痢色青冷熱不調之痢赤白之色相兼休息痢糞黑而如魚腸愈而復作瀼痢肚大停積而又下

飲食不爲肌膚、氣臭而大便閉塞、蟲毒痢下黑色、其治之法、必審挾寒挾熱或虛或實、實熱者即可用實治、寒者當同虛論也、至如痢久發熱者、陰虛也、肛門痛甚者、濕熱流於下也、禁口痢者、因胃口熱甚、或疫氣穢毒積於臟腑、熱毒之上衝、則成禁口痢矣、治宜清心解毒、徹熱下行、如後重之症、由肺氣鬱於大腸、宜升提清氣、降其濁熱、血虛者補血、養陰皆兼潤下、而痢自止、經云養血和血、而痢自愈、調氣理氣、後重自除、衰老幼弱、元氣虛者、必須如此治法、如強壯食積重、而痢盛者、初痢之時、必須下之、不可遲也、過五

日之後則脾胃漸虛當用消導升提行氣和血病久
挾虛者當滋補氣血收澀固脫後重者仍宜下之腹
痛者宜和身重者除濕脉弦者兼散去風膿血稠粘
者以重劑竭之驚澹爲痢者宜溫之在外者散之在
裏者下之在上未成積者吐之在下已成痢者通之
表熱者內疏之小便澀者分利之盛者和之去者送
之至者止之此治痢之格言也

痢疾論

於聖識著

夫痢無壞症卽有壞症必臟腑久已內傷一病卽禁
口不食痢如腐爛魚腸屋漏此不治之症也如初病

久病能食者、再無一壞也、余常讀諸名人著述、議論精微、無處不到、其理無出其外矣、每閱治痢諸方、與論大相懸遠、有曰不可用苦寒、而方中又用黃連、黃柏、黃芩、有曰不可用辛熱、而方中偏用丁香、肉桂、巴豆、乾薑、附子等藥、且又註明此丸能治諸痢、卽此一言、未分虛實、直誤至今、近時醫家、書並未富、只知此方能治諸痢、不問寒熱、槩而用之、如寒痢服熱藥者、賴以見功、胃積痢熱者、服之卽成禁口、如用苦寒者、熱痢服之、湊效、冷痢服之、寒戰腹痛、手指青黑、及至無救、尙在不知、徒空發嘆、又有好善者、見此方能治

諸痢可以多合施送救人其中所誤者亦不少也如果立心行善何不遵運氣之方寒熱又無偏勝救人更多矣凡痢瘧二症初病皆屬陽明胃與大腸積滯濕熱外受寒暑而成痢瘧要明表裏虛實不可執一之見痢有初起惡寒發燒頗象瘧症而又腹痛下痢人見瘧痢并行皆稱重候不知內停積滯外感風寒半表半裏之症治宜兩解如專一治之則多纏綿夫痢腹必痛有寒痛火痛虛痛實痛之分其寒痛者唇白面青手足作冷痢下白色脾氣虛弱體氣不壯之人積滯腸胃虛中挾實此爲寒痢腹痛也其火痛者

面赤唇紅、手足熱、痢下紅色、體壯強盛之人、因食煎炒厚物、不禁生冷、停積腸胃、實火實熱、此火痛之痢也、紅白相間之痢、腹痛者、因寒火之積相混、凝結於腸胃而成、此痢有虛有實、宜斟酌調治、其虛痛者、氣弱怕冷、痢時手按腹則快、無論紅白色、宜補血調氣、其實痛者、內如刀刮、手按之亦痛、後重下墜、小便短赤、肛門腫熱、下痢赤而稠粘、此爲實痛、宜當歸承氣湯加廣木香下之、卽鬆、如紅多加酒炒川連更妙、而痢有腹不痛者、此非痢也、由肝木之尅脾土也、脾虛受肝之制、此爲濕痢、不可作痢治、宜和肝理脾、分利

小便氣虛體弱者補氣溫中、體有熱者清中調氣、年
高衰老之人脾腎皆虛之體、如下痢腹不痛者必須
溫補真陽、急固滑脫、不可執定痢無止法、大小緩急
移步換行、全在見機也、

痢疾論脈

於聖著

黃帝問岐伯曰腸澼也即痢便血何如、岐伯曰身熱者

死、身涼者生、又曰下白沫者何如、岐伯曰脈沉則生、

脈浮者死、又曰下膿血者何如、即紅白痢岐伯曰脈懸絕

者死、懸絕脈空也脈滑大者生、又曰腸澼之屬身不熱、脈

不懸絕者何如、岐伯曰滑大者生、懸澇者死、此言臟

期之生死、又痢有不治之症九條、一脈洪大、不食者
不治、二飲食並藥、不過隔者、不治、三肛門如竹筒者
不治、四痢如魚腸、屋漏、不食者、不治、五食物完穀不
化者、不治、六氣虛下陷、不固者、不治、七面目俱赤直
視、不食者、不治、八脈散亂、無神、不食者、不治、九呃逆
不食者、不治、以上不治之症、本原內傷者、不過二三、
誤者八九、如陰虛下痢、當養血清之、脾虛氣弱之痢、
當理脾調氣清之、則無錯治、今人治痢、不審虛實、槩
以蒼朴爲治痢之要藥、專認痢皆濕、不知陰虛痢熱
一燥而陰更傷、痢毒之熱盡畜於胃、禁口由此治成

癩之故癩者不利也通因通用也通因通用要變通也如人實症實用當歸大承氣通之如人虛症實先固其本爲主再加入通癩之藥則無變動之虞凡癩全在入首初治不錯再無壞症所有不治者皆初入首之誤也余三十餘年治癩從無一損今將應驗各方分寒熱虛實對症施治不致有誤方錄於左明者審察之可也

治痢諸方

和瘥清痢飲 治痢有初起惡寒發燒惡心嘔吐下痢腹痛頗似瘥疾而並非瘥也此兩感半表半裏之症凡痢逢初病惡心發燒來勢最重大要留心如誤用燥熱之藥即成禁口宜慎之

和瘥清痢飲

紫蘇一錢五分 當歸八錢 廣霍香三錢 枳壳二錢 檳榔

一錢五分 青皮一錢五分 車前子三錢 甘草三分

引廣木香一錢五分 煨老薑二錢

此方一服蓋暖得汗寒熱惡心解痢亦輕矣如恐寒

熱未全清加炒柴胡五分再服一劑無有不清者
寒熱俱清去紫蘇霍香加炒白芍八錢炒萊菔子
三錢三四服痢全止矣如遍數多裏急後重再加
酒製大黃虛者三錢實者五錢如紅多加酒炒川
連七八分再無有不應如桴鼓也竟有服初方痢
愈而成瘡者照前瘡門調治必痊也

暢肝清痢湯 治春三月人患痢者服之如神

白芍

五錢

當歸

五錢

枳壳

二錢

檳榔

二錢

甘草

五分

萊菔子

三錢

車前子

三錢

引煨老薑

二錢

炒研

如初病惡寒發燒此有表邪加紫蘇一錢五分淡

豆豉三錢 如惡心加廣藿香三錢 如腹痛加

廣木香一錢五分 如痢多紅加酒炒地榆三錢

炒黑荆芥穗二錢 如遍數多加製大黃三五錢

二三服卽全愈

解暑清痢飲 治夏三月人患痢疾之神方

廣藿香 三錢 赤芍 五錢 枳壳 二錢 萊菔子 三錢 車

前子 三錢 檳榔 二錢 陳皮 一錢 當歸 八錢

引煨老薑二錢

如痢初起惡寒發熱此有表邪宜加紫蘇一錢五

分淡豆豉三錢 如腹痛加廣木香一錢五分

如痢紅多加酒炒川連三五分 如腹脹下墜遍

數多加酒製大黃三五錢三服全愈此通因通用

止痢之神方

清金止痢湯 治秋三月人患痢疾之神方

當歸八錢 大黃三錢 甘草一錢 萊菔子五錢 赤芍五錢

枳實二錢 車前子五錢

引射香一厘 小兒十歲外者半劑 十歲內者再減半服

如惡心加廣藿香三錢 如腹痛加廣木香一錢

五分 如痢紅多加酒炒川連三五分 如遍數

多加酒製大黃三五錢 如腹脹下墜加枳榔二

錢 如有外感惡寒發燒加紫蘇一錢五分淡豆

豉三錢三服全愈

固陰清痢煎 治冬三月人患痢疾之神方

全當歸 一兩 枳壳 二錢炒 白芍 一兩 萊菔子 三錢炒研地

骨皮 五錢酒泡 檳榔 二錢 甘草 八分 車前子 三錢 陳皮

一錢五分 引煨老薑二錢小兒照前減半服

如惡心加竈心土五錢 如腹痛加廣木香一錢

五分 如痢遍數多加製大黃五錢 如紅多加

酒炒川連三五分 如有外感加紫蘇一錢五分

葱頭三個此方初病一服痢輕二服又輕三服全

愈矣

上所定春夏秋冬四季治痢主方後有加用之藥見症加入服之神效初痢之時服此方再無變生不測亦無禁口之慮其春三月謂之發陳因一冬之寒人不慎重至春萬物發生之時其病亦隨春氣而發也經云冬不藏精春必病溫有積滯久留腸胃則成痢也故謂之發陳夏三月謂之蕃秀物生以長之時天地氣交之候萬物華實蕃茂而秀順之則精神充旺逆之則病生焉此謂之蕃秀秋三月謂之容平萬物華實已成天氣風涼地氣皆

明一派清肅之令諸事平定故曰容平順之則不傷寒露之氣逆之則生瘡痢冬三月謂之閉藏秋收冬藏草木盡凋之時萬物得陽而生得陰而伏今陽氣伏藏水冰地坼之時不可擾乎陽順之則不傷腎逆之則生傷寒殄泄故謂閉藏也今所定治痢之方皆順四時之氣不敢逆其天和此余三十餘年得心應手之方無論司天運氣皆可用之百戰百勝再無有一悞治也不可見藥分兩重而減之則不見功效矣切囑之再附誤治而變壞症今立救治方於左

奪命救痢飲因初痢毒熱蓄於陽明胃與大腸失於清下悞投吳萸乾薑之辛燥此尤火上加薪再用川連之苦寒以逼其痢毒之熱於中則成禁口上不能食下又不止慙慙待斃以此方救之如藥能下咽則可望其回生如藥不能下則無救矣

奪命救痢飲

枳實 二錢

大黃 三錢

枳榔 二錢

甘草 一錢

當歸 八錢

白芍 八錢

車前子 三錢

引 黑科豆一兩
蕎麥一兩

水煎緩緩一匙一匙燕之燕之不吐能下次日必有生機能進飲食用救陰煎調理四五劑痢全止

矣再以飲食調補

救陰煎

當歸 五錢
白芍 五錢
枳壳 二錢
陳皮 一錢
車前子 五分

三錢
巴戟肉 八錢
甘草 五分
檳榔 一錢
五分

引廣木香 一錢
煨

濟陰回春飲 治痢誤藥傷陰卧床不起舌苔中間

焦黑四邊紅赤晝夜痢下無度倖能進稀粥湯水

此方一服痢輕再服痢又輕胃氣亦開矣胃氣既

開病人想喫之物即與之食不可過多痢疾之症

能進食者皆吉兆也

濟陰回春飲

赤鮮首烏

一兩打碎

當歸

八錢

白芍

八錢酒炒

甘草

一錢二分

萊

菟子

五錢炒研

車前子

五錢

枳壳

二錢炒

陳皮

一錢五分

引煨廣木香一錢五分

如腹脹下墜加枳榔一錢五分四劑六劑必全愈矣

溫脾清痢飲

治脾虛寒痢腹痛裏急後重小便短

而不赤痢下無紅舌苔滑白四肢冷此方如神

溫脾清痢飲

寒痢

白芍

八錢炒

當歸

八錢

白朮

五錢土炒

雲苓

五錢

乾薑

一錢

炒黃枳壳五分 二錢 枳榔五分 車前子三錢 甘草五分

引煨廣木香一錢五分小兒減半服

此方一服腹痛痢輕二服又輕三四服全愈矣

溫腎止痢煎 治腎虛寒痢腹痛下墜痢下白色手

足冷腰痠小便短而清此方神效

溫腎止痢煎 寒痢

大熟地八錢 當歸三錢 甘草八分 乾薑二錢 甜

白朮三錢 莫莢五分 車前子三錢

引煨廣木香一錢

此方一服腹痛瀉痢輕再服又輕四服全愈如瀉

痢不止加石蓮子五錢肉蓯霜一錢 如陽虛加

附子一錢五分

清胃除痢湯 治熱痢實症脉弦有力腹痛痢赤或

紅白相間小便短濇身熱手溫後墜裏急肛門腫

熱舌苔黃赤通其陽明病者安吉

清胃除痢湯 熱痢實症神方

生軍 五錢 枳實 二錢 甘草 一錢五分 厚朴 一錢五分 生薑汁炒

白芍 八錢 當歸 八錢 車前子 三錢 川連 五分 酒炒

引廣木香一錢五分

此方熱痢重症一服即好大半二服全愈不用三

服

救陰清痢飲 治久痢傷陰危症內熱不除舌苔焦

黑痢下不止正虛邪勝此初治所誤之症能食者

此方救之神效

救陰清痢飲 虛熱痢症神方

赤鮮首烏 八錢 打碎 當歸 八錢 白芍 八錢 酒炒 枳壳 一錢 八分 炒

車前子 三錢 檳榔 一錢 五分 萊菔子 三錢 炒研

引煨廣木香一錢五分

此方服至痢止精神日復為主再見症加用可也

補氣清痢湯 治氣虛下陷久痢不愈腹有微痛脫

三元普濟方 七

肛下墜虛寒怕冷中氣不接形象欲脫宜補中益

氣加減如神

補氣清痢湯

治氣虛之痢

人參

一錢五分

黃芪

三錢或五錢炙

甜白朮

三錢土炒黃

雲苓

二錢

當歸

二錢酒炒

白芍

三錢酒炒

車前子

三錢

枳壳

一錢五分

陳皮

一錢五分

甘草

五分炙

引

煨廣木香一錢二分老薑二錢紅棗五枚

如痢中帶紅加炮薑一錢五分

如惡心加審心

土五錢 如痢不止加鐵蓮子五錢赤石脂二錢

如呃逆換乾薑一錢五分柿蒂五個貧人無力服

參以上党參一兩代之一服痢輕再服痢又輕四

服全愈此方愈後多服更妙

補陰清痢飲 治陰虛久痢不止身熱腹不痛口渴

舌乾腰腿痠軟無力此方服之神效

補陰清痢飲 治陰虛之痢

大熟地

或五錢
八錢

當歸

三錢
酒炒

甘草

五分
炙

山萸肉

三錢
酒炒

白芍

三錢
酒炒

乾薑

一錢五
分炒黃

車前子

三錢

杜仲

三錢
炒

引煨廣木香一錢

如手足冷腰痛加製附子一錢五分鹽水炒補骨

脂二錢 如痢不止加鹿角霜三五錢淡乾肉蓯

蓉三錢此方一服痢輕再服又輕四服全愈

祛痢飲 治初痢實症腹痛下墜無寒無熱專痢紅

自有裏無表此方如神

祛痢飲 治痢實症

當歸 八錢 白芍 八錢 枳實 二錢 檳榔 二錢 萊菔子

三錢 車前子 三錢 製軍 五錢 甘草 八分

引煨廣木香一錢五分

如惡心加廣藿香梗三錢 如紅多加酒炒川連

五分無紅不必加此方治初痢之神劑一服痢輕

再服痢又輕三服必愈無論風寒暑濕之痢服此

方再無變症此余三十餘年治痢初方百戰百勝

從無一損者卽此方也

清痢飲 治初痢不惡寒發炕裏急後重腹中疼痛
要痢不痢不痢要痢小便短濇此方最妙

清痢飲

當歸 八錢 赤芍 五錢 枳壳 二錢 檳榔 二錢 萊菔子

一錢 車前子 三錢 陳皮 一錢 生軍 三錢

引煨廣木香一錢五分

如脉弦有力痢下紅多加酒炒川連五六分 如
脉弱痢無紅色四肢作冷加燒酒炒川木瓜二錢
炮薑八分初痢一服輕二服全愈不用三服藥要

喫二煎惟痢疾藥宜多服其功更速飲食無忌多
喫湯水少喫燂炙宜自慎之

和肝清痢湯 治夏秋之間初病腹痛作瀉而變痢
者此方如神

和肝清痢湯

炒白芍 一兩 當歸 五錢 車前子 三錢 枳壳 一錢五分

赤苓 三錢 甘草 一錢 引廣木香 一錢五分

如腹痛脉弦有力加薑汁炒黑山梔三錢 如胸

口飽脹加檳榔一錢五分 如痢遍數多加酒製

大黃三錢 如痢紅多加酒炒地榆炭三錢川連

五分。如無紅不必加一服痢輕再服又輕三四服全愈。

除濕清痢飲 治夏秋之間先瀉後痢之症腹中疼痛裏急後重之極不痢不可忍欲痢不得痢口渴飲水小便艱澀小腸作脹人以爲火邪之重誰知濕熱之盛乎脉必弦數而滑此方服之神效

除濕清痢飲

車前子 一兩 赤苓 三錢 枳壳 一錢五分 厚朴 錢五分

檳榔 一錢五分 甘草 一錢五分 滑石 三錢

引川連 一錢 廣木香 一錢五分

一服後重除二服小便利三服痛脹止四服全愈
矣

養陰化濕除痢湯 治血虛夾濕之症渴又飲水飲

後胃中不舒心煩懊懣小便短澇不利紅白相間
似膿非膿似血非血夫濕久化熱而成此痢宜養
血化濕而痢自愈矣

養陰化濕除痢湯

當歸 一兩 白芍 一兩 車前子 五錢 檳榔 二錢 生軍

三錢 荊芥 二錢 炒黑 萊菔子 五錢 炒研 廣木香 一錢 五分

此方一服痢輕二服又輕三服全愈不用四服

陳遠公引胃湯

治因濕熱之極腹痛作痢上吐不

食下痢不止勻水難飲胸中悶亂人以爲禁口之
痢誰知是胃中濕熱之毒乎夫痢該下行何以上
吐而不能下此胃中之火夾濕熱蘊結於中也治
法必須開鬱火之門而門不易開必須引火開門
爲捷耳

引胃湯

人參 一錢

黃連 三錢

吳萸 三分

菖蒲 三分

雲苓 五錢

五味各研淨末滾水調成稀糊一匙一匙嚥之初
時嚥下必吐吐後仍宜緩緩嚥之只藥一受則不

吐矣卽將前藥服完上下俱開矣後服靖亂湯調
理卽愈

靖亂湯

白芍

一兩

川連

一錢

甘草

一錢

廣木香

生一錢

雲苓

三錢

枳壳

一錢五分

木通

一錢

車前子

五分

此方水煎服一劑輕二劑痢全愈不必三劑也

啟關散

治症同上

人參

二錢

川連

二錢

雲苓

二錢

吳萸

五分

廣木香

五分

不用引

水煎緩緩服之上下自通矣

又遠公止脫救痢湯 治濕熱作痢數日之後腹不
痛如膿如血陣陣自下手足厥冷元氣欲絕此是
火變爲寒而陰絕也夫痢無止法古人之語也然
痢實有不同有初起卽宜止者有日久而不可止
者未可執痢無止法一語竟不用止也然此等之
症勢在危急之時有不得不止者而腹作痛爲邪
今腹不痛何邪之有腹不痛膿血陣陣自下乃氣
脫而欲崩也手足厥冷氣脫而不能運也必須看
舌苔之滑燥熱極舌苔必燥寒極舌苔必滑熱變
爲寒舌苔必滑急須先止其痢以救其脫不可瀉

痢以攻邪

止脫救痢湯

此方虛設

人參

二兩

白芍

一兩

於朮

二兩

肉桂

三錢

雲苓

一兩

甘草

二錢

赤石脂

三錢
研末

此方據遠公得天師所示此等之症世不常有存

此一方以救萬人中之一人耳余三十餘年來曾

見此症竟有此痢因初治過用大熱之藥先腹痛

後腸胃腐爛腹不痛而膿血陣陣自下舌苔雖滑

脉懸絕者十人患此痢症十人皆是此脉如脉稍

有一線生機此方非大富貴者亦無此力量也如

此方論不得不收錄之

溫中救痢飲 治痢初病寒症悞用苦寒而寒凝於

胃胃家無陽成爲寒禁口面白色青黃手足冷舌

苔滑白食不能進呃逆下痢急宜補氣溫中陽回

頃刻方保春回也

溫中救痢飲

人參 二錢 甜於朮 五錢 雲苓 五錢 甘草 一錢五分 乾薑

二錢 巴戟天 一兩 枳實 二錢 車前子 三錢

引煨廣木香一錢二分

水煎緩緩而服藥力一到手足溫而呃逆止胃氣

亦開再服痢止其半四服全愈矣

清中救痢飲 治痢毒火留中因初治誤用辛熱之

藥而成熱禁口舌苔焦黑四圍紅赤週身乾熱面

紅目赤痢下不止食不能下之症此方救之藥下

胃開可保功成也

清中救痢飲 治熱禁口

人參 二錢 大黃 三錢 黃連 一錢 枳實 二錢 甘草 一錢

五分 引竈心土五錢 廣木香一錢 五分

水煎冷服 如脈弦硬有力加知母三錢 天花粉

三錢 如氣逆胸口加枳榔一錢五分 如痰塞

咽喉加麥芽桑白皮天冬花粉各二錢一服胃火
盡下二服痢減胃開三服痢好大半四服全愈貧
人皆以党參二兩代之痢愈宜飲食調補藥宜六
味地黃湯滋陰調理或合九藥亦可原方中加當
歸白芍各四兩酒炒加入合服每早開水下三五
錢

六味地黃湯方

大熟地

八錢

山萸肉

四錢

酒炒懷山藥

四錢

雲茯苓

三錢

粉丹皮

三錢

酒炒建澤瀉

三錢

鹽水炒

不用引

地黃丸加歸芍名歸芍地黃丸用煎方加十倍如

法炮製各研取淨末分兩修合其效功速不可惜
其費事將就合之則功力薄矣

一孕婦患痢者最難調治先要固胎方能清痢而痢
必須速清不可遲緩緩則痢熱存中胎氣不安矣
方用補血保胎清痢湯神效

補血保胎清痢湯

當歸身 八錢 白芍 八錢 川芎 一錢 枳壳 二錢 萊菔

子 三錢 甘草 五分 車前子 三錢 黃芩 一錢五分 砂仁

炒研 甜白术 三錢 引煨廣木香 一錢五分

如夏秋惡心加廣藿香三錢 冬月加竈心土三

錢 如紅多熱重加酒炒黃連四五分 如腰痛
加川續斷三錢 如痢甚遍數多不得不加製大
黃三五錢看人虛實用之而且不可遲遲則反受
其累矣痢愈以後方調理

胎前痢愈調理方

當歸 五錢 白芍 五錢 甜白朮 三錢 枳壳 一錢
五分 黃芩 五分

一錢 砂仁 二錢 雲苓 二錢 陳皮 一錢
五分 不用引

一產後痢者其血分先傷初痢不可用燥熱之藥如
誤投之毒熱留於中則成禁口難治捻宜大補血
分加以調氣清胃為主方用補血化痢湯神效

補血化痢湯

全當歸 八錢
白芍 八錢
甘草 八分
炮薑灰 八分
百

草霜 三錢
枳壳 二錢
炒
萊菔子 三錢
炒研
車前子 三錢

引廣木香 一錢五分

如惡心加廣藿香梗 三錢
如腹痛紅多加丹參

五錢元胡索 三錢
如痢遍數多不止加桃仁泥

三錢製大黃 三錢
一劑痢輕再一服又輕三服全

愈矣用後養陰培元煎調理

養陰培元煎

大熟地 八錢
當歸 五錢
酒洗
甘草 五分
炮薑 一錢
枳壳

一錢
五分 益母草 三錢
砂仁 二錢

不用引

一小兒痘疹後患痢者、有因痘疹之初、過用大苦大寒之藥、傷於脾胃而成者、先殮瀉而後變痢者、其痢黃白、而無紅、有因痘疹之毒未清、而夾飲食雜亂者、痢紅白俱有、然治法、必須辨明傷脾胃之痢、當用補脾清痢、痘疹毒未清之痢、當養陰解毒清痢、一因傷脾、一因傷血、今定補脾清痢飲、養陰解毒清痢湯、二方於後、一治傷脾之痢、一治養血之痢、則無錯悞

補脾清痢飲

治小兒痘疹後脾虛之痢神方面色黃白手足涼舌苔微白者是也

甜於朮 三錢 白芍 五錢 雲苓 五錢 車前子 三錢 五

谷虫 一錢 枳壳 一錢 甘草 五分 神麩 一錢 五分 炒焦

引煨廣木香一錢

養陰解毒清痢湯

治小兒痘疹後毒熱未清之痢神方面赤手足溫者是也

當歸 五錢 銀花 二錢 甘草 五分 枳壳 一錢 五分 陳皮

一錢 白芍 五錢 車前子 三錢 引煨廣木香 八分

如紅多熱重加酒炒黃連三五分痢不止加製軍

三錢 如惡心加竈心土三錢 如傷肉食加炒

山查二錢 如傷麵食加炒萊菔子二錢 如傷

蛋積加白蔻仁一二錢 如傷糯米食積加杏仁

三錢炒麥芽二錢 如生冷傷胃加煨老薑二錢

紅棗三枚

以上治小兒痘疹後患痢二方均照上增用一服
痢輕再服痢又輕四服痢全愈後用健脾丸調補
精神肌肉自然充足矣

健脾丸方

人參二錢 甜白朮一兩 雲苓一兩 五穀虫五錢 雞

朮皮五錢 胡黃連二錢 陳皮錢 甘草二錢 麥芽

五錢 山查五錢 神麴五錢 蝦蟆皮三張

右藥如法炮製各研淨末煉蜜為丸桂元大或早

慈舟集 卷四
或晚開水化服一丸貧人無力用參以黨參八兩
熬膏爲丸此方不但健脾長肌能治小兒一切傷
脾疴症此余治小兒脾虛腹大四肢消瘦之神方
其功不能盡述也

治久痢應驗單方

一治休息久痢不愈方用陳火腿骨煨成炭研細末
紅砂糖各八錢陳茶三錢烏梅五個煎湯調服卽
愈

一方治久痢紅多方用臭椿樹根皮酒炒黑研細末
二兩百草霜一兩酒炒大黃二兩廣木香五錢麵

包煨共研細末空心米湯和服三錢藥未服完卽愈

一方治久痢白色凍子方用炒焦鍋粃八兩川椒一兩炒出汗五味子二兩吳萸一兩同炒麪包煨廣木香八錢車前子二兩共研細末陳米湯爲丸每早開水服五錢

一治久痢紅白方用煨廣木香二兩酒炒黃連一兩酒炒黑臭椿樹根皮二兩共研細末每早米湯調服三錢服盡全愈此治痢之神方

陳遠公治長年累月裏急後重或愈或發此痢積未

清也。以盡穢丹神效之致。方用大黃一錢，厚朴一錢，枳榔一錢，滑石二錢，地榆酒炒二錢，共研細末。煉老蜜爲丸。一次服盡，卽喫飲食，壓之。其痢頓愈。此治大腸濕熱之神方也。

又煎方：炒白芍一兩，枳壳五分，枳榔五分，車前子一錢五分，四服全愈。

又方治痢氣逆不舒，下痢不止，痢無紅色，用萹撥散神效。

萹撥散

萹撥 三錢
當歸 五錢
白芍 五錢
車前子 三錢

引牛乳半斤對水煎

如腹痛加廣木香一錢五分飽脹加檳榔一錢五分
分 如痢有紅加酒炒地榆炭三錢一服痢輕再
服又輕三服全止矣

消瘀神丹治痢久不止下如清涕或如白油內有紫
黑血絲飲食減少脉沉細弦促此方如神

消瘀神丹

滑石 六錢 水飛 乳香 二錢 去淨油 沒藥 二錢 去淨油 桃仁 二十八粒 去皮

尖 檳榔 二錢 白芍 一兩 酒炒 廣木香 二錢 煨

以上藥各研淨末分兩神麩打糊為丸每服五錢

開水送下服二日卽下穢物痢自愈矣如恐未盡
用大黃一錢泡湯再二服必全止

鐵甲散神驗治大人小兒諸痢並禁口痢無論紅白
新久痢症皆能治之真妙不可言

鐵甲散 新方

蟻螂 卽推糞虫又 四兩 炙脆 南山查 四兩 檳榔 二兩

炒 廣木香 一兩

以上藥如法炮製其研極細末磁瓶收好勿走藥
性大人每服二錢小兒五分紅痢川連三分煎湯

和服白痢紅糖五錢老薑二錢煎湯服卽愈

又廣濟方治諸痢之神方用冬天蘿蔔菜陰乾宜多收濟人鄉間無藥之處更宜預先收之愈陳愈好每遇時行痢症用乾蘿蔔菜一兩紅多加紅砂糖五錢煎服白多加煨老薑三錢煎服不用四五服痢全止矣真神方也

烏金丸治痢之聖藥無論大人小兒初起痢疾服二三次卽愈用錦文大黃拾筋研極細末無灰黃酒拌透蒸晒數十次乾再加酒又蒸以黑發光爲度做丸如粿豆大磁瓶收好大人患痢症每服三五錢小兒無論瀉痢每用一錢五歲以內者服五分

腹痛廣木香煎湯化服有紅加紅沙糖三錢煎湯
化服白色無紅煨老薑二片紅沙糖二錢煎湯服
真神方仙方也惟手足冷有寒涼者不可輕用必
多用煨薑大棗煎湯服之則可

痢後調理諸方

應驗新方原遵古方加減其中變化不同也

理陰益氣煎 治久痢全止氣血兩虧中氣不接手

足不熱神氣衰弱此方調補元氣強壯精神

理陰益氣煎

大熟地

八錢

當歸

三錢

甘草

五分

雲苓

二錢

人參

一錢

白芍

三錢

附子

一錢

或一分

陳皮

八分

五分

不用引

調中益氣煎治痢後氣虛怕冷脾胃不開此方調補
最妙

調中益氣煎

人參 一錢

黃芪 三錢

蜜炙 當歸 二錢

甜白朮 三錢

甘草

土炒

五分

陳皮 一錢

神麩 一錢

分炒 白蔻仁 二錢

研

引煨老薑二錢大棗三枚

貧人無力用參以上党參一兩蜜炙透枸杞子三

五錢酒炒代之皆獲效如神

補脾和肝飲 治痢後肝燥脾虛食物難尅溏瀉不

補脾和肝飲

治痢後肝燥脾虛食物難尅溏瀉不

實此方調理最妙

補脾和肝飲

白芍

炒五錢

甘草

炙五分

雲苓

三錢

甜白木

土三錢

陳皮

一錢

神麴

一錢五分

車前子

二錢

引煨老薑二錢大棗三枚

如胃氣不開加炒焦谷芽五錢兔絲餅三錢如

老年人火衰便溏加鹿角霜三錢補骨脂二錢鹽

水炒

培土分消飲 治痢後脾虛頭面四肢虛腫肚腹膨

脹此方調理最妙務須多服方能見功

培土分消飲

冬白朮

二錢土炒焦

雲苓

三錢

薏仁

三錢炒

冬瓜子

二錢炒

五穀虫

一錢五分炒

川貝母

八分去心研

橘紅

一錢五分

車前子

二錢

神麩

一錢五分炒

引老薑皮三分

如小便短加好肉桂三五分貧人無力者加薄卷

官桂八分代之腹脹不消加砂仁壳二錢

起脾湯 治痢後四肢痿軟無力此脾氣大虧之症

宜大補氣理脾為主

起脾湯

黃芪

二兩炙

甜白朮

五錢

薏仁

五錢

杜仲

八錢淨絲炒

當歸 三錢 川牛膝 二錢 木瓜 二錢 山萸肉 五錢
酒炒

引酒水各半煎

如手足熱加元參八錢金釵石斛五錢 如手足

冷加炙虎骨五錢鹿角霜三錢製附子五分

安神飲 治痢後陰虛不寐神氣不寧夜夢多驚此

心腎受虧服此方神效

安神飲

茯神 三錢 棗仁 八錢 遠志肉 五分 麥冬 二錢 當歸
炒研 炙 去心

乳香 一錢 益智仁 二錢
酒炒 淨油去 水炒 鹽

引桂元肉五枚灯心三分

如心虛發空似怔忡相類加熟地八錢煨龍齒三錢
如胆怯加小麥一兩四服全好

小兒初生其症最禱、今摘其要者錄之於左、以備調
護小兒之一助耳、小兒初出母懷、斷臍之時、第一
緊要不可受寒、洗浴之時、水宜溫和、不可過熱、亦
不可冷、生水不可入於臍、不可風吹於臍、則無臍
風撮口之病矣、洗浴之時、務須用溫水、無論男女
先熨兩乳、熨後卽擠出乳中清漿白汁、則小兒諸
病不生、全在細心調護爲主、今備留禱症諸方於
後採而用之可也

治臍風撮口方

此方治小兒手足溫者用之

辰砂

五分
水飛

白殭蚕

一分

珍珠

三分

天竺黃

五分

射香 一分 共研細末用一二分白蜜調勻塗小兒

舌上令自嚙下或塗乳上吮之亦可

又方 治同上

牛黃 一分 研細竹瀝調勻滴入小兒口內神效

又方 此方治小兒手足冷者用之

川山甲 取尾上者三片 全蝎梢 去鉤七個 牛黃 一分

共研細末白蜜調勻一二分塗乳上令小兒吮之

用乳調滴口內皆可服後用厚棉衣包裹出微汗

即愈

又治小兒傷風發熱方

紫蘇 一錢 淡豆豉 三錢 連鬚葱 三根 水煎加黃酒

一鐘乘熱熨小兒手足心並手腕足腕蓋暖得汗

自愈

又治小兒禁口不吃乳方

蟬退 十四個 去頭足 全蝎梢 去尾 鉤 七個 元明粉 一分 生甘草

一分 煎濃汁一小盃一匙一匙服之大便微利即

吃乳矣

又治臍內有瘡出水方

龍骨 一錢 煨 輕粉 五分 黃連 一錢 枯礬 五分 桑螵蛸

一錢 其研細末敷之即愈

又方

大紅猩猩毡燒灰敷之亦妙

又治小兒目赤紅腫不開方

生地 三錢 木通 五分 赤芍 八分 花粉 八分 川連 一分

荆芥 八分 生甘草 三分 水煎服四劑全好

又治小兒小便閉塞不通方

葱白 打爛 加酒蒸熱封臍上用絹紮一時即通內

服煎方

赤苓 二錢 麥冬 一分 車前子 二錢

引灯心三分

又治小兒大便不通方

生大黃 五分 生甘草 三分 枳壳 五分

不用引

五福化毒丹

治胎熱蘊毒胎毒口瘡神方

元參 一錢 桔梗 一錢 人參 二分 青黛 二分 赤茯苓

五分 生甘草 二分 馬牙硝 二分 射香 二分

另研 其研細末煉蜜為丸每顆五分重遇胎火胎熱口

瘡破爛薄荷湯服一九有驚加鈎藤勾七個

青金丸 治小兒胎熱化痰鎮驚邪神方

人參 二錢 天麻 二錢 茯神 二錢 陳胆星 二錢 甘草

一錢 青黛 二錢 硃砂 五分 麝香 一分

其研細末煉蜜為丸梧子大金薄為衣每用薄荷

二分鈎藤勾七個煎湯服一丸

天麻丸 治胎風神效

天麻 二錢 半夏 二錢 羌活 一錢 防風 一錢 陳胆星

二錢 白僵蚕 二錢 全蝎 七個 去勾

共研細末神麩打糊為丸芡實大硃砂為衣鈎藤

煎湯化服一丸

鈎藤飲 治小兒天鈎目睛上視四肢痲癢即抽

人參 五分 鈎藤勾 五分 犀角 五分 甘草 二分

全蝎法勾天麻四分

引金銀器二事水煎服

天竺黃散治症同上

天竺黃一錢甘草一錢兒茶一錢全蝎七個去勾

包好荆芥穗五分菜豆四十粒生研二十粒枯礬五分

雄黃五分共研極細末磁瓶收好每遇小兒患天

癩之症面青白者人參煎湯服二三分面赤薄荷

湯

治小兒盤腸氣神方小兒時刻作努面色紫赤者或哭或止者是也

砂仁二錢烏藥八分紅糖二錢水煎服加廣木香

二分亦可

又方

葱 一握打爛酒調蒸熱作餅貼臍小便通利即止

又木香丸 治驚風內癆肚痛驚啼

木香一錢煨 小茴香一錢鹽水炒 沒藥一錢去油 鈎藤一錢焙 全

蝎五分去尾 乳香五分去油 共研極細末大蒜打爛為

丸梧子大鈎藤五分 灯心三分煎湯化服二丸

乳香丸 治驚風內癆腹痛夜啼神方

乳香五分去油 沒藥一錢去油 沉香一錢 全蝎一錢 檳榔

錢一 共研極細末煉蜜為丸梧子大菖蒲三分 鈎藤

勾七個煎湯化服一二丸即愈

琥珀丸 治急慢驚風痰涎潮熱昏冒目睛內翳

琥珀 一錢
辰砂 一錢
牛黃 一錢
殭蚕 一錢
陳胆星

一錢
乳香 去油 一錢
白附子 炮 一錢
代赭石 煨七次 一錢
全蝎

梢 去勾 一錢
天麻 煨 一錢
蟬退 一錢
於木 土炒 二錢
射香 三分

冰片 一分
共研細末煉蜜為丸梧子大薄荷鈞籐

湯化服一二丸

萬金散 治小兒臟冷腹痛夜啼面色帶青白手足冷者此方如神

人參 一錢
於木 土炒 二錢
雲苓 二錢
當歸 酒炒 二錢
白芍 二錢

酒炒 沉香 八分
乳香 去油 一錢
肉桂 五分
丁香 二分

共研細末煉蜜為丸梧子大每服三丸

又煎方 治小兒面赤心家有熱夜啼

生地 一錢 麥冬 一錢 茯神 一錢 遠志 三分 車前子

八分 鈞藤 五分 甘草 三分 木通 三分 燈心 三分

水煎服

蟬花散 治小兒夜啼不止如見鬼狀

燈花 七個 硃砂 五厘 共調勻用蟬退 十四個去頭足用肚煎

湯和服即止

雄麝散 治小兒客忤卒然心口刺痛腹大脹滿啼叫欲絕危急之致此方服之即愈

明雄黃 一錢 明乳香 五分 麝香 一分

共研細末每用一二分以雄鷄冠血調服或加灶

心土三錢煎湯和入服之亦可

至寶丹

治小兒大人卒中惡客忤諸癇急驚

生玳瑁屑

一兩

明雄黃

一兩

水飛硃砂

一兩

水飛生烏犀角

一兩

麝香

二錢

冰片

二錢

牛黃

五錢

銀箔

五十張

金箔

五十張

用安息香一兩五錢研細無灰酒飛

去粗渣沙石再漫火熬成膏將前藥研極細如麵

和安息膏為丸芡實大如管不敷加煉蜜亦可如

遇此症虛人用參湯化服二三丸小兒釣藤薄荷

湯化服一二丸

惺惺散

治小兒變蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

人參 五分 於朮 一錢 雲苓 一錢 甘草 一錢 花粉 一錢

白芍 一錢 桔梗 一錢 細辛 二分 五厘

其研粗末每用三錢薄荷葉一片煎服即愈有驚

加鈎藤勾五個蟬退肚七個如神

定驚神丹 治小兒急慢驚風

硃砂 五錢 輕粉 五錢 麝香 三分 大黃 三錢

其研極細青蒿虫研爛為丸金箔為衣每服三分

水鑑方 治小兒百日内忽作寒熱服寒藥反吐乳

服熱病益加有於石室得秘術歌曰桃花陰末一

錢餘甘草衝湯力更殊蘭花只須一二朶灌之入

口立消除此症用百合花亦妙

治小兒吐乳方

竈心土 三錢 白蔻仁 五粒 水煎服即愈

治小兒先受熱後受暑發熱方

谷精草 五錢 水煎服即愈 吐加竈心土二錢

治小兒赤遊神方

馬齒莧 亦名安樂菜 搗汁調青黛末輕粉少許敷

之即消

又方用症治全生方鮮草，膏敷之更妙神效

無比

又方用瓦花搗爛敷之亦可

治小兒天泡瘡方

藍靛和大黃末黃柏末敷之即愈

治小兒膿耳紅腫耳底疼痛方

蛇退一條 桑螵蛸一錢 射香一分 冰片一分

其研細末先用棉攪出耳內膿水吹藥少許即愈

止痛

治小兒口瘡方

馬蘭菜根一兩 生甘草三錢 青黛二錢

煎水洗口舌內服五福化毒丹即愈方見前

預解毒痘方 又名稀痘丹

綠豆 半升 赤小飯豆 半升 馬吃大黑豆 半升 生甘

草 一兩 煎濃汁和飛硃砂二分每遇出痘之時先

與小兒服一二次其三豆皆可吃出痘必輕屢驗
真稀痘第一方也

又稀痘方 五六月夏熱之時服二三次

金銀花 一兩 生甘草 三錢

煎濃汁和白蜜開水冲服神效無比

又方

燒肉與小兒常服真妙不可言

慈航集
三元普濟方
卷四

吳下有耀齋刻

氏藏終

三因極一病證方論卷五

宋青田鶴溪陳言無擇編

五運論

夫五運六氣乃天地陰陽運行升降之常道也五運
流行有太過不及之異六氣升降則有逆從勝復之
差凡不合於德化政令者則為之變青皆能病人故
經云六經波蕩五氣傾移太過不及專勝兼并所謂
治化人應之也或遇變青聿興災沴涸鬱發以亂其
真常之德而致折復隨人藏氣虛實而為病者謂之

時氣與夫感冒中傷天行疫疹類然不同前哲知夫
天地有餘不足違戾之氣還以天道所生德味而午
治之經論昭然人鮮留意恐成湮沒故叙而紀之

五運時氣民病證治

凡遇六壬年發生之紀歲未太過風氣流行脾土受
卯民病飧泄食減體重煩冤腸鳴脇支滿甚則忽
喜怒眩冒巔疾為金所復則反脇痛而吐甚則冲陽
絕者死

苓朮湯

治脾胃感風飧泄注下腸鳴腹滿四肢重

滯忽上喜怒眩冒巔暈或左脇偏痛

秋風熱

白茯苓 厚樸姜汁製妙 白朮 青皮 炮姜

半夏滑去 草果皮去 炙草各等分

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片棗二枚煎

七分去滓空心服之

凡遇六戊年赫曦之紀歲火太過炎暑流行肺金受
邪民病痰癯少氣欬喘血溢泄瀉噎燥耳聾中熱肩
背熱甚則胸中痛脇支滿背解并兩臂痛身熱骨痛
而為浸淫為水所復則反詬妄狂越欬喘息鳴血溢
泄瀉不已甚則太淵絕者死

麥門冬湯 治肺經受熱上氣咳喘咯血痰壅噎乾

耳聾泄瀉胸脇滿痛連肩背兩臂膊疼

痛息高

麥門冬心去

香白芷

製半夏

青竹葉

鍾乳粉

素白皮

紫苑去

熟人參

各等分

右咬咀每服四錢水一盞半夏二片棗一枚煎

七分去滓空心服

凡遇六甲年敦阜之紀歲土太過雨濕流行腎水受
邪民病腹痛清厥意不樂體重煩寃甚則肌肉痿足
痿不收脰善瘕脚下痛中滿食減四肢不舉為風所
復則反腹脹溇泄腸鳴甚則太谿絕者死

附子山茱萸湯

治腎經受濕腹痛寒厥足痿不收

腰膝疼痛行步艱難食則中滿食

不下或腸鳴溏泄

附子

萸肉

各一兩

木瓜

烏梅

各半兩

半夏

丁香

減半

肉果

各三兩

藿香

一分

右咬咀每服四錢水一盞半姜七片棗一枚煎

七分去滓溫心服

凡遇六庚年堅成之紀歲金太過燥氣流行肝木受邪民病脇與小腹痛目赤眦傷痒耳無聞體重煩寃胸痛引背脇滿引小腹甚則喘欬逆氣背肩尻陰股

膝髀膕胫足痛為大所復則暴痛脚脇不可反側欬
逆甚而血溢甚則太衝絕者死

牛膝木瓜湯 治肝虛遇歲金燥濕更勝脇連小腹

拘急疼痛耳聾目赤欬逆肩背連尻

及陰股膝髀脇胫皆痛悉主之

牛膝酒浸

木瓜各一兩

芍藥

杜仲姜製去絲炒

枸杞

黃松節

兔絲子酒浸

天麻各三分

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片棗一枚煎

七分去滓空心服

凡遇六丙年流衍之紀歲水太過寒氣流行邪害心
大民病心煩身熱躁悸陰厥上中下俱寒謔妄心痛
甚則腹大臃腫喘欬寢汗憎寒上氣為土所復則反
腹滿腸鳴溇泄食不化渴而妄冒甚則神門絕者死
川連茯苓湯 治心虛為寒冷所中身熱心躁手足

反寒心腹腫痛喘欬自汗甚則大腸
便血

黃連

茯苓

各一兩

麥門冬

去心

通草

車前子

炒

遠志

去心姜汁製
炒各半兩

半夏

黃芩

炙甘草

各一分

右咬咀每服四錢水一盞半姜七片棗一枚煎七分去滓空心服

凡遇六丁年委和之紀歲木不及燥乃盛行民病中清腰脇小腹痛腸鳴澹泄為火所復則反寒熱瘡瘍瘰癧腫欬而鼻

後蓉牛膝湯

治肝虛為燥所熱傷腰脇并小腹痛

腸鳴澹泄或發熱徧體瘡瘍欬嗽肢

滿鼻衄

肉蓯蓉

酒浸

懷牛膝

酒浸

乾木瓜

白芍藥

熟地

當歸身

炙甘草

各等分

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片烏梅半個
煎七分去滓空心服筋痿脚弱加鹿角屑同煎
凡遇六癸年伏明之紀歲火不及寒乃盛行民病胸
滿痛脇支滿膺背肩髀兩臂內痛鬱冒朦昧心痛暴
瘖甚則屈不能伸髀髀攣痛為土所復則反鶩溲食
飲不下寒中腸鳴泄注腹痛暴攣痿痺足不能任身
黃芪茯苓神湯 治心虛挾寒心胸中痛兩脇連肩背
肢滿噎塞鬱冒朦昧髀髀攣痛不能
屈伸或下利溲泄飲食不進腹痛手
足痿痺不能任身

心卷仁

黃芪

茯神

遠志

法去心姜炒

紫河車

酸棗

仁炒等分

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片棗一枚煎

七分去滓空心服

凡遇六已年卑監之紀歲土不及風氣盛行民病飡泄霍亂體重腹痛筋骨繇併肌肉暱酸喜怒不常為金所復則反胸脇暴痛下引小腹善太息氣客於脾食少失味

白朮厚朴湯

治脾虛為風冷所傷心腹脹滿疼痛

四肢筋骨重弱肌肉暱動痠廝善怒

霍亂吐瀉或胸脇暴痛下引小腹

善太息食少失味

白朮

厚朴製姜

半夏

桂心

藿香

青皮

乾姜炮

甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半夏三片棗一枚煎

七分去滓食前溫服

凡遇六乙年從革之紀歲金不及炎火盛行民病肩背脊重嘔噎便血注下為水所復則反頭腦戶痛延及腦頂發熱口瘡心痛

紫苑湯

治肺虛感熱欬喘滿自汗衄血肩背脊

重便血注下或腦戶連腦頂痛發熱口瘡

心痛

紫苑茸 白芷 人參 甘草 地骨皮

杏仁

桑皮

各各等分

右咬咀每服四錢水盞半棗一枚姜三片煎七

分去滓空心服

凡遇六辛年涸流之紀歲水不及濕乃盛行民病腫
滿身重濡泄寒瘍腰股膈膈膝痛不便煩寃足痿清
厥脚下痛甚則跗腫腎氣不行為木所勝則反面色
時變筋骨并臂肉瞶瘖目視瞢瞢肌肉胗發熱并膈

黃芪
白芷

中痛干心腹

五味子湯

治腎氣虛卧坐湿地腰膝重着疼痛腹

脹滿濡泄無度行步艱難足痿清厥甚

則浮腫面色不常或筋骨并臂矐瘵目

瞋、膈中及咽痛

五味子

附子

巴戟

鹿茸

燎去毛
酥炙

山茱萸

熟苧

杜仲

姜汁浸
各等分

右咬咀每服四錢水一大盞姜七片鹽少許煎

七分去滓食前服以效為度

凡六壬六戌六甲六庚六丙之歲乃水火土金水太

過為五運先天六丁六癸六巳六乙六辛之歲乃木
火土金水不及為五運後天民病所感治之各以五
味所勝調和之以平為期

六氣叙論

夫陰陽升降在天在象上下有位左右有紀地理之
應標本不同氣應異象逆順變生太過不及悉能病
人世謂之時氣者皆天氣運動之所為也今能次地
理為本氣然後以天氣加臨為標有勝有復隨氣主
治則悉見病源矣

本氣論

自大寒後至春分 厥陰風木為一主氣

春分至小滿 少陰君火為二主氣

小滿至大暑 少陽相火為三主氣

大暑至秋分 太陰濕土為四主氣

秋分至小雪 陽明燥金為五主氣

小雪至大寒 太陽寒水為六主氣

凡一氣所管六十日八十七刻半為本氣後以天之

六氣臨御觀其逆後以藥調和使上下合德氣無相

奪此天地之紀綱變化之淵源不可不深明之

六氣時行民病証治

辰戌之歲太陽寒水司天太陰濕土在泉氣化運行
先天

初之氣乃少陽相火加臨厥陰風木民病瘟疫身熱
頭痛嘔吐肌腠瘡瘍

二之氣陽明燥金加臨少陰君火民病氣鬱中滿

三之氣太陽寒水加臨少陽相火民病寒反熱中癰
疽注下心熱脅悶

四之氣厥陰風木加臨太陰濕土風濕交爭民病大
熱少氣肌肉痿足痿注下赤白

五之氣少陰君火加臨陽明燥金民病迺舒

終之歲太陰濕土加臨太陽寒水民病慘淒孕死
治法宜甘溫以平水酸苦以補火抑其運氣扶其不
勝

靜順湯

治辰戌之歲太陽寒水司天太陰濕土在

泉民病身熱頭痛嘔吐氣鬱中滿脅悶少

氣足痿注下赤白肌腠瘡瘍發癰疽

白茯苓

寧小瓜

各一兩

訶子肉

懷牛膝

酒浸

炙甘草

炮乾姜

各半兩

川附子

分

防風

兩半

右咬咀每服四錢水一盞半煎七分去滓空心

服

其年自大寒至春分宜去附子加枸杞半兩自
春分至小滿依前八附子枸杞自小滿至大暑
去附子木瓜乾姜加人參地榆枸杞白芷生姜
各三分自大暑至秋分依正方加石榴皮半兩
自秋分至小雪依正方自小雪至大寒去牛膝
加當歸芍藥阿膠炒各三分

郊酉之歲陽明燥金司天少陰君火在泉氣化運行
後天

初之氣太陰濕土加臨厥陰風木此下尅上民病中
濕腫脹面目浮腫善上氣衄嚏欠嘔吐小便黃赤

甚則淋

二之氣少陽相火加臨少陰君火此臣居君位民病疫癘大至善暴死

三之氣陽明燥金加臨少陽相火此下尅上民病燥熱交合涼風間發寒熱頭痛作渴

四之氣太陽寒水加臨太陰濕土此下土尅上水民病暴仆振慄譫妄少氣咽乾引飲心痛癰腫瘡瘍寒瘡骨痿便血

五之氣厥陰風木加臨陽明燥金民病氣不和

終之氣少陰君火加臨太陽寒水此下尅上民病溫

治法宜鹹寒以抑火辛甘以助金汗之清之散之安其運氣

審平湯

治外酉之歲陽明司天少陰君火在泉病

者中熱面浮鼻腫鼻嚏小便黃赤甚則淋或癘氣行善暴仆振慄譫語寒瘧癰腫便

血

遠志

去心姜製炒

檀香

各一兩

天門冬

心法

生姜

山茱萸

各三分

白朮

白芍

甘草

炙

右咬咀每服四錢水一盞半煎七分去渣食前

服

自大寒至春分加白茯苓半夏紫蘇生姜各半兩

自春分至小滿加玄參白微各半兩

自小滿至大暑去遠志白朮山萸肉加丹參澤

瀉各五錢

自大暑至秋分去遠志白朮加酸棗仁車前子

各半兩

自秋分至大寒並依正方

寅申之歲少陽相火司天厥陰風木在泉氣化運行

先天

初之氣少陰君火加臨厥陰風木民病濕厲氣拂於

上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠生瘡

二之氣太陰濕土加臨少陰君火民病熱鬱欬逆嘔吐胸臆不利頭痛身熱昏憤膿瘡

三之氣少陽相火加臨少陽相火民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔衄血渴欠喉痺目赤善暴死

四之氣陽明燥金加臨太陰濕土民病胸滿身重

五之氣太陽寒水加臨陽明燥金民避寒邪君子周

密

終之氣厥陰風木加臨太陽寒水民病閉閉不禁心痛陽氣不藏而欬

治法宜鹹寒平其上辛溫治其內宜酸滲之泄之清之發之

升明湯

治宣申之歲少陽相火司天厥陰風木在

泉病者氣鬱熱血溢目赤欬逆頭疼嘔吐

胸臆不利聾瞑作渴身重心痛陽氣不藏

瘡癩煩躁

紫檀香

車前子

炒

小青皮

製半夏

酸棗仁

炙甘草

生水薑

蓄藤

各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎七分去滓空心

服

自大寒至春分加白薇玄參各半兩

自春分至小滿加丁香一錢

自小滿至大暑加漏蘆升麻赤芍藥各半兩

自大暑至秋分加茯苓兩半

自秋分至小雪依正方

自小雪至大寒加五味子兩半

丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉氣化運行

後天

初之氣厥陰風木加臨厥陰風木民病血溢筋絡拘

強關節不利身重筋痿

秋農默識

二之氣少陰君火加臨少陰君火民病溫厲盛行遠
近咸若

三之氣太陰濕土加臨少陽相火民病身重跗腫胸
腹滿

四之氣少陽相火加臨太陰濕土民病膝理熱血暴
溢心腹脹滿寒瘧甚則肘腫

五之氣陽明燥金加臨陽明燥金民病皮膚寒氣及
體

終之氣太陽寒水加臨太陽寒水民病關節禁固腰
膝痛

治法用酸以平其上甘溫以治其下以苦燥之溫之甚則發之泄之贊其陽火令禦其寒

備化湯

治丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在

泉病者關節不利筋脉拘急身重痿弱或

瘟癘盛行遠近咸若或胸膈腹滿甚則浮

腫寒瘡血溢腰膝痛

宣木瓜

雲茯苓

去木各一兩

懷牛膝

酒浸

附子

炮去皮臍各三分

乾地黄

覆盆子

各半兩

甘草

一分

生姜

三分

右咬咀每服四大錢水一盞半煎七分去滓食

遠服

自大寒至春分依正方

自春分至小滿去附子加天麻防風

各半兩

自小滿至大暑加澤瀉

三分

自大暑至秋分至小雪小雪至大寒並依正方

子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉氣化運行

先天

初之氣太陽寒水加臨厥陰風木民病關節禁固腰

腫痛中外瘡瘍

二之氣厥陰風木加臨少陰君火民病淋目赤氣鬱

而熱

三之氣少陰君火加臨少陽相火民病熱厥心痛寒熱更作喘欬目赤

四之氣太陰濕土加臨太陰濕土民病黃疸欬衄噎乾吐飲

五之氣少陽相火加臨陽明燥金民乃安康伏邪於春為瘡

終之氣陽明燥金加臨太陽寒水民病上腫欬喘甚則血溢下連小腹而作寒中

治法宜鹹以平其上苦熱以治其內鹹以與之苦以

發之酸以收之

正陽湯

治子午之歲少陰君火司天陽明燥金在

泉病者關節禁固腰痛氣鬱而熱小便淋
目赤心痛寒熱更作欬喘或鼻衄嗝乾吐
飲發黃痺喘甚則連小腹而作寒中悉主
之

白薇

玄參

川芎

桑皮

矣

當歸

芍藥

旋覆花

甘草

生姜

右呔咀每服四錢水一盞半煎七分去滓空

心服

自大寒至春分加杏仁升麻各半

自春分至小滿加茯苓車前子各半

自小滿至大暑加杏仁麻仁各二

自大暑至秋分加荆芥茵陳各一

自秋分至小雪依正方

自小雪至大寒加紫蘇子兩半

巳亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉氣化運行

後天

初之氣陽明燥金加臨厥陰風木民病寒寒當痛干右

脇下寒

二之氣太陽寒水加臨少陰君火民病熱中

三之氣厥陰風木加臨少陽相火民病淚出耳鳴掉

眩

四之氣少陰君火加臨太陰濕土民病黃瘡跗腫

五之氣太陰濕土加臨陽明燥金燥濕相勝寒氣及

體

終之氣少陽相火加臨太陽寒水此下水尅上火民

病瘟癘

治法宜用辛涼以平其上鹹寒調其下畏火之氣無

妄犯之

敷和湯

治己亥之歲厥陰風木司天少陽相火在

泉病者中熱而反右脇下寒耳鳴淚出掉

眩燥濕相搏民病黃痺浮腫時作溫癘

半夏

茯苓

枳實

炒

橘紅

炮姜

酸棗仁

訶子

炮去核

炙草

五味子

各五錢

右咬咀每服四錢水一盞半煎七分去渣空心

服

自大寒至春分加鼠粘子

一分

自春分至小滿加麥門冬

去心 山藥

各一分

自小滿至大暑加紫苑

一分

自大暑至秋分加澤瀉山梔仁各一

自秋分至小雪小雪至大寒並依正方

六氣凡例

凡六氣數起於上而終于下歲半之前自大寒後天氣主之歲半之後自大暑後地氣主之上下交互氣交主之司氣以熱用熱無犯司氣以寒用寒無犯司氣以涼用涼無犯司氣以溫用溫無犯司氣同其主亦無犯其主則少犯之謂之四畏若天氣反時可依時及勝其主則可犯以平為期不可太過也