

第八冊

古今名醫驗方類編

上海大東書局印行

中華民國二十五年七月初版

古今名醫驗方類編

◆（全八冊實價國幣五元）

(外埠酌加郵費匯費)

編選者

曹繩

彦


上海北福建路三三一號

汎
駿

聲

發行人

總發行所



分發行所

南廣西安州頭徐
津沙長慶南雲南
平北濟口漢南南
陽潘常州梧杭州
封開無錫門廈陽信
坡嘉新

大東書局

發行人
印刷所
總發行所

沈 上海北福建路三三一號

駿 上海北福建路三三一號

大 上海北福建路三三一號

東 上海北福建路三三一號

書 上海北福建路三三一號

局 上海北福建路三三一號

局 上海北福建路三三一號

書 上海北福建路三三一號

局 上海北福建路三三一號

局 上海北福建路三三一號

(瑰 章 者 對 校 書 本)

今
名
醫
驗
方
類
綱
目
錄

卷二十九 中部

腰痛門	卷二十九 中部
腰痛脾痛	一
腰腹諸痛	一
腰脚風痛	一
腰脚疼痛	一
腰痛脚氣	一
腰脚錐痛	一
腎臟風壅	一
腰脚冷痺	一
腰脚風氣	一
卒腰脊痛	一
腰脚無力	一
腰膝疼痛	一
腰痛不止	一
反腰血痛	一
髮痕腰痛	四
打墜腰痛	四
攬腸沙痛	五
腰腰疼痛	二
冷氣腰痛	二
腎虛腰痛	三
虛寒腰痛	三
陰虛腰痛	三
久疹腰痛	三
濕氣腰痛	四
寒濕腰痛	四
腰痛如刺	四
腰痛難轉	四
腰重作痛	四
老人腰痛	四
項下熱腫	五
背腫如盤	五
頸項強硬	五
虛寒積癥	五
腹痛門	五
婦人腰痛	四
腰重刺脹	四
氣濕脾痛	四
風冷傷腎	五
腰痛揩牙	五
緩益腰膝	五
肩背門	五
虛火背熱	五
背腿間痛	五
項強筋急	五
卒然腰痛	二

肩背門

閃挫腰痛	四
婦人腰痛	四
氣濕脾痛	四
風冷傷腎	四
腰重刺脹	四
腰痛揩牙	五
緩益腰膝	五
肩背門	
虛火背熱	五
背腿間痛	五
項強筋急	五
項下熱腫	五
背腫如盤	五
頸項強硬	五
虛寒積癥	五
腹痛門	
攬腸沙痛	五

腹痛門

閃挫腰痛	四
婦人腰痛	四
氣濕脾痛	四
風冷傷腎	四
腰重刺脹	四
腰痛揩牙	五
緩益腰膝	五
肩背門	
虛火背熱	五
背腿間痛	五
項強筋急	五
項下熱腫	五
背腫如盤	五
頸項強硬	五
虛寒積癥	五
腹痛門	
攬腸沙痛	五

小腹痛滿	六	脾痛不止	七
冷熱腹痛	六	急吐疼痛	七
冷氣腹痛	六	腹痛脹滿	七
腹中虛痛	六	少小腹痛	七
腹中冷痛	六	腹脹脈數	七
腹痛熱滿	六	腹中脹滿	七
小腹熱痛	六	腹脹積聚	八
卒患腹痛	六	腹中緊脹	八
內鈎腹痛	六	中滿腹脹	八
陰毒腹痛	六	胸腹脹滿	八
陰證腹痛	七	腹痛痙攣	八
蠍蟲腹痛	七	食果腹脹	八
鬼疰腹痛	七	老幼腹脹	八
蠍疰腹痛	七	癲瘇腹脹	八
惡疰腹痛	七	腹中瘕氣	八
臍下絞痛	七	腹中痞積	八
女人腹痛	七	腹中積滯	九
留飲腹痛	七	腹中血塊	九
心腹氣痛	七	心腹惡氣	九
腸痛如打	七		
脾痛不止	七	水蟲腹大	九
急吐疼痛	七	腹大如箕	九
腹痛脹滿	七	小腹堅大	九
少小腹痛	七	脾溫腫滿	九
腹脹脈數	七	腹皮癰癧	九
腹中脹滿	七	腹冷氣起	九
腹脹積聚	八	陰冷入腹	九
腹中緊脹	八	腹中虛冷	九
中滿腹脹	八	虛冷短氣	九
胸腹脹滿	八	元臟虛冷	九
腹痛痙攣	八	元臟積冷	一〇
食果腹脹	八	轉筋入腹	一〇
老幼腹脹	八	腸胃生癰	一〇
癲瘇腹脹	八	腹癰有膿	一〇
腹中瘕氣	八	臍蟲怪病	一〇
腹中痞積	八	育腸氣痛	一〇
腹中積滯	九	惡風入腹	一〇
腹中血塊	九	少腹絞痛	一〇
心腹惡氣	九		
寸白蟲病	一〇	諸蟲門	

蛔蟲攻心	一
心痛有蟲	一
腹中蟲病	一
腹中白蟲	一
腹中長蟲	一
一切蟲病	一
諸蟲在臟	一
小兒蟲病	一
肝勞生蟲	一
制殺諸蟲	一
除三尸蟲	一
蠶下不止	一
熏衣去虱	一
噴虱成癥	一

古今醫學方類編目錄

卷三十 下部

關格門

大小便閉	一
關格脹滿	二
反胃關格	二
氣壅關格	二
癃閉不通	二
下部閉塞	二
下焦結熱	二
正水脹急	三
大小便血	三
產後秘塞	三
利大小便	三
結燥門	
大便壅結	三
大便閉塞	三

大便風秘	三
大便卒結	三
大腸乾結	三
大便不通	三
大便不快	四
大便艱難	四
大腸虛閉	四
相火閉結	四
燥渴腸祕	四
乾糞塞腸	四
熱黃便結	四
老人閉塞	五
大人閉塞	五
人腸冷祕	五
大腸濕悶	五
人腸冷積	五
人腸冷祕	九

痔病祕門	五
大便頻數	五
麻子仁丸	五
腸風下血門	五
腸風瀉血	八
腸風熱毒	八
久近腸風	八
久病腸風	八
脾毒腸風	八
濕痢腸風	八
腸風下蟲	八
臟毒痔漏	八
酒痢腸風	八
臟毒下痢	九
腸風臟毒	九
臟毒下血	九

古今名醫驗方類編

肛門鼠痔	一	痔漏脫肛	一一
十年痔瘻	一	臘毒痔漏	一一
下血成痔	一	上部漏瘻	一一
腸痔下血	一	諸瘻痔漏	一一
腸風痔血	一	下部漏瘻	一一
肛門酒痔	一	一切漏瘻	一一
酒痔下血	一	漏瘻不合	一一
痔瘻如瓜	一	漏瘻水溢	一一
內痔出血	一	漏瘻膿血	一一
蟲痔裏急	一	九瘻有孔	一一
痔瘻有蟲	一	漏瘻惡穢	一一
痔漏出水	一	漏瘻腫核	一一
痔漏腫痛	一	九漏有蟲	一一
痔疽痔漏	一	一切冷漏	一一
腸風痔瘻	一	蟻蛄漏瘻	一一
五痔諸瘻	一	蟻漏不愈	一一
年久痔漏	一	蛇瘻五孔	一一
痔漏出血	一	蛇瘻不愈	一一
久近痔漏	一	槐湯炙痔	一一

古今名醫驗方類編目錄

卷三十一 下部

不禁門

小便不禁	一
小便卒數	一
小便滑數	一
小便頻數	一
心虛尿滑	二
腎消尿數	二
膏痺尿多	二
小便過度	二
小便無度	二
小便尿多	二
老人遺尿	二
男婦遺尿	二
下虛尿床	二
遺尿且澀	二

遺尿淋瀝

夜臥尿床

老人尿閉

婦人遺尿

睡中尿床

老少尿床

止小便利

少小尿床

小閉門

小便不通

小便不利

小便難

小便熱短

小便澀痛

小便不快

小便閉脹

小便虛閉

汗多便闊

相火秘結

老人尿閉

通利小便

小腸結澀

立不得溲

諸淋門

小便淋痛

卒淋不通

小便淋瀦

五種淋症

五淋白濁

沙石淋痛

石淋破血

小便石淋

小便氣淋

血淋尿血

血淋熱痛

今名醫驗方類編

血淋心煩	一〇	小便尿血	一二
男婦淋血	一〇	下焦結熱	一三
老人血淋	一	小便血條	一三
熱淋血淋	一	男婦溺血	一三
小便熱淋	一	尿後鮮血	一三
男女淋疾	一	心熱尿赤	一三
熱淋如血	一	腎消飲水	一三
小便淋瀝	一	直指秋石丸	一三
小便渾濁	一	赤白濁門	一四
急淋陰腫	一	小便赤濁	一四
冷淋莖痛	一	小便白濁	一四
婦人患淋	一	腎虛白濁	一四
熱淋莖痛	一	氣虛白濁	一四
老人病淋	一	虛勞白濁	一四
妊娠患淋	一	濕痰白濁	一四
膏淋如油	一	尿渾白濁	一五
膏消膏淋	一	脾虛白濁	一四
膏淋如油	一	尿渾白濁	一五
胞轉淋閉	一	白濁滿腹	一四
尿血不定	一	白濁夢遺	一五
		小便如脂	一五
		漏精白濁	一六
		漏精白濁	一六
		夢遺白濁	一六
		精滑不禁	一六
		小便遺精	一六
		盜汗遺精	一六
		虛滑遺精	一六
		腎虛失精	一六
		腎虛遺精	一六
		驚悸遺精	一六
		內熱遺精	一五
		遺精門	一五
		分清丸	一五
		尿白如注	一五
		溲數白濁	一五
		濁遺帶下	一五
		赤白濁淋	一五
		白濁頻數	一五
		濁遺帶下	一五

今古名醫驗方類編目錄

卷三十二 下部

男陰門

陰下懸癰	一	男陰卒腫	一	風冷傷腎	二	腎邪冷氣	一
下部懸癰	一	陰腫如斗	三	陰頭疳瘡	二	陰頭生瘡	四
陰囊濕痒	一	陰腫痛痒	三	陰上粟瘡	五	下疳陰瘡	四
腎囊風痒	一	時疾陰腫	三	男女下疳	五	妬精陰瘡	五
囊瘡痒痛	二	陰囊腫痛	三	跨上便毒	五	下疳頭瘡	五
玉莖濕痒	二	腎莖腫痛	三	便毒初起	五	陰頭瘡	四
陰濕瘡疮	二	水注囊腫	三	囊濕精少	六	陰頭瘡	四
陰囊濕瘡	二	勞復卵腫	三	魚口毒瘡	六	陰頭瘡	四
陰下痒痛	二	外腎偏腫	三	陰毒腹痛	六	陰頭瘡	四
陰痒生瘡	二	陰腫極痛	三	陰毒卒腫	六	陰頭瘡	四
下焦虛冷	二	房勞陰毒	七	男女陰毒	七	陰頭瘡	四
陰虱作痒	二	陰潰瘍腫	三	陰痿陰汗	七	陰頭瘡	四
陰冷發悶	二	陰疽腫毒	四	陽事不起	七	陰頭瘡	四
陰冷入腹	二	外腎陰瘡	四	腎虛陰痿	七	陰頭瘡	四

今名醫驗方類編

陰寒痿弱	七	腎黃如金	一〇
陽虛陰痿	七	交接勞復	一〇
腎虛精竭	七	腎中無陽	一〇
老人腎硬	八	男子臟冷	一〇
玉莖強中	八	仙靈脾酒	一〇
男女轉脬	八	鹿茸酒	一〇
小便出血	八	秘精益髓	一〇
便癰腫痛	八	脚氣欲吐	一三
陰陽易病	八	脚氣衝心	一三
腎氣作痛	九	補腎興陽	一〇
本臟氣發	九	益助陽氣	一〇
腎氣上噦	九	補益老人	一〇
外腎偏疼	九	壯陽益腎	一〇
下部諸疾	一〇	補精潤肺	一〇
腎臟風瘡	一〇	補益腎氣	一一
陽虛不足	一一	強筋健髓	一一
紫金藤丸	一二	脚氣脛痛	一四
補骨脂丸	一二	脚氣濕瘡	一四
腳氣	一二	酒患腳氣	一四
新久腳氣	一五	水氣腳氣	一四
腰痛腳氣	一五	腳氣成漏	一四
飛絲縫陰	一〇〇	玉莖作痛	一〇〇
砂礆損陰	一〇〇	腎風下疰	一〇〇
寒濕腳氣	一一二	脚氣門	一一二
腳氣	一二		

脚氣上攻	一五	風氣腳弱	一六
男婦腳氣	一五	風毒膝攀	一六
老人腳氣	一五	腰腳疼痛	一六
風濕膝痛	一五	腰腳無力	一七
疏導腳氣	一五	腳筋攣痛	一七
消除腳氣	一五	水病腳腫	一七
風冷腳氣	一五	腳肚生瘡	一九
足趾門		腳上臭瘡	一九
腳心腫痛	一六	脚肚青瘡	一九
腳腿紅腫	一六	足上凍瘡	一九
風濕腳痛	一六	足瘡生蟲	一九
背腿間腫	一六	凍瘡坼裂	一九
病後足腫	一六	戶脚坼裂	一九
腰脚冷痺	一六	鵝眼肉刺	一九
腎水流注	一六	脚跟腫痛	二〇
濕熱足腫	一六	嵌甲作痛	二〇
膝風疼痛	一六	指甲作瘡	二〇
股癰瘻瘻	一八	割甲成瘡	二〇
濕瘡脚腫	一八		

足趾甲疽	一一〇
婦人甲疽	一一一
足釘怪疾	一一一
遠行足趼	一一一
脚弱病人	一一一
山行辟蛭	一一一
脚軟且疼	一一一
肝虛轉筋	一一一
海水傷裂	一一一
脚瘡夏發	一一一

古今名醫驗方類編卷一十九

中部

腰痛門

●腰痛脾痛

【本草方】砒霜成塊者爲末黃丹各半兩化蠟入砒以柳條攬焦則換至七條入起收之每旋丸

梧子大冷水送下

●腰腹諸痛

【集元方】焰硝雄黃各一錢研細末每點少許入

【千金方】新胡麻熬香杵末日服一小升服至一斗永瘥溫酒蜜湯薑汁皆可下

皆內名火龍丹

●腰脚疼痛

【壽域神方】甜瓜子三兩酒浸十日爲末每服三錢空心酒下日三

●腰脚風痛

【衛生易簡方】天麻半夏細辛各二兩絹袋二個

【千金方】不能履地皂角子一千二百個洗淨以

各盛藥令勻蒸熟交互熨痛處汗出則愈數日再熨

【千金方】用威靈仙末空心溫酒服一錢逐日以

微利爲度 經驗方用威靈仙一斤洗乾好酒浸七日爲末麪糊丸梧子大以浸藥酒每服二十丸

少酥蒸香爲末蜜丸梧子大每空心以蒺藜子
酸棗仁湯下三十九

●腰痛脚氣

【正要方】木瓜湯治腰膝痛脚氣羊肉一脚草果

五枚粳米二升回回豆即胡豆半升木瓜二斤

取汁入砂糖四兩鹽少許煮肉食之

●腰脚錐痛

【永類鈐方】支腿者貓兒屎燒灰唾津調塗之

●腎臟風壅

【集驗方】腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大溫酒

服八十九平明微利惡物如青膿膠即是風毒

積滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一

月仍常服溫補藥孫兆方名放杖丸

●腰脚冷痺

【聖惠方】疼痛有風川烏頭三個生去皮臍爲散
醋調塗帛上貼之須臾痛止

【唐德宗真元廣利方】行履不穩者草薢二十四

分杜仲八分搗篩每旦溫酒服三錢七禁牛肉

【聖惠方】石花浸酒飲之

【圖經本草】腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者取

茄子五十斤切洗以水五斗煮取濃汁瀝去渣

更入小鑷中煎至一升以來即入生粟粉同煎

令稀稠得所取出搜和更入麝香硃砂末同丸

如梧子大每日用秫米酒送下三十九近暮再

服一月乃瘥男子女人通用皆驗

●腰脚風氣

【崔元亮海上方】作痛大黃二兩切如棋子和少
酥炒乾勿令焦搗篩每用二錢空心以水三大

●卒腰脊痛

【梅師方】不能轉側鹿角五寸燒赤投二升酒中浸一宿飲

●腰膝疼痛

【經驗方】或頑麻無力兔絲子洗一兩牛膝一兩

同入銀器內酒浸一寸五分曝爲末將原酒煮

糊丸梧子大每空心酒服三二十九

【發明】頌曰古方多用海桐皮浸酒治風蹶南唐

筠州刺史王紹顏撰續傳信方云頃年予在姑

孰得腰膝痛不可忍醫以腎臟風毒攻刺諸藥

莫療因覽劉禹錫傳信方備有此驗修服一劑

便減五分其方用海桐皮二兩牛膝芎藭羌活

酒二斗浸之冬二七夏一七空心飲一盞每日

早午晚各一次長令醺醺此方不得添減禁毒

食

【續千金方】傷敗者鹿茸塗酥炙紫爲末每酒服

一錢

●腰脚無力

【崔元亮海上方】用韭子一升揀淨蒸兩炊久曝

乾去黑皮炒黃搗粉安息香二大兩水煮一二

百沸慢火炒赤色和搗爲丸梧子大如乾入少

蜜每日空腹酒下三十九以飯三五匙壓之大

佳

【發明】宏景曰相傳有人患腰脚弱往栗樹下食

數升卽能起行此是腎補之義然應生噉若服

餌則宜蒸曝之

【崔元亮海上方】腰脚不遂牽急冷痛取虎脰骨

五六寸刮去肉膜塗酥炙黃搗細絹袋盛之以

瓶盛酒一斗浸之塘火微溫七日後任性飲之

當微利便效也 又方虎腰脊骨一具前兩脚

全骨一具並於石上以斧槌碎安鐵床上文炭

火炙待脂出則投無灰濃酒中密封春夏七日

秋冬三七日任性日飲三度患十年以上者不

過三劑七年以下者一劑必瘥

●腰脊脹痛

【外臺祕要】蒺藜子搗末蜜和丸胡豆大酒服一

丸日三服

【摘元方】芥子末調酒貼之立效

【千金方】三月三日取桃花一斗一升井華水三

斗麴六升米六斗炊熟如常釀酒每服一升日

三服神良

●卒然腰痛

【延年祕錄】大豆六升水拌濕炒熱布裹熨之冷

卽易乃張文仲所處方也

【肘后方】不可俛仰用鼈甲灸研末酒服方寸七

日二

●腎腰疼痛

【肘后方】生葛根嚼之嚥汁取效乃止

●冷氣腰痛

【本草方】元胡索桂心當歸三味等分爲末溫酒

服三四錢隨量頻進以止爲度遂痛止蓋元胡

索能活血化氣第一品藥也其後趙待制霆因

氣滯腰痛

【聖惠方】青木香乳香各二錢酒浸飯上蒸均以酒調服

【許學士本事方】牽牛不拘多少以新瓦燒赤安

於上自然一半生一半熟不得撥動取末一兩

入硫黃末二錢半同研勻分作三分每分用白

麪三匙水和捍開切作棋子五更初以水一盞

煮熟連湯溫下痛卽已未注隔日再作予常有

此疾每發一服痛卽止

●腎虛腰痛

【經驗方】用破故紙一兩炒爲末溫酒服三錢神

妙或加木香一錢 和劑局方青娥丸治腎氣

虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不

【崔元亮海上集驗方】用杜仲去皮炙黃一大斤
分作十劑每夜取一劑以水一大升浸至五更
煎三分減一取汁以羊腎三四枚切下再煮三
五沸如作羹法和以椒鹽空腹頓服 聖惠方
入薤白七莖 篓中方加五味子半斤

【千金方】枸杞根杜仲萆薢各一斤好酒三斗漬

重墜用破故紙酒浸炒一斤杜仲去皮薑汁浸
炒一斤胡桃肉去皮二十個爲末以蒜搗膏一
兩丸如梧子大每空心溫酒服二十九婦人淡
醋湯下常服壯筋骨活血脈烏髭鬚益顏色

【戴原禮要訣】茴香炒研以豬腰子批開繆末入

內濕紙裹煨熟空心食之鹽酒送下

之器中密封鍋中煮一日任意飲之

【本草權度】用豬腰子一枚切片以椒鹽淹去腥

水入杜仲末三錢在內荷葉包煨食之酒下

【千金方】用羊腎去膜陰乾爲末酒服二方寸七

日三 正要治卒腰痛羊腎一對咱夫蘭一錢

水一盞浸汁入鹽少許塗抹腎上徐徐炙熟空

腹食之

【心鏡方】用羊脊骨一具槌碎煮和蒜薤食鹽少

酒炒 正要用羊腎骨一具槌碎肉蓯蓉一兩

草果五枚水煮汁下葱薑作羹食

【肘后方】如錐刺不能動搖鹿角屑三兩炒黃研

末空心溫酒服方寸七日三

●虛寒腰痛

【本草方】鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍各

梧子大陰乾每服三五十九溫酒下日三服

●久痲腰痛

二兩鹽花三分爲末棗肉和丸梧子大每服三十丸空心溫酒下 夷堅志云時康祖大夫病心胸一漏數竅流汁已二十年又苦腰痛行則僵仆形神憔悴醫不能治通判韓子溫爲檢聖惠方得此方令服旬餘腰痛減久服遂瘥心漏亦瘥精力倍常步履輕捷此方本治腰而效乃如此

【談壇翁試驗方】糯米二升炒熟搣靠痛處內以

八角茴香研酒服

●陰虛腰痛

【本事方】不能反側鹿茸炙兔絲子各一兩舶茴香半兩爲末以羊腎二對用酒煮爛搗泥和丸

梧子大陰乾每服三五十九溫酒下日三服

●濕氣腰痛

【簡便方】蝦蟆草連根七顆葱白連鬚七顆棗七枚煮酒一瓶常服終身不發

●腰重作痛

【斗門方】檳榔爲末酒服一錢

●寒濕腰痛

【外臺祕要】蒴藋葉火燎厚鋪牀上趁熱眠於上冷復易之冬月取根春碎熬熱用

【本草方】及腿痛用棠棣子鹿茸炙等分爲末蜜丸梧子大每服百丸日二服

●腰痛如刺

●腰痛不止

【簡便方】用八角茴香炒研每服二錢食前鹽湯

【熊氏補遺】天羅布瓜子仁炒焦擂丸酒服以渣

下外以糯米一二升炒熟袋盛拴於痛處活

傅之

人心統思仙散用八角茴香杜仲各炒研三錢

木香一錢水一鍾酒半鍾煎服

【簡便方】橘核杜仲各二兩炒研末每服二錢鹽

●反腰血痛

【簡便方】橘核杜仲各二兩炒研末每服二錢鹽

●腰痛門

【肘后方】桂末和苦酒塗之乾再上

彈子大每嚼一丸熱酒下

●髮痕腰痛

【本草方】南史云宋明帝宮人腰痛牽心發則氣絕徐文伯診曰髮痕也以油灌之吐物如髮引

之長三尺頭已成蛇能動搖懸之滴盡惟一髮爾

●打墜腰痛

【直指方】瘀血凝滯破故紙茴香炒辣桂等分爲

末每熱酒服二錢故紙主腰痛行血

【生生編】冬瓜皮燒研酒服一錢

●閃挫腰痛

【永類鈐方】薜蘿作末酒服二錢七

【玉機微義】趁痛丸用白蒿苔子炒三兩白粟米

炒一撮乳香沒藥烏梅肉各半兩爲末煉蜜丸

【攝生衆妙方】橙子核炒研酒服三錢卽愈

【儒門事親】用獐豬腎一枚批片鹽椒淹過入甘遂末三錢荷葉包煨熟食酒送下

●婦人腰痛

【肘后方】向東囊荷根一把搗汁三升服之

【楊氏產乳】鹿角屑炒黃研酒服方寸七日五六

服

●氣濕脾痛

【聖惠方】腰膝痛用牛膝葉一斤切以米三合於

豉汁中煮粥和鹽醬空腹食之

●腰重刺脹

【本草方】腰背虛痛杜仲一斤切炒酒二升漬十

日日服三合此陶隱居得效方也 三因方杜

仲爲末每日以溫酒服二錢

●腰痛揩牙

【乾坤生意】香附子五兩生薑二兩取自然汁浸

一宿炒黃爲末入青鹽二錢擦牙數次其痛即

止

●緩益腰膝

【杜光庭玉函方】王方平通靈玉粉散治腰膝緩

水臟益顏色其功不可具載硫黃半斤桑柴灰

五斗淋取汁煮三伏時以鐵匙炒於火上試之

伏火即止候乾以大火煅之如未伏再煮以伏

古之醫書卷之二

卷二十九 肩背門

五 大東書局印行

肩背門

●虛火背熱

【摘元方】虛火上行背內熱如火灸者附子末津

調塗涌泉穴

●背腿間痛

【袖珍方】一點痛不可忍者芫花根末米醋調傅之如不住以帛束之婦人產後有此尤宜

●項強筋急

【本事方】不可轉側肝腎二臟受風也用宣州木

飯丸麻子大每空心鹽湯下十九極有效驗鄉人王昭遂服之年九十顏貌如童子力倍常人

瓜二個取蓋去穰沒藥二兩乳香二錢半二味

入木瓜內縛定飯上蒸三四次爛研成膏每用三錢入生地黃汁半盞無灰酒二盞緩化微服

許叔微云有人患此自午後發黃昏時定予謂此必先從足起少陰之筋自足至項筋者肝之合今日中至黃昏陽中之陰肺也自離至兌

陰旺陽弱之時故靈室畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受邪故發於此時予授此及都梁丸服之而愈

●項下熱腫

【丹溪纂要】俗名蝦蟆溫五葉藤搗傅之

●背腫如盤

【主治蘇頌】治背上忽腫如盤不識名者取水中

白石一二盞燒熱投水中頻洗之立瘥

●頸項強硬

【千金方】不得顧視大豆一升蒸變色囊裹枕之

冷鋪生桃葉於內臥席上以項着坑上蒸至汗

出良久即瘥

●虛寒積癧

【濟生方】在背膜之外流於兩脇氣逆喘息久則營衛凝滯潰爲癰疽多致不救用胡椒二百五十粒蠍尾四個生木香二錢半爲末粟米飯丸綠豆大每服二十九橘皮湯下名磨積丸

腹 痛 門

●攬腸沙痛

【濟急方】陰陽腸痛手足冷但身上有紅點以燈

【主治時珍方】用河砂炒赤冷水淬之澄清服一

下小腹痛茴香湯下

二合

●冷氣腹痛

【壽域神方】馬蘭根葉細嚼嚥汁立安

【簡便方】蕎麥麪一撮炒黃水烹服

【本草方】用母豬生兒時拋下糞日乾爲末以白

湯調服

【經驗方】欲死者用馬糞研汁飲之立愈

【聖惠方】童子小便服之卽止

●小腹痛滿

【肘后方】天行病小腹滿不得小便雌黃末蜜丸

納尿孔中入半寸

●冷熱腹痛

【博濟方】疔刺不思飲食山梔子川烏頭等分生

人病令男子取井華水一杯飲之女
人病令男子取井華水一杯飲之

【集簡方】三柰丁香甘草當歸等分爲末醋糊丸

【唐瑤經驗方】吳茱萸二錢搗爛以酒一鍾調之
用香油一盃入鍋煎熱傾茱萸酒入鍋煎一滾取
服立止

●腹中虛痛

【潔古用藥法】白芍藥三錢炙甘草一錢夏月加
黃芩五分惡寒加肉桂一錢冬月大寒再加桂
一錢水二盞煎一半溫服

●腹中冷痛

【肘后方】男子病令女人取井華水一杯飲之女

人病令男子取井華水一杯飲之

梧子大每服三十九酒下

【肘后方】水穀陰結心下停痰兩脇痞滿按之鳴

轉逆害飲食用狼毒三兩附子一兩旋覆花三

兩搗末蜜丸梧子大每服三丸食前白湯下日

三服

【發明】頌曰古方有單服菖蒲法蜀人治心腹冷

氣拘痛者取一二寸搗碎同吳茱萸煎湯飲之

亦將隨行卒患心痛嚼一二寸熱湯或酒送下

亦效

●腹痛熱滿

【孫真人方】以布裹川椒安痛處用熨斗熨令椒

出汗即止

●腹痛熱滿

【子母祕錄】羚羊角燒末水服方寸七

●小腹熱痛

【張傑子母祕錄】青黑或赤色不能喘者苦參一
兩醋一升半煎八合分二服

●卒患腹痛

【本草方】山豆根水研半盞服入口卽定

【肘后方】令人騎其腹溺小便於臍中

●內釣腹痛

【阮氏小兒方】木香乳香沒藥各五分水煎服之

●陰毒腹痛

【本草方】燒酒溫飲汗出則止

【朱肱南陽活人書】厥逆唇青卵縮六脈欲絕者
用葱一束去根及青留白二寸烘熱安臍上以
熨斗火熨之葱壞則易良久熱氣透入手足溫
有汗卽瘥乃服四逆湯若熨手足不溫不可

治

●陰證腹痛

【集簡方】桑椹絹包風乾過伏天爲末每服三錢

熱酒下取汗

【劉氏方】面青甚者鴿子糞一大抄研末極熱酒

一鍾和勻澄清頓服卽愈

【肘后方】交接陰毒腹痛欲死假猪血乘熱和酒

飲之

●蛇蟲腹痛

【龐安常傷寒論】檳榔二兩酒二盞煎一盞分二

服

【外臺方】白鴿糞燒研飲和服之

●蠱疰腹痛

【外臺方】雄貓屎燒灰水服

七分入童子小便三分空心溫服

●永類鈐方

不可忍者獨頭蒜一枚香墨如棗大

搗和醬汁一合頓服

【永類鈐方】不可忍者獨頭蒜一枚香墨如棗大

丸時再服

●臍下絞痛

【千金方】芥子末蜜丸梧子大井華水寅時下七

丸時再服

【食療方】木瓜三片桑葉七片大棗三枚水三升煮半升頓服卽愈

●女人腹痛

【乾坤祕韞】野葡萄根七錢葛根三錢水一鍾煎

【圖經本草】內傷痞刺沒藥末一錢酒服便止

●留飲腹痛

【肘后方】椒目二兩巴豆一兩去皮心熬搗以棗

膏和丸麻子大每服二丸吞下其痛卽止 又
方椒目十四枚巴豆一枚豉十六枚合搗爲二
丸服之卽吐利

●心腹氣痛

【集簡方】烏藥水磨濃汁一盞入橘皮一片蘇一

葉煎服

●腸痛如打

【肘后方】大豆半升熬焦入酒一升煮沸飲取醉

●脾痛不止

【衛生易簡方】荔枝核爲末醋服二錢數服卽愈

●急吐疼痛

【談壇翁試驗方】用本人頭髮三十根燒過酒服
卽以水調芥子末封在臍內大汗如雨卽安

●腹痛脹滿

【金匱要略】厚朴七物湯用厚朴半斤製甘草大
黃各三兩棗十枚大枳實五枚桂二兩生薑五
兩以水一斗煎取四升溫服八合日三嘔者加

半夏五合

●少小腹痛

【千金方】車穀中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

●腹脹脈數

【張仲景金匱要略】厚朴三物湯用厚朴半斤枳

實五枚以水一斗二升煎取五升入大黃四兩
再煎三升溫服一升轉動更服不動勿服

●腹中脹滿

定不吐更服

【後魏書】黑鹽酒服六銖

【外臺祕要】蔓菁子一大合揀淨搗爛水一升和研瀝汁一盞頓服少頃自利或自吐或得汗卽愈

【梅師方】綿裹煨薑納下部冷卽易之

●腹脹積聚

【千金方】葶藶子一升熬以酒五升浸七日日服三合

●腹中緊脹

【子母祕錄】白糖以酒三升煮服之不過再服

●中滿腹脹

【李樓奇方】日食不能暮食用不著鹽水猪血瀝

【經驗方】不拘老小用桂末飯和丸綠豆大吞五

●胸腹脹滿

【崔元亮海上集驗方】欲令瘦者猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸大如梧子服時先喫羊肉兩鬚汁三兩口後以肉汁香藥十九以快利爲度覺得力更服以利清水卽止藥瘥後一月不得食肉及諸油膩

●腹滿癱堅

【外臺祕要】如石積年不損者必效方用白楊木東引枝去粗皮辟風細剉五升熬黃以酒五升淋訖用絹袋盛滓還納酒中密封再宿每服一

合日三服

●食果腹脹

六丸白湯下未消再服

●老幼腹脹

【王氏簡易方】血氣凝滯用此寬腸順氣名四炒

丸商州枳殼厚而綠背者去穰四兩分作四分

一兩用蒼朮一兩同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒一兩用乾漆一兩同炒一兩用茴香一兩同炒黃去四味只取枳殼爲末以四味煎汁煮麪

糊丸梧子大每食後米飲下五十九

●癩痞腹脹

【蘭氏經驗方】及堅硬如盃盤者用水荭花子一

兩另研獨頭蒜三十個去皮新狗腦一個皮硝

四兩石臼搗爛攤在患處上用油紙以長帛束

之酉時貼之次日辰時取之未效再貼二三次

倘有膿潰勿怪仍看虛實日逐間服錢氏白餅

飲數次痞自消

子紫霜丸塌氣丸消積丸利之磨之服至半月甚者一月無不瘥矣以喘滿者爲實不喘者爲

虛

●腹中癥氣

【韋宙獨行方】生芋子一斤壓破酒五斤漬二七

日空腹每飲一升神良

●腹中痞積

【摘元方】水荭花悉心氣疼痛方

【外臺祕要】大黃十兩爲散醋三升蜜二匙和煎

丸梧子大每服三十九生薑湯下吐利爲度

【經驗方】夏秋之交露坐夜久腹中痞如羣石在腹用大豆半升生薑八分水三升煎一升已來

頓服瘥

【衛生易簡方】用觀音柳煎湯露一夜五更空心

【孟詵食療】杏仁桂枝橘皮訶黎勒皮等分爲丸

腹中積滯

每服三十九白湯下無忌

【張子和儒門事親方】烏金石卽鐵炭也三兩自

然銅爲末醋熬一兩當歸一兩大黃童尿浸曬

一兩爲末每服二錢紅花酒一盞童尿半盞同

調食前服日二服

●腹中血塊

【摘元方】血竭沒藥各一兩滑石牡丹皮同煮過

一兩爲末醋糊丸梧子大服之

●腹中蟲病

【食療方】大麻子仁三升東行菜莢根八升清水

平旦服二升至夜蟲下

●心腹惡氣

【藥性論】艾葉搗汁飲之

【張文仲方】惡實微炒一兩爲末麪糊丸梧子大
以雞子二個打開入末在內攪勻紙糊沸湯煮
熟食之日一服連進三服瘳

●腹大如箕

●小腹堅大

【千金方】如盤胸滿食不能消化用麴末湯服方

寸七日三

●脾溫腫滿

【東垣蘭室祕藏】腹脹如鼓喘不得臥海金沙散

●水蠱腹大

【張文仲方】惡實微炒一兩爲末麪糊丸梧子大
每米飲下十九

用海金沙三錢白朮四兩甘草半兩黑牽牛頭末一兩半爲末每服一錢煎倒流水調下得利爲妙

●腹皮麻痺

【危氏方】不仁者多煮葱白食之卽自愈

●腹冷氣起

【續傳信方】白芥子一升微炒研末湯浸蒸餅丸小豆大每薑湯吞十九甚妙

●陰冷入腹

【千金方】有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿日夜

●虛冷短氣

【本草方】川椒三兩去目并合口者以生絹袋盛

浸無灰酒五升中三日隨性飲之

●腹中虛冷

【肘后方】不能飲食食輒不消羸弱生病蒼朮二

末二兩和勻用小砂罐不固濟慢火燒赤乃入

斤麴一斤炒爲末蜜丸梧子大每服三十九米湯下日三服大冷加乾薑三兩腹痛加當歸三兩羸弱加甘草二兩

【肘后方】食輒不消羸瘦弱乏因生百疾大麥蘖五升小麥麵半斤豉五合杏仁二升熬黃香搗篩糊丸彈子大每服一丸白湯下

【斗門方】用生川椒擇去不折者用四十粒以漿水浸一宿令合口空心新汲水吞下久服緩臍腑駐顏黑髮明目令人思飲食

●轉筋入腹

●元臟虛冷

【陳巽方】氣攻臍腹疼痛用礎砂一兩以鐵鬚草

硇在罐內不蓋口加頃火一秤待火盡爐寒取

出用川烏頭去皮臍生研末二兩和勻湯浸蒸

餅丸梧子大每服三丸木香湯醋湯任下日一

服

●腎臟積冷

【聖惠方】氣攻心腹疼痛面青足冷硇砂二兩桃

仁一兩去皮酒一小盞煎硇十餘沸去砂石入桃仁泥旋旋煎成膏蒸餅和丸梧子大每熱酒下二十九

【聖濟總錄】氣攻腹脹滿疼痛用大木瓜三十枚去皮核剜空以甘菊花末青鹽末各一斤填滿置籠內蒸熟搗成膏入新艾茸二斤搜和丸如梧子大每米飲下三十九日二

【張仲景金匱玉函方】薏苡仁附子敗醬湯用薏苡仁黑末和酒服一錢爲末水六合和方寸七溫服

●腸胃生癰

【坦仙皆效方】懷忠丹治內癰有敗血腥穢殊甚

臍腹冷痛用此排膿下血單葉紅蜀葵根白芷各一兩白枯礬白芍藥各五錢爲末黃蠟溶化和丸梧子大每空心米飲下二十九待膿血出盡服十宣散補之

●腹癰有膿

【張仲景金匱玉函方】薏苡仁附子敗醬湯用薏

苡仁十分附子二分敗醬五分搗爲末每以方

寸七水二升煎一升頓服小便當下卽愈

● 膽蟲怪病

【夏子益奇疾方】腹中如鐵石臍中水出旋變作

蟲行遠身匝痒難忍撥掃不盡用蒼朮煎濃湯

浴之仍以蒼朮末入麝香少許水調服

● 育腸氣痛

【衛生易簡方】婦人少腹痛禹餘糧爲末每米飲

服二錢日二服極效

● 惡風入腹

【外臺方】久腫惡風入腹及女人新產風入產戶

內如馬鞭噓吸短氣咳嗽者用鯉魚長一尺五

寸以尿浸一宿平旦以木篦從頭貫至尾文火

炙熟去皮空心頓食勿用鹽醋

● 少腹絞痛

【發明】時珍曰昔有人素多酒慾病少腹絞痛不可忍小便如淋諸藥不效偶用黃芩木通甘草

三味煎服遂止

諸蟲門

● 寸白蟲病

【本事方】先食豬肉一片乃以沙糖水調黑鉛灰四錢五更服之蟲盡下食白粥一日許學士病嘈雜服此下二蟲一寸斷一長二尺五寸節節

有斑文也

【張文仲備急方】胡粉炒燥方寸七入肉臍中空

心服大效

【外臺祕要】狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不

【發明】時珍曰赤藤善殺蟲利小便洪邁夷堅之

云趙子山苦寸白蟲病醫令戒酒而素性耽之

一日寓居邵武天王寺夜半醉歸口渴甚見廡

間甕水映月瑩然卽連酌飲之其甘如飴迨曉

蟲出盈席心腹頓寬宿疾遂愈皆驚異之視所

飲水乃寺僕織草履浸紅藤根水也

【本草方】酢石榴東引根一握洗剉用水三升煎

取半盞五更溫服盡至明取下蟲一大團永絕

根本食粥補之崔元亮海上方用榴皮煎水

煮米作粥食之亦良

【本草方】詵曰日食榧子七顆滿七日蟲皆化爲

水也外臺祕要用榧子一百枚去皮火燃啖

之經宿蟲消下也胃弱者啖五十枚

榔皮取一升空心調末方寸匕服之經日蟲盡出未盡再服以盡爲度

【千金方】茱萸東北陰細根大如指者炒洗去土

四寸切以水酒各一升漬一宿平旦分再服當

取蟲下

【經驗方】雷丸水浸去皮切焙爲末五更初食炙

肉少許以稀粥飲服一錢七須上半月服蟲乃

下

【生生編】蜂窠燒存性酒服一匙蟲卽死出

● 蟲蟲心痛

【食療方】治小兒虫咬心痛面青口中沫出臨死者取扁竹十斤剉以水一石煎至一斗去滓煎

如餳隔宿勿食空心服一升蟲卽下也仍常煮

汁作飯食海上歌云心頭急痛不能當我有仙人海上方扁竹醋煎通口嚥管教時刻便安康

【外臺祕要】棟實以苦酒漬一宿綿裹塞入穀道中三寸許日二易之

●蛔蟲攻心

【聖惠方】刺痛吐清水龍膽草一兩去頭剉水二盞煮一盞隔宿勿食平旦頓服之

●心痛有蟲

【乾坤生意】芫花一兩醋炒雄黃一錢爲末每服

一字溫醋湯下

●腹中蟲病

【外臺祕要】漏盧爲末以餅臘和方寸七服之

●腹中白蟲

【孟詵食療】馬齒莧水煮一盞和鹽醋空腹食之

少頃白蟲卽出也

●腹中長蟲

【集效方】狼毒作末每服二錢用鶴一皂子大沙糖少許以水化開臥時空腹服之次早卽下蟲也

●諸蟲在臟

【聖惠方】久不瘥者檳榔半兩炮爲末每服二錢以葱蜜煎湯調服一錢

●小兒蟲病

【發明】時珍曰凡殺蟲藥多是苦辛惟使君子榧子甘而殺蟲亦異也凡大人小兒有蟲病但每月上旬侵晨空腹服使君子仁數枚或以殼煎湯嚥下次日蟲皆死而出也或云七生七熯食

【杜王方】胃寒危惡證與癆相似者乾漆搗燒烟

盡白蕪荑等分爲末米飲服一字至一錢

●肝勞生蟲

●熏衣去虱

●噉虱成癥

【本草方】眼中赤脈吳茱萸根爲末一兩半粳米

半合雞子白三個化蠟一兩半和丸小豆大每米湯下三十九當取蟲下

●制殺諸蟲

分用水五升煮取一升調服卽下出

【本事方】生蕪荑生檳榔各四兩爲末蒸餅丸梧

子大每服二十九白湯下

●除三尸蟲

【外臺祕要】桃葉杵汁服一升

●驟下不止

【肘后方】雲實女萎各一兩桂半兩川烏頭二兩

古今名醫驗方類編卷二十九終

古今名醫驗方類編卷三十

下部

關格門

●大小便閉

【聖惠方】脹悶欲死二三日則殺人膩粉一錢生

麻油一合相和空心服

【家藏方】鹽和苦酒傅臍中乾卽易仍以鹽汁灌

肛內并內用紙裹鹽投水中飲之

【百一方】大小便閉脹欲死兩三日則殺人芒硝

三兩泡湯一升服取吐卽通

【經驗方】白礬末填滿臍中以新汲水滴之覺冷

透腹內卽自然通臍平者以紙圍環之

名霹靂散

【普濟方】諸藥不效紫花扁竹根生水邊者佳研

【本草方】脹急者生冬葵根二斤搗汁三合生薑四兩取汁一合和勻分二服連用卽通也

【本草方】脹悶欲死二三日則殺人蜀葵花一兩搗爛麝香半錢水一大盞煎服根亦可用

【千金方】不通者用白花胡葵子爲末煮濃汁服之

【聖惠方】甘遂末以生麪糊調傅臍中及丹田內仍灸三壯飲甘草湯以通爲度 又太山赤皮甘遂末一兩煉蜜和勻分作四服日一服取利

【本草方】生草烏頭爲末以葱頭蘸藥納穀道中

汁一盞服卽通

【發明】時珍曰外甥柳喬素多酒色病下極脹痛二便不通不能坐臥立哭呻吟者七晝夜醫用通利藥不效遣人叩予予思此乃濕熱之邪在

精道壅脹隧路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也乃用棟實茴香穿

山甲諸藥入牽牛加倍水煎服一服而減三服

而平

【摘元方】酸草一大把車前草一握搗汁入砂糖一錢調服一盞不通再服

【普濟方】土馬驥水淘淨瓦焙過切每服二錢水

一盞煎服

【外臺祕要】擣葱白和酢封小腹上仍灸七壯

【聖惠方】脹悶欲絕蔓菁子油一合空腹服之卽

通通後汗出勿怪

【普濟方】皺脹氣促八角茴香七個大麻仁半兩爲末生葱白三七根同研煎湯調五苓散末服之日一服

【孫真人方】桃葉杵汁半升服冬用榆皮

【普濟方】檳榔爲末蜜湯調服二錢或以童子小便葱白同煎服之亦良

【總錄】關格不通脹悶二三日則殺人胡椒二十

一粒打碎水一盞煎六分去滓入芒硝半兩煎化服

【千金方】用皂莢燒研粥飲下三錢立通 宣明

方鐵脚丸用皂莢炙去皮子爲末酒麵糊丸每服五十九酒下 聖惠方用皂莢燒烟於桶內坐上熏之卽通

末熱水服二錢先以芒硝二兩煎湯服取吐甚效

【楊氏家藏方】巴豆連油黃連各半兩擣作餅子先滴葱鹽汁在臍內安餅子上灸二七壯取利爲度

【千金方】餌帶煮汁和蒲灰末服方寸七日三次

【子母祕錄】蜂房燒末酒服二三錢日二服不拘

大人小兒

【本事推車散】經月欲死者用推車客七個男用

頭女用身土狗七個男用身女用頭新瓦焙研

末用虎目樹南向皮煎汁調服只一服卽通

楊氏經驗方治大小便不通六七月尋牛糞中

大蟻娘十餘枚線穿陰乾收之臨時取一個全

便不通用上截小便不通用下截各爲細末取井華水服之二便不通全用卽解

【普濟方】經月欲死用土狗推車客各七枚並男用頭女用身瓦焙焦爲末以向南樗皮煎汁飲一服神效

【肘后方】不通悶脹二三日則殺人以貝齒三枚

甘遂三銖爲末漿水和服須臾卽通也

【千金方】豬脂薑汁各二升微火煎至二升下酒

五合和煎分服

【聖惠方】明月砂一匙安臍中冷水滴之令透通

末用虎目樹南向皮煎汁調服只一服卽通也

【普濟方】雄鼠屎末傅臍中立效

【姚氏方】亂髮灰三指撮投半升水服

●關格脹滿

【肘后方】大小便不通欲死者用葵子二升水四升煮取一升納猪脂一鷄子頓服 千金用葵子爲末猪脂和丸梧子大每服五十九效止

【外臺祕要】大小便不通獨蒜燒熟去皮綿裹納

下部氣立通也

●反胃關格

【德生堂經驗方】氣噎不通丁香木香各一兩每

服四錢水一盞半煎一盞先以黃泥做成盃濾

藥汁于內食前服此方乃椽史吳安之傳于都

事蓋耘夫有效試之果然土盃取其助脾也

●氣壅關格

【廣利方】不通小便淋結臍下妨悶兼痛滑石粉

一兩水調服

●聖惠方】徐長卿湯治氣壅關格不通小便淋結

臍下妨悶徐長卿炙半兩茅根三分木通冬葵子一兩滑石二兩檳榔一分瞿麥穗半兩每服五錢水煎入朴硝一錢溫服日二服

●癰閉不通

【普濟方】小腹急痛無間久新荆芥大黃爲末等分每溫水服三錢小便不通大黃減半大便不通荆芥減半名倒換散

●下部閉塞

【外臺祕要】蘋蘿根一把搗汁水和絞去滓強人

每服一升

●下焦結熱

【千金方】小便淋閉或有血出或大小便出血瞿麥穗一兩甘草炙七錢五分山梔子仁炒半兩

爲末每服七錢連鬚葱頭七個燈心五十根生

二服甚效

薑五片水二盃煎至七分時時溫服名立效散

●正水脹急

【普濟方】大小便不利欲死甘草五錢半生半炒
胭脂坯子十文研勻每以一錢白麵四兩水和
作棗子大水煮令浮淡食之大小便利後用平

胃散加熟附子每以二錢煎服

●大小便血

【寇氏本草衍義】好墨細末二錢阿膠化湯調服

熱多者尤相宜

【集簡方】劉寄奴爲末茶調空心服二錢卽止

結燥門

●大便壅結

【聖惠方】繭黃散治腸風大小便血淋瀝疼痛用
繭黃蠶蛻紙並燒存性晚蠶沙白殼蠶並炒等

分爲末入麝香少許每服二錢用米飲送下日

【普濟方】膩粉半錢沙糖一彈丸研丸梧子大每
服五丸臨臥溫水下 又方膩粉二錢黃丹一
錢爲末每米飲服一錢

●產後閉塞

【婦人良方】五七日不通不宜妄服藥丸宜用大
麥芽炒黃爲末每服三錢沸湯調下與粥同服
【集驗方】大小便不通用桃花葵子滑石檳榔等
分爲末每空心葱白湯服二錢卽利

●利大小便

【聖惠方】菟實爲末半兩分二服新汲水下

【集元方】皂礬一錢巴霜二個同研入雞子內攪

勻封頭濕紙裹煨熟食之酒下卽通

【聖濟方】服藥不通者滄鹽三錢屋簷爛草節七

個爲末每用一錢竹筒吹入肛內一寸卽通名

提金散

【聖濟總錄】當歸白芷等分爲末每服二錢米湯

下

●大便閉塞

【千金方】羊膽汁灌之卽通

●大便風閉

【十便良方】香白芷炒爲末每服二錢米飲入蜜

少許連進二服

【普濟方】蒺藜子炒一兩猪牙皂莢去皮酥炙五
錢爲末每服一錢鹽茶湯下

【寇氏衍義】結瀆牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁
去皮尖麩炒半兩爲末熟蜜丸梧子大每湯服
三十九

●大便卒結

【聖惠方】羊蹄根一兩水一大盞煎六分溫服

●大腸乾結

【十便良方】厚朴生研猪臘煮搗和丸梧子大每

薑水下三十九

●大便燥塞

【直指方】大棗一枚去核入輕粉半錢縛定煨熟
食之仍以棗湯送下

●大便不通

【肘后方】十日至一月者冬葵子三升水四升煮

取一升服不瘥更服

聖惠用葵子末人乳汁

等分和服立通

之立通不用多喫其功神聖兼能取水

[簡要方]用牽牛子半生半熟爲末每服一錢薑湯下未通再以茶服一方加大黃等分

一 方加生檳榔等分

[肘后方]土瓜根搗汁入少水解之筒吹入肛門

內二便不通前後吹之取通

[肘后方]麻子煮粥下葱椒鹽豉空心服

[外臺方]生薑削長二寸塗鹽納下部立通

[食療本草]氣奔欲死者烏梅十顆湯浸去核丸

棗大納入下部少頃卽通

[必效方]爪蒂七枚研末綿裹塞入下部卽通

[普濟方]白膠香半棗大鼠糞二枚研勻水和作

挺納入肛門良久自通

[斗門方]烏臼木根方長一寸劈破水煎半盞服

[總錄]裏急後重用桃仁三兩去皮吳茱萸二兩食鹽一兩同炒熟去鹽茱每嚼桃仁五七粒

●大便艱難

[危氏得效方]枳實皂莢等分爲末飯丸米飲下

[張仲景傷寒論方]云陽明病自汗小便反利大

便硬者津液內渴也蜜煎導之用蜜二合銅器

中微火煎之候凝如飴狀至可丸乘熱捻作挺

令頭銳大如指長寸半許候冷卽硬納便道中

少頃卽通也 一法加皂角細辛爲末少許尤

速

[主治藏器]猪膽治大便不通以葷筒納入下部

三寸灌之立下

●大便不快

【千金方】桃花爲末水服方寸匕卽通

●大腸虛閉

【楊氏直指方】勻氣散用連鬚葱一根薑一塊鹽

一捻淡豉二七粒擣作餅烘掩臍中紮定良久

氣即通不通再作

【寇宗奭方】松子仁柏子仁麻子仁等分研泥鎔

白蠟和丸梧子大每服五十九黃芪湯下

【嚴子禮濟生方】因汗多津液耗涸者沉香一兩

湯點服二錢

●乾糞塞腸

【聖惠方】脹痛不通用毛桃花濕者一兩和麵三
兩作餛飩煮熟空心食之日午腹鳴如雷當下

惡物也

【本草方】風人虛人脚氣人大腸或祕或利用皂
角子一千二百個洗淨以少酥熬香爲末蜜丸

●熱黃便結

梧子大每空心服至百丸以通爲度

【聖惠方】蟻娘炒去翅足爲末熱酒服一錢

●相火閉結

【劉河間保命集】大黃末一兩牽牛頭末半兩每

服三錢有厥冷者酒服無厥冷五心煩蜜湯服

●燥渴腸祕

【寇宗奭衍義】九月十月熟括樓實取瓤拌乾葛
粉銀石器中慢火炒熟爲末食後夜臥各以沸

頓當瀉一切惡物沙石草髮並出

【孟說食療本草】用蕪菁子擣末水和絞汁服少

●老人冷祕

【和劑局方】綿黃耆陳皮去白各半兩爲末每服三錢用大麻子一合研爛以水瀝漿煎至乳起入白蜜一匙再煎沸調藥空心服甚者不過二服此藥不冷不熱常服無祕塞之患其效如神

【濟生方】陳皮一斤和杏仁五兩去皮尖熬少加蜜搗和丸如梧子大每日食前米飲下三十九

蜜搗和丸如梧子大每日食前米飲下三十九

【和劑局方】冷祕及痃癖冷氣半硫丸半夏炮炒

生硫黃等分爲末自然薑汁煮糊丸如梧子大每空心溫酒下五十九

【寇宗奭方】柏子仁松子仁大麻仁等分同研鎔

蜜蠟丸梧子大以少黃丹湯食前調服二三十

丸日二服

【本草方】阿膠炒二錢葱白三根水煎化入蜜二

卷三十 結燥門

●大腸冷祕

【普濟方】腸胃有濕大使祕塞大檳榔一枚麥門冬煎湯磨汁溫服或以蜜湯調末二錢服亦可

●大腸冷積

【經濟良方】威靈仙末蜜丸梧子大一更時生薑湯下十九至二十九

空心溫酒或薑湯下婦人醋湯下

●大腸濕閼

【聖濟總錄】附子一枚炮去皮取中心如棗大爲

末二錢蜜水空心服之

【普濟方】陳皮連白酒煮焙研末每溫酒服二錢

米飲下

● 痘病秘結

【醫方大成】用此寬腸黃連枳殼等分爲末糊丸

梧子大每服五十九空心米飲下

● 大便頻數

【發明】宗奭曰今人惟知半夏去痰不言益脾蓋

能分水故也脾惡濕濕則濡困困則不能治水

經云水勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑

一兩半夏大棗各三十枚水一升瓷瓶中慢火

燒爲熱水時呷之便已也

● 麻子仁丸

【張仲景方】治脾約大便秘而小便數麻子仁二

升芍藥半斤厚朴一尺大黃枳實各一斤杏仁

一升熬研煉蜜丸梧桐子大每以漿水下十九

日三服不知再加

腸風下血門

● 腸風下血

【斗門方】血師一兩火煅米醋淬盡醋一升搗羅

如麵每服一錢白湯下

【普濟方】脫肛蛇黃二顆火煅醋淬七次爲末每

服三錢陳米飲下

【永類方】積年不止虛弱甚者一服取效綠礬四

兩入砂鍋內新瓦蓋定鹽泥固濟煅亦收出入

青鹽生硫黃各一兩研勻再入鍋中固齊煅亦

梧子大每空心米飲溫酒任下三十九

十九溫酒下日三服

【孫用和祕寶方】黃芪黃連等分爲末麵糊丸綠

豆大每服三十九米飲下

【婦人良方】蒼朮不拘多少以皂角搘濃汁浸一

宿煮乾焙研爲末麵糊丸如梧子大每服五十

丸空心米飲下日三服

【余居士選奇方】香白芷爲末每服一錢米飲下

神效

【劉松石保壽堂方】木香黃連等分爲末入肥豬

大腸內兩頭紮定煮極爛去藥食腸或連藥搗

爲丸服

【普濟方】有疣瘡瘻破者不治馬蘭子一斤研破

酒浸夏三冬七日晒乾何首烏半斤雄黃雌黃

【王璆百一選方】茶簍內箬葉燒存性每服三匙空心糯米湯下或入麝香少許

【百一選方】生地黃熟地黃並酒浸五味子等分

爲末以煉蜜丸梧子大每酒下七十九

【篋中方】葛菪煎用葛菪實一升曝乾搗篩生薑

半斤取汁銀鍋中更以無灰酒二升取汁搜之

上火煎如稠餳卽旋投酒度用酒可及五升卽

止慢火煎令可丸大如梧子每日酒飲通下三

丸增至五七丸止若丸時粘手則以菟絲粉襯

隔之火候忌緊藥焦失力也初服微熱勿怪疾

甚者服過三日當下利疾去利亦止絕有效

【普濟方】諸藥不效天南星石灰炒焦黃色爲末

酒糊丸梧子大每酒下二十九

丸米飲下

【普濟方】木鼈子以桑柴燒存性候冷爲末每服一錢煨葱白酒空心服之名烏金散

心酒服一錢

【普濟方】馬兜鈴藤穀精草荆三稜川烏頭炒過三味各等分煎水先熏後洗之

【華陀中藏經】用榦藤子二個不蛀皂莢子四十

【聖濟方】久者葳靈仙鷄冠花各二兩米醋二升煮乾炒爲末以鷄子白和作小餅炙乾再研每服二錢陳米飲下日二服

九個燒存性爲末每服二錢溫酒下少頃再飲

酒一盞趁口服極效

【聖惠方】用榦藤子三枚厚重者濕紙七重包煨

爲末每服二錢槐花酒下

【聖惠方】用榦藤子三枚厚重者濕紙七重包煨熟去殼取肉爲末每服一錢食前黃芪湯下日一服

【永類方】敗毒菜根洗切用連皮老薑各半盞同炒赤以無灰酒淬之盞蓋少頃去淬任意飲

【仁存方】胡孫薑燒存性五錢酒或米飲服

【百一選方】蜜炙蘿蔔任意食之昔一婦人服此

【本草方】牽牛五兩牙皂三兩水浸三日去皂以酒一升煮乾焙研末蜜丸梧子大每服七丸空

有服

心酒下日三服下出黃物不妨病減後日服五

【普濟方】胡荽子和生菜以熱餅裹食之

【主治思邈方】腸風下血用百合子酒炒微赤研

末湯服

【靈苑方】經霜茄連蒂燒存性爲末每日空心溫

酒服二錢七

【主治吳瑞方】腸風下血不止茄蒂燒灰米飲服

二錢

【經驗良方】茄葉熏乾爲末每服二錢米飲下隔

年者尤佳

【許叔微本事方】霜後乾絲瓜燒存性爲末空心

酒服二錢一名蠻瓜一名天羅一名天絲瓜是

矣

【百一選方】用寒藥熱藥及脾胃藥俱不效者獨

用山裏果俗名酸棗又名鼻涕團乾者爲末艾

湯調下應手卽愈

【本草方】銀杏煅熟出火氣食之米飲下

合定鐵線紮住煅存性研末每服二錢米飲下

一方用硫黃填滿煅研酒服

【仁齋直指方】橄欖核燈上燒存性研末每服二

錢陳米飲調下

【普濟方】柏子十四個搗碎囊貯浸好酒三盞煎

八分服立止

【楊氏家藏方】松木皮去粗皮取裏白者切晒焙

研爲末每服一錢臘茶湯下

【聖惠方】用長尺皂角五挺去皮子酥炙三次研

末精羊肉十兩細切搗爛和丸梧子大每溫水

下二十九

【聖惠方】皂莢子槐寶一兩用粘穀糠炒香去糠

爲末陳粟米飲下一錢名神效散

【普濟方】便前近腎肝便後近心肺皂角刺灰二

兩胡桃仁破故紙炒槐花炒各一兩爲末每服

一錢米飲下

【普濟方】獨子肥皂燒存性一斤爲末糊丸陳米

飲下

【普濟方】秋採楮皮陰乾爲末酒服三錢或入麝

香少許日二

【經驗良方】枳實半斤麸炒黃芪半斤爲末米飲

非時服一錢七糊丸亦可

【博濟方】不拘遠年近日用枳殼燒黑存性五錢

羊脛炭爲末三錢五更空心米飲服如人行五

里再一服當日見效 簡便方用枳殼一兩黃

連五錢水一鍾煎半鍾空心服

【聖惠方】破絮燒灰枳殼麩炒等分麝香少許爲

末每服一錢米飲下

【聖惠方】皮鞋底蠶繭蛻核桃殼紅雞冠花等分

燒灰每酒服一錢

【本事方】五倍子白礬各半兩爲末順流水丸梧

子大每服七丸米飲下忌酒

【王璆百一選方】百藥煎二兩半生用半炒存性等分爲末飯丸梧子大每服五十九米飲下名

聖金丸

【筆峯雜興】殭蠶炒去嘴足烏梅肉焙各一兩爲末米糊丸梧子大每服百丸食前白湯下一日

三服

【聖惠方】枯桑樹下蟲矢燒存性酒服一錢

【聖惠方】乾蠍炒白礬燒各二兩爲末每服半錢

米飯

【百一方】活鱗魚一大尾去腸留鱗入五倍子末

填滿泥固煅存性爲末酒服一錢或飯丸日二

久近腸風

服
又用硫黃一兩如上法煅服亦效

【百一方】因酒毒者大田螺五個燒至殼白肉乾

研末作一服熱酒下

【楊氏家藏方】白刺猬皮一枚銚內燙焦去皮留

刺木賊半兩炒黑爲末每服二錢熱酒調下

●腸風瀉血
鍾煎一鍾空心服日一服

【許學士本事方】皂莢樹上蕈瓦焙爲末每服一

錢溫酒下

【普濟方】椿莢半生半熟爲末每服二錢半米飲

為末每服一錢米飲下

下

●脾毒腸風

【聖惠方】蕨菜花焙爲末每服二錢米飲下

未每服二錢五更米飲下一服天明再服當日見效忌油膩毒物

●久病腸風

【靈苑方】石燕磨水常服勿歇

【活法機要】痛痒不止地榆五錢蒼朮一兩水二

鍾煎一鍾空心服日一服

【聖惠方】瀉血百藥不瘥敗皮巾子燒灰白礬燒

各一兩人指甲燒焦麝香各一分乾薑炮三兩

為末每服一錢米飲下

【本事方】因營衛虛弱風氣襲之熱氣乘之血滲

腸間故大便下血用臭椿根刮去粗皮焙乾四

兩蒼朮米泔浸焙枳殼麩炒各一兩爲末醋糊

丸如梧子大每服五十九米飲下日三服

●濕痢腸風

【百一選方】變通丸治赤白下痢日夜無度及腸

風下血用川黃連去毛吳茱萸湯泡過各二兩

同炒香棟出各爲末以粟米飯糊丸梧子大各

收每服三十九赤痢甘草湯下黃連丸白痢薑

湯下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯下此乃

浙西河山純老方救人甚效 局方戊己丸治

脾胃受濕下痢腹痛米穀不化用二味加白芍

藥同炒研蒸餅和丸服

【聖惠方】用鰻鱗二斤治淨酒二盞煮熟入鹽醋食之

●臘毒痔漏

【孫探元集效方】下血不止藥皮丸用川黃藥皮

刮淨一斤分作四分三分用酒醋童尿各浸七

日洗晒焙一分生炒黑色爲末煉蜜丸梧子大

每空心溫酒下五十九久服除根 楊誠經驗

方百補丸專治諸虛赤白濁用川藥皮刮淨一

斤分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾

切研麋米飯丸如上法服 又陸一峯藥皮丸

黃藥一斤分作四分三分用醇酒鹽湯童尿各

浸二日焙研一分用酥炙研末以猪臘一條去

膜入藥在內紮煮熟搗丸如上法服

●腸風下蟲

●酒痢腸風

大便鮮血疼痛肛出或久患酒痢木餕頭燒存

性櫻櫞皮燒存性烏梅去核粉草炙等分爲末

每服二錢水一盞煎服

【本事方】百藥煎五倍子陳槐花等分焙研末酒

糊丸梧子大每服五十九米飲送下

●臟毒下痢

【經驗方】赤白用香椿洗刮取皮日乾爲末飲下

一錢立效

●腸風臟毒

【家藏經驗方】下血不止旱蓮子草瓦上焙研末

每服二錢米飲下

【聖惠方】何首烏二兩爲末食前米飲服二錢

【普濟方】下血蘆子生用甘草炙爲末每服二

【發明】時珍曰按方勺泊宅編云外兄劉棣云病
臟毒下血凡半月自分必死得一方只以乾柿
燒灰飲服二錢遂愈又王璆百一選方云曾
通判子病下血十年亦用此方一服而愈爲散
爲丸皆可與本草治腸澼消宿血解熱毒之義
相合則棟爲太陰血分之藥益可徵矣

【戴原禮證治要訣】銀杏四十九枚去殼生研入

百藥煎末和丸彈子大每服二三丸空心細嚼

米飲送下

【聖惠方】下血不止五倍子半生半熟爲末陳米
飯和丸如梧子大每服二十九食前粥飲送下

日三服

【濟生方】下血者用百藥煎燒存性烏梅連核燒

過白芷不見火爲末水糊丸如梧子大每服七

十九米飲下

【救急方】用豬大腸一條入芫荽在內煮食 奇

效用豬臘入黃連末在內煮爛搗丸梧子大每
米飲服三十九 又方豬臘入槐花末令滿縛
定以醋煮爛搗爲丸如梧桐子大每服二十九

溫酒下

●臘毒下血

【邵真人經驗方】百草霜五錢以米湯調露一夜

次早空心服

【附錄宋關經】頌曰地柏主臘毒下血與黃芪等

分爲末米飲每服二錢蜀人甚神此方

【濟生方】蒜連丸用獨蒜煨搗和黃連末爲丸日

日米湯服之

【究原方】烏犀散用淡豉十枚大蒜二枚煨同搗

九梧子大煎香茱湯服二十九日二服安乃止

永絕根本無所忌 濬州彭大祥云此藥甚妙
但大蒜九蒸乃佳仍以冷薑水送下昔朱元成
言其姪及陸子楫提刑皆服此數十年之疾更
不復作也

【聖濟總錄】槐耳燒二兩乾漆燒一兩爲末每服

一錢溫酒下

【儒門事親】溫白丸用椿根白皮去粗皮酒浸晒
研棗肉和丸梧子大每淡酒服五十九或酒糊

丸亦可

【經驗方】苦棟子炒黃爲末蜜丸梧子大米飲每

吞十九至二十九

【普濟方】新槐花炒研酒服三錢日三服或用鬼

〔王璆百一選方〕五倍子不拘多少爲末大鰣魚

一枚去腸胃鱗腮填藥令滿瓶內煅存性爲末

每服一錢溫酒下

●臘毒赤白

〔經驗方〕地錦草洗曝乾爲末米飲服一錢立止

●下血危篤

〔普濟方〕不可救者絲瓜卽天羅一個燒存性槐

花減半爲末每空心米飲服二錢

●大腸下血

〔頻湖集簡方〕三七研末同淡白酒調一二錢服

三服可愈加入五分四物湯亦可

〔經驗方〕用荆芥炒爲末每米飲服二錢婦人用

酒下亦可拌麵作餛飩食之 簡便方用荆芥

〔指南方〕王瓜一兩燒存性地黃二兩黃連半兩

爲末蜜丸梧子大米飲下三十九

〔戴原禮證治要訣〕血見愁少許薑汁和搗米飲

服之

〔仁存方〕卷柏側柏棕櫚等分燒存性爲末每服

三錢酒下亦可飯丸服

〔普濟方〕大蘿蔔皮燒存性荷葉燒存性蒲黃生

用等分爲末每服一錢米飲下

〔簡便方〕敗瓢燒存性黃連等分研末每空心溫

酒服二錢

〔濟生方〕及酒痢久不止用烏梅三兩燒存性爲

末醋煮米糊和丸梧子大每空心米飲服二十

丸日三

【普濟方】營衛氣虛或受風邪或食生冷或啖炙
燙或飲食過度積熱腸間使脾胃受傷糟粕不

聚大便下利清血臍腹作痛裏急後重及酒毒
一切下血並皆治之用細茶半斤研末川百藥

煎五個燒存性每服二錢米飲下日二服

【全幼心鑑】藕節晒乾研末人參白蜜煎湯調服

一錢日二服

【神秘方】勃薺搗汁大半鍾好酒半鍾空心溫服

三日見效

【百一選方】隨四時方向采側柏葉燒研每米飲
服二錢王渙之舒州病此陳宜父大夫傳方二
服愈

經驗方用槐花荆芥穗等分爲末酒服一錢七

集簡方用柏葉三錢槐花六錢煎湯日服 袖
珍用槐花枳殼等分炒存性爲末新汲水服二
錢

【集簡方】櫻筍煮熟切片曬乾爲末蜜湯或酒服
一二錢

【聖惠方】百藥煎荆芥穗燒存性等分爲末糊丸
梧子大每服五十丸米飲下

【直指方】不拘大人小兒臟毒腸風及內痔下血
日久多食易饑先用海螵蛸炙黃去皮研末每
服一錢木賊湯下三日後服猪臘黃連

【吳球便民食療】羊血煮熟拌醋食最效

【普濟方】血餘半兩燒灰鷄冠花柏葉各一兩爲

三神效

【千金方】亂髮及爪甲燒灰酒服方寸七

見效

●下血不止

【普濟方】大古錢四百文酒三升煮二升分三服

【百一選方】櫻櫞皮半斤栝樓一個燒灰每服二

錢米飲調下

●積年下血

【聖惠方】寒食蒸餅烏龍尾各一兩皂角七挺去

皮酥炙爲末蜜丸米飲每服二十九

●便前有血

【普濟方】石韋皮爲末茄子枝煎湯下二錢

【孫真人方】令人面黃用酢石榴皮炙研末每服

二錢用茄子枝煎湯服

●無故遺血

●糞後下血

【千金方】艾葉生薑煎濃汁服三合

【聖濟總錄】薑草根和生薑油炒酒沖服

【聖濟總錄】王不留行末水服一錢

【普濟方】凌霄花浸酒頻飲之

●全幼心鑑

不拘大人小兒五倍子末艾湯服一

錢

【聖惠方】白雞冠花并子炒煎服

●結陰便血

【普濟方】雄黃不拘多少入棗內線繫定煎湯用

鉛一兩化汁傾入湯內同煮自早至晚不住添

沸湯取出爲末共棗杵和丸梧子大每服三十

丸煎黑鉛湯空心下只三服止

●男子便血

【活人心統】黑豆一升炒焦研末熱酒淋之去豆

飲酒神效

●腸痔下血

【蘇頌圖經】多年不止用木賊枳殼各二兩乾薑

一兩大黃二錢半並於銚內炒黑存性爲末每

栗米飲服二錢甚效也

【外臺方】當以鯽魚作羹食

●大腸蟲出

【怪疾奇方】不斷斷之復生行坐不得鶴鱉末水

調半兩服自愈

●穀道生瘻

愈其方治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血

【肘后方】已決洞者牡丹末湯服方寸七日三服

【肘后方】槲皮櫟皮煮汁熬如飴糖以導下部

【肘后方】生漆塗之良

【總錄方】久不愈用雞膽脣燒存性爲末乾貼之

如神

●大腸血虛

【發明】宗奭曰洛陽一女人年四十六七耽飲無

度多食魚蟹畜毒在臟日夜二三十瀉大使與

膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢

藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血無

膿如此半年餘氣血漸弱食減肌瘦服熱藥則

腹愈痛血餘下服冷藥卽注泄食減服溫平藥

則病不知如此期年垂命待盡或人教服人參

散一服知二服減三服膿血皆定遂常服之而

【肘后方】蒸大棗取膏以水銀和捻長三寸以綿

痛甚多日不瘥用樗根白皮一兩人參一兩爲末每服二錢空心溫酒調服米飲亦可忌油膩

未每服二錢空心溫酒調服米飲亦可忌油膩

潔麪青菜果子甜物雞猪魚羊蒜薤等

●下部驟蟲

【楊氏產乳】蟲狀如蠍牛食下部作痒取扁竹一

把水二升煮熟五歲兒空腹服三五合

【外臺祕要】梅葉桃葉一斛煮爛蒸極熟內小器

中隔布坐蒸之蟲盡死也

【肘后方】病人齒無色舌上白喜睡憤憤不知痛

痒處或下痢乃下部生蟲食肛也桃仁十五枚

苦酒二升鹽一合煮六合服之

【梅師方】桃白皮煮取濃汁如稀餳入熊膽少許

以綿蘸藥納入下部瘡上

裹夜納入下部中明日蟲皆出也

【肘后方】皂莢燒研綿裹導之

【董炳集驗方】痛痒膿血旁生孔竅蟻娘七枚五

月五日收者新牛糞半兩肥羊肉一兩妙黃同

搗成膏丸蓮子大炙熱綿裹納肛中半日即大

便中蟲出四度永瘥

●槐角丸

【和劑局方】治五種腸風瀉血糞前有血名外痔

糞後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面

弩肉如蠍名舉痔頭上有孔名瘻瘡內有蟲名

蟲痔並皆治之槐角去梗炒一兩地榆當歸酒

焙防風黃芩枳殼炒各半兩爲末酒糊丸梧

子大每服五十丸米飲下

脫肛門

●大腸脫肛

【濟急方】烏龍尾卽梁上塵同鼠屎燒烟于桶內

坐上熏之數次卽不脫也

【直指方】慈石半兩火煅醋碎七次爲末每空心

米飲服一錢 簡便方用慈石末麪糊調塗顫

上入後洗去

【醫方摘要】苦參五倍子陳壁土等分煎湯洗之

以木賊末傅之

【經驗方】蛇牀子甘草各一兩爲末每服一錢白

湯下日三服並以蛇牀末傅之

【三因方】木賊燒存性爲末摻之按入卽止一加

龍骨

【儒門事親】曼陀羅子連殼一對樟斗十六個同

劉水煎三五沸入朴硝少許洗之

【葛洪肘后方】生栝樓搗汁溫服之以豬肉汁洗

手按之冷暖自入

【危氏得效方】水聖散用紫浮萍爲末乾貼之

【摘元方】生菜菔擣實臍中束之覺有瘡卽除

【子母祕錄】胡荽切一升燒烟熏之卽入

【天寶單方】凡大人小兒脫肛每天冷及喫冷食

卽暴痢不止肛則下脫久療不瘥者春間收紫

槿花二斤曝乾爲散加磁石末七兩相和研細

塗肛上納入卽使人喫冷水於面上卽吸入腸

中每日一塗藥噀面不過六七度卽瘥矣又以

熱酒半升和散一方寸七空腹服之日再服漸

加至二方寸七以瘥爲度若五歲以下小兒卽

上托之卽入

百一選方】槐角槐花各等分炒爲末用羊血蘸

藥灸熟食以酒送下猪腰子去皮蘸灸亦可

【聖惠方】不蛀皂角五挺搗碎水浸取汁二升浸

之自收上收後以湯盪其腰肚上下令皂角氣行則不再作仍以皂角去皮酥灸爲末棗肉和

丸米飲下十三丸

【仁齋直指方】黃皮桑樹葉三升水煎過帶溫罨

納之

【急救方】槿皮或葉煎湯熏洗後以白礬五倍末

傅之

【千金方】灸麻鞋底頻按入仍以故麻鞋底鼈頭各一枚燒研傅之按入即不出也

日二服仍以末塗腸頭上

【醫學集成】蟻娘燒存性爲末入冰片研勻摻肛

【聖惠方】治大腸久積虛冷每因大便脫肛用蝸牛一兩燒灰猪脂和傅立縮 又治上症及痢後脫肛用乾蠅牛一百枚炒研每用一錢以飛過赤汁磁石末五錢水一盞煎半盞調服日三

【全幼心鑑】以荆芥生薑煎湯洗之用地龍蟠如錢樣者去土一兩朴硝二錢爲末油調傅之

【李延壽方】蝸牛殼去土研末羊脂鎔化調塗送

入即愈

【主治范汪方】大腸脫肛桑牛燒研和豬脂塗之

立縮

【千金方】久積虛冷以鼈頭灸研米飲服方寸匕

枚將井水養三四日去泥用雞爪黃連研細末入醫內待化成水以濃茶洗淨肛門將雞翎蘸

掃之以軟帛托上自然不再復發也

【經驗良方】貼水荷葉焙研酒服二錢仍以荷葉盛末坐之

【扶壽精方】狗涎抹之自上也

【葉氏摘元方】猾皮一斤燒磁石煅五錢桂心五錢爲末每服二錢米飲下

●脫肛不收

【聖惠方】苧根搗爛煎湯熏洗之

【聖惠方】蕷菪子炒研傅之

【聖惠方】茜根石榴皮各一握酒一盞煎七分溫

服

【子母祕錄】蒲黃和猪脂傅日三五度

【聖惠方】生韭一斤切以酥拌炒熟錦裹作二包更互熨之以入爲度

【至寶方】鐵精粉之

【錢氏小兒方】赤石脂伏龍肝爲末傅之一加白芨升麻藥普濟方用五倍子百草霜等分爲末醋熬成膏鵝翎掃傅上卽入

●下痢脫肛

更互熨之以入爲度

【楊氏產乳方】女萎切一升燒熏之

【直指方】橡斗殼燒存性研末猪脂和擦并煎汁

洗之

【危氏得效方】黑色堅硬用巴豆殼燒灰芭蕉自

然汁煮入朴硝少許洗軟用真麻油點火滴于

上以枯礬龍骨少許爲末摻肛頭上以芭蕉葉

托入

【聖濟總錄】百藥煎一塊陳白梅三個木瓜一握

以水一碗煎半碗日二服

【姚和衆方】白龍骨粉撲之

●積痢脫肛

【千金方】枳實石上磨平蜜炙黃更互熨之縮乃

止

【三因方】已久者黑聖散主之大蜘蛛一個瓠葉

收之甚是有效也

●痢痔脫肛

【經驗良方】冷水調黃連末塗之良

●脫肛歷年

【集驗方】不入者生鐵二斤水一斗煮五升洗之

日再

●虛冷脫肛

【聖惠方】石灰燒熱故帛裹坐冷卽易之

●脫肛氣熱

【董炳方】孩兒茶二分熊膽五分片腦一分爲末人乳擦肛上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡

●風熱脫肛

【直指方】鐵粉研同白斂末傅上按入

●下血脫肛

●痔漏脫肛

【儒門事親】胡荽子一升粟糖一升乳香少許以小口瓶燒烟熏之

【勝金方】虎脛骨兩節以蜜二兩炙赤搗末蒸餅丸梧子大每侵晨溫酒下二十九取效

●老小脫肛

【三因方】香附子荆芥穗等分爲末每服一匙水一大碗煎十數沸淋洗

●脫肛瀉血

【聖惠方】不止用桑黃一兩熟附子一兩爲末煉蜜丸梧子大每米飲下二十九

【普濟方】石耳五兩炒白枯礬一兩密陀僧半兩爲末蒸餅丸梧子大每米飲下二十九

【永類鈐方】白雞冠花防風等分爲末糊丸梧子大空心米飲每服七十九一方白雞冠花炒

櫻榔灰羌活一兩爲末每服二錢米飲下

●肛門腫痛

【集簡方】欲作痔瘡急取屠刀磨水服甚效

【瀕湖集簡方】生苧根搗爛坐之良

【瀕湖方】馬齒莧葉三葉酸草等分煎湯薰洗一日二次有效

●肛門凸出

【外臺祕要】故屋東壁土一升研末以長皂莢

搗末粉之仍炙皂莢更互熨之

【外臺】虎骨燒末水服方寸七日三

●腸頭挺出

【孫真人方】蟾蜍皮一片瓶內燒烟熏之并傳之

● 肛門生瘡

【梅師方】肛門主肺肺熱卽肛塞腫縮生瘡白蜜

一斤猪膽汁一枚相和微火煎令可丸丸三寸

長作挺塗油納下部臥令後重須臾通泄

● 蟲蝕肛門

【外臺方】蟲蝕腎腑肛盡腸穿用青蛙一枚雞骨

一分燒灰吹入數用大效

【肘后方】見五臟則死以猪脂和馬蹄灰綿裹套

入下部日數度瘥

● 穀道虫痛

【肘后方】腫痒杏仁杵膏頻頻傅之

● 穀道亦痛

● 內痔腫痛

【孫氏集效方】孩兒茶麝香爲末唾津調敷之

【孫氏集效方】朝陽黃土黃連末皮硝各一兩用

猪膽汁同研如泥每日旋丸棗大納入肛內過

一夜隨大便去之內服烏梅黃連二味丸藥

【嬰童百問】鉛白霜白片腦各半字酒調塗之隨

【普濟方】木饅頭連皮子切炒茯苓猪苓等分爲

末每服二錢米飲下亦治夢遺名鎖陽丹

● 下痛肛痛

【肘后方】不可忍者熬鹽包坐熨之

痔漏門

手見效

【嬰童百問】黃丹滑石等分爲末新汲水調日五上之

【簡便方】無名異灰火煅紅米醋淬七次爲細末

以溫水洗瘡綿裹筋頭填末入瘡口數次愈

【直指方】鴨嘴背膽礬研蜜水調敷可以消脫

【趙氏經驗方】白礬四兩青鹽四兩爲末猪尿脬

一個盛之陰乾每服五錢空心溫水下

【孫氏集效方】不可忍者胡黃連末鵝膽汁調塗

之

【醫方摘要】先以皂莢烟熏之後以鵝膽汁調白

芷末塗之卽消

【醫方摘要】鬱金水調塗之卽消

【危亦林得效方】耳環草碧蟬兒花接軟納患處卽效

【集驗方】連翹煎湯熏洗後以刀上飛過綠礬入麝香貼之

【藥性論】扁竹搗汁服一二升未瘥再服亦取汁和麵作餽飪煮食日三次

【外科精義】威靈仙三兩水一斗煎湯先熏後洗

冷再服之

【集簡方】石胡荽擣貼之

【袖珍方】用盆盛沸湯以器蓋之留一孔用洗淨

韭菜一把泡湯中乘熱坐孔上先熏後洗數次自然脫體也

【海上仙方】芥葉擣餅頻坐之

【海內經】胡荽子炒爲末每服二錢空心溫酒

下數服見效

研末熱敷頭上額下一部良

【發明】時珍曰按陸文量菜園雜記云凡病痔者宜用苦苣菜或鮮或乾煮至熟爛連湯置器中

橫安一板坐之先熏後洗卽止日洗數次屢用

有效

【救急方】魚腥草一握煎湯熏洗仍以草搗痔卽愈一方洗後以枯礬入片腦少許敷之

【摘元方】苦蘿蔔苦苣菜煎湯先熏後洗仍貼熊膽密陀僧膽礬片腦末良

【袖珍方】冬瓜煎湯洗之

【發明】穎曰一人患痔諸藥不效用木耳煮羹食

而愈極驗

【本草方】桃根水煎汁浸洗之當有蟲出

【外臺方】大肥棗一枚剝去皮取水銀掌中以唾

【本方草】膽鰐一個以磚砌四方安於內泥住火煅存性爲末以猪廣腸一截紮定兩頭煮熟切

【必效方】用枳殼煨熟熨之七枚立定本事方用枳殼末入瓶中水煎百沸先熏後洗

【集簡方】冬至日取冬青樹子鹽酒浸一夜九蒸九晒瓶收每日空心酒吞七十粒臥時再服

【直指方】紫荆皮五錢新汲水煎服

【直指方】藩藺草根煎湯先熏後洗

【直指方】五倍子煎湯熏洗或燒烟熏之自然收縮

碎薑蟾蜍末食之如此三四次其痔自落

【直指方】青蛙丸用青色蛙長脚者一個燒存性爲末雪糕和丸如梧子大每空心先喫飯二匙

次以枳殼湯下十五丸

【直指方】用赤足蜈蚣焙爲末入片腦少許唾調

傅之孫氏集效方蜈蚣三四條香油煮一二

沸浸之再入五倍子末二三錢瓶收密封如遇痛不可忍點上油卽時痛止大效

【丹溪方】用蝎牛浸油塗之或燒研傅之濟生

用蝎牛一枚入麝香少許在內碗盛次日取出

塗之

【醫方摘要】蚺蛇膽研香油調塗立效

【外臺方】麝香當門子印城鹽等分塗之不過三

次

【萬表積善堂方】蠶繭內入男子指甲令滿外用

童子頂髮縛裹燒存性研末蜜調傅之仍日日

吞牛膽製過槐子甚效

【救急方】用熱童尿入礬三分洗之一日二三次

效

● 痔熱腫痛

【發明】時珍曰大全良方云痔熱腫痛者用大蝎蠶一個研泥入龍腦一字燕脂坯子半錢同傅之先以石薜煮水薰洗尤妙五羊大師趙尚書夫人病此止以蝎蠶京墨研塗亦妙大抵與蝎牛同功

● 痘蟲作痒

【梅師方】水銀棗膏各二兩同研綿裏納下部明

日蟲出

【活法機要】古石灰川烏頭炮等分爲末燒飯九

梧子大每服二三十九白湯下

●雞冠痔疾

【斗門方】黃連末傳之加赤小豆末尤良

●野鷄痔病

【經驗良方】先以槐柳湯洗過以艾灸上七壯取

效郎中王及乘驟入西川數日病痔大作如胡

瓜貫於腸頭其熱如火忽至僵仆無計有主郵

者云須灸卽瘥乃用土法灸三五壯忽覺一道
熱氣入腸中因大轉瀉血穢併出瀉後遂失胡
瓜所在矣

●五痔反腫

【衛生寶鑑】久不愈變成瘻瘍用雞冠花鳳眼草

各一兩水二碗煎湯頻洗

【瀕湖集簡方】用木鼈仁帶潤者雌雄各五個乳
貼痔上其痛卽止一夜一丸自消也江夏鐵佛
寺蔡和尚病此痛不可忍有人傳此而愈用之
數人皆有效

●痔瘡乳核

【經驗方】芫根一握洗淨入木臼搗爛入少水絞
汁於不津器中慢火煎成膏將絲線於膏內度
過以線繫痔乾落以紙撲蘸膏納竅內當除根
也 一方只搗汁浸線一夜用不得使水

【劉氏保壽堂方】白鵝膽二三枚取汁入熊膽二
分片腦半分研勻瓷器密封勿令泄氣用則手

指塗之立效

三次見效

● 痘如蟲咬

【肘后方】兔絲子熬黃黑爲末雞子白和塗之

● 內痔不出

【外科集驗方】草烏爲末津調點肛門內痔即反

出乃用枯痔藥點之

● 痘瘡初起

【楊氏經驗方】馬齒莧不拘鮮乾煮熟急食之以

湯薰洗一月內外其孔閉即愈矣

【集元方】痒痛不止用藍襪烘熱熨之冷又易

● 吐血痔血

【肘后方】向東蘿蔔根一把擣汁三升服之

● 痘瘡出血

【本草方】作痛胡麻子煎湯洗之即消

● 痘瘡風腫

【醫林集要】木瓜爲末以蟻魚身上涎調貼之以紙護住

● 翻花痔瘡

【李樓奇方】橡子粉糯米粉各一升炒黃滾水調

作果子飯上蒸熟食之不過四五次效

【肘后方】桃葉一斛杵納小口器中坐蒸之有虫自出

【外臺祕要】雀林草一大握水二升煮一升服日

【勝金方】發歇不定者是也白殭蠶二兩洗剉炒黃爲末烏梅肉和丸梧桐子大每薑蜜湯空心下五丸妙

【發明】時珍曰按蘇東坡與程正輔書云凡痔疾

宜斷酒肉與鹽醋醬菜厚味及硬米飯唯宜食

淡麪一味及以九蒸九晒胡麻卽黑脂麻同去

皮茯苓入少白蜜爲麵食之日久氣力不衰而

百病自去而痔漸退此乃長生要訣但易知而

難行爾

【簡便方】片腦一二分葱汁化搽之

【外臺祕要】許仁則方用槐角子一斗搗汁晒稠

取地膽爲末同煎丸梧子大每飲服十九粒作

挺子納下部或以苦參末代地膽亦可

●外痔長寸

【集簡方】用槐花煎湯頻洗并服之數日自縮

●諸痔發痒

【醫方大成】用此寬腸黃連枳殼等分爲末糊丸

●大腸氣痔

【集簡方】作痛下血百藥煎末每服三錢稀粥調

服日二次

●腸痔氣痔

【衍義方】出臘血用穿山甲燒存性一兩豆蔻三

兩爲末每米飲服二錢甚者加猬皮灰一兩中

病即止

●下部痔癰

【外臺】掘地作小坑燒亦以酒沃之納吳茱萸在

內坐之不過三度良

●痔病祕結

梧子大每服五十九空心米飲下

寸七甚效

●肛門鼠痔

【本草方】蜘蛛絲纏之即落

【塞上方】牛角腮燒灰酒服方寸七

【直指方】腫痛用穿山甲尾尖處一兩炙存性鼈

甲酥炙一兩麝香半錢爲末每服一錢真茶湯

服取效

●十年痔瘡

【外臺方】熊膽塗之神效一切方不及也

●下血成痔

【崔氏纂要】稻藁燒灰淋汁熱洗三五度瘥

●腸痔下血

【食醫心鏡】益母草葉搗汁飲之

【千金翼方】五月五日採倉耳莖葉爲末水服方

【寇氏衍義】檜藤子燒存性米飲服二錢有功
【肘后方】蒲黃末方寸七水服之日三服

【肘后方】下部痒痛如蟲咬者掘地作坑燒亦以
酒沃之搗茱萸二升入坑乘熱坐有孔板熏之
冷乃下不過三四度愈

【外臺方】葱白三升煮湯熏洗立效

【食醫心鏡】杏仁去皮尖及雙仁者水三升研瀝
汁煎減半同米煮粥食之

【肘后方】小豆三升苦酒五升煮熟日乾再浸至
酒盡乃止爲末酒服一錢日三服

【外臺方】鯉魚作膾以蒜薑食之忌冷毒物

醃炙空心食之

【食醫心鏡】野猪肉二斤煮五味炙空腹食之作

羹亦可

【衍義方】用猾皮合穿山甲等分燒存性入肉豆

蔻一半空腹熱米飲服一錢妙 外臺用猾皮

三指大熏黃如棗大熟艾一錢穿地作坑調和

取便熏之取口中有烟氣爲佳火氣稍盡即停

三日將息更熏之三度永瘥勿犯風冷羹臍將

養切忌雞魚猪生冷二十日後補之

●腸風痔血

【寇氏衍義】熱多者尤佳槲葉微炙研末一錢槐

花炒研末一錢米飲調服未止再服

【直指方】血竭末傅之

【便民食療】鱠魚煮食其性涼也

●酒痔下血

【嚴月仙方】絲瓜燒存性研末二錢酒下

每服三四十丸白湯下 一方用自然薑汁浸

焙炒

【永類鈐方】青蒿用葉不用莖用莖不用葉爲末

糞前冷水糞後水酒調服

●痔瘡如瓜

【本事方】腫痛如火柳枝煎濃湯洗之艾灸三五壯王及郎中病此驛吏用此方灸之覺熱氣入

腸大下血穢至痛一頃遂消馳馬而去

●內痔出血

●蟲痔裏急

【本草方】檳榔爲末每日空心以白湯調服二錢

●痔瘡有蟲

【集驗方】不止者用翫月砂卽免糞也慢火炒黃

爲末每服二錢入乳香五分空心溫酒下日三

服

【肘后方】猾皮燒末生油和塗

【梅師方】作痒或下濃血多取槐白皮濃煮汁先

熏後洗良久欲大便當有蟲出不過三度卽愈

●痔漏腫痛

【唐氏方】用蟻娘一枚陰乾入冰片少許爲細末

卽安也

【簡易方】荆芥煮湯日日洗之

【救急方】猪膽七個綿燕脂十個洗水和勻擦七

次即可

【劉松石保壽堂方】旱蓮草一把連根鬚洗淨用石臼擂如泥以極熱酒一盞冲入取汁飲之滓

傅患處重者不過三服卽安太僕少卿王鳴鳳患此策杖方能步服之得瘥累治有驗

【日華本草方】以馬兜鈴於瓶中燒烟熏病處良

仍以皮爲末綿裹納下部中
【唐仲舉方】葱涎白蜜和塗之先以木鱉子煎湯熏洗其冷如水卽效一人苦此早間用之午刻

卽安也

【海上方】椒目一撮研細空心水服三錢如神

紙燃蘸末入孔內漸漸生肉藥自退出卽愈
袖珍方用蟻娘焙乾研末先以礬湯洗過貼之

【集簡方】楮葉半斤搗爛封之

【董炳集驗方】赤白茯苓去皮沒藥各二兩破故

紙四兩石臼搗成一塊春秋酒浸三日夏二日

冬五日取出木籠蒸熟晒乾爲末酒糊丸梧子大每酒服二十九漸加至五十九痔漏神方也

【唐氏經驗方】大露蜂房燒存性研摻之乾則以

真菜子油調

【儒門事親】鯉魚鱗二三片綿裹如棗形納入坐

之其痛即止

【乾坤生意】用田螺一個入片腦一分在內取水

擦之仍先以冬瓜湯洗淨 孫氏用田螺一枚

用針刺破入白礬末同埋一夜取螺內水掃瘡

上又善能止痛也甚妙 袖珍用馬齒莧湯洗

淨搗活螺蟬傅上其病即愈

●癰疽痔漏

●腸風痔瘻

【子母祕錄】螭蠟研末傅之日一上

【濟急方】銅青密陀僧各一錢麝香少許爲末津和塗之

【孫尚藥傳家祕寶方】如聖散用草薢貫衆去土等分爲末每服三錢溫酒空心服之

【食醫心鏡】用槐葉一斤蒸熟晒乾研末煎飲代

茶久服明目

【本草方】頌曰用蠶皮及骨燒灰米飲空心服二錢甚者入紅雞冠花白礬爲末和之

【壽域方】熊膽半兩入片腦少許研和豬膽汁塗之

●五痔諸瘻

【外科精要】忍冬圓治消渴愈後預防發癰疽先

服此用忍冬草根莖花葉皆可不拘多少入瓶內以無灰好酒浸以糠火燶一宿取出晒乾入甘草少許碾爲細末以浸藥酒打麪糊丸梧子大每服五十九至百丸湯酒任下此藥不特治癰大能止渴

【本草方】苦蓬子蘆臺子荆芥子芫荽子蒿苣子蔓菁子蘿蔔子葱子等分以大鯽魚一個去鱗腸裝藥在內縫合入銀石器內上下用火煉熟放冷爲末每服二錢米飲下日二服

○久近痔漏

【廣濟方】芥子末以水蜜和傅乾卽易之食醫心鏡鴛鴦一隻治如常法炙熟切細佐以五味醋食之作羹亦妙

【孫氏集效方】三十年者三服除根用蓮花葢黑牽牛頭末各一兩半當歸五錢爲末每空心酒服二錢忌熱物五日見效

●年久痔漏

●痔漏有蟲

【便民食療】田龜二三個煮取肉入茴香葱醬常常食累驗此疾大忌糟醋等熱物

●痔漏出血

【直指方】香白芷爲末每服二錢米飲下并煎湯

【儒門事親】黑白牽牛各一兩炒爲末以豬肉四兩切碎炒熟蘸末食盡以白米飯三匙壓之取下白蟲爲效 又方白牽牛末四兩沒藥一錢爲細末欲服藥時先日勿夜飲次早空心將

猪肉四兩炙切片蘸末細細嚼食取下農血爲
熏洗神效

效量人加減用忌酒色油膩三日

【永類鈐方】用狗肉煮汁空腹服能引蟲出也

危氏用熟犬肉煮藍汁空心食七日效

●痔漏脫肛

【儒門事親】胡荽子一升粟糠一升乳香少許以

小口瓶燒烟熏之

【孫氏集效方】絲瓜燒灰多年石灰雄黃各五錢

爲末以猪膽雞子清及香油和調貼之收上乃

止

【救急方】每日空心嚼川椒一錢涼水送下三五

次卽收

●臟毒痔漏

【孫探元集效方】下血不止蘆皮丸用川黃蘆皮

刮淨一斤分作四分三分用酒醋童尿各浸七

●諸瘡痔漏

【普濟方】久不結痂用生薑連皮切大片塗白礬

末炙焦研細貼之勿動良

●上下諸瘡

【肘后方】或在頂或在下部用苦參五升苦酒一

斗漬三四日服之以知爲度

日洗晒焙一分生炒黑色爲末煉蜜丸梧子大
每空心溫酒下五十九久服可除根 楊誠經

驗方百補丸專治諸虛赤白濁川蘆皮刮淨一
斤分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾

切研糜米飯丸如上法服 又陸一峯蘆皮丸
黃蘆一斤分作四分三分用醇酒鹽湯童尿各
浸二日焙研一分用酥炙研末以猪臍一條去
膜入藥在內繁煮熟搗丸如上法服之

●下部漏瘡

【直指方】苦參煎湯日日洗之

●一切漏瘡

【急救易方】有孔用信石新瓦火煅研末以津調

少許於紙撲上插入蝕去惡管漏多勿齊上最

妙

【外臺祕要】故布裹鹽燒亦爲末每服一錢

【千金方】土瓜根搗傅之燥則易

【千金方】鹽麴和園燒研傅之

【千金方】用槲樹北陰白皮三十斤剉以水一石

煮一斗去滓煎如飴又取通都廁上雄鼠屎雌

勻瘦人食五合當有蟲出也 崔氏纂要用槲

白皮切五升水八升煮令沫盡去滓再煎成膏

日服棗許并塗瘡上宜食苜蓿鹽餅以助之以
瘡爲度

【聖惠方】鍊成松脂末填令滿日三四度

【千金方】不拘蜂瘻鼠瘻蟻螻燒末醋和傅

【肘后方】楸枝作煎頻洗取效

【本草方】柳眼紅鬚煎水日洗 摘元方用楊柳

條罐內燒烟熏之出水卽效

【千金方】白馬通汁每服一升良

【千金方】中有冷瘻肉者用正月狐糞乾末食前
新汲水下一錢七日二

●漏瘡不合

【雜病治例】童尿制爐甘石牡蠣粉外塞之內服

滋補藥

●瘻瘡水溢

【直指方】乃腎虛也牽牛末二錢半入切開猪腎

漏燭惡瘡

中竹葉包定煨熟空心食溫酒送下借腎入腎

一縱一橫兩得其便惡水既泄不復淋瀝

●鼠漏腫核

【直指方】大腹皮煎湯洗之

●漏瘡膿血

【直指方】白乳香二錢牡蠣粉一錢爲末雪糕丸

麻子大每薑湯服三十九

【姚大夫方】不止不合用啄木一隻或火老鴉亦

可鹽泥固濟煅存性研末酒服二錢七

●九瘻有孔

【千金方】苦瓠四枚大如盞者各穿一孔如指大

湯煮十數沸取一竹筒長一頭插瓠孔中一頭

注瘻孔上冷則易之用遍乃止

【千金方】用耕垡土燒赤以苦參浸之合壁土令

熱以大鱉鮮展轉染上貼之每日一次

●一切冷漏

【千金方】人吐蛇蟲燒灰先以甘草湯洗淨塗之
無不瘥者慎口味

●摩之即止

【千金方】自死蛇取骨爲末封之大痛以杏仁膏

爲末以泔水洗淨和臘豬脂傅之日三上

出若痒則易之蟲盡乃止

古今名醫驗方類編

● 蟑姑漏瘡

【儒門事親方】茜根燒灰千年石灰等分爲末油
調傅之

【聖惠方】槲葉燒存性研以米泔別浸槲葉取汁
洗瘡後乃納灰少許于瘡中

● 蟻漏不愈

【千金方】鰥鯉甲二七枚燒灰猪脂調傅

● 蠹瘻五孔

【聖惠方】相通者半夏末水調塗之日二

● 蛇瘻不愈

【千金方】蛇腹蠅燒灰封之

● 槐湯灸痔

【發明】頌曰劉禹錫傳信方著陝州王及郎中槐

湯灸痔法甚詳以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾

灸其上七壯以知爲度王及素有痔疾充西川
安撫使判官乘驛入駱谷其痔大作狀如胡瓜
熱氣如火至驛僵仆郵吏用此法灸至三五壯
忽覺熱氣一道入腸中因大轉瀉先血後穢其
痛甚楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳矣

● 桂角丸

【和劑局方】治五腫腸風瀉血等症悉腸風下血

門

虛勞弱精	一七	積熱夢遺	一七
心虛夢洩	一七	陰虛夢泄	一七
勞心夢泄	一七	睡即洩精	一七
夢洩遺尿	一八	夢洩遺便溏	一八
夢遺食減	一八	小便白淫	一八
精氣不固	一八	益氣固精	一八
滋陰養血	一八	固精強骨	一八
固元丹	一八	秋石交感丹	一八
癲癇門	一八	小腸疝氣	一八
		病氣危急	一〇
		疝氣脛腫	一〇
		疝氣入腎	一〇
		木腎疝氣	一〇
		奔豚疝氣	一〇
		疝氣偏腫	一〇
		膀胱疝氣	一〇
		陰癰偏腫	一〇
		狐疝陰癰	一一
		癲疝脹痛	一二
		卵腫偏墜	一二
		陰疝欲死	一二
		偏墜腫痛	一二
		寒疝腹痛	一二
		寒疝身痛	一二
		寒疝引脅	一二
		寒疝諸疾	一三
		寒疝滑泄	一三
		血疝初起	一三
		下部卒痛	一三
		膀胱石水	一三
		小腸臟氣	一三
		婦人疝痛	一三
		昆布罐	一三

今名醫駢方類編

古今名醫驗方類編卷三十一

下部

不禁門

●小便不禁

【經驗方】顆塊雌黃一兩半研乾薑半兩鹽四錢

同炒薑色黃爲末水和蒸餅丸綠豆大每服十

丸至二十九空心鹽湯下

【聖惠方】薔薇根煮汁飲或爲末酒服野生白花者更良

●小便卒數

【聖惠方】酸石榴燒存性無則用枝燒灰代之每服二錢用柏白皮切焙四錢煎湯一盞入榴灰

再煎至八分空心溫服晚再服

【外臺祕要】雄雞喉嚨及臘脣并屎白等分爲末麥粥清服之

【聖惠方】重鵠巢中草一箇燒灰每服二錢七以

薔薇根皮二錢煎湯服之日二

【普濟方】上熱下寒者鹿角霜爲末酒糊丸梧桐子大每服三四十九空心溫酒下

【三因方】茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋漓不禁用白茯苓赤茯苓等分爲末以新汲水按洗去筋控乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽酒下

【肘后方】非淋令人瘦石膏半斤搗碎水一斗煮五升每服五合

●小便滑數

【儒門事親方】金剛骨爲末每服三錢睡時溫酒下

●小便頻數

【朱氏集驗方】脬氣不足也雷州益智子鹽炒去

鹽天臺烏藥等分爲末酒煮山藥粉爲糊丸如

梧子大每服七十九空心鹽湯下名縮泉丸

【集元方】川草薢一斤爲末酒糊丸梧子大每鹽

酒下七十九丸

自減也

【心鏡方】小豆葉一斤入豉汁中煮和作羹食之

【本草方】茴香不拘多少淘淨入鹽少許炒研爲

末炙糯米糕蘸食之

【集驗方】下焦虛冷也羊肺一具切作羹入少羊

數不計度數便時莖內痛不可忍者此疾必先
大腑祕熱不通水液只就小腸大腑愈加乾竭
甚則渾身熱心躁思涼水如此卽重證也此疾
本因貪酒色積有餘毒腐物瘀血之類隨虛水
入于小腸故便時作痛也不飲酒者必平生過
食辛熱葷膩之物又因色傷而然此乃小便頻
數而痛與淋症澀而痛者不同也宜用萆薢一
兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽爲末每服二
錢水一盞煎八分和滓服之使水道轉入大腸
仍以葱湯頻洗穀道令氣得通則小便數及痛
自減也

每水飲服二錢

【本草方】白果十四枚七生七煨食之取效止

【本草方】胡桃煨熟臥時嚼之溫酒下

【本草方】下焦真氣虛弱者水芝丹用蓮實半升

酒浸二宿以野猪肚一個洗淨入蓮在內縫定

煮熟取出晒乾爲末酒煮米醋糊丸梧子大每

服五十九溫酒送下

【儒門事親】白茯苓去皮乾山藥去皮以白礬水

滌過焙等分爲末每米飲服二錢

【乾坤生意】牡蠣五兩燒灰小便三升煎二升分

三服神效

【心鏡方】用雄雞腸一具臘和酒服 普濟用雄

雞腸水煮汁服日三次

肉和鹽豉食不過三具

【鄭氏家藏方】鹿茸一對酥炙爲末每服二錢溫

酒下日三服

【梁氏總要】鹿角霜白茯苓等分爲末酒糊丸梧

子大每服三十九鹽湯下

●心虛尿滑

【本草方】及赤白二濁益智子仁白茯苓白朮等

分爲末每服三錢白湯調下

●腎消尿數

【聖濟錄】乾薑半兩以鹽四錢炒黃成顆雌黃一

兩半爲末蒸餅和丸綠豆大每服十九至三十

丸空心鹽湯下

【外臺方】鹿角一具炙搗篩溫酒每服方寸七日

二

●膏痺尿多

【傷寒類要】其人飲少用秦椒二分出汗瓜蒂二

分爲末水服方寸七日三服

●小便過多

【總錄】象牙燒灰飲服之

●小便無度

【普濟方】腎氣虛寒破故紙十兩酒煮茴香十兩

鹽炒爲末酒糊丸梧子大每服百丸鹽酒下或

以末繆猪腎煨食之

●消中尿多

【外臺祕要】日夜尿七八升冬葵根五斤水五斗

煮三斗每日平旦服二升

●老人遺尿

【普濟方】不知出者草烏頭一兩童便浸七日去皮同鹽炒爲末酒糊丸綠豆大每服二十丸鹽

湯下

●男婦遺尿

【余居士選奇方】枯白礬牡蠣粉等分爲末每服

方寸七溫酒下日三服

●下虛尿床

【千金方】羊肚盛水煮熟空腹食四五頓瘥

●遺尿且澀

【聖濟總錄】桑耳爲末每酒下方寸七日三服

●遺尿淋瀝

【梅師方】白龍骨桑螵蛸等分爲末每鹽湯服二

錢

【醫林集要】痛不可忍難忍內服五錢食乞覽

存性作一服白湯下立愈

【集驗方】用雞臠胫一具并腸燒存性酒服男用

以水七升煮二升分再服

雌女用雄

●夜臥尿牀

【近效方】麻鞋尖頭二七枚燒灰歲朝井華水服

之

【千金方】本人草薦燒灰水服立瘥

●婦人遺尿

【千金方】船故茹爲末酒服三錢

【集簡方】白紙一張鋪席下待遺于上取紙晒燒酒服

●止小便利

【食醫心鏡】雞腸草一斤於豆豉汁中煮和米作羹及粥頻食之

●少小尿牀

【外臺祕要】薔薇根五錢煎酒夜飲

【藏器方】用燕蓐草卽燕窠中草也無毒主眼中遺尿燒黑研末水進方寸匕

小閉門

●小便不通

【本草方】雄雞肝桂心等分搗丸小豆大每服一

丸米飲下日三服遺精加白龍骨

【集簡方】磨刀交股水一盞服之效

【皆效方】蚯蚓糞樸硝等分水和傅臍下卽通

【金匱要略】白魚散用白魚滑石亂髮等分爲散

飲服半錢七日三

【外臺祕要】梁上塵三指撮水服之

【聖惠方】黑鉛錯末一兩生薑半兩燈心一握井

水煎服先以炒葱貼臍

【崔氏方】薰黃末豆許內孔中良

【楊氏產乳】滑石末一升以車前汁和塗臍之四

畔方四寸乾卽易之冬月水和

【普濟方】濕紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立

通

【仲景金匱方】戎鹽湯用戎鹽彈丸一枚茯苓

半斤白朮二兩水煎服之

【簡要濟衆方】白花散用芒硝三錢茴香酒下

【總微論】綿黃耆二錢水二盞煎一盞溫服小兒

減半

【錢仲陽小兒直訣】捻頭散治小兒小便不通用

延胡索川苦棟子等分爲末每服半錢或一錢

白湯滴油數點調下

【聖惠方】用麻根蛤粉半兩爲末每服二錢空心

新汲水下 摘元方用苧根洗研攤絹上貼少

腹連陰際須臾卽通

【十便良方】馬蘭花炒茴香炒葶苈炒爲末每酒

服二錢

【聖濟總錄】臍腹急痛牛蒡葉汁生地黃汁二合

和勻入蜜二合每服一合入水半盞煎三五沸

調滑石末一錢服

圓頭益理會處臘月至春末取出研蜜丸梧子大

【集簡方】竹雞草一兩車前草一兩搗汁入蜜少許空心服之

【發明】時珍曰按聖惠方治小便不通用地麥草

一把水煎服古方亦常用之此物能益陰氣通

小腸無陰則陽無以化亦東垣治小便不通用

黃蘗知母滋腎之意

【百一方】車前草一斤水三升煎取一升半分三

服一方入冬瓜汁 一方入桑葉汁

【圖經本草】臍下滿悶海金沙一兩臍南茶半兩

搗碎每服三錢生薑甘草煎湯下日二服亦可

末服

【聖濟錄】臍腹脹痛不可忍諸藥不效者不過再

服用續隨子去皮一兩鉛丹半兩同少蜜搗作

大每服二三十九木通湯下化破尤妙病急亦可旋合

【摘元方】蓖麻仁三粒研細入紙燃內插入莖中即通

【聖惠方】腹脹用瓜萎焙研每服二錢熱酒下頻服以通爲度紹興劉駐云魏明州病此御醫用此方治之得效

【肘后方】土瓜根搗汁入少水解之筒吹入下部

【簡便方】陳大麥稽搗汁濃汁頻服

【張文叔方】止喘紅秫散用紅秫黍根二兩扁蓄

一兩半燈心百莖每服各半兩流水煎服

【發明】時珍曰用葱管吹鹽入玉莖內治小便不通及轉脬危急者極有捷效余常用治數人得

驗

【永類鈐方】葱白連葉搗爛入蜜合外腎上卽通

【聖濟總錄】胡荽二兩葵根一握水二升煎一升入滑石末一兩分三四服

【衛生易簡方】萐蘆菜搗傅臍上卽通

【海上仙方】萐蘆子搗餅貼臍中卽通

【聖濟總錄】脹急者用苦瓠子三十枚炒蟻姑三個焙爲末每冷水服一錢

【發明】吳曰膀胱有火邪并小便不利及黃澀者並用酒洗黃蘗知母爲君茯苓澤瀉爲佐凡小便不通而口渴者邪熱在氣分肺中伏熱不能生水是絕小便之源也法當用氣味俱薄淡滲之藥猪苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之七原苦邪熱在下焦血分不暢而小便不通者

乃素問所謂無陰則陽無以生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之黃蘗知母是也長安王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石脚腿裂破出水雙睛凸出飲食不下痛苦不可名狀治滿利小便滲洩之藥服遍矣予診之曰此乃奉養太過膏梁積熱損傷腎水致膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而爲嘔噦難經所謂關則不得小便格則吐逆者潔古老人言熱在下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒水所化大苦寒之藥黃蘗知母各一兩酒洗焙研入桂一錢爲引熟水丸如芡子大每服二百丸沸湯下少時如刀刺前陰火燒之狀溺如

云熱者寒之腎惡燥急食辛以潤之以黃蘆之

更炒

苦寒瀉熱補水潤燥爲君知母之苦寒瀉腎火爲佐肉桂辛熱爲使寒因熱引也

【攝生方】棕皮毛燒存性以水酒服二錢卽通利累試甚驗

【肘后方】烏臼根皮煎湯飲之

【普濟方】梔子仁十四個獨頭蒜一個滄鹽少許搗貼臍及囊良久卽通

【聖惠方】以水四升洗飢帶取汁煮葵子二升半分三服

【聖惠方】桑螵蛸炙黃三十枚黃芩二兩水煎分二服

二服

【斗門方】蚯蚓搗爛浸水濾取濃汁半碗服立通

【簡易方】蝸牛搗貼臍下以手摩之加麝香少許

【聖惠方】雞子殼海蛤滑石等分爲末每服五分

此方果愈

【葛洪方】用大蠅蝎二枚取小體以水一升漬飲須臾卽通壽域方用土狗下截焙研調服半錢生研亦可談慤翁方加車前草同搗汁服唐氏經驗方用土狗後截和麝搗納臍中縛定卽通醫方摘要用土狗一個炙研入冰片麝香少許翎管吹入莖內

【本草方】全蛇蛻一條燒存性研溫酒服之

【田氏方】白海蛇一對生一個燒一個爲末溫酒服

【類編方】腹脹如鼓用田螺一枚鹽半七生搗傅臍下一寸三分卽通熊彥誠曾得此疾異人授

米飲下日三

【千金方】用燕屎豆豉各一合糊丸梧子大每白湯下三丸日三服

【千金方】猪脂一斤水二升煎三沸飲之立通

【本草方】猪膽一枚熱酒和服 又用猪膽連汁籠住陰頭一二時汁入自通

【救急方】脹急者象牙生煎服之

【外臺方】數而微腫用陳久筆頭一枚燒灰水服

●小便不利

【聖濟錄】膀胱熱閉小便不快井泉石海金沙車前子滑石各一兩爲末每服二錢蜜湯下

【傷寒類要】小腹痛滿不得小便雄黃末蜜丸塞前孔中

【肘后方】天行病小腹滿不得小便雌黃末蜜丸

納尿孔中入半寸

【張仲景金匱方】有水氣括樓瞿麥丸主之瞿麥二錢半括樓根二兩大鷄子一個茯苓山芋各三兩爲末蜜和丸梧子大一服三丸日三未知益至七八丸以小便利腹中溫爲知也

【千金翼方】膀胱水氣流滯浮萍日乾爲末飲服

方寸七日二服

【金匱要略】蒲蓆灰七分滑石二分爲散飲服方寸七日三

【發明】時珍曰范汪方治小便不利取衣魚二七枚搗分作數丸頓服即通

●小便艱難

【聖惠方】或轉胞腹滿悶不急療殺人用秦艽一兩水一盞煎六分分作二服 又方加冬葵子一

【普濟方】不通乾箬葉一兩燒灰滑石半兩爲末

每米飲服三錢

●小便熱短

【集簡方】樺皮濃煮汁飲

●小便澀痛

【王氏博濟方】不通用蠶蛻紙燒存性入麝香少

許米飲每服二錢

●卒不小便

【古今錄驗方】杏仁二七枚去皮尖炒黃研末米

飲服之

●小便閉脹

【許學士本事方】不治殺人葱白三斤剉炒帕盛

二個更互熨小腹氣透卽通也

●相火祕結

【劉河間保命集】大黃末一兩牽牛末半兩每服

三錢有厥冷者酒服無厥冷五心煩蜜湯服

●老人尿閉

【普濟方】兩尺脈沉微用利小水藥不效者乃虛寒也附子一個炮去皮臍鹽水浸良久澤瀉一

兩每服四錢水一盞半燈心七莖煎服卽愈

【普濟方】因腫毒未潰小便不通用葱切入麻油煎至黑色去葱取油時塗腫處卽通

●汗多便闊

【濟生方】老人虛人皆可用肉蓯蓉酒浸焙二兩

研沉香末一兩爲末麻子仁汁打糊丸梧子大

每服七八丸白湯下

【朱氏集驗方】白頸蚯蚓茴香等分杵汁飲之卽愈

●通利小便

【主治蘇頌方】龍葵根與木通胡荽煎湯服通利

小便

●小腸結澀

【發明】時珍曰聖惠治小腸結澀不通心煩悶亂

有粟奴湯用粟奴苦竹鬚小豆葉炙甘草各一

兩燈心十寸葱白五寸銅錢七文水煎分服取

效乃止

●立不得溲

【發明】時珍曰洪邁夷堅志云吳巡檢病不得溲

臥則微通立則不能涓滴遍用通利藥不效唐

時硫飛去鉛不死鉛砂入膀胱臥則偏重猶可
溲立則正塞水道故不通取金液丹三百粒分

爲十服煎瞿麥湯下

諸淋門

●小便淋痛

【傳信適用】真定瓷器煅研二兩生熟地黃末各
一兩每用二錢木通煎湯服

【千金方】溫水和雲母粉服三錢

【簡要濟衆方】石燕子七枚搗黍米大新桑根白

皮三兩剉拌勻分作七帖每帖用水一盞煎七

分空心午前各一服

【衛生寶鑑】葵花根洗剉水煎五七沸服之如神

問其平日自利黑陽丹常服因吾日七分告少

【沈存中靈苑方】諸淋赤痛三葉酸漿草洗併取

自然汁一合酒一合和勻空心溫服立通

【發明】時珍曰按羅天益寶鑑云粳粟米粥氣薄

味淡陽中之陰也所以淡滲下行能利小便韓

愈醫通云一人病淋素不服藥予令專啖粟米粥絕去他味旬餘減月餘痊此五穀治病之理也

【聖惠方】水芹菜白根者去葉搗汁井水和服

【十便良方】麪煨檳榔赤芍藥各半兩爲末每服

三錢入燈心水煎空心服日二服

【救急方】多年木梳燒存性空心冷水服男用女

女用男

●卒淋不通

【普濟方】好墨燒一兩爲末每服一字溫水服之

【太平聖惠方】萎蕤一兩芭蕉根四兩水二大盃煎一盃半入滑石二錢分三服

【千金翼】紫草一兩爲末每食前用井華水服二錢

【發明】時珍曰按虞搏醫學正傳云搏兄年七十秋間患淋二十餘日百方不效後得一方取地

膚草搗自然汁服之遂通至賤之物有迴生之功如此

【范汪東陽方】繫縷草滿兩手水煮常常飲之

【集驗方】牛耳中毛燒取五分水服尾毛亦可

●小便淋漓

【千金方】三物木防已湯用防已防風葵子各二

兩咬咀水五升煮二升半分三服

【經驗方】或有白者以赤根櫟近根截一寸許

今名醫驗方類編

安臍中以艾灸七壯

【聖濟總錄】皂角刺燒存性破故紙等分爲末無

灰酒服

【醫學集成】服血藥不效者用牡礪粉黃蘆炒等

分爲末每服一錢小茴香湯下取效

●五種淋症

【沈存中靈苑方】勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至甚者透格散用硝石一兩不夾泥土

雪白者生研爲末每服二錢各依湯使勞淋勞
便不出小腹急痛葵子末煎湯下通
後便須服補虛丸散小便不出時下血疼痛滿
急熱淋小便熱赤色臍下急痛並用冷水調下

【集驗方】苦杖爲末每服二錢用飯飲下

【究原方】赤藤卽做草鞋者白茯苓苧麻根等分

爲末百沸湯下每服一錢如神

【陳藏器方】船底苔一團雞子大水煮食之

氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石

淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下

砂石令人悶絕將藥末先入銚內隔紙炒至紙
焦爲度再研用溫水調下小便不通小麥湯下

卒患諸淋只以冷水下並空心調藥使消如水
乃服之

三兩每日空心食之

【百一選方】木龍湯用木龍卽野葡萄藤也竹圍
萎淡竹葉麥門冬連根苗紅棗肉燈心草烏梅
當歸各等分煎湯代茶飲

【普濟方】榆白皮陰乾焙研每以二錢水五合煎
如膏日二服

【發明】頤曰深師療淋用亭長之說最詳云取葛
上亭長折斷腹腹中有白子如小米三分安
白板上陰二三日收之若有人患十年淋服三
枚八九年以還服二枚服時以水如棗許着小

【勝金方】用石決明去粗皮研爲末飛過熟水服
二錢每日二服如淋中有軟硬物卽加朽木末
五分

●五淋白濁

【扶壽精方】螺螄一盞連殼炒熱入白酒三盞煮
至一盞挑肉食之以此酒下數次卽效

盆中用爪研之當扁扁兒於水中仰面吞之勿
令近牙齒間藥雖微小下喉自覺至下焦淋所

有頃藥作大煩急不可堪者飲乾麥飯汁則藥

熱止也若無乾麥飯但水亦可耳老小服三分

【普濟方】古文錢煮汁服

●砂石淋痛

之當下淋疾如膿血連連爾去者或如指頭
或青或黃不拘男女皆愈若藥不快淋不下以
意節度更增服之此蟲五六月爲亭長頭赤身
黑七月爲斑蝥九月爲地膽隨時變耳

【外臺祕要方】石首魚頭石十四個當歸等分爲

末水二升煮一升頓服立愈

【直指方】小便澀痛用黃蠟浮石爲末每服二錢生甘草煎湯調服

【永類方】痛不可忍黃耆人參等分爲末以大蘿蔔一個切一指厚大四五片蜜二兩淹炙令盡

不令焦點末食無時以鹽湯下

【本草方】馬蘭花七枚燒故筆頭二七枚燒粟米一合炒爲末每服二錢酒下日二服名退神散

方治小便不利莖中痛欲死用牛膝并葉以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或砂石脹痛用牛膝一兩水二盞煎一盞溫服一婦患此十年服之得效土牛膝亦可或入麝香乳香尤良

【普濟方】黃蜀葵花一兩炒爲末每米飲服一錢名獨聖散

【發明】時珍曰予在鄂渚得九江守王南強書云老人久苦淋疾百藥不效偶見臨汀集要方中用牛膝者服之而愈又葉朝議親人患血淋流下小便在盆內凝如蒟蒻久而有變如鼠形但無足爾百治不效一村醫用牛膝根煎濃汁日飲五服名地髓湯未卽愈而血色漸淡久乃復舊後十年病又作服之又瘥因檢本草見肘后

【聖濟錄】重者取去根本用拔葜二兩爲末每米

飲服二錢後以地椒煎湯浴腰腹須臾卽通也

研勻溫酒服一錢以利爲度

【經驗良方】瓦松卽屋上無根草煎濃湯乘熱熏

●石淋破血

洗小腹約兩時卽通

【主治時珍方】小便淋瀝沙石痛不可忍用玉蜀

黍根葉煎湯頻飲

【楊氏經驗方】痛不可忍用玉株卽薏苡仁也子

葉根皆可用水煎熱飲夏月冷飲以通爲度

【普濟方】疼不可忍用蘿蔔切片蜜浸少時炙乾

數次不可過焦細嚼鹽湯下日三服名瞑眩膏

【普濟方】胡椒朴硝等分爲末每服用二錢白湯

下日二名二拗散

【肘后方】用九肋鼈甲醋炙研末酒服方寸七日

三服石出瘥

【十便良方】用雄鷄膽乾者半兩鷄屎白炒一兩

【外臺祕要】宜破血瞿麥子搗爲末酒服方寸七

日三服三日當下石

【肘后方】車前子二升以絹袋盛水八升煮取三

【傳信適用方】浮石蒲一手爲末以水三升酢一升和煮二升澄清每服一升

【總錄】牛角燒灰酒服方寸七日五服

●小便石淋

【發明】頤曰古方治淋瀝多單使滑石又與石韋同搗末飲服刀圭更快又主石淋取十二分研

粉分作兩服水調下煩熱定卽停後服

【主治時珍方】石淋取細白河沙三升炒熱以酒

三升淋汁服一合日再服

【外臺祕要】宜破血瞿麥子搗爲末酒服方寸七

日三服三日當下石

【肘后方】車前子二升以絹袋盛水八升煮取三

升服之須臾石下

【范汪方】葛蘿掘出根挽斷以盃于坎中承取汁

服一升石當出不出更服

【古今錄驗】桃木膠如棗大夏以冷水二合冬以

湯三合和服日三服當下石石盡即止

【崔元亮海上方】便中有石子者胡桃肉一升細

米煮漿粥一升相和頓服卽瘥

【發明】頌曰今方家治石淋導水用蠟蟬七枚鹽

二兩新瓦上鋪蓋焙乾研末每溫酒服一錢七

卽愈也

【主治別錄方】頌曰古今錄驗治石淋用鯉魚齒

一升研末以三歲醋和分三服一日服盡外臺

治卒淋用酒服時珍曰古方治石淋多用之末

詳其義

【古今錄驗】鷄矢白日中半乾炒香爲末以酸漿

飲服方寸匕日二當下石出

【本草方】用燕屎末以冷水服五錢日服至食時

當尿石水下

【肘后方】髮鬢燒存性研末每用一錢井水服之

●小便氣淋

【千金方】比輪錢三百文水一斗煮取三升溫服

【廣利方】臍痛鹽和醋服之

【普濟方】結澀不通白芷醋浸焙乾二兩爲末煎

木通甘草酒調下一錢連進二服

【聖濟總錄】鷄腸草三兩石韋去毛一兩每用三

錢水一盞煎服

【聖惠方】不通用好綿四兩燒灰麝香半分每服

二錢溫酒連進三服

血淋尿血

【資生經方】苦蕡菜一把酒水各半煎服

血淋熱痛

【千金方】黃芩一兩水煎熱服

【千金方】白薇芍藥各一兩爲末酒服方寸七日

三服

【經驗方】蓮房燒存性爲末入麝香少許每服二

錢半米飲調下日二

【十便良方】痛不可忍香附子陳皮赤茯苓等分

水煎服

【聖惠方】苧根煎湯頻服大妙亦治諸淋

【聖惠方】芭蕉根旱蓮草各等分水煎服日二

【聖惠方】生地黃汁車前葉汁各三合和煎服

【簡便單方】葵花根二錢車前子一錢水煮日服之

【普濟方】作痛車前子晒乾爲末每服二錢車前葉煎湯下

葉煎湯下

【普濟方】但利水道則清濁自分海金沙末新汲水或砂糖水服一錢

水或砂糖水服一錢

【經驗良方】牽牛子二兩半生半炒爲末每服二錢薑湯下良久熱茶服之

【王璆百一選方】酸草搗汁煎五茶散服之俗名醋啾啾是也

【劉長春經驗方】血風草井水擂服三度卽愈

【聖惠方】大豆葉一把水四升煮二升頓服

【經驗良方】茄葉薰乾爲末每服二錢溫酒或鹽

湯下隔年者尤佳

【聖惠方】桑黃槲白皮各二錢水煎服日一次

【楊氏家藏方】桃膠炒木通石膏各一錢水一盞

煎七分食後服

【葉氏方】用乾柿三枚燒存性研末陳米飲服

【經驗方】用白柿烏頭鹽花煎湯入墨汁服之

【本草方】檳榔一枚以麥門冬煎湯細磨濃汁一

盞頓熱空心服日二服

【發明】時珍曰一男子病血淋痛脹死予以藕

汁調髮灰每服二錢服三日而血止痛除

【衛生家寶方】櫻榔皮半燒半炒爲末每服二錢

甚效

【經驗良方】生山梔子末滑石等分葱湯下

【聖惠方】晚蠶蛾爲末熱酒服二錢

【鮑氏方】蟄娘研水服

【經驗方】海螵蛸末一錢生地黃汁調服 又方

海螵蛸生地黃赤茯苓等分爲末每服一錢柏

葉車前湯下

【聖惠方】亂髮燒存性二錢入麝香少許米飲服

●血淋心煩

【聖惠方】石燕子商陸赤小豆紅花等分爲末每服一錢葱白湯調下

●男婦淋血

【百一選方】亦治五淋多年煮酒瓶頭箬葉三五年至十年者尤佳每用七個燒存性入麝香少

許陳米飲下日三服有人患此二服愈福建煮

過夏月酒多有之

【普濟方】用真百藥煎車前子炒黃連各三錢半

二服

●老人血淋

【本草方】車前五合裏煮汁入青梁米四合煮粥飲汁亦能明目引熱下行

●熱淋血淋

【修真祕旨】不拘男女用赤小豆三合慢炒爲末

煨葱一莖搗酒熱調三錢服

●小便熱淋

【肘后方】白茅根四升水一斗五升煮取五升適冷暖飲之日三服

●小便淋瀝

【夷堅志】海金沙草陰乾爲末煎生甘草湯調服

二錢此陳總領方也一加滑石

【聖惠方】馬薊根搗汁服

【聖惠方】馬齒莧汁服之

【朱氏方】乾柿燈心等分水煎日飲

半盞入蜜溫服

●男女淋疾

【肘后方】自取爪甲燒灰水服

【乾坤祕韞】野葡萄根七錢葛根三錢水一鍾煎

七分入童子小便三分空心溫服

●熱淋如血

【衛生家寶方】蠶種燒灰入麝香少許水服二錢

極效方也

【初虞氏古今錄驗】生續斷搗絞汁服卽馬薊根

也

【范汪方】菟絲子煮汁飲

【朱氏集驗方】或有或無用大蒜一個紙包煨熟

露一夜空心新水送下

【普濟方】琥珀爲末二錢麝香少許白湯服之或

萱草煎湯服老人虛人以人參湯下亦可蜜丸

以赤茯苓湯下

●小便渾濁

【普濟方】如精狀木香沒藥當歸等分爲末以刺

棘心自然汁和丸梧子大每食前鹽湯下三十

丸

●急淋陰腫

【外臺方】泥葱半斤煨熟杵爛貼臍上

【本草方】槲葉研末每服三錢水一盞葱白七寸
煎六分去滓食前溫服日二

●婦人患淋

【發明】時珍曰按王執中資生經云一婦人患淋

臥久諸藥不效其夫夜告予予按既效方治諸
淋用剪金花十餘葉煎湯遂令服之明早來云
病減八分矣再服而愈剪金花一名禁宮花一
名金盞銀臺一名王不留行是也

●熱淋莖痛

【聖惠方】烏麻子蔓菁子各五合炒黃絆袋盛以

井華水三升浸之每食前服一錢

服日二取效

【聖惠方】麻皮一兩炙甘草三分水二盞煎一盞

服日二取效

地黃搗取自然汁白沙蜜各五合每服一盞石器溫服

●老人病淋

【壽親養老書】身體熱甚車前子五合綿裹煮汁

入青梁米四合煮粥食常服明日

【奉親書】身熱腹滿小麥一升通草二兩水三升
煮一升飲之卽愈

【養老書】青豆二升橘皮二兩煮豆粥下麻子汁
一升空心漸食之併飲其汁甚驗

●妊娠患淋

【千金方】冬葵子一升水三升煮二升分服

【梅師方】車前子五兩葵根切一升以水五升煎
取一升半分三服以利爲度

●膏淋如油

【仁存方】海金沙滑石各一兩甘草梢二錢半爲末每服二錢麥門冬煎湯服日二次

【本草方】葎草搗生汁三升酢二合合和頓服當

尿下白汁

●腎消膏淋

【聖惠方】病在下焦苦棟子茴香等分炒爲末每溫酒服一錢

【發明】宗奭曰男女虛損腎衰陰痿夢中失精遺溺白濁疝瘕不可闕也隣家一男子小便日數十次如稠米泔心神恍惚瘦瘠食減得之女勞令服桑螵蛸散藥未終一劑而愈其藥安神魄定心志治健忘補心氣止小便數用桑螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯神當歸龜甲醋炙各一兩爲末臥時人參湯調下二錢如無桑上者卽用

他樹者以炙桑白皮佐之桑白皮行水以接螵

螵就腎經也

【聖惠方】羊骨燒研榆白皮煎湯服二錢

●淋癰溺血

【危氏得效方】取乳香中夾舌者研細米飲服一

錢

●胞轉淋閉

【千金方】阿膠三兩水二升煮七合溫服

●尿血不定

【經驗方】鬱金末一兩葱白一握水一盞煎至三

合溫服日三服

●小便尿血

【活人書】元胡索一兩朴硝七錢半爲末每服四

錢水煎服

【談壇翁方】茅根煎湯頻飲爲佳

【姚僧垣集驗方】不止龍膽草一虎口水五升煮

取二升半分爲五服

【指迷方】香附子新地榆等分各煎湯先服香附

湯三五呷後服地榆湯至盡未效再服

【集簡方】荆芥縮砂等分爲末糯米飲下三錢日

三服

【外臺祕要】益母草搗汁服一升立瘥此蘇澄方

【聖惠方】吐血及耳鼻出血生地黃汁半升生薑

汁半合蜜一合和服

【千金方】葵根無灰酒服方寸匕日三

【外臺祕要】車前搗汁五合空心服

【醫學正傳】金陵草一名墨頭草車前草各等分

杵取自然汁每空心服三盃愈乃止

【衛生易簡方】金粟狼牙草焙乾入蚌粉炒槐花

百藥煎等分爲末每服三錢米泔空心調服亦

二錢淡豉湯下立效

治酒病

【衛生易簡方】五葉藤陰乾爲末服二錢白湯下

【千金方】胡麻三升杵碎以東流水二升浸一宿

平旦絞汁頓熱服

【集元方】麪麸炒香以肥猪肉蘸食之

【普濟方】葱白一把鬱金一兩水一升煎二合溫

服一日三次

【楊氏方】蒿苣菜搗傅臍上甚效

【本草方】烏梅燒存性研末醋糊丸梧子大每服

四十九酒下

【濟急方】柏葉黃連焙研酒服三錢

【箇中祕密方】槐花炒鬱金煨各一兩爲末每服

麥穗一兩甘草炙七錢五分山梔子仁炒半兩

【外臺祕要】棘刺三升水五升煮二升分三服

【直指方】琥珀爲末每服二錢燈心湯下

【救急良方】籬下竹根入土多年者不拘多少洗

淨煎湯併服數盃立止

【集簡方】五倍子末鹽梅搗和丸梧子大每空心

酒服五十九

【永類方】髮灰二錢醋湯服

【聖濟錄】人指甲半錢頭髮一錢半燒研末每服

一錢空心溫酒下

●下焦結熱

【千金方】小便淋閉或有血出或大小便出血瞿

爲末每服七錢連鬚葱頭七個燈心五十莖生薑五片水二盃煎至七分時時溫服名立效散

●小便血條

則甚市醫張康以草藥汁一器入少蜜水進兩服而愈求其方乃鏡面草也

●心熱尿赤

【危氏得效方】淡豆豉一撮煎湯空腹飲或入酒服
【本草方】勞傷溺血茅根乾薑等分入蜜一匙水

二鍾煎一鍾日一服

●男婦溺血

【千金方】時珍曰治丈夫婦人無故尿血用胡燕窠中草燒末酒服半錢七

【千丸方】龍骨末水服方寸七日三

●尿後鮮血

【發明】時珍曰按陳日華經驗方云年二十六忽

病小便後出鮮血數點而不疼如是一月飲酒

【錢氏方】面赤唇乾咬牙口渴導赤散用木通生地黃炙甘草等分入水竹葉七片水煎服

●腎消飲水

【保命集方】小便如膏油用茴香炒苦棟子炒等分爲末每食前酒服二錢

●直指秋石丸

【仁齊直指方】治濁氣干清精散而成膏淋黃白赤黯如脂膏蜜油之狀用秋石鹿角膠桑螵蛸炙各半兩白茯苓一兩爲末糕糊丸梧子大每服五十九人參湯下

卷一百一十一 二十一

赤白濁門

●小便赤濁

【普濟方】遠志甘草水煮半斤茯神益智仁各二

兩爲末酒糊丸梧子大每空心聚湯下五十九

【本草方】心腎不足精少血燥口乾煩熱頭暉怔

忡菟絲子麥門冬等分爲末蜜丸梧子大鹽湯

每下七十九

【直指方】心虛者蓮子六一湯用石蓮肉六兩炙

甘草一兩爲末每服一錢燈心湯下

●小便白濁

【發明】時珍曰仁存堂方云小便白濁緣心腎不

濟或由酒色遂至已甚謂之上淫蓋有虛熱而

腎不足故土邪干水史載之言夏則土燥水濁

反甚惟服博金散則水火既濟源潔而流清矣
用絡石人參茯苓各二兩龍骨煅一兩爲末每
服二錢空心米飲下日二服

【魏元君濟生丹】用苡麥炒焦爲末雞子白和丸

梧子大每服五十九鹽湯下日三服

【經驗良方】白糯米丸治人夜小便脚停白濁老人

虛人多此證令人卒死大能耗人精液主頭昏

重用糯米五升炒赤色白芷一兩爲末糯米糊

丸梧子大每服五十九木饅頭煎湯下無此用

局方補腎湯下若後生稟賦怯弱房室太過小

便太多水管塞澀小便如膏脂入石菖蒲牡蠣

粉甚效

【摘元妙方】糯米草煎濃汁露一夜服之

【普濟方】生蘿蔔剜空留蓋入吳茱萸填滿蓋定

簽住糯米飯上蒸熟去茱萸以蘿蔔焙研末糊

丸梧子大每服五十九鹽湯下日三服

【救急良方】陳冬瓜仁炒爲末每空心米飲服五

錢

【本草方】生白果仁十枚搗水飲日一服取效止

【丹溪方】椿根白皮滑石等分爲末粥糊丸梧子

大每空腹白湯下一百丸 又方椿根白皮一

兩半乾薑炒黑白芍藥炒黑黃蘖炒黑各二錢

爲末如上法丸服

【集簡方】清明柳葉煎湯代茶以愈爲度

【經驗良方】構葉爲末蒸餅丸梧子大每服三十

丸白湯下

●腎虛白濁

【聖濟總錄】肉蓯蓉鹿茸山藥白茯苓等分爲末

米糊丸梧子大每棗湯下三十九

●氣虛白濁

【經驗良方】黃芪鹽炒半兩茯苓一兩爲末每服

一錢白湯下

●虛勞白濁

【千金方】榆白皮二升水二斗煮取五升分五服

【千金方】羊骨爲末酒服方寸七日三

●濕痰白濁

【集簡方】牡荆子炒爲末每酒服三錢

●尿渾白濁

【經驗良方】心脾不調腎氣渾濁用厚朴薑汁炙

一兩白茯苓一錢水酒各一碗煎一碗溫服

●脾虛白濁

濟生方過慮傷脾脾不能攝精遂成此疾以羊

脛骨灰一兩薑制厚朴末二兩麪糊丸梧子大

米飲下百丸日二服一加茯苓一兩半

●白濁腹滿

【永類鈐方】不拘男婦用益智仁鹽水浸炒厚朴
薑汁炒等分薑三片棗一枚水煎服

●白濁夢遺

【許學士本事方】半夏一兩洗十次切破以木猪

荅二兩同炒黃出火毒去猪荅入煅過牡蠣粉
兩以山藥糊丸梧子大每服三十九茯苓湯送

下腎氣閉而一身精氣無所管攝妄行而遺者

宜用此方蓋半夏有利性猪荅導水使腎氣通

也與下元虛憊者不同

【和劑局方】茯苓丸治思慮太過心腎虛損真陽

●小便如泔

【衛生寶鑑】乃腎虛也王瓜散用王瓜根一兩白
石脂一兩菟絲子酒浸二兩桂心一兩牡蠣粉
一兩爲末每服二錢大麥粥飲下

●尿白如泔

【經驗方】小腹氣痛茶籠內箬葉燒存性入麝香

少許米飲下

●溲數白濁

【普濟方】熟附子爲末每服二錢薑三片水一盞

煎六分溫服

●濁遺帶下

【本草方】威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不固小

便下濁餘瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫白帶並治之白茯苓去皮四兩作匱以猪苓四錢半入內煮二十餘沸取出日乾擇去猪苓爲末化黃蠟搜和丸彈子大每嚼一丸空心津下以小便清爲度忌米醋李時珍曰抱朴子言茯苓千萬歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光燒之不焦帶之辟兵服之長生和劑局方威喜丸之名蓋取諸此

●白濁頻數

●赤白濁淋

【簡便方】好大黃爲末每服六分以鷄子一個破頂入藥攪勻蒸熟空心食之不過三服愈

【潔古家珍方】及夢洩精滑珍珠粉丸黃蘖炒真蛤粉各一斤爲末每服一百丸空心溫酒下黃蘖苦而降火蛤粉鹹而補腎也 又方加知母炒牡蠣粉煅山藥炒等分爲末糊丸梧子大每服八十九鹽湯下

●分清丸

【摘元方】治濁病用芡實粉白茯苓粉黃蠟化蜜和丸梧子大每服百丸鹽湯下

【本草方】旋面如燈油下如膏乃真元不足下焦虛寒草薢分清飲用草薢石菖蒲益智仁烏藥等分每服四錢水一盞入鹽一捻煎七分食前

溫服日一服效乃止

遺 精 門

●內熱遺精

【活人心統】鐵鏽末冷水服一錢三服止

不過三五服效

●心虛遺精

【唐瑤經驗方】猪心一個批片相連以飛過硃砂末摻入線縛白水煮熟食之

●驚悸遺精

【乾坤祕韞方】木饅頭炒白牽牛等分爲末每服二錢用米飲調下

●盜汗遺精

【普濟方】白茯苓二兩縮砂仁一兩爲末入鹽二錢精羊肉批片摻藥炙食以酒送下

●腎虛遺精

【劉公石保壽堂方】北五味子一斤洗淨水浸接去核再以水洗核去盡餘味通置砂鍋中布瀝

【普濟方】鹿角霜二兩生龍骨炒牡蠣煅各一兩爲末酒糊丸梧子大每鹽湯下四十九

●小便遺精

過入好冬蜜二斤炭火慢熬成膏瓶收五日出火性每空心服一二茶匙百滾湯下

一錢白湯下日二

●精滑不禁

【經驗方】多汗夜夢鬼交用猪腎一枚切開去膜入附子末一錢紙裹煨熟空心食之飲酒一盃

【濟生方】元氣虛寒大腑滯泄手足厥冷陽起石

●腎虛失精

【千金方】鹿膠三兩研末以酒二盞化服日三服

●虛滑遺精

煅研鍾乳粉各等分酒煮附子末用麪糊丸梧

子大每空心米飲服五十丸以愈爲度

●夢遺白濁

【藏器方】用韭子每日空心生吞一二十粒鹽湯下
聖惠治虛勞傷腎夢中洩精用韭子二兩
微炒爲末食前溫酒服二錢七

●白濁遺精

【本草方】石蓮肉龍骨益智仁等分爲末每服二
錢空心米飲下
普濟用蓮肉白茯苓等分爲
末白湯調服

【本草方】心虛不靈金鎖玉關丸用藕節蓮花鬚

蓮子肉芡實肉山藥白茯苓白茯神各二兩爲
末用金櫻子二斤搗碎以水一斗熬八分去滓
再熬成膏入少麵和藥丸子梧每服七十九米

飲下

【外臺方】盜汗虛勞桑螵蛸炙白龍骨等分爲細
末每服二錢空心用鹽湯送下

【唐氏方】晚歸蛾焙乾去翅足爲末飯丸綠豆大
每服四十九淡鹽湯下此丸當常以火烘否則
易霉溼也

之

【潔古方】因陽盛陰虛故精泄也珍珠粉丸主之
用蛤粉煅一斤黃柏新瓦炒過一斤爲細末白
水丸如梧子大每服一百丸空心用溫酒下日
二次蛤粉味鹹而且能補腎陰黃柏苦而降心
火也

【本草方】白果蓮肉江米各五錢胡椒一錢爲末
烏骨雞一隻如常治淨腹裝木瓜煮熟空心食

漏精白濁

【直指方】雪白鹽一兩并築緊固濟煅一日出火

毒白茯苓山藥各一兩爲末棗肉和蜜丸梧子大每棗湯下三十九粒甘以濟鹹脾胃兩得也

【發明】時珍曰治遺精用韭菜五合白龍骨一兩爲末空心酒服方寸七千金方治夢遺小便數用韭菜二兩桑螵蛸一兩微炒研末每旦酒服

二錢三因方用治下元虛冷小便不禁或成白

濁有家韭菜丸蓋韭菜乃肝之菜入足厥陰經腎主閉藏肝主疎洩素問曰足厥陰病則遺尿思想無窮入房太甚發爲筋痿及爲白淫男隨溲而下女子綿綿而下韭菜之治遺精漏泄小便頻數女人帶下者能入厥陰補下焦肝及命門之不足命門者藏精之府故同治云

●腎消溢精

【普濟方】胡桃丸治腎消病因房慾無節及服丹

石或失志傷腎遂致水弱火強口舌乾精自溢出或小便赤黃大便燥實或小便大利而不甚渴用胡桃肉白茯苓各四兩附子一枚去皮切斤薑汁蛤粉同焙爲末蜜丸梧子大每服三十丸米飲下

●夢遺失精

【外臺祕要】薰草湯用薰草人參白朮白芍藥生

地黃各二兩茯神桂心甘草炙各二兩大棗十二枚水八升煮三升分二服

【外臺祕要】蘇子一升熬杵研末酒服方寸七日

再服

【醫林集要】乳香一塊拇指大臥時細嚼含至三

更嘸下三五服卽效

【本草方】狗頭鼻梁骨燒研臥時酒服一錢

●虛勞弱精

【外臺祕要】用新韭子二升十月霜後采之好酒

八合漬一宿以清明日童子向南搗一萬杵平

旦溫酒服方寸七日再服之

【和劑方】玉鎖丹治腎經虛損心氣不足思慮太

過真陽不固澀有餘瀝小便白濁如膏夢中頻

遺骨節拘痛而黧肌瘦盜汗虛煩食減乏力此

方性溫不熱極有神效用五倍子一斤白茯苓

四兩龍骨二兩爲末水糊丸梧子大每服七十

丸食前用鹽湯送下日三服

【外臺方】白膠二兩炙爲末酒二升和溫服

●積熱夢遺

【許學士本事方】心忪恍惚膈中有熱宜清心丸

主之黃蘖末一兩片腦一錢鍊蜜丸梧子大每服十五丸麥門冬湯下此大智禪師方也

●心虛夢洩

【直指方】或白濁白茯苓末二錢米湯調下日二

服蘇東坡方也

●陰虛夢泄

【醫壘元戎】九肋鼈甲燒研每用一字以酒半盞

童尿半盞葱白七寸同煎去葱日晡時服之出

臭汗爲度

●勞心夢泄

【心統方】龍骨遠志等分爲末煉蜜丸如梧子大
砂爲衣每服三十九蓮子湯下

●睡卽洩精

【梅師方】白龍骨四分垂子五合爲散空心酒服

方寸七

●夢洩遺尿

【千金方】垂子一升稻米二斗水一斗七升煮粥

取汁六升分三服

●夢遺便溏

【丹溪方】牡蠣粉醋糊丸梧子大每服三十九米

飲下日二服

●夢遺食減

【劉松石保壽堂方】白色苦參三兩白朮五兩牡

蠣粉四兩爲末用雄猪肚一具洗淨砂罐煮爛

石臼搗和藥乾則入汁丸小豆大每服四十九

米湯下日三服久服體肥食進而夢遺立止

●小便白淫

【普濟方】因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服三十九煎補骨脂湯下日三服

●精氣不固

【三因方】破故紙青鹽等分同炒爲末每服二錢

米飲下

●益精固精

【鄧才雜興方】補血黑髮益壽有奇效還筒子半

兩芡實半兩金銀花二兩破故紙酒浸春三夏

一秋二冬五日焙研末二兩各研末蜜糊丸梧子大每服五十九空心鹽湯溫酒任下鄭西泉所傳方也

●滋陰養血

【潔古活法機要】溫補下元三才丸用天門冬去

心生地黃二兩二味用柳覓簾以酒洒之九蒸

九晒待乾秤之人參一兩爲末蒸棗肉搗和丸

梧子大每服三十九食前溫酒下日三服

●固精強骨

【集簡方】金毛狗脊遠志肉白茯神當歸身等分

爲末煉蜜丸梧子大每酒服五十九

●固元丹

【王璆百一選方】治元臟久虛遺精白濁五淋及

小腸膀胱疝氣婦人赤白帶下血崩便血等疾

悉煉服門

●四精丸

【永類方】治思慮色慾過度損傷心氣小便頻數

遺精用秋石白茯苓芡實蓮肉各二兩爲末蒸

棗和丸梧子大每服三十九空心鹽湯送下

●秋石交感丹

【鄭氏家傳方】治白濁遺精秋石一兩白茯苓五

錢菟絲子炒五錢爲末用百沸湯一盞井華水

一盞煮糊丸梧子大每服一百丸鹽湯下

癩 瘡 門

●小腸疝氣

【直指方】壅縮囊腫者用浮石爲末每服二錢木

通赤茯苓麥門冬煎湯調下 丹溪方用海石

香附等分爲末每服二錢薑汁調下

【壽域方】代赭石火煅醋淬爲末每白湯服二錢

【孫天仁集效方】黑參咬咀炒爲丸每服一錢半

空心酒服出汗卽效

【直指方】危急者元胡索鹽炒全蠍去毒生用等

【孫天仁集效方】青木香一兩酒三斤煮過每日

飲三次

【直指方】胡蘆巴炒研末每服二錢茴香酒下

【寇氏本草衍義】木賊細剉微炒爲末沸湯點服

二錢緩服取效 一方用熱酒下

【丹溪纂要】濕熱因寒鬱而發用梔子降濕熱烏

頭破寒鬱烏豆爲梔子所引其性急速不留胃
中也用川烏頭山梔子各一錢爲末順流水入
薑汁一匙調下

【本草方】倉卒散治寒疝腹痛小腸氣膀胱氣脾

腎諸痛攀急難忍汗出厥逆大附子炒去皮臍

一枚山梔子炒焦四兩每用二錢水一盞酒半

盞煎七分入鹽一捻溫服 宣明方治陰疝小

糊爲丸酒服五十九

【孫天仁集效方】蕎麥仁炒去尖胡蘆巴酒浸晒

乾各四兩小茴香炒一兩爲末酒糊丸梧子大
每空心鹽酒下五十九兩月大便出自白膜去根

【本草方】遠臍衝心連蒂老絲瓜燒存性研末每

服三錢熱酒調下甚者不過二三服卽消

【直指方】大棗一枚去核用斑蝥一枚去頭翅入

棗肉紙包煨熟去蝥食棗以桂心畢澄茄湯下

【主治時珍方】小腸疝氣及陰核腫痛橘核炒研

五錢老酒煎服或酒糊丸服甚效

【奇效良方】胡桃一枚燒灰研末熱酒服之

【和劑局方】奪命丹治遠年近日小腸疝氣偏墜

掣疼臍下撮痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋

長及陰間濕痒成瘡用吳茱萸去梗一斤分作四分四兩酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童子小便浸一宿同焙乾澤瀉二兩爲末酒糊丸梧子大每服五十九空心鹽湯或酒吞下名星斗

丸

【孫天仁集效方】烏藥一兩升麻八錢水二鍾煎一鍾露一宿空心熱服

【經驗方】本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一

百個溫湯浸去過皮巴豆二百個微打破以麪二升同於銅鑄內炒至金鉛子赤爲度放冷取出去核爲末巴麪不用每服三錢熱酒或醋湯

調服 一方入鹽炒茴香半兩

【宣明方】地膽去翅足頭微炒硃砂各半兩滑石一兩爲末每酒食前調服二錢即愈

【本草方】用緊小全蠍焙爲末每發時服一錢入麝香半字溫酒調服少頃再進神效

【生生編】每頓用鯽魚十個同茴香煮食久食自愈

【本草方】鷄子黃攪溫水服之三服效

【瑞竹堂方】用帶毛雀兒一枚去腸入金絲礬末五錢縫合以桑柴火煨成炭爲末空心無灰酒服年深者二服愈

【本草方】用豬脬一枚洗入小茴香大茴香破故紙川練子等分填滿入青鹽一塊縛定酒煮熟食之酒下其藥焙搗爲丸服之

●卒得疝氣

【肘后方】小腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死者沙參搗篩爲末酒服方寸七立瘥

●疝氣危急

【簡便方】地膚子卽落蒂子炒香研末每服一錢

酒下

【孫天仁集效方】天仙藤一兩好酒一盃煮至半

每鹽酒下五十九

●奔豚疝氣

盜服之神效

●疝氣卵腫

【本事方】脹痛不可忍噙珠丸用硇砂乳香各二

錢黃蠟一兩研鎔和丸分作一百單八丸以線

穿露一夜次日取出蛤粉爲衣每用一丸乳香

●疝氣偏腫

湯吞下日二服取效

●疝氣入腎

【簡便方】茴香炒作二包更換熨之

【簡便方】五月五日采穀樹葉陰乾爲末每服二

匙空心溫酒下

●木腎疝氣

【醫學集成】楮葉雄黃等分爲末酒糊丸梧子大
七箇巴豆七枚去皮油爲末糕糊丸梧子大硃
砂麝香爲衣每服二丸空心冷酒或冷鹽湯下
三兩日一服不可多

●疝氣偏腫

三兩日一服不可多

【儒門事親】甘遂茴香等分爲末酒服二錢

【本草蒙筌】刲之立住用綿袋包陰囊取天花粉

五錢以醇酒一盃浸自卯至午微煎滾露一夜
次早低凳坐定兩手按膝飲下卽愈未下再一
服

【衛生易簡方】山棠棣肉茴香炒各一兩爲末糊之

丸梧子大每服一百丸空心白湯下

【保幼大全】胡桃蒼耳心子各七枚爲末入新生

兒衣一副研入之每服一錢空心熱酒下

●膀胱疝氣

【發明】宗奭曰膀胱氣用胡蘆巴合桃仁炒等分爲末

分爲末半爲散半以酒糊和丸梧子大每服五

七十九空心鹽酒下其散以熟米飲下與丸子
相間空心服日各一二服

【本事方】用舶茴香杏仁各一兩葱白焙乾五錢

爲末每酒服二錢噙胡桃送下 集簡治疝氣

膀胱小腸痛用茴香鹽炒晚蠶沙鹽炒等分爲

末煉蜜丸彈子大每服一丸溫酒噙下

【主治大明】膀胱氣痛腎冷橘核炒研每溫酒服

一錢或酒煎服之

【海藥本草】檳榔十二枚一生一熟爲末酒煎服
之良此太醫秦鳴鶴方也

●陰癩偏腫

【千金方】氣脹不能動者牡丹皮防風等分爲末

酒服二錢甚效

【壽域神方】荆芥穗瓦焙爲散酒服二錢卽消

【本草方】偏墜或小腸疝氣下元虛冷久不愈者
沉香內消丸主之沉香木香各半兩胡蘆巴酒
浸炒小茴香炒各二兩爲末酒糊丸梧子大每

服五七十九鹽酒下

【梅師方】作痛大黃末和醋塗之乾則易

楊起簡便方】白附子一個爲末津調填臍上以

艾灸三壯或五壯卽愈

【壽域神方】痛甚者木鼈子一個磨醋調黃蘖芙蓉末傅之即愈

【吳球活人心統】天門冬三錢烏藥五錢以水煎服

【鄧才筆峯雜興】大茴香末一兩小茴香末一兩用牙猪尿胞一個連尿入二末於內繫定罐內以酒煮爛連胞搗丸如梧子大每服五十九白湯下仙方也

【孫氏方】用荔枝核炒黑色大茴香炒等分爲末每服一錢溫酒下 皆效方玉環來笑丹用荔枝核四十九個陳皮連白九錢硫黃四錢爲末鹽水打麪糊丸綠豆大遇痛時空心酒服九丸良久再服不過三服甚效如神亦治諸氣痛

【危氏得效方】敗精惡血結在陰囊所致用阿魏

二兩醋和蕎麥麵作餅裹之煨熟大檳榔二枚鑽孔鎔乳香填滿亦以蕎麥麵裹之煨熟入硇砂末一錢赤芍藥末一兩糊丸梧子大每食前酒下三十九

【澹寮方】棟實丸治鈎腎偏墜痛不可忍用川棟子肉五兩分作五分一兩用破故紙二錢炒黃一兩用小茴香三錢食鹽半錢同炒一兩用萊菔子一錢同炒一兩用牽牛子三錢同炒一兩用斑蝥七枚去頭足同炒棟去食鹽萊菔牽牛斑蝥只留故紙茴香同研爲末以酒打麪糊丸梧子大每空心酒下五十九 得效方棟實丸治一切疝氣腫痛大有神效用川棟子酒潤取肉一斤分作四分四兩用小麥一合斑蝥四十九個同炒熟去蝥四兩用小麥一合用巴豆四

十九枚同炒熟去豆四兩用小麥一合巴戟肉一兩同炒熟去戟四兩用小茴香一合食鹽一兩同炒熟去鹽加破故紙酒炒一兩廣木香不見火一兩爲末酒煮麵糊丸梧子大每服五十

丸空心鹽湯下日三服

直指方棟實丸治外

腎脹大麻木痛破及奔豚疝氣用川棟子四十

九個分七處切取肉七個用小茴香五錢同炒

七個用破故紙二錢半同炒七個用黑牽牛二

錢半同炒七個用食鹽二錢同炒七個用蘿蔔

子二錢半同炒七個用巴豆十四個同炒七個

用班蝥十四個去頭足同炒揀去蘿蔔子巴豆

班蝥三味不用入青木香五錢南木香官桂各

二錢半爲末酒煮麵糊丸梧子大每服三十九

食前用鹽湯下一日三服

【本草方】用五倍子一個放食鹽少許在內以火紙包定用水浸濕放文武火灰內煨存性爲末酒調服

【談塋翁方】青娘子紅娘子各十枚白麵拌炒黃

色去前二物熟湯調服立效也

●狐疝陰癲

【必效方】追越舉重卒得陰癲及小兒狐疝傷損

生癩並用地膚子五錢白朮二錢半桂心五分

爲末飲或酒服三錢忌生葱桃李

【發明】頌曰張仲景治陰狐疝氣偏有大小時時

上下者蜘蛛散主之蜘蛛十四枚炒焦桂半兩

爲散每服八分日再或以蜜丸亦通

●癩疝脹痛

【瀕湖集簡方】及小腸氣痛香附末二錢以海藻

一錢煎酒空心調下并食海藻

●卵腫偏墜

●偏墜腫痛

【劉松石保壽堂方】用雙蒂茄子懸于房門上出

入用眼視之茄蕷所患亦蕷茄乾亦乾矣 又

法用雙茄懸門上每日抱兒視之二三次打鍼

于十餘日消矣

【劉松石保壽堂方】絲瓜架上初結者留下待瓜

結盡葉落取下燒存性爲末煉蜜調成膏每晚

好酒服一匙如在左左睡在右右睡

●陰疝欲死

【肘后方】凡縮入腹急痛欲死狼毒四兩防風二

兩附子三兩燒以蜜丸梧子大每服三丸日夜

三度白湯下

【肘后方】發時腫痛如刺用生射干搗汁與服取

【醫方摘要】陳石灰炒五倍子山梔子等分爲末
藥和醋調傅之一夜卽消

【法天生意方】雞頭根切片煮熟鹽醋食之

【集簡方】蘇方木二兩好酒一壺煮熟頻飲立好

【簡便方】芙蓉葉黃蘆各三錢爲末以木蠶子仁

一個磨醋調塗陰囊其痛自止

【直指方】腎冷疝氣用生雀三枚燎毛去腸勿洗

以舶上茴香三錢胡椒一錢縮砂肉桂各二錢

入肚內濕紙裹煨熟空心服之酒下良

●寒疝腹痛

【聖惠方】小腹陰中相引痛自汗出欲死以丹參

一兩爲末每服二錢熱酒調下

【肘后方】來去用烏雞一隻治如常法生地黃七

斤剉細餌中同蒸下以銅器盛取汁清旦服至日晡令盡其間當下諸寒澼訖作白粥食之久病者作三劑

【張仲景金匱玉函方】遠臍手足厥冷自汗出脈

弦而緊用大烏頭煎主之大烏頭五枚去臍水三升煮取一升去滓納蜜二升煎令水氣盡強

人服七合弱人服五合不瘥明日再服

●寒疝身痛

【金匱玉函】腹痛手足逆冷不仁或身痛不能眠用烏頭桂枝湯主之烏頭一味以蜜二斤煎減半入桂枝湯五合解之得一升初服二合不知再服又不知加至五合其知者如醉狀得吐爲中病也

●寒疝引脅

【崔氏方】肋心腹皆痛諸藥不效者大烏頭五枚去角四破以白蜜一斤煎令透取焙爲末別以熟蜜和丸梧子大每服二十九冷鹽湯下永除

●寒疝往來

【肘后方】吳茱萸一兩生薑半兩清酒一升煎溫

分服

●寒疝諸疾

【發明】時珍曰胡盧巴右腎命門藥也元陽不足

冷氣潛伏不能歸元者宜之宋惠民和劑局方有胡盧巴丸治大人小兒小腸奔豚偏墜及小腹有形如卵上下走痛不可忍者用胡盧巴八錢茴香六錢巴戟去心川烏頭炮去皮各二錢棟實去核四錢吳茱萸五錢並炒爲末酒糊丸

梧子大每服十五丸小兒五丸鹽酒下太醫薛

已云一人病寒疝陰囊腫痛服五苓諸藥不效

與此而平也

【姚僧坦集驗方】寒疝不能食及腹內一切諸疾

消食肥肌馬蘭子一升每日取一把以麪拌煮

吞之服盡愈

●寒疝滑泄

【濟生方】腹痛腸鳴自汗厥逆熟附子去皮臍元

胡索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞

薑七片煎七分溫服

●冷氣疝瘕

【方廣心法附餘】胡蘆巴酒浸晒乾蕎麥炒研麪

各四兩小茴香一兩爲末酒糊丸梧子大每服

五十九丸空心鹽湯或鹽酒下服至兩月大便後

出白膿則除根
●小腸氣墜

【直指方】用八角茴香小茴香各三錢乳香少許

水服取汗 孫氏集效方治小腸疝氣痛不可

忍用大茴香荔枝核炒黑各等分研末每服一

錢溫酒調下 濱湖集簡方用大茴香一兩花

椒五錢炒研每酒服一錢

●血疝初起

【集簡方】胡椒菜葉搘按揉之

●下部卒痛

【肘后方】如烏啄之狀用小豆大豆各一升蒸熟

作二囊更互坐之即止

●膀胱石水

【集驗方】四肢瘦削小腹脹滿構根白皮桑根白

皮各二斤白朮四兩黑大豆五升流水一斗煮
四升入清酒二升再煮至三升日再一七服之

●小腸臟氣

【楊子建護命方】非時痛不可忍蓬莪茂研末空

心葱酒服一錢

●婦人疝痛

【纂要奇方】名小腸氣馬鞭草一兩酒煎滾服以

湯浴身取汗甚妙

●昆布臘

【廣濟方】治膀胱結氣急宜下氣用高麗昆布一

斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斛煮熟劈

薑橘末調勻食之仍宜食梁米梗米飯極能下氣無所忌海藻亦可依此法作之

古今名醫驗方類編卷三十二

服此兩劑卽合口乃韶州劉從周方也

下部

男陰門

●陰下懸癰

【李迅癰疽方】生於穀道前後初發如松子大漸如蓮子數十日後赤腫如桃李成膿卽破破則

難愈也用橫文甘草一兩四寸截斷以溪澗長

流水一盃河水井水不用以文武火慢慢蘸水

炙之自早至午令水盡爲度劈開視之中心水

潤乃止細剉用無灰好酒二小盃煎至一盃溫

服次日再服便可保無虞此藥不能急消過二

十日方得消盡興化守康朝病已破衆醫拱手

●下部懸癰

【永類鈐方】擇人神不在日空心用井華水調百藥煎末一盃服之微利後却用秋葫蘆一名苦不老生在架上而苦者切片置瘡上灸二七壯

蕭端式病此連年一灸遂愈

●陰囊濕痒

【經驗方】熟炭紫蘇葉末撲之

【主治藏器方】丈夫陰囊濕痒及陰汗鑄鐘黃土

細末撲之

【本草方】密陀僧末傳之 戴氏加蛇床子末

【集簡方】陰下濕汗滑石一兩石膏煅半兩枯白

礬少許研繆之

【直指方】爐甘石一分真蚌粉半分研末撲之

【御藥院方】枯礬撲之及泡湯沃洗

【古今錄驗】甘草煎湯日洗三五度

【趙真人濟急方】綿黃耆酒炒爲末以熟豬心點

喫妙

【濟急仙方】石菖蒲蛇床子等分爲末日搽二三

次

【千金方】蒲黃末傅三四度瘥

【本草方】大蒜淡豉搗丸梧子大硃砂爲衣每空

腹燈心湯下三十九

【外臺祕要】吳茱萸煎湯頻洗取效

【簡便方】欲潰者用板兒松香爲末紙卷作筒每

根入花椒三粒浸燈盞內三宿取出點燒淋下

油擦之先以米泔洗過

【簡便方】松毛煎湯頻洗

【孟詵必效方】槐樹北面不見日枝煎水洗三五

遍冷再煖之

【太平聖惠方】出水不瘥用五倍子臘茶各五錢

膩粉少許研末先以葱椒湯洗過香油調擦以
瘥爲度

【醫宗三法】龍骨牡蠣粉撲之

【醫宗三法】烏賊骨蒲黃撲之

●腎囊風痒

【直指方】川椒杏仁研膏塗掌心合陰囊而臥甚

效

【濟急仙方】以稻草燒皂角烟熏十餘次即止
【救急方】用豬尿胞火炙以鹽酒吃之

●囊瘡痒痛

【經驗方】紅椒七粒葱頭七個煮水洗之一人途

中苦此湘山寺僧授此方數日愈名驅風散

【經驗方】用蠟面茶爲末先以甘草湯洗後貼之

妙

【總微論】紫梢花一兩胡椒半兩煎湯溫洗數次

卽愈

●玉莖濕痒

【攝生方】肥皂一個燒存性香油調擦卽愈

●陰濕瘡疤

【梅師方】硫黃傅之日三

●陰囊濕瘡

【千金方】腎有勞熱麻黃根石硫黃各一兩米粉

一合爲末傅之

【外臺祕要】車前子煮汁頻洗

●陰痒生瘡

【肘后方】胡麻嚼爛傅之良

●下焦虛冷

【心鏡】脚膝無力陽事不行用羊腎一枚煮熟和

米粉六兩煉成乳粉空腹食之妙

●陰虱作痒

【劉長春方】陰毛際肉中生蟲如虱或紅或白痒

不可忍者白果仁嚼細頻擦之取效

●陰冷發悶

【千金方】冷氣入腹腫滿殺人醋和熱灰頻熨之

白傅之

【千金方】冷氣入腹腫滿殺人醋和熱灰頻熨之

●陰下痒痛

【千金方】漸入囊內腫滿殺人車前子末飲服方

寸七日二服

【千金方】漸入腹腫滿醋和麪熨之

【主治時珍方】陰下冷痛入腹則腫滿殺人莧根

搗爛傳之

●陰冷入腹

【千金方】有人陰冷漸冷氣入陰囊腫滿日夜疼悶欲死以布裹椒包囊下熱氣大通日再易之以消爲度

【千金方】以食茱萸納牛膽中百日令乾每取二

七枚嚼納陰中良久如火

●腎邪冷氣

【朱氏集驗方】力弱者用大茴香六兩分作三分

用生附子一個去皮分作三分第一度用附子

一分茴香一分同炒黃出火毒一夜去附子研

茴香爲末空心鹽酒下一錢第二度用二味各

一分同炒存性出火毒以附子去一半留一半

同茴香爲末如前服第三度各一分同炒存性出火毒全研爲末如前服之

●腎臟虛冷

【聖濟總錄】腹脇脹滿胡盧巴炒二兩熟附子硫黃各七錢五分爲末酒煮麵糊丸梧桐子大每鹽湯下三十九

【聖濟總錄】氣攻腹脇脹滿疼痛用大木瓜三十枚去皮核剜空以甘菊花末青鹽末各一斤填滿置籠內蒸熟搗成膏入新艾絨二斤搜和丸

如梧子大每米飲下三十九日二

●風冷傷腎

【陶隱居得效方】腰背虛痛杜仲一斤切炒酒二升漬十日日服三合 三因方杜仲爲末每日

故帛裹包腫處仍以熱湯洗之

升漬十日日服三合 三因方杜仲爲末每日

以溫酒服二錢

●陰莖熱瘡

【主治藏器方】稍瓜燒灰傅之

●男陰卒腫

【本草方】釜月下土和鷄子白傅之

【子母祕錄】鐵精粉傅之

【永類鈐方】脹痛蛇床子末鷄子黃調傅之

【集驗方】大如升核痛人所不能治白馬鞭草搗

塗之

【外臺方】作痒用桃仁炒香爲末酒服方寸七日

二仍搗傅之

●陰腫痛痒

【集驗方】柳枝三尺長二十枚細剉水煮極熱以

【醫壘元戎】荷葉浮萍蛇床子等分煎水日洗之

【梅師方】牛屎燒灰酒和傅之

●陰腫如斗

【永類鈐方】如刺汗出者小蒜一升韭根一升楊

柳根二斤酒三升煎沸乘熱熏之

【集驗方】生蔓菁根搗封之治人所不能治者

【本草方】荔枝核青橘皮茴香等分各炒研酒服

二錢日三

【肘后方】取雞翅毛一孔生兩莖者燒灰飲服左腫取右翅右腫取左翅雙腫並取

●時疾陰腫

【外臺方】囊及莖皆熱腫以羊屎黃藥煮汁洗之

●陰囊腫痛

【本草方】葱白乳香搗塗卽時痛止腫消 又方

用煨葱入鹽杵如泥塗之

【本草方】蒿苣子一合搗末水一盞煎五沸溫服

●腎莖腫痛

【本草方】荔枝核燒研酒服二錢

【本草方】橄欖核荔枝核山楂核等分燒存性研

末每服二錢空心茴香湯調下

●水注囊腫

【初虞世古今錄驗方】牡蠣煅粉三兩乾薑炮一

兩研末冷水調糊掃上須臾囊熱如火乾則再

上小便利卽愈 一方用葱十白

通司周卜毛

不用乾薑

●勞復卵腫

【肘后方】或縮入腹中絞痛身體重頭不能舉小

腹急熱拘急欲死用蚯蚓二十四枝水一斗煮取三升頓服取汗或以蚯蚓數升絞汁服之並

良

●外腎偏腫

【梅師方】桂末水調方寸匕塗之

●陰腫極痛

【永類鈐方】馬齒莧搗傅之良

●陰潰囊腫

【集簡方】木蓮卽木饅頭燒研酒服二錢 又方

木饅頭子小茴香等分爲末每空心酒服二錢

又文

● 陰疽腫毒

【發明】楊清叟曰凡風寒濕痺骨內冷痛及損傷

入骨年久發痛或一切陰疽腫毒並宜草烏頭

南星等分少加肉桂爲末薑汁熱酒調塗未破

者能內消久潰者能去黑爛二藥性味辛熱能

破惡塊逐寒熱遇冷卽消遇熱卽潰

● 外腎陰瘡

【便民圖纂】蚯蚓屎二分綠豆粉一分水研塗之

乾又上之

【藥性論】痛爛者以豉一分蚯蚓濕泥二分水研

和塗上乾卽易之禁熱食酒蒜芥菜

【扁鵲方】莖及頭潰爛痛不可忍久不瘥者以五

傅

【千金方】蜜炙甘草末頻頻塗之神效

【千金翼】人不能治者鱉甲一枚燒研雞子白和

● 下疳陰瘡

【奇效方】用溪港年久螺螄燒灰傅之

【外科方】用孩兒茶末米泔洗淨傅之神效或加

胡黃連等分 糜奇方孩兒茶一錢珍珠一分

食等物甚效

【丹溪方】絲瓜連子搗汁和五倍子末頻擦之

【奇效方】臭腐用豬胞一枚連尿去一半留一半

以煅紅新磚焙乾爲末入黃丹二錢繆之三五

次瘻先須以葱椒湯洗

【奚囊方】牛蹄甲燒灰油調敷之

● 陰頭生瘡

片腦半分爲末傅之 唐氏方用孩兒茶一錢

輕粉一分片腦一字爲末搽之

【主治時珍方】鏡鏽卽鏡上綠也同五倍子等分

米泔洗後傅之

【萬表積善堂方】輕粉末乾繆之卽結翳而愈

【通妙邵真人方】爐甘石火煅醋淬五次一兩孩兒茶三錢爲末麻油調傅立愈

【儒門事親】浮海石燒紅醋淬數次二兩金銀花一兩爲末每服二錢半水煎服病在上食後在下食前一年者半年愈

【孟訣食療本草】產門蟲疳痛痒不可忍用杏仁

去皮燒存性杵爛綿裏納入陰中取效

【趙原陽方】生白果杵塗之

【乾坤生意】橄欖燒存性研末油調敷之或加孩

兒茶等分

【肘后方】有二種一者陰蝕作白膿出一者只生

熱瘡熱瘡用黃藥黃芩等分煎湯洗之仍以黃藥黃連作末傅之 又法黃藥煎湯洗之塗以白蜜

【洪邁夷堅志方】妒精下疳大訶子燒灰入麝香少許先以米泔水洗後搽之或以荆芥黃藥甘草馬鞭草葱白煎湯洗亦可昔方士周守真醫唐靖爛莖一二寸用此取效也

【集簡方】破絲網燒灰存性孩兒茶各等分研末

以濃茶洗淨搽之三五次效忌生冷房事發物

【全幼心鑑】用五倍子枯礬等分研末先以薑水洗過搽之 杏林摘要用五倍子花椒去子炒

各一錢細辛焙三分爲末先以葱湯洗淨搽之

二二日生肉也

【簡便單方】白海蛇卽貝子也三個煅紅研末搽

之

【杏林摘要】雞卵殼炒研油調傅之

【龔氏經驗方】駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分

爲末搽之卽效

【心鑑】髮灰一錢棗核七個燒研洗貼

【本草方】男子陰瘡因不忌月事行房陰物潰爛

用室女血衲燒存性研末麻油調傅之

【楊氏方】蠶繭盛頭垢再以一繭合定煅紅出火

研搽

● 厥精陰瘡

【集簡方】鉛粉二錢銀杏仁七個銅錢內炒至香

黃去杏取粉出火毒研搽效

【千金方】黃礬青礬麝香等分爲末傅之不過三度

【醫林集要】大田螺二個和殼燒存性入輕粉同

研傅之效

● 陰頭瘡

【經驗方】雞內金不落水拭淨新瓦焙脆出火毒

爲細末先以米泔水洗瘡乃搽之亦治口瘡

【肘后方】蝦蟆灰兔屎等分爲末傅之

【千金方】男女陰蝕用肥豬肉煮汁洗不過二十斤瘥

● 陰上粟瘡

【外臺祕要】取停水濕處乾卷皮爲末傅之神效

● 男女下瘡

【簡便單方】母豬糞黃泥包煅存性爲末以米泔

洗淨搽立效

● 鰭上便毒

【醫林集要】鯽魚一枚山藥五錢同搗爛敷之卽效

● 便毒初起

【發明】時珍曰以胡桃同嚼食二三枚能消便毒便毒屬肝金伐木也

【集簡方】極力提起令有聲以鐵秤錘摩壓一日一夜卽散

【多能鄙事】貫衆酒服二錢良

【王永輔惠濟方】一枝箭搗爛塗之卽消若毒太甚者洗淨以生白酒煎服得微汗卽愈

【儒門事親】冬葵子末酒服二錢

【永類鈐方】淮人用黃蜀葵子七七粒皂角半挺

爲末以石灰同醋調塗之

【發明】震亨曰射干屬金有木與火行太陰厥陰之積痰故治便毒此足厥陰濕氣因疲勞而發取射干三寸與生薑同煎食前服利三兩行甚效

【瀕湖集簡方】芫根搗水服以渣傅之得下卽消黃州熊珍所傳

【李仲南永類方】黃瓜蔓一個黃連五錢水煎連服效

【萬表積善堂方】不問已潰未潰或初起發熱用

金銀花俗名甜藤采花連莖葉自然汁半碗煎八分服之以渣傅上敗毒托裏散氣和血其功

獨勝

【證治要訣】生菖蒲根搗傅之

【本草方】葱白炒熱以布包熨數次乃用傅藥卽消 永類方用葱根和蜜搗傅以紙護之外服

通氣藥卽愈

【儒門事親方】用胡桃七個燒研酒服不過三服

見效 楊氏經驗方用胡桃三枚夾銅錢一個

食之卽愈

【袖珍方】皂角炒焦水粉炒等分研末以熱醋調

攤貼患處頻以水潤之卽效 又方用豬牙皂

角七片煨黃去皮弦出火毒爲末空心溫酒服

五錢

【簡便方】肥皂搗爛傅之甚效

【陸氏積德堂方】雞子一個開孔入紅娘子六個

紙包煨熟去紅娘子食雞子以酒下小便淋瀝

出濃血卽愈

【東垣方】不拘已成未成隨卽消散斑蝥三個去翅足炒滑石三錢同研分作三服空心白湯下日一服毒從小便出如痛以車前木通澤瀉豬苓煎飲名破毒散甚效

【壽域神方】大黑蜘蛛一枚研爛熱酒一碗攬服隨左右側臥取利不退再服必效

服取汁卽散

【濟生祕覽】黃脚蜈蚣一條瓦焙存性爲末酒調

末二兩入麝香少許每服二錢半溫酒下

【仁齋直指方】穿山甲插入穀芒熱灰中炮焦爲乘熱研爛貼之 戴氏治露痕卽羊核用石首膠一兩燒存性研末酒服外以石菖蒲生研罨

之效

今名醫驗方類編

【直指方】水膠溶化塗之卽散

●囊濕精少

【發明】時珍曰石斛氣平味甘淡微鹹陰中之陽

降也乃足太陰脾足少陰右腎之藥深師云囊

濕精少小便餘瀝者宜加之一法每以二錢

入生薑一片水煎代茶飲甚清肺補脾也

●魚口毒瘡

【救急良方】白礬枯研寒石麪糊調傅上卽消

【楊誠經驗方】端午日午時取樹上青胡桃筐內

陰乾臨時全燒爲末黃酒服少行一二次有腹

自大便出無腹卽消二三服平

【杏林摘要】初起未成膿者用南五倍子炒黃研

末入百草霜等分以臘醋調塗於患處一日一

夜卽消

【本草方】五倍子不拘多少以淨瓦器盛之用陳

醋熬成膏用綿布攤貼之如乾卽換三五次卽

愈

●陰毒腹痛

【玉機微義】回陽丹用不灰木煅牡蠣煅高良薑

炒川烏頭炮白芍藥各一錢爲末入麝香少許

每用一錢男用女唾調塗外腎女用男唾調塗

乳上得汗卽愈

【本草方】露蜂房三錢燒存性葱白五寸同研爲

丸男左女右着手中握陰臥之汗出卽愈

【生生編】雞糞鳥豆地膚子各一把亂髮一團同

炒烟起傾入好酒一椀浸之去滓熱服卽止

●陰毒卒腫

【傷寒蘊要】用雄雞冠血入熱酒中飲之暖臥取

汗

【本草方】雞血冲熱酒飲

●男女陰毒

【唐瑤經驗方】銀硃輕粉各一錢用五日獨蒜一

枚搗和作餅貼手心男左女右兩手合定放陰

下頃間氣回汗出卽愈但口中微有氣卽活

【蔡氏經驗必用方】寒水石不拘多少爲末用兩

籠飯搗丸粟子大口乾每用一丸炭火煅紅燒

研以滾酒調服飲葱醋湯投之得汗愈

●房勞毒陰

【孫氏集效方】胡椒七粒葱心二寸半麝香一分

搗爛以黃蠟溶和做成條子插入陰內少頃汗

出卽愈

【肘后方】腹痛欲死猪血乘熱和酒飲之

●陰瘡陰汗

【普濟方】陽起石煅爲末每服二錢鹽湯下

【發明】珣曰張仲景用沒石子治陰汗燒灰先以

湯浴了布裹灰撲之甚良

●陽事不起

【千金方】慈石五斤研清酒漬二七日每服三合

日三夜

【食醫心鏡】栗當好者二斤卽列當擣篩畢以好

酒一斗浸之經宿取起隨性日飲之

【千金方】蛇牀子五味子菟絲子等分爲末蜜丸

梧子大每服三十九溫酒下日三服

【千金方】新五味子一斤爲末酒服方寸匕日三

服忌豬魚蒜醋盡一劑卽得力百日以上可御

十女四時不絕藥功能知

【集簡方】覆盆子酒浸焙研爲末每旦酒服三錢

【岣嶝神書】蜂窠燒研新汲井水服二錢可御十女

【千金方】未連蠶蛾二升去頭翅足炒爲末蜜丸

梧子大每夜服一丸可御十室以菖蒲酒止之

【集簡方】紫梢花生龍骨各二錢麝香少許爲末

蜜丸梧子大每服二十九燒酒下欲解飲生薑

甘草湯

【千金方】鯉魚膽雄雞肝各一枚爲末雀卵和丸

小豆大每吞一丸

【集簡方】泥鰌養食之

【千金方】用雄雞肝三具兔絲子一升爲末雀卵

和丸小豆大每服一百丸酒下日二

●腎虛陰痿

【主治孟詵】男子陰痿不起強之令熱多精有子

雀卵和天雄兔絲子末爲丸空心酒下五丸

【經驗方】羸瘦精衰少力用豮豬腎一對切片枸

杞葉半斤以豉汁一盞同椒鹽煮羹食

●陰寒痿弱

【千金方】蜂房灰夜傅陰上卽熱起

●陽虛陰痿

【梁氏總要】甚有補益鹿角霜白茯苓等分爲末

酒糊丸梧子大每服三十九鹽湯下

【主治時珍】陽虛陰痿精寒而清者用山獺陰莖酒磨少許服之療人以爲補助要藥

●腎虛精竭

【心鏡】羊腎一雙切於豉汁中以五味米揉作羹

粥食

●老人腎硬

【鶴峯備急方】治老人腎藏虛寒內腎結硬雖服

補藥不入用羊腎子一對杜仲長二寸闊一寸

一片同煮熟空心食之令人內腎柔軟然後服

補藥

●玉莖強中

【夏子益奇疾方】不痿精滑無歇時時如鍼刺捏

之則脆此名腎漏用破故紙垂子各一兩爲末

每用三錢水二盞煎六分服日三次愈則止

【經驗方】玉莖強硬不痿精流不住時時如針刺

捏之則痛其病名強中乃腎滯漏疾也用垂子

破故紙各一兩爲末每服三錢水一盞煎服日

三卽住

●男女轉脬

【永類鈐方】不得小便寒水石二兩滑石一兩葵

子一合爲末水一斗煮五升服一升卽利

【普濟方】乾箬葉一兩燒灰滑石半兩爲末每米

飲服三錢

立通

【肘后方】以布包蒲黃裹腰腎令頭致地數次卽

通

【指迷方】石韋去毛車前子各二錢半水二盞煎

一盞食前服

【醫壘元戎】非小腸膀胱厥陰受病乃強忍房事

或過忍小便所致當治其氣則愈非利藥可通

也沉香木香各二錢爲末白湯空腹服之以通

爲度

【聖惠方】真琥珀一兩爲末用水四升葱白十莖

煮汁三升入珀末二錢溫服沙石諸淋三服皆

效

【千金方】不通用死蟻娘二枚燒末井華水一盞

調服

【千金方】不出納衣魚一枚於莖中

【本草方】自取爪甲燒灰水服

●小便出血

【肘后方】當歸四兩剉水三升煮取一升頓服

【經驗方】白芷當歸等分爲末米飲每服二錢

【聖濟總錄】蒲黃末每服半錢生地黃汁調下量

人加減或入髮灰等分

【聖惠方】水芹搗汁日服六七合

【簡便方】新地骨皮洗淨搗自然汁無汁則以水

煎汁每服一盞入酒少許食前溫服

●便癰腫痛

【袖珍方】鼠粘子二錢炒研末入蜜一匙朴硝一

匙空心溫酒服

【直指方】皂角一條醋熬膏敷之屢效

【儒門事親】皂角子七個研末水服效 一方照

年歲吞之

【直指方】穿山甲半兩豬苓二錢並以醋炙研末

酒服二錢外穿山甲末和麻油輕粉塗之或只

以末塗之

【醫林正宗】抱出雞卵殼黃連輕粉等亦爲細末

用煉過香油調塗

●陰陽易病

【聖惠方】傷寒初愈交合陰陽必病拘急手足拳

小腹急熱頭不能舉名陰陽易當汗之滿四日

難治藍一把雄鼠屎三七粒水煎服取汗

【聖濟總錄】男子陰易黍米二兩煮薄粥和酒飲發汗即愈

【傷寒類要】男子陰易用丹黍米三兩煮薄酒和飲令汗即愈

【傷寒類要】傷寒後婦人得病雖瘥未滿百日不可

與男合爲病拘急手足拳腹痛欲死丈夫名陰易婦人名陽易速宜汗之即愈滿四日不可治也用乾薑四兩爲末每用一兩白湯調服覆衣被出汗後手足伸即愈

【南陽活人書】男子陰腫小腹絞痛頭重眼花宜

羶鼠屎湯主之用羶鼠屎十四枚垂根一大把水二盞煮七分去滓再煎二沸溫服得汗愈未

汗再服

【發明】時珍曰按張仲景云陰陽易病身體重少氣腹裏急或引陰中拘急熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝筋拘急者燒視散主之取中棍近隱處燒灰水服方寸七日三服小便即利陰頭微腫則愈男用女女用男成無己解云此以導陰氣也童女者尤良

【南陽活人方】男子陰易及勞復羶鼠屎湯用羶鼠屎兩頭尖者十四枚垂根一大把水二盞煎一盞溫服得粘汗爲效未汗再服

【本草方】陰陽易病用手足爪甲二十片中衣襠

一片燒灰分三服溫酒下男用女女用男取婦人陰毛燒灰飲服仍以洗陰水飲之

【聖濟總錄】病後交接卵腫或縮入腹絞痛欲死

●腎氣作痛

【楊仁齋直指方】黑白牽牛等分炒爲末每服三

錢以豬腰細切縫入茴香百粒山椒五十粒繆牽牛末入內紮定紙包煨熟空心食之酒下取出惡物效

●腎臟氣發

【聖濟錄】攻心面黑欲死及諸氣奔豚喘急鉛二

兩石亭脂二兩木香一兩麝香一錢先化鉛炒乾入亭脂急炒焰起以醋噴之傾入地坑內覆

作待冷取研粟飯丸芡子大每用二丸熱酒化

服取汗或下或通氣即愈如大便不通再用一

丸入元明粉五分服

●本臟氣通

【斗門方】鷄心檳榔以小便磨半個服或用熱酒

調末一錢服之

●腎氣上噦

【孫氏仁存方】腎氣自腹中起上築於咽喉逆氣

連屬而不能出或至數十聲上下不得喘息此

由傷寒胃脘腎虛氣逆上乘於胃與氣相併難

經謂之噦素問云病深者其聲噦宜服此方如

不止灸期門關元腎俞穴用吳茱萸醋炒熱橘皮附子去皮各一兩爲末麵糊丸梧子大每薑湯下七十九

●外腎偏疼

【梅師方】皂角和皮爲末水調傅之良

●下部諸疾

【積善堂方】龍液膏用堅實白茯苓去皮焙研取

清溪流水洗浸去筋膜復焙入瓷瓶內以好蜜

和勻入銅釜內重湯桑柴火煮一日取出收之

每空心白湯下二三匙解煩鬱躁渴一切下部疾皆可除

●腎臟風瘡

【經驗方】澤瀉皂莢水煮爛焙研煉蜜丸如梧子

大空心溫酒下十五丸至二十九丸

●腎風下疰

【奇效方】生瘡用驢蹄二十片燒灰密陀僧輕粉

各一錢麝香半錢爲末傅之

●硇砂損陰

●腎黃如金

【外臺祕要】葛苣子一合細研水一盞煎五分服

●交接勞復

【外臺方】豬蹄一具浮萍三兩水三升煮汁半升漬之冷卽出以粉傅之

●玉莖作痛

【主治元素】甘草梢用治胸中積熱去莖中痛加

【扁鵲方】丈夫熱病後交接復發忽卵腫縮入腹

酒煮元胡索苦棟子尤妙

【發明】時珍曰肘后方治小便不利莖中痛欲死用牛膝并葉以酒煮服之今再拈出表其神功

【山居四要】乳香葱白等分搗傅

●飛絲纏陰

【李樓怪證方】腫痛欲斷以威靈仙搗汁浸洗一

人病此得效

●腎黃如金

【外臺祕要】葛苣子一合細研水一盞煎五分服分大麥粥清服方寸七日三服熱毒從二便出也

痛欲死燒女人月經赤衣爲末熱水服方寸七

卽定

●腎中無陽

【發明】元素曰乾薑氣薄味厚半沉半浮可升可

降陽中之陰也又曰大辛大熱陽中之陽其用
有四通心助陽一也去臟腑沉寒痼冷二也發

諸經之寒氣三也治感寒腹痛四也腎中無陽
脈氣欲絕黑附子爲引水煎服之名薑附湯

●男子臟冷

【主治大明】白堊土研末點湯服之

●仙靈脾酒

【食醫心鏡】益丈夫興陽事理腰膝冷用淫羊藿
一斤酒一斗浸三日逐時飲之

●鹿茸酒

【普濟方】治陽事虛痿小便頻數面色無光用嫩

鹿茸一兩去毛切片山藥末一兩絹袋裏置酒

壘中七日開瓶日飲三盞將茸焙作丸服

●祕精益髓

【瑞竹堂方】太乙金鎖丹用五色龍骨五兩覆盆

子五兩蓮花蕊四兩未開者陰乾鼓子花三兩
五月五日采之鷄頭子仁一百顆並爲末以金
櫻子二百枚去毛木臼搗爛水七升煎濃汁一
升去滓和藥杵二千下丸梧子大每空心溫鹽
酒下三十九服之至百日永不泄如要泄以冷
水調車前末半合服之忌葵菜

●暖精益陽

【經驗方】龍骨遠志等分爲末煉蜜丸如梧子大

每冷水空心下三十九

●補腎興陽

【主治時珍】益陽道令人悅澤有子枸杞蟲炙黃和地黃末爲丸服之大起陽益精

【本草方】用蝦米一斤蛤蚧二枚茴香蜀椒各四

兩並以青鹽化酒炙炒以木香粗末一兩和勻

乘熱收新瓶中密封每服一匙空心鹽酒嚼下

甚妙

●益助陽氣

【本草方】洗曰丹雄鷄冠血和天雄太陽粉各四

分桂心二分丸服之

【發明】頌曰今人取雀肉和蛇床子熬膏和藥丸

服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世云明

皇服之有驗

●補益老人

【食治方】治老人臟腑虛損羸瘦陽氣乏弱雀兒五隻如常治粟米一合葱白三莖先炒雀熟入酒一合煮少時入水二盞下葱米作粥食

●壯陽益腎

【心鏡方】用羊肉半斤切生以蒜薤食之三日一

度甚妙

●補精潤肺

【瑞竹堂方】壯陽助胃用煉牛髓四兩胡桃肉四

兩杏仁泥四兩山藥末半斤煉蜜一斤同搗成膏以瓶盛湯煮一日每服一匙空心服之

●補益腎氣

【發明】時珍曰豇豆開花結莢必兩兩並垂有習坎之義豆子微曲如人腎形所謂豆爲腎穀者宜以此當之昔盧廉夫教人補腎氣每日空心

煮豇豆入少鹽食之蓋得此理與諸疾無禁但水腫忌補腎不宜多食耳

●強筋健髓

【發明】穀曰強筋健髓以肉蓯蓉鱠魚二味爲末

黃精汁丸服之力可十倍此說出乾寧記頌曰西人多用作食只刮去鱗甲以酒浸洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人勝服補藥

●陽虛不足

【發明】頌曰續傳信方著張仲景青木香丸主陽

虛諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩搗篩糖和丸梧子大每空腹酒下三十九日再其效尤速鄭駘馬去沙糖用白蜜加羚羊角十二兩用藥不類古方而云仲景不知從何而得也

【發明】破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐

鄭相國自敍云予爲南海節度年七十有五越

地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石

補藥百端不應元和七年有訶陵國舶王李摩

訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩

訶稽首固請遂服之經七八日而覺應驗自爾

常服其功神效十年二月罷郡歸京錄方傳之

用破故紙十兩淨擇去皮洗過曝搗篩令細胡

桃瓢二十兩湯浸去皮細研如泥更以好蜜和

令如飴糖瓷器盛之旦日以暖酒二合調藥一

匙服之便以飯壓如不飲酒人以煖熱水調之

彌久則延年益氣悅心目補添筋骨但禁芸

薹羊血餘無所忌此物自外番隨海舶而來非中華所有番人呼爲補骨脂語訛爲破故紙

也王紹陽續傳信方載其事頗詳故錄之

●紫金藤丸

【和劑方】補腎臟暖丹田興陽道減小便填精髓

駐顏色潤肌肉治元氣虛面目黎黑口乾舌濁

夢想虛驚耳鳴目淚腰胯沉重百節酸疼項筋

緊急背脾勞倦陰汗盜汗及婦人子宮久冷月

水不調或多或少赤白帶下並宜服之用紫金

藤巴戟天去心三兩吳茱萸高良薑肉桂青鹽

各二兩爲末酒糊丸梧子大每溫酒下二十九

日三服

●補骨脂丸

【和劑方】治下元虛敗等證悉虛損門

脚氣門

●寒濕腳氣

【扶壽方】磚燒紅以陳臭米泔水淬之乘熱布包

三塊用膝夾住綿被覆之三五次愈

【衛生易簡方】無名異末化牛皮膠調塗之頻換

【瑞竹堂方】石亭脂生用一兩川烏頭生一兩無

名異二兩爲末葱白自然汁和丸梧子大每服

一錢空心淡茶生葱吞下日一服

【醫方摘要】白芷芥子等分爲末薑汁和塗之效

【事林廣記】白芍藥六兩甘草一兩爲末白湯點

服

【楊氏家藏方】腿膝疼痛行步無力胡盧巴酒浸

一宿焙破故紙炒香各四兩爲末以木瓜開頂
去瓤安藥在內令滿用頂合住簽定蒸糊丸梧

子大每服七十九空心溫酒下

【本草方】草烏一味爲末以薑汁或酒糟同搗貼之

【本事方】腎臟風氣攻注下部瘡痒甘遂半兩木

鱉子仁四個爲末猪腰一個去皮膜切片用藥四錢繆在內濕紙包煨熟空心食之米飲下服

後便伸兩足大便行後吃白粥二三日爲妙

【外臺祕要】蓖麻子七粒去殼研爛同蘇合香丸貼足心痛卽止也

【簡要濟衆方】久不瘥者黑附子一個生去皮臍

爲散生薑汁調如膏塗之藥乾再塗腫消爲度

【永類鈐方】木鱉子仁每個作兩邊炒過切碎

再炒去油盡爲度每兩入厚桂半兩爲末熱酒

服二錢令醉得汗愈夢授祕方也

【衛生易簡方】筋骨引痛鷺鷥藤卽金銀花爲末

每服二錢熱酒調下

【外臺祕要】桃花一升陰乾爲末每溫酒細呷之一宿卽消

【大全良方】川椒二三升疎布囊盛之日以踏脚貴人所用

【主治時珍方】樟腦着鞋中去腳氣

【永類鈐方】鄉村無藥初發時卽取土烏藥不犯

鐵器布揩去土刮屑好酒浸一宿次早空心溫服溏泄卽愈入麝少許尤佳痛入腹者以烏藥同鷄子瓦罐中水煮一日去鷄子切片蘸食以湯送下甚效

【發明】時珍曰李石續博物志云腳弱病人用杉木爲桶灌足排樟腦于兩股間用綿綑定月餘甚妙 王璽醫林集要方治腳氣腫痛用樟腦

二兩烏頭三兩爲末醋糊丸彈子大每置一丸于足心踏之下以微火烘之衣被圍覆汗出如涎爲效

【永類鈐方】皂角赤小豆爲末酒醋調貼腫處

【普濟方】蘇方木蠶鱉藤等分細剉入定粉少許

水二斗煎一斗五升先熏後洗

【乾坤生意】疼不可忍用團魚二個水二斗煮一斗去魚取汁加蒼耳蒼朮尋風藤各半斤煎至七升去滓以盆盛薰蒸待溫浸洗神效

【本草方】羊角一副燒過爲末熱酒調塗以帛裹之取汗永不發也

【萬氏方】牛皮膠一塊細切麵炒成珠研末每服一錢酒下其痛立止

●風濕脚氣

每服十九空心酒下

【藥性論】紫蘇子高良薑橘皮等分蜜丸梧子大荆莖于鐧中燒烟熏涌泉穴及痛處使汗出則

愈此法貴賤皆可用者

●風毒脚氣

【肘后方】捻之沒指者牽牛子搗末蜜丸小豆大每服五丸生薑湯下取小便利乃止亦可吞之其子黑色正如棗小核

【肘后方】以銅器取烏牘尿三升飲之小便利則消

【本草方】猪肝作生膾食之取利

●一切脚氣

【食療本草】鹽三升蒸熱分裹近壁以脚踏之令

脚心熱又和槐白皮蒸之尤良夜夜用之

【救急方】每夜用鹽擦腿膝至足甲淹少時以熱

湯泡洗有一人病此曾用有效

●脚氣攻注

【稗史方】用生田螺搗爛傅兩股上便覺冷趨至

足而安又可傅用田螺利小便董守約曾用有

效

●脚氣欲吐

【蘇恭方】凡患脚氣人每旦飽食午後少食晚不

食若飢可食豉粥若覺不消欲致霍亂者卽以

高良薑一兩水三升煮一升頓服盡卽消若卒

無者以母薑一兩代之清酒煎服雖不及高良

薑亦甚效也

●脚氣衝心

【千金方】白礬三兩水一斗五升煎沸浸洗

【外臺祕要】黍穠一石煮汁入椒目一升更煎十

沸漬脚三四度愈

【廣利方】煩悶不識人以大豆一升水三升濃煮

汁服未定再服

【食療方】或心下結硬腹中虛冷陳皮一斤合杏仁五兩去皮尖熬少加蜜搗和丸如梧子大每日食前米飲下三十九

【廣利方】悶亂不識人用白檳榔十二枚爲末分二服空心暖小便五合調下日二服或入薑汁溫酒同服

【孟詵方】吳茱萸生薑搗汁飲甚良

●脚氣入腹

【簡便方】脹悶喘急用威靈仙末每服二錢酒下

痛減一分則藥亦減一分

●脚氣煩悶

製木瓜袋用之頓愈

【養老書】用烏雄鷄一隻治如食法入米作羹食

●脚氣腫渴

【外臺祕要】非冷非熱或老人弱人病此用檳榔仁爲末以檳榔殼煎汁或茶飲蘇湯或豉汁調服二錢甚利

【外臺祕要】大麻仁熬香水研取一升再入水三升煮一升入赤小豆一升煮熟食豆飲汁

●脚氣腹痺

暖服

【外臺方】大麻仁一升研碎酒三升漬三宿溫服

大良

●脚氣浮腫

三合同煮粥食之

【食醫心鏡】心腹脹滿小便澀少馬齒莧和少粳米醬汁煮食之

消乃止

【名醫錄】用木瓜切片囊盛踏之 廣德顧安中

●脚氣風痺

患脚氣筋急腿腫因附舟以足擋一袋上漸覺

【千金方】松葉酒治十二風痺不能行服更生散

四劑及衆療不得力服此一劑便能行遠不過

兩劑松葉六十斤細剉以水四石煮取四斗九

升以米五斗釀如常法別煮松葉汁以漬米并

饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此酒力

者甚衆

【肘后方】牛乳五升硫黃三兩煎取三升每服三

合羊乳亦可或以牛乳五合煎調硫黃末一兩

服取汁尤良

【食醫心鏡】五緩筋急用熊肉半斤切入豉汁中

和葱薑椒鹽作腌腊空腹食之

●脚氣走痛

【聖濟總錄】蘿蔔煎湯洗之仍以蘿蔔曬乾爲末

鋪襪內

●脚氣脛痛

【千金方】骨疼蒴藋根研碎和酒醋共三分根下

合蒸熟封裹腫上一二日卽消亦治不仁

●脚氣濕瘡

【摘元方】極痒有蟲烏柏根爲末傅之少時有涎

出良

●酒患脚氣

【發明】宗奭曰有人嗜酒日須五七盃後患脚氣

甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色去

米不用大黃一兩剉炒同爲末熟蜜丸溫水服

五七十九仍禁酒遂愈

●脚氣成漏

【戴原禮證治要法】脚跟有一孔深半寸許其痛

異常用人中白煅有水出滴入瘡口

●水氣脚氣

【聖濟總錄】桑條二兩炒香以水一升煎二合每日空心服之亦無禁忌

●腰痛脚氣

【正要方】木瓜湯治腰膝痛脚氣羊肉一脚草菓五枚粳米二升回回豆卽胡豆半升木瓜二斤取汁入沙糖四兩鹽少許煮肉食之

●新久脚氣

【奇效方】血竭乳香等分同研以木瓜一個剜孔入藥在內以麵厚裹砂鍋煮爛連麵搗丸梧子大每溫酒服三十九忌生冷

●脚氣上攻

【發明】時珍曰王璆百一選方云脚氣上攻結成腫核及一切腫毒用甘遂末水調傅腫處卽濃煎甘草汁服其腫卽散二物相反而感應如此

清流韓詠病脚疾用此一服病去七八再服而愈也

●脚氣痞絕

【發明】震亨曰杉屑屬金有火其節煮汁浸搽脚氣腫滿尤效頌曰唐柳柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚氣夜半痞絕脇有塊大如石且死困不知人搐搦上視三日家人號哭榮陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下三行氣通塊散方用杉木節一大升橘葉切一大升無葉則以皮代之大腹檳榔七枚連子碎之童子小便三大升共煮一大升半分爲兩服若一服得快卽停後服此乃死病曾有教者乃得不死恐人不幸病此故傳之云

●男婦脚氣

【瑞竹堂方】骨節皮膚腫濕疼痛服此進飲食健

氣力不忘事名五加皮丸五加皮四兩酒浸遠

志去心四兩酒浸並春秋三日夏二日冬四日

日乾爲末以酒浸糊爲丸梧子大每服四五十

丸空心溫酒下藥酒壞並用酒爲糊

●老人脚氣

【奉親養老書】嘔逆者用豬腎一對以醋蒜五味

治食之日作一服或以葱白粳米同煮粥食亦可

可

【養老方】豬肚一枚洗淨切作片以洗布絞乾和

蒜椒醬醋五味常食亦治熱勞

●風濕膝痛

【御藥院方】脚氣風濕虛汗少力多痛及陰汗燒

礬末一匙頭投沸湯淋洗痛處

●疏導腳氣

【直指方】枳殼炒二兩四錢甘草六錢爲末用木

瓜湯服

●消除腳氣

【外臺祕要方】每寅日割手足甲少侵肉去腳氣

●風冷腳氣

【肘后方】白礬石煅二升酒三斗漬三日稍稍飲

之

【肘后方】風毒脚氣痺弱硫黃末三兩鍾乳五升

煮沸入水煎至三升每服三合 又法牛乳三升煎一升半以五合調硫黃末一兩服厚蓋取

汗勿見風未汗再服將息調理數日更服北人

用此多效亦可爲丸服

足趾門

【吳綏蘊要方】但節食以養胃氣外用狗脊煎湯漬洗

●脚心腫痛

●腰脚冷痺

【永類鉛方】因久行久立致者以水和蚯蚓糞厚

傅一夕即愈

●脚腿紅腫

【惠濟方】熱如火炙俗名赤遊風用鐵繡水塗解

之

●風濕腳痛

【摘元方】鍼砂川烏頭爲末和勻炒熱綿包熨之

●背腿間腫

利黃水爲驗

●膝風疼痛

【袖珍方】一點痛不可忍者芫花根末米醋調傅

之如不住以帛束之婦人產後有此尤宜

●病後足腫

安護膝內能除風濕健步

【扶壽方】菊花陳艾葉作護膝久則自除也

【扶壽方】草烏細辛防風等分爲末繆靴襪中及

●毒熱足腫

【姚僧坦集驗方】作痛欲脫者苦參煮酒漬之

●濕滯足腫

【艾元英如宣方】早輕晚重用草烏頭一兩以生

薑一兩同研交感一宿蒼朮一兩以葱白一兩

同研交感一宿各焙乾爲末酒糊丸梧子大每服五十九酒下

●濕氣脚軟

【斗門方】樟柳根切小豆大煮熟更以綠豆同煮

爲飯每日食之以瘥爲度最效

●風氣腳弱

【肘后方】瘧滿上氣田舍貧家用此最良菝葜洗

態飲如常釀酒任意日日飲之

【肘后方】孔公孽二斤石斛五兩酒二斗浸服

●風毒膝攣

【食醫心鏡】骨節痛用豉三五升九蒸九曝以酒一斗浸經宿心隨性溫飲

●腰脚疼痛

【衛生易簡方】天麻半夏細辛各二兩絹袋二個各盛藥令勻蒸熟交互熨痛處汗出則愈數日

再熨

【千金方】用威靈仙末空心溫酒服一錢逐日以

微爲度 經驗方用威靈仙一斤洗乾好酒浸

七日爲末麩糊丸梧子大以浸藥酒每服二十

丸

【千金方】新胡麻一升熬香杵末日服一小升服至一斗永瘥溫酒蜜湯薑汁皆可下

【千金方】不能履地皂角子一千二百個洗淨以

少酥熬香爲末蜜丸梧子大每空心以羹藜子

酸棗仁湯下三十九

【發明】崔元亮海上集驗方治腰脚風濕痛不止

蒸法用荆葉不限多少蒸置大甕中其下着火溫之以病人置葉中須臾當汗出蒸時當旋旋

喫飯稍倦卽止便以被蓋避風仍進葱豉酒及豆酒亦可以瘥爲度

●腰脚無力

【崔元亮海上方】韭子一升揀淨蒸兩炊久曝乾

簸去黑皮炒黃擣粉安息香二大兩水煮一二百沸慢火炒赤色和擣爲丸梧子大如乾入少蜜每日空腹酒下三十九以飯三五匙壓之大佳

●脚筋痙痛

【食療本草】用木瓜數枚以酒水各半煮爛搗膏

乘熱貼于痛處以帛裹之冷卽換日三五度

●水病脚腫

【韋苗獨行方】葱莖葉煮湯漬之日三五次妙

●腫從脚起

【肘后方】豉汁飲之以淬傅之

●腰脚拘攣

【蘇頌圖經本草】腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛

者取茄子五十斤切洗以水五斗煮取濃汁濾去滓更入小鑑中煎至一升以來卽入生粟粉同煎令稀稠得所取出搜和更入麝香硃砂末同丸如梧子大每日用秫米酒送下三十九近暮再服一月乃瘥男子女人通用皆驗

●脚膝浮腫

【永類鉛方】荷葉心藁本等分煎湯淋洗之

煎湯洗之

●足蹙筋急

【皇甫謐甲乙經】桂末白酒和塗之一日一上

●脚多濕汗

【集元方】燒人場上土鋪於鞋底內蹉之灰亦可

【摘元方】楊花着鞋及襪內穿之

●脚杼濕爛

【千金方】不遂不能行者用醇酒三斗水三斗入甕中灰火溫之漬脚至膝常着灰火勿令冷三

【簡便方】荆芥葉搗傅之

【攝生方】茶葉嚼爛傅之有效

【集簡方】滑石一兩石膏煅半兩枯白礬少許研

繆之

●鶴膝風病

【本草方】酒醋糟四兩肥皂一個去子芒硝一兩五味子一兩砂糖一兩薑汁半甌研勻日日塗

日止

之加入燒酒尤妙也

【直指方】紫荆皮三錢老酒煎服日二次

●夏月趾腫

【壽域神方】用蚌蛤粉乾擦之

【主治時珍方】鵝掌上黃皮燒研擦脚趾縫濕爛

良

●遠行脚痛

【經驗方】草烏細辛防風等分爲末，繖鞋底內如

草鞋以微濕繖之用之可行千里甚妙

【救急方】被石墊傷者，草鞋浸尿缸內半日以磚

一塊燒紅置鞋于上，將足踏之，令熱氣入皮裏

卽消

●脚底木硬

【本草方】牛皮膠生薑汁化開，調南星末塗上，烘

物熨之

●脚肚轉筋

【外臺方】以故綿浸醋中，甑蒸熟裹之冷，卽易勿

停取瘥止

【攝生方】大蒜擦足心，令熱，卽安，仍以冷水食一

瓣

【肘后方】蜈蚣燒猪脂和傅

●股癰瘍瘻

【多能鄙事】無名異二錢，麝香一字研酒半盃，午

後空腹服立效

●濕瘡腳腫

【醫方摘要】行履難者，木鱉子四兩去皮甘遂半

兩爲末，以豬腰子一個去膜切片，用藥四錢在

中，濕紙包煨熟，空心米飲送下，服後便伸兩脚

如大便行者，只喫白粥二三日爲妙

●脚膝爛瘡

【集簡方】金星草背上星刮下，傅之，卽

●血注脚瘡

【奇效良方】桑耳楮耳牛屎菰各五錢，胎髮灰，男

用女女用男，三錢研末，油和塗之，或乾塗之

● 瞼脛爛瘡

【壽域神方】頭垢枯礬研勻猪膽調傅

【便民圖纂】圭地蚯蚓泥乾研入輕粉清油調傅
【袖珍方】白膠香爲末以酒瓶上箬葉夾末貼之

● 轉筋入腹

【摘元方】人乳桐油等分和勻以鵝翎掃塗神效

【醫林集要】用桃柳槐椿棟五枝同荆芥煎湯洗

拭淨以生黃蠟攤油紙上隨瘡大小貼十層以

帛拴定三日一洗除去一層不用一月痊愈

下卽安

【救急方】臭穢不可近用蜒蚰十條瓦焙研末油
調傅之立效

【張仲景方】其人臂脚直其脈上下微弦用雞矢
爲末水六合和方寸七溫服一合

● 下疰腳瘡

【直指方】用中鱗魚三尾洗淨穿山甲二錢以長

皂莢一挺劈開兩片夾住紮之煨存性研末

先以井水洗淨臘水用白竹葉刺孔貼之候水

【集要方】鹿角燒存性入輕粉同研油調塗之

● 濕毒脛瘡

出盡以麻油輕粉調藥傅之日一次

【海上方】牛蹄甲燒灰桐油和傅

【便民圖纂】以蘆汁洗拭刮虎骨末傅之

縫定以茶洗淨縛上膏藥黃水出五六日愈此

吳竹卿方也

【筆峯雜興】用楮霜楮蒂等分燒研傅之甚效

●脚肚生瘡

【醫學正宗】初起如粟搔之漸開黃水浸淫痒痛

潰爛遂至逸脛而成瘍疾用酸榴皮煎湯冷定

日日掃之取愈乃止

【集簡方】如癩桐油人乳等分掃之數次卽愈

【醫林集要】初起如粟米大搔之不已成片包脚

相交黃水出痒不可忍久成瘍疾用百藥煎末

唾調逐瘍四圍塗之自外入內先以貫仲煎湯

洗之日一次

●脚上臭瘡

【發明】時珍曰按類編云一人兩足生瘡臭潰難

近夜宿五夫人祠下夢神授方用漏藍子一枚

生研爲末入膩粉少許井水調唾依法治之果
愈蓋此物不堪服餌止宜入瘡科也

【本草方】熟雞子黃一個黃蠅一錢煎油塗之

●足上風瘡

【潘氏方】作痒甚者皂角炙熱烙之

●臍疽青爛

【千金方】生于臍脛間惡水淋漓經年瘡冷敗爲

深疽青黑好肉虛腫百藥不瘥或瘥而復發先

以藥蝕去惡肉後用痏豬屎散甚效以豬屎燒

研爲末納瘡孔令滿自汗出吮去更傅有惡肉

再蝕去乃傅以平爲期有驗

●足瘡生蟲

【岣嵝神書】南方地卑濕人多患足瘡歲久生蟲

如蛭乃風毒攻注而然用牛或羊或豬肚去屎

不洗研如泥看瘡大小入煅過白礬半兩已上

研勻塗帛上貼之須臾痒入心徐徐連帛取下

火上炙之蟲出絲髮馬尾千萬或青白赤黑以

湯洗之三日一作不過數次蟲盡瘡愈

●足上凍瘡

【本草方】以醋洗足研藕傳之

【乾坤生意】耳足凍瘡橄欖核燒研油調塗之

【姚和衆方】濃煎黃蠟塗之

【主治時珍方】鵝腦取塗凍瘡良

【主治時珍方】牡鼠用豬脂煎膏塗凍瘡良

●凍瘡坼裂

【本草方】蒸熟藕搗爛塗之

【主治時珍方】鵝掌上黃皮焙研油調塗凍瘡良

●戶脚坼裂

【千金方】無冬夏者雞屎煮湯漬半日取瘥乃止

【千金方】烊膠着布上烘貼之

●雞眼肉刺

【多能鄙事】枯礬黃丹朴硝等分爲末擦之次日

浴二三次即愈

【本草方】蕡菪根搗汁塗之 雷公炮炙論序云

脚生肉刺繩繫蕡菪謂繫於繩帶上也

【乾坤祕韞】割破出血以血見愁草搗傳之妙

【近效方】先以湯浸刮去一層用黑木耳貼之自

消爛不痛

【奇效方】無食子三枚肥皂莢一挺燒存性爲末

醋和傳之立效

【閨閣事宜】作痛作瘡地骨皮同紅花研細傳之

次日即愈

【便民圖纂】先挑破取黑白蟲各一枚置于上縛

之數日自愈也

【簡便方】剥去皮以燙雞湯洗之

【古今錄驗】刺破以新酒酢和羊腦塗之一合愈

●脚跟腫痛

【王永輔惠濟方】不能着地用黃牛屎入鹽炒熱

罨之

●嵌甲作痛

【醫林集要】不能行履者濃煎陳皮湯浸良久甲

肉自離輕手剪去以虎骨末傅之即安

【本草方】胡桃皮燒灰貼

【醫林集要】血竭末傅之

【初虞世方】痛苦用蛇皮一具燒灰雄黃一彈丸

同研末先以溫漿洗瘡針破貼之

【便民圖纂】以橘皮湯浸洗輕剪去甲以虎骨末

敷之痛即止

●嵌甲作瘡

【肘后方】足趾甲入肉作瘡不可履靴礮石燒灰

傅之蝕惡肉生好肉細細割去甲角旬日取愈

此方神效

【多能鄙事】知母燒存性研繆之

●割甲侵肉

【外臺祕要】久不瘥硇砂礮石爲末裹之以瘥爲

度

【千金方】不愈鬼針草苗鼠粘子根搗汁和臘豬

脂塗

●割甲成瘡

【古今錄驗】連年不愈川烏頭尖黃藥等分爲末

洗了貼之以愈爲度

效得此法如神

●足趾甲疽

【梅師方】石膽一兩燒烟盡研末傅之不過四五度瘥

【王燾外臺祕要】崔氏方治甲疽或因割甲傷肌

或因甲長侵肉遂成瘡腫黃水浸淫相染五指俱爛漸上脚趺泡漿四邊起如火燒瘡日夜怪憎醫不能療終礬石五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用末厚傅之以軟帛

肉自消

【發明】時珍曰孟詭必效方治甲疽生于脚趾邊腫爛用蘭茹三兩黃耆二兩苦酒浸一宿以豬脂五合合前取膏三合日三塗之即消

黃丹收之每以鹽湯洗拭用末厚傅之以軟帛
緩裹當日卽水斷瘡乾每日一遍鹽湯洗灌有
膿處洗淨傅其痂乾處不須近但有急痛處塗
之

酥少許令潤五日卽覺痂起依前洗傅十日痂
漸剝盡軟處或更生白膿泡卽擦破傅之自然
瘥也張侍郎病此臥經六十日京醫並處方無

【勝金方】弩肉裏趾甲膿血不瘥者用牡蠣頭厚
等分傅之內消卽愈

【靈苑方】濃血疼痛不愈用乳香爲末膽礬燒研

印城鹽等分和勻燒存性入光明硃砂少許傅

處生研爲末每服二錢紅花煎酒調下日三服
仍用敷之取效

●婦人甲疽

【醫方摘要】婦人趾甲內生瘡惡肉突出久不愈
名臭田螺用皂礬日曬夜露每以一兩煎湯浸

洗仍以礬末一兩加雄黃二錢硫黃一錢乳香

沒藥各一錢研勻擦之

●足釘怪疾

【夏子益奇疾方】兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如

釘脛骨生碎孔髓流出身發寒顫惟思飲酒此

是肝腎冷熱相呑用炮川烏頭末傅之內服垂

子湯效

●遠行足趼

【集簡方】水調半夏末塗之一宿即沒也

●脚弱病人

【海上方】成泡者水調生麵塗之一夜即平
木爲桶灌足排樟腦於兩股間用帛綁定月餘
甚妙

●山行辟蛭

【千金方】山中草木枝上有石蛭着人足則穿凡
入肉中害人但以臘豬膏和鹽塗足脛趾即不

着人也

●脚軟且疼

【發明】時珍曰按龐元英談載一少年新娶後

得脚軟病且疼甚醫作腳氣治不效路鈴孫琳

診之用杜仲一味寸斷片折每以一兩用半酒
半水一大盞煎服三日能行又三日全愈琳曰

此乃腎虛非脚氣也杜仲能治腰膝痛以酒行之則爲效甚容易矣

●肝虛轉筋

【聖惠方】肝臟氣虛風冷搏於筋遍體轉筋入腹

不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱清之

【聖惠方】吐瀉赤蓼莖葉切三合水一盞酒三合

煎至四合分二服

●海水傷裂

【使琉球錄】凡人爲海水鹹物所傷及風吹烈痛

不可忽用蜜半斤水酒三十斤防風當歸羌活

荆芥各二兩爲末煎湯浴之一夕卽愈

●腳瘡夏發

【發明】時珍曰有人患脚瘡以生蝦蟆搗傅之遂

愈悉奇異門

增訂錢氏兒科案疏

錢仲陽著

何筱廉編

內容

增入喻嘉言、江瓘、萬密齋、繆仲醇、葉天士、呂吳等驗案數十則，以資補充，較原書更形完備。

編制

全部方案一律注疏，對於病理研究，治療方法，均有精當剖解，一覽了然，較原書更切實用。

是嬰童疾病之救星。是兒科用藥的南針。

歷代醫家，對於兒科治療絕少專書。北宋錢仲陽氏始從事獨立研究，因症立方，據方剖理，徵以實驗，以啓後學，開兒科驗案之先河。本書即從錢氏原著重行編訂，增入宋後名醫有關兒科之驗案數十則，以補其不足，復加疏義，以明用藥施治之所以然，庶幾更較完備。全書兩編上編爲證治驗案，下編爲案中方鈔，凡有關兒科應用之方案，無不俱全，實醫家診斷之準繩，家庭保育之顧問。

二冊四角

上海東大書局印行