

聖濟總錄

吳錫璫著

已4
8649



大德重校聖濟總錄卷第三十八

霍亂門

霍亂統論

論曰三焦者水穀之道路氣之所終始也因風冷或飲食傷胃致中焦不和則正氣不守而邪得以干揮霍之間便致撩亂故名霍亂蓋清濁相干於腸胃之間心痛則吐腹痛則利甚者吐利俱發其不吐不利俗謂之乾霍亂亦以冷氣暴爭於中而不得出也然脉必代者以氣不足也脉大能言者為可治若其脉微氣劣而不欲言者為難治

霍亂吐利

論曰霍亂吐利者以三焦氣不升降而清濁相干於腸胃間若先心痛則吐先腹痛則利心腹並痛則吐利俱發治此者當以中焦為本中焦既和則清濁自分而吐利止矣

治霍亂吐利不止藿香湯方

藿香去梗半兩

白芷

縮沙去皮各一分

丁香一錢

右四味粗擣篩每服二錢匕水一中盞煎至六分去滓熱呷不計時候

治霍亂吐利不止正胃湯方

枇杷葉拭去毛炙桂去皮粗

厚朴去粗皮陳橘皮去白焙
薑炙陳橘皮各半兩

右四味搗羅為粗末每服二錢匕水一盞入生薑三片煎至六分去滓熱服

不計時候

治霍亂吐利白术湯方

白术三兩甘草炙

附子炮裂去皮臍人參各一兩桂去粗

當歸切

陳橘皮去白焙各二兩

右七味剉如麻豆每服五錢匕煮小麥汁一盞半入竹葉一握生薑半分拍碎煎至八分去滓溫服日三

治霍亂吐利陳橘皮湯方

陳橘皮去白焙二兩

甘草炙一兩

白术三兩

右三味粗搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉十片生薑半分小麥汁半盞煎至八分去滓溫服日三

治霍亂大豆飲方

大豆

香薷

蘆根

枇杷葉拭去毛炙竹茹

前胡去頭蘆

陳橘皮去白焙

右七味等分咬咀每服五錢匕以水一盞半入生薑一分切煎取一盞去滓溫服

治霍亂吐利不止理中湯方

人參

白朮各三兩

甘草炙

乾薑炮二兩

右四味粗搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取一盞去滓溫服若胸滿腹痛
吐下者加當歸二兩切焙厚朴二兩去粗皮薑汁炙透

治霍亂吐下虛冷厥逆腹痛乾嘔四順湯方

乾薑炮

甘草炙

人參各二兩

附子壹枚炮裂去皮臍

右四味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎取一盞去滓溫服一方下甚
加龍骨二兩腹痛不止加當歸二兩切焙

治霍亂吐瀉不止菖蒲飲方

菖蒲切焙

高良薑

青橘皮去白焙各壹兩

白朮

甘草炙半兩

右五味搗為粗末每服三錢匕以水一盞煎十數沸傾出放溫頓服



治冷熱不調霍亂吐瀉香薷丸方

香薷

壹兩半

白扁豆

炒

木香

各壹兩

丁香皮

二兩

藿香梗

右七味擣羅為末麪糊和丸如梧桐子大每服二十九食前溫紫蘇湯下
治霍亂吐下人參湯方

人參

乾薑

炮

陳橘皮

去焙

白桂

去粗皮各壹兩

甘草

炙半兩

治霍亂不止丁香散方

丁香

木香

肉豆蔻

去殼各壹兩

右三味擣羅為細散每服二錢匕白粥飲調下熱服

治霍亂吐逆腹痛或便利數多冷熱不調訶梨勒丸方

訶梨勒皮

微炒

陳橘皮

去白培各壹兩

乾生薑

切分三

甘草

炙半兩

右四味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九煎生薑米飲下不計時候
治飲食過多當風履濕薄衣露坐或夜卧失覆霍亂吐利人參丸方

人參

高良薑

炮各
壹兩

右二味擣羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸溫米飲嚼下不計時候治霍亂吐利不止正元湯方

枇杷葉

拭去毛尖桂皮粗

厚朴

去粗皮
薑汁炙
陳橘皮
去白培
各半兩

右四味粗擣篩每服三錢七水一盞入生薑三片煎至六分去滓熱服不以

時候

治霍亂吐瀉四肢厥冷香薷飲方

香薷

去梗兩半

草烏頭

浸切兩同炒

去皮臍暴乾

二兩入鹽黃褐色去鹽不用

藿香

去梗二兩同炒

黃連

去須以吳茱萸黃連去茱萸不用取

二兩同炒

右四味擣羅為粗末每服三錢匕以水二盞酒半盞同煎至一盞去滓新汲水沉極冷頓服相次四肢暖吐瀉定病輕每服一二錢匕

治霍亂吐逆不定手足厥冷面青諸藥不効青金散方

硫黃

壹兩鎔作汁

水銀

壹兩隨硫黃結作沙子

右二味研為散每服二錢匕冷木瓜湯調下冷米飲亦得治霍亂吐瀉冷熱不調和氣煮散方

胡椒

茱豆
兩各壹

人參
分壹

右三味生擣羅為散每服三錢匕水一盞同煎五六沸去滓熱服治食飲過傷霍亂吐瀉丁香丸方

丁香

白术

縮沙人

木香

內豆蔻
去皮

乾薑

桂
去粗皮
三分

陳橘皮

去白
焙
壹兩

枳殼
去瓢
炒
麸炒

紅豆蔻

去皮
半兩

右一十味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸煎生薑木瓜湯嚼下

治霍亂吐利心腹疼痛氣逆手足冷乾薑湯方

乾薑

炮
甘草
炙

桂
去粗
皮

附子

炮裂
去
皮

草豆蔻
去
皮

肉豆蔻

去殼
煨
麯

木香

高良薑
炒

乾木瓜
各半
兩

右九味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

霍亂嘔吐不止

論曰霍亂嘔吐不止者胃氣逆故也胃氣逆則氣上而不下故嘔吐不止也若上下升降陰陽和平而吐自止矣

治霍亂吐逆不定手足厥冷面青不樂青金散方

硫黃

壹兩
內鑄蓋子作汁

水銀

壹兩二味
結作沙子

右二味為細散每服一錢匕冷木瓜湯調下冷米飲亦得
治霍亂定嘔逆止心腹刺痛進飲食化痰益氣人參藿香湯方

藿香葉

厚朴

去粗皮
炙各二兩
薑汁

人參

白茯苓去黑皮

乾薑

青橘皮

湯浸去白焙

枇杷葉

拭去毛

半夏

為末生薑汁和作餅子暴乾各六枚

壹兩

甘草

炙三分

丁香

半两

草豆蔻

去皮六枚

拘時

治霍亂心腹痛嘔吐不止吳茱萸湯方

吳茱萸

湯浸炒

乾薑

炮各壹兩

甘草

炙半两

右三味粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂吐逆不止煩悶香薷湯方

香薷

經霜後收乾斤

厚朴

去粗皮
炙各半
薑汁

右三味粗搗篩每服五錢匕水一盞酒半盞同煎至一盞去滓放冷併二服



未効再服

治下虛陰陽錯逆霍亂吐逆粥食不下正氣丹方

硫黃
汁入硫黃子

三分

內鎔成

半夏
為末作餅暴乾

半兩

附子
炮裂去皮

半兩

藿香葉
各一兩

右五味為細末酒煮麪糊丸如梧桐子大以丹砂為衣每服二十九至三十丸米飲下不拘時

治霍亂嘔吐不止水壺湯方

高良薑
生

對生

右一味粗擣篩每服三錢七水一盞棗一枚去核煎至五分去滓用水沉冷頓服立定

治冷熱氣不調霍亂吐逆不定腹脇脹滿高良薑湯方

高良薑

桂皮去粗皮

各一兩

人參
各一兩

甘草
炙半兩

右四味粗擣篩每服三錢七水一盞棗一枚去核煎至七分去滓溫服不拘時治霍亂嘔吐不思飲食厚朴湯方

厚朴
去粗皮炙二兩

人參

白朮
各一兩

半夏
為末作餅暴乾

陳橘皮

湯浸去白
焙各壹兩

右五味粗擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚去核煎至七分去滓

溫服不拘時

治一切霍亂嘔逆手足厥冷返魂湯方

鹽

壹分

生薑

洗切
壹兩

右二味用童子小便一椀半煎取一椀去滓分溫三服

治脾藏有積霍亂吐逆乾薑散方

乾薑

炮

诃梨勒

去核
壹兩

白礬

燒汁

丁香

甘草

炙各半兩

右五味為細散每服一錢匕飯飲調下不拘時

治霍亂下焦熱氣逆上嘔吐不止名曰走哺人參湯方

人參

梔子人

萎蕤

黃芩

去黑心
各半兩

知母

各半兩

白茯苓

去黑皮
各壹兩

白术

陳橘皮

湯浸去白
各壹兩半
焙

石膏

碎壹兩半

右九味粗擣篩每服三錢匕生薑三片水一盞煎至七分去滓溫服日三

治霍亂走哺嘔吐不止或噎塞心熱滿悶香豉湯方

豉

炒二兩

生乾地黃

洗切
壹兩

白术

二兩

甘草

炙壹兩

石膏碎三兩

白茯苓去皮一兩半

右六味粗搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉十片葱白二寸煎至一盞去滓溫服日三

治霍亂走哺嘔吐不止噎塞滿悶芒消湯方

芒消別研

生乾地黃洗切

白术

甘草炙各一兩

豉炒

白茯苓去黑皮各一兩半

石膏碎二兩

右七味粗搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉十片葱白二寸煎至一盞去滓溫服日三

治霍亂吐嘔四汁煎方

生藕汁

生葛汁

木瓜汁各一兩合

生薑汁絳

右四味銀器中慢火熬如錫每服兩匙頭許含化徐徐嚥津
治嘔吐煩悶及霍亂雞子湯方

人參一兩

右一味粗搗篩用水三盞煎至一盞半去滓重煎令沸投入雞子白一枚打轉掠去沫頓服

治冷熱不調霍亂吐利宿食不消理中丸方

人參

白术

高良薑

各兩 槌乾薑 炮

桂

去六兩 相皮

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九粒空心米飲下日再服

治霍亂吐逆開胃和氣藿香散方

藿香葉

培壹兩

訶梨勒皮

培拾枚

人參

丁香

各半兩

糯米

三粒 一百兩

石蓮心

二枚 一百分

甘草

炙剉

人參

丁香

各半兩

右七味搗羅為散每服二錢七煨和皮生薑一塊棗兩枚同煎濃湯調下食前空心

治脾胃虛冷嘔逆霍亂瀉痢脹滿訶梨勒丸方

訶梨勒皮

五倍子

黃連

去須

鍾乳粉

白礬

熬令汁枯

縮沙蜜

去皮

厚朴

去粗皮生薑汁炙

當歸

切

酸石榴皮

炮炙

胡椒

樗根皮

剉各半兩

乾薑

炮

乾木瓜

剉

烏梅肉

炒微

肉豆蔻

伍枚 廟去殼

陳橘皮

湯浸去白

右十七味搗羅為末醋并艾葉汁煮麩糊和丸梧桐子大每服五十丸棗湯下空心食前日二服

治冷熱不調霍亂吐利宿食不消五味理中丸方

甘草炙 人參 桂去皮粗 乾薑炮 高良薑

右五味各等分擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九溫酒下空心食前日再服

霍亂四逆

論曰四肢為諸陽之本陽氣之所通也霍亂吐利陽氣暴厥故四肢逆冷而脉微欲絕也古法治四逆專於通脉蓋榮衛行流氣道升降則手足自和逆者順矣治霍亂多寒手足冷厥脉絕四逆茱萸湯方

吳茱萸

洗炒四兩當歸切焙

桂去粗皮

芍藥各三兩

細辛去苗葉

木通

剉二兩甘草炙各

桂去粗皮

芍藥各三兩

細辛去苗葉

右七味粗擣篩每服五錢匕生薑一棗大柏碎棗三枚擘破水一盞酒半盞煎至八分去滓溫服

治霍亂嘔逆四肢厥冷煩悶流汗飲食不化心腹虛滿拘急短氣理中湯方

麥門冬

去心六兩焙

人參

白朮各伍兩

乾薑炮六兩

甘草

炙伍兩

附子

炮裂去皮臍

人參

白朮各伍兩

乾薑炮六兩

右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至五分去滓溫服

治霍亂四逆吐下煩嘔轉筋肉冷汗出體痺氣急垂死音聲不出脉不通者附

子湯方

附子炮裂去皮臍

人參厚朴去粗皮生薑

白茯苓去黑皮塗炙乾薑

甘草炙

陳橘皮炒去白當歸切焙

葛根剉

桂皮去粗皮

乾薑炮各壹兩

右一十味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服隨藥吐者更服勿止
治霍亂脉微欲絕或惡寒四肢拘急手足厥逆或吐利已定汗出而厥四逆不解通脉四逆湯方

甘草炙二兩

附子炮裂去皮臍二枚

乾薑炮三兩

右三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服脉出即愈面色赤者加葱白二莖同煎腹痛去葱白加芍藥二兩嘔加生薑一分切同煎咽痛去芍藥加桔梗并人參二兩以吐利止為度

治霍亂吐利手足逆冷龍骨湯方

龍骨

白者
碎
兩半

附子

炮裂去皮
臍各一
兩

乾薑

炮

甘草

炙

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治霍亂吐利已定汗出厥冷四肢拘急腹中痛不解脉欲絕桔梗湯方

桔梗

剉炒
壹兩

甘草

炙
灸

附子

炮裂去皮
臍各二
兩

乾薑

炮
兩
壹

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治霍亂吐下虛冷厥逆乾薑湯方

乾薑

炮
壹

甘草

炙
灸

人參

各二
兩

附子

炮裂去皮
臍壹枚

右四味咬咀如麻豆每服六錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服下甚者加龍骨搗研二兩腹痛不止加當歸二兩切焙

霍亂欲死

論曰霍亂欲死者真氣厥而邪氣盛也或邪氣暴爭而未得吐利或吐利雖極而邪氣猶勝故真氣為之困乏其證煩悶痞滿四逆自汗脉微若絕者是也此由陰陽痞隔不得升降內經所謂出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危治霍亂吐利已止汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕通脉四逆湯方

附子炮裂去皮
壹枚

甘草炙
兩半

乾薑炮
兩

右三味剉如麻豆每服三錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服脉出即愈若面色赤者每服加葱白三寸腹中痛者每料加芍藥二兩仍去葱白嘔逆者每服加生薑五片咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加人參二兩皆與方相應乃服之仲景用通脉四逆加猪膽汁湯

治霍亂吐利煩嘔轉筋肉冷汗出手足指腫喘息垂死語音不出脉不通人參湯方

人參

附子炮裂去皮
厚朴

去粗皮生
薑汁炙

白茯苓去黑
皮

甘草炙

陳橘皮湯浸去
白焙

當歸焙切

葛根剉

乾薑炮

桂去粗皮
各二兩

當歸焙切

葛根剉

右一十味剉如麻豆每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂吐利不止腹痛轉筋煩悶欲死赤茯苓湯方

赤茯苓去黑
皮

五味子

藿香葉各半
黃耆剉

當歸焙切

白术炒
壹分

乾木瓜

人參各壹
兩

右八味粗擣篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂不吐不利氣脹滿悶欲絕者阿魏丸方

阿魏

研

青橘皮

湯浸

去白

各一兩

分

酸石榴皮

焙

各一兩

分

五味子

各半

兩

分

陳麴

炒

壹

右五味先擣後四味細羅為末與阿魏同研令勻用糯米糊丸如梧桐子大每服二十丸溫熟水下如脚轉筋絕甚者研開溫熟水調下

治霍亂吐不止欲死生薑散方

生薑

二兩

切焙

壹

陳橘皮

湯浸

去

白焙

各一兩

分

乾木瓜

各半

兩

分

右三味擣羅為散每服二錢匕溫水調下連三五服

治飲食傷飽取涼過度霍亂脹悶欲死上下不通雄雀糞散方

雄雀糞

二拾

粒

炒

壹

右一味研細用緩酒半盞調服未効再服

治霍亂多寒手足厥冷脉絕吳茱萸湯方

吳茱萸

半升

洗

炒

壹

兩

分

當歸

切

焙

各一兩

分

桂皮

去粗

各半

兩

分

芍藥

各三

分

細辛

去苗

葉

半升

洗

炒

剉

各半

兩

分

木通

剉

各半

兩

分

甘草

炙各

半兩

分

右七味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞酒半盞入生薑一棗大柏碎棗

二枚擘煎至一盞去滓溫服如氣痞加葛根半兩去棗

霍亂心腹痛

論曰霍亂者由脾胃虛弱客風冷之氣陰陽不和致水穀相并清濁莫分變亂於腸胃之間令人心胸煩懊悶亂不安因名霍亂然邪氣上干於陽絡則心痛而嘔吐下搏於陰經則腹痛而泄利故謂之霍亂心腹痛也

治霍亂吐逆心腹疼痛或便利數多冷熱不調訶梨勒丸方

訶梨勒皮炒陳橘皮湯浸去白

生薑切炒三分

甘草炙半兩

右四味搗羅為末練蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎生薑米飲下不計

時候

治霍亂吐瀉心腹疼痛理中丸方

高良薑剉

白术

各壹兩

桂去粗皮

甘草炙各半兩

右四味搗羅為末練蜜和丸如彈子大每服一丸不計時候濃煎橘皮湯化

下

治霍亂心腹痛煩嘔不止桂心湯方

桂去粗皮

厚朴去粗皮

炙四兩

枳實炒去瓤麸伍兩



右三味粗搗篩每服三錢匕生薑三片水一盞煎至七分去滓溫服不拘時治霍亂中冷心腹痛當歸湯方

當歸切焙
三兩桂皮去粗
二兩甘草炙各
二兩

右三味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時治霍亂吐下虛煩不止心腹絞痛溫中湯方

人參
乾薑炮
白术
甘草炙
當歸切

右五味等分粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時治霍亂心腹痛齊危飲方

齊危
厚朴去粗皮塗生
薑汁炙剉
枳殼去瓢炒
葛根剉

白茯苓去黑皮
甘草炙
人參
桔梗炒

桔梗
陳橘皮去白
切焙

黃芩去黑心
各壹兩

右一十四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時治霍亂宿食不消心腹疼痛抵聖散方

厚朴去粗皮生薑
汁金炙四兩
白术
二兩吳茱萸湯洗焙乾
白茯苓去黑皮
甘草炙剉
木香

高良薑半
人參
白茯苓去黑皮
甘草炙剉



枳殼

去瓤
炒

草豆蔻

去皮

陳橘皮

去白
焙各一
兩

右十一味搗羅為散每服二錢匕沸湯調下不拘時候

治霍亂心腹痛急如中惡菖蒲汁方

生菖蒲

剉碎四
兩

右一味以水同搗絞取汁一盞分為四服每用熱湯和溫服併三服

治霍亂心腹疼痛沉香丸方

沉香

丁香

犀角

枳實

去瓤
炒

肉豆蔻

炮去
殼

木香

蓬莪茂

去皮心
炮各半
兩

胡椒

壹分研
出油

枳榔

剉四
錢

乳香

研

沒藥

半兩研各
兩

巴豆

研出油心
炮各半
兩

麝香

研各一
錢

右一十三味先搗前九味為末與巴豆沒藥乳香麝香和令勻糯米粥為丸如菜菔子大每服五丸用生薑橘皮煎湯下加至十九治霍亂吐下心腹痛乾嘔手足冷不止乾薑湯方

乾薑

炮

甘草

炙

人參

各一
兩

附子

臍裂去
皮

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時治霍亂卒暴心腹痛備急丸方

乾薑炮

大黃炮各

巴豆去皮心

炒乾
別研半兩

右三味搗羅二味為末與巴豆和勻麵糊為丸如菉豆大每服二丸橘皮湯

下得利為効痛止勿服

治霍亂心腹痛煩不止或嘔厚朴湯方

厚朴

薑去粗皮生
炙剉各

桂皮去粗

枳殼去瓢麩炒
各二兩

芍藥

枳榔剉各

桂皮

枳殼去瓢麩炒
各二兩

右五味粗搗篩每服三錢七水一盞入生薑五片煎取七分去滓溫服不拘時

治霍亂吐利不止心腹俱痛桃葉飲方

桃葉

秋搗冬取枝
升

右一味搗碎以水五盞和絞取汁每溫服一盞不拘時

治霍亂心腹冷痛嘔逆惡心大腸滑泄縮沙蜜散方

縮沙蜜

去皮陳麴炒
升

白术

炒

乾薑炮

龍骨

赤石脂

吳茱萸
湯浸炒

芍藥

右九味等分搗羅為散每服二錢七熱米飲調下不拘時

治霍亂吐瀉不止心腹疼痛煩渴良薑散方

高良薑

剉炒壹分

蒼术

米泔浸壹宿剉炒

麥門冬

去心焙陳橘皮白湯浸去焙

肉豆蔻

去殼剉

吳茱萸

湯浸焙炒

人參

訶梨勒皮

各三分

論曰腎水也脾土制之水乃下行今霍亂吐下脾胃既虛則土不能制水故腎氣上乘於心心氣乃築築然而悸動也

治霍亂吐下過多臍上築悸恐作奔㹢理中去木加桂湯方

甘草

炙人參

桂

去粗皮各三分兩

乾薑

炮壹

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂心腹築悸附子湯方

附子

炮裂去皮二兩

白茯苓

去黑皮人參

甘草

炙

乾薑

炮裂去皮二兩

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三

治霍亂臍上築悸及四肢逆冷附子湯方

附子 炮裂去皮
臍半兩

半夏 生薑炒
汁

甘草 炙各一
兩

右三味剉如麻豆每服三錢匕水一盞棗一枚擘破粳米一撮煎至七分去滓溫服日三

滓溫服日三

治霍亂洞泄不止臍上築惇乾薑湯方

乾薑 炮

人參

甘草 炙各一
兩

白茯苓 去黑皮
皮

陳橘皮 湯浸去白
皮

桂皮 去粗
皮

黃耆 剉各二
兩

右七味粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三

治霍亂臍上築惇平胃湯方

乾薑 炮

附子 炮裂去皮
臍半兩

人參

甘草 炙

白茯苓 去黑皮
各三兩

白茯苓

去黑皮

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三

治霍亂心下築惇腎氣動茯苓湯方

白茯苓 去黑皮
人參各一
兩

甘草 炙各一
兩

白术 各二
兩

乾薑 炮
壹

右五味粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三

霍亂心腹脹

論曰霍亂心腹脹者陰陽氣不升降胃中虛客氣內實故脹而悶亂也挾穀不化內煩而嘔者降氣于下則病可愈

治霍亂心腹脹滿疼痛破氣消食高良薑湯方

高良薑

剉去粗皮淹生薑三度炙乾

陳橘皮湯浸去白焙乾

白术

桑根白皮炒剉甘草炙各二兩

人參壹兩

木瓜去皮搗并子中焙乾三兩

五味子

擗二桂去粗皮

枳榔剉

訶梨勒皮

木香

肉豆蔻人

各一兩

鹽鍊成鹽花研

淘去泥滓

右十五味先擣前十四味細羅為末與鹽花末同研令勻以水五升下藥末一時入鍋中和鹽花同煎不住手攪候水泣出藥於盆中乾貯之每服兩錢七八生薑少許煎湯點服之

治霍亂心腹脹滿氣逆或內煩而嘔手足厥冷金針丸方

陽起石

煅研不灰木研

阿魏半兩

巴豆去皮心膜不去

油二拾伍粒

杏人

湯去皮尖及雙人研二拾伍枚

右五味擣羅為細末軟粟米飴丸如櫻桃大每服一丸先穿一眼子欲服時燈上燒烟盡於冷為末生薑米飲調下以利為度

治霍亂一切冷氣宿食不消心脇脹痛胃冷嘔噦并諸痰飲鼈甲丸方

九肋鼈甲厚重綠色者一枚打鐵脚子格得鼈甲者平穩安於爐中下用
炭火炙之取好米醋五大合少少傾於甲中旋以雞翎塗於甲內令匀
炙盡米醋即得切不得令火猛及鼈甲背上色變黑了以薄醋刷洗打碎
烈日中暴乾擣羅成粉取五兩入後藥

京三棱炮

附子

炮裂去皮
各二兩

白石脂

研

赤石脂

研

白龍骨

研各半
兩

肉豆蔻人

壹

白豆蔻人

壹兩如無以草
豆蔻二兩代之

木香

研各半
兩

牛膝

酒浸去
苗焙

枳殼

去
麩炒

當歸

洗淨

白术

研各二

桂皮

去粗

防風

去
叉

陳橘皮

湯去
白焙

芍藥

華撥各二

牛乳

壹升不得
令有水

右一十九味除牛乳外擣羅為細末別取華撥末一兩和牛乳慢火煎如錫
與衆藥杵勻衆手丸如梧桐子大霍亂甚者取五十九嚼破以人參橘皮湯
下立愈未全愈更服三十九

治卒霍亂吐瀉腹痛刺上吐下瀉香薷湯方

香薷

剉二

木瓜

去
乾剉

荆芥穗

熟艾

各半

陳廩米

炒半

黑豆
炒
壹

右六味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服日三如人行三
五里進一服

治霍亂吐瀉腹滿不消食心腹痛理中湯方

人參

乾薑
炮裂

白朮

甘草
炙各壹兩

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓熱服

治霍亂脾胃氣攻腹脹滿不下食白朮湯方

白朮
半兩

枳殼
去瓤麸炒壹兩

分

右二味粗搗篩每服三錢匕入大棗三枚擘去核水一盞煎至六分去滓空
腹溫服早晨午時日晡各一服

治霍亂嘔吐腹脹滿枳榔湯方

枳榔
剉

陳橘皮
湯去皮乾焙

白

白茯苓

去黑皮

防風
去叉

人參

麥門冬
去心焙

紫蘇莖葉

甘草
炙

荊梨勒

煨黃去核各壹兩

右九味粗搗篩每服五錢匕入生薑一分拍碎陳米半合水兩盞煎至九分
去滓溫服日三每嘔逆時相次熱服

治霍亂未得利腹脹痞刺嘔逆不已大腹湯方

大腹和皮

厚朴

去粗皮

生薑

汁

防風

去

半夏

湯洗

茱萸

各半兩

滑石

人參

壹兩

右五味粗搗篩每服五錢匕木瓜三片小麥半合生薑一分拍碎水兩盞煎至一盞去滓溫服如吐時熱服

治霍亂吐利腹脹厚朴湯方

厚朴

去粗皮

生薑

汁

枳殼

去瓢

炒微

右二味粗搗篩每服三錢匕生薑一分拍碎水一盞煎至七分去滓溫服日三

治霍亂不得利氣急膨滿痞刺疼痛吳茱萸湯方

吳茱萸

淘雨

炒草

豆蔻

人

拾

甘草

炙

壹

分

乾木瓜

去皮

子

焙

三分

右四味粗搗篩每服五錢匕黑豆一百粒水一盞半煎至一盞去滓熱服如人五里再服

治冷熱氣不調霍亂吐逆不定腹脹悶高良薑煮散方

高良薑

桂去粗皮

人參

三

甘草炙半



大学图书馆

右四味搗羅為細散每服三錢匕水一盞入棗二枚同煎至六分和滓溫服
不計時

治霍亂腹脹煩悶不止手足厥逆救命散方

地龍

自死者焙乾踏

蛤粉

右二味等分搗羅為細散每服二錢匕蜜水調下

治霍亂心下堅滿妨悶半夏湯方

半夏

湯洗染偏焙切三分

人參

壹兩三分

白茯苓

去黑皮二兩半

右三味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎至一盞去滓溫服如人行八九里再服

治霍亂下利氣脹飲食不消木香散方

木香

丁香

白朮

炒

菖蒲

山薑子

桂皮

甘草

炙

人參

吳茱萸

洗淨炒

白豆蔻人

陳橘皮

湯去白焙

內豆蔻

炮去皮

高良薑

草豆蔻

去皮

右一十四味等分搗羅為細散每用四錢匕木瓜湯調下

治霍亂不吐不利壅悶腹脹或疼痛桔梗散方



桔梗

炒兩去皮

桂去粗皮

去粗皮三分

大黃

炒兩去皮

各三分

白术

各三分

人參

二兩

青橘皮

去白皮炒剉兩

桂去粗皮三分

枳殼

去瓢炒兩

各三分

白术

各三分

人參

右八味擣羅為細散以冷生薑湯調下三錢七治霍亂脾氣冷腹脹不能食胸膈氣痞厚朴丸方

厚朴

去粗皮炙三分

桂去粗皮三分

乾木瓜

各半兩去皮

乾薑炮

各三分

甘草

炙三分

胡椒

各一分

右九味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎蘭香湯下

大德重校聖濟總錄卷第三十九

霍亂門

霍亂昏塞下利

論曰霍亂昏塞下利者其人脾胃久虛陽氣不足因風冷之氣客於三焦傳於胃府使水穀不化清濁相干吐利不止致令真氣暴虛陰陽離守神識不明太便遺利無所覺知

治霍亂虛寒精神不守泄利不止語聲不出茯苓安心湯方

白茯苓去黑皮

人參

乾薑炮

桂去麌皮

遠志

去心各

遠志壹兩半

甘草

兩

壹

右六味麌搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服日三不拘時
治霍亂下焦虛寒洞泄不止黃藥皮湯方

黃藥

去麌皮

人參

地榆剉

阿膠炙燥各

壹兩半

厚朴去麌皮

艾葉壹兩半

黃連去須貳兩半

白茯苓

去黑皮

櫟木白皮各貳兩

右九味麌搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三不拘時
治霍亂暴利不自知理中湯方

人參

白朮

乾薑

甘草

火各
兩

右四味麞搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服日三治脾胃氣冷霍亂下利不自知訶梨勒丸方

訶梨勒皮

黃連

鍾乳粉

五倍子

白礬

燒汁盡
各一兩

縮沙

去皮

厚朴

去麞皮
薑汁火

樗皮

當歸

培

酸石榴皮

各一兩

木瓜

切

甘草

火

橡實

各一兩

陳橘皮

湯浸去白
培炒貳兩

肉豆蔻

去殼炮

乾薑

炮半

胡椒

半

右十七味為細散先醋煎艾葉一兩去滓取汁煮麪糊丸如梧桐子大每服三十九煎棗湯下不拘時

治霍亂昏塞下利吳茱萸餅方

吳茱萸

湯先

厚朴

去麞皮
薑汁火

陳橘皮

湯洗去白

培炒

木瓜

切

人參

各一兩

高良薑

分

胡椒

各一兩

木瓜

切

香薷

各一兩

烏牛溺

半升

右九味先以八味為細末將牛溺捻作餅子暴乾臨用時火燥再為細末每

服二錢匕水一盞煎至七分溫服

治霍亂暴利不禁服中雷鳴烏梅散方

烏梅肉 炒

黃連 去須

父葉

赤石脂 別研

當歸 切焙

甘草 炙

附子 炮裂去皮臍

阿膠 炙兩

右八味為細散每服二錢七覺冷則酒調下覺熱則熱水調下治霍亂昏塞下利或病後瀉黃白無度服中虛痛黃連湯方

黃連 去須四兩

黃芩 去皮麌

當歸 切各四兩

厚朴 去麌皮

乾薑 參各兩

地榆 煅

阿膠 炙

酸石榴皮 各四兩

右八味麌搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

治霍亂下利手足逆冷昏塞不自知龍骨湯方

龍骨 燒

附子 炮裂去皮各一兩

人參 各四兩

乾薑 半兩

甘草 炙各半兩

右五味剉如麻豆每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服日三

治霍亂暴利昏塞不自知吳茱萸散方

吳茱萸 炒

湯洗焙

壹兩

陳橘皮 湯浸去白

焙貳兩

右二味為細散每服三錢七米飲調下不拘時

乾霍亂

論曰乾霍亂之狀中氣喘爭而不吐不利是也腸胃挾實與冷氣相搏正氣暴



衰神志昏冒上下隔塞白汗自出治之稍緩則不可

治乾霍亂大小便不通手足心俱熱悶亂冬葵子湯方

冬葵子

滑石

碎

香薷

擇各
兩

乾木瓜

細切
瓣壹枚去皮

右四味麞搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服大小便通利中快立差日四五服

治乾霍亂上不得吐下不得瀉但冷汗自出氣悶將絕鹽湯方

鹽

半匙

童子小便

盞壹

右二味溫和服少頃吐下愈

治乾霍亂紫蘇丸方

紫蘇

桂皮

去麞

陳橘皮

湯浸白焙去

高良薑

人參

各一兩

右五味為細末鍊蜜丸梧桐子大繞覺食不消氣滿惡心欲吐不吐乾嘔每服二十九溫酒下日再

治乾霍亂厚朴湯方

厚朴

去麞皮生
薑火參分

大黃

剉炒

檳榔

剉

枳殼

去瓢
炒



朴消

高良薑

各分參

右六味麌搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

治乾霍亂人參湯方

人參

厚朴

去麌皮生薑
汁炙兩

高良薑

桂去麌皮
各半兩

白茯苓

去黑皮
壹兩

甘草

炙半兩

右六味麌搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓不拘時溫服
治乾霍亂不吐不瀉但壅悶脹滿或疼痛木香散方

木香

青橘皮

湯浸去白焙

檳榔

生剉

大黃剉炒各半兩

桔梗

剉炒壹兩

桂皮

去麌皮

白朮

各分參

人參剉

右八味搗羅為散每服二錢匕冷生薑湯調下加至三錢匕以差為度

治乾霍亂不吐利大黃丸方

大黃

剉炒壹兩

乾薑

炮平兩

桂皮

去麌皮參分

巴豆

心膜炒研剉肆枚去皮

右四味先擣前三味為細末與巴豆同研令勻鍊蜜丸如梧桐子大每服五
丸至七丸溫水下服久未動更服三丸以溫粥飲一盞投之取利為効
治乾霍亂上氣衝急欲悶絕大小便不通檳榔湯方

右一味麞搗篩每服五錢匕水一盞童子小便半盞煎至一盞去滓溫服日再

治乾霍亂腹脹滿不吐利心胸悶亂不可忍陳橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白
焙參兩

蜀椒

去目并閉口
出汗肆拾粒

右二味麞搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至一盞去滓溫服不拘時

治乾霍亂黍米飲方

黍米

貳合水
淘淨

右一味水研澄取白汁呷盡即差

治乾霍亂不吐利四肢煩身冷汗出水蓼飲方

水蓼

切
擣
各
貳兩

右二味以水五盞煎取三盞去滓分溫三服

治乾霍亂心腹脹煩滿氣痛不得吐下方

鹽壹合水壹升煎令鹽消旋服之吐出便愈若不吐又飲之令吐必差

治脾元虛損霍亂不吐瀉腹脹如鼓心胸痰壅活命飲方

鹽壹合

生薑半兩

甘草分夾壹

葛根半兩

丁香半粒

右五味細剗如麻豆用童子小便一盞半煎至一盞去滓分溫二服

治乾霍亂不吐不利令人昏冒煩亂氣短上下隔塞冷汗自出二勝散方

訶梨勒皮

乾薑各貳兩成塊者

右二味不擣碎同用水二升於銚子內煎水盡為度取出重細切焙乾擣羅為散每服二錢匕陳米飲調下

中惡霍亂

論曰中惡霍亂者客邪內干正氣暴亂使胃中食物不化氣道否結不得宣通令人心腹卒痛吐利煩悶甚則精神冒昧靡所知識此得之鬼氣所作也

治霍亂中惡不識人心痛腹脹不思飲食十香丸方

丁香

蘇合香

白檀香

沈香

木香

莎草根炒去毛

白朮剗炒

高良薑剗

安息香研

麝香研

薰陸香研

丹砂研

龍腦研各半兩

華撥炒

訶梨勒煨取皮

犀角镑屑

厚朴去麌皮各半兩

霍亂門

右一十七味除別研外為細末與別研者藥同研令勻鍊蜜丸如梧桐子大
每服五丸溫酒下老少加減服之甚者溫酒研下收貯於瓷合中日四五服
以差為度

治中惡霍亂心痛胸膈病痛喘急桃枝湯方

桃東行枝白皮

壹握

丹砂

碎壹

梔子人

拾肆枚

當歸

焙

桂去麤皮

各參兩

附子

炮裂去皮

丹砂

兩

吳茱萸

淘炒各

壹兩

右八味剉如麻豆每服四錢匕水二盞生薑三片煎至一盞去滓溫服用三
夜一

治中惡霍亂垂死丹砂丸方

丹砂

研半分

附子

炮裂去皮壹分為末

雄黃

貳豆許研

右三味以巴豆七粒去心皮別研出油後入諸藥末研令極勻鍊蜜丸如麻
子大每服三丸米飲下若下利未止加三丸至五丸與少冷粥食之即定
治卒中惡霍亂心腹刺痛去惡氣麝香散方

麝香

研壹分

犀角

銛屑

木香

各半兩

右三味為細散空心熱水調一錢七日三

治中惡霍亂麝醋方

麝香

壹錢
細研

右一味和醋半盞調分二服即差

治中惡霍亂吐利手足麻痺或轉筋白朮湯方

白朮

剉

木瓜

去瓢
切焙

人參

各一
兩

甘草

炙

乾薑

炮
半兩

右五味麌搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘同煎七分去滓溫服不拘時

治中惡霍亂心煩橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去
白培

木瓜

切
焙

桂皮

去
麌

草豆蔻

去
壳

右五味麌搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時
治中惡霍亂心腹痛煩悶木香散方

木香

炮參
分

檳榔

生剉
壹兩

青橘皮

湯浸去
白培

桂皮

去粗
壳

桃仁

去皮尖雙
人炒研

人參

各半
兩

右六味為細末每服二錢匕溫酒調下不拘時

東方先生全集 卷三十九

霍亂煩渴

論曰經曰上焦如霧言五藏津液之所熏蒸其氣潤澤故能分布於諸脉也今霍亂吐利之人重亡津液則藏府不和上焦熱津液不足故因霍亂而煩渴也治霍亂煩渴吐不止者緣吐利多津液虛少不至上焦故渴人參湯方

人參

參

烏梅

去核
貳枚

右二味麤擣篩每服五錢匕水一盞半竹茹彈子大煎至一盞去滓熱服日

四

治霍亂心煩渴吐利不下食草豆蔻湯方

草豆蔻

去皮
壹

黃連

去須
壹
兩

右二味麤擣篩每服三錢匕水一盞烏豆五十粒生薑三片煎至七分去滓溫服日三

治霍亂吐利四肢煩疼冷汗出多渴香薷湯方

香薷

貳
兩

蓼子

壹
兩

右二味麤擣篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫服日三

治霍亂吐利不止渴甚麥門冬湯方

中

西

醫

書

卷

三

九

東

方

先生

全

集

麥門冬去心
桔梗人
人參

陳橘皮
湯浸去白
焙各半兩

厚朴去皮
汗火壹兩

右五味麌擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三

治霍亂津液少渴甚青竹茹湯方

青竹茹子大
人參半兩
烏梅去核

右三味麌擣篩水三盞煎取一盞去滓溫分三服不拘時

治霍亂吐利渴躁不止人參湯方

人參半
葛根剉

白朮

桔梗去蘆頭

剉炒

赤茯苓去黑皮

各半兩

右五味粗搗篩每服三錢匕漿水一盞煎至七分去滓溫服

治霍亂渴甚糯米飲方

糯米淘貳

右一味淘取泔飲之即定

又方

右研糯米取白汁恣意飲之

治霍亂吐下大渴多飲梁米飲方

聖濟總錄

卷三十七

霍亂門



南京中医药大学图书馆藏印

黃粱米升淘五

右一味以水一斗煮取五升澄清稍溫飲之糯米飲亦得

治霍亂吐不止兼渴薑藥飲方

生薑壹兩洗切

生薑壹兩洗切

右二味研絞取汁分三服不拘時

治霍亂吐渴躁煩悶不止肉豆蔻丸方

肉豆蔻去殼炮

丁香

甘草炙

陳橘皮湯浸白焙去

高良薑

藿香葉各半兩

右六味為細末用棗肉丸如梧桐子大每服二十九三十丸溫生薑米飲下
不拘時

治霍亂吐逆冷熱不調心膈煩滿咽乾多渴藿香湯方

藿香葉卷分

枇杷葉炙去毛

陳橘皮湯浸去白焙

丁香各半兩

厚朴去皮生薑汁

大腹兩

白茅根

乾木瓜

麥門冬去心各半兩

甘草炙半兩

右九味麞鳩篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓早晚食前溫

服

治霍亂煩渴喘促無力食即嘔吐木瓜湯方

木瓜

壹兩

木香

檳榔

生薑

各半兩

甘草

炙壹分

黑豆

炒壹合

人參

分

右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓早晚食前溫服
治霍亂吐利煩渴不止木瓜湯方

木瓜

壹兩枝無生者亦得

桂

去麌皮兩

右二味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服一方以
豆蔻代桂

霍亂心煩

論曰霍亂心煩者緣心下有水害心火其氣不宣故令人心煩悶亂而不安
也蓋胃土氣衰不能運化飲食氣鬱於中使清濁不分陰陽干擾故霍亂而神
情煩躁也

治霍亂心煩坐卧不安麥門冬湯方

麥門冬

去心焙祌去皮

人參

陳橘皮

湯浸去白焙



甘草 炙各
壹兩

右五味麌搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分小麥五十粒竹葉十片煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂吐利後心煩亂髮湯方

亂髮 壹團如雞子
大燒存性

吳茱萸 湯浸培乾參分

甘草 炙

人參 各壹兩

右四味麌搗篩每服五錢匕水一盞酒半盞煎至八分去滓溫服日三

治霍亂心煩蘆根飲方

蘆根 剉焙壹分人參

水萍 紫者焙乾

枇杷葉 拭去毛各壹分

右四味麌搗篩每服五錢匕入薤白四寸拍破水一盞半煎至八分去滓溫

服日三

治霍亂吐後煩滿嘔逆橘皮湯方

陳橘皮 湯浸去白焙

梔子人 各貢兩

右二味麌搗篩每服三錢匕入豉半合水一盞煎至七分去滓溫服日三

治霍亂狂悶煩渴吐瀉無度氣欲絕者竹瀝飲方

淡竹瀝

壹合

粳米

壹合炒以水煮蓋同研去滓取汁

右二味和勻頓服之

治霍亂心煩不止厚朴湯方

厚朴

去麤皮薑汁天肆兩

桂

去麤皮參兩

枳實

去瓤炮炒貳兩

右三味㕮咀如麻豆大每服六錢匕水二盞入生薑一棗大拍碎同煎至一盞去滓溫服日三如腹痛加當歸二兩

治霍亂心中煩悶香豉湯方

豉

七
綿裹升半

梔子人

厚朴

去麤皮薑汁天各參兩

右三味㕮咀如麻豆大每服六錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服
治霍亂心煩梁米飲方

黃粱米

升半

右一味擣為粉每服六錢匕水二盞調頓服糯米亦得

治霍亂已吐利心煩悶不止桑葉飲方

桑葉

壹大升切

右一味以水一盞煎取七分頓服立定

治霍亂後心煩卧不安席葱白大棗湯方

葱白貳拾莖去須

大棗貳拾枚去核

右二味以水三盞煎取一盞半去滓分溫二服

治霍亂後脾胃尚虛穀氣未實津液內燥令人煩躁睡卧不安白豆蔻丸方

白豆蔻皮去

陳橘皮焙去白

厚朴去薑皮生薑汁浸炙

草豆蔻皮去

桂皮去麌

白朮炒炮

乾木瓜

人參

半夏

湯洗去滑皮偏各貳兩

縮沙蜜皮去

高良薑炒

甘草剉去皮

陳麴炒

麥蘖

炒肆兩去滑皮偏各貳兩

木香

乾薑炮

白茯苓去黑皮各壹兩

桃人

肆兩去滑皮偏各貳兩

右一十八味搗研為末練蜜和丸如梧桐子大每服三十九至四十九空心米飲下

霍亂逆滿

論曰霍亂逆滿雖本於飲食不消亦或痰水積聚滿遂不行皆氣為之痞也其證胸膈窒塞脇肋支滿或不得吐或吐而不止治法順其升降則愈

治霍亂逆滿氣痞胸膈咽塞妨悶飲食不消腹脇虛脹腸鳴刺痛蘇桂丸方

紫蘇葉

桂皮去麌

陳橘皮湯浸去白

人參

白朮各壹兩

白朮各壹兩

甘草

火半兩

高良薑

參分

右七味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九溫酒下米飲亦得如緩急無湯酒細嚼藥嚥津

治霍亂逆滿兩脇下妨悶嘔不下食茈胡湯方

茈胡

去苗

厚朴

去皮

白茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白皮

桔梗

去蘆頭炒

紫蘇葉

人參

火各壹

诃梨勒

煨去皮

桔梗

去蘆頭炒

桔梗

各壹兩半

右九味麞搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍碎煎至一盞去滓溫服日二

治霍亂逆滿不下食食即吐出參門冬湯方

參門冬

去心培

兩

茅根

剉去火

甘草

火

人參

各一

右四味麞搗篩每服五錢匕水一盞半入竹茹彈子大一塊生薑一棗大拍碎煎至一盞去滓溫服日三

治霍亂心下逆滿吐逆冒悶半夏湯方

半夏

湯洗去滑

朱砂

偏肆

兩

厚朴

去皮

甘草

火

赤茯苓

去黑皮

兩

右三味麞搗篩每服五錢兌水一盞半入生薑一塊大拍碎煎至一盞去滓溫服不拘時

治霍亂逆滿開胃口藿香散方

藿香葉

壹兩
培

訶梨勒

煨去核

拾枚

人參

丁香

各半兩

半兩

白豆蔻

半兩

代

甘草

吳壹

分

右七味為細散每服一錢七用煨和皮生薑一塊棗二枚去核煎湯調下早晚食前服

治霍亂逆滿風邪熱氣衝心心悶氣短吐不下食麥門冬人參湯方

麥門冬

去心
貳兩
培

人參

參
兩

陳橘皮

湯浸去
白焰

羚羊角

鎊屑
壹兩

右四味麞搗篩每服五錢兌水一盞半入生薑七片煎至一盞去滓溫服日

三

治霍亂逆滿心下痞塞半夏人參湯方

半夏

為末
餅
乾
作
汁
培
乾

人參

各參
兩

右二味麞搗篩每服三錢兌水一盞入白蜜一匙煎至七分去滓溫服日三

不拘時

治霍亂逆滿不下食或腹中氣妨悶豆蔻湯方

草豆蔻人半兩

人參一臺

甘草三分

炙參一錢

右三味麞鳩篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大指碎煎至一盞去滓

溫服

治霍亂逆滿胸膈噎悶飲食不消紫蘇子丸方

紫蘇子

陳橘皮

湯浸去白
焙各二兩

高良薑

桂皮

去麞

人參各一臺

右五味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸米飲下不拘時食生冷過多欲作霍亂者含化嚥汁

治腹藏不調內寒外熱脾胃虛冷宿食不消乍秘乍利不常霍亂逆滿厚朴丸

方

厚朴

去麞皮生
薑汁炙

赤石脂

各半兩

白朮

乾薑

炮

麥蘖

炒

人參

白茯苓

去黑皮

當歸

切

橘皮

湯浸去白培

甘草

炙

訶梨勒

煨取皮各一臺

而

右一十一味搏羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心米飲下二十九至三十丸

霍亂乾嘔

論曰霍亂乾嘔者胃氣逆也本於吐利之後脾胃俱虛三焦不理氣時逆上故但嘔逆而無所出即謂之乾嘔

治霍亂乾嘔木瓜湯方

木瓜

乾者去
瓤壹枚
厚朴

去
糞皮
半兩
甘草
半兩

乾薑

炮
壹
兩

人參

壹
分
兩

治霍亂乾嘔人參湯方

人參

甘草

炙

陳橘皮

湯
浸
去
白
焙
各
貳
兩

右三味麌擣篩每服三錢匕水一盞葱白二寸煎至六分去滓溫服
治霍亂乾嘔不止吳茱萸湯方

吳茱萸

湯
浸
燒
乾
炒

乾薑

炮
各
兩

右二味麌擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服
治霍亂乾嘔不吐木香湯方

木香

乾木瓜

去瓢各
壹兩

紫蘇莖
兩

右三味麞擣篩每服五錢匕水一盞半入黑豆一百粒生薑五片煎至一盞去滓溫服良久再服

治霍亂乾嘔不止薤白湯方

薤白

搗

右一味細切水三盞煎至一盞半去滓溫分二服不拘時

治霍亂飲食輒嘔高良薑湯方

高良薑

兩

右一味麞擣篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎煎至七分去滓溫服

日三不拘時

治霍亂後胃弱嘔吐不止厚朴湯方

厚朴

去麞皮薑
汁
天
肆
兩

乾橘豆葉

貳
兩

人參

白茯苓

去黑皮
各
冬
兩

右五味麞擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服



聖濟錄

卷三十九

北

大德重校聖濟總錄卷第三十九



南京中医药大学

图书馆藏

大德重校聖濟總錄卷第四十

霍亂門

霍亂嘔噦

論曰霍亂嘔噦者陰陽冷熱不調清濁相干胃氣不和風冷加之故嘔噦不止則噦昔人謂嘔噦發下焦之間是也此甚於嘔吐治宜降氣於下令上下通達升降無礙則病可愈

治霍亂嘔噦手足冷脉絕四順湯方

人參

乾薑炮

甘草炙各參兩

附子炮裂去皮

右四味㕮咀每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治霍亂嘔噦手足冷當歸湯方

當歸切培

桂皮去麤

吳茱萸湯洗培乾各參兩

細辛去苗

木通剉

甘草炙

乾薑炮各參兩

右七味麞搗篩每服五錢匕水一盞酒半盞大棗二枚去核煎至一盞去滓

溫服

治霍亂嘔噦不止橘皮湯方



陳橘皮

湯浸去白
培貳兩

甘草

炙壹兩

枇杷葉

拭去毛
炙貳兩

右三味麞搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服如人行

五七里再服

治霍亂氣厥嘔噦不得息半夏湯方

半夏

湯洗染偏
培貳兩

甘草

炙

人參

壹兩

前胡

去蘆頭壹兩

桂

去麞皮壹兩

右五味麞搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一分切豆豉五十粒煎至七分去

滓溫服

治霍亂心煩乾嘔蘆根湯方

蘆根

卷兩

人參

壹兩

薤白

洗切半
鹽

枇杷葉

拭去毛壹兩

右四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓空心溫服

治霍亂卒噦枳實湯方

枳實

去瓢炒貳兩

右一味麞搗篩每服三錢匕羊乳一盞羊脂一彈子大煎至七分去滓熱服

不拘時

治霍亂卒噦糯米粉方

糯米粉壹升

右一味每服三錢匕以井華水調下不拘時

治霍亂嘔噦生薑飲方

生薑切兩

右一味以水三盞煎取一盞半去滓分溫三服不拘時

霍亂下利

論曰霍亂者由冷熱之氣變亂於腸胃之間搏於陰經則腹痛而腸鳴故為霍亂下利之病然亦為熱白為寒冷熱相搏赤白交下寒甚則青黑不已則轉筋之證生焉

治霍亂腹中冷氣下利木瓜丸方

木瓜乾者

壹兩當歸切

培炒熟艾微

桂去蕊皮各半兩

陳橘皮湯浸去白

培參分

木香

人參各半兩

赤石脂去蕊皮兩

白朮

厚朴去蕊皮參分

薑炙剉

訶梨勒皮

高良薑各半兩

右十二味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每腹三十九米飲下空心服治霍亂下焦熱毒利血如鶩鳴肝片不止升麻湯方



升麻

參

犀角屑

地榆

去苗

各

紫草

去苗

參

裏荷根

剉碎

黃芩

去黑心

芭蕉根

剉碎

桔梗

炒參

梔子人

壹兩

右九味麞擣篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服日三夜一治霍亂下焦虛寒大便洞泄小便自利黃芩皮湯方

黃芩

去麞皮

壹兩半

黃連

去須剉

兩半

人參

壹兩半

赤茯苓

去黑皮

壹兩

地榆

去苗剉

壹兩半

櫟木白皮

剉碎

兩半

厚朴

去麞皮薑

壹兩半

阿膠

火令燥

兩半

艾葉

炒壹

赤茯苓

去黑皮

壹兩

地榆

去苗剉

壹兩半

櫟木白皮

剉碎

兩半

右九味麞擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓空腹溫服日三治霍亂後虛冷腹痛下利不止龍骨湯方

龍骨

當歸

炮切

乾薑

裂

甘草

微火

人參

各壹

附子

炮裂去皮

兩半

人參

各壹

附子

炮裂去皮

兩半

右六味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓熱服日三治霍亂下利不止而渴者白朮湯方

白朮

厚朴

去麞皮

壹兩半

甘草

微火

參

生

當歸

炮切

人參

乾薑

炮裂

甘草

微火

參

各

右六味麞擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服如人行五六里

再服

治霍亂後水利不止白茯苓丸方

白茯苓

去皮

黃蘖

去麌皮

乾薑

炮裂各一兩

木瓜

乾者去瓢壹枚切焙

右四味搗羅為末以粳米或粟米飲和為丸如梧桐子大暴乾米飲下五十丸日再老小加減亦治諸利

治冷利洞泄及赤白滯利石榴湯方

酸石榴

壹枚大者

黃連

去須壹兩

乾薑

炮貳兩

右三味㕮咀每服五錢匕以水一盞半煎至一盞去滓入阿膠二片令烊頓服之不拘時

治霍亂赤白冷熱等利及暴瀉病勢初發吐瀉不止食入不得並宜服藜蘆丸服之不拘時

治霍亂赤白冷熱等利及暴瀉病勢初發吐瀉不止食入不得並宜服藜蘆丸服之不拘時

方

藜蘆

去苗

皂莢

酥去皮子

巴豆

各壹兩去心皮膜炒出油

右三味先搗前二味細羅為末與巴豆同研令勻銚蜜為丸如小豆大每旦米飲下一丸取利為度未利稍加之

治霍亂下利陳橘皮湯方



陳橘皮

湯浸去
白炒乾

高良薑

剉各分厚朴去
麌皮薑汁蜜
炙參偏壹兩

右三味麌搗篩每服三錢七生薑半分拍碎水一盞煎至七分去滓溫服日

四五服

治霍亂水瀉腸胃冷滑訶梨勒丸方

訶梨勒

貳兩以麌裹煨
取皮并麌為末

乾薑

炮

龍骨

赤石脂

各壹分

右四味搗羅為末以麌糊為丸如梧桐子大每服空心以米飲下二十九

治霍亂下焦虛寒或先血後便此為遠血成利伏龍肝湯方

伏龍肝

淨陳節
貳兩

甘草

炙壹兩

乾薑

剝

生乾地黃

焙各貳兩半

黃芩

去黑心
壹兩半

牛膝

酒浸切培
壹兩

亂髮

燒灰
壹分

右七味麌搗篩每服三錢七生薑壹分拍碎水一盞煎至七分去滓溫服日

三

治霍亂下焦虛寒或便利後見血止血湯方

續斷

當歸

切培各
參兩

乾薑

炮裂
肆兩

甘草

炙貳
兩

生乾地黃

焙肆
兩

蒲黃

貳兩

桂

去麌皮
參兩

阿膠

炙令燥
貳兩

右八味麌搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三

治霍亂下焦熱毒利如魚腦雜赤血併下臍腹疼痛不可忍裏急後重香豉湯
方

香豉

微炒
貳兩

梔子人

壹兩

黃蘖

去麌皮
半兩

地榆

剉壹
兩

白朮

西根

根
抉淨剉碎
全分

右六味麌搗篩每服三錢匕用薤白四寸水一盞同煎至七分去滓溫服日

三

治霍亂下焦熱結或利下膿血煩痛赤石脂湯方

赤石脂

肆
兩

烏梅

去核炒
乾壹
兩

梔子人

半兩

白朮

壹
兩

乾薑

炮製
壹
兩

右七味麌搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空腹溫服日三

霍亂轉筋

論曰霍亂轉筋緣風冷傷於三焦傳於脾胃脾胃得冷則陽氣不得宣行致四肢筋絡不得舒緩此蓋中下不足其候冒悶不安脰筋攀結脹肉緊痛反急於上蓋足陽明之經虛膀胱之脉寒也然足陽明之脉其支者起胃下口循腹裏下至氣衝中而合以下髀關抵伏兔下入膝臍中下循髀外廉足太陽之經其

脉循脾外後廉下合膍中下貫膍內是動則病脾不可回轉膍如結膍如裂治宜調胃府而溫膀胱之經如此則小水得宣寒冷自下胃府溫和霍亂可愈轉筋之疾無由作也

治霍亂轉筋胡椒湯方

胡椒

吳茱萸

湯洗淨炒

肉豆蔻

去殼各半兩

人參

桂皮

乾薑

炮各半

半兩

右六味麤搗篩每服五錢凡以水一盞半煎至八分去滓溫服
治霍亂轉筋蜀椒湯方

蜀椒

去目并開口炒出汗各半分者

烏梅

半枚去核熟

右二味咬咀以水二盞煎取一盞再入蜜一匙頭煎兩沸空腹頓服之老人亦可服

治霍亂轉筋肉豆蔻湯方

肉豆蔻

去殼半兩人參各半兩

桂皮

去殼

吳茱萸

湯洗淨炒各半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕入生薑三片水一盞煎至六分去滓溫服
治霍亂轉筋杜仲湯方

杜仲

去皮剉炒
壹兩壹分

桂

去纏皮
壹兩

甘草

炙剉
壹分

右三味麞擣篩每服三錢匕生薑三片水一盞煎至六分去滓溫服

治霍亂轉筋悶絕欲死雞白湯方

雞糞白

壹合熟

胡椒

貳粒

高良薑

桂皮

白朮

各壹兩

木瓜

貳兩

生薑

陸分

治霍亂轉筋吐瀉不止木瓜湯方

木瓜

切壹兩

青銅錢

玖文肆拾枚

烏梅

伍枚碎炒

右三味以水二盞煎至一盞去滓分三服細呷

治霍亂轉筋脉微而細此風寒客於胃吐瀉不止厚朴湯方

厚朴

去麞皮生
伍度

乾木瓜

各壹兩

高良薑

香薷

陳橘皮

湯浸去
白培

紫蘇子

各半兩

右六味麞擣篩每服五錢匕生薑三片鹽少許水一盞半煎至八分去滓溫

服

治霍亂吐瀉轉筋煩悶蒙香子散方

簾香子 炒

木香

陳橘皮

湯去白焙人參各半

葛蒲

切米泔浸壹日炒壹兩

甘草

炙剉壹分

右六味擣羅為散以冷米飲調下三錢七如人行三里再服
治霍亂轉筋不止桃人煎方

桃人

壹千枚湯退皮六雙人研如麵

右一味以半乳五升解如漿水於銅器內盛在重湯內煎瓷器中盛每服空心溫酒調下兩匙

治霍亂轉筋入腹欲死生薑酒方

生薑

伍切兩

右一味用無灰酒一升煎取八合頓服便差

治霍亂轉筋入腹或腹中如欲轉雞白湯方

雞糞白

炒壹兩

右一味擣為麩末每服二錢匕以水七合煎三沸去滓頓服勿令病人知
治霍亂轉筋淋足附子湯方

附子

去皮剉壹枚

葱半斤

薑拍碎

生椒

綿

生薑

切

壹分各

右四味以水一升煎三兩沸入瓷盆中濾去滓以鹽漿水解之令熱得所淋洗立差

治霍亂轉筋入腹鹽搗方

鹽合參

右一味以水五升煎取三升浸青布搗轉筋上

治霍亂轉筋苦酒絮裹足方

苦酒壹半升

右取衣絮內苦酒中煮令溫從轉筋處裹之

治轉筋入腹裹足法

木瓜貳枚切破

右以水五升煎取三升以故青布浸湯中用裹轉筋上如無木瓜煎枝二兩

亦得

治霍亂轉筋方

木瓜汁壹盞

木香末壹錢七

右二味以熟酒調下不拘時



治霍亂轉筋諸藥不除方

胡椒末 壹分 木瓜汁 升

硇砂 研極細
壹錢七

右三味將木瓜汁浸椒砂二末攪勻微火熬令稠和丸如梧桐子大每服六丸薑香湯下

治胃氣虛霍亂吐瀉轉筋腹痛神聖香薷飲方

香薷穗 經霜者
壹兩半

厚朴 去皮
壹兩半

黃連 去須
貳兩

各 藕豆 壹兩
培

右四味先用生薑汁四兩一處擣黃連厚朴二味令細炒成黑色入香薷藕豆二味都麤擣篩每服五錢匕水一盞酒一盞共煎至一盞瓷瓶內蠟紙封沉入井底候極冷併服二服至死者亦可救

治霍亂轉筋方

糯米 貳兩
為末

乾薑 炮裂
為末

甘草 生用
為末

人參 為末各
貳錢

右四味拌勻冷水調下三錢匕不拘時

霍亂心煩痞逆

論曰霍亂氣結心下不散則心氣不得下通故字書以痞為否言其不通也然痞為虛按之不痛氣雖妨悶不須駁利唯和調其胃升降其氣則痞氣自散霍

亂自寧矣

治霍亂心下痞滿半夏湯方

半夏

湯洗滑切培參兩去黑皮

人參

貳兩

赤茯苓

去黑皮肆兩

右三味㕮咀如麻豆大每服三錢七水一盞入生薑一叢大搗碎煎至六分去滓溫服

治霍亂心下結氣連胸背痛及吐酸水日夜不止茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮去黑皮生薑汁炙

厚朴

去黑皮生薑汁炙

吳茱萸

湯浸培炒各壹兩

人參

陳橘皮

湯浸培各二兩去白

白朮

參兩

右六味麌搗篩每服五錢七水一盞半入生薑三片煎至八分去滓溫服不拘時

治霍亂心下痞滿煩嘔不止厚朴湯方

厚朴

去麌皮生薑汁炙肆兩

桂皮

去麌皮各參兩

枳實

炒去麌皮各參兩

右三味麌搗篩每服三錢七水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服不拘時

腹痛加當歸二兩

治霍亂心下氣痞不通木瓜丸方

木瓜

去皮瓢切
培拾枚

木香

參

人參

壹兩

肉豆蔻

去皮半兩

陳橘皮

湯浸去白
培貳兩

胡椒

檳榔剉各
壹兩

吳茱萸

湯浸培貳兩
炒貳兩

草豆蔻

去皮參兩

厚朴

去麌皮薑汁
大貳兩

桂

去麌皮壹兩

蒼朮

米泔浸宿刮
去皮焙貳兩

縮紗

去皮

高良薑

各參生薑壹斤搗取汁

生薑

壹斤搗取汁

右一十五味除生薑汁外為細末取生薑汁拌勻用瓷瓶盛於鍋中以重湯煮一復時取出更搗令勻衆手丸如梧桐子大每服十九熟水下治霍亂心下痞逆半夏湯方

半夏

湯洗去滑切培
去皮參兩

人參

各參

右二味剉如麻豆每服三錢匕入生薑三片白蜜半匙水一盞煎至六分去滓溫服不拘時

治霍亂嘔吐酸水結氣在心下吳茱萸湯方

吳茱萸

湯浸培炒壹兩

白朮

壹兩

赤茯苓

去黑皮各貳兩

陳橘皮

湯浸去白培壹兩半

草撥

壹兩

厚朴

去麌皮生薑汁大貳兩

檳榔

剉貳兩半

人參

壹兩半

大黃

剉炒

右九味麌搗篩每服五錢匕水一盞半竹茹彈子大生薑三片煎至一盞去

津溫服

治霍亂心下痞滿飲食吐遂水穀不化半夏橘皮湯方

半夏湯洗去滑切未編培

陳橘皮湯浸白培去

厚朴去麌皮火各壹兩

人參

白朮

高良薑各半兩

右六味麌搗篩每服五錢匕水一盞半生薑五片大棗二枚去核煎至一盞

去滓溫服

治霍亂心下痞遂似中惡狀葛蒲湯方

生葛蒲壹錢到搗

右一味以水同擣取汁一盞銀石器內煎熟分為三服不拘時

治霍亂嘔吐涎沫醫反下之心下作痞小半夏湯方

半夏湯洗去滑切未編培

右一味㕮咀每服三錢匕水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服

霍亂後煩躁卧不安

論曰霍亂後煩躁卧寐不安者胃虛餘勢未盡穀氣鬱蒸津液內耗血虛氣亂故煩懊不得安卧也當安其胃氣則病可愈

治霍亂煩躁懊惱不得安卧木香湯方

木香

乾木瓜

紫蘇

不去莖各壹兩草豆蔻去皮壹半

右四味麞搗節每服三錢匕水一盞入黑豆半合許生薑一東大柏碎煎至七分去滓溫服日三

治霍亂煩躁眠卧不安麥門冬湯方

麥門冬

去心
卷兩培

茅根

功培
雨

甘草

炙

人參

各壹分

右四味麞搗節每服五錢匕水一盞半入竹茹彈子大生薑一東大柏碎煎

至一小盞去滓溫服日三

治霍亂心煩懊不得安卧枇杷葉飲方

枇杷葉

拭去毛
一分

蘆根

洗培
卷分

人參

壹分

右三味麞搗節每服五錢匕水一盞半入薤白五寸煎至一盞去滓溫服有頃再服

治霍亂煩躁不得息甘草湯方

甘草

炙

半夏

湯洗去滑
卷半

陳橘皮

湯浸去白
各貳兩

右四味麞搗節每服五錢匕水一盞半入薤白五寸煎至八分去滓

溫服日二

治霍亂煩躁卧不安橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白培

人參

各參兩

右二味麞搏篩每服四錢匕水一盞半入生薑三片煎至八分去滓溫服日

三

治霍亂後煩躁卧不安橘薑湯方

陳橘皮

湯浸去白培壹兩

生薑

貳兩

右二味㕮咀每服五錢匕水一盞半入醋少許煎至一盞去滓溫服

治霍亂後煩躁卧不安豆薑湯方

大豆

淘壹分

生薑

切半分

右二味以酸漿水三盞煎至一盞半去滓分溫二服

治霍亂後煩躁卧不安葱白湯方

葱白

拾莖切

大棗

貳拾枚去核

右二味以水二盞煎至一盞頓服立差

治霍亂吐利後煩躁卧不安調胃乾薑散方

乾薑炮
兩

右一味為細散每服二錢匕溫粥飲調下

治霍亂利後煩熱躁渴卧不安竹葉湯方

右濃煮竹葉汁飲五六合佳

治霍亂吐後心腹煩滿卧不安覺熱渴者梔子湯方

梔子人貳
兩

右一味麞搗篩每服三錢匕水一盞入豉半合煎至七分去滓溫服有項再

服

梁米粉半升

右一味以水一升半和攪如白錫分三服飲之糯米亦得

治霍亂後煩躁卧不安薑茶散方

乾薑炮
為末
七錢

好茶末壹錢

右二味以水一盞先煎茶末令熟即調乾薑末服之

治霍亂後煩躁卧不安服木瓜子方

木瓜子

不拘多少

右一味每服七粒微嚼破以温水半盞吞之

治霍亂後煩躁眠睡不安神應散方

丹砂

研

硫黃

研各一錢

朴消

錢

蛤粉

參錢半

人參

白茯苓

去黑皮各一錢分

右六味擣羅為散每服一錢匕用脂麻水調下不計時候服
治霍亂後胃氣虛不能安卧香薷飲方

香薷

壹

生薑

參

木瓜

壹枝

右三味細切研攪取自然汁空心頓服

治霍亂煩躁不得安卧丁香白朮丸方

丁香

壹

白朮

兩

沉香

剉

胡椒

各半兩

肉豆蔻

去殼三分

五味子

各

參芩各一錢分

白僵蠶

各一錢

右八味擣羅為末研勻好酒煮木瓜一枚取肉丸如梧桐子大若患瀉煎
木瓜湯下二十九若氣疾溫酒下

聖濟總錄

卷之十一

大德重校聖濟總錄卷第四十



南京中医药大学图书馆藏

大德重校聖濟總錄卷第四十一

肝藏門

肝藏統論

論曰肝與膽合故足厥陰之經與足少陽之經為表裏其象木其主春其脉弦其神兎其養筋其候目其聲呼其臭臊其液泣其味酸氣盛則為血有餘故目赤兩脇下痛引少腹善怒甚者氣逆頭眩耳聾煩腫皆肝實之證也氣虛則為血不足故目昏兩脇拘急筋攣不得太息爪甲枯面青善悲恐如人將捕之皆肝虛之證也實則寫虛則補脉弱為不可汗脉弱為不可下要當量其虛實審其平脉而施治法其大槩如此

肝虛

論曰肝虛之狀其病面青善潔善怒齊左有動氣按之牢若痛不欲飲食悒悒不樂恐惕如人將捕之其脉見於左手關上陰虛者乃其候也

治肝元風虛面多青黃腹脹滿悒悒不樂口苦頭痛飲食減少沉香煎丸方

沉香

壹兩

附子

炮皮一塊去皮

白附子

炮皮一塊去皮

巴戟天

去心一錢

硇砂

半兩

飛研各

補骨脂

炒一錢

肉蓯蓉

半兩以上

並先煎

升麻

一錢

成膏

次入下藥

乾蠍

去土一錢

燬

壹分

木香

防風去叉

當歸

切培半兩

桂去麌皮

懷香子炒

牛膝

去苗酒浸切培各半兩

棟實

只取微炒內

青橘皮

湯去白培各全分

右一十六味別搗後九味為細末入前膏中拌和入臼擣令勻如未成劑用蜜少許和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸心溫酒下治肝元氣虛四肢勞倦飲食不消背痛頭旋或時寒熱肢節疼痛手足無力補順三焦通肝氣華撥丸方

華撥

洗炒參兩

乾薑

白者炮壹兩半

胡椒

炒裂去皮參兩

甘草

炙各半兩

人參

桂去麌皮

各半兩

木香

各半兩

白茯苓

去黑皮各壹兩

右八味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心食前鹽湯下三十九丸治肝虛脇下堅腹滿不欲食眼昏氣濁瞻視不明檳榔湯方

檳榔

各半兩

附子

炮裂去皮各壹兩

白茯苓

去黑皮各壹兩

桔梗

炒參兩

陳橘皮

湯去白培各半兩

桂

去麌皮各半兩

吳茱萸

水浸去涎炒壹兩

白朮

參各半兩

右八味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑一叢大拍碎煎至一盞去滓食後溫服若氣喘加芎芻三分半夏一兩湯洗甘草半兩炙剉治肝元虛損藏府不調洩瀉不止口內生瘡飲食進退燒肝散方

茵陳蒿

犀角

石斛

白朮

芷胡苗

紫參

芍藥

人參

桔梗

防風

桂皮

吳茱萸

蕪荑

桔梗

白朮

芷胡苗

右一十三味擣羅為細末每用白羊肝一具分作二分將一分去筋膜細切如竹葉入藥末十錢七葱白一握細切與肝調和令勻以濕紙裹七八重煨熟空心服之

治肝元氣久虛四肢筋脉急憤三焦氣不順上攻眼生黑花柏子人丸方

柏子人

防風

黑豆

煮令爛研

白蒺藜

炒各半兩

車前子

甘菊花

附子

炮裂去皮臍

羌活

去蘆頭

黃耆

蜜塗炙細刻各半兩

右九味除黑豆外搗羅為細末鍊蜜同黑豆膏拌和為丸如梧桐子大每服

十五丸空心食前鹽湯下

治肝元氣冷多困少力口無滋味耳鳴眼暗面色青黃黃耆湯方

黃耆

防風

石斛

去根

當歸

白芷

藿香

沉香

白蒺藜

去角

桑寄生

附子

炮裂去皮臍

芎芻

白朮

五味子

桂皮

去粗

羌活

去蘆頭各半兩

木香

壹分

右一十六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞來一枚擘破煎一兩沸去滓空心食前溫服

治肝元氣虛鹿茸丸方

鹿茸

去毛浸培

酒肉旋蓉

去皴皮酒浸培

巴戟天

去心

白茯苓

去皮黑

地骨皮

去土

附子

炮皮臍裂去

遠志心

去心

桂去粗

乾薑

去苗酒浸培

巴戟天

去心

柏子人

炒微

黃耆

剉細

熟乾地黃

培牛膝

去苗酒浸培

乾薑

去粗

地骨皮

去土

覆盆子

防風去叉

磁石

研細淬浮陸米次等分

柏子人

炒微

右一十六味除磁石外並搗羅為細末和勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十丸空心食前鹽湯下

治肝元風虛上攻頭目腎眩肩背拘急兼治脾氣不和沉香煮散方

沉香

剉參分

桂去麌皮壹兩

白豆蔻人

石斛去根各半兩

巴戟天去心壹兩

赤茯苓去黑皮

壹兩半

巴戟天去心壹兩

附子

炮裂去皮半兩

赤茯苓

去黑皮壹兩半

木香

壹兩

人參

參分

芎菊壹兩

五味子

參分

白朮

青橘皮

湯去白皮壹兩

培

厚朴

去麌皮汁半兩

黃耆

細剉各半兩

藿香葉全分

華澄茄

肉豆蔻去皮各半兩

卷

兩

各



右二十八味擣羅為細散每服三錢七水一盞入薑棗煎七分食前溫服日二

治肝元虛風上攻頭目昏悶腫疼背項緊急悒悒不樂羚羊角散方

羚羊角屑

芍藥各半兩

羌活去頭各半兩

獨活去蘆根各參錢人參

防風去叉

白蒺藜炒各半兩

右七味同搗為細散每服一錢七溫酒調下不計時候治腎氣虧損不能生肝肝乏生氣遂多虛冷肝若受病先診其脉若肝腎脉俱弱服此地黃丸方

熟乾地黃

山茱萸

草薢

當歸洗培

續斷

芍藥

黃耆細剉

五味子

狗脊去毛各半兩

細辛去苗葉壹分

白茯苓

牛膝去黑皮浸培

木瓜各半兩

右一十三味搗羅細末鍊蜜和丸如梧桐子大空心鹽湯下五十丸治肝藏虛客邪攻之真氣微弱不能主血脉氣微細大便失血香朮丸方

蒼朮

米泔浸培芍藥

防風去叉各半兩

五味子

黃耆細剉

當歸切培

硫黃研壹半兩

右七味先以六味搗羅為細末再入硫黃末研勻和丸如梧桐子大空心食

前鹽米飲下三十九

治肝虛生寒冷氣上攻眼目肢體疼痛攻注華澄茄丸方

華澄茄

補骨脂炒

附子炮裂去皮

羌活去頭

羌活去頭蘆

芎藶

遠志去心

草薢

肉蓯蓉去頭宿切焙

肉蓯蓉去頭皮酒浸

山芋

石斛根去

人參各一兩

甘菊

甘菊去頭

甘草

右十一味搏羅為細末醋煮麪糊丸如梧桐子大每服二十九至三十丸空心溫酒下

治肝藏虛風攻擊肢節疼痛及上攻眼目多淚穀精散方

穀精草

石決明

木賊剝

荆芥穗

甘草

羌活去頭蘆

旋復花

甘菊花

枸杞子

晚桑葉

各一兩生用

蛇蛻半條炒

蒼朮未培

浸一兩分

甘草

甘草

各一兩生用

右一十二味培乾搏羅為細散每服二錢匕茶清調下日三不拘時

治肝藏虛風上攻通利九竅羚羊角散方

羚羊角鋸屑半兩

空青錢研一兩

羌活去頭蘆半兩

羌活去頭蘆半兩

人參各一兩

防風去叉

白蒺藜炒半兩

决明子各一兩

白蒺藜炒半兩

白蒺藜炒半兩

人參各一兩

防風去叉

右七味並擣羅為細末每服一錢匕溫酒調下白湯點亦得不拘時候

治肝藏虛風上攻頭旋項筋急眼有黑花耳內虛鳴乾蠍丸方

乾蠍半兩

巴戟天

去心
糯米炒候米不用

附子

炮裂去皮臍
羌活頭去蘆

白蒺藜

壹兩

右五味擣羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸空心鹽湯下食後臨卧米飲下

治肝藏虛冷壯筋骨明耳目進飲食四聖散方

白附子

炮

白蒺藜

酒炒

羌活

去蘆頭

黃耆

剉各等分

右四味擣羅為細末每服二錢匕用羊腰子一對去筋膜切開入藥用線繩用水一盞入粟米一匙頭同煮候粟米熟食之此藥亦治腎藏風攻注治肝元虛損上攻口內生瘡飲食不進犀角散方

犀角

銚

決明子

人參各壹

梔子人

龍膽

白朮各半兩

右六味擣羅為細散每服一錢半匕溫熟水調下食後良久服

治肝虛目睛眩疼多淚羞明筋脈疼痛補肝散方

夏枯草

莎草根

各壹兩

同炒過

右二味搏羅為細散每服一錢七臘茶調下不拘時候
治肝虛筋急或霍亂轉筋手足麻痹人參飲方

人參

厚朴

去麌皮薑汁
炙各壹兩

白朮

右三味麌搗篩每服五錢七水一盞葱白五寸切碎同煎八分去滓不拘時
溫服

肝實

論曰肝實之狀苦心下堅滿常兩脇痛或引小復念念如怒頭目眩痛皆赤生
瘻肉是也其脉見於左手關上陰實者乃足厥陰經有餘之候蓋肝實則生熱
熱則陽氣盛故其證如此

治肝藏壅實風熱客搏經絡動于心肺上膈痰癖喉嗌乾燥不利四肢淫滯或
秘或壅犀角地黃湯方

犀角

鋸屑壹兩
分

熟乾地黃

洗切培
參兩

羌活

去蘆頭

獨活

去蘆頭

赤箭

石菖蒲

茺蔚

藁本

洗培

沒藥

研

威靈仙

洗培

黃耆

剉

烏藥

剉

甘草

炙

木香

當歸

切培

蟬蛻

洗培

防風

去叉

各

大黃

剉炒

郁李仁

去皮研

各

壹兩半

各

各

右一十九味麌搗篩每服三錢七水一盞薄荷五葉煎至七分去滓溫服日三如膈有熱入生地黃汁少許如大腸秘澀加芒消一錢七

治肝實風壅眼目昏澀上焦不利羌活丸方

羌活

去蘆頭
參分

木香

蒺藜子

炒去
黃耆

青葙子

甘菊花

麥門冬各半兩

枳殼

去瓢
炒

青橘皮

湯浸去
白焰

大黃

剉炒各半兩

右一十味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空心日午臨卧煎竹葉湯下

治肝藏壅頭目不利胸膈煩躁體痛羚羊角散方

羚羊角

鎔炒

芷胡

各去苗

壹兩

石膏

剉

兩

赤芍藥

各壹兩

車前子

去腐

川大黃

剉微炒

甘草

炙剉

赤兩

黃芩

剉

兩

赤芍藥

各壹兩

川升麻

去根

甘草

半兩

炙剉

麥門冬

去心

治肝藏壅熱心膈煩悶頭目不利大黃丸方

川大黃

剉碎微炒

枳殼

各壹兩

麸炒

黃連

去瓢

甘草

半兩

炙剉

麥門冬

去心

羚羊角

鎔炒

川升麻

去根

生乾地黃

犀角各半兩

分鎔

右八味搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每服二十九食前竹葉湯下忌酒熱麵等物

治肝氣壅塞瞼膜遮睛癮澁難視甘菊花散方

甘菊花

兩

白蒺藜

木賊

防風

去火

甘草

半兩

木香

分

右六味為細散每服一錢匕沸湯點服不拘時

治肝藏壅熱上攻頭目不利四肢拘倦茈胡湯方

茈胡

去苗兩半

石膏

碎貳兩

黃芩

去心黑

赤芍藥

甘草

炙各半兩

右五味麌搗篩每服三錢匕水一盞同煎至六分去滓食後溫服
治肝藏壅熱三焦不利胸膈滿悶睡卧不安郁李人散方

郁李人

湯浸皮六

大黃

剉炒各壹兩

梔子人

朴消

研

乾荷葉

湯浸皮六

荆芥穗

各半兩

右七味為細散每服二錢匕溫熟水調下食後服

治肝氣實壅上攻頭目筋脉拘急疼痛大小便赤熱秦艽散方

秦艽

去土切培

當歸

切

羌活

去蘆頭

濁活

去蘆頭

荆芥穗



連翹

虎杖

芎藭

牡丹皮

麻黃去根節各壹兩

右一十味為細散每服二錢七煎薄荷湯下食後服

治肝實兩腸脹滿氣急眼昏洗肝湯方

茈胡去苗

葛根

鼈甲醋炙去裙

各兩

桔梗各兩

檳榔剉

桂枝去皮

甘草剉

赤茯苓去黑皮

壹兩半

五味子

陳橘皮湯浸去白培

人參各壹兩

白朮壹兩

半夏湯浸七分去滑三分

右一十二味麌擣篩每服二錢七水一盞入生薑五片煎至六分食前去滓

溫服

治肝實熱兩眼赤澀疼痛頭重心煩上焦壅滯驅風湯方

蔓荆實

羌活去頭蘆

防風去叉

升麻

決明子

黃芩去心黑

赤芍藥

甘草

火

車前子

羚羊角

甘菊花

麥門冬去心各半兩

茈胡去苗

枳殼去瓢炒

梔子人各兩

右一十五味麌搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓食後溫服

治肝藏實熱風氣上攻煩渴茯神湯方

茯神去木

黃耆判

麥門冬去心

桔梗根兩

生乾地黃各一
參兩

洗切焙

酸棗人炒

羌活頭去蘆

葛根判

羚羊角

銹屑各半兩

右九味麞搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓食後溫服
治肝藏實熱上攻頭目昏眩兼治風化痰鎮心安神白茯苓丸方

白茯苓皮去黑

人參

麥門冬去心

酸棗人壹兩

甘草去火炒各半兩

丹砂別研

各龍腦壹分

臨卧服

右七味除別研外為細末和勻鍊蜜丸如雞頭大每服一丸乳香嚼下食後

治肝氣壅盛腸下結塊腹內引痛大小便赤澁飲食減少連翹散方

連翹

荆芥穗

鼈甲

醋炙去裙襡

梔子人

射干

羌活頭去蘆

獨活頭去蘆

當歸切

大黃生

惡實各半兩

牽牛子分

炒壹

右十一味為細散每服二錢七溫熟水調下食後臨卧服

治肝氣壅實熱刑於脾食已即吐大便黃赤忽覺背寒脣皮焦亦羌活散方

羌活頭去蘆

雞蘇去梗

獨活頭去蘆

防風去梗

蒺藜炒去角

荆芥穗

牡丹皮

木香

連翹

茵陳蒿

麻黃節

去根

羚羊角

銅屑各
壹兩

右一十二味為細散每服二錢七溫熟水調下加至三錢七早晚食後服治肝藏積熱氣昏血澀或因食酸物過多肝中血積不散氣血俱病兩脇下非時氣動每動左脇下有聲右脇相應日漸胃脘結塊使人心腹滿悶上衝咽喉頭目不利睡卧不安加蟲所齧瀉肝湯方

荆介穗

連翹

羌活

牡丹皮

黃芩

去黑心

杏人

去皮六
梗人炒研

當歸

去根

芍藥

梔子人

雞蘇

去梗

虎杖

麻黃節

去根

大黃

剉炒各半兩

右一十三味麌搗篩每服三錢七水一盞生薑二片煎至七分去滓溫服服此藥數日後如病勢不減却進後方射干散取肝中積血從大便下如腐爛瘀血之類若服前藥已差更不用服

後方射干散方

射干

桂皮

牛膝酒浸

牡丹皮

鼈甲

醋炙去裙襯

牽牛子

炒半兩

大黃

剉炒各半兩

荆芥穗

細辛

去苗葉各壹分

半夏

為末用生薑汁和成餅

狼毒

芫花

與狼毒同用
炒焦色各一錢

右一十二味為細散每服一錢七食後煎葱湯調下一二服內如毒已下即
不用服

治肝藏實熱壅盛利胸膈四順散方

石决明

蜜炙

甘菊花

各一錢

附子

炮裂去皮

防風

去叉

蒺藜子

炒去角

羌活

去頭蘆

黃芩

心去黑

梔子仁

黃連

去頭各一錢

右九味為細散每服二錢七用米泔水調下早晚各一服服藥後仰卧少時

肝脹

論曰肝脹之狀千金謂脇下滿而痛引少腹蓋足厥陰之經起於大指抵少腹
俠脣上貫膈布脇肋脉經曰肝病者必兩脇下痛引少腹是也夫肝受邪則令
氣血不通故令脇下脹滿引少腹而痛也

治肝受邪氣兩脇下痛牽連少腹胸脇脹滿桂苓湯方

桂皮

去麌

赤茯苓

去黑皮

柏子人

細辛

去苗葉

防風

去叉各一錢

鼈甲

醋炙去裙

桔梗

炒

枳殼

去瓢炒

白朮

各半兩

犀角屑

卷分

獨活

去蘆頭

半兩

甘草

吳茱萸炒

卷分



右一十二味麤搗篩每服三錢七水一盞入棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服不計時

治肝氣受寒脇下脹滿痛引少腹附子茯苓湯方

附子炮裂去皮
兩
附子

赤茯苓去黑皮
參兩

檳榔研各拾
肆枚

母薑伍
兩

陳橘皮湯浸去白培
乾壹兩

桂去麤皮
各參兩

桔梗炒

白朮各肆
兩

吳茱萸湯浸培
乾壹兩

右九味剉如麻豆每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服空心食前日三

服

治肝受風邪面多青黃兩脇脹滿引少腹痛渾身疼痛口淡無味飲食減少沉香煎丸方

沉香剉壹
兩

附子炮裂去皮
附子

白附子炮
附子

巴戟天心去
巴戟天

硇砂研各半兩

補骨脂炒壹
兩

肉蓯蓉酒浸切培半兩
以酒或升熬成膏次入下項藥

陸味為末

次入下項藥乾蠍去土
壹分

木香半
兩

青橘皮湯浸去白
培參分

防風去叉
防風

當歸切培各半兩

桂去麤皮
壹分

陳香子炒參分

牛膝酒浸切
培半兩

棟實只取肉參分
微炒過

右一十六味除前膏外搗羅為末入前膏拌和仍再入臼內擣令勻如未相



著更入蜜少許和丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下

治邪氣客於肝經攻脹兩脇時引少腹痛四肢厥逆三輔散方

赤茯苓

去黑皮
茱兩

赤芍藥

參兩

菖蒲

去苗須

蜀漆

桂

去麌皮
各貳兩

丹砂

研別

紫石英

研別

茈胡

去苗

山茱萸

各壹

前用溫酒調下

治肝藏邪氣兩脇脹滿筋脉拘急痛連少腹茱萸湯方

山茱萸

當歸

培切

五味子

山芋

黃耆

剉

茺蔚

各半
去皮兩

生乾地黃

培一

白朮

各壹分

獨活頭

去蘆

酸棗仁

微炒各
貳錢

木瓜

去皮子
培半兩

右十一味麌搗篩每服五錢七以水一盞半煮二枚同煎至八分去滓溫服空心食前日二服

治肝藏風寒面色青黃兩脇脹痛牽連少腹筋脉不利背膊拘急覆盆子丸方

覆盆子

五味子

附子

炮裂去
皮臍去

酸棗仁

微

白朮

各壹
兩

熟地黃

培半
兩

右六味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心食前溫酒下
飲亦得

肝著

論曰肝著之狀千金謂病人常欲臨其胸上先未苦時但欲飲熱者是也夫食氣入胃散精於肝淫氣於筋今風寒客於肝經不能散精氣血凝留故著於胞上其未苦時但欲飲熱者蓋血得溫則行遇寒則澀也

治肝氣虛寒邪著胸中實塞不快氣血留滯胸上欲人臨之者桂附湯方

桂皮去麤

附子炮裂去皮

各半兩

當歸切炒

檳榔各半兩

赤茯苓去皮

黑防風去叉

各半兩

柏子人研

細辛去苗葉炒

白朮

芎藭

枳殼各三分

右十一味除柏子人剗如麻豆篩拌勻每服三錢七水一盞入生薑三片大棗二枚同煎至七分去滓溫服空心食前

治肝經不足風寒乘之氣留胸中築塞不通脇滿筋急不得太息細辛桃人湯

方

細辛去葉

桃人湯浸去皮

雙人各一兩

肝藏門

山茱萸壹兩

柏子人兩



桂皮去麌

甘草炙各一兩

防風去叉

白茯苓去黑皮各二兩

右八味麌搗篩每服三錢七水一盞半入大棗三枚擘破同煎至一盞去滓溫服空心食前日三

治肝氣為寒邪所著胸中痞塞氣血凝留其人常欲喘其胸上陳橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白炒半兩

青木香

壹分

桔梗

炒參分

芍藥

剉炒

當歸

切焙各半兩

右五味麌搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片同煎至七分去滓溫服不

計時候

治風寒客肝經著於胸上膈脘痞悶枳實湯方

枳實

陳者去瓢炒肆枚

桂皮

去麌皮壹兩

厚朴

去麌皮生薑汁炙令煙出四兩

桔梗

去皮壹枚

右四味麌搗篩每服五錢七水二盞入薤白一握同煎至一盞去滓溫服空

心日午臨卧各一服

治風寒客於肝經膈脘痞塞脇下拘痛常欲喘其胸上名肝著喘胸湯方

枳實

去瓢炒

陳橘皮

湯浸去白焙

桔梗

炒各半兩

甘草

分壹

右四味麌鴉篩每服五錢七水二盞入生薑半分薤白少許同煎至一盞去滓溫服不計時候

肝筋脉抽掣疼痛

論曰肝藏血與筋合肝氣和則氣血強盛以行于筋膜故骨正筋柔氣血皆從若肝藏氣虛不能榮養則為風邪所侵搏於筋脉榮衛凝泣關節不通令人筋脉抽掣疼痛以至眩悶口眼偏斜皆其證也

治肝氣虛弱風邪外侵搏於筋脉流入經絡筋脉抽掣疼痛獨活湯方

獨活

去頭蘆

草薢

細辛

去葉苗

人參

牛膝

酒浸煖

酸棗仁

微炒

附子

炮裂去皮臍

羚羊角

鋸

赤芍藥

黃芩

去心

茵芋

去莖根

麻黃

去根節炒

防已

桂皮

甘草

微火剉各壹兩

右十五味剉如麻豆每服三錢七水一盞生薑三片棗三枚擘破煎至五分去滓八竹瀝一合煎兩沸溫服不拘時候

治肝受風邪筋脉抽掣疼痛異秀丸方

烏喙

炮裂去皮
伍兩

檳榔

參

防葵

槐膠

酒化為膏

牛膝酒浸培各貳兩草薢微炒

澤漆

木瓜去皮切培

子續隨子去皮別研如膏各壹分

右九味除槐膠續隨子外搏羅為末再拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大空心食

前溫酒下三十九以知為度

治肝藏風毒流注四肢拘急筋脉抽掣百節麻木身體疼痛頭目昏眩天麻湯

方

天麻

獨活去頭蘆

酸棗人炒

薏苡仁以人

防風去叉各壹兩

赤茯苓

去皮黑

芍藥

羚羊角鏘

甘草微炒

桂去皮

麻黃去節各半兩

焙去沫

羚羊角鏘

甘草微炒

桂去皮

右十一味麌搗篩每服三錢七水一盞入薄荷少許同煎至六分去滓食後溫服

治肝氣攻注偏身筋脉抽掣疼痛四肢無力枸杞湯方

枸杞子

海洞皮剉

白芷

苦參

防風去叉

甘草剉

麻黃去根節各半兩

牛膝切酒浸壹宿

桂去皮

酸棗人各半兩

右一十味麌搗篩每服三錢七水一盞入生薑二片同煎至七分去滓溫服

不拘時候

治肝風筋脉抽掣疼痛不得屈伸恍惚多忘或時恐怖疾神丸方

疾神去木

壹兩

遠志心去

壹兩

人參

白殭蠶微炒各

叁分

白附子炮微

壹兩

乳香別研

壹兩

當歸炒半兩

右七味擣研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下不計時候漸加

丸數

治肝藏風冷毒氣攻注筋脉抽掣疼痛及一切筋寒之疾補骨脂湯方

補骨脂炒

去土微

莽草

桂皮去麌

壹分

附子炮裂去皮

各

乾薑炮各

壹兩

右六味剉如麻豆每服二錢匕以水半盞入酒半盞葱白二寸鹽少許同煎至六分去滓食前熟服卒轉筋者熱酒煎服

治肝風筋脉抽掣疼痛肢節不利牛膝酒方

牛膝剉去苗

壹兩

薏苡仁各半斤

微

附子炮

各

酸棗人炒

各

甘草微炙

貳兩

右九味細剉和勻用生絹袋盛以好酒二盃浸七日不拘時溫飲一盞逐旋

乾薑炮

各

柏子人

石斛去根各

叁兩

甘草微炙

貳兩

添酒漬藥至味薄即止

煎厥

論曰內經謂陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聽潰潰乎若壞都汨汨乎不可止夫陽氣者衛外而為固也起居有常喜怒調節則志氣治而陽不擾若動作煩勞氣乃張大陽氣張大則真氣耗而精絕積至於夏陽氣益盛則衛外者躁而不靜此其證所以煎迫而厥逆視聽昏塞潰潰汨汨莫知所以然也內經又曰少氣善怒者陽氣不治則陽氣不得出肝氣當治而未得故善怒名曰煎厥亦以謂陽氣壹鬱於內不得其平故氣煎迫而厥逆也

治煎厥氣逆頭目昏憤視聽不明少氣善怒人參湯方

人參

遠志去心

赤茯苓去皮黑

防風去叉各二兩

芍藥

麥門冬去心

陳橘皮白湯浸去皮

白朮各一兩

各一兩

右八味剗如麻豆每服五錢七水一盞半煎去八分去滓溫服日再

治動作煩勞陽氣張大肝精不守善怒少氣頭目昏憤病名煎厥山芋湯方

山芋

生乾地黃

培

防風剗去叉

茯神去木

山茱萸炒

各一兩

桂去麌

天雄炮去遠志去

細辛去苗葉

枳實去瓢

甘菊花各

壹甘草半

參分

右一十二味細剗如麻豆每服三錢七水一盞入生薑三片煎至七分去滓溫服空心食前

治煎厥少氣善怒精神不守茯神湯方

茯神去木

羚羊角屑五味子

萎蕤

遠志去叉

沙參

酸棗人微炒各參分

龍骨半兩

右八味麌搗篩每服三錢七水一盞煎取七分去滓溫服不拘時候

治陽氣內鬱肝氣不治少氣善怒視聽昏塞煎追厥逆龍骨丸方

龍骨

白茯苓去黑皮遠志去叉

防風去叉

人參

柏子人別

犀角銹

生乾地黃

培合

牡蠣研如粉

壹兩半燒

右九味除柏子人外搗羅為末同拌勻入煮棗肉二兩鍊蜜和杵數百下丸如梧桐子大每服三十丸粥飲下空心食前

治煎厥氣逆多怒肝氣不治柏子人湯方

柏子人

虎頭骨塗酥炙各壹兩

人參

茯神去木

犀角屑

桃人

湯浸去皮六
雙人炒黃

遠志

心去

小草各參

右八味麞搗篩每服三錢七水一盞煎取七分去滓溫服不拘時候

肝氣逆面青多怒

論曰肝在色為青在志為怒故其氣逆則面青多怒蓋本藏氣逆於內平之而出則多怒而面青也

治肝藏氣逆手足拘急面青多怒脇下苦滿或時眩冒竹瀝湯方

竹瀝

甘草

炙剉

秦艽

去苗土

葛根

剉

黃芩

去黑

麻黃

去根節

防已

細辛

去苗葉

桂皮

去麞

乾薑

炮各壹兩

防風

去叉枝

升麻

各半兩

赤芍苓

去黑皮參兩

附子

炮裂貳枚

去皮

杏仁

去皮尖伍拾枚

右十五味除竹瀝外麞搗篩每服五錢七水一盞入竹瀝半盞煎至一中盞去滓溫服不計時候

治肝氣壅逆肢體沉重面色多青時欲嗔怒甚者恍惚狂言心神不安防風湯

方

防風去叉枝

麻黃去根節

半夏

湯洗去滑
末偏功焙

秦艽去土苗

醫藥大學圖書館版權所有

獨活

去蘆頭各貳兩

當歸

切培

遠志

去心

甘草

炙剗

防已

人參

黃芩

去黑心

升麻

芍藥

各壹兩

石膏

碎半兩

右一十四味麞搗篩每服五錢七水一盞半入麝香末少許蓋一棗大柏碎煎至一盞去滓溫熱服不計時候

治肝藏實熱血氣壅滯目視昏暗常多嗔怒頭旋目運面色青口多涎小便黃赤荆芥湯方

荆芥穗

牡丹皮

芍藥

蔓荆實

茈胡

去苗

羌活

去蘆頭

秦艽

去苗土

鼈甲

醋炙去裙襡

天靈蓋

酥炙焦黑

沉香

剗

甘草

炙剗

當歸

切培各壹分

連翹

半兩

右一十三味麞搗篩每服三錢七水一盞先煎水令沸後入藥末攪一次傾出食後臨卧去滓溫服

治邪熱客於肝經氣逆煩躁面青多怒怒已脇痛桔梗湯方

桔梗

炒伍兩

白朮

參

赤茯苓

去黑皮

桂皮

去麞

細辛

去苗葉各貳兩

當歸

切培

吳茱萸

湯浸炒

乾地黃

培

甘草

炙各壹兩

右九味麞搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服早晚食前

治肝氣逆面青多怒身體不能屈伸甚則頭目眩運秦艽散方

秦艽去苗土

乾薑炮

桔梗炒

附子炮裂去皮

當歸切培

天門冬去心培

人參

白朮

蜀椒去目并剪口者

壹

山茱萸

烏頭炮裂去皮臍

細辛去苗葉各卷分

甘草剉

白芷

半兩

右一十八味擣羅為散每服一錢七溫酒調下日三不拘時候

治肝約血聚使人多怒面青腸痛槐膠丸方

槐膠以酒化為膏

牛黃研

麝香別研各半兩

羚羊角鏘壹兩

石龍子火研壹枚

蜈蚣微研伍枚

丹砂研

乾蠍微炒研各半兩

蜚蠊炒焦研

羌青炒焦研各半兩

研

蜚蟲炒焦研拾肆枚

研

麤蟲炒焦研菜根

巴豆肆拾玖粒去皮膜研如膏存油

研

右一十三味各為末拌勻用糯米粥和槐膠巴豆成膏以和諸藥丸如菉豆大別以丹砂為衣每服三丸木香湯下甚者五丸不計時候如人行二十里再服以知為度

薄厥

論曰內經謂陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥夫蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固物或觸之怒而氣上則形氣不屬血與之俱故其證胸中菀結與氣薄而厥逆也

治暴怒氣逆胸中不便甚則嘔血赤茯苓湯方

赤茯苓

去皮黑

人參各貳兩

桔梗頭炒

陳橘皮

湯浸去白

檳榔各半兩

芍藥

桂枝

麥門冬

去心培

生乾地黃

培甘草

陳橘皮

湯浸去白培

當歸切

天門冬

去心培

五味子

桂枝

甘草

火煅各一兩

右七味麞搗篩每服五錢七水一盞半入生薑三片煎至八分去滓溫服不拘時候

治恚怒氣逆上而不下則傷肝血菀胸中使人薄厥甚則嘔血煩悶者黃耆湯方

黃耆

剉兩

茯神

去木培

麥門冬

去心培

桂枝

去皮

陳橘皮

湯浸去白

生乾地黃

培甘草

陳橘皮

湯浸去白培

當歸切

天門冬

去心培

五味子

桂枝

甘草

火煅各一兩

右一十味麞搗篩每服五錢七水一盞半入生薑三片大棗二枚擘破同煎至八分去滓溫服空心頓服

治恚怒傷肝胸中菀結或至嘔血者蓋氣血相薄而厥逆宜服大棗湯方

大棗伍拾枚去核培別搗

生乾地黃半斤功倍

阿膠火令燥

甘草炙兩半斤別搗

生乾地黃半斤功倍

阿膠火令燥

右四味除大棗外麤搗篩再作一處擣勻每服五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服日二夜一不計時



大德重校聖濟總錄卷第四十二

肝藏門

肝病筋急

論曰肝病筋急者肝與筋合也蓋足厥陰之經不足則脉弗營脉弗營則風邪易侵搏於筋脉故令筋急而攣縮也

治肝藏風毒氣注手臂頭項肩膊腰足筋脉拳急攻刺疼痛或四肢虛腫頭目旋運黑花昏暗嘔逆減食天麻湯方

天麻

酒哭

附子

炮裂去皮臍各壹兩半

乾蠍

炒去土

羌活

去蘆頭

酒浸去皮

麻黃

去根節炒培

酒浸去皮

白花蛇

酒浸去皮骨炭焦

酒浸去皮

當歸

切培

芎藭

去皮

白附子

炮浸去皮

牛膝

去苗酒浸切培

乾蠍

炒去土

羌活

去蘆頭

酒浸去皮

白花蛇

酒浸去皮

枸杞

去皮

白芷

去皮

人參

去皮

草薢

去皮

海桐皮

去皮

防風

去皮

桂皮

去皮

酸棗人

炒去皮

白蒺藜

炒去皮

當歸

切培

甘草

去皮

乳香

研去皮

右二十一味除研者外剉如麻豆每服五錢七水一盞半生薑三片煎取八分去滓溫服其煎藥水每用桃柳桑枝嫩者各一兩淨洗細剉甘菊葉半兩如無葉以花代用水二升煎取一升去滓若冬月十日為一料夏月逐日修事服之

治肝藏風毒流注脚膝筋脉拘急疼痛行履不得石南丸方

石南

烏蛇

酒浸去皮骨
天各壹兩

牛膝

去苗酒
浸功焙

防風

去叉

石斛

去根

桂

去粗

草薢

麻黃

去根

羌活

去蘆頭

海桐皮

赤茯苓

去黑皮

菌芋

去粗莖

獨活

去蘆頭

天麻

酒炙

當歸

切焙

附子

炮裂去皮

瓣各半兩

黑豆一升

淨淘以醇酒五升煮去豆滓熬成膏和諸藥

酒

右一十七味除黑豆膏外擣羅為細末以豆膏和丸如梧桐子大每服二十九至三十九早晚食前溫酒下

治肝虛血不足肢節拘急筋脉攣痛地黃丸方

生乾地黃

切焙熟

乾地黃

切焙各壹斤

杏人

去皮炒細研半斤

六雙人糉

防風

去叉

石斛

去根

枳殼

去瓢炒

牛膝

去苗酒浸功

各肆兩

右七味除杏人外擣羅為細末入杏人和勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸炒黑豆淋酒下日三不計時

治肝元虛風上攻頭目昏悶及背項緊急筋脉拘攣羚羊角散方

羚羊角

鋸

芎藭

各半兩

羌活

去蘆頭

獨活

去蘆頭各參分

人參

防風

去叉

白蒺藜

炒各半兩

酒

大中藥

公司

總經理

公司

總經理

右七味搗羅為細散每服二錢七溫酒調下不拘時

治肝虛勞損關節疼痛筋脉攣急虎骨酒方

虎骨酒

生薑
天
火
參
兩

乾薑

炮
武
兩

地骨皮

白朮
剉

丹參

肆
兩

五加皮

各
貳
兩

枳殼

去
蘆
頭
炒
壹
兩
半

熟乾地黃

切
培
參
兩

二盞

右一十味麌搗篩用生絹袋貯以清酒三斗浸四宿每日空腹服一盞加至

治肝藏風氣四肢筋脉攣急身體強直薏苡人湯方

薏苡人

芎藷

石膏

碎
研
壹
兩

羌活

去
蘆
頭
參
分

柏子人

研

酸棗人

炒
各
壹
兩

附子

炮
裂
去
皮
臍
參
分

右七味除研者剉如麻豆每服三錢七水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不計時候

治肝藏風氣攻注四肢筋急疼痛及脚膝少力行步艱難木瓜丸方

木瓜

去
皮
子
薄
切
焙
乾
貳
兩

牛膝

去
苗
酒
浸
切
焙
參
分

芎藷

去
蘆
頭
各
壹
兩
半

附子

炮
裂
去
皮
臍
貳
兩

右五味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九煎牛膝酒下漸加丸數空心食前

治肝風筋脉拘急背膊勞倦及頭昏項頸緊急疼痛獨活湯方

獨活去蘆頭

甘菊花擣

蔓荆實

芎藭各一兩

右四味麞搗節每服三錢七水一盞入酸棗人惡實各五十粒研碎同煎至七分去滓溫服不計時

治筋急轉筋舒展不能烏頭丸方

草烏頭半斤切

鹽水浸三日取出洗

荆芥穗半斤

右二味搗羅為細末別用宣州木瓜二枚砍熟去皮瓤入前件藥杵令勻用酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服三十九加至五十九食前木瓜湯下日三

瘳筋

論曰人有尺脈數甚筋急而見病名瘳筋是人腹必急白色黑色見則病甚夫熱則筋緩寒則筋急今肝氣內虛虛則生寒故筋急而見其尺脈數甚者蓋尺裏以候腹中其人腹急則尺脉見數數亦為虛以腹內氣虛故也其證筋急而見故曰瘳筋視其色白黑為病甚者氣既寒而筋急其色又見白黑是為寒甚

之證

治肝虛筋脉不利腹急筋見腸肋脹滿薏苡人湯方

薏苡人

防風去叉

桂去麤皮

當歸切焙壹兩

酸棗人炒分

各

白茯苓去皮

黑海桐皮

草薢各半兩

芎藭卷分

右九味㕮咀如麻豆大每服三錢七水一盞半煎取八分去滓溫服不拘時

候

治肝氣虛寒筋脉急見於外成疹不已補肝湯方

防風去叉兩

細辛去苗葉半兩

白茯苓去黑皮貳兩

柏子人壹兩

桃人去皮六雙

蔓荆實炒半兩

桂去麤皮

甘草炙

山茱萸

薏苡人各半兩

白茯苓去黑皮

桂去麤皮

柏子人壹兩

右九味麞擣篩每服五錢七水一盞半大棗三枚擘破煎至一盞去滓空心
頓服晚食前再煎服

治肝虛生寒脉數筋急腹脇妨悶筋見於外柏子人飲方

柏子人

茯苓去黑皮

防風去叉

細辛去苗葉各半兩

當歸炒微

檳榔各半兩

白朮

桂去麤皮各半兩

附子炮裂去臍皮半兩

芎菊

枳殼去瓢炒
各參分

右十一味剉如麻豆大每服三錢七水一盞入生薑三片棗二枚同煎至七分去滓溫服不計時候

治肝虛寒筋急腹滿脹痛柏子人丸方

柏子人

黃耆剉

白茯苓去黑皮

楮實

覆盆子

五味子

附子炮裂去皮

石斛去根

酸棗人炒

鹿草酥炙去毛

桂去麌

白朮

沈香剉

枳實炒

熟乾地黃焙各兩

右一十五味搏羅為末鍊蜜和搏三百杵丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下空心及晚食前服

治肝藏風筋脉成痙腹肋急痛羌活湯方

羌活去蘆頭

白朮

麻黃去根節煮

側子炮裂去皮

丹參

當歸剉炒

防風去叉

羚羊角镑屑各

白芍苓去黑皮

草薢

桂去粗皮

各半兩參分

右十一味剉如麻豆每服三錢七水一盞入生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時候

治肝氣不足筋脉急見心腹壅滯左肋妨脹不思飲食茯苓湯方

白茯苓

去黑皮

前胡

去蘆頭

白朮

蜜醋炙黃
去裙襕

鼈甲

生地黃

沉香

剉各一兩

黃耆

剉各半兩

桂皮

去蘆頭
炒微黃

枳實

各半兩
炒微黃

生乾地黃

五味子各三分

參

右一十味麞搗篩每服三錢七以水一盞入生薑三片煎至七分去滓溫服
不拘時

膽門

膽虛

論曰足少陽經不足者膽虛也虛則生寒寒則其病恐畏不能獨卧口苦善太
息嘔宿汁心下澹澹如人將捕之益中介介數唾頭眩痺蹙足指不能搖坐不
能起僵仆目視睭睭蓋膽虛則精神不守其氣上溢循其所在而生病也
治膽氣不足常多恐懼頭眩痺厥四肢不利僵仆目黃中正湯方

茯神

去木

酸棗人

微

炒

黃耆

剉

羌活

去蘆頭

各一兩

熟乾地黃

炮

甘菊花

柏子人

防風

去叉

各人參

卷分

白芍藥

當歸

去根

甘草

半兩

各剉各

聖濟急錄

卷四十二

膽門

四

右一十二味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治膽經虛冷不能獨卧心下澹澹如人將捕頭眩厥目黃失精遠志湯方

遠志去心

熟乾地黃

切焙各一
兩

防風去叉

人參

甘菊花

白朮

桂皮去麤

茯神木

細辛去苗葉

前胡

去蘆頭各參分

枳殼

去瓢炒半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

治膽虛生寒氣溢胸膈頭眩口苦常喜太息多嘔宿水天雄丸方

天雄

炮裂去皮

人參

山芋

桂去麤皮各壹兩

黃耆剉

白茯苓

去皮黑

防風

去叉

柏子人

細研

山茱萸

酸棗人炒各

右一十味除柏子人外搗羅為細末與柏子人和勻鍊蜜為劑杵五百下丸如梧桐子每服三十九溫酒下空心食前

治肝虛膽寒心神不安卧即驚覺目昏心躁四肢不利黃耆湯方

黃耆

剉參

人參

檳榔

剉

白朮

百合

酸棗人

炒微

白茯苓

去黑皮

參門冬

去心焙

桂皮

去麤

附子

炮裂去皮各半兩

右一十味剉如麻豆每服五錢七水一盞半入薑五片煎至一盞去滓溫服
空心食前日二

治足少陽經不足目眩痿厥口苦太息嘔水多唾沉香湯方

沉香

剉

白茯苓

去黑皮

桂

去皮

白朮

各一兩

芎藭

熟乾地黃

切培

五味子

各三分

枳實

去瓢炒

桂

去皮

各半兩

右九味麤擣篩每服三錢七水一盞入生薑二片同煎至七分去滓溫服不

計時

治膽虛勞煩精神不守奔氣在胸眠睡多恐人參湯方

人參

桂

去麤皮

各一兩

酸棗人

微

白茯苓

去黑皮

知母

培

石膏

碎各一兩

甘草

炙剉

錢

右七味麤擣篩每服五錢七用水一盞半生薑五片煎至一盞去滓溫服不

計時

治膽受冷精神不安眼目昏暗卧起不定犀角飲方

犀角

銹肩

一兩

羌活

去蘆頭

一兩

酸棗人

炒各一兩

茯神

去木

各三分

甘菊花

一兩

防風

去叉

卷分

人參

卷分

茈胡

去苗

一兩

右八味麌搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓食後溫服日三

膽實

論曰膽實則為有餘有餘則生熱故其證若腹中氣滿飲食不下咽乾心脇痛不能轉側足外反熱是為陽厥及頭痛目銳背痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀俠癰皆謂膽氣實足少陽經壅滯故也

治膽經有餘腹中冒冒氣滿不安咽乾頭重枳殼湯方

枳殼去瓢

炒壹兩

人參

葵子

甘草炙剉

各半兩

赤茯苓去皮

黑皮

時

右六味麌搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片煎至七分去滓溫服不計時

治足少陽經伏熱積久腹中氣滿睡卧不安頭昏口苦小便不利升麻湯方

升麻

麥門冬去心

黃芩去黑

茯神

大黃炒

地骨皮剉

羚羊角燒

甘草炙剉

各等分

右八味麌搗篩每服三錢七水一盞入青竹茹少許煎至七分去滓溫服食後臨卧服

治膽經實熱心神驚悸小便不利棟實丸方

棟實

參兩以童子小便浸一宿文大煮爛去核焙乾

大黃

炒

梔子人

炒各

人參

赤茯苓

去皮黑燒令赤酒中淬

酸棗人

半炒用半生用別研

蛇黃

燒五度別研

各

鹽各

兩

金牙石

搗碎壹兩壹分

右八味除別研者外擣羅為末再一處拌勻鍊蜜丸如梧桐子大每日早食後及夜卧用熟水下十五丸至二十九丸

治邪熱干膽神思不寧喜怒狂躁口苦舌乾山梔子飲方

山梔子人

半兩

甜竹茹

微炒壹兩

大青

錢

陳橘皮

湯浸去白培壹兩

卧各一

右五味麌搗篩每服三錢七水一盞入蜜少許煎至七分去滓溫服食後夜

治膽實生熱腹中氣滿飲食不下咽乾頭重酒酒惡寒兩脇脹痛半夏東流水

湯方

半夏

湯洗柒箇去滑炒壹兩半

酸棗人

貳兩別研入

黃芩

去黑心半兩

遠志

去心去

赤茯苓

各

壹分

生地黃

貳兩切培

右六味除別研外麌擣篩再拌勻每五錢七用東流水二盞入秫米半合生
薑五斤煎至一盞去滓分溫二服空腹食後各一服

治膽實熱苦冒冒氣滿飲食不下咽乾心脇痛不能轉側頭目連缺盆骨痛半
夏湯方

半夏

為末生薑汁
和作餅暴乾

酸棗人

各壹兩半

黃芩

去黑心半兩

遠志

去心

山梔子

皮去

赤茯苓

去黑皮各壹兩

秫米

參大合

右七味麌擣篩每服五錢七水一盞半生薑五斤生地黃半分切煎至八分
去滓食後溫服

治膽熱精神不安卧起不定口中常苦胡黃連丸方

胡黃連

壹兩

青羊角

鎊屑兩能膽壹分

蛇黃

大煅去毒半兩

青黛

別研壹分

右五味擣羅為末研令勻用黃牛膽搜和為丸如菉豆大每服七丸煎竹葉
湯下晚間再服無牛膽以羊膽代

治膽伏熱精神驚悸不安菊花散方

甘菊花

壹兩

牛黃

研半兩

犀角

鎊屑參分

鐵粉

半兩

麥門冬

去心焙半兩

桔梗

半兩

甘草

半兩

黃連

去須
參分

鉛霜

半兩

獨活

去蘆頭
壹兩

白附子

炮半兩

右九味擣羅為細散研和勻每服二錢七食後淡竹瀝調下或金銀煎湯下亦得

治膽實熱精神不安瀉熱湯方

龍骨

酸棗人

微炒

黃芩

去黑
火谷等分

茯神

去
伏龍肝

升麻

竹茹

甘草

火谷等分

右八味麌搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓食後溫服日三

膽虛不得眠

論曰膽虛不得眠者膽為中正之官足少陽其經也若其經不足復受風邪則膽寒故虛煩而寢卧不安也

治肝虛膽寒夜間少睡睡即驚覺心悸神思不安目昏心躁肢節萎弱補肝去膽寒和氣五補湯方

黃耆

參分

附子

炮皮
微炒

人參

檳榔

煨

白朮

百合

酸棗人

研微炒

白茯苓

去皮
湯浸去

麥門冬

心培乾

桂各半兩
去皮

右一十味除酸棗人外細剉分為十貼每貼水兩盞入生薑五片同煎至一盞去滓空心溫服日二

治膽寒虛煩不得眠溫膽湯方

半夏湯洗未偏培

甘草火未偏培

竹茹火未偏培

枳實去瓢炒各貳兩

陳橘皮湯浸去白各貳兩

酸棗人炒

甘草剉火各貳兩

桂皮去麌

黃芩去黑心

遠志去心

治膽寒虛煩不得眠千里流水湯方
右五味麌搗篩每服五錢七以水一盞半入生薑半分切煎取七分去滓溫服

治膽寒虛煩不得眠千里流水湯方

半夏湯洗未偏培

乾麥門冬去心各參兩

酸棗人炒

甘草剉火各貳兩

桂皮去麌

黃芩去黑心

遠志去心

草薢

人參各貳兩

右一十味麌搗篩每服五錢七先以千里流水五盞入秫米半合煮候沸揚之千過澄清取一盞半入藥并生薑半分切再煎取一盞去滓溫服
治膽虛睡卧不安精神恐怯酸棗人九方

酸棗人

火未炒研

人參

白朮

白朮苓去麌

半夏

湯洗去滑末
炒焙

旋復花

前胡

剉各一兩

乾薑

炮各一兩半
陳橘皮

去白

榆白皮

剉

右十一味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空心食前煎東湯下二十九日

再服加至三十九

治膽虛冷頭痛心中驚悸睡卧不安常如人將捕之精神不守五味子湯方

五味子

白茯苓

去黑皮

人參

酸棗人

微炒

熟乾地黃

培

麥門冬

去心各一兩分

芎菊

遠志

去心

桑寄生

剉

半兩

右九味麤搗篩每服三錢七水一盞東二枚同煎至七分去滓溫服空心食

前

治膽氣虛熱不睡酸棗人九方

酸棗人

炒剉各一兩

地榆

各一兩和苗用

丹砂

研

茯神

去木

人參

葛蒲

剉各半兩

右六味除丹砂外搗羅為細末入丹砂令勻蜜和丸如梧桐子大每服米飲

下二十九不拘時候

治膽虛冷精神不守寢卧不寧頭目昏眩恐畏不能獨處山芋丸方

山芋

酸棗人微炒各
壹兩

柏子人研

茯神去木

山茱萸各參分

右五味搗羅為末銖蜜和丸如梧桐子大每服三十九溫酒下米飲亦得不拘時候

治膽虛睡卧不安多驚悸人參散方

人參

白茯苓去黑皮各壹兩

丹砂別研

茯神去木各半兩

右四味搗研為細散每服一錢七粥飲調下不拘時候

治膽虛不得眠睡酸棗人丸方

酸棗人微炒各

地榆并苗用

茯神去木各壹兩

右三味搗羅為末銖蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲下不拘時候

治膽風不得眠睡精神恍惚乳香散方

乳香研

馬頭腦骨灰研各壹兩

酸棗人

貳兩微炒研

右三味研令細和勻每服二錢七溫酒調下不拘時候

膽熱多睡

論曰膽熱多睡者膽府清淨決斷所自出今肝膽俱實榮衛壅塞則清淨者濁

而擾故精神昏憤常欲寢卧也

治膽熱精神不守昏困多睡半夏湯方

半夏

湯洗米偏去
滑培參兩

生地黃

伍兩

遠志

去心去皮
去法

赤茯苓

去黑皮各貳兩

黃芩

壹去黑心兩

酸棗人

人生用壹兩半

右六味剉如麻豆每服先以長流水三盞入秫米半合煎取一盞半去米揚之千偏入藥五錢七煎取八分去滓溫服

治榮衛氣滯精神不爽膽熱多睡頭目昏塞麥門冬湯方

麥門冬

去心培去心

天門冬

去心培各半

羚羊角

鋸各分通剉

前胡

去蘆頭去皮

大黃

剉炒肆錢

各半夏

湯洗米偏去滑培乾

甘草

剉去火

防風

去火去半兩

右九味麌搗節每服三錢七以水一盞入生薑三片煎至六分去滓溫服食

後

治氣昏多睡晝夜不足遠志丸方

遠志

去心法

人參

細研

山芋

存性燒灰

防風

去火

玄參

各貳兩半

右八味搗羅為末銖蜜為丸如梧桐子大食後米飲下二十九日再漸加至

苦參

研

鐵粉

細研

鳥頭

存性燒灰各參兩

三十九

治膽熱口苦神昏多睡黃連湯方

黃連

去須

黃芩

去黑心

赤茯苓

去皮黑心

麥門冬

去培心

升麻

各壹分

右五味麌搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓放溫食後服
治膽風毒氣虛實不調昏困多睡酸棗人湯方

酸棗人

研生用壹兩

臘茶

以生薑汁塗火令微焦貳兩

右二味麌搗篩每服二錢七水一盞煎至七分去滓溫服不計時候

膽痺

論曰內經謂有病口苦名曰膽痺夫膽為中正之官清淨之府十一藏之所取決咽為之使若數謀慮不決則膽虛氣上溢而口為之苦膽主藏而不寫今數謀不斷則清淨者濁而擾矣故氣上溢而其證為口苦也經所謂是動則病口苦以氣為是動也

治肝膽俱虛熱氣上薰口中常苦泄熱益膽湯方

黃芩

去黑心

甘草

炙剉各壹兩

人參

桂去麌皮各壹兩

苦參

茯神

去半兩木各



右六味麌搗篩每服三錢七以水一盞半煎取七分去滓溫服不拘時

治謀慮不決膽氣上溢虛熱口苦神思不爽半夏茯苓湯方

半夏

湯洗未偏去滑培乾

赤茯苓

去黑皮去心培麥門冬各參兩

酸棗人

炙半皮

桂

去皮

黃芩

去黑心

遠志

去心

人參

各貳兩

右九味麌搗篩每服五錢七水一盞半入生薑五片秫米一匙頭許同煎至

一盞去滓溫服不拘時

治謀慮傷膽膽氣上溢膈胱虛煩常覺口苦地骨皮湯方

地骨皮

生乾地黃

各伍兩細剉

前胡

去蘆頭兩半

茯神

去木

麥門冬

去心培

知母

各貳兩半

人參

甘草

各貳兩半

右八味麌搗篩每服五錢七水一盞半入豉及粟米各少許同煎至一盞去

滓溫服不拘時

治膽虛氣逆口中常苦煩躁引飲麥門冬湯方

麥門冬

去心

地骨皮

黃芩

去黑

茯神

去木

天黃

炒剉

升麻

炙半

甘草

炙半

羚羊角

鎔各半兩

聖濟經全
卷之十一
右八味麌搏篩每服三錢七水一盞入竹茹半分同煎至七分去滓食後溫服

治膽熱氣逆口苦煩渴梔子湯方

梔子人貳拾壹枚

升麻

黃芩去黑心

大青

茯神去木參分

甘草炙半兩

剉

右六味麌搏篩每服三錢七水一盞入豉五十粒煎至七分去滓入蜜半合更煎三二沸食後溫服

治膽虛氣逆邪熱攻衝口苦煩渴人參湯方

人參

甘草炙各三分

冬葵子各半兩

黃芩去黑心

赤茯苓去皮

枳殼

去瓢殼各三分

右六味麌搏篩每服三錢七水一盞入生薑半分煎至七分去滓溫服不拘時

時

治膽熱口苦胡黃連丸方

胡黃連壹兩

青羊角鋤

蛇黃搗研如粉各半兩

熊膽研

青黛研壹分

右五味搗研為末用黃牛膽汁和丸或羊膽和丸如菉豆大每服七丸食後
溫竹葉湯下



北京大学中医系藏

北京大学图书馆出版

聖濟總錄

卷四十二

大德重校聖濟總錄卷第四十二



南京中医药大学图书馆藏