





10827/B

10-3

L xxiv. Alc

FORMULARIO UNIVERSAL

ó

GUIA PRACTICA

DEL MEDICO, DEL CIRUJANO

Y DEL FARMACEUTICO.

POR

DON FRANCISCO ALVAREZ ALCALÁ,

Dr. en Medicina y Cirujía.

SEGUNDA EDICION

enteramente refundida y aumentada.

TOMO III.

MADRID: 1850.

Librería de Don Angel Calleja, Editor.

LIMA :

CASA DE LOS SRES. CALLEJA, OJEA Y COMPAÑIA.



IMPRESA DE DON ALEJANDRO GOMEZ FUENTENEBO.

CONTINUACION

DE LA

PARTE TERCERA.

LAPICEROS.

3440. LAPICEROS DERMOGRÁFICOS (Pirlas).

℥ Manteca.	4
℥ Trementina de Venecia.	2
℥ Cera.	3
℥ Negro de humo.	c. s.

Se funde, se agita y se malaxa con una espátula, añadiendo poco á poco el negro de humo hasta que tenga la consistencia poco blanda. En seguida se aparta todo del fuego y se agita hasta que se enfrie. Se da á la masa la figura de lapicero.

Para quitar las líneas trazadas con este lapicero, basta frotar ligeramente la parte con un lienzo empapado en esencia de trementina.

Si se quiere obtener un lapicero que dure menos y se borre á un simple frote, se reemplazará la trementina con jabon comun, y se pondrá partes iguales de cera; finalmente si se quiere que sea rojo, se pondrá cinabrio ó bióxido de mercurio (precipitado rojo) en lugar del negro de humo.

3441. Otro, n. 2.

℥ Colofonia.	ḡxc (3 gr.).
----------------------	--------------

Estearina.	5j (4 gr.).
Cera.	5ß (2 gr.).
Negro de humo.	c. s.

Se funde, se agita y se malaxa con una espátula, añadiendo un poco de negro de humo, hasta que tenga una consistencia un poco blanda; despues se la vierte en moldes para formar lapiceros y se deja enfriar.

Esta fórmula es mas conveniente en estío, porque la anterior se ablanda con facilidad con el calor.

3442. L. DE NITRATO DE PLATA Y POTASA (*Cadet de Gassicourt*).

Se mezcla el nitrato de plata con el de potasa, se los funde en un crisol de plata ó platino, se agita de cuando en cuando la mezcla con una barrita de vidrio, y apenas esté fundido se le echa en una rielera calentada antes y cubierta de sebo para que no se pegue el nitrato de plata. Cuando se ha fundido el nitrato se abre la rielera, se sacan los cilindros y se los guarda en una caja.

Se preparan en la proporcion de $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ ó $\frac{1}{8}$ de nitrato de plata, y se aconsejan para cauterizar la

conjuntiva en lugar del nitrato de plata en los casos en que existan granulaciones vasculares pálidas ó cartilaginosas. Se emplean en los

casos en que el sulfato de cobre es insuficiente, y cuando el nitrato de plata determina accidentes graves.

LÁUDANOS.

3443. LÁUDANO CIDONIADO (*Vanhelmont*).

℞ Opio en bruto en polvo. ℥jv (125 gr.).
Zumo de membrillos reciente. lbjv (2000 gr.).
Se digiere durante tres semanas y se añade entonces:

Clavo machacado,
Nuez moscada machacada, ãã. . . . ℥j (30 gr.).

Se calienta ligeramente, se digiere despues de nuevo durante ocho dias y se añade:

Azafran. ℥j (30 gr.).
Azúcar blanca. . . . ℥jv (125 gr.).

Cuando el azúcar esté disuelta y el azafran bien infundido durante veinticuatro horas, se filtra; despues se evapora el líquido en el baño maría hasta que se reduzca al tercio de la cantidad.

D. Diez gotas de esta tintura contienen ḡj (5 cent.) de opio.

3444. L. CINABARINO ó *Extracto de opio cinabarino* (F. E.).

℞ Extr. acuoso de opio. ℥vj (24 gr.).
Azafran pulverizado,
Cinabrio nativo levigado, ãã. ℥iij (12 gr.).

Se hace una masa con un poco de agua, y se forman pastillas ó cilindros que se secan y guardan.

3445. L. DE FORD.

℞ Opio. ℥j (30 gr.).
Canela,
Clavo, ãã. ℥j (4 gr.).
Espíritu de vino,
Agua, ãã. lbβ (250 gr.).

Se macera durante tres semanas y se filtra.

D. Doce gotas en una pocion.

3446. L. LÍQUIDO DE SYDENHAM ó *Tintura vinosa de opio de Sydenham* (F. E.).

℞ Opio escogido partido en pedazos. ℥ij (60 gr.).
Azafran. ℥j (30 gr.).
Canela. ℥j (4 gr.).
Clavo en polvo. . . . ℥j (4 gr.).
Vino blanco bueno. ℥xviiij (560 gr.).

Se contunden las sustancias y se ponen á digerir en el vino durante un mes en un matraz de vidrio, se cuela y se guarda en un frasco bien tapado.

D. Seis gotas á ℥j (12 dec.).

3447. VINO DE OPIO COMPUESTO ó *Láudano liquido de Sydenham* (F. F. Y F. P.).

℞ Opio escogido cortado en pedazos. ℥ij (64 gr.).
Azafran partido. . . . ℥j (32 gr.).
Canela quebrantada. . . ℥j (4 gr.).
Clavo de especia. . . . ℥j (4 gr.).
Vino de Málaga. lbj (500 gr.).

Se pone todo en un matraz, se macera por quince dias, se cuela con expresion y se filtra.

Veinte gotas de este medicamento pesan quince granos, y representan ḡj (5 cent.) de extracto gomoso de opio.

Este vino que ha tenido gran reputacion, ha sido preconizado principalmente por Sydenham, quien le administraba en las enfermedades graves acompañadas de postracion, y en las viruelas cuya erupcion creia favorecer por su accion estimulante. En el dia, á pesar de las sustancias estimulantes de que se compone, todos están conformes en que el opio es su parte esencial.

Es uno de los medicamentos que mas se usa, ya interiormente ya exteriormente, en los casos en que conviene el opio. Se usa para detener las diarreas serosas crónicas, en el cólera y en las afecciones del estómago y de los intestinos en que conviene unir los tónicos y los sedantes. Se usa además en casi todas las enfermedades, á saber: en las manchas de la córnea, oftalmias, reumatismos, gastralgias, é interiormente en casi todas las flegmasias y neuralgias.

Entra en algunas lavativas y sirve para rociar diversas cataplasmas narcóticas y calmantes, que se prescriben unas y otras contra la diarrea, disenteria, ciertos cólicos, etc. Se administra puro interiormente, á la dosis de cuatro á ocho gotas que progresivamente se aumentan hasta quince ó veinte, las cuales equivalen á ḡj (5 cent.) de extracto acuoso de opio. Finalmente, tambien se usa algunas veces mezclado con agua contra ciertas oftalmias, instilándole entre los párpados.

3448. VINO DE OPIO DE LALOUPETTE
ó Láudano de Lalouette.

℞ Extr. acético de opio. ḡvj (24 gr.).
Vino de España. ḡx (320 gr.).
Aguardiente. ḡij (64 gr.).

I. Conviene en casi todas las flegmasias é inflamaciones. D. ḡvj (3 dec.) á ḡß (2 gr.).

3449. LÁUDANO Ú OPIO DE ROUSSEAU, *Vino de opio obtenido por fermentacion (F. F. Y F. P.).*

℞ Opio escogido. ḡjv (125 gr.).
Miel blanca. ḡxij (375 gr.).
Agua caliente. ḡiij y ḡxij (1875 gr.).
Levadura de cerveza
fresca. ḡij (8 gr.).

Se deslien separadamente la miel y el opio en el agua caliente, se

mezclan los líquidos, se les añade la levadura de cerveza y se dejan en digestion durante un mes cuando menos en un sitio en que la temperatura tenga cerca de 30° hasta que concluya la fermentacion. Se cuela con expresion, se filtra y se destila al calor del baño maria para extraer ḡbj (500 gr.) de líquido alcohólico que se destilará de nuevo para obtener ḡxij (375 gr.), las cuales se reducirán á ḡjvß (141 gr.) por una tercera destilacion. Por separado se toma el líquido que forma el residuo de la primera destilacion y se le evapora en el baño maria hasta que pese ḡx (320 gr.); se le añade el alcohol opiado, se mezcla exactamente, se filtra si es necesario y se guarda.

Veinte gotas de este láudano corresponden á cerca de ḡijß (12 cent.) de extracto de opio.

Se usa comunmente como calmante, y se ha pretendido que no posee las propiedades excitantes de las demás preparaciones de opio.

I. Tiene las mismas propiedades que el láudano de Sydenham, aunque mas considerables por contener en proporcion mayor cantidad de opio. La dosis debe ser de dos á ocho gotas.

Se le usa en instilaciones en el ojo á la dosis de algunas gotas para moderar los dolores ocasionados por una inflamacion viva. Este láudano se emplea tambien para cubrir las cataplasmas emolientes y hacerlas sedantes.

3450. L. OPIADO ó Extracto de opio azafranado (F. E.).

℞ Ext. acuoso de opio. . ḡij (60 gr.).
Azafran. ḡj (30 gr.).
Madre de perlas,
Jacintos orientales,
Corales, añ. ḡjß (6 gr.).
Tierra sellada. ḡj (4 gr.).

Piedra bezoar. ℥jv (48 dec.).

Rasuras de cuerno
de ciervo. ℥ij (24 dec.).

Se pulverizan sutilmente estas sustancias, y con un poco de agua se hace masa que se divide en trociscos que se guardan despues de secos.

D. ℥jv (2 dec.). No se usa.

3451. L. SIMPLE ó Extracto acuoso de opio (F. E.).

℥ Opio partido en pedacitos. ℥jv (125 gr.).

Se tritura en un mortero de mármol añadiendo poco á poco suficiente cantidad de agua fria, se pone en digestion en un paraje caliente hasta que se disuelva perfectamente la parte extractiva, se cuele el licor y se evapora en baño de agua hasta la sequedad.

D. Hasta ℥ij (1 dec.).

3452. L. URINARIO ó Extracto de opio con regaliz (F. E.).

℥ Extracto de regaliz. ℥iij (96 gr.).

Alcanfor. ℥ij (8 gr.).

Azafran. ℥viiij (20,6 gr.).

Alquequenge,

Trementina, añ. . . ℥j (32 gr.).

Goma tragacanto,

Almáciga, añ. . . . ℥j (4 gr.).

Extr. acuoso de opio. ℥℞ (16 gr.).

Se mezclan los extractos en un almirez con un poco de agua hasta formar una masa de consistencia de miel, despues se añade la trementina y se pista hasta que se mezcle bien; últimamente se añaden las demás sustancias pulverizadas, machacando y revolviendo la masa hasta que se presente homogénea, y se forman trociscos que se guardan.

D. Hasta ℥j (12 dec.).

LAVATIVAS.

3453. LAVATIVA DE ACEITE DE CROTON.

℥ Aceite de croton ti-
glio. ℥iij (15 cent.).

Goma arábiga. ℥j℞ (6 gr.).

Cocimiento de sen. . ℥bj (500 gr.).

I. Estreñimiento, cólico saturnino, hidropesía pasiva, ascitis, helmintiasis, gastralgia, angina, tétanos, conjuntivitis. D. Para dos lavativas.

3454. L. DE ACEITE DE OPIO.

℥ Aceite de olivas. . . . ℥jv (125 gr.).

Tintura de opio. . . . 40 á 60 gotas.

M. I. Afecciones espasmódicas del cuello de la vejiga y sensacion molesta de la glándula próstata en la gonorrea. D. En inyeccion.

3455. L. DE ACEITE DE RICINO.

℥ Aceite de ricino. . . . ℥j℞ (45 gr.).

Cocim. de malvabisco. ℥x (300 gr.).

H. S. A.

3456. L. DE ACEITE DE RICINO (H. DE INGL.).

℥ Aceite de ricino,

Miel comun, añ. . . . ℥j (30 gr.).

Cocimiento de harina

de avena mondada. ℥x (300 gr.).

I. Se usa como vermífugo.

3457. L. DE ACEITE DE TÁRTAGOS.

℥ Aceite de tártagos. . . ℥xviiij (4 gr.).

Cocim. de mercurial. ℥bj (500 gr.).

Almidon. ℥xc (5 gr.).

I. Estreñimiento, cólico saturnino, hidropesía, ascitis, asfixia, asma, angina, conjuntivitis, acne. D. Para dos lavativas por la mañana.

3458. L. ACEITOSA.

℥ Aceite comun. ℥ij (60 gr.).

Cocim. de malvabisco. ℥jx (270 gr.).

Miel. ℥j (30 gr.).

M. Si se juzga necesario, se puede añadir ℥℔ (15 gr.) de sulfato de sosa y sal comun.

3459. L. ACEITOSA (H. DE I.).

℥ Lavativa emoliente. . . número 1.
Aceite blanco. ℥ij (60 gr.).
Mézclese.

3460. L. ACETOSA.

℥ Cocim. emoliente. . . ℥vj (180 gr.).
Vinagre. ℥j, ℥ij ó ℥iij
(30, 60 ó 90 gr.).

Se puede sustituir el agua pura ó el cocimiento de avena por el cocimiento emoliente, á las mismas dosis segun las indicaciones.

I. Ileo, estreñimiento rebelde, apoplejía.

3461. L. DE ACETATO DE MORFINA (Bally).

℥ Almidon. ℥ij℔ (10 gr.).
Se diluye en
Agua. ℔j (500 gr.).
Se añade:
Acetato de morfina. . . ℥j (5 cent.).
Se la aconseja en las diarreas.

3462. L. ACÉTICA (Frank).

℥ Vinagre. ℥jv (16 gr.).
Agua. ℔j℔ (750 gr.).
M. I. Calenturas tifoideas.

3463. L. DE ACÍBAR.

℥ Acíbar. ℥℔ á ℥ij (2 á 8 gr.).
Yema de huevo. número 1.
Agua tibia. ℔j (500 gr.).
M. S. A.

3464. Otra (F. DE L.).

℥ Acíbar. ℥ij (24 dec.).
Carbonato de potasa. ℥xv (75 cent.).
Cocim. de cebada . . . ℔j (500 gr.).
M. S. A.

3465. L. DE ADORMIDERAS ó Lavativa calmante.

℥ Cabezas de adormid. . número 1.

Agua hirviendo. ℔j (500 gr.).

Se abre la cabeza de la adormidera y se sacan las semillas, se la parte en pedazos, se echa encima el agua hirviendo, se deja infundir por dos horas y se cuele.

I. Se usa para combatir las diarreas ligeras.

Nota. Si á esta fórmula se añade ℥j (30 gr.) de almidon, se tiene la lavativa de adormideras y almidon.

3466. L. DE ALBAYALDE (Devergie).

℥ Acetato de plomo. ℥ij (1 dec.).
Carbonato de sosa. ℥j (5 cent.).

Se disuelven separadamente en un poco de agua, se vierten las soluciones en ℔℔ (250 gr.) de cocimiento de lino y se añaden hasta cuatro gotas de láudano de Rousseau.

Se usa para calmar la diarrea de los tísicos.

3467. L. ALCANFORADA.

℥ Alcanfor. ℥ij (8 gr.).
Yema de huevo. . . número 1.
Cocim. de malvab. . . ℔j (1000 gr.).

M. I. Calenturas con adinamia, dolores neurálgicos, dismenorrea, etc.

3468. Otra, n. 2.

℥ Cocimiento de simiente de lino. ℔j (500 gr.).
Alcanfor. ℥j (4 gr.)

Se divide el alcanfor por medio de un poco de yema de huevo y se diluye en el cocimiento de lino.

I. Dolores neurálgicos, dismenorrea.

3469. L. ALCANFORADA (H. M.).

℥ Infus. de manzanilla. ℥xij (375 gr.).
Alcanfor. ℥ij (8 gr.).

M. S. A. I. Irritacion inflamatoria de la vejiga de la orina y de la uretra. *D.* Para dos lavativas.

3470. L. DE ALMIDON ó Enema de almidon (H. DE M.).

℞ Cocimiento de arroz. ℥xij (375 gr.).
Almidon. ℥β (45 gr.).

Se deslíe el almidon en un poco de agua y se mezcla con el cocimiento de arroz caliente.

I. Irritaciones de los intestinos gruesos y particularmente del recto.

3471. L. DE ALMIDON Y DE ACETATO DE MORFINA, ó Lavativa amilácea narcótica (Bally).

℞ Agua. ℔j (500 gr.).
Almidon. ℥j (4 gr.).
Acetato de morfina ḡj (5 cent.).

M. S. A. I. Flujos crónicos de los intestinos.

Nota. Debe retenerse esta lavativa el mayor tiempo posible.

3472. L. CON ALMIZCLE.

℞ Almizcle. ḡxviiij (4 gr.).
Se diluye en media yema de huevo y se añade:

Cocimiento de lino. ℔β (250 gr.).
Añadiendo á esta lavativa ℥β (2 gr.) de alcanfor, se tiene la *lavativa moscada alcanforada*.

I. Priapismo, angina, cólera, vólvulo, cardialgia. *D.* Una lavativa.

3473. L. ALOETICA (Clarck).

℞ Acíbar en polvo. ℥j (4 gr.).
Se disuelve en

Cocimiento de avena. ℥x (300 gr.).
Se usa contra las ascárides y para excitar las hemorroides.

3474. L. ALOETICA SALINA.

℞ Acíbar en polvo. ℥ij (8 gr.).
Yema de huevo. número 4.
Se trituran y se añade poco á poco:

Leche de vacas. ℥vj (200 gr.).
Cloruro de sodio. ℥j (30 gr.).

I. Coriza, angina, aftas, asma,

apoplejía, encefalitis, cefalalgia, esplenitis, plétora, pleuresía, convalecencia, tétanos, conjuntivitis, gastritis, hipocondría, histérico, ascárides vermiculares, partos laboriosos. *D.* Para dos medias lavativas.

3475. L. ANALÉPTICA.

℞ Yema de huevo. número 4.
Salep. ℔j (12 dec.).
Caldo de carne sin sal. ℥jv (125 gr.).

Radius indica otra fórmula, en que se reemplaza el salep por medio vaso de vino generoso.

3476. L. ANODINA.

℞ Opio. ḡj (5 cent.).
Goma arábica. ℥j (4 gr.).
Agua de menta pip. ℥jv (125 gr.).

Se hace emulsion y se añade:

Agua destilada de almendras amargas. ℥j (4 gr.).

I. Es útil en el cólera.

3477. Otra, n. 2.

℞ Cocim. de malvabisco
ó salvado ℔j (500 gr.).
Extr. gomoso de opio. ḡj (5 cent.).

M. S. A. I. Cólera, flegmasia gastro-intestinal, partos dolorosos, aborto, catarro útero vaginal, cálculos, cuerpos extraños, blenorragia, metritis, angina, aftas, encefalitis, gastralgia, gastritis, hepatitis, atrofia mesentérica, esplenalgia, cólicos, diarrea, disenteria, histérico, nefritis, vólvulo, denticion difícil, convalecencias. *D.* En dos lavativas.

3478. L. ANODINA DE ALMIDON (F. E.).

℞ Almidon. ℥ij (8 gr.).
Agua. ℥xij (375 gr.).

Se mezcla y se cuece hasta que se disuelva el almidon, y cuando el líquido está frio se le mezclan dos yemas de huevo.

I. Calma la irritacion y los dolores de vientre en la diarrea y disenteria.

La LAVATIVA AMILÁCEA de los H. M. es análoga á la anterior y contiene \mathfrak{B} (15 gr.) de almidon y \mathfrak{IbB} (250 gr.) de agua comun.

Se puede añadir de \mathfrak{gviij} á \mathfrak{gxij} (4 á 6 dec.) de tintura de opio.

3479. L. ANODINA (H. DE M.).

\mathfrak{z} Cocim. emoliente. . . . \mathfrak{Jxij} (375 gr.).
Elect. filonio romano. \mathfrak{Jj} (4 gr.).

M. I. Cólicos nerviosos. *D.* Para dos lavativas.

3480. L. ANTIBLENORRÁGICA (Velveau).

\mathfrak{z} Agua de goma. \mathfrak{Jjv} (125 gr.).
Bálsamo de copaiba. \mathfrak{Jjv} (15 gr.).
Alcanfor. \mathfrak{gijv} (20 cent.).
Extr. acuoso de opio. \mathfrak{gij} (5 cent.).
Yema de huevo. e. s.

H. S. A. I. Flujos blenorragicos agudos ó crónicos.

Nota. Esta lavativa, preferible á todas las preparaciones de copaiba destinadas á ingerirse en el estómago, debe retenerse el mayor tiempo posible.

3481. L. ANTIDIARREICA (Devergie).

\mathfrak{z} Acetato de plomo neutro. \mathfrak{gij} , \mathfrak{gijv} ú \mathfrak{gviiij} (10, 20 ó 40 cent.) aumentando progresivamente.

Carbonato de sosa. \mathfrak{gij} , \mathfrak{gij} ó \mathfrak{gijv} (5, 10 ó 20 cent.).

Láud. de Sydenham. . . 4 gotas.

Agua. \mathfrak{Jjv} (125 gr.).

I. Diarrea de los tísicos. *D.* Una lavativa mañana y tarde.

3482. Otra (ROSTAN).

\mathfrak{z} Cocimiento de arroz. \mathfrak{Ibj} (500 gr.).
Almidon. una pulgarada.
Goma tragacanto. . . \mathfrak{B} (2 gr.).
Láud. de Sydenham. 20 got.

D. Un cuarto de lavativa de seis en seis horas. Segun Rostan es

muy eficaz y seguros sus resultados.

3483. L. ANTIHELMÍNTICA.

\mathfrak{z} Musgo de Córcega. . . \mathfrak{B} (15 gr.).

Se hierve durante diez minutos en

Agua. \mathfrak{Jxij} (375 gr.).

Se cuele y se añade:

Aceite de ricino. . . . \mathfrak{Jij} (60 gr.).

Nota. Se puede usar tambien un cocimiento de helecho macho, una infusion de santónico, etc.

3484. Otra, n. 2.

\mathfrak{z} Yerba de abrotano. \mathfrak{vB} á \mathfrak{Jj} (22 á 30 gr.).

Agua hirviendo. e. s.

Se digiere durante un cuarto de hora y á \mathfrak{Jvj} ú \mathfrak{Jviiij} (180 á 250 gr.) de líquido colado se añade:

Aceite comun ó de linaza. \mathfrak{Jj} (30 gr.).

M. I. Lombrices y principalmente contra las ascárides.

3485. Otra (DUNCAN).

\mathfrak{z} Hojas de sabina,

Hojas de ruda,

Hojas de ajenjos, añ. \mathfrak{Jiiij} (12 gr.).

Se reducen á pedazos y se infunden en

Agua. \mathfrak{Ibj} (500 gr.).

Se cuele y se añade:

Aceite de ricino. . . . \mathfrak{B} (15 gr.).

3486. L. ANTIESPASMÓDICA.

\mathfrak{z} Extr. de valeriana. $\mathfrak{gxviiij}$ (1 gr.).

Agua caliente. . . . \mathfrak{Jiiij} (100 gr.).

I. Convulsiones y algunas neurosis.

3487. Otra, n. 2.

\mathfrak{z} Alcanfor. $\mathfrak{gxviiij}$ (1 gr.).

Asa fétida. \mathfrak{B} (2 gr.).

Yema de huevo. . . . número 1.

Agua. \mathfrak{Jjv} (125 gr.).

M. I. Eclampsia, neurosis abdominales ó uterinas con hinchazon del bajo vientre, cólicos histéricos, etc.

3488. L. ANTIESPASMÓDICA
(H. M.).

℥ Inf. de manzanilla. ℥xij (375 gr.).
Asa fétida disuelta en
vinagre. ℥ß (15 gr.).
M. D. Para dos lavativas.

3489. L. ANTIESPASMÓDICA
(P. DE MIGNOT).

℥ Valeriana quebrantada. ℥v (20 gr.).
Se infunde en
Agua. ℔j (500 gr.).
Se cuele y se disuelve:
Extr. gomoso de opio. ḡj (5 cent.).
Se añade á la solución despues
de fria:
Eter sulfúrico. ℥ß (2 gr.).
I. Se usa para resolver las her-
nias. Al mismo tiempo se puede
hacer irrigaciones etéreas sobre
el tumor.

3490. L. ANTIESPASMÓDICA
ALCALINA (*Mialthe*).

℥ Inf. de ℥ijß (10 gr.)
de valeriana. ℥vj (200 gr.).
Asa fétida. ḡxviii (1 gr.).
Carbonato de potasa. ḡjx (50 cent.).
Yema de huevo. . . número 1.
Se pista la asa fétida con el car-
bonato de potasa y algunas gotas
de agua, despues se añade la ye-
ma de huevo y por fin la infusion
de valeriana.

3491. L. ANTIESPASMÓDICA Y
VERMÍFUGA.

℥ Agua caliente. ℥iij (100 gr.).
Asa fétida. ḡjx á ḡxviii ó ℥j
(50 cent. á 1 ó 4 gr.).
I. Convulsiones, corea, coque-
luche, crup espasmódico, lom-
brices, ténia.

3492. L. ANTIPERIÓDICA.

℥ Sulfato de quinina. . . ḡxviii (1 gr.).
ó Quina amarilla. ℥j (30 gr.).
Cocim. de adormid. . . ℥jv (125 gr.).
I. Calenturas intermitentes, neu-

ralgias periódicas. D. En dos me-
dias lavativas.

3493. L. ANTIPÚTRIDA (H. M.).

℥ Quina de Loja. ℥j (30 gr.).
Agua. ℔jß (750 gr.).
Se cuece hasta que se reduzca á
la mitad, se cuele y se añade:
Alcanfor. ℥ij (8 gr.).
I. Fiebres graves con disposi-
cion á la gangrena. D. Para varias
lavativas.

3494. L. ANTISÉPTICA.

℥ Alcanfor. ℥j (4 gr.).
Quina amarilla.
Serpentaria, añ. ℥ß (15 gr.).
Agua. ℔j (500 gr.).
M. S. A. Se usa en las fiebres
graves con tendencia á la gan-
grena.

3495. Otra, n. 2.

℥ Alcanfor. ḡxc (5 gr.).
Se tritura con
Yema de huevo. . . número 1.
Se añade:
Cocimiento de quina. ℥xiiij (400 gr.).
Láudano líquido. ḡjx (50 cent.).
I. Calentura adinámica ó tifoí-
dea, cólera, cardialgia.

3496. L. ARSENICAL FEBRÍFUGA
(*Boudin*).

℥ Arseniato de potasa. ḡj (5 cent.).
Agua destilada. 2 quart. (1 lit.).
Dividase en diez partes. D. Para
diez lavativas.

3497. L. ANTISIFILÍTICA.

℥ Deutocloruro de merc. ḡij (1 dec.).
Agua destilada. ℥ij (60 gr.).
Cocimiento de semi-
llas de lino. ℔j (500 gr.).
I. Se usa en el caso en que el
estómago soporta mal el sublima-
do, ó cuando el recto es el sitio
de algunos síntomas sifilíticos.

3498. L. DE ASA FÉTIDA.

℞ Asa fétida. ʒ℞ á ʒj (2 á 4 gr.).
 ó Tint. de asa fét. ʒij á ʒjv (8 á 45 gr.).
 Agua. ℞℞ (250 gr.).
 Yema de huevo. número 4.

M. I. Afecciones nerviosas ó histéricas, etc.

3499. Otra (H. DE M.).

℞ Inf. de manzanilla. ʒxij (375 gr.).
 Asa fétida en polvo. ʒj (4 gr.).
 Yema de huevo. número 4.

Se tritura la asa fétida con la yema de huevo ó se incorpora á la infusión. V. n. 3488.

I. Se usa como antiespasmódica.

3500. Otra (MILLAR).

℞ Asa fétida. ʒij (8 gr.).
 Aceite comun. ʒiij (90 gr.).
 Cocimiento de malvab. ʒiij (90 gr.).

H. S. A. Millar la ha recomendado en la angina estrídula.

3501. L. DE ASA FÉTIDA ALCANFORADA.

℞ Asa fétida. ʒij (8 gr.).
 Alcanfor. ʒj (12 dec.).
 Aceite comun. ʒj℞ (45 gr.).

Se trituran en un mortero con Yema de huevo. número 2.

Inf. de manzanilla romana y raíz de valer. ℞℞ (250 gr.).

I. Cólico flatulento, no acompañado de calentura ó plétora general ó local.

3502. L. ASTRINGENTE.

℞ Cocimiento de corteza de roble,
 ó Cocimiento de bistorta,
 ó Cocimiento de cáscara de granada,
 ó Cocimiento de ratania. c. s.

I. Diarreas y disenterias crónicas.

3503. Otra, n. 2.

℞ Tanino. ʒxviiij (4 gr.).
 Agua. ʒx (300 gr.).
 Láudano de Sydenham. 6 gotas.

M. I. Diarreas, disenterias, co-

litis crónicas apiréticas, y diarreas de los niños.

3504. Otra, n. 3.

℞ Bistorta,
 Rosa rojas, añ. ʒij℞ (40 gr.).
 Agua. ʒx (300 gr.).

Se infunde, se cuele y se añade:
 Láudano de Sydenham 5 gotas.

I. Diarreas crónicas.

3505. Otra (H. DE M.).

℞ Cáscaras de granadas,
 Pét. de rosas rojas, añ. ʒj (30 gr.).

Se cuece las cáscaras en c. s. de agua para obtener ℞j (500 gr.) de cocimiento y se infunde en el líquido colado

Diascordio. ʒj (4 gr.).

M. I. Diarreas pasivas. *D.* Para tres veces.

3506. Otra (BOERHAAVE).

℞ Azafran,
 Hipericon, añ. una pulgarada.
 Trementina. ʒ℞ (45 gr.).
 Yema de huevo. número 2.
 Triaca. ʒij (8 gr.).
 Leche. c. s.

Se mezcla S. A. *I.* Disenterias y tenesmos crónicos acompañados de dolores vivos en las entrañas, que han resistido á las preparaciones de opio tomadas interiormente. Se usa en varias veces.

3507. Otra (H. DE AL.).

℞ Extracto de ratania. ʒj (12 dec.).
 Mucil. de semillas de membrillos. ʒiij (42 gr.).
 Cocimiento de salvia. ʒj℞ (48 gr.).

M. I. Diarrea rebelde y cólera morbo espasmódico.

3508. Otra (H. DE AL.).

℞ Cocimiento de corteza de encina. ʒvj (480 gr.).
 Acido sulfúr. diluido. ʒj (4 gr.).

M. I. Diarreas crónicas, disenteria, melena, hemorragia, ca-

tarro útero-vaginal. *D.* Para una lavativa.

3509. L. ASTRINGENTE
(H. DE DIOS).

℞ Raíz de bistorta. . . ℞ij (60 gr.).
Cabezas de adormid. ℞ß (45 gr.).
Agua. ℞bij (1000 gr.).

I. Diarreas y disenterias crónicas.

La LAVATIVA ASTRINGENTE DE LOS H. M. solo contiene ℞j (30 gr.) de raíz de bistorta contundida y ℞xviii (560 gr.) de agua comun. *D.* Para dos lavativas.

3510. L. ASTRINGENTE ó de nitrato de plata (*Trousseau*).

℞ Nitrato de plata. ℞j (5 cent.).
Agua caliente. ℞vj (200 gr.).

I. Colitis crónicas apiréticas, diarreas de los niños.

3511. L. ASTRINGENTE ALUMINOSA.

℞ Alumbre. ℞ß (2 gr.).
Opio. ℞j á ℞ij (5 á 10 cent.).
Almidon. ℞j (4 gr.).
Agua calient. ℞vj (200 gr.).

I. Cólera, diarrea rebelde, prociencia del recto, melena, asfisia. *D.* En dos veces.

3512. L. ASTRINGENTE CALIBEADA.

℞ Bolas de Nancy. ℞jß (6 gr.).
Quina. ℞ß (45 gr.).
ó Mil en rama. ℞ß (45 gr.).
Agua hirviendo. ℞v (450 gr.).
Miel rosada. ℞j (30 gr.).

I. Prociencia del recto, disenteria, catarro útero-vaginal. *D.* Para dos lavativas.

3513. L. ASTRINGENTE ó de cáscara de granada (*F. E.*).

℞ Cáscaras de granadas machacadas. ℞j (30 gr.).
Agua. ℞bjß (750 gr.).

Se cuece y se cuela.

I. Es muy útil para combatir las

diarreas y disenterias crónicas.

3514. L. ASTRINGENTE DE CATECÚ.

℞ Catecú. ℞xc (5 gr.).
Agua caliente. ℞x (300 gr.).

I. Diarrea crónica. Se prepara del mismo modo la lavativa astringente de goma quino.

3515. L. ASTRINGENTE CONTRA LAS GRIETAS DEL ANO (*Bretonneau y Trousseau*).

℞ Extracto de ratania. ℞jß (6 gr.).
Alcohol, c. s. para ablandarle.
Agua. ℞jv (125 gr.).

M. Se retendrá el mayor tiempo posible, y se administrará antes una lavativa emoliente.

3516. L. ASTRINGENTE DE QUINO.

℞ Quino verdadero. ℞ß (2 gr.).
Agua. ℞bij (1500 gr.).

M. Es muy eficaz en el tratamiento de ciertas diarreas atónicas.

3517. L. ASTRINGENTE Y TÓNICA (*Roucher*).

℞ Flores de arnica. ℞ß (45 gr.).
Hojas de salicaria. 4 puñado.
Agua hirviendo. c. s.

Se infunde S. A., se cuela y se añade:

Tintura acuosa de ℞xxjv (12 dec.) de ipecacuana. ℞jv (125 gr.).

I. Disenterias de carácter mucoso y con atonía. Disminuye la frecuencia de las deposiciones y fortifica el intestino recto.

3518. ENEMA ATEMPERANTE (H. DE M.).

℞ Tisana de cebada. ℞xij (375 gr.).
Nitrato de potasa. ℞j (4 gr.).

M. I. Calma el ardor de vientre en las fiebres, etc. *D.* Para una lavativa.

3519. ENEMA ATEMPERANTE ACETADO (H. DE M.).

℞ Agua comun. ℥xviii (560 gr.).
 Vinagre. ℥j (30 gr.).
 Nitro. ℥j (4 gr.).
 Disuélvase. *D.* Para dos lavativas.

3520. L. CON EL BÁLSAMO DE COPAIBA.

℞ Bálsamo de copaiba. ℥℥ (45 gr.).
 Se diluye en una yema de huevo y se añade:
 Alcanfor. ℥jv (2 dec.).
 Extr. acuoso de opio. ℥j (5 cent.).
 Agua de goma. ℥jv (125 gr.).
M. I. Blenorragia aguda ó crónica. Se procurará conservar la lavativa el mayor tiempo posible, para lo que se la hará preceder una ó dos lavativas emolientes.

3521. Otra (RICORD).

℞ Copaiba. ℥vj (24 gr.).
 Yema de huevo. número 4.
 Extr. gomoso de opio. ℥j (5 cent.).
 Agua. ℥vj (192 gr.).
 Se usa en los casos en que no puede administrarse el bálsamo de copaiba por la boca.

3522. L. CON EL BÁLSAMO DE COPAIBA (Velpeau).

℞ Bálsamo de copaiba. ℥ij á ℥j (8 á 30 gr.).
 Láudano de Sydenham. ℥xviii á ℥xxxvj (4 á 2 gr.).
 Yema de huevo. núm. 4.
 Cocim. de malvabisc. ℥℥ (250 gr.).
M. S. A. I. Flujos blenorragicos agudos ó crónicos.

3523. L. DE BELLADONA.

℞ Hoj. secas de bellad. ℥xij (6 dec.).
 Agua hirviendo. ℥vj (180 gr.).
 Se infunde.

I. Se usa para combatir la contraccion espasmódica que se opone algunas veces á la introduccion

de la sonda en la vejiga, espasmos del recto, hernia estrangulada, parto difícil, vólvulo, disenteria, cólera, esplenalgia, histérico, metrorragia. *D.* De una vez.

3524. Otra (RICORD).

℞ Extr. hidroalcohólico de belladona. ℥ij (10 cent.).
 Inf. de manzanilla. ℥jv (125 gr.).
 Disuélvase. Se usa para facilitar la reduccion de las hernias estranguladas. *D.* Se repite cada tres ó cuatro horas.

3525. L. CALCAREA (Freer).

℞ Agua de cal tibia. ℥x (300 gr.).
I. Contra las ascárides.

3526. L. CALMANTE (Fouquet).

℞ Opio. ℥ij (4 dec.).
 Filonio romano. ℥x (5 dec.).
 Agua ó leche. c. s.
I. Producen á veces mejor efecto que estos mismos medicamentos tomados por la boca.

3527. Otra, n. 2.

℞ Cocimiento de raiz de malvabisco, ó Cocimiento de linaza,
 Cocim. de cabez. de adorm., ãã. c. s.
 A veces se añaden diez ó quince gotas de láudano de Sydenham por ℥bj (500 gr.) de liquido.

3528. L. CARMINATIVA.

℞ Manzanilla,
 Hojas de naranjo,
 Hinojo,
 Anís,
 Cab. de adorm., ãã. ℥ij℥ (40 gr.).
 Agua hirviendo. ℥bij (1000 gr.).
 Se infunde bastante tiempo y se cuela.

I. Cólico ventoso, neumatosis, histérico.

3529. L. CARMINATIVA (F. M.).

℞ Cocim. carminativo. ℥x (300 gr.).

Electuario de bayas de laurel. ℥℔ (45 gr.).
 Aceite de anís destilado. ℥℔ (6 dec.).
 Miel de ruda. ℥ij (60 gr.).
M. I. Dolores cólicos y afecciones ventosas.

3530. L. DE CATECÚ.

℥ Catecú. ℥j (4 gr.).
 Alcohol. ℥xviiij (4 gr.).
 Agua caliente. ℥jv (425 gr.).
I. Grietas del ano, catarro útero vaginal, diarrea, disenteria, hemorragia, melena. *D.* Para un cuarto de lavativa que se repite mañana y noche.

3531. L. DE CEBADILLA.

℥ Cebadilla. ℥ij (8 gr.).
 Agua. ℥x (300 gr.).
 Leche. ℔℔ (250 gr.).
 Se hierve la cebadilla en el agua de modo que se obtengan ℥vij (210 gr.), se cuela y se añade la leche.
I. Ascárides.

3532. L. CON CLARA DE HUEVO (Ricord).

℥ Cocimiento de semillas de lino. ℥xij (375 gr.).
 Clara de huevo. . . . número 2 ó 3.
M. I. Diarreas crónicas.

3533. L. CLOROSA (Cottureau).

℥ Hidrocloro medicinal. ℥ij (8 gr.).
 Jalea de almidon. . . . ℥jv (45 gr.).
 Extr. acuoso de opio. ℥℔ (25 mil.).
 Agua destilada. ℥vj (480 gr.).
M. S. A. I. Diarreas de los tísicos. *D.* Esta lavativa debe usarse por la mañana y retenerla el mayor tiempo posible.

3534. L. CLORURADA (Labarraque).

℥ Cloruro de sosa. . . . ℥ij℔ (40 gr.).
 Agua filtrada poco caliente. ℔j (500 gr.).
M. I. Calenturas tifoideas.

3535. L. DE COLOQUINTIDA (F. DE L.).

℥ Extracto de coloquintida compuesto. . ℥ij (24 dec.).
 Jabon blando. ℥j (30 gr.).
 Agua. ℥xviiij (560 gr.).
 Se mezclan y se trituran.

3536. L. CONTRA LA DIARREA.

℥ Jar. diacodion. ℥ij á ℥jv (8 á 45 gr.).
 Cocimiento de almidon. . . . ℔℔ (250 gr.).
M. I. Diarreas colicuativas y diarreas en los niños.

3537. L. CONTRA LAS DIARREAS DISENTÉRICAS DE LOS NIÑOS.

℥ Licopodio, cuatro cucharadas de café.
 Yema de huevo. número 2.
 Agua caliente. c. s.
 Se puede añadir algunas gotas de tintura de opio.

3538. L. CONTRA LA DIARREA DE LOS TÍSICOS (Devergie).

℥ Acet. de plomo neutro. ℥ij (8 gr.).
 Carbonato de sosa. . . ℥j (4 gr.).
 Láudano de Sydenham. 4 gotas.
I. Diarrea y sudores de los tísicos. *D.* Para una vez; se repite mañana y noche.
Nota. Las dos sales se descomponen y se forma acetato de sosa y carbonato de plomo.

3539. L. CONTRA LAS DIARREAS CRÓNICAS (Rostan).

℥ Goma tragacanto. ℥xviiij á ℥xxxvj (4 á 2 gr.).
 Almidon. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.).
 Láudano de Sydenham. . . 20 gotas.
 Agua. . ℥xij á ℥xvj (375 á 500 gr.).
M. S. A.

3540. L. CONTRA LAS HEMORROIDES FLUENTES (Warten).

℥ Colofonia en polvo. . ℥j (30 gr.).

Miel. ℔℔ (250 gr.).
 Agua. ℥x (300 gr.).
 H. S. A. A veces añade Warten
 ℥℔ (15 gr.) de bálsamo de copaiba.

3541. L. DE CUBEBAS.

℥ Cubebas. ℥℔ (15 gr.).
 Cocim. de malvabisco. ℥vj (200 gr.).
 Aleanfor. ḡxviiij (4 gr.).
 Extr. de belladona. . ḡv (25 cent.).

I. Blenorragia, blenorrea, catarro útero-vaginal. *D.* Para dos lavativas.

3542. Otra (VELPEAU).

℥ Pimienta cubebas en polvo. ℥jv (16 gr.).
 Cocimiento muy cargado de malvabisco. . ℥vj (192 gr.).

H. S. A. I. Blenorragia aguda ó crónica. *D.* Se toma mañana y noche esta dosis, y se la debe retener el mayor tiempo posible.

Nota. Puede aumentarse la cantidad de cubebas hasta ℥j (30 gr.) y mas.

3543. L. DIURÉTICA.

℥ Cebolla albarrana. . . ℥ij (8 gr.).
 Agua. ℥xij (375 gr.).
 Se hierve durante diez minutos y se cuela.

3544. Otra, n. 2.

℥ Digital,
 Cebolla albarrana, ãã. ℥j (4 gr.).
 Se hierve durante diez minutos en
 Agua. ℥xij (375 gr.).
 Se cuela y se añade:
 Láudano de Rousseau. 6 gotas.

3545. Otra (FOUQUIER).

℥ Hojas de parietaria. . ℥j (4 gr.).
 Se hierve en
 Agua. ℔j (500 gr.).
I. Hidropesías. Se puede añadir ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) de nitrato ó acetato de potasa.

3546. L. DRÁSTICA (Moll).

℥ Hojas de tabaco. . . . ℥j (4 gr.).

Agua hirviendo. . . . ℥jv (125 gr.).
 Aceite de croton. . . . 3 gotas.
 Goma arábica. . . . ℥ij (8 gr.).
H. S. A. I. Se usa con buen éxito en los casos desesperados de íleo, apoplejía, encefalitis, lumbago. *D.* Para una lavativa.

3547. L. DULCIFICANTE (Fouquet).

℥ Salvado. medio puñado.
 Agua comun. ℔ij (1000 gr.).
 Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, se cuela y se añade:
 Yemas de huevo
 frescas. número 2.

I. Disenterias, diarreas, dolor nervioso en el recto. *D.* Se consume esta cantidad en las veinticuatro horas en cuatro lavativas.

3548. L. EMETIZADA.

℥ Tártaro emético. . . . ḡvj (3 dec.).
 Se disuelve en
 Infusion de arniea. . . ℔j (500 gr.).
 Se usa en la apoplejía, coma, etc.

3549. L. EMOLIENTE.

℥ Hojas de malva,
 Hojas de acelga, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Se hierve, se cuela y se añade:
 Aceite comun. . . . ℥iij (90 gr.).
M. I. La misma que las siguientes.

3550. Otra, n. 2.

℥ Especies emolientes. . . ℥j (30 gr.).
 Agua. e. s.
 para que resulte ℔j (500 gr.).

3551. Otra, n. 3.

℥ Cocimiento de simiente de linaza,
 ó Cocimiento de hojas de malvabiseo,
 ó Cocimiento de salvado,
 ó Cocimiento de malvas,
 ó Cocim. de manzanilla. ℔j (500 gr.).
 Ac. comun ó de linaza. ℥j (30 gr.).

I. Sirve para determinar evacuaciones alvinas y para templar el calor de los intestinos gruesos, flegmasias gastro-intestinales, es-

plenalgia, neumatosis, gastritis, gastralgia, peritonitis, nefritis, metritis, ovaritis, tifo, enuresis, catarro útero-vaginal. *D.* Para una ó dos lavativas.

El ENEMA EMOLIENTE DE LOS H. DE M. se compone de \mathfrak{X} xij (375 gr.) de cocimiento de raíz de malvabisco y \mathfrak{J} j (30 gr.) de aceite comun. *D.* De una vez.

3552. L. EMOLIENTE Y CALMANTE.

\mathfrak{Z} Cocimiento de simiente de linaza. $\mathfrak{Ib}\mathfrak{B}$ (250 gr.).
Láudano líquido de Sydenham. 45 gotas.

H. S. A. I. Diarreas con dolores nerviosos y al fin de la disenteria.

3553. L. EMOLIENTE DE HOJAS DE MALVA (F. E.).

\mathfrak{Z} Cocimiento emoliente de malvas. \mathfrak{J} x (300 gr.).
Miel,
Aceite comun, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{J} ij (60 gr.).

M. I. Se usa para humedecer los excrementos duros y secos, y en todas las enfermedades en que convenga mantener el vientre libre.

3554. L. EMOLIENTE Y LAXANTE (H. DE AL.).

\mathfrak{Z} Aceite de alm. dulces. \mathfrak{J} j (30 gr.).
Cogucho pardo. \mathfrak{J} j (30 gr.).
Cocimiento de cebada. $\mathfrak{Ib}\mathfrak{B}$ (250 gr.).

M. I. Gastro-entero-colitis con estreñimiento, gastralgia, gastritis, angina, aftas, esplenalgia, metritis, perineumonía, atrofia mesentérica, disenteria, enagenacion, apoplejía, plétora, cefalalgia, encefalitis, soitis, lumbago, tifo, convalecencias, anteverision, cálculos, denticion difícil, envenenamiento. *D.* Para una lavativa.

3555. L. ESTIMULANTE.

\mathfrak{Z} Sal comun. $\mathfrak{J}\mathfrak{B}$ á \mathfrak{J} j (15 á 30 gr.).
Infusion de arnica. \mathfrak{J} xij (375 gr.).

Disuélvase. *I.* Parálisis, apoplejía, y se usa como purgante.

3556. L. ESTIMULANTE (H. DE M.).

\mathfrak{Z} Agua tibia. \mathfrak{J} xij (375 gr.).
Aceite de ruda. $\mathfrak{J}\mathfrak{B}$ (45 gr.).
Vino emético turbio. \mathfrak{J} ij (60 gr.).

M. I. Apoplejía y conmociones cerebrales.

3557. L. EXCITANTE Y ANTISÉPTICA.

\mathfrak{Z} Cocimiento de quina,
Infusion de arnica, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. \mathfrak{J} ij (60 gr.).
Alcanfor diluido en una yema de huevo. \mathfrak{B} (2 gr.).

I. Parálisis, apoplejía, vértigos.
D. En dos medias lavativas.

3558. L. FEBRIFUGA (H. M.).

\mathfrak{Z} Cocimiento de quina. \mathfrak{J} xij (375 gr.).
Sulfato de quinina. \mathfrak{g} viiij (4 dec.).
Disuélvase. *I.* Calenturas intermitentes. *D.* Para dos lavativas.

3559. Otra, n. 2.

\mathfrak{Z} Sulfato de quinina. \mathfrak{g} xvj (8 dec.).
Láudano de Rousseau. 4 gotas.
Agua dest. de lechuga. \mathfrak{J} jv (125 gr.).
D. Para un cuarto de lavativa.

3560. Otra, n. 3.

\mathfrak{Z} Cocimiento de quina. $\mathfrak{Ib}\mathfrak{j}$ (500 gr.).
Alcanfor. \mathfrak{B} (2 gr.).
Se disuelve el alcanfor en una yema de huevo, y se añade el cocimiento de quina.

3561. L. FERRUGINOSA ASTRINGENTE (*Sundelin*).

\mathfrak{Z} Sum. de mil en rama. $\mathfrak{J}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
Agua hirviendo. \mathfrak{J} vj (180 gr.).
Se infunde durante quince á veinte minutos, se cuele con expresion y se añade S. A.

Tartrato de potasa y hierro. $\mathfrak{B}\mathfrak{B}$ (6 gr.).
Miel rosada. \mathfrak{J} j (30 gr.).

I. Procidencia del recto. *D.* En dos veces al dia.

3562. L. FÉTIDA (H. DE ING.).

\mathfrak{Z} Asa fétida. \mathfrak{J} ij (8 gr.).

Cocimiento de avena. . . ℥x (300 gr.).
Mézclese triturando.

I. Afecciones nerviosas ó histéricas, etc.

3563. L. GELATINOSA.

℥ Cola de Flandes. ℥℔ (45 gr.).
Agua comun. ℔bj (500 gr.).
Disuélvase en caliente.

3564. L. DE GOMA QUINO.

℥ Goma quino,
Raiz de granado,
Raiz de tormentila, añ. ℥℔ (45 gr.).
Cabezas de adormider. núm. 4.
Agua. ℥x (300 gr.).
I. Diarrea, disenteria, cólera, hemorragia uterina, melena. *D.* Para una lavativa.

3565. L. DE GRACIOLA.

℥ Graciola. ℥℔ (45 gr.).
Agua. ℥xiiij (400 gr.).
Se reduce un tercio por la coccion.

I. Procidencia del recto, hemorragia, delirio trémulo. *D.* Una lavativa para combatir el estreñimiento y destruir las ascárides.

3566. L. IODADA (Cottreau).

℥ Goma aráb. en polvo. ℥jv (46 gr.).
Agua comun. ℥vj (492 gr.).
Se disuelve y se añade al líquido
Tint. alcohol. de iodo. 5 gotas.

I. Amenorrea, dismenorrea, escrófulas y ciertas tisis. Se aumentará gradualmente la dosis de esta tintura, segun las indicaciones, hasta veinte gotas.

Nota. Debe retenerse esta lavativa el mayor tiempo posible.

3567. L. PROTOIODO FERRURADA.

℥ Solucion normal de protoioduro de hierro. . 45 á 50 got.
Solucion un poco viscosa de goma arábica. ℔bj (500 gr.).

D. En dos lavativas, mañana y noche.

3568. L. IRRITANTE DE TABACO (H. DE M.).

℥ Hoj. sec. de tabaco. ℥j (30 gr.).
Agua. ℥xxx (940 gr.).
Se infunden las hojas de tabaco y en el líquido se disuelve:
Tártaro emético. . . ℔℔ (6 dec.).

I. Asfixias y hernias estranguladas. *D.* Para tres enemas.

La LAVATIVA IRRITANTE DE LOS H. M. se prepara cociendo ℥j (30 gr.) de hojas de tabaco en ℔bj℔ (750 gr.) de agua comun; se cuele y se añade ℥ij (8 gr.) de trementina de Venecia incorporada con yema de huevo, y ℥ij (60 gr.) de cloruro de sodio. *D.* Para dos lavativas.

3569. L. IRRITANTE ANTIMONIADA.

℥ Vino antimonial. . . . ℥ij (60 gr.).
Hidroclorato de sosa. ℥℔ (45 gr.).
Cocimiento de sen. . ℥xij (375 gr.).
M. Apoplejía, afecciones comatosas. *D.* Para una lavativa.

3570. L. IRRITANTE DE VINO ANTIMONIADO (F. E.).

℥ Vino de óxido de antimonio. ℥jv (425 gr.).
Agua. ℔℔ (250 gr.).
Se mezcla para usarla en una sola dosis.

I. Se usa como derivativo en la apoplejía, epilepsia, letargo, etc.

3571. L. DE JABON (H. DE IT.).

℥ Jabon medicinal. . . . ℥j (4 gr.).
Miel. ℥vj (24 gr.).
Cocimiento de cebada. ℔℔ (250 gr.).
Disuélvase. *D.* Para una lavativa laxante.

3572. ENEMA JABONOSO (H. DE M.).

℥ Jabon. ℥vj (24 gr.).
Agua comun. ℔bj℔ (750 gr.).
Se disuelve en caliente.

I. Se usa como un débil estimulante. Esta lavativa es revulsiva y derivativa. *D.* Para dos lavativas.

3573. L. DE KOEMPF.

℞ Raíz de valeriana menor,
Raíz de rubia, ãã. . . ℥j (30 gr.).
Hojas de diente de leon,
Hojas de manzanilla,
Hojas de tanaceto, ãã. medio puñado.

I. Embarazos abdominales y convalecencia de las calenturas intermitentes.

3574. L. LAUDANIZADA.

℞ Láud. de Sydenham. ℥℞ (6 dec.).
Cocim. de malvabisco. ℔℞ (250 gr.).
A veces se añade ℥℞ (15 gr.) de almidon y se tiene la *lavativa de almidon laudanizada*, que se usa para combatir las diarreas.

D. Para dos ó tres lavativas, segun la indicacion.

3575. L. LAXANTE.

℞ Cocimiento de linaza,
ó Raíz de malvabisco. c. s.
Miel de mercurial,
ó Jarabe de espinó serbal,
Miel pura,
ó Aceite de ricino, ãã. ℥ij á ℥jv (60 á 120 gr.).
Mézclese.

3576. ENEMA LAXANTE (H. DE M.).

℞ Especies emolientes. . . ℥ij (60 gr.).
Sen. ℥℞ (15 gr.).
Sal de Glaubero. . . . ℥ij (8 gr.).
Se hierven las especies en c. s. de agua para obtener ℔j℞ (750 gr.) de cocimiento, se infunde en él las hojas de sen, se cucla y se disuelve el sulfato de sosa.

I. Estreñimiento pertinaz ó como derivativo. *D.* Para dos enemas.

3577. L. LAXANTE (H. M.).

℞ Cocim. de malvas. . ℔j℞ (750 gr.).
Sulfato de magnesia. ℥℞ (45 gr.).
Miel. ℥ij (60 gr.).
I. La misma que la anterior. *D.* Para dos lavativas.

3578. L. LAXANTE ANTIESPASMÓDICA ó Lavativa contra el estreñimiento (Lippich).

℞ Asa fétida. ℥iij (12 gr.).
Vinagre comun. . . . ℥j (32 gr.).
Miel. ℥ij (64 gr.).
Agua de cebada. . . . ℥x (320 gr.).
Yema de huevo. . . . c. s.

H. S. A. I. Estreñimiento nervioso. *D.* Para dos lavativas con una hora de intervalo.

3579. L. DE MANZANILLA.

℞ Manzanilla. ℥j (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℔j (500 gr.).
H. S. A. I. Cólicos nerviosos ó flatulentos.

3580. L. MERCURIAL (Kopp).

℞ Deutoclor. de merc. . . ℥¹/₄ (12 mil.).
Infusion de santónico. ℥j℞ (45 gr.).
Mucil. de goma aráb. ℥ij (8 gr.).
M. I. Se usa contra las ascárides de los niños de siete á ocho años.

3581. L. MOSCADA (H. M.).

℞ Inf. de manzanilla. . ℥xij (375 gr.).
Almizcle. ℥℞ (6 dec.).
I. Afecciones espasmódicas. *D.* Para dos lavativas.

3582. L. MUCILAGINOSA.

℞ Cocim. de malvabisco. ℔j (500 gr.).
Gelatina. ℥℞ (15 gr.).
Mucilago de goma. . . ℥ij℞ (10 gr.).
I. Diarrea crónica, disenteria, caquexia, esplenalgia, hepatitis, metritis crónica. *D.* Para una lavativa.

3583. L. NARCÓTICA.

℞ Cocimiento de yerbamora. . . . 400
Cocimiento de beleño. 400
Cocimiento de adormideras. . . 400
Cocimiento de estramonio. . . . 400
I. Esplenalgia, vólculo, catarro útero-vaginal, neumatosis, denticion difícil, metrorragia, metritis, nefritis, ovaritis, priapismo, hepatitis, histérico, perito-

nitis, disenteria, hernia. *D.* Para una ó dos medias lavativas.

3584. L. DE NUEZ DE AGALLA OPIADA (H. DE ING.).

℞ Cocimiento de nuez de agalla. ℔℔ (250 gr.).
Tintura de opio. ℥j (4 gr.).

M. I. Diarreas rebeldes, disenterias crónicas, procidencia del recto.

3585. L. NUTRITIVA.

℞ Caldo de carne. . . . ℔j (500 gr.).
Carne roja muy picada. ℥jv (125 gr.).
Yemas de huevo. . . número 2.
Para una ó dos lavativas.

3586. Otra, n. 2.

℞ Caldo de carne,
Leche, ãã. ℥iij (90 gr.).
Gelatina de asta de ciervo. ℥j (30 gr.).

M. Se procurará retenerla por algun tiempo, cuando nada se puede tragar.

3587. Otra (NASSE).

℞ Caldo del pucherø. . ℥xij (375 gr.).
Acido clorhídrico. . . c. s.

para agriar el caldo y suplir los flúidos necesarios para la digestion.

3588. L. DE CORNEZUELO DE CENTENO ó Lavativa obstétrica.

℞ Cornez. de centeno. ℥ij (8 gr.).
Agua. ℥xij (375 gr.).
Se hierve durante diez minutos y se cuela.

3589. L. CON OJIMIEL.

℞ Ojimiél simple. . . . ℥jv (125 gr.).
Agua. ℔j (500 gr.).
M. I. Se usa como atemperante y ligeramente laxante.

3590. L. OPIADA Y ALCANFORADA (Ricord).

℞ Alcanfor. ḡjx (50 cent.).

Extracto de opio. . . . ḡj (5 cent.).
Yema de huevo. . . . número 1.
Agua. ℥vj (200 gr.).
Disuélvase. *I.* Contra las erecciones, priapismo, vólculo, cardialgia, cólera, angina, histérico, nefritis. *D.* En dos medias lavativas.

3591. L. DE PARIETARIA.

℞ Hoja secas de parietaria. ℥j (4 gr.).
Agua. ℔ij (1000 gr.).
Se hierve, se cuela y se añade:
Nitro,
ó Acetato de potasa. . ℥j (4 gr.).
M. I. Hidropesías.

3592. L. DE PLENCK CONTRA LAS ASCÁRIDES.

℞ Acíbar. ℥ij (8 gr.).
Yema de huevo fresca. número 1.
Se trituran y se vierte poco á poco
Leche de vacas. ℥vj á ℥viii (180 á 250 gr.).
D. En una sola lavativa.

3593. L. PURGANTE.

℞ Tártaro emético. . . . ḡxx (1 gr.).
Solucion de goma arábica. ℔℔ (250 gr.).
Mézclese.

3594. Otra, n. 2.

℞ Sulfato de magnesia. ℥℔ (15 gr.).
Aceite de lino. ℥j℔ (45 gr.).
Cocim. de manzanilla. ℥vj (180 gr.).
Mézclese.

3595. L. PURGANTE ó Lavativa de sen compuesta.

℞ Hojas de sen,
Sulfato de sosa, ãã. . ℥℔ (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℔j (500 gr.).
Se infunde el sen en el agua durante una hora, se cuela y se añade el sulfato de sosa.

I. Estreñimiento pertinaz.

3596. L. PURGANTE.

℞ Sen. ʒij (8 gr.).
Cocimiento de linaza

hirviendo. lbj (1000 gr.).

Se infunde, se cuele y se añade:

Sulfato de sosa. . . . ʒʒ (15 gr.).

ó Sulfato de magnesia. ʒʒ (15 gr.).

M. I. Estreñimiento, embarazo de las primeras vias y envenenamiento, calenturas tifoidea, verminosa ó biliosa, síncope, tétanos, asma, destete, apoplejia, cefalalgia, denticion difícil, angina, plétora, convalecencia.

3597. Otra (H. M. F.).

℞ Sen. ʒʒ (16 gr.).

Sulfato de sosa. . . . ʒv (20 gr.).

Tártaro emético. . . . ʒjv (2 dec.).

Agua, c. s. para obtener. lbj (500 gr.).

Se infunde el sen durante un cuarto de hora, se cuele con expresion y se añade la sal y el emético.

3598. ENEMA PURGANTE (H. DE M.).

℞ Cocim. de manzanilla. lbjʒ (750 gr.).

Sulfato de magnesia. ʒj (30 gr.).

Disuélvase. D. Para dos enemas.

3599. L. PURGANTE EMETIZADA (Radius, Foy).

℞ Tártaro emético. . . . ʒxviiij (4 gr.).

Infusion de arnica. . . ʒvj (200 gr.).

Cocimiento de tabaco. lbj (500 gr.).

I. Apoplejia, síncope, tétanos, asfixia, afecciones soporosas, angina, cefalalgia, coriza, hernia, convalecencias. D. Para una lavativa.

3600. L. PURGANTE DE MAGNESIA.

℞ Infusion de sen. . . lbj (1000 gr.).

Sulfato de magnesia. ʒij (60 gr.).

Aceite de linaza. . . ʒjʒ (50 gr.).

I. Estreñimiento, ictericia, afecciones tifoideas, procidencia del recto, embarazo de las primeras vias, asma, denticion difícil, angina, laringitis, apoplejia, síncope, plétora, cefalalgia, encefalitis, convalecencias. D. Para dos lavativas.

3601. L. PURGANTE ó Lavativa de sen.

℞ Sen. ʒiij (12 gr.).

Agua. lbj (500 gr.).

Se hierve y se añade:

Miel de mercurial. . . ʒjv (125 gr.).

Disuélvase.

3602. L. PURGANTE SALINA.

℞ Sulfato de sosa. . . . ʒj (30 gr.).

Cocim. de malvabisco. lbj (500 gr.).

A veces se prescribe doble cantidad de la sal.

3603. L. DE QUINA.

℞ Quina amar. quebrant. ʒvj (24 gr.).

Se hierve durante media hora en c. s. de agua para obtener ocho onzas de líquido colado. Se añade:

Láudano de Sydenham. 12 gotas.

Se usa contra las fiebres intermitentes.

3604. Otra (H. DE LA CARIDAD).

℞ Quina. ʒj (30 gr.).

Agua. lbj (500 gr.).

I. Se usa como febrífugo y tónico cuando el estómago rehusa la ingestion de la quina, y como excitante y antipútrido en las calenturas tifoideas.

3605. L. DE QUINA ALCANFORADA ó Lavativa antiséptica.

℞ Quina roja. ʒjv (15 gr.).

Agua. lbj (500 gr.).

Se hierve ligeramente, se cuele y por otra parte se toma:

Alcanfor. ʒj (12 dec.).

Yema de huevo. número 1.

Se tritura el alcanfor en un mortero con algunas gotas de alcohol, se deslíe en la yema de huevo y se añade poco á poco el cocimiento de quina.

I. Calenturas adinámicas.

3606. L. REFRESCANTE.

℥ Cocimiento de semi-

llas de lino. ℥xij (375 gr.).

Ojimiél simple. ℥j (30 gr.).

Nitrato de potasa. ℥j (4 gr.).

M. Se usa en las flegmasias agudas de las vias urinarias.

3607. L. SEDANTE.

℥ Extr. acuoso de bellad. ℥ij (4 dec.).

Agua. ℥vj (200 gr.).

Disuélvase.

3608. L. SALINA.

℥ Cloruro de sodio. ℥j (30 gr.).

Cocimiento de lino. lbj (1000 gr.).

M. I. Es un laxante ligero. Se puede añadir ℥ij (8 gr.) de jabon.

3609. L. DE SIMIENTE DE LINAZA.

℥ Simiente de linaza. ℥β (15 gr.).

Se hierve durante quince minutos en c. s. de agua para obtener lbj (500 gr.) de líquido colado.

3610. L. DE SULFATO DE QUININA.

℥ Sulfato de quinina disuelto en algunas gotas de ácido sulfúrico alcoholizado. ℥vj á ℥xij (3 á 6 dec.).

Infus. de flor de tilo. ℥jv (125 gr.).

Extracto de opio. ℥²/₅ (2 cent.).

Para una lavativa que se debe retener.

3611. Otra, n. 2.

℥ Sulfato de quinina. ℥xviii (4 gr.).

Cocimiento de amapola

ó Adormideras. ℥v (150 gr.).

Acido sulfúrico alcoholizado, algunas gotas para disolver el sulfato de quinina.

Se retendrán estas lavativas el mayor tiempo posible.

3612. L. DE TABACO ESTIBIADA.

℥ Hojas de tabaco. ℥j (30 gr.).

Se hierve en

Agua. 2 cuart. (4 lit.).

Se cuela y se añade:

Tártaro emético. ℥xij (6 dec.).

I. Se usa como estimulante muy enérgico en la asfixia, etc., y se la ha aconsejado en las hidropeas pasivas del peritoneo.

3613. L. DE TABACO (Page).

℥ Hojas de tabaco. ℥β (2 gr.).

Agua hirviendo. ℥xij (375 gr.).

Se infunde durante media hora.

I. Se la ha elogiado como estimulante en las neumonías, cuando se agravan á pesar del tratamiento antiflogístico. También se puede usar para combatir el íleo, las hernias estranguladas y la constricción espasmódica. Se la ha alabado contra el tétanos y entonces se eleva la dosis hasta ℥Ljv ó ℥LXXij (3 á 4 gr.) para la misma cantidad de agua.

3614. L. DE TABACO Y CROTON (Moll).

℥ Hojas de tabaco. ℥j (4 gr.).

Agua hirviendo. ℥v (150 gr.).

Aceite de croton. 3 gotas.

Goma arábica. ℥ij (8 gr.).

H. S. A. Se usa en los casos desesperados de íleo.

3615. L. DE TANINO.

℥ Agua pura. lbj (500 gr.).

Tanino. ℥ij (8 gr.).

Disuélvase. *I.* Sirve para atenuar los efectos producidos por las lavativas de opio, adormideras y morfina, administradas á grandes dosis.

3616. L. TÓNICA Y EMOLIENTE.

℥ Quina roja quebrant. ℥ij (8 gr.).

Agua. lbj (500 gr.).

Se cuece ligeramente, se cuele y se suspende en el líquido un poco caliente :

Almidon. ʒij (8 gr.).

I. Diarreas, flujos atónicos, disenterias pútridas.

3617. L. DE TREMENTINA
(H. DE AL.).

ʒ Trementina. ʒj (4 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.

Se tritura y se añade :

Triaca. ʒʒ (15 gr.).

Se diluye todo en

Leche caliente. ʒjv (125 gr.).

Van Swieten usaba esta lavativa contra los cólicos y tenesmos que acompañan comunmente á la diarrea de los tísicos.

3618. ENEMA DE TREMENTINA
(H. DE M.).

ʒ Trementina. ʒiij (12 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 2.

Agua comun. ʒxij (375 gr.).

Sulfato de sosa. ʒiij (12 gr.).

Se agita la trementina con las yemas de huevo hasta que se mezclen bien, y se añade poco á poco el agua, en la que se habrá disuelto antes el sulfato de sosa.

3619. L. DE ESENCIA DE TREMENTINA.

ʒ Esencia de trementina. ʒj (30 gr.).

Yema de huevo. . . . número 1.

Cocimiento de sen. . . . ʒbj (500 gr.).

I. Tétanos, ceática.

3620. L. TREMENTINADA
(*Trousseau*).

ʒ Esencia de trementina. ʒj (30 gr.).

Yema de huevo. . . . número 1.

Agua. ʒbj (500 gr.).

M. S. A. Cross usa esta lavativa contra las ascárides vermiculares, y Recamier en las neuralgias lumbares, parálisis, etc.

3621. L. DE VALERIANATO DE QUININA.

ʒ Valerianato de quinina. ʒx (5 dec.).

Agua. ʒvj (200 gr.).
M. S. A.

3622. L. VERMÍFUGA.

ʒ Hiel de vaca.

Oleosácaro de ajén-

jo, ãã. ʒij (24 dec.).

Miel. ʒvʒ (22 gr.).

Infusion de ajenjos. . . ʒv (160 gr.).

I. Ascárides. *D.* Para dos lavativas.

3623. Otra, n. 2.

ʒ Santónico,

Valeriana, ãã. ʒʒ (15 gr.).

Agua hirviendo. . . . ʒbʒ (250 gr.).

Se infunde y se añade :

Asa fétida tritur. con

una yema de huevo. ʒxc (5 gr.).

I. Afecciones verminosas, lombrices, ascárides. *D.* Para una lavativa.

3624. Otra (RASPAIL).

ʒ Agua. ʒbj (1000 gr.).

Acibar,

Tabaco,

Asa fétida, ãã. ʒiij (15 cent.).

Accite alcanforado. . . ʒijʒ (10 gr.).

3625. ENEMA VERMÍFUGO
(H. DE M.).

ʒ Agua comun. ʒxij (375 gr.).

Hollin. ʒʒ (15 gr.).

Se infunde el hollin y se cuele.

3626. L. VERMÍFUGA TREMENTINADA.

ʒ Asa fétida,

Tanaceto,

Santónico, ãã. ʒxc (5 gr.).

Trementina. ʒʒ (2 gr.).

Agua. c. s.

I. Afecciones verminosas, hemacelinosis, neuralgias, lumbago. *D.* Para dos lavativas.

3627. L. DE VINAGRE (H. M.).

ʒ Vinagre. ʒj (4 gr.).

Agua. ʒvj (180 gr.).

M. I. Afecciones tifoideas, etc.

3628. L. VISCERAL (*Koempf*).

℥ Raiz de valeriana,
 Raiz de diente de leon,
 Raiz de saponaria,
 Salvado, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Centaura menor,
 Marrubio blanco.
 Cardo santo, ãã. ℥j (30 gr.).
 Flores de gordolobo,
 Flores de manzanilla,
 Flores de arnica,
 Meliloto, ãã. ℥ß (15 gr.).
 Agua. ℥xxxvß (800 gr.)
 que se reduce por la coccion á
 lbj (500 gr.).

I. Atrofia mesentérica, infartos de las vísceras abdominales, afatas, angina, esplenitis, hepatitis.
D. Para dos lavativas. V. n. 3573.

3629. Otra (*BERENDS*).

℥ Diente de leon. ℥iij (90 gr.).
 Salvado. ℥j (30 gr.).
 Agua. lbj (500 gr.).
 Se reduce á lbß (250 gr.) por la coccion y se añade al fin :
 Manzanilla,
 Valeriana, ãã. 5ij (8 gr.).
I. Obstrucciones del bajo vientre. *D.* Para dos lavativas.

LAVATORIOS.

3630. LAVATORIO ANODINO (H. DE M.).

℥ Cabezas de adormider. blancas. ℥ß (15 gr.).
 Raiz de malvab. ℥ij (60 gr.).
 Agua. ℥xxxvj (1125 gr.).
 Se cuece hasta que quede en lbjß (750 gr.), se cuele y se añade :
 Extracto de opio. ʒij (1 dec.).

3631. L. ANTIESCORBÚTICO ACIDULADO (H. DE M.).

℥ Cocimiento de cebada. lbjß (750 gr.).
 Alcohol de coclearia,
 Acido sulfúrico diluido, ãã. 5ß (2 gr.).
 Miel rosada. ℥j (30 gr.).
 Mézclese.

3632. L. ANTIESCORBÚTICO QUINADO (H. DE M.).

℥ Escordio,
 Quina calisaya, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Agua. ℥xxviii (875 gr.).
 Se hierva levemente, se cuele y se añade despues de frio :
 Alcohol muriático
 etéreo. 5ij (8 gr.).
 Alcohol de coclear. ℥ß (15 gr.).
 Jarabe de vinagre. ℥ij (60 gr.).

3633. L. ASTRINGENTE (H. DE M.).

℥ Hojas de arrayan.
 Hojas de salvia, ãã. ℥j (30 gr.).
 Se infunde en ℥xxviii (875 gr.) de agua, se cuele y se añade :
 Alumbre. 5j (4 gr.).
 Ojimiél simple. ℥j (30 gr.).
I. Reblandecimiento de las encías y laxitud de la membrana mucosa de la garganta.

LECHES.

3634. LECHE DE ALMENDRAS AMARGAS (*Trousseau*).

℥ Almendras dulces,
 Almendras amargas, ãã. 5j á 5jß (4 á 6 gr.).
 Agua comun. lbj 500 gr.).

Azúcar. ℥ij (60 gr.).
H. S. A. D. A medios cortadillos en las veinticuatro horas.
 Es muy sencilla, poco costosa y la mas segura de todas las preparaciones de las almendras amargas.

3635. L. ALUMINOSA.

℥ Alumbre. ℥ij (8 gr.).
 Leche hirviendo. . . . ℔bj (500 gr.).
 Disuélvase. *I.* Diarreas crónicas,
 hemorragias pasivas.

3636. L. AMONIACAL.

℥ Goma amoniaco. . . . ℥xij (6 dec.).
 Ojimieli escilitico. . . . ℥j (30 gr.).
 Se tritura en un mortero de por-
 celana y se añade poco á poco :

Infusion de hisopo. . . ℥jv (125 gr.).

Se cuele por una manga.

I. Catarros pulmonares rebel-
 des con expectoracion abundante
 y dificil. *D.* Una cucharada cada
 dos horas.

3637. Otra, n. 2.

℥ Leche. , 20 á 30
 Amoniaco. 4

M. Se usa como emenagoga en
 inyecciones en la vagina.

3638. Otra, n. 3.

℥ Goma amoniaco. . . . ℥j (4 gr.).
 Agua. ℔bj (500 gr.).
 Tritúrese. Conviene añadir un
 poco de goma ó yema de huevo
 para que no se precipite la resina.

3639. L. ANALÉPTICA DE MUSGO DE IRLANDA.

℥ Musgo de Irlanda. . . . ℥xc (5 gr.).
 Leche de vacas. ℔bj (500 gr.).

Se cuece durante diez minutos y
 se añade :

Agua de flores de nar. ℥j (30 gr.).

Canela. ℥xviii (4 gr.).

Azúcar. ℥j (30 gr.).

I. Convalecencia de las flegma-
 sias agudas, marasmo. *D.* Media
 taza.

**3640. L. ARTIFICIAL
(Rosenstein).**

℥ Almendras dulces. . . número 12.
 Se vierte poco á poco sobre ellas
 despachurrándolas:
 Agua hirviendo. . . . ℥jv (125 gr.).

Se echa encima :

Leche. ℥vj (200 gr.).

Azúcar. ℥j (4 gr.).

I. Sirve para alimentar á los ni-
 ños que no pueden mamar, y en
 las convalecencias. *D.* Se da ade-
 más dos cucharadas de caldo li-
 gero, tres veces al dia, como ali-
 mento.

3641. L. ARTIFICIAL PARA LOS NIÑOS.

℥ Carbonato de potasa. . . ℥j (12 dec.).

Agua de tilo. ℥ij (60 gr.).

Agua de cerezas negras,

Aceite de almendras

dulces, añ. ℥j (30 gr.).

Yema de huevo. número 3.

Mucil. de goma aráb. ℥xc (5 gr.).

I. Destete prematuro de los ni-
 ños, convalecencias, marasmo.
D. Como alimento.

3642. L. DE BURRA, ARTIFICIAL.

℥ Caracoles. número 6.

Cuerno de ciervo,

Cebada perlada,

Raiz de cardo corre-

dor, añ. ℥iij (12 gr.).

Agua. ℔bjβ (750 gr.).

Se reduce á la mitad por la ebu-
 llicion y se añade :

Jarabe de culantrillo. ℥j (30 gr.).

I. Marasmo, tisis, fetidez del
 aliento. *D.* A medias tazas.

3643. L. FABRICADA AL INSTANTE.

Se evapora á fuego lento la leche
 fresca de vacas hasta que se re-
 duzca á polvo fino, que se guarda
 en vasijas bien tapadas. Para ob-
 tener una taza de leche ó cual-
 quier cantidad de este líquido, se
 le mezcla ó disuelve en un poco
 de agua. Así puede durar la leche
 mucho tiempo.

**3644. L. DE ASA FÉTIDA ó Emul-
sion de asa fétida.**

℥ Asa fétida. ℥j (4 gr.).

Agua. ℔bj (500 gr.).

- ó Asa fétida. ʒj (4 gr.).
 Agua de menta. ʒvj (180 gr.).

3645. L. COSMÉTICA
 (F. CADET G.).

- ʒ Agua destil. de rosas. lbʒ (250 gr.).
 Tintura de benjui,
 Tintura de bálsamo
 de la Meca, ãã. . . ʒʒ (2 gr.).
M. D. Una á dos lociones al día.

3646. L. DE MAGNESIA (Mialthe).

- Magnesia calcinada oficial. . . . 400
 Agua pura. 800
 Agua de flores de naranjo. . . . 400

Se tritura la magnesia con el agua y se calienta la mezcla hasta la ebullicion, como se dirá en la preparacion de la medicina de magnesia, se cuela y se añade el agua aromática. Cada cucharada contiene ʒʒ (2 gr.) de óxido.

El autor recomienda que se cuele por una estameña; pero procediendo de esta manera queda sobre la tela toda la materia, por lo que es mejor colarla por un cedazo muy fino.

I. Absorvente y antiácida. *D.* Una cucharada de café por la mañana en ayunas, y una cucharada grande en la diabetes.

3647. L. MERCURIAL DE PLENCK.

- ʒ Mercurio. ʒj (4 gr.).
 Goma arábica. ʒʒ (15 gr.).
 Jarabe diacodion. . . c. s.

Se tritura hasta que se extinga perfectamente el metal y se añade poco á poco:

- Leche de vacas hirv. lbʒ (250 gr.).

I. Oftalmia gonorréica, úlceras sifiliticas, en lociones; úlceras del miembro, en baños; angina venérea, en gargarismo.

3648. L. NITRADA, SODATADA Ó CON VAINILLA.

- ʒ Nitro. ʒxxxij (16 dec.).
 ó Bicarbonato de sosa. ʒxxxij (16 dec.).
 ó Sacarolado de vain. ʒʒ (15 gr.).
 Leche. lbij (1000 gr.).

3649. L. DE PLOMO.

- ʒ Sal comun. ʒ
 Se disuelve en la menor cantidad posible de agua y se añade poco á poco:
 Extracto de Saturno. ʒ
 Se recoge el precipitado y despues de bien lavado se le mezcla con
 Emulsion comun. ʒʒ
I. Es cosmético.

3650. L. DE POLLO.

Es una crema que se compone de yema de huevo, agua caliente, azúcar y agua de flor de naranjo, batido todo junto.

3651. L. PURGANTE (Planche).

- ʒ Resina de escamonea. ʒviiij (4 dec.).
 Azúcar blanca. ʒij (8 gr.).
 Se trituran las dos sustancias y se les añade poco á poco:
 Leche pura. ʒiij (90 gr.).
 Agua de laurel real. 3 á 4 gotas.
 Se da de una vez á un adulto.
 Es una medicina muy agradable y el mejor modo de administrar la escamonea.

3652. L. TREMENTINADA.

- ʒ Trementina. ʒjʒ (45 gr.).
 Se la lava dos ó tres veces en aguardiente hasta que blanquee, se mezcla exactamente con una yema de huevo y se añade poco á poco:
 Agua destilada de parietaria. ʒxij (375 gr.).
 Se tritura hasta que la mezcla tome un color de leche.
I. Afecciones de las vias urinarias. *D.* ʒʒ á ʒj (15 á 30 gr.) en un vaso de agua.

3653. L. VIRGINAL ó Agua cosmética.

- ʒ Tintura de benjui. . . ʒj (4 gr.).
 Agua de rosas,
 ó Agua de meliloto. . . lbj (500 gr.).
M. Se usa como cosmético.

3654. L. VIRGINAL.

- ʒ Almendras amargas. . . ʒij (8 gr.).
 Almendras dulces. . . . ʒj (30 gr.).
 Agua de rosas. ʒv (150 gr.).
 Flores de benjuí. . . . ʒj (12 dec.).
 Hágase emulsion S. A.

3655. L. VIRGINAL MINERAL.

- ʒ Litargirio en polvo. ʒvj (180 gr.).

Vinagre destilado. : ʒxviii (560 gr.).
 Se cuece hasta que se consuma
 la tercera parte del líquido, se
 cuele y se añade:
 Alumbre. ʒjv (125 gr.).
 disuelto en
 Agua. lbjß (750 gr.).
 y se conserva el licor lactescente
 que resulta de la mezcla.

I. Es un cosmético peligroso de
 usar.

LEJÍAS.

3656. LEJÍA LITONTRIPTICA
(Saunders).

- ʒ Agua hirviendo. . . 8 quart. (4 lit.).
 Conchas de ostras
 calcinadas. . . . lbjß (750 gr.).
 Potasa recién cal-
 cinada. lbß (250 gr.).

Se mezcla y se filtra después de
 un día de reposo.

D. ʒij á ʒiij (8 á 12 gr.) al día
 en tres tomas, en una infusión de
 semillas de lino, á la cual se añade:

Magnesia calcinada. ʒxv (75 cent.).

LICORES.

3657. LICOR ACÉTICO DE OPIO.

- ʒ Opio en bruto. 63
 Acido acético concentrado. . . . 29
 Agua destilada. 263

Se filtra después de haberle te-
 nido cuatro días en maceración.

Cuatro gotas de esta tintura re-
 presentan ʒj (5 cent.) de opio.

I. Calma los movimientos y los
 dolores espasmódicos. D. Dos á
 ocho gotas en una pocion.

3658. L. ÁCIDO DE HALLER
(F. A.).

- ʒ Alcohol,
 Acido sulf. concentrado, añ. . p. ig.
 Se mezclan con cuidado en una
 vasija de vidrio, echando sucesi-
 vamente el ácido en el alcohol, y
 se le conserva en una botella de
 vidrio bien tapada. V. n. 1622.

D. Diez á treinta gotas.

3659. L. ACÉTICO DE MORFINA
(Dunghlisson).

- ʒ Acetato de morfina. . ʒxvj (8 dec.).
 Vinagre. ʒij (8 gr.).
 Agua destilada. . . . ʒvj (24 gr.).
 Disuélvase. Se dan seis á veinti-
 cuatro gotas al día como calmante.

3660. L. ALCANFORADO.

- ʒ Nitrato de potasa. : ʒv (20 gr.).
 Agua pura. lbiiij (1500 gr.).
 Se disuelve y se añade:

Alcohol rectificado
 alcanforado. . . . ʒj (30 gr.).

Se agita durante algun tiempo y
 se filtra.

D. Seis á veinticuatro gotas en
 un vaso de tisana.

3661. L. ALUMINOSO COMPUESTO.

- ʒ Alumbre,
 Sulfato de zine, añ. ʒj (4 gr.).
 Agua hirviendo. . . lbß (250 gr.).
 Se disuelve y se filtra.

I. Se usa en inyecciones en las blenorragias crónicas, leucorreas, oftalmias rebeldes, etc. Se usa comunmente con el agua de rosas en la proporcion siguiente:

Licor aluminoso com-
 puesto. ℥℔ (45 gr.).
 Agua de rosas. ℥viij℔ (233 gr.).

3662 L. AMONIACAL ANISADO
 (F. BR.).

℥ Alcohol. 400
 Amoniac liquido. 400
 Aceite volátil de anís. 20

M. S. A. I. Enfermedades por gran debilidad y sin inflamacion, asma espasmódico. *D.* Diez gotas cuatro veces al dia para los adultos, y cinco gotas mañana y tarde para los niños.

Nota. Debe darse este licor en un vehiculo apropiado.

3663. L. AMONIACAL BENZÓICO.

℥ Solucion de amoniaco cáustico concentrada, c. s. q.

Se tritura en caliente con el ácido benzóico y se filtra el licor.

I. Catarro crónico, asma de los ancianos. Esta preparacion es digna de fijar la atencion de los médicos.

3664. L. AMONIACAL ESTIBIADO.

℥ Linimento estomacal. ℥ij (8 gr.).
 Tártaro emético. ℥xxvij (4 gr.).
 Trementina. ℥j (4 gr.).

M. I. Reumatismo, lumbago, ceática. *D.* En fricciones.

3665. Otro, n. 2.

℥ Succinato de amoniaco liquido. 2
 Extracto de regaliz. 2
 Láudano liquido de Sydenham. 4
 Vino antimonial. 4

I. Coqueluche. *D.* Veinte á cuarenta gotas cada dos horas.

3666. L. ANODINO (*Triller*).

℥ Espíritu de sal amoniaco,
 Agua de Anhalt,
 Esencia de azafran,
 Esencia de castoreo, ãã. ℥ij (8 gr.).
 Esencia de nuez mose. 30 gotas.

M. I. Dolores reumáticos inveterados. *D.* En fomentos calientes.

3667. L. ANTICANCEROSO
 (*Kapeler*).

℥ Oxido blanco de arsénico. ℥j (5 cent.).
 Agua destilada. ℔j (500 gr.).
 Disuélvase. *D.* Una gota al dia, aumentando progresivamente hasta una cucharada de café mañana y noche.

3668. L. ANTIDIARRÉICO
 (*William Kerr*).

℥ Alambre de hierro cortado en pedacitos ó limaduras de hierro, ℥j℔ (45 gr.).

Acido nítrico. ℥iij (90 gr.).
 Agua comun. ℥xxvij (840 gr.).
 Acido clorhídrico. ℥j (4 gr.).

Se colocan en una vasija de barro los pedazos de hierro, y se vierte encima el ácido nítrico diluido antes en ℥xv (470 gr.) de agua. Se deja obrar el ácido hasta que se disuelva completamente el metal, se filtra el liquido y se le añade el resto del agua y del ácido clorhídrico de suerte que todo forme ℥xxx (940 gr.) de licor.

Nota. Este producto, que no es mas que sesqui-nitrato de peróxido de hierro, es de color rojo oscuro cuando se le interpone entre el ojo y la luz, y de color negro cuando se le ve á la luz reflejada. Su sabor es muy astringente, pero no cáustico.

I. Este remedio produce muy buenos efectos en las afecciones de la membrana mucosa intestinal, sobre todo en las diarreas crónicas en que el opio no ha sido suficiente; lejos de producir malos accidentes, parece segun Kerr que disminuye la irritabilidad y la sensibilidad de los intestinos. Sin embargo no produce buenos efectos en las disenterias ni en las afecciones diarréicas tifoideas. Se le ha recomendado además en el priapismo, eczema, lupus, lí-

quen, impétigo, lepra y herpes. *D.* Diez á veinte gotas en una infusion apropiada ó en una pocion astringente. A los niños ocho ó diez gotas en lavativas astringentes.

3669. L. ANTIEPILEPTICO.

℞ Nitrato de plata. ḡxjv (7 dec.).
Agua destilada. ḡj (30 gr.).

Disuélvase. *D.* Veinte gotas mañana y noche.

3670. L. ANTIESCROFULOSO
(*Hufeland*).

℞ Cloruro de bario. ḡij (40 cent.).
Agua destilada. ḡj (30 gr.).

Disuélvase. *I.* Escrófulas, para lavar las úlceras escrofulosas y atónicas y para tocar las aftas. *D.* Cinco á veinte gotas, tres veces al dia, á los niños hasta tres años; diez á treinta gotas á mayor edad, y cincuenta á sesenta gotas á los adultos.

3671. L. ANTIESPASMÓDICO
(*Grimaud*).

℞ Licor de cuerno de ciervo sucinado. ḡj (30 gr.).
Licor anodino mineral de Hoffmann. ḡj (30 gr.).
Esencia de manzanilla. ḡj (4 gr.).

I. Esta mistura es antiespasmódica y calmante y se usa en las afecciones nerviosas. *D.* Veinte á treinta gotas en una taza de infusion de amapola fria, que se toma por la noche al acostarse.

3672. Otro (PIERQUIN).

℞ Licor mineral de Hoffmann. ḡij (8 gr.).
Acido prúsico medicinal. 15 gotas.

Jarabe de malvabisco. ḡiij (90 gr.).
Se menea la mezcla al tiempo de usarla.

I. Afecciones nerviosas de pecho ó síntomas nerviosos en las enfermedades inflamatorias de esta misma cavidad, dispepsia, tos hética, tisis, palpitaciones, as-

ma, coqueluche. *D.* Una cucharada de café de dos en dos horas.

3673. L. ANTINEFRÍTICO (*Adams*).

℞ Agua comun. ḡbij (1000 gr.).
Cabezas de adorm. ḡvj (180 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á la cuarta parte, se exprime fuertemente y se añade al líquido colado:

Nitrato de potasa. ḡj (30 gr.).

I. Afecciones dolorosas de las vias urinarias, cálculos, catarros de la vejiga, etc. *D.* ḡij (8 gr.) mañana y tarde en un vaso de cocimiento tibio de semilla de lino ó de raiz de malvabisco.

3674. L. ANTIERETÉRICO
(*Hufeland*).

℞ Agua de laurel real,
Agua de Goulard, añ. ḡij (60 gr.).
Agua de rosas. ḡiij (90 gr.).

M. I. Calmante de los dolores locales, neuralgias antiguas, principalmente la neuralgia facial.

3675. L. ANTIHERPÉTICO.

℞ Flores de azufre. 4
Aceite comun. 4
Alcohol. 4
Acido clorhídrico. 4

M. I. Afecciones herpéticas. *D.* ḡj, ḡij ó ḡiij (30, 60 ó 90 gr.) en untura.

Se aumenta ó disminuye su actividad, dilatándole en mayor ó menor cantidad de infusion acuosa de flores de saúco.

A estas fricciones se añaden las pildoras de Belloste, las bebidas amargas, la de fumaria, escabiosa, etc. y un régimen alimenticio no salado ni ácido.

3676. L. ANTINEURÁLGICO
(*Battley*).

Se prepara por digestion una solucion acuosa concentrada de quina calisaya, y se evapora á una temperatura de 50° hasta la consistencia de jarabe. Este licor se conserva bien; y para que no

se altere se le puede añadir \tilde{g}^{ij} (1 cent.) de éter sulfúrico.

I. Neuralgias rebeldes. *D.* Diez á veinte gotas y aun mas, tres veces al día. El doctor Robert prefiere este licor al sulfato de quinina.

3677. L. ANTISIFILÍTICO
(*Chaussier*).

\mathcal{Z} Cianuro de mercurio. \tilde{g}^{ij} (5 cent.).
Agua destilada. $\tilde{\text{ij}}$ (60 gr.).

Disuélvase *I.* Enfermedades venéreas rebeldes, y herpes escamosos húmedos acompañados de prurito violento. *D.* $\tilde{\text{ijv}}$ á $\tilde{\text{ij}}$ (15 á 30 gr.) al día en muchas tomas, como el licor de Van Swieten.

3678. L. ANTIVENÉREO (*Richard de Autensierk*).

\mathcal{Z} Sublimado corrosivo. $\mathcal{D}\mathcal{B}$ (6 dec.).
Alcanfor. \tilde{g}^{ijv} (2 dec.).

Se tritura en un mortero de mármol, y se disuelve poco á poco:

Aguardiente. $\tilde{\text{ij}}$ (1000 gr.).

Al fin se añade:

Jarabe de amapolas. $\tilde{\text{ij}}$ (30 gr.).

Se conserva en una botella.

D. Una á dos cucharadas mañana y noche en $\tilde{\text{ij}}$ (250 gr.) de tisana pectoral ó leche de vacas.

3679. Otro (SPANGENBERG).

\mathcal{Z} Sublimado corrosivo. \tilde{g}^{ij} (1 dec.).
Tintura de opio. $\tilde{\text{ij}}$ (4 gr.).
Agua de rosas. $\tilde{\text{ijv}}$ (125 gr.).

Se lava el glande y el miembro despues de un coito sospechoso. Se tiene cuidado de dejar algunas gotitas entre el prepucio y el glande y hacer inyecciones con agua blanca.

3680. L. ARSENICAL (*Bielt*).

\mathcal{Z} Arseniato de amoniac. \tilde{g}^{ijv} (2 dec.).
Agua destilada. $\tilde{\text{ijv}}$ (125 gr.).

D. Se usa á la dosis de doce gotas hasta $\tilde{\text{ij}}$ (4 gr.) y aun mas en la mayor parte de las enfermedades crónicas de la piel, en el eczema, impétigo, liquen, etc.; pero principalmente en las afeccio-

nes escamosas, en la lepra y en la soriasis.

3681. L. ARSENICAL DE FOWLER
ó *Arsenito de potasa* (F. F. Y F. P.).

\mathcal{Z} Acido arsenioso,
Carbon. de potasa, $\tilde{\text{aa}}$. \tilde{g}^{xc} (5 gr.).
Agua destilada. $\tilde{\text{ij}}$ (500 gr.).
Alcohol de melisa compuesto. $\tilde{\text{ij}}$ (16 gr.).

Se reduce á polvo el ácido arsenioso, se le mezcla con el carbonato de potasa y se hierve en una vasija de vidrio hasta que se haya disuelto enteramente el ácido arsenioso. Cuando esté frio se añade al líquido el alcohol de melisa, se filtra y se echa c. s. de agua hasta que represente $\tilde{\text{ij}}$ (500 gr.). De este modo se obtendrá un licor que contendrá una centésima parte de su peso de ácido arsenioso.

I. y *D.* V. t. I, pág. 100.

El LICOR ARSENICAL DE FOWLER DE LOS H. DE M. tiene la misma composicion.

3682. L. ARSENICAL (*Bishop*).

\mathcal{Z} Arseniato de potasa líquido,
Licor de potasa, $\tilde{\text{aa}}$ $\tilde{\text{ij}}$ (4 gr.).
Cocim. de zarzapar. $\tilde{\text{xiij}}$ (375 gr.).
Mézclese.

3683. L. ARSENICAL DE DEVERGIE.

\mathcal{Z} Acido arsenioso. \tilde{g}^{ij} (10 cent.).
Carbonato de potasa. \tilde{g}^{ij} (10 cent.).
Agua destilada. $\tilde{\text{ij}}$ (500 gr.).
Alcohol de melisa
compuesto. \tilde{g}^{jx} (50 cent.).
Tintura de cochinilla. c. s.

para darle color.

Veinte granos (1 gr.) de esta solucion representan $\frac{1}{5000}$ ó $\frac{2}{10000}$ de ácido arsenioso; mientras que en el de Fowler se encuentra $\frac{1}{500}$ de grano por 20 granos de licor.

El autor recomienda darle mucho color para que se pueda reconocer fácilmente su presencia en un julepe.

3684. L. ARSENICAL DE HEINECKE.

\mathcal{Z} Arseniato de sosa. \tilde{g}^{ij} (1 dec.).

Agua de menta piperita. ℥vj (25 gr.).
Se añade á la solución:
Agua de canela. ℥xc (5 gr.).
Tintura de opio. ℥xviiij (4 gr.).
I. Afecciones cutáneas, calenturas intermitentes. *D.* ℥xviiij á ℥xxxvj (9 á 18 dec.) dos veces al día.

3685. L. ARSENICAL DE HEIM ó Solucion de Heim.

℥ Arsénico blanco,
Carbon. de potasa, ãã. ℥j (4 gr.).
Agua destilada. ℥vj (192 gr.).
Se disuelve por medio de la ebullicion y se añade al licor enfriado:
Espíritu de angélica compuesto. ℥j (32 gr.).
Agua destilada. c. s.
para obtener ℥xviiij (564 gr.) de líquido.

D. Cuatro á ocho gotas en agua.

3686. L. ARSENICAL DE PEARSON ó Arseniato de sosa líquido (F. F.).

℥ Arseniato de sosa cristalizado. ℥j (5 cent.).
Agua destilada. ℥j (32 gr.).
Se disuelve el arseniato en el agua y se filtra.

I. Calenturas intermitentes, jaquecas periódicas y afecciones cutáneas. Es un remedio muy venenoso, por lo cual se le debe prescribir con circunspeccion.

D. De veinte á sesenta gotas en un líquido mucilaginoso.

3687. L. CALMANTE DE CHAUS-SIER.

℥ Opio escogido. ℥j (30 gr.).
Agua destilada. lb℥ (250 gr.).
Se divide el opio, se deja con el agua en maceracion por dos ó tres dias, agitando de cuando en cuando, se filtra y se guarda en frascos bien tapados. Cuando se haya de conservar mas de un mes se le añade ℥℥ (15 gr.) de alcohol de 36°. *D.* Ocho á veinticuatro gotas.

3688. L. DE CANELA.

℥ Canela de Ceylan. 100

Aguardiente bueno. 1000
Se macera durante ocho dias, se destila en el baño maria y se añade:

Jarabe simple blanco. 1000

M. Es muy útil para reanimar las fuerzas abatidas. *D.* ℥℥ á ℥iiij (15 á 90 gr.).

Se pueden preparar del mismo modo otras preparaciones análogas con sustancias aromáticas.

3689. L. DE CARBONATO DE POTASA.

℥ Carbonato de potasa. 4
Agua destilada. 4
Disuélvase. *I.* Absorbente, estimulante y diurético. *D.* ℥j (4 gr.) en un vehículo apropiado.

3690. L. CATERÉTICO (Schmalz).

℥ Sulfato de cobre,
Sulfato de zinc,
Verde gris, ãã. ℥ij (8 gr.).
Agua hirviendo. lb℥ (250 gr.).
M. I. Se usa para reprimir las fungosidades de las úlceras y contra las fistulas.

3691. L. CAUSTICO (Freyberg).

℥ Bicloruro de mercurio. ℥℥ (2 gr.).
Acanfor. ℥j (4 gr.).
Alcohol rectificado. ℥j (32 gr.).
Disuélvase. *I.* Grietas y vegetaciones sifilíticas. *D.* Una aplicacion cada tres ó cuatro dias.

3692. L. CÁUSTICO (Plenck).

℥ Deutocloruro de mercurio. 8
Sulfato acido de alúmina. 8
Acanfor. 4
Subcarbonato de plomo. 4
Se trituran estas sustancias en
Alcohol rectificado. 96
Vinagre. 96
I. Escrescencias sifilíticas. *D.* Se aplica por medio de un pincel c. s. de este licor, que se agita siempre que se usa.

3693. L. CÍTRICO DE MORFINA ó Licor del doctor Porter.

℥ Opio. ℥jv (125 gr.).

Acido cítrico. ℥ij (60 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℔ij (4000 gr.).
 Se digiere durante veinticuatro horas y se filtra.

I. Se usa para reemplazar las gotas negras. *D.* Seis á veinticuatro gotas al dia.

3694. L. DE CLORURO DE PLATA AMONIACAL.

℥ Piedra infernal. ℥x (5 dec.).
 Agua destilada. ℥ij (64 gr.).
 Se disuelve, se filtra y se echa en el líquido :

Licor de muriato de sosa. c. s.
 para obtener un precipitado, el cual se disolvera en el momento en

Licor de amoniaco cáustico. ℥jβ (48 gr.).
 Se añade:

Acido clorhídrico. . . . ℥ij (8 gr.)
 ó c. s. para evitar que se precipite el cloruro de plata y permanezca en estado de solución, y que dé un líquido que pese ℥ijβ (75 gr.).

3695. L. CONTRA LAS AFTAS (Swediaur).

℥ Borax en polvo. ℥ij (8 gr.).
 Agua destilada de rosas. ℥j (30 gr.).
 Miel rosada. ℥ij (60 gr.).
 Tintura de mirra. . . . ℥j (30 gr.).

M. S. A. D. Se tocan las aftas muchas veces al dia con un pincel empapado en este licor.

3696. L. CONTRA LA EPISTAXIS (Swediaur).

℥ Alumbre. ℥β (2 gr.).
 Bol arménico. ℥vj (24 gr.).
 Vinagre,
 Vino tinto, ãã. ℥jv (46 gr.).

M. S. A. I. Se le ha propuesto para detener la hemorragia nasal.

3697. L. CONTRA EL VÓMITO DE LAS PREÑADAS (Pigeaux).

℥ Alcohol. ℥iij (90 gr.).

Agua destilada de laurel real. ℥ij (8 gr.).
 Agua pura. ℥jv (120 gr.).
 Azúcar. ℥ij (60 gr.).

Si los vómitos se presentan por la mañana en ayunas, se hace tomar uno ó dos pedazos de pan empapados en este licor; pero si acaecen despues de comer, se da una cucharada de este remedio, que es muy agradable, y puede aumentarse la dosis hasta una copa.

3698. L. CORDIAL (Brodun).

℥ Tintura de genciana
 Tintura de cardamomo,
 Tintura de quina,
 Tintura de colombo,
 Alcoholato de espliego compuesto,
 Vino marcial, ãã. . . . ℥jv (125 gr.).

I. Clorosis, escrófulas, escorbuto. *D.* ℥ij á ℥v (8 á 20 gr.).

3699. Otro (WARGNER).

℥ Ruibarbo. ℥ij (60 gr.).
 Sen. ℥β (15 gr.).
 Azafran. ℥j (4 gr.).
 Regaliz. ℥β (15 gr.).
 Pasas. ℔ij (500 gr.).
 Alcohol de 24°. . . ℔iij (1500 gr.).

Se digiere durante quince dias y se filtra.

I. Es estomacal. *D.* ℥j (30 gr.) como purgante.

3700. L. DE CUERNO DE CIERVO SUCINADO ó Sucinato de amoniaco impuro.

℥ Espiritu volátil de cuerno de ciervo. c. s. q.
 Acido succínico medicinal. . . c. s.

Se añade bastante ácido succínico para saturar el amoniaco del licor de cuerno de ciervo. Se separa una parte de aceite empireumático, que se aparta por medio de un filtro. *V. t. I,* pág. 87.

3701. L. DEPURATIVO (François).

℥ Zarzaparrilla roja. . ℥vj (180 gr.).
 Se vierte encima:
 Aguardiente de 22°. ℔ij (500 gr.).

Se infunden durante cuarenta y ocho horas:

Guayaco,
Dulcamara,
China, ãã. ℥j (30 gr.).

Se vierte encima:

Agua. lbij (1000 gr.).

Se macera durante cuarenta y ocho horas; se decanta la infusion espirituosa y se la pone aparte; se añade el residuo á las demás sustancias en maceracion, se hierve durante un cuarto de hora y se añade:

Sasafrás. ℥j (30 gr.).

Se aparta del fuego, se deja enfriar y se mezcla el cocimiento con la infusion espirituosa añadiendo:

Jarabe simple. . . . lbij (1000 gr.).

Este licor puede reemplazar muy bien al jarabe de Cuisinier.

D. Se usa solo á cucharadas, una ó dos veces al dia, ó en un vaso de tisana. Se emplea como vehículo útil para administrar la solucion de deutocloruro de mercurio ó la de iodo, segun la indicacion.

3702. L. DEPURATIVO DE KOEHLIN.

℥ Limaduras de cobre. . ℥j (4 gr.).

Amoniaco líquido. . . ℥j℞ (48 gr.).

Se deja digerir en frio hasta que el líquido tenga un color azul, se decanta en seguida y se guarda.

Para preparar el licor se toma de este líquido que se llama *Tintura de cobre amoniacal*, y se le mezcla con las sustancias siguientes:

℥ Tintura de cobre amoniacal. ℥j (32 gr.).

Acido clorhídrico á 22°. ℥ij℞ (10 gr.).

Agua destilada. ℥v (160 gr.).

I. Afecciones escrofulosas, atrofia mesentérica, coxalgia, ciertos casos de tisis incipiente, raquitis, sífilis constitucional, tiña, tumores blancos, tumores glandulosos. *D.* Una cucharadita despues de comer, á los niños de tres á

once años, una vez al dia; despues se hace beber una ó dos cucharadas de un buen vino azucarado.

Nota. Cada onza (30 gr.) contiene ℥jv (2 dec.) de cobre.

3703. L. DESINFECTANTE DE CLORURO DE ÓXIDO DE SODIO (Labarraque).

℥ Carbonato de sosa. 5
Agua. 20

Se disuelve. Por separado se introduce en un matraz una mezcla de

Cloruro de sosa. 8

Manganesa. 5

Se dispone el aparato de Woulff y se vierte por partes sobre la mezcla precedente:

Acido sulfúrico. 8

Dilatado en

Agua. 6

Se deja primero que empiece la operacion en frio, y despues se calienta progresivamente hasta que cese el desprendimiento.

I. Se usa para las autopsias, embalsamamientos, disecciones, contra la gangrena, etc. V. t. I, pág. 337.

3704. L. DIURÉTICO (J. P. Frank).

℥ Ceniza de madera. . lbj (500 gr.).

Sumid. de ajenos. ℥j (30 gr.).

Se infunde en frio durante veinticuatro horas en

Vino acidulo. 2 quart. (4 lit.).

D. ℥ij (60 gr.) dos ó tres veces al dia.

3705. L. DE ENEBRO.

℥ Aguardiente. lbij (1000 gr.).

Bayas de enebro

verdes. ℥jv (125 gr.).

Azafran,

Macis,

Canela, ãã. ℥j (42 dec.).

Se digieren en el alcohol, se filtra y se endulza con

Jarabe simple. . . . lbj℞ (750 gr.).

Se usa como un excelente estomacal.

3706. L. FUNDENTE (*Hancke*).

- ℥ Iodo. ḡxv (75 cent.).
- Ioduro de potasio. ḡß (2 gr.).
- Agua destilada. ḡv (150 gr.).
- Alcohol. ḡj (30 gr.).

Disuélvase S. A. Se aplica durante algunas horas: al principio produce una sensación considerable de quemadura, pero luego calma.

I. Prurito herpético del perineo.

Se continúa usando el remedio por tres semanas con los baños frecuentes, y al cabo de este tiempo es completa la curación.

3707. L. DE GOWLAND, *Locion de Gowland, Emulsion cosmética de Gowland.*

- ℥ Almendras amargas. ḡiij (90 gr.).
- Agua. ḡbj (500 gr.).
- Sublimado corrosivo. ḡxvj (8 dec.).
- Sal amoniaco. ḡxvj (8 dec.).
- Alcohol,

Agua de laurel real, ãã. ḡß (15 gr.).

Se machaca las almendras mondadas con el agua comun y se cuecla. Se disuelve las sales en el agua de laurel real y el alcohol, y se mezcla las dos soluciones.

Es medicamento y cosmético.

I. Pitiriasis, acné, líquenes y diversas formas de eczema crónico. Se usa en compresas como cosmético: se le deslie en agua y da frescura y suavidad á la piel; combate las grietas, las irritaciones ligeras producidas por el frío, el calor y las navajas de afeitar.

Este licor no contiene sublimado, sino un compuesto nuevo, á saber la sal Alembrot soluble ó cloruro de mercurio y amoniaco. V. t. I, pág. 258.

3708. L. HIDROSULFUROSO PARA BAÑOS (F. A.).

- ℥ Sulfuro de cal. ḡjv (125 gr.).
- Acido tártrico. ḡj (30 gr.).
- Agua. ḡxvj (8000 gr.).

Se disuelve agitando con fuerza y se vierte en el agua del baño.

I. Enfermedades de la piel.

3709. L. LLAMADO BITTERS DE LOS HOLANDESES.

- ℥ Genciana. ḡß (15 gr.).
- Naranjas. ḡß (15 gr.).
- Canela. ḡj (4 gr.).
- Cálamo aromático. ḡj (4 gr.).
- Raíz de énula. ḡß (2 gr.).
- Cilantro. ḡiij (12 gr.).

Se reduce á polvo grueso, se macera durante ocho días en ḡbjv (2000 gr.) de enebro, y se añade ḡjv (125 gr.) de jarabe ó ḡiij (90 gr.) de azúcar.

3710. L. MERCURIAL ALCANFORADO (H. DE AL.).

- ℥ Deutocloruro de mercurio. ḡß (2 gr.).
- Alcanfor. ḡj (4 gr.).
- Alcohol. ḡj (32 gr.).

M. I. Se usa para destruir los condilomas y las vegetaciones sífilíticas.

3711. L. MERCURIAL NORMAL (*Mialhe*).

- ℥ Agua destilada. ḡbj (500 gr.).
- Sal comun,
- Sal amoniaco, ãã. ḡxviiij (1 gr.).
- Clara de huevo. número 1.
- Sublimado corrosivo. ḡvj (30 cent.).

Se bate la clara de huevo en el agua destilada, se filtra y despues se disuelven los tres compuestos salinos en el agua albuminosa y se filtra de nuevo.

Cada onza (30 gr.) contiene ḡ²/₅ (2 cent.) ó ḡ¹/₅ (1 cent.) por cucharada. V. ns. 3723 y 24.

3712. L. DE MIRRA (F. BR.).

- ℥ Agua destilada. ḡß (250 gr.).
- Mirra machacada. ḡij (60 gr.).

Se digiere en el baño maria y se filtra. Segun la farmacopea de Bremen se puede añadir una sesta parte de miel.

I. Se usa como antiséptico en el

tratamiento de las úlceras de mal carácter. *D. C. s.* para empapar ligeramente una planchuela de hilas.

3713. L. DE MURIATO DE CAL.

℞ Cloruro de calcio. ℥ij (60 gr.).
Agua destilada. ℥iij (90 gr.).

Disuélvase. *I.* Afecciones escrofulosas, infarto de las glándulas linfáticas. *D.* Treinta á setenta y dos gotas en dos ó tres veces al día en agua azucarada.

3714. L. DE NITRO ALCANFORADO (*Baumé*).

℞ Agua pura. lbiiij (1500 gr.).
Nitrato de potasa purificado. ℥vj (180 gr.).
Alcohol rectificado alcanforado. ℥j (30 gr.).

Se disuelve el nitrato de potasa en el agua, se añade el alcohol alcanforado, se agita la mezcla por algun tiempo para facilitar la solución del alcanfor que se ha precipitado al principio y se filtra.

I. Blenorragias. *D.* Seis á veinticuatro gotas en un vaso de bebida apropiada.

3715. L. DE POTASA (H. ING.).

℞ Subcarbonato de potasa. 42
Cal viva. 8
Agua destilada hirviendo. 64

M. I. Es litontríptico y diurético. *D.* Ocho á treinta gotas en un vehículo mucilaginoso.

3716. L. DE PRESSAVIN.

℞ Tartrato de potasa,
Mercurio precipitado de su nitrato por la potasa, añ. . . . p. ig.

Se disuelve en veinte veces su peso de agua y se filtra.

I. Afecciones herpéticas y sifilíticas. *D.* Dos cucharadas en un cuartillo de agua, que se toma en tres ó cuatro vasitos con una tisana apropiada.

Nota. Este remedio es muy in-

fiel, por lo que se le ha abandonado.

3717. L. PROBATORIO DE HANHEMANN ó licor hidrosulfurado acidulo (F. A.).

℞ Sulfuro de cal,
Acido tártrico, añ. . . . ℥ij (8 gr.).
Agua destilada. lbj (500 gr.).

Se mezclan en una botella bien tapada, agitando durante un cuarto de hora; despues se tiene en quietud hasta que se apose el tartrato de cal; se echa el licor claro en una botella de vidrio sobre

Acido tártrico. ℥ij (8 gr.)
y se guarda en una botella bien tapada.

3718. L. REFRIGERANTE Ó CIDRA ARTIFICIAL (*Cottreau*).

℞ Azúcar en bruto. ℥xx (625 gr.).
Vinagre de buena calidad. lbß (250 gr.).
Agua filtrada. 20 cuart. (40 lit.).
Flores secas de saúco. ℥ij (8 gr.).

Se disuelve el azúcar en el agua, se añade el vinagre y la flor de saúco, se mezclan, se dejan en maceracion durante veinticuatro ó treinta y seis horas en un cántaro de barro, libertándole del acceso del aire, y teniendo cuidado de menear de cuando en cuando; se cuela despues al través de un lienzo ó de un tamiz muy apretado, y se pone en botellas que despues de haberlas tapado con solidez, se colocan en cuevas, teniéndolas echadas. Al cabo de diez á quince dias se establece la fermentacion y está el líquido en disposicion de beberse. Se puede variar el gusto y el aroma, sustituyendo á las flores de saúco las hojas y tallos de salvia esclarea (*salvia sclarea*, *L.*) ó de la planta olorosa que se quiera; pero se procurará sobre todo emplear vinagre de buena calidad.

Esta bebida, que se vuelve muy

gaseosa por la fermentacion, tiene un sabor ligero á manzana de la reina; es diurética, como la cerveza y los vinos blancos espumosos; no molesta jamás y conviene principalmente en los calores del estío

3719. L. SEDANTE DE OPIO
(*Battley*).

Opio en polvo fino, tres veces la cantidad prescrita en la F. de L. para ℔ij (1000 gr.) de tintura; se le añade ℔ij (1000 gr.) de ácido acético dilatado, y al cabo de algunas horas ℔vj ú ℔viij (3000 á 4000 gr.) de espíritu de vino rectificado; se macera durante siete dias, se filtra y destila; cuando el alcohol haya pasado enteramente, el producto que queda en la retorta, será el vinagre de opio sedante tan elogiado.

D. Una gota corresponde á tres gotas de tintura de opio.

3720. L. ESPIRITUOSO DE TIERRA FOLIADA DE TÁRTARO.

℥ Tierra foliada de tártaro bien seca. ℥℔ (15 gr.).
Alcohol concentrado. . ℥ij (60 gr.).

Se deja en digestion durante algunos dias y se filtra.

I. Gota, hipocondria. D. Treinta á cuarenta gotas.

3721. L. DE VATLEBLED CONTRA LOS CALLOS.

℥ Sulfato de hierro. . ℔ij (500 gr.).
Lejia á 40°. ℔jv (2000 gr.).

Se pone al fuego en un perol de hierro, se calienta hasta la ebullicion, se añade ℔ij (500 gr.) de agua, en la cual se hierve durante un cuarto de hora una pulgarada de la planta llamada sangre de drago (*Rumex sanguineus*). Se deja enfriar, se aparta la materia espumosa que se ha formado en la superficie de la vasija y se hace evaporar hasta que quede en ℔jv℔ (2250 gr.) de liquido.

Se aplican compresas empapadas en este licor y se renuevan dos ó tres veces al dia si es posible. Se dice que á los diez dias se destruyen los callos.

3722. L. DE WARNER.

℥ Ruibarbo. ℥j (30 gr.).
Sen. ℥℔ (15 gr.).
Azafran. ℥j (4 gr.).
Regaliz. ℥℔ (15 gr.).
Pasas. ℔ij (500 gr.).
Alcohol. ℔iij (1500 gr.).

D. Una onza (30 gr.) como cordial purgante (*c. pr. ing.*).

3723. L. DE VAN SWIETEN ó Solucion de deutocloruro de mercurio
(F. F. Y F. P.).

℥ Deutocloruro de mercurio. ḡxviiij (4 gr.).
Agua pura. ℥xxjx (900 gr.).
Alcohol rectificado. ℥iij (400 gr.).

Se disuelve el sublimado en el alcohol y se añade despues el agua destilada. Este licor contiene una milésima parte de su peso de sublimado corrosivo.

Nota. Se advierte que las dosis indicadas en diferentes farmacopeas para la preparacion del licor de Van Swieten, dan una solucion que contiene ḡ℔ (25 mil.) de sublimado por ℥j (30 gr.) ó sea $\frac{1}{1152}$ de su peso mientras que esta fórmula lleva $\frac{1}{1000}$, es decir cerca de un décimo mas.

I. Sifilis, sifilides, pian. D. ℥ij á ℥℔ (8 á 15 gr.) en ℥jv (125 gr.) de vehiculo mucilaginoso.

El LICOR DE VAN SWIETEN DE LOS H. DE M. se compone de ḡviiij (4 dec.) de sublimado corrosivo, ℥xv (470 gr.) de agua destilada y ℥j (30 gr.) de alcohol á 34° B. D. ℥ij á ℥℔ (8 á 15 gr.).

3724. L. DE VAN SWIETEN REFORMADO (*Mialhe*).

℥ Agua destilada. . . ℔ij (500 gr.).
Clorhidrato de amoniac. ḡxviiij (4 gr.).
Cloruro de sodio. . . ḡxviiij (4 gr.).

Bicloruro de merc. \tilde{g} viii (40 cent.).

M. I. Tiene las mismas proporciones de principio activo que el verdadero licor de Van Swieten, pero no tiene el inconveniente de causar dolores epigástricos; porque el sublimado, uniéndose con los cloruros alcalinos, ha perdido sus propiedades coagulantes. Cada onza (30 gr.) contiene $\tilde{g}\beta$ (25 mil.) de sublimado.

D. Una cucharada grande, mañana y noche.

3725. L. VITAL (*J. Rucco, de Nápoles*).

\mathcal{R} Hojas de ajeno,
Tanaceto,
Dictamo blanco,
Yedra terrestre,
Genciana,
Verónica, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{3}j$ (30 gr.).

Se hierven en dos cuartillos (1000 gr.) de agua.

Angélica,
Anagálide, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{3}j$ (30 gr.).

Se infunden en un cuartillo (500 gr.) de aguardiente.

Hojas de naranjo,
Hojas de aristoloquia,
Hojas de énula campana,
Hojas de marrubio blanco,
Hojas de verónica, $\tilde{a}\tilde{a}$. . . $\tilde{3}\beta$ (15 gr.).

Se infunde estas hojas en agua hirviendo, y por separado la misma cantidad en aguardiente; se filtra, se hace un jarabe con el producto de las infusiones y cocimientos acuosos y se le mezcla con el de las digestiones alcohólicas. Se añaden $\tilde{3}ij$ (60 gr.) de licor marcial.

I. Enfermedades con gran debilidad. *D.* $\tilde{3}jv$ á $\tilde{3}jv$ (15 á 125 gr.) al día.

LIMONADAS. NARANJADAS.

3726. LIMONADA ALCOHÓLICA.

\mathcal{R} Alcohol. $\tilde{3}j$ á $\tilde{3}ij$ (30 á 60 gr.).
Miel blanca. $\tilde{3}j$ (30 gr.).
Jarabe tartárico. $\tilde{3}ij$ (60 gr.).
Agua. $\tilde{1}bij$ (1000 gr.).

I. Se usa en las enfermedades en que conviene reparar las fuerzas, como en las calenturas graves y en la convalecencia de enfermedades de larga duración, afecciones tifoideas, delirio trémulo, hidroraquis.

3727. L. ALUMINOSA.

\mathcal{R} Alumbre. $\tilde{3}j$ (4 gr.).
Agua. $\tilde{1}bij$ (1000 gr.).

Se usa como profiláctica del cólico saturnino.

3728. L. DE CITRATO DE MAGNESIA (*Garot*).

\mathcal{R} Hidrocarbonato de magnesia. $\tilde{3}\beta$ (15 gr.).

Acido cítrico. $\tilde{g}xxij$ (11 dec.).

Jarabe aromático de limon. $\tilde{3}ij$ (60 gr.).

Agua una botella ó $\tilde{1}bij\beta$ (750 gr.).

Se disuelve, se filtra y se recibe el líquido en la botella en que se hallará el jarabe. Para hacerla gaseosa, solo se echa la mitad del ácido disuelto sobre el carbonato, se pone el líquido turbio en la botella, se le añade después la otra mitad de la solución ácida, y se tapa bien.

3729. L. CÍTRICA.

\mathcal{R} Acido cítrico. $\tilde{g}xviii$ á $\tilde{g}xxxvj$ (4 á 2 gr.).

Jarabe simple. $\tilde{3}ij$ (60 gr.).

Agua. $\tilde{1}bij$ (1000 gr.).

Alcoholato de limones. c. s.

M. S. A. I. Calenturas ó inflamaciones en que hay mucha sed y calor. No se usa en las flegmasias de las membranas mucosas del

estómago ni de las vías aéreas.

La LIMONADA COMUN DE LOS H. M. es muy análoga á la anterior, y se diferencia en que contiene ℞j (12 dec.) de ácido cítrico cristalizado, ℞bjβ (750 gr.) de agua comun y ℞ij (60 gr.) de jarabe simple. D. Para beber á pasto.

3730. L. CÍTRICA.

℞ Jarabe cítrico. . . . ℞ij (60 gr.).
 Agua. ℞bj (1000 gr.).
 Alcoholato de limo-
 nes. ℞xviii (4 gr.).

Reemplazando el jarabe por los de agracejo, cerezas, frambuesas, grosellas, limones, naranjas, manzanas ó vinagre, se obtienen unas bebidas atemperantes muy agradables y muy usadas en las calenturas inflamatorias.

Si se introduce estos líquidos en botellas fuertes con agua gaseosa simple, se pueden preparar bebidas gaseadas que tienen las mismas propiedades.

3731 L. CÍTRICA ó Limonada vegetal comun.

℞ Limones. c. s.
 Jarabe simple. . . . ℞ij (60 gr.).
 Agua. ℞bj (1000 gr.).

Se exprime el zumo en agua fria y se añade el jarabe.

Añadiendo ℞β (15 gr.) de goma, se tiene la limonada gomosa.

La LIMONADA CITRICA VINOSA se prepara añadiendo á la anterior :

Vino blanco tinto. . . . ℞iij (90 gr.).

Del mismo modo se prepara LA NARANJADA. V. Agua de limon, n. 187.

3732. L. CLORHÍDRICA (Martin Solon).

℞ Acido clorhídrico. . ℞j (4 gr.).
 Agua comun. ℞bj (1000 gr.).
 Vino de Burdeos. . . ℞vj (200 gr.).
 M. I. Diabetes.

3733. L. COMPUESTA.

℞ Jarabe de grosellas. 4
 Jarabe de frambuesas. 4

Jarabe de agracejo. 4
 Agua. 24

I. Calenturas inflamatorias, afecciones tifoideas, diarrea, acrodinia. D. A vasos.

3734. L. Ó AGUA DE CRÉMOR DE TÁRTARO.

℞ Crémor de tártaro,
 Azúcar, añ. ℞j (30 gr.).
 Agua. ℞bj (1000 gr.).
 Se filtra á las seis horas de contacto.

I. Es laxante.

Los alemanes la conocen con el nombre de *Agua cristalina*.

3735. L. CON EL CRÉMOR DE TÁRTARO.

℞ Crémor de tártaro soluble. ℞β (15 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℞bj (1000 gr.).
 Disuélvase. I. Es laxante y atemperante, y se usa en la encefalitis, etc.

3736. L. EMETIZADA.

℞ Emético. ℞ij (4 dec.).
 Azúcar. ℞ij (60 gr.).
 Limonada cítrica. . . ℞bj (1000 gr.).

M. Se usa como emeto-catártico á la dosis de medio vaso cada media hora.

I. Apoplejía, embarazo gástrico, calenturas biliosas.

3737. L. FERRUGINOSA Y ASTRINGENTE.

℞ Agua comun. ℞xx (625 gr.).
 Azúcar. ℞jv (125 gr.).
 Carbonato de hierro. ℞jv (2 dec.).
 Carbonato de sosa. . . ℞jv (2 dec.).
 Solucion gomosa. . . ℞ij (60 gr.).
 Zumo de limon. . . . 20 gotas.

Gas ácido carbónico, seis veces el volumen del agua.

I. Leucorrea antigua, flujos venéreos crónicos, infartos de las vísceras abdominales y catarros crónicos de la vejiga, cuando los enfermos están muy debilitados por estas enfermedades y no pue-

den soportar el uso de las aguas ferruginosas. *D.* Una botella al día.

3738. L. GASEOSA.

Para cada botella de $\bar{\text{xxx}}$ (625 gr.) se emplean $\bar{\text{iiij}}$ (90 gr.) de jarabe de limon, y se aromatiza con un oleosácaro hecho frotando sobre un terron de azúcar una corteza de limon. Puede ponerse el jarabe en las botellas y llenarlas de agua gaseosa, ó cargar de gas la mezcla de agua y de jarabe. Para preparar la limonada gaseosa, es casi indispensable la llave para tapar la botella en el mismo sitio donde se llena, á causa de la viscosidad que el azúcar da al liquido.

Los fabricantes tienen cuidado de preparar la limonada gaseosa segun se necesita, porque se conserva mal.

Cuando las limonadas gaseosas deben conservarse mucho tiempo, ó por ejemplo se han de remitir á paises lejanos, deben azufrarse para que se conserven; y se consigue introduciendo en cada botella antes de llenarla de agua, una solucion que contenga $\bar{\text{ij}}$ (5 cent.) de sulfito de sosa. Entonces pueden guardar indefinidamente el sabor propio del sulfito.

De la misma manera se preparan las limonadas gaseosas con los jarabes de grosellas, frambuesas, vinagre, granadas, etc.

3739. L. GASEOSA ACÍDULA.

☞ Agua comun. $\bar{\text{xxx}}$ (625 gr.).
Azúcar. $\bar{\text{ijv}}$ (125 gr.).
Zumo de limon. 20 gotas.
Solucion de goma. $\bar{\text{ij}}$ (60 gr.).
Gas ácido carbónico, seis veces el volumen del agua.

1. Es antiflogística, reanima el apetito, favorece la diuresis, y es una bebida agradable y cómoda como bebida ordinaria.

3740. L. GASEOSA IODURADA (Mialhe).

Se prepara añadiendo al agua gaseosa iodurada, una mezcla de $\bar{\text{vj}}$ (25 gr.) de jarabe de limon y $\bar{\text{vj}}$ (25 gr.) de jarabe simple.

3741. L. GASEOSA LÍQUIDA (Chatard).

☞ Azúcar muy blanca. $\bar{\text{iiij}}$ (1500 gr.).
Limonos muy frescos. número 12.
Crémor de tártaro muy puro. $\bar{\text{iiij}}$ (90 gr.).
Agua filtrada. 32 cuart. (16 lit.).

Se quita la cáscara de los limones, de modo que solo queden las células en que está contenido el zumo, se corta los limones en rebanadas muy delgadas, se quebranta el azúcar en pedazos y se la reduce á pasta grosera con las rebanadas de limones y el crémor de tártaro finamente pulverizado; por último, se echa encima el agua caliente filtrada, y se añade las cáscaras de dos limones cortados en pedazos pequeños para aromatizarla. Entonces se deja macerar todo durante veinticuatro horas, meneando de cuando en cuando; se cuela despues al través de un lienzo ó de un tamiz de crin de mallas apretadas, y se echa en botellas ó mejor en cántaros de barro, que se deberán tapar herméticamente y atar con un bramante; se los bajará á la cueva, en donde se los colocará derechos. A los quince ó diez y ocho dias se verifica la fermentacion y puede beberse la limonada.

Nota. Puede reducirse la dosis del crémor de tártaro á $\bar{\text{ij}}$ (60 gr.) ó aumentarse hasta $\bar{\text{ijv}}$ (125 gr.). La diferencia que resulta consiste en la mayor ó menor fermentacion; este movimiento es tanto mas activo, cuanto mas considerable es la dosis de esta sal;

pero es necesario emplear crémor de tártaro muy puro y no mezclado con el ácido bórico ó el borato de sosa. El azúcar debe ser tambien muy blanco; si fuese de calidad inferior, se estableceria una fermentacion tan violenta que infaliblemente se romperian los cántaros.

Si antes de embotellar el liquido de la maceracion se le mezcla con

Tintura de gengibre,
Espiritu de pimienta
de la Jamaica, ãã. ʒjv (125 gr.)

se obtiene despues de la fermentacion una bebida muy semejante á la cerbeza de gengibre de los ingleses.

3742. L. GASEOSA EN POLVO.

ʒ Azúcar. ʒjβ (50 gr.).
Acido tartárico. ʒLjv (3 gr.).

Se envuelve en un papel azul. Por separado se toma:

Bicarbonato de sosa. ʒβ (2 gr.).
Se guarda en un papel blanco.

Cuando se quiere hacer uso de ella, se disuelven el azúcar y el ácido en lbij (1000 gr.) de agua y despues se añade la sal; se beberá interin se verifica el desprendimiento del ácido.

3743. NARANJADA GASEOSA PURGANTE.

ʒ Crémor de tártaro soluble. ʒj (30 gr.).

Se disuelve en c. s. de agua, se filtra y se añade:

Jarabe de naranja. ʒiij (100 gr.).

Se introduce despues en una botella de agua de Seltz y se vierte despues:

Agua cargada de cuatro veces su volumen de ácido carbónico, lbj (500 gr.).

Se tapa y ata.

Es una bebida laxante agradable. Se puede reemplazar el jarabe por el de frambuesas, grosellas, etc.

3744. L. LACTICA.

ʒ Acido láctico. ʒj á ʒjv (4 á 15 gr.).
Agua comun. lbij (1000 gr.).
Jarabe simple. ʒij (60 gr.).
Mézclese.

3745. L. LAXANTE.

ʒ Crémor de tártaro soluble ʒj (30 gr.).
Jarabe simple. ʒij (60 gr.).
Agua. lbij (1000 gr.).

M. I. Embarazo gástrico, bilioso, etc. *D.* Por la mañana á vasos.

Se puede reemplazar el crémor por ʒij á ʒβ (8 á 15 gr.) de tamarindos ó acederas. V. ns. 3734 y 3735.

3746. L. MAGNESIANA (Mialhe).

ʒ Magnesia calcinada. 8
Acido cítrico. 2
Agua. 300
Jarabe de limones. 70

Se disuelve la magnesia en el ácido cítrico por medio del calor, se filtra el liquido hirviendo y se le echa en una botella en que se habrá puesto el jarabe. Esta dosis representa ʒjβ (45 gr.) de citrato de magnesia cristalizado.

3747. L. DE MANITO.

ʒ Manito. ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).
Agua hirviendo. ʒx (300 gr.).

Se disuelve y se añade c. s. de zumo de limon para hacer una bebida agradable.

Tiene un gusto muy grato y produce bastantes evacuaciones.

3748. L. MURIÁTICA.

ʒ Acido clorhídrico. ʒβ á ʒj (2 á 4 gr.).
Azúcar,
ó Jarabe simple. ʒij (60 gr.).
Agua. lbij (1000 gr.).

I. Calenturas atáxico-adinámicas ó tifoideas, cólicos biliosos, diarreas, embarazo de las primeras vias, eczema, acne, liquen, reumatismo. *D.* A medias tazas. Para

los niños se reducirá á la mitad la dosis del ácido. V. n. 3732.

3749. L. NÍTRICA (H. M. Y H. DE M.).

℥ Acido nítrico puro. ℥j (12 dec.).
 Agua comun. ℔j℔ (750 gr.).
 Jarabe simple. ℥ij (60 gr.).

M. I. Se usa como atemperante en las fiebres adinámicas, hemorragias pasivas, hemorragias uterinas, hepatitis crónica, disenteria, calenturas nerviosas petequiales, tifo, escorbuto. *D.* Un cortadillo tres ó cuatro veces al dia.

Bielt la usa en las erupciones con prurito y exaltacion, liquen, eczema, algunas sifilides y hemorragias.

La LIMONADA NÍTRICA DE FORGET se compone de ℔℔ á ℔j (2 á 4 gr.) de ácido nítrico (rara vez mas), ℔ij (1000 gr.) de agua y ℥ij (100 gr.) de jarabe simple. Es muy elogiada contra la albuminuria.

3750. L. PURGANTE.

℥ Raiz de jalapa. 20
 Tartrato de potasa neutro. 4
 Azúcar. 400
 Aceite esencial de naranja. 2

Se hace un oleosácaro, se añade la sal y despues la jalapa.

I. Purgante agradable, que se usa en las afecciones biliosas, embarazo gástrico, ictericia, asfixia, apoplejia. *D.* ℥ij℔ á ℥iij (10 á 12 gr.) en ℔j (500 gr.) de naranjada que se toma á vasos.

3751. Otra, n. 2.

℥ Citrato de magnesia. 40
 Acido cítrico. 4
 Jarabe simple. 400
 Tint. de casc. frescas de limon. 2
 Agua. 550

Se disuelve el citrato en agua caliente y se mezcla todo S. A.

D. Dos ó tres vasos al dia. V. número 3752.

3752. L. PURGANTE DE CITRATO DE MAGNESIA ó *citro-magnesiana* (Garot).

Para 40. Para 50.

℥ Carb. de magnesia. 15 48
 Acido cítrico. 23 28
 Agua. 350 350

Se hace reaccionar en caliente en un vaso de vidrio ó porcelana. Verificada la reaccion se pone en un frasco y se añade:

Jarabe de limon. 400
 Bicarbonato de sosa. 4

Se tapa muy bien. Se puede reemplazar el jarabe de limon por el de grosellas, cerezas, frambuesas, etc.

Esta limonada no tiene color, es trasparente y de sabor agradable, sin que se presuma la presencia de una sal magnesiana que contiene en gran cantidad.

3753. L. PURGANTE GASEOSA.

℥ Citrato de magnesia. 40
 Agua. 600
 Se disuelve, se filtra y se añade:
 Jarabe simple. 90
 Alcoholato de limon. 20
 Bicarbonato de sosa. 4
 Acido cítrico. 5

Se tapa bien. Se toma en tres veces.

3754. L. PURGANTE GASEOSA EN POLVO, DE CITRATO DE MAGNESIA (Cadet).

Se toma las cantidades de ácido cítrico y de magnesia calcinada en las proporciones necesarias para representar diez dosis de ℥j℔ ó 50 partes de citrato magnesiano.

A saber :

Acido cítrico. 260 gr.
 Magnesia calcinada. 80 gr.
 Acido bórico. 443 gr.

Se disuelve el ácido cítrico en ℔jv (2000 gr.) de agua destilada y se filtra.

Se pone despues en una cazuela de porcelana la magnesia y el ácido bórico, y se vierte en ella

poco á poco la solución ácida para formar una pasta, ayudando con una espátula de vidrio; despues se extiende y diluye esta pasta vertiendo en ella el resto de la solución; se disuelve la mezcla á la temperatura de una ebullición sostenida. Luego que está espesa la materia se la aparta del fuego, se la reúne con cuidado y se acaba de desecar en la estufa. Se pulveriza el citrato desecado.

℥ Sal anterior en polvo.	413
Azúcar blanca en polvo.	737
Acido cítrico en polvo.	100
Bicarbonato de sesa.	50

Se mezclan exactamente, se aromatizan con la tintura de cáscaras de limon y se divide en diez frascos que contengan 130 gramos cada uno.

La base de esta limonada es un citro-borato de magnesia, que es soluble. V. la siguiente.

3755. POLVO PARA LIMONADA GASEOSA DE CITRATO DE MAGNESIA (Maury).

℥ Oxido de magnesio.	5ij (8 gr.).
Magnesia comun.	5j (4 gr.).
Azúcar aromatizada.	℥jβ (50 gr.).
Acido cítrico en polvo.	℥vjβ (26 gr.).

Se mezcla en un mortero de porcelana.

Este polvo, puesto en una botella de agua, da á la media hora una limonada gaseosa purgante muy clara si la magnesia es pura.

3756. L. SECA PARA VIAJEROS.

℥ Acido cítrico ó tártrico.	5j (4 gr.).
Azúcar.	℥jv (125 gr.).
Esencia de limon.	8 gotas.

M. Se pone una cucharada de este polvo en un vaso de agua. Se prepara una naranjada seca, substituyendo la esencia de naranja á la de limon. Cuando se reemplaza el ácido cítrico por el ácido tartárico, no es tan agradable el sabor de esta bebida.

I. Flegmasias gastro-intestinales, calenturas inflamatorias, ictericia, calentura amarilla, as-tenia, diarrea.

3757. L. SECA (Fascio).

℥ Oxalato de potasa.	5iij (12 gr.).
Azúcar.	℥bj (500 gr.).
Esencia de limon.	℥viiij (4 dec.).

I. Enfermedades inflamatorias, flegmasias agudas, gastritis, inflamación, absceso, acrodinia, diabetes, diarrea, liquen. D. ℥j (30 gr.) en ℥bj (500 gr.) de agua, que se toma á medias tazas.

3758. L. SOLUTIVA (F. P.).

℥ Pulpa de tamarindos,	
Maná,	
Cáscara de limon, ãã.	5ij (8 gr.).
Agua hirviendo.	℥x (320 gr.).

Se macera y se menea hasta que se disuelva bien.

3759. L. SULFÚRICA Ó MINERAL.

℥ Agua.	℥bij (1000 gr.).
Azúcar.	℥ij (60 gr.).
Acido sulfúrico.	36 gotas ó c. s.

para dar un sabor agradable.

I. Calenturas adinámicas, hemorragias pasivas, calenturas inflamatorias, biliosas ó atáxicas, ictericia, urticaria, liquen, hemorragias, diabetes, absceso, eczema, delirio trémulo, congestión, diarrea, cólicos. D. A vasos.

3760. L. SULFÚRICA.

℥ Acido sulfúrico á 66°.	5j (4 gr.).
Agua comun filtra-	
da.	℥bij (1500 gr.).

M. I. Se usa como preservativo de los cólicos de plomo, en las hemorragias pasivas, fiebres graves, etc. D. A vasos en el dia.

Nota. Debe endulzarse cada vaso en el momento de tomarle con ℥j (30 gr.) de jarabe de goma.

La LIMONADA SULFÚRICA DE LOS H. M. contiene ℥j (12 dec.) de ácido sulfúrico concentrado, ℥bjβ (750 gr.) de agua

comun y \mathfrak{J} ij (60 gr.) de jarabe simple.
I. y D. Las mismas que la anterior.

3761. L. SULFÚRICA SIMPLE
(H. DE M.).

\mathfrak{Z} Agua comun. $\text{Ibj}\mathfrak{B}$ (750 gr.).
Acido sulfúrico á 66°. 20 gotas.
Jarabe simple. \mathfrak{J} ij (60 gr.).
M. I. Es atemperante y ligeramente astringente. V. ns. 3759 y 3760.

3762. L. SULFÚRICA HORDEADA
(H. DE M.).

\mathfrak{Z} Cocim. de cebada. . $\text{Ibj}\mathfrak{B}$ (750 gr.).
Acido sulf. de 66°. . 20 gotas.
Jarabe simple. \mathfrak{J} ij (60 gr.).
M. I. Se usa como atemperante.

3763. L. DE TARTRATO DE MAGNESIA (*Garnier*).

\mathfrak{Z} Carbonato de magnesia comun. . 15
Acido tártrico. 22
Agua. 600
Se disuelve, se filtra y se endulza con 60 partes de jarabe tártrico aromatizado con naranja ó limon.

El tartrato preparado así tiene poco sabor y es purgante, lo mismo que el citrato.

3764. L. DE BOROTARTRATO DE MAGNESIA.

\mathfrak{Z} Borotartrato de potasa y magnesia. \mathfrak{J} j (30 gr.).
Acido cítrico. $\mathfrak{3}\mathfrak{B}$ (2 gr.).
Jarabe aromatizado con limon. \mathfrak{J} ij (60 gr.).
Agua. $\mathfrak{3}\mathfrak{x}$ (300 gr.).

3765. L. TÁRTRICA ó Tisana con jarabe tártrico (F. F.).

\mathfrak{Z} Jarabe tártrico. \mathfrak{J} ij (64 gr.).
Agua. $\mathfrak{3}\mathfrak{xxx}$ (930 gr.).
M. Esta limonada refrigerante es bastante agradable, y debería preferirse á otras muchas bebidas ácidas porque es poco irritante. Tal vez es laxante cuando se toma en gran cantidad.

I. Flegmasias agudas, calenturas inflamatorias, absceso, liquen, eczema, diabetes, cólicos, diarreas, congestion, apoplejía.
D. A tazas.

3766. L. TÁRTRICA SECA
(H. DE AL.).

\mathfrak{Z} Acido tártrico. \mathfrak{J} ij (60 gr.).
Azúcar blanca. \mathfrak{J} j (30 gr.).
Esencia de limon. 8 gotas.
M. D. \mathfrak{D} j á $\mathfrak{3}\mathfrak{B}$ (12 dec. á 2 gr.) en $\text{Ibj}\mathfrak{B}$ (250 gr.) de agua.

3767. L. VEGETAL ó Limonada cocida.

\mathfrak{Z} Limon. número 1.
Se le corta en rebanadas, y se le infunde en
Agua hirviendo. Ibj (500 gr.).
Se añade:
Azúcar. \mathfrak{J} ij (100 gr.).
I. Enfermedades inflamatorias, flegmasias, gastritis, gastro enteritis, acrodinia, diabetes. D. A medias tazas. V. *Agua de limon*.

3768. L. VINOSA.

\mathfrak{Z} Vino tinto. 8
Agua. 22
Jarabe. 2
M. I. Afecciones atónicas, etc.
D. A vasos.

3769. Otra, n. 2.

\mathfrak{Z} Vino blanco,
Agua, $\tilde{\text{a}}$ Ibj (500 gr.)
Alcohol,
Jarabe tártrico, $\tilde{\text{a}}$ \mathfrak{J} j (30 gr.).
I. Afecciones atónicas. D. A medias tazas.

3770. L. VINOSA ALCOHÓLICA.

\mathfrak{Z} Vino blanco. Ibj (500 gr.).
Agua. Ibj (500 gr.).
Alcohol. \mathfrak{J} j (30 gr.).
Jarabe tártrico. \mathfrak{J} ij (60 gr.).
Se usa como la limonada alcohólica.

LINIMENTOS.

3771. LINIMENTO DE ACEITE DE CROTON.

℥ Aceite de croton. 4
 Aceite comun. 5

M. Se usa como revulsivo en fricciones varias veces al dia. Produce un exantema pustuloso que durante algunos dias deja fluir un licor amarillento, y despues vuelve la piel á su estado natural.

3772. Otro, n. 2.

℥ Aceite de croton. ḡjx (50 cent.).
 Carbonato de sosa. ḡxviiiij (4 gr.).
 Esencia de tremen-

tina. ḡLjv (3 gr.).

I. Reumatismo crónico, ronquera, afonía, pleuresia, pleurodinia, asma, asfixia, bronquitis, carditis, crup, adenitis, gastralgias, disenteria, estreñimiento, envenenamiento, neuralgia. *D.* En dos fricciones ó una aplicacion, y en los casos en que se quiera producir una rubefaccion revulsiva.

3773. L. DE ACONITINA (Turnbull).

℥ Aconitina. ḡxviiiij (4 gr.).
 Aceite comun. ḡxxxvj (2 gr.).
 Manteca. ḡj (32 gr.).

M. I. Afecciones nerviosas, catarata reciente, ciertas afecciones del oido. *D.* En fricciones dos ó tres veces al dia.

3774. Otro, n. 2.

℥ Aconitina. ḡjx (50 cent.).
 Aceite comun. ḡB (2 gr.).
 Manteca de cerdo. ḡv (20 gr.).

M. I. Amaurosis, iritis, opacidad de la córnea, catarata capsular. *D.* En fricciones, mañana y noche, en las cejas, párpados y globo del ojo. Reumatismo, ceática, otalgia, histeralgia, dolores

osteocopos, hidroraquis. En fricciones en las partes afectadas.

3775. L. AFRODISIACO.

℥ Aceite de manzanilla. ḡij (60 gr.).
 Aceite de laurel. ḡj (30 gr.).
 Bálsamo del Perú. ḡB (45 gr.).
 Tintura de mirra,
 Tintura de acibar,
 Ambar, ãã. c. s.

I. Parálisis momentánea de los órganos genitales, fetidez de las narices. *D.* En fricciones en el perineo y en el pubis al acostarse.

3776. L. DE AJO.

Se machaca el ajo con partes iguales de manteca; se frota las plantas de los piés y se aplica bajo la forma de emplasto.

Buchan le recomienda contra la coqueluche y las toses pertinaces.

3777. L. ALCALINO (Plenck).

℥ Carbonato de potasa
 líquido. ḡij (60 gr.).
 Aceite comun. ḡjv (125 gr.).
 Yema de huevo. número 2.

Mézclese y agítese al tiempo de usarle.

I. Grietas del ano, vegetaciones sifilíticas.

3778. L. ALCANFORADO (Fournier).

℥ Aceite comun. ḡij (60 gr.).
 Amoniaco líquido,
 Alcanfor, ãã. ḡij (8 gr.).

M. S. A. I. Reumatismo. *D.* La misma que los siguientes.

3779. Otro (H. DE M.).

℥ Ungüento de altea,
 Aceite comun, ãã. ḡj (30 gr.).
 Alcanfor. ḡB (6 dec.).

Se pulveriza el alcanfor con dos gotas de alcohol y se disuelve en

el aceite; se añade este poco á poco al unguento, agitando á cada adición á fin de que la mezcla resulte homogénea.

I. Infartos é induraciones del tegido celular. *D.* En fricciones.

3780. Otro (H. M.).

℞ Linimento amoniaco. ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. ℥j (4 gr.).

M. S. A. I. Reumatismo. *D.* La misma que la siguiente.

3781. Otro (VAYDI).

℞ Aceite comun

ó Aceite de almendras. ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. ℥ij (8 gr.).

H. S. A. I. Sarna, etc. *D. C. s.* para fricciones en las partes en que hay granos.

Nota. Este linimento cura en doce ó quince dias.

El LINIMENTO DE ALCANFOR DE LA F. DE L. se compone de ℥j (30 gr.) por ℥jv (425 gr.) de aceite comun.

3782 L. ALCANFORADO ANODINO (H. DE M.).

℞ Alcanfor. ℥j (4 gr.).
Esencia de trementina,
Láudano líquido, añ. ℥ij (8 gr.).
Bálsamo tranquilo. ℥ij (60 gr.).

Se disuelve el alcanfor en el bálsamo tranquilo y se añade los demás componentes. Se agitará bien al tiempo de hacer uso de él.

I. Vómito espasmódico, iscuria. *D.* En fricciones en el epigastrio ó sobre el pubis.

3783. L. ALCANFORADO Y OPIADO.

℞ Alcanfor. ℥j (4 gr.).
Esencia de manzanilla. ℥j (30 gr.).
Láudano de Sydenham. ℥ij (8 gr.).
Aceite de beleño. ℥j (30 gr.).

I. Reumatismo, ceática, contusiones, quemaduras, sabañones, fracturas, congelacion, espasmos, crup, insomnio, ablactacion, apoplejía, escleroma, efidrosis, torticollis, bocio, tialismo, gastralgia, cardiopalmia, histeralgia, me-

tritis, cistitis, calenturas tifoideas, envenenamiento. *D.* En fricciones mañana y noche.

3784. Otro, n. 2.

℞ Bálsamo tranquilo,
Aceite blanco, añ. ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. ℥ij (8 gr.).
Láudano de Sydenham. ℥j (4 gr.).
Mézclese.

3785. Otro (LEVACHER).

℞ Alcohol alcanforado. ℥iij (400 gr.).
Amoniaco líquido. ℥vj (25 gr.).
Láudano de Sydenham. ℥vj (25 gr.).

M. I. Se usa en las Antillas en los casos de tétanos.

3786. L. ALUMINOSO.

℞ Alumbre. ℥β (15 gr.).
Clara de huevo. número 4.
Aguardiente alcanforado. ℥x á ℥ij (40 á 60 gr.).

M. I. Escoriaciones por permanecer mucho tiempo en la cama, sabañones, intertrigo, eritema, astenia, reumatismo, amaurosis. *D.* Se aplica á la parte enferma.

3787. L. AMONIACAL, *Linimento volátil ó jaboncillo amoniaco* (F. F., F. F. Y F. P.).

℞ Aceite comun. ℥ij (64 gr.).
Amoniaco líquido. ℥ij (8 gr.).
Se mezcla en una vasija tapada y se agita al tiempo de usarle.

I. Sarna, infartos crónicos de las articulaciones, ascitis, dolores reumáticos, angina linfática, parálisis, neuralgia, ceática, tumores lácteos, tumores atónicos de los testículos, bubones, oftalmia reumática. *D.* ℥ij (8 gr.) en fricción por la noche.

Nota. Este linimento cura la sarna en doce ó quince dias.

El LINIMENTO AMONIACAL DE LOS H. DE M. se compone de ℥j (30 gr.) de aceite comun y ℥β (2 gr.) de amoniaco líquido á 22°.

3788. L. AMONIACAL ALCANFORADO (H. DE M.).

℥ Aceite comun. ℥j (30 gr.).
 Alcanfor. ℥j (12 dec.).
 Amon. líquido de 22°. ℥B (2 gr.).

Se disuelve el alcanfor en el aceite, se añade el amoniaco y se agita.

I. Reuma crónico, infartos lácteos. *D.* En fricciones.

3789. L. AMONIACAL CANTARIDADO.

℥ Linimento amoniacal. . ℥j (30 gr.).
 Tintura de cantáridas,
 Tintura aromática,
 Aceite de romero, ãã. ḡxc (5 gr.).

H. S. A. I. Reumatismo crónico, lumbago, ceática, cólera, hidrofobia, parálisis, hipocondría, aftas, torticolis, torceduras, entropion, cretinismo, atrofia, escleroma, neumatosiis, envenenamiento, espasmo, cólera. *D.* En fricciones.

3790. Otro (H. DE ITALIA).

℥ Tintura de cantáridas. . ℥iij (12 gr.).
 Alcanfor ℥j (4 gr.).
 Linimento volátil. . . . ℥jB (45 gr.).

M. I. Parálisis.

3791. L. AMONIACAL ESTIBIADO.

℥ Linimento amoniacal. ℥ij (8 gr.).
 Tártaro emético. . . ḡxviiij (4 gr.).
 Trementina. ℥j (4 gr.).

M. I. Reumatismo, lumbago, ceática. *D.* En fricciones.

3792. L. AMONIACAL FÉTIDO.

℥ Amoniaco líquido. 30
 Aceite animal de Dippel. 40
 Aceite de manzanilla. 70

I. Reumatismo, histérico, hipocondría, cólicos ventosos, ímpañitis atónica, neumatosiis, espasmos, torceduras, contusiones. *D.* En fricciones al abdómen, etc.

3793. L. AMONIACAL CON PETROLEO.

℥ Amoniaco líquido. . . ℥j (30 gr.).
 Petroleo. ℥B (15 gr.).

I. Inflamaciones atónicas, espasmos, cólico nervioso, disenteria, neumatosiis, apoplejía, calenturas intermitentes, hipocondría, parálisis, meningitis, entropion, envenenamiento. *D.* En fricciones en el punto dolorido.

3794. L. AMONIACAL DE NUEZ VÓMICA.

℥ Tintura de nuez vómica. ℥j (30 gr.).
 Amoniaco líquido. . . ℥ijB (10 gr.).

M. I. Cólera, parálisis, corea, artritis, reumatismo, gota, atrofia, disenteria, meningitis, diabetes, enuresis, hidrofobia. *D.* En fricciones en las partes enfermas.

3795. L. AMONIACAL SULFURADO.

℥ Amoniaco líquido. . . ℥j (30 gr.).
 Alcanfor. ℥B (2 gr.).
 Sulfuro de potasa. . . ℥B (15 gr.).
 Aceite comun. ℥vj (200 gr.).

I. Tiña, sarna, prurigo, parálisis, apoplejía, espasmos, calenturas intermitentes, angina, beriberi, disenteria, meningitis, hidrocefalo, hipocondría, artritis, artrocace, sífilis, diabetes, envenenamiento. *D.* En fricciones.

3796. L. AMONIACAL TREMENTINADO.

℥ Linimento amoniacal. . ℥jB (45 gr.).
 Esencia de trementina. ℥B (15 gr.).
 Mézclese.

3797. Otro, n. 2.

℥ Aceite de manzanilla,
 Aceite de beleño,
 Esencia de trement., ãã. ℥ij (60 gr.).
 Amoniaco líquido,
 Tintura de pimienta de
 Guinea, ãã. ℥j (30 gr.).
 Alcanfor. ℥B (15 gr.).

M. I. Gota asténica, reumatismo crónico, lumbago, artrodinia, ceática, edema, neuritis, neurosis, parálisis, acrodinia, artrocace, pleurodinia, cistitis, meningitis, apoplejía, tétanos, diabetes, entropion, angina, calenturas intermitentes, neumatosis, hipocondría, ictericia, ictiosis, acné, soriásis, envenenamiento. *D.* En fricciones.

3798. L. ANODINO.

℥ Aceite de beleño,
Aceite de haba de San
Ignacio, añ. ℥j (30 gr.).
Alcanfor. ℥j (4 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ℥j℞ (6 gr.).
Tintura de opio. ℥ij (8 gr.).

I. Espasmos, calambres, parto laborioso, metritis, peritonitis, calentura puerperal, tos, catarro vexical, catarro bronquial, histeralgia, tialismo, congelacion, neuralgias, lumbago, denticion difícil, dolores osteocopos, insomnio, cistitis, histérico, hipocondría, neumatosis. *D.* En fricciones.

3799. Otro, n. 2.

℥ Tintura de opio. 4
Aceite comun. 8
Mézclese y agítese al tiempo de usarle.

D. Se usa en fricciones en las partes doloridas.

3800. Otro, n. 3.

℥ Ungüento populeon,
Aceite comun,
Bálsamo tranquilo, añ. 5v (20 gr.).
Láudano de Rousseau. . 5℞ (2 gr.).
I. Dolores reumáticos, hemorroides.

3801. Otro (CAZENAVE).

℥ Extr. de belladona. ℥ij (8 gr.).
Agua de cal. lb℞ (250 gr.).
Aceite de almendras
dulces. ℥jv (425 gr.).
I. Superficies inflamadas del ec-

zema, pórriigo, impétigo. *D.* En unturas.

3802. Otro (BOYER).

℥ Aceite de almendras
dulces. ℥ij (60 gr.).
Bálsamo tranquilo. . . ℥ij (60 gr.).
Ungüento de altea. . . ℥j (30 gr.).
Extr. acuoso de opio. ℥ij℞ (40 gr.).

I. Dolores violentos, sobre todo cuando son de naturaleza nerviosa. *D.* En fricciones en los puntos doloridos.

3803. Otro (H. M.).

℥ Aceite comun. ℥ij (64 gr.).
Alcanfor. ℥ij (8 gr.).
Tintura vinosa de opio. ℥j (4 gr.).
Mézclese exactamente. Se le agita antes de usarle.

I. Reumatismo.

3804. L. ANODINO Y RESOLUTIVO (Dupuytren).

℥ Extracto de beleño. . 3℞ (2 gr.).
Jabon blanco. ℥ij (8 gr.).
Aceite de lirio. ℥vj (180 gr.).

M. I. Infartos glandulares. *D.* Una cucharada para cada friccion.

3805. L. ANTIAFTOSO.

℥ Alumbre calcinado. . ℥xviii (4 gr.).
Goma laca. ℥j℞ (6 gr.).
Miel rosada. ℥j (30 gr.).

I. Aftas, grietas, ulceraciones de la boca. *D.* En fricciones.

3806. L. ANTIARTRITICO.

℥ Alcanfor. 4
Aceite de trementina. 10
Disuélvase. *I.* Afecciones reumáticas crónicas, gota, etc. *D.* En fricciones.

3807. Otro (DESBOIS DE ROCHEFORT).

℥ Aceite,
Agua triacal, añ. ℥j (30 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ℥ij (8 gr.).
Láudano líquido. ℥j (4 gr.).
M. S. A. D. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) en fricciones, mañana y noche.

3808. L. ANTIARTRÍTICO (Home).

- ℥ Alcanfor. ℥ij (24 dec.).
- Esencia de trement. ℥ij (8 gr.).
- Jabon negro. ℥j (30 gr.).
- Ungüento nervino. ℥ß (15 gr.).
- Semillas de comino en polvo. ℥ij (8 gr.).
- Carbonato de amoniaco. ḡxv (75 cent.).

Se disuelve el alcanfor en la esencia de trementina y despues se mezcla todo S. A.

I. Afecciones gotosas ó reumáticas crónicas, ceática, gota, artritis, lumbago, eczema, calenturas intermitentes, torceduras, apoplejía, atrofia, cólera, disenteria, peritonitis, meningitis. *D.* La misma que el anterior.

3809. Otro (TURCK).

Se preparan primero lejías de potasa cáustica de 2, 4, 6, 8, 10 y 12^o Beaumé, en las que se disuelve alúmina recién precipitada (alumbre por medio del amoniaco líquido) en c. s. para hacer desaparecer la reaccion alcalina del licor, ó por mejor decir hasta la completa saturacion.

Para diez botellas de licor así saturado (de cualquier grado que sea) se toma:

- ℥ Goma aràbiga. ℥x (320 gr.).
- Trement. de Venecia. ℥vj (200 gr.).
- Jarabe simple. ℥vj (200 gr.).
- Aceite comun. ℥iij (100 gr.).

y con una yema de huevo se hace una emulsion que se reparte exactamente en las diez botellas, á las que se añade aun:

Esp. de vino de 36^o B. ℔ß (250 gr.) en el cual se disuelve todo el alcanfor posible.

Se conservará esta mezcla en botellas tapadas con cuidado, y se agitará al tiempo de usarla.

La botella contendrá ℔jß (750 gr.). Se prescribe el remedio de 1, 2, 3, 4, 5 ó 6^o segun la intensidad del mal.

3810. L. ANTIASMÁTICO (Graves).

- ℥ Acido acético fuerte. 5ß (2 gr.).
- Esenc. de trementina. ℥iij (12 gr.).
- Agua de rosas. 3jß (6 gr.).
- Aceite de limon. algunas gotas.
- Yema de huevo. c s.

M. S. A. I. Se usa en fricciones por medio de una esponja en la nuca, lados del cuello y en la parte anterior del pecho.

3811. L. ANTICOLÉRICO.

- ℥ Esencia de menta pip. ḡLjv (3 gr.).
- Tintura tebaica. 5j (4 gr.).
- Alcanfor. 3jß (6 gr.).
- Aceite de beleño. 3ij (60 gr.).

M. I. Cólera, vómitos espasmódicos. *D.* En fricciones al vientre y al epigastrio.

3812. L. ANTIÉPSÓRICO.

- ℥ Jabon negro. 2
- Agua comun. 2

Se disuelve y se incorpora poco á poco:

- Azufre sublimado. 4

Se mezcla y se agita al tiempo de usarle.

3813. Otro (H. DE IT.).

- ℥ Cal viva,
- Flores de azufre, ãã. 3ij (60 gr.).
- Aceite comun. c. s.

M. I. Sarna, herpes. *D.* En fricciones mañana y noche.

3814. L. ANTIHERPÉTICO (Neumann).

- ℥ Cloruro de cal. ḡxviiij (9 dec.).
- Carbon preparado. 3ß (15 gr.).
- Agua. c. s.

I. Herpes. *D.* Se menca con cuidado antes de usarle.

3815. L. ANTIESPASMÓDICO DE SELLE (H. DE M.).

- ℥ Ungüento de altea. 3lj (60 gr.).
- Alcanfor,
- Láudano líquido, ãã. 5j (4 gr.).

Se pulveriza el alcanfor por me-

dio del alcohol, se mezcla con el unguento y se añade el laudano.

I. Es muy eficaz en todas las afecciones espasmódicas de los intestinos, á saber, la gastralgia, enteralgia, cólicos, en las pleuresías y dolores reumáticos. Se unta el bajo vientre con algunas dracmas de este linimento y se cubre despues con una bayeta caliente ó cataplasma emoliente.

3816. L. ANTIESPASMÓDICO
(*Chrestien*).

℞ Aguardiente. ℥xij (375 gr.).
Acetato de potasa. ℥jv (125 gr.).
Alcanfor. ℥v (20 gr.).
Extracto de opio. ℥j (4 gr.).
H. S. A. *I.* Cólico nervioso. *D.*
En fomentos al abdómen.

3817. Otro (SIEBOLD).

℞ Tintura amoniaca l ani-
sada. ℥j (4 gr.).
Alcoholato de espliego. ℥jv (16 gr.).
M. I. Hipo de los niños. *D.* Dos
fricciones al dia sobre el pecho y
vientre de los niños.

3818. Otro (WEBER).

℞ Opio puro,
Aceite de manzanilla, añ. ℥β (2 gr.).
Aceite de almendras dul-
ces. ℥ij (8 gr.).
M. I. Espasmos de los párpados.
D. En fricciones al rededor de los
ojos.

3819. L. ANTIGOTOSO (*Boubée*).

℞ Aceite alcanforado. ℥jv (125 gr.).
Aceite de croton. ℥x (5 dec.).
Aceite animal de Dip-
pel. ℥β (2 gr.).
Disuélvase. *I.* Dolores vagos y
tumefacciones gotosas que resis-
ten al uso de los antiflogísticos in-
ternos.

3820. L. ANTIHELMÍNTICO.

℞ Santónico,
Valeriana, añ. ℥β (15 gr.).

Agua hirviendo. c. s.
para obtener lbβ (250 gr.) de in-
fusión, á la que se añade:

Asa fétida. ℥j (4 gr.)
triturada en una yema de huevo.

3821. Otro (BRERA).

℞ Hiel de buey,
Jabon amigdalino, añ. ℥j (4 gr.).
Se mezcla y se añade:
Aceite de tanaceto. ℥jv (125 gr.).
H. S. A. Se usa en fricciones en
la region umbilical.

3822. Otro (DUBOIS).

℞ Aceite rancio de nuez. ℥ij (90 gr.).
Ajos machacados. . . . número 3.
Alcohol alcanforado. . . . ℥ij (60 gr.).
Bálsamo de Fioraventi. ℥j (30 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ℥j (4 gr.).
Se hace la mezcla en un mortero
de mármol, se echa en un frasco,
se añade el amoniaco y se tapa
bien.

D. Se frota el vientre del enfer-
mo mañana y noche con parte de
este linimento, despues de haber
agitado bien el frasco.

3823. L. ANTIHEMORROIDAL
(*Andry*).

℞ Aceite de olivas,
Miel,
Trement. de Venecia, añ. ℥j (30 gr.).
M. S. A. D. Se usa la cantidad
suficiente para cubrir muchas ve-
ces al dia los tumores hemorroï-
dales y sabañones. Se menea al
tiempo de usarle.

3824. Otro (H. M.).

℞ Ungüento populeon. . . . ℥j (30 gr.).
Tintura vinosa de opio. ℥ij (8 gr.).
Yema de huevo. . . . número 4.
M. I. Tumores hemorroidales
dolorosos. *D.* C. s. para friccio-
nes. Se aplica por medio de una
planchuela de hilas.

3825. L. ANTINEURÁLGICO
(*Jung*).

℞ Extracto de belladona. ℥j (4 gr.).

Acetato de morfina. . . ℥j (30 gr.).

Linimento jabonoso alcanforado. ℥ij (60 gr.).

H. S. A una mistura muy homogénea.

I. Es eficaz en las neuralgias é irritacion intestinal. *D.* En fricciones sobre la parte enferma muchas veces al dia.

3826. L. ANTIHEMORROIDAL
(Ware).

℥ Nuez de agalla en polvo. ℥ij (8 gr.).

Alcanfor en polvo. . . . ℥j (4 gr.).

Se mezcla é incorpora en

Cera liquidada. ℥j (30 gr.).

Se añade S. A.

Alcoholado de opio. . . . ℥ij (8 gr.).

D. Dos ó tres unturas al dia.

3827. Otro (H. DE M.).

℥ Ungüento populeon. . . ℥ij (60 gr.).

Láudano liquido. ℥℔ (2 gr.).

Yemas de huevo. número 2.

Sal de Saturno. ℥℔ (6 dec.).

Se mezcla las yemas con el unguento y el acetato, se añade despues el láudano y se agita perfectamente la mezcla.

I. Se usa cuando los síntomas inflamatorios han disminuido.

3828. L. ANTINEUROPATICO DEL DOCTOR RANQUE.

Véase *Tratamiento del cólico de plomo por el doctor Ranque.*

I. Cólico saturnino, neurosis, neuralgias.

3829. L. ANTIOFTÁLMICO
(Plenck).

℥ Agua de rosas. ℥j (30 gr.).

Sulfato ácido de alúmina

en polvo. ℥j (4 gr.).

Yema de huevo. número 1.

Se funde el alumbre en el agua, se añade la yema de huevo y se cuele la mezcla.

I. Oftalmias que han llegado á su declinacion y enfermedades crónicas de los párpados. *D.* Mu-

chas aplicaciones ligeras en el curso del dia.

3830. L. ANTIPERIÓDICO.

℥ Esencia de trementina. ℥jv (125 gr.).

Láudano de Rousseau. ℥j (4 gr.).

H. S. A. *I.* Calenturas intermitentes rebeldes al sulfato de quinina ó no rebeldes. *D.* Dos cucharadas en fricciones en la columna vertebral mañana y noche durante la apirexia.

3831. Otro (SCHUSTER).

℥ Sulfato de quinina. . . . ℥℔ (2 gr.).

Tártaro emético. ℥vj (3 dec.).

Extr. acuoso de opio. ℥xij (6 dec.).

Alcohol alcanforado. . ℥ij (60 gr.).

I. Calenturas intermitentes perniciosas, neuralgias periódicas, gota y reumatismo periódico, envenenamiento. *D.* ℥ij℔ (10 gr.) ocho veces al dia y en fricciones en el epigastrio.

3832. L. ANTIREUMATICO
(H. DE M.).

℥ Jabon comun. ℥℔ (15 gr.).

Aguardiente de 48°. . . ℥ij (60 gr.).

Alcanfor. ℥j (12 dec.).

M. D. La misma que la del siguiente. V. n. 3938.

3833. Otro (TORTUAL).

℥ Alcanfor. ℥j (4 gr.).

Aceite de cajeput. ℥ij (8 gr.).

Eter sulfúrico. ℥j (32 gr.).

M. I. Dolores reumáticos. *D.* Dos ó tres fricciones al dia.

3834. L. ANTISÉPTICO
(Behrends).

℥ Alcanfor. ℥j℔ (6 gr.).

Carbon de boj en polvo,

Quina en polvo, añ. . . ℥j (30 gr.).

Esencia de trementina

rectificada. c. s.

M. S. A. I. Gangrena, úlceras pútridas. *D.* Dos ó tres unturas al dia.

3835. L. AROMÁTICO.

℥ Amon. líquido. ℥β á ℥j (15 á 30 gr.).
 Espíritu de espliego. ℥ij (60 gr.).
 Espir. de enebro. . . ℥jβ (45 gr.).
 Mézclese bien. *I.* Cólera.

3836. Otro (ROSEN).

℥ Alcohol de enebro. . . . ℥ij (60 gr.).
 Aceite de clavo,
 Aceite espeso de nuez
 moscada, ãã. . . . ℥β (2 gr.).
M. S. A. I. Lienteria, diarrea
 de los niños producida por atonía,
 enfermedades convulsivas, como
 el baile de San Vito; astenia de la
 matriz y hemorragias uterinas.
D. ℥ij á ℥jv (8 á 15 gr.) para fric-
 ciones en las diferentes partes con
 que se corresponden los órganos
 afectados.

3837. L. ARSENICAL (Swediaur).

℥ Aceite comun. ℥j (30 gr.).
 Oxido de arsénico. ḡij (1 dec.).
M. S. A. I. Ulceras cancerosas,
 úlceras de mal carácter, afeccio-
 nes cutáneas rebeldes, parálisis,
 sífilides, anestesia, cáncer, etc.
D. C. s. para una aplicacion muy
 ligera hecha con mucha pruden-
 cia.

**3838. L. ASTRINGENTE
(Knachstedt).**

℥ Extracto de Saturno,
 Aceite de beleño, ãã. c. s. q.
 Agua de rosas. c. s.
 Mézclese por trituracion.

I. Quemaduras en segundo, ter-
 cero ó cuarto grado. *D.* Se aplica
 por medio de compresas finas.

Cuando supuran mucho se pue-
 de usar el unguento de zinc con
 mirra.

3839. Otro (SCHWARTZ).

℥ Extracto de Saturno. ℥j (30 gr.).
 Aceite de linaza. . . . lbβ (230 gr.).
 Clara de huevo. . . . número 6.
 Se bate todo.

I. Recomendado en las quema-
 duras.

**3840. L. BALSÁMICO
(Dennemann).**

℥ Goma arábica en polvo. ℥ij (8 gr.).
 Aceite de alm. dulces. . ℥jβ (6 gr.).
 Bálsamo negro del Perú. ℥j (4 gr.).
 Agua destilada de rosas. ℥j (30 gr.).
M. S. A. I. Grietas del pecho en
 las nodrizas. *D.* Seis ó siete apli-
 caciones al dia. Se lava el pezon
 con agua tibia antes de dar de
 mamar.

3841. L. BARÍTICO.

℥ Agua de barita saturada en frio. 4
 Aceite comun. 6
M. I. Herpes, tiña.

3842. L. DE BAUMÉS.

℥ Aceite de belladona. . . ℥jβ (45 gr.).
 Agua de cal. ℥iij (90 gr.).
 Cerato de Galeno. . . . ℥v (20 gr.).
 Clorhidrato de morfina. ḡx (5 dec.).
I. Erupciones vesiculosas ó pu-
 rovesiculosas, acompañadas de
 alguna irritacion.

3843. L. DE BECK.

℥ Alcoholato de espliego,
 Alcoholato de sérpul, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Eter sulfúrico. ℥ij á ℥iij (8 á 12 gr.).
 Mézclese por agitacion. *I.* Vér-
 tigos nerviosos. *D.* Se hacen lo-
 ciones, muchas veces al dia, en
 la frente y en las sienas.

**3844. L. DE BELLADONA
(Sordet).**

℥ Extracto de belladona. . ℥j (30 gr.).
 Eter sulfúrico. ℥ij (60 gr.).
I. Se usa para facilitar la re-
 duccion de las hernias estrangula-
 das. *D.* En unturas frecuentes.
 En los intervalos se cubre el tu-
 mor con cataplasmas emolientes
 y narcóticas.

Nota. No es posible ejecutar es-
 ta fórmula.

3845. L. DE BENJUÍ.

℥ Tintura de benjuí. ʒj (4 gr.).
 Tintura de bálsamo
 del Perú. ʒxviiij (4 gr.).
 Aceite de almendras dulces,
 Agua de rosas, añ. ʒj (30 gr.).
M. S. A. I. Plica, sabañones,
 neumatosis, gota, lumbago. *D.*
 En fricciones.

3846. L. BORATADO (Harless).

℥ Borax. ʒj (4 gr.).
 Yema de huevo,
 Clara de huevo, añ. ʒij (8 gr.).
 Aceite de almendras dulc. ʒj (30 gr.).
 Bálsamo negro del Perú. ʒjβ (6 gr.).
M. I. Grietas del pezon. *D.* Tres
 ó cuatro aplicaciones al día.

3847. L. CALCAREO ó Jabon calizo (F. F.).

℥ Aceite de almendras
 dulces. ʒij (64 gr.).
 Agua de cal. lbj (500 gr.).
 Se agita en una botella, se deja
 apósar y se separa la masa blan-
 da jabonosa que sube á la super-
 ficie.

I. Se usa como dulcificante y re-
 solutivo contra las quemaduras en
 primer grado, es decir con rube-
 faccion pero sin elevacion de la
 epidermis. *D. C. s.* para cubrir li-
 geramente un pedazo de lienzo
 fino ó de papel de estraza muy
 delgado.

3848. L. CALMANTE.

℥ Alcanfor. ʒij (7 gr.).
 Esencia de manzanilla. ʒβ (15 gr.).
 Esencia de trementina. ʒj (30 gr.).

I. En fricciones en el epigastrio
 contra los vómitos, y en el pubis
 contra la iscuria.

3849. Otro (JUNG).

℥ Extracto de belladona. ʒj (4 gr.).
 Acetato de morfina. ʒvj (3 dec.).
 Jabon blando. ʒj (30 gr.).
 Aceite comun. ʒj (30 gr.).
I. Irritacion espinal y ciertas

neuralgias. *D.* En fricciones en la
 columna vertebral.

3850. L. CALMANTE Y RESOLUTIVO (Boyer).

℥ Bálsamo de Fioraventi,
 Alcohol de enebro,
 Agua triacal, añ. ʒij (60 gr.).
 Aceite de clavo. ʒj (4 gr.).
 Láudano de Rousseau. ʒiiij (12 gr.).
I. Dolores reumáticos.

3851. L. CANTARIDADO.

℥ Linimento amoniacal. ʒiiij (90 gr.).
 Alcanfor en polvo. ʒiiij (12 gr.).
 Tintura de cantáridas. 20 á 30 gotas
 Se agitará al tiempo de usarle.
I. Es estimulante enérgico que
 se usa en la parálisis, etc. *D.* En
 fricciones.

3852. Otro, n. 2.

℥ Tintura de cantáridas. ʒj (30 gr.).
 Alcohol alcanforado. ʒij (60 gr.).
M. I. y D. Se usa en fricciones
 sobre los miembros paralíticos y
 sobre las partes que se quiere es-
 timular.

3853. Otro, n. 3.

℥ Tintura de cantáridas. ʒijβ (10 gr.).
 Alcohol alcanforado. ʒj (30 gr.).
 Mostaza en polvo. ʒxc (5 gr.).
 Alcoholato de cspliego. ʒj (30 gr.).
 Aceite de laurel. ʒjβ (50 gr.).
M. I. Reumatismo crónico, ceá-
 tica, lumbago, parálisis, sarco-
 cele, meningitis, peritonitis. *D.*
 En fricciones dos veces al día.

3854. L. DE SESQUICARBONATO DE AMONIACO (F. DE L.).

℥ Solucion de sesquicar-
 bonato de amoniaco. ʒj (30 gr.).
 Aceite comun. ʒiiij (90 gr.).
M. Se agitan ambos líquidos
 hasta que estén bien mezclados.
I. Es excitante y se usa en fric-
 ciones.

3855. L. DE CARBURO DE AZUFRE.

℥ Carbuco de azufre. ʒβ (15 gr.).

Alcanfor. ʒij (8 gr.).
 Alcohol ʒj (30 gr.)
 ó Aceite de almendras dulc. ʒj (30 gr.).

I. Reumatismo, gota apirética, tofo artrítico, artrocace, gastralgia, aborto, parto laborioso. *D.* En fricciones.

3856. L. CARMINATIVO (*Writt*).

ʒ Bálamo anodino de
 Bath. ʒj (30 gr.).
 Aceite de macis. ʒʒ (45 gr.).
 Esencia de yerbabuena. ʒij (8 gr.).
 Mézclese perfectamente.

D. Una cucharada para frotar el epigastrio, cuando el enfermo se va á acostar.

3857. L. CIANURADO (*Caspari*).

ʒ Cianuro de sodio. . . ʒj (12 dec.).
 Lándano de Sidenham. ʒij (24 dec.).
 Manteca. ʒiij (12 gr.).

I. Peritonitis puerperal acompañada de accidentes convulsivos. *D.* En unturas al abdómen.

3858. L. CLOROSO (*Deimann*).

ʒ Hidrocloro medicinal. . 60 gotas.
 Aceite comun. ʒj (30 gr.).

I. Sarna inveterada, tiña anular, tiña favosa, úlceras atónicas, úlceras de mal carácter, manchas cutáneas á consecuencia de pústulas venéreas consecutivas. *D.* Dos ó tres aplicaciones al día.

3859. L. CLORURADO (*Kopp*).

ʒ Cloruro de cal líquido. ʒvj (24 gr.).
 Aceite comun. ʒjʒ (48 gr.).

M. I. Sarna inveterada, tiña, úlceras de mal carácter. *D.* Dos ó tres aplicaciones al día.

3860. L. CONFORTANTE (*Dubois*).

ʒ Bálamo de Fioraventi,
 Alcohol alcanforado,
 Aceite de almendras dulces,
 Amoniaco líquido, añ. . ʒij (60 gr.).

I. Infartos de las glándulas linfáticas. *D.* En fricciones.

3861. L. CONTRA LAS ALMORRANAS.

ʒ Ungüento populeon. . . ʒj (30 gr.).
 Aceite de sucino. . . . ʒij (8 gr.).

M. I. Mitiga el dolor de las almorranas endurecidas.

3862. L. CONTRA LA ASCITIS (*Lippich*).

ʒ Bálamo opodeldoc,
 Ungüento de altea, añ. . ʒj (30 gr.).
 Ungüento gris. ʒʒ (45 gr.).

M. S. A. D. En fricciones en el vientre.

Quando hay mucha atonía se usa el siguiente:

Tintura de cantáridas. . ʒj (4 gr.).

Bálamo opodeldoc,

Aceite volátil de enebro,

Ungüento gris, añ. . . . ʒiij (12 gr.).

M. S. A. D. En fricciones en los tegumentos abdominales.

3863. L. CONTRA EL CÓLERA ADINÁMICO (*Ranque*).

ʒ Aceite de manzanilla. 2
 Tintura etérea de quina amarilla. 4
 Mézclese y agítese al tiempo de usarle.

D. Una cucharada en fricciones en la parte interna de los muslos ó de las piernas, y principalmente en la parte lumbar del raquis.

3864. L. CONTRA LA COREA (*Chretien*).

ʒ Alcoholato de enebro. ʒjv (125 gr.).
 Esencia de clavo,
 Bálamo de nuez moscada, añ. ʒxc (5 gr.).

M. D. Se usa en fricciones en la columna vertebral con una cucharada de café de este linimento.

3865. L. CONTRA LAS ESCORIASIONES ó Escitodépsico.

ʒ Cocimiento de ʒij (60 gr.) de corteza de encina. ʒʒʒ (250 gr.).
 Extracto de Saturno. c. s.

ó hasta que no se forme precipitado, al que se lava y añade:

Alcohol. ʒij (7 gr.).

I. Escoriaciones por permanecer mucho tiempo en la cama.

3866. L. CONTRA LA GOTA.

ʒ Agua de laurel real. 16
 Eter sulfúrico. 2
 Extracto de belladona. 1
 Extracto de beleño. 4
 Mézclése.

3867. L. CONTRA LAS GRIETAS DE LOS PEZONES (H. DE AL.).

ʒ Agua de cal,
 Aceite de almendras dulces, añ. ʒiij (12 gr.)
 Extr. acuoso de opio. ʒj (5 cent.).
M. I. Se cubren los pechos con hilas empapadas en este linimento, y se colocan encima pezones artificiales con agujeritos para dar salida al aceite.

3868. L. CONTRA LA HIPERTROFIA DEL BAZO.

ʒ Extracto de cicuta. ʒljv (3 gr.).
 Aceite de beleño,
 Bálsamo opodeldoc, añ. ʒiij (12 gr.).
M. I. Infartos del bazo por intermitentes prolongadas.

3869. L. CONTRA LAS HIDROPESIAS.

NÚMERO 1.

ʒ Tintura de escila,
 Tintura de digital, añ. p. ig.

NÚMERO 2.

Tintura de digital,
 Vinagre escilitico. p. ig.

NÚMERO 3.

Tintura de semillas de colchico,
 Aceite amoniaca alcanf., añ. p. ig.

3870. L. CONTRA LA INFLAMACION DE LOS CARTÍLAGOS DE LOS PÁRPADOS.

ʒ Mucilago de semillas de membrillos,
 Albayalde, añ. ʒβ (15 gr.).
 Almidon. ʒij (8 gr.).

Goma tragacanto. ʒxij (6 dec.).
 Agua de rosas. c. s.

Se prepara S. A. una mezcla de la consistencia de unguento.

D. C. s. para cubrir muchas veces al dia el borde libre de los párpados inflamados.

3871. L. CONTRA LAS QUEMADURAS (H. M.).

ʒ Agua de cal. ʒjv (125 gr.).
 Aceite de almendras dulces. ʒβ (15 gr.).
M. Se usa como los siguientes.

3872. Otro (BOURGE).

ʒ Cloruro de cal líquido,
 Aceite blanco, añ. p. ig.
 Mézclése bien.

Se debe aplicar por medio de un lienzo fino ó hule agujereado. Se coloca tambien sobre este tafetan un poco de algodón cardado empapado en la misma solucion.

3873. L. PARA QUEMADURAS (H. DE M.).

ʒ Agua de cal. ʒxij (375 gr.).
 Aceite de simiente de linaza. ʒjv (125 gr.).
 Yemas de huevo. número 4.

Se bate las yemas de huevo con el aceite en un mortero de mármol, y se añade en veces el agua de cal, agitando fuertemente la materia á cada adición.

I. Se aplica humedeciendo las compresas ó planchuelas que cubren las quemaduras.

3874. L. CALMANTE Ó CONTRA LOS REUMATISMOS (*Reveillé Parisé*).

ʒ Extracto de belladona. ʒij (8 gr.).
 Se diluye en
 Agua de laurel real. ʒjv (125 gr.).
 Se añade:

Láudano de Rousseau. ʒj (4 gr.).
 Eter sulfúrico. ʒj (30 gr.).

Se menea al tiempo de usarle.

3875. L. CONTRA LOS SABAÑONES
(Berton).

℥ Bálsamo de Fioraventi. ʒij (8 gr.).
 Acetato de plomo. . . . ʒiij (12 gr.).
 Aceite comun. ʒiij (12 gr.).
 Acido-clorhídrico. . . . ʒj (4 gr.).

Se pone estas sustancias en un frasco de cristal, y se agitan hasta que la mezcla esté homogénea y forme linimento.

I. Se usa en fomentos ó fricciones suaves en los sabañones, principalmente para evitar la ulceración.

3876. Otro, n. 2.

℥ Agua de laurel real. . ʒv (150 gr.).
 Eter sulfúrico. ʒv (20 gr.).
 Extracto de belladona,
 Extracto de beleño, añ. ʒijβ (10 gr.).

M. I. Sabañones no ulcerados, grietas. *D.* En fricciones.

3877. Otro, n. 3.

℥ Manteca,
 Aceite de almendras
 dulces, añ. ʒj (30 gr.).
 Cera amarilla. . . . ʒijβ (10 gr.).

Se funde á fuego lento, se vierte en un mortero calentado, se agita, y cuando la mezcla esté casi fria se añade:

Alcanfor. ʒljv (3 gr.)
 disuelto en

Tintura de semillas de
 mostaza negra. . . ʒjβ (6 gr.).
 Aceite de espliego. . . ʒij (8 gr.).
 Amoniaco líquido. . . ʒjβ (6 gr.).

Se tritura el aceite con el álcali, se añade al jaboncillo la tintura que tiene el alcanfor en solucion, y se vierte todo en la masa fundida, agitando vivamente con la mano del mortero.

I. Sabañones no ulcerados. Se usa en fricciones estando cerca de la lumbre.

3878. Otro (COTTEREAU Y VERDÉ-DELISLE).

℥ Aceite de almendras dulces,
 Agua de cal, añ. ʒij (60 gr.).

Tintura de iodo. ʒj (4 gr.).
 Láudano de Rousseau. . ʒij (8 gr.).

M. S. A. I. Sabañones que han llegado al segundo período *D.* Se curan las ulceraciones mañana y noche con lienzos finos agujereados, empapados en este linimento.

3879. L. CONTRA LOS SABAÑONES.

℥ Acido clorhídrico,
 Cera blanca,
 Esperma de ballena, añ. ʒij (8 gr.).
 Bálsamo del Perú. . . . ʒj (4 gr.).
 Agua. ʒvj (24 gr.).
 Aceite de olivas. ʒij (64 gr.).

M. I. y D. Las mismas que el anterior.

3880. L. CONTRA LOS SABAÑONES
ó Pomada de Pearson.

℥ Aceite comun ʒv (150 gr.).
 Esencia de trementina. ʒij (60 gr.).
 Acido sulfúrico diluido. ʒβ (15 gr.).

II. S. A. I. Sabañones no ulcerados, neuralgias. *D. C. s.* para dar fricciones con cuidado en las partes enfermas.

• Nota El linimento de Pearson contra las neuralgias se compone de ʒij (60 gr.) de aceite comun, ʒjβ (45 gr.) de aceite de trementina y ʒj (4 gr.) de ácido sulfúrico.

3881. Otro (RICHARDIN).

℥ Alcohol rectificado. . ʒvij (224 gr.).
 Alcanfor,
 Amoniaco líquido, añ. ʒβ (16 gr.).
 Aceite volátil de manzanilla romana.
 Aceite volátil de enebro, añ. ʒljv (3 gr.).

3882. L. CONTRA LOS SABAÑONES
INMINENTES ó Linimento estimulante (Fievée).

℥ Bálsamo de Fioraventi. ʒjv (125 gr.).
 Acido clorhídrico. . . 32 gotas.

M. S. A. D. Una cucharada en fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

3883. L. CONTRA LA TIÑA
(Pourché).

℥ Aceite de olivas. . . . ʒvj (192 gr.).

Sulfuro de potasa. . . ʒjv (16 gr.).
 Amoniac. ʒj (32 gr.).
 Alcanfor. ʒß (2 gr.).
 M. S. A. I. Se hace caer las costras tiñosas con aceite comun, y se da diariamente una friccion sobre las partes enfermas.

Nota. Debe aumentarse la dosis del amoniaco hasta duplicarla.

3884. L. CONTRA LA TIÑA
 (Sydenham).

ʒ Aceite de almendras,
 Aceite de laurel,
 Ceniza de hojas de abrotano, añ. ʒj (30 gr.).
 Mézclese con cuidado. *D.* En fricciones á la cabeza cubriéndola despues con una vejiga de cerdo.

3885. L. DE DESADE.

ʒ Deutocloruro de mercurio. ʒij (8 gr.).
 Alcohol reetificado. . . ʒvj (24 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Aceite de manzanilla alcanforado. ʒij (64 gr.).
 Aceite volátil de trementina. ʒj (32 gr.).
 Láudano líquido de Sydenham. ʒij (8 gr.).
M. I. Dolores osteocopos. *D.* Dos aplicaciones al dia.

3886. L. DESECANTE Y CALMANTE.

ʒ Aceite de belladona. . . ʒj (30 gr.).
 Agua de cal. ʒij (60 gr.).
 Se mezcla y se añade:
 Cerato. ʒij (8 gr.).
 Clorhidrato de morfina. ʒvj (3 dec.).
I. Eczema crónico, afecciones pruriginosas.

3887. L. DE DIGITAL.

ʒ Extracto de digital. . . ʒj (4 gr.).
 Extracto de belladona. ʒß (2 gr.).
 Jabon amigdalino. . . ʒß (15 gr.).
 Tintura de beleño. . . ʒiij (90 gr.).
H. S. A. I. Palpitaciones, endocarditis, cardialgia, hipertrofia, afecciones orgánicas del corazon,

esplenitis, hepatitis, sabañones, hidrartrosis, hidrocéfalo, gota. *D.* En fricciones en la region precordial.

3888. L. DIURÉTICO.

ʒ Tintura de digital,
 Vinagre esecilítico, añ. . ʒj (30 gr.).
M. Se usa como los siguientes.

3889. Otro, n. 2.

ʒ Tintura de semillas de cólchico. ʒß (15 gr.).
 Aceite alcanforado amoniaal. ʒj (30 gr.).
M. Se usa como los siguientes.

3890. Otro (H. DE IT.).

ʒ Cebolla albarrana en polvo. ʒj (4 gr.).
 Jugo gástrico de vaca. . ʒij (60 gr.).
M. I. Hidropesias. *D.* Se hacen fricciones mañana y noche en la region de los lomos, en los casos de hidropesia cuando el enfermo no puede tomar interiormente las preparaciones de escila.

3891. Otro (KIESER).

ʒ Yema de huevo. ʒij (60 gr.).
 Aceite de trementina. . ʒj (30 gr.).
 Se los agita en un mortero de vidrio hasta mezclarlos perfectamente y despues se vierte poco á poco, meneando siempre,
 Agua de mentapiperita. ʒiij (90 gr.).
I. Disuria, iscuria y estranguria espasmódicas. *D.* ʒij á ʒjv (8 á 15 gr.) en fricciones en la region inguinal, mañana y noche.

3892. Otro (RULLIER).

ʒ Tintura de eseila,
 Tintura de digital, añ. . ʒij (60 gr.).
I. Produce buenos efectos en la anasarca sintomática, hidropesias, infiltraciones, hidrocele, hidrartrosis.

3893. Otro (SCHUBART).

ʒ Hojas de digital. ʒij (8 gr.).

Agua hirviendo. ℥j℞ (45 gr.).
Se infunde hasta que se enfríe,
se cuele y se añade S. A.

Esencia de trementina. ℥j (30 gr.).
Extracto de escila. . . ℥j (4 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 2.

I. Hidropesías, ascitis. *D.* En fricciones en el epigastrio y en lo interior de los muslos.

3894. L. DIURÉTICO (*Schmitt*).

℥ Hojas secas de tabaco. ℥iij (12 gr.).
Hojas secas de digital. . ℥iij (12 gr.).
Se infunden en ℥jv (125 gr.) de agua hirviendo, y despues de fría la infusion se añade:

Extracto de escila. . . ℥j (4 gr.).
Esencia de trementina. ℥j (4 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 2.

I. Ascitis. *D.* Se hacen dos ó tres fricciones al dia en la region de los riñones con una cucharada de este linimento.

3895. L. DIURÉTICO COMPUESTO.

℥ Lúpulo. ℥j (4 gr.).
ó Escila. ℥℞ (2 gr.).
Enebro. ℥℞ (15 gr.).
Polígala. ℥iij (12 gr.).

Se hierve en ℔j (500 gr.) de agua, se añade ℥℞ (2 gr.) de éter nítrico y se endulza.

I. Hidropesías, absceso, acne. *D.* Una cucharada cada dos horas.

3896. L. DULCIFICANTE (*Radius*).

℥ Yemas de huevo. . . . número 4.
Aceite de linaza. ℥ij (60 gr.).
Se mezcla por agitacion.

I. Quemaduras.

3897. L. EMOLIENTE (H. DE M.).

℥ Ungüento de altea,
Aceite comun, ãã. . . . ℥j (30 gr.).
Mézclese.

3898. L. EPILATORIO DE PIERQUIN ó rusma de los Orientales.

℥ Cal viva. ℥ij (60 gr.).
Sulfuro de arsénico
(amarillo ó rojo). . . ℥℞ (15 gr.).

Lejía alcalina. ℔j (500 gr.).
Se hierve hasta que el líquido sea bastante activo para que sumergida una pluma en él y extraída, se caigan sus barbas con facilidad.

D. Se aplica esta preparacion fria sobre las partes en que se quiere destruir los pelos; pero debe usarse con mucha circunspeccion por ser muy cáustica.

3899. L. EXCITANTE.

℥ Bálsamo de Fioraventi,
Aceite comun, ãã. . . . ℥ij (60 gr.).
Alcohol alcanforado. . . ℥j (30 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ℥j (4 gr.).

M. I. Se usa contra los reumatismos, parálisis, gangrena.

3900. Otro, n. 2.

℥ Aceite de almendras
dulces. ℥j (30 gr.).
Alcanfor. ℥℞ (2 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ℥j (4 gr.).
Alcoholato vulnerario. ℥j (4 gr.).
Tintura de cantáridas. ℥℞ (15 gr.).
Mézclese.

3901. L. ESTIMULANTE INGLÉS, Bálsamo de vida externo ó Alcohol de jabon amoniacal trementinado.

℥ Jabon medicinal. . . ℥j (30 gr.).
Se disuelve y se añade S. A.
Espiritu de sérpol. ℔jv (2000 gr.).
Esencia de trement. ℔℞ (250 gr.).
Amon. líquido. ℥ij á ℥j (8 á 30 gr.).

I. Parálisis, anquilosis falsa, tumores frios y artrodinia. *D.* ℥jv á ℥j (15 á 30 gr.) para fricciones mañana y noche en las partes enfermas.

Nota. Algunas veces se añade un cuartillo (1/2 lit.) de agua para hacer embrocaciones resolutivas.

3902. L. ESTIMULANTE.

℥ Acido nítrico. ℥ij (60 gr.).
Esencia de trementina. ℥iij (90 gr.).
Triaca. ℥j (4 gr.).
Miel. ℥j (30 gr.).
Alcohol. ℥vj (180 gr.).

M. I. Cólera. *D.* En fricciones.

3903. L. ESTIMULANTE BALSAMICO (Reil).

℥ Bals. negro del Perú. ℥℔ (15 gr.).
 Aceite de bayas de laurel. ℥℔ (15 gr.).
 Aceite de nuez moscada. ℥ij℔ (10 gr.).
 Esencia de clavo. . . . ℥℔ (2 gr.).
 H. S. A. *I.* Amaurosis por atonía, parálisis de los párpados, blefaroplejia. *D.* ḡxviiij á ʒj (1 á 4 gr.) en fricciones en las sienes y párpados.

3904. L. ESTIMULANTE (Magendie).

℥ Tintura de nuez vómica. ℥j (30 gr.).
 Amoniaco líquido ℥ij (8 gr.).
M. I. Parálisis. *D.* En fricciones.

3905. L. ESPIRITUOSO ANODINO.

℥ Opio. ʒj (4 gr.).
 Jabon blanco raspado. ℥℔ (15 gr.).
 Alcanfor. ℥ij (8 gr.).
 Alcohol. ℥jv (125 gr.).
 H. S. A. *I.* Se usa como resolutive y fortificante, y tiene mucha analogía con el bálsamo opodeldoc.

3906. Otro (SCHMITH).

℥ Digital en polvo. . . . ℥iij (12 gr.).
 Tabaco en polvo. . . . ℥iij (12 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℥v (150 gr.).
 Se infunde hasta que se enfríe, se cuela y despues se añade S. A.
 Extracto de escila. . . ʒj (4 gr.).
 Esencia de trementina. ʒj (4 gr.).
 Yemas de huevo. . . . número 2.
I. Ascitis esencial. *D.* Una cucharadita de café en fricciones, en la region de los riñones, dos ó tres veces al dia.

3907. L. ESTIMULANTE OPIADO (Fahnestock).

℥ Aceite animal de Dippel,

Aceite volátil de orégano,
 Aceite comun,
 Tintura de opio, añ. . . ℥j (30 gr.).
M. I. Reumatismo muscular y fibroso. *D.* Cada veinte minutos se aplica una cucharada de este linimento calentado en una vasija tapada, y se aplica encima una franela bien caliente ó un hule.

3908. L. ESTIMULANTE RESOLUTIVO.

℥ Alcoholato de Fioraventi. ℥ij (60 gr.).
 Alcoholato de romero. ℥ij (60 gr.).
 Tintura de cantáridas. . ℥ij (8 gr.).
M. I. Reumatismo, parálisis, etc.
D. Se usa en fricciones.

3909. L. ESTIMULANTE RUBEFACIENTE (Petit).

℥ Esencia de trementina. ℥ij (60 gr.).
 Amoniaco líquido. . . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Se usa en fricciones ó se aplica sobre la columna vertebral en los casos de cólera ó de tétanos.

3910. L. DE ESTRICNINA.

℥ Estricnina. ʒ℔ (2 gr.).
 Aceite comun. ℥j℔ (45 gr.).
 Disuélvase S. A. *I.* Amaurosis.
D. Diez gotas en fricciones que se repiten tres veces al dia en las sienes. Es ventajoso aplicar una cataplasma para favorecer la absorcion de la sustancia activa.

3911. Otro (FURNARI).

℥ Aceite comun. ℥jv (125 gr.).
 Amoniaco líquido. . . ℥ij (8 gr.).
 Bálsamo de Fioraventi. ℥℔ (15 gr.).
 Estricnina. ḡvj (3 dec.).
I. Amaurosis tórpida. *D.* En fricciones en las sienes y frente.

3912. L. ETÉREO DE TREMENTINA.

℥ Eter nítrico. ℥℔ (15 gr.).
 Esencia de trementina. ℥j (30 gr.).
I. Hepatitis crónica, cálculos biliares, espasmos, ictericia, diabetes, pleurodinia, acrodinia, reu-

matismo, gota, lumbago, herpes, neumatosiis, tétanos, meningitis, neuritis y parálisis. *D.* En fricciones en el hipocondrio derecho.

3913. L. EXCITANTE.

℥ Tintura de opio,
Aceite de succino rectificado, *ãã.* ℥ij (8 gr.).
Aceite comun. ℥℞ (15 gr.).
Aguardiente. ℥ij (60 gr.).
I. y D. Aconsejado en fricciones entre las espaldillas contra la coqueluche.

3914. Otro, n. 2.

℥ Alcanfor,
Nuez moscada, *ãã.* ℥j (4 gr.).
Eter sulfúrico. ℥℞ (15 gr.).
I. Parálisis. *D.* En fricciones en la columna vertebral.

3915. Otro (GRAEFFE).

℥ Alcoholato de menta,
Alcoholato de sérpol,
Alcoholato de romero,
Alcoholato de espl., *ãã.* ℥ij (60 gr.).
Mistura oleo-balsámica. ℥℞ (15 gr.).
Tintura amoniaca. ℥j (30 gr.).
I. Parálisis parcial debida á una conmocion fuerte. *D.* ℥ij á ℥℞ (8 á 15 gr.) al dia en fricciones.

3916. Otro (H. DE AL.).

℥ Amoniaco líquido,
Petroleo, *ãã.* ℥j (30 gr.).
M. I. y D. Se usa en fricciones sobre el vientre en los cólicos nerviosos y sobre los miembros en los espasmos, etc.

3917. Otro (H. M. F.).

℥ Tintura de cantáridas. ℥j (4 gr.).
Jabon medicinal seco. ℥ij (8 gr.).
Aceite comun. ℥j (30 gr.).
H. S. A. I. Reumatismo crónico.
El LINIMENTO EXCITANTE CANTARIDADO se prepara añadiendo al anterior $\tilde{\text{g}}\text{xc}$ (5 gr.) de alcanfor.

3918. L. EXCITANTE CANTARIDADO (Chomel).

℥ Aceite de almendras dulces. ℥jv (123 gr.).

Alcanfor. ℥℞ (2 gr.).
Disuélvase. Por separado se toma:

Tintura de cantáridas. ℥℞ (15 gr.).
Jabon medicinal. ℥j (30 gr.).
Se disuelve *S. A.* y despues se añade la solución aceitosa y se mezcla.

I. Reumatismos crónicos. *D.* Dos ó tres fricciones al dia.

3919. L. EXCITANTE TREMENTINADO.

℥ Pimienta de Guinea. 60
Alcanfor. 15
Esencia de trementina. 100
Alcohol. 200
M. S. A. I. Tétanos, cólera, artrodinia, pleurodinia, meningitis, anquilosis, lumbago, gota, nefritis, cistitis, diabetes, parálisis, hidrocefalo. *D.* En fricciones en el raquis.

3920. Otro (H. DE AL.).

℥ Tintura de cantáridas. ℥iij (12 gr.).
Esencia de trementina. ℥j℞ (45 gr.).
Amoniaco líquido. ℥j℞ (6 gr.).
M. I. Parálisis.

3921. L. DE EXTRACTO DE BELLADONA.

℥ Extracto blando de belladona. ℥j (4 gr.).
Cerato simple. ℥j (4 gr.).
Aceite. ℥v (20 gr.).
Se diluye el extracto en ℥j (4 gr.) de agua, se pone el cerato en un mortero, se vierte un poco de aceite, se tritura y se añade luego la solución del extracto.

3922. L. FEBRÍFUGO ó Linimento trementinado (Bellecontre).

℥ Esencia de trement. ℥jv (125 gr.).
Láudano de Rousseau. ℥j (4 gr.).
M. I. Calenturas intermitentes rebeldes al sulfato de quinina. *D.* En fricciones en la columna vertebral durante la apirexia, á la dosis de dos cucharadas cada fricción á los adultos. Se hará cada

fricción una ó dos horas antes del paroxismo, y se continuará así durante algun tiempo para impedir la recidiva de la fiebre.

Se harán las fricciones con suavidad para que no se irrite la piel, y se aumentará gradualmente la dosis de la esencia de trementina para que no pierda su accion.

3923. L. FORTIFICANTE (Double).

℞ Bálsamo de Fioraventi,
Tintura de quina,
Alcohol,
Aguard. alcanfor., añ. ʒ℔ (15 gr.).
Agua de melisa com-
puesta. ʒj (30 gr.).
Tintura etérea de digi-
tal. ʒij (60 gr.).
Mézclese.

3924. L. FOSFORADO.

℞ Aceite de almendras
dulces. lbj (500 gr.).
Fósforo en pedazos. ʒxxx (15 dec.).
Se disuelve á fuego lento y se
cuela despues de frío.

I. Reumatismos rebeldes, parálisis, atrofia y ciertas afecciones herpéticas. *D.* ʒ℔ á ʒj (15 á 30 gr.) para fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

3925. Otro (GERDESSEN).

℞ Fósforo. ʒvj (3 dec.).
Aceite animal de Dip-
pel. ʒij℔ (10 gr.).
Disuélvase. *I.* Parálisis parcia-
les. *D.* ʒxviiij (1 gr.) en fricciones
dos ó tres veces al dia.

3926. Otro (GORDEN).

℞ Fósforo. ʒij (24 dec.).
Esencia detrementina,
Esencia de sabina, añ. ʒ℔ (15 gr.).
Se disuelve y se añade:
Amoniaco liquido. . . ʒij (60 gr.).
M. I. Gota, reumatismos cróni-
cos. *D.* Una fricción al dia, al sa-
lir de un baño tibio.

3927. L. FOSFORADO AMONIACAL.

℞ Fósforo. ʒxviiij (1 gr.).

Aceite de sabina. . . . ʒj (32 gr.).
Aceite de trementina. ʒv (20 gr.).
Alcanfor. ʒxc (5 gr.).
Amoniaco liquido. . . ʒ℔ (2 gr.).

I. Reumatismo crónico, lumba-
go, parálisis, apoplejía, pleure-
sia, espasmos, tétanos, calentu-
ras intermitentes, neumatosis, a-
trofia, diabetes, disenteria, me-
ningitis, envenenamiento. *D.* En
fricciones.

3928. L. DE GOMA AMONIACO.

℞ Goma amoniaco. . . . ʒjv (125 gr.).
Vinagre escilitico. . . c. s.

I. Tumores blancos de las arti-
culaciones, tumores enquistados.

3929. L. DE HENSCHEL.

℞ Bálsamo del Perú. . . . ʒ℔ (2 gr.).
Eter clorhídrico. . . . ʒij (8 gr.)
Tintura de opio. . . . ʒij (8 gr.).

M. I. Sabañones, grietas del
pecho, crup. *D.* Para dos ó tres
fricciones.

3930. L. DE HUFELAND.

℞ Ungüento de altea. . . ʒj (30 gr.).
Hiel de buey reciente,
Jabon blanco, añ. . . . ʒiij (12 gr.).
Aceite de petroleo. . . . ʒij (8 gr.).
Alcanfor. ʒj (4 gr.).
Sal volátil de cuerno de
ciervo. ʒ℔ (2 gr.).

M. S. A. I. Tumores glandulosos
y particularmente los que se atri-
buyen á causa escrofulosa. *D.* Una
cucharada de café para fricciones
cada tres horas en las partes en-
fermas.

3931. L. HÚNGARO.

℞ Alcanfor en polvo. . . ʒj (40 gr.).
Pimienta en polvo. . . ʒ℔ (20 gr.).
Harina de mostaza. . . ʒj (40 gr.).
Ajo machacado. . . . ʒ℔ (20 gr.).
Cantáridas en polvo. . ʒij (10 gr.).

Se digiere durante veinticuatro
horas en:

Vinagre. ʒij (80 gr.).
Alcohol rectificado. . ʒjv (160 gr.).

I. Es un excitante energético que

se usa en fricciones en el cólera, para llamar el calor á los pies; en el reumatismo, ceática, gota, torceduras.

**3932. L. IRRITANTE
CANTARIDADO.**

℥ Tintura de cantáridas. ℥ij℞ (40 gr.).
Alcanfor. ℥j℞ (6 gr.).
Esencia de trementina ℥j (30 gr.).
Amoniaco liquido. . . ḡxc (5 gr.).

M. I. Reumatismo, ceática crónica, lumbago, parálisis, anestesia, tétanos, sarcocele, cólera, meningitis, envenenamiento. *D.* En fricciones.

3933. L. IODADO.

℥ Tintura de iodo. . . . ḡxc (3 gr.).
Láudano de Rousseau. ℥ij℞ (40 gr.).
Aceite de almendras
dulces. ℥ij (60 gr.).
Agua de cal. ℥ij (60 gr.).

M. I. Sabañones, heridas, escrófulas, adenitis ulcerada. *D.* En lociones y fricciones.

3934. L. DE IODO (*Mac Diarmid*).

℥ Iodo. ḡxviii (4 gr.).
Aceite comun. ℥j (30 gr.).

I. Diarreas y otras afecciones intestinales. *D.* Una ó dos aplicaciones á todo el abdomen á los niños y algunas mas á los adultos. Alivia muy pronto las diarreas agudas de los niños. En las formas crónicas conviene unirle á otros medicamentos; así en el tratamiento de la atrofia mesentérica se le une al aceite de hígado de bacalao en lugar del aceite comun.

**3935. L. DE JABON COMPUESTO ó
Alcohol de jabon alcanforado
(F. DE L.).**

℥ Jabon duro raspado. . ℥iij (90 gr.).
Alcanfor. ℥j (30 gr.).
Alcoholato de romero. ℞bj (500 gr.).

Se disuelve el alcanfor en el espíritu, se añade el jabon y se di-

giere á fuego lento hasta que se funda.

3936. L. JABONOSO.

℥ Jabon medicinal. ℥℞ (45 gr.).
Bálsamo de Fioraventi. ℥ij (60 gr.).
Alcohol de 30°. ℥℞ (45 gr.).

M. I. Se usa como resolutivo en los casos de tumores crónicos é indolentes, dolores reumáticos, infartos y contractura de las articulaciones.

3937. Otro (F. F.).

℥ Tintura de jabon. . . . ℥j (32 gr.).
Aceite de olivas. ℥j (4 gr.).
Alcohol de 34 ℥j (32 gr.).

Se mezclan agitándolos, y se conserva el producto en una botella bien tapada.

I. Es irritante y se usa como resolutivo á la vez en las afecciones reumáticas y gotosas, neuralgias, etc. Se aplica en los puntos en que reside la enfermedad.

Añadiendo ℥ij (8 gr.) de amoniaco, se tendrá el linimento jabonoso amoniacoal, y con ℥ij (8 gr.) de alcanfor, el linimento amoniacoal alcanforado que tiene los mismos usos que el bálsamo opodeldoc.

**3938. L. JABONOSO ALCANFORADO
(F. N. P.).**

℥ Jabon duro raspado. ℥jv (425 gr.).
Alcanfor. ℥j (30 gr.).
Alcohol de 25°. ℥xij (375 gr.).
Esencia de romero. . . ℥℞ (45 gr.).

H. S. A. I. Tumores atónicos, contusiones despues de haber pasado el período inflamatorio, dolores reumáticos crónicos. *D.* En fricciones.

3939. Otro (FERRIAR).

℥ Ungüento digestivo amarillo. ℥j (30 gr.).
Jabon verde de trementina. ℥℞ (45 gr.).
Alcanfor. ℥ij (8 gr.).

M. S. A. I. Reumatismos, dolores

artríticos, lupias y tumores enquistados. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) para fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

3940. L. JABONOSO HIDROSULFURADO ó Pomada de Jadelot (F. F.).

ʒ Jabon blanco. . . . lbj (500 gr.).
 Aceite de simiente de adormideras. . . . lbij (1000 gr.).
 Sulfuro de potasa en polvo seco. . . . ʒij (96 gr.).

Se ralla ó se corta el jabon segun su consistencia y se reblandece con ʒj (30 gr.) de agua en una cazuela al calor del baño maría, batiéndole con la mano de un mortero, y cuando la masa esté bien homogénea se va echando en veces primero el aceite y despues el sulfuro de potasa sin dejarlo de agitar.

Este medicamento se altera muy pronto cuando se expone al aire, por lo que solo se debe preparar la cantidad que se necesite.

I. Sarna y otras afecciones de la piel. *D.* ʒj (30 gr.) cada dia en fricciones.

Nota. El tratamiento dura comunmente ocho dias.

3941. L. JABONOSO (*Koempf*).

ʒ Alcohol á 30°. . . . ʒjv (125 gr.).
 Jabon alcalino de sosa. . . . ʒj (30 gr.).
 Alcanfor. . . . ʒlx (30 dec.).

Se pone el jabon raspado en una cazuela con el alcohol, despues se le inflama y se menea la mezcla con una barra de vidrio, y cuando cesa de arder se mezcla exactamente el alcanfor.

I. y *D.* Esta preparacion, análoga al bálsamo opodeldoc, tiene los mismos usos.

3942. L. JABONOSO IODURADO (*Dr. Morrés*).

ʒ Jabon medicinal. . . . ʒv (20 gr.).
 Ioduro de potasio. . . . ʒß (2 gr.).

Mézclese é incorpórese exactamente S. A.

Morrés le ha usado con ventaja en el tratamiento del hidrocele.

D. En fricciones en el tumor por la noche. Se ha usado tambien en fricciones en los casos de bocio, y en algunos casos se ha obtenido la curacion ó un grande alivio.

3943. L. JABONOSO OPIADO ó Linimento anodino (F. P.).

ʒ Aceite de almendras dulces. . . . ʒij (64 gr.).
 Jabon medicinal. . . . ʒjv (16 gr.).
 Tintura de opio. . . . ʒj (32 gr.).

Se disuelve el jabon en el alcohol y se añade el aceite.

3944. L. JABONOSO TREMENTINADO (*Jack*).

ʒ Jabon animal en polvo. . . . ʒijß (10 gr.).
 Esencia de trementina. ʒv (160 gr.).

Se funde en el baño maría y se echa en frascos como los del bálsamo opodeldoc. Se le pueden añadir esencias de buen olor, como aceites etéreos, alcanfor, etc.

3945. L. DE LOS JUDIOS.

ʒ Vinagre. . . . lbß (250 gr.).
 Alcohol. . . . lbj (500 gr.).
 Alcanfor en polvo. . . ʒß (15 gr.).
 Pimiento en polvo. . . ʒij (8 gr.).
 Mostaza en polvo. . . ʒß (15 gr.).
 Ajo machacado. . . ʒij (8 gr.).
 Cantáridas en polvo. ʒß (2 gr.).

Se pone en un frasco tapado y se infunde durante ocho dias.

I. Cólera, reumatismo, ceática, gota, torceduras. *D.* En fricciones.

Nota. Solo se diferencia del linimento húngaro en las cantidades de los componentes.

3946. L. LAUDANIZADO.

ʒ Cerato simple (sin agua). ʒj (4 gr.).

Láudano líquido. ʒj (4 gr.).
 Aceite de almendras. ʒj (30 gr.).
 Se mezcla el cerato con un poco del aceite en un mortero, se tritura, se añade el láudano por partes y de cuando en cuando se echa un poco de aceite.

3947. L. MAMILAR (Dannemann).

ʒ Balsamo del Perú. ʒj (4 gr.).
 Goma arábica. ʒij (8 gr.).
 Aceite de almendras. ʒjβ (6 gr.).
 Agua de rosas. ʒj (30 gr.).
M. D. En fricciones en los pechos ulcerados.

3948. Otro (RIBKE).

ʒ Balsamo del Perú. ʒj (4 gr.).
 Manteca de cacao. ʒβ (15 gr.).
M. I. Ulceras de los pechos. *D.* Se aplica tres ó cuatro veces al día á las partes afectadas.

3949. Otro (HAGLESS).

ʒ Balsamo del Perú. ʒjβ (6 gr.).
 Borax. ʒj (4 gr.).
 Yema y clara de huevo, ʒjv á ʒvj (16 á 24 gr.).
 Aceite de almendras. ʒj (32 gr.).
M. I. Grietas de los pechos. *D.* En fricciones.

3950. L. MERCURIAL OPIADO ó Linimento antivenéreo.

ʒ Ungüento mercurial doble. 4
 Aceite de almendras dulces. 48
 Láudano líquido. 3
 Mézclase bien.

I. Ulceras muy inflamadas del glándula. *D.* Se usa en inyecciones ó lociones, según el estado del prepucio, dos ó tres veces al día.

3951. L. MERCURIAL (Most).

ʒ Aceite de beleño. ʒj (30 gr.).
 Pomada mercur. doble. ʒjβ (6 gr.).
 Acido clorhídrico. ʒβ (15 gr.).
M. I. Anginas en su principio.
D. Dos fricciones al día al cuello.

3952. L. MERCURIAL AMONIACAL (H. DE M.).

ʒ Ungüento de mercurio terciado.
 Amoniaco liq. á 22°, añ. ʒj (4 gr.).
 Aceite comun. ʒj (30 gr.).
 Se mezcla el aceite con el unguento y se añade el amoniaco.

I. Infartos glandulares indolentes de naturaleza venérea y bubones venéreos.

3953. L. MERCURIAL AMONIACAL ALCANFORADO (H. DE M.).

ʒ Ungüento de mercurio terciado,
 Manteca, añ. ʒij (60 gr.).
 Alcanfor,
 Amon. líquido á 22°, añ. ʒj (8 gr.).
 Se pulveriza el alcanfor con un poco de alcohol, se incorpora con la manteca y el unguento de mercurio, se añade después el amoniaco y se agita perfectamente.

I. y D. Se usa en fricciones para favorecer la resolución de los tumores venéreos.

3954. L. MERCURIAL COMPUESTO (F. DE L.).

ʒ Ungüento mercurial fuerte,
 Manteca, añ. ʒjv (125 gr.).
 Alcanfor. ʒj (30 gr.).
 Espir. de vino rectific. ʒj (30 gr.).
 Solucion de amoniaco. ʒjv (125 gr.).

Se tritura el alcanfor en el espíritu, y después la manteca y el unguento; se vierte después poco á poco la solución de amoniaco y se mezcla todo.

3955. L. MURIÁTICO COMPUESTO.

ʒ Balsamo del Perú. ʒj (4 gr.).
 Esperma de ballena,
 Cera blanca,
 Acido clorhídrico, añ. ʒij (8 gr.).
 Agua. ʒj (30 gr.).
 Aceite comun. ʒij (60 gr.).

M. I. Sabañones. *D.* En fricciones.

3956. L. DE MUSTARD.

ʒ Ungüento epispástico. ʒj (30 gr.).

Alcanfor. ʒ℞ (15 gr.).
 Esencia de trementina. ʒiij (12 gr.).
 H. S. A. *I.* Gota y reumatismos crónicos. *D.* C. s. para fricciones ligeras, mañana y noche, en las partes enfermas.

3957. L. NARCÓTICO.

ʒ Balsamo de Fioraventi. ʒj (30 gr.).
 Balsamo tranquilo. . . ʒ℞ (45 gr.).
 Vinode opio compuesto. ʒj (4 gr.).
I. Dolores vivos con poca inflamación.

3958. Otro, n. 2.

ʒ Aceite de almendras dulces. . . . 16
 Láudano de Rousseau. 4
 ó Láudano de Sydenham. 2
M. I. Reumatismo. *D.* C. s. para fricciones ligeras.

3959. Otro (F. F.).

ʒ Balsamo tranquilo. . . . ʒiij (64 gr.).
 Láudano de Sydenham. ʒij. (8 gr.).
 Se mezclan agitándolos fuertemente.
I. Dolores nerviosos y reumáticos, neuralgias, etc. *D.* En fricciones en los puntos doloridos.

El LINIMENTO SEDANTE DE LOS H. DE M. es igual al anterior.

3960. L. NEGRO (Schmucker).

ʒ Emplasto negro de Bockholtz. ʒj (30 gr.).
 Aceite de hipericon. . . ʒj℞ (45 gr.).
M. I. Ulceras en los pechos que se encaminan á degenerar en cáncer; pero no cura las úlceras verdaderamente cancerosas.

3961. L. DE NEUMANN.

ʒ Alcanfor. ʒxij (6 dec.).
 Eter sulfúrico. ʒij. (8 gr.).
 Aceite de clavo. 6 gotas.
I. Viruelas en la conjuntiva. Se aplica por medio de un lienzo.

3962. L. NITRO ALCANFORADO (J. Frank).

ʒ Alcanfor en polvo. ʒj (4 gr.).

Nitrato de potasa. ʒij (8 gr.).
 Miel sin espuma. c. s.
 H. S. A. un linimento difluente.
I. Efélides. *D.* Dos fricciones al día.

3963. L. OBSTÉTRICO.

ʒ Carburo de azufre. . . . ʒij (8 gr.).
 Aceite de cornezuelo de centeno. ʒj (30 gr.).
M. I. Inercia de la matriz, partos laboriosos, aborto. *D.* En fricciones al abdómen.

3964. L. OPTÁLMICO (Magne).

ʒ Amoniaco líquido. ʒij (8 gr.).
 Tintura concentrada de nuez vómica. ʒij (8 gr.).
 Tintura de azafran. . . . ʒ℞ (2 gr.).
 Alcoholato de bergamota. ʒ℞ (2 gr.).
 Alcoholato de espliègo. . ʒj (4 gr.).
 Eter acético. ʒj (4 gr.).
I. Ambliopia y amaurosis asténica. *D.* Media cucharada de café en fricciones, una ó dos veces al día, en las sienes, frente y al rededor de las órbitas.

3965. L. OLEOSO COMPUESTO.

ʒ Aceite de olivas. . . . ʒij℞ (75 gr.).
 Aceite de trementina. ʒj (30 gr.).
 Acido clorhídrico. . . . 45 gotas.
 Se mezclan los aceites, y despues se añadirá poco á poco el ácido clorhídrico mezclándolo todo bien.
I. Enfermedades crónicas de las articulaciones; corrige los efectos de las dislocaciones y contusiones.

3966. L. OLEO ZINCADO (Meyer).

ʒ Oxido de zinc sublim. ʒxij (6 dec.).
 Aceite de almendras dulces,
 Manteca de cacao, añ. ʒj (4 gr.).
 Esencia de bergamota. ʒvj (3 dec.).
I. Grietas de los pechos, de los labios y de las manos; hemorroides. *D.* En aplicacion ó en fricciones.

3967. L. OPIADO.

℞ Linimento calcáreo. . . ℥j (30 gr.).
Láud. de Sydenham. 15 á 20 gotas.
I. Quemaduras no ulceradas.

3968. L. DE OPIO (F. DE L.).

℞ Linimento de jabon. . . ℥vj (180 gr.).
Tintura de opio. ℥ij (60 gr.).
M. I. Gastrodinia, dolores reumáticos. D. En fricciones.

3969. L. PAREGÓRICO.

℞ Extracto de acónito,
Extracto gomoso de opio,
Extr. de belladona, añ. ℥jx (50 cent.).
Amoniaco líquido. ℥ß (2 gr.).
Aceite alcanforado de
beleño. ℥iij (100 gr.).
Esencia de trementina. ℥ijß (10 gr.).
H. S. A. I. Dolores osteocopos,
reumatismo crónico, ceática, hidroraquis, histeralgia, otalgia.
D. En fricciones, mañana y noche.

3970. L. DE PISSIER.

℞ Cera blanca. 4
Se liquida en
Aceite de linaza. 8
Se añade despues de frio:
Tintura de opio. 2
Se empapa una planchuela de
hilas, con la cual se curan los cán-
ceres ulcerados.

3971. L. PURGANTE Ó RUBEFACIENTE.

℞ Carbonato de sosa. ℥x (5 dec.).
Se tritura en un mortero de
vidrio y se añade poco á poco:
Alcohol de yerbabuena. ℥ß (15 gr.).
Aceite de croton tiglio. ℥jv (2 dec.).
I. Afecciones reumáticas y como
purgante. D. Se usa en fricciones
sobre el abdómen.

3972. L. PURGANTE.

℞ Aceite de croton. 6 gotas.
Aceite comun. ℥j (4 gr.).
Se agita con violencia.
I. Se usa en fricciones al rede-

dor del ombligo. Se cubrirá con
una piel el dedo con que se ha de
hacer las fricciones.

3973. L. PURGANTE (Moll).

℞ Aceite de croton. 3 gotas.
Goma arábiga. ℥jß (6 gr.).
Infusion de ℥j (4 gr.)
de tabaco. ℥v (150 gr.).
I. Aconsejado contra el vómito
estercoráceo.

3974. L. DEL DOCTOR RAST.

℞ Aceite rosado. ℥ij (60 gr.).
Ungüento populeon. ℥ß (15 gr.).
Alcanfor. ℥ß (2 gr.).
Extracto de Saturno. ℥j (4 gr.).
Mézclese exactamente.
I. Meteorismo de vientre, que
procede del órgano uterino. D. En
unturas al vientre.

3975. L. DE REIL.

℞ Aceite de laurel. ℥v (20 gr.).
Aceite de macis. ℥ijß (10 gr.).
Aceite de clavo. ℥j (4 gr.).
Bálsamo del Perú. ℥v (20 gr.).
M. I. Blefaroplejia. D. En fric-
ciones en las sienes y los párpados.

3976. L. RESOLUTIVO.

℞ Alcoholato de Fioraventi,
Alcoholato de melisa
compuesto, añ. ℥ij (60 gr.).
M. Se usa en fricciones.

3977. Otro, n. 2.

℞ Agua de cal. ℥ß (2 gr.).
Aceite blanco. ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. ℥ij (8 gr.).
M. I. Inflamaciones superficiales
de la piel.

3978. Otro, n. 3.

℞ Aceite comun. ℥ij (60 gr.).
Esencia de trementina. ℥ß (15 gr.).
Mézclese y agítese al tiempo
de úsarle.
I. Produce buenos efectos con-

tra el edema parcial ó general de los miembros inferiores.

El LINIMENTO DE KENTISH se diferencia del anterior en que contiene unguento basilicon en lugar del aceite comun, y produce tambien buenos efectos en las hinchazones edematosas.

3979. L. RESOLUTIVO.

- ℥ Vinagre. ℥xij (6 dec.).
 - Sal amoniaco. ℥ij (8 gr.).
- M. I.* Tumores glandulosos.

3980. Otro, n. 2.

- ℥ Hiel de buey. ℔B (250 gr.).
- Sal comun. ℥jB (45 gr.).
- Aceite de nuez. ℥ij (60 gr.).

Se expone la mezcla al calor moderado de un horno durante treinta y seis horas.

I. Tumores frios é indolentes. *D.* Se empapa un poco de estopa ó hilas en este linimento, y se le aplica sobre el tumor.

3981. Otro, n. 3.

- ℥ Vino aromático. ℥vj (180 gr.).
- Tintura de iodo,
- Tintura de quina, ãã. ℥ij (60 gr.).

I. Infartos edematosos de los miembros inferiores. *D.* Una friccion por las mañanas.

3982. Otro (BECKER).

- ℥ Alcohol alcanforado,
- Alcohol. de enebro, ãã. ℥j (30 gr.).
- Vinagre escilitico. ℥B (15 gr.).

M. I. Tumores sanguíneos de la cabeza en los recién nacidos. *D.* Tres ó cuatro aplicaciones tibias al dia.

3983. Otro (FRANK).

- ℥ Alcanfor. 4
- Subcarbonato de potasa. 7
- Miel. c. s.

I. Para resolver las equimosis.

3984. L. RESOLUTIVO (Grekler).

- ℥ Acido clorhídrico,
- Acido nítrico, ãã. ℥B (15 gr.).

Aceite de linaza. ℥jv (125 gr.).

M. I. Manchas escorbúticas, dando interiormente el cloro ó una mezcla de una parte de ácido nítrico y dos de ácido clorhídrico.

3985. Otro (HUFELAND).

- ℥ Ungüento de altea. ℥j (30 gr.).
- Hiel de buey,
- Jabon blanco, ãã. ℥iij (12 gr.).
- Aceite de petróleo,
- Carbonato de amoniaco piroaceitoso, ãã. ℥ij (8 gr.).
- Alcanfor. ℥j (4 gr.).

I. Atrofia mesentérica, escrófulas, apoplejía. *D.* En fricciones al vientre cada tres horas.

3986. Otro (POTT.)

- ℥ Esencia de trementina. ℥ij (60 gr.).
- Acido clorhídrico. ℥j (30 gr.).

H. S. A. I. Reumatismo, dolores artríticos, lupias y tumores enquistados. *D.* ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) para fricciones en las partes enfermas, mañana y noche.

El LINIMENTO RESOLUTIVO DE POTT DE LOS H. DE M. se compone de ℥ij (60 gr.) de trementina y ℥B (15 gr.) de ácido clorhídrico.

3987. L. RESOLUTIVO ALCANFORADO.

- ℥ Alcanfor,
- Jabon negro, ãã. ℥iijB (10 gr.).
- Agua de cal. ℥B (15 gr.).
- Aceite de beleño. ℥ij (60 gr.).
- Aceite de trementina. ℥B (15 gr.).

I. Reumatismo, ceática, neuralgias, contusiones, escrófulas, quemaduras, congelacion, tialismo, cistitis, gastralgia, cardiopalmia. *D.* En dos fricciones.

3988. L. RESOLUTIVO CON PETROLEO (Tott).

- ℥ Bálsamo opodeldoc. ℥j (30 gr.).
- Petroleo. ℥B (2 gr.).

H. S. A. I. Hidrartrosis, orquitis crónica, tumores glandulosos. *D.* Dos ó tres unturas al dia.

3989. L. RESOLUTIVO Y ESTIMULANTE (Stoll).

℞ Emplasto vejigatorio,
Ungüento de altea, añ. ℥j (30 gr.).
Aceite de linaza,
Aceite de almendras,

ó Aceite comun c. s.
para hacer un linimento al que se
añade :

Tintura de cantáridas. ℥j (12 dec.).

M. I. Parálisis, gota asténica,
reumatismo crónico, infartos frios.
D. En fricciones en la parte enferma.
Prepara á las partes enfermas á la acción de tópicos mas activos.

3990. L. DE RICHARDIN.

℞ Alcanfor. ℥v (20 gr.).
Amoniaco líquido. ℥v (20 gr.).
Alcohol alcanforado. ℥x (320 gr.).
Esencia de manzanilla. ℥lv (3 gr.).
Esencia de enebro. ℥lv (3 gr.).

M. I. Se usa contra los sabañones.

3991. L. DE ROSEN.

℞ Alcohol. ℥ij (60 gr.).
Esencia de clavo. ℥ß (2 gr.).
Aceite de nuez moscada. ℥ß (2 gr.).

M. I. Se usa contra el marasmo de los niños, en fricciones á lo largo de la columna vertebral, dos veces al dia; y Chrestien le ha usado con buen éxito en la corea, en fricciones, á la dosis de una cucharadita de café, tres veces al dia.

3992. L. DE RONCALLI ó Linimento antiescrófuloso de Roncalli.

℞ Vejiga de hiel de buey llena de bilis. número 4.
Cloruro de sodio. ℥iij (90 gr.).
Aceite de nuez. tres cucharadas.

Se echan la sal y el aceite en la vejiga, y se expone todo durante algun tiempo á un calor lento.

I. Tumores escrófulosos que no están muy inflamados. *D. C. s.* para empapar ligeramente una plan-

chuela de bilas, que se aplica sobre las partes hinchadas y se renueva dos ó tres veces al dia. Es necesario acompañar á esta aplicacion un tratamiento interno.

Nota. Algunas veces se aplica sobre estos tumores el remedio húngaro, que se compone de goma amoniaco disuelta en vinagre y espesada hasta la consistencia de emplasto.

3993. L. RUBEFACIENTE.

℞ Aceite de croton. ℥ij (4 dec.).
Esencia de trementina. ℥xij (6 dec.).

M. I. Ronquera, enfermedades de la laringe. *D.* En fricciones. *I.* Bronquitis y enteritis crónica. *D.* Se pone una parte de aceite de croton con cinco de diaquilon gomado, y se extiende en la piel de modo que se forme un escudo que se aplica.

3994. L. SEDANTE.

℞ Aceite alcanforado. 4
Aceite de manzanilla. 4
Aceite de beleño. 4
Bálsamo tranquilo. 4
I. Reumatismo.

3995. Otro, n. 2.

Yema de huevo. 4
Grasa narcótica. 16
M. I. Se usa como tópico en las hemorroides.

3996. Otro, n. 3.

℞ Bálsamo tranquilo. ℥j (30 gr.).
Extracto de beleño. ℥ß (2 gr.).
Jabon blanco. ℥ijß (10 gr.).
Aceite alcanforado de manzanilla. ℥v (150 gr.).

M. I. Reumatismo agudo, infarto glandular de las mamas, adenitis, sabañones, acne, escrófulas, bocio, crup. *D.* En embrocaciones.

3997. Otro, n. 4.

℞ Jabon medicinal. 4

Aceite de almendras dulces. 4
 Tintura de opio. 2
M. I. Reumatismos.

3998. L. SEDANTE (Cottreau).

℞ Extracto hidro-alcohólico de digital. . . . 3j (4 gr.).
 Extracto de belladona. ʒß (2 gr.).
 Jabon amigdalino. . . ʒiij (12 gr.).
 Tintura alcohólica de beleño. ʒiij (96 gr.).
Disuélvase S. A. I. Afecciones del corazon, asma, coqueluche, cardiopalmia, congelacion, sabañones, diviesos, hemorroides, cistitis, mareo, catarro pulmonar crónico y tisis. *D.* Una cucharada de café para fricciones en la region precordial, tres veces al dia.

3999. L. SEDANTE CON LAUDANO.

℞ Esencia de trementina. ʒij (8 gr.).
 Acido clorhídrico. . . ʒj (4 gr.).
 ó Extracto de belladona. ʒß (2 gr.).
 Dilúyase en
 Agua de laurel real. ʒj (30 gr.).
 Se añade:
 Láudano de Sydenham. ʒxviiij (4 gr.).
 Eter sulfúrico. . . . ʒij (8 gr.).
I. Reumatismo, dolores artríticos, hemorroides. *D.* En fricciones.

4000. Otro (Trousseau).

℞ Extr. de estramonio. ʒß (2 gr.).
 Yema de huevo: . . . número 1.
 Hidroclor. de morfina. ʒvj (3 dec.).
M. I. Grietas del ano y hemorroides ulceradas. *D.* Se empapan hilas en el líquido y se aplican á la parte enferma.

4001. L. DE SIEBOLD.

℞ Alcoholado de amoniaco anisado. ʒj (4 gr.).
 Alcoholado de espliego. ʒij (60 gr.).
M. I. Hipo de los niños. *D.* En fricciones en el epigastrio.

4002. L. SINAPIZADO.

℞ Aceite volátil de semi-llas de mostaza. . . . ʒj (4 gr.).

Alcohol á 40°. ʒij (8 gr.).
 Aceite comun. ʒij (64 gr.).
I. Es un rubefaciente de la piel.

4003. L. DE SCHUSTER.

℞ Sulfato de quinina. . . ʒß (2 gr.).
 Licor de Hoffmann. . . ʒvj (24 gr.).
H. S. A. I. Calenturas intermitentes. *D.* ʒj (4 gr.) para fricciones en el epigastrio tres veces al dia.

4004. Otro (Schuster).

℞ Sulfato de quinina. . . ʒß (2 gr.).
 Tartrato de potasa antimoniado. ʒvj (3 dec.).
 Extr. acuoso de opio. . ʒxij (6 dec.).
 Alcohol alcanforado. . ʒx (40 gr.).
H. S. A. I. La misma que el anterior. *D.* ʒiij (12 gr.) para fricciones en el epigastrio tres veces al dia.

4005. L. DE STOKÉS.

℞ Esencia de trementina. ʒiij (90 gr.).
 Acido acético. ʒv (20 gr.).
 Agua de rosas. ʒxx (80 gr.).
 Esencia de limon. . . . ʒj (4 gr.).
 Yema de huevo. número 1.
M. I. Epilepsia, primer período de la tisis. *D.* En fricciones.

4006. L. SULFÚRICO (Brodie).

℞ Acido sulfúrico. ʒß (15 gr.).
 Aceite de linaza ʒjß (43 gr.).
H. S. A. I. Hidrartrosis, reumatismo articular crónico. *D.* En fricciones en el dia.

4007. L. DE SULFURO DE ANTIMONIO Y CALCIO (Radius).

℞ Sulfuro de antimonio y calcio. ʒß (2 gr.).
 Agua hirviendo. lbj (500 gr.).
 Brea. ʒij (60 gr.).
I. Parálisis, adenitis crónica, espasmos nerviosos, sabañones, diabetes, ictiosis, eczema. *D.* En fricciones dos ó tres veces al dia.

4008. L. DE SULFURO DE CAL Ó ARCANO DE ARCHIDETI.

℞ Sulfuro de cal. ʒj (30 gr.).

Aceite de eucbro,
 Aceite animal de Dip-
 pel, ãã. 10 gotas.
 Mézclese bien.

I. Se le ha aconsejado contra la gota.

**4009. L. DE SULFURO DE CARBONO
 ALCANFORADO (H. DE AL.).**

℥ Sulfuro de carbono. . . 5ij (8 gr.).
 Alcanfor. ʒβ (2 gr.).
 Aceite de alm. dulces. . ʒj (30 gr.).

M. I. Reumatismos, tumores artríticos crónicos y tofos recientes.
D. En fricciones.

**4010. Otro (WUTZER Y
 PELLENGAM).**

℥ Sulfuro de carbono. . 5ij (8 gr.).
 Aguardiente alcanfor. ʒjv (125 gr.).
 ó Aceite comun. . . . ʒij (60 gr.).

M. I. Reumatismo, gota, tofos recientes. *D.* En fricciones. Se diferencia muy poco del anterior.

**4011. L. DE TANATO DE PLOMO
 (José Leon).**

℥ Tanato de plomo. . . . ʒj (4 gr.).
 Cerato simple. ʒj (30 gr.).
 Esencia de rosas. . . . 2 gotas.

M. Se usa para fortificar la piel de los pezones y como profiláctico de las grietas. *D.* Se usa en fricciones en el pezon una vez al día, un mes antes del parto. Se lavará antes el pecho con agua tibia. Cuando la mujer es muy excitable se suprime la esencia.

**4012. L. CON LA TINTURA DE
 CANTÁRIDAS Y ALCANFOR.**

℥ Tintura de cantáridas. ʒβ (15 gr.).
 Aceite de alm. dulces. ʒjv (125 gr.).
 Jabon medicinal. . . . ʒj (30 gr.).
 Alcanfor. 5ij (8 gr.).

H. S. A. I. Es excitante de la piel, útil en la parálisis y dolores reumáticos.

4013. L. TREMENTINADO.

℥ Esencia de trementina. 8
 Acido clorhídrico. 4

I. Reumatismo y dolores artríticos. Es ligeramente rubefaciente.

4014. Otro (F. DE L.).

℥ Jabon blando. ʒij (60 gr.).
 Alcanfor. ʒj (30 gr.).
 Esencia de trementina. ʒbj (500 gr.).

I. Reumatismos. *D.* En fricciones.

**4015. L. TREMENTINADO OPIADO ó
 Linimento trementinado.**

℥ Esencia de trementina. ʒj (30 gr.).
 Aceite de manzanilla. . ʒij (60 gr.).
 Láudano de Sydenham. ʒj (4 gr.).

M. I. Neuralgias, cuando no se puede soportar el uso interno de la trementina; ceática, gota.

4016. L. DE VALENTIN.

℥ Aceite de alm. dulces. ʒj (30 gr.).
 Sulfuro de cal. ʒj (4 gr.).
 Alcanfor. ʒj (12 dec.).

I. Sarna. *D.* Se dan fricciones tres veces al día. El tratamiento dura diez á doce días, término medio.

**4017. L. DE VERATRINA
 (Turnbull).**

℥ Veratrina. ʒβ (2 gr.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).
 Aceite comun. ʒj (4 gr.).

M. Si se disuelve la veratrina en el alcohol ó éter la mezcla es mas activa.

I. Afecciones nerviosas, reumatismos. *D.* Se usa en fricciones.

**4018. L. DE VERATRINA É IODURO
 DE POTASIO (Turnbull).**

℥ Veratrina. ʒj (12 dec.).
 Ioduro de potasio. . . . ʒβ (2 gr.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Reumatismo, angina de

pecho, hipertrofia del corazon.
D. En fricciones.

4019. L. DE VERATRINA Y MERCURIO.

℥ Veratrina. ḡxviiij (4 gr.).
Ioduro de potasio. ʒB (2 gr.).
Manteca,
ó Ungüento mercurial
doble. ʒj (30 gr.).

M. I. Infartos linfáticos, escrófulas, amaurosis, otalgia, meningitis, espasmos. hipocondría, histérico, reumatismo, ceática, gota, disenteria, envenenamiento. D. En fricciones.

4020. Otro (TURNBULL).

℥ Veratrina. ʒB (2 gr.).
Ungüento mercurial
doble. ʒj (32 gr.).

M. Se usa como los anteriores.

4021. L. DE VERDE GRIS (F. DE L.).

℥ Verde gris en polvo. ʒj (30 gr.).
Vinagre. ʒvij (210 gr.).
Miel. ʒxjv (420 gr.).

Se disuelve el verde gris en el vinagre y se cuele por un lienzo; y despues de haber echado la miel se cuece hasta la consistencia conveniente.

I. Ulceras venéreas y en inyecciones en la uretra.

4022. L. VERMÍFUGO (Petrequin).

℥ Aceite de ricino. ʒj (30 gr.).
Aceite de ajenjos. ʒB (15 gr.).
Aceite de tanaceto. ʒB (15 gr.).
Tintura etérea de renuevos de helecho del Dr. Peschier. 20 gotas.

D. En fricciones en el vientre. En los casos urgentes se le hace mas activo macerando en el aceite de tanaceto un poco de ajo machacado.

4023. L. VEXICANTE ó Licor exutorio de Swediaur.

℥ Cantáridas en polvo. ʒB (2 gr.).

Esencia de trementina. ʒij (8 gr.).
Aceite comun. ḡxviiij (4 gr.).
Se digiere en el baño maria durante algunos dias, se exprime, se cuele y se añade:

Alcanfor. ʒj (4 gr.).
Se filtra. Se aplica por medio de compresas; antes de una hora de aplicado se levanta la epidermis, se enrojece la piel y se cubre de ampollas.

4024. L. VINOSO BALSAMICO (Meyer).

℥ Azúcar cande roja. ʒj (30 gr.).
Vino tinto generoso. ʒB (15 gr.).
Báls. negro del Perú. ʒjB (6 gr.).

Disuélvase S. A. I. Grietas de los pezones. D. Una aplicacion despues que el niño deja de mamar.

4025. L. VOLÁTIL DE PLENCK.

℥ Aceite de almend. dulces. ʒj (30 gr.).
Amoniaco líquido. ʒj (4 gr.).
Alcanfor. ʒB (2 gr.).

H. S. A. I. Cólico ventoso, timpanitis, inflamaciones del pecho ó del bajo vientre y angina de pecho. D. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en fricciones sobre el abdómen, el pecho ó el cuello, segun el sitio de la enfermedad.

4026. L. VOLÁTIL ALCANFORADO Y OPIADO.

℥ Amoniaco líquido,
Alcanfor,
Tintura de opio, ãã. ʒijB (10 gr.).
Aceite comun. ʒxx (80 gr.).

I. Dolóres reumáticos ó gotosos, ceática, calambres, espasmos, ictericia, hipocondría, cólicos nerviosos, neumatoses, cistitis, iscuria espasmódica, ablactacion, atrofia, glositis, aftas, torticolis, artritis, artrocace, neuritis, insomnio, escleroma, peritonitis, disenteria, meningitis, gastralgia, hipo, espasmos, envenenamiento, calenturas intermitentes, beriberi, cólera, diabetes, ic-

tiosis, bocio, cretinismo, entropion. *D.* En fricciones.

4027. L. DE WHITEREAD.

℥ Aceite de trementina. . . ℥iij (90 gr.).
 Acanfor. ℥ij (8 gr.).
 Esencia de romero. . . ℥j (4 gr.).
 Amoniaco liquido. . . ℥ij (8 gr.).
I. Reumatismo. *D.* En fricciones en las partes doloridas.

4028. L. DE WILKINSON.

℥ Cera blanca. ℥j (12 dec.).
 Flores de azufre. . . . ℥℞ (15 gr.).
 Manteca. ℥℞ (15 gr.).
 Brea. ℥℞ (15 gr.).
 Licor humeante de Boy-
 le. ℥xij (6 dec.).

I. Exantemas crónicos y aun en la tiña. *D.* Se frota cierta extension de la piel y no se pasa á otra sin limpiar la anterior.

LOCIONES.

4029. LOCION ACEITOSA.

℥ Aceite de beleño,
 Aceite comun,
 Aceite de manzanilla, ãã. ℥j (30 gr.).
I. Partos dolorosos, acrodinia, abscesos, insolacion, hipopion, nefralgias, dislocaciones, torceduras. *D.* En lociones.

4030. L. DE ACETATO DE AMONIACO.

℥ Acetato de amoniaco,
 Agua, ãã. ℥j℞ (50 gr.).
M. I. Hidrocele de los niños. Se aplica por medio de compresas empapadas en este licor, y se las tendrá aplicadas y húmedas durante un mes cuando menos.

4031. L. ACIDA.

℥ Acido nítrico,
 Acido clorhídrico, ãã. ℥j (12 dec.).
 Agua destilada. . . . ℥℞ (250 gr.).
M. I. Liquen y eczema crónicos.

4032. L. DE ÁCIDO MURIÁTICO (Sundelin).

℥ Acido clorhídrico puro. 15 gotas.
 Arrope de moras. . . . ℥iij (90 gr.).
 Tintura de catecú. . . ℥j (4 gr.).
M. I. Fungosidades de la boca. *D.* Se emplea empapando un pincelito con el cual se toca la fungusidad.

4033. L. ALCALINA.

℥ Carbonato de sosa. . ℥ij (8 gr.).
 Agua de rosas. . . . ℥℞ (250 gr.).
 Disuélvase. *I.* Liquen, prurigo, eczema y otras enfermedades crónicas de la piel.

4034. Otra, n. 2.

℥ Acetato de amoniaco. ℥iij (90 gr.).
 Alcohol. ℥℞ (15 gr.).
 Agua de rosas. . . . ℥jv (125 gr.).
I. Liquen con comezon demasiado viva. *D.* C. s. para lociones con una esponja fina.

4035. Otra (F. F.).

℥ Carbonato de potasa. ℥ij (64 gr.).
 Agua. ℥℥ij (1000 gr.).
 Disuélvase. Se usa para lavar la cabeza y las demás partes afectadas de sarna, herpes, prurito, prurigo, eczema, tiña, etc.

4036. L. ALCALINA SULFUROSA (Blasius).

℥ Sulfuro de potasa. . . ℥ij (8 gr.).
 Bicarbonato de potasa. ℥j (4 gr.).
 Agua destilada. . . . ℥℥j (500 gr.).
 Disuélvase. *I.* Prurigo. *D.* Tres ó cuatro lociones al dia.

4037. L. ALCANFORADA.

℥ Alcohol alcanforado. . ℥ij (60 gr.).

Infusion de flores de saúco. lbj (500 gr.).
Subcarbon. de potasa. ʒijʒ (10 gr.).

M. I. Infartos linfáticos y escrofulosos, induraciones lácteas, contusiones, úlceras escrofulosas, gota, lumbago, ictiosis. *D.* En lociones mañana y tarde.

4038. L. ALCOHÓLICA (*Swediaur*).

ʒ Agua de cal. 2
Alcohol. 4

M. I. Úlceras rebeldes, inflamaciones erisipelatosas de la cara y de las demás partes del cuerpo. Se usa en inyeccion en los trayectos fistulosos.

4039. L. ALCOHÓLICA JABONOSA.

ʒ Jabon blanco. ʒij (60 gr.).
Alcohol. lbj (500 gr.).

Disuélvase. *I.* Es resolutiva y se usa en el tratamiento de la sarna.

4040. L. ALOETICA.

ʒ Acíbar,
Mirra,
Azafran, ãã. ʒʒ (2 gr.).
Subcarbon. de potasa. ʒLjv (3 gr.).
Zumo de regaliz. ʒʒ (15 gr.).
Agua. lbj (500 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, se cuele y se añade: Tintura de cardamomo. ʒjv (125 gr.).
I. Para llamar las hemorroides. *D.* ʒj á ʒij (30 á 60 gr.) en lociones.

4041. L. ALUMINOSA.

ʒ Alumbre. ʒiij (12 gr.).
Sal amoniaco. ʒj (4 gr.).
Agua de Bareges. ʒLjv (3 gr.).
Agua de rosas. lbʒ (250 gr.).

4042. Otra, n. 2.

ʒ Sulfato de zinc,
Sulfato de alumina, ãã. ʒʒ (2 gr.).
Disuélvase en ʒjv (125 gr.) de agua de llanten.

I. Herpes, manchas hepáticas sin irritacion de la piel, eczema, impétigo, metrorragias, hemor-

roides, heridas, úlceras. *D.* ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

4043. L. ALUMINOSA Y SULFUROSA (*Gall*).

ʒ Alumbre. ʒj (4 gr.).
Agua de rosas. ʒij (60 gr.).

Se disuelve el alumbre en el agua de rosas y se añade:

Azufre lavado. ʒʒ (2 gr.).

Se agitará al tiempo de usarla.

I. Herpes y manchas hepáticas sin irritacion de la piel. *D.* ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

4044. L. AMONIACAL.

ʒ Flores de saúco. ʒijʒ (10 gr.).
Agua hirviendo. lbj (500 gr.).

Se infunde y se añade:

Sal amoniaco. ʒxc (5 gr.).

I. Heridas envenenadas, envenenamiento, enteritis? escarlatina. *D.* En lociones ligeras.

4045. L. ANTICANCEROSA.

ʒ Flores de caléndula,
Cicuta, ãã. ʒj (30 gr.).

Agua hirviendo. lbij (1000 gr.).

Se infunde y se añade:

Cloruro de hierro líquido. ʒʒ (15 gr.).

Agua de laurel real. ʒvj (200 gr.).

Tintura de opio. ʒj (30 gr.).

I. Cáncer ulcerado. *D.* En lociones dos veces al dia.

4046. Otra (*RUST*).

ʒ Extracto de caléndula,
Extr. de manzanilla, ãã. ʒij (8 gr.).

Agua de laurel real. ʒij (60 gr.).

Se disuelve y se añade:

Tintura de opio. ʒj (4 gr.).

M. I. Úlceras cancerosas. *D.* En lociones y curas.

4047. L. ANTIÉPSÓRICA.

ʒ Sublimado corrosivo. ʒj (4 gr.).
Agua destilada. lbj (500 gr.).

Disuélvase.

4048. Otra, n. 2.

ʒ Sulfuro de sosa. ʒiij (90 gr.).

Agua de cal. ℔℔ (250 gr.).
 Se añade :
 Jabon blanco. ʒj℔ (6 gr.).
 Disuelto en
 Alcohol. ʒiij (12 gr.).
 Se lava la cabeza dos veces al
 dia (tiña) ó el sitio dolorido
 (eczema y sarna).

4049. L. ANTIÉPSÓRICA (H. M.).

ʒ Sulfuro de potasa. ʒij (60 gr.).
 Agua comun. ℔j℔ (750 gr.).
 Se disuelve y se añade :
 Acido sulfúrico con-
 centrado. ʒj (4 gr.).
 D. Se usa dos ó tres veces al dia
 en lociones.

**4050. Otra (H. DE SAN LUIS DE
 PARIS).**

LICOR NUMERO 1.

ʒ Sulfuro de potasa. ʒj á ʒij (30 á 60
 gr.).
 Agua. ℔j (500 gr.).

LICOR NUMERO 2.

ʒ Acido clorhídrico. ʒj á ʒij (30 á 60
 gr.).
 Agua destilada. ℔j (500 gr.).
 Se echa ʒj (30 gr.) de cada li-
 cor en ʒjv (125 gr.) de agua cá-
 liente. Esta mezcla servirá para
 lociones.

4051. Otra (CAZENAVE).

ʒ Sulfuro de potasa. ʒj (4 gr.).
 Jabon blanco. ʒij (8 gr.).
 Agua destilada. ℔℔ (250 gr.).
 I. Prurigo, sarna, pórriigo.

**4052. L. ANTIÉPSÓRICA DE AGUA
 DE CAL (Pii).**

ʒ Cal viva,
 Azufre, ãã. ʒj℔ (45 gr.).
 Aceite comun. c. s
 M. I. Sarna, tiña, urticaria,
 hipopion, gangrena de hospital. D.
 En fricciones.

4053. L. ANTIHERPÉTICA (Bielt).

ʒ Sulfuro de sosa. ʒiij (12 gr.).

Jabon. ʒ℔ (15 gr.).
 Alcohol. ʒij (8 gr.).
 Agua de cal. ℔j (500 gr.).
 M. I. Afecciones herpéticas. D.
 En lociones.

4054. Otra (WENZEL).

ʒ Hojas de tabaco. ʒj (4 gr.).
 Agua. c. s.
 para obtener ʒviiij (250 gr.) de
 cocimiento; se añade al fin
 Hojas de cicuta. ʒij (8 gr.).
 I. Aconsejada en los casos de
 tiña de los niños.

4055. L. ANTISÉPTICA.

ʒ Cocimiento de quina. ℔j (500 gr.).
 Aguardiente alcanfor. ʒ℔ (15 gr.).
 H. S. A. I. Ulceras de mal ca-
 rácter. D. C. s. para lociones en
 las partes enfermas dos ó tres ve-
 ces al dia.

**4056. L. ANTISIFILÍTICA
 (Richard).**

ʒ Agua destilada. ℔℔ (250 gr.).
 Ioduro de potasio. ʒxviii (4 gr.).
 Tintura de iodo. ʒj (4 gr.).
 M. I. Ulceras sífilíticas y en par-
 ticular contra las de la garganta.
 D. En lociones.

**4057. L. ANTIÉPSÓRICA DE DUPUY-
 TREN (H. DE M.).**

ʒ Hígado de azufre. ʒjv (125 gr.).
 Agua. ʒxij (375 gr.).
 Acido sulfúrico. ʒ℔ (15 gr.).
 M. I. Se lavan tres veces al dia
 las partes afectadas de sarna, en
 cuya curacion se emplea con mu-
 cho éxito. D. ʒ℔ (15 gr.) para ca-
 da locion.

4058. L. AROMÁTICA.

ʒ Cocimiento aromático. ℔j (500 gr.).
 Acido clorhídrico. ʒxc (5 gr.).
 I. Efélides, horripilaciones,
 gangrena, ictiosis, lumbago, íleo.
 D. En lociones.

**4059. L. AROMÁTICA ALCOHOLI-
 ZADA (Cazenave).**

ʒ Esencia de menta,

Esencia de romero ,
 Esencia de espliego ,
 Esencia de limon, ãã. ḡjv (20 cent.).
 Alcohol de 32°. ḡjß (50 gr.).
 Infusion ligera de to-

millo. lbx (5 lit.).
 I. Sarna. El tratamiento dura ocho dias.

4060. L. AROMÁTICA JABONOSA.

℥ Jabon blanco raspado. ḡij (60 gr.).
 Alcohol rectificado. ḡiij (90 gr.).

Se disuelve y se añade:

Esencia de espliego. ḡjß (45 gr.).
 I. Sarna. D. ḡij (60 gr.) para cada friccion. Es buena preparacion.

4061. L. ASTRINGENTE.

℥ Cocimiento de bistorta, corteza de encina ó nuez de agalla. lbij (1000 gr.).

Miel. lbß (250 gr.).
 Sal amoniaco en polv. ḡj (30 gr.).

I. Hidrocele. D. Se rocía el tumor muchas veces al dia con este líquido y se le cubre con compresas empapadas en él.

4062. Otra, n. 2.

℥ Alumbre ,
 Sulfato de zinc, ãã . ḡij (8 gr.).
 Agua de llanten. lbj (500 gr.).

Se disuelve y se filtra.

I. Blenorrea, hemorragia, leucorrea, dislocaciones, torceduras, proptosis, telangiectasia. D. En lociones en las heridas y úlceras, y en las superficies que dan sangre. En inyeccion mezclada con seis partes de agua de rosas.

4063. Otra (BELL).

℥ Acetato de plomo. ḡß (6 dec.).
 Agua de rosas. lbß (250 gr.).
 Magisterio de azufre. ḡij (8 gr.).

I. Aconsejada en las erupciones herpéticas.

4064. Otro (GUEPIN).

℥ Alcohol alcanforado. ḡj (30 gr.).

Alumbre. 5ß (2 gr.).
 Agua destilada. ḡjv (125 gr.).

Se usan compresas empapadas en este líquido siempre que el enfermo siente calor en el ojo.

Guepin reemplaza á veces el alcohol alcanforado por 5ß (2 gr.) de extracto de belladona.

4065. L. ASTRINGENTE ALCOHOLIZADA (Hey).

℥ Corteza de encina en polvo. ḡjv (125 gr.).
 Agua de cal. lbij (1000 gr.).

Se macera durante ocho dias, se cuele y se añade S. A.:

Alcohol rectificado. ḡjv (125 gr.).

I. Caída del recto. D. Se lavan las partes que han salido, y despues que se hayan reducido se aplican compresas empapadas en el líquido y se sujetan por medio de un vendaje de T.

4066. L. ASTRINGENTE ALCOHÓLICA.

℥ Alcohol. ḡij (60 gr.).
 Agua de cal. lbß (250 gr.).

I. Dislocaciones, torceduras, blenorragia, viruela, fistulas. D. En lociones.

4067. L. ASTRINGENTE Y ANTIHERPÉTICA (Alibert).

℥ Agua de rosas. lbß (250 gr.).
 Alumbre. ḡiij (12 gr.).
 Sal amoniaco. 5j (4 gr.).

Solucion sulfurosa de Bareges. ḡj (12 dec.).

H. S. A. I. Herpes húmedos, eczema, angina. D. C. s. para hacer lociones ligeras en las partes enfermas, mañana y tarde.

4068. L. ASTRINGENTE CON AGUA DE CAL.

℥ Agua de cal. lbj (500 gr.).
 Infusion de quina. ḡjß (45 gr.).

M. I. Ulceras atónicas, gangrena, aftas, sarcocele. D. Para lociones, dos veces al dia.

4069. L. ASTRINGENTE OPIADA.

℞ Sulfato de zinc. ℥j (4 gr.).
 Agua. ℥jv (125 gr.)
 Licor de mirra. ℥j (30 gr.)
 Láud. de Sydenham. ℥ij (8 gr.).

I. Ulceras escrofulosas atónicas.
D. En la cura.

4070. L. DE BARLOW.

℞ Sulfuro de potasa. . . ℥ij (8 gr.).
 Jabon blanco. ℥ijβ (10 gr.).
 Alcohol rectificado. . ℥ij (8 gr.).

Se trituran en un mortero de porcelana y se añade:

Agua de cal. ℥vij (224 gr.).

I. Se usa contra la tiña. *D.* En compresas.

4071. L. DE BELEÑO ó Locion calmante.

℞ Extracto de beleño. . . ℥j (4 gr.).
 Agua. ℥iij (90 gr.).
 Disuélvase.

4072. L. DE BORATO DE SOSA (Hufeland).

℞ Borato de sosa. ℥β (2 gr.).
 Agua de rosas,
 Agua de flores de naranjo, ãã. ℥β (15 gr.).
 Mézclase exactamente.

I. Pecas, gangrena, prurigo del pubis, metrorragia, fetidez, impétigo, eczema. *D.* Se humedecen tres ó cuatro veces al dia con esta solucion las partes afectadas, teniendo cuidado de dejarla secar sobre ellas. Se dice que desaparecen las manchas al cabo de algunos dias.

4073. L. CALMANTE.

℞ Agua de Goulard. 4
 Cocimiento de yerba mora. 4
 Cocimiento de beleño negro. 4
I. Comezónes ocasionadas por el prurigo y eczema.

4074. Otra (TROUSSEAU).

℞ Carbonato de potasa. ℥iij (12 gr.).
 Agua. ℥jv (125 gr.).
I. Prurito de la vagina.

4075. L. CALMANTE ó Locion cianhídrica de Magendie.

℞ Acido prúsico medicinal. 4 á 2
 Agua de lechuga. 125
M. I. Herpes, cáncer ulcerado, caries, eczema, ictiosis, cánceres, úlceras, neuralgias, metrorragia y gangrena de hospital; y en inyecciones en los casos de cáncer de la matriz.

4076. L. CALCAREA Y OPIADA.

℞ Agua de cal.
 Aceite de linaza, ãã. . . ℥j (30 gr.).
 Láudano líquido. ℥β (15 gr.).
M. I. Grietas del pecho, gangrena de hospital, tiña, plica, quemaduras del segundo y tercer grado.

4077. L. DE CAZENAVE.

℞ Alumbre. ℥ij (8 gr.).
 Infusion de rosas rojas. ℥bj (500 gr.).
I. Acne, liquen, pian, herpes y aun eczema, impétigo.

4078. L. CIANURADA (Cazenave).

℞ Cianuro de potasio. . . ℥β (6 dec.).
 Emulsion de almen-
 dras amargas. ℥vj (192 gr.).
I. Erupciones crónicas de la piel con prurito.

4079. L. DE CLORITO DE CAL.

℞ Clorito de cal. 4
 Agua. 5
 Disuélvase y fíltrese.
I. Sarna, sífilis, úlceras, plica, prurigo, tiña, urticaria, escarlatina, impétigo, gangrena de hospital, antrax. *D.* En lociones á los muslos; piernas y brazos, dos ó tres veces al dia. El tratamiento de la sarna dura seis dias.

4080. L. CONTRA LA CAIDA DE LOS CABELLOS.

℞ Dientes de ajos. 3 á 4.
 Alcohol. ℥xxiij (810 gr.).
 Se macera durante treinta y seis

horas, se decanta y despues se añade:

Cocim. de bardana. . . ℥ss (250 gr.).

Se empapa una esponja en este licor, y se lava con ella la cabeza por la noche durante media semana.

4081. L. CONTRA LOS GANGLIOS
(Ricord).

℥ Tintura alcohólica de iodo. ℥iij (12 gr.).
Agua. ℥iij (96 gr.).

Se empapan planchuelas en esta solucion.

Obra como ligero caterético; la piel se desprende sin dolores y se cura el tumor en ocho dias.

4082. L. CONTRA EL LÍQUEN Y ECZEMA CRÓNICOS (Bielt).

℥ Acido nítrico,
Acido clorhídrico, añ. 25 gotas.
Agua destilada. ℥x (300 gr.).
Mézclese.

4083 L. CONTRA LA NEURALGIA FACIAL (Bermet).

℥ Agua de laurel real. . . ℥jv (125 gr.).
Eter sulfúrico. ℥j (30 gr.).
Extracto de belladona. ℥j (4 gr.).

Se empapa algodón en esta solucion y se aplica al sitio dolorido.

4084. L. CONTRA LA PITIRIASIS VERSICOLOR (Bielt).

℥ Cloro. ℥j (4 gr.).
ó Licor de potasa. ℥ij (8 gr.).
Agua destilada. ℥bj (500 gr.).
Mézclese.

4085. L. CONTRA LOS PÓLIPOS DE LAS FOSAS NASALES (Dallavay).

℥ Sulfato de zinc. ℥ij á ℥j (24 dec. á 4 gr.).
Agua comun. ℥j (30 gr.).

Se introducen por medio de un estilete, cuatro ó cinco veces al dia, unas hilas humedecidas, y se dice que los pólipos se curan en quince dias.

4086. Otra (Durr).

℥ Tintura de opio. ℥j (4 gr.).
Agua destilada. ℥j (4 gr.).

Se aplica tres veces al dia esta preparacion á los pólipos por medio de un pincel. Se disminuye gradualmente el agua hasta usar solo el opio. Con esta locion los pólipos se arrugan y reducen á bolitas, siendo fácil arrancarlos sin dolor.

4087. L. CONTRA EL PRURITO DE LA VULVA.

℥ Borato de sosa. ℥ß (16 gr.).
Sulfato de morfina. ḡvj (30 cent.).
Agua dest. de rosas. ℥ss (250 gr.).

M. Se lavan primero las partes afectadas con agua de salvado tibia, y despues se enjugan con cuidado. Entonces se hace una locion con una esponja ó un lienzo empapado en la mistura anterior. D. Se repite tres veces al dia esta locion.

4088. L. CONTRA LOS SABAÑONES.

℥ Acido nítrico,
Agua de can. vinosa, añ. ℥j (30 gr.).

I. Sabañones indolentes. D. Se tocan dos ó tres veces al dia los sabañones indolentes con la barba de una pluma empapada en este licor.

4089. L. CONTRA LOS SABAÑONES NO ULCERADOS.

℥ Alumbre: ℥j (30 gr.).
Agua. ℥x (300 gr.).
Disuélvase.

4090. L. CONTRA LOS SABAÑONES
(Brugnatelli).

℥ Carbonato de potasa, ℥j (30 gr.).
Agua de rosas. ℥bj (500 gr.).

Disuélvase. Se aplican sobre los sabañones lienzos empapados en este líquido.

4091. L. CONTRA LA SARNA.

℥ Escencia de trementina
de abeto plateado. ℥v (20 gr.).

Alcohol rectificado. ℥ij (100 gr.).

Bioduro de mercurio. ḡij (1 dec.).

Ioduro de potasio. ḡjv (2 dec.).

H. S. A. D. Una cucharada de este licor en un vaso de agua para lociones con una esponja fina.

4092. Otra (DORNBLUETH).

℥ Jabon negro. ℥jv (125 gr.).

Raiz de eléboro blanco en polvo. ℥β (15 gr.).

Agua de fuente caliente. c. s.

H. S. A. una mistura de la consistencia de jarabe.

Se aplica este linimento con la palma de la mano ó con un pincel sobre todas las partes del cuerpo que presentan el menor indicio de exantema, principalmente en las articulaciones, caderas y dorso, en una cantidad proporcionada á la sensibilidad del enfermo; pero se cesa de aplicar el linimento apenas éste sienta en la parte una sensacion de quemadura con rubicundez, lo cual acaece á la segunda, tercera ó cuarta aplicacion en lugar de la picazon que se sentia antes, y se ve que aparecen nuevos botones. Al dia siguiente se frota el cuerpo con ℥jv (125 gr.) de jabon negro, y despues se le lava con cuidado en agua caliente que contenga igual dosis de jabon. Entonces no falta mas que cambiar de ropa y vestidos, lavando antes y desinfectando al enfermo por medio del ácido sulfuroso gaseoso.

4093. Otra (MANRY).

℥ Mercurio. ℥ij (8 gr.).

Acido nítrico. ℥jv (125 gr.).

Se disuelve y se añade:

Agua destilada. 10 quart. (5 lit.).

M. D. ℥β (15 gr.) en lociones, mañana y noche.

4094. Otra (DUPUYTREN).

℥ Sulfuro de potasa. ℥jv (125 gr.).

Agua pura. lbij (1000 gr.).

Se disuelve y se añade:

Acido sulfúrico. ℥jv (16 gr.).

M. I. Sarna. D. Dos ó tres lociones al dia con ℥β á ℥j (15 á 30 gr.) de esta locion, que se dilata en un poco de agua si es muy irritante; se usa en fomentos sobre las partes enfermas y á veces en baños simples.

4095. L. CONTRA LA TIÑA.

℥ Agua de cal. lbj (500 gr.).

Sulfuro de sosa. ℥vj (180 gr.).

Alcohol. ℥vj (24 gr.).

Jabon blanco. ℥ijβ (10 gr.).

D. Se aplica dos veces al dia una compresa empapada en este licor.

4096. L. CONTRA LA TIÑA Y HERPES (H. DE M.).

℥ Hígado de azufre. ℥vj (180 gr.).

Jabon de sosa. ℥ijj (12 gr.).

Agua de cal. ℥xviii (560 gr.).

Alcohol de 24° B. ℥β (15 gr.).

Se disuelve el jabon en un poco de agua caliente, y en la de cal el hígado de azufre, se juntan ambos líquidos, y se añade el alcohol. D. Se aplica una compresa empapada en esta solucion.

4097. L. CONTRA LAS ÚLCERAS VENÉREAS (Gibert).

℥ Agua clorurada. ℥j (4 gr.).

ó Agua aluminosa. ℥j (4 gr.).

Agua destilada. lbj (500 gr.).

ó Agua comun. lbij (1000 gr.).

Sublimado corrosivo. ḡviii (4 dec.).

Láud. de Sydenham. 8 gotas.

4098. L. COSMÉTICA (Laforest).

℥ Vino tinto. ℥xij (375 gr.).

Sal comun. ℥j (4 gr.).

Sulfato de hierro. ℥ij (8 gr.).

Se cuece durante algunos minutos y se añade:

Oxido de cobre. ℥j (4 gr.).

Se deja dos minutos al fuego y se añade:

Nuez de agalla en

polvo. ℥ij (8 gr.).

I. Para teñir el pelo de negro. Se

frota el pelo con este licor, se seca con un lienzo caliente al cabo de algunos minutos, y se lava con agua comun.

4099. Otra (PIERQUIN).

℥ Acido clorhídrico. ℥j (4 gr.).
 Aceite de alm. amargas. ℥j (30 gr.).
 I. Equimosis, manchas de la piel, etc.

4100. L. DIURÉTICA.

℥ Tabaco,
 Digital, ãã. ℥jß (6 gr.).
 Agua hirviendo. c. s.
 para obtener ℥ij (60 gr.) de infusion; se cuele y se añade:
 Esencia de trementina. ℥ß (15 gr.).
 Yema de huevo. número 4.
 Se hace una emulsion y se añade:
 Extracto de escila. 5ß (2 gr.).
 I. Hidropesía. D. En fricciones en los lomos.

4101. L. DE ELÉBORO (Swediaur).

℥ Raiz de eléboro bl. ℥jv. (15 gr.).
 Agua hirviendo. lbij (1000 gr.).
 Se cuele despues de fria y se añade:
 Tintura de eléboro blanco. ℥jvß (135 gr.).
 I. Prúrigo y pórrigo faboso.

4102. L. EXCITANTE.

℥ Petroleo. ℥ß (15 gr.).
 Esenc. de trementina. ℥j (4 gr.).
 Espiritu de enebro. ℥jv (125 gr.).
 I. Hidropesía, sabañones, congelacion, atonía de las vias urinarias. D. En fricciones en los lomos ó en los miembros.

4103. Otra (HELNSCHEL).

℥ Tintura de opio,
 Eter clorhídrico, ãã. ℥ij (8 gr.).
 Bálsamo del Perú. 3ß (2 gr.).
 I. Sabañones no ulcerados, plica, viruelas. D. En lociones.

4104. L. ESTIMULANTE (Sachse).

℥ Tintura de cantáridas,
 Espír. de romero, ãã. ℥j (4 gr.).
 Solucion de carbonato de potasa. 5jß (6 gr.).
 Agua. ℥jv (125 gr.).
 I. Alopecia, viruelas, úlceras, plica, hemacelinosis, pleurodinia, fungo medular. Sirve para hacer que nazcan los cabellos cuando una erupcion cutánea los ha hecho caer. D. Dos lociones al dia.

4105. L. EXCITANTE Y CÁUSTICA (Alibert).

℥ Cloro líquido. 2
 Agua. 4
 D. Se aplica por medio de un pincel de hilas sobre ciertos herpes rebeldes.

4106. L. ESTIMULANTE (Saviard).

℥ Potasa cáustica. ℥ij (8 gr.).
 Aleanfor. ℥ij (24 dec.).
 Azúcar. ℥ij (60 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).
 Disuélvase. I. Úlceras atónicas y fungosas, heridas indolentes, viruelas, pleurodinia, hemacelinosis. D. En lociones y aplicaciones.

4107. Otra, n. 2.

℥ Aleanfor. ℥j (12 dec.).
 Alcohol. ℥ij (60 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Vinagre. lbß (250 gr.).
 I. Fiebres asténicas y exantemas repercutidos.

4108. L. DE EXTRACTO DE RATANIA (Trousseau).

℥ Extracto de ratania. 5jß (10 gr.).
 Tintura de ratania. ℥j (30 gr.).
 Agua. ℥vj (200 gr.).
 Se pone la tercera parte de esta preparacion en dos tercios de agua caliente, y con esta mezcla se hacen lociones tres ó cuatro veces al dia, obligando al enfermo

á que haga esfuerzos como si fuera á defecar. Despues se aplica una porcion de hilas empapadas en la mistura anterior, que se dejará aplicada á la grieta. V. número 3515.

El régimen debe ser acomodado á las circunstancias, y para facilitar las deposiciones se deben dar lavativas simples ó un purgante.

Cuando en lugar de grietas existen erosiones, se usan las lavativas de nitrato de plata preparadas como sigue:

Agua. lbß (250 gr.).
Nitrato de plata. ʒij (4 dec.).

Esta lavativa se administra todos los dias, si bien para facilitar la absorcion se aplicará una lavativa de agua simple.

4109. L. FEBRÍFUGA (*Guatánica*).

ʒ Sulfato de quinina. ʒviii (4 dec.).
Alcohol de 36°. ʒß (15 gr.).

En fricciones á lo largo de la columna vertebral.

4110. L. FULIGINOSA.

ʒ Hollin. 2 puñados.
Agua. 2 cuart. (1 lit.).

Se hierve durante media hora y se cuela.

I. Ulceras herpéticas, sóricas y venéreas. D. En lociones.

4111. L. GOMOSA Y MERCURIAL (*Frank*).

ʒ Sublimado corrosivo. ʒij (4 dec.).
Agua destilada. ʒxij (375 gr.).
Goma arábica. ʒß (15 gr.).

Disuélvase S. A. I. Sarna, erupciones sifilíticas, etc.

4112. L. DE GUERLAIN, *Agua cosmética ó contra las pecas* (*Guerlain*).

ʒ Agua destilada de laurel real.
Agua destilada de melocoton, ãã. lbxx (10,000 gr.).
Tintura de benjui. ʒß (15 gr.).
Extracto de Saturno. ʒjv (125 gr.).

Alcohol mezclado con la tintura. ʒij (60 gr.).
I. Cosmético y contra las pecas.

4113. L. DE HENRY.

ʒ Bicoloruro de mercur. ʒijv (2 dec.).
Agua destilada. ʒvj (200 gr.).
Alcólolato de menta. ʒß (15 gr.).

H. S. A. I. Comezons intensas, herpes sifilíticos y otros.

4114. L. HIDROCIÁNICA (*Magendie*).

ʒ Acido cianhídric. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
Agua de lechuga. lbj (1000 gr.).

M. I. Herpes y cánceres ulcerados. Se usa en inyecciones en los casos de cáncer de la matriz.

4115. L. HIDROSULFURADA Ó SULFUROSA (*Dupuytren*).

ʒ Sulfuro de potasa secó. ʒiij (90 gr.).
Agua. lbj (500 gr.).

Se disuelve y se filtra.

Al tiempo de usarla se añade:

Acido sulfúrico. ʒj (4 gr.)
dilatado en un poco de agua.

I. Sarna. D. Se usa en lociones.

4116. L. IODURO SULFUROSA (*Dauvergne*).

Se prepara con ʒij (8 gr.) de la solución número 1, y ʒjv (16 gr.) de la solución número 2.

NUMERO 1.

ʒ Iodo 3
Ioduro de potasio. 6
Agua destilada. 24

NUMERO 2.

ʒ Sulfuro de potasa. 32
Agua destilada. 64

I. Herpes crustáceo, tiña, sifilides, sarna, impétigo, prurigo, hidrargiria, oftalmias. D. ʒiij á ʒvj (12 á 24 gr.) para una cubeta de agua fria ó tibia.

4117. L. CON LAS HOJAS DE NOGAL (*Negrier*).

ʒ Hojas sec. de nogal. ʒj (30 gr.).
Agua. lbj (1000 gr.).

Se hierve durante algunos minutos, se cuela y se empapan com-

presas ó planchuelas que se aplican á las úlceras escrofulosas.

4118. L. IODADA.

℥ Iodo. ḡj á ḡij (5 á 10 cent.).
Alcohol rectificado. ℥j (4 gr.).

Se tritura en un mortero de vidrio y se añade:

Agua pura. ℔j (500 gr.).

I. Úlceras de naturaleza escrofulosa.

4119. L. IODOCLORURADA (Rhigini).

℥ Cloruro de cal. ℥v (20 gr.).

Se tritura en un mortero de vidrio y se añade ℥iij (96 gr.) de agua; se deja aposar, se filtra y se añade:

Tintura alcohólica de iodo. ḡxc (5 gr.).

Se mezcla y se conserva en una vasija bien tapada.

I. Es útil para deterger las úlceras herpéticas ó sifiliticas y las heridas de mal carácter, lavándolas muchas veces al dia con esta solucion.

4120. L. IODURADA CONTRA LA SARNA (Cazenave).

℥ Ioduro de potasio,
Ioduro de azufre, añ. ℥j℔ (6 gr.).
Agua comun ℔ij (1000 gr.).

Disuélvase. Se auxilia esta medicacion por medio de un baño sulfuroso.

4121. L. DE JABON.

℥ Jabon blanco del comercio. ℥ij (60 gr.).
Agua. ℔ij (1000 gr.).

Se disuelve en caliente. Se usa contra los herpes, tumores frios, edemas.

4122. L. LITONTRIPTICA.

℥ Acido clorhídrico. 60 gotas.
Cocimiento de cebada. ℥vj (180 gr.).

Disuélvase *I.* Cálculos, principalmente los de cal. *D.* ℥j (30 gr.) tres ó cuatro veces al dia.

4123. L. MERCURIAL (Adams).

℥ Sublimado corrosivo. ḡx (5 dec.).
Agua destilada. ℥x (300 gr.).

Se disuelve y se añade:

Tintura de cantáridas. ℥℔ (15 gr.).

I. Sarna.

4124. Otra (CAZENAVE).

℥ Bicloruro de merc. ℔℔ (6 dec.).
Agua destilada. 2 cuart. (4 lit.).

Alcohol. ℥iij (96 gr.).

Alcanfor. ℥℔ (2 gr.).

Disuélvase. *I.* Comezones.

4125. Otra (MAURY).

℥ Agua destilada. 10 cuart. (5 lit.).
Acido nítrico. ℥jv (125 gr.).

Mercurio crudo. ℥ij (8 gr.).

H. S. A. I. Sarna. *D.* ℥℔ (15 gr.) en lociones, mañana y tarde.

Es un medio muy cómodo que produce buenos efectos y no mancha la ropa.

4126. Otra (RUST).

℥ Bicloruro de mercurio. ḡiij á ḡvj (15 á 30 cent.).

Agua destilada. c. s.

Se disuelve y se añade:

Extracto de cicuta,
Extr. de manzan., añ. ℥j (4 gr.).

Tintura de opio. ℔ij (24 dec.).

Miel rosada. ℥℔ (15 gr.).

M. I. Úlceras sifiliticas de la boca posterior, de la nariz y de las partes sexuales de la mujer. *D.* Se aplica dos á tres veces al dia por medio de un pincel. En los casos rebeldes se reemplaza la tintura por ℔j (12 dec.) de opio impuro.

4127. L. MERCURIAL ALCOHÓLICA (Baumés)

℥ Sublimado corrosivo. ḡxviiij (4 gr.).
Agua destil. de rosas. ℥v (150 gr.).

Agua de Colonia. ℥ij℔ (10 gr.).

I. Barros, acne, erupciones vesiculosas ó puro-vesiculosas antiguas.

4128. L. MERCURIAL ANTIHERPÉTICA (*Trousseau*).

℞ Sublimado corrosivo. ℥ij (8 gr.).
Alcohol, c. s. para disolverle.

Se añade:

Agua destilada. . . . ℥vj (192 gr.).

I. Prurito de las partes exteriores de los órganos de la generación de uno y otro sexo, y en la mayor parte de las afecciones herpéticas. *D.* Una á cuatro cucharadas en un cuartillo de agua.

4129. L. MUCILAGINOSA.

℞ Mucilago de goma,
Mucilago de membrillo,
Mucilago de linaza,
Mucilago de zaragat., añ. ℥j (30 gr.).

I. Abscesos, heridas, eritema, insolacion, dislocaciones, torceduras. *D.* En lociones y fomentos.

4130. L. MUNDIFICANTE (*Boerhaave*).

℞ Sublimado corrosivo. ḡjv (2 dec.).
Agua dest. de rosas. ℥jv (125 gr.).

D. Se lavará mañana y tarde con este licor los sitios infestados de piojos y otros animales parásitos.

4131. L. MURIÁTICA.

℞ Acido clorhídrico. . . . ℥v (20 gr.).
Agua. ℥v (160 gr.).

Disuélvase. *I.* Herpes, impétigo, sarna, tiña, eczema, prurigo, heridas, carbunco, envenenamiento, neuralgia. *D.* En lociones.

4132. L. MURIATADA.

℞ Cloruro de sodio. . . ḡxviiij (1 gr.).
Agua. ℥vj (25 gr.).

Disuélvase. *I.* Torceduras, relajacion de las articulaciones. Se puede usar contra la sarna á la dosis de ℥iij (90 gr.) para lociones, dos ó tres veces al dia.

4133. L. NARCÓTICA.

℞ Cocimiento de yerba mora,

ó Cocimiento narcótico. lbij (1000 gr.).
Opio en bruto. . . . ℥j (4 gr.).

I. Zona, soriasis, pedionalgia, gangrena de hospital, ceática, esofagismo, oftalmias. *D.* En lociones ó fricciones.

4134. L. OPIADA ó Fomento narcótico opiado.

℞ Opio impuro. ℥j (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbj (500 gr.).

Se reduce el opio á polvo grueso, se vierte encima el agua y se deja infundir durante dos horas teniendo cuidado de menear de cuando en cuando, se cuele, se deja aposar y se decanta.

I. Abscesos, caries, gota, metrorragia, disenteria, hidrofobia, insolacion, eczema, eritema, ictiosis, impétigo, oftalmia. *D.* En lociones, inyecciones y fomentos.

4135. L. NÍTRICA Ó ÁCIDA.

℞ Acido nítrico. ℥j (4 gr.).
Agua. lbj (500 gr.).

M. Se recomienda este licor para lavar las úlceras fétidas.

4136. L. DE PETROLEO.

℞ Petroleo. ℥β (15 gr.).
Esencia de trementina. ḡxc (5 gr.).
Espíritu de enebro,
Espíritu de espliego, añ. ℥jβ (45 gr.).
Amoniac liquido. . . . ℥β (15 gr.).

I. Reumatismo crónico. *D.* En fricciones en el lado enfermo y en la region lumbar en las hidropeas crónicas.

4137. L. PURGANTE.

℞ Aceite de ricino. . . . ℥jβ (45 gr.).
Tint. de colocintida: ℥β (15 gr.).

M. I. Estreñimiento, hernia estrangulada por atascamiento. *D.* ℥iijβ (10 gr.) en fricciones en el abdomen.

4138. L. DE RATANIA.

℞ Ratania. ℥v (20 gr.).

Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Se cuece y se añade:
 Extracto de ratania. ℥ß (15 gr.).
 Tintura de catecú,
 Tintura de goma
 quino, ãã. ℥jß (6 gr.).
I. Leucorrea, blenorrea, caída
 de la vagina, metrorragia pasiva.
D. En lociones é inyecciones.

4139. L. RESOLUTIVA:

℥ Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Aguardiente alcanforado,
 Extr. de Saturno, ãã. ℥ß (15 gr.).
M. S. A. I. Contusiones, torce-
 duras, heridas, quemaduras re-
 cientes y tumores que se quiere
 resolver. *D.* C. s. para hacer lo-
 ciones tres ó cuatro veces al dia
 en las partes enfermas.

4140. Otra, n. 2.

℥ Agua de rosas. ℔ß (250 gr.).
 Subcarbonato de po-
 tasa. ℥ß (15 gr.).
I. Sabañones. *D.* Se aplica por
 medio de compresas.

4141. Otra, n. 3.

℥ Cal viva. ℥ij (8 gr.).
 Mercurio vivo. ℥ß (2 gr.).
 Se tritura hasta que se extinga
 el mercurio y se añade:
 Agua de jabon. ℔ij (1000 gr.).
I. Tumores, glándulas ingurgi-
 tadas é indolentes. *D.* Se aplica en
 compresas.

4142. L. RUBEFACIENTE.

℥ Tintura de pimienta,
 Alcohol alcanfor. , ãã. ℥iij (100 gr.).
 Amoniaco líquido,
 Esencia de trem. , ãã. ℥jß (50 gr.).
I. Angina membranosa, escar-
 latina, sarampion, viruelas cuan-
 do es difícil la erupcion, corea,
 eczema. *D.* En fricciones en los
 muslos, epigastrio, delante del
 cuello, etc.
Nota. Algunas veces no contie-
 ne la esencia de trementina.

**4143. L. RUBEFACIENTE
 ESTIBIADA.**

℥ Tártaro emético. ℥j (4 gr.).
 Sublimado corrosivo. ℥v (25 cent.).
 Agua. ℥j (30 gr.).
 Espíritu de espliego
 compuesto. ℥j (4 gr.).
M. I. Sarna, herpes, sífilides,
 angina, viruelas, escarlatina, pli-
 ca. *D.* En fricciones en las partes
 que se quiera poner rubicundas y
 en lociones.

4144. L. SATURNINA.

℥ Acetato de plomo. ℥j (4 gr.).
 Agua de rosas,
 Agua de llanten, . . ãã. ℥ij (60 gr.).
 Magisterio de azufre. . . ℥j (4 gr.).
I. Erupciones herpéticas, úlce-
 ras, excrescencias, urticaria, zo-
 na, efidrosis, insolacion. *D.* En
 lociones.

**4145. L. DE SAÚCO CON ALCOHOL
 ALCANFORADO.**

℥ Alcohol alcanforado. . . ℥ij (60 gr.).
 Infusion de flores de
 saúco. ℔j (500 gr.).
M. I. Infartos glandulosos indo-
 lentes en los niños escrofulosos.

4146. L. DE SCHARN.

℥ Succinato de amoniaco. ℥ß (2 gr.).
 Jarabe de opio. ℥j (30 gr.).
 Agua. ℥iij (90 gr.).
M. I. Corea de los que se em-
 briagan.

**4147. L. DE SUBLIMADO
 (Trousseau).**

℥ Sublimado. ℥ijß (10 gr.).
 Alcohol. ℥iij (96 gr.).
 Se usa para lociones una cucha-
 rada de café de esta solucion en
 ℔j (500 gr.) de agua muy calien-
 te. Se podrá segun las circunstan-
 cias aumentar ó disminuir la can-
 tidad proporcional de la solucion
 alcohólica de sublimado.
I. Afecciones herpéticas pruri-
 ginosas.

4148. L. SULFO-JABONOSA.

℞ Jabon blanco raspado. ℥jβ (50 gr.).
 Agua. ℥xij (400 gr.).
 Se disuelve y se añade.
 Sulfuro de potasa liq. ℥jβ (50 gr.).
 I. Sarna. D. Es una preparacion muy eficaz.

4149. Otra, n. 2.

℞ Agua. ℥v (150 gr.).
 Azufre,
 Jabon blanco, ãã. . . . ℥j (30 gr.).
 Se funde el jabon raspado en el agua en frio, se cuele con expresion al través de un lienzo y despues se añade el azufre.
 I. Sarna. D. C. s. para hacer lociones mañana y tarde en las partes cubiertas de granos.
 Nota. Es un medio irritante, que cura comunmente en quince ó veinte dias.

4150. L. SULFUROSA (H. DE M.).

℞ Hgado de azufre. . . . ℥j (30 gr.).
 Agua comun. ℥xij (375 gr.).
 Disuélvase. I. Erupciones herpéticas.

4151. L. SULFUROSA (Dupuytren).

℞ Agua destilada. . . . ℥ijβ (750 gr.).
 Sulfuro de potasa. . . . ℥jv (125 gr.).
 Acido sulfúrico. . . . ℥β (15 gr.).
 Se disuelve el sulfuro y se añade poco á poco el ácido sulfúrico.
 I. Herpes ligeros, sarna. D. Las mismas que las anteriores.

4152. L. Y FOMENTOS SULFUROSOS.

℞ Polisulfuro de potasio líquido. . . . ℥ij (8 gr.).
 Agua destilada. . . . ℥viiij (250 gr.).
 Láud. de Sydenham. ℥j (4 gr.).
 Mézclese y consérvase en una vasija bien tapada.
 I. Afecciones crónicas del sistema cutáneo, herpes surfuráceos

con comezon y prurito, dolores vagos reumáticos ó gotosos de las articulaciones pequeñas.

4153. L. SULFUROSA ALCANFORADA (Rust).

℞ Azufre sublimado. . . . ℥x (40 gr.).
 Alcanfor en polvo. . . . ℥ij (8 gr.).
 Agua destilada. . . . ℥ij (1000 gr.).
 M. I. Acne, barros. D. Una aplicacion por la noche; al dia siguiente se quita con un lienzo el azufre adherido.

4154. L. SULFUROSA ALCALINA (H. DE M.).

℞ Azufre pulverizado. . . . ℥ij (8 gr.).
 Carbonato de potasa. ℥j (4 gr.).
 Agua comun. ℥xij (375 gr.).
 Se tritura el azufre con el carbonato de potasa y se mezcla con el agua.
 I. En los mismos casos que la locion sulfurosa alcalina.

4155. L. TREMENTINADA.

℞ Tabaco,
 Digital, ãã. ℥jβ (6 gr.).
 Agua hirviendo. ℥ij (60 gr.).
 Se infunde y se añade:
 Esencia de trementina. ℥β (15 gr.).
 Yema de huevo. núm. 1.
 Se hace emulsion y se añade:
 Extracto de escila. . . . ℥β (2 gr.).
 I. Hidropesías, ascitis, reumatismo, acne, escarlatina, pleurodinia. D. En fricciones en los lomos.

4156. Otra, n. 2.

℞ Esencia de trementina,
 Alcohol, ãã. ℥jv (125 gr.).
 Alcanfor. ℥j (4 gr.).
 I. Pityriasis de los ancianos.

4157. L. CON VINAGRE.

℞ Vinagre blanco. . . . ℥ijβ (250 gr.).
 Agua fria. ℥ij (1000 gr.).
 M. Se usá en fricciones ligeramente estimulantes. Se reemplaza ventajosamente el vinagre comun

por el aromático, y esta locion es muy útil para calmar las comezones y contra las granulaciones del cuello de la matriz.

4158. L. Ó FOMENTO VINOSO.

℞ Vino tinto. 2 cuart. (4 lit.).
Miel. ℥jv (125 gr.).
Disuélvase en frío.

I. Ulceras y heridas de mal aspecto.

4159. L. DE ZINC.

℞ Oxido de zinc. ℥j (30 gr.).
Agua de flores de saúco. ℥xc (5 gr.).
I. Erisipela flemonosa, excrescencias, úlceras, gangrena, metrorragia. *D.* En lociones.

LOOCS.

4160. LOOC ACEITOSO (F. F.).

℞ Aceite de almendras dulces,
Goma aráb. en polv., ãã. ℥B (16 gr.).
Jarabe de malvabisco. . ℥j (32 gr.).
Agua de flor. de naranjo. ℥B (16 gr.).
Agua comun. ℥iij (96 gr.).

Se prepara un mucílago con la goma y una parte del agua, se añade el aceite en pequeñas cantidades para dividirle por una trituración prolongada, y se diluye por último en el resto de los líquidos.

I. Neumonía, catarro, tos, bronquitis, ronquera, sarampion, cálculos, y en los cólicos ventosos, irritaciones intestinales ó de los órganos urinarios con estreñimiento. *D.* Se usa del mismo modo que el looc blanco.

4161. L. ACEITOSO EMÉTICO.

℞ Quermes mineral. ℥j (5 cent.).
Ojimiél escilítico. ℥B (15 gr.).
Aceite de almendras dulces,
Jar. de ipecacuana, ãã. ℥j (30 gr.).
Agua comun. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. una emulsion. Se toma à cucharadas hasta que produzca el vómito.

4162. L. ALCANFORADO.

℞ Alcanfor. ℥v (25 cent.).
Mucílago de goma arábiga,
Jarabe de malvab., ãã. ℥B (15 gr.).
Jarab. de flor. de nar. ℥j (30 gr.).
M. D. Una cucharadita cada dos horas.

4163. L. ALCANFORADO Y NITRADO.

℞ Alcanfor,
Nitro, ãã. ℥xv (75 cent.).
Extracto de opio. ℥ij (10 cent.).
Looc blanco,
Agua de lechuga, ãã. ℥iij (96 gr.).

M. I. Cistitis, blenorragia, uretritis aguda, catarro agudo, vómitos espasmódicos, vértigos, polidipsia. *D.* A cucharadas de hora en hora.

4164. L. DE ALMENDRAS SUCINADO.

℞ Esencia de sucino. 42 gotas.
Looc de almendras. ℥vj (180 gr.).

M. I. Catarros, bronquitis crónica. *D.* Una cucharada de hora en hora.

4165. L. DE ALMIDON (F. P.).

℞ Almidon. 8
Catecú. 4
Jarabe de Tolú ó balsámico. 32
Clara de huevo batida en un poco de agua. 32

H. S. A. I. Diarreas rebeldes. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

4166. L. AMARILLO Ó DE HUEVO.

℞ Yema de huevo. núm. 4.
Aceite de almendr. dulc. ℥j (30 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
Agua de flor de naranjo. ℥j (30 gr.).
Agua de amapolas. ℥ij (60 gr.).
Se mezclan el aceite, el jarabe

y una corta cantidad de agua, haciéndolo por partes, con la yema de huevo en un mortero de mármol, se bate bien y por último se incorpora el resto de las aguas destiladas. Se usa como pectoral. *D.* $\bar{\text{ij}}$ á $\bar{\text{ijv}}$ (60 á 120 gr.) al día.

4167. L. AMIGDALINO.

$\bar{\text{z}}$ Azúcar. un terroneito.
Goma tragacanto . . . $\bar{\text{xxvj}}$ (8 dec.).
Jarabe simple. $\bar{\text{ij}}$ (48 gr.).
Agua de flor de naranj. $\bar{\text{ij}}$ (8 gr.).

Se hace un mucílago con el azúcar, la goma y el jarabe, y se añade el agua de flor de naranjo.

Se hacen $\bar{\text{iiij}}$ (96 gr.) de emulsion con

Almendras amargas. . $\bar{\text{ij}}$ (2 gr.).
Almendras dulces . . . $\bar{\text{ij}}$ (16 gr.).
Agua. e. s.

y se añade al mucílago. Cuando hay que añadir calomelanos se suprime las almendras amargas para que no se forme cloruro ó cianuro de mercurio.

4168. L. ANISADO PARA LOS NIÑOS.

$\bar{\text{z}}$ Anís. $\bar{\text{ij}}$ (2 gr.).
Azúcar. $\bar{\text{ij}}$ (30 gr.).

Se trituran en un mortero de mármol y se añade poco á poco:

Agua comun. $\bar{\text{ijv}}$ (125 gr.).

Se cuele. *I.* Flatuosidades. *D.* A cucharadas.

4169. L. ANISADO (F. DE HAMB.).

$\bar{\text{z}}$ Anís,
Hinojo,
Zumo de regaliz, ãã. . $\bar{\text{ij}}$ (30 gr.).
Jarabe de malvabiseo. $\bar{\text{xij}}$ (375 gr.).

M. I. Cólico ventoso de los niños, neumatosis. *D.* A cucharaditas de café.

4170. L. ANISADO CON JARABE DE IPECACUANA.

$\bar{\text{z}}$ Jarabe de ipecaeuana. $\bar{\text{ij}}$ (30 gr.).
Looc anisado. $\bar{\text{ijv}}$ (125 gr.).
M. I. Se usa para hacer expeler

á los niños las mucosidades de las primeras vias.

4171. L. ANODINO ALCANFORADO (H. DE M.).

$\bar{\text{z}}$ Looc blanco. $\bar{\text{ijv}}$ (125 gr.).
Extracto de opio. $\bar{\text{ij}}$ (5 cent.).
Aleanfor. $\bar{\text{ijv}}$ (3 dec.).

Se pulveriza el alcanfor con dos gotas de alcohol y se le agita con un poco de mucílago espeso de goma arábica ó de tragacanto; se deslie en el looc, y por último se añade el extracto disuelto en una corta cantidad de agua.

I. Catarros con tos espasmódica pertinaz. *D.* A cucharadas.

4172. L. ANTIHELMÍNTICO.

$\bar{\text{z}}$ Looc gomoso. $\bar{\text{ijv}}$ (125 gr.).
Coralina de Córcega
pulverizada. $\bar{\text{ij}}$ (2 gr.).
Aceite de almendras dulces,
Jarabe de limon, ãã. $\bar{\text{ij}}$ (30 gr.).

M. I. Lombrices lumbricoides de los niños, despues de haber usado la coralina de Córcega.

4173. L. ASTRINGENTE (F. N. P.).

$\bar{\text{z}}$ Conserva de rosas roj. $\bar{\text{ij}}$ (30 gr.).
Conserv. de einosbastos. $\bar{\text{ij}}$ (30 gr.).
Alumbre. $\bar{\text{ij}}$ (12 dec.).
Aceite de almend. dule. $\bar{\text{ij}}$ (15 gr.).
Jarabe de rosas. $\bar{\text{ij}}$ (30 gr.).

H. S. A. I. Astringente útil en las hemorragias pasivas estomacales ó pectorales. *D.* $\bar{\text{ij}}$ á $\bar{\text{ij}}$ (15 á 30 gr.).

4174. L. ASTRINGENTE (Swediaur).

$\bar{\text{z}}$ Catecú. $\bar{\text{ij}}$ (8 gr.).
Agua de canela $\bar{\text{ijv}}$ (125 gr.).

Se disuelve en frio y despues se prepara una emulsion con

Salep. $\bar{\text{ij}}$ (6 gr.).
Jarabe de amapolas. . $\bar{\text{ij}}$ (60 gr.).
Jar. de bals. de Tolú. $\bar{\text{ij}}$ (30 gr.).

M. I. Disenteria, hemotisis y diarrea crónicas, bronquitis, hemorragias pasivas, etc. *D.* Una cucharada cada hora.

4175. L. BALSÁMICO.

℞ Báls. negro del Perú. una gota.
 Mézclese con
 Aceite de almend. dulce. ℥℔ (15 gr.).
 Se mezcla en un mortero con
 Goma arábica en polvo. ℥ij℔ (10 gr.).
 Se añade poco á poco
 Jarabe simple. ℥j℔ (45 gr.).
 Emulsion simple. ℥vj (180 gr.).
 M. I. Bronquitis rebeldes. D. A
 cucharadas.

4176. Otro, n. 2.

℞ Bálsamo del Canadá. ḡxc (5 gr.).
 Yemas de huevo. núm. 2.
 Tintura de benjuí compuesta,
 Tintura de guayaco, añ. ℥℔ (15 gr.).
 Aceite de menta piper. ḡxviiij (1 gr.).
 M. I. Gota, leucorrea, blenorrea,
 catarro útero-vaginal, bronquitis. D. A cucharadas mañana y tarde.

4177. L. BLANCO (F. F.).

℞ Almendras dulces sin cáscara. ℥jv℔ (18 gr.).
 Almendras amargas mondadas. ℥℔ (2 gr.).
 Azúcar blanca. ℥jv (16 gr.).
 Aceite de almend. dulce. ℥jv (16 gr.).
 Polvos de gom. tragac. ḡxvj (8 dec.).
 Agua de flor de naranj. ℥jv (16 gr.).
 Agua comun. ℥jv (125 gr.).

Se hace una emulsion con las almendras, el agua comun y casi todo el azúcar; se deslié poco á poco en esta emulsion, hasta que se obtenga un mucilago un poco claro, la goma tragacanto, que se tendrá mezclada con el resto del azúcar; se añade por partes el aceite de almendras dulces y se bate por mucho tiempo; por último se diluye la mezcla con el resto de la emulsion y el agua de flores de naranjo.

I. Se usa en todas las afecciones ligeras de pecho, ronquera, bronquitis, neumonía, pleuresía,

cuando la tos es seca y difícil, gota, priapismo, cistitis. D. A cucharadas en diferentes horas del dia.

A veces se añade:

Jarabe de diacodion,
 ó Jarabe de morfina. ℥j (30 gr.).

4178. L. BLANCO (H. DE M.).

℞ Almendras dulces. núm. 12.
 Azúcar blanco. ℥vj (24 gr.).
 Goma tragacanto. ℥℔ (6 dec.).
 Agua. ℥jv (125 gr.).
 Agua de cidra. ℥j (4 gr.).

Se hace una emulsion con las almendras, el agua y el azúcar; se cuele, se forma mucilago con la goma, se disuelve y se añade el agua de cidra.

I. V. la fórmula anterior. D. ℥ij á ℥iij (60 á 90 gr.).

4179. L. CALMANTE.

℞ Looc blanco. ℥v (150 gr.).
 Jarabe diacodion. ℥j (30 gr.).
 M. D. A cucharadas.

4180. L. CALMANTE DE AGUA DE CAL (Radius).

℞ Goma arábica. ℥ij℔ (10 gr.).
 Yemas de huevo. núm. 2.
 Agua de cal. ℥iij (90 gr.).
 Tintura de opio. ḡxc (5 gr.).
 Aceite de almendras dulces,
 Jarabe diacodion, añ. ℥j (30 gr.).

M. I. Cólico nefrítico, cálculos urinarios, arenillas, neumatosis, bronquitis.

4181. L. DE CAÑAMONES.

℞ Cañamones. ℥v℔ (22 gr.).
 Goma arábica. ℥j (4 gr.).
 Agua de perejil. ℥v (160 gr.).
 Jarabe de bálsamo del Perú. ℥j (32 gr.).

M. I. Gonorrea. D. Una cucharada cada dos horas.

4182. L. DE CATECÚ Y ALMIDON.

℞ Catecú. 1

Almidon. 2

Se diluye en :

Clara de huevo batida en un poco
de agua y jarabe de Tolú. . . 8

M. I. Diarreas rebeldes. *D.* $\bar{3}jv$
á $\bar{3}v$ (120 á 150 gr.) á cucharadas
en las veinticuatro horas.

4183. L. CIDONIADO.

\bar{z} Semillas de membrill. $\bar{3}ij\beta$ (40 gr.).

Agua de lirio ,

Agua de adormid. , $\bar{a}\bar{a}$. $\bar{3}ij$ (64 gr.).

Jarabe de violetas. . . $\bar{3}j\beta$ (48 gr.).

M. I. Disenteria, diarrea crónica, lenteria, vómitos espasmódicos, vértigos, cardialgia. *D.* A cucharadas de hora en hora.

4184. L. COMPUESTO.

\bar{z} Alcanfor. $\bar{3}jv$ (3 dec.).

Looc blanco. $\bar{3}jv$ (125 gr.).

Extracto de opio. $\bar{g}j$ (5 cent.).

Extracto de quina. $\bar{g}jv$ (2 dec.).

M. I. Catarros pulmonares con secrecion abundante de mucosidades. *D.* A cucharadas en diferentes horas del dia.

4185. L. CONTRAESTIMULANTE.

\bar{z} Looc blanco de la F. F. $\bar{3}v$ (150 gr.).

Quermes mineral. $\bar{g}xviiij$ (1 gr.).

M. D. A cucharadas cada dos horas.

**4186. L. CONTRAESTIMULANTE ó
contra la neumonia (Trousseau).**

\bar{z} Looc blanco. $\bar{3}jv$ (125 gr.).

Antimonio diaforético

lavado. $\bar{3}j$ (4 gr.).

D. Se da una cucharada cada dos horas. Se agita al tiempo de usarle.

Se administra durante muchos dias luego que se han calmado un poco los primeros síntomas de la neumonia.

4187. L. DULCIFICANTE (Gaubius).

\bar{z} Esperma de ballena ,

Goma arábica , $\bar{a}\bar{a}$. . $\bar{3}ij$ (8 gr.).

Agua de rosas. $\bar{3}jx$ (288 gr.).

Azúcar blanca. $\bar{3}vj$ (24 gr.).

Se tritura durante mucho tiempo la esperma de ballena con la goma y el azúcar hasta que estén bien divididos, se añade un poco de agua de rosas, se tritura durante diez minutos y se mezcla poco á poco el resto del agua.

I. Se usa en las enfermedades de pecho para calmar la tos. *D.* Una cucharada cada hora.

4188. L. ESCILÍTICO.

\bar{z} Looc simple gomoso. $\bar{3}jv$ (125 gr.).

Miel escilitica. $\bar{3}j$ (4 gr.).

M. I. Es expectorante. *D.* A cucharadas.

4189. L. EXPECTORANTE.

\bar{z} Raiz de poligala. $\bar{3}ij$ (8 gr.).

Agua hirviendo. $\bar{3}vj$ (180 gr.).

Se infunde, se cuele y se añade:

Goma amoniaco. $\bar{3}j$ (4 gr.).

Jarab. de báls. de Tolú. $\bar{3}ij$ (60 gr.).

I. Catarro pulmonar, bronquitis crónica, asma. *D.* Una cucharada cada dos horas.

4190. Otro (BARBEYRAC).

\bar{z} Jarabe de violetas. $\bar{3}j\beta$ (45 gr.).

Ojimiél simple. $\bar{3}j$ (30 gr.).

Flores de azufre. $\bar{3}\beta$ (2 gr.).

Flores de benjuí. $\bar{3}\beta$ (15 gr.).

Mézclese para un looc.

I. Asma. *D.* A cucharadas para favorecer la expectoracion en los ancianos asmáticos.

4191. Otro (ROUCHER).

\bar{z} Jarabe de malvabisco ,

Jarabe de tusilago, $\bar{a}\bar{a}$. $\bar{3}j\beta$ (45 gr.).

Goma arábica. $\bar{g}xx$ (10 dec.).

Agua de lirio. $\bar{3}ij$ (60 gr.).

I. Tos; modera la irritacion de la traquearteria y facilita la expectoracion.

**4192. L. EXPECTORANTE DE ÁCIDO
BENZÓICO.**

\bar{z} Acido benzóico. $\bar{g}xc$ (5 gr.).

Mucilago de goma aráb. \mathfrak{z} ij \mathfrak{B} (40 gr.).
 Se tritura y se añade:
 Jarabe de báls. de Tolú. \mathfrak{z} ij (60 gr.).
I. Catarro, bronquitis, neumonía crónica, neumatosis. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

4193. L. EXPECTORANTE É INCISIVO (*Astruc*).

\mathfrak{z} Miel de Narbona,
 Pulpa de pasas, $\tilde{a}a$. . . \mathfrak{z} ij (60 gr.).
 Flores de benjuí,
 Flores de azufre, $\tilde{a}a$. . \mathfrak{z} j (4 gr.).
 Jarabe de erisimo. . . . c. s.
I. Afecciones crónicas de pecho, asma húmedo. *D.* Una cucharada de café, tres ó cuatro veces al dia.

4194. L. DE GOMA ARÁBIGA (F. N. P.).

\mathfrak{z} Goma aráb. en polvo. \mathfrak{z} j (30 gr.).
 Agua comun. \mathfrak{z} iv (125 gr.).
 Aceite de almendr. dulc. \mathfrak{z} B (15 gr.).
 Jarabe de altea. . . . \mathfrak{z} j (30 gr.).
H. S. A. I. Afecciones catarrales, ronquera. *D.* \mathfrak{z} B á \mathfrak{z} j (15 á 30 gr.) dos ó mas veces al dia.

4195. L. GOMOSO.

\mathfrak{z} Goma arábica en polvo. . . . 2 á 4
 Se tritura en un mortero de mármol con
 Jarabé de miel, de malvabisco ó de culantrillo, etc. 8
 Agua comun ó infusion de flores pectorales. 32
M. I. Diarreas rebeldes. *D.* \mathfrak{z} iv á \mathfrak{z} v (120 á 150 gr.) al dia.

4196. L. DE GORDON.

\mathfrak{z} Jarabe de lombarda. \mathfrak{lb} j (500 gr.).
 Agua. \mathfrak{lb} B (250 gr.).
 Azafran. \mathfrak{z} iiij (12 gr.).
 Se hierva un momento y despues se cuela por una estameña.
I. Asma húmedo, romadizo y catarros. *D.* Una cucharada cada hora.

4197. L. DE HUEVO (F. F. ANT.).

\mathfrak{z} Aceite de almendr. dulc. \mathfrak{z} ij (8 gr.).

Yema de huevo. número 1.
 Jarabe de malvabisco. . \mathfrak{z} j (32 gr.).
M. I. Tos, ronquera, catarro, bronquitis, neumonía. *D.* A cucharadas.

4198. L. INCRASANTE (*Gaubius*).

\mathfrak{z} Aceite de almendr. dulc. \mathfrak{z} ij \mathfrak{B} (45 gr.).
 Jarabe de violetas,
 Miel blanca,
 Yema de huevo, $\tilde{a}a$. . \mathfrak{z} B (13 gr.).
M. S. A. I. Enfermedades de pecho cuando se han suprimido los esputos. *D.* Una cucharada cada media hora.

4199. L. JABONOSO (F. ED.).

\mathfrak{z} Aceite de almendr. dulc. \mathfrak{z} j (30 gr.).
 Jarabe de limones. . . . \mathfrak{z} ij \mathfrak{B} (6 gr.).
 Jabon medicinal. \mathfrak{z} j (4 gr.).
H. S. A. I. Se usa como laxante y antiácido para los niños. *D.* Una cucharada cada hora hasta producir evacuaciones.

4200. L. DE J. P. FRANK.

\mathfrak{z} Mucilago de goma arábica,
 Miel cocida, $\tilde{a}a$ \mathfrak{z} j (30 gr.).
M. D. A cucharadas, y se bebe despues una taza ó vaso de infusion de flores de violetas, borraja ó frutos béquicos.

4201. L. LAXANTE PARA LOS NIÑOS.

\mathfrak{z} Looc blanco. \mathfrak{z} iiij (90 gr.).
 Jarabe de rosas pálidas. \mathfrak{z} j (30 gr.).
 Se da la mitad por la tarde y el resto al otro dia por la mañana.
 Se puede usar el jarabe de achicorias compuesto en lugar del solutivo.

4202. L. DE NAFTALINA (*Dupasquier*).

\mathfrak{z} Looc blanco. número 1.
 Naftalina. \tilde{g} x á \mathfrak{z} B (50 cent. á 2 gr.).
 Mézclese bien.
I. Romadizos y catarros crónicos. *D.* A cucharadas de cuarto en cuarto de hora.

4203. L. OPIADO.

℞ Extr. acuoso de opio. ℞β (6 dec.).
 Looc de almendras dul-
 ces. ℞v (150 gr.).
 Disuélvase. *I.* Vómitos, gastri-
 tis, pleuresía, neumonía, bron-
 quitis, ronquera, tétanos, hema-
 celinosis, neumatosis, hipocon-
 dría. *D.* A cucharaditas de café de
 dos en dos horas.

4204. L. PECTORAL (Berends).

℞ Goma amoniaco. ℞ij (8 gr.).
 Yema de huevo. número 4.
 Agua de hinojo. ℞v (150 gr.).
 Amoniaeo anisado. ℞iij. (12 gr.).
 Vino emético. ℞ij (8 gr.).
 Jarabe escilitico. ℞j (32 gr.).
M. I. Catarro sofocante, asma
 húmedo, neumonía, sarampion,
 bronquitis. *D.* Una cucharada de
 dos en dos horas.

4205. Otro (FRANK).

℞ Goma amoniaco. ℞ijβ (10 gr.).
 Acetato de amoniaco. ℞iij (96 gr.).
 Vino emético. ℞xc (5 gr.).
 Ojimiél simple. ℞j (32 gr.).
 Infusion de saúco. ℞iij (96 gr.).
I. Catarro crónico, bronquitis,
 neumonía crónica, hidrotorax,
 sarampion. *D.* Una cucharada ca-
 da dos horas.

4206. Otro (H. DE AL.).

℞ Ojimiél escilitico,
 Jarabe de malvabisco,
 Mucilago de goma, arábica, ãã. p. ig.
M. I. Catarros pulmonares cró-
 nicos. *D.* Una cucharada cada
 dos horas.

4207. Otro (H. DE AL.).

℞ Azufre dorado de anti-
 monio. ℞jv (2 dec.).
 Mucilago de goma aráb.,
 Miel blanca, ãã. ℞j (30 gr.).
M. D. A cucharadas.

4208. Otro (PREZIOZI).

℞ Agua destil. de saúco. ℞v (150 gr.).

Aceite de almendras

dulces. ℞jβ (45 gr.).
 Goma arábica. ℞β (15 gr.).
 Jarabe de polígala. ℞jβ (45 gr.).
 Jarabe de violetas. ℞j (30 gr.).
 Kermes mineral. ℞ij (1 dec.).
H. S. A. I. Tisis pulmonar. *D.*
 A cucharadas.

**4209. L. PECTORAL SULFURO
ANTIMONIADO.**

℞ Azufre dorado de an-
 timonio. ℞xviiij (1 gr.).
 Extracto de marrubio blanco,
 Extr. de polígala, ãã. ℞j (4 gr.).
 Ojimiél escilitico. ℞j (30 gr.).
 Jarabe de erisimo. ℞ij (60 gr.).
I. Catarro, bronquitis, neumo-
 nía crónica. *D.* A cucharadas de
 dos en dos horas.

4210. L. PURGANTE.

℞ Resina de jalapa. ℞vj (30 cent.).
 Looc blanco. ℞jv (125 gr.).
H. S. A. I. Se usa como purgante
 en los niños de seis á diez años. *D.*
 De una vez por la mañana en ayu-
 nas.

4211. Otro, n. 2.

℞ Raiz de jalapa,
 Escamonea, ãã. ℞viiij (4 dec.).
 Jarabe de horchata. ℞j (30 gr.).
 Agua de fl. de naranjo. ℞jβ (45 gr.).
 Esencia de limon. 2 gotas.
I. Afecciones biliosas, cálculos,
 embarazo gástrico. *D.* Por la ma-
 ñana en ayunas como purgante.

**4212. L. PURGANTE CON
TÁRTAGO.**

℞ Aceite de tártago. 10 gotas.
 Aceite de almend. dule. ℞β (15 gr.).
 Se echan en tres dracmas de go-
 ma en polvo, y se añade poco á
 poco:
 Jarabe simple. ℞j (30 gr.).
 Agua. ℞iij (90 gr.).
 Alcoholato de limon. 10 gotas.
 Se toma de una vez como pur-
 gante. Reemplazando las diez go-
 tas de aceite de tártago por una

gota de aceite de croton tiglio se obtiene el *looc purgante de croton*.

4213. L. QUERMETIZADO.

℥ Looe blanco. ℥jv (125 gr.).
 Quermes. ḡj á ḡjv (5 á 20 cent.).
 H. S. A. I. Es incisivo y diaforético. D. A cucharadas de hora en hora. V. *Looc contraestimulante*.

4214. L. QUERMETIZADO Y ALCANFORADO.

℥ Quermes mineral. ḡiij (15 cent.).
 Aleanfor. ḡjv (20 cent.).
 Mucil. de goma aráb. ℥β (15 gr.).
 Jarab. de malvabisco. ℥j (30 gr.).
 M. I. Crup en el principio, neumonía, vómitos espasmódicos. D. A cucharadas.

4215. L. SÓLIDO (Gallot).

℥ Almendras dulces. ℔j (500 gr.).
 Almendras amargas. ℥ij (60 gr.).
 Goma arábica. ℔ij (4000 gr.).
 Azúcar blanca. ℔ij (4000 gr.).
 Agua de flores de naranjo. ℥jv (125 gr.).
 H. S. A. una pasta.

4216. L. SIMPLE DE RESINEONA.

℥ Looe blanco de la F. F. sin azúcar. ℥jv (125 gr.).
 Sacaruro de resineona. ℥j (30 gr.).
 Se puede poner cinco partes de resineona con nuevecientas noventa y cinco de aceite de almendras dulces para componer los loocs en lugar del sacaruro, en la cantidad de ℥j (30 gr.).
 D. ℥β (15 gr.) en una pocion de ℥jv (125 gr.).

4217. L. COMPUESTO DE RESINEONA.

℥ Aceite de almendras dulces ℥β (15 gr.).
 Jarabe de violetas. ℥β (15 gr.).
 Sacarur. de resineona. ℥j (30 gr.).

Infusion béquica. ℥iij (90 gr.).
 Agua de flor de naranjo. ℥ijβ (40 gr.).
 Goma arábica en polv. e. s.

4218. L. TREMENTINADO (Recamier).

℥ Esencia de trementina. ℥iij (42 gr.).
 Yema de huevo. número 2.
 Jarabe de yerbabuena. ℥ij (60 gr.).
 Jarabe de flores de naranjo. ℥j (30 gr.).
 Jarabe de éter. ℥j (30 gr.).
 Tintura de canela. ℥β (2 gr.).
 H. S. A. I. Neuralgia, ceática, neuritis, parálisis, gangrena de hospital, lepra. D. Tres cucharadas al dia.

Nota. Cuando este medicamento produce vómitos se añade:
 Láud. líquido de Sydenham. ℥j (4 gr.).

4219. Otro (H. DE M.).

℥ Esencia de trementina. ℥iij (42 gr.).
 Yemas de huevo. número 2.
 Agua de yerbabuena,
 Jarabe de eidra, añ. ℥ij (60 gr.).
 Alcohol de canela. ℥β (2 gr.).
 Se tritura la esencia con las yemas de huevo en un mortero de vidrio, se añade despues el jarabe y por último poco á poco el agua agitando bien la mezcla.
 I. Neuralgias. D. A cucharadas.

4220. L. VERDE ó Looc de azafran (F. F. ANTIGUA).

℥ Alfónsigos recientes. número 14.
 Azafran. ḡjv (2 dec.).
 Agua. ℥jv (125 gr.).
 Jarabe de violetas. ℥j (30 gr.).
 Agua de flores de naranjo. ℥ij (8 gr.).
 Aceite de almendras dulces. ℥β (15 gr.).
 Goma tragaeanto en polvo. ḡxvj (8 dec.).
 H. S. A. I. Bronquitis, neumonía crónica. D. A cucharadas de hora en hora.

El *looc rojo* se diferencia de este en que se reemplazan los alfónsigos por ℥j (4 gr.) de quermes mineral. Siendo difícil encontrar los

alfónsigos secos, se los sustituye con las almendras dulces; y para darle color basta el jarabe de violetas y el azafran.

4221. L. VERMÍFUGO.

℞ Infusion de musgo de
 Córcega. ℥iij (90 gr.).
 Aceite de ricino. . . . ℥jβ (45 gr.).
 Jarabe de flores de
 mclocoton. ℥j (30 gr.).
 Calomclanos. ḡvj (30 cent.).

Ruibarbo. ḡviij (4 dec.).
 H. S. A. I. Afecciones verminosas. D. A cucharadas cada dos horas.

4222. L. DE YERBA ESCARCHADA.

℞ Zumo de yerba escarchada, reciente y espumado. ℥j (30 gr.).
 Jarabe de visco acercino. ℥β (15 gr.).
 Mézclese.

MACERACIONES.**4223. MACERACION AMARGA (Plisson).**

℞ Córteza de quina. . . ℥ijβ (10 gr.).
 Raiz de colombo. . . ℥j (4 gr.).
 Raiz de ruibarbo. . . ℥j (4 gr.).
 Semillas de anis. . . ℥j (4 gr.).
 Hojas de ajenjos. . . ℥β (2 gr.).
 Magnesia. ℥j (12 dec.).
 Agua fria. lbij (1000 gr.).

Se deja en maceracion durante doce horas y se filtra por un papel.

I. Es muy eficaz en las dispepsias, anorexias, debilidades y languideces del estómago. D. Un vaso, dos veces al dia, antes de comer y cenar.

4224. MACERADO ANTICTÉRICO (Souberbielle).

℞ Polv. de hojas de nogal. ℥j (4 gr.).
 Vino blanco. ℥v (150 gr.).
 Se macera durante doce horas y se cuele.

D. En una toma por la mañana en ayunas.

4225. M. CALCAREO DE ZARZAPARRILLA (O'Beirne).

℞ Zarzaparrilla roja cortada. ℥jv (125 gr.).
 Raiz de regaliz. . . . ℥β (15 gr.).
 Agua de cal. lbij (1000 gr.).

Se macera durante veinticuatro horas y se cuele.

I. Formas secundarias de la sífilis. D. lbj (500 gr.) al dia.

MANILUVIOS.**4226. MANILUVIOS.**

Se preparan con mostaza, carbonato de potasa y algunas veces con el ácido clorhídrico.

Son útiles cuando la sangre afluye en abundancia al pecho, como en la hemotisis, aneurisma del corazon, asma, etc.

Se usa la mitad de las dosis que en los baños de piés.

MASAS.

4227. MASA ODONTÁLGICA
(Henry).

Se satura de éter sulfúrico la almáciga, se decanta despues de algunos dias de maceracion, se empapa una bolita de algodón de igual grosor que la cavidad del diente cariado y se aglutina de modo que se llene el vacío del diente. V. *Odontoides*.

4228. Otra (VOGLER).

- ℥ Opio desecado. ℥j (30 gr.).
- Almáciga,
- Sandaraca, ãã. ℥ij (8 gr.).

- Sangre de drago. ʒß (2 gr.).
- Aceite volátil de romero. 8 gotas.
- Espíritu de coclearia. . . c. s.

Despues de haber pulverizado separadamente la almáciga, la sandaraca, la sangre de drago y el opio, se los mezcla; se los humedece con el aceite volátil, se los pista en un mortero de mármol y se añade poco á poco el espíritu, para formar una masa uniforme, de consistencia blanda y semiductil.

I. Dolores de dientes. D. Se extiende sobre la encía enferma una porcion de esta masa como el volumen de un guisante.

MASTICATORIOS.

4229. MASTICATORIO
AROMÁTICO.

- ℥ Mirra. 4
- Canela. 3
- Alcanfor. 1
- Trementina cocida. 16

Se incorporan los dos polvos en la trementina fundida con el alcanfor.

4230. M. INDIANO.

- ℥ Hojas de pimienta betel. 1

Se machacan é incorporan poco á poco con

- Nuez de arec en polvo. 2
- Cal viva preparada con conchas de ostras. 1

Mézclese.

4231. M. IRRITANTE.

- ℥ Almáciga en polvo. 6
 - Liquidambar. 3
- Se funde y se incorpora poco á poco:
- Polvo de raiz de pelitre. 2
 - Polvo de pimienta anual. 1

MEDICINAS.

4232. MEDICINA DE MANÁ
CON FRAMBUESA.

- ℥ Maná en lágrimas. ʒjß (45 gr.).
 - Agua. ʒjv (125 gr.).
 - Carbon animal. ʒxc (5 gr.).
 - Jarabe de frambuesas. ʒj (30 gr.).
 - Jarabe de flores de me-locoton. ʒj (30 gr.).
- Se funde el maná á fuego len-

to, se añade el carbon y se mantiene la mezcla al fuego por espacio de media hora, agitando sin cesar; se echa en un filtro y despues de frio se añade el maná y los dos jarabes.

Esta dosis es para un adulto. Purga con suavidad sin producir dolores, y es el mas agradable de los purgantes liquidos conocidos.

4233. M. DE CAFÉ.

℞ Sen. ℥ijβ (40 gr.).
 Sulfato de magnesia. . . ℥β (15 gr.).
 Café tostado. ℥β (15 gr.).
 Agua. ℥jv (125 gr.).

Se hierven estas sustancias durante algunos instantes, se cuele y se añade:

Jarabe simple. ℥jβ (45 gr.).

D. De una vez.

Esta medicina es un purgante muy agradable. V. n. 699.

4234. M. DE MAGNESIA ó Medicina blanca (Mialhe).

℞ Magnesia calcinada ofi-
 cinal. ℥ij (8 gr.).
 Agua simple. ℥x (40 gr.).
 Azúcar en polv. grueso. ℥jβ (50 gr.).
 Agua de flores de na-
 ranjo. ℥v (20 gr.).

Se trituran exactamente en un mortero de porcelana la magnesia calcinada con el agua comun, se introduce despues esta leche magnesiana en un cazo de plata, y se calienta hasta la ebullicion completa agitando sin cesar con una espátula de plata, para evitar que el óxido magnésico se precipite hidratándose. Hecho esto se aparta el cazo del fuego, se añá-

de el azúcar y se continúa agitando hasta que se haya disuelto enteramente esta última; finalmente se añade el agua de flor de naranjo y se cuele por una estameña. Se mantiene siempre líquida.

I. Es buen purgante sin producir incomodidad ni cólicos; produce pocas evacuaciones, pero copiosas, y como pultáceas, blandas; y tarda en obrar cinco á seis horas.

D. Se toma de una vez por la mañana en ayunas y despues medio vaso de agua fria, pero no mas.

4235. M. DE NAPOLEON (Corvisart).

℞ Crémor de tártaro soluble. ℥j (30 gr.).
 Tartrato de potasa y de antimonio. ḡβ (25 milig.).
 Azúcar. ℥ij (60 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).

H. S. A. I. y D. Es un laxante suave, del que se presentaban algunos vasos por la mañana á Napoleon.

Nota. Es necesario preferir el crémor de tártaro hecho soluble por el procedimiento de Soubeiran.

MERMELADAS.**4236. M. DE ALBARICOQUES ó Electuario de albaricoques.**

℞ Albaricoques bien maduros. ℔vj (3000 gr.).
 Azúcar blanca. ℔jv (2000 gr.).

Se abren por medio los albaricoques para separar los huesos; se cortan en pedazos; se ponen en un lebrillo con el azúcar en polvo grueso; se agita de cuando en cuando por veinticuatro horas para que se disuelva el azúcar en el zumo de los albaricoques; se pone todo en un perol

al fuego, y se cuece prontamente meneándolo sin cesar hasta que la mermelada al enfriarse tome una consistencia firme; entonces se le añade una parte de las almendras de albaricoques que se han separado de los huesos y mondado de sus películas, y se echa en vasijas.

Se usa en la economía doméstica.

Del mismo modo se preparan las MERMELADAS DE CIRUELAS Y MELOCOTONES, pero en estas no entran las almendras de los frutos.

4237. M. ANTIESCORBÚTICA ó Ali-
mentacion antiescorbútica.

- 2 Patatas cocidas al vapor. 100
- Quina en polvo. 6
- Jarabe simple. 25
- Agua. 400

Hágase una pasta.

D. $\bar{3}jv$ (125 gr.) que se duplica al quinto ó sexto dia.

4238. M. ASTRINGENTE.

- 2 Trementina cocida. . . $\bar{3}j$ (30 gr.).
 - Bálsamo de copaiba. . . $\bar{3}B$ (15 gr.).
- Mézclese exactamente en un mortero calentado y añádase:

- Mucilago de goma arábica. $\bar{3}j$ (30 gr.).
- Conserv. de rosas roj. $\bar{3}jv$ (125 gr.).

I. Gonorrea inveterada. D. $\bar{3}jB$ á $\bar{3}ij$ (6 á 12 gr.) tres veces al dia.

4239. M. ASTRINGENTE (Olier).

- 2 Bálsamo de copaiba. . . $\bar{3}jv$ (125 gr.).
- Aceite de sucino. . . . $\bar{3}jv$ (16 gr.).
- Láudano liquido. . . . $\bar{3}ij$ (8 gr.).
- Subcarbon. de potasa. $\bar{3}jB$ (6 gr.).

Se mezclan estas sustancias en un mortero de mármol y se añade c. s. de una mezclá de

- Almidon. 4
- Azúcar blanca. 2

H. S. A. I. Gonorreas crónicas. D. Una cucharada de café por la mañana, al mediodia y por la tarde, aumentando una cucharada cada tres dias.

4240. M. CONTRA LOS CATARROS CRÓNICOS.

- 2 Miel. $\bar{3}viii$ (250 gr.).
- Se funde en una vasija de barro y al apartarla del fuego se añade:
- Flores de azufre,
 - Raiz de émula campana,
 - Extracto de regaliz,
 - Agua de rosas, $\bar{a}\bar{a}$. . $\bar{3}ij$ (8 gr.).

H. S. A. D. El volúmen de una nuez moscada tres ó cuatro veces al dia, y se bebe despues un vaso de infusion de pétalos de amapola ó de flores de saúco caliente y bien azucarada.

4241. M. EXPECTORANTE.

- 2 Maná en lágrimas. . . $\bar{3}vj$ (180 gr.).
- Quermes mineral. $\bar{g}jv$ á $\bar{g}vj$ (2 á 3 dec.).

- Aceite de almendras dulces,
 - Jarabe de polígala,
 - Jarabe escilitico, $\bar{a}\bar{a}$. $\bar{3}ij$ (8 gr.).
- Mézclese bien.

D. Una cucharada de café cuatro ó cinco veces al dia. Se bebe despues una taza de té ligero.

4242. M. EXPECTORANTE DE BENJUÍ Ó BENZÓICA.

- 2 Flores de benjuí,
- Azufre, $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{g}xviii$ (4 gr.).
- Ipecacuana. $\bar{g}vj$ (3 dec.).
- Miel. $\bar{3}v$ (150 gr.).
- Jarabe de polígala de Virginia,
- Jarabe escilitico, $\bar{a}\bar{a}$: $\bar{3}j$ (30 gr.).

M. I. Catarro y neumonía crónica de los ancianos, bronquitis. D. Una cucharada de café, tres ó cuatro veces al dia.

4243. M. DE GENGIBRE ó Mermelada estimulante.

- 2 Gengibre en polvo. . . $\bar{3}B$ (15 gr.).
- Miel. $\bar{3}vj$ (180 gr.).

I. Bronquitis, catarro pulmonar crónico, afonía. D. Una cucharada de café dos ó tres veces al dia. Es la *mermelada de Rosem*.

4244. M. JABONOSA.

- 2 Jabon medicinal. . . . $\bar{3}B$ (2 gr.).
- Agua de menta. $\bar{3}ij$ (12 gr.).

Se añade:

- Yemas de huevo. . . . número 2.
- Magnesia blanca. . . . $\bar{g}Ljv$ (3 gr.).
- Ruibarbo. $\bar{3}B$ (2 gr.).
- Jarabe de malvabisco,
- Jar. de manzanilla, $\bar{a}\bar{a}$. $\bar{3}ijB$ (10 gr.).

I. Cólicos de los niños, neumatosis. D. A cucharadas.

4245. M. PECTORAL (Vergnes).

- 2 Ipecacuana. $\bar{B}B$ (6 dec.).
- Azufre. $\bar{B}j$ (12 dec.).
- Lirio. $\bar{3}j$ (4 gr.).
- Jarabe de malvabisco. . . $\bar{3}ij$ (60 gr.).

Maná. ʒij (60 gr.).

I. Coqueluche. *D.* Una cucharada de café dos ó tres veces al día.

4246. M. SUCINADA.

ʒ Quermes mineral. . . ʒjv (2 dec.).

Accite de sucino,

Jarabe de poligala,

Jarabe escilítico, ãã. ʒij (8 gr.).

Maná. ʒvj (180 gr.).

Hágase una pasta blanda.

I. Neumonía crónica, para facilitar la expectoracion en los catarrros crónicos. *D.* A cucharadas.

4247. M. DE TRONCHIN.

ʒ Maná en lágrimas,

Jarabe de violetas,

Pulpa de cañafistula,

Accite de almendras dulces, ãã. ʒj (32 gr.).

Agua de flores de naranjo. ʒj (4 gr.).

H. S. A. I. Se usa como purgan-

te suave en los catarrros, bronquitis y neumonía. *D.* Esta dosis se toma en dos mañanas y á cucharadas de hora en hora; se bebe un caldo ligero despues de cada toma.

4248. M. DE ZANETTI.

ʒ Quermes mineral. . . . ʒjv (2 dec.).

Maná en lágrimas. . . ʒij (60 gr.).

Manteca de cacao. . . ʒvj (24 gr.).

Accite de almendras dulces,

Cañafistula cocida, ãã. ʒj (30 gr.).

Jarabe de malvabisco. ʒjß (45 gr.).

Agua de flores de naranjo. ʒß (15 gr.).

H. S. A. I. Catarro, bronquitis, neumonía crónica, atrofia mesentérica. *D.* Algunas cucharadas de café al día cuando se quiere favorecer la expectoracion y mantener al mismo tiempo el vientre libre.

MEZCLAS.

4249. MEZCLA ACÚSTICA (Richter).

ʒ Bálsamo del Perú. . . ʒj (4 gr.).

Hiel de buey. ʒiij (12 gr.).

M. I. Flujos purulentos y fétidos de los oídos. *D.* Se llena de esta mezcla el conducto auditivo, y despues de algunos minutos de contacto se deja salir el líquido; se renueva esta operacion dos ó tres veces al día.

4250. M. ANTICANCEROSA (Rust).

ʒ Flores de caléndula,

Hojas de caléndula,

Hojas de cicuta, ãã. ʒj (30 gr.).

Agua hirviendo. . . . ʒbij (1000 gr.).

Se infunde durante media hora, se cuele y se añade S. A.

Alcoholado de cloru-

ro de hierro. . . . ʒß (15 gr.).

Agua destilada de lau-

rel real. ʒvj (180 gr.).

D. En lociones, fomentos ó inyecciones, segun los casos.

4251. M. ANTICATARRAL (Richter).

ʒ Raiz de rubia. . . . ʒij (8 gr.).

Raiz de cardo corre-

dor. ʒvj (24 gr.).

Agua comun. . . . ʒbjß (750 gr.).

Se hierve durante media hora y se añade:

Salep. ʒj (4 gr.).

Se continúa hirviendo hasta que se reduzca la mitad, se cuele y se añade:

Jarabe de malvabisc. ʒj (30 gr.).

I. Catarros crónicos inveterados. *D.* Dos cucharadas de dos en dos horas.

4252. M. ANTIESPASMÓDICA (Armstrong).

ʒ Extracto de cicuta. . . ʒxvj (8 dec.).

Agua de menta,
 Agua comun, āā. ʒjv (125 gr.).
 Azúcar blanca. ʒij (60 gr.).

M. I. Coqueluche en segundo ó tercer período. *D.* Una cucharada de café de hora en hora.

4253. M. ANTIESPASMÓDICA
 (*Blache*).

ʒ Oxido de zinc. ʒij (8 gr.).
 Calomelanos preparados
 al vapor. ʒj (4 gr.).
 Valeriana en polvo. ʒj (4 gr.).
 Mézclese y divídase en setenta tomas.

I. Enfermedades epilépticas de los niños. *D.* Dos tomas al dia, una por la mañana en ayunas y otra antes de comer.

4254. Otra (MOST).

ʒ Raiz de cálamo aromático,
 Raiz de angélica, āā. ʒij (8 gr.).
 Hojas de melisa,
 Hoj. de naranjo, āā. ʒj (4 gr.).
 Hojas de sen. ʒβ (2 gr.).
 Cilantro. ʒxij (60 cent.).

I. Histérico acompañado de estreñimiento. *D.* Esta dosis todos los dias en infusion de ʒbj (500 gr.) de agua.

4255. M. ANTILEUCORRÉICA
 (*Neumann*).

ʒ Verde gris,
 Sulfato de cobre,
 Sulfato de zinc, āā. ʒij (8 gr.).
 Agua de fuente. ʒbjβ (750 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca una tercera parte

I. Leucorrea vaginal crónica. *D.* Una parte de la mezcla con tres partes de infusion de salvia en inyecciones.

4256. M. ANTIODONTÁLGICA
 (*Toirac*).

ʒ Acetato de plomo,
 Sulfato de zinc, āā. ʒxviiij (4 gr.).
 Tintura de opio. ʒxxxvj (2 gr.).

I. Odontalgia por caries. Se pone en la cavidad del diente un

poco de esta mezcla que abulte como la cabeza de un alfiler.

4257. M. ANTISIFILÍTICA
 (*Pihorel*).

ʒ Ungüento mercurial. 3
 Sulfuro de cal. 4

Mézclese. Se hace una fricción por las noches al acostarse con ʒj (4 gr.) de esta mezcla, que se extiende con un pedazo de piel para dar una fricción en la parte interna de las dos piernas ó en la parte anterior del antebrazo. Al dia siguiente se lavan las partes en que se ha hecho la fricción con agua de salvado ó de jabon. Siguiendo este método no hay que temer la salivacion; los enfermos que han empezado á salivar con una fricción de menos de ʒβ (2 gr.) han dejado de salivar con fricciones de ʒj (4 gr.) de la mezcla.

4258. M. BALSÁMICA (*Smith*).

ʒ Báls. negro del Perú. ʒβ (2 gr.).
 Hiel de buey ʒjβ (45 gr.).

M. I. Otitis crónica. *D.* Se echan algunas gotitas en el oido muchas veces al dia, despues de haberle limpiado con agua de jabon. V. núm. 4249.

4259. M. CONTRA LA TIÑA
 (*Blaud*).

ʒ Hollin. ʒij (60 gr.).
 Yemas de huevo. número 6.
 Mézclese exactamente.

4260. M. DE CIANURO DE ZINC
 (*Magendie*).

ʒ Cianuro de zinc. ʒvj (3 dec.).
 Magnesia calcinada. ʒjv (2 dec.).
 Polvo de canela. ʒiiij (15 cent.).

M. I. Calambres de estómago. *D.* Se toma cada cuatro horas.

4261. M. DESINFECTANTE (*Siret*).

ʒ Sulfato de hierro. ʒbXL (20000 gr.).
 Sulfato de zinc. ʒbij (4000 gr.).
 Sulfato de cal. ʒbLiiij (26500 gr.).

Carbon vegetal. ℔ij (4000 gr.).
 Mézclase y con c. s. de agua se hace una pasta con la que se desinfectarán cien varas con ciento veinte libras.

4262. M. DESINFECTANTE (Knod).

℥ Flores de caléndula. ℥ij (12 gr.).
 Agua de fuente. ℥v (150 gr.).
 Se hierve hasta que se reduzca dos quintas partes, se cuele con expresion y se añade S. A.

Extracto de caléndula. ℥j (4 gr.).
 Brea. ℥ij (60 gr.).
 Acido piroleñoso. ℥jβ (45 gr.).
 Goma arábica en polvo. c. s.

I. Sirve para destruir el olor fétido que se exhala de ciertas úlceras cancerosas. D. Dos ó tres aplicaciones al dia.

4263. M. EMENAGOGA (Mansfeld).

℥ Sulfuro de carbono. ℥j (32 gr.).
 Iodo. ḡv (25 cent.).

M. D. Dos gotas en una taza de cocimiento de harina de avena azucarada, tres veces al dia.

4264. M. FRIGORÍFICAS.

1.^a Acido clorhídrico del comercio. 4
 Sulfato de zinc reducido á polvo fino. 4

Hace bajar la temperatura desde + 10° á — 7° ó 17°.

2.^a Sal amoniaco. 5
 Sal de nitro. 5
 Agua. 16

Hace bajar la temperatura de + 10° á — 12° ó 22°.

3.^a Sulfato de sosa. 3
 Acido nítrico diluido. 2

Hace bajar la temperatura de + 10° á — 19° ó 26°.

4.^a Sulfato de sosa. 3
 Nitrato de amoniaco. 5
 Acido nítrico diluido. 4

Hace bajar la temperatura de + 10° á — 26° ó 36°.

5.^a Fosfato de sosa. 9
 Nitrato de amoniaco. 6

Acido nítrico diluido. 4
 Hace bajar la temperatura de + 10° á — 30° ó 40°.

Se puede preparar hielo artificial colocando una vasija llena de agua en medio de estas mezclas.

Se pueden obtener temperaturas mas bajas mezclando hielo ó nieve, ácidos ó sales, pero estos frios no son necesarios sino en las operaciones de química.

4265. Otra (BOUTIGNI DE EU).

℥ Sulfato de sosa no eflorescido en polvo. ℔vj (2000 gr.).

Acido sulf. á 41°. ℔ij (1500 gr.).

Nota. El ácido sulfúrico á 41° resulta de la mezcla de siete partes en peso de ácido sulfúrico del comercio y cinco partes de agua, que se deja enfriar colocando la vasija que le contiene en agua fresca.

Se pone en una caja la mezcla y dentro de ella se sumergen dos cajas de hoja de lata de cabida cada una ℔ij (1500 gr.) de agua, la que puede helarse con tres dosis de la mezcla anterior cuando se opera á la temperatura de 10°.

4266. HIELO ARTIFICIAL (Courdemanche).

℥ Sulfato de sosa pulverizado. ℔vjβ (3250 gr.).

Acido sulfúrico á 36°. ℔vj (2000 gr.).

Se mezclan estas sustancias en un barril, en que se sumergen cilindros de hoja de lata que contengan el agua que se quiere helar; al cabo de tres mezclas, renovadas consecutivamente, se verifica la congelacion.

4267. Otro (FILHOL).

Las mezclas frigoríficas que usa son las siguientes:

NÚMERO 1.

℥ Sulfuro de sosa. 800

Acido clorhídrico del comercio. 500
 NÚMERO 2.
 Nitrato de amoniaco. 1000
 Agua. 1000

4268. M. REFRIGERANTE INGLESA,
Sal ó fomento refrigerante
(Vauquelin).

℥ Cloruro de potasa. 58
 Sal amoniaco. 32
 Nitrato de potasa. 10

M. Nota. Esta mezcla salina, disuelta en cuatrocientas partes de agua fria, hace bajar 15° R. la temperatura de este líquido.

4269. M. MERCURIAL (Cazenave).

℥ Oxido rojo de mercurio. ʒj (5 cent.).
 Azúcar blanca. ʒl̄jv (3 gr.).
 Mézclase y divídase en diez papeles iguales.

I. Sífilis terciaria. *D.* Uno por la mañana y al día siguiente otro por la tarde. De este modo se podría aumentar hasta dos ó tres papeles mañana y tarde.

Es un medicamento activo, que determina pronto la salivacion.

4270. Otra (VELPEAU).

℥ Calomelanos. ʒxc (5 gr.).
 Agua de malvabisco. . ʒv (150 gr.).

Se agita fuertemente la mezcla, y se empapan planchuelas que se colocan sobre las partes afectadas de grietas y úlceras sifilíticas.

4271. M. ODONTALGICA (Rust).

℥ Eter sulfúrico,
 Alcoholado de opio, añ. ʒB (2 gr.).
 Esencia de clavo. . . . ʒj (12 dec.).

M. I. Odontalgia por caries. *D.* Algunas gotas en la cavidad del diente.

4272. M. OLEO-SINAPIZADA
(P. Frank).

℥ Harina de mostaza negra muy fina. . . . ʒiij (12 gr.).

Acetate de almendras. . ʒB (15 gr.).
 Zumo de limon. c. s.
 H. S. A. una mezcla blanda.
I. Efélides. *D.* En fricciones mañana y noche.

4273. M. PARA DESENGRASAR LAS TELAS DE SEDA.

℥ Jabon negro. 125
 Miel. 150
 Aguardiente. 400

Se lava la tela en esta mezcla y despues se aclara en agua.

4274. M. PARA FUMAR ó Fumigacion calmante (Trousseau).

℥ Hojas de estramonio,
 Hojas de salvia, añ. c. s.
 para fumar en una pipa ó en un cigarro.

I. Asma seco ó húmedo. Echadas en las ascuas calman los accesos de tos, los catarros crónicos y el asma.

4275. M. PARA LOCIONES (Bielt).

℥ Alumbre. ʒiij (12 gr.).
 Sal amoniaco. ʒj (4 gr.).
 Sulfuro de potasa
 líquido. ʒj (30 gr.).
 Agua comun. lbB (250 gr.).

I. Al fin del eczema, impétigo. *D.* En lociones.

4276. Otra (BIETT).

℥ Dulcamara,
 Beleño,
 Yerbamora, añ. un puñado.

Se hierven en agua con un poco de raiz de malvabisco, y se aplican sobre las partes enfermas compresas empapadas en este cocimiento.

I. Acne, liquen.

4277. Otra (BIETT).

℥ Extracto de belladona. ʒij (8 gr.).
 Agua de cal. lbB (250 gr.).
 Aceite de alm. dulc. ʒjv (125 gr.).

H. S. A. un linimento.
 Sirve para untar las superficies

inflamadas del eczema y del impétigo.

4278. M. PARA LOCIONES (*Bielt*).

℞ Cianuro de potasio. ℥xij (6 dec.).
Emulsion de almen-
dras amargas. ℥vj (190 gr.).

Se usa en las erupciones crónicas con prurito.

4279. Otra (*BIETT*).

℞ Acetato de amoniaco. ℥iij (90 gr.).
Alcohol. ℥jv (15 gr.).
Agua de rosas. ℥jv (125 gr.).

Se usa en el liquen para hacer lociones en las partes enfermas con una esponja fina, cuando es muy viva la comezon.

4280. Otra (*BIETT*).

℞ Acido cianhídrico. ℥ij (8 gr.).
Sublimado corrosivo ℥ij (1 dec.).
Emulsion de almen-
dras amargas. ℥x (300 gr.).

Se usa en las erupciones crónicas con prurito.

4281. Otra (*BIETT*).

℞ Sulfato de zinc,
Acetato de plomo, ãã. ℥j (12 dec.).
Agua de rosas. ℥v (150 gr.).
Mucil. de membrillos. ℥j (32 gr.).

Se usa en ciertos casos de eczema y de impétigo de la cara y de los oídos. Se emplea en la leucorrea crónica.

4282. Otra (*BIETT*).

℞ Cocimiento de raiz de
malvabisco. ℔bj (500 gr.).
Extracto de Saturno. ℥j (4 gr.).

Se usa en el liquen y eczema crónicos.

4283. Otra (*BIETT*).

℞ Sulfuro de potasa. ℥j (4 gr.).
Jabon blanco. ℥ij (8 gr.).
Agua destilada. ℔β (250 gr.).

Se usa contra el prurigo, sarna y pórriigo.

4284. Otra (*BIETT*).

℞ Subcarb. de potasa. ℥j (4 gr.).
Azufre sublimado. ℥ij (8 gr.).
Agua. ℔bj (500 gr.).

Se usa en el prurigo y principalmente en su declinacion, cuando ha disminuido el prurito.

4285. Otra (*CAZENAVE*).

℞ Acido nítrico,
Acido clorhídrico, ãã. 24 gotas.
Agua destilada. ℥x (300 gr.).

Se usa en el liquen y eczema crónicos.

4286. Otra (*MAGENDIE*).

℞ Agua destilada de le-
chuga. ℔bij (1000 gr.).
Acido cianhídrico me-
dicinal. ℥ij (8 gr.).

M. I. y D. C. s. para aplicarla sobre los herpes, cánceres ulcerados, y para hacer inyecciones en el caso de cáncer de la matriz, comezon y dolores excesivos.

Nota. Se puede aumentar la dosis del ácido hasta ℥jv (15 gr.).

4287. M. PECTORAL (*Magendie*).

℞ Agua destilada. ℔bj (500 gr.).
Azúcar pura. ℥jβ (45 gr.).
Acido cianhídrico me-
dicinal. ℥j (4 gr.).

M. S. A. I. Tisis. D. Una cucharada mañana y noche; se menea cada vez que haya que usarla.

Nota. Parece preferible no poner primero mas que ℥β (2 gr.) de ácido y aumentar sucesivamente la dosis.

4288. Otra (*SANTA MARIA*).

℞ Goma arábica en polvo. 4
Miel. 4

M. I. Tos catarral con estreñimiento. D. ℥β á ℥ij (15 á 60 gr.) y más al día.

4289. Otra (*VILLERMÉ*).

℞ Agua destilada. ℔bj (500 gr.).

Azúcar pura. ℥℔ (45 gr.).
 Hidrocianato de potasa medicinal. . . . ℥j (4 gr.).
 H. S. A. I. Tisis. *D.* Una cucharada mañana y noche; se puede dividir la dosis hasta darla seis u ocho veces en veinticuatro horas.

4290. M. PULVERULENTA.

℥ Cloruro de oro y sodio. ℥j (5 cent.).
 Polvo de licopodio. . . ℥ij (10 cent.).
 Mézclese y divídase en quince papeles: En seguida se divide otra dosis igual en catorce papeles, luego en trece, en doce y en diez.
I. Sífilis. *D.* Un papel al día en fricciones en la lengua y en las encías.

4291. M. RESOLUTIVA (Becker).

℥ Alcohol alcanforado,
 Alcoholato de eneb., añ. ℥j (30 gr.).
 Vinagre escilítico. . . . ℥℔ (15 gr.).
M. I. Tumores sanguíneos de la cabeza de los recién nacidos. *D.* Tres ó cuatro aplicaciones al día.

4292. M. VOMITIVA (Magendie).

℥ Emetina de color. . . ℥jv (20 cent.).
 Infusion ligera de hojas de naranjo. . . ℥ij (60 gr.).
 Jarabe de flores de naranjo. ℥℔ (15 gr.).
 Disuélvase S. A. *I.* Catarros pulmonares crónicos, coqueluche, diarreas antiguas. *D.* Una cucharada de media en media hora.

4293. M. PARA LOS APARATOS INMÓBILES.

℥ Destrina. ℔℔℔ (750 gr.).

Goma. ℔℔ (250 gr.).
 Disuélvase en caliente.
 Es muy aglutinante y da gran solidez á las compresas impregnadas en ella.

Las proporciones de polvo y agua necesarias para producir una solución de una densidad conveniente, son:

Polvo. 1 litro que pesa 500 gr.
 Agua. ℔v (2500 gr.).

Esta solución será suficiente para 100 compresas que tengan 43 centímetros de largo por 38 de ancho.

4294. VENDAJE DE DESTRINA.

℥ Agua ℔xx (10000 gr.).
 Destrina. . . ℥jv á ℥v (120 á 150 gr.).

Se disuelve por medio del agua hirviendo. Se empapa en la solución una venda con que se cubre las dos terceras partes de la anchura de la venda sin usar compresas, sin necesidad de poner las vueltas unas encima de otras. Se quitará el vendaje á los tres días, y aunque parezca flexible se mojará bien con agua tibia antes de quitarle para que se haga pronto, tomando las mayores precauciones para que no arranque la epidermis.

I. Eczema con varices y edema, despues que haya pasado el período agudo.

Quitado el vendaje, deben pasar veinticuatro horas antes de aplicar otro nuevo.

MIELES.

4295. MELITO SIMPLE ó Jarabe de miel. (F. F.).

℥ Miel blanca. ℔vj (3000 gr.).
 Agua comun ℔ij (1000 gr.).

Se disuelve en caliente, se despuma y cuando el melito hirviendo señalé 30°, se cuele por una bayeta.

I. Sirve para dulcificar las tisanas y pociones demulcentes, y es ligeramente laxante para los niños. *D.* ℥j á ℥iij (30 á 90 gr.).

4296. MIEL ANTISIFILITICA
 (F. N. P.).

℥ Miel rosada. ℥ij (64 gr.).
 Tintura de mirra. . . . ℥jv (16 gr.).

Sublimado corrosivo. . . ḡjv (2 dec.).

H. S. A. I. Ulceras venéreas de la boca, garganta y nariz, sobre las que se aplica por medio de un pincel.

4297. M. DE BORAX (F. P.).

℥ Borax en polvo. ḡjv (46 gr.).

Miel. ḡiij (96 gr.).

M. I. Aftas, úlceras de la boca.

4298. MELITO DE CELEDONIA.

℥ Zumo de celedonia. 2

Miel. 3

M. I. Se usa exteriormente como deterativo, y lo es mas que la miel rosada.

Del mismo modo se prepara la MIEL DE ROMERO.

4299. M. DE ELATERIO.

℥ Frutos maduros de cohombro amargo. 1

Miel. 2

Se machaca todo, se echa en un saco de tela que estará colgado, se mezclará lo que fluye con el producto de la expresion, y se evaporará hasta la consistencia de jarabe espeso.

D. ḡj á ḡij (4 á 8 gr.) en lavativas.

4300. M. ESCILÍTICA ó Melito de escila (F. F.).

℥ Escamas secas de cebolla albarrana. . . ḡj (32 gr.).

Agua hirviendo. . . . ḡbj (500 gr.).

Miel blanca. ḡxij (375 gr.).

Se infunde la escila en el agua durante doce horas, se cuela con expresion, se deja aposar, se decanta, se añade la miel y se cuece hasta la consistencia de jarabe.

I. Hidropesias, catarro crónico, bronquitis crónica, hemorragia pasiva, absceso escrofuloso; se usa como diurético y expectorante. D. ḡj á ḡij (4 á 8 gr.) en un vehiculo apropiado.

Del mismo modo se prepara la MIEL

DE COLCHICO. I. Catarro crónico, hidropesia pasiva, bronquitis crónica. D. ḡβ á ḡj (15 á 30 gr.).

4301. M. DE ESCILA COMPUESTA.

℥ Escamas de escila. . . . ḡjv (125 gr.).

Polígala de Virginia. . . ḡjv (125 gr.).

Se hierve en ḡviii (4000 gr.) de agua hasta que se reduzca la cuarta parte, se cuela y se añade:

Miel depurada. . . . ḡbj (1000 gr.).

Se reduce á la cuarta parte, se cuela y á cada libra (500 gr.) se añade:

Tártaro emético. . . ḡjv (2 dec.).

4302. M. DE MERCURIAL, Melito de mercurial (F. F.).

℥ Zumo depurado de mercurial. ḡbj (1000 gr.).

Miel blanca. ḡbj (1000 gr.).

Se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuela.

D. ḡj á ḡjv (30 á 125 gr.) para una lavativa. V. t. I, pág. 353.

4303. M. DE MERCURIAL COMPUESTA ó Jarabe de larga vida (F. F.).

℥ Raiz reciente de lirio. ḡij (64 gr.).

Raiz seca de genciana. ḡj (32 gr.).

Vino blanco. ḡxij (375 gr.).

Zumo depurado de mercurial. ḡbj (1000 gr.).

Zumo depurado de borraja. ḡββ (250 gr.).

Zumo depurado de buglosa. ḡββ (250 gr.).

Miel blanca. ḡiij (1500 gr.).

Se maceran durante veinticuatro horas las raices de lirio y la genciana en el vino blanco; se cuela el liquido con expresion, se le mezcla con los zumos de las plantas y la miel; se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuela.

I. Es purgante, estomacal y emenagoga. D. ḡj á ḡjv (30 á 125 gr.).

**4304. M. DE MERCURIAL
COMPUESTA.**

℞ Jarabe de larga vida,
Zumo clarificado de
mercurial, añ. ℥j (30 gr.).
Zumo de borraja,
Zumo de buglosa, añ. ℥ij (8 gr.).
Lirio. ℥℔ (2 gr.).
Genciana,
Sen, añ. ḡxviiij (4 gr.).
Vino blanco. ℥iiij (42 gr.).
Miel. ℥j℔ (45 gr.).
I. Estreñimiento, atrofia me-
sentérica. D. ℥j á ℥j (4 á 30 gr.)
como laxante.

**4305. M. DE MERCURIAL COMPUES-
TA ó Jarabe vinoso de larga vida.**

℞ Raiz de genciana. . ℥ij (64 gr.).
Lirio de Florencia. ℥jv (125 gr.).
Ruibarbo. ℥ij (8 gr.).
Sen escogido. ℥ij (8 gr.).

Se cortan en pedacitos los tres primeros ingredientes, y se ponen con el sen en un cántaro bien barnizado ó en una redoma de vidrio grueso, que es mejor; se echa

Vino blanco seco. . 4 azumbre (2 lit.)
y se deja en infusion por veinticuatro horas sobre ceniza caliente ó cuarenta y ocho horas al sol, meneando cuatro ó cinco veces; se cuele por un paño bien limpio y sin exprimir, y se vuelve á echar en la vasija bien limpia.

Se añade:

Zumo de mercurial,
Zumo de buglosa,
Zum. de borraja, añ. lbj (500 gr.).
Miel blanca buena. lbvj (3000 gr.).

Se mezclan muy bien con la tintura, y se pone la mezcla en un perol sobre un hornillo muy encendido, en el cual se echará la composicion para que hierva, teniendo cuidado de espumarla bien mientras cuece; se cuele por una manga y se pone al fuego hasta que tome la consistencia de jarabe, se sacará del perol, se deja enfriar y se embotella. Estando

bien tapado, se podrá conservar por largo tiempo, teniendo asimismo el cuidado de colocarle en un paraje templado. D. Se toma por las mañanas una cucharada; no se comerá ni beberá hasta pasadas dos ó tres horas.

Este medicamento ha sido preconizado últimamente como un remedio universal, capaz de prolongar mucho la vida, conservando buena salud; el lector juzgará al considerar los ingredientes de que se compone, hasta qué punto pueden corresponder estos elogios con los efectos del medicamento. Con este objeto se le hace tomar dos largas temporadas al año, en primavera y en otoño. Conviene tomar este jarabe por espacio de seis meses ó un año contra las enfermedades inveteradas, y tambien para corroborar la salud é impedir las recaídas.

I. Se le ha aconsejado en el asma, ictericia, vértigos, jaquecas y generalmente en todas las enfermedades internas, tercianas, cuartanas y fiebres continuas.

**4306. M. MERCURIAL
(Swediaur).**

℞ Oxido rojo de mercurio,
Azúcar blanca, añ. ℥j (12 dec.).
Miel blanca. ℥iiij (90 gr.).
H. S. A. I. Se usa para aplicarla á las úlceras sifilíticas por medio de una planchuela.

**4307. M. DE MERCURIO DULCE
(Swediaur).**

℞ Mercurio dulce. ℥j (4 gr.).
Miel. ℥j (30 gr.).
M. I. Ulceraciones venéreas de la garganta y de las partes genitales.

**4308. M. DE MORAS ó Arrope de
moras (F. E.).**

℞ Zumo de moras negras recién exprimido. ℥xiij (375 gr.).

Miel. lbjß (250 gr.).
 Agua. c. s.

Se cuece en una vasija de Talavera hasta que tome la consistencia de jarabe espeso y se cuele.

I. Se usa en gargarismos en las inflamaciones y escoriaciones de la boca, de la garganta y de la lengua. *D.* ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

4309. M. CON PROTOIODOURO DE MERCURIO (Bielt).

ʒ Miel. ʒxij (375 gr.).
 Protoioduro de merc. ʒj (30 gr.).

Se tocan ligeramente las ulceraciones sifilíticas.

4310. M. DE QUININA (Petzold).

ʒ Miel purificada. . . . ʒjß (45 gr.).
 Sulfato de quinina. . . ʒjx (50 cent.).
 Alcohol sulfúrico. . . ʒj (4 gr.).

I. Calenturas intermitentes de los niños. *D.* Una cucharadita de café de dos en dos horas despues de mezclarle exactamente. Se continuará por el tiempo suficiente.

4311. MELITO DE RÁBANO RUSTICANO.

ʒ Zumo de rábano rusticano. ʒiij (90 gr.).
 Miel. ʒxij (375 gr.).

Se mezcla en frio.

I. Coriza, bronquitis, catarro crónico, edema del pulmon. *D.* ʒj á ʒiij (30 á 90 gr.) para endulzar una tisana pectoral.

4312. M. DE ROMERO.

ʒ Sumidad. de romero. ʒxij (375 gr.).
 Miel blanca. lbjß (750 gr.).
 Agua. ʒvj (180 gr.).

Se clarifica la miel, se la vierte hirviendo sobre la planta y se cuele á las veinticuatro horas.

4313. MIEL ROSADA Ó Melito de rosas rojas (F. F.).

ʒ Pétalos secos. de rosas rojas. . . lbij (1000 gr.).

Agua hirviendo. . . lbxij (6000 gr.).
 Miel blanca. lbxij (6000 gr.).

Se infunden las rosas en el agua por espacio de veinticuatro horas, se cuele con expresion, se deja aposar, se decanta, se añade la miel al licor, se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuele.

I. Anginas, aftas, afonia, poligalaccia. Es astringente y se usa principalmente en las afecciones de la boca ó de la faringe. *D.* ʒj á ʒij (30 á 60 gr.) para un gargarismo. Se usa solo por medio de un pincel en las aftas de la boca ó de la faringe.

4314. M. ROSADA TREMENTINADA (Martinet).

ʒ Esencia de trementina. ʒß (2 gr.).
 Miel rosada. ʒj (30 gr.).

A veces se añade:

Jarabe diacodion. . . . ʒijß (10 gr.).
 H. S. A. I. Lumbago, neuralgias, ceática. *D.* ʒß á ʒij (15 á 60 gr.) ó tres cucharadas al dia.

4315. M. TREMENTINADA (Recamier).

ʒ Esencia de trementina. ʒij (8 gr.).
 Miel blanca. ʒj (30 gr.).

H. S. A. I. Neuralgias, lumbago, ceática. A veces se añade ocho partes de jarabe diacodion. *D.* Tres cucharadas al dia.

4316. M. DE SALVIA (Neuber).

ʒ Hojas de salvia. . . . ʒij (64 gr.).
 Agua hirviendo. c. s.

para obtener lbß (250 gr.) de infusion; se añade:

Miel blanca. lbß (250 gr.).
 Se evapora S. A. hasta la consistencia de miel sin espuma.

4317. MIEL DE BAYAS DE SAÚCO Ó Arrope de saúco (F. E.).

ʒ Zumo del fruto maduro de saúco. . . ʒxij (375 gr.).
 Miel clarificada. . . . lbjß (750 gr.).
 Agua. c. s.

Se cuece hasta que tome la con-

sistencia de jarabe y se cuele para usarla.

I. Hidropesia é ictericia; es sudorífica y produce buenos efectos en la gota. *D.* ℥℞. á ℥j (15 á 30 gr.).

4318. M. DE VIOLETAS ó Miel violada.

℥ Violetas frescas con sus cálices. 1
Miel blanca. 3
Se infunden las violetas en doble de su peso de agua hirviendo, se

mezcla la infusión con la miel y se cuece hasta la consistencia de jarabe.

I. y D. Se usa como laxante en lavativas á la dosis de ℥j á ℥jv (30 á 120 gr.).

4319. M. DE ROSAS ROJAS, Miel rosada, Rodomel (F. E.).

℥ Zumo de rosas rojas,
Miel buena, añ. . . ℔ij (1000 gr.).
Se cuece hasta la consistencia de jarabe espeso y se cuele.

RODOMEL.

4320. RODOMEL CIDONIADO.

℥ Semillas de membrillo. ℥j (30 gr.).
Se hierve en ℔ij (1000 gr.) de agua hasta que se reduzca la ter-

cera parte; se añade al líquido colado:

Subborato de sosa. . . ℥ij (12 gr.).
Rodomel. ℥j (60 gr.).

D. Se usa en gargarismos cinco á seis veces al día.

MISTURAS.

4321. MISTURA ABSORVENTE AROMÁTICA (*Ring*).

℥ Creta preparada. . . . ℥jv (48 dec.).
Goma arábica en polv. ℥ij (24 dec.).
Agua destilada. . . . ℥jv (125 gr.).
Hidrolato de canela. . . ℥℞ (45 gr.).
Jarabe simple. . . . ℥℞ (15 gr.).

H. S. A. I. Diarreas crónicas. *D.* Dos cucharadas despues de cada evacuacion.

4322. M. ABSORVENTE.

℥ Magnesia calcinada. ḡv á ḡviiij (25 á 40 cent.).

Jarabe de goma. . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Acedías, vómitos de los niños, diarrea. *D.* A cucharaditas de café, cada dos horas.

4323. Otra, n. 2.

℥ Tintura de opio. . . . 60 gotas.
Tint. de goma quino. ℥j (8 gr.).

Creta preparada. . . . ℥ij (12 gr.).
Goma arábica,
Azúcar, añ. ℥℞ (6 gr.).
Agua de menta. . . . ℥vj (192 gr.).

M. I. Diarreas. *D.* Una cucharada cada dos horas.

4324. M. CON ACEITE ETÉREO DE CORNEZUELO DE CENTENO (*Bomjean y Wright*).

℥ Aceite etéreo de cor-
nezuelo de centeno. ḡxviiij (4 gr.).
Azúcar en polvo. . . . ℥℞ (45 gr.).

I. Conviene en los mismos casos que la infusión de cornezuelo de centeno. *D.* En dos tomas con un poco de vino blanco.

4325. M. DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO (*Roesch*).

℥ Aceite de hígado de bacalao,
Jarabe de cáscara de naranja,
Agua destil. de anís, añ. ℥j (30 gr.).

Esencia de cálamo aromático. 3 gotas.

M. I. Afecciones escrofulosas, tabes mesentérica, coxalgia, raquitis, tumores blancos, tumores glandulosos, tisis incipiente. *D.* Tres cucharadas al día.

4326. M. DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO (*Rayer*).

℞ Aceite de hígado de bacalao. ℥iij (90 gr.).

Agua comun,

Jarabe de opio, añ. . . ℥ij (60 gr.).

Goma arábica en polvo. ℥℞ (45 gr.).

M. I. Gastritis crónica, neumonía crónica, raquitis, escrófulas, tubérculos pulmonares. *D.* Se tomará esta pocion en tres dias en tres tomas iguales al día.

4327. M. ACEITOSA CALMANTE (*H. DE AL.*).

℞ Aceite de ricino,
Jarabe de cáscara de naranja, añ. ℥iij (90 gr.).

Jabon medicinal. . . . ℥℞ (45 gr.).

M. D. Una cucharada cada media hora.

4328. M. ACÉTICA (*Sundelin*).

℞ Eter acético. ℥℞ (2 gr.).

Vinagre concent. ℥j á ℥iij (4 á 8 gr.).

Agua de sangüesas. . ℥v (150 gr.).

Jarabe de sangüesas. . ℥ij (60 gr.).

D. Se toma una cucharada cada hora ó cada dos horas.

I. Conviene en el eretismo de las calenturas nerviosas.

4329. M. ACIDA.

℞ Acido nítrico,

Acido clorhíd., añ. ℥ij (8 gr.).

Agua. ℔iij (1500 gr.).

Jarabe simple. . . . ℥ij (64 gr.).

H. S. A. I. Hinchazones glandulares sífilíticas. *D.* En varias tomas al día.

4330. Otra (*H. DE AL.*).

℞ Sulfato de potasa. . ℥℞ (2 gr.).

Cocim. de cebada. . ℔ij (1000 gr.).

Se disuelve y se añade:

Ojimiél simple. . . . ℥j (32 gr.).

Vinagre. ℥j℞ (6 gr.).

4331. Otra (*H. DE AL.*).

℞ Acido nítrico. . . . ℥℞ (2 gr.).

Agua destilada. . . . ℔j℞ (750 gr.).

Jarabe de canela. . . ℥j℞ (48 gr.).

M. I. Sífilis, hepatitis crónica, tifo, etc. *D.* Una cucharada cada tres horas.

4332. Otra (*SELLE*).

℞ Agua pura. ℥xxx (625 gr.).

Ojimiél simple. . . . ℥jv (125 gr.).

Acido sulfúrico. . . . ℥j (4 gr.).

M. S. A. I. Fiebres adinámicas. *D.* Una taza cada hora.

4333. M. ACIDA CON CANELA (*Most*).

℞ Elixir ácido de Haller. ℥ij℞ (40 gr.).

Láudano de Sydenham. ℥℞ (2 gr.).

Alcoholado de canela. ℥j (30 gr.).

M. I. Metrorragia debida á un estado de espasmo. *D.* Veinticinco á cincuenta gotas cada media hora.

4334. M. ACIDA CONTRA LAS DISENTERIAS REBELDES (*Malgaine*).

℞ Acido nítrico. . . . ℥℞ (2 gr.).

Acido sulfúrico. . . . ℥℞ (2 gr.).

Agua destilada. . . . ℔ij (1000 gr.).

D. Una cucharada por la mañana, otra por la tarde y la tercera al otro día por la mañana. Se aguarda veinticuatro horas para ver el efecto del medicamento, y se vuelve á empezar si no ha producido el efecto que se desea.

4335. M. ACIDA OPIADA (*Most*).

℞ Elixir vitriólico de Myn-

sicht. ℥iij (42 gr.).

Elixir ácido de Haller. . ℥ij (8 gr.).

Láudano de Sydenham. ℥j (4 gr.).

M. I. Delirio trémulo, particularmente cuando se teme una congestión hácia el encéfalo. *D.* Treinta gotas, tres ó cuatro veces al día.

4336. M. DE ACIDO BENZOICO
(*Sundelin*).

℞ Acido benzóico. ḡviii (4 dec.).
Licor amoniaco anisado. 5℔ (2 gr.).
Vino emético. ʒij (8 gr.).
Jarabe de poligala del Senegal,
Ojimiél escilitico,
Jarabe de altea, ãã. . ʒiij (12 gr.).
M. D. Una cucharada de las de café cada hora ó cada dos horas.

4337. M. CON ACIDO FOSFORICO
(*Sundelin*).

℞ Palo de Campeche. ʒj℔ (45 gr.).
Agua comun. lbij (1500 gr.).
Se cuece hasta que queden lbij (1000 gr.) y al fin de la coccion se añade:

Cáscara de naranja. ʒ℔ (15 gr.).
Se cuele y se añade:
Acido fosfórico puro. ʒij (8 gr.).
Jarabe de canela. . ʒij (60 gr.).

I. Metrorragia asténica.

4338. M. DE AGUARDIENTE
(*F. DE L.*).

℞ Aguardiente,
Yemas de huevo,
Agua de canela, ãã. . ʒjv (125 gr.).
Azúcar purificada. . . ʒ℔ (15 gr.).
Aceite de canela. . . . 2 gotas.
Mézclese.

4339. M. ALCALINA ó Mistura de bicarbonato de sosa (*BIETT*).

℞ Jarabe de fumaría. . lbj (500 gr.).
Bicarbonato de sosa. . ʒiij (12 gr.).
M. I. Eczema, liquen, prurigo, etc. *D.* Se toman dos cucharadas, una por la mañana en ayunas y otra por la noche al tiempo de acostarse.

4340. M. ALCALINA DE ACEITE DE HIGADO DE BACALAO.

℞ Aceite de hígado de bacalao. ʒj (30 gr.).
Carbonato de potasa. . . ʒj (4 gr.).
Jar. de flor de naranja. ʒj (30 gr.).
Agua. ʒij (60 gr.).
M. I. Neumonía crónica, raqui-

tis, escrófulas, tubérculos pulmonares.

4341. M. ALCANFORADA
(*H. DE INGL.*).

℞ Alcanfor. ʒj (12 dec.).
Alcohol. 40 gotas.
Azúcar blanca. ʒ℔ (15 gr.).
Agua. lbj (500 gr.).
Se tritura primero el alcanfor con el alcohol, despues el azúcar, se añade el agua y se cuele.

I. Blenorragia, inflamacion de los órganos génito-uritarios. *D.* ʒj á ʒij (30 á 60 gr.) cada tres ó cuatro horas, solo ó como vehículo de otros medicamentos.

4342. M. ALCANFORADA
- COMPUESTA (*Duncan*).

℞ Alcanfor. ʒij (24 dec.).
Azúcar. ʒ℔ (15 gr.).
Se tritura y se añade poco á poco:
Agua de menta piperita. ʒvj (180 gr.).
I. Afecciones gangrenosas. *D.* ʒj℔ (45 gr.) cada tres horas.

4343. M. DE ALMENDRAS DULCES
(*F. DE L.*).

℞ Confeccion de almendras dulces. ʒij℔ (75 gr.).
Agua destilada. lbj (500 gr.).
Se añade poco á poco el agua á la confeccion de almendras, triturando siempre hasta que se mezcle exactamente y se cuele por un lienzo.

4344. M. ALMIZCLADA ó Julepe moscado (*F. E.*).

℞ Flor de naranjo,
Clavos de especia,
Azafran, ãã. ʒj (12 dec.).
Agua comun. ʒxij (375 gr.).
Se deja en infusion por una hora, se cuele y se añade:
Almizele,
Ambar gris, ãã. . . ʒij (1 dec.).
Carbonato de amoniacode cuerno de ciervo. ʒj (5 cent.)

Se trituran juntas estas tres sustancias y se añade :

Confeccion de sánda-
los cordial. ʒij (8 gr.).
Jarabe simple. ʒjβ (45 gr.).

Se mezclan y se añade la infusión anterior.

I. Calenturas nerviosas malignas, fiebres pútridas con afecciones catarrales. *D.* ʒiij (90 gr.) que deben repetirse por intervalos.

4345. M. DE ALMIZCLE
(F. DE L.).

ʒ Almizcle,
Goma arábica en polvo.
Azúcar, añ. ʒj (4 gr.).
Agua de rosas. ʒvj (180 gr.).

Se tritura el almizcle con el azúcar, despues con la goma, añadiendo poco á poco el agua de rosas.

D. ʒj á ʒij (30 á 60 gr.) cada dos ó tres horas.

4346. M. ALOÉTICA DIURÉTICA
(Cruveilhier).

ʒ Alcoholado de acibar. . . ʒij (8 gr.).
Alcoholado de digital,
Alcoholado de escila, añ. 20 gotas.

M. I. Pleuresía crónica. *D.* En una toma por la mañana en ayunas, y se repite esta dosis dos ó tres dias.

4347. M. ALOÉTICA.

ʒ Extracto de acibar,
Extr. de mirra, añ. ʒj (4 gr.).
Agua de menta piperrita. ʒvj (180 gr.).
Crémor de tártaro. . . ʒβ (45 gr.).

H. S. A. I. Apoplejía, vértigos, cálculos, acné, *D.* Una cucharada mañana y noche para provocar las hemorroides.

4348. M. AMONIACO-MERCURIAL
(Blanc).

ʒ Deutocloruro de mercurio. ʒij (1 dec.).

Alcohol. ʒjv (125 gr.).

Se disuelve y se añade :

Vino amoniacal. . . . 25 gotas.

I. Sífilis y reumatismo crónico.
D. ʒβ (15 gr.) dos veces al dia.

4349. M. DE AMONIACO
(H. DE AL.).

ʒ Amoniaco líquido. . . ʒβ (2 gr.).
Agua de yerbabuena. ʒββ (250 gr.).
Jarabe de cáscara de naranja. ʒj (30 gr.).

Mézclese. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

4350. M. ANALÉPTICA (Lewis).

ʒ Agua destilada de canela. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).

Crema de leche. . . . ʒvj (180 gr.).

Yema de huevo. . . . número 2.

Azúcar. ʒj (30 gr.).

Mézclese agitando.

I. Sirve para reparar las fuerzas debilitadas á consecuencia del abuso del coito, de la masturbacion ó cualquiera otra causa.

Nota. Esta preparacion es mas bien una crema.

4351. M. ANTIÁCIDA Y ABSORVENTE
(Delile).

ʒ Agua de cal,
Leche, añ. ʒj (30 gr.).

M. I. Se toma en una sola dosis cada dos horas en los casos de irritacion violenta del estómago. Se usa con buen éxito en los casos de calentura amarilla.

4352. M. ANTIARTRÍTICA
(Augustin).

ʒ Extracto de acónito. . . ʒβ (2 gr.).
Solucion de jabon estibiada. ʒj (30 gr.).

Tintura amoniacal de guayaco,
Eter sulfúrico, añ. . . . ʒβ (15 gr.).

M. I. Reumatismo, gota, ceática.
D. Sesenta á setenta gotas cada dos horas.

4353. Otra (BURDACH).

ʒ Sublimado corrosivo. . ʒij (1 dec.)

Agua destilada. ℥j℥ (45 gr.).

Se disuelve y se añade:

Vino de cólchico. . . . ℥℥ (15 gr.).

I. Gota aguda. *D.* Treinta á cuarenta gotas cada dos horas.

4354. M. ANTIBLENORRÁGICA
(*Eisenmann*).

℥ Trement. de copaiba. . ℥℥ (45 gr.).
Aceite volátil de menta

piperita. cuatro gotas.

Aceite volátil de clavo. una gota.

Alcoholado de opio. . ℥ij (24 dec.).

H. S. A. I. En la declinacion de la blenorragia. *D.* Treinta á cuarenta gotas al dia.

4355. Otra (LISEMANN).

℥ Clorhidr. de morfina. ℥jx (40 dec.).

Ioduro de potasio. . . ℥℥ (2 gr.).

Bálsamo de copaiba. . ℥℥ (15 gr.).

Aceite de cubebas. . . ℥℥ (15 gr.).

Agua de potasa. . . . ℥j (30 gr.).

M. D. Una cucharada de café, cada cuatro horas, en un cocimiento de cebada.

4356. M. ANTICATARRAL
(*Hufeland*).

℥ Extr. de cardo santo. ℥j (4 gr.).

Extr. de dulcamara. . ℥j (42 dec.).

Agua destil. de hinojo. ℥j (30 gr.).

Agua destilada de lauro

rel real. ℥j (4 gr.).

Disuélvase *S. A. I.* Catarro pulmonar crónico. *D.* Sesenta gotas cuatro veces al dia.

4357. M. ANTICATARRAL RUSA.

℥ Elixir paregórico inglés. ℥v (150 gr.).

Tintura de escila. . . . ℥j (30 gr.).

M. D. Una cucharada de café mañana y noche.

4358. M. ANTICEFÁLICA
(*Schultz*).

℥ Alcoholado de valeriana. ℥j (4 gr.).

Acido sulfúr. alcoholizado. ℥j (4 gr.).

M. I. Cefalea nerviosa. *D.* Diez á veinte gotas cada dos horas.

4359. M. ANTICOLÉRICA.

℥ Tintura de gengibre. . ℥ij℥ (10 gr.).

Tintura de cáscaras de

naranja. ℥ij℥ (10 gr.).

Láudano líquido. . . . ℥℥ (2 gr.).

M. I. Cólera y neuralgias. *D.* ℥xviii á ℥xxxvj (1 á 2 gr.) en ℥iij (90 gr.) de infusion de saúco ó de menta piperita.

4360. Otra (BANG).

℥ Alcanfor. ℥ij (24 dec.).

Eter sulfúrico alcoho-

lizado. ℥℥ (15 gr.).

Disuélvase. *I.* Cólera espasmódico. *D.* Veinte gotas de hora en hora.

4361. M. ANTIDIARREICA
(*Mialhe*).

℥ Cuerno de ciervo calci-

nado y porfirizado. . ℥ij℥ (10 gr.).

Goma arábica en polvo. ℥v (20 gr.).

Jarabe simple. ℥xxx (80 gr.);

Agua de flores de na-

ranjo. ℥x (40 gr.).

H. S. A. una mistura que se agitará siempre que haya que usarla.

D. Una cucharada de media en media hora, en todos los casos en que está indicado el cocimiento blanco de Sydenham. Véanse los números 1025 al 28.

4362. M. ANTIDIARRÉICA (Lentin).

℥ Salep en polvo. ℥ij (8 gr.).

Agua comun. ℥x (300 gr.).

Se hierve durante doce á quince minutos, se cuele y se añade *S. A.*

Borato de sosa. ℥℥ (2 gr.).

Extracto de palo de

Campeche. ℥j (4 gr.).

Extracto de quina. . . ℥j (4 gr.).

Jarabe de malvabisco. ℥℥ (15 gr.).

I. Diarrea de los niños recién nacidos, acompañada de aftas. *D.* Una cucharada de café cada dos horas.

4363. M. ANTIDISENTERICA
(*Swediaur*).

- ℞ Tártaro emético. ʒj (5 cent.).
 Goma arábica. ʒxc (5 gr.).
 Jarabe de cabezas de
 adormideras. ʒj (30 gr.).
 Agua de manzanilla. ʒvj (180 gr.).

I. En el principio de la disenteria, diarreas. *D.* Media cucharada de cuarto en cuarto de hora.

4364. Otra (RICHTER).

- ℞ Vino estibiado. ʒiij (12 gr.).
 Alcoholado de opio. ʒj (4 gr.).

M. I. Disenteria reumática. *D.* Quince gotas de hora en hora.

4365. M. ANTIEMÉTICA (H. DE M.).

- ℞ Agua comun. ʒj (30 gr.).
 Agua lacticinosa de ca-
 nela. ʒj (4 gr.).
 Bicarbonato de potasa. ʒß (2 gr.).

Se disuelve y se mezcla.

I. Vómitos espasmódicos y en los ocasionados por una dosis crecida de tártaro emético. *D.* En dos tomas, añadiendo á cada una ʒiij (12 gr.) de zumo de limon en el momento de administrarla.

4366. M. ANTIEMÉTICA ó Mistura de carbonato de potasa de ajenjos (F. E.).

- ℞ Agua. ʒj (32 gr.).
 Agua lactic. de canela. ʒj (4 gr.).
 Sal de ajenjos. ʒß (2 gr.).
 Zumo reciente de limon. ʒvj (24 gr.).

M. I. Vómitos nerviosos pertinaces. *D.* De una vez. El enfermo debe tomarla en el acto de la eferescencia.

4367. M. ANTIEPILÉPTICA (Tott).

- ℞ Sulfato de cobre amo-
 niacal. ʒj (4 gr.).
 Agua de canela. ʒvj (24 gr.).
 Succinato de amoniaco
 liquido. ʒij (8 gr.).

M. D. Tres ó cuatro gotas, tres veces al dia, al principio, au-

mentando gradualmente segun los efectos que se observen.

4368. M. ANTIESCORBÚTICA.

- ℞ Miel rosada. ʒj (30 gr.).
 Alcohol de coclearia,
 Tintura de quina, ññ. ʒij (8 gr.).

M. Se aplica esta mezcla pura sobre las encías enfermas. Es muy eficaz.

4369. Otra (NEUMANN).

- ℞ Levadura de cerveza. ʒij (60 gr.).
 Jarabe de miel. ʒj (30 gr.).
 Agua destilada. ℥ßß (250 gr.).

H. S. A. D. Una á dos cucharadas de hora en hora.

4370. M. ANTIESCROFULOSA.

- ℞ Aceite de hígado de bacalao. ʒv á ʒviiij
 (20 á 30 gr.).

Jarabe antiescorbútico. ʒj (30 gr.).

M. I. Raquitis. *D.* En dos tomas al dia.

4371. POCION ANTIESPASMÓDICA.

- ℞ Aceite animal de Dippel. ʒj (4 gr.).
 Licor de Hoffmann. ʒiij (12 gr.).

I. Corea, tétanos. *D.* Veinte á treinta gotas cuatro veces al dia.

4372. M. ANTIESPASMÓDICA (Armstrong).

- ℞ Extracto de cicuta. ʒxvj (8 dec.).
 Agua de menta. ʒjv (120 gr.).
 Agua comun. ʒjv (120 gr.).
 Azúcar blanca. ʒij (60 gr.).

I. Coqueluche que ha llegado al segundo ó tercer período. *D.* Una cucharada de café de hora en hora.

4373. M. ANTIESPASMÓDICA SIMPLE (H. DE M.).

- ℞ Agua de melisa. ℥ßß (250 gr.).
 Licor anodino mineral. ʒj (4 gr.).
 Agua de canela. ʒij (8 gr.).
 Jarabe de corteza de
 cidra. ʒj (30 gr.).

I. Afecciones espasmódicas. *D.* A cucharadas.

4374. M. ANTIESPASMÓDICA ANODINA (H. DE M.).

℥ Agua de yerbabuena. ℥ss (250 gr.).
 Agua de canela. ℥j (30 gr.).
 Licor anodino mineral. ℥j (4 gr.).
 Láudano líquido. ℥ss (2 gr.).
 Jarabe de corteza de
 cidra. ℥j (30 gr.).

I. Afecciones espasmódicas, etc.
D. A cucharadas.

4375. M. ANTIESPASMÓDICA (Blache).

℥ Oxido de zinc. ℥ij (8 gr.).
 Calomelanos al vapor. . . ℥j (4 gr.).
 Valeriana en polvo. . . . ℥j (4 gr.).
 Mézclase y dividase en setenta partes iguales.

I. Enfermedades epileptiformes de los niños. *D.* Dos tomas al día, una por la mañana en ayunas y la otra después de comer.

4376. Otra (J. FRANK).

℥ Almizcle escogido. ℥ij (4 dec.).
 Mucilago de goma arábica,
 Jarabe de rosas amari-
 llas, ãã. ℥ij (8 gr.).
 Agua destilada de rosas. ℥j (30 gr.).

H. S. A. I. Asma agudo de Millar, coqueluche en el tercer período. *D.* Una cucharadita de café cada dos horas.

4377. Otra (CLARUS).

℥ Sulfuro de carbono. . . ℥j (12 dec.).
 Leche de vacas. ℥vj (180 gr.).
 Azúcar blanca. ℥ij (8 gr.).
 Disuélvase. *I.* Disfagia espasmódica. *D.* Una cucharada cada cuatro horas.

4378. Otra (DUMERIL).

℥ Agua de canela hordeada,
 Agua de menta, ãã. . . ℥ss (15 gr.).
 Láudano de Rousseau. ℥j (12 dec.).
 Jarabe de éter. ℥j (30 gr.).
M. D. A cucharaditas de café.

4379. Otra (KUENZLI).

℥ Acido cianhídrico medicinal. . . 4

Alcohol rectificado. 4
 Agua destil. de flores de naranjo. 4
 Se guarda en un frasco con tapon esmerilado.

I. Convulsiones á consecuencia de afecciones morales. *D.* Cinco gotas, tres veces al día.

4380. Otra (SYDENHAM).

℥ Tintura de valeriana, ℥ss (2 gr.).
 Tintura de castóreo. . . ℥j (4 gr.).
 Eter sulfúrico. 15 gotas.
 Agua de eneldo. ℥ijss (75 gr.).
M. D. A cucharadas de café al

día.

4381. M. ANTIESCROFULOSA (Remer).

℥ Cloruro de calcio. . . . ℥ij (8 gr.).
 Agua destilada de lau-
 rel real. ℥ss (15 gr.).
 Agua destilada. ℥jss (45 gr.).
H. S. A. I. Afecciones escrofulosas, atrofia mesentérica, coxalgia, bócio, ciertos casos de tisis al principio, raquitis, tumores blancos, tumores glandulosos. *D.* Treinta gotas, dos veces al día.

4382. M. ANTIHELMÍNTICA.

℥ Tintura de coloquintida. 5 á 40 gotas.
 Agua destilada de man-
 zanilla. ℥iij (90 gr.).
 Jarabe de flores de me-
 locoton. ℥j (30 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora.

4383. M. ANTIHELMÍNTICA ó Poción vermífuga.

℥ Esencia de trementina. ℥ss (15 gr.).
 Aceite de nuez. ℥iij (90 gr.).
 Agítese. Se toma de una vez contra la ténia.

4384. M. ANTIHEMORRÁGICA (Gall).

℥ Extracto de guayaco. ℥j (4 gr.).
 Agua destilada de men-
 ta piperita. ℥jv (125 gr.).
 Alcoholato de canela,
 Alcoholado de opio, ãã. 20 gotas.
H. S. A. I. Hemorragias pasivas.
D. Una cucharada cada dos horas.

4385. M. ANTIHIDRÓPICA
(Morries).

℞ Elaterio. ḡj (5 cent.).
 Alcohol rectificado. ℥j (30 gr.).
 Acido nítrico. 4 gotas.
 H. S. A. I. Anasarca. D. Treinta á cuarenta gotas, dos ó tres veces al dia.

4386. Otra (RUST).

℞ Jarabe de espino seryal,
 Rob de enebro,
 Rob de saúco, ãã. ℥ij (60 gr.).
 M. I. Hidropesia, ascitis. D. Media-cucharada cada dos ó tres horas.

4387. M. ANTIHISTÉRICA.

℞ Asa fétida. ℥B (2 gr.).
 Espíritu de Minderero. ℥j (30 gr.).
 M. D. Cuarenta á cincuenta gotas cuatro veces al dia.

4388. Otra (FOY).

℞ Asa fétida. ℥j (4 gr.).
 Se tritura con
 Agua de menta piperit. ℥j℥ (48 gr.).
 Se cuele y se añade:
 Tintura de valeriana
 amoniacal. ℥ij (8 gr.).
 Tintura de castóreo. ℥iij (42 gr.).
 Eter sulfúrico. ℥j (4 gr.).
 I. Afecciones histéricas ó convulsivas, etc. D. Una cucharada de hora en hora.

4389. M. ANTICTÉRICA (Quarin).

℞ Agua destil. de hinoj. ℥vj (480 gr.).
 Jar. de las cinco raic. ℥j (30 gr.).
 Extracto líquido de taraxacon,
 Acetato de potasa, ãã. ℥B (45 gr.).
 Extracto de cicuta. ḡx (5 dec.).
 H. S. A. D. Dos cucharadas cada cuatro horas.

4390. M. ANTILETÁRGICA (Frank).

℞ Esencia de menta pi-
 perita. ℥vj (480 gr.).
 Eter sulfúrico. ℥vj (24 gr.).

Láudano líquido de
 Sydenham. ℥B (45 gr.).
 M. S. A. D. Una cucharadita de café de cuarto en cuarto de hora.

4391. M. ANTIMETORRÁGICA
(Thilenius).

℞ Esencia de canela. 40 gotas.
 Eter sulfúrico. ℥j (4 gr.).
 I. Metrorragia durante y despues del parto. D. Diez á trece gotas cada veinte á treinta minutos.

4392. M. ANTIMONIAL DE MASDEVAL (H. DE M.).

℞ Cocimiento de escor-
 zonera. ℥v (150 gr.).
 Vino emético claro. ℥j (30 gr.).
 Tartr. ácido de potasa. ℥j (4 gr.).
 I. Fiebres malignas, tifo, etc.
 Se usa como emético. D. A cucharadas.

4393. M. ANTIMONIO-MERCURIAL
(Blanc).

℞ Protocloruro de merc. ḡij (4 dec.).
 Alcohol. ℥jv (125 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Vino amoniacal. 25 gotas.
 M. I. Sífilis y reumatismo crónico. D. ℥B (15 gr.) al dia.

4394. M. ANTINEUROPÁTICA
(Nevermann).

℞ Tintura de nuez vómica,
 Tintura de opio,
 Tintura etérea de es-
 tramonio, ãã. ℥j℥ (40 gr.).
 Aceite volátil de vale-
 riana 46 gotas.

M. I. Cardialgias y neuralgias reumáticas. Es un remedio muy peligroso. D. Veinte á treinta gotas en una taza de infusion ligera de manzanilla azucarada, cada veinticuatro horas. Se disminuirá la dosis segun vayan cediendo los dolores.

4395. M. ANTIODONTÁLGICA.

℞ Aceite esencial de
 clavo. ḡviii (4 dec.).

Tintura de opio. . . . ʒj (4 gr.).
 Eter sulfúrico. ʒijβ (40 gr.).
M. I. Odontalgia. D. Se aplica al diente cariado una bolita de hilas empapada en esta mezcla.

4396. M. ANTIODONTÁLGICA.

ʒ Ládano de Sydenham. ʒβ (2 gr.).
 Extr. de beleño negro. ʒviii (4 dec.).
 Acido sulfúrico dilata-
 do en 7 partes de
 agua. ʒxij (6 dec.).
 Esencia de clavo. . . . ʒβ (6 dec.).
H. S. A. Se toma la mitad de esta mezcla en una bocanada de agua, y se tiene en la boca, inclinada la cabeza sobre el lado dañado para que el líquido se ponga en contacto de la parte enferma. A los cinco ó seis minutos se arroja el líquido. Si aparece el dolor se repite la aplicacion con la otra mitad del agua.

El autor asegura que es muy eficaz.

4397. Otra (CARUS).

ʒ Tintura de valeriana. . . ʒj (32 gr.).
 Tintura de guayaco. . . ʒvj (24 gr.).
 Tintura de benjuí compuesta,
 Alcoholato de coclea-
 ria, añ. ʒij (8 gr.).
 Ládano de Sydenham. . ʒj (4 gr.).
M. D. Una cucharadita de café en una taza de agua caliente para colutorio.

4398. Otra (LEMAZURIER).

ʒ Agua destilada de laurel
 real. ʒij (60 gr.).
 Acetato de morfina. . . ʒj (5 cent.).
H. S. A. I. Dolores de muelas.
D. Se usa en gargarismos á la dosis de algunas gotas, en ʒij (60 gr.) de agua tibia para una vez.
 Calma muy pronto los dolores sin irritar la mucosa de la boca.

4399. M. ANTIPRURIGINOSA (Bielt).

ʒ Jarabe de pensamien-
 to silvestre. ʒxv (470 gr.).

Jarabe de torbisco. . ʒij (60 gr.).
 Sulfito sulfurado de
 sosa ʒij (8 gr.).
H. S. A. I. Prúrigo. D. Dos cucharadas por la mañana en ayunas.

4400. M. ANTIREUMÁTICA (Weber).

ʒ Extracto de acónito. . . ʒj (4 gr.).
 Vino de semillas de cól-
 chico. ʒβ (15 gr.).
Disuélvase. I. Artritis reumática, gota, reumatismo muscular y fibroso. *D.* Quince á cuarenta gotas, tres veces al dia.

4401. M. ANTISÉPTICA (Peacock).

ʒ Confeccion de jacin-
 tos,
 Polvo de gengibre,
 Carbonato de amo-
 niaco, añ. ʒj (4 gr.).
 Alcoholado de opio. . ʒij (8 gr.).
 Agua destilada de
 menta piperita. . . ʒβ (250 gr.).
H. S. A. I. Afecciones gangrenosas. *D.* Una á dos cucharadas, cada dos ó tres horas.

4402. M. ANTISIFILÍTICA (Cazenave).

ʒ Jarabe de dafne me-
 cereon. ʒij (64 gr.).
 Jarabe balsámico de
 Tolú. ʒjv (128 gr.).
 Subcarbonato de amo-
 niaco. ʒβ (15 gr.).
M. I. Sífilis constitucional. *D.* Se dan dos cucharadas, una por la mañana y otra por la tarde.

4403. Otra (CIRILLO).

ʒ Agua pura. ʒij (60 gr.).
 Ungüento egipciaco. . ʒij (8 gr.).
M. S. A. I. Ulceras sifilíticas. *D.* Se aplica dos veces al dia sobre las partes enfermas una compresa empapada en esta mistura.

4404. Otra (PLISSON).

ʒ Infusion de hojas de
 naranjo. ʒbj (500 gr.).

Ioduro de potasio. \mathfrak{g}^{x} (5 dec.).
 Jarabe de saasafra. $\mathfrak{z}^{\text{ij}}\mathfrak{B}$ (45 gr.).
 D. En tres dosis al dia.

4405. M. ANTIVOMITIVA.

\mathfrak{z} Esencia de ajenjos. \mathfrak{z}^{B} (2 gr.).
 Alcohol rectificado,
 Licor mineral de Hoff-
 mann, añ. \mathfrak{z}^{B} (16 gr.).
 Jarabe de cáscara de
 naranja. \mathfrak{z}^{v} (20 gr.).
 M. I. Gastritis, gastralgia, vómi-
 tos espasmódicos. D. A medias cu-
 charadas.

4406. M. APERITIVA.

\mathfrak{z} Sal amoniaco. \mathfrak{g}^{xc} (5 gr.).
 Agua de manzanilla. \mathfrak{z}^{x} (300 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Vino antimonial. \mathfrak{z}^{j} (4 gr.).
 Ojimiél simple. \mathfrak{z}^{ij} (60 gr.).
 I. Es estimulante, alterante y
 fundente. D. A vasos.

4407. M. AROMÁTICA.

\mathfrak{z} Extracto de cascarilla. \mathfrak{z}^{j} (4 gr.).
 Oleosácaro de manzan. \mathfrak{z}^{vj} (24 gr.).
 Goma tragacanto. \mathfrak{z}^{B} (2 gr.).
 Láud. de Sydenham. $\mathfrak{g}^{\text{xviiij}}$ (4 gr.).
 Agua de canela. \mathfrak{z}^{ij} (60 gr.).
 Agua de menta pipe-
 rita. \mathfrak{z}^{vj} (125 gr.).
 M. I. Disenteria, diarrea cróni-
 ca. D. Una cucharada de hora en
 hora.

4408. Otra (LAUDERER).

\mathfrak{z} Hojas de laurel. $\mathfrak{z}^{\text{iiij}}$ (90 gr.).
 Clavo. $\mathfrak{z}^{\text{ij}}\mathfrak{B}$ (10 gr.).
 Alcohol de espliego,
 Alcohol de orégano, añ. \mathfrak{z}^{v} (150 gr.).
 Se digiere durante diez dias, se
 cuela y se añade:
 Eter sulfúrico. \mathfrak{z}^{B} (15 gr.).
 Se dice que esta tintura hace
 crecer mucho los cabellos.

4409. M. DE ASA FÉTIDA (Kopp).

\mathfrak{z} Asa fétida. \mathfrak{z}^{B} (2 gr.).
 Mucilago de goma aráb. \mathfrak{z}^{ij} (60 gr.).
 Jarabe de malvabisco. \mathfrak{z}^{j} (30 gr.).
 H. S. A. I. Coqueluche, cuando

está en toda su violencia, histéri-
 co, tos espasmódica. D. Una cu-
 charada de café cada dos horas
 para los niños; una cucharada
 grande para los adultos.

4410. Otra (F. DE L.).

\mathfrak{z} Asa fétida. \mathfrak{z}^{v} (20 gr.).
 Agua de yerbabuena. \mathfrak{z}^{Bj} (500 gr.).
 H. S. A. D. A cucharaditas cada
 dos horas.

4411. M. ASTRINGENTE.

\mathfrak{z} Salep en polvo. \mathfrak{z}^{ij} (8 gr.).
 Agua comun. \mathfrak{z}^{x} (300 gr.).
 Se hierve durante doce á quince
 minutos, se cuela y se añade S. A.
 Borato de sosa. \mathfrak{z}^{B} (2 gr.).
 Extracto de palo de Campeche,
 Extracto de quina, añ. \mathfrak{z}^{j} (4 gr.).
 Jarabe de malvabisco. \mathfrak{z}^{B} (15 gr.).
 D. Una cucharada de café ó gran-
 de cada dos horas, si es un niño
 recién nacido ó de cinco á siete
 años.

4412. M. ASTRINGENTE DE CADET (H. DE M.).

\mathfrak{z} Bálsamo de copaiba,
 Jarabe simple, añ. \mathfrak{z}^{j} (30 gr.).
 Agua de rosas. \mathfrak{z}^{vj} (125 gr.).
 Goma arábica. \mathfrak{z}^{j} (30 gr.).
 Espíritu de nitro dulce. \mathfrak{z}^{j} (4 gr.).
 Se forma un mucilago espeso con
 la goma, se añade el bálsamo y el
 jarabe, se agita la mezcla sin in-
 termision, concluyendo por añadir
 toda la cantidad de agua y por fin
 el espíritu de nitro dulce.

I. Blenorreas inveteradas. D. La
 mitad al acostarse y la otra en
 ayunas el dia siguiente.

4413. M. ASTRINGENTE (Hecker).

\mathfrak{z} Trement. de Venecia. $\mathfrak{z}^{\text{iiij}}$ (12 gr.).
 Acido sulfúr. concentr. \mathfrak{z}^{vj} (24 gr.).
 H. S. A. y añádase poco á poco:
 Alcohol rectificado. $\mathfrak{z}^{\text{iiij}}$ (90 gr.).
 I. Hemorragias pasivas, flujos
 mucosos crónicos. D. Quince á
 treinta gotas cada hora.

4414. M. ASTRINGENTE
(H. DE AL.).

℥ Sulfato de zinc. ℥β (6 dec.).
Agua de rosas. ℥jv (125 gr.).
Se disuelve y se añade:
Mucil. de goma aráb. ℥β (45 gr.).
M. I. Blenorragias rebeldes. D.
Una cucharada cada tres horas.

4415. Otra (LALLEMAND).

℥ Trementina,
Bálsamo de copaiba,
Aceite de sucino, ññ. ℥β (45 gr.).
Disuélvase. I. Ciertos casos de
poluciones nocturnas, blenorra-
gia, leucorrea. D. Treinta á se-
senta gotas en una cucharada de
azúcar, tres veces al día.

4416. Otra (WADELET).

℥ Bálsamo de copaiba,
Tintura de espliego compues-
ta, ññ. p. ig.
M. I. Diarreas atónicas, leucor-
reas, etc. D. Quince á veinte go-
tas, tres ó cuatro veces al día, en
℥ij (60 gr.) de infusión de gayuba.

**4417. M. ASTRINGENTE ALCANFO-
RADA (Haase).**

℥ Palo de Campeche. ℥j (30 gr.).
Agua comun. ℔bj (500 gr.).
Se hierve hasta que se reduzca
á la mitad, se cuele y se añade:
Alcanfor. ℥j (12 dec.).
M. I. Diarrea indolente á con-
secuencia del tifo y de la calentu-
ra tifoidea, etc. D. Dos cuchara-
das cada dos horas.

4418. M. ASTRINGENTE VINOSA
(Dreyssig).

℥ Alumbre. ℥ij (8 gr.).
Goma arábica en polvo,
Goma quino, ññ. ℥j (4 gr.).
Vino del Rin. ℥jv (125 gr.).
Agua destilada de ca-
nela alcoholizada. ℔β (250 gr.).
Mézclese y disuélvase S. A.
I. Incontinencia de orina por a-
tonía. D. Una cucharada cada hora.

4419. M. ATEMPERANTE
(H. DE AL.).

℥ Vinagre. ℥iij (90 gr.).
Miel. ℥ij (60 gr.).
Agua. ℔bjv (2000 gr.).
M. D. A tazas.

4420. M. BALSÁMICA.

℥ Jarabe de Tolú. ℥j (30 gr.).
Emuls. de goma aráb. ℔β (250 gr.).
Aceite de alm. dulces. ℥jβ (45 gr.).
M. I. Catarros pulmonares cró-
nicos, blenorrea. D. En cuatro ve-
ces por la noche.

4421. Otra (FRICKE).

℥ Bálsamo del Perú. ℥vj (24 gr.).
Aceite comun. ℥iij (90 gr.).
Yemas de huevo. número 2.
Se trituran y se añade poco á
poco:
Vinagre. ℥iij (90 gr.).
M. I. Gonorreas antiguas y re-
beldes. D. Una cucharada cada
dos horas. Es necesario tener
cuidado de menear la botella an-
tes de echar el líquido en la cu-
chara.

4422. M. BALSAMICA ó Mistura
de bálsamo de copaiba, de Fuller
(F.E.).

℥ Bálsamo de copaiba. ℥β (45 gr.).
Yemas de huevo. número 2.
Vino blanco. ℔β (250 gr.).
Jarabe simple. ℥ij (60 gr.).
Se mezcla la resina de copaiba
con las yemas de huevo en un
mortero, se añade poco á poco el
vino, y despues el jarabe, agi-
tando convenientemente hasta que
se forme una mistura como emul-
sion; se cuele y se guarda.
I. Catarros crónicos de la vejiga,
del útero ó de la uretra, blenor-
ragia crónica. D. Hasta ℥ij (60
gr.) al día.

4423. Otra (H. DE M.).

℥ Vino blanco. ℥jv (125 gr.).

Bálsamo de copaiba. ℥ij (8 gr.).
 Jarabe de altea. ℥j (30 gr.).
 Yemas de huevo. número 2.

Se agita por largo tiempo en un mortero de vidrio ó mármol el bálsamo con las yemas de huevo; y se añade por veces, agitando fuertemente en los intermedios, primero el jarabe y despues el vino blanco.

I. V. n. 4417.

4424. M. BALSÁMICA (Lallemand).

℥ Aceite de succino rectificado,
 Bálsamo de copaiba,
 Trementina, ãã. ℥ij (8 gr.).

M. I. Blenorragia, poluciones y flores blancas. *D.* Seis á treinta gotas, dos ó tres veces al dia, en una cucharadita de azúcar en polvo.

4425. M. BARÍTICA AMONIACO FERRUGINOSA (Clarus).

℥ Cloruro de hierro amoniaco,
 Cloruro de bario, ãã. ℥j (12 dec.).
 Agua destilada. ℥ij (60 gr.).

Disuélvase. *I.* Afecciones escrofulosas, coxalgia, bócio, ciertos casos de tisis al principio, raquitis, tumores blancos, tumores glandulosos, etc. *D.* Veinte á treinta gotas, dos ó tres veces al dia.

4426. M. BARÍTICA CON CICUTA (Vogt).

℥ Cloruro de bario. ℥ß (6 dec.).
 Extracto de cicuta. ℥j (12 dec.).
 Agua destil. de canela. ℥ß (15 gr.).

Disuélvase. *I.* Afecciones escrofulosas, coxalgia, bócio, tisis incipiente, raquitis, tumores blancos, tumores glandulosos. *D.* Veinte á treinta gotas, tres ó cuatro veces al dia.

4427. M. DE BAUMES CONTRA LA ATROFIA MESENTÉRICA.

℥ Extracto de cicuta. ℥ij (10 cent.).
 Extracto de quina. ℥ij (15 cent.).

Acetato de potasa. ℥x (50 cent.).
 Infusion de hojas de pensamiento. ℥iij (90 gr.).

M. I. Se usa cuando la enfermedad es producida por la repercusion de la costra láctea. *D.* A cucharadas, tres ó cuatro veces al dia, á los niños de dos años.

4428. M. DE BELLADONA (Hufeland).

℥ Extracto de belladona. ℥vj (3 dec.).
 Agua de laurel real. ℥ß (15 gr.).

Disuélvase. *I.* Escirros, particularmente los del estómago. *D.* Cuarenta á cincuenta gotas, tres veces al dia.

4429. M. BENZOICA.

℥ Acido benzóico. ℥xviiij (4 gr.).
 Fosfato de sosa. ℥ijß (10 gr.).
 Agua destilada. ℥iij (90 gr.).
 Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

H. S. A. I. Gota y cálculos de ácido úrico. *D.* En tres veces en el dia. El fosfato de sosa sirve para facilitar la disolucion del ácido benzóico.

4430. M. DE BIETT.

℥ Jarabe de fumaria. ℥xij (375 gr.).
 Jarabe de trinitaria silvestre. ℥iij (90 gr.).
 Hiposulfito de sosa. ℥j (8 gr.).

I. Enfermedades crónicas de la piel y principalmente el eczema y liquen. *D.* A cucharadas.

4431. M. DE BOYLE.

℥ Zumo de siempreviva mayor,
 Miel, ãã. ℥j (30 gr.).
 Sulfato de alumina. ℥j (12 dec.).

M. S. A. I. Aftas. *D.* C. s. para tocar cada hora las partes enfermas.

4432. M. BRASILEÑA CONTRA LA GONORREA.

℥ Bálsamo de copaiba. ℥iij (90 gr.).
 Yema de huevo,
 Jarabe de goma arábica, ãã. ℥j (30 gr.).

Tintura de azafran. ℥ij (8 gr.).
 Agua. ℔℔ (250 gr.).

Se tritura primero el bálsamo de copaiba y las yemas de huevo, y se añade sucesivamente el agua, el jarabe y la tintura.

I. Blenorragia, blenorrea, leucorrea, catarro útero-vaginal. *D.* ℥j á ℥iij (30 á 90 gr.) al día.

4433. M. BRASILEÑA LÍQUIDA
 (*Lepère*).

℥ Bálsamo de la Meca reducido á la consistencia de pasta. . . . 125
 Bálsamo de copaiba muy puro. 400
 Extracto de azafran. 4
H. S. A. I. Gonorrea. *D.* ℥j (30 gr.) al día en dos veces.

Nota. Se necesitan comunmente ℥vj (180 gr.) para cada tratamiento. Este producto no tiene propiedades mas activas que la trementina de copaiba sola.

Se puede reemplazar el bálsamo de la Meca por la trementina, y se la espesa lo mismo que el bálsamo de copaiba, hirviéndola en agua para desalojar parte de la esencia.

4434. M. BRASILEÑA EN PASTA.

℥ Mistura brasileña líquida. ℥iij℔ (105 gr.).
 Bálsamo de la Meca de la consistencia de maná. ℥vij (210 gr.).

H. S. A. I. La misma que la anterior. *D.* ℥j (30 gr.) al día en dos veces, ó en cuatro ú ocho dosis con iguales intervalos.

Nota. Comunmente se necesitan ℥vj (180 gr.) y mas para cada tratamiento.

4435. M. DE BRUCINA
 (*Dieffembach*).

℥ Brucina. ℥ij (1 dec.).
 Azúcar blanca. ℥ij (8 gr.).
 Mézclase y añádase poco á poco:
 Agua destilada. ℥ij (60 gr.).
I. Parálisis. *D.* Media cucharada mañana y noche.

La FORMULA DE MAGENDIE contiene ℥vj (3 dec.) de brucina.

4436. M. CALMANTE.

℥ Agua de lechuga. ℥j (30 gr.).
 Láudano de Sydenham. 6 á 20 gotas.
 Jarabe simple. ℥℔ (15 gr.).
 Se puede añadir ℥℔ (2 gr.) de licor de Hoffmann.

D. Una cucharada de café cada media hora.

4437. Otra (GOELIS).

℥ Tintura de digital. ℥j℔ (6 gr.).
 Succinato de amoniaco. ℥℔ (2 gr.).
 Láudano de Sydenham. ℥j (12 dec.).

M. I. Palpitaciones de corazón en los niños. *D.* Tres á seis gotas, tres veces al día.

4438. Otra (HOULTON).

℥ Licor acético de opio. 40 gotas.
 Espíritu de nitro etéreo. ℥℔ (2 gr.).
 Agua destilada. ℥j (30 gr.).

I. Esta mistura reemplaza ventajosamente á las demás preparaciones de opio cuando hay que administrarlas á grandes dosis, como en las enfermedades cancerosas, y cuando provocan náuseas y aun vómitos. Produce mejor efecto que cuarenta gotas de láudano líquido en una pocion. *D.* Se toma de una vez.

4439. Otra (RECAMIER).

℥ Miel. ℥jv (125 gr.).
 Láudano de Rousseau. ℥℔ (15 gr.).

M. I. Cáncer uterino. *D.* Se empapan hitas en esta mistura y se aplican al cuello del útero por medio del especulum.

4440. Otra (ROUX).

℥ Agua de laurel real. ℥jv (125 gr.).
 Eter sulfúrico. ℥j (30 gr.).
 Extracto de belladona. ℥j (4 gr.).

M. I. y D. Se usa en fricciones en los dolores nerviosos, reumáticos, gotosos, etc.

4441. M. CALMANTE ASTRINGENTE
(Kopp).

℞ Extracto de ratania. . . ℥ij (12 gr.).
 Agua de cerezas negr. ℥vj (180 gr.).
 Agua de laurel real. . . ℥j (4 gr.).
 Mézclese y disuélvase. *I.* Hemorragias pasivas, especialmente la hemotisis y flujos mucosos crónicos. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

4442. Otra (MONIN).

℞ Acetato de plomo. ℥jv (2 dec.).
 Agua destilada. ℥j (30 gr.).
 Extracto de opio. ℥ij (4 dec.).
I. Disenteria. *D.* Se da una cucharada cada dos horas.

4443. M. DE CANTÁRIDAS BALSÁMICA (Kopp).

℞ Bálsamo del Perú,
 Tintura de cantáridas, añ. ℥ij (8 gr.).
M. I. Incontinencia de orina en los ancianos. *D.* ℥j (12 dec.) cuatro veces al día en vino.

4444. M. CANTARIDADA Y OPIADA (Rayer).

℞ Solucion de goma arábica. ℥jv (125 gr.).
 Tintura de cantáridas. 12 gotas.
 Láudano líquido de Sydenham. 10 gotas.
M. I. Parálisis de la vejiga. *D.* Se toma á cucharadas en las veinticuatro horas.

4445. M. ESTOMACAL DE CARBONATO DE POTASA DE AJENJOS, *Julepe estomacal* (F. E.).

℞ Agua destilada de corteza de cidra,
 Agua destilada de ajenjos,
 Agua destilada de yerbabuena, añ. ℥jv (125 gr.).
 Agua destilada de canela. ℥ij (60 gr.).
 Carbonato de potasa. ℥jv (5 gr.).
 Tintura de leño áloes. ℥ij (8 gr.).
 Jarabe de corteza de cidra. ℥j (30 gr.).
H. S. A. D. Una cucharada ó ℥℥ (15 gr.).

4446. M. CARMINATIVA.

℞ Raiz de malvabisco. ℥j (30 gr.).
 Agua. ℥bj (500 gr.).
 Se reduce á la mitad y se añade:
 Anís,
 Hinojo,
 Cilantro, añ. ℥xc (5 gr.).
 Agua de ruda. ℥ij (60 gr.).

Se macera y se añade:

Jarabe diacodion. ℥ij (60 gr.).
 Láudano de Sydenham. ℥℥ (2 gr.).
I. Cólico ventoso de los niños, neumatosis, calambres de estómago, mareo, gastralgia, helmintiasis. *D.* A cucharadas.

4447. Otra (RICHTER).

℞ Tintura de castóreo,
 Eter sulfúrico alcoholizado, añ. ℥j (4 gr.).
M. I. Cólico ventoso. *D.* Treinta gotas, tres ó cuatro veces al día.

4448. M. DE CASCARILLA COMPUESTA (F. DE L.).

℞ Infus. de cascarilla. ℥xvij (530 gr.).
 Vinagre escilitico. ℥j (30 gr.).
 Tintura de alcanfor compuesta. ℥ij (60 gr.).
 Mézclese.

4449. M. DE CASTOREO ALOETICA (Hufeland).

℞ Tint. de cásc. de naranja. ℥ij (8 gr.).
 Tintura de castóreo,
 Tintura de acíbar, añ. ℥j (4 gr.).
I. Jaqueca histérica acompañada de vómitos. *D.* Sesenta gotas, dos veces al día, contra los paroxismos.

4450. M. CATÁRTICA ÁRABE.

℞ Jarabe de limon. ℥j (30 gr.).
 Escamonea de Alepo en polvo. ℥j (12 dec.).
 Sulfuro de antimonio en polvo. ℥xij (6 dec.).
H. S. A. I. Hidropesia. *D.* Toda la dosis de una sola vez.

4451. M. CATÁRTICA (Hufeland),

℥ Aceite de almendras dulces,
Sulfato de magn., ãã. ℥j (30 gr.).
Extracto de acibar. ℥B (6 dec.).
Extracto de beleño. ℥j (12 dec.).
Agua. ℔B (250 gr.).
Goma aráb. en polvo. c. s.

M. I. Ileo pertinaz. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

4452. M. DE CORNEZUELO DE CENTENO (Bocquet y Dufrenoy).

℥ Elixir de Garus. ℥jB (45 gr.).
Agua destilada de menta,
Agua destil. de tilo, ãã. ℥j (30 gr.).
Cornezuelo de centeno
en polvo. ℥B (2 gr.).

M. I. Partos laboriosos por inercia de la matriz, expulsion tardía de las secundinas, hemorragia, especialmente de la matriz, ciertas paraplejas, retencion de orina por inercia de la vejiga. *D.* Una cucharada cada tres ó cuatro horas.

4453. M. DE CICUTA (Moore Neligan).

℥ Zumo de cicuta. ℥ijB (10 gr.).
Alcohol rectificado. ℥B (2 gr.).
Mézclese y fíltrese.

I. Afecciones reumáticas subagudas ó crónicas, principalmente con dolores violentos ó neuralgias, gangrena senil.

4454. M. DE CICUTA CONTRA LA FOTOFobia ESCROFULOSA (Seidel).

℥ Extracto reciente de
cicuta. ℥B (2 gr.).
Azúcar blanca. ℥B (2 gr.).

Se tritura exactamente y se añade poco á poco, continuando la trituracion sin detenerse,

Agua destilada. ℥B (15 gr.).
Despues de bien disuelto se guarda en un frasco que tape bien.

D. Cuatro á diez gotas cada dia en un vehículo apropiado y endulzado. En los casos rebeldes puede aumentarse la dosis á los adultos

hasta veinte ó veinticinco gotas.

El autor dice que nunca ha observado que se presente síntoma alguno de narcotismo.

4455. M. CIDONIADA.

℥ Mucíl. de membrillos. ℥j (30 gr.).
Miel rosada. ℥ijj (90 gr.).
Yemas de huevo. número 2.

M. I. Ronquera, bronquitis, catarro agudo, vómitos espasmódicos, vértigos. *D.* Una cucharada de café cuatro á cinco veces al dia.

4456. M. DE CLARUS.

℥ Cloruro de hierro amoniacal. ℥xviiij (1 gr.).
Cloruro de bario. ℥xviiij (1 gr.).
Agua destilada. ℥jB (50 gr.).

I. Escrófulas. *D.* Veinte á treinta gotas, dos ó tres veces al dia.

4457. M. CLORÓNTRICA (Koechlin).

℥ Acido nítrico debilitado. ℥jB (6 gr.).
Acido clorhídrico debilit. ℥B (2 gr.).

M. I. Ictericia dependiente de la induracion del hígado, escorbuto. *D.* Veinte gotas cuatro veces al dia.

4458. M. CLORURADA ALCOHÓLICA (Trusen).

℥ Cloruro de cal. ℥B (15 gr.).
Agua comun. ℥ij (60 gr.).

Se disuelve por trituracion, se filtra y se añade:

Alcohol de 22°. ℥ij (60 gr.).
Esencia de rosas. 4 gotas.

M. I. Salivacion mercurial ú otra. *D.* Una cucharada de café en un vaso de agua para gargarismo.

4459. M. DE CLORURO DE CAL (Bielt).

℥ Cloruro de cal. ℥ij á ℥jv (8 á 16 gr.).
Agua destilada. ℔j (500 gr.).
Jarabe de genciana. ℥ij (60 gr.).

I. Blenorragia muy intensa. *D.*

Dos, tres ó cuatro cucharadas al día.

4460. M. COBREOSA ALCANFORADA
(*Swediaur*).

℞ Sulfato de cobre. ℥jv (16 gr.).
Alcanfor. ℥ij (8 gr.).

Se tritura en

Agua comun. ℔jv (2000 gr.).

I. Flujos mucosos crónicos, hemorragias traumáticas. *D.* En inyección, locion ó colirio, según los casos, diluido en o. s. de agua.

4461. M. DE COCHINILLA
(*Dieudonné*).

℞ Cochinilla. ℥xv á ℥xx (75 á 80 cent.).
Carbonato de potasa. ℥v á ℥xv (25 á 75 cent.).

Agua hirviendo. ℥iij (90 gr.).

Jarabe de flor de naranjo. ℥j (30 gr.).

M. I. Coqueluche. *D.* Cuatro cucharaditas en el primer día á los niños de un año, aumentando hasta dar una cucharadita cada dos horas. A los de más edad se da mayor dosis.

4462. M. DE CONICINA
(*Fronmueller*).

℞ Conicina. 3 gotas.

Alcohol. ℥xviiij (4 gr.).

Agua destilada. ℥v (20 gr.).

M. I. Oftalmia escrofulosa. *D.* ℥xv (75 cent) tres veces al día, en agua.

4463. M. COLCHÍTICA.

℞ Ojimiél colchico,

Acetato de amon., añ. ℥ij (60 gr.).

Agua de perejil. ℥vj (180 gr.).

M. I. Hidropesía, reumatismo, gota. *D.* A cucharadas cada dos horas.

4464. M. CONTRA LAS AFTAS.

℞ Crema de leche,

Agua destilada de ro-

sas, añ. ℥j (30 gr.).

Yema de huevo fresca. número 1.

Jarabe de adormideras. ℥β (13 gr.)

Mézclese bien.

D. Una cucharada de cuando en cuando, de modo que se consuma en veinticuatro horas.

4465. M. CONTRA LA ATROFIA
MESENTÉRICA.

℞ Miel. ℥jv (125 gr.).

Calomelanos prepara-

dos al vapor. ℥j (4 gr.).

Limaduras de hierro porfirizadas. ℥β á ℥j (2 á 4 gr.).

Ruibarbo en polvo. ℥j (4 gr.).

H. S. A. D. Media cucharadita de café á los niños de seis meses; una entera á los de un año; dos para los de dos años, y se aumenta en todos los casos media cucharadita de café cada tres ó cuatro días.

4466. Otra (BAUMÉS).

℞ Extracto de cicuta. ℥ij (10 cent.).

Extracto de quina. ℥iij (15 cent.).

Acetato de potasa. ℥x (5 dec.).

Infusion de hojas de pensamientos. ℥iij (90 gr.).

D. A cucharadas, tres ó cuatro voces al día para un niño de dos años.

4467. M. CONTRA EL BOCIO
(*Veret*).

℞ Ioduro de potasio. ℥viiij (4 dec.).

Agua destilada. ℥jv (125 gr.).

Se disuelve y se añade:

Jarabe de goma. ℥jβ (45 gr.).

Tintura de canela. ℥β (15 gr.).

M. I. Bocio. *D.* Una cucharada todas las mañanas en ayunas. Se usa en Suiza.

4468. M. CONTRA LA CALENTURA
PUERPERAL (*Most*).

℞ Elixir ácido de Haller. ℥β (2 gr.).

Láud. de Sydenham. ℥xviiij (1 gr.).

M. D. Se toman quince á veinte gotas en un vaso de agua de cebada, cada tres horas. Se continúa ordinariamente durante vein-

ticuatro horas. Smith elogia mucho el uso de este remedio.

4169. M. CONTRA LA COQUELUCHE.

℞ Cochinilla. ℥xviiij (4 gr.).
 Bitartrato de potasa. ℥xviiij (4 gr.).
 Azúcar. ℥j (30 gr.).
 Agua hirviendo. ℥vj (200 gr.).

D. Una cucharada de café tres veces al día. Se tomará en treinta y seis ó cuarenta horas á lo mas, porque se descompone pronto.

Los alemanes elogian mucho esta mistura. *V. Mistura de cochinilla.*

4170. Otra (SOBREGONDI):

℞ Tanino puro. ℥vj (3 dec.).
 Extracto de belladona. ℥j (5 cent.).
 Extracto de cicuta. ℥jv (2 dec.).
 Infusion de sen. ℥ij (60 gr.).
 Agua destilada de hinojo. ℥j (30 gr.).
 Jarabe de malvabisco. . ℥vj (25 gr.).

H. S. A. D. Media cucharada cada dos horas. Produce deposiciones líquidas, y apenas se ha tomado toda la mistura desaparece la coqueluche para no volver!!

4171. M. CONTRA EL CRUP.

℞ Agua de poleo. ℥iij (90 gr.).
 Espiritu de Minderero. ℥j (30 gr.).
 Asa fétida. ℥ij (8 gr.).

H. S. A. D. Una cucharada cada hora, sin despreciar el uso de los remedios generales.

4172. M. CONTRA LA EPILEPSIA (Bonorden).

℞ Eter fosforado ℥iij (90 gr.)
 Tintura de colocuint. ℥j (4 gr.).
 Tintura de arnica. . . ℥ij (8 gr.).
 Extracto alcohólico de

nuez vómica. ℥jx (50 cent.).

H. S. A. D. Tres á cuatro gotas tres veces al día, aumentando gradualmente la dosis.

4173. M. CONTRA LA FETIDEZ DEL ALIENTO.

℞ Acido nítrico puro
 á 32°. ℥ij (8 gr.).

Agua de fuente. . . . ℥bij (1000 gr.).

Azúcar blanca,

Jarabe de frambuesas, añ. ℥iij (90 gr.).

M. S. A. D. Se toman algunas tacitas al día, despues de haberla dilatado con partes iguales de agua de Seltz.

4174. Otra, n. 2.

℞ Cloruro de cal seco. ℥β (2 gr.).
 Se diluye en:

Agua común. ℥bij (1000 gr.).

Se filtra y despues se añade *S. A.*

Azúcar blanca. . . . ℥vj (180 gr.).

Agua destilada de

yerbabuena de sa-

bor de pimienta. . ℥j (30 gr.).

D. Se toman en cinco ó seis medias tazas en el espacio del día.

4175. M. CONTRA LAS FUNGOSIDADES DE LAS ENCIAS (Schneider).

℞ Acido clorhídrico. . . . ℥ij (8 gr.).

Alcohol de mirra . . . ℥β (15 gr.).

Miel rosada. ℥vj (24 gr.).

Extracto de ratania. . . ℥β (2 gr.).

H. S. A. D. En fricciones cuatro veces al día, pero antes se hace excision de las fungusidades.

4176. M. CONTRA LA GALACTORREA (Roëseberg).

℞ Iodo. ℥ij (4 dec.).

Ioduro de potasio. . . ℥xviiij (4 gr.).

Agua. ℥vj (80 gr.).

Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

D. A cucharadas en el día.

4177. M. CONTRA LA GONORREA (H. DE AL.).

℞ Resina de copaiba. 3

Espiritu de nitro dulce. 6

Tintura de opio. 4

Tintura de espliego. 4

M. I. Gonorreas rebeldes cuando el estómago del enfermo está en buen estado. *D.* Una cucharadita de café, dos ó tres veces al día, en un vaso de agua azucarada.

4478. M. CONTRA LA GONORREA
(*Lisemann*).

℞ Bálsamo de copaiba . ℥β (15 gr.).
 Esencia de yerbabuena de sabor de pimenta. 4 gotas.
 Esencia de clavo de especia. 1 gota.
 Tintura de opio simple. ℥ij (24 dec.).
 Mézclase y agítese al tiempo de usarla.

D. Una cucharada de café en un vaso de agua azucarada.

4479. M. CONTRA LA GOTA
(*Fievée*).

℞ Tintura de bulbos de cólchico. ℥ij (8 gr.).
 Tintura de semillas de cólchico. ℥j (4 gr.).
 Jarabe de limones. . . . ℥iij (90 gr.).

M. D. A cucharadas. Dada esta mezcla en las veinticuatro horas produce muchas evacuaciones de vientre. Generalmente cede el infarto gotoso y el enfermo se alivia al punto. Al tiempo de usar este remedio no se debe dar alimentos, y si vigilar con atención el conducto digestivo.

4480. M. CONTRA LA HIDROPESIA
(*Kenner*).

℞ Digital purpúrea. . . ℥β (2 gr.).
 Gatuña. ℥j (4 gr.).
 Polígala de Virginia. . ℥jβ (6 gr.).
 Agua comun. ℔β (250 gr.).

Se hierve durante diez á quince minutos, se cuela y se añade al líquido frío:

Nitro. ℥j (4 gr.).

D. A cucharadas cada dos ó tres horas. Es muy eficaz.

4481. M. CONTRA LA INCONTINENCIA DE ORINA.

℞ Tintura alcohólica de cantáridas. ℥j (4 gr.).
 Jarabe de canela,
 Jarabe de goma, añ. . ℥ij (64 gr.).

D. Se da una cucharada de café al tiempo de acostarse. Se aumentará sucesivamente la dosis.

4482. M. CONTRA EL INSOMNIO
(*Graves*).

℞ Tintura de colombo,
 Tintura de euasia,
 Tintura de genciana,
 Tintura de quina, añ. ℥jβ (45 gr.).
 Morfina. ℥ij (1 dec.).

D. Tres cucharaditas al día.

4483. M. CONTRA EL LIQUEN CRÓNICO
(*Bielt*).

℞ Jarabe de pensamiento silvestre. . . . ℔β (250 gr.).
 Subcarbon. de potasa. ℥ijβ (10 gr.).

D. Una cucharada en un poco de agua todas las mañanas.

4484. Otra, n. 2.

℞ Infus. de escabiosa. ℔ij (1000 gr.).
 Acido sulfúrico. . . . ℥j (4 gr.).
 Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).

M. I. Liquen, impétigo. *D.* A cucharadas en media taza de cocimiento de dulcamara ó cualquiera tisana amarga.

4485. M. CONTRA EL LIQUEN CRÓNICO DE LAS MANOS.

℞ Jarabe de torbisco. . ℥ij (60 gr.).
 Jar. de pensamientos. ℥xjv (440 gr.).
 Hiposulfito de sosa. . ℥ij (8 gr.).

4486. M. CONTRA LA PARÁLISIS
(*Payan*).

℞ Cornezuelo de centen. ℥xviii (1 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℥v (150 gr.).

Se infunde y se añade:

Jarabe simple. ℥β (15 gr.).

I. Payan la usa contra la parálisis de los miembros inferiores, y es útil en la del recto y de la vejiga. Puede aumentarse sucesivamente la dosis del cornezuelo hasta ℥β (2 gr.). *D.* Se toma en dos veces al día.

4187. M. CONTRA LOS PIOJOS.

℞ Eter sulfúrico. ʒj (4 gr.).
 Aceite de anís. 15 gotas.
 Se empapa el peine antes de pei-
 narse.

4188. M. CONTRA LA PIROSIS
(Vogt).

℞ Bicarbonato de sosa. . ʒijʒ (10 gr.).
 Extracto de genciana. ʒjv (16 gr.).
 Se disuelve en
 Agua de menta pip. ʒv (160 gr.).
 Eter sulfúr. alcoholiz. ʒij (8 gr.).
 Tint. acuosa de ruibar. ʒvj (24 gr.).
 M. I. Pirosis y dispepsia produ-
 cidas por el abuso de los licores
 fuertes. D. Una cucharada cada
 dos ó tres horas.

Esta TINTURA ACUOSA DE RUIBARBO se
 compone de seis partes de ruibarbo, una
 y media de carbonato de potasa, setenta
 de agua y una corta cantidad de agua de
 canela.

4189. M. CONTRA EL PROLAPSO
DEL RECTO (Bavez).

℞ Salep en polvo. ʒxc (5 gr.).
 Agua comun. ʒx (300 gr.).
 Se hierve durante quince á vein-
 te minutos, se cuela y se añade:
 Extracto acuoso de
 nuez vómica. ʒj (5 cent.).
 Disuélvase S. A.

D. A cucharadas en las veinti-
 cuatro horas. Conviene elevar gra-
 dualmente la dosis hasta ʒjv (20
 cent.) en la misma cantidad de
 vehículo.

4190. M. CONTRA LOS SABAÑONES
(Marjolin).

℞ Bálsamo del Perú. . . ʒʒ (15 gr.).
 Alcohol. ʒjv (125 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Acido clorhídrico. . . ʒj (4 gr.).
 Tintura de benjuí. . . ʒʒ (15 gr.).

D. Se hacen al día muchas em-
 brocaciones sobre las partes en-
 fermas.

4191. M. CONTRA EL SORIASIS
LABIAL (Bielt).

℞ Infus. de rosas rojas. ʒbj (500 gr.).

Acido sulfúrico. ʒj (12 dec.).
 Jarabe de malvabisco. ʒij (60 gr.).
 M. D. Dos á ocho cucharadas al
 día.

4192. M. CONTRA LA SORIASIS
(Cazenave).

℞ Hiposulfito de sosa. ʒ
 Jarabe de china. ʒ50
 Jarabe de torbisco. ʒ50
 M. I. Soriasis. D. Una cucharada
 mañana y noche.

4193. M. CONTRA LA TISIS
(Wilson).

℞ Nafta purificada. ʒv (20 gr.).
 Láudano de Sydenham. ʒxc (5 gr.).
 M. S. A. D. Quince gotas, tres
 veces al día, en una taza de agua
 caliente azucarada con el jarabe
 de Tolú.

4194. M. CONTRA LA TUMEFACCION
CRÓNICA DE LAS AGALLAS (Becker).

℞ Extr. de cáscara de nuez. ʒj (4 gr.).
 Agua destilada simple. . ʒij (64 gr.).
 Disuélvase para uso externo.
 D. En lociones al órgano enfer-
 mo por medio de un pincel.

4195. M. CONTRA EL VÓMITO DE
LAS PREÑADAS (Kroyher).

℞ Agua destilada de lau-
 rel real. ʒj (4 gr.).
 Tint. de nuez vómica. 2 gotas.
 M. D. Diez gotas por la mañana.
 Pigeaux prefiere la siguiente:
 Alcohol á 32°. . . . ʒvj (180 gr.).
 Agua destilada de lau-
 rel real. ʒʒ (15 gr.).
 Agua. ʒbʒ (250 gr.).
 Azúcar. ʒjv (125 gr.).
 M. D. Una cucharada despues
 de cada comida.

4196. M. DE COPAIBA SUCINADA
(Niemann).

℞ Bálsamo de copaiba,
 Trementina de alerce,
 Aceite de succino, aa. . . ʒj (4 gr.).
 I. Blenorrea, poluciones noc-

turnas, espermatorrea. *D.* Treinta á sesenta gotas cada hora.

4497. M. DE CREOSOTA (F. DE ED.).

℞ Acido acético,
Creosota, ãã. ℞β (6 dec.).
Espir. de eneb. comp. ℥vj (24 gr.).
Jarabe simple. ℥vj (24 gr.).
Agua. ℥xj (330 gr.).

Se mezcla la creosota con el ácido, se añade gradualmente el agua y despues el jarabe y el alcoholato.

**4498. M. CRETACEA
(F. P. Y F. DE L.).**

℞ Cal preparada. 16
Azúcar refinada. 12
Mucilago de goma arábica. 32
Agua. 384

Mézclese triturando.

I. Se usa como antiácida y absorbente en la gastralgia y piro-sis, diarrea. *D.* ℥iij (90 gr.) tres ó cuatro veces al dia.

**4499. M. DE CRETA COMPUESTA
(Brande).**

℞ Mistura de creta. ℥v (150 gr.).
Tintura de catecú,
Tintura de canela, ãã. ℥β (15 gr.).

D. Se da una cucharada de hora en hora contra los eructos ácidos y las diarreas.

4500. M. DE CRONIER.

℞ Raiz de malvabisco,
Raiz de grama, ãã. ℥iij (12 gr.).
Se hierve durante media hora en
Agua. ℥vj (192 gr.).

Se añade:

Sal amoniaco. ℥iij (12 gr.).
Mueíl. de goma aráb. ℥β (16 gr.).

I. Flegmasias uretro-vesicales con secrecion abundante de mucosidades. *D.* Una cucharada de hora en hora.

4501. M. DIAFORÉTICA.

℞ Miel pura. 1

Infusion de flores de saúco. 5
Se disuelve y se añade:

Acetato de amoniaco líquido. 1

D. Media taza cada hora; se agitará la mezcla al tiempo de usarla.

4502. Otra (H. DE AL.).

℞ Arrope de saúco. ℥vj (24 gr.).
Agua destilada. ℥j (30 gr.).

Se disuelve y se añade:

Acetato de amoniaco. ℥jv (16 gr.).
Ojimiél simple. ℥j (32 gr.).

M. D. Dos cucharadas cada dos horas.

4503. Otra (SELLE).

℞ Agua de flor de saúco. ℥β (250 gr.).
Acetato de amoniaco. ℥vj (180 gr.).
Antimonio diaforéti-
co lavado. ℥ij (8 gr.).

Disuélvase *S. A. I.* Calenturas agudas en que es necesario provocar la traspiracion. *D.* Media taza de hora en hora.

**4504. M. DISOLVENTE COMPUESTA
(F. POLACA).**

℞ Sal amoniaco. ℥ij (8 gr.).
Emético. ℥j (5 cent.).

Se disuelve en

Macerado de raiz de
malvabisco. ℥vj (180 gr.).

Se endulza con

Solucion de zumo de
regaliz. ℥β (15 gr.).

I. Es febrífuga y sudorífica. *D.* A cucharadas en el dia.

Nota. La *mistura disolvente simple* no contiene tártaro emético.

4505. M. DIURÉTICA.

℞ Esencia de trementina. ℥j (30 gr.).
Alcohol de eoclearia. ℥β (15 gr.).

Acido clorhídrico,
Espir. de nitr. dulce, ãã. ℥iij (12 gr.).

Espíritu volátil de sucino,
Elixir de propiedad, ãã. ℥ij (8 gr.).

H. S. A. D. Cuatro á quince gotas en vino blanco durante muchos dias.

4506. M. DIURÉTICA.

℞ Tint. de cebolla albarr. ℥ij (8 gr.).
 Eter nítrico. ℥j (30 gr.).
M. D. Una cucharadita de café,
 cinco á seis veces al día, en una
 taza de infusión de enebro.

4507. Otra (CRUVEILHIER).

℞ Tintura de acíbar. ℥ij (8 gr.).
 Tintura de digital,
 Tintura de escila, ãã. . . 20 gotas.
M. I. Pleuresía crónica: *D.* De
 una vez por la mañana en ayunas,
 y se repite cada dos ó tres días.

4508. Otra (H. DE AL.).

℞ Ojimiél cólchico,
 Espír. de Minder., ãã. ℥ij (60 gr.).
 Agua dest. de perejil. ℥vj (180 gr.).
M. D. Una cucharada de dos en
 dos horas.

4509. Otra (HILDEMBRAND).

℞ Tintura de semillas de cólchico,
 Tintura de digital, ãã. ℥ij (8 gr.).
 Eter nítr. alcoholizado. ℥j (12 dec.).
M. I. Hidrotorax. *D.* Veinte go-
 tas cada tres ó cuatro horas.

4510. Otra (HUFELAND).

℞ Aceite esencial de e-
 nebro. ℥β (2 gr.).
 Eter nítrico,
 Tintura de digital, ãã. ℥ijβ (10 gr.).
 Ojimiél escilítico. . . ℥β (15 gr.).
I. Hidropesías, hernias. *D.* ℥xxviiij
 (1 gr.) cada tres horas.

4511. Otra (LEVRAT).

℞ Rob de saúco,
 Rob de enebro,
 Elixir de genciana,
 Jarabe de espinoserval,
 Jarabe de las cinco rai-
 ces, ãã. ℥j (30 gr.).
 Jarabe de culantrillo. . ℥ij (60 gr.).
M. I. Asma. *D.* A cucharadas.

4512. Otra (RAYER).

℞ Inf. de rábano rustíc. ℥jv (125 gr.).
 Tintura de cantáridas. 8 gotas.
 Láudano líquido de
 Sydenham. 12 gotas.
 Jarabe simple. ℥β (15 gr.).
M. S. A. I. Hidropesía consecuti-
 va á la nefritis albuminosa cróni-
 ca. *D.* En tres tomas en las vein-
 ticuatro horas. Puede aumentarse
 gradualmente las dosis de la tin-
 tura de cantáridas hasta treinta y
 seis gotas, aumentando al mismo
 tiempo la del láudano hasta diez y
 ocho gotas.

**4513. M. DIURÉTICA ESTIBIADA
(Meyer).**

℞ Extracto de celedonia. ℥β (2 gr.).
 Tártaro emético. ℥j (5 cent.).
 Agua dest. de enebro. ℥jv (125 gr.).
 Se disuelve S. A. y se añade:
 Ojimiél escilítico,
 Jarabe de hinojo, ãã. ℥β (15 gr.).
I. Hidropesías pasivas. *D.* Una
 cucharada cada tres horas.

**4514. M. DIURÉTICA OPIADA
(Schneider).**

℞ Digital purpúrea. . . . ℥β (2 gr.).
 Cardo santo. ℥j (30 gr.).
 Agua hirviendo. lbβ (250 gr.).
 Se infunde hasta que se enfríe,
 se cuela y se añade S. A.:
 Extracto de lechuga
 virosa. ℥jβ (6 gr.).
 Extracto de escila. . . ℥xxviiij (1 gr.).
 Nitro,
 Eter nítrico alcoho-
 lizado, ãã. ℥ij (8 gr.).
 Láud: de Sydenham. . . ℥β (2 gr.).
 Alcoholato de enebro. ℥vj (24 gr.).
 Ojimiél escilítico. . . ℥ij (60 gr.).
I. Hidropesías pasivas. *D.* Una
 cucharada cada tres horas.

**4515. M. DIURÉTICO-SUDORIFICA
(Lippich).**

℞ Raíz de grama. ℥ij (60 gr.).

Agua. ℥ij (500 gr.).
Se hierva durante quince á veinte minutos, se cuela y se añade al líquido enfriado:

Acetato de amoniaco. ℥j (4 gr.).
Acetato de potasa líq. ℥ij (8 gr.).
Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Sirve para provocar las orinas y los sudores en los casos de calenturas catarrales gástricas, pleuresía con derrame seroso, etc. *D.* Se toma por cuartas partes de taza ó mas en las veinticuatro horas.

4516. M. DEL DOCTOR BORIES
contra el dolor de muelas.

℥ Alcanfor,
Esencia de anís, ãã. ℥j (4 gr.).
Acido clorhídrico. . . 20 gotas.
Opio. ℥ß (2 gr.).
Esencia de clavo. . . ℥ij (8 gr.).
Eter sulfúrico. . . . ℥j (4 gr.).
Alcohol. ℥j (30 gr.).
Mézclese exactamente S. A.

D. Se pone una gota en la muestra cariada, y es muy raro que se necesiten mas de tres ó cuatro gotas para calmar el dolor.

4517. M. DRÁSTICA (Andral).

℥ Aguardiente aleman,
Jar. de espino serv., ãã. ℥j (30 gr.).
D. Se toma de una vez por la mañana en ayunas, y obra sin producir dolores de tripas y sin ninguna reaccion febril.

4518. M. EMENAGOGA.

℥ Sulfuro de carbono. . ℥j (30 gr.).
Iodo. ḡv (25 cent.)
I. Amenorrea, dismenorrea. *D.* ḡij (15 cent.) dos veces al dia, en medio vaso de líquido mucilaginoso azucarado.

4519. M. EMETO-ANODINA.

℥ Láudano de Sydenham,
Eter sulfúrico, ãã. . . ḡj (12 dec.).
Quermes mineral. . . ḡij (1 dec.).

Jarabe simple. ℥j (30 gr.).
Agua. ℥jv (125 gr.).

M. I. Es calmante y expectorante. *D.* A cucharadas de hora en hora.

4520. M. EMOLIENTE (Monro).

℥ Cera blanca ó amarilla. 3
Jabón blanco. 4
Se disuelve á un calor lento y se deslie en

Agua pura. 8
Se añade poco á poco, triturando todo en un mortero de mármol:

Jarabe de quina,
Jarabe de canela, ãã. 8

M. I. Disenteria. *D.* A cucharadas. Se agitará al tiempo de usarla.

4521. M. EMULSIVA CALMANTE
(Henke).

℥ Aceite de alm. dulces. ℥ß (15 gr.).
Agua de saúco. ℥iij (90 gr.).
Extracto de beleño. . . ḡjv (2 dec.).
Extracto de opio. . . . ḡj (5 cent.).
Goma arábica en polvo. c. s.

M. I. Tos catarral. *D.* Una cucharada de café cada dos horas.

4522. M. DE ESCABIOSA ÁCIDA
(Bielt).

℥ Infus. de escabiosa. ℥ij (1000 gr.).
Jar. de malvabisco. ℥ij (60 gr.).
Acido sulfúrico. . . . ḡj (12 dec.).
I. Prúrigo, tiña. *D.* Cuatro á seis cucharadas al dia.

4523. M. ESCILÍTICA ANTIMONIADA
(Wildberg).

℥ Vino antimonial de Huxham,
Ojimiél escilítico, ãã. p ig.
M. I. Se recomienda como preservativo de la escarlatina. *D.* Diez gotas á los niños de un año, y se aumentan cinco gotas por cada año mas.

4524. M. EXCITANTE
(H. DE ITALIA).

℥ Ext. de zumaque venen. ℥j (30 gr.).

Agua. ʒj (4 gr.).
Disuélvase. *D.* Diez gotas dos veces al día. Se aumenta progresivamente hasta una cucharada de café.

4525. M. EXCITANTE (H. DE M.).

ʒ Agua de menta piper. ʒvj (180 gr.).
Elixir estomacal. . . . ʒj (4 gr.).
Jarabe de cidra. . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Digestiones lentas por debilidad del estómago. *D.* A cucharadas.

4526. M. DE ESPÍRITU DE VINO (F. DE L.).

ʒ Aguardiente de azúcar,
Yema de huevo,
Agua de canela, añ. . . ʒjv (125 gr.).
Azúcar pura. ʒʒ (15 gr.).
Esencia de canela. . . ʒ³/₅ (8 cent.).
Mézclese.

4527. M. ESTIBIO-ESTIMULANTE.

ʒ Vino antimonial. . . . ʒj (30 gr.).
Eter clorhídrico. . . . ʒij (24 dec.).
Tintura tebaica. . . . ʒj (12 dec.).
I. Cólera asiático. *D.* Diez gotas en azúcar, de media en media hora.

4528. M. ESTIMULANTE (Neumann).

ʒ Vino estibiado. . . . ʒj (30 gr.).
Esp. muriático etéreo. ʒij (24 dec.).
Tintura tebaica. . . . ʒj (12 dec.).
M. I. En los dos primeros períodos del cólera esporádico ó asiático. *D.* Diez gotas en azúcar, cada hora ó cada media hora.

4529. Otra (HORN).

ʒ Tintura de pimiento anual,
Tint. de coloquintida, añ. ʒj (4 gr.).
Tintura de arnica. . . . ʒij (8 gr.).
Esencia de sabina. . . . ʒʒ (2 gr.).
M. I. Parálisis por astenia. *D.* Diez á quince gotas, una vez al día.

4530. M. ESTOMACAL (J. P. Frank).

ʒ Extr. de genciana. . ʒʒ (2 gr.).
Agua de menta piper. ʒvj (180 gr.).
M. I. Estomacal excelente. *D.* Dos ó tres cucharadas de café en medio vaso de agua azucarada, ó en una infusion de flores de manzanilla ú hojas de naranjo.

4531. M. ESTÍPTICA ó Agua de sulfato de cobre con canela.

ʒ Sulfato de cobre. . . ʒj (12 dec.).
Agua de canela. . . ʒʒʒ (750 gr.).
Disuélvase. *I.* Hemorragias uterinas rebeldes. *D.* ʒiij á ʒvj (12 á 24 gr.) tres ó cuatro veces al día en un vehículo apropiado.

4532. M. ESTÍPTICA (Ryan).

ʒ Acetato de plomo. ʒjv á ʒx (2 á 5 dec.).
Agua destilada. ʒiij (90 gr.).
Acido acético débil. . . ʒij (8 gr.).
Licor sedante de opio. ʒʒ (2 gr.).
Jarabe simple. ʒvj (24 gr.).
M. I. Hemorragias activas de los pulmones, del estómago ó de los riñones, etc. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

4533. M. ETÉREA PIRO-ACEITOSA (Horn).

ʒ Aceite animal de Dippel. ʒʒ (2 gr.).
Eter sulfúrico. ʒij (8 gr.).
M. I. Artritis reumática, reumatismos muscular y fibroso. *D.* Quince á treinta gotas cada dos ó tres horas.

4534. M. ETÉREA.

ʒ Eter sulfúrico. ʒxc (5 gr.).
Aceite de anís. ʒxviiij (1 gr.).
M. I. Neuralgias, síncope, vértigos, tétanos, tifo, beriberi, dismenorrea, enfermedades pediculares; se empapa el peine y se le pasa por los cabellos. *D.* En fricciones.

4535. M. ETÉREA (H. DE M.).

℞ Agua dest. de lechuga. ℥vj (180 gr.).
 Eter sulfúrico. ℥j (4 gr.).
 Jar. de cort. de cidra. ℥j (30 gr.).
 H. S. A. I. Histerismo, asma y
 otras enfermedades nerviosas. *D.*
 A cucharadas.

**4536. M. FEBRÍFUGA METÁLICA Ó
M. ARSENICAL.**

℞ Arseniato de potas. ḡ^{1/5} (1 cent.).
 Ag. de yerbabuen. ℥xxv℔ (100 gr.).
 Jarabe simple. . . ℥℔ (15 gr.).
M. I. Calenturas intermitentes
 rebeldes, neuralgias. *D.* Se da á
 cucharadas durante la apirexia.
 Cada cucharada, que pesa cerca
 de ℥v (20 gr.), contiene una vi-
 gésima quinta parte de grano de
 arseniato.

**4537. M. FERRUGINOSA
(Pilschaft).**

℞ Tintura etérea de per-
 cloruro de hierro de
 Klapproth. ℥ij (8 gr.).
 Tintura de vainilla. . . . ℥j (30 gr.).
 Tintura de cáscara de
 naranja. ℥j (30 gr.).
 H. S. A. I. Clorosis. *D.* Veinte
 gotas en una cucharada de agua
 cada dos horas.

4538. M. FÉTIDA.

℞ Alcohol amoniacal fé-
 tido. ℥j (30 gr.).
 Agua de menta piper. ℥vij (210 gr.).
I. Síncopa de las histéricas. *D.*
 Dos cucharadas.

**4539. M. FORTIFICANTE DE SELLE
(H. DE M).**

℞ Extracto de cascarilla,
 Extr. de genciana, añ. ℥j (4 gr.).
 Agua de menta piper. ℥vj (180 gr.).
 Tintura de Marte tar-
 tarizada. ℥℔ (15 gr.).
 Mézclese y disuélvase S. A.
I. Debilidades de estómago é
 intestinos despues de las enfer-

medades adinámicas. *D.* Algunas
 cucharadas al dia.

4540. M. FUNDENTE (Hufeland).

℞ Extracto de dulcamara. ℥j℔ (6 gr.).
 Extracto de polígala. . ℥j (4 gr.).
 Extracto de cicuta. . . ℥℔ (2 gr.).
 Vino estibiado,
 Agua de canela, añ. . ℥℔ (15 gr.).
M. I. Tumores blancos. *D.* Cua-
 renta á ochenta gotas, cuatro ve-
 ces al dia.

4541. M. FUNDENTE (Mutzel).

℞ Agua. ℔℔ (250 gr.).
 Tartrato de potasa. . ℥℔ (15 gr.).
 Extracto de genciana,
 Extr. de centauro, añ. ℥ij (8 gr.).
 Disuélvase S. A. *I.* Hepatitis y
 esplenitis crónica, degeneracion
 de las vísceras abdominales. *D.*
 ℥℔ (15 gr.) cada dos horas.

4542. M. FUNDENTE ESPIRITUOSA.

℞ Tintura de antimonio. ℥j (32 gr.).
 Tintura de pimpinela. ℥v℔ (22 gr.).
 Tintura de sucino. . . ℥iij (12 gr.).
 Jabon de Alicante. . . ℥ij (8 gr.).
I. Esestimulante, tónica, balsá-
 mica, fundente, diaforética, etc.
D. Cuarenta á setenta gotas.

**4543. M. DE GENCIANA COMPUESTA
(F. DE L.).**

℞ Infusion de genciana
 compuesta. ℥xij (375 gr.).
 Infusion de sen com-
 puesta. ℥vj (180 gr.).
 Tintura de cardamomo
 compuesta. ℥ij (60 gr.).
 Mézclese.

**4544. M. DE GOMA AMONIACO Ó
Emulsion de Brunero (F. E. Y
H. DE M.).**

℞ Goma amoniaco. . . . ℥j℔ (6 gr.).
 Agua de hisopo. . . . ℥jv (125 gr.).
 Vino blanco bueno. . ℥ij (60 gr.).
 Se pulveriza la gomo-resina, se
 mezcla en un almirez con el vino,
 se añade el agua y se cuele.

1. Es expectorante incidente en el catarro pulmonar crónico, asma. *D.* En dos tomas. V. n. 1955.

4545. M. DE GOMA ARABIGA
(F. DE L.).

℞ Goma aráb. en polv. $\bar{\text{3}}\text{x}$ (300 gr.).
Agua hirviendo. . . . $\bar{\text{3}}\text{xiiij}$ (560 gr.).
Se tritura la goma con el agua, que se echará poco á poco y se disuelve.

4546. M. GOMOSA DE SULFATO DE HIERRO (F. E.).

℞ Sulfato de hierro. . . $\bar{\text{3}}\text{j}\beta$ (6 gr.).
Goma arábica. . . . $\bar{\text{3}}\text{j}$ (30 gr.).
Agua hirviendo. . . . $\bar{\text{3}}\text{xij}$ (375 gr.).
Se disuelve y se cuela.

1. Esta mistura es astringente y conviene en las diarreas crónicas. *D.* $\bar{\text{3}}\text{j}$ á $\bar{\text{3}}\beta$ (4 á 15 gr.).

4547. M. DE GUAYACO (F. DE L.).

℞ Resina de guayaco. . . $\bar{\text{3}}\text{iiij}$ (12 gr.).
Azúcar blanca. . . . $\bar{\text{3}}\beta$ (15 gr.).
Mucil. de goma aráb. $\bar{\text{3}}\beta$ (15 gr.).
Agua de canela. . . . $\bar{\text{3}}\text{xjx}$ (590 gr.).

Se tritura la resina y el azúcar con el mucilago, y se añade poco á poco la canela.

D. $\bar{\text{3}}\beta$ á $\bar{\text{3}}\text{ij}$ (15 á 60 gr.) dos ó tres veces al dia. Se bebe despues un vaso de cocimiento de cebada tibio.

4548. M. HIDRAGOGA (*Sundelin*).

℞ Cebolla albarrana. . . . $\bar{\text{3}}\beta$ (2 gr.).
Poligala del Senegal. . . $\bar{\text{3}}\text{ij}$ (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . c. s.

para obtener $\bar{\text{3}}\text{v}$ (150 gr.) de líquido despues de colado; se digiere hasta que se enfríe completamente, se cuela y se añade:

Tintura de coloquintida. $\bar{\text{3}}\text{j}$ (12 dec.).
Jar. de cásc. de naranja. $\bar{\text{3}}\text{j}$ (30 gr.).

M. I. Hidropesías pasivas. *D.* Una cucharada de dos en dos horas.

4549. Otra (VAN SWIETEN).

℞ Rob de enebro. . . . $\bar{\text{3}}\text{jv}$ (125 gr.).

Se diluye en $\bar{\text{1}}\text{b}\text{ij}$ (1000 gr.) de agua destilada de bayas de enebro, y se añade:

Espíritu de enebro. . $\bar{\text{3}}\text{ij}$ (60 gr.).

D. Media á dos cucharadas, cuatro á ocho veces al dia.

Nota. Cuando los enfermos están muy alterados, se añade algunas veces á toda la mistura $\bar{\text{3}}\beta$ (15 gr.) de espíritu de nitro dulce.

4550. M. DE HIERRO COMPUESTA DE GRIFFITH (F. DE L.).

℞ Mirra en polvo. . . $\bar{\text{3}}\text{ij}$ (8 gr.).
Subcarb. de potasa. $\bar{\text{3}}\text{j}$ (4 gr.).

Se trituran y se añade:

Sulfato de hierro en polvo. $\bar{\text{3}}\text{ij}\beta$ (30 dec.).

Azúcar blanca. . . . $\bar{\text{3}}\text{ij}$ (8 gr.).

Espíritu de nuez moscada. $\bar{\text{3}}\text{j}$ (30 gr.).

Agua de rosas. . . . $\bar{\text{3}}\text{xviiij}$ (560 gr.).

Se tritura la mirra con el espíritu de nuez moscada y el carbonato de potasa, y se añade trituyendo siempre, primero el agua, luego agua de rosas con azúcar, y despues el sulfato de hierro; la mistura se pone en una vasija que se tapa bien.

1. Se usa como tónica y emenagoga. *D.* $\bar{\text{3}}\text{j}$ á $\bar{\text{3}}\text{ij}$ (30 á 60 gr.).

4551. M. DE HIERRO AROMATICA.

℞ Quina de Loja. $\bar{\text{3}}\text{j}$ (30 gr.).
Clavillo. $\bar{\text{3}}\text{ij}$ (8 gr.).
Colombo. $\bar{\text{3}}\text{iiij}$ (12 gr.).
Hierro. $\bar{\text{3}}\beta$ (15 gr.).

Se digiere durante tres dias en una vasija tapada, agitando de cuando en cuando, en c. s. de agua de menta para obtener $\bar{\text{3}}\text{xij}$ (375 gr.) de líquido despues de colado, y se añade:

Tintura de cardamomo compuesta. $\bar{\text{3}}\text{iiij}$ (90 gr.).

Tintura de naranja. . . $\bar{\text{3}}\text{iiij}$ (12 gr.).

1. Es tónica, estimulante y carminativa. *D.* $\bar{\text{3}}\text{v}$ á $\bar{\text{3}}\text{j}\beta$ (20 á 45 gr.).

4552. M. DE HIPOSULFITO DE SOSA
(*Cazenave*).

℞ Hiposulfito de sosa. ʒj (4 gr.).
Jarabe de dafne mecereon,
Jarabe de china, ãã. ʒjv (125 gr.).
I. Soriasis. D. Una cucharada
mañana y noche.

4553. M. IODADA.

℞ Iodo. ʒv (25 cent.).
Se disuelve en
Espíritu de vino. ʒij (8 gr.).
Agua de canela. ʒxxx (80 gr.).
Jarabe simple. ʒjv (16 gr.).
M. I. Salivacion mercurial. D.
Cuatro medias cucharadas al dia,
y despues cuatro cucharadas en-
teras.

4554. Otra (GLOSS).

℞ Iodo. ʒvj (3 dec.).
Ioduro de potasio. ʒj (4 gr.).
Se disuelve en
Agua. ʒij (60 gr.).
Se añade:
Tintura aromática. ʒj (4 gr.).
M. I. Escrófulas. D. Tres cucha-
raditas de café al dia en una taza
de agua fria.

4555. M. DE DEUTOIODURO DE
MERCURIO (H. DE M.).

℞ Deutoioduro de mer-
curio. ʒj (5 cent.).
Ioduro de potasio. ʒj (4 gr.).
Agua destilada. ʒvij (270 gr.).
Jarabe simple. ʒj (30 gr.).
Se tritura en un mortero de vi-
drio el deutoioduro de mercurio
con el ioduro de potasio, se di-
suelve y se añade despues el ja-
rabe.

*I. Enfermedades venéreas com-
plicadas con escrófulas. D.* Una
cucharada en una taza de leche ó
agua azucarada.

4556. M. DE IPECACUANA Y CRETA
COMPUESTA (Hooper).

℞ Ipecacuana en polvo. ʒv (25 cent.).
Jarabe de amapola. ʒj (5 gr.).

Espíritu de canela. ʒij (10 gr.).
Mistura de creta. ʒxiiij (50 gr.).
*M. S. A. I. Diarrea y disenteria
crónicas. D.* De una vez, que se
repite cada cuarto de hora.

4557. M. JABONOSA (Fehr).

℞ Aceite de hígado de ba-
calao. ʒj (30 gr.).
Carbon. de potasa líq. ʒij (8 gr.).
Se mezcla y se añade:
Jar. de cásc. de naranja. ʒj (30 gr.).
Esenc. de cálamo arom. 3 gotas.
*I. Afecciones escrofulosas, atro-
fia mesentérica, ciertos casos de
tisis incipiente, raquitis, tumo-
res blancos, tumores glandulo-
sos, etc. D.* Una á dos cucharadas
de café, mañana y noche.

4558. M. JABONOSA PURGANTE
(*Plenck*).

Se prepara del mismo modo
que la mistura resinoso-jabonosa
de Plenck, empleandola jalapa en
lugar del guayaco.
Purga bien y sin producir cóli-
cos á los niños; se da líquida á la
dosis de ʒβ á ʒjβ (2 á 6 gr.) ó seca
á la de ʒx á ʒxx (5 á 10 dec.).

4559. M. LITONTRIPTICA ó Liton-
triptico de Tulp.

℞ Cantáridas. ʒj (4 gr.).
Cardamomo menor. ʒj (4 gr.).
Alcohol de 34º Cartier. ʒj (30 gr.).
Acido nítrico. ʒβ (15 gr.).
Se macera y se filtra.
D. Doce gotas en medio vaso de
agua azucarada.

4560. Otra (DURANDE).

℞ Eter sulfúrico. ʒvij (28 gr.).
Esencia de trementina. ʒjv (16 gr.).
H. S. A. I. Se recomienda por
algunos médicos para fundir los
cálculos biliaris y combatir los
cólicos hepáticos.

Nota. Algunas veces se asocia
al éter la yema y el aceite de hue-
vo. Otras veces se aumenta ó dis-
minuye la proporcion del aceite

volátil de trementina y se le asocia el jarabe de violetas, de diacodion, de amapola ó de cáscara de naranja. *D.* Se usa como la mistura de Whitt, á la que se parece mucho. *V.* n 2195.

4561. M. DE LIEBIG Y WOHLER.

℞ Almendras dulces. ʒij (8 gr.).
 Agua. c. s.
 Amigdalina. ʒxviij (95 cent.).
 Se hace una emulsion con las almendras y el agua y se añade la amigdalina.

Esta mistura contiene ʒj de ácido prúsico anhidro, ʒjxʒ (47 cent.) de ácido prúsico medicinal y ʒviiij (4 dec.) de esencia de almendras amargas. *V. Acido cianhídrico.*

4562. M. DE MAGNESIA AROMÁTICA.

℞ Magnesia. ʒʒ (2 gr.).
 Jarabe de gengibre. . ʒij (8 gr.).
 Se trituran y se añade:
 Agua de yerbabuena de sabor de pimient. ʒijʒ (75 gr.).
 Espiritu de espliego compuesto. ʒʒ (2 gr.).
 Espiritu de alcaravea. ʒʒ (15 gr.).

I. Cardialgia, flatuosidades, etc.
D. Una cucharada de hora en hora.

4563. M. MARINA (Mountain).

℞ Sulfato de magnesia. . . . 10 á 12
 Hidroclorato de magnesia. . . . 4
 Extracto cinárico. 4
 Carbonato de cal. 2
 Cola de Flandes. 3
 Mézclense y divídase en dosis de á ʒij ó ʒiij (60 ó 90 gr.).

D. Una dosis para un baño, al cual se añade de lbj á lbij (500 á 1000 gr.) de sal comun.

4564. M. MERCURIAL (Langembeck).

℞ Deutocloruro de mercurio. ʒj (5 cent.).
 Tintura de opio. . . . ʒj (4 gr.).

Goma arábica en polv. ʒiij (12 gr.).
 Agua destilada. . . . ʒvj (180 gr.).
M. I. Amaurosis por causa reumática. D. Una cucharada, mañana y noche.

4565. M. Ó JARABE MERCURIAL DE PLENCK (H. DE M.).

℞ Azúcar vermífugo,
 Goma arábica, añ. . . . ʒj (4 gr.).
 Jarabe de achicorias con ruibarbo. ʒij (60 gr.).
 Se tritura la goma arábica y el azúcar vermífugo con ʒj (4 gr.) de agua y despues se añade el jarabe. Se la debe agitar para hacer uso de ella.

I. Enfermedades venéreas de los niños. D. Una cucharadita.

4566. M. DE MIRRA ALCALIZADA (Griffith).

℞ Mirra escogida. . . . ʒij (8 gr.).
 Carbonato de potasa. ʒj (4 gr.).
 Se trituran exactamente y se añade:
 Agua de yerbabuena. lbʒ (250 gr.).
 Alcohol de yerbab. ʒjʒ (45 gr.).
 Jarabe de Tolú. . . . ʒj (30 gr.).
 Sulfato de hierro. ʒxx á ʒxxx (10 á 15 dec.).

I. Caquexia hidrópica, clorosis, leucorrea y debilidad que sigue á la fiebre adinámica. D. Cuatro cucharadas tres veces al dia.

4567. M. Ó JULEPE MOSCADO (H. DE M.).

℞ Infusion de azahar. . . ʒvj (180 gr.).
 Agua de canela. . . . ʒj (30 gr.).
 Almizcle. ʒviiij (4 dec.).
 Carbonato de amoniac. ʒij (1 dec.).
 Tintura de castóreo. . ʒj (4 gr.).
 Se mezcla primero el jarabe con la tintura de castóreo, se tritura el almizcle con el carbonato de amoniaco, se añade la infusion y se reúne todo.

I. Es antiespasmódica y se administra especialmente contra el tétanos y las fiebres nerviosas. D. A cucharadas.

4568. M. MOSCADA Y ALCANFORADA ó Julepe moscado.

℥ Alcanfor. ʒβ (2 gr.).
 Almizcle. ʒxviiij (4 gr.).
 Amoniaco líquido. . . . ʒxvj (8 dec.).
 Jar. de cásc. de naranj. ʒj (30 gr.).
 Agua de canela. . . . ʒiij (90 gr.).

M. I. Neuralgias, histérico, calenturas tifoideas y atáxicas, tifo, tétanos, vómitos espasmódicos, cardiopalmia, cardialgia, bronquitis, neumonía, esofagismo, gangrena de hospital. *D.* A cucharadas de hora en hora.

4569. M. DE NAFTA (Hasting).

℥ Nafta rectificada. ʒj (32 gr.).
 Láudano de Sydenham. . ʒij (8 gr.).

I. Tisis pulmonar. *D.* Quince gotas tres veces al día en agua azucarada ó un jarabe.

4570. M. DE NITRATO DE PLATA CRISTALIZADO.

℥ Nitrato de plata cristalizado. ʒβ á ʒj (25 á 50 mil.).

Agua destilada. . . . ʒiij (90 gr.).

Se disuelve y se añade:

Mucilago de salep. . . ʒijβ (75 gr.).

Jarabe diacodion. . . . ʒβ (15 gr.).

M. D. Una cucharada de café cuatro veces al día.

4571. M. NITROSA.

℥ Nitro. ʒijβ (10 gr.).
 Miel pura. ʒv (20 gr.).

Se disuelve en

Agua. lbj (500 gr.).

I. Se usa como atemperante y diurética. *D.* A vasitos, en el día.

4572. M. NITROSA Y OPIADA CONTRA LA DISENTERIA (Hope).

℥ Acido nítrico. ʒj (4 gr.).
 Mistura alcanforada. . ʒiij (90 gr.).
 Tintura de opio. 40 gotas.

H. S. A. I. Disenteria, cólera y diarrea, para calmar la sed y disminuir la intensidad de los dolores. *D.* La cuarta parte, cada tres ó cuatro horas.

4573. M. OBSTÉTRICA (Goupil).

℥ Cornezuelo de centeno en polvo. ʒj (4 gr.).
 Jarabe simple. ʒjβ (45 gr.).
 Espíritu de menta. . . . 3 gotas.
 Mézclese y agítese al tiempo de usarla.

I. Partos laboriosos por inercia de la matriz, hemorragias uterinas. *D.* Una cucharada de diez en diez minutos. Se puede añadir ʒj (30 gr.) de agua de canela.

4574. M. ODONTALGICA.

℥ Alumbre. ʒjv (2 dec.).
 Eter nítrico. ʒxjv (7 dec.).

I. Odontalgia. *D.* Se empapa un poquito de algodón, que se introduce en el hueco del diente cariado.

4575. Otra (H. DE AL.).

℥ Aceite esencial de clavo. 8 gotas.
 Tintura de opio. ʒj (4 gr.).
 Eter sulfúrico. ʒiij (12 gr.).

Mézclese y agítese al tiempo de usarla.

Se aplica sobre el diente cariado un poco de algodón empapado en esta mezcla.

4576. Otra (CARUS).

℥ Tintura de resina de guayaco. ʒijβ (10 gr.).
 Aceite de valeriana. . ʒiij (12 gr.).

Jarabe de coclearia,
 Tintura de benjuí com-

puesta, añ. ʒj (4 gr.).

Láudano líquido. . . . ʒβ (2 gr.).

I. Dolor de muelas. *D.* Una cucharada diluida en media taza de agua caliente, que se tendrá en la boca.

4577. Otra (C. L. CADET).

℥ Eter sulfúrico,
 Láudano líquido,
 Báls. del Comendador, añ. ʒj (4 gr.).
 Esencia de clavo. 20 gotas.

H. S. A. D. Se aplica por medio de un poco de algodón sobre el diente enfermo.

4578. M. ODONTALGICA (*Oudet*).

℥ Eter acético,
Láudano de Sydenham,
Esencia de clavo, ãã. . . 5ß (2 gr.).
Se empapa en este licor un poco de algodón, que se coloca en el diente enfermo.

4579. Otra (TOIRAC).

℥ Alcohol saturado de alcanfor. ʒij (8 gr.).
Báls. del Comendador. ʒx (5 dec.).
Tintura de opio. 30 gotas.
Aceite esene. de menta. 10 gotas.
Se empapa en este líquido un poco de algodón que se introduce en el diente cariado, y se renueva muchas veces al día en las veinticuatro horas para apagar el dolor.

4580. Otra (PIESTE).

℥ Amoniaco líquido. . . ʒv (20 gr.).
Tintura de clavo. . . . ʒijß (10 gr.).
M. I. Odontalgia por caries. D. Se empapa un poco de algodón en rama en el líquido, y se le introduce en la cavidad de la muela. Como obra por el amoniaco se puede usar otra tintura distinta que la de clavo. Obra cauterizando el nervio. Es buen medicamento.

4581. M. OLEOSO-RESINOSA (*Ramm*).

℥ Aceite de ricino. ʒij (8 gr.).
Trementina de alerce. . ʒvj (24 gr.).
Trement. de copaiba. . ʒj (32 gr.).
M. I. Retencion de orina por falta de secrecion. D. Treinta gotas, tres veces al día, en emulsion comun ó en leche. Conviene hacer al mismo tiempo fricciones con esencia de trementina, y dar al enfermo por alimento exclusivo espárragos, rábanos, apio, y por bebida la cerveza.

4582. M. OLEOSA ACIDA (H. DE AL.).

℥ Zumo de limon,
Aceite de linaza reciente, ãã. ʒij (90 gr.).
Extracto de opio. . . . ʒjv (2 dec.).
M. I. Hernias estranguladas. D. Una cucharada cada media hora.

4583. M. PARA CURAR LAS GRIETAS DEL ANO (*Bretonneau*).

℥ Extracto de ratania. . ʒß (15 gr.).
Tintura de ratania. . ʒjv (125 gr.).
Mézclese por trituracion. D. Se administra una ó dos cucharadas de esta mistura en una cuarta parte de lavativa de agua.

4584. M. PARA LAS ENCIAS.

℥ Alcoholato de coclearia compuesto. 4
Tintura alcohólica de quina. 4
Miel rosada. 4
I. Afecciones escorbúticas de las encías. D. Se usa pura ó mezclada con agua.

4585. M. PECTORAL (*Boherhaave*)

℥ Cocimiento de cebada perlada. ʒßß (250 gr.).
Agua dest. de hisopo. ʒjv (125 gr.).
Ojimiél escilítico. . . . ʒiij (90 gr.).
Vinagre escilítico. . . ʒvj (24 gr.).
Sulfato de sosa. ʒj (4 gr.).
H. S. A. I. Afecciones catarrales crónicas, en que es difícil la expectoracion. D. ʒj (30 gr.) cada media hora.

4586. Otra (COTTEREAU).

℥ Liquen islándico no privado de su principio amargo. . . ʒjv (16 gr.).
Agua comun. ʒßß (750 gr.).
Se hierve hasta que se reduzca la tercera parte, se cuela con expresion y se disuelve S. A. en el líquido colado
Azúcar de leche. . . ʒjß (48 gr.).
I. Se usa ventajosamente en el periodo de la tisis pulmonar en

que los enfermos padecen sudores nocturnos excesivos, seguidos de ataques de tos violentos. *D.* Dos cucharadas, tres ó cuatro veces al día.

4587. M. PECTORAL (H. DE AL.).

☞ Sal amoniaco. ℥ij (8 gr.).
Cocim. de malvabisc. ℥xij (375 gr.).
Zumo de regaliz. ℥vj (24 gr.).

M. I. Enfermedades crónicas del pulmon. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

4588. Otra (QUARIN).

☞ Goma amoniaco disuelta en una yema de huevo. ℥ij (8 gr.).
Ojimiél escilítico,
Jarabe de hisopo, ãã. ℥j℔ (45 gr.).
Agua de hisopo. ℔℔ (250 gr.).
Extr. de émula camp. ℥ij (24 dec.).

H. S. A. I. Apoplejía acompañada de tos, con silbido y dificultad de expectorar las materias mucosas muy tenaces que amenazan sufocación. *D.* Una cucharada de media en media hora.

4589. M. PIROTARTRICA CONTRA EL COLERA.

NÚMERO 1.

☞ Mistura pirotátrica. ℥ij (8 gr.).
Tintura simple de opio. ℥℔ (2 gr.).
M. D. Veinte gotas para un adulto.

NÚMERO 2.

☞ Corteza de cascarilla. ℥℔ (6 dec.).
Polvo aromático. ℥jv (2 dec.).
Alumbre crudo. ℥ij (1 dec.).
Opio en bruto. ℥j (5 cent.).
Para una dosis, que se puede repetir cuando sea necesario.

4590. M. DE POTASA (Wendt).

☞ Potasa cáustica. ℥xij (6 dec.).
Agua destilada de cáscara de naranja. ℥j (30 gr.).
Disuélvase. *I.* Afecciones escrofulosas. *D.* Diez á veinte gotas, cuatro veces al día.

4591. M. DE PULSATILA ESTIBIADA (Rust).

☞ Extracto de zumo no depurado de pulsatila. ℥℔ (2 gr.).
Vino emético. ℥℔ (15 gr.).
Disuélvase. *I.* Amaurosis. *D.* Veinte á sesenta gotas, tres veces al día.

4592. M. PURGANTE.

☞ Tintura de jalapa. ℥j (4 gr.).
Azúcar blanca. ℥j (4 gr.).
Aceite de ricino. ℥j (30 gr.).
Maná. ℥j (30 gr.).
Jarabe de rosas. c. s.

I. Cólico de los pintores. *D.* Dos cucharadas de media en media hora.

4593. Otra, n. 2.

☞ Aceite de croton tiglio. 4 gota.
Yema de huevo. ℥ij (8 gr.).
Tritúrense y añádase:
Agua de yerbabuena. ℥j (30 gr.).
Jar. de flor de naranjo. ℥j (30 gr.).
Se da de una vez por la mañana en ayunas.

4594. Otra, n. 3.

☞ Sulfato de sosa. ℥℔ (15 gr.).
Sen mondado. ℥j (4 gr.).
Agua. ℥jv (125 gr.).
Se infunde durante la noche.

I. Embarazo gastro-intestinal mucoso ó bilioso. *D.* De una vez. Puede servir de excipiente el cocimiento de ciruelas.

4595. Otra (ANDRY).

☞ Escamonea en polvo. ℥vj (30 cent.).
Alcoholato de romero. ℥℔ (2 gr.).
Se trituran en un mortero de porcelana y se añade poco á poco:
Agua de flores de naranjo,
Jarabe de flores de albrichigo, ãã. ℥j℔ (45 gr.).
Se da una toma por la mañana en ayunas.

4596. Otra (CHOMEL).

☞ Aceite de alm. dulces. ℥ij (60 gr.).

Jarabe de goma. ℥ij (60 gr.).
 Aceite de croton. 2 gotas.
 Mézclese.

4597. M. PURGANTE CON ACEITE DE RICINO (H. DE M.).

℥ Aceite de ricino. ℥j (30 gr.).
 Agua comun. ℥ij (60 gr.).
 Agua de azahar,
 Jarabe simple, añ. ℥℔ (15 gr.).
 Se mezcla el aceite con una yema de huevo y ℥℔ (2 gr.) de mucílago de goma arábica, se añade luego el jarabe y las aguas.

D. En cuatro veces de hora en hora.

4598. M. DE QUARIN.

℥ Extracto de cicuta,
 Acetato de potasa,
 Extracto de diente de leon, añ. ℥℔ (15 gr.).

Disuélvase en
 Agua de hinojo. ℥vj (180 gr.).

Se añade:
 Jar. de las cinco raic. ℥j (30 gr.).

M. I. Se usa como diurético y sedante; ictericia. D. Dos cucharadas cada cuatro horas.

4599. M. DE QUARIN CONTRA LA HEMOTISIS.

℥ Alumbre. ℥℔ (2 gr.).
 Goma arábica en polv. ℥℔ (15 gr.).
 Inf. de flor. de amap. ℔℔ (250 gr.).
 Jarabe diacodion. ℥j (30 gr.).

H. S. A. I. Calenturas tifoideas, hemotisis pasivas y otras hemorragias de la misma naturaleza. D. Una cucharada de media en media hora.

4600. M. DE QUINA.

℥ Jarabe de quina. ℥j (32 gr.).
 Alcohol de melisa. ℥ij y ℥xviiij (9 gr.).

Extr. blando de quina. ℥j (4 gr.).
 Poción gomosa. ℥jv (125 gr.).

I. Calenturas intermitentes, periodo adinámico de las enfermedades, atonia de los órganos digestivos. D. A cucharadas.

4601. M. REFRIGERANTE (H. DE AL.).

℥ Nitro. ℥℔ (15 gr.).
 Agua pura. ℥vj (24 gr.).
 Se disuelve y se añade:

Vinagre,
 Jarabe de vinagre con frambuesas, añ. ℥j (30 gr.).

M. D. Una cucharada cada dos horas.

4602. M. RESOLUTIVA (Schwartz).

℥ Crémor de tártaro soluble. ℥v (20 gr.).

Extracto blando de diente de leon. ℥ij℔ (10 gr.).

Extracto deceledonia. ℥xc (5 gr.).

Agua destil. de melisa. ℥v (150 gr.).

M. I. Hepatitis crónica. D. Una cucharada cada dos ó tres horas

4603. Otra (CARUS).

℥ Clorhidrato de amoniaco,
 Tintura de arnica, añ. ℥ij℔ (10 gr.).

Agua destil. de ruda. ℥x (300 gr.).

Vinagre de ruda. ℥v (150 gr.).

M. I. Hidrocele de los niños. D. Se la aplica al escroto por medio de compresas.

4604. M RESINOSO-JABONOSA (Plenck).

℥ Alcohol rectificado. ℔℔ (250 gr.).
 Resina de guayaco,

Jabonamigdalino, añ. ℥j (30 gr.).

Disuélvase S. A. I. Reumatismo y gota. D. Se usa esta tintura líquida á la dosis de ℥j (4 gr.) en una bebida apropiada; ó bien se la hace evaporar hasta la sequedad y entonces se da el residuo á la dosis de ℥xviiij (1 gr.) y se llama *extracto resinoso-jabonoso de Plenck*. V. n. 2240.

4605. M. RESOLUTIVA AMONICAL.

℥ Agua dest. de manzan. ℥x (300 gr.).
 Ojimiél simple. ℥ij (60 gr.).

Sal amoniaco,
 Vino emético, añ. ℥ij (8 gr.).

H. S. A. *I.* Fiebres en que hay que combatir éxtasis pertinaces, infartos de las vísceras abdominales, atrofia mesentérica. *D.* Media taza de hora en hora.

4606. M. RESOLUTIVA PARA LOS APARATOS INAMOVIBLES (Larrey).

℞ Alcohol alcanforado,
Extracto de Saturno,
Clara de huevo,
Agua, añ. ℥ij (60 gr.).
Mézclese.

4607. M. DE SABINA ALCANFORADA (Horn).

℞ Sabina. ℥jβ (6 gr.).
Agua hirviendo. ℥v (150 gr.).
Se infunde durante quince minutos, se cuele y se añade:

Alcanfor. ḡvj (3 dec.).

I. Incontinencia de orina á consecuencia de partos laboriosos. *D.* Una cucharada de hora en hora.

4608. M. SALINA SIMPLE (F. P.).

℞ Bicarbonato de potasa. 4
Zumo de limon agrio. c. s.
hasta saturar completamente el ácido.

Agua destilada. 460

Jarabe simple. 46

I. Es antiemética y antiflogística. *D.* Hasta ℥jv (120 gr.).

4609. M. SALINA (H. DE M.).

℞ Cocimiento de cebada. ℥vj (180 gr.).
Crémor de tártaro. . . ℥vj (24 gr.).
Zumo de limon. ℥j (30 gr.).
Nitrato de potasa. . . . ℥j (4 gr.).
Miel depurada. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. *I.* Es aperitiva y refrigerante. *D.* A cucharadas.

4610. M. SALINA FERRUGINOSA (H. DE ING.).

℞ Sulfato de magnesia,
Sulfato de sosa, añ. ℥v (20 gr.).
Sulfato de hierro. . . ḡij (4 dec.).
Agua hirviendo. . . ℥bij (1000 gr.).
M. D. ℥jv á ℥β (125 á 250 gr.)
dos veces al dia.

4611. M. DE SCUDAMORE.

℞ Carbonato de magnes. ℥jβ (6 gr.).
Agua de yerbabuena
de sabor de pimient. ℥jv (125 gr.).
Vinagre de cólchico,
Jarabe simple, añ. . . ℥β (15 gr.).
Mézclese y agítese al tiempo de usarla.

Se da á cucharadas como estimulante y diurética.

4612. M. SEDANTE (Cottereau).

℞ Extracto hidro-alcohólico de puntas de espárragos. ℥j (4 gr.).
Extracto hidro-alcohólico de beleño. . . . ℥β (2 gr.).
Extracto hidro-alcohólico de digital. ḡxviiij (4 gr.).
Hidrolato de hinojo. . . . ℥j (30 gr.).
Esencia de laurel real. 4 gotas.

H. S. A. *I.* Afecciones del corazón, angina de pecho, asma, catarro pulmonar crónico, neurosis, tisis, tos espasmódica. *D.* Quince á treinta gotas, tres veces al dia.

4613. Otra (HARRISON).

℞ Tintura de beleño. . . . ℥j (4 gr.).
Tintura de guayaco. . . . ℥ij (8 gr.).
I. Gastralgia, catarro útero-vaginal, odontalgia. *D.* ḡxviiij á ℥j (1 á 4 gr.) en dos tomas.

4614. M. DE SEN COMPUESTA (H. DE ING.).

℞ Sen,
Menta verde, añ. . . . ℥j (30 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥bij (1000 gr.).
Se infunde, se cuele y se añade:
Sulfato de magnesia, ℥vj (180 gr.).
M. D. ℥ij á ℥jv (8 á 15 gr.).

4615. M. DE SILVIO CONTRA EL VÓMITO DE SANGRE, ó Mistura de opio astringente de Silvio (F. E.).

℞ Agua destilada. ℥ijβ (75 gr.).
Vinagre destilado. . . . ℥β (15 gr.).
Opio puro pulverizado. ḡij (4 dec.).

Se disuelve y se añade:

Coral rojo levigado. . . ʒβ (2 gr.).
Catecú en polvo. . . . ʒβ (6 dec.).
Jarabe simple. . . . ʒj (30 gr.).

I. Detiene el vómito de sangre, la hemotisis, y las hemorragias uterinas. *D.* ʒβ (15 gr.), que se repite por intervalos.

Nota. Cada onza (30 gr.) de esta mistura contiene ʒβ (25 mil.) de opio.

La FORMULA DE LOS H. DE M. se distingue solo de la anterior en que no contiene el opio y se sustituye el jarabe de meconio al jarabe simple.

4616. M. SUDORIFICA.

ʒ Acetato de amoniaco líq. ʒj (30 gr.)
Jarabe de culantrillo. . . ʒij (8 gr.).
Láudano líquido .
Vino emético, ʒā. . . . 20 gotas.

H. S. A. D. Una cucharada de café de hora en hora.

4617. M. CON EL SULFATO DE QUININA TARTARIZADA (*Righini*).

ʒ Sulfato de quinina. . . ʒxviiij (9 dec.).
Acido tártrico. . . . ʒj (12 dec.).
Agua destilada. . . . ʒjv (125 gr.).
Jar. de menta piperit, ʒij (60 gr.).
H. S. A. D. En tres tomas.

4618. M. SULFUROSA (*Cazenave*).

ʒ Jarabe de fumaria. . . ʒij (60 gr.).
Jar. de pensam. silv. ʒjv (125 gr.).
Sulfito sulfur. de sosa. ʒij (8 gr.).

I. Se usa con utilidad en el tratamiento de muchas dermatosis crónicas, y particularmente contra el eczema y liquen. *D.* Dos cucharadas al día.

4619. M. SULFÚRICA (*Tode*).

ʒ Acido sulfúrico debilitado. ʒij (8 gr.).
Jarabe de frambuesas. ʒxjv (56 gr.).

I. Hemorragias pasivas y principalmente la hemotisis. *D.* Una cucharadita de café de hora en hora.

4620. M. TREMENTINADA Y OPIADA (*Rayer*).

ʒ Emulsion comun. . . . ʒij (6½ gr.).

Esencia de trementina. 36 gotas.

Jarabe diacodion. . . . ʒvj (24 gr.).

I. Ceática, lumbago, bocio, reumatismo, neuralgias, parálisis, neuroses, visceralgias, helmintiasis, lepra, gangrena de hospital. *D.* En una sola toma por la noche al acostarse. Se puede aumentar la dosis de la trementina hasta ʒj (4 gr.) sin aumentar por eso la dosis del jarabe diacodion.

4621. M. TÓNICA (*Gall*).

ʒ Tintura de genciana. . ʒjβ (45 gr.)
Tintura de ruibarbo .
Tintura de canela, ʒā. ʒβ (15 gr.).
Tintura anodina. . . . 40 gotas.

M. I. Diarreas y disenterias no inflamatorias y afecciones gastrointestinales de invasion repentina, producidas por el abuso de los helados, frutas rojas, etc., y que se presentan acompañadas de dolores vivos sin calor abdominal. Primer período del cólera esporádico, interin persistan los dolores. *D.* A cucharaditas de café de hora en hora.

4622. Otra (*H. DE AL.*).

ʒ Sulfato de hierro. . . . ʒij (4 dec.).
Acido sulfúrico. . . . ʒx (5 dec.).
Azúcar blanca. . . . ʒj (4 gr.).
Agua comun. . . . ʒj (30 gr.).

Se usa como tónico para los niños. *D.* Una cucharadita de café cada dos ó tres horas.

4623. Otra (*HERGT*).

ʒ Protocloruro de hierr. ʒjv (20 cent.).
Almizcle. ʒv (25 cent.).
Agua destilada. . . . ʒij (60 gr.).
Jar. de cásc. de nar. ʒj (30 gr.).

M. I. Gastromalacia. *D.* Una cucharadita de café cada hora.

4624. Otra (*J. P. FRANK*).

ʒ Mirra escogida. . . . ʒj (4 gr.)
Se tritura en un mortero y se echa poco á poco en
Infusion de manzanilla. ʒvj (180 gr.).

Se añade despues :

Agua de canela. ℥vj (24 gr.).

Sal de Marte. ℥xv (75 cent.).

Jar. de cáse. de naranj. ℥j (30 gr.).

M. I. Tiranteces de pecho que siguen á la lactancia prolongada.

4625. M. TÓNICA Y ESTIMULANTE
(*Ranque*).

℥ Vino de Alicante. 2

Agua de cebada. 1

M. I. Cólera adinámico, afecciones tifoideas. *D.* Una cucharada cada hora.

4626. M. TÓNICA Y ESTIMULANTE
ó *Pocion tónica y estimulante*
(*Dubois*).

℥ Extr. seco de quina. ℥j (4 gr.).

Goma arábica. ℥℔ (2 gr.).

Jarabe de malvabisco,

Jarabe balsámico de

Tolú, ãã. ℥j (30 gr.).

Agua comun. ℥vj (180 gr.).

M. S. A. *D.* Una cucharada de tres en tres horas. Se la vuelve antiespasmódica segun los casos, añadiendo:

Licor anod. de Hoffmann. ℥℔ (2 gr.).

4627. M. DE TREMENTINA
(*Frank*).

℥ Aceite de trementina. ℥℔ (15 gr.).

Eter sulfúrico. ℥ij (8 gr.).

Goma aráb. en polvo. ℥℔ (15 gr.).

Agua destilada de man-

zanilla. ℔bj (500 gr.).

I. Ténia. *D.* Se toma una cucharada llena mañana y noche.

4628. M. TREMENTINADA (*Most*).

℥ Esencia de trementin. ℥℔ (15 gr.).

Azúcar blanca. ℥j℔ (45 gr.).

Se mezcla por trituracion y se añade meneando siempre:

Ag. de yerbab. de sab. de pimienta,

Ag. de cardam., ãã. ℥vj (180 gr.).

I. Neuralgias y principalmente la ceática. *D.* Una cucharada cuatro ó cinco veces al dia durante cuatro semanas.

4629. *Otra* (H. DE SAN JUAN DE DIOS Y H. DE M.).

℥ Trementina. ℥j (4 gr.).

Yema de huevo. . . número 1.

Emulsion comun. . . ℥xij (375 gr.).

Se tritura convenientemente la trementina con la yema de huevo hasta que se haya interpuesto bien, y se añade el líquido por pequeñas porciones.

I. Catarros pulmonares crónicos y tambien de la vejiga. *D.* A cucharadas.

4630. M. TRIACAL (*Dubois*).

℥ Triaca. ℥ij℔ (10 gr.).

Goma aráb. en polvo. ℥j (4 gr.).

Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

Se trituran en un mortero de mármol y se añade poco á poco:

Agua. ℥vij (210 gr.).

I. Es tónica y calmante y conviene en la debilidad de estómago. *D.* A cucharadas.

4631. M. DE VALERIANA LAUDANIZADA (*Richter*).

℥ Tintura de castóreo. . . ℥j (4 gr.).

Tintura de valeriana. . ℥ij (8 gr.).

Láudano de Sydenham. ℔℔ (6 dec.).

M. I. Histérico, espasmos. *D.* Diez á veinte gotas de hora en hora.

4632. M. DE VALERIANA ETEREA
(*Schneider*).

℥ Esencia de valeriana. ℔j (12 dec.).

Eter acético. ℥jv (16 gr.).

M. I. Neuralgias acompañadas de jaqueca, neuralgia facial. *D.* Diez á quince gotas de hora en hora.

4633. M. DE WERLHOF.

℥ Bálsamo del Perú. . . ℥j (4 gr.).

Yemas de huevo. . . número 2.

Se disuelve y se añade:

Extracto de quina. . ℥jv (16 gr.).

Miel rosada. ℥vj (192 gr.).

M. I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* Una cucharada tres veces al día.

4634. M. VERMIFUGA.

℥ Helecho macho. ℥j (30 gr.).
 Agua. ℥jv (125 gr.).

Se hierve, se reduce una tercera parte, se cuele y se añade después de fría :

Eter sulfúrico. ℥j (4 gr.).
 Jarabe de ajénjos. . . ℥j (30 gr.).

M. D. Una cucharada de hora en hora.

4635. M. VOMITIVA (Hufeland).

℥ Polvo de ipecacuana. . ℥j (12 dec.).
 Ojimiél escilítico,

Jarabe de frambuesas.

Agua comun, añ. . . . ℥jv (16 gr.).

M. S. A. Se hace tomar á los niños, que no han llegado aun á la edad de un año, una cucharadita de café hasta que empiece el vómito.

4636. M. DE WHITT.

℥ Eter sulfúrico. ℥j (30 gr.).

Esencia de trementina. ℥℔ (15 gr.).

M. S. A. I. Cálculos biliares. *D.* Se toman durante muchos meses quince ó veinte gotas cada día en una cucharada de agua azucarada, y se bebe después una taza de suero clarificado ó agua de cebada. Debe usarse esta mistura durante muchos años.

MUCILAGOS.**4637. MUCILAGO CANTARIDADO (H. DE AL.).**

℥ Tintura de cantáridas. 4 gotas.
 Mucíl. de goma aráb. ℥jv (125 gr.).

M. I. Gonorrea y leucorrea crónicas. *D.* Una cucharada cada tres horas. Cada cucharada que pesa ℥v (20 gr.) contiene $\frac{5}{8}$ de grano de tintura de cantáridas.

4638. M. DE CARACOLES.

℥ Caracoles de viña. . . . número 4.
 Jarabe simple. ℥vij (28 gr.).
 Agua de flores de naranjo. ℥ij (8 gr.).
 Agua comun. ℥iij (96 gr.).

Se prepara los caracoles del mismo modo que para hacer el caldo; en seguida se corta la carne en pedacitos y se la bate bien durante un cuarto de hora en la cantidad de agua prescrita; se cuele el líquido con expresion por un lienzo claro, y se añade el jarabe y el agua de flores de naranjo.

4639. M. DE GOMA ARÁBIGA (F. F. Y F. P.).

℥ Polvo de goma arábica. ℥j (32 gr.).
 Agua fría. ℥j (32 gr.).

Se divide exactamente en un mortero de mármol.

I. Tiene las mismas propiedades que el agua de goma arábica, aunque mas caracterizadas porque está mas cargado. Generalmente se le prescribe como excipiente ó intermedio. *D.* ℥℔ á ℥j (15 á 30 gr.).

4640. M. DE GOMA TRAGACANTO (F. F. Y F. P.).

℥ Goma tragac. entera. ℥j (32 gr.).
 Agua caliente. ℔℔ (250 gr.).

Se limpia la goma haciendo saltar con un cortaplumas las impurezas que se adhieren á su superficie, se pone en una vasija de loza blanca con el agua prescrita, y se deja en digestion por veinticuatro horas; se cuele con expresion, y se agita el mucílago en un mortero de mármol hasta que

se presente enteramente homogéneo.

I. Posee las propiedades emulsivas de los medicamentos mucilaginosos, mas marcadas que las de la goma arábica; así se le usa con preferencia para hacer pil-doras y suspender medicamentos insolubles en el agua. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

4641. M. DE LINAZA (F. F.).

℥ Semillas de linaza. . . ℥j (32 gr.).
Agua hirviendo. . . ℥vj (192 gr.).

Se digieren durante seis horas meneando de cuando en cuando y se cuele con expresion.

Del mismo modo se preparan los MUCILAGOS DE SEMILLAS DE MEMBRILLOS, ZARAGATONA Ó RAIZ DE MALVABISCO.

Se usa exteriormente en locio-

nes, fomentos ó inyecciones emolientes.

4642. M. DE MUSGO MARINO.

℥ Musgo marino. . . . ℥j (30 gr.).
Agua comun. . . . ℥biiij (1500 gr.).

Se cuece por quince á veinte minutos, se cuele por partes, y exprimiendo por una manga de bayeta se obtienen ℥biiij (1500 gr.) de mucilago.

4643. M. OFTÁLMICO.

℥ Mucilago de semillas
de membrillo. . . . ℥vj (192 gr.).
Flores de zinc. . . . ℥ij (8 gr.).
Mézclese bien.

I. Se emplea para la oftalmia, y las escoriaciones que resultan en la circunferencia del ojo.

ODONTALGICOS.

4644. ODONTINA (Pelletier).

Es una mezcla de magnesia y manteca de cacao aromatizada con esencias.

Es una composicion sólida, de olor y sabor agradables, que tiene la propiedad de blanquear los dientes y conservar su esmalte y prevenir y detener su caries. V. tomo I, página 276.

4645. ODONTALGICO ALCANFORADO (Cottureau, hijo).

℥ Eter sulfúrico. . . . ℥iiij (90 gr.).
Alcanfor,

toda la cantidad que se pueda disolver, á lo que se añade dos ó tres gotas de amoniaco.

Sirve para cauterizar los dien-

tes cariadados y hace cesar inmediatamente la odontalgia. Es buena preparacion.

4646. CIMENTO PARA LOS DIENTES.

℥ Almaciga en lágrimas. . . . c. s. q.
Eter sulfúrico. c. s.

Se echa mayor cantidad de almaciga que de éter, y á los dos dias de maceracion se decanta. La solucion contiene 82 por 100 de resina.

Se empapa una bolita de algodon del grandor de la parte cariada, y se aplica á la cavidad del diente despues de haberla enjugado.

La fórmula del ODONTOIDE DE BILLARD es igual á la anterior y se usa del mismo modo.

OJIMIELES.

4647. OJIMIEL DE AJO.

℥ Vinagre de ajo. 4
Miel blanca. 2

Se cuece hasta la consistencia de jarabe.

I. Catarro crónico, aftas, acne.
D. A cucharadas, tres veces al día en una tisana pectoral.

4648. O. DE CÓLCHICO (F. F.).

℥ Vinagre de colchico. ℔ij (1000 gr.).
Miel. ℔jv (2000 gr.).

Se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuele.

I. Se usa como diurético en las hidropesías, anasarca, hidrotorax, gota, reumatismo. *D.* ℥ij (8 gr.) aumentando progresivamente hasta ℥j (30 gr.), dos veces al día, en un vehículo mucilaginoso.

4649. O. SIMPLE Ó MIEL DE VINAGRE (F. E., F. F. Y F. P.).

℥ Miel buena. ℔jv (2000 gr.).
Vinagre blanco bueno y filtrado. . . ℔ij (1000 gr.).

Se disuelve en una vasija de loza de Talavera, se evapora á fuego lento hasta que espume y tome la consistencia de jarabe y se cuele.

I. Es expectorante y se usa para favorecer la expectoración en los catarros crónicos, asma, etc.; se usa también en las obstrucciones. *D.* ℥j á ℥iij (30 á 90 gr.) solo ó mezclado con el jarabe de goma ó de altea, ó en una bebida apropiada.

4650. O. DE ELÉBORO.

℥ Vinagre de eléboro negro. 4
Miel blanca. 4

Se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuele.

4651. O. ESCILÍTICO ó Miel de vinagre de cebolla albarrana (F. E.).

℥ Vinagre recién preparado de cebolla albarrana. . . . ℔ij (1000 gr.).
Miel clarificada. . . ℔jv (2000 gr.).

Se disuelve en una vasija de loza de Talavera ó en un baño acuoso y se cuele.

I. Es diurético y expectorante, y en algunos casos se le usa como excitante general; se emplea en el asma, catarros crónicos, hidropesías, afecciones reumáticogotosas.

Del mismo modo se prepara, según la F. E., EL OJIMIEL CÓLCHICO Ó MIEL DE VINAGRE DE CÓLCHICO.

4652. O. ESCILÍTICO

(F. F. Y F. P.).

℥ Vinagre escilítico. . ℔ij (1000 gr.).
Miel blanca. ℔jv (2000 gr.).

Se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuele.

I. Albuminuria, pica, enagenación, crup, asma, bronquitis, afecciones reumáticas gotosas. *D.* ℥iij á ℥viij en un vehículo apropiado, tal como la tisana de grama, etc.

4653. O. DE NARCISO DE LOS PRADOS (Van Mons).

℥ Vinagre de narciso de los prados. 4
Miel blanca 4

Se cuece hasta la consistencia de jarabe.

I. Coqueluche y asma convulsivo. *D.* Una cucharadita de café.

4654. O. PECTORAL DE EDIMBURGO.

℥ Miel. ℔℔ (250 gr.).
Goma amoniaco. . . . ℥j (30 gr.).

Raiz de énula campana,

Lirio de Florencia, ã. $\mathfrak{z}\beta$ (15 gr.).

Despues de habermondado, cortado y machacado las raices se las hierven en $\mathfrak{z}\text{xx}$ (625 gr.) de agua hasta que se reduzca á $\mathfrak{z}\text{vij}$ (210 gr.). Por separado se disuelve la goma amoniaco en $\mathfrak{z}\text{ij}$ (90 gr.) de vinagre bueno. Se mezcla esta solucion con el cocimiento de las raices, despues se decanta y se cuele la mezcla por un lienzo muy apretado; por último se añade la miel y se cuece todo hasta la consistencia conveniente.

I. Afecciones catarrales. *D.* $\mathfrak{z}\text{j}$ á $\mathfrak{z}\text{j}\beta$ (30 á 45 gr.) al dia, pura ó en una pocion apropiada.

4655. O. PECTORAL DE LOS DANESSES.

\mathfrak{z} Raiz de énulacampan. $\mathfrak{z}\text{j}$ (30 gr.).

Lirio de Florencia. . . $\mathfrak{z}\beta$ (2 gr.).
Se dividen estas sustancias y se las hierva en $\mathfrak{z}\text{xxxvj}$ (1125 gr.) de agua de fuente. Se cuele el cocimiento y se le añade:

Miel blanca. lbj (500 gr.).

Goma amoniaco disuelta en c. s. de vinagr. $\mathfrak{z}\text{j}$ (30 gr.).

Se pone todo al fuego y se hierve hasta la consistencia de jarabe.

I. Asmas húmedos y catarras pulmonares crónicos. *D.* Una cucharada de cuando en cuando.

4656. O. TARTAROSO.

\mathfrak{z} Crémor de tártaro. . . $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$ (40 gr.).

Miel sin espuma. . . . $\mathfrak{z}\text{v}$ (20 gr.).

M. I. Embarazo de las primeras vias, calenturas biliosas, hidropesías, ascitis. *D.* A cucharadas en un vaso de limonada.

OLEOSACAROS.

4657. OLEOSACARO DE ACEITE DE CROTON TIGLIO (H. DE AL.).

\mathfrak{z} Aceite de croton. 1 gota.

Oleosácaro de canela. . . $\mathfrak{z}\text{j}$ (4 gr.).

Mézclese y divídase en ocho papeles. *I.* Se usa como purgante. *D.* Un papel cada hora, hasta que produzca deposiciones.

4658. O. DE ANIS (F. F.).

\mathfrak{z} Esencia de anis. 1 gota.

Azúcar blanca. $\mathfrak{z}\text{j}$ (4 gr.).

Se trituran en un mortero de mármol, porcelana ó vidrio hasta que estén bien mezcladas.

Se usa como el aceite esencial de anís para aromatizar las pociones tónicas, estomacales y carminativas.

4659. O. GOMOSO para cubrir las pildoras de copaiba ú otro medicamento repugnante.

\mathfrak{z} Azúcar blanca. $\mathfrak{z}\text{iv}$ (125 gr.).

Goma aráb. en polvo. $\mathfrak{z}\text{j}$ (30 gr.).

Esencia de limon, de menta ó cualquiera

otra. 6 gotas.

Se pulveriza el azúcar despues de haber echado la esencia, se cuele por un tamiz de cerda y se mezcla con la goma.

Este oleosácaro debe conservarse para cuando se necesite, en un frasco con tapon esmerilado. Roy reviste con él las pildoras segun el procedimiento ordinario.

4660. O. DE LIMON (F. F.).

\mathfrak{z} Limones recientes. número 4.

Azúcar de pilon en pedaz. $\mathfrak{z}\text{ij}$ (8 gr.).

Se frotran los pedazos del azúcar contra la corteza exterior del limon, hasta separar toda la parte amarilla, y se trituran en un mortero para mezclarlos exactamente.

Del mismo modo se preparan los oleosácaros de BERGAMOTA, CIDRA Y NARANJA.

I. Tienen las mismas propieda-

des que los aceites volátiles de su nombre, y se usan como ellos para aromatizar algunas pociones estomacales, antiespasmódicas y vermífugas.

4661. O. DE MACIS (F. A.).

℞ Macis. ℥j (12 dec.).
Azúcar. ℥j (30 gr.).

Se mezcla triturando en un mortero de vidrio y se conserva en una vasija bien tapada.

4662. O. DE MANZANILLA.

℞ Esencia de manzanilla. . . 24 gotas.
Azúcar. ℥j (30 gr.).

A veces se usa el agua destilada de manzanilla.

4663. O. DE YERBABUENA DE SABOR DE PIMIENTA.

℞ Esencia de yerbabuena de sabor de pimienta. . . . 4 gota.
Azúcar blanca. ℥j (4 gr.).
Mézclese.

Del mismo modo se prepara el OLEO-SÁCARO DE CANELA.

4664. O. DE SANTÓNICO.

℞ Esencia de santónico. . . 6 gotas.
Azúcar. ℥j (4 gr.).
Bouillon Lagrange le aconseja en la medicina de los niños.

D. De una vez.

OPIATAS.

4665. OPIATA ANTIBLENORRÁGICA.

℞ Bálsamo de copaiba. . . ℥jβ (6 gr.).
Azúcar en polvo. ℥x (40 gr.).

Se mezcla y se añade poco á poco:

Jarabe simple,

Mucilago de goma arábica, añ. c. s.

I. Blenorrea, leucorrea, catarro útero-vaginal. D. ℥j á ℥ijβ (4 á 10 gr.) mañana y noche.

4666. Otra (DIDAY).

℞ Extr. alcohólico de cubebas,
Aceite esencial de bálsamo de copaiba, añ. ḡxc (5 gr.).
Jalapa en polvo. ḡLjv (3 gr.).
Pimienta cubebas en polvo c. s., cerca de ℥jβ (6 gr.).

H. S. A. D. En tres tomas en las veinticuatro horas, entre hostias.

Nota. Si se quiere que no obre como purgante, se reemplaza la jalapa por mayor cantidad de cubebas en polvo.

Segun Diday la dosis de la opiata formulada antes, es igual á la de ḡxxxij (16 dec.) de opiata comun, preparada con copaiba y pimienta al natural.

Apenas se alivia la afeccion con este remedio, se reduce la dosis un tercio; pero se continúa administrando el medicamento durante diez dias cuando menos.

4667. O. ANTIDISENTERICA (Spielmann).

℞ Triaca. ℥ij (60 gr.).
Diascordio. ℥ij (60 gr.).
Goma arábica. ℥β (15 gr.).
Bol arménico. ℥iij (90 gr.).

I. Disenteria.

La OPIATA ANTIDISENTERICA BALSAMICA DE SPIELMANN contiene además ℥ij (60 gr.) de bálsamo de Lucatel.

4668. O. ANTIESCORBÚTICA ó Electuario antiescorbútico.

℞ Carbon vegetal en polvo y tamizado. ℥j (30 gr.).
Quina gris en polvo. . . ℥j (4 gr.).
Miel. c. s.

Se usa por medio de un pincel ó de una pluma.

4669. O. ANTIGONORREICA (Douvowistky).

℞ Trementina de copaiba,
Azúcar, añ. ℥jβ (45 gr.).

Mucil. de goma aráb. ℥ij (12 gr.).
 Carmin laca. ℥j (4 gr.)
 Hidroclorato de morfín. ℥x (5 dec.).
 Ag. de menta piperita. c. s.

H. S. A. *I.* Es uno de los mejores y mas eficaces antigonorréicos que se conocen. *D.* ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) al dia, mañana y noche.

4670. O. ANTIGONORREICA (*Pajot Laforet*).

℥ Sublimado corrosivo. ℥iij (15 cent.).
 Goma quino. ℥℔ (15 gr.).
 Goma arábica. ℥j℔ (45 gr.).
 Copaiba. ℥℔ (15 gr.).
 Azúcar. ℥v (150 gr.).
 Agua de menta. c. s.

D. ℥ij (8 gr.) mañana y noche.

4671. O. ANTILEUCORREICA (*Roberto Tomás de Salisbury*).

℥ Incienso en polvo,
 Trem. de copaiba, añ. ℥jv (15 gr.).
 Ruibarbo en polvo. ℥j (4 gr.).
 Genciana en polvo. ℥℔ (2 gr.).
 Conserva de rosas. ℥iij (12 gr.).
 Jarabe de gengibre. c. s.

H. S. A. *D.* ℥j (4 gr.) mañana y noche.

4672. O. ANTILEUCORREICA ó antitblenorragica (*Swediaur*).

℥ Resina de copaiba. ℥j (30 gr.).
 Azúcar en polvo. ℔℔ (250 gr.)
 Mézclase y añádase poco á poco:

Jarabe simple y mucilago de goma arábica. c. s.

H. S. A. una masa homogénea de consistencia de opiata.

D. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) mañana y noche.

4673. O. ANTIODONTÁLGICA.

℥ Extracto de belladona,
 Extracto de beleño,
 Opio, añ. ℥xx (10 dec.).
 Pelitre. ℔℔ (2 gr.).
 Esencia de clavo. 20 gotas.

H. S. A. una masa, que se distribuye en píldoras de á grano (5 cent.).

4674. Otra, n. 2.

℥ Opio,
 Alcanfor, añ. ℥ij (1 dec.).
 Aceite de clavo,
 Tint. de pimiento, añ. 4 gota.
 Hágase pasta.

4675. O. ANTIPERIÓDICA Y TÓNICA.

℥ Antim. diaforét. lavado. ℥j (4 gr.).
 Canela del Malábar. ℔℔ (2 gr.).
 Extracto de enebro. ℥ij (8 gr.).
 Extracto de quina. ℥j (4 gr.).
 Conserva de émula. ℥ij (8 gr.).
 Jar. de achicorias comp. c. s.

H. S. A. *I.* y *D.* En seis tomas durante la apirexia de las calenturas intermitentes, diarrea, pleuresía, escorbuto.

4676. O. ÁRABE.

℥ Zorzaparrilla,
 China,
 Avellana tostada, añ. ℥iij (90 gr.).
 Clavo. ℥jv (120 gr.).
 Miel. c. s.

M. I. Ulceraciones sifilíticas de la garganta, ronquera, escorbuto.
D. ℥ij á ℥jv (8 á 16 gr.).

4677. O. ASTRINGENTE.

℥ Bálsamo de copaiba,
 Cubebas en polvo, añ. ℥j (30 gr.).
 Extracto de ratania ℥j (4 gr.).
M. I. Gonorrea. *D.* ℥j á ℥jv (4 á 15 gr.) al dia.

4678. Otra (*BABEYBAC*).

℥ Conser. de cinosbastos. ℥vj (180 gr.).
 Bellotas de encina secas en polvo. ℥iij (90 gr.).
 Catecú,
 Coral rojo prepar., añ. ℥j℔ (45 gr.).
 Canela. ℥iij (12 gr.).
 Jarabe de rosas secas. c. s.

H. S. A. *I.* Disenteria y diarrea crónicas. *D.* ℥j (4 gr.) cada cuatro horas.

4679. Otra (*ROUCHER*).

℥ Salicaria en polvo. ℥xxx (15 dec.).

Raiz de arnica en polvo. ʒB (2 gr.).
 Alumbre. ʒvj (3 dec.).
 Conserva de cinosbast. . c. s.

I. Disenteria, cuando han cedido los síntomas de irritacion y predominan los signos de atonia y relajacion. D. Se da de una sola vez, que se puede repetir dos veces en las veinticuatro horas, diluida en una tisana apropiada.

4680. O. AZUFRAIDA.

ʒ Azufre sublim. y lavad. ʒvj (24 gr.).
 Miel. c. s.

M. I. Es laxante. Enfermedades cutáneas, estreñimiento en las enfermedades herpéticas. D. ʒB á ʒj (2 á 4 gr.), dos veces al dia.

4681. O. BALSÁMICA.

ʒ Bálsamo de Tolú. . . ʒiij (100 gr.).
 Bálsamo de copaiba. . ʒjB (50 gr.).

Se mezcla por medio de un calor suave, se añade almendras dulces en polvo, y se hace S. A. un electuario.

I. Blenorragias. D. En veinticinco tomas, tres á seis veces al dia.

4682. O. BALSÁMICA ó antigonorréica (Berton).

ʒ Bálsamo de copaiba . . ʒij (60 gr.)
 Cubebas. ʒij (60 gr.).
 Alumbre. ʒj (30 gr.).
 Extracto de opio. . . . ʒvj (3 dec.).

H. S. A. I. Blenorragia, blenorrea, leucorrea, catarro útero-vaginal. D. ʒj (4 gr.) mañana y noche en una ciruela.

4683. O. DE BALSAMO DE COPAIBA.

ʒ Bálsamo de copaiba. . ʒiij (12 gr.).
 Pimienta cubebas. . . ʒB (16 gr.).
 Polvos de jalapa. . . . ʒjB (6 gr.).
 Gutagamba. ʒB (6 dec.).
 Jarabe de rosas pálidas. c. s.

H. S. A. D. Se toma en dos dosis durante el dia.

4684. O. CON EL BALSAMO DE COPAIBA.

ʒ Bálsamo de copaiba. 4

Almendras machacadas no completamente exprimidas. 3
 Mézclese.

4685. Otra, n. 2.

ʒ Bálsamo de copaiba. . ʒB (15 gr.)
 ó Aceite esencial de copaiba ʒij (8 gr.).
 Magnesia inglesa. . . c. s.

H. S. A. una opiata añadiendo: Jabon medicinal. . . . ʒj (12 dec.). Se aromatiza con algunas gotas de esencia de menta.

I. Flujos gonorréicos agudos y crónicos. D. En tres ó cuatro tomas en uno ó dos dias.

4686. Otra (BOUTIGNI).

ʒ Bálsamo de copaiba 4
 Cubebas. 4
 Azúcar. 4
 Mézclese.

4687. Otra (LABELONYE).

ʒ Cubebino impuro (oleholado de extracto resinoso de cubebas). . 4
 Yema de huevo. 4
 Regaliz en polvo. 4
 Malvabisco. 4

4688. Otra (GIBERT).

ʒ Cubebas. 4
 Azafran. 4
 Bálsamo de copaiba. 8

I. Blenorragias agudas ó crónicas. D. El grosor de una avellana muchas veces al dia.

4689. O. CALMANTE.

ʒ Conserva de cinosbastos. ʒij (64 gr.).
 Nitro. ʒvj (24 gr.).
 Sal de Saturno. ʒB (2 gr.).
 Jarabe de culantrillo ó de manzanas. c. s.

I. Contra la salacidad en el hombre y en la mujer. D. ʒB (2 gr.) mañana y noche durante una semana. Se puede añadir alcanfor y láudano.

4690. O. DE CATECÚ.

ʒ Catecú,
 Cascarilla, ãã. ʒijB (10 gr.).

Bálsamo de Tolú. ꝑxc (5 gr.).
 Quina. ꝑB (15 gr.).
 Rob de enebro. c. s.

M. I. Leucorrea, blenorrea, catarro útero-vaginal. *D.* ꝑj (4 gr.) mañana y noche.

4691. O. DE COLOMBO COMPUESTA.

ꝑ Colombo. ꝑv (20 gr.).
 Cascarilla. ꝑijB (10 gr.).
 Macis. ꝑxc (5 gr.).
 Jar. de cásc. de naranj. c. s.

I. Diarrea crónica, disenteria.
D. Tres cucharadas al día.

4692. O. DENTÍFRICA TONICA.

ꝑ Quina roja en polvo. ꝑij (60 gr.).
 Canela en polvo. ꝑj (30 gr.).
 Hueso de jibia. ꝑj (30 gr.).
 Cochinilla. ꝑj (4 gr.).

H. S. A. I. Se aromatiza con c. s. de esencia de clavo.

4693. O. DENTÍFRICA ACIDA DE GOELIN.

ꝑ Alumbre calcinado. lbB (250 gr.).
 Lirio en polvo. lbB (250 gr.).
 Crémor de tártaro. ꝑjv (125 gr.).
 Hueso de jibia. lbB (250 gr.).
 Cochinilla en polvo. ꝑj (30 gr.).
 Jarabe de miel. lbij (1000 gr.).

H. S. A. Se aromatiza con esencia de menta.

4694. O. DENTÍFRICA DE CARBON.

ꝑ Carbon vegetal en polvo. ꝑj (30 gr.).
 Clorato de potasa. ꝑB (2 gr.).
 Agua de menta. c. s.
 para hacer una pasta.

Se deja sin enjuagar la boca durante la noche, y en la mañana siguiente se la lava con el agua dentífrica clorurada.

4695. O. ESTOMACAL (Helvetius).

ꝑ Gengibre confitado. ꝑij (60 gr.).
 Limones confitados,
 Clavo confitado, ãã. ꝑj (30 gr.).
 Opiata de Salomon. ꝑB (15 gr.).

Nuez moscada confitada,
 Canela, ãã. ꝑij (12 gr.).
 Cascarilla. ꝑB (2 gr.).
 Aceite esenc. de clavo. ꝑij (24 dec.).
 Aceite esenc. de canela. 40 gotas.
 Jarabe de claveles. c. s.

H. S. A. I. Se usa como estimulante de los órganos digestivos; es también afrodisíaco. *D.* Desde ꝑj á ꝑj (12 dec. á 4 gr.).

4696. O. FEBRÍFUGA.

ꝑ Diaprunis solutivo,
 Jarabe de flores de albérchigo,
 Quina roja en polvo, ãã. ꝑj (30 gr.).
 Sal amoniaco. ꝑj (12 dec.).
H. S. A. y dividase en doce tomas. *D.* Una toma, mañana y noche.

Nota. Una hora despues de la ingestion de cada toma se da un caldo.

4697. Otra (LESCURE).

ꝑ Quina amarilla en polv. ꝑB (15 gr.).
 Canela. ꝑj (12 dec.).
 Polvo de cardo estrellado,
 Polvo de manzanilla romana,
 Polvo de valeriana,
 Polvo de ajénjos,
 Polvo de centaurea menor, ãã. ꝑj (4 gr.).
 Miel. c. s.

Se prepara *S. A.* una opiata, que se divide en cuatro partes iguales.

I. Calenturas intermitentes en los días libres de acceso. *D.* Se da este remedio tres veces al día.

4698. Otra (TISSOT).

ꝑ Polvo de centaurea,
 Polvo de mirra,
 Polvo de ajénjos,
 Conserva de enebro, ãã. ꝑj (30 gr.).
 Jarabe de ajénjos. c. s.
 para hacer una opiata espesa.
D. ꝑij (8 gr.).

4699. O. DE GENGIBRE.

ꝑ Incienso,
 Bálsamo de copaiba, ãã. ꝑB (16 gr.).

Ruibarbo. ʒj (4 gr.).
 Genciana. ʒʒ (2 gr.).
 Conserva de rosas. . . ʒijʒ (10 gr.).
 Jarabe de gengibre. . . c. s.

I. Broncorrea, leucorrea. *D.* ʒj á ʒijʒ (4 á 10 gr.) mañana y noche.

4700. O. DE MARTINIER.

ʒ Electuario lenitivo. . . ʒij (60 gr.).
 Crémor de tartaro,
 Ruibarbo en polvo, ãã. ʒʒ (15 gr.).
 Bálsamo de copaiba. . ʒjʒ (45 gr.).
 Jarabe de rosas. c. s.

H. S. A. una opiata. *I.* Gonorreas rebeldes. *D.* ʒj (4 gr.) mañana y noche.

4701. O. MESENTÉRICA.

ʒ Goma amoniaco. ʒʒ (16 gr.).
 Limaduras de hierro porfirizadas. ʒʒ (16 gr.).
 Sen. ʒvj (24 gr.).
 Ruibarbo,
 Polvos cornachinos, ãã. ʒiij (12 gr.).
 Calomelanos,
 Raiz de yaro,
 Acíbar, ãã. ʒij (8 gr.).
 Jarabe de manzanas compuesto. c. s.

I. Infartos viscerales ó mesentéricos, amenorrea. *D.* ʒʒ á ʒj (2 á 4 gr.) como purgante, y ʒj á ʒvj (5 á 30 cent.) repetidos muchas veces al dia como emenagogo. Este electuario se ennegrece y endurece con el tiempo, pero se reblandece con un poco de jarabe.

4702. O. DE MICHU.

ʒ Triaca. ʒj (30 gr.).
 Extracto de quina. ʒij (8 gr.).
 Ext. acuoso de opio. ʒxv (75 cent.).

H. S. A. *I.* Enfermedades crónicas de los pulmones. *D.* Se toma la dosis indicada en una ó dos veces en las veinticuatro horas.

4703. O. NAPOLITANA.

ʒ Guayaco en polvo,

Zarzaparrilla en polvo,
 Raiz de china en p., ãã. ʒʒ (15 gr.).
 Sen mondado,
 Ruibarbo escogido, ãã. ʒij (8 gr.).
 Protocloruro de mercurio,
 Jalapa, ãã. ʒjʒ (6 gr.).
 Escamonea. ʒj (12 dec.).
 Jar. de rosas solutivo. c. s.
H. S. A. una opiata.

I. Enfermedades venéreas antiguas, afecciones reumáticas y enfermedades herpéticas complicadas con vicio sífilítico. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) por la mañana en ayunas.

4704. O. PARA DILATAR LA PUPILA.

ʒ Alcanfor. ʒj (12 dec.).
 Aceite de alm. dulces. c. s.

Se disuelve y se incorpora:

Extr. de belladona. . ʒij (8 gr.).

Se añade á la mezcla:

Ungüento napolitano. ʒij (8 gr.).

D. Se usa en unturas, en los párpados, cejas y sienes.

4705. O. PECTORAL.

ʒ Culantrillo,
 Pulmonaria, ãã. 2 puñados.
 Agua. c. s.

Se hierve para obtener lbjv (2000 gr.) de cocimiento, al que se añade al fin dos puñados de flores secas de tusilago. Se disuelve en este licor:

Azúcar blanca. lbv y ʒv (2650 gr.).

Se hace un jarabe al que se añade:

Pulpa de malvab. ʒxliij (1300 gr.)

Pulpa de énula,

Pulpa de pasas, ãã. ʒxiiij (330 gr.).

Se cuece hasta la consistencia de electuario y se añade aún:

Opio puro. ʒj (4 gr.) triturado con igual cantidad de azúcar.

Una onza (30 gr.) de esta preparacion contiene ʒ³/₅ (3 cent.) de opio.

Se podría preparar muy bien este medicamento bajo la forma de pasta.

4706. O. SULFURO-MAGNESIANA
(*Mialhe*).

℞ Azufre lavado. 40
 Carbonato de magnesia. 20
 Miel de Narbona. 60

M. I. Estreñimiento que acompaña á ciertas enfermedades herpéticas de los niños.

4707. O. TREMENTINADA.

℞ Magnesia calcinada. ḡLx (30 dec.).
 Mézclese en un mortero de porcelana con
 Esencia de trementina. ʒj (4 gr.).
 Esencia de yerbabuena. 8 gotas.

M. I. Neuralgias. *D.* El volúmen de una nuez tres veces al día.

4708. O. TÓNICA CALIBEADA.

℞ Oxido negro de hierro. ʒB (2 gr.).

ó Limaduras de hierro. . ʒijB (10 gr.).
 Quina,
 Ruibarbo, ãã. ḡxc (5 gr.).
 Sulfato de potasa. . . . ʒB (2 gr.).
 Rob de énula,
 Miel, ãã. ʒB (15 gr.).
M. I. Caquexia, diarrea, escorbuto, bocio, amenorrea, espasmos, estomacace, calenturas intermitentes. *D.* ʒB (2 gr.) mañana y noche.

4709. O. VERMIFUGA (*Chirac*).

℞ Etíope mineral,
 Semillas de hipericon,
 Semillas de ruda,
 Semillas de ajenjos,
 Semillas de tanac., ãã. ʒB (15 gr.).
 Jarabe de ajenjos. . . . c. s.

D. ʒB (2 gr.) mañana y noche con un cocimiento de helecho macho.

OXICRATOS.

4710. OXICRATO DE ANDRIA.

℞ Vinagre. ʒij (60 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).

M. D. Un vaso cada tres ó cuatro horas.

4711. OXICRATO (H. DE M.).

℞ Agua comun. lbij (1000 gr.).
 Vinagre. lbj (500 gr.).

M. I. Inflamacion por causa externa, como contusiones, fracturas, dislocaciones, equímosis, enfermedades escorbúticas, etc.

PANES.

4712. PANES MEDICINALES.

Se preparan con carbonato de protóxido de hierro, con bicarbonato de sosa, óxido de zinc, nitrato de bismuto, etc.

4713. P. DE ANIS (*Sainte Marie-aux-Mines*).

℞ Harina blanca de primera calidad,
 Azúcar blanca pulverizada, ãã. lbj (500 gr.).

Semillas de anis verde enteras, ãã. . . . ʒij (60 gr.).
 Claras de huevo. . . . número 4.
 Yemas de huevo. . . . número 2.
 Aceite de tártaro por deliquio, una cucharada de café.

Se amasa todo exactamente, despues se da la forma de panes, que se dejan aún doce ó veinticuatro horas sobre el horno de un panadero antes de meterlos en él.

Nota. Esta fórmula, dada por Jacquemin, boticario en Schirmeck (Vosgos), es la que se sigue

en Sainte-Marie; los panes de anís de esta ciudad deben su superioridad sobre los preparados por los confiteros de otras ciudades al uso del aceite de tártaro.

Esta fórmula tiene analogía con el pan de especias.

4714. P. FERRUGINOSO (*Louvel*).

Se prepara añadiendo ℞j (12 dec.) de subcarbonato de hierro á cada ℥jv (125 gr.) de pan.

Se usa como tónico en los casos de amenorrea, escrófulas, clorosis, etc.

4715. P. DE LACTATO DE HIERRO (*Boissiere*).

Se añaden ḡv (25 cent.) de lac-

tato de hierro á la pasta de medio pan. Es una preparacion muy eficaz.

4716. P. DE ESPECIAS.

℥ Anís.	℥B	(15 gr.).
Cilantro.	℥B	(15 gr.).
Clavo.	℥B	(2 gr.).
Canela.	℥B	(2 gr.).
Carbonato de pota.	ḡxc	(5 gr.).
Agua.	℔bj	(500 gr.).
Harina.	℔xxx	(10000 gr.).
Miel.	c. s.	

H. S. A una pasta que se dividirá en partes iguales, que se barnizarán con yema de huevo y se cocerán como el pan de anís.

PAPELES. TAFETANES.

4717. PAPEL.

Se aplica el papel blanco mojado en aguardiente sobre las escoriaciones de las piernas, á consecuencia de una contusion. El papel blanco cortado en pedacitos y puesto en un frasco bien tapado con ácido nítrico ó agua fuerte, forma un cáustico (*mantequilla de papel*) eficaz para destruir los lobanillos y verrugas.

El pápel que ha servido en las hojas ó panes de oro, sirve para reunir los bordes de la incision de una sangría.

4718. PERCALINA AGLUTINANTE ó *Espadrado de cola de pescado.*

℥ Masa para tafetan de Inglaterra. c. s.
Se extiende sobre percalina blanca ó negra. Se adhiere con fuerza á la piel, principalmente cuando se la sumerge en agua tibia.

1. Heridas consecutivas á las amputaciones ó diversas operaciones; y cuando se desea obtener

su adherencia inmediata. Es preferible al diaquilon por ser mas fácil de trasportar y no se pega ni se hiende.

4719. P. DE CAUTERIO.

℥ Cera amarilla,	
Pez resina, añ.	℥jv (125 gr.).
Trement. de Venecia.	℥ij (60 gr.).
Bálsamo del Perú.	℥j (4 gr.).

Se liquida á fuego lento, se cue-la al través de una tela un poco tupida y se extiende sobre tiras de papel.

4720. P. DE CAUTERIO ó *Papel de Michaleskul* (*Buchner*).

℥ Euforbio.	6
Alcohol absoluto.	125
Se disuelve y se digiere:	
Cantáridas en polvo.	12

Se añade :
Trementina de Venecia. 6
Se empapan en esta solucion los pedazos de papel y se dejan secar al aire.

4721. P. DE MOHE.

℥ Alcohol fuerte.	150
---------------------------	-----

Cantáridas en polvo. 8
 Euforbio. 2
 Se digiere durante algun tiempo,
 se filtra, y se añade á la solucion:
 Trementina de Venecia. 45
 Resina. 60
 Se extiende en capas delgadas
 sobre papel, ínterin la mezcla es-
 tá caliente.

4722. P. DE CAUTERIO
 (F. DE WURT.).

℥ Euforbio. 4
 Cantáridas en polvo. 48
 Espíritu de vino. 125
 Se digiere y se añade:
 Brea. 210
 Resina. 90
 Trementina. 6
 Aceite de linaza. 5

Se evapora hasta la consistencia
 de cerato y se extiende la mezcla
 sobre papel por medio del espa-
 drapero.

4723. P. DE CAUTERIO ó
encerado.

℥ Cera blanca. 100
 Esperma de ballena. 50
 Resina elemí. 50
 Trementina fina. 60
 Esencia de limon. c. s.

Se liquida estas tres sustancias,
 se cuele por un lienzo, y se echa
 sobre hojas de papel alisado en-
 tre las dos reglas del espadra-
 pero.

Es muy bueno para mantener
 los guisantes de cauterio, y pre-
 ferible á las hojas de yedra que
 no es fácil adquirir, se secan ó se
 arrugan sobre la piel y á veces
 causan dolor.

I. Flegmasias, dispepsia, a-
 blactacion.

4724. P. DERIVATIVO (Pirwitz).

℥ Polvo de cantáridas. ℥B (45 gr.).
 Resina de guayaco. ℥iij (90 gr.).
 Gálbano. ℥iij (90 gr.).
 Alcohol. ℥vj (180 gr.).

Se digiere durante ocho dias y
 se añade:

Resina de pino. . . . ℥ijB (75 gr.).
 Resina de alerce. . . . ℥j (30 gr.).

H. S. A. Se aplica este barniz
 sobre papel, y se dará varias
 manos.

I. Dolores pleuríticos, dolores
 reumáticos crónicos. Se usa en los
 mismos casos que los emplastos
 de pez de Borgoña.

4725. P. DERIVATIVO DE ALEMA-
NIA ó Papel antireumático.

℥ Colofonia negra. 300
 Cera amarilla. 100
 Pez naval flúida. 200

H. S. A. Se extiende esta mez-
 cla, despues de haberla liquidado
 á fuego lento, en capas delgadas
 sobre pedazos de papel prolon-
 gado.

4726. P. DERIVATIVO REUMÁTICO
(Berg).

℥ Cantáridas. ℥B (45 gr.).
 Euforbio. ℥j (30 gr.).
 Alcohol. ℥v (150 gr.).

Se digiere durante ocho dias, se
 cuele y se añade:

Colofonia. ℥ij (60 gr.).
 Trementina. ℥ijB (45 gr.).

Se cubre el papel con tres capas
 de esta mezcla.

I. Neuralgias, dolores artríti-
 cos, reumatismo, ceática, lum-
 bago. *D.* Se aplica á la parte do-
 lorida.

4727. P. EPISPÁSTICO.

Se extiende la mezcla que sir-
 ve para preparar el tafetan veji-
 gatorio sobre papel vitela por me-
 dio del espadrapero; si se quie-
 re cubrir las dos superficies, se
 extiende la materia sobre hojas
 de papel sin cola, que se colocan
 encima de un escalfador para man-
 tener la materia fundida todo el
 tiempo necesario á fin de exten-
 derla con uniformidad.

Sirve para promover la supuración de los vejigatorios.

4728. P. ESPADRÁPICO (Duclos).

- ℥ Galipodio. ℔v (2500 gr.).
- Resina amarilla. . . ℔jv (2000 gr.).
- Cera amarilla. . . . ℔v (2500 gr.).
- Esperma de ballena. ℔ij (1000 gr.).

Se liquida á fuego lento, se cue- la al través de una tela un poco apretada y se extiende S. A. so- bre tiras de papel.

4729. P. EPISPÁSTICO (Veeé).

NÚMERO 1.

- ℥ Cantáridas. ℥xxx (625 gr.).
- Manteca de cerdo. ℔viiij (4000 gr.).
- Cera muy blanca. ℔jv (2000 gr.).

NÚMERO 2.

- ℥ Cantáridas. ℔ij (1000 gr.).
- Ungüento de yerba- mora. ℔xvj (8000 gr.).
- Cera blanca. . . . ℔jv (2000 gr.).

NÚMERO 3.

- ℥ Cantáridas. ℔iiij (1500 gr.)
- Manteca dada de colorconancusa. ℔xvj (8000 gr.).
- Cera blanca. ℔jv (2000 gr.).

Se aplica diariamente á los veji- gatorios ó fuentes, para mante- nerlos en supuración.

Se prepara del mismo modo que la POMADA EPISPÁSTICA AMARILLA.

4730. P. EPISPÁSTICO DE CANTA- RIDAS.

- ℥ Cantáridas en polvo grueso. . . 70
- Manteca purificada. 260
- Sebo purificado. 260

Se digiere en el baño maría du- rante tres ó cuatro horas á la tem- peratura del agua hirviendo, se cue- la con expresión, se liquida de nuevo y se añade:

- Cera amarilla. 60

Se agita la mezcla hasta que es- té medio fría, y se aplica esta preparacion al papel, como se acostumbra con las demás.

4731. P. Y TAFETAN EPISPÁS- TICOS (Beral).

NÚMERO 1.

- ℥ Cera blanca. 20
- Aceite comun. 12
- Manteca de cacao. 16
- Esperma de ballena. 12
- Trementina. 4
- Cantáridas. 4
- Aguá. 32

NÚMERO 2.

- ℥ Cera blanca. 15
- Aceite comun. 10
- Manteca de cacao. 12
- Esperma de ballena. 9
- Trementina. 3
- Cantáridas. 4
- Aguá. 32

Se liquidan, se sumergen las ti- ras de tafetan ó tela fina, ó se ex- tiende en tiras de papel.

Se usan para curar los vejigato- rios y reemplazar las pomadas epispásticas.

Nota. Se puede establecer fuen- tes con guisantes sumergidos dife- rentes veces en una mezcla de Tint. etérea de cántar. ℥j (30 gr.). Extracto alcohólico de corteza de torbisco, Alcohol rectificado, añ. ℥jv (120 gr.).

4732. P. EPISPÁSTICO Ó VEJIGA- TORIO ó Espadrapo epispástico.

NÚMERO 1.

- ℥ Cera blanca. 240
- Esperma de ballena. 90
- Aceite comun. 120
- Trementina. 30
- Cantáridas en polvo. 30
- Aguá. 300

NÚMERO 2.

- ℥ Cera blanca. 240
- Esperma de ballena. 90
- Aceite comun. 120
- Trementina. 30
- Cantáridas en polvo. 40
- Aguá. 300

NÚMERO 3.

- ℥ Cera blanca. 240
- Esperma de ballena. 90

Aceite comun. 120
 Trementina. 30
 Cantáridas en polvo. 50
 Agua. 300
 Se hierve lentamente agitando y se cuele. Con esta mezcla se cubren las tiras de papel.

4733. P. EPISPÁSTICO DE TORBISCO.

℥ Corteza de torbisco en pedazos pequeños. 130
 Agua. 800
 Se hierve hasta que se reduzca á 400 partes de cocimiento fuerte; se cuele con expresion y se mezcla al cocimiento hirviendo:
 Manteca purificada. 260
 Sebo purificado. 260
 Se evapora en baño maría toda la humedad y se añade:
 Cera amarilla. 60
 Se agita la mezcla hasta que esté medio fria y se empapan tiras de papel de cola, de treinta á cuarenta líneas de ancho y de todo el largo de la hoja; y segun que es las saque de la mezcla fundida al fuego, se las pasa entre dos reglas de hierro calentadas.

4734. P. PARA DESTRUIR LAS MOSCAS (*Wilsin*).

℥ Arseniato de potasa ó sosa. 1
 Azúcar blanca. 2
 Agua. 20
 Disuélvase y empátese en la solucion hojas de papel un poco fuerte, de cola, y despues se cuelga para que se seque. Se coloca un poco de papel en un plato y se le humedece con algunas gotas de agua, que se renovará segun se seque.

Tiene el inconveniente de que las moscas tardan un poco en morir, y sus deposiciones manchan los puntos en que se paran.

4735. TAFETAN VEJIGATORIO.

℥ Cantáridas en polvo. ℥x (300 gr.).

Euforbio en polvo. . ℥j (30 gr.).
 Alcohol á 90° c. . . . ℔ij (1000 gr.).
 Se introducen las cantáridas y el euforbio en un matraz; se vierte en él el alcohol y se tapa libremente. Se coloca el matraz en agua, se le calienta de modo que hierva el alcohol, se deja enfriar, se decanta, se filtra y se hace un segundo cocimiento con

Alcohol á 90° c. . . ℔j (500 gr.).
 Se deja enfriar, se decanta, se exprime el residuo, se filtra y se destila para obtener la mayor cantidad posible de alcohol.

Cola de pescado. . . ℥j (30 gr.)
 Agua. c. s.

Se pone la cola de pescado en un vaso con agua, se la deja hinchar durante doce horas, y se calienta para disolverla; se cuele, se añade este hidrolado al alcoholado de cantáridas y se evapora para obtener ℥xij (375 gr.) de licor.

Se toma un pedazo de tafetan negro ó verde de tres cuartas de ancho por vara de largo, se extienden en él diversas veces por medio de un pincel las ℥xij (375 gr.) de licor, y despues de seca la materia vexicante se extiende una capa de alcoholado de benjuí con una parte de benjuí y tres de alcohol á 88° c.

Este tafetan se conserva mucho tiempo, para lo que basta arrollarle con papel y cubrirle. Para alcanforarle se extiende encima por medio de un pincel dos capas de alcohol á 90°, saturado de alcanfor.

4736. Otro (DUBISSON).

℥ Extracto hidroalcohólico de cantáridas preparado por maceracion. 4
 Gelatina pura. 1
 Agua. c. s.
 Se disuelve la gelatina en c. s. de agua, y se diluye el extracto hidroalcohólico para obtener una solucion poco cargada.

Se extiende sobre un hule por

medio de un pincel, y se le da diferentes veces de modo que se extienda con igualdad.

4737. Otro (DELOCHE).

Se agota las cantáridas por la esencia de trementina rectificada, se añade resina y cera amarilla, y se extiende en un tafetan. Antes de aplicar el vejigatorio, se extiende una gota de aceite por su superficie.

4738. T. VEJIGATORIO ó Espadrapo vejigatorio (Guilbert).

℥ Corteza de torbisco. ʒj (30 gr.).
 Agua. ℔jv (2000 gr.).

Se hierve, se cuele y se añade:
 Cantáridas,

Mirra,

Euforbio, añ. ʒj (30 gr.).

Se funde, se cuele, se evapora y se extiende con un pincel.

l. Vejigatorios, fuentes. *D.* Se aplica repetidas veces.

4739. T. VEJIGATORIO (F. F.).

℥ Polvo de cantáridas. ℔ij (1000 gr.).
 Eter sulfúrico. c. s.

Se prepara una tintura etérea de cantáridas por lixiviacion, se destila para sacar el éter, y el residuo será un aceite espeso muy epispástico: tómese de este:

Aceite de cantáridas. ʒjv (125 gr.).

Cera amarilla. ℔ß (250 gr.).

Se licua á un calor muy suave, y se extiende sobre un hule. Este espadrapo debe prepararse en cortas cantidades, y guardarsê en un frasco bien tapado.

Se usa en los mismos casos que el de cantáridas y conviene principalmente á los niños y á las mujeres de piel fina, cuando no urge obtener una vexicacion pronta y enérgica.

l. Se usa como rubefaciente, vexicante y revulsivo. Reumatismo, ceática crónica, parálisis, bocio, isquidriosis.

4740. Otro (TIERRY).

℥ Euforbio en polvo. c. s. q.

Alcohol de 21° Cart. c. s.

Se hace una tintura saturada, y se extienden cuatro capas sucesivas sobre una tela encerada, procurando dejar secar una antes de aplicar otra; despues se extienden otras dos con la preparacion siguiente:

Bálsamo de Tolú. 1

Cantáridas en polvo. 2

Eter sulfúrico. 8

Se humedece este tafetan con un poco de alcohol para que se pegue bien.

4741. P. VEJIGATORIO ó Espadrapo epispástico.

NUMERO 1.

℥ Cera blanca. 240

Esperma de ballena. 90

Aceite comun. 120

Trementina. 30

Extracto etéreo de torbisco. . . 15

NUMERO 2.

℥ Cera blanca. 240

Esperma de ballena. 90

Aceite comun. 120

Trementina. 30

Extracto etéreo de torbisco. . . 20

NUMERO 3.

℥ Cera blanca. 240

Esperma de ballena. 90

Aceite comun. 120

Trementina. 30

Extracto etéreo de torbisco. . . 30

H. S. A.

4742. P. Y TAFETAN VEJIGATORIO (Beral).

℥ Cera blanca. 18

Aceite comun. 9

Galipodio. 21

Extracto alcohólico de torbisco. . 4

Alcohol de 31° Cart. 6

Se funde la cera y el aceite, y se añade la solucion alcohólica del extracto. Se evapora el alcohol á fuego lento, se añade el galipodio y se cuele por una tela de lana.

Se impregna de esta mezcla el papel, la tela ó el tafetan por uno ó los dos lados; el papel por medio del espadrapero, y la tela y el

tafetán por el método adoptado para preparar la tela de mayo.

Se obtiene el papel núm. 2, que es más activo, usando la siguiente fórmula:

℥ Excipiente anterior.	32
Extracto de torbisco.	4
Alcohol de 31° Cart.	6

H. S. A.

EL PAPEL EPISPÁSTICO DE ALBESPEYRES es, según su propietario, la pomada epispástica de la F. F. extendida sobre un papel.

4743. T. VEJIGATORIO.

Se concentra en una retorta la tintura alcohólica de cantáridas; cuando está muy concentrada, se la extiende por medio de un pincel y en caliente sobre tafetán estirado por medio de un bastidor. Se deja secar el tafetán y se le cubre de una segunda capa y después de otra tercera.

4744. Otro, n. 2.

℥ Eter acético. ℥ij (60 gr.).
Cantáridas en polvo. ℥j℞ (45 gr.).

Se infunden durante ocho días, se decanta y se disuelve:

Colofonia. ℥ij (8 gr.).

Se aplica sobre un hule.

4745. Otro (COLDEFY-DORLY).

℥ Manteca fresca. ℥jv (125 gr.).

Cera blanca lavada en agua hirviendo. 5vj (24 gr.).

Esperma de ballena. ℥jv (16 gr.).

Se liquida á fuego lento, se mezcla exactamente y después se añade:

Res. verde de torbisco. ℥j (12 dec.).

Se extiende una capa de esta pomada un poco caliente sobre papel de seda; se presenta el papel al fuego para que se empape, se aplican del mismo modo otras dos capas, no presentando la última vez el papel al fuego sino resbalando, para que fundiéndose solo la superficie adquiriera un lustre que indique el lado por el cual debe aplicarse.

Nota. Coldefy-Dorly prepara dos papeles vejigatorios, núm. 1.º y núm. 2.º; el primero con ℥j (12 dec.) de resina, y el segundo solo con ̄xxviiij (1 gr.).

Coldefy-Dorly prepara del modo siguiente la *resina verde de torbisco*.

Corteza de torbisco. ℥bvj (3000 gr.).

Se machaca esta corteza en un mortero de hierro, humedeciéndola con alcohol hasta que presente una masa sedosa sin aspecto de corteza; se pone esta masa en baño maría con

Alcohol á 36°. . . ℥bvj℞ (3250 gr.).

Se calienta casi hasta la ebullición, después se deja enfriar casi completamente y se exprime con fuerza. Se repite la maceración segunda y aun tercera vez con nuevo alcohol, disminuyendo cada vez dos cuartillos; se reúnen y se filtran las tinturas; se destilan las tres cuartas partes del alcohol en el baño maría, se aparta del fuego, se deja enfriar un instante, se filtra y se pone á parte el producto; se reduce el líquido colado á cerca de las tres cuartas partes por la ebullición; después se deja enfriar, se decanta y se arroja el líquido; se pone el precipitado en un frasco con dos ó tres onzas de éter hidrático y se agita; se trata del mismo modo la resina que ha quedado sobre el filtro, se repite la loción hasta que el éter no se tiña ya de verde, se reúnen las tinturas y se las evapora lentamente en el baño maría.

4746. P. VEJIGATORIO ó Vejigatorio de Trousseau.

Se empapa un papel de filtros del grandor y forma del vejigatorio que se quiere establecer en extracto etéreo de cantáridas, y se evapora hasta la consistencia de jarabe. Se aplica sobre un pedazo de espadrapo, cuyos bordes so-

bresalgan un poco de la circunferencia del papel de filtros. A las siete ó diez horas de la aplicacion se levanta la epidermis. Esta clarencia del papel de filtros. A las siete ó diez horas de la aplicacion se de vejigatorio produce buenos efectos.

PASTAS.

4747. PASTA DE ALMENDRAS.

- ℥ Alm. dulc. en polvo. ℥ij (1000 gr.).
- Harina de arroz. . . ℥jv (125 gr.).
- Lirio de Florencia. . ℥jv (125 gr.).
- Anacardo en polvo,
- Jabon en polvo, ãã. ℥j (30 gr.).
- Esencia de rosas. . c. s.

Mézclese exactamente. Se usa como cosmético.

**4748. P. DE ALMENDRAS ó Lini-
mento amigdalino.**

- ℥ Almendras dulces. . ℥jx (270 gr.).
 - Piñones dulces. . . . ℥iij (90 gr.).
- Se machacan y se añade á la masa:

Yemas de huevo. . . . número 6.

I. Sirve para mantener suave la piel y preservarla de grietas.

4749. Otra (FRAQUER).

- ℥ Goma. ℥ij (60 gr.).
 - Miel blanca. ℥vj (180 gr.).
- Se mezclan en un mortero de mármol y se añade:

Jabon blanco de potasa y néutro. . . ℥iij (90 gr.).

Hecha la mezcla se incorpora poco á poco:

Aceite de almendras. ℥ij (1000 gr.).

Yemas de huevo. . . número 5.

Leche de pistachos preparada con agua de rosas. . . . ℥jv (125 gr.).

Si se quiere que tenga mas color verde, se añade aceite cargado de clorofila de espinacas. Se aromatiza con 3β (2 gr.) de esencia de almendras amargas por ℥bj (500 gr.).

Es un jabon cosmético.

**4750. P. DE ALMENDRAS PARA LAS
MANOS.**

- ℥ Almendras. 1500

- Harina de arroz. 250
 - Lirio. 250
 - Benjuí. 60
 - Sal de tártaro. 60
 - Esperma de ballena. 60
 - Esencia de espliego. 3
 - Esencia de clavo. 3
 - Esencia de palo de Rodas. . . . 3
- Mézclese.

**4751. P. ALUMINOSA ACETICA
(Lefoulon).**

- ℥ Alumbre en polvo,
- Goma arábica, ãã. . . 5ijβ (40 gr.).
- Eter acético. 3β (2 gr.).
- Albúmina,

ó Mucilago. c. s.
para hacer una pasta con la que se llena la cavidad del diente cariado, su cuello y el intervalo que le separa de los inmediatos.

4752. P. AMIGDALINA (Vée).

- ℥ Almendras dulces mondadas. . . 600
- Almendras amargas. 60
- Azúcar real. 600
- Agua destil. de flor de naranjo. 480

Se machacan las almendras y el azúcar en un mortero de mármol, añadiendo poco á poco el agua de flor de naranjo; luego que todo se haya reducido á una pasta gruesa, se la acaba de moler en una piedra de chocolatero hasta que esté bien homogénea; se la conserva en pucheros cubiertos de azúcar en polvo y una hoja de estaño.

Vée propone esta preparacion para preparar al momento looc y emulsiones, evitando que se enrancien las almendras.

Para hacer un looc se toma

- De esta preparacion. . ℥ij (60 gr.).

Agua comun. $\mathfrak{z}jv$ (125 gr.).
Se disuelve la pasta en el agua, se cuele y se obtiene al punto una emulsion, y se desarrollará el mucilago triturándola con

Goma trag. en polvo. $\mathfrak{g}xjv$ (7 dec.).

Azúcar. $\mathfrak{g}xe$ (5 gr.).

Para preparar el looc de la F. F. se reduce la proporcion de la pasta á $\mathfrak{z}j\mathfrak{B}$ (50 gr.), y se añade $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (16 gr.) de aceite de almendras dulces y $\mathfrak{g}xvj$ (8 dec.) de goma tragacanto. Finalmente el uso de esta pasta abrevia y regulariza la preparacion del looc.

4753. Otra (MANGOTI).

\mathfrak{z} Almendras dulces. . . $\mathfrak{z}vj$ (180 gr.).

Almendras amargas. . $\mathfrak{z}j$ (30 gr.).

Agua. \mathfrak{lbj} (500 gr.).

Goma arábica. \mathfrak{lbj} (500 gr.).

Azúcar blanca. \mathfrak{lbj} (500 gr.).

Agua de flores de na-

ranjo. $\mathfrak{z}j$ (30 gr.).

Agua de rosas. $\mathfrak{z}j$ (30 gr.).

Claros de huevo. . . . número 6.

Se hace una emulsion con las almendras y el agua, y en ella se disuelve la goma y despues el agua; evaporada la mezcla convenientemente se añaden las claras de huevo, batidas con las aguas aromáticas.

Esta fórmula da una pasta pectoral agradable.

4754. P. ANTIDONTALGICA (Duerr).

\mathfrak{z} Extracto de beleño. . . $\mathfrak{z}j$ (4 gr.).

Extracto de belladona,

Alcanfor en polvo, añ. $\mathfrak{g}vj$ (3 dec.).

Opio puro en polvo. . $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (2 gr.).

Tintura volátil de gua-

yaco. $\mathfrak{D}ij$ (24 dec.).

Alcoholado de cantár. 8 gotas.

Aceite de cajeput. . . . 15 gotas.

I. Odontalgia por caries. D. Se llena la cavidad del diente.

4755. Otra (Duerr).

\mathfrak{z} Opio. $\mathfrak{g}v$ (25 cent.)

Aceite de clavo. 3 gotas.

Extracto de beleño. . . $\mathfrak{g}v$ (25 cent.).

Extracto de belladona. $\mathfrak{g}jx$ (50 cent.).

Pelite. c. s.

H. S. A. una pasta consistente que se introduce en el diente cariado.

I. Dolores de muelas.

4756. P. DE APIO.

\mathfrak{z} Raiz fresca de apio. . $\mathfrak{lb}\mathfrak{B}$ (250 gr.).

Agua. c. s.

Se hierve ligeramente, se cuele por un lienzo y se añade:

Goma en polvo. \mathfrak{lbj} (500 gr.).

Azúcar. $\mathfrak{lb}\mathfrak{B}$ (250 gr.).

Se funde, se cuele y se evapora del mismo modo que la pasta de azufañas.

4757. P. ARSENICAL DE FRAY COSME.

\mathfrak{z} Arsénico blanco. . . $\mathfrak{g}vj$ (3 dec.).

Cinabrio. $\mathfrak{g}xxx$ (15 dec.).

Esponja calcinada. . $\mathfrak{g}xv$ (75 cent.).

Se pulveriza; se diluye el polvo en un poco de agua hasta formar una masita clara; se la extiende con un pincel sobre las superficies ulceradas, teniendo cuidado de emplear mediana cantidad, pues es mejor repetir la operacion que exponerse á grandes absorciones, y se cubre despues con un poco de agárico mojado. Este agárico se despega á los diez, quince, veinte ó treinta dias, algunas veces mas tarde y se desprende con la escara. Soberville cura la escara con la pomada amarilla de Fray Cosme.

\mathfrak{z} Cera amarilla. $\mathfrak{z}j$ (32 gr.).

Aceite rosado. $\mathfrak{z}j\mathfrak{B}$ (48 gr.).

Alcanfor. $\mathfrak{g}xv$ (75 cent.).

Extracto de Saturno. $\mathfrak{z}v$ (160 gr.).

Se aplica esta pomada extendida en un lienzo hasta que la úlcera se cubra de una capa blanquecina. Si vuelven á aparecer fungosidades se aplica nuevamente la pasta, y se repite las veces que sea necesario hasta que se destruya completamente el cáncer.

Es muy importante, cuando la úlcera tiene mas de quince líneas cuadradas, dividir el tratamiento para no exponerse á la absorcion, y no cauterizar nueva porcion hasta que no se haya caido la primera escara. Además cuando los bordes son callosos, se los avivará aplicándoles un vejigatorio, porque el cáustico solo obra sobre carnes vivas y húmedas.

4758. P. ARSENICAL PARA DESTRUIR LOS ANIMALES DAÑINOS.

2 ^o Sebo fundido.	1000
Harina de trigo.	1000
Acido arsenioso en polvo fino.	100
Negro de humo.	10
Esencia de anís.	1

Se funde el sebo á fuego lento y se añaden las demás sustancias.

Se usa sola ó mezclada con partes iguales de pan desmenuzado ó cualquier otra sustancia que apetezcan los animales que se quiera destruir.

4759. P. DE AZUFAIFAS (F. F.).

2 ^o Azufaias.	lbj (500 gr.).
Goma arábica.	lbvj (3000 gr.).
Azúcar blanca.	lbv (2500 gr.).
Ag. de flor de naran.	ʒvj (192 gr.).

Se hierven las azufaias durante media hora en lbjv (2000 gr.) de agua, se cuele el líquido con expresion, se deja aposar y se decanta.

Por separado, se lava dos veces la goma en agua fria y despues se añade lbviii (4000 gr.) de agua fria, se disuelve en frio y se cuele sin expresion. Se pone en un perol el cocimiento de azufaias y el azúcar, y se clarifica con tres ó cuatro claras de huevo; entonces se añade la solucion de goma y se calienta, teniendo cuidado de menear sin cesar con una espátula de madera; inmediatamente que hierva el lí-

quido se deja de menear y se mantiene una ebullicion lenta; cuando la pasta haya adquirido la consistencia de un extracto blando, se añade el agua aromática, se saca el perol del fuego, entonces se mete el perol dentro de otro lleno de agua hirviendo, y pasadas doce horas se quita la espuma espesa que se ha formado en la superficie y se echa la materia en moldes de hoja de lata, cuya superficie se haya frotado con un poco de mercurio. Se continúa la evaporacion en la estufa á la temperatura de 40°; se vuelve la pasta en los moldes luego que está bastante consistente, y se la deja en la estufa hasta que haya adquirido la consistencia conveniente.

El uso del mercurio para frotar la superficie interior de los moldes tiene el inconveniente de gastar un metal muy caro y peligroso y de desgastar los moldes: en general se prefiere darles de aceite, y entonces se tiene cuidado de limpiar muy bien el aceite pegado en la superficie de las pastillas cuando se las saca.

1. Bronquitis agudás y crónicas.
Del mismo modo se prepara la *Pasta de dátiles*.

4760. P. DE BOFES DE TERNERA.

2 ^o Bofes de ternera.	ʒxij (375 gr.).
Goma aráb. entera.	lbij (1000 gr.).
Azúcar blanca.	lbj (500 gr.).
Cloruro de sodio.	ʒxviii (1 gr.).
Ag. de flor de naranj.	ʒx (40 gr.).
Esencia de limon.	2 gotas.

Se corta los pulmones en pedazos, se los machaca, se los coloca en un puchero con sal y agua, se los cuece á fuego lento durante doce horas, se cuele y se exprime. Se lava la goma, se la funde en caldo, añadiendo agua si es necesario; se cuele por un lienzo apretado, se deja aposar durante media hora, se decanta para se-

parar las arenillas, se añade el azúcar, se cuece hasta la consistencia conveniente, se echa en moldes de hoja de lata dados de aceite y se calienta en la estufa.

4761. P. DE CARACOLES
(*Figuier*).

℞ Caracoles sin conchas
ni intestinos. ℥ij (96 gr.).
Azúcar blanca lbj (500 gr.).

Se machacan los caracoles con el azúcar para obtener una pasta muy fina, que se dividirá perfectamente sobre una piedra de chocolatero, y se la pasa por un tamiz muy fino. Por separado se funde:

Goma arábiga blanca. lbj (500 gr.).
Agua. c. s.

Se cuele y se evapora en el baño maría hasta la consistencia de jarabe. Entonces se añade la mezcla de los caracoles y el azúcar, y seis claras de huevo batidas con cuidado en ℥jβ (48 gr.) de agua de flores de naranjo. Se acaba la evaporación en el baño maría hasta la consistencia conveniente, meneando continuamente con una espátula.

I. Catarros pulmonares, tisis.

4762. P. CÁUSTICA (*Graeffe*).

℞ Deutocloruro de mercurio. ℥ij (8 gr.).
Goma arábiga en polvo,
Agua destilada, añ. ḡxviiij (1 gr.).

M. I. Callosidad de las úlceras fistulosas. D. C. s. para aplicarla ligeramente.

4763. P. CÁUSTICA ó Pasta cáustica de sulfato de cobre (*Payan*).

℞ Sulfato de cobre en polvo. . . c. s. q.
Yema de huevo. c. s.
H. S. A. una pasta blanda.

Segun Payan este cáustico produce su efecto en cuatro ó cinco horas, y se cura la escara sin dejar cicatriz.

I. Manchas de la piel, lunares, y como revulsivo.

Se hace un polvo que se aplica como el polvo de Viena, y se le quita á los cuatro ó cinco minutos.

4764. P. PARA CAUTERIZAR LAS MUELAS CARIADAS.

℞ Alumbre en polvo,
Cal pura, añ. 5β (2 gr.).
Eter nítrico. ʒij (8 gr.).
Almáciga. c. s.

H. S. A. una pasta líquida con que se cubre un pedacito de yesca ó algodón que se introduce en el agujero de la caries, despues de haberle limpiado con un estilete y secado con un poco de algodón. Esta pasta tiene la ventaja de tener el mismo color que el diente, por lo que es poco visible.

4765. P. CONTRA LA EPIDIDIMITIS (*Desruelles*).

℞ Harina de linaza,
Tormentila en pol., añ. ℥jv (125 gr.).
Ungüento mercurial. . . ℥j (30 gr.).
Extracto de belladona. ʒj (4 gr.).
Aceite de cañamones. c. s.

H. S. A. una pasta que se extiende en un lienzo y se aplica al testículo enfermo.

Se renueva tres ó cuatro veces en las veinticuatro horas, y por las mañanas se toma un baño de asiento con agua de jabon negro. Es un medio seguro y cómodo.

4766. P. CONTRA LOS SABAÑONES (*Swediaur*).

℞ Almendras amargas
mondadas y molidas. lbβ (250 gr.).
Miel pura. ʒvj (180 gr.).
Alcohol saturado de alcanfor,
Harina de mostaza
negra, añ. ʒβ (15 gr.).
Alumbre fundido,
Incienso en polvo, añ. ʒβ (2 gr.).
Agua hirviendo. lbβ (250 gr.).
Yemas de huevo. número 8.

H. S. A. I. Sabañones no ulcerados, sarna, pian. D. C. s. para frotar mañana y noche las partes enfermas, y lavar despues estas últimas con un poco de agua tibia.

4767. P. DENTIFRICA.

- ℥ Carbon vegetal. ℥j (30 gr.).
- Clorato de potasa. ℥ss (2 gr.).
- Aguadestilada de menta. c. s.

Se limpia la boca con estos polvos y no se enjuagará hasta el dia siguiente con el cepillo empapado en la mezcla siguiente :

- Aguardiente. ℥jv (125 gr.).
- Agua de menta. ℥jv (125 gr.).
- Cloruro de sodio. 4 cucharada.

4768. P. DEPILATORIA ó Rusma de los turcos.

- ℥ Cal viva. 40
- Oro pimente. 5

Se pulveriza y se diluye en Yema de huevo y lejía de jaboneros. c. s.

Se aplica sobre las partés de que se quiere quitar el vello. Se deja secar lentamente y se lava con mucha agua.

Bandelocque usaba esta pasta contra la tiña y principalmente contra la estiomena.

4769. P. DEPILATORIA ó Epilatorio de Plenck.

- ℥ Cal viva. 42
- Almidon. 40
- Sulfuro amarillo de arsénico. 4

H. S. A. un polvo muy fino, que se reduce á pasta clara con c. s. de agua.

I. Tiña, favus. D. Se aplica esta pasta sobre la parte del cuerpo en que se quiere quitar el vello, y luego que está seca se la quita con agua tibia.

4770. P. DEPILATORIA.

- ℥ Oro pimente. 4
- Cal viva. 46
- Almidon. 40

Se reduce á polvo fino, se mezcla y guarda el polvo en una vasija bien tapada.

Se usa haciendo una pasta con este polvo y un poco de agua, y

extendiéndola sobre las partes cubiertas de vello, se las deja secar lentamente y se lava despues con agua.

4771. P. DEPILATORIA ó Epilatorio de Colley.

- ℥ Cal viva. ℥j (30 gr.).
- Nitro. ℥j (4 gr.).
- Lejía de jaboneros. ℥jv (125 gr.).
- Oropimente. ℥iij (12 gr.).
- Azufre. ℥j (4 gr.).

Se evapora hasta la consistencia conveniente.

4772. P. Ó CERA PARA LOS DIENTES CARIADOS.

- ℥ Cera blanca. ℥ij (8 gr.).
- Almáciga. ℥j (4 gr.).
- Aceite de almendras. ℥iij (12 gr.).
- Opio puro. ℥ij (10 cent.).
- Aceite de clavo. 42 gotas.
- Cochinilla. ℥viiij (4 dec.).

Se mezclan y se forman barritas del grosor de una pluma de escribir y se envuelven en un papel.

3773. P. ESCILITICA PARA DESTRUIR LOS RATONES (Clommesny).

- ℥ Escila en polvo. ℥ij (60 gr.).
- Queso oloroso. ℥ss (250 gr.).

M. S. A. Es un excelente medio para destruir las ratas y ratones. Tiene muchisima reputacion en Argél.

4774. P. ESCARÓTICA ó Pasta de cloruro de zinc (Canquoin).

- ℥ Cloruro de zinc. 50
- Harina de trigo. 400

Se mezcla el cloruro reducido á polvo fino con la harina, y se añade bastante cantidad de agua para obtener una pasta muy sólida, que se extiende sobre un mármol con un rollo en capas del grosor de media á cuatro líneas, segun el grosor de la escara que se quiere obtener. Se conoce con el nombre de pasta número 2, la que

contiene tres partes de harina; pasta número 3, la que contiene cuatro partes de harina; y pasta número 4, la que contiene cinco partes de harina por una de cloruro. Generalmente se emplea el número 1.º Se corta la pasta de la forma de la escara que se quiere obtener, y se la aplica sobre la parte desnuda de la epidermis; excita al cabo de algunos minutos un calor doloroso, que llega á producir hasta la sensacion de una quemadura. La escara producida por esta pasta cae del octavo al décimo día. Es blanca, muy dura y gruesa. Este cáustico es muy cómodo, pero muy doloroso.

1. Tisis, carcinoma de la cara, tumores cancerosos, lupus.

Añadiendo un poco de cloruro de antimonio, la pasta toma la consistencia de cera blanda y se amolda muy bien á las partes.

En los casos en que hay que aplicarla sobre tumores cancerosos desiguales, se usa con preferencia la siguiente:

Cloruro de antimonio.	1
Cloruro de zinc.	2
Harina.	5

Se aumenta ó disminuye la cantidad de harina, segun se desee que sea mas ó menos activa.

4775. P. FOSFORADA PARA DESTRUIR LOS ANIMALES DAÑINOS.

Se ponen en un puchero nuevo trescientas partes de harina de trigo; se vierte encima mil partes de agua hirviendo, agitando por medio de una espátula de madera; por otra parte se ponen seis partes de fósforo fundido en c. s. de agua caliente; se decanta de modo que solo quede un poco de esta cuando esté fundido; se hace un agujero en la pasta aun caliente y se echa el fósforo fundido, agitando suavemente, pero despues con mas velocidad hasta ob-

tener una pasta en que el fósforo esté muy bien dividido.

Se extiende una capa delgada de esta mezcla sobre rebanadas de pan, que se colocan en los puntos en que hay ratones. V. n. 4758.

4776. P. DE GELATINA DE CUERNO DE CIERVO (*Mouchon*).

2 Sacarol. de cuerno	
de ciervo.	℔ij (1000 gr.).
Goma arábica.	℔ij (1000 gr.).
Jarabe simple.	℔jß (750 gr.).
Ag. de flor de nar.	℔ß (250 gr.).
Agua comun.	℔jvß (2250 gr.).

Se prepara como la pasta de liquen.

4777. P. DE GOMA ARÁBIGA, llamada de malvabisco (F. F.).

2 Goma arábica blanca.	℔j (500 gr.).
Azúcar blanca.	℔j (500 gr.).
Agua comun.	℔ß (250 gr.).
Ag. de flor de naranjo.	℥ij (64 gr.).
Claras de huevo.	número 6.

Se limpia la goma raspándola con un cortaplumas de todas las impurezas que pueda tener pegadas en su superficie; se la contunde y se la pasa por un tamiz de cerda; se la disuelve en el agua al calor del baño maría y en un perol plano; se añade el azúcar y se hace evaporar siempre en el baño maría, meneando continuamente hasta la consistencia de miel espesa. Por separado se baten las claras de huevo con el agua de flores de naranjo hasta que se reduzcan á una espuma blanca, ligera y voluminosa; se las añade entonces por partes á la pasta de goma que estará al fuego y que se meneará con velocidad: despues que se han echado todas las claras de huevo en la pasta, se continúa agitando para facilitar la evaporacion, y cuando la pasta haya adquirido tal consistencia que no se adhiera aplicándola con la espátula en el dorso de la mano, se la echa so-

bre una mesa ó en cajas cubiertas de almidon.

I. Catarros bronquiales ligeros y afecciones agudas leves de los órganos digestivos.

4778. P. DE LACTUCARIO.

℥ Masa de pasta de azufaisas. ℔ij (1000 gr.).
 Extracto alcohólico de lactucario. ḡxviiiij (1 gr.).
 Tintura de bálsamo de Tolú. 5℔ (2 gr.).
 H. S. A. *I.* Bronquitis. *D.* ʒij á ʒij (30 á 60 gr.).

4779. P. DE LIQUEN (F. F.).

℥ Liquen islándico. . . ℔j (500 gr.).
 Goma arábiga. . . ℔v (2500 gr.).
 Azúcar blanca. . . ℔jv (2000 gr.).
 Se pone el liquen en un perol con c. s. de agua, y se calienta casi hasta que hierva: se arroja el líquido y se hierve el liquen con nueva agua por una hora, se cuele con expresion, y en el líquido colado se echa la goma arábiga y el azúcar, las que se disuelven y evaporan hasta la consistencia de pasta muy firme: entonces se echa en un mármol untado ligeramente de aceite y cuando está fria se limpia con esmero para quitar el aceite, que pudiera tener adherido, y se guarda en cajas.

Si á estas cantidades se añade ʒj (4 gr.) de extracto de opio, se tendrá la pasta de liquen opiada, que contiene ḡ℔ (25 mil.) de extracto por onza.

Esta pasta tiene las propiedades tónicas del liquen y conviene en las mismas circunstancias que él.

I. Catarros pulmonares crónicos, tisis. *D.* ʒ℔ á ʒij (15 á 30 gr.) en las veinticuatro horas.

4780. P. DE LIQUEN OPIADA (Henri).

℥ Azúcar,
 Goma aráb., añ. ℔viiiij℔ (4250 gr.).
 Liquen islándico. ℔ij (1000 gr.).

Ag. de fl. de nar. ℔j (500 gr.).
 Extracto acnoso de opio. ʒij (8 gr.).

H. S. A. *Nota.* La cantidad de opio es cerca de ḡ℔ (25 mil.) por onza.

I. Catarros pulmonares crónicos, tisis, etc. *D.* La misma que la anterior.

4781. P. MAGNESIANA FERRUGINOSA (Maurat).

℥ Magnesía calcinada,
 Peróxido de hier., añ. ʒij℔ (50 gr.).
 Agua. c. s.

H. S. A. *I.* Se aplica en los puntos en que la orina humedece y desorganiza la piel en los casos de incontinencia de orina.

4782. P. DE MALVABISCO (F. A.).

℥ Raiz de altea. ʒjv (125 gr.).
 Agua. ℔x (5000 gr.).

Se hierven hasta que se reduzcan á ℔jx (4500 gr.), se cuele y se añade:

Goma aráb. en polvo. ℔ij (1000 gr.).
 Azúcar muy blanca. ℔ij (1000 gr.).

Se evapora á fuego suave, agitando continuamente con una espátula de madera hasta que se espese el jarabe; despues de apartado del fuego, se mezcla agitando continuamente y con violencia:

Claros de huevo frescas, agitadas hasta que formen espuma, núm. 12.

Se espesan despues á fuego lento, agitando siempre, hasta que la masa no se pegue á los dedos, y entonces se añade:

Agua de flor de naranjo. ʒij (60 gr.).

Téngase aun al fuego un poco tiempo; se saca la masa y se guarda espolvoreándola con almidon.

4783. P. DE MANÁ ó Pasta de Calabria.

℥ Goma arábiga. . . . ℔iiij (1500 gr.).
 Maná en lágrimas. . . ʒxij (375 gr.).
 Azúcar. ℔ij (1000 gr.).
 Agua. c. s.

Se prepara como la de azufaisas y al fin se aromatiza con

Digesto de báls. de Tolú. ℥iij (96 gr.).

4784. P. PARA MATAR LOS RATONES.

℥ Fosforo en pedacitos. . . ℥j (30 gr.).
Agua. ℥iij (60 gr.).

Se pone todo en un frasco y se le sumerge en un baño maria. Luego que se ha liquidado el fósforo se le agita y se le deja enfriar. Se echan despues en un mortero los globulitos de fósforo y se los mezcla con ℥jβ á ℥iij (50 á 100 gr.) de tocino; se tritura entonces la mezcla con violencia, se añade agua y lbβ (750 gr.) de harina y cerca de ℥jβ (50 gr.) de azúcar en polvo. Se divide esta pasta en bolitas del volúmen que se quiera.

La cantidad de azúcar que se añade debe variar, y debe ser mayor para los ratones que para otros animales.

4785. P. DE MUSGO MARINO.

℥ Musgo marino. 4
Goma arábiga. 8
Azúcar. 8

Se hierva dos veces en agua el musgo marino, se disuelve en el líquido la goma y el azúcar y se prepara una pasta como se hace la de azufaisas.

4786. Otra (MOUCHON).

℥ Musgo marino. . . ℥jv (125 gr.).
Agua. lbxxjv (12000 gr.).

Se hierva primero en lbxvj (8000 gr.) de agua, y despues en el resto; se añade á los líquidos reunidos:

Goma arábiga blanca. lbij (1000 gr.).

Se funde, se cuele y se añade:

Azúcar. lbij (1000 gr.).

Se prepara el resto como la de azufaisas.

4787. P. OPIADA (Tanchou).

Se digiere durante veinticuatro

horas á un fuego moderado (24° ó 25°) una dosis de opio impuro en pedazos, en c. s. de agua para obtener un caldo espeso.

Se cubre las úlceras cancerosas con una capa de una linea de esta preparacion, una ó dos veces al dia, y se coloca encima un pedazo de papel de cola ó un hule para impedir que se evapore. Debe vigilarse mucho el uso de este medicamento.

4788. P. PECTORAL (Parmentier).

℥ Goma arábiga. . . . lbij (1000 gr.).
Agua. c. s.

Se disuelve y se añade:

Azúcar de uva. . . . ℥xxx (900 gr.).

Se evapora hasta la consistencia de jarabe espeso, y se añade:

Agua de flor de naranjo. ḡxc (5 gr.).

Se funde la goma en el agua, se añade el azúcar de uva, se evapora hasta la consistencia de jarabe muy espeso, se aromatiza con agua de flor de naranjo y se distribuye este jarabe en moldes de hoja de lata, que se colocan en una estufa para acabar la evaporacion y dar la consistencia de pasta.

I. Flegmasías, catarro agudo, gastritis, gastro-enteritis, neumonía, pleuresía. D. ℥β á ℥iij (15 á 60 gr.).

4789. P. PECTORAL BALSAMICA.

℥ Dátiles,
Azufaisas, ãã. . . . ℥jv (125 gr.).

Se hierva durante una hora en c. s. de agua para obtener lbviii (4000 gr.) de líquido colado. Se vierte hirviendo sobre:

Flores de amapola. ℥jv (125 gr.).

Se cuele y se disuelven en el líquido:

Azúcar. lbv (2500 gr.).

Goma arábiga. . . . lbvj (3000 gr.).

Se evapora en el baño maria hasta la consistencia de jarabe. Entonces se añade:

Bálsamo de Tolú. ℥iij (12 gr.)
 disuelto en:

Alcohol. ℥jv (125 gr.).

Se mezclan, se vierte la mezcla en moldes de hoja de lata y se acaba la evaporacion en la estufa. Esta pasta conviene en la bronquitis y en otras afecciones del pecho. Puede reemplazar la pasta de Regnault.

4790. P. PECTORAL BALSÁMICA
 (Regnault).

℥ Cuatro flores pecto-
 rales. ℔bj (500 gr.).
 Goma arábiga. ℔bvj (3000 gr.).
 Tintura de bálsamo
 de Tolú. ℥vj (24 gr.).
 Agua. ℔iiij (1500 gr.).

Se prepara del mismo modo que las demás pastas, y se deberá añadir ℔v (2500 gr.) de azúcar.

Bouchardat propone que se añada $\frac{1}{3}$ (1 cent.) de extracto gomoso de opio por ℥j (30 gr.) de pasta.

I. Asma, catarro, bronquitis, gastritis, neumonía, pleuresía y otras flegmasías agudas.

4791. P. PECTORAL BALSÁMICA
 (Baudry).

℥ Goma arábiga. ℔bvj (3000 gr.).
 Azúcar blanca. ℔bjv (2000 gr.).
 Tridacio. ℥ij (8 gr.).
 Azúcar en terrones. ℥j (32 gr.).
 Bálsamo de Tolú. ℥x (40 gr.).
 Agua de flor de naranjo. ℥vj (192 gr.).
 Esencia de limon. 4 gotas.
 Claras de huevo. núm. 4.
 Extracto de regaliz. ℥x (40 gr.).

H. S. A. El extracto de regaliz debe prepararse con palo de regaliz por maceracion y en frio, y se espesa despues en baño maría hasta la consistencia necesaria.

I. Catarro, asma, coqueluche, bronquitis, gastritis, neumonía, pleuresía y otras enfermedades agudas. D. Diez á veinte pedazos al dia.

4792. P. PECTORAL DE BOFES DE TERNERA (Pablo Gage).

℥ Jalea de liquen,
 Jarabe de bofes de
 ternera, añ. ℥xxx (625 gr.).
 Jarabe de moras,
 Azúcar, añ. ℥xij (375 gr.).
 Bálsamo de Tolú. ℥ij (8 gr.).
 Tridacio. ℥Ljv (3 gr.).
 Extr. de ipecacuana. ℥ß (2 gr.).
 Goma. ℔v (2500 gr.).
 H. S. A. una pasta que se corta en pedazos.

I. Asma, catarro, bronquitis, neumonía, tisis y otras flegmasías agudas. D. Diez á veinte pedazos en el dia.

4793. Otra (DEGENETAIS).

℥ Pulmon de ternera. ℔ij (4000 gr.).
 Se echa los bofes de ternera en ℔bvj (3000 gr.) de agua hirviendo para lavarlos, se los pone despues con ℔xjv (7 quil.) de agua, se los cuece á fuego lento durante cerca de seis horas en baño maría de estaño, y se cuele este cocimiento. Por otra parte se hierve durante una hora:

Higos grasos,
 Dátiles,
 Azufaixas, añ. ℔bj (500 gr.)
 en ℔bvj (3000 gr.) de agua, se cuele y se añade:
 Jar. de adorm. blanc. ℔bj (500 gr.).
 Goma arábiga. ℔bvj (3000 gr.).
 Azúcar candé. ℔iiij (1500 gr.).
 Bálsamo de Tolú. ℥jv (125 gr.).

Se reune todo y se reduce hasta casi la consistencia de pasta, se añade al fin:

Ag. de fl. de naranjo. ℥iiij (96,6 gr.).
 Tintura de vainilla. ℥j (3,82 gr.)
 y algunas claras de huevo bien batidas en agua de flores de naranjo.

Se ha vendido este remedio con el nombre de *tesoro del pecho*, y en el privilegio de perfeccion se ha suprimido el jarabe de adormideras, y acaso se le ha susti-

tuido por una preparacion de opio. Bouchardat se inclina á creer que no contiene los boses de ternera. (Con privilegio.)

4794. PASTA DE REGALIZ BLANCA.

℞ Raiz de regaliz raspad. ℥ij (64 gr.).
Goma arábica. lbj (500 gr.).
Azúcar blanca. lbj (500 gr.).
Ag. de flor de naranjo. ℥ij (64 gr.).
Claros de huevo. . . . número 6.

Se prepara del mismo modo que la pasta de goma, sirviéndose de la infusion de regaliz en lugar del agua para disolver la goma.

4795. P. DE REGALIZ PARDAS (F. F.).

℞ Zumo de regaliz. . . . ℥iij (96 gr.).
Goma arábica. . . . lbij (1500 gr.).
Azúcar. lbij (1000 gr.).
Agua comun. lbv (2500 gr.).
Extracto de opio. . . . ḡxviiij (1 gr.).

Se disuelve el zumo de regaliz en agua, se añade al líquido colado por la manga la goma arábica mondada y lavada, se funde en el baño maría, se añade el azúcar y después la solución de opio, se evapora agitando continuamente, y cuando la pasta está cocida, se la echa sobre un mármol untado de aceite.

I. Catarros secos, convulsivos, afecciones ligeras de pecho acompañadas de tos.

4796. P. DE REGALIZ NEGRA (F. F.).

℞ Zumo de regaliz. . . . lbj (500 gr.).
Goma arábica. . . . lbij (1000 gr.).
Azúcar. lbj (500 gr.).
Agua. lbjv (2000 gr.).

Se disuelve el zumo de regaliz en el agua fría y se cuele por una manga; se usa este líquido para disolver la goma y el azúcar, se le cuele otra vez sin dejar de agitar, se hace evaporar sobre un fuego suave hasta la consistencia de extracto de píldoras, se echa la masa en una piedra de mármol dada de aceite y se la divide en tiras que se cortan después trans-

versalmente en pedazos con las tijeras y se secan al sol ó en la estufa. Se puede aromatizar esta pasta agitándola dentro de un frasco en que se echan veinticuatro gotas de un aceite esencial, ó incorporándola ℥j (4 gr.) de polvo de lirio de Florencia.

I. Romadizos y catarros. D. ℥j á ℥iij (30 á 60 gr.).

4797. P. RUBEFACIENTE (Clarus).

℞ Acetato de plomo ℥j (30 gr.).
Sulfato ácido de potasa. ℥iij (90 gr.).
Agua. c. s.

Esta pasta es muy rubefaciente.

4798. P. PARA TEÑIR EL PELO DE NEGRO.

℞ Cal viva en polvo. 120
Litargirio en polvo. 80
Infusion de salvia. 280

Se hace una papilla con esta mezcla, se aplica la pasta cinco ó seis horas sobre el pelo, al que se lavará antes con una solución de alumbre; cuando se quita la pasta se lava la cabeza con agua de salvado.

4799. P. PARA ENNEGRECER LOS CABELLOS.

℞ Nitrato de plata,
Protonitrato de mercurio, añ. ℥ß (15 gr.).
Agua destilada. ℥jvß (135 gr.).

Se disuelve, se filtra y se lava el depósito con c. s. de agua destilada, para obtener ℥vß (165 gr.) de solución.

Se hace una pasta líquida con esta solución y c. s. de almidón, y con ella se cubren los cabellos con precaución. Se hace la operación por la noche y se cubre la cabeza con un gorro de hule; al día siguiente por la mañana se lava la cabeza, y después se aplica una pomada ó un aceite cosmético. Esta preparacion no daña á la sustancia de los cabellos.

PASTILLAS. TABLETAS.

4800. PASTILLAS ABSORVENTES
(*Chevallier*).

℞ Chocolate. ℥ij (60 gr.).
Azúcar. ℥v (150 gr.).
Magnesia pura. ℥j (30 gr.).

Se hace una pasta con estas sustancias por medio del mucílago de goma trágacanto, que se puede aromatizar según se quiera, y se divide la masa en pastillas de ḡviiij, ḡxv̄j ó ḡxx (4, 8 ó 10 dec.) según que se quiera que contengan ḡj, ḡij ó ḡiij (5, 10 ó 15 cent.) de magnesia.

I. Agrios de estómago. *D.* Varía según la cantidad de magnesia que se quiera administrar.

4801. TABLETAS DE ACEITE DE
CROTON TIGLIO.

℞ Aceite de croton tiglio. cinco gotas.
Se le divide en un mortero de porcelana con

Almidon. ℥j (12 dec.).
Azúcar. ℥j (4 gr.).

Se incorpora todo en

Chocolate con vainilla. ℥ij (8 gr.).

Se mezcla exactamente y se preparan treinta píldoras, que se aplastan ligeramente sobre una lámina de hoja de lata calentada. Cada tableta contiene un sexto de gota de aceite de croton tiglio. Se necesitan de seis á doce para obtener una abundante purgación.

I. Estreñimiento, lombrices.

4802. T. DE ACEITE DE TÁRTAGOS
(*Bally y Cadet*).

℞ Chocolate con vainilla. ℥ij (8 gr.).
Azúcar. ℥j (4 gr.).
Almidon. ℥j (12 dec.).
Canela en polvo. ḡx (5 dec.).
Aceite de tártagos. 30 gotas.

Se tritura el aceite con el azúcar y el almidon, y se le incorpora

con el chocolate fundido; se divide en treinta píldoras que se aplastan en tabletas con una hoja de lata calentada.

Cada pastilla contiene una gota de aceite de tártagos. Es un purgante muy cómodo.

I. Casos en que conviene purgar. *D.* Una pastilla para purgar á los niños, y tres pueden producir el mismo efecto á los adultos.

4803. P. DE ÁCIDO CÍTRICO.

℞ Acido cítrico. ℥iij (12 gr.).
Azúcar blanca. lbj (500 gr.).
Esencia de limon. 16 gotas.

Mucíl. de goma tragac. c. s.

H. S. A. pastillas de ḡxij (6 dec.).

I. Son atemperantes y refrigerantes. *D.* Tres á cuatro al día. Generalmente se prefieren las limonadas secas.

4804. T. DE ÁCIDO LÁCTICO
(*Magendie*).

℞ Acido láctico. ℥ij (8 gr.).
Azúcar. ℥j (30 gr.).
Vainilla. ḡxviiij (1 gr.).
Mucíl. de goma tragac. c. s.

H. S. A. pastillas de á 3℥ (2 gr.).

Se dan cuatro al día en los casos de dispepsia y cálculos de fosfato de cal.

4805. T. DE ÁCIDO OXÁLICO ó
Pastillas para la sed.

℞ Azúcar. lbj (500 gr.).
Acido oxálico puro
porfirizado. ℥ij (8 gr.).
Esencia de limon. 20 á 30 gotas.
Mucílago de goma trag. c. s.

H. S. A. tabletas de ḡxij (6 dec.) de peso. Estas pastillas atraen la humedad del aire, por lo que se prefieren las de sobreoxalato de potasa.

I. Anginas, calenturas, inter-

mitentes. Se usan como refrigerantes á la dosis de seis á ocho al dia.

4806. P. ACIDULAS PURGANTES
(*Delvincourt*).

℞ Escamonea de Alepo. ḡviiij (4 dec.).
Tint. alcohol. de sen. 48 gotas.
Crémor de tártaro soluble. ʒjβ (6 gr.).
Azúcar blanca en polvo fino. ʒij (8 gr.).
Goma tragacanto. ḡv (25 cent.).
Esencia de bergamota. 1 gota.
Ag. destil. de flor de naranjo,
Carmin, ãã. c. s,
para hacer con la goma un mucilago de color, que servirá despues para preparar S. A. una pasta, la cual se dividirá en ocho pastillas muy iguales.

D. Se toman por la mañana en ayunas primero tres, que se dejan deshacer en la boca; detrás se bebe una taza de caldo. Un cuarto de hora despues se repite la misma ingestion y se toman las cuatro pastillas restantes á igual intervalo, si el individuo es difícil de purgar. Comunmente bastan seis para producir abundantes evacuaciones. A los niños se les da de una á cuatro.

Nota. Se beberá poco detrás de este medicamento, para no diseminar demasiado las partes activas.

4807. T. AFRODISIACAS (*Artune*).

℞ Almizele,
Ambar, ãã. ʒj (4 gr.)
Confección alquermes. ʒij (8 gr.).
Azúcar. lbj (500 gr.).
H. S. A. tabletas de ḡxxjv (12 dec.).
D. Tres al dia.

4808. P. DE AGRACEJO.

℞ Azúcar. ʒvj (180 gr.).
Zumo de agracejo. ʒj (30 gr.).
Se calienta y se hacen pastillas.

4809. P. DE ALMIDON.

℞ Almidon,
Raiz de regaliz, ãã. ʒβ (15 gr.).
Acido benzóico. ḡxviiij (1 gr.).
Goma arábica,
Azúcar, ãã. ʒj (30 gr.).
Esencia de limon. 3 gotas.
H. S. A. pastillas de ḡvj (3 dec.).
I. Catarro agudo, diarrea aguda. D. Diez á veinte al dia.

4810. T. DE ALMIDON OPIADAS.

℞ Almidon,
Goma arábica, ãã. ʒβ (15 gr.).
Azúcar. ʒij (60 gr.).
Extracto de opio. ḡjx (50 cent.).
Ag. de flor de naranjo. c. s.
H. S. A. tabletas de ḡxviiij (1 gr.).
I. Catarro agudo, diarrea aguda, disenteria. D. Ocho á diez al dia.

4811. P. DE AMBAR.

℞ Ambar. ʒβ (6 dec.).
Esencia de canela. 6 gotas.
Almizele. ḡjv (2 dec.).
Azúcar blanca. ʒj (30 gr.).
Mucil. de goma tragac. c. s.
H. S. A. cien pastillas. I. Ozena.
D. Diez al dia para perfumar el aliento.

4812. P. AMIGDALINAS.

℞ Sacarolado de almendras en polvo,
Azúcar real, ãã. lbβ (250 gr.).
Goma tragacanto. ʒβ (15 gr.).
Ag. de fl. de naranjo. ʒij (60 gr.).
H. S. A. tabletas de ḡxij (6 dec.)
que se secarán en una estufa moderadamente caliente.

4813. T. ANTICATARRALES
(*Delaurier*).

℞ Ipecacuana en polvo. 78
Poligala en polvo. 78
Extracto acuoso de adormideras. 47
Esencia de canela. c. s.
Sagú. 1000
Goma tragacanto en polvo. 24

Agua de flor de naranjo. c. s.
Azúcar en polvo. 12000
H. S. A. *Con privilegio.*

4814. T. ANTICATARRALES ó Tabletillas gomosas quermetizadas (Tronchin).

℞ Azúcar blanca. ℔ij (1000 gr.).
Goma aráb. en polv. ℔℔ (250 gr.).
Extracto de regaliz por infusión. ℥ij (60 gr.).
Quermes mineral,
Semillas de anís, ãã. ℥jv (5 gr.).
Ext. gomoso de opio. ℥xij (6 dec.).
Goma tragacanto. ℥ij (8 gr.).
Agua. ℥xx (625 gr.).
H. S. A. tabletas de á ℥vj (3 dec.).

I. y D. Se toman de seis á ocho al día cuando se quiere excitar la expectoracion.

4815. Otras (VANDAMME).

℞ Acido benzóico. ℥ij (8 gr.).
Azúcar en polvo. ℔ij (1000 gr.).
Lirio de Florencia. ℥℔ (15 gr.).
Goma arábica. ℥ij (60 gr.).
Almidon,
Agua destilada, ãã. ℥jv (125 gr.)
para hacer una masa que se divide en pastillas de ℥j (12 dec.).

4816. T. ANTIESCROFULOSAS (Pierquin).

℞ Azúc. blanc. en polvo. ℥jv (125 gr.).
Café de Moca en polv. ℥℔ (2 gr.).
Ioduro de potasio. ℥ij℔ (75 gr.).
Mucilago de goma tragacanto preparado con una fuerte infusion de café de Moca. c. s.
para quinientas tabletas, y cada una contiene ℥¹/₃ (1 cent.) de ioduro.

I. Flores blancas, bocio, amenorrea, atrofia mesentérica, infartos escrofulosos, tumores frios, tisis tuberculosa y otras afecciones escrofulosas.

4817. T. ANTIHELMINTICAS (H. DE AL.).

℞ Sulfato de hierro. ℥℔ (2 gr.).

Santónico. ℥j℔ (6 gr.).
Azúcar. ℥vj (24 gr.).
Mucilago de goma aráb. c. s.
H. S. A. treinta y dos tabletas.
D. Dos ó tres al día. Esta dosis es para un niño de siete á ocho años.

4818. P. ANTIHISTÉRICAS.

℞ Azafran. ℥℔ (15 gr.).
Azúcar. ℔ij (500 gr.).
Goma tragacanto,
Aceite de canela,
Agua, ãã. c. s.
I. Son anodinas, pectorales, diaforéticas y emenagogas.

4819. P. ANTILEUCORRÉICAS Y EMENAGOGAS (Pierquin).

℞ Ioduro de hierro. ℥j (4 gr.).
Azafran en polvo. ℥℔ (15 gr.).
Azúcar. ℥vij (210 gr.).
Mucilago de goma tragacanto,
Infusion de canela, ãã. c. s.
para doscientas cuarenta pastillas.

I. Leucorrea, y si está acompañada de amenorrea se puede usar además la pomada antileucorréica. *D.* Quince ó veinte al día, y se aumenta progresivamente.

4820. T. ANTIMONIALES DE KUNKEL (F. F.).

℞ Almendras dulces. ℥ij (64 gr.).
Azúcar. ℥xiiij (407 gr.).
Semillas de cardamomo menor. ℥j (32 gr.).
Canela. ℥℔ (16 gr.).
Sulfuro de antimonio porfirizado. ℥j (32 gr.).
Goma tragacanto. ℥ij (8 gr.).

Se mondan y pulverizan las almendras y el azúcar, se añaden los demás polvos y con c. s. de mucilago se hacen tabletas de á ℥xviiij (1 gr.). Cada una contiene ℥j (5 cent.) de sulfuro de antimonio.

I. Enfermedades cutáneas, reumatismo, gota, helmintiasis, infartos escrofulosos, herpes. *D.* De cuatro á diez al día.

4821. T. APERITIVAS (Tode).

- ℥ Flores de sal amoniaco marciales. 9
 Canela. 2
 Azúcar. c. s.
 H. S. A. tabletas de ḡv (25 cent.).
 I. Amenorrea por atonía. D. Dos
 ó tres pastillas varias veces al dia.

4822. P. AROMATICAS (Steel).

- ℥ Protosulfato de hierro. 40
 Tintura de cantáridas. 2
 Azúcar en polvo. 400
 Mucilago con agua destilada de
 canela. c. s.
 H. S. A. tabletas de ḡxviii (1
 gr.).
 I. Anafrodisia, astenia. D. Una
 tableta al dia.

4823. P. DE AZAFRAN.

- ℥ Sacarolado de azafran. . 3j (4 gr.).
 Mucilago. c. s.
 H. S. A. tabletas de ḡxvj (8
 dec.).

4824. T. DE AZUFRE (F. F., F. P.)

- ℥ Azufre lavado. 3ij (64 gr.).
 Azúcar en polvo. lbj (500 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto hecho
 con agua de rosas. c. s.
 H. S. A. tabletas de ḡxviii (1 gr.)
 y cada una contendrá ḡij (1 dec.)
 de azufre.
 I. Afecciones epsóricas, her-
 pes, bronquitis crónica. Convienen
 principalmente para los niños que
 repugnan las aguas y demás pre-
 paraciones sulfurosas. D. Dos á tres
 al dia.

**4825. T. DE AZUFRE ANTIRUBEO-
LICAS.**

- ℥ Azufre lavado. ḡLjv (3 gr.).
 Azúcar. 5vj (25 gr.).
 Mucil. con agua de rosa. c. s.
 H. S. A. cuarenta tabletas.
 I. Bronquitis, escarlatina, sa-
 rampion y como preservativo de
 la alfombrilla. D. Dos, mañana y
 noche.

**4826. T. DE AZUFRE COMPUESTAS
(F. F. AÑO DE 1818).**

- ℥ Azufre lavado. . . . 5vj (24 gr.).
 Flores de benjuí. . . ḡxxx (16 dec.).
 Lirio de Florencia. . . ḡc (5,3 gr.).
 Aceite de anís. . . . ḡxx (4,4 gr.).
 Azúcar. lbj (500 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto c. s.
 H. S. A. I. Se usan en los mis-
 mos casos que las tabletas de azu-
 fre simples. D. 3β á 3ij (4 á 8 gr.).

4827. P. AZULES (Rodriguez).

- ℥ Azul de Prusia. 3j (4 gr.).
 Goma aráb. en polvo. 3j (4 gr.).
 Azúcar blanca. 3ij (8 gr.).
 Canela en polvo. . . . ʒj (12 dec.).
 Jar. de cásc. de limon. c. s.
 M. y H. S. A. una masa muy
 homogénea y de consistencia con-
 veniente, que se dividirá en vein-
 te pastillas iguales.

I. Calenturas intermitentes de
 los niños. D. Tres á seis al dia.

4828. T. DE BÁLSAMO DE TOLÚ.

- ℥ Bálsamo de Tolú. . . . 3β (15 gr.).
 Azúcar. lbj (500 gr.).
 Mucilago de goma. . . c. s.
 H. S. A. tabletas de ḡxviii (1
 gr.).
 I. Tisis, catarro crónico, neu-
 monía crónica, bronquitis. D. Cua-
 tro á diez al dia.

**4829. T. DE BÁLSAMO DE TOLÚ
(F. F.),**

- ℥ Bálsamo de Tolú,
 Alcoh. de 34° Cart. ã. 3j (32 gr.).
 Azúcar. lbj (500 gr.).
 Goma tragacanto. . . . ʒjv (5,3 gr.).
 Agua destilada. 3ij (64 gr.).
 Se disuelve el bálsamo de Tolú
 en el alcohol, se añade el agua
 destilada, se calienta por algunos
 instantes en el baño maría, se fil-
 tra y con el líquido filtrado se pre-
 para un mucilago con la goma tra-
 gacanto, para hacer S. A. pastillas
 de ḡxvj (8 dec.).

I. Afecciones catarrales crónicas, particularmente las de la mucosa bronquial, toses crónicas, catarros crónicos. *D.* De cuatro á seis al dia.

4830. P. DE BELEÑO (Righini).

℞ Azúcar refinada. ℥ij (60 gr.).
Extracto de beleño. ℥j (12 dec.).

H. S. A. cuarenta y ocho pastillas con mucilago hecho en agua de lechuga.

I. Toses nerviosas. *D.* Cinco á doce al dia.

4831. P. DE BICARBONATO DE SOSA, Tabletás digestivas llamadas de Vichy ó d'Arcet (F. F., H. DE M.).

℞ Bicarbonato de sosa. ℥j (32 gr.).
Azúcar cristalizado. ℥xix (600 gr.).
Mucilago de goma tragacanto. c. s.
H. S. A. tabletas de ℥xx (10 dec.). Cada una contendrá ℥j (5 cent.) de bicarbonato de sosa. Se acostumbra aromatizar estas tabletas con distintos aromas para satisfacer el gusto particular de algunos enfermos.

Nota. Veinte pastillas representan un vaso de agua de Vichy por la cantidad de bicarbonato.

I. Digestiones lentas con acidez del estómago, dispepsia, acidez de las primeras vias, agrios, fetidez del aliento, pirosis, cálculos, gota. *D.* Bastan dos ó tres pastillas, tomadas de cinco en cinco minutos, para restablecer la digestion; una sola la favorece. Se usan tambien como fundentes y litontripticas. Se puede aumentar la dosis hasta cuatro ó seis. Generalmente se usan antes ó despues de comer, por lo que se las llama digestivas.

4832. P. DE BORAX.

℞ Borax. ℥ij (8 gr.).
Azúcar. ℥j (30 gr.).
Mucilago. c. s.

H. S. A. treinta pildoras.

I. Aftas. *D.* Se funden en la boca.

4833. TABLETAS DE CAFÉ DE MOCÁ IODURADAS ó Café iodurado (F. DEL PIAMONTE).

℞ Ioduro de potasio. ℥j (4 gr.).
Café de Moca porfiriz. ℥℔ (2 gr.).
Azúcar en polvo. ℥jv (125 gr.).
Mucilago de goma tragacanto hecho con una infusion de café. c. s.

H. S. A. trescientas tabletas, y cada una contiene cerca de ℥ $\frac{1}{4}$ (12 mil.) de ioduro. Se parecen mucho á las del n. 4816.

I. Bocio, escrófulas, atrofia mesentérica, flores blancas.

4834. T. DE CALDO (Cadet).

℞ Carne de pierna sin grasa. ℔xij (6000 gr.).
Pié de ternera. número 6.
Zanahoria,
Nabos,
Puerros,
Apio, ãã. un buen manojo.
Cebollas tostadas,
Clavos, ãã. número 6.
Goma arábica. ℥xx (600 gr.).

Se corta en pedazos la carne muscular, se la tritura en un mortero de mármol con c. s. de agua, y se exprime; se repite este tratamiento hasta agotar la carne, y finalmente se prensa. Se hierva un instante los líquidos reunidos, se cuele por una tela, se evapora el líquido colado en el baño maria hasta que se haya reducido á cerca de un cuartillo ($\frac{1}{2}$ lit.).

Se lavan y cortan en pedazos las legumbres y los pies de vaca, se ponen estas sustancias en una olla con tapadera con la cebolla y los clavos, y se añade agua de rio para cubrir todo; se hierva á fuego lento, se deja enfriar un poco antes de abrir la tapadera, se cuele el cocimiento, se le deja enfriar enteramente, se le quita la grasa, y se le pone al fuego para clarificarle con clara de huevo batida. Se cuele y se evapora el líquido en el baño maria.

Durante estas operaciones se funde la goma arábica en su peso de agua, y se cuele por una tela; despues se vierte la solucion en el caldo de los pies de vaca y legumbres evaporado hasta las tres cuartas partes, se continúa evaporando, y finalmente se añade el primer producto que se apartó; se mezcla continuando la evaporacion, despues se echa en moldes S. A. y se deja secar á fuego suave.

D. Cada tableta que pesa ʒʒ (15 gr.) fundida en ℔ʒ (250 gr.) de agua hirviendo, con ʒxxviii (1 gr.) de sal, da una buena taza de caldo.

4835. PASTILLAS DE CARACOLES (Mouchon).

ʒ Sacarolado de caracol. ℔j (500 gr.).
Goma tragacanto. . . . ʒj (4 gr.).
Ag. de flor de naranjo. ʒjʒ (45 gr.).
H. S. A. tabletas de ʒxvj (8 dec.). Cada una equivale á dos caracoles.

4836. TABLETAS DE CARBON (F. F.).

ʒ Carbon vegetal. . . . ʒjv (125 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒxij (375 gr.).
Mucíl. de gom. tragac. c. s.

Se procede S. A. á formar tabletas de á ʒxvj (8 dec.).

Su uso está casi limitado al de masticatorio para corregir el mal olor de la boca. La dosis es indeterminada.

4837. T. DE CARBON ANIMAL.

ʒ Carbon animal lavado y porfirizado,
Azúcar, añ. ʒiij (90 gr.).
Chocolate. ʒjx (270 gr.).
H. S. A. tabletas de á ʒxxviii (1 gr.).

I. Fetidez del aliento.

4838. T. DE CARBON Y CHOCOLATE DE A. CHEVALIER (F. P.).

ʒ Chocolate en polvo. ʒj (50 gr.).

Carbon vegetal lavado y porfiriz. . . . ʒj
Azúcar blanca. ʒj
Mucílago de goma tragacanto prepara-
do con agua de flor de naranjo, c. s.
H. S. A. tabletas de á ʒxij (6 dec.) de peso.

I. Fetidez del aliento, expectoracion purulenta, tisis, estomacace. Se usan para destruir el mal olor del aliento; se emplean algunas veces contra los esputos de pus y la tisis. D. De seis á doce al dia.

4839. T. DE CATECÚ (F. F. Y F. P.).

ʒ Extracto de catecú. . . . ʒjv (125 gr.).
Azúcar blanca. ℔j (500 gr.).
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
para hacer tabletas de ʒxij (6 dec.).

I. Son astringentes y se usan en las diarreas rebeldes, disenteria, hinchazon escorbútica de las encías, fetidez del aliento, leucorrea, etc. Se usan como estomacales. D. De tres á diez y mas al dia.

Algunas veces se reduce la masa á bolos, á que se da el nombre de *granos de catecú*. Los usan los fumadores para corregir el humo del tabaco.

4840. PASTILLAS DE CATECÚ, CANELA Y MAGNESIA.

ʒ Extracto de catecú. . . . ʒjv (16 gr.).
Magnesia calcinada. . . . ʒj (32 gr.).
Canela en polvo. ʒvj (24 gr.).
Azúcar. ℔j (500 gr.).
Mucílago con agua de canela. c. s.
H. S. A. pastillas de ʒxij (6 dec.).

I. Atonia del estómago acompañada de agrios y diarrea, dispepsia, fetidez del aliento, agrios, diarrea por esta causa.

4841. TABLETAS DE CATECÚ Y MAGNESIA (F. F.).

ʒ Magnesia pura. ʒij (64 gr.).

Catecú en polvo. . . ʒj (32 gr.).
 Azúcar en polvo. . . ʒxiiij (407 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto hecho
 con agua de canela. c. s.
 Se hacen tabletas de ʒxvj (8
 dec.), de las que cada una contén-
 drá ʒiij (15 cent.) de catecú y ʒij
 (1 dec.) de magnesia.

I. Fetidez del aliento causada
 por reblandecimiento de las en-
 cías, dispepsia debida á un aumen-
 to de secrecion del jugo gástrico
 ó á un estado de atonía de la mu-
 cosa del estómago.

4842. PASTILLAS DE CIANURO DE ORO (Chrestien).

ʒ Cianuro de oro. ʒij (1 dec.).
 Pasta de chocolate. . . . ʒj (30 gr.).
 H. S. A. veinticuatro pastillas.
 D. Una á cuatro al dia en la a-
 menorrea.

4843. P. DE CIANURO DE ORO Y CHOCOLATE (Chrestien).

ʒ Cianuro de oro. ʒj (5 cent.).
 Pasta de chocolate. . . . ʒj (30 gr.).
 Se mezclan exactamente en un
 mortero de mármol calentado y se
 dividen en veinticuatro pastillas.
 I. Enfermedades sifilíticas y es-
 crofulosas. D. Una diariamente y
 se aumenta otra cada ocho dias.

4844. P. DE CITRATO DE HIERRO.

ʒ Citrato de hierro,
 Acido cítrico, añ. . . ʒijʒ (10 gr.).
 Esencia de limon. . . diez gotas.
 Azúcar. ʒvj (200 gr.).
 Agua. c. s.
 H. S. A. pastillas de ʒjx (50
 cent.).

I. Amenorrea, dismenorrea, leu-
 correa, clorosis, escrófulas, dis-
 pepsia, congestion, catarro útero-
 vaginal. D. Se dan cinco á seis
 pastillas ó mas. Es una prepara-
 cion de hierro muy eficaz.

4845. Otras (BERAL).

ʒ Azúcar en polvo. . . . ʒjv (16 gr.).

Citrato de hierro y amoniaco anhi-
 dro,
 Sacaruro de clavo y
 vainilla, añ. ʒxviiij (1 gr.).
 Se hace pasta que se divide en
 pastillas de ʒxvj (8 dec.).

4846. TABLETAS DE CITRATO DE HIERRO.

ʒ Sacarolado de citrato
 de hierro. ʒiij (90 gr.).
 Mucil. de goma tragac. ʒʒ (15 gr.).
 Háganse tabletas de ʒjx (50 cent.).

I. Amenorrea, clorosis, catarro
 útero-vaginal, bulimia. D. Cinco á
 seis al dia.

4847. PASTILLAS Ó TABLETAS DE CITRATO DE MAGNÉSIA.

ʒ Citrato de magnesia. 100
 Azúcar buena. 200
 Acido cítrico. 5
 Mucilago aromatizado con c. s.
 de tintura de cáscaras frescas
 de naranja. c. s.
 H. S. A. tabletas de ʒʒ (2 gr.).

D. Una á seis á los niños valetu-
 dinarios, como laxante.

4848. PASTILLAS DE CLORURO DE CAL.

ʒ Cloruro de cal. ʒʒ (2 gr.).
 Azúcar con vainilla. . . ʒiij (90 gr.).
 Catecú. ʒʒ (15 gr.).
 Mucil. de goma tragac. c. s.
 H. S. A. pastillas de ʒxviiij (1
 gr.).

I. Fetidez del aliento, estoma-
 cace. D. Una á diez al dia.

4849. T. DE CLORURO DE CAL (Deschamps).

ʒ Cloruro de cal seco. 160
 Azúcar blanca. 3000
 Almidon. 640
 Goma tragacanto en polvo. . . 80
 Carmin. 3
 H. S. A. tabletas de ʒxviiij á ʒxx
 (9 á 10 dec.).

I. Destruye el mal olor del a-
 liento. D. La misma que la ante-
 rior y la siguiente.

4850. T. DE CLORURO DE CAL ó
Tabletas desinfectantes de A. Che-
valier.

℥ Cloruro de cal seco. ḡxij (6 dec.).
Azúcar. ʒj (30 gr.).
Gomatragac. en polvo. ḡxx (10 dec.).

Se divide el cloruro de cal en un mortero de vidrio; se le trata por el agua en pequeña cantidad; se usa este liquido para convertir el azúcar y la goma en una masa homogénea, que se divide en tabletas de ḡxviiij á ḡxx (9 á 10 dec.) de peso.

Nota. Se las puede aromatizar mezclando con el azúcar un aceite volátil, según la prescripción del práctico.

I. Se emplean para destruir el mal olor del aliento, contra la expectoración purulenta, tisis. *D.* De seis á ocho al día.

4851. P. DE CLORURO DE ORO Y
SODIO (Chrestien).

℥ Cloruro de oro y sodio. ḡv (25 cent.).
Azúcar. ʒj (30 gr.).
Mucil. de gom. tragac. c. s.

H. S. A. sesenta pastillas. Cada una contiene una sexta parte de la sal de oro.

I. Sífilis, incontinencia de orina, enuresis, herpes corrosivos, lepra, escrófulas, estomatitis, congestión. *D.* Una mañana y noche.

4852. T. CONTRA EL BOCIO
(Dubois).

℥ Esponja en polvo. ʒβ (15 gr.).
Carbonato de sosa. ʒij (8 gr.).
Canela. ʒj (4 gr.).
Azúcar. ʒjβ (45 gr.).
Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. tabletas de á ḡx (5 dec.).

I. Escrófulas, bocio, infartos linfáticos. *D.* Una mañana y noche.

4853. P. CONTRA EL ASMA
(Bodin).

℥ Ipecacuana. ḡxx (10 dec.).

Goma-arábica. ḡxv (75 cent.).

Hojas de naranjo en polvo. ḡxviiij (90 cent.).

Azúcar blanca. ʒj (4 gr.).

H. S. A. quince pastillas.

I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* Una todas las mañanas.

4854. P. CONTRA EL ROMADIZO
(Lepère).

℥ Azúcar en polvo. lbj (500 gr.).

Ruibarbo en polvo. ʒj (30 gr.).

Azafran en polvo. ʒβ (2 gr.).

Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. pastillas de ḡxxjv (12 dec.). *D.* Tres á cuatro al día.

4855. P. CONTRA LA TOS (Lepère).

℥ Azúcar. lbj (500 gr.).

Hidroclorato de morf. ḡxij (6 dec.).

Mucilago. c. s.

H. S. A. pastillas de ḡxviiij (4 gr.).
Se toman cuatro al día en las bronquitis agudas.

4856. P. CONTRA LAS TOSES
NERVIOSAS (Lepère).

℥ Azúcar en polvo. lbj (500 gr.).

Ipecacuana en polvo. ʒij (8 gr.).

Alcanfor. ḡxviiij (4 gr.).

H. S. A. pastillas de ḡxij (6 dec.).

4857. P. DE CRÉMOR DE TÁRTARO.

℥ Crémor de tárt. solub. ʒij (60 gr.).

Azúcar. ʒxjv (420 gr.).

Goma tragacanto. ʒj (4 gr.).

Ag. de cásc. de limon. ʒj (30 gr.).

H. S. A. pastillas.

4858. P. DE CUBEKINO.

℥ Cubebino. ʒvj (25 gr.).

Alcohol. ʒiij (100 gr.).

Azúcar. ʒjβ (50 gr.).

Aceite de menta piper. 5 gotas.

Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. pastillas de ḡjx (50 cent.).

I. Blenorragia. *D.* Cinco mañana y noche, aumentando gradualmente hasta diez.

4859. P. DE CHAUSSIER.

- ℥ Opio. ḡvj (3 dec.).
- Alcanfor. ḡxviiij (1 gr.).
- Azúcar. ḡiiij (12 gr.).
- Mucil. de goma trag. c. s.

H. S. A. cincuenta pastillas.
I. Catarro agudo, bronquitis, tisis. D. Cinco á diez al dia.

4860. P. DE CHOCOLATE CON CLORURO DE PLATA ó Pastillas de cloruro de plata (Sicard).

- ℥ Cloruro de plata. ḡj (5 cent.).
 - Chocolate. c. s.
- para doce pastillas.
I. Escrófulas. D. Una al dia.

4861. P. DE CHOCOLATE Y HIERRO REDUCIDO POR EL HIDRÓGENO (Miquelard y Quevenne).

- ℥ Hierro reducido por el hidróg. 400
 - Chocolate fino. 1400
- Se pone el hierro en el chocolate ablandado á fuego lento y se hacen pastillas de ḡxviiij (1 gr.).
Nota. Cada una contendrá $\frac{1}{15}$ de su peso de hierro ó cerca de ḡj (5 cent.).

4862. P. DE EXTRACTO ALCOHÓLICO DE DIGITAL (Labelonye).

- ℥ Extr. alcohol de digit. ḡxviiij (1 gr.).
 - Azúcar en polvo. ḡbβ (250 gr.).
 - Mucil. de gomatragac. c. s.
- H. S. A. doscientas ochenta y ocho tabletas, cada una de las cuales contendrá cerca de ḡ $\frac{1}{36}$ de extracto hidroalcohólico de digital.
I. Son diuréticas y expectorantes. D. De cuatro á diez y seis pastillas al dia.

4863. P. DIVINAS.

- ℥ Ambar gris
- Almizcle, ãã. ḡvj (3 dec.).
- Estoraque calamita. ḡβ (2 gr.).
- Nuez moscada. ḡxij (6 dec.).
- Cáscara de naranja
- Semillas de albaha-
ca, ãã. ḡβ (2 gr.).

- Macis. ḡxij (6 dec.).
 - Clavo. ḡβ (2 gr.).
 - Azafran. ḡjv (2 dec.).
 - Azúcar. ḡxij (375 gr.).
 - Mucil. de gom. trag. c. s.
- H. S. A. pastillas de ḡxij (6 dec.).

4864. T. DE EMETINA PECTORALES (Magendie).

- ℥ Azúcar. ḡj (30 gr.).
 - Emetina de color. ḡviiij (4 dec.).
 - Mucil. de goma tragac. c. s.
- H. S. A. sesenta y dos pastillas muy iguales.

I. y D. Una cada dos ó tres horas para facilitar la expectoracion en los catarros pulmonares crónicos y en la coqueluche. Se usan tambien como astringentes en los casos de diarrea sin inflamacion. Es esencial suspender su uso si se experimentan náuseas.

Nota. Se suele dar á estas pastillas el color de rosa; con éste objeto se usa un poco de laca carminada.

4865. T. DE EMETINA VOMITIVAS (Magendie).

- ℥ Azúcar. ḡx (40 gr.).
 - Emetina de color. ḡxviiij (1 gr.).
 - Mucil. de goma tragac. c. s.
- H. S. A. tabletas de ḡxviiij (1 gr.).

I. Embarazo gástrico, calenturas biliosas, tisis. D. Una de estas pastillas, tomada en ayunas, basta comunmente, segun Magendie, para hacer vomitar á los niños. Tres ó cuatro excitan el vómito en los adultos.

4866. P. DE ÉNULA CAMPANA.

- ℥ Polvo de énula camp. ḡβ (15 gr.).
- Polvo de lirio de Flo-
rencia. ḡj (4 gr.).
- Azúcar. ḡbj (500 gr.).
- Mucil. de goma tragac. c. s.

I. Escorbuto, hidropesia y clorosis. D. ḡβ (15 gr.) al dia.

4867. T. DE ESCAMONEA (Bourieres).

- ℥ Resina blanca de escamonea. 15

Merc. dulce preparado al vapor. 15
 Azúcar. 175
 Goma tragacanto. 2
 Tintura de vainilla. 3
 H. S. A. pastillas de ꝑxij (6 dec.).
 D. Una á dos para purgar los niños, y dos á cuatro para los adultos.

4868. T. DE ESCAMONEA Y SEN ó *Tabletas purgantes.*

Ꝛ Escamonea. 12
 Sen. 17
 Ruibarbo. 6
 Clavo. 4
 Cáscaras de limon confitadas. . 32
 Azúcar. 200
 Mucilago de goma tragacanto preparado con agua de canela. . . c. s.
 H. S. A. tabletas de ꝑxviiij (1 gr.).

I. Se usan como purgantes. D. Media á una tableta segun la edad y el sexo. Se la deslíe en medio ó un vaso de agua por la noche, y se la deja hasta el dia siguiente. Se agita al tiempo de tomarla para que se suspendan los polvos no disueltos.

4869. T. DE ESPONJA QUEMADA (F. F.).

Ꝛ Esponja quemada en polvo. ꝑjv (125 gr.).
 Azúcar blanca. ꝑxij (375 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto hecho con agua de canela. c. s.
 H. S. A. tabletas de ꝑxij (6 dec.).

I. Bocio y escrúfulas. D. De dos á cuatro ó mas al dia.

4870. P. DE DUBOIS MODIFICADAS.

Ꝛ Esponja calcinada. ꝑjß (50 gr.).
 Bicarbonato de sosa. ꝑvj (25 gr.).
 Azúcar. ꝑxjv (413 gr.).
 Goma tragacanto. ꝑj (4 gr.).
 Goma arábica. ꝑij (8 gr.).
 Esencia de menta. 16 gotas.
 H. S. A. tabletas de ꝑxviiij (1 gr.).

I. Bocio.

4871. P. EFERVESCENTES:

Giradou ha inventado hacer

unas pastillas de ácido tártrico y otras de bicarbonato de sosa; da color de rosa á una de ellas, y las reune una con otra por medio de mucilago. De este modo la reaccion se verifica en el estómago. Estas pastillas no han tenido éxito. Las *grageas minerales* de Megé son una cosa análoga, solo que se las deslíe en agua.

4872. P. ESCILÍTICAS (*Broussonnet*).

Ꝛ Escila en polvo fino. ꝑß (2 gr.).
 Azúcar. ꝑij (60 gr.).
 Mucil. de goma tragacanto. . . c. s.
 para ciento veinte pastillas, de las que cada una contiene un cuarto de grano de escila.

4873. P. ESTIBIO-ARSENICALES ALTERANTES.

Ꝛ Acido arsenioso. ꝑij (10 cent.).
 Protóxido de antimon. ꝑx (50 cent.).
 Pasta de chocolate con vainilla. ꝑbj (500 gr.).
 Se puede reemplazar la pasta de chocolate por una masa de azúcar en polvo y mucilago de goma tragacanto con agua de flor de naranjo.

H. S. A. mil pastillas, que contienen cada una $\frac{1}{500}$ ($\frac{1}{10}$ de mil.) de ácido arsenioso y $\frac{1}{100}$ ($\frac{1}{2}$ mil.) de protóxido de antimonio.

I. Afecciones sífilíticas constitucionales rebeldes al mercurio y preparaciones del iodo, enfermedades rebeldes de la piel, soriasis, calenturas intermitentes y neuralgias. Obran como la tisana de Feltz. D. Una cada hora y pueden darse al fin dos.

4874. P. ESTIMULANTES.

Ꝛ Gengibre. ꝑij (8 gr.).
 Azafran oriental. ꝑj (4 gr.).
 Almizcle,
 Clavo; ãã. ꝑß (2 gr.).
 Almáciga. ꝑij (12 gr.).
 Ambar gris. ꝑß (6 dec.).
 Azúcar. ꝑßß (250 gr.).

H. S. A. pastillas de ʒj (4 gr.).
 I. Anafrodisia. D. Dos ó tres al dia.

4875. P. ESTIMULANTES DE GENGIBRE.

ʒ Gengibre,
 Canela,
 Nuez moscada,
 Clavo, ãã. ʒj (4 gr.).
 Oleosácaro de alcaravea. ʒjβ (6 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto. c. s.
 H. S. A. pastillas de ʒxviiij (1 gr.).

I. Dispepsia, bronquitis, catarro pulmonar, afonía, enuresis.
 D. Dos á cinco al dia.

4876. T. ESTOMACALES (Daubenton).

ʒ Ambar gris ʒij (10 cent.).
 Ipecacuana. ʒβ (2 gr.).
 Catecú. ʒj (4 gr.).
 Azúcar. ʒβ (15 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto. . c. s.
 H. S. A. treinta tabletas.

I. Dispepsia, diarrea y disenteria crónicas, escrófulas, sarampion. D. Una á tres al dia.

4877. T. DE ETIOPE MARCIAL.

ʒ Oxido negro de hierro. 4
 Canela en polvo. 4
 Azúcar. 20
 Mucilago de goma tragacanto. . c. s.
 H. S. A. tabletas de ʒxij (6 dec.).
 Cada una contiene ʒij (1 dec.) de etiope marcial.

4878. P. FERRUGINOSAS (Bailly).

ʒ Limaduras de hierro porfirizadas. ʒj (30 gr.).
 Pasta de chocolate. ʒij (60 gr.).
 Azafran en polvo fino. ʒij (8 gr.)
 Mucil. de goma tragac. c. s.
 H. S. A. pastillas de ʒxij (6 dec.).

I. Clorosis, leucorrea, amenorrea, catarro útero-vaginal, caquexia. D. Tres ó cuatro al dia.

4879. P. DE FOSBROKE.

ʒ Pimiento de España. . ʒiiij (12 gr.).
 Gengibre.
 Rábano, ãã. ʒij (8 gr.).
 Azúcar. ʒj (30 gr.).
 Conserva de rosas. . . . ʒj (4 gr.).
 H. S. A. nueve pastillas.

I. Sordera catarral. D. Se toma una.

4880. P. DE GELATINA DE CUERNO DE CIERVO (Mouchon).

ʒ Sacarolado de cuerno de ciervo. ʒβ (2 gr.).
 Azúcar. ʒLjv (3 gr.).
 Mucilago. c. s.

H. S. A. tabletas de ʒxvj (8 dec.).

Una onza (30 gr.) corresponde á ʒβ (15 gr.) de cuerno de ciervo.

4881. T. DE GELATINA DE LIQUEN (Beral).

ʒ Sacarolado de liquen en polvo. 500
 Azúcar en polvo. 540
 Sacaruro de vainilla en polvo. 60
 Mucilago de goma arábica reducido á la cuarta parte, cerca de. 425

H. S. A. tabletas de figura orbicular y de á ʒxviiij (1 gr.) de peso. Cada onza (30 gr.) de estas tabletas contiene ʒxviiij (1 gr.) de gelatina seca, que corresponden á ʒij (8 gr.) de gelatina blanda.

I. Bronquitis, catarro y neumonía crónica, caquexia, tisis pulmonar, escrófulas, bulimia. D. ʒij á ʒjv (8 á 15 gr.) y mas en el espacio del dia.

4882. T. DE GENGIBRE.

ʒ Gengibre en polvo. 4
 Azúcar blanca. 7
 Mucilago de goma tragacanto. . c. s.
 H. S. A. tabletas de ʒxvj (8 dec.).
 Cada pastilla contiene ʒij (1 dec.) de gengibre.

4883. T. DE GINGSENG ó Pastillas de Richelieu.

℥ Azúcar.	℔ij (1000 gr.).
Vainilla.	ʒij (60 gr.).
Gingseng en polvo. ʒj	(30 gr.).
Tint. de cantáridas. ʒj	(4 gr.).
Accite de canela. . .	40 gotas.
Esencia de ambar. . .	2 gotas.
Mucilago.	c. s.

H. S. A. pastillas de ʒxviii (1 gr.), en cada una de las cuales se hallará una décima parte de grano de tintura de cantáridas. Algunas fórmulas no contienen las cantáridas.

I. Anafrodisia. *D.* Cuatro ó cinco al día.

Nota. Estas pastillas pueden determinar accidentes sin reanimar ni aun momentáneamente facultades que no corresponden ya á impotentes deseos.

4884. P. DE GOMA.

℥ Polvos de goma arábica.	7
Goma arábica en grano.	4
Azúcar molido.	24
Agua de azahar.	4

Se disuelve la goma en grano en el agua de azahar, se cuele la solución, y con este mucilago, los polvos de goma y el azúcar se hacen pastillas de ʒxvj (8 dec.).

4885. P. Ó TABLETAS DE GOMA ARÁBIGA (F. F.).

℥ Goma aráb. en polv. ℔j	(500 gr.).
Azúcar en polvo. . ℔iiij	(1500 gr.).
Agua de azahar. . . ʒij	(64 gr.).

Se hace un mucilago con toda el agua y parte de la goma, se añade el resto de esta mezcla con el azúcar, y se hacen tabletas de ʒxvj (8 dec.).

Son demulcentes como la pasta de goma arábica. *D.* De cuatro á ocho ó mas.

4886. P. DE GUARANA.

℥ Extracto alcohólico de guarana.	℔ß (250 gr.).
---	---------------

Azúcar aromatizada con vainilla. ℔j (500 gr.).

Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. pastillas de ʒxij (6 dec.).

D. Diez y seis á veinte al día.

4887. T. DE HIERRO ó Tabletillas marciales (F. F.).

℥ Limaduras de hierro porfirizadas.	ʒj (32 gr.).
Azúcar blanca.	ʒx (320 gr.).
Canela en polvo.	ʒij (8 gr.).
Mucil. de goma tragac. c. s.	

H. S. A. tabletas de á ʒxij (6 dec.), y cada una contendrá ʒj (5 cent.) de hierro.

I. Amenorrea, escrófulas, clorosis, dispepsia, acidez de las primeras vias, etc. *D.* Tres ó cuatro al día.

4888. P. INCISIVAS QUERMETIZADAS (Jobart).

℥ Quermes mineral ,	
Escila en polvo ,	
Opio gomoso, aa.	ʒjx (50 cent.).
Ipecacuana.	ʒxviii (1 gr.).
Azúcar.	ʒß (15 gr.).
Mucilago de goma tragacanto. c. s.	

para hacer cincuenta pastillas. *I.* Coqueluche, bronquitis, catarro, tos convulsiva, asma, ronquera. *D.* Una cada tres horas.

4889. P. DE IODOFORMO (Bouchardat).

℥ Iodoformo.	ʒj (4 gr.).
Azúcar blanca.	ʒxx (80 gr.).
Esenc. de yerbabuena. ʒxviii	(1 gr.).
Mucil. de goma tragac. c. s.	

H. S. A. pastillas de ʒxviii (1 gr.).

Se dan cinco ó seis al día en las afecciones escrofulosas, bronquitis, catarro, calenturas intermitentes, escrófulas, estomacace.

4890. P. DE IODURO DE HIERRO.

℥ Iodo	ʒjv (16 gr.).
------------------	---------------

Hierro porfirizado. . . ʒij (8 gr.).
 Agua. ʒv (150 gr.).
 Se calienta en el baño maría hasta que se haya obtenido un líquido sin color. Por otra parte se mezcla con

Azúcar bl. granulad. ʒxxv (800 gr.).
 Esencia de yerbab. ʒj (4 gr.).
 Se añade á la solución de ioduro de hierro c. s. de agua de yerbabuena.

H. S. A. pastillas de ʒjx (50 cent.).

I. Clorosis, afecciones escrofulosas y sífilíticas, afecciones tuberculosas. Es muy buena preparación. D. Diez pastillas al día, aumentando sucesivamente la dosis.

4891. P. DE IODURO DE HIERRO (F. P.).

ʒ Ioduro de hierro. . . ʒj (4 gr.).
 Azafran en polvo. . . ʒβ (16 gr.).
 Azúcar. lbβ (250 gr.).
 Goma tragacanto,
 Agua de canela, āā. . c. s.

H. S. A. doscientas ochenta y ocho pastillas. Cada una contiene ʒ¼ (12 mil.) de ioduro de hierro.

I. Leucorrea, escrófulas, amenorrea, catarro útero-vaginal, dispepsia, herpes, lepra, elefantiasis. D. Ocho á diez al día. Cada tres ó cuatro días se toma una pastilla mas.

4892. Otras (DUPASQUIER).

ʒ Solución oficial de protoioduro de hierro. 100
 Goma arábica. 30
 Azúcar. 300

H. S. A. pastillas de ʒxij (6 dec.).
 Cada una contiene ʒ½ (25 mil.) de ioduro.

D. Cinco á diez al día.

4893. T. DE PROTOIODURO DE HIERRO (Dupasquier).

ʒ Solución normal de protoioduro de hierro. . ʒv (20 gr.)

Pasta de tabletas de malvabisco, c. s. para hacer doscientas tabletas.

Se echa la solución en una cuchara de hierro y se añade:

Azúcar en polvo. . . . ʒj (32 gr.).

Se pone al calor y cuando el jarabe haya adquirido casi la consistencia de azúcar, cocido á la pluma, se mezcla rápidamente con la pasta, y se divide en tabletas que cada una contiene casi una octava parte de grano de iodo.

D. Una ó á lo mas dos al día, aumentando la dosis paulatinamente.

4894. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO (Corbel Lagneau).

ʒ Protoioduro de mercur. ʒβ (2 gr.).
 Acetato de morfina. . . ʒvj (3 dec.).
 Pasta de chocolate con vainilla. ʒj (30 gr.).

H. S. A. setenta pastillas.
 I. Síntomas consecutivos de la sífilis. D. Una á seis al día.

4895. T. DE IODURO DE POTASIO CON CAFÉ.

ʒ Ioduro de potasio. ʒxxvij (1,50 gr.).
 Café de Moca en polvo. ʒxviii (4 gr.).
 Azúcar en polvo. . ʒjβ (50 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto. . c. s.
 H. S. A. cien tabletas.

I. Escrófulas, bocio, leucorrea, atrofia mesentérica, catarro útero vaginal. D. Dos, mañana y noche.

4896. P. DE IODURO DE POTASIO (Giordano).

ʒ Ioduro de potasio. . ʒj (4 gr.).
 Azúcar. ʒiij (90 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto. c. s.

H. S. A. tabletas de ʒxij (6 dec.).

Cada pastilla contiene ʒβ (25 mil.) de ioduro.

D. Una á seis al día.

4897. P. DE IPECACUANA.

℥ Ambar gris.	ḡjv (2 dec.).
Ipecacuana.	ḡj (4 gr.).
Catecú.	ḡij (8 gr.).
Azúcar.	ḡj (30 gr.).
Mucilago.	c. s.

H. S. A. sesenta pastillas.

I. Coqueluche, asma, catarro, pica. D. Una de hora en hora.

4898. Otras (L. C. CADET).

℥ Azúcar.	ḡxxx (940 gr.).
Ipecacuana.	ḡv (20 gr.).
Goma tragacanto.	ḡβ (2 gr.).
Ag. de flor de naranj.	ḡijβ (75 gr.).

H. S. A. pastillas de ḡxij (6 dec.) de peso, de las cuales cada una contendrá un cuarto de grano de ipecacuana.

I. y D. Romadizos, coqueluche, asma, etc. Se toman ocho ó diez al dia con el intervalo de una hora.

4899. Otras (F. P.).

℥ Ipecacuana.	4
Azúcar.	4
Mucilago de goma tragacanto muy consistente, preparado con agua de flor de naranjo.	c. s.

Se prepara con velocidad para que el polvo no se humedezca mucho y se disuelvan los principios extractivos, y se divide la masa en pastillas de ḡβ (6 dec.).

I. Toses, catarros crónicos.

4900. P. DE IPECACUANA CON AZÚCAR (F. E.).

℥ Polvos de ipecacuan.	ḡj (4 gr.).
Azúcar blanca.	ḡvβ (165 gr.).
Goma tragacanto.	ḡij (12 gr.).
Agua, c. s. para que se disuelva la goma.	

Se mezcla todo exactamente y se hacen ciento cuarenta y cuatro pastillas, que se dejan secar bien.

I. Producen muy buenos efectos en todas las enfermedades de los niños, que vienen acompañadas

de embarazos en las primeras vias, y en las afecciones catarrales, coqueluche, etc.

Nota. Cada escrúpulo contiene ḡβ (25 mil.) de ipecacuana.

D. Hasta ḡj (12 dec.) ó una pastilla, que se repite por intervalos segun haya necesidad.

4901. T. DE IPECACUANA Y CHOCOLATE Ó DE DAUBENTON (F. F.).

℥ Ipecacuana en polvo.	ḡj (32 gr.).
Chocolate con vainilla.	ḡxij (375 gr.).

Se liquida el chocolate á un calor moderado, se le incorpora el polvo de ipecacuana y se divide en masas pequeñas de á ḡxij (65 cent.), que se arrollarán en bolas, á las que se hará tomar una figura hemisférica, teniéndolas durante algunos instantes sobre una hoja de lata caliente.

I. Se dan como vomitivas á los niños, y bastan tres ó cuatro para producir este efecto. A menos dosis son útiles en las afecciones catarrales, coqueluche, etc.

4902. P. DEL JAPON.

℥ Extracto de cáñamo.	ḡxviiij (4 gr.).
Extr. de estramonio.	ḡ ³ / ₅ (3 cent.).
Ambar,	
Almizcle, ãã.	c. s.
H. S. A. pastillas de	ḡjv (2 dec.).

4903. P. DE LACTATO DE HIERRO.

℥ Lactato de peróxido de hierro.	ḡvj (25 gr.).
Esenc. de yerbabuena.	ḡxviiij (4 gr.).
Azúcar.	ḡbj (500 gr.).
Agua destilada de yerbabuena.	c. s.

H. S. A. pastillas de ḡx (5 dec.).
I. Clorosis y accidentes que de ella dependen. D. Seis á doce pastillas al dia.

4904. Otras (CAP).

℥ Lactato de hierro.	ḡj (30 gr.).
Azúcar blanca.	ḡxij (375 gr.).

Mucilago de goma arábica. . . c. s.
 H. S. A. pastillas de ꝑxij (6 dec.).
 Cada una contendrá ꝑj (5 cent.)
 de sal ferruginosa.

I. Dismenorrea, clorosis, es-
 crófulas, pénfigo, dispepsia, con-
 gestion, catarro útero-vaginal.
D. Cinco á seis pastillas al dia.

4905. P. DE LECHE (Del Bue).

Ꝓ Leche reciente. . . lbij (1000 gr.).
 Se cuece y se añade:

Vinagre. ꝑß (15 gr.).

Se exprime fuertemente el coá-
 gulo y se contunde en un mortero
 de mármol con

Jarabe emulsivo. ꝑij (60 gr.).

Bicarbonato de sosa. ꝑj (4 gr.).

Despues se añade:

Azúcar bl. en polvo. lbij (1000 gr.).

Goma aráb. en polvo. ꝑij (8 gr.).

Se hacen pastillas de ꝑxviiij (1
 gr.).

4906. P. DE LIMON.

Ꝓ Azúcar. 480

Zumo de limon. 75

Oleosácara de limon. 120

Háganse pastillas.

4907. T. DE LIQUEN.

Ꝓ Sacarolado de liquen. 4

Azúcar. 2

H. S. A. tabletas de ꝑxviiij (1
 gr.) con c. s. de agua.

**4908. T. DE LIQUEN ISLÁNDICO
 (F. F.).**

Ꝓ Jalea seca de liquen. lbj (500 gr.).

Azúcar bl. en polvo. lbij (1000 gr.).

Polvos de goma aráb. ꝑjß (48 gr.).

Agua comun. c. s.

Se hace un mucilago con la goma
 y el agua, se añade el azúcar y la
 jalea en polvo, y se bate todo en
 un mortero para formar una pasta
 homogénea que se divide en ta-
 bletas de ꝑxvj (8 dec.).

D. Tiene las mismas propieda-
 des que la jalea y pasta de liquen.

**4909. T. DE LIQUEN ó Pastillas de
 liquen (Robinet).**

Ꝓ Polvo de liquen azu-

carado. lbß (250 gr.).

Azúcar en polvo. lbj (500 gr.).

Agua. ꝑij (60 gr.).

Se pone en un mortero el agua
 y una parte del polvo de liquen;
 se hace un mucilago, al cual se
 añade despues el resto del polvo
 y por último el azúcar. Entonces
 se forman S. A. tabletas de ꝑxij
 (6 dec.) de peso.

D. La misma que las anterio-
 res.

4910. T. DE LIRIO.

Ꝓ Polvo de lirio. 4

Azúcar blanca. 47

Mucilago de goma tragacanto. c. s.

H. S. A. tabletas de ꝑxviiij
 (1 gr.).

I. Son expectorantes y muy úti-
 les para disminuir el mal olor
 del aliento.

4911. T. DE MAGNESIA (F. F.).

Ꝓ Magnesia calcinada. ꝑiij (96 gr.).

Azúcar blanca. ꝑxiiij (416 gr.).

Mucilago de goma tragacanto. . c. s.

Se preparan tabletas de ꝑxvj
 (8 dec.), de las que cada una con-
 tendrá ꝑiij (15 cent.) de magne-
 sia.

I. Agrios del estómago, atonía
 de los órganos digestivos y dis-
 pepsia. *D.* De seis á doce.

4912. T. DE MAGNESIA.

Ꝓ Magnesia calcinada. ꝑß (15 gr.).

Azúcar. ꝑij (8 gr.).

Nuez moscada. ꝑjv (2 dec.).

Mucilago de goma tragacanto. c. s.

H. S. A. tabletas de ꝑxviiij
 (1 gr.).

I. Acidez de las primeras vias,
 dispepsia, estafiloma, sarampion.
D. Cinco á diez al dia.

4913. T. DE MAGNESIA Y CATECÚ
(F. F.).

℥ Magnesia calcinada. ℥ij (64 gr.).
 Catecú. ℥j (32 gr.).
 Azúcar en polvo. . ℥xij (407 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto, preparado con agua de canela, c. s.

Se preparan tabletas de ḡxvj (8 dec.), de las cuales cada una contiene ḡj (5 cent.) de catecú y ḡij (10 cent.) de magnesia.

I. Fetidez del aliento, reblandecimiento de las encías y dispepsia por aumento de secreción del jugo gástrico ó por un estado de atonía de la mucosa del estómago. D. Seis ó siete tabletas.

4914. T. DE MAGNESIA Y CHOCOLATE
(Chevalhier).

℥ Azúcar en polvo. . . ℔jβ (750 gr.).
 Chocolate en polvo. . ℥xij (375 gr.).
 Magnesia en polvo. . ℥jv (125 gr.).
 Se mezcla y se añade:

Mucilago de goma tragacanto. c. s.
 H. S. A. tabletas de ℔j (12 dec.).

4915. P. Ó TABLETAS DE MALVABISCO
(F. F.).

℥ Polvo de raíz de malvabisco. ℥ij (64 gr.).
 Azúcar. ℥xjv (436 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto con agua de flores de naranjo, c. s.

H. S. A. pastillas de ḡxvj (8 dec.).

I. Se usan como expectorantes demulcentes en los romadizos ligeros con tos y sequedad de la garganta.

4916. P. DE MALVABISCO GOMOSAS
(F. E.).

Su composición es muy análoga á la de la pasta de goma, y se preparan haciendo un cocimiento de ℥jv (125 gr.) de raíz reciente de malvabisco limpia y partida en pedazos, en ℔jvβ (2250 gr.) de agua.

Se disuelve á fuego lento en el líquido colado, agitando continuamente con una espátula de madera, ℥xxx (940 gr.) de goma arábiga muy blanca y en polvo, y despues se mezclan ℥xxx (940 gr.) de azúcar muy blanca. Se cuele y se evapora hasta solidificar medianamente la masa, no dejando de agitar. Se añaden cuatro claras de huevo disueltas en ℥jv (125 gr.) de agua de azahar. Se agita fuertemente sobre el fuego hasta consumir la humedad. Se echa la masa en un papel muy blanco cubierto de almidon y colocado sobre un cedazo de crin. Se aparta el papel, se separa el almidon restante, y luego que está medio fria la masa se la corta en tabletas y se las conserva en una vasija á propósito, cubriéndolas con almidon. Se usan del mismo modo que las anteriores.

I. Catarros pulmonares, neumonía crónica, tos.

4917. P. DE MANÁ.

℥ Maná escogido. . . . ℥iij (90 gr.).
 Agua de tusilago. . . . ℥vj (180 gr.).

Se disuelve el maná, se cuele y con ℥xviiij (560 gr.) de azúcar blanca en polvo se hacen pastillas S. A.

I. Son ligeramente purgantes y convienen especialmente á los niños, que las toman fácilmente creyendo que son confites. D. ℥j (4 gr.).

4918. T. DE MANÁ (F. F.).

℥ Maná en lágrima. . ℥ij (64 gr.).
 Azúcar en polvo. . . ℥xjv (339 gr.).
 Goma tragacanto. . ℔β (2 gr.).
 Agua de azahar. . . . ℥j (32 gr.).

Se divide el maná triturándole por algun tiempo con el azúcar, y añadiéndole el mucilago se reduce la mezcla á tabletas de ḡxvj (8 dec.), de las que cada una contendrá ḡij (1 dec.) de maná.

I. Se administran como expectorantes en las afecciones semi-agudas de las vias aéreas, y en el periodo creciente de los catarros especialmente de los niños. *D.* Cuatro á ocho pastillas.

4919. P. DE MANÁ (Boudet).

- ℥ Maná en lágrima. 125
- Azúcar en polvo. 850
- Goma arábica en polvo. 50
- Agua de flor de naranjo. 60

Se funde á fuego lento el maná en el agua de flores de naranjo, se cuele por un lienzo, se añade la goma mezclada antes con dos veces su peso de azúcar, se incorpora S. A. el resto del azúcar y se hacen pastillas de ḡxvj (8 dec.)

Este método es mas pronto que el de la F. F. y no hay necesidad de pulverizar el maná, lo que es muy pesado.

4920. T. DE MANÁ ó Pastillas de Calabria (Manfredi).

- ℥ Maná en lágrima. . ḡvj (180 gr.)
- Raiz de malvabisco. ḡiij (90 gr.)
- Azúcar blanca. . . . ḡbvj (3000 gr.)
- Ext. acuoso de opio. ḡxij. (6 dec.)
- Ag. de flor de naran. ḡiij (90 gr.)
- Esencia de bergam. 4 gotas.
- Esencia de limon. . 4 gotas.
- Agua de fuente. . . ḡbvj (2000 gr.)

Se hierve la raiz de malvabisco con el agua durante cinco á seis minutos, se añade el maná, se le disuelve en caliente y se cuele; se añade el azúcar y el extracto disuelto en un poco de agua; se le evapora hasta la consistencia de extracto sólido; se añade entonces el agua de flores de naranjo y las esencias disgregadas por medio de azúcar. Se menea mucho con una espátula de boj hasta que se haya espesado la masá; se echa despues en un cajoncito de papel dado de aceite, y antes que sea completo el enfriamiento se corta en pedacitos cuadrados de dos

líneas de espesor por seis líneas de anchura.

I. Neumonía, toses pertinaces, coqueluche, bronquitis, catarro pulmonar crónico y tisis, caquexia, escrófulas, estomacace y dispepsia. *D.* De 3j á 3ij (4 á 8 gr.) y mas en las veinticuatro horas.

4921. P. DE MANÁ TARTARIZADAS (H. DE AL.).

- ℥ Crémor de tártaro. . . ḡβ (45 gr.)
- Maná. ḡjv (125 gr.)
- Agua. ḡx (300 gr.)

Se cuece hasta la consistencia conveniente y se hacen pastillas de diez á doce granos.

Es un laxante muy cómodo para los niños.

4922. T. Ó PASTILLAS DE MANTECA DE CACAO.

- ℥ Manteca de cacao. . . ḡj (30 gr.)
- Azúcar. ḡvij (210 gr.)
- Goma tragacanto. . . ḡj (4 gr.)
- Agua de rosas. . . . ḡj (30 gr.)

Se tritura la manteca con el azúcar, y por medio del mucilago se hacen pastillas de ḡxviii (1 gr.)

4923. T. MARCIALES (Sydenham).

- ℥ Oxido negro de hierro. ḡj (30 gr.)
- Canela. ḡij (8 gr.)
- Azúcar. ḡv (150 gr.)
- Mucilago de gomatragacanto, c. s.
- H. S. A. tabletas de ḡxij (6 dec.)

I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, dispepsia, acidez de las primeras vias. *D.* De dos á seis al dia.

4924. Otras (H. DE IT.).

- ℥ Oxido negro de hierro. ḡjβ (45 gr.)
- Chocolate. ḡxv (470 gr.)
- H. S. A. setenta y dos pastillas.

I. Son muy útiles para los niños.

4925. P. MASTICATORIAS.

- ℥ Raiz de imperatoria en polvo. ḡij (8 gr.)

Almáciga. ℥℞ (45 gr.).

Se contunden en un mortero caliente y se hacen diez pastillas que se usan como sialagogas.

4926. P. DE MECHOACAN (F. M.).

℥ Mechoacan en polvo. ℥ij (90 gr.).

Jalapa en polvo. . . . ℥j (30 gr.).

Azúcar blanca. . . . ℔℥℥ (750 gr.).

H. S. A. pastillas con c. s. de mucilago de goma tragacanto.

I. Son purgantes, y se usan en las enfermedades de los niños.

4927. T. DE MENTA INGLESAS.

℥ Azúcar blanca. . . . ℔j (500 gr.).

Esencia de yerbabuena

de sabor de pimienta. ℥j (4 gr.).

Goma tragacanto. . . ℥ij (8 gr.).

Goma arábica. . . . ℥ij (8 gr.).

Agua de yerbabuena. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. tabletas de á ḡxij (6 dec.).

I. Son estomacales y carminativas.

4928. P. DE MENTA PIPERITA (F. F.).

℥ Esenc. de yerbabuena

de sabor de pimienta. ℥j (4 gr.).

Azúcar muy blanca. ℥xij (375 gr.).

Agua de yerbabuena de sabor de pimienta, c. s.

Se machaca el azúcar en un mortero de mármol y se pasa por un tamiz de cerda; se vuelve á tamizar el producto por otro de seda, y se reserva para hacer las pastillas el azúcar que no puede pasar por él. Se echa parte de este azúcar en un cacito de pico con la cantidad necesaria de agua de yerbabuena para hacer una pasta, se pone á calentar y cuando empiece á hervir se añade el resto del azúcar apartado y la esencia de yerbabuena; se agita por medio de una varilla de metal y se echa la masa en gotas separadas sobre hojas de lata, y se concluye la desecacion en la estufa á fuego lento.

I. Se usan como tónicas, estomacales y antiespasmódicas. D. De seis á doce.

Del mismo modo se preparan las PASTILLAS AROMÁTICAS DE ROSA, LIMON Y FLOR DE NARANJO.

4929. P. Ó TABLETAS MERCURIALES.

℥ Mercurio. ℥ij (64 gr.).

Goma arábica. . . . ℥j (32 gr.).

Azúcar. ℥jx (280 gr.).

Vainilla. ℥℥ (2 gr.).

Se hace un mucilago con la goma arábica y ℥j (32 gr.) de agua, y se tritura el mercurio con el mucilago hasta que no se perciba el menor glóbulo: se añade el azúcar en el cual se ha dividido la vainilla por trituracion y se forman pastillas de ḡxij (6 dec.): cada pastilla contiene ḡij (1 dec.) de mercurio.

4930. P. MERCURIALES ALTERANTES.

℥ Calomel. bien lavados. ḡxviii (4 gr.).

Pasta de chocolate con

vainilla. ℔j (500 gr.).

H. S. A. mil pastillas.

Se puede reemplazar el chocolate por ℔j (500 gr.) de pasta hecha con azúcar en polvo y mucilago preparado con agua de rosas. Cada pastilla contendrá ḡ¹/₅₀ (1 mil.) de calomelanos.

I. Infeccion sifilitica. D. Diez al dia, tomando una cada hora ó cada dos horas. Diariamente se aumentan dos. Cuando se llegue á tomar veinte pastillas (2 cent.) será prudente no aumentar mas, y se administrarán durante tres meses cuando menos ó seis meses cuando mas.

4931. P. MERCURIALES (Corbel Lagneau).

℥ Mercurio metálico,

Manteca de cacao, añ. ℥ij℥ (40 gr.).

Se tritura hasta que se extinga

el mercurio con c. s. de aceite de huevo, y se añade:

- Chocol. con vainilla. . . 5x (40 gr.)
- H. S. A. cien pastillas.

I. Síntomas primitivos de la sífilis. D. Dos á doce al dia.

4932. T. DE MERCURIO DULCE ó Pastillas vermífugas (F. F.).

- Mercurio dulce preparado al vapor. . . 5j (32 gr.)
 - Azúcar blanca. 5xj (350 gr.)
 - Mucilago de goma tragacanto. c. s.
- Se hacen S. A. tabletas de 5xij (6 dec.), y cada una contendrá 5j (5 cent.) de mercurio dulce.
- D. Una á dos pastillas para los niños.

4933. P. DE MERCURIO SACARINO (Lagneau).

- Azúcar. 5jx (270 gr.)
 - Mercurio. 5ij (60 gr.)
 - Goma arábica. 5v (20 gr.)
 - Vainilla. 5B (2 gr.)
 - Agua. c. s.
- H. S. A. quinientas setenta y seis pastillas; cada una contiene 5ij (1 dec.) de mercurio.
- I. Afecciones sífilíticas. D. Una á cuatro al dia.

4934. P. MOGÓLICAS.

- Azúcar. 5iijB (105 gr.)
 - Goma arábica. 5j (30 gr.)
 - Extr. seco de opio. 5xc (5 gr.)
 - Clavo,
 - Macis,
 - Nuez moscada, ãã. . . 5ijB (10 gr.)
 - Almizcle. 5v (25 cent.)
 - Agua dest. de rosas. c. s.
- H. S. A. pastillas ó pildoras de 5vj (3 dec.).
- I. y D. Se aconsejan dos ó tres al acostarse para excitar las fuerzas y facilitar la digestion.

4935. T. DE MUSGO DE CÓRCEGA (Deleschamps).

- Azúcar de musgo de Córcega. 5xv (459 gr.)

- Goma aráb. en polvo. 5j (30 gr.)
- Mucilago de goma tragacanto poco espeso y aromatizado con esencia de limon, c. s.
- H. S. A. pastillas de á 5xij (6 dec.).

I. Lombrices intestinales, particularmente en los niños. D. Seis á doce y aun mas al dia.

4936. T. DE MUSGO MARINO PERLADO.

- Jar. de musgo marino. 5bj (500 gr.)
 - Goma tragacanto. 5j (4 gr.)
 - Agua comun. 5jB (45 gr.)
 - H. S. A. tabletas de 5B (2 gr.)
- que se aromatizarán con el aroma que se quiera.

4937. T. DE MUSGO MARINO PERLADO.

- Sacarolado de musgo marino. 5jv (125 gr.)
- Goma tragacanto. 5j (30 gr.)
- Agua. 5xj (330 gr.)
- H. S. A. pastillas, que se aromatizarán segun se quiera.

4938. T. DE NAFTALINA (Dupasquier).

- Naftalina. 5j (4 gr.)
 - Azúcar. 5xij (375 gr.)
 - Mucilago de goma tragacanto,
 - Esencia de anís, ãã. c. s.
 - H. S. A. tabletas de 5xviiiij (1 gr.). Cada una contiene 5j (1 cent.) de naftalina.
- I. Catarros pulmonares crónicos. D. Una á veinte y aun treinta al dia.

4939. T. NITRADAS.

- Nitrato de potasa. 5j (30 gr.)
 - Azúcar pulverizado. 5xj (346 gr.)
 - Goma tragacanto. 5Ljv (3 gr.)
 - Agua. 5vj (24 gr.)
- Háganse tabletas de á 5xij (6 dec.).

4940. T. DE SUBNITRATO DE BISMUTO.

- Subnitrato de bismuto. 50

Azúcar. 438
 Goma tragacanto. 4
 Goma arábiga. 8
 Tintura de vainilla. 8
 Agua. c. s.
 para hacer tabletas de gxxviiij (1 gr.). Cada una representa gij (10 cent.) de subnitrato.

4941. Otras (Trousseau).

z Subnitrato de bismuto. zj (30 gr.).
 Azúcar. lbj (500 gr.)
 Mucilago de goma tragacanto. . . c. s.
 H. S. A. tabletas de gxxviiij (1 gr.)
 y cada una contiene gij (5 cent.)
 de subnitrato.

I. Gastralgia, diarrea. D. Cuatro á ocho al día. Convienen á los niños.

4942. T. DE OJOS DE CANGREJOS.

z Ojos de cangrejos lavados y porfirizados. zij (64 gr.).
 Azúcar en polvo. . . zxxvj (448 gr.).
 Goma y agua de azahar, c. s.

Del mismo modo se preparan las PASTILLAS DE CARBONATO DE CAL.

4943. PASTILLAS OLOSAS DE ALEMANIA.

z Estoraque calamita,
 Benjuí, aa zjv (125 gr.).
 Ládano. zij (8 gr.).
 Sándalo cetrino. . . . zj (30 gr.).
 Carbon de tilo. . . . lbj\beta (750 gr.).
 Sirven, quemándolas, para perfumar las habitaciones.

4944. TABLETAS DE OPIO.

z Extracto de opio. 4
 Azúcar. 60
 Mucilago de goma tragacanto, c. s.
 H. S. A. tabletas de $\text{g\text{v}j}$ (30 cent.). Cada una contiene $\text{g}\frac{1}{6}$ (8 mil.) de opio.

4945. PASTILLAS DE SOBROOXALATO DE POTASA ó Pastillas para la sed (F. F.).

z Sobrooxalato de potasa porfirizado. . zij (12 gr.)

Azúcar bl. en polvo. lbij (1000 gr.).
 Mucíl. de goma trag. c. s.
 Esencia de limon. . . 16 got. (0,6 gr.).
 H. S. A. tabletas de gxxij (6 dec.), y se guardarán en un frasco bien tapado.

I. Son atemperantes y refrigerantes como las sustancias que forman su base; pero en general se prefiere las limonadas secas preparadas con los ácidos cítrico ó tártrico. D. Tres á cuatro al día.

Del mismo modo se preparan las tabletas de ÁCIDO CÍTRICO Y DE ÁCIDO TÁRTRICO.

4946. T. DE ÓXIDO DE ORO.

z Azúc. blanca en polvo. zj (30 gr.).
 Peróxido de oro. . . . $\text{g\text{v}j}$ (3 dec.).

Se mezclan exactamente, y con mucilago de goma tragacanto se forma una masa que se divide en sesenta tabletas.

D. Se toma una en ayunas cada día; aumentando otra cada tres ó cuatro días hasta llegar á diez.

4947. P. PARA DESINFECTAR EL ALIENTO (*Magendie*).

z Cloruro de cal seco. . zij (8 gr.).
 Azúcar. lb\beta (250 gr.).
 Almidon zj (30 gr.).
 Goma tragacanto. . . zj (4 gr.).
 Carmin. $\text{g\text{ij}}$ (15 cent.).
 H. S. A. pastillas de $\text{g\text{ij}}$ (15 cent.).

I. Sirven para quitar el olor desagradable que el humo del tabaco comunica al aliento. D. Tres á seis pastillas de dos en dos horas.

4948. P. PARA PERFUMAR EL ALIENTO ó Pastillas de ambar.

z Ambar $\text{g\text{xij}}$ (6 dec.).
 Gengibre,
 Lirio de Florencia,
 Catecú, aa zj (4 gr.).
 Azúcar. zj (30 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto, c. s.
 H. S. A. cien píldoras.

4949. T. PECTORALES INCISIVAS.

℞ Azúcar en polvo. . . . ℞j (500 gr.).
 Maná en lágrimas. . . ℞jv (125 gr.).
 Tridacio. ℞ij (8 gr.).
 Ipecacuana en polvo. ℞℞ (15 gr.).
 Cebolla alb. en polvo. ℞j (4 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto, c. s.
 H. S. A. tabletas de ℞xviii (4 gr.).

D. Se dan cinco ó seis al dia contra los romadizos y catarros crónicos.

4950. T. PECTORALES, INCISIVAS Y CALMANTES (Jobard).

℞ Azúcar blanca. . . ℞iij (90 gr.).
 Ipecacuana. . . . ℞ij (8 gr.).
 Opio gomoso. . . . ℞j (4 gr.).
 Escamas secas de
 cebolla albarran. ℞Ljv (32 dec.).
 Quermes mineral. . ℞Lxij (31 dec.).
 Mucilago de goma tragacanto, c. s.
 H. S. A. cuatrocientas pastillas.

I. Romadizos, catarros pulmonares crónicos y coqueluche. D. Una cada dos horas.

Nota. Se hacen mas pequeñas para los niños.

4951. P. PECTORALES (Tissot).

En ℞℞ (250 gr.) de agua hirviendo se vierte ℞jv (125 gr.) de flores de naranjo mondadas, ℞ij (60 gr.) de tusilago y ℞ij (60 gr.) de violetas. Se infunde durante veinticuatro horas y se cuela. Se añaden ℞vj (3000 gr.) de azúcar y se hace jarabe y luego pastillas.

4952. T. PECTORALES (Boubel).

℞ Ricinos sin cáscara. . ℞jv (125 gr.).
 Manito en polvo. . . . ℞ij (64 gr.).
 Bálsamo de Tolú. . . . ℞iij (12 gr.).
 Goma aráb. en polvo. ℞℞ (16 gr.).
 Azúcar en polvo. . . . ℞j (500 gr.).
 Laca carminada. . . . ℞viii (4 dec.).
 H. S. A. tabletas de ℞℞ (2 gr.).
 D. Tres á diez al dia.

4953. T. DE PELITRE (Lacombe).

℞ Azúcar pulverizada. . ℞x (300 gr.).
 Tint. alcohol. de pelitr. ℞j (30 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto, c. s.
 H. S. A. una masa blanda y homogénea, que se divide en ciento cincuenta pastillas redondas.

I. Angina gutural, angina laríngea, catarro pulmonar, perineumonía crónica, asma, coqueluche, disposicion á la tisis, y por último casos en que la falta de expectoracion depende de la atonia de las membranas mucosas, sin fiebre y sin lesion orgánica de los pulmones. D. Cuatro á nueve pastillas al dia.

4954. T. DE PIPEROIDE DE GENGIBRE (Beral).

℞ Extracto etéreo de
 gengibre. ℞xviii (4 gr.).
 Alcohol de 90° c. . . . ℞ij℞ (10 gr.).
 Azúcar en polvo. . . . ℞jx (288 gr.).
 Goma arábica. . . . ℞iij (12 gr.).
 Agua. ℞vj (24 gr.).

Se disuelve el extracto etéreo de gengibre en el alcohol, se mezcla disuelto con el azúcar, y se deja que se evapore el alcohol al aire ó en una estufa. Por otra parte se prepara el mucilago de goma arábica, se incorpora con el polvo y se hacen tabletas de ℞xviii (1 gr.).

Cada una contiene el principio activo de ℞j (5 cent.) de gengibre.

4955. P. DE PIMIENTA COMPUESTAS.

℞ Canela. ℞℞ (13 gr.).
 Pimienta,
 Cálamo aromático,
 Macis,
 Nuez moscada, ãã. . ℞ij (24 dec.).
 Cubebas. ℞xv (75 cent.).
 Clavo,
 Galanga, ãã. ℞℞ (2 gr.).
 Cardamomo menor. . ℞xv (75 cent.).

Cásc. reciente de nar. ʒʒ (2 gr.).
 Cáscara reciente de
 limon. ʒj (4 gr.).
 Se hace una pasta homogénea y
 se añade:
 Alm. dulc. mondadas. ʒv (150 gr.).
 Cásc. de limon confitad. ʒj (30 gr.).
 Azúcar disuelta en agua
 de menta. ʒbj (500 gr.).
 Se cuece y se hacen pastillas
 S. A.

I. Son carminativas, estomaca-
 les y sialagogas.

4956. P. PURGANTES.

ʒ Calomelanos. ʒvj (3 dec.).
 Chocolate. ʒj (12 dec.).
 H. S. A. seis pastillas.

I. Afecciones verminosas, di-
 senteria, hemacelinosis, iritis.
 Son muy cómodas para purgar á
 los niños muy pequeñitos. D. Una
 ó dos para los niños.

4957. T. PURGANTES DE CHOCOLA- TE ó Chocolate purgante de Charles.

ʒ Raiz de jalapa en polv. ʒvj (24 gr.).
 Calomelanos porfiriz. ʒʒ (16 gr.).

Mézclase é incorpórese en

Chocol. aun caliente. ʒbj (250 gr.).
 H. S. A. tabletas de ʒxij (6 dec.).

D. Una á dos á los niños; tres ó
 cuatro á los adultos.

Seis tabletas contienen ʒvj (3
 dec.) de jalapa y ʒjv (2 dec.) de
 protócloruro de mercurio.

4958. T. PURGANTES PARA LOS NIÑOS.

ʒ Chocolate de salud. . ʒbj (500 gr.).
 Jalapa. ʒvj (24 gr.).
 Mercurio dulce. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. tabletas de ʒj (4 gr.).

D. Una para un niño de uno ó dos
 años, y dos para los de tres á seis
 años.

4959. T. DE QUERMES MINERAL (F. F.).

ʒ Quermes mineral. . ʒij (8 gr.).

Azúcar. ʒxvij (532 gr.).
 Goma arábica,
 Agua de flores de na-
 ranjo, añ. ʒj (32 gr.).

Se hacen tabletas de ʒxij (6
 dec.), que se conservan en vasi-
 jas bien tapadas.

Cada una contiene un sexto de
 grano de quermes.

I. Favorecen la expectoracion
 en el asma húmedo y catarros pul-
 monares crónicos. D. De una á
 doce y aun mas.

4960. T. DE QUINA (F. F.).

ʒ Quina en polvo. . . . ʒij (64 gr.).
 Canela. ʒij (8 gr.).
 Azúcar blanca. . . . ʒxjv (429 gr.).

Mucilago de goma tragacanto. c. s.
 Se preparan tabletas de ʒxvj
 (8 dec.), de las cuales cada una
 contiene ʒij (1 dec.) de quina.

I. Son tónicas y se emplean co-
 mo las de catecú para corregir el
 mal olor del aliento, reblandeci-
 miento de las encías, etc. D. De
 dos á seis al dia.

4961. T. DE RATANIA.

ʒ Sacaruro de ratania. 8
 Mucilago. 4

H. S. A. tabletas de á ʒvj (3
 dec.).

4962. P. REFRIGERANTES Y LA- XANTES DE CITRATO DE MAGNESIA.

Se preparan con el citrato de
 magnesia y cada una contiene
 ʒxviii (1 gr.). Como se necesita de
 ʒj á ʒjʒ (30 á 44 gr.) de citrato
 para purgar, se prescribirá el
 número que parezca suficiente.

4963. P. DE REGALIZ CON OPIO (F. P.).

ʒ Extracto de regaliz. 960
 Goma arábica. 15000
 Azúcar blanca. 10000
 Extracto gomoso de opio. 4

Se disuelve el extracto de re-

galiz en parte del agua, se cuele el líquido y se disuelve la goma y el azúcar; se cuele por una manga, se añade el opio á la solución filtrada, se evapora después á la lumbre y se vierte en una losa de mármol untada de aceite de almendras dulces.

I. Son emolientes y expectorantes. Cada una contiene un cuarto de grano de extracto de opio.

4964. T. DE RUIBARBO (F. F.).

℞ Ruibarbo en polvo. ℞j (32 gr.).
Azúcar. ℞xj (346 gr.).
Mucilago de goma tragacanto. c. s.
Se preparan S. A. pastillas de ℞xij (6 dec.), y cada una contendrá ℞j (5 cent.) de ruibarbo.

I. Se usan como estomacales y tónicas. D. Tres á cuatro al día.

4965. P. DE SALUD (Delvincourt).

℞ Resina de escamonea de Alepo. ℞vj (3 dec.).
Tint. alcohólica de sen. 40 gotas.
Carbonato de magnes. ℞jβ (6 gr.).
Azúcar blanca. ℞ijβ (40 gr.).
Regaliz en polvo. ℞viiij (4 dec.).
Goma tragac. en polvo. ℞v (25 cent.).
Esencia de anís. una gota.
Jarabe de violetas. c. s.

H. S. A. pastillas muy iguales.

I. Estas pastillas están destinadas particularmente para purgar á las mujeres ó á los niños: una infusión ligera de flores de tilo puede reemplazar á los caldos de yerbas, de vaca ó de pollo. Conviene principalmente á las personas sujetas á regurgitaciones ácidas y á las que están molestadas frecuentemente por flatuosidades. D. Si se quiere solamente mantener el vientre libre, se tomarán una ó dos por la mañana en ayunas. Si se quiere purgar, se tomarán las ocho, del mismo modo que las pastillas acidulas purgantes. V. n. 4806.

4966. T. DE SANTONINA ó Tabletás antihelmínticas de santonina (Mialhe, Galloud).

℞ Santonina. ℞j (4 gr.).
Azúcar. ℞v (150 gr.).
Goma tragacanto. ℞β (2 gr.).

H. S. A. ciento cuarenta y cuatro pastillas.

I. Son vermífugas. D. Dos á diez al día á los niños. Cada una contiene ℞v (25 cent.) de santonina.

4967. P. DEL SERRALLO.

℞ Vainilla. ℞ij (8 gr.).
Almizcle. ℞viiij (4 dec.).
Canela. ℞j (4 gr.).
Azafran. ℞iiij (12 gr.).
Ambar gris. ℞j (4 gr.).
Clavo. ℞j (4 gr.).
Cubebas. ℞j (30 gr.).
Gengibre. ℞iiij (12 gr.).
Macis. ℞vj (24 gr.).

Azúcar,
Mucil. de goma tragacanto, ãã. c. s.
H. S. A. gragea.

4968. T. DE SPITZLAY.

℞ Anís en polvo. ℞Ljv (3 gr.).
Azúcar. ℞bj (500 gr.).
Extr. gomoso de opio. ℞jx (50 cent.).
Goma arábica. ℞ij (60 gr.).
Goma tragacanto,
Zumo de regaliz, ãã. ℞ij (8 gr.).
H. S. A. tabletas de ℞xviiij (1 gr.).

4969. T. DE SULFATO DE QUININA.

℞ Sulfato de quinina. ℞xxxvj (2 gr.).
Azúcar en polvo. ℞bj (500 gr.).
Mucilago de goma tragacanto. c. s.
H. S. A. pastillas de á ℞xviiij (1 gr.). D. De una á veinticuatro.

4970. T. DE TARTRATO BÓRICO-POTÁSICO ó de crémor de tártaro soluble.

℞ Crémor de tártaro soluble. ℞ij (64 gr.).
Azúcar. ℞xjv (429 gr.).

Goma tragacanto. . . ʒj (4 gr.).
 Agua destilada de cor-
 teza de cidra. . . ʒj (30 gr.).

Estas pastillas tienen un sabor ácido bastante agradable.

4971. P. DE TARTRATO DE HIERRO.

ʒ Tartrato de hierro. . . ʒxviiij (4 gr.).
 Azúcar. ʒj (32 gr.).
 Esencia de menta. . . 2 gotas.

Mucilago de goma tragacanto. c. s.
 H. S. A. treinta y seis tabletas.
 I. Dismenorrea, clorosis, escrófulas, pénfigo, dispepsia, catarro útero-vaginal. D. Cinco á seis al dia.

4972. P. DE TRIDACIO.

ʒ Tridacio. 40
 Azúcar. 170
 Mucilago. c. s.

H. S. A. tabletas de á ʒxviiij (1 gr.) D. Se toma de seis á ocho al dia.

4973. T. DE VAINILLA.

ʒ Vainilla. ʒj (30 gr.).
 Azúcar. ʒvij (240 gr.).
 Goma tragacanto. . . ʒβ (2 gr.).
 Agua comun. c. s.

H. S. A. pastillas de ʒviiij (4 dec.). Cada pastilla contiene ʒj (5 cent.) de vainilla.

I. Son excitantes y estomacales y se usan para aromatizar el chocolate, á cuyo fin se pone una ó muchas en una jícara para que se deshagan al momento de tomarle.

4974. P. VERMÍFUGAS.

ʒ Santónico,
 Chocolate, añ. ʒj (30 gr.).
 Azúcar. ʒij (60 gr.).
 Mucilago. c. s.
 H. S. A. tabletas.

4975. Otras (BARTHEZ).

ʒ Azúcar. lbj (500 gr.).

Protocloruro de merc. ʒij (8 gr.).
 Mucilago. c. s.
 H. S. A. pastillas de ʒxx (10 dec.).

D. Una ó dos al dia á los niños atormentados de lombrices. Los adultos pueden tomar de seis á ocho.

4976. T. VERMÍFUGAS PURGANTES (F. DE BRUNSWICK).

ʒ Mercurio dulce,
 Jalapa, añ. ʒij (24 dec.).
 Santónico. ʒij (8 gr.).
 Azúcar. ʒjv (125 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto. c. s.
 H. S. A. tabletas de ʒvij (35 cent.).

4977. T. VERMÍFUGAS DE SANTÓNICO.

ʒ Sulfato de hierr. en polv. ʒj (4 gr.).
 Santónico en polvo. . . ʒiij (12 gr.).
 Azúcar bl. en polvo. . . ʒij (60 gr.).
 Se mezclan y se añade:

Mucilago de goma tragacanto. c. s.
 H. S. A. sesenta y cuatro tabletas. Se dan de seis á ocho al dia.

4978. T. DE VIDA.

ʒ Confeccion alquermes. ʒj (30 gr.).
 Ambar gris,
 Almizcle, añ. ʒij (8 gr.).
 Azúcar. lbj (500 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto. c. s.
 H. S. A. tabletas.

I. Convienen para restaurar las fuerzas en los ancianos y en los convalecientes. D. Se da ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) al dia.

4979. T. VOMITIVAS.

ʒ Tártaro emético. . . . ʒjx (50 cent.).
 Ipecacuana. ʒβ (2 gr.).
 Azúcar. ʒvj (25 gr.).
 Mucilago de goma tragacanto,
 Agua de flor de naranjo, añ. c. s.

I. Embarazo gástrico, calentura biliosa. D. Una de cuarto en cuarto de hora.

PEDILUVIOS.

4980. PEDILUVIOS ALCALINOS.

℥ Carbonato de potasa. ℥jv á lbß (125 á 250 gr.).

Agua caliente. c. s.

I. Se usan como revulsivos en las congestiones sanguíneas hácia el cerebro, meningitis, hemicránea, poligalaccia, cardialgia, cianosis.

4981. Otro, n. 2.

℥ Subcarbonato de sosa. ℥jv (125 gr.).
Agua caliente. . . . c. s.

I. Se usa principalmente para reblandecer los callos cuando impiden la progresion.

4982. P. AMONIACAL (*Ruelle*).

Consiste en espolvorear las medias al tiempo de acostarse con una cucharadita de una mezcla de dos cucharadas de cal apagada y unade sal amoniaco, y conservarlas puestas toda la noche.

I. Pleuresía, neumonía, pleurodinia, sarampion, escarlatina, clorosis, amenorrea. Sirve para llamar la transpiracion á los piés. En los casos mas ligeros basta hacer esto algunas noches seguidas para conseguir el objeto que se desea.

4983. P. CON ÁCIDO CLORHÍDRICO (H. DE M.).

℥ Acido clorh. de 20°. ℥ij (60 gr.).
Agua caliente. . . . lbjx (4500 gr.).

Se mezcla el ácido con el agua al tiempo de tomar el pediluvio.

Se usa como resolutivo.

4984. P. HIDROCLÓRICOS.

℥ Acido clorhidrico del comercio. ℥jv á lbß (125 á 250 gr.).

Agua, c. s.

M. Se usan como un buen derivativo en los casos de congestiones sanguíneas hácia las partes superiores del cuerpo.

I. Poligalaccia, pleurodinia, clorosis, gastrorragia, palpitaciones, cardiopalmia, astenia, cistitis, meningitis, hemicránea, congestion, epistaxis, cólera, crup. *D.* Para un pediluvio de veinte á treinta minutos como revulsivo.

4985. P. IRRITANTES.

℥ Rábano machacado. ℥jv (125 gr.).
Agua caliente. . . . lbjv (2000 gr.).

I. Sirven para llamar la transpiracion á los piés, y como revulsivo en los mismos casos que los sinapizados.

4986. P. MERCURIAL.

℥ Deutocloruro de mercurio. ḡj á ḡjv (5 á 20 cent.).

Agua pura. . . . 2 cuart. (1 lit.).

Disuélvase. *I.* Se usa contra las exóstosis, tumores sífilíticos, ulceraciones de las glándulas del velo del paladar, dolores osteocopos, etc. A veces se necesitan doce, quince ó veinte baños para obtener la curacion.

4987. P. NITRO-MURIÁTICOS (*Scott*).

℥ Acido clorhídrico. ℥ij (90 gr.).
Acido nítrico . . . ℥j (30 gr.).
Agua comun. . . . ℥vj (480 gr.).

Mézclese y viértase esta mezcla en

Agua caliente. . 40 cuart. (20 lit.).

Se usan en los infartos del hígado y del bazo. Se deben tomar estos pediluvios antes de acostarse, y cada uno puede durar veinte á cuarenta y cinco minutos, pudiendo servir el mismo líquido cuatro ó cinco veces.

Se los administra en una vasija

tapada, sumergiendo las piernas hasta las rodillas. Se toman todos los días durante las dos primeras semanas, pero mas tarde se da uno cada dos días.

1. Pleurodinia, angina, sarampion, escarlatina, palpitaciones, infartos del hígado y del bazo, acné, aftas y otras afecciones en que convienen los baños sinapizados.

4988. P. NITRO-MURIÁTICOS (H. DE M.).

℞ Acido nítrico de 34°,
Acido clorhídrico de
20°, añ. ℥j (30 gr.).
Agua caliente. . . . ℥jxx (4500 gr.).
Mézclese al tiempo de hacer uso de ellos. V. n. 438.

4989. P. CON SAL COMUN.

℞ Sal comun. ℥jv (125 gr.).
Agua c. s.

4990. P. SINAPIZADOS.

℞ Harina de mostaza. ℥ij á ℥jv (60 á 125 gr.).
Agua tibia. c. s.

Si el agua estuviese muy caliente, la acción estimulante sería viva pero pasajera; mas si se administran tibios, este pediluvio produce una excitación perma-

nente de las extremidades inferiores y determina por consiguiente una derivación mas enérgica.

1. Congestiones sanguíneas hacia las partes superiores del cuerpo, hidroftalmia, amaurosis, conjuntivitis, midriasis, fiebres, fluxion, coqueluche, asma, angina, afonía, tisis, acné, sudor inglés, sarampion, escarlatina, coriza, ronquera, tálismo, cistitis, poligalaccia, aftas, laringitis, esofagitis, irritación, embriaguez, melena, asfixia, aturdimiento, apoplejía, vértigos, meningitis, epistaxis, hemicránea, insolación, pleuresía, pleurodinia, cardialgia, carditis, conmoción, cianosis, erisipela, gastrorragia, isquidrosis, otalgia, odontalgia, otitis, mammitis.

Los ácidos y los álcalis se oponen al desarrollo de la esencia de la mostaza, por lo que no se mezclarán con estos baños.

LOS PEDILUVIOS SINAPIZADOS DE LOS H. M. solo contienen ℥ij (60 gr.) de mostaza molida.

4991. P. SINAPIZADO.

℞ Harina de mostaza. . . ℥ij (64 gr.).
Potasa del comercio. . . ℥vβ (22 gr.).

Se diluyen en el agua y se vierte en el baño.

PESARIOS.

4992. PESARIOS MEDICINALES.

Sympson ha propuesto varias fórmulas para preparar pesarios medicinales, y poner de este modo en contacto de la parte enferma la sustancia medicinal apropiada á la naturaleza de la enfermedad. Estos pesarios tienen el volumen de una nuez y pueden ser introducidos por las mismas enfermas. Se usa uno ó dos diariamente. Se preparan combinando el medicamen-

to que forma su base con la manteca, de modo que se forme una pomada á que se da la forma conveniente mezclándola con ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) de cera amarilla por ℥j (30 gr.) de la pomada. Para que se los pueda manejar se los cubre de una mezcla fundida de cera y resina, liquidada por el calor.

4993. P. DE ÓXIDO DE ZINC.

℞ Oxido de zinc.
Cera blanca, añ. ℥j (4 gr.).

Manteca. 5vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro pesarios.

4994. P. DE ACETATO DE PLOMO.

2 Acetato de plomo. . . . 5ß (2 gr.).
Cera blanca. 5jß (6 gr.).
Manteca. 5vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro pesarios.

4995. P. MERCURIALES.

2 Ungüento mercurial doble.
Cera blanca, ãã. . . . 5ij (8 gr.).
Manteca. 5ß (16 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro pesarios.

4996. P. DE IODURO DE PLOMO.

2 Ioduro de plomo. . . . 9j (12 dec.).
Cera amarilla. 5jß (6 gr.).
Manteca. 5vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro pesarios.

4997. P. DE TANINO.

2 Tanino. 9ij (24 dec.).
Cera amarilla. 5jß (6 gr.).
Manteca. 5vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro pesarios.

4998. P. ASTRINGENTES.

2 Sulfato de alúmina.
Catecú en polvo.
Cera amarilla, ãã. . . . 5j (4 gr.).
Manteca. 5vß (22 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro pesarios.

4999. P. ANODINOS.

2 Extr. de belladona. . . 9ij (24 dec.).
Cera amarilla. 5jß (6 gr.).
Manteca. 5yj (24 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro pesarios.

Antiguamente se habian propuesto otros varios pesarios, y los distinguian en emolientes, astrin-

gentes, y los que provocan la menstruacion. Preparaban los primeros con cera, grasa de oso, manteca fresca, resina seca, tuétano de ciervo, fenogreco y otras sustancias análogas, y los últimos con miel, artemisa, dictamo blanco, zumo de berza, regaliz, zumo de puerro, ruda, escamonea, etc. Los de la segunda especie servian para detener los flujos por la matriz y prevenir su caída, y tenian una consistencia un poco espesa. Antes de introducir los pesarios se les ataba un cordón para sacarlos cuando se juzgase á propósito.

Dorvault ha propuesto preparar pesarios medicinales como los antiguos farmacólogos, para lo que propone la siguiente fórmula de vehículo plástico:

- Gelatina fina. 2
- Goma. 2
- Azúcar. 4
- Agua comun y mejor aun agua destilada de rosas y flor de naranjo, de laurel real, etc. . . 2

Se funde en el baño maría. Para preparar pesarios medicinales se tritura con agua el agente medicinal soluble ó no, se añade la gelatina, la goma y el azúcar y se liquida todo. Se cortan pedazos de corcho de cuatro cent. de largo por uno y medio de diámetro, redondeados por las dos extremidades de modo que se les dé la fórmula de un ovoide prolongado. Al rededor de este ovoide, todo á lo largo, se fija una cintita que se ata en la base, de modo que deje libres los dos extremos de doce á quince cent. de largo. Finalmente en la misma base del ovoide de corcho se fija una horquilla larga y gruesa de las que usan las señoras para el pelo.

Fundida la materia plástica se sumerge en ella el corcho, sosteniéndole por la horquilla y dándole vueltas en el aire para que se seque la materia plástica. Se sumergirá distintas veces el corcho has-

ta que la masa tenga dos á cuatro milímetros de grueso. Se procurará no manchar los extremos de la cinta para lo que se la cubrirá con un papel. Estos sirven para poder extraer el pesario de la vagina y aun para fijarle.

Luego que los pesarios están frios, se los cubre ligeramente de aceite para que no se peguen, se quita la horquilla y se desdoblán las puntas de la cinta y pueden usarse.

Se impide que se salgan de la vagina sosteniéndoles con un cinturón.

Casi todos los agentes medicinales pueden usarse de este modo bajo la forma de pesarios, y en particular los calomelanos, los ioduros de mercurio, de potasio ó de plomo, el borax, el óxido de zinc, las sales de morfina, de quinina, los extractos de belladona y de

opio. Pero cuando se usan sustancias astringentes, tales como el tanino, el sulfato de alúmina, el sublimado corrosivo y otras sales metálicas que forman compuestos insolubles con la gelatina, se recurrirá á la mezcla soluble siguiente:

Goma.	4
Azúcar.	2
Agua.	4 á 2.

Se funde en el baño maría. Esta mezcla debe ser muy espesa, pues de otra manera tardarian mucho en secarse los pesarios.

Del mismo modo se podrian preparar supositorios ó candelillas, pero entonces no se pondrá el corcho central. Se podrian preparar con guta percha reblandecida en agua caliente, y arrolladas de modo que tomasen la forma del objeto que se necesitara.

PIEDRAS MEDICINALES.

5000. PIEDRA DIVINA, PIEDRA OFTÁLMICA ó Sulfato de cobre aluminoso.

℞ Sulfato de cobre cristalizado,
Nitrato de potasa,
Alumbre, ãã. ℥ij (96 gr.).
Alcanfor. ℥j (4 gr.).

Se pulverizan las tres sales, se ponen al fuego en un crisol hasta que experimenten la fusion acuosa, se añade el alcanfor en polvo, se vierte la materia sobre un mármol untado con aceite, y despues de fria se guarda para el uso en frascos bien tapados.

Se usa bajo la forma de colirio. V. n. 1246.

La piedra divina entra en la composicion de las aguas vulnerarias, unguentos y emplastos.

5001. P. MEDICINAL.

℞ Alumbre. ℥j (30 gr.).

Albayalde,
Bol arménico, ãã. . . ℥j (30 gr.).
Sulfato de zinc. . . . ℥jv (125 gr.).
Sal amoniaco. ℥B (15 gr.).
Vinagre. ℥j (30 gr.).
Se seca al fuego.

Se usaba disuelta en las úlceras sórdidas y contra las fistulas rebeldes.

5002. P. MEDICINAL ó de sulfato de alúmina acetado (F. E.).

℞ Oxido rojo de hierro. ℥ij (60 gr.).
Litargirio,
Bol arménico,
Sulfato de alúm., ãã. ℥jv (125 gr.).

Se pulverizan y se ponen en una olla de barro, se echa encima c. s. de vinagre fuerte hasta que cubra á los sólidos una capa de líquido de dos dedos.

Tapada la olla se la deja en maceracion por dos ó tres dias, agitando la mezcla de cuando en cuando; despues se añade:

Nitrato de potasa. ℥ss (250 gr.).
 Sal amoniac. ℥ij (60 gr.).
 Se evapora hasta la sequedad y se deja á fuego fuerte por una hora. Se usa disuelta en agua contra las úlceras antiguas, etc.

5003. P. ESTÍPTICA DE HESSELBACH ó Polvo cáustico de Ammon.

℥ Alumbre. ℥ij (60 gr.).
 Sulfato de hierro. ℥j (30 gr.).
 Sulfato de cobre. ℥B (15 gr.).
 Verde gris. ℥j (4 gr.).
 Clorhidrato de amoniac. ℥B (2 gr.).

Se funde en un crisol y se echa la mezcla sobre una losa de mármol.

I. Hemorragias traumáticas, caries inveterada, cáncer, lupus, ulceraciones. D. Una parte disuelta en veinticuatro de agua; se usa al exterior.

5004. P. DE SALUD.

℥ Sal amoniac. ℥j (30 gr.).

Bol arménico,
 Alumbre, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Nitro. ℥iij (90 gr.).
 Sulfato de hierro. ℥vj (180 gr.).
 Albayalde. ℥ij (60 gr.).
 Vinagre. c. s.

para hacer una pasta que se seca al fuego.

D. Se disuelve ℥j (30 gr.) en ℥j (500 gr.) de agua, y se usa en la curacion de las úlceras, flujos de diversa naturaleza, y contra la sarna, tiña, erisipela, etc.

5005. P. VULNERARIA.

℥ Alumbre,
 Sulfato de zinc, ãã. ℥vj (180 gr.).
 Acetato de cobre,
 Sal amoniac, ãã. ℥j (4 gr.).
 Se funde en un crisol, y cuando sea completa la fusion se añade:
 Azafran. ℥B (2 gr.).

Se usa para deterger, secar y consolidar las úlceras.

PIELES.

5006. PIEL DIVINA.

℥ Pez resina. ℥xij (375 gr.).
 Pez de Borgoña. ℥jv (125 gr.).
 Cera amarilla,
 Sebo de carnero,
 Trem. de Venecia, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Aceite de olivas. ℥j (30 gr.).

Se funde, se cuele y se extiende sobre una piel.

I. Se aplica contra las neuralgias reumáticas.

5007. P. DE GOULARD.

℥ Aceite comun. ℥j (500 gr.).
 Cera vírgen. ℥ss (250 gr.).
 Sal de Saturno. ℥j (30 gr.).
 Alcanfor,
 Sal amoniac, ãã. ℥j (4 gr.).

M. S. A. y extiéndase sobre una piel ó sobre una tela.

I. Reumatismos, anquilosis y úlceras atónicas.

PÍLDORAS.

5008. PÍLDORAS ABSORVENTES (Chevalhier).

℥ Carbonato de sosa,
 Ruibarbo en polvo,
 Extr. de genciana, ãã. ℥j (12 dec.).

Calomelanos. ℥iij (15 cent.).
 H. S. A. veinte pildoras.
 I. Dispepsia. D. Dos cada dia.

5009. P. DE ACEITE DE CROTON.

℥ Aceite de croton. una gota.

Conserva de rosas. ḡij (1 dec.).
 Malvabisco en polvo. . . c. s.
 H. S. A. una pildora.
 D. Una ó dos para purgar.

**5010. P. DE ACEITE DE CROTON
 CON MAGNESIA.**

℥ Aceite de croton. ℔ij (24 dec.).
 Carbonato de magnes. ʒj (4 gr.).
 D. ḡj (5 cent.) para los niños y
 ḡij (10 cent.) para los adultos.

5011. P. DE ACETATO DE COBRE.

℥ Acetato de cobre. ḡxviij (1 gr.).
 Agua hirviendo. c. s.
 Se disuelve y se añade:
 Opio. ḡvj (3 dec.).
 Zumo de regaliz. ʒj (4 gr.).
 Regaliz en polvo. c. s.
 H. S. A. ciento ochenta pildoras.
 D. Tres á doce pildoras tres ve-
 ces al dia.

5012. P. DE ACEITE DE HELECHO.

℥ Aceite de helecho ma-
 cho. 24 gotas.
 Raiz de malvabisco en
 polvo. ʒj (4 gr.).
 Mantequilla reciente. ℔ij (24 dec.).
 H. S. A. veinticuatro pildoras.
 I. Ténia. D. Veinticuatro ó cua-
 renta y ocho pildoras en dos ve-
 ces, la primera por la noche y la
 otra al dia siguiente por la maña-
 na; una hora despues se purga
 con aceite de ricino.

**5013. P. DE ACEITE DE LIGNITO ó
 Remedio antigotoso (Thaer).**

℥ Aceite pirogenado de lignito,
 Sulfuro negro de anti-
 monio, ãã. ʒj (32 gr.).
 Incienso en polvo. ʒij (8 gr.).
 Dulcamara en polvo. ʒvj (24 gr.).
 H. S. A. pildoras de ḡij (1 dec.)
 que se rodearán de polvo de rega-
 liz.

I. Gota. D. Seis á diez, tres ve-
 ces al dia.

Para que produzca un efecto du-
 rable se debe continuar su uso du-
 rante un mes.

5014. P. DE ACETATO DE MORFINA.

℥ Extracto de azafran ó
 conserva de flor de
 naranjo. ḡxvj (8 dec.).
 Acetato de morfina. ḡj (5 cent.).
 H. S. A. diez y seis pildoras.
 I. Casos en que está indicado
 el opio. D. Se puede dar una ó dos
 cada seis horas. Tambien se pue-
 de, observando sus efectos, dar
 hasta ḡiij (15 cent.) de acetato de
 morfina al dia en las neuralgias,
 cánceres y otras enfermedades.

5015. Otras, n 2.

℥ Acetato de morfina. ḡj (5 cent.).
 Polvo de malvabisco. ḡxviij (1 gr.).
 Jarabe de goma. c. s.
 H. S. A. ocho pildoras.
 D. Se toma una á dos cada seis
 horas.

**5016. P. DE ACETATO DE
 MERCURIO.**

℥ Acetato de mercurio,
 Opio,
 Alcanfor, ãã. ḡxxx (15 dec.).
 Jarabe de amapolas. c. s.
 H. S. A. treinta pildoras.
 I. Sifilis. D. Una ó dos al dia.

**5017. P. DE ACETATO DE PLOMO
 (Fouquier).**

℥ Acetato de plomo,
 Polvo de malvabisco, ãã. ʒj (4 gr.).
 Jarabe. c. s.
 H. S. A. treinta y seis pildoras.
 I. Sudores y diarreas de los
 tísicos. D. Cuatro á doce al dia. Se
 administran estas pildoras, cada
 una de las cuales contiene ḡj (5
 cent.) de acetato de plomo, á la
 hora en que empiezan comun-
 mente los sudores; generalmente
 bastan ocho ó diez.

Las PILDORAS DE ACETATO DE PLOMO
 DE LOS H. DE M. contienen ʒß (2 gr.)
 de acetato de plomo; ʒß (2 gr.) de
 polvo de malvabisco y c. s. de jarabe
 para treinta y dos pildoras.

5018. P. DE ACETATO DE PLOMO.

℞ Acetato de plomo. ḡij (1 dec.).
 Extracto de opio. ḡijv (2 dec.).
 Conserva de rosas. ḡvj (3 dec.).
 Mézclense y háganse seis pildoras.

D. Una ó dos al día.

5019. Otras, n. 2.

℞ Acetato de plomo. ḡxviiij (1 gr.).
 Extr. acuoso de opio. ḡij (1 dec.).
 Polvo de beleño. ḡx (5 dec.).
 Jarabe. c. s.

H. S. A. diez píldoras.

I. Sudores y diarreas colicuativas de los tísicos, hidropesías, ascitis. D. Dos á cuatro al día.

5020. P. DE ACETATO DE PLOMO É IPEGACUANA (H. DE AL.).

℞ Acetato de plomo,
 Ipecacuana, ãã. ʒß (2 gr.).
 Opio. ḡv (25 cent.).
 Jarabe simple. c. s.

H. S. A. cuarenta píldoras.

I. Hemorragias uterinas pasivas. D. Una cada tres horas.

5021. P. DE ACETATO DE POTASA.

℞ Acetato de potasa,
 Goma amoniaco,
 Píldoras de Rufus, ãã. ḡxviiij (1 gr.).
 Jabon blanco. ʒß (2 gr.).
 Jarabe simple. c. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Hidropesías, obstruccion de las vísceras abdominales, hepatitis crónica, muermo, soriasis. D. Cuatro mañana y noche.

5022. P. DE ACIBAR Y ASA FÉTIDA.

℞ Acíbar sucotríno. ʒj (4 gr.).
 Asa fétida. ʒß (2 gr.).
 Aceite de alcaravea. 15 gotas.
 Jarabe simple. c. s.

H. S. A. cincuenta píldoras.

I. Destete, acné, vómitos, histérico, hipocondría, encefalitis, hemorroides. D. Seis al día. Después de cada dosis se hace tomar

una buena dosis de una infusión de melisa azucarada.

5023. P. DE ACIBAR COMPUESTAS (F. P.).

℞ Acíbar sucotríno. ʒj (32 gr.).
 Jabon de sosa. ʒij (8 gr.).
 Extracto de genciana. ʒß (16 gr.).
 Jarabe simple. c. s.

H. S. A. I. Son tónicas, catárticas, útiles en las obstrucciones del bajo vientre. D. Hasta ʒij (24 dec.).

5024. Otras (F. DE L.).

℞ Acíbar en polvo. ʒj (30 gr.).
 Extracto de genciana. ʒß (15 gr.).
 Aceite de alcaravea. 40 gotas.
 Jarabe. c. s.

H. S. A. píldoras de ḡij (15 cent.).

5025. P. DE ACIBAR CON MIRRA (F. DE L.).

℞ Acíbar. ʒij (60 gr.).
 Azafran,
 Mirra, ãã. ʒj (30 gr.).
 Jarabe. c. s.

Se pulveriza aparte el acíbar y la mirra, se tritura todo junto y se forma una masa bien homogénea. Se hacen píldoras de ḡij (15 cent.).

I. Son purgantes. D. Dos á seis al día.

5026. P. DE ACIBAR, GENCIANA Y JABON.

℞ Acíbar,
 Ruibarbo, ãã. ʒijß (10 gr.).
 Extracto de genciana. ḡxc (5 gr.).
 Jabon medicinal. ʒß (15 gr.).
 Esencia de anís. 8 gotas.

H. S. A. píldoras de ḡij á ḡv (15 á 25 cent.).

I. Infartos apiréticos de las vísceras abdominales, cefalalgia, dispepsia, histérico, dismenorrea, hidropesía, hepatitis. D. Una á ocho, aumentando progresivamente y continuando su uso durante mucho tiempo.

5027. P. DE ACIBAR Y HIERRO.

℞ Sulfato de hierro. ḡLjv (3 gr.).
 Acibar de las Barbadas. 3ḡ (2 gr.).
 Polvo aromático. 3jḡ (6 gr.).
 Conserva de rosas. 3ij (8 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡv (25

cent.).
 I. Es un tónico purgante muy excelente. *D.* Dos á tres píldoras.

5028. Otras (F. P.).

℞ Extracto de acíbar. 240
 Goma amoniaco. 460
 Hierro preparado. 200
 Esencia de anís. 6
 Jarabe de canela. c. s.
 H. S. A. píldoras.

I. Son tónicas y resolutivas, útiles en las obstrucciones. *D.* ḡxij á 3j (6 dec. á 4 gr.).

5029. P. DE ACIBAR Y JABON (F. F.).

℞ Acíbar. 3jv (16 gr.).
 Jabon medicinal. 3xj (24 gr.).
 Esencia de anís. 8 gotas.
 Jarabe de espino serval. c. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.). Cada píldora contiene un grano y un tercio de acíbar.

I. Se administran como fundentes en los infartos de las vísceras del bajo vientre.

5030. P. DE ACIBAR MARCIALES, Píldoras emenagogas, píldoras aperitivas, píldoras de hierro compuestas.

℞ Acíbar sucotrino. 3ḡ (2 gr.).
 Limaduras de hierro. 3j (4 gr.).
 Canela. 5ḡ (2 gr.).
 Jarabe de artemisa. c. s.

H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Clorosis, histérico, amenorea, esplenitis, vértigos, cefalalgia, iritis, ataxia, hemorroides.

5031. P. DE ACIBAR Y TREMENTINA (Bois de Lourg).

℞ Trementina cocida. 3ij (8 gr.).
 Acíbar en polvo. 3ḡ (2 gr.).
 H. S. A. veinte píldoras.

I. Uretritis agüda. *D.* Diez á doce al dia.

5032. P. DE ÁCIDO ARSENIOSO.

℞ Acido arsenioso. ḡj (5 cent.).
 Almidon. ḡx (5 dec.).
 Mézclese y dividase en veinte píldoras.

5033. P. DE ÁCIDO BENZÓICO (Früne).

℞ Acido benzóico. ḡxc (5 gr.).
 Conserva de rosas. c. s.
 H. S. A. cincuenta píldoras.

I. Son muy útiles en la incontinencia de orina. *D.* Una mañana y noche, pero se puede aumentar la dosis hasta cuatro.

5034. P. DE ACONITINA (Turnbull).

℞ Aconitina. ḡj (5 cent.).
 Polvo de regaliz. ḡxviiij (4 gr.).
 Jarabe. c. s.
 H. S. A. diez y seis píldoras.

I. Parálisis, tisis, escrófulas, reumatismo, gota, ceática, hidropesías, amaurosis, cáncer, cólicos, lepra, muermo y neuralgias. *D.* Una de hora en hora.

5035. P. DE ACÓNITO.

℞ Extracto alcohólico de acónito. 3j (4 gr.).
 Extracto de guayaco. 3ij (8 gr.).
 H. S. A. setenta y dos píldoras.

I. Gota, reumatismos, sífilis, dolores osteocopos. *D.* Una á cuatro píldoras.

5036. P. DE ACÓNITO (Biett).

℞ Extracto alcohólico de acónito. 3ḡ (2 gr.).
 Polvo de malvabisco. c. s.

Mézclese y dividase en cuarenta y ocho píldoras.

I. Sifilides y dolores osteocopos.
D. Una á dos, mañana y noche.

5037. P. DE ACÓNITO ANTIMONIALES, PÍLDORAS ANTIREUMÁTICAS DE STOLL (F. P.).

℞ Extracto de acónito. 4
Sulfuro de antimonio hidratado. 4
Jarabe. c. s.
H. S. A. píldoras de ġij (1 dec.).

I. Reumatismo crónico. D. Dos píldoras, tres veces al dia, bebiendo despues un cocimiento apropiado.

5038. P. DE ACÓNITO MERCURIALES (Duble).

℞ Extracto de acónito. . . ℞j (12 dec.).
Sublimado corrosivo. . ġij (1 dec.).
Acónito en polvo. . . . c. s.

Se hace una mezcla muy exacta y se divide en veinticuatro píldoras iguales. Cada una contiene ġß (25 mil.) de sublimado y ġj (5 cent.) de extracto de acónito.

I. Herpés inveterados, complicados con afecciones sóricas y venéreas, enfermedades venéreas antiguas, infartos linfáticos, escrófulas, eczema, amaurosis, sifilis, tisis, cáncer, cólico, gota, iritis. D. Se da una píldora, mañana y noche. Cada diez dias se aumenta una píldora.

5039. P. DE ACÓNITO OPIADAS (H. M.).

℞ Extracto de acónito,
Extracto gomoso de opio, ãã. ℞j (12 dec.).
H. S. A. veinticuatro píldoras iguales.

D. Una ó dos cada cuatro horas.

5040. P. AFRODISÍACAS.

℞ Almizcle. ġvj (3 dec.).
Azúcar con vainilla. . . ℞j (12 dec.).
Jarabe de cáscara de naranja, c. s.
H. S. A. seis píldoras.

D. Una, mañana y noche.

5041. Otras (PIERQUIN).

℞ Cantáridas,
Estramonio, ãã. . . . ġj (50 mil.).

Beleño negro,
Beleño blanco, ãã. . ġß (25 mil.).
Conserva de rosas. . . c. s.

H. S. A. cuatro píldoras.

D. Una ó dos al acostarse, bebiendo despues una taza de café frio. Estas píldoras excitan el predominio de ciertos órganos, tales como las partes sexuales y el cerebello. En algunos casos se añade al café ġ¹/₈ (6 mil.) de polvo de cantáridas.

5042. P. DE AGÁRICO BLANCO.

℞ Polvo de agárico blanc. ʒß (2 gr.).
Iodo. ġxviii (1 gr.).
Goma tragacanto. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ġjv (2 dec.).

I. Escrófulas, tisis. D. Dos á cuatro mañana y noche.

5043. P. DE AGÁRICO BLANCO OPIADAS (Rayer).

℞ Agárico blanco. . . . ġxviii (1 gr.).
Extr. gomosode opio. ġiiij (15 cent.).
H. S. A. seis píldoras.

I. Tisis pulmonar acompañada de sudores abundantes. D. Una y luego dos por tarde.

5044. P. DE AGRIMONIA.

℞ Extracto de agrimonia,
Extracto de trébol de agua,
Extracto de taraxacon, ãã. ʒß (2 gr.).
Goma amoniaco. ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ġjv (2 dec.).

I. Esplenitis, hepatitis, pleuresía, bronquitis. D. Dos á seis al dia.

5045. P. ALCANFORADAS (Cullerier).

℞ Alcanfor. ʒß (15 gr.).
Extr. acuoso de opio. ġxviii (1 gr.).
Goma en polvo,
Jarabe simple, ãã. . c. s.

H. S. A. setenta y dos píldoras.

I. Inflamaciones de la uretra, erecciones dolorosas, irritacion del cuello de la vejiga. D. Cuatro ó cinco píldoras al dia.

5046. P. ALCANFORADAS (*Ricord*).

℥ Alcanfor,
Tridacio, ãã. ḡLjv (3 gr.).
H. S. A. veinte píldoras.

I. Se usan para prevenir las hemorragias y erecciones. D. Cinco ó seis al dia, principalmente por la noche. Si el enfermo no puede soportarlas tomará media lavativa con ḡxij (60 cent.) de alcanfor.

5047. P. DE ALMENDRAS AMARGAS (*Kranischfeld*).

℥ Alm. amargas prepar. 3j (4 gr.).
Sulfato de sosa. 3ß (2 gr.).
Ipecaeuana. ḡij (10 cent.).
Extracto de rubia. . . e. s.
H. S. A. sesenta píldoras.

I. Enfermedades cutáneas rebeldes que han debilitado el organismo y producido enflaquecimiento, amarillez de la cara, un estado caquético, dolores intestinales, insomnio, digestiones muy penosas, calenturas intermitentes, afecciones cancerosas, caquexia, catarros y afecciones catarrales. D. Tres mañana y noche.

5048. P. DE ALMIZCLE.

℥ Almizcle. 3j (4 gr.).
Oxido de zine. 3ß (2 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Enfermedades nerviosas, como epilepsia, histérico, convulsiones y neuralgias. D. Ocho á diez al dia.

5049. P. ALOÉTICAS (*Requin*).

℥ Acíbar sucotrina,
Regaliz en polvo, ãã. . . ḡxviii (4 gr.).
Miel. e. s.
H. S. A. veinte píldoras.

I. Se aconsejan para provocar ó producir el flujo hemorroidal, y para hacer una revulsion hácia el intestino recto. D. Cinco á diez antes de acostarse.

5050. P. ALOÉTICAS FUNDENTES (*Buchan*).

℥ Acíbar en polvo,

Ruibarbo en polvo,
Jabon medicinal, ãã. . . . 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de á ḡvj (3 dec.).

I. Ictericia é infarto del hígado.
D. Tres ó cuatro al dia.

5051. P. ALTERANTES.

℥ Sulfuro de potasio,
Res. de guayaco, ãã. ḡxx (10 dec.).
Bicarbon. de potasa. ḡv (25 cent.).
Carbon preparado. . . ḡx (50 cent.).
Extracto de opio. . . ḡij (15 cent.).
Extr. de dulcamara. . . e. s.

H. S. A. quince píldoras.

I. Coqueluche, crup, catarro sofocante, bronquitis, tisis, soriasis, herpes, cáncer. D. Tres mañana y noche.

5052. Otras, n. 2.

℥ Resina de guayaco. . . ḡxc (5 gr.).
Extr. de duleamara. . . 3ijß (10 gr.).
Azufre dorado de antimonio. 3ß (2 gr.).
Calomelanos. ḡxviii (4 gr.).
Flores de azufre. . . . 3j (4 gr.).
6 Extracto de acónito. . 3ß (2 gr.).
Jarabe de fumaria. . . e. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Gota, reumatismo crónico, lepra, elefantiasis, exantema, herpes crónicos, tisis. D. Cinco mañana y noche.

5053. Otras (ALIBERT).

℥ Jabon medicinal. 3ij (8 gr.).
Acíbar sueotrina,
Crémor de tártaro, ãã. . 3j (4 gr.).
Jarabe de las cinco raices. . e. s.
H. S. A. noventa y seis píldoras.

D. Dos á cuatro al dia.

5054. Otras (HILDEMBRAND).

℥ Resina de guayaco,
Azufre dorado de antimonio, ãã. 3ß (2 gr.).
Calomelanos. 3ß (6 dec.).
Extracto de taraxacon. . e. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Dolores articulares gotosos. D. Tres á cuatro píldoras, tres veces al dia.

5055. P. ALTERANTES

(*Sandrock*).

- ℥ Bicloruro de merc. ḡiij (15 cent.).
- Opio. ḡix (50 cent.).
- Extracto de cicuta. ḡxxx (150 cent.).
- Ruibarbo en polvo. ḡlx (30 dec.).

H. S. A. treinta píldoras.

I. Escirros y particularmente los del pecho. D. Una píldora tres veces al día.

5056. P. ALTERANTES ó Píldoras para la tos (F. M.).

- ℥ Zumo de regaliz,
- Incienso, ãã. ʒB (15 gr.).
- Mirra,
- Azafran,
- Opio, ãã. ʒjv (48 dec.).
- Jarabe de amapolas. . c. s.

H. S. A. una masa para píldoras.

I. Catarros, coqueluche, toses rebeldes. Se pueden usar en lugar de las píldoras de cinoglosa. D. ḡvj á ḡxij (3 á 6 dec.).

5057. P. DE ALUMBRE (*Helvecio*).

- ℥ Alumbre. 2
 - Sangre de drago. 4
 - Miel rosada. c. s.
- H. S. A. píldoras de ḡvj (3 dec.).

I. Cuatro á doce píldoras en las hemorragias pasivas, y en los flujos mucosos crónicos.

5058. P. DE ALUMBRE (*Formey*).

- ℥ Alumbre en polvo,
- Cloruro de hierro y amoniaco,
- Polvo aromático,
- Extracto de quina preparado en frio, ãã. ʒB (2 gr.).
- Aceite de canela. 12 gotas.

H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.) que se cubrirán con polvo de canela.

5059. P. DE ALUMBRE Y TRIDACIO (*Recamier*).

- ℥ Alumbre,
- Tridacio, ãã. ḡxviiij (1 gr.).

H. S. A. diez y ocho píldoras.

I. Dispepsias, gastralgias muy rebeldes. D. Una á seis al día.

5060. P. ALUMINOSAS.

- ℥ Bálsamo de copaiba. 1
 - Cubebas en polvo. 4
 - Alumbre en polvo. 4
 - Magnesia calcinada. 1
- H. S. A. píldoras de ḡvj (3 dec.).
- I. Blenorragia. D. Cinco á seis píldoras al día.

5061. P. ALUMINOSAS OPIADAS.

- ℥ Alumbre. ḡvj (30 cent.).
- Opio. ḡij (10 cent.).
- Catecú. ḡxviiij (1 gr.).
- Jarabe de rosas rojas. . c. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Ulceras atónicas, catarro útero-vaginal, leucorrea, blenorrea, hemorragias pasivas, metritis, miliar, disenteria. D. Dos á tres al día.

5062. P. AMARGAS (*Gall*).

- ℥ Extracto de trébol de agua,
- Extr. de ruibarbo, ãã. ʒj (4 gr.).
- Polvo de acibar. ʒij (24 dec.).
- Polvo de ruibarbo. . . c. s.

H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Embarazo intestinal, acompañado de pesadez de cabeza y entorpecimiento de los miembros. D. Tres píldoras al día.

5063. P. AMARGAS Y ESTOMACALES.

- ℥ Acibar sucotrino. ḡxviiij (1 gr.).
- Extracto de ruibarbo,
- Extracto de quina, ãã. ḡLjv (3 gr.).
- Extracto de genciana. ʒjB (6 gr.).
- Jarabe de ajenjos. . . c. s.

H. S. A. píldoras de ḡv (25 cent.).

I. Convalecencias, calenturas intermitentes, ictericia, hidropesías. D. Tres á seis píldoras.

5064. P. AMARGAS FUNDENTES (*Riecke*).

- ℥ Goma amoniaco,
- Gengibre en polvo,
- Extracto de centaurea menor,
- Jabon medicinal,
- Bilis de buey, ãã. ʒj (4 gr.).

H. S. A. ciento ochenta píldoras.

I. Inflamacion crónica é indura-

cion del hígado, del páncreas ó del bazo. *D.* Diez píldoras tres veces al día.

5065. P. DE AMBAR (H. DE AL.).

℞ Ambar gris,
Conserva de cáscara de naranja,
Extracto de quina, ãã. ʒj (4 gr.).
Opio. ʒij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒij (4 dec.).

I. Anafrodisia, escrófulas, sífilides, histérico, tétanos, lupus. Son un excelente afrodisíaco. *D.* Cinco á diez cada tres horas.

5066. P. AMONIACALES ANTIARTRÍTICAS (Bories).

℞ Carbon. de amon. ʒljv (3 gr.).
Jabon medicinal. ʒβ (15 gr.).
Extracto de opio. ʒjx (50 cent.).
Eseila en polvo. ʒxxvij (1,50 gr.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Gota, artritis crónica, artrocace. *D.* Dos á cuatro al día.

5067. P. DE AMONIACO (F. M.).

℞ Acíbar rosado. ʒjv (125 gr.).
Goma amoniaco pura. ʒvj (24 gr.).
Mirra escogida. ʒβ (16 gr.).
Almáciga,
Polvo de los tres sándalos, ãã. ʒij (8 gr.).
Azafrán. ʒij (24 dec.).
Tártaro soluble.
Sal de ajenjos, ãã. ʒj (4 gr.).

Se reducen á polvos sutiles, y con jarabe de cantueso se hace una masa para píldoras.

I. Son útiles en la hipocondría, asma, tos, caquexia y en general en todas las calenturas lentas y obstrucciones de las vísceras. *D.* Desde ʒj (12 dec.) á ʒj (4 gr.).

5068. P. DE ANDERSON ó Píldoras escocesas (F. F.).

℞ Gutagamba,
Acíbar sucotríno, ãã. ʒvj (24 gr.).
Esencia de anís. ʒj (4 gr.).
Jarabe simple. c. s.

II. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Embarazos intestinales sin irritacion. *D.* Se usan como purgantes á la dosis de tres á cuatro. Se usan principalmente cuando se quiere obtener una derivacion lenta y continua. Solo se toma una al tiempo de acostarse, cuando se quiere tener el vientre libre.

Las PILDORAS ESCOCESAS DE LOS *II.* DE M. se diferencian solo en que contienen polvos de anís en lugar de su aceite esencial.

5069. Otras, n. 2.

℞ Acíbar en polvo,
Gutagamba,
Jalapa, ãã. ʒv (20 gr.).
Esencia de anís. ʒj (4 gr.).
Jarabe de espinoserval. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Estreñimiento, embarazo de las primeras vias, anorexia, dispepsia, hipocondría, calenturas biliosas, galactirrea. *D.* Tres á seis como purgantes, y una á tres como tónicas digestivas.

5070. P. ANODINAS (Recamier).

℞ Extracto de opio. ʒiij (15 cent.).
Alcanfor. ʒvj (30 cent.).
Jarabe simple. c. s.

II. S. A. seis píldoras.

I. Casos en que los dolores vivos ocasionan insomnio. *D.* Una á tres al día.

5071. P. ANTECIBUM, PILDORAS GLOTONAS ó Granos de vida (F. F.).

℞ Acíbar. ʒvj (24 gr.).
Extracto de quina. ʒiij (12 gr.).
Canela. ʒj (4 gr.).
Jarabe de ajenjos. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Dispepsia, anorexia, hidropesía. Se usan como tónicas y digestivas. Se usan antes de comer para excitar el apetito. *D.* ʒvj á ʒxij (3 á 6 dec.).

5072. P. ANTIÁCIDAS.

- ℥ Carbon. de amoniaco. ḡv (25 cent.).
 Extr. de ruibarbo. . ḡviiij (40 cent.).
 H. S. A. dos píldoras.
 I. Acidez de las primeras vias,
 dispepsia, fetidez del aliento, vó-
 mitos.

5073. P. ANTIAMAUROTICAS
(Jaeger).

- ℥ Tártaro emético. . . . ḡvj (3 dec.).
 Sen en polvo,
 Ruibarbo en polvo,
 Castóreo en polvo, ãã. ʒj (12 dec.).
 Extracto de taraxacon. e. s.
 H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
 I. Amaurosis ocasionada ó com-
 plicada con una afeccion de las
 vísceras abdominales.

5074. Otras (RUST).

- ℥ Valeriana en polvo,
 Flores de arnica en polvo,
 Asa fétida en polvo, ãã. ʒij (8 gr.).
 Tártaro emético. . . . ʒʒ (6 dec.).
 Extracto de pulsatila. ʒʒ (2 gr.).
 Jarabe de goma. . . . e. s.
 H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
 D. Ocho á quince por la maña-
 na, al medio dia y por la noche.

5075. P. ANTIARTRÍTICAS.

- ℥ Jabon medicinal. . . . ʒjv (125 gr.).
 Carbon. de amoniaco. ʒvj (24 gr.).
 Extracto de opio. . . . ʒj (4 gr.).
 Cebolla albarrana en
 polvo. ʒiiij (12 gr.).
 Jarabe simple. . . . e. s.
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Se toman en los intervalos
 de los ataques de gota. D. Dos á
 cuatro todos los dias.

5076. Otras (GALL).

- ℥ Extracto. acuoso de
 guayaco. ʒijʒ (40 gr.).
 Antimonio crudo. . . . ʒʒ (2 gr.).
 Opio gomoso. ḡv (25 cent.).
 H. S. A. sesenta píldoras.
 Se dan tres por la mañana, tres
 al medio dia y tres por la noche.

5077. Otras (GRAEFFE).

- ℥ Quermes mineral,
 Extracto de acónito, ãã. ʒj (4 gr.).
 Extracto de dulcamara;
 Resina de guayaco, ãã. ʒij (8 gr.).
 Bálsamo negro del Perú. c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
 I. Gota regular. D. Cuatro á
 ocho mañana y noche.

5078. Otras (VICQ DE AZIR).

- ℥ Jabon medicinal. ʒʒ (16 gr.).
 Extr. de hiel de buey. ʒij (8 gr.).
 Resina de guayaco,
 Mercurio dulce, ãã. . ʒj (4 gr.).
 Guayaco en polvo. . . . e. s.
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2
 dec.).
 D. Una ó dos mañana y tarde.

5079. Otras (RADIUS).

- ℥ Brea de hulla,
 Antimonio crudo, ãã. ʒj (32 gr.).
 Incienso. ʒij (8 gr.).
 Dulcamara en polvo. ʒvj (24 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
 D. Seis á diez al dia.

**5080. P. ANTIARTRÍTICAS ó Pil-
doras de asa fétida estibiadas.**

- ℥ Asa fétida,
 Antimonio crudo,
 Jabon de jalapa,
 Res. de guayaco, ãã. ʒj (4 gr.).
 Opio. ḡviiij (4 dec.).
 Ruibarbo. ʒʒ (2 gr.).
 Jarabe simple. e. s.
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Gota crónica. D. Cinco píldo-
 ras dos veces al dia.

**5081. P. ANTIARTRÍTICAS ESTI-
BIADAS (F. DE LOS POBRES DE
HAMBURGO).**

- ℥ Tártaro emético. . . . ḡij (15 cent.).
 Extracto de acónito. . ḡxviiij (4 gr.).
 Resina de guayaco. . . ʒʒ (2 gr.).
 Jabon. ʒʒ (2 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡij (15
 cent.).
 I. Artrocace, tétanos, gota,

reumatismo crónico. *D.* Dos mañana y noche.

5082. P. ANTIARTRÍTICAS DE SULFURO DE CAL.

☞ Sulfuro de cal,
Res. de guayaco, ãã. ʒj (4 gr.).
Extracto de acónito. ʒxv (75 cent.).
Extr. de dulcamara. ʒj (4 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras.

I. Gota, artritis, reumatismo crónico. *D.* Cuatro píldoras tres veces al día.

5083. P. ANTIASMÁTICAS (Heim).

☞ Extracto de acíbar. ʒj (4 gr.).
Ipecacuana en polvo. ʒxij (6 dec.).
Esencia de menta pip. 6 gotas.
H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Asma nervioso. *D.* Una píldora mañana y noche.

5084. Otras (RICHTER).

☞ Asa fétida. ʒjβ (6 gr.).
Extracto de valeriana. ʒj (4 gr.).
Extracto de acónito. ʒvj (3 dec.).
Extr. de ceb. albarran. ʒvj (3 dec.).
Castóreo. ʒβ (2 gr.).
Sal volátil de cuerno

de ciervo. ʒxviii (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Asma nervioso. *D.* Diez por la mañana, al medio día y por la noche.

5085. P. ANTIBILIOSAS (Barclay).

☞ Extracto de coloquin-
tida compuesto. ʒij (8 gr.).
Resina de jalapa. ʒj (4 gr.).
Jabon amigdalino. ʒjβ (6 gr.).
Guayaco. ʒiij (12 gr.).
Emético. ʒviii (4 dec.).
Esencia de cnebro,
Esencia de alcaravea,
Esencia de romero, ãã. 4 gotas.
Jar. de espino serval. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
D. Cinco á seis al día como purgante hidragogo.

5086. Otras (HARBEY).

☞ Acíbar,

Resina de jalapa,
Ruibarbo,
Extr. de coloquintida, ãã. ʒij (8 gr.).
Jarabe de espino serval. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Son purgantes. *D.* Una á cuatro al día.

5087. Otras (DIXON).

☞ Acíbar,
Escamonea,
Ruibarbo, ãã. ʒij (8 gr.).
Emético. ʒxij (6 dec.).
H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).

I. Son purgantes. *D.* Una á tres al día.

5088. P. ANTIBLENORRÁGICAS.

☞ Bálsamo de copaiba. ʒij (8 gr.).
Calomelanos. ʒxviii (4 gr.).
Sangre de drago. ʒj (4 gr.).
Cons. de rosas rojas. ʒj (30 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒvj (3 dec.).

D. Una por la mañana y otra por la tarde, y despues dos ó tres.

5089. Otras (DROSTE).

☞ Cera amarilla. ʒβ (15 gr.).
Miel comun. ʒij (8 gr.).
Se funden, se mezclan, se dejan enfriar y se incorpora
Alcanfor en polvo. ʒβ (6 dec.).
H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras.

I. Segundo período de la blenorragia. *D.* Cinco á diez píldoras cada dos horas.

5090. Otras (GALL).

☞ Copaiba solidificado por
la magnesia. ʒj (32 gr.).
Ruibarbo en polvo. ʒij (8 gr.).
Mézlense y háganse píldoras de ʒjv (2 dec.).

D. Se dan seis por la mañana, seis al medio día y otras seis por la noche. Se aumenta progresivamente la dosis hasta diez ó doce, tres veces al día.

5091. P. ANTIBLENORRÁGICAS
(*Most*).

℥ Trementina de Venecia,
 Extracto de genciana,
 Goma quino,
 Sulfato de hierro, ãã. ʒij (8 gr.).
 H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
 I. Blenorragias atónicas inveteradas, sostenidas por un estado atónico ó por el abuso del plan antiflogístico continuado durante mucho tiempo. *D.* Cuatro á ocho al dia.

5092. P. ANTICALCULOSAS
(*Behrends*).

℥ Carbonato de sosa seco,
 Jabón medicinal, ãã. ʒij (8 gr.).
 Extr. de trébol de agua. c. s.
 H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
 I. Cálculos urinarios formados de ácido úrico. *D.* Tres á diez por la mañana, al medio dia y á la tarde.

5093. P. ANTICANCEROSAS (*Rust*).

℥ Extracto de caléndula,
 Extracto de cicuta,
 Carbonato de hierro, ãã. ʒij (8 gr.).
 Polvo de caléndula ʒjβ (6 gr.).
 H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
D. Cinco ó seis por la mañana, al medio dia y por la noche.

5094. P. ANTICAQUÉCTICAS
(*Dehaen*).

℥ Jabón medicinal. ʒβ (15 gr.).
 Goma amoniaco. ʒiij (12 gr.).
 Masa de píld. de Rufus. ʒβ (2 gr.).
 Tintura de mirra. c. s.
 H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).
 I. Clorosis, amenorrea y dismenorrea. *D.* Cuatro píldoras todos los dias.

5095. P. ANTICARDIÁLGICAS.

℥ Píldoras de Vallet. ʒijβ (10 gr.).
 Píldoras de cinoglosa. ʒβ (2 gr.).
 Ruibarbo en polvo. ʒijβ (10 gr.).
 H. S. A. cien píldoras.
 I. Son muy útiles en las car-

dialgias de las cloróticas. *D.* Una á diez al dia.

5096. Otras (*ALBERS*).

℥ Asa fétida. ʒj (32 gr.).
 Oxido de bismuto,
 Esencia de valeriana, ãã. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
 I. Cardialgia histérica acompañada ó no de acedías en las primeras vias. *D.* Cinco á diez gotas cada dos ó tres horas.

5097. Otras (*SCHMITZ*).

℥ Extracto de trébol. ʒij (8 gr.).
 Extr. de bilis de buey. ʒj (4 gr.).
 Extracto de acíbar. ʒβ (6 dec.).
 Castóreo. ʒβ (6 dec.).
 Jabón medicinal. ʒj (12 dec.).
 H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
 I. Cardialgia dependiente de causa atónica. *D.* Cinco píldoras, cuatro veces al dia.

5098. P. ANTICATARRALES.

℥ Escila en polvo. ʒxviii (4 gr.).
 Nitro. ʒx (5 dec.).
 Raíz de malvabisco en polvo. ʒxviii (4 gr.).
 Goma tragacanto. ʒx (5 dec.).
 Jarabe de artemisa. c. s.
 H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
D. Una mañana y noche.

5099. Otras, n. 2.

℥ Quermes mineral. ʒxvj (8 dec.).
 Azúcar blanca. ʒβ (16 gr.).
 Goma tragacanto. ʒxvj (8 dec.).
 Jarabe simple. c. s.
 H. S. A. treinta píldoras.
D. Dos mañana y noche.

5100. Otras (*H. CIVIL DE ESTRASBURGO*).

℥ Extracto de acónito. ʒij (8 gr.).
 Azufre dorado de antimon. ʒj (4 gr.).
 Zumo de regaliz. ʒij (8 gr.).
 H. S. A. cincuenta píldoras.

5101. Otras (*PARISET*).

℥ Goma tragacanto. ʒx (5 dec.).
 Tártaro emético,

Extracto gomoso de opio, ãã. ḡij (15 cent.).
 Conserva de rosas. . . e. s.
 H. S. A. sesenta pildoras.

I. Catarros antiguos con exceso de irritacion y expectoracion difícil, escrófulas, bronquitis. D. Dos, mañana y noche.

5102. P. ANTICATARRALES
 (*Wedekind*).

℥ Amoniaco purificado,
 Extracto de marrubio blanco,
 Polígala de Virginia en polvo, ãã. ʒjβ (6 gr.).
 Azufre dorado de antimonio,
 Calomelanos, ãã. ℥j (12 dec.).
 Jarabe de goma. . . . e. s.
 H. S. A. pildoras de ḡij (1 dec.).

I. Catarro pulmonar crónico rebelde. D. Seis pildoras, dos ó tres veces al dia.

5103. Otras (Trousseau).

℥ Trementina. ʒβ (15 gr.).
 Amoniaco. ʒj (4 gr.).
 Bálsamo de Tolú. . . . ʒβ (2 gr.).
 Extracto de opio. . . . ḡviii (4 dec.).
 H. S. A. setenta y dos pildoras.
 I. Catarro bronquial y de la vejiga. D. Cinco pildoras al dia.

5104. P. ANTICATARRALES
 Y CALMANTES (*Petit*).

℥ Manteca de cacao. ʒ
 Goma arábica. ʒ
 Extracto acuoso de opio. ʒ
 Jarabe de ipecaeuana. e. s.
 H. S. A. pildoras de ḡv (25 cent.), que se cubrirán con polvos de raiz de malvabisco.

I. Afecciones catarrales que perturban el sueño. D. Una todas las noches al acostarse.

5105. P. ANTICEFÁLICAS
 (*Broussais*).

℥ Extracto de beleño,
 Extr. de bellad., ãã. ḡv (25 cent.).
 Extracto de lechuga. ḡx (50 cent.).
 Extr. gom. de opio. ḡij (15 cent.).

Manteca de cacao. . ʒj (4 gr.).
 H. S. A. treinta pildoras muy iguales.

I. Cefalalgia inveterada. D. Una por la mañana y otra por la tarde.

5106. P. ANTICLORÓTICAS DE
BLAUD ó Pildoras de Blaud (F. P.).

℥ Sulfato de hierro cristalizado,
 Carbonato de potasa seco, ãã. ʒβ (15 gr.).
 Goma arábica. . . . ḡxviii (4 gr.).

Se trituran las dos sales en un mortero de hierro hasta que no se perciba ningun punto blanco; se añade la goma arábica y se divide en noventa y seis pildoras.

I. Clorosis, leucorrea atónica. D. El primero, segundo y tercer dia se da una pildora por la mañana en ayunas, una al medio dia y otra por la noche al acostarse; el cuarto, quinto y sexto dia, dos pildoras por la mañana y dos por la tarde; el séptimo, octavo y noveno dia, dos por la mañana, dos al medio dia y una por la tarde; el décimo, undécimo y duodécimo dia, dos pildoras por la mañana, dos al medio dia y dos por la tarde; el décimotercio, décimocuarto, décimoquinto y los siguientes, hasta la completa curacion, tres pildoras por la mañana, tres al medio dia y otras tres por la tarde.

En los casos de clorosis crónicas y rebeldes aconseja Blaud que se continúe usando las pildoras por espacio de quince á veinte dias, disminuyendo gradualmente la dosis.

5107. P. DE BLAUD MODIFICADAS.

℥ Sulfato de hierro puro y cristalizado. ʒij (8 gr.).
 Se pulveriza, se deja secar en la estufa á la temperatura de 40° y entonces se mezcla con
 Carbon. de potasa seco. ʒij (8 gr.).
 Miel. ʒj (4 gr.).
 Malvabisco en polvo. . . e. s.

H. S. A. una masa que se distribuirá en ochenta píldoras.

D. Una á diez al dia. Es una de las preparaciones ferruginosas mas simples, mejores y mas económicas.

5108. P. DE BLAUD MODIFICADAS POR ADORNE.

℞ Sulfato de hierro puro,
Carbonato de potasa,
Malvabisco en polvo, ãã. ʒij (8 gr.).
Mucílago hecho con partes iguales de goma y azúcar. c. s.

H. S. A. cuarenta píldoras, que se cubren con una capa muy fina de goma y azúcar aromatizada con limon.

5109. P. ANTICLORÓTICAS DE BLAUD (H. DE M.).

℞ Sulfato de hierro,
Carbon. de potasa, ãã. ʒʒ (15 gr.).
Polvos de regaliz,
Goma tragacanto, ãã. c. s.

H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

D. En los tres primeros dias se toma una por la mañana, otra al medio dia y otra por la tarde, y despues se aumenta sucesivamente.

5110. P. ANTICLORÓTICAS (Hamilton).

℞ Escamonea en polvo. ʒij (24 dec.).
Calomelános en polvo. ʒj (12 dec.).
Extracto de colonquintida compuesto. . . ʒj (12 dec.).

Jarabe de gengibre. . c. s.

H. S. A. doce píldoras.

D. Tres ó cuatro al dia.

5111. Otras (NEUMANN Y RADIUS).

℞ Hojas de digital. ʒʒ (2 gr.).
Hojas de tejo. ʒj (4 gr.).
Carbonato de hierro. . . ʒj (4 gr.).
Cornezuelo de centeno. . ʒij (8 gr.).

Jarabe simple. c. s.

H. S. A. cincuenta píldoras.

D. Dos á ocho al dia con una infusion de sabina.

5112. P. ANTICLORÓTICAS DE RAYER.

℞ Subcarbonato de hierro. ʒj (4 gr.).
Quina en polvo,
Canela en polvo, ãã. . . ʒʒ (2 gr.).

H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).

D. Cuatro á doce al dia.

5113. P. ANTICLORÓTICAS (Sundelin).

℞ Azafran de Marte aperitivo. ʒj (4 gr.).

Cascarilla,

Extracto de palo de Campeche, ãã. ʒjʒ (6 gr.).

Extracto de genciana. . . c. s.

H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).

D. Cinco á diez, tres veces al dia.

5114. P. ANTICORÉICAS (Josat).

℞ Cianuro de potasio. . ʒjv (2 dec.).

Valeriana en polvo. . ʒxviii (1 gr.).

Jarabe simple. c. s.

H. S. A. ocho píldoras, que se guardarán en una caja con carbon en polvo.

D. Dos píldoras en las veinticuatro horas.

5115. Otras (RASORI).

℞ Extracto de jalapa,
Escamonea, ãã. . . . ʒiij (15 cent.).

H. S. A. dos píldoras.

D. Una al dia hasta conseguir la curacion.

5116. Otras (SCHNEIDER).

℞ Asa fétida,
Valeriana en polvo, ãã. ʒiij (12 gr.).

Oxido de zinc sublim. ʒj (12 dec.).

Castóreo. ʒij (24 dec.).

Extracto de belladona. ʒv (25 cent.).

Extr. de manzanilla. c. s.

H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).

D. Seis píldoras al dia.

Se debe beber despues una taza de infusion teiforme de anserina de valeriana ó de manzanilla.

5117. P. ANTIDIABÉTICAS.

℞ Sulfato de hierro,
Sulfato de zinc, $\tilde{a}\tilde{a}$ ʒj (4 gr.).
Extracto de manzanilla. ʒβ (2 gr.).
H. S. A. treinta píldoras.
I. Diabetes, astenia. D. Tres píldoras al día.

5118. Otras (BERNDT).

℞ Sulfato de cobre amoniacal,
Opio puro, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{g}x$ (50 cent.).
Malvabisco en polvo,
Extr. de taraxacon, $\tilde{a}\tilde{a}$. ʒij (24 gr.).
H. S. A. píldoras de $\tilde{g}ij$ (1 dec.).
D. Cinco mañana y noche.

5119. P. ANTIDIARRÉICAS.

℞ Cascarilla,
Colombo, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{g}xc$ (5 gr.).
Láudano líquido,
Eter sulfúrico, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{g}xviii$ (4 gr.).
Jarabe de membrillo. c. s.
H. S. A. píldoras de $\tilde{g}ij$ (1 dec.).
I. Diarrea crónica, disenteria.
D. Una de hora en hora.

5120. Otras (VOGEL).

℞ Extracto alcohólico de cascarilla,
Oxido negro de hierro, $\tilde{a}\tilde{a}$. ʒij (8 gr.).
Jarabe de canela. c. s.
H. S. A. píldoras de $\tilde{g}ij$ (1 dec.).
I. Diarrea crónica. D. Tres mañana y tarde.

5121. P. ANTIDISENTÉRICAS.

℞ Extracto de cáscara verde de nuez,
Alúmina pura, $\tilde{a}\tilde{a}$ p. ig.
H. S. A. píldoras de $\tilde{g}ij$ á $\tilde{g}v$ (15 á 25 cent.).

5122. Otras (BOUDIN).

℞ Ipecacuana. $\tilde{g}vj$ (3 dec.).
Calomelanos. $\tilde{g}^{9/5}$ (3 cent.).
Extracto de opio. $\tilde{g}j^{1/5}$ (6 cent.).
H. S. A. tres píldoras.
I. Diarrea, disenteria, principalmente en los países cálidos.

5123. Otras (WILLIS).

℞ Cera amarilla. ʒβ (15 gr.).

Esperma de ballena,
Catecú, $\tilde{a}\tilde{a}$ ʒj (4 gr.).
Esencia de canela. 12 gotas.
Se hacen píldoras de $\tilde{g}vj$ (3 dec.).

I. Disenterias crónicas. D. Tres ó cuatro píldoras al día.

5124. P. ANTIEMÉTICAS (Fuller).

℞ Polvo fino de yerbab. ʒij (8 gr.).
Diascordio. ʒj (4 gr.).
Ajenjos. ʒij (24 dec.).
Balaustrias. ʒj (12 dec.).
Esencia de canela. 2 gotas.
Jarabe de membrillos. c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Se toman dos, tres veces al día, bebiendo despues un vaso de agua acidulada gaseosa simple.

5125. Otras (H. M.).

℞ Oxido blanco de bismuto. $\tilde{g}jv$ (2 dec.).
H. S. A. cuatro píldoras iguales.
I. Cardialgia, vómitos nerviosos, etc. D. Una cada tres horas.

5126. P. ANTIEPILÉPTICAS (H. DE M.).

℞ Oxido de zinc. ʒj (12 dec.).
Extracto de beleño. ʒij (24 dec.).
Polvos de regaliz. c. s.
H. S. A. píldoras de $\tilde{g}ij$ (1 dec.).
I. Epilepsia que no reconoce por causa alteraciones orgánicas. D. De tres á cuatro píldoras.

5127. Otras (BOURGE DE ROLLOT).

℞ Azul de Prusia,
Oxido de zinc, $\tilde{a}\tilde{a}$ ʒijβ (10 gr.).
H. S. A. cien píldoras.
D. Una por la mañana en ayunas durante la primera semana.

5128. Otras (LEURET).

℞ Extracto de estramonio. 2
Extracto de belladona. 2
Alcanfor. 4
Opio. 4
H. S. A. píldoras de $\tilde{g}ij$ (1 dec.).
D. Una al día y se aumenta su-

cesivamente la dosis hasta veinte. una vigésima parte de grano de nitrato de plata.

5129. P. ANTIEPILÉPTICAS
(Podreca).

℞ Añil. ḡxc (5 gr.).
Asa fétida. ḡxviiij (4 gr.).
Castóreo. ḡx (5 dec.).
H. S. A. veinte píldoras que se platearán.

I. Epilepsia. D. Una de hora en hora.

5130. Otras (QUARIN).

℞ Valeriana. ʒj (30 gr.).
Limaduras de hierro. . ʒiij (12 gr.).
Mirra,
Incienso,
Extr. de tormentila, añ. ʒjʒ (6 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Epilepsia determinada por el onanismo. D. Cinco á diez píldoras, tres veces al dia.

5131. Otras (RECAMIER).

℞ Extr. de nuez vómica. ḡ¹/₈ (6 mil.).
Acetato de plomo crist. ḡʒ (25 mil.).
Polvo de beleño negro. ḡj (50 mil.).
Para una píldora.

Perturban la vuelta de los accesos de la epilepsia, produciendo en la superficie mucosa una serie de movimientos preternaturales, que se sienten en todo el organismo.

D. Se da una por la mañana y otra por la tarde, despues de haber puesto en uso los medios revulsivos á propósito para disminuir los movimientos hácia el cerebro. Se aumenta gradualmente la dosis del extracto de nuez vómica hasta el punto de llegar en ocho dias á la dosis de ḡj (5 cent.).

5132. P. ANTIEPILÉPTICAS
INGLESAS.

℞ Miga de pan. ʒj (4 gr.).
Nitrato de plata. ḡj (5 cent.).

Se mezclan exactamente y se dividen en veinte píldoras, de modo que cada una solo contenga

D. Solo se da una cada vez.

5133. P. ANTIEPSÓRICAS.

℞ Azufre sublimado y lav. ʒj (4 gr.).
Guayaco en polvo. . . . ʒʒ (2 gr.).
Jarabe de borraja. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡvj (3 dec.).
D. Tres ó cuatro al dia.

5134. P. ANTIESCORBÚTICAS
(F. N. P.).

℞ Extracto de rubia,
Extracto de quina, añ. ʒij (24 dec.).
Extracto de colombo. . ʒj (12 dec.).
Alcanfor disuelto por
el alcohol. ʒʒ (6 dec.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Afecciones escorbúticas. D. Dos píldoras, dos veces al dia.

5135. P. ANTIESCIRROSAS (Boyer).

℞ Polvo de arnica. . . . ʒij (8 gr.).
Extracto de cicuta. . . ʒj (4 gr.).
Extracto de acónito. . ʒʒ (2 gr.).
Cloruro de bario. . . . ḡxviiij (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡij (10 cent.).

I. Exóstosis, escirros, tumores.
D. Cuatro á ocho mañana y noche.

5136. P. ANTIESCROFULOSAS
(Baudelocque).

℞ Sulfuro negro de merc. ḡij (10 cent.).
Magnesia. ḡj (5 cent.).
Cicuta en polvo. . . . ḡij (10 cent.).
Se prepara una píldora.

Se da una por la mañana y otra por la tarde, y se aumenta progresivamente hasta diez al dia.

5137. Otras (HENRY Y GUIBOURT).

℞ Escamonea. ʒjv (16 gr.).
Etíope mineral. . . . ʒjv (16 gr.).
Antimonio diaforético. ʒj (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . ʒvij (28 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.), y cada una contiene un

grano de etíope mineral y otro de escamonea.

5138. P. ANTIESCROFULOSAS
(*Jungken*).

℞ Sublimado corrosivo. ḡjv (2 dec.).
Agua destilada. c. s.
Extracto de quasía. ʒβ (2 gr.).
Zumo de regaliz. ʒβ (2 gr.).
H. S. A. treinta píldoras.

I. Corneitis escrofulosa. *D.* Una al día; cada tres ó cuatro días se aumenta poco á poco la dosis hasta cinco.

5139. Otras (SAUNDERS).

℞ Esponja tostada. ʒβ (2 gr.).
Conserva de cáscara de naranja. ℞j (12 dec.).
Jarabe simple. c. s.
D. En tres tomas en el día.

5140. Otras (WERNECK).

℞ Ioduro de hierro. ḡxviii (4 gr.).
Bromuro de sodio. ʒβ (2 gr.)
Extracto de regaliz. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
D. Una á tres mañana y noche.

5141. Otras (VOGT).

℞ Ioduro de potasio. ḡxviii (4 gr.).
Agua destilada. c. s.
Esponja tostada,
Extr. de dulcam., ãã. ʒv (20 gr.).
H. S. A. ciento ochenta píldoras.

I. Escrófulas, bocio. *D.* Seis píldoras dos veces al día.

5142. P. ANTIESCROFULOSAS Y TÓNICAS.

℞ Cloruro de bario. ḡx (5 dec.).
Extracto de genciana. ḡc (5 gr.).
Genciana en polvo. c. s.
H. S. A. cien píldoras.

D. Dos por la mañana y dos por la tarde.

5143. P. ANTIESPASMÓDICAS.

℞ Almizcle. ℞ij (24 dec.).
Oxido blanco de zinc. ℞j (12 dec.).
Goma arábica. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Afecciones espasmódicas. *D.* Tres á cuatro píldoras al día.

5144. Otras, n. 2.

℞ Oxido de zinc. ḡxviii (4 gr.).
Asa fétida. ʒβ (2 gr.).
Miel. c. s.
H. S. A. doce píldoras.

I. Gastralgia, calambres de estómago, neurosis abdominales histeriformes.

5145. Otras, n. 3.

℞ Castóreo en polvo. ḡxc (5 gr.).
Alcanfor en polvo. ḡxviii (4 gr.).
Extracto de opio. ḡj (5 cent.).
Arrope de saúco. c. s.
H. S. A. doce bolos. *D.* Dos cada seis horas.

5146. Otras (ANT. DUBOIS).

℞ Extracto de quina,
Catecú,
Alcanfor, ãã. ʒj (4 gr.).
Asa fétida. ℞j (12 dec.).
Extracto de enebro. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡv (25 cent.).

I. Epilepsia, histérico. *D.* Tres píldoras al día.

5147. Otras (BEHREND'S).

℞ Cloruro de hierro amoniacoal,
Gálbano, ãã. ʒj (4 gr.).
Asa fétida. ʒij (8 gr.).
Castóreo. ℞j (12 dec.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Afecciones nerviosas del corazón acompañadas de cardialgia, bastante frecuentes en las cloróticas. *D.* Tres ó cuatro mañana y tarde.

5148. Otras (CLOQUET).

℞ Extracto de valeriana. ʒj (4 gr.).
Extracto de opio. ḡij (10 cent.).
Asa fétida,
Castóreo, ãã. ḡxx (10 dec.).
H. S. A. treinta píldoras.

D. Tres ó cuatro mañana y noche.

5149. P. ANTIESPASMÓDICAS
(*Conradi*).

℞ Asa fétida. ʒβ (15 gr.).
Ipecacuana en polvo,
Opio purificado,
Esencia de menta piperita, ãã. ḡjv (2 dec.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Iscuria y estrangurria espasmódicas. D. Diez píldoras tres veces al dia.

5150. Otras (DUMERIL).

℞ Extr. de regaliz anis. ḡxviiij (1 gr.).
Extracto tebáico. ḡj (5 cent.).
Extracto de beleño,
Extr. de belladona, ãã. ḡviiij (4 dec.).
H. S. A. doce píldoras.

5151. Otras (HAEN).

℞ Almizcle. ʒβ (6 dec.).
Alcanfor. ʒj (12 dec.).
Goma amoniaco. ʒij (24 dec.).
Opio purificado. ḡjv (2 dec.).
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Espasmos histéricos é hipcondríacos. D. Tres á cuatro píldoras en las veinticuatro horas.

5152. Otras (HEIM).

℞ Ipecacuana,
Digital, ãã. ʒβ (2 gr.).
Opio. ḡvj (3 dec.).
Extr. de émula campana. c. s.
H. S. A. sesenta píldoras.
I. Asma convulsivo. D. Una píldora cada tres horas.

5153. Otras (HENNING).

℞ Cianuro de zinc. ḡxij (6 dec.).
Castóreo en polvo. ʒj (4 gr.).
Jarabe de goma. c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
D. Se dan una ó dos al dia.

5154. Otras (HONORÉ).

℞ Extracto de valeriana,
Extracto de quina, ãã. ʒj (4 gr.).
Valeriana en polvo. c. s.
H. S. A. cincuenta píldoras.
I. Histérico clorótico. D. Cuatro á diez píldoras.

5155. P. ANTIESPASMÓDICAS
MERCURIALES (*Jahn*).

℞ Extracto de acónito. ʒβ (2 gr.).
Extracto de cicuta,
Resina de guayaco,
Asa fétida, ãã. ʒj (4 gr.).
Calomelanos. ḡxviiij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Neuralgia, principalmente la facial. D. Cinco á diez píldoras, tres veces al dia.

5156. P. ANTIESPASMÓDICAS
(*Jahn*).

℞ Asa fétida,
Resina de guayaco,
Extr. de valeriana, ãã. ʒj (4 gr.).
Sal volátil de asta de ciervo,
Almizcle, ãã. ḡxij (6 dec.).
Quermes mineral,
Opio purificado, ãã. ḡvj (3 dec.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Angina de pecho en los gotosos, histérico, espasmos. D. Tres ó cuatro píldoras cada dos horas.

5157. Otras (LOMBART).

℞ Subnitrate de bismuto. ḡj (5 cent.).
Magnesia. ʒβ (2 gr.).
Polvos de Dower. ḡx (5 dec.).
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Gastralgias y neuroses intermitentes. D. Una cada dos horas.

5158. Otras (MAUNOIR).

℞ Oxido de zinc. ʒβ (2 gr.).
Conserva de rosas. c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Epilepsia, histérico, etc. D. Una píldora mañana y tarde.

5159. Otras (MONTAIGU).

℞ Almizcle. ḡj (5 cent.).
Asa fétida. ḡij (10 cent.).
Goma amoniaco. ḡij (10 cent.).
Polvo de valeriana. ḡviiij (40 cent.).
Jarabe. c. s.
para una píldora.
I. Afecciones nerviosas.
Nota. A esta preparacion asocia

Montaigu un tratamiento dirigido segun las indicaciones.

5160. P. ANTIESPASMÓDICAS
(Petit).

℥ Extracto de opio. ḡj (5 cent.).
Alcanfor. ḡvj (3 dec.).
Nitrato de potasa. ḡjv (2 dec.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. seis píldoras.

I. Afecciones nerviosas acompañadas de convulsiones, como el histérico, epilepsia, corea, y calenturas graves acompañadas de delirio y movimientos convulsivos. D. Una de hora en hora.

5161. Otras (PIDERIT).

℥ Asa fétida,
Castóreo, ãã. ʒj (4 gr.).
Acido succínico concreto. ʒß (2 gr.).
Aceite animal de Dippel. 20 gotas.
Tintura de mirra. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡv (25 cent.).

I. Afecciones nerviosas, histérico, convulsiones y neuralgias. D. Se dan de tres á seis píldoras.

Nota. Algunas veces añade el médico á estas píldoras cierta cantidad de opio.

5162. Otras (PIERQUIN).

℥ Asa fétida. ḡij (4 dec.).
Digital. ḡß (25 mil.).
Oxido de hierro. ḡij (4 dec.).
Conserva de cinosbastos ó de tilo, c. s.
para una píldora.

I. Aberracion del flujo menstrual.

5163. Otras (PLENCIZ).

℥ Asa fétida. ʒij (8 gr.).
Alcanfor,
Almizcle, ãã. ʒj (4 gr.).
Ambar. ʒß (2 gr.).
H. S. A. cien píldoras.

I. Angina de pecho. D. Seis píldoras al dia en tres tomas, dos por la mañana, dos al medio dia y dos por la noche.

5164. Otras (Trousseau).

℥ Asa fétida,
Extracto de valeriana, ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

I. Afecciones nerviosas que siguen á las hemorragias. D. Ocho píldoras al dia.

Nota. Se puede añadir á la masa algunos granos de extracto acuoso de opio.

5165. Otras (ZIPP).

℥ Nitrato de plata fundido. ḡx (5 dec.).
Opio purificado. ḡvj (3 dec.).
Resina de guayaco. ʒiij (12 gr.).
Jarabe de goma. c. s.

H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).

I. Angina de pecho puramente nerviosa. D. Una píldora mañana y noche, y se aumenta gradualmente la dosis segun los efectos producidos.

5166. P. ANTIFLEMÁTICAS.

℥ Ajo,
Jabon de Alicante, ãã. p. ig.
Milpiés preparado. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Catarro crónico, hidropesía pasiva, bronquitis. D. Cuatro píldoras al dia en dos tomas.

5167. P. ANTIGALACTOPOYÉTICAS
(Behrends).

℥ Sulfato de hierro cristalizado. ʒij (24 dec.).
Mirra. ʒj (4 gr.).
Polvo de quasia amarg. ʒv (5,30 gr.).
Extr. blando de quina. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).

I. Galactirrea, sobre todo cuando está acompañada de atonía de los órganos digestivos. D. Cuatro á ocho píldoras, tres veces al dia.

5168. P. ANTIGASTRÁLGICAS.

℥ Subcarbon. de hierro. ʒij (8 gr.).
Acíbar. ḡjv (2 dec.).
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

I. Enfermedades de estómago

que acompañan á la leucorrea, jaqueca, palpitaciones de corazón y palidez general. *D.* Dos á doce píldoras al día.

5169. P. ANTIGASTRÁLGICAS
(*La Rue*).

℞ Extracto de opio. . . . ḡvj (3 dec.).
Sesquicarbon. de hierr. ḡxij (6 dec.).
Magnesia. ḡjv (125 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.

H. S. A. veinticuatro ó cuarenta y ocho píldoras, según la edad y la susceptibilidad del individuo.

D. Una por la mañana dos horas antes del desayuno, y otra tres horas después de cenar. Se asociarán á su uso los medicamentos auxiliares que exija el estado del enfermo, y se suspenderá por algún tiempo su uso si hubiere necesidad. El tratamiento dura un mes á mes y medio.

5170. Otras (Trousseau).

℞ Subcarbonato de hierro. ḡj (30 gr.).
Extracto de regaliz. . . c. s.

H. S. A. cien píldoras.

I. Gastralgia, sobre todo la que ataca á las mujeres que padecen flores blancas, amenorrea, etc. *D.* Una á dos al día, mañana y noche, aumentando una ó dos cada día, hasta veinte ó veinticinco.

5171. P. ANTIGONORRÉICAS.

℞ Bálsamo de copaiba,
Magnesia calcinada, ãã. . . . p. ig.
H. S. A. píldoras de ḡx (5 dec.).

D. Dos á cuatro píldoras, tres veces al día.

5172. P. ANTIGOTOSAS
(*Bouchardat*).

℞ Extracto de coloquín-
tida compuesto. . . ḡv (20 gr.).
Extracto de cólchico. ḡv (20 gr.).
Extracto de opio. . . . ḡxviiij (1 gr.).

H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Son purgantes. *D.* Una á seis

píldoras hasta promover deposiciones de vientre.

Bouchardat ha propuesto estas píldoras para reemplazar las de Lartigüe.

5173. Otras (HALFORD).

℞ Extracto acético de
cólchico. ḡvij (35 cent.).

Extracto de coloquín-
tida compuesto. . . ḡjv (20 cent.).
Polvos de Dover. . . ḡjv (20 cent.).

H. S. A. dos píldoras.

Halford las administra después de haber hecho tomar durante algunos días treinta á cuarenta gotas de vino de cólchico mañana y noche.

I. Neuralgias, reumatismo, gota, ceática. *D.* Una píldora mañana y noche.

5174. Otras (HENROTAY).

℞ Azufre dorado de an-
timonio. ḡj (4 gr.).

Extracto de opio. . . . ḡv (25 cent.).

Regaliz. ḡj (4 gr.).

Mucil. de goma aráb. c. s.

H. S. H. treinta píldoras.

D. Una mañana y tarde durante quince días, después de haber tomado la pocion del mismo autor.

5175. Otras (LEMAZURIER).

℞ Sulfato de quinina. . . ḡx (50 cent.).

Digital purpúrea en
polvo. ḡv (25 cent.).

Raiz de belladona en polvo,

Acet. de morfina, ãã. ḡij (10 cent.).

Extracto de lechuga virosa,

Polvo atemperante de Sthal, ãã. c. s.

H. S. A. veinte píldoras.

D. En dos días, de dos en dos píldoras cuando los accesos son violentos, y en cuatro días cuando son menos fuertes los dolores.

5176. P. ANTIGOTOSAS, LLAMADAS DE LARTIGUE.

℞ Extracto acético de cólchico,
Extracto alcohólico de

coloquintida, ãã. . . ḡv (20 gr.).

H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

5177. P. ANTIHELMÍNTICAS.

℞ Mercurio dulce,
Azufre dorado de antimonio,
Extracto de ruibarbo,
Asa fétida, ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A. pildoras de ʒij (1 dec.).
D. Cuatro pildoras por la mañana, aumentando dos al dia.

5178. P. ANTIHELMÍNTICAS.

℞ Extracto de santónico. ʒxviii (1 gr.).
Santónico en polvo. . . c. s.
H. S. A. pildoras de ʒij (1 dec.).

5179. Otras, n. 2.

℞ Amalgama de estaño. c. s. q.
Extracto de ajénjos. c. s.
Se ponen á la ceniza caliente los dos metales hasta que se oxiden y se añade el extracto.
H. S. A. pildoras de ʒvj (3 dec.).
D. Cuatro á ocho por la mañana.

5180. Otras, n. 3.

℞ Acíbar. ʒj (4 gr.).
Ruibarbo. ʒjβ (6 gr.).
Calomelanos. ʒxviii (1 gr.).
Jalapa. ʒβ (2 gr.).
Jabon blanco. ʒj (4 gr.).
Extracto de enebro. . . c. s.
H. S. A. pildoras de ʒij (1 dec.).
I. Agrios, afecciones verminosas. D. Dos á seis pildoras por la mañana.

5181. Otras (H. DE AL.).

℞ Trementina. ʒj (4 gr.).
Jabon de jalapa. . . . ʒβ (2 gr.).
Extracto de beleño. . ʒjv (2 dec.).
Calomelanos. ʒviii (4 dec.).
H. S. A. pildoras de ʒxij (6 dec.).
I. Ténia. D. Cuatro pildoras cada tres horas.

5182. Otras (SCHMUKER).

℞ Semillas de cebadilla,
Miel, ãã. ʒβ (15 gr.).
Aceite volátil de hinojo. 20 gotas.
H. S. A. pildoras de ʒv (25 cent.).

D. Seis por mañana y noche á los adultos; una ó dos á los niños.

5183. P. ANTIHELMÍNTICAS FÉTIDAS.

℞ Asa fétida,
Calomelanos.
Extracto de ruibarbo,
Extracto de cáscara de nuez,
Extr. de ajénjos, ãã. ʒxviii (1 gr.).
Aceite de tanaceto. . c. s.
H. S. A. pildoras de ʒiij (15 cent.).
I. Helminthiasis, ascárides, ténia. D. Seis pildoras al dia.

5184. P. ANTIHELMÍNTICAS Y PURGANTES.

℞ Calomelanos,
Escamonea, ãã. ʒx (5 dec.).
Gutagamba. ʒvj (3 dec.).
Confeccion de jacintos. c. s.
H. S. A. dos ó tres bolos.
I. Ténia. D. Una de cuarto en cuarto de hora, despues de haber tomado ʒiij (12 gr.) de raiz de hellecho macho en ʒvj (180 gr.) de infusion de tilo, bebiendo despues una ó dos tazas de té.

5185. P. ANTIHEMICRÁNICAS.

℞ Láudano líquido. . . . ʒxviii (1 gr.).
Tintura de ipecacuana. ʒβ (2 gr.).
Acetato de amoniaco. ʒβ (15 gr.).
Polvo de acíbar,
Polvo de bellad., ãã. ʒxviii (1 gr.).
H. S. A. pildoras de ʒij (1 dec.).
I. Jaqueca, cefalalgia, hemotisis. D. Una de hora en hora.

5186. P. ANTIHEMÓPTICAS (Cottreau).

℞ Tanino puro. ʒβ (2 gr.).
Conserva de rosas. c. s.
H. S. A. diez y ocho pildoras muy iguales.
D. Se toma una de hora en hora y se van dando con mayor intervalo, á medida que disminuyen los accidentes.

Nota. Estas pildoras producen

igualmente buenos efectos en los casos de metrorragia y de flujos mucosos crónicos. Se usan ventajosamente contra la espermatorrea; pero en este último caso solo se toman seis en las veinticuatro horas, y á cada una se añade una sexta parte de grano de extracto hidroalcohólico de lechuga virosa.

Charvet de Grenoble dice que ha observado que producen buenos efectos contra los sudores que fatigan en ciertas enfermedades y particularmente en los de los tísicos.

5187. P. ANTIHEMORROIDALES
(Gall).

℞ Copaiba solidificado con magnesia. ʒjβ (45 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
D. Seis, ocho y despues diez ó doce píldoras, tres veces al dia.

5188. P. ANTIHERPÉTICAS.

℞ Ruibarbo. ʒβ (2 gr.).
Calomelanos. ʒvj (3 dec.).
Etíope mineral. ʒjβ (6 gr.).
Jabon de Alicante. ʒj (30 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.). D. Dos píldoras al dia, que se aumentarán hasta seis.

5189. Otras, n. 2.

℞ Guayaco,
Etíope antimonial, ãã. . . ʒj (4 gr.).
Tallos de dulcamara. . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.) que se cubrirán con polvo de licopodió.

5190. Otras (BARTHEZ).

℞ Mercurio. ʒij (64 gr.).
Flores de azufre,
Sulfato de potasa, ãã. ʒβ (16 gr.).
Alcanfor. ʒβ (2 gr.).
Se trituran en un mortero hasta

extinguir el mercurio. Entonces se añade:

Resina de guayaco en polvo. ʒj (32 gr.).
Bálsamo del Perú. . . ʒij (8 gr.).
Jarabe de claveles. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Herpes y otras enfermedades de la piel. D. Tres píldoras por la mañana en ayunas.

5191. Otras (DUBLE).

℞ Sublimado corrosivo. . . ʒij (1 dec.).
Extracto de acónito. . . ʒj (12 dec.).
Polvo de acónito. c. s.

Se trituran por mucho tiempo en un mortero de vidrio y se hacen veinticuatro píldoras.

I. Afecciones venéreas antiguas, sarna, herpes sífilíticos, infartos del sistema linfático, etc. D. Una por la mañana y otra por la tarde, aumentando progresivamente la dosis. Cada una de estas píldoras contiene una duodécima parte de grano de sublimado y ʒj (5 cent.) de extracto de acónito.

5192. Otras (DUBOIS).

℞ Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ãã. ʒβ (2 gr.).
Extracto de cicuta. . . ʒβ (16 gr.).
Polvo de cicuta. c. s.

H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Herpes. Nota. Al mismo tiempo se hace uso de baños, bebidas y se aplican los remedios que se emplean en semejantes casos.

5193. Otras (DUMAS).

℞ Goma amoniaco. ʒβ (15 gr.).
Extracto de dulcamara. ʒj (30 gr.).
Azufre dorado de antim. ʒj (4 gr.).
Flores de azufre. ʒij (8 gr.).
Jarabe de fumaria. c. s.

H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

D. Cuatro mañana y noche; se aumentan dos cada tres ó cuatro dias.

5194. P. ANTIHERPÉTICAS
(Fouquet).

- ℥ Etíope mineral. ḡXL (20 dec.).
 Mercurio dulce. ḡx (5 dec.).
 Azufre dor. de antim. ḡv (25 cent.).
 Extr. de escabiosa. ḡxxx (15 dec.).
 Jarabe de fumaria. . c. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Afecciones cutáneas, para remediar los vicios de la linfa é infartos glandulosos que de ella dependen. D. Tres por la mañana en ayunas, y se aumenta gradualmente la dosis hasta seis al día, en dos tomas.

5195. Otras (GOLFIN).

- ℥ Deutoclorur. de merc. ḡviii (4 dec.).
 Jabon. ḡij (8 gr.).
 Extracto de cicuta. ḡij (8 gr.).
 Ruibarbo en polvo. ḡj (4 gr.).

II. S. A. sesenta píldoras.

D. Se toma primero una mañana y tarde y se aumenta una píldora cada dos ó tres días, hasta llegar á seis ó siete solamente, á causa de la salivacion.

5196. Otras (KOPP).

- ℥ Deutoclor. de merc. ḡiij (15 cent.).
 Se disuelve en c. s. de alcohol rectificado y despues se añade:

Extracto de cicuta. . . ḡLx (30 dec.).

H. S. A. sesenta píldoras. Cada píldora contiene una vigésima parte de grano de sublimado, y ḡj (5 cent.) de extracto de cicuta.

I. Afecciones escrofulosas, enfermedades cutáneas crónicas, sífilis constitucional. D. Una á seis píldoras al día, aumentando progresivamente hasta doce.

5197. Otras (KUNKEL).

- ℥ Extracto de dulcamara. ḡjv (16 gr.).
 Sulfuro de antimonio. ḡij (8 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Se usan con buen éxito contra las enfermedades crónicas de la piel.

5198. P. ANTIHERPÉTICAS Y
ANTISIFILÍTICAS (Bally).

- ℥ Jabon blanco,
 Extr. de dulcamara, ãã. ḡj (4 gr.).
 Extracto de chrysan-
 themum crysanthus. ḡß (2 gr.).
 Extracto de cicuta,
 Extr. de coloquint., ãã. ḡxviii (1 gr.).
 Deutoclorur. de merc. ḡiij (15 cent.).

H. S. A. setenta y dos píldoras; cada una de ellas contendrá una vigésimacuarta parte de grano de sublimado.

D. Se da una, mañana y noche, aumentando con precaucion una cada seis ú ocho días.

5199. P. ANTIHERPÉTICAS
INGLESAS.

- ℥ Protochloruro de mercurio
 preparado al vapor. ḡj (4 gr.).
 Resina de guayaco. ḡij (8 gr.).
 Jarabe de espino serval. . c. s.
 H. S. A. setenta y dos píldoras.

D. Dos mañana y noche; se bebe despues un vaso de una infusion fuerte de lúpulo, y se toma la *pocion purgante inglesa* cada quince días.

5200. P. ANTIHIDRÓPICAS
(Dupuy).

- ℥ Extracto de trébol,
 Escila en polvo, ãã. ḡjß (6 gr.).
 Digital en polvo,
 Asa fétida, ãã. ḡj (4 gr.).
 II. S. A. cien píldoras.

I. Hidropesía, especialmente el hidrotorax, con asma y palpitaciones. D. Cuatro píldoras mañana y noche, bebiendo detrás de cada dosis una taza de infusion de pariataria nitrada.

5201. Otras (GRAEFFE).

- ℥ Azufre dorado de an-
 timonio. ḡx (5 dec.).
 Acíbar sucotrino. ḡjß (45 gr.).

Cebolla albarrana.
 Digital purpúrea, ãã. ḡxv (75 cent.).
 Extr. de cardo santo, e. s.
 H. S. A. cien píldoras iguales.

I. Anasarca, todas las hidropesías; y principalmente los infartos edematosos de las extremidades.
 D. Una píldora, mañana y noche; aumentando progresivamente hasta que tome el enfermo cinco cada vez; se bebe despues una taza de tisana apropiada.

5202. P. ANTIHIDRÓPICAS
 (Ronander).

℥ Sulfato de cobre amon. ḡx (5 dec.).
 Disuélvase la menor cantidad de agua posible y añádase:

Raiz de bellad. en polvo. ḡx (5 dec.).
 Gengibre en polvo. ḡj (4 gr.).
 Extracto de ajenjos. ḡij (8 gr.).
 H. S. A. ochenta píldoras.

I. Hidropesía pasiva con gran debilidad y fiebre cuando no existe ninguna lesion de las vísceras abdominales. D. Dos por la mañana, al medio dia y por la noche, aumentando una cada hora hasta que empiecen á manifestarse los efectos del sulfato ó de la belladona.

5203. P. ANTIHISTÉRICAS.

℥ Almizcle. ḡḂ (6 dec.).
 Aleanfor. ḡj (12 dec.).
 Goma arábica. ḡij (24 dec.).
 Extracto de opio. ḡjv (2 dec.).
 Alcohol de 88° c. 2 gotas.
 Malvabisco en polvo, e. s.
 H. S. A. veinticuatro píldoras.

Algunos las prescriben del modo siguiente:

Almizcle. ḡḂ (6 dec.).
 Aleanfor. ḡj (12 dec.).
 Goma amoniaco. ḡij (24 dec.).
 Extracto de opio. ḡjv (2 dec.).
 H. S. A. veinticuatro píldoras.

5204. Otras, n. 2.

℥ Castóreo,
 Extr. de valeriana, ãã. ḡḂ (2 gr.).

Asa fétida.
 Gálbano, ãã. ḡxviii (1 gr.).
 H. S. A. diez y seis píldoras.
 D. Una, dos y despues tres píldoras al dia.

5205. Otras, n. 3.

℥ Almizcle,
 Extr. de valeriana, ãã. ḡj (12 dec.).
 Extracto de opio. ḡḂ (6 dec.).
 H. S. A. diez y seis píldoras.
 Cada una contiene tres cuartas partes de grano de opio y uno y medio de almizcle.

D. Una á dos al dia, aumentando progresivamente.

5206. Otras, n. 4.

℥ Gálbano,
 Asa fétida,
 Mirra, ãã. ḡij (8 gr.).
 Castóreo,
 Valeriana, ãã. ḡj (12 dec.).
 Báls. líquido del Perú. e. s.

H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.). D. Dos píldoras, aumentando gradualmente hasta llegar á seis al dia.

5207. Otras (MEZA).

℥ Asa fétida,
 Extracto de acíbar gomoso,
 Goma amoniaco, ãã. ḡij (8 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

D. Cuatro al medio dia, por mañana y tarde. Se bebe despues una infusion concentrada de melisa azucarada convenientemente, y aromatizada con una cucharadita de agua de flor de naranjo.

5208. Otras (PIDERIT).

℥ Asa fétida. ḡLjv (3 gr.).
 Castóreo. ḡLjv (3 gr.).
 Acido succínico sublim. ḡxviii (1 gr.).
 Aceite animal de Dip-
 pel. ḡjx (50 cent.).

Se forma una masa con s. c. de tintura alcohólica de mirra.

5209. P. ANTIHISTÉRICAS
(*Rosenstein*).

℞ Asa fétida. ʒij (8 gr.).
Sal de cuerno de ciervo. ʒʒ (2 gr.).
Castóreo. ʒʒ (2 gr.).
Opio. ʒv (25 cent.).
H. S. A. píldoras de ʒijʒ (12 cent.).
D. Una píldora dos ó tres veces al dia.

5210. Otras (SELLE).

℞ Gálbano,
Asa fétida,
Extracto de angélica, ãã. ʒʒ (15 gr.).
Castóreo,
Azafran, ãã. ʒj (4 gr.).
Opio. ʒʒ (2 gr.).
Tintura alcohólica de castóreo, c. s.
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Espasmos histéricos. D. Cinco á ocho, dos veces al dia.

5211. Otras (SYDENHAM).

℞ Castóreo. ʒxv (75 cent.).
Mirra,
Goma gálbano, ãã. . ʒʒ (2 gr.).
Asa fétida. ʒj (4 gr.).
Tintura de valeriana, c. s.
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.)
que se cubren con licopodio.
I. Histérico. D. Tres á ocho píldoras.

5212. P. ANTHICTÉRICAS
(*Buchan*).

℞ Acíbar sucotrino,
Ruibarbo,
Jabon medicinal, ãã. . . . ʒj (4 gr.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒvj (3 dec.).
I. Ictericia, cuando la enfermedad se prolonga, é infartos del hígado. D. Cinco á seis píldoras al dia.

5213. Otras (COEROLY).

℞ Extracto de saponaria. . ʒij (8 gr.).
Protocloruro de mercur. ʒj (4 gr.).

H. S. A. setenta y dos píldoras.
D. Tres ó cuatro al dia.

5214. Otras (MACGREGOR).

℞ Extracto de cicuta,
Extracto de quina, ãã. . . ʒj (4 gr.).
Gengibre en polvo. c. s.
H. S. A. sesenta píldoras.
D. Dos ó tres al dia.

5215. Otras (STORCK).

℞ Extracto de cicuta. . ʒj (4 gr.).
Píldoras de Belloste. ʒxv (75 cent.).
H. S. A. sesenta píldoras.
D. Se dan una ó dos al dia.

5216. P. ANTILÁCTEAS (H. DE M.).

℞ Sulfato de potasa. . . . ʒv (20 gr.).
Alcanfor,
Nitrato de potasa, ãã. ʒij (8 gr.).
Arrope de saúco y almidon. . . c. s.
Háganse ciento veinte píldoras.
D. Dos por la mañana en ayunas y dos antes de comer, con una taza de cocimiento de grama ó de caña.

5217. P. ANTILECHOSAS.

℞ Calomelanos. ʒjx (50 cent.).
Etiope mineral. . . . ʒxviii (1 gr.).
Sulfato de potasa. . . ʒj (4 gr.).
Alcanfor. ʒv (25 cent.).
Resina de jalapa. . . ʒjx (50 cent.).
Goma en polvo. . . . ʒxviii (1 gr.).
Jarabe de las cinco raíces. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Infartos lechosos de las mamas, enuresis. D. Cuatro píldoras, mañana y noche.

5218. Otras (MASSAU).

℞ Acetato de sosa. . . . ʒv (20 gr.).
Alcanfor,
Nitro, ãã. ʒij (8 gr.).
Rob de saúco. c. s.
H. S. A. ciento veinte píldoras.
D. Dos por la mañana en ayunas y dos antes de comer, y se bebe

despues una taza de infusion de escolopendra.

I. Destete, infarto lechoso de las mamas, mareo.

5219. P. ANTILEUCORRÉICAS
(*Ritto*).

℞ Cólchico en polvo. ḡxviii (4 gr.).
Jabon medicinal. c. s.

H. S. A. diez y ocho píldoras.

D. Una píldora tres veces al dia, y se aumenta cada dia una píldora hasta nueve en las veinticuatro horas, á menos que no lo contra-indique su efecto purgante.

5220. P. ANTIMONIADAS
(*Ammon*).

℞ Tártaro emético,
Castóreo, ãã ḡvj (3 dec.).

Hojas de sen,
Ruibarbo, ãã. ḡxviii (4 gr.).

Jabon. ʒB (2 gr.).

Extracto de taraxacon. c. s.

H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Amaurosis, conjuntivitis, tétanos, reumatismo, sífilides. *D.* Cuatro píldoras, tres veces al dia.

5221. Otras (HILDENBRAND).

℞ Antimonio crudo. ʒB (2 gr.).

Goma de guayaco,
Extr. de dulcamara, ãã. ʒj (4 gr.).

Extracto de taraxacon. . . c. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Reumatismo articular. *D.* Dos píldoras cada dos horas.

5222. P. ANTINEURÁLGICAS.

℞ Extracto de acónito,

Extracto de beleño, ãã. ḡxviii (4 gr.).

Subnitr. de bismuto. ḡxij (6 dec.).

Valeriana en polvo. . . ʒB (2 gr.).

H. S. A. treinta píldoras.

I. Corea, reumatismo, efidrosis, epilepsia, neuralgia. *D.* Una á tres píldoras al dia.

5223. Otras (CORBEL LAGNEAU).

℞ Extracto de valeriana,

Asa fétida,

Tridacio, ãã. ʒB (2 gr.).

Extracto tebaico. ḡv (25 cent.).

Sulfato de quinina. ḡxij (6 dec.).

H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Cefalalgias con tipo intermitente muy oscuro, gastralgias de curso periódico.

5224. Otras (MARCHAL DE CALVI).

℞ Sulfato de quinina. ḡxvj (8 dec.).

Extracto de valeriana. ḡxx (10 dec.).

Extr. acuoso de opio. ḡjv (2 dec.).

Polvo de hojas de naranjo,

Polvo de canela, ãã. ḡxx (4 gr.).

Jarabe de belladona. . . c. s.

H. S. A. treinta píldoras.

D. Una de hora en hora. A la tercera se duerme el enfermo cesando el dolor.

5225. Otras (RECAMIER).

℞ Ipecacuana en polvo,

Opio purificado, ãã. ḡiij (15 cent.).

Carbonato de amoniaco,

Alcanfor, ãã. ḡxij (6 dec.).

Jarabe de goma. . . c. s.

H. S. A. treinta píldoras.

D. Una cada tres horas.

5226. P. ANTINEURÁLGICAS DE MEGLIN ó Píldoras de Meglin (F. F.).

℞ Extracto de beleño negro,

Extracto de valeriana,

Oxido blanco de zinc, ãã. ʒj (32 gr.).

H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Son antiespasmódicas y muy eficaces en un gran número de afecciones nerviosas, y en particular en las neurosis con dolores, calambre doloroso de la cara, co-rea, amenorrea, gastralgia, hemicránea y neuralgias. Se pueden reemplazar los extractos de beleño y valeriana por el de acónito y mejor aun por el de estramonio.

D. Se empieza por una píldora,

y se aumenta progresivamente hasta seis ú ocho.

La misma composicion tienen las PILDORAS ANTINEURÁLGICAS DE LOS H. M., solo que contienen extracto de belladona en lugar del de beleño.

5227. P. ANTINEURÁLGICAS DE MEGLIN (H. DE M.).

℥ Extracto de valeriana,
Extracto de fumaria,
Extracto de beleño,
Oxido de zinc, ãã. 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Epilepsia y neuralgias. D. Una píldora varias veces al día.

5228. P. ANTINEURÁLGICAS (Trousseau).

℥ Extracto de estramonio,
Extracto de opio, ãã. . . ḡx (5 dec.).
Oxido de zinc. 5ij (8 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.

D. Se administran de una á ocho en las veinticuatro horas. Se aumentará la dosis hasta que el enfermo empiece á experimentar una turbacion notable de la vista, y se continuará así á lo menos quince días despues de haber cesado los dolores.

La fórmula de los H. DE M. contiene ḡij (4 dec.) de extracto de estramonio, ḡij (4 dec.) de extracto de opio y 5ij (8 gr.) de óxido de zinc.

5229. P. ANTIODONTÁLGICAS.

℥ Opio puro,
Extracto de beleño,
Extr. de belladona, ãã. ḡḢ (6 dec.).
Aceite de clavo. 3 gotas.
Raiz de pelitre. c. s.
H. S. A. treinta píldoras, que se cubrirán con polvo de pelitre.

5230. Otras, n. 2.

℥ Opio puro,
Acanfor, ãã. ḡj (5 cent.).
Aceite de clavo,

Tint. de pimienta, ãã. ḡij (10 cent.).
H. S. A. cuatro píldoras.

5231. Otras, n. 3.

℥ Creosota. ḡḡjv (20 cent.).
Opio en polvo. ḡij (10 cent.).
Goma arábica. ḡv (25 cent.).
H. S. A. diez píldoras.

5232. Otras, n. 4.

℥ Catecú,
Sangre de drago,
Mirra, ãã. ḡxxjv (12 dec.).
Extracto de belladona,
Opio puro, ãã. ḡxv (75 cent.).
H. S. A. píldoras de ḡj (5 cent.).

5233. Otras (MOST).

℥ Asa fétida. 5j (4 gr.).
Trementina de Venecia. ḡxij (6 dec.).
Acanfor. ḡvj (3 dec.).
H. S. A. treinta píldoras.
I. Odontalgia nerviosa. D. Una píldora cubierta de algodón, que se introduce en la oreja.

5234. P. ANTIPERIÓDICAS.

℥ Sulfato de quinina. . . ḡj (12 dec.).
Extracto de quina. . . . 5Ḣ (2 gr.).
Jarabe de cáscara de naranja, c. s.
H. S. A. doce ó veinticuatro píldoras.

5235. Otras, n. 2.

℥ Sulfato de quinina,
Extracto de genciana, ãã. 5Ḣ (2 gr.).
Sal de ajénjos. c. s.
Mézclese y dividase en doce píldoras.

I. Apirexia de las calenturas intermitentes, neuralgias, hemorragias periódicas, etc. D. Una píldora cada dos ó tres horas en la apirexia.

5236. P. ANTIRAQUÍTICAS (Neumann).

℥ Asa fétida,
Peróxido de hierro, ãã. 5iij (12 gr.).

Ruibarbo en polvo,
Gengibre en polvo, ãã. ʒjβ (6 gr.).
Extracto de taraxacon, c. s.
H. S. A. pildoras de ġij (1 dec.).
I. Afecciones escrofulosas, co-
xalgia, raquitis, tumores blan-
cos. D. Cuatro á seis pildoras tres
veces al dia.

5237. P. ANTIREUMATICAS.

ʒ Extracto de alcachofa,
Polvo de regaliz, ãã. . . ʒjβ (6 gr.)
Mucilago de goma tragacanto, c. s.
H. S. A. noventa pildoras.
I. Reumatismo crónico. D. Tres
ó cuatro pildoras, cuatro veces al
dia.

5238. Otras (HILDENBRAND).

ʒ Extracto de acónito,
Azufre dorado de antimonio,
Asa fétida, ãã. ʒβ (2 gr.).
Extracto de taraxacon, c. s.
H. S. A. pildoras de ġjv (2 dec.).
I. Dolores articulares reumáti-
cos. D. Tres pildoras, tres veces
al dia.

**5239. P. ANTIREUMÁTICAS
(Lombard).**

ʒ Extracto alcohólico de
acónito. ʒj (12 dec.).
Raiz de regaliz. ʒj (4 gr.).
Rob de saúco. c. s.
H. S. A. cuarenta pildoras.
I. Reumatismo articular. D. Una
pildora cada dos horas, aumentan-
do poco á poco hasta seis ó nueve.

5240. Otras (RICHTER).

ʒ Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos,
Extr. de acónito, ãã. ġxviiij (4 gr.).
Extracto de regaliz,
Resina de guayaco, ãã. ʒjβ (6 gr.).
Extr. de dulcamara. . ʒijβ (10 gr.).
H. S. A. pildoras de ġij (1 dec.).
I. Artritis reumática, reumatis-
mo muscular y fibroso. D. Ocho
pildoras, cuatro veces al dia.

5241. Otras (VOGT).

ʒ Semillas de estramonio. ʒj (12 dec.).
Alcanfor. ʒj (4 gr.).
Sabina. ʒjβ (6 gr.).
Extracto de polígala
virginiana. ġxc (5 gr.).
H. S. A. pildoras de ġij (1 dec.).
D. Seis pildoras, tres ó cuatro
veces al dia.

**5242. P. ANTISÉPTICAS
(Dupuytren).**

ʒ Alcanfor en polvo. . . ʒj (12 dec.).
Almizele en polvo. . . ġviiij (4 dec.).
Extracto de opio. . . . ġij (1 dec.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. pildoras de ġvj (3 dec.).
I. Afecciones gangrenosas, ca-
lenturas adinámicas, gangrena de
hospital. D. Cinco ó seis al dia.

5243. Otras (KAPELER).

ʒ Alcanfor,
Nitrato de potasa,
Goma arábica en pol-
vo, ãã. ʒj (12 dec.).
H. S. A. pildoras de ġjv (2 dec.).
I. Afecciones gangrenosas; ca-
sos en que se manifiesta tendencia
á la gangrena ó se ha declarado
ya. D. Cuatro á ocho pildoras.

5244. P. ANTISIFILÍTICAS.

ʒ Deutocloruro de merc. ġvj (3 dec.).
Tridacio. ġxviiij (4 gr.).
Extr. de zarzaparrilla. ġxviiij (4 gr.).
Mézclese y dividase en veinti-
cuatro pildoras.
I. Sífilis constitucional, y se
puede secundar el efecto del su-
blimado por la tisana ó jarabe de
zarzaparrilla ó guayaco, y si hay
infartos gangliónicos se reempla-
za el sublimado por los ioduros de
mercurio.

5245. Otras (ALIBERT).

ʒ Malvabisco en polvo. ʒjv (125 gr.).

Protocloruro de mercurio,
Resina de guayaco, ãã. ʒij (60 gr.).
Jarabe de membrillo, c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
D. Cuatro á seis píldoras al dia.
Cada una contiene ʒj (5 cent.) de calomelanos.

5246. P. ANTISIFILITICAS
(Dupuytren).

ʒ Deutocloruro de merc. ʒviiij (4 dec.).
Extracto de opio. . . . ʒx (5 dec.).
Extracto de quina. . . . ʒcviiij (5 gr.).
Quina en polvo. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Afecciones sifilíticas.
Nota. Cada píldora contiene la quinta parte de grano de sublimado. D. De una á tres al dia.

5247. Otras (DUPUYTREN).

ʒ Sublimado corrosivo. ʒviiij (4 dec.).
Extracto de opio. . . . ʒx (5 dec.).
Extracto de guayaco. ʒjʒ (6 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
Mialhe propone en lugar de estas las píldoras cloro-mercúricas, para los casos en que está contra-indicado el opio.
I. Afecciones sifilíticas constitucionales. Cada una contiene $\text{ʒ}^{1/5}$ (1 cent.) de sublimado y $\text{ʒ}^{1/4}$ (12 mil.) de extracto acuoso de opio.
D. Una á tres píldoras al dia.

5248. Otras (REGAMIER).

ʒ Sublimado corrosivo,
Extr. gom. de opio, ãã. ʒvj (3 dec.).
Etiope mineral,
Quermes mineral, ãã. . ʒʒ (2 gr.).
Miga de pan. c. s.
H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras.
D. Una píldora el primer dia, dos en los dias siguientes, tres en los otros tres y así sucesivamente hasta ocho.

5249. Otras (SARRASIN).

ʒ Oxido negro de merc. ʒij (8 gr.).
Extracto de saponaria. ʒjv (16 gr.).

Extracto de opio. . . . ʒxviiij (4 gr.).
H. S. A. cien píldoras iguales.
D. Una por la mañana y dos por la tarde; al mismo tiempo se bebe un vaso de un cocimiento fuerte de saponaria, hecho con ʒij (60 gr.) de esta raiz y seis cuartillos (3 lit.) de agua, que se reducirán á cuatro por la ebullicion.

5250. P. ANTISUDORÍFICAS (H. M.).

ʒ Acetato de plomo cristalizado,
Polvos de malvab., ãã. ʒj (12 dec.).
Jarabe simple. c. s.
para hacer una masa, que se dividirá en doce píldoras iguales.
D. Una cada cuatro horas; esta dosis se aumentará ó disminuirá segun los efectos y los dolores cólicos que produzca.

5251. P. ANTITETÁNICAS.

ʒ Arnica en polvo. ʒijʒ (10 gr.).
Agua de Luce. ʒʒ (2 gr.).
Alcanfor,
Almizcle, ãã. ʒxviiij (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
Se puede añadir ʒxviiij á ʒj (1 á 4 gr.) de nitrato de potasa segun el estado del aparato urinario.
I. Tétanos, mordeduras de animales venenosos. D. Una píldora de hora en hora.

5252. P. ANTITÍPICAS (H. M.).

ʒ Sulfato de quinina. . . . ʒxij (6 dec.).
H. S. A. doce píldoras iguales.
I. Calenturas intermitentes. D. Dos píldoras cada tres cuatro horas durante la apirexia.

5253. P. ANTITÍSICAS
(A. Latour).

ʒ Sal marina,
Tanino, ãã. ʒijʒ (10 gr.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. cien píldoras.
D. Una cada hora durante un mes. Al mismo tiempo hace tomar una infusion de quina, de berro y buenos alimentos.

5254. P. ANTITÍSICAS (*Farmacopea de Palacios*).

℞ Azúcar de Saturno. ʒj (4 gr.).
 Sal de Marte. ʒʒ (2 gr.).
 Sangre de drago. ʒjʒ (6 gr.).
 Bálsamo de copaiba. c. s.
 H. S. A. I. Tisis y catarro pulmonar crónico. D. De ʒʒ á ʒj (6 á 12 dec.).

5255. P. ANTITUBERCULOSAS (*Righini*).

℞ Mirra. ʒij (24 dec.).
 Opio puro. ʒjv (2 dec.).
 Ioduro de potasio. ʒʒ (2 gr.).
 Rob de saúco. c. s.
 H. S. A. treinta píldoras.
 D. Dos píldoras tres veces al día.

5256. P. ANTIVENÉREAS.

℞ Cloruro de oro y sodio. ʒʒ (25 mil.).
 Extracto de saponaria. ʒj (4 gr.).
 Goma arábiga en polvo. c. s.
 H. S. A. treinta píldoras.
 D. Una á ocho píldoras al día; cada una contiene una sexagésima parte de grano de cloruro.

5257. Otras (SERRE).

℞ Cloruro de plata y amoniaco. ʒj (5 cent.).
 Lirio en polvo. ʒij (1 dec.).
 Conserva de tilo. c. s.
 H. S. A. catorce píldoras.
 I. Enfermedades sífilíticas, diarrea. D. Una mañana y tarde.

5258. P. APERITIVAS.

℞ Acíbar,
 Sulfato de potasa,
 Ruibarbo,
 Jabon blanco., ãã. ʒj (4 gr.).
 Extracto de genciana,
 Extracto de taraxacon, ãã. c. s.
 H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
 I. Hidropesía, ascitis, anasarca.
 D. Cinco mañana y tarde.

5259. P. DE ARMENIA.

℞ Bálsamo de copaiba. c. s. q.

Se evapora en el baño maría hasta la consistencia emplástica, y se añade despues para ʒj (32 gr.) de residuo

Magneſia calcinada. . ʒʒ (2 gr.).
 Cuando la masa esté casi solidificada se la agrega

Cubebas en polvo,
 Bol de Armenia en polvo, ãã. ʒijʒ (10 gr.).

H. S. A. una masa para píldoras que se divide en bolos de ʒviiiij (4 dec.) que se rodean de tierra de bolo de Armenia. Para ocultar mejor el olor sería mas conveniente cnbrirlas de gelatina ó convertirlas en grajea.

I. Blenorragias. Estas píldoras recuerdan los bolos de Armenia del doctor Carlos Albert, de charlatanesca memoria.

5260. P. DE ARSENIATO DE HIERRO (*Biett*).

℞ Arseniato de hierro. ʒiiij (15 cent.).
 Extracto de lúpulo. . ʒj (4 gr.).
 Polvo de malvabisco. ʒʒ (2 gr.).
 Jarabe de flores de naranjo. . . c. s.
 H. S. A. cuarenta y ocho píldoras iguales.

I. Afecciones cancerosas, eczema, líquen crónico, afecciones escamosas de la piel, como la lepra, soriasis, lupus, neuralgias rebeldes, heridas envenenadas, escrófulas, sífilis, herpes ulcerados y corrosivos, úlceras, lepra, elefantiasis, pian. D. Una al día.

Nota. Cada píldora contiene una décimasesta parte de grano de arseniato.

5261. P. DE ARSENIATO DE SOSA (*Biett*).

℞ Extracto hidroalcohólico de cicuta. ʒj (12 dec.).
 Arseniato de sosa. ʒij (1 dec.).
 H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Eczema, líquen crónico, afecciones escamosas, lepra, soriasis, lupus, pian, pitiriasis, lepra, herpes. D. Una á dos píldoras al día.

5262. P. ARSENICALES (Boudin).

℥ Arseniato de sosa. ḡ¹/₅ (1 cent.).
Se disuelve en algunas gotas de agua destilada, y con c. s. de un polvo inerte se hacen veinte píldoras.

D. Una á dos píldoras en las veinticuatro horas.

5263. P. ARSENICALES CONTRA EL CATARRO PULMONAR CRÓNICO (Garrin).

℥ Acido arsenioso. ḡj (5 cent.).
Extracto de opio. ḡx (50 cent.).
H. S. A. veinticinco píldoras.

I. Se refiere un caso de curacion del catarro pulmonar crónico con el uso del ácido arsenioso. *D.* Una píldora mañana y noche.

5264. P. DE ARSÉNICO AMERICANAS.

℥ Acido arsenioso. ḡij (4 dec.).
Opio en polvo. ḡviii (4 dec.).
Jabon en polvo. ḡj (12 dec.).

H. S. A. una masa que se divide en treinta y dos píldoras iguales.

I. Calenturas intermitentes pertinaces, que resisten á las preparaciones de quina. *D.* Una píldora, y se aumenta gradualmente la dosis hasta tres. Se debe observar sus efectos.

5265. P. DE ASA FÉTIDA.

℥ Asa fétida,
Extracto de quina, añ. ʒβ (2 gr.).
Belladona en polvo. c. s.

H. S. A. treinta píldoras.

I. Coqueluche, vómitos, esplenitis, polidipsia, asma, hipocondría, hipertrofia, histérico, esofagismo, parálisis, neuralgias. *D.* Una píldora de dos en dos horas.

5266. Otras, n. 2.

℥ Asa fétida. ʒijβ (10 gr.).
Extracto de lechuga. ḡLjv (3 gr.).
H. S. A. cincuenta píldoras.

D. Una píldora cada dos horas.

5267. P. DE ASA FÉTIDA Y ALCANFOR.

℥ Asa fétida. ʒij (8 gr.).
Alcanfor. ʒβ (2 gr.).
Conserva de rosas. c. s.

H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Afecciones espasmódicas. *D.* Se dan cinco á seis al dia.

5268. P. DE ASA FÉTIDA ó Píldoras de jabon compuestas (H. DE AL.).

℥ Asa fétida. ʒij (8 gr.).
Jabon amigdalino. ʒj (4 gr.).
Aceite esencial de hinojo. 6 gotas.

H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).

D. Dos á seis píldoras al dia.

5269. P. DE ASA FÉTIDA COBREOSAS (Feiler).

℥ Asa fétida. ḡLx (30 dec.).
Verde gris. ḡxij (6 dec.).

H. S. A. sesenta píldoras.

I. Afecciones escrofulosas, coxalgia, ciertos casos de tisis incipiente, raquitis, tumores blancos, tumores glandulares. *D.* Dos á tres píldoras al dia.

5270. P. DE ASA FÉTIDA CON BELEÑO.

℥ Asa fétida. ḡLjv (3 gr.).
Extracto de beleño. ḡjx (50 cent.).
Bálsamo del Perú. c. s.

Aceite de succino rect. 20 gotas.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Amenorrea, tétanos, vómitos, histérico, hipocondría, tisis, polidipsia, asma, corea, esofagismo, parálisis, neuralgias. *D.* Seis píldoras al dia.

5271. P. DE ASA FÉTIDA COMPUESTAS (H. DE ING.).

℥ Asa fétida. ḡxx (10 dec.).
Ipecacuana,

Cebolla albarrana, añ. ḡij (1 dec.).

Agua. c. s.

H. S. A. seis píldoras.

D. Una á dos píldoras, tres ó cuatro veces al dia.

**5272. P. DE ASA FÉTIDA
ESCLÍTICAS.**

℞ Asa fétida. ʒʒ (2 gr.).
 Digital. ʒxxviii (4 gr.).
 Escila. ʒʒ (2 gr.).
 Extracto de enebro,
 Extr. de coloquint., ãã. ʒxxviii (4 gr.).
 H. S. A. treinta píldoras.

I. Hipertrofia, hidropesías pasivas, anasarca, hidrotorax, vómitos, coqueluche, neuralgias.
D. Una píldora cada dos horas.

**5273. P. DE ASA FÉTIDA É IODURO
DE HIERRO.**

℞ Asa fétida,
 Valeriana en polvo,
 Ioduro de hierro, ãã. . . ʒj (4 gr.).
 H. S. A. setenta y dos píldoras,
D. Se toman cinco á seis al dia en la clorosis complicada con accidentes histéricos.

**5274. P. DE ASA FÉTIDA Y MAN-
ZANILLA (*Laferta*).**

℞ Asa fétida,
 Extr. de manzanilla, ãã. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. ochenta píldoras.
I. Previene la muerte del feto en las mujeres que ya han tenido síntomas de aborto. *D.* Dos píldoras, una mañana y noche. Se bebe despues una taza de café. Se aumenta la dosis cada cuatro ó cinco dias.

**5275. P. DE ASA FÉTIDA
MOSCADAS.**

℞ Asa fétida,
 Nitro, ãã. ʒʒ (2 gr.).
 Extracto de quina,
 Extr. de catecú, ãã. ʒj (4 gr.).
 Almizcle. ʒxv (75 cent.).
 H. S. A. píldoras de ʒvj (3 dec.).

I. Neuralgias, amenorrea, histérico, hipocondría, neumatosis, asma, ataxia, ileo. *D.* Dos á cuatro píldoras al dia y aun mas.

5276. Otras, n. 2.

℞ Asa fétida. ʒʒ (6 dec.).

Almizcle. ʒvj (3 dec.).
 H. S. A. seis píldoras.
D. Una á dos al dia.

**5277. P. DE ASA FÉTIDA
Y VALERIANA.**

℞ Asa fétida,
 Valeriana en polvo, ãã. ʒijʒ (10 gr.).
 Jarabe de goma. . . . c. s.
 H. S. A. cien píldoras.
D. Cinco á seis al dia.

5278. P. DE ASCLEPIAS.

℞ Asclepias,
 Extracto de taraxacon,
 Alcanfor, ãã. ʒxxviii (4 gr.).
 H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Lepra, elefantiasis, herpes.
D. Dos píldoras mañana y noche.

5279. P. ASIÁTICAS (F. F.).

℞ Acido arsenioso pul-
 verizado. ʒj (5 cent.).
 Pimienta negra en p. ʒxix (60 cent.).
 Goma aráb. en polv. ʒij (40 cent.).
 Agua comun. c. s.

Se trituran por mucho tiempo el ácido arsenioso y la pimienta negra en un almirez de hierro hasta obtener una mezcla íntima, se añade la goma y el agua, y se hacen doce píldoras.

Es muy importante triturar mucho tiempo el ácido y la pimienta para que aquel se reparta con uniformidad en la masa, y cuando se hagan cantidades de alguna consideracion se debè triturar por algunas horas.

I. Afecciones nerviosas, epilepsia, calenturas intermitentes y algunas formas secas y rebeldes de la piel, soriasis, eczema, liquen, lupus. Antiguamente se usaban en la India contra la lepra tuberculosa. Son uno de los agentes mas enérgicos y preciosos de la terapéutica. *D.* Se empieza dando una, y rara vez se pasa de dos.

5280. Otras (H. DE M.).

℞ Acido arsenioso. . . ʒvij (35 cent.).

Pimienta negra en polvo. ʒj (4 gr.).
H. S. A. cien píldoras iguales.
Cada una contiene un décimocuarto de grano de ácido arsenioso.

I. Lepra tuberculosa, herpes liquenoides inveterados y algunas erupciones escamosas. *D.* Una píldora al día, y rara vez se puede pasar de dos.

5281. P. ASTRINGENTES.

ʒ Alumbre. ʒj (4 gr.).
Catecú,
Sangre de drago, ãã. . . ʒß (2 gr.).
Jarabe diacodion. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).

I. Hemotisis, lenteria, blenorragia, disenteria crónica, neurosis. *D.* Tres á diez píldoras al día.

5282. Otras, n. 2.

ʒ Mercurio dulce. ʒj (12 dec.).
Bálsamo de copaiba. . . ʒiij (12 gr.).
Catecú. ʒiij (12 gr.).
Jarabe de consuelda mayor. . . c. s.
H. S. A. ciento cincuenta píldoras.

I. Leucorrea y blenorragias crónicas. *D.* Doce al día, á saber: cuatro por la mañana, cuatro al medio día y cuatro por la noche.

5283. Otras, n. 3.

ʒ Acetato de plomo,
Ipecacuana, ãã. ʒj (4 gr.).
Opio. ʒß (6 dec.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. cuarenta píldoras.

I. Hemorragias internas pasivas.

5284. Otras (CAPURON).

ʒ Catecú en polvo. ʒxij (6 dec.).
Alumbre en polvo. ʒvj (3 dec.).
Opio en polvo. ʒij (1 dec.).
Jarabe de rosas rojas. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒv (25 cent.).

I. Blenorrea, diarrea y disenteria crónicas, hemorragias pa-

sivas, bronquitis, catarro crónico, neurosis. *D.* Una ó dos píldoras al día.

5285. Otras (CAVARRA).

ʒ Tanino en polvo. ʒvj (3 dec.).
Goma aráb. en polvo. ʒxij (6 dec.).
Azúcar en polvo. ʒLXXij (4 gr.).
Jarabe simple. e. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

Se administran á la dosis de una á cuatro por la mañana é igual número por la tarde, para combatir varios flujos que dependen de relajacion.

5286. Otras (CULLEN).

ʒ Sangre de drago en polv. ʒj (4 gr.).
Alumbre en polvo. ʒß (2 gr.).
Conserva de rosas. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

I. Menorragias, hematemesis, hematuria. *D.* En el día.

5287. Otras (CULLERIER).

ʒ Cubebas,
Catecú,
Sangre de drago,
Alumbre, ãã. ʒß (16 gr.).
Carbonato de hierro. . ʒvj (24 gr.).
Goma en polvo,
Jarabe diacodion, ãã. c. s.
H. S. A. ciento noventa y ocho píldoras.

I. Blenorragias crónicas. *D.* Siete á ocho píldoras al día.

5288. Otras (H. DE AL.).

ʒ Sulfato de zinc. ʒx (5 dec.).
Mirra en polvo. ʒß (2 gr.).
Conserva de rosas. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

I. Leucorreas y catarros crónicos, blenorragias, hemorragias pasivas. *D.* Dos píldoras al día.

5289. Otras (H. DE M.).

ʒ Alumbre en polvo. ʒ
Catecú pulverizado. ʒ
Mucilago de goma arábica. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Diarrea é irritaciones intesti-

nales, hemorragias pasivas, leucorrea y blenorragia crónicas. *D.* De cuatro á ocho píldoras.

5290. P. ASTRINGENTES
(*Hufeland*).

℞ Alumbre,
Catecú, ãã. ʒ℔ (2 gr.).
Extracto de genciana. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Soriasis, diarrea, disenteria, hemotisis, hemorragias pasivas, leucorrea, catarro útero-vaginal, blenorrea, neurosis. *D.* Cuatro píldoras cada tres horas.

5291. Otras (*QUARIN*).

℞ Limaduras de hierro. ʒxviii (4 gr.).
Alumbre,
Trementina,
Extracto de quina, ãã. ʒ℔jv (3 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Leucorrea, blenorrea, neurosis, diarrea, disenteria. *D.* Cinco píldoras mañana y noche.

5292. Otras (*RECAMIER*).

℞ Alumbre. ʒvj (3 dec.).
Extracto de opio. . . . ʒij (4 dec.).
Catecú. ʒj (12 dec.).
Jarabe de goma. c. s.
H. S. A. seis píldoras.
I. Blenorrea inveterada, hemorragias pasivas, flujos mucosos crónicos, etc. *D.* Una píldora cada cuatro horas.

5293. Otras (*RADIUS*).

℞ Sulfato de zinc. . . . ʒj (4 gr.).
Trement. de Venecia. ʒxviii (4 gr.).
Tormentila. ʒ℔ (6 dec.).
H. S. A. treinta píldoras.
I. Gonorrea. *D.* Una píldora tres veces al dia.

5294. Otras (*SCHUBART*).

℞ Bálsamo del Perú. . . . ʒj (4 gr.).
Extr. de polígala amarga. ʒij (8 gr.).
Malvabisco. c. s.
H. S. A. ciento veinte píldoras
I. Flujos mucosos crónicos. *D.* Diez píldoras, cuatro veces al dia.

5295. Otras (*SWEDIAUR*).

℞ Goma quino. ʒ℔ (15 gr.).
Bálsamo del Canadá. . ʒij (60 gr.).
Raiz de tormentila en polvo. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒv (25 cent.).

I. Blenorragias rebeldes y en algunas hemorragias. *D.* Cuatro píldoras mañana y tarde.

5296. Otras (*WALCH*).

℞ Sulfato de hierro cristalizado en polvo,
Goma quino en polvo, ãã. ʒj (4 gr.).
Trementina cocida,
Extracto de genciana, ãã. ʒij (8 gr.).
Polvo de regaliz. c. s.
H. S. A. ciento ochenta píldoras.

I. Blenorreas rebeldes. *D.* Ocho á diez píldoras, cuatro veces al dia.

5297. P. ASTRINGENTES Y CALMANTES (*Dupuytren*).

℞ Extracto de opio. . . . ʒij (4 dec.).
Sulfato de zinc. ʒjv (2 dec.).
H. S. A. dos píldoras.

Se dan dos al dia en el tratamiento de los flujos mucosos y dolorosos de la uretra y de la vagina, en las diarreas que sobrevienen á consecuencia de una operacion cualquiera, sobre todo cuando proviene de reabsorcion purulenta.

5298. P. ASTRINGENTES FERRUGINOSAS (*SUNDELIN*).

℞ Extracto seco de palo de Campeche,
Cascarilla en polvo, ãã. ʒj℔ (6 gr.).
Oxido negro de hierro. . ʒj (4 gr.).
Extracto de genciana. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Leucorrea asténica. *D.* Cinco á diez píldoras, tres veces al dia.

5299. P. ASTRINGENTES VITRIOLADAS.

℞ Extracto de ratania pulverizado,
Catecú en polvo, ãã. ʒ℔jv (3 gr.).
Almáciga en polvo. . . ʒxxxvj (2 gr.).

Sulf. de hierro purif. ḡxviii (4 gr.).
Trementina fina. . . . ḡljv (3 gr.)

H. S. A. cincuenta píldoras. Cada una contiene cerca de ḡḅ (25 mil.) de sulfato de hierro ó dos tercios.

5300. P. ASTRINGENTES
(*Santa María*).

☞ Conserva de rosas. . . ḗij (60 gr.).
Copaiba. ḗḅ (45 gr.).
Sangre de drago. . . . ḗij (8 gr.).
Calomelanos. ḗḅ (2 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡvj (3 dec.).
I. Gonorrea.

5301. P. ATEMPERANTES.

☞ Nitro,
Alcanfor, ãã ḗij (8 gr.).
Extracto de opio. . . . ḡxviii (4 gr.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras.
I. Blenorragia en el período agudo. D. Dos á seis píldoras al día.

5302. P. DE ATROPINA.

☞ Atropina. ḡij (10 cent.).
Miel,
Malvabisco en polvo, ãã c. s.
H. S. A. cien píldoras. Cada una contiene una quincuagésima parte de grano de atropina.
I. Epilepsia, corea y otras neuroses. D. Una á diez píldoras al día.

5303. P. AURÍFERAS (*Chrestien*).

☞ Cloruro de oro,
ó Cianuro de oro,
ó Cloruro de oro y sodio,
ú Oxido de oro. ḡj (5 cent.).
Extracto de torbisco. ḡxv á ḡxx (75 á 100 cent.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. píldoras.
I. Afecciones escrofulosas y sobre todo afecciones sifilíticas. D. Una píldora, y despues dos, tres ó mas al día.

5304. P. DE AZUFRE.

☞ Azufre. ḗj (4 gr.).
Trementina,
Guayaco, ãã ḗḅ (2 gr.).
Jarabe de borraja. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Cistitis, prurigo, helmintiasis, asma, escarlatina, eczema, pian, iritis, estafiloma. D. Una píldora cada media hora.

5305. P. AZULES ó Píldoras
mercuriales simples.

☞ Mercurio. ḗj (4 gr.).
Conserva de rosas. . . ḗḅ (6 gr.).
Se trituran hasta que se extinga completamente el mercurio y se añade:
Regaliz en polvo. ḗḅ (2 gr.).
I. Esta preparacion se usa en Inglaterra como laxante suave y alterante. D. ḡij á ḡvj (15 á 30 cent.) al día. Tres granos (15 cent.) de esta masa contienen ḡj (5 cent.) de mercurio.

5306. P. BALSÁMICAS.

☞ Bálsamo líquido del Perú. 4
Polvo de regaliz. c. s.
Bálsamo de azufre anis. algunas got.
H. S. A. píldoras de ḡij (15 cent.).

5307. Otras, n. 2.

☞ Acíbar. ḗḅ (2 gr.).
Bálsamo del Perú,
Benjuí, ãã ḡjx (50 cent.).
Azafran,
Mirra, ãã ḡv (25 cent.).
Extracto de ruibarbo. ḡxviii (4 gr.).
Extracto de opio. . . . ḡjv (20 cent.).
H. S. A. cincuenta píldoras.
I. Hemorroides, leucorrea, diabetes, iritis. D. Seis píldoras al día.

5308. Otras, n. 3.

☞ Mirra,
Extracto de saponaria,
Jabon, ãã ḡxc (5 gr.).

Bálsamo de copaiba. ℥℔ (2 gr.).
 Acido benzóico. ℥xviii (4 gr.).
 H. S. A. píldoras de ℥jv (2 dec.).
 I. Blenorrea y leucorrea. D. Cinco píldoras mañana y noche.

5309. P. BALSÁMICAS.

℥ Bálsamo del Canadá. ℥ij (60 gr.).
 Goma quino. ℥℔ (15 gr.).
 Tormentila. c. s.
 H. S. A. píldoras de ℥v (3 dec.).
 I. Diarrea crónica y diabetes.
 D. Cuatro píldoras mañana y noche.

5310. Otras (BOERHAAVE).

℥ Esperma de ballena,
 Trementina, añ. ℥℔ (16 gr.).
 Mirra. ℥ij (8 gr.).
 Se machaca y se mezcla exactamente la mirra con la esperma de ballena; despues se añade la trementina y cantidad suficiente de polvo de incienso para hacer píldoras de ℥iij (15 cent.).

I. Tisis, catarrós pulmonares, etc. D. Una cada tres horas.

5311. Otras (CHABERLY).

℥ Bálsamo de Tolú. ℥ij (8 gr.).
 Bálsamo de estoraque. ℥j℔ (6 gr.).
 Carbonato de magnesia. c. s.
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
 I. Incontinencia de orina. D. Seis píldoras al dia.

5312. Otras (GAUBIUS).

℥ Trementina. ℥j (30 gr.).
 Ruibarbo en polvo: ℥℔ (15 gr.).
 Regaliz en polvo. c. s.
 H. S. A. píldoras de ℥jv (2 dec.).
 I. Gonorrea virulenta. D. Una píldora de hora en hora.

5313. Otras (H. DE M.).

℥ Goma amoniaco. ℥iij (12 gr.).
 Mirra,
 Acido benzóico, añ. ℥℔ (2 gr.).
 Bálsamo peruano sólido. ℥j (4 gr.).

Mucilago de goma arábica. c. s.
 H. S. A. píldoras de ℥ij (1 dec.).
 I. Asma, tos pertinaz y tisis pulmonar. D. ℥℔ á ℥j (6 á 12 dec.).

5314. P. BALSÁMICAS

(Hoffmann).

℥ Mirra,
 Acíbar,
 Ext. de eléb. negro, añ. ℥v (20 gr.).
 Extracto de cardo santo,
 Extracto de ajenjos,
 Extracto de fumaria,
 Extracto de centaurea menor,
 Extr. de milenrama, añ. ℥j (30 gr.).
 Trementina,
 Benjuí,
 Extracto de enebro,
 Extracto de yedra ter-
 restre, añ. ℥℔ (15 gr.).
 Azafran. ℥j (4 gr.).

Mézclese con cuidado y evapórese en el baño maría hasta obtener una masa á propósito para hacer píldoras.

D. De ℥jv á ℥xij (2 á 6 dec.) á la vez.

5315. P. BALSÁMICAS

(J. Juncker).

℥ Mirra escogida,
 Goma de enebro, añ. ℥j (4 gr.).
 Trementina ligeramente cocida,
 Sucino amarillo, añ. ℥j℔ (6 gr.).
 Raiz de jalapa. ℥iij (12 gr.).
 Extracto vinoso de fumaria,
 Extracto vinoso de cardo santo,
 Extracto vinoso de ajenjos,
 Extracto acuoso de co-
 clearia, añ. ℥ij (8 gr.).
 H. S. A. píldoras de ℥ij (1 dec.).
 I. Asma, hipocondria, vértigos, etc.

5316. P. BALSÁMICAS ASTRINGENTES CON CUBEBAS.

℥ Bálsamo de Tolú. ℥ij (8 gr.).
 Bálsamo de copaiba. ℥j (4 gr.).
 Cubebas en polvo. ℥iij (12 gr.).
 H. S. A. ciento veinte píldoras.
 I. Blenorragias, leucorreas, blenorreas. D. Diez píldoras, tres veces al dia.

5317. P. BALSÁMICAS DE MARCUS.

℞ Mirra. ℥iij (12 gr.).
 Bálsamo del Canadá. . . ℥jβ (6 gr.).
 Extracto de opio. ℥β (2 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡijβ (12 cent.).

I. Tisis ulcerosa. *D.* Dos á cuatro píldoras de hora en hora.

5318. P. BALSÁMICAS DE MORTON (F. F.).

℞ Polvo de milpiés. ℥xviiij (72 gr.).
 Polvo de goma amon. . . ℥jx (36 gr.).
 Flores de benjuí. ℥vj (24 gr.).
 Polvo de azafran. ℥j (4 gr.).
 Bálsamo de Tolú. ℥j (4 gr.).
 Báls. de azufre anis. ℥vj (24 gr.).

Se mezclan estas sustancias, y se pistan mucho tiempo para obtener una masa bien unida y homogénea.

I. Enfermedades crónicas del pecho y singularmente la tisis. Pueden ser útiles como expectorantes y resolutivas en los catarros antiguos. *D.* Dos á sesenta píldoras al día.

No se debe platear estas píldoras por el azufre que contienen.

5319. Otras (F. E.).

℞ Milpiés preparados. . . ℥vj (24 gr.).
 Goma amoniaco. ℥iij (12 gr.).
 Acido benzóico. ℥jv (48 dec.).
 Azafran,
 Báls. neg. del Perú, ãã. ℥j (12 dec.).
 Aceite de trementina sulfurado. c. s.
 H. S. A. píldoras.

I. Asma, tisis, neumonía y catarros crónicos. *D.* ḡvj á ḡxx (3 á 10 dec.).

5320. P. DE BÁLSAMO DEL CANADÁ.

℞ Bálsamo del Canadá. . . ℥β (15 gr.).
 Goma quino. ℥j (4 gr.).
 Tormentila. c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡv (25 cent.).

I. Blenorrea, diabetes. *D.* Cuatro mañana y noche. V. n. 5311.

5321. P. DE BÁLSAMO DE COPAIBA.

℞ Bálsamo de copaiba. . . ℥ijβ (10 gr.).
 Calomelanos. ḡxviiij (4 gr.).
 Ruibarbo,
 Catecú, ãã. ḡxc (5 gr.).
 Cons. de rosas rojas. ℥j (30 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡvj (3 dec.).

I. Blenorragia, blenorrea. *D.* Una píldora mañana y noche, aumentando progresivamente la dosis.

5322. P. DE BÁLSAMO DE COPAIBA MAGISTRALES.

℞ Bálsamo de copaiba. . . . ℥j (32 gr.).
 Magnesia calcinada. ℥vj á ℥vij (24 á 28 gr.).

Si se usa la magnesia blanca sería preciso aumentar un poco la dosis. Comunmente se necesita un peso igual al de la materia resinosa.

5323. P. DE BÁLSAMO DE COPAIBA OFICINALES (F. P.).

℞ Bálsamo de copaiba. 16
 Magnesia calcinada. 4

Se mezcla íntimamente la magnesia con el bálsamo de copaiba y se menea de cuando en cuando. Se necesitan ocho ó diez días para que se verifique la solidificación.

5324. P. DE BARBA ROJA.

℞ Mercurio,
 Acíbar, ãã. ℥vj (24 gr.).
 Ruibarbo. ℥ij (8 gr.).
 Agárico. ℥jv (16 gr.).
 Aromas. ℥iij (12 gr.).

Son una modificación de las píldoras mercuriales de Belloste.

5325. P. DE BARCLAY ó Píldoras antibiliosas de Barclay.

℞ Extracto de coloquín-
 tida compuesto. ℥ij (8 gr.).
 Resina de jalapa. ℥j (4 gr.).
 Jabón amigdalino. . . . ℥jβ (6 gr.).
 Guayaco. ℥iij (12 gr.).
 Emético. ḡviiij (4 dec.).

Esencia de enebro,
 Esencia de alcaravea,
 Esencia de romero, *añ.* 4 gotas.
 Jarabe de espino serval. c. s.
 H. S. A. píldoras de g^{ijv} (2 dec.).
D. Se toman cinco ó seis al dia
 como purgante hidragogo.

5326. P. DE BARTON.

z Arsénico bl. porfiriz. g^{ij} (4 dec.).
 Opio en bruto. . . . g^{viii} (4 dec.).
 Jabon medicinal. . . g^{xxjv} (12 dec.).
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Calenturas intermitentes re-
 beldes. Cada una contiene una dé-
 cimaoctava parte de grano arse-
 nioso.

5327. P. DE BELLADONA.

z Extracto de zumo de-
 purado de belladon. g^{xviii} (4 gr.).
 Polvo de mirra,
 Polvo de ipecac., *añ.* $\text{3}\beta$ (2 gr.).
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Asma. *D.* Se toma una por la
 mañana, otra al medio dia y otra
 por la noche.

5328. Otras, n. 2.

z Raiz de belladona. . . g^{viii} (4 dec.).
 Sabina. $\text{3}\beta$ (2 gr.).
 Extr. de milenrama. . . c. s.
 H. S. A. treinta píldoras.
I. Coqueluche, escarlatina, ic-
 tericia, oftalmia, amaurosis, tisis,
 asma, priapismo, bronquitis, co-
 rea, disenteria, hepatitis, metri-
 tis, muermo. *D.* Dos á seis al dia.

5329. Otras (Trousseau).

E Extr. de zumo depurado de belladona,
 Extracto de opio, *añ.* . g^{jv} (2 dec.).
 Extracto de valeriana. $\text{3}\beta$ (2 gr.).
 H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Coqueluche. *D.* Una á cuatro
 píldoras al dia.

**5330. P. DE BELLADONA FERRUGI-
 NOSAS (C. Le Blas).**

z Extracto de belladona. g^{ij} (4 dec.).

Carbonato de hierro. . g^{x} (5 dec.).
 H. S. A. doce píldoras.
I. Hipo convulsivo complicado
 con gastralgia. *D.* Una píldora de
 hora en hora.

**5331. P. DE BELLADONA
 IODURADAS.**

z Extracto de zumo de-
 purado de belladon. g^{xviii} (4 gr.).
 Protoioduro de hierro. $\text{3}\beta$ (2 gr.).
 Polvo de regaliz. . . . c. s.
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Afecciones escrofulosas ó can-
 cerosas, hipertrofia del bazo. *D.*
 Una á cuatro píldoras al dia.

5332. P. DE BELEÑO Y CICUTA.

z Extracto de zumo depurado de beleño,
 Extracto de cicuta, *añ.* 9j (12 dec.).
 Regaliz en polvo. . . . c. s.
 H. S. A. cuarenta y ocho píldo-
 ras.
I. Sirven para calmar los dolo-
 res de los cánceres. *D.* Una ó dos
 píldoras al dia.

**5333. P. DE BELEÑO IODURADAS
 (Cintrac).**

z Extracto de beleño. . . g^{Ljv} (3 gr.).
 Hierro porfirizado. . . g^{xxxvj} (2 gr.).
 Iodo. g^{jx} (50 cent.).
 Ioduro de potasio. . . g^{xviii} (4 gr.).
 H. S. A. cincuenta píldoras.
I. Hipertrofia del bazo. *D.* Dos
 á seis píldoras al dia.

**5334. P. BENEDICTAS DE FULLER
 (F. P.).**

z Acíbar. 3j (32 gr.).
 Sen. 3jv (46 gr.).
 Asa fétida,
 Gálbano, *añ.* 3ij (8 gr.).
 Mirra. $\text{3}\beta$ (46 gr.).
 Azafran,
 Macis, *añ.* 3j (4 gr.).
 Sulfato de hierro. . . $\text{3j}\beta$ (48 gr.).
 Aceite de succino rect. 3j (4 gr.).
 Jarabe de artemisa com-
 puesto. 3ij (64 gr.).
 H. S. A. píldoras de g^{jv} (2 dec.).
I. Clórosis. Se usan como anti-

histéricas y ligeramente purgantes. Cada pildora contiene ḡj (5 cent.) de sulfato de hierro y dos tercios de grano (36 mil.) de acíbar.

5335. P. BENEDICTAS DE FULLER *Ó Pildoras de acíbar marciales* (F. E.).

℞ Acíbar sucotrino. . . . ḗḗ (15 gr.).
Sen de España. . . . ḗij (8 gr.).
Sulfato de hierro. . . . ḗvj (24 gr.).
Mirra,
Gálbano,
Asa fétida, *añ.* ḗj (4 gr.).
Azafran,
Macis, *añ.* ḗḗ (2 gr.).

Se pulverizan, se mezclan S. A. añadiendo:

Aceite de *sucino*., 40 gotas.
Jarabe de artemisa. c. s.

H. S. A. una masa que se dividirá en ciento sesenta pildoras.

I. Son antihistéricas, ligeramente purgantes y emenagogas.
D. Cuatro pildoras para cada dosis.

Las PILDORAS BENEDICTAS DE FULLER DE LOS H. DE M. solo se diferencian en que contienen ḗḗ (15 gr.) de acíbar.

5336. P. DE BIETT.

℞ Extracto alcohólico de acónito. ḡvj (3 dec.).
Sublimado corrosivo. ḡij (1 dec.).
Polvo de malvabisco. ḡviiij (4 dec.).
H. S. A. ocho pildoras que se administran desde una hasta cuatro contra la sífilis.

5337. P. DE BISMUTO.

℞ Subnitr. de bismuto. ḗḗ (2 gr.).
Almizcle. ḡvj (3 dec.).
Extracto de beleño. . . ḡjx (50 cent.).
Extracto de valeriana. ḗḗ (2 gr.).
H. S. A. treinta pildoras.

I. Hipocondría, histérico, dispepsia, gastrodinia, gastralgia.
D. Cinco pildoras mañana y noche.

5338. P. DE BISTORTA.

℞ Raíz de bistorta,
Tintura de catecú, *añ.* ḡxviiij (4 gr.).

Jarabe de membrillos. ḡLjv (3 gr.).
Agua. c. s.
H. S. A. pildoras de ḡjv (2 dec.).
I. Hemorragias pasivas, diarrea crónica. D. Una ó dos pildoras, de hora en hora.

5339. P. BLANCAS (*Barthez*).

℞ Jalapa. ḗḗ (16 gr.).
Carbonato de hierro. ḗij (8 gr.).
Protocloruro de merc. ḗḗ (2 gr.).
Milpiés. ḗij (24 dec.).
Jar. de las cinco raic. c. s.
H. S. A. pildoras de ḡjv (2 dec.).
I. Enfermedades escrofulosas.
D. Dos pildoras al dia.

5340. P. DE BREA (H. DE IT.).

℞ Brea,
Bálsamo del Perú, *añ.* ḗḗ (15 gr.).
Regaliz en polvo. . . ḗj (30 gr.).
Raíz de lirio en polvo. ḗiiij (12 gr.).
H. S. A. pildoras de ḡvj (3 dec.).
I. Tisis pulmonar, catarro pulmonar y vesical crónicos, cistitis, ictiosis, lepra. D. Una pildora dos veces al dia.

5341. Otras (MIGNOT).

℞ Brea,
Anís en polvo, *añ.* . . . ḗijḗ (10 gr.).
Magnesia. c. s.
H. S. A. cien pildoras.
I. Broncorrea, cistorrea, leucorrea, gonorrea. D. Una á diez pildoras al dia.

5342. P. DE BROMURO DE HIERRO (*Magendie*).

℞ Bromuro de hierro. ḡxij (6 dec.).
Conserva de rosas. . . ḡxviiij (9 dec.).
Goma arábica. . . . ḡxij (6 dec.).
H. S. A. veinticuatro pildoras.
I. Hipertrofia del corazón, escrófulas, nefritis, pénfigo, lepra, elefantiasis. D. Dos pildoras por la mañana y dos por la noche. Cada una contiene ḡḗ (25 mil.) de bromuro.

5343. P. DE BRUCINA (Magendie).

℥ Brucina pura. ḡxij (6 dec.).
 Conserva de rosas. ʒβ (2 gr.).
 H. S. A. veinticuatro píldoras
 que se platearán.

I. Parálisis. D. Una á diez píldoras al día, aumentando gradualmente la dosis.

5344. P. DE BUCHAN.

℥ Acíbar,
 Ruibarbo, ãã. ʒβ (2 gr.).
 Jabon medicinal. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Ictericia, hidropesías. D. Cinco á seis píldoras al día.

5345. P. DE CAINCA.

℥ Extracto de cainca. ʒj (4 gr.).
 Jabon medicinal. ʒij (8 gr.).
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
 D. Se toman de dos á cuatro al día.

5346. P. CALIBEADAS.

℥ Limaduras de hierro
 porfirizadas. ʒj (30 gr.).
 Canela en polvo. ʒij (24 dec.).
 Acíbar sucotrino. ʒj (4 gr.).
 Jar. de artemisa ó de azafran. . . c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Se usan como emenagogas,
 tónicas y estomacales contra la
 clorosis y caquexia serosa, etc.
 D. De dos á seis píldoras al día.

5347. P. CALMANTES.

℥ Extracto de opio,
 Quermes mineral, ãã. ḡij (4 dec.).
 Nitrato de potasa. ḡjv (2 dec.).
 H. S. A. ocho píldoras.
 I. Ciertas afecciones reumáticas.
 D. De dos á cuatro píldoras
 al día.

5348. Otras, n. 2.

℥ Alcanfor. ʒβ (6 dec.).

Calomelanos. ḡvj (3 dec.).

Jarabe simple. c. s.

H. S. A. seis píldoras.

D. Una de hora en hora.

5349. Otras, n. 3.

℥ Acetato de morfina. ḡj (5 cent.).

Cons. de flor de naranj. ḡxvj (8 dec.).

H. S. A. ocho píldoras.

I. Neuralgias, afecciones cancerosas.
 D. Una ó dos píldoras cada seis horas.

5350. Otras, n. 4.

℥ Extracto de belladona. ḡjv (2 dec.).

Rob de saúco. c. s.

H. S. A. diez y seis píldoras.

I. Neuralgia facial, neuralgias,
 tisis, coqueluche, escarlatina, asma,
 bronquitis, neumonia, cardialgia.
 D. Una píldora cada dos horas.

5351. Otras (BELL).

℥ Alcanfor. ʒj (4 gr.).

Extracto de beleño. ʒij (8 gr.).

H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Ardor de orina. D. Tres á cuatro píldoras al día.

5352. Otras (BERNDT).

℥ Acetato de morfina. ḡviii (4 dec.).

Sulfato de cobre y amoníaco. ʒβ (2 gr.).

Extracto de quina,

Palo de quasia, ãã. ʒij (24 dec.).

H. S. A. cincuenta píldoras.

I. Diabetes sacarina; íleo, tisis,
 histérico, nefritis. D. Cinco píldoras
 mañana y noche.

5353. Otras (BROUSSAIS).

℥ Extracto de lechuga. ḡx (50 cent.).

Extracto de opio. ḡiij (15 cent.).

Extracto de belladona,

Extr. de beleño, ãã. ḡvj (30 cent.).

Manteca de cacao. ʒj (4 gr.).

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

5354. P. CALMANTES

(H. DE AMÉR.).

- ℞ Digital purpúrea,
 Opio, ãã. ḡvj (3 dec.).
 Conserva de rosas. . . c. s.
 H. S. A. doce píldoras.
 I. Asma. D. Una píldora de hora en hora.

5355. Otras (H. DE IT.).

- ℞ Sulfato de morfina. . ḡj (5 cent.).
 Aceite común. c. s.
 Se disuelve y se añade:
 Ipecacuana. ḡiij (15 cent.).
 Haba de San Ignacio. ḡij (10 cent.).
 Miga de pan,
 Miel, ãã. c. s.
 H. S. A. seis píldoras.
 D. Una píldora cada tres horas.

5356. Otras (KOOP).

- ℞ Asa fétida. ʒß (2 gr.).
 Extracto de lechuga. . ʒij (24 dec.).
 H. S. A. ochenta píldoras.
 I. Coqueluche. D. Dos ó tres píldoras cada dos horas hasta que disminuya la violencia de la tos. Segun calme la violencia de los síntomas se disminuirá la dosis del medicamento.

5357. Otras (VOGT).

- ℞ Cianuro de zinc. ʒß (6 dec.).
 Magnesia. ʒij (24 dec.).
 Aceite de valeriana. . . 20 gotas.
 Jarabe de manzanilla. ʒij (8 gr.).
 Valeriana. ʒiij (12 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Corea. D. Seis píldoras tres veces al dia, aumentando poco á poco la dosis.

5358. P. CALMANTES DE DIGITAL.

- ℞ Digital en polvo,
 Opio,
 Extracto de beleño, ãã. ḡvj (3 dec.).
 Conserva de rosas. . . . c. s.
 H. S. A. doce píldoras.
 I. Asma, angina, pleuresía, polidipsia, bronquitis aguda, catar-

ro, palpitaciones, cardialgia, glotitis, flebitis, reumatismo, pica, disnea, hemorroides, lepra. D. Una píldora cada hora.

5359. P. CALMANTES

Y NARCÓTICAS.

- ℞ Extracto de beleño,
 Extracto de belladona,
 Extracto de cicuta,
 Extracto de opio,
 Extracto de digital, ãã. ḡxviiij (1 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).
 I. Neuralgia facial, enfisema, íleo, iritis, dolores osteocopos ó cancerosos, pleuresía, pleurodinia, bronquitis, cardialgia, tisis, dismenorrea, dispepsia, histérico, nefritis, neuralgias. D. Una á tres píldoras al dia.

5360. P. CALMANTES RESOLUTIVAS (Hauff).

- ℞ Polvo de raiz de bellad. ḡvj (3 dec.).
 Oxido de bismuto. . . . ʒß (2 gr.).
 Ruib. en polvo. ʒij y ḡxviiij (9 gr.).
 Extracto de regaliz,
 Extracto de taraxacon, ãã. . . . c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
 I. Cardialgias rebeldes, inducciones incipientes del píloro y del páncreas. D. Tres píldoras al dia. Al mismo tiempo se debe aplicar un pedazo de hule ó de espadrapo simple en el epigastrio para que no se enfrie.

5361. P. CALMANTES Y TÓNICAS.

- ℞ Extracto de opio. . . ḡiij (15 cent.).
 Canela. ḡvj (30 cent.).
 Jarabe. c. s.
 H. S. A. seis píldoras.
 D. Una á tres al dia.

5362. P. DE CALOMELANOS.

- ℞ Calomelanos,
 Jabon medicinal, ãã. . . ʒj (4 gr.).
 Jalapa en polvo. ʒß (16 gr.).
 H. S. A. setenta y dos píldoras.
 D. Cuatro á seis al dia.

Se deben preparar al tiempo de usarlas, porque se descomponen y se forma sublimado corrosivo.

5363. P. DE CALOMELANOS ó de protocloruro de mercurio.

℞ Calomelanos,
Malvabisco, ãã. ḡxviiij (1 gr.).
Miel. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Son purgantes, alterantes y contraestimulantes.

5364. P. DE CALOMELANOS Y ASCLEPIAS.

℞ Calomelanos. ḡß (6 dec.).
Asclepias agigantada. ḡxviiij (1 gr.).
H. S. A. doce píldoras.
I. Albuminuria, ictericia, hepatitis, pleuresia, escarlatina, sífilis constitucional, sífilides, escrófulas, flebitis, conjuntivitis, lepra, soriasis, bocio, impétigo.
D. Dos píldoras mañana y noche.

5365. P. DE CALOMELANOS COMPUESTAS (Ricord).

℞ Calomelanos preparados al vapor. ḡxx (1 gr.).
Polvo de hojas de cicuta,
Jabon medicinal, ãã. ḡxl (2 gr.).
H. S. A. veinte píldoras.
I. Infartos del testículo á consecuencia de la epididimitis blenorragica. D. Una píldora diariamente durante cinco dias, despues dos, tres, cuatro, cinco y seis, si no se presentan accidentes mercuriales.

5366. P. DE CALOMELANOS FERRUGINOSAS.

℞ Cloruro de hierro amoniacal,
Calomelanos, ãã. ḡxc (5 gr.).
Extracto de lúpulo. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.)
I. Escrófulas, sífilis, sífilides, hepatitis, afecciones verminosas, pica, soriasis, escarlatina, nefritis, amenorrea, lupus, conjunti-

vitis, hepatitis, oftalmia, oftalmi-
tis. D. Cinco píldoras mañana y noche.

5367. P. DE CALOMELANOS Y POLÍGALA.

℞ Calomelanos. ḡx (50 cent.).
Polígala en polvo. ḡij (8 gr.).
Mucilago. c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Oftalmia. D. Dos á ocho píldoras al dia.

5368. P. DE CALOMELANOS Y SAPONARIA.

℞ Saponaria en polvo. ḡß (2 gr.).
Calomelanos. ḡx (50 cent.).
Jarabe de genciana, c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Escrófulas, raquitis, lepra, elefantiasis, lupus, líquen, oftalmias, nefritis. D. Tres píldoras mañana y noche.

5369. P. DE CANTÁRIDAS.

℞ Cantáridas en polvo. ḡv (25 cent.).
Limaduras de hierro. ḡß (2 gr.).
Sabiña. ḡLjv (3 gr.).
Jarabe de ruda. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Amenorrea, anafrodisia, enuresis, soriasis. D. Unã píldora tres veces al dia.

5370. Otras (H. DE AL.).

℞ Cantáridas en polvo. ḡvj (3 dec.).
Azúcar blanca. ḡij (24 dec.).
Canela en polvo. ḡxij (6 dec.).
Jarabe de rosas solutivo. c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
I. Hidropesias. D. De dos á seis píldoras cada dos horas. Cada una contiene un quinto de grano de cantáridas.

5371. P. DE CANTÁRIDAS ALCANFORADAS (Porta).

℞ Cantáridas en polvo. ḡiij (15 cent.).
Alcanfor. ḡx (50 cent.).
Jabon amigdalino. ḡj (4 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Incontinencia de orina. Cada

píldora contiene un décimotercio de grano de cantáridas.

5372. P. DE CANTÁRIDAS OPIADAS
(H. DE AMER.).

℥ Cantáridas en polvo. ḡxviiij (1 gr.).
Opio,
Acanfor, añ. ʒβ (2 gr.).
Conserva de rosas. c. s.

H. S. A. treinta y seis píldoras.
Cada una contiene ḡβ (25 mil.) de cantáridas y ḡj (5 cent.) de opio.

I. Impotencia; pero es menester examinar en tales casos si es la imaginación la alterada ó los órganos de la generación. Para los últimos será muy útil el discreto uso de estas píldoras, tomando una ó dos cada noche.

5373. P. DE CAOUTCHU.

Se le parte en pedacitos y se los cubre de una pasta de harina y agua. Pero es mejor evaporar hasta la consistencia de extracto blando la solución de caoutchu en esencia de trementina y hacer píldoras con c. s. de polvos de malvabisco.

5374. P. CÁPRICO-FERRUGINOSAS
(Schneider).

℥ Etíope mineral. ʒβ (15 gr.).
Pimiento. ḡxviiij (1 gr.).
Colombo. ʒj (4 gr.).
Canela. ʒj (4 gr.).
Extracto de manzanilla. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).

I. Clorosis. D. Diez píldoras tres veces al día.

5375. P. DE CARBONATO DE COBRE
Y AMONIACO (F. DE FERRARA).

℥ Carbonato de cobre
y amoniaco. ḡijβ (12 cent.).
Regaliz en polvo. ʒj (12 dec.).
Jarabe simple. c. s.

H. S. A. ocho píldoras.

I. Calenturas intermitentes rebeldes. D. Tres á cuatro píldoras al día.

5376. P. DE PROTO-CARBONATO DE
HIERRO ó Píldoras de Vallet (F. P.).

℥ Sulfato de hierro cristaliz. puro. 250
Carbonato puro de sosa. 298
Miel blanca muy pura. 453
Jarabe simple. c. s.

Se disuelve al calor el sulfato de hierro en cantidad suficiente de agua privada de aire por la ebullición, y azucarada antes con cerca de ʒj (30 gr.) de jarabe simple por ℔j (500 gr.) de agua; se disuelve también el carbonato de sosa en agua hervida y también azucarada; se filtran separadamente los dos líquidos; se los mezcla en un frasco con tapon esmerilado de tal capacidad que casi se llene con la mezcla; inmediatamente se pone el tapon de vidrio, se agita y después se deja aposar tranquilamente el carbonato de hierro que resulta de la descomposición recíproca del sulfato de hierro y del carbonato de sosa. Cuando se ha depositado bien el precipitado, se decanta el líquido que le sobrenada y se le reemplaza por nueva agua tibia, hervida y azucarada; se vuelve á agitar de nuevo, se le deja aposar aun, se le decanta y se continúan de este modo las lociones en vasijas tapadas, hasta que el líquido últimamente decantado no tenga sabor salino y no retenga ya sulfato ni carbonato de sosa; entonces se echa el precipitado en un lienzo bien apretado é impregnado antes de jarabe simple, se le exprime fuertemente y después se le mezcla inmediatamente con la miel concentrada antes en el baño maría. Entonces se vuelve flúida la mezcla, porque la miel, al disolverse en el agua retenida por el carbonato de hierro, forma un melito líquido; se le concentra siempre en el baño maría hasta la consistencia de píldoras con la

mayor prontitud posible; por último se guarda el producto en vasijas que se taparán con cuidado. Este es el melito simple de Vallet. Se hacen píldoras de ꝑij (15 cent.) añadiendo un polvo inerte.

Esta fórmula es muy buena: el azúcar y la miel tienen la propiedad de oponerse á la transformación del carbonato de hierro en peróxido, que es poco soluble en los ácidos del estómago.

I. Se administran con excelente éxito contra la clorosis y los accidentes que de ella dependen.

D. De dos á diez píldoras al día, dosis que puede aumentarse sin inconveniente.

Nota. Las píldoras de Vallet son preferibles á las de Blaud, porque se conservan sin alterarse, representan dosis constantes del medicamento principal y se administra el carbonato de protóxido y no el peróxido de este metal.

5377. P. DE CARBONATO DE HIERRO (Neumann).

- Ꝟ Hojas de digital. . . . ꝑx (3 dec.).
- Carbonato de hierro. ꝑxviiij (1 gr.).
- Cornez. de centeno. ꝑß (2 gr.).
- Jarabe de artemisa. . c. s.
- H. S. A. cincuenta píldoras.

I. Escrófulas, clorosis, amenorrea, anemia, esplenitis, caquexia, cáncer, soriasis, lupus; neuralgias. D. Dos á cuatro píldoras, mañana y noche.

5378. P. DE CARBONATO DE HIERRO Y POTASA.

- Ꝟ Sulfato de hierro. . . . ꝑjv (16 gr.).
- Bicarbonato de potasa. ꝑjv (16 gr.).
- Goma arábiga pulver. ꝑj (4 gr.).
- Malvabisco. . . . ꝑß (2 gr.).
- H. S. A. noventa y seis píldoras.

Se trituran juntas las dos sales en un almirez de hierro con lo que se descomponen mutuamente, se humedecen ligeramente pero se desecan muy pronto. Si enton-

ces se añade azúcar ó goma se liquida la mezcla, y es menester despues una cantidad bastante grande de goma para dar á la masa la consistencia pilular.

En esta fórmula la dosis del bicarbonato de potasa es mas que suficiente para descomponer el sulfato de hierro, pues se hallan sesenta y cinco granos en exceso ó trescuartos de grano por píldora. V. *Píldoras de Blaud.*

5379. P. DE CARBON ALCALINAS (H. DE AL.).

- Ꝟ Sulfuro de potasa. . . . ꝑj (4 gr.).
- Extracto de cardo santo,
- Carbon vegetal en p., ãã. ꝑij (8 gr.).
- H. S. A. píldoras de ꝑij (1 dec.), de las cuales cada una contiene un tercio de grano de sulfuro.

I. Tisis pulmonar. D. Quince á veinte píldoras, cuatro veces al día.

5380. P. DE CÁRLOS BELL.

- Ꝟ Alcanfor. ꝑvj (3 dec.).
- Extracto de beleño. . . ꝑjv (2 dec.).
- Jarabe simple. c. s.
- H. S. A. dos píldoras.

I. Ardor de orina. D. De tres á cuatro píldoras al día.

5381. P. CARMINATIVAS (Barthez).

- Ꝟ Asa fétida. ꝑij (8 gr.).
- Acíbar sucotrino,
- Sulfato de hierro cristalizado,
- Gengibre en polvo, ãã. . ꝑj (4 gr.).
- Elixir de propiedad. . . c. s.
- H. S. A. píldoras de ꝑjv (2 dec.).

I. Neumatoses, timpanitis, cólico ventoso, esplenitis, hepatitis, ictericia, hipocondria, dispepsia. D. Cuatro ó cinco píldoras todas las noches al tiempo de acostarse.

5382. P. DE CASTÓREO (H. DE AMER.).

- Ꝟ Castóreo. ꝑj (4 gr.).

Acido succínico. 5℔ (2 gr.).
 Extracto de genciana. . c. s.
 H. S. A. veinticuatro pildoras.
 D. Dos á seis pildoras al dia y aun mas.

5383. P. DE CATECÚ COMPUESTAS
 (F. N. P.).

℥ Alumbre. ʒ℔ (6 dec.).
 Catecú. 5℔ (2 gr.).
 Opio. ʒvj (3 dec.).
 Extracto de tormentila. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. veinticuatro pildoras.
 I. Son astringentes, útiles en las hemorragias pulmonares ó uterinas, diarreas, disenteria, lienteria, último período de la gonorrea. D. Una á dos pildoras dos veces al dia.

5384. P. CATÓLICAS (F. M.).

℥ Mirabolanos cetrinos. . ʒj (32 gr.)
 Acíbar sucotrino,
 Raiz de jalapa,
 Escamonea,
 Ruibarbo, añ. 5vj (24 gr.).
 Agárico,
 Trocisc. de Alhandal, añ. ʒij (8 gr.).
 Sal catártica. ʒvj (24 gr.).
 Se pulverizan sutilmente, y con jarabe de rosas de Alejandria se forma masa para pildoras.
 I. Son purgantes y muy útiles en las enfermedades de cabeza.
 D. De ʒj á ʒij y hasta ʒj (12 á 24 dec. ó 4 gr.).

5385. P. DE CEBADILLA
 (Turnbull).

℥ Extracto alcohólico de
 cebadilla. ʒij (4 dec.).
 Regaliz en polvo. . . . ʒxx (10 dec.).
 H. S. A. diez pildoras.
 I. Blenorragia, cistitis, diabetes, catarro útero-vaginal. D. Se toman en dos dias.

5386. P. DE CEBOLLÁ ALBARRANA,
 DIGITAL Y HIERRO (Chomel).

℥ Escila en polvo,
 Digital en polvo, añ. . . . 5℔ (2 gr.).

Hierro porfirizado. . . . ʒj (4 gr.).
 H. S. A. cuarenta pildoras.
 I. Albuminuria complicada con clorosis. D. Dos á seis pildoras al dia.

5387. P. DE CELEDONIA
 PURGANTES (Rath).

℥ Extracto de celedonia,
 Extr. de ruibarbo, añ. ʒxv (75 cent.).
 Calomelanos al vapor. ʒiij (15 cent.).
 Resina de jalapa. . . ʒviiij (40 cent.).
 Ruibarbo en polvo. . c. s.
 H. S. A. una masa muy homogénea, y divídase en quince pildoras iguales que se rodearán de polvo de lirio de Florencia.
 I. Afecciones biliosas. D. Cinco pildoras cada dos horas, hasta obtener el efecto que se desea. Segun dicen es pronto y suave.

5388. P. DE CETRARINO.

℥ Cetrarino. ʒiij (15 cent.).
 Extracto de quina. . . ʒxviiij (4 gr.).
 Extracto de opio. . . ʒj (5 cent.).
 Mucilago de goma tragacanto. . c. s.
 H. S. A. ocho pildoras.
 I. Calenturas intermitentes en la apirexia, tisis, caquexia. D. Una pildora cada dos horas.

5389. P. CIANURADAS (Parent y
Boutigni).

℥ Cianuro de mercurio
 porfirizado. ʒvj (3 dec.).
 Miga de pan. ʒj (4 gr.).
 Miel. c. s.
 H. S. A. noventa y seis pildoras.
 I. Sifilis. D. Una á dos pildoras al dia, aumentando progresivamente.

5390. P. DE CIANURO DE HIERRO
 COMPUESTAS (Jolly).

℥ Cianuro de hierro. . . ʒxx (4 gr.).
 Sulfato de quinina. . . ʒxij (60 cent.).

Extracto de opio. . . ḡj (5 cent.).
 Conserva de rosas. . . c. s.
 H. S. A. doce píldoras.

I. Neurálgias y especialmente las del estómago y la cara. *D.* Una píldora cada tres horas.

5391. P. DE CIANURO DE MERCURIO OPIADAS (F. P., *Parent*).

☞ Cianuro de mercurio. ḡvj (3 dec.).
 Opio en bruto. ḡxij (6 dec.).
 Miga de pan. 3j (4 gr.).
 Miel. c. s.

H. S. A. noventa y seis píldoras, de las cuales cada una contendrá una décimasesta parte de grano de cianuro y una octava parte de grano de opio.

I. Sífilis. *D.* Una píldora por la mañana y otra por la noche.

5392. P. DE OXICIANURO DE MERCURIO COMPUESTAS ó *Píldoras cianuradas* (*Parent*).

☞ Oxicianuro de merc. ḡxviiiij (4 gr.).
 Extracto de boj . . . 3jβ (50 gr.).
 Extracto de acónito. 3ijβ (40 gr.).
 Hidrocl. de amoniaco. 3ijβ (40 gr.).
 Esencia de anís ó de sasafrás. 24 gotas.

H. S. A. una masa, que se divide en cuatrocientas píldoras.

I. La misma que las anteriores. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5393. P. DE CIANURO DE ORO Y EXTRACTO DE TORBISCO.

☞ Cianuro de oro. . . . ḡj (5 cent.).
 Extracto de torbisco. . . ḡij (10 cent.).
 Polvo de malvabisco. . . c. s.

H. S. A. diez y seis píldoras.

I. Sífilis, escrófulas, amenorreas. *D.* Se da una píldora diariamente y se aumenta una cada ocho días hasta tomar diez ó doce.

Chrestien aumenta la dosis del extracto hasta ḡxvj (8 dec.).

5394. P. DE CIANURO DE ORO OPIADAS.

☞ Extracto de guayaco. ḡiiij (15 cent.).
 Extracto de opio. . . . ḡ¹/₄ (12 mil.).
 Cianuro de oro. . . . ḡ¹/₅ (4 cent.).
 H. S. A. una píldora.

5395. P. DE CIANURO DE POTASIO (*Bally*).

☞ Cianuro de potasio,
 Almidon ligado por el jarabe de goma, ãã. ḡij (4 dec.).
 H. S. A. cuatro píldoras.

I. Disnea, asma, ortofnea y afecciones convulsivas, dispepsia, reumatismo, tisis, palpitations, cardiopalmia, cardialgia, pleuresía, bronquitis. *D.* Una por la mañana y otra por la noche, aumentando progresivamente la dosis con mucha prudencia.

5396. P. DE CICUTA DE STORCK (H. DE M.).

☞ Extracto de cicuta. 3j (4 gr.).
 Polvos de cicuta. c. s.
 H. S. A. setenta y dos píldoras.
I. Afecciones cancerosas. *D.* De una á cuatro píldoras, aumentando progresivamente.

5397. P. DE CICUTA Y CALOMELANOS (*Cullerier*).

☞ Extracto de cicuta,
 Calomelanos, ãã. 3j (4 gr.).
 Goma arábica,
 Jarabe simple, ãã. c. s.
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Infartos sífilíticos. *D.* De tres á cuatro píldoras al día.

5398. P. DE CICUTA Y CALOMELANOS (*Gama*).

☞ Extracto de cicuta. . . 3j (32 gr.).
 Protocloruro de merc. 3ij (8 gr.).
 H. S. A. trescientas píldoras.
I. Producen muy buenos efectos contra la inflamacion crónica del

testículo. *D.* Una á seis píldoras al día.

5399. P. DE CICUTA Y CORNEZUELO DE CENTENO (Arnal).

℞ Extracto acuoso de cornezuolo de centeno. ḡvj (3 dec.).
Extracto de cicuta. . . ḡjv (2 dec.).
H. S. A. cuatro píldoras.

I. Enteralgias que acompañan algunas veces al uso del cornezuolo de centeno. *D.* En dos días y despues en uno.

5400. P. DE CICUTA COMPUESTAS.

℞ Extracto de cicuta. . . ʒj (4 gr.).
Extracto de opio. . . . ḡxviiij (4 gr.).
Calomelanos. . . . ʒʒ (2 gr.).
Jarabe de valeriana. . . c. s.

H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Dolores osteocopos, cáncer, neuralgias, enteralgias, metritis, hepatitis, reumatismo, queratitis, conjuntivitis, muermo, tisis. *D.* Dos á cuatro al día, aumentando progresivamente.

5401. P. DE CICUTA COMPUESTAS (Bernstein).

℞ Extracto de cicuta,
Polvo de cicuta,
Goma amoniaco,
Resina de guayaco, añ. . ʒij (8 gr.).
Resina de jalapa. . . . ʒʒ (2 gr.).
Azufre dorado de antim. ʒj (4 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).

I. Escirros. *D.* Ocho á diez y seis píldoras, tres veces al día.

5402. Otras (F. DE L.).

℞ Extracto de cicuta. . . ʒv (20 gr.).
Ipecacuana en polvo. . ʒj (4 gr.).
Mucílago de goma arábica. . . c. s.
H. S. A. píldoras de á ḡjv (2 dec.).

5403. P. DE CICUTA IODURADAS.

℞ Extracto de zumo no depurado de bellad. ʒj (4 gr.).
Protoioduro de hierro. . ʒjv (16 gr.).
Polvo de malvabisco. . c. s.

H. S. A. setenta y dos píldoras. Se toma una por la mañana y otra por la tarde para combatir los tumores escirrosos y escrofulosos, y la tisis pulmonar.

5404. P. DE CICUTA Y QUINA.

℞ Extracto de cicuta. ḡxxx (15 dec.).
Extracto de quina. ʒj (4 gr.).
H. S. A. treinta píldoras.

D. Se dan tres al día en el tratamiento de los escirros flemonosos.

5405. P. DE CICUTA, QUININA Y HIERRO (Rognetta).

℞ Extracto de cicuta. . . . ʒij (8 gr.).
Sulfato de quinina. . . . ʒj (4 gr.).
Carbonato de hierro. . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. ochenta píldoras plateadas.

I. Catarro uterino. *D.* Una, dos, tres ó cuatro píldoras al día segun las tolere el estómago.

5406. P. DE CINCONINA.

℞ Cinconina pura. . . . ʒj (12 dec.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras muy iguales y plateadas.

I. Calenturas intermitentes, sudor inglés, cefalalgia, convulsiones, lepra. *D.* Dos á ocho píldoras las veinticuatro horas.

5407. P. DE CINOGLOSA ó Píldoras de cinoglosa opiadas (F. E. Y H. DE M.).

℞ Corteza de raiz de cinoglosa en polvo. . . ʒij (64 gr.).
Extr. acuoso de opio. . ʒiij (12 gr.).
Azafran en polvo. . . . ʒv (20 gr.).
Castóreo. ʒvj (24 gr.).
Jarabe simple. ʒjx (36 gr.).

H. S. A. una masa, que se expone al aire para que se seque; despues de lo cual se hacen píldoras de uno, dos ó mas grános. *D.* De ḡvj á ḡxviiij (6 á 9 dec.).

5408. P. DE CINOGLOSA (F. F.).

- 2 Corteza seca de raiz de cinoglosa ,
Simiente de beleño,
Extracto acuoso de
 opio, ãã. ʒjv (16 gr.).
- Mirra. ʒvj (24 gr.).
- Incienso. ʒv (20 gr.).
- Azafran. ʒjß (6 gr.).
- Castóreo. ʒjß (6 gr.).
- Jarabe de opio. c. s.

Se pulverizan las córtezas de cinoglosa y la simiente de beleño, y por separado cada una de las demás sustancias; se reblan-dece el extracto de opio con un poco de jarabe, y se incorpora en un almirez de hierro con los polvos; se hace una masa de con-sistencia regular y se guarda en un bote tapado. Contienen la octa-va parte de su peso de extracto de opio.

I. Tos catarral, tisis, diarrea, disenteria, catarro agudo, bron-quitis aguda, neumonia, tisis, neumatosis, enfisema. *D.* Una ó dos píldoras de ʒiij ó ʒjv (15 á 20 cent.).

5409. P. DE CITRATO DE HIERRO.

- 2 Protocitrato de hierro. ʒxc (5 gr.).
- Miel. ʒxviiij (4 gr.).
- Malvabisco en polvo. c. s.
- H. S. A. cien píldoras.
- D.* Una á diez al dia.

5410. P. DE CITRATO DE HIERRO Y AMONIACO (Beral).

- 2 Azúcar en polvo. ʒiij (12 gr.).
- Citrato de hierro y a-
moniacó. ʒj (4 gr.).
- Mucílago de goma arábiga. c. s.
- H. S. A. píldoras de ʒjv (20 cent.) que se platearán.

5411. P. DE CLORHIDRATO DE MORFINA.

- 2 Clorhidr. de morfina. ʒij (4 dec.).
- Tridacio. ʒviiij (4 dec.).
- Polvo de malvabisco, c. s.

H. S. A. ocho píldoras. Se toma una por la tarde.

5412. P. DE CLORURO DE BARIO (Swediaur).

- 2 Cloruro de bario. ʒj 4 gr.).
- Extracto de dulceamara ,
- Extracto de zumaque venenoso ,
- Extracto de énula, ãã. ʒß (15 gr.).
- H. S. A. píldoras de ʒv (25 cent.).

I. Sifilides, lepra, herpes, es-crófulas, dismenorrea. *D.* Dos píldoras cuatro veces al dia.

5413. P. DE CLORURO DE BARIO (Walsh).

- 2 Cloruro de bario. ʒxviiij (4 gr.).
- Mucilago de goma tragacanto ,
- Malvabisco en polvo, ãã. c. s.
- H. S. A. doscientas píldoras.

I. Afecciones escrofulosas. *D.* Tres al dia, aumentando progre-sivamente hasta seis, diez, doce ó yeinte, pero en muchas tomas. Walsh recomienda que se tome estas píldoras despues de comer, para que su accion sobre el es-tómago no sea tan pronta ni tan enérgica.

5414. P. DE CLORURO DE HIERRO (Bielt).

- 2 Cloruro de hierro. ʒxij (6 dec.).
- Polvo de genciana. ʒj (12 dec.).
- H. S. A. doce píldoras. Se ad-ministran cuatro al dia en el tra-tamiento de las erupciones escro-fulosas.

5415. P. DE CLORURO DE HIERRO ALOÉTICAS (Cunier).

- 2 Protochlor. de hierro. ʒj (4 gr.).
- Acibar. ʒjx (50 cent.).
- Jabon medicinal. ʒxviiij (4 gr.).
- H. S. A. cuarenta píldoras.

I. Amaurosis crónica. *D.* Diez al dia, cuatro por la mañana, tres al medio dia y tres por la noche, dos á cuatro horas despues de cada comida.

5416. P. DE CLORURO DE MERCURIO.

℞ Sublimado corrosivo en polvo,
Salamón. en polvo, añ. ḡviiij (4 dec.).
Jarabe de albúmina. . . 45 gotas.
Sé tritura y se añade:
Almidon en polvo. . . ʒij (8 gr.)
Goma arábica. ʒß (2 gr.).
H. S. A. veinticuatro pildoras.
Cada una representa ḡ¹/₁₀ (5 mil.)
de cloruro.

5417. P. CLORO-MERCÚRICAS (Mialhe).

℞ Bicloruro de mercur. ḡx (5 dec.).
Cloruro de sodio. . . . ʒß (2 gr.).
Almidon. ḡLjv (3 gr.).
Goma arábica. ḡxviiij (4 gr.).
Agua destilada. c. s.
H. S. A. cincuenta pildoras, que
se toman en las mismas dosis y
en los mismos casos que las de
Dupuytren.

5418. P. DE PROTOCLORURO DE MERCURIO COMPUESTAS (F. P.).

℞ Protocloruro de mercurio. . . . 40
Opio purificado. 3
Alcanfor. 4
Extracto de guayaco. 10
Conserva de rosas. c. s.
H. S. A. pildoras de ḡjv (2 dec.).
I. Afecciones herpéticas, sífilis.
D. Dos pildoras, dos ó tres veces
al día.

5419. P. DE CLORURO DE MERCURIO COMPUESTAS (F. DE L.).

℞ Cloruro de mercurio,
Oxisulfuro de antim., añ. ʒij (8 gr.).
Resina de guayaco. . . ʒß (4 gr.).
Melaza. ʒij (8 gr.).
H. S. A.

5420. P. DE DEUTOCLORURO DE MERCURIO ó Pildoras de sublimado corrosivo de Bogler (F. P.).

℞ Zumo de regaliz depu-
rado. ʒj (4 gr.).
Goma tragacanto. . . . ʒij (24 dec.).
Deutocloruro de merc. ḡj (5 cent.).
H. S. A. cien pildoras.

5421. P. DE DEUTOCLORURO DE MERCURIO (H. DE AL.).

℞ Sublimado corrosivo. . ḡvj (3 dec.).
Agua destilada. c. s.
Se disuelve la sal y se añade:
Azúcar blanca,
Miga de pan blanco, añ. c. s.
H. S. A. ciento ochenta pildo-
ras. Cada una contiene una trigé-
sima parte de grano de sublima-
do. D. Cuatro á seis al día, au-
mentando progresivamente.

5422. P. DE DEUTOCLORURO DE MERCURIO DE DUPUYTREN.

℞ Deutocloruro de mercurio,
Extracto de opio, añ. ḡv (25 cent.).
Extracto de guayaco. ḡLjv (3 gr.).
Polvo de quina. c. s.
H. S. A. veinte pildoras.
I. Sífilis, sífilides, albuminu-
ria, soriasis, lupus, lepra, of-
tálmia. D. Una á dos al día. V. nú-
meros 5246 y 47.

5423. P. DE CLORURO DE MERCURIO Y MORFINA (Bouchardat).

℞ Cloruro de mercurio y
morfiná. ḡxviiij (4 gr.).
Polvo de regaliz. . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de goma. c. s.
H. S. A. setenta y dos pildoras.
I. Sífilis confirmada, dolores
osteocopos. Cada una contendrá
la cuarta parte de grano de sal
mercurial. D. Se tomará primero
una por la mañana y otra por la
noche, y se aumentará sucesiva-
mente la dosis.

5424. P. DE CLORURO DE ORO (H. DE AL.).

℞ Cloruro de oro. ḡx (5 dec.).
Regaliz en polvo. . . . ʒiiij (12 gr.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. doscientas pildoras.
I. Enfermedades venéreas re-
beldes al mercurio, escrófulas,
herpes, etc. D. Una ó dos al día,
aumentando progresivamente la
dosis. Cada una contiene una vi-
gésima parte de grano de cloruro.

5425. P. DE CLORURO DE ORO Y SODIO ó Píldoras de Chrestien (F. P.).

℥ Clor. de oro y sodio. ḡx (50 cent.).
 Fécula de patatas. . . ḡjv (20 cent.).
 Goma arábiga. ḡj (4 gr.).
 Agua destilada. c. s.
 H. S. A. ciento veinte píldoras.
 Se dan de una á quince al dia.

5426. P. DE PERCLORURO DE PLATINO (Hoefler).

℥ Percloruro de platino. . . ḡj (5 cent.).
 Extracto de guayaco. . . ḡj (4 gr.).
 Regaliz en polvo. c. s.
 H. S. A. veinticuatro píldoras.
 I. Sífilis constitucional, herpes rebeldes. *D.* Una, dos, tres y aun cuatro píldoras mañana y noche.

5427. P. DE CLORURO DE ORO Y SODIO (Groetzner).

℥ Cloruro de oro y sodio. ḡv (25 cent.).
 Agua. c. s.
 Extr. de dulcamara. ḡxx (4 gr.).
 Extracto de acónito. ḡxv (75 cent.).
 Goma. c. s.
 H. S. A. ochenta píldoras.
 I. Hidropesía, herpes corrosivos, amaurosis, incontinencia de orina, sífilis, sífilides, helmintiasis. *D.* Dos cada dos horas.

5428. P. DE CLORURO DE PLATA.

℥ Cloruro de plata. ḡijβ (10 gr.).
 Conserva de rosas. c. s.
 H. S. A. cien píldoras.
 I. Epilepsia. Estas píldoras irritan menos que el nitrato de plata, no dan color á la piel y obran lo mismo que el nitrato. *D.* Una píldora al dia aumentando sucesivamente hasta diez.

5429. P. CLORO-ARGÉNTICAS (Mialhe).

℥ Nitrato de plata. ḡxviiij (4 gr.).
 Cloruro de sodio. ḡj (4 gr.).
 Almidon. ḡLjv (3 gr.).

Goma arábiga. ḡxviiij (4 gr.).
 Agua. c. s.
 H. S. A. cien píldoras plateadas.

Segun Mialhe es la preparacion que conviene administrar cuando se quieren usar las preparaciones de plata en su mayor grado de fuerza.

5430. P. DE CLORURO DE PLATA (Trousseau).

℥ Cloruro de plata. ḡj (4 gr.).
 Extracto de beleño. . . ḡxviiij (4 gr.).
 H. S. A. cuarenta píldoras.
 I. Epilepsia. *D.* Una mañana y noche, aumentando sucesivamente hasta diez y doce durante muchos meses.

5431. P. CLORO-PLÓMBICAS (Mialhe).

℥ Acetato de plomo. ḡxviiij (4 gr.).
 Cloruro de sodio. ḡj (4 gr.).
 Raiz de malvabisco. . . ḡxc (5 gr.).
 Jarabe de goma. c. s.
 H. S. A. cien píldoras.

5432. P. DE COBRE, Píldoras cobreosas, píldoras antiépilépticas, píldoras azules.

℥ Miga de pan. ḡLjv (3 gr.).
 Sulfato de cobre amoniacal. ḡviiij (4 dec.).
 Carbon. de amoniaco. c. s.
 H. S. A. cuarenta y ocho píldoras. Cada una contiene cerca de una décimasesta parte de grano de la sal de cobre.

I. Epilepsia y hemorragias rebeldes. *D.* Dos ó tres píldoras al dia.

5433. P. DE COBRE AMONIACALES.

℥ Sulfato de cobre y amoniaco. ḡx (50 cent.).
 Raiz de belladona. . . ḡjv (20 cent.).
 Extracto de genciana. ḡijβ (6 gr.).
 Quina en polvo. c. s.
 H. S. A. sesenta píldoras.
 I. Calenturas intermitentes, co-

rea, epilepsia, polidipsia. *D.* Cuatro á seis píldoras al día.

5434. P. DE COBRE AMONIAICAL
(H. DE AL.).

℞ Sulfato de cobre amoniaco. ḡxvj (8 dec.).
Extracto de beleño. ʒj (4 gr.).
Valeriana en polvo. c. s.
H. S. A. ochenta y dos píldoras.

I. Epilepsia. *D.* Una á dos píldoras al día.

Nota. Cada píldora contiene ḡʒ (25 mil.) de sulfato de cobre amoniaco.

5435. P. DE COBRE AMONIAICALES GLICIRRIZADAS.

℞ Sulfato de cobre y amoniaco. ḡijʒ (12 cent.).
Zumo de regaliz. ʒj (12 dec.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. ocho píldoras.

I. Calenturas intermitentes rebeldes y regulares. *D.* Una píldora cada cuatro horas.

5436. P. DE CODEINA.

℞ Codeina,
Tridacio, añ. ḡjv (2 dec.).
Polvo de malvabisco. c. s.
H. S. A. cuatro píldoras.
D. Se toma una diariamente.

5437. Otras (MAGENDIE).

℞ Codeina. ḡij á ḡjv (1 á 2 dec.).
Conserva de rosas. c. s.
H. S. A. cuatro píldoras.
D. Una por la mañana y otra por la tarde.

5438. P. CÓCHIAS ó Píldoras de acíbar compuestas (F. E.).

℞ Acíbar sucotrino. ʒij (64 gr.).
Frutos de coloquintida preparados. ʒvjʒ (26 gr.).
Escamonea de Alepo. ʒʒ (16 gr.).
Raiz de jalapa,
Sulfato de magnesia, añ. ʒx (40 gr.).

Háganse polvos muy sutiles, y con c. s. de jarabe se forma una masa de la que se hacen píldoras.

I. Es un excelente purgante en las enfermedades de cabeza y de nervios. *D.* De ʒʒ á ʒij (6 á 24 dec.).

5439. P. COLAGOGAS.

℞ Ruibarbo. ʒʒ (2 gr.).
Sulfato de potasa,
Escamonea, añ. ḡjx (50 cent.).
Aceite de hinojo. ḡijj (15 cent.).
Goma amoniaco. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Obstrucciones de las vísceras abdominales, atrofia mesentérica, ictericia, hepatitis crónica, hipocondría. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5440. P. COLCHÍICAS.

℞ Acíbar. ʒj (4 gr.).
Cólchico. ʒʒ (2 gr.).
Regaliz. ʒʒ (2 gr.).
Canela. ʒʒ (2 gr.).
Escamonea. ʒʒ (6 dec.).
Alcohol. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡijj (15 cent.).

I. Gota, reumatismo, anafrodisia. *D.* Tres á seis píldoras al día, aumentando según haya necesidad.

5441. P. DE CÓLCHICO (Ritton).

℞ Cólchico en polvo. ḡijj (15 cent.).
Jabon medicinal. ḡij (10 cent.).
H. S. A. una píldora.

I. Leucorrea. *D.* Dos ó tres tomas al día.

5442. P. DE COLOMBO.

℞ Colombo. ʒʒ (2 gr.).
Opio. ḡij (10 cent.).
Aceite de menta piper. 5 gotas.
Jarabe de claveles. c. s.

I. Vómitos espasmódicos, diarrea. *D.* Una píldora cada dos horas.

5443. P. DE COLOQUÍNTIDA Y MERCURIO (H. DE ING.).

℞ Extr. de coloquintida. ʒj (4 gr.).
Calomelanos. ʒxviii (4 gr.).
H. S. A. diez y ocho píldoras.
D. Una á cuatro píldoras al dia.

5444. P. DE CONRADI ó Píldoras contra la disuria de los ancianos.

℞ Asa fétida. ʒβ (15 gr.).
Ipecacuana en polvo. . . ʒij (4 dec.).
Opio en polvo. ʒij (4 dec.).
Esencia de menta pip. ʒij (4 dec.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.)
que se cubren con licopodio.
I. Iscuria, disuria en los ancianos. D. Diez píldoras al dia en tres tomas.

5445. P. CONTRA EL ACNE ROSACEO (Bielt).

℞ Calomelanos. ʒβ (2 gr.).
Extracto de taraxacon. . ʒj (4 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Una por la mañana y otra por la noche.

5446. P. CONTRA LAS AFECCIONES CANCEROSAS (Boinet).

℞ Jabon medicinal. . . . ʒij (8 gr.).
Goma amoniaco. . . . ʒj (4 gr.).
Ioduro de hierro. . . . ʒβ (2 gr.).
Bromuro de hierro. . . ʒxviii (4 gr.).
Cicuta en polvo,
Acónito en polvo, añ. ʒβ (2 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
D. Dos píldoras mañana y noche.

5447. P. CONTRA LA AMAUROSIS (H. DE M.).

℞ Goma amoniaco,
Raiz de valeriana en polvo,
Flor de arnica en p., añ. ʒj (12 dec.).
Tártaro emético. . . . ʒβ (25 mil.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
D. Toda la fórmula en tres veces al dia.

5448. P. CONTRA LA AMAUROSIS ó Píldoras de Richter.

℞ Goma amoniaco,
Asa fétida,
Jabon de Venecia,
Raiz de valeriana,
Sumid. de arnica, añ. ʒiij (12 gr.).
Tártaro emético. . . . ʒxviii (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
D. Quince, repartidas en tres veces al dia; despues veinticuatro en tres veces al dia.

Al principio del uso de estas píldoras se nota calor, ansiedad, sueño, inquietud, dolor de cabeza, sensibilidad en el ojo, etc. En este caso se tomará ʒβ (2 gr.) de tártaro soluble con extracto de grama ó yerba de taraxacon, y un purgante todas las veces que esté indicado. Despues de algun tiempo se vuelve de nuevo al uso de las píldoras y se continúa si el enfermo las puede tolerar. Por lo regular las sufre bien despues de haber tomado el tártaro soluble por algun tiempo.

Se previene esto por si acaso alguna vez el enfermo tuviese ó sintiese en el ojo tension, calor frecuente, dolor de cábeza ó vértigos, amargor de boca, alteracion del pulso, orina encendida, inquietud y escalofrios continuos, pues en este caso se debe tomar inmediatamente ʒβ (2 gr.) de tártaro soluble, y se continúa tomándolo hasta que todos los síntomas hayan cesado.

La primera señal de mejoría que se puede esperar y del buen éxito de la curacion es cuando ya no aparecen las chispas igneas delante del ojo, y cede el sentimiento de tension en el globo del ojo.

5449. P. CONTRA LA AMAUROSIS ó Píldoras de Schmucker.

℞ Sagapeno,

Gálbano,

Jabon de Venecia,

Zumo de regaliz, ãã. . . 3j (4 gr.).

Ruibarbo. 3jß (6 gr.).

Tártaro emético. ʒxvj (8 dec.).

H. S. A. píldoras de ʒj (5 cent.).

D. Quince por la mañana y quince por la tarde, y así se continúa durante un mes ó seis semanas. En la primera caja de píldoras conviene reducir á la mitad la dosis del tártaro emético, y que solo tome el enfermo doce píldoras mañana y noche.

5450. P. CONTRA LA ANGINA TONSILAR (Mondezert).

ʒ Calomelanos. ʒvj (3 dec.).

Jabon amigdalino. . . 3j (4 gr.).

H. S. A. doce píldoras.

Se pretende que estas píldoras hacen que la angina tonsilar termine por reabsorción.

D. Dos píldoras mañana y noche.

5451. P. CONTRA EL ASMA (Quarin).

ʒ Esponja calcinada. . . . 3ß (15 gr.).

Extracto de fumaria,

Goma amoniaco,

Flores de azufre, ãã. . 3ij (8 gr.).

Sulfuro de antimonio. 3j (4 gr.).

H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).

I. Asma ocasionado por escrófulas y asma húmedo. D. Se toman seis píldoras, tres veces al día, y se aumenta por grados hasta diez ó doce.

5452. P. CONTRA LA BLENORRAGIA (Sandras).

ʒ Acíbar. ʒxc (5 gr.).

Tridacio. 3ß (2 gr.).

Polvos de malvabisco, c. s.

H. S. A. setenta píldoras.

I. Son muy útiles en la blenorragia aguda, y comunmente en la blenorragia crónica.

5453. P. CONTRA EL BOCIO (Villie).

ʒ Esponja calcinada. . . 3j (30 gr.).

Goma aráb. en polvo. 3j (4 gr.).

Canela en polvo. . . . ʒxvj (8 dec.).

Jarabe de cáscara de naranja. . c. s.

H. S. A. veinticuatro píldoras.

D. Una por la mañana.

5454. P. CONTRA LOS CÁLCULOS BILIARIOS (Tronchin).

ʒ Jabon blanco. 3jv (16 gr.).

Extracto de regaliz. . 3ij (8 gr.).

Trementina. ʒxx (10 dec.).

Jar. de las cinco raices aperitiv. c. s.

H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

D. Tres píldoras, tres veces al día, y se bebe despues un vaso de suero.

5455. P. CONTRA LA CARIES (Rust).

ʒ Asa fétida,

Acido fosfórico conc., ãã. 3ij (8 gr.).

Malvabisco en polvo,

Cálamo arom. en polvo, ãã. 3j (4 gr.).

Agua destilada. c. s.

H. S. A. píldoras de á ʒij (1 dec.).

D. Diez á treinta por la mañana, al medio día y por la noche.

5456. P. CONTRA EL CATARRO CRÓNICO (Recamier).

ʒ Sulfuro de potasa. . . ʒj (12 dec.).

Ipecacuana. ʒjv (2 dec.).

Extr. gomoso de opio. ʒiij (15 cent.).

H. S. A. veinticuatro píldoras.

D. Tres á seis píldoras al día.

5457. P. CONTRA EL CATARRO CRÓNICO,

ʒ Mirra. 3ß (2 gr.).

Bálsamo de Tolú. . . . ʒxviiij (4 gr.).

Extr. gomoso de opio. ʒvj (3 dec.).

Bálsamo del Perú. . . c. s.

H. S. A. veinticuatro píldoras.

D. Tres á seis píldoras al día.

5458. P. CONTRA EL CATARRO VESICAL (Gall).

℥ Balsamo de copaiba, .
Trem. de Burdeos, ãã. ʒijß (10 gr.).
Magnesia. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
D. Tres ó cuatro por la mañana, al medio dia y por la noche.

5459. P. CONTRA LA CISTITIS.

℥ Flores de azufre. ʒj (4 gr.).
Trement. de Venecia. ʒij (24 dec.).
Yema de huevo. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒv (25 cent.).
D. De cuatro á ocho al dia.

5460. P. CONTRA LA CLOROSIS (Marchall-Hall).

℥ Acíbar,
Sulfato de hierro, ãã. . ʒij (1 dec.).
H. S. A. una píldora.
D. Dos á seis píldoras al dia.

5461. Otras (CHOMEL).

℥ Escila en polvo,
Digital en polvo, ãã. . . ʒß (2 gr.).
Hierro porfirizado. . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. cuatro píldoras.
I. Albuminuria complicada con clorosis. D. Dos á seis al dia.

5462. P. CONTRA LA CLOROSIS SIFILITICA (Ricord).

℥ Protoioduro de merc. ʒLX (3 gr.).
Tridacio. ʒLX (3 gr.).
Extracto tebáico. . . . ʒxx (1 gr.).
Extracto de cicuta. . . ʒxxx (15 dec.).
Mézclese S. A. y hágase sesenta píldoras.

M. Ricord principia administrando una sola píldora, y aunque llega á la dosis de seis por dia jamás se excede de este número.

Este mismo práctico asocia una tisana de lúpulo ó de hojas de saponaria al uso de estas píldoras.

5463. P. CONTRA LA COQUELUCHE.

℥ Extracto de opio ʒj (5 cent.).
Subcarbonato de hierro. ʒij á ʒiij (10 á 15 cent.).
H. S. A. seis píldoras.
I. Primer periodo de la coqueluche. D. Tres píldoras al dia, por la mañana, al medio dia y por la noche.

5464. Otras (THORNSTEN).

℥ Sulfato de quinina. . . ʒxviii (1 gr.).
Acetato de morfina. . ʒij (1 dec.).
Conserva de rosas. . . c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras.
D. Una á tres al dia.

5465. Otras (LOEWENHART).

℥ Oxido de zinc,
Extr. de beleño, ãã. ʒxviii (1 gr.).
Flores de azufre,
Raiz de hinojo en p., ãã. ʒß (2 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Una á tres al dia.

5466. Otras (Trousseau).

℥ Extracto de zumo de belladona,
Extracto de opio, ãã. . ʒjv (2 dec.).
Extracto de valeriana. ʒß (2 gr.).
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Coqueluche, bronquitis, asma, calentura. D. Una á cuatro píldoras al dia.

5467. P. CONTRA LA DIARREA.

℥ Triaca. ʒij (24 dec.).
Polvo de colombo. . . ʒß (6 dec.).
Extracto de opio. . . . ʒvj (3 dec.).
H. S. A. doce píldoras.
D. Una por la mañana y otra por la noche.

5468. P. CONTRA LA DISMENORREA (Pigeaux).

℥ Opio en bruto. ʒj (5 cent.).
Alcanfor. ʒvj (30 cent.).
H. S. A. dos píldoras. D. Una por la mañana y otra por la noche.

5469. P. CONTRA LA DISPEPSIA
(H. DE AL.).

℞ Subnitrato de bismuto. ḡxij (6 dec.).
Extracto de valeriana. ʒj (4 gr.).
Esencia de valeriana. . . 40 gotas.
Raiz de valeriana en polvo. . . . c. s.
H. S. A. sesenta píldoras. D.
Seis píldoras, tres veces al dia.

5470. P. CONTRA EL ECZEMA
(Bielt).

℞ Masa de Belloste. . . . ʒij (24 dec.).
Jabon medicinal. . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Se dan dos al dia contra el
eczema crónico.

5471. P. CONTRA LA EPILEPSIA
(Bielt).

℞ Sulfato de cobre y amoniac. ʒj (12 dec.).
Extracto de valeriana. . ʒjβ (6 gr.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.
D. Una, despues dos y hasta
cuatro píldoras al dia.

5472. Otras (DUPUYTREN).

℞ Oxido de zinc. . . . ḡxxij (11 dec.).
Valeriana en polvo. ḡvij (4 dec.).
Castóreo pulverizad. ḡjv (2 dec.).
Jarabe simple. . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras que se
toman en el dia. Se continuará
usando estas píldoras por mucho
tiempo.

5473. Otras (DEBREYNE).

℞ Extracto acuoso de belladona por decoccion. ʒij (8 gr.).
Goma arábica en polvo. ʒβ (2 gr.).
Polvo inerte. c. s.
H. S. A. ciento veinte píldoras.
D. Una el primer dia, dos el
segundo, tres el tercero por la
mañana, al medio dia y por la noche,
una ó dos horas antes de comer.
Se continúa así hasta que produzca
una alteracion en la vision; si se
presenta, se disminu-

ye la dosis y se cesa al cabo de
pocos dias. Si no se experimenta
alteracion alguna de la vista se
aumenta la dosis hasta cinco píldoras
ó ḡvj (3 dec.) de belladona al
dia.

Se puede usar á veces el cocimiento
de valeriana solo ó con belladona.

5474. Otras (DUPUYTREN).

℞ Valeriana en polvo. ḡxl (2 gr.).
Oxido de zinc. ḡxx (4 gr.).
Castóreo. ḡjv (2 dec.).
Jarabe. c. s.
H. S. A. doce píldoras, que se
toman en tres tomas en el dia.

Dupuytren aconsejaba que se
continuase el uso de estas píldoras
durante mucho tiempo, un año
por ejemplo, en algunos casos de
epilepsia. En general usaba los
baños y un cauterio en el brazo.

5475. Otras (QUARIN).

℞ Raiz de valer. silvestre. ʒij (8 gr.).
Gálbano,
Sagapeno, ãã. ʒjβ (6 gr.).
Asa fétida. ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡiij (15
cent.).

D. Se dan de dos á cuatro á las
mujeres histéricas, que padecen
accesos de epilepsia.

5476. Otras (RECAMIER).

℞ Oxido de zinc. ḡj (5 cent.).
Alcanfor,
Extr. de belladona, ãã. ḡ³/₅ (3 cent.).
H. S. A. una píldora.

Al mismo tiempo se prescriben
vejigatorios volantes sobre los
diversos puntos afectados de parálisis
ó de hormigueo, y este tratamiento
ha producido buenos efectos.

5477. Otras (RECAMIER).

℞ Acetato de plomo. . . ḡvj (3 dec.).
Oxido de zinc,
Asa fétida, ãã. ʒβ (6 dec.).

Extr. de estramonio. ḡvj (3 dec.).
 Extracto de beleño. . . ḡviiij (4 dec.).

H. S. A. veinticuatro pildoras.

D. Una mañana y noche al principio del tratamiento; pero despues se aumenta la dosis.

5478. P. CONTRA LA EPILEPSIA
 (*Vallerand*).

ʒ Subnitr. de bismuto. ḡxviiij (4 gr.).
 Extracto de quina. . . ḡxxxvj (2 gr.).
 Extracto de beleño. . . ḡjx (50 cent.).

H. S. A. doce pildoras.

D. Dos pildoras al dia.

5479. P. CONTRAESTIMULANTES
 (*Uberti*).

ʒ Extracto de cornezuelo
 de centeno. ḡxc (5 gr.).

Malvabisco en polvo. . . c. s.

H. S. A. veinte pildoras.

D. Una cada dos horas.

Uberti las considera muy útiles para combatir algunas inflamaciones.

5480. P. CONTRA LAS FLORES
 BLANCAS.

ʒ Sucino preparado. . . . ʒij (8 gr.).

Almáciga,

Coral, ãã ʒj (4 gr.).

Alcanfor. ḡx (5 dec.).

H. S. A. pildoras con c. s. de bálsamo de copaiba.

I. Gonorrea, flores blancas. D. Cinco pildoras todas las mañanas, bebiendo encima un vaso de cocimiento de zarzaparrilla ó de raiz de bardana.

5481. Otras, n. 2.

ʒ Trementina cocida. . . ʒjß (45 gr.).

Bolo arménico,

Hueso de jibia, ãã . . . ʒß (15 gr.).

Sucino,

Almáciga, ãã ʒij (8 gr.).

Ruibarbo. ʒjß (6 gr.).

H. S. A. pildoras con c. s. de bálsamo de copaiba.

I. Gonorrea y flores blancas. D. ʒj (12 dec.) dos ó tres veces al dia, bebiendo un vaso de coci-

miento de zarzaparrilla ó de bardana.

5482. P. CONTRA LA GANGRENA
 DE HOSPITAL (*Dupuytren*).

ʒ Alcanfor. ʒj (12 dec.).

Almizcle. ḡviiij (4 dec.).

Extracto de opio. . . . ḡij (1 dec.).

Jarabe simple. c. s.

H. S. A. ocho pildoras, de las cuales cada una contiene ḡijj (15 cent.) de alcanfor.

D. Una pildora cada dos horas.

5483. P. CONTRA LA GALACTIRREA
 (*Behrends*).

ʒ Sulfato de hierro crist. ʒij (24 dec.).

Mirra. ʒj (4 gr.).

Quasia amarga en polv. ʒjv (5 gr.).

Extracto blando de quina. . . . c. s.

H. S. A. pildoras de á ḡij (1 dec.).

I. Galactirrea, principalmente si está acompañada de atonía de los órganos digestivos. D. De cuatro á ocho pildoras tres veces al dia.

5484. P. CONTRA LAS GASTRALGIAS
 (*Boudin*).

ʒ Extracto alcohólico de nuez vómica recién preparado. . . ḡviiij (4 dec.).

H. S. A. diez y seis pildoras plateadas.

I. Gastralgia rebelde. D. Cuatro, ocho y aun diez y seis pildoras al dia, pero gradualmente y empezando siempre por las dosis mas débiles y evitando el tomar muchas á la vez. A veces se notan efectos afrodisiacos muy marcados.

5485. Otras (JADIOUX).

ʒ Subnitrato de bismuto,

Extracto de valeriana, ãã . ʒß (2 gr.).

H. S. A. diez y ocho pildoras.

D. Una á dos pildoras al dia.

5486. Otras (LOMBARD).

ʒ Subnitr. de bismuto. ḡj (5 cent.).

Magnesia. ʒß (2 gr.).

Polvos de Dower. . . . $\mathring{g}x$ (50 cent.).
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Gastralgias, neurosis intermitentes. D. Una píldora cada dos horas.

5487. P. CONTRA LA GASTRALGIA.

\mathcal{R} Masa de Vallet. . . . $\mathfrak{3}j$ (4 gr.).
Masa de cinoglosa. . . $\mathring{g}xviiij$ (4 gr.).
Subnitr. de bismuto. . $\mathfrak{3}\mathfrak{B}$ (2 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Gastralgia clorótica. D. Una á cinco píldoras al dia.

5488. P. CONTRA LA GONORREA (Quarin).

\mathcal{R} Goma arábica. . . . $\mathfrak{3}\mathfrak{B}$ (16 gr.).
Almáciga en lágrimas. $\mathfrak{3}ij$ (8 gr.).
Extr. de tormentila. . $\mathfrak{3}j$ (4 gr.).
Trementina cocida. . c. s.
H. S. A. píldoras de $\mathring{g}jv$ (2 dec.).
D. Cinco ó seis píldoras mañana y noche.

5489. Otras (BERTON).

\mathcal{R} Brea,
Alumbre, $\mathring{a}\mathring{a}$ $\mathfrak{3}v$ (20 gr.).
Regaliz en polvo. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de $\mathring{g}vj$ (3 dec.).
D. Seis á diez píldoras al dia.

5490. P. CONTRA LA HEMOTISIS CRÓNICA (Righini).

\mathcal{R} Protocarbonato de hierro,
Acibár sucotrino, $\mathring{a}\mathring{a}$. . . $\mathring{g}Ljv$ (3 gr.).
Extracto de belladona. $\mathring{g}xviiij$ (4 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras.
D. Dos ó tres al dia.

5491. P. CONTRA LOS HERPES (Gall).

\mathcal{R} Extracto de trébol de agua,
Extracto acuoso de guayaco, $\mathring{a}\mathring{a}$. . . $\mathfrak{3}j$ (4 gr.).
Sulfuro de antimonio,
Calomelanos, $\mathring{a}\mathring{a}$. . . $\mathring{g}xviiij$ (4 gr.).
Ruibarbo en polvo. c. s.
H. S. A. píldoras de á $\mathring{g}iiij$ (15 cent.).
I. Herpes é infartos de las vis-

ceras abdominales. Estas píldoras son una imitacion de las de Plummer.

5492. P. CONTRA LA HIDROPEZIA (Lerminier).

\mathcal{R} Calomelanos. . . . $\mathring{g}viiij$ (4 dec.).
Cebolla albarrana,
Ruibarbo, $\mathring{a}\mathring{a}$ $\mathring{g}jv$ (2 dec.).
Jarabe de las cinco raices. . . . c. s.
Háganse cuatro píldoras, que se toman en veinticuatro horas.
I. Son diuréticas y purgantes.

5493. P. CONTRA LAS HIDROPESIAS.

\mathcal{R} Tridacio. $\mathfrak{3}j$ (4 gr.).
Escila en polvo,
Digital en polvo,
Nitro, $\mathring{a}\mathring{a}$ $\mathfrak{3}ij$ (24 dec.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.
D. Una mañana y noche.

5494. P. CONTRA LA HIDROPEZIA (Pierquin).

\mathcal{R} Mercurio dulce,
Escila en polvo, $\mathring{a}\mathring{a}$. . $\mathfrak{3}ij\mathfrak{B}$ (10 gr.).
Ojimiél escilitico. . . . c. s.
H. S. A. cien píldoras.
I. Son fundentes, purgantes y diuréticas. D. Dos píldoras mañana y noche. Se bebe despues un vaso de infusion de acebo endulzada con ojimiél escilitico, y despues se aumenta progresivamente.

5495. P. CONTRA EL HIDRÓTORAX (Dupuy).

\mathcal{R} Extracto de trébol de agua,
Polvo de cebolla albar., $\mathring{a}\mathring{a}$. $\mathfrak{3}j\mathfrak{B}$ (6 gr.).
Polvo de digital purpúrea,
Polvo de asa fétida, $\mathring{a}\mathring{a}$. . . $\mathfrak{3}j$ (4 gr.).
Se mezcla exactamente, y se hacen ochenta píldoras.
I. Hidrotorax, ascitis con asma y palpitaciones, hidrorquis y carditis. D. Cuatro píldoras mañana y noche y detrás de cada dosis se da una bebida de parietaria nitrada, á la cual se añade algunas veces $\mathfrak{3}\mathfrak{B}$ (15 gr.) de ojimiél escilitico.

5496. P. CONTRA EL HISTÉRICO
(*Debreyne*).

℞ Alcanfor,
Asa fétida, ãã. ʒiij (12 gr.).
Extr. de belladona. ḡLjv (3 gr.).
Extr. acuoso tebáico. ḡxviiij (4 gr.).
Jarabe de goma. c. s.

H. S. A. ciento veinte píldoras.

I. Ataques histéricos. *D.* Una el primer día, dos al segundo, y se aumenta una píldora cada día hasta seis en las veinticuatro horas, dos por la mañana, al medio día y por la noche, y dos horas antes de comer. Segun Debreyne esta dosis hasta para suspender y prevenir los ataques de histérico.

5497. P. CONTRA LA INCONTINENCIA DE ORINA (*Berengier*).

℞ Bálsamo de copaiba,
Hidrato de peróxido
de hierro, ãã. ʒijβ (10 gr.).
Carbonato de magnesia. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

D. Dos á diez al día. Al mismo tiempo se usará la tisana de hojas de nogal para bebida usual.

5498. Otras (H. DE M.).

℞ Bálsam. peruano sólido. ʒj (4 gr.).
Estoraque. ʒij (24 dec.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
D. ḡviiij (4 dec.) repetidos cuatro ó cinco veces al día.

5499. P. CONTRA LA INCONTINENCIA DE ORINA DE LOS NIÑOS (*Ribes*).

℞ Extracto alcohólico de
nuez vómica. ḡviiij (4 dec.).
Etiope marcial. ʒj (4 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.
D. Se administra una al día y se aumenta progresivamente la dosis.

5500. P. CONTRA LA INDIGESTION DE LAS BEBIDAS VINOSAS.

℞ Antimonio diaforético,

Goma amoniaco,
Masa de píldoras de
Rufus, ãã. ʒj (4 gr.).
Jabon de Castilla. ʒj (12 dec.).
H. S. A. setenta y dos píldoras muy iguales.

D. De seis á doce en las veinticuatro horas.

5501. P. CONTRA LOS INFARTOS ESCROFULOSOS Y ESCIRROSOS (*Stoerck*).

℞ Extracto de cicuta,
Jabon de Venecia, ãã. ʒjβ (6 gr.).
Goma amoniaco,
Masa de píldoras de Rufus, ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de á ḡiij (15 cent.).

I. Infartos escrofulosos en las personas débiles, delicadas ó histéricas. *D.* Dos píldoras, cuatro veces al día.

5502. P. CONTRA LA ICTERICIA
(*Greding*).

℞ Extr. de belladona. ḡxxjv (12 dec.).
Polvo de hojas de la
misma planta. ḡxv (75 cent.).
H. S. A. píldoras de ḡβ (25 mil.).

D. Se da una píldora mañana y noche. Los enfermos experimentan un calor considerable en todo el cuerpo, latidos mas frecuentes de las arterias, una especie de embriaguez y sudores. A estos síntomas suceden deposiciones verdosas y orinas copiosas; se termina la curacion por el ruibarbo y el sulfato de magnesiá.

5503. P. CONTRA LOS INFARTOS GLANDULOSOS CRÓNICOS.

℞ Jabon medicinal. ʒjv (16 gr.).
Goma amoniaco. ʒij (8 gr.).
Ioduro de hierro,
Extracto de cicuta,
Extracto de acónito, ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡv (25 cent.).

I. Infartos glandulares crónicos.
D. Dos á diez píldoras al día.

5504. P. CONTRA LAS LOMBRICES Y LAS ASCÁRIDES (Pitschaff).

℞ Santónico en polvo,
 Extracto de ajénjos, ãã. ḡxc (5 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.)
 que se rodean de magnesia. D.
 Cuatro píldoras cada dos horas.

5505. P. CONTRA LA METRORRAGIA CRÓNICA:

℞ Sabina en polvo. ʒiij (12 gr.).
 Extracto de sabina. . . ʒij (8 gr.).
 Aceite de sabina. . . . 24 gotas.
 H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).
 D. De cinco á diez al dia.

5506. P. CONTRA LA NEURALGIA DEL HÍGADO Ó HEPATALGIA.

℞ Extracto de belladona. ḡij (1 dec.).
 Extracto de diente de
 leon. ḡxij (6 dec.).
 Polvos de regaliz. c. s.
 H. S. A. ocho píldoras.
 D. Una cada dos horas por la mañana.

5507. P. CONTRA LAS PALPITACIONES (Andral).

℞ Digital en polvo. . . ḡxviiij (1 gr.).
 Extracto de beleño. . . ḡxxxvj (2 gr.).
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
 D. Una á ocho píldoras aumentando progresivamente.

5508. P. CONTRA LAS POLUCIONES (Hufeland).

℞ Alumbre en polvo,
 Catecú en polvo,
 Quina calis. en p., ãã. ḡxij (6 dec.).
 Extracto de quasia amarga. . . c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.)
 D. Diez píldoras mañana y noche, cuya dosis se aumenta sucesivamente.

5509. P. CONTRA LA SIFILIS (José Frank).

℞ Sublimado corrosivo. . . ḡjv (2 dec.).
 Extr. gomoso de opio. ḡxij (6 dec.).

Extracto de quina. . . ʒj (12 dec.).

Jarabe simple. c. s.

H. S. A. diez y seis píldoras.

D. Una al dia y despues dos. Se toman tres y rara vez cuatro. Despues se bebe un vaso de agua de goma ó de tisana gelatinosa ó mucilaginoso. Si producen cardialgia se tomarán despues de comer, ó se beberá en seguida una emulsion de goma arábica con un poco de opio, y algunas dosis de un polvo con sulfuro de potasa.

5510. P. CONTRA LA SIFILIDES.

℞ Extracto de acónito. . . ḡxij (6 dec.).
 Opio en polvo.
 Sublim. corrosivo, ãã. ḡij (1 dec.).
 H. S. A. ocho píldoras.
 D. Una por la mañana en ayunas.

5511. P. CONTRA LA SORDERA.

℞ Carbonato de amoniaco piroaccitoso. ḡxviiij (1 gr.).
 Castóreo en polvo. . . ḡvj (3 dec.).
 Aceite de sucinó. . . . 2 gotas.
 H. S. A. veinte píldoras iguales.
 D. Se introduce mañana y noche una de estas píldoras en el oido enfermo.

5512. P. CONTRA LOS SUDORES DE LOS TÍSICOS (Burdach).

℞ Agárico blanco. . . ḡxvj (8 dec.).
 Muc. de goma aráb. ḡxxvj (12 dec.).
 Extracto de genciana. c. s.
 H. S. A. diez y seis píldoras.
 D. Cuatro por la noche antes de acostarse.

5513. P. CONTRA LA TÉNIA ó de trementina mercuriales de Wilde. (F. P.).

℞ Trementina de Venecia. 18
 Jabon de jalapa. 9
 Extracto de adelfa. 4
 Protochloruro de mercurio. 2
 H. S. A. píldoras de ḡvj (3 dec.).
 D. Una de tres en tres horas, hasta cuatro ó seis al dia, y se

aumenta la dosis en los siguientes.

5514. P. CONTRA EL VÓMITO DE LAS PREÑADAS (*Pitschaff*).

℞ Creosota. ḡiij (15 cent.).
Beleño en polvo,
Agua destilada, ãã. c. s.
H. S. A. nueve píldoras, que deberán pesar ḡij (1 dec.) y plátense.

D. Tres píldoras al día, mañana, noche y al medio día.

5515. P. CONTRA LAS ULCERACIONES HERPÉTICAS (*Arnal*).

℞ Extracto acoso de cornezuelo de centeno. ḡvj (3 dec.).
Ioduro de azufre. . . . ḡjv (2 dec.).
H. S. A. cuatro píldoras.

I. Ulceraciones de la matriz de naturaleza herpética.

5516. P. DE COOPER.

℞ Extracto de cicuta. . . 5iij (12 gr.).
Protocloruro de merc. 3j (4 gr.).
Azufre dorado de anti-
monio. 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡv (25 cent.).

D. Una píldora mañana y noche.

5517. P. DE COPAIBA FERRUGINOSAS (*Berengier*).

℞ Bálsamo de copaiba,
Hidrato de peróxido de
hierro, ãã. 3ijß (10 gr.).
Carbonato de magnesia. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Incontinencia de orina. D. Dos á diez píldoras al día.

5518. P. DE COPAIBA MERCURIALES (H. M.).

℞ Resina de copaiba. . . . 5iij (12 gr.).
Calomelanos. Ḋj (12 dec.).
Tierra japónica. c. s.

H. S. A. una masa que se dividirá en ciento cincuenta píldoras iguales.

D. Una cada cuatro horas, aumentando progresivamente.

5519. P. DE CORNEZUELO DE CENTENO.

℞ Polvo reciente de cornezuelo de centeno. 3ß (2 gr.).
Extracto de opio. . . ḡß (25 mil.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.

I. Leucorrea. D. Se dan dos píldoras al día.

5520. P. DE CORNEZUELO DE CENTENO ALCANFORADAS (*Robert*).

℞ Cornezuelo de centen. ḡij (10 cent.).
Aleanfor. ḡj (5 cent.).
H. S. A. una píldora.

I. Son muy eficaces en las poluciones nocturnas. D. Una píldora mañana y noche.

5521. P. DE CREOSOTA.

℞ Creosota. 3j (4 gr.).
Malvabisco,
Zumo de regaliz, ãã. . 5jß (6 gr.).
Agua. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡijß (12 cent.).

I. Tisis pulmonar y laringea. D. Dos píldoras mañana y noche.

5522. Otras (LAVERAN).

℞ Creosota. 3 gotas.
Cicuta ḡjv (2 dec.).
Magnesia,
Mucilago, ãã. c. s.
H. S. A. nueve píldoras plateadas.

I. Vómitos de las mujeres preñadas. D. Tres píldoras al día.

5523. P. DE CROTON.

℞ Aceite de croton tiglio,
Jabon medicinal, ãã. . . ḡij (1 dec.).
Goma arábica. c. s.
H. S. A. cuatro píldoras.

I. Cólicos, helmintiasis, estreñimiento, hidropesía, reuma-

tismo. *D.* Una píldora por la mañana.

5524. P. DE CROTON COMPUESTAS.

℥ Aceite de croton tiglio. ḡjv (2 dec.).
Gutagamba,
Escamonea,
Jalapa, ãã. ḡxviiij (4 gr.).
Rob de saúco. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Cólico saturnino, hidropesía, reumatismo, helmintiasis, ténia y como purgante. *D.* Una píldora para los niños y dos ó tres para los adultos.

5525. P. DE CUBEBAS.

℥ Cubebas,
Trementina de Venecia,
Polvo de malvabisco, ãã. 3ß (2 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Blenorragia. *D.* Dos ó tres píldoras mañana y noche.

5526. P., BOLOS Ó CÁPSULAS DE CUBEBAS.

Se hacen del peso de ḡxviiij (4 gr.) ovoideas y cubiertas de gelatina.
D. Cinco á veinte píldoras.

5527. P. DE DELFINA.

℥ Delfina. ḡij (4 dec.).
Extracto de beleño. . . ḡjv (2 dec.).
Polvo de goma. . . . ḡLjv (3 gr.).
Jarabe. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Reumatismo, gota, ceática, lumbago, neuralgias. *D.* Una píldora cada dos horas.

5528. P. DEPURATIVAS (Althof).

℥ Extracto de dulcamara. 3j (30 gr.).
Antimonio crudo. . . . 3ß (15 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡij (4 dec.).
I. Herpes. *D.* Quince á veinte píldoras al dia.

5529. Otras (RIGHINI).

℥ Extracto alcohólico de zarzaparrilla. 3ß (2 gr.).
Resina de guayaco artificial. ḡxviiij (4 gr.).
Extracto de enebro. . . c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras.
D. Dos píldoras al dia.

5530. P. DEPURATIVAS ANTIMONIADAS.

℥ Azufre dor. de antim. ḡxviiij (4 gr.).
Extracto de cáscara de nuez,
Extracto de cicuta,
Resina de guayaco, ãã. 3ß (2 gr.).
Alcanfor,
Opio, ãã. ḡjx (50 cent.).
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Dolores osteocopos, reumatismo crónico, herpes, lepra, sífilis. *D.* Cuatro píldoras mañana y noche.

5531. P. DEPURATIVAS COMPUESTAS.

℥ Extracto de dulcamara,
Extracto de cicuta,
Antimonio crudo,
Resina de guayaco, ãã. . 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Reumatismo crónico, herpes, lepra, sífilis, dolores osteocopos.
D. Cuatro píldoras mañana y noche.

5532. P. DESINFECTANTES.

℥ Cloruro de cal seco. 5ij (8 gr.).
Azúcar. 1bß (250 gr.).
Almidon. 3j (30 gr.).
Goma tragacanto. . . 3j (4 gr.).
Carmin. ḡiiij (15 cent.).
Mézclese y hágase píldoras de ḡiiij (15 cent.).
I. Mal olor del aliento. *D.* Cinco ó seis píldoras de dos en dos horas.

5533. P. DE DESLANDES.

℥ Extr. gom. de opio. ḡjv (20 cent.).

Alcanfor,

Res. de guayaco, ãã. ḡxij (60 cent.).

Extracto de enebro. ḡxv (75 cent.).

H. S. A. ocho pildoras.

I. Reumatismo. *D.* Una pildora cada media hora, y se bebe despues una infusion caliente de escordio, buglosa, te ó amapola.

5534. P. DESOBSTRUENTES.

ᶯ Limaduras de hierro. ḡxviii (4 gr.).

Gálbano. 5ß (2 gr.).

Goma amoniaco. . . . ᶯj (12 dec.).

Extracto de genciana. 3jß (6 gr.).

Sal volátil de asta de

ciervo. ḡxij (6 dec.).

Aceite de menta. . . 6 gotas.

H. S. A. pildoras de ḡijß (12 cent.).

I. Hipocondria. *D.* Cinco pildoras tres veces al dia, ó una á menudo.

5535. Otras (H. M.).

ᶯ Jabon medicinal. . . . 3iij (12 gr.).

Acíbar sucotrino. . . . 3ß (16 gr.).

H. S. A. pildoras de ḡv (25 cent.).

D. Una cada cuatro horas, aumentando ó disminuyendo la dosis segun sea necesario.

5536. Otras (H. DE M.).

ᶯ Extracto de taraxacon,

Extracto de ajenjos,

Jabon medicinal, ãã. . . . 3j (4 gr.).

H. S. A. pildoras de ḡij (1 dec.).

I. Infartos de las vísceras abdominales. *D.* ᶯß á ᶯj (6 á 12 dec.).

5537. P. DESOBSTRUENTES MERCURIALES (H. DE M.).

ᶯ Protocloruro de merc. 3ß (2 gr.).

Goma amon. en polvo. 3ij (8 gr.).

Polvos de ruibarbo. . . 3j (4 gr.).

Jabon medicinal. . . . 3ß (15 gr.).

Jarabe de las cinco raices. . . . c. s.

H. S. A. pildoras de ḡjv (2 dec.).

I. Como las anteriores. *D.* ḡjv á ḡviii (2 á 4 dec.).

5538. P. DE LOS TRES DIABLOS (Maetzius).

ᶯ Protocloruro de merc. ḡviii (4 dec.).

Trociscos de coloquintida,

Escamon. de Alepo, ãã. ḡjv (2 dec.).

Jarabe de cantueso. . . c. s.

Maetzius dividia esta masa en cuatro pildoras, que consideraba como la dosis mayor que se podia dar al hombre mas fuerte. Las prescribia en las gonorreas para purgar y disminuir la inflamacion del conducto de la uretra.

5539. P. DIAFORÉTICAS.

ᶯ Extracto de dulcamara,

Azúfre sublim. y lav., ãã. 3ij (8 gr.).

H. S. A. pildoras de ḡv (25 cent.).

D. Se toman de cuatro á doce al dia en las afecciones epsóricas ó reumáticas.

5540. Otras (ROUCHER).

ᶯ Jabon blanco. 3j (30 gr.).

Goma de guayaco,

Etíope antimonial, ãã. 3ß (15 gr.).

Extracto de dulcamara. 3j (30 gr.).

Jarabe de las cinco raices. . . . c. s.

H. S. A. pildoras de ḡjv (2 dec.).

I. Reumatismo crónico y todas las enfermedades en que es necesario excitar un movimiento saludable hácia la piel. *D.* Una pildora mañana y noche, y se aumenta una cada tres dias hasta llegar á tres ó cuatro mañana y noche.

5541. P. DE DIGITAL FÉTIDAS DE WITHERING (F. P.).

ᶯ Digital en polvo,

Asa fétida, ãã 3j (4 gr.).

Jarabe simple. c. s.

H. S. A. pildoras de ḡij (1 dec.).

I. Catarro pulmonar crónico, tisis, enfermedades del corazon, asma, hidropesías. *D.* Una ó dos pildoras al dia al principio, au-

mentando progresivamente según los efectos que produzcan.

5542. P. DE DIGITALINA.

℞ Digitalina. ḡj (5 cent.).
Mucilago y polvo de malvabisco, c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

I. Hipertrofia del corazón. D. Una á cuatro píldoras al día.

5543. P. DE DIGITALINA, ESCILA Y ESCAMONEA.

℞ Digitalina de Homolle y
Quevenne. ḡj (5 cent.).

Escila en polvo,
Escamonea de Alepo en
polvo, ãã. ḡc (5 gr.).
Jarabe de goma. c. s.

H. S. A. cien píldoras iguales y plateadas.

I. Hidropesía por lesión del corazón ó alteración de la circulación. D. Dos, cuatro y después seis ú ocho píldoras cada día. Es buena fórmula.

5544. P. DIURÉTICAS.

℞ Escila en polvo. . . . ḡxviiij (4 gr.).
Digital,
Calómelanos, ãã. . . . ḡx (5 dec.).
Jarabe de goma. c. s.

H. S. A. veinte píldoras.

D. Dos á cuatro píldoras al día.

5545. Otras, n. 2.

℞ Digital en polvo,
Cebolla albarrana en
polvo, ãã. ḡxij (6 dec.).
Extracto de beleño. . . ḡvj (3 dec.).

H. S. A. seis píldoras.

I. Angina de pecho. D. Una píldora cada dos horas.

5546. Otras, n. 3.

℞ Escila. ḡijv (2 dec.).
Digital. ḡix (5 dec.).
Calómelanos. ḡvj (3 dec.).
Escamonea. ḡj (12 dec.).

Asa fétida. ḡj (12 dec.).

Extracto de trébol. . . . c. s.

H. S. A. quince píldoras.

I. Hidropesías serosas. D. Tres á cuatro píldoras al día.

5547. Otras, n. 4.

℞ Digital en polvo,
Asa fétida en polvo, ãã. . . 3j (4 gr.).
Jarabe de las cinco raíces, c. s.

H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).

I. Hidropesías. D. Una píldora mañana y noche.

5548. Otras (DEHAEN).

℞ Trementina. 3v (20 gr.).
Regaliz en polvo. c. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

D. Una píldora cada hora en una taza de infusión de regaliz con vino blanco.

Es el *diurético de Dehaen*.

5549. Otras (DEBREYNE).

℞ Digital. 5iij (12 gr.).

Escamonea. 3jß (6 gr.).

Escila. 3jß (6 gr.).

Extracto de enebro. . . . c. s.

H. S. A. ciento veinte píldoras.

5550. Otras (DUPUYTREN).

℞ Jabon medicinal. . . . 3iij (12 gr.).

Calómelanos. 3ij (8 gr.).

Digital purpúrea. . . . 3j (4 gr.).

Jar. de las cinco raíces aperitivas, c. s.

I. Hidropesías pasivas del tegido celular. D. Una píldora, mañana y noche.

5551. Otras (H. DE IT.).

℞ Cebolla albarrana en
polvo. ḡxx (10 dec.).

Digital purpúrea en

polvo. ḡxviiij (9 dec.).

Arrope de enebro. . . . c. s.

H. S. A. diez píldoras.

D. Una píldora de hora en hora. Cada una contiene ḡij (1 dec.) de cebolla albarrana.

**5552. P. DIURÉTICAS
ALCANFORADAS.**

℞ Nitrato de potasa,
Alcanfor, ãã. ʒß (6 dec.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. dos píldoras.
I. Ardores de orina.

**5553. P. DIURÉTICAS Y
ALTERANTES.**

℞ Escila en polvo,
Calomelanos, ãã. ʒxviii (4 gr.).
Extracto de lúpulo. . . ʒß (2 gr.).
H. S. A. diez y ocho píldoras.
I. Hidropesías, anasarca, in-
fartos glandulares. D. Dos píldo-
ras al dia.

**5554. P. DIURÉTICAS HIDRAGOŒAS
DE BOUCHARDAT (H. DE M.).**

℞ Cebolla albarrana,
Digital,
Escamonea, ãã. ʒj (4 gr.).
Jarabe de gomá. c. s.
H. S. A. setenta y dos píldoras.
I. Producen excelentes efectos en
las hidropesías pasivas, pleuresías
y carditis. D. Se toman de diez á
doce al dia hasta producir el efec-
to diurético y purgante.

5555. Otras (H. M.).

℞ Jabon medicinal. ʒß (15 gr.).
Goma amoniaco,
Nitrato de potasa,
Escila en polvo, ãã. . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
D. Una cada cuatro horas.

**5556. P. DIURÉTICAS MERCURIALES
(Cruveilhier).**

℞ Calomelanos. ʒj (12 dec.).
Cebolla albarrana en
polvo. ʒß (6 dec.).
Digital en polvo. . . ʒiij (15 cent.).
Jarabe de espinoserval. c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Pleuresía crónica cuando se
absorbe con lentitud el líquido

derramado. D. Una á dos píldoras
al dia. Se auxilia su accion apli-
cando un vejigatorio en el cos-
tado.

5557. P. DORADAS.

℞ Acíbar sucotrino. 40
Diagridio sulfurado. 40
Pétalos de rosas. 3
Semillas de apio. 3
Semillas de hinojo. 3
Semillas de anís. 3
Almáciga. 2
Azafran. 2
Trociscos de Alhandal. 2
Alcohol. c. s.

I. Es un purgante aconsejado en
otro tiempo para conservar y for-
tificar la vista. D. ʒxij á ʒxxjv (6
á 12 dec.).

5558. P. DRASTICAS.

℞ Aceite de croton tiglio. ʒj (5 cent.).
Polvo de malvabisco. . ʒß (2 gr.).
Jarabe de goma. c. s.
H. S. A. cuatro bolos.
D. Se administra uno cada cuar-
to de hora hasta producir el efecto
purgante.

5559. Otras (BURDACH).

℞ Agárico blanco,
Mucilago de goma a-
rábiga, ãã. ʒxviii (4 gr.).
Extracto de genciana, c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras.
I. Sudores nocturnos y colicua-
tivos de los tísicos. D. Cuatro píldo-
ras al dia.

5560. Otras (H. DE IT.).

℞ Gutagamba. ʒxij (6 dec.).
Rob de saúco,
Regaliz en polvo, ãã. c. s.
H. S. A. seis píldoras.
D. Una píldora cada tres horas.

5561. Otras (RAYER).

℞ Jalapa en polvo,
Escamonea, ãã. ʒß (2 gr.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. doce píldoras, que se

usan para combatir el estreñimiento en el cólico de plomo, á la dosis de dos á cuatro al dia hasta que hayan producido una evacuacion abundante.

5562. P. DRÁSTICAS OPIADAS
(Langley).

℥ Extracto de elaterio,
Opio purificado, ãã. ḡxx (1 gr.).
H. S. H. veinte píldoras.
I. Cólico saturnino. D. Una píldora cada hora.

5563. P. DE DUCHESNE.

℥ Goma amoniaco. ʒij (8 gr.).
Acíbar. ʒj (30 gr.).
Ruibarbo. ʒij (8 gr.).
Subcarbonato de potasa. ʒj (4 gr.).
Jar. de rosas solutivo, c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Infartos de las vísceras del bajo vientre, que suceden á las calenturas intermitentes, hepatitis crónica, atrofia mesentérica.
D. Cinco á seis píldoras.

5564. P. DE DULCAMARA
IODURADAS (Vogt).

℥ Ioduro de potasio. ʒß (6 dec.).
Extracto de dulcamara,
Esponja calcinada, ãã. ʒiij (12 gr.).
H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras.

I. Afecciones escrofulosas, coxalgia, bocio, tisis incipiente, sífilis constitucional, tiña, tumores blancos, tumores glandulosos, etc. D. Seis píldoras tres veces al dia.

5565. P. DE DULCAMARA Y SULFURO
DE ANTIMONIO.

℥ Extracto de dulcamara. ʒß (16 gr.).
Sulfuro de antimonio. . ʒij (8 gr.).
Polvo de dulcamara. . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Afecciones cutáneas rebeldes.
D. Cuatro, seis, ocho ó doce píldoras al dia.

5566. P. DULCIFICANTES.

℥ Goma arábica,
Goma tragacanto, ãã. ʒß (15 gr.).
Bálsamo del Perú. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Irritaciones crónicas del estómago y degeneraciones escirrosas de esta víscera. D. Cuatro á cinco píldoras por la mañana, al medio dia y por la noche, bebiendo un vaso de caldo de ternera en que se ha cocido una cabeza de adormidera.

5567. P. ECOPRÓTICAS (Pitschaff).

℥ Extracto de acíbar,
Sulfato de quinina, ãã. ḡxx (1 gr.).
H. S. A. veinte píldoras.
I. Pereza de los intestinos gruesos, estreñimiento por atonía, dispepsia, calenturas intermitentes. D. Cinco á seis píldoras.

5568. P. DE ELATERIO.

℥ Elaterio,
Acíbar,
Gutagamba, ãã ḡxviiij (1 gr.).
Goma amoniaco. . . . ʒß (15 gr.).
Ojimiél cólchico. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Ascitis, hidropesías pasivas, estreñimiento, hemorroides. D. Cuatro á seis píldoras al dia.

5569. P. DE ELÉBORO COMPUESTAS.

℥ Extracto de eléboro negro,
Acíbar,
Sal amon. marcial, ãã. ʒj (4 gr.).
Azafran. ʒß (2 gr.).
Opio. ḡv (25 cent.).
Tintura de ruibarbo. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Amenorrea. D. Tres píldoras mañana y noche.

5570. P. EMENAGOGAS.

℥ Píldoras de granos de vida,
Píldoras de Vallet, ãã. ʒijß (10 gr.).

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Se usan como emenagogas. *D.*
Dos á diez píldoras al dia.

5571. P. EMENAGOGAS (Barthez).

℥ Goma amoniaco. ḡj (30 gr.).
Sagapeno. ḡij (60 gr.).
Elixir de propiedad. . . c. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Supresion de las reglas por
atonía y cuando conviene excitar
los movimientos de la matriz. *D.*
Primero dos píldoras, y despues
cuatro, todas las noches al acos-
tarse.

5572. Otras (BARTHEZ).

℥ Almizcle. ḡxviii (4 gr.).
Alcanfor. ḡjx (50 cent.).
Mirra. ḡj (4 gr.).
Acibar. ḡβ (2 gr.).
Bálsamo del Perú. . . c. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Dismenorrea, amenorrea,
clorosis. *D.* Seis píldoras al dia
en tres veces.

5573. Otras (CHAMET).

℥ Extracto de genciana. ḡiij (15 cent.).
Acibar sucotrino,
Calom. al vapor, ãã. ḡj (5 cent.).
D. Una píldora mañana y noche.

Se auxilia la accion de estas pí-
ldoras con los pediluvios sinapi-
zados, las ventosas secas en el
hipogastrio y en la parte interna
de los muslos.

5574. Otras (FOUQUIER).

℥ Polvo de azafran. . . . ḡj (12 dec.).
Oxido negro de hierro. ḡβ (6 dec.).
Polvo de valeriana. . . . ḡj (12 dec.).
Jarabe de artemisa. . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.

I. Amenorrea por debilidad. *D.*
Cuatro á ocho al dia. Fouquier
auxilia su accion con la aplicacion
diaria ó cada dos dias de cuatro á
seis sanguijuelas á la vulva, para
ocasionar una congestion sangui-
nea del sistema vascular uterino.

5575. Otras (H. DE AL.).

℥ Sabina en polvo,
Extr. de manzan., ãã. ḡjβ (6 gr.).
Oxido negro de hierro,
Acibar, ãã. ḡxv (75 cent.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
Cada píldora contiene menos de
ḡj (5 cent.) de sabina.

I. Clorosis. *D.* Seis píldoras á la
vez.

5576. Otras (H. DE LYON).

℥ Limaduras de hierro. . . ḡj (4 gr.).
Eléboro negro. ḡj (12 dec.).
Extracto de genciana. ḡj (8 gr.).
Jarabe de azafran. . . . c. s.

H. S. A. sesenta píldoras.
D. Dos píldoras tres veces al
dia; se beberá despues una taza
de infusion caliente de melisa,
artemisa, etc.

5577. Otras (JAHN).

℥ Limaduras de hierro. . . ḡβ (16 gr.).
Goma amoniaco,
Jabon antimonial, ãã. ḡij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡijβ (12
cent.).

I. Amenorrea. *D.* Tres á cuatro
píldoras, dos ó tres veces al dia.

5578. Otras (NEUMANN).

℥ Hojas de tejo en polvo,
Carbonato de hierro, ãã. ḡj (4 gr.).
Cornezuelo de centeno. . . ḡij (8 gr.).
Digital en polvo. ḡβ (2 gr.).
Jarabe de naranja. . . . c. s.

H. S. A. doscientas cincuenta
píldoras.

I. Amenorrea complicada con
clorosis. *D.* Ocho píldoras, ma-
ñana y noche, en una taza de in-
fusion muy ligera de sabina.

5579. Otras (TRONCHIN).

℥ Asa fétida,
Sucino, ãã. ḡβ (2 gr.).
Almáciga. ḡjβ (6 gr.).

Mirra ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).

D. Cuatro á ocho píldoras mañana y noche, y despues se bebe un vaso de infusion de azafran endulzada.

5580. P. EMENAGOGAS ALOÉTICAS.

ʒ Acíbar sucotrino,
Extracto de sabina,
Genciana en polvo,
Carbonato de hierro, añ. ʒβ (2 gr.).
Jarabe de ajenjos. e. s.

H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Clorosis, vértigos, amenorrea, esplenitis, ataxia, histerico. D. Una á cuatro píldoras.

5581. P. EMENAGOGAS FÉTIDAS.

ʒ Asa fétida. ʒβ (2 gr.).
Subearbon. de hierro. ʒxc (5 gr.).
Extracto de sabina,
Extr. de artemisa, añ. ʒxviiij (4 gr.).
Jarabe de azafran. c. s.

H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Amenorrea, clorosis, dismenorrea. D. Seis á diez píldoras al dia.

5582. P. EMÉTICAS (Swediaur).

ʒ Sulfato de cobre,
Ipecacuana, añ. ʒj (12 dec.).
Jarabe simple. e. s.

H. S. A. doce píldoras. Cada una contiene ʒij (1 dec.) de sulfato de cobre.

I. Tisis pulmonar. D. Dos ó tres píldoras cada tres ó cuatro dias.

5583. P. DE EMÉTICO ó Píldoras de tártaro estibiado (Boudet).

ʒ Emético. ʒLXjv (32 dec.).
Extracto de opio. ʒiij (15 cent.).
Extracto de lechuga. ʒj (4 gr.).
Goma arábiga,
Malvabisco, añ. ʒxxx (15 dec.).

H. S. A. treinta y dos píldoras: cada una contendrá ʒij (1 dec.) de emético.

Boudet las ha propuesto para

reemplazar las soluciones de emético empleadas en el tratamiento de las inflamaciones agudas del pulmon por el método de Rasori.

5584. P. DE EMÉTICO, CALOMELANOS Y OPIO (Fearnley).

ʒ Emético. ʒviiij (4 dec.).
Calomelanos. ʒxx (4 gr.).
Opio. ʒβ (6 dec.).

H. S. A. ocho píldoras.
I. Cólera espasmódico y delirio trémulo. D. Una píldora cada hora.

5585. P. DE ÉNULA CAMPANA COMPUESTAS (Heim).

ʒ Extracto de énula. ʒj (4 gr.).
Ipecacuana en polvo,
Digital en polvo, añ. ʒj (12 dec.).
Opio puro. ʒvj (3 dec.).

H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Tos seca, tos espasmódica. D. Una píldora cada tres horas.

5586. P. DE ÉNULA Y ESCILA.

ʒ Extracto de énula. ʒijβ (40 gr.).
Escila en polvo. ʒxviiij (4 gr.).
H. S. A. diez píldoras.

I. Se usan como expectorantes.
D. Dos á cuatro píldoras al dia.

5587. P. DE ERGOTINA.

ʒ Ergotina. ʒxc (5 gr.).
Regaliz en polvo. c. s.

H. S. A. sesenta píldoras que se pueden platear.
I. Afecciones crónicas de la matriz. D. Seis á diez píldoras al dia.

5588. P. DE ERGOTINA Y CICUTA (Arnal).

ʒ Extracto aeuosó de cornezuelo de centeno. ʒvj (3 dec.).
Extracto de cicuta. ʒjv (2 dec.).

H. S. A. cuatro píldoras.
I. Enteralgias que acompañan á veces al uso del cornezuelo de centeno. D. En dos dias y despues en uno.

5589. P. DE ERGOTINA É IODURO DE HIERRO (Arnal).

℥ Ioduro de hierro,
 Extracto de cornezuelo
 de centeno, ãã. ḡjv (2 dec.).
 H. S. A. cuatro pildoras.

I. Son útiles á las mujeres cloróticas, linfáticas ó debilitadas por el catarro uterino. D. En el dia.

5590. P. DE ESCILA AMONIACALES ó Pildoras escilíticas (F. E.).

℥ Jabon blanco. 9
 Goma amoniaco pulverizada. 4
 Escila pulverizada. 3
 Bálsamo de copaiba. 3
 H. S. A. Cada escrúpulo contiene ḡij (1 dec.) de escila.
 D. Hasta ḡjx (45 cent.).

5591. P. DE ESCILA COMPUESTAS.

℥ Calomelanos. ḡviii (4 dec.).
 Escila,
 Ruibarbo, ãã. ḡjv (2 dec.).
 Jarabe de las cinco raices. c. s.
 H. S. A. cuatro pildoras.
 I. Son diuréticas y purgantes en las hidropesías.

5592. Otras (F. DE L.).

℥ Cebolla albarrana de-
 secada. 3j (4 gr.).
 Gengibre en polvo. 3ij (8 gr.).
 Jabon medicinal. 3iij (12 gr.).
 Goma amoniaco. 3ij (8 gr.).
 Se mezclan los polvos, se los incorpora el jabon con c. s. de jarabe, y despues se divide la masa S. A. en pildoras de ḡiij (15 cent.).

I. Se usan como diuréticas y expectorantes en las afecciones catarrales crónicas de las vias aéreas, etc. D. Doce, quince, diez y ocho á veinticuatro granos al dia y aun mas segun el estado del enfermo.

5593. P. DE ESCILA, DIGITAL Y HIERRO (Chomel).

℥ Escila en polvo,
 Digital en polvo, ãã. 5ß (2 gr.).

Hierro porfirizado. 3j. (4 gr.).
 H. S. A. cuarenta pildoras.
 I. Albuminuria complicada con clorosis. D. Dos á cuatro pildoras al dia.

5594. P. DE ESCILA É IPECACUANA.

℥ Escila. ḡx (50 cent.).
 Ipecacuana. ḡv (25 cent.).
 Sucino. ḡxv (75 cent.).
 Extr. gomoso de opio. ḡij (40 cent.).
 Conserva de émula. c. s.
 H. S. A. diez pildoras.

I. Catarro crónico, coqueluche, hácia el fin de la pulmonía, tos, pleuresía, asma, beriberi, hidropesías, ascitis. D. Dos pildoras tres veces al dia.

5595. P. ESCILÍTICAS.

℥ Escila en polvo. 3
 Goma amoniaco. 4
 Ojimiél escilítico. c. s.
 H. S. A. pildoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Catarros brónquiales y como diuréticas.

5596. Otras, n. 2.

℥ Polvo de escila,
 Polvo de digital,
 Calomelanos, ãã. ḡxij (6 dec.).
 Jarabe. c. s.
 H. S. A. doce pildoras, de las que se toman de dos á cuatro al dia.

5597. Otras (F. ED.).

℥ Jabon medicinal. 3j (4 gr.).
 Escila en polvo,
 Nitrato de potasa, ãã. 5ß (2 gr.).
 Bálsamo de copaiba. c. s.
 H. S. A. pildoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Hidropesía y retencion de orina no inflamatoria. D. Tres ó cuatro por la mañana en ayunas.

5598. Otras (CHRESTIEN).

℥ Cebolla albarrana en
 polvo. ḡvj (30 cent.).
 Sucino. ḡxv (75 cent.).

Ipccacuana. ḡij (10 cent.).

Conserva de émula campana. . . c. s.

H. S. A. nueve píldoras.

I. Afecciones flatulentas, hidropesías, timpanitis. *D.* Se toman en tres dosis al día.

5599. P. ESCILÍTICAS (H. DE M.).

2/ Goma amoniaco pulver. 3j (4 gr.).

Polvo de escila. 3ß (2 gr.).

Jabon medicinal. 3ij (8 gr.).

Bálsamo de copaiba. . . . c. s.

H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).

I. Hidropesías. *D.* Ɖß á Ɖj (6 á 12 dec.).

5600. Otras (F. P.).

2/ Goma amoniaco. 2

Escila preparada en polvo. 2

Cardamomo menor. 1

H. S. A. *I.* Son expectorantes y diuréticas. *D.* Ɖß (6 dec.).

5601. Otras (PARMENTIER).

2/ Jabon medicinal. 3ß (16 gr.).

Goma amoniaco,

Nitro,

Cebolla albarrana en

polvo, añ. 3ij (8 gr.).

Jarabe simple. c. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

Cada una contiene ḡ¹/₅ (4 cent.) de cebolla albarrana.

I. Hidropesías pasivas. *D.* Dos á seis píldoras al día.

5602. P. EXCITANTES (Lescure).

2/ Extracto resinoso de nuez vómica,

Conserva de tilo, añ. . . 3ß (2 gr.).

H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).

I. Parálisis. *D.* Una píldora por la mañana, en ayunas, y se aumenta otra todas las semanas hasta que el enfermo sienta una verdadera rigidez tetánica. Entonces se moderan sus efectos demasiado excitantes con los baños, bebidas diluentes, lavativas y anti-espasmódicos.

5603. P. ESCOCESAS.

2/ Jabon medicinal. 3ij (8 gr.).

Gutagamba,

Acíbar sucotrino,

Polvo de canelacomp., añ. 3j (4 gr.).

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

5604. P. ESCOCESAS Ó DE ANDERSON.

2/ Acíbar. 1b (500 gr.).

Jalapa,

Azufre,

Marfil quemado,

Regaliz, añ. 3ij (60 gr.).

Aceite de anís. 3j (4 gr.).

Gutagamba. 3jv (125 gr.).

Jabon. 3ij (8 gr.).

Jarabe de espinoserval. . . . c. s.

I. Son tónicas y purgantes. *D.*

Tres ó cuatro píldoras.

La fórmula de la F. F. es mas racional. V. núm. 5068.

5605. P. EXPECTORANTES.

2/ Cebolla albarrana. . . 3ß (2 gr.).

Mirra. 3jß (6 gr.).

Extracto de beleño. . . Ɖij (24 dec.).

Agua. c. s.

Háganse treinta y seis píldoras.

Cada una contiene ḡj (5 cent.) de cebolla albarrana.

I. Catarros pulmonares crónicos, etc. *D.* Dos al día.

5606. Otras (PARIS).

2/ Sulfato de zinc,

Mirra, añ. Ɖß (6 dec.).

Confeccion de rosas. . . c. s.

H. S. A. veinte píldoras.

I. Coqueluche. *D.* Una píldora tres veces al día.

5607. P. ESPLÉNICAS.

2/ Goma amoniaco,

Extr. de acíbar, añ. . . 3jß (48 gr.).

Mirra escogida,

Polvo de raiz de brio-

nia, añ. 3ij (8 gr.).

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Se usan como purgantes en la hipocondría, hepatitis, esplentitis y en la amenorrea. *D.* Tres á seis píldoras al día.

5608. P. ESTÉNICAS (Brown).

☞ Quermes mineral. . . ḡxv (75 cent.).
 Oxido de antim. hidrosulfurado pardo,
 Opio puro,
 Protocloruro de mer-
 curio, ãã. ḡx (5 dec.).
 Bálsamo del Perú. . . c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡj (5 cent.).
 I. Tisis pulmonar, hidropesías,
 espasmos. D. Una píldora mañana
 y noche.

5609. P. ESTIBIADAS (Broussonet).

☞ Tártaro emético. . . . ḡxij (6 dec.).
 Opio. ḡx (5 dec.).
 Goma arábica,
 Miga de pan, ãã. . . . c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡj (5 cent.).
 I. Reumatismo crónico, gota,
 sífilides. D. Una á tres píldoras
 aumentando progresivamente.

5610. P. ESTIMULANTES.

☞ Pimienta de Indias. . . . ʒj (4 gr.).
 Miga de pan,
 Agua, ãã. c. s.
 H. S. A. doce píldoras.
 I. Calentura amarilla. D. Una
 píldora cada dos horas.

5611. Otras, n. 2.

☞ Pimiento de España. . . ʒj (12 dec.).
 Extracto de genciana. . ʒj (4 gr.).
 Genciana. c. s.
 H. S. A. sesenta píldoras.
 I. Dispepsia crónica.

5612. P. ESTIMULANTES DE CANTÁRIDAS ó Píldoras estimulantes de Sundelin.

☞ Cantáridas. ḡv (25 cent.).
 Estricnina. ḡij (10 cent.).
 Resina de guayaco. . ʒj (4 gr.).
 Alcanfor. ḡxviii (4 gr.).
 Extracto de canela. . . c. s.
 H. S. A. veinticuatro píldoras.
 I. Amenorrea, parálisis de la
 vejiga, paraplegia, incontinencia
 de orina por atonía, enuresis. D.
 Una píldora mañana y noche.

5613. P. ESTIMULANTES (Ribes).

☞ Extracto alcohólico de
 nuez vómica. . . . ḡviii (4 dec.).
 Oxido negro de hierro. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Enuresis, incontinencia de
 orina, catarro útero-vaginal. D.
 Dos píldoras mañana y noche.

5614. P. ESTÍPTICAS (Dumeril).

☞ Acetato de plomo. . . . ḡjv (2 dec.).
 Opio. ḡj (5 cent.).
 Extracto de regaliz. . . ʒj (12 dec.).
 H. S. A. diez y seis píldoras.
 I. Diarreas crónicas y colicu-
 ativas. D. De dos á cuatro píldoras.

5615. P. ESTOMACALES.

☞ Ipecacuana,
 Extracto de centaurea
 menor, ãã. ḡxviii (4 gr.).
 Ruibarbo. ʒʒ (2 gr.).
 H. S. A. treinta píldoras.
 I. Debilidad de estómago. D.
 Una píldora mañana y noche.

5616. Otras, n. 2.

☞ Acíbar sucotrino. . . . ḡxc (5 gr.).
 Resina de guayaco. . . ḡLjv (3 gr.).
 Serpentaria de Virginia. ḡxviii (4 gr.).
 Extracto de genciana. . ʒʒ (2 gr.).
 Jar. de cásc. de naranja. c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Dispepsia, anorexia, emba-
 razo gástrico, calenturas inter-
 mitentes. D. Cuatro á seis píldoras
 mañana y noche.

5617. Otras (F. DE PLENCK).

☞ Extracto de genciana. ʒʒ (16 gr.).
 Ruibarbo en polvo,
 Tártaro vitriolado, ãã. ʒij (8 gr.).
 Aceite de yerbabuena. ʒj (4 gr.).
 Mézclese, y con c. s. de jarabe
 simple háganse píldoras de á ḡvj
 (3 dec.).
 I. Dispepsia y atonía del con-
 ducto digestivo.

5618. P. ESTOMACALES
(F. DE PLENCK).

- ☞ Cáscara de naranja confitada,
Cáscara de limon con-
fitada, ãã. ʒij (60 gr.).
Clavo,
Canela, ãã. ʒij (8 gr.).
Nuez moscada. ʒj (4 gr.).
Triaca. ʒiij (12 gr.).
Ojos de cangrejos. . . . ʒj (30 gr.).

Se reducen á polvo y se mezclan; se añaden ʒiij (12 gr.) de ruibarbo pulverizado, se continúa mezclando bien, y con c. s. de jarabe de membrillo se forman píldoras ó se deja bajo la forma de opiata.

I. Leucorrea y atonia del estomago. D. De ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) dos veces al dia.

5619. P. ESTOMACALES.

- ☞ Extracto de quina,
Extracto de cardo santo,
Extracto de genciana,
Extracto de ruibarbo, ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Debilidad de estómago, dispepsia, lepra, anorexia, consunción, convalecencia. D. Una ó dos píldoras por la mañana, al medio dia y por la tarde. Se bebe despues una taza de infusion de menta piperita convenientemente azucarada.

5620. P. ESTOMACALES (Cadet).

- ☞ Jabon medicinal. . . . ʒj (12 dec.).
Acíbar,
Extr. seco de quina de Lagaraye,
Resina de guayaco, ãã. ʒviiij (4 dec.).
Goma amoniaco. . . . ʒvj (3 dec.).
Deutóxido de hierro. . . ʒjv (2 dec.).
H. S. A. doce píldoras.

D. Se toman dos al tiempo de comer.

5621. P. ESTOMACALES ó Píldoras de acíbar y quina (H. M. F.).

- ☞ Acíbar sucotrinio. . . . ʒß (6 dec.).
Extr. blando de quina. ʒvj (3 dec.).

Canela en polvo. ʒij (1 dec.).
H. S. A. doce píldoras.

I. Calenturas remitentes mucosas, calenturas intermitentes, raquitis, heridas atónicas. D. Tres á cuatro píldoras al dia.

5622. Otras (SMITH).

- ☞ Acíbar sucotrinio,
Sagapeno,
Ruibarbo en polvo,
Polvo diaromaton, ãã. . . ʒj (4 gr.).
Aceite esencial de yerbabuena,
Aceite esenc. de clavo, ãã. 10 gotas.
Bálsamo liquido del Perú, c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Dispepsia é indigestiones. D. De tres á seis todas las noches.

5623. P. ESTOMACALES
(Tronchin).

- ☞ Mirra. ʒij (60 gr.).
Extr. de cent. menor. ʒj (4 gr.).
Bálsamo del Perú. . . . ʒj (12 dec.).
H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).

I. Debilidades del estómago. D. Ocho á doce píldoras al dia.

5624. Otras (WEDEKIND).

- ☞ Hiel espesada reciente,
Extracto de genciana,
Ruibarbo en polvo, ãã. ʒiij (12 gr.).
Limaduras de hierro. . ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).

I. Acidez de las primeras vias en los hipocondriacos, histéricas, cloróticas y gotosos. D. Ocho á doce píldoras, tres horas antes de comer.

5625. P. ESTOMACALES ó Granos de vida de Mezue.

- ☞ Acíbar sucotrinio. . . . ʒvj (24 gr.).
Rosas rojas,
Almáciga, ãã. ʒij (8 gr.).
Jarabe de ajensos. . . . c. s.

H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Se usan como estomacales, fortificantes y laxantes. D. Dos ó tres píldoras al tiempo de comer.

**5626. P. DE ESTORAQUE
COMPUESTAS (F. DE L.).**

℞ Estoraque purificado. . . ℥iij (12 gr.).
Opio duro en polvo,
Azafran, ãã. ℥j (4 gr.).
H. S. A.

**5627. P. DE EXTRACTO ALCOHÓ-
LICO DE NUEZ VÓMICA (H. DE M.).**

℞ Extracto alcohólico de
nuez vómica. ℥ij (4 dec.).
Carbonato de hierro. . . ℥j (12 dec.).
H. S. A. veinticinco píldoras.
I. Incontinencia de orina pro-
ducida por atonía de la vejiga.
D. Una píldora cada tres horas.

**5628. P. DE EXTRACTO DE
BELLADONA.**

℞ Extracto de belladona. . . ℥x (5 dec.).
Regaliz en polvo. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Neuralgias. D. Se empieza por
una píldora.

**5629. P. DE EXTRACTO DE CICUTA
Y QUINA.**

℞ Extracto de quina. . . ℥Ljv (3 gr.).
Extracto de cicuta,
Ext. de taraxac., ãã. ℥xxvij (1,5 gr.).
H. S. A. píldoras de ℥vj (3 dec.).
I. Infartos glandulares, atrofia
mesentérica, escirro, ictericia,
escirro del hígado ó de las mamas,
mareo, conjuntivitis, queratitis,
metritis, muermo, tisis, calen-
turas intermitentes, reumatismo,
lepra. D. Una á tres píldoras al
dia.

**5630. P. DE EXTRACTO DE CICUTA
MERCURIALES (H. DE M.).**

℞ Extracto de cicuta. . . ℥ij (24 dec.).
Protochlor. de mercurio. ℥xvj (8 dec.).
H. S. A. píldoras de ℥ij (1 dec.).
I. Escirros é infartos glandulo-
sos. D. g̃jv (2 dec.) una ó dos ve-
ces al dia.

**5631. P. DE EXTRACTO DE CÓL-
CHICO (Scudamore).**

℞ Extracto acético de cól-
chico. ℥ijß (40 gr.).
Malvabisco en polvo. . c. s.
H. S. A. cien píldoras.
I. Gota y como purgantes. D.
Una á cinco píldoras al dia.

**5632. P. DE EXTRACTO ETÉREO DE
CUBEBAS (Hausmann).**

℞ Extr. etéreo de cubebas. ℥j (4 gr.).
Goma arábica en polvo. ℥ß (2 gr.).
Magnesia calcinada. . . ℥jß (6 gr.).
Mézclese y con c. s. de agua
destilada se hacen noventa píldo-
ras.
D. Tres píldoras al dia.

**5633. P. DE EXTRACTO ALCOHÓ-
LICO DE NUEZ VÓMICA (Fouquier).**

℞ Extracto alcohólico de
nuez vómica. ℥j (4 gr.).
Polvo de malvabisco. . c. s.
H. S. A. ochenta píldoras.
D. Se dan una ó dos al dia, au-
mentando progresivamente hasta
nueve ó mas en los casos de pará-
lisis.

**5634. P. DE EXTRACTO DE ZARZA-
PARRILLA DEL DOCTOR FABRE.**

℞ Extr. de zarzaparrilla. ℥jv (125 gr.).
Ruibarbo. ℥v (20 gr.).
Extracto de enebro. . c. s.
H. S. A. píldoras de ℥vj (3 dec.).
Se las recomienda para reem-
plazar los cocimientos de zarza-
parrilla, á la dosis de diez píldo-
ras al dia.

5635. P. DE ESTRAMONIO.

℞ Semillas de estramon. ℥vj (3 dec.).
Alcanfor. ℥xviii (4 gr.).
Sabina,
Extracto de polígala de
Virginia, ãã. ℥ß (2 gr.).
H. S. A. píldoras de ℥jv (2 dec.).
I. Reumatismo crónico, corea,

histérico, neuralgias. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5636. P. ESTRÍCNICAS.

☞ Sulfato de morfina. ḡj (5 cent.).
 Extracto de acónito. ḡvj (3 dec.).
 Haba de San Ignacio. ḡij (4 dec.).
 Polvo de regaliz,
 Miel, añ. c. s.
 H. S. A. seis píldoras.

I. Amenorrea, tisis, corea, pleuresía, muermo, neuralgias, epilepsia, amaurosis, calenturas dolorosas, proctosis, enuresis, reumatismo. *D.* Una píldora cada dos ó tres horas.

5637. P. DE ESTRICNINA
 (*Magendie*).

☞ Estricnina muy pura. ḡij (4 dec.).
 Conserva de cinosbastos. ʒB (2 gr.).
 H. S. A. veinticuatro píldoras iguales y plateadas, para evitar que se peguen unas con otras.

D. Una píldora al día. Se puede aumentar la dosis hasta dos ó tres en las veinticuatro horas, pero debe hacerse este aumento con la mayor prudencia.

5638. P. DE ESTRICNINA (H. DE M.).

☞ Estricnina. ḡj (5 cent.).
 Conserva de rosas. ḡjv (2 dec.).
 Almidon. c. s.
 H. S. A. diez y ocho píldoras.

I. Incontinencia de orina producida por atonía de la vejiga.
D. Una píldora dos veces al día.

5639. P. DE ESTRICNINA
 (*Furnari*).

☞ Estricnina. ḡij (4 dec.).
 Extracto de valeriana. c. s.
 H. S. A. treinta y dos píldoras.

I. Amaurosis tórpida. *D.* Una píldora por la mañana en ayunas durante cinco días, y después una mañana y noche.

5640. P. DE ESTRICNINA
 MARCIALES.

☞ Estricnina. ḡij (4 dec.).

Oxido negro de hierro,
 Azúcar, añ. ʒj (4 gr.).
 Mucílago de goma. c. s.

H. S. A. veinticuatro píldoras plateadas.

I. Tisis, parálisis, amaurosis, corea, epilepsia, impétigo, enuresis, reumatismo, neuralgias.

D. Una píldora mañana y noche.

5641. P. ETIÓPICAS (F. M.).

☞ Etiope mineral. ʒij (60 gr.).
 Antimonio diaforético. ʒj (30 gr.).
 Goma de guayaco. ʒB (15 gr.).
 Extracto de zarzaparrilla. c. s.
 H. S. A.

I. Enfermedades que traen origen del vicio sifilítico, hidropesía, escorbuto y otras enfermedades. *D.* ʒj á ʒij (12 á 24 dec.).

5642. P. ETIÓPICAS COMPUESTAS.

☞ Etiope antimonial,
 Etiope mineral, añ. ḡxviiij (4 gr.).
 Extracto de cicuta. ḡxxviiij (4,5 gr.).
 Resina de guayaco. ḡxviiij (4 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡij (4 dec.).

I. Herpes, tiña, úlceras sifilíticas. *D.* Dos á cuatro píldoras al día.

5643. P. FEBRÍFUGAS.

☞ Quinoidina,
 Quina, añ. ʒj (4 gr.).
 Alcohol. c. s.
 H. S. A. treinta píldoras.
D. Tres á cinco cada dos horas.

5644. Otras, n. 2.

☞ Polvo de cálamo arom. ḡxviiij (4 gr.).
 Sulfato de quinina. ḡvj (3 dec.).
 Extracto de enebro. ḡjv (2 dec.).
 H. S. A. ocho á diez píldoras.

I. Calenturas intermitentes, reumatismo, neuralgias. *D.* Se toman durante la apirexia, de hora en hora.

5645. Otras (ANDONART).

☞ Opio. ʒj (4 gr.).

Alcanfor,
Acíbar sucotrino, ãã. . . ʒß (2 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras. *D.* Una píldora de dos en dos horas, entre los paroximos.

5646. P. FEBRÍFUGAS ó *Febrifugo de Metzinger.*

ʒ Quina calisaya. ʒß (16 gr.).
Carbonato de potasa. . ʒj (4 gr.).
Carbonato de amoniaco. ʒß (2 gr.).
Sal vegetal. ʒj (4 gr.).
Azufre dorado de antim. ʒß (2 gr.).
Extr. de trébol de agua. ʒj (4 gr.).
Extracto de ajenjos. . . ʒj (4 gr.).
Extracto de perejil. . . c. s.

H. S. A. una masa que se dividirá en píldoras de ʒiij (15 cent.).

I. Calenturas intermitentes. *D.* Seis píldoras inmediatamente despues del acceso, seis á las tres horas y otras seis tres ó cuatro horas antes del nuevo acceso. Cortada la fiebre toma el enfermo dos tomas al dia de cuatro píldoras, una por la mañana y otra por la noche, por espacio de tres ó cuatro dias, despues tres píldoras en cada toma y luego dos.

5647. P. FEBRÍFUGAS (*Henschel*).

ʒ Sulfato de quinina. ʒxv (75 cent.).
Canela en polvo. . ʒxxx (15 dec.).
Extracto de quina. c. s.

H. S. A. treinta píldoras.

I. Calenturas intermitentes. *D.* Dos á cuatro píldoras cada dos ó tres horas.

5648. *Otras* (*ISENSEE*).

ʒ Sulfato de quinina. . . . ʒß (2 gr.).
Extracto hidroalcohólico de belladona. ʒij (1 dec.).
Extr. de trébol de agua. c. s.

H. S. A. veinte píldoras.

I. Segun el autor son muy eficaces en las calenturas intermitentes, pues de diez calenturas curan nueve. *D.* Una píldora cada tres horas durante la apirexia.

5649. *Otras* (*JAHN*).

ʒ Limaduras de hierro. ʒß (15 gr.).

Extracto de milenrama,
Extracto de manzanilla, ãã. ʒij (8 gr.).
Extr. de nuez vómica. ʒxviiij (4 gr.).
Goma tragacanto. . . c. s.

H. S. A. píldoras de ʒijß (12 cent.).

I. Intermitentes cuartanas. *D.* Tres á cinco píldoras cada tres horas.

5650. *Otras* (*LIPPICH*).

ʒ Carbonato de hierro,
Sulfato de quinina, ãã. ʒxviiij (4 gr.).
Extr. de taraxacon. . . c. s.

H. S. A. treinta píldoras.

D. Dos píldoras cada dos horas. Se puede aumentar gradualmente la dosis del carbonato de hierro hasta ʒß (2 gr.).

5651. *Otras* (*LOCHSTAEDT*).

ʒ Esencia de almendras amargas. una gota.
Sulfato de quinina. . . . ʒij (4 dec.).
Polvo aromático. ʒx (5 dec.).
Extracto de centauro menor. c. s.

H. S. A. diez píldoras.

I. Calenturas intermitentes, cefalalgia. *D.* Una píldora de hora en hora durante la apirexia.

5652. *Otras* (*RONANDER*).

ʒ Quinato de quinina,
Pimienta negra,
Extr. de ajenjos, ãã. . . ʒj (4 gr.).

H. S. A. sesenta píldoras.

D. Tres píldoras cada dos ó tres horas.

5653. *Otras* (*SACHS*).

ʒ Cianuro de hierro. . . ʒxviiij (4 gr.).
Goma amoniaco,
Extracto de taraxacon,
Ruibarbo, ãã. ʒß (2 gr.).

H. S. A. cincuenta píldoras.

I. Calenturas intermitentes, esplenitis crónica, hepatitis, dispepsia. *D.* Cinco píldoras mañana y noche.

5654. P. FEBRÍFUGAS (Tissot).

℞ *Serpentaria virginiana* en polvo. ḡxviiij (4 gr.).
 Aleanfor en polvo. ḡxxxvj (2 gr.).
 Conserva de rosas. . . e. s.
 H. S. A. diez y ocho píldoras.
 I. Calenturas malignas. D. En el día.

5655. P. FEBRÍFUGAS AMARGAS (Luciano Pieste).

℞ *Aeíbar sucotrino*. ḡxxx (15 dec.).
 Bisulfato de quinina. ḡxv (75 cent.).
 Sulfato de hierro. ḡxij (60 cent.).
 Extracto de menta piperita. c. s.
 H. S. A. seis píldoras.
 I. Intermitentes rebeldes. D. Una píldora cada tres horas.

5656. P. FEBRÍFUGAS ANTISÉPTICAS (Levacher).

℞ Sulfato de quinina. ʒβ (2 gr.).
 Aleanfor. ḡx (5 dec.).
 Calomelanos. ḡxviiij (4 gr.).
 H. S. A. treinta píldoras.
 I. Calentura amarilla y calenturas intermitentes graves.

5657. P. FEBRÍFUGAS INGLESA.

℞ Quina. ʒj (32 gr.).
 Sal de ajonjos,
 Hidroclorato de amoníaco, añ. ʒj (4 gr.).
 Tartrato de potasa antimoniado. ḡxviiij (4 gr.).
 Jarabe de quina. . . e. s.
 H. S. A. treinta y seis píldoras ó mas, si se desea.

D. Se toma la tercera parte de esta dosis en una toma en la época mas distante del acceso que debe presentarse. Es indiferente el grosor de las píldoras. Creemos que podria dividirse esta masa en treinta y seis.

5658. P. DE FERROCIANATO DE QUININA.

℞ Ferrocianato de quinina. ḡx (50 cent.).

Polvo de peonia,
 Ext. de valeriana, añ. ḡxxx (4 gr.).
 H. S. A. cuarenta píldoras.

I. Tisis, reumatismo, sudor inglés, ataxia, caquexia, anemia, efidrosis, hepatalgia, esplenitis, calenturas intermitentes, epilepsia, corea, corea periódica, gastrofalmia, bulimia, neuralgias.
 D. Dos píldoras mañana y noche.

5659. P. FERRUGINOSAS.

℞ *Etiópe marcial*. ʒj (30 gr.).
 Azafran oriental,
 Canela, añ. ʒij (24 dec.).
 Extr. de ajonjos. ʒj (4 gr.).
 Jarabe de ajonjos. . . e. s.
 H. S. A. píldoras de ḡvj (3 dec.).
 D. Se dan tres ó doce al día en la clorosis, escrófulas, amenorrea, etc.

5660. Otras (ANDRAL).

℞ *Digital* en polvo. ḡxij (6 dec.).
 Limaduras de hierro,
Tridacio, añ. ḡxxxvj (2 gr.).
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
 I. Clorosis. D. Dos ó tres píldoras al día, aumentando la dosis.

5661. P. FERRUGINOSAS CON CANELA (Weikard).

℞ Limaduras de hierro porfirizadas. ʒijβ (10 gr.).
 Colombo en polvo. ḡLjv (3 gr.).
 Ruibarbo en polvo,
 Canela en polvo, añ. ʒβ (2 gr.).
 Extracto de ajonjos. . e. s.
 H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
 I. Metrorragia asténica, poluciones nocturnas, espermatorrea.
 D. Diez á quince píldoras, tres veces al día.

5662. P. DE IODURO DE PLOMO CRISTALIZADO (Cottreau).

℞ Ioduro de plomo. ʒβ (2 gr.).
 Conserva de rosas. c. s.
 H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras muy iguales.
 I. Escrófulas, atrofia mesentérica, tumores escirrosos, tisis y

cánceres. *D.* Se empieza por una píldora mañana y noche, y se eleva gradualmente la dosis hasta hacer tomar de ḡxij á ḡxxjv (6 á 12 dec.) de ioduro al día, teniendo cuidado durante este tiempo de mantener constantemente el vientre libre por medio de remedios apropiados, si sobreviene constipación.

Nota. Se debe auxiliar la acción de estas píldoras con el uso tópico de la pomada crisocroma. (Véase esta palabra.)

5663. P. FERRUGINOSAS IODADAS (*Boucharlat*).

℥ Protoioduro de hierro. ʒij (8 gr.).
Carbonato de potasa seco,
Miel. *aa.* ʒj (4 gr.)
Malvabisco en polvo,
Goma en polvo, *aa.* c. s.
H. S. A. ochenta píldoras.

I. Clorosis escrofulosa. *D.* Una á diez píldoras al día.

5664. P. FERRUGINOSAS DE TARTRATO FÉRRICO POTÁSICO (*Mialhe*).

℥ Tartrato férrico potásico. ʒvj (24 gr.).
Jarabe de goma c. s.
cerca de. ḡxc (5 gr.).

Se tritura exactamente el tartrato en un mortero de hierro, se añade poco á poco el jarabe de goma, se bate hasta que se haya obtenido una masa pilular muy homogénea que deberá estar un poco dura para evitar que las píldoras pierdan su forma algun tiempo despues de preparadas. Hecho esto se harán cien píldoras, que pesarán ḡvj (3 dec.) y contendrán ḡv (25 cent.) de tartrato de potasa y hierro, es decir, mas que el doble de la cantidad de principio activo que las de Blaud y las de Vallet.

5665. P. FÉTIDAS MENORES (*Hoffmann*).

℥ Mirra,
Gálbano, *aa.* ʒjʒ (6 gr.).

Castóreo. ḡxv (75 cent.).
Asa fétida. ḡxij (60 cent.).
Bálsamo del Perú. c. s.
H. S. A. doce píldoras.

D. Tres por la tarde en una dosis, y despues se toma una infusión conveniente.

5666. P. FORTIFICANTES.

℥ Flores de sal amoniaco marciales,
Gálbano, *aa.* ʒj (4 gr.).
Asa fétida. ʒij (8 gr.).
Castóreo. ʒj (12 dec.).
Tintura de valeriana, c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Enfermedades nerviosas atónicas. *D.* Dos á tres píldoras mañana y noche.

5667. P. DE FOTHERGILL.

℥ Acíbar,
Escamonea,
Extr. de coloquint., *aa.* ʒj (30 gr.).
Antim. diaforét. lavado. ʒj (12 dec.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Son purgantes y se usan en las afecciones cutáneas. *D.* Cinco á diez píldoras al día.

5668. P. DE FOY.

℥ Asa fétida. ʒʒ (2 gr.).
Extracto de lechuga. ʒij (24 dec.).
H. S. A. ochenta píldoras.
I. Coqueluche, asma, nefritis, oftalmia, pedionalgia, histérico.
D. Una ó dos píldoras cada hora.

5669. P. DE FULIGOCALI SULFURADO (*Deschamps*).

℥ Fuligocali sulfurado. ʒv (20 gr.).
Almidon. ʒijʒ (10 gr.).
Goma tragacanto. ḡjx (50 cent.).
Jarabe simple: c. s.

H. S. A. cien píldoras, que se cubrirán con dos ó tres capas de goma tragacanto y se guardarán en frascos.

Del mismo modo se preparan las PILDORAS DE FULIGOCALI, pero no se cubrirán con goma.

5670. P. FUNDENTES.

℥ Tártaro emético. ḡvij (35 cent.).
Castóreo,
Hojas de sen,
Ruibarbo, ãã. Ḑj (12 dec.).
Extr. de taraxacon. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡijß (12 cent.).

I. Amaurosis. D. Cuatro á ocho píldoras dos veces al dia.

5671. Otras (AMMOM).

℥ Poligala de Virginia. 5vß (22 gr.).
Extr. de taraxacon. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡijß á ḡjv (12 cent. á 2 dec.).

I. Hipopion, pannus, úlceras de la córnea. D. Seis á doce píldoras dos ó tres veces al dia.

5672. Otras (BURDACH).

℥ Extracto de acíbar,
Protocloruro de mercurio,
Jabon medicinal, ãã. 5ij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).

I. Afecciones escrofulosas, adenitis crónica, hepatitis, esplenitis, ictericia, prostatitis, prúrigo, beriberi, lepra, cistitis, nefritis, neuritis, neuralgias. D. Dos á tres píldoras por la noche.

5673. Otras (H. DE AL.).

℥ Goma amoniaco. 5ij (8 gr.).
Jabon medicinal. 5j (4 gr.).
Esencia de enebro. 20 gotas.
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
D. Doce á quince píldoras al dia.

5674. Otras (H. DE M.).

℥ Acíbar en polvo,
Sulfato de potasa pulverizado,
Ruibarbo en polvo,
Extracto de genciana,
Jabon medicinal, ãã. 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Infartos crónicos de las vísceras abdominales á consecuencia de las calenturas intermitentes.

D. Tres á cuatro píldoras dos veces al dia.

5675. Otras (LEMONIER).

℥ Subcarbon. de hierro. Ḑij (24 dec.).
Mirra-escogida,
Goma amoniaco,
Gálbano,
Acíbar-sucotrino, ãã. Ḑj (12 dec.).
Protocloruro de mercurio,
Oxido de antimonio hidrosulf. anar., ãã. Ḑß (6 dec.).
Jarabe de las cinco raices. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Obstrucciones, infartos crónicos de las vísceras abdominales, esplenitis, prostatitis, hepatitis, ictericia, nefritis. D. Tres píldoras, mañana y noche.

5676. Otras (PIERQUIN).

℥ Oxido de oro. ḡvj (3 dec.).
Extracto de torbisco. 5ij (8 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras.

5677. Otras (PEZOLE).

℥ Etiope antimonial. 4
Extracto de cicuta. 7
Jabon de Venecia. 15
Gálbano. 2
Hiel de vaca espesada. 3
H. S. A. píldoras de ḡijß (12 cent.).

I. Escirro del píloro. D. Ocho á diez píldoras tres veces al dia.

5678. Otras (RADIUS).

℥ Tártaro emético disuelto en agua. ḡvij á ḡxjv (35 á 70 cent.).
Goma amoniaco,
Ruibarbo,
Jabon medicinal,
Extracto de valeriana, ãã. 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡijß (12 cent.).

I. Amaurosis. D. Cuatro á ocho píldoras al dia.

5679. Otras (RICHTER).

℥ Goma amoniaco,
Asa fétida,

Jabon medicinal,
Raiz de valeriana,
Flores de arnica, ãã. . . ʒij (8 gr.).
Tartrato de potasa antimoniado disuelto en agua, ʒviii á ʒx (4 á 5 dec.).

H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Histérico, hepatitis crónica, esplenitis, nefritis. D. Cuatro píldoras cada tres ó cuatro dias.

5680. P. FUNDENTES (Righini).

ʒ Masa de Vallet. ʒjʒ (6 gr.).
Cloruro de bario. ʒxviii (1 gr.).
Resina de jalapa. ʒLjv (3 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.

5681. Otras (ROUCHER).

ʒ Goma amoniaco disuelta en vinagre escilítico. ʒʒ (16 gr.).
Jabon medicinal,
Extr. de saponaria, ãã. ʒj (32 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . . ʒij (8 gr.).
Mercurio dulce. ʒj (4 gr.).
Conserva de émula campana. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Obstruccion de las vísceras del bajo vientre, atonía del sistema general y caquexia producida por las fiebres intermitentes rebeldes. D. Tres ó cuatro píldoras, aumentando cada tres dias dos, hasta llegar á veinte al dia en dos ó tres tomas. Se bebe despues un vaso de suero clarificado con ʒj (4 gr.) de bayas de enebro y ʒj (4 gr.) de encinilla.

5682. Otras (SMITH).

ʒ Goma amoniaco,
Jabon medicinal, ãã. . . ʒjʒ (6 gr.).
Raiz de cebolla albarrana,
Polvo diaromaton, ãã. . ʒʒ (2 gr.).
Esencia de enebro. . . . 20 gotas.
Jarabe de cáscara de naranja. . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒv (25 cent.).

I. Histérico y hepatitis crónicas, esplenitis, prostatitis, nefritis, ictericias. D. Cuatro píldoras cada tres ó cuatro dias.

Nota. Se bebe despues ʒjv (125 gr.) de cocimiento de rubia.

5683. Otras (VICQ D'AZIR).

ʒ Extracto de bills de bucý desecado,
Extracto de centaurea menor, ãã. ʒiij (12 gr.)

Corteza de Winter,

Oxido negro de hierro, ãã. ʒj (4 gr.).

H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Obstrucciones. D. Cuatro ó seis píldoras al dia.

5684. P. FUNDENTES ALOÉTICAS (Recamier).

ʒ Acíbar. ʒjx (50 cent.).
Asa fétida. ʒʒ (2 gr.).
Azafran. ʒʒ (2 gr.).
Goma amoniaco. . . . ʒj (4 gr.).
Ruibarbo. ʒj (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . ʒiij (12 gr.).

H. S. A. píldoras de ʒiij ó ʒjv (15 ó 20 cent.).

I. Hidropesía, ictericia, hepatitis crónica, esplenitis. D. Cuatro á cinco píldoras tres veces al dia, y puede aumentarse la dosis segun los casos.

5685. P. FUNDENTES AMONIACALES.

ʒ Sal amoniaco. ʒʒ (2 gr.).
Asa fétida. ʒxviii (1 gr.).
Acíbar. ʒxviii (1 gr.).
Extracto de cicuta. . . . ʒij (24 dec.).

H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).

I. Infartos de las vísceras abdominales, clorosis, hepatitis crónica, hipertrofia del hígado, esplenitis crónica, nefritis. D. Cuatro á seis píldoras al dia.

5686. P. FUNDENTES DE DIGITAL.

ʒ Hojas de digital. . . . ʒj (4 gr.).
Extracto de cicuta,
Extracto de ruibarbo,
Extracto de acíbar,

Goma amoniaco, ãã. . . ʒʒ (2 gr.).

Ojimiél escilítico. c. s.

H. S. A. píldoras de ʒv (25 cent.).

I. Hipertrofia del hígado, ascitis, hidrotorax, hidropericardias,

hidrorraquis, flebitis, tétanos, neumonía, hepatitis, coqueluche, pica. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5687. P. FUNDENTES GOMOSAS.

☞ Goma amoniaco,
Escila, ãã. ʒβ (2 gr.).
Asa fétida,
Azafran, ãã. ʒxviiij (4 gr.).
Acíbar. ʒjx (50 cent.).
Jabon medicinal. . . ʒxc (5 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒiiij (15 cent.).

I. Obstrucciones de las vísceras abdominales, esplenitis, hepatitis, clorosis, catarro pulmonar. *D.* Dos á seis píldoras al dia.

5688. P. FUNDENTES OPIADAS (Dupuytren).

☞ Bicloruro de mercur. ʒj (5 cent.).
Extracto de opio. . . . ʒvj (30 cent.).
Extracto de guayaco. ʒj (12 dec.).
H. S. A. doce píldoras.

I. Orquitis crónica, tumores glandulares. *D.* Una píldora, tres veces al dia.

5689. P. FUNDENTES DE TREMENTINA.

☞ Trementina. ʒβ (2 gr.).
Calomelanos. ʒxviiij (4 gr.).
Extracto de taraxacon. ʒxc (5 gr.).
Jarabe de las cinco raíces. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Cálculos biliares, obstrucciones de las vísceras abdominales; reumatismo, cálculos, catarro útero vaginal, cistitis, nefritis crónica, hepatitis crónica. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5690. P. DE GÁLBANO COMPUESTAS, DE MURRAY (F. DE L.).

☞ Gálbano. ʒj (30 gr.).
Mirra,
Sagapeno, ãã. ʒjβ (45 gr.).
Asa fétida. ʒβ (15 gr.).

Se tritura estas sustancias con cantidad suficiente de jarabe sim-

ple y se hacen píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Histérico complicado con amenorrea. *D.* Tres ó cuatro píldoras al dia.

5691. Otras (FOY).

☞ Asa fétida,
Gálbano,
Valeriana, ãã. ʒxviiij (4 gr.).
Mirra. ʒβ (2 gr.).
Jarabe de artemisa. . . c. s.

H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Histérico, amenorrea, iritis. *D.* Seis píldoras al dia.

5692. P. DE GENCIANINO.

☞ Gencianino. ʒiiij (15 cent.).
Ferrocian. de quinina. ʒjv (20 cent.).
Conserva de rosas,
Polvo de regaliz, ãã. c. s.
H. S. A. seis píldoras.

I. Calenturas intermitentes, beriberi. *D.* Una píldora cada hora.

5693. Otras, n. 2.

☞ Gencianino. ʒiiij (15 cent.).
Conserva de rosas,
Polvo de regaliz, ãã. c. s.
H. S. A. seis píldoras. *D.* Una de hora en hora.

5694. P. DE GOMA AMONIACO.

☞ Goma amoniaco en polvo. ʒj (4 gr.).
Jarabe de goma. c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
Comunmente se añade á estas píldoras azúcar, azufre, azufre dorado de antimonio, jabon, cicuta y opio.

5695. Otras, n. 2.

☞ Goma amoniaco. ʒj (4 gr.).
Cebolla albar. en polvo. ʒj (12 dec.).
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

I. Facilitan la expectoracion en los catarros pulmonares crónicos. A grandes dosis obran como purgantes. *D.* Cuatro á cinco píldoras al dia.

5696. P. DE GOMA AMONIACO BAL-SÁMICAS ó Píldoras balsámicas (F. E.).

℥ Milpiés preparados. . . ʒvj (24 gr.).
 Goma amoniaco. ʒiij (12 gr.).
 Acido benzóico. ʒjv (5 gr.).
 Azafran,
 Báls. negro del Perú, ãã. ʒj (12 dec.).
 Aceite de trementina sulfurado, c. s.
 H. S. A. píldoras.

5697. P. DE GOMA AMONIACO JABONOSAS.

℥ Amoniaco. 4
 Ruibarbo. 4
 Jabon medicinal. 4
 H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).

5698. P. DE GOMA AMONIACO Y MIRRA.

℥ Goma amoniaco,
 Mirra, ãã. ʒij (8 gr.).
 Agua. c. s.
 H. S. A. cuarenta píldoras.
 D. Dos á cuatro píldoras, dos ó tres veces al dia.

5699. P. DE GOMA FÉTIDAS (F. P.).

℥ Asa fétida. 8
 Gálbano. 8
 Mirra. 8
 Aceite de sucino. 4
 Jarabe simple. c. s.
 I. Son desobstruéntes, y se las ha aconsejado en la amenorrea. D. ʒj (12 dec.) dos veces al dia.

5700. P. DE GOMA QUINO.

℥ Goma quino. ʒß (2 gr.).
 Alcanfor. ʒjx (50 cent.).
 Opio. ʒxxxij (1,20 gr.).
 Oxido de zinc. ʒjx (50 cent.).
 Tormentila en polvo. ʒxviiij (4 gr.).
 Bálsamo del Canadá, c. s.
 H. S. A. veinte píldoras.
 I. Diabetes, cardialgia, disenteria, diarrea crónica, gastrorrageia. D. Dos píldoras mañana y noche.

5701. P. DE GOMA QUINO FERRUGINOSAS (Most).

℥ Sulfato de hierro,
 Mirra,
 Goma quino; ãã. ʒij (8 gr.).
 Extracto de marrubio blanco. . c. s.
 H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
 I. Leucorrea inveterada. D. Cuatro á ocho píldoras, tres veces al dia.

5702. P. GOMO-RESINOSAS.

℥ Gálbano. ʒj (4 gr.).
 Mirra ʒjß (6 gr.).
 Sagapeno. ʒjß (6 gr.).
 Asa fétida. ʒß (2 gr.).
 H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
 D. Tres ó cuatro píldoras al dia.

5703. P. GOMOSAS DE PLENCK (F. P.)

℥ Mercurio purificado. . . ʒj (4 gr.).
 Goma arábica. ʒiij (12 gr.).
 Jar. de achicorias comp. c. s.
 Miga de pan. ʒj (32 gr.).
 H. S. A. píldoras.
 D. ʒß á ʒj (6 á 12 dec.).

5704. P. DE GRAHAM.

℥ Sulfato de zinc,
 Trementina, ãã. ʒLjv (3 gr.).
 Magnesia. c. s.
 H. S. A. diez y ocho píldoras.
 I. Blenorragia y leucorrea rebeldes. D. Tres píldoras al dia.

5705. P. DE GRIFFITH ó Píldoras de hierro compuestas.

℥ Mirra. ʒij (8 gr.).
 Carbonato de sosa,
 Sulfato de hierro,
 Melote, ãã. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).
 I. Los ingleses las elogian en la tisis tuberculosa. Son análogas á las de Blaud y Vallet.

5706. P. DE GROETZNER.

℥ Cloruro de oro y sodio. ʒjv (2 dec.).

Agua. c. s.

Se disuelve y se añade :

Extracto de dulcamara. $\mathfrak{J}j$ (4 gr.).

Extracto de acónito. . . $\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ (6 dec.).

Malvabisco. c. s.

H. S. A. ochenta píldoras.

I. Sífilis, incontinencia de orina, herpes corrosivos, enuresis, hipocondría. D. Cuatro píldoras mañana y noche.

5707. P. DE GUTAGAMBA.

\mathfrak{Z} Gutagamba. $\mathfrak{g}x$ (5 dec.).

Canela,

Gengibre, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{g}jv$ (2 dec.).

Jarabe simple. c. s.

H. S. A. seis píldoras.

D. Una cada cuarto de hora hasta promover deposiciones de vientre.

5708. P. DE GUTAGAMBA COMPUESTAS (F. DE L.).

\mathfrak{Z} Gutagamba. $\mathfrak{J}j$ (4 gr.).

Acíbar en polvo. $\mathfrak{J}j\mathfrak{B}$ (6 gr.).

Gengibre en polvo. $\mathfrak{J}\mathfrak{B}$ (2 gr.).

Jabon. $\mathfrak{J}ij$ (8 gr.).

H. S. A. píldoras de $\mathfrak{g}jv$ (2 dec.).

D. Dos á seis píldoras al dia como purgantes.

5709. P. DE HAHNEMANN ó Píldoras mercuriales de Hahnemann.

\mathfrak{Z} Merc. de Hahnemann. $\mathfrak{g}viiij$ (4 dec.).

Extracto de regaliz. . . $\mathfrak{J}ij$ (8 gr.).

H. S. A. sesenta y cuatro píldoras, de las cuales cada una contiene un octavo de grano de mercurio soluble.

I. Enfermedades sífilíticas. D. De una á ocho píldoras al dia.

5710. P. DE HELMENSTREIT.

\mathfrak{Z} Iodo. $\mathfrak{g}vij$ (35 cent.).

Extracto de genciana. $\mathfrak{J}j$ (4 gr.).

Mucilago de goma arábica. . . c. s.

H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Salivacion escorbútica ó mercurial. D. Tres píldoras cuatro veces al dia.

5711. P. DE HESSER.

\mathfrak{Z} Extracto de acónito,

Polvo de acónito,

Sulfuro de cal, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{J}\mathfrak{B}$ (2 gr.).

H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Enfermedades de la piel. D. Tres, seis, nueve y doce píldoras al dia, segun los efectos narcóticos.

5712. P. HIDRAGOGAS.

\mathfrak{Z} Asa fétida,

Cebolla albarrana en

polvo, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{J}\mathfrak{B}$ (2 gr.).

Extracto de colocintida compuesto,

Polvo de digital, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. . . $\mathfrak{g}xviiij$ (4 gr.).

H. S. A. veinte píldoras. Se dan

dos cada tres horas en los infartos linfáticos y en las hidropesías sintomáticas. Es un remedio enérgico y muy eficaz.

5713. P. HIDRAGOGAS ó Píldoras de Boncio (F. F.).

\mathfrak{Z} Acíbar,

Gutagamba,

Goma amoniaco, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. $\mathfrak{J}j$ (32 gr.).

Vinagre blanco. $\mathfrak{J}vj$ (192 gr.).

Se interpone al fuego las gomas resinas y el acíbar en la mitad del vinagre, se cuele con expresion, se echa el resto del vinagre sobre el residuo, se vuelve á calentar y se cuele; se reúnen los líquidos colados y se los evapora en el baño maría hasta la consistencia de píldoras.

I. Se usan como purgantes é hidragogas en el tratamiento de la hidropesía. Se hacen píldoras de $\mathfrak{g}jv$ (2 dec.). D. Tres á seis píldoras al dia.

5714. P. HIDRAGOGAS (F. DE L.).

\mathfrak{Z} Cebolla albarrana en polvo,

Extr. de colocint., $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. $\mathfrak{J}ij\mathfrak{B}$ (10 gr.).

H. S. A. cien píldoras.

I. Son purgantes y diuréticas. D. Una mañana y noche, aumentando progresivamente.

P. 5715. HIDRAGOGAS (Hein).

℞ Gutagamba,
 Digital,
 Escila,
 Azufre dorado de antimonio,
 Extr. de saxifraga, ãã. ḡxviiij (4 gr.).
 H. S. A. pildoras de ḡij (1 dec.).
 I. Hidropesías, ascitis, metrorragia. D. Una pildora cada dos horas.

5716. Otras (JANIN DE LION).

℞ Agua comun. ℔vj (3000 gr.).
 Jalapa,
 Acíbar sucotrino,
 Sen, ãã. ℔j (500 gr.).
 Carbonato de hierro,
 Nitrato de potasa, ãã. ℔ß (250 gr.).
 Agárico,
 Mechoacan,
 Ruibarbo,
 Escamonea,
 Raíces de brionia,
 Hermodáctilos, ãã. . ḡvj (192 gr.).
 Sulf. negro de merc. ḡv (160 gr.).
 Acido tartárico. . . . ḡij (64 gr.).
 Turbit gomoso,
 Gutagamba,
 Trociscos de Alhandal,
 Protocloruro de mercurio,
 Tártaro emético, ãã. ḡij (64 gr.).

Se hierva el sen y el ácido tartárico en las ℔vj (3000 gr.) de agua durante un cuarto de hora, se cuele despues con fuerte expresion, se pone el liquido en una olla de hierro que se coloca sobre el fuego, se añaden poco á poco las demás sustancias, que deberán estar porfirizadas, y se mezclan exactamente; se agita esta mezcla sin interrupcion y se la deja á fuego lento hasta que haya adquirido la consistencia de pildoras, se aparta la olla de encima del fuego y se divide la masa en pildoras del peso de ḡjv (2 dec.). Se las hace rodar en polvos de jalapa y se las deja secar.

D. Estas pildoras muy purgantes se dan primero en número de cua-

tro, y se aumentan despues hasta que produzcan el efecto. Por otra parte, la dosis debe ser relativa á la edad y al temperamento del enfermo.

5717. Otras (SPIELMANN).

℞ Semillas de Tilly,
 Gutagamba,
 Escamonea, ãã. ḡß (16 gr.).
 Jalapa,
 Ruibarbo, ãã. ḡij (8 gr.).
 Macis. ḡj (4 gr.).
 Arrope de saúco. ḡß (2 gr.).
 Háganse pildoras S. A.
 D. ḡxviiij (1 gr.).

5718. P. HIDRAGOGAS CONTRA LA ASCITIS.

℞ Escamonea de Alepo. ḡjß (6 gr.).
 Calomelanos preparados
 al vapor. ḡj (4 gr.).
 H. S. A. treinta pildoras.
 D. Una á dos pildoras, dos veces al dia.

5719. P. HIDRAGOGO-FERRUGINOSAS (Collier).

℞ Mercurio. ḡxxxvj (2 gr.).
 Sexquíóxido de hierr. ḡxviiij (4 gr.).
 Conserva de rosas. . . . ḡLjv (3 gr.).
 H. S. A. veinte pildoras.

I. Afecciones sífilíticas en individuos cloróticos, anémicos ó escrofulosos.

5720. P. HIDRAGOGAS ó Pildoras escilíticas compuestas (F. P.).

℞ Escila en polvo. 4
 Sulfuro amarillo de antimonio. 2
 Acido succínico. 2
 Extr. de coloquíntida compuesto. 3
 Esencia de anís. c. s.
 Háganse pildoras S. A.

I. Hidropesías pasivas. D. ḡv á ḡx (25 á 50 cent.).

5721. P. DE HIEL DE VACA.

℞ Hiel de vaca espesada,
 Extracto de genciana,
 Ruibarbo, ãã. ḡxc (5 gr.).

Subcarbon. de hierro. $\mathfrak{3}\mathfrak{b}$ (2 gr.).
H. S. A. píldoras de $\mathfrak{g}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (15 cent.).

I. Dispepsia, hipocondría, helmintiasis. *D.* Tres á seis píldoras mañana y noche.

5722. P. DE HIERRO (SWEDIAUR).

$\mathfrak{2}$ Oxido negro de hierro. . . . c. s. q.
Extracto de ajenjos. c. s.
H. S. A. píldoras de $\mathfrak{g}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ (3 dec.).

5723. P. DE HIERRO ALOÉTICAS.

$\mathfrak{2}$ Limaduras de hierro porfirizadas. . . . $\mathfrak{3}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (16 gr.).
Canela en polvo. . . . $\mathfrak{3}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (8 gr.).
Acíbar sucotrino. . . $\mathfrak{3}\mathfrak{j}$ (4 gr.).
Jarabe de artemisa. . . c. s.
H. S. A. píldoras de $\mathfrak{g}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (2 dec.).
D. Dos á diez píldoras al dia.

5724. P. DE HIERRO COMPUESTAS (F. DE L.).

$\mathfrak{2}$ Sulfato de hierro,
Subcarbonato de sosa,
Azúcar, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{3}\mathfrak{j}$ (4 gr.).
Mirra en polvo. $\mathfrak{3}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (8 gr.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.
I. Amenorrea, clorosis. *D.* Se dan de dos á seis al dia.

5725. Otras (F. P.).

$\mathfrak{2}$ Hierro preparado. 4
Mirra en polvo. 2
Polvos aromáticos. 4
Jarabe simple. c. s.
Háganse píldoras S. A.
I. Clorosis. *D.* $\mathfrak{3}\mathfrak{b}$ (2 gr.).

5726. P. DE HINOJO ACUÁTICO (Rhothe).

$\mathfrak{2}$ Semillas de hinojo. . . $\mathfrak{3}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (12 gr.).
Extracto de cardo santo. $\mathfrak{3}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (8 gr.).
Sal amoniaco. $\mathfrak{3}\mathfrak{j}$ (4 gr.).
H. S. A. píldoras de $\mathfrak{g}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (1 dec.).
I. Se usan como calmantes en la tos catarral, histérico. *D.* Seis á ocho píldoras, cuatro veces al dia.

5727. P. DE PROTOIODOURO DE HIERRO (Boudet).

$\mathfrak{2}$ Iodo. 8
Limaduras de hierro. 15
Agua destilada. 25

Se prepara como la solución oficial, después se filtra y se vierte en una cuchara de hierro sin estañar; se añade después:

Miel de Narbona. 20

Se evapora rápidamente hasta la consistencia de jarabe claro y entonces se añade:

Goma tragacanto en polvo. . . . 12

Se divide la masa en píldoras de cuatro y medio granos.

Como es muy difícil dividir en píldoras esta masa, se prefiere la fórmula siguiente:

Solución oficial de protoioduro de hierro. . . $\mathfrak{3}\mathfrak{j}$ (30 gr.).

Se reduce á la mitad por la evaporación en una cuchara de hierro y se añade:

Miel. $\mathfrak{3}\mathfrak{i}\mathfrak{j}\mathfrak{b}$ (10 gr.).

Se mezcla, se vierte todo en un mortero y se añade:

Malvabisco en polvo. c. s.

para obtener una masa firme que se dividirá en cien píldoras, que se cubrirán como á la grajea y se guardarán en un frasco. Cada píldora contendrá $\mathfrak{g}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (1 dec.) de protoioduro de hierro.

I. Son eficaces en la sífilis constitucional, afecciones escrofulosas, tuberculosas ó cloróticas. *D.* Cuatro píldoras y se puede elevar la dosis hasta veinte al dia.

5728. P. DE PROTOIODOURO DE HIERRO DE DUPASQUIER (F. P.).

$\mathfrak{2}$ Iodo. $\mathfrak{3}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (8 gr.).
Limaduras de hierro. . . $\mathfrak{3}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (16 gr.).
Agua destilada. $\mathfrak{3}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ (24 gr.).

Se prepara como la solución normal, después se filtra, se echa en una cuchara de hierro y se añade:

Miel buena. $\mathfrak{5}\mathfrak{v}$ (20 gr.).

Se evapora rápidamente hasta que se disipe gran parte del agua del protoioduro, es decir, hasta que la mezcla adquiera la densidad de un jarabe algo claro; se añade despues poco á poco, y agitando continuamente el jarabe con una espátula,

Goma tragac. en polvo. ʒiij (12 gr.).

Se procede como se acaba de indicar y se obtiene una masa de consistencia conveniente que se divide en doscientas píldoras, pesando cada una ʒjv (2 dec.) poco mas ó menos.

I. Clorosis. D. Una píldora, aumentando diariamente hasta llegar á ocho ó diez, en cuyo caso se acostumbra disminuir en la misma proporcion que se aumentó.

Estas píldoras suelen producir dolores de vientre, en cuyo caso no se aumentará la dosis.

5729. P. DE PROTOIODURO DE HIERRO (Calloud).

- ʒ Sulfato de hierro cristalizado. 16
- Ioduro de potasio. 21
- Goma tragacanto. 3
- Azúcar. 10
- Jarabe,

Malvabisco en polvo, añ. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒvj (3 dec.).

Se reduce á polvo fino el sulfato de hierro, despues el ioduro de potasio, se tritura la mezcla para facilitar la reaccion de las dos sales, se añade la goma, el azúcar, el jarabe y c. s. de polvo de malvabisco.

5730. P. DE PROTOIODURO DE HIERRO Y GUAYACO (Bielt).

- ʒ Protoioduro de mercurio. ʒß (2 gr.).
 - Extracto de guayaco. . ʒj (4 gr.).
 - Tridacio. ʒLjv (3 gr.).
 - Jarabe ó polvo de zarzaparrilla, c. s.
- H. S. A. setenta y dos píldoras.

I. Sifilides. D. Una píldora y despues dos al dia.

5731. P. DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (Magendie).

- ʒ Deutoioduro de merc. ʒj (5 cent.).
 - Extracto de encbro. ʒxij (60 cent.).
 - Polvo de regaliz. . . c. s.
- H. S. A. ocho píldoras.

I. Afecciones sifilíticas. D. Dos píldoras mañana y noche, al principio, y despues se duplica la dosis. Cada píldora contiene 1/5 de grano de ioduro.

5732. Otras (BIETT).

- ʒ Protoioduro de merc. ʒß (6 dec.).
 - Tridacio. ʒij (24 dec.).
- H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.
D. Se dan de una á cuatro píldoras en la sifilides.

5733. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO.

- ʒ Protoioduro de merc. ʒx (5 dec.).
 - Tridacio. ʒxxx (15 dec.).
- H. S. A. veinte píldoras.
D. Se da primero una y despues dos cada veinticuatro horas.

5734. Otras, n. 2.

- ʒ Protoioduro de merc. ʒjx (50 cent.).
 - Rob de saúco. ʒxxxvj (2 gr.).
 - Regaliz en polvo. . . c. s.
- H. S. A. cincuenta píldoras.
D. Una por la mañana y otra por la noche.

5735. Otras (MAGENDIE).

- ʒ Protoioduro de merc. ʒj (5 cent.).
 - Extracto de regaliz. ʒxij (60 cent.).
 - Polvo de regaliz. . . c. s.
- H. S. A. doce píldoras.

I. Afecciones escrofulosas complicadas con sifilis é infartos de los ganglios. D. Una píldora al dia.

5736. P. DE DEUTOIODURO IODURADO DE MERCURIO (Gibert).

- ʒ Biioduro de mercurio. ʒij (1 dec.).

Ioduro de potasio. . . $\tilde{g}xc$ (5 gr.)
 Goma aráb. en polvo. $\tilde{g}jx$ (50 cent.).
 Miel. c. s.
 H. S. A. veinte píldoras.

D. Dos píldoras, tomadas por la mañana en ayunas, representan las dosis medicinales contenidas en $\tilde{v}vj$ (24 gr.) del jarabe de deutoioduro iodurado de mercurio de Gibert y de Boutigni.

5737. P. DE DEUTOIODURO DE MERCURIO.

$\frac{2}{4}$ Deutoioduro de merc. $\tilde{g}vj$ (3 dec.).
 Almidon. $\tilde{D}j$ (12 dec.).
 Jarabe de goma. c. s.
 H. S. A. veinticuatro píldoras.
D. Una ó dos al dia.

5738. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO (H. DE M.).

$\frac{2}{4}$ Protoioduro de merc. $\tilde{g}j$ (5 cent.).
 Extracto de bayas de enebro. $\tilde{g}xij$ (60 cent.).
 H. S. A. ocho píldoras.

I. Enfermedades sifilíticas complicadas con escrófulas. *D.* Dos píldoras mañana y noche; mas adelante se puede duplicar la dosis.

5739. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO (Biett).

$\frac{2}{4}$ Protoioduro de mercurio,
 Malvabisco en polvo, $\tilde{a}\tilde{a}$. $\tilde{3}j$ (4 gr.).
 H. S. A. setenta y dos píldoras.
 Cada una contiene $\tilde{g}j$ (5 cent.) de protoioduro.

I. Sifilides. *D.* Una píldora al dia.

5740. Otras (LUGOL).

$\frac{2}{4}$ Protoioduro de merc. $\tilde{g}vj$ (3 dec.).
 Almidon en polvo. . . $\tilde{D}j$ (12 dec.).
 Jarabe de goma. c. s.
 H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Sifilis constitucional, sifilides, escrófulas. *D.* Una á dos píldoras al dia.

5741. Otras (RICORD).

$\frac{2}{4}$ Protoioduro de merc. $\tilde{g}vj$ (3 dec.).
 Tridacio. $\tilde{g}vj$ (3 dec.).
 Extracto de opio. . . . $\tilde{g}j\frac{1}{5}$ (6 cent.).
 Extracto de cicuta. . . $\tilde{D}\tilde{B}$ (6 dec.).
 H. S. A. seis ó doce píldoras.

Se administran á la dosis de una píldora, que se aumenta ó disminuye segun los efectos que se observan, la susceptibilidad del enfermo, etc.

5742. Otras (RICORD).

$\frac{2}{4}$ Protoioduro de mercurio,
 Tridacio, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{3}\tilde{B}$ (2 gr.).
 Extr. gomoso de opio. $\tilde{g}jx$ (50 cent.).
 Extracto de guayaco. $\tilde{3}j$ (4 gr.).
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Una, cinco horas despues de comer.

5743. Otras (RICORD).

$\frac{2}{4}$ Protoioduro de mercurio,
 Tridacio,
 Polvo de hojas de belladona, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{g}Ljv$ (3 gr.).
 Extracto tebáico. . . . $\tilde{g}xviiij$ (4 gr.).
 H. S. A. cincuenta píldoras.
I. Iritis sifilítica.

5744. Otras (VELPEAU).

$\frac{2}{4}$ Protoioduro de mercur. $\tilde{g}jv$ (2 dec.).
 Tridacio. $\tilde{3}\tilde{B}$ (2 gr.).
 H. S. A. veinte píldoras iguales.
D. Una, mañana y noche. El tratamiento dura dos meses.

5745. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO OPIADAS (Velpeau).

$\frac{2}{4}$ Protoioduro de mercurio,
 Extracto de opio, $\tilde{a}\tilde{a}$. $\tilde{g}xviiij$ (4 gr.).
 H. S. A. setenta y dos píldoras.
 Cada una contiene $\tilde{g}\frac{1}{4}$ (12 mil.) de ioduro é igual cantidad de extracto tebáico.

I. Sifilis. *D.* Una píldora y despues dos al dia durante un mes.

5746. P. DE PROTONITRATO DE MERCURIO (Santa María).

℞ Protonitrato de mercurio cristalizado. . . ḡx (5 dec.).
 Extracto de regaliz. ḡXL (2 gr.).
 H. S. A. sesenta píldoras.
 I. Sífilides y ciertas afecciones cutáneas. D. Cuatro á cinco píldoras al dia.

5747. P. HISTÉRICAS (F. M.).

℞ Goma opoponaco. ḡj (32 gr.).
 Goma amoniaco,
 Goma gálbano,
 Goma sagapeno, ãã. . . ḡB (16 gr.).
 Mirra. ḡij (8 gr.).
 Asa fétida,
 Castóreo, ãã. ḡiij (12 gr.).
 Aceite de sucino. ḡj (12 dec.).
 Triaca. c. s.
 H. S. A. masa de píldoras.
 I. Histérico y amenorrea. D. De ḡB á ḡij (6 á 24 dec.).

5748. P. DE HOOPER.

℞ Sulfato de hierro,
 Agua, ãã. ḡB (250 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Acíbar. ḡij (1000 gr.).
 Canela blanca. ḡvj (180 gr.).
 Mirra. ḡij (60 gr.).
 Opoponaco. ḡB (15 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Son muy útiles en la clorosis y en la amenorrea.

5749. P. INCISIVAS (Cadet).

℞ Mantequilla de cacao. . . ḡj (32 gr.).
 Escila en polvo. ḡB (16 gr.).
 Ipecacuana. ḡij (8 gr.).
 Extr. acuoso de opio. ḡxv (75 cent.).
 Jarabe de goma. c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Asma, romadizos y catarro pulmonar crónico, tos seca y rebelde, tos espasmódica. D. Dos píldoras, tres veces al dia.

5750. Otras (J. J. LEROUX).

℞ Cebolla alb. en polvo. ḡj (4 gr.).

Quermes mineral. ḡviiij (4 dec.).
 Extr. acuoso de opio. ḡvj (3 dec.).
 Mantequilla de cacao. . . . c. s.
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
 I. Afecciones catarrales. D. Tres ó cuatro píldoras al dia.

5751. P. INCISIVAS EXPECTORANTES.

℞ Escila en polvo,
 Ipecacuana, ãã. ḡijB (10 gr.).
 Extracto de belladona. ḡB (2 gr.).
 Mantequilla de cacao. . . . ḡB (15 gr.).
 Jarabe de goma. c. s.
 H. S. A. píldoras de á ḡiij (15 cent.).
 I. Catarros crónicos. D. Una píldora mañana y noche.

5752. P. INCISIVAS PECTORALES (Buchan).

℞ Cebolla de escila fresca,
 Goma amoniaco,
 Sem. de cardamomo, ãã. ḡij (8 gr.).
 Jarabe simple. c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
 I. Tisis incipiente. D. Tres ó cuatro píldoras, dos ó tres veces al dia.

5753. P. INMORTALES.

℞ Acíbar. ḡj (4 gr.).
 Jalapa. ḡij (8 gr.).
 Emético. ḡxviiij (1 gr.).
 Jarabe de goma. c. s.
 H. S. A. setenta y dos píldoras.
 D. Una á dos al dia.

5754. P. IODADAS.

℞ Iodo. ḡvj (3 dec.).
 Extracto de genciana. ḡj (4 gr.).
 Rob de saúco. c. s.
 H. S. A. veinticuatro píldoras.
 I. Caquexia, amenorrea, sífilides, blenorrea, esplenitis, catarro útero-vaginal, glositis, metritis, lupus. D. Seis píldoras, mañana y noche.

5755. P. DE IODURO DE HIERRO Y QUININA (Bouchardat).

℞ Protoioduro de hierro. ḡjB (6 gr.).

Sulfato de quinina. ḡxviiij (4 gr.).
 Miel. 3j (4 gr.).
 Regaliz en polvo. c. s.

H. S. A. setenta y dos píldoras.

I. Clorosis, escrófulas, efidrosis, lepra, lupus, amenorrea, anemia, esplenitis, convulsiones, calenturas intermitentes rebeldes, péñfigo, sudor inglés, bulimia, cefalalgia, congestiones, gerofthalmia. D. Se toman de dos á seis al dia en la clorosis, y de doce á diez y ocho en tres tomas con una hora de intervalo en las fiebres intermitentes.

5756. P. DE IODHIDRARGIRATO DE IODURO DE POTASIO (Mialhe).

℥ Ioduro de potasio,
 Protoiod. de merc., ãã. ḡvj (3 dec.).

Se tritura y se añade:

Extracto de opio. ḡxij (6 dec.).

H. S. A. veinticuatro píldoras que se cubrirán con gelatina.

I. Herpes rebeldes, infartos escrofulosos, sífilides, sífilis, úlcera venérea. D. Dos ó tres píldoras aumentando dos todos los dias.

5757. P. DE IODHIDRATO DE POTASA (F. P.).

℥ Iodhidrato de potasa. 5

Agua destilada. 6

Pan. c. s.

H. S. A. píldoras que contengan ḡj (5 cent.) de la sal.

I. Escrófulas, leucorrea, tumores blancos, bocio.

5758. P. DE IODURO DE HIERRO (Bouchardat).

℥ Iodo. 3xx (80 gr.).

Hierro, un exceso,
 cerca de. 5x (40 gr.).

Agua. 3xxv (400 gr.).

Se deja digerir á una temperatura de 60° hasta que los líquidos no tengan color, se decanta y entonces se evapora rápidamente en un mortero de hierro. Cuando

casi se haya disipado el agua se añade:

Miel. 3xijß (50 gr.).

Goma en polvo,

Malvabisco en polvo, ãã. c. s.

H. S. A. mil píldoras. Cada una contendrá cerca de ḡij (1 dec.) de protoioduro de hierro.

D. Cuatro píldoras al dia, aumentando progresivamente hasta veinte ó treinta.

5759. P. DE IODO (H. DE M.).

℥ Iodo. ḡj (5 cent.).

Regaliz en polvo. 9j (12 dec.).

Arrope de saúco. c. s.

H. S. A. doce píldoras.

I. Escrófulas, bocio, leucorrea crónica, infartos de los testículos, amenorrea. D. Se principia por una y se aumenta progresivamente.

5760. P. DE IODURO DE HIERRO (Piedagnel).

℥ Ioduro de hierro. c. s. q.

Extracto de genciana. c. s.

para hacer píldoras de ḡjv (2 dec.) que deben conservarse en un frasco bien tapado.

I. Exóstosis, perióstosis, etc.

D. Dos píldoras, aumentando progresivamente de dos hasta treinta al dia. Despues se suspende la administracion durante quince dias, y se vuelve á empezar por dos, cuatro, seis, etc., hasta treinta. Ordinariamente bastan estos dos tratamientos.

Piedagnel administra al mismo tiempo el agua iodada para bebida, y se hacen fricciones con pomada hidriodatada.

5761. P. IODO-ARGÉNTICAS (Mialhe).

℥ Nitrato de plata crist. ḡxviiij (4 gr.).

Ioduro de potasio. 3ß (2 gr.).

Almidon. ḡLjv (3 gr.).

Goma aráb. en polvo. ḡxviiij (4 gr.).

Agua. c. s.

H. S. A. cien píldoras plateadas.

5762. P. DE IODURO DE HIERRO ó Píldoras emenagogas de Lugol.

℥ Protoioduro de hierro. ḡvj (3 dec.).
 Almidon. ℥j (12 dec.).
 Jarabe de goma. . . . c. s.
 H. S. A. veinticuatro píldoras.
 Se guardarán en un frasco bien tapado, porque se descomponen.

5763. P. DE IODURO DE IODHIDRATO DE ESTRICNINA.

℥ Ioduro de iodhidrato de estri-
 cnicina. ḡvj (3 dec.).
 Conserva de rosas. . . . c. s.
 H. S. A. veinticuatro píldoras.
 D. Una píldora al día, aumentando sucesivamente la dosis.

5764. P. DE IODOFORMO (Bouchardat).

℥ Iodoformo. ʒβ (2 gr.).
 Extracto de ajenjos. . . . c. s.
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
 I. Afecciones escrofulosas, infartos linfáticos, bocio y amenorrea. D. Tres píldoras al día.

5765. P. DE IODHIDRARGIRATO DE MERCURIO Y POTASIO (Puche; Mialhe).

℥ Biioduro de mercurio,
 Ioduro de potasio, ãã. ḡvij (4 dec.).
 Azúcar de leche. . . . ḡLjv (3 gr.).
 Jarabe de goma. . . . c. s.
 H. S. A. treinta y dos píldoras.
 D. Se usan de una á ocho al día en el tratamiento de las afecciones sífilíticas constitucionales, simples ó complicadas con escrófulas, sífilides, corea, coqueluche, flebitis, úlceras venéreas.

5766. P. DE IODURO DE IODHIDRATO DE QUININA (Bouchardat).

℥ Ioduro de iodhidrato de quinina. . . . ḡxviiij (1 gr.).
 Conserva de rosas. . . . c. s.
 H. S. A. nueve píldoras.

I. Escrófulas, anemia, sudor inglés, cefalalgia, calenturas intermitentes rebeldes, convulsiones, amenorrea, clorosis, éfidrosis, bocio, flebitis. D. Tres píldoras al día con media hora de intervalo.

5767. P. DE IODURO DE ARSÉNICO (Thompson).

℥ Ioduro de arsénico. . ḡj (5 cent.).
 Extracto de cicuta. . ḡxviiij (1 gr.).
 H. S. A. diez píldoras.

I. Cáncer de los pechos, lepra, impétigo, úlceras corrosivas, liquen, soriasis. D. Una píldora cada ocho horas.

5768. P. DE IODURO DE MERCURIO (F. P.).

℥ Protoioduro de mercurio. 42
 Tridacio. 16
 Extracto de guayaco. 24
 H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

I. Albuminuria, sífilis, sífilides, infartos escrofulosos. D. Se empieza por una píldora.

5769. P. DE IODURO DE CLORURO MERCURIOSO (Boutigny).

℥ Ioduro de cloruro mercurioso. ḡv (25 cent.).
 Goma arábica. . . . ḡxviiij (1 gr.).
 Miga de pan. ʒij (8 gr.).
 Agua de flor de nar. c. s.
 H. S. A. cien píldoras.
 I. Afecciones escrofulosas.

5770. P. DE IODURO DE MERCURIO (F. DE L.).

℥ Ioduro de mercurio. . ʒj (4 gr.).
 Confecion de cinosb. ʒiiij (12 gr.).
 Gengibre en polvo. . . ʒj (4 gr.).
 Se machacan todos hasta que se incorporen.

5771. P. DE IODURO DE MERCURIO Y QUININA.

℥ Ioduro de mercurio y quinina. . . . ḡiiij (15 cent.).

Opio en polvo. $\tilde{g}^{\frac{2}{3}}$ (2 cent.).

H. S. A. sesenta píldoras.

I. Lupus. *D.* Se toman en seis dosis en dos días.

5772. P. DE IODURO DE MERCURIO Y MORFINA (Bouchardat).

\mathcal{R} Ioduro de mercurio y morfina. \tilde{g}^{xviii} (1 gr.).

Polvo de regaliz. $\mathfrak{3}\beta$ (2 gr.).

Jarabe de goma. c. s.

H. S. A. setenta y dos píldoras.

D. Se toma una por la tarde en la sífilis constitucional. Se elevará sucesivamente la dosis para combatir los dolores nocturnos y la sífilides.

5773. P. DE IODURO DE HIERRO.

\mathcal{R} Ioduro de hierro. \tilde{g}^{ix} (50 cent.).

Conserva de rosas. \tilde{g}^{xviii} (1 gr.).

Goma arábica. \tilde{g}^{xij} (6 dec.).

H. S. A. veinte píldoras.

I. Escrófulas, lepra, elefantiasis, hipertrofia, pica, lupus, pénfigo. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5774. P. DE IODURO DE PLATA (Patterson).

\mathcal{R} Ioduro de plata. \tilde{g}^{iv} (2 dec.).

Conserva de rosas. c. s.

H. S. A. veinte píldoras.

I. Gastralgia y sífilides.

El ioduro de plata no tiene el inconveniente de dar color á la piel como el nitrato de plata.

5775. P. DE IODURO DE POTASIO.

\mathcal{R} Ioduro de potasio. \tilde{g}^{ix} (50 cent.).

Agua destilada. c. s.

Esponja tostada,

Extr. de dulcam., $\tilde{a}\tilde{a}$. $\mathfrak{3ij}\beta$ (10 gr.).

H. S. A. cien píldoras.

I. Tétanos, escrófulas, bocio, histérico, neuralgias, artrocace, tumor blanco, leucorrea, sífilides, reumatismo, bulimia, dolores osteocopos, lepra. *D.* Seis píldoras mañana y noche.

5776. Otras (PIERQUIN).

\mathcal{R} Ioduro de potasio. $\mathfrak{3ij}\beta$ (10 gr.).

Agua destilada. $\mathfrak{3iij}$ (12 gr.).

Miga de pan. c. s.

H. S. A. ciento cincuenta píldoras.

I. Bocio y tumores blancos. *D.* Dos píldoras, mañana y noche.

5777. P. DE IODURO DE ZINC Y ESTRICNINA (Bouchardat).

\mathcal{R} Ioduro de zinc y estricnina. \tilde{g}^{ij} (1 dec.).

Conserva de rosas. c. s.

H. S. A. doce píldoras.

D. Se toma una al día y se aumenta progresivamente la dosis.

5778. P. DE IODURO DE ZINC Y AMONIACO CON BELLADONA.

\mathcal{R} Ioduro de zinc y amoniaco, Extracto de belladona, $\tilde{a}\tilde{a}$. $\mathfrak{3j}$ (4 gr.).

H. S. A. ochenta píldoras.

I. Corea, epilepsia. *D.* Una por la mañana, despues una por la noche, despues dos mañana y noche, y finalmente tres mañana y noche.

5779. P. DE IODURO DE ZINC Y MORFINA.

\mathcal{R} Ioduro de zinc y morfina. \tilde{g}^{ij} (1 dec.).

Polvo de malvabisco. \tilde{g}^{xx} (10 dec.).

Jarabe de goma. c. s.

H. S. A. ocho píldoras.

D. Se toman una ó dos al dia contra las gastralgias y demás afecciones nerviosas.

5780. P. DE IPECACUANA, CALOMELANOS Y OPIO (Ellis).

\mathcal{R} Calomelanos. \tilde{g}^{xviii} (1 gr.).

Opio. \tilde{g}^{v} (25 cent.).

Ipecacuana. \tilde{g}^{ix} (50 cent.).

H. S. A. ocho píldoras.

I. Disenteria. *D.* Una píldora cada hora ó cada dos horas.

**5781. P. DE IPECACUANA
COMPUESTAS (F. DE L.).**

℞ Polvo de ipecacuana
compuesto. ℥iij (96 gr.).
Escila recién seca,
Goma amoniaco, ãã. . . ℥j (4 gr.).
Mistura de goma arábica c. s.
Se machaca hasta que se incor-
poren.

5782. P. DE IPECACUANA Y OPIO.

℞ Polvos de Dower. . . . ℥lv (3 gr.).
Conserva de rosas. . . . ℥xviii (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ℥jv (2 dec.).

5783. P. DE JABON (F. F.).

℞ Jabon medicinal. . . . ℥jv (125 gr.).
Polvo de malvabisco. ℥℔ (16 gr.).
Nitrato de potasa. . . . ℥j (4 gr.).

Se contunde el jabon en un mortero de mármol, se añade las demás sustancias y se continúa contundiendo todo hasta que resulte una masa homogénea, de la cual se hacen píldoras de ℥jv (2 dec.) que se envuelven en polvo de almidon.

I. Se considera á estas píldoras como fundentes, y por consiguiente se usan contra los infartos abdominales. Tambien se emplean como diuréticas en las afecciones de los riñones y sobre todo en la nefritis calculosa. *D.* Se empieza por dos píldoras al dia y se aumenta sucesivamente.

**5784. P. DE JABON ALOÉTICAS
(H. M. F.).**

℞ Jabon amigdalino. . . . ℥j (4 gr.).
Acíbar sucotrino en p. ℥x (5 dec.).
Aceite. c. s.
H. S. A. diez píldoras iguales.
I. Son fundentes y resolutivas.

5785. P. DE JABON COMPUESTAS.

℞ Calomelanos,
Resina de jalapa,
Jabon medicinal, ãã. . . . ℥j (4 gr.).

H. S. A. píldoras de ℥jv (2 dec.).
D. Dos píldoras cada media hora hasta producir deposiciones de vientre.

**5786. P. DE JABON COMPUESTAS
(F. DE L.).**

℞ Opio puro en polvo. . . ℥℔ (15 gr.).
Jabon. ℥ij (60 gr.).
H. S. A.

5787. P. DE JABON ESTIBIADAS.

℞ Jabon estibiado,
Res. de guayaco, ãã. . . . ℥j (4 gr.).
Extracto de acónito. ℥jx (50 cent.).
H. S. A. píldoras de ℥iij (15 cent.).

I. Gota, reumatismo, albuminuria, cáncer. *D.* Seis píldoras, dos veces al dia.

5788. P. JABONOSAS (Buchan).

℞ Jabon blanco. ℥j℔ (6 gr.).
Sagapeno. ℥xviii (4 gr.).
Extracto de taraxacon. ℥ij (8 gr.).
Acíbar. ℥xviii (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ℥ij (1 dec.).

I. Estreñimiento, embarazo de las primeras vias, gastralgia, neumatosis, ictericia. *D.* Dos á cinco píldoras mañana y noche.

5789. Otras (H. DE M.).

℞ Jabon medicinal. ℥ij (8 gr.).
Polvos de acíbar,
Polvos de ruibarbo, ãã. . . . ℥j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ℥ij (1 dec.).
I. Infartos crónicos de las vísceras abdominales á consecuencia de las calenturas intermitentes.
D. ℥viii á ℥xvj (4 á 8 dec.).

5790. P. DE JAMES.

℞ Polvo de James,
Resina de guayaco,
Masa de píldoras de Rufus, ãã. ℥℔ (2 gr.).
Jarabe de genciana. c. s.
H. S. A. píldoras de ℥v (25 cent.).

I. Dispepsia. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5791. P. DE KEISSER ó Confites de Keisser.

℞ Acetato de protóxido de mercurio. ḡvj (3 dec.).
Maná en lágrimas. 3jß (6 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras que se cubrirán de almidon.

Nota. Cada una contiene ḡ¹/₁₀ (5 mil.) de acetato de mercurio.

I. Sífilis, blenorrea y leucorrea. *D.* Dos á cuatro píldoras al dia.

5792. P. DE KOOPP.

℞ Acetato de plomo en polvo. ḡjv (2 dec.).
Sem. de hinojo acuático pulverizadas. . . 3ß (2 gr.).
Extr. de milenrama. 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
Algunas veces se añade á la formula anterior:

Extr. gomoso de opio. ḡv (25 cent.).
I. Histérico y epilepsia. *D.* Se empieza por una píldora, y no se aumenta la dosis sino con la mayor precaucion.

5793. P. DE LACTATO DE HIERRO (Cap).

℞ Lactato de hierro,
Malvab. en polvo, ãã. ḡxviiij (1 gr.).
Miel. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

Se platearán ó se cubrirán con gelatina fundida segun el procedimiento de Garot.

5794. P. DE LACTATO DE HIERRO Y QUINA (Cap).

℞ Lactato de hierro,
Quina en polvo, ãã. . ḡxviiij (1 gr.).
Miel. c. s.

H. S. A. veinte píldoras que se deben platear ó cubrir con gelatina.

I. Clorosis y enfermedades es-ténicas.

5795. P. DE LACTUCARIO.

℞ Lactucario. 5j (4 gr.).
Malvabisco en polvo. . . . c. s.
H. S. A. cuarenta píldoras.
Se usan como hinópticas por la noche.

5796. P. LAXANTES (Blassius).

℞ Aloes. 3ß (2 gr.).
Jalapa. ḡLjv (3 gr.).
Jabon blanco. ḡxviiij (4 gr.).
Anís. ḡjx (50 cent.).
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Cólico ventoso, amaurosis. *D.* Tres á diez píldoras.

5797. Otras (BUCHAN).

℞ Asa fétida. 3ij (8 gr.).
Acíbar,
Cloruro de hierro,
Gengibre en polvo, ãã. . . 5j (4 gr.).
Elixir de propiedad. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Neumatosis, estreñimiento, gastralgia. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5798. Otras (HUFELAND).

℞ Extracto de hiel de buey,
Jabon medicinal,
Ruibarbo en polvo, ãã. . . 5j (4 gr.).
Extracto de taraxacon. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Estreñimiento por falta de secrecion de la bilis. *D.* Cinco á diez píldoras mañana y noche.

5799. P. LAXANTES Y FUNDENTES (Sanchez).

℞ Raiz de gengibre,
Azúcar, ãã. 3ij (8 gr.).
Alcanfor,
Almizele, ãã. 5ß (2 gr.).
Mercurio sublimado
dos veces. ḡxij (6 dec.).
Deutocloruro de mercurio,
Subdeutosulfato de
mercurio, ãã. . . . ḡviiij (4 dec.).

Se trituran en un mortero de vidrio y se añade:

Extracto de jalapa,
Extracto catártico de
la F. de L., ãã. ʒij (8 gr.).

Protosulfato de potasa,
Asa fétida, ãã. ʒjʒ (6 gr.).

Píldoras de Rufus,
Gálbano,

Extr. de regaliz, ãã. ʒj (4 gr.).

Bálsamo del Perú. . . ʒʒ (2 gr.).

Elíxir no ácido de propiedad. . c. s.

H. S. A. una masa, que despues se divide en píldoras de ʒjv (2 dec.), cada una de las cuales contiene una undécima parte de sal mercurial. D. Cuatro píldoras al dia, aumentando gradualmente la dosis hasta quince.

5800. P. DE LEIGER.

ʒ Cantáridas en polvo. . . ʒjx (50 cent.)
Extracto de borraja. ʒijʒ (40 gr.).

H. S. A. cuarenta píldoras.

I. Incontinencia de orina. D. Una píldora por la noche. Es remedio muy peligroso.

5801. P. DE LOCKSTAEDT.

ʒ Sulfato de quinina. . . ʒijʒ á ʒiijʒ (12 á 18 cent.).

Polvo aromático. ʒxij (6 dec.).

Esenc. de alm. amarg. una gota.
Extr. de cent. menor. c. s.

H. S. A. píldoras.

D. Se toman de una vez antes del acceso de las calenturas intermitentes.

5802. P. DE LUPULINA.

ʒ Lupulina. ʒijʒ (40 gr.).

Goma arábica. ʒj (4 gr.).

Extracto de achicorias, c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Escrófulas. D. De dos á cuatro al dia.

5803. P. DE MAGNESIA.

ʒ Crémor de tártaro
en polvo. ʒLjv (3 gr.).

Magnesia calcinad. ʒxxvij (1,5 gr.).

Jarabe de achicorias. c. s.
H. S. A. un bolo.
D. Dos píldoras por la mañana y dos por la tarde.

5804. P. DE MAGNESIA COMPUESTAS.

ʒ Magnesia comun. ʒʒ (2 gr.).

Alcanfor. ʒvj (3 dec.).

Opio puro. ʒvj (3 dec.).

Jarabe de goma. c. s.
H. S. A. doce píldoras.

I. Son antiácidas y convienen en las acedías y ardor de estómago.

D. Una píldora cada seis horas.

5805. P. DE MALATO DE HIERRO.

ʒ Gálbano. ʒj (4 gr.).

Malato de hierro. ʒLjv (3 gr.).

Aceite de sabina. ʒjx (50 cent.).

Valeriana en polvo. c. s.

I. Amenorrea, convalecencia, escrófulas, caquexia, histérico, úlceras atónicas, raquitis. D. Tres píldoras mañana y noche.

5806. P. DE MANTECA DE CACAO.

ʒ Manteca de cacao. ʒj (32 gr.).

Polvo de malvabisco. ʒj (4 gr.).

H. S. A. píldoras de ʒvj (3 dec.).

D. Doce píldoras.

5807. P. DE MAQUIAVELO.

ʒ Acíbar. ʒjʒ (6 gr.).

Cardamomo. ʒj (4 gr.).

Azafran,
Mirra,
Anís,
Betónica,

Bol arménico, ãã. ʒʒ (2 gr.).

H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Son tónico-purgantes, útiles para restablecer las fuerzas digestivas.

5808. P. MARCIALES (Koempf).

ʒ Vinagre escilítico. lbjʒ (750 gr.).

Gálbano,
Hidroclorato de amoniaco,

Asa fétida, ãã. ʒj (30 gr.).

Sulfato de potasa,
Sulfato de hierro, ãã. ʒß (15 gr.).

Se pone todo al fuego y se agita hasta la consistencia de extracto.

A la masa enfriada se añade:

Aceite de succino. 48 gotas.

Se divide la masa en pildoras de ʒjv (2 dec.).

I. Caquexia, clorosis, histérico, etc. *D.* De tres á ocho ó diez pildoras al dia.

5809. P. MARCIALES (F. E.).

ʒ Limaduras de hierro porfirizadas. ʒij (60 gr.).

Extracto blando de ajenjos. . . c. s.

H. S. A. pildoras de ʒvj (3 dec.).

Son las pildoras marciales de Sydenham de la F. M.

Nota. Algunas veces se añade ʒj (4 gr.) de canela en polvo ó ʒß (2 gr.) de acíbar.

I. Clorosis, histérico, hipocondría, dispepsia y leucorrea. *D.* Tres ó cuatro pildoras, mañana y noche.

5810. Otras (H. DE M.).

ʒ Limaduras de hierro porfirizadas. ʒij (60 gr.).

Raiz de genciana pulv. ʒj (30 gr.).

Mucílago de goma aráb., c. s.

H. S. A. pildoras.

I. Clorosis. *D.* De ʒviiij á ʒxvj (4 á 8 dec.).

5811. P. MERCURIALES DE SEDILOT ó *Pildoras de Sedillot.*

ʒ Ungüento mercurial. . ʒiij (12 gr.).

Jabon medicinal. . . . ʒij (8 gr.).

Polvo de regaliz. . . . ʒj (4 gr.).

H. S. A. pildoras de ʒjv (2 dec.).

I. Se usan como antisifilíticas.

5812. P. MARCIALES CON MIRRA (F. N. P.).

ʒ Hierro preparado,

Mirra,

Extracto de aristoloquia

redonda, ãã ʒß (2 gr.).

Azafran en polvo. . . . ʒj (12 dec.).

Jarabe balsámico. . . . c. s.

H. S. A. pildoras de ʒvj (3 dec.).

I. Atonía de las vísceras abdominales, obstrucciones, inercia del sistema nervioso.

5813. P. DE MATEO STARK.

ʒ Láudano,

Regaliz muy pulverizado,

Eléboro blanco,

Eléboro negro, ãã. . ʒij (60 gr.).

Jabon tartáreo. ʒvj (180 gr.).

Esencia de trementin. c. s.

H. S. A. una masa de pildoras, que siempre que se saque debe humedecerse con el mismo aceite de trementina.

I. Son purgantes sin causar dolor ni alteracion alguna en la caquexia, obstrucciones del bazo, cuartanas, ictericia y otras muchas enfermedades crónicas y rebeldes.

5814. P. MAYORES DE HOFFMANN ó *Pildoras mercuriales de Hoffmann.*

ʒ Sublimado corrosivo

porfirizado. ʒxviiij (1 gr.).

Miga de pan. ʒvj (24 gr.).

Agua destilada. c. s.

H. S. A. doscientas diez y seis pildoras. Se da una por la mañana y otra por la tarde en las afecciones sifilíticas. Cada pildora contiene un doceavo de sublimado corrosivo, que segun Guibourt existe en parte libre, y otra porcion hace parte de un compuesto insoluble.

5815. P. MENORES DE HOFFMANN.

ʒ Calomelanos,

Miga de pan, ãã. ʒß (2 gr.).

Agua. c. s.

H. S. A. setenta y dos pildoras.

I. Afecciones sifilíticas.

5816. P. DE MERAT.

ʒ Extracto acuoso de opio. ʒj (4 gr.).

Alcanfor. ʒjβ (6 gr.).
 Almizcle. ʒβ (2 gr.).
 Nitrato de plata fundido. ʒvj (3 dec.).
 H. S. A. noventa y seis pildoras.

Nota. Cada pildora contiene una décimasesta parte de grano de nitrato de plata, tres cuartas partes de grano de opio, ʒβ (25 mil.) de almizcle y ʒj (5 cent.) de alcanfor.

I. Baile de S. Vito, epilepsia, blenorragias. *D.* Seda una mañana y noche al empezar el tratamiento; despues se pueden dar tres y aun cuatro. Se bebe al mismo tiempo una tisana antiespasmódica. Se administran dos ó tres pildoras, mañana y noche, en las enfermedades sífilíticas y en las de la piel. Detrás de cada dosis se bebe una taza de cocimiento de leños sudoríficos ó simplemente de zarzaparrilla.

5817. P. DE MERAT.

ʒ Nitrato de plata. ʒj (5 cent.).
 Miga de pan. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. quince pildoras.

I. Baile de san Vito, epilepsia, blenorragia. *D.* Dos á seis pildoras al dia.

5818. P. MERCURIALES.

ʒ Deutochloruro de merc. ʒj (12 dec.).
 Alcohol. ʒij (8 gr.).
 Harina de trigo. ʒiij (12 gr.).
 Agua destilada. c. s.

Háganse ciento cuarenta y cuatro pildoras. Cada una contiene 1/8 de grano (6 mil.) de sublimado.

I. Se emplean contra las enfermedades venéreas. *D.* Se da primero una pildora por la mañana y otra por la noche, y despues se duplica la dosis.

5819. Otras, n. 2.

ʒ Jabon medicinal. ʒβ (15 gr.).
 Ruibarbo. ʒij (8 gr.).
 Deutochloruro de merc. ʒj (12 dec.).
 Polvo de regaliz,
 Jarabe de flores de naranjo, añ. c. s.

Háganse ciento cuarenta y cuatro pildoras.

I. y D. Las mismas que las anteriores.

5820. Otras, n. 3.

ʒ Ungüento mercurial
 doble. ʒiij (90 gr.).
 Jabon medicinal ʒij (60 gr.).
 Almidon. ʒijβ (75 gr.).
 H. S. A. pildoras de ʒjv (2 dec.).

I. Las mismas que las anteriores.

5821. Otras (BIETT).

ʒ Fosfato de mercurio. ʒβ (2 gr.).
 Extracto de fumaria. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. cuarenta y ocho pildoras.

D. Una ó dos al dia en las sífilides.

5822. Otras (BIETT).

ʒ Ungüento mercurial,
 Polvo de zarzaparrilla, añ. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. cuarenta y ocho pildoras. Cada una contiene ʒjβ (7 cent.) de ungüento mercurial ó tres cuartos de grano de mercurio.

5823. P. MERCURIALES, Pildoras de Belloste, Pildoras mercuriales purgantes, Pildoras mercuriales de escamonea aloéticas (F. F.).

ʒ Mercurio,
 Polvo de acíbar, añ. ʒvj (24 gr.).
 Polvo de ruibarbo. ʒiij (12 gr.).
 Polvo de escamonea. ʒij (8 gr.).
 Polvo de pim. negra. ʒj (4 gr.).
 Miel blanca. c. s.

Se tritura el mercurio con la miel hasta que se extinga perfectamente, se añaden los polvos, y se hace una masa que se conserva en un bote, y de la que segun se necesite se hacen pildoras de ʒjv (2 dec.). Cada una contiene ʒj (5 cent.) de mercurio, otro de acíbar y un tercio de grano de escamonea.

Estas píldoras, que son casi iguales á las de Belloste, son un antisifilítico muy malo, porque predominan en ellas los principios purgantes, y en la medicación antisifilítica y en la contraestimulante el buen resultado depende entre otras cosas de que se establezca la tolerancia del medicamento.

I. Sifilides, sífilis constitucional, afecciones herpéticas y escrofulosas, herpes, oftalmias, y comunmente como purgantes. *D.* Dos á tres píldoras al día.

5824. P. MERCURIALES (*Lagneau*).

℥ Ungüento mercurial de manteca de cacao. ℥ij (8 gr.).
Azúcar en polvo. ℥j (4 gr.).
Mucílago de goma arábica. c. s.
H. S. A. cincuenta y cuatro píldoras.

I. Sífilis constitucional, sífilides, oftalmias. *D.* Dos á cuatro píldoras mañana y noche.

5825. P. MERCURIALES (*Brugnatelly*).

℥ Almidon. ℥ij (60 gr.).
Mercurio purificado,
Conserva de rosas, ãã. ℥j (30 gr.).
Se extingue el mercurio en la conserva y se añade si es necesario un poco de mucílago, se la une al almidon y se divide la masa en cuatrocientas ochenta píldoras iguales.

I. Enfermedades sífilíticas. *D.* Una ó dos píldoras al día.

5826. Otras (*CADET*).

℥ Jalapa en polvo. ℥jv (125 gr.).
Mercurio purificado. ℥ij (60 gr.).
Maná en lágrimas. ℥j (30 gr.).
Trementina,
Flores de azufre,
Gutagamba, ãã. ℥ij (8 gr.).
Jar. de espinoserval. c. s.
H. S. A. píldoras de ℥jv (2 dec.).

I. Afecciones sífilíticas ó herpéticas. *D.* De tres á seis píldoras al día.

5827. Otras (*CHOMEL*).

℥ Sublimado corrosivo. ℥ij (4 dec.).
Extr. gomoso de opio. ℥ij (4 dec.).
H. S. A. veinte píldoras. Cada una contiene $\frac{1}{16}$ de grano (5 mil.).
D. Una píldora mañana y noche. A los quince días se aumenta hasta tres píldoras al día; á los quince días cuatro píldoras, en todo $\frac{2}{5}$ (2 cent.) al día, cuando mas, de sublimado.

Chomel ha obtenido buenos resultados con este tratamiento, y jamás ha visto que se presenten fenómenos secundarios.

5828. Otras (*DOCTOR ESTOR*).

℥ Mercurio purificado. ℥jv (16 gr.).
Trementina fina. ℥vj (192 gr.).
Sucino en polvo. ℥j (32 gr.).
Polvo de regaliz. c. s.
H. S. A. píldoras de ℥vj (3 dec.).
I. Gonorrea, cuando han desaparecido los síntomas de irritación. *D.* Una píldora y despues dos, todas las mañanas.

5829. Otras (*DOUBLE*).

℥ Extracto alcohólico de acónito. ℥xviiij (4 gr.).
Sublimado corrosivo. ℥ij (4 dec.).
H. S. A. veinte píldoras.
I. Herpes venéreos ó escrofulosos. *D.* Una píldora mañana y noche.

5830. P. MERCURIALES DE CULLERIER (*H. M.*).

℥ Deutocloruro de merc. ℥xviiij (4 gr.).
Harina de trigo. ℥ß (15 gr.).
Goma arábica. ℥ß (2 gr.).
Agua destilada. c. s.
H. S. A. píldoras de ℥iij (15 cent.). Cada una contiene una octava parte de grano de sublimado corrosivo.

I. Enfermedades sifilíticas. *D.* Una pílhora dos veces al día, aumentando según los efectos.

5831. P. MERCURIALES (H. M. F.).

- ℥ Mercurio. ʒx (40 gr.).
- Acíbar,
- Agárico blanco, ãã. . ʒxx (80 gr.).
- Macis,
- Canela, ãã. ʒijβ (40 gr.).
- Miel. ʒc (400 gr.).

Se extingue el mercurio en la miel en un mortero de mármol, se añade sin cesar las demás sustancias, se bate mucho tiempo y luego que esté bien unida la masa se hacen pílhoras de ʒijj (15 cent.).

D. ʒj á ʒij (12 á 24 dec.).

5832. Otras (PLENCK).

- ℥ Mercurio gomoso. . . ʒLjv (3 gr.).
- Extracto de cicuta,
- Extr. de guayaco, ãã. ʒxviiij (4 gr.).
- H. S. A. pílhoras de ʒij (1 dec.).

I. Oftalmias, conjuntivitis, ictericia, sífilis constitucional, sífilides, flebitis, bocio. *D.* Seis pílhoras mañana y noche.

5833. P. MERCURIALES CON CICUTA (Kopp).

- ℥ Bicloruro de mercur. ʒijj (15 cent.).
- Alcohol rectificado. . c. s.
- Se disuelve y se añade:
- Extracto de cicuta. . ʒLx (3 gr.).
- H. S. A. sesenta pílhoras.

I. Afecciones escrofulosas, enfermedades cutáneas crónicas, orquitis crónica, sífilis, tumores glandulares. *D.* Una á seis pílhoras al día, aumentando progresivamente hasta doce.

5834. P. MERCURIALES (Lagneau).

- ℥ Ungüento mercurial. . ʒjv (46 gr.).
- Polvos de malvabisco. . ʒijj (42 gr.).
- Se mezclan y se dividen en ciento cuarenta y cuatro pílhoras.

Cada pílhora contiene ʒj (5 cent.) de mercurio.

I. Enfermedades sifilíticas. *D.* De una á cuatro pílhoras, mañana y noche.

5835. Otras (MOSCATI).

- ℥ Extr. blando de quina. ʒij . (8 gr.).
- Mercurio soluble de
- Moscato. ʒij (24 dec.).
- Extr. acuoso de opio. ʒβ (6 dec.).
- H. S. A. veinte pílhoras.

I. Afecciones sifilíticas. *D.* Una pílhora por la mañana y otra por la noche.

Es el mercurio soluble de Hane-mann modificado por Moscati.

Nota. Si el enfermo es de buena constitucion, que no ha experimentado salivacion durante el uso de los demás mercuriales, el doctor Moscati prescribe ʒjv (48 dec.) de óxido de mercurio, ʒj (12 dec.) de opio, ʒβ (15 gr.) de extracto de quina, y hace dividir la masa en veinte bolos, de los cuales se toma uno mañana y noche. Por el contrario, si el sugeto es débil y ha sufrido tialismo, Moscati reduce la dosis á ʒj (12 dec.) de óxido de mercurio, ʒxij (6 dec.) de opio y ʒβ (15 gr.) de extracto de corteza del Perú.

5836. P. MERCURIALES Y DIURÉTICAS (Cruveilhier).

- ℥ Calomelanos. . . . ʒj (12 dec.).
- Escila en polvo. . . ʒx (5 dec.).
- Digital en polvo. . . ʒijj (15 cent.).
- Jar. de espinoserval. c. s.
- H. S. A. doce pílhoras.

I. Pleuresía crónica con derrame séroso. *D.* Una á dos pílhoras al día.

5837. P. MERCURIALES FUNDENTES.

- ℥ Calomelanos. . . . ʒxij (6 dec.).
- Extracto de saponaria,
- Extr. de taraxacon, ãã. ʒx (5 dec.).
- H. S. A. doce pílhoras.

I. Hepatitis, albuminuria, bocio crónico, ictericia, obstrucción de las vísceras abdominales.
D. Tres píldoras mañana y noche.

5838. P. MERCURIALES DE GLUTEN
(M. V. Nivet).

℞ Deutocloruro de merc. ḡjv (2 dec.).
Harina fina de trigo. ḡxviiij (4 gr.).
Tridacio. ḡxviiij (4 gr.).
Extracto de opio. . . . ḡvj (3 dec.).

Se disuelve el sublimado con un poco de alcohol, se añade la harina de trigo y las demás sustancias. Si la masa sale blanda se añade un poco de polvo inerte y se hacen treinta y seis píldoras.

D. Dos á tres píldoras al día.

5839. P. MERCURIALES OPIADAS
(H. M.).

℞ Calomelanos. ℞j (12 dec.).
Extr. gomoso de opio. ℞B (6 dec.).

H. S. A. veinticuatro píldoras iguales.

I. Enfermedades sífilíticas. D. Una píldora dos veces al día.

5840. P. MERCURIALES DE PLENCK
reformadas por Planche.

℞ Miel purificada. 2
Polvo muy fino de regaliz. 2
Mercurio puro. 4
Extracto de cicuta. 4
Malvabisco en polvo. c. s.

Se trituran en un mortero de mármol ó de porcelana con una mano de superficie ancha hasta que se extinga el mercurio; entonces se añade el extracto de cicuta, despues el polvo de malvabisco y se divide la masa en píldoras de ḡij (1 dec.). Cada píldora contiene un tercio de grano de mercurio.

I. Afecciones sífilíticas. D. Cuatro á seis píldoras en las veinticuatro horas.

Preparacion suave y fácil de manejar, que se puede aplicar al tratamiento de las enfermedades

sífilíticas recientes, principalmente en los sugetos delicados é irritables. Se empieza por una píldora por la mañana y otra por la noche, que gradualmente pueden irse aumentando hasta cuatro por dosis, y aun mas.

5841. P. MERCURIALES (Renou).

℞ Mercurio destilado. . . 3vj (24 gr.).
Acíbar. sucotrino. . . . 3v (20 gr.).
Ruibarbo. 3iij (12 gr.).
Escamonea. 3ij (8 gr.).
Agárico blanco. 3j (4 gr.).

Sasafrás,

Canela,

Macis, ãã. ℞j (12 dec.).

Miel. c. s.

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Enfermedades de la piel. D. De tres á ocho píldoras al día.

Nota. Son un poco purgantes.

5842. P. MERCURIALES GLIZIRRIDAS ó Píldoras mercuriales (F. E.).

℞ Mercurio purificado. . 3ij (60 gr.).
Miel. 3ijB (75 gr.).

Se extingue el mercurio con la miel en un mortero de mármol y despues se añade :

Polvos de regaliz. . . . 3jB (45 gr.).

H. S. A. masa para píldoras. Cada ℞j (12 dec.) contiene ḡviiij (4 dec.) de mercurio.

I. Enfermedades venéreas. D. De ḡiij (15 cent.) á ℞j (12 dec.).

5843. P. MERCURIALES LLAMADAS DEL NUMERO TRES (Sedillot).

℞ Ungüento mercurial. . 3iij (90 gr.).
Jabon medicinal. . . . 3ij (60 gr.).

Almidon,

ó Polvo de regaliz. . . . 3j (30 gr.).

H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.). Cada una una contiene ḡj (5 cent.) de mercurio.

I. Enfermedades sífilíticas graves, sífilides, oftalmias. D. Tres ó cuatro píldoras al día.

5844. P. DE MERCURIO (F. DE L.).

℞ Mercurio. 3ij (8 gr.).

Confec. de rosas rojas. ʒiij (12 gr.).
 Regaliz en polvo. ʒj (4 gr.).
 Se tritura el mercurio con la
 confecion, y despues de bien ex-
 tinguído se añade el regaliz y se
 mezcla todo bien. Se hacen pil-
 doras de ʒiij (15 cent.).

**5845. P. DE MERCURIO
 ALBUMINOSO.**

℥ Mercurio albuminoso. . ʒjʒ (6 gr.).
 Extracto gomoso de opio,
 Acibar en polvo, añ. ʒx (5 dec.).
 Extracto de zarzaparrilla. ʒʒ (2 gr.).
 H. S. A. cuarenta pildoras.
 I. Afecciones sifilíticas. D. Una
 pildora por la mañana durante
 ocho dias, y despues dos por la
 mañana y dos por la noche.

**5846. P. DE MERCURIO
 ANIMALIZADO.**

℥ Mercurio animalizado,
 Malvabisco, añ. ʒj (4 gr.).
 Jarabe. c. s.
 H. S. A. ochenta pildoras.
 D. Una pildora al dia. Se eleva
 sucesivamente la dosis.

**5847. P. DE MERCURIO EDIMBUR-
 GENSES (F. E.) (H. DE M.).**

℥ Mercurio puro,
 Miel buena, añ. ʒj (30 gr.).
 Se trituran juntos en mortero
 de mármol hasta que se extinga
 el mercurio; despues se añade:
 Miga de pan blanco y
 tierno. ʒiij (60 gr.).
 Se vuelve á machacar y se hace
 S. A. masa para pildoras.
 I. Enfermedades venéreas. D.
 Hasta ʒʒ (6 dec.).

**5848. P. DE MERCURIO SOLUBLE
 DE HAHNEMANN (Cazenave).**

℥ Mercurio soluble de
 Hahnemann. ʒj. (12 dec.).
 Tridacio. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. cincuenta pildoras.
 I. Síntomas primitivos de la si-
 filis. Dice Cazenave que nunca

ha observado salivacion. D. Una
 pildora y despues dos al dia.

5849. P. DE MIRRA Y BELEÑO.

℥ Extracto de mirra. . . . ʒjʒ (6 gr.).
 Extracto de beleño,
 Cebolla albarrana dese-
 cada, añ. ʒʒ (2 gr.).
 Agua. c. s.
 H. S. A. treinta pildoras.

I. Algunos médicos ingleses
 usan estas pildoras para facilitar
 la expectoracion en los catarros
 pulmonares crónicos y bronqui-
 tis. D. Dos ó tres pildoras al dia.

**5850. P. DE MIRRA FERRUGINOSAS
 (Meyer).**

℥ Limaduras de hierro,
 Ruibarbo en polvo,
 Mirra escogida, añ. ʒj (4 gr.).
 Extracto de milenrama. . c. s.
 H. S. A. pildoras de ʒiij (1 dec.).
 I. Clorosis y leucorrea. D. Cua-
 tro á ocho pildoras, tres veces al
 dia.

5851. P. DE MONESIA.

℥ Extracto de monesia. ʒxviiij (4 gr.).
 Almizele,
 Alcanfor, añ. ʒjx (50 cent.).
 H. S. A. pildoras de ʒjv (2 dec.).
 I. Cistitis, catarro útero-vagi-
 nal. D. Dos á cuatro pildoras ma-
 ñana y noche.

5852. P. DE MORFINA.

℥ Morfina. ʒij (4 dec.).
 Regaliz en polvo. . . . ʒxviiij (4 gr.).
 Jarabe de goma. . . . c. s.
 H. S. A. diez pildoras.
 D. Una pildora por la noche.

5853. Otras (Magendie).

℥ Morfina. ʒj á ʒiij (5 á 10 cent.).
 Conserva de rosas. . . c. s.
 H. S. A. cuatro pildoras.
 D. Una pildora mañana y noche.

5854. P. DE MORFINA Y CIANURO DE POTASIO (Rougier).

℞ Sulfato de morfina. ḡiij (15 cent.).
 Cianuro de potasio. ḡvj (30 cent.).
 Mucilago. c. s.
 para hacer veinticuatro píldoras.

I. Neuralgias. D. Cuatro píldoras al día, una cada seis horas, y despues se puede aumentar sucesivamente la dosis hasta doce.

5855. P. DE MORISSON.

Son de dos especies: las del número primero y segundo. La análisis ha descubierto en las del número primero gutagamba en pequeña cantidad, una sustancia soluble en el éter, muy acre (principio del espinio serval), acibar en gran cantidad, un polvo inerte y crémor de tártaro.

Las del número segundo contienen gran cantidad de gutagamba, menor cantidad de acibar que las precedentes, un polvo inerte, crémor de tártaro y quizás escamonea.

Bouchardat ha dado la fórmula siguiente:

℞ Acíbar,
 Resina de jalapa,
 Extracto de coloquintida,
 Gutagamba,
 Ruibarbo en polvo, ãã. ℞j (12 dec.).
 Mirra. ℞ij (24 dec.).
 H. S. A. sesenta y ocho píldoras.

D. Una á cuatro píldoras al día.

5856. Otras, n. 2.

℞ Acíbar,
 Gutagamba,
 Resina de jalapa,
 Ruibarbo,
 Extracto de coloquintida,
 Crémor de tártaro,
 Escamonea, ãã. ḡxviii (1 gr.).
 Mirra. ℞ß (2 gr.).
 H. S. A. cincuenta píldoras.

I. Embarazo de las primeras vias, estreñimiento, hidropesia.

D. Una á cuatro píldoras al día como drásticas.

5857. P. MOSCADAS COMPUESTAS (Hunter).

℞ Almizcle. ḡxv (75 cent.).
 Alcanfor. ḡv (25 cent.).
 Espíritu de vino. 2 gotas.
 Conserva de rosas. c. s.

H. S. A. doce píldoras, que se dan al día como antiespasmódicas.

5858. P. DE MOSCOU, PÍLDORAS DE HULM ó Píldoras tónicas de Hulm.

℞ Extracto de colombo,
 Extracto de genciana.
 Extracto de quasia,
 Hiel de vaca, ãã. ℞ij (8 gr.).
 Genciana en polvo. c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Debilidad de estómago y digestiones perezosas. D. Una ó dos píldoras inmediatamente despues de comer; se bebe despues una taza de infusion fria de quasia.

5859. P. DE MOSELLY.

℞ Ruibarbo de la China,
 Gengibre, ãã. ℞j (4 gr.).
 Jarabe de canela. c. s.
 H. S. A. cuarenta píldoras.
 D. Una píldora al día.

5860. P. NAPOLITANAS.

℞ Mercurio,
 Miel blanca,
 Acíbar, ãã. ℞jß (6 gr.).
 Ruibarbo. ḡLjv (3 gr.).
 Escamonea. ℞ß (2 gr.).
 Pimienta negra. ḡxviii (1 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Sífilis, sífilides, iritis, conjuntivitis, enfermedades de la piel, afecciones escrofulosas. D. Seis á ocho al día.

5861. Otras (MARTIN SOLON).

℞ Ungüento mercurial. ḡc (5 gr.).
 Extracto de cicuta. ḡLx (3 gr.).

Extracto de opio. ḡxl (2 gr.).
 Jabon y polvo de eicuta. c. s.
 H. S. A. cien píldoras.

I. Sífilis constitucional, herpes rebeldes. D. Dos á ocho píldoras al dia.

Nota. Son las píldoras de Sedillot adicionadas.

5862. P. NARCÓTICAS
 (Barthez y Rilliet).

2 Extracto de opio,
 Extr. de belladona, ãã. ḡjv (2 dec.).
 Tridacio. ḡvj (3 dec.).
 Malvabisco en polvo. . c. s.
 H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Corea grave en los niños de diez años. D. Tres píldoras al dia, aumentando sucesivamente la dosis.

5863. P. NARCÓTICAS ASTRINGENTES
 (Dumars).

2 Tanino. ḡxxxvj (2 gr.).
 Extracto de opio. . . ḡj (5 cent.).
 Conserva de rosas. . c. s.
 H. S. A. veinte píldoras.

I. Producen buenos efectos en las hemorragias uterinas. D. Una píldora cada hora hasta que cese la hemorragia.

5864. P. NAUSEOSAS.

2 Ipecacuana en polvo. . ḡvj (3 dec.).
 Arrope de saúco. . . . c. s.
 H. S. A. seis píldoras.
 D. Una píldora cada dos horas.

5865. P. NERVINAS (Krause).

2 Vitriolo verde,
 Subcarb. de potasa, ãã. 3j (4 gr.).
 Goma arábica. . . . ḡxij (6 dec.).
 H. S. A. veinte píldoras.

I. Dolores nerviosos crónicos.
 D. Tres á seis píldoras al dia.

5866. P. DE NITRATO DE PLATA.

2 Nitrato de plata. . . . ḡx (5 dec.).
 Extracto de diente de leon,
 Polvo de lirio, ãã. . . . 3j (4 gr.).
 H. S. A. cuarenta píldoras.
 Se toma una píldora por la ma-

ñana y otra por la noche en la gastralgia idiopática.

5867. P. DE NITRATO DE PLATA Ó Píldoras antiépilépticas (F. P.).

2 Nitrato de plata cristal. ḡj (5 cent.).
 Miga de pan. 3j (4 gr.).
 H. S. A. diez y seis píldoras.

I. Epilepsia, temblor nervioso y parálisis. D. Una píldora mañana y noche.

Nota. Segun la F. P. se puede asociar almizcle, opio ó alcanfor.

5868. P. DE NITRATO DE PLATA
 (Merat).

2 Extr. acuoso de opio. 3ß (2 gr.).
 Alcanfor en polvo. . 3ij (24 dec.).
 Almizcle en polvo. . 3j (12 dec.).
 Nitrato de plata crist. ḡiij (15 cent.).
 Jarabe simple. . . . c. s.

H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

I. Epilepsia, baile de S. Vito, neurosis, convulsiones, temblor nervioso y parálisis. D. Una píldora mañana y noche, aumentando progresivamente.

5869. Oiras (RUEF).

2 Nitrato de plata. . . . ḡjv (2 dec.).
 Agua destilada. . . . c. s.

Se disuelve y se espesa la solución con

Goma tragacanto. . . . c. s.
 H. S. A. doce píldoras.

I. Gastritis crónica, gastralgia, epilepsia. D. Una píldora cada media hora hasta llegar á cuatro ú ocho, etc.

Se debe renovar estas píldoras á menudo.

5870. P. DE NITRATO DE PLATA OPIADAS.

2 Nitrato de plata. . . . ḡj (5 cent.).
 Extracto de opio. . . ḡjv (20 cent.).
 H. S. A. píldoras.

D. Una por la mañana y otra por la noche.

5871. P. NITRO-ALCANFORADAS
(*C. Bell*).

℥ Nitro,
Alcanfor, ãã. ḡxviii (4 gr.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. cuatro píldoras.

I. Blenorragia aguda. *D.* Una píldora por la mañana y otra por la noche. Comunmente se añade ḡj (5 cent.) de opio.

5872. P. DE NOGAL (*Sandras*).

℥ Extr. de hojas de nogal. ḡc (5 gr.).
Polvo de malvabisco. c. s.
H. S. A. cincuenta píldoras.

D. Cuatro píldoras al día, con veinte á cuarenta gotas de tintura de iodo, y á veces sin ella á los escrofulosos.

5873. P. DE NUEZ VÓMICA.

℥ Extracto alcohólico de
nuez vómica. 5ß (2 gr.).
Conserva de rosas. 3ij (8 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.

D. Una píldora al día, aumentando progresivamente la dosis.

5874. Otras, n. 2.

℥ Extracto de nuez vómica,
Extracto de coloquintida,
Extr. de pelitre, ãã. ḡjx (50 cent.).
Jarabe de arnica. c. s.

H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Parálisis, proptosis, disenteria, reumatismo, enuresis, neuralgias. *D.* Una á seis píldoras al día, aumentando progresivamente.

5875. P. DE NUEZ VÓMICA FERRUGINOSAS (*Mondière*).

℥ Extr. de nuez vómica. ḡviii (4 dec.).
Oxido negro de hierro. 3j (4 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Incontinencia de orina por atonía. *D.* Tres píldoras al día.

5876. P. DE OBRIEN CONTRA LOS TUMORES BLANCOS.

℥ Calomelanos. ḡxx (4 gr.).
Opio. ḡvj (3 dec.).
H. S. A. seis píldoras.

Cuando sobreviene la salivacion se suspende el uso de las píldoras, teniendo cuidado de no combatir el tialismo con ningun medicamento inoportuno. Cuando la salivacion es muy intensa se la combate con gargarismos emolientes. *D.* Seis píldoras cada tres horas.

5877. P. ODONTÁLGICAS (*Rust*).

℥ Extracto de belladona,
Extracto de beleño,
Opio purificado, ãã. ḡxij (6 dec.).
Pelitre en polvo. 3ß (2 gr.).
Esencia de clavo. 24 gotas.

H. S. A. píldoras de ḡj (5 cent.).

I. Odontalgia por caries. *D.* Una píldora en la cavidad del diente.

5878. P. OPIADAS ALCANFORADAS (*Ricord*).

℥ Alcanfor. ḡLjv (3 gr.).
Extracto de opio. ḡviii (4 dec.).
Mucilago. c. s.

H. S. A. diez y seis píldoras.

I. Erecciones é irritaciones del cuello de la vejiga. *D.* Dos ó tres píldoras por las tardes.

5879. P. DE OPIO ANTIMONIALES.

℥ Opio. ḡij (10 cent.).
Tártaro emético. ḡj (5 cent.).
Triaca. c. s.

H. S. A. cuatro píldoras.

D. Una á dos píldoras al día.

5880. P. DE OPIO Y BELEÑO.

℥ Extr. acuoso de opio. ḡij (10 cent.).
Extracto de lechuga. ḡv (25 cent.).
Extr. de belladona. ḡiij (15 cent.).
Extracto de beleño. ḡiij (15 cent.).
Manteca de cacao. 3ß (2 gr.).

H. S. A. quince píldoras.

I. Sudor inglés, tisis, pleuresia, enfisema, hepatalgia, diar-

rea crónica, disenteria crónica, parálisis, pedionalgia, reumatismo, panarizo, muermo, orquitis, cólico nervioso, neumatosis, ileo, sífilides, polidipsia, convulsiones, disnea, iritis, catarro agudo, bronquitis, cardialgias, histérico, metritis, neuralgias. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5881. P. DE OPIO GLICIRRIZADAS.

☞ Opio. ḡxviii (1 gr.).
 Extracto de regaliz. ḡij (8 gr.).
 Pim. de la Jamáica. ḡxc (5 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡv (25 cent.).

5882. P. DE OPIO É IPECACUANA.

☞ Opio en polvo,
 Ipecacuana en polvo, añ. ḡj (5 cent.).
 Conserva de cinosbastos. c. s.
 H. S. A. dos píldoras.

5883. P. DE ORO.

☞ Oro dividido. ḡxij (6 dec.).
 Extracto de saponaria. ḡj (4 gr.).
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Una á doce ó quince al dia.

5884. P. ORIENTALES.

☞ Opio purificado. 1
 Azafran. 1
 Canela. 1
 Nuez moscada. 1
 Cardamomo. 1
 Jarabe de flores de naranjo. . . c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Se emplean para conseguir un sueño tranquilo. *D.* Dos ó tres píldoras antes de acostarse.

5885. P. DE ÓXIDO NEGRO DE HIERRO.

☞ Oxido negro de hierro,
 Azafran,
 Valeriana, añ. ḡjx (50 cent.).
 Jarabe de artemisa. . . c. s.
 H. S. A. ocho píldoras.

I. Catarro-útero vaginal, amenorrea, clorosis, diabetes, raquitis, enuresis, neuralgias. *D.* Cuatro píldoras al dia.

5886. P. DE OXICIANURO DE MERCURIO OPIADAS.

☞ Oxicianuro de mercur. ḡvj (3 dec.).
 Opio en bruto. ḡxij (6 dec.).
 Miga de pan. ḡβ (15 gr.).
 H. S. A. noventa y seis píldoras.

5887. P. DE ÓXIDO DE ORO (Chrestien).

☞ Extracto de corteza de
 raíz de torbisco. ḡij (8 gr.).
 Oxido de oro preparado
 por la potasa. ḡvj (3 dec.).
 H. S. A. sesenta píldoras iguales.
I. Escrófulas é infartos linfáticos.
D. Primero una píldora al dia, y despues dos, tres ó cuatro hasta siete ú ocho.

5888. P. PARA DESINFECTAR EL ALIENTO.

☞ Cloruro de cal seco. ḡij (8 gr.).
 Azúcar. ḡβ (250 gr.).
 Almidon. ḡj (32 gr.).
 Goma tragacanto. ḡj (4 gr.).
 Carmin. ḡiij (15 cent.).
 H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

D. Cinco ó seis píldoras cada dos horas.

5889. P. PARA PROVOCAR EL PARTO PREMATURO ARTIFICIAL (Van Wageninge).

☞ Ergotina,
 Cornez. de centeno, añ. ḡij (8 gr.).
 Acibar sucotrino. ḡj (12 dec.).
 H. S. A. sesenta píldoras.
D. Cuatro píldoras tres veces al dia.

5890. P. PARA RESTABLECER LAS HEMORROIDES.

☞ Acibar en polvo. ḡij (1 dec.).
 Azufre sublimado y lavado. ḡvj á ḡx (3 á 5 dec.).
 H. S. A. dos píldoras.
D. Cuatro ó seis píldoras al dia durante una semana.

5891. P. PARA RESTABLECER LAS REGLAS.

℞ Polvo ó extracto de sabina,
Polvo de acíbar, ãã. ḡij (1 dec.).
H. S. A. una píldora.

I. Amenorrea, dismenorrea, hemorroides. D. Tres ó cuatro píldoras al dia durante una semana.

5892. P. DE PARISET (F. P.).

℞ Goma tragacanto. ḡB (6 dec.).
Tártaro emético. ḡiij (15 cent.).
Opio gomoso. ḡiij (15 cent.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. doce píldoras.

I. Se usan como expectorantes en los catarros crónicos. D. Una píldora, dos ó tres veces al dia.

5893. P. PECTORALES (H. DE AL.).

℞ Azufre dorado. 3B (2 gr.).
Goma amoniaco,
Extracto de regaliz, ãã. 3B (15 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
D. Cinco á diez píldoras al dia.

5894. P. PECTORALES DE ÉNULA.

℞ Extracto de énula. 3B (2 gr.).
Digital en polvo,
Ipecacuana en p., ãã. ḡv (25 cent.).
Azufre. 3B (2 gr.).
Opio. ḡvj (30 cent.).
Goma amoniaco. 3B (2 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Catarro crónico, asma, coqueluche. D. Una píldora de hora en hora.

5895. P. DE PELITRE.

℞ Raiz de pelitre. 3j (4 gr.).
Aceite de menta pip. ḡv (25 cent.).
Conserva de coclearia. c. s.
H. S. A. quince píldoras.

I. Calenturas intermitentes, parálisis. D. Cinco píldoras mañana y noche.

5896. Otras (H. DE AL.).

℞ Pelitre. 3j (4 gr.).
Mucilago de goma arábica. c. s.
H. S. A. treinta píldoras.

I. Calenturas intermitentes. D. Seis píldoras cada cuatro horas.

5897. P. DE PETER.

℞ Acíbar,
Jalapa,
Escamonea,
Gutagamba, ãã. 3ij (60 gr.).
Calomelanos. 3j (30 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Purgante drástico. D. Una á cuatro píldoras.

5898. P. DE PIPERINO.

℞ Piperino. ḡxviiij (1 gr.).
Polvo de malvabisco. 3B (2 gr.).
Jarabe de goma. c. s.

H. S. A. diez y ocho píldoras.
D. Se toman dos de hora en hora contra las fiebres intermitentes.

5899. P. PLATÍNICAS.

℞ Percloruro de platino. ḡx (5 dec.).
Extracto de guayaco. 3j (4 gr.).
Regaliz en polvo. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

D. Una, dos, tres y aun cuatro píldoras mañana y noche.

5900. P. DE PLOMBAGINA.

℞ Plombagina,
Extr. de dulcamara, ãã. 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Enfermedades de la piel, afecciones reumáticas. D. Quince píldoras al dia.

5901. P. DE PLOMBAGINA MERCURIALES (Veinhold).

℞ Deutocloruro de merc. ḡij (1 dec.).
Plombagina. 3v (20 gr.).
Jarabe de malvabisco. c. s.

H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Afecciones escrofulosas, formas secundarias de la sífilis, enfermedades cutáneas crónicas. D. Cuatro á cinco píldoras cinco veces al dia.

5902. P. DE PLUMMER ó Píldoras alterantes simples de Plummer.

℞ Azufre dorado de antimonio. 4

Protocloruro de mercurio. 4
 Extracto de fumaria. 4
 H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.)

I. Enfermedades herpéticas. *D.* Una á tres píldoras por dia.

Muchas farmacopeas ponen extracto de regaliz en lugar del extracto de fumaria, pero este es mas á propósito para el uso de las píldoras.

5903. P. DE PLUMMER COMPUESTAS ó Píldoras alterantes compuestas (F. DE EDIMBURGO).

℥ Azufre dorado de antimonio,
 Calomelanos, ãã. ʒß (2 gr.).
 Resina de guayaco. ʒj (4 gr.).
 Mucilago de goma aráb. c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Herpes, impétigo, sífilis, sífilides, hepatitis. *D.* Dos á seis píldoras mañana y noche.

5904. P. DE PLUMMER COMPUESTAS ó Píldoras alterantes de Plummer (F. P.).

℥ Azufre dorado de antimonio. 6
 Protocloruro de mercurio. 6
 Zumo depurado de regaliz. 4
 Mucilago de goma arábica. c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡvj (3 dec.).

I. Convalecencia de las fiebres intermitentes é infartos de las vísceras abdominales acompañados de infiltracion de los miembros inferiores, afecciones venéreas, afecciones cutáneas, afecciones sífilíticas y como alterantes. *D.* Dos á cuatro píldoras al dia, bebiendo despues una tisana de achicorias.

5905. P. DE POLÍGALA.

℥ Poligala en polvo. ʒj (4 gr.).
 Jabon medicinal. ʒij (8 gr.).
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Una cada dos horas.

5906. P. DE POLVO DE DIGITAL.

℥ Polvo de hojas de digital. ḡxx (1 gr.).

Miel blanca. c. s.

H. S. A. veinte píldoras.

I. Son sedantes del sistema nervioso. *D.* Una píldora, aumentando sucesivamente hasta diez ó doce.

5907. P. Ó POLVOS PROFILÁCTICOS DE LAS VIRUELAS (Rosen).

℥ Calomelanos. ʒß (6 dec.).
 Alcanfor. ḡviiij (4 dec.).
 Extracto de acibar. ʒß (6 dec.).
 Resina de guayaco. ḡviiij (4 dec.).
 H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.) plateadas ó veinte papeles.

Se administran á la dosis necesaria para producir dos á cuatro deposiciones alvinas al dia.

5908. P. DE PROTOTARTRATO ANTIMONIADO DE POTASA (Waller).

℥ Etiope antimonial,
 Prototartrato de potasa, ãã. ḡxviiij (1 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Pannus, conjuntivitis. *D.* Una ó dos píldoras cada dos horas.

5909. P. DE PULSATILA.

℥ Raiz de valeriana,
 Flores de arnica,
 Asa fétida, ãã. ʒß (2 gr.).
 Extracto de pulsatila. ḡjx (50 cent.).
 Tártaro emético. ḡiij (15 cent.).
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Amaurosis, hemorroides, herpes crónicos, sífilides, parálisis. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5910. P. PURGANTES (Vandanme).

℥ Escamonea de Alepo,
 Acibar sucotrino ãã. ʒij (64 gr.).
 Aceite de croton tigl. ḡLjv (3 gr.).
 Alcohol de 32°. ʒiijß (14 gr.).
 Se disuelve el aceite en el alcohol; por otra parte se echa en un mortero de hierro el acibar y la escamonea en polvo y se mezclan bien con el pilon; se añade la solución alcohólica y se hace una masa muy homogénea, que se

divide en píldoras de $\tilde{g}v$ (25 cent.).

D. Una á tres píldoras á los adolescentes y tres á cinco á los adultos.

5911. P. PURGANTES.

℞ Raíz de jalapa en polvo,
Azúcar, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{g}j$ (12 dec.).
Ruibarbo en polvo. . . $\tilde{g}xxx$ (15 dec.).
Jarabe de achicorias compuesto, c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
D. De cuatro á ocho píldoras al día.

5912. Otras, n. 2.

℞ Resina de jalapa,
Gutagamba,
Jabon, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{g}vj$ (3 dec.).
Jarabe. c. s.
H. S. A. tres píldoras.

I. Estreñimiento rebelde é hidropesías. *D.* Se toman por la mañana en ayunas, y en la apoplejía despues del uso de las sangrías; como alterantes se hacen seis píldoras y se dan dos ó tres al día.

5913. Otras, n. 3.

℞ Acíbar,
Escamonea,
Gutagamba, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{g}xviiij$ (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . $\tilde{g}Ljv$ (3 gr.).
H. S. A. veinte píldoras.
D. Dos á cuatro píldoras.

5914. Otras, n. 4.

℞ Escamonea. 2
Gutagamba. 2
Coloquintida. 2
Acíbar. 1
H. S. A. píldoras de $\tilde{g}ij$ (1 dec.) que se platearán.

D. Dos ó tres píldoras al tiempo de comer, ó cantidad suficiente para obtener cuatro ó cinco deposiciones.

5915. Otras (ALIBERT).

℞ Resina de jalapa,
Mercurio dulce,
Jabon blanco, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{g}j$ (4 gr.).

Esencia de cáscara de nar. 6 gotas.

H. S. A. píldoras de $\tilde{g}ij$ (1 dec.).

D. Una píldora cada media hora hasta producir deposiciones alvinas.

5916. Otras (ALTHOF).

℞ Resina de jalapa. $\tilde{g}j$ (4 gr.).
Jabon medicinal. $\tilde{g}j$ (4 gr.).
Alcohol de 22 á 32°. . . . $\tilde{g}ij$ (8 gr.).
H. S. A. píldoras de $\tilde{g}jv$ (2 dec.).
D. Dos por la mañana y dos por la noche al acostarse.

5917. Otras (DEHAEN).

℞ Resina de jalapa,
Escamonea, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{g}jv$ (125 gr.).
Extracto católico. . . . $\tilde{g}j$ (30 gr.).
Alcohol para ablandar las sustancias. . . c. s.

H. S. A. píldoras de $\tilde{g}jv$ (2 dec.).

I. Hidropesías, enfermedades asténicas, etc. *D.* De dos á cinco píldoras en las veinticuatro horas.

NOTA. El extracto purgante drástico, llamado vulgarmente CATÓLICO, se prepara segun la F. DE VIENA con $\tilde{g}jv$ (125 gr.) de acíbar, $\tilde{g}iiij$ (90 gr.) de coloquintida despojada de su corteza, $\tilde{g}ij$ (60 gr.) de agárico blanco, $\tilde{g}ij$ (60 gr.) de escamonea y $\tilde{g}ij$ (60 gr.) de raíz de elëboro negro. Se trata estas sustancias por el alcohol y despues por el agua; se mezclan los líquidos colados y se los evapora en el baño maría para tener un extracto seco. Era necesario que Dehaen no conociese la composicion del extracto católico, porque es supérfluo añadir escamonea á escamonea.

5918. P. PURGANTES (PITSCHAFF).

℞ Extracto de coloquintida compuesto. . . $\tilde{g}xviiij$ (4 gr.).
Acetato de morfina. . . $\tilde{g}j$ (5 cent.).
H. S. A. veinte píldoras.

I. Se usan principalmente en los ancianos. *D.* Una píldora por la noche y segun las circunstancias una al despertar.

5919. P. PURGANTES DE FRANK ó granos de salud.

℞ Limaduras de hierro. . . $\tilde{g}ij$ (8 gr.).

Acíbar sucotríno,
Jalapa,
Pulpa de tamarindos, ãã. ʒj (4 gr.).
Jarabe de achicorias. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
D. De seis á ocho píldoras.

5920. P. PURGANTES (Rayer).

ʒ Jalapa en polvo,
Escam. en polvo, ãã. ʒij (24 dec.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Cólico de plomo. D. Dos á seis píldoras al día hasta producir evacuaciones abundantes.

5921. P. PURGANTES CON ACEITE DE CROTON.

ʒ Aceite de croton. 1 gota,
Miga de pan blanco. c. s.
H. S. A. una píldora.

5922. P. PURGANTES ANTIESPASMÓDICAS (Gnepratte).

ʒ Asa fétida,
Extracto de valeriana,
Tridacio, ãã. ʒxviii (4 gr.).
Limaduras de hierro. ʒß (2 gr.).
Jabon de croton. ʒLjv (3 gr.).
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

I. Produjo buenos resultados en un caso de gastralgia. D. Tres píldoras al día.

5923. P. PURGANTES DE LA HORSE.

ʒ Acíbar. ʒbj (500 gr.).
Gutagamba. ʒij (64 gr.).
Jabon. ʒjv (125 gr.).
Aceite de anís. ʒß (16 gr.).
H. S. A. Una masa que se dividirá en píldoras de ʒjv (2 dec.).

5924. P. PURGANTES ó Granos de salud (Bally y Cadet).

ʒ Acíbar sucotríno,
Jalapa, ãã. ʒj (32 gr.).
Ruibarbo. ʒij (8 gr.).
Jarabe de ajénjos. c. s.
Se hace una masa y se la divi-

de en píldoras de ʒiij (15 cent.); se las platea.

I. Se úsan en todos los casos en que hay que tomar las que se han atribuido á Frank. Digestiones difíciles, embarazo de las primeras vías, estreñimiento, dispepsia, vértigos, ablactacion, lepra. D. Una á cuatro píldoras y aun mas en todo el día.

5925. P. PURGANTES Y DIURÉTICAS (Frank).

ʒ Extracto de coloquintida compuesto,
Polvo de gutag., ãã. ʒxv (75 cent.).
Calomelanos en polv. ʒx (50 cent.).
Jarabe de gengibre. c. s.
H. S. A. doce píldoras.

Se dan seis por la mañana y seis por la noche en el tratamiento de las hidropesías.

5926. P. PURGANTES DIURÉTICAS (Gall).

ʒ Cebolla albarrana en polvo,
Asa fétida, ãã. ʒß (2 gr.).
Extracto de coloquintida compuesto,
Digital purpúrea, ãã. ʒxviii (4 gr.).
H. S. A. diez y ocho píldoras.

I. Hidropesías pasivas, tumores glandulosos, etc. D. Dos píldoras cada tres horas hasta producir deposiciones.

5927. P. PURGANTES Y FUNDENTES (Saiffert).

ʒ Extracto de genciana. ʒß (16 gr.).
Hiel de buey. ʒiij (12 gr.).
Escamonea. ʒij (8 gr.).
H. S. A. ciento setenta y dos píldoras iguales.

D. De cuatro á seis píldoras cada día en ayunas ó antes de comer.

5928. P. PURGANTES DE RESINA DE JALAPA (Mialhe).

ʒ Resina de jalapa pura. ʒx (5 dec.).
Potasa cáustica. ʒij (4 dec.).
Agua. 2 gotas.
Jabon amigdalino. ʒviii (4 dec.).
Magnesia calcinada. ʒLvj (2,8 gr.).

H. S. A. diez píldoras plateadas.

D. Cuatro ó cinco, y las diez píldoras constituyen un purgante de los mas eficaces. Se bebe uno ó dos vasos grandes de agua, y no se vuelve á tomar mas píldoras hasta que produzcan su efecto purgante.

5929. P. PURGANTES VERMÍFUGAS
(*Meased*).

℞ Aceite de croton. . . . 4 gotas.
Jabon medicinal. . . . ʒʒ (2 gr.).
Jalapa. . . . ʒʒ (2 gr.).
Extr. etéreo de helecho. ʒj (12 dec.).
Extracto de regaliz. . . c. s.
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Ténia.

5930. P. DE QUASIA.

℞ Extracto de quasia. . . . ʒʒ (6 gr.).
Genciana. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Dispepsia, acrodinia, acidez de las primeras vias, sudor inglés. D. Cinco píldoras, mañana y noche.

5931. P. DE QUINA ALCANFORADAS
(*Dupuytren*).

℞ Extracto de quina. . . ʒj (4 gr.).
Extracto de opio. . . . ʒj (5 cent.).
Alcanfor. . . . ʒxij (6 dec.).
Quina en polvo. . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Se usan como tónicas y estimulantes en las fiebres atáxico-adinámicas. D. Una píldora cada tres horas.

5932. P. DE QUERMES.

℞ Quermes mineral. . . ʒviiij (4 dec.).
Polvos de Dower. . . . ʒxij (6 dec.).
Arrope de saúco. . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.

I. Gota, reumatismo, para provocar la diaforesis y calmar los dolores. D. Una píldora cada dos horas.

5933. P. DE QUINA ALCANFORADAS.

℞ Extracto de quina. . . ʒj (4 gr.).

Alcanfor. . . . ʒʒ (6 dec.).
Extracto de opio. . . . ʒj (5 cent.).
Quina en polvo. . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.

I. Calenturas intermitentes, calenturas atáxico-adinámicas, as-tenia, ataxia, coqueluche, esplenitis, sudor inglés, pica, convulsiones, hepatalgia, anorexia, tétanos, priapismo, diarrea, gerofthalmia, cefalalgia, convalecencia. D. Una píldora cada tres horas.

5934. P. DE QUINA COMPUESTAS.

℞ Quina. . . . ʒʒ (2 gr.).
Alcanfor,
Ipecacuana,
Nitro, añ. . . . ʒvj (3 dec.).
Conserva de rosas,
Jarabe de limon, añ. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Amenorrea, anorexia, pica, caquexia, calenturas intermitentes, diarrea, disenteria, sudor inglés, bulimia, cefalalgia, convulsiones, catarro crónico, esplenitis, coqueluche, dispepsia, lepra, úlceras atónicas, ataxia, convalecencia. D. Dos píldoras mañana y noche.

5935. P. DE QUINOIDINA.

℞ Quinoidina. . . . ʒj (4 gr.).
Quina. . . . ʒj (4 gr.).
Opio. . . . ʒjv (2 dec.).
Oleosácaro de alcarav. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Esplenitis, cefalalgia, calenturas intermitentes ó remitentes perniciosas, tisis, convulsiones, amenorrea. D. Dos píldoras cada dos horas.

5936. P. DE RAIZ DE TONDIN.

℞ Raiz de tondin en polv. ʒʒ (2 gr.).
Extracto de genciana. ʒxviiij (4 gr.).
Jarabe de alcanfor. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Lepra, elefantiasis, herpes, soriasis, escrófulas. D. Dos píldoras mañana y noche.

5937. P. DE RASORI ó Píldoras anticoréicas de Rasori.

℥ Extracto de jalapa,
Escamonea, ãã. . . . ḡiij (15 cent.).
H. S. A. dos píldoras.
D. Se da una píldora todos los dias hasta obtener la curacion.

5938. P. DE RATANIA.

℥ Extracto de ratania. . . 5j (4 gr.)
Alumbre. ḡxviiij (4 gr.)
Cálamo aromático. . . 5ß (2 gr.)
Jarabe de cáscara de naranja. . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Diarrea y disenteria crónicas, gastrorragia, metrorragia, hemorragias pasivas, leucorrea, catarro útero-vaginal, sífilis. D. Tres píldoras mañana y noche.

5939. P. RELAJANTES (Buchan).

℥ Jabon blanco. 5jß (6 gr.)
Extr. de diente de leon. ḡij (24 dec.).
Sagapeno,
Acíbar sucotrino, ãã. ḡj (12 dec.).
H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).
I. Estreñimiento. D. Cuatro ó cinco píldoras mañana y noche.

5940. P. DE RENOÜ.

℥ Mercurio. 5iij (12 gr.)
Acíbar. 5ijß (10 gr.)
Ruibarbo. 5jß (6 gr.)
Escamonea. 5j (4 gr.)
Agárico blanco. . . . 5ß (2 gr.)
Sasafrás,
Canela,
Macis, ãã. ḡxij (6 dec.).
Miel. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Herpes, enfermedades de la piel. D. Tres á ocho píldoras al dia.

5941. P. RESINOSAS DEPURATIVAS (Jahn).

℥ Resina de guayaco,
Mirra,
Almáciga, ãã. 5ij (8 gr.)
Extracto de dulcamara,
Extr. de saponaria, ãã. 5jß (6 gr.)

H. S. A. píldoras de ḡj (5 cent.).
I. Leucorrea y otros flujos mucosos crónicos. D. Ocho píldoras, tres veces al dia.

5942. P. RESOLUTIVAS (Rust).

℥ Calomelanos. ḡxij (6 dec.).
Azufre dor. de antim. ḡj (12 dec.).
Extracto de cicuta,
Extr. de caléndula, ãã. 5ij (8 gr.).
Canela en polvo. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Induraciones crónicas. D. Cinco píldoras al dia.

5943. Otras (SCHUBARTH).

℥ Extracto de celedonia,
Goma amoniaco, ãã. . . 5jß (6 gr.).
Jabon medicinal. 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Hepatitis crónica. D. Ocho á doce píldoras por la mañana, al medio dia y por la noche.

5944. P. DE RITTMANN.

℥ Resina de jalapa. 5ß (15 gr.).
Protocloruro de merc. 5ß (2 gr.).
Divídase en setenta y dos píldoras.
D. Seis píldoras al dia.

5945. P. DE RUDA.

℥ Azafran en polvo,
Ruda en polvo,
Extr. de achicorias, ãã. ḡj (12 dec.).
Gomatragac. en polvo. ḡß (6 dec.).
H. S. A. doce píldoras.
D. Una píldora por la mañana y otra por la tarde, despues dos y luego tres.

5946. P. DE RUIBARBO (F. M.).

℥ Ruibarbo. 5iij (12 gr.).
Acíbar sucotrino. . . . 5x (40 gr.).
Mirabolanos cetrinos,
Polvo diarrodon, ãã. . . 5iij (12 gr.).
Zumo de regaliz,
Zumo de ajenjos, ãã. . 5j (4 gr.).
Sal catártica. 5ij (8 gr.).
Jar. de achicorias comp. c. s.
H. S. A. masa para píldoras.
I. Son purgantes y se han usado

mucho contra las tercianas y cuartanas. *D.* De $\mathfrak{D}j$ á $\mathfrak{3}j$ (12 dec. á 4 gr.).

5947. P. DE RUFUS (H. DE M.).

\mathfrak{z} Acíbar. $\mathfrak{3}ij$ (60 gr.).
Mirra. $\mathfrak{3}j$ (30 gr.).
Azafran. $\mathfrak{3}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . . c. s.

H. S. A. píldoras de $\mathfrak{g}jv$ (2 dec.).
Cada una contiene un grano y un tercio de acíbar.

I. Son purgantes, estomacales y emenagogas, útiles en las obstrucciones de las vísceras abdominales. *D.* Una á catorce píldoras como emenagogas, y cinco á diez como purgantes.

5948. P. DE RUIBARBO COMPUESTAS (F. DE L.).

\mathfrak{z} Ruibarbo en polvo. . . $\mathfrak{3}j$ (32 gr.).
Acíbar en polvo. . . . $\mathfrak{3}vj$ (24 gr.).
Mirra en polvo. $\mathfrak{3}j$ (32 gr.).
Jabon. $\mathfrak{3}j$ (4 gr.).
Aceite de alcaravea. . . $\mathfrak{3}\mathfrak{B}$ (16 gr.).
Jarabe. c. s.

H. S. A. píldoras.

5949. P. DE RUIBARBO MAGNESIANAS.

\mathfrak{z} Ruibarbo. $\mathfrak{3}ij$ (8 gr.).
Magnesia calcinada. . . $\mathfrak{3}ij$ (8 gr.).
Extracto de genciana. . . c. s.
H. S. A. píldoras de $\mathfrak{g}v$ (25 cent.).

5950. P. DE SABINA.

\mathfrak{z} Sabina en polvo,
Extr. de manzanilla, $\tilde{a}\tilde{a}$. $\mathfrak{3}j\mathfrak{B}$ (6 gr.).
Oxido negro de hierro,
Acíbar sucotrino, $\tilde{a}\tilde{a}$. $\mathfrak{g}xvj$ (8 dec.).
H. S. A. píldoras de $\mathfrak{g}ij$ (1 dec.).
I. Clorosis. *D.* Dos á cuatro píldoras al dia.

5951. P. DE SABINA FERRUGINOSAS (Radius).

\mathfrak{z} Polvo de sabina. . . . $\mathfrak{3}ij$ (8 gr.).
Polvo de hierro. . . . $\mathfrak{3}j$ (4 gr.).
Extracto de acíbar. . . $\mathfrak{D}j$ (12 dec.).
Jarabe de goma. . . . c. s.

H. S. A. píldoras de $\mathfrak{g}ij$ (1 dec.).
I. Leucorrea asténica. *D.* Dos á cuatro píldoras, dos ó tres veces al dia.

5952. P. DE SAGAPENO COMPUESTAS (F. DE L.).

\mathfrak{z} Sagapeno. $\mathfrak{3}j$ (32 gr.).
Acíbar. $\mathfrak{3}\mathfrak{B}$ (2 gr.).
Jarabe de gengibre. . . c. s.

Macháquese hasta que se incorporen.

5953. P. DE SAINTE MARIE para terminar la gonorrea.

\mathfrak{z} Cons. de rosas rojas. $\mathfrak{3}jv$ (125 gr.).
Bálsamo de copaiba. . $\mathfrak{3}j$ (32 gr.).
Sangre de drago. . . . $\mathfrak{3}\mathfrak{B}$ (16 gr.).
Protocloruro de merc. $\mathfrak{3}j$ (4 gr.).
H. S. A. píldoras de $\mathfrak{g}vj$ (3 dec.).

I. Blenorragia, blenorrea, leucorrea, sífilis. *D.* Se dan hasta $\mathfrak{3}\mathfrak{B}$ (2 gr.) dos veces al dia; se puede aumentar la dosis hasta $\mathfrak{D}ij$ (24 dec.) para las personas robustas. El uso del agua de hierro mezclada con vino, en las principales comidas, contribuye á los buenos efectos de este remedio.

5954. P. DE SALICINA.

\mathfrak{z} Salicina,
Extr. de genciana, $\tilde{a}\tilde{a}$. $\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ (6 dec.).
Polvo de regaliz. . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
D. Dos, cada dos horas.

5955. Otras, n. 2.

\mathfrak{z} Salicina. $\mathfrak{g}xviii$ (1 gr.).
Extracto de ajenjos,
ó Extr. de regaliz, $\tilde{a}\tilde{a}$. c. s.
H. S. A. seis píldoras.
D. Se toman en tres veces con media hora de intervalo.

5956. P. SEDANTES.

\mathfrak{z} Alcanfor,
Nitro,
Extracto de beleño,
Polvo de digital, $\tilde{a}\tilde{a}$. . $\mathfrak{g}xviii$ (1 gr.).
H. S. A. píldoras de $\mathfrak{g}jv$ (2 dec.).
I. Blenorragia, disuria, cisti-

tis aguda, cardiopalmia. *D.* Tres ó cuatro píldoras al día.

5957. P. SEDANTES.

℞ Digital. ʒj (4 gr.).
Hidroclor. de morfina. ʒvj (3 dec.).
Alcanfor. ʒʒ (2 gr.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Se toman dos al día y se aumenta sucesivamente la dosis.

5958. Otras, n. 3.

℞ Digital en polvo,
Píldoras de cinoglosa, añ. ʒj (4 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Tisis pulmonar, palpitaciones del corazón. *D.* Una á tres píldoras al día.

5959. Otras (GUNTHER).

℞ Asa fétida,
Extr. de valerian., añ. ʒxc (5 gr.).
Extr. de belladona. ʒvj (3 dec.).
Oxido de zinc sublim. ʒxxviii (1 gr.).
Castóreo. ʒxxxvj (2 gr.).
H. S. A. una masa bien homogénea que se dividirá en píldoras de ʒij (1 dec.).

I. Corea. *D.* Cinco píldoras por la mañana, al medio día y por la noche.

5960. Otras (ROUGIER).

℞ Sulfato de morfina. . . ʒiiij (15 cent.).
Cianuro de potasio. . . ʒvj (30 cent.).
Mucilago. c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.

D. Cuatro píldoras al día una cada seis horas, y despues se aumenta sucesivamente la dosis hasta llegar á doce.

5961. P. SEDANTES Y ASTRINGENTES.

℞ Acetato de plomo crist. ʒviiiij (4 dec.).
Extracto de opio. . . . ʒij (1 dec.).
Mezclese y divídase en ocho píldoras.

I. Disminuyen la tos y la diarrea de los tísicos; salivacion mercurial

antigua, hemorragias, cuando el pulso es pequeño y nervioso. *D.* Dos á tres píldoras al día.

5962. P. DE SEGOND.

℞ Ipecacuana en polvo. . . ʒviiiij (4 dec.).
Calomelanos. ʒjv (2 dec.).
Extr. acuoso de opio. ʒj (5 cent.).
Jar. de espino serval. c. s.
H. S. A. seis píldoras.

I. Disenteria de los países cálidos. *D.* Seis píldoras cada dos horas. Si es necesario se toma esta preparacion tres ó cuatro días.

5963. P. SOLUTIVAS (F. DE FERRARA).

℞ Orin de hierro. ʒiiij (12 gr.).
Acibar,
Escamonea,
Goma amoniaco, añ. . ʒij (8 gr.).
Azafran,
Sulfato de potasa, añ. . ʒljv (3 gr.).
Ojimiél escilitico. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Hepatitis y esplenitis crónicas, afecciones escrofulosas. *D.* Seis píldoras mañana y noche.

5964. P. DE SOSA (H. DE ING.).

℞ Carbonato de sosa. . . ʒiiij (12 gr.).
Jabon medicinal. . . . ʒj (4 gr.).
Esencia de alcaravea. . 40 gotas.
Agua. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Afecciones calculosas. *D.* Una á tres píldoras, dos ó tres veces al día.

5965. P. DE SPEEDIMANN.

℞ Acibar,
Mirra,
Ruibarbo,
Extr. de manzanilla, añ. ʒj (4 gr.).
Esencia de manzanilla. . 46 gotas.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Son purgantes y tónicas. *D.* Una á seis píldoras al día.

5966. P. DE SUBLIMADO.

℞ Deutocloruro de merc. ʒv (25 cent.).

Almidon. ʒj (4 gr.).
 Goma arábica. ʒʒ (2 gr.).
 Agua. c. s.
 H. S. A. treinta y seis píldoras.
 Cada una contiene $\frac{1}{8}$ (6 mil.) de sublimado.

D. Una á tres píldoras al dia.

5967. P. DE SUBLIMADO Y ACÓNITO
 (Biett).

℞ Extracto alcohólico de acónito. ʒvj (3 dec.).
 Sublimado corrosivo. ʒij (4 dec.).
 Malvabisco en polvo. . ʒviiij (4 dec.).
 H. S. A. ocho píldoras.
 I. Sifilides. D. Una á cuatro píldoras al dia.

5968. P. DE SUBLIMADO
 CORROSIVO.

℞ Deutocloruro de merc. ʒʒ (6 dec.).
 Extracto de guayaco. . ʒj (4 gr.).
 Extr. gomoso de opio. . ʒʒ (6 dec.).
 Tridacio. ʒʒ (2 gr.).
 H. S. A. treinta y seis píldoras.

D. Una píldora mañana y noche durante los seis primeros dias, y despues una por la mañana, otra al medio dia y otra por la noche.

Se guardarán en un frasquito bien tapado, porque se funden cuando se las expone al aire.

5969. Otras, n. 2.

℞ Sublimado corrosivo. . ʒj (12 dec.).
 Alcohol. ʒij (8 gr.).
 Harina de trigo. ʒiiij (12 gr.).
 Agua destilada. c. s.

H. S. A. ciento sesenta píldoras, que contiene cada una $\frac{1}{8}$ (6 cent.) de sublimado corrosivo.

5970. P. DE SUBLIMADO CORROSIVO
 CON GLÚTEN.

℞ Sublimado corrosivo porfirizado. . . . ʒij (4 dec.).
 Glúten fresco. . . . ʒxxxij (16 dec.).
 Goma arábica en p. ʒviiij (4 dec.).
 Malvabisco en polv. ʒxvj (8 dec.).

Se tritura el sublimado corrosivo con el glúten en un mortero

de porcelana durante diez minutos, se añade la goma y se tritura aun; despues se incorpora el polvo de malvabisco y se divide la masa en diez y seis píldoras. Cada una contiene una octava parte de grano de sublimado corrosivo.

I. Sifilis.

5971. P. DE SUCINO CROTON
 (F. M.).

℞ Sucino preparado,
 Almáciga, ãã. ʒij (8 gr.).
 Acíbar sucotrino. ʒv (20 gr.).
 Agárico. ʒjʒ (6 gr.).
 Aristoloquia. ʒʒ (2 gr.).
 Jarabe de betónica. . . . c. s.

H. S. A. masa para píldoras.

I. Se han alabado mucho en las enfermedades catarrales y nerviosas. D. ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.).

5972. P. SUDORÍFICAS CALMANTES
 (Dumeril).

℞ Extracto de beleño. . ʒij (8 gr.).
 Oxido de antim. hidro-sulfur. anaranjado,
 Oxido hidrosulfurado pardo, ãã. ʒxviiij (4 gr.).
 Extr. acuoso de opio. ʒxij (6 dec.).

H. S. A. sesenta y dos píldoras iguales.

I. Tos nerviosa pertinaz. D. De dos á cuatro al dia, segun la edad y estado del enfermo.

5973. P. SUECAS.

℞ Protocloruro de mercur. ʒjʒ (6 gr.).
 Sulfuro negro de mercurio,
 Quermes mineral, ãã. . ʒj (4 gr.).
 Miga de pan. c. s.

H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras iguales.

I. Afecciones sifiliticas. D. De dos á cuatro en las veinticuatro horas.

5974. P. DE SULFATO DE
 CINCONINA.

℞ Sulfato de cinconina. . . ʒʒ (2 gr.).

Conserva de rosas, c. s.

H. S. A. treinta y seis pildoras muy iguales y plateadas.

D. De dos á diez y ocho pildoras en las veinticuatro horas.

5975. P. DE SULFATO DE HIERRO.

℥ Sulfato de hierro puro. . 3j (4 gr.).
Extracto de genciana. c. s.
H. S. A. treinta y seis pildoras.

5976. P. DE SULFATO DE HIERRO COMPUESTAS.

℥ Sulfato de hierro. . . . ḡxviii (1 gr.).
Extracto de ratania,
Catecú,
Trementina, ãã. . . . ḡLjv (3 gr.).
H. S. A. pildoras de ḡjv (2 dec.).
I. Leucorrea, blenorrea, disenteria crónica, raquitis, escrófulas, corea, lupus, pénfigo.
D. Cuatro pildoras mañana y noche.

5977. P. DE SULFATO DE HIERRO COMPUESTAS (F. P.).

℥ Ruibarbo en polvo. 4
Sulfato de hierro. 9
Jabon amigdalino. 4
H. S. A. pildoras de ḡjv (2 dec.).
I. Amenorrea y como tónicas. D. Una á cuatro pildoras, dos ó tres veces al dia.

5978. P. DE SULFATO DE HIERRO Y DIGITAL.

℥ Sulfato de hierro,
Digital en polvo, ãã ḡj (5 cent.).
Mirra. ḡij (10 cent.).
Mucilago de goma arábica. . . . c. s.
H. S. A. pildoras.
I. Amenorrea complicada con epilepsia. D. En tres dias.

5979. P. DE SULFATO DE MORFINA.

℥ Sulfato de morfina. . . ḡxviii (1 gr.).
Conserva de rosas. . . 3j (4 gr.).
Polvo de malvabisco. c. s.
H. S. A. treinta y seis pildoras.
D. Se da una por la noche.

5980. P. DE SULFATO DE QUININA.

℥ Sulfato de quinina. . . ḡxx (10 dec.).
Extracto de genciana,
Polvo de regaliz, ãã. c. s.
H. S. A. diez pildoras muy iguales.

D. De dos á ocho y aun mas durante la apirexia de las calenturas intermitentes.

5981. P. DE SULFATO DE QUININA.

℥ Sulfato de quinina. . ḡj (12 dec.).
Extracto de opio. . . ḡiij (15 cent.).
Extracto de taraxacon. c. s.
H. S. A. doce pildoras.

I. Neuralgia. D. Una á cuatro pildoras en el intervalo del acceso.

5982. Otras, n. 2.

℥ Sulfato de quinina. ḡxxx (15 dec.).
Etiope marcial. . . ḡxx (10 dec.).
Extracto de genciana,
Extracto de marrubio, ãã. ḡxl (20 dec.).
H. S. A. pildoras de ḡjv (2 dec.).
I. Apirexia de las calenturas intermitentes, amenorrea, reumatismo, gerostalmia, clórosis, sudor inglés, tisis, convulsiones, efidrosis, hemicránea. D. Cuatro pildoras mañana y noche.

5983. Otras, n. 3.

℥ Sulfato de quinina. . . 5v (20 gr.).
Goma tragacanto. . . ḡxviii (1 gr.).
Jarabe simple. . . . 3ij (8 gr.).
Se pistan y se divide la masa en diez y seis partes, se las guarda en un pucherito, se cubre á éste con una tela mojada, y cada masita se divide en veinticinco pildoras.

5984. Otras (MIALHE).

℥ Sulfato de quinina. . . ḡxviii (1 gr.).
Acido sulfúrico. . . . 3 gotas.
Miel blanca. c. s.
H. S. A. una masa que se divi-

dirá en el número de píldoras que se prescriba.

5985. P. DE SULFATO DE QUININA OPIADAS.

℞ Sulfato de quinina. . . ℥j (12 dec.).
Extracto gomoso de opio. ḡj (5 cent.).
Jarabe de goma.
Polvo de regaliz, ãã. . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.

I. Han curado muy bien las calenturas intermitentes y han sido muy raras las recidivas. *D.* Cuatro píldoras cada hora en el primer día, lo mas distante posible del acceso que ha de presentarse; en el segundo y tercer día tres píldoras, y el cuarto día las dos últimas. Durante el tratamiento, que dura quince días ó un mes, se usa por bebida habitual una infusión de centaura.

5986. P. DE SULFATO DE QUININA SOLUBLE (Mialhe).

℞ Sulfato ácido de quinina. ʒj (4 gr.).
Conservaderosas, c. s.
cerca de. ḡxviij (1 gr.).
H. S. A. veinte píldoras plateadas.

5987. P. DE SULFURO DE ANTIMONIO.

℞ Polvo de sulfuro de antimonio. . . ʒ
Extracto de dulcamara. ʒ
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Enfermedades de la piel. *D.* Desde diez á treinta píldoras, aumentando progresivamente.

5988. P. DE SULFURO DE ANTIMONIO Y CALCIO (Radius).

℞ Sulfuro de antimonio y calcio. ʒβ (2 gr.).
Mucilago de goma tragac. ʒj (4 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras.

I. Escrófulas, obstrucciones de las vísceras, visceralgias, reumatismo, gota, hepatitis, lepra, pénfigo; pitiriasis, escarlatina.

D. Cinco píldoras, tres veces al día.

5989. P. SULFURO ALCALINAS (Mialhe).

℞ Azufre lavado. ʒj (4 gr.).
Carbonato de magnesia. ʒj (4 gr.).
Jabon medicinal. ʒβ (2 gr.).
Agua, c. s. cerca de. . . ʒβ (2 gr.).
H. S. A. cuatro píldoras.

I. Eczema, soriasis, flujo hemorroidal.

5990. P. DE SULFURO DE HIERRO (Biett).

℞ Sulfuro de hierro,
Jabon medicinal, ãã. . . ʒj (30 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Liquen agrius. *D.* Diez píldoras al día.

5991. Otras, n. 2.

℞ Sulfuro de hierro. . . ḡxxxvj (2 gr.).
Malvabisco en polvo. ḡxviij (1 gr.).
Jarabe. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

I. Erupciones escrofulosas. *D.* Una á cuatro píldoras al día.

5992. P. DE SULFURO DE POTASIO (F. P.)

℞ Sulfuro de potasio. 4
Jabon medicinal. 12
Bálsamo del Perú. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Catarros crónico y senil, tialismo mercurial, afecciones cutáneas, etc. *D.* Una ó dos píldoras cada cuatro horas. Comunmente se manda que se beba una taza caliente de infusión de bayas de enebro, un cuarto de hora despues de cada toma.

5993. P. DE TABACO (Augustin).

℞ Tabaco en polvo. ℥j (12 dec.).
Conserva de rosas. c. s.

H. S. A. setenta y dos píldoras.
I. Hidropesías generales. *D.*

Una, dos ó tres píldoras, dos ó cuatro veces al dia hasta que sobrevengan náuseas.

5994. P. DE TANINO COMPUESTAS
(*Jourdain*).

℥ Tanino. ḡxviiij (4 gr.).
Acetato de morfina,
Emético, ãã. ḡij (1 dec.).
H. S. A. veinte píldoras.
I. Hemorragias, diarrea. D. Una á dos píldoras al dia.

5995. P. DE TANINO CONTRA LOS SUDORES NOCTURNOS
(*Charvet*).

℥ Tanino puro ḡxviiij (4 gr.).
Conserva de rosas. c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Sudores nocturnos de los tísicos. D. Una á cuatro píldoras por la noche.

5996. P. TARTÁREAS DE BONCIO
ó *Píldoras aloéticas de sulfato de potasa* (F. E.).

℥ Acíbar sucotrino. ʒvj (24 gr.).
Goma amoniaco. ʒiij (12 gr.).
Sulfato de potasa. ʒj (4 gr.).
Se mezclan y con miel depurada se hace una masa S. A.
I. Son purgantes y aperitivas. D. Desde ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.).

5997. P. TARTAREAS
(*Schroederer*).

℥ Extracto seco de acíbar preparado con el ácido tartaroso. ʒjv (125 gr.).
Goma am. en lágrimas. ʒjβ (48 gr.).
Acetato de potasa. ʒj (32 gr.).
Extracto de genciana. ʒvj (24 gr.).
Sulfato de hierro,
Extr. de azafran, ãã. ʒβ (16 gr.).
Tint. de hierro tartar. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡvj (3 dec.).
I. Estas píldoras, que purgan ligeramente, se usan en las fiebres intermitentes, ictericia, clorosis, obstrucciones, esplenitis

y hepatitis. D. De seis á ocho píldoras al dia.

5998. P. DE TÁRTARO EMÉTICO
(*Boudet*).

℥ Emético. 16
Goma tragacanto. 16
Malvabisco en polvo. 10
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
Boudet las prefiere á las de tártaro emético á grandes dosis, porque tienen el inconveniente de irritar las primeras vias.

5999. P. DE TARTRATO VITRIOLADO DE HIERRO
(*Volpelière*).

℥ Subcarbonato de potasa,
Sulfato de hierro, ãã. ʒβ (15 gr.).
Se mezclan, y luego que está líquida la mezcla se la extrae del mortero, se la coloca en una cazuela de hierro al fuego, y se menea hasta que adquiera la consistencia de píldoras. Entonces se aparta del fuego y se deja enfriar.

Este producto que llama tartrato vitriolado de hierro, sirve para las píldoras siguientes:

Tartr. vitriolado de hier. ʒj (30 gr.).
Malvabisco en polvo. ʒβ (2 gr.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. ciento veinte píldoras.
I. Son muy eficaces, se conservan bien y no se endurecen. V. *Píldoras de Blaud y Vallet*.

6000. P. TEBÁICAS.

℥ Opio ʒj (4 gr.).
Pimiento. ʒij (8 gr.).
Extracto de regaliz. ʒvij (28 gr.).
Se ablanda el opio y el extracto de regaliz con un poco de alcohol y se añade el pimiento en polvo. Cada ḡx (5 dec.) contienen ḡj (5 cent.) de opio.

6001. P. TENÍFUGAS.

℥ Aceite etéreo de he-
lecho ḡxxxvj (2 gr.).

Mucilago y polvo de
helecho. c. s.

H. S. A. diez bolos.

D. Se toman por la mañana con una hora de intervalo. Se bebe despues una taza de cocimiento de helecho macho, y por el dia se administra aceite de ricino.

6002. P. TENÍFUGAS DE ACEITE DE HELECHO.

℥ Grasa de puerco. . . . 5β (2 gr.).
Raíz de malvab. en polv. ℥Ljv (3 gr.).
Aceite de helec. macho. 20 gotas.
H. S. A. píldoras de ḡijj (15 cent.).

D. Veinticuatro á cuarenta y ocho en dos tomas, segun la edad y temperamento: la primera dosis por la noche y la segunda al dia siguiente por la mañana, y una hora despues se da aceite de ricino.

6003. P. TÓNICAS.

℥ Cloruro de bario. ʒj (12 dec.).
Genciana en polvo. ʒβ (16 gr.).
Goma arábica. ʒj (4 gr.).
Jarabe simple. c. s.

Se disuelve el muriato de barita en un poco de agua destilada, y se hacen noventa y seis píldoras que cada una contiene una octava parte de grano de muriato de barita.

I. Escrófulas. D. Dos píldoras mañana y noche.

6004. Otras, n. 2.

℥ Extracto de genciana,
Extracto de centaurea
menor, añ. ḡxviiij (1 gr.).
Jarabe de genciana. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

6005. Otras (BARBIER).

℥ Extr. de trébol de agua. ʒj (4 gr.).
Acíbar sucotrina en polvo,
Ruibarbo en polvo, añ. . . . 5β (2 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Son purgantes y convienen en la jaqueca, disnea, tos, palpitations, vómitos espasmódicos, estreñimiento senil. D. Dos píldoras mañana y noche.

6006. P. TÓNICAS (H. DE AMÉR.).

℥ Sulfato de cobre. ḡjv (2 dec.).
Extr. de genciana. ḡxxxij (16 dec.).
Jarabe simple. c. s.
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Calenturas intermitentes.
Nota. Cada píldora contiene ḡ'⁄₄ (12 mil.) de sulfato de cobre.

6007. P. TÓNICAS (Formey).

℥ Cloruro de hierro y amoniaco,
Ruibarbo,
Extracto de quina,
Alumbre, añ. 5β (2 gr.).
Aceite de canela. ḡxij (6 dec.).
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Raquitis, calenturas intermitentes, hemorragia pasiva. D. Tres á cinco píldoras mañana y noche.

6008. Otras (GALL).

℥ Quina en polvo. ʒ
Alumbre en polvo. ʒ
Mucilago. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡijj (15 cent.).
I. Afecciones cancerosas de la matriz. D. Cinco píldoras al dia.

6009. P. TÓNICAS DE BACHER (F. F.).

℥ Raíz seca de eléboro
negro. ʒbj (500 gr.).
Carbonato de potasa
purificado. ʒjv (125 gr.).
Alcohol de 21°. ʒbjv (2000 gr.).
Vino blanco. ʒbjv (2000 gr.).
Se quebranta el eléboro, se le pone en digestion durante doce horas en un matraz con el carbonato de potasa y el alcohol, y se cuela con expresion; se echa sobre el residuo el vino blanco, se

deja en maceracion por veinticuatro horas, se hierve y se cue- la; se reunen los dos líquidos, se los clarifica por el reposo, se fil- tran y se evaporan hasta la con- sistencia de extracto líquido. En- tonces se toma de

Extracto líquido. . . . $\tilde{3}$ ij (64 gr.).
 Extracto de mirra. . . . $\tilde{3}$ ij (64 gr.).
 Polvo de cardo santo. . . $\tilde{3}$ j (32 gr.).

Se hace masa S. A. y se forman píldoras de \tilde{g} jv (2 dec.) que se guardan en un frasco bien ta- pado.

I. Hidropesía, ascitis, otitis, úlceras indolentes, raquitis, dis- pepsia. D. Una á dos píldoras al dia.

6010. P. TÓNICAS DE BACHER
(H. DE M.).

\mathcal{Z} Polvos de raiz de
 eléboro negro. $\tilde{3}$ jv (125 gr.)
 Carbonato de po-
 tasa. $\tilde{3}$ j (30 gr.).
 Alcohol de 48°
 Baumé. $\tilde{3}$ jx (270 gr.).
 Vino bl. gener. . $\tilde{3}$ xxxvj (1125 gr.).
 Hágase extracto S. A. Se toma
 De este extracto. 2
 Mirra. 2
 Polvo de cardo santo. 4
 H. S. A. píldoras de \tilde{g} j (5 cent.).
 I. V. las anteriores. D. Una ó dos
 píldoras al dia.

6011. Otras (STOLL).

\mathcal{Z} Limaduras de hierro,
 Extracto de centaurea menor,
 Goma amoniaco, $\tilde{a}\tilde{a}$. . . $\tilde{3}$ ij (8 gr.).
 Jarabe de fumaria. c. s.
 H. S. A. píldoras de \tilde{g} vj (3 dec.).
 D. Se da una ó dos píldoras
 antes de comer para favorecer la
 digestion, y en mayor número en
 la clorosis y en la amenorrea.

6012. P. TÓNICAS Y
ANTIESCROFULOSAS.

\mathcal{Z} Cloruro de bario. . . . \tilde{g} x (5 dec.).
 Extracto de genciana. \tilde{g} xc (5 gr.).
 Genciana en polvo. . . . c. s.

H. S. A. cien píldoras.
 D. Dos, mañana y noche.

6013. P. TÓNICAS Y ANTIESPAS-
MÓDICAS (*Dumas*).

\mathcal{Z} Antimonio diaforético lavado,
 Azafran de Marte ape-
 ritivo, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{3}\beta$ (2 gr.).
 Escila en polvo. . . . \tilde{g} xviii (1 gr.).
 Goma amoniaco. . . . $\tilde{3}$ j (4 gr.).
 Extr. de dulcamara. . $\tilde{3}\beta$ (15 gr.).
 Extracto de enebro. . . c. s.

H. S. A. píldoras de \tilde{g} v (25 cent.).

I. Hidropesía, ascitis, pica, asma. D. Cuatro píldoras mañana y noche.

6014. Otras, n. 2.

\mathcal{Z} Extracto de valeriana,
 Protosulfato de hierro,
 Carbonato de potasa, $\tilde{a}\tilde{a}$. $\tilde{3}$ j (4 gr.).
 Sulfato de quinina. . . . $\tilde{3}\beta$ (2 gr.).
 Valeriana en polvo. . . . c. s.

H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Son muy eficaces en la clo-
 rosis complicada con algunos sín-
 tomas nerviosos.

6015. P. TÓNICAS Y CALMANTES
(*Courti*).

\mathcal{Z} Quina roja,
 Sucino blanco, $\tilde{a}\tilde{a}$. . $\tilde{3}$ j (4 gr.).
 Canela fina,
 Flores de azufre, $\tilde{a}\tilde{a}$. $\tilde{3}\beta$ (2 gr.).
 Ipecacuana. \tilde{g} xviii (1 gr.).
 Extracto de cabezas
 de adormidera roja. $\tilde{3}\beta$ (2 gr.).
 Jarabe de cáscara de
 naranja amarga. . . c. s.

Se hacen S. A. píldoras de \tilde{g} jv (2 dec.).

I. Casos de debilidad acompa-
 ñada de irritabilidad, en el coque-
 luche pertinaz y en ciertos casos
 de asma y de tisis pulmonar. D.
 Una ó dos píldoras cada cuatro
 horas, y se aumenta gradual-
 mente hasta doce y aun quince al
 dia.

6016. P. TÓNICAS Y ESTOMACALES.

℞ Extr. acuoso de quina. ℞j (12 dec.).
Subcarbonato de hierro. ℞ß (6 dec.).
Jar. de cásc. de naranja. c. s.
H. S. A. doce píldoras de ḡjv
(2 dec.).

I. Anemia, clorosis, infiltraciones, amenorrea, dismenorrea con astenia. D. Dos píldoras antes de comer.

6017. P. TÓNICAS ASTRINGENTES (Valch).

℞ Trementina de Venecia,
Extr. de genciana, āā. ʒij (8 gr.).
Sulfato de hierro,
Goma quino, āā. ʒjß (6 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).

I. Blenorrea y leucorrea crónicas. D. Cuatro píldoras, tres ó cuatro veces al día.

6018. P. TÓNICAS (H. DE AL.).

℞ Oxido negro de hierro. ʒj (4 gr.).
Extracto de ajénjos. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡvj (3 dec.).
I. Clorosis, hidropesía, calenturas intermitentes. D. Cinco á nueve píldoras tres veces al día.

6019. P. TÓNICAS Y LAXANTES (Swediaur).

℞ Oxido negro de hierro,
Acíbar sucotrino, āā. ʒß (2 gr.).
Goma amoniaco. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Estreñimiento é infartos de las glándulas mesentéricas de los niños, afecciones cutáneas, escrófulas, dispepsia, úlceras atónicas. D. De dos á cuatro píldoras una ó dos veces al día.

6020. P. TÓNICAS (Ockel).

℞ Hollin brillante,
Extracto de quasia, āā. ʒij (8 gr.).
Extracto de taraxacon. ʒß (15 gr.).

H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Descenso de la matriz por relajación de los ligamentos anchos.
D. Seis píldoras por la mañana, seis al medio día y seis por la noche.

6021. Otras (STEMBERGER).

℞ Extracto de genciana,
Extr. de ajénjos, āā. ʒjß (6 gr.).
Cascañilla en polvo,
Ajénjos en polvo, āā. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Leucorrea asténica, escrófulas. D. Tres á seis píldoras al día.

6022. Otras (WHYTT).

℞ Cloruro de hierro,
Acíbar,
Extr. de marrubio, āā. ʒß (2 gr.).
Asa fétida. ʒjß (6 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Catarro útero-vaginal, leucorrea, raquitis, sífilis, dispepsia, histérico con estreñimiento. D. Cuatro ó cinco píldoras tres veces al día.

6023. P. TÓNICAS Y ESTIMULANTES.

℞ Extracto de genciana,
Anís en polvo, āā. ʒj (4 gr.).
Jarabe de menta. c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Son tónicas, estomacales y convienen en las digestiones lentas con ventosidades. Se dan antes de comer.

6024. P. TÓNICAS FUNDENTES (Clarus).

℞ Cloruro de hierro y amoniaco,
Acíbar, āā. ḡxviii (4 gr.).
Extracto de celedonia. ʒj (4 gr.).
Gálbano,
Jabon medicinal, āā. ʒij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
I. Infartos de las vísceras del bajo vientre consecutivas á las

calenturas intermitentes, esplenitis, hepatitis, ictericia, nefritis. *D.* Seis píldoras mañana y noche.

6025. P. TÓNICAS DE LIMADURAS DE HIERRO.

℞ Limaduras de hierro. . . ʒjβ (6 gr.).
Extracto de genciana. ʒl̄jv (3 gr.).
Canela en polvo. ʒxviiij (4 gr.).
Jar. de cásc. de naranj. c. s.

H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Dispepsia, pica, raquitis, caquexia, clorosis. *D.* Tres ó cuatro píldoras mañana y noche.

6026. P. DE TREMENTINA.

℞ Trementina. ʒj (4 gr.).
Extracto de ruibarbo. ʒβ (2 gr.).
Catecú,
Ratania, ãã. ʒxviiij (4 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.

I. Reumatismo, catarro útero-vaginal, cistitis, blenorrea, leucorrea, prurigo, neuritis, parálisis y neuralgias. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

6027. Otras, n. 2.

℞ Trementina. ʒj (32 gr.).
Extracto de ruibarbo. . ʒjβ (6 gr.).
Alcanfor. ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Leucorrea y blenorragia. *D.* Nueve píldoras al día en tres tomas.

6028. P. DE TREMENTINA ó Trementina cocida (F. F.).

Se toma trementina de Venecia, se la pone en un perol con agua que se mantiene hirviendo hasta que vertiendo un poco de esta resina en agua fría se solidifique en ella; entonces se la divide en píldoras de ʒjv (2 dec.), conservándolas blandas en agua tibia ó envueltas en almidón. *V. Trementina cocida*, tomo I, p. 348.

El objeto de la decocción es des-

prender la esencia; parece también, según Unverdorfen, que se cambia la naturaleza de la resina, la cual se transforma en una resina muy ácida llamada colófica.

I. Se usan en las inflamaciones catarrales crónicas de la vejiga, y aun de las del pecho y de la uretra. *D.* Tres ó cuatro píldoras, que se aumentan progresivamente.

6029. P. DE TREMENTINA (Trousseau).

℞ Trementina cocida. . . ʒβ (16 gr.).
Bálsamo de Tolú. . . . ʒβ (2 gr.).
Goma amoniaco. ʒj (4 gr.).
Extr. gomoso de opio. ʒviiij (4 dec.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.

I. Catarros crónicos de los bronquios ó de la vejiga. *D.* Una á diez píldoras al día.

6030. P. DE TREMENTINA MAGISTRALES.

℞ Trementina de Venecia,
Magnesia blanca, ãã. . ʒj (32 gr.).
H. S. A. píldoras:

Mouchon ha dado esta fórmula, y ha reconocido que la magnesia blanca daba instantáneamente más solidez á la trementina que la magnesia calcinada. Se necesitaría tres veces otro tanto de esta última para producir el mismo efecto.

Si se usa la trementina de Burdeos, bastan para solidificarla ʒvj ó ʒvjβ (26 gr.).

Soubeiran previene que no pueden determinarse con rigorosa exactitud estas dosis, porque las trementinas, aun las que provienen del mismo árbol, no son absolutamente semejantes á sí mismas, y cambian también con el tiempo; pero que las proporciones anteriores bastan casi constantemente.

I. Enfermedades de las vías urinarias. *D.* Cuatro á veinte píldoras de ʒjv (2 dec.).

6031. P. DE TREMENTINA OFICINALES (Faure) (F. P.).

℞ Trement. de Burdeos. ʒxvj (56 gr.).
Magnesia calcinada. . . ʒβ (2 gr.).

Se hace la mezcla y al cabo de doce horas la masa ha adquirido la consistencia de píldoras. Se hacen las píldoras de ʒvj (3 dec.) interin la masa tiene aun bastante blandura y se las conserva en licopodio. Si se tarda en hacer las píldoras, es necesario ablandar la masa en agua caliente para dividirla, y entonces las píldoras tienen menos trasparencia.

I. La misma que las anteriores.
D. De cuatro á veinte píldoras de ʒjv (2 dec.). Es el mejor modo de administrar la trementina.

6032. P. DE LOS TRES EXTRACTOS (Double).

℞ Extr. de dulcamara. . ʒiij (12 gr.).
Extr. de zarzaparrilla. ʒijβ (10 gr.).
Extracto de acónito. . ʒβ (2 gr.).

H. S. A. cien píldoras.

I. Reumatismos crónicos, afecciones sífilíticas antiguas. D. Dos á ocho píldoras al día.

6033. P. DE TRIBUS CON RUIBARBO (F. M.).

℞ Ruibarbo escogido,
Agárico trociscado,
Acíbar sucotrino, añ. . ʒj (32 gr.).
Sal catártica. ʒiij (12 gr.).

Se trituran sutilmente, y con jarabe de rosas se hace S. A. masa para píldoras.

I. Son purgantes y tónicas y promueven la menstruacion. D. De ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.).

6034. P. DE TRIBUS (H. DE SAN JUAN DE DIOS DE MADRID).

℞ Azufre sublimado. . . . ʒj (32 gr.).
Antimonio crudo. . . . ʒβ (16 gr.).
Jabon medicinal. . . . ʒj (32 gr.).
Mercurio vivo. . . . ʒvj (24 gr.).

Se tritura el azufre con el mercurio hasta que se extinga completamente, se mezclan el antimonio y el jabon, y con c. s. de agua se forman píldoras de ʒj (5 cent.).

I. Son antisifilíticas.

6035. P. DE TRONCHIN.

℞ Jabon blanco. ʒβ (16 gr.).
Extracto de regaliz. . . ʒij (8 gr.).
Trementina. ʒxx (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Cálculos biliares. D. Se toman tres píldoras tres veces al día, y se bebe despues un vaso de suero.

6036. P. DE TURNER.

℞ Azufre dorado de antimonio,
Protocloruro de mercurio, añ. ʒβ (2 gr.).

Extracto de fumaria,
Extracto de cicuta, añ. ʒLjv (3 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

I. Sífilides, herpes impetiginosos. D. Cuatro píldoras, mañana y noche.

6037. P. DE VALERIANA.

℞ Extracto de valerianá. ʒj (4 gr.).
Castóreo. ʒβ (2 gr.).
Alcanfor. ʒxviij (4 gr.).
Tridacio ʒβ (2 gr.).

H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Afecciones nerviosas. D. Se dan de una á seis píldoras al día.

6038. P. DE VALERIANA, AÑIL Y OPIO (Michel).

℞ Extr. gomoso de opio. ʒij (4 dec.).
Añil en polvo. ʒxvj (8 dec.).
Extracto de valeriana,
Extracto de quina, añ. ʒj (12 dec.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.

D. Cuatro píldoras al día, y se bebe mañana y noche una infusion de arnica.

Se ha observado que disminuyen y desaparecen despues los ataques de epilepsia traumática.

6039. P. DE VALERIANATO DE HIERRO.

℥ Valerianato de hierro. ḡxviiij (4 gr.).
Miel,
Malvabisco en polvo, ãã. c. s.
H. S. A. veinte píldoras de ḡjv
(2 dec.).

I. Accidentes histéricos complicados con clorosis.

6040. P. DE VALERIANATO DE QUININA.

℥ Valerianato de quinina. . 5ß (2 gr.).
Extracto de enebro. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

D. Dos á cinco al dia contra las calenturas intermitentes; cinco á diez contra las neurosis de tipo intermitente.

6041. P. DE VALERIANATO DE ZINC (Devay).

℥ Valerianato de zinc. . ḡxij (6 dec.).
Goma tragacanto. . . . 5ß (2 gr.).
H. S. A. doce píldoras.

I. Son antiespasmódicas. D. Una píldora mañana y noche. Es malo el excipiente.

6042. P. DE VALETT CON CUBEBAS (Puche).

℥ Masa de píld. de Valett. ḡj (5 cent.).
Cubebas en polvo. ḡjv á ḡvj (2 á 3 dec.).

H. S. A. una píldora.
I. Blenorragias crónicas. D. Veinte á cincuenta píldoras al dia.

6043. P. VERMÍFUGAS.

℥ Ruibarbo en polvo. . . . 5j (4 gr.).
Mercurio dulce. 5ß (2 gr.).
Extracto de ajenjos. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

D. Una á seis píldoras al dia, á los niños de dos á seis años; diez á quince á los adultos.

6044. Otras, n. 2.

℥ Aceite ctérco de helecho macho. . . . ḡxviiij (4 gr.).

Polvo de santónico. . ḡjx (50 cent.).
Extracto de ajenjos. . . c. s.

H. S. A. diez píldoras.

I. Afecciones verminosas, helmintiasis. D. Se toma una píldora cada media hora, y se administra despues 5j á 5jß (30 á 50 gr.) de aceite de ricino.

6045. Otras, n. 3.

℥ Santónico. 5j (4 gr.).
Calomelanos preparados
al vapor. 5ß (2 gr.).

Extracto de ajenjos. c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

D. Dos píldoras para los niños de cuatro años y diez para los adultos.

6046. Otras (MELLIN).

℥ Asa fétida,
Hiel de vaca, ãã. 5ij (8 gr.).
Jalapa. 5j (4 gr.).

H. S. A. píldoras de ḡijß (12 cent.).

I. Ténia. D. Primero diez píldoras, dos ó tres veces al dia.

6047. Otras (PESCHIER).

℥ Tintura etérea de renúe-
vos de helecho. 30 gotas.
Extracto de taraxacon. . 5j (4 gr.).

H. S. A. treinta píldoras.
D. Dos, mañana y noche. Para expulsar la ténia se debe aumentar la dosis hasta treinta. Estas píldoras no fatigan el estómago.

6048. Otras (PESCHIER).

℥ Extracto etéreo de he-
lecho macho. ḏj (12 dec.).
Helecho macho en polv. ḏß (6 dec.).

Conserva de rosas. c. s.
H. S. A. doce píldoras.

6049. P. VERMÍFUGAS DE CORTEZA DE GRANADO.

℥ Polvo de corteza de raiz
de granado. 5j (4 gr.).
Asa fétida. 5ß (2 gr.).

Aceite de croton. ḡjv (2 dec.).
 Jarabe de éter. c. s.
 H. S. A. quince píldoras.
 I. Ténia. D. Cinco píldoras al dia.

6050. P. DE VIDA (Belzeri).

℥ Acíbar. ḡviii (32 gr.).
 Mirra ḡjv (16 gr.).
 Almáciga. ḡij (8 gr.).
 Azafran. ḡj (4 gr.).
 Ruibarbo,
 Cubebas,
 Clavo, ãã. 3ß (2 gr.).
 Vinagre destilado. . . c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2dec.).
 Esta fórmula es el tipo de todas las recetas de granos de vida.

6051. Otras (FORM. ALEM.).

℥ Acíbar. 80
 Jalapa. 40
 Ruibarbo. 8
 Azafran. 8
 Almáciga. 8
 Jabon blanco. 8
 H. S. A. píldoras de ḡv (25 cent.).

I. Se usan como tónico-purgantes. D. Dos á ocho píldoras al dia.

6052. P. VISCERALES.

℥ Extracto de taraxacon,
 Extracto de cicuta, ãã. ḡxc (5 gr.).
 Jabon blanco. ḡijß (10 gr.).
 Acetato de potasa. . . . c. s.
 Calomelanos. 3ß (2 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Ictericia, hepatitis, esplenitis crónica, infartos del hígado y de las vísceras abdominales. D. Cuatro á seis píldoras al dia.

6053. P. DE WERNECK.

℥ Ioduro de hierro. 5j 4 gr.).
 Bromuro de sodio. 3ß (2 gr.).
 Extracto de genciana. . . c. s.
 H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).

I. Escrófulas, caquexia, afecciones cancerosas, amenorrea,

clorosis. D. Dos píldoras mañana y noche.

6054. P. DE UNGUENTO NAPOLITANO (Fouquier).

℥ Ungüento napolitano. . . 5ij (8 gr.).
 Polvo de regaliz. c. s.
 H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras.

I. Fouquier empleaba comunemente estas píldoras en el tratamiento de la sífilis, y las consideraba como menos irritantes para el estómago que cualquiera otra preparacion mercurial. D. Pueden administrarse hasta seis píldoras al dia; se suspende su uso cuando sobreviene irritacion en la boca, para darlas de nuevo despues. Fouquier usaba con estas píldoras una tisana sudorífica y algunos baños.

6055. P. DE VERATRINA (Magendie).

℥ Veratrina. ḡj (5 cent.).
 Goma aráb. en polvo. ḡLjv (3 gr.).
 Jarabe de goma. . . c. s.
 H. S. A. doce píldoras de ḡj (5 cent.).

I. Las mismas que el alcohol de veratrina.

Nota. Reemplazan ventajosamente á las píldoras de Bacher. D. Una al principio. Se puede elevar gradualmente la dosis hasta tres píldoras en el espacio del dia.

6056. Otras (TURNBULL).

℥ Veratrina. ḡj (5 cent.).
 Extracto de beleño,
 Polvo de regaliz, ãã. . ḡxij (6 dec.).
 H. S. A. doce píldoras.

I. Anasarca, reumatismo crónico, neuralgia facial, gota, parálisis, amaurosis, enuresis y neuralgias. D. Las mismas que las anteriores.

6057. P. DE ZELLER.

℥ Protonitrato de mercurio. . . . ḡx (5 dec.).

Zumo de regaliz. . . ḡxxxvj (18 dec.).
 Mézclense y háganse sesenta pildoras.

D. Una ó dos pildoras en las veinticuatro horas, aumentando la dosis hasta seis. Se emplea muy rara vez en razon de ser esta sal muy descomponible por las sustancias orgánicas.

6058. P. ZINCADAS (RADIUS).

℥ Sulfato de zinc. ʒj (4 gr.).
 Trementina. ḡxv (75 cent.).
 Tormentila. ḡx (5 dec.).
 H. S. A. treinta pildoras.

I. Catarro útero-vaginal, histérico, blenorrea, leucorrea, parálisis, corea, disenteria, epilepsia, neuralgia. *D.* Tres pildoras mañana y noche.

6059. P. DE ZUMAQUE.

℥ Extracto de zumaque,
 Rob de enebro, añ. . . ḡjx (50 cent.).
 Extracto de arnica,
 Extr. de valeriana, añ. ʒβ (2 gr.).
 Cálamo aromático. . . c. s.

H. S. A. pildoras de ḡjv (2 dec.).
I. Hemiplegia, herpes, lepra, elefantiasis, soriasis. *D.* Una ó dos pildoras mañana y noche.

6060. P. DE ZUMAQUE AROMATIZADAS.

℥ Alcanfor,
 Extracto de zumaque venenoso, añ. . . ḡxv (75 cent.).
 Extracto de arnica,
 Extracto de valeriana, añ. . . . ḡxx (4 gr.).
 Polvo aromático. . . c. s.
 H. S. A. pildoras de ḡiij (15 cent.).

I. Hemiplegia, parálisis. *D.* Dos á tres pildoras mañana y noche.

6061. P. DE ZUMAQUE VENENOSO.

℥ Zumaque venen. en p. ḡj (5 cent.).
 Regaliz en polvo. . . . ʒj (12 dec.).
 Arrope de saúco. . . . c. s.
 H. S. A. cuatro pildoras.
I. Herpes rebeldes, reumatismos crónicos, parálisis, etc. *D.* Se toman en el dia.

POCIONES.

6062. POCION ABSORVENTE Ó ANTIACIDA (H. M.).

℥ Magnesia calcinada. . . ʒj (4 gr.).
 Agua comun. ʒjv (125 gr.).
 Jarabe simple. ʒj (30 gr.).

M. I. Acidos en el estómago, pirosis, flatuosidades y cardialgia. *D.* Una cucharada cada media hora.

6063. P. ABSORVENTE (Ellis).

℥ Amoniaco líquido,
 Subcarbonato de potasa, añ. ʒj (4 gr.).
 Agua de canela. ʒjv (125 gr.).

M. Se puede reemplazar el subcarbonato de potasa por la magnesia calcinada.

I. Agrios, neumatoses, cólicos ventosos, eructos ácidos, escarlatina, dispepsia, meteorismo, calenturas tifoideas, nefritis. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6064. Otra (SWEDIAUR).

℥ Ruibarbo en polvo. . . ʒij (8 gr.).
 Carbonato de sosa. . . ʒij (24 dec.).
 Jarabe simple. ʒj (30 gr.).
 Agua de yerbabuena. ʒββ (250 gr.).

M. I. Agrios, pirosis, cardialgias. *D.* Dos cucharadas tres veces al dia. Se agita al tiempo de usarla.

6065. P. DE ACEITE DE CROTON.

℥ Aceite de croton. . . . ḡj (5 cent.).

Aceite de alm. dulces. g^{ij} (15 cent.).

Hágase una emulsion con

Goma arábica. ʒij (8 gr.).

Jarabe de flores de
naranja. ʒj (30 gr.).

Agua. ʒjv (125 gr.).

Alcoholato de limon: ʒʒ (2 gr.).

I. Albuminuria, cólicos, hidropesía, amaurosis, estreñimiento, helmintiasis, metritis. D. A cucharadas de media en media hora hasta producir el efecto purgante.

6066. P. DE ACEITE DE CROTON TIGLIO, Poción del doctor Cory ó Poción purgante.

ʒ Aceite de croton tiglio. 2 gotas.

Azúcar. ʒij (8 gr.).

Goma arábica. ʒʒ (2 gr.).

Agua. ʒj (30 gr.).

Tintura de cardamomo
menor. ʒʒ (2 gr.).

I. y D. Se da esta poción á cucharadas de café hasta producir suficientes deposiciones alvinas. Los enfermos toman esta poción sin repugnancia.

6067. P. DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO.

ʒ Aceite de hígado de bacalao. ʒʒ (15 gr.).

Goma arábica. c. s.

Se hace S. A. una emulsion con

Agua de hinojo ʒj (30 gr.)

y se añade:

Jar. de cásc. de naranja. ʒʒ (15 gr.).

D. Dos cucharadas mañana y noche.

6068. Otra, n. 2.

ʒ Aceite de hígado de bacalao. ʒj (30 gr.).

Licor de carbonato de
potasa. ʒij (8 gr.).

Aceite de cáalamo aromát. 3 gotas.

Jar. de cásc. de naranja. ʒj (30 gr.).

D. Una cucharada mañana y noche.

6069. P. DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO Ó DE RAYA.

ʒ Aceite de hígado de
bacalao. ʒj (30 gr.).

Agua de laurel real. ʒij (8 gr.).

Goma arábica. ʒʒ (15 gr.).

Agua. ʒjv (125 gr.).

Jar. de flor. de naranja. ʒjʒ (45 gr.).

H. S. A. I. Escrófulas, raquitis, etc. D. Se toma á cucharadas de hora en hora.

6070. P. DE ACEITE DE RICINO (Righini).

ʒ Aceite de ricino puro. ʒij (60 gr.).

Yema de huevo. núm. 1.

Infusion de café bueno. ʒjv (125 gr.).

Azúcar. ʒj (30 gr.).

H. S. A.

6071. P. DE ACEITE DE RICINO.

ʒ Looc blanco. ʒiij (90 gr.).

Agua de tilo. ʒij (60 gr.).

Aceite de ricino. ʒʒ á ʒj (15 á 30 gr.).

Jarabe de limones. ʒj (30 gr.).

Goma arábica. ʒjʒ (6 gr.).

Produce buenos efectos y está muy enmascarado el sabor del aceite de ricino.

6072. P. DE ACEITE DE RICINO EMULSIONADA.

ʒ Aceite de ricino. ʒjʒ (45 gr.).

Jar. de flor de melocot. ʒj (30 gr.).

Agua de azahar. ʒʒ (15 gr.).

Agua comun. ʒj (30 gr.).

Yema de huevo. núm. 1.

Se mezcla en un mortero la yema de huevo con el jarabe y un poco de agua, se añade poco á poco el aceite de ricino y el resto del agua y se incorpora exactamente.

6073. P. DE ACEITE DE RICINO PARA LOS NIÑOS (Thompson).

ʒ Agua destilada de hinojo. 32

Agua destilada de eneldo. 32

Aceite de ricino. 4 á 6
 Yema de huevo. 50
 H. S. A. una pocion emulsiva.
 D. Una cucharadita de café dos veces al dia. Se puede añadir si hay necesidad dos gotas de láudano.

6074. P. CON ACEITE DE SABINA.

℞ Esencia de sabina. . . 4 á 6 gotas.
 Jarabe de artemisa. . . ℞j (30 gr.).
 Agua de fl. de naranjo. ℞jv (125 gr.).
 Se pesa el jarabe en una redomita y se añade el aceite esencial, se mezcla agitando y se añade poco á poco el agua destilada.

6075. P. CON EL ACEITE DE TÁRTAGO (Martin Solon).

℞ Aceite de tártago. ℞Lx (3 gr.).
 Jarabe de báls. de Tolú. ℞j (32 gr.).
 Agua de tilo. ℞iij y ℞j (100 gr.).
 M. D. Una cucharada de hora en hora hasta promover deposiciones de vientre.

6076. P. ACEITOSA.

℞ Infusion béquica,
 Aceite de alm. dulce., ãã. ℞ij (60 gr.).
 Jarabe simple. ℞j (30 gr.).
 I. Se usa en las inflamaciones de pecho para calmar la tos; es ligeramente laxante.

6077. Otra, n. 2.

℞ Aceite de alm. dulces. ℞jß (45 gr.).
 Jarabe simple. ℞jß (45 gr.).
 Goma tragacanto. ℞xv (75 cent.).
 Agua de fl. de naranj. ℞jv (45 gr.).
 Agua de lechuga. ℞jv (125 gr.).
 M. I. Irritacion de la membrana mucosa de los intestinos, flegmasias catarrales ó parenquimatosas de pecho, como medio á propósito para disminuir la tos. En este último caso para hacer mas fácil la expectoracion, se añade:
 Quermes mineral. ℞j (5 cent.).

Fouquier para producir una derivacion saludable hácia el conducto intestinal, sustituye el aceite de ricino al de almendras dulces.

D. A cucharadas.

6078. Otra, n. 3.

℞ Aceite de alm. dulces. ℞ij (60 gr.).
 Goma arábica. ℞ij (8 gr.).
 Jarabe simple. ℞j (30 gr.).
 Agua. ℞jv (125 gr.).
 Ag. de flor de naranjo. ℞j (4 gr.).
 H. S. A. I. Estreñimiento, metritis, destete, envenenamiento, cólico verminoso. D. En dos tomas con una hora de intervalo.

6079. Otra, n. 4.

℞ Goma tragac. en polvo. ℞x (5 dec.).
 Jarabe de culantrillo. ℞j (30 gr.).
 Se tritura en un mortero de mármol, se añade poco á poco y alternativamente:
 Aceite de alm. dulces. ℞ß (15 gr.).
 Agua de hisopo. ℞iij (90 gr.).
 I. Catarros y romadizos. D. A cucharadas. Se agita la botella al tiempo de tomar la pocion.

6080. Otra, n. 5.

℞ Aceite comun. ℞ij (60 gr.).
 Solucion de goma aráb. ℞v (150 gr.).
 Jarabe de culantrillo. ℞ij (60 gr.).
 M. I. Para calmar la tos y facilitar la expectoracion. D. A cucharadas. A veces se añade ℞j á ℞viiij (5 á 40 cent.) de ipecacuana en polvo, ℞ij (60 gr.) de miel escilitica ó ℞ß á ℞j (15 á 30 gr.) de ojimiél escilitico.

6081. Otra, n. 6.

℞ Pocion gomosa. núm. 1.
 Aceite de alm. dulces. ℞j (30 gr.).
 M. I. Calma la tos en las inflamaciones de pecho.

6082. P. ACEITOSA PURGANTE ó Purgante de maná.

℞ Mapá. ℞ij (60 gr.).

Agua. ℥jv (125 gr.).

Se disuelve y se añade:

Aceite de alm. dulces. ℥ij (60 gr.).

Es un purgante muy suave, que conviene en las afecciones de pecho, en las enfermedades de las recién paridas y en las enfermedades de la vejiga.

6083. P. CON EL ACETATO DE AMONIACO.

℥ Acetato de amoniaco. ℥ij (8 gr.).

Ag. de flor de naranjo. ℥β (15 gr.).

Infusion de flores de saúco,

Inf. de flor de tilo, añ. ℥jv (125 gr.).

Jarabe. ℥j (30 gr.).

I. Conviene para excitar y sostener la transpiracion.

D. Dos cucharadas cada dos horas.

6084. P. DE ACETATO DE MORFINA.

℥ Jarabe de acetato de morfina,

Agua de flor de naranjo,

Agua de laurel real, añ. ℥jβ (50 gr.).

I. Flegmasias, peritonitis, metritis, neumonia, pleuresia, cardialgia, histérico, ninfomanía, sarampion, disenteria, disuria, enuresis, hemicránea, plétora, beriberi, corea, dismenorrea, dispepsia, zona, prurito, calentura hética, hemotisis, insomnio, ceática, nefritis, asma, panarizo, grietas, pedionalgia, neuralgias. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6085. P. CON ACETATO DE POTASA.

℥ Acetato de potasa. . . ℥ij (8 gr.).

Jarabe de vinagre. . . ℥j (30 gr.).

Agua de canela. ℥j (4 gr.).

Infusion de tilo. ℥jv (125 gr.).

M. I. Diurético que se usa en algunas afecciones orgánicas de las vísceras abdominales. *D.* A cucharadas.

6086. P. ÁCIDA ASTRINGENTE (II. DE M.).

℥ Acido sulfúr. alcoholiz. ℥jβ (6 gr.).

Infusion de rosas rojas. ℥jv (125 gr.).

Jarabe simple. ℥jβ (45 gr.).

M. I. Hemorragias uterinas. *D.*

A cucharadas de hora en hora.

6087. P. DE ÁCIDO PRÚSICO.

℥ Poción gomosa. ℥v (150 gr.).

Acido prúsico medicinal. 42 gotas.

Mézclese en un frasco bien tapado.

D. A cucharadas.

6088. Otra (MAGENDIE).

℥ Inf. de yedra terrestre. ℥ij (60 gr.).

Acido prúsico medicin. 45 gotas.

Jarabe de malvabisco. . . ℥j (30 gr.).

I. Tos espasmódica, coqueluche, asma, etc. *D.* Una cucharada de tres en tres horas.

6089. P. DE ACÓNITO.

℥ Alcoholaturo de acónit. ḡxviii (1 gr.).

Infusion de toronjil. . . ℥jv (125 gr.).

Jarabe diacodion. ℥j (30 gr.).

M. I. Amaurosis, ceática, parálisis, cólico, efidrosis, pasmo. *D.* Se toma á cucharadas.

6090. P. AERÓFORA Ó POCION ANTIEMÉTICA (H. DE M.).

℥ Acido tártrico en polvo,

Bicarbon. de sosa, añ. ḡxviii (1 gr.).

Se mezclan al lado del enfermo, y al usarlos se echan en una mezcla de ℥ij (60 gr.) de agua comun ó infusion de menta y ℥j (30 gr.) de jarabe simple, se agitan y se hace tomar todo.

I. Vómitos idiopáticos y simpáticos. Se repite varias veces al día y reemplaza la poción de Riverio.

6091. P. DE AGUA DESTILADA DE ALMENDRAS AMARGAS (Sundelin).

℥ Agua destilada de al-

mendras amargas. . . ℥ij (8 gr.).

Tartrato de sosa. ℥β (2 gr.).

Extracto de grama. ℥ij (60 gr.).

Agua destilada. ℥jv (125 gr.).
M. D. A cucharadas.

D. En este último caso se da ℥ij (60 gr.) cada seis horas.

6092. P. CON EL AGUA DE YERBABUENA.

℥ Eter sulfúrico. ℥β (2 gr.).
 Agua de yerbabuena. ℥jv (125 gr.).
 Jarabe simple. ℥β (15 gr.).
M. D. A cucharadas.

6098. Otra, n. 2.

℥ Alumbre. ℥ijβ (10 gr.).
 Miel rosada. c. s.
M. I. Crup. *D.* Se recorre toda la boca posterior con un pincel empapado en la pocion.

6093. P. ALCALINA.

℥ Bicarbonato de sosa. ℥ij (8 gr.).
 Agua de melisa. ℥iij (100 gr.).
 Jarabe de canela. ℥jβ (50 gr.).
M. I. Tifo, cólera. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6099. Otra (BOUCHARDAT).

℥ Alumbre. ℥j (4 gr.).
 Agua de rosas. ℥jv (125 gr.).
 Jarabe simple,
 Jarabe diacodion, ã. ℥β (15 gr.).
M. I. Hemorragias uterinas pasivas. *D.* A cucharadas.

6094. P. ALCALINA GOMOSA.

℥ Carbonato de potasa. ℥xij (6 dec.).
 Pocion gomosa. ℥ββ (250 gr.).
 Jarabe diacodion. ℥β (15 gr.).
 Se usa a cucharadas de hora en hora en el tratamiento de la peritonitis puerperal.

6100. Otra (GENDRIN).

℥ Alumbre. ℥ij (8 gr.).
 Agua destilada. ℥iij (90 gr.).
 Acido sulfúrico. 10 gotas.
 Esencia de limon. 6 gotas.
 Jarabe de limon. ℥ij (60 gr.).
H. S. A. I. Hemorragias uterinas pasivas, disenterias, tifo, metrorragia, pénfigo, cólico de plomo. *D.* Una cucharada cada dos horas.
Nota. No debe tomarse este remedio sino mucho tiempo despues de haber comido, y es necesario estar algun tiempo sin comer despues de haberle tomado.

6095. P. ALCANFORADA.

℥ Alcanfor,
 Nitrato de potasa, ã. ℥j (12 dec.).
 Goma arábica. ℥j (4 gr.).
 Infusion pectoral. ℥v (150 gr.).
 Jarabe de culantrillo. ℥j (30 gr.).
I. Erecciones dolorosas en las uretritis agudas. *D.* De una vez.

6096. Otra, n. 2.

℥ Alcanfor. ℥xv (75 cent.).
 Yema de huevo. c. s.
 Emulsion simple. ℥vj (180 gr.).
 Jarabe diacodion. ℥j (30 gr.).
M. I. Blenorragia inflamatoria muy dolorosa. *D.* En cuatro dosis.

6101. P. ALUMINOSA EXCITANTE (Rust).

℥ Alumbre. ℥j (4 gr.).
 Agua de menta piperita. ℥ij (60 gr.).
 Tintura de canela. ℥β (15 gr.).
 Jarabe diacodion. ℥j (30 gr.).
I. Metrorragia con atonia, anorexia, cólicos. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6097. P. ALUMINOSA.

℥ Alumbre. ℥ij (8 gr.).
 Agua destilada. ℥jv (125 gr.).
 Jar. simple ó de goma. ℥ij (60 gr.).
H. S. A. I. Hemorragias uterinas pasivas, disenterias, tifo, metrorragia, pénfigo, cólico de plomo.

6102. P. ALUMINOSA TÓNICA (Schroeder y Jahn).

℥ Alumbre. ℥ij (8 gr.).
 Extracto de quina. ℥β (15 gr.).
 Jarabe de limon ℥j (30 gr.).

Agua de canela. ℥vj (180 gr.).
 H. S. A. I. Tifo, crup, dispepsia, calentura hética, nosocomial ó tifoidea no inflamatoria, cólicos, metrorragia, conjuntivitis. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6103. P. ALTERANTE (Hagen).

℥ Sulfuro de potasa. ℥xxviii (4 gr.).
 Quermes mineral. ℥jx (50 cent.).
 Jarabe de polígala. ℥ij (60 gr.).
 Amoniaco anisado. ℥xxviii (4 gr.).
M. I. Crup, coqueluche. *D.* Una cucharadita de café de hora en hora.

6104. P. AMARGA.

℥ Infusion ligera de centauro menor. ℥jv (125 gr.).
 Tintura de genciana. ℥j (4 gr.).
 Jarabe de canela,
 Jarabe simple, aa. ℥β (45 gr.).
M. I. Dispepsia y atonía de los órganos digestivos. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6105. P. AMONIACAL.

℥ Raiz de angélica. ℥β (45 gr.).
 Agua hirviendo. ℔β (250 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade:
 Extracto de genciana. ℥ij (8 gr.).
 Extracto de escila. ℥β (2 gr.).
 Alcohol amoniac. anis. ℥j (4 gr.).
M. I. Embriaguez, ascitis, anasarca, hidropesías pasivas, hidroraquis, flegmasias, bronquitis, catarro crónico, pleuresía, ceática, lumbago, hemicránea, histérico, herpes, blenorragia. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6106. Otra (CHEVALHIER).

℥ Agua destilada. ℥v (450 gr.).
 Agua de menta. ℥β (45 gr.).
 Amoniaco líquido. 3 gotas.
M. I. Eructos ácidos. *D.* En dos tomas.

6107. P. ANALÉPTICA Y SEDANTE.

℥ Liquen islándico lavado. ℥ij (60 gr.).

Rasuras de cuerno de ciervo. ℥j (30 gr.).
 Agua. c. s.

Se cuece y se añade:

Láudano de Sydenham. 15 gotas.
I. Tisis pulmonar acompañada de grandes dolores. *D.* Se toma poco á poco en el día.

6108. P. DE ANGÉLICA.

℥ Agua de angélica. ℥iij (400 gr.).
 Jarabe de menta. ℥jβ (50 gr.).
 Quermes mineral. ℥iij (45 cent.).
I. Catarro crónico, neumonía, bronquitis. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6109. P. DE ANGUSTURA.

℥ Cocim. de angustura. ℥iij (96 gr.).
 Agua de canela. ℥v (20 gr.).
 Tintura de opio. ℥β (2 gr.).
 Extracto de quina. ℥ij (8 gr.).
 Jar. de cásc. de naranj. ℥jβ (48 gr.).
I. Astenia, calenturas intermitentes, calenturas atáxico-adinámicas, neuralgias. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6110. P. ANISADA.

℥ Esencia de anís. 12 gotas.
 Alcohol. ℥iijβ (40 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Poción gomosa. ℥v (450 gr.).
M. I. Flatusidades.

6111. P. ANODINA.

℥ Agua destilada de flor de naranjo. ℥j (30 gr.).
 Agua dest. de toronjil. ℥iij (90 gr.).
 Jarabe simple. ℥j (30 gr.).
 Jarabe diacodion. ℥jβ (45 gr.).
M. D. A cucharadas.

6112. Otra (H. M.).

℥ Triaca magna. ℥ij (8 gr.).
 Infusion de tilo. ℔β (250 gr.).
 Jar. de cort. de cidra. ℥ij (60 gr.).
M. I. Afecciones espasmódicas.
D. Una cucharada cada hora.

6113. P. DE ANSERINA.

℞ Aceite de anserina. . . . ʒj (4 gr.).
Azúcar,
Goma arábica, ãã. . . . ʒjß (6 gr.).
Agua de menta. ʒij (60 gr.).
M. I. Afecciones verminosas, helmintiasis. *D.* Una cucharadita de café, dos veces al día.

6114. P. ANTIÁCIDA (Andry).

℞ Jarabe de malvabisco. ʒj (30 gr.).
Jabón medicinal. . . . ʒiij (42 gr.).
Magnesia calcinada. . ʒj (4 gr.).
Agua. ʒjv (125 gr.).
M. I. Envenenamiento por los ácidos concentrados. *D.* Tres cucharadas cada cinco ó seis minutos. Es muy eficaz.

6115. Otra (CHEVALHIER).

℞ Amoniaco líquido. . . 3 gotas.
Agua destilada. . . . ʒv (150 gr.).
Agua dest. de yerbab. ʒß (45 gr.).
M. I. Eructos ácidos. *D.* En dos veces.
Añadiendo doce gotas de amoniaco en lugar de tres, se tiene la pocion contra la embriaguez.

6116. Otra (H. DE AL.).

℞ Carbonato de potasa. . ʒj (4 gr.).
Agua de menta. ʒv (150 gr.).
Jar. de cásc. de naranj. ʒjß (45 gr.).
M. I. Acidez de las primeras vias y calambres de estómago, cardialgias y vómitos. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

6117. P. ANTIARTRÍTICA (Perard).

℞ Semillas de cardo santo,
Semilla de cártamo, ãã. ʒx (40 gr.).
Sobretartrato de potasa,
Sen mondado, ãã. . . . ʒß (16 gr.).
Escamonea,
Raiz de zarzaparrilla,
Raiz de china,
Palo de guayaco, ãã. . ʒij (8 gr.).
Canela fina. ʒj (4 gr.).
H. S. A. D. ʒj (4 gr.) todos los

meses para prevenir los accesos de gota.

6118. P. ANTIPOPLÉCTICA (Most).

℞ Pulpa de tamarindos. ʒiij (90 gr.).
Se hierve en c. s. de agua para obtener lbß (250 gr.) de líquido colado, y se añade:
Nitrato de potasa. . . ʒij (8 gr.).
Sulfato de sosa. ʒj (30 gr.).
Tártaro emético. . . . ʒjß (75 mil.).
M. I. Apoplejía sanguínea, despues del uso conveniente de las sangrías. *D.* Una cucharada cada media hora.

6119. P. ANTIARTRÍTICA (Behrends).

℞ Flor de arnica. ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒvj (180 gr.).
Se infunde, se cuele y se añade S. A. :
Extracto de acónito. ʒvj (3 dec.).
Tintura de guayaco amoniacal. ʒj (4 gr.).
Jarabe de poligala virginiana. ʒß (15 gr.).
I. Gota acompañada de fiebre. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6120. Otra (H. DE AL.).

℞ Vino de cólchico. . . . ʒij (8 gr.).
Carbonato de magnesia. ʒj (4 gr.).
Agua destilada de canela,
Agua comun, ãã. . . . ʒiij (90 gr.).
M. D. Una cucharada de tres en tres horas.

6121. P. ANTIASMÁTICA.

℞ Asa fétida. ʒij (8 gr.).
Espiritu de Minderero. ʒj (30 gr.).
Infusion de menta pip. ʒv (150 gr.).
M. D. Una cucharadita de café á los niños, y una cucharada comun para los adultos, de hora en hora.

6122. P. ANTIASMÁTICA AMONIA-CAL (Van Swieten).

℞ Carbon. de amoniaco. ʒj (4 gr.).

Agua de ruda. ℥vj (180 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ℥ij (60 gr.).

H. S. A. I. Asma convulsivo, espasmos, astenia, envenenamientos. D. A cucharadas de media en media hora.

6123. P. ANTICALCULOSA
(*Quarin*).

℥ Gayuba. ℥℔ (15 gr.).
Goma arábica. ℥ij (8 gr.).
Jalapa. ℥j (4 gr.).
Azúcar. ℥℔ (15 gr.).
Esencia de naranja. . . . 6 gotas.

M. I. Cólico nefrítico, cistitis.
D. ℥j (4 gr.) al día.

6124. P. ANTICATARRAL ó Poción
expectorante.

℥ Ojimiél escilitico. . . . ℥j℔ (48 gr.).
Elixir paregórico. . . . ℥iij (12 gr.).
Espíritu de espl. comp. ℥iij (12 gr.).
Agua dest. de menta. . ℥j℔ (48 gr.).

I. Es un excelente incisivo. D.
Tres á cinco cucharadas al día.

6125. P. ANTICATARRAL (*Kortum*).

℥ Alcanfor. ℔℔ (6 dec.).
Clorhidrato de amon. ℥ij (8 gr.).
Agua dest. de saúco. ℥xij (375 gr.).
Jarabe simple. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. I. Catarros recientes sin complicacion gástrica. D. Dos cucharadas cada dos horas.

6126. P. ANTICATALÉPTICA
(*Schroeder*).

℥ Asa fétida. ℥j℔ (6 gr.).
Agua dest. de valeriana,
Ag. dest. de manz., ãã. ℥iij (90 gr.).
Licor de cuerno de ciervo
sucinado. ℥j (4 gr.).
Jarabe de canela. . . . ℥j (30 gr.).
Yema de huevo. c. s.

I. Catálepsia histérica. D. Una cucharada cada hora.

El autor aconseja al mismo tiempo el
POLVO ANTICATALEPTICO.

6127. P. ANTICOLÉRICA.

℥ Esencia real. 4

Tintura de macis. 4

Tintura de opio azafranada. 4

Eter sulfúrico. 4

M. I. Combate los vómitos. D.
Veinte gotas cada cuarto de hora.

6128. Otra (AMMAN).

℥ Tint. de ambar y almizcle comp. 4

Tintura de macis. 4

Tintura de opio azafranada. 4

Eter sulfúrico. 4

M. I. Cólera. D. Veinte gotas
cada cuarto de hora para quitar y
corregir los vómitos.

6129. P. ANTICOLÉRICA ESTIBIADA.

℥ Tártaro emético. . . . ℥vj (3 dec.).

Alcanfor,

Láudano líquido, ãã. ℥xviij (1 gr.).

Aceite comun. ℥vj (180 gr.).

M. I. Cólera, tétanos. D. A cu-
charadas de café de cuarto en
cuarto de hora.

6130. P. ANTICOLÉRICA (*Radius*).

℥ Extracto de beleño. 2

Alcanfor. 2

Goma arábica. 45

Emulsion de adormideras. . . . 180

Licor de succinato de amon. . . 7 á 11

Azúcar. 30

I. Cólera, vómitos. D. Una cu-
charada cada hora al principio.

6131. Otra (VOGEL).

℥ Goma aráb. en polvo. ℥j (4 gr.).

Yema de huevo. ℥j℔ (6 gr.).

Agua dest. de hinojo. ℥j℔ (48 gr.).

Aceite de alm. dulces. ℥℔ (16 gr.).

Jarabe de horchata. . . ℥vj (24 gr.).

Alcoholado de opio. . . 45 gotas.

H. S. A. I. Cólera esporádico
de los niños. D. Una cucharadi-
ta de café cada media hora.

6132. P. ANTICRUPAL (*Albers*).

℥ Alcanfor. ℥²/₅ (2 cent.).

Tártaro emético. . . . ℥j (5 cent.).

ó Quermes mineral. . . ℥j²/₅ (7 cent.).

Vino de ipecacuana. ℥ij (24 dec.).

Mucil. de goma aráb. ℥ij (8 gr.).

Jarabe de malvabisco. \mathfrak{zj} (30 gr.).
 Agua. $\mathfrak{z}ij$ (90 gr.).
 I. Crup, escarlatina. D. A cucharaditas de café cada diez minutos.

6133. P. ANTIDIARREICA.

\mathfrak{z} Raiz de consuelda mayor. \mathfrak{zj} (30 gr.).
 Raiz de serpentaria virginiana. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
 Canela. $\mathfrak{z}ij\mathfrak{B}$ (10 gr.).
 Agua. c. s.
 para $\mathfrak{z}jv$ (125 gr.) de cocimiento, al que se añade:
 Acetato de amoniaco. $\mathfrak{z}ij\mathfrak{B}$ (10 gr.).
 Elixir de Garus. . . . \mathfrak{zj} (30 gr.).
 Jarabe de quina. . . . $\mathfrak{z}ij\mathfrak{B}$ (10 gr.).
 M. I. Diarrea, disenteria crónica. D. Una cucharada de hora en hora.

6134. Otra (BERENDS).

\mathfrak{z} Raiz de arnica, Colombo, ãã. $\mathfrak{z}ij\mathfrak{B}$ (10 gr.).
 Cascarilla. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
 Agua hirviendo. c. s.
 para obtener $\mathfrak{z}vj$ (180 gr.); se cuele y se añade:
 Jarabe de cáscaras de naranja. $\mathfrak{z}j\mathfrak{B}$ (45 gr.).
 I. Diarrea, metrorragia, histérico. D. Una cucharada cada hora.

6135. Otra (GOELIS).

\mathfrak{z} Colombo. \mathfrak{zj} (4 gr.).
 Salep. $\mathfrak{B}\mathfrak{B}$ (6 dec.).
 Agua. c. s.
 para $\mathfrak{z}ij$ (90 gr.) de cocimiento, al que se añade:
 Jarabe de manzanilla. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
 I. Diarrea de los niños. D. Una cucharada de hora en hora.

6136. Otra (JAHN).

\mathfrak{z} Corteza de cascarilla. $\mathfrak{z}ij$ (8 gr.).
 Agua común. $\mathfrak{z}vj$ (180 gr.).
 Se hierve hasta que se reduzca la tercera parte, se cuele y se añade S. A.
 Acido nítrico alcoholiz. $\mathfrak{B}jv$ (5 gr.).

Jar. de cásc. de naranj. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
 I. Diarrea crónica. D. Una cucharada cada dos horas.

6137. P. ANTIDISENTÉRICA (Spielmann).

\mathfrak{z} Ipecacuana. $\mathfrak{z}ij$ (8 gr.).
 Agua. $\mathfrak{z}xij$ (375 gr.).
 Se divide en tres partes y cada una de ellas sirve para hacer un cocimiento. La cantidad total del producto debe ser de $\mathfrak{z}vj$ (180 gr.). Se añade:
 Jarabe de goma. $\mathfrak{z}ij$ (60 gr.).
 Se administra en tres veces con tres horas de intervalo en las disenterias y en las diarreas crónicas. Es un medicamento enérgico y muy eficaz. V. *Pocion contra la disenteria, de Helvetius.*

6138. P. ANTIDISENTÉRICA (Richter).

\mathfrak{z} Extracto alcohólico de nuez vómica. $\mathfrak{g}jv$ (2 dec.).
 Agua. $\mathfrak{z}vj$ (180 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Mucilago,
 Jarabe de altea, ãã. . . $\mathfrak{z}j\mathfrak{B}$ (50 gr.).
 M. D. A cucharadas de hora en hora.

6139. Otra (REMER).

\mathfrak{z} Raiz de arnica. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
 Agua hirviendo. . . . $\mathfrak{B}\mathfrak{B}$ (250 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade S. A.:
 Salep en polvo. \mathfrak{zj} (4 gr.).
 Láud. de Sydenham. $\mathfrak{B}j$ (12 dec.).
 Jarabe de claveles. . . \mathfrak{zj} (30 gr.).
 I. Disenteria crónica. D. Una ó dos cucharadas cada hora.

6140. P. ANTIEMÉTICA.

\mathfrak{z} Bicarbonato de potasa. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (2 gr.).
 Agua destilada. $\mathfrak{z}ij$ (90 gr.).
 Jarabe simple. \mathfrak{zj} (30 gr.).
 Disuélvase S. A.
 I. Estafiloma, cólera, gastritis, gastralgia, vómitos espasmódicos, acidez de las primeras vias.

D. Una cucharada cada diez minutos, y despues otra cucharadita de café de zumo de limon.

6141. P. ANTIEMÉTICA
(*Chaussier*).

℞ Agua pura. un vaso.
Azúcar blanca en polvo. ℞j (30 gr.).
Bicarbonato de potasa. . ℞ij (8 gr.).
Acido tartárico en polvo. ℞j (4 gr.).
H. S. A. Se puede emplear los ácidos cítrico y oxálico concretos, y mezclarlos con los diferentes carbonatos alcalinos ó térreos, segun el objeto que se propone el médico.

I. Cólera morbo, vómitos espasmódicos rebeldes. *D.* Se toma de una sola vez, inmediatamente despues de haber hecho la mezcla.

Nota. A veces se hace tomar separadamente la sal alcalina y el ácido, para que hagan la efervescencia en el estomago.

6142. P. ANTIEMÉTICA Y ASTRINGENTE (*Barthe*).

℞ Raiz de colombo. ḡxxx (15 dec.).
Catecú preparado. . . ℞j (4 gr.).
Corteza de Winter
quebrantada. ḡxx (10 dec.).

Se infunde durante ocho horas en ceniza caliente con

Agua. ℞jv (125 gr.).

Se cuela y se añade:

Jar. de rosas rojas. ℞j (30 gr.).

I. Diarreas asténicas con vómitos, cólera morbo, etc. *D.* A cucharadas.

6143. P. ANTIEMÉTICA (*Dubois*).

℞ Carbonató de sosa. . . ℞j (4 gr.).
Agua destilada. ℞iij (90 gr.).
Vinagre muy fuerte. . . ℞ij (60 gr.).
Ojimiél. ℞j (30 gr.).

D. De una vez, inmediatamente despues de la mezcla.

6144. Otra (*GALLEREUX*).

℞ Infusion de flor de amapolas. ℞v (150 gr.).

Agua de azahar. ℞j (30 gr.).

Ipecacuana. ḡxv (75 cent.).

Jarabe diacodion. . . . ℞℞ (45 gr.).

Eter sulfúrico. 40 gotas.

M. D. Una cucharada cada media hora.

6145. P. ANTIEMÉTICA DE RIVERIO
ó *Pocion gaseosa* (*F. F.*).

℞ Jarabe de limones. . . . ℞j (32 gr.).
Zumo de limon. ℞℞ (16 gr.).
Agua comun. ℞iij (96 gr.).
Bicarbonato de potasa. ℞℞ (2 gr.).

Se mezclan en una botella, que se tapa inmediatamente.

Es mas ventajoso que el enfermo tome separadamente la sal alcalina y los ácidos, á fin de que se haga la efervescencia en el estómago mismo; entonces es necesario preparar la pocion del modo siguiente:

Bicarbonato de potasa. ℞℞ (2 gr.).

Jar. de cort. de cidra. ℞℞ (16 gr.).

Agua. ℞iij (64 gr.).

Se mezclan en una botella. Por separado se toman:

Zumo de limon. ℞℞ (16 gr.).

Jarabe de limon. ℞j (32 gr.).

Agua. ℞iij (64 gr.).

Se mezclan en otra botella.

I. Es útil para combatir el vómito, ya sea producido por una gastralgia ó por cualquiera otra afeccion del estómago, en el histerismo, en las enfermedades de las vias digestivas, en los casos de lentitud en la digestion, etc. *D.* Se hacen tomar sucesivamente al enfermo partes iguales de estas pociones.

6146. P. ANTIEPILÉPTICA (*Pii*).

℞ Zumo exprimido de galio. ℞v (150 gr.).

Vinagre de ruda. ℞iij℞ (10 gr.).

Tintura de castóreo. . . ḡxviiij (1 gr.).

Jarabe de cantueso. . . ℞j (30 gr.).

M. I. Epilepsia. *D.* En dos veces antes del acceso.

6147. P. ANTIEPILÉPTICA
AMONIACAL.

℞ Agua de peonia. ℞iij (60 gr.).

Jarabe de valeriana. . . ℥j℥ (45 gr.).
 Cloruro de plata y amoniac. 40 gotas.
I. Epilepsia. D. A cucharadas.

6148. P. ANTIEPILEPTICA OPIADA.

℥ Nitrate de plata cristalizado. ḡ^{2/5}
 (2 cent.).
 Agua destilada. ℥ij (60 gr.).
 Tintura de opio. ℥℥ (6 dec.).
 Muc. de goma arábica. ℥j (30 gr.).
M. Nota. Se puede aumentar sucesivamente la dosis del extracto hasta ḡijj (15 cent.). *I. Epilepsia, enfermedades convulsivas, parafimosis. D. Una cucharada tres veces al dia.*

6149. P. ANTIESCORBÚTICA.

℥ Jarabe de quina. ℥j (30 gr.).
 Agua de fumaría ó de menta. ℥jv (125 gr.).
 Alcoholato de coclear. ℥ij (8 gr.).
 Zumo de limon. ℥j (30 gr.).
I. Es antiescorbútica. D. Una cucharada de hora en hora.

6150. Otra, n. 2.

℥ Berro,
 Coclearia,
 Rábano rusticano, ãã. ℥℥ (15 gr.).
 Agua hirviendo. ℥bj (500 gr.).
 Se infunde durante una hora, se cuele y se añade:
 Jarabe de genciana. . . ℥j (30 gr.).
 Carbonato de potasa. . . ḡxc (5 gr.).
I. Escorbuto, estomacace, liquen, lupus, lepra. D. A cucharadas de dos en dos horas.

6151. Otra (Frank).

℥ Cocimiento de quina. . . ℥v (160 gr.).
 Agua espirit. de canela. ℥ij (64 gr.).
 Jarabe de adormideras. ℥j (32 gr.).
 Extracto de quina. . . ℥vj (24 gr.).
H. S. A. I. Escorbuto que ha llegado á su mayor grado. D. Una cucharada cada media hora.

6152. P. ANTIESCROFULOSA.

℥ Carbonato de sosa. ℥j (4 gr.).

Agua de manzanilla. . . ℥iij (90 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Jarabe de genciana. . . ℥j (30 gr.).
 Tint. de quina amar. ℥j (4 gr.).
 Se da á cucharadas.

6153. Otra, n. 2.

℥ Cloruro de bario. ḡij (4 dec.).
 Agua destilada. ℥vj (180 gr.).
 Jarabe simple. ℥j℥ (45 gr.).
M. D. A cucharadas, tres ó cuatro veces al dia.

6154. Otra, n. 3.

℥ Carbonato de sosa. ℥℥ (2 gr.).
 Tintura de genciana. . . ℥j (30 gr.).
M. A veces se sustituye el carbonato de amoniacó al de sosa. D. A cucharadas.

6155. Otra (CIMA).

℥ Cloruro de calcio fundido. ℥℥ (2 gr.).
 Agua destilada. ℥vij (210 gr.).
 Jarabe simple. ℥j (30 gr.).
H. S. A. I. Afecciones escrofulosas, coxalgia, bocio, al principio de ciertos casos de tisis, raquitis, tumores blancos, tumores glandulosos. D. Una cucharada cada dos ó tres horas.

6156. Otra (HENN).

℥ Acetato de potasa. ḡxc (5 gr.).
 Extracto de cicuta. ḡjv (2 dec.).
 Agua. ℥iij (90 gr.).
 Jarabe de adormider. ℥j (30 gr.).
H. S. A. I. Atrofia mesentérica. D. Una cucharada de café cuatro veces al dia.

6157. P. ANTIFEBRIL (H. DE AL.).

℥ Acido clorhídrico,
 Eter sulfúrico, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Agua de canela. ℥℥ (250 gr.).
 Jarabe de frambuesas. ℥iij (90 gr.).
M. I. Calenturas graves. D. Dos cucharadas cada dos horas.

6158. P. ANTIGALACTOPOYÉTICA
(*P. Frank*).

- ʒ Mirra. ʒj (4 gr.).
 Infusion ligera de man-
 zanilla. ʒvj (180 gr.).
 Agua dest. de canela. ʒj (30 gr.).
 Se disuelve triturando en un
 mortero, se cuele y se añade:
 Tart. de hierrosoluble. ʒj (12 dec.).
 Jarabe de corteza de
 naranja. ʒj (30 gr.).
I. Galactirrea. D. Una cucharada
cada tres horas.

6159. P. ANTIGONORRÉICA
(*Handel*).

- ʒ Extr. de nuez vómica. ʒß (2 gr.).
 Agua de pepinos. . . . ʒvj (180 gr.).
 Aceite de linaza. . . . ʒj (30 gr.).
 Miel blanca. ʒß (15 gr.).
 Yema de huevo. . . . número 1.
M. D. Una cucharada cada dos
horas.

6160. Otra (PIERQUIN).

- ʒ Cubebas en polvo. . . . ʒij (8 gr.).
 Vino. ʒij (60 gr.).
 Esencia de bergamota. . una gota.
M. D. Se da esta pocion cada dos
horas hasta que cese el flujo. Se
administra despues algunas píldoras
mercuriales como medio pro-
filáctico.

6161. P. ANTIESPASMÓDICA.

- ʒ Acido nítrico alcoholizado,
 ó Acido sulfúrico alco-
 holizado. ʒij (8 gr.).
 Infusion de tilo. . . . ʒjv (125 gr.).
 Agua de flores de nar. ʒß (15 gr.).
 Jarabe de claveles. . . ʒj (30 gr.).
M. I. Afecciones histéricas. D.
A cucharadas.

6162. Otra, n. 2.

- ʒ Jar. de flor de naranjo. ʒj (30 gr.).
 Agua destilada de lechuga,
 Agua dest. de tilo, ãã. ʒij (60 gr.).
 Eter sulfúrico. 30 gotas.
 Láudano de Sydenham: 10 gotas.
D. A cucharadas de hora en

hora, ó cada dos horas; se agitará la botella al tiempo de tomar la pocion.

6163. Otra, n. 3.

- ʒ Eter sulfúrico. ʒß (2 gr.).
 Jar. de flor de naranjo. ʒj (30 gr.).
 Agua destil. de tilo. ʒjv (125 gr.).
H. S. A. I. Hipo, tos convulsi-
va incipiente, tos sufocante, có-
licos, histéricos, síncope, lipoti-
mias, estupor y delirio de las ca-
lenturas graves, etc. En este úl-
timo caso se puede reemplazar el
éter por la tintura de almizcle.

6164. Otra, n. 4.

- ʒ Tintura de castóreo. . . ʒj (4 gr.).
 Infusion de toronjil. . . ʒv (150 gr.).
 Jarabe de cantueso. . . ʒj (30 gr.).
 Mézclese.

6165. Otra, n. 5.

- ʒ Agua destilada de tilo,
 Agua destilada de melisa,
 Agua destilada de le-
 chuga, ãã. ʒjß (45 gr.).
 Agua dest. de azahar. ʒß (15 gr.).
 Eter sulfúrico. 20 gotas.
 Jar. de flor de naranjo. ʒj (30 gr.).
M. S. A. D. A cucharadas.

6166. Otra, n. 6.

- ʒ Amoniaco líquido. . . ʒj (4 gr.).
 Tintura de castóreo,
 Tint. de asa fétida, ãã. ʒß (16 gr.).
 Ag. de menta piperita. ʒvj (192 gr.).
 Jar. de cásc. de nar. ʒx (40 gr.).
I. Asma, ataxia, caquexia, eso-
fagismo, amenorrea, polidipsia,
escarlatina, histérico, disme-
norrea, ninfomanía, neurosis, an-
gina, espasmo, sudor inglés, sín-
copes, tétanos, caquexia serosa,
tifo, beriberi, crup, hematocele,
neuralgia. D. Una cucharada de
hora en hora.

6167. Otra (F. F.).

- ʒ Jarabe de azahar. . . . ʒj (32 gr.).

Agua destilada de tila. ℥ij (64 gr.).
 Agua destil. de azahar. ℥ij (64 gr.).
 Eter sulfúrico. ℥ß (2 gr.).

Se mezclan en una botellita y se tapan perfectamente.

I. Afecciones espasmódicas de los órganos pulmonares ó gástricos, corea, histérico, etc., y en las flegmasias que se presentan desde el principio con síntomas atáxicos. *D.* A cucharadas.

6168. P. ANTIESPASMÓDICA.

℥ Agua de hinojo. ℥vj (180 gr.).
 Alcohol de melisa com-
 puesto. ℥ij (8 gr.).
 Tintura de castóreo. . ℥j (4 gr.).
 Láudano líquido. . . . ℥ß (2 gr.).
 Jar. de cort. de cidra. ℥j (30 gr.).

M. I. D. A cucharadas de hora en hora.

6169. Otra (FORGET).

℥ Agua dest. de melisa. ℥jv (125 gr.).
 Licor de Hoffmann. . 20 gotas.
 Tintura de castóreo. ℥ß (2 gr.).
 Jar. de cásc. de naranja. ℥j (30 gr.).

M. D. A cucharadas de hora en hora.

6170. P. ANTIESPASMÓDICA AMONIACAL.

℥ Almizcle. ℥jx (50 cent.).
 Jar. de báls. del Perú. ℥j (30 gr.).
 Oleosácaro de melisa. ℥ij (60 gr.).
 Carbonato de amoniaco,

Conserva de rosas ro-
 jas, ãã. ℥ijß (10 gr.).

M. I. Dismenorrea, histérico, amenorrea, gastritis, peritonitis, sarampion, ninfomanía, diarrea crónica, escarlatina (retroceso), angina, espasmo, síncope, tétanos, erup, sudor inglés, tifo, neuroses, polidipsia, embriaguez, neuralgias. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6171. P. ANTIESPASMÓDICA ANISADA.

℥ Esencia de anís. 10 gotas.

Eter sulfúrico. 24 gotas.
 Láudano de Sydenham. 20 gotas.
 Jarabe simple. ℥jß (45 gr.).
 Agua. ℥v (150 gr.).

Se usa en los cólicos ventosos espasmódicos.

6172. P. ANTIESPASMÓDICA (Wendt).

℥ Asa fétida. ℥ß (2 gr.).
 Almizcle. ℥viii (4 dec.).
 Mucil. de goma aráb. ℥j (30 gr.).
 Azúcar blanca. ℥ij (8 gr.).

Se tritura en un mortero de mármol, y despues se añade poco á poco:

Agua destilada. ℥ijß (75 gr.).

M. I. Crup, laringitis espasmódica. *D.* Una cucharadita de café de hora en hora.

6173. Otra (WENDT).

℥ Valeriana quebrantad. ℥xc (5 gr.).
 Agua. ℥iij (96 gr.).

Se infunde y se añade:

Almizcle. ℥viii (4 dec.).
 Tintura de ambar. . ℥ijß (10 gr.).
 Jar. de flor de naranj. ℥v (20 gr.).

H. S. A. I. Laringitis espasmódica. *D.* Una cucharada de media en media hora. Al mismo tiempo se prescriben las lavativas de asa fétida.

6174. P. ANTIESPASMÓDICA EMULSIVA (Richter).

℥ Aceite de beleño. . . . ℥ß (16 gr.).
 Goma aráb. en polvo. ℥vj (24 gr.).
 Jarabe de malvabisco. ℥j (32 gr.).
 Agua destilada de ce-

rezas negras. ℥vj (192 gr.).

I. Hemotisis, cuando es espasmódica ó los enfermos muy irritables. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6175. P. ANTIESPASMÓDICA MOSCADA.

℥ Agua de tilo,
 Agua de azahar, ãã. . . ℥ij (60 gr.).
 Tintura de almizcle. . 20 gotas.

Jarabe de éter ,
Jarabe de azahar , $\text{ãã.} \cdot \text{ʒjv}$ (15 gr.).
Mézclese.

**6176. P. ANTIESPASMÓDICA
ETÉREA.**

ʒ Jarabe de extr. de opio. ʒj (30 gr.).
Agua destilada de tilo ,
Ag. dest. de azahar , $\text{ãã.} \cdot \text{ʒij}$ (60 gr.).
Eter sulfúrico. ʒʒ (2 gr.).
Se pesan en una botella de vidrio de cuello vuelto, primeramente los jarabes, despues las aguas destiladas y por último el éter sulfúrico, y se tapa al instante.

**6177. P. ANTIFLOGÍSTICA Y
SUDORÍFICA.**

ʒ Emético. ʒvj (3 dec.).
Miel blanca. ʒʒ (15 gr.).
Inf. de flor de saúco. ʒij (1000 gr.).
M. I. Afecciones reumáticas y gotosas. D. A tazas pequeñas.

**6178. P. ANTIGONORRÉICA
(Delpech).**

ʒ Agua de yerbabuena ,
Agua de flores de naranjo ,
Jarabe de limon ,
Bálsamo de copaiba , $\text{ãã.} \cdot \text{ʒj}$ (30 gr.).
Acido sulfúrico. ʒj (4 gr.).
Goma tragacanto. . . . c. s.
M. S. A. D. Una cucharada, mañana y noche; cuando es difícil la digestion del bálsamo de copaiba, se añade á esta pocion de ocho á quince gotas de láudano líquido de Sydenham.

6179. P. ANTIHELMÍNTICA.

ʒ Santónico en polvo. . ʒʒ (2 gr.).
Jarabe de flores de me-
locoton ʒj (30 gr.).
Agua de lechuga. . . . ʒv (150 gr.).
H. S. A.

6180. Otra (H. DE M.).

ʒ Ruibarbo quebrantado. ʒij (24 dec.).
Santónico. ʒij (8 gr.).
Se infunde en cantidad suficien-

te de agua para obtener ʒxij (375 gr.) de líquido, se cuele y se añade:

Jarabe de achicorias
con ruibarbo. ʒj (30 gr.).
D. En dos tomas.

6181. Otra (SCHWART).

ʒ Petroleo. ʒʒ (16 gr.).
Tintura de asa fétida. . ʒvʒ (22 gr.).
I. Ténia. D. Cuarenta gotas tres veces al dia.

6182. P. ANTIHEMICRÁNICA.

ʒ Carbonato de amon. ʒxviiij (1 gr.).
Tintura de pimienta. . ʒʒ (2 gr.).
Jarabe de azafran ,
Jarabe de flores de
naranja , $\text{ãã.} \cdot \text{ʒj}$ (30 gr.).
Agua de laurel real ,
Agua de menta pipe-
rita , $\text{ãã.} \cdot \text{ʒjʒ}$ (45 gr.).
I. Hemicránea, insomnio, pesadilla, escarlatina. D. Dos cucharadas mañana y noche.

**6183. P. ANTIHEMICRÁNICA
OPIADA.**

ʒ Láudano líquido. . . . ʒxviiij (1 gr.).
Tintura de ipecacuana. ʒʒ (2 gr.).
Acetato de amoniaco
líquido. ʒʒ (15 gr.).
Agua de menta piper. ʒjʒ (45 gr.).
Jarabe de belladona. . ʒj (30 gr.).
I. Jaqueca, hemicránea, cefalalgia, hemotisis, D. Una cucharada de hora en hora.

**6184. P. ANTIHEMORRÁGICA
(Laidlamo).**

ʒ Acetato de plomo. . . ʒxvj (8 dec.).
Tintura de opio. . . . ʒj (4 gr.).
Vinagre comun. . . . ʒjʒ (45 gr.).
Agua destilada. . . . ʒij (60 gr.).
M. I. Hemorragias pasivas, principalmente en los casos de hematemesis ó cuando una metrorragia hace temer un aborto. D. Una cucharada cada cuatro horas.

6185. P. ANTIHIDRÓPICA (*Leake*).

℞ Carbonato de potasa pu-
rificado. ℥ij (8 gr.).
Vinagre escilítico. c. s.

Se tritura para saturarle com-
pletamente, y despues se aña-
de S. A.

Agua destilada de canela. ℥ij (60 gr.).
Alcoholado de opio. 30 gotas.

I. Ascitis, especialmente la que
sigue á las pirexias intermiten-
tes. *D.* En tres dosis iguales, por
la mañana, al medio dia y por la
noche.

6186. Otra (*SCHMIDT*).

℞ Digital en polvo. ℥j (12 dec.).
Genciana quebrantad. ℥j (4 gr.).
Agua hirviendo. ℥vj (180 gr.).

Se infunde, se cuele y se aña-
de:

Ojmiel escilítico. ℥j (30 gr.).

I. Ascitis esencial. *D.* Una cu-
charada de hora en hora. Se au-
xilia la accion de este remedio
con el linimento estimulante del
mismo autor, y despues con los
ferruginosos asociados á los amar-
gos aromáticos especialmente el
ruibarbo, y se continúa usando
estos últimos medios hasta que
las orinas salgan claras.

6187. P. ANTIHISTÉRICA ó Poción
con sustancias fétidas (*F. F.*).

℞ Tintura de castóreo. ℥℥ (2 gr.).
Agua destilada de valeriana,
Agua destilada de flor

de naranjo, añ. ℥ij (64 gr.).

Eter sulfúrico. ℥j (4 gr.).

Jarabe de artemisa com-
puesto. ℥j (32 gr.).

Se mezcla la tintura alcohólica
y el jarabe, se añade despues las
aguas destiladas, en seguida el
éter y se tapa exactamente.

I. Histérico, neurosis. Produce
tambien buenos efectos en la ame-
norrea y dismenorrea de las clo-
róticas y aun de las mujeres de
constitucion fuerte, cuando depen-

de de un estado espasmódico de
la matriz. *D.* Se toma á cucha-
radas.

6188. P. ANTIHISTÉRICA (*Josat*).

℞ Cianuro de potasio. ḡj (5 cent.).

Agua destilada de le-
chuga virosa. ℥ij (64 gr.).

Jarabe de flores de na-
ranjo. ℥j (32 gr.).

M. D. A cucharadas.

6189. P. ANTICTÉRICA
(*Baldinger*).

℞ Ipecac. quebrantada. ℥j℥ (6 gr.).

Cáscara de naranja. ℥ij (8 gr.).

Bitartrato de potasa. ℥j (4 gr.).

Agua comun. ℥v (150 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca
la quinta parte, se cuele y se aña-
de:

Jarabe de manzanilla. ℥j (30 gr.).

I. Ictericia espasmódica. *D.* Una
cucharada cada tres horas.

6190. P. ANTILÍSICA (*Selle*).

℞ Acetato de amoniaco

líquido. ℥℥℥ (250 gr.).

Triaca de Venecia. ℥℥ (15 gr.).

Subcarb. de amoniaco. ℥ij (8 gr.).

Alcanfor. ℥j (4 gr.).

Carralejas. número 8.

H. S. A. I. Hidrofobia y casos
que exigen una fuerte evacuacion
por los sudores y las orinas.

D. Una cucharada de hora en
hora ó cada media hora.

6191. P. ANTIMETORRAGICA
(*Osiander*).

℞ Extr. de cort. de sauce. ℥j℥ (6 gr.).

Alumbre. ℥℥ (2 gr.).

Hidrolato de canela. ℥v (150 gr.).

Jarabe de frambucas. ℥j (30 gr.).

I. Metrorragia asténica. *D.* Dos
cucharadas cada veinte á treinta
minutos.

6192. P. ANTIMONIAL.

℞ Antimonio diaforético lavado,
ó Acido antimónico. ℥j (4 gr.).
Goma tragacanto. ḡxvj (8 dec.).

Ag. de flor de naranjo. \mathfrak{z} j (30 gr.).
 Agua destilada. . . . \mathfrak{z} ijj (90 gr.).
 Jarabe simple. . . . \mathfrak{z} j (30 gr.).

I. Pleuroneumonía. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6193. P. ANTIMONIAL (H. M.).

\mathfrak{z} Tártaro emético. . . \mathfrak{g} j (5 cent.).
 Agua comun. . . . \mathfrak{z} xij (375 gr.).
 Disuélvase. *D.* En tres dosis al día.

6194. P. DE ANTIMONIO
 DIAFORÉTICO.

\mathfrak{z} Antimonio diafor. lavado. \mathfrak{z} j (4 gr.).
 Poción gomosa de la F. F. núm. 1.
M. I. Reumatismo articular agudo. *D.* A cucharadas.

6195. P. ANTINEFRÍTICA (*Williams de Norford*).

\mathfrak{z} Cocimiento de cebada perlada. . . . \mathfrak{H} ij (1000 gr.).
 Goma arábica. . . . \mathfrak{z} ijj (90 gr.).
 Agua de bayas de e-nebro compuesta. \mathfrak{z} ij (60 gr.).
 Jarabe de altea. . . . \mathfrak{z} j \mathfrak{B} (45 gr.).
H. S. A. I. Cólico nefrítico. *D.* La mitad de la dosis indicada al día.

6196. P. ANTIPERIÓDICA.

\mathfrak{z} Sulfato de quinina. . . \mathfrak{g} viiij (4 dec.).
 Acido sulfúrico. . . . una gota.
 Jarabe de goma. . . . \mathfrak{z} ij (60 gr.).
 Agua destilada. . . . \mathfrak{z} jv (125 gr.).
 Disuélvase. *I.* Apirexia de las calenturas intermitentes. *D.* En tres ó cuatro dosis, y la última dos horas antes del acceso venidero.

6197. *Otra*, n. 2.

\mathfrak{z} Sulfato de quinina. . . \mathfrak{g} xij (6 dec.).
 Sulfato de morfina. . . \mathfrak{g} ijj (15 cent.).
 Agua de Rabel. . . . \mathfrak{g} x (5 dec.).
 Oleosácaro de menta. \mathfrak{g} xc (5 gr.).
 Jarabe de quina,
 Jar. de genciana, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. \mathfrak{z} j (30 gr.).
 Agua de laurel real. . \mathfrak{z} ijj (90 gr.).
I. Calenturas intermitentes ó remitentes perniciosas, neuralgias

intermitentes y periódicas. *D.* En cuatro tomas de dos en dos horas.

6198. P. ANTIRAQUÍTICA (*Freiler*).

\mathfrak{z} Raiz de rubia. . . . \mathfrak{z} ij (8 gr.).
 Agua comun. . . . \mathfrak{z} vj (192 gr.).
 Se hierve hasta que se reduzca la sexta parte, se cuela y se añade:

Agua destilada de ca-nela vinosa. . . . \mathfrak{z} j (32 gr.).
 Jarabe de ajensos. . . \mathfrak{z} vj (24 gr.).
D. Una cucharada cada dos horas.

6199. P. ANTIREUMÁTICA
 (*Wardelevorth*).

\mathfrak{z} Ioduro de potasio. . . \mathfrak{z} \mathfrak{B} (2 gr.).
 Agua de menta. . . . \mathfrak{z} vj (180 gr.).
 Jarabe de azafran. . . \mathfrak{z} \mathfrak{B} (15 gr.).
M. I. Reumatismo articular agudo. *D.* \mathfrak{z} j (30 gr.) tres veces al día.

6200. P. ANTISÉPTICA.

\mathfrak{z} Serpentina virginiana,
 Quina calisaya, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. . \mathfrak{z} ij (8 gr.).
 Se infunde en
 Agua. \mathfrak{z} vj (180 gr.).
 Se cuela y se añade:
 Jarabe simple. . . . \mathfrak{z} j \mathfrak{B} (45 gr.).
 Acetato de amoniaco. \mathfrak{z} \mathfrak{B} (15 gr.).
D. A cucharadas de hora en hora.

6201. *Otra*, n. 2.

\mathfrak{z} Alcanfor. \mathfrak{g} jx (50 cent.).
 Tintura de canela. . \mathfrak{z} ij \mathfrak{B} (10 gr.).
 Jarabe. \mathfrak{z} j (30 gr.).
 Se trituran en un mortero de vidrio y se añade:
 Cocimiento de quina. \mathfrak{z} jv (125 gr.).
 Acetato de amoniaco. \mathfrak{z} ij (8 gr.).
I. Calentura tifoidea ó atáxica, gangrena de hospital, adinamia con disposición gangrenosa, orlin, escorbuto, cólera, sudor inglés, bronquitis, hemotisis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6202. *Otra*, n. 3.

\mathfrak{z} Alcanfor. \mathfrak{g} x (5 dec.).

Cocimiento de quina. ℥jv (125 gr.).
Tintura de canela,
Acet. de amoniaco, ãã. ℥j (4 gr.).
Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

M. I. Calenturas graves con adinamia, amenorrea, sudor inglés, tétanos, calentura tifoidea, calentura atáxica, gangrena, astenia, efidrosis, gangrena de hospital, hemicránea, cólera, crup, orlin, neuralgias. *D.* A cucharadas.

6203. P. ANTISÉPTICA.

℥ Quina amarilla. ℥B (15 gr.).
Serpentar. virginiana. ℥ij (8 gr.).

Se hierve en

Agua. lbB (250 gr.).

Se cuele y se añade:

Jar. de báls. de Tolú. ℥jB (45 gr.).

Alcanfor diluido en

la cuarta parte de

unayemadehuevo, ℥xviii (4 gr.).

Se toma á cucharadas en el período de putridez de las afecciones tifoideas.

**6204. P. ANTISÉPTICA
ALCANFORADA.**

℥ Infusion de ℥ij (8 gr.)
de serpentaria vir-
giniana. ℥jv (125 gr.).

Tintura de quina. ℥ij (8 gr.).

Alcanfor. ℥xij (6 dec.).

Acetato de amoniaco,

Jarabe de quina, ãã. ℥j (30 gr.).

H. S. A. I. Período de putridez de las calenturas tifoideas, fiebres adinámicas con disposicion á la gangrena. *D.* A cucharadas.

6205. P. ANTISÉPTICA TÓNICA.

℥ Quina gris. ℥j (4 gr.).

Jarabe de adormideras. ℥ij (60 gr.).

Acetato de amoniaco,

Tintura de canela, ãã. ℥ij (8 gr.).

Agua. ℥jv (125 gr.).

ó Agua de menta rizada,

Agua de flor de naran-

jo, ãã. ℥ij (60 gr.).

M. I. Calenturas graves con postracion de fuerzas, escorbuto, gangrena de hospital, astenia, ca-

lenturas atáxico-adinámicas ó tifoideas, cólera, efidrosis, neuralgias. *D.* Una cucharada de dos en dos horas.

6206. P. ANTISIFILÍTICA.

℥ Sublimado corrosivo. ℥ij (10 cent.).

Agua destilada. ℥vj (24 gr.).

Alcoholato de canela,

Jarabe simple, ãã. ℥j (32 gr.).

M. Cada cucharada que pesa ℥v (20 gr.), contiene ℥¹/₆ (18 mil.) de sublimado.

D. Una ó dos cucharadas, dos ó tres veces al dia.

6207. Otra (H. M.).

℥ Sublimado corrosivo. ℥iij (15 cent.).

Alcohol comun. ℥vj (180 gr.).

M. D. Media cucharada en un vaso de cocimiento sudorífico.

6208. Otra (H. M. F.).

℥ Solucion de deutocloruro de mercurio. ℥ijB (10 gr.).

Goma arábiga. ℥xviii (4 gr.).

Agua dest. ó de lluvia. ℥iij (96 gr.).

H. S. A. Dos dracmas y media (10 gr.) de la solucion, contienen ℥¹/₃ (1 cent.) de deutocloruro.

6209. Otra (MENDACA).

℥ Cianuro de mercurio. ℥vj (3 dec.).

Agua destilada. ℥vj (180 gr.).

Láudano líquido. ℥B (2 gr.).

D. Una cucharada mañana y noche en un cocimiento de zarzaparrilla.

6210. Otra (PARENT).

℥ Agua destilada. ℥x (300 gr.).

Alcohol rectificado. ℥v (150 gr.).

Extracto alcohólico de

boj. ℥vj (24 gr.).

Extracto de acónito. ℥ij (8 gr.).

Sal amoniaco. ℥iij (12 gr.).

Cianuro de mercurio. ℥xvj (8 dec.).

Esencia de sasafrás. 16 gotas.

Jarabe simple. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. D. Dos cucharaditas de café al dia, que se aumenta gradualmente hasta dos cucharadas grandes.

6211. P. ANTITETÁNICA (Fournier).

☞ Infusion muy fuerte de
flores de arnica. ℥jv (125 gr.).
Agua de Luce. ℥ij (8 gr.).
Alcanfor,
Almizcle puro, ãã. ℥j (4 gr.).
H. S. A. I. Mordedura de anima-
les venenosos, hidrofobia, tétanos. *D.* Una cucharada de hora
en hora.

Nota. Se pueden añadir ℥ij ó ℥jv (8 á 16 gr.) de nitrato de potasa, segun el estado del aparato urinario.

6212. P. ANTITENÁNICA ESTIBIADA (Foy).

☞ Tártaro emético. ḡviiij á ḡxij (4 á 6 dec.).

Infusion de arnica. ℥jv (125 gr.).
Jarabe de valeriana. ℥j (30 gr.).

M. I. Tétanos, ceática, corea, conjuntivitis. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6213. P. ANTITETANICA DE FOUQUIER (H. DE M.).

☞ Almizcle,
Alcanfor, ãã. ℥j (4 gr.).
Agua destil. de melisa. ℥ij (60 gr.).
Infusion muy fuerte

de flor de arnica. ℥jv (125 gr.).
Se pulveriza el alcanfor con unas gotas de alcohol, se interpone juntamente el almizcle por medio de un poco de mucilago de goma arábica, y se deslíe en el líquido.

I. Mordeduras de animales venenosos, hidrofobia, tétanos. *D.* A cucharadas de hora en hora. Se puede añadir dos, tres y hasta ℥jv (5 gr.) de nitro, segun el estado del aparato urinario.

6214. P. ANTITÍSICA (Amelung).

☞ Acetato de plomo. ḡij (1 dec.).
Extracto de beleño. ḡj (5 cent.).
Agua destilada. ℥vj (180 gr.).
Disuélvase. *D.* Se da una cucharada cada dos horas.

6215. Otra (EBENS).

☞ Creosota. 2 á 4 gotas.
Mucil. de goma arábica. ℥j (30 gr.).
Infusion de salep. ℥v (150 gr.).
Azúcar. ℥j (4 gr.).
I. Diarreas colicuativas de los tísicos. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6216. P. ANTIVOMITIVA.

☞ Raiz de colombo. ℥j (4 gr.).
Se hierve en ℥x (320 gr.) de agua hasta que se reduzca un tercio, se cuele y se añade:

Carbonato de potasa. ℥j (12 dec.).
Zumo de limon. ℥vj (24 gr.).
Láudano líquido. 24 gotas.

D. Una cucharada cada tres cuartos de hora. Se tendrá en una botellita muy bien tapada.

6217. P. APERITIVA.

☞ Cocimiento de las cinco raíces. ℥v (150 gr.).
Ojimiél escilitico. ℥j (30 gr.).
Nitrato de potasa. ℥j (12 dec.).
Acetato de amoniaco. ℥℔ (15 gr.).
H. S. A. una pocion.
I. Hidropesías. *D.* Una cucharada.

6218. Otra, n. 2.

☞ Extr. de milenrama. ℥℔ (15 gr.).
Infus. ligera de manzanilla. ℥vj (180 gr.).
Tierra foliada de tártaro. ℥ij (8 gr.).
Agua de canela hordecada. ℥ij (60 gr.).
I. Infartos de las vísceras abdominales á consecuencia de las calenturas intermitentes, inercia de los órganos digestivos que acompaña á la hipocondría. *D.* Una cucharada tres veces al dia. Se bebe despues una taza de caldo de ℥jv (125 gr.) de pescuezo de carnero, un puñado de hojas de achicorias amargas, diente de leon y berros.

6219. P. AROMÁTICA.

☞ Esencia de naranjo. ḡvj (3 dec.).

Esencia de romero. . . ḡjv (2 dec.).
 Alcohol. ʒij (8 gr.).
 Se disuelve y se mezcla con
 Jarabe de goma: . . . ʒij (64 gr.).
 Agua. ʒjv (125 gr.).
 D. Se toma á cucharadas.

6220. P. AROMÁTICA ó *Pocion cordial* (F. F.).

ʒ Jarabe de claveles. . . ʒj (32 gr.).
 Alcoholato de canela. . ʒjv (16 gr.).
 Confeccion de jacintos. ʒij (8 gr.).
 Agua de menta piperita,
 Agua de azahar, ãã. . . ʒij (64 gr.).
 Se mezclan las aguas destiladas,
 el alcoholato y el jarabe, y se des-
 líe la confeccion de jacintos en el
 líquido.

I. Es estimulante y tónica y con-
 viene á los individuos debilitados
 por enfermedades largas, y en la
 atonía del estómago. D. Una cu-
 charada cada hora.

6221. P. DE ARNICA (*Renér*).

ʒ Raiz de arnica. ʒß (16 gr.).
 Agua hirviendo. ʒvj (192 gr.).
 Se infunde y se añade:
 Salep en polvo. ḡxc (5 gr.).
 Láudano líquido de Sy-
 denham. ʒß (2 gr.).
 Jarabe aromático. . . . ʒjß (48 gr.).
 I. Disenteria, diarrea crónica,
 infartos abdominales, parálisis.
 D. Dos cucharadas de hora en
 hora.

6222. P. DE ARSENIATO DE AMONIACO.

ʒ Arseniatode amoniac. ḡvij (4 dec.).
 Agua de saúco. ʒß (250 gr.).
 Espíritu de angélica. . ʒß (15 gr.).
 H. S. A. I. Calenturas intermi-
 tentes, herpes, afecciones cutá-
 neas, escrófulas. D. ḡxviiij á
 ḡxxxvj (1 á 2 gr.) al dia.

6223. *Otra*, n. 2.

ʒ Agua de tilo,
 Agua de hinojo, ãã. . ʒjß (48 gr.).

Jarabe de amapola,
 Jarabe de flor de na-
 ranjo, ãã. ʒv (20 gr.).
 Almizcle. ḡv (25 cent.).
 Arseniat. de amoniac. ḡjv (20 cent.).
 I. Coqueluche, asma, histéri-
 co, calenturas intermitentes, ca-
 tarro. D. A cucharadas de hora
 en hora.

6224. P. ARSENICAL.

ʒ Solucion de Fowler. . . 60 gotas.
 Tintura de opio. 30 gotas.
 Alcoholato de espliego. ḡxc (5 gr.).
 Agua de canela. ʒß (15 gr.).
 Jar. de flor de naranjo. ʒj (30 gr.).
 I. Sifílides, apirexia de las ca-
 lenturas intermitentes. D. Una
 cucharadita de café, cada tres
 horas.

Nota. Cada cucharadita contie-
 ne $\frac{1}{6}$ de grano (8 mil.) de arsenito
 de potasa.

6225. P. DE ASA FÉTIDA (*Millar*).

ʒ Asa fétida. ʒij (8 gr.).
 Acetato de amoniaco. . ʒj (30 gr.).
 Agua de poleo. ʒiij (90 gr.).
 Jarabe simple. ʒj (30 gr.).
 H. S. A. I. Crup, histérico. D.
 Se toma á cucharadas.

6226. P. ASTRINGENTE.

ʒ Carbonato de potasa. ʒj (4 gr.).
 Agua de flor de saúco. ʒvj (180 gr.).
 Jarabe de malvabisco. ʒj (30 gr.).
 I. Angina tonsilar acompañada
 de aftas, fiebres catarrales vio-
 lentas. D. Una cucharada de hora
 en hora.

6227. *Otra*, n. 2.

ʒ Extracto de rataniã. . ʒij (8 gr.).
 Jarabe de vinagre con
 frambuesas. ʒj (32 gr.).
 Infusion de rosas rojas. ʒiij (96 gr.).
 M. Se puede poner el extracto
 de catecú en lugar del de ratania.
 I. Hemorragias, diarreas, flujos
 atónicos. D. A cucharadas en el
 dia.

6228. P. ASTRINGENTE.

℥ Cocim. de tormentila. ℥jv (125 gr.).
 Jarabe de arándano. . ℥j (30 gr.).
 Bálsamo de copaiba. . ℥jβ (6 gr.).
 Goma quino. ℥j (12 dec.).
 Agua de Rabel. 15 gotas.

Se diluye el bálsamo de copaiba en un poco de yema de huevo y del mismo modo la goma quino.

I. Hemorragias, lenteria y gonorrea crónica. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6229. Otra (CLARUS).

℥ Acido sulfúr. debilit. ℥j (4 gr.).
 Ag. de cerezas negras. ℥jv (125 gr.).
 Jarabe de frambuesas. ℥j (30 gr.).

M. I. Flujos mucosos crónicos, hemorragias pasivas. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

6230. Otra (FOUQUIER).

℥ Agua destil. de rosas. ℥jv (125 gr.).
 Extracto de ratania. . ℥ij (24 dec.).
 Jarabe de vinagre ó
 diacodion. ℥j (30 gr.).

H. S. A. I. Disenteria crónica, cuando ha cesado la inflamacion, y hemorragias pasivas. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6231. Otra (FOUQUIER).

℥ Extracto de quina,
 Tintura de canela, ãã. 5β (2 gr.).
 Jarabe de membrillo. . ℥j (30 gr.).
 Agua de flor de naranjo. ℥iij (90 gr.).

M. I. Tónico que se usa en las hemorragias pasivas, diarreas crónicas, etc. *D.* A cucharadas.

6232. Otra (GAMBA).

℥ Tanino. ℥j (12 dec.).
 Agua dest. de ajenos. ℥jv (125 gr.).
 Jarabe vinoso de azafran,
 Vino de Málaga, ãã. . ℥j (30 gr.).

M. I. Hemorragias pasivas por inercia de la matriz y leucorrea. *D.* De tres á seis cucharadas al dia, que se toman en muchas veces.

6233. Otra (H. DE AM.).

℥ Inf. de nuez de agalla. ℥jv (125 gr.).
 Creta preparada. . . . ℥β (15 gr.).
 Tintura de opio,
 Goma arábica, ãã. . . ℥j (4 gr.).

M. I. Diarrea. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6234. Otra (H. DE SAN ANT.).

℥ Raiz de historta en
 polvo. ℥ij (8 gr.).
 Jarabe de membrillo. ℥j (32 gr.).
 Tintura de catecú. . . ℥ij (8 gr.).
 Agua. ℥jv (125 gr.).

M. I. Hemorragias, diarreas, leucorreas, etc. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6235. Otra (H. DE AM.).

℥ Tintura de catecú. . . ℥j (30 gr.).
 Tintura de opio. . . . 60 gotas.
 Goma arábica. ℥ij (8 gr.).
 Agua de canela. . . . ℥vj (180 gr.).

M. I. Diarrea. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6236. Otra (H. DE IT.).

℥ Corteza de simaruba. ℥β (15 gr.).
 Agua. ℥bj (500 gr.).
 Se hierve hasta que se reduzca á ℥β (250 gr.), se cuela y se añade:

Mucíl. de goma aráb. ℥ij (60 gr.).
 Tintura de opio. 12 gotas.

M. I. Diarrea crónica. *D.* A cucharadas cada dos horas.

6237. Otra (H. DE M.).

℥ Raiz de sinfito. ℥ij (8 gr.).
 Se hierve en c. s. de agua para obtener ℥xij (375 gr.) de cocimiento, y se añade:

Catecú. ℥ij (8 gr.).
 Agua de canela. ℥j (30 gr.).
 Jarabe de cidra. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. I. Diarreas. *D.* A cucharadas para los niños.

6238. Otra (JAHN).

℥ Láudano de Sydenham. ℥j (4 gr.).

Tintura de canela. . . ʒiij (12 gr.).
 Agua de Rabel. ʒj (12 dec.).
I. Metrorragia. D. Treinta á cuarenta gotas cada media hora en agua de avena.

6239. P. ASTRINGENTE
(Osiander).

ʒ Extracto de sáuce,
 Extracto de ratania, añ. ʒj (4 gr.).
 Alumbre. ʒß (2 gr.).
 Agua de canela. ʒv (150 gr.).
 Jarabe de frambuesas. . ʒj (30 gr.).
I. Metrorragia, sudor inglés, cólera. D. A cucharadas de media en media hora.

6240. Otra (PRADEL).

ʒ Tanino. ʒxij (6 dec.).
 Agua alcanforada. . . ʒjv (125 gr.).
 Jarabe de extracto de ratania,
 Jar. de goma aráb., añ. ʒj (30 gr.).
I. Ciertas diarreas y al fin de las blenorragias, cuando lo permite el estado del estómago y de los intestinos. D. De una á doce cucharadas en las veinticuatro horas en muchas veces.

6241. Otra (SUNDELIN).

ʒ Ratania. ʒj (30 gr.).
 Agua comun. lbj (500 gr.).
 Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, se cuele y se añade:
 Elixir ácido de Haller. ʒj (4 gr.).
 Jarabe de canela. . . . ʒjß (45 gr.).
M. I. Hemorragias pasivas, flujos mucosos crónicos. D. Una cucharada cada dos ó tres horas.

6242. P. ASTRINGENTE CON TANINO
(Bouchardat).

ʒ Agua comun. ʒiij (90 gr.).
 Agua de flor de naranj. ʒj (30 gr.).
 Tanino. ʒß (6 dec.).
 Tintura de canela. . . ʒß (2 gr.).
 Jarabe de clavel. . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Hemorragias pasivas. D. Una cucharada de hora en hora.

6243. P. ASTRINGENTE DE CATECÚ.

ʒ Tintura de catecú. . . ʒj (30 gr.).

Tintura de opio. ʒj (3 gr.).
 Jar. de cásc. de granad. ʒij (60 gr.).
 Infusion de bistorta. . ʒiij (90 gr.).
 Esencia de canela. . . ʒxviii (1 gr.).

M. I. Diarrea crónica, cólera metrorragia. D. Una cucharada de hora en hora.

6244. P. ASTRINGENTE DE GAYUBA
(Radius).

ʒ Hojas de gayuba. . . ʒjß (45 gr.).
 Milenrama. ʒj (30 gr.).
 Agua. lbij (1500 gr.).
 Se reduce á lbij (1000 gr.) por la coccion y se añade:
 Regaliz. ʒj (30 gr.).
 Se cuele y se añade:
 Jarabe de canela. . . ʒij (60 gr.).

I. Hematuria crónica, hemotisis, blenorrea, diarrea crónica. D. A medias tazas de media en media hora.

6245. P. ASTRINGENTE ACETOSA
(H. DE M.).

ʒ Catecú en polvo. . . . ʒj (4 gr.).
 Goma quino en polvo. ʒj (12 dec.).
 Agua rosada. ʒjv (125 gr.).
 Jarabe de vinagre. . . ʒj (30 gr.).
 Mézclese S. A.

I. Hemorragias pasivas. D. A cucharadas.

6246. P. ATEMPERANTE.

ʒ Agua destilada de almendr. amargas,
 Agua de amoniaco anisada, añ. ʒß (15 gr.).
 Ag. de flor de naranjo. ʒvj (180 gr.).
 Mucil. de goma aráb. ʒj (30 gr.).
M. I. Cólera. D. Una cucharada de hora en hora.

6247. Otra (CHOULANT).

ʒ Hojas de digital. . . . ʒß (2 gr.).
 Ipecacuana. ʒxviii (1 gr.).
 Agua hirviendo. c. s.
 para obtener ʒjv (125 gr.) de infusion; se cuele y se añade:
 Jarabe de malvabisco. ʒvß (22 gr.).
 Amoniaco anisado. . . ʒij (24 dec.).
I. Afecciones espasmódicas del par vago. D. Una cucharada cada dos horas.

6248. P. ATEMPERANTE (H. M.).

℥ Tisana comun. . . . ℥xij (375 gr.).
 Nitrato de potasa. . . ℥j (4 gr.).
 Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Se da como bebida habitual á los que padecen calenturas inflamatorias, biliosas, etc. *D.* Un cortadillo cada tres horas.

6249. P. ATEMPERANTE (Sydenham).

℥ Agua de lechuga,
 Agua de verdolaga, ãã. ℥iij (90 gr.).
 Jarabe de limon. . . . ℥ij (60 gr.).
 Jarabe de violetas. . . ℥j (30 gr.).
 Nitrato de potasa. . . . ℥ß (6 dec.).
 Agua de flor de naranj. ℥ß (15 gr.).

D. Se usa en el dia á cucharadas en las enfermedades inflamatorias ó enfermedades agudas.

6250. P. ATEMPERANTE AMONIACAL.

℥ Agua de frambuesas,
 Agua de almendras amargas, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Sal amoniaco. ℥ß (2 gr.).
 Nitro. ℥j (4 gr.).
 Jarabe de flor de naranj. ℥j (30 gr.).

I. Cistitis, nefritis, gastroenteritis, calenturas inflamatorias, neumonías. *D.* Una cucharada cada hora.

6251. P. ATRÓFICA.

℥ Ioduro de potasio. . . ℥j (4 gr.).
 Agua de lechuga,
 Ag. de laurel real, ãã. ℥jß (45 gr.).
 Tintura de digital. . . ℥xviiij (4 gr.).
 Jarabe de amapolas. . . ℥j (30 gr.).

I. Hipertrofia del corazon ó del bazo, esplenitis, viruelas. *D.* Una cucharada mañana y noche.

6252. P. ATRÓFICA DE MAGENDIE (H. DE M.).

℥ Ag. dest. de lechuga. ℥jv (125 gr.).
 Agua dest. de menta. ℥j (30 gr.).
 Ioduro de potasio. . . ℥ij (8 gr.).
 Jarabe de altea. . . . ℥ß (15 gr.).
M. I. Hipertrofia de los ven-

trículos. *D.* Una cucharada por la mañana y otra por la noche. Puede duplicarse la dosis.

6253. P. AZUFRADA (Kopp).

℥ Azúcar blanca. ℥ß (16 gr.).
 Se disuelve en
 Mueíl. de goma aráb. ℥vij (28 gr.).
 Agua de rosas. ℥j (4 gr.).

Se añade:

Flores de azufre. . . . ℥j (12 dec.).

M. I. Salivacion mercurial. *D.*

Una cucharadita de café de hora en hora. Se debe agitar la mezcla al tiempo de usarla.

6254. P. BALSÁMICA (Chopart).

℥ Agua destilada de yerbabuena,
 Alcohol rectificado,
 Bálsamo de copaiba,
 Jar. de eulantrillo, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Agua de flores de naranjo,
 Acido nítr. alcohol., ãã. ℥j (4 gr.).

H. S. A. I. Blenorragias, leucorrea y gonorrea sifiliticas, aun en el período agudo; hemotisis rebel-des. *D.* Dos cucharadas por la mañana, al medio dia y otra por la noche durante doce dias.

Nota. Se debe agitar la botella cada vez que el enfermo toma la pocion.

6255. Otra (MIALHE).

℥ Bálsamo de copaiba. 50
 Alcoholato de menta. 30
 Leche de magnesia. 20

M. I. Gonorrea y flujos mucosos análogos. *D.* Tres cucharadas de café al dia, en ayunas, por la mañana y al acostarse. Es bueno beber un vaso de agua detrás de cada cucharada de esta pocion, pero es conveniente suprimir cualquiera bebida fuera de las horas de comer.

6256. P. BALSÁMICA DE COPAIBA.

℥ Agua de menta,
 Agua de flor de naranjo,
 Jarabe de limones, ãã. ℥jß (45 gr.).
 Bálsamo de copaiba. . . ℥j (30 gr.).

Agua de Rabel. . . . ʒj (4 gr.).

I. Blenorrea crónica. *D.* Dos á cinco cucharadas al dia. Si produce deposiciones ventrales se añade dos ó tres gotas de láudano á cada cucharada.

6257. P. DE BÁLSAMO DE COPAIBA EMULSIONADA.

ʒ Balsamo de copaiba,
Agua destilada,
Jarabe de sinfito mayor, ãã. ʒij (60 gr.).
Gomaaráb. pulverizada. ʒj (30 gr.).

Se mezclan en un mortero la goma, el jarabe y ʒß (15 gr.) de agua, poco mas ó menos; se añade poco á poco el bálsamo de copaiba y despues el resto del agua, triturándolos continuamente para formar una mezcla exacta.

D. Se toma muchas veces al dia una cucharada de café, dilatada en un poco de agua azucarada.

6258. P. DEL DOCTOR BAYLE.

ʒ Tintura de digital. . . ʒxxviii (4 gr.).
Ag. destilada de tilo. . ʒjß (48 gr.).
Jarabe simple. . . . ʒijß (40 gr.).

I. Muchos médicos han pretendido que la digital usada de este modo era un medio curativo de la tisis pulmonar en todos grados. *D.* En el dia.

Nota. Se aumenta cada dia diez gotas y se puede llegar hasta trescientas.

6259. P. BÉQUICA EXPECTORANTE.

ʒ Infusion de melisa. . . ʒiij (90 gr.).
Jarabe de hisopo. . . ʒij (60 gr.).

M. I. Catarros crónicos, al fin de las bronquitis y perineumonía, cuando es difícil la expectoracion. Si los esputos son viscosos se puede reemplazar la melisa por ʒj (4 gr.) de polígala de Virginia.

6260. P. BÉQUICA (Recamier).

ʒ Poción béquica. . . . ʒjv (125 gr.).
Acetato de amoniaco. ʒij (8 gr.).
ó Agua destilada de laurel. ʒß á ʒj (2 á 30 gr.).

I. Facilita la expectoracion y calma la tos; romadizos crónicos. *D.* A cucharadas.

6261. Otra (JOHN).

ʒ Extracto de énula. . . . ʒij (8 gr.).
Vino estibiado. ʒj (30 gr.).
Jar. de flor de naranjo. ʒß (15 gr.).

I. Asma y catarros crónicos. *D.* Veinte á treinta gotas cada tres horas.

6262. Otra (RIEL).

ʒ Tintura de saxifraga. . ʒij (8 gr.).
Ojimiél escilítico,
Jar. de malvabisco, ãã. ʒj (30 gr.).

M. I. Ronquera crónica. *D.* A cucharadas.

6263. P. DE BELEÑO.

ʒ Raiz de malvabisco,
Gatuña, ãã. ʒß (15 gr.).
Agua. ʒßß (250 gr.).

Se reduce á ʒvj (180 gr.) por la coccion, y se añade:

Yerba de beleño. . . ʒj (4 gr.).
Se hierve, se cuele y se añade:
Jarabe de opio. . . . ʒj (30 gr.).

I. Tos violenta, coqueluche, asma, neumonía, pleuresía, bronquitis. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6264. P. DE BELLADONA.

ʒ Extracto de belladona. ʒx (5 dec.).
Agua de laurel real,
Jarabe de amapola, ãã. ʒj (30 gr.).

H. S. A. I. Espasmos rebeldes, tos convulsiva, asma, coqueluche, neumonía, pleuresía, disenteria, amaurosis, hemicránea, ninfomanía, polidipsia, esplenitis, cólicos nerviosos, pasmo, íleo, esofagismo, muermo. *D.* Una cucharada de café cada dos horas.

6265. P. BENZÓICA.

ʒ Acido benzóico. . . . ʒj (4 gr.).
Poción gomosa. ʒjv (125 gr.).

M. I. Catarros crónicos y cálculos de ácido úrico. *D.* A cucharadas.

6266. P. BORATADA.

℥ Borato de sosa,
 Ag. de alm. am., ãã. ʒj (4 gr.).
 Agua de melisa. . . . ʒiij (90 gr.).
 Láudano líquido. . . . ʒxviiij (4 gr.).
M. I. Dismenorrea. *D.* A cucharadas.

6267. P. DE BROMURO DE POTASIO
(*Magendie*).

℥ Bromuro de potasio. ʒxij (6 dec.).
 Agua de lechuga. . . ʒiij (90 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Jarabe de altea. . . . ʒj (30 gr.).
I. Bócio y escrófulas, calentura tifoidea, hipertrofia del corazón, del hígado y del bazo, corea, aneurisma, esplenitis, sífilides, congestión, hematocele, hepatitis, mareo. *D.* Se toma á cucharadas en las veinticuatro horas.

6268. P. CALMANTE.

℥ Narcotina. ʒj (4 gr.).
 Agua de limon. . . . ʒiij (90 gr.).
M. D. A cucharadas.

6269. Otra, n. 2.

℥ Jarabe diacodion. . . . ʒj (30 gr.).
 Ag. de flor de naranjo. ʒij (8 gr.).
 Solucion de goma arábica,
 Infusion béquica, ãã. . ʒj (30 gr.).
 Infusion de tilo. . . . ʒij (60 gr.).
 Jarabe simple. . . . ʒß (45 gr.).
M. I. Dolores violentos, convulsiones, etc. *D.* A cucharadas.

6270. Otra, n. 3.

℥ Jarabe de opio,
 Jarabe simple, ãã. . ʒß (45 gr.).
 Flor de tilo. ʒj (4 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ʒiij (90 gr.).
 Se vierte el agua sobre la flor de tilo, y á la media hora se cuele y se añaden los jarabes.
 Esta pocion contiene ʒß (25 mil.) de opio.

6271. Otra, n. 4.

℥ Jarabe de opio. ʒj (30 gr.).

Tridacio. ʒvj (3 dec.).
 Agua de lechuga. . . . ʒiij (90 gr.).
M. D. A cucharadas.

6272. Otra, n. 5.

℥ Agua de lechuga,
 Agua de tilo, ãã. . . . ʒjß (48 gr.).
 Jarabe diacodion. . . . ʒj (32 gr.).
 Agua de flor de naranj. ʒijß (40 gr.).
M. D. Una cucharada de hora en hora.

6273. Otra, n. 6.

℥ Ag. dest. de lechuga. ʒiij (100 gr.).
 Agua destilada de laurel real. ʒijß (40 gr.).
 Jarabe diacodion. . . ʒj (30 gr.).
M. D. A cucharadas.

6274. Otra, n. 7.

℥ Alcoholado de ambar y almizcle compuesto. ʒxc (5 gr.).
 Jarabe de acetato de morfina,
 Agua de flores de naranjo,
 Ag. de laurel real, ãã. ʒjß (45 gr.).
I. Trismo de los recién nacidos, plétora, pleuresía, neumonía, histerico, hipocondría, ninfomanía, delirio, temblor, disenteria, hemicránea, insomnio, neurosis, espasmos, esplenalgia, tétanos, vómitos, íleo, ascitis, asma, bronquitis, coqueluche, peritonitis, tisis, polidipsia, dispepsia, zona, prurito, sarampion, enuresis, hematuria, pasmo, diabetes, enfisema, envenenamiento, hidrorraquis, hidropesía, muermo, nefralgia, pedionalgia, nefritis; pero principalmente en las flegmasias, tos, coqueluche, bronquitis y asma. *D.* Una cucharadita de las de café de media en media hora.

6275. Otra, n. 8.

℥ Sulfato de morfina. . . ʒß (25 mil.).
 Ag. de flor de naranjo. ʒj (30 gr.).
 Agua de lechuga. . . . ʒiij (90 gr.).
 Jarabe simple. ʒj (30 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas de hora en hora.

6276. P. CALMANTE, n. 9.

- ☞ Infusion de flor de tilo. $\mathfrak{Z}\text{ij}$ (90 gr.).
- Infusion béquica,
- Solucion de goma arábica, ãã $\mathfrak{Z}\text{j}$ (30 gr.).
- Ag. de flor de naranjo. $\mathfrak{Z}\text{ij}$ (8 gr.).
- Jarabe diaeodion. $\mathfrak{Z}\text{j}$ (30 gr.).
- Jarabe simple. $\mathfrak{Z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).

M. I. Se usa en todos los casos de dolores violentos, en las convulsiones, en los accesos histéricos y en los de epilepsia. *D.* A cucharadas.

6277. Otra, n. 10.

- ☞ Jarabe de malva,
 - Jarabe diaeodion, ãã . $\mathfrak{Z}\text{vj}$ (24 gr.).
 - Ag. de flor de naranjo. $\mathfrak{Z}\text{jv}$ (16 gr.).
 - Agua de lechuga. $\mathfrak{Z}\text{j}$ (32 gr.).
- Comunmente se añade:
- Eter sulfúrico. 5 á 10 gotas.

I. Afecciones espasmódicas y dolores nerviosos. *D.* Se toma en dos, tres ó cuatro veces con mayores ó menores intervalos.

6278. Otra, n. 11.

- ☞ Solucion de acetato de morfina. 20 gotas.
 - Extracto de lechuga virosa. $\mathfrak{g}\text{x}$ (5 dec.).
 - Jarabe de malvabisco. $\mathfrak{Z}\text{j}$ (30 gr.).
 - Inf. de manzanilla. . $\mathfrak{Z}\text{xv}$ (470 gr.).
- M. D.* A cucharadas.

6279. Otra (BUTTNER).

- ☞ Ipecacuana. $\mathfrak{Z}\text{vj}$ (24 gr.).
 - Sen. $\mathfrak{Z}\text{j}$ (4 gr.).
 - Ledo palustre. $\mathfrak{Z}\text{j}$ (32 gr.).
 - Agua hirviendo. e. s.
- para obtener $\mathfrak{Z}\text{jv}$ (125 gr.) de infusion, á la que se añade:
- Azúcar. $\mathfrak{Z}\text{j}$ (32 gr.).
 - Amoniaco anisado. $\mathfrak{Z}\text{j}$ (4 gr.).
- I.* Coqueluche. *D.* Media cucharada cada dos horas.

6280. Otra (CHAUSSEIER).

- ☞ Acido bórico. $\mathfrak{Z}\text{j}$ (4 gr.).
- Jarabe simple. $\mathfrak{Z}\text{j}\mathfrak{B}$ (43 gr.).
- Infusion de tilo. $\mathfrak{Z}\text{jv}$ (125 gr.).

M. I. Afecciones cerebrales de los niños, pleuresia, neumonia, meningitis, histérico, íleo, vómitos, asma, coqueluche, grippe, zona, sarampion, pasmo, encantis, muermo, nefralgia. *D.* A cucharadas.

6281. Otra (H. DE AL.).

- ☞ Extracto de cicuta. $\mathfrak{D}\text{j}$ (12 dec.).
- Agua de canela,
- Jarabe de cáscara de naranja, ãã $\mathfrak{Z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).

M. D. A cucharaditas de café al dia.

6282. Otra (MILLAR).

- ☞ Ag. de menta piper. $\mathfrak{Z}\text{ij}$ (90 gr.).
- Asa fétida. $\mathfrak{g}\text{xc}$ (5 gr.).
- Almizelc. $\mathfrak{g}\text{vj}$ (3 dec.).
- Jarabe de azafran,
- Acetato de amon., ãã . $\mathfrak{Z}\text{j}$ (30 gr.).

M. I. Asma, coqueluche, vómitos, pleuresia, neumonia, pasmo, enfisema. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6283. Otra (PITSCHAFF).

- ☞ Hojas secas de tabaco. $\mathfrak{D}\text{j}$ (12 dec.).
 - Agua hirviendo. $\mathfrak{Z}\text{vj}$ (180 gr.).
 - Jar. de alm. dulces. $\mathfrak{Z}\text{j}$ (30 gr.).
- Se infunde durante cinco ó seis minutos, se cuele y se añade el jarabe.

I. Segundo período de la coqueluche. *D.* Una cucharada de café de hora en hora para los niños de uno á tres años, y una cucharada grande á los niños de mas edad.

6284. P. CALMANTE DE SCHMIDTMANN (Radius).

- ☞ Extracto de belladona,
- Extr. de belcño, ãã . $\mathfrak{g}\text{vj}$ (3 dec.).
- Tintura de estramonio. $\mathfrak{Z}\text{ij}\mathfrak{B}$ (10 gr.).
- Agua destilada de almendras amargas. . . $\mathfrak{Z}\text{ij}$ (60 gr.).
- Jarabe de digital. . . . $\mathfrak{Z}\text{j}$ (30 gr.).

M. I. Histérico, neuralgia facial, zona, ceática, neurosis, tétanos. *D.* Una cucharada de café tres veces al dia.

6285. P. CALMANTE DE SCHNEIDER
(*Radius*).

℞ Extr. de lechuga viros. ʒʒ (2 gr.).
Tintura de digital. . . . ʒʒ (15 gr.).
Agua de canela virosa. ʒxc (5 gr.).
M. I. Vómitos, asma, hidrotorax, coqueluche, grippe, íleo, metritis, hidropesía, ascitis, enuresis, angina, pleuresía, neumonía, histérico, zona, ceática, pasmo, hidrorraquis, nefralgia, neurosis.
D. ʒxviiij á ʒLjv (1 á 3 gr.) cada dos horas.

6286. P. CALMANTE (*Schneider*).

℞ Alcoholado de ambar y almizcle compuesto. ʒʒ (2 gr.).
Ag. de flor de naranjo. ʒLjv (3 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ʒʒ (2 gr.).
M. I. Trismo de los recién nacidos, plétora, pleuresía, neumonía, histérico, hipocondría, ninfomanía, delirio trémulo, disenteria, hemicránea, insomnio, neurosis, espasmos, esplenalgia, tétanos, vómitos, íleo, ascitis, asma, bronquitis, coqueluche, peritonitis, tisis, polidipsia, dispepsia, zona, prurito, sarampion, enuresis, hematuria, pasmo, diabetes, enfisema, envenenamiento, hidrorraquis, hidropesía, muermo, nefralgia, pedionalgia, nefritis. *D.* Una cucharada de café de media en media hora.

6287. P. CALMANTE, Julepe calmante ó pocion anodina (F. F.).

℞ Jarabe de opio. . . . ʒij (8 gr.).
Jar. de flor de naranj. ʒvj (24 gr.).
Ag. destil. de lechuga. ʒjv (125 gr.).
M. I. Es una fórmula opiada poco activa, que se usa como sedante en las flegmasias de las vías aéreas, angina de pecho y en las enfermedades en que hay que calmar al enfermo, no pudiendo hacerse otra cosa, como en el último período de la tisis pulmonar, en

las diarreas colicativas, etc. *D.* En una ó dos tomas por la noche, para procurar el sueño.

6288. P. CALMANTE Y
ANTIESPASMÓDICA.

℞ Tintura de castóreo. . . 20 gotas.
Agua de valeriana,
Agua de peonía, ʒā. . ʒij (60 gr.).
Jarabe de cantueso. . . ʒj (30 gr.).
M. D. A cucharadas.

6289. Otra, n. 2.

℞ Jarabe de sulfato de morfina. . . . ʒj (30 gr.).
Agua destilada de yerbabuena. . . . ʒjv (125 gr.).
Eter sulfúrico. . . . ʒʒ (2 gr.).
D. Se toma á cucharadas.

6290. Otra, n. 3.

℞ Agua destilada de laurel real. . . . ʒijʒ (40 gr.).
Agua destilada. . . . ʒiij (90 gr.).
Jar. de flor de naranj. ʒj (30 gr.).
Extracto de zumo de purgado de bellad. ʒj (5 cent.).
Eter sulfúrico. . . . ʒʒ (2 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas de hora en hora.

6291. Otra, n. 4.

℞ Jarabe diacodion. . . ʒj (30 gr.).
Infusion de tilo. . . . ʒjv (125 gr.).
Eter sulfúrico. . . . ʒxviiij (4 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora.

6292. Otra (SPIELMANN).

℞ Agua de menta rizada,
Agua de manzanilla, ʒā. ʒij (60 gr.).
Jarabe de amapola,
Jar. de manzanilla, ʒā. ʒʒ (15 gr.).
H. S. A. I. Dolores de vientre de los niños. *D.* Una cucharada de café cada quince ó veinte minutos.

6293. P. CALMANTE ETÉREA.

℞ Agua de tilo

Agua de flor de na-
ranjo, ãã. ℥jß (45 gr.).
Jarabe de extracto de opio,
Jarabe de ninfea, ãã. ℥j (30 gr.).
Eter sulfúrico. ℥ß (2 gr.).

M. I. Plétora, gastralgia, vómitos espasmódicos, hipó, cólicos nerviosos, espasmos, nefralgia, neurosis, histérico, tétanos, síncope, pasmo, dispepsia, envenenamiento, muermo, neumonía, pleuresía, pedionalgia. D. A cucharadas de hora en hora.

6294. P. CALMANTE Y LAXANTE
(Kopp).

℥ Aceite de ricino muy fresco. ℥j (30 gr.).
Agua destilada. ℥jv (125 gr.).
Acido prúsico de Vau-
quelin. 7 gotas.

M. I. Cólicos con estreñimiento en las personas muy irritables, cuyos intestinos están atacados de una inflamación ligera. D. A cucharadas de hora en hora.

6295. P. CAPIVI (Willis).

℥ Agua comun. ℥vj (180 gr.).
Bálsamo de copaiba. . ℥iij (90 gr.).
Alcohol,
Jar. de malvab., ãã. ℥j (30 gr.).
Aceite de enebro. . . 30 gotas.
Mucil. de goma aráb. c. s.

H. S. A. I. Gonorrea que ha llegado á su declinacion; dificultad de orinar, sobre todo cuando es difícil la secrecion de las orinas á consecuencia de la inflamacion de los riñones, y ulceracion del conducto de la uretra. D. Dos cucharadas dos veces al dia.

6296. P. DE CARBONATO DE
AMONIACO (Guerard).

℥ Agua alcanforada. . . . ℥iij (96 gr.).
Carbonato de amoniaco. ℥xviii á ℥ß (1 á 2 gr.).
Jarabe de polígala,
ó Jarabe de Tolú. ℥ß (16 gr.).
H. S. A. I. Flógosis crónica de

los brónquios ó catarro pulmonar con ó sin enfisema; favorece la expectoracion y facilita la respiracion. D. A cucharadas en las veinticuatro horas.

6297. P. CON EL CARBONATO DE
AMONIACO (Hamilton).

℥ Carbonato de amon. ℥xviii (1 gr.).
Agua de menta pip. ℥iij (90 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jarabe de rosas. . . . ℥ijß (10 gr.).
M. I. Diarrea crónica. D. En dos tomas.

6298. P. DE CARBONATO DE
POTASA.

℥ Carbonato de potasa. ℥xviii (1 gr.).
Agua de hisopo,
Agua de flordenaran-
jo, ãã. ℥jß (45 gr.).
Jarabé diacodion,
Jarabe de Tolú,
Jarabe de ipecac., ãã. ℥ß (15 gr.).
M. I. Coqueluche, tétanos, vómitos, disnea, crup, asma, plétora, arenillas. D. Una cucharada cada dos horas.

6299. P. DE CARIOFILEA.

℥ Extracto de cariofilea. ℥ij (8 gr.).
Jarabe de cascarilla,
Jarabe de cáscara de
naranja, ãã. ℥j (30 gr.).
Tintura acuosa de rui-
barbo. ℥ß (15 gr.).
Eter sulfúrico. ℥ij (8 gr.).
Agua de canela. ℥iij (90 gr.).
M. I. Calenturas intermitentes, neuralgias. D. A cucharadas de hora en hora.

6300. P. DE CARMICHAEL.

℥ Esencia de trementin. ℥ß (15 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.
Se mezcla y se añade á
Emulsion comun. . . ℥jv (125 gr.).
Jar. de cásc. de nar. ℥ij (60 gr.).
Esencia de canela. . . 3 gotas.
M. I. Iritis y coroiditis crónicas.
D. Una cucharada comun.

6301. P. CARMINATIVA (Dehaen).

℞ Láudano de Sydenham. 40 gotas.
 Agua de canela. ℥j (30 gr.).
 Emulsion azucarada. . ℥vj (180 gr.).
M. D. Una cucharada cada cuarto de hora.

6302. P. DE CASTÓREO.

℞ Tintura de castóreo,
 Tintura de asa fétida,
 Licor de Hoffmann, ãã. ℥β (2 gr.).
 Agua de flor de naranjo,
 Infusion de valeriana,
 Jar. de artemisa compuesto, ãã. ℥jβ (45 gr.).
M. I. Histérico, hipocondría, parálisis, amenorrea. *D.* A cucharadas.

6303. P. CATÁRTICA.

℞ Jar. de espino serval. ℥j (30 gr.).
 Cocim. de ciruelas. . ℥jv (125 gr.).
M. D. En dos tomas.

6304. P. OLEOSO-CATÁRTICA (H. M.).

℞ Aceite de ricino,
 Jarabe simple,
 Agua comun, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Mézclese exactamente. *D.* Se da la tercera parte cada tres horas.

6305. P. CATÁRTICA (Hufeland).

℞ Maná en suerte,
 Tamarindos,
 Sulfato de magn., ãã. ℥j (30 gr.).
 Agua comun. ℥xij (375 gr.).
 Se hierve hasta que se reduzca la tercera parte, y se vierte al fin:
 Sen. ℥ij (8 gr.).
 Se cuela y se añade:
 Extracto de beleño. ḡviiij (4 dec.).
 Jarabe de amapola. ℥j (30 gr.).
I. Ileo no inflamatorio ó despues del uso de los antiflogísticos. *D.* Dos cucharadas de hora en hora, alternando con una cucharada de aceite de ricino. En los intermedios se puede dar una

pocion antiemética para prevenir los vómitos.

6306. Otra (MENDE).

℞ Sulfato de sosa,
 Maná en lágrimas, ãã. ℥β (45 gr.).
 Tartrato de potasa antimoniado. ḡij (4 dec.).
 Se disuelve en:
 Agua destilada. ℥jv (125 gr.).
 Se añade despues:
 Ojimiél escilítico. ℥j (30 gr.).
D. Una cucharada cada dos horas.

6307. Otra (RICHTER).

℞ Aceite de manzanilla. ℥vj (180 gr.).
 Ac. de linaza reciente. ℥ij (60 gr.).
 Jarabe de amapola,
 Sulfato de magn., ãã. ℥j (30 gr.).
 Extr. acuoso de opio. ḡij (4 dec.).
 H. S. A. *I.* Cólico saturnino, íleo. *D.* Una cucharada cada media hora, hasta que produzca deposiciones alvinas.

6308. P. DE CERA (Noll).

℞ Cera blanca. ḡxxx (15 dec.).
 Azúcar blanca. ℥ij (8 gr.).
 Goma aráb. en polv. ℥j (4 gr.).
 Infusion de manzan. ℥iij (90 gr.).
 Extr. acuoso de opio. ḡj (5 cent.).
 H. S. A. una pocion.
I. Disenteria, enteritis aguda y crónica, y particularmente en las diarreas agudas ó crónicas acompañadas de dolores vivos.

6309. P. DE CIANURO DE POTASIO (Bally).

℞ Agua destilada. ℥ij (64 gr.).
 Jarabe simple. ℥iij (42 gr.).
 Cianuro de potasio. ḡjv (2 dec.).
 H. S. A. *I.* Asma, ortofnea, catarro pulmonar crónico y tisis. *D.* Una cucharada de café cada dos ó tres horas.

6310. P. DE CIANURO DE POTASIO (Magendie).

℞ Cianuro de potasio. ḡβ á ḡij (25 á 100 mil.).

Agua dest. de lechuga. \mathfrak{z} ij (60 gr.).
 Jarabe de malvabisco. \mathfrak{z} j (4 gr.).
M. D. A cucharadas de dos en dos horas.

6311. P. DE CIANURO DE ZINC.

\mathfrak{z} Cianuro de zinc. \mathfrak{g} x (5 dec.).
 Jarabe de valeriana,
 Agua de manzanilla,
 Agua de flor de nar., $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. \mathfrak{z} j (30 gr.).
M. I. Cardialgia, corea, histérico, disenteria. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6312. P. DE CICUTA.

\mathfrak{z} Extracto de cicuta. . \mathfrak{z} j (4 gr.).
 Tintura de opio alcanforada,
 Jarabe de bálsamo de Tolú, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{z} ß (15 gr.).
 Agua de lechuga. \mathfrak{z} iv (125 gr.).
M. I. Bronquitis, coqueluche, tos convulsiva, ronquera, escirro, cáncer, corea, conjuntivitis, disenteria. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6313. P. DE CINCONINA.

\mathfrak{z} Sulfato de cinconina. \mathfrak{g} xviiij (4 gr.).
 Agua de menta. \mathfrak{z} iiij (90 gr.).
 Jarabe de quina. \mathfrak{z} j (30 gr.).
 Jarabe diacodion. \mathfrak{z} ß (15 gr.).
 Disuélvase. *I.* Apirexia de las calenturas intermitentes, tifo. *D.* En tres veces al día.

6314. Otra (MARIANI).

\mathfrak{z} Sulfato de cinconina. \mathfrak{g} xviiij (4 gr.).
 Agua destilada de menta piperita. \mathfrak{z} iiij (90 gr.).
 Jarabe de culantrillo. \mathfrak{z} j (30 gr.).
H. S. A. D. Se toma en tres ó cuatro veces, en el espacio del día.

6315. P. CON CLARA DE HUEVO (Ricord).

\mathfrak{z} Agua de lechuga. \mathfrak{z} ij (60 gr.).
 Jarabe diacodion. \mathfrak{z} j (30 gr.).
 Clara de huevo. núm. 4.
M. I. Diarreas y disenterias subagudas. *D.* A cucharadas en el día.

6316. P. CLÓRICA.

\mathfrak{z} Hidrocloro medicinal. \mathfrak{z} ij (60 gr.).
 Jarabe simple. \mathfrak{z} vj (180 gr.).
M. I. Fiebres tifoideas. *D.* Una cucharada cada media hora.

6317. Otra, n. 2.

\mathfrak{z} Cloro líquido. \mathfrak{z} ß (15 gr.).
 Jar. de cásc. de nar. \mathfrak{z} j (30 gr.).
 Agua de sangüesas. \mathfrak{z} iiij (90 gr.).
M. I. Escorbuto, hemacelinosis, tifo, estomacace, escrófulas. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6318. P. DE CLORO.

\mathfrak{z} Cloro líquido. \mathfrak{z} ij (8 gr.).
 Agua filtrada. \mathfrak{z} vj (192 gr.).
 Jarabe simple blanco. \mathfrak{z} ß (48 gr.).
M. I. Calenturas pútridas. *D.* A cucharadas.

6319. P. DE CLORO-PLATINATO DE SODIO.

\mathfrak{z} Percloruro de platino. \mathfrak{g} vj (3 dec.).
 Cloruro de sodio exento de sales de potasa. \mathfrak{g} x (5 dec.).
 Poción gom. de la F. F. \mathfrak{z} vj (180 gr.).
I. Sífilis reciente, reumatismo crónico. *D.* Se toma á cucharadas en las veinticuatro horas.

6320. P. DE CLORURO DE BARIO (Luteroti).

\mathfrak{z} Cloruro de bario. \mathfrak{g} xviiij (4 gr.).
 Agua dest. de manzan. \mathfrak{z} iiij (90 gr.).
M. D. Diez gotas de dos en dos horas.
 Luteroti dice que curó en diez días una neuralgia facial en un niño escrofuloso.

6321. P. DE CLORURO DE BARIO.

\mathfrak{z} Cloruro de bario,
 Cloruro de hierro, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{z} ß (2 gr.).
 Agua de melisa,
 Jar. de émula camp., $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. \mathfrak{z} j (30 gr.).
M. I. Escrófulas. *D.* Una cucharadita de café, dos veces al día.

6322. P. DE CLORURO DE PLATINO.

℞ Percloruro de platino. ḡjv (2 dec.).
 Agua destilada. ḡiij (96 gr.).
 Azúcar blanca. ḡij (8 gr.).
M. I. Sífilis constitucional, herpes rebeldes. *D.* Tres ó cuatro cucharadas al día.

6323. P. PLATÍNICA Ó DE PERCLORURO DE PLATINO (Hoefler, Mialhe).

℞ Percloruro de platino. ḡij (1 dec.).
 Poción gom. de la F. F. ḡvj (180 gr.).
H. S. A. D. A cucharadas en las veinticuatro horas.

6324. P. DE COCLEARIA CÍTRICA (Vogel).

℞ Agua dest. de saúco. ḡvj (180 gr.).
 Alcoholato de coclear. ḡß (15 gr.).
 Zumó de limon. ḡij (60 gr.).
 Jarabe de amapola. ḡij (60 gr.).
H. S. A. I. Afecciones escorbúticas. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6325. P. DE COCLEARIA COMPUESTA.

℞ Infusion de fumaría. ḡiij (90 gr.).
 Jarabe de diacodion. ḡjß (45 gr.).
 Jarabe de quina. ḡj (30 gr.).
 Zumó de limon,
 Espir. de coclearia, ãã. ḡß (15 gr.).
M. I. Calenturas atáxico-adinámicas, escorbuto, escrófulas. *D.* A cucharadas cada dos horas.

6326. P. DE COCHINILLA (Wachtl).

℞ Cochinilla en polvo. ḡij (1 dec.).
 Azúcar. ḡxc (5 gr.).
 Agua. ḡv (20 gr.).
I. Alabada en la coqueluche. *D.* En las veinticuatro horas.

6327. P. DE CODEINA.

℞ Jarabe de codeína. ḡj (30 gr.).
 Infusion béquica. ḡjv (125 gr.).
D. Se toma á cucharadas de hora en hora.

6328. P. DE CÓLCHICO (Forget).

℞ Vino de cólchico. ḡj (30 gr.).
 Infusion de manzan. ḡjv (125 gr.).
 Agua de laurel real. ḡj (4 gr.).
 Jarabe simple. ḡj (30 gr.).
H. S. A. una pocion.

I. Es muy eficaz en la gota. *D.* Una cucharada de dos en dos horas. Las primeras tomas producen comunmente vómitos y deposiciones repetidas que pueden tener mal resultado, por lo cual se tendrá mucho cuidado en la administracion de este medicamento.

6329. P. COLCHÍTICA.

℞ Tintura de semillas de cólchico,
 Tintura de guayaco,
 Tintura de digital; ãã. ḡxc (5 gr.).
 Eter nítrico. ḡxviiij (1 gr.).
M. I. Hidropesía de pecho, gota, reumatismo, ascitis, hidrorraquis. *D.* Treinta gotas, mañana y noche, en un poco de agua azucarada.

6330. P. DE COLOMBO COMPUESTA.

℞ Cocimiento de salep. ḡiij (90 gr.).
 Se infunde en él:
 Colombo. ḡxc (5 gr.).
 Se añade:
 Jar. de cásc. de nar. ḡj (30 gr.).
 Láudano líquido,
 Eter sulfúrico, ãã. ḡxviiij (1 gr.).
M. I. Dispepsia, diarrea crónica. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6331. P. CONTRA LA AFONIA.

℞ Té,
 Yedra terrestre, ãã. ḡij (8 gr.).
 Gordolobo. ḡj (4 gr.).
 Lirio de Florencia. ḡß (2 gr.).
 Agua hirviendo. ḡvj (180 gr.).
 Se infunde y se añade:
 Ron,
 Jarabe de crisimo, ãã. ḡj (30 gr.).
 Jar. de báls. de Tolú. ḡß (45 gr.).
 Tintura de canela. ḡxviiij (1 gr.).
I. Afonía. *D.* A cucharadas cada dos horas.

6332. P. CONTRA LAS AFTAS.

℞ Jabon amigdalino. ℥ij (8 gr.).

Se disuelve en:

- Agua de menta,
- Agua de hinojo, ãã. ℥ij (60 gr.).
- Jarabe de malvabisco. ℥℔ (15 gr.).
- Carbonato de magnesia. ℥ij (8 gr.).

I. Orlin gangrenoso, aftas. D.

A cucharadas.

6333. P. CONTRA LAS AFTAS CONFLUENTES GANGRENOSAS.

℞ Jabon amigdalino. ℥ij (8 gr.).

Se disuelve en

- Agua de yerbabuena,
- Agua de hinojo, ãã. ℥ij (60 gr.).

Se añade:

- Jarabe de malvabisco. ℥℔ (15 gr.).
- Carbonato de magnes. ℥ij (8 gr.).

D. A cucharaditas de café al dia.

6334. P. CONTRA LA ANGINA PELICULOSA (Billard).

℞ Goma tragacanto. ḡx (5 dec.).

Agua destilada. ℥ij (60 gr.).

Mercurio dulce. ḡx (5 dec.).

Agua de flores de nar. ℥j (4 gr.).

Jarabe de achicorias,

Jar. de ipeeacuana, ãã. ℥℔ (15 gr.).

Mézclase y agítase al tiempo de usarla.

D. Una cucharada de café cada media hora.

6335. P. CONTRA LAS BLENORRAGIAS CRÓNICAS (E. Marchand).

℞ Acetato de plomo cris-

talizado. ḡviiiij (4 dec.).

Morfina. ḡij (1 dec.).

Acido acético. ℥j (4 gr.).

Agua destilada. ℥vj (180 gr.).

Jarabe simple. ℥ij (60 gr.).

M. D. Tres cucharadas al dia, dos horas antes de comer.

6336. P. CONTRA LA CARDIALGIA (Andry).

℞ Agua destilada de flores

de naranjo. ℥ij (60 gr.).

Agua destilada de rosas,

Jarabe diacodion, ãã. ℥j (30 gr.).

Mercurio. ḡvj (3 dec.).

Se extingue el mercurio en el jarabe y se mezclan despues con las aguas. D. Una cucharada mañana y noche.

6337. P. CONTRA LA CEFALALGIA.

℞ Alcoholaturo de raices

de acónito. ḡxviiiij (1 gr.).

Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

Agua. ℥iiij (90 gr.).

Alcoholato de canela. ℥ij℔ (10 gr.).

D. Una cucharada de hora en hora. Se puede aumentar sucesivamente la dosis del alcoholaturo.

6338. P. CONTRA LA CLOROSIS (José Frank).

℞ Agua comun. ℥x (300 gr.).

Agua de flor de naranj. ℥ij (60 gr.):

Elixir ácido de Haller. ℥℔ (2 gr.).

Jarabe de violetas. ℥j (30 gr.).

M. D. ℥ij (60 gr.) cada dos horas.

Se consume en quince ó diez y ocho horas toda la pocion.

6339. P. CONTRA LOS CÓLICOS (Cuffer).

℞ Jarabe diacodion. ℥ij℔ (10 gr.).

Jarabe de membrillo. ℥v (20 gr.).

Agua de yerbabuena. ℥x (40 gr.).

Agua comun. ℥xiij℔ (50 gr.).

M. D. Se toma en dos ó tres tomas con un cuarto de hora de intervalo.

6340. P. CONTRA LA COQUELUCHE (Buettner).

℞ Raiz de ipeeacuana. ḡjv (2 dec.).

Sen eseogido. ℥j (4 gr.).

Agua hirviendo. ℥jv (125 gr.).

Se infunde, se cuele y se añade S. A. al líquido colado:

Licor amoniacaal anis. ℥j (4 gr.).

Azúcar blanca. ℥j (30 gr.).

D. Media cucharada cada dos horas.

6341. Otra (ROBERTO TOMAS DE SALISBURY).

℞ Agua de rosas. ℥ij (60 gr.).

Jarabe de violetas. . . ʒij (8 gr.).
Acetato de plomo cristalizado ʒij á ʒv (10 á 25 cent.).

H. S. A. D. Una cucharada de café cada cuatro horas.

6342. Otra (Trousseau).

ʒ Agua destilada. ʒj (32 gr.).
Jarabe. ʒv (20 gr.).
Nitrato de plata. ʒj (5 cent.).

D. A cucharaditas de café á los niños de uno á dos años, atacados de coqueluche muy intensa.

6343. Otra (Pitzcheft).

ʒ Tabaco. ʒxviii (1 gr.).
Se infunde en

Agua. ʒvj (192 gr.).

Se añade:

Jarabe de horchata. . ʒx (40 gr.).

D. Una cucharadita de café de hora en hora á los niños de un año, á los de mas edad dos cucharaditas, y una cucharada comun á los de ocho ó diez años.

6344. Otra (Levrat Perretón).

ʒ Ag. dest. de lechuga. ʒjv (125 gr.).
Ag. de flor de naranj. ʒij (8 gr.).
Jarabe de peonía. . . ʒj (30 gr.).
Jarabe de belladona. ʒij (8 gr.).
Amoniaco. 6 gotas.

M. I. Coqueluche rebelde en que segun el autor ha sido muy eficaz.

D. A cucharadas de hora en hora.

6345. P. CONTRA EL CRUP.

ʒ Emético. ʒjß (75 mil.).
Jar. de ipecacuana. ʒj (30 gr.).
Ojimiél escilítico. . . ʒiij (12 gr.).
Infusion de poligala. ʒjv (125 gr.).

D. Se toma á cucharadas para favorecer la expulsion de las falsas membranas; pero se usa al mismo tiempo las sangrías locales, las aplicaciones irritantes y los derivados ligeros al conducto intestinal.

6346. Otra, n. 2.

ʒ Alcanfor. ʒß (25 mil.).

Tártaro emético. . . . ʒij (1 dec.).

Vino de ipecacuana. . ʒij (24 dec.).

Mucílago. ʒij (8 gr.).

Jarabe de malvabisco. ʒvj (24 gr.).

Agua destilada. ʒij (64 gr.).

D. Se da cada diez minutos una cucharada de esta pocion, y en el intervalo se hace tomar agua tibia.

6347. Otra (Godefroy).

ʒ Sulfato de cobre. . . ʒij (1 dec.)

Jar. de flor de naranj. ʒvj (25 gr.)

Agua de tilo. ʒiij (100 gr.).

D. A cucharadas cada diez minutos, para promover vómitos.

Esta pocion es muy eficaz, principalmente cuando se emplea al principio del segundo periodo del crup.

6348. Otra (Jadelot).

ʒ Sulfuro de potasa. . . ʒß (6 dec.).

Ag. de flor de naranjo. ʒiij (90 gr.).

Jarabe simple. ʒj (30 gr.).

Se prepara S. A. una pocion.

D. Una cucharada de media en media hora hasta que sobrevengan vómitos.

6349. Otra (Jadelot).

ʒ Cocimiento de ʒj (4 gr.)

de poligala virgi-

niana. ʒjv (125 gr.).

Tártaro emético. . . . ʒj (5 cent.).

Ojimiél escilítico. . . . ʒß (15 gr.).

I. y D. Se usa del mismo modo y en los mismos casos que la anterior.

Nota. Al mismo tiempo se usan sangrías locales, aplicaciones irritantes y derivados dirigidos al conducto intestinal.

6350. P. CONTRA LA DIARREA (Dorvault).

ʒ Jarabe de membrillos. ʒj (30 gr.).

Tintura de catecú. . . ʒijß (10 gr.).

Agua de canela. ʒj (30 gr.).

Agua comun. ʒiij (90 gr.).

Agua de Rabel. ʒß (2 gr.).

Láudano de Rousseau. 10 gotas.

H. S. A. I. Esta pocion es muy

eficaz contra la diarrea comun, y se administra á doble dosis contra la diarrea colérica. *D.* En dos ó tres tomas al dia.

6351. P. CONTRA LA DIARREA DE LOS TÍSICOS (*Cottreau*).

℞ Hidrocloro medicinal. ℥℔ (15 gr.).
 Agua destilada. ℥jv (125 gr.).
 Jar. de cásc. de naranj. ℥j (30 gr.).
M. S. A. D. Una cucharada de hora en hora.

6352. P. CONTRA LA DISMENORREA (*Raciborski*).

℞ Inf. de flor de saúco. ℥jv (125 gr.).
 Acetato de amoniaco,
 Jarabe de opio,
 Jarabe de flor de naranjo, ãã. ℥℔ (15 gr.).
D. A cucharadas de media en media hora.

6353. P. CONTRA LA DISENTERIA (*Helvetius*).

℞ Ipecacuana quebrantada. ℥ij (8 gr.).
 Se echa encima tres vasitos de agua caliente, se deja digerir por espacio de doce horas, se cuela y se decanta.

El primer dia se favorece el vómito con agua tibia, pero en los siguientes se vierte una nueva cantidad de agua hirviendo sobre el residuo. Se puede continuar así durante cinco dias.

D. Un vasito cada cuarto de hora. *V. n.* 6137.

6354. Otra (*REQUIN*).

℞ Agua de tilo. ℥iij (90 gr.).
 Jarabe de opio. ℥j (30 gr.).
 Clara de huevo. núm. 2.
H. S. A. D. A cucharadas en el dia.

6355. P. CONTRA LOS DOLORES NEFRÍTICOS.

℞ Aceite comun,
 Jarabe de limon, ãã. p. ig.

M. D. Una ó dos cucharadas bastan algunas veces para calmar los dolores.

6356. P. CONTRA LA EPILEPSIA (*Sem*).

℞ Agua destilada de tilo. ℥ij (60 gr.).
 Ag. dest. de laur. real. ℥ij℔ (10 gr.).
 Jar. de flor de naranj. ℥j (30 gr.).
 Amoniaco liquido. . . . 12 gotas.
I. Epilepsia. *D.* Tres cucharadas al dia.

6357. P. CONTRA LA EMBRIAGUEZ.

℞ Amoniaco liquido. . . . 8 gotas.
 Agua azucarada. ℥iij (12 gr.).
M. D. En una sola vez, despues que el enfermo ha vomitado. Dicen que este medicamento es infalible.

6358. P. CONTRA LA ESCARLATINA (*Stahl*).

℞ Mist. de carb. de amon. de Bohemius,
 Carb. de amoniaco, ãã. ℥ij (8 gr.).
 Agua destilada. ℥vj (192 gr.).
 Jarabe de malvabisco. ℥x (40 gr.).
I. Escarlatina nerviosa y atáxica.

6359. P. CONTRAESTIMULANTE.

℞ Pocion gomosa. ℥iij (90 gr.).
 Quermes. ℥xviiij (4 gr.).
 Se puede aumentar progresivamente la dosis del quermes hasta ℥j (4 gr.).
I. Pleuresía, neumonía. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6360. P. CONTRAESTIMULANTE CON QUERMES.

℞ Inf. de hoj. de naranj. ℥vj (180 gr.).
 Goma tragacanto. ℥℔ (2 gr.).
 Quermes mineral. ℥j (4 gr.).
 Jarabe simple. ℥j (30 gr.).
 Jarabe diacodion. ℥℔ (15 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas de hora en hora.

6361. P. CONTRA LA GANGRENA
(*Hunter*).

℞ Clorato de potasa. ʒʒ (2 gr.).
 Jarabe simple. ʒijʒ (40 gr.).
 Agua. ʒjʒ (45 gr.).
 H. S. A. I. Ulceras gangrenosas.
 D. A cucharaditas en las veinticuatro horas.

6362. P. CONTRA LAS GASTRALGIAS
(*Boudin*).

℞ Estrienina. ʒ³/₅ (3 cent.).
 Agua. ʒjv (125 gr.).
 Acido clorhídrico. . . una gota.
 Jar. de yerbabuena. ʒj (30 gr.).
 M. D. A cucharadas de dos en dos horas.

6363. Otra (SANDRAS).

℞ Agua. ʒx (40 gr.).
 Azúcar. ʒxc (5 gr.).
 Clorhidrato de morfin. ʒij (10 cent.).
 M. D. Una cucharada de café apenas se sienta el dolor. Se repite la dosis con mas ó menos frecuencia, segun la intensidad y tenacidad del dolor. Conviene auxiliar la accion de este remedio con un régimen apropiado.

6364. P. CONTRA LA GOTA
(*Henrotay*).

℞ Goma arábica. ʒij (60 gr.).
 Agua. lbʒ (250 gr.).
 Tintura de eólcieo. . . ʒij (8 gr.).
 Jarabe de ruibarbo. . . ʒij (60 gr.).
 M. D. A cucharadas de dos en dos horas. Al dia siguiente se toman las píldoras del mismo autor.

6365. P. CONTRA LA HEMATURIA
(*H. Linck*).

℞ Alumbre. ʒxviii (4 gr.).
 Sulfato de magnesia. ʒxc (5 gr.).
 Infusion de rosas rojas,
 Agua, ña. ʒjʒ (45 gr.).
 Acido sulfúrico. 6 gotas.
 M. D. Se toma en tres veces.

Se puede aumentar la dosis del alumbre hasta ʒij (24 dec.).

6366. P. CONTRA LAS HEMORRAGIAS ATÓNICAS
(*Gall*).

℞ Extr. de quina. ʒʒ á ʒij (2 á 8 gr.).
 Agua de menta pip. ʒjv (125 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Tintura de eantáridas. ʒʒ (15 gr.).
 Tintura tebáica. 20 gotas.
 I. Flujos sanguíneos uterinos despues de la edad crítica. D. Una cucharada cada dos horas.

6367. P. CONTRA LAS HEMORRAGIAS
(*Martin Solon*).

℞ Extracto de cornezuelo de centeno. ʒjx (50 cent.).
 Poción gomosa. ʒjv (125 gr.).
 M. I. Anemia que ha sucedido á las hemorragias. D. En cuatro tomas en las veinticuatro horas.

6368. Otra (TRUSEN).

℞ Licor estíptico de Loof. ʒj (4 gr.).
 Elixir ácido de Haller. ʒij (8 gr.).
 Alcoholato de canela. . . ʒxc (5 gr.).
 Mézclese exactamente.
 D. Quince gotas cada cuarto de hora en media taza de agua azucarada.

El licor estíptico de Loof se obtiene sublimando en tres veces una mezcla de sal amoniaco y lápiz encarnado, eflorescida al aire húmedo; por consiguiente es un clorhidrato de amoniaco y hierro.

6369. P. CONTRA LA HEMOTISIS
(*Henriette*).

℞ Cornezuelo de centen. ʒʒ (2 gr.).
 Tintura de digital. . . ʒxviii (4 gr.).
 Agua destil. de tilo. ʒiij (96 gr.).
 Azúcar. ʒv (20 gr.).
 M. D. Una cucharada de café cada cuarto de hora.

6370. P. CONTRA EL MAREO
(*Grepratle*).

℞ Agua dest. de valeriana. ʒij (60 gr.).

Agua destilada de flor
de naranjo. ℥j (30 gr.).
Agua dest. de lechuga. ℥j (30 gr.).
Tintura de canela. . . . ℥j (4 gr.).
Láudano. 20 gotas.
Jar. de cásc. de naranja. c. s.

D. Media cucharada de café de modo que se consuma en seis á ocho horas.

6371. P. CONTRA LA PARÁLISIS
ó Poción drástica (Fischer).

℥ Raíz de angélica. . . . ℥iij (12 gr.)
Hojas de tabaco. . . . ℥j (4 gr.).
Regaliz. ℥ß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℔ß (250 gr.).
Se infunde.

D. Una cucharada cada media hora.

6372. P. CONTRA LA PARAPLEJIA
ó Poción drástica (Tessier).

℥ Agua de tilo. ℥jv (125 gr.).
Aguardiente aleman,
Vino de cólchico,
Jarabe de espino ser-
val, ãã. ℥j (30 gr.).
Tártaro emético. . . . ḡv (25 cent.).

D. En tres dosis de media en media hora. Tessier deja un dia de reposo, y repite la poción drástica cada dos dias hasta la perfecta curacion.

6373. P. CONTRA EL REUMATISMO
ARTICULAR CRÓNICO (Bounyer).

℥ Ioduro de potasio. . . ḡv (25 cent.).
Jar. de adorm. blanc. ℥ß (15 gr.).
Agua destilada. . . . ℥iij (90 gr.).

M. D. Se toma en tres tomas, por lá mañana, al medio dia y por la noche.

6374. P. CONTRA LA TÉNIA.

℥ Esencia de trementina. ℥iij (96 gr.).
Miel. ℥vj (24 gr.).
Agua dest. de yerbab. ℥iij (96 gr.).

H. S. A. D. Se toma en tres veces, la primera dosis por la mañana y las demás con algun tiempo de intervalo.

6375. Otra (DESLANDES).

℥ Extracto alcohólico de
raíz de granado. . . . ℥vj (24 gr.).
Zumo de limon,
Agua de tilo,
Agua de menta, ãã. . . ℥ij (64 gr.).
I. Helmintiasis, ténia, botriocéfalo de anillos cortos. D. A cucharadas de media en media hora.

6376. Otra (DESLANDES).

℥ Agua de menta,
Agua de tilo,
Zumo de limon, ãã. . . ℥ij (64 gr.).
Extracto alcohólico de
granado. ℥vj (24 gr.).
H. S. A. D. Se toma á cucharadas.

6377. P. CONTRA LOS VÓMITOS
(Debreyne).

℥ Agua de lechuga. . . . ℥vj (180 gr.).
Láudano de Sydenham. 10 gotas.
Goma arábica. . . . ℥ß (15 gr.).
Jarabe simple. . . . ℥ij (60 gr.).
Bicarbonato de sosa. . . ℥ß (2 gr.).
H. S. A. D. Se toma en cuarenta y ocho horas, dando una cucharada cada dos horas.

6378. P. CONTRA LOS VÓMITOS
DE LAS PREÑADAS (Privat).

POCION ALCALINA.

℥ Bicarbonato de sosa. . . ḡLjv (3 gr.).
Extracto de beleño. . . ḡLjv (2 dec.).
Jarabe. ℥ß (15 gr.).
Agua de melisa. . . . ℥ij (60 gr.).

POCION ACIDA.

℥ Acido cítrico. ḡLjv (3 gr.).
Jarabe. ℥ß (15 gr.).
Agua. ℥ij (60 gr.).

M. D. Se administra una cucharada de cada una de estas pociones, de hora en hora.

Es la fórmula de Riverio sin efervescencia, dada por Hufeland y modificada por Pravat. Produce buenos efectos.

**6379. P. CONTRA LA ÚLCERA GAN-
GRENOSA DE LA BOCA EN LOS NIÑOS**
(*Hunt*).

℥ Clorato de potasa. ʒʒ (2 gr.).
Jarabe simple. ʒijʒ (10 gr.).
Agua. ʒjʒ (48 gr.).
H. S. A. Se administra á cucha-
raditas en las veinticuatro horas.

6380. P. DE CONTRAYERBA.

℥ Contrayerba. ʒxc (5 gr.).
Serpentaria. ʒʒ (2 gr.).
Agua de menta. ʒiij (96 gr.).
Jarabe de canela. ʒjʒ (48 gr.).
M. I. Dispepsia, calentura atá-
xico-adinámica. D. A cucharadas
de hora en hora.

6381. P. CORDIAL.

℥ Infusion de toronjil. ʒvij (210 gr.).
Tintura de canela. ʒij (8 gr.).
Triaca. ʒj (4 gr.).
Jarabe de claveles. ʒj (30 gr.).
M. D. Se usa á cucharadas en los
casos en que es necesario reani-
mar las fuerzas vitales debilitadas
por una enfermedad larga, ó un
tratamiento mercurial mal dirigi-
do.

6382. Otra, n. 2.

℥ Confeccion de jacintos. ʒj (4 gr.).
Agua destilada de yerbabuena,
Agua destilada de toron-
jil, añ. ʒj (30 gr.).
Agua destilada de canela,
Agua destilada de flores
de naranjo, añ. ʒʒ (15 gr.).
Jarabe simple. ʒj (30 gr.).
M. I. Se usa en los mismos casos
que la anterior. D. A cucharadas.

6383. Otra, n. 3.

℥ Infusion de melisa,
Inf. de menta pip., añ. ʒjʒ (45 gr.).
Triaca. ʒj (4 gr.).
Extracto de quina. ʒʒ (2 gr.).
Tintura de canela. ʒijʒ (10 gr.).
Jarabe de claveles. ʒj (30 gr.).
M. I. Calentura tifoidea, adina-

mia, escorbuto, astenia, dispep-
sia. D. A cucharadas de hora en
hora.

6384. Otra (H. DE PARÍS).

℥ Vino tinto. ʒjv (125 gr.).
Jarabe simple. ʒj (30 gr.).
Tintura de canela. ʒij (8 gr.).
M. I. Afecciones atónicas. D. A
cucharadas en el dia.

6385. P. CORDIAL Y DIURÉTICA
(*Fouquier*).

℥ Cocimiento de énula. ʒjv (125 gr.).
Alcohol de digital. ʒʒ (2 gr.).
Alcoholado de potasa. 24 gotas.
Jar. de las cinco raic. ʒj (30 gr.).
M. I. Hidropesías pasivas. D. A
cucharadas.

6386. P. CORDIAL CON VAINILLA.

℥ Azúcar de quina,
Azúcar de vainilla, añ. ʒijʒ (40 gr.).
Elixir de Garus. ʒʒ (15 gr.).
Jarabe de ajénjos. ʒj (30 gr.).
Agua de canela. ʒjv (125 gr.).
M. I. Dispepsia, anorexia, car-
dialgia, ataxia, escorbuto, úlce-
ras atónicas, calenturas atáxicas.
D. Una cucharada un momento an-
tes de comer.

**6387. P. DE CORNEZUELO DE
CENTENO.**

℥ Polvo de cornezuelo de
centeno. ʒʒ (2 gr.).
Jarabe simple. ʒʒ (15 gr.).
Agua de yerbabuena. ʒj (30 gr.).
M. I. Parto laborioso por inercia
de la matriz y hemorragias uteri-
nas. D. Se toma en tres veces con
veinte á treinta minutos de inter-
valo.

**6388. P. CON CORNEZUELO DE
CENTENO OPIADA (Schussmann).**

℥ Cornez. de centeno. ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. ʒv (150 gr.).
Se infunde, se cuele y se añade:
Extr. de belladona. ʒiij (15 cent.).
Jarabe de opio. ʒj (30 gr.).

I. Metrorragia, amenorrea, para facilitar el aborto, aborto, catarro útero-vaginal, enuresis, hematocele, hematuria. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6389. P. DE CORNEZUELO DE CENTENO (Boudin).

℞ Cornez. de centeno. ℥j (12 dec.).
 Agua. ℥jβ (45 gr.).

M. I. Diarrea crónica con atonía del recto, parálisis ó pereza del recto, parálisis de la vejiga, debilidad y parálisis de los miembros inferiores y para expulsar los calculitos vexicales ó uretrales. *D.* En tres tomas.

Boudin prescribe tambien un cuarto de lavativa con la misma dosis de cornezuelo de centeno.

6390. P. DE CREOSOTA (Pitschaff).

℞ Creosota. 5 gotas.
 Tintura de canela. ℥j (30 gr.).
 Tintura de opio. ℥jx (50 cent.).
 Jarabe simple. ℥j (30 gr.).
 Agua. ℥v (150 gr.).

M. I. Púrpura hemorrágica. *D.* Una cucharada de media en media hora. Al mismo tiempo se usan lociones con vinagre sobre toda la superficie del cuerpo, y se mantiene el vientre libre.

6391. P. DE CROTON.

℞ Aceite de croton. 2 gotas.
 Se tritura en un mortero con:
 Azúcar blanca. ℥v (20 gr.).
 Goma arábica en polv. ℥β (15 gr.).

Se añade poco á poco:
 Tintura de canela. ℥β (2 gr.).
 Agua destilada. ℥jβ (45 gr.).
M. D. A cucharaditas de café cada hora. *V. ns.* 6065 y 66.

6392. P. DE DEHAEN.

℞ Carbonato de cal. ℥β (2 gr.).
 Jarabe de limon. ℥j (30 gr.).
 Licor de Hoffmann. 42 gotas.
 Láud. de Sydenham. 48 gotas.

Agua de yerbabuena. ℥j (30 gr.).
 Agua de toronjil. ℥iij (90 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas contra los vómitos espasmódicos.

6393. P. DE DELPECH.

℞ Bálsamo de copaiba,
 Jarabe de limon,
 Agua de menta,
 Agua de flor de nar., añ. ℥j (30 gr.).
 Acido sulfúrico. ℥j (4 gr.).
 Goma tragacanto. c. s.

M. I. Blenorragia, blenorrea, sífilis. *D.* Una cucharada mañana y noche.

Si hay vómitos ó diarrea se añaden ocho á diez gotas de láudano.

Es buen medicamento, pero muy desagradable.

6394. P. DIAFORÉTICA.

℞ Acetato de amoniaco. ℥iij (12 gr.).
 Vino blanco. ℥v (150 gr.).
 Alcoholato de canela. ℥ij (8 gr.).
 Jarabe simple. ℥ij (60 gr.).
M. D. Se da á cucharadas.

6395. Otra (BOUCHARDAT).

℞ Carbonato de amon. ℥xxxvj (2 gr.).
 Ron. ℥v (20 gr.).
 Jarabe simple. ℥v (20 gr.).
 Agua. ℥iij (96 gr.).

M. S. A. I. Glucosuria. Es muy eficaz y puede aumentarse la dosis sucesivamente hasta noventa ó ciento ochenta granos. *D.* En dos tomas por la mañana en ayunas y una hora antes de comer.

6396. Otra (H. DE M.).

℞ Infusion de saúco. ℥xij (375 gr.).
 Arrope de saúco. ℥j (30 gr.).
M. I. Afecciones catarrales. *D.* ℥vj (180 gr.).

6397. P. DE DIGITAL (Piedagnel).

℞ Infus. de flor de tilo. ℥jv (125 gr.).
 Jarabe diacodion. ℥β (15 gr.).
 Agua de flor de nar. ℥β (15 gr.).

Digital en polvo. . . . ḡviiij (4 dec.).
M. I. Dolores que siguen á los partos repentinos. *D.* A cucharadas de media en media hora.

6398. P. DE DIGITAL ESTIBIADA
 (Wendt).

℥ Hojas de digital. . . . ℥B (6 dec.).
 Agua hirviendo. . . . ℥iiij (90 gr.).
 Se infunde durante doce á quince minutos, se cuele y se añade:
 Vino estibiado. . . . ℥j (4 gr.).
 Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
M. I. Escrófulas. *D.* Media cucharada cada dos horas.

6399. P. DIGITALINA (*Homolle y Quevenne*).

℥ Digitalina. . . . ḡ¹/₁₀ (5 mil.).
 Aguard. de lechuga. ℥iiij (100 gr.).
 Jar. de flor de naranj. ℥vj (25 gr.).
 Se disuelve la digitalina en algunas gotas de alcohol y se añade al agua destilada. *D.* A cucharadas en las veinticuatro horas.

6400. P. DIFUSIBLE.

℥ Cloro líquido,
 Jarabe de frambuesas,
 Agua destilada, añ. . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Tifo, calenturas tifoideas, dismenorrea, encefalitis, coqueluche. *D.* A cucharadas de hora en hora. *V. n.* 6316 y 17.

6401. P. DIURÉTICA.

℥ Acetato de potasa,
 Ojimiél escilítico, añ. ℥j (4 gr.).
 Cocimiento de grama. ℥jv (125 gr.).
 Jar. de las cinco raic. ℥j (30 gr.).
M. D. A cucharadas.

6402. Otra, n. 2.

℥ Cocimiento de las cinco raices. . . . ℥iiij (90 gr.).
 Agua de flores de nar. ℥B (15 gr.).
 Ojimiél escilítico. . . . ℥ij (8 gr.).
 Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).
 Láudano líquido;

Tintura de castóreo,
 Tint. de almízele, añ. 4 gotas.
 Alcohol nítrico,
 Eter, añ. 10 gotas.

M. I. Ciertas hidropesías. *D.* A cucharadas.

6403. Otra, n. 3.

℥ Solucion de carbonato de amoniaco. . . . ℥j (4 gr.).
 Vinagre escilítico. . . . ℥jB (6 gr.).
 Jarabe de maná. . . . ℥ij (8 gr.).
 Láudano líquido. . . . ḡvj (3 dec.).
M. I. Retencion de orina en los niños, mareo, nefralgia, ascitis, pleuresía, neumatosis, hidropesía, carditis. *D.* ḡxviiij á ḡxxxvj (1 á 2 gr.) cada hora.

6404. Otra, n. 4.

℥ Tintura de cantáridas,
 Eter nítrico, añ. . . . 60 gotas.
 Azúcar blanca. . . . ℥j (4 gr.).
 Agua de yerbabuena. . ℥ij (60 gr.).
M. D. Una cucharada de café cada tres ó cuatro horas. Cada cucharadita contiene cerca de tres y medio granos de tintura, é igual cantidad de éter nítrico.

6405. Otra, n. 5.

℥ Vino blanco. . . . un cuart. (¹/₂ lit.).
 Acetato de potasa líquido. ℥j (30 gr.).
M. I. Hidropesías, anasarca. *D.* A vasos.

6406. Otra, n. 6.

℥ Ojimiél cólchico. . . . ℥jB (45 gr.).
 Acetato de amoniaco. ℥ij (8 gr.).
 Agua destilada. . . . ℥vj (180 gr.).
M. D. Una cucharada de hora en hora.

6407. Otra, n. 7.

℥ Digital fresca. . . . ℥j (4 gr.).
 Agua. ℥jv (125 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade:
 Ojimiél escilítico. . . ℥B (15 gr.).
 Jarabe de éter. . . . ℥j (30 gr.).
 Se toma á cucharadas.

6408. P. DIURÉTICA.

℞ Agua de perejil. . . . ℥vj (180 gr.).
 Acetato de amoniaco,
 Ojimiél cólchico. . . . ℔β (250 gr.).
M. I. Hidropesías. *D.* A cucharadas al día.

6409. Otra (BUCHARD).

℞ Cocimiento de cebada. ℔j (500 gr.).
 Jarabe de malvabisco. ℥vj (180 gr.).
 Aceite de alm. dulces. ℥jv (125 gr.).
 Nitrato de potasa. . . . ℥β (15 gr.).
H. S. A. I. Disuria y estranguria. *D.* Una taza cada cuatro horas.

6410. Otra (FOUQUIER).

℞ Infusion de té. . . . ℥jv (125 gr.).
 Tintura de digital. . . ℥j (4 gr.).
 Miel escilitica. . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Anasarca dependiente de afecciones orgánicas del corazón. Fouquier desahoga antes el sistema sanguíneo.

6411. Otra (GUERSANT).

℞ Jarabe de espárragos,
 Ojimiél escilitico, ãã. ℥j (30 gr.).
 Nitrato de potasa. . . . ℥vj (3 dec.).
 Cocimiento de grama. ℥ij (60 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora.

6412. Otra (HALLE).

℞ Agua de las tres nueces. . . . ℥jv (125 gr.).
 Agua dest. de yerbab. ℥j (30 gr.).
 Ojimiél escilitico. . . . ℥β (15 gr.).
H. S. A. D. Una cucharada de hora en hora.

6413. Otra (H. M.).

℞ Tisana aperitiva. . . . ℥jv (125 gr.).
 Alcohol de digital. . . ℥β (15 gr.).
 Acetato de potasa. . . ℥xviiij (1 gr.).
 Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).
M. D. Una cucharada cada tres horas.

6414. Otra (H. DE AL.).

℞ Acetato de amoniaco. . ℥ij (60 gr.).
 Acetato de potasa. . . . ℥ij (8 gr.).
M. D. Una cucharada cada tres horas en un vaso de agua azucarada.

6415. Otra (SCHMITT).

℞ Hojas secas de digital. ℥xviiij (1 gr.).
 Raiz de genciana. . . ℥xc (5 gr.).
 Se infunde en :
 Agua. ℥vj (180 gr.).
 Se cuele y se añade:
 Ojimiél escilitico. . . ℥jβ (45 gr.).
I. Ascitis. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6416. P. DIURÉTICA ACTIVA.

℞ Infusion de ráb. silv. ℥v (150 gr.).
 Ojimiél escilitico. . . . ℥j (30 gr.).
 Tintura de digital. . . 25 gotas.
M. D. En dos ó tres veces al día.

6417. P. DIURÉTICA AMARGA (Meyer).

℞ Sumidad. de ajénjos. ℥ij (8 gr.).
 Bayas de enebro. . . ℥β (15 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℔β (250 gr.).
 Se infunde durante doce á quince minutos, se cuele y se añade S. A.

Carbonato de potasa. ℥j (12 dec.).
 Eter nítrico alcoholiz. ℥j (4 gr.).
 Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).
I. Hidropesías pasivas. *D.* A cucharadas en las veinticuatro horas.

6418. P. DIURÉTICA AMONIACAL.

℞ Acetato de amoniaco,
 Solucion de acetato de potasa,
 Ojimiél escilitico, ãã. ℥jβ (45 gr.).
M. I. Abscesos, ceática, anasarca, hidropesía, carditis aguda, histeroptosis, neumatosis, flegmasias, embriaguez. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6419. P. DIURÉTICA Y CALMANTE.

℞ Acetato de potasa,
Ojimiél escilítico, ãã. ℥j (4 gr.).
Láud. de Sydenham. 45 gotas.
Agua de tilo. ℥jv (125 gr.).
Jar. de las cinco raic. ℥j (30 gr.).
M. D. A cucharadas.

6420. Otra (JAHN).

℞ Aceite de almendras. . ℥jv (16 gr.).
Goma arábica en polv. ℥ij (8 gr.).
Yema de huevo. . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ℥j (32 gr.).
Agua de cal. ℥iij (96 gr.).
M. S. A. I. Iscuria y estrangur-
ria. *D.* Una cucharada cada hora.

6421. P. DIURÉTICA DE LA CARIDAD.

℞ Miel escilítica ℥jv (16 gr.).
Eter nítrico. ℥j (4 gr.).
Láudano líquido. . . . ℥ß (2 gr.).
Agua destilada de valeriana,
Agua destilada de men-
ta piperita, ãã. . . . ℥jv (125 gr.).
Jar. de las cinco raic. ℥j (32 gr.).
M. I. Anasarca dependiente de
una enfermedad orgánica del cora-
zon. *D.* Una cucharada cada dos ó
tres horas.

6422. P. DIURÉTICA COLCHÍTICA.

℞ Infus. de parietaria. ℥jv (125 gr.).
Acetato de potasa,
Ojimiél colchico, ãã. ℥ij (8 gr.).
Jar. de las cinco raic. ℥j (30 gr.).
Acido nítrico. ℥ß (2 gr.).
M. I. Calenturas tifoideas, obs-
trucciones de las vísceras abdo-
minales, hidropesías, esplenitis,
pleuresía, neumonía, sífilis, ne-
fralgia, nefritis. *D.* A cucharadas
de hora en hora.

6423. P. DIURÉTICA CON DIGITAL (H. DE M.).

℞ Tintura alcohólica de
digital. ℥ß (2 gr.).
Infus. de flor de malva. ℥iij (90 gr.).

Jarabe de las cinco rai-
ces aperitivas. ℥j (30 gr.).

M. I. Hidropesías que reconocen
por causa lesiones del corazon. *D.*
A cucharadas pequeñas de hora en
hora.

6424. P. DIURÉTICO-ESCILÍTICA (H. DE M.).

℞ Agua dest. de hisopo. ℥iij (90 gr.).
Agua destilada de menta piperita,
Ojimiél escilítico, ãã. ℥j (30 gr.).
Espír. de nitro dulce. ℥ß (2 gr.).
M. S. A. I. Casos en que conven-
ga aumentar la secrecion de la
orina. *D.* A cucharadas.

6425. P. DIURÉTICA ETÉREA.

℞ Eter nítrico alcoholizado,
Vinagre escilítico, ãã. ℥j (30 gr.).
Agua de enebro. . . . ℥v (150 gr.).
Espíritu de coclearia compuesto,
Jar. de adormid., ãã. ℥ij (60 gr.).
M. I. Escrófulas, neumatoses, as-
tenia, ataxia, cólico nefrítico, hi-
dropesía pasiva, síncope, pleure-
sía, asfixia, insomnio, envenena-
miento. *D.* A cucharadas de hora
en hora.

6426. P. DIURÉTICA LAXANTE (Martin).

℞ Digital en polvo. . . . ℥ß (2 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥x (300 gr.).
Se infunde durante cinco ó seis
minutos, se cuele y se añade:
Sulfato de potasa,
Miel, ãã. ℥vj (24 gr.).
I. Hidropesías, flegmasia blan-
ca dolorosa. *D.* Dos cucharadas
cada dos horas.

6427. P. DIURÉTICA Y SEDANTE (Krause).

℞ Digital en polvo. . . . ℥ij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vij (210 gr.).
Se infunde, se cuele y se añade:
Nitrato de potasa. . . ℥ij (8 gr.).
Agua de laurel real. ℥iij (12 gr.).
Jarabe de malvabisc. ℥j (30 gr.).
M. I. Carditis aguda idiopática,

despues de haber combatido los síntomas mas alarmantes, é iscuria espasmódica. *D.* Una cucharada de hora en hora.

seria dañosa la pocion *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

6428. P. DEL DOCTOR ANDRY CONTRA LOS ENVENENAMIENTOS POR LOS ÁCIDOS MINERALES.

- ℞ Agua comun. ℥jv (125 gr.).
- Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
- Jabon medicinal. . . . ℥iij (12 gr.).
- Magnesia. ℥j (4 gr.).

H. S. A. D. Tres cucharadas cada medio cuarto de hora.

Nota. Luego que han cesado los vómitos, se da un looc de aceite de almendras dulces, jarabe de malvabisco, goma arabiga, magnesia y agua destilada.

6429. P. DEL DOCTOR GOELIS.

- ℞ Infusion de hinojo,
- Agua destilada de hinojo, ãã. ℥ij (60 gr.).
- Magnesia calcinada. ℥xv (75 cent.).
- Láud. de Sydenham. ʒ gotas.
- Jarabe. ℥β (15 gr.).

M. D. Se toma á cucharadas de hora en hora. Se usa contra los cólicos de los niños, indicados por deposiciones verdes.

6430. P. DEL DOCTOR MONGENOT CONTRA LA AFONÍA.

- ℞ Té heyswen,
- Yedra terrestre, ãã. . . ℥ij (8 gr.).
- Hojas de gordolobo. . . ℥j (4 gr.).
- Lirio de Florencia. . . ℥ij (24 dec.).

Se vierten ℥vj (180 gr.) de agua hirviendo sobre todas las sustancias y se infunde hasta que se enfrie. Se cuele y se añade:

- Ron,
- Jarabe de erisimo, ãã. ℥j (30 gr.).
- Jarabe de Tolú. . . . ℥β (15 gr.).
- Tintura de canela. . . ℥j (12 dec.).

I. Catarro de los bronquios, asma y afonía, cuando estas enfermedades son crónicas ó están perfectamente caracterizadas por un estado de astenia; de otro modo

6431. P. DEL DOCTOR WILLIAMS KERR.

- ℞ Nitrato de peróxido de hierro. 8 gotas.
- Agua de tilo. ℥vj (180 gr.).
- Jarabe. ℥ij (8 gr.).

M. D. Se da una cucharada al dia contra la diarrea crónica.

6432. P. DE DONOVAN.

- ℞ Solucion de iodo, arsenito de mercurio. ℥j (4 gr.).
- Agua destilada. ℥ijβ (75 gr.).
- Jarabe de gengibre. . . ℥j (30 gr.).

M. I. Afecciones sifilíticas. *D.* Tres ó cuatro cucharadas al dia.

6433. P. DULCIFICANTE.

- ℞ Inf. de flor. de violet. ℥jv (125 gr.).
- Goma arábiga. ℥j (4 gr.).
- Jarabe de manzanas. . . ℥j (30 gr.).

M. I. Catarros pulmonares poco intensos. *D.* En tres ó cuatro tomas.

6434. Otra (H. DE IT.).

- ℞ Goma arábiga. ℥j (30 gr.).
- Agua dest. de enebro. ℥β (15 gr.).
- Jarabe de malvabisco. ℥jβ (45 gr.).
- Cocimiento de cebada. ℥bjβ (750 gr.).

M. I. Cólico nefrítico. *D.* A cordadillos.

6435. Otra (WENDT).

- ℞ Mucilago de goma arábiga,
- Ag. destil. de tilo, ãã. ℥jβ (45 gr.).

M. I. Diarrea de los niños en la época del destete. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6436. P. DULCIFICANTE AMONICAL.

- ℞ Pocion gomosa. . . . ℥iij (90 gr.).
- Sal amoniaco. ℥xc (5 gr.).
- Alcanfor. ℥jv (2 dec.).

Aceite de alm. amarg. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
M. I. Cistitis, nefritis, uretritis, blenorragia, embriaguez, parálisis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6437. P. EFERVESCENTE
 (*Chaussier*).

\mathfrak{z} Azúcar blanca. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).
 Carb. de potasa cristal. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (8 gr.).
 Acido tartár. en polvo. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (4 gr.).
 Agua. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (125 gr.).

Se mezclan y se diluye en agua al tiempo de usarla.

I. Vómitos espasmódicos.

6438. P. EFERVESCENTE DE
GAUBIUS (*Boerhaave*).

\mathfrak{z} Zumo reciente de limon. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
 Vino tinto bueno. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).
 Carbonato de potasa. . . . $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (4 gr.).
 Se mezcla el polvo con el licor y se toma en el momento de la efervescencia.

6439. P. EFERVESCENTE PARA
LIMONADA GASEOSA.

\mathfrak{z} Oleosácaro de limon. . . $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
 Agua. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ (180 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Bicarbonato de sosa. $\mathfrak{g}\mathfrak{x}\mathfrak{c}$ (5 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Acido tártrico. $\mathfrak{g}\mathfrak{x}\mathfrak{c}$ (5 gr.).

I. Acidez de las primeras vías, gastritis crónica, vómitos espasmódicos, dispepsia, gastralgia, cálculos. Se bebe al tiempo de hacer la efervescencia.

6440. P. EMENAGOGA.

\mathfrak{z} Agua destilada de menta piperita,
 Agua dest. de ruda, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (60 gr.).
 Tintura de azafran. . . . 20 gotas.
 Jarabe de artemisa. . . . $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).
M. I. Amenorrea con debilidad general ó local. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6441. Otra, n. 2.

\mathfrak{z} Ioduro de potasio. . . . $\mathfrak{g}\mathfrak{x}\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (1 gr.).

Agua de yerbabuena. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (125 gr.).
 Jarabe de azafran. . . $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (60 gr.).
M. D. Se toma en dos veces, mañana y noche.

6442. Otra, n. 3.

\mathfrak{z} Zumo de ruda. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).
 Ojimiél escilitico. . . . $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
M. I. Afecciones histéricas. *D.* A cucharadas cada dos ó tres horas.

6443. Otra (*DESBOIS*).

\mathfrak{z} Agua dest. de artemisa. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$ (150 gr.).
 Azúcar. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).
 Ag. dest. de flor de nar. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
 Esencia de ruda,
 Esencia de sábiná, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. 6 gotas.
M. S. A. I. y D. Se toma á cucharadas de café, cuando se ha interrumpido el flujo menstrual ó se presenta con dificultad. Se favorece su acción con pediluvios, baños de asiento, sangrías locales, fricciones, ventosas.

6444. Otra (*FURNARI*).

\mathfrak{z} Cianuro de oro. $\mathfrak{g}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (15 cent.).
 Alcohol á 48°. $\mathfrak{l}\mathfrak{b}\mathfrak{B}$ (250 gr.).
M. D. Se toma al principio una cucharada de café mañana y noche, y despues una cucharada comun. Se meneará al tiempo de tomarla.

6445. Otra (*PITSCHAFF*).

\mathfrak{z} Borax,
 Ag. de almendras am., $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (4 gr.).
 Agua de melisa. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ (180 gr.).
M. I. Cólico menstrual. *D.* A cucharadas.

6446. Otra (*SUNDELIN*).

\mathfrak{z} Sumidades de menta piperita,
 Sum. de romero; $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (12 gr.).
 Agua hirviendo. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (210 gr.).
 Se infunde durante veinte minutos, se cuele y se añade S. A.
 Eter sulfúrico. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (8 gr.).
 Jar. de cásc. de nar. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).
I. Amenorrea dependiente de

causa asténica. *D.* Una cucharada cada dos horas.

razos gástricos. *D.* A cucharadas hasta producir vómitos.

6447. P. EMENAGOGA CALIBEADA.

℥ Tintura de deutocloruro de hierro,
Tint. de acibar com-
puesta, āā. . . . ℥ij℥ (10 gr.).
Tintura de eastóreo. . . . ℥xc (5 gr.).
Jarabe de eáscara de naranja,
Agua destilada, āā. . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Amenorrea, bulimia. *D.*
Una cucharadita de café, tres
veces al dia, en media taza de in-
fusión de manzanilla.

6452. Otra (H. M.).

℥ Tártaro emético. . . . ℥iij (15 cent.).
Agua destilada. . . . ℥vj (180 gr.).
M. D. Se da en tres tomas con
tres cuartos de hora de intervalo.

6448. P. EMENAGOGA IODURADA.

℥ Ag. dest. de lechuga. ℥jv (125 gr.).
Agua dest. de menta. ℥j (30 gr.).
Ag. dest. de valeriana. ℥ij (8 gr.).
Tintura de iodo. . . . 20 gotas.
Jarabe de Tolú. . . . ℥ij (60 gr.).
M. D. A cucharadas cada media
hora.

6453. P. EMÉTICA CON IPECACUANA (H. DE M.).

℥ Ipecacuana pulveriz. ℥xviiij (1 gr.).
Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).
Agua comun. . . . ℥b℥ (250 gr.).
M. D. En varias dosis hasta pro-
ducir el vómito.

6449. P. EMENAGOGA CON IODURO DE POTASIO.

℥ Azafran. ℥℥ (2 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥iij (90 gr.).
Ioduro de potasio. . . . ℥ij (4 dec.).
Jarabe de artemisa. . . . ℥j (30 gr.).
Se infunde el azafran, se cuele,
se disuelve el ioduro y se añade
el jarabe. *D.* En cuatro dosis en el
dia, en los dos ó tres dias que
preceden á la época de la apari-
cion de las reglas.

6454. P. CON EMÉTICO (Cayol).

℥ Emético. ℥ij (1 dec.).
Agua de manzanilla. . . . ℥jv (125 gr.).
Jarabe de ipecacuana. ℥j (30 gr.).
Agua de flores de nar. ℥iij (12 gr.).
M. D. En dos ó tres veces con
media hora de intervalo.

6450. P. EMÉTICA (H. DE AL.).

℥ Emético. ℥iij (15 cent.).
Agua. ℥ij℥ (75 gr.).
Ojimiél escilítico. . . . ℥℥ (15 gr.).
M. D. Se toma la mitad de una
vez, y el resto á cucharadas de
cuarto en cuarto de hora.

6455. P. EMETIZADA.

℥ Emético. ℥viiij (4 dec.).
Infusion de arniea. . . . ℥jv (125 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ℥j (30 gr.).
M. D. Se da á cucharadas de
hora en hora en el tratamiento
del tétanos.

6451. Otra (H. DE M.).

℥ Tártaro emético. . . . ℥j℥ (75 mil.).
Agua destilada. . . . ℥vj (180 gr.).
Disuélvase. *I.* Saburras y emba-

6456. Otra, n. 2.

℥ Emético. ℥jv (2 dec.).
Infusion de tila. . . . ℥jv (125 gr.).
Jarabe diaeodion. . . . ℥j (30 gr.).
H. S. A. I. Neumonía y reuma-
tismo. *D.* A cucharadas de hora en
hora.

6457. Otra (AUGUSTIN).

℥ Tártaro emético. . . . ℥iij (15 cent.).
Agua de manzanilla. ℥iij (90 gr.).
Ojimiél escilítico. . . . ℥℥ (15 gr.).
H. S. A. I. Embarazo gástrico,
cólico saturnino, angina, impéti-
go. *D.* La mitad de una vez, y el

resto á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.

6458. P. EMETIZADA Y NITRADA
(Richter).

☞ Tártaro emético. ḡiij (15 cent.).
Nitrato de potasa. ḡiij (12 gr.).
Inf. de flor de saúco. ḡjx (270 gr.).
Miel blanca. ḡiij (90 gr.).

M. I. Pleuresía, neumonía. *D.* Una cucharada de hora en hora. Conviene esta pocion despues de haber usado las emisiones sanguíneas.

6459. P. DE EMETINA, REFORMADA
(H. DE M.).

☞ Emetina parda. ḡjv (2 dec.).
Agua comun. ḡv (150 gr.).
Jarabe de cidra. ḡj (30 gr.).

M. I. Se usa como nauseabunda. *D.* Una cucharada cada cuarto de hora hasta que produzca efecto.

6460. P. EMETO-CATÁRTICA
(H. DE M.).

☞ Tártaro emético. ḡj (5 cent.).
Sulfato de sosa. ḡij (8 gr.).
Agua comun. ḡxviiij (560 gr.).

H. S. A. I. Saburras gastro intestinales. *D.* ḡvj (180 gr.) repetidas cada seis horas.

6461. Otra (BOUDIN).

☞ Sulfato de magnesia. ḡjß (45 gr.).
Agua destilada. ḡv (150 gr.).
Tártaro emético. ḡij (1 dec.).

M. I. Calenturas tifoideas. *D.* De una vez durante muchos días.

6462. P. EMETO-ESCILÍTICA.

☞ Emético. ḡjß (75 mil.).
Jar. de ipecacuana. ḡj (30 gr.).
Ojimiél escilítico. ḡiij (12 gr.).
Infusion de polígala. ḡjv (125 gr.).

M. I. Crup. *D.* A cucharadas para facilitar la expulsion de las falsas membranas.

6463. P. EMULSIVA (H. M. F.).

☞ Almendras dulces mondadas, ḡiij á ḡjv (12 á 15 gr.).

Jarabe simple. ḡj (30 gr.).

H. S. A. una emulsion con c. s. de agua para ḡiij (90 gr.).

Añadiendo ḡj (8 gr.) de agua destilada de flor de naranjo y ḡvj (3 dec.) de nitro, se tiene la **POCION EMULSIVA NITRADA**. Con ḡß (6 dec.) de tintura de opio se prepara la **POCION EMULSIVA OPIADA**. Con ḡx (5 dec.) de alcanfor dividido en un mucilago de goma arábica, se obtiene la **POCION EMULSIVA ALCANFORADA**, la que puede ser **ALCANFORADA Y NITRADA** añadiendo nitro. Finalmente se puede agregar ḡxviiij (1 gr.) de jalapa en polvo, y se prepara la **POCION EMULSIVA CON JALAPA Ó PURGANTE**.

6464. P. EMULSIVA DE JALAPA.

☞ Emulsion de almen-
dras azucarada. ḡjv (125 gr.).
Raiz de jalapa. ḡxviiij (1 gr.).

M. D. Se toma de una vez como purgante.

6465. P. EMULSIVA DE MANÁ.

☞ Almendras dulces. ḡß (15 gr.).
Maná en lágrimas. ḡij (60 gr.).
Jarabe de flores de al-

bérchigo. ḡj (30 gr.).
Agua de flor de nar. ḡß (15 gr.).
Infusion de regaliz. ḡjv (125 gr.).

M. I. Mantiene suavemente el vientre libre en los niños y en las mujeres. *D.* A cucharadas cada cuarto de hora ó en tres dosis.

**6466. P. DE ÉNULA CAMPANA COM-
PUESTA ó Poción cordial diurética.**

☞ Cocimiento de énula
campana. ḡjv (125 gr.).

Tintura de digital. ḡß (2 gr.).

Acetato de potasa. 18 gotas.

Jar. de las cinco raic. ḡj (30 gr.).

M. I. Hidropesías pasivas que dependen de una afeccion del corazón, etc. *D.* A cucharadas.

6467. P. DE ERGOTINA.

☞ Ergotina. ḡxviiij (1 gr.).

Agua comun. ℥iij (90 gr.).
 Jarabe de flores de
 naranjo. ℥j (30 gr.).
 H. S. A. una pocion, que se
 toma á cucharadas en el dia en los
 casos de hemorragias, y de cuar-
 to en cuarto de hora en un caso
 de inercia de la matriz hasta que
 los dolores expulsivos determinen
 el parto. Cuando hay hemorra-
 gias muy violentas despues del
 parto, la pocion deberá contener
 de noventa á ciento ochenta gra-
 nos de ergotina, y administrarse
 á cucharadas con cortos interva-
 los.

6468. P. EXCITANTE (H. DE AL.).

℥ Cloró líquido.
 Agua destilada,
 Jar. de frambuesas, ãã. ℥ij (60 gr.).
 M. I. Fiebres tifoideas. D. Una
 cucharada de hora en hora.

6469. P. EXCITANTE ALCOHÓLICA.

℥ Agua de melisa. . . . ℥j (30 gr.).
 Agua de menta piper. ℥j (30 gr.).
 Jarabe de limon. . . . ℥ij (60 gr.).
 Extracto de quina. . . . ℥xviiij (4 gr.).
 Alcohol. ℥jβ (45 gr.).
 M. I. Tifo, afecciones tifoideas,
 dispepsia, atrofia, dismenorrea,
 anorexia, neumatosis. D. Una cu-
 charada de hora en hora.

**6470. P. EXCITANTE AMONIACAL
 (Ammon).**

℥ Alcohol amoniacal. . . . ℥β (15 gr.).
 Esencia de sucino,
 Esencia de anís,
 Esencia de canela,
 Esencia de clavo,
 Esencia de macis, ãã. . . 3 gotas.
 M. I. Anorexia, ventosidades,
 tifo, calenturas tifoideas, cólicos
 ventosos, pleuresía, hemicránea,
 dismenorrea, gota atónica, enve-
 nenamiento. D. Quince á treinta
 gotas en ℥jβ (45 gr.) de agua de
 cebada.

**6471. P. ESCILÍTICA ó Pocion
 diurética (F. F.).**

℥ Ojimiél escilítico. . . . ℥j (32 gr.).

Agua dest. de hisopo. . ℥iij (96 gr.).
 Ag. dest. de menta pip. ℥j (32 gr.).
 Alcohol nítrico. . . . ℥β (2 gr.):
 Mézclese exactamente.

I. Infiltraciones é hidropesía por
 atonía y sin reaccion febril. Con-
 viene en los mismos casos que las
 demás preparaciones de escila. D.
 A cucharadas.

6472. P. ESCILÍTICA (H. M.).

℥ Agua destilada. . . . ℥vj (180 gr.).
 Ojimiél escilítico. . . . ℥j (30 gr.).
 Alcohol nítrico etéreo. ℥j (4 gr.).
 Mézclese exactamente.

I. Hidropesías: D. En cuatro to-
 mas.

6473. P. ESCILÍTICA DIURÉTICA.

℥ Extracto de escila. . . . ℥xviiij (4 gr.).
 Acetato de potasa. . . . ℥β (15 gr.).
 Agua de perejil. . . . ℥jv (125 gr.).
 Jarabe de ruibarbo. . . ℥j (30 gr.).

M. I. Leucoflegmasia, hidrope-
 sia, anasarca, pleuresía. D. A cu-
 charadas.

6474. P. EXCITANTE (Harless).

℥ Hojas de digital. . . . ℥β (2 gr.).
 Cascarilla quebrantad. ℥ij (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℥jv (125 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade:

Espíritu de Minderero,
 Jarabe simple, ãã. . . ℥β (16 gr.).

M. I. Hidrotorax y ascitis á con-
 secuencia de enfriamiento y de in-
 flamaciones catarrales, y acompa-
 ñados de eretismo vascular. D.
 Media á una cucharada, tres ó cua-
 tro veces al dia.

6475. Otra (H. DE AL.).

℥ Cálamo aromático. . . ℥x (40 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℥ββ (250 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade:
 Agua de menta. . . . ℥ij (64 gr.).
 Eter clorhídrico. . . ℥ij (8 gr.).
 Jarabe de goma. . . ℥j (32 gr.).

M. I. Tifo, calenturas tifoideas,
 anorexia, neumatosis, atrofia. D.
 A cucharadas cada dos horas ó mas
 á menudo.

6476. P. EXCITANTE (Schubart).

℥ Vinagre. ℥j (30 gr.).
 Jarabe de cerezas. . . . ℥ij (60 gr.).
 M. I. Calenturas tifoideas. D.
 Una cucharada de café de hora en hora.

6477. P. EXCITANTE ESTIBIADA (Radius).

℥ Infusion de manzanilla,
 Infusion de menta
 piperita, ãã. . . . ℥v (150 gr.).
 Tártaro emético,
 Opio, ãã. ḡij (15 cent.).
 H. S. A. I. Corea, anorexia,
 atrofia, conjuntivitis. D. Una cu-
 charada cada dos horas.

6478. P. EXCITANTE IODADA (Kluge).

℥ Iodo puro. ḡvj (3 dec.).
 Alcohol rectificado. . . ℥ij (8 gr.).
 Disuélvase y añádase:
 Agua de canela. . . . ℥ijβ (75 gr.).
 Jarabe simple. . . . ℥β (15 gr.).
 M. I. Salivacion mercurial. D.
 Media cucharada al principio y
 despues una cuatro veces al dia.

6479. P. EXPECTORANTE.

℥ Raiz de polígala del
 Senegal. ℥j (4 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℥vj (180 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade:
 Goma amoniaco. . . . ℥j (4 gr.).
 Jarabe de Tolú. . . . ℥j (30 gr.).
 M. I. Catarros pulmonares no
 inflamatorios. D. Una cucharada
 cada dos horas.

6480. Otra, n. 2.

℥ Pimienta larga ma-
 chacada. ℥ij (8 gr.).
 Agua. lbβ (250 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade:
 Jarabe de Tolú. . . . ℥ij (60 gr.).
 D. Se da á cucharadas de media
 en media hora en las afecciones
 catarrales de los ancianos, cuando
 se llena el pecho de mucosidades

bronquiales que no pueden ser ex-
 pectoradas y ocasionan la muerte
 por asfixia.

6481. Otra, n. 3.

℥ Infusion de hisopo. . ℥jv (125 gr.).
 Extracto de enebro. . ℥β (15 gr.).
 Ojimiél escilítico. . . ℥j (30 gr.).
 M. D. Se toma á cucharadas.

6482. Otra, n. 4.

℥ Acetato de amoniaco. ℥ij (8 gr.).
 Acido succínico. . . . ℥β (2 gr.).
 Jarabe de ipecacuana. ℥j (30 gr.).
 Agua de menta piperita,
 Agua de rábano sil-
 vestre, ãã. ℥jβ (45 gr.).
 I. Coqueluche, bronquitis, ca-
 tarro y neumonía crónicas, beri-
 beri. D. Una cucharada cuatro ve-
 ces al dia.

6483. Otra, n. 5.

℥ Infusion de hisopo. . ℥v (150 gr.).
 Extracto de enebro. . ℥ijβ (10 gr.).
 Ojimiél escilítico. . . ℥jβ (45 gr.).
 M. I. Catarros pulmonares cró-
 nicos, asma. D. A cucharadas.

6484. Otra, n. 6.

℥ Agua de yedra terres-
 tre. ℥jv (125 gr.).
 Tintura de escila. . . ℥j (4 gr.).
 Extracto de polígala
 de Virginia. ℥j (12 dec.).
 Jarabe de goma,
 Jarabe de Tolú. . . . ℥j (30 gr.).
 M. I. Catarro pulmonar crónico.
 D. A cucharadas.

6485. Otra (H. DE AL.).

℥ Espiritu de Minderero,
 Asa fétida, ãã. . . . ℥β (2 gr.).
 Agua de yerbabuena. . ℥ij (60 gr.).
 M. I. Asma, catarros pulmona-
 res crónicos. D. A cucharadas.

6486. P. EXPECTORANTE ANTIMONIADA.

℥ Agua de hinojo. . . . ℥jx (36 gr.).

Infusion de hojas de belladona. ℥ij (64 gr.).
 Vino estibiado. ℥j (4 gr.).
 Jarabe de polígala. ℥j℥ (48 gr.).
M. I. Coqueluche, tisis, sífilides, neumonía, disenteria. *D.* Una cucharada de café, cuatro veces al día.

6487. P. EXPECTORANTE DE DIGITAL.

℥ Infusion de digital, Emulsion gomosa, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Quermes mineral. ℥vj (3 dec.).
 Jarabe de escila. ℥ij (60 gr.).
M. I. Neumonía aguda y crónica, pleuresía, bronquitis, congestión, flebitis. *D.* A cucharadas.

6488. P. DE ESPINO SERVAL.

℥ Cocim. de achicorias. ℥iij (90 gr.).
 Jar. de espino serval. ℥j (30 gr.).
 Tintura de jalapa. ℥℥ (15 gr.).
M. I. Hidropesías pasivas. *D.* En dos tomas por la mañana en ayunas y como purgante en la apoplejía.

6489. P. ESTIBIADA (Louis).

℥ Emético. ℥vj (3 dec.).
 Infusion de tilo. ℥v (150 gr.).
 Jarabe diacodion. ℥j (30 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas de hora en hora en las neumonías. *V.* números 335 y 3429.

6490. P. ESTIBIADA (Breschet),

℥ Agua de tilo. ℥v (150 gr.).
 Tártaro emético. ℥vj (3 dec.).
 Jarabe diacodion ℥℥ (15 gr.).
 Esencia de anís. 2 gotas.
H. S. A. I. Pústula maligna complicada con síntomas atáxicos graves. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6491. Otra (PREZIOZI).

℥ Emético. ℥j (5 cent.).
 Goma arábiga. ℥℥ (2 gr.).
 Jarabe de liquen. ℥x (40 gr.).
 Agua. ℥v (160 gr.).

M. I. Tisis pulmonar. *D.* Una cucharada cada día.

6492. Otra (RAYER).

℥ Solucion de goma. ℥jv (125 gr.).
 Tártaro emético. ℥iij (15 cent.).
 Jarabe diacodion. ℥℥ (15 gr.).
M. I. Reumatismo articular agudo en union con las sangrías. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6493. P. ESTIBIO-OPIADA (Seré).

℥ Emético. ℥jv (2 dec.).
 Jarabe diacodion. ℥j (30 gr.).
 Agua de flores de nar. ℥ij℥ (10 gr.).
 Agua destilada. ℥iij (90 gr.).
H. S. A. I. Calenturas intermitentes.

6494. P. ESTIBIO-OPIADA (Peysson).

℥ Tártaro emético,
 Opio, ãã. ℥j (5 cent.).
 Goma tragacanto. ℥j (12 dec.).
 Agua de flor de nar. ℥ij (8 gr.).
 Agua. ℥℥℥ (250 gr.).
M. I. Calenturas intermitentes, tétanos, atrofia, angina. *D.* A cucharadas cada media hora.

6495. P. ESTIBIO-OPIADA DE PEYSSON (H. DE M.).

℥ Tártaro emético. ℥j (5 cent.).
 Jarabe de meconio,
 Jarabe de cidra, ãã. ℥℥ (15 gr.).
 Goma tragacanto. ℥j (12 dec.).
 Agua. ℥℥℥ (250 gr.).
 Agua dest. de cidra. ℥ij (8 gr.).
H. S. A. I. Calenturas intermitentes. *D.* A cucharadas durante la apirexia.

6496. P. ESTIBIO-OPIADA (Collin).

℥ Emético. ℥viiiij (4 dec.).
 Tintura de opio. 30 gotas.
 Agua. ℥℥℥ (250 gr.).
 Jarabe simple. ℥ij℥ (10 gr.).
H. S. A. I. Se la ha elogiado en la eclampsia. *D.* A cucharadas cada media hora.

6497. P. ESTIMULANTE.

℥ Esencia de yerbab. ʒβ (2 gr.).
Alcohol. ʒijβ (10 gr.).

Se disuelve y se mezcla con

Jarabe de goma. . . ʒiij (96 gr.).
Agua de canela. . . . ʒjβ (48 gr.).

M. D. A cucharadas.

6498. Otra, n. 2.

℥ Bicarbon. de potasa. ʒj (4 gr.).
Agua de menta rizada. ʒvj (180 gr.).

M. I. Recomendada en el cólera.

D. Una cucharada de hora en hora.

6499. Otra, n. 3.

℥ Aceite de cajeput. . . ʒxviii (4 gr.).
Eter sulfúrico alcoh-

lizado. ʒj (4 gr.).

Agua de yerbabuena. ʒv (150 gr.).

Jarabe de flor de nar. ʒx (40 gr.).

M. D. A cucharadas de hora en hora.

6500. Otra (ALIBERT).

℥ Esencia de canela. . . 2 gotas.

Esencia de yerbab. 3 gotas.

Alcoholato de yerbab. ʒj (30 gr.).

Jarabe de malvabisc. ʒiij (90 gr.).

Agua destilada de yer-
babuena. ʒjv (125 gr.).

M. I. Hipo espasmódico. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6501. Otra (BERENDS).

℥ Flores de arnica. . . . ʒij (8 gr.).

Agua hirviendo. c. s.

Se hierve hasta que despues de colado resulten ʒvj (180 gr.) y se añade:

Goma arábica. ʒij (8 gr.).

Jar. de cáscara de nar. ʒj (30 gr.).

I. Calenturas tifoideas. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6502. Otra (LENTIN).

℥ Raiz de valeriana,
Flor de manzanilla, ãã. ʒβ (15 gr.).

Agua. ʒx 300 gr.).

Se cuece y se añade:

Sal amoniaco. ʒij (8 gr.).

Castóreo. ʒj (4 gr.).

Jar. de cáscara de nar. ʒjβ (45 gr.).

I. Apoplejía despues del uso de la sangría, asfixia, neumatosis, dispepsia, calenturas tifoideas. *D.* A cucharadas de media en media hora.

6503. P. ESTIMULANTE AROMÁTICA.

℥ Tintura de vainilla,
Tintura de canela, ãã. ʒij (8 gr.).

Vino blanco generoso. ʒjv (125 gr.).

Jarabe simple. ʒij (60 gr.).

M. D. Se toma en una ó muchas veces.

6504. P. ESTIMULANTE DE ARNICA.

℥ Flores de arnica,
Melisa, ãã. ʒxc (5 gr.).

Anís estrellado. ʒxviii (4 gr.).

Agua hirviendo. . . . ʒvj (192 gr.).

Se infunde y se añade:

Tintura de malato de
hierro. ʒβ (2 gr.).

Jarabe de artemisa. . ʒjβ (48 gr.).

I. Asfixia, parálisis, amaurosis, calenturas tifoideas, neumonías. *D.* A cucharadas cada tres horas.

6505. P. ESTIMULANTE DE BRUCINA (Magendie).

℥ Brucina. ʒvj (3 dec.).

Agua destilada. ʒij (60 gr.).

Azúcar blanca. ʒij (8 gr.).

H. S. A. I. Se usa en los mismos casos que la anterior. *D.* Una cucharada, mañana y noche.

6506. P. ESTIMULANTE DIAFORÉTICA.

℥ Acetato de amoniaco. ʒβ (15 gr.).

Agua destilada de canela,

Agua destilada de menta piperita,

Jarabe simple, ãã. . . ʒjβ (45 gr.).

H. S. A. D. A cucharadas de hora en hora.

6507. P. ESTIMULANTE DIFUSIBLE.

℥ Amoniaco líquido. . . . 24 gotas

Agua dest. de melisa. ℥iij (96 gr.).
 Jarabe simple. ℥ij (64 gr.).
M. I. Para promover el sudor; en los casos de mordeduras de animales venenosos, y en los de colapsus, debilidad nerviosa y para combatir la embriaguez. *D.* En tres ó cuatro.

6508. P. ESTIMULANTE CON ESTRICNINA (Magendie).

℥ Estricnina pura. ḡj (5 cent.).
 Azúcar blanca. ℥ij (8 gr.).
 Acido acético. 2 gotas.
 Agua destilada. ℥ij (60 gr.).
H. S. A. D. Una cucharada de café, mañana y noche.
Nota. Se puede aumentar progresivamente la dosis, pero con mucha circunspeccion, hasta tres ó cuatro cucharadas de café.

6509. P. ESTIMULANTE DE IPECACUANA.

℥ Ipecacuana. ℥β (2 gr.).
 Foliculos de sen. ḡxc (5 gr.).
 Agua hirviendo. ℥iij (90 gr.).
 Se infunde durante doce horas, se cuela y se añade:
 Ojimiél escilítico,
 Jarabe de hisopo, añ. ℥j (30 gr.).
 Licor amoniacal anis. ℥β (2 gr.).
I. Bronquitis, neumonía y catarros crónicos, calenturas biliosas ó tifoideas, embarazo de las primeras vias. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6510. P. ESTIMULANTE DE MENTA PIPERITA.

℥ Esencia de canela. . . ḡij (4 dec.).
 Esencia de menta. . . ḡiij (15 cent.).
 Alcoholato de melisa. ℥j (30 gr.).
 Jarabe diacodion. . . ℥j (30 gr.).
 Agua de menta pip. ℥iij (90 gr.).
M. I. Apoplejía, hipo espasmódico, neumatosis, cólico ventoso, asfixia, vómitos espasmódicos, neumonía, dispepsia, hipocondría. *D.* Una cucharada de café de cuarto en cuarto de hora.

6511. P. CON EL EXTRACTO DE QUINA (Chomel).

℥ Extr. blando de quina. ℥j (4 gr.).
 Poción gomosa. ℥jv (125 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas en el periodo adinámico de las fiebres tifoideas.

6512. P. DE ESTRICNINA.

℥ Acct. de estriçnina. ḡiij (15 cent.).
 Alcohol. ḡxc (5 gr.).
 Agua de cancla. ℥iij (90 gr.).
 Jarabe de valeriana. ℥j (30 gr.).
M. I. Epilepsia, corea, atrofia, parálisis, amaurosis, incontinençia de orina, enuresis, zona, ceática, disenteria, neuralgias. *D.* Una cucharada de café mañana y noche.

6513. P. ESTÍPTICA.

℥ Infusion de rosas. ℥v (150 gr.).
 Jarabe de rosas,
 Jarabe de catecú, añ. ℥j (30 gr.).
 Extracto de ratania. . . ℥β (2 gr.).
 Agua de Rabel. 15 gotas.
 Alumbre. ḡx (5 dec.).
H. S. A. I. Hemorragias pasivas. *D.* Una cucharada cada media hora.

6514. P. ESTOMACAL.

℥ Sumidades de ajcnjos. ℥j (30 gr.).
 Cáscaras de naranja. . . ℥β (15 gr.).
 Ruibarbo. ℥ij (24 dec.).
 Genciana. ℥j (4 gr.).
 Agua hirviendo. c. s.
 para obtener ℥vj (180 gr.) de líquido colado; se infunden durante algunos minutos, se cuela y se añade:
 Jar. de cáscar. de nar. ℥j (30 gr.).
I. Dispepsia, anorexia, neumatosis, dismenorrea. *D.* Se toma en dos veces.

6515. Otra, n. 2.

℥ Bistorta en polvo. . . ℥j (4 gr.).
 Arrope de saúco. ℥iij (12 gr.).
 Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

Agua. ℥jv (125 gr.).
M. I. Es tónica. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6516. P. DE EXTRACTO DE CALÉNDULA (*Ockel*).

℥ Extracto de caléndula,
 Sulfato de sosa, aa. . . ℥℞ (15 gr.).
 Agua comun. ℥vj (180 gr.).
M. I. Hipertrofia de la matriz despues de haber calmado el estado inflamatorio y haber evacuado el conducto intestinal. *D.* Cuatro cucharadas al dia.

6517. P. DE EXTRACTO DE QUINA (*Chomel*).

℥ Extr. blando de quina. ℥j (4 gr.).
 Poción gomosa. ℥v (150 gr.).
M. I. Período adinámico de las calenturas tifoideas. *D.* A cucharadas.

6518. P. DE ESTRICNINA (*H. DE M.*).

℥ Estricnina pura. ḡj (5 cent.).
 Azúcar blanca. ℥ij (8 gr.).
 Agua destilada. ℥ij (60 gr.).
M. I. Parálisis. *D.* Una cucharadita de café por la mañana y otra por la tarde. Se agita al tiempo de usarla.

6519. P. ETÉREA (*H. M.*).

℥ Agua de hinojo. ℥vj (180 gr.).
 Alcoholato de melisa compuesto. ℥ij (8 gr.).
 Eter sulfúrico. ℥ij (24 dec.).
 Jar. de cort. de cidra. ℥j (30 gr.).
M. I. Es excitante, difusiva, antiespasmódica, en las calenturas adinámicas, histérico, convulsiones, astenia, cólicos ventosos, síncope, letargo, cefalalgia. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6520. P. ETÉREA ALCANFORADA (*H. DE AL.*).

℥ Alcanfor. ℥j (12 dec.).
 Eter sulfúrico. ℥ij (8 gr.).

Láud. de Sydenham. 20 gotas.
 Agua de canela. ℥vj (180 gr.).
M. D. Una cucharada cada tres ó cuatro horas.

6521. P. FEBRÍFUGA.

℥ Sulfato de quinina. ℥℞ (6 dec.).
 Acido sulfúrico. 2 gotas.
 Se trituran en un mortero de vidrio con:
 Agua destilada. ℥iij (90 gr.).
 Jarabe de genciana. ℥j (30 gr.).
M. I. Fiebres intermitentes. *D.* En una ó dos tomas antes del acceso.

6522. Otra, n. 2.

℥ Sulfato de quinina. ℥℞ (6 dec.).
 Agua de canela. ℥ij℞ (75 gr.).
 Acido sulfúrico débil. 10 gotas.
 Jar. de cásc. de nar. ℥℞ (15 gr.).
M. I. Calenturas intermitentes. *D.* A cucharadas de café de hora en hora.

6523. Otra (*CHRESTIEN*).

℥ Resina de quina. ℥j (4 gr.).
 Carbonato de potasa. ℥℞ (2 gr.).
 Agua destilada. ℥iij (90 gr.).
H. S. A. I. Calenturas intermitentes, intermitentes biliosas, remitentes ó de mal carácter, y finalmente en las enfermedades con tipo periódico. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6524. Otra (*FRANK*).

℥ Almendras amargas. ℥ij (8 gr.).
 Agua. c. s.
 para obtener ℥j (30 gr.) de infusión, en la que se disuelve:
 Extr. de centaurea menor. ℥j (4 gr.).
I. Calenturas intermitentes, escorbuto. *D.* Se toma antes del acceso.

6525. Otra (*H. DE AL.*).

℥ Café tostado. ℥vj (24 gr.).
 Agua. ℥iij (96 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade:
 Zumo de limon. ℥ij (64 gr.).

D. Se toma caliente en ayunas durante la apirexia.

6526. P. FEBRÍFUGA
(H. DE AMÉR.).

℥ Solucion de Fowler. . . 60 gotas.
Tintura de opio. 30 gotas.
Alcoholato de espliego. ℥j (4 gr.).
Agua de canela. ℥iij (12 gr.).
M. D. Una cucharadita de café cada dos horas durante la apirexia. Cada cucharada contiene cerca de un sexto de grano de arsenito de potasa.

6527. Otra (H. M. F.).

℥ Quina en polvo. ℥ij (8 gr.).
Agua de menta piper. ℥iij (90 gr.).
Alcoholado de canela. ℥xc (5 gr.).
Se diluye la quina en el agua aromática, y se añade el alcoholado.

La POCION FEBRIFUGA ALCANFORADA se prepara añadiendo ℥x (5 dec.) á la pocion anterior. A la POCION FEBRÍFUGA ETÉREA se añade ℥℔ (2 gr.) de licor de Hoffmann, y á la POCION FEBRÍFUGA OPIADA se añade ℥℔ (6 dec.) de alcoholado de opio.

6528. Otra (PLENCK).

℥ Flores de arnica. . . ℥℔ (2 gr.).
Agua hirviendo. ℔℔ (250 gr.).
Se infunde durante diez minutos, se cuele y se añade:

Quina calisaya en p. ℥vj (24 gr.).
Jarabe de manzanilla. ℥j (32 gr.).

M. D. Dos cucharadas cada dos horas durante la apirexia. Si esta pocion excita vómito se añade un poco de opio.

6529. Otra (RADIUS).

℥ Hidroclor. de quinina. ℥j (12 dec.).
Agua de menta piper. ℥℔ (15 gr.).
M. D. Veinte á sesenta gotas cada dos horas.

6530. Otra (RADIUS).

℥ Hidroclor. de quinina. ℥viiij (4 dec.).
Agua de hinojo. ℥v (150 gr.).

Eter clorhídrico. ℥j (4 gr.).
Azúcar. ℥℔ (15 gr.).
M. D. Una cucharada cada dos horas.

6531. P. FEBRÍFUGA AMONIACAL.

℥ Agua de menta pip. ℥ij (60 gr.).
Extracto de ajenos. ℥j (4 gr.).
Cocimiento de quina. ℥ij (60 gr.).
Tártaro emético. ℥xv (75 cent.).
Hidrocl. de amoniac. ℥j (4 gr.).

M. I. Calenturas intermitentes, cuartanas. D. A cucharadas cada dos horas.

6532. P. FEBRÍFUGA ANTIESPASMÓDICA (Chaberly).

℥ Agua destilada de tilo,
Agua destilada de manzanilla,
Agua destilada de valeriana, ãã. ℥x (40 gr.).
Sulfato de quinina. ℥xviiij (4 gr.).
Extr. blando de quina. ℥℔ (2 gr.).
Jarabe de cáscara de naranja,
Jarabe de éter; ãã. ℥v (20 gr.).

H. S. A. D. A cucharadas de hora en hora.

6533. P. FERRUGINOSA.

℥ Agua. ℥jv (125 gr.).
Jarabe de valeriana. ℥ij (60 gr.).
Azafran,
Cloruro de hierro, ãã. ℥℔ (2 gr.).
Se infunde el azafran durante una hora, se cuele y se añaden la sal ferruginosa y el jarabe.

I. Hemorragias pasivas, clorosis y leucorrea. D. Una cucharada de hora en hora.

6534. P. DE FERROCIANATO DE QUININA.

℥ Ferrocianato de quinina. ℥jx (50 cent.);
pero como es insoluble, es mejor
Valerianato de quinina. ℥jx (50 cent.);
Jarabe de amapola,
Jarabe de flor de naranjo, ãã. ℥j (30 gr.).
Agua. ℥iij (90 gr.).

M. I. Calenturas intermitentes,

sudor inglés, gangrena de hospital, gangrena, escorbuto, corea, reumatismo, gota, ceática, neuralgias, hemicránea, hemotisis, muermo. *D.* A cucharadas.

6535. P. FOSFORADA.

℥ Fósforo. ℥iij (15 cent.).
 Agua de canela. . . . ℥iij (96 gr.).
 Extracto de quina. . . ℥xc (5 gr.).
 Jar. de cásc. de nar. ℥iij (96 gr.).
 Eter sulfúrico. ℥xviiij (4 gr.).

M. I. Calenturas atáxico-adinámicas, calenturas tifoideas, intermitentes rebeldes, cólera, tisis, parálisis. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6536. P. ÓLEO-FOSFORADA DE SOUBEIRAN (*Mialhe*).

℥ Aceite fosforado. . . . ℥ij (8 gr.).
 Goma aráb. en polvo. ℥ij (8 gr.).
 Agua de yerbabuena. . ℥iij (96 gr.).
 Jarabe simple. ℥ij (64 gr.).

Se hace un mucílago con el polvo de gomá y la mitad del agua de menta, se echa en una botella, se pesa en la misma botella el aceite fosforado, se agita durante algunos minutos, despues se añade por partes y sucesivamente el jarabe y el resto del agua destilada. *D.* Se da á cucharadas de hora en hora.

Esta fórmula es un excelente modo para administrar el fósforo, y preferible á la siguiente.

6537. P. FOSFORADA CON ÉTER (*Soubeiran*).

℥ Eter fosforado. ℥j (4 gr.).
 Agua de menta piperita,
 Jarabe de goma, ãã. . . ℥ij (64 gr.).

H. S. A. D. Se toma á cucharadas de hora en hora. Conviene agitar la botella al tiempo de tomar la pocion.

6538. P. FOSFORADA GOMOSA (*Wendt*).

℥ Acido fosfórico debilitado. ℥ij (8 gr.).

Cocimiento de salep. ℥vj (180 gr.).
 Jarabe de frambuesas. ℥j (30 gr.).
H. S. A. I. Salivacion, salivacion mercurial. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6539. P. FUNDENTE.

℥ Cloruro de bario. . . . ℥jv (2 dec.).
 Agua destilada. . . . ℥ij (60 gr.).
 Extracto de cicuta. . . ℥jv (2 dec.).
 Emulsion comun. . . . ℥bj (500 gr.).
 Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

M. I. Escrófulas y tisis pulmonar escrofulosa.

6540. Otra (*H. DE IT.*).

℥ Sulfato de potasa. . . ℥iij (12 gr.).
 Infusion de ruibarbo. ℥vj (180 gr.).
M. I. A cucharadas como antilechosa.

6541. Otra (*SCHAEFFER*).

℥ Licor de tierra foliada de tártaro,
 Jar. de achicorias, ãã. ℥j (30 gr.).
 Extracto de grama. . . ℥iij (12 gr.).
 Vino emético,
 Jabon estibiado, ãã. . . ℥ij (8 gr.).
M. I. Atrofia mesentérica. *D.* Una á dos cucharadas cada tres horas.

6542. Otra (*SELLE*).

℥ Carbonato de potasa. . ℥j (4 gr.).
 Vinagre. c. s.
 para saturarle; se añade:
 Infusion de ruibarbo. . ℥j (30 gr.).
 Aguabendita de Ruland. ℥j (4 gr.).
I. Atrofia mesentérica. *D.* Quince á veinte gotas, tres veces al dia.

6543. P. FUNDENTE NERVINA.

℥ Flores de arnica. . . . ℥j (4 gr.).
 Agua hirviendo. c. s.
 para obtener ℥bj (500 gr.) de infusion. Se cuele y se añade:
 Subcarbon. de potasa. ℥ij (8 gr.).
 Jarabe simple. ℥j (30 gr.).
I. Infartos del bajo vientre y afecciones escirrosas acompañadas de alteraciones nerviosas.

6544. P. DE GEOFREÁ.

℥ Corteza de geofrea. ℥β (15 gr.).
 Agua. ℥vj (180 gr.).

Se hierve durante media hora, se cuele y se añade:

Tintura de geofrea. ℥j (30 gr.).
 Jar. de cort. de nar. ℥jβ (45 gr.).

I. Afecciones verminosas, helmintiasis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6545. P. DE GOELIS.

℥ Cocimiento de-raiz de altea,
 Infusion de raiz de re-
 galiz, añ. ℥ij (60 gr.).

Nitrato de potasa. . . . ℥j (12 dec.).
 Ojimiél simple. . . . ℥jβ (45 gr.).

I. Se usa contra la neumonía de los niños.

D. Una cucharada de café de hora en hora á los niños de dos años. Cuando se ha verificado la resolución, se reemplaza el nitrato de potasa por ℥j á ℥jv (4 á 15 gr.) de acetato de amoniaco.

6546. P. CON GOMA AMONIACO.

℥ Raiz de polígala. . . . ℥ij (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℥vj (180 gr.).

Se infunde y se añade:

Goma amoniaco. ℥β á ℥j (2 á 4 gr.).
 Jarabe de Tolú. . . . ℥j (30 gr.).

I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6547. Otra, n. 2.

℥ Goma amon. en polvo. ℥xij (6 dec.).
 Ojimiél escilitico. . . . ℥j (30 gr.).
 Infusion de hisopo. . . . ℥jv (125 gr.).
 Yema de huevo. . . . c. s.

Se divide la goma amoniaco sobre un pórfido con yema de huevo; se la tritura por partes, y cada una de estas se echa en un mortero. Cuando se ha tritura-do toda la goma resina, se tritura y añade el jarabe y la infusion.

Del mismo modo se prepara la de ASA FÉTIDA.

No deberá usarse instrumento alguno de hierro.

6548. Otra (H. DE M.).

℥ Goma amon. en polv. ℥jβ (6 gr.).
 Inf. de yedra terrestr. ℥ββ (250 gr.).

Agua lacticinosa de
 canela. ℥ij (60 gr.).

Se tritura la gomo-resina con un poco de infusion, se diluye, se cuele y se añade el agua de canela.

6549. P. DE GOMA QUINO.

℥ Rosas rojas. ℥ij (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℥jv (125 gr.).

Se infunde y se añade:

Goma quino. ℥vj (24 gr.).
 Agua de Rabel. . . . ℥xc (5 gr.).

Jar. de cásc. de gran. ℥j (32 gr.).
 Tintura de canela. . . . ℥j (4 gr.).

M. I. Diarrea y disenteria crónicas, gastralgias, metrorragia. *D.* A cucharadas cada dos horas.

6550. P. GOMOSA (H. M.).

℥ Goma arábica. . . . ℥j (30 gr.).
 Agua comun. . . . ℥biiij (1500 gr.).

Se disuelve la goma en el agua y se añade:

Jarabe simple. . . . ℥jv (125 gr.).

D. Un cortadillo cada dos horas.

6551. P. GOMOSA ó Julepe gomoso (F. F.).

℥ Goma aráb. en polvo. ℥ij (8 gr.).
 Jarabe de malvabisco. ℥j (32 gr.).

Agua de azahar. . . . ℥β (16 gr.).
 Agua comun. . . . ℥iiij (96 gr.).

Se disuelve la goma en el agua comun en un mortero de mármol, y se añaden las demás sustancias.

I. Inflamaciones de las vias aéreas acompañadas de tos y de irritacion de la faringe, en otras flegmasias y en los casos en que convienen los mucilaginosos.

6552. P. GOMOSA Ó PECTORAL (H. M. F.).

℥ Goma arábica entera. ℥ij (8 gr.).

Jarabe simple. ℥j (30 gr.).
 Agua de flor de nar. ℥ij (8 gr.).
 Infusion pectoral. . . ℥iij (90 gr.).

Se lava la goma en agua fria, se la disuelve en frio en la cantidad de infusion prescrita, se cuele, se añade el jarabe y el agua de flores de naranjo.

Si urge se reemplazará la goma arábica entera por el polvo de goma.

Si se añade á esta pocion ℥j (30 gr.) de aceite de almendras dulces se tendrá la **POCION ACEITOSA**.

Para que la pocion pectoral sea **OPIADA**, **NITRADA** ó **ALCANFORADA**, se añade: ℥℞ (6 dec.) de tintura de opio, ḡvj (3 dec.) de nitro ó ḡx (5 dec.) de alcanfor. Si se añade ḡj (5 cent.) de quermes se tendrá la **POCION QUERMETIZADA**, aunque en este caso se reemplaza la goma arábica por la goma tragaeanto.

6553. P. GOMOSA ESTIMULANTE
(Meyer).

☞ Gayuba,

Yedra terrestre, ãã. . ℥iij. (42 gr.).
 Agua comun. ℥x (300 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca la quinta parte y se añade entonces:

Cáseara de naranja. . ℥ij (8 gr.).

Se deja infundir durante doce á quince minutos, se cuele y se añade S. A.

Jarabe de malvabiseo. ℥j (30 gr.).

I. Catarro vesical crónico, hematuria pasiva, leucorrea. *D.* ℥ij (60 gr.) cuatro veces al dia.

6554. P. DE HELECHO MACHO.

☞ Raiz de helecho macho. ℥j (30 gr.).
 Agua. ℥jx (280 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca una tercera parte, y se cuele. Despues de frio se añade:

Eter sulfúrico. ℥j (4 gr.).

Jarabe de tanaeeto. . ℥j (30 gr.).

I. Lombrices. *D.* A cucharadas de media en media hora.

6555. P. HEMOSTÁTICA.

☞ Extracto de ratania. ℥℞ (2 gr.).

Infus. de rosas rojas. ℥v (150 gr.).

Alumbre. ḡjx (50 cent.).

Agua de Rabel. . . . ḡxv (75 cent.).

Jarabe de catecú,

Jarabe de quina, ãã. ℥j (30 gr.).

M. I. Gastralgia, metrorragias pasivas, hemotisis y otras hemorragias pasivas, parálisis. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6556. Otra, n. 2.

☞ Extracto de eornezue-

lo de eenteno. ℥j (4 gr.).

Agua dest. de canela. ℥iij (96 gr.).

Jarabe diacodion. . . ℥ij℞ (40 gr.).

Jarabe simple. ℥v (20 gr.).

M. I. Hemorragias uterinas. *D.* A cucharadas de media en media hora.

6557. Otra (BROUSSONNET).

☞ Zumo de ortiga bl. ℥jv (125 gr.).

Sangre de drago. . . ḡxv (75 cent.).

Alumbre. ḡvj (3 dec.).

H. S. A. I. Hemotisis, hematemesis, etc. *D.* Una cucharada de hora en hora.

Nota. Se bebe al mismo tiempo una tisana de consuelda mayor acidulada con agua de Rabel.

6558. Otra (DUMAS).

☞ Sulfato de hierro. . . . ḡvj (3 dec.).

Sangre de drago,

Tintura de canela, ãã. ḡx (5 dec.).

Agua de Rabel. ℥℞ (2 gr.).

Cocim. de consuelda. ℥v (150 gr.).

Jarabe diaeodion. . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Vómitos, gastralgia, hematemesis, hemotisis, hemorragias pasivas. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6559. P. HIDRAGOGA.

☞ Extr. de celedonia. ḡxc (5 gr.).

Extracto de beleño. ḡcxviiij (4 gr.).

Sulfato de potasa. . . . ℥℞ (15 gr.).

Tártaro emético. . . . ḡij (5 cent.).

Agua de saúco. ℥iij (90 gr.).

Ojimiél eselítico. . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Hidropesía, anasarca, as-

citis, infartos de las visceras abdominales. *D.* Una cucharadita de café cada dos horas.

6560. Otra (GAUBIUS).

℞ Zumo de corteza fresca de saúco. ℥j (30 gr.).
Jarabe de violetas. ℥℔ (15 gr.).
M. I. Hidropesía.

6561. Otra (LENTIN).

℞ Vino emético. ℥j (4 gr.).
Vino escilitico. ℥iij (12 gr.).
M. I. Hidropesía. *D.* Cincuenta á cien gotas cada dos ó tres horas.

6562. Otra (VOGT).

℞ Crémor de tártaro,
Vino emético,
Vinagre escilitico, ãã. ℥℔ (2 gr.).
Agua de perejil. ℥j℔ (45 gr.).
Jarabe de polígala. ℥j (30 gr.).
M. I. Anasarca, ascitis, hidropesía consecutiva á la escarlatina. *D.* Una cucharadita de café cada dos horas.

6563. P. HIDRAGOGA EMETIZADA.

℞ Tártaro emético. ℥j (5 cent.).
Tártaro boratado. ℥℔ (15 gr.).
Infusion de enebro. ℥vj (180 gr.).
Licor de Hoffmann. ℥iij (12 gr.).
Láud. de Sydenham. ℥℔ (2 gr.).
M. I. Hidropesías, ascitis, cólico, neumatosis, grippe. *D.* Una cucharada cada hora.

6564. P. DE HINOJO ACUÁTICO.

℞ Semillas de hinojo acuático. ℥ij℔ (10 gr.).
Agua hirviendo. ℥vj (180 gr.).
Se infunde, se cuele y se añade:
Amoniaco anisado. ℥ij℔ (10 gr.).
Jarabe de Tolú. ℥ij (60 gr.).
I. Catarro crónico, calentura atáxica, tisis pulmonar. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6565. P. CON HOLLIN Ó CAFÉ (H. DE M.).

℞ Café tostado en polvo,
Hollin de leña, ãã. ℥j (30 gr.).

Se infunde en c. s. de agua para obtener ℔j℔ (750 gr.) de líquido.

I. Lombrices intestinales. *D.* ℥vj (180 gr.), dando pasada una hora de ℥℔ á ℥j (15 á 30 gr.) de aceite de ricino.

6566. P. DE HUFELAND CONTRA LA HIDROPESIA ESPASMÓDICA.

℞ Agua común. ℥x (300 gr.).
Raiz de ceb. albarrana. ℥℔ (15 gr.).
Se hierve durante veinte minutos, y hácia el fin de la decoccion se añade:

Raiz de valeriana en p. ℥ij (8 gr.).
Se cuele el cocimiento y se le mezcla con

Jar. de cáscara de nar. ℥j (30 gr.).
Mucilago de goma arábica. ℥iij (12 gr.).
Gomo-resina de guayaco en polvo,
Tintura acre de antimonio,
Acido nítrico alcoholizado,
Espíritu de nitro dulcificado, ãã. ℥j (8 gr.).

D. Una cucharada cada dos horas.

6567. P. INCIDENTE (H. M.).

℞ Polígala amarga. ℥℔ (15 gr.).
Agua común. ℥xviii (560 gr.).
Se cuece S. A. y se añade:
Quermes mineral. ℥vj (3 dec.).
Jarabe de altea. ℥j℔ (45 gr.).
I. Catarros pulmonares. *D.* Un cortadillo cada cuatro horas.

6568. P. IODURADA (Desfermon).

℞ Acido prúsico medic. 10 á 12 gotas.
Solucion de ioduro de potasio. 10 gotas.
Agua de lechuga. ℥jy (125 gr.).
Jarabe de malvabiscó. ℥j (30 gr.).
M. I. Afecciones pulmonares, tisis. *D.* Una cucharada de café de hora en hora. Se puede reemplazar el ácido prúsico y el jarabe de malvabisco por ℥j (30 gr.) de jarabe ciánico.

6569. P. INCISIVA (Barbier).

℞ Goma amoniaco. ℥j (4 gr.).

Ojimiél escilitico,
 ó Yedra terrestre. ℥j (30 gr.).
 Agua destilada de hisopo,
 Agua destilada de men-
 ta ó rosas, ãã. ℥jv (125 gr.).
M. I. Edema del pulmon, fin de
 los catarros pulmonares crónicos,
 perineumonías falsas, asma hú-
 medo. *D.* A cucharadas.

6570. P. INCISIVA (F. F. DE 1818).

℥ Goma amoniaco. ℥xij (6 dec.).
 Ojimiél escilitico. ℥j (30 gr.).
 Infusion de hisopo. ℥jv (125 gr.).
 Se tritura la goma amoniaco
 con el ojimiél, y se diluye poco á
 poco en la infusion. Se usa como
 diurético en los catarros crónicos.
D. A cucharadas.

6571. P. IODURADA.

℥ Ioduro de potasio. ℥xviii (4 gr.).
 Poción gomosa. núm. 4.

M. I. Escrófulas, accidentes ter-
 ciarios de la sífilis, como exósto-
 sis, caries, úlceras del velo del
 paladar. *D.* A cucharadas.

6572. Otra (CULLERIER).

℥ Iodo,
 Ioduro de potasio, ãã. ℥ij (4 dec.).
 Julepe gomoso. ℥jv (125 gr.).
M. I. Enfermedades sífilíticas y
 escrofulosas. *D.* A cucharadas en
 el día.

**6573. P. CON IODURO DE HIERRO
 (Cullerier).**

℥ Ioduro de hierro. ℥jv á ℥vj (2 á 3
 dec.).
 Julepe gomoso. ℥jv (125 gr.).
M. I. Afecciones escrofulosas ó
 sífilíticas, etc. *D.* A cucharadas.

6574. P. DE IODURO DE POTASIO.

℥ Ioduro de potasio. ℥j (4 gr.).
 Iodó. ℥iij (15 cent.).
 Agua. ℥iij (90 gr.).
 Jar. de zarzaparrill. ℥j (30 gr.).
M. I. Escrófulas, reumatismo

articular, sífilis, sífilides. *D.* Dos
 cucharadas mañana y noche.

**6575. P. DE IODURO DE POTASIO
 (Wardleworth).**

℥ Ioduro de potasio. ℥ß (2 gr.).
 Agua de yerbabuena. ℥vj (192 gr.).
 Jarabe de azafran. ℥ß (16 gr.).
H. S. A. I. Reumatismo articu-
 lar agudo. *D.* En tres tomas en
 las veinticuatro horas.

**6576. P. DE IODURO DE POTASIO
 CONTRA LA NEUMONIA CRÓNICA
 (Upshur).**

℥ Ioduro de potasio. ℥j (12 dec.).
 Infusion de lúpulo. ℥ß (250 gr.).
 Disuélvase. *I.* En tres tomas en
 las veinticuatro horas.

**6577. P. DE IODURO DE POTASIO
 Y DIGITAL.**

℥ Ioduro de potasio. ℥iij (15 cent.).
 Tintura de digital. 15 gotas.
 Poción gomosa. ℥jß (45 gr.).
M. I. Pericarditis y endocarditis
 que complica el reumatismo ar-
 ticular. *D.* En tres tomas en el
 día.

**6578. P. DE IODURO DE ZINC Y
 ESTRICNINA.**

℥ Ioduro de zinc y es-
 tricnina. ℥ß (25 mil.).
 Agua destilada. ℥jv (125 gr.).
 Jar. de flores de nar. ℥j (30 gr.).
M. D. Se toma en dos veces al
 día.

**6579. P. DE IODURO DE ZINC Y
 MORFINA (Bouchardat).**

℥ Ioduro de zinc y morf. ℥ß (25 mil.).
 Infusion de toronjil. ℥jv (125 gr.).
 Jarabe de flor de nar. ℥j (30 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas de
 hora en hora.

6580. P. DE IPECACUANA.

℥ Ipecacuana en polvo. ℥j (12 dec.).

Jarabe de goma. ℥j (30 gr.).
 Agua. ℥vj (180 gr.).
M. D. En dos tomas con un cuarto de hora de intervalo como vomitivo.

6581. P. DE IPECACUANA (Haller).

℥ Cáscaras de naranja. . ℥ij (8 gr.).
 Ipecacuana en polvo. . ℥j℥ (6 gr.).
 Crémor de tártaro. . . . ℥℥ (15 gr.).
 Se hierven en ℥jv (125 gr.) de agua de fuente, se cuele y se añade ℥℥ (15 gr.) de ojimiel escilitico.

I. Se usa en los embarazos gástricos, ictericia, fiebres intermitentes, asma, tos de estómago é hidropesía. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6582. P. DE IPECACUANA VOMITIVA.

℥ Ipecacuana en polvo. ℥xviii (1 gr.).
 Se diluye en
 Agua tibia. ℥iij (90 gr.).
M. I. Plétora biliosa, angina aguda incipiente, crup. *D.* En dos ó tres tomas con un cuarto de hora de intervalo.

La POCION DE IPECACUANA ESTIBIADA se prepara añadiendo ℥j (5 cent.) de emético. Se usa del mismo modo.

6583. P. CON JABON MEDICINAL.

℥ Goma tragacanto. ℥x (5 dec.).
 Jarabe de fumaria. . . . ℥j (30 gr.).
 Se tritura en un mortero de mármol y se añade poco á poco :
 Agua destilada. ℥iij (90 gr.)
 en que se habrá disuelto antes
 Jabon medicinal. ℥ij (8 gr.).

I. Infartos de las vísceras abdominales. *D.* A cucharadas.

6584. P. DE JALAPA (Velpeau).

℥ Raiz de jalapa en polv. ℥xviii (1 gr.).
 Escamonea. ℥vj (3 dec.).
 Emulsion de almendr. ℥jv (125 gr.).
M. D. En dos veces. Se agitará al tiempo de usarla.

6585. P. DE JUAN ROY CONTRA LA COQUELUCHE ó Poción de ipecacuana compuesta.

℥ Foliculos de sen. ℥ij (8 gr.).
 Raiz de ipecacuana. . . . ℥j (4 gr.).

Se infunden en un cuartillo de agua hirviendo, se cuele y se añade :

Ojimiel escilitico,
 Jarabe de hisopo, añ. . . ℥j (30 gr.).

D. Seis cucharadas de café á los niños en el espacio de una mañana.

6586. P. DE JUSSIEU CONTRA LOS ESPUTOS DE SANGRE.

℥ Agua de llanten,
 Agua de buglosa, añ. ℥ij (60 gr.).
 Jarabe de consuelda

mayor. ℥j (4 gr.).

Agua de flor de nar. ℥℥ (2 gr.).

Esencia de Rabel. . . ℥iij (15 cent.).

H. S. A. D. Se toma de dos veces con una hora de intervalo.

6587. P. DE KERS.

℥ Nitrato de peróxido de hierro. 8 gotas.

Agua de tilo. ℥vj (192 gr.).

Jarabe simple. ℥ij℥ (10 gr.).

I. Diarrea crónica. *D.* Una cucharada al dia.

6588. P. LAXANTE.

℥ Púlpas de tamarindos. ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

Agua hirviendo. ℥vj (180 gr.).

Se cuele y se añade :

Jarabe de frambuesas. ℥j (30 gr.).

Mézclese.

6589. P. DE LACTATO DE QUININA.

℥ Lactato de quinina. . . ℥x (5 dec.).

Agua dest. de yerbab. ℥v (20 gr.).

Agua. ℥iij (96 gr.).

Jarabe de claveles. . . ℥j (32 gr.).

H. S. A. I. Calenturas intermi-

tentes rebeldes. *D.* En tres tomas.

6590. P. LAXANTE.

℞ Aceite de ricino. ℥vj (24 gr.).
Ojimiél escilitico. ℥℞ (46 gr.).
Jar. de espino serval. ℥j (32 gr.).
M. D. De una vez.

6591. Otra (FERNELIO).

℞ Maná en lágrimas. ℥j (30 gr.).
Agua comun. ℥jv (125 gr.).
Se funde y se añade:
Cañafistula cocida,
Aceite de almendras
dulces, ãã. ℥j (30 gr.).

Se mezclan exactamente en un mortero de mármol.

I. y D. Una cucharada de hora en hora por la mañana para obtener una suave evacuacion en los enfermos delicados, afectados de estreñimiento.

6592. Otra (H. DE AL.).

℞ Fosfato de sosa,
Jar. de malvabisco, ãã. ℥℞ (45 gr.).
Agua. ℥jv (125 gr.).
M. D. En cuatro tomas, de hora en hora.

6593. Otra (H. DE AL.).

℞ Pulpa de tamarindos. ℥iij (90 gr.).
Agua. ℥xij (375 gr.).
Se hierva hasta que se reduzca á ℥x (300 gr.), se cuele y se añade:
Maná en lágrimas. ℥ij (60 gr.).
D. En dos ó tres veces.

6594. P. LAXANTE DE VIENA.

℞ Agua comun. ℥x (320 gr.).
Maná en lágrimas. ℥ij (64 gr.).
Folículos de sen. ℥vj (24 gr.).
Crémor de tártaro. ℥j (4 gr.).
Cilantro. ℥℞ (2 gr.).
Pasas de Corinto,
Polipodio, ãã. ℥ij (24 dec.).
Se reduce el agua por la ebullicion á ℥vj (192 gr.).

I. y D. Se toma de una vez

cuando se quiere que obre como laxante, y á cucharadas de hora en hora cuando sea necesario combatir la disposicion al estreñimiento.

6595. P. DE LAUREL REAL.

℞ Agua de laurel real. ℥iij (90 gr.).
Jarabe de amapolá. ℥j (30 gr.).
Jarabe de éter. ℥℞ (45 gr.).
Tintura de digital. ℥xviiiij (4 gr.).
M. I. Angina, grippe, ronquera, gastritis, carditis, hipo, cardialgia, cardiopalmia, aortitis, asma, palpitaciones, coqueluche, gastralgias nerviosas, ninfomanía, corea, histérico, espasmos, síncope, tétanos, peritonitis, neumonía, bronquitis, esplenitis, vómitos, cólicos, sudor inglés, tisis, cáncer, plétora, congestion, cálculos, cianosis, zona, hipertrofia, prurito, enuresis, ceática, hemicránea, beriberi, flebitis, diabetes, calentura héctica, muermo, hipocondría, insomnio, pedionalgia, esofagismo, neuralgias. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6596. P. DE LICOPODIO (Hufeland).

℞ Licopodio en polvo. ℥ij (8 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥j℞ (48 gr.).
Agua de hinojo. ℥ij (64 gr.).
M. I. Estrangurria, diarrea dolorosa de los niños, disuria ó iscuria espasmódica. *D.* Una cucharadita de café de hora en hora.

6597. P. LITONTRIPTICA.

℞ Carbonato de potasa. ℥ij (8 gr.).
Agua de cal. ℥bij (1000 gr.).
M. I. Cálculos urinarios, nefritis, grippe. *D.* ℥j (30 gr.) en una taza de leche cuatro veces al dia.

6598. Otra, n. 2.

℞ Bicarbonato de sosa. ℥j (4 gr.).
Infusion de quasia. ℥jv (125 gr.).

Tintura de colombo. . ʒj (4 gr.).
M. D. Una cucharada cuatro veces al día.

6599. P. DE LOBELIA (Leclerc).

ʒ Lobelia hinchada. . . ʒij (8 gr.).
 Agua. ʒiij (90 gr.).
 Jarabe simple. . . . ʒj (30 gr.).
H. S. A. I. Asma. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6600. P. DE LOCKSTAEDT.

ʒ Bálsamo de copaiba. . ʒijʒ (10 gr.).
 Goma arábica. ʒxc (5 gr.).
 Vino blanco. ʒij (60 gr.).
 Tint. de acet. de hier. ʒxc (5 gr.).
 Jar. de báls. de Tolú. ʒj (30 gr.).
I. Blenorrea, blenorragia. *D.* Una cucharada tres veces al día.

6601. P. DE MAGNESIA (Gobley).

ʒ Magnesia calcinada. . ʒij (8 gr.).
 Jar. de flores de nar. ʒj (30 gr.).
 Agua destilada. . . . ʒiij (90 gr.).
H. S. A. Se ha propuesto esta fórmula en lugar de la medicina de magnesia, de Mialhe, porque esta se espesa á los tres días, y aquella se conserva líquida indefinidamente.

I. Es un purgante agradable que se toma de una ó dos veces.

6602. P. DE MAGNESIA COMPUESTA.

ʒ Magnesia calcinada. . . ʒiij (12 gr.).
 Tintura acuosa de ruibarbo.
 Agua de menta pip., ãã. ʒij (60 gr.).
 Láudano líquido. . . . ʒj (4 gr.).
 Eter sulfúrico. ʒij (8 gr.).
M. I. Cólera, arenillas, destete, dispepsia y afonía. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6603. P. DE MANÁ.

ʒ Maná. ʒiij (90 gr.).
 Agua. ʒvj (180 gr.).
 Disuélvase. *D.* En dos tomas.

6604. P. DE MANÁ COMPUESTA.

ʒ Maná. ʒij (60 gr.).
 Ruibarbo. ʒʒ (45 gr.).
 Agua hirviendo. ʒjv (125 gr.).
 Se infunde y se cuele.
D. En dos tomas.

6605. P. DE MANITO.

ʒ Hojas de sen. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
 Se hacen ʒvj (180 gr.) de infusión y se disuelve ʒj (30 gr.) de manito.

6606. Otra, n. 2.

ʒ Crémor de tártaro soluble. ʒʒ (15 gr.).
 Manito. ʒj (30 gr.).
 Agua hirviendo. ʒx (300 gr.).
 Se disuelve.

6607. Otra, n. 3.

ʒ Manito. ʒʒ (15 gr.).
 Agua. ʒiij (90 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Azúcar. ʒv (20 gr.).
 Alcoholato de limon. . . 6 gotas.
 Se filtra.
D. Se da de una vez á las personas delicadas.

6608. P. MINORATIVA (Boerhaave).

ʒ Pulpa de cañafistula. . ʒj (12 dec.).
 Ruibarbo en polvo. . . ʒij (4 dec.).
 Jarabe de flores de melocoton. c. s.
I. Se da c. s. á los niños recién nacidos para evacuar el meconio. *D.* Se toma un poco en la punta del dedo y se le introduce en la boca del niño.

6609. P. DE MONGENOT.

ʒ Té hyswen,
 Yedra terrestre, ãã. . ʒij (8 gr.).
 Flores de gordolobo. . ʒj (4 gr.).
 Lirio de Florencia. . . ʒʒ (2 gr.).

Agua hirviendo. . . . \mathfrak{Vj} (180 gr.).
Se infunde, se cuele y se añade:

de S. A. :

Jar. de báls. de Tolú. \mathfrak{B} (15 gr.).

Jarabe de erisimo,

Ron, ãã. \mathfrak{ij} (30 gr.).

Tintura de canela. . . \mathfrak{xxviii} (1 gr.).

I. Asma, catarro bronquial, afonía crónica y caracterizada por un estado asténico. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

6610. P. MORFINOSA (H. M.).

\mathfrak{z} Acetato de morfina. . . \mathfrak{ij} (5 cent.).

Agua destilada. \mathfrak{Lvj} (125 gr.).

Vinagre. 8 gotas.

Jarabe simple. \mathfrak{ij} (30 gr.).

M. S. A. *D.* A cucharadas.

6611. P. MOSCADA (Dubois).

\mathfrak{z} Almizcle en polvo. . . \mathfrak{xxij} (6 dec.).

Azúcar. \mathfrak{ij} (8 gr.).

Agua comun. \mathfrak{ij} (60 gr.).

M. I. Epilepsia, histérico, baile de san Vito, calentura atáxica acompañada de delirio y convulsiones. *D.* A cucharadas de café.

6612. Otra (H. M.).

\mathfrak{z} Poción etérea. \mathfrak{Vj} (180 gr.).

Almizcle. \mathfrak{x} (5 dec.).

M. D. Una cucharada de hora en hora.

6613. P. MOSCADA Y OPIADA (Cheselden).

\mathfrak{z} Almizcle. \mathfrak{ij} (1 dec.).

Agua de hinojo. . . . \mathfrak{Vj} (180 gr.).

Se trituran y se añade:

Tintura de opio. . . . 40 gotas.

Jarabe de amapola. . \mathfrak{ij} (8 gr.).

I. Tétanos. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6614. P. MUCILAGINOSA OPIADA (Clarus).

\mathfrak{z} Musgo marino mond. \mathfrak{B} (2 gr.).

Agua comun. \mathfrak{Lb} (250 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca

la cuarta parte, se cuele y se añade:

Fosfato de sosa. . . . \mathfrak{B} (6 gr.).

Jarabe de opio. . . . \mathfrak{ij} (12 gr.).

I. En los intervalos de los accesos de hemotisis. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6615. P. MUCILAGINOSA Y SEDANTE (Hufeland).

\mathfrak{z} Polvo de salep. \mathfrak{B} (2 gr.).

Agua comun. \mathfrak{ij} (90 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca a \mathfrak{ij} (60 gr.), se cuele y se añade:

Ag. de flor de naranjo. \mathfrak{ij} (60 gr.).

Jarabe de malvabisco. \mathfrak{ij} (30 gr.).

Extracto de beleño. . \mathfrak{v} (25 cent.).

M. I. Tos espasmódica, tos seca. *D.* Una cucharada de café cada veinte minutos.

6616. P. MURIÁTICA.

\mathfrak{z} Acido clorhídrico. . . \mathfrak{ijB} (10 gr.).

Cocimiento de quina. \mathfrak{ij} (96 gr.).

Jarabe de frambuesas. \mathfrak{B} (48 gr.).

M. I. Escorbuto, hemacelinosis, estomacace, tifo. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6617. P. DE MUSGO DE CÓRCEGA.

\mathfrak{z} Musgo de Córcega. . \mathfrak{ij} (4 gr.).

Agua hirviendo. . . . \mathfrak{Lvj} (125 gr.).

Se infunde, se cuele y se añade:

Jarabe simple. \mathfrak{ij} (30 gr.).

M. D. A cucharadas ó de una vez segun la constitucion del enfermo.

6618. P. NERVINA CON VALERIANA.

\mathfrak{z} Valeriana,

Quina, ãã. \mathfrak{ij} (30 gr.).

Se cuece en

Agua. \mathfrak{xx} (300 gr.)

que se reducen a \mathfrak{Vj} (180 gr.) y se añade:

Jarabe de manzanilla,

Jarabe de arnica,

Jarabe de acetato de morfina, ãã. \mathfrak{ij} (30 gr.).

Tintura de cálamo aromático,
Alcoh. alcanforado, añ. ℥ijβ (10 gr.).
I. Tifo, período atáxico adinámico de las calenturas tifoideas, corea. D. A cucharadas de hora en hora.

6619. P. DE NINFEA.

℥ Jarabe de ninfea. . . . ℥j (30 gr.).
Tártaro emético. . . . ḡvj (3 dec.).
Agua de valeriana,
Agua de flor de nar., añ. ℥jβ (45 gr.).
M. I. Neumonía, pleuresía, histérico, epilepsia, corea, zona. D. A cucharadas de hora en hora. A los dos ó tres dias se duplica la cantidad del jarabe y del tártaro emético.

6620. P. NITRADA.

℥ Nitrato de potasa. . . ℥j (12 dec.).
Jar. de las cinco raic. ℥j (30 gr.).
Agua de hinojo. . . . ℥jv (125 gr.).
M. I. Afecciones dolorosas de las vias urinarias. D. A cucharadas de hora en hora.

6621. Otra, n. 2.

℥ Nitro. ḡxviiij (4 gr.).
Cocimiento de cebada. ℥jv (125 gr.).
Jarabe de las cinco raices. ℥j (30 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora. Algunas veces se eleva la dosis del nitro hasta ℥iiij ó ℥jv (12 á 15 gr.) al dia.

6622. P. NITRADA ESTIBIADA (Thilenius).

℥ Nitro ℥ij (8 gr.).
Tártaro emético. . . . ḡij (4 dec.).
Agua dest. de saúco. . . . ℥v (150 gr.).
Ojimiél simple. . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Artritis reumática, reumatismo muscular y fibroso. D. Una cucharada cada dos horas.

6623. P. DE NITRATO DE PLATA (Trousseau).

℥ Nitrato de plata. . . . ḡj (5 cent.).

Agua destilada. 5xx (80 gr.).
Jarabé. ℥x (40 gr.).
M. I. Diarrea aguda, convulsiones, disenteria. D. Una cucharada de hora en hora.

6624. P. OBSTÉTRICA (Dewes).

℥ Polvo de cornezuelo de centeno. 5β (2 gr.).
Azúcar blanca. ℥ijβ (10 gr.).
Agua de canela endulz. ℥j (30 gr.).
H. S. A. I. Partos laboriosos por inercia de la matriz, hemorragias uterinas, expulsion retardada de la placenta, y retencion de orina por inercia de la vejiga. D. Se toma en tres veces de veinte en veinte minutos.

6625. Otra (VELPEAU).

℥ Agua gomosa. ℥jv (125 gr.).
Agua destil. de azahar. ℥ij (8 gr.).
Cornezuelo en polvo,
Jarabe de limon, añ. ℥j (30 gr.).
M. D. Se usa como estimulante especial del útero, y se administra una cucharada cada media hora para promover las contracciones del útero en los partos laboriosos por inercia de la matriz.

6626. P. OCÍTICA (Charles).

℥ Jarabe simple. ℥iiij (96 gr.).
Cornezuelo de centeno en polvo. 5j (4 gr.).
Láudano de Sydenham. 20 gotas.
Esencia de bergamota. c. s.
El autor prescribe esta pocion en una ó dos dosis en los partos difíciles ó lentos, en las hemorragias uterinas y expulsion retardada de la placenta, y retencion de orina por inercia de la vejiga. Se puede dar á cucharadas en los casos de amenorrea.

6627. P. OPIADA (H. M.).

℥ Extr. acuoso de opio. ḡjv (2 dec.).
Agua destilada. ℥jv (125 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jarabe de altea. ℥j (30 gr.).
D. Una cucharada cada hora.

6628. *Otra* (H. DE INGL.).

℞ Tintura de opio. . . . 20 gotas.
 Agua de menta piper. ℥v (20 gr.).
 Agua. ℥iij (96 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora.

6629. P. PECTORAL.

℞ Infusion de especias
 béquicas. ℥iij (96 gr.).
 Jarabe de Tolú. . . . ℥v (20 gr.).
 Acido cianhidrico. . . 12 gotas.
 Se mezcla en un frasquito bien tapado.
D. A cucharadas.

6630. P. PECTORAL ó *Julepe béquico*.

℞ Especies béquicas. . . 5℔ (2 gr.).
 Goma arábica. . . . ℥ij (8 gr.).
 Jarabe simple. . . . ℥vj (24 gr.).
 Agua. ℥jv (125 gr.).
M. I. Se usa en los mismos casos que el julepe gomoso; á saber, en los romadizos y catarros. *D.* A cucharadas.

6631. *Otra* (H. M.).

℞ Tisana pectoral. . . . ℥jv (125 gr.).
 Goma amon. en polvo. ℥xij (6 dec.).
 Ojimiél escilitico. . . . ℥j (30 gr.).
H. S. A. D. Una cucharada cada dos horas.

6632. P. PECTORAL ó *Pocion hidrociánica* (Magendie).

℞ Inf. de yedra terrestre. ℥ij (60 gr.).
 Jarabe de malvabisco. . ℥j (30 gr.).
 Acido prúsico medicinal. 15 gotas.
H. S. A. I. Asma, ortofnea, catarro pulmonar crónico y tisis. *D.* Una cucharada cada tres horas, teniendo cuidado de menear la botella siempre que se toma la pocion.

Nota. Es prudente, segun el doctor Bally, empezar por seis ú ocho gotas de ácido en una pocion.

6633. P. PECTORAL (F. P.).

℞ Cianuro de potasio. . . ʒ℔ (25 mil.).
 Agua de lechuga. . . . ℥ij (60 gr.).
 Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
M. I. Asma, ortofnea, catarro pulmonar crónico y tisis. *D.* Una cucharada de café, y se aumenta poco á poco la dosis. *V. n.* 6310.

6634. *Otra* (RAYER).

℞ Aceite de hígado de bacalao. ℥iij (90 gr.).
 Goma aráb. en polvo. ℥℔ (15 gr.).
 Jarabe de opio,
 Agua, añ. ℥ij (60 gr.).
M. I. Neumonía crónica, tisis. *D.* Dos cucharadas mañana y noche. Se añade cuatro ó cinco gotas de láudano si el estómago no soporta el aceite.

6635. P. PECTORAL ACEITOSA (*Virey*).

℞ Cocimiento de cebada,
 Cocim. de azufaixas, añ. ℥iij (90 gr.).
 Aceite de alm. dulces,
 Jarabe de malvab., añ. ℥j (30 gr.).
 Esperma de ballena. . ℥j (4 gr.).
 Goma tragacanto. . . . ʒxvj (8 dec.).
 Quermes mineral. . . ʒij (4 dec.).
 Se tritura en un mortero la goma tragacanto y el quermes con una pequeña cantidad de azúcar; se mezcla despues con ellos el jarabe y la esperma de ballena fundida en caliente en el aceite de almendras dulces, y por último se añade lentamente los dos cocimientos.

I. Se usa para dulcificar la tos y facilitar la expectoracion en los catarros pulmonares y en la perineumonía. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6636. P. PECTORAL AMARGÁ.

℞ Quina. 5℔ (2 gr.).
 Especies béquicas. . . ʒj (12 dec.).
 Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).

Agua. ℥jv (125 gr.).
M. I. Se usá en los catarros pulmonares crónicos para facilitar la expectoracion, sobre todo en las personas avanzadas en edad. *D.* A cucharadas.

6637. P. PECTORAL AMONIACAL.

℥ Agua de hinojo. . . . ℥iij (90 gr.).
 Aceite de alm. dulces. ℥v (20 gr.).
 Carbonato de amon. ḡxc (5 gr.).
 Jarabe de menta. . . . ℥jβ (45 gr.).
 Emuls. de goma aráb. ℥j (30 gr.).
M. I. Coqueluche, catarro crónico, bronquitis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6638. P. PECTORAL DE ÉNULA CAMPANA.

℥ Extr. de énula camp. ḡxc (5 gr.).
 Se disuelve en
 Agua de hisopo. . . . ℥iij (90 gr.).
 Sal amoniaco. ℥j (4 gr.).
 Tintura de digital. . . . ℥β (15 gr.).
 Jarabe de opio. . . . ℥j (30 gr.).
 Jar. de las cinco raic. ℥j (30 gr.).
I. Tétanos, asma, vómitos, plétora, bronquitis, catarro crónico, coqueluche, calenturas intermitentes. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6639. P. PECTORAL TONICA.

℥ Liquen islándico lavado en agua fria (no privado del cetrarino) ℥j (30 gr.).
 Quina. ℥β (15 gr.).
 Serpentaria de Virginia. ḡxc (5 gr.).
 Agua. ℥v (150 gr.).
 Se cuele y se añade:
 Emulsion gomosa. . . . ℥jv (120 gr.).
M. I. Asma, bronquitis, coqueluche, catarro crónico, crup, tisis, calenturas intermitentes tifoideas. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6640. P. PIROACÉTICA (Pitschaft).

℥ Agua destilada de flor de naranjo. ℥ij (60 gr.).

Acido piroleñoso. ℥j (4 gr.).
 Jarabe de almendras: . . . ℥j 30 gr.).
H. S. A. I. Reblandecimiento gelatiniforme del estómago. *D.* Una cucharadita cada veinte á treinta minutos.

6641. P. DE PITSCHAFT MODIFICADA.

℥ Acíbar. ḡjx (50 cent.).
 Extr. de taraxacon. ℥ij (8 gr.).
 Agua de almendras amargas. ℥j (4 gr.).
 Agua de hinojo. . . . ℥v (150 gr.).
 Jarabe de puntas de espárragos. ℥ij (60 gr.).
M. I. Ictericia, amenorrea con palpitations de corazon. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6642. P. PIROLIGNICA.

℥ Acido piroleñoso rectificado. ℥ij (8 gr.).
 Tint. de cálamo arom. ℥iij (12 gr.).
 Agua de menta. ℥jv (125 gr.).
 Jarabe de horchata. . . . ℥ij (60 gr.).
H. S. A. I. Angina, gastromalacia. *D.* A cucharadas cada dos horas.

6643. P. DE POLÍGALA.

℥ Polígala de Virginia. . . ℥ij (8 gr.).
 Agua hirviendo. ℥vj (180 gr.).
 Se infunde y se añade:
 Jarabe de Tolú. ℥j (30 gr.).
 Goma amoniaco. ℥β á ℥j (2 á 4 gr.).
M. I. Facilita la expectoracion en los catarros pulmonares rebeldes. *D.* A cucharadas.

6644. P. PURGANTE.

℥ Tint. de jalapa comp. ℥j (30 gr.).
 Jar. de espino serval. ℥β (15 gr.).
 Cocim. de achicorias. ℥jv (125 gr.).
M. I. Ciertas hidropesías. *D.* A cucharadas.

6645. Otra, n. 2.

℥ Raiz de jal. en polvo: ḡxxx (15 dec.).
 Sulfato de sosa. ℥v (20 gr.).

Jarabe de miel. . . . \mathfrak{zj} (30 gr.).
 Cocimiento de achicorias hirviendo. \mathfrak{zvj} (180 gr.).
M. D. En muchas tomas.

6646. P. PURGANTE (n. 3.).

\mathfrak{z} Agua de cerezas. \mathfrak{zij} (60 gr.).
 Vino estibiado. \mathfrak{zj} (4 gr.).
 Jarabe de maná. \mathfrak{zj} (30 gr.).
M. I. Destete, albuminuria, afo-
 nia, cólico, neumatosis, hematu-
 ria, metritis. *D.* A cucharadas de
 hora en hora á los niños.

6647. Otra, n. 4.

\mathfrak{z} Pulpa de cañafistula,
 Jarabe de achicorias
 con ruibarbo, \mathfrak{aa} . . \mathfrak{zj} (30 gr.).
 Cocimiento de cabe-
 zas de adormideras. $\mathfrak{lb\beta}$ (250 gr.).
M. D. En tres ó cuatro tomas.

6648. Otra, n. 5.

\mathfrak{z} Crémor de tártaro,
 Pulpa de tamar., \mathfrak{aa} . \mathfrak{zj} (4 gr.).
 Agua. $\mathfrak{lb\beta}$ (250 gr.).
 Disuélvase. *D.* En dos tomas.

6649. Otra, n. 6.

\mathfrak{z} Aguardiente aleman. . $\mathfrak{zij\beta}$ (10 gr.).
 Jar. de espino serval. \mathfrak{zvj} (20 gr.).
 Agua. \mathfrak{ziii} (96 gr.).
 Alcoholato de limon. . $\mathfrak{z\beta}$ (2 gr.).
M. D. En una toma por la ma-
 ñana en ayunas.

6650. Otra, n. 7.

\mathfrak{z} Sen. $\mathfrak{z\beta}$ (15 gr.).
 Sulfato de magnesia. . $\mathfrak{z\beta}$ (15 gr.).
 Cacao tostado. . . . $\mathfrak{z\beta}$ (15 gr.).
 Agua hirviendo. . . . \mathfrak{ziii} (90 gr.).
 Se digiere durante media hora,
 se cuele y se añade:
 Azúcar. $\mathfrak{zj\beta}$ (45 gr.).
 Es una pocion purgante tan efi-
 caz como la medicina negra y aun
 mas agradable. *D.* De una vez.

6651. Otra, n. 8.

\mathfrak{z} Raiz de jalapa pulv. \mathfrak{gxxx} (15 dec.).
 Sulfato de sosa. . . . \mathfrak{zvj} (20 gr.).

Jarabe de miel. . . . \mathfrak{zj} (30 gr.).
 Cocim. de achicorias
 hirviendo. \mathfrak{zvj} (180 gr.).
D. Se toma en diferentes veces.

6652. Otra, n. 9.

\mathfrak{z} Hojas de sen. \mathfrak{zij} (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . . \mathfrak{zjv} (125 gr.).
 Se infunde durante un cuarto de
 hora, se cuele y se disuelve en
 el líquido colado:
 Sulfato de sosa. . . . $\mathfrak{z\beta}$ (15 gr.).
 Se añade:
 Jalapa en polvo. . . . $\mathfrak{gxxviii}$ (1 gr.).
D. Se toma en dos veces por la
 mañana en ayunas.

6653. P. PURGANTE ó Medicina comun (H. M. F.).

\mathfrak{z} Sen. \mathfrak{zij} (8 gr.).
 Sulfato de sosa. . . . $\mathfrak{z\beta}$ (15 gr.).
 Jar. de espino serval. \mathfrak{zj} (30 gr.).
 Agua hirviendo. . . . \mathfrak{zvj} (150 gr.).
 H. S. A. *D.* Se toma de una vez
 por la mañana en ayunas.

6654. Otra (ANDRY).

\mathfrak{z} Agua de flor de naranjo,
 Jarabe de flores de al-
 bérchigo, \mathfrak{aa} \mathfrak{zj} (30 gr.).
 Espíritu de romero. . . \mathfrak{zj} (4 gr.).
 Diagridio. $\mathfrak{z\beta}$ (6 dec.).
 H. S. A. *I.* Este purgante con-
 viene á las personas que tienen
 repugnancia á tomar las medicinas
 ordinarias. *D.* Se toma de una sola
 vez por la mañana en ayunas.

6655. Otra (BARATAUS).

\mathfrak{z} Alm. dule. mondadas. núm. 8.
 Azúcar. \mathfrak{zj} (30 gr.).
 Agua. \mathfrak{ziii} (90 gr.).
 Se hace una emulsion. Por otra
 parte se toma:
 Resina de jalapa. . . . \mathfrak{gxx} (5 dec.).
 Azúcar. $\mathfrak{gxxviii}$ (1 gr.).
 Almendras. núm. 4.
 Goma en polvo. . . . \mathfrak{gc} (5 gr.).
 Se tritura la resina con el azú-
 car, se pista con la almendra, se
 añade la goma y despues la emul-

sion poco á poco. De este modo la resina está muy dividida. *D.* De una vez.

6656. P. PURGANTE
(*Cruveilhier*).

℞ Aceite de almendras dulces,
Aceite de ricino,
Jar. de malvabisco, ãã. ʒj (30 gr.).

M. D. Se toma de una ó dos veces en la peritonitis puerperal, despues de las sangrías, el baño y las inyecciones uterinas.

6657. *Otra* (F. F.).

℞ Hojas de sen mond. ʒij (8 gr.).
Sulfato de sosa. ʒjv. (16 gr.).
Ruibarbo escogido. . . ʒj (4 gr.).
Maná en suerte. . . ʒij (64 gr.).
Agua hirviendo. . . ʒiijʒ (112 gr.).

Se echa el agua sobre el sen y el ruibarbo, y despues de media hora de digestion se cuele con expresion, se añade en seguida el sulfato de sosa y el maná, se disuelven á fuego lento, se cuele y se decanta.

6658. *Otra* (H. BEAUMONT).

℞ Aceite de ricino. ʒij (60 gr.).
Limon. número 1.

Se exprime el zumo, se le bate con el aceite y se añade:

Jarabe simple. ʒj (30 gr.).

M. D. En dos tomas.

6659. P. PURGANTE CON ACEITE DE RICINO.

℞ Aceite de ricino. ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

Jarabe. ʒj (30 gr.).

Goma arábica pulver. ʒij (8 gr.).

Agua. ʒjv (125 gr.).

M. D. En dos ó tres veces.

6660. *Otra*, n. 2.

℞ Aceite de ricino,
Jarabe de espinio serval,

Agua de menta pip., ãã. ʒij (60 gr.).

Mézclase y tritúrese con una yema de huevo.

D. Se toma en dos ó tres veces por la mañana en ayunas.

6661. P. PURGANTE DE ACEITE DE RICINO Y MAGNESIA (*Mialhe*).

℞ Aceite de ricino. . . . ʒv (20 gr.).
Alcohol de menta. . . ʒʒ (16 gr.).
Leche de magnesia. . . ʒijʒ (40 gr.).

D. A vasos de una vez, y se bebe en seguidados tazas de caldo con té, y despues de tomada no se prescribe ningun líquido hasta que produzca la purgacion.

6662. P. PURGANTE ACEITOSA (*Lentin*).

℞ Sulfato de magnesia. ʒj (30 gr.).
Aceite de linaza. . . ʒiij (90 gr.).
Agua comun. ʒvij (210 gr.).
Jarabe de diacodion. ʒj (30 gr.).
Tintura de opio. . . . 12 gotas.

M. I. Ileo. *D.* Una cucharada cada media hora. Si se llegase á vomitar se aumentará la dosis del opio.

6663. P. PURGANTE DE ACEITE DE TÁRTAGO.

℞ Aceite de tártagos,
Goma tragacanto, ãã. ʒjx (50 cent.).
Azúcar. ʒj (30 gr.).

Agua destilada,
ó Agua de menta. . . . ʒiij (90 gr.).

Jarabe de cáscara de naranja. ʒj (30 gr.).

M. I. Albuminuria, amaurosis, estreñimiento, apoplejía, metritis. *D.* En dos tomas por la mañana con un cuarto de hora de intervalo.

6664. P. PURGANTE ACÍDULA.

℞ Aceite de ricino. . . . ʒjʒ (45 gr.).

Jarabe tártrico. . . . ʒj (30 gr.).

Agua. ʒiij (90 gr.).

Alcoholato de limon. . ʒʒ (2 gr.).

Tambien se asocia ʒj (30 gr.) de jarabe de espinio serval á ʒj (30 gr.) de aceite de ricino.

6665. P. PURGANTE AGRADABLE.

℞ Escamonea en polvo. ʒxv (75 cent.).

Jarabe de horchata. ℥j (30 gr.).
 Agua de flor de naranjo,
 Agua de melisa, āā. ℥jβ (45 gr.).
 Esencia de vainilla. ḡij (4 dec.).

M. I. Albuminuria, ascitis, calenturas intermitentes ó tifoideas, estreñimiento, galactirrea, gripe, amaurosis, líquen, lepra, blenorragia, metritis, peritonitis, otitis. *D.* De una vez por la mañana.

6666. P. PURGANTE CON CAFÉ.

℥ Café tostado,
 Sen, āā. : ℥iij (42 gr.).
 Jarabe simple. ℥jβ (45 gr.).
 Agua. ℥jv (125 gr.).

H. S. A. Esta poción es un buen purgante para los niños. *D.* De una vez.

6667. P. PURGANTE DE CITRATO DE MAGNESIA (*Eymael*).

℥ Acido cítrico cristalizado. 28
 Agua hirviendo. 80
 Se disuelve y se añade poco á poco

Subcarbonato de magnesia. 47
 Disuelto ya, se cuele por una manga de tela, y se añade:

Jarabe simple. 32
 Agua de flor de naranjo. 4

Se tomará á las siete ú ocho horas de preparada, porque si no se espesa mucho. Cuando se haya de tomar en distintas veces, se pondrán doscientas veinte partes de agua en lugar de ochenta.

6668. P. PURGANTE Y DIURÉTICA (*Tessier*).

℥ Agua de tilo. ℥jv (125 gr.).
 Aguardiente aleman. ℥j (30 gr.).
 Vino de cólchico. ℥j (30 gr.).
 Jar. de espino serval. ℥j (30 gr.).
 Tártaro emético. ḡv (25 cent.).

H. S. A. I. Paraplegia. *D.* En tres tomas por la mañana en ayunas de media en media hora.

6669. P. PURGANTE CON JALAPA.

℥ Polvo de jalapa. ℥β á ℥β (6 dec. á 2 gr.).

Jarabe de flor de melocoton,
 Agua comun, āā. ℥j (30 gr.).
 Agua de azahar,
 ó Agua de yerbabuena,
 ó Agua de cidra. ℥j (4 gr.).

Se tritura en un mortero el polvo de jalapa con el jarabe, y se añade el agua. Se agita la botella al tomar la poción.

6670. P. PURGANTE DE MANÁ.

℥ Sen. ℥jβ (6 gr.).
 Sulfato de sosa. ℥β (15 gr.).
 Maná. ℥ij (60 gr.).
 Agua hirviendo. ℥iij (90 gr.).

H. S. A. D. Se toma de una ó dos veces.

6671. P. PURGANTE PARA LOS NIÑOS.

℥ Magnesia calcinada. ℥β (2 gr.).
 Ruibarbo en polvo. ḡvj (3 dec.).
 Azúcar blanca. ℥j (4 gr.).
 Esencia de menta. 6 gotas.
 Agua. ℥jβ (45 gr.).

M. D. Una cucharadita de café cada dos horas.

6672. P. PURGANTE QUERMETIZADA.

℥ Quermes mineral. ḡiij (15 cent.).
 Infusion de borraja. ℥x (300 gr.).
 Semillas de anís. una pulgarada.
 Maná. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. I. Afecciones comatosas, apoplejía. *D.* A cucharadas con frecuencia.

6673. P. PURGANTE CON RESINA DE JALAPA ó *Looc purgante*.

℥ Emulsion azucarada. ℥iij (90 gr.).
 Resina de jalapa. ḡxij (6 dec.).
 Aceite de alm. dulces. ℥j (12 dec.).
 Goma tragacanto. ḡvj (3 dec.).

Se trituran en un mortero la resina de jalapa y el aceite, se añade la goma tragacanto y c. s. de emulsion para formar el mucílago, se mezclan exactamente, y se añade el resto de la emulsion.

6674. P. PURGANTE DE RUIBARBO.

℞ Ruibarbo. ℥β (15 gr.).
 Agua. ℥v (150 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade:
 Jarabe de achicorias
 compuesto. ℥j (30 gr.).
 D. De una vez.

6675. P. PURGANTE DE TAMARINDOS.

℞ Tamarindos. ℥j (30 gr.).
 Sen. ℥ij (8 gr.).
 Sulfato de sosa. ℥β (15 gr.).
 Eleosácaro de limon. . . c. s.
 Agua. ℥v (150 gr.).

Se diluyen los tamarindos en el agua y despues de algunos hervores se añade el sen y el sulfato de sosa; se deja infundir de media á una hora, se cuele con ligera expresion y se aromatiza con el eleosácaro.

6676. P. PURGANTE Y TÓNICA (Roucher).

℞ Tamarindos. ℥j (30 gr.).
 Sándalo cetrino. ℥j (4 gr.).
 Maná. ℥ijβ (75 gr.).
 Tintura acuosa de ipecacuana preparada con seis granos. ℥j (30 gr.).

H. S. A. I. Disenterias crónicas y biliosas, cuando hay atonía de los intestinos.

6677. P. PURGANTE Y VERMÍFUGA (Macartan).

℞ Agua de menta piper. ℥ijj (90 gr.).
 Aceite de ricino. ℥ij (60 gr.).
 Jarabe de culantrillo. ℥β (15 gr.).
 Carbonato de potasa. . . ℥j (12 dec.).

Se trituran en un mortero de vidrio la sal y el aceite, se añade el jarabe, se mezcla bien y se extiende en el agua de yerbabuena. D. Se toma en dos veces con media hora de intervalo.

6678. P. QUERMETIZADA.

℞ Quermes mineral. ℥j (5 cent.).

Goma tragacanto. ḡx (5 dec.).
 Agua. ℥jv (16 gr.).
 M. I. Se usa como expectorante.

D. A cucharadas.

6679. Otra, n. 2.

℞ Goma trag. en polvo. ḡxviiij (4 gr.).
 Quermes mineral. ḡij (4 dec.).
 Se tritura con
 Jarabe de Tolú. ℥jβ (45 gr.).

Se añade:

Infusion de hisopo. . . ℥vj (180 gr.).
 I. Es expectorante. D. A cucharadas de hora en hora.

6680. P. QUERMETIZADA CONTRAESTIMULANTE.

℞ Poción gomosa. ℥jv (125 gr.).
 Quermes. ḡxviiij (4 gr.).

M. I. Se usa como contraestimulante. D. Una cucharada de hora en hora.

6681. Otra, n. 2.

℞ Infusion de hojas de naranjo. 200
 Goma tragacanto. 4
 Quermes mineral. 2
 Jarabe simple. 20
 Jarabe diacodion. 20

M. D. A cucharadas de hora en hora.

6682. P. DE QUARIN CONTRA LA TOS SOFOCATIVA.

℞ Ojimiél escilitico,
 Aceite de almendras dulces,
 Jar. de malvab., añ. ℥x (40 gr.).
 Goma amoniaco. ℥j (4 gr.).
 Yema de huevo. c. s.

Despues de haber triturado bien estas sustancias se añade:

Agua de hisopo. ℥vj (192 gr.).
 D. ℥j (30 gr.) cada tres ó cuatro horas.

6683. P. DE QUASIA.

℞ Extracto de quasia. ℥ijβ (10 gr.).
 Colombo. ḡxc (5 gr.).
 Carbonato de sosa. ℥β (2 gr.).
 Vino de Málaga. ℥vj (180 gr.).

Jarabe de canela. . . . ℥j℔ (45 gr.).
 H. S. A. I. Dispepsia, vómitos espasmódicos, escorbuto, diarrea atónica, disenteria. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6684. P. DE QUINA (H. M. F.).

℥ Quina. ℥ij℔ (10 gr.).
 Jarabe simple. ℥j (30 gr.).
 Alcoholado de canela. ℥xc (5 gr.).
 Se hierve ligeramente la quina y se la infunde después en c. s. de agua para obtener ℥iij (90 gr.) de líquido colado. Se cuela y se añade el jarabe.

I. Es tónica y estimulante en el período adinámico de las calenturas tifoideas.

La POCION DE QUINA ALCANFORADA se prepara añadiendo á la anterior ℥xc (5 gr.) de alcanfor. *I.* Período pútrido de las calenturas tifoideas.

Para preparar la POCION DE QUINA ETÉREA se añade á la pocion de quina ℥℔ (2 gr.) de licor de Hoffmann. *I.* Es antiespasmódica y tónica.

La POCION DE QUINA OPIADA se prepara añadiendo ℥j℔ (6 gr.) de alcoholado de opio. *I.* Tónica y calmante, que conviene en las afecciones intermitentes ligeras.

6685. P. DE QUINA Y CANELA (Frank).

℥ Extracto de quina. . . ℥iij (12 gr.).
 Cocimiento de quina. ℥ij℔ (75 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Alcoholato de canela. ℥j (30 gr.).
 Jarabe de adormider. ℥℔ (15 gr.).
M. I. Escorbuto. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6686. P. DE QUINA COMPUESTA.

℥ Infusion de quina. . . ℥jv (125 gr.).
 Agua destilada de yerbabuena,
 Agua destilada de canela, ña. ℥℔ (15 gr.).
 Jarabe de quina. . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Calenturas adinámicas. Se puede añadir extracto de quina y acetato de amoniaco. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6687. P. DE QUININA CONTRA LAS NEURALGIAS (Hermel).

℥ Julepe gomoso. ℥jv (125 gr.).
 Sulfato de quinina. . . ℥j (4 gr.).
 Acido sulfúrico. 4 á 4 gotas.
 Jarabe simple. c. s.

Se toma al fin del acceso, cuando son muy próximos, ó en su intervalo en cuatro tomas.

Si persisten algunos síntomas, se tomará una infusion de café tostado después de comer.

Si esta pocion no bastase, se deberá añadir ℥℔ á ℥j (2 á 4 gr.) de extracto de quina.

6688. P. DE QUININA ARSENICAL (Boudin).

℥ Sulfato de quinina. . . ℥xij (6 dec.).
 Agua destilada. ℥j (30 gr.).
 Acido sulfúrico. 2 gotas.

Se añade ;

Soluc. arsenical de Boudin ℥ij (60 gr.)
 que representa un octavo de grano de ácido arsenioso.

Se usa cuando el sulfato de quinina y el ácido arsenioso no han podido cortar una fiebre intermitente. *D.* De una vez, una á cinco horas antes del acceso.

6689. P. DE RAIZ DE ESPIGELIA.

℥ Raiz de espigelia. . . . ℥ij (8 gr.).
 Maná en lágrimas. . . ℥ij (60 gr.).
 Agua hirviendo. ℔j (500 gr.).
 Se infunde.

I. Lombrices. *D.* En tres tazas al dia. Conviene usar al mismo tiempo lavativas de cocimiento de almidon, hervido con el de espigelia.

6690. P. DE RATANIA.

℥ Ratania. ℥vj (24 gr.).
 Agua. ℔j (500 gr.)
 que se reduce á la mitad y se añade:
 Extracto de ratania. . ℥iij (12 gr.).

Jarabe de canela. . . ℥j (32 gr.).

I. Diarrea crónica, disenteria, hemorragia, aborto. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6691. P. DE RESINEONA.

℥ Aceite de resineona,
Jarabe de Tolú,
Jarabe de violetas, āā. ℥℔ (15 gr.).
Agua de amapola. . . ℥iij (90 gr.).
Goma tragacanto. . . ℥℔ (6 dec.).
H. S. A. D. ℥℔ (15 gr.) en una poción de ℥jv á ℥vj (125 á 180 gr.).

6692. P. RESOLUTIVA.

℥ Acetato de potasa. . . ℥xc (5 gr.).
Ojimiél escilitico. . . ℥j (30 gr.).
Extracto de quina,
Extr. de cicuta, āā. ℥jx (50 cent.).
Jar. de las cinco raic. ℥ij (60 gr.).
Agua de hinojo,
Agua de enebro, āā. ℥j℔ (45 gr.).
M. I. Atrofia mesentérica, obstrucciones de las vísceras abdominales, hidropesía. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6693. Otra (HEIN).

℥ Acetato de potasa. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.).
Extracto de cicuta. . . ℥jv (2 dec.).
Agua. ℥iij (90 gr.).
Jarabe de amapolas. . . ℥j (30 gr.).
M. I. Se usa con buen éxito en el principio de la atrofia mesentérica. *D.* Cuatro cucharaditas al día.

6694. P. DE RIVERIO ETÉREA.

℥ Jarabe de limón. ℥j (30 gr.).
Zumo de limón. ℥℔ (15 gr.).
Agua de azahar. ℥℔ (15 gr.).
Agua de tila. ℥ij (60 gr.).
Láudano líquido. 12 gotas.
Eter sulfúrico. 12 gotas.
Bicarbonato de potasa. ℥℔ (2 gr.).

Se pesan en la botella el jarabe de limón, el zumo, las aguas destiladas, el vino de opio y el éter; se añade el bicarbonato alcalino y se tapa al instante.

6695. P. DE ROBERTO TOMAS DE SALISBURY.

℥ Acet. de plomo crist. ℥iij (15 cent.).
Agua de rosas. ℥ij (60 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jarabe de violetas. . . ℥ij (8 gr.).
I. Coqueluche. *D.* Una cucharadita cada cuatro horas.

6696. P. DE SALEP.

℥ Cocimiento de salep. ℥iij (96 gr.).
Infusion de ruibarbo. ℥ij℔ (40 gr.).
Jarabe de canela,
Jarabe diacodion,
Ag. de laurel real. āā. ℥v (20 gr.).
M. I. Diarrea atónica, disenteria crónica. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6697. P. SALINA (H. M.).

℥ Sulfato de magnesia. ℥j (30 gr.).
Agua comun. ℥xij (375 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jarabe simple. ℥ij (60 gr.).
D. En tres tomas.

6698. P. SALINA PURGANTE.

℥ Tartrato de potasa y
sosa. ℥vj (24 gr.).
Tártaro emético. ℥j (5 cent.).
Agua de flores de nar. ℥ij (8 gr.).
Jarabe de miel. ℥j (32 gr.).
Agua. ℥ij (64 gr.).
M. D. A cucharadas con diferentes intervalos como purgante.

6699. P. SATURNINA OPIADA (Ritther).

℥ Acetato de plomo. . . ℥iij (15 cent.).
Láud. de Sydenham. ℥j (12 dec.).
Agua de cerezas ne-
gras. ℥v (150 gr.).
Jarabe simple. ℥℔ (15 gr.).
M. I. Neumonías agudas. *D.* Una cucharada cada dos, cuatro ó cinco horas. Cuando es muy activa la circulación conviene reemplazar el agua de cerezas negras por una infusion de digital, preparada

con \mathfrak{ij} (8 gr.) de hojas por \mathfrak{v}
(150 gr.) de agua.

6700. P. SEDANTE.

\mathfrak{z} Extracto de zumo de-
purado de belladon. \mathfrak{ij} (5 cent.).
Agua dest. de lechuga. \mathfrak{iiij} (90 gr.).
Jarabe de Tolú. . . . \mathfrak{j} (30 gr.).
M. I. Coqueluche. *D.* Se toma á
cucharadas de hora en hora.

6701. Otra (F. BA.).

\mathfrak{z} Semillas de beleño. . . \mathfrak{xx} (10 dec.).
Almendras dulces. . . \mathfrak{ij} (8 gr.).
Agua. \mathfrak{iv} (125 gr.).
Se hace una emulsion y se cue-
la.
I. Asma y catarros. *D.* A cucha-
radas.

6702. Otra (FOQUIER).

\mathfrak{z} Polvo de digital. . . . \mathfrak{iv} (2 dec.).
Extracto de Saturno. . . 5 gotas.
Jar. de flor de naranj. \mathfrak{j} (30 gr.).
Se tritura todo en un mortero
de vidrio y se añade poco á poco:
Infusion de amapola. . . \mathfrak{vj} (180 gr.).
D. Se usa á cucharadas al dia en
los casos de hipertrofia del cora-
zon. Se agitará la botella al tiem-
po de tomar la pocion.

6703. Otra (HENKE).

\mathfrak{z} Extracto de quina. . . \mathfrak{j} (4 gr.).
Agua dest. de hinojo. $\mathfrak{j\beta}$ (45 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jar. de cáscara de nar. \mathfrak{j} (30 gr.).
Láudan. de Sydenham. $\mathfrak{xxviiij}$ (4 gr.).
Eter sulfúr. alcohol. \mathfrak{j} (4 gr.).
I. Ultimo período de la coque-
luce, cuando predomina la de-
bilidad. *D.* Una cucharada de café
cada hora á los niños de cuatro á
diez años.

6704. Otra (H. DE IT.).

\mathfrak{z} Extracto de beleño. . . \mathfrak{v} (25 cent.).
Agua de lechuga. . . \mathfrak{iiij} (90 gr.).
Jarabe simple. . . . $\mathfrak{\beta}$ (15 gr.).
M. D. A cucharadas en el dia.

6705. Otra (RICHTER).

\mathfrak{z} Acetato de amoniaco. \mathfrak{vj} (24 gr.).
Extr. de cardo santo. \mathfrak{j} (4 gr.).
Tintura de opio. . . . 8 gotas.
Agua de saúco. \mathfrak{iv} (125 gr.).
M. I. Catarro pulmonar con tos
seca. *D.* A cucharadas de hora en
hora.

6706. Otra (SUNDELIN).

\mathfrak{z} Agua destilada de men-
ta piperita. \mathfrak{v} (150 gr.).
Jarabe de malvabisco. $\mathfrak{j\beta}$ (45 gr.).
Borato de sosa. $\mathfrak{j\beta}$ (6 gr.).
Láudan de Sydenham. $\mathfrak{\beta}$ (2 gr.).
H. S. A. I. Cólico saturnino. *D.*
Una cucharada cada dos horas.

**6707. P. SEDANTE ACEITOSA
(Jahn).**

\mathfrak{z} Agua de cal. \mathfrak{iiij} (90 gr.).
Aceite de almendras dulces,
Jar. de adormider., ãã. \mathfrak{j} (30 gr.).
Goma arábica en polv. \mathfrak{j} (8 gr.).
Alcoholado de opio,
Yema de huevo, ãã. . . \mathfrak{j} (4 gr.).
M. I. Iscuria, estrangurria, dolo-
res provocados por los cálculos
urinarios. *D.* Una cucharada de
hora en hora.

**6708. P. SEDANTE AMONIAL
(Hecker).**

\mathfrak{z} Maná en lágrimas. . . \mathfrak{j} (30 gr.).
Agua de cerezas negr. \mathfrak{iiij} (90 gr.).
Tintura de amoniaco
anisada. $\mathfrak{\beta}$ (2 gr.).
M. I. Tos, tos espasmódica. *D.* A
cucharadas.

6709. P. SEDANTE DE DIGITAL.

\mathfrak{z} Infusion de digital. . . \mathfrak{iiij} (90 gr.).
Extr. gomoso de opio. \mathfrak{ij} (4 dec.).
Nitro. $\mathfrak{xxviiij}$ (4 gr.).
Jarabe de valeriana. $\mathfrak{j\beta}$ (48 gr.).
Acido cianhídrico . . . \mathfrak{jx} (50 cent.).
Agua de menta piper. \mathfrak{iv} (20 cent.).
M. I. Asma, aneurisma, cardio-
palmia, palpitations de corazon,

esplenitis, plétora, carditis, neumonía aguda, enfisema, hemotisis, gastralgia. *D.* A cucharadas de café de hora en hora.

6710. P. SEDANTE EMULSIVA
(*Rothamel*).

℥ Semillas de lechuga cultivada. ℥j (4 gr.).
Agua destilada de cerezas negras. ℥jv (125 gr.).
H. S. A. una emulsion, se cuele y se añade:
Tridacio. ℥xv (75 cent.).
Jarabe de adormid. ℥iij (12 gr.).
I. Gastritis, cuando las arcadas y los vómitos persisten á pesar de las evacuaciones alvinas. *D.* Al principio una cucharada cada media hora, y mas tarde solo de hora en hora.

6711. P. DE SIMARUBA OPIADA
(*Lemarchand*).

℥ Corteza de simaruba. ℥j (4 gr.).
Agua. ℥xij (375 gr.).
Se hierve hasta que se reduzca á la mitad y se añade:
Láud. de Sydenham. ℥vij (35 cent.).
H. S. A. I. Disenteria de los países cálidos. El régimen debe constar de carne de pollo, huevos frescos y pescados. Se usará por bebida el agua ferruginosa y un poco de vino á las comidas. *D.* En dos tomas por la mañana en ayunas.

6712. P. DE SPIELMANN.

℥ Agua destilada de yerbabuena,
Agua destilada de manzanilla, ãã. ℥ij (60 gr.).
Jarabe de flores de amapola,
Jar. de manzanilla, ãã. ℥ß (15 gr.).
H. S. A. D. Una cucharada de café cada cuarto de hora.

6713. P. DE STHAL.

℥ Sal de amoniaco. . . ℥ij (8 gr.).

Agua destilada. ℥vj (180 gr.).
Jarabe de altea. ℥j (30 gr.).
D. Media cucharada cada dos horas contra la escarlatina nerviosa ó atáxica, escarlatina grave.

6714. P. DE STEARNS.

℥ Cornezuelo de centen. ʒß (2 gr.).
Agua. ℥vj (180 gr.).
Se infunde.
I. Partos laboriosos por inercia de la matriz. *D.* Una cucharada de café cada diez minutos.

6715. P. DE STUETZ CONTRA EL TÉTANOS.

℥ Carbonato de potasa. . ℥iij (12 gr.).
Agua de manzanilla. . ℥iij (96 gr.).
Agua de canela. ℥iij (96 gr.).
Jarabe de amapolas. . ℥j (32 gr.).
M. D. Una cucharada cada tres horas.

Nota. Media hora despues de tomar una cucharada se dan de cinco á quince gotas de tintura de opio.

Stuetz auxilia la accion de estos medios con lavativas de agua de jabon, á las cuales añade de ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) de carbonato de potasa, y hace tomar al enfermo dos baños diarios de agua caliente, en la cual disuelve de ℥j á ℥jß (30 á 45 gr.) de potasa cáustica. Se puede reemplazar los baños por aplicaciones continuas sobre el bajo vientre, de una franela empapada en una solucion de cerca de ʒß (2 gr.) de potasa cáustica en ℔j (500 gr.) de agua de jabon.

6716. P. SUCINADA.

℥ Aceite de sucino. . . ℥j (4 gr.).
Tint. de báls. de Tolú. ℥ij (8 gr.).
Jarabe de goma. . . . ℥j (30 gr.).
Agua. ℥jv (125 gr.).
H. S. A. I. Asma, bronquitis, catarro crónico, gota, parálisis, tétanos, histérico, íleo. *D.* Una cucharada de dos en dos horas.

6717. P. DE SUCINATO DE AMONIACO.

℥ Sucinato de amoniaco. ℥j (4 gr.).
 Jarabe diacodion. . . . ℥ij (60 gr.).
 Agua de ruda,
 Ag. de flor de nar., ãã. ℥iij (90 gr.).
M. I. Asma, coqueluche, tos, espasmos, envenenamiento, tétanos, histérico, parálisis, neumonía, pleuresia, muermo. *D.* A cucharadas:

6718. P. SUDORÍFICA (Remer).

℥ Amoniaeo líquido,
 Eter sulfúrico, ãã. . . ℥ijß (40 gr.).
 Agua de menta piper. ℥v (150 gr.).
 Jarabe de canela. . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Sifilis, sífilides, mordeduras de animales venenosos, hidrofobia, tétanos, reumatismo, parálisis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6719. P. SUDORÍFICA AMONIACAL.

℥ Acetato de amoniaco. ℥ß (45 gr.).
 Vino tinto. ℥v (150 gr.).
 Tintura de canela. . . ℥ijß (40 gr.).
 Jarabe de quina. . . . ℥jß (45 gr.).
M. I. Flegmasias, neumonía, pleuresia crónica, catarro crónico con adinamia, blenorragia, absceso, reumatismo, sifilis, sífilides, neumatosis. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6720. Otra, n. 2.

℥ Agua de canela. . . . ℥ij (60 gr.).
 Jarabe de azafran. . . . ℥j (30 gr.).
 Carbonato de amoniaeo. ℥xc (5 gr.).
 Tintura de pimienta de la Jamáica. ℥ß (15 gr.).
M. I. Envenenamiento, sifilis, sífilides, catarro crónico, embriaguez, reumatismo, parálisis, pasmo, supresion de la traspiración, atonía del conducto digestivo, úlceras atónicas, astenia. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6721. P. SUDORÍFICA ANTIMONIADA.

℥ Cocimiento de zarzaparrilla. ℥iij (96 gr.).
 Vino estibiado. . . . ℥ijß (40 gr.).
 Acetato de amoniaco. ℥j (32 gr.).
 Rob de saúco. ℥ß (46 gr.).
M. I. Parálisis, tétanos, reumatismo agudo y crónico, repercusión ó erupción difícil de los exantemas agudos, sifilis, sífilides. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6722. P. DE SULFATO DE QUININA.

℥ Sulfato de quinina. . . ℥xij (6 dec.).
 Agua. ℥jv (125 gr.).
 Acido sulfúrico alcoholizado. algunas gotas para disolver el sulfato de quinina.
 Jarabe simple,
 Jarabe diaeodion, ãã. ℥ß (15 gr.).
M. D. Se toma en dos veces con una hora de intervalo.

6723. Otra, n. 2.

℥ Agua destilada de lechuga. ℥iij (90 gr.).
 Agua destilada de canela. ℥jv (45 gr.).
 Sulfato de quinina. . . ℥xij (6 dec.).
 Jar. de cáse. de nar. ℥j (30 gr.).
H. S. A. D. De cuatro á ocho cucharadas al dia con dos horas de intervalo.
Nota. Se puede reemplazar ventajosamente el sulfato de quinina por ℥ij á ℥jv (8 á 16 gr.) de alcohol de quinina.

6724. Otra, n. 3.

℥ Sulfato de quinina. . . ℥x (50 cent.).
 Jarabe de aleanfor,
 Jarabe de acetato de morfina,
 Agua de lechuga,
 Agua de flor de naranjo,
 Agua de melisa, ãã. ℥j (30 gr.).
M. I. Apirexia de las calenturas intermitentes, sudor inglés, gangrena, gangrena de hospital, escorbuto, esplenalgia, hemicránea,

hemotisis, hipo, reumatismo, ceática, gota, neuralgia, muermo.

6725. P. DE SULFATO DE QUININA
(H. DE AMÉR.).

℞ Sulfato de quinina. . . ℥xij (6 dec.).
Agua de canela. ℥ijβ (75 gr.).
Acido sulfúr. diluido. 10 gotas.
Jar. de cáscara de nar. ℥j (30 gr.).
M. I. V. la anterior. D. Una cucharadita de café de hora en hora.

6726. P. DE TANINO.

℞ Tanino. ℥xviiij (4 gr.).
Agua alcanforada. . . ℥jv (125 gr.).
Jarabe de extracto de ratania,
Jarabe vinoso de azafra, añ. ℥j (30 gr.).
M. I. Diarrea atónica, hemotisis, blenorrea, leucorrea, hemorragias, metrorragia, úlceras atónicas, envenenamiento.

6727. P. TÓNICA.

℞ Acetato de amoniaco. . . ℥j (4 gr.).
Agua de goma. ℥iiij (90 gr.).
Jarabe simple,
Miel escilitica, añ. ℥j (30 gr.).
Agua de flores de naranjo,
Extracto de quina, añ. ℥ij (8 gr.).
M. D. A cucharadas.

6728. Otra, n. 2.

℞ Acetato de amoniaco. . . ℥β (15 gr.).
Agua de canela,
Agua etérea alcanf., añ. ℥ij (60 gr.).
Tintura de quina. . . . ℥ij (8 gr.).
Eter. ℥β (2 gr.).
Jarabe de claveles. . . ℥j (30 gr.).
M. I. Calenturas graves complicadas con flegmasias del pulmon, calentura héctica, calentura atáxica, adinámica ó tifoidea, úlceras asténicas, tifo, diarrea, dispepsia. D. A cucharadas de hora en hora.

6729. Otra, n. 3.

℞ Jarabe de geneiana,
ó Jarabe de quina,
ó Jarabe de Tolú. ℥j (30 gr.).

Tintura de quina,
ó Extracto de quina. . . ℥ij (8 gr.).
Agua de camedrios. . . ℥jv (125 gr.).
M. D. Una cucharada de hora en hora.

6730. Otra (H. M.).

℞ Coeimiento de quina. lbβ (250 gr.).
Tintura alcohólica de canela. ℥j (4 gr.).
Acetato de amoniaco líquido. ℥ij (8 gr.).
Jar. de cort. de cidra. ℥ij (60 gr.).
M. D. Una cucharada cada hora.

6731. Otra (H. DE NIÑOS).

℞ Jarabe de quina. ℥j (30 gr.).
Alcohol de melisa: . . . ℥ij (8 gr.).
Poción gomosa. ℥jv (125 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora.

6732. Otra (H. DE P.).

℞ Jarabe de quina. ℥vj (24 gr.).
Alcohol de melisa compuesto. ℥ij (8 gr.).
Agua de menta piper. ℥j (32 gr.).
Agua comun. ℥iiij (96 gr.).
M. D. Una cucharada de hora en hora.

6733. Otra (LERMINIER).

℞ Agua de valeriana. . . ℥vj (180 gr.).
Agua de menta,
Agua de canela, añ. . . ℥j (30 gr.).
Extr. seco de quina. ℥ij (8 gr.).
Eter sulfúrico. ℥j (4 gr.).
Jarabe de claveles. . . ℥j (30 gr.).
M. I. Calenturas tifoideas ó adinámicas; con gran postracion de fuerzas. D. A cucharadas.

6734. Otra (JAHN).

℞ Angustura,
Flores de arnica, añ. ℥ijβ (10 gr.).
Agua hirviendo. ℥v (150 gr.).
Se cuece y se añade:
Vinagre,
Jarabe de naranja, añ. ℥j (30 gr.).

Goma arábica,
Tintura tebáica, ãã. . ʒj (4 gr.).

I. Diarreas crónicas, calenturas tifoideas, calenturas hécticas, tifo, úlceras atónicas, astenia, ataxia, dispepsia. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6735. P. TÓNICA (*Recamier*).

ʒ Raíz de angustura. . ʒʒ (15 gr.).

Se hierve en

Agua. ʒxx (625 gr.).

Se toma de este

Coeimiento. ʒvj (180 gr.).

Se añade:

Agua de canela. . . . ʒʒ (15 gr.).

Tintura de opio. . . . 20 gotas.

I. Casos en que hay que dar tono en las enfermedades acompañadas de debilidad considerable de las funciones digestivas. Se la puede endulzar con un jarabe. *D.* Tres cucharadas al día.

6736. Otra (*VOGT*).

ʒ Infusion de ruibarbo. ʒjʒ (6 gr.).

Extracto de cuerno de

ciervo. ʒij (24 dec.).

Agua de canela. . . . ʒjʒ (48 gr.).

Jarabe de opio. . . . ʒvjʒ (22 gr.).

M. I. Diarrea de los niños. *D.* Una cucharada de café de hora en hora.

6737. P. TÓNICA Y ASTRINGENTE.

ʒ Extracto de quina,

Tintura de canela, ãã. ʒʒ (2 gr.).

Jarabe de membrillos. ʒʒ (15 gr.).

Infusion de rosas rojas. ʒiij (90 gr.).

M. I. Diarreas crónicas, hemorragias pasivas.

6738. Otra (*WENDT*).

ʒ Quina roja quebran-

tada. ʒʒ (15 gr.).

Agua hirviendo. . . . ʒjv (125 gr.).

Se infunde, se cuele y se añade S. A.

Extracto de palo de

Campeche. ʒj (4 gr.)

Agua de canela,

Jarabe de flores de

naranja, ãã. ʒʒ (15 gr.).

M. I. Diarrea asténica, dispepsia de los niños. *D.* Una cucharada de café de hora en hora.

6739. P. TÓNICA Y ESTOMACAL.

ʒ Colombo. ʒij (8 gr.).

Agua hirviendo. . . . ʒʒʒ (250 gr.).

Se infunde, se cuele y se añade:

Láud. de Sydenham. 24 gotas.

Eter sulfúrico. 20 gotas.

M. I. Dispepsia y diarreas crónicas, etc. *D.* A cucharadas.

6740. P. TÓNICA Y EXCITANTE
(*Fiard*).

ʒ Infusion de café. . . . ʒjv (125 gr.).

Jarabe de quina. . . . ʒij (60 gr.).

Aacetato de amoniaeo. ʒʒ (15 gr.).

M. I. Narcotismo producido por el envenenamiento por el opio. *D.* Una cucharada cada media hora.

6741. P. TÓNICA Y OPIADA.

ʒ Extracto de quina. . . ʒij (8 gr.).

Extracto de opio ʒij (4 dec.).

Agua destilada de yerbabuena,

Agua destilada de ea-

nela, ãã. ʒij (60 gr.).

M. D. Una cucharada cada dos horas.

6742. P. TÓNICA DE MALATO DE
HIERRO.

ʒ Extracto de quina,

Extracto de genciana, ãã. ʒj (4 gr.).

Malato de hierro. . . . ʒʒ (2 gr.).

Agua de menta piperita,

Agua de manzanilla, ãã. ʒj (30 gr.).

Jarabe de flor de naranj. ʒv (20 gr.).

M. I. Escrófulas, amenorrea, caquexia, úlceras atónicas, bulimia, calentura héctica. *D.* Una cucharada cada tres horas.

6743. P. TÓNICA VERMÍFUGA.

ʒ Musgo de Córcega,

Canela, ãã. ʒij (8 gr.).

Acíbar. ʒ℔ (2 gr.).
 Jar. de cásc. de naranj. ʒj (30 gr.).
 Agua de menta piper. ʒiij (90 gr.).
M. I. Atonía del conducto diges-
 tivo, lombrices. *D.* Una cucharada
 de hora en hora.

6744. P. DE TREMENTINA.

ʒ Trementina. ʒij℔ (10 gr.).
 Yema de huevo. . . . número 1.
 Se tritura y se añade:
 Extracto de ruibarbo,
 Sal prunela, ãã. . . . ʒxc (5 gr.).
 Se vierte despues poco á poco:
 Infusion de regaliz. . ʒx (300 gr.).
 Jarabe de malvabisco. ʒj (30 gr.).
M. I. Blenorragia, leucorrea,
 reumatismo, ceática, beriberi. *D.*
 A cucharadas de hora en hora.

6745. P. TREMENTINADA CONTRA LA TÊNIA ó Remedio contra la ténia (Levacher).

ʒ Aceite de ricino. . . . ʒij (60 gr.).
 Esencia de trementina. ʒ℔ (15 gr.).
 Agua de menta. . . . ʒij (60 gr.).
 Jarabe simple. . . . ʒj (30 gr.).
 Goma arábiga. . . . ʒij℔ (10 gr.).
M. D. De una vez por la mañana
 en ayunas.

6746. P. TREMENTINADA (Debreyne).

ʒ Agua de lechuga. 480
 Goma arábiga. 45
 Esencia de trementina. 25
 Jarabe simple. 60
M. I. Ceática. *D.* Tres cucharadas
 al dia, en union de la pomada
 del mismo autor.

6747. P. DE TRIDACIO.

ʒ Tridacio. ʒxij (6 dcc.).
 Infusion de amapola. ʒjv (125 gr.).
 Jarabe simple. . . . ʒj (30 gr.).
D. Se toma á cucharadas de ho-
 ra en hora.

6748. P. DE TRUSEN CONTRA LAS HIDROPESIAS.

ʒ Elixir ácido de Haller. ʒij℔ (10 gr.).

Agua comun. ʒvj (180 gr.).
 Ojimiél escilitico. . . ʒj℔ (45 gr.).
M. S. A. I. Hidropesía no soste-
 nida por lesion orgánica de los
 órganos de la respiracion ó des-
 organizacion considerable del hi-
 gado. *D.* Una cucharada cada dos
 horas.

6749. P. DE VAINILLA (Hersokmann).

ʒ Vainilla. ʒxc (5 gr.).
 Agua. ʒv (150 gr.).
 Se infunde y se añade:
 Jarabe de canela. . . . ʒj (30 gr.).
H. S. A. I. Calenturas nervio-
 sas, en que está indicada la vai-
 nilla; calentura adinámica acom-
 pañada de síntomas histéricos,
 despues de haber combatido los
 síntomas de gastritis y conges-
 tion. Se administra la vainilla a-
 sociándola á cortas dosis de cas-
 tóreo, en las calenturas adinami-
 cas que agotan las fuerzas de las
 personas ancianas y delgadas; en
 las calenturas adinámicas que es-
 tán acompañadas de evacuaciones
 colicuativas ó menos abundantes,
 y especialmente en la debilidad
 que se parece al síncope no inter-
 rumpido, que es la consecuencia
 de la sangría practicada sin sufi-
 ciente indicacion, ó contraindi-
 cada, y en este último caso obra
 de un modo sorprendente, princi-
 palmente si se la asocia al opio. *D.*
 A cucharadas.

6750. P. DE VALERIANATO DE ZINC (Devay).

ʒ Agua destilada. . . . ʒjv (125 gr.).
 Valerianato de zinc. . ʒij (1 dcc.).
 Jarabe simple. . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Es antiespasmódica. *D.*
 Una cucharada cada media hora.

6751. P. VERMÍFUGA.

ʒ Santónico. . . . ʒij℔ (10 gr.).
 Agua. ʒiij y ʒj (100 gr.).

Se infunde, se cuele y se añade:

Jarabe vermífugo de Boullay,
ó Jarabe de cáscara
de naranja. . . ℥j (30 gr.).

D. Se toma de una vez por la mañana en ayunas.

6752. P. VERMÍFUGA (n. 2).

℥ Agua hirviendo. . . ℥jv (125 gr.).
Zumo de limon. . . . ℥j (30 gr.).
Agua de flor de nar. . . ℥℞ (15 gr.).
Musgo de Córcega. . ℥j (4 gr.).

Se hierve durante ocho minutos el musgo de Córcega, y se añaden las demás sustancias al líquido colado frío.

D. Se toma de una sola vez por la mañana en ayunas.

Nota. Se debe continuar el uso de esta poción durante tres ó cuatro días.

6753. Otra, n. 3.

℥ Ajenjo marino. . . . ℥̄xc (5 gr.).
Agua. ℥̄iij (90 gr.).
Jarabe vermífugo . . . ℥j (30 gr.).

D. En dos veces.

6754. Otra, n. 4.

℥ Coralina de Córcega. ℥jv (125 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (180 gr.).
Se infunde, se cuele y se añade:
Jarabe de miel. . . . ℥j (30 gr.).

M. D. De una vez.

6755. Otra (STOLL).

℥ Extr. de cásc. de nuez. ℥ij (8 gr.).
Agua de canela. . . . ℥℞ (16 gr.).

M. D. Cincuenta gotas dos ó tres veces al día, á los niños de tres á cuatro años.

6756. P. VERMÍFUGA DE ESENCIA DE TREMENTINA.

℥ Esencia de trementina,
Ag. dest. de menta, ãã. ℥iij (90 gr.).
Jarabe de artemisa. . . ℥j (30 gr.).
Yema de huevo. . . . núm. 1.

M. I. Ténia. D. En cuatro dosis de hora en hora.

6757. P. VERMÍFUGA PURGANTE.

℥ Sen. ℥ij (8 gr.).
Musgo de Córcega. . . ℥j (4 gr.).
Limon en rajadas. . . . núm. 1.
Maná. ℥ij (60 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (180 gr.).

Se cuele á las doce horas de infusion.

6758. P. VINOSA DE ÉNULA CAMPANA (H. DE AL.).

℥ Tint. de énula camp. . ℥j (4 gr.).
Vino blanco. ℥vj (180 gr.).
Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Hidropesías. D. A cucharadas.

6759. P. VOMITIVA.

℥ Emético. ℥̄j (5 cent.).
Jarabe de flor de nar. ℥j (30 gr.).
Agua destilada de tilo. ℥v (150 gr.).

H. S. A. D. En dos dosis por la mañana en ayunas. Se puede reemplazar el emético por ℥̄xx (1 gr.) de ipecacuana ó ℥̄j (5 cent.) de emetina impura, ó bien si el enfermo vomita con dificultad se añadirá á esta poción ℥̄vj á ℥̄x (3 á 5 dec.) de ipecacuana ó ℥̄℞ (25 mil.) de emetina impura.

6760. Otra, n. 2.

℥ Emético. . . ℥̄j á ℥̄iij (5 á 15 cent.),
ó Ipecacuana en polvo, ℥̄xx á ℥̄xxjv (10 á 12 dec.).

Se tritura en

Agua destilada,
ó Agua de manzanilla,
ó Agua de menta. . . . ℥̄xij (375 gr.).

D. En tres tomas con media hora de intervalo. Se facilitan los primeros vómitos haciendo beber mucha agua tibia, y se continúa dándola en los intervalos de los vómitos.

6761. Otra, n. 3.

℥ Ipecacuana en polvo. ℥̄℞ (6 dec.).

Agua. ℥jv (128 gr.).
M. D. Se toma de una vez.

6762. P. VOMITIVA.

℥ Emético. ℥ij (4 dec.).
 Agua destilada de yer-
 babuena. ℥j℥ (45 gr.).
 Agua destilada. . . . ℥vj (180 gr.).
 Jarabe de ipecacuana. ℥j℥ (45 gr.).
H. S. A. D. En tres tomas con
 media hora de intervalo.

**6763. P. VOMITIVA DE MAGENDIE
 (F. P.).**

℥ Inf. de flor de tilo. . . ℥iij (90 gr.).
 Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
 Emetina pura, disuelta
 en c. s. de ácido acé-
 tico ó nítrico. . . . ℥j (5 cent.).
H. S. A. I. Una cucharada de
 cuarto en cuarto de hora hasta
 producir el vómito.

6764. Otra (HUFELAND).

℥ Tártaro emético. . . ℥j (5 cent.).
 Ipecacuana en polvo. ℥xv (75 cent.).
 Ojimiél escilítico. . . ℥℥ (45 gr.).
 Agua simple. . . . ℥ij (60 gr.).
M. D. Se toma en tres veces con
 diez minutos de intervalo.

6765. Otra (MAGENDIE).

℥ Emetina parda. . . . ℥jv (2 dec.).
 Inf. de hojas de nar. ℥iij (90 gr.).
 Se disuelve y se endulza con
 Jar. de flor. de naranjo. ℥v (20 gr.).
I. Catarros pulmonares, diar-
 reas crónicas, coqueluche. *D.* Una
 cucharada cada media hora.

6766. P. VOMITIVA COMPUESTA.

℥ Tártaro emético. . . . ℥j (5 cent.).
 Jarabe escilítico. . . . ℥j (30 gr.).

Agua de manzanilla. . . ℥ij (60 gr.).
 Tintura de ipecacuana. ℥℥ (15 gr.).
M. I. Crup, grippe, calenturas
 mucosas, embarazo gástrico, ac-
 ne; coqueluche. *D.* A cucharadi-
 tas de café de cuarto en cuarto de
 hora.

**6767. P. VOMITIVA CON
 EMÉTICO.**

℥ Tártaro emético. . . ℥ij (4 dec.).
 Agua. ℥vij (210 gr.).
 Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).
M. D. En dos ó tres tomas con un
 cuarto de hora de intervalo.

**6768. P. VOMITIVA CON
 IPECACUANA.**

℥ Polvo de ipecacuana. ℥j (12 dec.).
 Agua. ℥vij (210 gr.).
 Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).
M. D. Para tomar en dos veces
 con un cuarto de hora de inter-
 valo.

6769. P. DE WENDT.

℥ Tartrato de potasa. . . ℥ij (8 gr.).
 Nitrato de potasa. . . ℥℥ (2 gr.).
 Disuélvase en
 Cocimiento de cebada. ℥jv (125 gr.).
 Jarabe de moras. . . . ℥j℥ (45 gr.).
H. S. A. I. Calenturas tifoideas
 de los niños de cuatro á seis años.
D. A cucharadas de hora en hora.

6770. P. DE ZINCATER.

℥ Eter cincado. ℥xviii (4 gr.).
 Jarabe de valeriana. . ℥j (30 gr.).
 Agua de flor de naranjo,
 Ag. de laurel real, añ. ℥j℥ (45 gr.).
M. I. Neurosis, convulsiones
 tétanos, epilepsia, corea. *D.* Una
 cucharada de hora en hora.

POLVOS.

6771. POLVO ABSORBENTE.

℥ Magnesia calcinada. . ℥xvj (8 dec.)

Canela. ℥ij (4 dec.).
 Mézclase y dividase en dos pa-
 peles.

I. Diarreas en los niños por formación de ácido en las primeras vias. *D.* En dos tomas al día.

6772. P. ABSORBENTES.

℥ Harina de centeno. 1
Harina de altramuces. 2

M. I. Erisipela, eritema, cáncer. Se espolvorea la parte. *I.* Vómitos. Se aplica al epigastrio.

6773. Otro (BRERA).

℥ Carbonato de cal. ḡvj (3 dec.).
Magnesia. 3β (15 gr.).
Colombo. 3βjx (50 cent.).
Ruibarbo. 3βiij (15 cent.).
Quina. ḡxviiij (1 gr.).

M. I. Dispepsia, neumatosis, tialismo, pirosis, acidez de las primeras vias, vómitos. *D.* 3β (2 gr.) tres veces al día.

6774. Otro (TODE).

℥ Polvo de quasia. ḡxc (5 gr.).
Magnesia. 3β (15 gr.).

M. I. Neumatosis, vómitos, dispepsia, acidez de las primeras vias, gangrena de hospital, tialismo. *D.* Una cucharada de café en un vaso de agua.

6775. P. ABSORBENTE Y ESTOMACAL.

℥ Magnesia comun,
Azúcar de leche, añ. 3ij (60 gr.).
Cascaquilla en polvo. 3ij (8 gr.).
Oleosácaro de hinojo. 3jβ (6 gr.).

M. I. Eructos agrios con debilidad de estómago. *D.* Una cucharada de café en medio vaso de agua azucarada, por la mañana, al mediodía y por la noche.

6776. P. ABSORBENTE MAGNESIANO.

℥ Magnesia calcinada. 1
Azúcar blanca pulverizada. 1

Se mezclan por trituración en un mortero, y se guardan en una vasija bien tapada. Este polvo se

debe preparar cuando se necesite. Se puede aumentar la cantidad del azúcar.

I. Acedías del estómago y envenenamiento por los ácidos. *D.* Contra las acedías de ḡxij á ḡxvj (6 á 8 dec.), y contra el envenenamiento la dosis que exijan.

6777. P. DE ACÍBAR.

℥ Acíbar. ḡvij (35 cent.).
Azúcar. 3j (4 gr.).
Hágase polvo fino.

I. Manchas en la córnea, cataratas. *D.* Se insufla en el ojo. *I.* Acne, amenorrea, clorosis, histérico, albuminuria. *D.* Se toma de una vez.

6778. P. DE ACÍBAR COMPUESTO (F. DE L.).

℥ Acíbar. 3jβ (45 gr.).
Resina de guayaco. 3j (30 gr.).
Polvo de canela comp. 3β (15 gr.).

Se pulverizan por separado el acíbar y la resina de guayaco, y despues se mezcla con el polvo compuesto.

6779. P. DE ACÍBAR COMPUESTO.

℥ Acíbar sucotrino,
Mirra,
Sulfato de hierro, añ. 3j (4 gr.).
Esencia de sabina. 12 gotas.
Azúcar. c. s.

para incorporar el aceite.

Divídase en doce papeles. *I.* Albuminuria, destete, catarata, amenorrea, clorosis, histérico. *D.* Un papel mañana y noche, incorporado con miel.

6780. P. DE ÁCIDO BENZÓICO ALCANFORADO.

℥ Alcanfor,
Acido benzóico, añ. ḡvj (3 dec.).
Opio. ḡij (1 dec.).
Azúcar. 3j (4 gr.).

M. I. Histérico, corea, cólera, dispepsia. *D.* En cuatro veces.

6781. P. DE ÁCIDO BENZÓICO
(*Sundelin*).

℥ Acido benzóico. ʒβ (2 gr.).
Alcanfor,
Azufre dorado de anti-
monio, añ. ʒvj (3 dec.).

Oleosácaro de hinojo. . . ʒj (4 gr.).

M. Háganse polvos y dividanse en seis partes iguales.

I. Catarros pulmonares crónicos, broncorreas, neumonía con síntomas tifoideos. *D.* Un papel cada hora con cocimiento de avena.

6782. P. DE ÁCIDO GÁLICO
(*Stevenson*).

℥ Acido gálico. ʒviiij (40 cent.).
Canela. ʒv (25 cent.).

Divídase en seis papeles.

I. Hematuria y hemorragia uterina. *D.* Un papel cada seis horas.

6783. P. DE ACÓNITO BORÁCICO
(*Fritze*).

℥ Extracto de acónito. . . ʒj (12 dec.).
Acido bórico. ʒβ (15 gr.).

Mézclese y dividase en doce tomas.

I. Neuralgia, principalmente la ceática, reumatismo muscular y fibroso. *D.* Una toma mañana y noche.

6784. P. AERÓFOROS
(*Hufeland*).

℥ Carbon. de magnes. ʒj (12 dec.).

Si se desea obtener mas efervescencia se añade :

Bicarbonato de sosa. ʒxv (75 cent.).

Acido tártrico,

Azúcar en polvo, añ. ʒj (12 dec.).

Háganse polvos que se toman en un vaso de agua en el momento de la efervescencia.

6785. P. AERÓFORO MARCIAL
(*Hufeland*).

℥ Magnesia comun. . . . ʒij (8 gr.).

Tártaro depurado. . . . 5jv (16 gr.).

Tartrato de hierro. . . ʒij (24 dec.).

H. S. A. D. Dos á tres cucharadas de café desleidas en agua y se toma durante la efervescencia.

6786. P. DE AGÁRICO BLANCO
(*F. F.*).

℥ Agárico blanco. c. s. q.

Se corta en pedazos, se deseca en la estufa, y se pulveriza por contusion sin dejar residuo, pasándolos por tamiz de seda.

I. y D. V. t. I, p. 69.

6787. P. DE AGÁRICO MERCURIAL.

℥ Agárico,

Oxido rojo de mer-

curio, añ. ʒxxviiij (4 gr.).

Azúcar blanca. . . . ʒβ (15 gr.).

M. I. Engrosamiento de la córnea. *D.* Se insufla un poco en el ojo.

6788. P. DE AGÁRICO OPIADO.

℥ Agárico. ʒviiij á ʒxxjv (4 á 12 dec.).

Extracto de opio. ʒijβ á ʒjvβ (12 á 22 cent.).

Goma arábica. ʒij (8 gr.).

Hágase polvo y dividase en seis papeles.

I. Sudores colicuativos de los tísicos. *D.* Un papel por la noche.

6789. P. DE AILHAUT.

℥ Escamonea. ʒj (4 gr.).

Hollin. ʒjβ (6 gr.).

Colofonia. ʒij (8 gr.).

I. Calenturas biliosas, embarazo gastro-intestinal, cólico metálico, hidropesía, ascitis. *D.* ʒβ á ʒjv (2 á 15 gr.) en ayunas como purgante drástico.

6790. P. DE ALCANFOR (F. F.).

℥ Alcanfor. c. s. q.

Se pone en un mortero de mármol, se rocía con alcohol rectificado hasta penetrarle bien, y se pulveriza por trituracion.

I. y D. V. t. I, págs. 74 y 75.

6791. P. ALCANFORADO.

℞ Alcanf. en polvo. ḡß á ḡj (2 á 5 cent.).
Goma en polvo,
Azúcar blanca, ãã. . . 3ß (2 gr.).
M. I. Síntomas adinámicos que se manifiestan en el curso de las calenturas eruptivas. *D.* Se da esta dosis cada dos horas en un vehículo.

6792. Otro (H. DE AL.).

℞ Alcanfor,
Acido benzóico, ãã. . . ḡvj (3 dec.).
Azúcar blanca. 3j (4 gr.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
D. Un papel cada tres horas.

6793. P. ALCANFORADO ANTIMONIADO (Mursinna).

℞ Alcanfor en polvo. . . 3ß (2 gr.).
Ipecacuana en polvo,
Azufre dor. de ant., ãã. ḡxij (6 dec.).
Azúcar blanca. 3vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en doce tomas.
I. Neumonía asténica. *D.* Un papel cada dos horas.

6794. P. ALIMENTICIO.

℞ Azúcar.	7500
Chocolate.	4000
Arrow root.	2000
Salep.	250
Café.	125
Canela.	480
Castañas tostadas.	1000
Manteca de cacao.	250

Hágase polvo.

6795. P. DE ALMIDON Y QUINA CON CANELA (Recamier).

℞ Alumbre. 3j (4 gr.).
Canela en polvo. . . . 3j (12 dec.).
Opio purificado. . . . ḡjv (2 dec.).
Hágase polvo S. A.
I. Metrorragia asténica. *D.* Una dosis cada cuatro horas.

6796. P. DE ALMIDON Y QUINA ALUMINOSO (Recamier).

℞ Almidon. 3x (40 gr.).
Quina en polvo. . . . 3xxv (100 gr.).
Alumbre en polvo. . . 3jv (16 gr.).
M. I. Cáncer atrófico ulcerado.
Retarda la marcha de la enfermedad aplicado tópicamente.

6797. P. DE ALMIZCLE ESTIBIO-MERCURIAL (J. P. Frank).

℞ Almizcle. ḡxx (10 dec.).
Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ãã. . . . ḡx (5 dec.).
Divídase en veinte papeles.
I. Neuralgia, especialmente la facial. *D.* Un papel, mañana y noche.

6798. P. ALTERANTE ó Polvos aromáticos rosados (F. M.).

℞ Rosas rojas bien limp. 3xv (60 gr.).
Palo álces,
Sándalo cetrino, ãã. . . 3iij (12 gr.).
Canela buena. 3xv (60 gr.).
Clavo de especia,
Macis, ãã. 3ijß (10 gr.).
Nuez moscada,
Cardamomo menor,
Raiz de galanga, ãã. . 3j (4 gr.).
Espinacardo. 3ij (26 dec.).
Háganse unos polvos muy sutiles.

I. Son muy corroborantes, muy digestivos, detienen los vómitos y diarreas, y excitan el apetito.

6799. P. ALTERANTE.

℞ Etiope antimonial,
Res. de guayaco, ãã. 3ß (6 dec.).
Magnesia,
Extracto de cicuta, ãã. ḡv (25 cent.).
Alcanfor. ḡij (1 dec.).
Azúcar. ḡxyiiij (1 gr.).
Divídase en quince papeles.

I. Discrasia reumática. *D.* Un papel tres veces al día.

6800. Otro (HUFELAND).

℞ Resina de guayaco. . . 3j (4 gr.).

Etiope antimonial,
Magnesia, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\mathcal{D}j$ (12 dec.).
M. I. Exantemas crónicos. *D.* Se toma en dos días.

6801. P. ALTERANTE (Sundelin).

\mathcal{R} Etiope antimonial. . . $\tilde{g}Lx$ (3 gr.).
Carbonato de sosa. $\tilde{g}XLjv$ (22 dec.).
Sasafrás,
Azúcar, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\mathcal{I}ij$ (8 gr.).
Divídase en seis papeles.
D. Uno al día en las afecciones crónicas de la piel.

6802. Otro (VOGT).

\mathcal{R} Nítro. $\tilde{\mathcal{I}}\mathcal{B}$ (15 gr.).
Sal comun seca. $\tilde{\mathcal{I}}j$ (30 gr.).
Azúcar. $\tilde{\mathcal{I}}ij$ (60 gr.).
M. I. Gangrena á consecuencia de una contusion.

6803. P. DE ALUMBRE Y CANELA (Jahn).

\mathcal{R} Alumbre. $\mathcal{I}j$ (4 gr.).
Canela en polvo. $\mathcal{D}j$ (12 dec.).
Opio purificado. $\tilde{g}jv$ (20 cent.).
Divídase en cuatro dosis.
I. Metrorragia asténica. *D.* Un papel cada cuatro horas.

6804. P. DE ALUMBRE Y CATECÚ.

\mathcal{R} Alumbre. \mathcal{I}
Catecú. \mathcal{I}
M. I. Hemorragias. Si se reemplaza el catecú por el sulfato de zinc, se obtiene un polvo estíptico que puede tener los mismos usos.

6805. P. DE ALUMBRE Y QUINA (Schoeys).

\mathcal{R} Alumbre calc. en polvo. $\mathcal{I}\mathcal{B}$ (2 gr.).
Quina de Loja en polvo. $\tilde{\mathcal{I}}j$ (30 gr.).
M. I. Se le aconseja para combatir y prevenir el tialismo mercurial.

6806. P. ALUMINOSO DE VOGEL.

\mathcal{R} Alumbre. $\mathcal{I}ij$ (8 gr.).
Quino. $\mathcal{D}j$ (12 dec.).

Opio. $\tilde{g}ij$ (15 cent.).
Azúcar de leche. $\mathcal{I}j$ (4 gr.).
Divídase en seis papeles iguales.
I. Metrorragia atónica.

6807. P. ALUMINOSO (H. DE AL.).

\mathcal{R} Alumbre. $\tilde{g}ij$ (4 dec.).
Azúcar blanca,
Goma arábica, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{g}x$ (5 dec.).
M. I. Hemorragias pasivas, tialismo, diarrea rebelde, metrorragia, gangrena de hospital. *D.* Para una dosis.

6808. Otro (PERRIN):

\mathcal{R} Alumbre en polvo,
Azúcar en polvo, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\mathcal{I}ij$ (8 gr.).
M. I. Se usa en insuflacion para combatir las anginas guturales.

6809. Otro (RECAMIER).

\mathcal{R} Alumbre en polvo. $\mathcal{I}ij$ (8 gr.).
Almidon. $\tilde{\mathcal{I}}ij$ (90 gr.).
M. I. Se usa para combatir las escoriaciones de la vagina.

6810. P. AMARGO (Schlesier).

\mathcal{R} Nuez vómica en polvo. $\tilde{g}j$ (5 cent.).
Azúcar de leche. $\tilde{g}xc$ (5 gr.).
H. S. A. polvo y divídase en diez y seis papeles iguales.
I. Calentura tifoidea. *D.* Un papel cada tres horas, y al comer en la gastralgia.

6811. P. AMARGO ALCALINO (Heim).

\mathcal{R} Carbon. $\mathcal{I}vj$ (24 gr.).
Carbonato de magnesia,
Quasia, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\mathcal{I}j$ (4 gr.).
Mézelese y hágase polvo.
I. Pirosis. *D.* Una cucharada de café dos ó tres veces al día.

6812. P. DE AMBAR MOSCADO.

\mathcal{R} Ambar gris. $\tilde{g}xviii$ (4 gr.).
Almizcle. $\tilde{g}ij$ (15 cent.).
Esencia de canela. 2 gotas.

Azúcar blanca. ʒij (12 gr.).
M. D. ʒʒ á ʒj (6 á 12 dec.) muchas veces al día.

6813. P. DE AMBAR COMPUESTO.

ʒ Canela fina,
 Clavo,
 Macis,
 Nuez moscada,
 Raiz de galanga,
 Raiz de zedoaria,
 Raiz de sasaf. rasp., ãã. ʒij (12 gr.).
 Leño de álces raspado,
 Sándalo cetrino raspado,
 Cáscaras de limon secas,
 Sim. de cardamomo, ãã. ʒij (8 gr.).
 Ambar gris. ʒj (4 gr.).
H. S. A. I. Es estomacal y excitante. *D.* ʒxij (6 dec.) hasta ʒʒ (2 gr.).

6814. P. ANONIALCANFORADO

ʒ Carbonato de amoniaco. ʒjv (2 dec.).
 Alcanfor. ʒij (4 dec.).
 Azúcar blanca. ʒj (12 dec.).
M. I. Es diaforético y antiespasmódico. *D.* En una dosis.

6815. P. AMMONÍGENO (Ruelle).

ʒ Cal apagada. ʒij (60 gr.).
 Clorhidrato de amoniaco
 en polvo. ʒj (30 gr.).
I. Se usa para llamar el sudor á los piés. *D.* Se espolvorean las medias, día y noche, con una cucharadita de esta mezcla.

6816. P. ANODINO ó de coral anodino (Helvetius).

ʒ Mirra. lbjʒ (750 gr.).
 Cascarrilla,
 Canela de olor de clavo, ãã. lbj (500 gr.).
 Opio,
 Bol arménico, ãã. . . . ʒjv (125 gr.).
 Coral rojo preparado. lbʒ (250 gr.).
H. S. A. I. Disenterias, cólicos de estómago y pleuresía. *D.* De ʒxviiij á ʒʒ (1 á 2 gr.).

Nota. Esta composición es mas excitante que anodina. Es neces-

rio no dejarse llevar del título y de la adición del opio.

6817. P. HANNOVERIANOS (F. M.).

ʒ Cinabrio nativo,
 Azúcar piedra, ãã. . . . ʒvj (24 gr.).
 Aceite de canela. . . . 6 gotas.
 Se reducen á polvo exactamente, se mezclan y guardan para el uso.

I. Enfermedades del cerebro y de los nervios. *D.* ʒjv hasta ʒxx (2 á 10 dec.).

6818. P. ANTIÁCIDO.

ʒ Magnesia calcinada. . . ʒʒ (15 gr.).
 Cáscaras de naranja,
 Azúcar blanca, ãã. . . . ʒj (4 gr.).
 Mézclese y divídase en seis papeles.

I. Agrios del estómago. *D.* Tres ó cuatro papeles al día.

6819. P. ANTIARTRÍTICO.

ʒ Extracto de acónito. . . ʒjv (2 dec.).
 Azúcar blanca. ʒʒ (15 gr.).
 Divídase en dos papeles.

I. Gota, reumatismo, otitis, sordera, cefalalgia, hemicránea, coriza, síncope, histérico. *D.* Un papel mañana y noche.

6820. Otro (HARTMANN).

ʒ Azúcar. ʒij (60 gr.).
 Canela. ʒjʒ (45 gr.).
 Carbonato de hierro. . ʒʒ (15 gr.).
H. S. A. D. De ʒʒ á ʒj (2 á 4 gr.).

6821. Otro (H. DE AL.).

ʒ Resina de guayaco,
 Tártaro purific., ãã. ʒxv (75 cent.).
M. D. En una toma, tres ó cuatro veces al día, en un poco de agua de malvabisco.

6822. Otro (MARC).

ʒ Polvo de regaliz. ʒij (8 gr.).
 Rhododendrum chrysanthum. ʒx (5 dec.).

H. S. A. un polvo muy homogéneo, que se divide en diez tomas iguales. *D.* Una toma mañana y noche.

Nota. Se aumenta una dosis cada día hasta que se presente un abundante sudor ó aumento de la excreción de la orina. Algunas veces hay que administrar hasta ḡxxx (15 dec.) al día.

6823. P. ANTIARTRÍTICO (Richter).

- ʒ Azufre sublimado. ʒβ (2 gr.).
- Cálamo arom. en polvo. ʒj (4 gr.).
- Antimonio crudo,
- Azúcar blanca, ãã ʒij (8 gr.).

H. S. A. *I.* Gota acompañada de atonía de los órganos abdominales. *D.* Una cucharada de café cada dos ó tres horas.

6824. P. ANTIARTRÍTICO PURGANTE ó Polvo de escamonea compuesto.

- ʒ Escamonea. 2
 - Sen. 4
 - Bitartrato de potasa. 4
 - Cardo santo. 4
 - Zarzaparrilla. 4
 - China. 2
 - Guayaco. 2
 - Canela de Ceylan. 2
- Redúzcanse á polvo S. A.

I. y *D.* Se usa como purgante suave para prevenir los ataques de gota, á la dosis de ʒj (4 gr.) todos los meses.

Nota. ʒj (4 gr.) de este polvo contiene ḡvj (3 dec.) de escamonea y ḡxij (6 dec.) de sen.

6825. P. ANTIASMÁTICO (Urban).

- ʒ Azufre dorado de antimonio. ḡjv (2 dec.).
- Extracto de beleño. ḡxij (6 dec.).
- Ojos de cangrejos preparados. ʒjv (16 gr.).
- Azúcar blanca. ʒiij (12 gr.).

M. I. Asma húmedo. *D.* Una cucharadita de café cada dos ó tres horas.

6826. P. ANTIASMÁTICO Ó INCISIVO.

- ʒ Azúcar. 3
- Azufre lavado. 2
- Cebolla albarrana. 1

H. S. A. *I.* Romadizos, catarros. *D.* Diez y ocho á treinta granos.

6827. P. ANTIATRÓFICO (Hufeland).

- ʒ Hierro alcoholizado. ḡj (5 cent.).
 - Carbonato de magnes. ḡv (25 cent.).
 - Canela. ḡij (10 cent.).
 - Azúcar blanca. ḡj (12 dec.).
- H. S. A. *I.* Atrofia y raquitis de los niños.

6828. P. ANTIBLENORRÁGICO (Eisermann).

- ʒ Cloruro de hierro y amoniaco. . . 33
 - Polígala de Virginia en polvo. . . 33
 - Amoniaco en polvo. 29
 - Regaliz en polvo. 400
- Divídase en papeles de ʒβ (2 gr.).

I. Bleenorragia en personas poco irritables y cuando el flujo es muy flúido. *D.* Una dosis cada tres ó cuatro horas.

6829. P. ANTICARDIÁLGICO (Schubart).

- ʒ Magnesia calcinada. ḡxl (3,30 gr.).
 - Azúcar blanca. ʒβ (2 gr.).
 - Oxido de bismuto. ḡβ (6 dec.).
 - Esencia de cajeput. 12 gotas.
- Hágase polvo y divídase en seis papeles.

D. Un papel mañana y noche.

6830. P. ANTICARCINOMATOSO (Fr. Cosme).

- ʒ Sulfuro rojo de mercurio. ʒij (8 gr.).
 - Oxido blanco de arsénico. ḡij (24 dec.).
 - Sangre de drago. ḡxij (65 cent.).
 - Ceniza de suelas viejas. ḡviiij (40 cent.).
- Se hace un polvo muy fino.

D. Se empapa c. s. de este polvo con un poco de agua, se le extiende con un pincel sobre la úlcera cancerosa, que se cubrirá despues con un lienzo. La escara cae al cabo de tres ó cuatro dias.

6831. P. ANTICATALÉPTICO
(Schroeder).

☞ Oxido de zinc sublimado. ḡxxv (75 cent.).
Castóreo. ḡxxx (15 dec.).
Valeriana en polvo. ʒj. (4 gr.).
Aceite animal de Dippel. . . 40 gotas.

M. I. Catalepsia histérica, auxiliando su uso con la pocion anticataléptica. *D.* Un papel al dia.

6832. P. ANTICATARRAL
(Burchard).

☞ Nitro. ʒβ (15 gr.).
Azufre dorado de antimonio. ḡxjv (7 dec.).
Divídase en doce papeles.

I. Ronquera crónica. *D.* Uno ó dos papeles al dia.

6833. Otro (F. A.).

☞ Azúcar. ʒiij (90 gr.).
Lirio de Florencia. . . ʒiij (12 gr.).
Flores de azufre. . . . ʒj (4 gr.).
Azafran. ʒj (4 gr.).
Goma arábiga,
Almidon,
Regaliz, añ. ʒj (12 dec.).

H. S. A. I. Catarros pulmonares con expectoracion difícil. *D.* De ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) al dia.

6834. Otro (H. DE AL.).

☞ Flores de azufre. . . ʒij (8 gr.).
Crémor de tártaro. . ʒvj (24 gr.).
Azufre dorado de antimonio. ḡxy (75 cent.).

Mézclese y divídase en diez y seis papeles.

I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* Un papel cada cuatro horas.

6835. Otro (JAHN).

☞ Azufre dorado de antimonio. ḡvj (30 cent.).
Acido benzóico sublimado,
Opio, añ. ḡjx (45 cent.).
Oleosácaro de anís. . ʒij (24 dec.).
Divídase en seis partes iguales.
I. Catarro pulmonar crónico con tos intensa. *D.* Una dosis cada tres horas.

6836. Otro (P. FRANK).

☞ Azufre dorado de antimonio. ḡviiij (4 dec.).
Almizcle. ḡjv (2 dec.).
Opio. ḡij (1 dec.).
Azúcar blanca. . . . ʒj (4 gr.).
Mézclese y divídase en diez y seis partes iguales.

I. Catarro pulmonar crónico con tos intensa. *D.* Un papel cada tres horas.

6837. P. ANTICEFÁLICO
(Hufeland).

☞ Resina de guayaco. ḡxxx (15 dec.).
Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos,
Extr. de acónito, añ. ḡij (1 dec.).
Esencia de valerian. 2 gotas.
Azúcar blanca. . . . ḡxx (4 gr.).
Mézclese y divídase en dos dosis.

I. Cefalalgias reumáticas rebeldes. *D.* Una toma mañana y noche.

6838. P. ANTICLORÓTICO (Dubois)
(H. DE M.).

☞ Polvos de quina Loja. . ʒj (4 gr.).
Polvos de canela. . . ʒβ (2 gr.).
Limaduras de hierro porfirizadas. ʒj (12 dec.).

Mézclese *S. A.* y divídase en doce papeles.

I. Clorosis. Se recomiendan para restablecer las reglas. *D.* Uno cada dos ó cuatro horas.

6839. P. ANTICLORÓTICO
(*Richter*).

- ℥ Limaduras de hierro porfirizadas. ℥ij (8 gr.).
Azúcar blanca. ℥B (15 gr.).
Cascañilla en polvo,
Canela en polvo, ãã. . . ℥j (4 gr.).
H. S. A. D. Una cucharada de café, cuatro veces al día.

6840. Otro (STA. MARIA).

- ℥ Hierro porfirizado,
Castóreo,
Anís, ãã. ℥ij (8 gr.).
Canela. ℥j (4 gr.).
Nuez moscada. ℥jx (50 cent.).
Se mezclan y dividen en veinticuatro papeles. Cada uno contiene ℥vj (3 dec.) de hierro y ℥vj (3 dec.) de castóreo.

6841. P. ANTICOLÉRICO.

- ℥ Carbonato de amon. ℥xxx (15 dec.).
Quinina pura. ℥jv (20 cent.).
Opio. ℥j (5 cent.).
Azúcar. ℥B (2 gr.).
Dividase en treinta papeles.
I. Cólera. D. Un papel cada hora.

6842. P. ANTICRUPAL (Kopp).

- ℥ Sulfato de cobre. ℥ij (1 dec.).
Azúcar de leche. ℥B (2 gr.).
H. S. A. ocho papeles.
I. Crup. D. Un papel cada cuarto de hora hasta producir el vómito á los niños de uno á siete años. Si al día siguiente está aun ronca la voz, se les da la misma dosis con hora y media de intervalo.

6843. P. ANTIDIARRÉICO.

- ℥ Ipecacuana en polvo,
Opio en polvo,
Alcanfor en polvo, ãã. ℥j (5 cent.).
M. D. Cinco ó seis dosis al día en un vehículo apropiado.

6844. Otro (BRERA).

- ℥ Cascañilla en polvo. ℥xxx (15 dec.).

- Ipecacuana en polvo. ℥ij (15 cent.).
Opio puro. ℥ij (15 cent.).
Divídase en tres dosis iguales.
I. Diarrea crónica. D. Una dosis por la mañana, otra al medio día y otra por la noche.

6845. Otro (Trousseau).

- ℥ Subnitrato de bismuto. ℥j (32 gr.).
Ojos de cangrejos en p. ℥ij (8 gr.).
Mézclese y dividase en treinta y dos papeles.
I. Diarrea crónica. D. Tres papeles al día al tiempo de comer.

6846. P. ANTIDOTARIO (Taddei).

- ℥ Gluten fresco. ℥x (300 gr.).
Jabón medicinal. ℥ij (60 gr.).
Agua. ℥xx (600 gr.).
Se disuelve, se deseca y pulveriza.
I. Envenenamiento. D. ℥vj (25 gr.) para descomponer ℥xviiij (1 gr.) de sublimado. Se da este polvo en un vehículo apropiado.

6847. P. ANTIEMÉTICO PARA LOS NIÑOS (Rosen).

- ℥ Magnesia blanca. . . ℥B (15 gr.).
Comino. ℥ij (12 gr.).
Raíz de lirio. ℥ij (8 gr.).
Azafran. ℥xxx (15 dec.).
M. I. Vómitos y flemas. D. Un puñadito en agua de hinojo.

6848. P. ANTIEPILÉPTICO
(*Behrends*).

- ℥ Hidroclorato de amoniaco,
Carbon. de magnes., ãã. ℥B (2 gr.).
Raíz de valeriana. . . . ℥v (20 gr.).
Aceite de cajeput. . . . ℥B (2 gr.).
H. S. A. un polvo fino.
I. Epilepsia, corea, cólera. D. Una cucharada de café, tres veces al día.

6849. Otro (BRESLER).

- ℥ Raíz de artemisa en polvo. ℥ij (100 gr.).

Azúcar. ℥vj (200 gr.).
 M. D. Una cucharada de café al día.

6850. P. ANTIEPILÉPTICO
 (Hildenbrant).

℥ Sulfato de cobre y amoniaco. ḡij á ḡiij (10 á 15 cent.).
 Raiz de belladona. ḡj á ḡv (5 á 25 cent.).
 Azúcar. ℥j (4 gr.).
 Divídase en seis papeles.
 D. Uno cada dos horas.

6851. Otro (H. DE AL.).

℥ Oxido de zinc. . . . ḡxvj (8 dec.).
 Carbon. de magn. ℥ij (24 dec.).
 Oleosácaro de cajeput. ℥iij (12 gr.).
 Mézclese exactamente y divídase en ocho papeles.
 D. Uno cada tres horas.

6852. Otro (HUFELAND).

℥ Oxido de zinc. ḡj á ḡvj (5 á 30 cent.).
 Extracto de beleño. . . ḡj (5 cent.).
 Aceite etéreo de valer. 4 gota.
 Raiz de valeriana en p. ℥β (2 gr.).
 H. S. A. D. Se toma en dos veces al día. En los casos rebeldes se añadirá ḡβ (25 mil.) de cobre amoniacal.

6853. Otro (REGOLO).

℥ Valeriana. ℥j (30 gr.).
 Hojas de naranjo. . . . ℥β (15 gr.).
 Hidroclorato de amoniaco,
 Magnesia,
 Aceite de cajeput, añ. ℥j (4 gr.).
 I. Epilepsia, histérico, corea, calenturas atáxico-adinámicas, tifo. D. ℥ijβ (10 gr.) cuatro veces al día en media taza de té caliente.

6854. Otro (KAHLEISS).

℥ Raiz de artemisa. . . . ℥ij (60 gr.).
 Agua comun. ℥β (250 gr.).
 Se hierve hasta que se reduzca

una cuarta parte, se cuele y se añade:

Nitrato de plata fundido en polvo. . . . ḡx (5 dec.).

Se separa por el filtro el precipitado que se forma, se hace secar y se mezcla S. A. con

Azúcar blanca. ℥j (30 gr.).
 Hágase polvo y divídase en sesenta dosis.

D. Una, mañana y noche.

6855. Otro (KIRCFKOFF).

℥ Cianuro de hierro. . . . ℥ij (8 gr.).
 Azúcar blanca. ℥j (32 gr.).
 Mézclese y divídase en diez y seis dosis iguales.

I. Epilepsia no sostenida por lesión orgánica. Si el enfermo tiene constitucion sanguínea, debe preceder á su administracion una larga sangría y algunas sanguijuelas en las sienas. D. Se da una dosis al día, dividida en cuatro partes y con tres ó cuatro horas de intervalo.

6856. P. ANTIEPILÉPTICO ó Tomas antiepilépticas (Losen).

℥ Sulfato de cobre amoniacal. ḡj (5 cent.).
 Azúcar blanca en polv. ḡc (5 gr.).
 Divídase en seis tomas.

D. Una tres veces al día, y se bebe un vasito de vino de Málaga despues de cada toma. Se continúa este tratamiento durante algunos dias, y se aumentará la dosis de la sal de cobre, dividiendo la cantidad en cuatro ó cinco papeles.

6857. P. ANTIEPILÉPTICO
 (Quincy).

℥ Raiz de valeriana silvestre,
 Raiz de peonía machacada, añ. ℥β (16 gr.).
 Semillas de ruda,
 Mirra,
 Castóreo,
 Sucino blanco, añ. . . . ℥ij (8 gr.).
 Cinabrio natural. ℥j (32 gr.).

Se reducen á polvo y se los mezcla exactamente.

I. Afecciones nerviosas y convulsivas. *D.* De ḡx á ḡxx (5 á 10 gr.) á los niños, y de ḡxx á ḡj (3 á 4 gr.) á los adultos.

6858. P. ANTIEPILÉPTICO
(*Rosensthal*).

- ʒ Haba de S. Ignacio en polvo. ḡx (50 cent.).
- Ipecacuana en polvo. ḡv (25 cent.).
- Cáscara de naranja. . ḡj (4 gr.).
- Carbonato de magnes. ḡj (4 gr.).
- Azúcar blanca. . . . ḡj (30 gr.).
- Esencia de menta pip. 4 gotas.

H. S. A. I. Epilepsias que afectan una marcha casi periódica. *D.* Cuatro cucharadas de café al día, cuando se aproxima el acceso.

6859. Otro (TOTT).

- ʒ Sulfato de cobre. . . . ḡv (25 cent.).
- Castóreo. ḡḡ (2 gr.).
- Azúcar. ḡij (12 gr.).

H. S. A. polvo y divídase en veinte dosis.

D. Una, mañana y noche.

6860. P. ANTIEPSÓRICO.

- ʒ Flores de azufre ,
- Acetato de potasa, ãã . . ḡj (4 gr.).
- Sulfato de zinc. ḡḡ (2 gr.).

M. Se dan fricciones mañana y noche con una pulgarada de este polvo diluido en algunas gotas de aceite. Es muy cómodo para tratar la sarna, y de este modo se evita el mal olor y la suciedad consiguiente al uso de las pomadas.

6861. Otro, n. 2.

- ʒ Azufre sublim. y lav. ḡxij (48 gr.).
- Bardana en polvo. . . . ḡvj (24 gr.).
- Regaliz en polvo. . . . ḡvj (24 gr.).
- Alcanfor. ḡj (4 gr.).

M. D. ḡij (8 gr.) al día en dos tomas.

6862. Otro (BALLY).

- ʒ Azufre sublimado. 1
- Polvo fino de carbon de leña. . . . 1
- Ladrillo machacado. 1

H. S. A. D. Un puñado grande, que se humedece con un poco de aceite y con el que se frota el hueco de la mano durante un cuarto de hora, mañana y noche.

Nota. Este remedio cura muy bien la sarna aun cuando sea inveterada.

6863. Otro (CHAUSSIER).

- ʒ Flores de azufre. 2
- Acetato de plomo. 2
- Sulfato de zinc. 1

I. Tiña, sarna, soriasis. *D.* Se usa en fricciones en las palmas de las manos, á la dosis de una pulgarada diluida en algunas gotas de aceite.

6864. Otro (RICHTER).

- ʒ Azufre. ḡj (4 gr.).
- Regaliz. ḡjv (16 gr.).
- Alcanfor. ḡj (8 gr.).

M. I. Sarna, soriasis, prúrigo. *D.* Una cucharada de café dos veces al día.

6865. P. ANTIESCROFULOSO
(*Ammon*).

- ʒ Sulfato de quinina. ḡj á ḡij (5 á 10 cent.).
- Carbonato de sosa. ḡv á ḡvj (25 á 30 cent.).
- Azúcar. ḡj (12 dec.).

H. S. A. seis papeles. *I.* Oftalmia escrofulosa. *D.* Un papel mañana y noche.

6866. Otro (RUST).

- ʒ Esponja calcinada. . . . ḡḡ (15 gr.).
- Digital en polvo. . . . ḡvj (3 dec.).
- Oleosácaro de hinojo. . ḡij (8 gr.).

Divídase en doce tomas. *I.* Afecciones escrofulosas, bo-

cio, tumores blancos, etc. *D.* Dos ó tres tomas al día.

6867. P. ANTIESCROFULOSO
(*Sichel*).

℞ Etíope antimonial,
Ruibarbo, ãã. ʒij (8 gr.).
Magnesia. ʒj (4 gr.).
Mézclese y divídase en veinticuatro papeles.

D. Tres ó cuatro papeles al día.
Para los niños se prescribe:

Etíope antimonial,
Ruibarbo, ãã. ʒj (4 gr.).
Magnesia. ʒß (2 gr.).

Para veinticuatro papeles.

6868. P. ANTIESPASMÓDICO.

℞ Flores de zinc. ʒviiij (7 dec.).
Almizele. ʒjv (2 dec.).
Láudano de Sydenham. 60 gotas.
Azúcar. ʒij (8 gr.).
Divídase en ocho papeles.

I. Trismo, tétanos, convulsiones de los niños. *D.* Un papel cada dos horas en una cucharada de agua, de jarabe ó de tisana.

6869. Otro, n. 2.

℞ Castóreo,
Valeriana,
Azúcar, ãã. ʒj (4 gr.).
D. Para tres dosis.

6870. Otro, n. 3.

℞ Valeriana. ʒj (4 gr.).
Canela. ʒxij (6 dec.).
Mézclese y divídase en seis papeles.

D. En las veinticuatro horas.

6871. Otro, n. 4.

℞ Quina. ʒij (8 gr.).
Valeriana. ʒj (4 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.

D. En las veinticuatro horas.

6872. Otro, n. 5.

℞ Raiz de valeriana silvestre pulverizada. ʒj (4 gr.).
Almizele,

ó Ambar gris. ʒj (12 dec.).
Asa fétida. ʒvj (3 dec.).
Alcanfor. ʒxij (6 dec.).
M. S. A. y háganse polvos.

I. Enfermedades convulsivas, histéricas, epilépticas ó espasmódicas, manía, hidrofobia. *D.* ʒxij hasta ʒxx (6 á 10 dec.).

6873. Otro, n. 6.

℞ Castóreo. ʒj (4 gr.).
Canela. ʒxviiij (4 gr.).
Azúcar. ʒij (8 gr.).
Mézclese y divídase en veinte papeles.

D. Se toma uno de hora en hora.

6874. Otro (BRACHET).

℞ Oxido de zinc. ʒvj á ʒxij (3 á 6 dec.).
Azúcar. ʒxx á ʒxxx (10 á 25 dec.).
Mézclese y divídase en seis tomas.

I. Convulsiones de los niños. *D.* Uno cada dos horas en un poco de agua azucarada. Se puede añadir de ʒvj á ʒx (3 á 5 dec.) de extracto de beleño.

6875. P. ANTIESPASMÓDICO ó Polvo de valerianato de zinc (Devay).

℞ Valerianato de zinc. ʒxij (6 dec.).
Azúcar. ʒlx (3 gr.).
Divídase en veinticuatro papeles.

D. Uno á cuatro al día.

6876. Otro (DUBLE).

℞ Hoj. de naranjo en p. ʒjv (20 cent.).
Nitro. ʒiij (15 cent.).
Digital en polvo. . . ʒß (25 mil.)

M. I. Palpitaciones nerviosas idiopáticas. *D.* En una dosis al día.

6877. Otro (H. DE ITAL.).

℞ Castóreo. ʒij (4 dec.).

Magnesia calcinada. . . ʒj (4 gr.).
 Goma arábica. ḡxij (6 dec.).
M. D. En una dosis.

6878. P. ANTIESPASMÓDICO
 (H. DE ALEM.).

ʒ Almizcle. ḡxxxij (16 dec.).
 Opio. ḡjv (2 dec.).
 Azúcar. ʒj (4 gr.).
 Mézclese y divídase en doce papeles.
D. Uno de hora en hora.

6879. Otro (MAGENDIE).

ʒ Cianuro de zinc. ḡß 25 mil.).
 Magnesia calcinada. ḡjv (2 dec.).
 Canela. ḡiij (15 cent.).
M. I. Calambres del estómago y enfermedades verminosas de los niños. *D.* Se toma toda la dosis cada cuatro horas.

6880. Otro (RECAMIER).

ʒ Subnitrato de bismuto. ḡjv (2 dec.).
 Magnesia,
 Azúcar, ãã. ðij (24 dec.).
 Se dividen en cuatro papeles iguales y se toma uno á la vez.
I. Gastrodinia rebelde y no inflamatoria.

6881. Otro (TSELEPPE).

ʒ Azuf. dorado de antim. ḡxviiij (4 gr.).
 Oxido de zinc sublim. ʒß (2 gr.).
 Nitro. ḡLjv (3 gr.).
 Azúcar blanca. ʒij (60 gr.).
 Divídase en diez y ocho papeles.
I. Hipo. *D.* Un papel cada dos ó tres horas.

6882. Otro (WEPFER).

ʒ Raiz de valeriana. ʒß (16 gr.).
 Raiz de peonía. ʒß (2 gr.).
 Rasuras de cuerno de ciervo. ʒiij (12 gr.).
 Aceite de nuez mosc. ḡiij (15 cent.).
 Azúcar. ʒiij (96 gr.).
 Mézclese y divídase en papeles de ʒj (4 gr.).

I. Enfermedades espasmódicas, en las que produce buenos efectos continuando mucho tiempo su uso. *D.* Una dosis por la mañana en ayunas, y otra por la tarde, bebiendo despues un vaso de infusion de flores de tilo.

6883. POLVO ANTIESPASMÓDICO AMONIACAL.

ʒ Carbon. de amoniaco. ḡjv (2 dec.).
 Extracto de beleño,
 Almizcle, ãã. ḡj (5 cent.).
 Oleosác. de valeriana. ḡxviiij (1 gr.).
M. I. Epilepsia, histérico. *D.* En dos dosis en medio vaso de infusion de flores de naranjo.

6884. POLVO ANTIESPASMÓDICO MOSCADO CINABARINO.

ʒ Almizcle. 1
 Cinabrio. 7
 Segun Jourdan este es el verdadero polvo de Tonquin, calcado por el que usan los chinos.
I. Histérico, convulsiones, epilepsia. *D.* ḡxij (6 dec.) dos ó tres veces al dia.

6885. P. ANTIESPASMÓDICOS PARA LOS NIÑOS (Hufeland).

ʒ Ojos de cangrejos. 1
 Raeduras de asta de ciervo. 1
 Visco ó muérdago. 1
 Raiz de valeriana. 1
 Mézclese y hágase polvo.
I. Diarrea, vómito, denticion difícil. *D.* ðß (6 dec.) cada dos ó tres horas á los niños.

6886. P. ANTIESPASMÓDICO PURGANTE (Hems).

ʒ Calomelanos al vapor. ḡxij (6 dec.).
 Opio purificado. ḡij (1 dec.).
 Ipecacuana en polvo. ḡjß (75 mil.).
 Olcosácuro de menta. ʒj (4 gr.).
 Divídase en seis dosis.
I. Ileo nervioso. *D.* Una dosis cada dos ó tres horas.

6887. P. ANTIFEBRIL COMPUESTO
(*Brera*).

℞ Corteza del Perú. . . . ℥j (30 gr.).
Valeriana en polvo. . . ℥℞ (15 gr.).
Hágase polvo y divídase en ocho partes iguales.

6888. P. ANTIFLOGÍSTICO (*Rust*).

℞ Nitro,
Bitartrato de potasa,
Azúcar, ãã. . . . ℥ij (8 gr.).
Divídase en doce papeles.
D. Un papel de hora en hora ó cada dos horas con cocimiento de harina de avena.

6889. P. ANTIGASTRÁLGICO.

℞ Oxido de hierro. . . . ℥j (4 gr.).
Subnitrato de bismuto. . ℥j (30 gr.).
Raiz de valer. en polvo. ℥ij (8 gr.).
Mézclese y divídase en treinta y dos papeles.
D. Un papel mañana y noche al tiempo de comer.

6890. Otro, n. 2.

℞ Magnesia. ℥j (4 gr.).
Canela. ℥℞ (2 gr.).
Opio en bruto. ḡj (5 cent.).
Mézclese y divídase en doce papeles.
D. Se toma uno ó dos al dia antes de comer.

6891. Otro (SCROEDER).

℞ Oxido de bismuto. . ℥℞ (6 dec.).
Carbon. de amoniaco. ḡvj (3 dec.).
Opio purificado. . . . ḡiij (15 cent.).
Oleosácara de valer. ℥j (4 gr.).
Divídase en seis dosis.
D. Tres ó cuatro al dia.

6892. P. ANTIHÉCTICO (*Goelis*).

℞ Cuerno de ciervo quemado. . . . 4
Nuez moscada. 4
Bayas de laurel tostadas. 4
Regaliz. 3
Hágase polvo.
D. Media cucharada de café dos

veces al dia á los niños de un año, y una cucharada entera á los de dos ó cuatro.

6893. P. ANTIHELMINTICO.

℞ Coralina de Córcega,
Santónico, ãã. ℥iij (90 gr.).
Calomelanos. ℥j (12 dec.).
Mézclese y divídase en ocho papeles.

I. Helmintiasis, ascárides lumbricoides. D. Se toma en el dia.

6894. Otro, n. 2.

℞ Estaño en polvo fino. . . ℥j (32 gr.).
Sulfuro negro de mercur. ℥ij (8 gr.).
Divídase en seis tomas.

D. Una toma mañana y noche en un poco de triaca ó un extracto cualquiera.

6895. Otro, n. 3.

℞ Helecho macho. ℥j (12 dec.).
Gutagamba. ḡij (1 dec.).
M. D. De una vez.

6896. Otro, n. 4.

℞ Santónico. ℥℞ (2 gr.).
Tartrato de potasa. . . ℥iij (12 gr.).
Azúcar blanca. ℥ij (8 gr.).
Divídase en diez y seis papeles.
D. Uno cada dos ó tres horas.

6897. P. ANTIHELMINTICO ó Polvo vermífugo (H. M. F.).

℞ Polvo de musgo de Córcega,
Polvo de santónico, ãã. ℥j (32 gr.).
Polvo de ruibarbo. . . . ℥℞ (16 gr.).
Mézclese y consérvase en un frasco bien tapado.
D. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.).

6898. P. ANTIHELMINTICO ó Polvo amargo ferruginoso.

℞ Sulfato de hierro crist. ℥j (4 gr.).
Santónico. ℥iij (12 gr.).
Flores de tanaceto. . . ℥j (12 dec.).
Se mezcla y divide en papeles

de $\tilde{g}xij$ (6 dec.), que cada uno contiene $\tilde{g}ij$ (1 dec.) de sulfato de hierro.

6899. P. ANTIHELMÍNTICO
(Dupuytren).

\mathcal{Z} Calomelanos. $\tilde{g}ij$ (1 dec.).
Ruibarbo. $\tilde{g}vj$ (3 dec.).
Jalapa. $\tilde{g}xxx$ (15 dec.).
M. I. Es antihelmíntico, y se usa también como purgante suave. D. De una vez.

6900. P. ANTIHELMÍNTICO
(H. DE M.).

\mathcal{Z} Coralina en polvo. 1
Helecho macho. 1
M. I. Lombrices intestinales. D. 3β (2 gr.).

6901. P. ANTIHELMÍNTICOS DE PALACIÓS (F. N. P.).

\mathcal{Z} Santónico. $3ij$ (8 gr.).
Mechoacan. 3β (2 gr.).
Mercurio dulce. $\tilde{g}xl$ (2,2 gr.).
Coralina de Córcega. $3j$ (4 gr.).
Macis. $\tilde{g}jx$ (45 cent.).
Se hace polvo S. A.
I. Lombrices, ténia. D. 3β (6 dec.) dos veces al día, suspendidos en c. s. de agua azucarada.

6902. P. ANTIHELMÍNTICOS
(F. N. P.).

\mathcal{Z} Coralina,
Santónico,
Helecho macho, $\tilde{a}\tilde{a}$ $3j$ (4 gr.).
Redúzcase á polvo muy fino.
I. Lombrices, ténia. D. 3β (2 gr.) suspendidos en agua azucarada, dos veces al día.

6903. P. ANTIHEMATEMÉSICO
(Denton).

\mathcal{Z} Acetato de plomo. 3β (18 dec.).
Extracto de cicuta. $\tilde{g}lx$ (30 dec.).
Mézclese y redúzcase á polvo que se divide en doce dosis.
D. Un papel cada dos horas.

6904. P. ANTIHEMÓRRÁGICO
(Hecker).

\mathcal{Z} Opio. $\tilde{g}ij$ (15 cent.).
Canela en polvo. $3j$ (4 gr.).
Sulfato de hierro. 3β (6 dec.).
Azúcar blanca. $3ij$ (8 gr.).
Divídase en doce dosis.
I. Hemorragias pasivas. D. Una dosis cada 25 ó 30 minutos.

6905. Otro (KRIMER).

\mathcal{Z} Acetato de plomo. $\tilde{g}xvj$ (8 dec.).
Opio puro. $\tilde{g}ij$ (1 dec.).
Azúcar de leche. $\tilde{g}xxxij$ (16 dec.).
Hágase polvo y divídase en ocho dosis.
I. Hemorragias pasivas, especialmente la hemotisis y epistaxis. D. Una dosis cada dos horas.

6906. P. ANTIHEMORROIDAL
(H. DE AL.).

\mathcal{Z} Flores de azufre. 3β (16 gr.).
Tartrato de potasa. $3j$ (32 gr.).
Oleosácara de limon. $3vj$ (24 gr.).
M. D. Una cucharadita, dos ó tres veces al día.

6907. P. ANTIHERPÉTICO (Bielt).

\mathcal{Z} Azufre sublimado. $3j$ (30 gr.).
Cremor de tártaro. 3β (15 gr.).
Mézclese y divídase en diez y seis papeles.
D. Uno todas las mañanas.

6908. P. ANTICTÉRICO ó Polvo de sen y guayaco (Schneider).

\mathcal{Z} Hojas de sen. 1
Resina de guayaco. 1
D. Dos cucharadas de café dos ó tres veces al día á los adultos, y 3β (2 gr.) en $3j$ (30 gr.) de jarabe de malvabisco á los niños, á cucharaditas.

6909. P. ANTIHISTÉRICO ó Polvo de asa fétida y gálbano compuesto.

\mathcal{Z} Asa fétida. 3

Gálbano.	5
Mirra.	4
Castóreo.	4
Raiz de ásaró.	2
Raiz de aristoloquia redonda.	2
Hojas de sabina.	2
Hojas de yerba gatera.	2
Hojas de matricaria.	2
Hojas de dictamo de Creta.	2

Se eligen las gomoresinas en lágrimas, y lo mas secas que sea posible; se mezclan en un mortero por medio de la contusion con el castóreo, las raices y las hojas bien mondadas de tallos; y despues de algunos dias de exposicion en la estufa se concluye la pulverizacion y se pasa todo por un tamiz de seda.

D. De ḡviii á ḡxxx (4 á 15 dec.).

6910. P. ANTILEUCORRÉICO (Rust).

℥ Bolo de Armenia,
Cloruro de magnesio,
Oleosác. de mácis, āā. ʒvj (24 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . ʒj (12 dec.).
H. S. A. D. Una cucharada de café cinco veces al dia.

6911. P. ANTIMETORRÁGICO (Brera).

℥ Digital en polvo. . . . ʒʒ (6 dec.).
Goma quino. ʒj (4 gr.).
Hágase polvo y divídase en seis dosis.

I. Metrorragia activa. D. Un papel cada hora.

6912. Otro (TROUSSEAU).

℥ Cornezuelo de centeno
en polvo. ʒj (4 gr.).
Tanino. ʒj (12 dec.).
H. S. A. seis papeles.

I. Metrorragias que siguen ó acompañan al parto natural ó al aborto, en las que se manifiestan en la edad crítica, y en las sintomáticas del cáncer uterino. D. Un papel de cuatro en cuatro horas.

6913. P. ANTIMONIAL.

℥ Calomelanos. ḡvj (3 dec.).
Azufre dorado de antim. ḡij (1 dec.).
Carbonato de magnesia. ʒʒ (2 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.

I. Oftalmias escrofulosas. D. Un papel mañana y noche.

6914. P. ANTIMONIAL ó Polvo de James (F. F.).

℥ Sulfuro de antimonio en polvo. . . 4
Cuerno de ciervo rasurado. 4
Se mezclan estas dos sustancias y se tuestan en una cazuela de barro, meneándolas sin cesar hasta que se hayan reducido á un polvo de color agrisado; se porfiriza perfectamente este polvo, y se expone á un calor rojo por dos horas en un crisol.

I. Se puede usar como excitante y diaforético en la neuralgia facial y en las escrófulas. D. ḡiiij á ḡviii (15 á 40 cent.) en polvo ó en pildoras, tres ó cuatro veces en el transcurso del dia.

6915. P. DE ANTIMONIO MARCIAL DIAFORÉTICO (Keup).

℥ Limaduras de hierro,
Sulfuro de antimonio
nativo, āā. ʒʒ (250 gr.).

Se trituran y se mezclan estas sustancias, se ponen en un crisol enrojecido al fuego y se las menea con una varilla de hierro hasta que parezcan reducidas á escorias; se las saca y cuando la masa está fria, se la tritura de nuevo con tres veces su peso de nitro seco; despues se echa el polvo á cucharadas en un crisol hecho ascua; cuando han terminado la deflagracion y la calcinacion, se echa la materia en cantidad suficiente de agua para disolver la potasa que contiene. Se precipitará el antimoniato de potasa y hierro bajo la forma de un polvo amarillo; se

procederá á la levigacion y se secará muy bien el polvo que ha quedado sobre el filtro.

I. Caquexia, ictericia y debilidad de los intestinos. *D.* ḡv á ḡvj (25 á 30 cent.) al dia.

6916. P. DE ANTIMONIO MERCURIAL
(*Smith*).

ʒ Sulfuro negro de mercurio. ḡxxx (15 dec.)
Polvo antimonial. ḡij (4 dec.)

M. I. Afecciones escrofulosas. *D.* En dos tomas.

6917. P. ANTIMONIAL (*Sichel*).

ʒ Azufre dorado de antimonio,
Ruibarbo,
Carbonato de magn., ãã . ʒj (4 gr.)
H. S. A. veinte papeles para los niños y diez para los adultos.

I. Oftalmias escrofulosas. *D.* Uno mañana y noche con un poco de agua azucarada.

6918. Otro (*SICHEL*).

ʒ Etiope antimonial. ʒij (8 gr.)
Magnesia pura. ḡxij (6 dec.)
Goma arábica en polvo,
Resina de guayaco, ãã . ʒj (4 gr.)
Mézclese y dividase en veinticuatro papeles.

I. Oftalmias escrofulosas. *D.* Una á ocho tomas al dia.

6919. P. ANTINEURÁLGICO
(*J. P. FRANK*).

ʒ Almizcle. ḡxx (1 gr.)
Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ãã ḡx (5 dec.)
Mézclese y dividase en veinte tomas.

I. Neuralgias, principalmente la de la cara. *D.* Un papel mañana y noche.

6920. Otro (*MOLINARI*).

ʒ Carbonato de hierro. ʒj (4 gr.)
Azúcar blanca. ʒiij (12 gr.)

Mézclese y dividase en nueve papeles.

D. Uno cada dos ó tres horas.

6921. P. ANTIOFTÁLMICO OPIADO
(*Sichel*).

ʒ Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ãã ḡvj (3 dec.)
Opio en bruto. ḡij (1 dec.)
Magnesia pura. ḡxij (6 dec.)
Goma arábica en polv. ʒj (4 gr.)
Mézclese y dividase en veinticuatro tomas.

I. Oftalmias reumáticas y artríticas. *D.* Una á doce tomas al dia.

6922. P. ANTIOFTÁLMICO RESOLUTIVO (*Graeffe*).

ʒ Bióxido de mercurio,
Agárico blanco, ãã ʒß (2 gr.)
Azúcar blanca. ʒj (30 gr.)

M. I. Engrosamiento de la córnea. *D.* Se insufla todos los dias un poco de este polvo.

6923. P. ANTIOTORRÉICO
(*Dr. Bonnafort*).

ʒ Nitrato de plata fundido,
Talco de Venecia,
Licopodio, ãã ḡxv (75 cent.)
Se reduce á polvo fino y se guarda en un frasco con tapon esmerilado, cubierto de papel negro para que no le dé la luz.

Se limpia el oido con inyecciones ó con una esponjita, y se insufla en el oido el polvo, por medio de un soplete, de modo que se aplique á la úlcera que sostiene la otorrea crónica.

Se renovará estas insuflaciones todos los dias ó de mas tarde en tarde, según la naturaleza del mal. Si existe perforacion de la caja del tambor, convienen las inyecciones por la trompa.

6924. P. ANTIPERIÓDICO ANTIMONIAL (*Sichel*).

ʒ Sulfato de quinina,
Etiope antimonial, ãã ʒij (8 gr.)

Mézclese y hágase polvo que se dividirá en veinticuatro papeles.

D. Dos á ocho papeles al dia.

6925. P. ANTIREUMÁTICOS ó Polvos de Olivencia (F. DE PLENK).

℞ Hojas de sen,

Zarzaparrilla, ãã. ℥jß (45 gr.).

Se reducen á polvo separadamente, se pasan por un tamiz para que quede un polvo fino y se añade:

Azúcar blanca. ℥j (30 gr.).

Se mezclan y se reparte en catorce papeles. Se tomarán dos cada dia del modo siguiente: se dará por la noche un papel de polvos en medio cuartillo de cocimiento de zarzaparrilla; por la mañana se toma en ayunas otro papel con otro medio cuartillo de cocimiento de zarzaparrilla; despues de dos horas, el enfermo tomará chocolate, al medio dia comerá su puchero compuesto de carnero, ternera, gallina ó perdiz, segun sus fuerzas alcancen, pero siempre debe ser carnero ó vaca y garbanzos, con muy poco jamon ó tocino añejo; no debe comer postre alguno, ni pescado, ni vinagre, ni frutas; por la tarde tomará otro papel despues de haber pasado cinco ó seis horas de la comida, teniéndole ya prevenido en infusion desde por la mañana; pasadas dos horas podrá cenar ó bien sea una sopa con caldo de puchero ó un par de huevos pasados por agua ó una jícara de chocolate. El agua que ha de beber debe ser cocida con la zarzaparrilla y se prepara del modo siguiente: se toman

Zarzaparrilla. ℥jv (125 gr.)

Se parte en pedacitos y se pone á cocer en

Agua. ℔x (5000 gr.)

hasta que se reduzca á la mitad. Este primer cocimiento es el que sirve para tomar los polvos; se vuelve á cocer la misma zarzapar-

rilla en otra tanta agua hasta quedar en la mitad y esta es la que sirve para beber á pasto; en tiempo de invierno es menester beberla algo tibia. Si pasados los siete dias no se hubiesen extinguido ó desvanecido los dolores, hinchazones, etc., se tomarán otros siete dias con el mismo método y forma; concluida la curacion tomará por quince ó veinte dias la leche de burras ó de cabras. Si el sugeto que usá estos polvos no llega á diez y seis ó diez y ocho años de edad, tomará la mitad de los polvos de cada papel.

Si se quiere que sean mas purgantes, se les puede añadir ℥jß (6 gr.) de polvos de jalapa ó ℥ß (2 gr.) de pulpa de coloquintida.

I. Dolores reumáticos, hinchazones edematosas, etc.

6926. P. ANTIREUMÁTICO (Vogler).

℞ Azúcar de leche. ℥j (32 gr.).

Azufre porfirizado. ℥jß (6 gr.).

Magnesia pura,

Extr. de acónito, ãã. ℥ß (2 gr.).

H. S. A. I. Artritis reumática, reumatismo muscular y fibroso.

D. Una cucharada de café, tres veces al dia.

6927. Otro (H. DE AL.).

℞ Azufre dorado de anti-

monio. ḡj (5 cent.).

Regaliz en polvo. ḡx (50 cent.).

M. D. Para una dosis.

6928. Otro (F. DE PLENK).

℞ Zarzaparrilla. ℥ij (60 gr.).

Hojas de sen. ℥j (30 gr.).

Polipodio,

Hermodáctiles, ãã. ℥ß (15 gr.).

Azufre. ℥ß (15 gr.).

Se muelen separadamente, se pasan por un tamiz, se mezclan y se reparten en siete partes iguales.

I. Enfermedades venéreas ó reu-

máticas. *D.* Todas las mañanas se toma una parte mezclada con ʒjv (125 gr.) de tisana de zarzaparrilla, que esté algo caliente, permaneciendo el enfermo en cama bien arropado; pasada media hora, beberá un vaso de la tisana también tibia y guardará el sudor en el caso en que sobrevenga; después de haber sudado, podrá levantarse resguardándose del viento y del frío. Tomará los polvos siete días seguidos, á menos que se sienta débil, y en este caso podrá dejar de tomarlos uno ó dos días; pero siempre deberá beber á pasto la tisana, que usará tibia en tiempo de invierno.

6929. P. ANTISÉPTICO

(H. DE AL.).

ʒ Quina en polvo. ʒj (32 gr.).
 Alcanfor. ʒj (4 gr.).

M. I. Ulceras atacadas de gangrena de hospital, afecciones gangrenosas.

El POLVO ANTISÉPTICO DE HARTMANN contiene ʒjv (2 dec.) menos de quina por dracma.

6930. Otro (RUST).

ʒ Alcanfor,
 Mirra, ãã ʒij (8 gr.).
 Quina,
 Manzanilla, ãã ʒß (15 gr.).
 Carbon preparado. ʒj (30 gr.).
 Divídase en ochenta papeles iguales.

I. Gangrena húmeda, cólera, tisis, angina gangrenosa, tifo, calentura tifoidea. *D.* Uno á cuatro papeles mezclados con igual cantidad de azúcar en polvo, ó se espolvorea con él las superficies ulceradas.

6931. P. ANTISÉPTICOS DE SWEDIAUR (H. DE M.).

ʒ Raiz de arnica en polvo. ʒ
 Quina Loja en polvo. ʒ
 Alcanfor en polvo. ʒ
 H. S. A. *I.* Ulceras rebeldes ó

que están afectadas de gangrena. *D. C. s.* para espolvorear los puntos enfermos.

6932. P. ANTISIFILÍTICO (Berg).

ʒ Oxido rojo de merc. ʒijß (12 cent.).
 Antimonio crudo. ʒijß (10 gr.).
 Azúcar. ʒij (2,6 gr.).
 H. S. A. diez y seis papeles.

I. Se le aconseja en el tratamiento de las enfermedades venéreas. *D.* Uno á dos papeles en dos veces, mañana y noche, suspendidos en agua.

6933. P. ANTITÍSICO.

ʒ Creosota. 6 gotas.
 Malvabisco. ʒj (4 gr.).
 Azúcar. ʒj (4 gr.).
 Divídase en tres papeles.

I. Hemotisis, tisis. *D.* Se toma en el día.

6934. P. ANTITÍSICO, Polvo gomoso amigdalino ó polvo de Haly (F. M.).

ʒ Simiente de adormideras blancas. ʒvj (24 gr.).
 Goma arábica,
 Goma tragacanto,
 Almidón,
 Rasuras de marfil,
 Ras. de orozuz, ãã . ʒij (8 gr.).
 Simiente de membrillos,
 Sim. de berd., ãã . ʒß (16 gr.).
 Pipas de melon,
 Pipas de calab., ãã . ʒj (32 gr.).
 Azúcar piedra. ʒxxviii (112 gr.).
 Hágase polvo S. A.

I. Tos seca, tisis, hemotisis. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).

6935. P. ANTITÍSICO (Bories, Hufeland).

ʒ Acetato de plomo,
 Opio, ãã ʒvj (3 dec.).
 Azúcar. ʒj (12 dec.).

M. y divídase en doce papeles. *I.* Sudores y diarreas colicativas de los tísicos. *D.* Un papel mañana y noche.

6936. P. DE ANTRACOCALI SIMPLE
ó Polvo antiherpético (Polya).

℞ Antracocali. ḡij (1 dec.).
Regaliz en polvo. ḡvj (3 dec.).
M. I. Eczema, impétigo, lupus, herpes, escrófulas, reumatismos crónicos. D. Para una vez tres ó cuatro veces al día. Este polvo produce sudores abundantes.

6937. P. DE ANTRACOCALI COMPUESTO.

℞ Antracocali. ḡij (1 dec.).
Azufre lavado. ḡvj (3 dec.).
Regaliz en polvo. ḡjv (2 dec.).
Se elogia este polvo en la complicación epsórica.
℞ Antracocali. ḡij (1 dec.).
Merc. de Hahnemann. ḡi/5 (1 cent.).
Regaliz en polvo. ḡjv (2 dec.).
I. Cólera, sífilides, tiña, eczema, herpes sífilíticos. D. Una dosis cada tres horas.

6938. P. DE ARNICA COMPUESTO
(H. DE AL.).

℞ Raiz de arnica,
Raiz de serpentaria de Virginia,
Olcosác. de menta pip., ãã. ḡij (8 gr.).
Mézclese y divídase en diez y seis papeles.
I. Diarrea, calenturas graves acompañadas de diarrea. D. Un papel cada dos horas.

6939. P. AROMÁTICO.

℞ Canela. ḡj (30 gr.).
Clavo,
Gengibre,
Nuez moscada, ãã. ḡiij (12 gr.).
Macis. ḡij (8 gr.).
Sándalo rojo. ḡβ (15 gr.).
Azúcar. ḡbij (1000 gr.).
Hágase polvo.

I. Ulceras atónicas, manchas escrófulosas de la córnea, vegetaciones, torceduras, contusiones. D. ḡijβ á ḡv (10 á 20 gr.) para espolvorear las partes enfermas.

6940. Otro (DUPUYTREN).

℞ Polvo de tomillo,
Polvo de salvia,
Polvo de romero, ãã. ḡjv (125 gr.).
Hidroclorato de amoniaco,
Alcanfor, ãã. ḡxx (10 dec.).
M. I. Sirve para curar las heridas complicadas con gangrena de hospital, úlceras gangrenosas, tumores frios, contusiones, torceduras, tifo, caquexia.

6941. Otro (F. P.).

℞ Nuez moscada. 2
Cardamomo menor. 2
Canela. 1
Gengibre. 1
M. I. Es excitante, carminativo.
D. ḡβ (2 gr.).

6942. P. AROMÁTICO ESTIMULANTE.

℞ Canela. 5
Gengibre. 1
Clavo. 1
Nuez moscada. 1
Azúcar. 10
M. I. Tifo, raquitis, contusiones, dispepsia, anorexia. D. ḡxviiij (1 gr.) dos veces al día.

6943. P. AROMÁTICOS CON HIERRO
(F. P.).

℞ Polvos aromáticos. 2
Hierro preparado. 1
Mézclese exactamente.
I. Tónico del sistema digestivo. D. ḡβ (2 gr.) ó mas.

6944. P. DE ARROZ (F. F.).

℞ Simiente de arroz. c. s. q.
Se lava con agua hasta que salga clara, se echa entonces sobre un lienzo y se rocía de cuando en cuando con nueva agua, hasta que los granos se vuelvan enteramente opacos y friables, en cuyo estado se pulverizan sin dejar residuo y se seca el polvo en la estufa.
I. y D. V. t. 1, pág. 98.

6945. P. ARSENICAL (Justamond).

℞ Oxido blanco de arsénico en polvo. . . . ʒv (20 gr.).
Antimonio crudo porfirizado. ʒx (40 gr.).

M. Se funde en un crisol, se pulveriza de nuevo y se añade según prescriba el médico.

Extracto de opio. . . ʒijβ (10 gr.).

I. Excrecencias y úlceras fungosas y rebeldes *D. C. s.* para espolvorear muy ligeramente las partes enfermas.

Nota. El uso de este polvo exige la mayor circunspección.

6946. P. ARSENICAL (Cazenave).

℞ Oxido bl. de arsénico. ʒx (5 dec.).
Sulfuro de mercurio. . . ʒL (25 dec.).
Carbon animal en polv. ʒx (5 dec.).

Se diluye una corta cantidad sobre un cuerpo sólido, y por medio de una espátula se aplica á la superficie enferma, pero no excederá del grandor de una peseta. A poco tiempo se presenta un dolor vivo, y al cabo de algunas horas una hinchazon erisipelatosa creciente, que á las veinticuatro ó treinta y seis horas presenta el aspecto de una enfermedad grave; pero estos síntomas se disipan y queda una costra parda muy dura y muy adherida, que dura un mes y al caerse están ya las superficies cicatrizadas ó presentan buen aspecto.

6947. P. ARSENICAL ó Polvo cáustico (Dupuytren).

℞ Acido arsenioso. . . . ʒx (5 dec.).
Calomelanos. ʒj (32 gr.).

M. I. Cáncer, úlceras, lupus, herpes corrosivos. Se espolvorea la úlcera con un copo de algodón cargado de esta mezcla, de modo que se forme una capa de $\frac{2}{3}$ de línea de grosor.

6948. P. ARSENICAL (Pluncquet).

℞ Ranunculus flamula. . ʒj (4 gr.).
Manzanilla hedionda. . ʒβ (16 gr.).
Oxido blanco de arsén. ʒij (8 gr.).
Azufre sublimado. . . . ʒj (4 gr.).

Se hace un polvo muy fino, del cual se mezcla una parte con un poco de clara de huevo.

I. Úlceras fungosas ó carcinomatosas. *D. C. s.* de mezcla aluminosa para cubrir ligeramente las partes enfermas.

Nota. Despues de la aplicacion de este polvo, cuyo uso exige mucha prudencia, se forma una escara que cae al cabo de cuarenta y ocho horas.

6949. Otro (ROUSSELOT).

℞ Arsénico porfirizado. ʒ
Sangre de drago. ʒ
Cinabrio pulverizado. ʒ

M. I. Escrófulas, carcinoma de la cara, úlceras cancerosas. *D.* Al tiempo de usarle se hace una pasta con saliva ó agua ligeramente gomosa.

6950. P. ARSENICAL FEBRÍFUGO (Boudin).

℞ Acido arsenioso. . . . ʒ $\frac{1}{5}$ (1 cent.).
Azúcar de leche. . . . ʒxx (1 gr.).

Mézclese íntimamente y divídase en veinte papeles; cada uno representará $\frac{1}{100}$ de grano de ácido arsenioso.

I. Calenturas intermitentes, afecciones sífilíticas inveteradas, afecciones cutáneas rebeldes. *D.* Un papel, diluido en una cucharada de agua, cinco á seis horas antes de presentarse el acceso.

6951. P. DE ARTEMISA AZUCARADO ó Polvo de Bresler.

℞ Polvo de raiz de artemisa. . . . ʒ
Azúcar. ʒ

M. I. Epilepsia y baile de San Vito. *D.* Una cucharada de café

desleida en un poco de agua, tres ó cuatro veces al día.

6952. P. ARTRÍTICO AMARGO ó Polvo de genciana compuesto.

℥ Polvo de genciana.	1
Polvo de aristoloquia redonda. . .	1
Polvo de camedrios.	1
Polvo de manzanilla.	1
Polvo de centauro menor.	1

Mézclese exactamente.

6953. P. DE ASA FÉTIDA.

℥ Asa fétida.	ḡxv (75 cent.).
Jar. de flor de naranj.	ʒj (30 gr.).
Agua dest. de valer.	ʒiij (90 gr.).
Yema de huevo.	ʒʒ (15 gr.).

H. S. A.

6954. P. ASTRINGENTE.

℥ Alumbre.	ʒʒ (2 gr.).
Opio.	ḡvj (3 dec.).
Goma quino.	ḡxviii (4 gr.).
Diascordio.	ʒʒ (2 gr.).

H. S. A. y dividase en doce papeles.

I. Metrorragia, diarreas rebeldes. *D.* Un papel cada tres horas.

6955. Otro, n. 2.

℥ Raiz de bistorta.	48
Raiz de tormentila.	43
Flores de granado.	24
Semillas de agracejo.	24
Catecú.	24
Almáciga en lágrimas.	24
Sangre de drago.	24
Sucino.	18
Bol arménico preparado.	18
Tierra sellada preparada.	18
Coral rojo.	18
Extracto de opio.	1

M. I. y *D.* Se usa este polvo como astringente á la dosis de ḡxij á ʒj (6 dec. á 4 gr.).

6956. Otro (GAUBIUS).

℥ Oxido rojo de hierro.	ʒʒ (2 gr.).
Sangre de drago.	ʒj (4 gr.).
Sarcocola.	ʒiij (8 gr.).
Bol arménico.	ʒj (32 gr.).

M. D. Sirve para espolvorear las superficies sangrientas despues de haberlas lavado; se las cubre con hilas empapadas en alcohol caliente.

6957. P. ASTRINGENTE.

℥ Alumbre.	ʒʒ (2 gr.).
Opio.	ḡiij (15 cent.).

Mézclese y dividase en seis papeles.

I. Diarreas rebeldes. *D.* Un papel cada dos ó tres horas.

6958. Otro, n. 2.

℥ Catecú.	1
Sangre de drago.	1

M. I. ʒj á ʒʒ (4 á 6 gr.).

6959. Otro (BRÉRA).

℥ Cascarilla.	ḡxviii (4 gr.).
Opio puro.	ḡij (4 dec.).
Ipecacuana.	ḡij (4 dec.).
Catecú.	ḡxviii (4 gr.).

Dividase en doce papeles.

I. Hemorragias, diarrea crónica, disenteria. *D.* Un papel mañana y noche.

6960. P. ASTRINGENTES (F. N. P.).

℥ Alumbre,	
Goma quino, ãã.	ʒʒ (16 gr.).
Mirra,	
Incienso, ãã.	ʒij (8 gr.).

H. S. A. *I.* Hemorragia por la picadura de sanguijuelas; úlceras que dan sangre.

6961. P. ASTRINGENTE (Griffith).

℥ Bol arménico,	
Alumbre, ãã.	ʒʒ (15 gr.).
Sangre de drago.	ʒij (8 gr.).
Sulfato de hierro.	ʒj (30 gr.).

M. y con c. s. de clara de huevo se hace una pasta blanda que se extiende sobre un lechino de hilas, y se introduce en las narices en los casos de epistaxis.

6962. P. ASTRINGENTE (Otto).

- ℞ Sulfato de quinina. ḡiij (15 cent.).
- Oxido negro de hier. ḡx (50 cent.).
- Regaliz en polvo. . . ḡxij (60 cent.).
- Esencia de yerba-

buena rizada. 1 gota.

Mézclese y divídase en doce papeles.

I. Gonorreas rebeldes. D. Un papel, cuatro veces al dia.

6963. P. ASTRINGENTE (Vogt).

- ℞ Alumbre,
- Catecú, ãã. 3j (4 gr.).
- Extracto de ratania,
- Regaliz en polvo, ãã. . . 3ij (8 gr.).

Mézclese y divídase en quince papeles.

I. Flujos mucosos crónicos, hemorragias pasivas. D. Dos, tres ó cuatro papeles al dia.

6964. P. ASTRINGENTE HEMOSTÁTICO.

- ℞ Alumbre. 5
- Catecú. 5
- Bol arménico. 30
- Goma quino. 5

Redúzcase á polvo muy fino.

I. Epistaxis, hemorragia, metrorragia, vegetaciones. D. Se espolvorea la superficie que da sangre y se cubre con una planchuela de hilas que se comprimirá; se tapanán las fosas nasales ó la vagina.

6965. P. ASTRINGENTES Ó DE LA MEZCLA (H. DE M.).

- ℞ Alumbre calcinado. 1
- Polvo de rosas rojas. 1
- Polvo de quina calisaya. 1

H. S. A. D. Se usa como tópicos en ciertas soluciones de continuidad fungosas y con poca vida.

6966. P. ASTRINGENTE OPIADO.

- ℞ Alumbre en polvo. . 3j (36 dec.).

- Opio en polvo. . . . ḡxvj (8 dec.).
 - Azúcar en polvo. . . ḡcviiij (54 dec.).
- Mézclese y divídase en papeles de ḡx á ḡxv (50 á 75 cent.).

I. Diarreas rebeldes. D. Un papel cada tres ó cuatro horas.

6967. P. ASTRINGENTE OPIADO DE VOGEL.

- ℞ Catecú. 5jß (6 gr.).
- Opio. ḡvj (3 dec.).
- Oleosácaro de clavo. . . 3ß (15 gr.).

Divídase en doce papeles.

I. Hemorragias, diarreas crónicas. D. Un papel cada tres horas.

I. Vegetaciones. D. En aplicaciones.

6968. P. ASTRINGENTE OPIADO (Boucharadat).

- ℞ Alumbre.
- Azúcar, ãã. 3j (4 gr.).
- Opio. ḡjv (2 dec.).

Mézclese y divídase en doce papeles iguales.

I. Diarreas rebeldes, hemorragias pasivas. D. Se toman dos ó tres papeles al dia.

6969. P. ATEMPERANTE.

- ℞ Digital en polvo. . . ḡxviiij (4 gr.).
- Nitro. ḡxc (5 gr.).
- Azúcar. 3v (20 gr.).

Mézclese y divídase en seis papeles.

I. Afecciones del corazon. D. Un papel al dia.

6970. Otro, n. 2.

- ℞ Goma arábica en polvo,
- Azúcar de leche,
- Azúcar, ãã. lbij (1000 gr.).
- Nitro. lbß (250 gr.).

Tridacio seco,

Acido benzóico, ãã. 3vj (25 gr.).

Mézclese exactamente.

I. Blenorragias agudas. D. 3ß (15 gr.) disuelta en dos cuartillos (1 lit.) de agua.

6971. P. ATEMPERANTE (n. 3).

℥ Clorato de potasa. ḡvij á ḡx (35 á 50 cent.).

Azúcar. ℥j (12 dec.).

I. Tisis pulmonar para disminuir el calor febril. *D.* Se repite la dosis dos ó cuatro veces.

6972. Olro (PITSCHAFT).

℥ Sulfato de sosa. . . ḡxc (5 gr.).
Opio. ḡijß (12 cent.).

I. Hemorragias é inflamaciones despues de la sangría.

6973. P. ATEMPERANTE DE STALH (F. F.).

℥ Sulfato de potasa,
Nitrato de potasa, ãã. ḡjx (288 gr.).
Sulfuro rojo de mercurio (cinabrio). ḡij (64 gr.).

Se porfirizan juntos hasta obtener un polvo sutil.

I. Afecciones herpéticas, eretismo, etc. Este polvo que en el día no tiene uso, era considerado como sedante por Stahl. *D.* ḡvj á ḡxviiij (3 á 9 dec.).

6974. P. DE ATROPINA ó Tomas de atropina.

℥ Atropina. ḡj (5 cent.).
Azúcar blanca. ḡij (10 cent.).

Se mezcla por trituracion y se divide en cien papeles.

I. Coqueluche. *D.* Dos ó tres papeles al dia á los niños de cinco años.

6975. P. AZAFRANADO.

℥ Azafran. ḡjv (16 gr.).
Ojos de cangrejos. . . ḡij (8 gr.).
Canela,
Sándalo cetrino, ãã. . ḡß (2 gr.).
Hojas de dictamo,
Mirra, ãã. ḡxviiij (4 gr.).

M. I. Amenorrea, dismenorrea, leucorrea, clorosis. *D.* Se usa para preparar la confeccion de jacin-
tos, y en bolos y píldoras.

6976. P. DE AZÚCAR MERCURIAL.

℥ Azúcar cande. ḡj (4 gr.).
Calomelanos. ḡij (8 gr.).
Tritúrese.

D. ḡjv á ḡviiij (2 á 4 dec.) aumentando progresivamente.

6977. P. DE AZUFRE Y ESCILA ó Polvo incisivo (H. M. F.).

℥ Azufre sublim. y lavad. ḡjv (2 dec.).
Escila en polvo. ḡij (4 dec.).

M. D. Para una dosis.

6978. P. DE AZUFRE TARTARIZADO (Jahn).

℥ Bitartrato de potasa. ḡß (15 gr.).
Azufre precipitado,
Azúcar blanca, ãã. . ḡij (8 gr.).
Polvo de acónito. . . ḡx (50 cent.).

M. I. Neuralgias, especialmente la ceática. *D.* Una cucharada de café cada dos ó tres horas.

6979. P. BALSAMICO.

℥ Acido benzóico. . . . ḡxij (6 dec.).
Azúcar en polvo. . . ℥j (12 dec.).
Oleosácuro de anís. ḡxxx (15 dec.).

M. I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* En ocho dosis.

6980. P. DE BELEÑO (Vogler).

℥ Extracto alcohólico de
beleño. ḡxij (6 dec.).
Subnitrato de bismuto. ḡx (5 dec.).
Magnesia. ḡß (2 gr.).

Azúcar de leche,
Oleosác. de hinojo, ãã. ḡijß (10 gr.).
Mézclese y divídase en diez papeles.

I. Asma, coqueluche, catarro, neumonía, bronquitis. *D.* Un papel cada tres horas.

6981. P. DE BELLADONA COMPUESTO ó Polvo sedante de Wetzler.

℥ Raiz de bellad. en p. ḡvj (3 dec.).
Azúcar. ḡxxjv (12 dec.).

Mézclese y divídase en veinticuatro tomas.

I. Coqueluche de los niños y tos nerviosa de los adultos. *D.* Dos á seis tomas al dia á los niños, segun la edad, y hasta doce á los adultos.

6982. P. DE BELLADONA COMPUESTO (*Hufeland*).

℞ Raiz de belladona en p. ʒx (5 dec.).
Ruibarbo en polvo. . . ʒij (24 dec.).
Mézclase y divídase en diez y ocho tomas.

I. Asma espasmódico, hipertrofia y degeneracion del higado y del bazo, ictericia, palpitations de corazon simpáticas. *D.* Dos ó tres papeles al dia.

6983. P. DE BELLADONA OPIADO
ú *Hojas de belladona opiadas.*

℞ Hojas de belladona. . . ʒjv (16 gr.).
Extracto de opio. ʒxviii (1 gr.).
Agua pura. ʒjv (16 gr.).

Se disuelve el extracto en el agua, se impregnan exactamente de él las hojas de belladona colocadas en un vaso de loza, y se secan en un tamiz al aire libre.

I. Hemotisis complicada con tisis pulmonar.

6984. P. BENEDICTOS PARA EL CÁNCER (H. DE M.).

℞ Raiz de dragencillo, recolectada en los meses de junio, julio ó agosto y desecada. ʒiiij (96 gr.).

Acido arsenioso opaco, sutilmente pulveriz. ʒj (32 gr.).

Hollin de chimenea, abundante en principios solubles. . . ʒiiij (12 gr.).

Se mezclan exactamente levigándolos sobre un pórfido y se guardan en un frasco bien tapado.

I. Cáncer. Segun el autor, son tanto mejores cuanto mas antiguos, por lo que no se usan hasta pasado un año.

6985. P. DE BENJUI (*Pii*).

℞ Benjuí,
Azúcar cande, ʒā. ʒß (2 gr.).
Divídase en seis papeles.

I. Asma, bronquitis, catarro

crónico, neumonía, histérico. *D.* Un papel mañana y noche en una infusion de marrubio.

6986. P. BEZOARDICOS DE CURBO
ó *Polvos antisépticos de quina*
(F. E.).

℞ Raiz de contrayerba,
Raiz de carlina,
Raiz de tormentila,
Raiz de dictamo blanco,
Flores de amapola,
Hojas de cardo santo,
Hojas de escordio, ʒā. ʒij (8 gr.).
Perlas levigadas,
Cuerno de ciervo levigado,
Ojos de cangrejos levigados,
Antimonio diaforético,
Piedra cananor,
Bezoar oriental,
Pied. cordial de Goa, ʒā. ʒj (4 gr.).
Quina peruv. escogida. ʒij (64 gr.).
Se reducen á polvos muy sutiles.

I. Se usan como antipútridos y entran en la composicion de los cocimientos bezoárdicos de Curbo. *D.* De ʒij á ʒj (24 dec. á 4 gr.).

6987. P. BENZOICO ANTIMONIADO.

℞ Quermes mineral. . . ʒiiij (15 cent.).
Acido benzóico. ʒvj (30 cent.).
Castóreo. ʒij (10 cent.).
Divídase en seis papeles.

I. Catarro sofocante, coqueluche. *D.* Un papel cada cuatro horas en una cucharada de infusion de marrubio.

6988. P. BENZOICO ASTRINGENTE
(*Geigel*).

℞ Acido benzóico,
Tanino, ʒā. ʒxviii (4 gr.).
Azúcar. ʒijß (10 gr.).
Divídase en veinte papeles.

I. Coqueluche. *D.* Un papel cada dos horas á los niños de tres años.

6989. P. DE BERENDS.

℞ Calomelanos. ʒv (25 cent.).
Digital purpúrea. . . ʒjv (20 cent.).
Azúcar. ʒj (4 gr.).

Háganse doce papeles.

I. Bronquitis, coqueluche, hidrocéfalo, diarrea. *D.* Un papel cada dos horas.

6990. P. DE BERLIN OLOROSO.

℞ Almizcle.	ḡij	(1 dec.).
Benjuí,		
Cascarilla, ãã.	ḡj	(4 gr.).
Estoraque calamita,		
Lirio, ãã.	ḡß	(16 gr.).
Clavo,		
Canela, ãã.	ḡiij	(12 gr.).
Rosas rojas,		
Flores de espliego,		
Flores de granado, ãã.	ḡvj	(24 gr.).
Macis.	ḡß	(2 gr.).
Esencia de bergamota,		
Esencia de clavo, ãã.	ḡxij	(6 dec.).
Esencia de manzanilla.	ḡviiij	(4 dec.).
Esencia de rosas.	ḡxij	(6 dec.).

Mézclese y redúzcase á un polvo impalpable, de que se echará una pulgarada sobre una chapa de hierro caliente.

6991. P. DE BICARBONATO DE SOSA.

℞ Bicarbonato de sosa.	ḡxviiij	(4 gr.).
Opio.	ḡj	(5 cent.).
Oleosácara de menta piperita,		
ó Cajeput.	ḡxviiij	(4 gr.).

Divídase en seis papeles.

I. Estafiloma, tifo, cólera, dispepsia. *D.* Un papel cada hora. Despues se toma una cucharadita de café de zumo de limon.

6992. P. DE BOL ARMÉNICO (F. F.).

℞ Bol de Armenia. c. s. q.
Se pulveriza por contusion en un almirez, se echa el producto en un barreño con agua fria, se deslie perfectamente, y se deja cuarenta y ocho horas en el agua, meneándole de cuando en cuando. Pasado este tiempo se revuelve el polvo dentro del agua y despues de algunos minutos de reposo se decanta el liquido turbio, cuya operacion se repite cuantas veces

sea necesario para separar todo el polvo sutil: se arroja el residuo como inútil, se dejan sedimentar los líquidos decantados, se separa el sedimento, se pone á escurrir sobre un lienzo, se trocisca y se seca.

I. y *D.* V. t. I, pág. 221.

6993. P. DE CAINCA (Beral).

℞ Solucion alcohólica de extr. de cainca. ḡjv (125 gr.).
Azúcar blanca en pedazos. ḡbjß (750 gr.).
Se vierte el liquido sobre el azúcar, se le deja secar al aire libre y se reduce á polvo. *D.* ḡj á ḡjv (4 á 16-gr.) al dia en cuatro cucharadas de agua.

6994. P. CALMANTE.

℞ Subnitrate de bismuto. ḡjv (2 dec.).
Magnesia calcinada,
Azúcar, ãã. ḡß (2 gr.).
Mézclese y dividase en cuatro papeles.

I. Gastrodinia, cólera, pirosis, dispepsia, tisis, gastralgia, gastritis, bronquitis, ronquera. *D.* Un papel cada hora en media taza de infusion de manzanilla.

6995. Otro (BERENDS).

℞ Raiz de belladona. ḡiiij (15 cent.).
Ipecacuana. ḡij (10 cent.).
Oxido de zinc. ḡvj (30 cent.).
Azúcar. ḡj (4 gr.).
H. S. A. seis papeles.

I. Epilepsia, hidrocéfalo, tisis, bronquitis, coqueluche, pirosis, dispepsia. *D.* Uno cada dos horas.

6996. Otro (CLARUS).

℞ Magisterio de bismuto, ḡviiij á ḡxjv (4 á 7 dec.).
Ipecacuana. ḡijß (12 cent.).
Magnesia calcinada. ḡij (8 gr.).
H. S. A. doce papeles.

I. Gastrodinia. *D.* Un papel, tres ó cuatro veces al dia.

6997. P. CALMANTE (Cottereau).

℥ Extr. hidroalcohólico de pulsatila. ḡxij (6 dec.).
 Polvo de digital purpúrea. ḡvj (3 dec.).
 Acetato de morfina. ḡj (5 cent.).
 Azúcar blanca. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. un polvo muy homogéneo, que se deberá dividir en treinta y seis partes iguales.

I. Tos é insomnio de los tísicos, coqueluche, bronquitis, pirosis, neumonía, tisis, catarro crónico, tos convulsiva, dispepsia. *D.* Cuatro tomas cada día, con cerca de cuatro horas de intervalo de unas á otras.

Nota. El modo mas conveniente de administrarlos es diluir cada toma en una cucharada de agua azucarada ó de jarabe, ya de goma ó de puntas de espárragos.

6998. Otro (HENNING).

℥ Cianuro de zinc. ḡvj (3 dec.).
 Magnesia calcinada. ḡjv (2 dec.).
 Canela. ḡiij (15 cent.).

M. I. Afecciones nerviosas y calambres de estómago. *D.* Se toma cada cuatro horas.

6999. Otro (KOPP).

℥ Subnitrato de bism. ḡxij (60 cent.).
 Extr. de lechuga vir. ḡvj (30 cent.).
 Magnesia calcinada. ḡxv (75 cent.).
 Ipecacuana. ḡjv (20 cent.).
 Oleosácaro de manz. ʒβ (2 gr.).
 Dividase en cinco papeles.

I. Tisis, gastralgia, bronquitis, ronquera, gastrodinia, dispepsia, pirosis. *D.* Un papel cada dos horas.

7000. Otro (KOPP).

℥ Raiz de belladona. ḡij (1 dec.).
 Ipecacuana, ḡj á ḡij (5 á 10 cent.).
 Azufre depurado. ʒβ (2 gr.).
 Azúcar de leche. ḡx (3 dec.).
 H. S. A. ocho papeles.

I. Coqueluche. *D.* Un papel, cuatro veces al día.

7001. Otro (MARENS).

℥ Magisterio de bismuto,
 Almizcle, ãã. ḡj (5 cent.).
 Extracto de beleño. ḡβ (25 mil.).
 Magnesia. ḡvj (3 dec.).

I. Gastrodinia. *D.* Esta cantidad cada tres horas.

7002. Otro (VOGT).

℥ Extr. de beleño. ʒij (24 dec.).
 Azúcar de leche. ḡljv (3 gr.).
 Regaliz. ʒβ (15 gr.).
 Goma arábica. ʒij (8 gr.).
 Oleosácaro de hinojo. ʒiij (12 gr.).

M. I. Catarros. *D.* Una cucharada de café tres ó cuatro veces al día con agua de malvabisco.

7003. P. CALMANTE ABSORBENTE (Righini).

℥ Carbonato de sosa. ʒij (8 gr.).
 Semillas de beleño. ḡxviij (1 gr.).
 Azúcar. ʒj (4 gr.).
 Hágase polvo y dividase en seis tomas iguales.

7004. P. DE CALOMELANOS (Swediaur).

℥ Mercurio dulce. ḡvj (3 dec.).
 Almidon. ḡxij (6 dec.).
 Azúcar blanca. ʒβ (2 gr.).
M. I. Es laxante. *D.* De una vez.

7005. P. CALMANTE CONTRA LA COQUELUCHE (Viricel).

℥ Polvo de raiz de belladona. ḡiij (15 cent.).
 Cochinilla en polvo,
 Bicarb. de sosa, ãã. ḡxij (60 cent.).
 Azúcar en polvo. ʒj (30 gr.).
 Mézclese y dividase en doce papeles.

I. Es muy eficaz contra la tos convulsiva y la coqueluche. *D.* Un papel por la noche.

7006. P. DE CALOMELANOS CON OPIO (F. P.).

℞ Protocloruro de mercurio. 4
 Opio. 4
M. I. Afecciones venéreas, dolores artríticos y venéreos de los ojos. *D.* ḡß á ḡj (25 á 50 mil.) ó mas, aumentando gradualmente, y c. s. para destruir la atonía de las úlceras venéreas.

7007. P. DE CALOMELANOS OPIADO (H. DE AL.).

℞ Calomelanos. ḡvj (3 dec.).
 Opio. ḡij (4 dec.).
 Azúcar blanca. 3j (4 gr.).
 Mézclese y divídase en seis papeles.
I. Es alterante, y Hufeland prescribe este polvo en las inflamaciones locales, y principalmente al principio de las pleuresías. *D.* Un papel de hora en hora.

7008. P. DE CAL VIVA.

℞ Cal viva en polvo. c. s. q.
I. Reumatismo crónico. Se espolvorea las partes doloridas, pero antes se las cubre de miel. Se cubre todo con papel de estraza ó una franela.

7009. P. DE CANELA (F. F.).

℞ Cortezas de canela. c. s. q.
 Se pulverizan por contusion sin dejar residuo.
 Del mismo modo se pulverizan las cortezas de CANELA DE CEYLAN, CANELA BLANCA, CLAVO, QUINA CALISAYA SIN EPI-
 DERMIS Y CORTEZA DE WINTER.

7010. P. DE CANELA COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Canela. 3ij (64 gr.).
 Cardamomo. 3x (40 gr.).
 Gengibre. 3j (32 gr.).
 Pimienta larga. 3ß (16 gr.).
 Se reducen todos á un polvo

muy sutil. *D.* ḡxviiij (1 gr.) como tónico.

7011. P. DE CANTÁRIDAS (F. F.).

℞ Cantáridas. c. s. q.
 Se ponen á secar al sol ó en la estufa, y despues de bien secas se pulverizan por contusion en un mortero de bronce sin dejar residuo.

El operario debe tomar las precauciones necesarias para librarse del polvo en esta pulverizacion. Del mismo modo se pulverizan la COCHINILLA, GRANA QUERMES Y MILPIÉS.

7012. P. DE LOS CAPUCHINOS.

℞ Semilla de cebadilla,
 Semilla de estafisagria,
 Semilla de peregil,
 Hojas de tabaco, ãã. . . 3ß (2 gr.).
I. Se usa para destruir los piojos. *D.* Se espolvorea la cabeza con c. s. de este polvo.

7013. P. CAQUÉCTICO.

℞ Oxido negro de hierro. 3
 Polvo aromático. 6
 Azúcar. 8
M. I. Raquitis, leucorrea. *D.* 3ß á 3j al dia (2 á 4 gr.) y ḡvj á ḡx (3 á 5 dec.) para los niños.

7014. Otro (HARTMANN).

℞ Azafran de marte aperitivo. 4
 Canela en polvo. 2
 Azúcar. 5
H. S. A. Este polvo se emplea como tónico.

7015. P. DE CARBON MAGNESIANO.

℞ Carbon vegetal. 3vj (192 gr.).
 Magnesia. 3ij (8 gr.).
 Se porfirizan, [se mezclan con cuidado y se añade:
 Esencia de yerbabuen. ḡxviiij (1 gr.).
 Se usa como dentífrico.

7016. P. DE CARBON CON QUINA.

℞ Polvo de quina. 4

Polvo de carbon. 1
M. Se usa para espolvorear y curar las heridas gangrenosas.

Este polvo constituye un dentífrico excelente. Se le añade algunas veces el crémor de tártaro, la mirra, el lirio, etc.

7017. P. DE CARBONATO DE CAL COMPUESTO (F. ED.).

℞ Carbonato de cal preparado y pulverizado. ℥ij (60 gr.).
 Canela en polvo. ℥jβ (45 gr.).
 Nuez moscada en polvo. ℥ij (8 gr.).

M. I. Diarreas y disenterias crónicas. *D.* De 3β á 3j (2 á 4 gr.).

7018. P. DE CARBONATO DE MAGNESIA (Frank).

℞ Carbon. de magnesia. ℥ij (24 dec.).
 Polvo de ruibarbo. ḡx (5 dec.).
 Polvo de canela. ḡxij (6 dec.).

D. Se toma en dos veces en los casos de cardialgias y agrios.

7019. P. DE CARBONATO DE MAGNESIA CON LA SOSA (Nicolai).

℞ Regaliz en polvo. ℥j (12 dec.).
 Carbonato de magnes. ℥β (6 dec.).
 Carbonato de sosa,
 Polvo de gengibre, ãã. ḡv (25 cent.).

D. Se toma de una vez en los casos de cardialgia.

7020. P. DE CARDAMOMO (F. F.).

℞ Cardamomo. c. s. q.
 Se rompen los frutos del cardamomo para sacar las semillas; se desecan estas en la estufa, y se pulverizan sin dejar residuo.

Del mismo modo se pulverizan el AMOMO RACIMOSO Y LOS DEMÁS CARDAMOMOS.

7021. P. DE CARDENILLO (F. F.).

℞ Cardenillo. c. s. q.
 Se pulveriza por contusion en un almirez de bronce cubierto

con una gamuza, y se pasa por un tamiz de seda tapado.

Del mismo modo se preparan los polvos de ALUMBRE, CAL, CARBON VEGETAL; CRÉMOR DE TÁRTARO, LITARGIRIO, PERÓXIDO DE MANGÁNESO, SULFATO DE ZINC, DE POTASA Ó DE HIERRO, y en general los de todas las sustancias minerales que puedan rayar el mármol, y que en seco no tienen accion sobre el bronce.

7022. P. DE CARIGNAN, tal como le ha dado la princesa á Piat y Deyeux.

℞ Polvo de Guteta. ℥β (250 gr.).
 Ambar gris. ℥xij (375 gr.).
 Coral rojo. ℥jv (125 gr.).
 Tierra sellada. ℥jv (125 gr.).

Cinabrio,
 Quermes mineral,
 Negro de marfil, ãã. ℥iij (12 gr.).
 Mézclese y divídase en tomas de ḡij (1 dec.).

7023. P. CARMINATIVO Y ESTOMACAL.

℞ Azúcar de leche. ℥jv (125 gr.).
 Canela en polvo,
 Semillas de anís,
 Gengibre, ãã. ℥jv (48 dec.).

M. D. Una cucharadita de café por la mañana, al medio día y por la noche, en medio vaso de agua azucarada y aromatizada con algunas gotas de agua de flor de naranjo.

7024. P. DE CASTÓREO (F. F.).

℞ Castóreo. c. s. q.
 Se rasgan las bolsas, se quita la cubierta exterior y las membranas que se puedan, y se pulveriza el resto por trituracion tamizándolo sin dejar residuo.

I. y D. Véase tomo I, pág. 141.
 Del mismo modo se pulveriza el ALMIZCLE.

7025. P. CATÁRTICO.

℞ Polvo de ruibarbo,

Polvo de cáscara de naranja,
Crémor de tártaro, ãã. ʒʒ (15 gr.).
M. D. De ʒʒ á ʒj (2 á 4 gr.).

7026. P. CATÁRTICO (H. M.).

ʒ Crémor de tártaro,
Azúcar blanca, ãã. ʒj (30 gr.).
Mézclese y dividase en cuatro
papeles iguales. D. Uno cada tres
horas.

**7027. P. CATÁRTICO FEBRÍFUGO
(H. DE MOMP.).**

ʒ Quina roja. ʒiij (12 gr.).
Magnesia calcinada. . . ʒij (8 gr.).
Manzanilla romana. . . ʒj (4 gr.).
Mézclese y dividase en cuatro
papeles.

D. Uno cada cuatro horas en una
taza de infusión de achicoria sil-
vestre.

**7028. P. CATÁRTICO ó Polvo de
jalapa y escamonea.**

ʒ Polvo de jalapa. 5
Polvo de escamonea. 4
Bitartrato de potasa. 2
Se tritura por mucho tiempo.

D. ʒviiij á ʒljjv (4 dec. á 3 gr.)
en un vehículo apropiado.

7029. P. CATERÉTICO.

ʒ Alumbre calcinado. 4
Pimienta larga. 4
Sulfato de zinc. 4
Sabina. 4

H. S. A. I. Excrescencias ó úl-
ceras venéreas, dolores osteoco-
pos. Se espolvorea la parte con
c. s. de este polvo.

7030. Otro (AMMON).

ʒ Sabina. ʒij (8 gr.).
Alcanfor. ʒj (4 gr.).
Sal amoniaco. ʒv (20 gr.).

I. y D. Se usa c. s. para espol-
vorear las úlceras fungosas, ve-
getaciones y mamelones carnosos.

7031. Otro (RODINGTON).

ʒ Alumbre calcinado en polvo. 4
Verde gris en polvo. 4
Sabina en polvo. 4

M. I. Grietas y vegetaciones si-
filiticas. D. Se espolvorea con este
polvo la superficie que se quiere
cauterizar.

**7032. P. DE CATECÚ COMPUESTO
(H. DE AL.).**

ʒ Catecú,
Cascarilla,
Goma arábica,
Canela, ãã. ʒj (4 gr.).
Mézclese y dividase en doce pa-
peles.

I. Diarrea crónica, hemorragia,
odontalgia, espasmo, dispepsia.
D. Un papel cada dos horas.

**7033. P. CATÓLICOS PURGANTES
ó Polvos católicos de escamonea
(F. E.).**

ʒ Polvos de escamonea
escogida. ʒʒ (16 gr.).
Raiz de mechoacan,
Raiz de jalapa, ãã. . . ʒvj (24 gr.).
Tartrato de potasa. . . ʒiij (12 gr.).
Háganse polvos S. A.

I. Son purgantes y convienen
principalmente en las obstruccio-
nes de las vísceras. D. De ʒj á ʒij
(12 á 24 dec.).

7034. P. CÁUSTICO.

ʒ Alumbre calcinado. . . ʒj (30 gr.).
Precipitado rojo. . . . ʒʒ (15 gr.).

M. I. Sirven para corroer y des-
truir las carnes fungosas de las
heridas y de las úlceras, y fijar
la úlcera pútrida.

**7035. P. CÁUSTICO (Kruger,
Masius).**

ʒ Bicloruro de mercurio,
Sulfato de cobre, ãã. . ʒx (5 dec.).

Nitrato de plata. ḡvj (3 dec.).

H. S. A. I. Vegetaciones y grietas sifilíticas. *D.* Se aplica un poco de este polvo en la superficie que se quiere cauterizar, y se humedece despues con un poco de agua. Se usará este polvo con mucha circunspeccion.

7036. P. CÁUSTICO (PLENK).

℥ Oxido rojo de mercurio,
Alumbre calcinado, ãã. ʒj (4 gr.).
Sabina. ʒß (16 gr.).

M. I. Se usa para reprimir las carnes fungosas de las úlceras venéreas, condilomas, dolores osteocopos, verrugas.

El POLVO CÁUSTICO DE GARDINER tiene la misma composicion.

LOS POLVOS CÁUSTICOS Ó CATERÉTICOS DE LOS H. DE M. se componen de ʒij (8 gr.) de polvo de sabina, ʒij (8 gr.) de alumbre calcinado y ʒj (4 gr.) de precipitado rojo.

7037. P. CEFALICO (Siedler).

℥ Peonía. ʒß á ʒj (6 á 12 dec.).
Oxido de zinc. ḡx á ḡxjv (5 á 7 dec.).
Extracto de beleño. ḡj á ḡij (5 á 10 cent.).

M. I. Ha sido recomendado en la epilepsia y corea. *D.* ḡxviiij (9 dec.) mañana y noche, aumentando la dosis hasta ḡxxjv (12 dec.).

7038. P. CEFÁLICO DE TABACO.

℥ Tabaco rapé. ʒß (15 gr.).
Polvo de mejorana,
Polvo de lirio de los valles,
Polvo de maro, ãã. . . ʒß (2 gr.).
Polvo de castaño de Indias. ʒj (4 gr.).

M. I. Cefalalgia. *D.* Se toma muchas veces al dia como el tabaco.

7039. P. DE CENTAURA MENOR (F. F.).

℥ Sumidades floridas de centaura menor. c. s. q.
Se desecan en la estufa, y se

pulverizan por contusion hasta obtener las tres cuartas partes del peso total.

I. y D. V. tomo I, pág. 146.

Del mismo modo se pulverizan las SUMIDADES DE HIPERICON, DE CUAJALECHE y las demás sumidades floridas.

7040. P. DE CETRARINO (Muller).

℥ Cetrarino,
Goma arábica, ãã. . . ḡxviiij (1 gr.).
Azúcar. ḡxc (5 gr.).
Mézclese y divídase en ocho papeles.

I. Apirexia de las calenturas intermitentes. *D.* Un papel cada dos horas.

7041. P. CIANURADO (Henning).

℥ Cianuro de zinc. . . ḡß (25 mil.).
Magnesia calcinada. . ḡjv (20 cent.).
Canela en polvo. . . ḡiiij (15 cent.).
Divídase en seis papeles.

I. Enfermedades convulsivas y particularmente las que complican la denticion y las afecciones verminosas de los niños, calambres de estómago, dismenorrea. *D.* Un papel cada cuatro horas.

7042. P. DE CIANURO DE HIERRO.

℥ Cianuro de hierro. . . ḡxij (6 dec.).
Azúcar. ḡxc (5 gr.).
Divídase en quince papeles.

I. Escrófulas, sífilis, epilepsia, corea, calenturas intermitentes. *D.* Un papel cada dos horas.

7043. P. DE CIANURO DE ORO (Chrestien).

℥ Cianuro de oro. . . . ḡj (5 cent.).
Raiz de lirio en polvo. ḡij (10 cent.).
Divídase en papelitos que se emplean en fricciones.

7044. P. DE CLARC.

℥ Mercurio dulce. . . . ḡjv (2 dec.).

Bolo arménico. ḡvj (3 dec.).

Divídase en cuatro papeles.

D. En el día, en cuatro fricciones en las encías, en la superficie interna de los labios, de la lengua y del paladar, por el método de Clare y Bráchet.

7045. P. DE CLORURO DE BARIO
(*Swediaur*).

℥ Cloruro de bario. . . . ʒij (8 gr.).

Protocloruro de merc. ḡx (5 dec.).

Sulfuro de antimonio. . . ḡvj (3 dec.).

Divídase en cincuenta papeles.

I. Escrófulas, sífilis, viruelas, tiña, tifo, gangrena de hospital. *D.* Dos papeles al día en ʒijβ (10 gr.) de jarabe.

7046. P. DE CLORURO DE ORO.

℥ Cloruro de oro: . . . ḡj (5 cent.).

Almidon en polvo. . . ʒv (600 cent.).

Mézclese exactamente y divídase en quince papeles.

I. Enfermedades venéreas rebeldes al mercurio, escrófulas y herpes. *D.* Un papel en fricciones.

7047. P. DE CLORURO DE ORO Y SODIO (*Magendie*).

℥ Clor. de oro y sodio. ḡj (5 cent.).

Lirio de Florencia en polvo. ḡij (10 cent.).

Mézclese íntimamente y divídase en papeles iguales.

I. Sífilides, tiña, viruelas. *D.* Un papel mañana y noche en fricciones en las encías.

7048. P. DEL CONDE DE PALMA.

Con este nombre se ha aconsejado, lo mismo que con el de polvo de Sentinelli, polvo de Valentini, polvo de Swinger ó panacea inglesa, el uso del carbonato de magnesia.

7049. P. DE CLORURO DE PLATA.

℥ Cloruro de plata. . . ḡj (5 cent.).

Lirio de Florencia. . . ḡij (10 cent.).

Divídase en ocho papeles.

I. Enfermedades sífilíticas, sífilides, epilepsia. *D.* En fricciones en la lengua.

7050. P. DE COLOFONIA (F. F.).

℥ Colofonia. c. s. q.

Se pulveriza por trituración, y se pasa por tamiz. Véase tomo I, pág. 160.

Del mismo modo se pulverizan el BENJUI, el BÁLSAMO DE TOLÚ, las RESINAS DE ALMÁCIGA, de GUAYACO ó de JALAPA, la SANGRE DE DRAGO y demás resinas.

7051. P. DE COLOQUINTIDA
(F. F.).

℥ Frutos de coloquintida c. s. q.

Se abren para sacar las semillas que se arrojan, se corta la carne en pedazos pequeños, se deseca en la estufa, y se pulveriza por contusión sin dejar residuo. Véase tomo I, pág. 160 y 161.

Del mismo modo se pulverizan las CABEZAS DE ADORMIDERAS.

7052. P. DE COLOQUINTIDA
(H. DE AL.).

℥ Coloquintida. ḡj á ḡiij (5 á 15 cent.).

Goma arábiga,

Regaliz,

Azúcar blanca, ãã. . . ḡv (25 cent.).

M. D. De una vez.

7053. P. DE COLOMBO.

℥ Colombo. ḡxviii (4 gr.).

Magnesia calcinada. . . ʒβ (2 gr.).

Oleosácara de canela. ʒj (4 gr.).

Divídase en seis papeles.

I. Dispepsia, diarrea, pirosis, acidez de las primeras vías. *D.* Dos papeles mañana y noche.

7054. P. DEL CONDE DE WARWICK.

℞ Diagridio sulfurado. ℥ij (60 gr.).
 Antimonio diaforético. ℥jβ (45 gr.).
 Crémor de tártaro. . . ℥β (15 gr.).
 H. S. A. *l. y D.* Se usa como purgante á la dosis de ℞β á ℞j (6 á 12 dec.).

7055. P. DE CONTENT.

℞ Azúcar. lbj (500 gr.).
 Harina de arroz. . . lbij (4000 gr.).
 Cacao. lbjβ (750 gr.).
 Canela. ℥vj (25 gr.).
 Clavo. ℥ijβ (10 gr.).
 Cardamomo. ℥xc (5 gr.).
 Báls. negro del Perú. 5 gotas.
 H. S. A. Se usa como analéptico.

7056. P. CONTRA LA AMAUROSIS (H. DE M.).

℞ Extracto de pulsatila. ℥j (5 cent.).
 Raiz de valeriana en p. ℞ij (24 dec.).
 Mézclese y divídase en dos papeles. *D.* Se toma uno por la mañana y otro por la noche.

7057. P. CONTRA LA AMENORREA (Tshierchki).

℞ Extracto de tejo. . . . ℥ij (10 cent.).
 Calomelanos. ℥j (5 cent.).
 Azúcar blanca. ℥x (50 cent.).
 Esencia de sabina. . . 4 gota.
 H. S. A. una dosis.
D. Una dosis mañana y noche.

7058. P. CONTRA LA AMENORREA (Fouquier).

℞ Carbonato de hierro. . ℥β (18 dec.).
 Extracto seco de quina. ℞j (12 dec.).
 Polvo de canela. . . . ℞β (6 dec.).
D. Se toma primero en tres veces, despues en dos ó en una al día antes de comer.

7059. P. CONTRA LA ATROFIA MESENTÉRICA (Wendt).

℞ Calomelanos. ℥viii á ℥xvj (4 á 8 dec.).
 Flores de azufre. ℥β á ℥j (2 á 4 gr.).
 Azúcar blanca. . . . ℥j (4 gr.).
 Divídase en cuatro papeles iguales.
D. Un papel mañana y noche.

7060. P. CONTRA EL BOCIO.

℞ Esponja tostada de color rojo. ℥v (20 gr.).
 Clorhidrato de amon. ℥xviii (1 gr.).
 Carbon vegetal. . . . ℥xviii (1 gr.).
M. l. Bocio, tumores blancos, leucorrea, raquitis, escrófulas.
D. Se da en tomas de ℥xviii (1 gr.). A los enfermos de diez años se dan ℥lv (3 gr.) al día en tres tomas, una por la mañana, otra al medio día y otra por la noche. Se introduce la dosis en el fondo de la boca con una cucharadita de café y se hace tragar el polvo seco. Es muy eficaz, y para hacerle mas activo se añade á la fórmula ℥xviii (1 gr.) de ioduro de potasio. Algunas veces se añade ℥v (20 gr.) de musgo de Córcega en polvo, y en este caso hay que poner la mitad del clorhidrato de amoniaco.

Esta preparacion puede reemplazar el *polvo de Sency*, cuya eficacia está generalmente reconocida.

7061. P. CONTRA LOS CALAMBRES DE ESTÓMAGO (H. DE AL.).

℞ Subnitr. de bismuto. ℥xij (6 dec.).
 Gengibre en polvo. . . ℥viii (4 dec.).
 Conchas de ostras preparadas. ℞ij (24 dec.).
 Azúcar blanca. . . . ℥ij (8 gr.).
 Mézclese y divídase en ocho papeles.
D. Un papel dos ó tres veces al día, en una taza de infusion de

manzanilla ó de yerbabuena de sabor de pimienta.

7062. P. CONTRA LOS CALAMBRES DE ESTÓMAGO (Wendt).

℞ Magisterio de bismuto. ḡxij (6 dec.).
 Extracto de lechuga virosa. ℞j (12 dec.).
 Polvo de ipecacuana. ḡiij (15 cent.).
 Oleosácaro de menta piperita ó de manzanilla. ℞ijß (3 gr.).
 H. S. A. un polvo, que se dividirá en seis tomas iguales. *D.* Tres ó cuatro tomas al día.

7063. P. CONTRA EL CÓLICO SATURNINO (Harlon).

℞ Calomelanos preparados al vapor. ḡv (25 cent.).
 Opio en polvo. ḡij (10 cent.).
 Acetato de plomo. ḡiij (15 cent.).
M. D. Para una dosis, que puede repetirse cada dos horas hasta que alivie, lo cual acaece á las dos ó tres horas.

7064. P. CONTRA LA COQUELUCHE.

℞ Belladona. 4
 Cicuta. 4
 Oxido de zinc. 4
D. ḡj á ḡv (5 á 25 cent.) al día.

7065. Otro, n. 2.

℞ Quermes mineral. ḡij (1 dec.).
 Ipecacuana. ḡvj (3 dec.).
 Mézclese y dividase en seis papeles.
D. Un papel cada cuatro horas.

7066. Otro, n. 3.

℞ Polvo de raiz de belladona. ḡjv (2 dec.).
 Polvo de ipecacuana. ḡviiij (4 dec.).
 Azúcar. ḡijß (10 gr.).
 Divídase en diez y seis papeles.
D. Uno ó dos al día á un niño de tres años.

7067. Otro, n. 4.

℞ Quermes. ḡij (1 dec.).

Ipecacuana en polvo. ḡjv (2 dec.).
 Raiz de belladona en p. ḡj (5 cent.).
 Mézclese y dividase en seis papeles.

D. Se toma uno cada cuatro horas.

7068. Otro (BRACHET).

℞ Extracto de opio,
 Extr. de belladona, añ. ḡvj (3 dec.).
 Azúcar de leche. ḡxviiij (1 gr.).
 H. S. A. seis papeles iguales.
D. Uno ó dos en las veinticuatro horas en algunas cucharadas de tisana.

7069. Otro (GUERSANT).

℞ Belladona,
 Oxido de zinc, añ. p. ig.
M. I. Coqueluche, tos espasmódica, asma. *D.* ḡj á ḡv (5 á 25 cent.) al día.

7070. Otro (KAHLEISS).

℞ Raiz de belladona en p. ḡjv (2 dec.).
 Polvos de Dower. ḡx (5 dec.).
 Azufre sublimado, lavado y porfirizado. ℞ij (24 dec.).
 Azúcar blanca. ḡjv (15 gr.).
 H. S. A. un polvo que se divide en veinte papeles iguales.

D. Un papel cada tres horas, para un niño de dos años.

Nota. Entre las tomas se administra la pocion siguiente á la dosis de una cucharada de café:

Agua destilada de manzanilla. ḡj (32 gr.).
 Jarabe simple. ḡij (8 gr.).
 Acido prúsico de Vauquelin. 42 gotas,

7071. Otro (PISCHEF).

℞ Tabaco. ḡij (10 cent.).
 Tártaro estibiado. ḡj (5 cent.).
 Azúcar en polvo. ḡijß (10 gr.).
 Goma arábica. ḡß (2 gr.).
 Divídase en veinte papeles.
D. Uno cada dos horas á los ni-

ños que arrojan muchas flemas y tienen una constitucion atónica.

Si el remedio excita vómitos, estos favorecen la curacion. Su autor asegura que produce buenos resultados y que puede curar la coqueluche en cuatro semanas.

7072. P. CONTRA LA COQUELUCHE
(*Sandrás*).

℞ Raiz de belladona en polvo. ḡj (5 cent.).
Azúcar. ḡv (25 cent.).

M. D. Una toma á los niños de un año, dos á los de dos ó tres años, cuatro á los de mas edad y ocho á los adultos.

7073. P. CONTRA LA COQUELUCHE
Y EL CATARRO NERVIOSO.

℞ Azúcar. 3j (4 gr.).
Regaliz. ℞j (12 dec.).
Raiz de belladona. ḡiij (15 cent.).

H. S. A. un polvo, que se divide en doce tomas iguales.

D. Una toma al dia.

7074. P. CONTRA LA COQUELUCHE
(*Marc*).

℞ Azúcar. 3j (4 gr.).
Polvo de regaliz. ℞j (12 dec.).
Raiz de belladona en polvo. ḡiij (15 cent.).

Hágase polvo S. A. y divídase en doce papeles.

D. Un papel cada seis horas.

7075. P. CONTRA LA COQUELUCHE
(*Goelis*).

℞ Almizele. ḡiij (15 cent.).
Opio. ḡß (25 mil.).
Goma arábiga. ḡxviiij (1 gr.).
Azúcar. 3ij (8 gr.).

Divídase en seis papeles.

I. Coqueluche. D. Un papel cada tres horas.

7076. P. CONTRA LA COREA
(*Bouneau*).

℞ Hierro porfirizado. ḡij (10 cent.).

Extracto de opio. ḡ¹/₅ ḡ²/₅ (1 á 2 cent.).

Extracto seco de quina. ḡjv (2 dec.).
H. S. A. una toma.

I. Corea de los niños. D. Una toma mañana y noche, y se aumenta progresivamente la dosis de hierro y opio.

7077. P. CONTRA EL CRUP.

℞ Regaliz en polvo,
Extr. de belladona, añ. ḡij (1 dec.).
Polvos de Dower. ḡjv (2 dec.).
Azúcar blanca. 3iij (12 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.

D. Dos á cuatro papeles al dia segun las circunstancias.

7078. P. CONTRA EL CRUP
(*Weber*).

℞ Calomelanos. ḡj (5 cent.).
Magnesia calcinada. ḡvj (30 cent.).
Azúcar. ḡxij (60 cent.).

M. D. Se toma en dos veces con media hora de intervalo. Algunas veces se necesitan quince á diez y seis dosis.

7079. P. CONTRA LA DENTERA.

℞ Subcarbonato de cal,
ó Magnesia,
Azúcar y tierra aluminosa, añ. p. ig.
I. En fricciones ligeras en los dientes por medio de un cepillo.

7080. P. CONTRA LAS DIARREAS
CRÓNICAS (*J. P. Frank*).

℞ Ipecacuana en polvo. ḡij (1 dec.).
Azúcar. 3j (4 gr.)
en la que se echará

Aceite destilado de nuez moscada. 2 gotas.

Mézclese exactamente y divídase en cuatro dosis iguales.

D. Las cuatro dosis en las veinticuatro horas, y cada una en medio vaso de agua azucarada, y se tomará durante quince ó veinte dias.

7081. P. CONTRA EL ENGROSAMIENTO DE LA CórNEA (Graeffe).

- ℞ Precipitado rojo,
 Agárico blanco, ãã. ʒß (2 gr.).
 Azúcar blanca. ʒj (30 gr.).
 Mézclase sobre un pórfido.
 I. Se administra este polvo por insuflacion.

7082. P. CONTRA LOS ENTUERTOS DE LAS RECIEN PARIDAS.

- ℞ Cornezuelo de centeno en polvo. ʒij (40 cent.).
 Canela en polvo. ʒj (5 cent.).
 D. Esta dosis cada cuarto de hora. Generalmente bastan tres ó cuatro dosis, y rara vez hay que usar hasta ocho ó diez.

7083. P. CONTRA LA EPILEPSIA (Chaberly).

NÚMERO 1.

- ℞ Polvo de Guteta. ʒv (150 gr.).
 Valeriana en polvo. ʒjß (45 gr.).
 Mézclase y dividase en papeles de ʒxxviiij ó ʒxxxvj (1 ó 2 gr.).

NÚMERO 2.

- ℞ Polvo de Carignan,
 Valeriana en polvo, ãã. ʒjß (45 gr.).
 Dividase en papeles de ʒxxviiij á ʒxxxvj (1 á 2 gr.).
 Chaberly le administra del modo siguiente: da mañana y noche una infusion de hojas de naranjo endulzada con una cucharada de jarabe de valeriana; el dia antes de la luna nueva hace tomar por la mañana en ayunas ʒxxviiij (1 gr.) de polvo de Carignan ó de Guteta en una taza de infusion de tilo, azucarada con jarabe de valeriana. Por la noche y á los dos dias siguientes las mismas dosis. Obra del mismo modo durante el pleniluvio, y da las dos dosis el dia antes, el mismo dia y al siguiente de esta fase de la luna. Así se to-

man al mes doce papeles de la mezcla de Carignan, y en los demás dias se administra el jarabe de valeriana. Se continúa este mismo tratamiento durante cinco á seis meses, y despues se suspende el uso de los polvos antiperiódicos usando solo el jarabe de valeriana.

7084. Otro (HUFELAND).

- ℞ Oxido de zinc. ʒvj (30 cent.).
 Extracto de beleño,
 Aceité de valer., ãã. ʒj (5 cent.).
 Valeriana. ʒß (2 gr.).
 Dividase S. A. en nueve papeles.
 D. Tres al dia.

7085. Otro (PITSCHAFT).

- ℞ Cinabrio,
 Magisterio de bismuto,
 Tabaco, ãã. ʒxxviiij (1 gr.).
 Acibar. ʒv (25 cent.).
 Dividase S. A. en veinte papeles.
 D. Un papel mañana y noche.

7086. Otro (KAHLEISS).

- ℞ Raiz de artemisa. ʒij (60 gr.).
 Agua. lbß (250 gr.).
 Se hierve, se reduce la cuarta parte, se cuele y se añade:
 Nitrato de plata fund. ʒx (50 cent.).
 Se separa el precipitado despues de la filtracion, se seca y se mezcla con
 Azúcar. ʒj (30 gr.).
 Dividase en sesenta papeles.
 D. Uno, mañana y noche.

7087. Otro (ROSENTHAL).

- ℞ Haba de S. Ignacio en polvo. ʒx (50 cent.).
 Ipecacuana en polvo. ʒv (25 cent.).
 Cáscara de naranja en polvo,
 Carbon. de magn., ãã. ʒj (4 gr.).
 Azúcar. ʒj (30 gr.).
 Esencia de menta pip. ʒjv (20 cent.).
 D. Dos cucharadas de café en la intermitencia de los accesos.

7088. P. CONTRA LA EPILEPSIA.

℞ Oxido de bismuto. ḡxij (60 cent.).
 Carbon. de amoniaco. ḡvj (30 cent.).
 Opio. ḡiij (15 cent.).
 Oleosác. de valerian. ʒj (4 gr.).

Divídase en seis papeles.

I. Epilepsia, corea, gastralgia, histérico. D. Dos papeles mañana y noche.

7089. P. CONTRA LA EPILEPSIA ó Polvo de Ragolo.

℞ Valeriana. ʒB (2 gr.).
 Sal amoniaco,
 Magnesia,
 Aceite de cajeput, añ. ḡjv (2 dec.).

H. S. A. polvo para una dosis.

I. Epilepsia. D. Una á tres tomas al dia. Este remedio ha tenido mucha aceptación en Alemania.

7090. P. CONTRA EL ERETISMO DE LOS NERVIOS DEL ESTÓMAGO (Wendt).

℞ Magisterio de bismuto. ḡxviiij (4 gr.).
 Magnesia blanca. ʒB (2 gr.).
 Oleosácaro de anís. ʒj (4 gr.).

H. S. A. un polvo que se divide en nueve tomas iguales. D. Cuatro tomas al dia.

Nota. Si la enfermedad es pertinaz y el enfermo ha hecho uso largo tiempo de este polvo, se le puede añadir por cada toma ḡ¹/₅ (1 cent.) de polvo de ipecacuana.

7091. P. CONTRA LA ESPERMATORREA ó pérdidas seminales.

℞ Cornezuelo de centeno en polvo. ḡj¹/₅ (6 cent.).
 Alcanfor en polvo. ḡ³/₅ (3 cent.).

D. Se administra esta dosis mañana y noche en una cucharada de jarabe ó de miel ó en una piladora.

7092. P. CONTRA LOS ESPASMOS (Brachet).

℞ Oxido de zinc en polvo,
 Beleño, añ. ḡij (4 dec.).

I. Espasmos y convulsiones de los niños. D. En una cucharada de tisana.

7093. P. CONTRAESTIMULANTE.

℞ Calomelanos. ḡxviiij (4 gr.).
 Nitrato de potasa. ḡxc (5 gr.).

Divídase en nueve papeles.

D. Se da uno cada dos horas en el hidrocéfalo agudo y en otras muchas enfermedades esténicas. Algunos pretenden que el nitro se opone á la salivacion.

7094. P. CONTRA LAS FLATUOSIDADES (Heim).

℞ Hojas de sen,
 Menta piperita, añ. ʒij (24 dec.).
 Semillas de cilantro. ʒB (15 gr.).

H. S. A. polvo.

D. Una cucharada de café, tres veces al dia.

7095. Otra (SANTOLI).

℞ Almizele. ḡvj (3 dec.).
 Goma amoniaco. ḡxij (6 dec.).

M. I. Timpanitis, flatuosidades. D. En tres dosis al dia.

7096. P. CONTRA LA GASTRALGIA (H. DE M.).

℞ Oxido de bismuto. ḡjv (2 dec.).
 Carbonato de magnesia,
 Azúcar, añ. ʒij (24 dec.).

M. D. En cuatro veces.

7097. P. CONTRA LA GASTRALGIA ó Tomas contra la gastralgia (SZERLECKI).

℞ Subnitrato de bismuto,
 Extr. de beleño, añ. ḡj (5 cent.).

Nuez vómica en polv. $\text{ḡ}^{\text{v}}/4$ (4 cent.).
Castóreo. ḡ^{iiij} (15 cent.).
Azúcar. ḡ^{x} (50 cent.).

Mézclase y divídase en doce tomas.

D. Una toma cada tres horas.

7098. P. CONTRA LA GASTRODINIA
(*Odier*).

℞ Oxido bl. de bismuto. ḡ^{xc} (5 gr.).
Magnesia en polvo,
Azúcar, añ. ḡ^{ij} (48 gr.).
Divídase en cuatro papeles.

I. Gastralgia independiente de inflamacion.

7099. P. CONTRA LA GOTA
SERENA.

℞ Pulsatila. ḡ^{vj} (16 gr.).
Valeriana silvestre. . . ḡ^{ij} (48 gr.).
Divídase en treinta y dos papeles iguales.

D. Uno mañana y noche en medio vaso de agua ó en otra bebida mas conveniente.

7100. P. CONTRA LAS HEMORRAGIAS
(*Krimer*).

℞ Acetato de plomo. . . . ḡ^{ij} (4 dec.).
Opio puro. $\text{ḡ}^{\text{v}}/4$ (12 mil.).
Azúcar de leche. ḡ^{vj} (2 dec.).

I. Metrorragias, sobre todo despues del parto. D. Se toma esta dosis cada dos horas, hasta seis veces.

7101. P. CONTRA LAS HEMORRAGIAS INTERNAS Y LAS EXCESIVAS.

℞ Cornezuelo de centeno en polvo. . . . ḡ^{x} (50 cent.).
Badiana en polvo. . . ḡ^{iiij} (15 cent.).
Hágase polvo.

D. Se da esta dosis cada seis horas cuando la hemorragia es abundante; pero si es moderada bastan ḡ^{vj} á ḡ^{vj} (2 á 3 dec.).

7102. P. CONTRA LA HIDROPESIA.

℞ Nitro. ḡ^{vj} (16 gr.).

Escila en polvo. ḡ^{ij} (4 gr.).
Hágase polvo S. A. y divídase en doce papeles.

D. Dos al dia en un poco de agua, bebiendo despues un vaso de bebida diurética.

7103. P. CONTRA EL IMPÉTIGO
(*Bielt*).

℞ Azufre sublimado ó precipitado. ḡ^{ij} (30 gr.).
Subcarbon. de potasa. . ḡ^{ij} (15 gr.).

M. I. Impétigo crónico. D. ḡ^{L} á ḡ^{LX} (25 á 30 dec.) todas las mañanas en ayunas, en una taza de tisana de dulcamara.

7104. P. CONTRA LOS INFARTOS ESCROFULOSOS DEL CUELLO (*Boynet*).

℞ Sulfato de hierro en polvo,
Clorhid. de amon., añ. ḡ^{Lvj} (3 gr.).
Fécula de patatas. . . ḡ^{ij} (250 gr.).

Se pone este polvo sobre un colchoncillo de lana, que se aplicará constantemente sobre las glándulas.

7105. P. CONTRA LA LARINGITIS
MEMBRANOSA (*Mignot*).

℞ Tanino en polvo. ḡ^{ij} á ḡ^{ij} (2 á 10 gr.)

Azúcar en polvo. . . . ḡ^{ij} (10 gr.)
Mézclase íntimamente.

I. Se insufla en la boca posterior.

7106. P. CONTRA LAS MANCHAS DE LA CórNEA (*Guepin*).

℞ Sulfato de cobre. . . . ḡ^{xij} (6 dec.).
Sulfato de morfina. . . ḡ^{vj} (2 dec.).
Azúcar. ḡ^{ij} (60 gr.).

I. Se introduce este polvo una vez al dia entre los párpados.

7107. P. CONTRA LA OZENA
(*Trousseau*).

℞ Calomelanos,
Precipitado rojo, añ. . ḡ^{ij} (4 gr.).

Azúcar cande. ʒB (13 gr.).
M. I. Ozena y afecciones herpéticas de las fosas nasales. D. Se toma por la nariz, cinco ó seis veces al dia.

7108. P. CONTRA LAS PALPITACIONES DEL CORAZON.

ʒ Digital en polvo. ʒviii (4 dec.).
 Extr. gomoso de opio. ʒjv (2 dec.).
 Azúcar con algunas gotas de esencia de menta piperita. . ʒj (30 gr.).
Mézclese y divídase en ocho á diez dosis iguales.

I. Palpitaciones del corazon por enfermedad orgánica ó neurosis. D. Una por la noche al acostarse en medio vaso de agua. Por la mañana en ayunas se beben, en cinco ó seis vasos, dos cuartillos de suero clarificado y nitrado, ó de tisana de grama ó regaliz nitrada.

7109. P. CONTRA LAS PÉRDIDAS SEMINALES (Heim).

ʒ Licopodio. ʒjB (45 gr.).
 Quasia amarga. ʒj (4 gr.).
Mézclese y hágase polvo.

D. Una cucharada de café mañana y noche.

7110. P. CONTRA LA PIROSIS (Heim).

ʒ Raiz de jalapa. ʒxc (5 gr.).
 Trébol de agua. ʒij (8 gr.).
 Carbon. ʒjB (45 gr.).
 H. S. A. polvo.

D. Una cucharada de café mañana y noche.

7111. P. CONTRA EL PRURITO DE LA VULVA.

ʒ Piedra calaminar. ʒ
 Almidón. ʒ

Se espolvorean las partes enfermas.

7112. P. CONTRA LA RABIA.

ʒ Hojas y tallos de cardo corredor,

Hojas y tallos de equio ó viborera comun,

Hojas y tallos de aliso espinoso,
 Hojas y tallos de yerba gatera.

Se toman cantidades suficientes é iguales de las hojas y tallos de estos vegetales para pulverizarlas, y se distribuyen en dosis de ʒj (12 dec.). Se toma un papel en un sorbo de vino mañana y noche por espacio de nueve dias.

Se deberán coger estas plantas cuando estando bien floridas empiezan á granar, lo que sucede en Julio respecto al cardo corredor y á la vivorera comun, y en Agosto respecto á los otros dos. Del cardo corredor se toman con preferencia las raices y tambien el resto de la planta; y de las otras tres todo, á excepcion de las raices. Deben secarse á la sombra y pulverizarse á partes iguales de cada planta, las que se guardan en un frasco bien tapado para hacer el uso conveniente. En cada toma la dosis es ʒj (12 dec.) para una persona, y ʒj (4 gr.) para los irracionales. Debe propinarse con el vehículo que se quiera. Se debe tomar á lo menos por espacio de nueve dias consecutivos, una toma por la mañana y otra por la tarde, sin que el mordido tenga que sujetarse á dieta, ni cambiar su régimen ordinario. Estos polvos son tan útiles, que en todos los casos de rabia bien marcada en que se han usado, han hecho desaparecer todos los fenómenos de una muerte inevitable. Han sido muy elogiados contra la rabia, y fueron ensayados con muy buen éxito en el hospital de Madrid. Tambien se han recomendado últimamente los polvos del almez.

7113. P. CONTRA LA RAQUITIS (Temple).

ʒ Oxido negro de hierro,
 Ruibarbo, ña. ʒj (4 gr.).
 Azúcar. ʒxviii (4 gr.).

Mézclese y dividase en seis pa-
peles.

D. Uno, mañana y noche.

7114. P. CONTRA LA RISA
CONVULSIVA (*Usteinan*).

℞ Oxido de zinc. ḡxij (6 dec.).
Oleosácara de cajeput. ʒij (8 gr.).

H. S. A. un polvo que se divide
en doce tomas iguales.

D. Una toma de hora en hora.

7115. P. CONTRA LOS SABAÑONES,
ó *Salvado de almendras contra los
sabañones* (*Bandof*).

℞ Borato de sosa. 45
Alumbre. 2
Benjuí. 8
Mostaza en polvo. 60
Lirio. 45
Salvado. 45
Raspaduras de almendras. . . . 55
Esencia de cáscara de naranja. . 4
Esencia de bergamota. 4

M. I. Sabañones, grietas. *D.* Se
pone una pulgarada en el hueco de
la mano, se añade un poco de agua
y se dan fricciones.

7116. P. CONTRA LA SALIVACION
MERCURIAL.

℞ Sulfuro de potasa. ḡxc (5 gr.).
Crémor de tártaro. ʒβ (15 gr.).

Mézclese y dividase en veinti-
cuatro papeles, y cada uno con-
tendrá ḡjv (2 dec.) de sulfuro.

I. Salivacion mercurial, gingi-
bitis, estomacace. *D.* Un papel,
dos veces al dia.

7117. Otro, n. 2.

℞ Azufre,
Cálamo aromático,
Azúcar, āā. ḡxviiij (4 gr.).

I. Tialismo. *D.* Se toman en me-
dia taza de limonada nítrica.

7118. P. CONTRA LAS VEGETACIO-
NES (*Vidal de Cassis*).

℞ Alumbre. ʒβ (2 gr.).

Sabina en polvo. ḡxviiij (4 gr.).

M. D. Se aplica á la vegetacion
dos veces al dia. Si el glande está
cubierto por el prepucio se le des-
cubre y se aplica el polvo sobre la
vegetacion; en los casos contra-
rios basta una simple cura, pues
la secrecion de la mucosa fija al
principio el polvo.

7119. P. CONTRA LAS VIRUELAS.

℞ Calomelanos,
Jalapa,
Azúcar, āā. ʒj (4 gr.).

M. I. Incubacion de las viruelas,
helmintiasis, ténia. *D.* ḡijj (15
cent.) tres ó cuatro veces al dia.

7120. P. CONTRA LAS ÚLCERAS
CANCEROSAS (*Rust*).

℞ Alcanfor,
Mirra, āā. ʒij (8 gr.).
Quina en polvo,
Alcanfor, āā. ʒβ (16 gr.).
Carbon vegetal. ʒj (32 gr.).
Hágase polvo *S. A.*

I. Se usa para espolvorear y cu-
rar las úlceras cancerosas.

7121. P. CONTRA LAS ÚLCERAS
DEL CUELLO DE LA MATRIZ (*Boinet*).

℞ Almidon en polvo. ʒv (150 gr.).
Sulfato de hierro en p. ḡxviiij (4 gr.).
Sal amoniaco en polvo. ḡxviiij (4 gr.).
Sabina en polvo. ʒβ (2 gr.).
Acetato de morfina. ḡxviiij (4 gr.).
Mézclese exactamente.

D. Se aplica por medio de una
porcion de hilas cubiertas de ce-
rato. Se renovará la aplicacion
cada dos dias.

7122. P. DE CONTRAYERBA.

℞ Contrayerba. ʒijβ (40 gr.).
Conchas de ostras pre-
paradas. ʒjx (36 gr.).

M. I. Debilidad del conducto di-
gestivo, diarreas rebeldes. *D.* ḡx
á ḡlx (5 á 30 dec.).

7123. P. CORDIAL.

℥ Canela.	46
Clavo.	2
Vainilla.	4
Azúcar.	96
Harina de arroz.	72

H. S. A. I. y D. Es un excelente estomacal y se administra á la dosis de ḡx á ḡxxx (5 á 15 dec.).

7124. P. DE CORAL ANODINO DE HELVETIUS, ó Polvo de mirra y coral compuesto.

℥ Mirra.	6
Cascarilla.	4
Canela aclavillada.	4
Coral rojo preparado.	2
Bol arménico preparado.	4
Opio pulverizado.	4

M. I. Es calmante, astringente y estomacal. D. De ḡviiij á ḡxxjv (4 á 12 dec.).

7125. P. DE CORAL ROJO (F. F.).

℥ Coral rojo.	c. s. q.
-----------------------	----------

Se lava el coral entero en agua tibia, se pone á secar, se muele en el almirez y se pasa por un tamiz de seda. Se lava este polvo cuatro ó cinco veces con agua hirviendo, y se porfiriza estando húmedo, añadiendo si hubiese necesidad nueva porcion de agua. Se deslie despues en agua, para separar por dilucion el polvo mas fino, volviendo el mas grueso al pórfido para continuar del mismo modo hasta que todo se haya reducido á polvo impalpable; se pone este á escurrir, se reduce á trociscos y se secan.

Del mismo modo se pulverizan los OJOS DE CANGREJOS y la MADRE DE PERLAS, y tambien sin previa locion el CINABRIO, la PIEDRA CALAMINAR, la HEMATITIS y el SUCINO.

I. y D. V. t. I, pág. 163.

7126. P. CORNACHINOS, DE TRIBUS, ó Polvos antimoniales de escamonea (F. E. Y F. F.).

℥ Escamonea de Alepo escogida,	
--------------------------------	--

Crémor de tártaro,
Antim. diaforético, ãã. ḡjv (125 gr.).
Se reducen separadamente á un polvo muy sutil, y se mezclan.

I. Se usan como purgantes en las intermitentes, embarazos gástricos, hemiplegia, apoplejía, etc.
D. De 3ß á 3j (2 á 4 gr.).

Nota. Cuando se prepara este polvo con el antimonio diaforético, para cuya elaboracion se ha economizado el nitro, y retiene protóxido de antimonio, sucede con el tiempo que los polvos cornachinos se vuelven eméticos porque se forma tartaro emético.

7127. P. DE CORNEZUELO (F. F.).

℥ Cornezuelo reciente.	c. s. q.
--------------------------------	----------

Se pulveriza por trituracion y se pasa por un tamiz de seda.

El polvo de cornezuelo se altera con mucha facilidad, por lo que no se debe preparar sino en cortas porciones y conservarse en frascos bien tapados. Es preferible pulverizarle en el momento en que se pide y solo la cantidad necesaria. Con este objeto Charriere ha inventado un instrumento llamado esclerotribo, que el comadron debe llevar siempre consigo.

I. y D. V. t. I, p. 163 y 164.

7128. P. DE CORNEZUELO DE CENTENO COMPUESTO (Szerlecki de Mulhouse).

℥ Cornezuelo de centeno,	
Borato de sosa,	
Oleosácaro de manzani-	
lla, ãã.	ḡx (5 dec.).

Mézclese y dividase en seis papeles.

I. Parto retardado por inercia de la matriz. D. Un papel cada cuarto de hora.

7129. P. CORROBORANTE (Werlhoff).

℥ Quina en polvo.	3ß (2 gr.).
---------------------------	-------------

Canela en polvo. ḡvj (3 dec.).
Mézclese exactamente.

I. Convalecencia de las calenturas intermitentes. D. Se toma de una sola vez.

7130. P. COSMÉTICO JABONOSO PARA LAS MANOS.

℥ Jabon de España en polvo.	720
Carbonato de potasa.	120
Castaño de Indias.	1440
Esencia de espliego.	4
Esencia de limon.	3
Esencia de clavo.	4
Esencia de bergamota.	4
Azúcar.	30
M. S. A.	

7131. P. COSMÉTICO PARA LAS MANOS ó Pasta de almendras cosmética.

℥ Harina de castaño de Indias.	480
Almendras amargas.	360
Raiz de lirio.	30
Carbonato de potasa.	7
Esencia de bergamota.	4
Mézclese.	

7132. P. COSMÉTICO PARA LAS MANOS (F. de Wirt).

℥ Almend. dulces mon- dadas.	℔β (250 gr.).
Harina de arroz.	ḡj (30 gr.).
Lirio de Florencia.	ḡj (30 gr.).
Benjuí.	ḡij (8 gr.).
Esperma de ballena.	ḡij (8 gr.).
Sal de tártaro.	ḡij (8 gr.).
Esencia de palo de Rodas.	3 gotas.
Esencia de espliego.	3 gotas.
Esencia de clavo.	3 gotas.
Háganse polvo.	

7133. P. DE CRETA COMPUESTO (F. DE L.).

℥ Creta preparada.	℔β (250 gr.).
Canela,	
Pimienta larga, ãã.	ḡjv (125 gr.).
Raiz de tormentila,	
Goma arábica, ãã.	ḡiij (90 gr.).
Se pulveriza separadamente ca-	

da sustancia y se las mezcla despues exactamente.

I. Embarazo mucoso del estómago y diarrea con atonía. D. De ḡvj á ḡxij (3 á 6 dec.) tres veces al dia.

Añadiendo ḡjv (48 dec.) de opio puro en polvo á ḡvjβ (195 gr.) de polvos de creta compuestos, se tiene el polvo de CRETA COMPUESTO CON OPIO DE LA F. DE L. Ó POLVOS DE CRETA OPIADOS.

7134. P. DE CRETA CON RUIBARBO (Nicolai).

℥ Polvo de creta comp. ḡj (12 dec.).	
Polvo de ruiubarbo.	ḡxv (75 cent.).

D. Seusa de una vez por la noche en el tratamiento de la piro-sis y de la cardialgia.

7135. P. DE CUBEBAS (F. F.).

℥ Pimienta de cubebas.	c. s. q.
Se deseca en la estufa, y se pulveriza por contusion sin dejar residuo.	

Del mismo modo se pulverizan las PIMIENTAS BLANCA, LARGA Y NEGRA, ANIS, CEBADILLA, SIMIENTE DE AMEOS y las demás simientes de las plantas umbeladas.

I. y D. V. t. I, p. 166.

7136. P. DENTÍFRICO.

℥ Ratania,	
Quina, ãã.	ḡβ (15 gr.).
Sangre de drago,	
Coral rojo, ãã.	ḡij (8 gr.).
Aceite de clavo	42 gotas.
H. S. A.	

7137. Otro, n. 2.

℥ Hueso de jibia en polvo.	4
Quina en polvo.	4
Mirra en polvo.	4
Esencia de menta.	c. s.
Mézclese.	

7138. Otro, n. 3.

℥ Carbon en polvo.	ḡv (20 gr.).
Quina en polvo.	ḡx (40 gr.).

Azúcar en polvo. . . . ʒijʒ (10 gr.).
Mézclese sobre un pórfido.

7139. P. DENTÍFRICO.

ʒ Crémor de tártaro. . ʒjx (36 gr.).
Bol arménico prepar. ʒvj (24 gr.).
Coral rojo porfirizado. ʒvj (24 gr.).
Hueso de jibia pulver. ʒvj (24 gr.).
Sangre de drago. . . ʒiij (12 gr.).
Canela porfirizada. . ʒjʒ (6 gr.).
Cochinilla en polvo. . ʒijʒ (3,2 gr.).
Clavo en polvo. . . . ʒxviii (4 gr.).
Mézclese exactamente.

D. Una pequeña cantidad para frotar los dientes.

Nota. Se emplea tambien este polvo bajo la forma de opiata con c. s. de un jarabe aromático.

7140. Otro (BALLY).

ʒ Quina en polvo,
Magnesia calcinada,
Coral rojo prepar., ãã. ʒʒ (15 gr.).
Canela. ʒij (24 dec.).
Se reducen S. A. á un polvo muy fino.

I. Se emplea en fricciones para limpiar y blanquear los dientes.

7141. Otro (CHARLARD).

ʒ Crémor de tártaro. . . ʒv (160 gr.).
Alumbre calcinado. . . ʒijʒ (10 gr.).
Cochinilla. ʒij (8 gr.).

H. S. A. un polvo fino, que se aromatizará con

Esencia de rosas. . . . 6 gotas.

I. La misma que el anterior.

7142. P. DENTÍFRICO ó Polvo dentífrico negro (Chevalier).

ʒ Carbon pulverizado. 4
Quina en polvo. 4

Mézclese. Nota. Se puede añadir á este polvo azúcar y un aroma. En algunos formularios se pone carbon de pan en lugar del carbon vegetal.

I. Se emplea en fricciones para limpiar y blanquear los dientes, y para desinfectar las encías saniosas ó caries dentaria.

El POLVO DENTÍFRICO DE RIGHINI se

compone de cuatro partes de carbon de pan en polvo y una de quina calisaya.

7143. Otro (DESIRABODE).

ʒ Coral rojo. ʒjv (125 gr.).
Sangre de drago. . . ʒj (30 gr.).
Carmin. ʒv (25 cent.).
Cáscara de limon. . . ʒxviii (4 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒʒ (15 gr.).
Blanquea los dientes y da un hermoso color rojo á los labios y las encías.

7144. Otro (DOCTOR REGNARD).

ʒ Magnesia calcinada. ʒʒ (15 gr.).
Sulfato de quinina. . ʒjx (50 cent.).
Carmin fino,
ó Cochinilla. ʒʒ (2 gr.).
Esencia de menta pip. 3 gotas.

7145. Otro (F. F.).

ʒ Bol de Armenia,
Coral rojo,
Huesos de jibia, ãã. ʒiij (96 gr.).
Sangre de drago. . . ʒjʒ (48 gr.).
Cochinilla. ʒiij (12 gr.).
Crémor de tártaro. . ʒjvʒ (140 gr.).
Canela. ʒvj (24 gr.).
Clave de especia. . . ʒj (4 gr.).

Se pulverizan separadamente las sustancias, y se mezclan en el pórfido.

Estos polvos tienen el inconveniente de que el bitartrato de potasa puede alterar el esmalte de los dientes por su exceso de ácido. Igual inconveniente tienen todos los polvos y electuarios dentífricos que contienen crémor de tártaro.

7146. Otro (H. DE AL.).

ʒ Quina en polvo. . . . ʒvj (24 gr.).
Sándalo rojo porfirizad. ʒij (8 gr.).
Aceite de clavo,
Aceite de bergamota, ãã. 3 gotas.

Mézclese y hágase un polvo muy fino.

I. Relajacion escorbútica de las encías.

7147. P. DENTIFRICO (Jamet).

- 2 Lirio de Florencia lavado en alcohol. . . lbj (500 gr.).
 Magnesia. ℥jv (125 gr.).
 Piedra pomez. lb℥ (250 gr.).
 Hueso de jibia. lb℥ (250 gr.).
 Sulfato de quinina. . . ℥jv (125 gr.).
 Cascarilla. ℥j (32 gr.).
 Azúcar de leche. lbj (500 gr.).
 Esencia de yerbab. ℥j y ℥℥ (34 gr.).
 Esencia de canela. . . ℥ij (8 gr.).
 Esencia de neroli. . . ℥j (4 gr.).
 Tintura de ambar. . . ℥j (4 gr.).
 H. S. A. un polvo muy fino.

7148. Otro (KEMERER).

- 2 Hollín de leña en polvo. ℥j (32 gr.).
 Fresa en polvo. ℥v (20 gr.).
 Agua de Colonia. algunas got.
 Segun su autor este polvo blanquea y conserva muy bien los dientes.

7149. Otro (LEFOULON).

- 2 Coquearia. 4
 Rábano silvestre. 4
 Guayaco. 4
 Quina. 4
 Yerbabuena. 4
 Pelitre. 4
 Cálamo aromático. 4
 Redúzcase á un polvo impalpable. Cuando los enfermos están afectados de gastralgia, Lefoulon asocia á este polvo un poco de magnesia calcinada.

7150. Otro (MAURY).

- 2 Carbon de leña. lb℥ (250 gr.).
 Quina. ℥jv (125 gr.).
 Azúcar. lb℥ (250 gr.).
 Esencia de menta. . . ℥℥ (16 gr.).
 Esencia de canela. . . ℥ij (8 gr.).
 Tintura de ambar. . . ℥℥ (2 gr.).
 H. S. A. un polvo muy fino.
 Mézclese.

7151. Otro (TOIRAC).

- 2 Carbonato de cal. . . . ℥j (4 gr.).

- Magnesia. ℥ij (8 gr.).
 Azúcar. ℥j (4 gr.).
 Crémor de tártaro. . . . ℥j (12 dec.).
 Esencia de menta. . . . 4 gota.

Es el que con mas frecuencia usa Toirac.

7152. Otro (TOIRAC).

- 2 Carbon. ℥ij℥ (10 gr.).
 Magnesia. ℥xc (5 gr.).
 Quina. ℥xc (5 gr.).
 Crémor de tártaro. . . . ℥Ljv (3 gr.).
 Esencia de menta. . . . 4 gota.

M. I. Estomatitis, estomacace, odontalgias. D. En fricciones ó aplicaciones á los dientes y encías.

7153. P. DENTÍFRICO ACIDO (Deschamps).

- 2 Talco de Venecia. . . . ℥jv (125 gr.).
 Crémor de tártaro. . . . ℥j (32 gr.).
 Carmin. ℥vj (3 dec.).
 Esencia de menta. . . . 15 gotas.
 Mézclese.

7154. Otro (DESFORGES).

- 2 Coral porfirizado. . . . ℥v (150 gr.).
 Crémor de tártaro en p. ℥j (30 gr.).
 Hueso de jibia. ℥v (20 gr.).
 Cochinilla. ℥vj (3 dec.).
 Miel de Narbona. ℥v y ℥ij℥ (170 gr.).
 Mézclese.

7155. P. DENTÍFRICO ALCALINO (Deschamps).

- 2 Talco de Venecia. . . . ℥jv (125 gr.).
 Bicarbonato de sosa. . . ℥j (30 gr.).
 Carmin. ℥vj (3 dec.).
 Esencia de yerbabuen. 15 gotas.
 Mézclese.

7156. P. DENTÍFRICO ALCANFORADO.

- 2 Lirio de Florencia. . . ℥℥ (15 gr.).
 Hueso de jibia. ℥℥ (15 gr.).
 Alcanfor. ℥℥ (2 gr.).
 Alcohol de 88°. algunas gotas.
 Mézclese.

**7157. P. DENTÍFRICO
ANTIESCORBÚTICO.**

℥ Ratania,
Quina,
Carbon, ãã. ʒB (15 gr.).
Sangre de drago.
Coral rojo, ãã. ʒij (8 gr.).
Aceite de clavo,
Bálsamo del Perú, ãã. ʒB (6 dec.).
M. I. Reblandecimiento de las
encías, odontalgia, estomacace,
escorbuto. *D. C. s.* como dentí-
frico.

7158. Otro, n. 2.

℥ Extracto de ratania. . . ʒB (16 gr.).
Carbon vegetal. ʒij (64 gr.).
Canela,
Clavo, ãã. ʒij (8 gr.).
Se reducen todas las sustancias
á un polvo impalpable y se mez-
clan.

7159. Otro (F. M.).

℥ Raiz de pelitre,
Corteza de Winter,
Macis, ãã. ʒiij (12 gr.).
Alumbre calcinado,
Catecú, ãã. ʒj (4 gr.).
Se reducen á polvos muy finos
y se hace una pasta con *c. s.* de
miel rosada.

**7160. P. DENTÍFRICO DESCOLO-
RANTE (Magendie).**

℥ Cloruro de cal seco. . . ʒjv (2 dec.).
Coral rojo. ʒij (8 gr.).
M. I. y D. Se humedece ligera-
mente un cepillo nuevo, se le em-
papa en el polvo dentífrico y se
frotan con él los dientes. Se usa
para volver su blancura natural á
los dientes amarillos.

**7161. P. DENTÍFRICO
DESINFECTANTE.**

℥ Cloruro de cal seco. 4
Talco de Venecia. 40
Mézclese.

TOMO III.

7162. P. DENTÍFRICO DETERSIVO.

℥ Carbon en polvo. . . . ʒj (32 gr.).
Quina en polvo. ʒiij (12 gr.).
Esencia de rosas. 2 gotas.
H. S. H.

7163. Otro, n. 2.

℥ Canela. ʒvj (24 gr.).
Hueso de jibia. ʒj (32 gr.).
Carbon en polvo. ʒj (32 gr.).
Quina en polvo. ʒB (46 gr.).
Se aromatiza con cualquier
esencia.

7164. P. DENTÍFRICO INGLÉS.

℥ Creta seca. 3
Alcanfor. 4
Mézclese y guárdese en un
frasco bien tapado.

7165. P. DENTÍFRICO CON MIRRA.

℥ Crémor de tártaro. . . ʒjv (125 gr.).
Lirio. ʒij (60 gr.).
Mirra. ʒj (30 gr.).
Sangre de drago. . . . ʒj (30 gr.).
Esencia de clavo. . . . ʒB (2 gr.).
M. S. A.

**7166. P. DENTÍFRICO PERUVIANO
(Poisson).**

℥ Azúcar. ʒB (2 gr.).
Magnesia. ʒj (4 gr.).
Almidon. ʒj (4 gr.).
Canela. ʒvj (3 dec.).
Macis. ʒij (4 dec.).
Crémor de tártaro. . . ʒj (4 gr.).
Sulfato de quinina. . . ʒiij (15 cent.).
Carmin. ʒv (25 cent.).
Esencia de rosas,
Esencia de menta, ãã. 4 gotas.

**7167. P. DENTÍFRICO CON TANINO
(Mialhe).**

℥ Azúcar de leche. . . ʒbij (1000 gr.).
Laca carminada. . . ʒijB (10 gr.).
Tanino puro. ʒB (15 gr.).

Esencia de menta. . . 20 gotas.

Esencia de anís. . . . 20 gotas.

Esencia de flor de naranjo. 40 gotas.

H. S. A.

El uso diario de este polvo impide la acumulacion del tártaro y fortifica las encías. Si no bastase se usa el elixir dentífrico astringente. V. n. 1663.

7168. P. DENTÍFRICO TÓNICO.

℥ Canela. ℥j (30 gr.).

Quina en polvo. ℥j (30 gr.).

Lirio en polvo. ℥β (15 gr.).

H. S. A.

7169. P. DENTÍFRICO DE SANGRE DRAGO ó Dentífrico seco (F. E.).

℥ Crémor de tártaro,
Sangre de drago,
Cuerno de ciervo preparado, añ. ℥β (16 gr.).

Raiz de lirio de Florene. ℥ij (8 gr.).

Se pulverizan sutilísimamente y se añade:

Polvos de clavo. ℥j (4 gr.).

Polvos de cochinilla. ℥β (6 dec.).

I. La misma que los anteriores.

Estos polvos atacan al esmalte de los dientes por el exceso de ácido del crémor de tártaro que contienen; por consiguiente cuando solo se quiere usar sustancias para limpiar los dientes, se elegirán los que solo obren mecánicamente. Así se asocia, por ejemplo, los polvos de quina y carbon aromatizado con aceite esencial de menta.

7170. P. DENTÍFRICO DE SULFATO DE QUININA (Pelletier).

℥ Coral preparado. ℥j (30 gr.).

Laca carminada. ḡviii (4 dec.).

Sulfato de quinina. ḡjv (2 dec.).

Esencia de yerbabuen. 2 gotas.

H. S. A. D. C. s. para limpiar los dientes con un cepillo mojado.

7171. P. DEPURATIVO (Jahn).

℥ Pensamiento silvestre en polvo,
Azúcar de leche, añ. ℥iiij (12 gr.).

Magisterio de azufre .

Carbon. de magnesia, añ. ʒβ (2 gr.).

H. S. A. I. Enfermedades crónicas de la piel en general, y costra láctea en particular. D. Una cucharada de café, cada tres ó cuatro horas.

7172. P. DEPURATIVO (Jaser).

℥ Sulfuro de antimonio en polvo,

Flores de azufre,

Nitro,

Lirio, añ. ḡvj (3 dec.).

Se hace un polvo fino.

I. Enfermedades de la piel. D. Se da esta dosis mañana y noche en medio vaso de agua azucarada ó mejor en un poco de miel.

7173. P. DETERSIVO (Vogt).

℥ Acíbar,

Mirra, añ. ʒj (4 gr.).

Carbon. ℥β (45 gr.).

M. I. Ulceras atónicas fétidas.

7174. P. DESINFECTANTE.

℥ Sulfato de hierro. ℔cd (200 kil.).

Sulfato de zinc. ʒijβ (10 gr.).

Carbon vegetal. ʒijβ (10 gr.).

Sulfato de cal. ʒviiiβ (266 gr.).

Agua. c. s.

para hacer pasta.

I. Sirve para desinfectar las materias fecales.

Ciento cincuenta kilogramos bastan para desinfectar mil metros de sumidero.

7175. Otro (MEYER).

℥ Carbon en polvo. ʒ

Quina en polvo. ʒ

Mirra en polvo. ʒ

M. I. Sirve para destruir el olor fétido de la ozena. Se toma del mismo modo que el tabaco rapé.

7176. P. DIAFORÉTICO.

℥ Resina de guayaco,

Nitro, añ. ḡxc (5 gr.).

Ipecacuana. ḡiiij (15 cent.).

Opio. ḡij (10 cent.).

H. S. A. seis papeles.

I. Reumatismo, dolores osteocopos. *D.* Un papel cada tres horas.

7177. Otro, n. 2.

℥ Nitro. ʒj (4 gr.).

Tártaro emético. ḡj (5 cent.).

Calomelanos. ḡvj (30 cent.).

Mézclese y dividase en seis papeles.

D. Uno cada dos horas, en jarrabe.

7178. Otro, n. 3.

℥ Flores de azufre. ʒB (15 gr.).

Alcanfor. ʒj (12 dec.).

Mézclese y dividase en doce papeles.

D. Uno ó dos al dia en una taza de té.

7179. Otro (RICHTER).

℥ Azufre dorado de antimonio, Calomelanos al vapor,

Escila en polvo,

Opio purificado, añ. ḡviiij (4 dec.).

Azúcar blanca. ʒj (4 gr.).

Dividase en ocho dosis.

I. Hidrotorax. *D.* Una dosis mañana y noche.

7180. Otro (THAER).

℥ Sulfuro de antimonio,

Alcanfor, añ. ḡij á ḡjv (1 á 2 dec.).

Nitro. ʒB á ʒj (2 á 4 gr.).

Goma arábica,

Azúcar, añ. ʒj (4 gr.).

Dividase en seis papeles.

I. Perineumonía, cuando ha pasado la fiebre fuerte. *D.* Un papel cada dos horas.

7181. P. DIAROMATON INGLÉS.

℥ Canela. ʒij (60 gr.).

Semillas de cardamomo,

Raiz de gengibre,

Nuez moscada, añ. ʒj (30 gr.).

H. S. A. I. Dispepsia sin calor,

flatuosidades, eructos y astenia.

D. De ḡv á ḡxx (25 á 100 cent.).

7182. P. DIGESTIVO.

℥ Azafran de Marte. ʒB (15 gr.).

Azúcar. ʒj (30 gr.).

Oleosácara de anís. ʒij (7,5 gr.).

M. I. Atonía de los órganos digestivos. *D.* Dos á cuatro cucharadas de café al dia.

7183. Otro (KLEIN).

℥ Tartrato de potasa. ʒiij (12 gr.).

Ruibarbo. ʒj (4 gr.).

Magisterio de azufre. ʒij (24 dec.).

Cáscara de naranjas,

Magnesia, añ. ʒjB (6 gr.).

D. Una cucharada de café tres veces al dia, en las obstrucciones de la vena porta.

7184. P. DIGESTIVO SIMPLE ó Polvo de canela azucarado (Duc).

℥ Canela en polvo. ʒj (30 gr.).

Azúcar. ʒbj (500 gr.).

M. Se dan ʒij á ʒiij (8 á 12 gr.) al tiempo de ir á comer, como estomacal, tónico y excitante.

7185. P. DIGESTIVO COMPUESTO.

℥ Sulfato de potasa. ʒjv (16 gr.).

Ruibarbo. ʒj (4 gr.).

Mézclese y dividase en diez papeles.

D. Uno ó dos al dia.

7186. P. DIGESTIVO COMPUESTO (Lemery).

℥ Frutos de anís,

Frutos de cilantro,

Frutos de hinojo, añ. ʒiij (12 gr.).

Corteza de naranja amarga,

Corteza de limones,

Canela fina, añ. ḡLjv (3 gr.).

Clavo de especia,

Ruibarbo, añ. ḡxviiij (4 gr.).

Azúcar blanca. ʒij (64 gr.).

Se pulverizan todas las drogas juntas á excepcion del azúcar, que se mezcla despues con el polvo compuesto.

7187. P. DE DIGITAL (F. F.).

℥ Hojas de digital purpúrea. . . c. s. q.
Se secan en la estufa y se pulverizan por contusion hasta obtener las tres cuartas partes del peso total.

I. V. tomo I, pág. 172.

Del mismo modo se pulverizan las hojas de ACÓNITO, BELEÑO, BELLADONA, NARANJO y SEN, y casi todas las demás hojas.

7188. P. DE DIGITAL COMPUESTO.

℥ Hojas de digital. . . ʒβ (2 gr.).
Protochlor. de merc. ʒjx (50 cent.).
Valeriana,
Asa fétida,
Castóreo, ãã. ʒβ (2 gr.).
Azúcar candc. ʒj (4 gr.).

Divídase en doce papeles.

I. Neumonía, asma, hidrocefalo. D. Un papel mañana y noche.

7189. P. DE DIGITAL

(H. M. DE PRUSIA).

℥ Digital. ʒij (10 cent.).
Cálamo aromático. . . ʒv (25 cent.).
Azúcar blanca. ʒβ (6 dec.).
Mézclese y divídase en dos papeles.

D. En el día.

7190. P. DIURÉTICO.

℥ Digital. ʒxv (75 cent.).
Nitrato de potasa. . . ʒiij (12 gr.).
Crémor de tártaro. . . ʒjv (16 gr.).
Mézclese y divídase en seis papeles.

D. Uno cada dos horas.

7191. Otro (BRERA).

℥ Hojas de digital. . . ʒj 1/3 (6 cent.).
Oxid. negro de mang. ʒjv (2 dec.).
Regaliz. ʒβ (6 dec.).
Divídase S. A. en seis papeles.

I. Hidropesía complicada con clorosis. D. Un papel cada cuatro horas.

7192. Otro (H. DE AL.).

℥ Cantáridas. ʒjv (2 dec.).
Alcanfor. ʒviiij (4 dec.).
Azúcar de leche. . . . ʒiij (12 gr.).
Mézclese y divídase en seis papeles.

D. Uno cada dos ó tres horas.

7193. Otro (H. DE AL.).

℥ Enebro tostado. ʒ
Azúcar blanca. ʒ
M. D. A cucharadas de café cada dos horas.

7194. Otro (H. DE ING.).

℥ Cebolla albarrana. . . . ʒj (12 dec.).
Opio. ʒjv (2 dec.).
Cancla. ʒj (4 gr.).

Mézclese y divídase en ocho papeles. Cada papel contiene ʒiij (15 cent.) de cebolla albarrana.

I. Hidropesías. D. Dos papeles al día.

7195. Otro (OSIANDER).

℥ Escila. ʒij (1 dec.).
Digital. ʒx (5 dec.).
Crémor de tártaro. . . . ʒβ (2 gr.).

D. Se toma en tres tomas en el día.

7196. Otro (SZERLECKI).

℥ Digital en polvo,
Cebolla alb. en p., ãã. ʒxviiij (1 gr.).
Oleosácaro de enebro. ʒiijβ (10 gr.).
Mézclese y divídase en doce dosis.

I. Hidropesías pasivas. D. Un papel cada cuatro horas.

7197. P. DIURÉTICO

ATEMPERANTE.

℥ Crémor de tártaro,
Nitro, ãã. ʒij (8 gr.).
Azúcar de leche,
Goma,
Azúcar, ãã. ʒij (64 gr.).
Se divide en ocho papeles. Se

disuelve cada papel en dos cuartillos de agua.

7198. P. DIURÉTICO ó Tisana seca (F. F.).

℞ Nitrato de potasa en polvo,
Malvabisco en polvo, ãã. ʒj (32 gr.).
Goma arábica,
Azúcar, ãã. ʒij (64 gr.).

I. Es diurético y se usa principalmente en el tratamiento de las gonorreas. *D.* Una cucharada de café en un vaso de agua.

En el día rara vez se usa y generalmente se prefiere el nitro solo.

7199. P. DIURÉTICO OPIADO (Rust).

℞ Digital en polvo. . . ʒxij (6 dec.).
Opio purificado. . . ʒiij (15 cent.).
Crémor de tártaro. . ʒj (4 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒij (8 gr.)

Mézclese y divídase en doce papeles.

I. Hidropesías. *D.* Tres ó cuatro papeles al día.

7200. P. DIURÉTICO RESOLUTIVO (Kreysig).

℞ Calomielanos. ʒxvj (8 dec.).
Quermes mineral. . . ʒjv (2 dec.).
Nitro. ʒj y ʒviiij (4,40 gr.).

Magnesia,
Azúcar, ãã. ʒv (6,60 gr.).
Divídase en ocho dosis.

I. Carditis. *D.* Una dosis cada dos horas.

7201. P. DEL DOCTOR ODIER.

℞ Magnesia calcinada,
Azúcar, ãã. ʒx (40 gr.).
Oxido de bismuto. . . ʒj (4 gr.).
Divídase S. A. en papeles de á ʒxx (10 dec.).

I. Gastrodinia y dispepsia. *D.* Un papel cada tres horas.

7202. P. DE DOWER ó Polvos de ipecacuana con opio (F. E.).

℞ Sulfato de potasa. . . ʒj (32 gr.).

Nitrato de potasa. . . ʒjβ (48 gr.).

Raiz de ipecacuana,

Opio, ãã. ʒij (8 gr.).

Se reducen á polvo separadamente y se mezclan todos en un almirez de piedra.

Los POLVOS DE DOWER DE LOS H. DE M. tienen la misma composición.

Nota. Cada escrúpulo (12 dec.) contiene ʒij (1 dec.) de opio.

I. Afecciones asmáticas; son expectorantes, diaforéticos y algo calmantes, y se aconsejan en los catarros y principalmente en las afecciones reumáticas. También se los puede prescribir en las sífilis como sudoríficos. *D.* ʒβ á ʒj (6 á 12 dec.).

7203. P. DE DOWER (F. F. Y F. P.).

℞ Polvo de sulfato de potasa,
Polvo de nitrato de potasa, ãã. ʒjv (125 gr.).

Polvo de ipecacuana,

Polvo de regaliz,

Polvo de extracto seco

de opio, ãã. ʒj (32 gr.).

Se mezclan exactamente despues de secarlos bien en la estufa.

I. Diarreas, afecciones pulmonares, bronquitis, carditis, cólera, gota, reumatismo crónico, albuminuria, catarata, isquidrosis, tos, afecciones catarrales, fiebres, reumatismo. *D.* ʒv á ʒvj (25 á 30 cent.) y aun mas al día.

Los POLVOS DE DOWER DE LOS H. M. se diferencian de los anteriores en la cantidad de los componentes, pues entran dos partes de sulfato de potasa, otras dos de nitrato de potasa, una de opio pulverizado, otra de ipecacuana pulverizada y dos de polvos de regaliz. *D.* De ʒx á ʒxx (5 á 10 dec.) en una tisana diaforética tibia.

7204. P. DE DUPUYTREN CONTRA LOS HERPES FAGEDÉNICOS Ó CORROSIVOS.

Convencido Dupuytren de la ineficacia de los remedios antiherpéticos, antiscrofulosos, antivéné-

reos y demás empleados contra esta cruel enfermedad, propuso los polvos siguientes:

℞ Calomelanos impalpables. 199
Acido arsenioso. 4

Este remedio, que obra mas bien como específico que como cáustico, se puede emplear de diferentes modos.

Si la superficie del herpes está ulcerada, húmeda y limpia, se la espolvorea por medio de una borrita cargada del polvo indicado, de modo que se le cubra con una capa del grosor de media á una línea.

Si la superficie está cubierta de costras, se las hace caer por medio de cataplasmas y se la espolvorea despues como acabamos de decir. Por último si el herpes está cubierto de una cicatriz imperfecta es necesario destruirla y se espolvorea veinticuatro horas despues la superficie, que para entonces ya ha dejado de dar sangre.

Si se teme que el polvo no se adhiera bastante á las partes y que pueda caerse, se le diluye en agua de goma ó se le incorpora con unguento rosado. En este caso se debe aumentar una ó dos décimas partes la dosis del ácido arsenioso.

En todos estos casos se debe aguardar á que el polvo ó la pomada se caigan por sí mismos, lo que sucede comunmente á los ocho ó diez dias, y se renuevan las aplicaciones hasta la completa curacion, la cual se verifica mas comunmente al cabo de ocho á diez semanas ó despues de cinco ó seis aplicaciones. Se concibe bien que un práctico instruido puede aumentar ó disminuir las proporciones de los elementos constituyentes del remedio, segun la extension y la profundidad del mal; pero parece importante no excluir á ninguno de los que entran en su composicion. Los dos parecen ne-

cesarios á su accion, sin que pueda determinarse de un modo preciso la parte que cada uno toma en ella. Véase núm. 6947.

7205. P. ECEFRÁCTICO.

℞ Vitriolo verde. ḡv (25 cent.).
Gengib. ḡxij á ḡxx (6 dec. á 4 gr.).
M. I. Amenorrea, clorosis, leucorrea, dispepsia. D. En dos veces al dia.

7206. Otro (SELLE).

℞ Carbonato de magnesia,
Tártaro depurado,
Raiz de ruibarbo,
Flor de manzanilla,
Eleosácaro de hinojo,
Azufre depurado, añ. . . ʒij (8 gr.).
Mézclese y hágase polvo.
I. Obstrucciones de las vísceras abdominales; hipocondría, sobre todo cuando hay plétora abdominal. D. Una cucharada de café tres veces al dia.

7207. P. DE ELATERINA (Bright).

℞ Elaterina. ḡjv (2 dec.).
Crémor de tártaro. . . ʒx (40 gr.).
Dividase en sesenta y cuatro papeles.
I. Enfermedad de Bright. D. Un papel cada dos ó tres horas segun el efecto. Este polvo debe producir deposiciones abundantes líquidas sin dolores ni cólicos.

7208. P. DE ELATERIO COMPUESTO (Bright).

℞ Extracto de elaterio. . ḡjv (2 dec.).
Tartrato de potasa. . . ḡxc (5 gr.).
Gengibre. ḡxviii (4 gr.).
Mézclese y dividase en doce papeles.
I. Enfermedad de Bright. Precede á su uso el reposo en la cama, purgantes diaforéticos y diuréticos comunes, tales como la jalapa, el acetato de amoniaco,

el vino emético, el nitro, etc. *D.* ḡv á ḡxx (25 á 100 cent.). Treinta granos (15 dec.) contienen ḡj (5 cent.) de elaterio.

7209. P. EMENAGOGO.

\mathcal{R} Polvo de sabina,
Polvo de gengibre, ãã . ḡj (4 gr.).
Azúcar con vainilla. . . ḡj (32 gr.).
Mézclese y dividase en doce papeles.
D. Se tomará uno ó dos al día.

7510. Otro (BERENDS).

\mathcal{R} Sal amoniaco. ḡij (8 gr.).
Alcanfor. ḡvij (35 cent.).
Flores de arnica. . . ḡḡ (2 gr.).
Azúcar blanca. . . . ḡvḡ (22 gr.).
I. Se puede usar tambien en los catarros crónicos. *D.* Una cucharada de café tres ó cuatro veces al día.

7211. Otro (H. DE IT.).

\mathcal{R} Limaduras de hierro. . ḡxviii (4 gr.).
Acibar sucotrino. . . . ḡvj (3 dec.).
Magnesia calcinada. . . ḡjḡ (6 gr.).
Mézclese y dividase en tres papeles.
I. Amenorrea atónica. *D.* Un papel cada cuatro horas.

7212. P. EMÉTICO (H. M.).

\mathcal{R} Ipecacuana en polvo. . . ḡj (4 gr.).
Azúcar. ḡij (8 gr.).
Mézclese y dividase en cuatro papeles iguales.
I. Embarazo gástrico. *D.* Un papel cada media hora hasta producir el vómitos.

7213. Otro (H. DE M.).

\mathcal{R} Raiz de ipecacuana en p. ḡj (12 dec.).
Tártaro emético. . . . ḡj (5 cent.).
M. D. ḡḡ á ḡj 4 á (12 dec.).

7214. P. EMETO-CATÁRTICO.

\mathcal{R} Ipecacuana en polvo. . . ḡj (4 gr.).

Ruibarbo. ḡij (8 gr.).
M. D. ḡḡ á ḡj (2 á 4 gr.).

7215. P. DE ÉNULA (H. DE AL.).

\mathcal{R} Raiz de énula campan. ḡj (4 gr.).
Raiz de angélica. . . . ḡxij (6 dec.).
Mézclese y dividase en cuatro papeles.
I. Catarros pulmonares crónicos, dispepsia, etc. *D.* Un papel cada tres horas.

7216. P. ERRINO (Griffith).

\mathcal{R} Alumbre,
Bol arménico, ãã ḡj (4 gr.).
Sangre de drago. . . . ḡḡ (2 gr.).
Oxido rojo de hierro. . . ḡij (8 gr.).
M. I. Epistaxis.

7217. Otro (VOGT).

\mathcal{R} Alumbre. ḡv (25 cent.).
Extracto de ratania,
Corteza de encina, ãã . ḡj (4 gr.).
M. I. Atonía de la mucosa nasal.

7218. P. ERRINO ASTRINGENTE.

\mathcal{R} Acibar,
Mirra, ãã ḡjḡ (45 gr.).
Cal viva. ḡj (4 gr.).
Deutóxido de plomo. . . ḡḡ (2 gr.).
Alumbre. ḡxc (5 gr.).
Cáscara de granada,
Balaustrias, ãã ḡij (8 gr.).
Aceite de arrayan,
Agua de rosas, ãã . ḡij y ḡv (84 gr.).
Agua de llanten. c. s.
M. I. Ulceras de las narices, ozena, cefalalgia. *D.* Se usa en inyecciones é inhalaciones.

7219. P. ERRINO FEBRIFUGO.

\mathcal{R} Sulfato de quinina. . ḡxv (75 cent.).
Tabaco en polvo. . . . ḡijḡ (10 gr.).
M. I. Hemicránea, cefalalgia intermitente. *D.* ḡjv (2 dec.) de media en media hora.

7220. P. ERRINO HEMOSTÁTICO.

℞ Alumbre. ʒB (2 gr.).
 Bol arménico. ʒvj (24 gr.).
 Vinagre,
 Vino tinto, añ. c. s.

para hacer una pasta que se introduce en las narices en los casos de epistaxis.

7221. P. DE ESCAMONEA ANTIMONIALES ó Polvos cornaquinos (F. E.).

℞ Oxido blanco de antimonio. ʒ
 Crémor de tártaro. ʒ
 Escamonea de Alepo. ʒ
 H. S. A. D. Hasta ʒj (4 gr.).

7222. P. DE ESCAMONEA CATÓLICOS (F. E.).

℞ Escamonea escogida. . ʒB (16 gr.).
 Raiz de mechoacan,
 Raiz de jalapa, añ. . . ʒvj (24 gr.).
 Tartrato de potasa. . . ʒiij (12 gr.).
 Se reducen á polvo separadamente, se mezclan todos y se guardan para el uso.
 I. Son purgantes. D. ʒij (24 dec.).

7223. P. DE ESCAMONEA COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Escamonea,
 Extr. de jalapa duro, añ. ʒij (60 gr.).
 Gengibre. ʒB (15 gr.).
 Se reducen á polvo fino separadamente y se los mezcla.
 I. Es purgante drástico. D. Se dan de ʒvj á ʒx (3 á 5 dec.) en un vehículo conveniente.

7224. P. DE ESCAMONEA Y PROTOCLORURO DE MERCURIO (F. P.).

℞ Escamonea en polvo. ʒ
 Protocloruro de mercurio. ʒ
 Azúcar fina. ʒ
 H. S. A. y divídase en papeles de ʒB (6 dec.).
 D. Uno á dos al día.

7225. P. DE ESCAMONEA COMPUESTO (Vimmer).

℞ Res. de escam. pura. ʒLjv (3 gr.).
 Jabon blanco. ʒvj (25 cent.).
 Azúcar blanca. ʒxij (375 gr.).
 Se mezcla, se reducen á polvo tenue y se añade poco á poco:
 Bizcocho en polvo. . ʒvj (24 gr.).
 Agua. algunas gotas.
 Se tritura con cuidado, se seca al aire y se conserva en un frasco tapado.
 Cada ʒLjv (3 gr.) contienen cerca de ʒvj (3 dec.) de escamonea.
 I. Es buen purgante vermífugo.
 D. ʒviiij (4 dec.) para un adulto y ʒij (1 dec.) para un niño.

7226. P. ESCARÓTICO ARSENICAL ó Polvo cáustico de Fray Cosme ó de Rousselot (F. F.).

℞ Cinabrio porfirizado,
 Sang. de drago en p., añ. ʒjv (16 gr.).
 Arsén. bl. porfirizado. ʒij (8 gr.).
 Se mezclan exactamente y se guardan para el uso.
 I. Cáncer, herpes, lepra, elefantiasis, lupus, tiña, soriasis, pirosis, dispepsia.

Cuando haya de usarse se reducen á masa con un poco de saliva ó agua gomosa, y solo se unta de cada vez una superficie como una peseta, por ejemplo, teniendo entendido que puede causar accidentes si se aplica sin precaucion. Esta aplicacion da lugar á una verdadera erisipela; la piel se pone encendida y sobrevienen escalofrios y fiebre; pero estos accidentes ceden ordinariamente con algunos ligeros derivativos, y despues de dos ó tres dias se consigue una escara sólida, gruesa, que cubre una superficie que se cicatriza con rapidez cuando la persistencia ó la profundidad de la afeccion no exigen nuevas aplicaciones.

7227. P. ESCARÓTICO CONTRA LOS CONDILOMAS.

℞ Precipitado blanco. ḡvj (3 dec.).
 Magnesia blanca. ʒj (12 dec.).
 Sabina en polvo. ʒj (4 gr.).

M. I. Es un caterético poco activo. *D.* Una pulgarada de este polvo, mañana y noche, sobre las vegetaciones.

7228. P. DE ESCILA (F. F.).

℞ Escama de escila. c. s. q.
 Se desecan en la estufa, y se pulverizan sutilmente por contusion sin dejar residuo. Como el polvo de escila atrae poderosamente la humedad atmosférica es preciso ponerle en la estufa recién preparado, y guardarle en frascos bien secos y pequeños. Se pulverizará corta cantidad á la vez.

I. y D. Véase t. I, p. 144.

7229. P. DE ESCILA COMPUESTO (Sthal).

℞ Escamas de escila recientes. ʒvj (180 gr.).
 Raíz de asclepias venetósigo. ʒj (30 gr.).

Se machaca la escila en un mortero de mármol, y cuando está reducida á polvo se le añade el polvo de venetósigo. Se deja secar todo en la estufa, se pulveriza de nuevo y se pasa por un tamiz.

I. Hidropesía, asma húmedo y catarro crónico sin irritacion. *D.* ḡiij á ḡv (15 á 25 cent.).

7230. P. DE ESCILA Y AZUFRE ó Polvo incisivo (H. M. F.).

℞ Azufre sublimado y lavado. ʒß (2 gr.).
 Escila en polvo. ḡxviiij (4 gr.).

M. I. Catarros crónicos. *D.* ḡvj (3 dec.).

7231. P. DE ESCILA Y AZUFRE ó Polvo incisivo (F. P.).

℞ Escila preparada en polvo. ʒ
 Azufre sublimado y lavado. ʒ
 Azúcar fino. ʒ

H. S. A. I. Asma, catarros pulmonares, romadizo. *D.* ḡvj á ḡxij (3 á 6 dec.) aumentando progresivamente.

7232. P. DE ESCILA COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Escila recién desecada y en polvo. ʒj (4 gr.).
 Gengibre en polvo,
 Goma amoniaco en polvo, ãã. ʒij (8 gr.).
 Jabon. ʒiij (12 gr.).
 Jarabe. c. s.

Mézclense los polvos, pístense con el jabon, y añádase el jarabe para hacer una masa de la consistencia conveniente.

7233. Otro (F. P.).

℞ Escila en polvo. ʒ
 Polvos aromáticos. ʒ
 Azúcar fino. ʒ
H. S. A. I. Hidropesias como diurético. *D.* ḡjv á ḡvj (2 á 3 dec.) y mas.

7234. P. DE ESCILA NITRADO (Vanhelmont).

℞ Nitrato de potasa. ʒvij (28 gr.).
 Raíz de asclepias venetósigo. ʒß (2 gr.).
 Escamas de escila seca. ʒj (4 gr.).
 Se hace un polvo muy homogéneo y muy fino.

I. Ascitis. *D.* ḡxij (6 dec.) dos veces al dia.

Nota. Es necesario tener cuidado de secar el nitrato de potasa para quitarle una parte de su agua de cristalización.

7235. P. DE ESCILA PARA ENVENENAR LOS RATONES.

℞ Escila en polvo. ʒij (60 gr.)

Queso oloroso. ℞β (250 gr.).
Esta mezcla mata rápidamente las ratas y ratones.

7236. P. ESCILITICO MERCURIAL
(P. Frank).

℞ Polvos de cebolla albarrana. ḡxij (6 dec.).
Calomelanos preparados al vapor. ḡvj (3 dec.).
Mézclase y divídase en doce tomas.

I. Hidrotorax complicado con una afección del hígado. D. Una toma tres veces al día.

7237. P. EXPECTORANTE
(Babeyrac).

℞ Flores de benjuí. ḡvj (3 dec.).
Flores de azufre lav. ḡix (5 dec.).
Cascañilla. ḡxij (6 dec.).
Azúcar piedra. ḡxx (10 dec.).
M. Para una dosis.

I. Sirve para facilitar la expectoración en el asma húmedo.

7238. Otro (Recamier).

℞ Cebolla albarrana. ℞β (6 dec.).
Ipecacuana. ℞j (12 dec.).
M. y divídase en seis papeles.

I. Catarros pulmonares crónicos, al fin de la neumonía, etc. D. Un papel cada tres horas.

7239. P. DE ESPONJA COMPUESTOS.

℞ Polvo de esponja ligeramente tostada y de color rojo. ḡijβ (75 gr.).
Carbon en polvo. ḡβ (15 gr.).
Hidrocl. de amoníaco. ḡj (4 gr.).

M. D. A los enfermos de más de diez años se les dan ℞ij (24 dec.) en tres tomas, una por la mañana, otra al mediodía y otra por la noche. Se introduce la dosis en el fondo de la boca en una cucharada de café y se la traga toda en seco. Se usa contra el bocio.

7240. P. DE ESTAÑO ó Limaduras de estaño (F. F.).

℞ Estaño puro. c. s. q.

Se funde á un calor suave en un cazo de hierro, se echa inmediatamente en un almirez del mismo metal calentado antes, y se tritura ligeramente con una mano algo plana, también caliente, hasta que se solidifique el metal. Se pasa el polvo por un tamiz de seda para separar la porción más dividida, y el resto se vuelve á fundir y triturar de la misma manera hasta obtener el polvo que se necesite.

I. y D. Véase t. I, p. 186.

7241. P. ESTIBIO OPIADO.

℞ Extracto de opio en polvo,
Emético, añ. ḡij (1 dec.).
Azúcar de leche. ḡj (30 gr.).
Azúcar. ḡij (60 gr.).

Divídase en doce papeles. D. Se da uno por la mañana y otro por la noche, disuelto en un vaso de agua, en las bronquitis crónicas y en la tisis en primer grado.

7242. Otro, n. 2.

℞ Tártaro emético. ḡj (5 cent.).
Opio. ḡjv (20 cent.).
Raíz de valeriana. ḡij (8 gr.).
H. S. A. cuatro papeles.

I. Reumatismo y catarro crónicos. D. Un papel cada tres horas.

7243. P. ESTIMULANTE.

℞ Canela. ḡβ (16 gr.).
Gengibre,
Clavo, añ. ḡij (8 gr.).

M. D. ḡxviii á ḡj (1 á 4 gr.), dos á tres veces al día.

7244. Otro, n. 2.

℞ Gengibre. ḡij (8 gr.).

Canela. ʒB (16 gr.).
Anís. ʒj (32 gr.).
Quina en polvo. ʒij (8 gr.).

Mézclese y dividase en papeles de á ʒxij (6 dec.).

D. Se dan de uno á dos papeles al dia en la dispepsia.

7245. Otro, n. 3.

ʒ Azúcar con vainilla. ʒxijB (50 gr.).
Canela,
Nuez moscada, ãã. . ʒijB (10 gr.).
Ambar gris. ʒB (2 gr.).

Dividase en diez y seis papeles.

I. Anafrodisia. D. Dos ó tres papeles al dia.

7246. Otro (SOMMERVALL).

ʒ Alcanfor. ʒXLV (3 gr.).
Hidroclor. de amoniaco. ʒj (4 gr.).
Mézclese y dividase en quince tomas.

I. Retencion de orina por falta de contractilidad de la vejiga. D. Una toma cada dos horas.

7247. P. ESTIMULANTE Y NUTRITIVO.

ʒ Polvo de osmazomo,
Polvo de gelatina, ãã. ʒj (32 gr.).
Polvo de goma. ʒij (8 gr.).
Polvo de clavo,
Polvo de pimienta,
Polvo de semillas de apio,
Polvo de zanahoria, ãã. ʒxij (6 dec.).

M. D. ʒiij (90 gr.) de este polvo y un poco de sal, diluidas en ʒij (1000 gr.) de agua hirviendo, dan un líquido muy sano y muy agradable. Se deberá colar por un lienzo antes de tomarle.

7248. P. ESTIPTICO (Augustin).

ʒ Goma arábiga. ʒij (60 gr.).
Goma quino. ʒj (30 gr.).

H. S. A. I. Hemorragias traumáticas. D. Para espolvorear las heridas y úlceras que dan sangre.

7249. P. ESTIPTICOS ó Polvos de alumbre y quino (F. P.).

ʒ Alumbre. 4
Quino. 1

H. S. A. I. Hemorragias pasivas, flujos serosos, diarreas colicuativas.

7250. P. ESTIPTICO DE COLBATCH ó específico astringente de Maetzius.

ʒ Solucion saturada de deutocloruro de hierro. ʒjv (125 gr.).

Se hace evaporar hasta la mitad y se añade un peso igual de acetato de plomo seco; se continúa la evaporacion á fuego lento hasta la sequedad, se pulveriza el residuo y se le pasa por un tamiz.

Nota. Es necesario libertar este polvo del contacto del aire, porque atrae la humedad.

I. y D. Se emplea exterior é interiormente para toda clase de hemorragias. Se da interiormente á la dosis de ʒjv á ʒxij (2 á 6 dec.).

7251. P. ESTOMACAL.

ʒ Quina roja,
Ruibarbo, ãã. ʒB (15 gr.).
Hidroclor. de amoniac. ʒxc (5 gr.).
Dividase en doce papeles.

I. Dispepsia, anorexia. D. Un papel al dia.

7252. Otro, n. 2.

ʒ Quina,
Ruibarbo, ãã. ʒj (4 gr.).
Mézclese y dividase en doce papeles.

D. Un papel en una cucharada de sopa al tiempo de comer.

7253. Otro, n. 3.

ʒ Genciana. ʒXL (20 dec.).
Canela,
Ruibarbo, ãã. ʒj (36 dec.).

Mézclese y dividase en cuatro papeles.

D. Una toma al tiempo de comer, en una cucharada de sopa ó en un poco de vino.

7254. Otro, n. 4.

℞ Colombo. ḡx (5 dec.).
Magnesia calcinada. ʒij (24 dec.).
Mézclese y dividase en dos papeles.

I. Dispepsia. *D.* Un papel cada tres horas.

7255. Otro (BIRKMANN).

℞ Raiz de yaro. ʒij (60 gr.).
Raiz de cálamo aromático,
Raiz de saxifraga, ãã. ʒj (30 gr.).
Piedras de cangrejos. ʒʒ (45 gr.).
Canela fina. ʒiij (42 gr.).
Sulfato de potasa. ʒij (8 gr.).
Hidroclor. de amoniac. ʒij (24 dec.).

H. S. A. Se usa en la debilidad de estómago con embarazo mucoso. *D.* De ʒij á ʒjv (8 á 16 gr.).

7256. Otro (VOGT).

℞ Nuez vómica en polv. ḡxx (4 gr.).
Ipecacuana en polvo. ʒj (12 dec.).
Ruibarbo en polvo. ʒj (4 gr.).
Conchas de ostras preparadas. ʒij (24 dec.).
Oleosácaro de yerbab. ʒij (8 gr.).
Mézclese y dividase en doce papeles.

D. Una toma cada dos ó tres horas.

7257. P. ESTORNUTATORIO.

℞ Hojas de ásaro,
Hojas de mejorana, ãã. ʒij (8 gr.).
Flores de espliego,
Lirio de Florencia, ãã. ʒj (4 gr.).
Accite de clavo. 7 gotas.

H. S. A. D. Una pequeña toma, ya pura ó ya mezclada con cualquier otro polvo de propiedades análogas, pero menos activas, como por ejemplo el tabaco.

7258. P. ESTORNUTATORIO
(Flucher).

℞ Raiz de pelitre,
Semillas de estafisagria,
Semillas de gengib., ãã. ʒj (4 gr.).
Pimienta larga. ʒʒ (2 gr.).
H. S. A. un polvo fino.

I. Epilepsia de los niños, amaurosis, síncope, coriza, hemicránea, cefalalgia, sordera, otitis, anosmia, histérico. *D.* Se insufla en las narices.

7259. Otro (MIALHE).

℞ Azúcar cande en polvo. ʒj (30 gr.).
Veratrina. ḡj á ḡij (5 á 10 cent.).
Mézclese exactamente.

Reemplaza muy bien á todos los polvos estornutatorios empleados hasta ahora.

7260. Otro (SCHNEIDER).

℞ Alcanfor. ḡviii (4 dec.).
Raiz de guayaco. ḡx (5 dec.).
Camedrios,
Azúcar blanca, ãã. ʒj (30 gr.).
H. S. A. un polvo homogéneo.
I. Coriza.

7261. P. ESTORNUTATORIO, Polvo de ásaro compuesto ó de St. Angel.

℞ Hojas secas de ásaro,
Hojas de mejorana,
Hojas de betónica,
Flores secas de lirio de los valles, ãã. ʒij (8 gr.).
M. I. Jaqueca, hemicránea, amaurosis, síncope, anosmia, coriza, cefalalgia, histérico, otitis, sordera. *D.* Una pulgarada.

7262. P. ESTORNUTATORIO DE BETÓNICA.

℞ Betónica. ʒ
Mejorana. ʒ
Salvia. ʒ
Espliego. ʒ
Lirio de Florencia. ʒ
Redúzcase á polvo.

I. Cefalalgia, síncope, coriza, hemicránea, histérico crónico, anosmia, sordera, otitis.

7263. P. ESTORNUTATORIO DE ELÉBORO.

- ℞ Eléboro. ʒj (4 gr.).
- Betónica,
- Pelitre, ãã. ʒß (2 gr.).
- Poleo. ʒxviiij (4 gr.).
- Mejorana. ʒjß (6 gr.).
- H. S. A. un polvo fino.

I. Jaqueca, cefalalgia, coriza, amaurosis, síncope, anosmia, sordera, histérico, otitis.

7264. P. DE ESTRICNIÑA (Magendie).

- ℞ Estricnina. ʒj (5 cent.).
 - Oxido negro de hierro. ʒj (4 gr.).
 - Azúcar. ʒiiij (12 gr.).
- Mézclese y dividase en seis papeles.

D. Uno, mañana y noche.

7265. P. DE ESTRICNINA Y DE ÓXIDO DE HIERRO.

- ℞ Estricnina. ʒij (4 dec.).
 - Oxido negro de hierro. ʒxc (5 gr.).
 - Goma en polvo,
 - Azúcar en polvo, ãã. ʒjx (45 cent.).
- Mézclese y dividase en diez papeles.

D. Uno al día.

7266. P. ETIÓPICO.

- ℞ Etiope antimonial. ʒ
- Cicuta en polvo. ʒ
- Carbonato de magnesia. ʒ
- Azúcar. ʒ

I. Exantemas crónicos de los niños. *D.* ʒv á ʒxviiij (25 cent. á 1 gr.).

7267. P. EXCITANTE.

- ℞ Quina. ʒij (60 gr.).
 - Mirra. ʒß (15 gr.).
 - Alcanfor. ʒij (8 gr.).
- M. I.* Gangrena.

7268. P. EXPECTORANTE.

- ℞ Escila en polvo. ʒxviiij (4 gr.).
 - Gengibre en polvo,
 - Ipecacuana en p., ãã. ʒxxxvj (2 gr.).
- Mézclese y dividase en veinte papeles iguales.

I. Catarros pulmonares crónicos, al fin de las perineumonias, etc.
D. Dos á cuatro al día.

7269. P. EXPECTORANTE (Bereñds).

- ℞ Acido benzóico. ʒß (2 gr.).
 - Azufre dorado de antimonio,
 - Alcanfor, ãã. ʒvj (3 dec.).
 - Oleosácaro de hinojo. ʒj (4 gr.).
- Mézclese y dividase en seis papeles.

D. Uno cada dos horas.

7270. Otro (HORN).

- ℞ Acido benzóico. ʒß (2 gr.).
 - Ipecacuana. ʒvj (3 dec.).
 - Azufre dor. de antim. ʒiiij (15 cent.).
 - Azúcar. ʒj (4 gr.).
- Dividase en seis papeles.

I. Neumonía asténica. *D.* Cuatro papeles al día.

7271. Otro (H. DE AL.).

- ℞ Quermés mineral. ʒxv (75 cent.).
 - Azúcar blanca. ʒj (30 gr.).
- Mézclese y dividase en quince papeles.

D. Uno á tres al día.

7272. P. EXPECTORANTE AMONIACAL.

- ℞ Azufre dor. de antim. ʒjv (2 dec.).
 - Nitro. ʒxx (4 gr.).
 - Alcanfor. ʒiiij (15 cent.).
 - Extracto de opio. ʒij (4 dec.).
 - Sal amoniac. ʒxx (4 gr.).
- Dividase en seis papeles.

I. Ronquera, tos espasmódica, tos catarral, catarro crónico, neumonía. *D.* Un papel cuatro veces al día.

**7273. P. EXPECTORANTE
ANTIMONIADO.**

℥ Ipecacuana. ḡv (25 cent.).
Mirra. ḡx (5 dec.).
Azufre dor. de antim. ḡij (1 dec.).
Goma,
Azúcar, ãã. ḡxc (5 gr.).
Divídase en diez papeles.

I. Catarros, ronquera, neumonías crónicas, asma, hipo. *D.* Un papel cada dos horas.

**7274. P. EXPECTORANTE
(Mursinna).**

℥ Ipecacuana,
Azufre dor. de ant., ãã. ḡB (6 dec.).
Alcanfor. ḡjv (2 dec.).
Polvo gomoso. ḡj (12 dec.).

I. Perineumonía, cuando se han suprimido los esputos. *D.* Una dosis cada dos horas.

7275. P. DE FAVÉ.

℥ Cort. de encina verde. 3jB (6 gr.).
Parte esponjosa del fruto del espinoserval. . . 5B (2 gr.).
Escila en polvo. 3j (4 gr.).
Vainilla. ḡij (1 dec.).
Almidon. 3j (4 gr.).

H. S. A. I. Se usa en Argél contra la disenteria. *D.* ḡLjv á ḡxc (3 á 5 gr.) de este polvo dos veces al día. Se toma con los alimentos una dosis por la mañana y otra por la noche, y si se vomita se disminuye la cantidad.

Durante su uso pueden los enfermos entregarse á sus ocupaciones, y segun Fave no contraindica la administracion del medicamento un dolor vivo ó una fiebre intensa.

7276. P. FEBRIFUGO.

℥ Sulfato de quinina. . . . 3B (2 gr.).
Sulfato de mortina. . . . ḡj (5 cent.).
Mézclese y divídase en ocho papeles.

I. Calenturas intermitentes. *D.* Dos papeles al día.

7277. P. FEBRIFUGO ó Febrífugo francés.

℥ Manzanilla en polvo. 4
Genciana en polvo. 4
Corteza de roble en polvo. 4

M. I. Calenturas intermitentes. *D.* 3ij á 3jv (8 á 15 gr.) en bolos ó en píldoras ó bajo la forma de electuario.

7278. P. FEBRIFUGO (Boullemer).

℥ Ojos de cangrejos. . . . 3j (4 gr.).
Hidrocl. de amoniaco. 5B (2 gr.).
Mirra. ḡj (12 dec.).
Se pulverizan y se dividen en tres partes iguales.

D. El enfermo tomará la dosis en tres dias; la primera dos horas antes del paroxismo, la segunda al otro dia á la misma hora y la tercera al dia siguiente.

7279. Otro (CHLEGHORN).

℥ Quina gris. 3B (16 gr.).
Sulfato de magnesia. . . 3vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro papeles. *D.* Una toma de dos en dos horas, durante la apirexia.

7280. Otro (GOLA).

℥ Emético. ḡij (15 cent.).
Sulfato de quinina. . . ḡjx (45 cent.).
Mézclese.

7281. Otro (HARTMANN).

℥ Polvo de quina. 3ij (8 gr.).
Polvo de cascarilla. . . ḡxij (6 dec.).
M. D. Se da de una vez en las fiebres remitentes é intermitentes.

7282. Otro (HECKER).

℥ Sulfuro de arsénico amarillo. ḡB (25 mil.).

Azúcar blanca. ḡxij (6 dec.).
 Aceite de anís. ¼ de gota.
 Mézclese.

7283. P. FEBRIFUGO (H. DE AL.).

℥ Hidroclorato de amon. ʒij (8 gr.).
 Opo. ḡj (5 cent.).
 Flores de manzanilla en
 polvo. ʒiij (12 gr.).
 Oleosácaro de hinojo. . ʒʒ (16 gr.).
 M. D. Una cucharada de café
 cada dos horas.

7284. Otro (H. DE AL.).

℥ Cianuro de hierro,
 Azúcar blanca, añ. . ḡxviiij (4 gr.).
 Mézclese y divídase en tres pa-
 peles.
 D. Se toman en un día.

7285. Otro (H. DE IT.).

℥ Sulfato de cobre amo-
 niacal. ḡj (5 cent.).
 Azúcar blanca. ʒj (4 gr.).
 Mézclese y divídase en cuatro
 papeles.
 D. Uno cada cuatro horas.

7286. Otro (H. DE ING.).

℥ Quina,
 Crémor de tártaro, añ. ʒʒ (15 gr.).
 Clavo de especia. . . ḡxv (75 cent.).
 Mézclese y divídase en nueve
 papeles.
 D. Uno cada tres horas.

**7287. P. FEBRIFUGO ESTIBIADO
 (H. DE IT.).**

℥ Quina roja. ʒj (30 gr.).
 Tártaro emético. . . . ḡj (5 cent.).
 Mézclese y divídase en cuatro
 papeles.
 I. Calenturas intermitentes con
 síntomas gástricos. D. Un papel
 cada dos horas.

7288. P. FEBRIFUGO (Jadelot).

℥ Quina. ʒj (32 gr.).

Cáscaras de naranjas amargas,
 Raíz de genciana, añ. . ʒij (8 gr.).
 Sal amoniaco,
 Ruibarbo, añ. ʒj (4 gr.).
 M. I. Fiebres intermitentes re-
 beldes. D. ʒj (4 gr.) cuatro veces
 al día, diluida en un poco de agua,
 pasado el acceso.

7289. Otro (JUNCKER).

℥ Oxido de antimonio hidrosulfurado
 anaranjado,
 Magnesia,
 Sulfato de potasa, añ. ʒʒ (2 gr.).
 H. S. A. y divídase en cuatro
 partes iguales.
 D. Se dan estas cuatro dosis á
 iguales distancias, durante la api-
 rexia.

7290. Otro (RADIUS).

℥ Hidroclor. de quinina. ʒʒ (2 gr.).
 Escila. ḡvj (3 dec.).
 Opo puro. ḡxij (6 dec.).
 Oleosácaro de menta. ʒij (8 gr.).
 Divídase en doce papeles.
 D. Tres á cuatro al día.

**7291. P. FEBRIFUGOS COMPUESTOS
 (H. M.).**

℥ Corteza peruviana. . . ʒj (30 gr.).
 Genciana. ʒij (8 gr.).
 Alcanfor. ḡxij (6 dec.).
 Se reducen á polvo sutil, se
 mezclan y se dividen en ocho pa-
 peles iguales.
 D. Uno cada dos horas durante
 la apirexia.

**7292. P. FEBRIFUGO ESTIBIO
 OPIADO (H. DE IT.).**

℥ Quina amarilla. ʒj (30 gr.).
 Tártaro emético. . . . ḡij (10 cent.).
 Opo purificado. ḡj (5 cent.).
 Mézclese y divídase en cuatro
 papeles.
 I. Calenturas subintrantes ó
 perniciosas cuando hay que ad-
 ministrar en poco tiempo un tó-
 nico muy energético.

**7293. P. FEBRIFUGO CON
MAGNESIA (Roucher).**

℞ Quina roja. ʒvj (24 gr.).
Magnesia calcinada. . ʒjv (16 gr.).
Flores de manzanilla
en polvo. ʒij (8 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro
papeles iguales.

I. y D. Se administra uno, cada cuatro horas, durante la intermitencia de las fiebres de acceso que resisten á las demás mezclas febrífugas. Se diluye en una taza de infusion de achicorias amargas.

**7294. P. FEBRIFUGO OPIADO
(Neumann).**

℞ Sulfato de quinina. . ʒiij (15 cent.).
Opio. ʒj (5 cent.).
Azúcar blanca en polvo,
Goma aráb. en p., ãã. ʒvj (30 cent.).
Hágase polvo.

D. Se toma de una vez antes del acceso.

**7295. P. FEBRIFUGO DE LOS
POBRES (H. DE AL.).**

℞ Raiz de cariofilea,
Goma arábica, ãã. . . . ʒiij (12 gr.).
Hidroclor. de amoniac. ʒij (8 gr.).
Mézclese y divídase en veinticuatro papeles iguales.

D. De uno á dos y aun mas, en diferentes veces, durante la apirexia.

**7296. P. FEBRIFUGO Y PURGANTE
(Helvetius).**

℞ Jalapa. ʒij (64 gr.).
Crémor de tártaro. . . . ʒxjv (56 gr.).
Sulfato de potasa,
Zum de ajo, ãã. . . . ʒj (32 gr.).
Quina. ʒvj (24 gr.).
Diagridio. ʒʒ (16 gr.).
Tartr. de potasa y sosa. ʒiij (12 gr.).
Emético. ʒij (8 gr.).
Nitrato de potasa. . . . ʒj (4 gr.).
Azafran,
Gntagamba, ãã. . . . ʒxij (6 dec.).

Sulfuro rojo de merc. ʒvj (3 dec.).
H. S. A. I. Se usa como vermífugo ó en las fiebres intermitentes. *D.* ʒxviii á ʒʒ (1 á 2 gr.).

**7297. P. FEBRIFUGOS SIMPLES
(H. M.).**

℞ Corteza peruviana en polvo,
Quina calisaya en p., ãã. ʒʒ (15 gr.).
Mézclese y divídase en ocho papeles.

D. Uno cada dos horas durante la apirexia.

7298. P. FERRUGINOSO.

℞ Oxido negro de hierro. ʒj (30 gr.).
Yaro. ʒij (8 gr.).
Carbonato de cal. . . . ʒʒ (15 gr.).
Canela. ʒxc (5 gr.).
Azúcar. ʒij (60 gr.).

M. I. Dispepsia, pirosis, raquitis, leucorrea. *D.* ʒvj á ʒx (3 á 5 dec.) ó ʒj (12 dec.) dos ó tres veces al dia.

7299. Otro (COLOMBAT).

℞ Sulfato de hierro. ʒʒ (2 gr.).
Acido tártrico. ʒjʒ (6 gr.).
Azúcar. ʒiij (12 gr.).
H. S. A. doce papeles.

M. I. Amenorrea, leucorrea, clorosis. *D.* Una cucharada para ʒj (500 gr.) de agua.

**7300. P. FERRUGINOSO DE MENZER
(F. P.).**

℞ Sulfato de hierro crist. ʒj (4 gr.).
Azúcar blanca. ʒiij (12 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles, que se los marcará con el número 1.

Por separado se toma:

Bicarbonato de sosa. . . ʒj (4 gr.).
Azúcar blanca. ʒiij (12 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles, á los que se pondrá el número 2.

Se disuelve un papel de cada número en un poco de agua, se reúnen los líquidos y se los bebe inmediatamente al tiempo de la

efervescencia. Esta agua ferruginosa artificial contiene carbonato de protóxido de hierro, sulfato y un poco de carbonato de sosa, y puede rivalizar cuando menos con las pildoras de Blaud. Es el mejor medio de administrar el subcarbonato de hierro.

7301. P. DE FONTANEILLES.

- ℞ Arsénico blanco porfirizado. ℥ij (4 dec.).
- Mercurio dulce. ℥xvj (8 dec.).
- Opio en bruto. ℥ij (4 dec.).
- Goma arábica. ℥j (4 gr.).
- Azúcar. ℥j (4 gr.).

Mézclese y dividase en veinticuatro papeles.

I. Se le recomienda contra las fiebres intermitentes rebeldes. *D.* Un papel al dia.

7302. P. DE FORDYCE.

- ℞ Tartrato de potasa y sosa. ℥x (50 cent.).
- Ruibarbo. ℥vij (35 cent.).

Mézclese y dividase en dos papeles.

I. y *D.* Se administra uno todas las mañanas á los niños atacados de atrofia mesentérica.

7303. P. FUMIGATORIO.

- ℞ Incienso en polvo,
- Almáciga en polvo,
- Sucino en polvo, ãã. ℥jv (16 gr.).
- Estoraque calamita. ℥ij (8 gr.).
- Benjuí,
- Ládano, ãã. ℥j (4 gr.).

M. I. Reumatismo, gota, amenorrea, histérico. *D.* C. s. para echarle sobre ascuas. Se dirige el vapor hácia las partes afectadas de dolores reumáticos.

7304. Otro, n. 2.

- ℞ Sucino,
- Almáciga,
- Enebro, ãã. ℥ij (8 gr.).

Cascarilla. ℥B (2 gr.).
I. Reumatismo, gota, amenorrea, histérico. *D.* Se echa un poco en las ascuas y para fumigaciones secas.

7305. P. FUMIGATORIO BALSÁMICO ó Polvo de benjuí y almáciga compuesto.

- ℞ Almáciga. ℥
- Incienso. ℥
- Benjuí. ℥
- Bayas de enebro. ℥
- Pulverícense S. A.

7306. P. FUMIGATORIO FÉTIDO.

- ℞ Cuerno de ciervo rasp. ℥j (30 gr.).
 - Asa fétida. ℥ij (8 gr.).
- M.* Se echa sobre las ascuas y se hace respirar los vapores á las mujeres histéricas.

7307. P. FUMIGATORIO MERCURIAL.

- ℞ Mercurio dulce. ℥j (4 gr.).
 - Azúcar en polvo,
 - Benjuí en polvo, ãã. ℥B (15 gr.).
- M.* Se usan de ℥j á ℥jv (4 á 15 gr.) para cada fumigacion, que se dirige á las úlceras rebeldes de la garganta.

7308. P. FUNDENTE (Clarus).

- ℞ Carbon animal. ℥j (12 dec.).
 - Subcarbonato de hierro,
 - Azúcar, ãã. ℥ij (24 dec.).
- Dividanse en diez papeles.
I. Hipertrofia incipiente de la matriz y de los ovarios. *D.* Tres ó cuatro papeles al dia.

7309. Otro (COTTEREAU).

- ℞ Extracto hidroalcohólico de estramonio. ℥ij (4 dec.).
 - Polvo de digital purpúrea,
 - Ioduro de plomo cristalizado, ãã. ℥v (3 dec.).
 - Azúcar blanca. ℥j (4 gr.).
- H. S. A.* un polvo muy homogé-

neo, que se divide en veinticuatro papeles iguales.

I. Tisis con infartos glandulosos. *D.* Cuatro papeles al dia, con cuatro horas de intervalo de uno á otro.

Nota. Cada toma debe diluirse en una cucharada de agua azucarada, ó mejor de jarabe de puntas de espárragos.

7310. P. FUNDENTE OPIADO (Most).

℥ Extracto de opio,
Calomelanos, ãã. ḡvj (3 dec.).
Polvo de regaliz. ʒjß (6 gr.).
Mézclese y dividase en doce tomas.

I. Flegmasia blanca dolorosa. *D.* Tres ó cuatro tomas al dia.

7311. Otro (JAHN).

℥ Iodo. ḡj (5 cent.).
Digital en polvo,
Calomelanos, ãã. ḡxvj (8 dec.).
Azúcar blanca. ʒß (15 gr.).
Divídase en diez y seis dosis.

I. Hidrocéfalo crónico. *D.* Una dosis cada tres horas.

7312. P. GALACTOPOYÉTICO ó Polvo de hinojo y neguilla compuesto (F. WIRT).

℥ Simiente de anís. 4
Simiente de hinojo. 4
Simiente de neguilla. 2
Trociscos de creta. 3
Trociscos de ojos de cangrejos. 3
Azúcar blanca. 8

M. I. Aumenta la leche de las nodrizas, absorve los ácidos de las primeras vias y facilita la quili-ficación.

7313. P. GASEOSO FEBRÍFUGO ó Polvo aeróforo (Meirieu).

℥ Acido tártrico. ḡxx (1 gr.).
Sulfato de quinina. ḡij (1 dec.).
Se trituran estas dos sustancias y luego se añade:
Bicarbonato de sosa. ḡxxij (11 dec.).

Azúcar blanca en polvo. ʒij (8 gr.).

Para una dosis, que se tomará en el momento de la efervescencia, en medio vaso de agua.

I. Fiebres de los pantanos. *D.* Se puede repetir la misma dosis cada dos horas.

7314. Otro (BRETON).

℥ Sulfato de hierro cristalizado. ḡxij (6 dec.).
Acido tártrico ʒjv (16 gr.).
Azúcar pulverizada. ʒx (40 gr.).
Bicarbonato de sosa. ʒiij (12 gr.).
Se pulveriza el sulfato de hierro en un mortero de porcelana, se reduce el ácido tártrico á polvo no muy sutil, se añade el azúcar reducido á polvo fino y últimamente el bicarbonato de sosa pulverizado; se mezcla todo y se divide en cuatro dosis, que se ponen en cuatro vasijas de vidrio tapadas.

Para usar este polvo se toma una botella de dos cuartillos casi llena de agua clara, y se echa en ella de una vez una dosis del polvo ferruginoso.

7315. P. GASEOSO PARA LIMONADA ó Limonada seca gaseosa.

℥ Bicarbonato de sosa. ʒv (20 gr.).
Azúcar. ʒjvß (140 gr.).
Esencia de limon. ḡxviiij (1 gr.).
Divídase en doce papeles azules.
Acido cítrico. ʒvj (24 gr.).
Divídase en doce papeles blancos.

7316. P. GASÍFEROS LAXANTES ó PURGANTES (H. DE M.).

℥ Acido tártrico pulv. ʒvj (24 gr.).
Se divide en doce papeles blancos.
Bicarbonato de sosa pulverizado. ʒvj (24 gr.).
Tartrato de potasa y sosa. ʒxviiij (72 gr.).
Se divide en doce papeles azu-

les ó blancos, señalados convenientemente.

I. Gastrodinias. *D.* Un papel de cada uno, en ℥vj (180 gr.) de agua.

7317. P. GASÍFEROS FERRUGINOSOS
(H. DE M.).

℥ Sulfato de hierro. . . . ʒβ (2 gr.).
Acido tártrico. ʒjβ (6 gr.).
Azúcar. ʒiij (12 gr.).
Mézclese y dividase en doce papeles blancos.

Bicarbonato de sosa. . . ʒij (8 gr.).
Azúcar. ʒiij (12 gr.).

Mézclese y dividase en doce papeles azules ó blancos, señalados de un modo cualquiera.

I. Gastrodinias con astricción de vientre. *D.* Uno de cada clase, disueltos en ℥vj (180 gr.) de agua en el acto de tomarlos.

7318. P. DE GENCIANA.

℥ Genciana,
Cascarilla,
Cáscara de nar., ãã. ʒj (4 gr.).
Ruibarbo. ʒjx (50 cent.).
Oleosácara de menta
piperita, ãã. ʒijβ (10 gr.).

I. Dispepsias. *D.* ʒβ (2 gr.) mañana y noche.

7319. P. DE GOMA ALUMINOSO
(*Leclayse*).

℥ Goma en polvo. ʒ
Alumbre en polvo. ʒ
Mézclese. Se usa insuflándole en las fosas nasales en los casos de epistaxis.

7320. P. DE GOMA AMONIACO
(F. F.).

℥ Goma amoniaco. c. s. q.
Se pulveriza por trituración y se pasa por tamiz.

I. y *D.* Véase tomo I, pág. 204.
Del mismo modo se pulverizan la ASA

FÉTIDA, LA GOMA GÁLBANO, INCIENSO, OPOPONACO y demás gomo-resinas.

7321. P. DE GOMA ARÁBIGA (F. F.).

℥ Goma arábica. c. s. q.
Se limpia separando los cuerpos extraños que adhieren á su superficie, se quebranta, se seca en la estufa y se pulveriza sin dejar residuo.

I. y *D.* Véase tomo I, pág. 205.

Del mismo modo se pulveriza la GOMA TRAGACANTO, pero se separa el primer polvo que generalmente sale sin color.

**7322. P. DE GOMA QUINO COM-
PUESTO (F. DE L. Y F. P.).**

℥ Goma quino. ʒβ
Canela. ʒj
Opio puro. ʒ

Se reducen á polvo con separación y se mezclan.

I. Son tónicos y astringentes en las diarreas sin inflamación interna.

7323. P. DE GOMA QUINO.

℥ Goma quino. ʒβ (5 gr.).
Canela. ʒjxx (4 gr.).
Opio. ʒij (4 dec.).
Digital. ʒjxx (4 gr.).

Dividase en diez papeles.

I. Hemorragias pasivas, diabetes. *D.* Un papel cada hora.

**7324. P. DE GOMA QUINO
COMPUESTO (F. DE L.).**

℥ Goma quino. ʒxjv (28 gr.).
Canela. ʒjv (16 gr.).
Opio. ʒj (4 gr.).

Se pulveriza separadamente cada sustancia, y se las mezcla despues exactamente.

Nota. Cada dracma (4 gr.) contiene ʒjv (2 dec.) de opio.

I. Se usa como estíptico y astringente en las hemorragias internas. *D.* ʒj (12 dec.).

**7325. P. DE GOMA TRAGACANTO
COMPUESTO (F. DE L.).**

℥ Goma tragacanto,
Goma arábiga,
Almidon, āā. ℥jβ (45 gr.).
Azúcar. ℥iij (90 gr.).

M. I. Afecciones de las vías urinarias é irritaciones de la mucosa de los intestinos. *D.* ʒβ á ʒj (2 á 4 gr.) en un vehículo acuoso.

La fórmula de la *F. P.* solo contiene una parte de los primeros y seis de azúcar.

7326. P. GOMOSO (F. A.).

℥ Almidon en polvo,
Regaliz en polvo, āā. . . ʒj (4 gr.).
Goma arábiga,
Azúcar blanca, āā. . . . ℥ij (64 gr.).
Mézclese.

**7327. P. GOMOSO ALCALINO
ó Jabon vegetal.**

℥ Bicarbonato de potasa. ʒ
Goma arábiga. ʒ
M. I. Es un fundente que se emplea en los infartos viscerales.

**7328. P. GOMOSO ALUMINOSO
(Vogt).**

℥ Alumbre en polvo. . . ʒij (24 dec.).
Goma aráb. en polvo. ʒβ (15 gr.).
M. I. Grietas de los pezones. *D.* Se espolvorea las grietas después de haberlas lavado con agua guardiente, teniendo cuidado de lavar el pecho antes de dar de mamar al niño.

**7329 P. GOMOSO MERCURIAL
(Mouton).**

℥ Calomelanos porfirizad. ʒj (4 gr.).
Goma arábica en polvo. ʒjv (16 gr.).
M. I. Afecciones sífilíticas externas. *D.* Se usa espolvoreando la parte enferma.

7330. P. DE GRACIOLA.

℥ Graciola. ʒβ (2 gr.).
Calomelanos,
Asa fétida, āā. ʒjx (50 cent.).
Aceite de menta. . . ʒiij (15 cent.).
Divídase en cuatro papeles.

I. Helmintiasis, ténia, gota. *D.* Un papel cada tres horas.

7331. P. DE GUINDRE.

V. la prep. t. I, p. 323.

I. Embarazo gástrico, destete, estreñimiento, ictericia, calenturas biliosas. *D.* Se usa como purgante en media taza de caldo de yerbas.

7332. P. DE GUAYACO (F. F.).

℥ Palo de guayaco. c. s. q.
Se reduce á polvo grueso por medio de una escofina, se deseca en la estufa y se pulveriza por contusion sin dejar residuo.

Del mismo modo se pulverizan los leños y las raíces gruesas muy leñosas, como el LEÑO ÁLOES, los SÁNDALOS CENTRINO Y ROJO, la RAIZ DE QUASIA AMARGA y el SASAFRÁS.

**7333. P. DE GUAYACO OPIADO
(Peraire).**

℥ Guayaco porfirizado. . ʒβ (16 gr.).
Hojas de nar. en polvo. ʒβ (2 gr.).
Acetato de morfina. . . ʒj (5 cent.).
Mézclese y divídase en diez y seis papeles.

I. Reumatismo articular agudo. *D.* Una toma cada dos horas en una infusión béquica.

7334. P. DE GUTAGAMBA.

℥ Gutagamba. ʒiij (15 cent.).
Azúcar. ʒxxjv (12 dec.).
M. D. Se toma cada tres horas hasta promover deposiciones de vientre.

7335. P. DE GUTETA ó Polvo antiepiléptico de Guteta.

- ℥ Visco acercino. 2
- Raiz de dictamo blanco. 2
- Raiz de peonía. 2
- Semillas de peonía. 2
- Semillas de armuelle. 1
- Coral rojo preparado. 1
- Uña de elan. 2

H. S. A. I. Convulsiones de los niños, epilepsia, apoplejía, perlesía, vahidos y calenturas malignas. D. Algunos granos.

7336. P. DE HALY, Polvo gomoso amigdalino ó polvo antitísico.

- ℥ Azúcar cande. ʒvj (24 gr.).
- Almendras dulc. mond. ʒij (8 gr.).
- Semillas de membrillos,
- Semillas de adórmideras blancas,
- Almidon,
- Goma arábica,
- Goma tragacanto, añ. ʒj (4 gr.).
- Regaliz. ʒß (2 gr.).

H. S. A. I. Hemotisis, tisis, diarrea y debilidad de estómago. D. ʒß á ʒjß (2 á 6 gr.) al dia.

Nota. Este polvo no se conserva largo tiempo, y es necesario prepararle en pequeñas cantidades á la vez.

7337. P. HEMOSTÁTICO (Dr. Bonafoux).

- ℥ Colofonia. ʒij (60 gr.).
- Goma arábica,
- Carbon, añ. ʒj (30 gr.).

H. S. A. I. Hemorragias capilares, metrorragias y epistaxis. D. C. s. para una aplicacion en la superficie que da sangre.

7338. Otro (MALHERBE).

- ℥ Subcarb. de hierro. ʒiij (12 gr.).
 - Canela en polvo. . . . ʒx (50 cent.).
- Mézclase y dividase en quince papeles.

I. Hemorragias uterinas y menstruaciones abundantes. D. Cuatro

papeles al dia en un poco de agua azucarada ó té. Se da mayor ó menor número de dosis segun la urgencia.

7339. Otro (GRAEFFE).

- ℥ Goma arábica. ʒj (30 gr.).
- Sulfato de cobre. . . . ʒij (8 gr.).
- Goma quino. ʒj (4 gr.).
- Piedra hematitis. . . . ʒß (2 gr.).

H. S. A. I. Hemorragias traumáticas. D. Se espolvorean las heridas y superficies que dan sangre.

7340. Otro (MIALHE).

- ℥ Alumbre,
- Goma tragacanto,
- Tanino, añ. ʒij (8 gr.).

M. I. Es muy eficaz para detener las hemorragias producidas por las picaduras de las sanguijuelas.

7341. P. DE HENNING.

- ℥ Oxido de zinc. ʒvj (3 dec.).
- ó Cianuro de zinc. . . . ʒß (2 gr.).
- Magnesia calcinada. . ʒj (12 dec.).
- Canela. ʒxx (1 gr.).

H. S. A. catorce papeles. I. Calambres de estómago, enteralgias, coqueluche, hipo. D. Un papel cada dos horas.

7342. P. DE LOS HERMANOS MAHON CONTRA LA TIÑA.

- ℥ Cenizas de boj nuevo. ʒij (60 gr.).
- Carbon porfirizado. . . ʒj (30 gr.).

Se variará la cantidad del carbon segun la alcalinidad de las cenizas y la susceptibilidad del enfermo. Se espolvoreará diariamente la cabeza de los enfermos con este polvo.

7343. P. HIDRAGOGOS (F. M.).

- ℥ Crémor de tártaro. . . ʒj (32 gr.).
- Mechoacan,
- Jalapa, añ. ʒvj (24 gr.).

Simiente de yezgos. . . ʒ℔ (16 gr.).
 Goma gamandra. . . . ʒj℔ (6 gr.).
 Nuez moscada. ʒij (8 gr.).
 Hágase polvo.

I. Es un excelente remedio en la hidropesía y la ictericia rebelde. D. ʒ℔ á ʒj (2 á 4 gr.).

7344. P. HIDRAGOGO (Jahn).

℥ Iodo. ʒ³/₄ (3 cent.).
 Calomelanos,
 Digital, ãã. ʒij (1 dec.).
 Azúcar. ʒ℔ (15 gr.).
 H. S. A. cuatro papeles.

I. Hidrocéfalo, hidropesía. D. Un papel cada tres horas.

7345. P. HIDRAGOGO ó Polvo de jalapa y soldanela compuesto.

℥ Polvo de jalapa. 8
 Polvo de mechoacan. 4
 Polvo de ruibarbo. 3
 Polvo de soldanela. 2
 Polvo de gutagamba. 1
 Polvo de canela. 2
 Polvo de anís. 4

I. Es purgante á la dosis de ʒvj á ʒxxxvj (3 á 18 dec.).

7346. P. DE HIERRO Y CANELA.

℥ Hierro porfirizado,
 Canela, ãã. ʒj (4 gr.).
 Azúcar. ʒvj (24 gr.).
 Se mezclan y dividen en veinticuatro papeles.

7347. LIMADURAS DE HIERRO PORFIRIZADAS (F. F.).

℥ Limaduras de hierro prep. . c. s. q.
 Se porfirizan en cortas porciones y en seco hasta reducir las á polvo sutilísimo. Las limaduras de hierro porfirizadas son de color oscuro; se las preservará de la humedad atmosférica.

7348. LIMADURAS DE HIERRO PREPARADAS (F. F.).

℥ Limaduras de hierro. c. s. q.

Se contunden en un almirez de hierro con mano de lo mismo, se pasan por un tamiz fino y se arroja el polvo que en su mayor parte proviene del óxido que tenia el hierro; se pasa el residuo por un tamiz de cerda tupido, para separar las partes mas gruesas que tambien se ponen aparte. Las limaduras preparadas así deben ser brillantes, atraibles al imán y solubles en el ácido clorhídrico con desprendimiento de hidrógeno, produciendo una solución casi sin color. Se las guardará en frascos tapados.

7349. POLVO DE HIRSCHEL.

℥ Azúcar de leche. ʒij (60 gr.).
 Goma arábica,
 Salep, ãã. ʒj (30 gr.).
 Polvo de hinojo acuático. ʒj (4 gr.).

M. D. Se toma una cucharada de café en un vaso de agua azucarada tres ó cuatro veces al día. Es útil en los romadizos y catarros crónicos.

7350. P. DE HUESOS DE JIBIA (F. F.).

℥ Huesos de jibia. c. s. q.
 Se raspan con un cuchillo para quitarles todos los cuerpos extraños que ensucian su superficie, y se arrojan las partes duras de la concha testácea; se pulveriza el resto en un mortero, se pasa por un tamiz de seda, y despues se pulveriza en seco hasta reducirlo á polvo impalpable.

I. y D. V. t. I, pág. 230.

7351. P. DE HUFELAND.

℥ Nuez vóm. en polvo. ʒiij (15 cent.).
 Goma aráb. en polvo,
 Azúcar, ãã. ʒxij (60 cent.).

M. I. Se usa con buen éxito en algunos casos de disenteria y diarrea. D. ʒxx á ʒxxx (10 á 15 dec.) dos ó tres veces al día.

7352. P. DE HUFELAND CONTRA LA DIARREA DE LOS NIÑOS.

℥ Magnesia calcinada. 1
 Ojos de cangrejos. 1
 Cuerno de ciervo raspado. 1
 Polvo de visco acercino. 1
 Raiz de valeriana. 1
M. D. Una ó dos tomas de ḡvj (3 dec.) al dia.

7353. P. IMPERIAL DE LEMERY ó Polvo de canela y gengibre almizclado.

℥ Canela. ʒijβ (10 gr.).
 Gengibre. ʒij (8 gr.).
 Clavo. ʒj (4 gr.).
 Galanga menor,
 Macis,
 Nuez de especia,
 Almizcle, ãã. ʒβ (2 gr.).
I. Es digestivo y excitante. *D.* ḡxij á ḡxxxvj (6 á 18 dec.).

7354. P. INCISIVO (Mongenot).

℥ Azúcar,
 Goma arábica, ãã. . ʒj (4 gr.).
 Lirio de Florencia. . ʒj (12 dec.).
 Oxido de antimonio
 hidrosulfur. pardo. ḡij (10 cent.).
 Tártaro emético. . . . ḡj (5 cent.).
 Hágase polvo S. A. y divídase en noventa y seis tomas.
I. Afecciones catarrales, pasado el período de irritacion. *D.* Una toma cada media hora.

7355. P. DE IODOFORMO (Boucharlat).

℥ Iodoformo. ʒijβ (10 gr.).
 Azúcar. ʒijβ (75 gr.).
 Azúcar con vainilla. . ʒijβ (10 gr.).
M. Se usa esta preparacion como los polvos de Sency.

7356. P. DE ALMIDON IODURADO CONTRA LA ASCITIS (Burnet).

℥ Iodo. 3
 Almidon. 800

Se cubre el abdómen de una capa bastante gruesa de esta mezcla. Se harán frecuentes lociones para lavar la piel.

7357. P. DE IODURO DE BARIO (Magendie).

℥ Ioduro de bario. ḡj á ḡx (5 á 50 cent.).
 Canela,
 Azúcar, ãã. ʒj (4 gr.).
 Divídase en ocho papeles.
M. I. Escrófulas, atrofia mesentérica, sífilis, corea. *D.* Un papel dos ó tres veces al dia.

7358. P. DE IODURO DE PLOMO.

℥ Ioduro de plomo,
 Digital, ãã. ḡvj (3 dec.).
 Extracto alcohólico de
 estramonio. ḡij (1 dec.).
 Azúcar. ʒj (4 gr.).
 Divídase en diez y seis papeles.
I. Atrofia mesentérica, sífilis, impétigo, prostatitis, escrófulas, catarata. *D.* ʒj (4 gr.) al dia en fricciones.

7359. P. DE IPECACUANA (F. F.).

℥ Raiz de ipecacuana. c. s. q.
 Se deseca en la estufa, y se pulveriza por contusion hasta obtener en polvo sutil las tres cuartas partes de la raiz empleadas.
I. y *D.* Véase tomo I, pág. 228.

7360. P. DE IPECACUANA, CALOMELANOS Y OPIO (Ellis).

℥ Calomelanos. ḡxx (1 gr.).
 Opio. ḡv (25 cent.).
 Ipecacuana. ḡx (50 cent.).
 Divídase en ocho papeles.
I. Disenteria. *D.* Un papel cada hora.

7361. P. DE IPECACUANA COMPUUESTO (F. DE L.).

℥ Ipecacuana en polvo,
 Opio puro en polvo, ãã. ʒj (4 gr.).

Sulf. de potasa en polvo. $\bar{3}j$ (32 gr.).
Mézclese.

**7362. P. DE IPECACUANA Y
RUIBARBO.**

\mathcal{R} Ipecacuana. $\bar{5}j$ (4 gr.).
Ruibarbo. $\bar{3}ij$ (8 gr.).
M. D. $\bar{g}x$ á $\bar{g}xx$ (5 á 10 dec.)
como emeto-catártico y $\bar{g}jv$ á $\bar{g}vj$
(2 á 3 dec.) dos ó tres veces al
dia como diaforético.

**7363. P. DE JALAPA COMPUESTO,
Polvo catártico ó purgante.**

\mathcal{R} Raiz de jalapa en polvo,
Escamonea en polvo, $\bar{a}\bar{a}$. $\bar{5}j$ (4 gr.).
Sulfato de potasa en polvo. $\bar{3}ij$ (8 gr.).
M. D. $\bar{g}xviii$ á $\bar{3}\bar{b}$ (1 á 2 gr.).

7364. P. DE JALAPA COMPUESTO.

\mathcal{R} Polvo de jalapa. $\bar{g}ij$ (4 dec.).
Ruibarbo,
Canela, $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{g}j$ (5 cent.).
M. D. Para una toma para los
niños.

7365. Otro (F. E.).

\mathcal{R} Raiz de jalapa. 4
Crémor de tártaro. 4
Magnesia cálcinada. 4
H. S. A. D. De $\bar{3}\bar{b}$ á $\bar{3}j\bar{b}$ (2 á 6
gr.).

7366. Otro (F. DE L.).

\mathcal{R} Jalapa. $\bar{3}ij$ (96 gr.).
Bitartrato de potasa. $\bar{3}vj$ (192 gr.).
Raiz de gengibre. $\bar{3}ij$ (8 gr.).
M. D. Es un buen purgante á la
dosis de $\bar{3}j$ (4 gr.).

**7367. P. DE JAMES ó Polvo anti-
monial de James.**

\mathcal{R} Deutóxido de antimon. $\bar{3}j\bar{b}$ (48 gr.).
Protocloruro de mere. $\bar{3}j$ (4 gr.).
Mézclese exactamente.
Nota. Algunas veces se duplica
la proporción del óxido.
I. Fiebres designadas en otro

tiempo con el nombre de pútridas
ó adinámicas. D. $\bar{3}j$ ó $\bar{3}j\bar{b}$ (4 á 6
gr.).

7368. P. DE JAMES (F. P.).

\mathcal{R} Sulfuro de antim. en polvo grueso. 4
Cuerno de ciervo raspado. 4
Se mezclan estas materias y se
las hace tóstar en una cazuela
caliente, agitando continuamente
hasta que la masa haya adquirido
un color gris; se la reduce á pol-
vo fino y se la calienta durante
dos horas en un crisol hecho
ascua.

I. Son diaforéticos, eméticos,
purgantes, y se los ha recomen-
dado en las fiebres, sarampion,
escarlatina, afecciones de pecho,
obstrucciones.

7369. P. DE KAEMPF.

\mathcal{R} Resina de guayaco. $\bar{3}\bar{b}$ (2 gr.).
Bitartrato de potasa. $\bar{3}j$ (4 gr.).
Hágase polvo S. A.

I. Vértigos por retroceso de
dolores reumáticos. Beck ha pre-
conizado su linimento contra los
vértigos nerviosos V. núm. 3843.
D. En dos dosis iguales, que se to-
man con un dia de intermedio de
una á otra.

7370. P. DE KÄTRIMER.

\mathcal{R} Cornezuelo de cente-
no en polvo. $\bar{g}ij$ (10 cent.).
Canela en polvo. $\bar{g}v$ (25 cent.).

M. I. Partos laboriosos por iner-
cia de la matriz. D. Una dosis
cada tres cuartos de hora para
calmar los entuertos de las mu-
jeres en el puerperio. General-
mente bastan tres ó cuatro dosis.

7371. P. DE KLEIST.

\mathcal{R} Sulfato ácido de potas. $\bar{3}vj$ (180 gr.).
Acetato de plomo. $\bar{3}j\bar{b}$ (45 gr.).
Bióxido de mangán. $\bar{1}\bar{b}\bar{b}$ (250 gr.).
Se reducen á polvo.

I. Sirve para hacer fumigacio-

nes en las salas de los escorbú-
ticos.

7372. P. DE KNOX.

℞ Hidroclorato de sosa. 8
Cloruro de cal. 3
Se mezclan y se conserva en un frasco bien tapado. Cuando se vierte un gran vaso de agua sobre ʒj ó ʒij (30 á 60 gr.) este polvo abandona el cloro; pero el desprendimiento será mas considerable si se añaden algunas gotas de ácido sulfúrico.

I. y D. Los ingleses consideran á este polvo como un preservativo de las enfermedades sifilíticas, y le emplean en locion antes y despues del coito.

7373. P. LAXANTE.

℞ Magnesia calcinada. . ʒv (25 cent.).
Crémor de tártaro en polvo. ʒxxx (10 dec.).
Calomelanos preparados al vapor. . . . ʒv (25 cent.).
D. De dos á cinco tomas de ʒxxx (15 dec.) al dia.

7374. Otro, n. 2.

℞ Sal de Seignete. . . . ʒj (32 gr.).
Bicarbonato de sosa. . . ʒij (8 gr.).
Oleosácaro de hinojo. . ʒʒ (46 gr.).
D. A cucharadas hasta que produzca efecto.

7375. Otro, n. 3.

℞ Sen en polvo. 4
Anís en polvo. 4
Azúcar blanca en polvo. . . . 4
Crémor de tártaro en polvo. . . 4
M. D. Se da ʒj (4 gr.) mañana y noche.

7376. P. LAXANTE Y ATEMPERANTE (H. DE AL.).

℞ Crémor de tártaro. . . ʒiij (96 gr.).
Nitrato de potasa. . . ʒiij (42 gr.).

Azúcar blanca. ʒjv (125 gr.).
M. D. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) por la mañana en un vaso de suero.

7377. P. DE LECHE.

℞ Leche de vacas. . . . ʒbij (1000 gr.).
Subcarbon. de sosa. ʒʒ (2 gr.).
Se evapora hasta sequedad.

7378. P. DE LINAZA ó harina de linaza (F. F.).

℞ Simiente de lino. c. s. q.
Se muele en un mortero y se pasa por un tamiz de cerda.
I. y D. Véase t. I. p. 236.

7379. P. DE LIQUEN AZUCARADO (Robinet).

℞ Líquen islándico mondado. ʒbj (500 gr.).
Se macera durante dos dias en c. s. de agua fria, renovando esta cada seis horas á fin de quitar el amargor de la planta. Se exprime y se hierve el líquen en c. s. de nueva agua hasta que se haya disuelto la mayor parte, se cuela con expresion y se añade al cocimiento:

Azúcar blanca en polvo. ʒbj (500 gr.).
Se evapora á fuego lento, agitando continuamente hasta que se haya secado la materia y reducido á polvo; se pasa por un tamiz y se conserva.

I. Se usa para preparar el chocolate y las pastillas de líquen.

7380. P. DE LIQUEN ISLÁNDICO (F. F.).

℞ Líquen de Islandia. c. s. q.
Se deseca en la estufa y se pulveriza por contusion sin dejar residuo.

Quando el médico quiera usar el líquen privado de su principio amargo debe prescribirlo así.

7381. P. LITONTRIPTICO
(H. DE AM.).

℞ Gayuba,
Quina, ãã. ʒij (8 gr.).
Opio. ʒiij (15 cent.).
Mézclese y dividase en seis papeles.

I. Cistitis, cálculos urinarios y catarro crónico de la vejiga. D. Uno, tres ó cuatro papeles al dia, bebiendo en seguida ʒij (60 gr.) de agua de cal.

7382. P. DE LIRIO COMPUESTO.

℞ Lirio de Florencia en polvo. 1
Azúcar. 4
Mézclese.

7383. P. DE LUPULINA
(Magendie).

℞ Lupulina. 1
Azúcar. 2
M. D. Diez granos á ʒxxviiij (5 á 9 dec.) tres veces al dia en un poco de agua.

7384. P. DE MAGNESIA BLANCA
(F. F.).

℞ Magnesia blanca en panes. c. s. q.
Se coloca un tamiz de cerda sobre un papel, se van frotando sobre las cerdas los panes hasta que hayan pasado enteramente al otro lado, y despues se vuelve á pasar el polvo por tamiz de sedá.

I. y D. Véase t. I, p. 242.

Del mismo modo se pulveriza el ALBAYALDE, pero si se le quiere obtener mas fino se porfiriza en seguida.

7385. P. DE MAGNESIA COMPUESTO,
Polvo antiácido ó polvo absorbente.

℞ Magnesia. ʒij (8 gr.).
Canela. ʒxxviiij (4 gr.).

M. En algunas fórmulas se reemplaza la canela por el colombo, el polvo de cáscara de naranja ó los oleosácaros; otros

añaden azúcar, nuez moscada, hinojo, genciana y azafran.

7386. P. DE MAGNESIA
COMPUESTO.

℞ Magnesia calcinada. . ʒj (4 gr.).
Genciana,
Hinojo,
Canela, ãã. ʒxxviiij (4 gr.).
H. S. A. siete papeles.

I. Acidez de las primeras vias, falta de leche, dispepsia, vómitos, tialismo. D. Uno ó dos papeles al dia.

7387. P. DE MAGNESIA COMPUESTO
ó Sacarolado de magnesia.

℞ Magnesia. 1
Azúcar. 1
Mézclese y guárdese en un frasco bien tapado.

7388. P. DE MALATO DE HIERRO.

℞ Malato de hierro. ʒl̄jv (3 gr.).
Azúcar. ʒxxxvj (2 gr.).
NÚMERO 2.

Extracto de manzanas ferrurado. ʒʒ (2 gr.).

Extracto de trébol de agua. ʒj (4 gr.).

Azúcar. ʒvj (196 gr.).

M. I. Raquitis, caquexia, escrófulas, convalecencia. D. En bolos, píldoras y chocolate.

7389. P. MARCIAL, *Polvo marcial aromático, polvo emenagogo, polvo anticlorótico.* (H. DE AL.).

℞ Limaduras de hierro porfirizadas,
Canela, ãã. ʒʒ (2 gr.).
Azúcar blanca. ʒiij (12 gr.).
Mézclese y dividase en doce papeles.

I. Clorosis, amenorrea. D. Un papel cada tres horas.

7390. P. MARCIAL AROMÁTICO
(Jourdan).

℞ Limaduras de hierro,

Carbonato de magnesia,
Canela,
Resina de guayaco, ãã. ʒß (2 gr.).
Azúcar. ʒijß (10 gr.).
H. S. A. doce papeles.

I. Dispepsia, raquitis, úlceras atónicas, contusiones, escrófulas, clorosis, amenorrea, tifo, gangrena de hospital. D. Tres papeles al dia.

7391. P. MASTICATORIO.

ʒ Raiz de imperatoria,
Corteza de saúco, ãã. ʒß (16 gr.).
Hojas de laurel. . . . ʒjß (6 gr.).
Semillas de mostaza,
Sem. de estafis., ãã. ʒj (4 gr.).
Clavo. ʒjv (48 dec.).
Mirra. ʒvj (24 gr.).

H. S. A. I. Afonía y parálisis de la lengua. D. ʒj (12 dec.).

7392. P. DE MARC ó Polvo narcótico y tónico.

ʒ Extracto de opio. . . . ʒij (5 cent.).
Goma en polvo. . . . ʒij (10 cent.).
Colombo en polvo. . . . ʒxl (2 gr.).
Azúcar. ʒxc (5 gr.).
Esencia de yerbab. ʒij (10 cent.).

Mézclese y divídase en seis tomas.

I. Cardialgia. D. Una por la mañana y otra por la noche, media hora antes de comer y de cenar.

7393. P. DE MENZER.

ʒ Sulfato de hierro crist. ʒjv (2 dec.).
Azúcar. ʒc (5 gr.).
Canela en polvo. . . . ʒj (5 cent.).

Se reduce el sulfato á polvo, se le mezcla con el azúcar en polvo y la canela, y se guarda en un papel al que se pone el núm. 1.

Por otra parte se toma

Carbon. de sosa en polvo. ʒjv (2 dec.), en un papel con el núm. 2.

Se vierte el papel núm. 1 en medio vaso de agua, se agita y

despues se añade el papel núm. 2 y se toma inmediatamente.

7394. P. MERCURIAL Y DE CARBONATO DE MAGNESIA (Cheyne).

ʒ Sulfuro de mercurio negro,
Magnesia calcin., ãã. ʒv (25 cent.).
Deutocloruro de mercurio. ʒ'½ (25 mil.).

Mézclese exactamente. D. Se toma de una vez por la noche, al tiempo de acostarse, en el tratamiento de las afecciones cutáneas.

7395. P. MERCURIAL CON CICUTA (Pistchaft).

ʒ Cinabrio. ʒxx (1 gr.).
Polvo de cicuta. . . . ʒij (10 cent.).
Bióxido de mercurio. ʒj (5 cent.).
Azúcar blanca. . . . ʒß (15 gr.).

Mézclese y divídase en veinte papeles.

I. Afecciones escrofulosas avanzadas, caries escrofulosa, coxalgia, formas secundarias de la sífilis, espina ventosa, etc. D. Una toma despues del desayuno y la segunda por la noche. Esta fórmula es para los niños de uno á dos años; pero á los de mas edad se aumenta proporcionalmente la dosis de la cicuta hasta ʒx (5 dec.) y la del bermellon á ʒxl (2 gr.).

7396. P. DE MERCURIO Y CRETA (H. DE INGL.).

ʒ Mercurio purificado. . ʒij (90 gr.).
Creta preparada. . . . ʒv (150 gr.).
Tritúrese hasta que se extinga el mercurio.

Nota. Ocho granos (4 dec.) de esta masa contienen ʒij (15 cent.) de mercurio.

D. ʒjv á ʒx (2 á 5 dec.) dos veces al dia, en un jarabe ó mucílago.

7397. P. MERCURIAL LÁCTEO
(*Griesselich*).

℞ Mercurio soluble de
Hanhemann. ḡj (5 cent.).
Azúcar de leche. ʒj (4 gr.).
H. S. A. un polvo, que se divi-
dirá en veinticuatro tomas.

I. Salivación no mercurial. D.
Tres tomas al día.

7398. P. MERCURIAL OPIADO
(*Hufeland*).

℞ Calomel. al vapor. . . ḡvj (3 dec.).
Oxido de zinc sublim. . . ḡiij (15 cent.).
Opio puro. ḡij (4 dec.).
Azúcar blanca. ʒj (4 gr.).

H. S. A. y divídase en seis pa-
peles.

I. Hidrotorax determinado por
afecciones asmáticas, metástasis
artríticas ó neumonías. D. Una
dosis cada tres horas.

7399. P. MERCURIAL OPIADO
(*Rust*).

℞ Calomelanos. ʒʒ (2 gr.).
Opio. ḡiij (15 cent.).
Digital. ʒʒ (6 dec.).
Oleosácaro de hinojo. ʒij (8 gr.).

H. S. A. polvo y divídase en
doce papeles.

I. Hidroftalmia. D. Uno á dos
papeles al día.

7400. P. MERCURIAL PARA LAS
MUJERES PREÑADAS.

℞ Protocloruro de mer-
curio al vapor. ḡij (4 dec.).
Ruibarbo en polvo. . . ʒj (12 dec.).
Azúcar. ʒij (24 dec.).

M. D. ḡxviiij á ḡxxx (9 á 10 dec.)
por la mañana, al medio día y por
la noche en un poco de tisana.

7401. P. DE MOSTAZA ó Harina
de mostaza (F. F.).

℞ Mostaza. c. s. q.
Se muele en un mortero de

hierro ó de bronce con mano que
tenga poca superficie y se pasa
por un tamiz de cerda.

I. y D. V. t. I, p. 269.

7402. P. DE MERCURIO SACARINO
(*Lagneau*).

℞ Azúcar blanca. ʒʒ (16 gr.).
Mercurio vivo. ʒij (8 gr.).

Se trituran hasta que se extinga
completamente el mercurio y se
divide en treinta y seis dosis igua-
les.

I. Afecciones sifilíticas en los ni-
ños y en las personas delicadas.
D. Una dosis cada día en una taza
de chocolate ó de café.

7403. P. DE MUSGO MARINO
(*Frank*).

℞ Musgo marino. ʒʒ (15 gr.).
Agua. lbj (500 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca
á la mitad, se cuele y se añade:
Azúcar. ʒjv (125 gr.).
Goma. ʒj (30 gr.).
Lirio en polvo. ʒj (4 gr.).

Se evapora hasta sequedad y
se mezcla con

Arrowroot. ʒiij (90 gr.).

Sirve para preparar jaleas, úti-
les contra la tos y diarreas en la
fiebre hética.

7404. P. DE MUSGO DE CÓRCEGA
(F. F.).

℞ Musgo de Córcega. c. s. q.

Se golpea con una varita sobre
una mesa, se monda separándole
los pedazos de conchas y caraco-
litos, y se criba para acabar de
limpiarle; se deseca despues en la
estufa, y se pulveriza sin dejar
residuo.

I. y D. Véase t. I, p. 271.

7405. P. DE MUSGO DE CÓRCEGA
COMPUESTO.

℞ Musgo de Córcega,

Santónico,
Ajenjos,
Tanaceto, ãã. ʒijʒ (10 gr.).
Ruibarbo. ʒxc (5 gr.).
M. I. Afecciones verminosas.
D. ʒxviiij á ʒj (1 á 4 gr.) diluido
en agua, leche ó incorporado á
un bizcocho.

7406. P. NAUSEOSO.

ʒ Digital. ʒj (12 dec.).
Ipecacuana. ʒviiij (4 dec.).
Mézclese y divídase en ocho
papeles.
D. Un papel cada dos horas.

7407. P. DE NITRATO DE BISMUTO (Recamier).

ʒ Nitrato de bismuto. ʒjv (2 dec.).
Magnesia en polvo,
Azúcar, ãã. ʒij (24 dec.).
M. I. Gastrodinias rebeldes no
inflamatorias. D. En cuatro dosis.

7408. P. DE NITRATO DE POTASA (F. F.).

ʒ Nitrato de potasa. c. s. q.
Se pulveriza por contusion en
un mortero de mármol con mano
de boj y se pasa por tamiz.
Del mismo modo se pulverizan el ACE-
TATO DE PLOMO, el BICARBONATO DE SO-
SA, el TARTRATO DE POTASA, y en ge-
neral todas las sales neutras no metali-
zadas.

7409. P. DE NITRO ALCANFORADO.

ʒ Extracto de acónito. ʒjv (2 dec.).
Azúcar blanca. ʒʒ (15 gr.).
Nitro. ʒj (4 gr.).
Divídase en cuatro papeles.
I. Gota, reumatismo. D. Se to-
man en el dia.

7410. Otro (SWEDIAUR).

ʒ Nitro en polvo. ʒx (5 dec.).
Alcanfor. ʒjv (2 dec.).
Goma en polvo. ʒj (12 dec.).
D. Se divide en tres dosis y se

usa como atemperante y diuré-
tico.

7411. P. DE NITRO ANTIMONIAL (Burchard).

ʒ Nitro. ʒjv (15 gr.).
Azufre dorado de anti-
monio. ʒʒ (6 dec.).
Divídase en doce dosis.
I. Hidrotorax. D. Cuatro dosis
al dia en una infusion teiforme
de bayas de enebro.

7412. P. DE NITRO ANTIMONIADO Y ALCANFORADO (Thaer).

ʒ Nitrato de potasa. ʒj (4 gr.).
Azufre dorado de antimonio,
Alcanf. en polvo, ãã. ʒiiij (15 cent.).
Divídase en seis tomas.
I. Neumonía aguda despues de
las emisiones sanguíneas locales,
y cuando ha cesado de pronto la
expectoracion. D. Una toma cada
dos horas.

7413. P. DE NUEZ VÓMICA (H. DE AL.).

ʒ Nuez vómica. ʒiiij (15 cent.).
Goma arábica,
Azúcar blanca, ãã. ʒxij (60 cent.).
Mézclese y divídase en seis pa-
peles.
I. Disenteria. D. Dos á seis pa-
peles al dia.

7414. P. NUTRITIVO.

ʒ Grenetina,
Osmazomo, ãã. ʒj (30 gr.).
Goma arábica. ʒij (8 gr.).
Clavo,
Pimienta,
Sēmillas de zanahoria,
Semillas de apio, ãã. ʒʒ (6 dec.).
D. ʒiiij (90 gr.) hervidas en dos
cuartillos (1 litro) de agua, y añan-
diendo c. s. de sal.

7415. P. OCÍTICO (Schmidt).

ʒ Cornezuelo de centeno,

Borato de sosa,
Oleosácaro de man-
zanilla, ãã. ḡx (50 cent.).

H. S. A. polvo, que se divide
en seis papeles.

I. Partos laboriosos por inercia
de la matriz, hemorragias ute-
rinas.

7416. P. OFTÁLMICOS (F. P.).

℥ Oxido de zinc. 1
Azúcar cande. 1
Protocloruro de mercurio. 1

Hágase polvo S. A.

I. Opacidad de la córnea. Véase
Colirio.

7417. Otro (SICHEL).

℥ Etiope antimonial. . . 3ij (8 gr.).
Resina de guayaco,

ó Ruibarbo. 3j (4 gr.).

Magnesia calcinada. . . ḡxij (6 dec.).

Goma arábica. 3j (4 gr.).

Mézclese y divídase en veinticu-
atro partes.

D. Se dan de una á ocho al dia
en un vaso de agua azucarada,
contra las oftalmias escrofulosas.

7418. Otro (SICHEL).

℥ Calomelanos,
Azufre dorado de anti-

monio, ãã. ḡvj (3 dec.).

Magnesia calcinada. . . ḡxij (6 dec.).

Goma arábica en polv. 3j (4 gr.).

Mézclese y divídase en doce pa-
peles. Se toma de uno á doce al
dia en las oftalmias escrofulosas y
reumáticas. Se puede añadir al
anterior ḡij (1 dec.) de opio en
bruto.

7419. Otro (SICHEL).

℥ Calomelanos,
Azufre dorado de antimonio,

Resina de guayaco, ãã. ḡjv (2 dec.).

Magnesia calcinada. . . ḡxij (6 dec.).

Extracto de acónito. . . ḡjv (2 dec.).

Goma en polvo. 3j (4 gr.).

Mézclese y divídase en veinti-
cuatro papeles.

I. Se usa en las oftalmias artrí-
ticas y reumáticas.

7420. Otro (SICHEL).

℥ Etiope antimonial,
Sulfato de quinina, ãã. 3ij (8 gr.).

Mézclese y divídase en papeles
de ḡxL á ḡL (20 á 25 dec.).

I. Oftalmias periódicas. D. De
dos á ocho papeles al dia.

7421. Otro (DELILLE).

℥ Semillas de cañafistula privadas de su
túnica externa y pulverizadas, c. s.

I. Oftalmias serosas. D. De ḡj á
ḡxij (5 á 60 cent.) dentro del pár-
pado inferior.

7422. P. OPIADO (Spiegel).

℥ Sulfato de sosa. . . . 3ij (8 gr.).
Opio purificado. . . . ḡiij (15 cent.).

Mézclese y divídase en seis
tomas.

I. Hemorragias en general y
hemotisis en particular, así como
en todas las inflamaciones des-
pues de haber usado la sangría.
D. Una toma por la mañana, otra
al medio dia y otra por la noche.

7423. P. DE OPIO (F. F.).

℥ Opio escogido. c. s. q.

Se corta en pedazos, se deseca
en la estufa y se pulveriza sin
dejar residuo.

Del mismo modo se pulverizan el ACÍ-
BAR, el CATECÚ, el EXTRACTO DE REGA-
LIZ y la GOMA QUINO.

7424. P. DE OPIO Y CRETA.

℥ Creta preparada. . . 3ij (64 gr.).

Canela. 3j (32 gr.).

Tormentila. 3vj (24 gr.).

Goma arábica. 3vj (24 gr.).

Pimienta larga. . . . 3j (4 gr.).

Opio. 3ḡ (2 gr.).

Se reducen á polvo separadamente y se mezclan.

D. Se usa á la dosis de ḡjx (45 cent.) en las diarreas y en los flujos durante la dentición de los niños. Cada escrúpulo (12 dec.) contiene ḡḡ (25 mil.) de opio.

7425. P. DE ÓXIDO BLANCO DE ZINC ó *Sacarolado de óxido de zinc.*

ḡ Flores de zinc. ḡxjv (7 dec.).
Azúcar. ḡj (4 gr.).
Divídase en seis papeles.

I. Coqueluche y enfermedades convulsivas de los niños. *D.* Un papel por la mañana y otro por la noche.

7426. P. DEL PAPA BENEDICTO (F. M.).

ḡ Simiente de cilantro,
Simiente de anís,
Simiente de hinojo,
Simiente de alcarabea,
Simiente de comino de Marsella,
Raiz de zedoaria,
Raiz de regaliz,
Canela escógida, ãã . ḡj (30 gr.).
Azúcar blanca. ḡvj (180 gr.).
Hágase polvo S. A.

I. Afecciones del estómago; facilita la digestion y disipa los flatos. *D.* ḡj á ḡij (4 á 8 gr.).

7427. P. PARA CALAS (F. M.).

ḡ Trociscos de Alhandal. ḡj (30 gr.).
Acibar sucotrino. ḡjḡ (45 gr.).
Sal gemma. ḡij (60 gr.).
Háganse polvos S. A.

7428. P. PARA CORREGIR LA MALA CUALIDAD DE LA LECHE Y AUMENTAR SU SECRECIÓN.

Se toma tres veces al día, en una taza de agua de tila, una cucharada de la mezcla siguiente:

ḡ Magnesia inglesa. ḡijḡ (10 gr.).
Polvo de cáscara de naranja. ḡxc (5 gr.).

Azúcar. ḡij (64 gr.).
Bastan dos ó tres cucharadas para obtener el efecto deseado.

La siguiente fórmula da los mismos resultados:

Azúcar. ḡxx (80 gr.).
Bicarbonato de sosa. ḡj (4 gr.).
Cásc. de naranja en p. ḡj (4 gr.).

Se toma del mismo modo.

7429. P. PARA LOS NIÑOS.

ḡ Magnesia pura en polv. ḡḡ (2 gr.).
Simiente de anís. ḡx (5 dec.).
Mézclese y divídase en ocho partes iguales.

D. Dos al día mezcladas con leche de la nodriza.

7430. *Otros* (HUFELAND).

ḡ Carbonato de magnes. ḡj (30 gr.).
Raiz de ruibarbo. ḡij (8 gr.).
Raiz de valeriana. ḡḡ (2 gr.).
Oleosácara de hinojo. ḡḡ (15 gr.).
Mézclese y háganse polvos.

D. Se da una ó dos veces al día lo que se coge con la punta de un cuchillo.

7431. *Otro* (HUFELAND).

ḡ Azafran en polvo. ḡviii (4 dec.).
Valeriana,
Magn. calcinada, ãã . ḡLjv (3 gr.).
Lirio de Florencia. ḡj (4 gr.).
Regaliz. ḡjḡ (6 gr.).
Mézclese.

D. Se divide en mayores ó menores dosis segun la edad de los niños.

7432. P. PARA TERNIR EL PELO.

ḡ Cenizas de plomo. ḡḡ (16 gr.).
Cal apagada. ḡij (8 gr.).
Creta. ḡḡ (16 gr.).

Se mezcla este polvo con agua en la que se sumerge un pincel, con el que se frota muchas veces los cabellos; al cabo de dos horas se lava la cabeza.

7433. P. PARA TEÑIR EL PELO DE NEGRO (Hanmann).

℞ Litargirio porfirizado. ℞ℬ (250 gr.).
Cal viva porfirizada. . . ℞jv (425 gr.).
Polvo de pólvora. . . ℞ij (60 gr.).

H. S. A. un polvo perfectamente homogéneo.

Se forma una masita con c. s. de polvo y agua caliente. Se aplica esta masa á los cabellos teniendo cuidado de empapar bien los pelos hasta la raiz. Se procurará que no penetre ninguna partícula del polvo en los ojos, porque resultaria una oftalmia.

Se cubre todo con una pelota de algodón acolchado humedecido ligeramente en agua, y se sujeta con un lienzo ó pañuelo grande doblado muchas veces.

Se tendrá aplicada la pasta durante tres horas y mejor una noche, porque el calor favorece su accion. Para quitar esta pasta que se ha secado y endurecido, se frota los cabellos entre los dedos y se los lava despues con agua de jabon. Para darles suavidad se les da pomada y se pasa un peine.

Se renueva cuando haya necesidad.

7434. P. PARA TISANA EXTEMORÁNEA (Chaussier).

℞ Nitro. ℞ij (8 gr.).
Azúcar,
Extracto seco de regaliz,
Extracto de grama, ãã. ℞ij (60 gr.).
Goma arábica. ℞ℬ (45 gr.).

M. I. Cianosis, ictericia, metritis aguda, cistitis. D. Una cucharadita en un vaso de agua.

7435. P. PARA LAS ÚLCERAS DEL CUELLO DE LA MATRIZ (Boinet).

℞ Almidon en polvo. . . ℞v (150 gr.).
Sulfato de hierro en p. ℞xviii (4 gr.).
Clorhidrato de amon. ℞xviii (4 gr.).
Sabina en polvo. . . . ℞ℬ (2 gr.).

Acetato de morfina. . . ℞xviii (4 gr.).
Se aplica dos veces al dia por medio de un peloton de hilas cubierto de cerato.

7436. P. PECTORAL (Schneider).

℞ Esencia de milenrama,
Esencia de salvia,
Esencia de hisopo, ãã. . . 4 gotas.
Arrowroot,
Azúcar, ãã. ℞j (30 gr.).

M. I. Broncorreas. D. Una cucharadita de café cada dos horas.

Schneider añade á veces ℞x (50 cent.) de extracto alcohólico de beleño ó ℞xx (1 gr.) de lactucario inglés, ó ℞j ó ℞ij (5 á 10 cent.) de extracto acuoso de opio.

7437. Otro (WEDEL).

℞ Azúcar blanca. ℞ij (60 gr.).
Flores de azufre. . . . ℞ℬ (45 gr.).
Raiz de regaliz,
Lirio de Florencia, ãã. ℞ij (8 gr.).
Acido benzóico. ℞j (12 dec.).
Esencia de anís,
Esencia de hinojo, ãã. 40 gotas.

H. S. A. I. Catarros pulmonares crónicos. D. De ℞j á ℞ij (12 á 24 dec.).

7438. P. PECTORAL Ó POLVO DE REGALIZ COMPUESTO (H. M. F.).

℞ Regaliz. ℞jℬ (48 gr.).
Sen. ℞ijℬ (40 gr.).
Semillas de anís,
Azufre sublimado y lavado, ãã. ℞v (20 gr.).
Mézclese.

D. ℞ij (8 gr.) una, dos ó tres veces al dia.

7439. P. DE PLUMER, ANTISIFILITICO Y ANTIESCROFULOSO.

℞ Protocloruro de mercur. ℞j (4 gr.).
Azufre dorado de antim. ℞ij (8 gr.).
Mézclese exactamente.

I. Enfermedades sifilíticas y escrofulosas, como preservativo de la escarlatina, convalecencia de

las calenturas intermitentes, infartos de las vísceras abdominales con edema de las extremidades inferiores. *D.* ʒvij (35 cent.) mañana y noche, bebiendo despues uno ó dos vasos de cocimiento de zarzaparrilla. Se le debe preparar en el momento de usarle, porque se descompone al aire húmedo y toma un color pardusco.

7440. P. DE POLIGALA ALCANFORADO (Richter).

ʒ Polígala virginiana en polvo,
Azúcar en polvo, añ. ʒij (8 gr.).
Alcanfor en polvo. ʒß (2 gr.).
Mézclese y divídase en doce tomas.

I. Neumonía con síntomas tifoideos. *D.* Una toma cada tres horas.

7441. P. DE POLIGALA CON MAGNESIA (Schmaltz).

ʒ Polígala de Virginia en polvo. ʒß (16 gr.).
Tartrato de potasa. ʒvj (24 gr.).
Carbonato de magnes. ʒij (8 gr.).
H. S. A. I. Iritis y oftalmia en el período de exudacion y enfermedades consecutivas á las oftalmias reumáticas, reumático-catarrales, artríticas, á la iritis, hipopion y terigion. *D.* Tres cucharaditas de café al dia.

7442. P. DE POLIGALA TARTARIZADO (Ammon).

ʒ Polígala de Virginia en polvo. ʒß (16 gr.).
Tartrato de potasa. ʒijß (10 gr.).
Oleosácáro de cálamo aromático. ʒjß (6 gr.).

II. S. A. I. Tiene los mismos usos que el polvo de polígala con magnesia.

7443. P. DE PRINCE.

Este polvo, empleado en Inglaterra en las enfermedades si-

filíticas y escrofulosas, no es mas que el deutóxido de mercurio perfectamente puro.

I. Se usa principalmente al exterior para curar las úlceras sifilíticas ó fungosas y la oftalmia crónica.

7444. P. DE PROVENZA Ó DE MARSELLA.

ʒ Catecú,
Hierro porfirizado,
Azúcar, añ. ʒij (8 gr.).
Hágase polvo y divídase en papeles de ʒxviii (1 gr.).

I. Clorosis y afecciones crónicas del estómago.

7445. P. PURGANTE.

ʒ Jalapa en polvo. ʒij (10 cent.).
Ruibarbo en polvo. ʒij (5 cent.).
Canela en polvo. ʒj (5 cent.).
M. D. En una toma á los niños.

7446. Otro, n. 2.

ʒ Jalapa ʒv (150 gr.).
Escamonea. ʒj (30 gr.).
Crémor de tártaro. ʒij (60 gr.).

7447. Otro, n. 3.

ʒ Jalapa en polvo. ʒj (12 dec.).
Sulfato de sosa. ʒv (20 gr.).
Divídase en tres partes iguales.
Es un purgante eficaz y económico, que se da cada media hora hasta producir deposiciones. Se diluye cada dosis en un vaso de caldo de yerbas.

7448. Otro (H. DE M.).

ʒ Raiz de jalapa pulverizada. ʒ
Crémor de tártaro. ʒ
I. Embarazos intestinales sin inflamacion. *D.* De ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).

7449. Otro (WOLFF).

ʒ Digital en polvo. ʒß (6 dec.).

Jalapa en polvo. ʒij (8 gr.).
 Calomelanos al vapor. ʒj (12 dec.).
 Divídase en doce dosis.

I. Hidrotorax. *D.* Una dosis cada tres horas hasta que produzca su efecto purgante.

**7450. P. PURGANTE Y ANTIHEL-
 MÍNTICO (Pringle).**

ʒ Polvo de ruibarbo. ʒx (5 dec.).
 Calomelanos. ʒxviiij (9 dec.).

D. Se toma de una vez en las fiebres biliosas y contra las lombrices lumbricoides.

**7451. P. PURGANTE Y
 ATEMPERANTE.**

ʒ Nitro. ʒj (4 gr.).
 Emético. ʒj (5 cent.).

Se disuelven en tres cuartillos (1½ lit.) de caldo de yerbas. Se bebe á tazas hasta producir suficiente efecto purgante.

**7452. P. PURGANTE DE CITRATO
 DE MAGNESIA.**

ʒ Carbonato de magnesia. ʒ6
 Acido cítrico. ʒ23
 Azúcar. ʒ60

Se priva á estas sustancias, por medio de la desecacion, de toda el agua que pueden retener.

7453. Otro, n. 2.

Es una mezcla de cuarenta y seis partes de ácido cítrico y quince de magnesia calcinada. Esta mezcla representa ʒij (60 gr.) de citrato de magnesia; se disuelve muy pronto en el agua caliente y tarda cinco á diez minutos en disolverse en la fria. Si se quiere usar el carbonato en lugar de la magnesia, se pondrá treinta partes; pero en este caso abulta mas el polvo y hace efervescencia al ponerle en un líquido.

7454. P. PURGANTE COMPUESTO.

ʒ Calomelanos. ʒx (5 dec.).

Jalapa en polvo. ʒj (4 gr.).
 Azúcar. ʒxx (4 gr.).
M. D. ʒL (25 dec.) á los adultos.

**7455. P. PURGANTE Y DIURÉTICO
 (Lescure).**

ʒ Sulfato de sosa. ʒij (8 gr.).
 Acetato de potasa. ʒxxx (15 dec.).
 Cebolla albarrana,
 Digital purpúrea, ãã. ʒv (25 cent.).
 Resina de jalapa. ʒvj (30 cent.).

M. I. Hidropesías, obstrucciones de las vísceras abdominales y caquexia que sobreviene á consecuencia de las calenturas intermitentes. *D.* Se toma en una sola dosis por la mañana en ayunas en un cocimiento aperitivo.

7456. P. PURGANTE Y TÓNICO.

ʒ Tartrato de potasa y
 sosa. ʒx (50 cent.).
 Ruibarbo en polvo. ʒv (25 cent.).

M. I. Atrofia mesentérica de los niños. *D.* Se toma de una vez por la mañana.

**7457. P. DE QUARIN CONTRA LA
 TOS CONVULSIVA.**

ʒ Extracto de regaliz,
 Azúcar, ãã. ʒij (8 gr.).
 Azufre sublimado. ʒj (4 gr.).
 Goma tragacanto,
 Goma arábica, ãã. ʒß (2 gr.).
 Oxido de antimonio hidrosulfurado
 pardo. ʒij á ʒjv (1 á 2 dec.).

H. S. A. D. ʒß (2 gr.) cada cuatro horas, en un looc ó en un vehículo adecuado.

**7458. P. DE QUERMES ALCANFO-
 RADO (H. DE AL.).**

ʒ Quermes mineral. ʒß (25 mil.).
 Alcanfor. ʒj (5 cent.).
 Azúcar blanca. ʒxxjv (12 dec.).

Mézclese y divídase en dos pa-
 peles.

D. En el dia.

7459. P. DE QUINA ALUMINOSO.

℞ Quina roja. ʒj (30 gr.).
 Alumbre. ʒij (8 gr.).
 Canela,
 Alcanfor, ãã. ʒß (2 gr.).
M. I. Estomacace, tialismo, hemorragia pasiva, metrorragia, odontalgia, diarrea crónica, úlceras atónicas, úlceras saniosas, gangrena de hospital, gangrena. *D.* ʒj (4 gr.). Se espolvorea la parte enferma.

7460. P. DE QUINA ESTIBIADO.

℞ Quina roja. . . . ʒj (30 gr.).
 Tártaro emético. ʒxx (4 gr.).
 Carbonato de sosa. ʒxxx (15 dec.).
 Hidroclorato de a-
 moniaco. ʒj (4 gr.).
 Opio. ʒjv (20 cent.).
 Divídase en diez papeles.
I. Calenturas intermitentes, remitentes, perniciosas ó tifoideas, tifo. *D.* Tres papeles al dia.

7461. P. DE QUINA FACTICIO
 (*Hufeland*).

℞ Corteza de sáuce,
 Corteza de castaño de Indias,
 Genciana,
 Cálamo aromático,
 Cariofilea, ãã. ʒß (15 gr.).
M. I. Calenturas intermitentes, dispepsia, debilidad del conducto digestivo, tifo, reumatismo, gangrena de hospital. *D.* En píldoras, bolos ó cocimiento.

7462. P. DE QUINA É ICTIOCOLA.

℞ Quina. ʒj (30 gr.).
 Ictiocola. ʒjß (6 gr.).
 Divídase en diez y seis papeles.
I. Hemorragias uterinas pasivas, leucorrea, blenorrea, diarreas crónicas. *D.* Cuatro papeles al dia y despues seis.

7463. P. DE QUINA DE LOJA
 (F. F.).

℞ Quina de Loja. c. s. q.
 Se raspan las cortezas con un cuchillo para quitar los líquenes, la epidermis y el tegido celular inmediato, se seca en la estufa y se pulveriza sutilmente sin dejar residuo.

I. y D. Véase t. I, pág. 309.

Del mismo modo se pulverizan las cortezas de QUINA ROJA Y QUINA AMARILLA sin epidermis, la CASCARILLA y la ANGUSTURA VERDADERA Y FALSA.

7464. P. DE QUINA Y MAGNESIA.

℞ Quina. ʒ
 Magnesia. ʒ
 Del mismo modo se preparan los polvos de QUINA Y RUIBARBO, QUINA Y CAFÉ, QUINA Y VALERIANA.

7465. P. DE QUININA Y MORFINA
 (*Magendie*).

℞ Sulfato de quinina. ʒij á ʒvj (10 á 30 cent.).
 Sulfato de morfina. ʒß á ʒj (25 á 50 mil.).
 Mézclese y divídase en cuatro papeles iguales. *D.* Una toma cada dos ó tres horas durante la apirexia.

7466. P. DE QUININA EMETIZADO
 (*Dr. Gola*).

℞ Tártaro estibiado. . ʒiij (15 cent.).
 Sulfato de quinina. . ʒx (50 cent.).
 Mézclese exactamente y divídase en seis papeles iguales. *D.* Esta mezcla, que se ha empleado con mucho éxito contra ciertas calenturas intermitentes que habian resistido á la accion del sulfato de quinina, solo debe tomarse á la dosis de un papel cada dos horas durante la apirexia.

7467. P. DE QUININA OFTÁLMICO
(Sichel).

℞ Etíope antimonial,
Sulfato de quinina, ãã. ʒij (8 gr.).
Mézclese y divídase en veinticuatro papeles.

I. Oftalmias periódicas. D. Dos á ocho papeles al dia.

7468. P. DE REGALIZ (F. F.).

℞ Raiz de regaliz. c. s. q.
Se raspa ligeramente con un cuchillo, se corta en rodajas delgadas, se seca en la estufa y se pulveriza por contusion hasta que solo quede un residuo fibroso y casi insípido.

Del mismo modo se preparan los polvos de raices de MALVABISCO, GATUÑA Y PAREIRA BRAVA y de todas las raices muy fibrosas.

7469. P. DE RAIZ DE HELECHO MACHO (F. F.).

℞ Cepas radicales de helecho macho, c. s. q.

Se cortan en pedazos menudos, se aventan para separar las escamas foliáceas, se secan en la estufa y se pulverizan por contusion sin dejar residuo.

I. y D. Véase t. I, p. 211.

7470. P. REFRIGERANTE
(Van Mons).

℞ Nitro. 2
Sal amoniaco. 4

Mézclese triturando.

Se usa poniéndole en una vejiga con agua ó mezclado con hielo machacado, y se aplica sobre la parte enferma.

I. Contusiones, encefalitis, teliangiectasia, asma, aracnitis, meningitis. D. Se aplica en las hernias sobre el tumor herniario, y en fomentos en las contusiones y equimosis.

7471. P. REFRIGERANTE Y DIURÉTICO.

℞ Malvabisco en polvo. ʒxx (4 gr.).

Regaliz en polvo. ʒxx (4 gr.).
Sal de nitro. ʒijv (20 cent.).
Alcanfor. ʒij (5 cent.).
Azúcar de leche. ʒijß (40 gr.).
Azúcar. ʒijß (40 gr.).

M. I. Inflamacion aguda de las vias urinarias. D. Tres dosis al dia en ʒjx (280 gr.) de agua. Es muy cómodo para las personas que viajan.

7472. Otro, n. 2.

℞ Nitrato de potasa. ʒxij (6 dec.).
Malvabisco en polvo,
Regaliz en polvo, ãã. ʒj (4 gr.).
Alcanfor. ʒiij (15 cent.).
Mézclese y divídase en tres papeles.

I. Es muy cómodo para los viajeros afectados de uretritis aguda. D. Un papel tres veces al dia en un vaso de agua.

7473. P. DE RESINA DE ESCAMONEA.

℞ Resina de escamonea. ʒLjv (3 gr.).
Jabon de Venecia. ʒciv (25 cent.).
Azúcar blanca. ʒjx (288 gr.).
H. S. A. polvo muy tenue, al que se añade:

Bizcocho en polvo. ʒvj (24 gr.).
Agua. algunas gotas.
Se mezclan S. A.

I. Es purgante y vermífugo. D. ʒviiij (4 dec.) que bastan para producir muchas deposiciones á un adulto; á los niños de quince años se reduce la dosis á ʒvj (3 dec.); ʒjv (2 dec.) para los de siete á ocho años, y ʒij (1 dec.) para los de uno á dos años.

7474. P. DE RESINA DE GUAYACO COMPUESTO (Hufeland).

℞ Resina de guayaco. ʒvj (24 gr.).
Extracto de acónito,
Esencia de valeriana,
Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ãã. ʒj (12 dec.).
Azúcar blanca. ʒß (16 gr.).
Mézclese y divídase en veinticuatro tomas.

I. Prosopalgia artrítico-reumática. *D.* Una toma mañana y noche.

7475. P. RESOLUTIVO (Berends).

℞ Mercurio dulce. ḡjv (20 cent.).
Digital purpúrea. ḡv (25 cent.).
Azúcar. ʒj (4 gr.).
Divídase en doce papeles.

I. Hidrocéfalo crónico. *D.* Dos papeles al día.

7476. P. RESOLUTIVO (Boinet).

℞ Almidon en polvo. ʒv (150 gr.).
Sulfato de hierro. ḡxviii (1 gr.).
Clorhidrato de amon. ḡxviii (1 gr.).
Sabina en polvo. ʒß (2 gr.).
Acetato de morfina. ḡxviii (1 gr.).

M. Sirve en las curas de las úlceras del cuello de la matriz. Se aplica por medio de un peloton de hilas cubierto de cerato, y se renueva esta cura cada dos días.

7477. Otro (RICHTER).

℞ Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ãã. ḡvj (3 dec.).
Cicuta en polvo. ʒß (2 gr.).
Azúcar blanca. ʒij (8 gr.).
Mézclese y divídase en seis tomas.

I. Hepatitis crónica. *D.* Una toma mañana y noche.

7478. Otro (RUPIPUS).

℞ Calomel. al vapor. ḡviii (40 cent.).
Tártaro emético. ḡj (5 cent.).
Láud. de Sydenham. 8 gotas.
Azúcar blanca. ʒij (8 gr.).
Hágase polvo y divídase en ocho dosis iguales.

I. Flegmasias de los órganos parenquimatosos. *D.* Una dosis cada dos horas.

7479. P. RESOLUTIVO Ó DIGESTIVO (J. P. Frank).

℞ Crémor de tártaro. ʒß (16 gr.).
Tártaro emético. ḡj (5 cent.).

Mézclese bien y divídase en seis dosis iguales.

I. Calenturas biliosas y embrazos gástricos.

Obra casi siempre como purgante cuando se da una dosis de tarde en tarde.

7480. P. RESTAURANTE.

℞ Cacao tostado. lbß (250 gr.).
Arroz,
Azúcar, ãã. ʒjv (125 gr.).
Canela. ʒj (4 gr.).

I. Enflaquecimiento, caquexia, marasmo, consuncion, convalecencia, gastritis crónica, bulimia, dispepsia. *D.* Dos cucharadas en una taza de leche ó caldo.

7481. P. RESTRICTIVOS DE NUECES DE CIPRÉS ó Polvos restrictivos (F. E.).

℞ Bol arménico. ʒij (8 gr.).
Raiz de bistorta,
Rosas encarnadas,
Bayas de arrayan,
Nueces de ciprés,
Incienso,
Sulfato de zinc, ãã. ʒj (32 gr.).
Háganse polvos S. A. muy finos.

I. y *D.* Mezclados con clara de huevo y aplicados exteriormente aprovechan en los flujos de sangre por las narices, en las almorranas y en otros: algunas veces se usan interiormente en las diarreas y en el esputo de sangre.

7482. P. DE ROBERTO THOMAS.

℞ Goma tragacanto. ʒj (12 dec.).
Oxido de bismuto. ḡij á ḡx (15 á 50 cent.).

H. S. A. I. Gastrodinia. *D.* Se repite esta dosis tres veces al día.

7483. P. DE ROSAS ROJAS (F. F.).

℞ Pétalos de rosas rojas. c. s. q.
Se secan en la estufa y se pul-

verizan por contusion sin dejar residuo.

I. y D. Véase t. I, p. 319.

Del mismo modo se preparan los polvos de los PÉTALOS DE VIOLETAS, los estigmas de AZAFRAN, las flores de ARNICA, MANZANILLA Y SANTÓNICO, y de todas las flores aisladas.

7484. P. DE ROSSEN DE ROSENSTEIN PARA LAS NODRIZAS.

℞ Magnesia blanca. ℥j (32 gr.).
Azúcar blanca. ℥ij (8 gr.).
Cáscaras de naranjas en polvo,
Sem. de hinojo en p., ãã. ℥j (4 gr.).
H. S. A. y divídase en doce dosis.

I. y D. Se dan dos ó tres al dia para aumentar la leche de las nodrizas, impedir que se agrie y facilitar la digestion.

7485. P. DE RUBIA Y QUINA (Oslander).

℞ Quina en polvo,
Rubia en polvo, ãã. ℥β (15 gr.).
Mézclese y divídase en ocho tomas.

I. Amenorrea en el curso de la tisis pulmonar. *D.* Una toma todos los dias.

7486. P. DE RUIBARBO (F. F.).

℞ Raiz de ruibarbo. c. s. q.
Se quebranta en el almirez ó se corta en pedazos, se pone á secar en la estufa, y se reduce despues á polvo sutil por contusion sin dejar residuo.

Del mismo modo se preparan los polvos de raiz de APIO, ARISTOLOQUIA LARGA Y REDONDA, BARDANA, CÁLAMO AROMÁTICO, BRIONIA, COLOMBO, CURCUMA, ELÉBORO BLANCO, ÉNULA CAMPANA, GALANGA, GENCIANA, GENGIBRE, JALAPA, LIRIO, PACIENCIA, PELITRE, PEONÍA, YARRO, ZEDOARIA Y TORMENTILA; y en general los de todas las raices que siendo jugosas y carnosas cuando están frescas, son compactas despues de secas, y no constan apenas de partes fibrosas: no obstante, se preparan tambien del mismo

modo los polvos de las raices fibrosas de RATANIA Y ZARZAPARRILLA.

7487. P. DE RUIBARBO CON BELLADONA (Hufeland).

℞ Polvo de raiz de belladona. ḡx (5 dec.).
Polvo de ruibarbo. ℥ij (24 dec.).
Hágase polvo y divídase en diez dosis.

I. Asma espasmódico, hipertrofia y degeneracion del hígado y del bazo, ictericia, palpitaciones simpáticas del corazon. *D.* Dos ó tres dosis al dia.

7488. P. DE RUIBARBO COMPUESTO (H. DE ING.).

℞ Ruibarbo,
Carbonato de potasa, ãã. ℥j (4 gr.).
Colombo. ℥ij (8 gr.).
Mézclese. *D.* ḡx á ḡxx (5 á 10 dec.), dos ó tres veces al dia.

7489. P. DE RUIBARBO FERRUGINOSO (Sachs).

℞ Limaduras de hierro porfirizadas,
Polvo de ruibarbo, ãã. ℥j (4 gr.).
Azúcar blanca. ℥ij (8 gr.).
Hágase polvo, que se dividirá en doce tomas.

I. Raquitis. *D.* Una toma al dia, aumentando poco á poco hasta tres ó cuatro papeles.

7490. P. DE RUIBARBO Y MERCURIO (H. DE ING.).

℞ Ruibarbo. ℥jv (125 gr.).
Calomelanos,
Gengibre, ãã. ℥j (4 gr.).
M. D. Diez granos á ḡxxjv (5 á 12 dec.).

7491. P. DE RUIBARBO OPIADO.

℞ Extr. de opio en polvo. ḡij (1 dec.).
Ruibarbo en polvo. ℥j (4 gr.).
H. S. A. seis papeles.
I. y D. Se usa uno al dia como

estomacal en las gastralgias. Si se desarrolla mucho ácido se añade ʒj (4 gr.) de magnesia calcinada, y entonces se obtiene el polvo de ruibarbo y magnesia opiado.

7492. P. DE RUIBARBO COMPUESTOS (F. P.).

ʒ Magnesia en polvo,
Ruibarbo en polvo, ãã. ʒj (4 gr.).
Divídase en doce tomas. Se usa una antes de cada comida en el tratamiento de la pirosis y de la gastralgia.

7493. P. DE SABINA (F. F.).

ʒ Sabina. c. s. q.
Se seca en la estufa y se pulveriza sin dejar residuo.
I. y D. Véase t. I, pág. 322.
Del mismo modo se pulverizan las hojas de DÍCTAMO CRÉTICO, TE Y GAYUBA.

7494. P. SACARINO EFERVESCENTE (Davidson).

ʒ Azúcar en polvo. . . . ʒiv (125 gr.).
Sacaruro de vainilla. . ʒij (60 gr.).
Acido tártrico. ʒij (60 gr.).
Bicarbonato de sosa. . ʒiij (90 gr.).
Mézclese y guárdese bien.
I. Cálculos ó arenillas de ácido úrico. D. Una cucharada disuelta en medio vaso de agua, que se toma por la mañana en ayunas.

7495. P. DE SAL AMONIACO.

ʒ Sal amoniaco. ʒjß á ʒiij (6 á 12 gr.).
Regaliz en polvo. . . . ʒiij (12 gr.).
Divídase en nueve tomas.
I. Flujos crónicos de las vias urinarias. D. Una toma cada tres horas en cocimiento de harina de avena mondada.

7496. P. DE SALEP.

ʒ Salep. ʒj (32 gr.).
Sagú. ʒv (20 gr.).

Goma trágacanto. . . . ʒljv (3 gr.).
M. I. Convalecencia de las calenturas graves, caquexia, calenturas tifoideas ó atáxico-adinámicas, cólera, diarrea. D. Una cucharadita pequeña de café cocida en una taza de leche.

7497. Otro (F. F.).

ʒ Salep de Persia. c. s. q.
Se sumerge en agua fría por veinticuatro horas, se enjuga frotándole fuertemente con un lienzo áspero para quitarle la parte cortical, se seca en la estufa, se le reduce por contusion á un polvo muy fino, y se pasa por un tamiz fino de seda.

7498. P. DE SALICINA.

ʒ Salicina. ʒxviiij (4 gr.).
Azúcar. ʒxc (5 gr.).
Mézclese y dividase en tres tomas.
I. Calenturas intermitentes. D. Se toman con media hora de intervalo.

7499. P. SALINO COMPUESTO (H. DE ING.).

ʒ Sulfato de magnesia. 4
Sal comun. 4
Sulfato de potasa. 3
Mézclese, pero se triturarán separadamente cada uno de los ingredientes. D. Una cucharadita de café en dos cuartillos de agua.

7500. P. DE SALVADO COMPUESTO ó Salvado contra los sabañones (Baudot).

ʒ Borato de sosa. ʒß (15 gr.).
Alumbre,
Benjuí, ãã. ʒijß (10 gr.).
Mostaza. ʒij (60 gr.).
Raiz de lirio,
Salvado, ãã. ʒjß (45 gr.).
Salvado de almendras. ʒv (150 gr.).
Se mezclan estas sustancias

despues de haberlas reducido á polvo, y se usa con un poco de agua para prevenir los sabañones. V. n. 7115.

**7501. P. DE SANTÓNICO
COMPUESTO.**

℞ Santónico,
Tanaceto, ãã. ḡljv (3 gr.).
Sulfato de hierro. ḡxviij (4 gr.).
Divídase en seis papeles.
I. Lombrices, ascárides, helmintiasis. D. Un papel cada dos horas en miel, leche, etc.

**7502. P. SATURNINO OPIADO
(Hufeland).**

℞ Acetato de plomo,
Opio purificado, ãã. ḡvj (3 dec.).
Azúcar blanca. ḡj (12 dec.).
H. S. A. polvo que se dividirá en doce tomas.
I. Sudores colicuativos. D. Una toma mañana y noche.

7503. P. SEDANTE (Gumprech).

℞ Lactucario. ḡjv (2 dec.).
Azúcar de leche. ḡj (4 gr.)
H. S. A. y dividase en cuatro dosis.
I. Segundo ó tercer período de la coqueluche. D. Un papel cada dos horas.

7504. Otro (H. DE AL.).

℞ Opio. ḡj (5 cent.).
Nitrato de potasa. ḡxij (6 dec.).
Azúcar blanca. ḡj (24 dec.).
Mézclese y dividase en seis papeles.
I. Afecciones reumáticas. D. Un papel cada dos horas.

7505. Otro (RECAMIER).

℞ Borax. ḡx á ḡxx (5 á 10 dec.).
Azúcar en polvo. ḡj (4 gr.).
Mézclese.

**7506. P. SEDANTE AZUFRAO
(Richter).**

℞ Extracto de beleño,
Extracto de cicuta, ãã. ḡß (6 dec.).
Azufre porfirizado,
Azúcar blanca, ãã. ḡij (24 dec.).
Mézclese y dividase en seis papeles.
I. Tos seca, tos espasmódica.
D. Una toma tres veces al dia.

**7507. P. SEDANTE Y
DIAFORÉTICO.**

℞ Polvos de Dower,
Polvo de James, ãã. ḡjv (2 dec.).
M. I. Dolores reumáticos rebel-
des. D. Se da esta dosis cada cua-
tro horas.

**7508. P. DE SEDLITZ, Polvo gasi-
fero ó sedlitz powers.**

℞ Acido tártrico en p. ḡvj (24 gr.).
Divídase en nueve papeles blan-
cos.
Bicarbonato de sosa. ḡvj (24 gr.).
Tartrato de potasa y
sosa. ḡxviij (72 gr.).
Mézclese y dividase en nueve papeles azules.
Para usarle se echa el polvo contenido en uno de los papeles blancos en un vaso grande que tenga el tercio de su capacidad de agua, se añade el polvo que contiene el papel azul, y se bebe al instante.

I. Se usa como refrigerante, antiemético y laxante, en las calenturas biliosas y embarazo gástrico.

7509. AGUA DE SEDLITZ.

℞ Sulfato de magnesia: ḡijß (10 gr.).
Cloruro de magnesio. ḡxviij (4 gr.).
Agua gaseosa de tres volúmenes. ḡxx (600 gr.).
Disuélvase. I. Flegmasias cró-

nicas, neumonia, hepatitis, bronquitis, embarazo de las primeras vias, calenturas biliosas, calentura mucosa, estreñimiento, disenteria, lepra, ectima, eczema, efélides, acne, erisipela, afecciones tifoideas, ictericia, hidropesía, hipocondría, corea, gastrorrhea, ovaritis, cólera, adenitis, albuminuria, amaurosis, pasmo, conjuntivitis, aneurisma, apoplejía, calentura, cólicos y hematuria. *D.* A vasos.

7510. P. DE SEDLITZ COMPUESTO
(Planche).

℞ Sulfato de magnesia purificado y reducido á polvo fino. . . ʒij (8 gr.).
Bicarbonato de sosa. . . ʒij (24 dec.).
Se mezclan exactamente.
Se señala este polvo con el número 1.

Acido tartárico puro en polvo fino. ʒβ (2 gr.).
Se señala este polvo con el número 2.

Se ponen los dos papeles en ℥β (250 gr.) de agua, y se toma al tiempo de hacer la efervescencia.

7511. P. DE SELTZ.

℞ Acido tártrico en polv. ʒvβ (22 gr.).
Se divide en doce papeles blancos.
Bicarbonato de sosa en polvo. ʒvj (24 gr.).
Se divide en doce papeles azules.

Se disuelve el ácido en un vaso grande lleno de agua hasta la tercera parte, se añade el bicarbonato, se agita y se bebe en el momento de la efervescencia.

7512. P. DE SELTZ, Polvo gasifero simple, soda, powders.

℞ Acido tártrico en polvo. ʒjv (16 gr.).
Bicarbonato de sosa. . . ʒvj (24 gr.).
Se divide el ácido tártrico en doce partes, que se ponen en papel blanco, y el bicarbonato en otros doce papeles azules.

Se disuelve el papel del ácido en un vaso de agua grande lleno solo hasta la tercera parte, se añade el papel del polvo alcalino, se agita y se bebe despues.

Este polvo tiene sabor agrillo aunque el bicarbonato se encuentra en exceso, y depende de que no se ha disuelto completamente en el momento de tomarle, y además en que está impregnado de ácido carbónico.

7513. P. DE SEN COMPUESTO ó
Polvo antiartrítico purgante
(H. M. F.).

℞ Sen en polvo,
Canela en polvo,
Crémor de tártaro en polvo,
Goma arábica en p. ãã. ʒviiij (4 dec.).
Palo de guayáco en polvo,
Zarzaparrilla en polvo,
Escamon. en polv., ãã. ʒjv (2 dec.).
M. D. Para una dosis.

7514. P. DE SEN COMPUESTOS
(F. P.).

℞ Bitartrato de potasa. 8
Hojas de sen. 8
Escamonea de Alepo. 2
Gengibre. 1
H. S. A. I. Es purgante. *D.* ʒβ á ʒij (15 á 60 gr.).

7515. P. DE SENCY.

℞ Polvo de esponja de color de rosa. . . . ʒv (20 gr.).
Clorhidrato de amon. ʒxviiij (1 gr.).
Carbon vegetal. . . . ʒxviiij (1 gr.).
Se tuesta las esponjas finas lo menos posible y se las reduce á polvo. *V. núm. 7239.*

D. ʒxviiij (1 gr.) á los de menos de diez años; á los demás ʒxviiij por la mañana, al medio dia y á la noche. Se introduce el polvo en el fondo de la boca con una cucharada de café y se le traga todo y en seco. Es muy eficaz.

7516. P. DE SEYFFER.

℞ Bioduro de mercur. ḡj (5 cent.).
Alcohol. 2 gotas.

Se disuelve y se añade:

Calomelanos preparados al vapor. . . ḡviiij (40 cent.).

Se tritura y despues se añade:

Azúcar. ʒijβ (40 gr.).

H. S. A. un polvo muy homogéneo que se divide en treinta y dos dosis.

I. Hidrocéfalo agudo. D. Se prescribe una dosis por la mañana, otra al medio dia y otra por la noche á los niños de tres á seis años.

7517. P. DE SOBREOXALATO DE POTASA (F. F.).

℞ Sobreoxalato de potasa. . . . c. s. q.

Se pulveriza por contusion en un mortero de vidrio ó de porcelana.

Del mismo modo se preparan los polvos de ÁCIDO TÁRTRICO, ó CÍTRICO, el CRÉMOR DE TÁRTARO SOLUBLE, el TÁRTARO EMÉTICO, el MERCURIO DULCE y el SUBLIMADO CORROSIVO, y en general los de todos los ácidos cristalizados, las sales ácidas, y otras varias que sin ser ácidas atacan con facilidad los almireces metálicos.

7518. P. DE SUCINO AZUCARADO ó Polvo fumigatorio sucinado.

℞ Sucino. ʒ
Azúcar. ʒ
Mézclense.

7519. P. SULFURO-MAGNESIANO (Bielt).

℞ Azufre sublimado,
Magnesia, āā. ʒβ (15 gr.).

Divídase en diez y ocho papeles. Se da uno diariamente en el eczema crónico, acné, lupus, impétigo, y en las afecciones escamosas ó impetiginosas.

7520. P. DE SULFATO DE QUININA.

℞ Sulfato de quinina. . . ḡxij (6 dec.).
Azúcar blanca en polv. ʒβ (2 gr.).

Mézclese y divídase en seis papeles.

D. Dos á seis papeles, entre obleas ó en una cucharada de miel.

7521. P. DE SULFATO DE QUININA Y TABACO (Hug).

℞ Sulfato de quinina. . . ḡxv (75 cent.).
Tabaco rapé. ʒj (30 gr.).
Mézclese con cuidado.

I. Dólores de cabeza nerviosos intermitentes. D. Se toma como el tabaco rapé. V. n. 7219.

7522. P. SULFUROSO ACÍDULO (Sundelin).

℞ Sulfuro de magnesia. . . ʒj (4 gr.).
Acido tártrico. ʒij (24 dec.).
Azúcar blanca. ʒij (8 gr.).

Divídase en diez y ocho papeles.

I. Salivacion mercurial. D. Un papel cada tres horas.

7523. P. DE SULFURO DE ANTIMONIO.

℞ Sulfuro de antimonio. ʒ
Asta de ciervo. ʒ

I. Es excitante y diaforético, que se usa contra las neuralgias, y principalmente la facial. D. ḡvj á ḡx (3 á 5 dec.) en bolos ó píldoras.

7524. P. DE SULFURO DE ESTAÑO COMPUESTO (F. P.).

℞ Sulfuro de estaño en polvo. ʒ
Raiz de jalapa en polvo. ʒ
Asa fétida en polvo. ʒ

H. S. A. I. Ténia, lombrices. D. ʒβ á ʒj (6 á 12 dec.) tres veces al dia.

**7525. P. DE SULFURO
MAGNESIANO.**

℥ Azufre lavado,
Magnesia calcinada, ãã. ʒjv (16 gr.).
H. S. A. diez y ocho papeles.
I. Eczema crónico y soriasis. *D.*
Se toma un papel cada día.

**7526. P. DE SULFURO DE MERCURIO
Y ESTAÑO (F. P.).**

℥ Estaño reducido á polvo fino. 4
Sulfuro negro de mercurio. 4
H. S. A. I. Ténia, lombrices. *D.*
ʒB á ʒj (2 á 4 gr.) con miel ó
triaca.

**7527. P. DE SULFURO NEGRO DE
MERCURIO COMPUESTO (F. P.).**

℥ Raiz de valeriana silvestre en polvo. 2
Simiente de Alejandría. 1
Sulfuro negro de mercurio. 4
M. I. Lombrices, ténia. *D.* ʒjv
á ʒxij (2 á 6 dec.) y aun mas.

7528. P. SULFURO TÁRTRICO.

℥ Sulfuro de magnesia. . ʒj (4 gr.).
Acido tártrico. ʒLjv (3 gr.).
Azúcar. ʒxc (5 gr.).
H. S. A. doce papeles.
I. Tialismo. *D.* Un papel cada
tres horas en media taza de limo-
nada.

7529. P. TENÍFUGO (Dupuis).

℥ Limaduras de estaño. ʒj (12 dec.).
Tanino. ʒx (50 cent.).
Gutagamba. ʒx (50 cent.).
Oleosácaro de cajeput. ʒv (25 cent.).
Divídase en dos papeles.
D. Uno á las seis de la mañana
y otro media hora despues.

7530. P. TISANIFERO.

℥ Goma arábica,
Extracto de regaliz, ãã. ʒij (60 gr.).

Nitrato de potasa. . . . ʒij (8 gr.).
M. D. Una cucharadita de café
en un vaso de agua.

7531. P. TÓNICO.

℥ Quina en polvo. ʒj (4 gr.).
Genciana en polvo,
Serpentaria de Virgi-
nia, ãã. ʒB (2 gr.).
Alcanfor en polvo. . . ʒxij (6 dec.).
M. I. Calenturas intermitentes.
D. En dos tomas.

7532. Otro, n. 2.

℥ Quina roja. ʒj (4 gr.).
Café tostado,
Cacao tostado, ãã. ʒij (8 gr.).
H. S. A. cinco papeles.
I. Dispepsia, anorexia, cloro-
sis. *D.* Un papel mañana y noche.

7533. Otro, n. 3.

℥ Quina roja en polvo,
Ruibarbo, ãã. ʒj (4 gr.).
Canela. ʒB (2 gr.).
Opio. ʒvj (3 dec.).
Divídase en papeles de ʒxij
(6 dec.).
I. Este polvo es útil en algunas
atonías del estomago.

7534. Otro (H. DE AMÉR.).

℥ Tartrato de potasa y
hierro. ʒx (50 cent.).
Colombo. ʒxv (75 cent.).
M. D. Una dosis cada cinco ho-
ras.

7535. Otro (H. DE AMÉR.).

℥ Subcarbonato de hierro,
Colombo,
Ruibarbo,
Gengibre, ãã. ʒj (4 gr.).
Mézclese y dividase en doce
papeles.
D. Tres al día.

7536. P. TÓNICO Y ASTRINGENTE
(Otto).

℞ Sulfato de quinina. ḡij (15 cent.).
Oxido negro de hier. ḡxx (50 cent.).
Regaliz en polvo. ḡxij (60 cent.).
Esencia de yerbab. 4 gota.

Mézclese y dividase en doce papeles.

I. Gonorreas rebeldes. D. Un papel cuatro veces al dia.

7537. P. TÓNICO ALOÉTICO
(Bories).

℞ Quina gris. ʒij (64 gr.).
Nuez de agalla. ʒiij (12 gr.).
Oxido negro de hierro,
Acibar sucotrino, ãã. . ʒij (8 gr.).

M. I. Sirve para fortificar los estómagos perezosos de los sugetos á quienes falta el apetito; conviene para facilitar las reglas difíciles por atonia, lombrices. D. De ḡx á ḡxx (5 á 10 dec.) en la primer cucharada de sopa.

7538. P. TÓNICO DE BRERA.

℞ Oxido negro de hierro,
Colombo, ãã. ḡxc (5 gr.).
Cáscara de naranja. . ʒijʒ (10 gr.).
Canela. ḡxviiij (4 gr.).
Divídase en nueve papeles.

I. Clorosis, bocio, amenorrea, leucorrea, raquitis. D. Tres papeles al dia.

7539. P. TÓNICO DE BUCHNER
(Radius).

℞ Vitriolo verde,
Bicarb. de sosa, ãã. ḡj (5 cent.).
Azúcar. ḡvj (30 cent.).

Se toma en un vaso de agua azucarada.

7540. P. TÓNICO Y ESTIMULANTE.

℞ Quina. ʒʒ (2 gr.).
Canela. ḡvj (3 dec.).

M. I. Convalecencia de las ca-

lentas intermitentes, para reanimar las fuerzas digestivas.

7541. P. TÓNICO Y ESTOMACAL.

℞ Limaduras de hierro,
Quina, ãã. ʒij (8 gr.).
Canela. ʒj (4 gr.).
Crémor de tártaro. . . ʒʒ (15 gr.).
Mézclese y dividase en veinticuatro papeles.

I. Clorosis. D. Un papel por la mañana y otro por la noche en un poco de agua azucarada.

7542. P. TÓNICO Y EXPECTORANTE DE BENJUÍ.

℞ Acido benzóico. ʒʒ (2 gr.).
Ipecacuana,
Alcanfor,
Azufre dorado de anti-
monio, ãã. ḡvj (3 dec.).
Oleosácaro de anís. . . ʒj (4 gr.).
Mézclese y dividase en ocho papeles.

I. Catarro crónico, neumonía, bronquitis, astenia. D. Un papel cada tres horas.

7543. P. TÓNICO INCISIVO
(Lassone).

℞ Polvo de regaliz. . . . ʒj (4 gr.).
Catecú,
Canela,
Lirio, ãã. ʒj (12 dec.).
Carbonato de sosa,
Deutóxido de hier., ãã. ḡxij (6 dec.).
Ipecacuana. ḡjv (2 dec.).
Quermes. ḡij (1 dec.).
H. S. A. y dividase en treinta dosis.

I. y D. Se dan en el embarazo gástrico tres dosis cubiertas de un pedazo de hostia mojada, mediando un cuarto de hora de intervalo entre cada dosis.

Nota. Se toman una ó dos horas antes de comer.

7544. P. TÓNICO PURGANTE.

℞ Sulfato de magnesia,
Quina, ãã. ʒvj (24 gr.).

Mézclese y dividase en seis pa-
peles.

D. Uno cada dos horas.

7545. P. DE TONQUIN DE REUSS ó
Polvo de almizcle compuesto.

- ℥ Almizcle. ʒjβ (6 gr.).
- Raiz de valeriana en p. ʒj (4 gr.).
- Alcanfor. ʒβ (2 gr.).

H. S. A. I. Enfermedades con-
vulsivas, espasmos, histérico,
epilepsia, hidrofobia, gastritis,
hipocondria. D. ʒjv á ʒxij (2 á 6
dec.).

7546. P. DE TORBISCO (F. F.).

℥ Cortezas de torbisco. c. s. q.
Se cortan al través en pedaci-
tos, se desecan en la estufa y se
pulverizan por contusion hasta
que no quede mas que una pelu-
sa voluminosa.

Esta pulverizacion es peligrosa para
el que la ejecuta, por lo que debe te-
nerse mucho cuidado en tapar el mor-
tero y el tamiz.

Del mismo modo se pulverizan las
cortezas de OLMO, SIMARUBA, SAUCE,
SAUCO y todas las cortezas muy fibro-
sas.

7547. P. DE LOS TRES SÁNDALOS
(F. M.).

- ℥ Polvo de los tres sándalos,
 - Rosas encarnadas,
 - Rasuras de regaliz, añ. ʒβ (16 gr.).
 - Simiente de escarola,
 - Simiente de verdolaga,
 - Simiente de melon,
 - Goma tragacanto,
 - Goma arábica, añ. ʒj (4 gr.).
 - Rasuras de marfil. ʒij (8 gr.).
- Hágase polvo S. A.

I. Ardores del estómago y del
higado, disenterias y calentura
hética. D. Desde ʒβ á ʒjv (2 á 5
gr.).

7548. P. DE LOS TRES SÁNDALOS ó
Especies de los tres sándalos.

- ℥ Sándalo cetrino. 95

- Sándalo blanco. 95
- Sándalo rojo. 99
- Semillas de verdolaga. 70
- Rosas. 1010
- Violetas. 150
- Ruibarbo. 70
- Almidon. 50
- Marfil calcinado. 70
- Zumo de regaliz. 70
- Goma arábica. 50
- Goma tragacanto. 50
- H. S. A. D. ʒxviiij á ʒj (1 á 4
gr.).

7549. P. DE VAINILLA (F. F.).

- ℥ Vainilla. ʒj (32 gr.).
- Azúcar. ʒiiij (96 gr.).

Se corta con tijeras la vainilla
en pedazos muy pequeños; se
tritura despues en un mortero de
mármol con el azúcar y se pasa
por un tamiz de seda.

M. Sirve para aromatizar con
vainilla diferentes preparaciones.

7550. P. DE VALERIANA (F. F.).

- ℥ Raiz de valeriana. c. s. q.

Se quebranta ligeramente la
raiz en un almirez con mano de
madera, se criba para separar la
tierra, se seca en la estufa y se
pulveriza en almirez de bronce
sin dejar residuo.

Del mismo modo se obtienen los pol-
vos de raíces de ANGÉLICA, ARNICA, ÁSA-
RO, CONTRAYERBA, ELÉBORO NEGRO,
SERPENTARIA VIRGINIANA, VENCETÓSIGO,
y en general de todas las raíces del-
gadas, poco leñosas y que por estar reu-
nidas en haccillos retienen fácilmente
la tierra.

7551. P. DE VALERIANA AROMÁ-
TICO ó Polvo nervino (H. M. F.).

- ℥ Valeriana en polvo. ʒβ (2 gr.).
- Canela en polvo. ʒvj 3 dec.).

M. D. Se toma de una vez.
I. Afecciones nerviosas.

7552. P. VERMÍFUGO.

- ℥ Santónico. ʒxij (6 dec.).

Calomelanos. ḡx (5 dec.)
Azúcar en polvo. . . . ḡxx (10 dec.)
Mézclese y dividase en cuatro papeles.

I. Ascárides lumbricoides. *D.* Dos papeles al dia en miel ó en dulce.

7553. P. VERMICIDA.

☞ Helecho macho. ḡj (30 gr.)
Escamonea. ḡx (5 dec.)
Gutagamba,
Calomelanos, ãã. . . . ḡxjv (7 dec.)
Divídase en tres papeles.

I. Helmintiasis, afecciones verminosas, diarreas. *D.* Un papel cada tres horas.

7554. P. VERMÍFUGO.

☞ Helecho macho. 4
Santónico. 4
Ruibarbo. 4
Musgo de Córcega. 4

M. D. ḡx á ḡxij (5 á 6 dec.) para los niños, y ḡj (4 gr.) para los adultos.

7555. Otro, n. 2.

☞ Santónico en polvo. ḡiij (12 gr.)
Calomelanos. ḡiij (15 cent.)
Mézclese y dividase en tres papeles.

D. Se dan contra las ascárides y las lombrices en una cucharada de miel, uno por la noche al acostarse, otro al dia siguiente por la mañana, y otro al inmediato dia al levantarse.

7556. Otro, n. 3.

☞ Coralina de Córcega. 4
Santónico. 4
Semillas de ajénjos. 4
Semillas de tanaceto. 4
Hojas de escordio. 4
Hojas de sen. 4
Ruibarbo. 4

H. S. A. D. ḡvj (3 dec.) para los niños y hasta ḡj (4 gr.) para los adultos.

7557. Otro (BEEK).

☞ Mercurio dulce. . . . ḡxxjv (12 dec.)
Cuerno de ciervo calcinado,
Cinabrio, ãã. ḡxij (6 dec.)

M. D. Se da una dosis cada cuatro á cinco horas.

Por la tarde se bebe ḡij (60 gr.) de aceite de almendras; al dia siguiente se toma en ayunas en jarabe la tercera parte del polvo preparado con

Helecho. ḡj (4 gr.)
Jalapa,
Gutagamba,
Cardo santo,
Carbon animal, ãã. . . . 5ḡ (2 gr.)

Si la ténia no sale, se toma la segunda tercera parte á las dos horas y la última tercera parte dos horas despues.

7558. Otro (BRUGNATELLY).

☞ Estaño de Malaca en limaduras. ḡiij (90 gr.)
Azufre sublimado. . . . ḡj (30 gr.)

Se calienta esta mezcla en un crisol sobre las ascuas hasta que se manifiesta una llama muy viva. Se aparta el crisol del fuego, se le tapa, se le deja enfriar, se pulveriza y se tamiza el sulfuro. Se le conserva en una vasija de vidrio.

I. y D. Se da este polvo, ya solo ó ya mezclado con azúcar ó magnesia, á la dosis de 5ḡ á ḡj (2 á 4 gr.) cuatro veces al dia, á las personas que tienen lombrices ó la ténia.

7559. Otro (F. F.).

☞ Polvo de musgo de Córcega,
Polvo de santónico, ãã. ḡj (32 gr.)
Polvo de ruibarbo. . . . 5ḡ (16 gr.)

Se mezclan exactamente y se guardan para el uso en un frasco tapado.

D. Se puede dar en leche ó agua á la dosis de ḡij á ḡjv (8 á 15 gr.) para los niños.

7560. P. VERMÍFUGO (H. DE AL.).

℥ Helecho macho. ℥j (12 dec.).
 Gutagamba. ḡij. (1 dec.).
 Mézclese.

D. Para una dosis.

7561. Otro (H. DE AL.).

℥ Limaduras de estaño. ℥ij (8 gr.).
 Sulfato de hierro. ḡv (25 cent.).
 Se trituran con cuidado y se divide en seis papeles.

I. Afecciones verminosas, helmintiasis, ténia. *D.* Un papel cada dos horas.

7562. Otro (H. DE AL.).

℥ Santónico. ℥B (2 gr.).
 Tartrato de potasa. ℥iij (12 gr.).
 Azúcar blanca. ℥ij (8 gr.).
 Mézclese y divídase en diez y seis papeles. *D.* Uno cada tres ó cuatro horas.

7563. Otro (GOELIS).

℥ Calomelanos. ḡij (1 dec.).
 Valeriana. ḡxx (1 gr.).
 Badiana. ḡjv (2 dec.).
 Azúcar. ℥j (4 gr.).
 Divídase en diez y seis papeles.

D. Uno por la mañana en una cucharada de agua azucarada.

7564. P. VERMIFUGO DE ASA FÉTIDA (Augustin).

℥ Asa fétida. ℥B (2 gr.).
 Protocloruro de merc. ḡv (25 cent.).
 Graciola. ℥B (2 gr.).
 Esenc. de menta piper. 3 gotas.
 Divídase en diez papeles.

I. Afecciones verminosas. *D.* Un papel cada tres horas.

7565. P. VERMIFUGO DE ESTAÑO.

℥ Estaño reducido á polvo fino. ℥j (32 gr.).

Sulfuro negro de merc. ℥ij (8 gr.).
 H. S. A. y divídase en seis dosis iguales.

D. Se da una en un poco de jaraube, de triaca ó de miel, dos veces al día.

7566. P. VERMIFUGO MERCURIAL (F. F. 1818).

℥ Sulfuro negro de mercurio. 4
 Polvos cornaquinós. 4
 Se mezclan con cuidado.

D. ḡv á ḡx (25 á 30 cent.) y aun ḡxv (35 cent.).

7567. P. VERMIFUGO PURGANTE (Bally).

℥ Azúcar muy refinada. ℥iij (12 gr.).
 Ruibarbo,
 Escamonea,
 Protocloruro de mercurio sublimado y lavado, ãã. ℥j (4 gr.).

H. S. A. *D.* ḡx á ḡxij (5 á 6 dec.) para los niños, y ℥j (4 gr.) una ó dos veces á la semana para los adultos.

7568. P. DE VERNIX ó Polvo de vitriolo compuesto.

℥ Sulfato de cobre,
 Sulfato de zinc,
 Alumbre calcinado,
 Carbonato de plomo,
 Tierra sellada, ãã. ℥j (30 gr.).

Se funden los sulfatos en un crisol, se echan en un mortero, se pulverizan, se añaden las dos sustancias y se pasa por un tamiz.

I. y *D.* Se aplica exteriormente c. s. para detener la sangre. Se usa también en inyecciones en la gonorrea.

7569. P. DE VICHY.

Se compone de las mismas sales que el agua de Vichy, solo que en lugar de bicarbonato de sosa se usa el carbonato simple.

Se emplea disolviéndole en agua y mejor si es gaseosa.

7570. P. VOMITIVO.

℥ Ipecacuana. ℥j (12 dec.).
 Emético. ḡj (5 cent.).
 Mézclese y divídase en tres papeles.

I. Embarazo gástrico, calentura biliosa, acne, cálculos. *D.* Un papel cada cuarto de hora. Si bastan los dos primeros, no se da el tercero. Se facilita el vómito bebiendo mucha agua caliente. Es un buen emético.

7571. Otro (HELVETIUS).

℥ Crémor de tártaro. . ℥ss (250 gr.).
 Emético. ℥j (30 gr.).
 Ipecacuana. ℥ß (15 gr.).

Se trituran cuidadosamente y se pasan por un tamiz de seda.

I. y *D.* Se da á la dosis de ḡxviii (1 gr.) para excitar el vómito sin sacudidas violentas.

Nota. Algunas veces es purgante.

7572. Otro (H. DE AL.).

℥ Ipecacuana,
 Azúcar blanca, ãã. . . ℥j (12 dec.).
 Mézclese y divídase en cuatro papeles.

D. Uno cada cuarto de hora hasta producir el vómito.

7573. P. VOMITIVO COMPUESTO.

℥ Tártaro emético. . . ḡijß (12 cent.).
 Ipecacuana. ℥ij (24 dec.).
 Almidon. ℥ß (2 gr.).
 Divídase en tres papeles.

D. Uno de cuarto en cuarto de hora.

7574. P. DE WENDT.

℥ Subnit. de bismuto. ḡxij (6 dec.).
 Extracto de lechuga

virosa. ḡxxjv (12 dec.).

Ipecacuana en polv. ḡiij (15 cent.).

Eleosácaro de menta piperita. . . . ḡLx (30 dec.).

Mézclese y divídase en seis papeles.

I. Calambres de estómago.

POMADAS.

7575. POMADA CON ACEITE DE BREA (Giraud).

℥ Aceite de pirelaina de brea. ℥ij á ℥jv (8 á 15 gr.).

Manteca. ℥ij (60 gr.).

M. I. Soriasis. *D.* En fricciones.

7576. P. DE ACEITE DE CROTON.

℥ Manteca. 5

Cera: 4

Se funde y cuando esté casi fría la mezcla se añade:

Aceite de croton. 2

I. Es rubefaciente y puede servir para los vejigatorios.

7577. P. DE ACEITE DE HIGADO DE BACALAO (Brefeld).

℥ Aceite de hígado de bacalao. ℥ijß (10 gr.).

Acetato de plomo liq. ḡxc (5 gr.).

Manteca. ℥ijß (10 gr.).

M. I. Ulceras escrofulosas.

7578. Otra (CARRON DE VILLARDS).

℥ Extracto de hollin. 2

Ungüento cetrino. 4

Aceite de hígado de bacalao. . . . 2

Tuétano de vaca fundido. 48

H. S. A. I. Rubicundez crónica de los bordes de los párpados.

7579. P. DE ACEITE VOLÁTIL DE ALMENDRAS AMARGAS.

℞ Esencia de almendras amargas,
Manteca de cacao, ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A. I. Glaucoma, iritis y para combatir los dolores neurálgicos. D. El volúmen de un guisante en fricciones, de hora en hora, en la frente y sienes.

7580. P. DE ACETATO DE MORFINA ó Pomada calmante.

℞ Acetato de morfina. ḡvj (3 dec.).
Manteca. ʒij (8 gr.).
M. I. En fricciones en los puntos doloridos.

7581. P. DE ACETATO DE PLOMO.

℞ Acetato de plomo. ḡxviiij (4 gr.).
Corcho quemado. ʒʒ (15 gr.).
Manteca fresca. ʒij (60 gr.).
Extracto de belladon. ḡjx (50 cent.).
Láudano líquido. ʒʒ (2 gr.).
H. S. A. I. Hemorroides dolorosas, eczema, pitiriasis, pór-rigo, congelacion, erisipela, blefaritis, epinictis, encantis. D. En fricciones.

7582. P. DE ACÍBAR.

℞ Acíbar,
Extracto de ajenjos, ãã. ʒij (8 gr.).
Manteca de cerdo. ʒj (30 gr.).
M. I. Afecciones verminosas, mareo, blenorragia, ovaritis, amenorrea. D. En fricciones al abdómen.

7583. P. DE ACÍBAR.

℞ Acíbar. ʒij (8 gr.).
Manteca. ʒj (32 gr.).
M. I. Se usa en fricciones como vermífuga.

7584. P. CON EL ACIDO ARSENIOSO.

℞ Acido arsenioso. ḡij, ḡv ó ḡvij (10, 25 ó 35 cent.).

Manteca. ʒj (30 gr.).
M. I. Lupus.

7585. P. DE ACIDO FOSFÓRICO.

℞ Acido fosfórico á 45°. 4
Manteca de cerdo. 8
M. I. Se ha alabado esta pomada contra los tumores huesosos de los raquíuticos.

7586. P. DE ACONITINA (Turnbull).

℞ Aconitina. ḡijʒ (12 cent.).
Alcohol. 6 gotas.
Manteca. ʒj (4 gr.).
H. S. A. I. Produce muy buenos efectos en las neuralgias, neuralgia facial, etc. D. En fricciones.

7587. P. DE ACÓNITO.

℞ Extracto de acónito. ʒj (4 gr.).
Manteca de puerco. ʒj (30 gr.).
H. S. A.
Del mismo modo se preparan las pomadas de BELLADONA, CICUTA, DIGITAL, BELEÑO, YERBAMORA Y ESTRAMONIO.
Tambien se podrian preparar cociendo una parte de la planta con dos de manteca, del mismo modo que la de laurel.

7588. P. ALCALINA (Brierre de Boismont).

℞ Carbonato de potasa. ʒijʒ (10 gr.).
Manteca ʒj (30 gr.).
M. I. Comezon de las partes genitales ó al rededor del ano, acompañadas de herpes ó eczema. Se emplea comunmente con lociones hechas con el cocimiento de perifollo.

7589. P. ALCALINA ALCANFORADA (Cazenave).

℞ Subcarbon. de potasa. ḡxviiij (4 gr.).
Manteca. ʒv (20 gr.).
Alcanfor. ḡiij (15 cent.).
H. S. A. I. Es muy útil contra la sicosis.

7590. P. ALCALINA (Bielt).

℥ Subcarbonato de potasa. ℥ij (8 gr.).
 Manteca purificada. . . ℥ij (64 gr.).
M. I. Afecciones papulosas, pór-
 rigo.

7591. P. ALCALINA DE CULLERIER (F. P.).

℥ Subcarbonato de potasa. ℥ij (8 gr.).
 Manteca. ℥j (32 gr.).
 Vino de opio compuesto. ℥j (4 gr.).
M. I. Afecciones papulosas y
 pórigo.

7592. P. ALCALINA COMPUESTA (Bielt).

℥ Subcarbonato de sosa. ℥ij (8 gr.).
 Extracto de opio. ḡx (5 dec.).
 Cal apagada. ℥j (4 gr.).
 Manteca. ℥ij (60 gr.).
M. I. Prúrigo.

7593. P. ALCALINA ó Pomada depilatoria.

℥ Sosa de Alicante. . . . ℥iij (12 gr.)
 Cal apagada. ℥ij (8 gr.).
 Manteca. ℥ij (60 gr.).
 Se reduce la sosa de Alicante á polvo fino, se añade la cal y la manteca, y se mezclan exactamente.
I. Tiña.

7594. P. ALCALINA OPIADA (Gibert).

℥ Carbonato de potasa. 100
 Láudano de Sydenham. 50
 Manteca. 850
M. I. Prúrigo, líquen. *D.* En fricciones mañana y noche.

7595. P. ALCANFORADA.

℥ Alcanfor en polvo,
 Oxido de zinc, ãã. . . ḡiij (15 cent.).
 Manteca fresca. . . . ℥iij (12 gr.).
 Esperma de ballena. ℥ij (64 gr.).

Cera blanca. ℥iij (96 gr.).
 Se funden los cuerpos grasos, y triturando se añade el alcanfor y el óxido de zinc.

I. Ciertas enfermedades de ojos y para impedir que los párpados se peguen durante el sueño. *D.* Se extiende en pedazos estrechos de lienzo fino, que se aplican despues sobre el borde libre de los párpados y se sostienen con una venda.

7596. Otra, n. 2.

℥ Alcanfor. ḡjx (50 cent.).
 Petróleo. ℥jß (6 gr.).
 Ungüento populeon. . ℥vj (24 gr.).

M. I. Ninfomanía, sífilides, le-
 norragia, priapismo, cistitis, di-
 suria, sabañones, heridas, grie-
 tas, quemaduras, crup, efélides,
 erisipela, mammitis. *D.* En fric-
 ciones.

7597. Otra (CAZENAVE).

℥ Calomelanos. ℥ß (2 gr.).
 Alcanfor. ḡLjv (3 gr.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
M. I. Herpes de la cara.

7598. Otra (RASPAIL).

℥ Manteca. 3
 Se funde en el baño maría y se añade:
 Alcanfor en polvo. 4
 Se menea hasta que esté bien disuelto el alcanfor.
I. Escoriaciones, úlceras, do-
 lores.

7599. P. DE ALIBERT).

℥ Sosa de Alicante bien pulverizada,
 Sulfato de potasa en
 polvo, ãã. ℥iij (12 gr.).
 Manteca. ℥iij (96 gr.).
 Mézclese exactamente.
I. Tiña, fabus, lepra. *D.* Se fro-
 ta todos los dias la cabeza de los
 liñosos con esta pomada, des-
 pues de haber hecho caer las

costras ó las escamas por medio de cataplasmas emolientes.

Se cortan los cabellos bastante cerca de la cabeza para hacer mejor las fricciones, y se cubre despues el cuero cabelludo con un papel de estraza.

7600. P. ALOÉTICA (Rognetta).

- ℥ Acíbar. ℥ij (60 gr.).
- Petróleo,
- Hiel de buey, ãã. . . ℥iij (90 gr.).
- Grasa purificada. . . ℔ij (1000 gr.).

Se mezcla todo á fuego lento y se añade poco á poco la grasa.

I. Diarrea inflamatoria de los niños y como vermífugo. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.) en fricciones al vientre.

7601. P. AMARILLA DE FRAY COSME.

- ℥ Cera amarilla. ℥j (32 gr.).
 - Aceite rosado. ℥j℔ (48 gr.).
 - Alcanfor. ℥xv (75 cent.).
 - Extracto de Saturno. ℥v (160 gr.).
- Mézclese S. A.

Se extiende en un lienzo y se aplica á la úlcera cancerosa despues de haber usado la pasta cáustica de Fray Cosme, v. número 4757, y cuando se haya caido el pedazo de yesca que se aplica inmediatamente.

7602. Otra (F. DE CERDEÑA).

- ℥ Carbonato de amon. ℥Ljv (3 gr.).
- Cominos,
- Manzanilla, ãã. ℥ij℔ (10 gr.).
- Alcanfor disuelto en aceite de trementina. ℥℔ (2 gr.).
- Rob de saúco. ℥jv (125 gr.).
- Jabon negro. ℥j (30 gr.).

M. I. Inflamaciones, lumbago, ceática, reumatismo crónico, absceso, soriasis, hidroraquis, cáncer, cefalalgia, meningitis, neuritis. *D.* En fricciones.

7603. P. DE SAN ANDRÉS ó de la viuda de Farnier.

- ℥ Acetato de plomo. . . ℥℔ (16 gr.).
- Clorato de amoniaco. ℥℔ (2 gr.).
- Tucia preparada. ℥xviiij (1 gr.).

Se reduce á polvo fino y se añade:

Manteca fresca lavada con agua de rosas. ℥iij (96 gr.).

Se reduce á polvo fino y se añade:

Oxido rojo de merc. ℥℔ (16 gr.).

I. Oftalmias, oftalmitis, blefaritis. *D.* ℥xviiij á ℥j (1 á 4 gr.) en fricciones en el borde libre de los párpados.

7604. P. ANODINA (Bourge).

- ℥ Cerato de Galeno. ℥x (40 gr.).
- Extracto de belladon. ℥ij℔ (10 gr.).
- Acetato de morfina. ℥jv (2 dec.).

M. I. Reumatismos articulares ó musculares. *D.* Se usa en fricciones.

7605. P. ANTICANCEROSA (Plunkett).

- ℥ Acido arsenioso. ℥j (4 gr.).
- Flores de azufre,
- Ranúnculo acre,
- Asa fétida, ãã. ℥j (32 gr.).

Se forma una pasta con una clara de huevo.

Esta pomada debe usarse con mucha prudencia. (*C. pr. de inv.*).

7606. P. ANTIEPSÓRICA.

- ℥ Nitrato de potasa. 25
- Sulfato de alúmina y potasa. 30
- Azufre sublimado. 30
- Protóxido de plomo. 30
- Clavo de especia. 45
- Aceite comun. 60
- Manteca de cerdo. 60

Se funde la manteca con el aceite y se incorporan las demás materias en polvo muy fino.

I. Sarna inveterada. D. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.) para cada fricción.

7607. P. ANTIEPSÓRICA.

\mathfrak{z} Jabon negro. $\mathfrak{I}\mathfrak{b}\mathfrak{B}$ (250 gr.).
Flores de azufre. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (125 gr.).
Esencia de trementín. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).
M. D. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.) al día, en fricciones.

7608. Otra, n. 2.

\mathfrak{z} Manteca. 200
Jabon negro. 300
Carbonato de potasa. 50
Flores de azufre. 100
Esencia de trementina. 50
M. I. Sarna. D. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.) al día en fricciones.

7609. Otra, n. 3.

\mathfrak{z} Jabon blanco. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (96 gr.).
Aceite de alm. dulces. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$ (160 gr.).
Azufre sublimado. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$ (20 gr.).
Carbonato de potasa. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}\mathfrak{B}$ (10 gr.).
Esencia de limón. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (32 gr.).
M. I. Sarna. D. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).

Es buena fórmula, principalmente en la medicina de los pobres.

7610. Otra, n. 4.

\mathfrak{z} Flor de azufre. 4
Pulpa de raíz de paciencia. 8
Manteca. 16
Zumo de limón. 8
Mézclese.

7611. Otra (VAN DER ANWIERMULIN).

\mathfrak{z} Ungüento cetrino. 485
Aceite comun. 93
Acetato de plomo crist. en polv. 18
Sulfato de zinc en polvo. 42

Se funde el ungüento cetrino y el aceite comun á fuego lento, y se les añade las sales reducidas separadamente á polvo impalpable.

7612. Otra (DENIS).

\mathfrak{z} Subcarbon. de potasa. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).
Azufre sublimado. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (60 gr.).
Jabon negro. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (125 gr.).
Divídase en ocho dosis.
D. Una al día, en una ó dos fricciones, y un baño diario.

7613. Otra (H. M. F.).

\mathfrak{z} Azufre sublimado. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$ (150 gr.).
Sal comun decrepitada. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).
Manteca. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}$ (300 gr.).
H. S. A. D. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (8 gr.) para cada fricción.

7614. Otra (ALIBERT).

\mathfrak{z} Manteca. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (125 gr.).
Flores de azufre. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (60 gr.).
Subcarb. de potasa. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).
Se trituran la potasa y la sosa, se añade despues la grasa y se mezclan exactamente.
D. De $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ á $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (15 á 30 gr.) al día en fricciones.

7615. Otra (F. F.).

Flores de azufre. $\mathfrak{I}\mathfrak{b}\mathfrak{B}$ (250 gr.).
Hidroclorato de amoniaco,
Alumbre, ãã. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (16 gr.).
Manteca. $\mathfrak{I}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ (500 gr.).
Mézclese exactamente.

I. Sarna. D. Se emplea c. s. de esta pomada para fricciones. El tratamiento dura de doce á quince días.

7616. Otra (H. M.).

\mathfrak{z} Flores de azufre. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (125 gr.).
Sal amoniaco. $\mathfrak{D}\mathfrak{j}$ (12 dec.).
Manteca de cerdo. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (375 gr.).
Mézclese S. A.

7617. Otra (GIRAUD).

\mathfrak{z} Manteca. $\mathfrak{I}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ (500 gr.).
Aceite ó pirlaina de
brea. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (125 gr.).

M. Esta pomada no mancha la ropa.

7618. P. ANTIEPSÓRICA (JASSER).

℥ Azufre,
Sulfato de zinc, añ. ℥xviii (4 gr.).
Manteca. ℥j (4 gr.).
Algunos formularios añaden aceite de laurel.

7619. Otra (POUZIN).

℥ Manteca. ℥xxx (900 gr.).
Albaya. ℥xv (450 gr.).
Sublimad. corrosivo. ℥j (30 gr.).
Mézclase exactamente.

D. Una dracma (4 gr.) con la que se dan fricciones en las partes afectadas, particularmente en las articulaciones, despues de usar medicamentos internos apropiados.

7620. Otra (PRINGLE).

℥ Azufre sublimado y porfirizado. ℥j (30 gr.).
Eléb. blanco en polvo. ℥ij (8 gr.).
Clorhidrato de amoníaco en polvo. ℥ij (8 gr.).
Manteca. ℥ijβ (75 gr.).

H. S. A. y dividase en cuatro dosis.

D. Una en fricciones por la noche.

Nota. Comunmente bastan las cuatro dosis para obtener la curacion.

7621. Otra (PRINGLE).

℥ Eléboro. ℥ij (60 gr.).
Azufre. ℥j (30 gr.).
Manteca. ℥jv (125 gr.).

M. I. Herpes, tiña, sarna, eczema, lepra. D. En fricciones.

Se parece mucho á la pomada antiepsórica inglesa.

7622. Otra (THOMANN).

℥ Manteca de vacas fresca,
Manteca de cerdo, añ. ℥ij (90 gr.).

Polvo de carbon. ℥ij (8 gr.).
Se trituran hasta que sea íntima la mezcla.

D. Despues que el enfermo haya tomado un baño tibio, se le frota con ℥ij (8 gr.) de esta pomada, y se le lava al dia siguiente por la mañana con una solucion acuosa de jabon tibio. Al otro dia se da nueva friccion, y al cabo de cinco ó seis dias se cura la sarna.

7623. Otra (ZELLER).

℥ Muriato amoníaco merc. ℥j (4 gr.).
Mant. de cerdo. ℥j á ℥ij (32 á 64 gr.).
M. D. Se usa en fricciones.

7624. P. ANTIESCABIOSA (H. DE M.).

℥ Aceite comun,
Sebo, añ. ℔bjv (2000 gr.).
Azufre pulverizado. ℔bij (1000 gr.).
Sal comun decrepit. ℔bj (500 gr.).
Hágase pomada S. A.
I. Sarna.

7625. P. ANTIESCROFULOSA.

℥ Ioduro de hierro. ℥ij (8 gr.).
Manteca. ℥j (30 gr.).

M. I. Tumores blancos, infartos linfáticos; pero despues del período inflamatorio.

7626. P. ANTIESCROFULOSA (Rust).

℥ Precipitado rojo. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.).
Cerato de Saturno. ℥j (30 gr.).
M. I. Ulceras escrofulosas.

7627. P. ANTIESPASMÓDICA.

℥ Láudano de Sidenham. ℥j (4 gr.).
Alcanfor,
Ungüento de altea, añ. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. I. Afecciones nerviosas del bajo vientre. D. En fricciones.

7628. P. ANTIESPASMÓDICA
(*Golfin*).

℥ Aceite de almendras
dulces. ℥jv (125 gr.).
Cera virgen. ℥j (30 gr.).
Opio en bruto. ℥ij (60 gr.).

Se funde la cera en el aceite á un calor moderado, se añade el opio, se deja infundir durante media hora y se cuele con expresion.

Se hierve el residuo en ℥jv (125 gr.) de agua hasta que se reduzca á la mitad, se cuele y se agita el cerato opiado con este cocimiento.

I. Retencion de orina, supresion del flujo menstruo por causa espasmódica, dolores reumáticos crónicos y cardialgia. *D.* Se dan fricciones sobre las partes enfermas ó las que simpatizan con ellas.

7629. P. ANTIHELMÍNTICA.

℥ Acibar. 40
Aceite de petroleo. 45
Bilis de buey. 45
Grasa purificada. 166

M. D. ℥ij á ℥v (8 á 20 gr.) en fricciones en las paredes del vientre.

7630. P. ANTIHEMORROIDAL.

℥ Pomada de pepinos. . . ℥jv (46 gr.).
Cal apagada con agua,
Láudano líquido, añ. . ℥℥ (2 gr.).
Mézclese S. A.

I. Es muy eficaz para resolver los tumores hemorroidales y templar los dolores que ocasionan.

7631. Otra (CULLEN).

℥ Polvo de nuez de agalla. ℥j (4 gr.).
Manteca. ℥j (32 gr.).
Mézclese.

7632. Otra (WARE).

℥ Nuez de agalla en polvo. ℥ij (8 gr.).

Alcanfor en polvo. . . . ℥j (4 gr.).
Mézclese é incorpórese con
Cera liquidada. ℥j (32 gr.).
Añádase:

Tintura de opio. ℥ij (8 gr.).
M. I. Hemorroides, principalmente despues de las aplicaciones de sanguijuelas. *D.* ℥j (4 gr.) mañana y noche en fricciones ligeras.

7633. Otra (VALLEZ).

℥ Extr. de hojas de saúco. ℥j (4 gr.).
Ungüento populeon. . . ℥℥ (15 gr.).
Alumbre calcinado. . . ℥℥ (2 gr.).

D. Se da el volúmen de una ave-llana de esta pomada, en unturas, en las hemorroides fluentes.

7634. P. ANTIHERPÉTICA.

℥ Manteca. ℥j (30 gr.).
Azufre sublimado. . . . ℥ij (8 gr.).
Litargirio en polvo,
Precip. rojo en polvo, añ. ℥j (4 gr.).

M. I. Produce excelentes efectos en el tratamiento de diversas especies de herpes.

7635. Otra, n. 2.

℥ Cinabrio. ℥j℥ (6 gr.).
Sal amoníaco. ℥℥ (2 gr.).
Manteca. ℥ij (60 gr.).
Agua de rosas. ℥j (4 gr.).

H. S. A. I. Pitiriasis, para moderar el prurito y disminuir la produccion de insectos.

7636. Otra (ALIBERT).

℥ Cinabrio en polvo. . . . ℥℥lv (3 gr.).
Alcanfor. ℥xviiij (4 gr.).
Cerato. ℥vj (24 gr.).
H. S. A.

7637. Otra (BIETT).

℥ Cal apagada. ℥xc (5 gr.).
Carbonato de sosa. . . ℥j℥ (10 gr.).
Extr. acuoso de opio. . ℥℥ (6 dec.).
Manteca. ℥ij (60 gr.).

Mézclese por trituracion.

I. Herpes, tiña, eczema, fabus, pórriigo, prúrigo, sabañones, ozena. *D.* Dos unturas al dia.

7638. P. ANTIHERPÉTICA (*Bielt*).

℥ Protosulfato de merc. ℥j (4 gr.).
Azufre sublimado. . . ℥ij (8 gr.).
Manteca de cerdo. . . ℥ij (60 gr.).
Esencia de limon. . . ℥xv (75 cent.).
H. S. A. I. Herpes liquenoides.
D. En fricciones ligeras.

7639. P. ANTIHERPÉTICA ó de manteca de cacao (*CORBEL Y LAGNEAU*).

℥ Precipitado blanco. . . ℥xviii (4 gr.).
Manteca de cacao. . . ℥j (30 gr.).
Bálsamo del Perú. . . ℥j (4 gr.).
H. S. A. I. Herpes superficiales, manchas cutáneas, erupciones de la cara despues del sobreparto, conocidas comunmente con el nombre de leche esparcida por el cuerpo.

7640. P. ANTIHERPÉTICA (*Chevallier*).

℥ Cloruro de cal. ℥iij (12 gr.).
Turbit mineral. ℥ij (8 gr.).
Aceite de almendras dulces. ℥vj (24 gr.).
Manteca. ℥x (40 gr.).
H. S. A. I. Lepra, herpes, impétigo, tiña, escrófulas, sífilis, sífilides, tiriasis, eczema, encantís, bocio. *D. C. s.* para dos fricciones ligeras al dia, mañana y noche, en las partes enfermas.

7641. Otra (*CORBEL Y LAGNEAU*).

℥ Aceite de almendras dulces. ℥jβ (45 gr.).
Esperma de ballena. ℥j (30 gr.).
Cera blanca. ℥xviii (1 gr.).
Agua dest. de rosas. ℥xc (5 gr.).
Precipitado blanco. . . ℥xxxvj (2 gr.).
H. S. A. I. Herpes superficiales,

manchas cutáneas, erupciones de la cara despues del parto, llamadas paños, y atribuidas á la leche derramada.

7642. Otra (*CULLERIER*).

℥ Turbit mineral. ℥j (4 gr.).
Láudano líquido. ℥j (4 gr.).
Azufre sublimado. ℥β (2 gr.).
Manteca. ℥j (32 gr.).
M. I. Afecciones herpéticas. *D.* Se dan fricciones en las partes enfermas, y se repiten con mas ó menos frecuencia. Se asocia el uso de los baños de agua simple.

7643. Otra (*DUBOIS*).

℥ Pomada de pepino. ℥β (16 gr.).
Nitrato de mercurio. . . ℥ij (8 gr.).
I. Herpes poco considerables. *D.* Se usa en fricciones sobre las partes afectadas.

7644. Otra (*FAURE*).

℥ Subnitrato de mercurio desecado. ℥jv (2 dec.).
Manteca pura. ℥j (30 gr.).
H. S. A. I. Es muy eficaz en el eczema crónico y grietas del ano.

7645. Otra (*FOUQUIER*).

℥ Calomelanos. ℥j (4 gr.).
Azufre sublimado. ℥ij (8 gr.).
Manteca. ℥j (30 gr.).
M. I. Herpes liquenoides.

7646. Otra (*GIBERT*).

℥ Cloruro amoniaco de mercurio, Alcanfor, ãã. ℥viii (4 dec.).
Manteca. ℥jv (16 gr.).
M. I. Oftalmias herpéticas.

7647. Otra (*H. DE M. Y H. M.*).

℥ Ungüento rosado. ℥j (30 gr.).
Precipitado blanco. . . . ℥j (4 gr.).

H. S. A. D. Dos unturas al día.
Véase *Pomada contra los herpes de la F. E.*

**7648. P. ANTIHERPÉTICA
QUERMETIZADA.**

℞ Quermes mineral. ʒj (4 gr.).
Flores de azufre. ʒʒ (15 gr.).
Manteca de cerdo. ʒj (30 gr.).
H. S. A. I. Herpes. D. En fricciones. Cuando irrita demasiado se modera su acción con ʒj (4 gr.) de láudano líquido.

**7649. P. ANTIHERPÉTICA
(Lassaigne).**

℞ Borato de azufre. 4
Manteca de cerdo. 8
M. I. Herpes furfuráceos.

7650. Otra (RICORD).

℞ Cerato azufrado. ʒj (30 gr.).
Turbit mineral. ʒxviii (4 gr.).
Brea. ʒj (4 gr.).
M. I. Erupciones secas de la piel.

7651. P. ANTIMONIADA.

℞ Antimonio porfirizado. ʒʒ (15 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).
M. I. Reumatismo, ceática, pulmonía, pleuresía, hepatitis, laringitis, encefalitis, epilepsia, peritonitis crónica, tétanos, soriasis, tisis, hemicránea, neuritis, flebitis. D. En fricciones y obra como la de Autenrieth.

7652. P. ANTINEURÁLGICA.

℞ Opio. ʒj (4 gr.).
Carbonato de hierro. ʒijʒ (10 gr.).
Manteca. ʒʒ (16 gr.).
Bálsamo tranquilo. c. s.
M. I. Neuralgia, neuralgia facial, lepra. D. En fricciones en los puntos doloridos.

7653. Otra (DEBREYNE).

℞ Extracto de belladona. ʒiij (12 gr.).

Opio. ʒʒ (2 gr.).
Manteca. ʒiij (12 gr.).

Se aromatiza con la esencia que se quiera. D. El grosor de una judía en fricciones en la parte afectada, tres veces al día.

7654. Otra (FLORENT).

℞ Aceite de almendras amargas,
Manteca de cacao, añ. ʒj (4 gr.).
M. I. Neuralgias sintomáticas que se observan en algunas afecciones oculares, principalmente en la iritis. D. El volumen de un guisante en fricciones en la frente y sienas.

7655. P. ANTIOFTÁLMICA.

℞ Oxido rojo de merc. ʒv (25 cent.).
Sulfato de zinc. ʒx (50 cent.).
Manteca. ʒj (30 gr.).
Se mezcla en un mortero de porcelana ó mejor sobre un pórvido.

I. Oftalmias crónicas. D. Se aplica como el volumen de un guisante sobre el borde libre de los párpados.

**7656. Otra (CARRON DE
VILLARDS).**

℞ Manteca de hígado de
raya. ʒj (30 gr.).
Cianuro de hierro. ʒj (12 dec.).
Cianuro de mercurio. ʒviii (4 dec.).
Esencia de espliego. 4 gotas.
Mézclese sobre un pórvido.
I. Conjuntivitis escrofulosa crónica. D. En fricciones á dosis muy pequeñas.

**7657. P. ANTIOFTÁLMICA ó Po-
mada oftálmica (Carron de Vi-
llards.)**

℞ Ungüento. mercurial
doble. ʒj (30 gr.).
Estricnina. ʒviii (4 dec.).
Aceite esencial de al-
mendras amargas. 8 gotas.

M. I. Oftalmias graves; tiene la ventaja de combatir la inflamacion y mantener la pupila bastante dilatada para no temer la atresia.

7658. P. ANTIOFTÁLMICA
(Desmarres).

℥ Manteca muy fresca y lavada con agua caliente. . . . ḡLjv (3 gr.).
Precipitado rojo. ḡij á ḡjv (10 á 20 cent.).

Alcanfor. ḡiij (15 cent.).
H. S. A. I. Queratitis vasculares crónicas en los escrofulosos, y manchas aun no organizadas de la córnea. *D.* El volúmen de un grano de trigo al borde libre de los párpados al acostarse.

7659. P. ANTIOFTÁLMICA DE
DESSAULT (F. F.).

℥ Oxido rojo de mercurio,
Tucia preparada,
Acetato de plomo,
Alumbre calcinado, ãã. 3j (4 gr.).
Sublimado corrosivo. . . ḡxij (6 dec.).
Pomada rosada. . . . 3j (32 gr.).
Se mezcla todo porfirizándolo por mucho tiempo.

I. Se usa contra las afecciones herpéticas y las inflamaciones crónicas de los párpados. Al usarla el dolor aumenta primero, pero se avivan las superficies que hasta entonces tenian un color rojo livido y progresa rápidamente la curacion. *D. C. s.* para dar ligeras fricciones en los bordes de los párpados.

7660. P. ANTIOFTÁLMICA
(Dupuytren).

℥ Manteca de puerco. . . 3j (30 gr.).
Oxido rojo de merc. ḡx (5 dec.).
Sulfato de zinc. . . . ḡxx (10 dec.).

M. I. Oftalmias crónicas y rebeldes sostenidas por vicio escrofuloso. *D.* Se usa untando ligeramente con ella el borde de los párpados.

7661. Otra (GRAN JEAN).

℥ Precipitado rojo. . . . 3j (4 gr.).
Cerato sin agua. . . . 3B (16 gr.).

M. I. Oftalmias crónicas. Se usa como la anterior.

7662. Otra (GUEPIN).

℥ Oxido rojo de mercurio. 6
Sulfato de zinc. 4
Manteca. 60

H. S. A. I. Conjuntivitis agudas, en que dice Guepin que es muy eficaz. *D.* Se introduce como el volúmen de un grano de avena de esta pomada entre los párpados; el dolor se aumenta y se vuelve muy vivo durante una hora, pero despues se calma; á las seis horas el enfermo está mejor, y á la segunda aplicacion está curado.

7663. Otra (H. DE AL.).

℥ Oxido rojo de hierro. . . 5B (2 gr.).
Manteca purificada. . . 3jv (16 gr.).

M. I. Oftalmia crónica. *D.* El grosor de un guisante, con el que se cubre el borde de los párpados.

7664. P. ANTIOFTÁLMICA ó Poma-
da de óxido rojo de mercurio.

℥ Oxido rojo de mercurio porfirizado,
Alcanfor,
Subacetato de plomo
cristalizado, ãã. . . ḡxviiij (1 gr.).

Manteca fresca y purificada. 3jvB (18 gr.).
Mézclese por trituracion en un mortero de vidrio.

I. Oftalmias crónicas. *D.* Se pone en el ángulo del ojo el volúmen de la cabeza de un alfiler.

7665. P. ANTIOFTÁLMICA ó Poma-
da psoftálmica (SICHEL).

℥ Cerato de torbisco,
Pomada de torb., ãã. ḡvj (30 cent.).

Estricnina. ḡ^{ij} (1 cent.).

M. I. Sirve para curar los veji-
gatorios, que se aplican en la fren-
te en el tratamiento de la amauro-
sis. *D.* Puede aumentarse progre-
sivamente la dosis de la estri-
cnicina hasta ḡ^{ij} (5 cent.).

7666. P. ANTIOFTÁLMICA ó Pomada oftálmica (St. Ives).

ʒ Manteca de vacas fres-

ca sin sal. ʒ^{ij} (96 gr.).

Cera blanca. ʒ^{ss} (16 gr.).

Deutóxido de mercurio. ʒ^{ijss} (10 gr.).

Oxido de zinc. ʒ^{j} (4 gr.).

Alcanfor disuelto en a-
ceite de huevos. . . ḡ^{Ljv} (3 gr.).

Despues de haber hecho fundir
la cera y la manteca, se mezclan
todas las sustancias en un mortero
de mármol

I. Se usa contra las oftalmias
crónicas escrofulosas. *D.* Se pone
un poco de pomada sobre el borde
de los párpados al tiempo de ac-
costarse. Por la mañana se dan li-
geras friciones con esta pomada
sobre las partes enfermas.

**7667. P. ANTIOFTÁLMICA
(Velpeau).**

ʒ Nitrato de plata fundid. ḡ^{ij} (1 dec.).

Manteca. ʒ^{ij} (8 gr.).

Se trituran en un mortero de
porcelana.

I. Se aplica el tamaño de la ca-
beza de un alfiler sobre la super-
ficie interna de los párpados en-
fermos.

**7668. P. ANTIPERIÓDICA
(Dr. C. Spinelli).**

ʒ Sulfato de quinina. . . ʒ^{ss} (2 gr.).

Subcarbonato de per-
óxido de hierro. . . ḡ^{xij} (60 cent.).

Opio puro. ḡ^{ij} (15 cent.).

Manteca reciente. . . ʒ^{xx} (80 gr.).

H. S. A.

Se recomienda esta pomada

quando los paroxismos periódicos
ó la intermitencia no es bastante
marcada para que sea posible to-
mar las preparaciones de quina
á dosis determinadas ó fijas.

Se usa en los niños muy tiernos
que no pueden usar el sulfato de
quinina mas que por el método
iatraléptico; en los casos de in-
termitentes con paroxismos pró-
ximos, que no permiten el uso
de la quina ó sus álcalis; en la ca-
lentura intermitente acompañada
de vómito y disfagia; en las in-
termitentes perniciosas y en las
calenturas remitentes de mal ca-
rácter, para prevenir la recidiva
de las intermitentes cuando se
las quiera cortar.

Se da una untura cada dos ho-
ras durante tres dias en la region
vertebral, despues de haber la-
vado esta parte con agua de ja-
bon.

**7669. P. ANTIPRURIGINOSA
(Gibert).**

ʒ Alumbre. ʒ^{xx} (1 gr.).

Alcanfor. ʒ^{xxv} (75 cent.).

Manteca. ʒ^{j} (30 gr.).

Mezclense.

7670. P. ANTISIFILÍTICA.

ʒ Ungüento de mercurio duplicado,
Cerato opiado, añ. . . ʒ^{j} (30 gr.).

D. Se usa para curar las úlceras
sifilíticas estacionarias.

7671. Otra (GIBERT).

ʒ Cerato opiado. . . . ʒ^{j} (30 gr.).

Precipitado rojo. . . ḡ^{xv} (75 cent.).

M. D. Se usa para curar las úlce-
ras sifilíticas estacionarias, quan-
do no se teme reanimar la infla-
macion.

7672. Otra (RUST).

ʒ Calomelanos. ʒ^{j} (4 gr.).

Opio. 5ß (2 gr.)

Manteca. ʒß (15 gr.)

M. I. Ulceras sífilíticas secundarias de la piel.

7673. P. DE ANTRACOCALI (Gibert).

ʒ Antracocali. 4

Manteca de cerdo. 30

M. I. Eczema, impétigo, lupus.

D. En fricciones ligeras mañana y noche.

7674. P. AROMÁTICA (Cazenave).

ʒ Tuétano de vaca. ʒj (30 gr.)

Tintura aromática. ʒxc (5 gr.)

M. I. Pórrigo decalvans, favus.

D. Se usa en untura mañana y noche, pero antes de aplicar la pomada se lavan las partes enfermas con un poco de agua salada.

7675. P. DE ARSENIATO DE SOSA.

ʒ Arseniato de sosa. ʒj (4 gr.)

Manteca. ʒij (60 gr.)

M. I. Afecciones cancerosas.

7676. P. ARSENICAL.

ʒ Arsénico blanco porfirizado. 4

Manteca. 8

Mézclese.

7677. Otra (BOUDIN).

ʒ Arseniato de amoniac. ʒ¹/₅ (1 cent.)

Manteca. ʒj (4 gr.)

Mézclese con cuidado.

I. Se usa en ciertos herpes para calmar las comezones.

Boudin llama á su fórmula mineral en lugar de arsenical.

7678. P. ARSENICAL CONTRA LOS PIOJOS.

ʒ Manteca. 42

Polvo de Rousselot. 5

M. Ha producido muy buenos efectos contra los piojos (*ricinus*

gallinæ) de las gallinas y perdicces comunicados al hombre.

7679. P. DE ASA FÉTIDA (Rieken).

ʒ Asa fétida en polvo. ʒj (4 gr.)

Manteca. ʒj (32 gr.)

M. I. Coqueluche. *D.* Se dan fricciones dos veces al dia en el vientre y pecho, en la columna vertebral y en las plantas de los piés.

7680. P. ASTRINGENTE.

ʒ Polvo de nuez de agallas. 4

Polvo de nuez de ciprés. 4

Bayas de arrayan. 4

Cáscara de granada. 4

Hojas de zumaque. 4

Almáciga. 4

Pomada rosada. 18

Se liquida la pomada de rosas, se la echa en un mortero y con ella se incorporan los polvos en caliente. Es un astringente bastante enérgico.

7681. Otra, n. 2.

ʒ Oxido de zinc. ʒj (4 gr.)

Cerato simple,

ó Manteca. ʒj (32 gr.)

Mézclese sobre un pórfido.

I. Grietas del pecho y afecciones herpéticas ligeras.

7682. Otra (RUST).

ʒ Alumbre. ʒjß (6 gr.)

Alcanfor,

Opio, añ. ʒß (2 gr.)

Bálsamo del Perú. ʒj (4 gr.)

Cerato de Saturno. ʒß (15 gr.)

M. I. Manchas de la piel, hemorroides, encantís, nefritis. *D.* En fricciones cada dos horas en las partes entorpecidas por el frío.

7683. P. ASTRINGENTE DE AGRÁZ.

ʒ Agraz ó zumo de uva sin madurar depurado. ʒß (250 gr.)

Ungüento rosado. ℞j (300 gr.).

Cera amarilla. ℥jv (125 gr.).

Se cuecen en una vasija de barro hasta que se consuma el líquido acuoso; se separan las heces de la pomada fría; se liquida de nuevo y se la aromatiza con esencia de rosa.

I. Grietas de los pechos y de los labios; se puede usar también contra las hemorroides.

7684. P. ASTRINGENTE Y SEDANTE
(Dupuytren).

℥ Extracto de Saturno,

Extr. de belladona, añ. ℥j (4 gr.).

Alcanfor. ℥ij (8 gr.).

Manteca. ℥jβ (48 gr.).

M. I. Grietas del ano, fistulas, herpes, quemaduras, congelación, encantis, eczema, metritis, blenorragia, disuria, hemorroides. *D.* En aplicaciones.

7685. P. ASTRINGENTE OPIADA.

℥ Alumbre en polvo. ḡxc (5 gr.).

Cerato opiado. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. I. Hemorroides dolorosas y fluentes, metritis, congelación, encantis, tiriasis, manchas de la córnea. *D.* Se frota la parte enferma mañana y noche.

7686. P. DE ATROPINA.

℥ Atropina. ḡv (25 cent.).

Manteca. ḡc (5 gr.).

Mézclese con cuidado.

I. Adherencia del iris con el cristalino. *D.* Se introduce mañana y noche el volumen de la cabeza de un alfiler entre los párpados.

7687. P. AURÍFERA (Niel).

℥ Oro dividido. ḡxij (6 dec.).

Cerato de Galeno. ℥j (30 gr.).

Mézclese exactamente.

I. Ulceras venéreas. *D.* Se puede usar por el método iatraléptico,

7688. P. AZUFRADA (F. F.).

℥ Azufre sublimado y

lavado. ℥jv (125 gr.).

Manteca de cerdo. ℥xij (375 gr.).

M. I. Sarna y afecciones crónicas de la piel, principalmente las formas escamosas como la soriasis y la lepra vulgar. *D.* ℥β á ℥j (15 á 30 gr.).

7689. P. DE AZUFRE Y CARBON
(Bielt) (F. P.).

℥ Carbon en polvo. 4

Azufre sublimado. 2

Manteca. 5

M. I. Pórrigo.

7690. P. DE BANYER.

℥ Alumbre calcinado,

Calomelanos en p., añ. ℥iij (12 gr.).

Litargiro porfirizado. ℥jv (16 gr.).

Mézclense exactamente é incorporese con

Manteca. ℞β (250 gr.).

Trement. de Venecia. ℥ij (64 gr.).

I. Tiña anular, tiña favosa. *D.* ℥ijβ (10 gr.) al día.

7691. P. DE BAREGES.

℥ Hidrosulfato de sosa,

Carbonato de sosa, añ. ℥ij (8 gr.).

Se disuelven en un poco de agua y se mezclan con

Manteca balsámica. ℥ijβ (75 gr.).

I. Herpes ligeros.

7692. P. DE BELEÑO (Weber).

℥ Extracto de beleño ḡxxjv (12 dec.).

Manteca fresca. ℥ij (8 gr.).

M. I. Fotofobia que acompaña á las oftalmias escrofulosas. *D.* Tres ó cuatro fricciones al día en la parte exterior del párpado superior y sobre el punto correspondiente al agujero supraorbitario.

7693. P. DE BELEÑO.

- ℥ Hojas de beleño,
- Hojas de estramonio,
- Hojas de dulcamara,
- Hojas de saúco, ãã. ℥jv (120 gr.).
- Manteca. ℥x (300 gr.).

Se cuece, se cuele y se añade:

- Aceite de semillas de beleño. ℥ij (60 gr.).

I. Sabañones, grietas, reumatismo, nefritis. *D.* En fricciones en las partes enfermas.

7694. P. DE BELLADONA.

- ℥ Extracto de belladona. ℥j (4 gr.).
- Manteca balsámica. ℥j (32 gr.).

M. I. Se usa para dilatar el cuello de la matriz en los casos de contraccion espasmódica de este órgano, hernias, constriccion de los esfínteres. Puede aumentarse la dosis del extracto hasta igualar la cantidad de manteca.

La POMADA DE BELLADONA DE LOS H. DE M. se compone de una parte de extracto de belladona y cuatro de manteca de puerco.

La POMADA ANTIESPASMÓDICA DE LOS H. M. se compone de ℥j (12 dec.) de extracto de belladona, y ℥B (45 gr.) de manteca fresca.

7695. Otra (CHAUSSIER).

- ℥ Extracto de belladona. ℥ij (8 gr.).
- Agua destilada,
- Cerato, ãã. ℥ij (64 gr.).

Se disuelve el extracto y se incorpora el cerato por trituracion.

I. Se usa con buen éxito para obtener la relajacion del cuello de la matriz en ciertos casos de partos dificiles, en el fimosis y para-fimosis y en las rigideces y constricciones espasmódicas. *D.* Se aplica á la dosis de ℥ij (8 gr.) en el útero, dirigiéndola por medio de una geringuilla.

7696. P. DE BELLADONA.

- ℥ Belladona fresca. 1
- Manteca. 2

Se prepara del mismo modo

que el aceite de belladona, solo que se exprime en caliente y se separan las heces despues que se haya enfriado la pomada.

Del mismo modo se preparan las pomadas de BELEÑO, YERBAMORA, TABACO y ESTRAMONIO.

I. Contracciones espasmódicas de la matriz en el acto del parto, tumores blancos.

7697. P. DE BELLADONA ó Pomada contra la fotofobia (Cunier).

- ℥ Extracto de belladona. 1
 - Aceite de higado de bacalao. 2
- H. S. A. I. Fotofobia.

7698. P. DE BELLADONA ALCANFORADA (Jadioux).

- ℥ Extr. de zumo depurado de belladona, Alcanfor, ãã. ℥ij (8 gr.).
- Manteca. ℥j (30 gr.).

M. I. Peritonitis. *D.* ℥ij (8 gr.) tres ó cuatro veces al dia.

7699. P. DE BELLADONA Y SATURNO ó Manteca de belladona y Saturno (Dupuytren).

- ℥ Manteca. 6
- Extracto de belladona. 1
- Subacetato de plomo líquido. 1

M. Es un tópico sedante y astringente que se usa en los casos de grietas del ano, cuando los enfermos no se quieren someter á la operacion.

7700. P. DE BERTON.

- ℥ Tuétano de vaca,
- Aceite de ricino, ãã. ℥j (30 gr.).

Se funde al calor del baño maria, se cuele y se añade S. A.:

- Brea. ℥ij (8 gr.).

I. Alopecia. *D.* Una aplicacion mañana y noche.

7701. P. DE BIGKER.

- ℥ Verde gris,
- Calomelanos, ãã. ℥j (12 dec.).

Pomada rosada. ℥j℥ (45 gr.).
 I. Tiña anular, tiña fabosa. *D.* En fricciones ligeras.
 Una aplicacion mañana y noche.
 Se hace tomar al mismo tiempo, dos veces al dia, ḡj (5 cent.) de una mezcla de partes iguales de calomelanos, azufre dorado de antimonio y azúcar.

7702. P. DE BISMUTO.

℥ Magisterio de bismut. ℥ij℥ (10 gr.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
 I. Líquen, eczema, herpes, fabus, lepra. *D.* En fricciones.

7703. P. DE BORAX (*Sichel*).

℥ Manteca. ℥j (4 gr.).
 Borax. ḡij (15 cent.).
 Láud. de Sydenham. 8 á 10 gotas.
 I. Blefaritis glandular.

7704. P. DE BORAX ó Pomada antiherpética de Lassaigne.

℥ Borax en polvo. ℥j (4 gr.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
 Mézclese sobre un pórfido.
 I. Prúrigo, esclerotitis, didimalgia, hernia, sífilides, efélides, lumbago, zona, eczema, prúrigo, mammitis, nefritis. *D.* En fricciones dos veces al dia.

7705. P. BORATADA.

℥ Borato de sosa,
 Nuez de agalla, ãã. ℥ij (8 gr.).
 Alcanfor. ℥j (4 gr.).
 Se incorpora en
 Cera líquida. ℥j (30 gr.).
 Se añade:
 Tintura de opio. ℥ij (8 gr.).

7706. Otra, n. 2.

℥ Cerato simple. ℥ij℥ (40 gr.).
 Borato de sosa. ḡxviiij (1 gr.).
 Conserva de rosas. ℥℥ (2 gr.).
 Neroli. ḡjv (2 dec.).
 I. Hemorroides, prúrigo, hin-

chazon escrófúlosa de los labios.
D. En fricciones ligeras.

7707. P. DEL DOCTOR BOUCHERON PARA HACER CRECER EL PELO.

℥ Jabon medicinal,
 Cenizas de cuero,
 Sal gemma,
 Tártaro rojo,
 Polvo de peinar,
 Sulfato de hierro,
 Sal amoniaco,
 Coloquintida, ãã. ℥j (30 gr.).
 Catecú. ℥ij (8 gr.).
 Se reduce á polvo y con c. s. de manteca se hace pomada. Se da de esta pomada á un gorro de hule y se le aplica á la cabeza.

7708. P. DE BOYER.

℥ Aceite de alm. dulces. ℥jv (120 gr.).
 Cera blanca. ℥℥ (15 gr.).
 Manteca lavada,
 Zumo de siempreviva menor, ãã. ℥iiij (90 gr.).
 H. S. A. I. Se emplea como dulcificante y refrigerante contra las irritaciones de la piel y las hemorroides. *D.* C. s. para ligeras fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.
Nota. Accarie, hallando demasiado líquida esta pomada, ha propuesto añadirle ℥℥ (15 gr.) de cera.

7709. P. DE BREA.

℥ Brea. ℥j (30 gr.).
 ó Pirelaina. ℥℥ (15 gr.).
 Flores de azufre. ℥j (30 gr.).
 Tintura de opio. ℥j (4 gr.).
 Manteca. ℥iiij (90 gr.).
 I. Lepra, pitiriasis, prúrigo, eczema, soriasis, herpes, fabus, líquen, sarna, reumatismo, lumbago. *D.* En fricciones.

7710. Otra (EMERY).

℥ Brea vegetal. ℥℥ (2 gr.).

Cera blanca,
Manteca, añ. ℥℔ (15 gr.).
Agua de Colonia. 20 gotas.

I. Afecciones cutáneas crónicas y principalmente la soriasis, sarna, herpes, prurigo, lepra vulgar. D. En fricciones mañana y noche.

7711. P. DE BREA (Emery).

℥ Brea. 100
Manteca. 300

I. Sarna, herpes, pórriigo. Debe usarse en gran cantidad, pero su uso ocasiona accidentes graves. Cura mas pronto que las preparaciones arsenicales, pero su curacion es menos duradera. Mancha la ropa.

7712. Otra (GIRAULT).

℥ Manteca. 600
Aceite ó pirlaina de brea. 100

Se ha propuesto en los mismos casos que la anterior.

7713. Otra (RICORD).

℥ Subsulfato de merc. ℥ij (8 gr.).
Brea. ℥℔ (15 gr.).
Manteca. ℥iij℔ (105 gr.).

M. I. Soriasis sifilítica, tiña. D. En tópico.

7714. P. DE BREA ALCANFORADA (Baumes).

℥ Manteca. ℥j (30 gr.).
Brea. ℥j (4 gr.).
Alcanfor. ḡjx (50 cent.).

M. I. Erupciones vesiculosas ó puro-vesiculosas, pápulo-pruriginosas y escamosas; calma la co-mezon.

7715. P. BROMURADA.

℥ Bromuro de potasio. ḡxviiij (1 gr.).
Bromo liquido. ḡiijx (50 cent.).
Manteca. ℥j (30 gr.).

M. I. Infartos escrofulosos, ho-

cio, hidrocele, escrófulas, oftalmias, manchas, blefaritis, conjuntivitis, congestion, encantis, pedionalgia, reumatismo, gota, tenesmo, sifilis, eczema tiña, amenorrea. D. ℥℔ á ℥j (2 á 4 gr.) mañana y noche en fricciones.

7716. P. DE BROMURO DE HIERRO.

℥ Bromuro de hierro. ℥j (4 gr.).
Bromo. ḡxij (6 dec.).
Manteca de cerdo. ℥j (32 gr.).

H. S. A. I. Amenorrea de las tísicas, y principalmente infartos escrofulosos y leprosos, sifilides, bocio, encantis. D. ℥℔ (2 gr.) en fricciones en la parte interna de los muslos, lo mas cerca posible de los grandes labios; se reparte la dosis para uno y otro muslo.

7717. P. DE BROMURO DE POTASIO.

℥ Bromuro de potasio. ℥j (12 dec.).
Manteca. ℥j (30 gr.).

H. S. A. Se puede emplear el bromuro de sodio en lugar del de potasio.

I. Infartos escrofulosos. D. De ℥℔ á ℥j (2 á 4 gr.) en fricciones sobre las partes enfermas.

Nota. Añadiendo á las dosis indicadas de ḡvj á ḡxij (3 á 6 dec.) de bromuro, se tiene la pomada de bromuro de potasio bromurado.

7718. Otra (MAGENDIE).

℥ Bromuro de potasio. ℥℔ (2 gr.).
Manteca. ℥j (30 gr.).

M. I. Infartos escrofulosos. D. ℥℔ á ℥j (2 á 4 gr.) en fricciones.

7719. P. DE CADMIO (Radius).

℥ Sulfato de cadmio. ḡij (1 dec.).
Manteca. ℥j (4 gr.).

M. I. Manchas de la córnea, catarata. D. ḡxviiij (1 gr.) en fricciones mañana y noche.

7720. P. CALMANTE.

℥ Extr. de zumo depurado de cicuta. . . 2
 Dilúyase en un poco de agua y
 mézclese con
 Cerato. ʒj (4 gr.).

7721. Otra (POTT).

℥ Polvo de cicuta. ʒʒ (45 gr.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).
M. I. Enfermedades escrofulosas
 con inflamacion y en el mal ver-
 tebral de Pott. *D.* Se usa en fric-
 ciones á la dosis de ʒʒ á ʒij (2 á 8
 gr.).

7722. Otra (FOUQUIER).

℥ Carbonato de plomo. . . ʒj (30 gr.).
 Opio. ʒj (4 gr.).
 Manteca. ʒʒ (45 gr.).
 Bálsamo tranquilo. . . . c. s.

I. Tenesmo, lumbago, neural-
 gias, jeroftalmias, mammitis,
 nefritis, neuralgia facial, hemi-
 cránea. *D.* En aplicacion y en
 fricciones.

7723. Otra (GUEPIN).

℥ Calomelanos. 4
 Extracto de belladona. 5
 Manteca balsámica. 30
M. I. En unturas en las oftal-
 mias dolorosas.

7724. Otra (JAMES).

℥ Esencia de laurel real. ʒij (8 gr.).
 Manteca de cerdo. . . . ʒij (60 gr.).
M. Véase *Pomada de laurel real.*

7725. Otra (ROGNETTA).

℥ Extracto de cicuta menor,
 Extr. de estramon., ãã. ʒij (8 gr.).
 Extracto de belladona. ʒxviii (4 gr.).
 Manteca preparada con
 agua de rosas. . . . ʒj (30 gr.),
 Mézclese S. A.

Se aplica esta pomada sobre el
 cuello de la matriz, y en friccio-
 nes sobre el hipogastrio en los
 casos de catarro uterino.

**7726. P. DE CALOMELANOS ó de
 Protochloruro de mercurio
 (H. M. F.).**

℥ Mercurio dulce prepara-
 do al vapor. ʒj (4 gr.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).
 Se mezcla por trituracion.

I. Escoriaciones, bubones y úl-
 ceras sifilíticas y escrofulosas.

Biett la usa en la mayor parte
 de las erupciones crónicas y al fin
 del tratamiento de las afecciones
 escamosas.

Si á ʒiij (90 gr.) de la pomada ante-
 rior, se añade ʒj (4 gr.) de extracto
 gomoso de opio ó ʒij (8 gr.) de láudano
 líquido, se tiene la POMADA DE CALOME-
 LANOS OPIADA, que se usa para curar
 las pústulas primitivas planas, ó las úl-
 ceras venéreas indolentes, etc.

**7727. P. DE CALOMELANOS ALCAN-
 FORADA (Cazenave).**

℥ Calomelanos preparados
 al vapor. ʒʒ (2 gr.).
 Alcanfor. ʒvj (3 dec.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Herpes de la cara que pa-
 san rápidamente al estado cró-
 nico.

7728. P. DE CAMUESAS.

℥ Manteca reciente lav. ʒbij (4000 gr.).
 Camuesas partidas en
 pedacitos. ʒbj (500 gr.).
 Agua rosada. ʒʒʒ (250 gr.).
 Benjuí,
 Estoraque calam., ãã. ʒj (4 gr.).
 Clavo de especia. . . ʒʒ (2 gr.).

Se ponen las tres últimas sustan-
 cias contundidas en una muñequita
 de lienzo, se suspende esta en la
 vasija que contenga las demás, se
 cuece todo hasta que se consuma
 la humedad, comprimiendo con
 una espátula la muñequita; se
 cuele, se deja enfriar, se saca
 con cuidado para separar las he-
 ces, se agita y se guarda para el
 uso.

I. Es refrigerante y se emplea

en las escoriaciones de los labios, de las narices, ó de las manos, y en las cicatrices, principalmente de las que resultan de las viruelas.

7729. P. CANTARIDADA.

℥ Cantáridas en polvo. ʒij (8 gr.).
Manteca. ʒiv (125 gr.).
Se liquida la manteca, se añaden las cantáridas y se hierve algunos instantes la mezcla en el baño maría.

7730. P. DE CANTARIDINA.

℥ Cantaridina. ʒj (5 cent.).
Manteca. ʒvij (28 gr.).
Cera blanca. ʒj (4 gr.).
Se tritura la cantaridina con un poco de alcohol, se añade el excipiente graso y se les tritura mucho tiempo hasta que estén bien mezclados.

7731. P. DE CANTARIDINA ó Pomada vexcicante de cantaridina.

℥ Cantaridina. ʒ 4
Manteca. ʒ 8
Se digiere en el baño maría durante seis horas, se cuele con expresion y se deja aposar, se decanta y se filtra.

7732. P. DE CARACOLES.

℥ Carne de caracoles,
Aceite de ricino, añ. . ʒj (30 gr.).
Se cuece, se cuele y se añade:
Brea. ʒijʒ (10 gr.).
I. Tiña, favus, alopecia y zona. D. En fricciones.

7733. Otra (RIVIERE).

℥ Caracoles de viña. . número 50.
Cera blanca. lbj (500 gr.).
Aceite de almendras dulces. lbjv (2000 gr.)
Esencia de rosas. . 2 gotas.
Se pulpa la carne de los caracoles en un mortero, y por otra parte se hace un cerato con la cera y el aceite, y con él se in-

corpora la pulpa de caracoles, y al fin se añade la esencia.

I. Grietas de los pezones.

7734. P. DE CARBON Y FLORES DE AZUFRE (F. P.).

℥ Carbon vegetal en polvo. ʒ 4
Flores de azufre. ʒ 2
Cerato blanco. ʒ 5
Mézclese exactamente.
I. Es eficazísimo en la tiña.

7735. P. DE CARBONATO DE PLOMO ó Ungüento blanco de Rasis (F. F.).

℥ Manteca. ʒv (20 gr.).
Carbonato de plomo. . . ʒj (4 gr.).
M. Se usa como desecante y se emplea con buen éxito contra las neuralgias faciales. D. De ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en fricciones.

Esta pomada se enrancia pronto, por lo que solo se preparará cuando se necesite.

7736. P. DE CARBONATO DE POTASA Y CAL (Devergie).

℥ Carbonato de potasa. . . ʒj (4 gr.).
Cal. ʒʒ (2 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).
M. Un enfermo que padecía ic-tiosis parda, se ha curado con esta pomada y los baños alcalinos.

7737. P. CATERÉTICA.

℥ Acido arsenioso en polvo fino. ʒj (4 gr.).
Sulfuro rojo de mercur. ʒʒ (2 gr.).
Manteca. ʒj (32 gr.).
H. S. A.

7738. Otra (NEUMANN).

℥ Alkali volátil. ʒ 5
Sublimado corrosivo. ʒ 5
Sabina en polvo. ʒ 10
Manteca. ʒ 30
M. I. Se extiende en hilas y se cubre con él las berrugas; dolores osteocopos.

7739. P. CÁUSTICA (Baumes).

- ℥ Manteca. ʒij (8 gr.).
 Sabina en polvo,
 Alumbre,
 Calomelanos, ãã. . . . ʒxxviii (4 gr.).
M. I. Vegetaciones.

7740. P. CÁUSTICA (Graeffe).

- ℥ Deutocloruro de merc. ʒij (8 gr.).
 Goma arábiga en polvo,
 Agua destilada, ãã. . . ʒj (12 dec.).
M. I. Grietas y vegetaciones sifiliticas, úlceras cancerosas.
D. Una aplicacion ligera cada cuatro ó cinco dias. Esta solucion tiene el nombre impropio de pomada.

7741. P. DE CAZENAVE.

- ℥ Zumo de siempreviva,
 Zumo de yerbamora,
 Aceite de almendras dulces, ãã. ʒjv (125 gr.).
 Manteca de cerdo. . . ʒij (60 gr.).
M. I. Grietas y fístulas. Se da de grasa una mecha y se introduce en el ano. Metritis, quemaduras, encantis, hemorroides, catarro útero-vaginal. D. En aplicacion.

7742. P. DE CEBADILLA (José Gascon).

- ℥ Cebadilla. ʒi6
 Manteca. ʒ100
H. S. A. I. Sarna. D. Se dan fricciones dos veces al dia en los puntos enfermos. El tratamiento dura de cinco á seis dias.

7743. P. CETRINA ó Ungüento cetrino (F. F.).

- ℥ Manteca de cerdo,
 Aceite comun, ãã. . . ʒbʒ (250 gr.).
 Mercurio. ʒj (32 gr.).
 Acido nítrico de 32°. ʒjʒ (48 gr.).
Se disuelve el mercurio en el ácido nítrico á un calor lento, se licúa la manteca con el aceite, y cuando esté medio fria la mezcla

se echa en ella la solucion mercurial, se agita para mezclarla exactamente y se vacia en moldes de papel.

I. Sarna; pero no se debe recurrir á ella, porque tiene el grave inconveniente de excitar la salivacion. Véase Ungüento cetrino de la F. E.

7744. P. CETRINA CON EL ACEITE DE OLIVAS (Planche).

- ℥ Mercurio purificado. . . ʒij (8 gr.).
 Acido nítr. puro de 32°. ʒjv (16 gr.).
Se opera la solucion sin auxilio de mas calor que el que resulta de la reaccion del metal y del ácido. Por separado se pone en una cazuela de porcelana:

Aceite de olivas muy puro. ʒij y ʒiij (76 gr.).

Se coloca la cazuela en un baño de agua calentada á 30° Reaumur; se vierte poco á poco la solucion mercurial, meneando la mezcla á la misma temperatura durante media hora. Se aparta la cazuela del baño y se continúa meneando sin interrupcion hasta que la masa haya adquirido la consistencia de cerato; entonces se echa en un tarro de loza.

La pomada preparada de este modo se conserva durante nueve meses á lo menos sin que se altere su color.

Haciendo la mezcla en frio, la pomada es menos consistente y mas pálida; disminuyendo la mitad de la dosis del nitrato de mercurio, se la obtiene aun mas blanda y capaz de reemplazar extemporáneamente la mezcla gris de pomada cetrina y cerato.

I. Sarna y ciertas afecciones herpéticas. D. De ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) para fricciones en las partes enfermas.

7745. P. DE CIANURO DE MERCURIO (Bielt).

- ℥ Cianuro de mercurio. . ʒjv (2 dec.).

Manteca. ℥j (30 gr.).
M. I. Ulceraciones sifilíticas.

7746. Otra, n. 2.

℥ Cianuro de mercurio. ℥xvj (8 dec.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
 Esencia de limon. . . . 15 gotas.

H. S. A. I. Se usa ventajosamente contra los herpes escamosos húmedos, acompañados de inflamacion intensa y de prurito quemante, peritonitis, meningitis, metritis, angina, esplenitis, vi-ruelas, atrofia mesentérica, tétanos, cataratas, iritis, oftalmias, sífilis, sífilides, divieso, muermo, prurigo, zona, líquen, efélides, gota. *D. C. s.* para dar ligeras fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

7747. Otra (CAZENAVE).

℥ Cianuro de mercurio. ℥xx (50 cent.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
M. I. Enfermedades de la piel con prurito y úlceras venéreas.

7748. Otra (PARENT).

℥ Cianuro de mercurio. ℥xij (6 dec.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
M. I. Úlceras sifilíticas, herpes escamosos húmedos con inflamacion y prurito.

Nota. Se puede aromatizar esta pomada con algunas gotas de un aceite esencial.

7749. P. DE CIANURO DE PLATA.

℥ Cianuro de plata. . . . ℥xij (6 dec.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
M. Para diez fricciones.

I. Enfermedades sifilíticas, prurito, encantis, oftalmias. *D.* Dos fricciones al dia.

7750. P. DE CIANURO DE POTASIO (Bielt).

℥ Cianuro de potasio. . ℥xij (6 dec.).
 Aceite de almendras amargas. ℥ij (8 gr.).

Cerato de Galeno. . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Líquen y prurigo, cuando la piel está muy seca y es muy viva la comezon.

7751. P. DE CIANURO DE POTASIO (H. DE M.).

℥ Cianuro de potasio. . ℥iij (15 cent.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
H. S. A. I. Neurosis. *D.* En fricciones.

7752. Otra (LOMBART).

℥ Cianuro de potasio. ℥iij á ℥vj (15 á 30 cent.).

Manteca de cerdo. . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Ulceraciones escrofulosas complicadas con sífilis y acompañadas de dolores. *D.* El volúmen de una avellana para cada friccion.

7753. Otra (SANDRAS).

℥ Cianuro de potasio. . . ℥jv (2 dec.).
 Manteca. ℥j (4 gr.).
M. I. Neuralgias, reumatismo crónico. *D.* En fricciones.

7754. P. DE CIANURO DE ZINC.

℥ Cianuro de zinc. . . . ℥jv (2 dec.).
 Grasa,
 Manteca de cacao, ãã. ℥xc (5 gr.).

H. S. A. D. Una friccion cada cuarto de hora en la frente, párpados y sienes con el volúmen de una judía de esta pomada.

7755. P. DE CICUTA.

℥ Cicuta machacada. 1
 Manteca. 2 á 4

Se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuela con expresion y se separan las heces.

I. Sirve para curar las úlceras escrofulosas.

7756. Otra, n. 2.

℥ Aceite de cicuta,
 Aceite de beleño, ãã. ℥ijß (10 gr.).
 Manteca. ℥ij (60 gr.).
M. I. Catarata, priapismo, didi-

malgia, mammitis, reumatismo, cuerpos extraños, úlceras cancerosas y escrofulosas, hemorroides. *D.* En fricciones en la parte dolorida.

7757. P. CINABARINA.

℞ Sulfuro rojo de mercur. ʒjβ (6 gr.).
Sal amoniaco. ʒβ (2 gr.).
Manteca. ʒij (60 gr.).
Se tritura y se aromatiza con
Agua de rosas. ʒj (4 gr.).

I. Sífilis, sífilides, prúrigo, sarna, lupus, muermo, esplenitis, coriza, atrofia mesentérica. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en fricciones.

7758. P. DE CIRILLO (F. F., F. P., II. DE M.).

℞ Sublimado corrosivo. . ʒj (4 gr.).
Manteca. ʒj (32 gr.).

Se porfiriza el sublimado corrosivo, se añade la manteca y se continúa la porfirización hasta que se obtenga una mezcla muy exacta. Se usa en fricciones como antisifilítico á la dosis de ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.) en cada fricción. Cirillo aconsejaba precediera á la fricción un pediluvio, y daba la fricción en los dos pies. Es medicamento muy peligroso.

I. Diviesos, herpes, sífilis, escrófulas, cataratas, iritis, líquen, encefalitis, soriasis, pleuresía, atrofia mesentérica.

Si se añade ʒj (12 dec.) de extracto de opio se tiene la pomada de CIRILLO OPIADA. *I.* Gonorrea rebelde. *D.* En fricciones en el perineo.

7759. P. DE CITRATO DE QUININA.

℞ Citrato de quinina. . . ʒβ (6 dec.).
Manteca. ʒj (4 gr.).

M. I. Calenturas intermitentes. *D.* En fricciones en los sobacos.

7760. P. CLORADA (F. A.).

℞ Cloro líquido. ʒj (4 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Herpes, sarna, tiña, es-

crófulas, pian, úlceras, lepra, sífilis, eczema. *D.* Se debe preparar en el momento de usarla.

7761. P. DE CLORHIDRATO DE MORFINA.

℞ Clorhidrato de morfina. ʒx (5 dec.).
Manteca de puerco. . . ʒj (30 gr.).
Mézclese exactamente.

D. Se extiende sobre el sitio de eleccion una masa mas ó menos considerable, segun la superficie de la parte dolorida y la intensidad del dolor; desde el volumen de un guisante hasta el de una nuez, repitiéndose estas fricciones segun lo exige la clase y rebeldía de la afeccion.

7762. P. DE BICLOROIODURO DE MERCURIO.

℞ Bicloruro de mercurio. 1 á 2
Bioduro de potasio. 1 á 2
Manteca. 30

Se tratan los dos cuerpos por el alcohol, juntos ó separados, se los somete á la evaporacion, se los deseca en la estufa y se los mezcla con la manteca.

7763. P. DE CLOROIODURO DE MERCURIO (Recamier).

℞ Cloroioduro de merc. ʒij (1 dec.).
Manteca,
ó Cerato sin agua. . . . ʒijβ (10 gr.).
Mézclese exactamente.

I. Sirve para resolver los tumores del pecho. *D.* Una ó dos fricciones al dia con ʒxviii (1 gr.) de esta pomada.

7764. P. CLORO-MERCÚRICA (Mialhe).

℞ Bicloruro de mercurio. ʒj (4 gr.).
Clorhidrato de amoniac. ʒij (8 gr.).
Manteca. ʒij (64 gr.).

Se tritura el sublimado y la sal amoniaco, se añade poco á poco la manteca y se continúa triturando hasta que esté bien homogénea.

Se puede usar en lugar de la pomada napolitana en el tratamiento abortivo de ciertas afecciones inflamatorias locales, y se la ha preconizado para reemplazar la pomada de Cirillo, siendo mas activa que ella.

7765. P. CLORO-PLATÍNICA
(*Hoefler*).

℥ Cloruro de platino. 4
Extracto de belladona. 2
Manteca. 30
M. I. Ulceras indolentes. *D.* En fricciones.

7766. P. CLORO-PLÓMBICA
(*Mialhe*).

Acetato neutro de plomo ḡxviii (4 gr.).
Cloruro de sodio. . . 3j (4 gr.).
Manteca. 3j (30 gr.).
Mézclese.

7767. P. DE CLORURO AMONIACO MERCURIAL
(*Bielt*).

℥ Cloruro amoniaco merc. 3ß (2 gr.).
Alcanfor. ḡx (5 dec.).
Cerato amigdalino. . . 3j (30 gr.).
M. I. Acne, sicosis. *D.* En fricciones.

El UNGUENTO DE CLORURO DE MERCURIO Y AMONIACO DE LA F. DE L. se compone de 3j (4 gr.) de cloruro y 3jß (48 gr.) de manteca.

7768. P. CON EL CLORURO DE CAL.

℥ Azufre sublimado y lavado. 3iij (90 gr.).
Cloruro de cal bien triturado. 3jv (125 gr.).
Manteca. 3xij (375 gr.).
M. I. Sarna. *D.* Se usa en fricciones, mañana y noche.

7769. P. DE CLORURO DE CALCIO.

℥ Cloruro de calcio. . . . 5j (4 gr.).
Digital. 3ij (8 gr.).
Vinagre. ḡLjv (3 gr.).

Manteca. 3j (30 gr.).
M. I. Artrocace, adenitis crónica, tiña, sífilis, pian, eczema, lepra.
D. 3j (4 gr.) en fricciones, dos veces al día.

7770. P. DE CLORURO DE ESTAÑO.

℥ Cloruro de estaño. ḡj á ḡij (5 á 10 cent.).
Manteca de cerdo. . . 1bj (500 gr.).
H. S. A. Se divide en ocho dosis iguales, de las cuales emplea una el enfermo en fricción en la parte interna de los muslos.

7771. P. DE PROTOCLORURO DE MERCURIO ó Pomada de mercurio dulce
(*Cazenave*).

℥ Protocloruro de mercurio. ʒj á 3j (1,3 á 4 gr.).
Manteca purificada. . . 3j (30 gr.).
I. Al fin de las erupciones crónicas y en el tratamiento de las afecciones escamosas, úlceras sífilíticas.

La fórmula de los H. M. F. contiene una parte de protocloruro por ocho de manteca.

7772. P. DE CLORURO DE ORO
(*Chrestien*).

℥ Cloruro de oro. ḡxij (6 dec.).
Manteca. 3j (30 gr.).
M. I. Se usa en tópico un poco espeso ó en fricciones ligeras sobre las excrescencias sífilíticas, úlceras venéreas rebeldes de naturaleza escrofulosa, etc.

7773. P. DE CLORURO DE ORO Y SODIO
(*Magendie*).

℥ Cloruro de oro y sodio. ḡij (4 dec.).
Manteca purificada. . . 3j (30 gr.).
D. Se aplica esta pomada en la superficie de un pequeño vejigatorio para hacer absorber la sal de oro.

7774. P. DE CLORURO DE ORO Y SODIO (*Chrestien*).

℞ Cloruro de oro y sodio. $\overline{\text{xxij}}$ (6 dec.).
Manteca. $\overline{\text{3j}}$ (30 gr.).
Mézclase bien.

I. Sífilis, sífilides, helmintiasis, pian, lepra, lupus. *D.* En fricciones. *I.* Congestión, bubones indolentes, aplicado á la superficie de un vejigatorio pequeño.

7775. Otra (*NIEL*).

℞ Cloruro de oro y sodio. $\overline{\text{xx}}$ (5 dec.).
Manteca. $\overline{\text{3B}}$ (15 gr.).

I. Para aplicar en la piel desnudada por un vejigatorio, cuando el enfermo no puede darse las fricciones en la lengua.

7776. P. DE CLORURO DE PLATA (*Sicard*).

℞ Cloruro de plata. $\overline{\text{ijv}}$ (2 dec.).
Manteca. $\overline{\text{3j}}$ (30 gr.).
M. I. Infartos escrofulosos.

7777. P. DE COLOQUÍNTIDA (*Chrestien*).

℞ Coloquintida en polvo. . $\overline{\text{3j}}$ (4 gr.).
Manteca. $\overline{\text{3j}}$ (32 gr.).

M. Se usa como purgante en fricciones sobre el vientre, y en las afecciones mentales, en el delirio maniático y en la demencia. *D.* $\overline{\text{3ij}}$ (8 gr.) en fricciones en el vientre.

7778. P. DE LA CONDESA ó Pomada virginal.

℞ Sulfato de zinc. $\overline{\text{3B}}$ (16 gr.).
Hojas de arrayan,
Zumaque, ãã. $\overline{\text{3iij}}$ (12 gr.).
Agallas de encina,
Nuez de ciprés,
Cáscara de granada, ãã. $\overline{\text{3ij}}$ (8 gr.).

Se pulverizan separadamente todas estas sustancias; se las mezcla, se las pasa por un tamiz

muy fino y se las incorpora con cantidad suficiente de unguento rosado.

I. Se usa esta preparacion as-tringente para hacer contraer los esfínteres demasiado dilatados. Metrorragias, leucorrea, metritis, mareo, catarro útero-vaginal. *D. C. s.* para cubrir ligeramente las partes que se quiere hacer contraer.

7779. P. CONTRA EL ACNE ENDURECIDO.

℞ Cal apagada. $\overline{\text{3j}}$ (4 gr.).
Alcanfor puro. $\overline{\text{3B}}$ (6 dec.).
Cerato calaminar. $\overline{\text{3j}}$ (30 gr.).
D. Se usa tópicamente.

7780. P. CONTRA EL ACNE ROSADO (*Boinet*).

℞ Protoioduro de mercur. $\overline{\text{3B}}$ (2 gr.).
Manteca. $\overline{\text{3v}}$ (20 gr.).
M. I. Barros inveterados. *D.* En fricciones mañana y noche.

7781. P. CONTRA LA ALOPECIA (*Schneider*).

℞ Zumo reciente de limon. $\overline{\text{3j}}$ (4 gr.).
Extracto de quina. $\overline{\text{3ij}}$ (8 gr.).
Tintura de cantáridas. . . $\overline{\text{3j}}$ (4 gr.).
Aceite de cedro. $\overline{\text{3j}}$ (12 dec.).
Aceite de bergamota. . . . 10 gotas.
Tuétano de vaca. $\overline{\text{3ij}}$ (60 gr.).

Se liquida el tuétano de vaca, y primero se añade el extracto de quina ablandado con el zumo de limon y despues la tintura alcohólica y los aceites.

Se lava primero la cabeza con agua de jabon, al otro dia se da una fricción con un poco de pomada y se vuelve á aplicar todos los dias, durante un mes ó seis semanas.

7782. Otra, n. 2.

℞ Manteca balsámica. 300
Zumo de limon. 6

Tintura de cantáridas.	2
Esencia de limones.	10
H. S. A.	

7783. P. CONTRA LA ALOPECIA.

℥ Tuétano de vaca.	℥vj (24 gr.).
Aceite de alm. dulces. ℥ij	(8 gr.).
Sulfato de quinina.	℥℔ (2 gr.).
Esencia de rosas.	3 gotas.

Se incorpora exactamente el sulfato de quinina en la mezcla líquida de los dos cuerpos grasos y se la aromatiza con esencias. Se aplica todas las mañanas un poco de esta pomada.

7784. P. CONTRA LA AMAUROSIS (Miquel).

℥ Cerato.	48
Pomada epispástica.	60
Estricnina.	5 á 6
Alcohol.	algunas gotas

para disolver la estricnina.

M. Se cura el vejigatorio en la nuca con ℥xij (6 dec.) de esta pomada, extendida en una hoja de acelga.

7785. P. CONTRA EL BOCIO (Pistchaft).

℥ Borato de sosa.	10
Opio puro	5
Pomada rosada.	40

H. S. A. una pomada perfectamente homogénea.

I. Bocio, várices. D. C. s. para dos fricciones al dia sobre el tumor.

7786. P. CONTRA LA CAIDA DE LOS CABELLOS.

℥ Quina roja en polvo.	℥j (4 gr.).
Aceite de alm. dulces. ℥ij	(8 gr.).
Tuétano de vaca fundido y clarificado. ℥vj	(180 gr.).

Se trituran hasta el completo enfriamiento y se añade al fin:

Esencia de bergamota. 6	gotas.
Bálsamo del Perú.	20 gotas.

7787. Otra (DUPUYTREN).

℥ Tuétano de vaca.	℔℔ (250 gr.).
Acet. de plomo crist. ℥j	(4 gr.).
Báls. negro del Perú. ℥ij	(8 gr.).
Alcohol de 21°.	℥j (32 gr.).
Tintura de cantár. ℥j	(12 dec.).
Tintura de clavo,	
Tint. de canela, añ. 15	gotas.

D. Todas las noches se unta el cuero cabelludo con el grueso de una nuez de esta pomada.

7788. Otra (RICORD).

℥ Tuétano de vaca preparado,	
Cerato azufrado, añ.	℥℔ (16 gr.).
Turbit mineral. ℥℔ á ℥j	(2 á 4 gr.).
Esencia de limon.	c. s.

para aromatizarla.

I. Sifilis y ciertas afecciones eruptivas de la piel de la cabeza. El enfermo se aplicará la pomada con los dedos.

7789. P. CONTRA LOS CALLOS.

℥ Pez blanca.	℥j (4 gr.).
Cera amarilla.	℥ij (8 gr.).
Trementina.	℥℔ (2 gr.).

Se liquida y se añade:

Acetato de cobre porfirizado.	℥℔ (2 gr.).
---------------------------------------	-------------

Se agita hasta que se enfrie.

D. Se cubre con ella los callos y ojos de gallo.

7790. P. CONTRA LA CEÁTICA (Bourge).

℥ Pomada estibiada.	℥j (30 gr.).
Extracto de acónito.	℥j (4 gr.).

M. I. Se usa en fricciones en la direccion del nervio.

7791. P. CONTRA LA CIFOSIS (Cazenave).

℥ Carbonato de potasa. ℥xviii	(4 gr.).
Manteca.	℥v (20 gr.).
Alcanfor.	℥iiij (15 cent.).

Mézclese.

7792. P. CONTRA EL CRUP.

℥ Precipitado blanco. ℥j (4 gr.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
 M. D. Se emplea en dos ó tres veces al dia despues de las emisiones sanguíneas.

7793. Otra (RADEMACHER).

℥ Extracto de digital. ℥ij (8 gr.).
 Cerato. ℥j (30 gr.).
 H. S. A. D. Se aplica á la parte anterior del cuello y por medio de compresas empapadas en esta pomada. Probablemente habrá convenido en el crup falso y en la angina estrídula.

7794. P. CONTRA EL DERRAME ARTICULAR (Biechy).

℥ Nitrato de plata. ℥j (4 gr.).
 Agua destilada. c. s. para disolver la sal.
 Manteca. ℥j (30 gr.).
 El autor recomienda disolver antes la sal en agua, para evitar la rubefaccion y la vexicacion. Produce buenos efectos.

7795. P. CONTRA EL ECZEMA (Velpear).

℥ Precipitado blanco. ℥ß á ℥j (2 á 4 gr.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
 Mézclese exactamente.
 I. Afecciones escamosas con prurito.

7796. P. CONTRA EL ECZEMA CRÓNICO (Mialhe).

℥ Manteca reciente. 40
 Turbit nitroso. 2
 Extracto de opio. 4
 H. S. A. I. Blefaritis crónica.
 D. En fricciones mañana y noche.

7797. P. CONTRA EL ECZEMA Y CIERTOS PRURITOS (Wienhoffld).

℥ Plombagina. ℥vj (180 gr.).
 Manteca. ℥x (300 gr.).
 M. D. Dos aplicaciones al dia con cantidad proporcionada á las superficies enfermas.

7798. P. CONTRA EL ECZEMA (Devergie).

℥ Manteca. ℥j (30 gr.).
 Calomelanos. ℥ß á ℥j (2 á 4 gr.).
 Alcanfor. ḡv á ḡvj (25 á 30 cent.).
 Se pulverizará el alcanfor por medio de un poco de alcohol y despues se mezclará todo.
 Calma las comezons violentas del eczema.

En el último período para dar á la piel su resistencia primitiva, se usa la pomada siguiente:

Tanino. ℥j (4 gr.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
 Tambien se usa la de brea; pero entonces no conviene una fórmula que contenga mucha brea sino la siguiente:

Manteca. ℥j (30 gr.).
 Brea. ḡjx á ḡxviii (0,5 á 1 gr.).
 La brea es muy resolutive, pero tambien es muy excitante para una superficie eczematosa.

7799. P. CONTRA EL ECZEMA DE LA PIEL DE LA CABEZA, TIÑA AMIANTACEA.

℥ Sulfato de potasa. ℥ß (2 gr.).
 Sosa de Alicante. ℥ß (6 dec.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
 Se da en unturas por la noche y se cubre la cabeza con papel de seda.
 I. Afecciones escamosas con prurito.

7800. P. CONTRA LAS ERUPCIONES SECAS (Ricord).

NÚMERO 1.
 ℥ Cerato azufrado. ℥j (30 gr.).

Turbit mineral. ḡxviiij (4 gr.).
 Brea. ʒj (4 gr.).
 H. S. A.

Aceite de euforbio, añ. ʒʒ (2 gr.).
 H. S. A. una pomada homogénea.

NÚMERO 2.

NUMERO 2.

ʒ Cerato azufrado. ʒj (30 gr.).
 Calomelanos preparados al vapor. ʒʒ (2 gr.).
 Brea. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. I. Irritaciones secas de la piel, pitiriasis, ictiosis, líquen, lepra vulgar ó sifilítica, y en la terminacion de las erupciones que se parecen á las que se acaba de enumerar.

ʒ Estoraque líquido. ʒjv (120 gr.).
 Manteca lavada. ʒij (60 gr.).
 Sublimado,
 Emético, añ. ʒij (8 gr.).
 Tintura de cantáridas,
 Aceite de euforbio, añ. ʒj (4 gr.).
 H: S. A. una pomada homogénea.

7801. P. CONTRA EL ECZEMA (Bielt).

ʒ Manteca. ʒj (30 gr.).
 Sulfato amar. de merc. ʒj (12 dec.).
 Láudano líquido. ḡxij (6 dec.).
 D. Se usa en unturas sobre las partes atacadas de eczema crónico.

ʒ Deutoioduro de merc. ḡxxx (4 gr.).
 Alcanfor. ḡxix (6 dec.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).
 M. D. C. s. para fricciones en las partes enfermas.

7805. P. CONTRA LAS GRIETAS DEL ANO (Diday).

7802. P. CONTRA LAS ESCORIASIONES OCASIONADAS POR PERMANECER EN LA CAMA.

ʒ Cort. de encina machac. ʒij (64 gr.).
 Agua. c. s.
 Se cuece durante una hora, de modo que se obtenga ʒʒʒ (250 gr.) de líquido colado, en el cual se añade:

ʒ Manteca. ʒʒ (15 gr.).
 Tanino. ḡxviiij (4 gr.).
 Se eleva la dosis hasta ḡLjv (3 gr.) segun el efecto que se observe.

D. El volúmen del hueso de una guinda de esta pomada, introducida por medio del dedo.

Acetato de plomo en polvo. . . . c. s. hasta que ya no forme precipitado. Se deja en reposo, se recoge el precipitado que se lava en agua fria y se incorpora en Manteca fresca. ʒj (32 gr.).
 Se aplica con el objeto indicado.

7806. P. CONTRA LAS GRIETAS DE LAS MANOS (Veret).

ʒ Polvo fino de bol arménico,
 Polvo fino de mirra,
 Polvo fino de albayalde, añ. ʒiij (12 gr.).
 Yema de huevo. c. s.
 H. S. A. una pomada blanda.

7803. P. CONTRA LA ESTIOMENA (Duchesne Duparc).

7807. P. CONTRA LAS GRIETAS DE LOS PECHOS (Bertel).

NUMERO 1.

ʒ Estoraque líquido,
 Manteca lavada, añ. ʒiij (90 gr.).
 Sublimado corrosivo,
 Tártaro emético, añ. ʒj (4 gr.).
 Tintura de cantáridas,

ʒ Manteca pura. ʒj (30 gr.).
 Oxido de zinc. ʒʒ (2 gr.).
 Láud. de Sydenham. ḡxviiij (4 gr.).
 H. S. A. I. Es muy eficaz contra las grietas. D. Se usa en unturas tres veces al dia.

7808. P. CONTRA LAS GRIETAS DE LOS PECHOS (Chevallier).

2^o Manteca de cacao. ʒ℔ (15 gr.).
 Aceite de alm. dulces. ʒij (8 gr.).
 Mucilago de semillas de membrillos. ʒij (8 gr.).

H. S. A. I. Se usa como cicatrizante de las grietas. D. C. s. para cubrir ligeramente y muchas veces al dia los puntos enfermos.

7809. Otra (CRUVEILHIER).

2^o Manteca. ʒj (30 gr.).
 Báls. líquido del Perú. ʒj (4 gr.).

M. Si los dolores son muy vivos se añade:

Opio en bruto. ʒij (1 dec.)
 y en este caso el niño no debe mamar.

7810. P. CONTRA EL HERPES CIRCINATUS.

2^o Manteca. ʒj (30 gr.).
 Sulfuro de cal. ʒj (4 gr.).
 Alcanfor. ʒxv (75 cent.).

M. D. El volúmen de una nuez pequeña para cada fricción.

7811. P. CONTRA LOS HERPES (Gibert).

2^o Ungüento cetrino. 40

Se lava con cuidado con agua destilada y se incorpora con

Pomada de pepino. 50

I. Herpes, pitiriasis, líquen y soriasis. Se debe acompañar el uso de esta pomada con un tratamiento interno. D. En fricciones.

7812. P. CONTRA LOS HERPES (Mad. Marechale).

2^o Manteca lavada en agua de rosas. ʒij (64 gr.).
 Oxido rojo de mercurio. ʒj (4 gr.).
 Alcanfor. ʒvj (3 dec.).

M. I. Oftalmias, herpes. D. Se

dan fricciones con el volúmen de un grano de trigo de esta pomada en el borde libre de los párpados. Tiene mucha analogía con la pomada del Regente de la F. F.

7813. P. CONTRA EL HERPES TONSURANS (Cazenave).

2^o Tanino. ʒxviii (1 gr.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).
 Agua. c. s.

H. S. A. D. En unturas en las partes afectadas. Se las lava todos los dias con una solución alcalina. Cazenave usa algunas veces la siguiente pomada.

7814. Otra (CAZENAVE).

2^o Ungüento cetrino. . . ʒv (20 gr.).
 Brea. ʒij℔ (40 gr.).

M. D. En fricciones.

7815. P. CONTRA EL IMPÉTIGO DESPARRAMADO.

2^o Cerato. ʒj (30 gr.).
 Sulfato de mercurio rojo. ʒ℔ (2 gr.).
 Alcanfor. ʒx (5 dec.).

M. D. C. s. para dar fricciones todas las noches sobre las partes enfermas, en cantidad proporcionada á las superficies afectadas.

7816. P. CONTRA LOS INFARTOS CANCEROSOS (Boinet).

2^o Bromuro de potasio,
 Ioduro de hierro, ãã. ʒ℔ (2 gr.).
 Bromo líquido. 40 gotas.
 Manteca. ʒj℔ (45 gr.).

M. D. Una fricción, mañana y noche, de un cuarto de hora de duración.

7817. P. CONTRA LOS INFARTOS GLANDULARES (Boinet).

2^o Deutoioduro de merc. ʒjv (2 dec.).

Ioduro de potasio. . . ℥j (12 dec.).
 Manteca. ℥jv (125 gr.).
 M. D. Dos fricciones al día.

7818. P. CONTRA EL INTERTRIGO
 (*Rosen*).

℥ Cerato. ℥B (15 gr.).
 Flores de zinc,
 Polvo de lycopodio, āā. ℥j (4 gr.).
 H. S. A.

7819. P. CONTRA EL LÍQUEN
 (*Biett*).

℥ Protónitrato de mercurio,
 Alcanfor, āā. ℥j (12 dec.).
 Manteca,
 Aceite de almendras
 dulces, āā. ℥B (15 gr.).
 M. D. C. s. para fricciones por
 la noche sobre las partes enfer-
 mas.

7820. Otra (BIETT).

℥ Alumbre. ℥xviiij (4 gr.).
 Alcanfor. ℥xv (75 cent.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
 M. D. Se dan fricciones sobre
 las partes enfermas al tiempo de
 acostarse.

7821. P. CONTRA LA MENTAGRA.

℥ Protosulfuro de
 mercurio. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.).
 Manteca. ℥ij (60 gr.).
 M. D. Se aplica á las superficies
 enfermas.

7822. P. CONTRA LAS NEURALGIAS
 (*Debourge*).

℥ Cerato. ℥jv (16 gr.).
 Carbonato de plomo. . ℥ij (12 gr.).
 Extracto de belladona. ℥j (4 gr.).
 M. I. Es muy útil en las neu-
 ralgias faciales. D. Una fricción
 tres horas antes de la aparición
 del acceso, y se repite de hora
 en hora; cada una durará diez

minutos á la vez. Antes de usar
 las unturas se recomienda quitar
 la pomada que quedó de la untura
 anterior, y empezar las unturas
 con nueva dosis de pomada.

7823. P. CONTRA LA NEURALGIA
 FACIAL (*Brookes*).

℥ Atropina. ℥v (25 cent.).
 Manteca de cerdo. . . ℥iij (12 gr.).
 Esencia de rosas. . . una gota.
 H. S. A.

7824. P. CONTRA LAS NEURALGIAS
 (*Calvé*).

℥ Veratrina. ℥j (5 cent.).
 Manteca rancia. . . . ℥j (4 gr.).
 Se aumenta sucesivamente la
 dosis de la veratrina hasta ℥ij (1
 dec.).
 D. Se dan fricciones en el pun-
 to dolorido, ó en el punto de don-
 de nace el dolor.

7825. P. CONTRA LA NEURALGIA
 FACIAL (*Fouquier*).

℥ Opio. ℥j (4 gr.).
 Carbonato de plomo. . . ℥j (32 gr.).
 Manteca. ℥B (16 gr.).
 Bálsamo tranquilo. . . c. s.
 M. D. Se dan fricciones en los
 puntos doloridos muchas veces al
 día.

7826. P. CONTRA LA OCTORREA
 CRÓNICA (*Meniere*).

℥ Protoioduro de merc. ℥xx (4 gr.).
 Hidrocl. de morfina. . ℥jv (2 dec.).
 Pomada de pepinos. . . ℥B (15 gr.).
 D. Se usa en fricciones en el
 interior del oído, con un clavo de
 hilas de algodón cubierto de esta
 pomada.

7827. P. CONTRA LAS OFTALMIAS
 ESCROFULOSAS (H. DE NIÑOS).

℥ Óxido de zinc. . . . ℥xv (75 cent.).
 Calomelanos. ℥xij (6 dec.).

Alcanfor. ḡviiij (4 dec.).

Manteca de vacas fresca. ʒij (8 gr.).

Manteca de cacao. ʒxij (48 gr.).

M. D. El tamaño de la cabeza de un alfiler en el borde libre de los párpados, cada dos ó tres días, al tiempo de acostarse.

7828. P. CONTRA LOS PIOJOS ó *Pomada de estafisagria.*

ʒ Polvo de estafisagria. 4

Manteca. 2

Se infunde en caliente durante algunas horas y se cuele con expresion. *V. Pomada de estafisagria.*

Sirve para destruir los piojos.

7829. P. CONTRA LOS PIOJOS Y LAS LADILLAS.

ʒ Vinagre,
Estafisagria,
Miel,

Azufre, ãã. ʒj (30 gr.).

Aceite comun. ʒij (60 gr.).

M. S. A.

7830. P. CONTRA EL PRÚRIGO.

ʒ Manteca,
Zumo de siempreviva,
Aceite de hipericon,
Agua de cal, ãã. ʒj (30 gr.).

D. Se usa en fricciones sobre las partes enfermas.

7831. *Otra* (BIETT).

ʒ Carbonato de sosa. ʒij (8 gr.).

Extr. acuoso de opio. ḡx (5 dec.).

Cal apagada. ʒj (4 gr.).

Manteca. ʒij (60 gr.).

D. Se usa con ventaja en diferentes especies de prúrigo.

7832. *Otra* (DEBREYNE).

ʒ Pez liquida. ʒij (8 gr.).

Alcanfor. ʒij (24 dec.).

Manteca. ʒj (30 gr.).

H. S. A. D. En fricciones mañana y noche.

7833. P. CONTRA LAS PÚSTULAS DE LAS VIRUELAS.

ʒ Ungüento mercurial. 13

Cera amarilla. 5

Pez negra. 3

H. S. A. Se aplica esta pomada sobre las postillas de las viruelas; impide que dejen impresiones en la piel, y tiene la ventaja sobre la pomada mercurial de ser mas consistente y de no correrse.

7834. P. CONTRA LAS QUEMADURAS.

ʒ Yema de huevo endu-
recida. número una.

Cera amarilla. ʒß (15 gr.).

Aceite de alm. dulces. ʒjß (45 gr.).

Se hace un cerato con el aceite y la cera, y se le incorpora la yema de huevo.

7835. *Otra* (SUTRO).

ʒ Creosota. 15 gotas.

Carbon animal. ḡxviiij (4 gr.).

Alcohol rectificado. ʒß (2 gr.).

Ungüento de esperma
de ballena. ʒj (30 gr.).

H. S. A. D. Se aplica á las superficies ulceradas por medio de compresas finas ó de planchuelas de hilas.

7836. P. CONTRA LOS SABAÑONES.

ʒ Cera amarilla. lbß (250 gr.).

Extracto de Saturno. ʒj (30 gr.).

Alcanfor. ʒj (30 gr.).

Aceite de laurel. lbß (250 gr.).

Manteca. lbß (250 gr.).

H. S. A. D. ʒij á ʒiij (8 á 12 gr.) en fricciones en las partes no ulceradas.

7837. P. CONTRA LOS SABAÑONES ó *Arcano del cura Walther, comprado por el Gobierno de Wurtemberg.*

ʒ Manteca de vacas

Manteca de puerco, ãã. ℥bj (500 gr.).
Limaduras de hierro. ℥jß (6 gr.).

Se mezclan en una vasija de hierro, agitando con una espátula del mismo metal hasta que la masa tome color negro; despues que se ha dejado aposar se decanta y se añade:

Trementina de Venecia. ℥ij (64 gr.).
Aceite de bergamota. . ℥j (4 gr.).
Bol de Armenia, triturado antes con aceite comun. ℥j (32 gr.).

Mézclese exactamente.

Se cubren las partes enfermas ulceradas ó no con esta preparacion.

7838. P. CONTRA LOS SABAÑONES
ó Arcano contra los sabañones
(Brefeld).

℥ Manteca de vacas,
Grasa de puerco, ãã. ℥bj (500 gr.).
Mézclese con

Oxido negro de hierro. ℥ij (64 gr.).

Se mezclan en una vasija de hierro, agitando continuamente con una espátula del mismo metal, hasta que la mezcla tome color negro, y despues de haberla dejado aposar, se cuele y se añade:

Trementina de Venecia. ℥ij (64 gr.).
Aceite de bergamota. . ℥j (4 gr.).
Bol arménico triturado antes con aceite comun. ℥j (32 gr.).

Mézclese exactamente.

Se cubren las partes enfermas con compresas de lienzo ó planchuelas de hilas cubiertas de este unguento.

Se usa principalmente en los casos de sabañones graves.

La fórmula de Berton se diferencia de las dos anteriores, en que contiene ℥j (30 gr.) de óxido negro de hierro, ℥i (30 gr.) de trementina de Venecia, ℥ß (2 gr.) de aceite de bergamota, y ℥ß (15 gr.) de bol arménico, por ℥bj (500 gr.) de manteca de puerco y ℥bj (500 gr.) de manteca de vacas.

7839. Otra (DEVERGIE).

℥ Manteca de cerdo. ℥j (30 gr.).

Creosota. 40 gotas.
Extracto de Saturno. . . 40 gotas.
Extracto tebáico. ℥ij (1 dec.).
H. S. A.

Se extiende mañana y noche una capa de esta pomada sobre las partes hinchadas por los sabañones, y se la cubre por medio de un paño de lienzo.

7840. Otra (KNOERLZER).

℥ Opio. ℥j (4 gr.).
Alcanfor. ℥ß (2 gr.).
Carbonato de amoniaco. ℥j (4 gr.).
Acetato de plomo. ℥ij (8 gr.).
Manteca. ℥jß (48 gr.).
Mézclese.

7841. Otra (RUST).

℥ Alcanfor,
Opio en polvo, ãã. ℥j á ℥ß (12 dec. á 2 gr.).
Bálsamo del Perú. ℥j (4 gr.).
Se tritura y se añade:

Alumbre en polvo. ℥jß (6 gr.).
Cerato de Saturno. ℥ß (15 gr.).

M. I. Sabañones en el segundo grado.

7842. P. CONTRA LOS SABAÑONES ULCERADOS.

℥ Acetato de plomo liq. 6 gotas.
Alcanfor en polvo. ℥xviiiij (4 gr.).
Pomada de pepinos. ℥j (30 gr.).
Tintura de benjuí,
Tintura de Tolú, ãã. ℥ß (2 gr.).
M. I. Se aplica una capa ligera sobre los sabañones ulcerados.

7843. P. CONTRA LA SARNA.

℥ Flores de azufre. ℥vj (24 gr.).
Polvo de eléboro bl. ℥jv. (16 gr.).
Carbonato de potasa. ℥xij (48 gr.).
Jabon negro. ℥xij (48 gr.).
Manteca. ℥j (32 gr.).
Esencia de espliego. ℥j (4 gr.).
M. D. ℥ß (15 gr.) durante ocho dias. Es muy usada en Inglaterra y en Bélgica.

7844. P. CONTRA LA SARNA.

℥ Brea. ℥j (30 gr.).
 Turbit mineral. ℥℔ (45 gr.).
 Oxido rojo de mercur. ℥℔ (45 gr.).
 Manteca. ℥iij (90 gr.).
 Esencia de limon. ḡxviiij (4 gr.).
 M. I. Sarna. D. ℥℔ (15 gr.) en fricciones, mañana y noche. Cura en cuatro dias.

7845. Otra (EMERY).

℥ Jabon negro. ℔℔ (250 gr.).
 Sal marina. ℥jv (125 gr.).
 Azufre. ℥jv (125 gr.).
 Alcohol. ℥j (30 gr.).
 Vinagre. ℥ij (60 gr.).
 Cloruro de sodio. ℥℔ (45 gr.).
 D. ℥j (30 gr.) al dia para dos fricciones.

7846. Otra (FORGET).

℥ Sulfuro de cal. ℥j (4 gr.).
 Manteca. c. s.
 D. Se dividen en dos partes iguales, que se colocan por la noche en el sobaco.

7847. Otra (HOSPITAL).

℥ Azufre sublimado y lavado. ℥iij (96 gr.).
 Cloruro de cal bien triturado. ℥jv (125 gr.).
 Manteca. ℥xij (375 gr.).
 M. D. Tres fricciones al dia en los puntos ocupados por las vesículas.

Cada dos dias se prescribe un baño ó lociones generales para limpiar la superficie del cuerpo y facilitar la accion de las fricciones. Basta esta dosis para diez ó doce dias.

7848. Otra (LISSON).

℥ Litargirio. ℥j (30 gr.).
 Se disuelve á fuego lento en Aceite comun. ℥jv (125 gr.).

D. ℥℔ (15 gr.) mañana y noche para cada friccion, que se hará en las manos, en los piés y en las axilas.

7849. Otra (MELIER).

℥ Azufre sublimado. ℥v (150 gr.).
 Carbonato de potasa. ℥ij (60 gr.).
 Agua. ℥j (30 gr.).
 Aceite comun. ℥℔ (45 gr.).
 Se disuelve el carbonato, se le añade el aceite y se incorpora despues el azufre en el jabon formado de este modo.

I. Sarna.

Nota. Esta pomada no ensucia la ropa y no tiene olor. La duracion media del tratamiento es de trece dias.

7850. Otra (ROLB).

℥ Calomelanos. ℥ij (8 gr.).
 Aceite de almendras. ℥j (32 gr.).
 Cera blanca. ℥ij (8 gr.).
 H. S. A. D. En diez dosis.

7851. P. CONTRA LAS SIFÍLIDES ESCROFULOSAS (Bielt).

℥ Protocloruro amoniacal de mercurio. ℥j (12 dec.).
 Alcanfor. ℥℔ (6 dec.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
 M. I. C. s. como tópico en las partes enfermas.

7852. P. CONTRA LA SORIASIS (Boinet).

℥ Protoioduro de mercurio. ℥j (30 gr.).
 Manteca. ℥j (4 gr.).
 H. S. A. I. Es excelente en la soriasis y en todas las afecciones escamosas rebeldes. D. Una friccion al dia.

7853. Otra (BOINET).

℥ Deutoioduro de merc. ḡjv (2 dec.).
 Ioduro de potasio. ḡxxx (15 dec.).
 Manteca. ℥jv (125 gr.).
 M. D. Dos fricciones al dia.

7854. P. CONTRA LA TIÑA.

- ℥ Sosa cáustica,
- Sulfuro de potasa, ãã. ℥ij (8 gr.).
- Manteca. ℥iij (90 gr.).

Se reducen á polvo la sosa y el sulfuro y se los incorpora despues con la manteca.

D. Se usa en fricciones sobre la cabeza de los tiñosos, despues de haber hecho caer las costras por medio de cataplasmas y de haber cortado los cabellos; luego se cubre el cuero cabelludo con papel de estraza.

7855. Otra, n. 2.

- ℥ Ungüento cetrino. . . . ℥ß (15 gr.).
- Ungüento de brea. . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Tiña, pórrigo, líquen. *D.* En fricciones en las partes enfermas.

7856. Otra, n. 3.

- ℥ Carbon,
- Azufre, ãã. ℥jß (50 gr.).
- Hollin. ℥vj (25 gr.).
- Carbonato de sosa. . . . ℥ijß (10 gr.).
- Manteca. ℥iij (100 gr.).

M. I. Tiña, impétigo, líquen. *D.* En fricciones en el cuero cabelludo.

7857. Otra (BORIES).

- ℥ Hollin en polvo fino. . . ℥jß (48 gr.).
- Sulfato de zinc. ℥vj (24 gr.).
- Manteca. ℥jv (125 gr.).

M. D. El grosor de una nuez pequeña dos veces al dia.

7858. Otra (ORDINAIRE).

- ℥ Almidon. 110
- Pez de Borgoña. 220
- Pez resina. 100
- Trementina. 50
- Vinagre blanca. 1250

Se hace engrudo con la vinagre y el almidon, se añade la mezcla de pez y trementina y se

aparta despues de un ligero hervor. Se extiende esta pomada en capas bastante gruesas sobre vendotes, que se aplican á los puntos enfermos. despues de haber cortado los cabellos. Al siguiente dia están tan pegados que es imposible desprenderlos sin arrancar todos los pelos; se cubre la parte de aceite comun y encima con papel de filtros. Se continúa usando alternativamente los vendotes aglutinantes y las fricciones aceitosas hasta que la piel haya vuelto á su estado normal.

Ha producido muy buenos efectos.

7859. Otra (PINEL GRANCHAMP).

- ℥ Oxido rojo de merc. . . ℥ijß (10 gr.).
 - Carbon. de sosa seco. ℥ß (16 gr.).
 - Sulfato de zinc. ℥jß (6 gr.).
 - Tucia. ℥j (4 gr.).
 - Flores de azufre. ℥ß (16 gr.).
 - Manteca. ℥jv (125 gr.).
- Mézclese exactamente.

D. Todas las noches se cubre la cabeza con esta pomada y al otro dia se la lava con agua tibia.

7860. P. CONTRA LA TIÑA CON CARBON VEGETAL (H. DE M.).

- ℥ Carbon vegetal,
 - Flores de azufre, ãã. ℥jv (125 gr.).
 - Hollin de chimeneas. ℥ij (60 gr.).
- Mézclese despues de bien pulverizados y añádase:
- Manteca de puerco. . . ℥xv (450 gr.).
- I.* Tiña.

7861. P. CONTRA LA TIÑA CON CARBON ANIMAL (H. DE M.).

- ℥ Carbon animal. ℥ij (60 gr.).
 - Azufre puro. ℥j (30 gr.).
 - Precipitado blanco. ℥ß (15 gr.).
 - Sebo;
 - Manteca, ãã. ℥xviij (560 gr.).
- H. S. A. I.* Tiña.

7862. P. Y POLVO CONTRA LA TIÑA FAVOSA (Petel).

- ℥ Sosa del comercio. ḡxij (6 dec.).
 Cal apagada. ʒj (4 gr.).
 Manteca. ʒjv (120 gr.).
 Hágase una pomada S. A.
 ℥ Cal viva. ʒjv (120 gr.).
 Carbón en polvo. ʒij (8 gr.).
 Hágase polvo.

Se corta el pelo hasta tres líneas de la cabeza, se hace caer las costras aplicando cataplasmas emolientes de linaza, y se lava la cabeza con agua de jabón ó una lejía ligera. Al sexto día se da diariamente una fricción con la pomada sobre la parte enferma, se limpia la cabeza con un peine untado con un cuerpo graso y con lociones con agua de jabón cada seis á ocho días. A las seis semanas, dos meses y frecuentemente mas tarde, se ha conseguido que desaparezca el favus. Entonces se echa cada dos días una pulgarada del polvo sobre los cabellos. Estos pierden poco á poco su adherencia á la piel y se los puede arrancar fácilmente con unas pinzas ó con los dedos. La avulsión no causa dolor y se concluye á pocas aplicaciones. Luego que está limpia la cabeza se ha terminado la operación, y solo queda dar de pomada la cabeza cada dos ó tres días y tener mucha limpieza. Los cabellos nacen donde no se ha destruido su raíz. Se suspenden las fricciones cuando la piel ha tomado su color natural.

7863. P. DE CORNEZUELO DE CENTENO.

- ℥ Cornezuelo de centeno
 en polvo. ḡxc (3 gr.).
 Carburo de azufre. ʒß (2 gr.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).
 M. I. Partos laboriosos, aborto,
 hemorragias, metrorragias, es-

trecheces, enuresis. D. En aplicación ó en fricciones.

7864. P. COSMÉTICA ó Cosmético de Alibert.

- ℥ Agua de rosas. ℔ij (1000 gr.).
 Pomada de pepinos. ʒiij (90 gr.).
 Jabon amigdalino. . ʒiij (12 gr.).
 H. S. A. I. Barros ó granos que se presentan en la cara ó en la parte superior del tronco. D. Una locion ligera, mañana y noche.

7865. P. COSMÉTICA DE MANTECA DE CACAO (Lange).

- ℥ Manteca de cacao. . ℔j (500 gr.).
 Cera virgen. ℔ß (250 gr.).
 Esperma de ballena. ℔ß (250 gr.).
 Aceite comun. ℔ij (1000 gr.).
 Flores de benjuí. . . ʒj (4 gr.).
 Bermellon. ʒj (4 gr.).

Se funden las grasas, en seguida se las bate en un mortero añadiendo ℔vj (3000 gr.) de agua, que contenga en solución las flores de benjuí, despues se añade el bermellon y c. s. de esencia de rosas.

I. Grietas de la cara, de las manos y de los pechos.

7866. P. DE CREMA PARA LA CARA.

- ℥ Cera blanca. 4
 Esperma de ballena. 4
 Aceite de almendras dulces. 16
 Agua de rosas. 12

Se liquida la cera y la esperma de ballena en aceite á fuego lento; se colocan en un mortero caliente y se agita con fuerza; se incorpora poco á poco el agua de rosas.

7867. P. DE CREOSOTA.

- ℥ Creosota. ḡß (25 mil.).
 Manteca. ʒij (60 gr.).
 Tritúrese.

I. Ulceras de mal carácter.

7868. P. DE CREOSOTA (Hiff).

℥ Creosota. 80 gotas.
 Oxido de zinc. ℥j (4 gr.).
 Manteca. ℥ij (64 gr.).
 H. S. A. I. Tiña.

7869. Otra (MAX. SIMON).

℥ Manteca. ℥j (32 gr.).
 Creosota. ḡxviiij (4 gr.).
 Es muy eficaz en el tratamiento de las afecciones papulosas inveteradas. Se debe usar solo cuando la inflamacion ha pasado al estado crónico.

D. En unturas en las partes afectadas.

7870. P. CRISOCROMA (Cottureau y Verdé-Delisle).

℥ Ioduro de plomo. ℥j (4 gr.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).
 Esencia de limon. c. s.
 H. S. A. una pomada.

Nota. Se puede aumentar la cantidad de ioduro hasta ℥ij (8 gr.) y mas; se puede añadir igualmente, segun sea necesario, ℥β á ℥j (2 á 4 gr.) de láudano de Sydenham ó láudano de Rousseau.

I. Se usa ventajosamente contra los infartos escrofulosos, los cánceres, las úlceras de la matriz y otras. Al parecer excede en actividad á las preparaciones de iodo y al iodo mismo; esto inducen á creer los numerosos experimentos que se han hecho estos últimos años. D. C. s. para fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

7871. P. DE CROLIUS.

℥ Acido sulfúrico. ℥j (30 gr.).
 Manteca. ℥ij (60 gr.).
 M. I. Sarna.

7872. P. DE DELFINA.

℥ Polvo de delfina. ḡxviiij (4 gr.).

Manteca. ℥j (30 gr.).
 M. I. Piojos. D. En fricciones.
 Véase número 7893.

7873. P. DESECANTE.

℥ Manteca de cacao,
 Esperma de ballena, añ. ℥j (30 gr.).
 Cera amarilla. ℥β (15 gr.).
 Acetato de plomo. ℥ij (8 gr.).
 H. S. A. I. Ulceras por decúbito. Se aplica en capas muy delgadas.

7874. P. DE DESSAULT (H. DE S. J.).

℥ Oxido rojo de mercurio,
 Tucia preparada,
 Acetato de plomo,
 Alumbre calcinado, añ. ℥j (4 gr.).
 Sublimado corrosivo. ḡxij (6 dec.).
 Pomada rosada. ℥j (30 gr.).
 Se mezcla todo porfirizándolo por mucho tiempo.

I. Afecciones herpéticas, eczema, lepra, zona, lumbago, gota, reumatismo, cuerpos extraños; oftalmias rebeldes, conjuntivitis. D. El volumen de la cabeza de un alfiler para untar el párpado. Con su influencia el dolor aumenta por el pronto; pero las superficies que hasta entonces son de un color rojo cárdeno ó pálido, se avivan y propenden progresivamente á la curacion.

7875. P. DE DIGITALINA.

℥ Digitalina. ḡj (5 cent.).
 Se disuelve en algunas gotas de alcohol á 22° y se incorpora con Manteca balsámica. ℥ijβ (10 gr.).
 I. Anasarca. D. En fricciones.

7876. P. DE DIGITAL.

℥ Digital fresca. 1
 Manteca. 2
 Se cuece á fuego lento hasta que se consuma la humedad.

I. Tumores escirrosos ó cancerosos, úlceras cancerosas.

7877. P. ECTRÓTICA CONTRA LAS PÚSTULAS VARIOLOSAS.

℞ Ungüento mercurial.	144
Cera blanca.	60
Pez negra.	36

Mézclese.

Esta mezcla reemplaza muy bien el emplasto de Vigo, que es demasiado duro. Se extiende en una piel, que se coloca en la parte del cuerpo que se quiere libertar de los estragos de las viruelas.

7878. P. DE ELÉBORO.

℞ Raiz de eléboro en polvo. . .	4 á 2
Manteca de puerco.	8

M. Se usa en algunos casos de herpes inveterados.

7879. P. DE ELÉBORO BLANCO.

℞ Polvo de raiz de eléboro blanco.	℥β (15 gr.).
Manteca.	℔β (250 gr.).

Se mezcla y se añade :

Esencia de limon. . . 3 gotas.

I. Sarna. D. En fricciones. El tratamiento dura trece ó catorce dias.

7880. P. EPILATORIA (Cazenave).

℞ Carbonato de sosa.	℥ij (8 gr.).
Cal.	℥j (4 gr.).
Manteca.	℥j (32 gr.).

M. I. Tiña.

7881. P. EPISPÁSTICA (Radius).

℞ Ungüento populeon ,	
Cera blanca, ãã.	℥j (30 gr.).

Se funde y se añade :

Cantáridas,

Torbisco, ãã.

D. ʒxviii (1 gr.) para activar la supuracion de los vejigatorios.

7882. P. EPISPÁSTICA ALCANFORADA (Marjolin).

℞ Cantáridas en polvo.	℥j (32 gr.).
Agua.	℥xij (375 gr.).
Manteca.	℥vj (192 gr.).
Aceite comun,	
Cera blanca, ãã.	℥jv (125 gr.).
Alcanfor.	℥ij (8 gr.).

Se hierven las cantáridas en el agua durante media hora, se filtra y se evapora hasta cerca de ℥v (160 gr.), se añaden los cuerpos grasos, se hace evaporar toda el agua, se deja enfriar y se añade el alcanfor.

I. Sirve para mantener la supuracion de los vejigatorios sin ocasionar una irritacion demasiado viva y sin obrar sobre las vias urinarias.

7883. P. EPISPÁSTICA AMARILLA Ó SUAVE (F. F.).

℞ Cantáridas en polvo grueso.	℥jv (125 gr.).
Grasa de puerco.	℔biiij y ℥jv (1680 gr.).
Cera amarilla.	℔β (250 gr.).
Cúrcuma en polvo.	℥ij (8 gr.).
Esencia de limon,	
ó Esencia de cidra.	℥ij (8 gr.).

Se ponen las cantáridas y la manteca en un baño maria y se digieren durante tres ó cuatro horas á la temperatura del agua hirviendo, meneando de cuando en cuando; se cuele con fuerte expresion, se pone la pomada al fuego con el polvo de cúrcuma, se hace digerir, se filtra, se liquida el producto con la cera amarilla, se menea la mezcla hasta que se ha enfriado en parte, y se la aromatiza con el aceite volátil de limon.

Tiene las mismas propiedades que la pomada epispástica verde, y se la cree, sin razon suficiente, menos activa.

7884. P. EPISPÁSTICA VERDE
(F. F.).

- ℥ Cantáridas en polvo fino. ℥j (32 gr.).
- Ungüento populeon. ℥xxviii (875 gr.).
- Cera blanca. ℥jv (125 gr.).

Se liquida la cera á fuego lento con el unguento populeon, se añaden las cantáridas y se menea hasta que se enfríe.

I. Sirve para sostener una irritacion suficiente en los vejigatorios que se quiere hacer supurar é impedir que se cicatricen. Se aumenta, disminuye ó se suprime esta pomada, segun que la irritacion es suficiente, fuerte ó excesiva. Se reconoce este último estado en que se segrega una pseudomembrana muy adherente, la cual se desprende suspendiendo el uso de la pomada y aplicando sobre el vejigatorio una cataplasma emoliente.

7885. P. EPISPÁSTICA DE TORBISCO (F. F.).

- ℥ Manteca de cerdo. ℥xjvß (452 gr.).
- Cera blanca. ℥jß (48 gr.).
- Cortezas secas de torbisco. ℥jv (125 gr.).

Se cortan en pedacitos al través las cortezas de torbisco, se echan en un almirez de hierro, se humedecen con un poco de alcohol y se machacan hasta reducir las á una masa fibrosa; se pone esta en digestion con la manteca por doce horas, se cuele con fuerte expresion; y se deja enfriar lentamente el producto, se separa el sedimento, se licúa la pomada con la cera y se agita hasta que se enfríe.

Conviene cuando se quiere una revulsion lenta y prolongada, y cuando se teme el uso de las cantáridas por razon de una irritacion existente ya en los órganos urinarios ó por una predis-

posicion de ellos á irritarse. Por lo demás se emplea como las cantáridas, y á vecès con preferencia para mantener la supuracion de los vejigatorios.

7886. P. EPISPÁSTICA CON LAS PREPARACIONES DE ORO (*Niel*).

- ℥ Manteca. ʒß (2 gr.).
- Oro dividido por el mercurio. ʒj (5 cent.).

I. Se emplea en las enfermedades sifilíticas, cuando el estado de la boca no permite emplear fricciones sobre esta parte. *D.* Se pone á descubierto el dermis de uno de los lados del cuello, y estableciendo en él una lengüeta epispástica, se curan mañana y noche los vejigatorios con las mezclas precedentes. Se aumenta gradualmente la dosis del oro dividido hasta ʒij (10 cent.) y despues se reemplaza la primera pomada por esta:

- Manteca. ʒß (2 gr.).
- Cloruro de oro y sodio. ʒⁱ/₁₀ (5 mil.).

7887. P. EPISPÁSTICA SUAVE
(*Henry y Guibourt*).

- ℥ Cantáridas en polvo. 2
 - Manteca. ʒii
- Se digiere en baño maría, se cuele con expresion, se filtra y se añade:
- Cera blanca. ʒi
 - Bálsamo nerval. ʒi

7888. P. DE ESENCIA DE ALMENDRAS AMARGAS.

- ℥ Esencia de almendras amargas,
 - Manteca de cacao, aa. . ʒj (4 gr.).
- H. S. A. I.* Glaucoma, iritis, dolores neurálgicos. *D.* Una friccion de hora en hora en la frente y sienes con el volúmen de un guisante de esta pomada.

7889. P. EXCITANTE (Trussen).

℞ Clorito de cal,
 Borax, ãã. ʒj (4 gr.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).
 I. Sabañones. D. En fricciones.

7890. P. DE ESPERMA DE BALLENA.

℞ Esperma de ballena. ʒ
 Cera blanca. ʒ
 Aceite de almendras dulces. ʒ

Se liquidan á fuego lento, se echan en un mortero calentado por medio del agua hirviendo y se tritura hasta que se enfrie la mezcla.

Algunos formularios añaden ʒjv (2 dec.) de tintura de ambar.

7891. P. DE ESPLIEGO (Baumé).

℞ Manteca de cerdo. lbv (2500 gr.).
 Flores de espliego recientes y mondadas. . . lbxxx (15000 gr.).
 Cera blanca. . . lbʒ (250 gr.).

Se malaxan en un lebrillo lbjv (2000 gr.) de flores de espliego y toda la manteca; se pone la mezcla en baño maría de estaño, tapado, y se calienta por dos horas; se cuele por un lienzo fuerte; se exprime, se deja en reposo para que se enfrie y separar el agua: se malaxa la manteca con lbjv (2000 gr.) de nuevas flores; se pone al calor como la primera vez y se repiten las mismas operaciones hasta que se haya empleado las lbxx (10000 gr.) de flores. Entonces se separa por última vez la pomada del agua que se encuentra en el fondo; se malaxa en muchas aguas para privarla de toda la parte extractiva de las flores; se derrite y enfria de nuevo para separar la humedad y últimamente se licúa con la cera y se echa en las vasijas.

7892. P. DE ESTAFISAGRIA.

℞ Mercurio. ʒxviii (1 gr.).
 Sem. de estafisagria. ʒʒ (2 gr.).
 Eléboro blanco. ʒxviii (1 gr.).
 Tabaco. ʒiiij (15 cent.).
 Trementina. ʒlʒv (3 gr.).
 Manteca. ʒjʒ (48 gr.).

M. I. Tiña, sarna, enfermedad pedicular. D. En fricciones en el cuero cabelludo.

7893. Otra, n. 2.

℞ Estafisagria en polvo. ʒ
 Cerato simple ó manteca. ʒʒ

M. La pomada de estafisagria de Swediaur se prepara con

Estafisagria en polvo. ʒ
 Manteca. ʒʒ

Se digiere en el baño maría, se cuele con expresion y se separan las heces despues de fria la pomada.

I. Se usan para matar los piojos.

7894. P. ESTIBIADA (Fabre).

℞ Tártaro emético. . . ʒʒ (2 gr.).
 Hidroclorat. de amon. ʒj (4 gr.).
 Alcanfor. ʒxviii (1 gr.).
 Almizcle. ʒjx (50 cent.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).

Se tritura con cuidado.

I. Calenturas intermitentes, obstrucciones de las vísceras abdominales, hemicránea, epilepsia, enagenacion, angina, aftas, inflamaciones, tisis, pleuresía, bronquitis, carditis, cistitis, laringitis, enteritis, peritonitis, neumonía, coqueluche, encefalitis, meningitis, reumatismo, ceática, cólera, soriasis, catarata. D. ʒxviii (1 gr.) en fricciones, la que se aumentará progresivamente.

7895. P. ESTIBIADA CON BELLADONA (Bourge de Rollot).

℞ Pomada estibiada. . . . ʒx (40 gr.).
 Extracto de belladona. . ʒxc (5 gr.).

M. D. Se usa en fricciones en las

paredes del pecho para combatir muchas afecciones de los órganos contenidos en esta cavidad.

7896. P. ESTIBIADA ó Pomada de Autenrieth (F. F. Y H. M.).

℥ Tártaro emético porfir. ʒj (4 gr.).
Manteca de cerdo. . . . ʒiij (12 gr.).
Mézclase exactamente sobre un pórfido.

D. El grosor de una nuez para frotar muchas veces al dia la region del estómago.

Nota. Esta preparacion se usa como revulsiva y estimulante local; así obra como rubefaciente, ó producirá pústulas segun la cantidad de pomada y la frecuencia en su aplicacion.

7897. P. ESTIBIADA (H. DE M.).

NUMERO 1.

℥ Tártaro emético. . . . ʒj (4 gr.).
Manteca de puerco. . . ʒvij (28 gr.).

NUMERO 2.

℥ Tártaro emético. . . . ʒij (8 gr.).
Manteca de puerco. . . ʒvj (24 gr.).

NUMERO 3.

℥ Tártaro emético. . . . ʒiij (12 gr.).
Manteca de puerco. . . ʒv (20 gr.).

Se reduce el tártaro emético á polvo fino, se le mezcla con la manteca y se porfiriza la pomada.

D. En fricciones como revulsivo.

7898. P. ESTIBIO-MERCURIAL (Stannay).

℥ Manteca. ʒjß (48 gr.).
Tártaro emético en polvo fino. ʒij (8 gr.).
Bicloruro de mercurio. ʒvj (3 dec.).

H. S. A. Es mas pronta que la pomada de Autenrieth sin producir salivacion.

7899. P. ESTIBIO-RICÍNICA (Vitzmann).

℥ Tártaro emético porfirizado. ʒjv (2 dec.).

Aceite de ricino,
Manteca fresca, ãã. . . ʒj (4 gr.).

M. I. Manchas de la córnea. D.

El grosor de una lenteja, dos veces al dia. En seguida se frota el párpado superior, se cubre el ojo con una compresa caliente para que la pomada se extienda con uniformidad y se absorba. Si se irrita el ojo y hay congestion á la cabeza, se usan pediluvios sinapizados y pomada estibiada á la nuca.

7900. P. ESTIMULANTE (Levacher).

℥ Cerato. ʒjß (48 gr.).
Esencia de trement. ʒLjv (3 gr.).
Láud. de Sydenham. ʒxxxvj (2 gr.).

M. I. Ulceras atónicas y particularmente en las úlceras epsóricas.

7901. P. DE EXTRACTO DE BELLADONA.

℥ Extracto blando de belladona. ʒj (4 gr.).

Manteca,

ó Cerato simple. ʒj (30 gr.).

Se pesa la manteca, se coloca el extracto sobre papel graso, se coloca un poco de manteca en el mortero y se tritura; se quita el extracto con un cuchillo dado de grasa, se le pone en un mortero y se tritura; se añade un poco de agua si es necesario, se tritura y se añade el resto del cuerpo graso. Operando así se emplea menor cantidad de agua que la que se necesitaria si se diluyera el extracto. Se puede preparar esta pomada sin añadir agua, reemplazando una porcion de grasa por ʒxc á ʒij (5 á 8 gr.) de cerato de Galeno.

Del mismo modo se preparan las pomadas con el **EXTRACTO DE CICUTA**, **BELLEÑO**, etc., cualquiera que sea el peso del extracto.

7902. P. DE ESTRAMONIO.

℞ Hojas de estramonio. ℥ij (60 gr.).
Manteca. ℥jv (120 gr.).
Cera blanca. ℥j (30 gr.).
Se cuece á fuego lento.

I. Gota, reumatismo, neuralgia. *D.* En fricciones.

7903. P. DE ESTRAMONIO.

℞ Extracto de estramonio. ℥j (4 gr.).
Manteca. ℥j (30 gr.).

M. I. Gota, reumatismo, neuralgias. *D.* En fricciones.

7904. P. DE ESTRICNINA.

℞ Estricnina. ḡjv (2 dec.).
Manteca. ℥j (30 gr.).
Mézclese.

7905. Otra (SANDRAS).

℞ Estricnina. ḡxviii (1 gr.).
Manteca. ℥j (30 gr.).
H. S. A. I. Reumatismo, ceática, gota, lumbago, anasarca, parálisis, enuresis, nefritis. *D.* Se usa en fricciones sobre los miembros paralizados. Hace desaparecer los tumores que se forman en el dorso de las manos.

7906. P. DE FABRÉ.

℞ Manteca. ℥j 30 gr.).
Hidroclorato de amoníaco. ℥j (4 gr.).
Tartrato de potasa antimoniado. ℥ß (2 gr.).
Alcanfor. ℥j (12 dec.).
Almizcle. ḡx (5 dec.).

M. I. Infartos del hígado y obstrucciones análogas, manchas, oftalmias. *D.* ḡxviii (1 gr.) en fricciones.

Nota. Se puede aumentar gradualmente la dosis según el grado de sensibilidad de la piel.

7907. P. FEBRÍFUGA CON SULFATO DE QUININA (Boudin).

℞ Sulfato de quinina. ℥j (4 gr.).
Se disuelve con algunas gotas de alcohol y ácido sulfúrico y se incorpora con

Manteca. ℥ß (15 gr.).

Se usa cuando el estómago y el recto no pueden soportar la acción de la quinina.

D. En fricciones en la ingle ó axilas después de haber afeitado la parte, que se cubrirá con un pedazo de hule.

7908. P. FERRUGINOSA CONTRA LA ERISPELA ó Pomada marcial (Velpreau).

℞ Protosulfato de hierro en polvo fino. ℥ijß (10 gr.).
Manteca fresca. ℥iij (90 gr.).
M. D. En unturas.

7909. P. FILOCOMA.

℞ Extracto de quina. ℥ß (2 gr.).
Aceite de rosas. 2 gotas.
Aceite de bergamota. 8 gotas.
Tuétano de vaca. ℥ß (15 gr.).
M. I. Recomendada en la calvicie y alopecia.

7910. P. DE FOSFATO DE MERCURIO (Albano).

℞ Deutofosfato de merc. ℥j (4 gr.).
Manteca. ℥xj (44 gr.).
Se mezclan por porfirización.
I. Bubones sífilíticos. Comúnmente bastan ℥j ó ℥ij (4 á 8 gr.) para la curación.

7911. P. FOSFORADA (Lescot).

℞ Aceite fosforado. ℥j (30 gr.).
Manteca. ℥ßß (250 gr.).
Cera blanca. ℥j (30 gr.).
H. S. A. I. Raquitis, disenteria crónica y por atonía. *D.* En fric-

ciones en los riñones, espinazo y miembros.

7912. P. FOSFORADA Y ALCANFORADA (*Cruveilhier*).

℞ Fósforo. ḡx (5 dec.).
Alcanfor. ʒj (4 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Parálisis apopléctica. *D.* ʒB á ʒj (2 á 4 gr.) al dia en fricciones.

7913. P. DE FÓSFORO ó Grasa de fósforo (*F. F.*).

℞ Fósforo. ʒj (4 gr.).
Manteca de cerdo. ʒLj (200 gr.).

Se pone la manteca en un frasco de vidrio de boca ancha y con tapon esmerilado; se añade el fósforo y se coloca en el baño maria teniendo cuidado de interponer entre el cuello y el tapon del frasco un papelito, que impidiendo que se ajuste el tapon dé salida al aire interior; se hace hervir el agua del baño maria, se tapa entonces exactamente el frasco y se agita con violencia hasta que se haya disuelto el fósforo; se saca del baño maria, y se sigue agitando hasta que se enfrie la pomada.

I. Es excitante y se usa en la parálisis, ciertos herpes, varices, gota, reumatismos. *D.* ḡxviiij á ḡxxxvj (1 á 2 gr.) al dia.

7914. P. DE FOURNIER.

℞ Ungüento mercurial
doble. ʒjB (48 gr.).
Ungüento basilicon. ʒvj (24 gr.).
Cantáridas en polvo. ḡjx (50 cent.).

M. I. Se usa en las Antillas contra las heridas de animales venenosos. *D.* Se cura la herida ó picadura, dos veces al dia, con esta pomada extendida en hilas.

7915. P. DE FULIGOCALI (*Deschamps*).

℞ Fuligocali. ḡxviiij á ḡxxxvj (1 á 2 gr.).

Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Es resolutive y ligeramente estimulante; á grandes dosis es muy irritante.

7916. P. DE FULIGOCALI SULFURADO (*Deschamps*).

℞ Fuligocali sulfurado,
Almidon, añ. ʒB (2 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).
Mézclese.

7917. P. FUNDENTE.

℞ Cerato opiado. ʒj (32 gr.).
Calomejanos. ʒj (4 gr.).
Tintura de iodo. 20 gotas.
Alcanfor en polvo. ʒijB (10 gr.).
Mézclese exactamente.
I. Infartos escrofulosos.

7918. Otra (*FABRE*).

℞ Muriato de amoniaco. ʒj (4 gr.).
Alcanfor. ʒj (12 dec.).
Almizcle. ḡx (5 dec.).
Manteca. ʒj (30 gr.).
M. I. Infartos del hígado. *D.* En fricciones en la region de este órgano.

7919. Otra (*LERMINIER*).

℞ Mercurio dulce. ʒj (4 gr.).
Cerato blanco. ʒj (32 gr.).
Se usa en fricciones en el vientre en los infartos crónicos del hígado.

7920. P. DE GIACOMINI.

℞ Manteca fresca. ʒB (15 gr.).
Acetato de plomo. ʒj (4 gr.).
Agua cohobada de laurel real. ʒj (4 gr.).
M. I. Inflamaciones externas y particularmente contra los sabañones.

7921. P. DE GIROUX.

℞ Brea. ʒij (8 gr.).

Láudano. ℥j (4 gr.).
Manteca. ℥j (32 gr.).

M. I. Prúrigo y afecciones escamosas.

7922. P. DE GONDRET (F. F., H. DE M. Y F. P.).

℥ Sebo. ℥j (32 gr.).
Manteca de cerdo. . . . ℥j (32 gr.).
Amoniaco líquido de 25°. ℥ij (64 gr.).

Se licúan el sebo y la manteca en un frasco de boca ancha, se añade el amoniaco, se tapa el frasco, y se agita con violencia; se sumerje en seguida en agua fria, y se agita la pomada hasta que se enfríe.

Esta pomada sumamente irritante determina la vexicacion en breve tiempo. Así se usa siempre que se quiere denudar prontamente la superficie para administrar algun medicamento por el método endérmico. Mas no es este su principal uso, pues se emplea mucho mas frecuentemente como revulsivo é irritante local en la amaurosis y ciertas oftalmias crónicas. En estos casos generalmente se aplica á la base de la órbita y sobre el trayecto del nervio frontal.

Se emplea con buen éxito contra ciertas afecciones rebeldes de la piel, singularmente contra el prúrigo, y en la catarata, amaurosis, neumonía, epilepsia, encefalitis, neuralgias, ceática, reuma crónico, parálisis, cólera, catarro útero-vaginal, angina, laringitis, crup. *D.* En fricciones como rubefaciente; en aplicacion como vexicante. Para esto se cubre de ella una compresa y se hace desprender el amoniaco colocando encima un cuerpo caliente.

7923. P. DE GRAND JEAN.

℥ Ungüento populeon. . ℥j℥ (750 gr.).
Aceite comun. ℥j (500 gr.).

Cera amarilla. ℥jx (270 gr.).
Cantáridas. ℥j℥ (45 gr.).

H. S. A. I. Esta pomada es epispástica. Se aplica detrás de las orejas para desviar la fluxion que se dirige á los ojos.

Nota. Si esta pomada no tiene mas usos, cualquiera otro epispástico es tan bueno como ella. *V. Pomada epispástica verde.* *V. números 7883, 7884 y 7885.*

7924. P. DE HANAY.

℥ Tártaro emético. ℥ij (8 gr.).
Sublimado corrosivo. . . . ℥vj (3 dec.).
Manteca. ℥j℥ (45 gr.).

Mézclese con cuidado.

D. Se usa exteriormente.

7925. P. DE HELMERICH ó *Pomada sulfojabonosa.*

℥ Flores de azufre. 2
Carbonato de potasa seco. 4
Manteca. 8

M. I. Cáncer, sarna. *D.* Se frota el cuerpo del enfermo en un baño jabonoso de modo que se rompan las pústulas de la sarna, despues se hacen fricciones tres veces al dia, ante el fuego, con ℥j (30 gr.) de la mezcla en cada friccion. El tratamiento dura de diez á trece dias.

La fórmula de la F. P. contiene una parte de subcarbonato de potasa, dos de azufre sublimado y cuatro de grasa de puerco.

7926. P. DE HENKE.

℥ Manteca fresca. ℥j (30 gr.).
Oxido de zinc. ℥℥ (2 gr.).
Opio en polvo. ℥j (5 cent.).

H. S. A. I. Impétigo crónico.

7927. P. DE LOS HERMANOS MAHON.

℥ Sosa del comercio. . . . ℥iij (12 gr.).
Cal apagada. ℥ij (8 gr.).
Manteca. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. I. Tiña, favus. *D.* Se usa como la pomada de Alibert.

7928. P. HIDRIODATADA (Riecke).

- ℥ Ioduro de potasio. . . . ʒj (4 gr.).
- Jabon medicinal. . . . ʒß (2 gr.).
- Agua de rosas. . . . ʒij (8 gr.).
- Ungüento rosado. . . . ʒvj (24 gr.).

H. S. A. Esta pomada se conserva bastante tiempo.

7929. P. HIDRIODATADA (F. F. Y F. P.).

- ℥ Ioduro de potasio. . . . ʒj (4 gr.).
- Manteca reciente. . . . ʒj (32 gr.).

M. Se tritura primero el ioduro solo, despues con una parte de la manteca, y luego se añade el resto de esta.

I. Tumores escrofulosos é infartos crónicos no cancerosos de los pechos y testículos. D. ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) durante ocho dias, y despues ʒj (4 gr.) en fricciones mañana y noche.

Del mismo modo se prepara la POMADA DE IODURO DE PLOMO DE LA F. F.

7930. P. HIDRIODATADA É IODURADA (Baudelocque).

- ℥ Manteca. ʒj (30 gr.).
- Iodo. ʒxij (6 dec.).
- Ioduro de potasio. . . . ʒj (4 gr.).

M. I. Afecciones escrofulosas, y principalmente contra las escrófulas tuberculosas, celulosas ó huesosas, etc. D. El grosor de una avellana en fricciones.

7931. P. DE HIDRIODATO DE AMONIACO (Bielt).

- ℥ Hidriodato de amon. ʒxviii (4 gr.).
 - Grasa de carnero. . . ʒß (15 gr.).
 - Aceite de alm. dulces. ʒij (8 gr.)
- Mézclense.

7932. Otra (GIBERT).

- ℥ Hidriodato de amoniaco. 4
- Manteca. 9

M. I. Soriasis. D. En fricciones mañana y noche.

7933. P. DE HIDRIODATO DE POTASA Ó IODURO DE POTASIO (H. DE M.).

NUMERO 1.

- ℥ Ioduro de potasio. . . . ʒß (2 gr.).
- Manteca de puerco. . . ʒij (60 gr.).

NUMERO 2.

- ℥ Ioduro de potasio. . . . ʒj (4 gr.).
- Manteca de puerco. . . . ʒij (60 gr.).

H. S. A. I. Se usa como resolutiva, no existiendo síntomas de inflamacion aguda.

7934. P. DE HIDRIODATO DE POTASA Y MERCURIO.

- ℥ Hidriodato de potasa. ʒxviii (4 gr.).
- Ungüento gris. ʒß (15 gr.).

M. I. Sarcoccele, absceso, artrocace, bocio, adenitis, orquitis crónica, esplenitis, pleuresía, infartos, escrófulas, hidrocele, acné, sífilides. D. ʒß (2 gr.) en fricciones, mañana y noche.

7935. P. DE HIDRIODATO IODURADO DE POTASA (Magendie).

- ℥ Hidriodato de potasa. ʒß (2 gr.).
- Iodo puro. ʒv á ʒxv (25 á 75 cent.).
- Manteca. ʒjß (45 gr.).

M. I. Bocio, tumores glandulares escrofulosos, ciertos infartos de los testículos.

7936. P. DE HÍGADO DE AZUFRE.

- ℥ Hígado de azufre liquid. ʒjv (16 gr.).
- Manteca balsámica. . . ʒx (40 gr.).
- Jabon de potasa. . . . ʒx (40 gr.).

M. I. Es muy eficaz en los herpes escamosos ligeros.

7937. P. DE HOLLIN.

- ℥ Carbon en polvo,
- Azufre, añ. ʒj (30 gr.).
- Hollin. ʒß (15 gr.).
- Manteca. c. s.

M. I. Tiña, pórriigo, grietas,

helminthiasis. *D.* ʒiij á ʒjv (12 á 16 gr.) cada tres dias en fricciones en la piel de la cabeza, lavada antes con agua de jabon.

7938. P. DE HOLLIN.

℥ Hollin. ʒxviiij (4 gr.).
Manteca. ʒj (4 gr.).
Mézclese.

7939. Otra, n. 2.

℥ Extr. acético de hollin. ʒxc (5 gr.).
Sal marina decrepitad. ʒijʒ (10 gr.).
Manteca. ʒjv (125 gr.).
M. I. Herpes ulcerados, tiña, eczema, zona. *D.* En fricciones despues de lavar la parte enferma.

7940. P. DE HOLLIN (Blaud).

℥ Hollin. ʒj (4 gr.).
Manteca. ʒjv (16 gr.).
Mézclese. *I.* Herpes ulcerados, tiña, etc.

7941. Otra (CARRON DE VILLARDS).

℥ Tuétano de vaca. . . . ʒj (30 gr.).
Extr. de hollin de leña. ʒlx (3 gr.).
Ungüento cetrino. . . . ʒxij (6 dec.).
Aceite de hígado de bacalao. ʒij (24 dec.).

M. D. El grosor de la cabeza de un alfiler sobre los párpados que han quedado enrojecidos por la oftalmia variolosa.

7942. Otra (FOY, MARINAS).

℥ Hollin en polvo,
Manteca, aa. ʒj (4 gr.).
M. I. Tiña y herpes.

7943. Otra (LANEAU).

℥ Concreciones de hollin preparadas. . . . ʒʒ (15 gr.).
Alcohol de 30° C. . . ʒiij (12 gr.).
Manteca fresca. . . . ʒij (60 gr.).

Se bate el hollin y el alcohol en un mortero de mármol, y luego que la mezcla está pastosa se mezcla fácilmente con la manteca.

Las concreciones de hollin aumentan las virtudes de la pomada, y es útil en el tratamiento de ciertos herpes, tiña y ciertas úlceras.

7944. P. DE HOLLIN CONTRA LA TIÑA (Lablache).

℥ Manteca. ʒjv (125 gr.).
Hollin en polvo. c. s.
para dar á la manteca un color pardo oscuro. Se la somete durante veinticuatro horas á una ligera ebullicion.

Se cortan los cabellos y se cubre la cabeza con una cataplasma. Se lava la cabeza con el cocimiento de hollin de Blaud y despues se la cubre con la pomada. Se necesitan de quince á veinte dias para la curacion.

7945. P. LLAMADA DE LOS HOSPITALES MILITARES FRANCESES CONTRA LA SARNA.

℥ Manteca. ʒbxxʒ (5250 gr.).
Azufre sublimado. ʒbijʒ (1250 gr.).
Sal marina decrep. ʒbj (500 gr.).

Se porfirizan las sales con un poco de grasa, en seguida se funde la grasa y despues se mezcla todo en un barreño barnizado.

D. ʒj (30 gr.) cada dia en fricciones.

Nota. Esta pomada cura en catorce ó quince dias.

7946. P. DE IODHIDRARGIRATO DE IODURO DE POTASIO.

℥ Iodhidrargirato de ioduro de potasio. 20
Manteca. 500

Se puede aumentar la dosis del iodhidrargirato.

7947. P. DE IODHIDRARGIRATO DE MERCURIO Y POTASIO (Mialhe).

℥ Ioduro de potasio,
Protoioduro de mercurio, ãã. ʒβ (2 gr.).
Hidroclorato de morf. ḡviiij (4 dec.).
Manteca. ʒj (32 gr.).

Se mezclan muy bien las tres sales y despues se añade la manteca. En algunas circunstancias se puede aumentar la dosis de la sal.

I. Glándulas infartadas y úlceras escrofulosas ó sifiliticas. *D.* En fricciones ó para curas.

7948. P. DE IODO.

℥ Iodo. ʒβ (2 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).

H. S. A. I. Se usa en fricciones en los tumores indolentes, bubones que han terminado por induración, etc.

7949. Otra, n. 2.

℥ Iodo. . . ḡxviiij á ḡxxxvj (1 á 2 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).

Mézclese para el uso.
D. ʒij (8 gr.) en fricciones en los tumores indolentes.

7950. Otra (H. DE M.).

℥ Iodo. ʒj (12 dec.).
Manteca de puerco. . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. I. Se usa como resolutivo cuando no existen síntomas de inflamación aguda.

7951. P. IODO-CALMANTE (Chomel).

℥ Ioduro de potasio. . . ḡxviiij (1 gr.).
Clorhidrato de morf. ʒβ (2 gr.).
Manteca. ʒx (40 gr.).

M. I. Tumores dolorosos de los pechos. *D.* En unturas mañana y noche.

7952. P. DE IODOFORMO.

℥ Cerato. 8
Iodoformo. 4
Láudano de Sydenham. 4
H. S. A. I. Cánceres ulcerados.

7953. Otra (GLOWER).

℥ Iodoformo. ʒβ (2 gr.).
Cerato simple. ʒj (30 gr.).

H. S. A. I. Afecciones rebeldes de la piel, lepra, soriasis, eczema crónico. *D.* En fricciones.

7954. P. IODO-NARCÓTICA ALCANFORADA.

℥ Ioduro de potasio. . ʒj (12 dec.).
Extracto de beleño,
Extr. de cicuta, ãã. ḡxviiij (9 dec.).
Alcanfor. ḡjv (2 dec.).
Manteca. ʒijβ (10 gr.).
Iodo. ḡj (5 cent.).

D. Se usa como tóxico sedante en las úlceras sifiliticas, cancerosas ó escrofulosas.

7955. P. IODURADA (F. F.).

℥ Iodo. ʒj (4 gr.).
Ioduro de potasio. . . ʒiiij (12 gr.).
Manteca. ʒiiij (96 gr.).

Se tritura el iodo con el ioduro de potasio, se añade la manteca y se mezcla perfectamente sobre un pórfido.

I. Tumores escrofulosos, infartos crónicos no cancerosos de los pechos y testiculos.

7956. Otra (BAUDELLOCQUE).

℥ Manteca. ʒj (30 gr.).
Iodo puro. ʒβ (6 dec.).

Ioduro de potasio,
ó Ioduro de plomo. . . . ʒj (4 gr.).
ó Ioduro de mercurio. . . ʒβ (2 gr.).

M. I. Úlceras escrofulosas, infartos escrofulosos. *D.* ʒβ á ʒj (2 á 4 gr.) y mas en fricciones.

7957. P. IODURADA DE LUGOL
(F. P.).

NUMERO 1.

℥ Iodo. ḡxij (60 cent.).
Ioduro de potasio. . . ℔jv (48 dec.).
Manteca purificada. . ℥xvj (64 gr.).

NUMERO 2.

℥ Iodo. ḡxxvij (90 cent.).
Ioduro de potasio. ℥ij (8 gr.).
Manteca purificada. ℥xvj (64 gr.).

NUMERO 3.

℥ Iodo. ḡxxj (105 cent.).
Ioduro de potasio. ℥ijß (40 gr.).
Manteca purificad. ℥xvj (64 gr.).

NUMERO 4.

℥ Iodo. ḡxxjv (120 cent.).
Ioduro de potasio. ℥iij (42 gr.).
Manteca purificad. ℥xvj (64 gr.).

Se mezclan íntimamente.

I. Tumores escrofulosos ó huesosos, úlceras tuberculosas y cutáneas, escrófulas, úlceras ó fístulas escrofulosas, varitis, orquitis, didimalgia, prostatitis, sarcocele, blenorragia, sífilis, sífilides, atrofia mesentérica, erisipela, bocio, lepra, lupus, soriasis, mareo, flemon, abscesos, fisoblefaron, infartos é induraciones glandulares. *D.* En fricciones.

7958. P. IODURADA CONTRA LA GOTA (*Gendrin*).

℥ Manteca,
Bálsamo tranquilo, ãã. ℥ß (15 gr.).
Ioduro de potasio. . . . ℥j (4 gr.).
Iodo. ℔j (12 dec.).

M. D. Dos fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas con una cucharadita de la mezcla.

7959. P. IODURADA JABONOSA
(*Riecke*).

℥ Ioduro de potasio. . . . ℥j (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . ℔ij (24 dec.).
Agua destilada. ℥ij (8 gr.).

Aceite de cajeput. . . . ℥ij (8 gr.).
Pomada rosada. . . . ℥vj (24 gr.).

M. I. Inflamacion crónica é induracion del hígado, del páncreas ó del bazo. *D.* ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) tres veces al dia, en fricciones en el vientre.

7960. P. IODURADA OPIADA
(*Lemasson*).

℥ Iodo. ḡxviiij (4 gr.).
Ioduro de potasio. . . ḡxc (5 gr.).

Mézclese en un mortero de porcelana y añádase:

Manteca. ℥iij y ℥j (100 gr.).
Láudano de Rousseau. ℥ijß (40 gr.).

M. I. Úlceras escrofulosas. *D.* Se extiende esta pomada sobre una planchuela de hilas, que se aplica sobre las úlceras. Si produce mucha irritacion se aplica encima una cataplasma emoliente.

7961. P. DE IODURO DE ARSÉNICO
(*Bielt*).

℥ Ioduro de arsénico. . ḡiij (15 cent.).
Manteca. ℥j (30 gr.).

H. S. A. I. Herpes corrosivos y tuberculosos, úlceras escrofulosas, sífilides, lepra, eczema. *D. C. s.* para cubrir ligeramente las partes enfermas.

Nota. El uso de esta pomada exige mucha circunspeccion.

7962. P. DE IODURO DE AZUFRE.

℥ Ioduro de azufre. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.).
Manteca. ℥jvß (140 gr.).

H. S. A. I. Ciertas afecciones cutáneas de naturaleza escrofulosa, ulceraciones herpéticas complicadas con escrófulas, sífilis, pór-rigo, etc.; se la ha usado tambien en el nodus reumático. *D. C. s.* en fricciones.

7963. Otra, n. 2.

℥ Ioduro de azufre. . . . ḡxij (6 dec.).
Manteca. ℥j (30 gr.).
M. Se usa frotando ligeramente

las partes enfermas, dos veces al dia, con un escrúpulo de ella.

7964. P. DE IODURO DE AZUFRE
(Biett).

℥ Ioduro de azufre. ḡxviiij (4 gr.).
Manteca purificada. ʒv (20 gr.).

M. I. Escrófulas cutáneas, acné, prúrigo, sarna, pórrigo, soriasis, eczema, amenorrea, escrófulas, herpes, tiña, sífilis, sífilides, favus, lepra, liquen, tubérculos de la piel, sarna, impétigo, lupus.
D. En fricciones.

7965. P. DE IODURO DE BARIO
(Biett).

℥ Ioduro de bario. ḡjv (2 dec.).
Manteca. ʒj (30 gr.).

H. S. A. I. Ciertos casos de infartos escrofulosos. *D.* Se dan fricciones dos ó tres veces al dia sobre las partes enfermas con ʒj (4 gr.) de pomada.

7966. Otra (RADIUS).

℥ Ioduro de bario. ʒß (2 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Efélides, escrófulas, sífilides, eczema, pórrigo, cáncer, lepra, lupus. *D.* En fricciones.

7967. P. DE IODURO DE HIERRO.

℥ Ioduro de hierro. ʒj (4 gr.).
Manteca. ʒj (32 gr.).

M. I. Leucorrea y catarro útero-vaginal. *D.* En fricciones en los muslos. Tumores blancos, infartos escrofulosos, sífilis, sífilides, lepra, soriasis, lupus, ovaritis, orquitis, prostatitis, sarcocele, fisoblefaron, mareo, congestión, artrocace, hernia, esplenitis, bocio.

7968. Otra (PIERQUIN).

℥ Ioduro de hierro. ʒjß (6 gr.).

Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Amenorrea, flores blancas. *D.* El grosor de una avellana, mañana y noche, en la parte interna y superior de los muslos.

7969. P. DE IODURO DE IODHIDRATO DE QUININA (*Righini*).

℥ Ioduro de iodhidrato de quinina. ʒß (2 gr.).

Esperma de ballena. ʒv (20 gr.).
Aceite de alm. dulces. ʒx (40 gr.).

Se funde á fuego lento el aceite y la esperma de ballena, se deja enfriar, y despues se le incorpora con cuidado con la sal de quinina.

I. Infarto del bazo á consecuencia de las calenturas intermitentes rebeldes. *D.* En fricciones.

7970. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO (*H. DE M.*).

℥ Protoioduro de mercurio. ʒß (6 dec.).
Manteca purificada. ʒj (30 gr.).

M. I. Bubones venéreos, úlceras venéreas. *D.* ḡxviiij (1 gr.) para una fricción.

7971. Otra (BIETT).

℥ Protoioduro de merc. ʒj á ʒij (12 á 24 dec.).

Manteca de puerco. ʒj (32 gr.).

M. I. Úlceras venéreas. *D.* ḡxviiij (1 gr.) para una fricción.

7972. Otra (MAGENDIE).

℥ Protoioduro de mercur. ḡxx (4 gr.).
Manteca. ʒjß (45 gr.).

H. S. A. I. y D. Se ha alabado esta pomada en el tratamiento de las úlceras venéreas inveteradas, cuya cicatrización acelera según se asegura.

7973. Otra (LUGOL).

NUMERO 1.

℥ Protoioduro de mercur. ʒij (4 dec.).
Manteca. ʒij (60 gr.).

NUMERO 2.

- ℥ Protoioduro de mercur. ḡijv (2 dec.).
Manteca. ḡij (60 gr.).

NUMERO 3.

- ℥ Protoioduro de merc. ḡv (25 cent.).
Manteca. ḡij (60 gr.).

M. I. Lepra, líquen, lupus, efélides, acne, soriasis, rupia, eczema, sífilis, sífilides, sarcoccele, bocio, escrófulas, orquitis, adenitis indolentes, esclerotitis, catarata, iritis, oftalmia, angina, esplenitis, hepatitis, meningitis, clorosis, erisipela, flebitis, metritis, flegmasia blanca dolorosa.
D. En fricciones.

La fórmula de la *F. P.* contiene ḡij (24 dec.) en el número 1, ḡj (36 dec.) en el número 2, y ḡjv (48 dec.) en el número 3.

7974. P. DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (H. DE M.).

- ℥ Deutoioduro de merc. . . ḡxij (6 dec.).
Manteca de puerco. . . . ḡj (30 gr.).

H. S. A. I. Se usa como resolutiva cuando hay complicacion sífilítica.

7975. P. DE BIODURO DE MERCURIO (Hoffmann).

- ℥ Manteca. ḡij (8 gr.).
Biioduro de mercurio. $\text{ḡ}^{2/5}$ (2 cent.).

H. S. A. I. Efélides y afecciones de la piel de naturaleza indeterminada. *D.* C. s. en fricciones.

7976. P. DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (Magendie).

- ℥ Manteca. ḡjβ (45 gr.).
Deutoioduro de merc. ḡxx (4 gr.).

H. S. A. I. y *D.* Esta pomada, mas activa que la de protoioduro, se usa del mismo modo, pero á menor dosis, contra las úlceras venéreas inveteradas.

La POMADA DE IODURO DE MERCURIO DE LOS H. M. se compone de ḡj (12 dec.) de proto ó deutoioduro de mercurio y ḡj (30 gr.) de manteca de puerco.

7977. Otra (BIETT).

- ℥ Deutoioduro de merc. ḡxij (6 dec.).
Manteca purificada. . . ḡj (30 gr.).
Esencia de bergamota. c. s.

M. I. Sífilis y afecciones escamosas secas y rebeldes, fijas en ciertas regiones, tubérculos sífilíticos, úlceras sífilíticas, sífilis constitucional.

7978. P. DE IODURO DE PLATA (F. DE L.).

- ℥ Ioduro de plata. . . . ḡxij (6 dec.).
Manteca. ḡj (30 gr.).
Tritúrese.

I. Enfermedades sífilíticas, blenorragia, bubones indolentes, encantís, lepra, lupus, mareo. *D.* Para diez fricciones dos veces al dia.

7979. P. DE IODURO DE PLOMO.

- ℥ Ioduro de plomo. ḡj á ḡij (4 á 8 gr.).
Emplasto de cicuta. . . . ḡj (30 gr.).

M. I. Tumores venéreos y escrofulosos, úlceras escrofulosas, úlceras de la matriz. *D.* Si hay dolores vivos se añaden ḡvj á ḡxij (3 á 6 dec.) de extracto gomoso de opio.

7980. P. DE IODURO DE PLOMO (H. DE M.).

- ℥ Deutoioduro de plomo. ḡj (4 gr.).
Manteca de puerco. . . . ḡj (32 gr.).
H. S. A. I. Úlceras escrofulosas.

7981. P. DE IODURO DE POTASIO.

- ℥ Ioduro de potasio. . . . ḡxx (4 gr.).
Manteca de puerco. . . . ḡj (30 gr.).

La farmacopea francesa indica ḡxx (10 dec.) de ioduro por ḡjv (16 gr.) de manteca; creemos que esta fórmula es mala, sobre todo al principio. En nuestro concepto es preferible empezar por una

trigésima parte de iodo para llegar á la octava, que es la cantidad por la que dicha farmacopea aconseja que se empiece.

7982. P. DE IODURO DE POTASIO.

Cuando hay que usar la pomada de ioduro de potasio en partes cuya piel es muy fina é impresionable, se puede usar la siguiente:

- ℥ Ioduro de potasio. ḡxviiij (1 gr.).
- Cerato sin agua. ʒijʒ (10 gr.).
- Agua de rosas. ḡxviiij (1 gr.).
- Esencia de rosas. 2 gotas.

H. S. A.

Si hay que combatir tumores acompañados de dolores vivos se puede añadir á la pomada anterior:

- Iodhidrato de morfín. ḡjx (50 cent.).
- ó Alcanfor. ʒʒ (2 gr.).

7983. Otra (MAGENDIE).

- ℥ Manteca. ʒj (32 gr.).
- Ioduro de potasio. ʒʒ (2 gr.).

H. S. A. *I.* Bócio, escrófulas, tumores indolentes é infartos crónicos de las glándulas. *D.* Se dan fricciones sobre el tumor y despues se le cubre con papel empapado en la misma pomada.

7984. P. DE IODURO DE POTASIO IODURADA (Coindet).

Se añade á la anterior:

- ℥ Iodo. ḡx (5 dec.).
- I.* y *D.* Las mismas que las anteriores.

7985. P. DE IODURO DE POTASIO (Mialhe).

- ℥ Manteca fresca. ʒj (30 gr.).
- Ioduro de potasio. ḡxviiij á ʒij (1 á 8 gr.).

Es uno de los mejores tópicos iodurados.

Segun Mialhe la pomada de ioduro de potasio, preparada con

la manteca fresca y el ioduro potásico bien neutro, es sin contradiccion el mejor tópicos iodurado que se conoce. Algunos prácticos añaden á esta pomada cierta cantidad de iodo con el objeto de aumentar sus propiedades fluidificantes y desobstruentes; pero este último, en lugar de aumentar su accion curativa, inflama el tegido dermoideo, y se pierde en todo ó en parte el efecto dinámico que se ha obtenido durante la absorcion del ioduro.

Si existe dolor se puede añadir:

- Hidroclor. de morfín. ḡjx (50 cent.),
- ó Alcanfor. ʒʒ (2 gr.).

7986. P. DE IODURO DE POTASIO IODURADO (H. DE M.).

- ℥ Iodo. ʒʒ (6 dec.).
- Ioduro de potasio. ʒʒ (2 gr.).
- Manteca. ʒj (30 gr.).

H. S. A. *I.* Tumores de naturaleza sifilitica.

7987. P. DE IODURO DE ZINC (Ure y Magendie).

- ℥ Manteca. ʒj (30 gr.).
- Ioduro de zinc. ʒj (4 gr.).

H. S. A. *I.* Ulceraciones escrofulosas, tumores escrofulosos; reemplaza en ciertos casos á la pomada de ioduro de potasa. *D.* Se dan fricciones dos ó tres veces al dia sobre las partes enfermas con ʒj (4 gr.) de esta pomada.

7988. P. IRRITANTE.

- ℥ Extracto de belladona. 4
 - Ungüento mercurial. 4
 - Aceite comun. c. s.
- M. I.* Oftalmias agudas. *D.* En fricciones.

7989. Otra, n. 2.

- ℥ Aceite de croton. ḡx (50 cent.).
- Manteca. ʒʒ (15 gr.).

M. D. El volúmen de una ave-llana, dos veces al día, en fricciones, hasta producir la salivación.

7990. P. IRRITANTE (H. M.).

℥ Tártaro emético. ℥iij (12 gr.).
Alcanfor. ℥ij (8 gr.).
Azufre sublimado. ℥j (4 gr.).

Se trituran y se añade:

Manteca de puerco. ℥j (32 gr.).

H. S. A. Se cubre con ella el sitio prescrito y se aplica encima una cataplasma emoliente.

7991. P. DE JAMES ó Pomada de laurel real.

℥ Esencia de laurel real. ℥ij (8 gr.).
Manteca. ℥ij (60 gr.).

M. I. Quemaduras, infartos de las mamas, mareo. Sirve para calmar los dolores lancinantes de los cánceres.

7992. P. DE JANIN (H. DE S. J.).

℥ Mercurio dulce,
Tucia, añ. ℥j (4 gr.).
Bol arménico. ℥ij (8 gr.).
Manteca lavada en agua

de rosas. ℥℞ (16 gr.).
M. I. Oftalmia escrofulosa, blefaritis, conjuntivitis, manchas de la córnea. *D.* ℥xviiij á ℥j (1 á 4 gr.) en fricciones en el borde libre de los párpados.

7993. P. DE JASSER.

℥ Flores de azufre,
Sulfato de zinc,
Bayas de laurel, añ. ℥ij℞ (10 gr.).
Ungüento rosado. ℥x (40 gr.).

M. I. Sarna, cáncer, lepra, elefantiasis. *D.* En fricciones.

7994. P. DE KOPP.

℥ Precipitado blanco. 4 á 5
Ungüento de digital. 30

Es mas activa y causa menos dolor que la de Autenrieth.

I. Coqueluche, peritonitis puerperal, neumonía, bronquitis, catarro crónico, herpes, eczema, tiña. *D.* En fricciones en el epigastrio ó sitios correspondientes.

7995. P. DE KRUGER HAUSEN.

℥ Calomelanos. ℥℞ (2 gr.).
Opio. ℥xij (6 dec.).
Manteca. ℥℞ (15 gr.).

M. I. Crup. *D.* En fricciones en la parte anterior del cuello.

7996. P. DE LAUREL ó Ungüento de laurel (F. F.).

℥ Hojas recientes de laurel,
Bayas de laurel, añ. ℥bj (500 gr.).
Manteca de puerco. ℥bij (1000 gr.).

Se contunden las hojas y bayas de laurel y se ponen con la manteca á un fuego moderado hasta que se evapore toda la humedad; se cuele con fuerte expresion, se deja enfriar con lentitud y se separa el sedimento que forma; se derrite otra vez la pomada, y cuando está medio fria se la echa en una vasija de barro.

I. Dolores reumáticos, parálisis, etc. *D.* En fricciones.

7997. P. DE LUPULINA (Freake).

℥ Lupulina en polvo. ℥j (30 gr.).
ó Lúpulo. ℥ij (60 gr.).

Se digiere en el baño maría durante cinco á seis horas en

Manteca. ℥iij (90 gr.).

Se cuele y se guarda.

I. Cáncer y escrófulas. Se usa como sedante en los dolores cancerosos.

7998. P. DE LÚPULO.

℥ Lúpulo muy oloroso. 4
Manteca. 10

Se digiere y se cuele con expresion.

I. Se usa para calmar los dolores lancinantes del cáncer. Debe preferirse la pomada de lupulina.

7999. P. DE LYON.

Ungüento rosado. ℥j (32 gr.)
Deutóxido de mercurio. ℥β (2 gr.).
H. S. A. I. Inflamacion crónica de los párpados. D. Se extiende ligeramente esta pomada sobre los bordes de los párpados infartados, que destilan un humor mucoso que los pega durante el sueño.

8000. Otra, n. 2.

Oxido rojo de merc. ḡxviiij (1 gr.).
Manteca. ℥vj (24 gr.).
Esencia de limon. ḡxviiij (1 gr.).
M. I. Oftalmias escrofulosas, blefaritis, conjuntivitis. D. ḡxviiij á ḡxxxvj (1 á 2 gr.) en fricciones en el borde libre de los párpados.

8001. P. DE MANZANAS Y PASAS (F. P.).

Manteca de vacas fresca, sin sal, 3
ó á falta de ella
Manteca de puerco sin sal. 3
Cera amarilla. 1
Pasas sin semillas. 1
Manzanas dulces sin pepitas. . . . 1

Se derrite primero la manteca y la cera, se añade despues las pasas y las manzanas bien machacadas y mezcladas, se cuece en una vasija de barro, hasta que echando algunas gotas en la lumbre no se enciendan; se cuele la masa hirviendo por un paño con expresion en un vaso lleno de agua rosada, y despues de fria se separa de ella.

I. Inflamaciones, grietas y escoriaciones de los labios.

8002. P. DE MANGANESO.

Bióxido de manganeso. 1
Manteca 1
M. I. Tiña, sarna, herpes.

8003. P. DE MELIER.

Subcarbonato de sosa. ℥ij (60 gr.).
Agua. ℥j (30 gr.).

Se disuelve en caliente y se añade:

Aceite comun. ℥jv (125 gr.).
Se forma un jabon y se incorpora con

Flores de azufre. ℥jv (125 gr.);
ó bien con

Alcanfor. ℥β (15 gr.).

I. Sarna, asma. D. Dos fricciones al dia con ℥ij (60 gr.) de pomada durante doce á catorce dias.

8004. P. MERCURIAL (Bataille).

Ungüento mercurial. ℥vj (24 gr.).
Cera amarilla. ℥ijβ (10 gr.).
Pez negra. ℥jβ (6 gr.).

H. S. A. Se aplica exactamente desde el principio de la erupcion variolosa.

8005. Otra (BIETT).

Protosulfato de merc. ℥j (4 gr.).
Azufre sublimado. ℥ij (8 gr.).
Manteca. ℥ij (60 gr.).
Esencia de limon. 15 gotas.

M. I. Herpes liquenoides poco intensos.

8006. P. MERCURIAL DE COTTEREAU (F. P.).

Pomada mercurial antigua. 1
Mercurio purificado. 8
H. S. A. y al concluir se añade:

Manteca de cerdo sin sal. 4
Se continúa triturando hasta que se extinga perfectamente el mercurio, y se añade:

Manteca de cerdo. 7
Mézclese exactamente.

I. Sífilis. D. En fricciones.

8007. Otra (DUPUYTREN).

Ungüento napolitano,
Sal amoniaco, aa. ℥β (15 gr.).

M. I. Prostatitis, orquitis, adenitis, úlceras venéreas é indolentes, infartos linfáticos y cancerosos, sífilides, artrocace, hidroraquis, blefarospasmo, hidroftalmia, iritis, amaurosis, esclerotitis, manchas, catarata, flebitis, meningitis, metritis, peritonitis, angina, pleuresia, carditis, atrofia mesentérica, hidrocéfalo, flegmasia blanca dolorosa, tétanos, coriza, sabañones, eczema, efélides, viruelas, soriásis, rupia, flemon, muermo. *D.* ʒj (4 gr.) en fricciones mañana y noche.

**8008. P. MERCURIAL DE COTTE-
REAU (Jadelot).**

ʒ Jabon blanco raspado. 1
Aceite comun. 2
Protocloruro de mercurio preparado al vapor. 4

Se añade al jabon la octava parte de su peso de agua y se le ablanda en el baño maría. Se diluye en aceite y se añade el mercurio dulce en frio.

I. Se usa como antisifilítico y antiépsórico.

**8009. P. MERCURIAL DE SAVE
(F. P.).**

ʒ Mercurio purificado. 20
Manteca de cerdo. 20
Acido tártrico. 3
H. S. A.

**8010. P. IODO MERCURIAL ALCAN-
FORADA (Golfín).**

ʒ Protoioduro de merc. ʒB (2 gr.).
Ioduro de potasio. ʒLjv (3 gr.).
Alcanfor. ʒB (2 gr.).
Cerato de Galeno. ʒj (32 gr.).
H. S. A. *I.* Hidrocéfalo agudo. *D.* ʒB á ʒj (2 á 4 gr.) en fricciones.

**8011. P. MERCURIAL AMONIACAL
(Hufeland).**

ʒ Bicloruro de mercurio. ʒB (45 gr.).

Clorhidrato de amon. ʒB (45 gr.).
Agua destil. de rosas. ʒjv (125 gr.).
Manteca. ʒjv (125 gr.).
H. S. A. *I.* Exóstosis traumáticas, tumores blancos, tumores glandulosos. *D.* ʒB á ʒj (2 á 4 gr.) en fricciones mañana y noche.

**8012. P. MERCURIAL ANODINA
(Weller).**

ʒ Extracto de beleño. ʒxij (6 dec.).
Opio purificado. ʒvj (3 dec.).
Pomada merc. doble. ʒj (4 gr.).

M. I. Dolores nocturnos que acompañan á la oftalmia sífilítica. *D.* En fricciones por la noche en la region ciliar.

**8013. P. MERCURIAL ASTRINGENTE
(Ritterich).**

ʒ Mercurio precipitado
blanco. ʒjv (2 dec.).
Oxido de zinc sublim. ʒviiij (4 dec.).
Extracto de ratania. ʒx (5 dec.).
Manteca de vacas fresc. ʒij (8 gr.).

M. I. Tercer período de la blefoftalmia de los recién nacidos. *D.* El grosor de la cuarta parte ó mitad de un grano de trigo, introducido mañana y noche entre los párpados.

**8014. P. MERCURIAL CON BELLA-
DONA (P. de Mignot.).**

ʒ Ungüento mercur. doble. ʒj (32 gr.).
Extracto hidroalcohólico
de belladona. ʒj (4 gr.).
Bálsamo líquid. del Perú. ʒj (4 gr.).

M. I. Fimosis complicado con sífilis y en otros muchos casos. Así añadiendo ʒxviiij á ʒxxxvj de extracto gomoso de opio, se obtiene un excelente tópico contra los tumores hemorroidales.

**8015. P. MERCURIAL BELLADONI-
ZADA (Sichel).**

ʒ Extracto de belladona. ʒj (4 gr.).
Agua destilada. ʒij (8 gr.).

Disuélvase y mézclese S. A. con la conjuntiva. *D.* Se aplica á la Pomada mercurial doble. ℥ij (8 gr.) parte enferma.

I. Oftalmias violentas acompañadas de fotofobia intensa. *D.* El grosor de una avellana en fricciones sobre la parte superior de la frente, cinco á seis veces al día.

Nota. Sustituyendo á la solución de belladona ℥j (4 gr.) de láudano de Rousseau se tiene la pomada mercurial laudanizada, que se usa en los mismos casos y del mismo modo.

8016. P. MERCURIAL CON BELLADONA (Velpeau).

℥ Ungüento merc. doble. ℥j (30 gr.).
Extracto de belladona. . ℥j (4 gr.).
M. I. Infartos linfáticos.

8017. P. MERCURIAL BELLADONIZADA Y ALCANFORADA (J. Cloquet).

℥ Ungüento mercurial doble. 4
Extracto de belladona. 4
Alcanfor. 4
M. I. Oftalmias rebeldes. *D.* En fricciones en la frente y sienes.

8018. P. Ó UNCIÓN MERCURIAL CON BELLADONA (Desmarres).

℥ Miel blanca. 40
Extracto de belladona. 5
Mercurio. 5
H. S. A. I. Fotofobia en las oftalmias intensas. *D.* Cinco á seis fricciones al día en la frente y sienes con el volúmen de una avellana de la mezcla, cuidando de limpiarla á la media hora.

8019. P. MERCURIAL CON CREOSOTA (Tanesville).

℥ Óxido rojo de mercurio porfirizado. ℥xviiij (4 gr.).
Manteca. ℥j (30 gr.).
Creosota. 10 gotas.
M. I. Enfermedades crónicas de

8020. P. MERCURIAL CON ZINC (Vogel).

℥ Tucia preparada. ℥xv (75 cent.).
Sulfato de zinc. ℥ij (10 cent.).
Bióxido de mercurio. ℥vj (30 cent.).
Manteca fresca. ℥ij (8 gr.).

H. S. A. I. Blefnoftalmia cataral atónica, manchas de la córnea. *D.* El volúmen de un grano de trigo, introducido mañana y noche entre los párpados.

8021. P. MERCURIAL IODURADA (Hanche).

℥ Ungüento gris. ℥j (30 gr.).
Iodo. ℥viiij (4 dec.).
Ioduro de potasio. ℥jβ (6 gr.).

M. I. Inflamacion del periostio. Al mismo tiempo se administra el agua iodurada.

8022. P. MERCURIAL DE MANTECA DE CACAO.

℥ Manteca de cacao. ℥β (15 gr.).
Aceite de almendras. ℥j (4 gr.).
Se funde, se echa en un mortero de mármol calentado y se añade poco á poco:
Mercurio. ℥v (20 gr.) hasta que se extinga.

8023. P. MERCURIAL CON MANTECA DE CACAO, DE PLANCHE (F. P.).

℥ Mercurio purificado,
Manteca de cacao muy reciente, ãã. ℥ij (60 gr.).
Aceite de huevos muy reciente. 20 gotas.

H. S. A. I. y D. Se emplea en los mismos casos y á las mismas dosis que el ungüento mercurial doble, pero es de un uso mas agradable.

8024. P. DE MERCURIO AMONIACAL
(Dupuytren).

℞ Pomada merc. doble. ℥xij (48 gr.)
Hidroclorato de amon. ℥jv (16 gr.)
M. I. Exóstosis traumáticas, tumores blancos, tumores glandulosos. D. De ℥β á ℥j (2 á 4 gr.) mañana y noche.

8025. P. MERCURIAL OPIADA.

℞ Ungüento mercurial doble. 4
Cerato opiado. 4
M. I. Segundo período de la peritonitis puerperal, oftalmias, oftalmítis, hidroftalmia, hipopion, catarata, conjuntivitis, iritis, amaurosis, esclerotitis, escrófulas, sífilis, sífilides, hidrocele, angina, esplenitis, blenorragia, artrocace, úlceras, soriásis, rupia, eczema, muermo, atrofia mesentérica, meningitis, flebitis, carditis, metritis, ovaritis, sabañones, gota, hidrorraquis, flegmasia blanca dolorosas. D. ℥j (4 gr.) en fricciones al abdómen, dos ó tres veces al día.

8026. Otra (WELLER).

℞ Bióxido de mercurio. ḡv (25 cent.).
Láudano de Sydenham. ℥β (2 gr.).
Manteca. ℥j (4 gr.).
M. I. Manchas de la córnea. D. Se aplica una ó dos veces al día una cantidad que equivalga al grueso de la cabeza de un alfiler.

8027. P. DE MERCURIO DULCE.

℞ Mercurio dulce preparado al vapor. ℥β (2 gr.).
Alcanfor. ḡvj (3 dec.).
Manteca. ℥j (30 gr.).
Mézclese. I. V. núm. 8029.

8028. Otra, n. 2.

℞ Mercurio dulce. 4 á 2

Manteca. 8
Mézclese. I. V. la siguiente.

8029. Otra (F. P.).

℞ Mercurio dulce. ℥j (4 gr.).
Ungüento rosado. ℥j (32 gr.).
Aceite de espliego. ℥j (12 dec.).
M. I. Infartos del hígado. D. ℥β á ℥ij (2 á 8 gr.) en fricciones.

8030. P. MINERAL ó Pomada de sulfato mercurioso.

℞ Sulfato mercurioso. ℥β (2 gr.).
Manteca de yemas de chopo. ℥ij (60 gr.).
Mézclese.

8031. P. DE MONESIA.

℞ Extracto de monesia. ℥j (4 gr.).
Manteca de cerdo. ℥j (32 gr.).
H. S. A. una pomada, que contendrá la octava parte de su peso de extracto.
I. V. la siguiente.

8032. Otra, n. 2.

℞ Extracto de monesia. 4
Agua. 4
Aceite de almendras. 4
Cera blanca. 2
H. S. A. Se debe llamar á esta pomada cerato de monesia.
I. Úlceras cutáneas de diferente naturaleza, oftalmias purulentas, estomatitis, hemorroides, grietas del ano, sabañones no ulcerados.

8033. P. DE MORFINA.

℞ Acetato de morfina. ḡvj (3 dec.).
Manteca. ℥ij (8 gr.).
M. I. Dolores, neuralgias, reumatismo, gota, ceática, lumbago, tenesmo, zona.

8034. Otra (SANDRAS).

℞ Clorhidrato de morfina. ḡij (1 dec.).

Manteca balsámica. . . ʒjʒ (16 gr.).
M. I. Neuralgia facial, ceática, neuralgia del corazón, neuralgia femoral. *D.* Se aplica en unturas á la parte dolorida.

8035. P. DE NAFTALINA (Emery).

ʒ Naftalina. ʒʒ (2 gr.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).
M. I. Soriasis, lepra, prurigo, sarna, tiña granulosa, herpes, eczema, etc.

8036. P. CONTRA LAS NEURALGIAS (Debreyne).

ʒ Extracto de belladona,
 Manteca de cerdo, ña. ʒij (12 gr.).
 Opio. ʒʒ (2 gr.).
 Esencia de tomillo. . . c. s.
H. S. A. I. Neuralgia, excepto la ceática, dolores nerviosos locales, jaquecas, etc. *D.* El volumen de una avellana de esta pomada por la mañana, al medio día y á la noche, sobre todo cuando los dolores son muy fuertes. Cada fricción durará cinco á seis minutos hasta que se absorba la pomada, y se añade un poco de saliva para que la pomada penetre mejor. Se suspenderá cuando la vista se altere.

8037. P. DE NITRATO DE ESTRICNINA (Wendt).

ʒ Manteca. ʒij (8 gr.).
 Nitrato de estrienina. ʒij (4 dec.).
H. S. A. I. Gota anómala, afecciones artríticas y de la columna vertebral. *D.* ʒj (4 gr.) en fricciones.

8038. P. DE NITRATO DE MERCURIO.

ʒ Protonitrato de merc. ʒxviii (1 gr.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).
M. I. Eczema crónico y particularmente en las formas escamosas.

8039. Otra (DUBOIS).

ʒ Pomada de pepinos. . . ʒʒ (16 gr.).
 Nitrato de mercurio. . . ʒij (8 gr.).
M. I. Afecciones herpéticas poco intensas.

8040. P. DE PRONITRATO DE MERCURIO.

ʒ Pronitrato de mercur. ʒjʒ (6 gr.).
 Manteca. ʒj (32 gr.).
 Se trituran en un mortero de vidrio.
I. Lepra y soriasis.

8041. P. DE PRONITRATO DE MERCURIO (Bielt).

ʒ Pronitrato de merc. ʒj (12 dec.).
 Manteca purificada. . . ʒj (30 gr.).
M. I. Sarna; lepra y afecciones escamosas.

8042. P. DE NITRATO DE PLATA.

ʒ Nitrato de plata crist. ʒv (25 cent.).
 Opio. ʒijv (20 cent.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).
M. I. Blenorrea, úlceras, quemaduras, blefaritis, encantis, lepra. *D.* Se introduce en el conducto de la uretra, ó se dan fricciones en la parte dolorida.

8043. Otra (CAZENAVE).

ʒ Pez blanca. ʒjv (16 gr.).
 Cera. ʒij (8 gr.).
 Aceite de almendras dulces. ʒʒ (2 gr.).
 Se liquida y se añade:
 Nitrato de plata fundido en polvo. . ʒvjʒ (26 gr.).
M. I. Sirve para cauterizar las estrecheces de la uretra. *D. C. s.* para untar un bordon.

8044. P. DE NITRATO DE PLATA Ó Pomada oftálmica (Guthrie).

ʒ Nitrato de plata cristalizado y porfiriz. ʒviii (4 dec.).

Manteca. ʒij (8 gr.).
 Acetato de plomo liq. ʒvj (3 dec.).
 Mézclase exactamente.

I. Oftalmias escrofulosas, catarrales ó crónicas, blefaritis, manchas de la córnea, y en bujías en la blenorrea rebelde. *D.* El grosor de una cabeza de alfiler, tres ó cuatro veces al día, sobre el borde libre de los párpados.

8045. *Otra* (GUEPIN).

ʒ Nitrato de plata. ʒ
 Grasa balsámica. 20
 Aceite. 5

H. S. A. I. Se usa en los mismos casos que otras pomadas análogas.

8046. *Otra* (H. M. F.).

ʒ Nitrato de plata cristalizado. ʒviiiij (4 dec.).
 Manteca. ʒj (30 gr.).
 Se tritura exactamente sobre un pórfido (Scouteten).

8047. *Otra* (JOBERT).

NUMERO 1.

ʒ Nitrato de plata. . . . ʒj (4 gr.).
 Manteca. ʒj (32 gr.).
M. I. Tumores blancos de la rodilla. *D.* En fricciones.

La pomada número 2 contiene ʒij (8 gr.) de nitrato, y la del número 3 ʒiiij (12 gr.) por ʒj (32 gr.) de manteca.

8048. POMADA DE NOGAL.

ʒ Extracto de hojas de nogal. ʒj (32 gr.).
 Manteca. ʒx (40 gr.).
 Esencia de bergam. ʒiiij (15 cent.).

Se hacen fricciones suaves durante un cuarto de hora, dos veces al día.

8049. P. DE NUEZ DE AGALLA.

ʒ Nuez de agalla,
 Tintura de opio, añ. ʒB (2 gr.).

Alcanfor. ʒxviiiij (4 gr.).
 Cera. ʒij (8 gr.).
M. I. Hemorroides, caída del recto, encantis. *D.* Se aplica c. s. al rededor del ano.

8050. P. OBSTÉTRICA
 (*Chaussier*).

ʒ Extracto de belladona. ʒij (8 gr.).
 Agua destilada. ʒij (60 gr.).
 Se disuelve el extracto en el agua y se le incorpora con

Manteca ó cerato. . . . ʒij (60 gr.).
I. Rigidez de la matriz en el momento del parto. *D.* Se aplican ʒij (8 gr.) por medio de una geringuita de cánula larga ó por medio del dedo.

8051. P. OFTÁLMICA.

ʒ Manteca. ʒxc (5 gr.).
 Nitrato de plata. ʒij (4 dec.).
M. I. Oftalmias granulares. *D.* El volúmen de un guisante en el borde libre de los párpados inferiores.

8052. *Otra*, n. 2.

ʒ Ungüento rosado. . . . ʒj (32 gr.).
 Precipitado rojo. . . ʒxxxvj (2 gr.).
M. I. Oftalmias crónicas. *D.* Se usa como la pomada oftálmica de Grand Jean, solo que es mas suave.

8053. *Otra*, n. 3.

ʒ Ungüento napolitano. ʒij (8 gr.).
 Opio en bruto. ʒvj (3 dec.).
 Extracto de beleño. . ʒxij (6 dec.).
M. Se usa como la pomada oftálmica de Sichel.

8054. *Otra*, n. 4.

ʒ Aceite de hígado
 de bacalao. . . . ʒxxxij (16 dec.).
 Yema de huevo ó
 manteca. ʒxxvj (12 dec.).
 Extr. de Saturno. ʒxvj (8 dec.).

M. S. A. I. Oftalmias escrofulosas con manchas y úlceras de la córnea.

8055. P. OFTÁLMICA.

℥ Ungüento napolitano. . . ʒj (4 gr.).
Láudano de Rousseau. . . ʒβ (2 gr.).

M. I. Oftalmias dolorosas sin fotofobia. D. El grosor de una avellana para fricciones, cinco ó seis veces al día, en la parte superior de la frente.

8056. Otra (CARRONDE VILLARDS).

℥ Manteca de hígado de raya. ʒj (30 gr.).
Cianuro de hierro. . . ʒxxxjv (12 dec.).
Cianuro de mercurio. ʒviii (4 dec.).
Esencia de espliego. 4 gotas.

Mézclase sobre un pórfido.
I. Conjuntivitis escrofulosa crónica, manchas, oftalmias crónicas. D. Se usa en fricciones á dosis muy pequeñas.

8057. P. OFTÁLMICA (Cunier).

℥ Precipitado rojo. ʒjv (2 dec.).
Aceite de híg. de bacal. ʒj (4 gr.).
Cerato. ʒβ (2 gr.).

M. I. Úlceras interciliares, nubes de la córnea á consecuencia del pannus vascular, pannus celularo y úlceras atónicas, etc.

8058. Otra (DESMARRES).

℥ Sulfato de cobre porfir. ʒij (1 dec.).
Manteca lavada. ʒβ (2 gr.).
Alcanfor. ʒjv (2 dec.).

I. Ulceraciones de los párpados.

8059. P. ANTIOFTÁLMICA (H. M.).

℥ Manteca de puerco. . ʒij (60 gr.).
Oxido rojo de merc. ʒx (5 dec.).
Sulfato de zinc. . . . ʒxx (10 dec.).

H. S. A. I. Oftalmias crónicas y rebeldes sostenidas por una afeccion escrofulosa general. D. Se

cubre ligeramente el borde de los párpados.

8060. Otra (F. P.).

℥ Manteca fresca de cerdo, lavada en agua de rosas. 48
Alcanfor. 4
Oxido rojo de mercurio 4
Extracto de Saturno. 4

H. S. A. I. Inflamacion crónica de los párpados.

8061. P. OFTÁLMICA ó Pomada antioftálmica (Guthrie).

℥ Nitrato de plata. ʒij á ʒx (40 á 50 cent.).
Pomada de esperma de ballena. ʒj (4 gr.).
Subacetato de plomo líq. 15 gotas.

M. I. Oftalmias crónicas, escrofulosas, catarrales ó purulentas. D. El volúmen de la cabeza de un alfiler, debajo del párpado superior, y se dan fricciones ligeras tres ó cuatro veces al día. Graeffe la usa en la gonorrea crónica rebelde, en bujías de cera.

8062. P. OFTÁLMICA (H. DE M.).

℥ Precipitado rojo. ʒij (1 dec.).
Manteca de puerco. . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. I. Se usa untando ligeramente las pestañas.

8063. Otra (JADELOT).

℥ Manteca reciente. . ʒij (8 gr.).
Mercurio precipitado blanco. ʒxij (6 dec.).
Alcanfor. ʒviii (4 dec.).
Tucia preparada. . . ʒxv (75 cent.).
Manteca de cacao. . ʒβ (2 gr.).

H. S. A. I. Oftalmias escrofulosas. D. Se pone en el borde de los párpados el volúmen de una cabeza de alfiler de pomada, cada dos ó tres dias, en el momento de acostarse.

8064. P. OFTÁLMICA DE JANIN
(H. DE M.).

℥ Precipitado blanco. . . ʒj (4 gr.).
 Oxido de zinc impuro preparado,
 Bol arménico, añ. . . . ʒij (8 gr.).
 Manteca lavada con a-
 gua de rosas. . . . ʒβ (15 gr.).
 Mézclese S. A. y porfirícese.

I. Oftalmias escrofulosas, oftalmias crónicas. D. Se dan fricciones ligeras en el borde libre de los párpados, por la noche, con pequeñas porciones de pomada.

8065. P. OFTÁLMICA (Lyon).

℥ Ungüento rosado. . . ʒv (20 gr.).
 Precipitado rojo. . . ʒxviiij (4 gr.).
 M. I. Oftalmias crónicas. D. Se aplica como el grosor de un guisante sobre el borde libre de los párpados.

8066. Otra (REGENTE).

℥ Azafran. ʒij (64 gr.).
 Agua de rosas. . . lbvijβ (3750 gr.).
 Se macera durante veinticuatro horas y se cuele con expresion.
 Por otra parte se toman:
 Acanfor. ʒij (8 gr.).
 Aguardiente. . . . c. s.

Se disuelve y se vierte la solución encima del líquido de la maceración; se pone despues con la mezcla:

Manteca de vacas, despojada antes de la leche que contiene por la malaxación en agua fresca de pozo, lbjv (2000 gr.).

Se maceran despues durante cuatro dias, se separa luego la manteca del agua y se incorpora S. A.
 Deutóxido de mercurio porfirizado,
 Acetato de plomo cristalizado y porfirizado, añ. . . . ʒjv (125 gr.).

I. Oftalmias crónicas, oftalmias escrofulosas. D. C. s. para cubrir ligeramente el borde libre de los párpados.

8067. Otra (VELPEAU, SICHEL).

℥ Precipitado blanco. ʒj á ʒiiij (5 á 15 cent.).
 Manteca ó cerato
 sin agua. ʒj (30 gr.).
 H. S. A. V. núm. 8111.

8068. Otra (SCARPA).

℥ Tucia. ʒβ (2 gr.).
 Calomelanos. ʒj (5 cent.).
 Acibar. ʒx (5 dec.).
 Manteca. ʒij (8 gr.).
 M. I. Oftalmia escrofulosa.

8069. Otra (SICHEL).

℥ Manteca. ʒj (4 gr.).
 Precipitado rojo. . . ʒxv (75 cent.).
 Se mezcla y se añade:
 Sulfato de cadmio. . ʒij (10 cent.).
 M. Se usa para disminuir las cicatrices de la córnea. D. Dós ó tres fricciones al dia sobre el borde libre de los párpados inferiores, con el grueso de la cabeza de un alfiler de la mezcla.

8070. Otra (SICHEL).

℥ Ungüento mercurial. . . ʒij (8 gr.).
 I. Fotofobia y conjuntivitis muy agudas. D. El grosor de una ave-llana para fricciones, cinco ó seis veces al dia, en la parte superior de la frente.

8071. Otra (SICHEL).

℥ Ungüento napolitano. . . ʒij (8 gr.).
 Extracto de belladona. . ʒj (4 gr.).
 M. I. Oftalmias violentas acompañadas de fotofobia intensa. D. El grosor de una nuez para fricciones, cinco ó seis veces al dia, en la parte superior de la frente.

8072. Otra (VELPEAU).

℥ Nitrato de plata. . . . ʒj (5 cent.).

Manteca. ʒj (4 gr.).
M. I. Oftalmias granulares, blefaritis, manchas de la córnea. *D.* El grosor de un guisante en el borde libre de los párpados inferiores. Se procurará, antes de aplicar esta pomada, hacer caer las costras por medio de unturas hechas con aceite comun ó de almendras dulces, manteca ó cataplasmas emolientes.

8073. P. OFTÁLMICA
(William Adams).

℥ Nitrato de plata fundido en polvo,
 Azul de Prusia, ãã. ʒxx (10 dec.).
 Manteca. ʒj (4 gr.).
 Gotas de Blacks. ʒxx (10 dec.).
M. I. Oftalmia egipcia. *D.* Despues de haber practicado la excision de la conjuntiva, se cubre el interior de los párpados con un poco de pomada.

8074. P. OFTÁLMICA BLANCA DE
 AGUILERA (H. DE M.).

℥ Sublimado corrosivo. ʒß (6 dec.).
 Litargirio. ʒß (2 gr.).
 Sal amoníaco. ʒj (12 dec.).
 Extracto de opio. ʒvij (35 cent.).
 Manteca lavada con
 agua de rosas. ʒjß (45 gr.).
 Báls. peruano negro. ʒj (12 dec.).
 Se reducen á polvo las tres primeras sustancias, se disuelve el extracto en la menor cantidad posible de agua, se mezcla todo S. A. y se porfiriza.
I. Oftalmias crónicas palpebrales, sifilíticas y algunas otras.

8075. P. OFTÁLMICA DE DESSAULT
 (H. DE M.).

℥ Oxido rojo de mercurio pulverizado,
 Litargirio pulverizado,
 Oxido de zinc impuro
 preparado, ãã. ʒj (4 gr.).
 Sublimado corrosivo. ʒxij (6 dec.).
 Ungüento rosado. ʒj (30 gr.).

Mézclese S. A. y porfirícese la pomada. V. n. 7859.

I. Oftalmias crónicas en que hay complicacion sifilítica.

8076. P. OFTÁLMICA EXCITANTE
(Rust).

℥ Precipitado rojo. ʒvj (3 dec.).
 Manteca fresca sin sal. ʒij (8 gr.).
 Láudano de Sydenham,
 Subacétato de plomo líquido, ãã. ʒß (6 dec.).

M. I. Soroftalmia, segundo período de casi todas las oftalmias, sobre todo en las catarrales y escrofulosas, úlceras de los párpados, de la conjuntiva y de la córnea. *D.* El volúmen de la cabeza de un alfiler entre los párpados ó en fricciones sobre los párpados cerrados. Si produce mucho dolor se disminuye por cierto tiempo.

8077. P. OFTÁLMICA CON HOLLIN
(Carron de Villards).

℥ Tuétano de vaca. ʒj (30 gr.).
 Extracto de hollin. ʒlrv (3 gr.).
 Ungüento cetrino. ʒß (6 dec.).
 Aceite de hígado de
 bacalao. ʒij (24 dec.).

M. D. El volúmen de la cabeza de un alfiler en los párpados, que quedan enrojecidos despues de la oftalmia variolosa.

8078. P. OFTÁLMICA CON TUCIA
 (H. DE M.).

℥ Precipitado rojo. ʒjv (2 dec.).
 Oxido de zinc impuro
 levigado. ʒvj (3 dec.).
 Manteca de puerco. ʒij (8 gr.).
 Mézclese S. A.

I. Oftalmias crónicas palpebrales.

8079. P. OPIADA.

℥ Láudano líquido. ʒxc (5 gr.).
 Ungüento populcon. ʒij (60 gr.).

Yema de huevo fresco. número 1.

Harina de trigo. c. s.

Tritúrese todo.

I. Quemaduras, hemorragias, inflamaciones, cólico espasmódico, zona, erisipela, grietas, hemorragias, orquitis, cuerpos extraños, tenesmo, vólvulo, disuria, didimalgia, flebitis, oftalmia, lumbago, mammitis. *D.* En fricciones en la parte enferma.

8080. P. OPIADA.

℞ Opio en polvo. . . ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).

Cerato. ʒjv (125 gr.).

M. I. Sirve para curar las heridas y úlceras muy dolorosas, y para dar unturas en ciertas pústulas y en los tumores venéreos.

8081. Otra, n. 3.

℞ Extracto de opio. . . ʒxviii (1 gr.).

Disuélvase en

Agua. ʒβ (2 gr.).

y se mezcla con

Manteca balsámica. . . ʒx (40 gr.).

M. I. Úlceras ó úlceras venéreas muy dolorosas. *D.* ʒxviii (1 gr.) en cada cura.

8082. P. DE ORO (Legrand).

℞ Oro dividido. ʒvj á ʒxij (3 á 6 dec.).

Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Se usa en fricciones sobre las úlceras indolentes y excrescencias, úlceras venéreas, bubones venéreos, lepra, sífilides. Por el método endérmico. Encantis. *D.* ʒxviii á ʒxxxvj (1 á 2 gr.).

8083. P. DE OXIDO DE PLATA.

℞ Oxido de plata. . . . ʒxviii (4 gr.).

Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Enfermedades sífilíticas, gangrena de hospital, neuritis. *D.* Para diez fricciones dos veces al día.

8084. P. DE OXIDO ROJO DE MERCURIO ó Pomada de deutóxido de mercurio (Bielt).

℞ Oxido rojo de mercurio. ʒβ (2 gr.).

Manteca. ʒj (32 gr.).

Alcanfor. ʒjv (2 dec.).

M. I. Sífilides, afecciones crónicas de la piel con prurito, pórigo.

8085. P. DE DEUTÓXIDO DE MERCURIO ALCANFORADA (Monod).

℞ Bióxido de mercurio. . . ʒβ (2 gr.).

Alcanfor. ʒxc (5 gr.).

Manteca. ʒx (40 gr.).

M. I. Sífilides y afecciones crónicas de la piel con prurito.

8086. P. DE OXIDO ROJO DE MERCURIO ó Pomada contra la oftalmia.

℞ Oxido rojo de merc. ʒv (25 cent.).

Sulfato de zinc. ʒx (50 cent.).

Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Oftalmias crónicas, sobre todo cuando están sostenidas por la diátesis escrofulosa. *D.* Se aplica el grosor de un guisante sobre el borde libre de los párpados.

8087. P. DE OXIDO DE ZINC (Schmidt).

℞ Oxido de zinc porfirizad. ʒβ (2 gr.).

Aceite de nuez. ʒj (4 gr.).

Manteca de cerdo. ʒj (30 gr.).

M. I. Manchas de la córnea. *D.* Se aplica un poco de la pomada como el tamaño de una lenteja, dos veces al día.

8088. Otra (CAZENAVE).

℞ Oxido de zinc. ʒβ (2 gr.).

Cerato. ʒv (20 gr.).

M. I. Eczemas semiagudos, que fluyen poco humor.

8089. Otra (MARTÍN SOLON).

℞ Manteca. ʒj (30 gr.).

Oxido de zinc. 5ß (2 gr.).
 M. I. Eczema, impétigo, ecti-
 ma.

**8090. P. NÍTRICA ó unguento
 oxigenado (F. E.)**

℥ Manteca. lbß (250 gr.).
 Se derrite en una vasija ancha de
 porcelana y se echa poco á poco:

Acido nítrico puro. . . 3j (30 gr.).

Se menea con una espátula de
 madera hasta que no desprenda
 vapores rojos; entonces se aparta
 del fuego, se menea mucho, y
 cuando está fria se echa los moldes
 de papel y se guarda para cuan-
 do haya de usarse.

I. Sarna y afecciones crónicas
 de la piel, principalmente contra
 el pórriigo.

La POMADA OXIGENADA DE LOS H. M.
 se diferencia de la anterior, en que con-
 tiene 3vj (24 gr.) de ácido nítrico.

**8091. P. OXIGENADA ó Pomada
 nítrica (F. F., F. A. Y F. P.).**

℥ Manteca de cerdo. . . lbj (500 gr.).
 Acido nítrico de 32°. . 3ij (64 gr.).

Se derrite la manteca en una
 vasija de tierra, se añade el ácido
 nítrico y se continúa al fuego me-
 neándola con un tubo de vidrio
 hasta que empiecen á despren-
 derse búrbulas de gas nitroso,
 en cuyo caso se aparta del fuego,
 se sigue meneándola hasta que
 esté medio fria y se vacia en
 moldes de papel.

I. Afecciones crónicas de la
 piel, y principalmente contra la
 sarna, el pórriigo, herpes, afec-
 ciones cutáneas, epsóricas ó ve-
 néreas.

**8092. P. PARA LOS CABELLOS
 (Boucheron).**

℥ Jabon medicinal. 3i
 Cenizas de cuero. 3i
 Sal gemma. 3i
 Tártaro rojo. 3i

Polvo para el pelo. 3i
 Sulfato de hierro. 8
 Sal amoniaco. 8
 Coloquintida. 8
 Catecú. 8

Se mezclan exactamente todas
 éstas sustancias, divididas antes,
 con c. s. de manteca para hacer
 una pomada, y se unta un gorro
 de tafetan de esta composicion.

8093. Otra (HUART).

℥ Manteca saturada de lirio,
 Manteca saturada de clavel,
 Manteca saturada de canela,
 Manteca saturada de hojas de menta
 alcanforada, ãã. . . lbj (500 gr.).
 Oxido blanco de antimonio tartarizado,
 Esencia de tomillo,
 Esencia de salvia, ãã. 3jv (16 gr.).

Se toma la raiz de lirio en pe-
 dazos y la corteza de canela, se
 machacan los pétalos de clavel y
 hojas de menta, y se introducen
 estas sustancias en una vasija
 herméticamente cerrada; se fun-
 de la manteca á fuego lento, se la
 calienta mas y se la echa casi hir-
 viendo sobre las sustancias cita-
 das, se tapa la vasija, y se deja
 en contacto durante quince dias;
 al cabo de este tiempo se la fun-
 de de nuevo, se la prensa y cuela
 por un lienzo tupido, se incorpo-
 ra á la manteca el óxido reducido
 antes á polvo impalpable y las
 esencias por medio de la tritu-
 racion.

**8094. POMADA Ó CREMA PARA LA
 CARA.**

℥ Cera blanca. 10
 Esperma de ballena. 10
 Aceite de almendras dulces. . . 150
 Agua de rosas. 120
 H. S. A.

**8095. P. PARA DILATAR LA
 PUPILA.**

℥ Alcanfor. ʒj (12 dec.).
 Aceite de alm. dulces. c. s.

Se disuelve y se incorpora :

Extracto de belladona. ℥ij (8 gr.).

Ungüento napolitano. . ℥ij (8 gr.).

Para unturas en los párpados, cejas y sienes con un poco de esta pomada.

8096. P. PARA HACER ABORTAR LAS VIRUELAS.

℥ Ungüento napolitano. 3
Almidon en polvo. 4

M. Se la ha propuesto en lugar del emplasto de Vigo. Se usa teniendo cubierta constantemente la parte afectada.

8097. P. PARA LOS RECONOCIMIENTOS.

℥ Esperma de ballena. 4
Cera amarilla. 4
Aceite comun. 16
Sosa cáustica. 4

Se funde la esperma de ballena y la cera en aceite, á un calor lento, en un barreño barnizado; se añade la sosa cáustica y se agita hasta que se enfríe.

Se usa esta pomada para hacer los reconocimientos en la época del parto.

8098. P. DE PEPINOS.
Procedimiento de Page.

℥ Pan de puerco mondado. ℔xxjv (12000 gr.).

Grasa de vaca. . . . ℔xv (7500 gr.).

Se machaca en un mortero de hierro, se lava despues, primero con agua tibia y despues con agua fria, se deja escurrir y en seguida se funde en el baño maría; despues de haber añadido:

Báls. del Perú disuelt. ℥vj (24 gr.).

Agua de rosas. . . . ℥jv (125 gr.).

Se cuele con expresion y se deja aposar.

Se mondan sesenta pepinos, se los rae, se pone la pulpa en un saco de crin agujereado, se exprime y se pasa el zumo por un tamiz.

En un perol estañado, de la capacidad conveniente, se pesa

Grasa preparada antes aun caliente y colocada en la superficie. ℔xxvj (13000 gr.).

Se añade un tercio del zumo.

8099. Procedimiento de Bouron.

℥ Pepinos. ℔xv (7500 gr.).

Alcohol á 85°. . . . ℔ß (250 gr.).

Se rae los pepinos, se los pone con el alcohol sobre el diafragma de una cucúrbita, y se destila hasta obtener ℥vij (250 gr.) de alcoholato de pepinos. Se toma:

Manteca. ℥jv (125 gr.).

Esperma de ballena. ℥ß (15 gr.).

Cera blanca. ℥ij (8 gr.).

Licor anterior. . . . ℥ij (8 gr.).

Se funden los cuerpos grasos, se los vierte en un mortero calentado en agua hirviendo, y se añade el licor aromático; cuando la pomada empieza á trabarse, se la echa en botes.

8100. Procedimiento de Henry y Guibourt.

℥ Manteca de puerco preparada. . . . ℔bjv (2000 gr.).

Sebo de ternera purificado. . . . ℔j (500 gr.).

Se licúan y cuele, y cuando las grasas están frias se añade:

Zumo de pepinos. . ℔ij (1500 gr.).

Se mezcla y malaxa con la mano para multiplicar los puntos de contacto, se abandona esta mezcla por veinticuatro horas, se decanta el zumo, se reemplaza con otro nuevo, y esto se repite hasta diez veces haciéndolo siempre del mismo modo.

Cuando la manteca ha adquirido un olor muy declarado á pepinos, se derrite en el baño maría y se añade ℥jß (45 gr.) de almidon en polvo, destinado á dar consistencia al agua interpuesta y conseguir la precipitacion.

8101. Procedimiento de Dorvault.

- ℥ Manteca. ℔ij (1000 gr.).
- ℥ Pepinos. ℔v (2500 gr.).
- ℥ Melones. ℔v (2500 gr.).
- ℥ Manzanas de la reina. número 4.
- ℥ Leche de vacas. . . . ℔ij (1000 gr.).

Se rae los frutos y se los pone con la grasa y la leche en una vasija que se calienta en el baño maría durante ocho ó diez horas; se cuele despues con expresion, se deja enfriar en un paraje fresco, se separan la parte acuosa y las heces, se funde y se deja enfriar de nuevo para separar las primeras partes de este, y finalmente se bate.

I. Se usan como dulcificantes de la piel, y como excipientes de pomadas mas activas. Pitiriasis, viruelas, ectima, efélides, epinitis, grietas, sabañones, ninfomanía. *D.* ʒβ á ʒij (2 á 8 gr.) en fricciones.

8102. P. DE PEYSSON.

- ℥ Tártaro emético. . . . ʒxjv (7 dec.).
 - ℥ Agua hirviendo. . . . c. s.
- Se disuelve y se añade:
 ℥ Manteca. ʒβ (15 gr.).
 Divídase en doce papeles.

I. Apirexia de las calenturas intermitentes, inflamaciones, encefalitis, neumonía, carditis, cólera, coqueluche, laringitis, epilepsia, meningitis, neuritis, cáncer. *D.* Cuatro ó cinco fricciones al dia en el vientre, dorso, muslos ó brazos, cambiando de sitio para evitar los exantemas.

8103. P. DE PICROTOXINA.

- ℥ Picrotoxina. ʒx (5 dec.).
 - ℥ Manteca de cerdo. . . . ʒj (30 gr.).
- M. I.* Se la ha aconsejado contra la tiña.

8104. P. DE PIHOREL.

- ℥ Pomada mercurial doble. ʒijβ (10 gr.).
- ℥ Sulfuro de cal amoniaco en polvo. . . . ʒj (4 gr.).

M. I. Antisifilítica. *D.* En fricciones en las manos y en los piés á la dosis de ʒj á ʒij (4 á 8 gr.); la mitad por la mañana y la otra mitad por la noche.

8105. P. DE PIMIENTA ó Pomada rubefaciente de pimienta.

- ℥ Pimienta negra en polvo fino. . . . ʒ
- ℥ Manteca. ʒ

M. I. Pórrigo. *D.* Esta pomada se usa como rubefaciente.

8106. P. DE PIMIENTA (Cazenave).

- ℥ Pimienta en polvo. . . . ʒβ (2 gr.).
- ℥ Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Es muy útil en el pórrigo favoso.

8107. P. DE PINEL GRANDCHAMP.

- ℥ Oxido rojo de merc. . . ʒijβ (10 gr.).
- ℥ Carbon. de sosa seco. ʒjv (16 gr.).
- ℥ Sulfato de zinc. . . . ʒjβ (6 gr.).
- ℥ Tucia. ʒj (4 gr.).
- ℥ Flores de azufre. . . . ʒjv (16 gr.).
- ℥ Manteca. ʒjv (125 gr.).

M. I. Tiña, favus, pórrigo. *D.* Se cubre las partes enfermas despues de haberlas lavado con agua de jabon.

8108. P. DE PIRELAINA DE EMERY (F. P.).

- ℥ Pirelaina de brea. ʒ
- ℥ Manteca. ʒ

M. I. Herpes. No mancha la ropa.

8109. P. DE PRINGLE.

- ℥ Manteca. ʒijβ (75 gr.).
- ℥ Azufre. ʒj (30 gr.).
- ℥ Eléboro blanco,
- ℥ Sal amoniaco, añ. . . ʒij (8 gr.).

Nota. Es probable que el azafran sea enteramente inútil en esta composicion; por consiguiente se le podria suprimir y limitarse á verter la solucion alcohólica de alcanfor en el agua de rosas. Respecto de esta última, despues de separada de la manteca, se la conserva para ser destilada el año siguiente sobre nuevas rosas.

H. S. A. *I.* Sarna y prurigo. *D.* ʒj (30 gr.) al día en fricciones. Esta pomada cura comunmente en quince ó veinte días.

8110. P. DE PLOMBAGINA
(*Maerker*).

ʒ Plombagina. ʒij (8 gr.).
Sulfato de zinc. ʒß (2 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).
D. Se usa tópicamente.

8111. P. DE PRECIPITADO BLANCO.

ʒ Manteca. ʒj (4 gr.).
Precipitado blanco. ʒj á ʒiij (5 á 15 cent.).
Láudano de Sydenham. 8 á 10 gotas.
M. I. Blefaritis glandular.

8112. *Otra*, n. 2.

ʒ Precipitado blanco. . ʒxxviiij (4 gr.).
Manteca fresca. . . . ʒv (20 gr.).
Esencia de rosas. . . ʒxxxvj (2 gr.).
M. I. Afecciones herpéticas acompañadas de comezon viva.

8113. P. DE PRECIPITADO BLANCO Y ROJO (*Gibert*).

NÚMERO 1.

ʒ Precipitado blanco. . . ʒj (12 dec.).
Manteca. ʒj (30 gr.).
M. Para los niños solo se pone ʒxxv (75 cent.) de precipitado blanco.

NUMERO 2.

ʒ Precipitado rojo. . ʒxxv (75 cent.).
Manteca. ʒj (30 gr.).
M. I. Ulceras venéreas. *D.* La primera se usa para untar las mechas que se introducen en el ano en los casos de grietas, y la segunda en la cura de los tubérculos planos de las partes genitales, vegetaciones, tubérculos ulcerados de los niños de pecho y úlceras del ano.

8114. P. DE PRECIPITADO ROJO.

ʒ Oxido rojo de merc. . ʒxxviiij (4 gr.).
Sulfato de zinc. . . . ʒß (2 gr.).
Manteca. ʒiij (100 gr.).
M. I. Oftalmias escrofulosas, es-

clerotitis, oftalmitis, meningitis, y en fricciones en el borde libre de los párpados, en el punto dolorido, en la sífilis, sífilides, peritonitis, viruelas, hepatitis, soriásis, eczema, lepra, muermo.

8115. P. DE PRECIPITADO ROJO
ó *Pomada oftálmica* (*Sichel*).

ʒ Manteca. ʒj (4 gr.).
Precipitado rojo. ʒß á ʒij (25 mil. á 10 cent.).

Láudano de Sydenham. 8 á 10 gotas.

M. I. Blefaritis glandulares y manchas de la córnea. *D.* Se dan unturas en el borde libre de los párpados con una porcion de pomada como la cabeza de un alfiler.

Sichel añade á veces ʒij á ʒiij (10 á 15 cent.) de sulfato de zinc, de cobre ó de cadmio.

8116. P. DE PULSATILA.

ʒ Pulsatila en polvo. . . ʒxc (5 gr.).
Láudano. ʒxxviiij (4 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).

M. I. Reumatismo, gota, proptosis y didimalgia. *D.* En fricciones.

8117. P. PURGANTE (*Chrestien*).

ʒ Coloquintida en polvo. . ʒj (4 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).
M. I. Se usa en fricciones sobre el abdomen á la dosis de ʒj (8 gr.).

8118. P. DE QUINA AMARILLA
(*Rust*).

ʒ Alcanfor triturado, . . .
Mirra en polvo, ʒā. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
Quina amarilla en polvo, . . .
Ungüento de estoraque líquido, . . .
Carbon en polvo, ʒā. . ʒvj (24 gr.).
Aceite de trementina. c. s.
para hacer una pomada.

I. Ulceras gangrenosas y pútridas. Se puede reemplazar el unguento de estoraque por un poco de bálsamo del Perú.

8119. P. DEL REGENTE.

ʒ Oxido rojo de mercurio. 6

Manteca fresca. 100
 Cera blanca. 15
M. I. Oftalmias, blefaritis, manchas de la córnea, conjuntivitis, deslumbramiento de la vista. *D.* ḡxviiij á ʒj (1 á 4 gr.) en fricciones en el borde libre de los párpados. *V. n.* 8066.

Se usa contra las exóstosis traumáticas y los tumores que sobrevienen al rededor de la rótula, en las personas que tienen la costumbre de estar mucho tiempo de rodillas.

S120. P. DEL REGENTE (F. F.).

ʒ Manteca lavada con agua de rosas. ʒij y ʒij (72 gr.).
 Alcanfor. ḡvj (3 dec.).
 Oxido rojo de mercur. ʒj (4 gr.).
 Acetato de plomo crist. ʒj (4 gr.).
 Se porfirizan con cuidado el óxido de mercurio y la sal de plomo; se añade el alcanfor pulverizado con algunas gotas de alcohol y despues la manteca, y se mezcla todo porfirizándolo mucho tiempo.

S124. Otra (LISFRANC).
 ʒ Cerato de Galeno. . . . ʒiij (90 gr.).
 Digital en polvo. ʒj (30 gr.).
M. I. Tumefacciones, derrames pasivos. *D.* Se dan unturas con el volúmen de una avellana de esta pomada.

Esta pomada es un buen auxiliar de la compresion.

I. Ulceras venéreas primitivas ó consecutivas, pero principalmente contra las oftalmias palpebrales crónicas.

S125. Otra (SUNDELIN).
 ʒ Cloruro de calcio. . . . ʒiij (12 gr.).
 Polvo de digital. ʒvj (24 gr.).
 Vinagre fuerte. ʒij (8 gr.).
 Manteca. ʒiij (96 gr.).
M. I. Infartos glandulares crónicos. *D.* De ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en fricciones.

S121. P. RESOLUTIVA.

S126. P. RESOLUTIVA CALMANTE.

ʒ Calomelanos,
 Cebolla albarrana, ãã . ʒß (15 gr.).
 Manteca. ʒij (8 gr.).
 Aceite de rosas. 4 gotas.
M. I. Se usa en fricciones en los infartos crónicos de las articulaciones.

ʒ Ioduro de potasio. . . . ḡxc (5 gr.).
 Hidriodato de morfina. ḡxviiij (1 gr.).
 Manteca muy fresca. ʒjß (48 gr.).
 Esencia de rosas. 5 gotas.

M. I. Dolores ocasionados por un tumor del pecho, y para resolver estos. *D.* Se hacen fricciones, mañana y noche, con ḡxviiij (1 gr.) de pomada.

S122. Otra (BIETT).

S127. P. RESOLUTIVA MERCURIAL.

ʒ Protocloruro de mercurio,
 Acetato de plomo, ãã . ḡLjv (3 gr.).
 Manteca purificada. . . . ʒv (20 gr.).
 Alcanfor. ḡx (5 dec.).
M. I. Tubérculos.

ʒ Calomelanos,
 Escila, ãã ʒß (2 gr.).
 Goma amoniaco. ʒj (4 gr.).
 Manteca. ʒß (15 gr.).
 Aceite de rosas. 5 gotas.

S123. Otra (DUPUYTREN).

H. S. A. I. Absceso, artrocace, sabañones, infartos crónicos de las articulaciones, adenitis, escrófulas, eczema, sífilis, sífilides, efélides, conjuntivitis, hidroftalmia, hepatitis, hidrorraquis, ovaritis, nefritis. *D.* En fricciones.

ʒ Sal amoniaco en polvo. ḡxc (5 gr.).
 Ungüento mercurial. . . ʒiij (90 gr.).
M. I. Infartos escrofulosos. *D.* El grosor de una avellana en fricciones, mañana y noche.
 La misma composicion en las proporciones siguientes:
 Sal amoniaco. ʒijß (10 gr.).
 Ungüento mercurial. . . ʒj (30 gr.).

8128. P. DE ROL.

℥ Aceite de almendras. ℥j (30 gr.).
 Cera blanca. ℥ij (8 gr.).
 Se liquidan y se incorpora:
 Protocloruro de mercur. ℥ij (8 gr.).
 Divídase en doce dosis.

I. Sarna. D. Una fricción por la noche al acostarse, en las partes afectadas.

8129. P. DE ROMERO COMPUESTA.

℥ Jabon. 48
 Manteca. 48
 Alcanfor. 16
 Aceite de romero. 10
 Aceite de espliego. 10
 Aceite de cajeput. 10
 Aceite de menta. 10
 Aceite de manzanilla. 10

M. I. Reumatismo crónico, anestesia. *D.* ℥j á ℥ijβ (4 á 10 gr.) en fricciones.

8130. P. DE ROSAS.

℥ Manteca lavada en agua de rosas. ℥j (30 gr.).
 Esencia de rosas. 2 gotas.
M. Se usa como cosmética.

8131. P. RUBEFACIENTE.

℥ Cantáridas en polvo,
 Alcanfor, ña. ℥j (4 gr.).
 Manteca balsámica. ℥j (32 gr.).
 Mézclese exactamente.

I. Crup. D. De ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) en fricciones al rededor del cuello.

8132. P. DE RUST.

℥ Precipitado blanco. ḡij (15 cent.).
 Láudano líquido de Sydenham. ḡvij (40 cent.).
 Extracto de Saturno. ḡvij (40 cent.).
 Manteca. ℥j (4 gr.).

H. S. A. I. Blefaritis glandulosas crónicas.

8133. P. DE SABINA.

℥ Sabina en polvo. 1
 Manteca. 1
 Mézclese.

8134. P. SATURNINA (F. POLACA).

℥ Grasa de puerco. ℥ij (90 gr.).

Acetato de plomo crist. ℥j (4 gr.).
 Mézclese y añádase poco á poco agitando continuamente la masa:
 Agua destilada. ℥β (15 gr.).
I. Se usa en el tratamiento de las úlceras superficiales de la piel.

8135. P. SATURNINA ALCANFORADA (Baumés).

℥ Manteca. ℥vj (24 gr.).
 Extracto de Saturno. ℥ij (8 gr.).
 Alcanfor. ℥j (4 gr.).

H. S. A. I. Se usa para hacer desaparecer las manchas que suceden á las sífilides papulosas y otras; úlceras venéreas indolentes, sabañones ulcerados, etc.

8136. P. SATURNINA RESOLUTIVA (Baumés).

℥ Cerato. ℥ij (90 gr.).
 Extracto de Saturno. ℥ijβ (10 gr.).
 Alcanfor. ḡxvij (1 gr.).

H. S. A. I. Úlceras venéreas indolentes, sabañones, úlceras, etc.

8137. P. DE SAÚCO ó Ungüento de saúco.

℥ Hojas frescas de saúco. 300
 Manteca. 400
 Sebo. 200

Se cuece hasta que se consuma la humedad y se cuele.

8138. P. SEDANTE.

℥ Cianuro de potasio. ḡjv (2 dec.).
 Manteca. ℥j (30 gr.).

M. I. Jaqueca, neuralgia facial, enfermedades nerviosas, flebitis.
D. En fricciones.

8139. Otra (DUPUYTREN).

℥ Acetato de plomo en polvo,
 Extracto de bellad., ña. ℥j (4 gr.).
 Manteca. ℥vj (24 gr.).

M. I. Grietas del ano. *D.* Se engrasa una mecha de un volumen conveniente que se introduce en el ano. Se aumenta poco á poco el grosor de la mecha.

8140. Otra (PETREQUIN).

℥ Manteca. ℥jx (36 gr.).

Extracto de belladona,
 Digital en polvo, āā. ʒj (4 gr.).
 Tintura de digital. . . ʒʒ (2 gr.).
 Acido prúsico medic. 25 gotas.

H. S. A. I. Enfermedades del co-
 razon. *D.* En fricciones en la re-
 gion de este órgano.

8141. P. SEDANTE Y ABORTIVA
(Debreyne).

ʒ Ungüento napolitano. . . ʒij (8 gr.).
 Extracto de belladona. . ʒj (4 gr.).
 Opio. ʒj (4 gr.).

I. Panarizo. *D.* Se cubre la par-
 te enferma con toda la pomada, y
 se dan fricciones cada hora pa-
 ra favorecer la absorcion. Comun-
 mente bastan veinticuatro horas
 para que aborte la inflamacion.

8142. P. SEDANTE ANTIHEMOR-
ROIDAL *(Debreyne).*

ʒ Ungüento populeon. . ʒj (30 gr.).
 Extracto de belladona. ʒj (4 gr.).
 Extracto de opio. . . ʒxij (6 dec.).
 Se mezcla y aromatiza.

8143. P. SEDANTE Ó CALMANTE.

ʒ Manteca. ʒj (32 gr.).
 Extracto de opio. . . ʒxij (6 dec.).
 Se disuelve el extracto en c. s.
 de agua y se incorpora con la
 manteca.

I. Inflamaciones crónicas, úl-
 ceras, cánceres ulcerados. *D.* En
 fricciones.

8144. P. DE SULFATO DE COBRE
(Desmarres).

ʒ Sulfato de cobre. ʒj á ʒjv (5 á 20
 cent.).
 Manteca fresca lavada
 en agua caliente. . . ʒʒ (2 gr.).
 Alcanfor. ʒij (4 dec.).

Se porfiriza exactamente el sul-
 fato de cobre y el alcanfor, aña-
 diendo una gota de aceite, y des-
 pues se mezcla exactamente con
 la manteca.

I. Manchas no enteramente for-
 madas de la córnea, queratitis
 vasculares crónicas, cuando la
 pomada de óxido rojo de mercu-

rio causa demasiada irritacion. *D.*
 El grosor de un grano de trigo en
 fricciones en los párpados al acos-
 tarse.

8145. P. DE SULFATO DE QUININA.

ʒ Sulfato de quinina. . . . ʒʒ (15 gr.).
 Alcohol de 38° ó 40°
 cerca de. ʒj (30 gr.).
 Acido sulfúr. cerca de. 30 gotas.
 Manteca. ʒij (60 gr.).

H. S. A. I. Calenturas intermi-
 tentes, obstrucciones del bazo de
 los niños débiles. *D.* ʒiij (12 gr.)
 que representan ʒʒ (2 gr.) de sul-
 fato de quinina en fricciones en
 los muslos y axilas; se cubre
 despues la parte con un hule y
 se sujeta con una venda.

8146. P. SULFOALCALINA.

ʒ Azufre sublimado y lav. ʒʒ (16 gr.).
 Potasa purificada. . . ʒij (8 gr.).
 Manteca. ʒj (32 gr.).

M. I. Es muy usada contra la
 sarna, á la que cura sin irritar
 la piel.

8147. P. SULFUROALCALINA.

ʒ Azufre. 2
 Carbonato de potasa. 4
 Manteca. 8

M. I. Sarna. *D.* ʒij á ʒʒ (8 á 15
 gr.) en fricciones, mañana y no-
 che.

8148. Otra (JADELOT).

ʒ Jabon blanco. ʒʒʒ (250 gr.).
 Agua. ʒʒ (15 gr.).

Se reblandece en el baño maria
 y se añade poco á poco :

Hígado de azufre. . . ʒjʒ (45 gr.).
 Aceite de clavel. . . ʒbj (500 gr.).

I. Prúrigo, vegetaciones, piti-
 riasis. *D.* En fricciones.

8149. L. SULFOAMONIACAL.

ʒ Azufre. ʒj (30 gr.).
 Hidroclorato de amoniaco,
 Alumbre, āā. ʒʒ (2 gr.).
 Manteca. ʒij (60 gr.).

M. I. Vegetaciones, impétigo,
 sarna, herpes, tiña, prúrigo, ec-
 zema, favus. *D.* En fricciones.

8150. P. SULFOCARBONOSA.

℥ Azufre,
Carbon, ãã. ℥j (30 gr.).
Quina,
Hollin, ãã. ℥B (15 gr.).
Cerato. c. s.

M. I. Vegetaciones, heridas, líquen, sarna, herpes, tiña, pór-rigo, eczema, impétigo, pitiriasis. *D.* En fricciones.

8151. P. SULFOJABONOSA CON ELÉBORO.

℥ Azufre subl. y porfir. ℥j (30 gr.).
Eléboro blanco en polv. ℥j (4 gr.).
Nitro. ℥B (6 dec.).

Jabon negro,
Manteca, ãã. ℥jB (45 gr.).
H. S. A. I. Sarna. *D.* En fricciones.

8152. P. SULFOJABONOSA (Lugol).

℥ Azufre sublimado,
Jabon blanco, ãã. . . . ℥ij (60 gr.).
Disuélvase el jabon en el agua, cuélese y añádase el azufre.

I. Sarna. No mancha la ropa y cura muy bien la sarna en diez dias, término medio. La rubicundez que estas fricciones ocasionan cede fácilmente al uso de los baños.

8153. P. SULFURADA (F. F.).

℥ Azufre subl. y lavado. ℥jv (125 gr.).
Manteca de cerdo. . . . ℥xij (375 gr.).

M. I. Sarna y muchas afecciones crónicas de la piel, principalmente en las formas escamosas, tales como la soriasis y la lepra vulgar. *D.* ℥jv á ℥viiij (15 á 30 gr.) para una ó dos fricciones al dia.

8154. F. SULFÚRICA (Naylor).

℥ Acido sulfúrico. ℥j (4 gr.).
Alcanfor en polvo. ℥ij (8 gr.).
Manteca. ℥j (30 gr.).

H. S. A. I. Bocio. *D.* ℥B á ℥j (2 á 4 gr.) en fricciones, mañana y noche.

8155. P. DE SULFURO DE ARSÉNICO Y CALCIO (F. P.).

℥ Cal viva reciente. 4
Oropimente. 4
Lejía fuerte de potasa. 3200

Se pone á hervir en una vasija de barro hasta la consistencia conveniente.

I. Herpes corrosivo, lobanillos, tumores escrofulosos indolentes, glándulas escirrosas.

8156. P. DE SULFURO DE CARBONO.

℥ Sulfuro de carbono ó carburo de azufre. . . . ℥B (15 gr.).
Alcanfor. ℥ij (8 gr.).
Aceite comun. ℥ij (60 gr.).

M. I. Partos laboriosos, metritis, estrecheces de la uretra ó de la vagina, blenorrea. *D.* En aplicacion.

8157. P. DE SULFURO DE MERCURIO (Bielt).

℥ Sulfuro de mercurio. . . ℥B (2 gr.).
Alcanfor. ℥x (5 dec.).
Cerato simple. ℥j (30 gr.).

M. I. Erupciones vexico-pustulosas en estado crónico. Es el cerato antiherpético de Alibert.

8158. P. DE SULFURO DE SODIO (F. P.).

℥ Jabon animal. ℥j (30 gr.).
Sulfuro de sodio seco. ℥ij (60 gr.).
Alcohol á 30°. ℥vj (180 gr.).
H. S. A.

8159. P. SULFUROSA.

℥ Jabon blanco. 2
Manteca balsámica. 2
Polisulfuro de potasio líquido. . . . 4

M. Se renueva á menudo porque se altera pronto.

I. Tiña, afecciones de la piel, sarna, herpes rebeldes. *D.* En unturas mañana y noche.

8160. P. DE LA SULTANA.

℥ Cera blanca. ℥iij (12 gr.).
Esperma de ballena. . . ℥j (32 gr.).
Se liquida á fuego lento en
Aceite de alm. dulces. ℥ij (64 gr.).

Se echa en una vasija de porcelana y se agita hasta que esté bien hecha la mezcla; se incorpora despues:

- Agua de rosas. ℥j (4 gr.).
 - Bálsamo de la Meca. ℥xxjv (42 dec.).
 - Tintura de benjuí. 12 gotas.
- Es buen cosmético.

8161. P. DE TANATO DE PLOMO
(Yott).

- ℥ Tanato de plomo seco. ℥ij (8 gr.).
 - Manteca. ℥j (30 gr.).
- M. I. Úlceras gangrenosas, úlceras atónicas, hernias, caída del recto, hemorroides.

8162. P. DE TANINO.

- ℥ Grasa de puerco rec. ℥j℔ (45 gr.).
 - Tanino,
 - Agua pura, añ. ℥ij (8 gr.).
- Se disuelve el tanino en c. s. del agua prescrita, triturándolos juntos en un mortero de vidrio; se añade la grasa y se mezcla exactamente.

I. Atonía de las úlceras, relajación de ciertos órganos y hernias de los niños, caída del recto, úlceras, hemorroides, artrocace, encantis.

8163. P. DE THIERRY.

- ℥ Ungüento populcon. ℔℔ (250 gr.).
 - Ungüento basilicon. . ℥iij (90 gr.).
 - Cera amarilla. ℥ij (60 gr.).
- Se liquida todo, se menea y se añaden:
- Cantáridas reducidas á polvo fino. ℥℔ (15 gr.).

I. y D. Esta pomada es epispástica y sirve para mantener abiertos los vejigatorios.

8164. P. DE TODDE.

- ℥ Mercurio dulce,
 - Cicuta en polvo,
 - Oxido de zinc,
 - Acetato de plomo, añ. ℥j℔ (6 gr.).
 - Miel rosada. c. s.
- M. I. Úlceras corrosivas y cancerosas, sífilis, cálculos.

8165. P. DE TORBISCO (H. DE M.).

- ℥ Polvos de corteza de torbisco,
 - Cera blanca, añ. ℥j (30 gr.).
 - Manteca. ℥xjv (420 gr.).
- M. S. A. I. Se usa como excitante para mantener la supuración en los vejigatorios.

8166. P. DE TORBISCO ESTIBIADA
(Terborgh).

- ℥ Pomada de torbisco. ℥j (32 gr.).
 - Tártare emético. ℥j (4 gr.).
- M. I. Tisis laringea. D. Se usa en fricciones en la region cervical anterior. Se suspende cuando ha producido la erupcion específica de los antimoniales. Obra como la pomada de Autenrieth y el autor dice que es mas eficaz.

8167. P. TREMENTINADA
(Debreyne).

- ℥ Esencia de trementin. ℥ij (60 gr.).
 - Aguardiente alcanfor. ℥j (30 gr.).
 - Amoniaco. ℥ij (8 gr.).
 - Manteca. ℔℔ (250 gr.).
- I. Ceática. D. En fricciones mañana y noche.

8168. P. DE TUÉTANO DE VACA.

- ℥ Tuétano de vaca preparado,
 - Mant. de vacas prep., añ. ℥ij (60 gr.).
 - Bálsamo del Perú. ℥j (4 gr.).
 - Vainilla. ℥℔ (2 gr.).
 - Accite de avellana. ℥ij (8 gr.).
- H. S. A. I. Se usa como cosmético cuando los cabellos están secos y áridos.

8169. P. DE TURBIT MINERAL.

- ℥ Turbit mineral. ℥xij (6 dec.).
 - Manteca. ℥℔ (15 gr.).
- D. Se toma una porcion como ℥j (12 dec.) para ligeras fricciones sobre la parte enferma.

8170. Otra (SWEDIAUR).

- ℥ Turbit mineral. 4
- Manteca. 8

8171. P. DE TURBIT (Alibert).

- ℥ Manteca. ℔ij (1000 gr.).

Turbit mineral. $\bar{3}ij$ (60 gr.).

Se reduce el sulfato á polvo muy fino, se funde la manteca á un calor lento, se la incorpora el polvo y se menea con la mano de un mortero hasta que la grasa se haya enfriado enteramente. Se la conserva en una vasija de loza.

I. Herpes escamosos y crustáceos. *D. C. s.* para fricciones ligeras en las partes enfermas.

8172. P. DE VERATRINA DE MAGENDIE (H. DE M.).

\mathcal{R} Veratrina. $\bar{g}jv$ (2 dec.).
Manteca. $\bar{3}j$ (30 gr.).

H. S. A. I. Neuralgias, reumatismo crónico, anasarca, gota, cuerpos extraños, disuria, mammitis. Algunos la aconsejan en el asma. *D.* De $\bar{3}j$ á $\bar{3}ij$ (4 á 8 gr.) en fricciones.

8173. Otra (TERRIER).

NÚMERO 1.

\mathcal{R} Veratrina. $\bar{g}x$ (50 cent.).
Alcohol. c. s.
Manteca. $\bar{3}j$ (30 gr.).

NUMERO 2.

\mathcal{R} Veratrina. $\bar{g}xx$ (4 gr.).
Alcohol. c. s.
Manteca. $\bar{3}j$ (30 gr.).

NUMERO 3.

\mathcal{R} Veratrina. $\bar{g}xxx$ á $\bar{g}xl$ (1,50 á 2 gr.).
Alcohol. c. s.
Manteca. $\bar{3}j$ (30 gr.).

Se empieza por la pomada número 1, despues el 2 y el 3.

I. Oftalmias con fotofobia, amaurosis incipiente, ambliopia amaurotica y dolores ó neuralgias del ojo. *D.* La dosis debe ser menos elevada para las mujeres y los niños. Se da $\bar{3}B$ (2 gr.) para cada friccion. Se procurará que no caiga en los ojos y se limpiará con cuidado la parte.

8174. P. VERMÍFUGA.

\mathcal{R} Acíbar. $\bar{3}ij$ (8 gr.).
Manteca. $\bar{3}j$ (32 gr.).
M. I. Es antihelmíntica.

8175. P. VERMIFUGA (Doerffurt).

\mathcal{R} Hiel de toro espesada,
Extracto de cáscara de nuez, $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ijB$ (40 gr.).
Manteca de cerdo. $\bar{3}ij$ (60 gr.).
Aceite de tanaceto. $\bar{3}B$ (2 gr.).
M. S. A. D. Se frota el vientre de los niños que tienen lombrices.

8176. P. DE WERLHOF.

\mathcal{R} Calomelanos. $\bar{3}j$ (4 gr.).
Ungüento rosado. $\bar{3}j$ (32 gr.).
M. I. Sarna. D. En fricciones.

8177. P. DE WITZMANN.

\mathcal{R} Tártaro emético. $\bar{g}jv$ (2 dec.).
Aceite de ricino,
Manteca fresca, $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$ (4 gr.).
M. I. Manchas á consecuencia de oftalmias, catarata, neuritis, inflamacion, tétanos, cáncer, laringitis, calenturas intermitentes, meningitis, albugo. *D.* Se introduce en el ojo el volúmen de una lenteja y se hacen fricciones en el párpado superior.

8178. P. DE LA VIUDA DE FARINIER.

\mathcal{R} Manteca muy fresca. $\bar{3}ij$ (60 gr.).
Minio. $\bar{g}xviii$ (4 gr.).
Acetato de plomo crist. $\bar{g}Ljv$ (3 gr.).
H. S. A. I. Conjuntivitis y queratitis crónicas, inflamaciones de los folículos palpebrales, queratitis ulcerosas crónicas, manchas de la córnea.

8179. P. DE WILLAN.

\mathcal{R} Carbónato de potasa. $\bar{3}B$ (15 gr.).
Sulfuro rojo de mercurio,
Agua de rosas, $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$ (30 gr.).
Esencia de bergamota. $\bar{3}B$ (15 gr.).
Azufre sublimado,
Manteca, $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}jx$ (270 gr.).
M. I. Sarna.

8180. P. DE YEMAS DE ALAMO.

\mathcal{R} Yemas secas de álamo. 4
Manteca. 4
Se digiere en el baño maría ó sobre un fuego suave, se cuele con expresion y se separan las heces.
I. Hemorroides.

8181. P. ZINCO-PLÚMBICO OPIADA
(Rosenthal).

℞ Pomada de tucia,
Pomada de albayalde,
Aceite de adorm., ãã. ℥j (4 gr.).
Bióxido de mercurio
porfirizado. ḡiij (15 cent.).
Opio purificado. ḡx (50 cent.).
H. S. A. I. Blefoftalmia catar-
ral á consecuencia de las calen-
turas exantemáticas, blefoftalmia
contagiosa crónica. D. El volúmen
de medio grano de trigo, intro-
ducido entre los párpados, maña-
na y noche.

8182. P. DE ZINC Ó ZINCADA
(Schmidt).

℞ Oxido de zinc porfirizad. ʒβ (2 gr.).

Aceite de nueces. ʒj (4 gr.).
Manteca. ʒj (30 gr.).
H. S. A. I. Manchas de la cór-
nea. D. El volúmen de una lenteja,
que se aplica dos veces al dia.

8183. P. DE ZINC.

℞ Oxido de zinc. ʒxv (75 cent.).
Calomelanos. ʒxij (60 cent.).
Alcanfor. ʒviii (40 cent.).
Acibar. ʒj (5 cent.).
Ungüento rosado. . . ʒijβ (10 gr.).
H. S. A. I. Hernia, callos, pór-
rigo, eczema, favus, lepra, lu-
pus, metrorragias, oftalmia es-
crofulosa, encantis, manchas de
la córnea. D. En fricciones en los
puntos doloridos y en el borde li-
bre de los párpados.

PONCHES.

8184. PONCHE.

℞ Aguardiente. ʒij (60 gr.).
Alcohol de melisa. . . ʒijβ (40 gr.).
Jarabe simple. ʒj (30 gr.).
Pocion gomosa. ʒij (60 gr.).
M. I. Para reanimar las fuerzas
en las calenturas graves y á los
niños débiles; adinamia y conva-
lecencia de las enfermedades de
larga duracion, tifo, delirio tré-
mulo, cólera morbo, astenia,
convulsiones, etc. D. A cortadi-
llos.

8185. P. CONTRA LAS CALENTURAS
NERVIOSAS DE LOS ANCIANOS.

℞ Infusion de té. lbj (500 gr.).
Ron de la Jamáica,
Zumo de limon, ãã. . ʒij (60 gr.).
Azúcar. ʒjv (125 gr.).
M. I. Enfermedades asténicas
de los ancianos por falta de in-
fluencia nerviosa. Cuando no se
encuentre ron de buena calidad
se le puede reemplazar por ʒiij ó

ʒjv (90 ó 125 gr.) de vino de Ma-
dera, siendo las mismas las can-
tidades de los otros ingredientes.
D. ʒij (60 gr.) cada hora ó cada
dos horas.

8186. P. ESPAÑOL.

℞ Cerveza. una botella.
Agua de limon helada. . un cuartillo.
M. I. Se usa como refrescante.

8187. P. OFICIAL.

℞ Té. ʒij (8 gr.).
Agua. lbβ (250 gr.).
Se infunde, se cuele y se añade:
Alcohol de 33°. . . . ʒjv (125 gr.).
Zumo de limon. . . . número 1.
Jarabe simple. ʒjv (125 gr.).
M. I. Es estimulante y sudorí-
fico, aconsejado por Magendie en
el período álgido del cólera, en
el envenenamiento por el arséni-
co, en el enfriamiento y colapso
que acompaña ó precede á mu-
chas enfermedades agudas. Es
menos alcohólico que el ponche
comun. D. A cortadillos.

PULPAS.

8188. PULPA DE CAÑAFÍSTULA
(F. F. Y F. P.).

℞ Cañafistula. c. s. q.

Se rompen los frutos á lo largo
de las suturas, para lo cual una de
estas se apoya sobre un punto
resistente y se golpea en la opues-

ta; se sacan con una espátula la pulpa, las simientes y los disepimentos, y se pasa la pulpa por un tamiz de cerda.

Si la pulpa interior estuviese muy dura, se ablanda primero con un poco de agua antes de sacarla del fruto.

I. Es un laxante muy suave que conviene aunque haya irritacion intestinal y calentura. *D.* ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

§189. P. DE CAÑAFISTULA COMPUESTA, ó Pulpa de cañafistula para lavativas.

- ʒ Hojas de acelga,
- Hojas de malva,
- Hojas de mercurial,
- Hojas de parietaria,
- Hojas de violetas,
- Flor. de violetas, añ. ʒʒ (15 gr.).
- Agua. lbij (1000 gr.).

Se reduce por la coccion hasta ʒxx (625 gr.) y se añade:

- Pulpa de cañafistula. c. s.
- Azúcar. lbij (1000 gr.).

Se cuece hasta la consistencia de electuario.

I. Estreñimiento, cólicos. *D.* En lavativas.

§190. P. DE CICUTA (F. F.).

- ʒ Hojas mondadas de cicuta. . c. s. q.
- Se reducen á pasta fina machacándolas en un mortero de mármol, y se pasa por un tamiz de cerda.

Del mismo modo se preparan las pulpas de BERROS, COCLEARIA, ROSAS ROJAS y de todas las demás flores y hojas frescas.

§191. P. DE CIRUELAS (F. F.).

Se exponen las ciruelas sobre un diafragma á la accion del vapor de agua, hasta que estén enteramente ablandadas; y despues de quitarles los huesos, se machaca la carne del fruto en un mortero de mármol y se la pasa por un tamiz de cerda.

Del mismo modo se preparan las pulpas de DÁTILES, AZUFAIFAS, CEBOLLAS

COMUNES, CEBOLLA ALBARRANA, CEBOLLA DE LIRIO, AZUCENAS, RAIZ DE ÉNULA CAMPANA, RAIZ DE MALVABISCO Y ESPECIES EMOLIENTES, etc.

Las ciruelas cocidas suministran una bebida refrigerante y ligeramente laxante; su pulpa tiene las mismas propiedades y entra en la composicion de otras pulpas.

§192. P. DE COCLEARIA (F. F.).

- ʒ Hojas frescas y mondadas de coclearia. c. s. q.

Se reducen á pasta fina machacándolas en un mortero y se las pasa por un tamiz.

Del mismo modo se preparan las pulpas de BERRO, ROSAS ROJAS, CICUTA y de todas las flores y hojas frescas.

§193. P. DE ESCARAMUJOS Ó CINOSBASTOS (F. F.).

- ʒ Cinosbastos ó escaramujos. . c. s. q.

Se cogen un poco antes que hayan llegado á su perfecta madurez; se les quita el limbo del cáliz y la extremidad inflada del pedúnculo; se arrojan igualmente las semillas y los pelos que las envuelven; se echa el resto en una vasija de loza blanca, se rocía con un poco de vino blanco, se coloca en un paraje fresco, y se revuelve de cuando en cuando con una espátula de madera para repartir por igual la humedad. Cuando estén bien blandos se machacan en un mortero de mármol, y se pasan por un tamiz de cerda.

I. La pulpa de escaramujos es un astringente muy enérgico, pero rara vez se usa interiormente.

§194. P. DE TAMARINDOS (F. F.).

- ʒ Tamarindos. c. s. q.

Se ponen en una vasija de loza blanca, se añade un poco de agua, se dejan en digestion sobre cenizas calientes hasta que se ablanden por igual, y entonces se pasa por un tamiz para separar las semillas y los filamentos que tiene el fruto.

I. Se administra como laxante en los mismos casos que la cañafístula. *D.* De $\text{ʒ}\beta$ á ʒj (15 á 30 gr.).

8195. P. DE TAMARINDOS ARTIFICIAL.

ʒ Pulpa de tamarindos. . . ʒj (30 gr.).
 Crémor de tártaro. ʒij (8 gr.).
M. I. Estreñimiento, cólicos, embarazo gastro-intestinal. *D.* De una vez como purgante.

8196. P. DE ZANAHORIA (F. F.).
 ʒ Raiz de zanahoria. c. s. q.

Se reducen las raíces á pulpa por medio del rallo.

Del mismo modo se preparan las pulpas de PACIENCIA, AJO, PATATAS, MEMBRILLO, etc.

I. Cáncer, quemaduras, úlceras; cánceres ulcerados en que obra como demulcente; afecciones de la piel, en todos los casos en que están indicadas las cataplasmas emolientes. *D.* En cataplasmas.

PURGANTES.

8197. PURGANTE ACÍDULO.

ʒ Pulpa de cañafístula,
 Pulpa de tamarindos, *añ.* ʒj (30 gr.).
 Se cuece en lbj (500 gr.) de suero clarificado hasta que quede en ʒxij (375 gr.); se cuele y se añade:

Zumo de limon. ʒj (30 gr.).
D. En dos tomas, por la mañana, con el intermedio de una ó dos horas. Se bebe limonada interin produce el efecto purgante.

8198. P. ANTILECHOSO.

ʒ Sen mondado,
 Sal de Glaubero, *añ.* . . ʒij (8 gr.).
 Se infunde en un vasito de agua hirviendo, se cuele y se añade:
 Maná en lágrimas. . . . ʒij (60 gr.).
 Jar. de achicorias comp. ʒj (30 gr.).
 Se cuele y se añaden despues de frio dos ó tres gotas de esencia de anís.

I. Es buen purgante y se puede usar al mismo tiempo caldos de yerbas.

8199. P. DE CALOMELANOS.

ʒ Calomelanos. ʒxij (6 dec.).
 Miel blanca y dura. . . ʒij (8 gr.).
M. D. De una vez. Es el modo mas cómodo de administrar los calomelanos.

8200. P. DRÁSTICO (Andral).

ʒ Aguardiente aleman,
 Jar. de espinoserval, *añ.* ʒj (30 gr.).

M. I. Afecciones cutáneas rebeldes. *D.* De una vez por la mañana en ayunas.

8201. P. DE GRANT.

ʒ Tártaro soluble. ʒvj á ʒviij (24 á 32 gr.).
 Maná en lágrimas. . . ʒij (64 gr.).
 Agua de achicorias a-
 margas. ʒxx (625 gr.).
H. S. A. I. Atonía del hígado, afecciones hipocondríacas. *D.* En dos ó tres tomas por la mañana.

8202. P. LECHOSO.

ʒ Escamonea sin color
 por el carbon. ʒxij (6 dec.).
 Leche de vacas. ʒjv (125 gr.).
 Jar. de flores de nar. ʒj (30 gr.).
M. D. Para una dosis.

8203. P. DE LE ROY.

Primer grado.

ʒ Escamon. de Alepo. $\text{ʒj}\beta$ (48 gr.).
 Raiz de turbit. . . . ʒvj (24 gr.).
 Jalapa. ʒvj (192 gr.).
 Aguardiente de 20°. lbxij (6000 gr.).
 Se infunden las sustancias reducidas á polvo, durante doce horas, en un baño maría á la temperatura de veinte grados; se cuele y se añade el jarabe siguiente:
 Sen. ʒvj (192 gr.).
 Agua hirviendo. . . $\text{lbj}\beta$ (750 gr.).
 Se infunde durante cinco horas, y despues de exprimido se cuele; se añade lbij (1500 gr.) de azú-

car terciada y se hace S. A. un jarabe.

Esta tintura puede representarse aproximadamente por la siguiente:

- Tintura de escamonea. ℥j (32 gr.).
- Tintura de turbit. . . . ℥℔ (16 gr.).
- Tintura de jalapa. . . ℥℔ (16 gr.).
- Jarabe de sen. . . . ℥ij℔ (80 gr.).

Segundo grado.

- ℥ Escam. de Alepo. ℥ij (64 gr.).
- Raiz de turbit. . . ℥j (32 gr.).
- Jalapa. ℔℔ (250 gr.).
- Aguardiente de 20° ℔xij (6000 gr.).

Se prepara del mismo modo que el anterior, y se añade el jarabe preparado con

- Sen. ℔℔ (250 gr.).
- Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.).
- Azúcar terciada. . . ℔ij℔ (1250 gr.).

Tercer grado.

- ℥ Escam. de Alepo. ℥iij (96 gr.).
- Raiz de turbit. . . . ℥j℔ (48 gr.).
- Jalapa. ℥xij (375 gr.).
- Aguardiente de 21°. ℔xij (6000 gr.).

Se prepara como las anteriores, y se añade el jarabe preparado con

- Sen. ℥xij (375 gr.).
- Agua hirviendo. . . ℔iij (1500 gr.).
- Azúcar terciada. . . ℔iij (1500 gr.).

Cuarto grado.

- ℥ Escam. de Alepo. ℥jv (125 gr.).
- Raiz de turbit. . . . ℥ij (64 gr.).
- Jalapa. ℔j (500 gr.).
- Aguardiente de 22°. ℔xij (6000 gr.).

Se prepara como las anteriores y se añade el jarabe preparado con

- Sen. ℔j (500 gr.).
- Agua hirviendo. . . ℔iij (1500 gr.).
- Azúcar terciada. . . ℔iij℔ (1750 gr.).

Este remedio drástico puede convenir en todos los casos en

que el médico juzgue están indicados los drásticos; pero ignorantes empíricos han abusado de él y han sucumbido numerosas víctimas á consecuencia de su imprudente administracion, habiendo caido en descrédito una fórmula que en muchos casos puede ser útil.

I. Embarazo gástrico, cólico saturnino, hidropesías, ascitis, afecciones biliosas. D. De una á cuatro cucharadas al dia.

8204. VOMIPURGATIVO DE LE ROY.

- ℥ Vino blanco de buena calidad. ℔jv (2000 gr.).
- Sen. ℥jv (125 gr.).

Se infunde en frio durante tres dias meneando la mezcla de cuando en cuando, se cuela y se esprime de modo que resulte en cuanto sea posible la cantidad de vino indicada.

Se añade por cada libra (500 gr.) de vino preparado de este modo, ℥j (4 gr.) de tártaro emético.

Se cuela. Este licor puede representarse por

- Vino de sen. ℥viiij℔ (34 gr.).
- Tártaro emético. . . ℥jv℔ (22 cent.).

D. Una cucharada.

8205. P. VERMÍFUGO.

- ℥ Sen mondado. ℥ij á ℥jv (8 á 16 gr.).
- Musgo de mar. ℥j (4 gr.).
- Limon en rebanadas. . . núm. 4.
- Maná. ℥ij (60 gr.).
- Agua hirviendo. un vaso.

Se deja infundir durante la noche y se cuela al dia siguiente. Despues se puede beber un caldo de vaca, en la que se infunde hojas de achicorias amargas.

FORMULARIO UNIVERSAL

ó

GUIA PRACTICA

DEL MEDICO, DEL CIRUJANO

Y DEL FARMACEUTICO.

POR

DON FRANCISCO ALVAREZ ALCALÁ,

Dr. en Medicina y Cirujía.

SEGUNDA EDICION

enteramente refundida y aumentada.

TOMO IV.

MADRID Y SANTIAGO:

Librería de Don Angel Calleja, Editor.

LIMA:

CASA DE LOS SRES. CALLEJA, OJEA Y COMPAÑIA.

—
1850.

LIBRO DE CUENTA

DE LA

CAJERÍA DE LA

CAJERÍA DE LA

DE LA

DE LA

CONTINUACION

DE LA

PARTE TERCERA.

QUINTAS ESENCIAS.

8206. QUINTA ESENCIA DE AJENJOS ó Alcoholado de ajenjos con clavo.

- ☞ Sumidades secas de ajenjos. ℥j (30 gr.).
Sumidades secas de ajenjo pónico. . . . ℥j (30 gr.).

Clavo machacado,
Azúcar, ãã. ℥℞ (15 gr.).
Alcohol á 21° Cart. . . ℔j (500 gr.).
Se macera durante ocho dias, se cuele con expresion y se filtra.
I. Se usa como estomacal. D.
℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

RATAFIAS.

8207. RATAFÍA DE AJENJOS ó Ajenjo suizo.

- ☞ Hoj. de ajenjos mond. ℔jv (2000 gr.).
Bayas de enebro. . . ℔℞ (250 gr.).
Canela fina. ℥ij (64 gr.).
Raiz de angélica. . . ℥j (30 gr.).
Aguardiente de 52° c. 20° Cart. ℔xviiij (9000 gr.).

Se macera todo durante quince dias, y se destilan á hilo fuerte doce cuartillos (6 lit.) de espíritu; se vuelve á cohobar y se destilan á fuego mas moderado diez cuartillos (5 lit.) solamente de alcoholato, que debe señalar 82° cent. (32° Cart.).

Entonces se toma:

- Alcoholato de ajenjos compuesto. . 4 quart. (2 lit.).

Agua pura. ℔ij℞ (1250 gr.).
Agua de azahar. . ℥vj (192 gr.).
Azúc. muy blanca. ℔ij℞ (1250 gr.).
Clara de huevo. . número una.
Se disuelve el azúcar en frio en el agua pura, se añade el agua de azahar, batida con la clara de huevo, se mezcla el alcoholato, se calienta todo en el baño maria tapado hasta que no pueda resistir el calor la mano puesta sobre su tapadera, se deja enfriar y se filtra.

La fórmula de Virey se distingue de la anterior en que contiene 36 cuartillos (18 lit.) de alcohol á 20°, ℔jv (2000 gr.) de sumidades de ajenjos, ℔ij (1000 gr.) de sumidades de ajenjo menor, ℥jv (125 gr.) de raiz de angélica, ℥jv (125 gr.) de raiz de cálamo aromático, ℥ij (60 gr.) de semillas de badiana y ℥j

(30 gr.) de hojas de dictamo crético.

Se macera durante ocho dias, se destila la mitad del alcohol empleado, se añade ℥ij (8 gr.) de ESENCIA DE ANÍS VERDE, y se da color con zumo de apio ó espinaca.

I. Calenturas intermitentes, dispepsia, afecciones gotosas con atonía del conducto digestivo, leucorrea crónica, lombrices. D. Una ó mas cucharadas al dia.

8208. R. DE ANIS.

℥ Sim. de anisenteras. ℥jß (48 gr.).
Aguard. de 24° C. ℔iij (1500 gr.).
Agua pura. ℔ij (1000 gr.).
Azúcar. ℔ijß (1250 gr.).

Se hacen como la de angélica y cilantro.

La ratafia de anís destilada, llamada ACEITE DE ANÍS, se prepara destilando en baño maría el alcoholado que sirve para la ratafia anterior, y mezclando el producto con doble cantidad en peso de jarabé simple.

Del mismo modo se preparan las ratafias de ENEBRO DESTILADA Y SIN DESTILAR.

8209. R. DE ANIS Ó DE ALCARAVEA COMPUESTA ó *Rosoli de las semillas.*

℥ Simiente de anís,
Simiente de eneldo,
Simiente de alcaravea,
Simiente de cilantro,
Simiente de daúco crético,
Sim. de hinojo, ãã. ℥j (30 gr.).
Aguardiente. ℔jv (2000 gr.).
Agua,
Azúcar, ãã. ℔j (500 gr.).
Se prepara como la anterior.

8210. R. DE ANGÉLICA.

℥ Tallos recientes de
angélica. ℥jv (125 gr.).
Almendr. amargas. ℥jv (125 gr.).
Azúcar blanca. ℔jv (2000 gr.).
Aguardiente de 56°
c., 21° Cart. 12. quart. 6 lit.).
Agua de rio. ℔xij (6000 gr.).
Se cortan en pedazos los tallos

de angélica, se quebrantan las almendras amargas, se pone todo en un cántaro con el aguardiente y el agua, se deja en maceracion por cuatro dias, se añade el azúcar y despues de 10 ó 12 dias se filtra.

8211. R. DE ANGÉLICA Y CILANTRO COMPUESTA ó *Vespetro.*

℥ Semill. de angélica. ℥ij (64 gr.).
Cilantro. ℥ij (64 gr.).
Anís,
Hinojo, ãã. ℥ij (8 gr.).
Aguardiente. ℔jv (2000 gr.).
Se macera durante ocho dias y se añade:

Agua pura,
Azúcar blanca, ãã. ℔j (500 gr.).
I. Dispepsia, cólico flatulento, neumatosis. D. ℥jß á ℥iij (45 á 90 gr.) despues de comer.

8212. R. LLAMADA ANISETA DE RURDEOS.

℥ Anís estrellado. ℔ij (1000 gr.).
Cilantro,
Hinojo, ãã. ℥ij (64 gr.).
Alcohol. ℔xij (6000 gr.).
Agua. ℔viiij (4000 gr.).
Se reduce á pedazos los frutos, se los echa con el aguardiente en el baño maría de un alambique y se destilan veinte cuartillos (10 lit.) de producto que se deja tres ó cuatro meses; entonces se disuelve en el agua c. s. de cola de pescado y
Azúcar. ℔xij (6000 gr.).
Agua pura. ℔xvj (8000 gr.).
Se mezcla con el espíritu aromático y se filtra.

8213. R. DE AZAFRAN COMPUESTA ó *Escubac.*

℥ Azafrañ. ℥ij (64 gr.).
Azufaiñas. ℥jv (125 gr.).
Dátiles. ℥iij (96 gr.).
Pasas de Damasco. ℥iij (96 gr.).

Anís. 3j (4 gr.).
 Cilantro. 3j (4 gr.).
 Canela 3j (4 gr.).
 Aguardiente á 56°

c. 21° Cart. ℥viii (4000 gr.).
 Agua pura. ℥ij (1000 gr.).
 Azúcar. ℥jv (2000 gr.).

Se abren las pasas, los dátiles y las azufaixas, y se quitan los huesos de estos últimos frutos; se pone todo en un cántaro con el anís, el cilantro y la canela quebrantada; se echa aguardiente y se deja todo en maceracion por quince dias; se cuele con expresion, se añade el azúcar disuelto en agua y se filtra.

8214. R. DE AZAHAR.

℥ Pétalos de flor de naranjo. ℥jβ (750 gr.).
 Alcohol de 52° c. 20° Cart. 24 quart. (12 lit.).
 Agua de azahar. ℥ij (1000 gr.).
 Azúcar muy bl. ℥jvβ (2250 gr.).

Se ponen los pétalos de flor de naranjo en un lebrillo; se vierte sobre ellos ℥vj ú ℥viii (3000 ó 4000 gr.) de agua á 60° del centigrado, con el fin de lavarlos y quitarles parte de su amargor; se echan casi al instante sobre un lienzo y se exprimen con la mano; se maceran entonces en el alcohol débil por seis horas; se cuele el líquido en otra vasija que contenga el azúcar y el agua de azahar, y cuando se haya verificado la solucion se filtra por papel.

8215. R. DE AZAHAR DESTILADA ó Crema de azahar ó de flor de naranjo.

℥ Pétalos de flor de naranjo. 2
 Alcohol de 21° Cart. 8

Se destila en el baño maría para sacar ℥jv (2000 gr.) de alcoholato, al cual se añade:

Azúcar muy blanca. 2
 Disuelta antes en

Agua de azahar. 2
 Se cuele y se filtra.

8216. R. DE AZAHAR COMPUESTA ó Agua divina.

℥ Esencia de limon. 3ij (8 gr.).
 Esenc. de bergam. 3ij (8 gr.).
 Alcoh. de 35° Cart. ℥viii (4000 gr.).
 Agua pura. ℥j (500 gr.).

Se destila en el baño maría ℥viii (4000 gr.) de líquido espirituoso, al cual se añaden:

Azúcar. ℥jv (2000 gr.).
 Agua pura. ℥xjv (7000 gr.).
 Agua de azahar. . ℥ij (1000 gr.).
 Filtrese.

8217. R. LLAMADA BITTER DE LOS HOLANDESES Y AMARGO DE LOS ALEMANES.

℥ Genciana,
 Naranjitas, ãã. 3β (16 gr.).
 Canela,
 Cálamo aromático, ãã. 3j (4 gr.).
 Enula campana. . . . 3β (2 gr.).
 Cilantro. 3iij (12 gr.).

Se reduce á polvo grueso, se macera ocho dias en ℥jv (2000 gr.) de enebro (de los alemanes) y se añade 3iij (96 gr.) de azúcar.

8218. R. DE CACAO.

℥ Cacao de Caracas tostado y mond. ℥j (500 gr.).
 Cacao de las islas. ℥β (250 gr.).
 Aguard. de 21° C. ℥viii (4000 gr.).
 Agua. ℥jβ (750 gr.).
 Azúcar. ℥jβ (750 gr.).
 Vainilla. ʒxij (6 dec.).

Se tuesta de nuevo el cacao al aire libre en una paila de hierro agitándole continuamente, y cuando se haya enfriado se reduce á polvo grueso en un mortero, y se pone en maceracion en una botella bien tapada con la vainilla y el aguardiente. Pasado un mes se cuele con expresion, se añade el azúcar disuelto en el agua y se filtra.

8219. R. DE CAFÉ.

☞ Café de Moca tostado
y quebrantado. ℔j (500 gr.).
Aguard. de 30° Cart. 8 cuart. (4 lit.).
Se macera por ocho dias, se
cuela y se añade:
Azúcar blanca,
Agua, ãã. ℥xx (625 gr.).
Filtrese.

**8220. R. DE CAFÉ DESTILADA ó
Crema de café, Crema de Moca.**

☞ Café de Moca tostado
y molido. ℔ij (1000 gr.).
Aguardiente de 21° Cart. 20 cuart.
(10 lit.).

Se macera por ocho dias, y se
destilan en el baño maría 14
cuart. (7 lit.) de liquido, que se
echan sobre el residuo para des-
tillar de nuevo á fuego muy lento
12 cuart. (6 lit.); entonces se to-
ma:

Azúcar blanca. ℔v (2500 gr.).
Agua. ℔viii (4000 gr.).
Se disuelve en frio, se mezclan
los dos liquidos y se filtra.

**8221. R. DE CANELA ó Licor de
Madama Amphoux.**

☞ Alcoholato de canela. 4
Jarabe simple. 4
Mézclese y filtrese.

I. Repara las fuerzas abatidas.
D. ℥β á ℥ij (15 á 90 gr.).

Del mismo modo se prepara la ratafia
de MENTA.

**8222. R. DE CÁSCARAS DE
NARANJA.**

☞ Cáscaras recientes
de naranj. dulces. ℥jv (125 gr.).
Aguardiente añejo. 8 cuart. (4 lit.).
Se maceran por seis horas, se
cuela y añade:
Azúcar blanca. ℔jβ (750 gr.).
Se disuelve en frio y se filtra.

**8223. R. DE CÁSCARAS DE NARAN-
JAS AMARGAS Ó CURAZAO.**

☞ Cáscaras secas y mon-
dadas de nar. amarg. ℔j (500 gr.).
Clavos de especia. ℥ij (8 gr.).
Canela fina. ℥ij (8 gr.).
Aguardiente añejo. 20 cuart. (10 lit.).
Se maceran durante ocho dias,
se cuela y se añade:

Agua pura. ℔ij (1000 gr.).
Azúcar. ℔v (2500 gr.).
Verificada la solucion se filtra.

Nota. Algunas veces se añade
á este licor palo de Fernambuco,
que le comunica la propiedad de
enrojecerse cuando se le deja ex-
puesto al aire.

**8224. R. DE CÁSCARA VERDE DE
NUEZ.**

☞ Nueces pequeñas re-
cien cuajadas. . . número 30.
Aguardiente. 2 cuart. (1 lit.).
Azúcar. ℥vj (192 gr.).
Clavos de especia,
Macis,
Canela, ãã. ℥xij (6 dec.).

Se machacan las nueces, se
maceran en el aguardiente por un
mes, se añade el azúcar, y tres
semanas despues los aromas; pa-
sados ocho dias se cuela con ex-
presion y se filtra.

I. Este licor es un buen esto-
macal, pero es necesario que
tenga á lo menos dos años para
usarle.

**8225. R. DE LOS CARIBES ó
Remedio de los caribes.**

☞ Aguard. de azúcar. 6 cuart. (3 lit.).
Resina de guayaco. ℥ij (60 gr.).
Se machaca la resina y se la
hace digerir en el aguardiente
durante quince dias.

I. Gota blanda. D. ℥β (15 gr.) al
dia.

Nota. Endulzando y aromatizan-

do este aguardiente se obtiene un licor agradable.

8226. R. DE CLAVELES.

- ℥ Pétalos de claveles rojos privados de sus uñas. 2000
- Canela 1
- Clavo. 1
- Aguardiente. 4000
- Azúcar. 500

Se macera durante quince días, se exprime, se añade el azúcar y se filtra.

8227. R. DEL COMENDADOR DE COUMARTIN CONTRA LAS ARENILLAS.

- ℥ Aguardiente. . ℔x y ℥iij (5090 gr.).
- Azúcar. ℔ij y ℥v (1020 gr.).
- Raiz de gatuña,
- Raiz de cinorrodon,
- Raiz de malvabisco,
- Raiz de sello de Salomon,
- R. de cardo corred., ãã. ℥ij (64 gr.).
- Raiz de consuelda mayor,
- Bayas de enebro, ãã. . ℥j (32 gr.).
- Nuez moscada. ℥vj (24 gr.)
- Semillas de anís. ℥j (4 gr.).

Se maceran las raíces en el aguardiente durante quince días, se cuele con expresion, se funde el azúcar en el líquido y se filtra.

D. Un vaso pequeño, mañana y noche.

Nota. Se auxilia la accion de este remedio por el uso de una infusion de hinojo de mar, *crithmum maritimum*.

8228. R. DE FRUTOS ó Ratafia antiescorbútica.

- ℥ Cerezas. ℥℔ (15 gr.).
- Grosellas. ℥j℔ (6 gr.).
- Sangüesas. ℥Ljv (3 gr.).
- Alcohol. ℥vj (24 gr.).

Se exprime al cabo de un mes, y á ℔xv (7500 gr.) de licor se añade:

- Clavo. número 24.

- Vainilla. Media.
 - Azúcar. ℔jv (2000 gr.).
- Se filtra al cabo de un mes.

8229. R. DE GUINDAS AGRIAS COMPUESTA ó Marrasquino de Zara.

- ℥ Espiritu de guindas agrias fermentadas. ℥xij (375 gr.).
 - Alcoholato de framb. ℔℔ (250 gr.).
 - Alcohol de 38° Cart. ℔ij (1000 gr.).
 - Agua pura. ℔vj (3000 gr.).
 - Azúcar muy blanca. ℔j℔ (750 gr.).
- Disuélvase y fíltrese.

El verdadero marrasquino viene de Dalmacia.

8230. R. DE GUINDAS.

- ℥ Guindas agrias de rabo corto, mondadas y despachurradas con sus huesos. ℔iij (1500 gr.).
- Aguard. de 32° C. ℔viiij (4000 gr.).

Se maceran durante un mes, se cuele con expresion y se añade á cada libra (500 gr.) de líquido:

- Azúcar. ℥iij (96 gr.).

Se filtra despues que se haya disuelto.

Del mismo modo se preparan las ratafias de FRAMBUESAS y de GROSELLAS.

8231. R. DE GROSELLAS NEGRAS.

- ℥ Grosellas negras sin escobajos. . ℔vj (3000 gr.).
- Aguardiente de 20° Cartier. 18 quart. (9 lit.).
- Azúcar. ℔iij℔ (1750 gr.).
- Clavo de especia. . ℥j (4 gr.).
- Canela fina. ℥ij (8 gr.).

Se despachurren las grosellas en un lebrillo, se echan en un jarro de vidrio ó en un cántaro, y se añade el aguardiente, el azúcar, el clavo y la canela. Despues de quince días de maceracion se cuele con expresion y se filtra el líquido por una manga ó por papel.

8232. R. DE HUESOS.

- ℥ Huesos de melocoton,

ó Huesos de albaricoq. número 60.

Aguardiente ℔ij (1000 gr.).

Azúcar. ℥v (160 gr.).

Se quebrantan los huesos, se ponen almendras y cáscaras mezcladas en un frasco con el aguardiente, se cuele despues de un mes de maceracion, se añade el azúcar y se filtra.

El ACEITE DE HUESOS DE NOYÓ se prepara destilando el alcohol de los huesos indicado antes, y mezclando el producto con igual cantidad en peso de jarabe simple sin color.

8233. R. DE LIMON DESTILADA.

Se toman las cáscaras de doce limones, se maceran en 16 quart. (8 lit.) de alcohol de 32° Cartier, y se destila en el baño maría. Entonces se añade:

Alcoholato de limon. 4

Agua pura. 4

Azúcar bien blanca. 4

Mézclese y fíltrese.

Del mismo modo se prepara la de CIDRA.

Lo que se llama PERFECTO AMOR es la ratafiá de cidra, dada de rojo con la cochinilla.

La CREMA DE LAS BARBADAS es una mezcla de dos partes de ratafia de limon y una de cidra.

8234. R. DE MEMBRILLOS.

℥ Zumo de membrill. ℔vj (3000 gr.).

Alcohol rectificado

de 35° Cart. . . ℔iij (1500 gr.).

Azúcar blanca. . . ℔ijß (1250 gr.).

Almendras amargas

machacadas. . . . 3jv (16 gr.).

Canela. 3iij (12 gr.).

Cilantro quebrant. 3ij (8 gr.).

Macis. 3j (4 gr.).

Clavo de especia. . . ̄xxxjv (12 dec.).

Se macera todo junto por quince dias y se filtra.

8235. R. DE QUINA.

℥ Tintura de quina á 20°. 5

Jarabe simple. 4

Fíltrese.

8236. R. DE ROSAS ó Aceite de rosas.

℥ Alcoholato de rosas. ℔vj (2000 gr.).

Agua dest. de rosas. ℔jß (750 gr.).

Agua pura. ℔ijß (1250 gr.).

Azúcar. ℔ij (1000 gr.).

Cochinilla. 3j (4 gr.).

Crémor de tártaro. ̄jxx (50 cent.).

Se hierven la cochinilla y el crémor de tártaro en ℔ß (250 gr.) de agua, y se filtra el líquido; se disuelve por separado el azúcar en el resto del agua, se añade la tintura de cochinilla y el alcoholato de rosas, y despues de dos dias de reposo se filtra.

8237. R. DE TOLÚ.

℥ Bálsamo de Tolú. . . 3ij (64 gr.).

Agua pura. ℔jß (750 gr.).

Se ponen en digestion en baño maría hirviendo por dos horas, agitando muchas veces para favorecer la accion del agua sobre el bálsamo; se dejan reposar, se decanta y se añade al líquido:

Azúcar muy blanca. ℔jß (750 gr.).

Alcohol de 24° Cart. ℔ij (1000 gr.).

Despues que el azúcar se haya disuelto se filtra.

Del mismo modo se prepara la ratafia de BENJÚ, conocida con el nombre de ELEFANTE ó ELEFANTINA.

8238. R. DE VAINILLA ó Aceite de vainilla.

℥ Alcohol de 32° Cart. ℔j (500 gr.).

Vainilla fina cortada

en pedazos. 3j (4 gr.).

Se macera por dos dias, se cuele y se añade:

Jarabe simple. ℔ij (1000 gr.).

Fíltrese.

El ACEITE DE VENUS es este mismo licor, añadiéndole espíritu de canela, claveles, clavo y flor de naranjo.

REMEDIOS.

8239. REMEDIO ANTIHEMORROIDAL (Vallez).

℞ Extr. de hojas de saúco. ℥j (4 gr.).
 Alumbre calcinado. . . . ℥℞ (2 gr.).
 Ungüento populeon. . . ℥℞ (15 gr.).
M. D. El grueso de una avellana, tres veces al día. Si hay estreñimiento se dará antes un purgante ligero. Si las hemorroides son secas, se usa una mezcla de hojas de saúco y perejil medio cocidas.

8240. R. ASTRINGENTE TÓNICO (Putegnat).

℞ Sulfato de alúmina y potasa. . . . ℥j (500 gr.).
 Hidroclorato de amoniaco,
 Oxido de cobre,
 Sulfato de zinc, ãã. . ℥j (30 gr.).
 Se mezcla todo y se funde á fuego lento.

Se disuelve el grueso de una nuez de esta piedra en 2 cuartillos (1 lit.) de agua tibia, y se usa esta solución por medio de compresas que se renuevan cada tres ó cuatro horas en los casos de contusiones con ó sin equimosis, en las fracturas con tumefacción enorme y gran derrame sanguíneo, tumefacción por dislocación, erisipela de la cara, erisipela por arañazos en los miembros edematosos, edema de una angioleucitis, panarizos incipientes, úlceras varicosas, coces de caballos, y los veterinarios pueden usarle en las heridas de los caballos producidas por la silla.

8241. R. CONTRA LAS AFECCIONES CRÓNICAS DE LAS ARTICULACIONES (Purmann).

℞ Solución de hidroclorato de sosa. . . ℥ij (1000 gr.).

Vinagre concentrad. ℥ij (500 gr.).
 Sulfato de cobre. . . ℥j℞ (45 gr.).
 Sulfato de alúmina
 en polvo. . . . ℥v℞ (165 gr.).

Hojas de salvia. . . . 2 puñados.
 Se hierve durante media hora y se aplica tibio al rededor de las articulaciones hinchadas.

8242. R. CONTRA EL BOCIO (Dr. Coindet).

℞ Agua destilada. . . . ℥j (30 gr.).
 Ioduro de potasio. . . . ℥℞ (2 gr.).
 Iodo. . . . ḡx (5 dec.).

H. S. A. D. Se dan á los adultos seis gotas, tres veces al día, en una tacita de agua azucarada. Al mismo tiempo se dan fricciones sobre el tumor con la pomada de ioduro de potasio iodurado. Se usa este remedio contra el bocio, las escrófulas, los tumores indolentes y los infartos crónicos de las glándulas. V. núms. 7984 y 7986.

8243. R. CONTRA LOS CARBUNCLOS CUALQUIERA QUE SEA SU INDOLE.

℞ Sublimado corrosivo. . . ℥℞ (15 gr.).
 Ungüento basilicon. . . . ℥j (30 gr.).
 Escabiosa pulverizada c. s.

para que tome la mezcla la consistencia de emplasto.

Se toma un poquito para formar un parche del diámetro de un real de plata, y se aplica sobre el carbunco: á las veinticuatro horas se levanta y se pone otro nuevo; fija la gangrena y la úlcera se cura con una hila untada con miel rosada. El régimen interior se reducirá á los atemperantes y á la dieta, no necesitando preparar al enfermo con evacuaciones sanguíneas, ni generales, ni locales, ni con los purgantes.

8244. R. CONTRA EL CÁNCER
(Landolfi).

℞ Cerato de Galeno. ℞j (30 gr.).
Morfina. ℞v (25 cent.).
Polvo de Rousselot. ℞xc (5 gr.).
Mézclese.

8245. R. CONTRA LA EPILEPSIA
(Marochetti).

Hay dos clases de remedios: las píldoras para el primer grado, y las gotas para el segundo.

Las *Píldoras antiépilépticas* se componen de

℞ Acíbar. ℞j (4 gr.).
Gutagamba. ℞ß (2 gr.).
Esencia de anís. 8 gotas.

Hágase polvo.

Extracto acuoso de rui-
barbo seco. ℞xviii (1 gr.).

Extracto seco de hojas
de lirio de los valles. ℞xx (80 gr.).

H. S. A. píldoras de ℞ij (1 dec.).

D. Una píldora, tres veces al día, por la mañana en ayunas, al medio día y por la noche al acostarse, bebiendo después de cada píldora un vaso de agua.

I. Se usan en las epilepsias que pueden provenir de una causa humoral cualquiera que sea.

Las *gotas antiépilépticas* se componen de

℞ Alcohol á 22°. ℞xjv (440 gr.).
Raíz de angélica en
polvo. ℞ij (60 gr.).

Se hace macerar durante cuarenta y ocho horas y se añade:

Anís estrellado en polvo. ℞ij (8 gr.).

Semillas de cardamomo. ℞ij (8 gr.).

Cort. de raíz de alcaná. ℞j (4 gr.).

Raíz de zedoaria en polv. ℞jß (6 gr.).

Azafran oriental. ℞ij (8 gr.).

Opio puro ℞ij (8 gr.).

Se maceran todas estas sustancias en una vasija bien tapada durante dos semanas, se filtra y se añade:

Esencia de manzanilla. 25 gotas.

Esencia de valeriana. . . 25 gotas.

Esencia de cáscaras de

limon. 20 gotas.

Esencia de canela. . . . 15 gotas.

Esencia de nafta. 25 gotas.

Etér sulfúrico. ℞j (12 dec.).

Se digiere durante dos semanas.

I. Epilepsia por afección nerviosa. D. Cinco gotas, tres veces al día, á los niños, diez á los adolescentes y quince á los de mas edad, siempre sobre un pedazo de azúcar.

Si al residuo que queda después de haber extraído la tintura se añade ℞j (500 gr.) de jarabe simple bien caliente, se cubre la vasija y á los dos días se cuele con expresión, se obtiene un *Jarabe antiéspasmódico* que puede darse á los niños á pequeñas dosis contra las convulsiones ligeras, espasmos histéricos, añadiendo una agua destilada aromática cualquiera.

8246. R. CONTRA EL ESCIRRO Y EL CÁNCER (Reitz).

℞ Acido nítrico. ℞jv (125 gr.).

Acido clorhídrico,

Etér sulfúrico,

Borato de sosa, añ. . . . ℞ij (8 gr.).

Se ponen estas sustancias en un frasco de diez y seis á veinticuatro onzas, y se tapa imperfectamente; se abandona todo á sí mismo durante algunas horas. Desprende vapores, y cuando la mezcla haya tomado un tinte pardusco se la echa en frasquitos.

D. Para usarle interiormente se diluye una parte de esta mezcla en dos partes de éter sulfúrico alcoholizado y se administran diez gotas en éter sulfúrico alcoholizado. Para uso externo se mezcla ℞j (4 gr.) con ℞ij (60 gr.) de un aceite graso cualquiera y se forma un linimento. En inyecciones se emplea ℞ß (2 gr.) en ℞j (500 gr.) de agua destilada.

8247. R. CONTRA LAS DIARREAS.

℞ Goma arábica en polvo ʒj (4 gr.).
Raiz de ipecacuana en p. ʒvj (3 dec.).
Mézclese y divídase en cuatro papeles iguales.

Extracto acuoso de opio. ʒij (1 dec.).
Háganse cuatro píldoras iguales.

Se administra un papel en ʒij (60 gr.) de cocimiento blanco gomoso con una píldora de opio.

Se dan dos ó tres tomas al dia.

Píldoras contra la diarrea.

℞ Ipecacuana en polvo. . ʒvj (3 dec.).

Extracto acuoso de opio. ʒij (1 dec.).

H. S. A. cuatro píldoras iguales.

D. Una cada cuatro horas con ʒij (60 gr.) de cocimiento blanco.

8248. R. CONTRA EL ENVENENAMIENTO POR LOS HONGOS.

Se debe emplear un vomitivo, tal como el tártaro emético, á dosis suficiente, asociándole á alguna sal propia para excitar la accion del estómago y diluir y dividir el humor mucoso, cuya secrecion se vuelve mas abundante por la impresion de los hongos.

Se hará beber la *solucion emetocatórtica* tibia á vasos, dejando mas ó menos intervalo de tiempo y aumentando las dosis hasta que el enfermo haga evacuaciones. En los primeros instantes el vómito basta á veces para hacer expeler todos los hongos y hacer cesar los accidentes; pero si se ha diferido dar los socorros convenientes, si no han sobrevenido los accidentes hasta muchas horas despues de haberlos comido, se debe presumir que parte de los hongos venenosos ha pasado á los intestinos, y entonces se usará con buen éxito una mistura hecha con aceite de ricino y jarabe de flores de melocoton, que se aromatizará con algunas gotas de licor mineral de Hoffmann y se hará tomar

á cucharadas con mayores ó menores intervalos.

Despues de estas evacuaciones, que son de una necesidad indispensable, es necesario recurrir al uso de los mucilaginosos y de los dulcificantes, que se asociarán á los fortificantes para remediar los dolores y la irritacion producida por el veneno. Por esta razon se prescribirá el agua de arroz gomosa y una ligera infusion de flores de saúco mezclada con leche, á la cual se añadirá agua de flores de naranjo, agua simple de yerbabuena y un jarabe. Se usarán tambien con buen éxito las emulsiones y las pociones aceitosas aromatizadas con cierta cantidad de éter sulfúrico. En algunos casos se recurrirá á los tónicos y á las pociones alcanforadas, y cuando haya tension dolorosa en el vientre se emplearán los fomentos emolientes, algunas veces los baños y las sangrias.

8249. R. CONTRA LOS ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LOS HONGOS.

℞ Acíbar sucotrino. . . . ʒijʒ (80 gr.).
Mirra. ʒjʒ (48 gr.).
Resina de guayaco. . . ʒx (40 gr.).

Se ponen estas sustancias cada una aparte en

Aguardiente. lbj (500 gr.).

Se menean diariamente las botellas durante doce á quince dias, despues se decantan los líquidos y se los mezcla.

D. Inmediatamente que se siente la menor incomodidad despues de haber comido los hongos, se toma una copa de este remedio y cada vez que se vomita se toma medio vaso. Algun tiempo despues que han cesado los vómitos, se bebe té muy azucarado. Este elixir conviene tambien en las indigestiones, en los cólicos de estómago y del bajo vientre y en la supresion de las reglas por debilidad. Es vulne-

rario y se emplea contra la gota y los dolores reumáticos.

8250. R. CONTRA LA GOTA.

Wells usa con éxito contra la gota y el reumatismo gotoso las fricciones durante veinte minutos con el agua de Colonia y compresas calientes, durante tres días, continuamente humedecidas con esta agua.

Henrotay de Auvers aconseja la pocion y las píldoras siguientes:

Pocion.

℥ Polvo de goma aráb. ℥ij (60 gr.).
 Agua comun. lbß (250 gr.).
 Alcoholado de cólchic. ℥ij (8 gr.).
 Jarabe de ruibarbo. . ℥ij (60 gr.).

M. D. A cucharadas de dos en dos horas.

Desde el día siguiente hace tomar mañana y noche una de las píldoras siguientes:

Píldoras.

Azufre dorado de antimonio. ℥j (4 gr.).
 Opio puro. ḡv (25 cent.).
 Regaliz en polvo. . . ℥j (4 gr.).
 Mucilago de goma arábica. . . . c. s.

para treinta píldoras.

Prescribe la abstinencia completa de las bebidas espirituosas ó fermentadas, y los alimentos suaves en cantidad moderada.

8251. R. CONTRA LA GOTA (Turck).

℥ Lejía de sosa cáustica á 8°. 20 quart. (10 lit.).

Se satura con

Alúmina en jalea. . . . c. s.

Se añade:

Goma arábica. ℥vij (224 gr.).

Trementina de Chio. ℥vj y ℥ij (200 gr.).

Aceite comun. . ℥ij y ℥j (100 gr.).

Alcohol de 36° alcanf. lbß (250 gr.).

8252. R. ANTIGOTOSO (Lucas).

℥ Aceite pirogenado de lignito. ℥j (32 gr.).
 Sulfuro negro de antimonio. ℥j (32 gr.).
 Incienso en polvo. . . ℥ij (8 gr.).
 Dulcamara en polvo. . ℥vj (24 gr.).
 H. S. A. píldoras de ḡij (1 dec.).
 D. Diez y ocho á treinta píldoras al día, en tres dosis diferentes. Se continuará este tratamiento durante tres meses ó mas para consolidar la curacion y evitar que se reproduzca la enfermedad.

8253. R. CONTRA LAS FLORES BLANCAS (Dr. Kopp).

℥ Cocimiento de ratania. ℥xij (375 gr.).
 Extracto de ratania. . ℥jv (45 gr.).
 Tintura de catecú,
 Tintura de quino, añ. ℥jß (6 gr.).

M. D. Se introduce en la vagina una esponja empapada en este líquido astringente, y se renueva todos los días la aplicacion del remedio hasta la perfecta curacion de la enfermedad.

8254. R. CONTRA LAS PECAS

℥ Almendras amargas. . . . número 6.
 Miga de pan. c. s.
 Leche. c. s.
 para hacer una cataplasma de cinco centímetros cuadrados.

Celso usaba la composicion siguiente:

Mirabolanos. 4
 Tierra cimolita azulada. 4
 Almendras amargas. 4
 Harina de cebada. 4
 Harina de orobio. 4
 Semillas de meliloto. 4
 Miel muy amarga. 4

Se frota con ellas las pecas y cicatrices por la noche, y solo se las enjuga por la mañana.

8255. R. CONTRA LA RABIA.

Médicos muy acreditados de Cádiz recomiendan contra la rabia ʒj (4 gr.) en polvo de la corteza del árbol llamado almezo (conocido vulgarmente en Andalucía con el nombre de Mesto) puesta en infusión en medio cuartillo de agua hasta que rompa el hervor; otros toman los citados polvos en un vaso de horchata, una toma por la mañana y otra por la noche, durante veinticinco ó treinta días.

8256. Otro (JACNICHER).

Burchardt ha publicado este remedio, que segun dice ha experimentado mas de cien veces!!

Electuario.

- ʒ Belladona. ʒv (25 cent.).
- Flores de zinc. ʒxviiij (4 gr.).
- Etiope antimonial. . . ʒß (2 gr.).
- Miel. ʒß (15 gr.).
- Electuario de triaca. . ʒj (30 gr.).

H. S. A. D. Se toma en los tres primeros días media cucharadita de café mañana y noche, y despues una cucharada entera.

Bebida.

- ʒ Alkali volátil fluor. . . ʒß (15 gr.).
- D. Diez gotas, tres veces al día, en una taza de té ó de saúco.

Ungüento.

- ʒ Ungüento basilicon. ʒß (15 gr.)
- Ungüento mercurial gris. ʒij (8 gr.).
- Manteca de antimon. ʒjß (6 gr.).
- Oxido rojo de merc.. ʒxvj (80 cent.).
- Cantáridas en polvo. ʒvij (35 cent.).
- Opio puro. ʒx (50 cent.).

H. S. A. D. Se aplica á la herida, la que se procurará supure durante seis semanas.

8257. R. CONTRA LA RABIA.

Se está ensayando actualmente

en la escuela veterinaria de Lion el siguiente medicamento:

- ʒ Asclepias venetósigo. ʒvj (24 gr.).
- Corteza de serval (cratægna terminalis) tomada de los ramos tiernos. ʒij (8 gr.).

y la parte mas interior ó el corazon de los dientes de ajos.

Se pone todo en una vasija con dos cuartillos de agua y se deja macerar durante doce horas; se tapa y se aproxima al fuego. Despues de la primera ebullicion se modera el fuego, pero se procurará que no hierva ni que el vapor levante la tapadera. Apartado el cocimiento de la lumbre, se cuele en caliente y debe tomarse tibio por el enfermo. Solo servirá para un día. D. Cinco cucharadas para un adulto, y una á tres y media á lo mas para los niños. Generalmente solo se toma una vez por la mañana, de cinco á seis.

Algunas veces el inventor da el remedio por la noche, pero la cucharada será menor; cree que basta una dosis.

Se tomará al séptimo ú octavo día en que empezó á rabiarse el perro ó lo mas pronto el tercero, y se repite la dosis durante seis días.

8258. R. CONTRA LA TÉNIA (Dubois).

El día antes por la noche se da una taza de sustancia de pan.

Al día siguiente por la mañana en una taza de caldo de yerbas,

- ʒ Polvo de helecho. . . . ʒß (15 gr.).

Una hora despues se hace tomar en tres bolos, de hora en hora, la masa siguiente:

- Jalapa,
- Diagridio,
- Gutagamba,
- Escamonea, ãã. ʒvj (3 dec.).

Se hace beber todo el resto del día caldo de yerbas.

8259. Otro (ALIBERT).

Se da por bebida habitual á los enfermos el cocimiento siguiente:

℞ Raíz de helecho macho. ℥iv (125 gr.).
Agua comun. ℔iij (1500 gr.).

Se hierve y se reduce por la ebullicion á ℔ij (1000 gr.) y despues se añade:

Jarabe de coralina de Córcega. ℥ij (60 gr.).

Tres horas despues de la comida se administra el bolo siguiente:

Mercurio dulce,
Cuerno de ciervo calcinado, añ. ḡij (1 dec.).

Conserva de rosas. c. s.

Por la tarde se da ℥j (30 gr.) de aceite de almendras dulces.

Al segundo dia se prescribe el purgante siguiente:

Escamonea en polvo. ḡxviiij (1 gr.).

Raíz de helecho macho en polvo. ℥j (30 gr.).

Gutagamba,
Mercurio dulce, añ. ḡxij (6 dec.).

Se toma en tres dosis en agua azucarada ó mezclada con vino.

Nota. Se modifica este remedio segun la edad y la resistencia de la ténia.

8260. R. CONTRA LA TÉNIA (Bourdier).

Por la tarde el enfermo toma una taza de sustancia de pan con yema de huevo. Al dia siguiente por la mañana en un vaso de un cocimiento fuerte de helecho:

Eter sulfúrico. ℥j (4 gr.).

Cinco minutos despues se usa una lavativa con el mismo cocimiento, al cual se añade:

Eter sulfúrico. ℥ij (8 gr.).

Una hora despues se da el purgante siguiente:

Aceite de ricino. ℥ij (60 gr.).

Jarabe de flores de alhérchigo. ℥j (30 gr.).

cuya accion se auxilia con algunas tazas de caldo de yerbas.

Nota de Guilbert sobre el tratamiento de la ténia.

Este profesor en su práctica no dirige en general ningun medio de tratamiento contra la solitaria; ha observado que este animal parásito puede existir largo tiempo en la economía sin determinar ningun accidente, con tal que se tenga cuidado de alimentar mucho á los enfermos. En un gran número de sugetos que ha tenido ocasion de observar, los purgantes drásticos eran la principal causa de la enfermedad. Por consiguiente ha abandonado la ténia á sí misma, persuadido de que concluye por desaparecer espontáneamente. Sin embargo, cuando la lombriz llega á producir accidentes graves, lo que sucede alguna vez, prefiere el tratamiento de Bourdier.

8261. Otro (DUPUIS).

℞ Estaño inglés en polv. ℥j (12 dec.).

Tanino puro. ℔B (6 dec.).

Gutagamba. ℔B (6 dec.).

Eleosácaro de cajeput. ḡv (25 cent.).

Divídase en dos papeles.

D. Se toman en ayunas con media hora de intervalo en una hostia. Despues de cada polvo se dan dos tazas de café sin azúcar.

A las dos horas aparecen dolores de tripas con deposiciones, y sale la ténia generalmente entera; si los dolores de tripas son fuertes se da aún café negro.

Para fortificar los intestinos se da despues durante quince dias:

Tintura etérea de acetato de hierro. ℥ij (8 gr.).

Tintura corroborante de With. ℥B (15 gr.).

D. Se toman cada tres horas cuarenta gotas en vino tinto.

8262. Otro (LEVACHER).

℞ Aceite de ricino. ℥ij (60 gr.).

Esenc. de trementina. \mathfrak{B} (15 gr.).
 Agua destilada de yer-
 babuena. \mathfrak{ij} (60 gr.).
 Jarabe simple. \mathfrak{j} (30 gr.).
 Goma arábica. $\mathfrak{ij}\mathfrak{B}$ (10 gr.).
 H. S. A. D. Se toma de una vez
 por la mañana en ayunas. Se pue-
 de aumentar la dosis de la esen-
 cia hasta \mathfrak{j} (30 gr.).

8263. REMEDIOS CONTRA EL TIALISMO DE LAS PREÑADAS.

Cominos, cardamomo menor, mascados en ayunas; infusiones de manzanilla, melisa ó verónica; la goma arábica y el azúcar cande tenidos en la boca; pedazos de hielo, una solución fuerte de alum- bre, el acetato de plomo, los pur- gantes á cortas dosis, las sales de quinina, el extracto de canela y el opio.

8264. R. CONTRA EL TIALISMO.

\mathfrak{z} Sulfato de sosa. 50
 Carbon. 40
 Azufre. 6

Se funden en un crisol cubierto, se lava, se filtra y se hace cristali- zar.

D. \mathfrak{Dj} (12 dec.) cuatro veces al día, contra la salivación ocasiona- da por el mercurio.

Nota. Se usa también este reme- dio en las enfermedades del hí- gado, que se han hecho crónicas.

8265. R. CONTRA LA TIÑA (Dr. Bárlow).

\mathfrak{z} Agua de cal. $\mathfrak{vij}\mathfrak{B}$ (240 gr.).
 Sulfuro de sosa rec. \mathfrak{ij} (96 gr.).
 Jabon medicinal. . . . \mathfrak{B} (16 gr.).
 Alcohol rectificado. \mathfrak{ij} (8 gr.).
 Jabon medicinal. . . . $\mathfrak{j}\mathfrak{B}$ (6 gr.).

Mézclase exactamente y fíltrese.

I. Se lava muchas veces la ca- beza del enfermo con este agua, mañana y noche. Se la deja secar sin tocarla. Las costras se des- prenden, se caen y dejan las par-

tes subyacentes perfectamente sanas. No es necesario cortar los pelos ni afeitar la cabeza para ha- cer uso de esta agua.

8266. R. CONTRA LA TÊNIA ó Tenífugo (Schmidt).

Este secreto ha sido comprado por el gobierno prusiano.

Se da desde por la mañana, de dos en dos horas, hasta la siete de la tarde, dos cucharadas de la poción siguiente:

\mathfrak{z} Valeriana. \mathfrak{vj} (24 gr.).
 Sen. \mathfrak{ij} (8 gr.).
 Agua hirviendo. \mathfrak{vj} (192 gr.).

Se deja infundir, se cuele y se añade:

Sulfato de sosa. \mathfrak{ij} (12 gr.).
 Jarabe de maná. \mathfrak{ij} (64 gr.).
 Oleosácaro de tanaceto. \mathfrak{ij} (8 gr.).

En los intervalos de estas to- mas se hace que el enfermo beba gran cantidad de café con agua muy azucarada. Al medio día to- ma el enfermo un poco de aren- que con lechecilla de peces. A las ocho de la noche se le permite comer una ensalada hecha con arenques, jamon crudo picado, una cebolla, mucho aceite y azú- car.

En el segundo día, á las seis de la mañana, se administran al enfermo de hora en hora, diez de las píldoras siguientes:

Asa fétida. \mathfrak{ij} (12 gr.).
 Extracto de grama. \mathfrak{ij} (12 gr.).
 Gutagamba. \mathfrak{ij} (8 gr.).
 Ruibarbo. \mathfrak{ij} (8 gr.).
 Jalapa. \mathfrak{ij} (8 gr.).
 Ipecacuana. \mathfrak{ixij} (6 dec.).
 Digital. \mathfrak{ixij} (6 dec.).
 Azufre dorado de an-
 timonio. \mathfrak{ixij} (6 dec.).
 Calomelanos. \mathfrak{ij} (24 dec.).
 Esencia de anís. \mathfrak{ixij} (6 dec.).
 Esencia de tanaceto. \mathfrak{ixij} (6 dec.).

H. S. A. píldoras de á \mathfrak{ij} (1 dec.).

A la media hora de tomar es- ta dosis se da una cucharada de

aceite de ricino, y durante el dia mucho café con agua muy azucarado.

Comunmente se expulsa la lombriz á las dos de la tarde; si no sucediere así, se continúa tomando las píldoras y de cuando en cuando el aceite de ricino.

8267. R. CONTRA LA TÉNIA, DE MATHIEU, farmacéutico de Berlin, y del Dr. Kuttinger, publicado por orden del colegio de médicos de Prusia.

Electuario A.

- ℥ Limad. de estaño puro. ʒj (32 gr.).
- Polvo de raiz de helecho macho. ʒvj (24 gr.).
- Semillas de ajenos. . . ʒjv (16 gr.).
- Polvo de raiz de jalapa, Sulfato de potasa, ãã. . ʒj (4 gr.).
- Miel. c. s.

para dar á la mezcla la consistencia conveniente.

Electuario B.

- ℥ Raiz de jalapa en polvo, Sulfato de potasa, ãã. ʒij (24 dec.).
- Polvo de escamonea de Alepo. ʒj (12 dec.).
- Gutagamba en polvo. . ʒx (5 dec.).
- Miel. c. s.

El enfermo debe alimentarse ligeramente durante el uso de estos remedios, evitar los alimentos salinos y no tomar mas que agua de pan, legumbres y frutas bien cocidas.

Se le da cada dos horas una cucharada de café del electuario A, y se continúa de este modo durante dos á tres dias, hasta que experimente en los intestinos sensaciones determinadas comunmente por la presencia de la ténia.

Entonces se hace tomar el electuario B del mismo modo que el anterior hasta que salga la ténia. En el caso en que no se verifique esta expulsion, se la provoca por

algunas cucharadas de aceite de ricino, ó bien se le administra una lavativa con una onza de este aceite.

En general se debe regular la dosis de estos remedios, segun la edad, el sexo y la constitucion del enfermo.

8268. R. CONTRA LA TIÑA (Bicker).

- ℥ Oxido de antimonio hidrosulfurado anaranjado. ʒ
 - Protocloruro de mercurio. ʒ
 - Azúcar blanca. ʒ
 - D. De ʒß á ʒj (25 mil. á 5 cent.)
- dos veces al dia. Se dan fricciones, mañana y noche, sobre las partes enfermas con el unguento siguiente:

- Manteca fresca. ʒxj (44 gr.).
- Acetato de cobre, Protocloruro de mercurio, ãã. ʒj (1,3 gr.).

Nota. Las costras se caen muy pronto, frotándolas con un cepillo; se lava despues la cabeza con agua tibia, jabon y sulfuro de potasa. Luego que ha desaparecido la tiña, debe lavarse mucho tiempo la cabeza con una solucion tibia de subcarbonato de potasa.

8269. R. CONTRA LA TISIS (Cottereau).

En un frasco de dos ó tres galletes que contenga ʒvj (180 gr.) de agua, se vierten 5, 10 ó 15 gotas y aun hasta 60 de cloro líquido muy puro. El gas se desprende, y el enfermo le inspira mezclado con el vapor del agua por medio de un tubo encorvado que se sumerge dentro del frasco. Se renuevan estas inspiraciones seis ó siete veces al dia, durante cinco ó seis minutos á la vez.

8270. R. CONTRA LA TISIS PULMONAR (Hufeland).

- ℥ Acetato de plomo cristalizado, Opio, ãã. ʒvj (3 dec.).

Azúcar. ℥j (12 dec.).

Mézclese y dividase en doce pa-
peles iguales.

I. Tisis á consecuencia de fie-
bres prolongadas, fiebre héctica
y cuando hay sudores y diarreas
considerables y colicuativas. D.
Un papel mañana y noche.

8271. R. DEL CURA CHANCÉ
ó Tintura hidragoga.

℥ Ruibarbo. ℥j (4 gr.).
Jalapa. ℥℔ (2 gr.).
Lirio. ℥j (4 gr.).
Diagridio. ℥j (4 gr.).
Azúcar. ℥ij (60 gr.).
Aguardiente. ℔bj (500 gr.).
H. S. A. I. Hidropesía.

8272. R. FEBRÍFUGO (Foldi).

℥ Vino blanco. una botella.
Limon en rebanadas. . . número 4.
Se expone al sol en el verano
ó á un fuego lento en el invierno
hasta que fermente; se cuela el
vino exprimiendo bien el residuo.

D. Un vaso por la mañana en
ayunas á los adultos y menor do-
sis á los niños. Si hay saburra se
combate con un purgante y un
régimen severo. Es remedio muy
eficaz.

Durante su accion produce mu-
cho sudor.

**8273. R. PRESERVATIVO DE HUD-
SON PARA LOS DIENTES Y LAS
ENCÍAS.**

℥ Tintura de mirra,
Tintura de quina,
Tintura de canela, ãã. ℥ij (60 gr.).
Alcohol. vulnerario. ℥jv (120 gr.).

M. I. Sirve para enjuagarse la
boca y fortificar los dientes y las
encías. D. Una cucharadita en un
vaso de agua para enjuagarse la
boca.

**8274. R. CONTRA LA TÉNIA ó Lom-
briz solitaria (Madama Nouffer).**

El dia antes, por la noche, el en-
fermo toma una taza de sustan-
cia de pan. Por la mañana toma
℥ijj (12 gr.) de raiz de helecho
macho en polvo muy fino y diluido
en ℥vj (180 gr.) de tisana de hele-
cho ó de flores de tilo. Se cuela dos
ó tres veces la misma tisana para
que no deje poso. Dos horas des-
pues se toma un bolo purgante
compuesto de

℥ Calomelanos,
Res. de escamonea, ãã. ℥x (5 dec.).
Gutagamba. ℥vj (3 dec.).
Confecion de jacintos. c. s.

Se divide comunmente esta
cantidad en tres bolos iguales.

D. Uno para los niños, dos pa-
ra las personas nerviosas y deli-
cadas y tres para los adultos vi-
gorosos; con un cuarto de hora
de intervalo de una á otra toma.

Nota. Se debe beber detrás de
cada bolo una ó dos tazas de in-
fusion de te.

8275. R. CONTRA LOS SABAÑONES
(Poungens).

℥ Almendras amargas
recientes. ℥jv (125 gr.).
Miel. ℥ijj (90 gr.).
Alcanfor,
Harina de mostaza, ãã. ℥ij (8 gr.).
Alumbre calcinado,
Incienso en polvo, ãã. ℥j (4 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 2.

Se las mezcla y se hace una
especie de pomada.

Se frotan los sabañones no ul-
cerados, dos ó tres veces al dia.

8276. R. CONTRA LA DISENTERIA
(Quarin).

℥ Agua de flores de ama-
pola. ℔bj (500 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
Polvo de salicaria. . . ℥℔ (6 gr.).

H. S. A. D. ℥iij℥ (105 gr.) cada tres horas.

8277. R. CONTRA LA DISENTERIA MALIGNA (Quarin).

℥ Agua de toronjil. . . ℥℥ (250 gr.).
Jarabe de quermes. . . ℥j (30 gr.).
Catecú. ℥iij (12 gr.).
Alcanfor triturado con
goma arábica. . . ḡviiij (4 dec.).

M. S. A. D. A cucharadas de hora en hora, cuando se juzga á propósito suspender las evacuaciones.

8278. R. DE QUARIN, cuando son insuficientes los anteriores.

℥ Conserva de rosas rojas,
Jar. de arándano. ãã. ℥vj (24 gr.).
Polvo de raíz de tormentila. ℥j (4 gr.).
Polvo de raíz de ipecacuana. ℥℥ (2 gr.).
Opio purificado. . . . ḡjv (2 dec.).
M. S. A. D. ℥j (4 gr.) cada dos horas.

8279. R. VERMÍFUGOS DE BREMSER.

Núm. 1. Electuario.

℥ Santónico machacado ó semillas, ó mejor flores de tanaceto. ℥℥ (15 gr.).
Polvo de valeriana silvest. ℥ij (8 gr.).
Polvo de raíz de jalapa,
Sulfato de potasa, ãã. ℥j℥ á ℥ij (6 á 8 gr.).
Ojimiél escilítico. c. s.

Núm. 2. Especies para lavativas.

℥ Ajenjos,
Raíz de valeriana, ãã. ℥j (30 gr.).
Semillas de tanaceto,
Cáscaras de naranj., ãã. ℥℥ (15 gr.).
Dividanse y mezclense.

En dos cucharadas de estas sustancias se vierte un cuartillo de agua hirviendo, se deja infundir durante la noche, se cuele, se exprime y se usa la infusión para dos

lavativas. A cada una se añade una cucharada de aceite empireumático.

Núm. 3. Polvo purgante.

℥ Polvo de raíz de jalapa. ℥j (12 dec.).
Polvo de hojas de sen. ℥℥ (2 gr.).
Sulfato de potasa. . . . ℥j (4 gr.).

Se dividen en tres ó cuatro dosis iguales, que se toman de hora en hora, ó por medias dosis cada media hora, hasta que obre el remedio.

Núm. 4. Aceite antihelmíntico de Chabert. Véase t. II, pág. 6.

Núm. 5. Tintura fortificante.

℥ Tint. de malato de hier. ℥j (30 gr.).
Elixir vitriól. de Mynsicht. ℥℥ (2 gr.).
Tintura de acibar compuesta de la farmacopea austriaca. . . ℥j (4 gr.).

D. Diez, veinte, treinta gotas y aun mas, tres ó cuatro veces al día, en un poco de agua ó vino. Aunque hay descomposición en esta mezcla, el autor asegura que no por eso obra con menos eficacia.

Aplicación de los remedios.

Contra el tricocéfalo y los oxiuros se administra una cucharada de café del electuario número 1, mañana y noche, y dos lavativas pequeñas del número 2; para las personas poco irritables se añade una cucharada de bilis de buey reciente. Se continúa durante muchas semanas.

Contra los oxiuros introducidos en la vagina se hacen inyecciones de agua fría acidulada con vinagre.

Contra las ascárides se usa una ó dos cucharadas de café del electuario número 1, mañana y noche. Cuando mas, se necesitan dos pociones. Se purga reemplazando momentáneamente el electuario con el polvo purgante número 3.

Contra el botriocéfalo y la té-

nia se usan dos ó tres cucharadas de café al dia del electuario número 1, y se pasa despues al uso del aceite número 4, dado á la dosis de una ó dos cucharadas, mañana y noche; se le mezcla con un poco de agua y aun mejor con jarabe de limon. Cuando el enfermo ha tomado de este modo $\bar{3}$ ijß á $\bar{3}$ ij (75 á 90 gr.) de este aceite, se le da el polvo número 3. Se empieza de nuevo con el uso del aceite hasta que haya tomado de $\bar{3}$ vj á $\bar{3}$ vij (180 á 210 gr.). Este tratamiento es largo, pero el autor le considera seguro. Cuando hay predisposicion á la formacion de flemas, administra

durante algunas semanas la tintura número 5.

8280. R. PRESERVATIVO CONTRA LAS CICATRICES DE LAS VIRUELAS (Thielmann).

$\bar{2}$ Bicloruro de mercur. \bar{g} j (5 cent.).
 Agua destilada. $\bar{3}$ vj (180 gr.).
 Láudano de Sydenham. $\bar{3}$ j (4 gr.).
 H. S. A. para un colirio; que se aplica una vez al dia por medio de compresas.

Su autor dice que hace secar muy pronto los granos de viruelas luego que han llegado á supuracion, sin que quede el menor indicio de las pústulas voluminosas confluentes é inflamadas.

ROBS.

8281. ROB. ANTISIFILÍTICO DE GIRADOUX DE ST. GERVAIS.

Dice Bouchardat que se parece mucho á la fórmula de Laffecteur; pero que es tan pequeña la proporcion de las materias activas, que se le puede considerar que no tiene mas virtudes que las de la melaza.

8282. R. ANTISIFILITICO DE LAFFECTEUR.

$\bar{2}$ Zarzaparrilla. . . . $\bar{1}$ bjx (4500 gr.).
 Guayaco,
 China,
 Sasafrás, ãã. . . . $\bar{1}$ bjv (3000 gr.).
 Quina amarilla. . $\bar{1}$ bij (1500 gr.).
 Flores de borraja. $\bar{1}$ bjß (750 gr.).
 Semillas de anís. $\bar{3}$ jv (125 gr.).
 Melote clarificado. $\bar{1}$ bxxx (15000 gr.).

Se ponen las cinco primeras especies, convenientemente preparadas, en una caldera estañada que contenga ciento cuarenta cuartillos de agua; se dejan macerar durante cuarenta y ocho horas; se hierve hasta que se eva-

poren las dos terceras partes del líquido; se cuele con expresion al través de una estameña; se empieza de nuevo la decoccion con una nueva cantidad de agua; se cuele los tres cocimientos reunidos al través de una estameña doblada; se añade el melote, se concentra hasta la consistencia de jarabe y se cuele por la manga; se hace hervir de nuevo y se infunden hasta el enfriamiento completo las flores y las semillas en una muñequita; se aparta, se exprime y se menea el jarabe con una espátula de madera.

I. Afecciones sifilíticas y enfermedades cutáneas. D. $\bar{3}$ j á $\bar{3}$ ij (30 á 60 gr.) en una tisana apropiada.

Nota. Sería mejor infundir el sasafrás.

8283. Otro (FÓRMULA DE SOUBEIRAN).

$\bar{2}$ Raiz de zarzaparrilla,
 Raiz de carrizo quebrantada, ãã. . . . $\bar{3}$ xxx (960 gr.).

Palo santo rasurado. ℥ss (250 gr.).
Cominos,
Flor de borraja,
Hojas de sen,
Rosas de Alejandría, āā. ℥ij (64 gr.).
Agua. ℥xviii (9000 gr.).

Se cuecen todas estas sustancias con la mitad del agua por espacio de una hora, y se cuele el líquido; se echa el resto del agua sobre el residuo, se cuece por hora y media, se cuele y se añade á los dos líquidos reunidos:

Azúcar,
Miel, āā. ℥bjv (2250 gr.),
y se cuece hasta que tenga la consistencia de arrope.

I. Se usa como dulcificante á la dosis de dos á tres cucharadas por la mañana, é igual dosis por la tarde, en las enfermedades venéreas ya desnaturalizadas por el mercurio.

8284. R. ANTISIFILÍTICO DE LAFECTEUR, *Fórmula de Bouchardat.*

℥ Zarzaparrilla. . . . ℥bjv (2000 gr.).
Hojas de sen. . . . ℥jv (125 gr.).
Anís,
Canela, āā. . . . ℥ij (60 gr.).
Azúcar. ℥viii (4000 gr.).
Agua. c. s.

Se coloca la zarzaparrilla partida en pedazos con el sen en c. s. de agua, que se renueva hasta que se agote, y para esto se la tiene en digestión bien sostenida á 60°. Se evaporan los líquidos en un alambique á fuego moderado, y cuando se han reducido á ℥bjv (2000 gr.) se funde el azúcar y se vierte caliente sobre una manga que contenga el anís y la canela en pedazos.

D. Cinco á seis cucharadas al día en un vaso de tisana.

Para que produzca buenos efectos debe seguirse un régimen severo, y estará el enfermo en una habitación á la temperatura media de 15° á 18° durante mucho tiempo. ¿ Los buenos resultados

que se notan no se deberán á este régimen?

Bouchardat ha propuesto este jarabe para reemplazar al rob de Laffecteur.

8285. R. ANTISIFILÍTICO (H. DE M.).

℥ Zarzaparrilla. ℥xv (480 gr.).
Guayaco. ℥jx (288 gr.).
Hojas de laurel. . . . ℥ij (64 gr.).
Resina de guayaco. . . ℥ij (8 gr.).
Raiz de china. ℥vj (192 gr.).
Dulcamara,
Raiz de saponaria, āā. ℥vj (24 gr.).
Cominos,
Flor de borraja,
Hojas de sen, āā. . . ℥j (32 gr.).
Azúcar,
Miel, āā. ℥bj (750 gr.).
Agua. c. s.

H. S. A. I. Síntomas terciarios de infecciones sifilíticas bajo la forma crónica. D. A cucharadas en tisana de zarzaparrilla.

8286. R. DE ARÁNDANO.

℥ Bayas de arándano. c. s.
Se machaca, se exprime y se cuece á fuego fuerte.

I. Subinflamación, cálculos, arenillas, cistitis, galactirrea, embarazo de las primeras vías. D. ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.) para acidular las bebidas atemperantes.

Del mismo modo se preparan los robs de CEREZAS, ESPINO SERVAL, FRESAS, FRAMBUESAS, GROSELLAS, YEZGOS Y PASAS.

8287. R. DE CÁSCARA DE NUEZ (Véret).

℥ Zumo de nuez antes de endurecerse. . ℥bjv (2000 gr.).
Miel sin espuma. . . ℥bij (1000 gr.).
Se evapora hasta la consistencia de miel y se guarda para el uso.

8288. R. DEPURATIVO.

℞ Zarzaparrilla. ℔β (250 gr.).
 Corteza de dafne me-
 cereon. ℥jv (125 gr.).
 Se infunden en c. s. de agua
 hasta obtener ℔bjv (2000 gr.) de
 líquido colado. Se disuelven des-
 pues en él:

Azúcar. ℔xviiij (9000 gr.).
 Protoioduro de
 hierro. ℥viiij (96 dec.).

D. Se toman dos á seis cucha-
 radas al dia en la sífilis constitu-
 cional.

8289. Otro (DEVERGIE).

℞ Bardana,
 Paciencia,
 Hojas de saponaria,
 Guayaco rasp., ãã. ℔ij (1000 gr.).
 Sen. ℔β (250 gr.).
 Miel,
 Azúcar, ãã. ℔x (5000 gr.).
 Agua. 30 quart. (15 lit.).
 H. S. A. D. Tres cucharadas al
 dia en las afecciones sífilíticas.

8290. R. DE MORAS (F. P.).

℞ Zumo de moras. c. s. q.

Se evapora hasta la consisten-
 cia de miel.

I. Se usa como astringente, re-
 frigerante y deterativo en las af-
 tas, inflamacion de las encías,
 hemotisis. D. En gargarismo.

8291. R. Ó TISANA DE NARANJO.

℞ Cáscara de limon,
 Cáscaras de nar., ãã. ℥jβ (45 gr.).
 Infusion de hojas de
 ulmaria. ℔β (250 gr.).
 Agua de flores de na-
 ranjo. c. s.

Se cuele y se añade:

Quina en polvo. . . . ℥ij (8 gr.).
 Jar. de cásc. de nar. ℥ij (60 gr.).

I. Calenturas intermitentes,
 gangrena de hospital, afecciones
 atónicas, cálculos, arenillas, con-
 valecencias. D. ℥j á ℥ij (30 á 60
 gr.) mañana y noche.

8292. R. DE YEZGO (F. A.).

℞ Zumo de bayas de yezgo. 9
 Azúcar. 4

Se cuece agitando continuamen-
 te hasta la consistencia de rob.

Del mismo modo se preparan el rob
 de MORAS, SAÚCO Y ESPINO SERVAL.

SACARUROS. SACAROLADOS. AZÚCARES.

8293. SACAROLADO DE ACEITE DE CROTON.

℞ Aceite de croton. una gota.
 Oleosácaro de canela. . . ℥j (4 gr.).
 Mézclese.

8294. SACARURO ALBUMINOSO (Mondiere).

℞ Agua comun. ℔ij (1000 gr.).
 Yemas de huevo fres-
 cas. número 6.

Se baten con cuidado, se cuele y
 se añade:

Jarabe simple. . . . ℥iij (90 gr.).
 Agua de flores de na-
 ranjo. ℥β (15 gr.).

I. Disenteria. D. Tres á cuatro
 botellas de esta mezcla en las
 veinticuatro horas, y la mitad á
 los niños.

8295. AZÚCAR ALCALINA, Sacarocali ó polvo digestivo alcalino (Blondeau).

℞ Azúcar. ℔ij (1000 gr.).

Bicarbonato de sosa. ʒv (20 gr.).
 Laca carminada. c. s.
 para dar color.

M. I. Escrófulas, hidropesías, etc.; y como antiácido, en las malas digestiones y en los mismos casos que las pastillas de Vichy. D. ʒß á ʒj (2 á 4 gr.).

8296. SACAROLADO DE ALMENDRAS.

ʒ Almendras dulces. 3000
 Azúcar. 3000
 Agua comun. 9000
 Agua de laurel real. c. s.

Se forma en un mortero de mármol una pasta gruesa con las almendras sin cáscaras, la mitad del azúcar y un poco de agua; se tritura la pasta sobre una piedra de chocolatero, se la diluye en las dos terceras partes del agua prescrita, se cuele con fuerte expresion, se vuelve á tratar el residuo con un poco de agua y un poco de azúcar, se muele de nuevo en la piedra, se añade el resto del agua y se exprime. Se reúnen las emulsiones y se las concentra á fuego lento y mejor en el baño maría, meneando siempre, hasta que se reduzca al peso del azúcar y las almendras; se continúa agitando, se añade el agua de laurel real, se echa en tarros de ʒß (250 gr.) cuando mas, y se tapa con cuidado luego que están frios.

El producto no es, propiamente hablando, el sacaruro amigdalino de Mouchon, sino la confeccion de almendras, como se acaba de ver,

Mouchon usa esta confeccion para preparar el looc blanco, la emulsion simple y el jarabe de horchata. Para el looc blanco toma treinta partes de esta confeccion, la mezcla con un mucilago bien trabado de goma tragacanto con ó sin aceite de almendras dulces, segun prescriba el médico, y termina la operacion

añadiendo sucesivamente el agua y el hidrolato, y se tarda en todo ocho á diez minutos.

Se prepara la emulsion simple mezclando por trituracion treinta á sesenta partes de la confeccion con quinientas de agua. La preparacion del jarabe de horchata con la confeccion no presenta ventaja alguna.

El producto que Mouchon designa con el nombre de sacarolado es la confeccion anterior evaporada hasta que sea quebradiza. El producto que resulta se puede emplear en los mismos usos que la confeccion y sirve para preparar las pastas y pastillas amigdalinas. V. núm. 4812.

La confeccion se conserva dos ó tres meses en un paraje fresco y seco, y el sacarolado un poco mas en un parage seco.

8297. S. DE ALUMBRE ó Azúcar de alumbre.

ʒ Alumbre. ʒ
 Azúcar. ʒ

8298. S. ANTIESPASMÓDICO.

ʒ Tintura de almizcle. . . 10 gotas.
 Tintura de valeriana. . 16 gotas.
 Azúcar blanca. ʒiij (12 gr.).
 H. S. A. treinta y seis dosis.

8299. S. ANTIHELMÍNTICO.

ʒ Tintura de santónico. . 20 gotas.
 Tintura de coloquintid. 10 gotas.
 Tint. de helecho macho. 20 gotas.
 Azúcar blanca. ʒß (15 gr.).
 H. S. A. cuarenta y ocho dosis.

8300. S. ASTRINGENTE (Fossati).

ʒ Azúcar en polvo. . . . ʒjß (45 gr.).
 Extracto de ratania,
 Catecú en polvo, ãã. . ʒj (4 gr.).
 Bol arménico,
 Sangre de drago, ãã. . ʒß (2 gr.).

Sacaruro de macis. . . ʒj (4 gr.).
Divídase en diez y seis papeles.
I. Flujos crónicos, etc. D. Dos
á cuatro papeles al día.

8301. S. DE BERRO DE PARÁ ó
Azúcar de berro de Pará.

ʒ Azúcar blanca en pedazos. 16
Alcoholaturo de berro de Pará. 2

Se vierte el alcoholaturo sobre el azúcar, se deja secar al aire libre ó al calor de una estufa, y se reduce despues á polvo.

Nota. ʒj (32 gr.) representa ʒj (4 gr.) de flores recientes.

D. ʒij á ʒj (8 á 30 gr.) en una mistura ó una tisana apropiada.

8302. S. CALMANTE.

ʒ Láudano líquido. 30 gotas.
Tintura de benjuí. 48 gotas.
Azúcar blanca. ʒiij (12 gr.).
Divídase en treinta y seis papeles.

8303. S. DE CARACOLES
(Arnaud).

Se toman doscientos caracoles, se les quita las conchas, golpeándolos con un martillo, se los quita los intestinos y se los lava con prontitud para quitarles todas las impurezas; se mezclan despues con ℥ij (1000 gr.) de azúcar en polvo hasta que se haya convertido en una pasta blanda; se retira el cuerpo de los caracoles que se los tratará del mismo modo, se renueva tercera vez la operacion y se obtiene ʒcxv (3600 gr.) de sacarolado núm. 1; de donde se sigue que por este procedimiento se obtienen ʒxjx (600 gr.) de mucílago puro, que se secará en la estufa. Se toma despues los cuerpos privados de mucus, lo que los hace mas fáciles de machacar, y se mezclan con c. s. de azúcar para obtener el sacarolado núm. 2, que se hace secar en la estufa.

Sirve para preparar el jarabe y la pasta de caracoles, núm. 3035.

8304. SACARURO DE CARACOLES
(Figuier).

ʒ Carne de caracoles. 1
Azúcar. 5

Se trituran íntimamente y se secan en la estufa.

Reducido á pasta este sacarolado por medio de mucílago de goma tragacanto, forma las pastillas de caracoles de Figuier. V. núm. 4761.

8305. SACAROLADO DE CARACOLES
ó Azúcar heliciada de Mouchon.

ʒ Carne de caracoles sin intestinos. 3
Azúcar en polvo. 8
Agua de fuente. 8

Se prepara un mucílago de caracoles como se ha dicho, se añade el azúcar y se evapora á fuego lento.

Cada onza (30 gr.) contiene dos caracoles.

Despues de seca esta preparacion se guarda en un frasco bien tapado.

8306. SACARURO DE CARBONATO DE HIERRO.

ʒ Sulfato de hierro. ʒjv (120 gr.).
Carbonato de sosa. ʒv (150 gr.).

Se disuelven con separacion en ℥ij (1000 gr.), se mezclan y se añade:

Azúcar en polvo. ʒij (60 gr.).
Se deseca.

I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, dismenorrea, ictericia. D. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en electuario, pastillas, grajea ó píldoras.

8307. SACAROLADO DE CUERNO DE CIERVO ó *Sacaruro de cuerno de ciervo (Mouchon).*

ʒ Gelatina de cuerno de ciervo raspado obtenida por el ácido clorhídrico. 4000

Jarabe simple. 3000

Se seca en el baño maría, se machaca y se tamiza.

8308. S. DE CAINCA ó Azúcar de extracto de cainca.

☞ Tintura alcohólica de cainca á $\frac{1}{4}$. 4
Azúcar blanca. 23

Se vierte la tintura sobre el azúcar, se mezcla por trituración, se seca en la estufa y se pulveriza de nuevo.

La tintura se ha preparado con cuatro partes de alcohol y una de raíz, y según Beral contiene un cuarto de su peso de extracto.

Cada onza (30 gr.) de sacarolado contiene ℥j (12 dec.) de extracto y corresponde á ℥ij (8 gr.) de la raíz.

D. ℥j á ℥jv (4 á 15 gr.) al día. Se tomará separadamente cada dracma y se disolverá en cuatro cucharadas de agua común.

8309. SACARURO DE CITRATO DE HIERRO PARA AGUA FERRURADA.

☞ Azúcar en polvo. . . . ʒvβ (22 gr.).
Cittrato de hierro y amoníaco anhidro. . . ʒxviiij (1 gr.).
Sacaruro de clavo y vainilla. ʒβ (2 gr.).
Mézclese exactamente.

8310. SACAROLADO DE CITRATO DE HIERRO (Beral).

☞ Azúcar en polvo. . . . ʒxj (330 gr.).
Cittrato de peróxido de hierro líquido. . . . ʒj (30 gr.).

Se mezclan exactamente, se seca la mezcla en la estufa y se la reduce á polvo.

Nota. Se puede aromatizar este sacarolado con seis gotas de aceite esencial de limón, y reemplazar el citrato líquido por el citrato en polvo. Véase núm. 8311.

D. ʒβ á ʒj (2 á 4 gr.) sola ó en vehículo apropiado.

8311. SACARURO DE CITRATO DE HIERRO.

☞ Citrato de peróxido de hierro líquido. . . . ʒc (5 gr.).
Azúcar. ʒij (60 gr.).
Oleosácuro de limón. . . c. s.

Se seca en la estufa.

I. Amenorrea, dismenorrea, clorosis, leucorrea. D. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.).

8312. SACAROLADO DE DIGITAL FRESCA.

☞ Hojas frescas de digital mondadas de su peciolo y nervios. . . . 4
Azúcar blanca quebrantada. . . . 3

Se expone la digital durante doce horas al aire libre, pero á la sombra y entre dos hojas de papel de estraza; se la tritura con azúcar hasta que se mezclen perfectamente, se seca suavemente en la estufa, se pulveriza y guarda en frascos negros.

Del mismo modo se preparan los de BELLADONA, CICUTA, ACÓNITO, BELEÑO, SABINA, RUDA Y ESTRAMONIO.

8313. S. EMENAGOGO.

☞ Tintura de azafrán. . . 42 gotas.
Tintura de azafrán de marte aperitivo. . . ʒβ (2 gr.).
Azúcar blanca ʒiij (12 gr.).
Divídase en treinta y seis pa-
peles.

8314. S. EXPECTORANTE.

☞ Tintura de benjuí. . . . ʒβ (2 gr.).
Tintura de escila. . . . 20 gotas.
Azúcar blanca. . . . ʒiij (12 gr.).
Divídase en treinta y seis do-
sis.

8315. S. GOMOCEROSO DE NOEL THIAVILLE.

☞ Cera blanca. 48

Azúcar. 96
Goma. 60

Se calienta en agua hirviendo un mortero de mármol con su mano y se enjuga bien; se tritura la cera, y cuando está bien blanda y en capas delgadas se añade el azúcar; bien mezclada ya, se añade la goma y se pasa por un tamiz.

D. ʒiij (12-gr.) en una pocion.

8316. S. DE JALAPA COMPUESTO,
Azúcar anaranjada purgante ó Polvo de jalapa anaranjado compuesto.

ʒ Azúcar. ʒxjv (420 gr.).
Jalapa. ʒij (60 gr.).
Crémor de tártaro soluble. ʒβ (15 gr.).
Aceite volátil de cáscara de naranja. . ʒij (8 gr.).

H. S. A. I. Es un purgante agradable para las personas á quien repugnan los medicamentos. D. ʒij á ʒiij (8 á 12 gr.) en ʒbj (500 gr.) de naranjada.

Nota. ʒxx (1 gr.) contienen cerca de ʒij (1 dec.) de jalapa.

8317. S. DE LÍQUEN.

Se puede privar al líquen de su principio amargo por el agua alcalizada, se precipita el cocimiento por el alcohol, se mezcla con azúcar el precipitado gelatinoso que resulta y se deja secar como lo ha propuesto Beral; pero el primer procedimiento es mas sencillo.

8318. S. DE GELATINA DE LÍQUEN
(Beral).

ʒ Gelatina alcohólica de líquen. . . . ʒbj (1000 gr.).
Azúcar pulverizada groseramente. . . ʒbjv (2000 gr.).

Se mezcla, triturando en un mortero de mármol, despues se deja secar en la estufa ó al calor

del baño maría, meneando frecuentemente la masa.

I. Se usa ventajosamente para preparar la jalea y las tabletas ó pastillas de líquen.

Nota. El azúcar cargado de este modo del principio gelatinoso del líquen no tiene amargor, y se disuelve completamente y con facilidad en el agua hirviendo.

8319. S. DE LÍQUEN ó Jalea seca de líquen islándico.

ʒ Liquen ʒ
Azúcar. ʒ

Se priva al líquen de su principio amargo durante una hora y se le hierve en agua, se cuele con expresion, se añade el azúcar y se evapora meneando continuamente hasta que se haya secado la materia, se apila y pasa por un tamiz. Tambien se puede poner la materia en la estufa cuando está bastante consistente para formar masa, se acaba de secarle en la estufa y se pulveriza.

8320. S. DE QUINA ó Azúcar de quina (Goldefy).

ʒ Tintura alcohólica de quina. ʒvij (210 gr.).
Azúcar blanca en p. ʒiij (90 gr.).

Se evapora en la estufa hasta sequedad y se ponen

Azúcar anterior. . . . ʒjv (125 gr.).
Inf. acuosa de quina. ʒxij (375 gr.).

Se pone todo en la estufa y se hace evaporar hasta sequedad, meneandó la mezcla tres ó cuatro veces al dia.

I. Calenturas intermitentes. D. ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.).

8321. S. DE HIPOCOLA ó Sacaruro de hipocola.

ʒ Tintura de hipocola. . . ʒj (4 gr.).
Azúcar. ʒβ (15 gr.).
Se pulveriza despues de seca.

8322 S. DE IPECACUANA.

℥ Tintura alcohólica de ipecacuana. 15
Azúcar blanca. 7
Se mezcla y se seca en la estufa.

8323. S. DE MUSGO DE CÓRCEGA
(*Deschamps*).

℥ Musgo de Córcega. . ℔j (500 gr.).
Azúcar. ℔ij (1000 gr.).
Agua de flor. de nar. ℥jv (125 gr.).
Se hierve el musgo de Córcega durante dos horas en c. s. de agua para tener ℔ij (1000 gr.) de cocimiento, se cuele, se decanta y se evapora hasta sequedad. Al fin se añade el azúcar y el agua aromática, y se acaba de secar á fuego lento ó en la estufa. Se usa para preparar las pastillas de musgo de Córcega.

8324. S. DE MUSGO MARINO
PERLADO.

℥ Musgo marino perlado. 1
Azúcar. 4
Se agotan las partes solubles del musgo marino cociéndole tres veces en agua, se evaporan los líquidos hasta la consistencia de jarabe, se añade el azúcar y se concluye la evaporacion en el baño maría hasta la consistencia seca.
El musgo marino da la mitad de su peso de gelatina seca.

8325. S. DE ORO.

℥ Oro en hoja. ḡiij (15 cent.).
Azúcar. ℥B (15 gr.).
M. D. En fricciones en las encías.

8326. SACARURO DE PULSATILA.

℥ Extracto de pulsatila. ḡx (50 cent.).
Azúcar blanca. ḡc (5 gr.).

M. I. Parálisis, escrófulas. *D.* ḡxx (10 dec.) mañana y noche.

8327. AZÚCAR PURGANTE.

℥ Jalapa en polvo. . . ℥jvβ (145 gr.).
Tártaro emético. . . ḡxij (6 dec.).
Azúcar bl. en polvo. ℔j (500 gr.).
Polvo aromático especial. ℥ij (8 gr.).
Mézclese exactamente.
D. ḡxviiij á ℥jβ (1 á 6 gr.) según la edad de los enfermos.

NOTA. El POLVO AROMÁTICO ESPECIAL se prepara con ℥iij (96 gr.) de canela de Ceylan, ℥ij (8 gr.) de nuez moscada, ℥ij (8 gr.) de macis y otras ℥ij (8 gr.) de clavo. Se reduce *S. A.* á un polvo muy ténue.

8328. S. DE RESINEONA.

℥ Resineona. 1
Azúcar. 200
M. I. Catarros pulmonares, bronquitis crónica, broncorreas. *D.* Se toma á cucharadas tres ó cuatro veces al día, en una taza de infusion.

8329. AZÚCAR ROSADA.

Es el azúcar fundida, aromatizada con rosas.

8330. A. DE ROSAS PÁLIDAS.

℥ Pétalos de rosas amarillas, c. s. q.
Se machaca los pétalos de rosa, se exprime y depura; se toman partes iguales de azúcar y zumo depurado y se cuece hasta la consistencia de jarabe.
I. Es un laxante ligero que se usa en la medicina de los niños.

8331. SACAROLADO TÓNICO.

℥ Tintura de colombo. . . ℥B (2 gr.).
Tintura de quina. . . . ℥B (2 gr.).
Tintura de benjuí. . . . 10 gotas,
Azúcar blanca. ℥B (15 gr.).

Dividase en cuarenta y ocho dosis.

8332. SACARURO DE TINTURAS
(Beral).

Se preparan los sacaruros de jalapa, ruibarbo, ipecacuana, escila, mirra, canela, quina, macis, azafran, nuez moscada, clavo, vainilla, bálsamo de Tolú, castóreo, beleño y belladona con

- Tintura alcohólica. ℥ij (60 gr.).
- Azúcar. ℔bj (500 gr.).
- M. D. ℥℔ á ℥ij℔ (2 á 10 gr.).

8333. S. DE ESENCIA DE TREMENTINA ó *Oleosácaro de trementina.*

℥ Esencia de trementina. ℥j (12 dec.).
Acido pirotátrico. ḡx (5 dec.).
Azúcar. c. s.
para absorber todo y que se reduzca á polvo.

I. Ténia. D. Tres tomas en las veinticuatro horas.

8334. AZÚCAR VERMÍFUGO (F. E.).

℥ Mercurio. ℥ij (60 gr.).
Azúcar blanca pulver. ℥jv (120 gr.).

Se trituran en un mortero de piedra con c. s. de agua para que se haga una masa blanda, y se

agita por mucho tiempo hasta extinguir casi enteramente el mercurio. Cada dracma (4 gr.) contiene ℥j (12 dec.) de mercurio. Véase pág. 255.

Se da este medicamento á los niños para destruir las lombrices. D. ḡvj á ℥j (3 dec. á 12 dec.).

El AZÚCAR VERMÍFUGO DE LA F. P. se compone de una parte de mercurio puro y tres de azúcar: D. ḡjv á ḡvj (2 á 3 dec.) varias veces al dia.

8335. A. VERMÍFUGO MERCURIAL
(Baumé).

- ℥ Azúcar en polvo. 7
- Mercurio. 3
- Sulfuro negro de mercurio. 2

Se tritura el mercurio con el sulfuro y cuando está apagado se añade el azúcar.

Se divide en doce papeles iguales.

8336. SACARUROS DE ZUMOS
(Foy).

- ℥ Planta fresca. 1
- Azúcar. 3

Se preparan con *digital, belladona, beleño, acónito, cicuta, estramonio, sabina, ruda, cornezuelo de centeno, cólchico, escila.*

SALES.

8337. SAL ESENCIAL DE LIMON.

- ℥ Crémor de tártaro. ℥jv (125 gr.).
- Sal de acederas. ℔℔ (250 gr.).
- Esencia de limon. ℥j (4 gr.).

Se usa para quitar las manchas de orin al lienzo.

8338. S. ESENCIAL DE LAGARAYE
ó *Extracto seco de quina.*

Para obtener este extracto se

usa con preferencia la quina gris, que contiene mas materias extractivas que las demás quinas, y que suministra un extracto seco de hermoso aspecto.

Se usa mas bien como tónico que como febrífugo.

I. y D. Véase *Quina.*

8339. S. GUINDRE ó *Polvo de sulfato de sosa compuesto.*

- ℥ Sulfato de sosa efflorescido. ℥vj (24 gr.).

Nitrato de potasa. ḡxij (6 dec.).

Tártaro emético. ḡß (25 mil.).

I. y M. Se funde esta mezcla en dos cuartillos (1 lit.) de tisana ó de caldo de yerbas, para tomar á vasos como purgante por la mañana de hora en hora.

8340. S. MARCIAL DE LAGRESIE ó Sulfato de potasa ferruginoso.

℥ Sulfato de potasa en polvo. ḡxij (375 gr.).

Sulfato de hierro. ḡvj (24 gr.).

Acido sulfúrico. ḡj (4 gr.).

Se trituran durante media hora en un mortero de hierro con ḡij ó ḡiij (64 á 96 gr.) del sulfato de potasa. Se vierte gota á gota el ácido sulfúrico y se continúa triturando durante media hora; se añade poco á poco las ḡjx (288 gr.) de sulfato de potasa y se continúa así hasta que se combinen exactamente.

I. Es tónica, aperitiva y diurética, útil en la ictericia, caquexia, obstrucciones é hidropesía. *D.* ḡxviii (1 gr.) hasta ḡjß (6 gr.)

en dos cuartillos de agua comun, que se toman á manera de tisana.

8341. S. VOLÁTIL AROMÁTICA.

℥ Carbonato de amoniác. ḡij (60 gr.).

Cáscaras frescas de naranjas,

Cáscaras frescas de li-

mon, ãã. ḡvj (24 gr.).

Vainilla,

Macis, ãã. ḡij (8 gr.).

Canela. ḡj (4 gr.).

Clavo. ḡß (2 gr.).

Se destila en una retorta. Tambien se extrae este producto de la retorta que ha servido para destilar el alcoholato aromático amoniacal.

8342. S. VOLÁTIL INGLÉS.

℥ Sal amoniaco en polvo. 2

Carbonato de potasa seco. 3

Se mezclan pronto y se introducen en frascos esmerilados.

Esta mezcla se prefiere al amoniaco, porque desprende gran cantidad de él.

SAQUITOS.

8343. SAQUITOS ANTIREUMÁTICOS, Cinturon antireumático (Marjolin).

℥ Alcanfor. ḡj (4 gr.).

Benjuí. ḡij (8 gr.).

Euforbio. ḡij (8 gr.).

Sal amoniaco. ḡjv (16 gr.).

H. S. A. un polvo grueso que se pondrá sobre algodón y se pondrá dentro de una franela agujereada. Se rodea al tronco.

I. Reumatismo crónico del tronco.

8344. S. ANTISÉPTICO.

℥ Alcanfor,

Castóreo, ãã. ḡijß (10 gr.).

Almizcle,

Accite de sucino, ãã. ḡxc (5 gr.).

Sándalo cetrino. ḡjß (48 gr.).

H. S. A. I. Cólera, peste, tifo.

D. Se mete en un saquito y se aplica.

8345. S. AROMÁTICO.

℥ Menta rizada,

Manzanilla romana,

Cálamo aromático,

Ruda, ãã. ḡjv (125 gr.).

Alcanfor. ḡj (30 gr.).

H. S. A. un polvo grueso que se rociará con aguardiente.

I. Mareo, cardialgia, calambre de estómago, cólicos ventosos, hidroftalmias, conjuntivitis. *D.*

Se aplica en el hueco del estómago ó en las sienas.

8346. S. ESTOMACAL.

℞ Clavo. ℥ij (8 gr.).
Mejorana. ℥ß (15 gr.).
Romero. ℥j (30 gr.).

Se hace un polvo grueso que se rocía con agua de Colonia y se aplica al hueco del estómago.

I. Cardialgia, calambre de estómago, mareo. *D.* En las sienas en la hidroftalmia y conjuntivitis, y al rededor del cuello en el bocio.

8347. S. DE GUICHARD.

℞ Lirio de Florencia. . ℥ij (8 gr.).
Alcanfor,
Romero,
Dictamo crético, añ. ℥ß (2 gr.).
Saúco,
Espliego, añ. ḡxviiij (4 gr.).

8348. S. DE IODURO DE POTASIO Y CLORHIDRATO DE AMONIACO.

℞ Ioduro de potasio. . . ℥ijß (10 gr.).
Clorhidrato de amon. ℥xxx (80 gr.).

Se mezclan por trituracion estas sales bien secas y pulverizadas separadamente.

I. Bocio, escrófulas, adenitis y otros infartos linfáticos. *D.* Se pone en un saco de lienzo y se le rodea al rededor del cuello.

8349. S. RESOLUTIVO (Barthez).

℞ Flores de meliloto en polvo. . . c. s.
Alcanfor $\frac{1}{8}$ en peso.

Mézclese y hágase un saquito.

I. Infartos de los testículos, ú otras glándulas, despues de un tratamiento conveniente. *D.* Se renueva cada cuatro ó cinco dias.

8350. S. RESOLUTIVO (Dumeril).

℞ Sulfato de cal,
Sulfato de hierro,
Hidroclorato de amon., añ. ℥j (4 gr.).

Se pone en algodón, se le cubre por fuera con tafetan negro y con una muselina clara por el lado que debe tocar la piel.

I. Bocio y tumores formados por el desarrollo morbosos del cuerpo tiroides, tumores indolentes, adenitis crónica. *D.* Se aplica en forma de collar.

8351. S. RESOLUTIVO ó Saquito contra los tumores del pecho (Tanchou).

℞ Ioduro de potasio. ℥j (4 gr.).
Esponja en polvo. ℥ij (8 gr.).
Sal amoniaco. ℥j (32 gr.).
Sal marina. ℥ij (8 gr.).

M. I. Tumores del pecho. *D.* En algunos casos se puede añadir alcanfor, opio, valeriana, etc.

8352. S. RESOLUTIVO AMONIACAL.

℞ Sal amoniaco en polvo. 1
Cal apagada. 1

Se mezclan estas materias y se las pone entre dos capas de algodón; se cubre todo de una muselina agujereada, y se la rodeará al cuello de los enfermos que padecen bocio.

Se ha empleado esta mezcla para llamar el sudor de los piés en los gotosos y reumáticos y contra los tumores blancos de la rodilla. Para esto se cubre las partes enfermas con un tegido de lana doblado y espolvoreado con el polvo.

SEMICUPIOS.

8353. SEMICUPIO EMOLIENTE Y CALMANTE.

- ℞ Raiz de malvabisco. . ℞℞ (250 gr.).
Tallos y hojas de yer-
bamora. ℥jv (125 gr.).

Cabezas de adormid. número 8.
Se hierven en dos azumbres (4 lit.) de agua y se vierte el cocimiento en el baño.

SINAPISMOS.

8354. SINAPISMO AMONIAL.

- ℞ Harina de mostaza. . . ℥j℞ (45 gr.).
Harina de centeno. . . ℥℞ (15 gr.).
Amoniaco líquido. c. s.
para hacer con las harinas una pasta blanda.

I. Retroceso y erupciones difíciles, viruelas, viruelas locas, escarlatina, sarampion, acné, isquidrosis y erisipela. Como derivativo: amaurosis, oftalmia, hidroftalmia, hemeralopia, midriasis, amenorrea, histérico, poligalaxia, sudor inglés, horripilacion; insolacion, tialismo, glositis, glosantrax, panarizo, epistaxis, melena, flebitis, hemicránea, síncope, irritacion, plétora, inflamacion, gastrorrhea, gastrorragia, hemotisis, meningitis, pleuresia, pleurodinia, hidropericardias, ronquera, laringitis, esofagitis; coriza, denticion difícil, odontalgia, calenturas intermitentes, calentura mucosa, otitis, gota, otalgia, neurosis, neuralgias. *D.* Se aplica á la parte enferma y se quita á los veinte ó treinta minutos.

8355. S. ANIMADO.

- ℞ Sinapismo comun. . . ℞℞ (250 gr.).
Se incorpora con
Ajo machacado,
Pimienta en polvo, ãã. ℥ij á ℥jv (8 á 16 gr.).

Amoniaco líquido. . . 20 á 30 gotas.
Se procurará que no produzca excoriaciones.

8356. S. CANTARIDADADO, VEJIGATORIO MAGISTRAL ó Cataplasma cantaridadado (F. P.).

- ℞ Cantáridas en polvo,
Harina, ãã. ℥℞ (15 gr.).
Vinagre. c. s.
para hacer una pasta blanda.

Su accion es mas pronta que la del emplasto de cantáridas. Puede usarse el fermento en lugar de la harina. Es epispástico útil.

8357. S. Ó CATAPLASMA DE SINAPISMO (H. DE M.).

- ℞ Mostaza en polvo. . . ℥xij (375 gr.).
Harina de cebada,
ó Miga de pan,
Polvo de ruda, ãã. . ℥ij (60 gr.).
Agua. c. s.
Hágase cataplasma S. A.
I. Como revulsivo.

8358. S. ISQUIÁTICO.

- ℞ Harina de mostaza. . ℞℞ (250 gr.).
Pimienta negra en polvo,
Gengibre en polvo, ãã. ℥xc (5 gr.).
Ojimiél. c. s.
M. I. Neuralgia, gota, reumatismo, ceática, amenorrea, glosalgia, embriaguez. *D.* Se aplica durante mucho tiempo al punto dolorido.

8359. S. Ó CATAPLASMA DE MOSTAZA (F. F.).

℞ Harina de mostaza. . ℔β (250 gr.).
 Agua tibia. c. s.

M. Cuando se los quiere hacer mas activos se espolvorean con Sal amoníaco. ℥j (32 gr.).

I. Se emplean como revulsivos en las afecciones cerebrales, en ciertas enfermedades del pulmon y del corazon con sufocacion inminente, etc.: para obtener una excitacion general, como en el último período de las afecciones tifoideas, en las neumonias adinámicas, cólera morbo, etc., se aplican en diferentes puntos de la superficie del cuerpo.

Nota. No debe usarse agua hirviendo para la preparacion de los sinapismos, porque no se desarrolla el aceite esencial bajo su influencia: á la temperatura de 40° es mas rápida la trasformacion de la sinapisina en aceite volátil que á la temperatura ordinaria.

8360. S. PARA LAS PLANTAS DE LOS PIÉS ó Cataplasma discuciente de mostaza (F. E.).

℞ Levadura agria. ℥jβ (45 gr.).
 Polvos de mostaza. ℥jv (125 gr.).
 Sal amoníaco. ℥j (4 gr.).

Yerba reciente de ruda machacada. ℥β (15 gr.).
 Vinagre bueno. c. s.
 para formar una pasta blanda.

I. Se usa como rubefaciente en las afecciones soporosas, etc.

Nota. Debe usarse agua tibia en lugar del vinagre, porque los ácidos vegetales, que marcan cuando menos 3° en el areómetro, se oponen á la formacion del aceite volátil, principio activo de la mostaza.

8361. S. MITIGADO ó Cataplasma sinapizada.

℞ Cataplasma emoliente. ℥jv á ℥viii (125 á 250 gr.).

Se espolvorea con

Harina de mostaza. ℥jv á ℥j (15 á 30 gr.).

I. Estos sinapismos son menos irritantes que los anteriores, y se usan con preferencia para determinar una derivacion prolongada mas bien que fuerte.

8362. S. DE PIMIENTA.

℞ Harina de trigo tostad. ℔j (500 gr.).
 Vinagre muy fuerte. ℥v (150 gr.).
 Clara de huevo. número 6.

Se mezclan S. A., se extiende en un lienzo y se espolvorea con Pimienta negra en p. ℥iij (90 gr.).

SOLUCIONES.

8363. SOLUCION DE ACETATO DE AMONIACO.

℞ Sexquicarbonato de amoníaco. ℥jvβ (140 gr.)
 ó lo que se necesite.

Vinagre destilado. 2 azumb. (4 lit.).
 Se añade c. s. de sexquicarbonato de amoníaco para saturar el vinagre.

TOMO IV.

8364. S. DE ACETATO DE MORFINA (Magendie).

℞ Acetato de morfina. ḡxvj (8 dec.).
 Agua destilada. ℥j (30 gr.).
 Acido acético. 4 gotas.
 Alcohol. ℥j (4 gr.).

H. S. A. I. Se emplea en los mismos casos que el láudano líquido y puede reemplazarle. D.

Seis á veinticuatro gotas en una pocion, que se toma en las veinticuatro horas.

Nota. ℥℥ (2 gr.) de este líquido contiene cerca de ḡj (5 cent.) de acetato de morfina.

8365. S. DE ACETATO DE PLOMO (*Ricord*).

℥ Agua. ℔℔ (250 gr.).
Acetato de plomo cristalizado. ℥j (4 gr.).
Disuélvase.

I. Se usa en inyecciones contra la balanitis, y tópicamente sobre las picaduras de las sanguijuelas.

8366. S. ACÉTICA (*Houlton*).

℥ Opio puro. ḡxij (6 dec.).
Acido acético concentrado. ℥j (30 gr.).
Agua destilada. ℥viii℔ (265 gr.).
Se digiere á fuego suave durante cuatro dias.

I. Espasmos, tos, coqueluche, dolores neurálgicos. *D.* ḡij á ḡjx (10 á 50 cent.).

8367. S. DE ÁCIDO ARSENIOSO.

℥ Acido arsenioso. ḡij (4 dec.).
Agua ℔j (500 gr.).
Disuélvase.

I. Afecciones cancerosas y calenturas intermitentes. *D.* Una cucharada de café por la mañana con igual cantidad de leche y un poco de jarabe, aumentando poco á poco hasta cuatro cucharadas al dia.

8368. S. ALCALINA.

℥ Carbonato de sosa ó potasa. ℥iij (12 gr.).
Agua. ℔j (500 gr.).
I. Afecciones herpéticas. *D.* En lociones.

8369. S. ALCOHÓLICA DE CARBONATO DE AMONIACO (*H. DE AL.*).

℥ Carbonato de amoniaco líquido. ℥℔ (15 gr.).

Alcohol rectificado. ℥j (30 gr.).
M. D. Cincuenta á sesenta gotas en agua azucarada ó en una pocion.

8370. S. DE ALUMBRE.

℥ Alumbre. ℥v (20 gr.).
Agua. c. s.
Se disuelve y se añade:

Miel. ℥ij℔ (10 gr.).
Vinagre. ℥j (4 gr.).

I. Aftas, crup, tisis laríngea, úlceras atónicas, gangrena de hospital. *D.* Se empapa una esponja atada á una ballena y se la introduce lo mas posible en la boca posterior.

8371. S. ALUMINOSA (*Scudamore*).

℥ Infus. de rosas rojas. ℥jv (125 gr.).
Alumbre. ℥ij (8 gr.).

Se usa en tópicos ó en inyecciones contra las hemorragias, y diluida en mayor cantidad de agua de rosas (℔j) en ciertas formas ligeras de acné, líquen, tiriásis, herpes y aun eczema é impétigo.

8372. S. ALUMINOSA COMPUESTA (*F. DE L.*).

℥ Alumbre,
Sulfato de zinc, añ. ℥j (30 gr.).
Agua hirviendo. ℥lx flúidas.
Disuélvase y fíltrese.

I. Se usa como un astringente local en la gonorrea, leucorrea. *D.* En lociones é inyecciones.

8373. S. AMONIACAL (*H. DE M.*).

℥ Gomoresina amoniac. ℥j℔ (6 gr.).
Cocimiento de yedra terrestre. ℔℔ (250 gr.).
Agua lactinosa de

cancla. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. Se usá en los catarros pulmonales crónicos y asma. *D.* ℥ij á ℥iij (60 á 90 gr.).

8374. S. AMONIACAL FUNDENTE
(*Debreyne*).

℥ Sal amoníaco,
Aguardiente alcanf., añ. ℥ij (60 gr.).
Agua comun. 4 quart. (2 lit.).
Disuélvase.

I. Ciertas lupias. *D.* Se usa aplicando sobre la parte enferma una compresa gruesa empapada, que se sujetará comprimiendo con fuerza.

8375. S. ANTICORÉICA (*Vauters*).

℥ Asa fétida. ℥β (15 gr.).
Agua comun. lbj (500 gr.).

H. S. A. una emulsion y cuélese para separar la materia resinosa. *D.* ℥ij (60 gr.) cada dos horas.

8376. S. ANTIDISENTÉRICA
(*Bonorden*).

℥ Nitrato de sosa. ℥β (15 gr.).
Agua de goma. lbβ (250 gr.).
Disuélvase.

I. Al principio de la disenteria simple inflamatoria ó diarrea, despues de haber combatido la inflamacion. *D.* Una cucharada cada dos horas.

8377. S. ANTIEPILÉCTICA
(*Magendie*).

℥ Ioduro de potasio. ℥jv (15 gr.).
Iodo. ḡij (4 dec.).
Agua destilada de yerbabuena,
Agua destilada de flores
de naranjo, añ. ℥iij (90 gr.).

M. D. Una cucharada tres veces al dia.

8378. S. ANTIEPSÓRICA.
(*Derheines*).

℥ Cloruro de cal. ℥iij (90 gr.).
Agua destilada. lbj (500 gr.).
Se disuelve *S. A.* y se filtra,

I. Sarna. *D.* *C. s.* para lociones ó para fricciones en los muslos, piernas y brazos, dos ó tres veces al dia.

Nota. Comunmente bastan para la curacion seis á diez dias de este tratamiento.

8379. S. ANTIESCROFULOSA
(*H. DE AL.*).

℥ Cloruro de bario,
Cloruro de hierro, añ. ℥β (2 gr.).
Agua destilada. ℥j (30 gr.).
Disuélvase.

D. Veinte á cuarenta gotas en un vehiculo mucilaginoso. Cada dracma (4 gr.) contiene ḡjvβ (22 cent.) de cloruro.

8380. S. ANTILEUCORÉICA.

℥ Nitrato de plata,
Agua destilada, añ. ℥ijβ (10 gr.).
M. I. Para tocar las úlceras de la matriz. Hidrofobia.

8381. Otra (*RICORD*).

℥ Nitrato de plata. ḡx (5 dec.).
Agua destilada. ℥j (30 gr.).
Disuélvase.

I. Leucorrea vaginal, blenorrea, sordera, fístulas. *D.* Se hace una inyeccion, y despues se introducen en la vagina hilas empapadas en el líquido, que las enfermas deben conservar todo el tiempo que puedan.

8382. S. ANTINEURALGICA (*Kopp*).

℥ Bicloruro de mercur. ḡx (50 cent.).
Eter acético. ℥iij (12 gr.).
Alcohol rectificado. ℥vj (24 gr.).

I. Neuralgia, especialmente la ceática, reumatismo, prosopalgia. *D.* ℥β á ℥j (2 á 4 gr.) en fricciones, tres ó cuatro veces al dia.

8383. Otra (*SCHLESIER*).

℥ Sublimado corrosivo. ḡij (10 cent.).

Extr. de estramonio. ḡij (15 cent.).
 Agua destilada. ḡjβ (45 gr.).
 Disuélvase.

I. Neuralgias reumáticas, especialmente la prosopalgia y ceática. *D.* Treinta á cincuenta gotas cada dos horas.

8384. S. ANTIODONTÁLGICA
 (*Chapmann*).

℥ Alcanfor. ḡj (4 gr.).
 Esencia de trementina. ḡjv (16 gr.).
 Disuélvase.

I. Odontalgia. *D.* Se aplica sobre el diente enfermo.

8385. Otra (*KOPF*).

℥ Alcoholado de pelitre. ḡij (8 gr.).
 Alcanfor. ḡxx (10 dec.).
 Se disuelve y se añade:

Láudano de Sydenham. ḡj (12 dec.).

D. Se aplica á la muela cariada y se usa en fricciones en la encía correspondiente.

8386. S. ANTISÉPTICA.

℥ Quina. ḡj (30 gr.).
 Vino de quina. ḡv (150 gr.).
 Tintura opiada, de alcanfor. ḡiij (90 gr.).
 Agua fria. lbj (500 gr.).

Se filtra despues de tres dias de maceracion.

I. Blenorreas, diarrea, disenteria atónica, leucorrea, ozena, gangrena de hospital, eczema, lepra, úlceras atónicas, cáncer. *D.* En inyecciones, lavativas y lociones.

I. Crup, aftas. *D.* En gargarismos.

I. Tifo, lepra, calenturas intermitentes, tifoideas. *D.* A cucharadas.

8387. S. ANTIVENÉREA (*Weikard*).

℥ Agua destilada ḡij (60 gr.).
 Deutocloruro de mercurio,
 Hidroclor. de amon., añ. ḡjv (2 dec.).
 Láudano líquido. ḡβ (2 gr.).
 Esencia de canela. una gota.

H. S. A. Esta solucion conviene principalmente á las personas delicadas y cuyo estómago no puede soportar el licor de Van Swieten.

I. Sífilis, sífilides. *D.* Treinta á cuarenta gotas, por mañana y noche, en agua de goma ó leche.

8388. S. DE ARSENIATO DE AMONIACO.

℥ Arseniato de amon. ḡviiij (4 dec.).
 Agua destilada. ḡij (64 gr.).
 Espíritu de angélica. ḡβ (16 gr.).

H. S. A. I. Calenturas intermitentes rebeldes, afecciones cancerosas y hemicráneas periódicas.

Nota. El líquido contiene $\frac{1}{2000}$ de arseniato de amoniaco.

Exteriormente se usa en los herpes escamosos húmedos, que no están acompañados de inflamacion viva, soriasis, líquen. *D.* ḡxxjv á ḡij (12 dec. á 8 gr.) en un vehículo conveniente.

8389. Otra (*BIETT*).

℥ Arseniato de amoniaco. ḡij (1 dec.).
 Agua destilada. ḡij (60 gr.).
 Disuélvase.

I. La mayor parte de las enfermedades de la piel, pero particularmente las afecciones escamosas, enfermedades intermitentes, neuralgias rebeldes, heridas envenenadas, escrófulas, sífilis. *D.* Cinco á veinte gotas en el dia, y se puede aumentar progresivamente hasta ḡj (4 gr.) y mas en las veinticuatro horas, segun los efectos producidos.

8390. S. ARSENICAL (*Boudin*).

℥ Acido arsenioso. ḡij (1 dec.).
 Agua destilada. 2 cuart. (1 lit.).
 Cada ḡv (20 gr.) de esta solucion representan $\text{ḡ}^{\frac{1}{25}}$ (2 miligr.) de arsénico.

I. Herpes, lepra, sarna. *D.* En las calenturas intermitentes Boudin empieza por ḡx (40 gr.) de esta solucion, que representan

$\tilde{g}^{\frac{2}{25}}$ (4 mil.) de ácido. Se debe administrar cuatro á cinco horas antes del momento presumible del acceso. Conviene que la preceda una pocion emética, compuesta de $\tilde{g}ij$ (1 dec.) de tártaro emético y xvij (1 gr.) de ipecacuana. Despues de cortada la calentura se disminuye progresivamente la dosis. En la sífilis rebelde, principalmente en la sífilides, y en los herpes antiguos se empezará por $\tilde{3}x$ (40 gr.) de la solución, y todos los días se aumentará $\tilde{3}ij\beta$ á $\tilde{3}v$ (10 á 20 gr.) hasta que el enfermo tome $\tilde{g}^{\frac{1}{5}}$, $\tilde{g}^{\frac{2}{5}}$ y aun $\tilde{g}^{\frac{3}{5}}$ (1, 2, 3 cent.). Se dividirá la dosis en muchas tomas, y debe vigilarse su administracion con el mayor cuidado.

8391. S. ARSENICAL (A. Devergie).

\mathcal{R} Acido arsenioso,
 Carbon. de potasa, $\tilde{a}\tilde{a}$. $\tilde{g}ij$ (1 dec.).
 Agua destilada. $\tilde{lb}j$ (500 gr.).
 Alcoh. de melisa comp. $\tilde{g}x$ (5 dec.).
 Tintura de cochinilla. c. s.
 para darle color.

Cada $\tilde{g}xx$ (10 dec.) de esta solución, contiene $\tilde{g}^{\frac{1}{5}}$ (1 cent.) de ácido arsenioso.

Esta solución es preferible al licor de Fowler, porque se la puede subdividir mejor, pues está menos cargada.

Se le da color para diferenciarla y que pueda reconocerse su presencia en un julepe.

8392. S. ARSENICAL DE PRUSIA.

\mathcal{R} Agua destilada. $\tilde{3}xij$ (375 gr.).
 Oxido de arsénico sublimado y finalmente pulverizado,
 Subcarbonato de sosa, $\tilde{a}\tilde{a}$. $\tilde{3}j$ (4 gr.).

Se calienta en el baño de arena, se filtra y se conserva en una botella bien tapada.

Nota. $\tilde{3}j$ (4 gr.) de esta preparación contiene dos terceras partes de grano de óxido de arsénico. Se la puede dilatar en jarabé.

Los médicos de Berlin la emplean en las calenturas intermitentes rebeldes. D. Cinco á veinte gotas á la vez, en una taza de agua azucarada ó de tisana conveniente.

8393. S. DE ARSENITO DE POTASA (F. DE L.).

\mathcal{R} Acido arsenioso,
 Carbonato de potasa, $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{D}j$ (12 dec.).
 Tintura de espliego. $\tilde{3}v$ flúidas.
 Agua destilada. $\tilde{3}xx$ flúidas.

Se hierve el ácido arsenioso y el carbonato de potasa en $\tilde{3}x$ flúidas de agua, en un vaso de vidrio, hasta que se haya disuelto; luego que se ha enfriado el licor, se vierte en él la tintura de espliego compuesta, y despues se añade el agua destilada para que todo forme exactamente las $\tilde{3}xx$ flúidas.

8394. S. ASTRINGENTE.

\mathcal{R} Licor de Van Swieten. c. s.
 Se usa en lociones, una ó dos veces al dia.

I. Eflorescencias cutáneas, tiña de la cara y de las orejas.

8395. S. ATRÓFICA (Magendie).

\mathcal{R} Ioduro de potasio. $\tilde{3}jv$ (16 gr.).
 Agua de lechuga. $\tilde{lb}\beta$ (250 gr.).
 Agua de yerbabuena. $\tilde{3}ij$ (8 gr.).
 Jarabe de malvabisc. $\tilde{3}j$ (32 gr.).

M. I. Hipertrofia del corazon con aceleracion de los movimientos de este órgano. D. Una cucharadita en un poco de agua, mañana y noche.

8396. S. ATRÓFICA CON LA TINTURA DE DIGITAL (Magendie).

\mathcal{R} Ioduro de potasio. $\tilde{3}jv$ (16 gr.).
 Tintura de digital. $\tilde{3}j$ á $\tilde{3}ij$ (4 á 8 gr.).
 Agua de lechuga. $\tilde{lb}\beta$ (250 gr.).

Agua de flor de nar. ℥ij (8 gr.).
Jarabe de malvabisc. ℥jβ (48 gr.).

M. I. Hipertrofia del corazón con aceleración de sus movimientos. *D.* Una cucharada mañana y noche.

8397. S. DE BELLADONA (*Lippic*).

℥ Muc. de goma aráb. ℥β (15 gr.).
Extracto de belladona. ḡviiij (4 dec.).
Disuélvase. Se usa por el método endérmico.

I. Lumbago reumático, cefalalgia reumática, reuma torácico, neuralgia celiaca, etc.

8398. Otra (*LISTON*).

℥ Extracto hidroalcohólico de belladona. . ḡj (5 cent.).
Agua comun. ℔j (500 gr.).
Disuélvase.

I. Para prevenir las recidivas de las erisipelas de la cabeza y de la cara, etc. *D.* Dos cucharadas cada tres horas.

8399. S. DE ACETATO DE PLOMO
(*F. DE L.*).

℥ Acetato de plomo. ℥xxvij (846 gr.).
Oxido de plomo en polvo. ℔j (500 gr.).
Agua. ℔vijβ (3750 gr.).

Se hierve durante media hora, meneando de cuando en cuando, y cuando el licor se haya enfriado se añade c. s. de agua destilada para que todo constituya doce cuartillos (6 lit.), y despues se filtra.

8400. S. ETÉREA DE BROMURO DE MERCURIO ó *Solucion antisifilítica de Werneck.*

℥ Deutobromuro de merc. ḡj (5 cent.).
Eter sulfúrico. ℥j (4 gr.).
Disuélvase.

I. Tiña. *D.* Diez á veinte gotas

en una taza de cocimiento de cebada.

8401. S. DE BICLORURO DE MERCURIO (*F. DE L.*).

℥ Bicloruro de mercurio,
Hidroclor. de amoníaco, añ. ḡx (5 dec.).
Agua destilada. ℥xx (625 gr.).

8402. S. BORATADA (*Hufeland*).

℥ Borax. ℥j (30 gr.).
Agua de rosas,
ó Agua de llanten. ℔jβ (750 gr.).

I. Pecas y herpes furfuráceos, etc. *D.* Se humedece la parte dos ó tres veces al dia y se la deja secar sin enjuagarla. Véase núm. 4072.

8403. S. CALMANTE.

℥ Cianuro de potasio. ḡviiij á ḡx (4 á 5 dec.).
Agua destilada,
Alcohol,
Eter sulfúrico, añ. ℥j (30 gr.).
M. Se aplica exteriormente en las neuralgias y jaqueca.

8404. S. DE CAMERON (*Formularios ingleses*).

℥ Nitrato de potasa. ℔β (250 gr.).
Vinagre. ℔iij y ℥jv (1625 gr.).
Azúcar. c. s.
Esencia de menta. algunas gotas.
H. S. A. I. Escorbuto. *D.* ℥iij á ℥viiij (90 á 250 gr.) al dia.

8405. S. DE SESQUICARBONATO DE AMONÍACO (*F. DE L.*).

℥ Sesquicarbonato de amoníaco. ℥jv (125 gr.).
Agua destilada. ℥xx (625 gr.).
Se disuelve y se filtra.

8406. S. DE SUBCARBONATO DE POTASA (*Rosenstein*).

℥ Subcarbon. de potasa. ℥j (30 gr.).

Agua destilada. ℥j (500 gr.).
Disuélvase.

I. Reumatismos, escrófulas, etc. D. Veinte á cien gotas al dia en una taza de tisana apropiada.

8407. S. DE SUBCARBONATO DE SOSA (Trousseau).

℥ Agua caliente. ℥ij (1000 gr.).
Se añade:

Solucion saturada de subcarbonato de sosa: . . . 4 á 4 cucharadas de café.

I. Prurito de las partes genitales exteriores de la mujer. D. Cuatro lociones al dia.

Nota. Se aumenta sucesivamente la dosis de la solucion alcalina hasta que la enferma sienta escozor, y se debe continuar las lociones cuando menos quince dias despues de haber cesado todos los síntomas.

8408. S. DE CARBONATO DE SOSA ó Gotas alcalinas de Hamilton.

℥ Carbonato de sosa. ℥j (30 gr.).
Agua. ℥j (500 gr.).

Se usa en lociones en el prurito de las partes genitales de la mujer.

I. Convulsiones de los niños, eclampsia, corea. D. Diez á cuarenta gotas al dia.

8409. S. CATERÉTICA.

℥ Mercurio. ℥℥ (16 gr.).
Acido nítrico á 35°. ℥vj (24 gr.).

Se disuelve en un matraz y se hierve durante algunos instantes. Se toma:

Agua destilada. ℥j (500 gr.).
Nitrato obtenido. ℥j (32 gr.).

I. Se usa para destruir las vegetaciones sifilíticas.

8410. S. DE CATECÚ CONTRA LOS FLUJOS MUCOSOS CRÓNICOS.

℥ Catecú. ℥iij (12 gr.).
Agua destilada. ℥v (160 gr.).

Disuélvase.

I. Flujos mucosos muy rebeldes, blenorragias refractarias. D. Se retiene minuto y medio esta inyeccion en el conducto de la uretra.

8411. S. CAUSTICA (Mapper).

℥ Nitrato de plata. ḡiij (15 cent.).
Agua de cerezas negr. ℥vj (24 gr.).
Tintura de opio. ℥℥ (2 gr.).

M. I. Grietas del pezon. D. Se aplica por medio de hilas.

8412. S. CIANURADA.

℥ Oxicianuro de mercurio. ḡvj á ḡxij (3 á 6 dec.).

Agua destilada. ℥j (500 gr.).
Disuélvase.

I. Se usa en los mismos casos que el licor de Van Swieten. D. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) al dia, en un vaso de leche ó agua de avena.

8413. S. DE CIANURO DE MERCURIO (F. P.).

℥ Cianuro de mercurio. ℥
Agua destilada. ℥1500
Disuélvase.

D. Cada onza (30 gr.) contiene $\frac{7}{8}$ de grano de cianuro, y por consiguiente cada ℥jv (48 dec.) contienen $\frac{1}{16}$ de grano.

8414. S. DE CIANURO DE POTASIO (Lombart).

℥ Cianuro de potasio. ḡjv (2 dec.).
Agua destilada. ℥j (30 gr.).
Disuélvase.

I. Reumatismo, gota, neuralgia, y principalmente la jaqueca. D. Se aplican compresas sobre el punto dolorido.

8415. S. DE CITRATO DE MORFINA DE MAGENDIE ó Gotas de color de rosa.

℥ Acido cítrico. ḡviiij (4 dec.).

Morfina pura. ḡxvj (8 dec.).
 Agua destilada. Ḷj (30 gr.).
 Tintura de cochinilla. Ḷij (8 gr.).
 Es un calmante que se ha propuesto para reemplazar el licor de Porter.

I. Tiene las propiedades de las sales de morfina. *D.* Seis á treinta gotas en un liquido apropiado.

8416. S. CITRO-MURIÁTICA ó *Ferbrifugo de Broussonnet.*

Se funde cloruro de sodio en zumo exprimido de limon hasta completar la saturacion, y se filtra.

I. Fiebres pútridas y adinámicas. *D.* Una cucharada cada hora.

8417. S. DE CLORURO DE BARIO.

℥ Cloruro de bario. Ḷj (4 gr.).
 Agua pura Ḷv (20 gr.).
 Disuélvase.

I. y *D.* Diez á veinte gotas á los niños; veinte, treinta y sesenta á los adultos, en un liquido mucilaginoso, como antiescrofuloso. Se usa exteriormente en lociones sobre las úlceras, herpes, y para combatir las manchas de la córnea.

8418. *Otra* (LISFRANC).

℥ Cloruro de bario. ḡvj (3 dec.).
 Agua destilada. Ḷjv (125 gr.).
 Disuélvase.

I. Tumores blancos, escirros. *D.* Una cucharada cada hora, excepto una hora antes y dos despues de comer. El enfermo estará sujeto á dieta vegetal, y por bebida agua pura. Cada ocho dias se aumentan ḡvj (3 dec.) de cloruro.

8419. *Otra* (SICHEL) (F. DE L.).

℥ Cloruro de bario. Ḷj (4 gr.).
 Agua. Ḷj (32 gr.).

Se echan quince á veinte gotas en un vaso de agua azucarada.

I. Oftalmias escrofulosas y otras afecciones de igual naturaleza.

8420. S. DE CLORURO DE CALCIO.

℥ Cloruro de calcio. Ḷj (30 gr.).
 Alcohol Ḷv (150 gr.).
 Agua. Ḷiij (90 gr.).

Se filtra despues de tres dias de digestion.

I. Escrófulas, gota, calenturas intermitentes, gangrena de hospital, tiña. *D.* ḡxviiij á Ḷj (1 á 4 gr.) mañana y noche, en unataza de tisana de lúpulo ó en lociones.

8421. *Otra* (BIETT).

℥ Cloruro de calcio. ḶijḶ (10 gr.).
 Agua destilada. Ḷbj (500 gr.).

Se disuelve y se añade:

Jarabe de genciana. ḶbḶ (250 gr.).

I. Lupus escrofuloso. *D.* Una ó dos cucharadas, mañana y noche.

8422. *Otra* (F. DE L.).

℥ Cloruro de calcio. Ḷjv (125 gr.).
 Agua destilada. Ḷxij (375 gr.).

Se disuelve el cloruro de calcio en el agua y se cuele el licor.

8423. S. DE CLORURO DE CAL ALCOHOLIZADA (*Chevallier*).

℥ Cloruro de cal seco en polvo fino. Ḷij (8 gr.).

Agua destilada,
 Alcohol á 36°, *añ.* Ḷij (60 gr.).
 Aceite esencial de clavo. 2 gotas.

Se trata el cloruro por el agua, se decanta, despues se filtra y se añade el alcohol y despues el aceite esencial.

I. Se usa para quitar el olor del humodel tabaco, y en lociones en el caso de ablandamiento de las encías con ulceraciones fétidas. *D.* Media cucharada de café en un vaso de agua, en cuyo liquido se empapa una esponja.

8424. S. DE CLORURO DE ESTAÑO.

℥ Bicloruro de estaño. ḡβ (25 mil.).
 Agua destilada. ℔j (500 gr.).
 Disuélvase.

I. Infartos de las glándulas, afecciones escirrosas y cánceres ulcerados. D. Una cucharada al día en una taza de agua de goma ó en lociones.

8425. S. DE CLORURO DE ORO Y AMMONIO (Furnari y Deleschamps).

℥ Cloruro de oro y amonio. ḡx (50 cent.).
 Agua destilada,
 Alcohol á 36°, ãã. ℥x (300 gr.).
 Disuélvase.

I. Amenorrea y dismenorrea. D. Una cucharadita de café por la mañana en ayunas y otra por la noche. Es muy segura y eficaz.

8426. S. DE CLORURO DE SOSA (F. DE L.).

℥ Carbonato de sosa. ℥xij (375 gr.).
 Agua destilada. ℔iij (1500 gr.).
 Cloruro de sodio. ℥jv (125 gr.).
 Bióxido de mangan. ℥iij (96 gr.).
 Acido sulfúrico. ℥jv (125 gr.).

D. Se disuelve el carbonato de sosa en dos pintas de agua, se pone en una retorta el cloruro de sodio y el bióxido de manganeso, se le reduce á polvo, y se vierte encima el ácido sulfúrico mezclado antes con tres onzas flúidas de agua fria; se calienta, se deja pasar el cloro primero al través de ℥v flúidas de agua, y despues al través de la solución precedente de sosa.

8427. S. DE COBRE AMONIAL (H. DE IT.).

℥ Solucion de cobre amoniacal. ḡx (50 cent.).
 Agua destilada. ℥ij (8 gr.).

Disuélvase.

I. Corea. D. Cinco gotas al dia, aumentando progresivamente.

Nota. Nueve gotas contienen cerca de ḡβ (25 mil.) de sulfato de cobre.

8428. S. CONCENTRADA DE SUBLIMADO (Ricord).

℥ Sublimado corrosivo. ḡxx á ḡxl (1 á 2 gr.).
 Agua destilada. ℥j (30 gr.).
 Disuélvase.

D. Se usa para cauterizar las superficies descubiertas por medio de los vejigatorios, en el tratamiento de los bubones, etc.

8429. S. CONTRA LAS AFECCIONES HERPÉTICAS DEL CONDUCTO AUDITIVO (Meniere).

℥ Extracto de Saturno. ḡxviii (1 gr.).
 Láudano de Rousseau. ℥β (2 gr.).
 Agua destilada. ℥jv (125 gr.).
 Disuélvase S. A.

D. Cinco á diez gotas instiladas por la noche en el oido. Se tapa despues con un poco de algodón.

8430. S. CONTRA LAS GRIETAS DE LOS PECHOS DE LAS NODRIZAS.

℥ Tanino. ḡv (25 cent.).
 Agua destilada. ℥j (30 gr.).

D. Se aplica por medio de compresas. Es muy buena preparacion.

8431. S. CONTRA LAS HERIDAS HECHAS DURANTE LA DISECCION.

℥ Solucion acuosa saturada de alumbre, c. s.

Se fomenta la parte herida con esta solución, y se tiene puesta durante dos ó tres dias una compresa empapada en ella.

8432. S. CONTRA LAS INFLAMACIONES DE LA BOCA POSTERIOR (Nard).

NUMERO 1.

℞ Acido oxálico. ḡvj á ḡxvj (3 á 8 dec.).

Solucion de goma aráb. ℥iij (90 gr.).

Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

Mézclese exactamente.

I. Diversas anginas, estomatitis, aftas, gastritis y gastro-enteritis.

D. A cucharadas, con cortos intervalos, reteniendo la mezcla en la boca, y tragándola lentamente.

NUMERO 2.

℞ Cocimiento de cebada. ℔bj (500 gr.).

Acido oxálico. ℔j á ℥j (12 dec. á 4 gr.).

Se mezcla exactamente, y se usa como colutorio contra las úlceras escorbúticas ó venéreas de la boca.

8433. S. CONTRA LAS MANCHAS DE LA CórNEA (Evermann).

℞ Ioduro de potasio. ḡxviiij (1 gr.).

Agua. ℥j℔ (50 gr.).

I. Es útil contra las manchas de la córnea, determinadas por una oftalmia escrofulosa descuidada.

8434. S. CONTRA LAS VEGETACIONES SIFILITICAS (Venot).

℞ Agua destilada. ℔bj (500 gr.).

Extr. acuoso de opio. ℥ij (64 gr.).

Extr. acuoso de cicuta ℥vj (24 gr.).

I. Puerros húmedos, irritados, condilomas, pústulas vegetantes é hipertróficas, célulo-vasculares.

8435. S. CONTRA LAS ÚLCERAS DE LAS PIERNAS (Popper).

℞ Piedra divina. ℥℔ (2 gr.).

Extracto de Saturno. ḡx (5 dec.).

Láudano líquido. ℥j (4 gr.).

Agua. ℥jv (125 gr.).

D. Se aplican compresas sobre las úlceras.

8436. S. ALCOHÓLICA DE CREOSOTA.

℞ Creosota. ℥j

Alcohol á 38° Cart. ℥℔ 16

Disuélvase.

I. Introducida esta solucion en un diente cariado, hace cesar el dolor.

8437. S. DE CREOSOTA (Pigné).

℞ Creosota. 10 gotas.

Agua destilada. ℔bj (1000 gr.).

M. I. Sirve para conservar las sustancias animales y los cadáveres destinados á la diseccion, y puede usarse en el tratamiento de las úlceras escrofulosas.

8438. S. DIURÉTICA (Martin Solon).

℞ Digital fresca. ḡxx (10 dec.).

Azúcar blanca. ḡxl (20 dec.).

Se tritura todo, y se vierte en

Agua pura. ℔bj (1000 gr.).

Jarabe simple. ℥ij (60 gr.).

M. S. A. I. Afecciones del corazón. D. A tacitas en el dia.

8439. S. ALCOHÓLICA DE ELATERINA (Morrus).

℞ Elaterina. ḡjv (2 dec.).

Alcohol rectificado. ℥jv (125 gr.).

Se disuelve á fuego lento.

I. Es drástica y se usa en las hidropesías pasivas. D. ḡxviiij á ḡLjv (1 á 3 gr.) y mas, aumentando progresivamente.

8440. S. ESCARÓTICA (Freiberg).

℞ Alcanfor. ℥℔ (2 gr.).

Bicloruro de mercurio. ℥j (4 gr.).

Alcohol rectificado. ℥j (30 gr.).

Disuélvase.

I. Sirve para destruir los condilomas y vegetaciones sifiliticas. Se extiende por medio de un pincel sobre la parte, despues de haberlos cortado.

8441. S. ESTIBIADA
(*Fontaneilles*).

℞ Emético. ℥ij℥ (10 gr.).
Agua destilada. ℥v (160 gr.).

M. S. A. I. Afecciones cutáneas agudas, pero no intensas; flegmasias simples, infartos lácteos de las mamas, cefalalgias intensas, etc. D. Se usa en lociones.

8442. S. FERRUGINOSA CONTRA LA ERISPELA (*Velpeau*).

℞ Sulfato de hierro. . ℥ij (60 gr.).
Agua. 2 cuart. (1 lit.).
Disuélvase.

I. Erisipela, úlceras atónicas. D. Este liquido abrevia la duracion de la erisipela y es el mejor tóptico contra ella.

8443. S. DE FRIEKE CONTRA LOS CONDILOMAS.

℞ Sulfato de zinc. ℥j (4 gr.).
Agua vegeto mineral. ℥ij℥ (75 gr.).

M. S. A. I. Es un cáustico poco enérgico, que obra con lentitud, pero con seguridad, contra los condilomas.

8444. S. DE GOMA AMONIACO ó Cola de fray Cosme.

℞ Goma amoniaco.
Vinagre.
Disuélvase.

I. Es un aglutinante muy enérgico, que aglutina muy bien las partes, y puede usarse con preferencia á otros.

8445. S. DE HEINCKE.

℞ Arseniato de sosa. ḡij (1 dec.).

Agua de yerbabuena de sabor de pimienta. . ℥ij (60 gr.).
Se disuelve y se añade:
Agua de canela. ℥j℥ (45 gr.).
Tintura de opio. ℥j (4 gr.).
Disuélvase S. A.

I. Se emplea en los mismos casos que la del arseniato de amoniaco. D. Cuarenta ó cincuenta gotas, cuatro veces al dia.

Nota. Una dracma (4 gr.) contiene un poco menos de un sesto de grano de arseniato.

8446. S. HEMOSTÁTICA.

℞ Ergotina. 1
Agua. 10
Se disuelve y se filtra.

I. Hemorragias. D. Se empapan hilas en esta solucion, y se las aplica á la parte por donde se verifica la hemorragia.

8447. S. DE HIDROCLORATO DE MORFINA.

℞ Hidroclorato de morfin. ḡj (5 cent.).
Agua destilada. 100 gotas.
M. D. 10 á 25 gotas en un julepe, pocion ó mistura como calmante.

8448. S. IODADA PARA COMBATIR LAS HIPOPIESIAS Y LOS ABSCESOS DE LAS ARTICULACIONES (*Bonnet*).

℞ Agua. 40
Iodo. 5
Ioduro de potasio. 8

Se mezcla en un mortero de vidrio el iodo y el ioduro, y se añade poco á poco el agua. D. La cantidad de liquido que se inyecte no debe pasar del que haya contenido en la articulacion.

8449. S. DE IODHIDRARGIRATO DE IODURO DE POTASIO.

℞ Iodhidrargirato de ioduro de potasio. ḡxvj (8 dec.).
Agua destilada. lbj (500 gr.).

Disuélvase.

D. ʒij á ʒij (8 á 60 gr.) tomada gradualmente en las veinticuatro horas.

8450. S. DE IODHIDRARGIRATO DE POTASA (Puche).

ʒ Biioduro de mercurio,
Ioduro de potasio, ãã. ʒviiij (4 dec.).
Agua destilada. ℥ss (250 gr.).

Se toma en los mismos casos que el licor de Van Swieten. Se usa exteriormente bajo la forma de gargarismo contra las úlceras de la garganta; en inyecciones contra las úlceras venéreas de la uretra, de la vagina ó del cuello de la matriz; y en lociones para deterger las úlceras venéreas, atrofiar los tubérculos, etc. D. ʒij á ʒij (8 á 60 gr.) en las veinticuatro horas.

8451. S. DE IODOARSENITO DE MERCURIO (Donovan).

ʒ Arsénico metálico. 0,158
Mercurio metálico. 0,400
Iodo. 1,305

Se tritura el arsénico en polvo con el mercurio, el iodo y un poco de alcohol, hasta que se haya secado la masa. Se diluye en 100 partes de agua destilada; después de haber triturado un momento, se añade ácido iodhídrico preparado, acidificando 0,13 de iodo, y se hace hervir durante algunos instantes; después de frío, se añade igual cantidad de agua destilada, para que la solución fría sea igualmente de 100 partes.

I. Véase la siguiente.

8452. S. DE IODOARSENITO DE MERCURIO DE DONOVAN, MODIFICADA POR SOUBEIRAN.

ʒ Ioduro de arsénico. 1
Ioduro de mercurio. 1
Agua destilada. 98

Este licor contiene $\frac{1}{100}$ de cada ioduro.

I. Lepra, soriasis, lupus, rupia, sífilis secundaria. D. ʒj (4 gr.) en ʒxx (80 gr.) de agua destilada, y ʒjv (16 gr.) de jarabe de gengibre. Es la *Pocion de Donovan*, n. 6342.

8453. S. DE IODO CÁUSTICA (Puche).

ʒ Alcohol rectificado. c. s. q.
Iodo, todo lo que el alcohol pueda disolver.

I. Se usa del mismo modo que las soluciones ioduradas.

8454. S. IODURADA.

ʒ Iodo. ʒv (25 cent.).
Se disuelve en
Espiritu de vino. . . . ʒij (8 gr.).
Se añade:

Agua de canela. . . . ʒij (60 gr.).
Jarabe simple. . . . ʒss (15 gr.).

Para hacer tomar al día al principio cuatro medias cucharadas, y después cuatro enteras de esta mistura.

8455. S. IODURADA RUBEFACIENTE DE LUGOL (F. P.).

NÚMERO 1.

ʒ Iodo. ʒjv (16 gr.).
Ioduro de potasio. . . ʒj. (32 gr.).
Agua destilada. . . . ʒvj (192 gr.).

NUMERO 2.

ʒ Iodo,
Ioduro de potasio, ãã. . ʒj (32 gr.).
Agua destilada. . . . ʒij (64 gr.).

Se toca con esta solución la superficie de las heridas indolentes, escrofulosas, ó el borde libre de los párpados en las oftalmias escrofulosas; debajo de la lengua en la hidrofobia, y en fricciones ligeras en el acné, gota y heridas.

8456. S. IODURADAS PARA USO EXTERIOR (F. P.).

NUMERO 1.

ʒ Iodo. ʒij (1 dec.).

Ioduro de potasio. ḡjv (2 dec.).
 Agua destilada. ḡbij (1000 gr.).

NUMERO 2.

℥ Iodo. ḡiij (15 cent.).
 Ioduro de potasio. ḡvj (30 cent.).
 Agua destilada. ḡbij (1000 gr.).

NUMERO 3.

℥ Iodo. ḡjv (2 dec.).
 Ioduro de potasio. ḡviiij (4 dec.).
 Agua destilada. ḡbij (1000 gr.).
 Disuélvase S. A.

I. Escrófulas. D. C. s. para lociones, inyecciones en las fosas nasales, colirios ó fomentos.

8457. S. IODURADA CÁUSTICA.

℥ Iodo,
 Ioduro de potasio, añ. ḡj (30 gr.).
 Agua destilada. ḡij (60 gr.).
 Disuélvase S. A.

Esta solucion, la mas concentrada que se puede preparar, obra convirtiendo en escara las partes que toca. Sirve para avivar y renovar las superficies de las úlceras escrofulosas.

8458. S. IODURADA (Furnari).

℥ Ioduro de potasio. ḡj (4 gr.).
 Iodo. ḡiij (15 cent.).
 Agua. ḡx (300 gr.).

I. Oftalmias escrofulosas. D. Una eucharada mañana y noche en un vaso de tisana de lúpulo.

8459. S. IODURADA CONCENTRADA.

℥ Iodo. ḡj (12 dec.).
 Ioduro de potasio. ḡij (24 dec.).
 Agua destilada. ḡbβ (250 gr.).
 Disuélvase S. A.

Esta solucion contiene una vigésimacuarta parte de iodo. I. Escrófulas. D. Se empieza por seis gotas por la mañana en ayunas, é igual cantidad por la noche en medio vaso de agua azucarada. Puede aumentarse por grados la

dosis hasta treinta y seis gotas en las veinticuatro horas.

En los niños menores de siete años se empieza por dos gotas, dos veces al dia, que se aumentan por grados hasta cinco gotas.

En el segundo septenario de la vida no se administran mas que diez y seis gotas de esta solucion por dia; no sería prudente pasar de esta dosis.

En cualquier época del tratamiento debe darse la dosis en dos ó en tres tomas. Mas frecuentemente se da la mitad por la mañana, y la segunda mitad una hora antes de comer.

El iodo aumenta con frecuencia el apetito; produce comunmente muchas deposiciones al dia, sin que esto constituya ningun accidente. Cuando existe estreñimiento, se le remedia con algunos granos de calomelanos, un poco de agua de malvas ó algunos vasos de agua de Sedlitz.

8460. S. IODURADA PARA FOMENTOS.

℥ Iodo. ḡjv (2 dec.).
 Ioduro de potasio. ḡx (5 dec.).
 Agua destilada. ḡbj 500 gr.).

Se usa en lociones, colirios y fomentos en las afecciones escrofulosas, y en inyecciones en el conducto de la uretra, la vagina, las fosas nasales, los trayectos fistulosos, etc.

8461. S. IODURADA PARA INYECCION (Guibourt).

℥ Iodo,
 Ioduro de potasio, añ. ḡxc (5 gr.).
 Alcohol á 90° c. ḡjβ (48 gr.).
 Agua destilada. ḡiij (96 gr.).

Se tritura el iodo y el ioduro en un mortero con un poco de agua, se añade el alcohol y en seguida el resto del agua.

Guibourt propone esta solucion

para reemplazar la mezcla de las tinturas de iodo y agua que se usan en el tratamiento quirúrgico de las hidropesías.

8462. S. IODURADA RUBEFACIENTE.

- ℥ Iodo. ℥jv (46 gr.).
 - Ioduro de potasio. . . ℥j (32 gr.).
 - Agua destilada. . . . ℥vj (492 gr.).
- Disuélvase S. A.

Esta solución debe estar guardada en un frasco de vidrio con tapon esmerilado, en atención á que el iodo destruye muy pronto los taponés de corcho. Se usa esta preparación como excitante en los casos de oftalmia escrofulosa crónica; se toca con ella el borde libre de los párpados, y se la introduce entre estas partes y el globo del ojo. Pueden tocarse las fosas nasales con el mismo líquido, que se usa generalmente para hacer que sean mas unidas las cicatrices. Se emplea tambien para hacer cataplasmas ioduradas.

8463. S. IODURADA SULFUROSA (Baumés).

- ℥ Ioduro de potasio. . . ℥jβ (6 gr.).
- Sulfuro de potasa. . . ℥ijβ (40 gr.).
- Agua destilada. . . . ℥xiiij (416 gr.).

I. Erupciones papulosas, tuberculosas y escamosas sin síntomas de irritación.

8464. S. RADICAL DE IODURO FERROSO.

- ℥ Hidrolado concentrado de iodo ferroso recién prepar. . . 4
- Azúcar muy blanca. 4½

Se pesa el hidrolado y el azúcar en un globito, se añaden algunas puntas de hierro bien limpias, se calienta para que se funda pronto el azúcar y se guarda el jarabe en frasquitos, que se taparán bien y lacrarán.

D. ḡxviiij (1 gr.) representa ḡij (10 cent.) de ioduro.

8465. S. OFICINAL DE PROTOIODURO DE HIERRO (Dupasquier).

- ℥ Iodo. 37
- Alambre de hierro. 75
- Agua destilada. 400

Se corta el alambre en pedazos de cerca de diez líneas, se le echa en un frasco con tapon esmerilado y se añade despues el agua, el iodo, y se tapa. Si hay que usar al momento la solución, se sumerge el frasco por espacio de ocho á diez minutos en agua á la temperatura de cerca de 80° cent., teniendo cuidado de agitar muchas veces la mezcla. En seguida se filtrará la solución necesaria, interin el líquido pase sin color. Cuando no hay que emplear al momento la solución, se abandonará la mezcla á sí misma, y se combinarán el hierro y el iodo sin que haya necesidad de calentarlo. La solución se conserva indefinidamente.

Cuando haya que ejecutar alguna fórmula, se filtrará parte del líquido, y despues de haber usado la cantidad necesaria, se echará el resto en el frasco. De este modo se puede gastar todo lo contenido en el frasco, sin que la solución adquiera color ni presente los caracteres de las sales ferruginosas puras de cualquiera otra mezcla de sal de hierro.

8466. S. NORMAL DE PROTOIODURO DE HIERRO DE DUPASQUIER (F. P.).

- ℥ Iodo. 80
- Limaduras de hierro. 400
- Agua destilada. 400

Se pone todo en un matracito, que se tendrá sumergido por ocho ó diez minutos en agua á 70 ú 80°; pero no hirviendo para que no se volatilice una parte del iodo, agi-

tando repetidas veces la mezcla.

Cuando principia á verificarse la combinacion, el protoioduro de hierro hace que se disuelva completamente el iodo y el líquido tome un color rojo pardusco. Si se sigue por algunos minutos calentando y agitando la mezcla, desaparece el color pardo, lo que indica que se ha verificado completamente la combinacion del iodo y del hierro; cuya certeza se puede adquirir por otra parte filtrando el líquido, que debe de ser enteramente incoloro, ó cuando mas, presentar un viso verdoso casi insensible.

Se usa en la tisis pulmonar, principiando siempre por dosis muy cortas, que se pueden seguir aumentando gradualmente cuando no tome gran incremento la calentura, y en especial la tos. Cada escrúpulo de la solucion tiene ḡij (15 cent.) de iodo.

8467. S. ALCOHÓLICA DE DEUTOIODURO MERCÚRICO (H. DE M.).

\mathcal{Z} Deutoioduro de merc. ḡxx (10 dec.).
Alcohol de 36°. ḗjβ (45 gr.).
Disuélvase.

I. Sífilis constitucional, sífilides, escrófulas, lepra é hidropesía. D. Diez á quince gotas, aumentando progresivamente.

8468. S. ETÉREA DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (Magendie).

\mathcal{Z} Deutoioduro de merc. ḡxviiij (1 gr.).
Eter sulfúrico. ḗjβ (45 gr.).
M. S. A.

D. Diez á veinte gotas y aun mas en un vaso de agua azucarada.

8469. S. ALCOHÓLICA DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (Magendie).

\mathcal{Z} Alcohol á 36°. ḗjβ (45 gr.).
Deutoioduro de merc. ḡxx (10 dec.).
Veinte gotas corresponden con

muy poca diferencia á una octava parte de grano de deutoioduro.

M. S. A. I. Se asegura que ha producido buenos efectos en las afecciones escrofulosas complicadas con sífilis. D. Diez, quince ó veinte gotas en un vaso de agua destilada.

8470. S. DE IODURO DE POTASIO (Cooper).

\mathcal{Z} Ioduro de potasio. ḡij (15 cent.).
Tisana de zarzaparr. ḗjβ (48 gr.).
Disuélvase.

I. Ulceras venéreas primitivas.
D. En tres tomas al dia.

8471. Otra (MAGENDIE).

\mathcal{Z} Agua destilada. ḗβ (16 gr.).
Ioduro de potasio. ḡxx (1 gr.).
Disuélvase S. A.

Cada dracma (4 gr.) contiene ḡjvβ (103 mil.) de ioduro.

I. Bocio, escrófulas, ciertos casos de cáncer, hinchazon escorbútica de las encías é hipertrofia del corazon. D. Veinte gotas á ḗβ (2 gr.) al dia, en una taza de agua azucarada ó de tisana conveniente.

Nota. Se puede aumentar sucesivamente la dosis hasta ḗj (30 gr.) en las veinticuatro horas.

8472. S. DE IODURO DE POTASIO IODURADO (Coindet).

Se prepara añadiendo á la solucion precedente:

Iodo. ḡv (25 cent.).

I. La misma que la anterior. D. Cinco á diez ó quince gotas, tres veces al dia, en medio vaso de agua azucarada.

Nota. Puede aumentarse la dosis gradualmente.

8473. S. ACUOSA DE IODURO DE POTASIO CONTRA LAS MANCHAS DE LA PIEL.

Se moja la piel con una solucion

acuosa de ioduro de potasio, y se expone la parte á la luz del sol.

Gerard propone que el ioduro de potasio dado interiormente, podria quitar tambien las manchas del nitrato de plata.

8474. S. DE IODURO DE POTASIO OPIADA.

℞ Ioduro de potasio. ḡjx (50 cent.).
 Agua. ḡiij (96 gr.).
 Jarabe de adormid. ḡj (32 gr.).

Se puede aumentar la dosis del ioduro de potasio hasta ḡxc (5 gr.); pero despues se disminuirá siguiendo una progresion inversa.

I. Sifilis constitucional, acne, escorbuto, ozena, exóstosis, perióstosis, caries, dolores osteocopos, tumores gomosos, gota. *D.* En tres tomas en medio vaso de tisana de zarzaparrilla, lúpulo, etc.

8475. S. DE JARABE DE GROSELLAS.

℞ Jarabe de grosellas. 400
 Agua. 4000
 Mézclese.

Se preparan del mismo modo las soluciones de los jarabes de LIMON, NARANJA, AGRACEJOS, CEREZAS, GRANADAS, FRAMBUESAS, MANZANAS, VINAGRE Y VINAGRE CON FRAMBUESAS.

I. Se usan como bebidas atemperantes; útiles en las fiebres inflamatorias.

8476. S. DE LAUDANO (*Cullerier*).

℞ Láudano líquido. ḡj á ḡij (30 á 60 gr.).
 Agua pura. lbij (1000 gr.).
 Mézclese.

Se usa en los mismos casos que las soluciones opiadas.

8477. S. MERCURIAL (*Larrey*).

℞ Bicoloruro de mercurio,

Clorhidrato de amoniaco,

Extr. de opio, āā. ḡv (25 cent.).
 Licor de Hoffmann. ḡß (15 gr.).
 Agua destilada. lbj (500 gr.).
 Disuélvase S. A.

D. Una cucharadita de café, aumentando gradualmente hasta una cucharada grande en un vehiculo mucilaginoso ó leche, y observando diariamente sus efectos.

8478. Otra (*PLISON*).

℞ Bicoloruro de mercurio,
 Cloruro de potasio, āā. ḡij á ḡx (10 á 50 cent.).
 Alcohol, c. s.

Se disuelve y se dilata en

Agua destilada. ḡxjx (600 gr.).
 Guárdese.

I. Eczema, herpes, sarna, pénfigo crónico, impétigo, acne, líquen, prurigo, afecciones cutáneas sifilíticas, etc. Cuando se emplea contra las afecciones cutáneas de origen sifilítico se auxilia su accion con el uso de los baños de la misma naturaleza, administrados dos ó tres veces por semana, y tomando interiormente la misma solucion á la dosis de una cucharada, mañana y noche, en una taza de tisana apropiada. *D.* Se empapa un papel grueso, y se cubren con él las partes enfermas.

8479. S. MERCURIAL ETÉREA (*Kopp*).

℞ Deutocloruro de merc. ḡx (5 dec.).
 Eter acético. ḡiij (12 gr.).
 Alcohol rectificado. ḡvj (24 gr.).
 H. S. A. *I.* Dolores reumáticos.

D. Cincuenta á cien gotas en fricciones tres ó cuatro veces al dia.

8480. S. MERCURIAL IODURADA (*Bielt*).

℞ Protoioduro de mercur. ḡj (5 cent.).
 Miel rosada. ḡij (8 gr.).
 M. S. A. *I.* Ulceraciones de la

membrana mucosa de la garganta. *D.* Se aplica por medio de un pincel.

8481. S. MERCURIAL OPIADA.

℞ Deutocloruro de mercurio. ḡxviii á 3j (1 á 4 gr.).
 Agua destilada. ℔j (500 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Láudano líquido de Sydenham. 3ß á 3j (15 á 30 gr.).

I. Se emplea tópicamente en las úlceras venéreas indolentes y estacionarias por medio de compresas empapadas; en lociones mas ó menos repetidas sobre las pústulas rebeldes, herpes rebeldes debidos ó no al virus sífilítico.

8482. S. MERCURIAL RESOLUTIVA (Vogt).

℞ Deutocloruro de merc. ḡj (5 cent.).
 Agua de rosas. 3j (30 gr.).
 Tintura de gálibano. 3j (4 gr.).

M. I. Otitis crónica. *D.* Se echan algunas gotas en el conducto auditivo, despues de haberle lavado por las inyecciones.

8483. S. DE NITRATO DE PLATA CONTRA LA ERISPELA (Higginbottou).

℞ Nitrato de plata. 3jß (6 gr.).
 Acido nítrico. 7 gotas.
 Agua destilada. 3jvß (18 gr.).

H. S. A. Se limpia bien la porcion inflamada de los tegumentos lavándola con agua pura; entonces se aplica distintas veces la solucion cáustica por medio de un pincel, procurando extenderla hasta dos ó tres pulgadas mas allá de la parte inflamada. A las doce horas se puede saber si ha bastado esta cauterizacion, y si no ha sido suficiente se repite inmediatamente. En algunos casos este tratamiento no impide que se extienda la erisipela; pero ya es menos gra-

ve. Este tratamiento conviene en todos los períodos de la erisipela, é importa recorrer bien todas las superficies erisipeladas.

8484. S. DE NITRATO DE PLATA (H. DE AL.).

℞ Nitrato de plata cristalizado. ḡß á ḡiij (25 mil. á 15 cent.).
 Agua destilada. 3ij (64 gr.).
 Tintura de opio. ḡx (5 dec.).
 Mucilago de goma aráb. 3j (32 gr.).
 Disuélvase *S. A.*

I. Enfermedades convulsivas. *D.* Una cucharada, que contiene un duodécimo á medio grano de nitrato de plata, dos veces al dia.

La SOLUCION DE NITRATO DE PLATA DE BIETT se compone de 3ß (2 gr.) de nitrato de plata y 3vj (24 gr.) de agua destilada.

8485. S. DE NITRATO DE PLATA (F. DE L.).

℞ Nitrato de plata. 3j (4 gr.).
 Agua destilada de rosas. 3j (32 gr.).
 Mézclese.

I. Relajacion crónica de la campanilla y de la mucosa gutural. *D.* Se empapa un pincelito en esta solucion, y se recorre con él la campanilla y la superficie de la mucosa faríngea:

8486. Otra (HANN).

℞ Nitrato de plata. ḡLjv (3 gr.).
 Agua destilada. 3j (32 gr.).
 Filtrese.

I. Ozena, blenorragia, acne, impétigo, úlceras sífilíticas y atónicas, aftas, gangrena de hospital, telangiectasia, fistulas, crup, balanitis. *D.* En inyecciones y lociones.

8487. Otra (F. P.).

℞ Nitrato de plata fundido. 4
 Agua destilada. 64
 Vino de opio compuesto. 4

Mézclese.

I. Conjuntivitis crónica, oftalmia purulenta. *D.* Se toca levemente la parte enferma con esta solución.

8488. S. DE NITRATO DE PLATA
(Ricord).

℞ Nitrato de plata. ḡxviij (4 gr.).
Agua destilada. lbß (250 gr.).

I. Balanitis simple acompañada de fimosis, trayectos fistulosos. *D.* Se hacen inyecciones entre el glande y el prepucio tres veces al día. Conviene antes hacer una ó dos con agua tibia ó con un cocimiento de adormideras para deterger las úlceras. De este modo se cura completamente en tres ó cuatro días.

8489. Otra (SAMSON).

℞ Nitrato de plata. ḡv (25 cent.).
Agua destilada. ʒj (30 gr.).
Disuélvase S. A.
I. Úlceras indolentes.

8490. S. DE NITRATO DE PLATA
SATURADA.

℞ Nitrato de plata,
Agua destilada, ãã. ʒijß (40 gr.).
Disuélvase S. A.
I. Úlceras de la matriz.

8491. S. DE NUEZ VÓMICA
(Schwartz).

℞ Extracto alcohólico de nuez vómica,
ḡviiij á ḡxvj (4 á 8 dec.).
Agua destilada. ʒj (30 gr.).
Disuélvase.

I. Caída del recto, incontinencia de orina. *D.* Cinco á seis gotas á los niños pequeños, doce á quince á los de mas edad, y veinte á cincuenta á los adultos, en un poco de agua azucarada.

8492. S. ODONTÁLGICA
(Chapmann).

℞ Alcanfor. ʒj (4 gr.).
Esencia de trementina. ʒß (16 gr.).
Disuélvase.
Se aplica sobre el diente enfermo.

8493. Otra (KOPP).

℞ Alcoholado de pelitre. ʒij (8 gr.).
Alcanfor. ḡxviij (4 gr.).
Disuélvase y añádase:
Láudano de Sydenham. ʒj (12 dec.).
I. Odontalgia por caries. *D.* Se la aplica en la cavidad del diente, y en fricciones sobre la encía correspondiente.

8494. S. OFTÁLMICA (Sichel).

℞ Cloruro de bario. ʒß (2 gr.).
Agua destilada. ʒj (30 gr.).
Disuélvase.
I. Oftalmias escrofulosas. *D.* Seis á cuarenta gotas, cuatro veces al día, en un vaso de agua azucarada.

8495. S. OPIADA.

℞ Extr. gomoso de opio. ʒijß (40 gr.).
Agua destilada. ʒiij (96 gr.).
Disuélvase.
Se usa para lavar las úlceras sífilíticas doloridas, úlceras.

8496. S. ACUOSA DE OPIO
(Chaussier).

℞ Opio escogido. ʒij (60 gr.).
Agua destilada. lbj (500 gr.).
Alcohol á 36°. ʒj (30 gr.).
H. S. A. I. y D. Diez y seis á treinta y seis gotas y aun mas, en un vehículo apropiado, interior ó exteriormente, contra la tos de irritación que precede á la hemotisis, afecciones de pecho, ciertas irritaciones ó inflamaciones de los

ojos ó infartos de las mamas, á consecuencia de un golpe, cánceres de las mamas y afecciones de la matriz. En este último caso se hacen inyecciones ó se empapan hilas que se introducen en el fondo de la vagina.

8497. S. DE OPIO Y CICUTA CONTRA LAS VEGETACIONES SIFILÍTICAS.

℥ Agua destilada. ℥ij (500 gr.).
 Extr. acuoso de opio. ℥ij (64 gr.).
 Extr. acuoso de cicuta. ℥vj (24 gr.).
 Se aplica por medio de compresas.

8498. S. PROFILÁCTICA CONTRA LA ESCARLATINA (Hanhemann).

℥ Extracto de zumo depurado de belladona. ℥ij (4 dec.).
 Agua destilada. ℥j (30 gr.).
 Disuélvase.
 D. Se dan dos gotas cuatro veces al día á los niños de menos de diez años para prevenir la escarlatina.

8499. S. DE POTASA (F. DE L.).

℥ Carbonato de potasa. ℥xv (485 gr.).
 Cal. ℥bb (250 gr.).
 Agua hirviendo. ℥x (5000 gr.).
 Se disuelve el carbonato de potasa en 4 quart. (2 lit.) de agua; se rocía la cal con un poco de agua, y cuando está apagada se añade el resto del agua. Se mezclan al punto los dos licores en una vasija tapada, meneando de cuando en cuando hasta que se hayan enfriado. Se los deja reposar para que se apose el carbonato de cal, se decanta el líquido, y se le conserva en un frasco de vidrio bien tapado.

I. Es antiácida y litontríptica.
 D. ℥x á ℥bb (5 dec. á 2 gr.).

8500. S. DE POTASA CÁUSTICA PARA LOS CALLOS (Donné).

℥ Agua destilada. ℥j (30 gr.).

Potasa cáustica. ℥jx (45 cent.).
 Disuélvase.
 Se desgastan ligeramente los callos con una piedra pomez, que se prepara al efecto empapándola en esta solución.

8501. S. DE POTASA CÁUSTICA.

℥ Potasa cáustica. ℥j (5 cent.).
 Agua destilada. ℥bij (1000 gr.).
 M. I. Se usa para destruir las carnes fungosas en los casos de uñeros, etc. Por último, se la ha propuesto en inyecciones contra la gonorrea, y en colirio para las manchas de la córnea. D. Se da primero una cucharada, despues medio vaso, y se sigue aumentando progresivamente.

8502. S. PURGANTE (H. DE M.).

℥ Tártaro emético. ℥bb (25 mil.).
 Sulfato de sosa. ℥j (30 gr.).
 Agua comun. ℥vj (180 gr.).
 Disuélvase S. A.
 D. En dos vecès.

8503. S. RESOLUTIVA.

℥ Hidrocl. de amoniaco. ℥bb (16 gr.).
 Sulfuro de antimonio. ℥vj (24 gr.).
 Cloruro de sodio. ℥j (32 gr.).
 Agua. ℥x (320 gr.).
 I. Tumores indolentes y escrofulosos, edemas duros y renitentes, sarna. Se sumerge la parte enferma en esta solución dos veces al día, durante una hora, y se la cubre de compresas empapadas en el mismo licor.

8504. S. RESOLUTIVA CALMANTE.

℥ Ioduro de potasio. ℥ijbb (10 gr.).
 Clorhidrato de morfín. ℥bb (2 gr.).
 Alcohol á 21°. ℥vj (180 gr.).
 Esencia de rosas. 10 gotas.
 Mézclese.
 I. Calma los dolores ocasionados por un tumor del pecho. D. Se dan

fricciones suaves y de larga duracion, mañana y noche, con ʒj (4 gr.) de la solucion anterior.

8505. S. DE SAL AMONIACO
(Ricord).

ʒ Sal amoníaco. ʒij (8 gr.).
Agua pura. ℔ʒ (250 gr.).
Disuélvase.

I. Bubones. D. Se usa como tópico resolutivo.

8506. S. DE SCUDAMORE.

ʒ Alumbre. ʒxxx á ʒxxxvj (15 dec. á 2 gr.).
Agua comun ó infusion de rosas. ʒj (30 gr.).
Disuélvase.

I. Hemorragias arteriales y uterinas. D. Se usa tópicamente y en inyeccion.

8507. S. DE SOSA EFERVESCENTE
(F. DE L.).

ʒ Sexquicarbonato de sosa. ʒj (4 gr.).
Agua destilada. ʒxx (625 gr.).
Se disuelve y se impregna el líquido de carbonato de sosa hasta saturarle completamente; se le conserva despues en una vasija bien tapada.

8508. S. DE SOUBEIRAN.

ʒ Ioduro de arsénico,
Ioduro de mercur., ãã. ʒxviij (1 gr.).
Agua destilada. ʒiij (100 gr.).
I. Lepra, soriasis, lupus, pian, herpes, impétigo, líquen. D. ʒj (4 gr.) en una pocion á cucharadas.

8509. S. DE SUBLIMADO
CORROSIVO (H. DE M.).

ʒ Agua destilada. ℔ʒʒ (750 gr.).
Sublimado corrosivo,
Sal amoníaco, ãã. . ʒiij (15 cent.).
Se disuelve en un mortero de vidrio.

I. Es antisifilitica. D. ʒʒ (15 gr.) en un cocimiento apropiado.

8510. S. DE SULFATO DE COBRE.

ʒ Sulfato de cobre. ʒjv (125 gr.).
Agua pura. ℔ij (1000 gr.).
Disuélvase y fíltrese.

I. Cáustico y estimulante para avivar las úlceras venéreas indolentes, pústulas húmedas. D. Se usa tópicamente.

8511. S. DE SULFATO DE COBRE
ALCANFORADA (Swediaur).

ʒ Sulfato de cobre. ʒʒ (15 gr.).
Alcanfor. ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. 4 cuart. (2 lit.).
Se cuele despues de fria.

Se usa estelicor dilatado en agua en lociones, inyecciones y en colirios; como estíptico en las hemorragias traumáticas; y como estimulante en la blenorragia, leucorrea, oftalmias crónicas, etc.

8512. S. DE SULFATO DE COBRE
Y AMONIACO (F. DE L.).

ʒ Sulfato de cobre y amoníaco. ʒj (4 gr.).
Agua destilada. ʒxx (625 gr.).
Se disuelve y se filtra.

I. Es escarótica y deterativa y se usa en las úlceras indolentes.

8513. S. DE SULFATO DE
VERATRINA (Magendie).

ʒ Sulfato de veratrina. ʒj (5 cent.).
Agua destilada. ʒij (60 gr.).
Disuélvase S. A.

I. Gota, reumatismo crónico, neuralgias, anasarca, etc. D. ʒj á ʒjv (4 á 16 gr.) en una pocion apropiada.

Nota. Esta solucion puede reemplazar el agua de Hudsson.

8514. S. DE SULFATO DE ZINC
(Ideler).

ʒ Sulfato de zinc. ʒviij (4 dec.).

Agua comun. ℥℥ (250 gr.).
Disuélvase.

I. Histérico. D. Una cucharada de hora en hora.

8515. S. DE SULFURO DE ANTIMONIO Y CALCIO (F. B.).

℥ Sulfuro de antimonio y calcio. ḡxc (5 gr.).

Agua destilada. ℥vj (3000 gr.).

Se reduce una quinta parte por la ebullicion.

I. Infartos crónicos del bajo vientre, hinchazon glandular, es-crófulas, bocio, gota, reumatis-mo, tiña é hidrofobia. D. En ba-ños, lociones, etc.

8516. S. DE VERATRINA (Terrier).

NUMERO 1.

℥ Veratrina. ḡx (5 dec.).

Alcohol. ℥j (30 gr.).

NUMERO 2.

℥ Veratrina. ḡxx (10 dec.).

Alcohol. ℥j (30 gr.).

NUMERO 3.

℥ Veratrina. ḡxxx (15 dec.).

Alcohol. ℥j (30 gr.).

I. Amaurosis, ambliopia, neu-ralgias oculares. D. En fricciones en las sienes y frente. Se empie-za por el numero 1. Terrier pre-fiere la pomada de veratrina.

8517. S. DE EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA ó Hidrolado de extracto de zarzaparrilla.

℥ Extracto hidroalcohó-lico de zarzaparrilla. ℥j (4 gr.).

Agua pura. ℥vj (500 gr.).

Se disuelve el extracto en el agua, y se filtra por un papel.

I. Enfermedades venéreas, reu-matismo, etc.

Nota. ℥xij (375 gr.) de esta pre-paracion representan ℥j (30 gr.) de zarzaparrilla

SONDAS.

8518. SONDAS.

Solo se diferencian de las candelillas en que son huecas y están abiertas por los dos extremos. Se preparan con tegidos de seda su-mergidos diferentes veces en una mezcla de una parte de aceite de linaza hecho secante por el litargi-rio, la tercera parte de sucino, la

cuarta parte de aceite de tremen-tina y una vigésima de caoutchu.

Se las deja secar al aire ó en la estufa y se las pulimenta con pie-dra pomez.

Recientemente Charrière las ha preparado con marfil elástico, es decir, con marfil privado de gran parte de su principio solidificable (el fosfato de cal) por medio del ácido clorhídrico. V. *Candelillas.*

SUEROS.

8519. SUERO PREPARADO (F. E.).

℥ Leche recién ordeñada, c. s.

Se la mezcla poco á poco con flor de cardo, ó con cualquier ácido

vegetal, en una vasija de barro vidriada á fuego lento para que se cuaje la leche. Se echa en una manga para que filtre el suero, y se cuela dos ó tres veces.

8520. S. CLARIFICADO (F. E.).

℥ Suero extraído del modo anterior. . . ℥xij (375 gr.).
Crémor de tártaro muy puro y pulver. ℞B (6 dec.).

Se diluye perfectamente una clara de huevo en un poco de suero y se añade el crémor al resto del suero que estará al fuego; cuando empieza á hervir se añade la porcion de suero con la clara de huevo fria.

Se cuele por una manga, y si el líquido colado no estuviere bastante claro se vuelve á colar el suero cuando esté frio.

D. ℥vj á ℥xij (180 á 375 gr.).

8521. SUERO.

Gay ha recomendado el siguiente método para preparar pronto el suero.

Se bate una clara de huevo en un poco de agua, se añade sucesivamente dos cuart. (1 lit.) de leche y ℥vj (24 gr.) de vinagre bueno ó c. s. de una solución de ácido tártrico, agitando sin cesar. Se calienta hasta la ebullicion, se vierte un poco de agua fria para calmar el hervor, se echa sobre una estameña y se filtra.

8522. Otro (F. F.).

℥ Leche de vacas pura. 2 cuart. (1 lit.).

Se calienta la leche hasta que cueza, y se añade por partes c. s. de una solución hecha con

Acido tártrico. 4
Agua. 8

Cuando esté bien formado el coágulo, se cuele sin expresion; se pone el suero al fuego con media clara de huevo, que estará desleida y batida en algunas cucharadas de agua fria; se hace hervir; se echa un poco de agua fria para cortar el hervor; se cuele

por una estameña, y por último se filtra por un papel lavado antes en agua hirviendo. Se puede coagular la leche con otros ácidos y principalmente con el vinagre, del que solo debe echarse la cantidad necesaria, y mejor aún con el cuajo.

El *cuajo líquido* puede componerse de

Cuajo reciente. . . . ℥xij (375 gr.).
Cloruro de sodio,
Alcohol á 31° C., añ. ℥ij (60 gr.).
Vino blanco. 8 cuart. (4 lit.).

Se digiere durante veinticuatro horas y se filtra.

Una cucharada de café basta para cuajar dos cuartillos de leche.

El suero es una bebida atemperante y laxante que se prescribe en las enfermedades inflamatorias y sobre todo en las del conducto digestivo, en las enfermedades cutáneas sifilíticas, hemorragias pulmonares pasivas, hematuria, afecciones hemorroidales asténicas, etc. Comunmente se le asocia al jarabe de violetas y sirve de vehículo á medicamentos mas activos.

El cuajo es la leche cuajada que se saca del estómago de los terneros de poca edad, se sala y se deseca mas ó menos para conservarle.

8523. POLVO PARA SUERO.

℥ Sal comun. ℥ij (64 gr.).
Azúcar de leche. . . . ℥jv (125 gr.).
Nitro,
Alumbre, añ. ℥ij (8 gr.).
M. Sirve para preparar el suero artificial.

8524. S. ARTIFICIAL.

℥ Polvo para suero. . ℥iij (12 gr.).
Agua. ℥bij (1000 gr.).
Se disuelve y se añade:
Vinagre,
Jarabe de espino ser-
val, añ. ℥xviij (1 gr.).

8525. S. FACTICIO.

- ℥ Azúcar de leche. . . . ℥iij (90 gr.).
 - Cloruro de sodio. . . . ℥ij (60 gr.).
 - Nitrato de potasa. . . . ℥℔ (45 gr.).
 - Goma arábica en p. ℥℔ (45 gr.).
 - Azúcar en polvo. . . . ℔℔ (250 gr.).
 - Flores de alazor en p. ℔℔ (2 gr.).
- Mézclense exactamente S. A. para hacer un polvo homogéneo; entonces se toma del
- Polvo precedente. . . . ℥ij (8 gr.).
 - Vinagre. ℔℔ (2 gr.).
 - Agua filtrada. ℔℔j (500 gr.).
- H. S. A.

8526. Otro, n. 2.

- ℥ Sal marina. ℥jv℔ (140 gr.).
 - Azúcar de leche. . . . ℥jv (125 gr.).
 - Nitro. ℥ij℔ (80 gr.).
 - Alumbre. ℥ij℔ (10 gr.).
- Mézclese.

Por otra parte se toma

- Jarabe simple. . . . ℥jv (125 gr.).
- Vinagre blanco. . . . ℔℔ (45 gr.).
- Jarabe de espino ser-
val. ℥ij (8 gr.).

Para obtener dos quart. (1 lit.) de suero, se añade c. s. de agua, ℔℔℔ (6 gr.) de la mezcla salina y ℔vj (24 gr.) de la mezcla del jarabe.

I. Flegmasías, absceso.

8527. S. ALUMINOSO (F. P.).

- ℥ Suero clarificado. 1000
 - Alumbre. 46
- Se deja coagular la leche, y se cuele.

I. Hemorragias pasivas, diarreas crónicas, púrpura hemorrágica, flujos crónicos, hemorragias uterinas. D. Se bebe frío á tacitas cada dos horas.

Se le puede hacer aromático añadiendo ḡxv (75 cent.) de polvo de canela, que se endulza según se quiere, y se usa en los mismos casos y en la angina, albuminuria, hemotisis y metrorragia. D. Hasta ℥jv (125 gr.).

8528. S. ALUMINOSO AROMATIZADO.

- ℥ Alumbre en polvo. ℔j (4 gr.).
- Azúcar de leche. . . . ℔℔ (2 gr.).
- Canela en polvo. . . . ḡxviiij (4 gr.).
- Leche de vacas. . . . ℥xviij (530 gr.).

Se hierva, se cuele después de coagulado y se añade

Azúcar. c. s.

I. Hemorragias uterinas. D. En dos tomas, mañana y noche.

8529. S. ANTIESCORBÚTICO ó Suero de coclearia.

- ℥ Zumo de coclearia. . . . ℥jv (125 gr.).
- Leche de vacas. . . . ℔℔j (500 gr.).

Se cuece y se cuele después de coagulado.

I. Escrófulas, escorbuto. D. A tazas pequeñas al día.

Se puede usar el zumo antiescorbúutico en lugar del de coclearia.

8530. S. ANTIESCORBÚTICO (Boerhaave).

- ℥ Acederilla,
Betónica, ãã. un puñado.
- Claveles. 1/2 puñado.
- Tamarindos. ℥j℔ (45 gr.).

Se infunde durante una hora en caliente en

Suero clarificado. . . . ℔iiij (4500 gr.).

Se cuele y se añade:

- Jarabe de limones,
- Jar. de violetas, ãã. . . . ℥j℔ (45 gr.).

D. Dos ó tres cucharadas cada media hora.

8531. S. APERITIVO (Desbois de Rochefort).

- ℥ Acetato de potasa. . . . ℔j (4 gr.).
- Nitro. ℔℔ (2 gr.).
- Zumo de borraja. . . . ℥ij (60 gr.).

Se añade á la solución

Suero clarificado. . . . ℔iiij (1000 gr.).

I. Obstrucciones de las vísceras abdominales, hidropesía, ictericia,

acrodinia, cálculos. *D.* Una taza mañana y noche.

8532. S. CALIBEADO.

℥ Suero, c. s.

Se extingue en él muchas veces un hierro hecho ascua.

I. Amenorrea, leucorrea, clorosis. *D.* A medias tazas.

8533. S. EMETIZADO.

℥ Emético. ḡß á ḡj (25 á 50 mil.).

Suero. ℔j (500 gr.).

I. Laxante ligero, útil en la apoplejía y afecciones comatosas. *D.* A tazas en las veinticuatro horas.

8534. S. GASEOSO.

℥ Suero clarificado. ḡxx (625 gr.).

Gas ácido carbónico, seis veces el volúmen del suero.

Se usa como diluente y refrigerante; facilita la evacuación de las flemas y mucosidades del estómago.

8535. S. GASEOSO Y PURGANTE.

Su composición es idéntica al del anterior, pero contiene

Cremer de tártaro soluble. ḡß á ḡj (15 á 30 gr.).

Es purgante y conviene á las personas de constitución débil.

8536. S. NITRADO.

℥ Sal de nitro. ḡxviiij (1 gr.).

Suero clarificado. ℔ij (1000 gr.).

D. Se da á tazas en diferentes veces al día. Es diurético y refrigerante.

El SUERO NITRADO DE LOS H. DE M. se compone de ℔j (12 dec.) de nitrato de potasa, y ḡxij (375 gr.) de suero simple. *D.* En dos tomas.

8537. S. PURGANTE.

℥ Maná. ḡj (30 gr.).

Crémor de tártaro. ḡß (15 gr.).

Pulpa de tamarindos. ḡj (30 gr.).

Se disuelven en

Suero clarificado. ℔j (500 gr.).

I. Catarros, bronquitis, neumonía crónica, otalgia, escrófulas.

D. A medias tazas.

8538. Otro (H. DE AL.).

℥ Maná. ḡj (30 gr.).

Crémor de tártaro. ḡß (15 gr.).

Suero clarificado. ḡvj (180 gr.).

M. D. Se da en dos ó tres veces, dejando dos horas de intervalo entre cada toma.

8539. S. SINAPISADO.

℥ Semillas de mostaza

machacada. ḡj (30 gr.).

Leche de vacas. ḡxij (375 gr.).

Se cuece hasta que se separe el caseo, se cuele y se evapora el suero.

I. Gota, parálisis, artrodinia, hidropesía pasiva, escorbuto, escrófulas. *D.* ḡxij á ḡxxjv (375 á 750 gr.) á tazas.

8540. S. TAMARINDADO.

℥ Suero clarificado. ℔j (500 gr.).

Tamarindos. ḡj á ḡij (30 á 60 gr.).

Se ponen los tamarindos en una vasija de Talavera, se echa sobre ellos el suero hirviendo, se deja en infusión agitándolo de cuando en cuando hasta que esté frío, y se cuele por una bayeta.

Se usa como atemperante y laxante suave á la dosis de ḡvj á ḡviiij (180 á 250 gr.).

I. Afecciones febriles, inflamaciones, plétora, neumonía, ictericia, metritis. *D.* A vasos.

El SUERO TAMARINDADO DE LOS H. DE M. se compone de ḡß (15 gr.) de tamarindos y ḡxij (375 gr.) de suero simple. Se hierve ligeramente los tamarindos y se cuele. *I.* Se usa como purgante minorativo y refrigerante. *D.* En dos tomas.

8541. S. DE VAN SWIETEN ó Suero aperitivo de Van Swieten.

- ℞ Taraxacon,
 - Fumaria,
 - Berro,
 - Perifollo, ãã. ʒijʒ (10 gr.).
 - Suero. lbij. (1000 gr.).
- Se hierve y se añade
- Tartrato de potasa y sosa. ʒxc (5 gr.).
 - Miel. ʒv (20 gr.).

I. Infartos de las vísceras abdominales, hidropesía é ictericia. *D.* A vasos mañana y noche.

8542. S. DE WEISS REFORMADO.

- ℞ Foliculos de sen,
- Sal de Epsom, ãã. . . ʒʒ (2 gr.).
- Sumidades de hipericon,
- Sumidades de cuajaleche,
- Flor de saúco, ãã. . . ʒj (12 dec.).
- Suero hirviendo. . . lbj (500 gr.).

Se infunde y se cuele el líquido. La fórmula siguiente ha sido publicada por Zanetti que la tenia de la viuda de Weiss.

- Raiz de aristoloquia larga,
- Raiz de helecho macho,
- Calénd. de viñas, ãã: ʒjv (125 gr.).
- Hójas de verbena,
- Hojas de betónica,
- Hojas de vinca,
- Flores de sérpol,
- Flores de tilo,
- Flores de cuájaleche,
- Flores de primavera,

- Flores de laureola,
- Flores de hipericon,
- Muérdago de encina,
- Raiz de paciencia,
- Raiz de escrofularia, ãã. ʒij (64 gr.).
- Sen ʒvjʒ (208 gr.).

Se reduce el sen á polvo fino, y las demás sustancias á polvo grueso. Se infunden ʒij (8 gr.) de estos polvos en dos vasos de suero, á los cuales se añade ʒj (4 gr.) de sulfato de magnesia.

Se alaba este remedio como un excelente antilácteo. Se continúa su uso durante veinte ó treinta días; se purga al enfermo hácia el medio y al fin del tratamiento.

Además se ha empleado en las enfermedades de la piel, y como purgante y sudorífico en el puerperio, destete, mareo, enagenacion, tisis. *D.* Se toma por la mañana en tres ó cuatro dosis.

8543. S. VINOSO (Swediaur).

- ℞ Leche,
- Agua, ãã. lbij (1000 gr.).
- Vino blanco. ʒjʒ (45 gr.).

Se hierve, se cuele y se clarifica.

8544. S. VINOSO (J. P. Frank).

- ℞ Suero. lbij (1000 gr.).
 - Vino bl. generoso. . lbʒ (250 gr.).
- Mézclese.

SUPOSITORIOS, CALAS.

8545. SUPOSITORIO ALOÉTICO ó Cala aloética.

- ℞ Manteca de cacao. . . ʒij (8 gr.).
 - Acibar. ʒxviiij (1 gr.).
- H. S. A. un supositorio, que se usa para provocar el flujo hemorroidal.

8546. S. ANODINO ó Cala anodina (H. DE M.).

- ℞ Miel. ʒj (30 gr.).
- Se cuece hasta que adquiriera la debida consistencia y se añade
- Opio. ʒij (10 cent.).
- Se deslíe el opio, reducido á polvo, en un poco de agua; se añade

la miel, y se hierva la mezcla hasta que por el enfriamiento resulte de consistencia quebradiza. Entonces se vierte sobre una losa de mármol untada ligeramente con aceite; se da á la masa la forma triangular; se coloca en su centro una cuerda mas larga que la cala, terminada en un nudo grueso la parte de aquella que ha de quedar envuelta por la masa, y despues se juntan los lados del triángulo, se da un movimiento de rotacion y queda preparada la cala. Esta operacion debe hacerse con rapidez, pues de lo contrario la masa se enfria demasiado, y no se podria manejar.

Puede prepararse tambien dando á la materia la indicada consistencia, y vertiéndola en un molde cónico de papel untado con aceite, en el que se ha colocado de antemano la cuerda.

8547. S. ANTIESPASMÓDICO ó
Cala antiespasmódica.

℞ Polvo de castóreo. ʒβ (2 gr.).
Manteca de cacao. ʒij (8 gr.).
H. S. A. un supositorio.

Si se pone ʒj (5 cent.) de extracto de opio en lugar del castóreo, se tiene un *supositorio calmante*.

8548. S. ANTIHELMÍNTICO ó *Cala antihelmintica.*

℞ Miel cocida hasta la consist. necesaria. ʒjv (125 gr.).
Acibar. ʒβ (15 gr.).
Vitriolo de marte. . . ʒij (8 gr.).

H. S. A. supositorios de ʒxij (6 dec.) de peso. Se conservan despues de untados de aceite y secos.

Se aplican á los niños despues de haber hecho deposiciones de vientre.

8549. S. ANTIHELMÍNTICO.

℞ Acibar sucotrino,

Hidroclorato de sosa,
Raiz de ásaro, ãã. ʒxx (10 dec.).
Coloquintida. ʒv (25 cent.).
Miel. c. s.

H. S. A. una pasta firme á que se da la figura de cono.

I. Afecciones verminosas. D. En aplicaciones al ano.

8550. CALA ANTIHELMINTICA
(H. DE M.).

℞ Acibar sucotrino en polvo. ʒij (8 gr.).
Polvos de raiz de ásaro. ʒij (8 gr.).
Cloruro de sodio en polvo. ʒj (12 dec.).
Miel. ʒij (60 gr.).

Se da á la materia la consistencia debida, y se forman calas del peso de ʒxij á ʒxv (60 á 75 cent.).

I. Ascárides.

8551. S. ANTIHELMINTICO
(*Swediaur*).

℞ Acibar sucotrino. ʒβ (15 gr.).
Sal comun. ʒiij (12 gr.).
Harina. ʒij (8 gr.).
Miel. c. s.

Se forma una pasta firme, que se modela en forma de cono.

8552. S. ASTRINGENTE.

℞ Extracto de ratania. ʒ
Cera blanca. ʒ
Manteca de cacao. ʒ

8553. Otro (REUSS).

℞ Corteza de roble,
Tormentila en polvo, ãã. ʒij (8 gr.).
Miel. c. s.

H. S. A. ocho supositorios.

I. Caída del recto y atonía de este intestino despues de las hemorragias. Hemorroides.

8554. S. ASTRINGENTE OPIADO.

℞ Corteza de encina en polvo,

Tormentila, ãã. ʒij (8 gr.).
 Extracto de opio. ʒjv (20 cent.).
 Miel. c. s.
 H. S. A. ocho supositorios.
 I. Caida del recto, atonia de este intestino, hemorroides.

8555. S. CALMANTE.

ʒ Opio. ʒij (10 cent.).
 Jabon medicinal. ʒj (4 gr.).
 Mézclese íntimamente.

8556. Otro, n. 2.

ʒ Extracto de opio. ʒj (5 cent.).
 Manteca de cacao. ʒijʒ (10 gr.).
 H. S. A. un supositorio.

8557. S. CARMINATIVO.

ʒ Hiel de vaca. ʒjʒ (45 gr.).
 Nitro. ʒʒ (15 gr.).
 Jabon. ʒjv (120 gr.).
 Cogucho. ʒij (60 gr.).
 H. S. A. supositorios.

I. Se usan para provocar las deposiciones y la salida de ventosidades.

8558. S. DE CICUTA.

ʒ Cera. ʒxviii (1 gr.).
 Manteca de cacao. ʒj (4 gr.).
 Extracto de cicuta. ʒxviii (1 gr.).

Se ablanda el extracto, y se añade á la materia al tiempo de colarle.

Del mismo modo se preparan los supositorios con EXTRACTO DE RATANIA.

8559. S. COMUN, Cala comun ó Cala comun de miel (F. E.).

ʒ Miel. ʒij (60 gr.).
 Se cuece á fuego lento hasta que se ponga dura, y cuando está acabando de cocer se añade :

Cloruro de sodio pulverizado (sal comun). ʒij (8 gr.).
 Se mezclan muy bien, y sobre

una tabla ó piedra untada de aceite se forman dos calas cónicas, pendientes de un hilo doble.

I. Se usa para promover evacuaciones alvinas, estimulando ligeramente el intestino recto.

La CALA COMUN DE LOS H. DE M. contiene ʒj (4 gr.) de muriato de sosa y ʒjʒ (45 gr.) de miel.

8560. S. CONTRA LAS HEMORROIDES.

ʒ Manteca de vacas fresca. ʒij (8 gr.).
 Corcho quemado,
 Cera, ãã. ʒj (4 gr.).
 H. S. A. tres supositorios.

8561. S. DE COPAIBA (Colombat).

ʒ Bálsamo de copaiba sólido,
 Manteca de cacao; ãã. ʒj (4 gr.).
 Extracto de opio. ʒʒ (25 mil.).
 Se prepara un supositorio. Se aplica uno por la mañana y otro por la noche contra la blenorrea y leucorrea crónicas.

8562. S. EMENAGOGO (Trousseau).

ʒ Manteca de cacao. ʒij (8 gr.).
 Acíbar. ʒij (1 dec.).
 Castóreo,
 Asa fétida, ãã. ʒx (5 dec.).
 Se usa muchas veces al dia en la época presumida de las reglas.

8563. S. EMOLIENTE.

ʒ Manteca de cacao. 1
 Esperma de ballena. 1
 ó Cerato sólido. 1
 H. S. A. I. Hemorroides muy dolorosas.

8564. S. IRRITANTE ó Cala irritante (F. E.).

ʒ Miel cocida hasta que esté dura. ʒj (30 gr.).

Polvo de coloquintida. . . ʒʒ (2 gr.).
 Polvo de mur. de sosa. . . ʒj (4 gr.).
 Se mezcla y sobre una tabla ó piedra untada de aceite se hace una cala.

I. Se usa en la apoplejía y conmociones cerebrales.

La CALA IRRITANTE DE LOS H. DE M. se compone de ʒʒ (2 gr.) de polvo de coloquintida, ʒij (24 dec.) de sal comun y ʒjʒ (45 gr.) de miel. H. S. A. una cala.

8565. S. DE JABON ó *Cala de jabon.*

Se prepara con un cuchillo cortando en forma de cono un pedazo de jabon medicinal.

Se usa como laxante.

8566. S. LAXANTE.

ʒ Extracto de ruibarbo. ʒʒ (2 gr.).
 Jabon. ʒij (12 gr.).
 Jalapa en polvo. c. s.
 H. S. A. un supositorio.
I. Estreñimiento en los niños.

8567. *Otro*, n. 2.

ʒ Jabon medicinal. ʒij (60 gr.).
 Sal comun. ʒj (30 gr.).
 Miel espesa. c. s.

M. y prepárense S. A. conos del grosor conveniente, que se introducen en el ano.

I. Promueven evacuaciones de vientre.

8568. S. DE MANTECA DE CACAO.

ʒ Manteca de cacao. c. s.
 Se liquida y echa en moldes de cartas.

8569. *Otro*, n. 2.

ʒ Manteca de cacao. . . ʒjv (120 gr.).
 Se funde y se añade
 Extracto de belladona. ʒx (50 cent.).
 Extr. gomoso de opio. ʒij (10 cent.).
 H. S. A. cuatro supositorios.

I. Hemorroides, fistulas del ano.
D. Se introduce en el recto.

Se pueden incorporar á este supositorio copaiba, extracto de ratania, etc., segun las indicaciones.

8570. S. MERCURIAL.

ʒ Manteca de cacao. . . ʒij (12 gr.).
 Ungüento mercurial. . ʒjʒ (6 gr.).
 Cera. ʒjʒ (6 gr.).

8571. S. DE MERCURIO DULCE.

ʒ Mercurio dulce. ʒij (12 gr.).
 Manteca de cacao,
 Cera, añ. ʒjʒ (6 gr.).
 H. S. A. un supositorio.

8572. S. PARA CALMAR LOS DOLORES HEMORROIDALES.

ʒ Manteca de cacao. . . . ʒij (8 gr.).
 Extracto gomoso de opio,
 Extracto de estram., añ. ʒj (5 cent.).
M. Se introduce dos veces al dia en el recto para calmar las hemorroides.

8573. S. PARA PROVOCAR LAS HEMORROIDES.

ʒ Acíbar en polvo,
 Sal gemma, añ. ʒj (12 dec.).
 Polvo de coloquintida. ʒv (25 cent.).
 H. S. A. un supositorio.

8574. *Otro* (Trousseau).

ʒ Manteca de cacao. ʒj (4 gr.).
 Tártaro emético. ʒij, ʒjv ó ʒvj (15, 20 ó 30 cent.).
 H. S. A. Es muy eficaz para producir la aparicion de los tumores hemorroidales.

8575. S. PURGANTE ó *Cala purgante.*

ʒ Manteca de cacao. ʒj (4 gr.).
 Aceite de tártago. 7 gotas.
 H. S. A. un supositorio. Se usa

cuando no puede administrarse interiormente el aceite de tártago.

del fruto de belladona es mucho mas activo que el de las hojas.

8576. S. PURGANTE.

- ℞ Coloquintida en polvo. 2
- Sal comun. 4
- Miel espesa. 30

Se forma un cono que se introduce en el recto, y se le deja hasta que determine una deposicion.

8577. Otro, n. 2.

- ℞ Acíbar,
 - Cloruro de sodio, añ. ḡxviiij (4 gr.).
- Se pulverizan juntos, se incorporan con c. s. de miel, se cuece y se hace un supositorio en un molde cónico de papel; se deja enfriar.

8578. S. DE UNGUENTO POPULEON ó Supositorio calmante (Labordette).

- ℞ Cera blanca. ʒß (16 gr.).
- Ungüento populeon. . . ʒx (40 gr.).
- Extracto de belladona. . ḡxc (5 gr.).
- ♃ Rob de belladona. . . ḡxc (5 gr.).

H. S. A. diez supositorios.
I. Son útiles en las hemorroides.
Labordette dice que el extracto

8579. S. DE SULFATO DE QUININA (Boudin):

- ℞ Sulfato de quinina. . ḡxviiij (4 gr.).
 - Manteca de cacao. . ʒjß (6 gr.).
- Incorpórese.

Se usa cuando el estómago no soporta el sulfato de quinina y el recto no retiene las lavativas, ó cuando no hay tiempo para aguardar la absorcion de la pomada febrífuga.

8580. S. VAGINAL (Gaudriot).

- ℞ Cloruro de zinc líq. 5 gotas.
 - Sulfato de morfina. . ḡß (25 mil.).
- Se pista convenientemente con ʒij (8 gr.) de la mezcla siguiente:
- Mucilago espeso de goma tragac. 6
 - Azúcar en polvo. 3
 - Almidon. 9

Mézclase exactamente, y amóldese de modo que el supositorio sea hueco, y solo tenga dos miligramos de espesor.

I. Su inventor dice que cura muy pronto la blenorragia simple de la uretra y de la vagina, y dilata la uretra.

TABLETAS. V. PASTILLAS.

TAFETANES. V. PAPELES.

TEES.

8581. TÉ DE ABEJAS CONTRA LA ESTRANGURRIA Y RETENCION DE ORINA (Gordon).

Se hacen caer cuarenta abejas en un vaso de agua para mane-

jarlas mejor; se las pone en una taza, y se echan encima siete cuartillos y medio de agua hirviendo, y se cubre la vasija. A los veinticuatro minutos se decanta el líquido y se le da al enfermo, que debe tragarlo de una vez.

8582. T. HEMOSTÁTICO
(*Pierquin*).

- 2/ Rosas sin abrir mon-
dadas. 3B (16 gr.).
 - ó Rosas secas. 3ij (8 gr.).
 - Vinagre blanco, c. s. 3Ljv (3 gr.).
 - Azúcar. 3j (32 gr.).
 - Agua hirviendo. . . . 1bij (1000 gr.).
- Se infunde durante dos horas y se cuele.

I. Hemacelinosis, hemorragias, diarreas, etc. D. A tazas en el dia.

8583. T. PECTORAL (*Boerhaave*).

- 2/ Raiz de alelí de mon-
taña. 3ij (60 gr.).
 - Raiz de regaliz. . . . 3jB (45 gr.).
 - Verónica,
 - Yedra terrestre, ãã. . un puñado.
 - Flores de hipericon. . . 3 pulgaradas.
 - Flores de centaurea me-
nor. 2 pulgaradas.
 - Semillas de hinojo. . . 3iij (12 gr.).
- Macháquense y mézclense.

I. Se le ha recomendado en la tisis pulmonar. Se usa del mismo modo que el té, y se le dulcifica con miel purificada. D. Tres ó cuatro tazas al dia.

8584. T. TUNKA.

- 2/ Flores de meliloto. . . 3iij (90 gr.).
 - Flores de manzanilla,
 - Flores de saúco,
 - Hojas de botris, ãã. . . 3j (30 gr.).
- Se maceran durante ocho dias en dos cuartillos (1 lit.) de alcohol á

veinte grados, se cuele y despues se mezcla de la

- Tintura anterior. 4
- Jarabe de culantrillo. 2

I. Es estomacal y antiespasmódico, y puede reemplazar á las tisanas en las enfermedades asténicas; es bueno en las indigestiones, dolores reumáticos, vapores y retardo de las reglas. D. Una cucharadita de café por taza de agua caliente.

8585. T. SUIZO (F. F.).

- 2/ Hojas y sumidades de ajenos. . . 4
- Hojas y sumidades de betónica. . . 4
- Hojas y sumidades de búgula. . . 4
- Hojas y sumidades de calamita. . . 4
- Hojas y sumidades de camedrios. . 4
- Hojas y sumidades de hisopo. . . 4
- Hojas y sum. de yedra terrestre. . 4
- Hojas y sumidad. de milenrama. . 4
- Hojas y sumidades de orégano. . . 4
- Hojas y sum. de yerba doncella. . 4
- Hojas y sumidades de romero. . . 4
- Hojas y sumidades de sanicula. . . 4
- Hojas y sumid. de escolopendra. . 4
- Hojas y sumidades de salvia. . . . 4
- Hojas y sumidades de escordio. . . 4
- Hojas y sumidades de tomillo. . . 4
- Hojas y sumidades de verónica. . . 4
- Flores de arnica. 4
- Flores de egnafalio. 4
- Flores de escabiosa. 4
- Flores de tusilago. 4

Se mezclan y se guardan para el uso.

Se usan en infusion como vulnerarias, y contra las conmociones, contusiones, etc.

TELAS.

8586. TELA EMPLÁSTICA
IMPERMEABLE (*Dedé*).

- 2/ Goma arábica quebrantada. . . . 4
- Azúcar blanca. 2
- Aceite comun. 2
- Agua comun. 5

Se disuelve la goma en el agua fria, se añade el azúcar, se cuele la solucion por una tela muy tupida, se mezcla el aceite con la solucion agitando vivamente en un mortero de mármol, hasta que la mezcla esté lo mas blanca posible.

Se extiende esta mistura por medio de un pincel plano sobre un pedazo de calicó bien estirado, y se aplican tres capas, aguardando á que la anterior esté bien seca.

Esta tela se adhiere muy bien cuando se la ha mojado un poco, es poco costosa, y se la debe preferir al baldés para preparar los escudos.

8587. T. VEJIGATORIA (Garoste).

- ℥ Pez negra purificada. ℥jv (125 gr.).
 - Cera blanca. ℥j (30 gr.).
 - Cantáridas en polvo fino. ℥ij (60 gr.).
 - Esencia de trementina. ℥℔ (15 gr.).
 - Aceite comun. ℥ij (8 gr.).
- H. S. A. Esta tela es bastante vexicante.

TINTURAS.

8588. TINTURA DE ACEITE DE CROTON TIGLIO.

- ℥ Aceite de croton tiglio. . 18 gotas.
 - Alcohol rectificado. . . . ℥j (30 gr.).
- H. S. A. D. Veinte gotas en una taza de tisana de harina de avena. Pope preparaba esta tintura con Semillas mondadas. 4
Alcohol. 12
- Esta tintura es mucho mas fuerte.

8589. ACEITE VOLÁTIL DE LIMON (Deschamps de Avallon).

- ℥ Esencia de limon puro. ℥j (4 gr.).
 - Alcohol absoluto. . . . ℥iij (12 gr.).
- Mézclese.
- Una gota sirve para ℥jv (125 gr.) de jarabe para aromatizar. Deschamps de Avallon recomienda este alcoholado para aromatizar los jarabes muy ácidos al tiempo de venderlos, con lo que no hay que temer la accion del ácido sobre el aceite volátil, porque necesita muchos dias para que el ácido modifique los elementos del aceite volátil.
- Del mismo modo se prepara el alcoholado de ACEITE VOLÁTIL DE NARANJA, etc.

8590. T. DE ACETATO DE ESTRICNINA (Radius).

- ℥ Acetato de estriquina. : ℥ij (1 dec.).

Alcohol. ℥℔ (15 gr.).
Disuélvase.
I. Dolores osteocopos. D. Veinte á treinta gotas por la noche, tres ó cuatro veces.

8591. T. ETÉREA DE ACETATO DE HIERRO ó Eterolado de acetato de hierro (Beral).

- ℥ Acetato de peróxido de hierro. . . 4
 - Eter acético. 4
- Se mezclan, se deja obrar durante cuarenta y ocho horas, y se filtra S. A.
- Nota. Este éter acético ferrurado tiene un color rojo muy oscuro, se disuelve en parte en el agua y no la enturbia.
- I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, etc. D. De veinte á treinta gotas en una pocion apropiada.

8592. T. DE ACETATO DE HIERRO ó Alcoholado de acetato de hierro (Beral).

- ℥ Alcohol de 22°. . . . ℥xjv (440 gr.).
 - Acetato de peróxido de hierro cristaliz. ℥ij (60 gr.).
- Se mezcla, se deja obrar durante cuarenta y ocho horas, y se filtra.
- Nota. Este medicamento es rojo, ácido, soluble en el agua é inalterable por la accion del aire.
- I. Escrófulas, clorosis, amenor-

rea, dismenorrea, leucorrea, etc. *D.* ℥℔ á ʒj (6 dec. á 4 gr.) en una pocion ó bebida apropiada. V. página 214 del tomo I.

8593. T. DE ACETATO DE MORFINA, *Alcoholado de morfina, alcohol ó tintura de morfina, solucion alcohólica de morfina.*

℥ Acetato de morfina. 4
Alcohol de 56° c. 40
Disuélvase:

Esta tintura contiene ĩij (1 dec.) de acetato de morfina por ʒj (4 gr.) de alcohol, como la solucion acuosa de morfina; pero se conserva mejor que esta última. *D.* La misma que los láudanos.

8594. T. DE ACIBAR (F. DE L.).

℥ Acíbar en polvo. ʒj (32 gr.).
Extracto de regaliz. ʒiij (96 gr.).
Agua destilada. ʒxxx (625 gr.).
Espír. de vino rectific. ʒx (320 gr.).
Se macera durante catorce dias y se filtra.

I. Tiene las mismas propiedades que el acíbar. *D.* ʒiij á ʒj (12 á 30 gr.).

8595. T. ETÉREA DE ACIBAR.

℥ Acíbar sucotrino,
Mirra, ãã. ʒiij (12 gr.).
Azafran. ʒij (8 gr.).
Eter sulfúrico alcohó-
lizado. ʒiij (100 gr.).

I. Pleuresia, disenteria, histérico y lepra. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en una pocion antiespasmódica.

8596. T. ALCOHÓLICA DE ACÍBAR COMPUESTA. *ó Elixir de propiedad (F. E.).*

℥ Acíbar sucotrino,
Mirra, ãã. ʒj (30 gr.).
Azafran contundido. ʒ℔ (15 gr.).
Alcohol. ʒxviiij (560 gr.).
Se digieren por ocho dias en un

frasco de cristal bien tapado, agitando de cuando en cuando, y se filtra.

I. Atonía de los órganos digestivos, dispepsia, lombrices intestinales, escorbuto, enfermedades malignas, calenturas intermitentes, etc. Facilita la digestion y regulariza las deposiciones en las personas que están habitualmente estreñidas. *D.* ℥℔ á ʒ℔ (6 dec. á 2 gr.)

8597. T. DE ACIBAR COMPUESTA *ó Droga amarga (Virey).*

℥ Acíbar sucotrino. . ℔j (500 gr.).
Mirra,
Almáciga,
Benjuí, ãã. ℔℔ (250 gr.).
Raices de colombo,
Raices de angélica,
Raices de genciana,
Azafran, ãã. ʒjv (125 gr.).
Aguardiente. 36 c. (18 lit.).
Aguardiente de enebro de Holanda. ℔xij (6000 gr.).

Se maceran durante cuarenta dias y se filtra.

Se usa en la India contra el cólera morbo.

D. ʒ℔ á ʒj℔ (15 á 45 gr.).

Nota. Se emplean tambien contra el cólera morbo ochenta gotas de láudano en una mezcla de ʒij (60 gr.) de aguardiente y dos cucharadas de aceite de ricino.

8598. T. DE ACIBAR COMPUESTA (F. DE L.).

℥ Acíbar en polvo. ʒjv (125 gr.).
Azafran. ʒij (64 gr.).
Tintura de mirra. . ℔ij℔ (1250 gr.).
Se macera durante catorce dias y se filtra.

I. Es estomacal y purgante y se usa en la clorosis, ictericia, gota, etc. *D.* ʒ℔ á ʒj℔ (2 á 6 gr.) como estomacal, y ʒ℔ á ʒj℔ (15 á 45 gr.) como purgante.

8599. T. DE ACIBAR COMPUESTA
ó Elixir de larga vida (F. F.).

- ℥ Acibar sucotrino. ℥jx (36 gr.).
- Raiz de genciana,
- Raiz de ruibarbo,
- Raiz de zedoaria,
- Azafran,
- Agárico blanco,
- Triaca, ãã. ℥j (4 gr.).
- Alcohol de 21°. ℥lv (1728 gr.).

Se echa la mitad del alcohol sobre todas las sustancias convenientemente divididas, se macera durante ocho dias y se cuele con expresion: se echa sobre el residuo el resto del alcohol, se pone nuevamente en maceracion por ocho dias y se cuele, se mezclan los dos productos y se filtran.

Cada onza (30 gr.) contiene ℥xij (6 dec.) de acibar ó sea 1/48.

I. Dispepsia, escorbuto, calenturas intermitentes, caquexia, lombrices. Es tónica y estomacal á dosis cortas, y purgante á mayor cantidad. Facilita la digestion y regulariza las cámaras en las personas habitualmente estreñidas. *D.* ℥ß (6 dec.) á ℥ß (2 gr.) como tónico; y ℥j á ℥ij (4 á 60 gr.) como purgante, sola ó mezclada con agua, por la mañana en ayunas; ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.) como vermífugo y purgante. Exteriormente como deterativo en las úlceras indolentes, y de ℥j á ℥ijß (4 á 10 gr.) en lavativa como vermífugo.

8600. T. DE ACIBAR Y MIRRA.

- ℥ Tintura de acibar. 4
 - Tintura de mirra. 4
- M. D.* ℥j á ℥j (12 dec. á 4 gr.) dos ó tres veces al dia, como estomacal y excitante.

8601. T. DE ACONITINA.

- ℥ Aconitina. ℥x (50 cent.).

Alcohol rectificado. ℥ij (60 gr.).
H. S. A. I. Sordera, otitis, reumatismo. *D.* De diez á treinta gotas en fricciones en el pabellon, detrás de la oreja ó en inyecciones en el conducto auditivo. Se usa cada tres ó cuatro dias, alternando con las tinturas de veratrina y delfina.

8602. T. ETÉREA DE ACÓNITO.

- ℥ Hoj. frescas de acónito. ℥ij (60 gr.).
 - Alcohol. ℥iij (90 gr.).
 - Eter acético. ℥j (30 gr.).
- I.* Reumatismo, sordera, enagenacion, otitis. *D.* Treinta gotas y mas en una pocion.

8603. T. DE AJENJOS COMPUESTA.

- ℥ Sumidades de ajenjo mayor ℥j (30 gr.).
 - Sumidades de centaurea menor,
 - Quina,
 - Melisa, ãã. ℥ß (15 gr.).
 - Acibar. ℥j (30 gr.).
 - Cáscaras de limon,
 - Enebro, ãã. ℥ß (15 gr.).
 - Alcohol. ℥ij (1000 gr.).
- I.* Clorosis, calenturas intermitentes tercianas ó cuartanas, enuresis. *D.* ℥j (4 gr.).

8604. T. DE AJENJOS COMPUESTA,
Quinta esencia de ajenjos, elixir, esencia, tintura amarga ó alcoholado de ajenjos con clavo.

- ℥ Sumidades secas de ajenjo mayor. ℥j (30 gr.).
 - Sumidades secas de ajenjo menor. ℥j (30 gr.).
 - Clavo. ℥ß (15 gr.).
 - Azúcar. ℥ß (15 gr.).
 - Alcohol de 21° Cart. ℥ij (500 gr.).
- Se macera durante ocho dias, se cuele con expresion y se filtra.
- I.* Estomacal, carminativa y vermífuga. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

8605. T. DE AJENJO DE SUIZA
COMPUESTA (*Virey*).

- ☞ Sumidades de ajeno mayor. ℔j (500 gr.).
 Sumidades de ajeno menor. ℔℔ (250 gr.).
 Raiz de angélica,
 Raiz de cálamo aromático, añ. ℥j (30 gr.).
 Semillas de badiana. ℥℔ (15 gr.).
 Hojas de dictamo. ℥ij (8 gr.).
 Se macera durante ocho dias en Alcohol. ℔jx (4500 gr.).
 Se extrae por destilacion Alcoholato. ℔jv℔ (2250 gr.).
 Se añade:
 Esencia de anís verde. ℥j (4 gr.).

I. Dispepsia, leucorrea crónica, catarro útero-vaginal. *D.* ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) en medio vaso de agua azucarada ó vino.

8606. T. DE AJENJOS, Alcoholado
ó alcoholaturo de ajenjos (F. DE FERRARA).

- ☞ Extracto de ajenjos. 1
 Agua destilada de ajenjos. 8
 Alcohol. 8
 Ajenjos secos. c. s.

Se digiere á fuego lento durante ocho dias, se exprime fuertemente y se filtra.

I. Es tónica, amarga, estomacal y vermífuga; se usa en las calenturas tifoideas ó intermitentes, escrófulas, anasarca, tétanos, dispepsia. *D.* ℔j á ℥iij (12 dec. á 12 gr.).

8607. T. VINOSA DE EXTRACTO
DE AJENJOS COMPUESTA, ó *Elixir balsámico atemperante de Hoffmann* (F. E.).

- ☞ Extracto de ajenjos,
 Extracto de cardo santo,
 Extracto de centauro menor,
 Extracto de raiz de genciana, añ. ℥j (30 gr.).
 Cáscaras de naranja. ℥jv (125 gr.).

Vino blanco bueno. ℔j℔ (750 gr.).

Alcohol de cáscaras de naranja. ℥ij (60 gr.).

Se digiere S. A. por espacio de tres dias, agitando la mezcla de cuando en cuando hasta que se disuelvan los extractos; despues se filtra y guarda.

I. Dispepsia, anorexia, atonía de los órganos digestivos, convalecencia de las calenturas graves, calenturas intermitentes y lombrices intestinales. *D.* ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) solo ó dilatado en un vehiculo conveniente.

8608. T. ALCALINA, ALCOHOLADO
DE POTASA CARBONATADO, *Tintura de sal de tártaro, solucion alcoholica de carbonato de potasa.*

- ☞ Carbonato de potasa. ℥xviii (4 gr.).
 Alcohol á 90° c. ℥j (4 gr.).

Se calcina fuertemente la sal en un crisol, se la echa en un mortero caliente, se la pulveriza pronto y se vierte sobre ella el polvo aún caliente.

8609. T. ALCALINA DE ASAFÉTIDA
ó *Alcoholado de asa fétida alcalino.*

- ☞ Asa fétida,
 Subc. de potasa, añ. ℥ij (60 gr.).
 Aguardiente. ℥xij (360 gr.).

Se digiere durante tres dias á un calor fuerte y se filtra.

I. Es antihistérica y nervina. *D.* De quince á veinte gotas.

8610. T. DE ALCANFOR COMPUESTA
(F. DE L.).

- ☞ Alcanfor. ℔ij℔ (30 dec.).
 Opio duro en polvo,
 Acido benzóico, añ. ℥j (4 gr.).
 Aceite de anís. ℥j flúida. (4 gr.).
 Esp. de vino debil. ℔ij℔ (1250 gr.).

Se macera durante catorce dias y se filtra.

I. Anodina, que se usa en los catarros crónicos, asma crónico, tos, etc. *D.* ℥℔ á ℥j℔ (2 á 6 gr.).

**8611. T. DE ALMÁCIGA
COMPUESTA.**

℥ Alcohol rectificado. ℥xij (375 gr.)
Almáciga en lágrimas,
Mirra,
Incienso, añ. ℥β (15 gr.)

Se digieren hasta que parezca completa la solución y se filtra.

I. y D. Se usa, pero con precaución, para fortificar los pies y las manos que padecen sabañones y grietas.

**8612. T. ALEXIFARMACA DE HUX-
HAN ó Tintura alcohólica de quina
compuesta (F. E.).**

℥ Quina de Loja en polvo. ℥ij (60 gr.)
Corteza amarilla de naranja. ℥β (15 gr.)
Raíz de serpiente virgiana. ℥iij (12 gr.)
Azafran. ℥jv (48 dec.)
Cochinilla. ℥ij (24 dec.)

Después de quebrantadas todas estas sustancias, se las pone á macerar en una vasija bien tapada por espacio de cuatro días en ℔j (500 gr.) de espíritu de vino; después se filtra y se guarda para el uso.

I. Calenturas adinámicas y atáxicas, intermitentes pestilenciales y epidémicas, atonía del estómago. *D.* ℥ij á ℥β (8 á 15 gr.).

**8613. T. DE ALMENDRAS
AMARGAS (Horn).**

℥ Esencia de almendras amargas. ℥j (12 dec.)
Alcohol rectificado. ℥iij (12 gr.)

M. I. Neuralgias, principalmente la de la cara. *D.* Diez ó veinte gotas tres ó cuatro veces al día.

**8614. T. DE ALMIZCLE
ARTIFICIAL.**

℥ Aceite de succino. ℥β (2 gr.)

Acido nítrico. ℥j (4 gr.)
Alcohol. ℥j (30 gr.)

Se disuelve á fuego lento.

Se administran 40 gotas en

Agua de valeriana,
Jarabe de peonía, añ. ℥j (30 gr.)
I. Epilepsia, corea. *D.* A cucharadas de hora en hora.

**8615. T. AMARGA ó Elixir de
Stoughton.**

℥ Sumidades secas de ajénjos,
Sumidades secas de camedrios,
Genciana,
Cáscaras de naranjas amargas, añ. ℥vj (24 gr.)
Cascarilla. ℥j (4 gr.)
Ruibarbo. ℥β (16 gr.)
Acíbar. ℥j (4 gr.)
Alcohol de 21° Cart. ℔ij (1000 gr.)

Se macera durante quince días, se cuele con expresión y se filtra.

I. Enfermedades escrofulosas, atonía de las vías digestivas, dispepsia, anorexia, leucorrea, sífilides y helmintiasis. *D.* Se usa como excitante, estomacal y vermífugo, á la dosis de media á algunas dracmas, solo ó en un vehículo apropiado.

8616. T. AMARGA (F. A.).

℥ Hojas secas de trifolio fibrino. 35
Sumidades de centauro menor. 35
Raíz de genciana. 35
Cáscaras de naranja. 35
Carbonato de sosa. 47
Alcohol de 91° cent. 420
Agua de canela simple. 1680

Se macera por ocho días, y después de exprimida y filtrada se obtendrán 1680 partes.

**8617. T. AMARGA, Tintura de
ruibarbo y genciana (F. P.).**

℥ Tintura de ruibarbo. ℔iij (1500 gr.)
Alcohol de genciana compuesto. ℥vj (192 gr.)

I. Tónico del conducto intestinal, laxante. *D.* ℥β á ℥j (15 á 30 gr.) solo ó con algún vehículo.

8618. T. AMARGA, *Tintura de ajénjos compuesta, elixir amargo ó alcoholado de ajénjos compuesto.*

℥ Tintura de ajénjos. 5
Tintura amarga. 2
Tintura aromática. 1

M. I. Amarga, tónica, excitante, estomacal y carminativa. D. 3℔ á 3j (2 á 4 gr.).

8619. T. DE AMBAR BALSÁMICA (*Dippel*).

℥ Ambar gris,
Bálsamo del Perú, añ. 3j (4 gr.).
Subcarbon. de potasa. 3iij (12 gr.)
Se trituran exactamente y se añade poco á poco:

Alcohol rectificado. . 3jv℔ (18 gr.).

Se dan treinta gotas en

Agua de laurel real. . 3x (40 gr.).

Jarabe de morfina. . . 3v (20 gr.).

I. Trismo de los recién nacidos, histérico. D. Una cucharada de café de media en media hora.

8620. T. DE AMONIACO CON AMBAR, *Alcoholado de amoniaco y ámbar ó Alcohol amoniactal ambreado (Beral).*

℥ Alcoholado de amoniaco. 23
Tintura de ambar. 4
Mézclese.

8621. T. DE AMONIACO ANISADA, *Alcoholado de amoniaco anisado, Licor ó alcóhol amoniactal anisado, Espiritu de sal amoniaco anisado.*

℥ Alcohol á 90° cent. . 3vj (24 gr.).
Aceite volátil de anís. ʒxviiij (4 gr.).
Amoniaco líquido. . . 3j℔ (6 gr.).
Disuélvase.

I. Es estimulante y carminativa. D. ʒxviiij á 3j (1 á 4 gr.) en poción, bebida, jarabe, etc.

8622. T. AMONIACAL CANTARIDA *DA ó Alcohol amoniactal cantaridado.*

℥ Amoniaco líquido. . . . 3j℔ (6 gr.).

Esencia de trementina. ʒiij (12 gr.).

Tintura de cantáridas. . ʒj (30 gr.).

M. I. Hidropesía pasiva, anasarca, ceática, gota atónica, reumatismo crónico. D. Se dan fricciones en el perineo, en la region de los riñones y en los miembros.

8623. T. DE AMONIACO COMPUESTA (*F. DE L.*).

℥ Almaciga. ʒij (64 gr.).
Espír. de vino rectific. ʒjx (36 gr.).
Aceite de espliego. . ʒxjv (56 gr.).
Aceite de sucino. . . ʒ℔ (16 gr.).

Solucion fuerte de sal

amoniaco. ʒxx (625 gr.).

Se disuelve la almaciga en el espíritu, se decanta el licor para separarle del poso, se añaden las demás sustancias y se mezclan.

I. Es estimulante y antiespasmódica, útil en la coqueluche, histérico y afecciones nerviosas. D. ʒiij á 3v (12 á 20 gr.).

8624. T. DE AMONIACO CON ESPLIEGO *ó Alcoholado de amoniaco con espliego (Beral).*

℥ Alcoholado de amoniaco. 23
Aceite volátil de romero. 4
Se disuelve y se filtra.

8625. T. AMONIACAL JABONOSA *ó Alcoholado amoniactal jabonoso.*

℥ Amoniaco líquido. . . ʒxviiij (4 gr.).
Jabon. ʒxc (5 gr.).
Se disuelve en
Alcohol. ʒ℔ (15 gr.).

Se añade:

Alcanfor. ʒxviiij (4 gr.).

Reemplaza muy bien al bálsamo opodeldoc.

I. Dolores reumáticos, gota, ceática, torceduras y amaurosis. D. 3j á 3jv (4 á 16 gr.) en fricciones.

8626. T. AMONIACAL SUCINADA *ó Alcoholado amoniactal sucinado.*

℥ Alcohol amoniactal. . . ʒj℔ (48 gr.).

Aceite de succino rectificado. ʒj (4 gr.).
 Aceite de espliego. . . ʒj (4 gr.).
 H. S. A. I. Síncope. D. En inspiraciones. I. Parálisis, reumatismo crónico, síncope, ceática. D. Algunas gotas en un vaso de agua.

8627. T. AMONIAICAL SUCINADA ó Agua de Luce (F. P.).

ʒ Alcohólato amoniaco. 12
 Aceite de succino rect. dos veces. 4
 I. Es excitante, analéptica, y se emplea contra el histérico, espasmos, ataxia, síncope. etc. D. Seis á doce gotas en un vehículo apropiado.

8628. T. AMONIAICAL TREMENTINADA ó Alcohol amoniacoal trementinado.

ʒ Amoniaco líquido. . . . ʒijʒ (10 gr.).
 Alcohol alcanforado. . . ʒj (30 gr.).
 Esencia de trementina. ʒʒ (15 gr.).
 M. I. Edema, artritis crónica, contractura, artrocece, reumatismo; ceática. D. ʒij á ʒv (8 á 20 gr.) en fricciones.

8629. T. ANISADA (Alibert).

ʒ Espíritu de anís. . . . ʒjv (125 gr.).
 Polvo de ipecacuana. ʒj (30 gr.).
 Se hace digerir. Se añade á veces un poco de azúcar.

I. y D. ʒj á ʒij (30 á 60 gr.) en los romadizos; ʒiij ó ʒjv (12 á 15 gr.) contra las bronquitis crónicas y asma húmedos en un vehículo apropiado, tal como una infusión teiforme de yedra terrestre ó un vaso de vino de Burdeos.

Esta tintura conviene á los niños que padecen catarros, porque el perfume encubre el gusto de la ipecacuana; pero entonces solo se da ʒʒ á ʒj (2 á 4 gr.) segun la edad.

8630. T. ANTICÓLICA DE PALACIOS ó Tintura vinosa de opio anticólica (F. E.).

ʒ Opio en pedacitos. . . . ʒij (60 gr.).

Raiz de zedoaria. . . . ʒj (30 gr.).
 Raices de carlina,
 Galanga, ãã. ʒʒ (15 gr.).
 Cálamo aromático,
 Corteza amarilla de naranja,
 Corteza seca de cidra,
 Semillas de anís,
 Semillas de alcaravea,
 Flor de manzanilla, ãã. ʒij (8 gr.).
 Clavo,
 Bayas de laurel,
 Bayas de enebro, ãã. . ʒʒ (2 gr.).
 Macis. ʒj (4 gr.).

Se quebrantan todos estos simples, se los pone á macerar por ocho dias en ʒxxxvj (1125 gr.) de vino blanco bueno en un matraz de vidrio; despues se filtra y guarda para el uso.

I. Aprovecha en los dolores cólicos, especialmente en los flatulentos. D. Hasta ʒij (24 dec.).

8631. T. ANTIESCORBÚTICA ó Tintura de rábano rusticano compuesta (F. F.).

ʒ Raiz de rábano. ʒʒʒ (250 gr.).
 Sem. de mostaza negra. ʒjv (125 gr.).
 Sal amoniaco. ʒij (64 gr.).
 Alcohol de 21° Cart.,
 Alcohólato de coclearia compuesto, ãã. ʒʒj (500 gr.).

Se cortan las raices en pedazos, se quebranta la mostaza y se maceran en los líquidos espirituosos durante ocho dias, se cuele con expresion y se filtra.

Es un buen medicamento, que representa bien los principios activos de las cruzadas, porque este disolvente se carga del aceite esencial acre y de la materia amarga; pero la sinapisina de la mostaza no se convierte en aceite esencial acre por solo la influencia del alcohol.

I. Conviene en el escorbuto y se la puede administrar en las enfermedades escrofulosas, púrpura, caquexia sifilitica, salivacion mercurial, y en todas las afecciones generales caracterizadas por síntomas atónicos. Se la ha empleado

en estos últimos tiempos en el tratamiento de la albuminuria. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) pura ó mezclada con agua.

8632. T. ANTIESPASMÓDICA.

ʒ Asa fétida. ʒß (2 gr.).
 Acíbar. ʒjß (6 gr.).
 Almizcle. ʒij (24 dec.).
 Ambar gris. ʒij (8 gr.).
 Alcohol. ʒß (250 gr.).
 Filtrese.

I. Histérico, leucorrea, dismenorrea, catarro útero-vaginal. *D.* Una cucharada tres veces al día.

8633. Otra (KEUP).

ʒ Licor anodino mineral de Hoffmann. . . . ʒjv (125 gr.).
 Raiz de valeriana. . . ʒj (30 gr.).
 Se digiere durante quince días y se decanta. Se añaden despues partes iguales de alcoholato de cáscara de naranja.

I. Cólico ventoso. *D.* Se dan cada media hora cuarenta gotas en una infusion de manzanilla.

8634. T. ANTIESPASMÓDICA CON ACETATO DE POTASA (Chrestien).

Se satura la tintura antiespasmódica con acetato de potasa.

Conviene principalmente en la hidropesía, y sobre todo en la del bajo vientre ó enquistada.

D. ʒß (15 gr.) para fricciones, una por la mañana y otra por la noche, en la parte interna de los muslos, vientre y region lumbar.

8635. T. ANTIHIDRÓPICA (Boherhaave).

ʒ Raiz de aristoloquia larga;
 Raiz de aristoloquia redonda, ãã. ʒjß (45 gr.).
 Raiz de gengibre,
 Raiz de rábano silvestre,
 Bulbos de cebolla albarana secos, ãã. . . . ʒß (15 gr.).

Sumidades de ajenjos,
 Sumidades de centaurea menor,
 Bayas de enebro, ãã. . ʒj (30 gr.).
 Sal de ajenjos. ʒß (15 gr.).
 Se machacan y se maceran durante ocho dias en

Alcohol de enebro. ʒvj (3000 gr.).
 Se filtra.
D. Se toma ʒj (30 gr.) cuatro veces al día.

8636. T. Ó ESENCIA ANTIHISTÉRICA (F. M.).

ʒ Mirra escogida,
 Asa fétida,
 Azafran,
 Castóreo, ãã. ʒjß (6 gr.).
 Alcanfor. ʒj (4 gr.).
 Sal volátil de amon. . ʒij (8 gr.).
 Aceite dest. de sucino. ʒß (2 gr.).
 Espír. de vino rectific. ʒß (250 gr.).
 H. S. A. Se filtra y guarda en una vasija bien tapada.

I. Afecciones histéricas y epilépticas. *D.* De doce á veinte gotas.

8637. T. ANTIMONIAL ó Azufre dorado líquido, licor de jabon estibiado (Jacobi).

ʒ Azufre dorado. 30
 Potasa cáustica líquida. c. s.
 Se disuelve el sulfuro, se deja digerir y se añade:

Jabon. 90
 Alcohol. 180
 Agua destilada. 180

Se continúa la digestion á fuego lento meneando á menudo, y se filtra

I. Resolutiva y diurética. Se usa en las gonorreas crónicas y en las obstrucciones de las vísceras abdominales. *D.* Se empieza por algunas gotas, y se aumenta sucesivamente la dosis, segun lo exijan las circunstancias.

8638. T. ANTIREUMÁTICA (Blasius).

ʒ Tintura de semillas de cólcico,
 Tint. de guayaco, ãã. . ʒij (12 gr.).

D. Treinta á cuarenta gotas tres veces al dia.

8639. T. ANTIREUMÁTICA
(Zollickoffer).

℞ Semillas de estramonio ℥j (30 gr.).
Se maceran en alcohol y se añade:

Extracto de opio. ℥j (30 gr.).
Espiritu de vino alcanforado aromático. . . . ℥ij (60 gr.).

D. Se da interiormente á la dosis de cinco gotas aumentando gradualmente hasta producir el vértigo, y exteriormente en fricciones.

8640. T. ANTISIFILÍTICA ó Alcoholado antisifilitico (Eichenheimer).

℞ Carbonato de potasa muy puro. ℥ij (60 gr.).
Agua destilada de melisa. ℥jv (125 gr.).

Se disuelve, se filtra y se añade:

Carbonato de amoníaco líquido. ℥ij (8 gr.).
Alcoholado de cátequí. ℥℔ (2 gr.).

I. Sifilis. D. Quince á cincuenta gotas, tres veces al dia.

8641. T. ANTITÍSICA (Garmann).

℞ Acetato de plomo. 15
Sulfato de hierro. 15
Vinagre. 60
Alcohol. 60
Agua de rosas. 22

H. S. A. I. Diarrea y sudores colicuativos de los tísicos, gonorrea y poluciones nocturnas. D. 20 á 30 gotas.

8642. T. ANTIVENÉREA (Falck).

℞ Sublimado corrosivo. ℥j (12 dec.).
Alcohol rectificado. . ℥j (30 gr.).
Se disuelve. Por separado se toma:

Bálsamo del Canadá,
Goma de guayaco, ãã. ℥j (30 gr.).
Alcohol rectificado. . ℥vij (210 gr.).

Se disuelven el bálsamo del Ca-

nadá y la resina de guayaco en el alcohol, y se mezclan los dos líquidos despues de haberlos filtrado. Entonces se añade:

Aceite de sasafrás. . ℥ij (8 gr.).

I. Este medicamento obra con buen éxito en las afecciones sifilíticas mas graves. D. Diez, veinte hasta treinta gotas en un vaso de leche ó de tisana apropiada.

8643. T. AROMÁTICA ó Esencia cefálica (F. F.).

℞ Nuez moscada,
Clavo de especia, ãã. ℥ij (64 gr.).
Canela,

Flores de gran., ãã. ℥j℔ (48 gr.).

Alcohol á 31° Cart. . ℔ij (1000 gr.).

Se macera durante quince dias y se cuele el producto con expresion.

Se usa como estimulante en fricciones ó á la dosis de algunas gotas en agua azucarada, en los mismos casos y del mismo modo que la del núm. 8646.

8644. T. AROMÁTICA (F. A.).

℞ Raiz de cálamo aromático,
Raiz de galanga, ãã. ℥j (32 gr.).
Raiz de gengibre,
Canela del Malabar,
Clavo,

Nuez moscada, ãã. ℥iij (12 gr.).

Alcohol de 85° cent. ℔j℔ (750 gr.).

Se digieren por ocho dias y se obtendrán ℥xxj (660 gr.) de licor exprimido y filtrado.

8645. Otra (ADORNE).

℞ Amoníaco líquido. 1
Alcoholato de trementina. 3

I. Amaurosis. D. En fumigacion. Se vierten una ó dos gotas en la palma de la mano, se frota una con otra, y se aproximan lo mas que se pueda á los ojos ligeramente abiertos.

8646. T. AROMÁTICA DE ARNICA.

℞ Flores de arnica. . . . ℥j (30 gr.).
 Clavo,
 Canela,
 Gengibre, ãã. ℥ij (8 gr.).
 Anís. ℥ij (60 gr.).
 Alcohol. ℔j (500 gr.).

Se macera durante ocho días y se cuele.

I. Cefalalgia, hemicránea, asma.

D. Se vierten unas gotas en la mano y se aspira por la nariz. Una cucharada en medio vaso de agua azucarada, que se repite dos ó tres veces al día. Exteriormente se usa en lociones ó aplicada sola ó con partes iguales de agua en las contusiones, equimosis, escrófulas, tétanos.

8647. T. AROMÁTICA SULFÚRICA ó Elixir vitriólico de Mynsich (F. F.).

℞ Raíz de cálamo aromático,
 Raíz de galanga, ãã. ℥j (32 gr.).
 Flor de manzanilla,
 Hojas de salvia,
 Hojas de ajenjos,
 Hojas de yerbabuena, ãã. ℥B (16 gr.).
 Clavo de especia,
 Canela,
 Cubebas,
 Nuez moscada,
 Gengibre, ãã. ℥iij (12 gr.).
 Palo de acíbar,
 Cásc. de limón, ãã. . . . ℥j (4 gr.).
 Azúcar. ℥iij (96 gr.).
 Alcohol de 31° Cart. ℔ij (1000 gr.).
 Acído sulfúrico. . . . ℥jv (125 gr.).

Se pulverizan groseramente todas las sustancias, se las pone en un matraz, y sobre ellas se echan ℥viiij (250 gr.) de alcohol; se deja en maceracion durante cuarenta y ocho horas, se añade despues poco á poco el ácido sulfúrico, se vuelve á dejar en maceracion por veinticuatro horas, y se añade el resto del alcohol; se macera to-

davía por cuatro días, se cuele con expresion y se filtra.

I. Es estomacal y antipútrida.

D. De quince á veinte gotas.

8648. T. DE ASA FÉTIDA COMPUESTA ó Tintura de hollin fétida.

℞ Asa fétida. ℥j (4 gr.).
 Hollin de leña. ℥ij (8 gr.).
 Alcohol de 22°. ℥iij (90 gr.).

Se macera durante ocho días y se filtra.

I. Se usa como antiespasmódica contra las convulsiones de los niños. *D.* Algunas gotas.

8649. T. ASTRINGENTE (Gibert).

℞ Nuez de agalla,
 Agua, ãã. ℔j (500 gr.).
 Se macera durante doce horas, y se añade de nuevo:

Agua. ℔j (500 gr.).

A las doce horas se añade:

Alcohol. ℔ij (1000 gr.).

Agua de Colonia. . . . ℥vj (180 gr.).

Se filtra.

I. Blenorrea, flores blancas. *D.* En inyecciones. Se usa despues de haber dilatado la tintura en seis á ocho veces su peso de agua.

8650. T. Ó GOTAS DE ATROPINA.

℞ Atropina. 4
 Alcohol de 85°. 40
 Disuélvase.

I. Se recomienda como profiláctica de la escarlatina. *D.* Una gota al día en medio vaso de agua azucarada para un niño de cinco años; dos gotas para un niño de diez años; tres gotas para los de quince años, y cinco gotas para los adultos.

8651. T. BALSÁMICA, Bálsamo del Comendador de Permes ó bálsamo católico (F. F.).

℞ Raíz de angélica. ℥B (16 gr.)

Flor de hipericon. ℥j (32 gr.).
 Alcohol de 31°
 Cart. ℔ij¼ (1125 gr.).
 Se digiere á fuego lento por ocho dias en una vasiya tapada, agitando de cuando en cuando, se cuela exprimiendo fuertemente y se añade al producto:

Mirra,
 Incienso, ãã. ℥B (16 gr.).
 Se vuelve á digerir como se ha dicho anteriormente, y se añade:
 Bálsamo de Tolú,
 Benjuí, ãã. ℥iij (96 gr.).
 Acíbar. ℥B (16 gr.).
 Se macera por quince dias y se filtra.

I. Se usa como cicatrizante en los casos de heridas poco graves, úlceras atónicas y saniosas, contusiones. Tomada interiormente, es cordial, estomacal y excitante. Calma los dolores de muelas producidos por la caries, aplicándola en unas hilitas. Tambien puede servir para fricciones en los infartos artríticos y parálisis.

8652. T. BALSÁMICA PARA LAS ENCÍAS.

℥ Mirra. 30
 Catecú. 30
 Bálsamo del Perú. 4
 Espíritu de coclearia. 90
 Alcohol. 90
 Se digiere por dos dias y se filtra.

I. Laxitud de las encías, encías que dan sangre, relajacion y ulceracion de las amígdalas y de la campanilla por el mercurio.

8653. T. DE BENJUÍ (F. F.).

℥ Benjuí en polvo. . . . ℥jv (125 gr.).
 Alcohol de 34° Cart. ℔j (500 gr.).
 Se macera durante quince dias meneando de cuando en cuando, y se filtra.

Del mismo modo se preparan las tinturas de BALSAMO DE TOLÚ Y TODOS LOS BALSAMOS; TREMENTINA, RESINA DE

GUAYACO Y TODOS LOS DEMÁS ZUMOS RESINOSOS; ESCAMONEA, ASA FÉTIDA, GOMA AMONIACO, MIRRA Y TODAS LAS DEMÁS GOMORESINAS.

8654. T. DE BENJUÍ COMPUESTA (Swediaur).

℥ Benjuí. 8
 Bálsamo del Perú. 4
 Alcohol de 34° Cart. 64

Se macera hasta que se hayan disuelto las resinas.

Se usa como cosmética.

Se pone ℥B (15 gr.) de esta tintura en ℔ij (1000 gr.) de agua de rosas. El liquido tiene un aspecto lechoso.

8655. Otra (F. DE L.).

℥ Benjuí. ℥iijB (112 gr.).
 Estoraque calamita. ℥ijB (80 gr.).
 Bálsamo de Tolú. ℥x (40 gr.).
 Acíbar. ℥v (20 gr.).
 Alcohol. ℔jB (1250 gr.).

Se macera durante catorce dias y se filtra.

I. Es estimulante, expectorante y antiespasmódica, aconsejada en el asma, catarro crónico y tisis con languidez. Se usa en lociones frecuentes contra las úlceras y las quemaduras en primer grado, antes que se hayan desarrollado las flictenas. D. ℥B á ℥jB (2 á 6 gr.)

8656. T. DE BOERHAAVE ó Alcohol de Boerhaave.

℥ Enula campana. . . . ℥j (32 gr.).
 Raices de aristoloquia larga,
 Raices de aristoloquia redonda,
 Raic. de zedoaria, ãã. ℥vj (24 gr.).
 Diente de ajo. ℥jB (48 gr.).
 Sumidades de ajeno,
 Centaura menor,
 Semillas de dauco,
 Bayas de enebro,
 Palo de sasafrás, ãã. ℥j (32 gr.).
 Corteza de Winter. . . . ℥B (16 gr.).

Se machacan estas sustancias, se las macera durante seis horas

en el baño maría en agua hirviendo y se las filtra.

I. Hidropesías. *D.* Una cucharada cuatro veces al día.

8657. T. DE BRUCINA ó *Alcoholado de brucina (Magendie).*

℥ Brucina. ḡxviii (4 gr.).
Alcohol. ℥j (32 gr.).
H. S. A. I. Ciertas parálisis. *D.* ḡiij á ḡxx (15 cent. á 10 dec.) en una pocion ó en una bebida apropiada.

8658. T. DE CAINCA.

℥ Alcohol de 21°. ℔j (500 gr.).
Raiz de cainca en polvo. ℥ij (60 gr.).
Se macera *S. A.* durante seis días y se filtra. *D.* ℥β á ℥j (15 á 30 gr.) al día.

8659. T. ALCOHÓLICA DE CAINCA AMONIAICAL.

℥ Alcohol amoniacal. . . ℔j (500 gr.).
Raiz de cainca en polvo. ℥jv (125 gr.).
Se macera *S. A.* durante seis días y se filtra.

Nota. Esta tintura tiene un color verde oscuro, debido á la accion prolongada del amoniaco sobre la materia colorante de la cainca. *D.* De ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) al día mezcladas con ℥jv (125 gr.) de un vehiculo acuoso, y se tomará á cucharadas cada dos horas.

8660. T. DE CÁLAMO AROMÁTICO COMPUESTA.

℥ Cálamo aromático. . . ℥iij (90 gr.).
Zedoaria,
Gengibre, ãã. ℥j (30 gr.).
Naranjas verdes. ℥ij (60 gr.).
Alcohol. ℥xxxjvβ (1080 gr.).

8661. T. CALMANTE (*Herisson*).

℥ Tintura alcohólica de beño negro. ℥j (4 gr.).

Tintura alcohólica de guayaco. ℥ij (8 gr.).

M. I. Gastralgia y neuralgia facial. *D.* Se toman treinta gotas por la mañana y otro tanto por la noche en agua ó en otro escipiente adecuado.

Nota. Es necesario seguir un régimen antiflogístico. Los dolores mas atroces cesan inmediatamente, segun dicen, por la influencia de este medio.

8662. T. DE CANELA (F. F.).

℥ Canela en polvo un poco grueso. ℥jv (125 gr.).
Alcohol de 31°. ℔j (500 gr.).
Se macera durante quince días, se cuele con expresion y se filtra.

Del mismo modo se preparan las tinturas de AZAFRAN, CASCARILLA, CLAVO DE ESPECIA, ALMIZCLE, AMBAR GRIS, HOJAS DE DIGITAL Y DE ÁSARO, NUEZ VÓMICA, RAIZ DE CONTRAYERBA, ELÉBORO NEGRO, GENGIBRE Y PELITRE, VAINILLA Y CASTOREO.

8663. T. DE CANELA Y AMBAR MOSCADO ó *Esencia de Italia.*

℥ Canela. ℥iij (90 gr.).
Cardamomo mayor. ℥ij (60 gr.).
Galanga. ℥ij (60 gr.).
Clavo. ℥β (15 gr.).
Gengibre. ℥β (15 gr.).
Pimienta larga. . . . ℥iij (12 gr.).
Nuez moscada. . . . ℥ij (8 gr.).
Ambar gris. ḡjv (2 dec.).
Almizele. ḡjv (2 dec.).
Alcohol á 90°. ℔ij (1000 gr.).
Se digiere y se filtra.

I. Es afrodisíaca. *D.* Veinte á treinta gotas sobre azúcar.

8664. T. DE CANELA CON CICUTA (*Kopp*).

℥ Extracto de zumo depurado de cicuta. ℥j (4 gr.).
Alcoholato de canela. . ℥β (15 gr.).
Disuélvase.

I. Oftalmia escrofulosa, fotoforo-

bia escrofulosa, etc. *D.* Cuatro gotas tres veces al día á los niños de dos á tres años, teniendo cuidado de añadir todos los días una gota á cada dosis hasta llegar á 25 ó 30 gotas por toma.

Nota. Se auxilia la acción de este remedio aplicando sobre los ojos compresas empapadas en alcohol de opio ó vejigatorios detrás de las orejas.

8665. T. DE CANELA COMPUESTA (F. DE L.).

℞ Canela quebrant. . . ℥j (32 gr.).
Semillas de cardam. ℥℔ (16 gr.).
Pimienta larga. . . . ℥ij℔ (10 gr.).
Gengibre. ℥ij℔ (10 gr.).
Espíritu de vino. . . ℔ij℔ (1250 gr.).
Se maceran durante catorce días y se filtra.

D. ℔℔ á ℥j℔ (2 á 6 gr.) como aromática, cordial, tónica y estomacal. Se usa unida á otros medicamentos en la gota atónica, etc.

8666. T. CANTARIDADA.

℞ Cantáridas
Alcanfor, ññ. ℥j (4 gr.).
Ruibarbo. ℥j℔ (6 gr.).
Resina de guayaco. . . ℥Ljv (3 gr.).
Laca. ℥j (4 gr.).
Alcohol. ℥xij (400 gr.).
Se infunde y se cuela.

I. Gonorrea crónica, artrocace, hidropesía, pleuresía, asma, tétanos, beriberi, tortícolis, alopecia, enuresis y envenenamiento. *D.* ḡxviiij á ḡxxxvj (1 á 2 gr.) mañana y noche en fricciones.

8667. T. DE CANTÁRIDAS (F. E.).

℞ Polvos de cantár. ℥℔ (15 gr.).
Polv. de cochinill. ℥j (4 gr.).
Espíritu de vino. ℥xxxvj (1125 gr.).

Se pone en digestión durante ocho días, meneando á menudo, y luego se añade:

Ambar gris. . . . ℥℔ (2 gr.).
Espirit. de canela. ℥ijj (90 gr.).

Se continúa la digestión por tres días y se filtra.

I. Se usa exteriormente como estimulante.

8668. Otra (F. F.).

℞ Polvos de cantáridas. ℥ij (64 gr.).
Alcohol de 21° Cart. . ℔bj (500 gr.).

Se pone en maceración por quince días, se cuela con expresión y se filtra.

I. Estimulante y rubefaciente, que se usa en la hidropesía, asma, hidrofobia. *D.* Tres á diez gotas dos veces al día. *I.* Tumores indolentes, ceática, parálisis, dolores de muelas por caries, contusiones, etc., algunas formas secas de afecciones cutáneas, soriasis y eczema crónico. *D.* Seis á doce gotas en un vehículo mucilaginoso. Exteriormente se usa en fricciones contra ciertas hidropesías, tumores blancos de las articulaciones, dolores reumáticos, á la dosis de ℔℔ á ℥j (2 á 4 gr.) diluida en agua ó mezclada con tintura de escila y de digital, y también como rubefaciente, unida por lo común al aceite de almendras dulces ó de manzanilla alcanforado.

8669. T. ETÉREA DE CANTÁRIDAS (F. F.).

℞ Cantáridas en polvo. ℥jv (125 gr.).
Eter acético. ℔ij (1000 gr.).

Se maceran durante ocho días en un frasco con tapón esmerilado, se cuela con expresión, se exprime y se filtra.

I. Apoplejía, parálisis, reumatismo crónico. Asociada al aceite, se usa para linimentos excitantes.

8670. T. DE CARDAMOMO COMPUESTA (F. DE L.).

℞ Semillas de cardam. ℥ij℔ (10 gr.).
Semillas de alcaravea. ℥ij℔ (10 gr.).
Cochinilla en polvo. ℥j (4 gr.).

Canela. 5v (20 gr.).

Pasas privadas de sus pepitas. 3v (160 gr.).

Alcohol. ℔ijβ (1250 gr.).

Se maceran durante catorce dias y se filtra.

I. Flatuósidades y lentitud en la digestion. Se usa como estimulante y estomacal. *D.* 3j á 3ij (4 á 8 gr.) en un vehiculo apropiado.

8671. T. DE CASTAÑO DE INDIAS (Jobert).

☞ Corteza de castaño de Indias quebrant. 3iij (100 gr.).

Alcohol de 21° Cart. 3xij (400 gr.).

Se macera durante quince dias y se filtra.

I. Gastralgia atónica. *D.* Una cucharada en un vaso de agua de achicorias, por la mañana en ayunas ó antes de comer.

8672. T. ETÉREA DE CASTÓREO (F. F.).

☞ Castóreo en polvo. 3jv (125 gr.).

Eter sulfúrico. ℔j (500 gr.).

Se ponen estas dos sustancias en un frasco con tapon esmerilado, se dejan en maceracion durante cuatro dias, teniendo cuidado de agitar la vasiya de cuando en cuando; se filtra despues en un embudo cubierto, y se conserva para el uso.

Del mismo modo se preparan las tinturas etéreas de SUCINO, BÁLSAMO DE TOLÚ, ASA FÉTIDA, ALMIZCLE, AMBAR GRIS, y en general las resinas y las gomoresinas.

8673. T. Ó ALCOHOLADO DE CA-TECÚ COMPUESTA (F. P.).

☞ Tintura de catecú. 48

Canela en polvo grueso. 2

Semillas de cardamomo menor. 4

Se macera durante ocho dias, se cuele y guarda.

8674. T. DE CHESTON.

☞ Hojas frescas de laurel real. 3jv (125 gr.).

Agua hirviendo. ℔ij (1000 gr.).

Se infunde durante doce horas, se cuele y se añade:

Miel blanca. 3jv (125 gr.).

I. Cáncer de los lábios, úlceras de mal carácter de las encías y de los lábios. *D.* En lociones.

8675. T. DE CIANURO DE MERCURIO Ó CIANURADA (Parent).

☞ Extracto de boj. 3jβ (45 gr.).

Extracto de acónito,

Sal amoniaco, ãã. 3iij (12 gr.).

Aceite esencial de

anis ó de sasafrás. 9j (12 dec.).

Cianuro de mercurio. 9xx (4 gr.).

Agua. 3xjv (440 gr.).

Alcohol á 33°. 3x (310 gr.).

H. S. A. una tintura, que despues de filtrada debe pesar 3xxjv (750 gr.).

Nota. Cada onza (30 gr.) contiene 3β (2 gr.) de extracto de boj, 9jx (45 cent.) de extracto de acónito, 9jx (45 cent.) de hidrociorato de amoniaco, tres cuartas partes de grano de cianuro de mercurio y 9j (5 cent.) de aceite esencial.

I. Sifilis, sifilides, herpes. *D.* De 3β á 3j (15 á 30 gr.) al dia, empezando por una cucharada de café mañana y noche, en medio vaso de agua azucarada ó de tisana de cebada, de grama, etc.

8676. T. ETÉREA DE CICUTA (F. F.).

☞ Polvos de hojas de cicuta. 3jv (125 gr.).

Eter sulfúrico. ℔j (500 gr.).

Se trata el polvo de la cicuta por el éter en el embudo de desalojamiento, se recibe el líquido etéreo y se guarda para el uso.

Del mismo modo se preparan las tinturas etéreas de BELEÑO, ACÓNITO, BE-

LLADONA, DIGITAL PURPÚREA, YERBA-MORA, TABACO, FLORES DE ARNICA, RAICES DE PELITRE, RAICES DE VALERIANA.

8677. T. DE CICUTA (F. DE L.).

☞ Hojas secas de cic. $\mathfrak{Z}v$ (160 gr.).
Cardam. quebrant. $\mathfrak{Z}j$ (32 gr.).
Espir. de vino deb. $\mathfrak{Hij}\mathfrak{B}$ (1250 gr.).
Se macera durante catorce dias, y se filtra.

8678. T. Ó ALCOHOLADO DE CITRATO DE HIERRO (Beral).

☞ Citrato de hierro liq. $\mathfrak{Z}\mathfrak{B}$ (16 gr.).
Aguardiente. $\mathfrak{Z}ij$ (96 gr.).
Espiritu de limon. $\mathfrak{Z}ij$ (8 gr.).
H. S. A. I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, afecciones atónicas, escrófulas. *D.* $\mathfrak{g}xvii\mathfrak{j}$ á $\mathfrak{g}Ljv$ (1 á 3 gr.) en una pocion.

8679. T. DE SEXQUICLORURO DE HIERRO (F. DE L.).

☞ Sexquióxido de hierro. $\mathfrak{Z}vj$ (192 gr.).
Acido hidroclórico. $\mathfrak{Z}xx$ (625 gr.).
Espiritu de vino rectificado. $\mathfrak{Z}Lx$ (1875 gr.).

Se vierte el ácido en el sexquióxido de hierro en una vasija de vidrio, se digiere durante tres dias, agitando de cuando en cuando, se añade el espíritu y se filtra.

I. Amenorrea, leucorrea, afecciones asténicas y escrófulas. *D.* $\mathfrak{g}x$ á $\mathfrak{g}xx$ (50 cent. á 1 gr.) en una pocion.

8680. T. ETÉREA DE PERCLORURO DE HIERRO ó Tintura de Bestuchef ó del Dr. Klaproth (F. F.).

☞ Percloruro de hierro seco. $\mathfrak{Z}j$ (4 gr.).
Licor anodino de Hoffmann. $\mathfrak{Z}vij$ (28 gr.).

Se ponen las dos sustancias en un frasco con tapon esmerilado, y luego que se haya disuelto el per-

cloruro, lo que se verifica fácilmente, se guarda preservándola de la luz.

I. Se usa como tónica y antiespasmódica en la gastralgia, clorosis, etc. *D.* Quince á treinta gotas en un vehiculo apropiado; pero en el dia apenas se usa.

Esta tintura (eterolado) se prepara, segun Beral, con siete partes de éter sulfúrico rectificado y una de percloruro de hierro cristalizado. Se pesa el éter en un frasco, se añade el cloruro y se agita hasta que se haya disuelto; se deja en reposo durante veinticuatro horas y despues se decanta.

Nota. Este éter sulfúrico ferrurado, que reemplaza ventajosamente á la tintura de Bestucheff ó del doctor Klaproth, es de color amarillo verdoso, tiene siempre la misma composicion y es constante en sus efectos. Muchos farmacólogos prescriben para prepararle añadir alcohol al éter; pero esta adicion, que es indispensable si se usa percloruro liquido, es inútil cuando se usa percloruro cristalizado.

I. y D. Las mismas que la de la F. F.

8681. T. DE CLORURO DE HIERRO Y AMONIACO (F. DE L.).

☞ Cloruro de hierro y amoniaco. $\mathfrak{Z}jv$ (125 gr.).
Alcohol. $\mathfrak{Z}xx$ (625 gr.).

Se disuelve el cloruro de hierro y amoniaco en el alcohol, y se cuele. *D.* Diez á treinta gotas, dos ó tres veces al dia.

8682. T. DE COBRE AMONIACAL (Tronsdorff).

☞ Limaduras de cobre. $\mathfrak{Z}j$ (30 gr.).
Amoniaco liquido. $\mathfrak{Z}xij$ (375 gr.).

M. Cuando el licor haya tomado un color azul, se decanta y conserva para el uso.

8683. T. DE COCHINILLA AROMÁTICA ó *Botella roja de Taylor.*

℞ Alcohol á 21°. ℞bß (250 gr.).
 Cochinilla. ℞ij (8 gr.).
 Esencia de mejorana. ℞j (4 gr.).

H. S. A. I. Es estimulante difusivo. D. Una cucharadita de café en un vaso de agua azucarada.

8684. T. DE CÓLCHICO COMPUESTA (F. DE L.).

℞ Semillas de cólchico quebrantadas. ℞v (150 gr.).
 Espiritu de amoníaco aromático. ℞ijß (1250 gr.).
 Se macera durante catorce dias y se filtra.

8685. T. DE SEMILLAS DE CÓLCHICO.

℞ Semillas de cólchico. ℞ij (60 gr.).
 Alcohol á 33°. ℞bj (500 gr.).
 Se macera durante ocho dias y se filtra.

I. Artritis, flebitis, pleuresía, tétanos, anasarca. D. De ℞xviii á ℞j (1 á 4 gr.).

8686. T. DE CÓLCHICO ó *Agua medicinal de Husson* (F. P.).

℞ Bulbos frescos de cólch. ℞j (30 gr.).
 Alcohol de 36°. ℞ij (60 gr.).
 Se macera durante quince dias, se filtra y guarda.

I. Gota, reumatismo. D. Cinco, seis ú ocho gotas al dia, en un vaso de agua azucarada.

La TINTURA DE WILSON contiene ℞j (30 gr.) de bulbos por ℞bß (250 gr.) de alcohol. I. Gota.

8687. T. DE BULBOS DE CÓLCHICO ó *Antigotoso de Want.*

℞ Bulbos de cólchico frescos. ℞jv (120 gr.).
 Alcohol á 20°. ℞vj (180 gr.).
 Se maceran durante una sema-

na, se cuele con expresion y despues se filtra.

I. Afecciones artríticas. D. ℞ij (8 gr.) ó cerca de dos cucharadas de café para un adulto, en una tisana apropiada, aumentando ó disminuyendo todavía la dosis segun la constitucion de los enfermos.

8688. T. DE COLOQUINTIDA (*Fabre*).

℞ Coloquintida en polvo grueso. ℞jß (45 gr.).
 Clavo de especia. número 6.
 Anís estrellado. ℞j (4 gr.).
 Azafran. ℞xij (6 dec.).
 Tierra foliada de tárt. ℞j (30 gr.).

Se digiere durante un mes en ℞xx (625 gr.) de alcohol. Fabre administraba esta tintura del modo siguiente: el enfermo toma en ayunas durante tres dias de seguido ℞ij (8 gr.) de esta tintura en ℞ij ó ℞iij (60 ó 90 gr.) de vino de Málaga; descansa al cuarto dia, continúa otros tres tomando como los primeros, vuelve á descansar un dia, y así sucesivamente hasta veinte ó veinticinco dosis. Es preciso tener cuidado de beber una hora antes de la administracion del medicamento dos ó tres vasos de tisana de cebada ó de grama. Si sobrevienen dolores de tripas, se deben usar lavativas emolientes. Esta medicacion de Fabre es excelente en las blenorragias un poco crónicas.

8689. T. CONTRA LAS ASCÁRIDES (*Dorfmüller*).

℞ Elíxir balsámico de Hoffmann, Tintura de cálamo arom. compuesta, Vino marcial, ññ. ℞jv (15 gr.).
 M. D. Se toma, segun la edad, de treinta á sesenta gotas, mañana y noche, en media cucharada de vino bueno.

La TINTURA DE CÁLAMO AROMÁTICO COMPUESTA se prepara, segun la farmacopea de Prusia, del modo siguiente:

raiz de cálamo aromático, ℥iij (90 gr.);
raiz de zedoaria y gengibre, āā. ℥j (30
gr.); naranjas sin madurar, ℥ij (60
gr.); alcohol, 3 quart. (1½ lit.). Des-
pues de digerir por tiempo suficiente, se
exprime y filtra.

8690. T. CONTRA LA CALVICIE
(Dr. Landerer).

℥ Hojas de laurel real. . . ℥ij (60 gr.).
Clavo. ℥ij (8 gr.).
Alcoholato de espliego,
Alcohol. de orég., āā. ℥vj (180 gr.).
Se digiere durante seis dias, se
cuela con expresion, se filtra y se
añade:

Eter sulfúrico. ℥β (15 gr.).

Se guarda en un frasco con ta-
pon esmerilado.

D. En fricciones.

Se nota su efecto á las cinco ó
seis aplicaciones.

8691. T. CORDIAL (Rymer).

℥ Acíbar. ℥ijβ (10 gr.).
Alcanfor. ℥β (2 gr.).
Alcohol de 56°. ℔j (500 gr.).
Ruibarbo. ℥ijβ (10 gr.).
Pimiento. ℥β (2 gr.).
Castóreo. ℥j (4 gr.).
Cardamomo. ℥β (15 gr.).

Se macera durante ocho dias, se
filtra y se añade:

Acido sulfúrico. ḡxviiij (1 gr.).

I. Cordial y antiespasmódica.
Escrófulas, tisis, catarro, ñeumo-
nia. D. ḡxviiij (1 gr.) en una ti-
sana apropiada.

8692. T. CORROBORANTE DE WITH
ó *Tinturá alcohólica de cáscara de*
naranja (F. E.).

℥ Cáscaras de naranja. ℥jv (125 gr.).
Quina de Loja. . . . ℥ij (60 gr.).
Raiz de genciana. . . ℥j (30 gr.).

Se quebrantan bien estas sus-
tancias, y se ponen á macerar por
veinticuatro horas en

Espiritu de vino. . . ℔jβ (750 gr.).

Despues se filtra y se guarda
para el uso.

I. Es un excelente tónico y cor-
roborante, y mucho mas si se
echa en media copa de agua de
nieve ó muy fria. D. De ℥ij á ℥jv
(8 á 16 gr.).

**8693. T. DE CORTEZA DE NARAN-
JAS COMPUESTA ó Elixir estomacal**
(F. E.).

℥ Cortezas de naranja seca,
Quina de Loja, āā. . ℥jβ (45 gr.).
Sumidades de ajenos,
Flor de manzanilla,
Pim. de Tabasco, āā. ℥j (30 gr.).
Cochinilla. ℥β (2 gr.).
Agua. ℥xviiij (560 gr.).
Espiritu de vino. . . ℥jv (125 gr.).

Se trituran los sólidos, se mez-
clan con los líquidos, dejándolos
en infusion por tres dias, y se fil-
tra.

I. Atonía de los órganos digesti-
vos, dispepsia y anorexia. D. ℥β á
℥j (2 á 4 gr.).

**8694. T. DE EXTRACTO OLEO-
RESINOSO DE CUBEBAS, Esencia con-
centrada de cubebas ó alcoholado**
de cubebas (Beral).

℥ Alcohol rect. de 33°. ℥xij (375 gr.).
Extracto oleoresinoso
de cubebas. ℥jv (125 gr.).

M. S. A. I. Blenorrea, blenorra-
gia. D. ℥j á ℥β (4 á 15 gr.) en una
pocion. V. número 2032.

Nota. Esta composicion no se
emplea jamás en este estado, y
para usarla conviene mezclarla
con cierta cantidad de agua por
medio de un mucilago ó de cual-
quier otro intermedio.

8695. T. DE DAFFY.

℥ Aguardiente. ℔jβ (750 gr.).
Azúcar. ℥vj (180 gr.).
Sen. ℥j (30 gr.).

Jalapa,
Crémor de tártaro,
Cilantro, āā. ℥β (15 gr.).
H. S. A. I. y D. Se usa como un

purgante grato, á la dosis de ℥j á ℥iij (30 á 90 gr.) dejando un largo intervalo entre cada toma.

8696. T. DE DALBY ó *Carminativo de Dalby.*

℥ Tintura de opio. . . ℥j (32 gr.).
Tintura de asa fétida. ℥v (20 gr.).
Esencia de alcaravea. ℥ij℔ (10 gr.).
Esencia de menta. . ℥v (20 gr.).
Magnesia calcinada. . ℥ij℔ (10 gr.).
Tintura de castóreo. ℥j℔ (50 gr.).
Espiritu de vino. . . . ℥vj (200 gr.).
Jarabe simple. . . . ℔℔ (250 gr.).

D. Una cucharadita de café en un vaso de agua azucarada.

8697. T. DENTIFRICA CON PELITRE ó *Agua para la boca.*

℥ Canela.	80
Vainilla.	60
Cilantro.	60
Clavo.	60
Macis.	45
Cochinilla.	45
Sal amoniaco.	45
Alcoholato de pelitre.	43440

Se macera durante quince dias y se añade:

Agua de flor de naranjo. . . .	240
Esencia de anís.	45
Esencia de menta.	60
Esencia de limon.	45
Esencia de tomillo.	7,5
Esencia de espliego.	7,5
Tintura de ambar.	7,5

Mézclese y fíltrese.

8698. T. DE DIGITAL.

℥ Polvo de digital. . . . ℥ij℔ (10 gr.).
Se digiere durante ocho dias en Alcohol de 33°. . . . ℥x (40 gr.).
Se exprime y se añade:
Alcohol. ℥x (40 gr.).
Se filtra.

8699. Otra, n. 2.

℥ Hojas de digital. . . . ℥ij℔ (10 gr.).

Agua de canela,
Alcohol, ãã. ℥j (30 gr.).
Se macera durante quince dias y se filtra.

8700. Otra, n. 3.

℥ Hojas de digital,
Alcohol,
Eter sulfúrico, ãã. . . . ℥j (30 gr.).
Se macera durante cuatro dias y se filtra.

8701. T. DE DIGITAL COMPUESTA.

℥ Hojas de digital,
Hojas de belladona,
Hojas de beleño, ãã. . . ℥℔ (2 gr.).
Se digiere durante un cuarto de hora y se añade:
Agua de canela. . . . ℥j (30 gr.).
Alcoholato de cáscaras de naranja. . . . ℥iij (100 gr.).

I. Enagenacion, congestion, conmocion, apoplejía, pleuresía, peritonitis, anafrodixia, calentura, diabetes, cálculos, reumatismo, neuritis, parálisis, ectropion, entropion. D. ℥ij á ℥j (8 á 30 gr.) en una pocion ó á cucharadas.

8702. T. DE DIGITALINA, *Alcoholado de digitalina ó solucion normal de digitalina.*

℥ Digitalina pura. . . . ḡxviiij (1 gr.).
Alcohol á 56° cent. . . ℔j (500 gr.).
Este alcoholado está en la proporcion de 1 á 500 ó $\frac{1}{40}$ por 18 gr.
Se ha propuesto esta preparacion cuando se quiere que entre la digitalina en un medicamento líquido. D. ḡxviiij á ḡLjv (1 á 3 gr.).

8703. T. ELÁSTICA
(Dr. Bañares).

℥ Subcarbonato de potasa. ℥v (160 gr.).
Extracto de Marte aperitivo. ℥vj (24 gr.).
Agua destilada. . . . ℥xij (375 gr.).
Se ponen en digestion en un ma-

traz por cuatro dias y se filtra el líquido.

I. Es tónica y emenagoga. *D.* ʒj (4 gr.) en ℥iij (1500 gr.) de agua que se toma á pasto.

8704. T. ELÁSTICA Ó DE CARBONATO DE POTASA Y HIERRO LÍQUIDO (F. E.).

ʒ Limaduras de hierro. ʒij (60 gr.).
Carbonato de potasa. ℥β (250 gr.).
Se mezclan, se licúan en un crisol de barro á fuego fuerte hasta convertirlo en masa, la que despues de fría se pulveriza en almirez de hierro y mejor de mármol, se pone en un plato de barro en paraje húmedo para que se licúe, se filtra y repone *S. A.*

D. ʒj (4 gr.) mezclada con ℥iij (1500 gr.) de agua para beber por intervalos.

8705. T. DE ELATERINA (Morrus).

ʒ Elaterina. ʒij (5 cent.).
Alcohol. ʒj (30 gr.).
Acido nítrico. 4 gotas.

H. S. A. I. Purgante drástico recomendado en las escrófulas. *D.* De treinta y seis á cuarenta gotas en medio vaso de agua azucarada. Se usa en lociones contra los sabañones.

8706. T. DE ÉNULA CAMPANA.

ʒ Raiz de énula camp. ℥β (250 gr.).
Raiz de cálamo aromático. ʒβ (15 gr.).
Alcohol de 22°. ℥iij (1500 gr.).

Se maceran las raices durante ocho dias, se cuele y filtra.

I. Es tónica y excitante del conducto digestivo. *D.* ʒij (8 gr.) en un decilitro de vino tinto.

8707. T. DE ESPLIEGO COMPUESTA (F. DE L.).

ʒ Espiritu de espiego. ʒxxx (960 gr.).

Espiritu de romero. ʒx (320 gr.).
Canela,
Nuez moscada, ãã. . ʒijβ (10 gr.).
Sándalo rojo. ʒv (160 gr.).
Se digiere durante seis dias y se filtra.

I. y D. Es un estimulante activo, que se da desde diez gotas hasta ʒj (4 gr.) con ʒij (8 gr.) de azúcar en la debilidad del estómago y as-tenia nerviosa.

8708. T. DE ESTAFISAGRIA (Turnbull).

ʒ Estafisagria. 1
Alcohol de 31° Cart. 2

Se usa en los mismos casos que las preparaciones de delfina. *D.* ʒβ á ʒjβ (2 á 6 gr.) en fricciones.

8709. T. ESTOMACAL Ó Alcohol estomacal (F. N. P.).

ʒ Extracto de quina,
Extracto de cascarilla,
Extracto de genciana,
Extr. de manzan., ãã. ʒβ (2 gr.).
Alcohol de 22°. ʒjv (125 gr.).
Disuélvase.

I. Dispepsia, atonía del conducto intestinal. *D.* ʒβ á ʒj (15 á 30 gr.) dos veces al dia.

8710. T. ESTOMACAL (F. V.).

ʒ Tintura de cáscaras de naranja. ʒjv (125 gr.).
Extracto de ajenjos,
Extr. de genc., ãã. . ʒj (30 gr.).
Subcarb. de potasa. ʒβ (15 gr.).
Se macera durante tres dias en vino blanco. ℥jv (2000 gr.).
Se filtra.

I. Dispepsia, atonía del estómago é indigestiones. *D.* Una cucharada en un vehículo apropiado.

8711. Otra (F. M.).

ʒ Canela de Manila. . ʒj (30 gr.).
Clavo,
Nuez moscada, ãã. ʒβ (15 gr.).
Macis. ʒij (8 gr.).
Cálamo aromático. . ʒiij (12 gr.).

Se quebrantan estos simples y se infunden en

Aguardiente bueno. ℥iij (1500 gr.).

Se menea bien y se ponen en digestión por algunos días, se decanta la tintura y se añade:

Jarabe de corteza de cidra. ℥jv (125 gr.).

Se mezcla y se guarda para el uso.

I. Indisposiciones flatulentas del estómago. *D.* Una ó dos cucharadas á cualquiera hora.

8712. T. ESTOMACAL
(*Moscato*).

℥ Agua destilada de cáscaras de limon,
Agua destilada de hojas de ajenos,
Alcohol de 32°, añ. . ℥bβ (250 gr.).
Cáscaras de naranjas
amargas. ℥j (30 gr.).
Casarilla pulverizada,
Hojas secas de camedrios, añ. ℥β (15 gr.).

Se digieren durante tres días á fuego lento, se cuele y se filtra.

I. y *D.* ℥jv ó ℥vj (15 á 24 gr.) antes de desayunarse ó de comer.

8713. T. ESTOMACAL AMARGA, ó
Alcohol de genciana y naranjas amargas compuesto.

℥ Alcohol debilitado. . ℥xxv (780 gr.).
Raiz de genciana. . ℥ij (60 gr.).
Cáscaras secas de naranjas amargas. ℥j (30 gr.).
Canela blanca. . . . ℥β (15 gr.).
Cochinilla. ℥β (2 gr.).

Se macera durante cuatro días y se filtra.

I. Es estomacal y vermífuga para los niños. *D.* De ℥jv á ℥vj (16 á 24 gr.) por la mañana en ayunas ó una hora antes de comer.

8714. T. ESTOMACAL AMONIACAL.

℥ Alcohol amoniacal. . . ℥j (30 gr.).
Alcoholato de melisa. . ℥β (15 gr.).
Aceite esencial de ajenos. ℥jβ (6 gr.).

Se digiere y se añade:

Tint. de sándalo rojo. ℥β (15 gr.).

I. Tétanos, anorexia, dispepsia, dismenorrea y gota atónica. *D.* Veinte á treinta gotas en una infusión de hojas de naranjo azucarada, ℥jβ (45 gr.)

8715. T. DE ESTRAMONIO
(*Hufeland*).

℥ Semillas de estramonio en polvo. . . . ℥ij (60 gr.).
Vino de Málaga. . . . ℥xij (375 gr.).
Espir. de vino de 15°. ℥ij (60 gr.).
Se digiere á fuego lento durante tres ó cuatro días y se filtra.

I. Insomnio, dolores atroces por cáncer de la matriz. *D.* Seis gotas á ℥j (12 dec.) en un vaso de agua azucarada ó en un vehículo á propósito.

8716. Otra (PIERQUIN).

℥ Hojas de estramonio. . ℥ij (60 gr.).
Alcohol debilitado. . . ℥bj (500 gr.).
Se macera durante cinco días, se cuele y se añade:
Esencia de poleo. . . . 20 gotas.
Esencia de canela. . . ℥β (2 gr.).
Tintura de opio. . . . ℥j (30 gr.).
Aguardiente alcanfor. ℥ij (60 gr.).

I. Cáncer; principalmente de la matriz. *D.* Diez á veinte gotas mañana y noche.

8717. T. DE ESTRICNINA, Alcohol ó alcoholado de estriknina (Maugendie).

℥ Estriknina. ḡiij (15 cent.).
Alcohol á 36°. . . . ℥j (30 gr.).

H.S. A. D. Seis á veinte gotas en una pocion ó en una bebida apropiada. Tambien se usa exteriormente en fricciones, mezclándola con manteca de puerco en la proporción de 50 partes de tintura por 70 de grasa, aunque es preferible usar la pomada ó el aceite de veratrina.

8718. T. FEBRIFUGA (Clutton).

℞ Alcohol. ℥iij (90 gr.).

Acido sulfuroso,

Acido sulfúrico,

Cloruro de sodio, ãã. . ℥ij (60 gr.).

Se digiere durante ocho dias y se destila después hasta la sequedad. Se añade al líquido destilado:

Raiz de angélica,

Raiz de aristoloquia,

Sem. de cardamomo, ãã. ℥jß (45 gr.).

D. Se añade c. s. de esta tintura á agua endulzada con miel ó jara-be para darle una acidez agradable. Se da como bebida ordinaria á los enfermos que tienen calenturas intermitentes.

8719. T. DE ASA FÉTIDA (F. DE L.).

℞ Asa fétida. 1

Alcohol amoniacal. 16

Se digiere durante veinticuatro horas, y se destila hasta la sequedad al calor del baño maría.

8720. Otra (VAN MONS).

℞ Alcohol amoniacal. 128 gotas.

Asa fétida. 6 partes.

Se infunde en frio durante algunos dias y se añade:

Aceite de cuerno de ciervo. 1

Aceite de sucino 1

Se filtra al dia siguiente.

I. Es antihistérica y antiespasmódica. D. Diez ó veinte gotas en un vaso de agua fria, tres veces al dia.

8721. T. FOSFORADA.

℞ Fósforo. ḡjv (2 dec.).

Aceite de valeriana. . . ℥jß (6 gr.).

Aceite animal de Dip-

pel. ℥j (4 gr.).

I. Calenturas intermitentes ó tifoides. D. ḡjv á ḡxviiij (20 cent. á 1 gr.) en medio vaso de agua azucarada.

8722. T. ETÉREA DE FÓSFORO ó Eter fosforado (F. F.).

℞ Fósforo. ℥j (4 gr.).

Eter sulfúr. purísimo. ℥L (200 gr.).

Se pone el éter en un frasco de tapon esmerilado cubierto de papel negro; se echa en seguida el fósforo cortado en pedacitos y lavado antes con un poco de éter; se deja en maceracion por un mes cuidando de menear de cuando en cuando, y se reparte en frascos pequeños tapados herméticamente y cubiertos con papel negro.

I. Estimulante del sistema nervioso. D. Cinco á diez gotas en un julepe ó pocion.

Cada onza (32 gr.) disuelve ḡjv (2 dec.) de fósforo.

El ETER FOSFORADO DE PELLETIER se prepara con ℥jv (125 gr.) de éter sulfúrico y ḡxxviiij (14 dec.) de fósforo puro. D. Doce á cuarenta gotas.

8723. T. DE FÓSFORO ó Alcohol de fósforo.

℞ Fósforo. ḡj (5 cent.).

Alcohol de 90° cent. . . ℥j (30 gr.).

Se trituran con precaucion y se decanta.

8724. T. DE GENCIANA AMONIAL ó Elixir antiescrofuloso (F. F.).

℞ Genciana. ℥j (32 gr.).

Carbonato de amon. ℥ij (8 gr.).

Alcohol de 21°. lbij (1000 gr.).

Se macera por ocho dias, se cue-la con expresion y se filtra.

Si en lugar del carbonato de amoniaco se ponen ℥iij (12 gr.) de carbonato de sosa cristalizado se obtendrá el elixir antiescrofuloso de Peyrilho, que puede usarse contra los accidentes sífilíticos secundarios, y principalmente contra las exóstoses.

I. Escrófulas, infartos de las

visceras del bajo vientre, escorbuto, lupus, sífilis. *D.* De ʒj á ʒjv (4 á 15 gr.) en una pocion.

8725. T. DE GENCIANA COMPUESTA,
Alcoholado de genciana compuesto,
Elixir estomacal (F. P.).

ʒ Raiz de genciana. 2
Canela. 1
Semillas de cardamomo. 1
Alcohol de 22° B. 60

Se digiere por seis dias y se filtra.

I. Enfermedades asténicas, atonía del estómago é intestinos, calenturas intermitentes asténicas, etc. *D.* ʒj á ʒij (4 á 12 gr.).

8726. T. DE GENCIANA COMPUESTA
(F. DE L.).

ʒ Genciana cortada en pedazos. ʒijß (80 gr.).
Cáscaras de naranja en pedazos. ʒx (40 gr.).
Semillas de cardamomo menor. ʒv (20 gr.).
Espiritu de vino. lbijß (1250 gr.).

Se macera durante catorce dias y se cuele.

I. Es tónica y estomacal. Dispepsia. *D.* De ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).

8727. T. DE GENCIANINO
(Magendie).

ʒ Alcohol de 24°. ʒj (30 gr.).
Gencianino. ʒv (25 cent.).

H. S. A. I. Escrófulas, clorosis. *D.* Se usa para reemplazar al elixir de genciana á la dosis de ʒß á ʒij (2 á 8 gr.) en una pocion adecuada.

8728. T. GINGIVAL.

ʒ Tintura de bálsamo del Perú. ʒj (4 gr.).
Tintura de raiz de guayaco. ʒj (4 gr.).
Tintura de mirra. ʒij (8 gr.).
Espiritu de coclearia. ʒß (15 gr.).

8729. Otra, n. 2.

ʒ Laca en barras. ʒx (40 gr.).
Alumbre calcinado. ʒijß (10 gr.).
Alcoholato de coclearia compuesto, ʒx (320 gr.).

Se macera y se filtra.

I. Escorbuto, estomacace, aftas. *D.* Cuatro á cinco gotas en un vaso de agua para enjuagarse la boca.

8730. T. GINGIVAL DE CATECÚ.

ʒ Catecú,
Mirra, ãã. ʒß (15 gr.).
Bálsamo del Perú. ʒj (4 gr.).
Espiritu de coclearia. lbß (250 gr.).
Se filtra al cabo de dos dias.

I. Escorbuto, estomacace, aftas, dispepsia. *D.* ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) en media taza de agua para colutorio y gargarismos.

8731. T. DE GODEFROY ó Cordial de Godefroy.

ʒ Triaca,
Gengibre, ãã. ʒij (64 gr.).
Alcohol. 3 cuart. (1½ lit.).
Es. de sasafrás. ʒvj (24 gr.).
Agua. 24 cuart. (12 lit.).
Melaza. lbxjv (7000 gr.).
Tintura de opio. 4 cuart. (2 lit.).

H. S. A. I. Bronquitis. *D.* Una cucharadita de café en un vaso de tisana apropiada.

8732. T. DE GUAYACO (F. DE L.).

ʒ Resina de guayaco en polvo. ʒvij (224 gr.).
Espiritu de vino débil. lbijß (1250 gr.).

Se macera durante catorce dias y se filtra.

I. Excitante del sistema linfático, sudorífico. Reumatismos, afecciones artríticas, asténica, gota. *D.* ʒß á ʒij (6 á 24 dec.) en las veinticuatro horas.

8733. T. DE GUAYACO COMPUESTA.

℥ Tint. vol. de guayaco. ℥℞ (16 gr.).
 Tint. antimonial acre. . ℥iij (12 gr.).
 Tintura tebáica. ℥j (4 gr.).
 M. I. Ceática. D. De treinta á cuarenta gotas al dia en una tisana apropiada.

8734. Otra, n. 2.

℥ Guayaco. ℥j℞ (6 gr.).
 Sasafrás. ℥j (4 gr.).
 Palo de Rodas. ḡxviiij (4 gr.).
 Zarparrilla,
 Sándalo rojo,
 Sándalo cetrino, āā. . ℥℞ (2 gr.).
 Espíritu de fumaría. . ℥j℞ (48 gr.).
 Spielmann añade émula campana, ruibarbo, fumaría, ácido clorhídrico, y reemplaza el espíritu de fumaría por aguardiente.

8735. Otra (F. DE L.).

℥ Resina de guayaco en polvo. ℥vij (224 gr.).
 Espíritu de amoníaco aromático. ℞iij℞ (1250 gr.).
 Se macera durante catorce dias y se filtra.

I. Es estimulante, diaforética, antiespasmódica en la gota atónica, menstruaciones difíciles por atonía del sistema uterino, reumatismo crónico, cardialgia, cólico nefrítico. D. ℥℞ á ℥j (2 á 4 gr.) en una taza de leche ó agua tibia, dos veces al dia.

8736. T. DE GUAYACO JABONOSA (Plenk).

℥ Resina de guayaco, Jabon amigdalino, āā. ℥℞ (15 gr.).
 Alcohol rectificado. . ℥jv (125 gr.).
 Disuélvase.
 I. Artritis reumática, gota, reumatismo muscular y fibroso. D. ℥j (4 gr.) al dia.

8737. T. DE GUAYACO Y MIRRA ALOÉTICA ó Droga amarga contra la gota.

℥ Resina de guayaco,
 Acibar sucotr., āā. ℥x (40 gr.).
 Mirra. ℥xij (48 gr.).
 Alcohol de 21° C. . ℞j℞ (750 gr.).
 Se pone en digestion por diez dias y se filtra.

D. Dos cucharadas por la mañana en ayunas.

8738. T. DE GREENOUGH PARA LOS DIENTES.

℥ Almendras amargas. ℥ij (60 gr.).
 Palo del Brasil. . . . ℥℞ (15 gr.).
 Yemas de abeto. . . . ℥℞ (15 gr.).
 Lirio. ℥ij (8 gr.).

Cochinilla,
 Sal de acederas,
 Alumbre, āā. ℥j (4 gr.).
 Alcohol. ℞iij (1000 gr.).
 Espir. de coclearia. . ℥j℞ (45 gr.).
 M. Se macera durante ocho dias y se filtra.

I. Odontalgia y estomacace. D. Algunas gotas en un vaso de agua en gargarismo.

8739. T. VOLÁTIL DE GUAYACO (Deweese).

℥ Alcohol á 20°. ℞iij (1000 gr.).
 Resina de guayaco en polvo. ℞℞ (250 gr.).
 Fruto de pimienta de la Jam. en polvo. ℥ij (60 gr.).
 Carbonato de sosa. . ℥iij (12 gr.).
 H. S. A. y á cada ℥jv (125 gr.) de esta tintura se añade:

Amoníaco líquido. . ℥j (4 gr.).

I. Disnea, cardialgia, cefalalgia, cólico, disuria, reumatismo crónico, amenorrea. D. Esta tintura se toma á la dosis de una cucharada de café en un vaso pequeño de vino de Madera ó en una infusion aromática, como un remedio muy activo en los casos de menstruacion difícil.

Nota. Cuando existe plétora in-

flamatoria, este remedio seria mas dañoso que útil.

8740. T. DE RESINA DE GUAYACO AMONIACAL.

℞ Resina de guayaco. ḡxviii (4 gr.).
Alcohol alcanforado. ℥j℥ (6 gr.).
Amoniaco líquido. ℥℥ (2 gr.).
Filtrese.

I. Reumatismo crónico, lumbago, ceática, tétanos, dismenorrea y dispepsia. D. En fricciones tres veces al dia.

8741. T. DE HATFIELD.

℞ Guayaco,
Jabon, ãã. ℥ij℥ (40 gr.).
Alcohol. ℥iij (96 gr.).
H. S. A. I. Afecciones gotosas ó reumáticas. D. Una cucharadita de café en una tisana.

8742. T. DE RENUEVOS DE HELECHO MACHO (*Peschier*).

℞ Renuevos de helecho macho. ℥j (30 gr.).
Eter sulfúrico. ℥℥ (250 gr.).
Se macera durante cinco á seis dias, se decanta y se conserva en una vasija tapada.

I. Es antihelmíntica. D. De ocho á treinta gotas en ocho ó treinta pildoras.

8743. T. HIDROCLÓRICA MERCURIAL ó *Solucion mercurial de Marryat*.

℞ Deutochlor. de merc. ḡxij (6 dec.).
Acido clorhídrico. ḡxxxvj (2 gr.).
Alcoholado de canela con espliego. ℥j (30 gr.).
Nota. Este licor contiene $\frac{1}{48}$ de deutochloruro.

I. Se usa como antisifilitica. D. Doce á veinte gotas, una ó dos veces al dia, en un cocimiento de avena.

8744. T. DE HINOJO ACUÁTICO (*Dr. Marcius*).

℞ Sem. de hinojo acuát. ℥℥ (15 gr.).
Alcohol. ℥vj (180 gr.).
Se digiere durante veinticuatro horas y se añade:
Vino moscado. ℥vj (180 gr.).
Se continúa la digestion durante dos dias y se filtra.

I. Tisis pituitosas. D. De diez á sesenta gotas en una pocion apropiada.

8745. T. DE HIPERICON VULNERARIA ó *Bálsamo católico* (F. E.).

℞ Flores secas de hipericon con las semillas. ℥℥ (15 gr.).
Raiz de cál. arom. ℥℥ (15 gr.).
Espíritu de vino. ℥xxxvj (1060 gr.).

Se pone á digerir en una vasija bien tapada por espacio de algunos dias en un sitio caliente, meneando de cuando en cuando. Entonces se añaden las sustancias siguientes quebrantadas:

Benjuí. ℥iij (90 gr.).
Estoraque,
Bálsamo de Tolú, ãã. ℥ij (60 gr.).
Mirra. ℥℥ (15 gr.).
Se digiere de nuevo y se cuele.

I. Se usa en las contusiones, torceduras, heridas, úlceras, mordeduras de animales venenosos y rabiosos, dolores de las articulaciones, infartos artríticos, parálisis de los oidos y de los dientes, y en las almorranas, aplicándola fria; en los dolores cólicos y de estómago. Se administra de seis gotas á ℥j (12 dec.).

8746. T. DE HOLLIN.

℞ Hollin. ℥j (4 gr.).
Canela,
Gengibre, ãã. ℥ij (8 gr.).
Se macera durante ocho dias en Alcohol á 22°. ℥j (30 gr.).
Se filtra.

Se usa como estimulante á la dosis de ʒj (4 gr.) en una tisana apropiada.

8747. T. DE HOLLIN (Duvillards).

ʒ Opio. ʒij (60 gr.).
Clavo. ʒj (4 gr.).
Hollin lavado. . . . ʒB (15 gr.).
Agua de canela. . . . lbB (250 gr.).
Aguardiente. . . . ʒjv (125 gr.).

I. Granulaciones, manchas de la córnea. *D.* Se tocan ligeramente con un pincel empapado en este licor.

8748. T. DE IODO (F. F.)

ʒ Iodo. ʒj (32 gr.).
Alcohol de 34° Cart. ʒxij (375 gr.).

Se disuelve á fuego lento y se filtra.

Esta tintura es mala, porque deja precipitar iodo cuando se la mezcla con agua.

I. Escrófulas, sífilis, bocio. *D.* Tres á cinco, diez ó quince gotas en una pocion ó en medio vaso de agua azucarada.

La TINTURA ALCOHÓLICA DE IODO DE LOS H. DE M. es igual á la anterior.

8749. T. DE IODO COMPUESTA (F. DE L.).

ʒ Iodo. ʒj (32 gr.).
Ioduro de potasio. ʒij (64 gr.).
Espír. de vino rect. lbijB (1250 gr.).

Se dejan en contacto hasta que se disuelvan perfectamente, y se filtran.

Nota. No se debe preparar esta tintura con mucha anticipacion.

I. Bocio, clorosis y escrófulas. *D.* De cuatro á diez gotas, tres veces al dia, en medio vaso de agua azucarada. Se aumenta progresivamente la dosis hasta veinte gotas, que es cerca de ʒj (5 cent.) de iodo.

La TINTURA DE IODO DE LOS H. M. solo se diferencia de la anterior en que contiene ʒB (2 gr.) de iodo.

8750. T. DE IODO DEBILITADA (Ricord).

ʒ Agua destilada. ʒij (96 gr.).
Tint. de iodo. . ʒj á ʒvj (4 á 24 gr.).

M. I. Bubones, hidrocele acompañado de epididimitis, etc. Se usa tópicamente.

8751. T. DE IODO Y QUINA.

ʒ Iodo,
Ioduro de potasio,
Extracto de quina, ãã. ʒB (15 gr.).
Alcohol de 56° cent. . . ʒj (30 gr.).

I. Escrófulas, sífilis, anafrodisia y epilepsia. *D.* ʒj (4 gr.) á ʒB (15 gr.) en un vaso de tisana de gen-ciana.

8752. T. DE IODURO DE HIERRO (Pierquin).

ʒ Ioduro de hierro. . . . ʒij (8 gr.).
Alcohol rectificado,

Agua comun, ãã. . . . ʒij (60 gr.).
H. S. A. I. Amenorrea, flores blancas. *D.* De ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.) en una bebida apropiada.

8753. T. DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (Magendie).

ʒ Deutoioduro de merc. ʒxx (1 gr.).
Alcohol de 36°. . . . ʒjB (45 gr.).
Disuélvase.

I. Afecciones escrofulosas, formas secundarias de la sífilis, enfermedades cutáneas crónicas. *D.* Diez á veinte gotas y mas, aumentando progresivamente en un vaso de agua azucarada.

Nota. Veinte gotas de esta solucion contienen aproximadamente 1/8 (6 á 7 mil.) de grano de deutoioduro.

8754. T. DE IODURO DE POTASIO (Puche).

ʒ Ioduro de potasio,
Iodo puro, ãã. ʒB (15 gr.).

Alcohol á 22°. ℥j (30 gr.).
M. I. Escrófulas y sífilis complicada con escrófulas. **D.** De dos á ocho gotas en una tisana de gen-ciana.

8755. T. DE IPECACUANA ANISADA
(Alibert).

℥ Ipecacuana. 1
 Espíritu de anís. 4
 Digierase.

I. Embarazo gastrico, calenturas biliosas, sabañones. **D.** Se administra á los niños como emética á la dosis de ℥β á ℥j (2 á 4 gr.).

8756. T. DE JABON (F. F.).

℥ Jabon blanco. ℥iij (96 gr.).
 Carbonato de potasa. ℥j (4 gr.).
 Alcohol á 21° Cart. . ℥xij (375 gr.).

Se maceran hasta disolver completamente el jabon, y se filtra.

I. Reumatismo, contusiones, etc. **D.** Se usa en fricciones como resolutive.

8757. T. DE JABON ó Esencia de jabon.

℥ Jabon de aceite comun, blanco, seco y raspado. 4
 Alcohol de 26° Cart. 4

Se disuelve en frio en un matraz y se filtra.

I. Resolutiva y contra los dolores reumáticos.

Se puede aromatizar esta tintura con ℥ij (8 gr.) de aceite volátil de limon, de bergamota, de romero ó cualquiera otro.

La *Esencia de jabon* de los perfumistas se prepara con

Jabon blanco. ℥xij (375 gr.).
 Agua destilada. . . . ℥bj (500 gr.).
 Alcohol de 26° Cart. ℥bij (1000 gr.).

Carbonato de potasa,
 Esencia de limon,

ó Esencia de espliego ó
 agua de olor, āā. ℥β (15 gr.).

Se disuelve el jabon en el agua

y en el alcohol, se añade el carbonato de potasa, despues la esencia, y se filtra.

Este alcoholado hace mucha espuma por la agitacion, y sirve para el tocador.

I. Dolores reumáticos, gotosos, contracturas, etc.

8758. T. DE JABON SUCINADA.

℥ Aceite de sucino rect. ℥ij (8 gr.).
 Carbonato de potasa,

Jabon, āā. ℥j (4 gr.).
 Alcohol. ℥jv (125 gr.).

I. Reumatismo crónico. **D. C. s.** en fricciones.

8759. T. DE JALAPA COMPUESTA ó Aguardiente aleman (F. F.).

℥ Raiz de jalapa. . . . ℥ββ (250 gr.).
 Raiz de turbit. . . . ℥j (32 gr.).

Escamon. de Alepo. ℥ij (64 gr.).
 Alcohol de 21°. . . . ℥bvj (3000 gr.).

Se ponen en maceracion por espacio de quince dias, se cuele con expresion y se filtra.

I. Estreñimiento. **D.** Esta tintura se emplea como un excelente purgante á la dosis de ℥j á ℥jβ (30 á 45 gr.).

Si se añaden algunos aromas como la canela, el clavo, el cilantro y el sándalo rojo, se tiene el *Aguardiente aleman aromático*. Tambien la llaman algunos *Elixir purgante oficial de Lavolley*.

8760. T. ETÉREA DE KLAPROTH ó Tintura etérea de acetato de hierro, Eter acético ferruginoso de Klaproth.

℥ Acido acético á 10°. c. s. q.
 Hidrato de peróxido de hier. c. s.

Se satura el ácido acético á fuego suave con el hidrato, y se filtra.

℥ De la solucion anterior. 6
 Eter acético. 2

Alcohol rectificado. 4
M. Esta tintura contiene la mitad.

de su peso de acetato de hierro periodado.

I. Es antiespasmódico. Dismenorrea; histérico, clorosis y parálisis. *D.* ʒxviij á ʒβ (1 á 2 gr.) en un vaso de infusión fría de valeriana.

8761. T. ACUOSA DE LACA (F. E.).

- ʒ Resina laca pura trit. ʒj (30 gr.).
- Alumbre purificado. ʒβ (15 gr.).
- Agua de rosas. lbjβ (750 gr.).

Se ponen en digestión en un bote de cristal bien tapado, y cuando la tintura está encarnada se filtra.

I. Dentífrico.

8762. T. DE LAUDERER.

- ʒ Hojas de laurel real. . ʒij (60 gr.).
- Clavo. ʒij (8 gr.)
- Alcoholato de espliego,
- Alcohol. de orég., añ. ʒvj (180 gr.).

Se digiere á fuego lento ó se macera durante seis días, se cuele y se añade:

- Eter sulfúrico. ʒβ (15 gr.).

I. Calvicie. *D.* En lociones en el cuero cabelludo.

8763. T. LEGIVIAL (Vogler).

- ʒ Agua hirviendo. . . lbijβ (1250 gr.).
- Cenizas graveladas. ʒxv (470 gr.).
- Raiz de genciana. . ʒiv (125 gr.).
- Cásc. de nar. secas. ʒij (60 gr.).

Se digieren durante dos días y se añade:

- Alcohol rectificado. ʒij (60 gr.).

Se filtra.

I. Infartos escrofulosos, atrofia y arenillas. *D.* ʒj (4 gr.) que se toma en tres veces al día, en un vehículo apropiado.

8764. T. DE LOBELIA INFLADA (J. Andrew).

- ʒ Hojas de lobelia inflada. ʒijβ (75 gr.).
- Alcohol de 18°. lbj (500 gr.).

Se digiere durante quince días y se filtra.

I. Asma. *D.* De treinta á cuarenta gotas en una taza de infusión de manzanilla muchas veces al día, según la gravedad de la enfermedad.

8765. T. DE LUPULINA (Magendie).

- ʒ Alcohol á 36°. 2
- Lupulina machacada. 1

Se digiere durante seis días en una vasija tapada, se cuele; se exprime fuertemente, se filtra y se añade la cantidad necesaria de alcohol á 36° para obtener tres partes de tintura.

I. Escrófulas y ciertas afecciones cutáneas. *D.* De veinte á cincuenta gotas en una pocion apropiada.

8766. T. ALCOHÓLICA DE LÚPULO.

- ʒ Flores de lúpulo. . . ʒj (30 gr.).
- Alcohol de 21° Cart. . lbβ (250 gr.).

H. S. A. Contiene lupulina, aceite volátil y resina.

I. Se usa como narcótica.

8767. T. DE LÚPULO ALCALINA ó Licor de los tiñosos.

- ʒ Lúpulo,
- Centaurea menor, añ. ʒj (30 gr.).
- Cáscara de naranjas amargas. ʒij (8 gr.).
- Carbonato de pot. . ʒj (12 dec.).
- Alcohol de 56°. . . ʒxviij (560 gr.).

Se filtra después de ocho días de maceración.

I. Herpes, tiña, lepra. *D.* ʒj (30 gr.) en un vehículo apropiado.

8768. T. DE MALATO DE HIERRO.

- ʒ Zumo reciente de manzanas ácidas, ó mejor aún zumo de membrillo. . . lbij (1500 gr.).
 - Limaduras de hierro porfirizadas. lbj (500 gr.).
- Se deja algún tiempo el zumo

sobre el metal, y se tiene cuidado de menear á menudo. Cuando el zumo está saturado al parecer, se le decanta y se añade de nuevo mas zumo hasta que todo el hierro esté disuelto; se reunen estas soluciones y se las evapora hasta la mitad de su peso; entonces se añade una parte de alcoholato de canela por cada seis partes de la solucion concentrada, se digiere la mezcla durante algun tiempo y se filtra.

I. Clorosis, debilidad del estómago y atrofia mesentérica. *D.* De ℥j á ʒj (12 dec. á 4 gr.) en un vehiculo apropiado.

8769. T. DE MELATO DE HIERRO (F. A.).

℥ Extracto de malato de hierro. ʒij (60 gr.).
Alcohol,
Agua de canela, añ. ℥ss (250 gr.).
Se digiere durante suficiente tiempo, se filtra y guarda.

8770. T. DE MARTE CON ELÉBORO.

℥ Extr. de eléb. negro. ʒij (8 gr.).
Tint. de marte aperit. ʒjv (125 gr.).
M. I. Melancolía, hipocondría, calenturas cuartanas. *D.* Cuarenta á sesenta gotas.

8771. T. DE MARTE TARTARIZADA (F. F.).

℥ Limaduras de hierro puras. 400
Crémor de tártaro. 250
Alcohol á 33° Cart. 50
Se ponen las limaduras de hierro y el crémor de tártaro en una caldera de hierro, y se les añade c. s. de agua para hacer de todo una masa blanda que se abandona á sí misma durante veinticuatro horas; entonces se vierte sobre ella:
Agua de lluvia. 3000

Se hierva durante dos horas meneando y añadiendo agua hirviendo para reemplazar á la que se evapora. Se deja aposar, se decanta el líquido que sobrenada, se le filtra y se le evapora hasta que marque 32°. Se añade el alcohol y se mezclan exactamente.

I. Es tónica y se usa en la amenorrea, clorosis y escrófulas. *D.* De veinte á cuarenta gotas en una pocion ó en un poco de agua azucarada.

8772. T. DE LOS METALES, Liliun de Paracelso, Alcoholado de potasa antimoniado.

℥ Antimonio metálico. 4
Estaño puro. 4
Cobre. 4

Se funden estos tres metales juntos en un crisol, se pulveriza la liga, y se mezclan exactamente las dos sales siguientes:

Nitrato de potasa. 6
Bitartrato de potasa. 9

Se echan por partes en un crisol enrojecido; se calienta fuertemente, se vierte la materia sobre una plancha de hierro fundido, se pulveriza con prontitud, y se introduce todavía caliente en un matraz que contenga:

Alcohol de 38° Cart. 32

Se pone en digestion en una estufa por quince dias y se filtra.

8773. T. DE MIRRA COMPUESTA Ó Alcohol de mirra (F. N. P.).

℥ Mirra,
Catecú, añ. ʒj (30 gr.).
Bálsamo del Perú. . . ʒj (4 gr.).
Espiritu de coclearia,
Alcohol de 22°, añ. . . ʒjv (125 gr.).

Se macera durante cuatro dias y se cuele.

I. Ulceras atónicas, úlceras esorbúticas, caries de los huesos. *D.* En inyecciones y en planchuelas.

8774. T. DE MIRRA COMPUESTA ó Agua de Madama Beaumont.

- ℥ Mirra,
 - Aristoliquia,
 - Semillas de perejil, ãã. ʒß (16 gr.).
 - Amapola. ʒvj (24 gr.).
 - Alcanfor. ʒß (16 gr.).
 - Opio. ʒiij (12 gr.).
 - Hipericon. ʒjß (48 gr.).
 - Aguardiente. lbvj (3 kil.).
- I. Catarro útero-vaginal y como cosmética.

8775. T. ALCOHÓLICA DE MIRRA UTERINA ó Esencia antihistérica (F. E.).

- ℥ Mirra escogida,
- Asa fétida,
- Azafran,
- Castóreo, ãã. ʒjß (6 gr.).
- Alcanfor. ʒj (4 gr.).
- Carbonato de amoníaco cristalizado. . ʒij (8 gr.).
- Aceite dest. de suc. . ʒß (2 gr.).
- Alcohol. lbß (250 gr.).

Se prepara S. A. una tintura, que se filtra y guarda en una vasija bien tapada.

I. Afecciones histéricas y epilépticas. D. De diez á veinte gotas.

8776. T. ALCOHÓLICA DE MIRTILO (Reiss).

- ℥ Bayas recientes de arándano. 400
 - Aguardiente. 1000
- Se macera durante quince dias.
I. Diarrea, escorbuto, afecciones catarrales. D. Un vasito.

8777. T. ALCOHÓLICA DE MOSTAZA (Faure).

- ℥ Aceite volátil de mostaza. 1
 - Alcohol de 25° Cart. 20
- Se mezcla y filtra.

Produce una viva irritacion cuando se la aplica sobre la piel por medio de un pedazo de fra-

nela ó un lienzo fino, que se puede humedecer diferentes veces. A los dos ó tres minutos ha producido efecto. Se puede conseguir hasta la vexicacion.

8778. T. DE MOSTAZA (H. de S. J.).

- ℥ Mostaza en polvo fino. ʒij (60 gr.).
 - Alcohol de 66° cent. ʒxij (375 gr.).
- Se digiere por seis dias, se filtra y se añade:

Esencia de mostaza. . ʒj (4 gr.).
Se puede usar como rubefaciente.

8779. T. DE NAFTALINA, Aguardiente ó Alcoholado de naftalina (Rossignon).

- ℥ Naftalina. 4
 - Aguardiente de 58° cent. 39
- Disuélvase.

Se le ha propuesto para reemplazar el aguardiente alcanforado.

8780. T. NERVAL Y TÓNICA.

- ℥ Alcohol de 34° Cart. lbjß (750 gr.).
- Valeriana,
- Yerbabuena de sabor de pimienta, ãã. . ʒjß (45 gr.).
- Castóreo. ʒj (30 gr.).
- Azafran. ʒß (15 gr.).
- Esenc. de yerbab. . ʒj (4 gr.).

H. S. A. I. Espasmos y debilidad del estómago. D. De veinte á treinta gotas en un vehículo apropiado.

8781. T. NERVINO-TÓNICA (Bestuckef).

- ℥ Cloruro de hierro líquido. 4
- Acido nítrico. 4

Se filtra y se evapora hasta la sequedad en el baño de arena en una cazuela de porcelana.

Se expone la masa desecada en una cueva; atrae la humedad del aire y se resuelve en un líquido que se llama *aceite de Marte*. Se filtra este líquido y se le mezcla con doble de su peso de éter

sulfúrico; se la agita hasta que despues de haberle dejado aposar, haya tomado el éter un color amarillo de oro; se decanta el éter y se le mezcla con el doble de su peso de alcohol muy rectificado, meneando la mezcla en un frasco con tapon esmerilado.

I. Enfermedades espasmódicas y asténicas. D. De veinte á treinta gotas en un vehículo acuoso apropiado.

8782. T. DE NUEZ DE AGALLA COMPUESTA ó Alcoholado tánico (Lepère).

℥ Nuez de agalla. . . . ℥bj (500 gr.).
Se la reduce á polvo grueso y se echa en

Agua comun. . . . ℥bjv (2000 gr.).
Se deja hervir hasta que se reduzca á la mitad, se cuele y se añade al líquido colado despues de frio

Alcohol rectificado. ℥bj (1000 gr.).
Alcoholato de limon compuesto. . . . ℥jv (125 gr.).

I. Cosmético; blenorrea, leucorrea, reblandecimiento del cuello de la matriz, etc., y para prevenir un gran número de afecciones de este órgano. D. Se le dilata en seis á diez veces su peso de agua, y se usa en lociones y principalmente en inyecciones.

8783. T. DE NUEZ VÓMICA.

℥ Alcohol á 34° Cart. 4
Nuez vómica. 4

H. S. A. I. y D. Esta tintura se administra á gotas en pociones y en bebidas en los mismos casos que la estricnina. Se administra en fricciones en las partes atrofiadas ó paralizadas.

8784. T. DE NUEZ VÓMICA ó Alcoholado de nuez vómica (Magendie).

℥ Alcohol á 36°. . . . ℥j (30 gr.).

Extracto seco de nuez vómica. ḡiij (15 cent.).
Se disuelve. Se usa en las mismas circunstancias que el extracto alcohólico en sustancia. D. Veinte á treinta gotas y aun mas en pociones ó en bebidas; á dosis mas fuertes en fricciones sobre las partes paralizadas ó atrofiadas.

8785. T. DE NUEZ VÓMICA ó Gotas uterinas de la reina de España.

℥ Extracto de nuez vómica. 4
Alcohol de 34° Cart. 192
Disuélvase y filtrese.

I. Excitante útil en la parálisis, atrofiyas parciales. D. Cuarenta á ochenta gotas aumentando, y en fricciones á las partes afectadas.

8786. T. DE NUEZ VÓMICA AMONIACAL (Magendie).

℥ Tintura de nuez vómica. ℥j (32 gr.).
Amoniaco concentrado. ℥ij (8 gr.).
M. I. Cólera. D. En fricciones.

8787. T. ODONTÁLGICA ó Tintura de raiz de pelitre odontálgica (F. E.).

℥ Raiz de pelitre. ℥vj (24 gr.).
Rasur. de palo de guay. ℥ij (64 gr.).
Rasuras de palo de sa-
safrás. ℥j (32 gr.).
Hojas de tabaco. ℥iij (12 gr.).
Sumidades de tomillo,
Sum. de orégano, ãã. ℥ij (8 gr.).
Clavo. ℥j (4 gr.).
Alcanfor,
Opio, ãã. ℥jß (6 gr.).

Se infunden todas las sustancias quebrantadas en ℥iij (1500 gr.) de alcohol; se dejan digerir por doce dias, se cuele y se guarda.

I. y D. Enjuagándose con esta tintura se calman los dolores de muelas y dientes.

8788. T. ODONTÁLGICA ó Alcohol odontálgico (F. N. P.).

℥ Clavo,
Opio,
Canela, ãã. ʒij (8 gr.).
Pelitre. ʒj (4 gr.).
Resina. ʒʒ (16 gr.).
Alcohol de 22°. ℔ʒ (250 gr.).
Se digiere por tres dias y se filtra.

I. Odontalgia pútrida, principalmente por la diátesis escorbútica.

8789. T. ODONTÁLGICA ó Paraguay rojo.

℥ Hojas y flores de la énula de dos frentes. ʒ
Flores de berro de Pará. ʒ
Raiz de pelitre. ʒ
Alcohol de 33°. ʒ
Se hacen macerar durante quince dias.

Este remedio es célebre como odontálgico.

I. Odontalgia, escorbuto, estomacace. D. Se empapa un poquito de algodón en el líquido, y se introduce en el diente cariado, ó se añaden algunas gotas á un vaso de agua clara, y se usa para enjuagarse la boca.

8790. PARAGUAY CON CREOSOTA.

℥ Paraguay rojo. ʒijʒ (10 gr.).
Creoseta. ʒj (4 gr.).
D. Se usa del mismo modo que el paraguay rojo.

8791. T. ODONTÁLGICA, Tesoro para la boca.

℥ Alcoholato de coclearia,
Alcohol. de espl., ãã. ʒvj (180 gr.).
Alcoholato de menta,
Alcoholato de lim., ãã. ʒiij (90 gr.).
M. D. Una cucharadita de café en un vaso de agua para enjuagarse la boca.

8792. T. DE OPIO.

℥ Opio. ʒ
Alcohol de 21° Cart. ʒʒ
Se macera por ocho dias, se cuela con expresion y se filtra.
Veinticuatro partes de tintura corresponden á dos de opio y una de extracto.

8793. T. DE OPIO ALCANFORADA ó Tintura de opio alcanforado (F. P.).

℥ Alcanfor. ʒ
Opio. ʒ
Acido benzóico. ʒ
Aceite esencial de anís. ʒ
Alcohol de 32° B. 1000
Se digiere por siete dias y se filtra. Media onza (15 gr.) contiene casi ʒj (5 cent.) de opio.

I. Anodina, antiespasmódica; disneas periódicas. D. ʒʒ á ʒj (2 á 4 gr.) y mas. V. n. 8795.

8794. T. DE OPIO ALCANFORADA ó Tintura antiespasmódica alcanforada (Chrestien).

℥ Opio en bruto. ʒij (8 gr.).
Alcanfor. ʒjv (16 gr.).
Aguardiente. ℔j (500 gr.).
Se macera durante tres ó cuatro dias y se filtra.

Se usa en los mismos casos que la antiespasmódica. Sin embargo, es muy eficaz en las afecciones reumáticas y calenturas intermitentes complicadas con dolores reumáticos. D. En fricciones, y en el último caso se la mezcla con partes iguales de tintura alcohólica de quina.

8795. T. DE OPIO AMONIACAL ó Elixir paregórico (F. F.).

℥ Opio. ʒij (8 gr.).
Flores de benjuí,
Azafran, ãã. ʒiij (12 gr.).
Aceite esenc. de anís. ʒʒ (2 gr.).

Amoniaco líquido. ℥v (160 gr.).

Alcohol á 34°. ℥xj (352 gr.).

Se macera por ocho dias y se filtra.

I. Coqueluche, asma, histérico, afecciones convulsivas. *D.* De veinte á treinta gotas al dia en un poco de azúcar ó en una pocion.

8796. T. DE OPIO CON CANELA.

℥ Extracto de opio. 2

Alcohol de 36° Cart. 41

Agua destilada de canela. 41

Se disuelve el extracto en los dos líquidos reunidos y se filtra.

Esta tintura contiene $\frac{1}{12}$ de su peso de extracto de opio.

8797. T. DE OPIO CIDONIADA ó *Esencia de Langelot.*

℥ Extracto de opio cidoniado. 4

Espiritu de enebro. 4

Disuélvase y filtrese.

8798. T. DE OPIO COMPUESTA (*Carron de Villards*).

℥ Opio. ℥ij (60 gr.).

Clavo. ℥j (4 gr.).

Hollin lavado. ℥jv (15 gr.).

Agua de canela. lb℥ (250 gr.).

Aguardiente. ℥jv (125 gr.).

Se digieren durante seis dias, se cuele con expresion y se filtra.

I. Se tocan las granulaciones y manchas de la córnea con un pincel empapado en este líquido.

8799. T. DE EXTRACTO DE OPIO (F. F.).

℥ Extracto de opio ℥j (32 gr.).

Alcohol de 24° Cart. ℥xij (375 gr.).

Se macera suficientemente hasta que se disuelva el extracto y se filtra.

I. V. Opio. *D.* Seis á veinte gotas en una pocion ó en un julepe.

8800. T. ALCOHÓLICA JABONOSA DE OPIO ó *Bálsamo anodino* (F. E.).

℥ Jabon blanco. ℥j (32 gr.).

Opio. ℥℔ (16 gr.).

Alcanfor. ℥vj (24 gr.).

Azafran. ℥j (4 gr.).

Se cortan en pedazos y se ponen á digerir en una vasija tapada por espacio de ocho dias en ℥xviiij (564 gr.) de alcohol comun y se cuele. Cada onza (30 gr.) contiene ℥xvj (8 dec.) de opio.

I. Se usa en los dolores gotosos y reumáticos, á la dosis de ℥ij (8 gr.) para fricciones.

8801. T. PAREGÓRICA ó *Tintura alcohólica de opio* (F. E.).

℥ Opio en pedazos. ℥ij (60 gr.).

Azafran contundido. ℥℔ (15 gr.).

Canela de Manila quebrantada. ℥ij (8 gr.).

Espiritu de vino comun,

Agua, ãã. ℥xij (375 gr.).

Se pone en digestion durante ocho dias y se filtra. Cada escrupulo (12 dec.) contiene ℥ij (1 dec.) de opio.

I. Se usa en los mismos casos que el láudano líquido. *D.* De nueve gotas á ℥j (12 dec.).

8802. T. PARA HACER CRECER EL PELO (*Landerer*).

℥ Hojas de laurel real. ℥ij (60 gr.).

Clavo. ℥ij (8 gr.).

Espiritu de espliego,

Espir. de orégano, ãã. ℥jv (125 gr.).

Se digiere á fuego lento y se añade:

Eter sulfúrico. ℥℔ (15 gr.).

8803. T. ETÉREA DE PELITRE.

℥ Raiz de pelitre. 4

Eter sulfúrico. 4

H. S. A. I. Odontálgico, que se usa empapando un poquito de al-

godon que se introduce en el diente cariado.

8804. T. ALCOHÓLICA DE PELITRE FLOJA.

℥ Raiz de pelitre. ℥j (30 gr.).
 Espiritu de romero. . ℥bj (500 gr.).
 H. S. A. Se usa para el tocador.

8805. T. DE PELITRE FUERTE.

℥ Raiz de pelitre. ℥j (30 gr.).
 Alcohol de 36°. ℥jv (125 gr.).
 H. S. A. Esta tintura contiene todas las partes acres de la raiz. D. 5℔ á 3j (2 á 4 gr.) en ℥jv (125 gr.) de agua para colutorio.

8806. T. ALCOHÓLICA DE PEZ GRIEGA COMPUESTA ó Bálsamo de Salazar (F. E.).

℥ Pez griega. ℥℔ (45 gr.).
 Incienso bueno,
 Resina almáciga,
 Acibar sucotrino, añ. ℥j (30 gr.).
 Alcohol. ℥Lx (1875 gr.).
 Se contunden ó se las pulveriza, se ponen en digestion por veinte dias en una vasija de vidrio grande y bien tapada, se filtra y se guarda.
 Se usa exteriormente.

8807. T. PURGANTE ó Tintura de elaterina (Morrus).

℥ Elaterina. ℥ij (24 dec.).
 Alcohol. ℥j (30 gr.).
 Acido nítrico. 4 gotas.
 M. I. Hidropesía pasiva y ascitis, estreñimiento, sabañones, hemorroides. D. Treinta ó cuarenta gotas en agua de canela.

8808. T. DE QUINA DE LOJA (F. F.).

℥ Corteza de quina gris. ℥jv (125 gr.).
 Alcohol á 21° Cart. . ℥bj (500 gr.)

Se macera durante quince dias, se cuele con expresion y se filtra.

Del mismo modo se preparan las tinturas con la corteza de QUINA AMARILLA, QUINA ROJA, PALO DE GUAYACO (tintura llamada aguardiente de guayaco), raices de ÉNULA CAMPANA, JALAPA, IPECACUANA, GENCIANA, QUASIA AMARGA, RUIBARBO, VALERIANA, bulbo de ESCILA ó CÓLCHICO, hojas de AJENJOS, ACÓNITO, BELLADONA, CICUTA, BELEÑO, SENÓ ESTRAMONIO Y CATECÚ.

8809. T. DE QUINA ó Rosoli de quina (Pierquin).

℥ Tintura saturada de quina roja. ℥℔ (250 gr.).
 Agua de flores de naranjo,
 Azúcar en polvo fino, añ. ℥xij (375 gr.).
 Jar. de culantrillo. . ℥℔ (250 gr.).
 I. Calenturas intermitentes. D. Se toma á cucharadas.

8810. T. DE QUININA ó Alcoholado de quinina.

℥ Quinina en bruto. ℥j (30 gr.).
 Alcohol,
 Agua destilada, añ. ℥xj (350 gr.).
 Se filtra.
 I. Se usa como antiperiódica y para resolver el infarto del bazo, contra el que se dice que es mas eficaz que el sulfato de quinina. D. No se debe aumentar la dosis de sulfato de quinina, porque se precipitaria. Dos cucharadas de esta solucion representan ℥xviiij (1 gr.) de sulfato de quinina.

8811. T. ALCOHÓLICA DE RÁBANO COMPUESTA ó Tintura antiescorbútica.

℥ Raices de rábano. 4
 Simiente de most. negra machac. 2
 Sal amoniaco. 1
 Alcohol de 56°, 21° Cart. 8
 Alcoholato de coclearia compuesto. 8

Se macera durante ocho dias, se cuela con expresion y se filtra.

8812. T. DE RÁBANO RUSTICANO
ó *Alcoholato de rábano rusticano*
(F. P.).

℥ Raiz reciente de rábano rustic.	24
Parte am. de cásc. de naranja.	24
Yerba de coclearia.	48
Nuez moscada.	4
Alcohol de 22° B.	288

Se macera durante algun tiempo, se añade un poco de agua y se destilan 288 partes.

I. Es diurética, antiescorbútica y desobstruente. *D.* ℥℥ á ℥j (2 á 4 gr.).

8813. T. RESOLUTIVA
ESPIRITUOSA.

℥ Tintura de carbonato de potasa.	℥j (32 gr.).
Tint. saxifraga blanca. ℥vj	(24 gr.).
Tintura de sucino.	℥iij (12 gr.).
Jabon de Alicante.	℥ij (8 gr.).

Mézclese y disuélvase.

I. Es antiespasmódica, nervina, diurética y sudorífica. *D.* De cuarenta á setenta gotas.

8814. T. RUBEFACIENTE.

℥ Aceite esencial de mostaza.	℥iij (12 gr.).
Alcohol de 25°.	℥℥ (250 gr.).

Disuélvase.

I. Parálisis, anestesia. *D.* Se empapa un pedazo de franela, y se aplica á la piel. I. Apoplejía, congestiones cerebrales, meningitis, anafrodisia, alopecia, anestesia, enuresis. *D.* Se aplica á las extremidades inferiores.

8815. T. DE RUIBARBO Y ACÍBAR
COMPUESTA, *Elixir sagrado, tintura sagrada* (F. ED.).

℥ Ruibarbo.	℥x (40 gr.).
---------------------	--------------

Acíbar.	℥vj (24 gr.).
Semillas de cardam. ℥℥	(16 gr.).
Aguardiente.	℥bij (1000 gr.).

Se macera durante ocho dias y se filtra por un papel.

I. Atonia de los órganos digestivos, dispepsia, anorexia, lombrices intestinales, escrófulas, ictericia, embarazo gástrico. *D.* ℥ij á ℥j℥ (8 á 45 gr.) sola ó en un vehiculo apropiado.

8816. T. DE RUIBARBO COMPUESTA.

℥ Ruibarbo quebrant. ℥j	(30 gr.).
Regaliz.	℥jv (15 gr.).
Gengibre.	℥ij (8 gr.).
Azafran.	℥ij (8 gr.).
Espíritu de vino.	℥bij (1000 gr.).
Agua.	℥xij (375 gr.).

Se filtra á los catorce dias de maceracion.

D. De ℥ij á ℥ij (8 á 60 gr.) como estomacal y catártica.

8817. T. VINOSA DE RUIBARBO
COMPUESTA (*Coqueret*).

℥ Ruibarbo.	℥j (30 gr.).
Genciana.	℥j℥ (6 gr.).
Serpentaria.	℥j (4 gr.).
Sem. de cardamomo. ℥j	(4 gr.).
Cásc. de nar. amarga. ℥j℥	(6 gr.).
Vino de Málaga.	℥℥ (250 gr.).
Alcohol de 80°.	℥℥ (250 gr.).

Se macera durante ocho dias y se filtra.

8818. T. DE RUIBARBO COMPUESTA
(F. DE L.).

℥ Ruibarbo.	℥ij℥ (80 gr.).
Regaliz.	℥vj (24 gr.).
Gengibre,	
Azafran, añ.	℥iij (12 gr.).
Espir. de vino deb. ℥bij℥	(1250 gr.).

Se macera durante catorce dias y se cuela.

D. Una cucharadita de café como tónico, antes de comer, para disipar las flatuosidades y facilitar las digestiones perezosas. *D.* ℥℥ á ℥j (15 á 30 gr.)

8819. T. DE RUSPINI PARA LOS DIENTES.

- ℥ Lirio de Florencia. . ℞℞ (250 gr.).
 Clavo. ℥j (30 gr.).
 Alcohol. ℞ij (1000 gr.).
 Ambar gris. ℥j (12 dec.).
 H. S. A. I. Dolores de muelas.

8820. T. DE SABINA COMPUESTA (F. P.).

- ℥ Extracto de sabina. 32
 Tintura de castóreo. 384
 Tintura de mirra. 576

Se macera hasta que se disuelva el extracto y se filtra.

I. Amenorrea, obstrucciones uterinas atónicas. D. Cinco á veinte gotas en un vehículo apropiado.

8821. T. DE SEN COMPUESTA (F. DE L.).

- ℥ Sen. ℥iij℞ (112 gr.).
 Alcaravea. ℥iij℞ (14 gr.).
 Cardamomo. ℥j (4 gr.).
 Pasas. ℥v (160 gr.).
 Espír. de vino deb. ℞ij℞ (1250 gr.).

Se macera durante catorce dias y se filtra.

I. Estomacal, carminativa, cártica; útil en los cólicos flatulentos y atonía del estómago. D. ℥j℞ á ℥vj (6 á 24 gr.).

8822. T. ETÉREA DE SUCINO (Beral).

- ℥ Aceite de succino. 4
 Eter sulfúrico. 45
 Disuélvase.

D. Quince á treinta gotas.

8823. T. ALCOHÓLICA DE SUCINO (F. E.).

- ℥ Succino amarillo sútilmente pulverizado. ℥ij (60 gr.).
 Alcohol. ℥xij (375 gr.).
 Se pone en infusion en frasco

de cristal con tapon de lo mismo, hasta que adquiriera el líquido color dorado, se filtra por papel de seda y se guarda.

D. ℥℞ á ℥℞ (6 dec. á 2 gr.).

Del mismo modo se preparan las tinturas de CASTÓREO, MIRRA, ASA FÉTIDA, BENJUÍ, LEÑO ALOES, QUERMES ANIMAL, ACÍBAR y otros semejantes.

8824. Otra (F. F.).

- ℥ Succino en polvo muy fino. ℥j (32 gr.).
 Alcohol de 34°. ℞ij (500 gr.).

Se digiere en una vasija tapada por seis dias y se filtra.

D. Doce gotas á ℥j (4 gr.) en una pocion apropiada.

8825. T. DE SULFATO DE CINCONINA ó Alcohol de sulfato de cinconina (Magendie).

- ℥ Sulfato de cinconina. . . ℥℞ (6 dec.).
 Alcohol de 32°. ℥j (30 gr.).

H. S. A. I. Calenturas intermitentes, atonía del conducto digestivo. D. ℥j á ℥℞ (4 á 15 gr.) en una pocion apropiada.

8826. T. DE SULFATO DE QUININA, Alcohol ó alcoholado de sulfato de quinina (Magendie).

- ℥ Sulfato de quinina. . . ℥vj (3 dec.).
 Alcohol de 32°. ℥j (30 gr.).

H. S. A. D. ℥ij á ℥jv (8 á 15 gr.) en una pocion ó julepe.

Nota. Cada dracma (4 gr.) contiene $\frac{3}{4}$ de grano de sulfato.

8827. T. ALCOHÓLICA SULFÚRICA DE GENCIANA COMPUESTA ó Elixir de vitriolo dulce (F. E.).

- ℥ Canela de Manila. . . ℥j (30 gr.).
 Cort. de nar. secas. . . ℥j (30 gr.).
 Raiz de genciana. . . ℥ij (60 gr.).

Se pulveriza y se añade:
 Alcohol sulfúrico. . . ℥xij (375 gr.).

Se dejan en infusion por cuatro dias y se filtra.

D. Ocho gotas á ℥j (12 dec.).

8828. T. DE SULFURO DE CARBONO
(Wutzer).

℥ Sulfuro de carbono. . . ℥ij (8 gr.).
Alcohol rectificado. . . ℥jv (16 gr.).

H. S. A. I. Gota, artritis reumática, reumatismo muscular y fibroso. *D.* Cuatro gotas cada dos horas.

8829. T. DE TABACO (Bauer).

℥ Hoj. secas de tabaco. ℥ij℞ (75 gr.).
Alcohol rectificado. . ℥xij (375 gr.).

Se digiere durante algunos dias, se filtra y se guarda.

I. Hemotisis. *D.* Una á tres gotas.

8830. T. DE TANINO ó Alcoholado
tánico (Boutigni).

Se introducen en un aparato grande de desalojamiento ℔viii (4000 gr.) de polvo grueso de nuez de agalla; se le aprieta ligeramente y se le cubre con una lámina agujereada de zinc, se echan encima diez quart. (5 lit.) de alcohol á 33°. El líquido pasa por las distintas capas, y á los cuatro dias se le deja salir por la llave inferior. Se repite tres ó cuatro veces esta operacion con nuevo alcohol hasta agotar el polvo: para esto bastan treinta quart. (15 lit.) de alcohol; entonces se le reemplaza por agua, que á la cantidad de diez á doce quart. (5 á 6 lit.) desaloja todo el alcohol que retenia el polvo.

Concluida ya esta operacion, se reúne el líquido en el baño maría de un alambique y se destila. Se recogen cerca de veintiocho quart. (14 lit.) de alcohol de los quince empleados en la operacion. En el baño maría quedan despues

de la destilacion un extracto, al que se añade ℔ij (1000 gr.) de alcohol. Luego que está disuelto, se añade esencia de bergamota, limon, espliego y tintura alcohólica de benjuí. Se deja enfriar y se filtra por papel. El líquido que resulta es pardo, cristalino, astringente y aromático, y es el alcoholado tánico.

I. Ha producido buenos efectos contra la blenorrea en inyecciones, y contra los flujos de las mujeres. Es muy astringente y se le debe dilatar en mayor ó menor cantidad de agua, segun la susceptibilidad de las partes.

8831. T. TEBÁICA (Bamberg).

℥ Agua de canela hor-
deada. ℔℞ (250 gr.).
Alcohol. ℥jv (125 gr.).
Opio en bruto. ℥ij (60 gr.).
Clavo. ℥j (4 gr.).

Se macera durante seis dias y se filtra.

I. y *D.* Se usa como calmante y antiespasmódica á la dosis de diez á veinte gotas en un vehiculo apropiado.

8832. T. TÓNICA (Roberto With).

℥ Quina en polvo. ℥j (30 gr.).
Raiz de genciana,
Cásc. de naranja, ña. . . ℥ij (12 gr.).

Se echa en ℔j (500 gr.) de aguardiente, se infunde durante seis dias, se cuele y se guarda.

D. Una cucharada en un vaso de agua fria, dos ó tres veces al dia.

8833. T. TÓNICA Y CALMANTE
(Grimaud).

℥ Quina en polvo grueso. ℥j (4 gr.).
Ipecacuana quebrant. ℥℞ (15 gr.).

Se infunde durante cuatro horas en una vasija tapada, con

Cocimiento de una ca-
beza de adormidera. ℔j (500 gr.).

Se cuele y se añade:

Jarabe de sucino,

Jarabe de tortuga, ãã. ʒij (12 gr.).

I. Dispepsia, atonía de los órganos digestivos y dolor de estómago. *D.* Una cucharada antes de comer.

8834. T. TRIACAL.

ʒ Triaca. 4
Aguardiente. 6
Van Mons la prescribe en la proporción de 1 á 3.

8835. T. DE VALERIANA.

ʒ Alcohol. ℥bj (500 gr.).
Raiz de valeriana. . . ʒij (60 gr.).
Esencia de limon. . . ʒj (4 gr.).
Clavo. ʒß (2 gr.).
Amoniaco líquido. . . ʒß (15 gr.).

Se digiere en un mortero, en el baño de arena, durante dos ó tres dias, se filtra el líquido y se embotella.

I. Epilepsia, etc. *D.* Veinte á treinta gotas en una infusion de raiz de valeriana.

8836. T. DE VALERIANA COMPUESTA (F. P.).

ʒ Valeriana. 4
Espiritu aromático de amoniaco. . . 8
Se macera durante catorce dias y se cuele.

I. Antiespasmódico eficaz. Afeciones nerviosas, epilepsia, calenturas adinámicas, histérico y convulsiones. *D.* ʒxviiij á ʒxxxvj (1 á 2 gr.) en una pocion.

8837. T. DE VERATRINA, Alcohol ó alcoholado de veratrina (Magendie).

ʒ Veratrina. ʒjv (2 dec.).
Alcohol. ʒj (30 gr.).
Disuélvase S. A.

I. Hidropesia, leucoflegmasia y anasarca, y exteriormente en fricciones en estas mismas enfer-

medades y en la gota. *D.* Este alcoholado se da á la dosis de diez á veinticinco gotas en una pocion.

8838. T. VINOSA DE HIERRO TARTARIZADA (F. E.).

ʒ Limaduras de hierro bien respland. ℥ß (250 gr.).
Tartrito acidulo de potasa impuro. . ℥bj (500 gr.).
Agua. ℥xij (6000 gr.).

Se cuece todo en una vasija de hierro, meneando continuamente con una espátula por espacio de doce horas y añadiendo la c. s. de agua hirviendo. Entonces se decanta el licor, se filtra y se evapora en una vasija de barro vidriado hasta que tenga la consistencia de extracto blando; despues se toma:

De esta masa salina. ʒiij (90 gr.).
Vino blanco. ʒxij (375 gr.).
Espiritu de vino. . . ʒß (15 gr.).
Se pone á digerir por ocho dias y se filtra.

I. Hidropesia, caquexia, amenorrea pasiva y clorosis. *D.* De ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).

8839. T. VULNERARIA ó Agua vulneraria roja (F. F.).

ʒ Hojas frescas de albahaca,
Hojas frescas de calaminta,
Hojas frescas de hisopo,
Hojas frescas de mejorana,
Hojas frescas de melisa,
Hojas frescas de menta piperita,
Hojas frescas de orégano,
Hojas frescas de romero,
Hojas frescas de ajedrea,
Hojas frescas de salvia,
Hojas frescas de séropol,
Hojas frescas de tomillo,
Hojas frescas de ajenjos,
Hojas frescas de angélica,
Hojas frescas de hinojo,
Hojas frescas de ruda,
Sumidades floridas de hipericon,
Sumidades floridas de espliego, ãã. . ʒj (32 gr.).
Alcohol de 31° Cart. ℥bj (1000 gr.).

Se cortan las plantas en pedazos, se las macera en alcohol por espacio de quince dias, se cuele el producto con expresion y se filtra.

Solo se diferencia del alcohol vulnerario en el grado de concentracion del alcohol y en el modo de prepararle.

I. Se usa como resolutivo en los sabañones, contusiones, etc.

8840. T. ALCOHÓLICA DE YEMAS DE ABETO.

℥ Yemas de abeto frescas. 4
Alcohol de 31° Cart. 6

Se macera por quince dias, se cuele con expresion y se filtra.

8841. T. DE YEMAS DE ABETO ó Esencia de abeto compuesta.

℥ Yemas de abeto. ℥j (32 gr.).
Guayaco. ℥v (20 gr.).
Sasafrás,
Enebro, ãã. ℥ijß (10 gr.).
Alcohol. ℥xij (375 gr.).

H. S. A. I. Escrófulas, herpes, leucorrea, histérico. D. ʒß á ʒß (2 á 15 gr.) en una pocion.

8842. T. DE ZEDOARIA COMPUESTA ó Esencia carminativa de Wedel.

℥ Raiz de zedoaria. ℥jv (125 gr.).
Raiz de carlina,
Raiz de cálamo aromático,

Raiz de galanga, ãã. ℥ij (64 gr.).
Flores de manzanilla,
Frutos de anís,
Frutos de alcaravea,
Cáscar. de nar., ãã. ℥j (32 gr.).
Clavo de especia,
Bayas de laurel, ãã. ℥vj (24 gr.).
Macis. ℥jv (16 gr.).
Alcohol. de cidra. ℥bjvß (2¼ kil.).
Alcoholado nítrico. ℥ijß (80 gr.).

Se pulverizan todas las sustancias secas; se las macera por quince dias en los dos alcoholes mezclados, se cuele, se exprime y se filtra.

I. Estomacal, carminativa, emenapoga y diurética. D. ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) en un vehiculo apropiado.

8843. T. DE EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA ó Alcoholado de extracto de zarzaparrilla.

℥ Alcohol á 20°. ℥xjv (440 gr.).
Extracto hidroalco-
hólico de zarzap. ℥ij (60 gr.).

Se disuelve el extracto en el alcohol, y despues se filtra por un papel.

Nota. Una onza (30 gr.) de este alcoholado representa un peso igual de zarzaparrilla.

8844. T. ALCOHÓLICA DE ZUMAQUE VENENOSO.

℥ Hoj. secas de zumaque venenoso. 1
Alcohol de 21° Cart. 4
Se macera durante quince dias, se cuele con expresion y se filtra.

TISANAS.

8845. TISANA ACIDULADA.

℥ Vinagre. ℥j (30 gr.).
Eter acético. ℥j (4 gr.).

Jar. de frambuesas. ℥iij (90 gr.).
Agua. ℥bij (1000 gr.).
H. S. A. I. Ictericia, calenturas biliosas, hepatitis, cálculos, flegmasias agudas, reumatismo, enagenacion.

8846. T. ALCALINA.

- ℥ Bicarbonato de sosa. ʒB (2 gr.).
 Infusion de tilo. . . . 2 cuart. (4 lit.).
 Jarabe simple. . . . ʒijB (50 gr.).

8847. Otra, n. 2.

- ℥ Bicarbonato de potasa cristalizado. . . ʒB (2 gr.).
 Tintura de canela,
 Tint. de vainilla, añ. . . ʒxviii (4 gr.).
 Jarabe simple. . . . ʒij (64 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).

Se toma á tazas en un dia. Se administran de cuatro á ocho cuartillos al dia contra los cálculos de ácido úrico. Se aumenta sucesivamente la dosis del bicarbonato hasta ʒB (15 gr.) al dia.

8848. T. ALBUMINOSA (Mondiere).

- ℥ Yemas de huevo bien frescas. número 6.
 Agua comun fria. . . . lbj (500 gr.).
 Se cuele y se añade S. A.
 Jarabe simple. ʒijj (90 gr.).
 Agua destilada de flor de naranjo. ʒij (8 gr.).

I. Diarrea, disenteria. D. Cuatro á seis cuartillos (2 á 3 lit.) á tazas en las veinticuatro horas.

Mondiere elogia mucho esta tisana en union con media lavativa de agua y clara de huevo.

8849. T. ALCALINA (Bielt).

- ℥ Carbonato de sosa. . . ʒB (2 gr.).
 Agua de cebada. . . . lbj (500 gr.).
 Se toman cuatro vasos al dia en los casos de líquen, prúrigo y afecciones crónicas con comezon.

8850. Otra (MASCAGNI).

- ℥ Carbonato de potasa. ʒij (8 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).
 I. Neumonía crónica. D. A cucharaditas en las veinticuatro ho-

ras. Uno ó dos litros al dia contra los cálculos de ácido úrico.

8851. T. AMARGA.

- ℥ Especies amargas. . . ʒB (16 gr.).
 Agua hirviendo. . . . lbij (1000 gr.).
 Se infunden por seis ó doce horas y se cuele por una estameña.
 Del mismo modo se preparan las infusiones ó tisanas de ESPECIES ANTIHELMINTICAS, BÉQUICAS, APERITIVAS, DIURÉTICAS, ASTRINGENTES, PECTORALES, etc.

8852. T. ANGÉLICA.

- ℥ Regaliz de angélica. ʒj (4 gr.).
 Alcohol,
 Jarabe simple, añ. . . ʒij (60 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).

Esta bebida se usa en la convalecencia de las enfermedades crónicas, y en todos los casos en que conviene restablecer las fuerzas digestivas y hay que hacer uso de aromáticos y estimulantes.

8853. T. DE ANÍS.

- ℥ Frutos de anís. . . . ʒij (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . . lbij (1000 gr.).
 Se infunde durante dos horas y se cuele.

Del mismo modo se preparan las tisanas con los frutos de ANIS ESTRELLADO, HINOJO ACUÁTICO, ENEBRO (bayas de enebro), CÁSCARA DE NARANJA AMARGA y SIMIENTE DE LINO.

8854. T. ANTIARTRÍTICA (Quarin).

- ℥ Zarzaparrilla en pedazos. . . . 120
 Antimonio metido en una muñequita. 200
 Agua comun. 1000

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, y se vierte hirviendo sobre

- Raiz de regaliz raspado. . . . 20
 Anís verde. 5
 Se infunde durante ocho á diez

minutos y se cuele. *D.* A tazas en el día.

8855. T. ANTICATARRAL
(*Pierquin*).

℞ Anís estrellado. ℥ij (8 gr.).
Raíz de énula campana. ℥j (12 dec.).
Miel. ℥jv (125 gr.).
Agua hirviendo. ℔ij (500 gr.).
Se infunde y se cuele.

I. Catarros crónicos, principalmente en los ancianos. *D.* A tazas pequeñas.

8856. T. ANTIÉPSÓRICA.

℞ Raíces de bardana,
Raíces de paciencia,
Dulcamara, ãã. ℥β (2 gr.).
Se digieren durante cuatro horas en

Agua caliente. ℔ij (1000 gr.).
Se cuele y se añade:
Jarabe de miel. ℥ij (60 gr.).
Se da á tazas al día.

8857. T. ANTIESCORBÚTICA.

℞ Especies amargas. ℥j (30 gr.).
Agua. ℔ij (1000 gr.).
Se infunde y se añade:

Alcohol. de coclear. ℥β (15 gr.).
I. Afecciones escrofulosas ó escorbúticas. *D.* A tazas pequeñas, varias veces al día.

8858. Otra, n. 2.

℞ Espir. de coclearia. ℥β (15 gr.).
Tisana de bardana. ℔ij (1000 gr.).
Mézclese.

8859. T. ANTIÉSPASMÓDICA.

℞ Infusion de flor de tilo. ℔ij (1000 gr.).
Agua destilada de flor de naranjo. ℥ij (60 gr.).
Licor de Hoffmann. ℥ij (8 gr.).
Jarabe de goma. ℥ij (60 gr.).

I. Espasmos, vapores, males de nervios.

8860. Otra, n. 2.

℞ Cásc. seca de nuez. ℥ijβ (80 gr.).
Zarzaparrilla,
China, ãã. ℥iij (12 gr.).
Antimonio crudo. ℥vj (24 gr.).
Piedra pomez. ℥iij (12 gr.).
Agua. ℔iij (1500 gr.).
Se reduce la mitad por la coccion.

I. Afecciones sífilíticas. *D.* La mitad por la mañana y la mitad por la noche.

8861. Otra, n. 3.

℞ For de tilo,
Flor de manzanilla,
Hojas de naranjo, ãã. ℥β (2 gr.).
Se infunden durante media hora en

Agua hirviendo. ℔ij (1000 gr.).
Se cuele por una estameña y se añade:
Jarabe simple. ℥ij (60 gr.).
D. Una taza pequeña cada dos horas.

8862. T. ANTIHELMÍNTICA.

℞ Espec. antihelm. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.).
Agua hirviendo. ℔ij (1000 gr.).
Jarabe. ℥j (30 gr.).
H. S. A.

8863. T. ANTIHERPÉTICA.

℞ Raíz de bardana,
Raíz de paciencia,
Raíz de saponaria,
Corteza de olmo piramidal,
Tallos de dulcam., ãã. ℥ijβ (10 gr.).
Agua. ℥xxxviiij (1180).

Se hierve hasta que se reduzca la quinta parte del líquido, se cuele y se añade:

Jarabe de fumaría
ó Jarabe de zarzaparrilla. ℥ij (8 gr.).
I. Enfermedades cutáneas, prúrigo, ectima, herpes, lepra, ele-

fantiasis. *D.* Se toma en las veinticuatro horas.

8864. T. ANTIHERPÉTICA
(*Gibert*).

℥ Zarzaparrilla. ℥ij (60 gr.).
Corteza de mecereon,
Semillas de cilantro,
Regaliz, añ. ℥j (4 gr.).
Se infunden en
Agua. ℔ij (1000 gr.).
Se cuele. Se toma á medios vasos al dia.

8865. T. ANTILEUCORREICA
(*Kopp*).

℥ Extracto de ratania. . ℥vj (24 gr.).
Agua comun. ℥xij (375 gr.).
Se disuelve y se añade:
Alcoholado de quino. ℥jß (6 gr.).
Alcohol de catecú . ℥j (4 gr.).
I. Leucorrea vaginal. *D.* Se empapa una esponja en esta mezcla, y al tiempo de acostarse se la introduce en la vagina de modo que la llene casi enteramente.

8866. T. ANTINEFRÍTICA
(*Hildenbrand*).

℥ Raiz de gatuña. ℥j (30 gr.).
Agua. ℔ij (500 gr.).
Se reduce á ℥xiiij (400 gr.) por la ebullicion, y se añade:
Ojimiél escilitico. ℥ß (15 gr.).
I. Catarro de la vejiga, cistitis, cálculos. *D.* Media taza de hora en hora.

8867. T. ANTISIFILÍTICA, *Tisana*
ó rob de Arnoud.

℥ Zarzaparrilla cort. . ℥ij (60 gr.).
Guayaco raspado,
Corteza de boj,
Corteza de torbisco,
Cola de pescado, añ. ℥ij (8 gr.).
Agua. ℔ij (1500 gr.).
Se hierva hasta que se reduzca á dos cuartillos y se cuele.
I. Sifilis, sifilides, lepra, her-

pes. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.) mañana y noche.

8868. *Otra* (*DUPUYTREN*).

℥ China cortada en pedazos,
Guayaco cortado en pedazos,
Zarzaparrilla cortada en pedazos, añ. ℥ij (60 gr.).
Agua. ℔ij (1500 gr.).
Jarabe de Cuisimier. ℥jv (125 gr.).
Se hierven las raices en el agua hasta que se reduzca á dos cuartillos de líquido, se cuele y se añade el jarabe.

8869. T. ANTIVENÉREA (*Plenk*).

℥ Zarzaparrilla. ℥ij (60 gr.).
Corteza de mecereon. ℥ß (2 gr.).
Se cuece en tres cuartillos (1½ lit.) de agua de fuente hasta que se reduzca la tercera parte, se cuele y se añade despues de fria:
Licor de Van Swieten, una cucharada y despues dos.
I. Enfermedades venéreas inveteradas. *D.* A vasos en el dia, endulzándola con jarabe de horchata, malvabisco ó culantrillo. Se usa durante un mes.

8870. T. ANTIRAQUÍTICA.

℥ Raiz de rubia. ℥jv (15 gr.).
Conos de lúpulo. ℥ij (8 gr.).
Hojas de nogal. ℥jv (15 gr.).
Se hierven en ℔ij (1000 gr.) de agua hasta que se consuma una tercera parte. Despues de frio se cuele y se añade:
Tintura de marte tart. ℥ij (8 gr.).
D. Dos vasos por la mañana en ayunas.

8871. T. APERITIVA.

℥ Especies aperitivas. ℥ij (12 gr.).
Agua hirviendo. ℔ij (1000 gr.).
Se infunde durante cuatro horas, se cuele y se añade algunas veces:
Jarabe de las cinco raices. ℥ij (90 gr.).

I. Se usa como diurética. *D.* En el día.

8872. T. APERITIVA (H. DE M.).

℥ Raiz de caña,
Raiz de grama, ãã. ℥B (15 gr.).
Raiz de regaliz. ℥B (2 gr.).
Agua comun. c. s.
para que resulte ℔bjß (750 gr.) de cocimiento.

D. Para bebida usual.

8873. Otra (H. M.).

℥ Raiz de caña
Raiz de perejil,
Raiz de hinojo, ãã. ℥ij (60 gr.).
Raiz de regaliz. ℥j (30 gr.).
Agua comun. ℔biiij (1500 gr.).

Se cuece S. A. y se cuele.

D. A pasto.

8874. Otra (HOFF).

℥ Taraxacon,
Achicorias,
Trébol de agua, ãã. ℥ij (60 gr.).

Se hierve en

Agua. ℔bij (1000 gr.).

Se añade:

Sulfato de potasa. . . ℥j (30 gr.).

Licor de Hoffmann. ℥j (4 gr.).

I. Calenturas intermitentes rebeldes, cólicos, cálculos biliares, ictericia, abscesos, infartos abdominales. *D.* A vasos.

8875. T. DE FLORES DE ARNICA (F. F.).

℥ Flores de arnica. ℥j (4 gr.).

Agua hirviendo. ℔bij (1000 gr.).

Se ponen en infusión por media hora y se cuele.

Del mismo modo se preparan las tisanas de FLORES DE AMAPOLA, SAÚCO, etc.

8876. T. DE ARROZ.

℥ Arroz. ℥B (15 gr.).

Se hierve hasta que se abra el arroz, en c. s. de agua para ob-

tener ℔bj (500 gr.) de tisana, y se cuele por una estameña clara.

Del mismo modo se preparan las tisanas con CEBADA PERLADA Y AVENA MONDADA.

8877. T. DE ARROZ Y CATECÚ.

℥ Arroz. ℥B (15 gr.).

Agua comun. ℔bij (1000 gr.).

Se cuece, se cuele y se disuelve:

Catecú. ℥ij á ℥iij (8 á 12 gr.).

I. Diarrea y disenterias agudas.

D. A tazas pequeñas al día.

Si se reemplaza el catecú por ℥B (15 gr.) de goma arábica se tendrá la *tisana de arroz gomosa*, que se usa como la anterior.

8878. T. ASTRINGENTE.

℥ Raiz de bistorta,

Raiz de consuelda

mayor, ãã. ℥j (4 gr.).

Agua. ℔bij (1000 gr.).

Se hierve una hora, se cuele y se añade:

Jarabe de membrillos

ó de catecú. ℥j (30 gr.).

I. Hemorragias internas consideradas como pasivas. *D.* ℥ij á ℥jv (60 á 125 gr.).

8879. Otra, n. 2.

℥ Catecú. ℥B (15 gr.).

Agua hirviendo. ℔bij (1000 gr.).

Se infunde.

Esta tisana, de sabor agradable, es tónica y astringente. Se usa en la diarrea crónica, etc.

Se puede añadir:

Jarabe de membrillos. ℥ij (60 gr.).

I. Diarrea, flujos atónicos.

8880. Otra, n. 3.

℥ Raiz de bistorta,

Raiz de torméntila,

Raiz de consuelda

mayor, ãã. ℥B (15 gr.).

Agua

ó Caldo de pollo. ℔biiij (1500 gr.).

Se hierve durante media hora, se cuele y se añade:

Jarabe de consuelda
mayor, ãã. ℥ij (60 gr.).

I. Hemorragia, púrpura hemorrágica, hemotisis. *D.* A tazas en el día.

8881. T. ASTRINGENTE.

℥ Cocimiento de arroz. ℔ij (1000 gr.).
Agua de Rabel. ℥j (4 gr.).

Jarabe simple,
Jarabe de membrillos

ó Jarabe de consuelda
mayor. ℥ij (60 gr.).
M. I. Diarrea crónica.

8882. Otra (CHAPTAL).

℥ Raíz de consuelda. ℥j (30 gr.).
Rosas rojas. una pulgarada.

Bayas de cinorrodon. número 12.
Catecú. ℥j (12 dec.).

Se preparan *S. A.* dos cuartillos de tisana, que se endulzan con

Jarabe de membrillo. ℥ij (60 gr.).

I. Disenterias rebeldes, pérdidas blancas y hemorragias persistentes.

8883. Otra (H. M.).

℥ Raíz de tormentila
contundida. ℥ij (60 gr.).

Agua comun. ℔iiij (1500 gr.).

Se hace hasta que se reduzcan á ℥xxxvj (1125 gr.) y se añade:

Jarabe de vinagre. ℥iiij (90 gr.).

D. Un cortadillo cada cuatro horas.

8884. T. ASTRINGENTE DE QUINO (Mialhe).

℥ Quino verdadero. ℥ß (2 gr.).

Agua. ℔ij (1000 gr.).

Se mezcla, se filtra y se añade:

Jar. de membrillos. ℥iiij (96 gr.).

D. Se toma á vasos de hora en hora en todos los casos en que se emplean los astringentes vegetales.

8885. T. DE ASTRUC.

℥ Antimonio crudo,
Zarzaparrilla,
China,
Sasafrás,

Guayaco, ãã. ℥ij (8 gr.).

Agua. ℔bjx (4500 gr.).

Se reduce un tercio por la coccion y se añade al fin:

Regaliz. ℥j (30 gr.).

y en caso de necesidad:

Sen. ℥ß (15 gr.).

I. Afecciones herpéticas, herpes, lepra, elefantiasis, reumatismo crónico, gota, ectima, sífilis constitucional, obstrucciones del hígado y de las vísceras abdominales. *D.* A medias tazas.

8886. T. ATEMPERANTE DE STOLL (H. DE M.).

℥ Cebada. ℥j (30 gr.).

Agua comun. c. s.
para que resulte ℔bjß (750 gr.) de cocimiento.

Se añade:

Nitrato de potasa. ℥ß (2 gr.).

Jarabe de vinagre. ℥ij (60 gr.).

M. I. Se toma como bebida usual.

8887. T. DE BARDANA (F. F.).

℥ Raíz de bardana que-
brantada. ℥j (32 gr.).

Raíz de regaliz. ℥iiij (12 gr.).

Agua hirviendo. ℔ij (1000 gr.).

Se ponen en infusion por cuatro horas, y se cuele.

I Es diaforética y se la ha aconsejado en las afecciones de la piel, reuma, gota y enfermedades sífilíticas.

Del mismo modo se preparan las tisanas de raíces de APIO, ANGÉLICA, ESPÁRRAGO, ÉNULA CAMPANA, CARDO CORREDOR, ACHICORIAS, HELECHO MACHO, FRESA, PACIENCIA, RATANIA, SAPONARIA, SIMARUBA y CORTEZA DE QUINA.

8888. T. DE BORRAJA (F. F.).

℥ Hoj. sec. de borraja. ℥iij (12 gr.).
 Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.).
 Se infunde durante media hora y se cuele. Se endulza segun se quiera.

I. Es diurética y sudorífica.

Del mismo modo se preparan las tisanas de hojas de ARTEMISA, CULANTRILLO, CAMEDRIOS, CARDO SANTO, ACHICORIAS, FUMARIA, NARANJO, PARIETARIA, TRINITARIA SILVESTRE, SAPONARIA, ESCABIOSA, ESCOLOPENDRA, ESCORDIO, SEN, MIL EN RAMA y VERÓNICA.

8889. T. DE BUCHAN.

℥ Cebada perlada. ℥ij (60 gr.).
 Se hierve durante hora y media en ocho cuartillos de agua y se añade:

Pasas,
 Higos secos,
 Raiz de regaliz rasp., ãã. ℥ij (60 gr.).
 Se continúa hirviendo hasta que solo queden cuatro cuartillos, se cuele y se añade:

Nitrato de potasa. . . . ℥j (4 gr.)

I. Se usa como emoliente y peccoral. *D.* A tazas pequeñas en el espacio del dia.

8890. T. DE CAINCA COMPUESTA.

℥ Cainca. ℥ij (8 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade:
 Ojimiél cólechico. . . ℥j (30 gr.).
 Jarabe de goma. . . ℥ij (60 gr.).
 Se toma á vasos durante el dia.

8891. T. DE CALLAC (H. DE M.).

℥ Raiz de zarzaparr. ℥vj℔ (26 gr.).
 Mercurio dulce. . . ℥lvij℔ (28 dec.).
 Agua. ℔bjv℔ (2250 gr.).
 Hojas de sen. . . . ℥iij (12 gr.).
 Simiente de cilantro. ℥jx (10,8 gr.).
 Alumbre. ℥xjv (7 dec.).
 Se macera por doce horas la

raiz de zarza, se cuece con el cloruro de mercurio puesto en una muñequita hasta que el liquido quede reducido á ℥xxx (960 gr.), se infunde el sen y el cilantro, se cuele y se disuelve el alumbre.

I. Es antisifilítica. *V. n.* 1113.

8892. T. DE CAÑAFÍSTULA ó Agua de cañafistula (F. F.).

℥ Frutos de cañafist. . . ℥ij (64 gr.).
 Agua á 60°. ℔ij (1000 gr.).
 Se abren longitudinalmente los frutos, se deslie la pulpa en el agua y se cuele por una manga.
I. Es laxante y atemperante.
D. A tazas.

8893. T. CARMINATIVA.

℥ Manzanilla. ℥℔ (2 gr.).
 Anís. ℥j (4 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Azúcar. ℥ij (60 gr.).
 H. S. A. *I.* Flatuosidades, cólico ventoso.

8894. Otra, n. 2.

℥ Melisa. ℥ij (8 gr.).
 Anís,
 Hinojo,
 Cilantro, ãã. ℥℔ (2 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℔ij (1000 gr.).
 Se infunde y se cuele.
I. Cólico ventoso, cardialgia.
D. A tazas.

8895. T. DE CEBADA ó Agua de cebada (F. F.).

℥ Cebada lavada en agua fría. ℥v (20 gr.).
 Raiz de regaliz. ℥iij (12 gr.).
 Se hierve la cebada en c. s. de agua hasta que esté bien reventada y se haya reducido el liquido á ℔ij (1000 gr.), se infunde entonces la raiz y se cuele por una estameña clara.
I. Es atemperante, refrigerante

y aun ligeramente nutritiva, y conviene en todas las enfermedades inflamatorias.

Del mismo modo se preparan las tisanas de ARROZ y de AVENA descortezada.

8896. T. DE CEBADA ESTIBIADA.

℥ Emético. ḡj (5 cent.).
Tisana comun. ℔ij (1000 gr.).
M. I. Embarazo gástrico y plétora biliosa sin irritacion gastrointestinal.

8897. T. DE CEBADA GOMOSA (H. DE M.).

℥ Goma arábica. ḡB (15 gr.).
Tisana de cebada. ℔ijB (750 gr.).
Jarabe simple. ḡij (60 gr.).
I. Flegmasias agudas. D. Se emplea como bebida usual.

8898. T. DE CEBADA Y MIEL.

℥ Cebada mondada y lavada en agua hirviendo. ḡj á ḡij (4 á 8 gr.).
Se hierva durante veinticinco ó treinta minutos en
Agua comun. ℔ij (1000 gr.).
Se cuele y se añade:
Miel blanca muy pura. ḡij (60 gr.).
I. Es atemperante y laxante. D. A medias tazas al dia.

8899. T. DE CEBADA Y OJIMIEL.

En la tisana anterior se reemplaza la miel por cantidad igual de ojimiel simple.

I. Es tambien una bebida atemperante.

8900. T. DE CEBOLLA ALBARRANA COMPUESTA.

℥ Bayas de enebro. ḡjv (125 gr.).
Poligala de Virginia quebrantada. ḡiij (90 gr.).
Escila en pedazos. ḡiij (12 gr.).

Se hierva lentamente en
Agua. ℔jv (2000 gr.).
Se cuece hasta que se reduzca á la mitad, se cuele, se deja aposar y se añade:

Acido nítrico alcoholizado. ḡjv (15 gr.).
I. Hidropesía. D. Una cucharada grande.

8901. T. DE CIRUELAS.

℥ Ciruelas. ḡij 60 gr.).
Se las abre en dos pedazos, y se hierven durante una hora en c. s. de agua para obtener dos quart. (1 lit.) de tisana; se cuele por una estameña.

Del mismo modo se preparan las tisanas de DÁTILES, HIGOS y AZUFAIFAS.

8902. T. DE CIRUELAS PASAS CON SEN.

℥ Sen. ḡj (32 gr.).
Ciruelas. ℔B (250 gr.).
Agua. ℔ij (1000 gr.).
Se digiere en la ceniza caliente durante doce horas y se cuele. D. A tacitas.

8903. T. CLORURADA.

℥ Cloruro de sosa líquido á 18°. ḡxij á ḡxx (6 á 10 dec.).
Tisana comun. ℔ij (1000 gr.).
M. I. Fiebres tifoideas.

8904. Otra (CHOMEL).

℥ Cloruro de sosa. 36 got. (2 gr.).
Cocim. de cebada. ℔ij (1000 gr.).
Jarabe de goma. ḡij (60 gr.).
M. I. Periodo de putridez de las calenturas tifoideas, tifo, lepra.
D. A vasos durante el dia.

8905. T. DE COLOMBO.

℥ Raiz de colombo. ḡij á ḡB (8 á 15 gr.).
Agua. ℔ij (1000 gr.).
Varian sus propiedades segun

el modo de prepararla; por maceracion se extrae la parte olorosa y la materia amarga, y por coccion están enmascaradas las virtudes tónicas porque disuelve el almidon. Así se da el cocimiento en la disenteria cuando se teme su accion irritante, y la maceracion cuando se prefiere un tónico franco.

8906. T. COMUN Ó DE RAIZ DE REGALIZ.

☞ Grama mondada. ℥j (30 gr.).
Regaliz raspado. ℥℞ (45 gr.).

Se hierve en

Agua comun. ℔ij (1000 gr.).

Se usa como bebida ordinaria en las calenturas inflamatorias y biliosas, y en todos los casos en que convenga hacer uso de los atemperantes. A esta tisana, que es ligeramente diurética, se pueden añadir algunos granos de nitrato de potasa para aumentar sus propiedades.

8907. T. COMUN (H. DE M.).

☞ Cocim. de cebada. ℔j℞ (750 gr.).
Ojimiél simple. ℥j (30 gr.).
M. I. A pasto como refrigerante.

8908. T. CONTRA LAS ARENILLAS.

☞ Cocim. de linaza. ℔ij (1000 gr.).
Jarabe simple. ℥iij (90 gr.).
Bicarbonato de sosa. ℥℞ (2 gr.).
D. A tacitas al dia.

8909. T. CONTRA LAS ESCRÓFULAS.

☞ Raiz de rubia. ℥℞ (45 gr.).
Lúpulo. ℥j (4 gr.).
Agua. ℔ij (1000 gr.).

Se infunden, se cuela y se añade:

Jarabe de quina amarilla con vino. ℥ij (60 gr.).

D. Se toma en varias veces al dia.

8910. Otra, n. 2.

☞ Cocimiento de quina. ℥j
Agua de mar. ℔ij
D. A tacitas en el dia.

8911. T. CONTRA LA PIEDRA.

☞ Semillas de linaza machacadas,
Culantrillo, ãã. un manojo.
Agua. ℔ij (500 gr.).
Se hierve, se cuela y se añade:
Carbonato de sosa. ℥j (42 dec.).
D. A tazas pequeñas, varias veces al dia.

8912. T. DE CUERNO DE CIERVO.

☞ Cuerno de ciervo raspado. ℥jv (125 gr.).
Se lava el cuerno de ciervo en agua tibia, y se deja hervir durante una hora en c. s. de agua para obtener dos cuartillos (1 lit.) de tisana; se cuela.

Frank prescribe solo ℥j (30 gr.) de cuerno de ciervo.

I. Es emoliente y nutritiva. *D.* A tazas en el dia.

8913. T. DE DATISBIUS.

☞ Limones. número 2.
Se les quita la corteza y las pepitas y se los tritura en un mortero de vidrio ó porcelana con

Pan tostado. ℥ij (60 gr.).

Se echa poco á poco:

Cocimiento de cebada germinada ℔j℞ (750 gr.).

Se cuela y se añade:

Jarabe de moras. ℥j (30 gr.).

Vino añejo

ó Vino generoso. ℥vj (180 gr.).

I. Fiebres adinámicas, convalecencia de las fiebres graves y atonía de los órganos digestivos. *D.* De ℥ij á ℥jv (60 á 120 gr.) cada tres ó cuatro horas.

8914. T. DIAFORÉTICA.

- ℞ Agua hirviendo. . . . ℔ij (1000 gr.).
 Borracha. ꝑxc (5 gr.).
 Melisa. ꝑxc (5 gr.).
 Se infunde durante una hora, se
 cuele y se añade:
 Jarabe de amapola. . ꝑjβ (45 gr.).

8915. Otra, n. 2.

- ℞ Dulcamara. ꝑijβ (10 gr.).
 Sasafrás,
 Flores de saúco, ãã. ꝑxc (5 gr.).
 Se infunde durante dos horas en
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Se cuele y se añade:
 Jarabe de yerbab. . ꝑijj (90 gr.).
 D. Se toma á vasos en el dia.

8916. Otra (BRERA).

- ℞ Cort. interior de olmo. ꝑij (60 gr.).
 Raiz de paciencia. . . . ꝑj (30 gr.).
 Agua comun. c. s.
 para obtener ℔iij (1500 gr.) de
 líquido colado, que se endulzará.
 Se dan de ꝑjv á ꝑvij (125. á 250
 gr.) dos ó tres veces al dia.

8917. Otra (GIMELLE).

- ℞ Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.).
 Polvo de guayaco raspado,
 Raiz de regaliz, ãã. . ꝑjv (15 gr.).
 Flores secas de saúco,
 Flores de amap., ãã. ꝑij (8 gr.).
 Se vierte el agua sobre todas
 las sustancias, se infunde durante
 cuatro horas y se cuele expri-
 miendo; se filtra por un papel
 blanco y despues se añade:
 Jarabe de culantrillo. . ꝑij (60 gr.).
 D. Se dan cuatro vasos al dia.

8918. Otra (H. M.).

- ℞ Flor de saúco. . ꝑij (60 gr.).
 Agua comun. . . ꝑxxxvj (1125 gr.).

Se infunden S. A., se cuele y se
 añade al líquido colado:

- Arrope de saúco. ꝑij (60 gr.).
 Se usará tibia á pasto.

8919. Otra (STANDIRK).

- ℞ Guayaco,
 Pasas, ãã. ꝑj (30 gr.).
 Agua. ℔iij (1500 gr.).
 Se hierve durante media hora
 y se añade:
 Sasafrás,
 Regaliz, ãã. ꝑβ (15 gr.).
 Se infunde hasta que se enfrie.

8920. T. DIURÉTICA.

- ℞ Grama. ꝑij (8 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Se hierve durante un cuarto de
 hora, se cuele y se añade:
 Nitro. ꝑxviiij (4 gr.).
 Jarabe de grosellas. ꝑij (60 gr.).
 I. Reaccion febril, irritacion de
 los órganos urinarios, cuando las
 orinas están muy cargadas, son
 escasas y de mucho color.

8921. Otra, n. 2.

- ℞ Raiz de grama,
 Raiz de fresa,
 Raiz de espárrago, ãã. ꝑij á ꝑjv (8 á
 15 gr.).
 Raiz de regaliz. ꝑij (8 gr.).
 Agua. ℔lj (1. lit.).
 Se hierve y se añade:
 Nitro. ꝑxviiij (4 gr.).
 I. Edemas, anasarca, hidrope-
 sia.

8922. Otra, n. 3.

- ℞ Cocimiento de gra-
 ma. ℔ij (1000 gr.).
 Acetato de potasa. . ꝑβ (2 gr.).
 Jarabe de las cinco
 raices. ꝑijj (90 gr.).
 M. D. A tazas pequeñas.

8923. T. DIURÉTICA.

℥ Acido nítrico alcoholizado ℥j (4 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Jarabe simple. ℥iij (96 gr.).
 Mézclese.

8924. Otra, n. 2.

℥ Especies aperitivas. ℥j (30 gr.).
 Parietaria. ℥℔ (45 gr.).
 Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.).
 Se infunden durante media hora, se cuele y se añade:
 Nitrato de potasa. . . ℥℔ (2 gr.).
 Jarabe de las cinco raíces. ℥iij (60 gr.).
 D. Se da á vasos al día.

8925. Otra, n. 3.

℥ Nitro. ℥ij (8 gr.).
 Ojimiél escilitico. . . ℥℔ (45 gr.).
 Cocimiento de raíz de esparraguera. . ℔ij (1000 gr.).
 M. D. Varias tazas pequeñas al día.

8926. Otra, n. 4.

℥ Cinco raíces. ℥j (30 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Acetato de potasa. . ℔j (42 dec.)
 Miel escilitica. ℥j (30 gr.).
 Se infunden las raíces en el agua hirviendo, se cuele á la media hora y se añaden la sal y la miel.

I. Hidropesía, inflamaciones, ictericia, disuria. D. A tazas pequeñas.

8927. Otra (BOUCHARDAT).

℥ Bicarb. de potasa. . ℥j (4 gr.).
 Nitrato de potasa. . . ℥xviiij (4 gr.).
 Infusion de enebro. ℔ij (1000 gr.).
 M. D. A tazas pequeñas.

8928. Otra (DUBOIS).

℥ Raíz de fresa,
 Raíz de esparraguera,
 Raíz de brusco, ãã. ℥v (20 gr.).
 Agua. ℔ij℔ (1250 gr.).
 Se reduce á ℔ij (1000 gr.), se cuele y se añade:
 Jarabe de hisopo,
 Jarabe de las cinco raíces, ãã. ℥j (30 gr.).

I. Dubois aconseja esta bebida en las hidropesías esenciales ó sintomáticas del tegido celular y de las cavidades serosas. En algunos casos se puede añadir nitrato de potasa á la dosis de ℥xij á ℥xxxvj (6 dec. á 2 gr.).

8929. Otra (FOY).

℥ Digital fresca. ℥ij (8 gr.).
 Azúcar blanca. ℥℔ (45 gr.).
 Se tritura todo junto y se echa en Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.).
 Se cuele y se añade:
 Jarabe simple. ℥iij (60 gr.).
 I. Hidropesías rebeldes. D. Se da á tazas pequeñas al día.

8930. Otra (RECAMIER).

℥ Goma arábica. ℥v (20 gr.).
 Jabon medicinal. . . ℥℔ (45 gr.).
 Nitrato de potasa. . . ℔j (12 dec.).
 Carbonato de potasa. ℥j℔ (6 gr.).
 Infusion de enebro. ℔ij (1000 gr.).
 I. Hidropesía y aun en los casos de cálculos urinarios. D. A tazas pequeñas, diferentes veces al día.

8931. T. DIURÉTICA SIMPLE (H. DE IT.).

℥ Acetato de potasa líquido. ℥iij (60 gr.).
 Cocimiento de grama. ℔j (500 gr.).
 M. D. A tazas pequeñas.

8932. TISANA DE DULCAMARA.

℥ Dulcamara quebrantada. ℥v (20 gr.).

Agua hirviendo. . . ℥ij (1000 gr.).
Se infunde durante dos horas y se cuela.

Algunas veces se añade:

Jarabe de fumaria. . ℥iij (90 gr.).

I. Excitante y diaforética. Herpes, escrófulas, afecciones sifilíticas constitucionales. D. A vasos.

8933. T. EMENAGOGA.

℥ Limaduras de hierro. ℥jv (15 gr.).
Quina machacada. . ℥iij (90 gr.).
Vino tinto

ó Agua comun. ℥ij (1000 gr.).
Se infunden durante doce horas y se cuela.

I. Clorosis, amenorrea, escrófulas, etc. D. Una tacita, cada tres ó cuatro horas.

A veces se añade ℥j (30 gr.) de jarabe de artemisa.

8934. T. EMOLIENTE.

℥ Goma arábica en pedazos. ℥℔ (15 gr.).
Agua. ℥ij (1000 gr.).
Azúcar. ℥ij (60 gr.).
Se disuelve en frío ó por digestión.

I. Irritación de los órganos pulmonares, gástricos, urinarios, etc.

8935. Otra (H. M.).

℥ Flor de malva. . . 3 puñados.
Agua comun. . . ℥xxxvj (1125 gr.).
Se infunden S. A., se cuela y se añade líquido colado:
Jarabe de altea. ℥iij (90 gr.).
Se da un cortadillo cada tres horas.

8936. Otra (H. DE M.).

℥ Raiz de malvabisco desecada. ℥℔ (15 gr.).
Agua comun. c. s.
para que resulten ℥xxxvj (1125 gr.) de cocimiento. Se añade:
Jarabe de malvabisco. ℥j℔ (45 gr.).

I. Enfermedades del conducto digestivo. D. ℥vj (180 gr.)

8937. T. EMULSIONADA.

℥ Almendras dulces. . ℥j (30 gr.).
Avena machacada. . ℥iij (90 gr.).
Se pistan en un mortero y se vierte poco á poco:

Cocim. de cebada. . ℥iij (1500 gr.).
Jarabe de violetas. . ℥ij (60 gr.).
Agua de canela. . . ℥℔ (15 gr.).

M. I. Cistitis aguda, nefritis, uretritis aguda, cálculos, abscesos. D. A medias tazas.

Si á la fórmula anterior se añade ℥℔ (2 gr.) de nitro, se tiene una *tisana emulsionada y nitrada*.

8938. T. EMULSIONADA Y ALCANFORADA.

℥ Nitro. ℥j (12 dec.).
Alcanfor. ℥viiij (4 dec.).
Semillas de melon. . ℥ij (60 gr.).
H. S. A. una emulsion con
Agua de fuente. . . ℥ij (1000 gr.).
Se cuela y se añade:

Azúcar. ℥ij (60 gr.).

M. D. Un vaso cada dos horas y se añade un poco de zumo de limon.

8939. T. EMULSIONADA Y NITRADA.

℥ Tisana comun. . . . ℥ij (500 gr.).
Emulsion simple. . . ℥ij (500 gr.).
Nitro. ℥j (12 dec.).
M. D. A tazas pequeñas al dia.

8940. T. DE ESCABIOSA.

℥ Escabiosa. ℥jv (16 gr.).
Agua hirviendo. . . ℥ij (1000 gr.).
Se infunde durante dos horas, se cuela y se añade:
Acido nítrico. 50 gotas.
Jar. de malvabisco. ℥iij (90 gr.).
I. Tiña. D. A tazas en el dia.

8941. T. ESTOMACAL FUNDENTE.

℞ Nitro. ʒjβ (6 gr.).
 Cocimiento amargo. ℔j (500 gr.).
 Extracto de taraxacon. ʒj (4 gr.).

I. Infartos de las vísceras del bajo vientre con languidez en la digestion.

8942. T. EXCITANTE.

℞ Menta piperita. 2 pulgaradas.
 Agua. ℔j (500 gr.).
 Jarabe de anís. ʒj (30 gr.).
 Se infunde.

I. Conviene como estomacal y antiventosa en los flujos atónicos intestinales con debilidad nerviosa, lentitud de la circulacion y frio de la periferia. Se la puede hacer difusible añadiendo quince gotas á ʒβ (2 gr.) de amoniaco ó ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) de un alcoholato aromático. Se la hace estomacal y fortificante añadiendo la misma cantidad de tintura de cantáridas, de ajenjos, etc.

8943. Otra, n. 2.

℞ Canela quebrantada. ʒj (4 gr.).
 Raiz de angélica. ʒij (60 gr.).

Se infunde durante media hora en ℔ij (1000 gr.) de agua hirviendo, se cuele y se añade:

Azúcar. ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

I. Esta bebida es excitante y diaforética.

8944. T. EXCITANTE ALCOHÓLICA.

℞ Alcohol. ʒjβ (45 gr.).
 Infusion de cáscara de naranja. ℔ij (1000 gr.).

I. Adinamia, afecciones tifoideas, astenia. D. Medio vaso de dos en dos horas.

8945. T. EXPECTORANTE.

℞ Hojas de yedra terrestre. ʒij (8 gr.).

Sumid. de hisopo. ʒj (4 gr.).

Se infunde en

Agua hirviendo. ℔ij (1000 gr.).

A cada taza se añade una cucharadita de café de ojimiél escilítico.

8946. T. CON FÉCULA.

℞ Fécula de patatas. ʒij (8 gr.).

Agua. c. s.

Se disuelve la fécula en ʒij (60 gr.) de agua fria, se la hace hervir y se vierte la fécula diluida; se continúa la ebullicion durante un cuarto de hora y se obtienen dos cuart. (1 lit.) de tisana, que se cuele por una estameña. D. A cortadillos.

Del mismo modo se prepara la TISANA DE SALEP.

8947. T. DE FELTZ ó Tisana de zarzaparrilla (Rayer).

℞ Cocimiento de zarzaparrilla. ℔j (500 gr.).
 Arseniato de sosa. ʒ¹/₁₆ (3 mil.).
 H. S. A.

Rayer prescribe esta tisana en lugar de la de Feltz.

8948. T. DE FELTZ (F. F. Y F. P.).

℞ Zarzaparrilla hendi-
 da. ʒij (64 gr.).
 Cola de pescado. ʒijβ (40 gr.).
 Sulfuro de antimonio pulverizado. ʒijβ (80 gr.).
 Agua comun. ℔jv (2000 gr.).

Se pone el sulfuro de antimonio en una muñeca de trapo, y se hierva durante una hora en el agua prescrita; se arroja esta agua, se pone la muñequilla con la zarzaparrilla y la cola de pescado en igual cantidad de agua, y se cuece á fuego lento hasta que merme la mitad, se cuele, se deja aposar y se decanta.

I. Enfermedades sifilíticas y ciertas afecciones cutáneas ó sifili-

des, herpes. *D.* Un cuartillo al día en tres veces.

Segun Soubeiran no está suficientemente estudiado el efecto químico que puede producir el sulfuro de antimonio en esta preparacion. Cuando está cargado de sulfuro de arsénico, este, segun los experimentos de Guibourt, descompone el agua, desprende hidrógeno sulfurado y deja en el líquido ácido arsenioso. Su cantidad es muy variable, porque no siempre contiene arsénico el sulfuro de antimonio, y además porque no ejerciéndose la accion del agua sino en la superficie, solo es atacado en una pequeña parte. No se convence de que sea este el único efecto del sulfuro de antimonio. ¿No podria suceder que algunas sales alcalinas ó ácidas diesen lugar á su descomposicion y á la disolucion de algunas partes antiomiales?

8949. T. DE FELTZ (H. DE M.).

℥ Zarzaparrilla cort. ℥iij (90 gr.).
 Cola de pescado. . ℥β (15 gr.).
 Sulfuro de antimonio pulverizado. ℥jv (125 gr.).
 Agua comun. . . . ℥biiβ (1250 gr.).

Se pone el antimonio crudo en una muñequita de lienzo, y se colocan los demás ingredientes en una vasija de barro, de modo que toque al fondo; se añade el agua, y se hace hervir á fuego lento hasta que queden reducidas á la mitad y se cuele.

I. Afecciones venéreas inveteradas, que han resistido á toda clase de tratamientos. *D.* Toda la dosis en seis veces.

8950. T. DE FRUTOS PECTORALES (F. F.).

℥ Frutos pectorales. . . . ℥ij (64 gr.).
 Se abren los dátiles y las azu-

faifas, se tiran los huesos, y se hierven durante una hora juntamente con los demás frutos en la cantidad de agua necesaria para que resulten ℥bii (1000 gr.) de tisana; se cuele por una estameña y se endulza como se quiere.

Del mismo modo se preparan las tisanas de AZUFAIFAS, CIRUELAS PASAS Y DÁTILES.

8951. T. DE GAYUBA.

℥ Hojas de gayuba. . . ℥β (15 gr.).
 Agua hirviendo. . . ℥bii (1000 gr.).
 Se infunde durante una hora y se cuele. Se endulza algunas veces con

Jarabe simple. . . . ℥iij (90 gr.).
 Algunas veces se añade á esta tisana ℥j (12 dec.) de nitro.

Del mismo modo se preparan las tisanas de DORADILLA, PARIETARIA, DIOSMA AFESTONADA, PEREJIL, HINOJO, ACEBO, GATUÑA, ALCAPARRO, BAYAS DE ALQUEQUENJE, SEMILLAS DE ORTIGAS.

8952. T. GELATINOSA (Swediaur).

℥ Ictiocola. ℥jβ (45 gr.).
 Agua hirviendo. . . ℥biiij (1500 gr.).
 Se reduce á ℥bii (1000 gr.), se cuele y se añade:

Agua de canela. . . ℥ij. (60 gr.).
 Azúcar. ℥j (30 gr.).
I. Disenteria, nefritis, gonorrea y catarro pulmonar. *D.* ℥iij á ℥jv (90 á 120 gr.) muchas veces al día.

8953. T. DE GOMA ó Agua de goma (F. F.).

℥ Goma aráb. entera. ℥β (16 gr.).
 Agua fria. ℥bii (1000 gr.).
 Se lava primero la goma en agua fria, se disuelve en frio en la cantidad de agua indicada, y se cuele. *V.* tomo I, pág. 204.

8954. T. DE GOMA, Solucion ó Agua de goma.

℥ Goma arábica pulverizada, ℥jv á ℥viii (15 á 30 gr.).

Agua. ℔ij (1000 gr.).

Se pone la goma en el fondo de un mortero de mármol, se diluye con prontitud con doble cantidad de agua, se añade poco á poco el resto del agua y se cuele por una estameña.

Esta bebida, que debe ser perfectamente clara y trasparente, se dulcifica con ℥jß (45 gr.) de azúcar ó ℥ij (60 gr.) de un jarabe apropiado, tales como el de membrillo, sinfito, goma, malvabisco, grosellas, etc.

I. Es eminentemente mucilaginoso y se administra en todas las enfermedades inflamatorias, y particularmente en las de las vias respiratorias y urinarias.

8955. T. DE FLORES DE GORDOLOBO (F. F.).

℥ Flores de gordolobo. ℥ij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.).

Se infunde durante una hora y se cuele.

Del mismo modo se preparan las tisanas con las flores de CENTAURA, MALVABISCO, LÚPULO, MALVA, ROSAS ROJAS, TILO, TUSÍLAGO, VIOLETAS.

8956. T. DE GRAMA (F. F.).

℥ Raiz de grama. . . . ℥j (32 gr.).
Raiz de regaliz. . . . ℥iij (12 gr.).

Se lava la grama en agua fria, se la contunde en un mortero de mármol, y se hierve por espacio de media hora en la cantidad de agua necesaria para obtener ℔ij (1000 gr.) de tisana; se añade hácia el fin el regaliz contundido, se deja en infusion por una hora, y se cuele.

8957. T. DE GRAMA IODURADA ó Grama iodurada (Magendie).

℥ Tisana de grama. . . ℔ij (1000 gr.).
Ioduro de potasio. . . ℥ß (2 gr.).
Jarabe de menta. . . ℥ij (60 gr.).

M. I. Sifilis, sífilides, infartos é induraciones linfáticas, escrófulas y reumatismos crónicos. D. Media taza.

8958. T. DE PALO DE GUAYACO (F. F.).

℥ Leño guayaco rasur. . ℥j (32 gr.).
Raiz de regaliz. . . . ℥iij (12 gr.).

Se hierve el guayaco por una hora en c. s. de agua para obtener ℔ij (1000 gr.) de tisana, se añade la raiz de regaliz, se deja en infusion por una hora, se cuele, se deja aposar y se decanta.

8959. T. DE GUAYACO COMPUESTA (Hufeland).

℥ Rasuras de palo de guayaco. ℥ij (60 gr.).
Tallos de dulcamara. ℥ß (15 gr.).

Se hierve en Agua. ℔ij (1000 gr.) hasta que se reduzca á ℔jß (750 gr.). Se añade al líquido colado:

Sublimado corrosivo. ℥ß (25 mil.).
Jarabe de goma. . . ℥ij (60 gr.).

M. I. Reumatismo rebelde. D. A medias tazas cada dos horas. Debe durar dos dias.

8960. T. DE GUAYACO Y DAFNE MECEREON.

℥ Guayaco raspado,
Dafne mecereon, ãã. ℥j (30 gr.).
Agua. ℔ijß (1250 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á ℔ij (1000 gr.), se cuele y se endulza á gusto del enfermo.

I. Afecciones sífilíticas ó cutáneas rebeldes, etc. D. A tazas en el dia.

8961. T. DE HISOPO.

℥ Hisopo. ℥ij (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℔ij (1000 gr.).
 Se infunde durante una hora y se cuela.

Del mismo modo se preparan las tisanas con las hojas de CALAMITA, YEDRA TERRESTRE, MARRUBIO, MELISA, ORÉGANO.

8962. T. DE HISOPO Y YEDRA.

℥ Yedra terrestre,
 Hisopo, añ. ℥j (4 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Se infunde y se añade:
 Jarabe simple. . . . ℥iij (90 gr.).

8963. T. IODADA (Cullerier).

℥ Iodo,
 Ioduro de potas., añ. ℥ij (4 dec.).
 Cloruro de sodio. . . ℥ij (8 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 I. Escrófulas, sífilis, etc. D. A tazas en el día.

8964. T. IODURADA.

℥ Ioduro de potasio. . ℥j (4 gr.).
 Cocimiento de zarz. ℔ij (1000 gr.).
 Jarabe de cáscara de naranja. ℥v (160 gr.).
 I. Sífilides, sífilis constitucional, infartos é induraciones linfáticas, escrófulas. D. A vasos.

8965. Otra (RICORD).

℥ Infus. de saponaria. ℔ij (1000 gr.).
 Ioduro de potasio. . ℥℔ (2 gr.).
 Jarabe simple. . . . ℥ij (60 gr.).
 Puede aumentarse la dosis de ioduro hasta ℥ij ó ℥ij¹/₄ (8 á 9 gr.); y casi todos los enfermos, después de algunos días, pueden tomar ℥℔ (6 gr.).
 I. Sífilis, exóstosis, caries sífilítica, úlceras de la garganta.

8966. T. DE IODURO DE ALMIDON.

℥ Almidon. ℥v (20 gr.).

Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.).
 Se diluye el almidon y se añade:
 Tintura de iodo. . . ℥ij℔ (10 gr.).
 Jarabe de goma. . . ℥ij (60 gr.).

8967. T. LAXANTE.

℥ Tamarindos. ℥ij (60 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℔ij (1000 gr.).
 Se diluye, se cuela y se añade:
 Jarabe de miel. . . . ℥j (30 gr.).
 D. Muchas tazas al día según el efecto que se quiere obtener.

8968. Otra (H. DE M.).

℥ Sen español. ℥j (30 gr.).
 Tartrato de potasa,
 Anís, añ. ℥j (4 gr.).
 Agua comun. ℔j℔ (750 gr.).
 I. Se usa como purgante. D. ℥vj (180 gr.).

8969. T. DE LIMON COMPUESTA (H. DE AL.).

℥ Limon mondado y sin semillas, n. 2.
 Se machaca en un mortero de porcelana y se añade poco á poco:
 Cocimiento de cebada perlada. . . ℔ij (1000 gr.).
 Pan blanco tostado. ℥ij (60 gr.).
 Jarabe de moras. . . ℥j (30 gr.).
 Vino tinto. ℥vj (180 gr.).
 Se cuela con expresion.
 D. A vasos.

8970. T. DE LINO CANTARIDADA ó Infusion de lino cantaridada.

℥ Simiente de linaza. . ℥ij (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℥iij (96 gr.).
 Se infunde y se añade:
 Tintura de cantáridas. 5 gotas.
 I. Parálisis de la vejiga. D. Diez, veinte, treinta, sesenta y hasta ochenta gotas ó á cucharadas al día.

8971. T. DE LIQUEN.

℥ Líquen islándico. . . . ℥ij (8 gr.).

Se vierte sobre el líquen ocho á diez veces su peso de agua hirviendo, se deja infundir durante media hora y se tira el licor; se toma el líquen lavado de este modo y se le hierve durante dos horas en c. s. de agua para que queden ℥ij (1000 gr.) de tisana. Se cuele con expresion, se deja aposar y se decanta. Comunmente se añade:

Jarabe simple. ℥ij (60 gr.).
I. Afecciones crónicas de pecho.

8972. T. LUSITANA.

℥ Guayaco raspado. . . ℥j (30 gr.).
Mecereon cortado. ℥B (15 gr.).
Zarzaparr. cortada. ℥iij (90 gr.).
Sulfuro de antimonio en una muñequita de lienzo. . . ℥ij (60 gr.).

Se hierve en

Agua comun. ℥xij (6000 gr.)
hasta que se reduzca á ℥viiij (4000 gr.). Se echa el cocimiento hirviendo sobre:

Sándalo rojo machacado,
Sándalo blanco machacado, añ. . . ℥iij (90 gr.).
Regaliz machacado. ℥B (15 gr.).
Palo de rosa,
Sasafrás, añ. ℥j (30 gr.).

Se dan de dos á cuatro cuartillos al dia contra la sífilis constitucional, afecciones herpéticas, anemia.

8973. T. DE MANZANILLA.

℥ Manzanilla romana. ℥B (15 gr.).
Anís. ℥ij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥ij (1000 gr.).

D. A tacitas un poco despues de haber comido.

8974. T. DE MASCAGNI.

℥ Carbonato de potasa. ℥ij (8 gr.).
Agua comun. ℥ij (1000 gr.).
Jarabe de goma. . . . ℥ij (60 gr.).

I. Neumonía crónica, raquitis.

D. A cucharadas, mezclada con un jarabe mucilaginoso.

Mas diluido el carbonato de potasa se usa para disolver los cálculos de ácido úrico y contra algunos casos de disenteria, raquitis.

8975. T. DE MECEREON (Thompson).

℥ Corteza de torbisco. ℥ij (8 gr.).
Agua. ℥ij (1000 gr.).

Se reduce la cuarta parte por la ebullicion y se añade:

Regaliz. ℥B (15 gr.).

8976. Otra, n. 2.

℥ Raiz de zarzaparrilla. ℥ij (60 gr.).
Corteza de torbisco. ℥ij (8 gr.).

Se hierve en

Agua. ℥iij (1500 gr.)
hasta que se reduzca á ℥ij (1000 gr.), se cuele y se añade:

Semillas de cilantro,
Regaliz, añ. ℥j (4 gr.).
I. Lepra, soriasis. D. A vasos.

8977. T. NARCÓTICA ESTIMULANTE DE MIQUEL.

℥ Acet. de amoníaco. ℥ij (8 gr.).
Agua gomosa. ℥ij (1000 gr.).
Láud. de Sydenham. 20 gotas.

M. I. Fiebres tifoideas. D. En el dia.

8978. T. PECTORAL.

℥ Especies pectorales. ℥iij (12 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥ij (1000 gr.).

Algunas veces se añade:

Jarabe simple,
ó Jarabe de altea. ℥ij (60 gr.).
I. Afecciones de pecho. D. A tazas.

8979. Otra, n. 2.

℥ Cangrejos. número 8.

Agua. c. s.
Se hierven durante tres horas,
añadiendo al fin de la coccion:

Líquen islándico,
Marrubio blanco, ãã. ℥iij (12 gr.).
Se reduce á ℥xvij (530 gr.) por
la coccion y se cuele.

D. Se toma tibia durante el dia
en el catarro crónico,

8980. T. PECTORAL.

℥ Bofes de vaca. núm. 1.
Se hierve durante dos horas en
dos quart. (1 lit.) de agua, se añade
y se deja infundir

Cabeza de adormideras. . . número 1.
Hojas de culantrillo,
Hojas de pulmonaria,
Hojas de malva,
Hojas de gordolobo,
Flór de violeta,
Líquen islándico, ãã. una pulgarada.
Se cuele y se añade:

Azúcar candi. ℥ij (60 gr.).
I. Afecciones de las vias aéreas
subagudas ó crónicas antiguas con
tos rebelde y enflaquecimiento.
D. Una taza mañana y noche.

8981. Otra (H. DE M.).

℥ Agua de cebada. ℔iij (1500 gr).
Raiz de malvabisco
desecada. ℥ij (60 gr.).
Flor de malva,
Flor de buglosa, ãã. ℥j (30 gr.).

Se divide el líquido en dos partes;
en la una se infunden las flores y en
la otra se cuece ligeramente el malvabisco;
y colados ambos líquidos se mezclan.

I. Catarros pulmonares agudos.
D. De ℥jv á ℥viiij (120 á 250 gr.).

8982. Otra (H. M.).

℥ Hojas de yedra ter-
restre. ℥iij (90 gr.).
Regaliz. ℥ij (60 gr.).
Agua comun. ℔vj (3000 gr.).
Se cuece S. A., se cuele y se endulza
con jarabe de altea.

D. A pasto.

8983. T. PECTORAL TÓNICA (Swediaur).

℥ Líquen islándico. ℥℔ (15 gr.).
Poligala amarga ℥j (30 gr.).
Agua. ℔iij (1500 gr.).

Se cuece hasta que se reduzca
la tercera parte.

I. Catarros pulmonares crónicos.

8984. T. PURGANTE (H. DE M.).

℥ Hojas de sen español. ℥iij (12 gr.).
Raiz de jalapa gruesamente pulver. ℥j (4 gr.).
Anís. ℥j℔ (6 gr.).
Agua comun. ℥vj (180 gr.).

Se infunden en el líquido y despues
de colado se disuelve

Tartrato de potasa. ℥j℔ (6 gr.).
I. Es purgante y mas activa
que la laxante. D. Para una vez.

8985. T. PURGANTE ó Medicina del cura de Devil.

℥ Achicorias. ℥℔ (15 gr.).
Raiz de grama. ℥j (30 gr.).
Raiz de paciencia. ℥ij (60 gr.).
Raiz de malvabisco,
Regaliz verde, ãã. ℥j (30 gr.).
Rapónico,
Sulfato de magnesia,
Sen, ãã. ℥℔ (15 gr.).
Agua. ℔ij (1000 gr.).
Se hierve veinte minutos.

I. Estreñimiento, gota, reumatismo.
D. A vasos.

8986. T. DE QUINA CALCÁREA ó Infusion de quina con agua de cal.

℥ Quina en polvo. ℥j (30 gr.).
Agua de cal. ℔viiij (4000 gr.).

Se vierte poco á poco el agua
de cal sobre la quina, diluyéndola
con cuidado durante un cuarto de
hora, y despues se cuele por una
estameña.

I. Es un remedio febrífugo en
Inglaterra y en América.

8987. T. DE RABANO COMPUESTA.

℥ Ráb. silvestre fresco. ℥ijβ (45 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade:
 Jarabe antiescorbútico,
 Zumo de limon, ãã. ℥iij (90 gr.).
 I. Albuminuria, hidropesía,
 principalmente la consecutiva á la
 enfermedad de Brighth. D. A taci-
 tas.

8988. T. DE RAIZ DE POLÍGALA DE VIRGINIA (F. F.).

℥ Polígala de Virginia
 quebrantada. . . . ℥ij (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.).
 Se infunde por dos horas y se
 cuele.

Del mismo modo se preparan las tisa-
 nas de las raices de QUASIA AMARGA, SA-
 SAFRÁS, VALERIANA, BOJ, etc.

8989. T. DE RATANIA (H. DE IT.).

℥ Raiz de ratania. . . ℥β (15 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Se hierve hasta que se reduzca
 á la mitad y se añade:
 Vinagre. ℥β (15 gr.).
 Azúcar. c. s.
 D. A cortadillos.

8990. T. REAL (F. F.).

℥ Hojas de sen,
 Sulfato de sosa, ãã. ℥jv (46 gr.).
 Anís,
 Cilantro, ãã. . . . ℥j (4 gr.).
 Hojas frescas y parti-
 das de perifollo. . ℥jv (46 gr.).
 Agua comun. . . . ℔ij (1000 gr.).
 Limon partido en ra-
 jas. número 1.

Se pone en maceracion por vein-
 ticuatro horas meneando de cuan-
 do en cuando, se cuele con ex-
 presion y se filtra.

I. Afecciones herpéticas ó sifili-
 ticas, sífilides, ectima, icteri-
 cia, lupus, lepra. Se usa como

purgante. D. De ℥jv á ℥vj (120 á
 180 gr.).

8991. T. REFRESCANTE.

℥ Nitrato de potasa. . . ℥xc (5 gr.).
 Cocim. de cebada. . ℔ij (1000 gr.).
 Jarabe de vinagre
 con frambuesas. . . ℥j (30 gr.).
 I. Calenturas inflamatorias,
 flegmasias agudas, abscesos, ena-
 genacion, cálculos, amaurosis.
 D. A tazas.

8992. T. REFRIGERANTE Y TEMPERANTE EN POLVO (F. C. Gassicourt).

℥ Goma arábica. . . . ℔iij (1500 gr.).
 Azúcar de leche,
 Azúcar, ãã. . . . ℔ij (1000 gr.).
 Ext. seco de grama. ℥vijβ (225 gr.).
 Se pulveriza separadamente ca-
 da una de estas sustancias y se
 las mezcla despues S. A. Se con-
 servan en una vasija tapada.

I. Gonorrea, irritacion gastro-
 intestinal, etc. D. Este polvo á la
 dosis de ℥β (15 gr.) disuelto por la
 agitacion en dos ó cuatro quart.
 (1 á 2 lit.) de agua, es de un uso
 cómodo para las personas que no
 tienen la facilidad de preparar por
 sí mismas las tisanas comunes.

8993. T. DE POLIGONO AVICULAR (Levrat).

℥ Polígono avicular. . . ℥v (20 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Se cuece y se añade:
 Jarabe de goma. . . ℥iij (96 gr.).
 I. Diarreas crónicas.

8994. T. DE RUIBARBO TÓNICA, Agua de ruibarbo, medicina de ruibarbo.

℥ Ruibarbo. ℥ij (8 gr.).
 Agua. ℔j (500 gr.).
 Se macera en frio. Se puede vol-
 ver á tratar el ruibarbo por nueva
 cantidad de agua.

I. Estreñimiento y cólico de los niños. D. Para los adultos se ponen \mathfrak{z} ij á \mathfrak{z} jv (8 á 15 gr.) por \mathfrak{z} vj (192 gr.) de agua y se toma de una vez. V. *Cocimiento de ruibarbo de la F. E.*, n. 1103.

8995. T. DE RUIBARBO PURGANTE
ó *Agua de ruibarbo.*

\mathfrak{z} Ruibarbo. \mathfrak{g} xc (5 gr.).
Agua. \mathfrak{b} ij (1000 gr.).
Se macera.

D. Se toma como bebida ordinaria.

8996. T. DE SALVADORI Ó
DE PASSERINI.

\mathfrak{z} Zorzaparilla. 107
Aristolouquia redonda. 27
Raiz de alcachofa. 14
Fumaria. 14
Aciano. 14
Calomelanos sin lavar. 8
Alumbre calcinado. 8
Agua. 3940

Se reduce á la mitad y se añade:

Sen. 20

Esta tisana es muy celebrada en Italia, y tiene bastante analogía con la de Zittmann.

D. \mathfrak{z} jv á \mathfrak{z} xij (125 á 375 gr.) al día.

8997. T. SIMPLE (H. M.).

\mathfrak{z} Cebada. \mathfrak{b} jv (2000 gr.).
Regaliz. \mathfrak{b} j (500 gr.).
Agua comun. \mathfrak{b} Lxjv (32000 gr.).
Se cuece S. A.

D. Se emplea á pasto.

8998. T. DE ESPARTO DE ESCOBAS
(*Kauser*).

\mathfrak{z} Hojas de esparto. \mathfrak{z} ij \mathfrak{b} (10 gr.).
Agua. 2 cuart. (1 lit.).
Azúcar. \mathfrak{z} ij \mathfrak{b} (45 gr.).

I. Herpes húmedos. D. Se toma en el día.

8999. T. DE STANDISH.

\mathfrak{z} Guayaco,
Pasas, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{z} v (20 gr.).
Agua. \mathfrak{b} ij (1000 gr.).

Se hierve durante media hora y se añade:

Sasafrás,
Regaliz, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{z} ij \mathfrak{b} (10 gr.).

Se infunde.

I. Afecciones herpéticas ó sifilíticas, sifilides, ictericia.

9000. T. SUDORÍFICA.

\mathfrak{z} Guayaco raspado. . \mathfrak{z} j (30 gr.).
Agua. \mathfrak{b} ij (1500 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á \mathfrak{b} ij (1000 gr.) y se vierte el líquido hirviendo sobre

Sasafrás,
Rasuras de guayaco; $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{z} ij (8 gr.).

Se infunde durante una hora en una vasija tapada, se cuela y se añade:

Jarabe de anís. . . \mathfrak{z} ij (60 gr.).

I. Afecciones reumáticas.

9001. Otra, n. 2.

\mathfrak{z} Espec. sudoríficas. \mathfrak{z} ij (60 gr.).
Agua caliente. . . . 2 cuart. (1 lit.).

Se digiere durante cuatro horas, se cuela y se añade:

Jarabe de zorzaparilla compuesto. \mathfrak{z} ij (60 gr.).

9002. Otra, n. 3.

\mathfrak{z} Zorzaparrilla,
Palo de guayaco,

China, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{z} \mathfrak{b} (15 gr.).
Sasafrás. \mathfrak{z} ij (8 gr.).

Agua. \mathfrak{b} jv (2000 gr.).

Se hierve y se cuela.

D. A vasos en el día.

9003. Otra, n. 4.

\mathfrak{z} Bardana,
Paciencia, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{z} v (20 gr.).

Se infunde en lbij (1000 gr.) de agua y se añade:

Jarabe simple. ℥iij (90 gr.).
Acetato de amoniaco. . . ℥v (20 gr.).
Se toma en el dia.

9004. T. SUDORIFICA (Alics).

℥ Guayaco raspado. . lbj (500 gr.).
Agua. lbjv (2000 gr.).
Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, se cuele y se divide en seis dosis.

I. Gota, reumatismo. *D.* Tres dosis al dia, una por la mañana, otra al medio dia y otra por la noche.

9005. Otra (CAZENAVE).

℥ Zarparrilla. . . . ℥jß (45 gr.).
Agua. lbijß (1250 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca la tercera parte, y á los diez últimos minutos de la ebullicion se añade:

Corteza de mecereon. . . ℥ij (8 gr.).
Se cuele y se endulza con

Jarabe de china. . . . ℥iij (90 gr.).

I. Enfermedades sifiliticas antiguas y degeneradas. *D.* Se toma en tres vasos en el dia.

9006. Otra (DUBOIS).

℥ Raices secas de bardana. ℥j (30 gr.).
Semillas de cebada. ℥ß (15 gr.).
Semillas de hinojo. ℥iij (12 gr.).
Agua. lbijß (1250 gr.).

Se reduce por la coccion á dos quart. (1 lit.) y se añade:

Jarabe sudorifico de Cuisinier. ℥ij (60 gr.).

I. Enfermedades venéreas. Dubois hacia tomar al mismo tiempo el licor de Van Swieten á la dosis de ℥ß (15 gr.) en una taza de leche ó de agua de goma azucarada.

9007. Otra (H. M.).

℥ Raiz de zarparrilla,

Raiz de bardana, ãã. ℥iij (90 gr.).
Raiz de regaliz. . . . ℥ij (60 gr.).
Agua comun. lbvß (2250 gr.).
H. S. A. D. A pasto.

9008. T. SUDORIFICA AMERICANA ó Cocimiento de zarparrilla compuesto.

℥ Zarparrilla. . . . ℥jß (45 gr.).
Guayaco,
Sasafrás,
Regaliz, ãã. ℥ij (8 gr.).
Mecereon. ℥j (4 gr.).
Agua hirviendo . . . lbiiij (1500 gr.).

Se deja digerir á un calor suave durante seis horas la zarparrilla y el guayaco, se añade al fin las demás sustancias y se cuele.

I. Afecciones venéreas inveteradas.

9009. T. SUDORIFICA DE BARDANA (Radius).

℥ Bardana. ℥j (30 gr.).
Cebada,
Hinojo, ãã. ℥ß (15 gr.).
Agua. lbij (1000 gr.).

Se cuece y se añade:

Jarabe de Cuisinier. ℥ij (60 gr.).

I. Enfermedades de la piel, eczima, acné, herpes, sífilis, sífilides, reumatismo crónico y cólicos nerviosos. *D.* A vasos.

9010. T. SUDORIFICA ECONÓMICA.

℥ Palo de guayaco,
Palo de boj, ãã. . . . ℥j (30 gr.).
Raiz de bardana,
Raiz de pacienc., ãã. ℥ß (15 gr.).
Bayas de enebro. . . ℥ij (60 gr.).
Agua. lbjv (2000 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad.

I. Enfermedades venéreas. *D.* Varios vasos al dia.

9011. T. SUDORIFICA ESTIBIADA.

℥ Tártaro emético. . . . ℥vj (3 dec.).

Infusion de saúco. . . ℥ij (1000 gr.).
 Miel sin espuma. . . ℥j (30 gr.).
 I. Reumatismo, gota, sífilis, sífilides, cólicos nerviosos, ectima.
 D. A tazas.

9012. T. DE TAMARINDOS (F. F.).

℥ Tamarindos. ℥j (32 gr.).
 Agua hirviendo. . . ℥ij (1000 gr.).

Se disuelven los tamarindos en el agua hirviendo, se deja infundir durante una hora y se cuele.

Se usa como laxante y refrigerante.

Si se quiere que obre como purgante se añaden ℥ij (64 gr.) de tamarindos.

9013. T. DE TE DE ESPAÑA (Rilliet y Barthez).

℥ Te de España. ℥j (4 gr.).

Agua. ℥ij (500 gr.).

Jarabe de flores de nar. ℥jβ (45 gr.).

H. S. A.

I. Corea de la infancia.

9014. T. DE FLOR DE TILO (F. F.).

℥ Flores secas de tilo. ℥ij (8 gr.).

Agua hirviendo. . . . ℥ij (1000 gr.).

Se infunden por media hora y se cuele.

Del mismo modo se preparan las tisanas de flores de CENTAURA MENOR, GORDOLOBO, MALVA, MALVABISCO, ROSAS ROJAS, TUSILAGO, VIOLETA, etc.

9015. T. TÓNICA.

℥ Quina gris. ℥β (15 gr.).

Agua. ℥ij (1000 gr.).

Se hierve cinco ó seis minutos, se cuele y se añade:

Jarabe de vinagre con frambuesas. . ℥ij (60 gr.).

Esta tisana se debe usar tibia.

I. Atonía del estómago, afecciones escorbúticas, escrofulosas, etc.

Se puede reemplazar la quina por ℥β (15 gr.) de raíz de gen-ciana.

9016. T. TÓNICA GASEOSA.

℥ Agua acidula gaseosa fria. ℥ij (1000 gr.).

Vino de Madera. . . ℥ij (60 gr.).

M. I. Enfermedades adinámicas y atáxicas. D. Muchas tazas al dia.

9017. T. DE VACA TAMARINDADA.

℥ Caldo de vaca. 4

Tisana de tamarindos. 4

M. I. Es una bebida laxante. D. Cinco á seis tazas al dia.

9018. T. DE VALERIANA Y QUINA (Nattley).

℥ Quina amarilla

real. ℥v (20 gr.).

Se hierve en

Agua. ℥xxxviii (1200 gr.).

Se reduce á ℥ij (1000 gr.) y se vierte hirviendo sobre

Raíz de valeriana contundida. ℥ijβ (10 gr.).

Se cuele.

I. Convalecencias largas en personas débiles y nerviosas.

9019. T. DE VIGAROUX.

℥ Zarzaparrilla. ℥vj (200 gr.).

Sen mondado. ℥iij (100 gr.).

Palo de guayaco raspado puesto en una muñequita,

Sasafrás,

Raíz de china,

Lirio de Florencia,

Sulfuro de antimonio,

Anís verde,

Tartrato acidulo de potasa,

Aristolouquia larga,

Aristolouquia redonda,

Jalapa machacada,

Polipodio de encina, ãã. ℥jβ (50 gr.).

Nueces ordinarias groseramente machacadas, cáscara y carne todo junto,

número 12.

Se ponen estas sustancias en una vasija de diez y ocho cuartillos (9 lit.), se las deja infundir durante veinticuatro horas sobre cenizas calientes en cuatro cuartillos (2 lit.) de vino blanco de buena calidad. Se vierten despues sobre la infusion doce cuartillos (6 lit.) de agua de fuente y se hace hervir todo á fuego moderado y sostenido hasta que el liquido haya disminuido una tercera parte ó cerca de ella, teniendo cuidado durante la operacion de tener tapada la vasija. Se cuela y se guarda el liquido en botellas, á las que se pondrá el número 1.

Se echan sobre el residuo todavía caliente dos cuartillos y medio de vino blanco, y se añade la cantidad suficiente de agua de fuente para obtener la misma cantidad de liquido que en la primera operacion. Se vuelve á cocer hasta que se disminuya una tercera parte ó cerca de ella, se cuela y se guarda en botellas, á las que se pondrá el número 2.

I. y D. Se usa esta tisana en los dolores reumáticos y en los producidos por enfermedades venéreas antiguas mal tratadas. Se empieza por usar las botellas que tienen el número 2. Cuando se han gastado ya, se pasa á las que tienen el número 1, y se continúa de este modo alternando hasta que el médico juzgue á propósito suspender la tisana.

9020. T. DE VINACHE.

℥ Sulfuro de antim. ℥ij (60 gr.).
Zarzaparrilla,
China,
Guayaco, ãã. . . . ℥jß (45 gr.).
Sasafrás,
Sen, ãã. ℥ß (15 gr.).
Agua. ℔vij (4000 gr.).

Se pone en una muñequita el sulfuro en polvo y se le hierva con la zarzaparrilla, la china y el

guayaco en ℔vj (3000 gr.) de agua. Reducido el cocimiento una tercera parte, se añade el sen y el sasafrás, que se dejan infundir; se cuela, se deja aposar y se decanta.

I. Se usa como purgante y sudorifica en las enfermedades cutáneas y en la sífilis. *D.* Muchos vasos en el espacio del dia.

9021. T. VINOSA.

℥ Agua. ℔ij (1000 gr.).
Vino blanco ó tinto. ℥v (150 gr.).
Nitro. ℥ß (2 gr.).

I. En las calenturas adinámicas y atáxicas.

9022. T. DE YEMAS DE ÁLAMO (H. M. F.).

℥ Yemas de álamo. ℥ß (15 gr.).
Agua. c. s.
para que queden ℔ij (1000 gr.).

Despues de una ligera ebullicion se infunde durante una hora, y se añade si se prescribe:

Alcoholato de coclearia. ℥v (20 gr.).

I. Leucorrea, afecciones escorbúticas y reumáticas.

9023. T. DE ZARZAPARRILLA.

℥ Zarzaparrilla. . . . ℥ij (64 gr.).
China. ℥j (32 gr.).
Corteza de boj,
Hojas de yedra,
Cola de pescado, ãã. ℥vj (24 gr.).
Sulfuro de antimonio. ℥jv (125 gr.).
Agua. ℔vj (3000 gr.).

Se reduce á la mitad por la ebullicion.

9024. Otra, n. 2.

℥ Zarzaparrilla. ℥jv (125 gr.).
Sasafrás,
Palo santo
ó Palo de guayaco, ãã. ℥j (30 gr.).

Raiz de china,

Cilantro

ó Cominos rústicos, ãã. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (45 gr.).Canela. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (4 gr.).Regaliz. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).Flores cordiales. . . . $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (45 gr.).

Se pone á cocer todo (á excepcion de las flores, que estas se echarán á lo último) á fuego lento endos azumbres (4 lit.) de agua de fuente hasta disminuir la tercera parte, y se cuela para el uso. Si el enfermo no se ha curado en todo este tiempo, podrá volver á tomar esta dosis otros siete dias con las mismas reglas y las prevenciones que se ha dicho en los *Polvos antireumáticos*. V. n. 6925.

I. Reumatismos crónicos y en aquellos casos en que los enfermos han sufrido varias preparaciones mercuriales, y que por su mala administracion ó por exceso de los enfermos les han quedado los dolores que muchas veces son insufribles.

9025. T. DE ZARZAPARRILLA. \mathfrak{z} Raiz de zarzaparrilla. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (64 gr.).Agua. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (1000 gr.).

Se machaca la raiz, se la pone en una vasija herméticamente tapada, se vierten $\mathfrak{z}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (1000 gr.) de agua hirviendo, se mantiene durante dos horas á la temperatura de 60° y se cuela con expresion.

Se prefiere esta tisana á la de Beral.

I. Es sudorífica en el reuma, enfermedades sifilíticas y enfermedades cutáneas.

9026. T. DE ZARZAPARRILLA (Beral). \mathfrak{z} Agua comun. 4 vasos.

Extracto vinoso de zarzaparrilla. 2 cucharadas.

Mézclese.

Nota. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (375 gr.) de esta preparacion representan $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (60 gr.) de zarzaparrilla; un vaso representa $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (15 gr.).

9027. T. DE ZARZAPARRILLA COMPUESTA. \mathfrak{z} Zarzaparrilla cortada en pedazos y machacada. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{B}$ (45 gr.).Guayaco raspado, Sasafrás rasp., ãã. . $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (60 gr.).

Regaliz,

Cort. de mecer., ãã. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (42 gr.).Agua comun. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (1500 gr.).

Se digiere todo durante diez á doce horas y se cuela.

I. Afecciones sifilíticas, herpéticas, etc. D. A tazas en el dia.

9028. T. DE ZARZAPARRILLA CON BARDANA (H. DE M.). \mathfrak{z} Zarzaparrilla. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ (24 gr.).Bardana. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (46 gr.).

Agua comun. c. s.

para que resulten $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{x}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ (1125 gr.) de cocimiento.

I. Erupciones cutáneas crónicas y afecciones venéreas y reumáticas. D. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ (180 gr.).

TOPICOS.

9029. TÓPICO DE ALMIDON ALCANFORADO. \mathfrak{z} Almidon. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (60 gr.).Alcanfor. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}\mathfrak{B}$ (40 gr.).

Se pulveriza y se mezcla.

I. Erisipela edematosa. D. Se aplica localmente.

9030. T. DE ALMIDON Y SAL AMONIACO (Chaverly). \mathfrak{z} Almidon en polvo. . . . $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (60 gr.).

Clorhidr. de amoníaco. \mathfrak{z} ij (8 gr.).
Se usa contra la erisipela.

9031. T. ANTICANCEROSO
(*Chester*).

\mathfrak{z} Hojas recientes de
laurel real. \mathfrak{z} jv (125 gr.).
Agua hirviendo. . . \mathfrak{l} bij (1000 gr.).
Se infunde en vasijas tapadas
hasta que se enfríe, se cuele y se
añade:
Jarabe de miel. \mathfrak{z} jv (125 gr.).
Se usa por medio de compresas
ó planchuelas.

9032. T. ANTIESCROFULOSO.

Se rodean los tumores escrofulo-
sos con compresas empapadas
en agua de mar, que se renuevan
muchas veces al día y se dejan se-
car en la piel.

9033. Otro (BREFELD).

\mathfrak{z} Aceite de hígado de
bacalao. \mathfrak{z} ß (15 gr.).
Extracto de Saturno,
Yema de huevo, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. . \mathfrak{z} ijß (10 gr.).
M. I. Ulceras escrofulosas. *D.*
Se aplican por medio de plan-
chuelas de hilas.

9034. T. ANTIESPASMÓDICO
(*Barthez*).

\mathfrak{z} Castóreo,
Asa fétida,
Triaca, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{z} ß (15 gr.).
Vinagre de ruda. c. s.
I. Histérico, amenorrea. *D.* En
aplicación al hipogastrio.

9035. T. ANTICTÉRICO (Vogler).

\mathfrak{z} Aceite de linaza. \mathfrak{z} vj (24 gr.).
Láudano de Sydenham. \mathfrak{z} ij (8 gr.).
I. Ictericia, esplenitis, hincha-
zon hepática. *D.* Dos ó tres apli-
caciones sobre la región del hígado
por medio de una franela.

9036. T. ANTILEUCORRÉICO
(*Kopp*).

\mathfrak{z} Extracto de ratania. \mathfrak{z} vj (24 gr.).
Agua. \mathfrak{z} xij (375 gr.).
Se disuelve y se añade:
Alcoholado de goma
quino. \mathfrak{z} ß (6 gr.).
Alcoholado de catecú. \mathfrak{z} j (4 gr.).
I. Leucorrea, catarro útero-
vaginal. *D.* En inyecciones ó apli-
cado por medio de una esponja.

9037. T. ANTIODONTÁLGICO
(*Handel*).

\mathfrak{z} Aceite de beleño. \mathfrak{z} j (4 gr.).
Opio purificado. \mathfrak{z} ß (2 gr.).
Extracto de belladona,
Alcanfor, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{g} vj (3 dec.).
Tintura de cantáridas,
Aceite de cajeput, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. 8 gotas.
H. S. A.
I. Caries de los dientes, odon-
talgia. *D.* Se introduce c. s. en la
cavidad del diente cariado.

9038. T. ANTISIFILÍTICO
(*Cerillo*).

\mathfrak{z} Miel egipciaca. \mathfrak{z} ij (8 gr.).
Agua pura. \mathfrak{z} ij (60 gr.).
D. Se aplica dos ó tres veces al
día, sobre las úlceras sifilíticas,
una compresa empapada en este
líquido.

9039. T. ASTRINGENTE.

\mathfrak{z} Cloruro de hierro. . \mathfrak{z} ijß (10 gr.).
Agua. \mathfrak{l} vj (3000 gr.).
I. Agalaxia, aneurisma, impé-
tigo, gota y reumatismo atónico.
D. En lociones y baños.

9040. Otro (PUNEGNAT).

\mathfrak{z} Sulfato de hierro,
Alumbre, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{l} bj (500 gr.).
Sal amoníaco,
Oxido de cobre,
Sulfato de zinc, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. . \mathfrak{z} j (30 gr.).

Se mezcla todo y se funde á fuego lento.

I. Torceduras, contusiones con ó sin heridas, y fracturas con tumefaccion enorme y derrame sanguíneo, hinchazon considerable á consecuencia de una dislocacion, erisipela de la cara, erisipela por grietas en los miembros edematosos, pánarizo incipiente y úlcera varicosa. **D.** Se disuelve el grosor de una nuez en lbij (1000 gr.) de agua tibia, y se empapan compresas en el líquido.

9041. T. AURIFERO (Niel).

℥ Oro dividido. ℥j (12 dec.).
Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

M. I. Es á propósito para dete-
ger las úlceras sífilíticas, apagar
el dolor y destruir las fungosida-
des y excrescencias venéreas. **D.**
Se aplican sobre las partes enfer-
mas por medio de un pincel mu-
chas veces al dia, y se somete al
enfermo á un tratamiento metódi-
co por el cloruro de oro y sodio.

**9042. T. DE BELLADONA
(Mignot).**

℥ Extracto acuoso de
belladona. ℥xx (10 dec.).
Extr. acuoso de opio. ℥vj (3 dec.).
Agua destilada. ℥jv (125 gr.)
Disuélvase.

I. Fimosis y para fimosis.
Mignot introduce este tópicó y
la pomada por medio de un estile-
lete entre el glande y el prepucio
con dos pedazos de esponja cor-
tados en forma de cono, empapa-
dos en este líquido; pero es ne-
cesario hacer inyecciones cada
hora entre los mismos tegidos por
medio de esta solucion.

Mignot modifica á veces su fór-
mula:

Cerato sin agua. ℥j (30 gr.).
Mucilago de semillas
de membrillos. ℥ij (8 gr.).

Extracto hidroalcohó-
lico de belladona. ℥j (4 gr.).
Extr. gomoso de opio. ℥jv (2 dec.).
H. S. A.

9043. T. CALMANTE.

℥ Cianuro de potasio. ℥jv (2 dec.).
Agua destilada. ℥j (30 gr.).
Disuélvase.
Se aplica en compresas sobre el
punto dolorido.

9044. Otro (POUGENS).

℥ Hojas de beleño,
Flores de adormidera
blanca, ãã. ℥j (30 gr.).
Opio disuelto en c. s.
de vinagre. ℥vj (3 dec.).
Se hace una pasta. Se aplica so-
bre la frente en la cefalalgia vio-
lenta.

9045. Otro (THOMPSON).

℥ Acido prúsico medicinal,
Alcohol rectificado, ãã. ℥j (4 gr.).
Agua. ℥v (20 gr.).
Mézclase y agítase al tiempo de
usarle. Se empapan lienzos que se
aplican sobre las partes doloridas.

9046. T. CONTRA EL ACNE.

℥ Cal apagada. ℥j (4 gr.).
Cerato calaminar. ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. ℥j (12 dec.).
M. I. Acne. **D.** Se usa en unturas
sobre la piel.

**9047. T. CONTRA LOS CALLOS
(Laroche).**

℥ Aceite comun. ℥j (30 gr.).
Cera blanca. ℥iij (12 gr.).
Se liquida añadiendo c. s. de
ancusa, y se bate esta pomada
con
Harina. ℥iij (90 gr.).
Acido acético. ℥iij (90 gr.).
Esencia de espliego. ℥j (4 gr.).

Se guarda la mezcla en frascos con tapon esmerilado.

Se extiende este t6pico en un pedazo de tela que se aplica al callo, y se cubre todo de un pedazo de espadrapo. Se tendr1 puesto veinticuatro horas.

9048. T. CONTRA LAS CICATRICES DE LAS VIRUELAS (Thielmann).

℞ Bicloruro de mercurio. ḡj (5 cent.).
 Agua destilada. ℥vj (180 gr.).
 Láud. de Sydenham. . . ℥j (4 gr.).
 H. S. A. un colirio, que se aplica una vez al dia por medio de compresas.

Segun dice el que le ha propuesto, este t6pico seca pronto sin dejar vestigios las pústulas variolosas, voluminosas, confluentes é inflamadas de la cara y de los párpados.

9049. T. CONTRA LAS CONTUSIONES (Montese).

℞ Polvo de sen ,
 Polvo de verbena oficial,
 Polvo de pim. blanca, añ. ℥j (30 gr.).
 Se mezclan los polvos y se hace una pasta con yema de huevo. Se empapa estopa en la mezcla, se la aplica á la parte enferma y encima de todo un vendaje. Se levanta á las veinticuatro horas.

I. Hinchazon por contusiones; es muy útil para los pobres por ser poco costoso.

9050. T. CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL (Cazenave).

En algunas f6rmas ligeras del acne, líquen, soriasis, herpes y aun eczema, Cazenave emplea simples lociones aciduladas, ó bien sobre todo en el impétigo, por ejemplo, despues de haber hecho caer las costras, produce

buenos efectos la aplicacion de una solucion aluminosa:

Alumbre. ℥ij á ℥iij (8 á 12 gr.).
 Infus. de rosas rojas. ℔bj (500 gr.).
 Pero la locion que en estos casos ha producido mejores resultados es la locion mercurial análoga al remedio secreto conocido con el nombre de licor de Gowland, y mas aún á la emulsion mercurial de Batedmen.

Despues de muchos ensayos ha adoptado la fórmula siguiente:

Bicloruro de mercurio,
 Bicloruro de amonio, añ. ḡij (1 dec.).
 Leche de almendras. ℔℔ (250 gr.).
 H. S. A.

Cuando el eczema se ha hecho cr6nico, se hacen lociones repetidas con la mezcla siguiente:

Acido nítrico,
 Acido clorhídrico, añ. 25 gotas.
 Agua destilada. ℥x (300 gr.).

Para el prurito del ano y de la vulva, á veces tan inc6modos y rebeldes, se recurre á las lociones siguientes:

Subcarbonato de potasa. ℥ij á ℥iij (8 á 12 gr.).
 Agua destilada. ℔bj (500 gr.);
 ó bien á las lociones sulfurosas:
 Sulfuro de potasa. . . . ℥j (4 gr.).
 Agua destilada. ℥x (300 gr.);
 ó al t6pico siguiente propuesto por Bielt:

Cianuro de potasio. . . . ℔℔ (6 dec.).
 Emulsion de almen-
 dras amargas. ℥vj (180 gr.);
 á las lociones alcanforadas:

Agua de lechuga. ℔bj (500 gr.).
 Agua alcanforada. . . . ℥j (30 gr.);
 á la solucion siguiente:

Bicloruro de mercur. ḡjv (2 dec.).
 Agua destilada. ℥vj (180 gr.).
 Alcoholato de menta. ℥℔ (15 gr.).

9051. T. CONTRA LAS HEMORROIDES (Valsalva).

℞ Triaca. ℥ij (8 gr.).
 Opio. ḡx (5 dec.).
 Se aplica al ombligo.

9052. T. CONTRA LAS HERIDAS RECIENTES DE LOS DEDOS (Mignot).

℞ Bálsamo del Perú líq. . ℥j (30 gr.).
 Alcoholato vulnerario. . ℥j (4 gr.).
 Se rocía la parte dos veces al dia por encima de las vendas y sin quitar el aparato.

9053. T. CONTRA LAS INDURACIONES DE LA PIEL Ó LOS INFARTOS, ó Tópico pulverulento iodurado (Chaberly).

℞ Almidon en polvo. . . ℥ij (60 gr.).
 Iodo en polvo. ḡx (50 cent.).
 Acetato de morfina. . . ḡjx (45 cent.).
M. I. Infartos é induraciones cutáneas, acne, anorexia, clorosis, escrófulas y panarizo. Se espolvorea una piel de cisne, que se aplica sobre el sitio enfermo.

9054. T. CONTRA LAS MANCHAS HEPÁTICAS (Hufeland).

℞ Borato de sosa. ℥ß (2 gr.).
 Agua de rosas,
 Agua de flores de naranjo, añ. ℥vj (24 gr.).
H. S. A. I. Pécas de color amarillo (*manchas hepáticas*), que se presentan en la piel de los jóvenes de uno y otro sexo. *D.* Basta humedecer las manchas tres ó cuatro veces al dia con esta solución, teniendo cuidado de dejar secar las partes sin enjuagarlas. En general desaparecen las manchas al cabo de algunos dias.

9055. T. CONTRA LOS SABAÑONES (Berton).

℞ Alcoholato de Fioraventi. ℥ij (60 gr.).
 Sub-acetato de plomo líquido,
 Aceite comun, añ. . . ℥ij (90 gr.).
 Acido hidroclórico. . . ℥j (30 gr.).
 Se agita la mezcla al tiempo de servirse de ella.

I. Sabañones no ulcerados, prurito. *D.* Se untan con este linimento por la noche las partes afectadas, y se las cubre despues con papel de seda empapado en el mismo líquido.

Nota. Se debe agitar la mezcla antes de servirse de ella, y aumentar ó disminuir el aceite segun se quiere aumentar ó disminuir la actividad del remedio.

9056. Otro (MIALHE).

℞ Extracto de saturno,
 Aguard. alcanforado, añ. ℥j (30 gr.).
I. Sabañones no ulcerados. *D.* Se dan fricciones por la mañana sobre la parte enferma, y por la noche se cubre con una compresa empapada en él. Produce buenos efectos.

9057. T. PULVERULENTO CONTRA LOS SABAÑONES (Chaberly).

℞ Azafran en polvo. . . ḡxviiij (4 gr.).
 Alcañfor en polvo. . . ℥ß (15 gr.).
 Fécula. ℥jß (45 gr.).
M. I. Sabañones, prurito.
 Se espolvorean unos guantes forrados por dentro, los que se llevan puestos dia y noche.

9058. T. CONTRA LOS SABAÑONES ULCERADOS (Hufeland).

℞ Borato de sosa. ℥ij (8 gr.).
 Ungüento rosado. ℥j (30 gr.).
H. S. A. D. C. s. para dar fricciones en las partes enfermas por la noche antes de acostarse, y puede usarse contra las manchas hepáticas.

9059. T. CONTRA LA TIÑA.

℞ Pez negra,
 Pez de Borgoña, añ. lbijß (1250 gr.).
 Se liquida á un calor suave y se incorpora:
 Harina de trigo. . . lbijß (1250 gr.).

Despues se añade poco á poco :

Vinagre blanco ca-
liente. ℥xv (7500 gr.).

Se extiende c. s. de esta mezcla sobre la piel y se aplica sobre las partes enfermas. Al cabo de doce horas se quita y se lava la herida.

Este método bárbaro ha sido abandonado.

9060. T. PULVERULENTO CONTRA LA TIÑA (Chaberly).

℥ Almidon en polvo. . . . ℥ij (60 gr.).
Azufre sublimado,
Belladona en polvo, ãã. ℥j (4 gr.).
Mézclese.

Espolvoréese la cabeza con este polvo.

9061. T. DESECANTE ó Polvo para las partes escoriadas.

℥ Licopodio. ℥j (30 gr.).
Oxido de zinc. ℥ß (15 gr.).
M. I. Efélides, equimosis ligeras, escoriaciones por obesidad, por andar á caballo ó por la orina en los niños. D. Se espolvorean ligeramente las partes escoriadas.

El TÓPICO PULVERULENTO DE ÓXIDO DE ZINC de Cazenave se compone de una parte de óxido de zinc por siete de almidon. A veces se añade alcanfor. I. Comeziones herpéticas, prurito.

9062. T. DIAFORÉTICO.

℥ Cataplasma de harina de linaza. ℥v (150 gr.).
Vinagre. ℥j (30 gr.).
Se mezclan y se aplican sobre las partes desnudas.

9063. T. DE DIGITAL ALCANFORADO (Chaberly).

NÚMERO 1.

℥ Digital. ḡxc (5 gr.).
Alcanfor. ḡLjv (3 gr.).
Almidon. ℥j (30 gr.).

NUMERO 2.

Digital. ḡxc (5 gr.).
Almidon. ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. ℥ijß (10 gr.).

NUMERO 3.

Digital. ḡxc (5 gr.).
Almidon. ℥ijj (90 gr.).
Clorhidrato de amon. ḡLjv (3 gr.).

I. Edema de los convalecientes, erisipela edematosa.

9064. T. DULCIFICANTE.

℥ Acido cianhídrico,
Alcohol, ãã. ℥j (4 gr.).
Agua. ℥v (20 gr.).
I. Flegmasias, particularmente de la piel, eritema y eczemas. D. Se empapan compresas que se aplican á las partes doloridas.

9065. T. ESCARÓTICO Y ANTISIFILÍTICO.

℥ Alcohol á 30°,
Vinagre, ãã. ℥j (30 gr.).
Sublimado corrosivo en polvo. ℥ij (8 gr.).
Alumbre en polvo,
Alcanfor,
Litargirio porfirizado, ãã. ℥j (4 gr.).
Mézclese y agítese.

I. Grietas, crestas, condilomas venéreos que los enfermos no se quieren dejar cortar.

9066. T. DE HANCKE, CONTRA LAS COMEZONES.

℥ Iodo. ḡxviii (4 gr.).
Ioduro de potasio. . . ḡLjv (3 gr.).
Agua destilada. . . . ℥vj (200 gr.).
Alcohol. ℥ijß (50 gr.).
Disuélvase.

I. Prúrigo acompañado de comeziones vivas. D. Se aplican compresas empapadas en esta mezcla.

9067. T. MADURATIVO (Piderit).

℞ Cera amarilla,
Resina comun, ãã. ʒj y ʒij (40 gr.).
Se funden á fuego lento y se añade:
Jabon negro. ʒj á ʒiij (4 á 12 gr.).
Pulpa de cebollas cocidas,
Miel amarilla, ãã. ʒvij (224 gr.).
Se deja la mezcla al fuego hasta que se haya evaporado la humedad de la pulpa, y se menea hasta que se enfrie.

9068. T. PURGANTE.

℞ Acíbar,
Coloquintida,
Eléboro negro,
Resina de jalapa, ãã. ʒijʒ (40 gr.).
Aceite de croton. . . . 45 gotas.
Tintura de ruibarbo. . . c. s.
I. Cólico metálico, hidropesía, helmintiasis, ténia. Es muy cómodo para purgar los enfermos. Se aplica al epigastrio ó á la region umbilical extendido en un pedazo de piel, sobre todo cuando alguna flegmasia de la membrana mucosa gástrica contrain-

dica los purgantes interiormente.

9069. T. REFRIGERANTE Y CALMANTE.

Se aplica á las heridas contusas, tumores tirantes, calientes y dolorosos, con hojas de oliva, lechuga ó acelga, etc.

9070. T. SECO ALCALINO (Cazenave).

℞ Carbonato de sosa en polvo impalpable. . . ʒxviiij (4 gr.).
Almidon. ʒijʒ (40 gr.).
I. Es útil en las afecciones pruriginosas del ano y del escroto.

9071. T. VERMÍFUGO (Roux).

℞ Extracto de genciana,
Extracto de ajénjos, ãã. ʒj (30 gr.).
Se extiende en un pedazo de piel suave y se espolvorea con Pulpa de coloquintida. . . c. s.
Se aplica al hueco del estómago y se da todos los días ʒj (5 cent.) de mercurio dulce, dosis que se puede aumentar progresivamente.

TRATAMIENTOS ESPECIALES.

9072. TRATAMIENTO TÓPICO DE LA ALOPECIA (Wilson).

Se lava todas las mañanas la cabeza con agua de jabon, despues se la frota con un lienzo áspero, se la cepilla con un cepillo fuerte, y finalmente, despues de estas maniobras se dan fricciones durante cinco minutos con la mistura siguiente:

℞ Agua de Colonia. ʒij (60 gr.).
Tintura de cantáridas. ʒij (8 gr.).
Esencia de romero. . . . 40 gotas.

Esencia de espliego. . . . 40 gotas.
Mézclese.

No se aplicará esta mistura hasta enrojecer bien la piel por medio del cepillo. Wilson asegura que es muy eficaz en casos desesperados.

9073. T. DE LA AMENORREA (Rey).

Consiste en rodear las partes genitales de la enferma con hojas frescas y machacadas de celedonia, y conservarlas dia y noche. Se ha observado que hace aparecer la menstruacion.

9074. T. DE LA BLENORRAGIA EXTERNA (Ricord).

Si se puede descubrir el glande, la inflamacion es ligera y hay poca descamacion del epiteliu, basta hacer lociones de agua blanca, interponer un lienzo fino y seco entre el glande y el prepucio. Pero si es mas intensa y la secrecion mucoso-purulenta es mas abundante, existan ó no escoriaciones, se hacen dos veces al dia lociones con la solucion siguiente:

Agua destilada. ℥vj (200 gr.).
Nitrato de plata. ℥℔ (2 gr.).
M. S. A.

Despues se coloca un lienzo seco entre el prepucio y el glande.

Si existen úlceras un poco mas profundas ó hay hipertrofia de los folículos mucíparos, se cauterizan las partes con nitrato de plata.

Si hay fimosis y las mismas circunstancias, se hacen tres ó cuatro inyecciones al dia con los líquidos indicados, ó se cauteriza ligeramente con el nitrato de plata introducido entre el prepucio y el glande. Este método produce buenos resultados.

En los casos de fimosis Ricord no cauteriza por no ocasionar la inoculacion á consecuencia de la herida, y porque en el mayor número de casos no es mas que accidental y pasajero.

Los emolientes y los antiflogísticos solo obran de un modo lento é incierto; á pesar de esto, es útil como medicacion accesoria aplicar algunas sanguijuelas á las regiones inguinales, y si hay reaccion febril, practicar una sangría del brazo.

El enfermo debe tener reposo, observar un régimen suave y aun la dieta en casos graves, y usar bebidas diluentes y laxantes. Si existe eretismo, podrá tomar por

las noches dos píldoras de las siguientes:

Alcanfor,
Tridacio, añ. ḡLjv (3 gr.).
Mucilago. c. s.

para veinte píldoras.

No usa los baños locales tibios de malvabisco, porque dice que son dañosos; pero aconseja los fomentos con cocimiento de cabezas de adormideras.

9075. T. DE LA BLENORRAGIA URETRAL (Ricord).

Cuando no existe ningun síntoma de inflamacion, se procurará hacer abortar la blenorragia; el mas eficaz de los remedios para conseguirlo es la inyeccion de nitrato de plata. Las dosis que adopta son las siguientes:

Inyeccion argéntica.

℥ Nitrato de plata. ḡjx (50 cent.).
Agua destilada. ḡj (30 gr.).

Esta inyeccion debe hacerse con una geringa de vidrio, y debe recorrer todo el conducto de la uretra, en donde permanecerá medio minuto. A veces es necesario aumentar la dosis del nitrato hasta ḡxx (1 gr.) y basta una sola inyeccion al dia.

Al mismo tiempo prescribe la cubebas y el copaiba.

Cuando ya no existe flujo, prescribe Ricord la inyeccion siguiente:

Inyeccion de acetato de zinc.

℥ Sulfato de zinc,
Acetato de plomo, añ. ḡxx (1 gr.).
Agua. ℥vj (200 gr.).
D. Tres inyecciones al dia.

Cuando la Blenorragia está acompañada de síntomas agudos, se debe recurrir primero á un tratamiento antiflogístico enérgico.

Si persiste el flujo, Ricord emplea una inyeccion que contiene ġij (1 dec.) de protoioduro de hierro por ʒiij (100 gr.) de agua, ó la inyeccion siguiente:

Inyeccion astringente.

ʒ Vino tinto. ʒv (150 gr.).
 Agua dest. de rosas. . . ʒjβ (45 gr.).
 Extracto de ratania. . . ġxviiij (1 gr.).
 Láudano de Sydenham. ʒβ (2 gr.).
 D. Tres ó cuatro inyecciones al dia.

O bien en los flujos rebeldes:

Protoioduro de hierro. ġj á ġjv (5 á 20 cent.).

Agua destilada. ʒvj (200 gr.).

En estos casos es bueno dar al enfermo todos los dias dos ó tres vasos de agua de brea con una cucharada del jarabe siguiente:

Jarabe de Tolú. lbj (500 gr.).

Citrato de hierro. . . . ʒjβ (6 gr.).

9076. T. DE LOS BUBONES
 (*Reynaud*).

Si los fenómenos inflamatorios son francos, se aplican sanguijuelas; si el bubon está en supuracion, se aplica en el centro, en donde se percibe la fluctuacion, un vejigatorio del grandor de dos reales á una peseta, segun la extension del tumor; cuando está bien formada la flictena, se quita todo, se enjuga la parte, y se aplica sobre el dermis una planchuela de hilas empapada en una solucion de ġxviiij (1 gr.) de cloruro mercúrico en ʒj (30 gr.) de agua destilada; á las dos horas se ha formado la escara; pero si no lo está, se vuelve á aplicar otra compresa, se cubre el tumor con una cataplasma emoliente, y se desprende la escara. Cuando el bubon está en estado de induracion, se usan las pomadas resolutivas, los emplastos fundentes y una presion suave y continua por medio de ladrillos calientes.

9077. T. DE LA CATARATA
 (*Gondret*).

Consiste en cauterizar con la pomada amoniaca ó con el cauterio de Percy.

9078. T. DE LA CARIDAD CONTRA EL CÓLICO DE LOS PINTORES.

Dia primero.

Se administra la *lavativa purgante de los pintores*, que se compone de

Hojas de sen. ʒβ (15 gr.).

Agua. lbj (500 gr.).

Se hierve el sen en el agua y se añade al cocimiento:

Sulfato de sosa. . . . ʒβ (15 gr.).

Vino emético. ʒjv (125 gr.).

Durante el dia se hace tomar el *agua de casia con los granos*, que consta de

Cocimiento de pulpa

de cañafístula. . . lbij (1000 gr.).

Sal de Epsom. ʒj (30 gr.).

Tártaro emético. . . ġiij (15 cent.).

Si el cólico es muy violento y el enfermo es muy robusto, se añade algunas veces al agua de casia:

Jarabe de espino serval. ʒj (30 gr.).

Confecion de Hamech. ʒij (8 gr.).

A las cinco de la tarde se da la *lavativa anodina de los pintores*, que se prepara con

Aceite de nueces. . . . ʒvj (180 gr.).

Vino tinto. ʒxij (375 gr.).

A las ocho se administra un *bolo* formado de

Triaca. ʒj á ʒjβ (4 á 6 gr.).

Opio. ġj á ġjβ (5 cent. á 75 mil.).

Dia segundo.

Se administra por la mañana el vomitivo llamado *agua bendita*, que se compone de

Tártaro emético. . . ġvj (30 cent.).

Agua tibia. lbβ (250 gr.).

para tomarle en dos veces con dos horas de intervalo.

Cuando se presentan los vómitos, se facilitan con agua tibia, y luego que el enfermo ha concluido de vomitar, se le da todo el resto del día la *tisana sudorífica*, que se prepara con

Guayaco,

China,

Zarzaparrilla, añ. ℥j (4 gr.).

Se hierve durante una hora en

Agua comun. lbij (1500 gr.)
que se reducen á dos, y se añade

Sasafrás. ℥j (30 gr.).

Regaliz. ℥B (15 gr.).

Se hierve ligeramente y se cuele.

A las cinco de la tarde se usa la lavativa anodina, y á las ocho la triaca con el opio como el primer día.

Día tercero.

Se prescribe la *tisana sudorífica laxante* que sigue:

Tisana sudor. simple. lbij (1000 gr.).

Sen. ℥j (30 gr.).

Se hierve un poco y se cuele.

Se toma de una vez por la mañana.

En el resto del día se administra la tisana sudorífica simple, por la tarde á las cuatro la lavativa purgante de los pintores, dos horas despues la lavativa anodina, y por último á las ocho el bolo de triaca con el opio.

Día cuarto.

Se da la *poción purgante de los pintores*, que se prepara con

Sen. ℥ij (8 gr.).

Agua. lbB (250 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á ℥vj (180 gr.) y se añade:

Sal de Glaubero. ℥B (15 gr.).

Jalapa en polvo. ℥j (4 gr.).

Jar. de espino serval. ℥j (30 gr.).

Se favorece la acción de este purgante con el auxilio de un caldo de yerbas. Durante el día se vuelve al uso de la tisana sudorífica;

á las cinco de la tarde se administra otra vez la lavativa anodina, y á las ocho se repite el bolo de triaca con el opio.

Día quinto.

Tisana sudorífica laxante; por la tarde á las cuatro la lavativa purgante, á las seis la lavativa anodina, y á las ocho el bolo de triaca con el opio.

Día sexto.

Se vuelve á dar el purgante de los pintores, y del mismo modo que en el cuarto día, se da la tisana sudorífica simple, la lavativa anodina y el bolo de triaca con el opio.

Comunmente los enfermos se curan despues de la segunda medicina; pero si subsistiesen los cólicos, se repite el purgante una, dos, tres veces ó mas, observando la misma conducta que en el cuarto y sexto día; en los días intermedios se sigue el mismo método que en el tercero y quinto.

Hay algunos casos, aunque raros, en que los purgantes no determinan evacuaciones ni por arriba ni por abajo; en este caso se usan los *bolos purgantes de los pintores*, que se componen de

Diagridio,

Resina de jalapa, añ. ℥x (5 dec.).

Gutagamba. ℥xij (6 dec.).

Confec. de Hamech. ℥jB (6 gr.).

Jar. de espino serval. c. s.

Se hacen doce bolos, de los que se toma uno cada dos horas.

Durante este tratamiento debe prescribirse una dieta severa en los dos ó tres primeros días; se empieza á dar caldos al cuarto ó quinto día, y despues se aumentan gradualmente los alimentos. Cuando se empieza á dar vino, debe ser añejo y de buena calidad.

En los niños, en las personas débiles y en las mujeres se disminuyen las dosis del tratamiento, en particular las del vomitivo y las del purgante, pues solo se da la mitad ó la tercera parte de la dosis.

Este es el tratamiento que á pesar de su extraña composicion cuenta tan numerosas curaciones, que muchos médicos han creído deber adoptarle con la mayor escrupulosidad. Lerminier le sigue exactamente en el hospital de la Caridad, á donde acude el mayor número de enfermos del cólico metálico á obtener su curacion. Fouquier ha creído se debe modificar este medio empírico; habiéndole demostrado la observacion que en el mayor número de casos existe disposicion marcada al vómito, ha llenado esta indicacion dando un emeto-catártico (agua mineral) que repite dos y aun tres veces hasta que han cesado las náuseas. Entonces solo administra los purgantes, en los que insiste hasta que las evacuaciones alvinas sean abundantes y fáciles. No usa la lavativa anodina de los pintores ni el bolo de triaca y opio. Restablecer y mantener el curso de las evacuaciones alvinas son las dos principales indicaciones que Fouquier cree deben llenarse en el tratamiento del cólico metálico. Este práctico usa poco los narcóticos, y antes que la experiencia le hubiese probado la poca eficacia del extracto de beleño, le preferia al de opio, como remedio menos á propósito para producir el estreñimiento, que constituye la parte principal de la enfermedad. Considera á los medios que le destruyen como el único remedio de los dolores atroces que experimentan los enfermos.

Kapeler, médico del hospital de San Antonio, combate con feliz éxito el cólico de plomo por el uso

del alumbre, á la dosis de 5j á 5ij (4 á 8 gr.) en una pocion gomosa. Se repite otra dosis cuando no se disipa el mal después de tomar la primera. Los demás remedios que emplea el práctico distinguido de que acabamos de hablar, son las lavativas, ya simplemente emolientes, ya aceitosas, que se repiten frecuentemente, y algunas veces cada media hora.

9079. T. DEL CÓLICO DE PLOMO (Ranque).

El primer dia toma el enfermo un semicupio de media hora para que la piel se ponga mas permeable y susceptible de recibir la impresion de los tópicos que se han de aplicar; despues de salir del baño, se cubre todo el abdomen con un *epitema* compuesto del modo siguiente:

Emplasto de cicuta,
Emplasto de diaqui-
lon, ãã. ʒjß (45 gr.).
Triaca. ʒß (15 gr.).
Alcanfor. ʒj (4 gr.).
Flores de azufre. . . . ʒß (2 gr.).

Se mezcla todó á fuego lento, y se extiende sobre una piel ó un lienzo bastante grande para cubrir todo el abdomen, incluso el epigastrio y hasta una pulgada del miembro. Antes de aplicar el epitema se le calienta, y despues se cubre su superficie con la mezcla siguiente:

Alcanfor,
Tártaro emético, ãã. . . ʒj (4 gr.).
Azufre en polvo. ʒß (2 gr.).

Se quitará este epitema luego que los enfermos se quejen de la erupcion pustulosa que produce, y se sustituirá por otro nuevo si aún no se hubiesen calmado los dolores cólicos.

Se cubren tambien los lomos desde la última vértebra dorsal

hasta el sacro con el *epitema lumbar*, que se prepara con

Masa emplástica del epitema abdominal. c. s.

Se extiende en una piel ó un lienzo del grandor suficiente, y se espolvorea con

Alcanfor. ʒij (8 gr.).

Este último epitema puede permanecer aplicado por espacio de cinco ó seis dias (1).

Se frotarán los muslos y los miembros doloridos con el *linimento* siguiente:

Agua destilada de laurel real. ʒij (60 gr.).

Eter sulfúrico. ʒj (30 gr.).

Extracto de belladona. ʒij (24 dec.).

Se mezcla y se agita antes de usarle. Se empleará una ó dos cucharadas para cada fricción.

Si subsiste astringencia de vientre, se administra la *lavativa antineuropática*, que consta de

Tintura etérea de hojas de belladona (2). 30 gotas.

Aceite de olivas ó de almendras dulces. ʒjv (125 gr.)

ó Cocimiento de semillas de linaza. . . . ʒʒ (250 gr.).

Se administra esta lavativa una ó dos veces al dia segun la intensidad del dolor y la duración del estreñimiento (3).

Cuando los dolores se hacen muy violentos, se usa á cucharadas la *pocion antineuropática* siguiente:

Agua de tilo. ʒij (60 gr.).

Tintura etérea de belladona. 20 gotas.

Jarabe de horchata. . . ʒʒ (2 gr.).

Algunas veces reemplaza Ranque

esta pocion por la mezcla siguiente:

Tintura etérea de belladona. 6 gotas.

Jarabe de horchata. . . ʒj (4 gr.).

Se mezcla para una sola dosis.

Durante este tiempo el enfermo estará á dieta absoluta, y usará por bebida agua de cebada gomoosa, suero ó emulsiones en pequeña cantidad.

Dia segundo.

Se continúa del mismo modo, solo que se suprime la pocion á los sugetos á quienes no calma los dolores. Se sigue exactamente el mismo régimen.

Dia tercero.

Se quita el epitema abdominal á los que ya no tienen cólico. Se le reemplaza por franelas empapadas en un cocimiento emoliente caliente. Entonces se disponen algunos ligeros alimentos. Cuando es poco considerable el alivio, se reconoce si el epitema ha producido alguna rubicundez; entonces se le vuelve á poner, añadiendo ʒij (8 gr.) de tártaro estibiado. Si no ha habido los cambios que acabamos de enumerar, se continúa con la pocion, la lavativa, las fricciones, las bebidas y el régimen severo.

Dia cuarto.

Si se han calmado los dolores, se quitan los dos epitemas.

Se continúa con las lavativas y las fricciones en los casos en que no haya deposiciones ó subsistan aún los dolores de los miembros.

Cuando han disminuido mucho los dolores, se deja aun el epitema abdominal hasta el dia siguiente, á no ser que el enfermo sufra mucho. Cuando persisten

(1) Se ha aconsejado además los dos epitemas en la calentura tifoidea.

(2) Puesto el éter en digestion durante algun tiempo sobre el polvo de belladona, quita á esta planta su propiedad venenosa y le da una propiedad sedante.

(3) Se ha aconsejado tambien esta lavativa contra la disenteria aguda.

con la misma intensidad, lo que es muy raro, se reconoce levantando el epitema abdominal que no ha producido rubicundez ni pústulas. Entonces es necesario aplicar tres ó cuatro ventosas escarificadas en el vientre y hacer tercera aplicacion del epitema, duplicando la dosis del tártaro estibiado.

Se continúa con las fricciones y las lavativas; se aumenta la porcion de alimentos á los sugetos que los soportan bien, y á los que no recobran el apetito se les da una infusion aromática mezclada con leche y un poco de caldo grasso, mezclado igualmente con leche.

Dia quinto.

Si las pústulas que se han desarrollado en el vientre excitan mucha irritacion, se las curará con una mezcla de cerato y unguento rosado extendida en hojas de acelga. Cuando persiste el dolor en las rodillas, en las pantorrillas ó en las plantas de los piés, se reemplaza el linimento por el epitema estibiado, que se aplica en todos los puntos en que existe dolor.

Si se paralizan las manos y las muñecas, se las frota con el linimento; si se declara una amaurosis ó queda cefalalgia, despues de haber cesado el cólico, se frotan con el mismo linimento las sienes, la frente y la nuca; si falta apetito para el sexto dia, se administra el aceite de ricino ó cualquiera otro minorativo.

El EPITEMA DE RANQUE DE LOS H. DE M. se prepara como sigue:

- Emplasto de diaquilon mayor,
- Emplasto de cicuta, ãã. \mathfrak{z} ij (60 gr.).
- Triaca. \mathfrak{z} j (30 gr.).
- Alcanfor. \mathfrak{z} j (4 gr.).
- Azufre sublimado. . . . \mathfrak{z} B (2 gr.).

Se licúan los emplastos á fuego lento, se deja enfriar algun tanto la materia y se añade el alcanfor pul-

verizado por medio de unas gotas de alcohol; se incorpora despues la triaca. Para aplicarle se extiende sobre un lienzo ó baldés, y se espolvorea con la composicion siguiente que puede tenerse ya preparada:

- Tártaro emético. \mathfrak{z} j (4 gr.).
- Azufre sublimado,
- Alcanfor pulverizado por medio del alcohol, ãã. \mathfrak{z} B (2 gr.).

H. S. A. I. Como revulsivo; cólera, cólico saturnino, odontalgia. El lumbago lo mismo que el anterior, y en el histérico y saturnino.

9080. T. DEL CÓLICO DE PLOMO
(*Martin Solon*).

Prescribe la pocion purgante siguiente:

- \mathfrak{z} Jalapa en polvo. \mathfrak{z} xij (6 dec.).
- Sulfato de sosa. \mathfrak{z} B (15 gr.).
- Maná. \mathfrak{z} j (30 gr.).
- Agua. c. s.

Se prepara una pocion de \mathfrak{z} jv (125 gr.).

Por la noche se administra una lavativa con sen y sulfato de sosa, y poco despues un julepe con \mathfrak{z} j (30 gr.) de jarabe de diacodion.

Se repite la misma prescripcion al dia siguiente, si no han cedido completamente los síntomas, lo que sucede con frecuencia. Pero despues del segundo purgante se disipan el estreñimiento y los dolores de los miembros, la cara recobra su expresion natural y se restablece el apetito. Muchos enfermos á quienes se les ha tratado de este modo, se han curado al quinto ó sexto dia de tratamiento. Toma además el enfermo una tisana de vaca tamarindada.

9081. Otro (GENDRIN).

Se prescribe la limonada sulfúrica á la dosis diaria de \mathfrak{z} x á \mathfrak{z} xij (300 á 375 gr.), la cual se prepara con \mathfrak{z} ljjv á \mathfrak{z} lxxij (3 á 4 gr.) de ácido sulfúrico á 66° por 2 quart. (1 lit.) de agua que se endulza si se quiere con \mathfrak{z} ij

(60 gr.) de jarabe simple. Esta dosis de limonada sulfúrica es suficiente para preservar del cólico á los obreros que trabajan el plomo si no desprecian las precauciones siguientes: 1.^a Usar vestidos especiales para el trabajo, que se quitarán en los momentos de dejarle; 2.^a Lavar con agua de jabon, cuando interrumpen el trabajo, todas las partes habitualmente desnudas del cuerpo; 3.^a tomar dos veces á la semana un baño jabonoso, cuya accion se auxilia con las fricciones con un cepillo. Es indispensable esto último á los obreros que trabajan el albayalde ó el litargirio, el minio ó muelen los colores. Para conservar la salud son indispensables estas precauciones, pues basta interrumpirlas siete á ocho dias, y aun tres, si los obreros hacen excesos en el vino ó licores, para que sobrevengan accidentes saturninos. Debe continuarse con estas precauciones aunque haga ocho ó diez dias que se ha suspendido todo trabajo peligroso, porque pueden sobrevener accidentes tóxicos.

9082. T. CONTRA LA OFTALMIA CATARRAL CRÓNICA (*Reveillé Parisé*).

Se sustraerá el enfermo en todo lo que sea posible de las causas que la producen; hará uso del colirio siguiente y las lociones con un cocimiento ó infusion fuerte de ratania con ó sin extracto de Saturno á una temperatura suave ó tibia.

℞ Sulfato de cobre. ḡiij (15 cent.).
Láudano. 12 gotas.
Agua destilada de rosas. ḡjv (125 gr.).

9083. T. CONTRA LA SARNA (*Dornblueth*).

℞ Jabon negro. ḡjv (125 gr.).
Raiz de eléboro blanco. ḡij (60 gr.).

Agua comun caliente. c. s.

H. S. A. una mistura de la consistencia de jarabe.

Se aplica este linimento por medio de un pincel. Al dia siguiente de la última friccion se frota todo el cuerpo con ḡjv (125 gr.) de jabon negro y se lava el cuerpo con agua y jabon.

9084. T. CONTRA EL TUMOR LAGRIMAL (*Beral*).

Antes de recurrir á las operaciones, Beral aconseja que se emplee el tratamiento siguiente:

1.^o Cada diez dias se purga el enfermo con ḡjß (45 gr.) de sulfato de magnesia en un puchero de caldo de yerbas.

2.^o Por la mañana y por la noche se dan fricciones sobre el tumor y el lado correspondiente de la nariz con unguento napolitano.

3.^o Tres veces al dia se dejan caer entre los párpados, en el ángulo mayor del ojo, algunas gotas del colirio siguiente:

℞ Sulfato de zinc. ḡjv (2 dec.).
Agua destilada. ḡvj (3 dec.).
Láudano. 15 gotas.

4.^o Se bebe la infusion de hojas de nogal y se sorbe muchas veces al dia el mismo cocimiento.

5.^o Cada dos dias se toma un baño de piés.

9085. T. DE LA COREA (*Walrdlervorth*).

℞ Extr. de elaterio. ḡj (5 cent.).
Jalapa en polvo. ḡxxxvj (18 dec.).
Gengibre en polvo. ḡxxjv (12 dec.).
H. S. A. polvo, que se divide en doce dosis.

D. Una cada cuatro horas, hasta empezar á producir su efecto laxante.

Si á pesar de la accion enérgica del medicamento sobre el conducto intestinal persiste la enfermedad, el autor recomienda el tartrato de hierro y amoniaco primero á la dosis de ḡiij (15 cent.)

tres veces al dia, en un vehiculo cualquiera, y aumenta gradualmente la dosis hasta ḡv (25 cent.) en cada toma, lo que en los casos comunes basta para curar la enfermedad.

Asegura Walrdlervorth que este tratamiento es muy eficaz.

9086. T. DE LA ERISIPELA DE LOS NIÑOS (Trousseau).

Siendo tan grave esta enfermedad en los primeros dias de la vida, Trousseau ha recomendado los siguientes tratamientos como mas eficaces.

1.º Se disuelve:

Eter sulfúrico. ʒij (60 gr.).

Alcanfor. ʒj (30 gr.).

Se puede concentrar mas esta solucion y se usa extendiéndola sobre todas las partes afectadas de erisipela, cuya aplicacion debe renovarse cinco ó seis veces al dia.

2.º Se ha usado tambien con buen éxito la siguiente pomada:

ʒ Nitrato de plata cristalizado. ʒʒ (2 gr.).

Manteca reciente. ʒij (8 gr.).

Se extiende sobre la parte enferma, pero tiene el inconveniente de que se ennegrece al contacto del aire y oculta de este modo la extension de la enfermedad. Por esta causa se ha propuesto la solucion siguiente:

ʒ Nitrato de plata cristalizado. ʒʒ (2 gr.).

Agua destilada. ʒij (8 gr.).

Se aplica por medio de un pincel, mañana y noche, sobre el punto enfermo. Aplicándola con mas frecuencia no ha dado resultado mas ventajoso.

9087. T. DEL ESCORBUTO Y DE LA PÚRPURA.

Se comen todos los dias dos ó tres limones, un manojo de berros

y de acederilla. Se bebe todos los dias mañana y noche medio vaso de vino preparado con

ʒ Quina amar. real. ʒjʒ (50 gr.).

Raiz de rábano. . . ʒvj (200 gr.).

Hojas de coclearia. 2 puñados.

Aguardiente. . . . $\frac{1}{2}$ quart. ($\frac{1}{4}$ lit.).

Vino blanco bue-

no. 4 quart. (2 lit.).

H. S. A. Tambien se puede usar este mismo vino dilatado en agua bajo la forma de gárgaras.

Este tratamiento ha producido muchas veces buen resultado.

9088. T. DE LAS AFECCIONES ESCROFULOSAS (Negrier).

Negrier ha preconizado el siguiente tratamiento de las afecciones escrofulosas, que ha producido buen éxito.

Tisana de hojas de nogal.

ʒ Hojas secas de nogal. ḡxc (3 gr.).

Agua. ʒbj (500 gr.).

Se infunde y se endulza con miel ó con jarabe de nogal.

Extracto de nogal.

Se prepara con las hojas de nogal por desalojamiento ó en el baño maria. Se prescribe en píldoras de ḡjv (2 dec.) de extracto y c. s. de polvo de nogal.

D. Dos á cuatro píldoras al dia.

Cocimiento de hojas de nogal.

ʒ Hojas secas de nogal. ʒj (30 gr.).

Agua. 2 quart. (1 lit.).

Jarabe de hojas de nogal.

V. número 3248.

Pomada de nogal.

ʒ Extracto de hojas de nogal. ʒj (30 gr.).

Manteca. ʒx (40 gr.).

Esencia de bergam. . . ḡiij (15 cent.).

D. En fricciones suaves durante un cuarto de hora, dos veces al día en las regiones afectadas.

Colirio contra las oftalmias escrofulosas. V. núm. 1191.

Recomienda que se continúe este tratamiento durante mucho tiempo seis meses, un año ó mas.

9089. T. DE LAS FRACTURAS CON LA SOLUCION DE DEXTRINA
(*d'Arcet*).

1.º Se hace una mezcla de cien partes de dextrina, sesenta de aguardiente alcanforado ó aguardiente comun y cincuenta de agua caliente.

2.º Se exprime con cuidado el exceso de la mezcla que moja inútilmente la venda.

3.º Se aplica con precaucion el aparato, procurando hacer el menor número posible de inversos.

4.º Se barnizará el aparato con el resto de la mezcla, pasando la mano de arriba á bajo en el sentido en que están los circulares.

5.º Se suspenderá el aparato de una venda, cubierta de cerato, para que no se pegue cuando se seque.

9090. T. DE LA GONORREA
(*Edwards*).

Primeramente da á los enfermos ḡx (50 cent.) de calomelanos divididos en tres dosis, cada cuatro horas. Una hora despues da tres cucharadas de la mistura siguiente:

℥ Tártaro emético. ḡij (15 cent.).
Escamonea. ḡxv (75 cent.).
Jalapa. ʒʒ (2 gr.).
Sulfato de magnesia. ʒʒ (15 gr.).
Agua. ℔ʒ (250 gr.).

Se da media racion de alimentos, tisana de cebada y linaza. Los enfermos vomitan generalmente la primera dosis, pero luego se habitua el estómago.

Se lavan á menudo las partes genitales con agua tibia, y el enfermo llevará suspensorio.

Cuando haya cesado la inflamacion se hará uso de la mistura siguiente:

Clorhidrato de morfi-
na. ḡij (10 cent.).
Ioduro de potasio. ʒʒ (2 gr.).
Bálsamo de copaiba,
Aceite de cubebas, āā . ʒijʒ (10 gr.).
Agua de potasa (1). ʒj (30 gr.).

D. Una cucharadita de café cada cuatro horas en un cocimiento de cebada.

Se cubre el miembro con compresas empapadas en una solucion, que se humedece constantemente con otra de subacetato de plomo. A los tres dias de este tratamiento el enfermo toma aún por la noche una dosis de calomelanos y al dia siguiente un purgante. Desde este momento toma cada dos ó tres horas la inyeccion siguiente:

Subacetato de plomo. ʒj (4 gr.).
Agua. ℔ʒ (250 gr.).

El flujo cesa pronto; el enfermo toma todos los dias una dosis de la mistura, y solo usa cada dos dias una inyeccion de agua fria.

Edwards dice que jamás ha producido malos resultados este tratamiento pronto.

9091. Otro (DELPECH).

℥ Pimienta de cubebas. ʒij (8 gr.).

D. Da una, dos, tres y aun cuatro veces al dia, esta dosis diluida en un poco de agua.

Si produce náuseas ó dolores de tripas añade ocho ó diez gotas de láudano ó un poco de un ácido vegetal.

Corregida la blenorrea, y aun

(1) El agua ó licor de potasa de la R. DE PRUSIA se compone de una parte de carbonato de potasa y dos de agua destilada.

cuando no exista, somete á los enfermos á un tratamiento mercurial por medio del licor de Van Swieten ó de las píldoras mercuriales de Plenck.

9092. T. DE LAS ALUCINACIONES CON EL ESTRAMONIO.

Se ha conseguido su curacion en cuatro, siete dias ó un mes con ḡij (10 cent.) mañana y noche de extracto de zumo depurado de estramonio; en cinco, ocho á quince dias usando ḡvj (30 cent.) á cucharadas de hora en hora; en veinticuatro horas por la dosis de ḡj (5 cent.) de extracto administrado de hora en hora, hasta que sobrevengan los efectos fisiológicos, que acaecen á los ḡvj (30 cent.). Debe vigilarse la accion del remedio para corregir sus malos efectos.

9093. T. DE LA HIDROPESÍA PASIVA DEL TEGIDO CELULAR (Dupuytren).

Prescribe para bebida :

- ℥ Raiz de grama,
- Raiz de fresa,
- Raiz de brusco, ãã. ℥B (15 gr.).
- Agua comun. ℔ij (1000 gr.).

Se hace un cocimiento y se añade:

- Jarabe de las cinco raices. ℥ij (60 gr.).
- Nitrato de potasa. ḡxv (75 cent.).

Píldoras.

- ℥ Jabon medicinal. ℥iij (12 gr.).
- Polvo de digital. ℥j (4 gr.).
- Calomelanos. ℥ij (8 gr.).

Para setenta y dos píldoras.

Se toma una por la mañana y otra por la noche.

Linimento.

- ℥ Aceite de manzanilla. ℥vj (180 gr.).
- Tintura de cebolla albarrana,
- Tintura de digital, ãã. ℥j (4 gr.).

Se mezcla agitando.
Se dan por la noche fricciones en las partes infiltradas.
Cada cuatro dias se suspende el tratamiento para tomar un purgante.

9094. T. DE LOS HERPES CON EL ANTRACOCALI.

- ℥ Antracocali simple. . . ḡij (10 cent.).
 - Polvo de raiz de regaliz
 - ó Carbon. de magnesia. ḡv (25 cent.).
- M. S. A. Se dan tres de estas dosis al dia.

En los herpes complicados con sarna, se une el antracocali simple ó sulfurado con las flores de azufre.

- ℥ Antracocali simple
 - ó Antracocalisulfurado. ḡij (10 cent.).
 - Flores de azufre lav. ḡv (25 cent.).
 - Carbonato de magnesia
 - ó Polvo de raiz de reg. ḡiij (15 cent.).
- M. S. A. y se usan como el anterior.

Los herpes sifilíticos exigen el uso del antracocali y del mercurio; si existen úlceras sifilíticas primitivas ó una blenorragia sifilítica, se usan los calomelanos ó el mercurio soluble de Hanhemann.

- ℥ Antracocali simple. . ḡij (10 cent.).
 - Calomelanos
 - ó Mercurio soluble de Hanhemann, de una quinta parte á dos quintas partes de grano.
 - Polvo de raiz de reg. ḡiij (15 cent.).
- M. S. A. D. La misma que el anterior.

Pero si la sífilis es constitucional, se dan además por separado las píldoras siguientes:

- ℥ Deutocloruro de merc. ḡj (5 cent.).
- Se disuelve en

Espíritu de vino. . . . c. s.
y se añade á la solucion
Extracto de regaliz sólido. . . . c. s.
para hacer veinte píldoras, que se rodearán de polvo de regaliz.
Todos los dias el enfermo tomará cinco píldoras despues de co-

mer, y cada tres dias se aumentarán dos hasta que haya tomado ḡxij (60 cent.) de sublimado, segun el método de Dzondi; con estas píldoras se usa tambien el antracocali, solo ó combinado con las flores de azufre, segun las fórmulas anteriores.

La fórmula que emplea Polya contra los herpes simples, es la siguiente:

℞ Antracocali simple. . . . ḡij (1 dec.).

El herpes desarrollado á la vez bajo la influencia del virus sifilitico y epsórico, cede al uso combinado del antracocali, de las flores de azufre y del mercurio, cuyos efectos se auxilian por el uso de las tisanas sudoríficas.

El doctor Polya combate la lepra con el antracocali y el antimonio.

℞ Antracocali simple

ó Antracocali sulfur. . . ḡij (10 cent.).

Azufre dorado de antimonio

ó Antimonio crudo,

Carbonato de magnesia

ó Polvo de regaliz, ãã. ḡiij (15 cent.).

Cuando el herpes está complicado con una diátesis cancerosa, se combina el iodo con el antracocali y con las flores de azufre.

Iodó puro. ḡi (5 cent.).

Ioduro de potasio. . . ḡij (10 cent.).

Se disuelve en

Aguá destil. simple. . ḡij (60 gr.).

Se empieza por cuatro gotas mañana y noche, y diariamente se aumentan dos, hasta llegar á diez ó catorce gotas, dosis que se continúa lo mismo.

El buen éxito que se consigue con este tratamiento depende del buen diagnóstico respecto á las complicaciones, y de la eleccion juiciosa del remedio. Pero como las complicaciones se manifiestan algunas veces al mismo tiempo que la enfermedad, y otras durante su tratamiento y despues que se ha triunfado de una de estas diátesis, que tienen á la enfermedad dominada por su influencia, tambien las fórmulas

muy compuestas citadas anteriormente; son las recomendadas por la necesidad.

9095. T. DE LOS INFARTOS EDEMATOSOS DE LOS MIEMBROS INFERIORES DE LOS LOCOS (*Levrat Perrotin*).

Se dan fricciones por las mañanas en los miembros hinchados con la mezcla siguiente:

℞ Vino aromático. ḡvj (180 gr.).

Tintura de iodo;

Tintura de quina, ãã. ḡij (60 gr.).

Mézclese.

Por las noches se da otra fricción con la pomada siguiente:

Manteca. ḡiij (90 gr.).

Extracto blando de

quina. ḡij (8 gr.).

Ioduro de potasio. . . ḡj (4 gr.).

Aleanfor. ḡijß (12 cent.).

M. D. Interiormente se prescribe una limonada y el régimen anaplético.

Este tratamiento ha producido muy buenos efectos.

9096. T. DE LA INFLAMACION DE LA RETINA (*Dupuytren*).

La operacion de la catarata se hace siempre en el Hôtel-Dieu por el método de la depresion y de la fraccion. Una de las consecuencias mas comunes y mas graves de este método es la inflamacion de la retina, llamada *inflamacion del iris* ó *iritis*. Esta afeccion produce los síntomas siguientes: dolores continuados y pertinaces de cabeza, constriccion de la pupila, enturbiamiento de los humores acuoso y vítreo, rubicundez de la conjuntiva, secrecion continúa de lágrimas quemantes, imposibilidad de sufrir la luz mas débil, contraccion fuerte de los músculos orbiculares, formacion detrás de la pupila de una película fibrosa accidental, á la que se adhiere comunmente

el iris, y por último la ceguera, la cual puede también remediarse al cabo de algunos meses, destruyendo ó haciendo mudar de sitio á la película de que se acaba de hablar, por medio de la aguja de catarata.

Esta inflamación ataca comunmente á los niños afectados de escrófulas y presenta los mismos síntomas que en los casos anteriores, unidos á un horror á la luz y á una contracción del orbicular de los párpados. Esta los obliga á ocultarse en los sitios mas oscuros y á comprimir los párpados uno con otro, de modo que hacen pasar comunmente el párpado inferior detrás del superior, por lo cual, poniéndose las pestañas del primero en contacto con la conjuntiva del segundo, aumentan los dolores y los peligros de la enfermedad de que se trata.

Se concibe que las sangrías, las sanguijuelas, los diluentes y derivativos, tales como los sedales y los purgantes, están indicados y son útiles en casos iguales; pero la experiencia ha hecho conocer frecuentemente su insuficiencia, y esto obligó á Dupuytren á buscar otros medios. El que mejor efecto le ha producido al cabo de diez años es el uso interno del polvo y del extracto de *belladona*, á la dosis siguiente: el polvo á la dosis de tres, cuatro, ocho, doce ó mayor número de granos; y el extracto á la de uno, dos, tres y mayor número de granos, uno y otro divididos en seis dosis, de las que se toma una cada dos horas.

Para prevenir el narcotismo general ó local que estos remedios podrian producir, Dupuytren acompaña su uso con el del agua de Seltz artificial.

Es inútil decir que el uso de los amargos, de los antiescorbúticos y de los antiescrofulosos, remedios tan prodigados desde hace

treinta años, solo puede mantener ó exaltar esta inflamación en los niños. Los principios de Dupuytren dan bastante á conocer que no los emplea jamás en estas inflamaciones, aunque puedan provenir de una afección escrofulosa.

9097. T. DE LA LEUCORREA (Velpéau).

Se inyecta en la vagina una vez durante quince días un cocimiento de hojas de nogal. Durante los quince días siguientes se reemplaza el cocimiento anterior por una solución compuesta de ʒj (4 gr.) de alumbre en un vaso de agua de cebada. Durante el mismo espacio de tiempo se reemplaza este cocimiento con el de cebada, con ʒj (4 gr.) de calomelanos al vapor por vaso.

Constantemente se usará un cinturón que sostendrá convenientemente el vientre.

9098. T. DEL LUPUS (Putegnat).

1.º Se tomará por las mañanas veinte gotas del licor arsenical de Pearson.

2.º Para tisana dos cuartillos (1 lit.) de infusión de hojas de nogal, que contenga ʒxviii á ʒj (1 á 4 gr.) de ioduro de potasio.

3.º Cada seis horas se darán fricciones en el borde de la úlcera con una pomada compuesta de ʒxviii (1 gr.) de ioduro de azufre y ʒv (20 gr.) de manteca. Se continuará usando esta pomada hasta la cicatrización.

4.º Todos los días se lavarán las partes con agua alcalina.

5.º Cada dos días se quitará la película pardusca con unas pinzas.

9099. T. DE LAS NEURALGIAS POR LA ESENCIA DE TREMENTINA (Martinet).

La esencia de trementina tiene al parecer una acción específica; su efecto inmediato es producir primero en los órganos digestivos y después en el trayecto del nervio enfermo un calor considerable, al que sucede pronto la curación. La duración media de este tratamiento es de seis días, y es tanto más eficaz cuanto más aguda es la forma de la enfermedad. El modo más conveniente de administrarla es interiormente. Algunas veces se manifiestan signos de irritación gastro-intestinal durante el uso de la esencia de trementina; más comúnmente son pasajeros, y en un gran número de casos no se manifiestan.

Generalmente se administra la trementina combinada con la miel rosada en las proporciones siguientes:

℞ Esencia de trement. ℥ij (8 gr.).
Miel rosada. ℥jv (125 gr.).

Se toman cada día tres cucharadas de esta mezcla.

Esta es la fórmula más general; pero comúnmente los enfermos no pueden soportarla por su sabor detestable, el estómago la rehusa frecuentemente y entonces se emplean las preparaciones siguientes:

Looc trementinado.

℞ Yema de huevo. núm. 2.
Esencia de trementina. ℥iij (12 gr.).
Jarabe de yerbabuena. ℥ij (60 gr.).
Jarabe de flores de naranjo,
Jarabe de éter, añ. ℥j (30 gr.).
Tintura de canela. ℥℔ (2 gr.).
H. S. A. un looc.

La dosis es de tres cucharadas al día.

Algunas veces se añade á este

looc ℥j (4 gr.) de láudano para prevenir el vómito.

Opiata trementinada.

℞ Aceite de trementina. ℥ij (8 gr.).
Goma arábica en polvo. ℥j℔ (45 gr.).
Jarabe simple. ℥℔ (15 gr.).
Jarabe de flor. de nar. ℥j (30 gr.).
H. S. A. una opiata.

Se tomará la tercera parte cada día en tres veces y entre dos obleas.

Cuando no son suficientes estas preparaciones para hacer que el enfermo soporte la esencia de trementina; se la usa en fricciones; asociándola al láudano líquido.

Linimento trementinado.

℞ Aceite de manzanilla. . . ℥ij (60 gr.).
Esencia de trementina. ℥j (30 gr.).
Láudano de Sydenham. ℥j (4 gr.).

En los casos de neuralgia de los nervios lumbares se usa ventajosamente este medicamento en la lavativa.

Lavativa trementinada.

℞ Aceite de trementina. ℥j (30 gr.).
Yema de huevo. núm. 1.
Cocimiento de adorm. ℔℔ (250 gr.).

9100. T. DE LA OFTALMIA ESCROFULOSA (Cunier).

Primeramente administra un purgante: el jarabe de ruibarbo á los niños y el sulfato de magnesia á los adultos.

Al otro día da el polvo siguiente:

℞ Calomelanos preparados al vapor. ℥xij (60 cent.).
Azufre dorado de antimonio. ℥iij (15 cent.).
Azúcar blanca. ℥j (4 gr.).

H. S. A. un polvo homogéneo, y dividase en doce tomas iguales.

D. A los niños de ocho á quince años se reduce la dosis á la mitad

á los de menos de ocho años á la tercera ó cuarta parte. Cunier da un papel de hora en hora, y continúa así hasta que se presenten prodromos de la salivacion.

Segun la intensidad de la fotofobia y blefarospasmo, da de hora en hora, cada dos, tres ó cuatro horas, ó solo dos ó tres veces al dia, una untura en la frente y sienes con una pomada compuesta de partes iguales de unguento napolitano y extracto alcohólico de belladona, á la dosis del volumen de una avellana en cada unción.

Al segundo dia aplica detrás de cada oreja un emplastro vejigatorio de Janin, que estará aplicado hasta que se caiga.

Régimen. Carnes blancas y legumbres verdes; prohíbe las patatas, la leche, la manteca de vacas y cosas de pastelería; vino, habitacion seca, bien aireada y clara. Si hay necesidad, se abriga los ojos por medio de una visera y una compresa flotante.

Apenas empiece á ceder la fotofobia, prescribe el tratamiento antiescrofuloso, principalmente el ioduro de hierro, que da á la dosis de tres á seis cucharaditas al dia á los niños, y tres á cuatro ó cinco cucharadas á los adultos. Además recurre en algunos casos á las preparaciones de hojas de nogal y á los baños con sal comun, con los que ha obtenido resultados ventajosos. Secunda la accion de este tratamiento haciendo que los enfermos coman carne asada y frita, legumbres con manteca y saladas é infusion de conos de lúpulo.

9101. T. DE LA OFTALMIA ESCROFULOSA (*Dr. Saffert*).

Saffert trata las oftalmias escrofulosas administrando el iodo interiormente. Además de esta

medicacion interna aplica tópicamente el siguiente colirio:

- ℞ Iodo. ḡj (5 cent.).
 - Ioduro de potasio. . . ḡv. (25 cent.).
 - Agua destilada. . . . ḡbj (500 gr.).
- Mézclase y hágase disolver S. A.

Con este colirio se practican lociones en los ojos muchas veces al dia (dos, tres, cuatro y aunmas, segun los efectos que se obtengan), y además se hace instilar de cuando en cuando algunas gotas de este liquido entre los párpados.

9102. T. DE LA OFTALMIA DE LOS RECIEN NACIDOS (*Ammon*).

Ammon ha obtenido buenos resultados con el colirio siguiente:

- ℞ Extr. de belladona. . ḡvj (30 cent.).
- Agua clorurada. . . . 40 gotas.
- Agua destilada. . . . ḡjv (125 gr.).

Se empapa una esponja en esta solucion tibia, y se la debe aplicar á los párpados cada cuarto de hora ó media hora, á fin de que penetre hasta la conjuntiva. En los intervalos se usan compresas empapadas en la misma solucion.

Se mantendrá al mismo tiempo el vientre libre.

La belladona hace cesar el espasmo del ojo, y mantiene dilatada la pupila.

9103. T. DE LA OTITIS CRÓNICA (*Velpeau*).

Se inyecta en el conducto auditivo externo agua de cebada con miel, agua ligeramente cargada de extracto de Saturno ó un cocimiento de hojas de nogal. Se usan estos líquidos durante una semana cada uno, y se hace tomar para tisana una infusion de hojas de nogal.

9104. T. DE LAS QUEMADURAS (*Righini*).

- ℞ Creosota oficial. . . ḡxviii (1 gr.).

Alcohol de 36°. ℥j (30 gr.).

Agua comun. ℥vj (180 gr.).

Extracto de Saturno. ℥j (30 gr.).

M. Se usa en lociones sobre las superficies ulceradas, colocando encima paños empapados en esta mistura.

Al principio produce una sensacion dolorosa que dura algun tiempo, pero despues desaparece; es indispensable continuar con el uso de esta locion durante muchas horas, si se quiere obtener un resultado satisfactorio.

Esta medicacion, endureciendo la piel que se levanta, impide que se formen las flictenas, y en poco tiempo las partes vuelven á su estado sano.

Si se han formado las flictenas antes de recurrir á las lociones, conviene curarlas con la pomada siguiente:

Manteca. ℥jv (125 gr.).

Se liquida S. A. y se añade despues:

Subcarbonato de plomo finamente pulverizado. ℥ij (60 gr.).

Se agita todo y despues se incorpora con

Vinagre comun. . . . una cucharada.

Se menea la mezcla hasta que se enfrie.

9105. T. DE LAS QUEMADURAS DE LOS RECIEN NACIDOS (*Payan*).

Prescribe que se hagan curas tardias con linimento óleo-calcaéreo cubierto de una capa de algodón cardado y sujeto con compresas y vueltas de venda. Se muda al cabo de muchos dias y no se toca el apósito.

I. Quemaduras de primero, segundo y tercer grado segun la division de Dupuytren.

El linimento óleo-calcaéreo de Payan se compone de

Aceite comun. 1

Agua de cal. 3

9106. T. DE LAS QUERATITIS ULCEROSAS Y DE LAS IRITIS SENILES (*N. Guilliot*).

Esta enfermedad, que se presenta en los ancianos y que produce la ceguera en los últimos períodos de la vida, se combate con cuatro instilaciones diarias del colirio siguiente:

Agua destilada. ℥j (30 gr.).

Bicloruro de mercurio. ḡj á ḡvj (5 á 30 cent.).

Deben variar las dosis del medicamento entre las proporciones indicadas.

9107. T. DE LA RABIA (*Dr. Gottlieb de Schallern*).

Despues de haber cauterizado con un hierro hecho ascua ó á lo menos con la manteca de antimonio la mordedura hecha por el animal rabioso, se somete al enfermo al uso graduado cada dia, mañana y noche, del polvo siguiente:

Polvo de raiz de belladona. ḡj (5 cent.).

Azúcar blanca. ℥ij (24 dec.).

Calomelanos. ḡβ (25 mil.).

Aceite de cajeput. ℥j (30 gr.).

Se hace polvo y se divide en dos partes iguales.

Se toma una por la mañana y otra por la noche en jarabe de culantrillo. Al segundo dia se aumenta la dosis de la raiz de belladona grano y medio mas; al tercer dia otro grano; y cada dia se sigue aumentando un grano hasta llegar á veinte, pero dejando intervalos entre las dosis; los demás ingredientes del polvo quedan siempre á las mismas dosis.

Se cura la herida cauterizada con el unguento siguiente:

Alcanfor. ḡxij (6 dec.).

Se disuelve en

Aceite volátil de trem. ℥ij (24 dec.).

Se mezclan con

- Ungüento basilicon. ℥ij (60 gr.).
- Oxido rojo de mercur. ḡviii (4 dec.).
- Cantáridas en polvo. ℥jv (48 dec.).

Cuando se ha cicatrizado la herida, se usa una mezcla de

- Ungüento basilicon. 3
- Ungüento de altea. 5

La bebida del enfermo se compone del cocimiento siguiente:

- Yerba y flores de anagálide de los campos. ℥iij (90 gr.).
- Raiz de saponaria,
- Raiz de bardana, añ. ℥jβ (45 gr.).
- Raiz de regaliz. ℥iij (12 gr.).
- Tallos de dulcamara. ℥vj (24 gr.).
- Semillas de anís. ℥j (4 gr.).
- Agua. c. s.

para obtener dos cuartillos (1 lit.).

Se endulza con jarabe de culantrillo.

En los espasmos que pueden sobrevenir se da la mistura siguiente:

- Polvo de belladona. 5β (2 gr.).
- Agua destilada de laurel real. ℥jβ (45 gr.).
- Láudano líquido de Sydenham. ℥j (12 dec.).
- Jarabe de amapolas. ℥j (30 gr.).

Se toma á cucharadas, teniendo cuidado de menear la mezcla.

El uso simultáneo de todos estos remedios tiene mucha aceptación en Alemania para el tratamiento de la rabia.

9108. T. DE LA SARNA CON EL HÍGADO DE AZUFRE (Devergie).

Usa la pomada de Helmerich, que se compone de

- Manteca. 8
- Azufre. 2
- Carbonato de potasa. 1

Se hacen fricciones con ℥β (15 gr.) de esta pomada, mañana y noche, y hace tomar un baño cada dos dias durante la curacion; pero como esta pomada tiene el grave inconveniente de ennegrecer la ropa, sin que las manchas se quiten con la lejía, entonces reemplaza la pomada de Helme-

rich por las soluciones siguientes:

NÚMERO 1.

- Azufre. 4
- Agua. 3

NUMERO 2.

- Azufre. 4
- Agua. 6

Contra la sarna discreta emplea solo la solucion número 2; pero contra la sarna confluyente hace fricciones durante dos dias con la fórmula número 1 y termina con la del número 2. Este tratamiento dura diez dias y no ha presentado recidivas.

9109. T. DE LA SARNA EN TRES DIAS (Adolfo de Mitau).

Consiste: 1.º En elegir si se puede la época del menguante de la luna; 2.º Si la piel está cubierta de costras se las hará caer por medio de fricciones con jabon verde y un baño caliente; 3.º Durante el tratamiento el enfermo se abstendrá de alimentos agrios, indigestos ó salados, y solo tomará sopas y carne en cantidades moderadas.

El primer dia tomará el paciente una cucharada de café bien llena de partes iguales de bayas de enebro y laurel diluidas en agua ó en aguardiente. A los niños de diez años bastará media cucharadita de café, y lo que se coge con un cuchillo á los niños de pecho. Despues de haber tomado el polvo se darán fricciones con la pomada siguiente:

- ℥ Bayas de enebro en polvo,
- Bayas de laurel, añ. ℥jβ (45 gr.).
- Flores de azufre. ℥iij (90 gr.).
- Mant. de vacas salada. ℥vj (180 gr.).

Se harán fricciones fuertes por todo el cuerpo, y principalmente en las partes que presentan la erupcion, consumiendo en cada fricción ℥jv (125 gr.) de pomada el primer dia. Se vestirá el enfer-

mo y no mudará de ropa ni de habitación, que deberá ser espaciosa y estar bien ventilada, durante el tratamiento. Se repite la misma dosis el segundo y tercer día por la mañana. En la noche del tercer día se desnudará el enfermo en una habitación muy caliente, se lavará con agua caliente y jabon verde, se dará nuevas fricciones con la pomada y se meterá despues en un baño de vapor de agua, cuya temperatura se elevará gradualmente hasta la que el enfermo pueda resistir durante media hora. Al salir de este baño se lavará con agua de jabon, se mudará de ropa blanca y de vestido y ya estará curado.

9110. T. DE LA SARNA POR MEDIO DE LA CEBADILLA (*l'Huilhier*).

2^o Cebadilla en polvo. . . ʒβ (16 gr.).
 Aceite comun. ʒjβ (48 gr.).
 Aguardiente. ʒj (32 gr.).
 Se maceran durante veinticuatro horas.

En los dos primeros dias se hacen las fricciones por la mañana, y por la noche se hace tomar un baño.

9111. T. DE LOS ACCIDENTES TERCARIOS DE LA SIFILIS (*Devergie*).

Diariamente se toma la tisana sudorífica. En el vaso de por la mañana primero, y mas adelante en el de la mañana y la noche, se toma una cucharada grande de la solucion siguiente:

Agua. lbj (500 gr.).
 Ioduro de potasio. . . ʒij (8 gr.).
 Cada cucharada tiene ʒv (25 cent.) de ioduro, y la mayor dosis será una cucharada por la mañana, otra al medio día y otra por la noche.

D. En los ocho primeros dias

se toma por la mañana en ayunas una de las píldoras siguientes:

Extracto de guayaco. ʒjv (20 cent.).
 Extr. acuoso de opio. ʒ¹/₄ (12 mil.).
 Sublimado. ʒ¹/₈ (6 mil.)

que son las píldoras de Dupuytren, solo que contienen menos cantidad de opio y de sublimado. En los dias siguientes tomará el enfermo una por la mañana y otra por la noche.

Usará la mitad de los alimentos, leche en lugar de vino y un baño por semana. Si está muy debilitado, puede tomar las preparaciones ferruginosas, tales como el jarabe de protoioduro de hierro (2 por 500) á la dosis de ʒj (30 gr.), las aguas de Passy, las píldoras de Blaud ó las de Valet.

9112. T. ANTISIFILÍTICO DE DUPUYTREN.

La sífilis complica muchas enfermedades quirúrgicas; ella solo produce un gran número. De aquí resulta la necesidad de hacer concurrir los remedios antisifilíticos con los remedios quirúrgicos en el tratamiento de estas afecciones complicadas.

Es importante en este caso la eleccion de los medios curativos. El mercurio metálico, mezclado con la manteca y administrado en fricciones, no puede emplearse con facilidad en los hospitales generales y en las grandes salas privadas de una temperatura suave, que disponga la piel á la absorcion. Además el unguento tiene la propiedad de enranciarse en la superficie de la piel y por consiguiente esparcir un olor infecto, que daña comunmente á los que le emplean y á los que están cerca de ellos; y por último tiene el inconveniente de manchar por mucho tiempo los vestidos y la ropa de la cama.

El sublimado; administrado por

la boca en solucion concentrada ó dilatada, tiene otros inconvenientes: en solucion concentrada obra demasiado directamente sobre el estómago, al que irrita é inflama del mismo modo que á los pulmones; en solucion dilatada en la tisana diaria se descompone casi siempre, se precipita y pierde de este modo toda su virtud; por otra parte su administracion, abandonada á la disposicion de los enfermos, es comunmente muy irregular, etc.

La enfermedad venérea, que complica las enfermedades quirúrgicas, es casi siempre antigua, rebelde y constitucional, y está mas comunmente caracterizada por dolores nocturnos.

Estas consideraciones han obligado á Dupuytren á elegir los medios que empleaba contra estas afecciones complicadas. Su tratamiento reúne los sudoríficos, los mercuriales y los calmantes, medicamentos cuya combinacion constituye el conjunto mas á propósito para hacer cesar los dolores y combatir el vicio venéreo mas antiguo y mas rebelde.

Da los sudoríficos en tisana y en jarabe, despues el sublimado y el opio combinados y reducidos á píldoras, y todo del modo siguiente:

Se toma todos los dias, dividida entre la mañana y noche, en la cama, si fuese posible, la tisana siguiente:

- China,
- Zarzaparrilla,
- Guayaco, ãã. ℥ß (15 gr.).
- Agua. lbij (1000 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca una tercera parte.

Se añade al primer vaso de este cocimiento por la mañana y al último vaso por la noche:

- Jarabe sudorífico. ℥ij (60 gr.).

Por último, se toma todos los dias, por la mañana, al medio dia y por la noche, una hora á lo me-

nos antes de la comida mas inmediata, una píldora compuesta de

- Extracto de guayaco. ḡij (1 dec.).
- Extr. acuoso de opio. ḡß (23 mil.).
- Deutocloruro de mercurio. ḡ¼ (8 mil.).

La dieta moderada auxilia la accion de este tratamiento.

Generalmente no emplea ningun tratamiento antisyfilitico local. De este modo los síntomas locales son hasta cierto punto el termómetro de la eficacia de los medios internos, y desaparecen casi constantemente despues de algun tiempo de su uso; á saber: los dolores al cabo de ocho ó diez dias; el carácter venéreo de las heridas y úlceras al cabo de algunas semanas; las induraciones, las escrescencias y aun las úlceras al cabo de un mes ó seis semanas, y las exóstosis las últimas.

En general se consideran como radicalmente curadas las afecciones venéreas, cuyos síntomas han desaparecido. Pero Dupuytren creia que en el mayor número de casos la enfermedad solo estaba paliada, y ha atribuido á los tratamientos dirigidos segun estos principios las recidivas espontáneas que presentan tan comunmente las enfermedades venéreas en los hospitales; ha adoptado tambien por regla general en el tratamiento de las enfermedades venéreas constitucionales continuar el uso de los medios curativos despues de la desaparicion completa de todos los síntomas, durante un tiempo igual al que ha sido necesario para disiparlos. Solo entonces se han curado la causa y los efectos y no hay que temer las recidivas.

9113. T. ARÁBIGO (*Payan*).

Se compone de una opiata, píldoras, tisana sudorífica y un régimen particular designado con el nombre de dieta seca.

1.º *Opiata arábiga.*

℥ Zarzaparrilla. ℥v (150 gr.).
 China en polvo. ℥iij (90 gr.).
 Cáscara de avellanas
 tostadas. ℥β (15 gr.).
 Clavo. ℥j (4 gr.).
 Miel. c. s.
 para hacer una opiata, cuya dosis será ℥jv á ℥v (15 á 20 gr.).

2.º *Píldoras arábigas.*

℥ Mercurio puro,
 Deutocl. de merc., ãã. ℥j (30 gr.).
 Pelitre en polvo,
 Agárico en polvo,
 Sen, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Miel. c. s.

para formar una masa, con la que se harán bolos de ḡjv á ḡvj (20 á 30 cent.). Se dan dos al día.

3.º La *tisana sudorífica* se prepara con un cocimiento de china y zarzaparrilla. El enfermo no tomará otra bebida durante todo el tratamiento, y beberá 2 á 4 quart. (1 á 2 lit.) al día.

4.º El régimen debe constar de galleta, nueces, almendras tostadas, higos y pasas, absteniéndose el enfermo completamente de los alimentos ordinarios.

I. Formas terciarias de la sífilis.

9114. T. DE LA SIFILIS CONSTITUCIONAL DE LOS NIÑOS (*Trousseau*).

Se da diariamente á la madre y al niño un baño de sublimado en la proporción siguiente:

Sublimado. ℥β á ℥j (15 á 30 gr.).
 Alcohol. ℥iij (90 gr.)
 para un baño.

Después la madre da de mamar, y se hace que esta tome todos los días una píldora de ḡj (5 cent.) de protoioduro de mercurio. Si el niño no mama, se le da diariamente en ℥ijβ (10 gr.) de jarabe

simple ḡxviiij (1 gr.) de la solución siguiente:

Sublimado. ḡxviiij (1 gr.).
 Agua. libij (1000 gr.);
 de modo que cada ḡxviiij (1 gr.) de la solución contiene exactamente 1 mil. de sublimado. Produce excelentes efectos.

9115. T. DE LA SIFILIS (*Dzondi*).

℥ Deutocloruro de merc. ḡxij (6 dec.).
 Agua destilada. c. s.

Se añade:

Miga de pan,
 Azúcar blanca, ãã. c. s.
 para hacer doscientas cuarenta píldoras, que se rodearán de polvo de canela.

Se administran del modo siguiente:

Días. . .	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º
Píldoras.	4	0	6	0	8	0
Días. . .	7.º	8.º	9.º	10.	11.	12.
Píldoras.	10	0	12	0	14	0
Días. . .	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Píldoras.	16	0	18	0	20	0
Días. . .	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Píldoras.	22	0	24	0	26	0
Días. . .	25.	26.	27.			
Píldoras.	28	0	30.			

Cada píldora contiene una décima parte de grano de sublimado.

9116. MÉTODO DE DZONDI MODIFICADO.

℥ Deutoclor. de merc. ḡiij (15 cent.).
 Hidroclor. de amon. ḡviiij (4 dec.).
 Agua. c. s.

para disolver las sales; se añade:
 Polvo de salep. ℥iij (12 gr.).
 Goma arábiga. ℥j (4 gr.).

Se forma una masa y se divide en píldoras de á ḡij (1 dec.).

El enfermo tomará los dos primeros días; mañana y noche, cinco píldoras; desde el tercero al noveno día aumentará la dosis dos píldoras al día, de modo que al cabo de estos nueve días haya

tomado los ĩij (15 cent.) de sublimado.

Se prepara una nueva cantidad de píldoras aumentando ĩj (5 cent.) de sublimado. El décimo y undécimo día de tratamiento el enfermo toma diez píldoras en una sola dosis inmediatamente después de comer; aumentará la dosis dos píldoras al día desde el undécimo al decimoctavo.

En la tercera cantidad de píldoras se pone ĩj (5 cent.) mas de sublimado y no se las administra mas que cada dos días; de este modo se dan el día diez y nueve veintiuna píldoras, el veintiuno veintidos píldoras, y así sucesivamente aumentando cada vez ĩij (1 dec.).

9117. T. ANTISIFILITICO DE ZITTMANN.

1. Cocimiento fuerte.

℞ Raiz de zarzapar. ℥xij (375 gr.).
 Agua. 24 cuart. (12 kil.).

Se hierve y se añade después de un cuarto de hora, estando estas tres sustancias contenidas en una muñequita,

Alumbre purificado. . . ℥jβ (45 gr.).
 Mercurio dulce. . . . ℥β (15 gr.).
 Cinabrio antimoniado. ℥j (4 gr.).

Se añaden después, hacia el fin de la ebullicion:

Hojas de sen. ℥iij (90 gr.).
 Raiz de regaliz. . . . ℥jβ (45 gr.).
 Semillas de anís,
 Semillas de hinojo. āā. ℥β (15 gr.).

Cuando el líquido se ha reducido una tercera parte, es decir, á diez y seis cuartillos (8 lit.) se le pone en ocho botellas.

2. Cocimiento flojo.

℞ Residuo del cocimiento fuerte,
 Raiz de zarzap. ℥vj (180 gr.).
 Agua. 24 cuart. (12 kil.).

Se hierve y al fin de la ebullicion se añade:

Polvo de cáscara de limon,
 Polvo de canela,
 Polvo de cardam., āā. ℥iij (12 gr.).
 Raiz de regaliz. ℥vj (24 gr.).

Se conserva el líquido colado en ocho botellas de dos cuartillos (1 lit.) cada una.

3. Píldoras purgantes.

Su uso debe repetirse cada cinco días durante la administracion de los cocimientos anteriores.

Calomelanos. ℥xxjv (12 dec.).
 Resina de jalapa. . ℥jβ (45 gr.).
 H. S. A. ochenta píldoras.

D. De nueve á doce al día.

El enfermo empieza á tomar de nueve á doce píldoras de una sola vez. Los cuatro días siguientes bebe por la mañana en ayunas una botella del *cocimiento fuerte*, un poco caliente, y después del medio día la misma cantidad del *cocimiento flojo* á la temperatura ordinaria. El sexto día se repite el uso de los laxantes y á los cuatro días siguientes el de los cocimientos, como la primera vez.

El enfermo se limita á tomar ℥ij (60 gr.) de carnero ó de vaca asada con igual cantidad de pan blanco, y solamente tres sopas los días de purga. Debe guardar cama durante todo este tratamiento, y aun no salir de su habitacion, seguir un régimen severo y beber un poco de tisana sudorífica durante algunos días después de terminado el tratamiento.

Si pasado este tiempo no se han disipado los caracteres de la infeccion sifilítica, conviene proceder á nuevo tratamiento; pero en el mayor número de casos bastan diez ú once días para hacer cesar todos los síntomas, ó á lo menos reducirlos al punto de no exigir ya una terapéutica especial.

Este tratamiento es útil en las afecciones venéreas recientes, y en las que son antiguas y han sido tratadas infructuosamente y aun exasperadas por las preparaciones mercuriales.

9118. T. DE LA SORDERA ACCIDENTAL.

1.º Se echará una insuflacion de sulfato de alúmina en polvo al fondo de la garganta con un tubo de vidrio; 2.º se harán gárgaras dos veces al dia con una mezcla de ʒijß á ʒjv (10 á 16 gr.) de alumbre por ʒvj (200 gr.) de agua de cebada; y 3.º se aplicará por la noche en los dos oídos un poco de algodón empapado en aceite de beleño.

9119. T. DE LA TÉNIA (Grahle de Hamburgo).

En la noche antes se da al enfermo una taza de sustancia de pan.

Al dia siguiente un bolo con
Raiz de jalapa en polvo,
Gutagamba en polvo,
Mercurio dulce en
polvo, ãã ʒvij (35 cent.).
Conserva de rosas... c. s.

Una hora despues de tomar este bolo, se da una preparacion hecha con

Raiz de helecho macho
en polvo. ʒiij (12 gr.).
Agua de flor de tilo. . . ʒiij (90 gr.).

Mézclese y tómese en una sola vez.

Poco despues la ténia produce malestar y vómitos. Se calman estos síntomas haciendo que se mueva el enfermo. Si á las cuatro ó cinco horas no ha expulsado la ténia, se dan al enfermo algunas cucharadas de aceite de ricino de media en media hora.

Este tratamiento se parece mucho al remedio antiguo de madama Nouffer.

9120. T. DE LA TÉNIA POR EL ACEITE ETÉREO DE HELECHO (Coindet).

El enfermo se alimenta con sopas y caldos grasos antes de administrar las píldoras, que se toman en dos dosis, una al acostarse y otra al dia siguiente.

ʒ Aceite etéreo de helecho macho,
Calomel. al vapor, ãã . ʒij (24 dec.).
Helecho fresco en polvo. . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒvj (30 dec.)

A las dos horas de la primera dosis se prescriben ʒij (60 gr.) de aceite de ricino, y á poco es expelida la ténia.

9121. T. DE LA TÉNIA POR LA CORTEZA DE GRANADO (Merat).

Consiste en el uso del cocimiento de ʒij (60 gr.) de corteza de raiz fresca de granado en lbjß (750 gr.) de agua, que se reducirá á lbj (500 gr.) por la coccion, y se da en tres tomas.

La raiz debe separarse de un granado que tenga de ocho á diez años cuando menos, en casa del enfermo, en el mismo dia, ó lo mas tarde el dia antes de administrarla.

Si no se pudiese obtener la corteza de la raiz con estas condiciones, aconseja Merat que se use la raiz del helecho macho reciente, seca y reducida á polvo y á la dosis de ʒj (30 gr.)

9122. T. DE LA TÉNIA POR EL HELECHO (Ronzel).

Ronzel dice que ha curado mas de 150 enfermos con la raiz de helecho macho fresca en bolos, y por medio del jarabe de flores de melocoton. Cada bolo debe tener ʒxviiij (1 gr.) y se tomarán treinta á sesenta y mas en un cuarto de

hora. Dos dias despues se purga al enfermo con \mathfrak{z} ij (60 gr.) de aceite de ricino.

9123. T. DE LA TIÑA (Gruby).

Segun Gruby la tiña es determinada por una erupcion microscópica, y recomienda contra ella la limpieza, los alcalinos débiles, y quizá las preparaciones de hollin.

9124. T. DE LAS TORCEDURAS.

Bauders aconseja la aplicacion de un vendaje sólido y el uso continuado durante ocho á doce dias de las inmersiones en agua fria.

9125. T. DE LOS TUMORES BLANCOS CON EL APARATO DE SCOTT (Boileau).

- 1.º Alcanfor en polvo,
Ungüento mercurial doble,
Cerato de jabon, añ. . \mathfrak{z} ß (15 gr.).
- 2.º Tiras aglutinantes de diaquilon de tres ó cuatro centímetros de anchas, bastante largas para dar vuelta y media al miembro.
- 3.º Emplasto de plomo. 3
Jabon. 4

H. S. A. emplasto, que se extiende sobre una piel blanca.

4.º Una ó muchas vendas.

5.º Una solucion espesa de almidon.

Para aplicarle: 1.º se lava la parte con agua de jabon caliente.

2.º Se hacen fricciones con aguardiente alcanforado hasta excitar ligeramente la piel.

3.º Se carga del unguento número 1 las tiras de lienzo delgadas de la longitud necesaria para que den vuelta y media al miembro y de cuatro cent. de anchas; se cubre con ellas la parte enferma desde cuatro traveses de dedo encima á cuatro traveses de dedo debajo, siguiendo el procedimien-

to de Scultet, con la diferencia de que se aplica toda la venda por encima y por debajo. Por otra parte se tendrá cuidado de cubrir las partes sin dejar nada al descubierto, excepto en el caso en que haya ulceraciones ó trayectos fistulosos.

4.º Se obra del mismo modo por medio de tiras de diaquilon.

5.º Se cubre todo con emplasto de plomo y jabon, disponiendo las piezas de este emplasto segun la longitud del miembro, de modo que se rodee exactamente la articulacion.

6.º Se termina todo el aparato con un vendaje arrollado y almidonado, empezando por la punta del miembro, y comprimiendo con regularidad.

Se emplean estos medios en el procedimiento de Scott para tratar los tumores blancos.

9126. T. DE LOS TUMORES DEL PECHO (Tanchou).

Consiste en el uso interior de las preparaciones ferruginosas, el iodo y el mercurio; exteriormente en la compresion, las aplicaciones pulverulentas, los emplastos y los unguentos.

Saquito contra los tumores del pecho (Tanchou).

- \mathfrak{z} Ioduro de potasio. . . $\tilde{\text{g}}\text{x}$ c (5 gr.).
- Esponja en polvo. . . . \mathfrak{z} ijß (10 gr.).
- Clorhidrato de amon. \mathfrak{z} x (40 gr.).
- Cloruro de sodio. . . . \mathfrak{z} ijß (10 gr.).

9127. T. DE LAS ÚLCERAS DE LAS PIERNAS.

Consiste en la aplicacion de tiras de emplasto diaquilon, que se rodean al miembro enfermo, cuyo uso se renueva cada dos semanas. Se aplica encima un vendaje no apretado.

9128. T. DE LAS ÚLCERAS DE LA CórNEA CON EL COLIRIO DE CLORURO DE SODIO (Tavignot).

NUMERO 1.

℞ Agua comun. ℥jv (125 gr.).
Sal comun. ℥ß (16 gr.).

NUMERO 2.

Agua comun. ℥jv (125 gr.).
Sal comun. ℥j (32 gr.).

NUMERO 3.

Agua comun. ℥jv (125 gr.).
Sal comun. ℥x (40 gr.).

I. Úlceras de la córnea.

Se ha propuesto tambien el uso del cloruro de sodio cortado con un cortaplumas y en un lapicero para cauterizar las úlceras, y en pomada compuesta de ℥j, ℥ij ó ℥jv (4, 8 ó 16 gr.) por ℥j (32 gr.) de manteca.

Se debe empezar siempre por los grados mas bajos para aumentar el cloruro gradualmente.

9129. T. DE LA ÚLCERA VENÉREA CORROSIVA (Ricord).

Se usa la tintura de iodo pura por medio de un pincel; se cubre la úlcera con hilas empapadas en la tintura, se aplica de nuevo el cáustico y se cicatriza la úlcera.

9130. T. DEL VARUS MENTAGRA Y GUTTA ROSEA (Dauvergne).

Solucion núm. 1.

℞ Sulfato de hierro. 25
Agua. 200

Solucion núm. 2.

Sulfato de hierro. 50
Agua. 200

Cuando ha cesado la inflamacion, se bañan las partes enfermas con estas soluciones.

A veces se espolvorean las partes ulceradas con el polvo ferro-carbonoso;

Sulfato de hierro. 10
Carbon. 35

TINTAS.

9131. TINTAS.

℞ Agallas. 2
Sulf. de hierro cristalizado. 1
Goma arábica. 1
Agua. c. s. q.

Se hierven las agallas enteras en el agua para tener treinta partes de liquido; se disuelve en él la goma, y despues se añade en frio el sulfato de hierro disuelto en dos partes de agua fria: se añade un poco de esencia de espliego para impedir que se enmohezca la tinta. Algunos añaden á la tinta palo de campeche y sulfato de cobre. No se aumentará esta última sal, porque ataca fuertemente las

plumas de hierro que tanto se usan hoy.

La tinta toma color en contacto del aire á proporcion que el hierro se va oxidando. El color es mas hermoso, segun Barreswil, cuando el óxido que hace parte de ella está formado de protóxido y peróxido en tales proporciones, que ambos contengan la misma cantidad de oxígeno.

Para tener una tinta indeleble, el medio mas sencillo consiste en añadir á la tinta comun un poco de negro de humo; se agita cada vez que se usa.

9132. T. AZUL.

℞ Añil molido. 40

Acido sulfúrico. 14
 Amoniaco. c. s.
 Polvos de goma arábiga. 25
 Agua. 1000
 Se disuelve el añil en el ácido en un matraz de vidrio, se deslíe en agua, se satura exactamente con amoniaco y se disuelve en ella la goma.

9133. T. ENCARNADA.

℥ Palo del Brasil. 3
 Alcohol á 56° cent. 8
 Se macera por veinticuatro horas, se cuele y se evapora hasta tener tres partes de líquido, al cual se añadirán:
 Alumbre. 2
 Goma arábiga. 1
 Azúcar. 1
 Se obtiene una hermosa tinta roja disolviendo carmin en amoniaco, y añadiendo á la solucion la suficiente cantidad de goma.

9134. T. AMARILLA.

℥ Granos de Aviñon. 30
 Agua. 120
 Se hace un fuerte cocimiento, se cuele y se añade:
 Alumbre. 4
 Goma arábiga. 1
 Se obtiene una tinta mas hermosa y mas sólida desliendo en agua un poco de gutagamba.

9135. T. VERDE.

℥ Acetato de cobre cristalizado. 1

Crémor de tártaro. 5
 Agua. 40
 Se hierve para reducir el líquido á la mitad y se filtra.

9136. T. PARA MARCAR EL LIENZO.

℥ Nitrato de plata cristalizado. 1
 Polvos de goma arábiga. 5
 Agua destilada. 8
 Disuélvanse.

Cuando el lienzo es un poco fino, puede marcarse por medio de un sello de madera; pero cuando es un poco grueso, mejor es empaparle primero en una solucion alcalina, secarle y aplicarle la tinta con un pincel por medio de una lámina de plata recortada, que se tiene pegada al lienzo.

La solucion alcalina se prepara de la manera siguiente:

Cola comun. ʒv (20 gr.).
 Carbonato de sosa cristalizado. ʒv (160 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).

Se disuelve, se deja reposar el líquido y se decanta.

Esta tinta sirve dificilmente para las telas gruesas de cáñamo nuevas. En este caso se reemplaza en el servicio de los hospitales de París por la composicion siguiente, que se aplica con el pincel en la lámina de plata.

Nitrato de plata cristalizado. 8
 Nitrato de cobre. 3
 Carbonato de sosa cristalizado. 4
 Amoniaco. 100

Disuélvanse, y consérvese la mezcla en un frasco bien tapado.

TROCISCOS.

9137. TROCISCOS DE ÁCIDO LÁCTICO (Magendie).

℥ Acido láctico puro y seco. ʒij (8 gr.).
 Azúcar blanca. ʒj (30 gr.).
 Goma tragacanto. c. s.

Tintura de vainilla. 4 gotas.
 H. S. A. pastillas de ʒß (2 gr.) que se conservan en una vasija bien tapada.

I. Dispepsia y atonía de los órganos digestivos.

9138. T. DE AGÁRICO (F. E.).

℞ Agárico blanco. c. s. q.

Se rae lo mas menudo que sea posible, y con c. s. de vino blanco se hace masa en un mortero de mármol con mano de madera, la que dividida en trociscos se seca; en tal estado se pulveriza, y mezclada segunda vez del mismo modo, se forman trociscos que despues de secos se guardan.

I. Hidropesías. *D.* De ʒj (4 gr.) en polvo hasta ʒv (20 gr.) en infusion.

9139. T. DE ALQUEQUENJE (F. M.).

℞ Pulpa inspisada de alquequenjes con sus simientes. . . . ʒij (64 gr.).

Goma arábica,

Goma tragacanto,

Zumo de regaliz,

Almendras amargas,

Sim. de adorm. bl., ãã. ʒjβ (48 gr.).

Cuatro semillas frias mayores,

Semillas de apio,

Sucino preparado, ãã. ʒij (8 gr.).

Opio. ʒj (4 gr.).

Se hacen trociscos con c. s. de cocimiento de alquequenjes.

I. Se usa con buen éxito para templar el ardor de la uretra y vejiga de la orina, úlceras, estrangurria y disuria; son tambien algo calmantes. *D.* ʒβ á ʒβ (6 dec. á 2 gr.).

9140. T. DE ALHANDAL ó Trociscos de fruto de coloquintida (F. E.).

℞ Polvo de coloquintida. ʒjv (125 gr.).

Polvo de goma tragac. ʒij (8 gr.).

Vino blanco generoso. c. s.

Se hace una pasta en un mortero de mármol, de la que se hacen trociscos que se deben secar á la sombra; despues se los pulveriza, se hace otra vez trociscos con vino, y se repite la operacion por tercera vez.

I. y *D.* Son purgantes y se usan en las enfermedades cutáneas, en la hidropesía, en el letargo y en la apoplejía. Se pueden usar en lavativas disueltos en un vehiculo apropiado. *D.* ʒjv á ʒvj (2 á 3 dec.).

9141. T. ANTIÁCIDOS (Todd).

℞ Carbonato de magnesia,

Azúcar blanca, ãã. . . . ʒij (8 gr.).

Mucilago de goma aráb. c. s.

H. S. A. doce trociscos.

I. Acedías y pirosis.

9142. T. ANTIHELMINTICOS (F. M.).

℞ Mercurio dulce. . . . ʒβ (15 gr.).

Cuerno de ciervo pre-

parado. ʒij (24 dec.).

Canela. ʒj (12 dec.).

Diagridio sulfurado. . . ʒj (4 gr.).

Azúcar blanca. . . . ʒj (30 gr.).

Conserva de rosas en-

carnadas. ʒij (8 gr.).

Goma tragacanto di-

suelta en agua rosad. c. s.

H. S. A. trociscos.

I. Afecciones verminosas. *D.* De ʒβ á ʒj (6 á 12 dec.) segun la edad.

9143. T. AROMÁTICOS ó Barras aromáticas rusas.

℞ Bálsamo negro del Perú. 18

Bálsamo de la Meca. 18

Bálsamo de Tolú. 72

Estoraque calamita. 72

Benjuí en lágrima. 72

Polvo de canela. 72

Polvo de cascarilla. 72

Polvo de clavo de especia. 18

Azúcar. 72

Vainilla. 36

Almizcle. 1

Ambar gris. 1

Sucino. 162

Laca carminada. 18

Espíritu de rosas. c. s.

Hágase una masa que se divi-

dirá en cilindros largos del peso de $\text{ʒ}\beta$ (16 gr.).

Sirven para aromatizar los apocentos, pues frotándolos sobre un badil caliente, despiden un olor aromático y agradable.

9144. T. BÉQUICOS OPIADOS.

ʒ Opio. ʒij (8 gr.)
Tintura de bálsamo del Perú. $\text{ʒ}\beta$ (15 gr.)
Jarabe de bálsamo de Tolú. $\text{℥}\beta$ (250 gr.)
Extracto de regaliz, Goma arábica, ãã . . . ʒv (150 gr.)
H. S. A. trociscos de ḡxij (6 dec.).

9145. T. DE CARBONATO DE PLOMO ALCANFORADO ó Trociscos blancos de Rhassis (F. E.).

ʒ Albayalde muy blanco y porfirizado. $\text{ʒj}\beta$ (45 gr.)
Almidon en polvo,
Goma arábica, ãã . . . ʒij (8 gr.)
Alcanfor. $\text{ʒ}\beta$ (2 gr.)

Se reducen á polvo separadamente y con c. s. de agua se hacen trociscos: se tendrá cuidado de disolver el alcanfor en alcohol.

Quando se los quiere prescribir con opio se añade á ʒj (4 gr.) de estos trociscos, ḡiij (15 cent.) de opio, y entonces ḡxxv (125 cent.) contienen ḡj (5 cent.) de opio.

I. Gonorrea. Se usan exteriormente en las enfermedades de los ojos; calman la irritacion é inflamacion y moderan las fluxiones. D. ʒj (4 gr.) disueltos en ʒviiij (250 gr.) de agua.

9146. T. DE CASTÓREO (F. A.).

ʒ Castóreo en polvo. . . ʒij (8 gr.)
Azúcar blanca. ʒjv (125 gr.)
Mucil. de goma tragac. c. s.
H. S. A. trociscos de ḡiij (15 cent.).

I. Espasmos, amenorrea.

9147. T. DE CEBOLLA ALBARRANA ó Trociscos escilíticos (F. E.).

ʒ Pulpa reciente de cebolla albarrana extraída por coccion. . . . ℥bj (500 gr.)
Corteza de raiz de dictamo blanco en polvo. c. s.
para formar masa, que dividida en trociscos se dejan secar y se guardan.

Entran en la composicion de la triaca del colegio, y no tienen en el dia otro uso.

9148. T. CIFEOS ó Masticatorio egipcio (Demócrates).

ʒ Pasas.	96
Trementina cocida.	96
Esquenanto.	48
Mirra.	48
Cálamo aromático.	34
Canela.	16
Bedelio.	12
Nardo índico.	12
Canela del Malabar.	12
Fumaria redonda.	12
Enebro.	12
Asfalto.	10
Azafran.	4
Miel.	c. s.
Vino de Creta.	c. s.

Se disuelven las gomoresinas y la trementina en vino, se añade la miel y las pasas en pulpa, despues las demás sustancias reducidas á polvo, y se hacen trociscos que se secan á la sombra.

I. Son masticatorios, é interiormente se usan como cordiales, estomacales y anticontagiosos.

9149. T. DE CUBEBAS (Dr. Spitta).

ʒ Pimienta cubebas en polvo. ʒij (8 gr.)
Bálsamo de Tolú. 6 gotas.

Mézclese exactamente. Por separado se toma:

Extracto de regaliz purificado,
Jarabe de bálsamo del
Perú, ãã. ʒj (30 gr.).
Goma arábiga en polvo. c. s.

Se hace una pasta con estas sustancias y el polvo cubebas aromático anterior, y se forman con ella trociscos de ʒx (5 dec.) de peso cada uno.

I. Coriza. D. Se pone uno ó dos trociscos sobre la lengua, y á medida que se funden en la boca desaparece la coriza.

9150. T. DE CHAUSSIER.

ʒ Azúcar. ʒjx (36 gr.).
Aleanfor. ʒj (4 gr.).
Opio. ʒj (12 dec.).
Goma tragacanto. . . . ʒʒ (6 dec.).
Agua. c. s.

H. S. A. ciento cincuenta trociscos, en cada uno de los cuales hay una sexta parte de grano (8 mil.) de opio.

I. Tisis laríngea y angina. D. De cuatro á seis al día.

Nota. Hay tan poca diferencia entre estos trociscos y las pastillas de Chaussier contra el crup, que parece duplicada la insercion de las dos fórmulas. En efecto, las sustancias componentes son las mismas, casi igual la proporcion de las sustancias entre sí, y aun la division de la masa total.

9151. T. ESCARÓTICOS ó de deutocloruro de mercurio (F. E.).

ʒ Sublim. corrosivo. ʒj (32 gr.).
Almidon. ʒj y ʒvj (56 gr.).
Goma tragacanto. ʒij (8 gr.).

Se hacen polvos muy sutiles en un mortero de piedra, y con c. s. de agua se hacen trociscos oblongos. Cada dracma (4 gr.) contiene ʒj (12 dec.) de sublimado corrosivo.

I. Se usan como escaróticos pa-

ra destruir las fungosidades y callosidades de las fistulas y úlceras, ensanchar los trayectos fistulosos; para combatir las vegetaciones sifilíticas y abrir abscesos frios, bubones venéreos, etc.; pero en general se prefiere la potasa ú otros cáusticos, como el nitrato ácido líquido de mercurio.

9152. T. ESCARÓTICOS (F. F.).

ʒ Sublimado corrosivo. . ʒij (8 gr.).
Almidon. ʒʒ (16 gr.).
Mucilago de goma trag. c. s.

Se pulveriza el sublimado, se le mezcla con almidon y se añade el mucilago para obtener una pasta con que se harán trociscos de ʒij (15 cent.) de la figura de un grano de avena.

I. Véanse los anteriores.

9153. T. ESCARÓTICOS DE MINIO (F. F.).

ʒ Sublimado corrosivo. . . ʒij (8 gr.).
Minio. ʒj (4 gr.).
Miga de pan tierno. . . . ʒj (32 gr.).
Agua destilada. c. s.

H. S. A. trociscos de la figura de los granos de avena, y que tengan ʒij (15 cent.) de peso cuando están húmedos; pesan dos despues de la desecacion.

I. Se usan en los mismos casos que los anteriores.

9154. T. DE HEDICROY ó Trociscos de cálamo aromático de Hedicroy (F. E.).

ʒ Maro,
Mejorana,
Raiz de ásaro,
Leño álces, ãã. . . . ʒxj (352 gr.).
Raiz de cálamo aromático,
Esquenanto,
Hojas de Santa María,
Valeriana mayor,
Canela,
Opobálsamo,
Jilobálsamo, ãã. . . . ʒbj (500 gr.).

Malabatro,
Nardo de Indias,
Canela del Malavar,
Mirra,
Azafran, ãã. ℥ij (1000 gr.).
Amomo racimoso. ℥Lxiiij (1980 gr.).
Almáeiga. ℥v y ℥ij (168 gr.).

Se reducen á polvo y se hacen trociscos con vino blanco bueno. Entran en la composicion de la triaca.

9155. T. MASTICATORIOS.

℥ Almáeiga. 4
Gengibre. 4
H. S. A. pastillas de ℥β (2 gr.).

9156. T. DE MIRRA COMPUESTOS (F. E.).

℥ Mirra. ℥β (16 gr.).
Asa fétida,
Sagapeno,
Opoponaco,
Hojas de ruda,
Hojas de poleo,
Hojas de mastuerzo,
Raiz de rubia de tintoreros,
Simiente de perejil, ãã. ℥ij (8 gr.).

Se pulverizan sutilmente, se mezclan añadiendo c. s. de cocimiento de artemisa, se hacen pasta que, dividida en trociscos, se secan á la sombra y se guardan en una vasija tapada.

I. Son antihistéricos. Facilitan el parto, la expulsion de las secundinas y la menstruacion. D. Hasta ℥j (4 gr.).

9157. T. MOSCADOS (F. de Wurt.).

℥ Almizcle. ℥j (12 dec.).
Ambar. ℥j (4 gr.).
Láudano,
Benjuí, ãã. ℥j (30 gr.).
Azúcar. ℥jβ (45 gr.).
Estoraque. ℥jv (125 gr.).
Mucílago. c. s.
H. S. A. D. Se usan en fumiga-

ciones, é interiormente á la dosis de ℥ij á ℥jv (8 á 15 gr.).

9158. T. OLOROSOS.

℥ Estoraque 'purific. ℥j (12 dec.).
Ambar gris. ℥xv (75 cent.).
Almizcle. ℥vij (35 cent.).
Aceite de canela. 5 gotas.
Azúcar fino. ℥j (30 gr.).
Mucíl. de goma aráb. e. s.

I. Parálisis, enfermedades nerviosas y vaporosas, asténicas, anafrodisia, etc. D. Una ó dos cucharadas de cuando en cuando, que se dejan fundir en la boca como excitantes.

9159. T. DE RAMICH (F. E.).

℥ Zumo de membrillos. ℥ij (500 gr.).
Zumo de agraces. ℥jβ (48 gr.).
Nuez de eiprés. ℥iiij (96 gr.).
Hojas de arrayan. ℥ij (64 gr.).
Rosas rojas. ℥j (32 gr.).

Se cuecen ligeramente, se cuele y se añade:

Goma aráb. en polvo. ℥jβ (48 gr.).
Sánd. eetrino en polvo. ℥x (40 gr.).
Zumaque en polvo. ℥j (32 gr.).
Rosas rojas en polvo. ℥j (32 gr.).
Pimienta de Tabascó. ℥jβ (48 gr.).

Se expone la masa al sol hasta que se seque, se pulveriza despues sutilmente y con c. s. de agua de rosas se hacen trociscos S. A.

I. Son astringentes. D. De ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.).

9160. T. DE REGALIZ OPIADOS.

℥ Zumo de regaliz,
Azúcar, ãã. ℥j (30 gr.).
Extracto de opio. ℥v (25 cent.).
H. S. A. trociscos.

9161. T. DE VÍBORAS (F. E.).

℥ Polvos de troncos de víbora preparados S. A. y sus vísceras. . . . c. s. q.
Mucílago de goma tragacanto preparado con vino blanco. . . . c. s.
Se hacen trociscos S. A., los

que se secan á la sombra; despues se untan sus superficies con bálsamo negro del Perú, y se guardan separados en papel blanco.

Entran en la composicion de la triaca del colegio.

I. Enfermedades de la piel, mordeduras de viboras y de otros animales venenosos, enfermedades contagiosas, pestilenciales ó malignas, sarampion, viruelas.

UNGUENTOS.

9162. UNGUENTO DE LA ABADIA DE BEC.

℞ Manteca,
Pez de Borgoña, ãã. ℥ij (500 gr.).
Cera amarilla. . . . ℥x (320 gr.).
Pez resina
Pez naval, ãã. . . ℥v (160 gr.).
Incienso en polvo. ℥j y ℥ij (40 gr.).
H. S. A. I. Ulceras indolentes,
D. C. s. para cubrir ligeramente una planchuela de hilas ó un lienzo fino, que se aplica sobre las partes enfermas.

9163. U. ABORTIVO (Debreyne).

℞ Ungüento merc. doble. ℥ij (8 gr.).
Extracto de belladona. ℥j (4 gr.).
Opio en bruto. . . . ℥j (4 gr.).
M. I. Se usa para prevenir el panarizo.

9164. U. DE ACETATO DE PLOMO ó Manteca de Saturno (F. E.).

℞ Acetato de plomo líquido,
Aceite comun, ãã. . . ℥ij (500 gr.).
Se mezclan en un mortero de piedra y se agita continuamente con una mano de madera hasta que adquiera la consistencia de linimento.

I. Ulceras, quemaduras, escoriaciones, etc.

9165. U. DE ACETATO DE PLOMO ó Ungüento de litargirio (F. A.).

℞ Manteca de puerco. . . ℥ij (500 gr.).

Cera blanca. ℥℔ (250 gr.).
Se liquidan, se cuelan, y cuando están medio frios se añade agitando continuamente:

Acetato de plomo há-
sico disuelto. . . . ℥℔ (250 gr.).
Se guarda.

9166. U. DE AGALLA Y MORFINA ó Ungüento sedante del Dr. Paris (F. P.).

℞ Morfina. 4
Aceite. 72
Ungüento de zinc. 286
Agallas en polvo. 36
H. S. A. I. Hemorroides.

9167. U. ALABASTRINO.

℞ Flor de manzanilla,
Flor de ruda, ãã. . . ℥iij (90 gr.).
Flor de rosas,
Flor de saúco,
Flor de betónica, ãã. . ℥℔ (15 gr.).
Raiz de malvabisco. . ℥ij (60 gr.).
Aceite rosado. . ℥ij y ℥x (540 gr.).
Se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuele y se añade:
Alabastro en polvo. . . ℥v (150 gr.).
M. I. Se le aconseja como calmante en fricciones, en las sienes, frente, espinazo y plantas de los piés.

9168. U. ALCANFORADO.

℞ Alcanfor. ḡxc (5 gr.).
Aceite de ninfea,
Aceite de laurel, ãã. ℥j (30 gr.).
Semillas de lechuga,
Sem. de adormid., ãã. ḡxc (5 gr.).

Extracto de beleño. . . ḡxviiij (1 gr.).
Cerato. c. s.

M. I. Cistitis, nefritis, uretritis, disuria, poligalaxia, priapismo, ninfomanía, sífilides, raquitis y sabañones. *D.* En fricciones en el pubis, perineo y en el pecho.

9169. U. DE ALDERETE ó Ungüento de muriato de mercurio oxigenado ó de deutocloruro de mercurio compuesto (F. E.).

℥ Mant. de vacas fresca. ℥jv (125 gr.).
Trementina,
Aceite de rosas, ãã. . . ℥j (30 gr.).
Se derrite á fuego lento, despues se menea bien en un mortero de piedra y se mezclan los polvos siguientes:

Albayalde. ℥ijß (75 gr.).
Sublimado corrosivo. . . ℥ij (8 gr.).
Alumbre calcinado. . . ℥ij (8 gr.).

Despues se añade:

Yemas de huevo. . . . número 2.
Zumo de limon. ℥ij (60 gr.).

Se mezcla todo y se guarda para el uso.

Cada onza (30 gr.) de este unguento contiene ℥ß (6 dec.) de sublimado corrosivo.

I. Sarna y varias enfermedades de la piel.

9170. U. DE ALTEA (F. E.).

℥ Aceite de altea. . . . ℥bjß (750 gr.).
Cera amarilla,
Resina, ãã. ℥vj (180 gr.).
Se licúan, se cuele y se añade:
Trementina pura. ℥ij (60 gr.).

I. Se usa como emoliente y resolutivo. *D.* La misma que los anteriores.

9171. U. DE ALTEA (F. F.).

℥ Aceite de alholvas. . . ℥bij (1000 gr.).
Cera amarilla. ℥ßß (250 gr.).
Resina de pino,
Trementina, ãã. . . . ℥jv (125 gr.).
Se licúa la cera y la resina de

pino en el aceite de alholvas, se añade la trementina, se cuele por un lienzo, y se agita la mezcla con una espátula de madera hasta que se enfrie enteramente.

9172. Otro (F. P.).

℥ Mucilago de raiz de malvabisco. . . 3
Grasa de puerco. 9
Se cuece hasta que se evapore el agua y se añade:
Cera amarilla. 1

9173. U. ANONIACAL (H. DE AL.).

℥ Carbonato de amoniaco. ℥j (4 gr.).
Ungüento rosado. ℥j (30 gr.).
Aceite de jazmin. 4 gotas.

M. I. Infartos de las mamas, flegmasias, abscesos, cistitis, histerico, escrófulas, mareo, tiña. *D.* Se usa en fricciones, tres ó cuatro veces al dia.

9174. U. ANTIÉPSÓRICO.

℥ Precipitado rojo. 1
Mercurio. 1
Azufre precipitado. 16
Manteca. 32
H. S. A. D. ℥ij (8 gr.) á ℥viiij (32 gr.) en fricciones por la noche.

9175. U. ANTIHELMÍNTICO.

℥ Zumo de ajenjos,
Zumo de abrótano,
Zumo de persicaria,
Zumo de hojas de melocoton,
Zumo de raiz de yezgo,
Zumo de puerros,
Zumo de berros, ãã. . . . ℥ij (60 gr.).
Aceite de ajenjos. ℥bj y ℥x (540 gr.).
Se cuece suficiente tiempo, y se añade:

Cera amarilla. c. s.
Polvo de balaustrias. . . . ℥j (4 gr.).
Mézclese exactamente.

9176. U. ANTIHELMÍNTICO (Boerhaave).

℥ Bilis de buey,

Acíbar, ãã. ʒj (4 gr.).
 Ungüento de altea. . . . ʒj (32 gr.).
 Se usa en fricciones ó en aplica-
 ciones sobre el abdómen.

9177. U. ANTIHEMORROIDAL.

ʒ Azafran en polvo. . . ʒj (12 dec.).
 Aleafor. ʒij (24 dec.).
 Aceite de beleño. . . . ʒij (8 gr.).
 Cerato de Goulard. . . ʒvj (24 gr.).
 M. D. En unturas en los tumores
 hemorroidales doloridos.

9178. Otro (H. DE MONP.).

ʒ Acetato de plomo. . . ʒxv (75 cent.).
 Coreho quemado en
 polvo. ʒjv (16 gr.).
 Mantea de vacas
 fresca. ʒij (64 gr.).
 Mézclese por trituracion.

9179. Otro (RIGHINI).

ʒ Extracto de semillas de estramonio,
 Extr. de beleño, ãã. . ʒj (4 gr.).
 Ungüento populeon. . ʒxjv (56 gr.).
 H. S. A.

9180. U. ANTILEUCORREICO.

ʒ Hojas verdes de ajenjos,
 Hojas verdes de ruda,
 Hojas verdes de sal-
 via, ãã. ʒj (4 gr.).
 Aceite comun. ʒjv (125 gr.).

Se cuece á fuego moderado, se
 cuela y se añade:

Cera amarilla. ʒj (30 gr.).
 Pez resina. ʒjv (125 gr.).

Se añade á la mezcla fundida:

Trementina. ʒj (4 gr.).

Se cuela, se decanta y se me-
 nea hasta que se enfrie entera-
 mente.

I. Leucorrea, catarro útero-
 vaginal. D. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en
 fricciones en el hipogastrio.

**9181. U. DE ARCEO ó Bálamo
 de Arceo (F. E.).**

ʒ Sebo. ʒxij (360 gr.).

Trementina pura,
 Resina elemí,
 Mant. de puereo, ãã. ʒx (300 gr.).
 Se liquidan á fuego suave y se
 cuela.

I. Se usa como deterativo y se-
 cante en el tratamiento de las he-
 ridas indolentes y de las úlceras.

El BÁLAMO DE ARCEO DE LOS H. M. solo
 se diferencia del anterior en que contie-
 ne ʒvj (180 gr.) de manteca de puereo.

9182. Otro (F. F.).

ʒ Sebo de carnero. . . ʒbij (1000 gr.).
 Trementina,
 Resina elemí, ãã. . ʒbjß (750 gr.).
 Mantea de cerdo. . ʒbj (500 gr.).

Se licúa el sebo, la manteca y
 la resina, se añade la trementina,
 se cuela por un lienzo y se agita
 la mezcla hasta que esté casi fria.

I. Se usa como deterativo y se-
 cante, y produce muy buenos
 efectos en las heridas y úlceras
 indolentes, úlceras atónicas. D.
 Se le extiende en una planchuela
 de hilas.

Si á ʒß (16 gr.) de este ungüen-
 to se añaden ʒij (1 dec.) de al-
 canfor, se tiene el bálamo de Ar-
 ceo alcanforado; y si se ponen dos
 partes de ungüento por una de
 petroleo, el bálamo de Arceo li-
 quido.

**9183. U. DE ARTÁNITA COMPUES-
 TO ó Ungüento de pan de puercó
 (F. E.).**

ʒ Aceite reciente de
 raíz de artánita. . ʒbjß (750 gr.).

Mantea de vacas,
 Cera amarilla, ãã. . ʒß (250 gr.).

Se licúan á fuego lento y se añá-
 de:

Goma sagapeno purificada,
 Hiel de buey espesada hasta la con-
 sist. de miel, ãã. . ʒß (15 gr.).

Se mezcla todo, y cuando está á
 medio enfriar se añaden los pol-
 vos siguientes:

Eseamonea de Alepo,

Raiz de jalapa ,
 Coloquintida ,
 Hojas de mecereon ,
 Acíbar sucotrino , $\text{ãã. } \text{ʒB}$ (15 gr.).
 Sal gemma ,
 Euforbio ,
 Mirra ,
 Pimienta larga ,
 Raiz de gengibre ,
 Flor de manzanilla , $\text{ãã. } \text{ʒij}$ (8 gr.).
 Se mezcla todo S. A. y se guarda para el uso.

I. Facilita el movimiento de vientre, resuelve los tumores edematosos y destruye las lombrices.
D. C. s. para untar las partes afectadas ó el vientre.

9184. U. DE AZUFRE COMPUESTO
 (F. P.).

ʒ Grasa de cerdo. 30
 Azufre sublimado. 45
 Sal amoniaco. 4
 H. S. A. I. Sarna.

9185. U. DE AZUFRE (F. DE L.).

ʒ Azufre. ʒijij (96 gr.).
 Manteca. ʒvj (192 gr.).
 Aceite de bergamota. ʒj (12 dec.).
M. I. Sarna, herpes.

9186. U. DE AZUFRE COMPUESTO
 (F. DE L.).

ʒ Azufre sublimado. ʒvj (192 gr.).
 Raiz de eléboro en polvo. ʒij (64 gr.).
 Nitro. ʒj (4 gr.).
 Jabon blando. ʒvj (192 gr.).
 Manteca. ʒxviiij (564 gr.).
 Esencia de bergam. 30 gotas.
M. I. Sarna. *D.* ʒv (20 gr.).

9187. U. DE AZUFRE CON SULFURO DE MERCURIO (F. P.).

ʒ Azufre sublimado. 72
 Carbonato de potasa. 4
 Cinabrio. 4
 Grasa de cerdo. 96

Esencia de bergamota. 2
 H. S. A. I. Sarna y enfermedades cutáneas.

9188. U. BASALICON ó de colofonia amarillo (F. E.).

ʒ Cera amarilla ,
 Sebo ,
 Resina comun ,
 Colofonia , $\text{ãã. } \text{ʒbj}$ (500 gr.).
 Se licuan en

Aceite comun. ʒbjB (750 gr.).
 Se cuele. Si se pone pez negra en lugar de la colofonia, se obtiene el *ungüento basalicon negro de la F. E.*

Nota. Este unguento se endurece mucho y debe preferirse la fórmula siguiente, que es la de la *F. F.*

Pez negra ,
 Cera amarilla ,
 Colofonia , $\text{ãã. } \text{ʒij}$ (64 gr.).
 Aceite comun. ʒB (250 gr.).

Se derriten la pez y la colofonia á un calor suave en un perol de cobre, y se añaden la cera y el aceite; cuando se ha fundido todo, se cuele por un lienzo, se agita con la mano de un mortero hasta que el unguento esté tibio y entonces se le guarda en vasijas convenientes.

I. Se usa como excitante para acelerar la cicatrizacion de las úlceras indolentes, y como madurativo para favorecer la supuracion de los tumores indolentes.

El de la F. P. contiene partes iguales de resina de pino, cera amarilla y aceite.

9189. U. DE BERENGENA (F. E.).

ʒ Aceite de rosas. ʒxxxvj (1125 gr.).
 Berengenas frescas cortadas en pedacitos. ʒbjB (750 gr.).
 Se cuecen á fuego lento hasta consumir la humedad, se cuele y se disuelve en el aceite :
 Cera amarilla. ʒjx (270 gr.).

Se añade:

Cardenillo levigado sin
agua. ℥ij (8 gr.).

Se cuece un poco para que adquiera color verde, se agita hasta que se enfríe y se guarda.

9190. U. BLANCO DE RHASSIS.

℥ Ungüento simple. ℥xc (5 gr.).
Aceite comun. ℥xviiij (4 gr.).
Albayalde. ℥B (2 gr.).

M. I. Quemaduras, grietas. D.
Para curas ligeras.

9191. U. BLANCO ALCANFORADO.

℥ Manteca. ℥xxx (625 gr.).
Protocarb. de plomo. ℥xv (470 gr.).

Se calienta, se agita hasta que la grasa tenga la consistencia de unguento y se añade:

Alcanfor en polvo. . ℥iij (12 gr.).

I. Quemaduras y contusiones.
D. C. s. para cubrir ligeramente una planchuela de hilas ó un lienzo fino, que se aplica sobre la parte enferma.

9192. U. BLANCO DE RHASSIS ó Ungüento de carbonato de plomo (F. E.).

℥ Carbonato de plomo
en polvo. ℥xij (375 gr.).
Aceite rosado. ℥bjß (750 gr.).
Cera blanca. ℥jv (125 gr.).

Se liquida la cera en el aceite, se mezcla en seguida el albayalde y despues se cuece poco á poco á fuego lento, y se agita hasta que se enfríe.

El UNGUENTO BLANCO DE LOS H. M. tiene la misma composicion que el anterior.

Soubeiran adopta la fórmula y modo de preparacion siguiente, porque de este modo el unguento no se enrancia con tanta facilidad, y se prepara en el momento de usarle:

Albayalde. 4
Manteca. 5

M. I. Esta pomada se usa como desecante en las úlceras crónicas y para facilitar la cicatrizacion.

Añadiendo ℥jx (45 cent.) de alcanfor por ℥j (30 gr.) se tiene el unguento blanco alcanforado de la F. M.

9193. U. DE BREA (F. DE L.).

℥ Brea,
Sebo, ãã. ℥bj (500 gr.).

Se funde y se cuele por un pedazo de tela de lana.

9194. U. DE BRIONIA DE AGRIPA ó Ungüento de Agripa (F. E.).

℥ Aceite de raiz de brionía compuesto recién preparado. ℥bjv (2000 gr.).
Cera blanca. ℥bj (500 gr.).

Se licúa la cera á fuego lento; separado se agita hasta que se enfríe y se guarda.

I. Es resolutivo y fundente.

9195. U. BRUNO (F. F.).

℥ Ungüento basalicon. . . ℥ij (64 gr.),
Precipitado rojo. ℥j (4 gr.).

Se porfiriza el precipitado rojo, se añade poco á poco el unguento basalicon y se tritura hasta mezclarlo exactamente.

I. y D. Se usa para curar las úlceras atónicas, como estimulante y ligeramente caterético; pero conviene particularmente en los infartos duros, crónicos é indolentes que suceden á los bubones que no se han resuelto bien.

9196. U. DE CAL (Vogler).

℥ Agua de cal viva. ℥jß (45 gr.).
Aceite comun

ó Aceite de almendras dulces. ℥B (15 gr.).

Mucílago de semillas de membrillos. ℥j (30 gr.).

M. I. Aconsejado en las quemaduras.

9197. U. Ó BÁLSAMO DE CALABAZA.

℥ Calabaza comun,
 Hojas de verdolaga,
 Hojas de violeta,
 Hojas de llanten,
 Hojas de yerba mora, ãã. ℥j (500 gr.).
 Se machacan en un mortero de piedra y se ponen á macerar por dos dias en un sitio caliente con Aceite. ℔v (2500 gr.).
 Se cuece hasta que se haya consumido la humedad, se exprime fuertemente y en el aceite depurado se derrite Cera. ℥j (500 gr.).
 Se prepara el unguento S. A.
 I. Se usa como calmante.

9198. U. DE CAMUESAS (F. M.).

℥ Benjuí,
 Estoraque calamita, ãã. ℥ij (8 gr.).
 Clavo. ℥j (4 gr.).
 Camuesas finas en pedazos. número 12.
 Agua de rosas,
 Agua de azahar, ãã. ℥iij (90 gr.).
 Se quebrantan un poco, se echan en una vasija de barro vidriado, y se añade:
 Manteca fresca derretida. ℔jvß (2250 gr.).
 Se cuece á fuego lento hasta que se consuma la humedad, se cuele sin expresion y se guarda.
 I. Ulceras de las narices, grietas de los labios, grietas de las manos, cicatrices, especialmente en las de las viruelas. V. número 7728.

9199. U. DE CANTÁRIDAS EXCITANTE (Millan).

℥ Tintura de cantáridas. . ℥ij (8 gr.).
 Alcanfor. ℥j (4 gr.).
 Aceite de laurel. ℥j (30 gr.).
 Aceite comun. c. s.

H. S. A. I. Asma. D. En fricciones.

9200. U. DE CANTÁRIDAS (F. DE L.).

℥ Cantár. en polvo fino. ℥j (32 gr.).
 Agua destilada. ℥jv flúidas (125 gr.).
 Cerato de colofonia. . ℥jv (125 gr.).
 Se hierven las cantáridas en el agua hasta que se reduzca á la mitad y se filtra, se añade el cerato al liquido, y se evapora hasta la consistencia conveniente.
 I. Se usa para favorecer la supuracion de los vejigatorios y fuentes.

9201. U. DE CARBONATO DE PLOMO Ó DE ALBAYALDE (F. P.).

℥ Carbonato de plomo. 4
 Cera blanca. 4
 Aceite. 9
 Se derrite la cera en el aceite á fuego suave, se añade poco á poco el albayalde y se menea. Si se añade á cada onza ℥ij (1 dec.) de alcanfor disuelto en algunas gotas de aceite, se tiene el *Ungüento blanco alcanforado*.
 I. Quemaduras, escoriaciones.

9202. U. CARMINATIVO (Tourtual).

℥ Alcohol amoniaco anisado. ℥j (4 gr.).
 Ungüento nervino. . . . ℥ß (15 gr.).
 M. I. En fricciones, mañana y noche, al bajo vientre y pecho de los niños.

9203. U. CETRINO ó de nitrato de mercurio, pomada cetrina (F. E.).

℥ Mercurio,
 Acido nítrico, ãã. . . . ℥j (30 gr.).
 Se echa poco á poco el ácido sobre el mercurio en una vasija de vidrio. Entonces se toma:
 Manteca líquida y ya medio enfriada. . . . ℥x (300 gr.).

Se echa en un mortero de piedra, despues se añade poco á poco la solucion, y se agita la mezcla hasta que se enfrie.

Se usa contra la sarna; pero tiene el inconveniente grave de provocar la salivacion. V. *Pomada cetrina de la F. F.*

El UNGUENTO DE NITRATO DE MERCURIO DE LA F. DE L. se prepara disolviendo ℥j (32 gr.) de mercurio en ℥ij (64 gr.) de ácido nítrico, se le mezcla el licor caliente con ℥vj (192 gr.) de manteca, y ℥jv (125 gr.) de aceite liquidados juntos.

9204. U. CETRINO ó Ungüento mercurial cetrino (F. A.).

℥ Mercurio. ℥j (30 gr.).
Acido nítrico diluido. ℥ij (60 gr.) ó c. s.

Se añade estando aún caliente la solucion:

Manteca de cerdo liquidada y á medio enfriar. ℥xij (375 gr.).
H. S. A.

9205. U. CETRINO Ó DE NITRATO DE MERCURIO (F. P.).

℥ Nitrato de mercurio flúido. 1
Manteca de cerdo. 4

H. S. A. I. Tiña, herpes, sarna, escoriaciones de los tarsos y en otras enfermedades cutáneas.

El nitrato mercurial se prepara con 96 partes de ácido nítrico á 32° y 64 de mercurio puro.

9206. U. DE CICUTA DEOPILATIVO ó Ungüento deopilativo (F. E.).

℥ Hojas de cicuta,
Hojas de apio,
Hojas de yezgos,
Hojas de perejil,
Hoj. de sabina, ññ. ℥xij (375 gr.).
Corteza de raiz de alcaparro,
Raiz de lirio del país,
Raiz de brionía, ññ. ℥vj (180 gr.).
Aceite de olivas. . ℥bjvß (2250 gr.).
Se cortan y contunden, se las

deja en digestion en el aceite por cuatro dias, despues se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuela con expresion dejándolo sedimentar, se saca por decantacion, se le pone á fuego suave y se mezcla:

Cera amarilla. . . . ℥xviiij (560 gr.).
Luego que se ha licuado se separa del fuego; se deja enfriar un poco y se añade:

Goma amoniaco pulverizada. ℥ij (60 gr.).
Raiz de aristoloquia lar-
ga pulverizada. . . . ℥ij (60 gr.).

Se agita con una espátula hasta que se mezclen perfectamente.

I. Obstruccion del hígado ó del bazo, tumores duros y escirrosos.

9207. U. DE COBRE (Swediaur).

℥ Solucion de sulfato de cobre amoniacal. . . . ℥j (4 gr.).
Cerato simple. ℥j (30 gr.).

M. I. Ulceras atónicas y fungosas.

9208. U. DE COBRE ó Ungüento verde.

℥ Verdete. 1
Ungüento basalicón. 15

M. I. Se usa en el tratamiento de las úlceras venéreas atónicas.

9209. U. DE COBRE COMPUESTO.

℥ Aceite rosado. ℥iiij (96 gr.).
Fruto de cohombri-
llo amargo. ℥ijß (80 gr.).

Se cuece suavemente y se añade:

Cera amarilla. ℥v (20 gr.).
Acetato de plomo por-
firizado. ℥xviiij (1 gr.).

Se agita al fuego.

I. Infartos escrofulosos, úlceras venéreas. D. En fricciones y para curas.

9210. U. DE LA CONDESA ó de arrayan compuesto (F. E.).

℥ Aceite cocido de ar-
rayan. ℥xij (375 gr.).

Cera amarilla. ℥iij (90 gr.).
 Se licúa la cera en el aceite, se aparta del fuego y se añade:
 Nuez de agallas sin madurar, en polvo. ℥j (30 gr.).
 Bayas de arrayan en polvo,
 Nuez de ciprés en polvo,
 Cáscaras de granadas en polvo, ãã. ℥ij (8 gr.).
 Hojas de zumaque en p. ℥j (30 gr.).
 Almáciga en polvo. . . ℥ß (15 gr.).
 Se agita hasta que se enfríe y se guarda.

Se usa como tónico y astringente y contra las hemorroides. *D.* Se usa en fricciones en los lomos ó en los riñones. Véase núm. 7778.

9211. U. CONTRA LAS HEMORROIDES.

℥ Ungüento nutrido,
 Ungüento popul., ãã. ℥vj (24 gr.).
 Aceit. cocido de beleño. ℥ij (8 gr.).
 Alcanfor molido. ℥ij (24 dec.).
 Azafran. ℥j (12 dec.).
 Mézclese bien.

Tambien se puede mezclar una yema de huevo, y si se le quiere hacer mas anodino se puede añadir ℥ß (6 dec.) de opio.

I. Apácigua los dolores de las almorranas, y muchas veces las disipa.

9212. U. DE MERCURIO DULCE CONTRA LOS HERPES ó de protocolo de mercurio. (F. E.).

℥ Ungüento rosado. . . . ℥vj (196 gr.).
 Mercurio dulce. . . . ℥vj (24 gr.).
 Se mezclan en un mortero de vidrio.

I. Herpes, sarna, manchas y enfermedades de la piel. *D.* La misma que las de los anteriores.

Nota. Cada tres dracmas (12 gr.) de este unguento contienen ℥j (12 dec.) de mercurio dulce.

La fórmula de Dupuytren contiene una parte de calomelanos por tres de pomada con rosa.

9213. U. CONTRA LAS QUEMADURAS (H. M.).

℥ Cera blanca. ℥ij (60 gr.).
 Aceite comun. ℥bjß (750 gr.).
 Se derrite á fuego lento y se añade:
 Piedra calaminar porfirizada. ℥ij (60 gr.).
 Se agita la mezcla hasta que esté fria.

9214. U. CONTRA LOS SABAÑONES (Plenk).

℥ Manteca,
 Grasa de buey,
 Aceite de laurel,
 Cera, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Se disuelven á fuego lento y se añade despues de frio:
 Alcanfor. ℥ß (15 gr.)
 disuelto en:
 Alcohol rectificado. . . . ℥j (30 gr.).
D. C. s. para fricciones, mañana y noche, en los puntos enfermos.

9215. Otro (SWEDIAUR).

℥ Alm. amargas mond. ℥bß (250 gr.).
 Miel. ℥vj (180 gr.).
 Alumbre calcinado,
 Incienso en polvo, ãã. ℥ij (60 gr.).
 Harina de mostaza,
 Alcanfor, ãã. ℥ß (15 gr.).
 Yemas de huevo. . . núm. 3.
 Se mezclan y se forma una pasta.

D. Se usa en ligeras fricciones sobre los sabañones, y algunos instantes despues se los lava con agua tibia ó mejor aún se ponen encima guantes ó escarpines.

9216. U. CONTRA LA SARNA (H. DE M.).

℥ Aceite comun,
 Sebo, ãã. ℥bvj (3000 gr.).
 Azufre en polvo. . . ℥bij (1000 gr.).

Sal comun decrepit. ℔j (500 gr.).

H. S. A.

9217. U. CONTRA LA SARNA ó Ungüento sulfurado (F. A.).

℥ Azufre depurado,
Sulfato de zinc, ãã. ℥jβ (45 gr.).
Ungüento simple. ℥xij (375 gr.).
H. S. A.

9218. Otro (BAILEY).

℥ Aceite comun,
Manteca, ãã. ℔j (500 gr.).
Nitro,
Alumbre,
Sulfato de zinc, ãã. ℥ij (60 gr.).
Cinabrio. ℥β (15 gr.).
Esencia de anís,
Esencia de mejorana,
Esencia de espliego, ãã. ℥j (4 gr.).
Raiz de ancusa. c. s.
H. S. A.

9219. U. CONTRA LA TIÑA DE LA CABEZA (Sydenham).

℥ Aceite de almendras,
Aceite de laurel,
Cenizas de hojas de abrotano, ãã. ℥j (30 gr.).
Mézclese y hágase linimento S. A.
D. Una fricción por la mañana, y se pone encima una vejiga de cerdo.

9220. U. CONTRA LA TIÑA.

℥ Harina de trigo. 5
Vinagre. 40
Se cuece hasta la consistencia de cola, y se añade por otra parte:
Pez negra. 4
Pez resina. 3
Pez blanca. 3

Se liquida, se cuele, se mezcla con la pasta de harina, y se menea hasta que se enfrie.

Este unguento se empleaba extendido en un baldés, se le aplicaba sobre la cabeza y se arrancaba de pronto.

9221. Otro (HENKE).

℥ Acido clorhídrico. ℥β (15 gr.).
Ungüento de altea,
Ungüento de enebro, ãã. ℥ij (60 gr.).
M. D. Dos fricciones al dia.

El UNGÜENTO DE ENEBRO se prepara con una parte de hojas de enebro y seis de cerato resinoso.

9222. U. DE CREOSOTA (F. DE L.).

℥ Creosota. ℥β flúida (16 gr.).
Manteca. ℥j (32 gr.).
Tritúrese y mézclese.

I. Ulceras de mal carácter, pórriigo.

9223. U. DE DIAPALMA (F. M.).

℥ Emplasto diapalma. ℥xij (375 gr.).
Aceite rosado. ℔β (250 gr.).
Trementina. ℥ij (60 gr.).

H. S. A. I. Heridas, úlceras y quemaduras.

9224. U. DIGESTIVO (H. DE M.).

℥ Trementina,
Ungüento amarillo, ãã. ℥j (30 gr.).
Yemas de huevo. núm. 2.
Aceite de hipericon. ℥β (15 gr.).
Mézclese S. A.

I. Ulceras sórdidas y atónicas.

9225. U. DISCUSIVO (Frank).

℥ Mostaza. ℥iij (90 gr.).
Aceite de almendras. ℥β (15 gr.).
Zumo de limon. c. s.
M. I. Pecas.

9226. U. DIURÉTICO.

℥ Cebolla albarrana en polvo. ℥β (2 gr.).
Ungüento mercurial. ℥j (4 gr.).
Mézclese exactamente.

I. Hidropesías. D. Se dan fricciones en la parte interna de los muslos, en los lomos y en el bajo

vientre, cuando los enfermos no pueden tomar las preparaciones de cebolla albarrana.

9227. U. DEL DUQUE.

℥ Aceite de nueces. ℔β (250 gr.).
Flores de azufre. ℥ij (60 gr.).
Se los calienta en el baño de arena hasta que se disuelva el azufre y el aceite se vuelva rojo; despues se funde:

Manteca. ℔β (250 gr.).
Cera amarilla. ℥j (30 gr.).

Se le da color con c. s. de ancusa. Se cuele por un lienzo y se echa en un mortero de mármol para mezclar exactamente el aceite de azufre.

I. Ulceras indolentes y tumores articulares indolentes. *D.* C. s. para cubrir ligeramente las partes enfermas.

9228. U. EGIPCIACO ó Ungüento de óxido de cobre (F. E., F. F. Y H. DE M.).

℥ Miel buena. ℥xjv (448 gr.).
Vinagre fuerte. ℥vij (224 gr.).
Cardenillo en polvo. ℥v (160 gr.).

Se cuece á fuego lento hasta que adquiera la consistencia de unguento, y de suerte que tome un color de púrpura.

Mundifica las úlceras antiguas y fistulosas y destruye las fungosidades. Se emplea tambien contra las que tienen mal carácter y particularmente contra las cancerosas.

9229. U. DE ELÉBORO BLANCO (F. DE L.).

℥ Eléboro blanco en polvo. ℥ij (64 gr.).
Manteca. ℔β (250 gr.).
Aceite de limon. 20 gotas.

M. I. Sarna y otras enfermedades de la piel.

9230. U. DE ELEMÍ (F. DE L.).

℥ Elemí. ℥xij (375 gr.).
Trement. comun. ℥x (320 gr.).
Sebo. ℔bjβ (750 gr.).
Aceite comun. ℥ij flúidas (64 gr.).

Se funde el elemí con el sebo; se añade la trementina y el aceite, se mezcla todo y se exprime por un pedazo de tela.

I. Estimulante digestivo. *D.* Se aplica sobre las úlceras cuando por su estado no se puede aplicar los espadrapos adhesivos.

9231. U. HEMORROIDAL.

℥ Azafran en polvo. ℥j (12 dec.).
Alcanfor. ℥ij (24 dec.).
Aceite de beleño. ℥ij (8 gr.).
Cerato de Goulard. ℥vj (24 gr.).

M. I. y *D.* Se usa en unturas sobre los tumores hemorroidales dolorosos.

9232. Otro (F. M.).

℥ Ungüento populeon,
Ungüento de litargirio
nutrido, ña. ℥iij (90 gr.).
Yemas de huevo. núm. 3.
Azafran en polvo. ℥jβ (6 gr.).
Opio. ℥β (2 gr.).

Se mezclan y se agitan en un mortero de piedra y se hace unguento S. A.

I. Almorranas dolorosas é inflamadas.

9233. U. DE ÉNULA CAMPANA.

℥ Raiz de énula. 200
Manteca. 400
Aceite comun. 400

Se reduce á pulpa, se cuele con expresion y se añade:

Cera amarilla. 30
Trementina. 30

I. Sarna. *D.* Dos fricciones al dia, y se lava á la media hora con agua de jabon.

9234. U. DE ÉNULA CAMPANA
(Bruckmann).

℥ Raíz de énula campana
cortada en pedazos. ℥jβ (45 gr.).
Se cuece hasta que se ablande
en
Agua comun. ℥iij (90 gr.).
H. S. A. una masa pulposa, que
se pasa por un tamiz y se añade:
Manteca. ℥j (30 gr.).
I. Sarna. D. Se frotan con esta
pomada dos veces al dia las par-
tes afectadas, y despues de una
hora se lavará con agua de jabon.

9235. U. EPILATORIO
(Swediaur).

℥ Trementina de Venecia. ℥x (40 gr.).
Pez resina. ℥j (32 gr.).
Se liquidan, despues se mez-
clan exactamente y se conservan
en agua fria. Se toma un poco en-
tre los dedos mojados, se cogen
los pelos y se arrancan tirando
con prontitud.

9236. U. EPISPÁSTICO.

℥ Ungüento basalicón. . ℥jv (125 gr.).
Semillas de mostaza. . ℥β (45 gr.).
Estafisagria,
Pimienta larga,
Pelitre, ãã. ℥j (4 gr.).
Euforbio. ℥j (12 dec.).
Trementina. c. s.
H. S. A. I. y D. Las mismas que
el siguiente.
Nota. Este unguento no tiene
accion sobre la vejiga.

9237. Otro (CADET).

℥ Ungüento basalicón;
Ungüento popul., ãã. ℥j (30 gr.).
Cantáridas en polvo. . ℥xviiij (4 gr.).
H. S. A. I. Se emplea para man-
tener la supuracion de los vejiga-
torios. D. C. s. para cubrir ligera-
mente un pedazo de papel fino ó
una hoja de acelga.

9238. U. EPISPÁSTICO ó Ungüento
de cantáridas (F. E.).

℥ Ungüento de colofonia
amarillo. ℥iij (90 gr.).
Cera amarilla. ℥β (45 gr.).
Se derriten á fuego lento y se
añade:
Cantáridas en polvo. . ℥jβ (45 gr.).
Se mezcla á fuego lento y se agi-
ta continuamente con una espátula
hasta que se enfrie.
I. y D. Las mismas que los an-
teriores.

La POMADA DE CANTÁRIDAS DE LA F. P.
se compone de veinte partes de cera
amarilla, seis de colofonia, seis de tre-
mentina y veinte de polvos de cantári-
das.

9239. U. DE ESPERMA DE BALLENA
(F. DE L.).

℥ Esperma de ballena. . ℥vj (24 gr.).
Cera blanca. ℥ij (8 gr.).
Aceite comun. ℥iij (96 gr.).
Se funden juntos á fuego lento
hasta que se enfrien.
I. Escoriaciones de la piel.

9240. U. DE ESTORAQUE
(H. DE M.).

℥ Aceite comun. ℥bjβ (750 gr.).
Pez griega. ℥xx (625 gr.).
Resina de limon,
Cera amarilla, ãã. . ℥xv (480 gr.).
Se licúa todo á fuego lento, y
cuando esté casi frio se mezcla
poco á poco
Estoraque líquido. . ℥xx (625 gr.).
Se cuele.
I. Ulceras gangrenosas, úlce-
ras indolentes, úlceras escorbúti-
cas.

I. Este unguento se usa comun-
mente para curar las heridas y úl-
ceras de mal carácter; se le asocia
frecuentemente al cerato de Gale-
no y al láudano.

9241. Otro (F. F.).

℥ Aceite de nueces. . . ℥xij (375 gr.).

Estoraque líquido. . . ℥ss (250 gr.).
 Colofonia. ℥ij (500 gr.).
 Resina elemí. ℥ss (250 gr.).
 Cera amarilla. ℥ss (250 gr.).

Se derrite la colofonia, la cera y la resina elemí á un calor muy suave, se aparta el perol del fuego, se añade el estoraque, y cuando esté licuado se echa el aceite de nueces, se cuele por un lienzo y se agita el unguento hasta que se enfríe.

I. Ulceras, heridas, lupus, uvoloptosis.

9242. U. DE FALCK.

℥ Limaduras de estaño fino,
 Mercurio vivo, añ. ℥ij (8 gr.).
 Se hace una amalgama y se añade:

Ungüento rosado. ℥j (30 gr.).
 Mercurio precip. rojo. . . ℥ij (8 gr.).
 Aceite destil. de yerbab.
 de sabor de pimienta. 20 gotas.

H. S. A. I. Tumores hemorroidales. D. C. s. para untar ligeramente, tres ó cuatro veces al dia, las partes enfermas.

9243. U. FUNDENTE OPIADO.

℥ Aceite de linaza. . . ℥ij (1000 gr.).
 Minio,
 Albayalde,
 Cera amarilla, añ. . . ℥ss (250 gr.).
 Trementina. ℥iij (90 gr.).
 Opio en polvo. ℥j (30 gr.).
 Hágase unguento S. A.

I. Tumores escirrosos cuando están en su principio y aun sensibles. D. Se extiende este unguento sobre una piel bastante ancha para cubrir todo el tumor. Se renueva cada ocho dias.

9244. U. DEL HIJO DE ZACARÍAS
ó Ungüento de medula mucilaginoso (F. E.).

℥ Cera blanca,
 Tuétano de caña de vaca,
 Manteca de cerdo, añ. ℥vj (180 gr.).

Aceite reciente de semente de linaza. . . ℥v (150 gr.).
 Se licúan á fuego suave y á medio enfriar se añade:

Mucílago muy espeso desimiente de linaza. ℥vj (180 gr.).

Se agita hasta mezclar el mucílago exactamente y que el unguento se enfríe, siguiendo agítándolo por algunos dias para que no se enmohezca su superficie.

I. Es emoliente y expectorante.

9245. U. DE IMPERATORIA
(Milius).

℥ Manteca. ℥ij (60 gr.).
 Raíz de imperatoria en polvo. ℥jss (45 gr.).
 Tintura de imperatoria. ℥ij (60 gr.).

M. I. Ulceras cancerosas de la cara. D. Se aplica dos veces al dia.

9246. U. DE IODO COMPUESTO
(F. DE L.).

℥ Iodo. ℥ss (2 gr.).
 Ioduro de potasio. ℥j (4 gr.).
 Espír. de vino rectific. ℥j (4 gr.).
 Manteca. ℥ij (64 gr.).
 H. S. A. I. Bócio, escrófulas.

9247. U. DE BAYAS DE LAUREL *ó*
Ungüento nervino (F. P.).

℥ Sebo. 16
 Aceite de bayas de laurel real. . . 24
 Aceite de trementina. 4
 H. S. A. I. Estimulante en los tumores frios, reumatismo, sarna.

9248. U. DE LINARIA (F. M.).

℥ Linaria en flor,
 Manteca, añ. ℥xij (375 gr.).
 Se machaca, se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuele y se guarda.
 I. Hemorroides.

9249. U. DE LA MADRE TECLA Ó
Ungüento negruzco de óxido de
plomo (F. E.).

℥ Manteca de puerco fresca,
Manteca de vacas,
Cera amarilla,
Sebo de macho cabrío,
Litargirio, ãã. ℥ss (250 gr.).
Aceite comun. ℥j (500 gr.).

Se cuece, no dejando de menear hasta que se ponga casi negro.

I. Se emplea para acelerar la supuracion de los bubones, de los tumores indolentes, escrofulosos, de los abscesos y de las úlceras. *D.* Se usa del mismo modo que los anteriores.

9250. U. DE LA MADRE TECLA,
Ungüento fusco ó emplasto pardo
(F. F.).

℥ Aceite de olivas. . . ℥ij (1000 gr.).
Manteca de cerdo,
Manteca de vacas,
Sebo de carnero,
Cera amarilla,
Litargirio en polvo
muy fino, ãã. . . ℥j (500 gr.).
Pez negra purificada. ℥jv (125 gr.).

Se ponen todas las grasas en un perol de cobre bastante capaz, y se calientan hasta que empiecen á despedir humo; entonces se añade por partes el litargirio pulverizado y se agita sin cesar con una espátula de madera, manteniéndolo al fuego hasta que la materia adquiere color pardo oscuro: se añade la pez negra colada por un lienzo, y cuando el emplasto esté á medio enfriar se echa en moldes de papel ó en una vasija de barro.

I. Se emplea principalmente como madurativo para acelerar la formacion del pus en los tumores y abscesos indolentes ó escrofulosos, ó para la cura de los vejigatorios.

9251. U. MADURATIVO
(Canquoin).

℥ Infusion acética de torbisco,
Melote,
Aceite comun, ãã. . . ℥xij (48 gr.).
Bilis de buey. ℥ij (8 gr.).
Se mezclan, se evapora hasta la consistencia de miel espesa y se añade:

Ungüento basalicón,
Ungüento de la madre Tecla, ãã. . . ℥xij (48 gr.).
Subnitrate de mercurio porfirizado. ℥j (4 gr.).

Se aplica este unguento sobre los tumores escirrosos indolentes de color rojo violado.

9252. U. MAGISTRAL, DE ÓXIDO
DE PLOMO ROJO Ó DE MINIO (F. E.).

℥ Aceite de rosas. . . ℥xviii (560 gr.).
Cera blanca. ℥jv (120 gr.).
Minio. ℥v (150 gr.).
Albayalde,
Litargirio, ãã. . . ℥jß (45 gr.).

Se hierve un poco agitando continuamente, y despues se añade la cera; en seguida se aparta del fuego, se agita y guarda.

I. Es demulcente, secante y refrigerante.

El UNGUENTO DE MINIO DE LOS H. M. tiene la misma composicion.

9253. U. DE IODURO DE PLOMO
(F. DE L.).

℥ Ioduro de plomo. . . ℥j (32 gr.).
Manteca. ℥ss (250 gr.).

M. D. En fricciones y aplicaciones por medio de hilas. En algunos formularios se añade c. s. de esencia de rosas.

9254. U. MARCIAL Ó Mezcla
marcial.

℥ Solucion acuosa de nitrato de hierro con una vigésima parte de hierro. ℥ij (8 gr.).

Extracto de acibar en polvo. . . c. s.
para obtener una masa de consistencia de unguento.

I. Vegetaciones sifilíticas ó úlceras sifilíticas fagedénicas.

9255. U. MARCIATON (F. E.).

℞ Aceite de énula campana comp. . ℔iij (1500 gr.).
Cera amarilla. ℥xij (375 gr.).
Manteca de puerco. ℥jv (125 gr.).
Se licúan y cuando están á medio enfriar se añade:

Estoraque líquido. . . ℥xj (44 gr.).
Almáciga en polvo. ℥vj (24 gr.).

Se agita hasta que se enfríe y se guarda para usarle.

I. Afecciones nerviosas, temblor, convulsiones.

9256. U. MERCURIAL (Bêche).

℞ Sebo purificado. ℥jv (125 gr.).
Mercurio puro. ℔bj (500 gr.).
Manteca purificada. . . ℥xij (375 gr.).

Se mezcla exactamente el sebo con el mercurio y se añade la manteca. En invierno se añade al sebo un poco de aceite ó manteca. Por este procedimiento se prepara muy pronto el unguento mercurial.

9257. U. MERCURIAL BLANCO.

℞ Cerato ó pomada blanca. ℥j (30 gr.).
Protocloruro de merc. . . ℥j (4 gr.).

H. S. A. I. Se usa como cosmético y en las enfermedades cutáneas, epsóricas, herpéticas ó sifilíticas. D. De ℥β á ℥j (2 á 4 gr.) en fricciones.

9258. Otro (J. P. FRANK).

℞ Precipitado blanco. . . . ℥j (4 gr.).
Manteca. ℥j (32 gr.).

M. I. Herpes corrosivos y erupciones secas de la piel.

9259. U. MERCURIAL CON BREA (Guillot).

℞ Mercurio. ℥iij (96 gr.).
Brea. ℔bj (500 gr.).

Se extingue el mercurio en la preparacion mercurial.

I. Se usa como medio abortivo de la sífilis, y en los casos de vi-ruelas, como el emplasto de Vigo.

9260. U. MERCURIAL CENICIENTO (F. A.).

℞ Mercurio,
Sebo, añ. ℥j (30 gr.).

Se tritura hasta extinguir el metal, y se añade al fin ℥iij (90 gr.) de manteca de cerdo.

Se guarda.

9261. U. MERCURIAL COMPUESTO.

℞ Ungüento mercurial
doble. ℥x (40 gr.).
Cal apagada. ℥ijβ (10 gr.).
Sal amoniaco,
Azufre sublimado, añ. ℥β (16 gr.).
Mézclese.

Se usa en el tratamiento de la sífilis, porque mancha menos la ropa.

9262. U. MERCURIAL CONTRA EL HERPES MENTAGRA (Le Blas).

℞ Extracto de belladona. ḡxc (5 gr.).
Ungüento napolitano. . . ℥v (20 gr.)
para cinco dias.

D. Tres fricciones al dia.

Se emplea en union de las cataplasmas emolientes despues de las fricciones, é interiormente la resina de jalapa á la dosis de ḡxviiij (1 gr.) para diez pildoras, de que se darán cuatro al dia.

9263. U. MERCURIAL DOBLE (Lanneau).

℞ Mercurio vivo. ℥j (30 gr.).

Sulfuro negro de mercurio. $\text{ʒ}\frac{3}{5}$ (3 cent.).
Manteca fresca. ʒj (30 gr.).

Se trituran primero el mercurio y el sulfuro con la cuarta parte de manteca, y se añade el resto. Bastan cuatro ó cinco minutos para que desaparezca el mercurio, y con diez minutos mas ya no se notan glóbulos metálicos.

Este unguento se prepara con mucha prontitud.

9264. U. MERCURIAL DOBLE, *Pomada mercurial ó unguento napolitano* (F. F. Y F. P.).

ʒ Mercurio metálico,
Manteca, añ. lbj (500 gr.).

Se tritura el mercurio con la cuarta parte de la manteca en un mortero de mármol ó de hierro, hasta que frotando un poco de pomada entre dos pedazos de papel de estraza no se perciba ningún glóbulo metálico; entonces se añade por partes el resto de la manteca, y se mezcla exactamente.

Se ha usado como antiflogístico contra la peritonitis puerperal, la iritis, la hepatitis y el hidrocéfalo agudos, etc. Guersant ha obtenido excelentes resultados en esta última afección de las fricciones practicadas detrás de las orejas, que las ha llevado hasta la dosis de ʒj (4 gr.) sin producir salivación, la que parece debería haberse excitado infaliblemente si el estado flegmático no modificara la acción mercurial.

Se emplea como antisifilítico en fricciones en la parte interna de los muslos, variando de sitio diariamente, cuyo tratamiento se sigue por un mes ó seis semanas según el curso de la enfermedad. Si se quisiere tener oculto este tratamiento, se podría poner $\text{ʒ}\beta$ (2 gr.) de esta pomada en el sobaco, donde se absorbería rápidamente.

También se hacen con el unguento napolitano fricciones sobre el escroto y la ingle en los casos de orquitis ó de bubon.

9265. U. MERCURIAL SIMPLE ó *Ungüento gris, Pomada mercurial simple* (F. F.).

ʒ Pomada merc. doble. ʒjv (125 gr.).
Manteca de cerdo. . . $\text{ʒij}\beta$ (80 gr.).
Mézclese exactamente.

Esta pomada puede llenar las mismas indicaciones que la pomada mercurial, solo que no es tan enérgica.

Se emplea casi exclusivamente para destruir los piojos, ladillas, etc.

9266. U. DE MERCURIO ó *Ungüento de unciones* (F. E.).

ʒ Manteca de cerdo. . lbj (1000 gr.).
Mercurio. lbj (500 gr.).

Se tritura el mercurio en un mortero de mármol con mano de madera con el tercio de su peso de grasa. Cuando no se percibe con el anteojo ningún glóbulo de mercurio, después de haber frotado un poco de pomada entre dos pedazos de papel de estraza, se añade el resto de la grasa.

Nota. Cada dracma (4 gr.) contiene ʒj (12 dec.) de mercurio.

El *ungüento de mercurio duplicado* contiene partes iguales de mercurio y manteca.

I. Enfermedades venéreas, sarna, peritonitis puerperal; mata los piojos, chinches, ladillas, etc. D. De ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.) en fricciones en las enfermedades venéreas. De ʒj á ʒjv (30 á 125 gr.) en el vientre, en los casos de peritonitis puerperal.

La misma composición tiene el **UNGUENTO DE MERCURIO TERCiado DE LOS H. M.**

9267. U. MERCURIAL FUERTE
(F. A.).

℥ Mercurio. ℥j (30 gr.).
Manteca de cacao,
Manteca de cerdo, ãã. : ℥B (15 gr.).
H. S. A.

9268. U. MERCURIAL OPIADO.

℥ Ungüento mercurial
doble. ℥jv (120 gr.).
Opio en polvo. ℥ij (60 gr.).
I. Ulceras venéreas acompañadas de dolores violentos.

9269. U. MERCURIAL ROJO
(J. P. Frank).

℥ Manteca fresca. ℥jB (48 gr.).
Cera blanca. ℥ijB (40 gr.).
Oxido rojo de mercurio,
Alcanfor, ãã. ḡxc (5 gr.).
H. S. A. I. Paños de la cara en las mujeres que han parido, sífilides y herpes rebeldes.

9270. U. DE MERCURIO DULCE.

℥ Calomelanos. ḡLjv (3 gr.).
Ungüento basilicon. ℥j (30 gr.).
M. I. Sífilis, sífilides, calenturas, conjuntivitis, hipopion, encefalitis, hidroftalmia, ceática, hidrorraquis, ovaritis. D. En fricciones en las pústulas de la lepra.

9271. U. DE MOMPPELLER.

℥ Ungüento de altea,
Ungüento rosado,
Ungüento populeon,
Miel, ãã. ℥ij (60 gr.).
H. S. A. I. Hemorroides. D. C. s. para untar ligeramente, tres ó cuatro veces al día, las partes enfermas.

9272. U. NAPOLITANO.

℥ Pomada mercurial an-
tigua. ℥iij (90 gr.).

Se tritura en un mortero de mármol y se añade poco á poco:
Mercurio puro. ℥j (500 gr.)
y despues

Grasa reciente. ℥j (500 gr.).
I. Ulceras venéreas, parafimosis, sífilides.

9273. U. NEGRO (Fricke).

℥ Manteca. ℥j (30 gr.).
Flores de zinc,
Bálsamo del Perú, ãã. ℥j (4 gr.).
Nitrato de plata fund. ℥j (12 dec.).
I. Ulceras venéreas y para acelerar su cicatrizacion.

9274. U. NERVINO DE LOMBRICES
(F. E.).

℥ Ruda fresca,
Sumidades floridas de salvia,
Sumidades de mejorana,
Sumidades de romero,
Hojas de yerbabuena,
Sumidades de camepiteos,
Hojas de gordolobo,
Sumidades de espliego,
Sumidades de hipericon,
Flor de manzanilla,
Sumid. de meliloto, ãã. ℥ij (60 gr.).
Bayas de laurel,
Bayas de enebro, ãã. . ℥j (30 gr.).
Se dividen convenientemente todas las sustancias y se ponen á macerar por dos dias en ℥xxxvj (1125 gr.) de aceite de lombrices, despues se cuece hasta consumir toda la humedad, se cuele el aceite con expresion, se deja aposar, se decanta y se añade:

Cera amarilla. ℥jx (270 gr.).
Se licúa la cera en el aceite á fuego lento, y cuando esté medio frio se añade:
Aceite destilado de cera,
Aceite destilado de
trementina, ãã. . . ℥ij (60 gr.).
Ungüento de altea. . . ℥jv (125 gr.).
Se mezcla exactamente y se guarda.

I. Véase el siguiente.

9275. POMADA Ó BÁLSAMO NERVINO (F. F.).

- ℞ Tuétano de vaca purificada,
 Aceite sólido de nuez
 moscada, ãã. . . . ℥jv (125 gr.).
 Aceite volátil de rom. ℥ij (8 gr.).
 Aceite volátil de clavo,
 Alcanfor en polvo, ãã. ℥j (4 gr.).
 Bálsamo de Tolú. . . ℥ij (8 gr.).
 Alcohol de 34° Cart. . ℥jv (16 gr.).

Se ponen á derretir la medula de vaca y el aceite de nuez moscada en un frasco de boca ancha, se añaden los aceites volátiles, el alcanfor y el bálsamo de Tolú disuelto en el alcohol, y se calienta por algunos instantes sin dejar de menearlo, para que resulte una mezcla enteramente homogénea.

I. Parálisis, reumatismo crónico, neuritis, neuralgias. *D.* De ℥ij á ℥iij (8 á 12 gr.) para una fricción.

9276. U. NERVINO.

- ℞ Sebo de carnero. 100
 Se funde y se añade:
 Aceite de laurel. 150
 Aceite de trementina. 15
 Aceite de succino rectificado. 8
 Aceite de menta piperita. 2
 Aceite de romero. 2
 Amoniaco líquido. 10

M. I. Ceática, reumatismo, artritis, artrocace, neumatosis, cólicos espasmódicos y ventosos, gastralgia, peritonitis, hipocondría, histérico, raquitis, parálisis. *D.* En fricciones en las partes doloridas.

9277. U. DE NUEZ DE AGALLAS (F. P.).

- ℞ Agalla de Alepo en polvo. 1
 Ungüento rosado. 1
 Mézclese.

9278. U. DE NUEZ DE AGALLA Y MORFINA ó Ungüento sedante del Dr. Paris (F. P.).

- ℞ Morfina. 1
 Aceite purificado. 72
 Se tritura y se añade despues:
 Ungüento de zinc. 286
 Agalla en polvo. 30
I. Conviene en las hemorroides.

9279. U. DE NUEZ DE AGALLA COMPUESTO (F. DE L.).

- ℞ Nuez de agalla en polvo
 muy fino. ℥ij (8 gr.).
 Manteca. ℥ij (64 gr.).
 Opio duro en polvo. . . ℥ß (2 gr.).
M. I. Hemorroides.

9280. U. NUTRIDO ó Pomada nutrida (F. F.).

- ℞ Litargirio porfirizado. ℥iij (96 gr.).
 Aceite comun. ℥jx (282 gr.).
 Vinagre blanco. ℥jv (125 gr.).
 Se pone todo en un barreño vi-
 driado y se calienta á fuego len-
 to, agitándolo sin cesar hasta que
 la mezcla tome la consistencia de
 pomada blanda.

Esta pomada no debe prepararse sino en el momento de servirse de ella, porque á poco tiempo toma mucha consistencia.

9281. U. NUTRIDO, de óxido de plomo acetado ó de litargirio (F. E.).

- ℞ Litargirio en pol-
 vo. ℥xij (375 gr.).
 Aceite comun. ℥xxxvj (1125 gr.).
 Vinagre muy
 fuerte. ℔j (500 gr.).

Se cuece el óxido de plomo con ℥xij (375 gr.) de aceite, añadiendo c. s. de agua hasta que adquiera la consistencia de cerato; se añade á esto en un mortero unas veces el vinagre y otras el aceite, y se

agita continuamente hasta que se consuman estos liquidos y el unguento adquiera el color blanco y consistencia debidos.

I. Se usa como fundente, resolutivo y cicatrizante.

9282. U. OFTALMICO (F. M.).

- ℥ Manteca fresca. ℥ij (60 gr.).
- Albayalde. ℥B (15 gr.).
- Tucia,
- Alcanfor, ãã. ℥j (4 gr.).
- Zumo de limon. ℥B (15 gr.).
- H. S. A. I. Oftalmias, catarata.

9283. Otro (REIL).

- ℥ Aceite esenc. de laurel. ℥B (2 gr.).
- Aceite esenc. de macis. ℥j (12 dec.).
- Aceite esenc. de clavo. ℥B (6 dec.).
- Bálsamo del Perú. ℥j (4 gr.).
- M. I. Blefaroptosis, oftalmias.
- D. En fricciones en las sienes y en los párpados.

9284. Otro (SMELLOME).

- ℥ Alcanfor dividido por el alcohol,
- Oxido bl. de zinc, ãã. ℥vj (24 gr.).
- Oxido verde de cobre. ℥ij (8 gr.).
- Despues de haberlos triturado bien, se añade en un mortero caliente y se agita:
- Manteca de puerco,
- Clara de huevo, ãã. ℥ij (64 gr.).
- I. Oftalmia crónica. D. C. s. para cubrir ligeramente, mañana y noche, el borde libre de los párpados.

9285. U. DE OLIBARDA DE AREGON (F. E.).

- ℥ Aceite de olivarda compuesto recién preparado. ℥biiij (1500 gr.).
- Cera blanca. ℥xij (375 gr.).
- Manteca de cerdo. ℥jv (125 gr.).
- Se licúan á fuego lento, se separa del fuego y cuando esté á medio enfriar se añade:
- Polvo de raiz de pelitre,

- Polvo de raiz de gengibre,
- Polvo de pimienta negra,
- Polvo de euforbio,
- Polvo de incienso,
- Resina almáciga, ãã. ℥B (15 gr.).
- Se mezclan exactamente y se agita con una espátula hasta que se enfríe.

I. Convulsiones, hemiplegia, cólico nervioso, cólico nefrítico.

9286. U. DE ÓXIDO DE MERCURIO POR EL ÁCIDO NÍTRICO (F. DE L.).

- ℥ Oxido de mercurio por el ácido nítrico. ℥j (32 gr.).
- Cera blanca. ℥ij (64 gr.).
- Manteca. ℥vj (192 gr.).

Se funden la cera y el aceite, se añade el óxido reducido á polvo fino y se mezcla.

I. Estimulante y escarótico, que se usa contra las úlceras indolentes, conjuntivitis crónica y manchas de la córnea.

9287. U. OXIGENADO.

- ℥ Hidrocloro medicinal. ℥j (4 gr.).
- Manteca. ℥j (30 gr.).
- Se mezclan por trituracion.

I. Sarna. D. ℥ij (8 gr.) en fricciones cada noche, sobre las partes en que se presentan los granos.
V. *Pomada oxigenada.*

9288. U. DE PEZ NEGRA (F. DE L.).

- ℥ Pez negra,
- Cera,
- Colofonia, ãã. ℥jx (282 gr.).
- Aceite comun. ℥bj (500 gr.).

Se funden todos juntos, y se exprime á través de un pedazo de lienzo.

I. Estimulante deterativo, que se usa contra el pórriigo favoso y en otras afecciones.

9289. U. DE PIDERIT.

- ℥ Miel amarilla y granosa,

Pulpa de cebollas cocidas, ãã. ℥viij (224 gr.).
Cera amarilla,
Resina comun,
Jabon negro, ãã. . . ℥xj (44 gr.).

Se cuecen las cebollas debajo de la ceniza y se las reduce á pulpa; se funde la cera y la resina; se añaden la miel, las cebollas y el jabon; se mantienen al fuego hasta que se haya evaporado toda la humedad y se menea hasta que se enfrie.

I. Reumatismo. D. C. s. para fricciones; mañana y noche, en los puntos doloridos.

9290. U. DE PLOMO COMPUESTO
(F. DE L.).

℥ Creta preparada. . ℔β (250 gr.).
Vinagre destilado. ℥vj . (192 gr.).
Empl. de plomo. ℥xxxvj (1125 gr.).
Aceite comun. . . ℥xx (625 gr.).

Se funde el emplasto en el aceite á fuego lento, se añade poco á poco la mezcla de creta y vinagre, y despues que ha cesado la efervescencia se menea siempre hasta que se enfrie.

I. Ulceras indolentes.

9291. U. DE PLOMO NEGRO
(F. E.).

℥ Sulfuro de plomo,
Litargirio, ãã. . . ℥ij (60 gr.).
Carbonato de plomo,
Sulf. de ant., ãã. ℥j (30 gr.).
Aceite de rosas. . ℥xxxvj (1125 gr.).
Cera blanca. . . ℥jx (270 gr.).

Se licúa la cera en el aceite y se mezcla despues los demás medicamentos levigados; se cuece un poco la mezcla y despues de separada del fuego se agita hasta que se enfrie.

I. Se usa como demulcente y desecante.

9292. U. POPULEON ó yemas de álamo negro (F. E.).

℥ Yemas frescas de álamo negro machacadas. ℔iij (1500 gr.).

Manteca de puerco fresca. ℔viiij (4000 gr.).

Se mezclan y se ponen á macerar en una vasija de barro vidriada hasta que se puedan reunir recientes las yerbas siguientes:

Hojas de beleño. . ℔ββ (750 gr.).
Hojas de siempreviva mayor,
Hojas de violetas,
Hojas de ombligo
de Venus, ãã. . ℔j (500 gr.).
Hojas de yerbam. ℔ij (1000 gr.).

Se machacan estas sustancias, se las mezcla y se cuecen á fuego lento, agitando continuamente hasta que se consuma la humedad, se cuele y se exprime.

9293. U. POPULEON Ó POMADA
(F. F.).

℥ Yemas secas de álamo negro. ℥xij (375 gr.).
Hojas frescas de adormideras,
Hojas frescas de belladona,
Hojas frescas de beleño,
Hojas frescas de yer-
bamora, ãã. . . . ℔β (250 gr.).
Manteca de cerdo. . ℔jv (2000 gr.).

Se pistan las plantas frescas en un mortero de mármol, se ponen en un perol con la manteca, y se cuecen á fuego lento hasta que se consuma toda la humedad; entonces se añaden las yemas de álamo quebrantadas y se dejan en digestion durante veinticuatro horas; se cuele con expresion, se deja enfriar el producto y se separa el sedimento; se vuelve á derretir la pomada y se echa en seguida en vasijas de barro ó de vidrio.

I. Partes dolorosas inflamadas, sabañones, grietas, diviesos, flegmasias, absceso, pian, hemorroides, rigidez de las articulaciones.

9294. U. DE PROPOLEOS
(Cadet).

℥ Aceite comun. ℔ββ (750 gr.).

Propoleos purificados en agua hirviendo. ℥jv (125 gr.).

Se disuelven los propoleos en el aceite á fuego lento y se cuele el unguento en caliente.

I. Ulceras antiguas y hemorroides. *D. C. s.* para cubrir ligeramente las partes enfermas.

9295. U. DE QUINA BALSÁMICO
(*Naumann*).

℥ Extracto de quina,
Alcoholado de bálsamo
del Perú, ãã. ℥ij (8 gr.).
Cantáridas en polvo. ℥xij (6 dec.).
Pomada rosada. ℥ij (60 gr.).
M. I. Calvicie. *D.* Una ó dos fricciones al dia.

9296. U. DE REGALIZ.

℥ Pulpa de raiz fresca de regaliz. 480
Manteca. 480
Se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuele exprimiendo y se añade:
Ponfolix. 20
Albayaide. 90
Alcanfor. 2,5
I. Escoriaciones y grietas del pecho.

9297. U. RESOLUTIVO
(*Zelleberg*).

℥ Ungüento de Genoveva. ℥j (30 gr.).
Acido clorhídrico. ℥j (4 gr.).
M. I. Bubones sifilíticos. *D.* ℥ß á ℥j (2 á 4 gr.) al dia para una ó dos fricciones.

9298. U. RESOLUTIVO AMONIACAL
(*Hufeland*).

℥ Carbonato de amoniaco,
Petroleo, ãã. ℥j (4 gr.).
Jabon medicinal,
Hiel de buey, ãã. ℥jß (6 gr.).
Alcanfor. ℥ß (2 gr.).
Ungüento de pez. ℥ß (15 gr.).
I. Tiña, soriasis, atrofia me-

sentérica, cistitis, hepatitis crónica, infartos escrofulosos, mareo. *D.* En fricciones en la piel de la cabeza y en el bajo vientre.

9299. U. RESOLUTIVO MERCURIAL
(*H. DE M.*).

℥ Ungüento de mercurio. ℥j (30 gr.).
Jabon. ℥ij (60 gr.).
Alcohol de vino alcanf. ℥iij (90 gr.).
Mézclese *S. A.*
I. Infartos crónicos glandulares.

9300. U. DE RICOUR.

℥ Aceite rosado. ℥x (320 gr.).
Cera blanca. lbß (250 gr.).
Albayaide. ℥jv (125 gr.).
Litargirio ℥ij (64 gr.).
Se añade al fin de la decoccion:
Bálsamo líq. del Perú. ℥ß (16 gr.).
I. Ulceras indolentes. *D. C. s.* para untar las partes enfermas tres ó cuatro veces al dia.

9301. U. ROSADO (F. E.).

℥ Manteca de puerco
recien prepar. . lbxij (6000 gr.).
Pétalos de rosas amarillas recient. lbvj (3000 gr.).
Se macera por espacio de tres dias, se cuece despues hasta que se exhale la humedad y se cuele con expresion.

I. Es emoliente y se usa en las inflamaciones, escoriaciones, etc.

9302. U. ROSADO ó Pomada rosada (F. F.).

℥ Manteca de cerdo lavada muchas veces en agua de rosas. lbij (1000 gr.).
Pétalos de rosas de
Alejandria. lbjv (2000 gr.).
Raiz de ancusa. ℥j (32 gr.).
Se machacan la mitad de los pétalos, se mezclan con la manteca fria, se dejan en contacto durante dos dias, y pasado este tiempo

po se derrite á un calor suave y se cuela exprimiendo fuertemente. Cuando la pomada esté fria , se mezcla con el resto de los pétalos machacados como los primeros, y pasadas veinticuatro horas se derrite de nuevo y se cuela con expresion; se pone el producto en digestion con la raiz de ancusa hasta que tome color, se cuela, se deja enfriar lentamente, y se separa el sedimento que forma; se vuelve á licuar, y cuando esté medio fria se guarda.

Se prefiere á la manteca comun cuando se ha de aplicar en partes expuestas á la vista, principalmente en las mujeres.

9303. U. ROSADO.

- ℥ Manteca de cerdo. 12
- Agua de rosas. 4
- H. S. A. I. Escoriaciones de la piel, grietas.

9304. U. ROSADO COMPUESTO.

- ℥ Ungüento rosado. 24
- Protocloruro de merc. precipit. 3
- Accite de espliego. 4
- M. I. Ulceras venéreas ó herpéticas.

9305. U. DE RUDA ó Manteca de ruda (F. E.).

- ℥ Hojas frescas de ruda,
- Hojas frescas de ajénjos,
- Hojas frescas de yerba-buena, ãã. ℥ij (60 gr.).
- Manteca de cerdo. . . lbj (500 gr.).
- Se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuela con expresion, se deja enfriar y se separan las heces.
- I. Histeralgia.

9306. U. DE SABINA (F. P.).

- ℥ Hoj. fresc. de sabina sin peciolos. 2

- Manteca de cerdo. 4
- Cera amarilla. 4
- H. S. A. I. Es un epispástico y vexicante activo. Tambien se puede preparar con hojas secas.

9307. U. DE SATURNO.

- ℥ Extracto de Saturno. . ℥ß (2 gr.).
- Accite de linaza. . . . ℥jß (48 gr.).
- Accite de beleño. . . . ℥vj (24 gr.).
- Ungüento de altea. . . ℥j (32 gr.).
- I. Quemaduras, congelacion, sabañones, herpes vivos, úlceras y eczenra. D. En aplicacion.

9308. U. Ó POMADA DE SATURNO (H. DE M.).

- ℥ Cera blanca. ℥vj (180 gr.).
- Accite comun. ℥xviii (560 gr.).
- Alcanfor. ℥j (4 gr.).
- Extr. de Saturno. . . ℥iij (90 gr.).
- Se licúa la cera en lbj (500 gr.) de aceite, y en el resto se disuelve el alcanfor; se vierte la materia en un mortero, y se añade el extracto de Saturno; se agita fuertemente, y cuando está fria se añadé la solución oleosa del alcanfor y se mezcla exactamente.

I. Tópico refrigerante y astringente, útil en las escoriaciones.

9309. U. DE SATURNO ó Pomada de Saturno.

- ℥ Acet. de plomo liq. . lbß (250 gr.).
- Accite coman. ℥xij (375 gr.).
- Cera blanca. ℥ij (60 gr.).
- Se derrite la cera en el aceite, se echa en un mortero de piedra, y se agita con mano de madera hasta que se enfrie; entonces se añadé poco á poco el acetato de plomo, continuando la agitacion hasta mezclarle perfectamente, y se guarda para el uso.
- I. Escoriaciones y quemaduras.

9310. U. DE SAÚCO (F. E.).

- ℥ Corteza interior y fresca de la medulla de saúco. . . lbijß (1250 gr.).

Hojas frescas del mismo. lbß (250 gr.).

Se machacan y se maceran por espacio de ocho dias con lbjx (4500 gr.) de manteca de cerdo en una vasija de barro vidriada; se cuece hasta que se consuma casi toda la humedad; entonces se cuele con fuerte expresion, se quitan las hecés y se conserva.

9311. U. DE SAÚCO (F. DE L.).

℥ Saúco,
Manteca, ãã. lbj (500 gr.).

Se cuecen las flores de saúco en la manteca hasta que estén quebradizas, y se exprime por un pedazo de tela.

I. Emoliente que se usa contra las úlceras benignas.

9312. U. SIMPLE (F. A.).

℥ Manteca de cerdo. . lbj (500 gr.)
Cera blanca. lbij (4500 gr.).

Se liquidan y se dejan enfriar agitando continuamente.

9313. U. SULFURADO Ó CONTRA LA SARNA (F. A.).

℥ Azufre depurado,
Sulfato de zinc, ãã. ℥ß (45 gr.).
Ungüento simple. ℥xij (375 gr.).
Mézclese.

9314. U. SULFÚRICO, JABON ÁCIDO ó Jabon de ácido sulfúrico (Achar).

℥ Aceite comun. ℥ij (8 gr.).

Se añade poco á poco triturando:

Acido sulfúrico. ḡxc (5 gr.).

A las veinticuatro horas se lava con agua tibia hasta que esta ya no enrojezca la tintura de girasol. Tambien se le ha llamado *Jabon ácido de Carminatti*. V. n. 2853.

I. Hidropesía, ictericia. D. ḡxx á ḡxxx (10 á 15 dec.).

9315. U. DE SULFURO DE MERCURIO ó Ungüento cinabarino (F. E.).

℥ Oxido de plomo semivitrificado. ℥jv (125 gr.).

Mercurio dulce. ℥ij (8 gr.).

Carbonato de plomo. ℥jß (45 gr.).

Sulfuro de mercurio sublimado. ℥ij (60 gr.).

Aceite de rosas. lbjß (750 gr.).

Cera amarilla. ℥vj (480 gr.).

Se licúa la cera con el aceite; en seguida se le aparta del fuego y se mezclan los sólidos levigados agitando la mezcla hasta que se enfríe.

I. Úlceras, úlceras venéreas.

9316. U. DE TABACO.

℥ Cera amarilla,
Pez resina, ãã. ℥jß (45 gr.).

Aceite de mirra. ℥jv (125 gr.).

Se funde y se añade:

Zumo de tabaco. ℥iij (90 gr.).

I. Sarna, herpes, escrófulas, reumatismo, gota, ceática, nefritis. D. En fricciones.

9317. U. DE TÁRTARO EMÉTICO ó Ungüento antimonial (F. DE L.).

℥ Tártaro emético en polvo. ℥j (32 gr.).

Manteca. ℥jv (125 gr.).

M. I. Inflamaciones internas y reumatismo de las articulaciones. V. núm. 7896 y 7897.

9318. U. DE TOMATE.

℥ Tomates machacados. 4

Manteca fresca. 4

Se ponen á hervir al fuego hasta que se consuma la humedad, se cuele con expresion y se añade al producto colado igual cantidad de tomates que la primera vez; se vuelve á cocer, se cuele y se guarda despues de frio.

I. Se usa como calmante en las almorranas.

9319. U. TREMENTINADO (F. A.).

℥ Ungüento simple. ℥jx (282 gr.).
Trementina. ℔j℔ (750 gr.).
Se liquidan á fuego lento y se continúa agitando hasta que se enfrie.

9320. U. DE TUCIA ó Pomada de tucia (F. F. Y F. P.).

℥ Oxido de zinc impuro, sublim. y porfirizado. ℥ij (8 gr.).
Manteca lavada con agua de rosas, Ungüento rosado, ãã. ℥℔ (16 gr.).
Se mezclan exactamente.

I. Oftalmias crónicas. *D.* El grueso de la cabeza de un alfiler en fricciones en el borde libre de los párpados en los casos de oftalmias crónicas y herpes.

9321. U. DE TUÉTANO DE VACA (F. E.).

℥ Mant. de vacas fresca. ℔j (500 gr.).
Tuétano de vaca. ℔℔ (250 gr.).
Se mezclan en un mortero de piedra, se lava muchas veces con agua, y se guarda el ungüento cubierto de agua de rosas.

I. Se usa como emoliente y refrigerante. *D.* C. s. en fricciones en la columna vertebral.

9322. U. DE VALDAJOU.

℥ Cera amarilla. ℥vj (24 gr.).
Manteca fresca. ℥v (160 gr.).
Se funde y se añade:
Aceite verde de ajenjos,
Aceite de tanaceto, ãã. ℥j℔ (48 gr.).
Se cuece y se añade:
Tintura trementinada de asa fétida. ℥j (32 gr.).

M. I. Afecciones verminosas, neumatosis, atrofia mesentérica.
D. En fricciones en el epigastrio.

9323. U. VERDE ó Ungüento de cobre.

℥ Verdete. 1
Ungüento amarillo. 15
Mézclese.

9324. U. VERMÍFUGO.

℥ Raiz de helecho,
Raiz de brionía,
Ajo, ãã. ℥j℔ (48 gr.).
Abrótano,
Ajenjos,
Tanaceto, ãã. ℥ij℔ (10 gr.).
Aceite. ℔j (500 gr.).

Se cuece hasta que se consuma la humedad y se añade:

Cera amarilla. ℥j℔ (48 gr.).
Acíbar. ℥j (32 gr.).
Coloquintida. ℥℔ (16 gr.).
H. S. A.

I. Cólico verminoso. *D.* ℥v á ℥j (20 á 30 gr.) en fricciones tres veces al día al rededor del ombligo.

9325. Otro (H. DE AL.).

℥ Acíbar. hepático en polvo. ℥j (30 gr.).
Hiel de buey espesa. ℥ij (8 gr.).
Ungüento de altea. ℥j (30 gr.).
M. D. Se usa en fricciones al rededor del ombligo en los casos de cólico verminoso.

9326. Otro (F. BELGA).

℥ Acíbar. 62
Hiel de vaca. 93
Petroleo. 93
Manteca de puerco. 750

Se funde la grasa á fuego suave, se añade la bilis y el acíbar en polvo meneando siempre, se aparta del fuego, y cuando la masa esté casi fria se añade el petroleo.

I. Cólico verminoso. *D.* Una cucharada en fricciones, tres veces al día, al rededor del ombligo.

9327. U. DE ZINC CON MIRRA
(*Knachstedt*).

℞ Oxido de zinc porfirizado,
Calamina porfirizada,
Licopodio, ãã. ʒij (8 gr.).
Acetato de plomo cristalizado,
Mirra pulverizada, ãã. ʒß (2 gr.).
Manteca lavada con agua de rosas. ʒjß (45 gr.).
M. I. Supuracion demasiado abundante de las quemaduras de segundo, tercero y cuarto grado.
D. Dos ó tres aplicaciones al dia.

9328. U. DE ZINC ó Ungüento de óxido de zinc (F. DE L.).

℞ Oxido de zinc. ʒj (32 gr.).

Grasa preparada. . . . ʒvj (192 gr.).
M. I. Oftalmia, sarna, escoriaciones simples. *D.* ʒij á ʒv (8 á 20 gr.).

9329. UNTURAS CONTRA LA FOTOFobia EN LAS OFTALMIAS AGUDAS
(*Desmarrés*).

℞ Miel blanca. ʒij (8 gr.).
Extracto de belladona,
Mercurio, ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A.

Esta mezcla se quita con mucha facilidad y no ocasiona ninguna irritacion en los tegumentos.

D. Cinco ó seis fricciones al dia en la frente y sienes con el volúmen de una avellana, teniendo cuidado de limpiarla á la media hora.

VAHOS.

9330. VAHOS Ó VAPORES EMOLIENTES (F. de Plenck).

℞ Yerbas emolientes. . . un puñado.
Leche. lbj (500 gr.).
Se hierve.
I. Romadizo, angina, inflamacion de la vagina y de la matriz.

9331. V. RESOLUTIVOS Ó VAPOR RESOLUTIVO (F. de Plenck).

℞ Hojas de ajenjos,

Hojas de romero,
Cogollos de ruda, ãã. medio puñado.
Flores de espliego. . ʒß (15 gr.).
Bayas de laurel,
Sem. de cominos, ãã. ʒiij (90 gr.).
Se reduce á pedacitos, se guardan en un taleguito, y se cuecen en c. s. de vino blanco.

I. Amaurosis, torpeza de oido, anquilosis incompleta.

Se aplica su vapor á la parte afectada por medio de un embudo durante un cuarto de hora.

VEJIGATORIOS.

9332. VEJIGATORIO ALCÁNFORADO OFICIAL (*Mialhe*).

℞ Cantáridas. 400
Manteca. 25
Sebo de vaca. 25

Pez blanca. 50
Cera blanca. 100
Eter sulfúrico. 100

Se pulverizan las cantáridas sin secarlas antes, se cuela por un tamiz de seda, y se suspende la pulverizacion apenas se obtengan

cien partes de polvo fino, que se coloca en un frasco de boca ancha con la cantidad de éter indicada antes; se pone el resto de las cantáridas en un perol estañado con la manteca y el sebo y c. s. de agua para bañarlo todo bien; se calienta hasta una ebullicion moderada durante una hora agitando continuamente la masa; se deja enfriar en el mismo perol, y se separa despues la mezcla de grasa con las cantáridas que se cuajan en la superficie, y el residuo queda en el fondo, que se apoya y se aparta.

Se funde despues sin agua esta mezcla grasa; se la cuele por un lienzo en un baño maria de estaño; se añade la pez blanca, la cera y el alcanfor; se calienta hasta que se funda completamente: entonces se añade el polvo de cantáridas etéreo, y se calienta hasta que se evapore todo el éter, es decir, una hora. Se le echa en un mortero de mármol, y se agita hasta que se enfrie enteramente.

Conviene extender este emplasto en capas delgadas sobre espadrapo, porque es blando, y no sobre baldés. Produce su efecto en una, dos ó dos y media á tres horas cuando mas, segun la susceptibilidad del enfermo y de la parte á que se aplica, temperatura, etc.

Siempre que se tema la accion de las cantáridas en la vejiga, se le deberá cubrir de un papel dado de aceite, no tener aplicado el emplasto mas que dos ó tres horas, y reemplazarle con un pedazo de espadrapo, porque la cantidad de cantaridina absorbida es insuficiente para obrar sobre la vejiga y suficiente para producir la vexicacion.

9333. V. AMONIACAL.

Se prepara con agua de cal y

aceite un jabon calcáreo, que tenga la consistencia de crema. Se le añade un exceso de amoníaco líquido.

D. Se empapa un lienzo en esta mezcla y se le aplica sobre la piel en el sitio en que se quiere hacer levantar una vejiga. Es bueno irritar antes la piel, frotándola con un pedazo de franela. Conviene cortar en redondo el lienzo que debe empaparse en la mezcla.

Ha producido aún mejores efectos que la pomada de Gondret. V. núm. 7922.

9334. V. DE BOUVOISIN.

Se toma un pedazo de tafetan de Inglaterra del grandor que se quiera dar al vejigatorio; se le moja por el lado que está engomado con ácido acético muy concentrado (*vinagre radical*), y se le aplica sobre la piel.

9335. V. DE BRETONNEAU.

℞ Polvo de cantáridas. ʒjv (125 gr.).
 Aceite comun. c. s.
 para obtener una pasta blanda, que se conserva en una vasija y se aplica sobre espadrapo con una espátula, por medio de una hoja de papel, en que se hace una abertura del grandor y forma que se quiere dar al vejigatorio. Se quita la hoja de papel y se vuelve á cubrir la mezcla de cantáridas con una hoja de papel de estraza que la sobrepase un poco. Se aplica inmediatamente el vejigatorio haciendo adherir los bordes libres por medio de diaquilon.

Esta preparacion es muy sencilla y produce buenos efectos.

9336. V. ECONÓMICO.

Se espolvorea con cantáridas una masa de levadura humedecida con vinagre.

9337. V. EXTEMPORÁNEO AMONIACAL (Dr. Darck).

Se echan en un cristal de reloj plano ocho á diez gotas de amoniaco muy concentrado; se cubre el liquido con un pedazo de lienzo de diámetro un poco menor que el cristal, y se aplica el aparato á la piel. Se ha obtenido el resultado que se desea cuando se observa una zona de color de rosa al rededor del vidrio. Entonces se lava la herida y se quita la epidermis. Bastan treinta segundos para producir la vexicacion. Se cura la herida segun disponga el profesor.

9338. V. DE GONDRET.

℞ Amoniaco liquido. 4
Manteca. 4
M. S. A. D. Se extiende sobre un lienzo y se le aplica sobre la piel; este vejigatorio obra con gran prontitud, produce la rubefaccion en pocos minutos, y corroe la piel cuando se le deja aplicado aunque no sea mas que una hora.

V. *Pomada amoniacal.*

9339. V. DE LECOMTE.

℞ Cera amarilla. ℞x (320 gr.).
Se funde y se añade:
Trementina,
Cantáridas pasadas por un tamiz muy fino, añ. ℞vj (192 gr.).
Euforb. en polvo fino. ℞vj (24 gr.).
Se mezcla y se aromatiza despues con una mezcla de aceite volátil de espliego y de bergamota.

9340. V. DE LOUYER-VILLERMAY.

℞ Ungüento basalicon. . ℞ij (60 gr.).

Cantáridas en polvo im-
palpable. ℞ij (60 gr.).
Cera amarilla. ℞jβ (45 gr.).
Pez de Borgoña. ℞j (30 gr.).
Trementina. ℞β (15 gr.).
Resina. ℞iij (12 gr.).

Se mezcla S. A. y se aromatiza despues con c. s. de agua de espliego.

9341. V. MAGISTRAL.

℞ Polvo de cantáridas;
Harina de trigo, añ. . . ℞β (15 gr.).
Vinagre. c. s.

M. Se hace una masa blanda que se aplica sobre la piel y obra con prontitud.

9342. V. DE MONEDA.

Se necesitan algunas gotas de amoniaco, una moneda y dos compresas redondas sobrepuestas de lienzo usado.

Se coloca la moneda en un plato, encima los dos discos de lienzo que sea un poco mayor que su diámetro, se echa el amoniaco en el lienzo para que se empape y se le aplica por su superficie en el punto de la piel que se quiera desnudar, comprimiendo ligeramente la moneda con los dedos. A los diez minutos la circunferencia de la piel indica que ha terminado la operacion, y se quita el aparato. Se quita la epidermis con el indice rodeado de un lienzo.

9343. V. PERPETUO (Janin).

℞ Cantáridas. ℞ij (60 gr.).
Euforbio. ℞j (30 gr.).
Se reduce á polvo y se incorpora en caliente con

Trementina. ℞xij (375 gr.).
Se añade:

Almáciga. ℞xij (375 gr.).

Se menea hasta que se enfrie enteramente.

9344. V. PERPETUO (Janin).

℥ Almaciga,
Trementina, añ. ℥iij (90 gr.).
Cera. ℥j (30 gr.).
Se funde y se añade:
Cantáridas en polvo fino. ℥x (38 gr.).
Euforbio. ℥ß (15 gr.).
Mézclese exactamente.
Esta fórmula es mas activa que la anterior, y se la debe preferir.

9345. V. DE WAUTERS.

℥ Jabon blanco raspado. ℥vj (192 gr.).
Incienso pulverizado. . ℥v (20 gr.).
Semillas de pimienta negra,
Hidroclorato de sosa
en polvo, añ. ℥iij (12 gr.).
Se hace digerir esta mezcla en ℥vij (224 gr.) de alcohol hasta que se haya fundido el jabon. Se cuece durante algunos minutos y se menea con una espátula.

I. y D. Se extiende este unguento sobre un lienzo y se renueva la cura todos los dias. Este remedio es un rubefaciente que obra en dos ó tres dias. Es útil en los reumatismos. Hay personas en que obra con mucha energía, y otras en que sus efectos son mas lentos.

9346. MOSCAS DE MILAN (Louradour).

℥ Resina elemí,
Estoraque líq., añ. ℥jv (120 gr.).
Cera amarilla. ℥v (150 gr.).
Alcanfor. ℥j (30 gr.).
Cantár. en polvo fino. ℥xjß (345 gr.).
Se funden juntas la resina y la cera, se añade el estoraque, despues las cantáridas, y se mantiene todo á fuego lento durante media hora; al cabo de este tiempo se aparta del fuego y se agita la masa hasta que esté casi fria, en cuya época se añade el alcanfor.
Este emplasto produce pronto

la vexicacion. Se extiende en tafetan negro.

9347. Otras (MENIER).

℥ Pez de Borgoña.	1500
Resina elemi.	300
Galipodio.	400
Estoraque liquido.	700
Cera amarilla.	700
Cantáridas en polvo.	1400
Alcanfor en polvo.	160
Esencia de espliego.	6
H. S. A. una masa emplástica.	

9348. Otras (MOUCHON).

℥ Pez resina,
Cera amarilla,
Manteca de cerdo,
Cantár. en polvo, añ. lbß (250 gr.).
Trementina. ℥ij (64 gr.).
Esencia de espliego,
Esencia de tom., añ. ℥j (4 gr.).
Se liquida la resina, la cera y la manteca, y se añade las cantáridas; se digiere durante dos horas y entonces se añade la trementina y se agita hasta que se enfrie añadiendo al fin las esencias.

Se usa como derivativo en las fluxiones, dolores de cabeza, enfermedades de ojos, reumatismos, neuralgias. Es buena preparacion.

9349. Otras (PESSINA DE MILAN).

℥ Colofonia escogida.	135
Trementina clara.	135
Se funde y se añade:	
Cantáridas en polvo fino.	90
Euforbio en polvo fino.	15
Se mezclan cuidadosamente á la masa líquida y se añade:	
Estoraque liquido.	15
Se extiende esta masa emplástica aún caliente sobre tafetan negro, hasta el grosor de una pseta.	

En verano se debe aumentar un poco la dosis de colofonia y disminuir la de trementina.

I. Se usan como derivados contra las fluxiones, dolores de cabeza, enfermedades de ojos, reumatismos, etc. Se coloca en el

punto designado una ó dos moscas que se cubren con una compresa. Se quitan las moscas cuando no producen una secrecion de serosidad ó se desprenden por si mismas; se las renueva cuando es necesario.

VINAGRES.

9350. VINAGRE ALCANFORADO.

℥ Vinagre. ℥j (500 gr.).
Alcanfor. ℥j (30 gr.).
Agua. ℥viiij (4000 gr.).

I. Afecciones nerviosas, neuralgias, síncope. D. En lociones y fomentos.

9351. Otro (F. P.) (J. P. FRANK).

℥ Alcanfor. ℥j (4 gr.).

Se trituran con veinte gotas de alcohol en un almirez de piedra, y se añade:

Azúcar fino. ℥ij (64 gr.).

Se tritura todo competentemente y se añade:

Vinagre bueno. ℥x (320 gr.).

Se usa al exterior como analéptico.

9352. Otro (F. F.).

℥ Alcanfor. ℥j (32 gr.).

Vinagre fuerte. . . ℥ij℥ (1250 gr.).

Se pulveriza el alcanfor con c. s. de ácido acético concentrado en un almirez de vidrio, se añade poco á poco el vinagre, y se echa todo en un frasco tapado, se filtra pasados algunos dias y se guarda para el uso.

I. Estimulante, excitante, útil en los desmayos, tumores atónicos, edemas linfáticos, contusiones. Se puede usar como preservativo de las afecciones contagiosas frotándose con él la cara y las

manos, y regando las habitaciones.

Se le usa como resolutivo y antiséptico en fricciones, lociones y fomentos en todos los casos en que conviene el alcohol y aguardiente alcanforados.

9353. Otro (RASPAIL).

℥ Vinagre rectificado. ℥ij (1000 gr.).
Alcanfor. ℥j (30 gr.).
Mézclese.

9354. Otro (SPIELMANN).

℥ Alcanfor. ℥j (4 gr.).

Se le pulveriza en un mortero, añadiéndole:

Alcohol. 20 gotas.

Se trituran con el alcanfor ℥ij (60 gr.) de azúcar, se vierten encima ℥x (300 gr.) de vinagre bueno, se agita hasta que el liquido esté todo lo saturado que sea posible, se filtra y se conserva en un frasco con tapon esmerilado.

I. Fiebres atáxicas y adinámicas, exantemas. D. De ℥ij á ℥jv (8 á 16 gr.) en un vehículo apropiado.

Nota. Se aplica tambien sobre las partes gangrenadas.

9355. V. DE AJO.

℥ Ajo cort. en pedazos. ℥j℥ (45 gr.).

Vinagre bueno. . . . ℥j (500 gr.).

Se macera durante quince dias

meneando con frecuencia y se añade:

- Alcohol. ℥j (30 gr.).
Se decanta.

I. Tifo, hidropesías pasivas, síncope y asfixias, y en lociones en la gangrena de hospital, asfixia y síncope. *D.* Una cucharada en una pocion apropiada ó en lociones.

9356. V. ANTIESCORBÚTICO.

℥ Rábano. ℥j (32 gr.).
Coclearia,
Berro,
Mostaza, añ. ℥β (16 gr.).
Sal amoníaco. ℥ij (8 gr.).
Vinagre. ℔jβ (750 gr.).
Espíritu de coclearia. ℥β (16 gr.).
Se filtra á los dos dias.

9357. V. AROMÁTICO.

℥ Especies aromátic. ℥iij (90 gr.).
Vinagre blanco. . . 2 quart. (1 lit.).
Se macera durante ocho dias, se cuele con expresion y se filtra.
Se usa para combatir la comezon que acompaña á muchas enfermedades de la piel.

9358. V. AROMÁTICO INGLÉS (F. F.).

℥ Alcanfor. ℥ij (64 gr.).
Se le pulveriza en un mortero de vidrio por medio de un poco de ácido acético, se le introduce en un frasco de tapon esmerilado y se añaden:
Acido acético muy concentrado. ℥xx (625 gr.).
Esencia de espliego. ℥x (50 cent.).
Esencia de clavo. . . ℥β (2 gr.).
Esencia de canela. . . ℥xx (55 cent.).
Despues de quince dias se decanta y está en disposicion de usarse.

I. Escorbuto, helmintiasis, asfixias, síncope, y como preservativo de los miasmas, en las afec-

ciones pútridas, etc., por lo que se usa en fricciones en las palmas de las manos ó en fumigaciones. Se usa como desinfectante y anti-pútrido. Se le aconseja en el síncope, y en fricciones sobre los miembros paralizados ó amenazados de gangrena, etc.

Se le puede dar color con cochinilla.

9359. V. AROMÁTICO DE JUNCIA ó Vinagre sevillano (F. E.).

℥ Raiz de juncia olor. ℔jβ (750 gr.).
Pét. de rosas cast. ℥jx (270 gr.).
Sumidades de romero,
Sumidades de tomillo,
Sum. de espl., añ. ℥jβ (45 gr.).
Simiente de melilot. ℥xviiij (560 gr.).
Pim. de Tabasco. . ℥ij (60 gr.).
Bálsamo de benjuí. ℥β (15 gr.).
Vinagre fuerte. . . ℔x (5000 gr.).

Se cortan y contunden estas sustancias, se ponen en digestion con el vinagre, despues se destila en retorta de vidrio en baño de arena hasta que el líquido salga empireumático, y se guarda en una vasija bien tapada.

I. Asfixia, síncope, parálisis, y como preservativo de los miasmas contagiosos.

9360. V. AROMÁTICO ó Vinagre vulnerario.

℥ Canela,
Macis,
Clavo, añ. ℥β (15 gr.).
Palo de Rodas,
Sándalo blanco,
Hinojo, añ. ℥ij (8 gr.).
Vinagre. ℔jv (2000 gr.).

Se digiere durante cuarenta y ocho horas y se añade:

Ajenjos,
Romero,
Menta piperita,
Espliego, añ. ℥β (15 gr.).
Mejorana. ℥j (4 gr.).
Se conoce con frecuencia este

vinagre aromático con el nombre de ácido acético aromatizado.

I. Se usa en los mismos casos que el anterior.

9361. V. AROMÁTICO Y ANTIMEFÍTICO (Bully).

- 2/ Agua. ℞xjv (7000 gr.).
- Alcohol. ℞viiiij (4000 gr.).
- Aceite volátil de bergamota,
- Aceite vol. de cáscarad delimon, āā. ℞j (32 gr.).
- Aceite volátil de Portugal. ℞iiij (12 gr.).
- Aceite vol. de rom. ℞vj (24 gr.).
- Aceite volátil de espliego,
- Neroli, āā. ℞j (4 gr.).
- Alcohol de melisa. ℞bj (500 gr.).

Se pone todo en una botella, se menea de cuando en cuando, y á las veinticuatro horas se añade:

- Infusion de bálsamo de Tolú,
- Infusion de estoraque,
- Infusion de benjuí,
- Inf. de clavo, āā. ℞ij (64 gr.).

Se agita de nuevo y se añade despues:

- Vinagre blanco, ó con preferencia
 - Vinagre destilado. . ℞bjv (2000 gr.).
- Se filtra despues de algunas horas y se añade aún:
- Vinagre radical. . ℞iiij (90 gr.).

9362. V. AROMÁTICO FUERTE.

- 2/ Acido acético conc. . ℞vj (200 gr.).
- Alcanfor. ℞v (20 gr.).
- Esencia de espliego,
- Esencia de romero,
- Esencia de clavo, āā. ℞xc (5 gr.).
- Cochinilla en polvo. . ℞jv (2 dec.).
- H. S. A.

9363. V. DE BELLADONA.

- 2/ Hojas frescas de belladona,
 - Aguardiente, āā. . . ℞℞ (15 gr.).
 - Vinagre. ℞jv (125 gr.).
- M. I. Síncopes, afecciones del

corazon, neuroses. D. Se usa en lociones y fomentos.

9364. V. BEZOÁRDICO (Berlin).

- 2/ Vinagre blanco. . . ℞vj (3000 gr.).
- Raiz de angélica,
- Raiz de valeriana,
- Yerbabuena,
- Flores de manzanilla,
- Bayas de enebro,
- Bayas de laurel, āā. ℞℞ (15 gr.).
- Azafran oriental,
- Alcanfor, āā. ℞j (4 gr.).

Se dejan en digestion y despues se cuele el licor.

I. Escorbuto, fiebres malignas y nerviosas, peste, fiebre amarilla y otras enfermedades llamadas contagiosas. D. ℞j (4 gr.) muchas veces al dia en un vehiculo apropiado.

Nota. Se puede aumentar gradualmente esta dosis segun se presente la indicacion.

9365. V. DE CAFÉ ó Bebida antinarcótica (Swediaur).

- 2/ Café tostado. ℞iiij (90 gr.).
 - Vinagre blanco. . . . ℞xij (375 gr.).
- Se hierve y se reduce á la mitad, se cuele y se añade:
- Azúcar blanca. ℞j℞ (45 gr.).

I. Envenenamientos por el opio y los narcóticos. D. Dos cucharadas calientes cada cuarto de hora.

9366. V. CALIBEADO.

- 2/ Limaduras de hierro. 1
 - Vinagre. 12
- Se macera durante ocho dias y se filtra.

Como este vinagre no contiene siempre la misma cantidad de hierro, es mejor añadir á cada onza (30 gr.) de vinagre, ℞ij (1 dec.) de acetato férrico seco ó ℞ij²/₃ de acetato líquido.

I. Leucorrea, amenorrea, clorosis.

9367. V. DE CANTÁRIDAS ó Vinagre epispástico (F. DE L.).

℥ Cantáridas en polvo. ℥iij (96 gr.).
Acido acético. ℔ij (1000 gr.).

Se maceran las cantáridas en el ácido acético durante ocho días meneando de cuando en cuando, se exprime y se filtra.

I. Es rubefaciente, epispástico y diurético. Hidropesías. D. Seis á doce gotas como diurético.

9368. V. DE CEBOLLA ALBARRANA ó Vinagre escilítico (F. E.).

℥ Cebolla albarrana recién desecada, cortada en pedacitos. ℥xij (375 gr.).
Vinagre fuerte. ℔jvß (2250 gr.).

Se pone en digestión á un calor suave en una vasija de vidrio por espacio de veinticuatro horas, se cuele con expresión, se deja aposar y se saca por decantación. Se añade:

Alcohol. ℥iij (90 gr.).

Se pone en frascos de cristal ligeramente tapados por quince días. Sirve para elaborar el ojimiél escilítico.

D. Desde ℥ß á ℥iij (15 á 90 gr.).

9369. V. CÓLCHICO (Reuss).

℥ Vinagre de buena calidad. ℥xij (375 gr.).

Raíz de cólchic. fresca y recog. en otoño. ℥j (30 gr.).

Se maceran durante cuatro días, se exprime ligeramente la raíz y se añade al líquido:

Alcohol. ℥vj (24 gr.).

Se filtra y se guarda este vinagre en un frasco.

I. Ascitis. D. De ℥j á ℥j (4 á 30 gr.).

Nota. Se mezcla algunas veces con láudano y se endulza con un jarabe.

9370. V. DE SEMILLAS DE CÓLCHICO.

℥ Semillas de cólchico. ℥ijß (75 gr.).
Vinagre blanco. ℥x (300 gr.).

Se maceran durante cuatro días y se añade:

Alcohol. ℥jß (45 gr.).

Se filtra y se guarda en un frasco tapado.

I. Hidropesía, leuco-flegmasia. D. ℥j á ℥ß (4 á 15 gr.) en una porción opiada.

9371. V. DE CÓLCHICO (F. E.).

℥ Bulbos recientes de cólchico partidos en pedacitos. ℥vj (180 gr.).
Vinagre bl. bueno. ℔jvß (2250 gr.).

Se infunde, se cuele y se guarda como se ha dicho en la preparación del vinagre escilítico.

Sirve solamente para elaborar el ojimiél cólchico.

9372. Otro (F. P.).

℥ Bulbos de cólchico. 64
Vinagre bueno. 500

Se macera por quince días y se cuele con expresión.

I. Es un diurético activo. D. ℥ß á ℥jß (2 á 6 gr.) dos veces al día.

9373. V. DE LOS CUATRO LADRONES ó Vinagre antiséptico alcanforado (F. E.).

℥ Sumidades sêcas de ajénjos,
Sumidades secas de romero,
Sumidades secas de salvia,
Sumidades secas de yerbabuena,
Sum. secas de ruda, ãã. ℥jß (45 gr.).
Flores secas de espl. ℥ij (60 gr.).
Ajos. ℥ij (8 gr.).
Pimienta de Tabasco. ℥j (30 gr.).

Se machacan todos estos simples y se ponen á digerir al calor del sol ó en un baño de arena en un matraz cerrado, por espacio de

doce dias en lbvj (3000 gr.) de vinagre bueno. Se cuele, se exprime fuertemente y se filtra; despues se añade:

Alcanfor disuelto en espíritu de vino, ℥℞ (15 gr.).

I. Se usa en los mismos casos y del mismo modo que el siguiente.

9374. V. DE LOS CUATRO LADRONES ó Vinagre antiséptico (F. F.).

℥ Sumidades secas de ajenjos,
Sumidades secas de ajeno pónico,
Romero,
Salvia,
Yerbabuena de sabor de pimienta,
Flores de espliego,
Ruda, añ. ℥ij (64 gr.).
Raiz de cálamo aromático,
Canela,
Clavo,
Nuez moscada,
Ajo, añ. ℥ij (8 gr.).
Vinagre fuerte. . . lbviii (4000 gr.).
Alcanfor disuelto
en alcohol. ℥℞ (16 gr.).
Vinagre radical. . ℥ij (64 gr.).

Se maceran todas las plantas y partes de ellas por espacio de quince dias en el vinagre, se cuele con expresion, se añade el alcanfor disuelto en el vinagre radical y despues de algunas horas se filtra.

I. Se usa en lociones, fumigaciones y aspersiones en las afecciones pútridas, durante las epidemias, y se le lleva en frascos para destruir la influencia de los miasmas á que hay que exponerse, etc.; pero no es un medicamento específico. En un caso obra como tónico y excitante, y en otro como tónico y reemplazando el olor desagradable por un olor aromático bastante fuerte para disimular el primero, pero no para destruirle. Se le hace respirar en el síncope y asfixias. En las afecciones verminosas se puede usar en lociones ó fumigaciones.

No es tan complicada la fórmula de la F. P.

9375. V. DENTÍFRICO.

℥ Raiz de pelitre. ℥ij (60 gr.).
Canela,
Clavo, añ. ℥ij (8 gr.).

Se maceran en

Vinagre. lbjv (2000 gr.).

y se añade:

Resina de guayaco. ℥ij (8 gr.)

disuelta en

Espir. de coclearia. ℥ij (60 gr.).

Ag. vulneraria roja. ℥jv (125 gr.).

I. Odontalgia, escorbuto. D. Algunas gotas en un vaso de agua como un dentífrico agradable.

9376. V. DESTILADO (F. F.).

℥ Vinagre de vino. c. s. q.

Se destila en una retorta de vidrio en baño de arena hasta obtener las tres cuartas partes del vinagre empleado, se recoge el producto en un recipiente tambien de vidrio que se tendrá cuidado de refrescar convenientemente, se añade al residuo un volúmen de agua igual al suyo, y se vuelve á destilar hasta que la totalidad del producto de ambas destilaciones sea igual al volúmen del vinagre empleado.

9377. V. DE DIGITAL (Martius).

℥ Digital seca. 4

Se digiere durante veinticuatro horas en

Vinagre. 8

Se cuele con expresion y se funde á un calor suave en

Azúcar. 10

M. I. Tisis pulmonar. D. Algunas dracmas en pociones ó julepes.

9378. Otro (NASSE).

℥ Hojas de digital. ℥j (30 gr.)

Vinagre fuerte. ℥xij (375 gr.).

Se digiere á fuego lento durante tres dias y se filtra.

Se le puede administrar solo á gotas ó á dosis mas elevadas. Cuando se le emplea saturado, es decir, combinado con la potasa, es un medio poderoso de excitar la diuresis, y en él se encuentran las propiedades sedantes de la digital.

9379. V. DE ELÉBORO BLANCO.

℥ Eléboro blanco. ℥j (4 gr.).

Vinagre. ℥xxx (625 gr.).

Se hierve y se cuela.

I. Manía. D. Una cucharada cada dos horas.

9380. V. DE ELÉBORO NEGRO.

℥ Raíces secas de eléboro negro. 4

Vinagre. 42

Se macera durante ocho dias, se cuela con expresion y se filtra.

I. Hidropesía.

9381. Otro, n. 2.

℥ Raiz fresca de eléboro negro. ℥iij (90 gr.).

Alcohol. ℥ij (60 gr.).

Vinagre. ℥xxx (900 gr.).

H. S. A. Esta preparacion es mas eficaz porque se emplea el eléboro fresco.

9382. V. ESCILÍTICO

(F. F. Y F. P.).

℥ Esemas secas de cebolla albarrana. lbß (250 gr.).

Vinagre tinto muy fuerte. lbvj (3000 gr.).

Se macera en un matraz durante quince dias, se cuela y se filtra.

Se usá como diurético y expectorante en los mismos casos y á las mismas dosis que el vino es-

cilítico. Pero cuando se le usa interiormente se debe procurar tomarle en una pocion ó en una tisana, tal como la de grama, por ejemplo; porque el estómago la soportaria con dificultad. Por esta razon se usa muy rara vez y solo sirve para hacer el ojimiél y disolver las gomas.

D. De ℥ß á ℥ij (2 á 8 gr.).

Del mismo modo se prepara el VINAGRE DE CÓLCHICO con los bulbos desecados de este vegetal. Este vinagre se usa muy rara vez y se prefiere el ojimiél, en euya composicion entra.

9383. V. DE ESPLIEGO.

℥ Vinagre muy fuerte. 4

Alcohol de espliego. 4

M. Se usa una cucharada en un vaso de agua como odontálgico.

9384. V. DE FRAMBUESAS Ó SANGUESAS (F. F.).

℥ Frambuesas recientes mondadas de sus cálices. lbij (1500 gr.).

Vinagre tinto muy fuerte. lbij (1000 gr.).

Se maceran en un matraz de vidrio ó en un cántaro de barro durante quince dias, se cuela despues sin expresion y se filtra.

Algunos le usan como comestible; pero si se exceptua el aroma, no hay ventaja alguna de preferirle al vinagre comun. Puede entrar en la composición de los gargarismos astringentes, y usarse además en las afecciones inflamatorias, calentura tifoidea, tifo.

D. ℥j á ℥iij (30 á 90 gr.) en lbij (1500 gr.) de agua para acidular las tisanas.

Del mismo modo se preparan los vinagres con los demás frutos rojos.

9385. V. DE HIERRO.

℥ Vinagre. ℥iij (90 gr.).

Acetato de hierro seco. ḡvj (3 dec.)
 ó Acetato de hierro liq. ḡviiij (4 dec.).
 Disuélvase S. A.
 I. Véase número 9366.

9386. V. DE MIRRA.

℥ Mirra. 4
 Vinagre. 16
 Se macera durante tres dias y se filtra.
 I. Angina gangrenosa, escorbuto, estomacace, caries de los huesos. D. Se usa disuelto en mayor ó menor cantidad de agua.

9387. V. DE MOSTAZA DESTILADO (F. N. P.).

℥ Mostaza. 4
 Vinagre. 12
 Destílense ocho partes.
 I. Es excitante, rubefaciente, útil en la parálisis, hemiplegia; abatimiento del sistema nervioso. D. En fricciones.

9388. V. DE OPIO.

℥ Opio en bruto. 4
 Vinagre blanco muy fuerte. . . . 8
 Se corta el opio en rebanadas, se le hace macerar en vinagre durante veinticuatro horas, al cabo de algun tiempo se le malaxa para dividirle bien, se continúa la maceracion durante cinco ó seis dias, se cuele con expresion y se filtra.
 Soubeiran adopta esta fórmula, que da á esta preparacion un grado de concentracion igual al del láudano de Sydenham. Pero sin embargo el vinagre debe modificar la accion del opio de un modo diferente que el vino.
 I. Se usa en lugar del láudano de Sydenham. D. De doce gotas á ℥j (12 dec.) en una pocion.

9389. V. DE OPIO ó Tintura acetica de opio (F. F.).

℥ Opio escogido. ℥j (32 gr.).
 Vinagre muy fuerte. ℥vj (192 gr.).
 Alcohol de 31° Cart. ℥jv (125 gr.).
 Se divide el opio en el vinagre, se añade el alcohol, se pone en maceracion por ocho ó diez dias, se cuele con expresion y se filtra por un papel.
 Esta preparacion contiene los principios solubles de la décima parte de su peso de opio, y por consiguiente ℥j (4 gr.) corresponde sensiblemente á ḡvij (14 dec.) de opio.

Se puede usar en las mismas circunstancias que la tintura de opio, y puede reemplazar á las *gotas negras*, remedio inglés, cuya composicion no es conocida con exactitud.
 D. Seis á doce gotas.

9390. V. DE PEPINOS.

℥ Pepinos. ℥jβ (45 gr.).
 Vinagre fuerte. ℥bij (1000 gr.).
 Se macera durante quince dias y se filtra.
 Del mismo modo se preparan los de AJO, BERRO, CÁSCARA DE NARANJA, ESTRAGON, GENGIBRE, CEBOLLA, PIMIENTA, CRIADILLAS DE TIERRA, PIMIENTO.

9391. V. DE PIMIENTA DE INDIAS (Swediaur).

℥ Pimienta de Indias fresca. ℥ij (60 gr.).
 Vinagre blanco, Aguardiente, añ. ℥xij (375 gr.).
 Se infunde y se filtra.
 I. Hidropesías pasivas, leucoplegmasías. D. De ℥β á ℥j (2 á 4 gr.) muchas veces al dia, en un cocimiento de quina, en lociones y fomentos.

**9392. V. PONTIFICAL, Agua vul-
neraria de zumos vegetales ó agua
del Papa (F. E.).**

- ℥ Zumo de betónica,
Zumo de milenrama,
Zumo de orégano,
Zumo de pimpinela,
Zumo de siempreviva,
Zumo de sanícula,
Zumo de verbena, añ. ℥vj (180 gr.).
Zumo de maro de
cortuso. ℥iij (90 gr.).
Carbonato de potasa,
Sal comun, añ. . . . ℥vj (180 gr.).
Crémor de tártaro. . ℥jv (120 gr.).
Acíbar sucotrina. . . ℥j (30 gr.).
Vinagre destilado. . . ℥xij (375 gr.).

Se disuelve el acíbar en el vi-
nagre; en el zumo de la betónica
la sal comun; en los zumos de
milenrama y verbena el carbona-
to de potasa, y en el zumo de
pimpinela el crémor tártaro. Se
mezclan todas estas sustancias en
una retorta de vidrio, á la que se
hace comunicar con un recipiente:
se engrudan las junturas, se deja
en digestion por espacio de tres
dias y despues se destila en baño
de arena hasta la sequedad. Se
mezcla el liquido destilado con el
residuo que quedó en la retorta
despues de seco y pulverizado,
volviéndolo á destilar como ante-
riormente y repitiendo igual ope-
racion por tercera vez. En este
caso se guarda el líquido destila-
do, que debe contener un poco de
olor empireumático, en frasco de
cristal bien tapado.

9393. V. ROSADO (F. E.).

- ℥ Pétalos de rosas rojas secas y sin
uñas. ℥xij (375 gr.).
Vinagre blanco
bueno. lbvj (3000 gr.).

Se ponen á la accion del sol por
espacio de algunos dias en una re-
doma de vidrio tapada, despues se
cuela sin expresion y se añaden

para que no se enmohezca ℥ij (60
gr.) de alcohol.

I. Leucorrea, blenorrea. *D.* En
inyecciones ó lóciones con cuatro
ó seis veces su peso de agua.

Del mismo modo se preparan los vi-
nagres de las demás yerbas, flores y
sumidades floridas.

9394. Otro (F. F. Y F. P.).

- ℥ Pétalos secos de ro-
sas rojas. ℥j (32 gr.).
Vinagre tinto muy
fuerte. ℥xij (375 gr.).

Se macera todo durante ocho
dias teniendo cuidado de menear
de cuando en cuando, se cuele
con expresion y se filtra.

Es un buen astringente, que se
usa principalmente al exterior en
inyecciones contra los flujos blan-
cos y la blenorrea. Entonces se le
dilata en cuatro á ocho veces su
volúmen de agua.

La F. F. prescribe que se preparen
de este modo los vinagres de FLORES DE
SAÚCO, ROMERO, SALVIA, ESPLIEGO Y
CLAVELES.

**9395. V. RUBEFACIENTE
(H. M. F.).**

- | | |
|------------------------------|-------|
| ℥ Ajo quebrantado. | 300 |
| Simiente de mostaza. | 300 |
| Pimienta negra. | 500 |
| Cantáridas en polvo. | 150 |
| Alcanfor. | 70 |
| Vinagre blanco. | 45000 |
| Alcohol de 33°. | 4500 |
| Acido acético á 10°. | 750 |

Se disuelve el alcanfor en el al-
cohol, se añade el ácido acético y
el vinagre, y despues las demás
sustancias; se macera en una va-
sija tapada durante quince ó mas
dias segun la temperatura de la
atmósfera, meneando de cuando
en cuando, se filtra y se guarda
en vasijas tapadas.

I. Se usa en fricciones, lóciones
y fomentos, en las convalecen-

cias de las calenturas tifoideas y otras para excitar y restablecer las funciones de la piel y en las neuralgias. Se le puede hacer respirar en el síncope y en el período álgido del cólera asiático.

9396. V. DE RUDA (F. A.).

℞ Ruda seca. ℞jv (125 gr.).
 Vinagre. ℞iij (1500 gr.).

Se macera por tres días y se cuele con ligera expresión, se filtra y se guarda en una botella de vidrio.

I. Es antiséptico.

9397. V. DE SAÚCO.

℞ Hojas secas de saúco. 4
 Vinagre. 12

Se macera durante ocho días, se cuele con expresión y se filtra. Se usa en gargarismos resolutivos contra la angina crónica.

9398. V. DEL TOCADOR.

℞ Alcohol de 33°. . . ℞xjv (7000 gr.).
 Vinagre blanco. . . ℞bjv (2000 gr.).
 Agua de Colonia. . . ℞xjv (450 gr.).
 Extr. de benjuí,
 Extr. de estor., añ. ℞ij (60 gr.).
 Vinagre piroleñoso. ℞jv (125 gr.).
 Esencia de espliego. ℞jβ (45 gr.).
 Esencia de canela,
 Esencia de clavo,
 Alkali volátil, añ. . ℞j (4 gr.).

Se le da color con la orchilla y se filtra.

9399. V. DE TRIACA Ó BENZOICO (F. M.).

℞ De los ingredientes del agua triacal templada. ℞xβ (315 gr.).

Se macera durante treinta días en

Vinagre bueno. . ℞vijβ (3750 gr.).

Se cuele, se exprime y se añade:

Triaca. ℞v (150 gr.).

Se pone al sol por treinta días, se cuele y se guarda.

I. Se usa como anticontagioso, y contra los síncope. D. ℞j á ℞ij (30 á 60 gr.).

El AGUA TRIACAL TEMPLADA se compone de ℞iij (90 gr.) de triaca, ℞xxxvj (1125 gr.) de zumo de ruda, ℞xxxvj (1125 gr.) de zumo de escordio, ℞xxxvj (1125 gr.) de zumo de acederas y ℞xxxvj (1125 gr.) de zumo de acedera ó limon. Se digiere por tres días en una vasija de vidrio bien tapada, se destila hasta obtener ℞vj (3000 gr.) y se guarda. Es tónico.

9400. V. VIRGINAL.

℞ Alcohol,
 Vinagre,
 Benjuí, añ. ℞j (30 gr.).

Se macera y se filtra.

I. Blenorrea, leucorrea, catarro útero-vaginal. D. Algunas gotas en un vaso de agua en lociones é inyecciones. También puede usarse como cosmético, pues comunica á la piel propiedades tónicas y es un perfume agradable.

VINOS.

9401. VINO DE ACEBO (Rousseau).

℞ Hojas de acebo en polvo. ℞ij (8 gr.).

Vino blanco. ℞vj (180 gr.).
 Infúndase.

I. Calenturas intermitentes. D. En una toma.

9402. V. ACERADO Ó CALIBEADO
(F. F.).

℞ Limaduras de hierro puras. ℥j (32 gr.).
Vino blanco gener. . ℔ij (1000 gr.).

Se maceran en un matraz por espacio de seis días meneando de cuando en cuando, se decanta el vino y se filtra.

I. Tiene las propiedades de los ferruginosos, y conviene particularmente en la clorosis, gastralgia, amenorrea y leucorrea cloróticas, catarro útero-vaginal, escrófulas, afecciones atónicas, caquexias, por ejemplo, la sífilítica, etc. D. De ℥℔ á ℥j (15 á 30 gr.).

9403. V. DE ACETATO DE HIERRO.

℞ Acetato de hierro seco. ꝑxxxij (16 dec.).
Vino blanco. . . . ℔j (500 gr.).
Mézclese.

9404. V. DE ACETATO DE HIERRO LÍQUIDO ú Oenolado de acetato de hierro líquido.

℞ Vino de Chablis privado de su principio astringente. ℥xvij (530 gr.).
Acetato de peróxido de hierro líquido. ℥viiij (8 gr.).
Mézclese.

Nota. Cuando se usa vino blanco para preparar este vino calibeado, la materia astringente que contiene obra sobre el acetato de hierro, le descompone y da un medicamento de color negruzco. Para quitarle esta materia se diluyen ℥j ó ℥ij (4 á 8 gr.) de peróxido de hierro recién precipitado y bien lavado, se dejan en contacto durante dos ó tres días, teniendo cuidado de menear la mezcla, y se filtra.

D. Una cucharada, mañana y noche.

9405. V. DE ACÍBAR (F. DE L.).

℞ Acíbar en polvo. . . ℥ij (64 gr.).
Canela en polvo. . . ℥℔ (16 gr.).
Vino de Jerez. . . ℔ij℔ (1250 gr.).

Se macera durante catorce días meneando de cuando en cuando y se filtra.

I. Dispepsia, clorosis, diabetes, calenturas mucosas, pirosis. D. Media á una onza (15 á 30 gr.) como purgante, ℥℔ á ℥j℔ (2 á 6 gr.).

La fórmula de la F. P. contiene ℔j (500 gr.) de alcohol á 20°.

9406. V. DE ACÍBAR ALCALIZADO
(*Swediaur*).

℞ Acíbar sucotrino, Mirra, Azafran, añ. ℥j (30 gr.).
Subcarbon. de pot. ℥ij (60 gr.).
Vino blanco. . . . ℔ij (1000 gr.).
Se digiere durante diez días y se cuela.

I. Es tónico, amargo y excitante, útil en la pirosis, dispepsia, diabetes y calentura mucosa. D. Una onza (30 gr.).

9407. V. DE ACÍBAR ó Tintura sagrada.

℞ Acíbar. ℥j (32 gr.).
Cardamomo menor. ℥j (4 gr.).
Gengibre. ℥j (4 gr.).
Vino de Málaga. . . ℔ij (1000 gr.).

Las fórmulas de este vino varían al infinito, ya por las proporciones del vino, ya por la naturaleza y cantidad de los aromas. Cada onza (30 gr.) de la tintura anterior contiene ꝑxviiij (1 gr.) de acíbar.

I. Dispepsia, pérdida del apetito, indigestiones, calenturas mucosas, pirosis. D. Una cucharada en un vehículo apropiado.

9408. V. CON AGRAZ Y TRIACA
(H. DE M.).

℥² Vino tinto. ℔β (250 gr.).
 Zumo de agraz. ℥jv (125 gr.).
 Triaca. ℥j (30 gr.).
 Se deslie la triaca en el líquido.
 I. Se usa al exterior como as-
 tringente tónico.

9409. V. DE AJENJOS.

℥² Ajenjo mayor. ℥iij (90 gr.).
 Vino medicin. ℔v y ℥vj (2700 gr.).
 El *vino medicinal* se compone de
 Alcohol de 82° cent. 81
 Azúcar. 462
 Vino blanco. 2457
 Se macera durante ocho dias, se
 exprime y se filtra.

Una onza (30 gr.) representa el
 macerado de ḡxviiij (1 gr.).

Del mismo modo se debe preparar el
 vino de GENCIANA.

9410. Otro (F. E.).

℥² Sumidades de ajenjos secas y corta-
 das en pedazos. . ℥ij (60 gr.).
 Vino blanco bueno. ℔iij (1500 gr.).
 Se dejan en infusion por dos
 dias y se filtra.

D. Una á cuatro onzas (30 á
 125 gr.).

Del mismo modo se preparan los vinos
 de otros vegetales.

9411. Otro (F. F.).

℥² Hoj. secas de ajcnj. ℥j (32 gr.)
 Vino bl. generoso. . ℔ij (1000 gr.).
 Alcohol de 34° Cart. ℥j (32 gr.).

Se cortan los ajenjos en pedazos,
 se rocían con el alcohol, y á las
 veinticuatro horas de contacto se
 añade el vino blanco, se deja ma-
 cerar por dos dias, se cuele con
 expresion y se filtra.

Una onza (32 gr.) de vino re-
 presenta ḡxviiij (1 gr.) de ajenjos.
 Este vino es un estimulante bas-

tante enérgico, que conviene par-
 ticularmente á las personas cuyas
 digestiones son penosas ó que tie-
 nen padecimientos de estómago
 tomados frecuentemente por gas-
 tritis crónicas, aunque en la rea-
 lidad dependen de un estado de
 atonía general, que es la causa de
 los flujos blancos abundantes, de
 las hemorragias uterinas, etc.
 Promueve la menstruacion. Tam-
 bien se le aconseja á los niños
 como vermífugo, á la dosis de una
 ó dos cucharadas al dia.

D. Una á cuatro onzas (30 á 120
 gr.) al dia.

Del mismo modo se prepara el VINO
 DE ÉNULA CAMPANA, que se usa como
 excitante en las jóvenes mal regladas, y
 en los ancianos atacados de catarros cró-
 nicos. D. ℥ij á ℥iij (60 á 90 gr.).

**9412. V. DE AJENJOS ó Vino anti-
helmíntico.**

℥² Hojas secas de ajenjo mayor,
 Hojas secas de ajen-
 jo menor, āā. . ℥vj (24 gr.).
 Vino blanco gener. . ℔jv (2000 gr.).
 I. Escrófulas. D. Medio vaso tres
 veces al dia.

9413. V. ALCANFORADO.

℥² Alcanfor. 4
 Vino de Lunel. 576
 Disuélvase.

I. Contusiones, heridas de mal
 carácter.

9414. V. AMARGO (Dubois).

℥² Vino de Madera. ℔xviiij (9000 gr.).
 Quina gris,
 Quina amar., āā. ℥v (150 gr.).
 Canela,
 Bayas de enebro,
 Corteza de limon,
 Corteza de Win-
 ter, āā. ℥x (40 gr.).

Carbonato de sos. ḡxc (5 gr.).
 H. S. A. I. Debilidad de los ór-

ganos digestivos, tifo, escrófulas, raquitis, escorbuto, viruelas. *D.* De ℥ij á ℥ij (8 á 30 gr.) y mas, ya puro, ya en un vehículo apropiado.

9415. V. AMARGO (H. DE INGL.).

℥ Quina raspada. ℥ij (60 gr.).
Vino de Málaga. ℔j (500 gr.).
Clavo de especia. ℔j (12 dec.).
Se digiere y se filtra.

I. Vómitos en las preñadas, etc. *D.* Una á cuatro cucharaditas de café, tres ó cuatro veces al dia.

9416. V. AMARGO AROMÁTICO (Lazerme).

℥ Sumid. de ajenjos. . un puñado.
Canela,
Nuez moscada,
Gengibre, ãã. ℔j (12 dec.).
Vino tinto. ℔j℔ (750 gr.).

Se reducen á pedazos pequeños, se infunde todo durante veinticuatro horas, se filtra y se añade:

Lilium de Paracelso. ℥℔ (15 gr.).

I. Este vino es cordial y estomacal, y conviene para restablecer las digestiones y fortificar el estómago. *D.* Tres cucharadas al dia, inmediatamente despues de comer.

9417. V. AMARGO Y DIURÉTICO (Corvisart).

℥ Vino blanco. ℔jv (2000 gr.).
Alcohol á 34°,
Corteza de limon,
Cort. de Winter, ãã. ℥ij (60 gr.).
Quina en polvo,
Raiz de asclepias,
Angélica,
Escila seca, ãã. ℥j (30 gr.).
Bayas de enebro,
Macis, ãã. ℥ij (8 gr.).
Hojas secas de ajenjos,
Melisa, ãã. ℥℔ (15 gr.).

Se machacan las sustancias y se las hace digerir en el baño de are-

na durante veinticuatro horas, meneando de cuando en cuando. Se cuele, se exprime y se filtra por un papel de estraza. Se divide el licor en cuatro vasijas de á cuartillo bien tapadas.

I. Hidropesía pasiva y atónica, leucoflegmasias, albuminuria, beriberi, debilidad de los órganos digestivos. *D.* Cuatro cucharadas al dia, dos mañana y noche.

9418. V. AMARGO ESCILITICO ó Vino diurético amargo de la Caridad (F. F.).

℥ Quina de Loja,
Corteza de Winter,
Cásc. de limon, ãã. ℥ij (64 gr.).
Raiz de asclepias,
Escamas de cebolla albarrana,
Raiz de angélica,
Bayas de enebro,
Macis, ãã. ℥℔ (16 gr.).
Hojas de ajenjos,
Hoj. de melisa, ãã. ℥j (32 gr.).
Vino blanco. ℔viii (4000 gr.).

Se reduce á polvo grueso las raices, las cortezas, las hojas y el macis; se le pone en un matraz con las bayas de enebro enteras, se vierte el vino, se macera durante cuatro dias, se cuele con expresion y se filtra.

I. Hidropesias, ascitis, hidrotorax, edema, leucoflegmasia, albuminuria, beriberi. Es un excelente medicamento que se puede dar en todos los casos en que están indicados los diuréticos. *D.* Una á tres onzas (30 á 90 gr.) solo ó en un jarabe ó una tisana apropiada.

9419. V. AMONIACAL.

℥ Sal amoniaco. ℥ij℔ (10 gr.).
Vino de genciana. ℥v (160 gr.).

I. Escrófulas, hidropesía. *D.* Una cucharada en una infusion de lúpulo dos veces al dia, ó c. s. en lociones y fomentos.

9420. V. DE ANGÉLICA.

℞ Raíz de angélica. . . ℥℞ (15 gr.).
Vino blanco. ℔℞ (250 gr.).

Se digiere durante veinticuatro horas, se cuele y se añade:

Tintura de cáalamo
aromático. ℥℞ (15 gr.).

I. Dispepsia, clorosis. D. Onza y media (50 gr.) mañana y noche.

9421 V. ANTIPOPLÉCTICO.

℞ Vino blanco. . . . ℔ij℞ (1250 gr.).

Raíz de rábanosilv. ℥ij℞ (45 gr.).

Raíz de jalapa. . . . ℥℞ (15 gr.).

Canela,

Ruibarbo, ãã. . . . ℥ij (8 gr.).

Nitrato de potasa. . ℥℞ (2 gr.).

Se digieren en frio durante cuatro dias, se filtra y se añade:

Espír. arom. aceti-
toso de Silvio. . . . ℥ij (8 gr.).

D. De ℥ijj á ℥jv (90 á 125 gr.) por la mañana en ayunas.

9422. V. ANTIESCORBÚTICO

(F. F.).

℞ Raíz reciente de rá-
bano silvestre. . . . ℥j (32 gr.).

Hojas recientes de coclearia,

Hojas recientes de berro,

Hojas recientes de trébol acuático,

Sem. de mostaza, ãã. ℥℞ (16 gr.).

Sal amoníaco. ℥ij (8 gr.).

Vino blanco gener. ℔ij (1000 gr.).

Alcoholato de coclea-
ria compuesto. . . . ℥℞ (16 gr.).

Se corta en rodajas delgadas la raíz de rábano, se limpia y corta las hojas de las demás plantas, se quebranta la mostaza y se echa todo en un matraz con la sal amoníaco; se añade el vino y el alcoholato de coclearia, se tapa el matraz y se macera por ocho dias, pasados los cuales se cuele por un lienzo con expresión y se filtra.

I. Es muy útil para combatir algunos síntomas del escorbuto,

como la atonía general y la hinchazón de las encías. Así puede usarse contra las afecciones con debilidad, tales como las escrófulas y la caquexia sifilítica, etc. D. ℥j á ℥ijj (30 á 90 gr.).

9423. Otro (H. DE M.).

℞ Raíz fresca de rábano
silvestre. ℥vj (24 gr.).

Vino de Málaga supe-
rior. ℔ij℞ (750 gr.).

Se macera durante dos dias, se cuele y se añade:

Espiritu de coclearia. ℥ij (8 gr.)

I. Afecciones escorbúticas, escrófulas, raquitis. D. Una á dos onzas (30 á 60 gr.).

9424. V. ANTIHIDRÓPICO

(Fuller).

℞ Corteza de saúco,

Cort. de Winter, ãã. ℥ij (60 gr.).

Bulbos de escila. . . ℥j℞ (45 gr.).

Raíz de énula camp. ℥j (30 gr.).

Raíz de lirio de Florencia,

Raíz de eléboro negro,

Raíz de jalapa,

Agárico blanco,

Sen mondado, ãã. . . ℥ij (8 gr.).

Vino blanco. ℔jv (2000 gr.).

Se contunden todas las sustancias, se maceran en el vino por espacio de ocho dias, se cuele, se exprime y se filtra.

D. ℥jv (125 gr.) por la mañana en ayunas.

9425. V. ANTICTÉRICO.

℞ Vino blanco gener. 2 quart. (1 lit.).

Azafran. ℥j (4 gr.).

Naranjas agrias. . . núm. 2.

Se vacian las naranjas y se introduce en ellas el azafran; se las envuelve en un papel y se las cuece entre ceniza. Se las corta despues á rebanadas, se las infunde durante doce horas en el vino y se filtra.

I. y D. Cuatro cucharadas por la mañana é igual cantidad una hora antes de comer, al fin de la ictericia.

9426. V. ANTILEUCORREICO.

℥ Agua pura. . . .	℔xviii (9000 gr.).
Alcohol.	℔iiij (1500 gr.).
Agua de flores de naranjo.	℔bjβ (750 gr.).
Tintura de marte. ℥xij	(375 gr.).
Jarabe simple,	
Quina gris, ãã. . . .	℥vj (192 gr.).
Azafran.	℥iiij (96 gr.).
Cuasia amarga,	
Cálamo arom., ãã. ℥jβ	(48 gr.).
Canela,	
Fl. de saúco, ãã. ℥vj	(24 gr.).

H. S. A. I. Leucorrea, amenorrea, clorosis, catarro útero-vaginal y blenorragia. D. ℥ij (60 gr.) mañana y noche.

9427. V. ANTIMONIADO ó Vino emético (F. E.).

℥ Vino blanco bueno. . ℥xij (375 gr.).
Tartrato de potasa antimoniado. ℥j (12 dec.).
Disuélvase. Cada onza (30 gr.) contiene ḡij (1 dec.) de tártaro emético.

I. Comunmente se usa como diaforético; algunas veces se emplea en lavativas como purgante y rara vez se usa como emético. D. De ℥j á ℥jv (4 á 16 gr.) y aun hasta ℥j (30 gr.).

La misma composicion tiene el VINO EMÉTICO CLARO de los H. DE M.

9428. Otro (F. F.).

℥ Tartrato de potasa y antimonio. . . ḡxxxvj (2 gr.).
Vino de Málaga. . . ℥xviii (564 gr.).
Se disuelve exactamente el tartrato en el vino. D. De ℥j á ℥jv (4 á 16 gr.) en un vehículo apropiado como sudorífico.

El VINO ANTIMONIAL DE HUXHAM ó AGUA

BENDITA DE RULAND se compone de 5β (2 gr.) de tártaro emético y ℔bj (500 gr.) de agua. D. ℥j á ℥iiij (30 á 90 gr.) en lavativas como purgante, y ḡxviii á ḡxxxvj (1 á 2 gr.) en un vehículo apropiado como sudorífico.

9429. V. ANTIMONIAL (Swediaur).

℥ Tártaro emético. . . . ℥j (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥ij (60 gr.).

Se disuelve y se añade:

Vino de Málaga. . . . ℥vj (200 gr.).
I. Reumatismo, cólera, gota, oftalmias crónicas, parálisis, afecciones atónicas. D. Diez y ocho granos á ℥ijβ (1 á 10 gr.) como sudorífico, y ℥j á ℥iiij (30 á 100 gr.) como purgante en colirio, lavativa, etc.

9430. V. ANTIPERIÓDICO (Rosen).

℥ Quina en polvo. . . . ℥ij (60 gr.).
Sum. de cent. men. ℥j (30 gr.).
Flores de manzan. . . ℥ij (60 gr.).
Coral rojo en polvo. ℥ij (8 gr.).
Vino blanco gener. ℔bjv (2000 gr.).
D. Un vaso por las mañanas.

9431. V. AROMÁTICO.

℥ Hojas secas de salvia,
Hojas secas de mejorana,
Hojas secas de tomillo,
Hojas de romero,
Sérpol,
Menta acuática,
Orégano comun,
Hisopo,
Flores de espliego,
Ajenjos, ãã. ℥x (40 gr.).
Vino blanco. ℔bjv (2000 gr.).
Alcohol á 82° cent. ℥jv (125 gr.).
Se macera durante ocho dias, se cuela, se exprime y se filtra.

9432. V. AROMÁTICO (F. F.).

℥ Especies aromáticas. ℥jv (125 gr.).
Vino tinto. ℔bij (1000 gr.).
Alcoholato vulnerar. ℥ij (64 gr.).

Se macera durante ocho días, se cuele con expresión y se añade el alcoholato vulnerario, se filtra.

I. Contusiones, contorsiones, equimosis, edemas, leucoflegmasia, raquitis, escrófulas, úlceras atónicas ó fungosas. Se emplea en fricciones al rededor de los puntos amenazados de gangrena, sobre las equimosis que tardan en resolverse, sobre ciertos tumores blandos, indolentes, y en los miembros debilitados ó paralizados, en la columna vertebral y en la region de los órganos pectorales.

9433. V. AROMÁTICO
(H. DE S. JOSÉ).

℥ Especies aromáticas. ℥jv (125 gr.).
Vino tinto. ℔ij (1000 gr.).
Se macera y se filtra.

D. Se usa en fomentos tónicos y resolutivos. V. n. 9431.

9434. V. AROMÁTICO AMARGO
(Recamier).

℥ Sum. de cardamomo. ℥ij (8 gr.).
Trébol,
Ajenjos, ãã. ℥ß (15 gr.).
Vino de Grave. ℔jß (750 gr.).
Se macera durante ocho días, se cuele y se filtra.

D. Una copa antes de cada comida.

9435. V. AROMÁTICO OPIADO.

℥ Vino aromático. ℔ij (1000 gr.).
Opio en bruto. ℥j (30 gr.).
Se disuelve el opio en el vino y se cuele.

I. Úlceras, úlceras venéreas de mal aspecto y doloridas.

9436. V. ASTRINGENTE.

℥ Botones de rosas,

Balaustrias,
Cásc. de granada, ãã. ℥ijß (10 gr.).
Vino tinto. ℔ij (1000 gr.).
Alumbre. ℥j (4 gr.).

Se digiere durante dos ó tres horas, se cuele y se añade:

Agua vulneraria. ℥iij (96 gr.).

I. Hemorragias pasivas, flujos mucosos atónicos, leucorrea, blenorrea, raquitis, catarro útero-vaginal. D. Una cucharada cada dos ó tres horas. Se puede usar en los mismos casos en fomentos é inyecciones.

9437. V. AROMÁTICO CON TANINO.

℥ Vino aromático. ℔ij (1000 gr.).
Tanino. ℥ij á ℥iij (8 á 12 gr.).

M. Sirve para curar las úlceras venéreas ó las úlceras cutáneas que han llegado á su declinacion.

9438. V. DE CAINCA ó Tintura
vinosa de cainca.

℥ Vino de Málaga. ℔j (500 gr.).
Raiz de cainca en polvo. ℥j (30 gr.).

Se macera S. A. durante seis días y se filtra.

I. Hidropesía. D. Cuatro cucharadas al día, que se toman en una ó muchas veces.

9439. V. CALIBEADO
(Parmentier).

℥ Tintura de marte tar-
tarizada. ℥j (30 gr.).
Vino blanco. ℔j (500 gr.).

M. I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, etc. D. De ℥j á ℥jv (30 á 125 gr.) al día.

9440. Otro (SOUBEIRAN).

℥ Tartrato de protóxido de hierro,
Acido tártrico, ãã. ḡxviiij (4 gr.).
Vino blanco. ℔ij (1000 gr.).
Se tritura el tartrato y el ácido

tárrico en un mortero de porcelana ó vidrio, se añade el vino blanco y se filtra si es necesario.

D. Una á tres onzas (30 á 90 gr.).

Esta fórmula ha sido propuesta por Soubeiran para regularizar la preparacion del vino calibeado, teniendo la ventaja que puede prepararse al momento.

9441. V. CALIBEADO Ó DE HIERRO (F. P.).

℥ Limaduras de hierro. ℥j (32 gr.).
Vino blanco. ℔ij (1000 gr.).

Se macera durante siete á ocho dias.

I. Amenorrea, clorosis, leucorrea, viruelas, catarro útero-vaginal. *D.* A cucharadas mañana y noche.

El VINO CALIBEADO AROMÁTICO de la F. P. se prepara añadiendo al vino calibeado noventa y seis partes de tintura de canela compuesta.

9442. V. DE CANELA.

℥ Canela. ℥j (30 gr.).
Alcohol de 31° Cart. ℥ij (60 gr.).
Vino tinto. ℔jv (2000 gr.).

Se quebranta la canela, se vierte encima alcohol, se deja en contacto durante veinticuatro horas, se añade el vino y á las veinticuatro horas se cuela y filtra.

Si se añade ámbar gris y otros aromas, se obtiene el *hipocrás*.

Si se disuelven en frio ℥jx (280 gr.) de azúcar con ℥vj (180 gr.) de vino de canela, se obtiene el *Jarabe de canela vinoso*.

9443. V. DE CANELA COMPUESTO.

℥ Alcoholado de canela. ℥ij (8 gr.).
Alcoholato de melisa simple. ℥xc (5 gr.).
Jarabe simple. ℥j (32 gr.).
Vino tinto. ℥iij (96 gr.).
M. Excitante difusible que no se

usará si hay la menor irritacion del conducto digestivo.

Es la antigua pocion cordial.

9444. V. DE CANELA COMPUESTO, Hipocrás, vino cordial, vino hipocrático.

℥ Almendras dulces. . ℥jv (125 gr.).
Canela. ℥jβ (45 gr.).
Azúcar. ℥xxx (900 gr.).
Aguardiente. ℥xij (360 gr.).
Vino de Madera. . . ℔jβ (720 gr.).

Se macera durante algunos dias y se añade despues de colado:

Almizcle,
Ambar gris, ãã. ℥xviiij (9 dec.).
Se cuela.

9445. V. DE CANELA ó Vino cordial.

℥ Canela. ℥j (30 gr.).
Vino de Málaga. ℔j (500 gr.).
Se deja macerar.

Así se preparan los vinos de *cascaquilla*, *enebro* y *gengibre*.

9446. V. DE CANTÁRIDAS.

℥ Cantáridas. ℥xvj (8 dec.).
Vino blanco generoso. ℔j (500 gr.).
H. S. A. I. Anafrodisia. *D.* Se da de ℥β á ℥j (15 á 30 gr.) en un vaso de agua azucarada. Debe usarse con mucha circunspeccion.

9447. V. DE CASCARILLA.

℥ Cascarilla. ℥jβ (50 gr.).
Vino de Málaga. ℔ij (1000 gr.).
Se macera durante quince dias en una vasija tapada y se filtra.
I. Tisis. *D.* Medio vaso tres veces al dia.

9448. V. DE CATECÚ.

℥ Tintura de catecú. 4
Vino tinto. 16

Se mezcla y se filtra al cabo de algunos días.

Una onza (30 gr.) de vino representa casi $\bar{\text{g}}\text{x}$ (5 dec.) de catedú.

9449. V. DE CENIZA DE CUASIA.

☞ Ceniza de cuasia. $\bar{\text{z}}\text{ij}$ (8 gr.).
Vino de Málaga. $\bar{\text{b}}\text{ij}$ (500 gr.).

Se macera durante seis ú ocho días y se filtra.

I. Atonía de los órganos digestivos, dispepsia.

9450. V. DE CINCONINA (Magendie).

☞ Sulfato de cinconina. $\bar{\text{z}}\text{j}$ (12 dec.).
Vino de Madera. $\bar{\text{b}}\text{ij}$ (1000 gr.).
H. S. A.

Nota. Este vino puede prepararse también añadiendo $\bar{\text{z}}\text{ij}$ (60 gr.) de alcohol de cinconina á la cantidad indicada de vino de Madera.

I. Atonía de los órganos digestivos y escrófulas. D. De $\bar{\text{z}}\text{j}$ á $\bar{\text{z}}\text{jv}$ (30 á 125 gr.) y mas en diferentes veces en el espacio de un día.

9451. V. DE CITRATO DE HIERRO ú Oenolado de citrato de hierro (Beral).

☞ Vino de Chablis privado de su principio astringente. $\bar{\text{z}}\text{xv}\text{ij}$ (530 gr.).
Citrato de peróxido de hierro líquido. $\bar{\text{v}}\text{v}\text{ij}$ (9,6 gr.).

M. I. Amenorrea, clorosis, escrófulas, etc. D. Una cucharada mañana y noche.

9452 V. DE COCLEARIA.

☞ Alcoholato de coclear. $\bar{\text{z}}\text{ij}$ (8 gr.).
Vino blanco. $\bar{\text{z}}\text{ij}$ (90 gr.).

I. Escorbuto, afecciones escrofulosas.

9453. V. DE COCLEARIA COMPUESTO.

☞ Rábano rústicano. $\bar{\text{z}}\text{j}$ (30 gr.).
Coclearia,

Berro,

Trébol de agua,

Mostaza, añ. $\bar{\text{z}}\text{ß}$ (15 gr.).

Hidroclor. de amon. $\bar{\text{z}}\text{ij}$ (8 gr.).

Vino blanco. $\bar{\text{b}}\text{ij}$ (1000 gr.).

Se macera durante dos días, se exprime y se añade:

Espir. de coclearia. $\bar{\text{z}}\text{ß}$ (15 gr.).

I. Escorbuto, escrófulas, estomacace. D. Medio vaso al día.

9454. V. DE CÓLCHICO.

☞ Bulbos secos. 4
Vino de Málaga. 16

Se macera durante doce días, se cuele con expresion y se filtra.

Como varía tanto la composición de los vinos de cólchico, conviene que el médico designe la fórmula que quiere usar.

9455. Otro (F. DE L.).

☞ Cólchico seco. $\bar{\text{b}}\text{ß}$ (250 gr.).
Vino de Jerez. $\bar{\text{b}}\text{ijß}$ (2250 gr.).

Se macera durante catorce días y se filtra.

I. Es diurético, sedante y purgante, y se usa en el reumatismo, gota y afecciones inflamatorias. D. Veinte gotas á $\bar{\text{z}}\text{ß}$ (2 gr.) en un vehículo apropiado.

9456. Otro (F. P.).

☞ Bulbos de cólchico. 64
Vino blanco. 280

Se digiere durante seis días á la temperatura de 160°.

I. Reumatismos crónicos, gota atónica. D. Ocho á diez ó veinticuatro gotas, aumentando progresivamente.

9457. V. DE CÓLCHICO
(*Locher Balber*).

℥ Bulbo de cólchico
fresco. ℥iij (90 gr.).
Vino de Málaga. ℥vj (192 gr.).
Alcohol á 22°. ℥vj (24 gr.).

Se macera durante ocho dias.

I. Hidropesías y reumatismos crónicos. *D.* Se dan de veinte á cuarenta gotas en una pocion y se aumenta sucesivamente la dosis.

Nota. Es mas seguro y enérgico que el vino de cólchico de las farmacopeas *E.* y *F.*

9458. Otro (WILLIAMS).

℥ Semillas de cólchico. 4
Vino blanco generoso. 12
Se digiere durante seis dias.

D. Ocho á ochenta gotas hasta ʒj (4 gr.) ó mas en una infusion aromática, mañana y noche.

9459. V. DE CÓLCHICO ó Especifico antigotoso de Reinold.

℥ Bulbos de cólchico. ℥bβ (250 gr.).
Vino de Jerez. ℥bj (500 gr.).
Se da de color con c. s. de amapola y se aromatiza con
Ron. ℥j (30 gr.).

D. Veinte gotas en un vaso de agua.

9460. Otro (WILLIAMS).

℥ Semillas de cólchico. ℥jβ (48 gr.).
Vino de Jerez. ℥xv (480 gr.).

I. Gota, ceática, reumatismo, hidropesías, cálculos, neuralgias. *D.* Diez y ocho granos á media dracma (1 á 2 gr.) y mas progresivamente en un vehiculo apropiado.

9461. V. COLCHÍTICO ó Vino medicinal de Husson.

℥ Cólchicos secos. ℥ij (60 gr.).

Vino de Jerez. ℥jv (125 gr.).
I. Gota y reumatismo. *D.* Veinte gotas en un vaso de agua azucarada.

9462. V. DE COLOQUÍNTIDA.

℥ Coloquintida. ʒj (4 gr.).
Vino de Málaga. ℥v (150 gr.).
Se macera durante cuatro dias y se cuela.

I. Blenorragia. *D.* Una cucharada de hora en hora hasta que produzca su efecto purgante.

9463. Otro, n. 2.

℥ Coloquintida. ʒv (20 gr.).
Alcohol de 21° Cart. ℥ij (64 gr.).
Vino blanco gener. ℥xxx (960 gr.).
Se macera la coloquintida durante veinticuatro horas en el alcohol, se añade el vino, y despues de ocho dias de maceracion se cuela con expresion y se filtra.

Cada onza (32 gr.) de vino contiene exactamente ʒxj (55 cent.) de coloquintida. *D.* De ℥β á ℥j (15 á 30 gr.).

9464. V. DE COPAIBA.

℥ Copaiba. 32
Goma arábiga. 8
Vino blanco. 125
Solo debe usarse cuando se hayan disipado los accidentes inflamatorios.

9465. V. DE CORNEZUELO DE CENTENO (*Balardini*).

℥ Centeno cornezuelo. ʒxxx (15 dec.).
Vino blanco. ℥ij (60 gr.).

M. I. Partos laboriosos por inercia de la matriz. *D.* Una cucharada cada diez minutos.

Se debe agitar la mezcla cada vez que se haga uso de ella.

9466. V. DE DIASCORDIO.

- ℥ Diascordio. ʒj (4 gr.).
 Vino tinto. ʒiij (100 gr.).
M. I. Diarreas rebeldes y atónicas.

9467. V. DIURÉTICO.

- ℥ Cebollas. número 2.
 Vino blanco. lbij (1000 gr.).
 Se macera y se cuele.
I. Obra como diurético y produce buenos efectos.

9468. Otro, n. 2.

- ℥ Bayas de enebro quebrantadas. . . ʒj (30 gr.).
 Vino blanco. lbij (1000 gr.).
 Se macera durante seis días, se cuele y se añade:
 Tintura de escila. . ʒij (8 gr.).
I. Edema, inflamacion, hidropesía, y en las personas anémicas. *D.* Tres copas al día.

9469. V. DIURÉTICO MAYOR (Debreyne).

- ℥ Jalapa quebrantada,
 Escila quebrantada, ññ. ʒij (8 gr.).
 Nitrato de potasa. . . ʒiij (15 gr.).
M. Se ponen estas sustancias en dos cuartillos (1 lit.) de vino blanco durante veinticuatro horas.

I. Debreyne aconseja este vino contra los edemas, hidropesías pasivas, ascitis, etc. En los casos en que el vino mayor es insuficiente ó los enfermos no le pueden tomar, aconseja las píldoras diuréticas. *D.* Se dan tres cucharadas al día, una por la mañana, otra al mediodía y otra por la noche, dos horas antes de cada comida. Al cabo de dos días se toman seis cucharadas, dos en cada toma, y á los otros dos días tres cucharadas en cada toma. Se continuará de este modo si el estómago so-

porta bien el medicamento y no produce demasiada irritacion en las vias digestivas, ni vómitos, ni grandes dolores de vientre, y si las deposiciones no son excesivas, pues estas no han de pasar de siete á ocho en las veinticuatro horas.

9470. V. DIURÉTICO MENOR (Debreyne).

- ℥ Nitro. ʒiij (12 gr.).
 Bayas de enebro. . . ʒij (30 gr.).
 Se echa estas sustancias en lbij (1000 gr.) de vino blanco durante veinticuatro horas, y pasado este tiempo se toma un vaso al día, en tres veces, por la mañana, al mediodía y por la noche.

Debreyne usa el vino menor contra el edema de los piés y muslos y contra las hidropesías incipientes. En los casos en que el vino mayor no produce efecto ó los enfermos le toman con repugnancia, aconseja el uso de las píldoras diuréticas, núm. 5549.

9471. V. DE DIGITAL (F. P.).

- ℥ Hoj. secas de digital. ʒj (30 gr.).
 Vino blanco gener. . lbij (1000 gr.).
I. Diurético, nauseoso. Es poco usado. *D.* De ʒij á ʒiij (8 á 12 gr.).

9472. V. DE SEMILLAS DE CÓLCHICO.

- ℥ Semillas de cólchico. ʒij (64 gr.).
 Vino de Málaga. . . lbij (1000 gr.).
 Se divide las semillas, se las macera en vino durante ocho días, se cuele con expresion y se filtra.

Nota. Los efectos del vino de semillas de cólchico son mas suaves y mas seguros que los del vino de los bulbos.

I. Hidropesías y reumatismos crónicos. *D.* De ocho á diez gotas en una taza de té, mañana y noche; se aumenta sucesivamente la dosis.

9473. V. DIURÉTICO INGLÉS.

- ℥ Canela en polvo. . . . ℥iij (12 gr.).
 Raiz de zedoaria. . . . ℥ij (8 gr.).
 Carbonato de potasa. . ℥jβ (6 gr.).
 Escamas secas de cebolla albarrana,
 Bayas de enebro molidas,
 Ruibarbo en polvo, ãã. ℥j (4 gr.).
 Se maceran en media azumbre
 de vino blanco añejo y se filtra.
 I. Hidropesías. D. De tres á cua-
 tro vasos al dia.

9474. V. DE ELÉBORO.

- ℥ Raiz seca de eléboro. 4
 Vino de Málaga. 8
 Se divide la raiz, se la macera
 durante ocho dias en el vino, se
 cuela con expresion y se filtra.

9475. V. DE ELÉBORO BLANCO.

- ℥ Eléboro blanco. . . . ℥xviiij (4 gr.).
 Vino blanco. ℥β (15 gr.).
 Alcohol de 21° Cart. . ℥xviiij (4 gr.).
 Se vierte el alcohol en el elébo-
 ro, se cuela despues de veinticu-
 tro horas, se añade el vino, se
 deja macerar durante algunos dias
 y se filtra.

9476. Otro (F. DE L.).

- ℥ Eléboro blanco cor-
 tado. ℔β (250 gr.).
 Vino de Jerez. . . . ℔ijβ (1250 gr.).
 Se macera durante catorce dias
 y se filtra.
 I. Afecciones cutáneas, y en la
 gota combinado con el opio. D. ℔j
 á ℥jβ (12 dec. á 6 gr.).

9477. V. EMÉTICO TURBIO ó Vino de óxido de antimonio (F. E.).

- ℥ Oxido de antimonio semivitrificado y
 levigado (higado de antimonio) ℥iij
 (90 gr.).
 Vino blanco bueno. . ℔jβ (750 gr.).
 Se digiere en un matraz de cris-
 tal y se filtra. Debe agitarse siem-
 pre que vaya á usarse, si se le

prescribe en la receta turbio para lavativas.

I. Se usa en lavativas en las afecciones comatosas.

9478. V. DE ENEBRO.

- ℥ Vino con miel. ℥v (150 gr.).
 Extracto de enebro. . ℥ijβ (10 gr.).
 Se disuelve en el baño maría.

9479. Otro, n. 2.

- ℥ Enebro,
 Mostaza,
 Rábano, ãã. ℥β (15 gr.).
 Subcarb. de potasa. ℥β (2 gr.).
 Vino blanco. ℔viiij (4000 gr.).
 Se cuela despues de algunos
 dias de maceracion.
 I. Leucollegmasias, hidropesía,
 ascitis, edemas, raquitis, escró-
 fulas. D. De ℥j á ℥jβ (30 á 50 gr.).

9480. V. DE ÉNULA AROMATIZADO (Radius).

- ℥ Raiz de énula. . . . ℥j (30 gr.).
 Cáscaras de naranja. ℥β (15 gr.).
 Vino blanco. ℥xviiij (530 gr.).
 Se cuela á las veinticuatro ho-
 ras de digestion.
 I. Atonía del estómago. D. Una
 copita tres veces al dia.

9481. V. DE ÉNULA CAMPANA (F. F.).

- ℥ Raiz de énula camp. ℥j (32 gr.).
 Vino blanco. ℔ij (4000 gr.).
 Alcohol de 21° Cart. ℥j (32 gr.).
 Se parte la raiz, se añade el al-
 cohol, á las veinticuatro horas
 se echa el vino, se deja mace-
 rar por ocho dias y se cuela.
 Una onza (32 gr.) de vino re-
 presenta exactamente ℥xviiij (1
 gr.) de raiz.

I. Se usa casi en los mismos ca-
 sos que el de ajenjos, es decir:
 como tónico, excitante en las jó-
 venes mal regladas, y en los an-
 cianos que padecen catarro cróni-

co, etc. *D.* De $\bar{3}$ ij á $\bar{3}$ jv (60 á 120 gr.) al dia.

9482. V. ESCILÍTICO (F. F. Y F. P.).

℥ Escamas de escila seca. $\bar{3}$ j (32 gr.).
Vino de Málaga. ℞j (500 gr.).

Se contunden las escamas de escila, se ponen á macerar en el vino durante doce dias, se cuele el producto y se filtra.

I. Atonía de los órganos digestivos, hidropesías pasivas. Tiene las mismas propiedades que la cebolla albarrana, y es uno de los preparados que mas se usan. Se emplea como expectorante en los casos de catarro crónico de los ancianos, y tambien se le usa en fricciones en los miembros ó al abdómen en los casos de leucoflegmasia parcial ó general. *D.* De $\bar{3}$ ij á $\bar{3}$ j (8 á 30 gr.).

Del mismo modo se preparan los vinos de BULBOS Y SEMILLAS DE CÓLCHICO.

9483. V. ESCILÍTICO (H. DE M.).

℥ Escila. $\bar{3}$ iiij (12 gr.).
Vino blanco. ℞j℞ (750 gr.).

Se macera durante seis dias y se cuele.

I. Se usa en los mismos casos que el anterior. *D.* De $\bar{3}$ ℞ á $\bar{3}$ j (15 á 30 gr.).

9484. Otro (RICHARD).

℥ Vino blanco. ℞j℞ (750 gr.).
Cebolla albarrana. . $\bar{3}$ j (30 gr.).

Cáscara de naranja,
Cálamo aromát., añ. $\bar{3}$ ij (8 gr.).
Se digieren durante tres dias y se añade:

Ojimiél escilítico. . . $\bar{3}$ ij (60 gr.).

I. Hidropesías. *D.* De tres á cuatro cucharadas al dia.

9485. V. ESCILÍTICO LAUDANIZADO (Tessier).

℥ Vino blanco. 4 quart. ($\frac{1}{2}$ lit.).
Escila en polvo. . . $\bar{3}$ xce (5 gr.).
Láudano. 5 gotas.

H. S. A. D. Una cucharada des-

vezes al dia, una por la mañana en ayunas y la otra por la tarde tres horas despues de haber comido. Se toma cada cucharada en un vaso de agua pura ó azucarada. Si el estómago soporta bien el medicamento se puede dar tres ó cuatro cucharadas al dia. Comunmente se manifiesta su efecto al segundo ó tercer dia.

9486. V. ESCILÍTICO COMPUESTO (Fuller).

℥ Corteza de saúco,
Corteza de Winter,
Escamas de esc., añ. $\bar{3}$ j (30 gr.).
Raiz de énul. camp. $\bar{3}$ ℞ (15 gr.).
Raiz de lirio,
Eléboro negro,
Jalapa, añ. $\bar{3}$ j (4 gr.).
Agárico blanco,
Sen, añ. $\bar{3}$ ℞ (2 gr.).
Vino de Chablis. . . ℞ij (1000 gr.).

9487. V. ESTIPTICO ó Vino del fruto de ciprés compuesto (F. E.).

℥ Nueces verdes de
ciprés. $\bar{3}$ j℞ (45 gr.).
Hojas de romero,
Hojas de arrayan,
Rosas rojas,
Cáscara de granada,
Balaustrias, añ. . . . $\bar{3}$ ℞ (15 gr.).
Vino tinto bueno. . . ℞j℞ (750 gr.).

Se contunden todos estos simples, se ponen á digerir por espacio de dos horas á fuego lento y despues se cuele con expresion.

I. Es astringente y corroborante, útil en las contusiones, contorsiones y tumores linfáticos.

9488. V. ESTOMACAL (Plenk).

℥ Vino tinto de buena
calidad. ℞ij (1000 gr.).
Raices de genciana
secas y cortadas en
lám. muy delgad. $\bar{3}$ vj (180 gr.).
Quina escog. quebr. $\bar{3}$ ℞ (15 gr.).
Corteza de naranja. $\bar{3}$ ij (8 gr.).

Se maceran durante tres dias, se cuele y se filtra.

I. Fiebres intermitentes, debilidad de estómago y convalecencia de las enfermedades agudas. *D.* De \mathfrak{z} j á \mathfrak{z} ij (30 á 60 gr.) al dia.

9489. V. DE ESTRAMONIO.

\mathfrak{z} Semillas de estram-
nio machacadas. \mathfrak{z} ij. (60 gr.).
Vino de Málaga. $\mathfrak{lb}\mathfrak{b}$ (250 gr.).
Alcohol. \mathfrak{z} j (30 gr.).

Se digiere á un calor suave durante algunos dias y se filtra.

Es un medicamento muy enérgico que se usa como anodino en muchas enfermedades. Hufeland considera á esta preparacion como superior al opio. *D.* De seis gotas á \mathfrak{z} j (12 dec.) en un vaso de agua azucarada.

9490. V. EXCITANTE.

\mathfrak{z} Trébol de agua. 15
Mostaza. 30
Vino tinto. 1080

Se filtra despues de suficiente infusion.

I. Hidropesía, dispepsia. *D.* A vasos.

9491. V. DE ESTIÉRCOL DE GALLINA Ó GALLINAZA.

\mathfrak{z} Excrementos blancos de gallina. 4
Vino blanco. 16

Se trituran en un mortero, se dejan por dos horas en maceracion y se filtra.

Es un remedio popular en Francia contra los golpes en la cabeza y contra los piojos.

9492. V. FEBRIFUGO.

\mathfrak{z} Quina amarilla quebrantada. \mathfrak{z} vj (24 gr.).

Raiz de genciana,
Corteza de naranjas amargas,
Flores de manz., ãã. \mathfrak{z} jv (16 gr.).
Vino de Málaga. $\mathfrak{lb}\mathfrak{ij}$ (1000 gr.).

Se ponen en maceracion por quince dias; se cuele, se exprime y se filtra.

9493. Otro, n. 2.

Se prepara poniendo en una botella de vino blanco un limon partido en rebanadas; se le expone al sol si es verano ó al calor del fuego si es en estacion fria hasta que fermente; se cuele y se exprime bien el residuo.

D. Es un remedio popular en Italia, y se toma un vaso por la mañana para los adultos y á dosis proporcionada para los niños.

9494. Otro, n. 3.

\mathfrak{z} Vino de Málaga. $\mathfrak{lb}\mathfrak{ij}$ (1000 gr.).
Quina amarilla machacada. \mathfrak{z} ij (60 gr.).
Alcohol á 35° Cart. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$ (15 gr.).
Palo de Surinam. \mathfrak{z} j (4 gr.).

Se maceran durante ocho ó diez dias y se filtra. *D.* De \mathfrak{z} j á \mathfrak{z} ij (30 á 60 gr.) en ayunas.

9495. V. FEBRIFUGO DE QUINA.

\mathfrak{z} Quina calisaya. \mathfrak{z} jv (125 gr.).
Angustura verdadera. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$ (15 gr.).
Alcohol á 24°. $\mathfrak{lb}\mathfrak{b}$ (250 gr.).
Vino bl. de Borgoña. $\mathfrak{lb}\mathfrak{ij}$ (1000 gr.).

Se deja macerar durante un mes meneando de cuando en cuando y se filtra.

D. De $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$ á \mathfrak{z} j \mathfrak{b} (15 á 45 gr.) como tónico, $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$ á \mathfrak{z} iii (15 á 90 gr.) como febrífugo.

Es un tónico poderoso usado despues de comer, á la dosis de $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$ (15 gr.) y facilita la digestion. Se usa como febrífugo y para impedir la recidiva de las calenturas intermitentes y entonces se le debe prescribir por el método de Sydenham.

9496. V. FEBRIFUGO DE SEGUIN.

\mathfrak{z} Vino de Málaga. $\mathfrak{lb}\mathfrak{ij}$ (1000 gr.).
Alcohol á 20°. \mathfrak{z} j (30 gr.).

Quina amarilla,
Cáscaras secas de naranjas,
Raices de genciana,
Flores de manza-

nilla, ãã. \mathfrak{z} v y \mathfrak{z} xviiij (21 gr.).

9497. V. FERRUGINOSO.

℥ Citrato de hierro. . . . ʒijβ (10 gr.).
 ó Ioduro de hierro. . . . ʒβ (16 gr.).
 Vino de Burdeos. . . . ℔j (500 gr.).
 Disuélvase.

I. Amenorrea, clorosis, leucorrea, catarro útero-vaginal. *D.* Una cucharada mañana y noche.

9498. V. DE FORDYCE.

℥ Vino generoso. . . . ℔j (500 gr.).
 Quina en polvo. . . . ʒij (60 gr.).
 Clavo. . . . ʒβ (2 gr.).

Se maceran durante dos días y se decanta. Se vierte sobre el polvo un cuartillo de agua hirviendo, se deja infundir durante doce horas y se filtra. Se mezcla esta infusión con el vino.

I. Blenorragia crónica, leucorrea, calenturas intermitentes. *D.* Cuatro cucharadas al día.

9499. V. DE GENCIANA (F. F.).

℥ Raiz de genciana. . ʒj (32 gr.).
 Alcohol de 24° Cart. ʒij (64 gr.).
 Vino tinto. . . . ℔ij (1000 gr.).

Se quebranta la raíz de genciana, se la pone por veinticuatro horas en el alcohol en una vasija tapada, después se añade el vino, se continúa la maceración por ocho días y se filtra.

I. Conviene como tónico y amargo en los casos en que está indicada la genciana, si bien se usa particularmente en la dispepsia, afecciones escrofulosas y convalecencia de las calenturas intermitentes. *D.* ʒj á ʒiij (30 á 90 gr.) al día.

9500. V. DE GRACIOLA.

℥ Graciola. 7
 Vino blanco. 360

I. Hipocondría. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

9501. V. DE GUAYACO CON ELÉBORO (Lewis).

℥ Eléboro negro,
 Guayaco, ãã. . . . ʒij (60 gr.).
 Cardamomo menor,
 Cásc. de nar., ãã. . ʒj (30 gr.).
 Vino blanco. . . . ℔jv (2000 gr.).
 Se cuele á los doce días.

I. Raquitis, herpes, lepra, inflamación de la piel, hidropesías, reumatismos. *D.* Una cucharada, mañana y noche.

9502. V. HIDRAGOGO.

℥ Lirio de Florencia,
 Corteza interior de
 saúco, ãã. . . . ʒj (30 gr.).
 Raiz de énula,
 Hojas de sen, ãã. . ʒjβ (45 gr.).
 Raiz de jalapa. . . ʒij (8 gr.).
 Vino blanco gener. . ℔ij (1000 gr.).

Se maceran durante ocho días y se filtra. *D.* Un vaso por la mañana en ayunas contra las hidropesías.

9503. V. DE IODURO DE HIERRO (F. P.).

℥ Ioduro de hierro. 4
 Vino tinto. 32
 Disuélvase.

I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, tisis, etc. *D.* Una cucharada, mañana y noche, á los adultos.

Igual composición tiene el vino de IODURO DE HIERRO DE PIERQUIN.

9504. V. DE IPECACUANA (F. DE L.).

℥ Ipecacuana. . . . ʒijβ (80 gr.).
 Vino de Jerez. . . ℔ijβ (1250 gr.).
 Se macera durante catorce días y se filtra.

Se usa como emético á la dosis de ʒij (8 gr.) cada cuarto de hora, y mas diluido como diaforético.

I. Diarreas, disenterias, hemorragias. *D.* ʒij á ʒß (8 á 15 gr.) según la diátesis.

9505. V. MARCIAL (H. DE M.).

ʒ Vino blanco. lbjß (750 gr.).
Tintura de hierro
tartarizada. ʒj (30 gr.).

I. Se usa en la clorosis y debilidades del sistema linfático, particularmente del uterino. *D.* ʒij (60 gr.).

9506. V. DE MEMBRILLOS.

ʒ Zumo de membrillos. 12
Azúcar. 4
Se deja fermentar en un barril.

I. Atonía de los órganos digestivos, diarrea y disenteria crónicas.

9507. V. DE MIEL (H. DE M.).

ʒ Vino. ʒx (300 gr.).
Miel rosada. ʒij (60 gr.).
Acíbar. ʒß (6 dec.).
Mézclese S. A.

Se usa como detergente y tónico.

9508. V. CON MIEL.

ʒ Miel. ʒj (30 gr.).
Vino. lbß (250 gr.).
Disuélvase.

I. Se usa en el tratamiento de las úlceras y grietas atónicas, gangrena de hospital, heridas de mal carácter, ectima. *D.* En lociones y fomentos.

9509. V. DE MOSTAZA.

ʒ Mostaza quebrantad. ʒß (15 gr.).
Vino blanco. lbij (1000 gr.).
Se macera durante algunos días, se cuele con expresion y se filtra.
I. Dispepsia.

9510. V. NITRADO.

ʒ Vino blanco. lbj (500 gr.).
Nitro. ʒß (2 gr.).

M. D. Se toma en el día, puro ó dilatado en agua.

9511. V. DE OPIO (F. DE L.).

ʒ Extracto de opio
purificado. ʒijß (80 gr.).
Canela contundida,
Clavo contund., ãã. ʒijß (10 gr.).
Vino de Jerez. lbijß (1250 gr.).
Se macera durante catorce días y se filtra.

I. Narcótico y anodino, que conviene en los mismos casos que la tintura de opio, en los desarreglos del sistema nervioso, etc.

9512. V. OXIGENADO.

ʒ Vino blanco
ó Vino tinto. ʒxx (625 gr.).
Gas oxígeno, la mitad del volúmen del vino.

I. Es tónico y antiespasmódico á los ancianos y personas delicadas.

9513. V. PARA PREPARAR LOS VINOS MEDICINALES.

ʒ Vino blanco. 910,00 27,30.
Alcohol de 82° cent. 30,00 0,90.
Azúcar. 60,00 1,80.

Para preparar el vino medicinal basta, despues de haber fijado el peso de la sustancia medicinal que ʒj (30 gr.) ó dos cucharadas de vino debe representar, multiplicar un número cualquiera 15, 45, 90, 190, etc., peso de la sustancia medicinal, por el peso de los principios constituyentes de ʒj (30 gr.) de vino para los vinos medicinales.

9514. V. DE PORTUGAL ARTIFICIAL.

ʒ Sidra. ʒxxxjv (1060 gr.).
Aguardiente. ʒxij (360 gr.).
Goma quino. ʒj (4 gr.).
Si se añade ʒj (4 gr.) de éter nítrico alcoholizado en lugar de la

goma quino, se tiene un licor que simula el *vino añejo del Rhin* (segun Wylle).

9515. V. PURGANTE.

℥ Sen. ℥j (30 gr.).
 Agárico blanco. . . ℥jβ (6 gr.).
 Crémor de tártaro. . ℥iij (12 gr.).
 Cebolla albarrana,
 Enula,
 Marrubio, ãã. . . . ℥iij (90 gr.).
 Lirio. ℥vj (180 gr.).
 Gengibre. ℥Ljv (3 gr.).
 Vino. ℔iij (1500 gr.).
 Tintura de genciana. ℥iij (12 gr.).
 I. Afecciones atónicas y como purgante. D. ℥j á ℥iij (30 á 90 gr.).

9516. V. DE QUASIA AMARGA.

℥ Quasia amarga. . . ℥j (30 gr.).
 Alcohol de 21° Cart. ℥j (30 gr.).
 Vino blanco. ℔ij (1000 gr.).
 H. S. A.

9517. V. DE QUINA.

℥ Quina amarilla en polvo. . . . 360
 Cáscaras de naranja. 18
 Vino para los vinos medicinal. 5400
 Alcohol á 82° cent. 462
 Azúcar. 324
 Vino blanco. 4914
 Se macera durante ocho dias, se exprime y se filtra.

Una onza (30 gr.) representa el macerado de ℥β (2 gr.) de quina y ℥ij (10 cent.) de cáscara de naranja.

Del mismo modo se prepara el vino de PENSAMIENTO SILVESTRE, ESCILA, etc.

9518. Otro, n. 2.

℥ Quina. 4
 Vino tinto. 32
 Se filtra á los ocho dias y se añade:
 Tintura de genciana. 3

TOMO IV.

Tintura de quina. 3

9519. Otro, n. 3.

℥ Quina. 4
 Vino blanco. 12
 ó Vino de Madera. 16

9520. Otro (F. F.).

℥ Quina de Loja. . . . ℥ij (64 gr.).
 Vino tinto generoso. ℔ij (1000 gr.).
 Alcohol de 21° Cart. ℥jv (125 gr.).
 Se vierte el alcohol sobre la quina quebrantada; á las veinticuatro horas se añade el vino, se macera durante ocho dias agitando de cuando en cuando, se cue-la y se filtra.

En otro tiempo se le usaba como febrífugo; pero es muy corta su accion, por lo que en la actualidad solo se emplea como tónico en los ancianos, en los individuos debilitados por una enfermedad aguda ó por una larga supuracion. Se debe preferir como tónico y antifebril el *vino febrífugo de quina*.

D. De ℥j á ℥jv (30 á 120 gr.) al dia.

9521. Otro, n. 2.

℥ Quina gris. ℥jv (125 gr.).
 Quasia amarga,
 Corteza de Winter,
 Nar. amarga, ãã. . . ℥β (15 gr.).
 Alcohol de 21° . . . ℔ij (500 gr.).
 Vino generoso. . . 6 quart. (3 lit.).
 H. S. A. D. 3v á ℥iij (20 á 100 gr.).

9522. V. DE QUINA COMPUESTO,
Vino de quina ferruginoso, Vino tónico y antiperiódico.

℥ Quina,
 Limad. de hierr., ãã. ℥β (15 gr.);
 Canela. ℥ij (8 gr.).
 Azúcar. ℥j (30 gr.).
 Vino blanco. ℔ij (1000 gr.).

I. Blenorrea, leucorrea, calenturas intermitentes ó adinámicas, atonía, edema, caquexia, leucoflegmasia, hidropesías, convalecencias.

D. Dos á cuatro cucharadas mañana y noche.

9523. V. DE QUINA COMPUESTO.

℞ Quina,
Cálamo aromático,
Galanga,
Zedoaria,
Cásc. de naranja, ãã. ʒß (15 gr.).
Ajenjos,
Centaura,
Manzanilla, ãã. . . ʒij (8 gr.).
Alcohol. ʒij (60 gr.).
Vino de Jerez. . . . ʒxvij (530 gr.).

9524. V. DE QUINA COMPUESTO (F. P.).

℞ Quina buena. 96
Raiz de genciana. 32
Parte amarilla de la cáscara
de naranja. 8
Vino blanco generoso. 1000
Alcohol de 22° B. 125

Se macera durante ocho días y se cuele.

D. Media onza á ʒij (15 á 60 gr.) y mas.

9525. V. QUINADO (H. DE M.).

℞ Quina calis. gruesamente pulverizada,
Alcohol de 24° B., ãã. ʒj (30 gr.).
Vino blanco. ℔ij (1000 gr.).

Se infunde durante veinticuatro horas y se cuele.

I. Se usa como tónico en las debilidades del conducto digestivo.

9526. V. DE QUINA Y VALERIANA.

℞ Quina amarilla real
quebrantada. . . . ʒiij (100 gr.).
Raiz de valeriana
quebrantada. . . . ʒjß (50 gr.).

Se echa en Alcohol á 85° cent. ʒvj (200 gr.);

y despues en

Vino blanco ácido. . ℔ij (1000 gr.).

Se deja macerar durante ocho dias y se decanta.

I. Calenturas intermitentes. **D.** ʒiij (90 gr.) al dia.

9527. V. DE RUIBARBO.

℞ Ruibarbo. ʒj (32 gr.).
Canela. ʒj (4 gr.).
Vino de Málaga. . . . ℔ij (1000 gr.).

Se macera durante ocho dias, se cuele con expresion y se filtra.

I. Es tónico excitante, ligeramente laxante, elogiado en la hipochondria y en las diarreas, etc. **D.** ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

9528. V. ANTIMONIAL DE HUXHAM.

℞ Vino de Málaga. ʒj (30 gr.).
Emético. ʒi (5 cent.).

H. S. A. I. Supresion de la traspiracion. **D.** De treinta á cuarenta gotas en un vehículo apropiado.

9529. V. DE RUIBARBO COMPUESTO.

℞ Vino de Málaga. ℔ij (500 gr.).
Ruibarbo en polvo,

Alcohol, ãã. ʒij (60 gr.).
Canela blanca. ʒj (4 gr.).

Se maceran durante siete dias y se filtra.

I. Diarrea y debilidad de estómago. **D.** De ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

9530. Otro, n. 2.

℞ Vino de Madera. ℔ij (500 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . ʒij (60 gr.).
Canela. ʒj (4 gr.).

Se macera durante siete dias y se filtra.

I. Diarrea, etc. *D.* $\bar{3}j$ á $\bar{3}ij$ (30 á 60 gr.).

9531. V. DE RUIBARBO Y ÉNULA CAMPANA ó *Tintura de Darel.*

$\bar{2}$ Ruibarbo. $\bar{3}j$ (30 gr.).
 Enula campana. $\bar{3}B$ (15 gr.).
 Corteza de naranja.
 amarga. $\bar{3}ij$ (8 gr.).
 Cardamomo menor. $\bar{3}j$ (4 gr.).
 Vino de Madera. $\bar{3}xjv$ (450 gr.).
 H. S. A.

9532. V. ROSADO.

$\bar{2}$ Rosas rojas secas. $\bar{3}jv$ (125 gr.).
 Vino tinto generoso. $\bar{1}bj$ (1000 gr.).
 Se macera durante ocho dias y se cuela.

I. Ulceras indolentes. *D.* Se usa exteriormente en inyecciones ó para tópicos. Es un tónico astringente poderoso.

9533. V. SUDORÍFICO ú *oenolado sudorífico (Dr. Smith).*

$\bar{2}$ Extr. sudorífico
 del Dr. Smith. $\bar{1}bj$ (500 gr.).
 Vino generoso. 7 cuart. ($3\frac{1}{2}$ lit.).
 Aceite volátil de
 sasafrás. 64 gotas.

Se agita el aceite con el vino, se disuelve el extracto en la mezcla y se filtra despues la solucion.

Nota. Cada onza (30 gr.) de esta preparacion representa una cantidad igual de especies sudoríficas, y contiene $\bar{3}j$ (4 gr.) de extracto y media gota de aceite de sasafrás; cada cucharada representa $\bar{3}jv$ (16 gr.) de especies sudoríficas, y contiene $\bar{3}B$ (2 gr.) de extracto y una cuarta parte de gota de aceite de sasafrás.

9534. V. DE SULFATO DE QUININA (*Beral*).

$\bar{2}$ Vino de Málaga. $\bar{1}bj$ (500 gr.).

Sulfato de quinina. $\bar{g}xvj$ (8 dec.),
 Acido sulfúrico. 16 gotas.
 Cada onza (30 gr.) contiene $\bar{g}j$ (5 cent.) de sulfato de quinina.

9535. V. DE SULFATO DE QUININA (*Magendie*).

$\bar{2}$ Sulfato de quinina. $\bar{g}xij$ (6 dec.).
 Vino bueno de Ma-
 dera. $\bar{1}bj$ (1000 gr.).
 H. S. A.

Nota. Se puede hacer esta preparacion con vino de Málaga ó comun. Se la puede preparar poniendo $\bar{3}ij$ (60 gr.) de alcohol de quinina por dos cuartillos (1 lit.) de vino.

I. Calenturas intermitentes, calenturas atáxicas, síncope, gangrena de hospital. *D.* De $\bar{3}j$ á $\bar{3}ij$ (30 á 60 gr.) á cucharadas, cada dos horas.

Nota. Cada onza (30 gr.) contiene tres cuartas partes de grano de sulfato de quinina.

9536. V. DE TABACO (*H. DE AL.*).

$\bar{2}$ Hojas de tabaco. $\bar{3}j$ (30 gr.).
 Vino blanco. $\bar{3}xij$ (375 gr.).
 Se macera duranté ocho dias y se filtra.

I. Ciertas hidropesías. *D.* Cinco á cincuenta gotas en un vehículo apropiado.

9537. V. TREMENTINADO.

$\bar{2}$ Esencia de trement. $\bar{3}ijB$ (10 gr.).
 Zumo de limon. $\bar{3}j$ (30 gr.).
 Vino blanco. $\bar{3}jv$ (125 gr.).

M. I. Hidropesías, ascitis, anasarca, leucoflegmasia. *D.* $\bar{3}ij$ (60 gr.) mañana y noche.

9538. V. TÓNICO (*Vogel*).

$\bar{2}$ Centaura menor,
 Cardo santo,
 Ajenjos,
 Trébol de agua, $\bar{a}\bar{a}$. $\bar{3}jB$ (48 gr.).
 Manzanilla. $\bar{3}ijB$ (10 gr.).

Eléboro negro,
 Sen, ãã. ℥℔ (16 gr.).
 Quina. ℥j (32 gr.).
 Crémor de tártaro. . ℥vj (24 gr.).
 Vino blanco. . . . ℔ij (1000 gr.).
 Agua. ℔j (500 gr.).

Se digieren durante algunos dias y se cuecla.

I. Calenturas intermitentes rebeldes, enfisema, leucoslegmasias, viruelas. *D.* Un vaso tres veces al dia.

9539. V. TÓNICO AMARGO
(Cottereau).

℥ Tintura alcohólica de quina,
 Tintura alcohólica de genciana,
 Tint. alc. de lúp., ãã. ℥j (30 gr.).
 Vino de Madera. . . . ℔j (500 gr.).
 Se mezcla, se filtra en una vasi-
 ja tapada y se añade S. A. al líquido
 colado:

Jar. antiescorbútico,
 Jarabe de cáscaras de
 naranja, ãã. ℥ij (60 gr.).

I. Raquitis, bocio ó disposicion á las escrófulas en los niños. *D.* Tres cucharadas al dia.

Nota. Se puede aumentar esta dosis por grados hasta el doble y aun mas.

9540. V. TRIACAL.

℥ Triaca. ℥j (4 gr.).

Vino bueno. ℔℔ (250 gr.).
H. S. A. I. Congelacion, afeccio-
 nes atónicas. *D.* Se da en dos tomas
 en el espacio de una hora para
 reanimar las fuerzas de las perso-
 nas medio heladas ó que han caido
 en el agua fria.

9541. V. DE TULIPERO.

℥ Corteza fresca de
 tulipero. ℥iij (100 gr.).

Se quebranta y se añade:

Alcohol rectificado. ℥iij (100 gr.).
 Vino blanco gener. 2 quart. (1 lit.).

Se macera durante ocho dias y se filtra.

I. Se usa con buen éxito contra las calenturas intermitentes. *D.* Un vaso durante la apirexia.

9542. V. DE ZARZAPARRILLA ú
oenolado de extracto de zarzapar-
rilla (Beral).

℥ Vino de Málaga. . . ℔iij (1500 gr.).
 Extr. hidroalcohóli-
 co de zarzapar. . . ℔j (500 gr.).

Se disuelve el extracto en el vi-
 no y se filtra por un papel.

Nota. ℥j (30 gr.) de esta prepa-
 racion representa ℥ij (60 gr.) de
 zarzaparrilla.

I. Gota, reumatismo crónico,
 sífilis.

ZUMOS.

9543. ZUMO.

℥ Yerba reciente de verónica. . . c. s.
 Se contunde, se exprime con
 fuerza, se decanta y en ℔℔ (250
 gr.) se disuelve

Sal amoniaco depurada . ℥ij (8 gr.).

I. Podagra.

9544. Z. ACÍDULOS.

℥ Frutos de grosellas,

Frutos de cerezas,
 Frutos de arándano, ãã. ℥ij (60 gr.).

Se contunde, se exprime, y se
 mezcla el zumo colado y decanta-
 do con

Elcosácaro de cortezas
 de naranja. ℥iij (90 gr.).

9545. Z. DE ACHICORIAS
(F. F.).

℥ Hojas de achicorias mond. . c. s. q.

Se las machaca en un mortero de mármol, se exprime el zumo y se le cuela al través de un filtro de papel.

I. Cálculos biliares.

Del mismo modo se preparan los zumos de HOJAS DE BELLADONA, BORRAJA, CICUTA, ESTRAMONIO, FUMARIA, PÉTALOS DE ROSA, CORTEZA DE RAIZ DE SAÚCO, y en general los de todas las plantas verdes.

Cuando las plantas contienen un zumo demasiado mucilaginoso como las borragíneas, ó no son bastante suculentas como las labiadas, se les añade despues de haberlas machacado la octava parte de su peso de agua para poder extraer el zumo.

9546. Z. DE AGRAZ (F. E.).

Se separan los agraces de sus pedúnculos de modo que queden las bayas limpias, las que se machacan un poco en un mortero de pórfido con miano de madera; se introducen en capuchas de esparto ó pita, que se colocan en la prensa; obteniendo el zumo, se deja sedimentar por algunas horas, y sacado por decantacion se cuela por una manga de lienzo y mejor de bayeta, se vuelve á dejar sedimentar por veinticuatro horas sacándolo por decantacion, para guardarle en botes ó redomas de cristal con tapon de lo mismo ó en las vasijas llamadas agraceras.

I. Diluido en agua se usa contra las diarreas ligeras, calenturas biliosas ó inflamatorias, etc.

9547. Z. ANTIESCORBÚTICOS (F. F.).

- 2 Hojas de berros. 1
- Hojas de coclearia. 1
- Hojas de trifolio acuático. 1

Se machacan en un mortero de mármol, se exprime el zumo y se filtra por papel.

I. Conviene en el escorbuto, escorfulas, enfermedades crónicas de la piel, debilidad general, etc.

D. De $\tilde{\text{B}}$ á $\tilde{\text{ij}}$ (15 á 60 gr.) por la mañana en ayunas. Algunos prefieren hacerle tomar antes ó despues de cenar.

9548. Z. ANTIFLOGÍSTICO (Gaubius).

- 2 Zumo exprimido de achicorias,
- Zumo exprimido de lechuga,
- Zumo exprimido de diente de leon,
- Zumo exprimido de fumaría, añ. $\tilde{\text{ijB}}$ (45 gr.).
- Zumo exprimido de escorzonera. $\tilde{\text{v}}$ (150 gr.).
- Nitro. $\tilde{\text{ijB}}$ (6 gr.).

I. Conviene en el estado inflamatorio de las viruelas. **D.** $\tilde{\text{ij}}$ (30 gr.) de hora en hora.

9549. Z. DE ARANDANO.

2 Fruto del arándano. c. s.
Se los despachurra, se pasan por un tamiz, se dejan fermentar durante dos dias, se cuela y se filtra.

Del mismo modo se preparan los de CEREZAS, GROSELLAS, FRAMBUESAS, LIMON, ERISIMO Y ALELUYA.

I. Subinflamacion, calenturas inflamatorias ó tifoideas, gastritis, embarazo gástrico, calenturas biliosas, escorbuto. **D.** $\tilde{\text{B}}$ á $\tilde{\text{j}}$ (15 á 30 gr.) para acidular las bebidas atemperantes.

9550. Z. DE BELLADONA.

2 Belladona fresca y mondada, c. s. q.
Se machaca la planta en un mortero y se exprime el zumo. Rara vez se usa solo. Se emplea depurado ó no depurado.

I. y D. Véase tomo I, p. 117.

Del mismo modo se preparan los zumos de BELEÑO, TABACO, YERBAMORA Y ESTRAMONIO.

9551. Z. DE CEREZAS (F. F.).

☞ Cerezas encarnadas. c. s. q.
Se despachurren entre las manos sobre un tamiz de cerda, se recoge el zumo y se prensa el residuo; se mezcla el último zumo con el anterior, y se dejan en fermentación por dos días; se filtra después y se conserva por el método de Appert.

I. Véase tomo I, pág. 146.

Del mismo modo se extraen los zumos de AGRACEJO, AGRAZ Y GRANADAS.

9552. Z. DE COCLEARIA COMPUESTO.

☞ Coclearia,
Berro,
Naranjas, ãã. ℥ij (500 gr.).
Espír. de nuez mosc. ℥iij (12 gr.).
Se mezclan las plantas, se exprime el zumo, se añade el alcoholato y se filtra.

9553. Z. DIURÉTICO ó Agua diurética (Duchesne).

☞ Zumo de puerros,
Zumo de cebollas,
Zumo de rábano, ãã. ℥ij (1000 gr.).
Zumo de parietaria,
Zumo de limon, ãã. ℥℥ (250 gr.).
Se digiere durante tres días, y se destila después á fuego suave.
I. Afecciones crónicas de los riñones y de la vejiga. *D.* ℥j (30 gr.) mañana y noche.

9554. Z. DE GROSELLAS (F. F.).

☞ Grosellas encarnadas. 10
Cerezas encarnadas. 1
Se despachurren las grosellas con la mano sobre un tamiz de cerda, se hace en seguida igual

operación con las cerezas, y se presan los residuos; se mezclan los zumos, se bajan á la cueva, y pasadas veinticuatro horas se pone á escurrir sobre un lienzo ó en un tamiz la masa gelatinosa que se habia formado; se somete el residuo á la prensa en un cubo de madera agujereado, forrado interiormente con una tela de cerda y paja, se filtra el líquido que sale; se reúne con el primero, y se conserva por el método de Appert.

I. y D. Véase tomo I, pág. 208.

9555. Z. DE LIMONES (F. F.).

☞ Limones escogidos y muy jugosos. c. s. q.
Se les quita con cuidado la corteza y las semillas, se exprime entre las manos ó en una prensa de mano, se mezcla el residuo con paja de centeno cortada y lavada, y se prensa de nuevo; se deja el zumo en reposo por algun tiempo para que se clarifique, se filtra después por papel, y se conserva por el procedimiento de Appert.

I. y D. Véase tomo I, pág. 235.

Del mismo modo se preparan los zumos de CIDRA Y NARANJAS.

9556. Z. DE LOMBARDA (F. F.).

☞ Hojas de lombarda. . ℥ij (500 gr.).
Agua. ℥iij (96 gr.).
Se cortan en pedazos, se machacan para reducir las á una especie de pulpa, se deslie ésta en el agua prescrita, y se cuele con expresión; se calienta el zumo y después de coagulada la albúmina se filtra.

I. Catarros, enfermedades crónicas de pecho. *D.* Véase tomo I, pág. 239.

9557. Z. DE MEMBRILLOS (F. F.).

☞ Membrillos sin acabar de madurar. c. s. q.

Se limpian con un lienzo áspero para quitarles la borra que cubre su superficie, se reducen á pulpa con un rallo, se mezcla esta con paja de centeno picada y lavada, y se prensa. Se abandona el zumo hasta que por un principio de fermentacion se aclare, se filtra por papel y se conserva por el método de Appert.

Del mismo modo se preparan el zumo de MANZANAS, y los de raices de BRIONIA y de COHOMBRILLO.

I. Diarrea, cuando ha pasado el periodo de la mayor irritacion; inflamaciones de las fáuces y de las agallas, en gargarismo.

9558. Z. DE ESPINO SERVAL (F. F.).

℥ Hojas de espino serval maduras. c. s. q.

Se despachurren entre las manos, y se abandonan por tres ó cuatro dias para que fermenten; se cuele entonces con expresion, se filtra el zumo, y se conserva por el metodo de Appert.

I. Es purgante.

Del mismo modo se preparan los zumos de BAYAS DE SAÚCO, de YEZGOS y de MORAS.

9559. Z. DE REGALIZ VERMÍFUGO (Sorbi).

℥ Zumo de regaliz purificado, Calomelanos, ãã. c. s. para que resulten magdaleones que contengan un quinto, dos quintos de grano ó un grano ó mas.

Esta parte tiene un sabor agradable.

9560. Z. DE FRAMBUESAS Ó SANGUESAS (F. F.).

℥ Sangüesas sin acabar de madurar. c. s. q.

Se despachurren entre las manos sobre una criba, se mezcla el residuo con el zumo, se pone en la cueva por dos ó tres dias; y cuando sobrenada una porcion de líquido claro, se cuele por un lienzo y se prensa el residuo; se filtra el zumo, y se conserva por el procedimiento de Appert.

I. y D. Véase tomo I, pág. 195.

9561. Z. DE YERBAS (F. F.).

℥ Hojas de achicorias. 1
Hojas de fumaria. 1
Hojas de borraja. 1
Hojas de perifollo. 1

Se machacan en un mortero de mármol, se exprime el zumo, y se filtra por papel en un paraje fresco.

I. Depurante y tónico, y aun en el dia todavía se echa mano de él: por otra parte es fácil conocer por el conjunto de estas plantas, achicorias, fumaria, borraja y perifollo, que su zumo debe de ser amargo y depurativo por excelencia. Se emplea principalmente en la primavera y otoño como un ligero tónico en las enfermedades crónicas de la piel, sarna y las escrófulas. D. ʒj á ʒjv (30 á 125 gr.) y aun mas por la mañana generalmente.

9562. Z. DE YERBAS ANTIESCORBÚTICAS.

℥ Zumo de hojas frescas de berro. . 1
Zumo de hojas frescas de coclear. 1
Zumo de hojas frescas de fumaria. 1
D. Dē ʒiij á ʒjv (90 á 125 gr.)

por la mañana en ayunas. Se prolonga su uso durante veinte ó treinta dias.

9563. Z. DE YERBAS DIURÉTICO.

℥ Hojas frescas de borraja. 1
Hojas frescas de parietaria. 1

Hojas frescas de achicoria. 4
 Hojas frescas de perifollo. 4
 H. S. A. \mathfrak{z} jv (125 gr.) de zumo,
 al que se añade:

Acetato de potasa. \mathfrak{z} j (4 gr.).

I. Hidropesías, infartos de las
 visceras abdominales.

9564. Z. DE YERBAS FUNDENTE
 (*Honoré*).

\mathfrak{z} Achicoria. 4
 Diente de leon. 4
 Lechuga. 4
 Perifollo. 4

para obtener \mathfrak{z} jv (125 gr.) de zumo.

I. Cólicos hepáticos. *D.* En una
 toma por la mañana en ayunas.
 Algunas veces se añade \mathfrak{z} j (4 gr.)
 de acetato de potasa.

9565. Z. DE YERBAS PURGANTE.

\mathfrak{z} Zumo de borraja y
 achicoria. \mathfrak{z} jv (125 gr.).

Sulfato de sosa. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (16 gr.).
D. En una toma por la mañana
 en ayunas.

9566. Otro, n 2.

\mathfrak{z} Sal de Glaubero. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (15 gr.).
 Zumo de achicorias. \mathfrak{z} jv (125 gr.).
 Disuélvase. *D.* Se toma de una
 vez por la mañana en ayunas.

9567. Z. DE ZANAHORIAS
 (F. F.).

\mathfrak{z} Raíces de zanahorias. c. s. q.
 Se rallan para reducir las á pul-
 pa, se prensan y se filtra el zu-
 mo para clarificarle.

I. Lombrices, angina, tisis, ic-
 tericia.

La dosis es casi indiferente.

PARTE CUARTA.

AGUAS MINERALES.



Se da el nombre de *aguas minerales medicinales* á los manantiales minerales que por su temperatura elevada ó proporcion de la naturaleza de las materias que contienen disueltas, tienen caracteres particulares que las hacen impropias para los usos ordinarios de la vida, y les comunican propiedades especiales de que la medicina puede sacar partido para la curacion de las enfermedades.

Las aguas minerales se parecen con frecuencia al agua comun, pero algunas veces tienen color por el hierro, el cobre ó las materias orgánicas; su sabor varía mucho y generalmente es característico; es á tinta en las ferruginosas, picante en las acídulas, á huevos podridos en las sulfurosas, alcalino en las que contienen mucho carbonato de sosa, y amargo en las mineralizadas por las sales de magnesia. Algunas son cristalinas, muchas se enturbian apenas nacen ó poco despues.

Contienen los gases oxígeno, ázoe, ácido carbónico é hidrógeno sulfurado; los ácidos sulfúrico, sulfuroso, bórico ó clorhídrico; las sales de base de sosa, de cal, de magnesia, cuyos ácidos mas comunes son el sulfúrico, el carbónico y el clorhídrico; algunas contienen sulfuros alcalinos y en otras se encuentran materias de naturaleza orgánica. La mayor cantidad de estos diversos principios ha servido de base para su clasificacion; pero como muchos existen en una misma agua, tienen caracteres mistos, se las puede colocar en distintas clases y no es posible clasificarlas bien.

Las materias disueltas en las aguas minerales son encontradas en los terrenos subterráneos que recorren, y se apoderan de ellas poco á poco ó se forman en circunstancias que han sido constantes duran-

te muchos siglos. Los volcanes son uno de los elementos de la formación de los principios que se hallan en las aguas minerales: el ácido carbónico, el clorhídrico y el sulfúrico son sus productos habituales. La acción disolvente del agua sobre las rocas poco solubles, los fenómenos de descomposición que puede determinar, y las reacciones químicas que resultan necesariamente de las fuerzas electromotrices que sin cesar están en acción en la naturaleza, concurren de un modo eficaz á suministrar á las aguas minerales los principios que en ellas encontramos.

Se ha adelantado muy poco acerca del origen de los principios constituyentes de las aguas minerales, pues salen aguas minerales de todos los terrenos. Muchas veces las materias que en ellas existen no tienen ninguna relación con el terreno por donde se las ve salir, y á veces sucede lo contrario. En una misma población nacen aguas minerales de composición análoga, y á veces en un mismo punto se observa mucha diferencia en los manantiales.

Las aguas minerales al tiempo de salir dejan desprender gran cantidad de sustancias gaseosas que son arrastradas con el agua en los conductos subterráneos, ó son disueltas por la fuerte presión á que están sometidas y apenas cesa ésta se desprenden. Estos gases son el ácido carbónico, el azoe y el aire atmosférico, etc. Unas veces salen con el aire á modo de corrientes, ó atraviesan el agua un gran número de ampollas y se rompen en su superficie.

Varía mucho la temperatura de las aguas minerales, pues en unas es mas baja y en otras mas elevada que la de la atmósfera, y aun á veces próxima á la del agua hirviendo; en otras es igual á la del aire ó mas baja. Las primeras se han llamado *calientes* ó *termales*; las segundas han recibido el nombre de *frias*.

La temperatura de las aguas minerales puede depender en unos casos de los volcanes apagados hace mucho tiempo, en otros del calor central de la tierra; en algunos casos la que tienen al salir no puede servirnos para apreciar la que tienen en el foco, pues la pierden al atravesar los terrenos ó se mezclan con agua fria; sucede á veces que ciertos manantiales tienen una temperatura elevada porque siguen la misma dirección que un manantial termal.

Es muy notable que las aguas minerales presenten siempre los mismos fenómenos, tanto en la cantidad como en la composición, temperatura y desprendimiento de gas. Pero á pesar de esto es posible que se haya exagerado esta constancia, pues la cantidad de los elementos debe variar un poco porque las causas que los producen se consumen ó disminuyen de acción, y es de esperar que luego que las aguas sean mejor conocidas se noten mas las diferencias. Se ha observado tambien que algunas aguas se alteran antes de las tempestades, antes de las variaciones del tiempo y segun el calor. Los tem-

blores de tierra violentos modifican la composición de las aguas minerales.

Composicion. Las aguas minerales contienen gases que se desprenden en su superficie, gases disueltos en el agua, ácidos libres, álcalis libres, sales, composiciones hepáticas del azufre y materias de naturaleza orgánica.

Los gases, unos se desprenden de las aguas minerales y otros se hallan disueltos ó libres: entre los primeros se cuentan, según su frecuencia, el ácido carbónico, el azoe, el oxígeno, el aire atmosférico, el hidrógeno sulfurado, y rara vez el hidrógeno ó el hidrógeno carbonado; en las inmediaciones de los volcanes se hallan el ácido sulfuroso y á veces el ácido sulfúrico mezclados con vapores acuosos.

Los gases que se hallan disueltos en el agua son el aire atmosférico, que comunmente es mas rico en oxígeno, el ácido carbónico, el ácido sulfuroso y el hidrógeno sulfurado.

Entre los ácidos libres se cuentan el ácido carbónico, el ácido sulfuroso, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el ácido bórico.

La sosa es la única base que se halla en estado de libertad en las aguas minerales.

Las sales mas comunes son los sulfatos, los carbonatos y los muriatos (cloruros), y sus bases mas comunes son la sosa, la cal, la magnesia y el óxido de hierro. Entre los carbonatos se hallan en gran número de aguas los de cal, de magnesia, de sosa y de hierro; pero en otras se halla el de litina, de barita, de estronciana, de manganeso, que es muy comun en las aguas ferruginosas, el de alúmina y el de cobre. Los carbonatos de potasa ó sosa dan á las aguas propiedad alcalina, y su presencia da al residuo de la evaporacion la propiedad de hacer efervescencia por los ácidos; los carbonatos térreos y el de hierro se hallan en disolucion por el ácido carbónico.

Los sulfatos mas comunes son los de sosa, cal y magnesia, el de hierro lo es mas, y mas aún el de alúmina; pero tambien se encuentran los de manganeso y estronciana. Los nitratos mas comunes son los de potasa, cal y magnesia. Son muy raros los fosfatos, pero se han observado los de potasa, de sosa, de alúmina, el de magnesia y el de cal. Los fluatos son raros y poco abundantes y solo se halla el de cal. Se encuentran en la naturaleza los boratos de sosa y amoníaco. Los cloruros de magnesio y sodio son muy frecuentes, y el de calcio es mas raro: se ha hallado tambien el de manganeso.

Respecto á las bases se observa que la potasa es rara, pero se encuentra comunmente en estado de nitrato en las aguas que atraviesan los terrenos cargados de materias orgánicas, y en estado de alumbre en algunas aguas ferruginosas; se la ha visto tambien en estado de fosfato y acetato; que la sosa es muy comun y está combinada

principalmente con los ácidos sulfúrico y carbónico en estado de sal marina y también se halla unida al ácido fosfórico; que la litina es muy rara; que el amoníaco es una base rara y se encuentra en estado de carbonato, clorhidrato ó borato, ó unido con los ácidos crénico y apocrénico; que la cal es muy común, principalmente en estado de carbonato y sulfato, pero se la ha observado en algunas aguas en el de fosfato, fluorato, silicato ó nitrato; que la magnesia está en el mismo estado que la cal, y siempre unida con ella; que la barita y la estronciana son raras, y Bergman ha hallado el cloruro de bario, pero es dudoso, si bien se ha encontrado el carbonato; que la estronciana es menos rara que la barita y se la ha notado en estado de sulfato y carbonato, y finalmente que la alúmina parece ser bastante común en las aguas minerales, y se halla en estado de sulfato, de fosfato, silicato y aun se dice que en el de carbonato.

El hierro es uno de los elementos mas importantes que entran en la composición de las aguas, pues tienen propiedades especiales á poca cantidad que de él contengan.

Se reconocen fácilmente las aguas que tienen hierro en disolución, en que tienen un sabor á tinta mas ó menos marcado; en que se enturbian mas ó menos pronto en contacto del aire y dejan separar un depósito rojizo; en que el cianuro de potasio ferrurado forma un precipitado azul, principalmente si se añade antes un poco de cloro ó ácido nítrico. Cuando el licor contiene un exceso de carbonato alcalino y no se le ha acidulado antes, el agua toma solo un color verde, y al cabo de algunas horas forma un depósito azul verdoso.

El hierro se halla en las aguas en estado de carbonato ó de sulfato, ó en el de crenato como en muchas aguas minerales ferruginosas de Galicia. El manganeso acompaña comúnmente á esta especie de aguas, y se le ha encontrado en el estado de sulfato, de cloruro y en el de carbonato.

Además en algunas aguas minerales se encuentra el cobre y el zinc, el primero en estado de carbonato y el segundo en estado metálico; y se dice se ha hallado el arsénico en estado de sulfuro en Bañeras de Bigorre, Bañeras de Luchon, de Pougues, Bussang, Vichy, Chateldon, Plombières, etc., en Francia; y en las de Wiesbaden, Ems, Pyrmont, Spa, etc., en Alemania.

El azufre contenido en las aguas minerales en estado de sulfuro alcalino ó de hidrógeno sulfurado da al agua el olor y sabor de los huevos podridos, que son característicos; pero las aguas sulfurosas no contienen el azufre en el mismo estado de combinación. Se distingue: 1.º las aguas que solo contienen gas hidrógeno sulfurado; 2.º las que contienen sulfuros; 3.º las que contienen á la vez hidrógeno sulfurado y sulfuros, y 4.º las que contienen á la vez hidrógeno sulfurado, sulfuros y ácido carbónico.

Materias orgánicas contenidas en las aguas minerales. Es difícil determinar con exactitud cuál es la naturaleza de las materias orgánicas contenidas en las aguas minerales por no haberlas estudiado bien. En algunas aguas se encuentra una sustancia que tiene olor y sabor á caldo, como sucede á las de Baden; en otras es una materia resinosa, un aceite concreto, un betun ó un aceite es-
pirituoso; y en otras es una materia extractiva ó los ácidos crénico y apocrénico. Se ha hallado tambien acetato de potasa y ácido fórmico. En cierto número de manantiales se halla una materia azoada que probablemente tendrá la misma naturaleza en todas, pues se la compara á la gelatina, á la albúmina, á un principio jabonoso ó fibroso.

Vauquelin y principalmente Anglada han hecho investigaciones sobre la materia animal de las aguas de Vichy y de los manantiales sulfurosos de los Pirineos, y le han dado el nombre de *glerina* ó *baregina*.

El poso que dejan las aguas minerales varía segun su composicion. Las que están cargadas de carbonatos térreos disueltos por medio del ácido carbónico son las que forman depósitos mas comunes, pues á medida que se desprende el ácido carbónico, se precipitan las sales, y elevan sin cesar el fondo de la fuente que les da origen cubriéndole de una incrustacion calcárea. Las aguas que contienen á un tiempo carbonatos térreos y de hierro ofrecen de particular que el primer depósito que forman es muy ferruginoso y de color muy oscuro; pero á medida que se forman otros son de cada vez menos oscuros, hasta que los últimos están completamente despojados de óxido de hierro.

En algunas aguas se forman unos posos sin consistencia que se usan en embarros, y contienen todas ó casi todas las materias que existian en las aguas y se depositan al contacto del aire; se emplean contra las parálisis é infartos locales. En algunos casos estos posos son sulfurosos aunque no provengan de aguas sulfurosas, porque las materias animalizadas del agua ó las introducidas artificialmente pasan á putrefaccion. Si las aguas contienen sulfatos se descomponen y se convierten en sulfuros.

Clasificación de las aguas minerales. Se ha dividido las aguas minerales segun los principios que en ellas predominan, pero teniendo mas en consideracion las virtudes que la cantidad de estos principios; así las aguas ferruginosas y las aguas sulfurosas contienen menos hierro ó menos productos hepáticos que salinos, pero como los primeros las caracterizan, se atiende á dichos principios para que sirvan de base á esta clasificacion. En algunos casos es muy difícil colocar una agua en una clase, porque hay aguas que tienen propiedades mistas, por las que están tan bien colocadas en una seccion como en otra; en esto depende las variaciones que se observan en la clasificacion de las aguas minerales hecha por distintos autores.

Los antiguos las han dividido en *frías*, *tibias*, *calientes* ó *termales*, segun que su temperatura iguala ó excede á la del aire.

A medida que la química progresó y se procuró imitar la composición de las aguas minerales, se las dividió en *naturales* y *artificiales*. Monnet las divide en tres clases: alcalinas, sulfurosas y ferruginosas. Fourcroy distingue nueve clases, á saber: acídulas frías, acídulas calientes, sulfúricas salinas, muriáticas salinas, sulfurosas simples, sulfurosas gaseosas, ferruginosas simples, ferruginosas acídulas, y sulfúricas ferruginosas. Duchanoy ha hecho diez órdenes, á saber: gaseosas, alcalinas, térreas, ferruginosas, calientes, simples termales, jabonosas, sulfurosas, bituminosas y salinas.

Por numerosas que sean estas divisiones no pueden comprender exactamente las variedades de las aguas minerales, por lo que es mejor clasificarlas segun su principio predominante, y dividir las como Bergman en cuatro clases, á saber: aguas minerales hidrosulfurosas, acídulas, ferruginosas acídulas y salinas, que es la clasificación generalmente adoptada hasta ahora.

Soubeiran ha propuesto dividir las aguas minerales en seis clases, á saber: aguas salinas, aguas acídulo-gaseosas, aguas ferruginosas, aguas sulfurosas, aguas ioduradas ó bromuradas y aguas ácidas.

Chenu divide las aguas minerales segun sus principios constitutivos en: 1.º aguas *sulfurosas*; 2.º aguas *salinas*; 3.º aguas *metálicas*; 4.º aguas *gaseosas*; 5.º aguas *ioduradas*; 6.º aguas *ácidas*, y 7.º aguas *termales simples*.

Aguas minerales artificiales. No siendo posible en algunos casos que los enfermos puedan ir á tomar las aguas minerales naturales, ó no pudiendo ser trasportadas por el cambio que algunas experimentan, se ha creado un arte nuevo, cual es la preparación de las aguas minerales artificiales.

Las aguas minerales naturales deben preferirse á las artificiales cuando no se conservan mucho tiempo sin alterarse. Pueden usarse indiferentemente cuando se las ha imitado completamente, á saber: cuando han sido analizadas por un químico hábil y esta análisis ha servido de base para fabricar el agua artificial; cuando no entra en la composición de la mineral ninguno de los principios que no podemos formar artificialmente, y no se sospecha la existencia de algun principio que se haya escapado á la análisis; y finalmente cuando el estudio comparativo y continuado de las propiedades medicinales de las dos especies haya demostrado que tienen una acción idéntica sobre la economía viviente. Hay casos en que se deben preferir las aguas artificiales, por ejemplo, cuando por haber cargado de mayor cantidad de ácido carbónico á las aguas ferruginosas ó salinas se las hace

mas agradables, mas digestibles, sin debilitar las demás propiedades.

Virtudes medicinales. Las aguas minerales no convienen en las enfermedades agudas ni en las flegmasias un poco vivas, porque el curso rápido de estas afecciones reclama el uso de medios activos y pronto, pero producen buenos efectos en las enfermedades crónicas. Tomadas en el manantial son mas eficaces.

Las aguas minerales obran sobre dos grandes superficies, sobre la membrana mucosa gastro-intestinal y ramificaciones nerviosas del gran simpático ó sobre los tegumentos. Esta excitacion reacciona sobre los órganos con que tienen simpatías, activan sus funciones y modifican su vitalidad. Así cuando se usan en bebida el estómago recibe su primera accion, participa de ella el conducto intestinal é imprime actividad en estas partes; si esta es demasiada, se presenta el vómito ó la diarrea, si no reacciona sobre otro órgano; pero si se trasmite secundariamente á la piel ó los riñones, pueden obrar como purgantes, sudoríficas ó diuréticas. Cuando se usan en baño obran del mismo modo que sobre el estómago: excitan la piel, aumentan sus funciones y se presenta el sudor.

En general las aguas minerales reaniman la circulacion lánguida, imprimen nueva direccion á la fuerza vital, restablecen la diaforesis y otras secreciones viciadas ó suprimidas, provocan la aparicion de exantemas, de diviesos y de evacuaciones saludables por la orina, las deposiciones ó la traspiracion, y producen en la economía un cambio profundo, que tempera en cierto modo el cuerpo del enfermo. Pero es preciso confesar que el viaje, el alejamiento de los sitios que han sido testigos de los males que se ha padecido, el abandono momentáneo de todos los negocios, la esperanza de obtener pronto la curacion, el aire puro, un régimen sano, la regularidad en el uso metódico del tiempo, en tomar las aguas, los baños, en comer, en divertirse, etc., secundan la accion medicinal de las aguas.

Se usan las aguas minerales en bebida, baños, lociones, chorros, en vapor y en embarros.

Se usan en baños y chorros al mismo tiempo que en bebida. Generalmente solo se usan en baños las aguas termales al calor natural; se mitiga cuando es fuerte ó se las calienta cuando la temperatura es baja. El efecto de los baños y chorros termales depende de sus propiedades físicas y químicas; influyen además la extension del vapor, la altura de la caida del agua, la direccion y el diámetro de los tubos conductores.

Los baños de vapor de aguas minerales tienen las mismas propiedades que los baños acuosos de estufas, á no ser que contengan gas hidrosulfúrico, ácido carbónico ú otro.

Los embarros obran de un modo análogo al agua que los impregna,

pero generalmente son mas activos que los baños , porque las sustancias activas se hallan mas concentradas y amalgamadas con las materias térreas que les dan la consistencia de una especie de cataplasma.

La duracion de los baños varia segun las propiedades físicas y químicas de las aguas minerales , que se emplean segun la naturaleza de la enfermedad que se quiere combatir , el objeto que se espera , y sobre todo segun la constitucion particular del enfermo. Los baños frios , tales como los de agua de mar , deben ser de corta duracion ; son en cierta manera baños de inmersion con afusion. Los baños muy calientes á mas de 40° deben administrarse con las mismas precauciones y deben ser muy cortos , porque pueden producir congestiones cerebrales ó pulmonares. Para asegurar el efecto de las aguas minerales es preciso evitar las variaciones de temperatura , abrigándose bien al salir del baño , y que sea trasladado el enfermo á la cama bien tapado. Se procurará no producir en ciertos casos sudores excesivos.

Se modificará la aplicacion de las aguas minerales segun las circunstancias. En ocasiones es útil combinar con las aguas minerales otros medios terapéuticos , ya para suavizar sus efectos , ya para aumentar sus propiedades ; así se mezcla el agua que se ha de beber con cocimientos relajantes , mucilaginosos ó con leche. En algunos casos es ventajoso tomar en bebida aguas minerales diferentes de las que se usan en baños ó en chorros.

Segun se expuso antes , se ha adoptado generalmente la division de las aguas en sulfurosas , acídulas , ferruginosas y en salinas.

Estas aguas , llamadas tambien *hidrosulfurosas* , *sulfuradas* ó *hepáticas* , toman su nombre del gas hidrógeno sulfurado ó del sulfuro de sodio que contienen.

Propiedades físicas. El olor de estas aguas es mas ó menos fétido , y tiene mucha relacion con el de los huevos podridos ó recién cocidos. Expuestas al aire ó á un calor suave y continuado pierden su olor , sabor y sus propiedades ; en su mayor parte son termales , pero hay algunas frias. Todas contienen mayor ó menor cantidad de una materia pseudo-orgánica , conocida con el nombre de *baregina* ó *glerina*.

Propiedades químicas. Las aguas sulfurosas ponen pardos ó ennegrecen los metales blancos , tales como la plata , el plomo , el bismuto y el mercurio ; precipitan en negro el acetato de plomo , depositan azufre cuando se las expone al aire , y el azufre se halla en estado de hidrógeno sulfurado ó de sulfuro. Contienen además tan corto número de materias fijas , que no se puede esperar de ellas efectos terapéuticos bien marcados. No sucede lo mismo á los principios volátiles que se hallan en proporcion mas considerable , pero el principio sulfuroso se altera tan pronto que se pierde enteramente. Contienen además ázoe y ácido carbónico.

Propiedades medicinales. Las aguas sulfurosas son muy excitantes: estimulan la membrana mucosa gastro-intestinal, y segun que sean mas ó menos bien digeridas determinan aumento ó disminucion del apetito, el estreñimiento ó la diarrea; aceleran el pulso, producen una sensacion de ardor interior, insomnio y agitacion; á veces causan una embriaguez pasajera, y concluyen por un sudor abundante, exantemas ó un flujo excesivo de orina, que sirven de crisis en la mayor parte de las enfermedades crónicas. Por esta accion tan enérgica no se las puede administrar mas que en las enfermedades en que hay que despertar la accion vital ó cuando los enfermos son mas bien linfáticos que sanguíneos.

Se las recomienda interiormente contra las enfermedades crónicas de la piel, las efélides, disposicion á las erisipelas, diviesos, principalmente en las afecciones herpéticas ó epsóricas antiguas sin flegmasia local é independientes del virus venéreo; y no son saludables sino cuando hay inercia en las propiedades vitales de la piel ó los enfermos son poco irritables. Durante su uso se procurará vigilar el estado de la piel, pues se suspenderá el uso de los baños cuando haya flógosis de ésta, y se recurrirá á los remedios apropiados. La temperatura de los baños variará segun la irritacion local, y solo convendrán los baños calientes cuando la piel se halle en un estado de entorpecimiento ó atonía, y son mas ventajosos los baños templados ó un poco frescos, que calman las comèzones. En muchos casos convendrá tomarlas al mismo tiempo en bebida.

Se las ha elogiado tambien en las enfermedades crónicas de pecho, como el catarro pulmonar, la neumonía, la pleuresía, el asma y la tisis; pero solo convendrán cuando estas enfermedades no estén acompañadas de una irritacion demasiado viva, no haya fiebre héctica, y principalmente cuando son producidas por la retropulsion de los principios reumático, gotoso, herpético ó epsórico; y entonces serán útiles produciendo una revulsion á la piel, reduciendo las secciones cutáneas á su estado normal y llamando los flúidos del centro á la circunferencia: y la curacion será mas cierta si se presenta una crisis por sudores ó por deposiciones, cuando se restablecen los flujos suprimidos, aparecen exantemas, diviesos ó abscesos en el tegido celular subcutáneo. Respecto á la tisis, las aguas sulfurosas han sido útiles en el primer grado, cuando los tubérculos son recientes ó poco numerosos; pero si existen grandes cavernas, fiebre héctica, demacracion y esputos purulentos, aceleran la muerte de los enfermos.

Son sumamente eficaces en el tratamiento de heridas, principalmente de armas de fuego, pues las cicatrices viciosas se relajan, hacen expeler los proyectiles introducidos en las carnes, y disminuir ó cesar las anquilosis incompletas, la rigidez, la retraccion de

los tendones y de las fibras musculares. Los chorros sulfurosos son muy eficaces en la curacion de las úlceras callosas, fistulosas ó inveteradas, á las que reducen al estado de úlcera simple.

Los efectos admirables que producen dependen de la naturaleza de las aguas y del grado de calor. Excitan una fiebre local, aumentan la supuracion, favorecen la detersion de las úlceras y funden las callosidades. En las úlceras fistulosas, que comunmente dependen de que permanece dentro de las carnes un pedazo de camisa ó del vestido, la nueva inflamacion con aumento de supuracion que produce el chorro determina comunmente la expulsion de los cuerpos extraños. En muchos casos hay que auxiliar la salida de estos cuerpos con inyecciones, dilataciones, contraaberturas para evitar la estancacion del pus, y en los casos en que la enfermedad sea producida por la caries, descubrir el hueso afectado y quitar la parte cariada. En algunos de estos casos para auxiliar los buenos efectos del chorro, se beberá por la mañana en ayunas algunos vasos de agua mineral y se tomarán baños templados.

Se emplean tambien con ventaja en las escrófulas, raquitis é infartos lentos de los gánglios linfáticos, y se usarán las aguas sulfurosas suaves en los niños muy irritables. Se auxilia el tratamiento con el uso del iodo y del aceite de hígado de bacalao ó de raya.

Se ha creido que las aguas sulfurosas eran dañosas cuando existian enfermedades venéreas; pero por el contrario contribuyen á hacerlas aparecer cuando están ocultas, ó solo se sospecha su existencia; los baños sulfurosos auxilian mucho el tratamiento mercurial, reparan los males producidos por la mala administracion del mercurio ó simplifican las enfermedades curando una de ellas.

Son muy eficaces, lo mismo que todas las aguas termales, contra los reumatismos, ceática, lumbago, cuando son antiguos y no tienen carácter inflamatorio. Son muy saludables en los reumatismos musculares y dañan á los nerviosos y gotosos.

Son útiles en la inapetencia, agrios de estómago rebeldes por atonía de las vísceras digestivas; en la clorosis, debilidad general, gonorreas inveteradas, flores blancas, poluciones nocturnas, temblores y parálisis por las preparaciones saturninas, infartos vasculares de las vísceras del bajo vientre, catarros crónicos de la vejiga y arenillas. Se emplean en inyecciones contra la sordera sostenida por humor herpético ó escrofuloso.

Las estufas sulfurosas producen buenos efectos en las enfermedades que provienen de la supresion de la traspiracion, disipan los edemas locales y vuelven su flexibilidad á los miembros. Se ha aconsejado la inspiracion del gas hidrógeno sulfurado á los tísicos. Los embarras sulfurosos resuelven los edemas de los miembros y vuelven á los mismos el resorte que habian perdido.

Dañan á los individuos de temperamento sanguíneo, pletórico, á las personas dispuestas á las congestiones cerebrales, á la epilepsia, al aneurisma, y en todas las enfermedades de carácter agudo, en el cáncer, escorbuto y gota.

Administracion. En bebida se usarán al principio á dosis cortas por ser muy excitantes: bastan dos ó tres vasos y no se puede pasar de tres cuartillos, segun la excitacion que produzcan sobre los órganos digestivos. Cuando están calientes son menos desagradables que frias, y se las mezcla con leche para que las puedan beber las personas delicadas; pero siendo mas eficaces cuando están puras, conviene que los enfermos se habituen poco á poco á beberlas así. Los baños sulfurosos excitan la piel y favorecen la traspiracion.

Las aguas sulfurosas se descomponen pronto por la glerina que contienen, por lo que se renovará con frecuencia las aguas que pueden ser trasportadas.

AGUAS SULFUROSAS EN PARTICULAR.

AIX LA CHAPELLE ó *Aquisgran*, en Prusia. Ciudad considerable á doce leguas de Colonia, nueve de Lieja, siete de Spa y ochenta de París. Se pueden tomar sus aguas en todas las estaciones.

P. F. El agua es clara, trasparente, de olor sulfuroso y de sabor alcalino, salado y hepático; si se la deja enfriar pierde su transparencia, olor y sabor, se vuelve lechosa y se enturbia; la temperatura del baño del emperador es de 57°,5 cent.

An. Segun Reumont y Monheim, un litro del agua del emperador contiene:

Carbonato de sosa. . . .	0,5444
Cloruro de sodio.	2,9697
Sulfato de sosa.	0,2637

Carbonato de cal.	0,1304
Carbonato de magnesia.	0,0440
Sílice.	0,0705

Segun Monheim los gases que se desprenden de las aguas se componen de

Azoe.	51,25
Acido carbónico.	28,26
Acido hidrosulfúrico.	20,49

V. M. Son muy enérgicas y tienen mucha analogía con las aguas de Bareges y Bañeras de Luchon. Conviene en las enfermedades crónicas, herpes, afecciones escrofulosas, reumatismos crónicos, dispepsia, infartos del hígado, cólicos metálicos, flores blancas, anquilosis incompleta, debilidad, rigidez y contractura de los miembros por heridas de

armas de fuego, etc. Hufeland las recomendaba contra la hipocondría; y se usará con mucha circunspección en las parálisis por apoplejía. Dañan á los predispuestos á las congestiones sanguíneas al pecho ó cabeza, y á los predispuestos á las hemorragias.

Se usa en bebida, sola ó con leche, ó en baños, chorros y estufa.

Agua de Aix la Chapelle artificial.

	gr.	g̃.
2 Bicarbonato de sosa	1,17	14
Cloruro de sodio	2,77	32
Cloruro de calcio cristalizado	0,28	3½
Cloruro de magnesio cristalizado	0,09	1
Sulfato de sosa cristalizado	0,60	3
Agua privada de aire	875	17½
Agua hidrosulfurada	125	2½
Acido carbónico	2 volúm.	

Se disuelven separadamente las sales de sosa y los cloruros térreos en una corta cantidad de agua, y se pone sucesivamente cada solución en las botellas; se introduce entonces el agua cargada de ácido carbónico, teniendo cuidado de reservar el lugar necesario para el agua hidrosulfurada; se añade esta de pronto y se tapa inmediatamente la botella.

ALCEDA. Lugar á siete y media

leguas de Santander, partido de Villacarriedo. Este establecimiento de baños está bajo la dirección del médico de Ontaneda, y se toman las aguas desde primero de junio á fin de setiembre.

P. F. Sus propiedades físicas y temperatura son iguales á las de Ontaneda.

An. Cada cinco libras de agua mineral contienen.

	p. cúb.
Acido hidrosulfúrico	0,951
Acido carbónico	0,929
	granos.
Hidroclorato de magnesia	77,429
Hidroclorato de sosa	64,838
Sulfato de sosa	46,334
Sulfato de cal	65,892
Subcarbonato de magnesia	5,614
Subcarbonato de cal	4,957
Sílice	2,819
Pérdida	3,117

V. M. Se las recomienda particularmente en las enfermedades cutáneas, fluxiones de la vista, enfermedades crónicas del estómago.

ALHAMA. Se halla á siete leguas de Granada, cuatro de Loja y seis de Velez-Málaga, provincia de Granada. La *temporada primera* para tomar estas aguas es desde 1.º de abril á 15 de junio, y la *segunda* desde 1.º de setiembre á 15 de octubre; pero se pueden tomar con buen éxito en otras estaciones. Tienen médico director.

Tiene un solo manantial, llamado *Baño fuerte*, de donde sale el

agua y pasa á otros llamados baño de San José, cuya temperatura es de 26 á 28°; baño de los Remedios, de 28 á 30°; baño de la Reina, de 30 á 32°, y baño Fuerte, cuya temperatura es de 36°.

P. F. El agua es muy abundante y sale con estrépito, formando muchas ampollitas que se rompen en la superficie del líquido; no tienen olor ni color particular, sino que son muy claras y trasparentes, no dejan poso alguno aunque estén depositadas en botellas ú otras vasijas, ni dejan incrustaciones por los puntos por donde pasan; son untuosas al tacto.

An. Contienen estas aguas mucha cantidad de ácido hidrosulfúrico con una pequeña porción de gas ácido carbónico, y en sesenta libras se han encontrado:

	granos.
Hidroclorato de sosa.	30
Sulfato de magnesia.	20
Carbonato de magnesia.	15
Sulfato de cal.	10
Hidroclorato de magnesia.	4
Sílice.	3

V. M. Están indicadas en la parálisis, reumatismos, afecciones catarrales habituales, baile de San Vito, principio de las escrófulas, clorosis, caquexia, leucorrea, amenorrea, amaurosis, sordera por fluxiones, oftalmias rebeldes, congestiones linfáticas en los sistemas absorbente y celular, accidentes mercuriales; resuelven muy bien los tumores huesosos, contracturas, enfermedades crónicas de la piel,

inflamaciones del hígado, del bazo y mesenterio, principalmente los atribuidos á la quina; ceática, anasarca, neuralgias, catarros crónicos, toses bronquiales, úlceras sostenidas por caries ó necrosis.

Dañan á los pletóricos, excesivamente sanguíneos, á los débiles, en el estado de preñez, cuando hay congestiones cerebrales, vicio herpético ó canceroso, á los tísicos, hemotóicos ó hidrópicos, etc.

D. Se usan en bebida, baños, baños á chorro, de vapor ó en estufa.

ARAMAYONA. Está situada en la provincia de Alava, á veinticuatro leguas de Burgos y cinco de Vitoria.

Tiene una fuente mineral; el agua sale á la temperatura de la atmósfera, contiene ácido hidrosulfúrico y se cree que contenga algo de hierro.

Temporada. Desde 1.º de junio á fin de setiembre. Hay director interino.

ARCHENA. Villa de la provincia de Murcia, á cuatro leguas de la capital, tres de Mula y nueve de Calasparra, á orilla del rio Segura.

La temporada primera para tomar estas aguas es desde primero de abril á fin de junio, y la *segunda* desde primero de setiembre á fin de octubre. Tiene director.

P. F. Las aguas son perfectamente diáfanas é inodoras al nacer, pero se enturbian á medida que se enfrian, tomando un viso

azulado que pierden, adquiriendo diafanidad al enfriarse mas; de olor á huevos podridos, de sabor salobre poco perceptible cuando se usan calientes, que es mas intenso cuando están frias; dejan desprender muchas ampollitas gaseosas que se deshacen en la superficie; su temperatura es de 42° R.; su gravedad específica es casi igual á la del agua destilada ó 1,0018.

Una libra de agua mineral contiene, segun D. Nicolás Sanchez de las Matas:

	granos.
Gas ácido hidrosulfúr.	3,23976
Acido carbónico libre.	1,84625
Hidroclorato de sosa.	13,70588
Sulfato de sosa.	1,11769
Carbonato de cal.	0,82352
Carbonato de sosa.	0,47058
Sulfato de cal.	0,29411
Hidroclorato de magn.	2,35294
Sílice.	0,05882

V. M. Se emplean contra el reumatismo crónico, dolores artríticos violentos, gota, parálisis, hemiplegia, síntomas sífilíticos locales ó generales, á saber: úlceras callosas lívidas, hidrocele, blenorreas inveteradas, infartos sífilíticos, dolores osteocopos, siempre que no exista fiebre continua, enfermedades mercuriales; en las hidropesías, hidrartrosis; enfermedades cutáneas, como sarna, tiña, herpes y enfermedades escrofulosas; en la debilidad de los órganos digestivos, como en la dispepsia, cardialgia, cólicos y lombrices; en la clorosis, dismenorrea y leucorrea crónicas, of-

talmia crónica, inflamacion de los párpados, disposicion á la erisipela de los labios y la cara, tumores blancos circunscritos, abscesos subcutáneos, induraciones indolentes, úlceras antiguas en personas débiles y nerviosas ó sostenidas por un vicio específico; úlceras, fístulas, cicatrices falsas, edema, retraccion permanente de los miembros, anquiñosis.

A. Se usan en bebida, baños, baños de vapor, chorros y embrocaciones.

ARDALES. Villa en la provincia de Málaga, á siete leguas de la capital, tres de Campillos y tres cuartos de Carratraca.

A trescientas varas de la villa existe una fuente mineral.

P. F. Su olor es hediondo, parecido al de los huevos podridos, son transparentes recién sacadas, pero á poco rato toman un color fusco, de sabor algo estíptico; su temperatura 18° R., es mas pesada que el agua destilada. En los desagües dejan una sustancia cenicienta, suave al tacto, que desecada cruje y despide olor de azufre. Contiene gas ácido hidrosulfúrico, un poco de gas ácido carbónico, sulfatos de cal y de magnesia, bicarbonato de cal y de magnesia y carbonato de hierro.

V. M. Segun la Monja disipan los infartos del estómago y del conducto intestinal, y son muy útiles en la gastrodinia, lombrices, clorosis, infartos crónicos del hígado, amenorrea, hemorragias pasivas, escrófulas, vicios cutáneos rebeldes, como ti-

ña, herpes y sarna, úlceras atóxicas, caries y fístulas por caries ó por otra causa.

ARECHAVALETA. Esta poblacion dista nueve y media leguas de Tolosa, treinta y tres de Burgos y dos de Vergara, provincia de Guipúzcoa.

P. F. El agua tiene 14° R., con olor y sabor á huevos podridos. Tiene un buen establecimiento con diez y seis baños. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre. Tienen director.

Se componen, segun el análisis que de ellas han hecho los señores D. Diego Genaro Lletget y D. Vicente Santiago Masarnau, de

	pulg. cúb.
Acido hidrosulfúrico.	3,462
Acido carbónico.	2,423
	granos.
Sulfato de cal.	11,4881
Sulfato de sosa.	2,2313
Sulfato de magnesia.	2,5134
Carbonato de cal.	3,2431
Carbonato de magnes.	0,0903
Cloruro de sodio.	3,1511
Cloruro de magnesio.	0,2141
Cloruro de calcio.	0,1479
Sílice.	0,1051

V. M. Producen buen resultado en la curacion de los herpes, tiña, sarna, enfermedades cutáneas, escrófulas, gota, reumatismos antiguos, anorexia, dispepsia, flegmasias crónicas del conducto digestivo, de los órganos respiratorio y génito-urinario, sífilis y enfermedades mercuriales, afecciones consecutivas á los

envenenamientos y á los cólicos, como temblores, parálisis y otras enfermedades.

Aguas de Arechavaleta artificial.

	gran.
Cloruro de calcio cristalizado.	7 1/2
Cloruro de magnesio cristalizado.	1/5
Sulfato de cal.	11 1/3
Sulfato de magnesia cristalizado.	5 1/3
Sulfato de sosa cristalizado.	4 1/2
Carbonato de sosa.	5
	draem.
Agua hidro-sulfurosa saturada.	6
Agua con 3 volúmenes de ácido carbónico, 15 onz. y 2 dr.	

Se hacen disoluciones separadas de los cloruros, de los sulfatos y del carbonato de sosa; se ponen en botellas que se llenan con el agua carbonizada, dejando no obstante espacio para el agua sulfurosa que se añade inmediatamente, y se tapan las botellas (Casares).

ARENOSILLO. Se halla en el término de la ciudad de Montoro, á tres cuartos de legua de esta poblacion y á siete leguas de Córdoba, provincia de Córdoba.

Las aguas se empiezan á tomar desde 15 de julio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. Las aguas son transparentes, de olor incómodo y nauseabundo, parecido al de los huevos podridos, de sabor á huevos po-

dridos; su temperatura 24° cent. ó 19° R.; de igual peso que el agua destilada; son untuosas al tacto, despiden burbujas al nacer y sobrenadan unas costras insolubles que despiden un olor sulfuroso por la combustion.

P. Q. Cada dos libras castellanas de esta agua contienen:

	gran.
Acido hidrosulfúrico libre.	1,50
Acido carbónico.	0,75
Hidroclorato de sosa. . . .	1,25
Hidroclorato de magnesia.	1,00
Hidroclorato de cal.	0,50
Oxido de silicio.	0,75
Sustancia vegeto-animal..	1,25
Pérdida.	1,00

V. M. Conviene en las enfermedades cutáneas rebeldes, á saber: en la sarna, barros, herpes, lepra, tiña, impétigo, ictiosis, callosidades, verrugas; en las aftas, úlceras callosas y fistulosas inveteradas sostenidas ó no por caries, úlceras escrofulosas, clorosis, desarreglos de la menstruacion, oftalmias inveteradas, cataratas incipientes, flegmasias crónicas de la mucosa de la vejiga, de los órganos genitales, esterilidad producida por estas afecciones, obstrucciones de las vísceras abdominales, afecciones crónicas de estas vísceras, inapetencia, acidez del estómago, digestiones laboriosas; en muchas neurosis y neuralgias, á saber: en las convulsiones, corea, catalepsia, histérico, hipocondría y melancolía.

Están contraindicadas en las calenturas agudas, flujos activos, inflamaciones generales ó parti-

culares, vicios orgánicos, aneurismas, escirros y cánceres.

Se usa en baños, bebida, fomentos, colirios, inyecciones ó chorros.

AZCOITIA (*San Juan de*). Villa en la provincia de Guipúzcoa, á cuatro y media leguas de Tolosa, nueve y media de Vitoria y tres cuartos de legua de Azpeitia.

A poca distancia del pueblo se halla una fuente de agua sulfurosa llamada de San Juan, y otro manantial análogo.

An. Contienen hidrógeno sulfurado, carbonato de magnesia y cal, sulfato de cal, magnesia, sodio y alúmina, cloruro de magnesio y óxido de silicio, en la preparacion de 21 $\frac{1}{3}$ de gr. por libra de agua mineral.

V. M. Se las recomienda en las enfermedades de la piel, principalmente en los herpes, vicios en la digestion, como dispepsia, anorexia, afecciones crónicas del hígado, principalmente en las congestiones de sangre venosa á las vísceras abdominales, en las almorranas, afecciones crónicas del pulmon ó de los bronquios, escrófulas, reumatismos, heridas, úlceras inveteradas, etc.

Se toman en bebida, baños y chorros.

Temporada. Desde primero de junio á fin de setiembre. Tiene director.

BADEN. Ciudad á cuatro leguas de Viena. Hay diez y seis manantiales de agua termal á orilla del rio Schwécha.

P. F. Las aguas son un poco lechosas, de olor á huevos podri-

dos, de sabor salado, ácido y desagradable. Su temperatura varía de 31 á 35° cent.

Se dice que contienen ácido hidrosulfúrico, ácido carbónico, cloruro de magnesio, sulfatos de sosa y de magnesia, carbonatos de magnesia y cal y materias térreas.

P. M. Se las recomienda en baños contra el reumatismo crónico, parálisis, enfermedades crónicas de la piel, catarros pulmonares é infartos escrofulosos.

Dañan cuando hay mucha debilidad ó plétora sanguínea.

Se usan en baños y bebida.

BAÑERAS DE LUCHON ó Luchon, en Francia. Ciudad pequeña, á dos leguas de España, departamento del alto Garona.

Se encuentran muchos manantiales, y su temperatura varía de 30° á 46° cent.

La temperatura de los diversos manantiales antiguos, segun Fontan, es la siguiente: gruta inferior en la llave del baño, núm. 15, que es la mas cerca del manantial, 56°,30 cent.; gruta superior, 47°; Ferras, 36°,70; manantial antiguo de la Reina, 25°; manantial para los ojos, 23°; manantial frio, 17°; manantial Soucerat el fuerte, 34°, y el flojo, 32°. La de los nuevos es la siguiente: manantial nuevo de la Reina, en la llave, 52°; en el del calentador, 47°,70; y el nuevo de Richard, 38°,50.

P. F. Las aguas de Luchon son claras, excepto las del manantial blanco, pero parecen negras por las piedrecitas de pizarra que guarnecen el fondo de los depósi-

tos: exhalan olor á huevos podridos, que se siente á mas de cien pasos del manantial; el sabor es fastidioso y dulzaino y son mas pesadas que el agua destilada. En tiempo tempestuoso se ve que el agua compuesta de los manantiales gruta superior y de la Reina por una parte y la del frio y blanco por otra, se vuelve de color lechoso, y este cambio se verifica en el intervalo de dos horas, pero se vuelve trasparente añadiendo agua del de la gruta superior.

An. Estas aguas contienen segun el análisis de Bayen por litro de agua:

Cloruro de sodio.	0,0784
Sulfato de sosa cristaliz.	0,1126
Carbonato de sosa seco.	0,0322
Sílice disuelta.	0,0762
Azufre disuelto y materia grasa orgánica.	c. ind.

Segun Longchamp cada manantial contiene la siguiente cantidad de sulfuro de sodio por litro de agua.

Gruta inferior.	0,0868
Richard.	0,0720
Gruta superior.	0,0717
La Reina.	0,0631
Blanco.	0,0023

Fontan ha encontrado en cada litro de agua del manantial nuevo de la Reina y en los de Soulerat las siguientes cantidades de sulfuro de sodio:

Reina, nuevo.	0,0455
Soulerat, manantial fuerte.	0,0364
Soulerat, manantial flojo.	0,0012

V. M. Son muy eficaces contra los herpes y otras enfermedades

de la piel, rigidez de los tendones y ligamentos á consecuencia de las dislocaciones ó fracturas; en los infartos linfáticos de las articulaciones, anquilosis falsas á consecuencia de las heridas de armas de fuego, úlceras simples ó complicadas con fístulas ó caries, escrófulas y úlceras escrofulosas, catarros pulmonares crónicos, asma, tisis mucosa, clorosis, flores blancas, reumatismos, parálisis, ceática; enfermedades de los párpados y de los ojos, de naturaleza herpética ó escrofulosa; obstrucciones del hígado y del bazo, en muchas enfermedades del estómago y principalmente en las digestiones lentas, difíciles, acompañadas de flatuosidades; en las enfermedades nerviosas, tales como la hipocondría y el histérico; en los cólicos nefríticos y en otras enfermedades de las vías urinarias.

Es dañosa á los muy irritables y en todos los casos en que existen signos de plétora ó de inflamación.

Se usa en bebida, semicupios, chorros, vapor, colirio, inyecciones ó lociones.

Las aguas de Luchon se alteran al trasportarlas.

Agua de Bañeras de Luchon artificial.

		gr.
Sulfuro de sodio cristalizado. . .	0,243	3
Carbonato de sosa cristalizado. . .	0,100	1 $\frac{1}{5}$
Sal marina.	0,078	1
Agua no aireada.	1000	3 20

BAÑOS DE MONTEMAYOR. Pueblo á dos leguas de Bejar, ocho de Plasencia y una de Montemayor, provincia de Cáceres.

La temporada para tomar estos baños es desde primero de junio á fin de setiembre, y hay médico director.

P. F. Sus aguas son sulfurosas, transparentes, de color azulado verdoso, de olor á huevos podridos, que desaparece pronto al contacto del aire; de sabor á huevos podridos, estíptico metálico principalmente despues de fria. Nadan en su superficie unos filamentos blancos sucios, que se depositan en su corriente, formando una capa blanquecina ó una especie de nata mantecosa, bastante abundante, que desecada y quemada huele á azufre, y se ven algunas ampollitas gaseosas que suben á la superficie. Su peso específico es igual al del agua destilada, y su temperatura es 33° R.

An. Contienen ácido carbónico, ácido hidrosulfúrico, bastante cantidad de hidrociorato de sosa, carbonato de cal, un poco de alumbre, sílice y tal vez algo de carbonato de hierro y sulfato de cal.

V. M. Se las recomienda en las neurosis, reumatismo muscular y fibroso, temblores, espasmos, convulsiones, epilepsia, hipocondría, histérico, baile de San Vito, parálisis, síntomas sifilíticos, enfermedades de los huesos, úlceras cariosas, nodos, exóstosis, úlceras escrofulosas ó cancerosas, contracturas nerviosas muscula-

res, obstrucciones viscerales, infartos escrofulosos, glandulares y linfáticos, catarros crónicos de pecho, asma, cálculos, clorosis, raquitis, mal vertebral de Pott, afecciones cutáneas, etc.

BAÑOS DE ROSA ó Bilo, á media legua de Alcaucin ó Alcautin. Este pueblo dista siete leguas de Málaga y tres de Velez-Málaga.

A una hora de la poblacion se hallan los baños minerales sulfurosos, llamados de las Majadas ó de Bilo, que manan de la fuente Santa. Su naturaleza es sulfurosa, y su temperatura igual á la de la atmósfera. Contiene los mismos principios que las aguas de Benimarfull, y son menos activos que los de Carratraca,

La fuente del Peral es tambien sulfurosa.

Temporada. Desde 15 de junio á fin de setiembre. Tiene médico director.

BARAMBIO. Lugar en la provincia de Alava, á seis leguas de Victoria y seis de Orduña.

Tiene algunas fuentes de agua mineral sulfurosa, de mal olor y sabor.

Temporada. Desde primero de junio á fin de setiembre. Hay médico director interino.

BAREGES, en Francia. Poblacion á una legua de San Salvador, cuatro de Cauterest y seis de Bañeras de Bigorre, departamento de los altos Pirineos.

Se toman las aguas desde primero de junio á quince de setiembre y hay médico director.

Se observan tres manantiales principales, y los principales ba-

ños son: el baño de la entrada, el baño mayor ó Real, el del Fondo, el de Polard, y el baño de la Capilla ó de la gruta.

P. F. Las aguas de estos manantiales son claras, cristalinas, de olor á huevos podridos, de sabor dulce, fastidioso, nauseabundo ú oleaginoso (Bordeu); su superficie se cubre de una película que le da un aspecto untuoso; nadan en ellas una materia viscosa que se deposita en el borde de las bañeras, y barniza el interior de los baños, en los que se halla un depósito sulfuroso y calcáreo, unido á una sustancia vegeto-animal; desprende búrbulas al salir por el caño, que, segun Longchamp, contienen ázoe perfectamente puro.

Temperaturas: baño Polard 38°,20 cent.; templado 33°; el fondo 36°,25; el chorro 44°,38; la entrada 42°,00; la capilla 28°,45; la Buvette 42°,5; las piscinas 35 á 36°,2.

An. Segun Longchamp, un litro de agua de Beuvette contiene:

	litros.
Azoe.	0,004
	granos.
Sulfuro de sodio.	0,042100
Sulfato de sosa.	0,050042
Cloruro de sodio.	0,040050
Silice.	0,067826
Cal.	0,002902
Magnesia.	0,000344
Sosa cáustica.	0,005100
Potasa cáustica.	indicios.
Amoniaco.	indicios.
Baregina	indicios.

Longchamp ha encontrado en un litro de cada uno de los manantiales las siguientes cantidades de sulfuro de sodio:

Chorro grande.	0,0498
Baño de la entrada. . .	0,0393
Baño del fondo.	0,0270
Baño de Polard.	0,0270
Manantial templado. . .	0,0245

V. M. Son muy eficaces contra las afecciones herpéticas, heridas de armas de fuego, fístulas, caries de los huesos, úlceras atónicas ó varicosas, cicatrices, exóstosis, dolores osteocopos, hinchazones articulares, anquilosis, retraccion de los músculos y de los tendones, reumatismo, reumatismo articular, ceática, lumbago, parálisis parcial, gastralgia, oftalmia, hepatitis y esplenitis crónica, etc.

D. Se usa en bebida, baños, chorros, inyecciones y lavativas.

Estas aguas se alteran bastante por el transporte.

Agua de Bareges artificial.

		gr.
Sulfuro de sodio cristalizado. . .	0,119	1 ³ / ₅
Carbonato de sosa cristaliz. . .	0,030	1 ¹ / ₃
Sulfato de sosa cristalizado. . .	0,112	1 ¹ / ₃
Sal marina.	0,040	1 ¹ / ₂
Agua.	1000	3 20

Se disuelven las sales en agua privada de aire, con la cual se llenan casi completamente las botellas, que se tapan con mucho cuidado.

Solucion para un baño artificial de Bareges (F. F.).

	onz.
Sulfuro de sodio cristalizado.	2
Carbonato de sosa cristalizado.	2
Cloruro de sodio.	2
Agua pura.	10

Se disuelven las sales en el agua y se echa la solucion con prontitud en una botella, que se tapa exactamente para mezclarla con el agua del baño al tiempo de entrar en él. Por lo general esta cantidad basta para un baño de seiscientos cuartillos. La fórmula anterior produce un baño sin color, de olor ligeramente hidrosulfurado y enteramente diverso por su composicion del baño sulfuroso ordinario, que se prepara con el sulfuro de potasio hecho con el azufre y la potasa.

Esta solucion reemplaza las aguas sulfurosas de los Pirineos para uso externo, como el agua sulfurada para el interno.

BOLAS DE BAREGES (Mountain).

Sulfuro de cal.	360
Extracto de alcachofa ó de saponaria.	180
Cloruro de sodio.	60
Cola de Flandes.	90

Se mezcla el sulfuro y la sal, se disuelve en caliente la gelatina y el extracto en trescientas partes de agua, y se hace toda una pasta que se dividirá interin esté caliente en bolas de dos onzas y media. Se usa una bola para un baño.

BAZA, ZUJAR ó BENZALEMA. Se da el nombre de baños de Baza á los que están situados en las inmediaciones de un antiguo castillo llamado de Benzalema, á dos leguas al norte de Baza, término de Zujar, ocho de Guadix, en la provincia de Granada. La primera temporada para tomar estos baños es desde primero de mayo á 10 de julio, y la segunda desde 15 de agosto á fin de octubre. Tienen médico director.

P. F. El agua es clara, trasparente, de olor sulfuroso, de color azulado verdoso y de olor á huevos podridos que desaparece pronto al aire; de sabor muy ingrato; desprende vapores de gas ácido sulfhídrico; conservada por mucho tiempo pierde ambas propiedades, y se observan unos copitos blanquecinos que se pegan á los cuerpos que halla por donde pasa. Su peso específico es igual al del agua destilada, pero se aumenta luego que se enfria, y su temperatura 30° R.

An. Treinta libras de estas aguas contienen mucho ácido hidrosulfúrico, un poco de ácido carbónico y además

	gran.
Carbonato de sosa.	30
Carbonato de cal.	8
Hidroclorato de sosa.	102
Hidroclorato de magnesia.	18
Sulfato de sosa.	156
Sulfato de cal.	450
Sílice.	2

V. M. Se las ha recomendado en las convulsiones, epilepsia, debilidad muscular, obstruccio-

nes del hígado, del bazo y del mesenterio, afecciones histéricas, amenorrea, artritis, erupciones cutáneas crónicas, úlceras corrosivas, sordera.

A. Se usan en baños, estufas, chorros, bebida, cienes y embarras.

BENIMARFULL. Baños situados á un cuarto de legua de la poblacion, en la provincia de Alicante, á diez leguas de la capital y tres cuartos de legua de Concentaina y una y media de Penáguila.

A un cuarto de hora de la poblacion se halla la fuente del Baral ó del agua podrida, por el olor y sabor á huevos podridos y las demás propiedades análogas á las aguas de Penáguila: su peso específico es de 1,08.

An. Cada libra de agua contiene:

	p. c.
Acido sulfhídrico.	10
	gr.
Sulfato de magnesia.	1,2
Cloruro de sodio.	0,9
Sulfato de cal.	1,1
Sulfuro de sodio.	0,8
Residuo silíceo.	0,9
Pérdida.	0,6

V. M. Produce buenos efectos en las afecciones herpéticas y cutáneas, irritaciones de estómago por atonía, inapetencia, cólicos, gastrodinia, gastralgia, amenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, caquexia y demás enfermedades sostenidas por debilidad.

Se usa en bebida, baños generales ó parciales, y en chorros.

La primera temporada para to-

mar los baños empieza desde primero de mayo á 30 de junio, y la segunda desde primero de setiembre á fin de octubre. Tiene médico director.

Se la puede trasportar á pesar de que deja depositar azufre.

BONNES ó *Aguas Buenas*, en Francia. Lugar en el departamento de los Pirineos bajos, á siete leguas de Pau. Se toman las aguas desde fin de mayo á mitad de setiembre y tienen médico director.

El establecimiento tiene tres manantiales.

P. F. Al salir de los manantiales el agua es cristalina, acarrea algunos puntos blanquecinos que se aposan, chisporrotea en los vasos y forma ampollitas que se rompen en su superficie; es untuosa al tacto, de olor á huevos podridos, de sabor dulzaino y un poco amargo. La temperatura del manantial nuevo y del de abajo es de 31°,60, y el del viejo es de 33°,20 cent.

An. Segun O. Henry cada litro de agua contiene:

	litros.
Azoe.	indicios.
Acido carbónico. . . .	0,0064
Acido hidrosulfúrico. .	0,0055
	granos.
Cloruro de sodio. . . .	0,3423
Cloruro de magnesio. .	0,0044
Cloruro de potasio. . .	indicios.
Sulfato de cal.	0,1180
Sulfato de magnesia. .	0,0125
Carbonato de cal. . . .	0,0048
Azufre.	indicios.
Sílice y óxido de	
hierro.	0,0160

Materia orgánica que contiene azufre. . . 0,1065

V. M. Son muy útiles en las afecciones crónicas de pecho, á saber: en el catarro pulmonar, asma húmedo, neumonía, pleuresía, tisis laríngea, tisis pulmonar en primer grado, alivian en el segundo y aceleran la muerte en el tercero; á las cloróticas y á los niños dispuestos á las escrófulas, enfermedades cutáneas, heridas de armas de fuego, úlceras antiguas, úlceras fistulosas; pero en estos casos son preferibles las aguas de Baresges. El manantial frio se usa exclusivamente contra las afecciones atónicas del conducto digestivo, la clorosis y la amenorrea.

A. Se usa en bebida y rara vez en baños por la escasez del manantial.

Agua artificial de Bonnes.

		gr.
Sulfuro de sodio		
cristalizado. . . .	0,075	1
Sal marina.	0,322	4
Carbonato de sosa		
cristalizado. . . .	0,100	1 1/2
Sulfato de magn. . . .	0,113	1 1/2
Agua no aireada. . . .	1000	3 20

CALDAS DE BOHI. Santuario y establecimiento de baños en la provincia de Lérida, á treinta horas de la capital, quince de Tremp y una de Bohi.

Existen diversos manantiales, cuya temperatura varía de 34 á 36° R.

P. F. El agua termal de 35° R. de

temperatura, no tiene olor ni sabor alguno sensible, y dejada enfriar no se diferencia del agua común. Contiene cuatro granos de sulfato de cal, dos de muriato de sosa, dos de carbonato de cal y dos de sílice y materias extrañas.

Las aguas termales sulfurosas en el baño superior tienen 36½° R.; la fuente caliente del lado de la misma agua del baño señala 33° R., y el baño inferior ó templado tiene 34° R. La fuente mas inmediata á este baño, llamada *Fonteta*, solo 25°, y los demás manantiales que se hallan en los prados y bajo el santuario mas contiguos al rio, son sulfurosos y su temperatura mas inferior.

P. F. El agua es clara, trasparente, de olor á huevos podridos, de sabor amargo é ingrato; expuesta al sol no desprende ampollas; enfriada al aire libre en una vasija descubierta y agitada pierde su olor y mal gusto, pero no su transparencia, y solo presenta una telilla en su superficie y unos ligeros átomos que voltean por ella.

An. Cada libra de agua sulfurosa, segun el análisis de D. Francisco Carbonell y Brabo, contiene dos y media pulgadas cúbicas de gas hidrógeno sulfurado y un poco de gas ácido carbónico, y en cada diez décimas de aquel residuo se hallan:

Carbonato de cal.	1
Cloruro de sodio.	1
Sulfato de cal.	3
Sílice y materias extrañas. . .	3

V. M. Se usan las aguas termales simples en las afecciones cutáneas rebeldes, en algunas especies de herpes y en los dolores reumáticos y artríticos.

Las aguas sulfurosas han producido resultados prodigiosos en bebida contra las toses convulsivas y rebeldes, asma húmedo acompañado de edema muy considerable, y hasta de anasarca completa, afecciones escrofulosas, infartos de las vísceras abdominales, cálculos urinarios, supresion de la menstruacion, etc.

Los baños generales ó locales, de inmersion ó chorro, han producido resultados prontos y felices contra los herpes rebeldes, la tiña, sarna, úlceras antiguas, parálisis completas, parciales ó generales, dolores artríticos ó reumáticos.

Encima de la montaña del Santuario, como á hora y media de distancia de él, se halla una fuente bastante copiosa y muy cargada de hierro. Conviene en las obstrucciones del hígado y del bazo, supresion de la menstruacion, dispepsia y otras enfermedades atónicas. Se usan estas aguas desde 25 de junio á 15 de setiembre.

CALDAS DE CUNTIS. Villa á cuatro y media leguas de Santiago, una y media de Caldas de Reyes, cuatro de Pontevedra y cuatro de Padron, provincia de Pontevedra.

Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre y tienen médico director.

En la margen izquierda de un

pequeño río, que atraviesa por la poblacion, están las casas de baños llamadas *Era vieja* y *Era nueva*, Santa María, Horno y Castro, cuyas aguas son termales y sulfurosas. Se puede templar el agua según se quiera, porque hay agua de varias temperaturas; así llaman fría á la de 24° R. (36° cent.), templada á la de 28° R. (35° cent.), picante á la de 32° R. (40° cent.), y caliente al de 40° R. (50° cent.).

P. F. El agua no tiene color, es diáfana, con olor á huevos podridos, de sabor repugnante á huevos podridos, y mas pesada que el agua destilada; su temperatura varía entre 30° cent. (24° R.) y 54° (43° R.); así la casa antigua de la Era tiene 32° cent. (25½° R.), los de la casa nueva de la Era 29° (23° R.), unos y otros 34° (27° R.); los de Santa María ó de la Virgen se gradúan á voluntad, y el agua mas caliente les viene de una arqueta llamada *Fuego de Dios*, donde el termómetro señala 54° (43° R.); el agua de los baños del chorro tienen 50° (40° R.), la del baño romano 54° (43° R.), y la de la casa de Castro 41° (32½° R.).

Todas las aguas al atravesar los conductos ó cañerías que están en contacto de la atmósfera depositan una sustancia traslucida, blanda y gelatinosa, mezclada con un polvillo blanco, suave al tacto.

Todos los manantiales presentan la misma composición, pero solo se ha analizado la del baño templado de la Era, y en ochenta

ta onzas de dicha agua mineral, según D. Antonio Casares, se han encontrado: 0,276 granos ó 0,762 pulgadas cúbicas de hidrógeno sulfurado, y además:

	onzas.
Agua.	80
	granos.
Sulfuro de sodio.	5,99
Cloruro de sodio.	37,60
Sulfato de sosa.	4,87
Sílice y una materia orgánica nitrogenada. . .	7,50

V. M. Son muy eficaces en las afecciones espasmódicas, á saber: las parálisis, neuralgias, afecciones articulares, artritis, reumatismos crónicos, dolores osteocópos ó por el abuso del mercurio, caries linfáticas, tumores linfáticos, úlceras antiguas, herpes, erisipelas, efélides.

A. Se usan en chorros, vapor, baño general ó local y en bebida.

Agua de Caldas de Cuntis artificial.

	granos.
Sulfuro de sodio cristaliz. 3¾	
Cloruro de sodio.	7½
Sulfato de sosa.	1
	onzas.
Agua privada de aire. . . .	16

No se puede imitar exactamente estas aguas, porque faltan medios de producir la materia orgánica que tienen en disolución.

CALDAS (*Santiago de*). Feligresía á un cuarto de legua de Orense, y á otro cuarto de legua de Cancedo, provincia de Orense.

CALDAS DE LA REINA, en Portugal, á catorce leguas al norte de Lisboa.

Existe un establecimiento de aguas minerales, que tiene cuatro baños grandes, dos para hombres y dos para mujeres. El primer baño para las mujeres tiene $28\frac{1}{2}^{\circ}$ R., y el segundo $27\frac{1}{2}^{\circ}$ R. El primer baño de los hombres tiene varios manantiales, cuya temperatura es de $28\frac{1}{2}$, $27\frac{1}{2}$ y otro de $26\frac{1}{2}^{\circ}$ R. El segundo baño de los hombres recibe el agua del primero.

P. F. Estas aguas tienen olor sulfuroso, son perfectamente cristalinas vistas en un vaso, pero en el baño son de color á vidrio; el sabor es análogo al olor, pero es seguido de una ligera sensacion de aspereza al paladar; desde el fondo de los baños se elevan gran número de burbujas gaseosas de ácido hidrosulfúrico; este se descompone en contacto de la atmósfera y forma una película de azufre en la superficie del agua que despues de rota se precipita; dejan por donde pasan un depósito en forma de limo.

An. Ocho libras de agua analizadas por Withering, contenian:

Acido carbónico.....	1½	onz.
Gas hidrógeno sulfurado.	6½	

Carbonato de cal.	12	gran.
Carbonato de magnesia. .	3½	
Hidrosulfato de hierro. .	2½	
Alúmina.,	1¼	
Silice.,	¾	
Carbonato de magnesia. .	64	

Sulfato de cal.	44	gran.
Sulfato de sosa.	64	
Cloruro de sodio.	148	

No pueden trasportarse porque se descomponen.

La época mas á propósito para tomarlas es la primavera y el otoño.

Se usa en bebida, baños generales ó parciales, en lavativas, etc., en los casos en que convienen las aguas sulfurosas.

CARBALLO. Casa de baños en el partido de Carballo, á cinco leguas de la Coruña y seis de Santiago.

La época de hacer uso de estas aguas es desde primero de julio á fin de setiembre. Tienen médico director.

Se distribuye el manantial mineral en cuatro pozos de cantería: el primero tiene 29° R., el segundo 25° ó baño de la arqueta, el tercero 23° .

P. F. El agua es clara y diáfana vista en un vaso de cristal, deja desprender burbujas produciendo algun ruido, y forman una telita de color ceniciento, que nada en la superficie; tiene olor á azufre y sabor nauseoso como á huevos podridos, muy fuerte, penetrante y tenaz; su peso específico es de 1,0002.

An. Contiene gas ácido hidrosulfúrico y gas ácido carbónico, que brota en la superficie en ampollas, que revientan produciendo estallido, sulfuro de calcio y sulfuro de magnesio. Se presume que tienen ázoe.

En 1000 partes de agua se encuentra, segun D. Antonio Casares, 0,0737 de sulfuro de sodio en el agua de la fuente mas caliente, y 0,0928 en el agua de la arqueta. Además encontró cloruro de sodio y sulfato de sosa.

V. M. Se las recomienda en las acedías, reumatismos, parálisis muscular, temblor, asma, vómito crónico, cólicos hepáticos, nefritis, oftalmias serosas, herpes, lepra y otras enfermedades crónicas de la piel, úlceras, úlceras sórdidas, fístulas, heridas de armas de fuego, tumores escrofulosos enquistados.

CARBALLINO. Poblacion pequeña á media legua de Partovia, provincia de Orense. Para hacer uso de estas aguas deben concurrir los enfermos desde 15 de julio á fin de setiembre. Tiene director, que cuida tambien de las de Partovia.

P. F. Estas aguas minerales son claras, algo opacas, de sabor desagradable, de olor hepático, y su temperatura es de 22° R.; desprenden algunas ampollitas gaseosas. Dejan por donde pasan unas concreciones calizas con puntos rojizos.

An. No existe una análisis exacta de este agua, y solo se sabe que contiene hidrosulfato de sosa, carbonato de sosa, hidrocloreto de magnesia y ácido carbónico. Segun D. Antonio Casares, en cada mil partes de agua hay 0,019 de sulfuro de sodio.

V. M. Son muy eficaces en el reumatismo crónico, herpes miliares y escamosos, histérico,

amenorrea, hepatitis crónica, leucorrea, cólicos nerviosos, erisipelas y nefritis. Por lo comun se administran estas aguas en bebida, y al mismo tiempo las de Partovia en baños.

CARRATRACA. Baños situados á siete leguas de Málaga y media de Ardales, provincia de Málaga. Se usan las aguas desde 15 de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. Las aguas son muy abundantes, claras, transparentes, de olor hediondo á huevos podridos, de sabor ligeramente astringente, de igual peso específico que el agua destilada, y de 15° de temperatura. Expuestas al aire se descomponen, pierden enteramente su olor, se vuelven lechosas y depositan sulfato de cal. Al brotar arrojan muchos copos amarillos, que forman una costra blanquecina y resbaladiza.

An. Cien libras de agua mineral contienen:

	p. cúb.
Gas ácido hidrosulfúr.	800
	dr. g̃.
Acido carbónico.	2 6
Sulfato de magnesia.	1 60
Sulfato de cal.	1 28
Hidrocloreto de magn.	50
Materia arcillosa.	48

Analizados cincuenta granos de los copos blanquecinos, han dado:

	g̃.
Azufre puro.	23
Carbonato de magnesia.	11
Carbonato de cal.	10 1/2
Arcilla.	4

V. M. Ha producido buenos efectos usada en bebida en la dispepsia, enteralgia, hipocondría, diarrea crónica y afecciones verminosas, cuando estas enfermedades están sostenidas por inercia del aparato digestivo; en los casos en que hay perversion de la nutrición, como en la clorosis, amenorrea, extenuación; en la diátesis escorbútica, herpética ó epsórica; en los que padecen obstrucciones de las vísceras abdominales ó de los vasos linfáticos por relajación de sus tegidos ó por un estado de irritación pasiva, y finalmente para neutralizar la acción de los venenos metálicos, principalmente la hidrargirosis y los síntomas saturninos.

En baño por inmersión á la temperatura del manantial, obran con buen éxito en la clorosis, laxitud y debilidad nerviosa, muscular ó de los ligamentos, en los vicios atónicos de la piel, flujos pasivos sanguíneos ó serosos, ambliopia, sordera, cefálea, demencia, parálisis, hipocondría, epilepsia, histérico, infartos del hígado, leucorrea, amenorrea, hemorragias, hinchazones, tumores atónicos, endurecimientos escirrosos, blenorreas, leucorreas atónicas, impotencia ó esterilidad por debilidad del aparato genital y uterino.

Los baños parciales, frios ó templados de mas ó menos duración segun el objeto, limpian las úlceras y trayectos fistulosos.

Los chorros son útiles en la debilidad de la inervación, en la anquilosis, contracturas muscula-

res, tumores huesosos, infartos linfáticos, infartos glandulares, úlceras atónicas y senos fistulosos, expulsión de esquirlas.

Se usan tambien en inyecciones y fomentos.

A. Se usa en bebida, inyecciones, baños, fomentos, etc.

CAUTERETS, en Francia. Población que dista siete leguas de Ba-rejes, departamento de los Pirineos altos.

Tiene un buen establecimiento termal, al que acuden los enfermos principalmente en julio y agosto, y hay médico director.

Tiene once manantiales.

P. F. Las propiedades físicas se diferencian segun el manantial. El agua del de Railliere es abundante, trasparente, muy untuosa al tacto, de olor fuerte y eminentemente sulfurosa, de sabor desagradable; arrastra muchos filamentos flemosos y blanquecinos que desecados y calcinados tienen olor á azufre y á sustancias animales: su temperatura 38°,5 cent.

El agua de César es siempre clara, áspera al tacto, de olor á huevos podridos, y deja un poso blanquecino; su temperatura 48°,5 cent.

El agua de los Españoles es muy cristalina, suave al tacto, contiene mucho limo flemoso y blanco, de olor sulfuroso picante, de sabor mas agradable que el de los otros manantiales; su temperatura 48°,5.

El agua de la fuente de Bru-zaud es cristalina, sin olor, suave y untuosa al tacto; el limo que arrastra es abundante, grumoso y

pardusco; su temperatura 40°.

El agua de *Pause* es muy cristalina, suave al tacto, de sabor desagradable, arrastra un limo blanco y flemoso; su temperatura 45°.

El agua de *Pré* es cristalina, áspera al tacto, y deposita copos flemosos; tiene olor sulfuroso fuerte, sabor áspero, y su temperatura es de 47°,5.

El agua del *Bois* es siempre cristalina, extremadamente suave al tacto, deja copos blancos y grasos; su sabor es como amargo; su olor sulfuroso muy fuerte y su temperatura 43°,8.

El agua de *San Salvador menor* es flemosa, untuosa al tacto, nadan en ella materias blanquecinas, de sabor dulzaino y como azucarado, y su temperatura es de 32°,5.

El agua de *Maouhourat* es cristalina, poco mucilaginosa al tacto, poco cargada de copos blancos, áspera al gusto, de olor sulfuroso y su temperatura 50°.

El agua de *Rieumiset* es clara, untuosa, sin olor, de sabor dulzaino, deposita un limo verde y su temperatura es de 30°.

An. El agua de *Railliere* analizada por *Longchamp* contiene por litro:

	litros.
Azoe.	0,004
	granos.
Sulfuro de sodio.	0,019400
Sulfato de sosa.	0,044347
Cloruro de sodio.	0,049576
Sílice.	0,061097
Cal.	0,004487

granos.

Magnesia. 0,000441

Sosa cáustica. 0,003396

Baregina, potasa cáustica y amoníaco. . . indicios.

Segun el mismo *Longchamp* los manantiales de *Cauterest* contienen las siguientes cantidades de sulfuro de sodio:

El manantial de los Españoles.	0,0334
El de <i>Bruzaud</i>	0,0385
El de <i>César</i>	0,0303
El de <i>Pause</i>	0,0303
El de <i>Pré</i>	0,0159
El de <i>Bois</i>	0,0140
El de <i>Maouhourat</i>	0,0124

V. M. Se administran las aguas de *Railliere* en los catarros crónicos, en el primer período de la tisis tuberculosa, en ciertas hemotisis, en las neurosis pulmonares y en las gastralgias.

Las aguas de *Pause* se usan en bebida, baños y chorros, y son particularmente útiles en las afecciones reumáticas crónicas, en las enfermedades cutáneas, principalmente en los herpes, en los catarros antiguos, asma húmedo, en ciertos casos de sífilis degenerada y en muchas afecciones linfáticas.

Las aguas de *César* y de los *Españoles* llenan casi las mismas indicaciones, solo que son mas enérgicas y no pueden usarse en personas muy irritables; son útiles en ciertas parálisis, dolores osteocopos, y algunas afecciones linfáticas inveteradas.

Las aguas de *Bois* y de *Pré* se

usan particularmente en los reumas gotosos y en las afecciones cutáneas; se toman en baños y chorros.

Las aguas de *San Salvador menor* se emplean en las afecciones hemorroidales, en ciertas irritaciones de la matriz, en los infartos del cuello de la matriz acompañados de sensibilidad, cuando ha pasado el período de irritación; entonces se envía á los enfermos á la *Railliere* para acelerar la resolución y completar el tratamiento.

El agua de *Maouhourat* es ventajosa en las enfermedades crónicas de las vías digestivas sin irritación marcada, y la gastralgia y dispepsia ceden pronto bebiendo estas aguas.

Se usa el agua de *Bruzaud* para disipar los infartos abdominales y como tópico; se toma en baños, chorros y bebida.

Se aconseja el agua de *Rieumiset* para calmar la irritación producida por los otros manantiales y para combatir ciertas afecciones nerviosas.

A. Se usan en bebida, baños, chorros, lociones é inyecciones.

Se trasporta el agua de César y se conserva intacta durante mucho tiempo. La de *Railliere* pierde mucho.

Agua de Causterest artificial.

	gr.	ḡ.
Sulfuro de sodio cristalizado.	0,069	$\frac{4}{5}$
Sulfato de sosa cris- talizado.	0,160	2

	gr.	ḡ.
Sal marina.	0,050	$\frac{1}{2}$
Carbonato de sosa cristalizado.	0,015	$\frac{1}{2}$

onz.
Agua no aireada. . . 1000 20
Se prepara del mismo modo que la de Bareges.

CORTEGADA. Se halla esta población á cinco leguas de Orense, provincia de Orense. Se toman estos baños desde 15 de julio á fin de setiembre. Tienen médico director.

En su término nacen aguas sulfurosas y aguas ferruginosas. En las primeras se cuentan los baños de la Piedra, los del Campo y los del Monte, y las segundas, de 18 á 20° de temperatura, están situadas á cien pasos del baño de la Piedra, y la otra entre esta y el baño del Campo.

P. F. El agua de los tres manantiales es clara, trasparente, de olor á huevos podridos, y de sabor análogo al olor é ingrato; deja por donde pasa incrustaciones blanquizas con vetas amarillas.

An. No hay análisis exacta de estas aguas, y se dice que contienen ácido hidrosulfúrico, sulfato de sosa y carbonato de cal.

V. M. Las aguas sulfurosas son las útiles interior y exteriormente en las enfermedades de la piel, tales como herpes de todas clases, erisipela, sarna antigua, elefantiasis, úlceras antiguas; en las afecciones cerebrales, por ejemplo, en la epilepsia, en las cefalalgias producidas por una excitación nerviosa, en las neuralgias y

odontalgias; en las afecciones de pecho, en especial en las fluxiones crónicas, cuando se usan las aguas interiormente; en todas las afecciones del conducto digestivo, por ejemplo, en la enteritis y en la gastro-enteritis crónica, en la colitis y en la gastro-entero-hepatitis; en la gastralgia; en las enfermedades crónicas de la vejiga y de la matriz; en todas las afecciones nerviosas, en los reumatismos crónicos apiréticos, en la gota vaga atónica, en las afecciones escrofulosas externas é internas, en las flegmasias superficiales de las membranas mucosas, en las afecciones histéricas y sifilíticas, en los tumores hemorroidales y en las afecciones hepáticas, etc.

Las aguas ferruginosas convienen en las afecciones cloróticas, en la amenorrea, dismenorrea y leucorrea; en la amaurosis, caquexia, calenturas intermitentes con pérdida de color de los tegidos, hipertrofia de las glándulas secretorias y excretorias, y en especial del hígado y del bazo; en todas las obstrucciones del vientre; en las afecciones escrofulosas; en los espasmos complicados con principio de clorosis; en la esterilidad producida por espasmo de la matriz ó por obstrucción del órgano y de sus accesorios; en las hemorragias uterinas con clorosis; en la gastralgia, atonía del estómago, gastritis, gastro-entero-hepatitis y colitis crónica, en la cistitis, cálculos vesicales, etc.

A. Se las aconseja en baños y en bebida.

CHICLANA DE LA FRONTERA. Villa á cuatro leguas de Cádiz, provincia de Cádiz.

Tiene dos manantiales: la fuente amarga y el pozo de Braque. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de octubre, y tienen médico director.

P. F. El agua de la *fuentes amarga* es trasparente, muy cristalina y no deposita ningun material insoluble, de olor á huevos podridos y de sabor desagradable algo salino; su temperatura es de 15° R. Los acueductos por donde pasa se incrustan ligeramente de un material algo blanquizco: el peso específico es de 1,0016. Cuando se eleva la temperatura del agua hasta la ebullicion, dos azumbres de agua pierden cincuenta y cinco pulgadas cúbicas de gas hidrógeno sulfurado, sin perder su transparencia; sucede lo mismo en contacto del aire.

An. Contienen:

Hidroclorato de sosa. . .	0,506
Protosulfato de cal.	1,051
Sub-proto-carbonato de magnesia interpuesto con el de cal.	0,750
Sub-proto-sulfato de alumina.	0,013
Proto-hidro-clorato de magnesia.	0,074
Azufre.	0,058
Sustancia resiniforme. . .	0,003

V. M. Produce buenos efectos contra las enfermedades herpéticas en muchas enfermedades, exceptuando la lepra tuberculosa y elefantíaca, amaurosis incipiente,

oftalmias crónicas, herpéticas ó escrofulosas, afecciones verminosas, úlceras escrofulosas, úlceras herpéticas; no convienen en las afecciones venéreas ni en las de carácter canceroso. Son útiles en la clorosis, metrorragia, prociencia de la matriz, leucorrea, obstrucciones del hígado, flegmasia crónica del conducto intestinal, fístulas, en muchas afecciones convulsivas y parálisis, raquitis incipiente, enfermedades crónicas de la vejiga, pirosis, gastrodinia, reumatismo muscular y fibroso, amenorrea por irritabilidad del aparato genital, anorexia y dispepsia por atonía.

P. F. El agua de Braque tiene olor á huevos podridos, aunque menos fuerte que la de la fuente amarga, su sabor es desagradable, se enturbia al contacto del aire y se vuelve lechosa y algo azulada; es un poco mas pesada que el agua destilada, y su temperatura es de 15° R.

An. Evaporando un cuartillo de agua resulta:

	gran.
Muriato de magnesia.	0,299
Muriato de sosa.	2,501
Sulfato de sosa.	1,000
Carbonato de cal y magnesia.	0,699
Sulfato de cal.	1,761

y gas hidrógeno sulfurado que pierde pronto.

V. M. Produce buenos efectos contra las enfermedades ocasionadas por el abuso del mercurio, pero no conviene en las afecciones sífilíticas. Tiene las mismas virtu-

des que el agua de la fuente amarga, pero es útil mas especialmente en las afecciones que participan algo del carácter agudo; aprovechan en la miositis, artritis y neuralgias crónicas, en las úlceras callosas, fístulas, raquitis incipiente y afecciones escrofulosas, debilidad de la vista, desarreglos de la menstruacion, gastrodinia, cálculos.

A. Se usa en bebida y baños.

ELORRIO. Villa que se halla á dos leguas de Durango, dos de Vergara y siete de Vitoria, en la provincia de Vizcaya. Se toman las aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. Las aguas son transparentes, de olor hediondo á huevos podridos, de sabor análogo al olor y algo salino; su temperatura es igual á la de la atmósfera; su peso específico se diferencia poco del agua destilada.

Segun D. Juan Higinio Arenaza, cada diez y seis onzas contienen:

	p. cúb.
Acido hidrosulfúrico.	24,63
Acido carbónico.	0,36
	gran.
Sulfato de sosa.	6
Sulfato de cal.	3,98
Muriato de cal.	0,50
Carbonato de magnesia.	2
Carbonato de cal.	2
Carbonato de hierro al minimum.	1,06
Betun.	0,41
Silice.	0,05

V. M. Se usan estas aguas en

baño y bebida en las afecciones cutáneas, catarros crónicos del pulmón, reumatismo, escrófulas, etc.

A. Se emplean en baño, bebida, chorros ó baños de vapor.

ENCINA HERMOSA. Se halla en el partido de Alcalá la Real, y á tres cuartos de legua del castillo de Lucubin. No se han analizado sus aguas; son sulfurosas y análogas á las de Frailes. Su temperatura es de 16 á 18° R.

ENGHIEN (*Baños de*). Lugar situado en medio del delicioso valle de Montmorency, á orilla del estanque de San Graciano, á un cuarto de legua de Montmorency y cuatro de París, departamento del Sena y Oise.

Hay tres manantiales: el manantial antiguo ó del Rey, el nuevo y la pesquería.

P. F. El agua es clara, trasparente, de sabor fastidioso, dulzaino y seguido de un amargor ligero y de una especie de astringencia, de olor á huevos podridos; su temperatura 14° cent. Expuesta al aire pierde su olor y forma un precipitado y una película.

An. Analizadas por Longchamp contienen:

	gran.
Azoe.	0,0088
Acido hidrosulfúrico. . .	0,0160
Acido carbónico.	0,0904
Hidrosulfato de cal. . . .	0,0920
Hidrosulfato de potasa. .	0,0097
Muriato de magnesia. . .	0,0107
Muriato de potasa. . . .	0,0423
Sulfato de magnesia. . . .	0,0470
Sulfato de cal.	0,1210
Sulfato de potasa.	0,0423

	granos.
Subcarbonato de cal. . . .	0,0423
Subcarbonato de magnesia.	0,4686
Subcarbonato de hierro. .	0,0525
Silice.	0,0521
Alúmina.	0,0408
Materia vegeto mineral. c. ind.	

V. M. Segun ha acreditado la experiencia son útiles en las afecciones escrofulosas, infartos glandulosos del cuello, enfermedades cutáneas, en algunos casos de asma, catarros crónicos de pecho ó de la vejiga, metritis crónica, leucorrea, clorosis, amenorrea, diarreas rebeldes, gastralgia, reumatismos antiguos, tumores blancos, parálisis y principalmente la del cólico saturnino.

A. Se usa en chorros, baños, bebida y afusiones.

ESPARRAGUERA. Se halla esta villa á seis leguas de Barcelona y cuatro leguas de Igualada, en el camino de Madrid á Barcelona.

A la orilla del rio Llobregat, á poca distancia de la montaña de Montserrat, se ha fundado la casa de baños, en el término de la villa de Olesa, y en Cataluña se conoce á estas aguas con el nombre de aguas de la *Puda* (hedor). Se tomán estas aguas en la primera temporada desde 1.º de mayo á 15 de julio; y en la segunda desde 1.º de setiembre á 15 de octubre. Tienen médico director.

P. F. Las aguas son transparentes, un poco opalinas, pero luego se enturbian y dejan en las pare-

des y en el fondo del vaso un sedimento suave al tacto, y al cabo de algunas horas quedan enteramente claras. Su olor es análogo al de los huevos duros, y después de haber salido de los manantiales adquiere el de los huevos hueros y se disipa enteramente en el espacio de cuatro horas. Su sabor es desagradable igual al olor. El olor se disipa comunmente en el término de cuatro horas, y en la superficie del cuerpo del que se ha bañado en ella deja una especie de untuosidad, que procede de una sustancia pseudo-orgánica llamada baregina, y por los naturales *llet*. Su temperatura es de 23° R., y su peso específico es un poco mayor que el del agua destilada.

An. Según don Mariano de la Paz Graells contienen gas azoe, hidrógeno sulfurado y ácido carbónico libres, y los ácidos sulfúrico, carbónico é hidrocórico unidos en varias combinaciones salinas con la cal, la magnesia y probablemente con la sosa, sílice y materia pseudo-orgánica.

V. M. Obran de la misma manera que las aguas sulfurosas, y son útiles en la mayor parte de las enfermedades crónicas de la piel, en los catarros de las mucosas, en la amenorrea y dismenorrea. Son igualmente muy útiles en las afecciones escrofulosas y bastante útiles en las sífilíticas. Respecto á la hemotisis y á la tisis, se observa que se alivian; pero en estos casos se deben aumentar las precauciones, no usar el mineral sino con cautela y lentitud,

prolongando su uso por mucho tiempo. Son también muy útiles las inspiraciones de los gases que estas aguas desprenden en los casos de tisis y hemotisis, en los que producen buenos efectos.

Los producen también maravillosos en todas las enfermedades cutáneas en general, en bebida y en baños.

Estas aguas tomadas interior y exteriormente son útiles y causan resultados maravillosos en los dolores reumáticos y gotosos, y en los casos de anquilosis aplicadas en forma de chorro.

Se han elogiado también estas aguas contra los tumores frios, en baños, chorros y bebida; en el escorbuto de las encías, en lociones é interiormente. Se las ha recomendado igualmente contra la ténia y enfermedades verminosas, tomándolas por mañana y tarde. Se las prescribe además contra los infartos reumáticos, gota tofácea, úlceras antiguas rebeldes y parálisis, para los que son de grande utilidad los chorros. En inyecciones son ventajosas en las supuraciones de la vejiga y en las úlceras incipientes de la matriz. Contra alguna de estas enfermedades se usa también la aplicación del lodo ó cieno.

Bajo la forma de colirios y aplicada en compresas ocasionan buenos resultados en las enfermedades de ojos por vicio herpético, y en las producidas por el vicio escrofuloso. Son también útiles aplicadas en compresas contra las úlceras herpéticas.

Se obtienen pocos resultados

contra las enfermedades crónicas de pecho cuando están muy adelantadas y son muy antiguas; dañan en las afecciones del corazón, y se deben recomendar contra las afecciones de vientre ocasionadas por la retropulsion de algun vicio, en cuyo caso se tomarán en baños y bebida. Es peligroso su uso en las tisis producidas por irritacion ó congestion pulmonar; tampoco conviene en las tisis comunes cuando hay poco calor, sin sed, pero tienen calentura héctica con recargos vespertinos, sudores colicativos y esputos puriformes, en cuyos casos dañan aunque se las mezcle con leche ó algun cocimiento emoliente, porque á los primeros les aumenta la fiebre y los demás síntomas, y á los segundos les causa diarrea. Se han observado algunos casos de curacion de tisis laríngea, especialmente al principio de la enfermedad, y entonces se usarán mezcladas con leche ó un cocimiento de líquen ó alguna otra sustancia emoliente. Produce buenos efectos en las enfermedades asmáticas, en las que casi siempre se alivian los enfermos; y si no sucede es porque están sostenidas por causas sobre las que no tiene accion el agua mineral. Son útiles contra los catarros pulmonares crónicos sin fiebre, en la hemotisis pasiva, en la hemotisis por retroceso de un herpes ú otra enfermedad cutánea; se las prescribe contra la tisis por causa traumática, por heridas ó contusiones.

Son un cicatrizante poderoso

de las úlceras atónicas, fungosas, fagedénicas, varicosas ó escrofulosas.

Están contraindicadas en todas las enfermedades orgánicas, en las agudas, en las menorragias y metrorragias, en las afecciones del hígado y del bazo, en las intermitentes, en las diarreas y disenterias, á no ser que sean producidas por la retropulsion de alguna enfermedad, especialmente por causa herpética.

A. Se usan en baños y bebida.

FUENTE ÁLAMO. A quinientas varas de la poblacion, en la jurisdiccion de Alcalá la Real, están los baños de Fuente Alamo.

P. F. Las aguas son cristalinas, con olor á huevos podridos, transparentes, pero depositadas en la balsa parecen de un color azulado y su temperatura $14\frac{1}{2}^{\circ}$ R.

An. Contienen gas hidrógeno sulfurado, ácido carbónico, sulfato de magnesia, sulfato de cal, cloruro de magnesio y sílice.

V. M. Tienen las mismas virtudes que las de Rivera, pero se las considera con virtudes especiales para curar las úlceras sordidas, epsóricas ó venéreas. Estas aguas se toman desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director, que es el que cuida de las de Frailes.

FRAILES. Lugar en la provincia de Jaen, á cinco leguas de la capital y una de Alcalá la Real. Se toman las aguas desde primero de junio á fin de setiembre. Tiene director, que cuida además los de Fuente Alamo y Rivera.

El establecimiento tiene tres manantiales, que llenan tres balsas, que solo se las distingue con los números 1.^a, 2.^a y 3.^a La primera, de 13° R. de temperatura; la segunda, de 14½; y la tercera de 15° R.

P. F. Estas aguas son claras, transparentes, pero pasado algun tiempo se ponen lechosas y depositan un sedimento térreo, quedando claras otra vez; su olor es á huevos podridos, y su sabor algo estíptico y parecido al olor.

En la superficie de estas aguas se observan unos copos blanquecinos, suaves al tacto, fétidos especialmente si se los frota despues de secos, y si se aproximan al fuego desprenden olor sulfuroso.

An. Analizadas treinta y dos onzas de agua por D. Miguel Rodriguez, han dado el resultado siguiente:

	gran.
Gas hidrógeno sulfurado.	5½
Gas ácido carbónico.	2½
Sulfato de magnesia.	3
Sulfato de cal.	1½
Muriato de magnesia.	½
Alúmina.	1

Analizados los copos blancos por el mismo Rodriguez han dado: cuatro granos de carbonato de cal, cuatro y medio de carbonato de magnesia, siete de azufre puro, uno de arcilla y uno de sílice.

V. M. Las aguas de la primera balsa producen unos resultados muy satisfactorios en las metrorragias, menorrhagias, clorosis, a-

menorrea y otros padecimientos por debilidad de la economía. Las de la segunda ocasionan constantemente felices efectos en la curacion de la caries y necrosis de los huesos y sus ligamentos, y en las fistulas sostenidas por estas mismas afecciones. Las aguas de la tercera balsa son muy eficaces en las erupciones cutáneas, principalmente en las herpéticas, en la leucorrea, escrófulas, y en casi todos los padecimientos producidos ó sostenidos por la diátesis herpética, sórica ó escrofulosa. Combinado el uso de los tres manantiales, producen excelentes efectos en la curacion del histérico, hipocondría, temblores, convulsiones, anafrodisia, satiriasis, priapismo y otras afecciones nerviosas, aftas, úlceras de la córnea, en los infartos viscerales, edemas atónicos, cálculos, oftalmias crónicas y contra las lombrices intestinales.

GIGONZA. Casa y baños minerales de la provincia de Cádiz, á cinco leguas de Jerez de la Frontera. Temperatura 16° R.

Se toman estas aguas desde 15 de junio á fin de setiembre. Tienen director, que cuida tambien las de Paterna.

An. Contienen ácido sulfhídrico, cloruro de sodio, cloruro de calcio, sulfato de calcio, azufre, sílice, y materia orgánica albuminosa.

GRAVALOS. Villa en la provincia de Logroño, á diez leguas de la capital, dos de Cervera del Rio Alhama, treinta de Burgos y cuatro de Calahorra. Se toman estas

aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. El agua de la fuente mineral mana de arriba abajo, formando burbujas; tiene olor á huevos podridos; puesta en un vaso de cristal es clara y diáfana; su sabor es poco perceptible al principio, pero despues es desagradable, parecido al de huevos podridos, y despues que se disipa esta sensacion se percibe otra algun tanto salada y desagradable.

En las paredes del arca que al principio sirvió de depósito, se nota un ruido como de ebullicion, y á pesar de su grosor están impregnadas de una materia colorante gris negruzca; su temperatura en la fuente es de 13° R. y su peso específico es 250,787.

An. Segun la análisis de D. José Elvira cada libra de agua contiene:

	pulg. cúb.
Acido sulfhídrico. . . .	2,413
Sulfuro de calcio. . .	4,441
Cloruro de sodio. . . .	5,053
Cloruro de magnesio. .	2,213

Aire y ácido carbón. indicios.

V. M. Son un remedio muy eficaz en las erupciones de la piel como herpes, sarna, tiña, en las que se las puede considerar como específicas. Es tambien indudable su utilidad en el asma y disnea espasmódicos, en los infartos crónicos, particularmente del hígado y del bazo, en la leucorrea atónica, en las escrófulas, anorexia, dispepsia, gastrodinia y gastralgia dependientes de la a-

tonía del estómago, en las neurosis de la cabeza, en las acedías, flegmasias crónicas del estómago sin lesion orgánica, en las induraciones escirrosas, en las convulsiones, cólicos nerviosos, neurosis de relacion, hidropesías parciales y leucoflegmasia no sostenida por inflamaciones viscerales ó de las membranas serosas, en la cistitis crónica, en algunas caries, en la nefritis calculosa y en algunas intermitentes rebeldes.

A. Se usan en baño general, baños á chorro, baño de vapor y en bebida.

GUARDIA VIEJA. A legua y media del pueblo de Dalías, provincia de Almería, á una legua de Berja y dos y media de Adra, se halla el castillo, puerto y baños de Guardia Vieja.

P. F. El agua exhala un olor hediondo, semejante al de los huevos podridos, su sabor es amargo y salado, y es menos pesada que el agua destilada; su temperatura es de 22 á 27° R.

An. Contienen mucho ácido hidrosulfúrico, un poco de ácido carbónico, magnesia, cal y sosa.

V. M. Están indicadas en los reumatismos, parálisis, afecciones cutáneas, escorbúticas ó escrofulosas, úlceras escrofulosas, infartos glandulares, etc.

Se toman estas aguas en la primera temporada desde primero de marzo á fin de junio; y en la segunda, desde primero de setiembre á fin de octubre. Tienen médico director.

LEDESMA. El establecimiento de

baños de Ledesma se halla en un lugar agregado al ayuntamiento de Tirados de la Vega, provincia de Salamanca, á cinco leguas de la capital y dos de Ledesma. Se toman estas aguas desde 15 de mayo á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. El agua del principal manantial, cuya temperatura es de 39½° R., es diáfana, cristalina, que tiene en suspension algunos átomos blanquecinos. Tiene un ligero olor á huevos podridos, es suave al tacto, recogida en un vaso es perfectamente clara y no se enturbia enfriándose, ni despues de hervida ni mezclada con agua; pero la gran masa del manantial tiene un ligero color azulado, es suave al tacto, y menos pesada que el agua destilada.

Se encuentran además otros tres manantiales sulfurosos de 22 á 32° R.

An. Contiene corta cantidad de ácido hidrosulfúrico, ácido carbónico, carbonato é hidrocloreto de sosa, y tal vez sulfato de la misma base, y una sustancia orgánica.

V. M. Producen prodigiosos efectos en todas las afecciones reumáticas y gotosas aunque sean sífilíticas, en las escrófulosas, en el lumbago y ceática; en las parálisis incompletas dependientes de congestiones cerebrales, siempre que éstas no estén sostenidas por un núcleo apopléctico duro y antiguo; en la leucorrea atónica y en todos los tumores linfáticos, y en estos casos se usa interior y exteriormente. No son tan segu-

ros sus efectos en las paraplegias á consecuencia de lesiones de la medula espinal, en las enfermedades venéreas recién tratadas por el mercurio, aunque estén complicadas con reumatismo, en los que han abusado del ioduro de potasio, y no debe confiarse cuando haya propension á las hemorragias ó hiperemias sanguíneas. Producen buenos resultados contra las úlceras, enfermedades de la piel, como sarna, tiña, herpes, etc.

A. Se usan en baño, chorro, bebida, inyeccion, lavativa ó linimento.

LIERGANES. Lugar á tres leguas de Santander, una y media de Entrambasaguas, y á una del Real sitio de la Calabada, provincia de Santander. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen director.

El agua de la *Fuente Santa* es sulfurosa, muy útil para curar las enfermedades de la piel, afecciones de estómago, retencion de orina, etc.

En treinta y cinco libras de agua se han encontrado:

	gran.
Acido sulfhídrico.	24,04
Cloruro de magnesio.	86,0
Cloruro de sodio.	172,0
Sulfato de sosa.	168,0
Carbonato de cal.	19,72
Carbonato de magnesia.	22,28
Sulfato de cal.	378,5
Sílice.	1,5

LUGO. En la márgen izquierda del Miño, al S. de la ciudad de Lugo, y cerca de cien pasos de la

capital, se halla el baño termal sulfuroso, y fuera del edificio se hallan otros manantiales sulfurosos. Se toman estas aguas desde 15 de junio á fin de setiembre, y tienen director.

P. F. El agua es cristalina, pero en algunas ocasiones se vuelve turbia y como lechosa; su temperatura es 30°, de sabor fastidioso y nauseabundo y de olor á huevos podridos; forma en su superficie una costra grasienta, y produce por donde corre un sedimento limoso blanquecino. Es mas pesada que el agua destilada cuando está caliente, pero es mas ligera despues de fria.

An. Contienen gas hidrógeno sulfurado y dejan depositar por donde pasan un sedimento limoso blanquecino. No han sido analizadas.

V. M. Convienen en las apoplejías serosas, hemiplegia, paraplegia, parálisis, espasmos, herpes, dolores articulares sifilíticos, gonorrea pertinaz, sífilis, reuma, apoplejía, sarna retropulsa, histérico y leucorrea crónica.

MARTOS. Villa en la provincia de Jaen, á tres leguas de la capital. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre y tienen director.

P. F. Estas aguas minerales son cristalinas, de olor semejante al de huevos podridos. La temperatura del baño fuerte es de 17° R. y la del flojo 16°.

An. Contienen gas hidrógeno sulfurado, ácido carbónico libre y ácido carbónico combinado, y además sulfato de magnesia, sul-

fato de alúmina, sulfato de cal y azufre, carbonato de magnesia, carbonato de cal, carbonato de alúmina, sílice y arcilla.

V. M. Son útiles en las enfermedades de la piel y en las demás enfermedades en que convienen las aguas sulfurosas frias.

MOLAR. Villa en la provincia de Madrid, á siete leguas de la capital y cuatro de Colmenar Viejo, á la derecha del camino real que va á Burgos.

A un cuarto de hora de la villa se halla la fuente llamada del Toro. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre, y tienen director.

P. F. El agua es clara, trasparente; pero en el pilon tiene un color algo oscuro, de olor fétido, semejante á cieno ó huevos podridos, de sabor igual al olor; es untuosa al tacto, un poco mas ligera que el agua destilada; al rededor del pilon y sus corrientes deja una materia orgánica; su temperatura es de 15° y su peso específico de 0,994.

An. Segun la análisis hecha de orden del Gobierno por D. Vicente Santiago Masarnau, D. Diego Genaro Lleget y D. José Abades y Rezano, que fué médico director de los baños, cada libra de agua mineral contiene:

	p. c.
Azoe.	1/2
	lin.
Gas ácido sulfhídrico. . .	2 1/2
Aire atmosférico, c. inaprec.	gran.
Hidroclorato de sosa. . . .	1,75
Hidroclorato de magnesia.	1,9

	gran.
Sulfato de magnesia.	0,75
Sulfato de cal.	0,50
Carbonato de magnesia.	0,75
Carbonato de cal.	0,35
Sílice.	1

V. M. Aprovechan de un modo inequívoco en las erupciones herpéticas, con tanta mas seguridad cuanto menos complicacion tenga con la sífilis, en la sarna y en la tiña, en las erupciones crónicas de la piel, en las disneas y asma espasmódicos no sostenidas por lesion orgánica; en los infartos crónicos, especialmente en los del hígado y del bazo; en la leucorrea por atonía general, en la clorosis, en la dismenorrea y amenorrea por atonía, en las cefalalgias y demás neurosis de la cabeza; en la gastralgia, gastrodinia y dispepsia; en las alteraciones de la secrecion de la bilis, en la gastritis y gastro-enteritis crónicas sin lesion orgánica, en las inducciones escirrosas de las glándulas, en el histérico, convulsiones, cólicos nerviosos y biliosos, hidropesías parciales, leucoflegmasias no sostenidas por flegmasias de las membranas serosas, en las escrófulas, en las úlceras y caries escrofulosas, en la cistitis crónica, en la nefritis calculosa, en la convalecencia de las enfermedades graves y en todas las enfermedades por atonía general. Produce buenos efectos en los catarros pulmonares crónicos siempre que no haya disposicion á los tubérculos, y produce admirables efectos contra la metritis crónica.

Daña en las enfermedades sostenidas por aumento de accion vital, en las calenturas agudas y crónicas, en todas las flegmasias agudas, etc.

A. Se usa en bebida, chorros, baños y embarros.

NAVA (Buyeres de). Feligresía de S. Bartolomé de la Nava, provincia de Oviedo, á ochenta y cinco leguas de Madrid y cinco de Oviedo. Se toman estas aguas desde 15 de junio á fin de setiembre. Tienen director.

P. F. Estas aguas minerales son claras y cristalinas, exhalan olor á huevos podridos, y le pierden despues de algun tiempo. Su temperatura es de 24 á 28° cent.; en el caño que sirve de desagüe al estanque de los baños se observan unas materias blanquecinas de naturaleza orgánica, llamada baregina.

An. Cada litro de agua contiene segun D. Ignacio José Lopez:

	granos.
Azufre.	0.001,782
	cent. cúb.
Gasácido sulfhídrico.	1 224,023

Analizadas al aire libre pierden:

	granos.
Azufre.	0.000,381

Segun los ensayos practicados por D. Adriano Paillette por medio del sulfidrómetro de Dupasquier, cada litro de agua contenia:

Acido sulfhídrico.	0,149;
----------------------------	--------

y entre los principios activos salinos predominan los sulfatos de magnesia y de cal, y hay además cloruro de magnesio y cloruro de calcio.

An. Contiene segun la análisis

hecha por D. Magin Bonet, D. Leon Sálmean y D. Amalio Maestre :

	cent. cúb.
Oxígeno.	4,478
Azoe.	14,926
Acido carbónico.	2,985

	granos.
Sulfato de cal.	0,047
Sulfato de magnesia.	0,038
Carbonato de cal.	0,063
Carbonato de magnes.	0,026
Cloruro de calcio, magnesio y potasio.	0,025
Sílice.	0,053
Sustancia orgánica.	0,080
Oxido de hierro.	indicio.
Agua pura.	999,669

No contienen ni ioduros ni bromuros.

V. M. Se las recomienda en la dispepsia, gastrodinia, gastritis y enteritis crónica, en el principio de las desorganizaciones del hígado y demás órganos abdominales, si está acompañado de un vicio eruptivo, en las grietas, en la clorosis, derrames serosos y sinoviales, en la gota atónica, infartos articulares, anquilosis, escrófulas, sarna, tiña y herpes en que son muy eficaces.

ONTANEDA. El establecimiento de baños de Ontaneda se halla á siete leguas de Santander, en el valle de Toranzo. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen director que cuida de las de Alceda.

P. F. Hay un solo manantial que es muy abundante; el agua es cristalina, sin color, de olor fuerte á huevos podridos; el sabor es agradable y algo dulce; su

temperatura es de 20° R. y su peso específico es de 1,005.

An. Segun la análisis hecha por D. José Ramon Pelayo, D. Manuel Mantecon y D. Ramon Solórzano, cada cinco libras de agua mineral contienen:

	p. cúb.
Acido hidrosulfúrico.	9,51
Acido carbónico.	9,29
	gran.
Hidroclorato de magnes.	77,429
Hidroclorato de sosa.	64,838
Sulfato de sosa.	46,334
Sulfato de cal.	65,892
Subcarbonato de magn.	5,614
Subcarbonato de cal.	4,957
Sílice.	2,819
Pérdida.	3,117

V. M. Estas aguas están indicadas en las enfermedades de la piel, á saber, en los herpes, tiña, sarna, lepra, eczema y pelagra. Producen admirables resultados en la clorosis, amenorrea, desarreglos de la menstruacion, en las erisipelas, epistaxis y otros trastornos que acompañan la aparicion de la menstruacion y en los padecimientos que preceden ó siguen á su cesacion; en las afecciones sífilíticas, y para corregir los fenómenos consecutivos al uso del mercurio. Producen maravillosos efectos contra las afecciones escrofulosas, á saber, las oftalmias escrofulosas, escrófulas, úlceras y padecimientos de los huesos; casi siempre se curan los flujos blenorragicos, la leucorrea, la otorrea, los dolores de oido y las diarreas purulentas. Se han conseguido muchas curaciones de congestiones hepáticas ó

esplénicas, infartos de los ovarios, neurosis del estómago y reumatismo crónico. Son útiles en las tisis incipientes, ronqueras recientes, toses rebeldes, neumonía crónica, y los catarros crónicos desaparecen en un gran número de casos. En bebida y respirando los gases son ventajosas en los espasmos del pulmón, como el asma, etc.

Están contraindicadas en las afecciones del corazón, en los padecimientos del cerebro, en las afecciones cancerosas, etc.

A. Se usan en baños, chorros y bebida.

PARACUELLOS DE JILOCA. Pueblo á una legua de Calatayud y cuatro de Alhama.

En una era á corta distancia de las casas se halla el manantial, que en otro tiempo fué mas abundante. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre y tienen médico director.

P. F. El agua es clara, trasparente, de olor fétido y cenagoso como á huevos podridos, que se percibe á gran distancia, de sabor de azufre, pero despues es desagradable; deja por donde pasa un cieno de color agrisado oscuro, untuoso al tacto y cuando se le quema huele á pólvora; su temperatura es de 14° R., y su peso específico es mayor que el del agua destilada.

An. Contiene ácido sulfhídrico, azufre, carbonato y sulfato de cal, sulfato de magnesia, hidroclorato de magnesia é hidroclorato de sosa.

V. M. Producen buenos efectos

en los herpes, ectima, acne, sarna, prúrigo, escrófulas, oftalmia purulenta, gastralgia, amenorrea, leucorrea, catarros crónicos, obstrucciones viscerales y afecciones sifilíticas.

A. Se usa en bebida y baños.

PARTOVIA (*Santiago de*). Feligresía en la provincia de Orense, á cinco leguas de la capital y media legua de Carvallino.

En la Aldea de Caldas existen unos baños termales llamados comunmente de Partovia. Se toman estas aguas desde 15 de julio á fin de setiembre, y tienen director que cuida de las de Carvallino.

P. F. Las aguas son claras, algo opacas, de sabor ligeramente salado, y su temperatura es de 27° R. bajando hasta 22° dentro de la misma poza, á medida que se aleja del punto de donde nace.

An. No se tiene una análisis exacta de estas aguas, y se sabe que contienen sulfuro de sodio, carbonato de sosa, cloruro de magnesio é hidrógeno sulfurado.

V. M. Son eficaces en todas las afecciones reumáticas, nerviosas y erupciones cutáneas.

Se usa principalmente en baños, y al mismo tiempo en bebida las de Carballino. V. estas aguas.

RIBERA. Poblacion en la provincia de Jaen, en la jurisdiccion de Alcalá la Real.

A ciento cincuenta varas al S. de la poblacion se hallan las aguas minerales sulfurosas frias, y nacen en un barranco al nivel del rio; su temperatura es de 14° á 15° R. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiem-

bre, y tienen por médico director el que cuida las de Frailes.

An. Contienen gas hidrógeno sulfurado, gas ácido carbónico, sulfato de magnesia, sulfato de cal, muriato de magnesia y alúmina.

V. M. Convienen en las afecciones cutáneas, en los flujos mucosos pasivos, en las intermitentes rebeldes y en todas las demás enfermedades atónicas.

SANTA AGUEDA Ó GÜESALIBAR. En la aldea de Guesalibar, se hallan los baños sulfurosos de Sta. Agueda. Dista nueve y media leguas de Tolosa y media de Mondragon, provincia de Guipúzcoa. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre y tienen médico director.

P. F. El principal manantial es de aguas sulfurosas; el agua es perfectamente cristalina, con mucho olor á huevos podridos; su sabor, análogo al olor, es dulce al principio y despues salino; su temperatura 14° R.; su peso específico es 1,005. Deja por donde corre un sedimento blanquecino y detenida forma una nata mucosa; abandonada á la influencia de la atmósfera ó detenida en un pozo se descompone; se pone blanquecina, pareciéndose á agua de jabon.

An. Segun el análisis que de ellas hizo D. Antonio Moreno, se componen estas aguas de

	p. cúb.
Acido hidrosulfúrico.	0,87
Acido carbónico.	3,95
Carbonato de cal.	1,89

	gran.
Carbonato de magnesia.	0,68
Hidroclorato de sosa.	2,78
Hidroclorato de magnesia.	0,81
Sulfato de cal.	5,64
Sulfato de sosa.	1,45
Sulfato de magnesia.	0,75
	onz.
Agua.	16

V. M. Produce buenos efectos en los herpes, enfermedades cutáneas, reumas, catarros crónicos, degeneraciones sifilíticas, parálisis locales que provienen de ataques moderados de apoplejía ú otras distintas dolencias, como son diarreas, infartos de las vísceras abdominales, de la vagina ó del útero, supresion menstrual, etc., reumatismos, obstrucciones de las vísceras abdominales, enfermedades mercuriales, etc.

A. Se usa en bebida, baños, chorro ó baños de vapor.

Se exporta en botellas bien lacradas y selladas, y no se altera ni descompone durante algunos meses.

Inmediato á la fonda hay un manantial de agua ferruginosa que se usa en bebida, y además un depósito de aguas de Cestona. Este agua ferruginosa contiene gran cantidad de protocarbonato de hierro disuelto por medio de un exceso de ácido carbónico, algo de sulfato de cal y un poco de carbonato de magnesia.

P. F. El agua es perfectamente diáfana, sin olor, de sabor estíptico como á tinta, y su temperatura es de 11° R.

V. M. Estas aguas son útiles en

las astenias, escrófulas, amenorea por debilidad, hidropesías pasivas sin lesion de tegido, leucorrea y metrorragia crónica, blenorrea, flatulencia, digestiones penosas, etc.

Agua artificial de Santa Agueda.

An. Fundándose en la análisis de D. Antonio Moreno, ha propuesto Casares la fórmula siguiente:

	gran.
2 Cloruro de calcio cristaliz.	4
Cloruro de magnesio crist.	1
Sulfato de cal.	5 ³ / ₅
Sulfato de magnesia.	2 ¹ / ₂
Sulfato de sosa.	1 ¹ / ₂
Carbonato de sosa.	4 ¹ / ₅

Agua hidrosulfurosa. 2 dr.
 Agua con tres volúmenes de ácido carbónico, 15 onzas y 6 dracmas.

Se disuelven con separacion en un poco de agua los cloruros térreos, los sulfatos y el carbonato de sosa, se echan estas disoluciones en botellas, y se llenan con el agua carbonizada, dejando el suficiente espacio para el agua hidrosulfurosa.

FONT SANTA DE SAN JUAN DE CAMPOS. En San Juan de Campos, villa á seis leguas de Palma, en Maliorca, se halla á poco mas de una legua al S. de dicha Villa la balsa de las estacas, llamada *Fuente Santa*. Se toman estas aguas desde primero de abril á fin de mayo, y tienen médico director.

An. Segun el Dr. Don Juan Ignacio Estelrich, dichas aguas tie-

nen 28° R., y están compuestas de ácido hidrosulfúrico, ácido carbónico, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, sulfato de cal, sulfato de sosa, carbonato de cal y sílice.

A. Se usa en bebida, baños, chorro y baños de vapor.

SAN SALVADOR, en Francia, villa á una legua de Bareges y un cuarto de legua de Luz, tiene un buen establecimiento. Se toman las aguas desde mayo á fin de octubre y tienen médico director.

Existe un solo manantial, dividido en muchos brazos llamados el *Castaño*, *Becegua*, el *Terraplen* y la *Capilla*.

P. F. El agua es clara, cristalina, muy grasa, untuosa al gusto y al tacto; de igual sabor y olor que la de Bareges, esparciéndole lejos del manantial; expuesta al aire desprende gas. La temperatura en la llave del baño del chorro es de 34°,50 cent.; la de los baños de la Capilla, que son tres, 30°; la del Terraplen, que son tres, 32,5; la de los tres de Becegua, 33°,7; la del Castaño, 35; los del medio tienen tambien 35° cent.

An. Segun la análisis de Longchamp, un litro de agua contiene:

	lit.
Azoe.	0,004
	gran.
Sulfuro de sodio.	0,025360
Sulfato de sosa.	0,038680
Cloruro de sodio.	0,073598
Sílice.	0,050710
Cal.	0,001847
Magnesia.	0,000242

	gran.
Sosa cáustica.	0,005201
Potasa cáustica, ba- regina y amoniaco. indicios.	

V. M. Estas aguas, ligeramente sulfuradas y termales, pueden ser consideradas como auxiliares y preparatorias de las de Bareges, y por ser mas suaves que estas convienen mas á las mujeres, á los niños y á los enfermos de constitucion endeble y delicada, y á los de temperamento seco é irritable. Se las recomienda en las afecciones espasmódicas ó hipocondriacas, tos incipiente, infartos ligeros de las vísceras del bajo vientre, cefalalgia, jaqueca, y para reparar los desórdenes de la menstruacion y las flores blancas; catarros vesicales, bronquitis crónica, asma seco y húmedo, afecciones calculosas, gastralgias y enteralgias.

A. Se usa en baños, chorros, inyecciones y en bebida.

Se usan al mismo tiempo las aguas de Bonnes ó la ferruginosa de Viscos.

Agua de San Salvador artificial.

	gr.	g̃.
½ Sulfuro de sodio cristalizado.	0,077	1
Sulfato de sosa, crist.	0,085	1
Cloruro de sodio.	0,073	1
Carbonato de sosa cristalizado.	0,030	¼
Agua no aireada.	1000	20 onz.

TIERMAS. Poblacion á doce le-

guas de Jaca, provincia de Zaragoza. Hay un establecimiento á un cuarto de legua del pueblo. Se toman estas aguas desde 15 de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

Hay varios manantiales.

P. F. Estas aguas son diáfanas, de olor á huevos podridos y de sabor algo salado y astringente, suaves y untuosas al tacto, desprenden burbujas gaseosas, y por donde pasan dejan una sustancia blanquecina, que nada tambien en la superficie. La fuente que nace dentro de la casa marca 13° cent.; la del chorro tiene 34 y 28°; la de la Ripa y la de las demás fuentes varía de 30 á 32½° R.

An. Cada libra de agua medicinal contiene una pulgada cúbica de gas sulfhídrico, y en el residuo de la evaporacion se halla:

	gr.
Bicarbonato de cal.	1
Bicarbonato de magnesia.	0,5
Cloruro de sodio.	16,5
Cloruro de calcio.	1
Cloruro de magnesio.	0,5
Sulfato de sosa.	8,4
Sulfato de cal.	3
Sílice.	0,5
Materia orgánica.	3

V. M. Producen buenos efectos en la artritis, reumatismos crónicos, parálisis, ceática, enfermedades crónicas de la vejiga y aparato urinario, obstrucciones de las vísceras del bajo vientre, histérico, hipocondría, convulsiones, clorosis, enfermedades de la piel, como herpes, úlceras atónicas, anquilosis, tumores frios

de las articulaciones, y en los producidos por causa escrofulosa.

Están contraindicadas en los enfermos que padecen calentura, y en los que están amenazados de congestión cerebral ó de alguna enfermedad aguda.

A. Se usa en baño, bebida, chorro ó estufa.

ZARAGOZA. A dos leguas de Zaragoza, en la casa de campo llamada Torre de San Miguel, hay un pozo bastante profundo con un manantial abundante de agua medicinal fría, que ha sido analizada en Madrid por el catedrático de química el Dr. D. José Camps y Camps. Según él contienen en cada mil partes:

Cloruro de sodio. 0,261

Cloruro de magnesio. . . 0,001

Sulfato de sosa. 0,341

Sulfato de cal. 0,026

Carbonato de cal y de

magnesia. 0,705

Hierro. 0,005

Silice. 0,010

y además restos de una sustancia orgánica y los ácidos carbónico é hidrosulfúrico libres, en proporción bastante considerable.

V. M. Hay establecimiento de baños, y sus aguas son útiles en las afecciones de pecho, dolores de estómago, inapetencia, debilidad de estómago, desarreglos de la menstruación, úlceras cancerosas, flujos de sangre, toses, asma, dolores reumáticos ó gotosos crónicos, dolores sifilíticos, herpes, convulsiones y afecciones nerviosas.

AGUAS MINERALES ACIDULAS.

GENERALIDADES.

Las aguas minerales *acidulas*, *gaseosas* ó *carbónicas*, están caracterizadas por la presencia del gas ácido carbónico que contienen. Se observan en los terrenos que están cargados de cal y se aproximan al terreno primitivo, pero que también son ricos en ácido carbónico.

P. F. Las aguas acidulas tienen un sabor vivo, picante, que se pierde á medida que se desprende el gas ácido carbónico; las burbujas se rompen sin cesar en su superficie y le dan el aspecto de hervor; estas burbujas son más numerosas en tiempos secos que en la proximidad á las tempestades. Expuestas al aire libre, á un calor suave, pierden su gas, en que depende su principal virtud. Son calientes ó frías.

P. Q. Estas aguas forman un precipitado blanco con el agua de cal, y enrojecen la tintura de girasol y de violetas. Contienen rara vez tanto ácido carbónico como su volúmen; y además gene-

ralmente muriato y sulfato de sosa, carbonato de sosa, carbonato de cal, carbonato de magnesia, carbonato de hierro y sílice.

V. M. Estas aguas obran algunas veces por las deposiciones, pero generalmente por la orina, cuya secrecion aumentan. Tienen mas accion sobre la cabeza que las demás aguas minerales, pues producen una especie de embriaguez pasajera y tendencia al sueño, y á veces aumentan las incomodidades á las personas atormentadas de flatuosidades. Tienen una accion especial sobre el estómago, el que fortifican sin irritar y calman su estado espasmódico; á veces quitan el apetito, por la sedacion que producen en el estómago, lo que se previene exponiendo el vaso de agua al sol para que pierda parte del ácido carbónico ó se le mezcla con una tisana dulcificante.

Esta accion sedante sobre el sistema nervioso y la excitacion lenta y moderada que comunican á nuestros órganos, son muy favorables á las personas de temperamento seco, nervioso, bilioso, y en las enfermedades en que existen algunos indicios de irritacion ó alguna disposicion inflamatoria.

En bebida son excelentes para calmar la sed, y convienen en las afecciones que requieren las bebidas refrigerantes; así se emplean con feliz éxito en las calenturas biliosas, en las pútridas, mezcladas con suero ó agua de cebada, ó solas cuando la fiebre no es ardiente. Tienen una accion especial sobre el sistema biliar y destruyen con prontitud los desórdenes que se manifiestan en el sistema nervioso, por su accion sedante; así son útiles en las enfermedades del hígado con eretismo, ictericia, diarrea biliosa, vómitos biliosos. Son tambien muy útiles en las enfermedades crónicas, principalmente en las del abdómen, á saber, en la gastritis y enteritis antiguas, gastralgias, infartos de las vísceras del bajo vientre, clorosis, amenorrea, flores blancas y estado de languidez; en las afecciones nerviosas, á saber, el histérico é hipocondría, etc. Por su virtud diurética se las ha recomendado en las enfermedades de las vias urinarias, catarro vesical, cólicos nefríticos y afecciones calculosas, en que obran como diuréticas ó como disolventes cuando contienen gran cantidad de bicarbonato de sosa.

No convienen en las enfermedades cutáneas, á no ser que provengan de una afeccion del estómago ó de una hepatitis crónica. Las personas dispuestas á las congestiones sanguíneas á la cabeza ó al pecho las usarán con circunspeccion.

A. Se beben á la dosis de uno á dos vasos y aun á mayor cantidad en el dia; se tomarán en el mismo manantial, y si ocasionan males de cabeza, opresion y movimiento febril, se usarán despues de algo evaporadas. Se las puede mezclar con leche y suero ó cualquier otro líquido dulcificante; mezcladas con vino se vuelve espumoso y con agua facilitan la digestion. Se conoce que producen buenos efectos

cuando el enfermo tiene apetito y digiere con facilidad ; pero si producen diarrea ó insomnio debe suspenderse su uso.

Para trasportarlas y conservarlas se llenará las botellas por la madrugada, se las tapaná con cuidado y se las conducirá de noche; pero á pesar de esto pierden el ácido carbónico y no se usarán las aguas que al destapar la botella no se desprenda el gas; se tapaná inmediatamente cuando no se consuma toda la que llenaba la botella.

AGUAS ACIDULAS EN PARTICULAR.

ALANGE. Villa en la provincia de Badajoz, á once leguas de la capital y tres de Mérida.

La casa de baños dista doscientos pasos de la villa de Alanje. Se toman estas aguas desde 24 de junio á 20 de setiembre y tienen médico director.

P. F. El agua es clara y trasparente, desprende gruesas burbujas, que producen ruido al romperse; miradas al través del sol se ven chispear como si estuviesen electrizadas; depositan légamo, que cuando se revuelve tambien desprende burbujas; su sabor es picante y refresca un poco, son untuosas al tacto, dejadas en quietud depositan un sedimento cálcáreo y untuoso, y en las paredes de los vasos en que se dejan veinticuatro horas se notan unos globulitos semejantes á los del mercurio; su temperatura es de 22° R. poco mas ó menos, y su peso específico 1,18.

An. Contiene gran cantidad de gas ácido carbónico, y en quince libras de agua se ha encontrado:

	gran.
Carbonato de sosa.	3
Carbonato de magnesia.	6
Sulfato de sosa.	8
Sulfato de cal.	2
Sílice.	1

V. M. Se las recomienda en la cefalalgia, jaqueca, neuralgia, ceática, epilepsia, manía, convulsiones, histérico, baile de San Vito, amaurosis, parálisis, esplenitis, leucitis, sífilis, escrófulas, herpes, oftalmias, gastritis, colitis, metritis y cistitis crónicas, angina, metrorragia, dismenorrea, amenorrea, leucorrea, gastrodinia, cólicos, palpitaciones, reumatismo, artritis, gota, parálisis, enfermedades venéreas, heridas y gastroenteritis crónica.

A. Se usa en baños y bebida.

ALCANTUD. Villa á diez leguas de Cuenca y dos de Priego, provincia de Cuenca. En la márgen del río Guadiela, á quinientos pasos de la poblacion, se hallan los baños antiguos. Se han construido despues cuatro casas y un baño cerrado. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre.

gran.

Hidroclorato de magnesia. . 6 1/2

P. F. Las aguas son cristalinas, carbónico ; no tienen en suspensión de sabor algo picante y ligeramente agrio, su temperatura es de 16° R.; dejan desprender burbujas de ácido carbónico.

An. No existe análisis satisfactoria de este agua, y solo se sabe que deja desprender burbujas de ácido carbónico y contiene carbonato de hierro, sulfatos de magnesia y de potasa, alumbre y sílice.

V. M. Producen admirables resultados en el reumatismo y afecciones herpéticas, atonía, perle-sía, obstrucciones, escrófulas, supresion de orina y de la menstruacion ó hemorroides, cálculos renales ó vesicales, oftalmias, convulsiones, vahidos, hidropesías, cólicos, hipocondría, histérico, escorbuto, calenturas rebeldes por lesion de algun órgano, enfermedades cutáneas y en muchas otras.

A. Se usan en bebida, baños y en embarros.

ALHAMA DE ARAGON. Pueblo en la provincia de Calatayud, á cinco leguas de la capital.

Existen dos establecimientos, llamados baños nuevos y baños viejós. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre, y tienen médico director.

P. F. Las aguas de todos los manantiales son muy cristalinas, diáfanas, transparentes, no tienen olor ni color, de sabor acidulo y algo estíptico, de igual peso específico que el agua destilada; son untuosas y suaves al tacto; agitadas dejan desprender gran cantidad de burbujas de ácido

carbónico ; no tienen en suspensión materias insolubles; dejan por donde pasan una incrustacion ó un poso verdoso y tiñen las piedras de verde, dejando en ellas mucho óxido de hierro y cubriéndolas de una película irisada; su temperatura es de 29° R.

An. Según la análisis de D. Ramon Marconel contienen gas oxígeno, gas ácido carbónico, y en cada diez y seis onzas se halla:

	gran.
Sulfato de cal.	6
Carbonato de magnesia. . .	7
Hidroclorato de magnesia.	3,5
Sulfato de hierro.	5

V. M. Producen buenos efectos en los dolores nefríticos y en todas las enfermedades crónicas de los órganos urinarios por cálculos ó por catarros; corrigen los desarreglos de la menstruacion y disminuyen los infartos escirrosos de la matriz; curan el reumatismo, la gota y la ceática, y son muy eficaces en la parálisis, convulsiones, asma, hidropesías, leucoflegmasias, hipocondría y en todas las oftalmias por renitentes que sean; son muy útiles en las enfermedades cutáneas, á saber, en la sarna, herpes, impétigo y manchas de la piel. Son excelentes y se las recomienda mucho en las obstrucciones del bajo vientre, hígado y bazo, en las cardialgias, gastrodinia, pirosis, dolores de estómago, flatuosidades y acedia, cólicos nerviosos, en la clorosis, flujo blanco, flujo hemorroidal; son muy provechosas

en la artritis fija ó vaga, y en todas las especies de gota, tumores frios escrofulosos, anquilosis por cualquiera causa que sea, producidas por heridas de armas de fuego; en los infartos escirrosos de las vísceras y en particular en los del útero y sus dependencias; en la sífilis, contra los fenómenos mercuriales y contra las neuras de relacion.

Están contraindicadas en las personas de constitucion irritable y de temperamento sanguíneo y pletórico; en los que padecen inflamaciones de alguna víscera, hemotisis, tisis, asma, hidropesía con fiebre, en los histéricos muy marcados, en las demacraciones muy considerables aunque sean infebriles, en las inflamaciones del útero y otros órganos de la generacion, en las flegmasias agudas y preludios de enfermedades, en la época crítica y en los abscesos del pulmon, aunque en algunos de estos casos convienen frias.

A. Se usan en bebida y en baños.

ALAMILLA, SIERRA ALAMILLA. Baños llamados tambien de Almería ó de Pechina. La primera temporada para tomar estas aguas empieza desde primero de mayo á fin de junio, y la segunda desde primero de setiembre á fin de octubre. Tienen médico director.

P. F. El agua es clara, diáfana, sin color, olor ni sabor, su temperatura es de 42° R.; forma ampollitas que suben á la superficie y se deshacen; expuestas al aire atmosférico dejan un sedimen-

to anaranjado sin formar película. An. Analizadas cuatro libras de agua, segun D. Mariano Gonzalez Crespo, han dado:

Acido carbónico.	12,08
Oxígeno.	6,26
Azoe.	13,66
	granos.
Carbonato de magnesia.	9,22
Carbonato de cal.	4,20
Hidroclorato de cal.	3,80
Hidroclorato de sosa.	3,82
Hidroclorato de magnes.	4,62
Sulfato de magnesia.	12,52
Sulfato de cal.	4,84
Sílice.	1,17

V. M. Tomadas estas aguas en bebida, baños templados frios ó calientes ó de vapor, producen buenos efectos en el reumatismo muscular ó fibroso, general ó parcial, en la gota, retracciones musculares, anquilosis, parálisis, hemiplegia, paraplegia, epilepsia, baile de San Vito, histérico, convulsiones, cefalalgias, hemicráneas, vértigos, úlceras, enfermedades cutáneas, oftalmias rebeldes, sífilis constitucional, amenorrea, dismenorrea, leucorrea, clorosis, erupciones cutáneas, á saber, el eczema, herpes, ictiosis, edemas, etc. Están contraindicadas en las enfermedades crónicas de pecho y en las agudas del cerebro, etc.

A. Se usa en bebida, baños calientes, templados, frios ó de vapor.

BUSSANG, en Francia. Poblacion á siete leguas de Remiremont, departamento de los Vosgos. No

existe establecimiento de baños.

Hay tres manantiales.

P. F. El agua es fria, cristalina, de sabor agrillo, ferruginoso, sobre todo en el manantial de arriba, chisporrotea en el vaso como el vino de Champaña, y las paredes del depósito se cubren de una materia rojiza ocrácea.

An. Segun Barruel un litro de agua contiene:

	gran.
Cloruro de sodio.	0,0800
Sulfato de sosa.	0,1100
Carbonato de sosa.	0,7700
Carbonato de magnesia.	0,1800
Carbonato de cal.	0,3610
Carbonato de protóxido de hierro.	0,0160
Silice.	0,0560

y vez y media el volúmen del agua de ácido carbónico libre y aun doble.

V. M. Convienen en la languidez de las vias digestivas, en los infartos lentos de las vísceras abdominales y en las arenillas.

Se pueden exportar y se usan en bebida.

Agua artificial de Bussang.

	gr.	g̃.
Carbonato de sosa cristalizado.	0,252	3
Sulfato de cal.	0,162	2
Sulfato de magnesia cristalizado.	0,027	1/3
Cloruro de calcio cristalizado.	0,241	3
Sulfato de hierro cristalizado.	0,061	1/3

onzas.

Agua gaseosa de cinco volúmenes. . . . 1000 20

Se disuelven el sulfato de magnesia, el hidrociorato de cal y el sulfato de hierro en un poco de agua, y se divide esta solucion en las botellas que se llenan de agua gaseosa que tengan en disolucion el carbonato de sosa. Podria tambien ponerse á parte la solucion del sulfato de hierro, y cargar de ácido carbónico el líquido con las otras sustancias salinas.

Agua de Bussang para bebida.

	granos.
Protocarbonato de sosa.	6
Protocarbonato de hierro.	1/2
Agua.	21

V. M. Se la recomienda en las enfermedades crónicas del estómago, afecciones calculosas de los riñones y de la vejiga, infartos abdominales y clorosis.

A. Se usa á vasos, por la mañana y en las comidas.

CALDAS DE OVIEDO. Con este nombre, ó solo con el de Caldas, se conoce una fuente medicinal, situada en el término de Casielles, parroquia de San Juan de Priorio, provincia de Oviedo. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre y tienen médico director.

El establecimiento tiene dos baños generales y ocho particulares con sus sudaderos.

P. F. El agua es clara, traspa-

rente, sin olor ni sabor, aunque deja un gusto estíptico en el paladar; no causa náuseas cuando está caliente. Su temperatura es de 30 á 34° R.; la del caño que sirve para beber solo tiene 32 á 33°, la que surte á los baños 30 á 32° y la de la estufa 28 á 29°. Al nacer forman burbujas que se agitan y se elevan, y contienen ázoe; en el fondo y en los conductos por donde pasa dejan una porcion de sedimento viscoso.

An. Cada litro de agua contiene segun la análisis de D. José Salgado:

	centil. cúb.
Acido carbónico.	16,21
Aire atmosférico.	7,69
Azoe.	9,63
	granos.
Cloruro de sodio.	0,020
Sulfato de sosa.	0,010
Sulfato de cal.	0,017
Carbonato de cal.	0,053
Carbonato de magnesia.	0,030
Fosfato de cal.	0,038
Fosfato de alúmina.	0,015
Oxido de hierro.	0,005
Sílice.	0,008
Materia orgánica.	0,013
Estronciana.	indic.

V. M. Son útiles en los catarros pulmonares crónicos y en la hemotisis por irritacion hemorrágica de la mucosa del pulmon; modifican las afecciones nerviosas de pecho, asma esencial, tisis incipiente, impidiendo su desarrollo ulterior; corrige los desarreglos de la digestion, los dolores de estómago y de los intestinos, las

afecciones crónicas de vientre, el reumatismo, la gota, caries aunque esté sostenida por escrófulas; dolores nefriticos, catarros vesicales, arenillas, parálisis apopléticas, dolores nerviosos, convulsiones, hipocondría, hidropesías incipientes y erupciones atónicas. Son muy útiles en los desarreglos de la menstruacion y así combaten la esterilidad.

A. Se usa inspirando los gases que dejan desprender, en baño, chorro, estufa y en bebida.

CONTREXEVILLE, en Francia, departamento de los Vosgos, á cuatro leguas de Mirecourt. La temporada mas favorable para tomar estos baños es desde 15 de junio á 15 de setiembre, y tienen médico director.

Existen dos manantiales.

P. F. El agua del Pabellon es fria, de sabor fresco, acídulo y ligeramente ferruginoso; expuesta al aire se cubre su superficie de una pelicula irisada; deja aposar por donde pasa una capa ocrácea, su olor es sulfuroso y su temperatura es de 10° cent.

El agua de la fuente de los Baños tiene los mismos caractéres físicos y químicos.

An. Cada litro de agua contiene:

	granos.
Sulfato de cal.	1,079
Sulfato de magnesia.	0,022
Subcarbonato de cal.	0,805
Subcarbonato de magn.	0,017
Cloruro de calcio.	0,038
Cloruro de magnesio.	0,012
Nitrato de cal.	indic.
Sílice.	0,178

	gran.
Materia orgánica.	0,034
Pérdida.	0,002

	gr.	g.
Sulfato de hierro cristalizado.	0,030	1/5
		onz.

A cero de temperatura y á la presion de 0,77 de mercurio contiene un poco menos que las dos terceras partes de volúmen de gas, compuesto de

Oxigeno.	11
Azoe.	30
Acido carbónico.	59

Agua. 1000 20
Acido carbónico. . . 5 volúm.
Se emplean los carbonatos cal- cáreos y magnesio recientemente precipitados; se deslíen con cui- dado como el sulfato de cal en la disolucion de las demás sales, se carga de ácido carbónico y se echa en las botellas en las que se ha puesto la disolucion del sulfato de hierro.

V. M. Son útiles en las arenillas calculosas, pero no en los cálcu- los; en los infartos de las vísceras abdominales, catarros vesicales crónicos, gastralgia, clorosis, go- ta, anasarca, enfermedades cutá- neas; en inyecciones, en la leu- correa, úlceras de la vagina y blenorrea; en colirios, en las en- fermedades de los párpados y en las inflamaciones crónicas de las glándulas de Meibomio.

FUENSANTA (*Hervideros de*). Se halla en la dehesa llamada de Vi- llafranca, á dos leguas y media de Almagro y una de Pozuelo de Ca- latrava, provincia de Ciudad Real. Hay varios manantiales. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre y tienen médico director.

A. Se usa en baños, chorros, inyecciones, colirio y bebida.

P. F. El agua es clara y tras- parente, aunque al salir arrastra una porcion de partículas rojizas que luego se precipitan, el sabor es agrio, picante y astringente, pero si ha pasado algun tiempo ó si se hierve, se vuelve ingrata y salobre; agitada desprende mucha espuma; si se la deja al aire libre despues de veinticuatro horas se forma en su superficie una telita plateada; cuando recibe los ra- yos del sol refleja todos los colo- res del arco iris, y su olor es pa- recido al del ácido carbónico. Su temperatura 17° R. en el hervide- ro principal y un grado menos en los pequeños. Es un poco mas pe- sada que el agua destilada.

Agua artificial de Contrexeville.

	gr.	g.
⌘ Sulfato de cal.	1,079	13
Sulfato de magnes.	0,018	1/5
Carbonato de cal.	0,806	10
Carbonato de magn.	0,123	1 1/2
Carbonato de sosa cristalizado.	0,021	1/4
Cloruro de calcio cristalizado.	0,076	1
Cloruro de magne- sia cristalizado.	0,023	1/4

An. Segun el análisis del doctor

D. Gregorio Bañares, cada libra de agua mineral contiene:

	p. c.
Acido carbónico.	147
Carbonato de hierro. . . .	1½
Carbonato de magnesia. . .	11
Carbonato de cal.	1
Sulfato de sosa.	1½
Hidroclorato de sosa. . . .	15

puesto D. Antonio Casares, la siguiente fórmula:

	gran.
2/ Sulfato de hierro cristaliz.	3¼
Cloruro de calcio cristaliz.	2¼
Carbonato de magnesia. . .	11
Carbonato de sosa.	3¼
Cloruro de sodio.	9
Agua.	1 libra.
Acido carbónico. 5 volúmenes.	

V. M. Se las recomienda en el reumatismo, afecciones cutáneas, obstrucciones de las vísceras abdominales, gota, herpes, sarna, erisipela crónica, escrófulas, cáncer, escorbuto, úlceras sordidas, sífilis, blenorrea, dolores venéreos, erupciones, tumores, úlceras, escrescencias, y otros síntomas sífilíticos; reuma crónico, ceática, gota, dolores por grandes contusiones, heridas, dislocaciones, anorexia, dispepsia, pirosis, cardialgia, gastrodinia, cólico, hepatalgia, ictericia, hipocondría, dolores nefríticos, hidropesías, cefalalgia, oftalmia, odontalgia, amenorrea, clorosis, menorragia y leucorrea atónicas, esterilidad, histérico, vértigos, afecciones espasmódicas, temblores, convulsiones, baile de S. Vito, etc., raquitis, asma, hidrotorax.

A. Se usan en baño y en bebida.

Agua artificial de los hervideros de Fuensanta.

Para preparar este agua ha pro-

Se disuelven con separacion en un poco de agua el sulfato de hierro y el cloruro de calcio, y se reparten las disoluciones en las botellas: el cloruro de sodio y el carbonato de sosa se disuelven en el resto del agua, en la cual se deslíe el carbonato de magnesia y se carga despues de ácido carbónico, y con este líquido se acaban de llenar las botellas.

MARMOLEJO. Villa en la provincia de Jaen, á siete leguas de la capital y una de Andújar.

A un cuarto de legua de la ribera izquierda del Guadalquivir, brotan muchos manantiales en medio del lodo y despojos del rio. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 15 de abril á 15 de junio, y en la segunda desde 20 de setiembre á 11 de noviembre, y tienen médico director.

P. F. El agua mineral brota produciendo un ruido notable, y forma continuamente en la superficie ampollitas que se deshacen al instante; no tiene color, es perfectamente clara y trasparente, y su sabor es picante y herrumbroso. Dejada en reposo se forma en su superficie una película dorada con

ráfagas ligeramente azules, semejantes á las que se ven adheridas al suelo y canal de su corriente. Su temperatura es de 17° R., y es un grado y medio menos pesada que el agua destilada.

An. Veinticinco libras de agua mineral contienen:

Acido carbónico libre. . . .	92
Hidroclorato de potasa. . . .	13
Sulfato de potasa.	11
Subcarbonato de potasa. . . .	51
Subcarbonato de cal.	34
Subcarbonato de magnesia. . .	100
Subcarbonato de hierro. . . .	18
Silice.	5
Pérdida.	10

V. M. Son útiles en las caque- xias por excesos de líquidos blan- cos, en las que son consecutivas á las calenturas intermitentes, en las debilidades de la infancia, en las afecciones verminosas, en las hidropesías esenciales ó atónicas no sostenidas por lesiones orgá- nicas de las vísceras, en los in- fartos glandulares frios, y po- drán convenir en las escrófulas ó cuando menos en la predispo- sición á esta enfermedad, en to- dos los casos en que convenga dar vida y acción al sistema san- guíneo. Son también muy útiles en las flegmasias crónicas de las vís- ceras abdominales si reconocen por causa la vida sedentaria, las meditaciones profundas, el abuso de los alimentos de mala calidad, en las que quedan después de las enfermedades agudas, en el histó- rico, hipocondría, leucorrea, ne-

fritis, principalmente en la calcu- losa, en la hepatitis, lienitis y gastroenteritis, y finalmente en todas aquellas en que la atonía y falta de acción de los órganos im- pide á la naturaleza que promue- va un movimiento vital de crisis. También estas aguas pueden fa- vorecer la aparición de las he- morroides suprimidas, de los her- pes retropulsos y la gota, cuan- do estas enfermedades son la cau- sa de la debilidad.

A. Se usa en bebida y baños.

MONT D'OR, en Francia, lugar á ocho leguas de Clermont Fer- rand, departamento de Puy de Dôme. Es concurrido desde 15 de junio á 20 de setiembre.

Hay siete manantiales.

P. F. El agua es trasparente, expuesta al aire se cubre pronto de una telilla muy fina, nacarada é irisada, antes ó después de las grandes tempestades; las aguas del baño grande presentan copos muy ligeros y muy pequeños; no tienen olor, y su sabor es ligera- mente ácido, después untuoso y salado, y al fin amargo y un poco estíptico. La temperatura de la fuente de Santa Margarita es de 15° cent., la de César 45°, la fuen- te Carolina 45°, el baño grande 42,5, el baño Ramon 42°, el baño Rigny 42° y la fuente de la Magda- lena 47°.

An. Analizadas las aguas de la Magdalena por Berthier, se ha en- contrado:

	litros.
Acido carbónico libre. . .	0,133
	granos.
Carbonato de sosa. . . .	0,386

granos.

Sulfato de sosa. 0,116
 Cloruro de sodio. 0,296
 Carbonato de cal. 0,237
 Carbonato de magnesia. . 0,077
 Alúmina. 0,126
 Oxido de hierro. 0,022

V. M. Convienen en el catarro pulmonar crónico, perineumonía crónica, afecciones crónicas de los pulmones, á consecuencia del retroceso de un principio morboso cualquiera ó que suceden á una fiebre exantemática, á la supresion de las reglas ó de las hemorroides; en la hemotisis de personas poco irritables, y cuya circulacion capilar cutánea está lánguida, á no estar la enfermedad acompañada de una dilatacion aneurismática; pueden suspender el curso de los tubérculos pulmonares, cuando son poco numerosos y prevenir esta degeneracion, pero no en los sugetos irritables cuando prevalecen los signos de irritacion; en el asma húmedo que sucede al catarro pulmonar crónico, ó por retroceso de reuma ó herpes; en la parálisis que sucede al reumatismo, flegmasias cutáneas ó evacuaciones habituales suprimidas; reumatismo muscular crónico sin complicacion; hinchazones articulares crónicas por causa reumática gotosa, debilidad articular por la gota; dislocaciones del fémur consecutivas por causa externa y en personas robustas; afecciones del corazón, del estómago, de los intestinos ó del útero por retroceso de la gota ó herpes, pero sin lesion orgánica, etc.

A. Se usan en bebida, baños, baños de vapor, chorros ó lociones.

Se las puede exportar con tal de que se las guarde en vasijas bien tapadas y pequeñas.

Agua artificial de Mont d'Or
 (F. F.).

dracm.

2 Carbonato de sosa cristalizado. 2

gran.

Cloruro de calcio cristal. 8
 Cloruro de magnesio crist. 1½
 Cloruro de sodio. 1½
 Sulfato de hierro cristaliz. 2
 Sulfato de sosa cristaliz. 1½

onz.

Agua privada del aire. . . 20
 Gas ácido carbónico. . . . 5 v.

Se disuelve el carbonato de sosa y la sal marina en el agua y se carga la disolucion de ácido carbónico; se disuelven á parte los cloruros térreos y el sulfato de hierro, se mezclan las dos disoluciones, se las introduce en botellas y se las acaba de llenar con el agua salina gaseosa; se las tapa inmediatamente.

V. M. Esta agua es tónica y se administra en la clorosis, amenoreea acompañada de clorosis, en el escorbuto, púrpura, etc. Se usa en los últimos períodos de las afecciones catarrales.

A. Dos á cinco vasos, sola ó mezclada con leche.

NAVALPINO. Lugar á doce leguas de Ciudad Real, provincia

de Toledo, ocho de Piedrabuena y treinta de Madrid.

Las aguas fueron descubiertas en 1812. Se toman estas desde primero de junio á fin de setiembre y tienen médico director.

Hay tres hermosas charcas. El agua de la primera es trasparente, sin olor, no se descompone á la temperatura ordinaria, su sabor es un poco ácido y estíptico, y su temperatura 23° R. Las otras dos charcas se llaman baños grandes, distan poco de la anterior, son de la misma naturaleza y su temperatura es 24° R.

An. Contienen gas ácido carbónico libre, carbonato de hierro *al maximum*, hidrociorato de sosa, hidrociorato de magnesia, hidrociorato de cal y un precipitado abundantísimo de hierro.

A. Se usan en bebida y baños.

PATERNA. Villa en la provincia de Almería, á diez leguas de la capital.

A un cuarto de legua de la poblacion se halla la fuente agria. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre y tienen médico director.

P. F. El agua es muy cristalina, tiene en suspension algunos cuerpecillos, forma una multitud de ampollas gaseosas; abandonada al contacto del aire se pone algo blanquecina, lo que no sucede guardándola en una vasija tapada, que se rompen á menudo si no se procura que sean fuertes; si en este estado se destapan de pronto, se ve subir y bajar el agua hasta que destapándola sale con mucha fuerza y es-

trépito; agitada el agua en una botella manifiesta un olor hediondo que desaparece pronto; su sabor es picante ferruginoso que desaparece despues de hervida, toma un color anaranjado bajo y deposita un sedimento parecido al que deja en su corriente. Cuando permanece en quietud forma una telita de diversos colores. Su temperatura es de 11° R.; es medio grano menos pesada que el agua destilada, y muy poco mas despues que pierde los principios volátiles que contiene.

An. Cincuenta libras de este agua contienen gran cantidad de gas ácido carbónico, un poco de gas ácido hidrosulfúrico y además:

	gran.
Sulfato de cal.	26
Carbonato de hierro.	16
Carbonato de magnesia. . .	20
	gran.
Sulfato de magnesia.	19
Sílice.	12
Hidrociorato de magnesia. .	10

V. M. Se las aconseja en las palpitations, caquexia, ictericia, epilepsia, hidropesía incipiente, fiebre intermitente mesentérica, cuando resultan de obstrucciones, y en los mismos casos que las de Pórtugos y Lajarón.

POUGUES, en Francia, poblacion á tres leguas de Nevers, departamento de la Nièvre. Se toman estas aguas desde 15 de mayo á fin de octubre, y tienen médico director.

Hay dos manantiales.

P. F. El agua mineral desprende gran cantidad de burbujas de ácido carbónico; en un vaso es cristalina; no tiene olor, su sabor es agrillo, alcalino y picante. Abandonada en un vaso deja aposar un precipitado ligero de óxido de hierro; su temperatura es de 12°,5 á 13°,7 cent.

An. Un litro de agua contiene segun Hassenfratz :

	litros.
Acido carbónico.	0,929
	gran.
Carbonato de cal.	1,2960
Carbonato de sosa.	1,1045
Carbonato de magnesia.	0,1274
Cloruro de sodio.	0,2337
Alúmina.	0,0372
Sílice y óxido de hierro.	0,3899

V. M. Son muy útiles en los desórdenes de la digestion, tales como las gastritis y gastro-enteritis crónicas, la gastralgia, etc.; en los infartos del hígado, del bazo, en los cólicos hepáticos por concreciones biliares, en las intermitentes cuartanas, en las flores blancas, en la clorosis, en la anasarca pasiva, en los exantemas que provienen de una afeccion de las vísceras abdominales, y se las aconseja particularmente en las enfermedades de las vias urinarias, catarro vesical, cólicos nefríticos y arenillas. Dañan en las enfermedades de pecho.

A. Se usa en bebida, baños y chorros; se exportan y se conservan bastante tiempo.

Agua artificial de Pougues.

		gran.
27 Cloruro de calcio		
cristalizado.	2,35	43
Sulfato de magnesia		
cristalizado.	1,666	30
Carbonato de sosa		
cristalizado.	c. s.	

Se precipitan separadamente la disolucion de cloruro de calcio y la del sulfato de magnesia con un exceso de carbonato de sosa; se lava el precipitado. La descomposicion de la primera sal debe hacerse en frio, la de la segunda al calor de la ebullicion; entonces se toma:

		gran.
Carbonato de cal, la		
totalidad.		11
Carbonato de magnesia, la totalidad.		7
Carbonato de sosa		
cristalizado.	1,20	14
Sulfato de cal.	0,240	3
Sulfato de sosa cris-		
talizado.	0,610	8
Cloruro de magnesio		
cristalizado.	0,610	8
Sulfato de hierro.	0,070	4/5
		onz.
Agua.	1000	20
Acido carbónico.	5 volúm.	

Se disuelve el sulfato de hierro en un poco de agua y se introduce la solucion en las botellas; por otra parte se mezcla con el agua las sales solubles é insolubles, se cargan de ácido carbóni-

co y se echa el agua gaseosa que resulta en las botellas que contienen la sal de hierro.

PUERTOLLANO. Pueblo en la provincia de Ciudad Real, á seis leguas de Almagro, y seis de Ciudad Real. Se toman estas aguas desde 18 de junio á fin de agosto, y tienen médico director.

Hay tres fuentes minerales.

P. F. El agua de la primera es trasparente, pero se enturbia si permanece mucho tiempo á la accion del aire atmosférico, depositando un limo de color amarillo anaranjado; deja desprender un gas formando ampollitas que se rompen en la superficie del agua, y así van perdiendo parte de su sabor, que es agrio y fuerte y al último un poco austero; hierve con facilidad; su temperatura es de 13° R. La segunda sirve comunmente para baños, los que se toman en una charca construida con este objeto, y de ella salen las aguas á borbotones con mucha abundancia; tiene las mismas propiedades que la precedente aunque un grado mas débil, y se enturbia un poco porque se mezcla con el agua dulce que nace en la extremidad de la charca; su temperatura varía de 13 á 16°, y es tanto mas elevada cuanto mayor es el calor y sequedad de la atmósfera.

An. Segun la análisis hecha por D. Antonio Moreno, cada libra de agua contiene:

	p. cúb.
Acido carbónico.	28,67
	gran.
Carbonato de hierro.	0,54

Carbonato de cal.	1,7
Carbonato de magnesia.	5,5
Carbonato de sosa.	0,56
Hidroclorato de sosa.	1,49

V. M. Las aguas y baños de Puertollano producen prodigiosos efectos en las afecciones del estómago, vómitos pertinaces, particularmente en las dispepsias y cardialgias, en la hipocondría, en las obstrucciones de las vísceras abdominales, en la diarrea, disenteria y afecciones verminosas. Tambien son un remedio eficaz en la clorosis, atonía de la matriz, escorbuto, flujos de sangre y supresion de la menstruacion. Son igualmente útiles entre otras varias enfermedades en las de los riñones y en los cálculos urinarios, principalmente en los que están compuestos de fosfato de cal; en las escrófulas, en las hidropesías pasivas no sostenidas por una flegmasia, y en las úlceras envejecidas.

Son tambien útiles en las enfermedades cutáneas crónicas y rebeldes, en las afecciones uterinas; así cesan con su uso los flujos de la matriz y aparece la menstruacion cuando no ha aparecido ó se habia suspendido, y á veces ha contenido las leucorreas, y ha corregido la esterilidad por debilidad.

Están contraindicadas en todas las enfermedades en que el síntoma predominante es una irritacion, y por consiguiente perjudican en las enfermedades dichas cuando son activas.

A. Se usan en bebida y baños.

Agua artificial de Puertollano.

	granos.
2/3 Cloruro de calcio cristal.	3 2/3
Sulfato de hierro cristal.	1
Carbonato de sosa crist.	4
Carbonato de magnesia.	5 1/2
Agua.	1 lib.
Acido carbónico.	3 vol.

Se disuelven con separacion en una pequeña cantidad de agua el cloruro de calcio y el sulfato de hierro, y se reparte la solucion en las botellas; se disuelve por otra parte el carbonato de sosa, se deslíe en el líquido el carbonato de magnesia, se carga de ácido carbónico y se llenan con esta disolucion las botellas, que se tapan bien.

SAN NECTARIO, en Francia. Poblacion del departamento de Puy de Dôme, á tres leguas de Issoire.

Se toman las aguas desde 15 de junio á 20 de setiembre y tiene dos médicos directores.

Existen muchos manantiales.

P. F. Las aguas son perfectamente transparentes, de color de suero clarificado, se cubren de una película grasa y untuosa, su olor es hepático, su sabor dulzaino y ligeramente acidulo, y su peso específico es de 1,035.

Los manantiales Gros Bouillon, el manantial antiguo y el del Coté tienen segun Longchamp 38°,75 cent., el de Paulina 35°, el de Voute y el del Camino 25°.

An. Segun Berthier un litro de agua contiene:

	litr.
Acido carbónico libre.	0,373

	gran.
Bicarbonato de sosa.	2,8330
Cloruro de sodio.	2,4200
Sulfato de sosa.	0,1560
Carbonato de cal.	0,4400
Carbonato de magnesia.	0,2400
Sílice.	0,1000
Oxido de hierro.	0,0140

Se han descubierto otros dos manantiales.

V. M. Tienen una accion particular sobre los cálculos urinarios, catarros vesicales, afecciones crónicas de las vias digestivas, del hígado, del bazo y de otras vísceras abdominales. Son útiles en la leucorrea, amenorrea, menorragias y otras enfermedades de la matriz, en las escrófulas, herpes, reumatismos crónicos y parálisis no dependientes de afeccion del encéfalo. Se recomienda el uso del manantial Gros Bouillon en las enfermedades de las vias digestivas, y el manantial del Camino en las enfermedades de la matriz. Dañan en las enfermedades de cabeza y de pecho.

A. Se usa en baños y en bebida, sola ó mezclada con agua comun ó una tisana dulcificante, y en embarros contra las úlceras atónicas é infartos escrofulosos.

Trasportadas con cuidado conservan parte de sus propiedades.

Agua artificial de San Nectario.

	gr.	g̃.
2/3 Carbonato de sosa		
cristalizado.	7,361	84
Sal marina.	1,640	20
Sulfato de sosa crist.	0,326	4

Cloruro de calcio cristalizado.	0,950	10
Cloruro de magnesio cristalizado.	0,440	6
Sulfato de hierro cristalizado.	0,020	$\frac{1}{4}$

Agua gaseosa decin-
co volúmenes. 1000 20

Se hace una solución de las sales de sosa y se carga de ácido carbónico; por otra parte se disuelven en una pequeña cantidad de agua los cloruros térreos y el sulfato de hierro; se divide este líquido en botellas, que se acaban de llenar con el agua salina gaseosa. También pueden introducirse todas las sales en el tonel y cargar la solución de ácido carbónico.

SEGURA DE ARAGON. Villa en la provincia de Teruel, á siete leguas de Daroca. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre, y tienen médico director.

El establecimiento de baños está al N. de la población.

P. F. El agua es clara, no tiene olor ni sabor, su temperatura es de 19° R., y su peso específico es igual al del agua destilada; cuando se agita su superficie se cubre de una porción de burbujitas gaseosas que estallan en el momento de aparecer.

An. Según D. Ignacio María Sall cada doce onzas contienen:

Acido carbónico.	4,237	gran.
Hidroclorato de magnes. 0,93		

Hidroclorato de sosa. . .	0,75
Sulfato de cal.	1,27
Sulfato de magnesia. . . .	0,61
Sulfato de sosa.	0,45
Sílice.	algunos átomos.

V. M. Son útiles en todas las enfermedades del aparato digestivo, producidas por debilidad ó desorden de las funciones digestivas, tales como la cardialgia é indigestiones; en las afecciones calculosas, en los catarros vesicales, en la blenorrea, oftalmia, en las obstrucciones de las vísceras abdominales y estreñimiento.

Son prodigiosas y sin igual en los primeros grados de la amaurosis y catarata, en los desarreglos de la menstruación, en los reumas nerviosos, musculares, artríticos y gotosos en cualquier estado y procedencia, así como en las parálisis dependientes de estas mismas afecciones.

Están contraindicadas en las lesiones orgánicas avanzadas en personas débiles y deterioradas, y que propenden á una reacción febril; en los muy predispuestos á congestiones sanguíneas en la cabeza y pecho, tales como las tisis, la hemotisis, la apoplejía, y en las calenturas intermitentes con disposición á la ictericia ó calenturas lentas nerviosas.

A. Se usa en bebida y baños.

SELTZ, SELTEN Ó SELTERS. Población situada en el ducado de Nassau, á cinco leguas de Francfort y once de Coblantz.

Tiene un manantial.

P. F. El agua es fría, clara, acidula, de sabor picante agrada-

ble; mezclada con vino chisporrotea y forma muchas ampollas.

An. Segun la análisis de Bischoff cada litro de agua contiene:

	litros.
Acido carbónico.	0,260
	gran.
Carbonato de sosa.	1,014
Carbonato de cal.	0,323
Carbonato de magnesia.	0,276
Carbonato de hierro.	0,027
Cloruro de sodio.	2,796
Sulfato de sosa.	0,043
Fosfato de sosa.	0,046
Sílice.	0,048

V. M. Se la usa como refrigerante, aperitiva y diurética, y principalmente para facilitar la digestion. Se emplea con buen éxito en las calenturas biliosas ó adinámicas, escorbuto, flores blancas, menorragias pasivas y cálculos urinarios.

Segun Hufeland, es la única agua mineral que se puede dar á las personas afectadas de tisis catarral ó mucosa sin temor de que irrite el pecho.

A. Se usa pura ó mezclada con vino al tiempo de comer, ó con agua de cebada, leche de burra ó de cabras en las calenturas biliosas.

Agua artificial de Seltz (F. F.).

	gran.
Cloruro de calcio cristaliz.	6
Cloruro de magnesio crist.	5
Cloruro de sodio.	20
Carbonato de sosa cristaliz.	16
Fosfato de sosa cristalizad.	1½

	gran.
Sulfato de sosa cristalizado.	1
Acido carbónico.	5 volúm.
	onz.
Agua pura.	20

Se disuelven en el agua por una parte las sales de sosa y por separado los cloruros térreos; se mezclan los líquidos y se los carga de ácido carbónico; el agua salina gaseosa que resulta se echa en botellas, las que se taparán inmediatamente. Esta agua reemplaza al agua de Seltz natural, y es preferible porque está mas cargada de ácido carbónico.

Tiene los mismos usos que el agua gaseosa simple, y es muy útil á las personas que padecen dispepsia, calentura tifoidea, en las digestiones difíciles, gastritis, gastralgia, flegmasia de los órganos digestivos, etc.

Agua de Seltz por mezcla.

	gran.
Agua.	620
Acido cítrico.	6
Bicarbonato de sosa.	5

Se tapa al momento.

Reemplaza á la de Seltz en caso de necesidad; pero el citrato que contiene la hace menos agradable y ligeramente laxante.

SOLAN DE CABRAS. Se halla en el término de Beteta, á tres leguas de Cuenca, provincia de Cuenca. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre, y tienen médico director.

Se recogen las aguas en una arca de piedra de sillería, desde donde se distribuye á la fuente y cinco baños llamados de San Joaquín, nuestra Señora de la Concepcion, San Mateo, San Pedro y San Lorenzo. A diez piés de los baños se encuentra la fuente con tres caños.

P. F. El agua es trasparente, de sabor agradable, mantecoso y un poco amargo y agrio; su temperatura es de 15 á 17° R., desprende unas burbujitas y deja un sedimento de color amarillo oscuro.

An. Segun la análisis de D. Antonio Moreno, en cada libra de agua se encuentra:

	p. cúb.
Acido carbónico.	0,5
	granos.
Carbonato de cal.	0,83
Hidroclorato de sosa.	0,25
Hidroclorato de magnesia.	0,16
Carbonato de magnesia.	0,33
Sulfato de magnesia.	0,36
Sulfato de sosa.	0,27
Sulfato de cal.	0,82

V. M. Son muy eficaces en las enfermedades del estómago y conducto intestinal, tales como en la inapetencia, digestiones difíciles, acedías, cólicos, diarreas, disenterias y afecciones verminosas, flujos hemorroidales, enfermedades del hígado y bazo con obstrucciones de esta víscera, en la hipocondría é ictericia; en las afecciones del sistema urinario, tales como los cálculos, retencion de orina, en la leucorrea, disme-

norrea, histérico y en varias enfermedades de la matriz. Producen tambien buenos efectos en la jaqueca, vahidos, epilepsia, parálisis, dolores reumáticos, ceática, gota; en las enfermedades de la piel, tales como los herpes, la sarna y la tiña; en los escirros, escrófulas, erisipelas, oftalmias y en las enfermedades venéreas.

A. Se usa en baños generales y de chorro.

Agua artificial de Solan de Cabras.

	gran.
2/ Cloruro de calcio.	1 1/5
Cloruro de magnesio.	1/6
Sulfato de magnesia.	1 1/2
Sulfato de cal.	4/5
Carbonato de sosa.	1 1/2
	onz.
Agua gaseosa con tres volúmenes de ácido carbónico.	16

Se hace una solucion con los cloruros y sulfatos térreos, y otra con el carbonato de sosa, y se reparten en las botellas, que se llenan despues con agua gaseosa. La cantidad de ácido carbónico es mayor en el agua natural para hacerla de un gusto mas agradable.

VICHY, en Francia. Ciudad pequeña en la orilla derecha del Allier, á quince leguas de Moulins, departamento del Allier. Estas aguas se toman desde 15 de mayo á 15 de setiembre, y tienen dos médicos directores.

Hay siete manantiales: el manantial de la verja grande; los pozos Chomel ó pozo cuadrado menor, y el pozo cuadrado mayor, que están dentro del mismo establecimiento; el Boulet menor ó fuente de las Acacias, el manantial Lucas, la fuente del Hospital, la fuente de los Celestinos ó de la Roca, y el manantial Sornin.

P. F. Las aguas de la verja grande, de los dos pozos cuadrados y del Hospital presentan grandes burbujas de ácido carbónico; las de las Acacias y de Lucas tienen un olor un poco sulfuroso. Todas son claras, de sabor de lejía muy ligero; el agua de los Celestinos tiene un sabor picante, un poco agrillo. En el manantial del Hospital se forma una materia vegetal-animal bajo la forma de conferva. Según Longchamp la temperatura del manantial de la verja grande es de 39°,18 cent.; la del pozo Chomel 39°,26; la de la balsa del baño grande 44°,88; la de las Acacias, 27°,25; la de Lucas, 29°,85; la del hospital, 35°,25, y la de los Celestinos 19° 75.

An. Berthier y Puvis, que han analizado los siete manantiales de Vichy, han obtenido resultados idénticos. Cada litro contiene:

	litros.
Acido carbónico.	1,149
Carbonato de sosa.	3,813
Carbonato de cal.	0,285
Carbonato de magnesia.	0,045
Cloruro de sodio.	0,558
Sulfato de sosa.	0,279
Sílice.	0,045
Peróxido de hierro.	0,006

V. M. Se las recomienda como fundentes y aperitivas, y son muy útiles en las enfermedades crónicas de las vísceras del bajo vientre, y particularmente en los infartos del hígado y del bazo, cólicos hepáticos, gastritis, gastroenteritis y gastralgia sin lesión orgánica; cólicos hemorroidales, obstrucciones del bajo vientre, clorosis, leucorrea, irregularidades de la menstruación y en la mayor parte de las enfermedades que se desarrollan en la época crítica: así son útiles en los infartos de la matriz, es decir, en la metritis crónica con tumefacción del cuello ó del cuerpo de este órgano; pero si presenta síntomas de inflamación aguda, de ulceraciones ó de degeneración cancerosa, se puede agravar la enfermedad; son muy eficaces en las inflamaciones crónicas de naturaleza escrofulosa, cálculos de ácido úrico ó de fosfato amoníaco magnésiano, y en la gota. A pesar de ser estos los usos principales del agua de Vichy, se ha observado que la fuente de los Celestinos es útil para curar las arenillas y los cálculos; la de la verja grande para curar los infartos de las vísceras abdominales; la fuente del Hospital en los eructos ácidos, digestión difícil, en las enfermedades consecutivas al parto, tal como la metritis, la peritonitis puerperal crónica, los depósitos lácteos y lo que se llama leche desparada; en los reumatismos articulares, calambres de estómago, cólicos nerviosos, gota indeterminada que altera las funciones di-

gestivas. Las aguas de la fuente de las Acacias se emplean en los infartos de las glándulas del mesenterio, tumores escrofulosos; la de la fuente Chomel en los catarrhos pulmonares crónicos por afección simpática del estómago, y en las toses consecutivas á las pleuresías biliosas.

Dañan á los temperamentos secos, muy excitables y de pecho delicado, etc.

A. Se usa en bebida, en baños y chorros.

Se alteran poco, y se exportan las aguas de la verja grande, del Hospital y de los Celestinos.

Agua artificial de Vichy (F. F.).

* Carbonato de sosa. 1 dr. y 54 gr.

gran.

Cloruro de sodio. 1/3

Cloruro de calcio. 11

Sulfato de sosa. 6

Sulfato de magnesia. 3

Sulfato de hierro cristaliz. 1/3

onz.

Agua privada del aire. . . . 20

Gas ácido carbónico. . 3 1/2 vol.

Se hace una solución de las sales de base de sosa, otra del sulfato de magnesia y la tercera del cloruro de calcio; se mezclan todos estos líquidos y se los carga de ácido carbónico; se recibe el agua gaseosa salina que resulta, en botellas en que se haya introducido el sulfato de hierro disuelto en una cantidad muy pequeña de agua. El agua que resulta se diferencia de la natural de Vichy en que no contiene materias orgánicas.

V. M. Se usa como fundente, diurética y tónica, etc., principalmente en las afecciones gastro-hepáticas, digestiones difíciles, gastro-enteritis, gastralgia, gastritis, dispepsia, encefalitis, anemia, astenia y cálculos, cólicos biliosos, infartos del hígado, del bazo, del mesenterio, etc., y son muy eficaces contra las afecciones calculosas.

A. El profesor prescribirá la dosis de estas aguas, pero cuando se usen como litontrípticas se deberá beber la mayor cantidad posible.

AGUAS MINERALES FERRUGINOSAS.



GENERALIDADES.

Se ha denominado *aguas ferruginosas, marciales ó calibeadas*, á aquellas en que predomina el hierro y provienen comunmente de los terrenos de transición ó secundarios.

P. F. Las aguas ferruginosas son cristalinas, inodoras, de sabor estíptico y astringente. Expuestas al contacto del aire se cubren de una película irisada, se enturbian, dejan precipitar su óxido de hier-

ro bajo la forma de un depósito coposo, rojizo, y despues se vuelven transparentes é insípidas; igual depósito se observa en las balsas que las contienen y á lo largo de los conductos que recorren.

El mayor número de ellas son frias, y el corto número de las termales que se observan tienen propiedades especiales.

P. Q. Con la infusion de nuez de agalla dan un precipitado que no tarda en volverse azul negro; con el cianuro de hierro y potasio dan un depósito azulado, tanto mas oscuro quanto mas oxidado está el hierro. Los elementos que las componen son las sales de base alcalina ó térrea, de amoníaco y principalmente de hierro que á veces se halla en estado de sulfato, crenato ó bicarbonato, que es lo mas comun. Es bastante comun el que contengan ácido carbónico.

V. M. Estas aguas deben su eficacia á la combinacion del hierro con el ácido carbónico, unido á los bicarbonatos alcalinos. Cuando se las prescribe á dosis convenientes son un medicamento muy ventajoso: aumentan el apetito, facilitan la digestion, producen el estreñimiento y comunican á todo el organismo una fuerza y bienestar que se manifiesta por el mejor color, mas animacion é incremento de alegría y agilidad. Absorvidas las partículas del hierro reponen las faltas de este principio de la sangre, el pulso se hace mas fuerte, frecuente, la sangre mas roja y todas las funciones se ejecutan con energia y regularidad.

Las aguas ferruginosas son astringentes, condensan los tegidos y aumentan la tonicidad de nuestros órganos, y son saludables á las personas que habitan paises frios, húmedos, pantanosos y en las enfermedades por relajacion; en los flujos mucosos por atonía de los vasos, en la debilidad general que sucede á las hemorragias y al abuso de las emisiones sanguíneas; en las afecciones que se aproximan al escorbuto y están caracterizadas por hinchazon de las encías que dan sangre, equimosis subcutáneas; en las convalecencias de larga duracion, en la leucorrea, blenorrea, pérdidas seminales por la masturbacion ó por exceso de placeres venéreos; en los catarros vesicales crónicos, diarreas antiguas, hidropesias pasivas por beber mucha agua, ó habitar en parajes bajos y húmedos; en los infartos abdominales indolentes, sin fiebre; en las intermitentes de otoño, en la supresion de la menstruacion, ó cuando esta es muy abundante si es producida por debilidad general ó de la matriz; en la esterilidad, disposicion á los abortos, impotencia ó mala calidad del semen por debilidad de la constitucion, en la atonía del conducto digestivo, etc.; en las enfermedades nerviosas sin irritacion del estómago, y por el ácido carbónico y las sales que contienen calman los dolores nefríticos y favorecen la expulsion de las arenillas, pero no las disuelven por contener poco bicarbonato de sosa.

Dañan en las afecciones un poco agudas, á los pletóricos y á los de constitucion nerviosa, irritable, en la debilidad por opresion de fuerzas, á las personas de pecho delicado ó hemotóicas, á las preñadas, en las afecciones de pecho, disposicion á la tisis pulmonar, enfermedades orgánicas del corazon ó de los grandes vasos, y en las desorganizaciones incipientes del estómago ó intestinos.

A. Se usan á la dosis de dos ó tres vasos por la mañana en ayunas, y se aumenta gradualmente la dosis. Si producen ansiedad, dolores en el epigastrio, náuseas y laxitudes generales, se las mezclará con leche ó una tisana dulcificante. A veces producen aturdimiento y tendencia al sueño por el gas ácido carbónico que contienen. Se ha utilizado en Alemania en baños gaseosos el gas ácido carbónico que desprenden las aguas ferruginosas acidulas, como agentes estimulantes, en las parálisis locales, espasmos, amenorrea, etc., por debilidad.

Solo se pueden tomar puras en los manantiales, porque dejan depositar el hierro que contienen; pero se podria prevenir esta pérdida introduciendo un alambre ó un clavo por el tapon, procurando que este toque el agua.

AGUAS FERRUGINOSAS EN PARTICULAR.

CRANSAC, en Francia. Villa del departamento de Aveyron, á media legua de Aubin. Se toman estas aguas desde primero de junio á primero de octubre.

Tiene cuatro manantiales: dos llamados de Richard y dos denominados Bezelgues, descubiertos en 1811. Cada uno tiene un manantial fuerte y otro débil.

P. F. El agua es mas ó menos abundante, segun el año ha sido mas ó menos abundante de lluvias; es clara, trasparente, sin olor, de sabor amargo y estípico.

An. En 1840 han sido analizadas por O. Henry y Ponmarede, y cada litro del manantial fuerte ó alto de Richard contiene:

Sulfato de magnesia. 1,55

Sulfato de hierro.	1,25
Sulfato de manganeso.	0,99
Sulfato de alúmina.	0,47
Sulfato de cal.	0,75
Sílice.	0,07
Agua pura.	994,92

Su sabor no es desagradable al gusto.

El manantial suave ó bajo de Richard, contiene:

Sulfato de cal.	2,43
Sulfato de magnesia.	2,20
Sulfato de alúmina.	1,15
Sulfato de hierro.	0,15
Sulfato de manganeso.	0,14
Materia orgánica negra, bituminosa.	0,02
Sílice.	0,02
Agua pura.	993,89

La experiencia la ha designa-

do como la mas eficaz en un gran número de casos.

Los otros dos manantiales no se usan mas que para lavar las botellas, y el manantial bajo de Bezelgues para beber; no se exporta; nó contienen hierro, pero sí manganeso y las sales indicadas antes.

Analizada el agua de este último contenia:

Sulfato de cal.	1,21
Sulfato de magnesia. .	1,12
Sulfato de manganeso.	0,41
Sulfato de alúmina. . .	0,95
Agua pura.	996,31

Es muy notable que es cómoda de beber y no produce incomodidad en el estómago, á pesar de contener tan gran cantidad de hierro; lo que depende segun Ponmarede en que está mineralizada por sulfatos dobles de hierro (sulfato ferroso férrico).

Estas aguas pueden ser trasportadas, porque no pierden ni su transparencia ni sus propiedades enérgicas.

Teniendo estos manantiales composicion distinta debe variar su accion. Así se ha observado que el manantial suave es ligeramente laxante y aperitivo, y que el fuerte ó alto es tónico por escelencia y astringente pues detiene la diarrea y las hemorragias pasivas. Ambos manantiales convienen en el tratamiento de todas las enfermedades cuyas causas y síntomas dominantes son un empobrecimiento de la sangre.

El manantial alto es uno de los hemostáticos mas poderosos que se conocen; se administran con mucho éxito en los infartos de las vísceras abdominales, en la amenorrea acompañada de un estado de languidez, en las intermitentes cuartanas, esplénicas; y son muy especiales contra las calenturas intermitentes prolongadas, que presentan muchas recidivas, contra las que ha fallado la quina, y contra la caquexia consecutiva, en el histérico, gastralgia y neuralgias periódicas, en la leucorrea y gonorrea crónica, en los infartos del bazo no acompañados de fiebre.

Las aguas del manantial bajo son muy útiles en chorros en la parálisis á consecuencia de la apoplejía, pues se ha notado que han disminuido el ruido de oidos, la soñolencia, el entorpecimiento de los miembros, la dificultad de pronunciar y todos los demás síntomas de la apoplejía; tienen una eficacia cierta en las enfermedades saturninas.

Se toman á la dosis de medio vaso á media botella, cuya dosis se dispondrá segun el caso.

Exteriormente es muy eficaz contra las úlceras atónicas, varicosas, escorbúticas, etc.

FORGES, en Francia. Aldea á cuatro leguas de Gournay, nueve de Neufchâtel, nueve de Rouân y veinticinco de París, departamento del Sena inferior. Se concurre á tomar estas aguas desde julio hasta 15 de setiembre y tienen médico director.

Hay tres manantiales: el de

la Reina, el Real y el Cardenal, y se ha descubierto otro en 1834.

P. F. Las aguas de la fuente son perfectamente claras en el manantial; pero dejadas al aire libre se enturbian, depositan un sedimento ocreoso, y luego cambian de sabor; este es fresco en todas, apenas ferruginoso en la Reina, ferruginoso en la Real y de sabor á tinta en la del Cardenal; son inodoras, y su temperatura 7°,50 cent. siendo 14° la de la atmósfera. El fondo y las paredes de los depósitos se cubren de un polvo amarillo rojizo. El agua del manantial nuevo es turbia y un poco lechosa, de olor de agua ligeramente corrompida y de sabor ferruginoso muy marcado.

El agua de la fuente Real contiene por litro:

	litro.
Acido carbónico.	1,250
	gran.
Carbonato de cal.	0,0417
Carbonato de hierro. . .	0,0278
Cloruro de sodio.	0,0483
Cloruro de magnesio. . .	0,0069
Sulfato de cal.	0,0278
Sulfato de magnesia. . .	0,0483
Sílice.	0,0046

La de los otros manantiales contiene los mismos principios, pero en mayor cantidad.

V. M. Son tónicas y aperitivas, y convienen en la atonía del estómago, inapetencia, dispepsia, diarrea crónica, anasarca esencial, infartos del bajo vientre, flores blancas, clorosis, incontinencia de orina, edemas inveterados, ascitis confirmadas, pero

principalmente contra la esterilidad por atonía general ó local.

Dañan á los tísicos, escorbúticos, á los que padecen gota, asma y vértigos.

A: Se toman solo en bebida y se trasportan sin alterarse.

Agua artificial de Forges.

	gran.	onz.
2 Cloruro de calcio cristalizado.	0,073	$\frac{4}{5}$
Cloruro de magnesio cristalizado.	0,012	$\frac{1}{6}$
Sulfato de hierro cristalizado.	0,060	$\frac{2}{3}$
Sulfato de cal.	0,027	$\frac{1}{3}$
Sulfato de magnesia cristalizado.	0,084	1
Carbonato de sosa cristalizado.	0,176	2
Agua.	1000	20
Acido carbónico.	5 volúm.	

Se hace primero una solución de los cloruros térreos y del sulfato de magnesia; se deslíe en ella el sulfato de cal, y en seguida se añade el sulfato de hierro disuelto en un poco de agua; se divide en las botellas, que se acaban de llenar con la solución de carbonato de sosa cargada de ácido carbónico.

FUENCALIENTE. Se halla esta villa en la provincia de Ciudad Real, á trece leguas de la capital. Hay cuatro manantiales. Se toman estas aguas en la primera temporada desde primero de mayo á 18 de junio; y en la segunda, desde pri-

mero de setiembre á 8 de octubre. Tienen médico director.

Nace el agua del manantial á los piés de la iglesia de la vírgen de los Baños, y desde allí es conducida por dos conductos hasta el sitio de los baños; estos están divididos en dos mitades por un arco grande; el primer baño se llama Grande y puede contener treinta personas; el segundo llamado Nuevo, está entre este y el del rincon, tienen casi la misma capacidad y cabrán diez y seis personas.

La temperatura del manantial es igual en todas épocas, pero desigual en cada uno de los baños; al nacer tiene 32° R., en el baño grande ó caliente marca 31° por no estar bien cerrada la cañería, 30° en el de en medio ó templado, y 29 en el del rincon llamado tambien baño frio.

P. F. En el manantial el color de las aguas es algo azul claro, que se inclina á verde; pero si se las examina en un vaso de cristal aparecen claras y trasparentes, no tienen olor y su sabor es ligeramente agrio; sirven para la vegetacion. Dejadas enfriar se altera su transparencia y dan un precipitado de color blanco sucio que tira á amarillo; son suaves al tacto; tienen casi el mismo peso que el agua destilada, pero se aumenta un poco luego que ha estado algun tiempo expuesta al contacto del aire. En los registros y depósitos se forma un sedimento craso y untuoso.

An. Segun la análisis practicada por D. Carlos Mestre, resulta que

ocho libras de agua mineral contenian :

	gran.
Acido carbónico.	20,40
Carbonato de hierro.	27,50
Sulfato de cal.	31,35
Hidroclorato de sosa.	23,47
Sulfato ácido de alúmina.	15,31
Sílice.	3,13

Corresponde á cada libra medicinal 15,50.

V. M. Estos baños son útiles en los reumas crónicos, artritis gotosa y en las neurosis de movimiento, principalmente en la ceática, en las erupciones herpéticas y epsóricas, en la parálisis y otros trastornos del sistema nervioso no producidos por lesion del cerebro, en la anquilosis, hidrartrosis, en las obstrucciones de las vísceras, al principio de algunas hidropesías y en los cólicos rebeldes y crónicos. Son útiles en el asma húmedo, cardialgia, pleurodinia, gastrodinia, dispepsia, hipocondría, hepatalgia, nefralgia, en la leucorrea pasiva, clorosis sin extenuacion, retenciones y desarreglos de la menstruacion, en los tumores edematosos é infartos linfáticos escrofulosos.

Están contraindicadas en algunas clorosis, leucorreas, gonorreas, bienorragias y dolores de estómago, en la hemotisis, hematemesis y la tisis pulmonar.

A. Se usa en baños, en embarros y en bebida.

GRAENA. Villa de la provincia de Granada, á ocho leguas de la capital y una de Guadix,

A un cuarto de legua de la poblacion nacen varios manantiales, y hay una casa de baños. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 25 de mayo á 30 de junio, y en la segunda desde 15 de agosto á seis de octubre. Tiene médico director.

En Graena se encontraban á mediados del siglo pasado dos baños denominados el Fuerte y la Teja, y luego se dividió este último en tres que se llaman el Templadillo ó de la Cruz, la Tejilla ó la Teja. Posteriormente se construyó una poza ó alberca, continuacion del baño Fuerte, y se le denomina su derrame, pues por este se desagua el primero.

P. F. Baño fuerte. El agua recién sacada es clara, trasparente, no tiene olor y es insípida; despues de fría pone ásperas las manos y despide un olor poco perceptible, parecido al herrumbroso; se presentan tambien manchas verdosas, entre las que se interponen algunas amarillas de poca extension y distintas figuras. Su temperatura $32\frac{1}{2}^{\circ}$ R., y antes de introducirse en el estanque marca medio grado mas. Cuando el estanque se encuentra lleno y el agua está en perfecto reposo se ve que su superficie está cubierta de ampollitas semiesféricas, ligeramente doradas, que se rompen con explosion en su superficie. En las paredes del baño Fuerte, fondo y el mismo nacimiento se deposita peróxido de hierro mezclado con otras sustancias fijas. De la superficie de este baño se desprenden densos vapores que hacen subir la

temperatura de aquel recinto á 27° invariables. Es mas pesada que el agua destilada.

An. Veinticinco cuartillos de agua contienen:

	gran.
Cloruro de magnesio. . .	2
Sulfato de magnesia. . .	112
Sulfato de cal.	148
Carbonato de hierro. . .	11,38
Carbonato de cal.	120,62
Silice.	154

Agua de la Tejuela. Sus propiedades físicas son iguales á las del baño Fuerte, solo que su temperatura es de 31° R. antes de mezclarse con la del estanque; y la del Fuerte es de $32\frac{1}{2}^{\circ}$ R. Es mas pesada que el agua destilada.

An. Evaporados veinticinco cuartillos dan un residuo de quinientos setenta y seis granos, que contienen:

	gran.
Cloruro de magnesio. . .	2
Sulfato de magnesia. . .	120
Sulfato de cal.	62
Carbonato de hierro. . .	9,76
Carbonato de cal.	320,24
Silice.	44
Pérdida.	18

Agua de la Teja y Tejilla. Tiene los mismos caractéres que la del baño Fuerte, y su temperatura antes de mezclarse con la del estanque es de $32\frac{1}{2}^{\circ}$ R. Cuando los estanques se encuentran llenos no aparecen en su superficie las ampollitas que en el baño Fuerte, pero se perciben las manchas verdosas. Es un poco mas pesada que

el agua destilada. De la superficie del baño de la Tejilla se desprenden unos vapores que hacen subir la temperatura del aire hasta 23 ó 24° R.

An. Examinando veinticinco cuartillos del agua de la Teja y Tejilla, dieron 572 granos de residuo compuesto de

	gran.
Cloruro de magnesio. . .	2
Sulfato de magnesia. . .	108
Sulfato de cal.	294
Carbonato de hierro. . .	8,15
Carbonato de cal.	98,87
Silice.	44

V. M. Las enfermedades que se curan ó alivian mas á menudo con estos baños son los dolores artríticos reumáticos, y muy pronto cuando son recientes y acometen á personas no deterioradas; los dolores reumáticos vagos y no constantes se curan con mas prontitud que los fijos; curan tambien las contracciones musculares producidas por estos dolores, cuando no aparece en ellos alguna lesion orgánica. Curan estas contracturas cuando son producidas por causas traumáticas, no sostenidas por lesiones orgánicas; alejan y alivian los padecimientos consecutivos á la artritis gotosa crónica, pero no impiden la repeticion de los ataques, no logrando mas que contener estos é impedir que la gota haga progresos. Son útiles en la sinovitis tanto gotosa como reumática, con tal que no haya supurado ni esté sostenida por una lesion orgánica. No se curan

ni los tumores blancos ni las anquilosis. Curan la mitad ó las dos terceras partes de las parálisis cuando son recientes y residen en personas jóvenes con suficientes fuerzas; pero rara vez son eficaces cuando son síntomas de una encefalitis ó mielitis crónicas. Si las parálisis son idiopáticas é independientes de lesion cerebral se pueden curar. Han producido buenos resultados en algunos casos de blefaroptosis.

Son ventajosos estos baños en las personas predispuestas á las convulsiones, en lá corea de las personas endebles, y no convienen cuando el enfermo es robusto y sanguíneo ó cuando la enfermedad es inveterada ó el enfermo es adulto. Disipan las cefalalgias crónicas que atormentan á menudo á las personas nerviosas, hacen mas llevaderos los ataques ó que se presenten de tarde en tarde. Curan las congestiones cerebrales crónicas y todos los movimientos fluxionarios; pero no se usarán durante su aparicion. Aprovechan en las neuralgias; curan la nictalopia y la ambliopia; pero cuando esta última es el primer grado de la amaurosis, ó ya la amaurosis confirmada, es refractaria á la accion de estas aguas: calman la dismenorrea y solo se consigue la curacion tomando estos baños durante dos ó tres temporadas distintas. Hace ceder la bronquitis crónica cuando no está sostenida por tubérculos. Producen buenos efectos en los dolores artríticos reumáticos ocasionados por las afecciones venéreas, cuan-

do estas han desaparecido, y finalmente alivian los dolores ocasionados por las dislocaciones antiguas.

Dañan en la corea antigua cuando el paciente es sanguíneo, robusto, en particular si es adulto, en la leucorrea, menorrea y amenorrea; son inútiles ó perjudiciales en el histérico y afecciones cutáneas crónicas. No tienen acción ó dañan en las irritaciones crónicas del estómago y en la hipocondría; dañan en las afecciones del pulmón y del corazón, en las afecciones venéreas, y se administrarán estos baños con circunspección en las personas pletóricas robustas y en las predispuestas á la apoplejía.

LANJARON. Villa á siete leguas de Granada, provincia de Granada, cuatro de Motril. Tiene seis fuentes minerales: la del Salado ó Baño, la Capuchina, la Capilla, la Salud, la de Gomez y la Agria del Rio. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

La fuente del Salado ó Baño brota en la orilla derecha del barranco que le da el nombre, á mil sesenta y seis varas de la población, y es de naturaleza acídula ferruginosa. El edificio tiene cinco habitaciones.

P. F. Su temperatura es de 24° R., es mas pesada que el agua destilada, su color es claro, su sabor austero y algo picante. Se observan algunos átomos flotantes, desprenden ácido carbónico, en el fondo se notan una porción de sales de naturaleza ferrugino-

sa, y en su superficie se ve una telilla irisada si no se agita; manchan las ropas de color amarillo. A cien varas antes de llegar á este manantial se encuentra otro menos abundante de 21°, y con las demás propiedades físicas que el anterior.

An. Un cuartillo contiene:

	gran.
Acido carbónico.	4,95
Bicarbonato de hierro. . .	0,96
Carbonato de magnesia. . .	4,84
Carbonato de cal.	8,42
Hidroclorato de magnes. . .	13,46
Hidroclorato de cal.	5,01
Hidroclorato de sosa.	15,31
Sulfato de cal.	0,77
Silice.	0,25

V. M. Las aguas del Baño colocadas en la clase de las acídulo-salino-ferruginosas, son útiles en todas las enfermedades que reconocen por causa la debilidad; curan el reuma crónico, la artritis aunque esté acompañada de reblandecimiento ó abultamiento de los huesos, la parálisis incipiente sin lesión orgánica cerebral; aprovechan en la hipocondría, histérico, convulsiones y epilepsia; quitan la leucorrea y blenorrea pasiva y la clorosis; resuelven los infartos glandulares escrofulosos, favorecen la expulsión de los cálculos urinarios, pero con preferencia en las enfermedades esténicas, principalmente las irritaciones del aparato digestivo acompañadas de obstrucciones de las vísceras. Están contraindicadas en los sujetos demasiado pletóricos,

en los que padecen enfermedades febriles, hemotisis, enfermedades por vicio sifilitico, herpes ó erupciones agudas.

A. En bebida, baños y chorros.

Fuente Capuchina. Su temperatura es de 16 á 17° R.; es mas pesada que el agua destilada; su color es claro, trasparente, y su sabor amargo austero como tinta, salado y picante; deja desprender muchas burbujas gaseosas, y cuando se la deja sin movimiento se cubre de una telilla irisada, encontrándose en su fondo peróxido de hierro, y caparrosa por donde sale el agua é inmediaciones.

An. Un cuartillo de agua contiene:

	gran.
Acido carbónico.	9,18
Bicarbonato de hierro. . .	1,89
Carbonato de magnesia. . .	4,22
Carbonato de cal.	8,96
Hidroclorato de magnes. . .	37,94
Hidroclorato de cal.	11,86
Hidroclorato de sosa. . . .	25,37
Sulfato de cal.	1,52
Silice.	0,26

V. M. Esta agua es útil en la astenia gástrica muscular y nerviosa con acedías, vómitos y pirosis, en las hidropesías asténicas, en el estreñimiento, asma periódico, hipocondría, lombrices, ictericia, escrófulas, escorbuto, en los infartos del hígado y del bazo, amenorrea, apirexia de las intermitentes, cefalalgias y parálisis por atonía cerebral, diarreas inveteradas, leucorreas crónicas por

atonía de la mucosa del útero ó de la vagina.

Daña á los de temperamento sanguíneo, en las enfermedades sostenidas por inflamacion de cualquier órgano ó tejido.

A. Se usa en bebida.

Fuente de la Capilla. Su temperatura es de 16 á 17° R.; es mas pesada que el agua destilada, pero menos que la de la Capilla; su color es claro; su sabor poco salado con agrio picante; se observan algunas burbujas y deja desprender tambien gas ácido carbónico, aunque no tanto como la de la Capilla.

An. Cuatro cuartillos contienen:

	gran.
Acido carbónico.	28,92
Bicarbonato de hierro. . .	0,43
Carbonato de magnesia. . .	2,76
Carbonato de cal.	3,12
Hidroclorato de magnes. . .	2,66
Hidroclorato de cal.	0,31
Hidroclorato de sosa. . . .	5,03
Sulfato de cal.	0,83
Silice.	0,96

V. M. Produce los mismos efectos que la anterior, solo que es mas diurética y mas eficaz en las afecciones crónicas del sistema de la vena porta y del hígado, y en las nefralgias espasmódicas, mucosas ó calculosas. Conviene en los mismos casos que el agua de la Capuchina, en las intermitentes inveteradas y sus consecuencias; en la anasarca, edemas particulares, clorosis y otras afecciones; en la melena, afecciones espasmódicas del aparato renal aun-

que procedan de cálculos; en las irritaciones crónicas sin fiebre de la mucosa de la vagina y uretra, con disuria, iscuria é incontinen- cia de orina; en la parálisis de es- tos órganos; en la clorosis y en los flujos blancos y disenterias cróni- cas. Daña á los pletóricos, en las afecciones con calentura, en las lesiones orgánicas del aparato res- piratorio, ó en los que padecen enfermedades herpéticas ó sifilíti- cas.

A. Se usa en bebida, sola ó con el agua de la fuente de Gomez.

Fuente agria del Rio. El agua es clara, de sabor desagradable, un poco austero, y su temperatu- ra es de 14° R.; es un poco mas pesada que el agua destilada.

An. Cuatro cuartillos contie- nen:

	gran.
Acido carbónico.	17,31
Bicarbonato de hierro.	0,14
Carbonato de magnesia.	1,05
Clorato de cal.	1,09
Sílice.	0,13

V. M. Es muy eficaz en la cura- cion de las afecciones gástricas nerviosas, cardialgia, gastrodinia, pirosis, en los cólicos nerviosos, en las convalecencias largas y pe- nosas, en las afecciones por debi- lidad y cálculos biliares ó vesica- les, en la blenorrea, leucorrea, clorosis, apirexia de las calentur- ras intermitentes, caquexia; y precave las afecciones intermiten- tes inveteradas.

Perjudica á los predispuestos á las afecciones cerebrales y sopo- rosas, á los que tienen fiebre len-

ta ó sufren hemorragias pulmo- nares.

A. En bebida.

Fuente de la Salud Su tempe- ratura es de 14° R.; tiene el mis- mo peso que el agua destilada; su color es claro, trasparente, arroja muchas burbujas; no tie- ne olor, pero produce una sensa- cion de picor en el olfato; su sa- bor es fresco y agrio, y es en ex- tremo delgada.

An. Ocho cuartillos de agua de la fuente de la Salud contie- nen:

	gran.
Acido carbónico.	43,64
Carbonato de magnesia.	1,14
Carbonato de cal.	1,08
Sílice.	0,70

Fuente de Gomez. Su temperatura es de 13° R.; su color es claro, su sabor es ligeramente ácido y su peso específico igual al del agua destilada. Las propiedades son en- teramente iguales á las de la Sa- lud, excepto que son menos los principios volátiles.

An. Ocho cuartillos contienen:

	gran.
Acido carbónico.	32,22
Carbonato de magnesia.	1,68
Carbonato de cal.	1,57
Sílice.	0,35

El agua de la fuente de la Salud y de Gomez (acidulo-gaseosas) son útiles en las irritaciones del con- ducto digestivo y aparato génito- urinario, en la ascitis, hidrotor- rax y edemas, en las erupcio- nes cutáneas, en los casos en que

usándose las demás aguas excitan demasiado los tejidos y reclaman medios suaves como correctivos, y son además beneficiosas á las personas sanas para apagar la sed.

Están contraindicadas en los que padecen afecciones crónicas del sistema respiratorio con fiebre héctica, y en los que sufren cólicos flatulentos.

Fuente de San Antonio. El agua es clara, de sabor poco salado con agrio picante; de 15 á 16° R. En el punto en que se detiene forma una telita irisada, y se forma un poco de óxido de hierro.

An. Se ha encontrado en cuatro cuartillos de agua:

	gran.
Acido carbónico.	23,14
Bicarbonato de hierro. . .	0,35
Carbonato de magnesia. . .	2,84
Carbonato de cal.	2,6
Hidroclorato de magnes. . .	2,18
Hidroclorato de cal.	0,27
Hidroclorato de sosa. . . .	4,9
Sulfato de cal.	1,58
Silice.	0,79

V. M. Tiene las mismas propiedades que el agua de la Capilla, y conviene en las convalecencias de enfermedades largas, en los caquécticos, apirexia de las calenturas intermitentes, padecimientos nerviosos crónicos, hidropesías generales ó parciales, clorosis, amenorrea, flujos mucosos pasivos de la matriz ó de los intestinos, afecciones calculosas, cardialgias, gastralgia, gastritis crónica con pirosis ó acedías.

Dañan en las afecciones sanguíneas, etc.

A. Se usa en bebida.

PANTICOSA. Este establecimiento de baños se halla casi en la cresta del Pirineo, legua y media mas allá de Panticosa, provincia de Huesca. Se toman estas aguas desde 1.º de julio á 20 de setiembre, y tienen médico-director.

El establecimiento consta de nueve edificios separados, llamados la casa de Abajo, la casa de los Herpes, la casa del Estómago, la casa Borda, la casa de la Fonda, el Templete de la Salud ó de la fuente del Hígado, la cocina central y la casa de la pradera.

Las fuentes minerales son cuatro: la del Hígado, la de los Herpes, la del Estómago y la Purgante ó de la laguna.

Fuente del Hígado. El agua es clara, sumamente diáfana, sin olor, de gusto agradable, aunque ligeramente áspero la primera vez que se bebe; su temperatura es de 22° R.; su peso específico es poco mas de 1,002; en su superficie se rompen muchas ampollas gaseosas, y tomada en un vaso forma muchas ampollitas muy pequeñas de color de plata.

An. Analizadas sesenta libras medicinales de esta agua mineral salino-gaseosa, contenian segun D. José Herrera y Ruiz:

	granos.
Azoe.	321,45
ó 1066,2 pulgadas cúbicas.	
Sulfato de sosa.	31
Hidroclorato de sosa. . .	10,60

Carbonato de cal.	2
Hidroclorato de magn.	2,10
Sílice.	8

V. M. Esta agua solo se usa interiormente, y produce maravillosos resultados en la hemotisis, hematemesis, metrorragia, dismenorrea, tisis tuberculosa, tisis laríngea, siempre que se use al principio y antes de que se hayan destruido los tejidos; en los catarros crónicos, neumonía, gastritis, colitis, cistitis ó catarros vesicales; en el asma esencial, pirosis, cardialgia y gastrodinia, cólicos nerviosos; en las obstrucciones de las vísceras del vientre ó afecciones crónicas del hígado y de los riñones, hepatitis, esplenitis, nefritis crónica; en la ictericia, hepatalgia, hipocondría, histérico y otras neuroses de los órganos genitales de la mujer; en la esterilidad y contra algunos cálculos urinarios.

Es inútil en la hemotisis dependiente de lesión orgánica del corazón ó de los pulmones, en la tisis ó disnea por lesiones del corazón ó grandes vasos; daña cuando hay fiebre hética y cavernas, en el hidrotorax, amenorrea, leucorrea por atonía, clorosis, ascitis, escrófulas, etc.

A. En bebida é inspirando el gas.

Fuente de los Herpes. Esta agua es perfectamente diáfana, sin color ni olor, de sabor ligeramente amargo, y causa en el paladar la impresion del agua tibia; su temperatura es 21 $\frac{1}{2}$ ° R., y es un poco

mas pesada que el agua destilada.

An. Sesenta libras medicinales han dado segun Herrera y Ruiz:

	gran.
Azoe.	214,3
ó 710,8 pulgadas cúbicas.	
Sulfato de sosa.	29
Hidroclorato de sosa.	12
Carbonato de cal.	5,7
Hidroclorato de magnesia.	3
Sílice.	7

V. M. Este agua es muy útil en las erupciones cutáneas con carácter agudo, acompañadas de inflamacion viva, picor, dolor ó calor intenso, á saber: en el eczema, herpes, sarna, ectima, acne, tiña y prurigo; en las afecciones crónicas de la matriz y vejiga de la orina, metritis, cistitis; en el histérico, cólicos nerviosos, pirosis, gastrodinia, flegmasias crónicas del hígado y de los riñones, en varios casos de reumatismo muscular ó fibroso, en la parálisis con rigidez mas ó menos dolorosa, en la leucorrea y amenorrea dependientes de mucha irritabilidad en el aparato genital.

A. En baños, chorros é inyecciones.

Fuente del Estómago. Esta agua sulfurosa salina es clara, tiene olor hediondo á huevos podridos, de sabor análogo al olor y un poco amargo y nauseabundo; deja en su curso un sedimento blanco y untuoso; su temperatura es de 23° R., y su peso específico es 1,005.

An. Analizadas sesenta libras de agua contienen, segun Herrera y Ruiz:

	gran.
Gas ácido hidrosulfúrico.	130,81
ó 355,4 pulg. cúbic.	
Hidrosulfato de sosa.	9,14
Hidrociorato de sosa.	14,40
Sulfato de sosa.	26,48
Carbon. neutro de sosa.	20
Glerina.	13
Silice.	9
Hidrosulfato de cal.	2,03

sis incompletas, hidrartrosis, úlceras antiguas, callosas, fistulosas ó cariosas, y ha curado las intermitentes rebeldes, algunos síntomas sífilíticos y los fenómenos mercuriales.

A. En bebida, baños y chorro. *Fuente purgante, de la Laguna*

ó *de Ibon*. El agua es cristalina, sin color ni olor, de sabor agradable; su temperatura es de 21° R., y su peso específico es como 1,004 á 1.

An. Sesenta libras de agua hndado segun Herrera y Ruiz:

V. M. El agua del Estómago se usa con ventaja notable en las erupciones cutáneas, que han perdido el carácter agudo, y en los herpes rebeldes. Conviene en la diátesis escrofulosa, anorexia y dispepsia atónicas, amenorrea, leucorreas sin irritacion sanguínea, en algunos casos de clorosis; es utilísima en los catarros crónicos muy antiguos de los ancianos y linfáticos, asma húmedo, opresiones nerviosas de pecho, y en las enfermedades por retro-pulsion de un principio gotoso, reumático, herpético ó epsórico; en la ictericia, hepatitis crónica, obstrucciones del hígado, hepátalgia é hipocondría por desaparicion de una enfermedad cutánea.

Sus baños ó chorros solos, y tomándola además en bebida, son útiles en las convulsiones, artritis, miositis, néuralgias crónicas, en la parálisis á consecuencia de golpes, caidas ó enfermedades largas del aparato locomotor, atrofia local de los miembros, en los infartos articulares, anquilo-

	gran
Gas ácido carbónico, muy corta cantidad.	1,88
ó 4 pulgadas cúbicas.	
Sulfato de sosa.	25
Hidrociorato de sosa.	11
Subcarbonato de hierro.	9
Silice.	10,7
Carbonato de cal.	6

V. M. Es muy útil en la clorosis, amenorrea atónica, asteinia del estómago ó de la vejiga de la orina. Aprovecha en las afecciones crónicas del hígado y del bazo, sobre todo si son consecutivas á las calenturas intermitentes, en la leucorrea y caquexia mercurial y sífilides.

A. Solo se usa en bebida.

SPA. Ciudad pequeña en Bélgica, á diez leguas de Aquisgran. Tiene buenos edificios, se usan las aguas desde fin de mayo á mitad de octubre, y hay varios médicos directores.

Tiene muchos manantiales, pero los mas nombrados son los de

Pouhon, la *Geronstere*, la *Sauveniere*, el *Groesbeck*, la fuente de *Tonnelet* y el *Watroz*.

Pouhon. El agua es clara, transparente, de sabor acidulo y un poco ferruginoso; deja desprender burbujas de ácido carbónico, y cubre las paredes de los pozos una capa ligera ocreosa; su temperatura es de 10° cent.

La *Geronstere* tiene olor desagradable, que se atribuye al hidrógeno sulfurado; su sabor es ferruginoso y menos acidulo que la de *Pouhon*; al contacto del aire deja desprender burbujas, se enturbia y deja un poso rojizo.

La *Sauveniere*. El sabor es ácido y picante, agradable y menos ferruginoso que la de *Pouhon*; exhala un olor sulfuroso que desaparece pronto; desprende burbujas cuando se la pone en un vaso, se enturbia y deja aposar un polvo rojizo pálido.

El *Groesbeck*. Sus propiedades físicas son análogas á las del manantial anterior.

La *fuente de Tonnelet* es muy abundante, esparce un olor ferruginoso, su sabor es picante, agradable y menos ferruginoso que el de los otros manantiales.

La de *Watroz* tiene sabor ferruginoso, su temperatura es variable, y contiene un poco de ácido carbónico.

An. Segun la análisis de Bergmann, un litro de agua contiene:

litro.
Acido carbónico. 0,450

gran.

Carbonato de sosa cristalizado. 0,201
Cloruro de sodio. 0,027
Carbonato de hierro. . . 0,077
Carbonato de cal. 0,201
Carbonato de magnesia. 0,480

V. M. El agua de *Pouhon* conviene á las personas robustas cuyo estómago no es demasiado sensible; es la mas saludable contra las menorragias, infartos del higado, del bazo ó del mesenterio, ictericia, hipocondría, cólicos nefríticos, gonorrea, poluciones, y en lavativas contra las ascárides.

La *Geronstere* es mas á propósito para las personas cuyo estómago es irritable, en los vómitos, inapetencia, dispepsia atónica, histérico, amenorrea y en la mayor parte de las enfermedades que padecen las mujeres en la época crítica; es muy eficaz contra las lombrices.

La *Sauveniere* es útil en las enfermedades de la piel, escorbuto, arenillas, y dicen que cura la esterilidad; su actividad ocupa un medio entre las dos primeras.

El agua de *Groesbeck* se emplea casi en los mismos casos que la *Sauveniere*, solo que es mas activa y resuelve con mas facilidad los infartos abdominales.

El agua de *Tonnelet* se usa principalmente mezclada con vino ó jarabe de frambuesas ó grosellas como refrigerante.

A. Se usan en bebida, en baños, inyecciones ó lavativas

El agua de Pouhon es la única que se exporta, y se conserva mucho tiempo sin alterarse.

Agua artificial de Spa (F. F.).

	granos.
Carbonato de sosa crist.	3
Carbonato de cal.	$\frac{5}{5}$
Carbonato de magnesia.	$\frac{1}{4}$
Protocloruro de hierro.	$\frac{2}{3}$
Alumbre cristalizado.	$\frac{1}{7}$
	onz.
Agua privada de aire.	20
Acido carbónico.	5 vol.

Se disuelve el carbonato de sosa en una pequeña cantidad de agua, y se diluye en el licor el carbonato de cal y el de magnesia; por separado se disuelve el alumbre y el cloruro de hierro en otra porcion de agua, y se mezcla esta disolucion con el primer líquido; se echa todo en botellas, y se acaban de llenar con agua gaseosa simple.

Esta fórmula produce una agua que debe ser muy análoga á la composicion de la natural de Spa, y que se aproxima tambien á las de Bussang, Forges, Pymont, Vals, etc.

A. Se dan de tres á cuatro vasos hasta doce, sola ó mezclada con leche.

VILLAR DEL POZO. Villa á dos leguas de Ciudad Real, provincia de Ciudad Real. Cerca de la poblacion se encuentra el manantial de aguas minerales, cuya temperatura es de 23° R.

An. Contienen ácido carbónico,

cloruro de cal, cloruro de sodio y carbonato de hierro.

Tiene médico-director, y se toman en las mismas temporadas que estos.

VILLATOYA. Pueblo de la provincia de Albacete, á diez leguas de la capital.

A dos mil pasos de Villatoya se halla el establecimiento de baños. Se toman estas aguas desde 15 de mayo á fin de setiembre, y tienen médico-director.

Los baños consisten en dos balsas capaces de contener treinta personas á la vez.

P. F. El agua es trasparente, cristalina, blanda, untuosa y suave, sin color ni olor, de sabor ligeramente astringente; deja por donde pasa un poso de color verdoso y ocre; en las balsas forma una película plateada en unas é irisada en otras; tomada en un vaso de cristal se advierten unos cuerpecitos flotantes que suben y bajan y luego desaparecen; desprende muchas burbujas. Su temperatura es de 21° R., y no se ha determinado su gravedad específica.

An. Segun la análisis practicada por D. Francisco Miner y D. Antonio Beulloe, han dado dos pulgadas de aire atmosférico, tres pulgadas y cinco líneas de gas ácido carbónico, y en cada libra de agua mineral de la fuente de los Baños se halla:

	gran.
Sulfato de cal.	28,92
Sulfato de magnesia.	3,16
Carbonato de cal.	4,28

	granos.	por heridas de armas de fuego,
Muriato de cal.	45,03	contusiones violentas, dislocaciones,
Muriato de magnesia. . .	0,24	erupciones cutáneas habituales y hernias por debilidad.
Muriato de alúmina. . . .	0,32	Están contraindicadas en los
Muriato de sosa.	0,09	flujos mucosos activos, aneurismas,
Sílice.	0,85	escirros, cáncer, hemotisis, tisis, etc.
Oxido de hierro.	0,78	

V. M. Producen excelentes efectos en el reumatismo crónico general ó parcial, dolores artríticos, clorosis, supresiones y aberraciones menstruales, flujo blanco, dismenorrea atónica, debilidad de estómago, afecciones verminosas, cardialgia con ó sin vómitos, histérico, hipocondría, convulsiones, hemiplegia, paraplegia, parálisis parcial, retracciones de los músculos, baile de San Vito, epilepsia, parálisis de los miembros, úlceras pútridas antiguas, inflamaciones serosas, inflamaciones crónicas de la boca, erisipelas habituales, obstrucciones abdominales, afecciones escrofulosas y raquíticas, cefalalgias, jaqueca, varices, tumores hemorroidales por debilidad, contracciones musculares

En el término de Villatoya existen además la fuente de Gilanco y la de las Lombrices.

El agua de la *f fuente Podrida* es clara, muy trasparente, de sabor azufroso nauseabundo y de olor muy fétido á huevos podridos, que se percibe á mucha distancia; su temperatura es de 14 ó 15° R., es pues sulfurosa fria.

Contiene ácido sulfúrico libre y combinado con la cal y la sosa.

La *f fuente de las Lombrices* brota de un gran peñasco de figura irregular, y cae en una pocita y es muy escasa. Las propiedades físicas, químicas y medicinales son las mismas que las del agua de la fuente de los Baños.

Contiene carbonatos de cal y de magnesia y un poco de carbonato de hierro.

AGUAS MINERALES SALINAS.



GENERALIDADES.

Todas las aguas minerales son mas ó menos salinas, porque contienen mas sales que el agua coman; pero se ha dado particularmente este nombre á las que no siendo sulfurosas, ferruginosas ni acidulas, tienen las sales por principios predominantes.

P. F. Varía mucho el sabor, que es fresco, amargo ó picante;

es raro que tengan olor particular á no ser que contengan un poco de hidrógeno sulfurado, y son termales ó frias.

P. Q. Estas aguas contienen cloruros de sodio, de calcio y magnesio, sulfato de sosa, carbonatos alcalinos, sílice, indicios de hierro, rara vez sulfato de alúmina, ioduros, bromuros y una materia grasa comparable á la baregina; con frecuencia ácido carbónico y á veces ácido hidrosulfúrico.

V. M. En bebida convienen á las personas flemáticas, de fibra floja, cuando las secreciones se han trastornado ó pervertido y no hay plétora sanguínea. Estimulan la membrana mucosa del estómago, aumentan la secrecion del jugo gástrico, modifican su naturaleza y corrigen sus cualidades viciosas; dan mas actividad al estómago, dan tono y remedian muchos vicios de la digestion por atonía de esta víscera, y del mismo modo obran sobre los intestinos produciendo un efecto laxante. A dosis mas fuerte, aumentan la secrecion de los riñones, hígado y páncreas y la accion de los absorbentes; así disminuyen y desaparecen los infartos crónicos de las vísceras del bajo vientre ó del sistema linfático, si son capaces de resolucion. Son útiles por consiguiente en las afecciones del estómago por abundancia de bilis ó mucosidades, en los infartos de las vísceras abdominales, ictericia, cálculos biliares, cuartanas rebeldes, cólicos nefríticos, catarro vesical, supresion de las reglas, leucorrea, esterilidad y en las enfermedades nerviosas que al parecer dependen de lentitud y atonía de las funciones digestivas. No se usarán cuando haya demasiada susceptibilidad nerviosa ó irritacion de los órganos gástricos, pues son tanto mejores cuanto menor sea la irritacion de estos órganos ó estén en un estado de atonía, y dañan á los que tienen el pecho delicado, á los asmáticos y los dispuestos á la hemotisis.

Se las ha recomendado en baños ó chorros en las parálisis aunque resulten de la apoplejía, con tal que no haya congestion activa hácia el cerebro, y solo se usarán medios baños ligeramente calientes. Se emplean con éxito los baños de aguas ligeramente salinas en las enfermedades de la piel, tales como las erupciones secas acompañadas de comezon, el líquen, algunas variedades de prúrigo, en los eczemas crónicos, en el impétigo y pórigo; pero si se agrava mucho la erupcion, se suspenderán los baños salinos y se usarán los emolientes.

Las aguas salinas calientes son útiles, lo mismo que todas las demás termales, en las contracturas de los músculos, enfermedades de los huesos y de las articulaciones, y en las afecciones reumáticas crónicas.

A. Se usan las aguas salinas á mayor ó menor dosis segun la indicacion: si se quiere que obren como laxantes, se tomará por la mañana en ayunas tres á cuatro cuartillos en una hora, debiendo variar

esta dosis segun la edad y temperamento de los enfermos. Son mas activas en el manantial que trasportadas, y no irritan los órganos digestivos como muchos de los purgantes ordinarios, porque reaniman sus funciones y restablecen el apetito. Se toman calientes, y se aumenta su accion añadiendo una sal neutra cuando las personas son difíciles de purgar. Si se usan frias y son digeridas con dificultad, se las calienta en el baño maria. Solo se usarán por pocos dias, pues producirian una diarrea rebelde si se continuase su administracion por mucho tiempo.

Cuando se usan como alterantes, se las administrará á pequeñas dosis; entonces mantienen la regularidad de las evacuaciones alvinas sin purgar, aumentan la secrecion urinaria y producen cierta depuracion humoral, por medio de la que son eliminados sus principios deletéreos; así continuados durante mucho tiempo curan ó alivian muchas afecciones abdominales crónicas, á veces sin producir ningun fenómeno critico.

Comunmente se usan los baños al mismo tiempo que las aguas en bebida, pero la excitacion que producen en la piel y en la mucosa intestinal determina irritaciones interiores y aun flegmasias, por lo que hay que renunciar á uno de los dos medios; así es prudente no tomar los baños hasta que el enfermo se haya habituado á beber el agua mineral.

En algunas enfermedades externas se usa la grasa untuosa que depositan muchos manantiales salinos, en cataplasma ó en baños; pero no se usará inconsideradamente estos tópicos, porque producen con frecuencia una sobreexcitacion peligrosa en las partes enfermas.

Las aguas salinas, cuyas propiedades consisten en principios fijos, pueden trasportarse y conservarse cierto tiempo sin que se alteren de un modo notable.

AGUAS SALINAS EN PARTICULAR.

ALHAMA. Villa en la provincia de Murcia, á seis leguas de la capital.

Dentro de la villa existen unos excelentes baños minerales. Las aguas, cuya temperatura es de 36° R. y se rebajan hasta 28° brotan de la raiz del Peñon, y se depositan dentro de edificios subterráneos y abovedados en donde

los enfermos toman los baños. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 1.º de abril á fin de junio, y en la segunda desde 1.º de setiembre á fin de octubre. Tienen médico director.

An. Segun la análisis contienen muriato de sosa, sulfato de cal, muriato de magnesia, car-

bonato de magnesia, carbonato de cal, alúmina y gas ácido carbónico.

ALZOLA ó *Urberuaga de Alzola*. Anteiglesia en la provincia de Guipúzcoa, á tres leguas de Vergara y tres de Azpeitia.

El establecimiento de baños está situado en la orilla izquierda del rio Deva. Se toman estas aguas desde 1.º de junio á fin de setiembre, y tienen médico-director interino.

Tiene una fuente de buena agua, y otra de agua mineral ferruginosa, pero los manantiales mas notables son los termales.

P. F. El agua es clara, no tiene color ni olor, es trasparente y de sabor ligeramente salino; su temperatura es de 30 á 31º cent. (24º R.), y deja desprender gran número de burbujas.

An. Segun la análisis de D. Antonio Moreno y D. Diego Genaro de Lletget, resulta que cada libra de agua contiene:

	gran.
Cloruro de sodio.	0,68
Cloruro de magnesio. . .	0,06
Cloruro de cal.	0,09
Sulfato de cal.	0,16
Sulfato de sosa.	0,15
Bicarbonato de cal. . . .	1,31
Acido silícico.	0,033

p. cúb.

Aire atmosférico. 0,4

y una materia orgánica.

V. M. Son eficaces en la dispepsia, anorexia, estreñimiento pertinaz, obstrucciones del hígado y del bazo, afecciones hipochondriacas, afecciones cutáneas

y gotosas; pero principalmente en las enfermedades de las vías urinarias con ó sin cálculos ó arenillas, cólicos nefríticos, retenciones de orina, iscuria, extranguria, afecciones histérico-espasmódicas, despues de los partos laboriosos ó abortos, asma, palpitaciones nerviosas ó con lesion incipiente del corazón.

A. Se usa en baños y bebida.

ARTEIJO. Se halla este pueblo á legua y media de la Coruña.

Las aguas nacen por tres puntos, y hay además un manantial á 24º R., que se usa en bebida. Se toman estas aguas desde 1.º de julio á fin de setiembre, y tienen médico-director.

P. F. Las aguas minerales son claras, transparentes; tienen sabor alcalino y despiden un olor desagradable, que pierden á poca distancia del manantial. Hay tres baños, cada uno con su edificio, cuyas temperaturas son de 26,2, 28 y 31º R.

An. Segun la análisis de D. Antonio Casares los tres manantiales contienen:

	gran.
Cloruro de sodio.	1,62
Cloruro de calcio.	0,34
Sulfato de cal.	0,12
Sustancia orgánica. . . .	
Agua.	997,92

V. M. Producen buenos efectos en las erisipelas, herpes, afecciones de la piel, reumatismo muscular crónico, reumatismo fibroso, parálisis, neuralgias,

dispepsias, anorexias, gastrodina, gastritis apiréticas, parálisis nerviosa, gota, iscuria, estrangurria, diabetes, afecciones crónicas de las vísceras abdominales, amenorrea, clorosis, leucorrea, impotencia, epilepsia, corea, convulsiones crónicas, amaurosis, oftalmias serosas, úlceras callosas ó fagedénicas.

A. Se usa en bebida y baños.

ARNEDILLO. Villa en la provincia de Logroño, á siete leguas de la capital y seis de Calahorra.

El edificio tiene diez baños, en los que se pueden bañar seis personas á la vez. Se toman éstas aguas desde 14 de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. Las aguas son diáfanas, cristalinas, de sabor exclusivamente salado, que se percibe mas cuando están frias; su temperatura es de 42° R., y su gravedad específica es de 1,004.

An. Analizadas estas aguas en 1837 por D. José Elvira, encontró que cada libra de agua contenia:

	p. cúb.
Aire y ácido carbónico.	235
	gran.
Sulfato de cal.	5,437
Carbonato de cal.	3,562
Sulfato de sosa.	8,762
Hidroclorato de sosa. . .	51,259
Hidroclorato de magnes.	6,061
Carbonato de hierro. . .	0,537

V. M. Producen excelentes resultados en la gastritis crónica, debilidad de estómago, entero-

mesenteritis, histérico, fiebres intermitentes sostenidas por infartos del hígado y del bazo, clorosis, amenorrea, parálisis generales y parciales, aunque sean consecutivas al cólico de Madrid ó al de plomo, neuralgias articulares, reuma, artritis aunque esté complicada con reblandecimiento de los huesos, hemiplejía, parálisis sin lesión ó congestión cerebral, inflamaciones blancas, escrófulas aunque estén ulceradas, virus sifilítico y enfermedades consecutivas, úlceras por antiguas que sean, á las que reduce al estado de simplicidad; hacen expeler las esquirlas de los huesos y proyectiles si son producidas por las heridas de armas de fuego, cuando no ha sido posible extraerlas; corrigen la demacración en los miembros, las fracturas mal consolidadas, cálculos urinarios, reumatismos agudos y leucorrea, debilidad, etc.

Están contraindicadas en las enfermedades asténicas del conducto digestivo, en las personas demasiado pletóricas, en los flujos activos con fiebre continua, en las afecciones acompañadas de fiebre, en la hemotisis, en los que padecen herpes ó erupciones antiguas, y en las hemiplejías recientes producidas por congestión cerebral si esta no ha desaparecido.

BALARUC, en Francia. Villa cerca de Narbona, á tres cuartos de legua de Frontignan y cuatro de Montpellier, departamento del Herault. Tiene establecimiento de baños. Se toman las aguas desde 1.º de

mayo al 1.º de setiembre, y tienen médico-director.

P. F. El agua es cristalina, de olor parecido á la de mar, de sabor salado, mezclado con amargor; su superficie se cubre de muchas burbujas y presenta una película que se parece bastante á las gotas de aceite, cuando ha permanecido mucho tiempo el agua tranquila; es mas pesada que el agua destilada; su temperatura es de 47 á 50º cent.

An. Según la análisis de Figuiet, un litro de agua se compone de

	litros.
Acido carbónico.	0,119
	gran.
Cloruro de sodio.	7,40
Cloruro de magnesio.	1,38
Cloruro de calcio.	0,91
Carbonato de cal.	1,16
Carbonato de magnesia.	0,09
Sulfato de cal.	0,70
Hierro.	c. ind.

V. M. Se usa en las afecciones escrofulosas, embarazo bilioso ó mucoso del aparato digestivo, infarto de las vísceras del bajo vientre, calenturas intermitentes rebeldes, reumatismo crónico, ceática, rigidez é hinchazon de las articulaciones, contractura y debilidad de los miembros á consecuencia de las fracturas, dislocaciones ó contorsiones, sordera por causa catarral.

Daña á los predispuestos á la apoplejía, epilepsia ó hemorragias, y en los casos de histérico, hipocondría, afecciones del pecho, asma, etc.

A. Se usa en bebida, baños y chorros.

Se alteran poco por el transporte.

Agua de Balaruc para bebida.

		gran.
2 Cloruro de sodio.	5,054	60
Cloruro de calcio cristalizado.	5,439	62
Cloruro de magne- sia cristalizado.	2,842	33
Sulfato de sosa cris- talizado.	1,644	20
Bicarbonato de sosa.	2,115	24
Bromuro de potasio.	0,006	1/12
		onzas.

Agua gaseosa con tres volúmenes de gas. 1000 20

Se disuelve á parte los cloruros de calcio y de magnesio, se divide esta solución salina en las botellas, y se llenan con la disolución de las sales de sosa y de bromuro que se ha cargado con tres volúmenes de ácido carbónico.

Cuando se emplea el agua de Balaruc en baños no se carga de ácido carbónico.

BELLÚS. Fuente mineral salina tibia en la provincia de Valencia, á nueve leguas de la capital y una de Játiva.

Surte varios baños, bastante cómodos y capaces. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 15 de abril á 15 de julio, y en la segunda desde 1.º de setiembre á 30 de octubre, y tienen médico-director.

P. F. El agua es clara, trasparente, inodora é insípida, algo untuosa al tacto; su temperatura es de 20° R.; pesa lo mismo que el agua destilada.

An. Segun D. Serafin María Clemencin, cada libra castellana de agua contiene:

	gran.
Hidroclorato de soña.	1 1/2
Hidroclorato de magnesia. 2	
Protosulfato de magnesia. 3	
Protosulfato de sosa.	2
Subcarbonato de cal.	4
Subcarbonato de magnesia. 2	
Sílice.	1/2
Y un poco de aire atmosférico.	

V. M. Se las recomienda en la inapetencia, dispepsia, acedías, cólicos, malas digestiones, afecciones verminosas ó hemorroidales, obstrucciones de las vísceras del bajo vientre, calenturas intermitentes, hipocondría, ictericia, cálculos renales y vesicales, desarreglos de la menstruacion, histérico, afecciones del útero, leucorrea, dismenorrea, parálisis, reuma artrítico y muscular, afecciones cutáneas é hidropesías.

A. Se usa en bebida y baños.

BOURBONNE. Baños de Bourbonne, en Francia, á diez leguas de Langres, departamento del Alto Marne. La temporada para tomar estas aguas dura desde 1.º de junio á 1.º de octubre, y tienen médico-director. Tiene tres manantiales.

P. F. El agua de los tres ma-

nantiales no tiene color, es trasparente, no se percibe olor aunque los baños exhalan el del hidrógeno sulfurado; su sabor es amargo, muy salado y no nauseabundo; al principio es untuosa al tacto, pero despues causa en la piel un poco de rigidez; su peso específico es de 1,006. La temperatura de la fuente de la Plaza es de 58°,75 cent., la de los baños Civiles de 57°,50 y la de los baños Militares 50°.

An. Segun la análisis de Bastien y Chevallier un litro de agua contiene:

	gran.
Bromuro alcalino.	0,050
Cloruro de sodio.	6,005
Cloruro de calcio.	0,740
Carbonato de cal.	0,287
Sulfato de cal.	0,783
Pérdida.	0,135

V. M. Se las recomienda generalmente en las parálisis parciales ó generales, aunque sean ocasionadas por una lesion del cerebro, siempre que se tomen todas las precauciones para evitar una congestion cerebral; en los reumatismos crónicos, algunas neuralgias, debilidades musculares, accidentes por heridas de armas de fuego, torceduras, dislocaciones y enfermedades escrofulosas; producen algunas veces buenos efectos en los infartos del bajo vientre, clorosis, flores blancas, relajacion de los ligamentos de la matriz, etc.

Dañan en las fracturas, raquitis, hemotisis, tisis pulmonar,

aneurismas, etc., y en las enfermedades agudas ó en individuos de constitucion sanguinea ó nerviosa.

A. Se toman en bebida, baños, chorros ó estufas. Se conservan sin alterarse, y se las puede trasportar.

Agua artificial de Bourbonne ó agua bromurada para bebida (F. F.).

	gran.
22 Bromuro de potasio.	2 1/2
Cloruro de sodio.	54
Cloruro de calcio cristal.	38
Sulfato de sosa cristaliz.	23
Bicarbonato de sosa cristalizado.	6
	onz.
Agua pura.	20
Gas ácido carbónico.	5 vol.

Se disuelven en parte del agua las sales de base de sosa, y se satura la solucion con el ácido carbónico; se disuelven por separado el bromuro de potasio y el cloruro de calcio, y se distribuye la solucion en botellas que se acaban de llenar de agua salina gaseosa.

Busor. Se halla esta villa en la provincia de Alicante, á dos y media leguas de la capital y una de Jijona. A media legua S. E. del pueblo se halla la casa de baños con siete pilas. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 1.º de mayo á fin de junio, y en la segunda desde 1.º de setiembre á fin de

octubre, y hay médico director.

Los manantiales que se usan son: la *Cogolla*, el de los *Baños*, *Colladed*, *Fuente de los Romanos* y la *Caba ó Mina*.

Fuente de la Cogolla. Dista medio cuarto de legua del edificio de los baños. El agua es clara, sin color, no deja sedimento ni se altera al contacto del aire; su sabor es salado al paladar, no tiene olor, corta el jabon y cuece mal las legumbres; si se la somete á la accion del fuego es poco sensible el desprendimiento de sustancias volátiles; su temperatura es de 33º R., y su peso especifico es de 1,0049; luego que se enfria se puede beber.

Fuente del Colladed. No es constante este manantial pues pasan algunos años sin presentarse, y es mas ó menos abundante segun que los años son secos ó lluviosos.

La *Fuente de los Romanos* ó *Balsa Nueva*, nace entre el paseo de balza y sirve para regar las huertas.

La *Fuente de la Mina* ó *Cava*, mana en el ángulo que forma una colina en la parte posterior de la *Cogolla*.

An. Segun D. Joaquin Fernandez Lopez, cada libra de agua contiene:

	p. cúb.
Aire atmosférico.	1,8
	granos.
Sulfato de cal.	5,6
Sulfato de magnesia.	8,5
Cloruro seco de calcio.	3,46
Cloruro de magnesio.	3,46

Igual composición tienen las aguas de la Cogolla, de los baños, de los Romanos y balsa nueva, y la temperatura de todas es de 33° R.

V. M. En bebida son útiles en la melancolía, hipocondría, dolores cólicos, neurosis gástricas, afecciones del estómago, hígado, páncreas, bazo, ictericia, convalecencia de las apoplejías leves, encefalitis y aracnoiditis, oftalmía, otitis, coriza, neuralgias, blenorreas, arenillas, clorosis, etc.

Están contraindicadas en la hemotisis, tisis pulmonar, en las preñadas, y en las que padecen metrorragias, en los que padecen melenas, en los casos de flujos sanguíneos intensos, en las fiebres lentas con diarrea, sudores excesivos por desorganización de alguna viscera, etc.

En baños son útiles en el reumatismo, artritis, gota, neuroses, principalmente en la ceática, irritaciones crónicas del conducto gastro-intestinal, del hígado, páncreas, bazo; en los infartos de las glándulas escrofulosas; bubones venéreos, úlceras, supuraciones profundas, heridas de armas de fuego, en que hace arrojar esquirlas ó pedazos de paño, fracturas, úlceras venéreas, úlceras reumáticas, úlceras escrofulosas, y á veces las carcinomatosas, afecciones herpéticas, epsóricas y aun la tiña; impiden la reproducción de las apoplejías leves, y palian ó curan las consecuencias: hemiplegia, paraplegia, tortícolis y *tortura oris*; arreglan la

menstruación y curan las blenorreas, leucorreas y el catarro vesical crónico.

Los baños están contraindicados en los mismos casos dichos antes, en la ascitis, hidropesía del escroto, leucóflegmasia, tumores escirrosos, cáncer y fiebres.

A. Se usa en bebida, baños y baños de vapor.

CALDAS DE BESAYA. *Caldas de Santander*. El establecimiento de baños se halla en la provincia de Santander, á seis leguas de la capital. La temporada empieza en 1.º de mayo y concluye en fin de setiembre, y tiene médico-director.

El establecimiento tiene cinco baños particulares y un baño general en que se pueden bañar seis personas á un tiempo. En la parte superior de estos baños hay una sala con cuatro alcobas, y en el mismo piso hay cuatro baños surtidos por medio de bombas.

P. F. El agua es trasparente, inodora, de sabor algo salino y ácido, corta el jabon y cuece mal las legumbres; forma ampollitas; su temperatura es de 30° R. ó 38° cent., y se mantiene tibia por bastante tiempo.

An. Evaporadas veinte onzas han dado:

	gran.
Cloruro de sodio	25
Cloruro de magnesio	15
Sulfato de cal	5

y cuatro y media pulgadas cúbicas de ácido carbónico por cada

pié cúbico. Contienen además una sustancia vege-to-animal llama-da baregina.

La fuente fria y ferruginosa, que brota á cien pasos de las termales, contiene principalmente óxido de hierro.

V. M. Son muy eficaces en la sarna, herpes, tiña; en las gastralgias, vómitos nerviosos; hepatalgia, enteralgia; en las acedías, flatos y desarreglos de la digestion, hidropesías; contra los cálculos vesicales, cistitis crónica, blenorragias, leucorreas y diarreas; se dice además que son litontrípticas y anticancerosas. En baños son muy útiles en las afecciones enumeradas anteriormente, en el histérico, hipochondría; monomanía, parálisis, convulsiones, calambres, baile de San Vito, epilepsia, palpitaciones, jaqueca, clavo histérico, clorosis, amenorrea, dismenorrea, ninfomanía, satiriasis, anafrodisia, disuria, estrangurria; resuelven algunos infartos glandulares, escrofulosos ó escirrosos, derrames serosos; induraciones, lesiones del hígado; bazo, útero y demás órganos; reuma, sífilis, ictericia, aftas, ocella, úlceras, reumatismo, ceática, reumatismo gotoso, gota regular, etc.

El agua ferruginosa es útil en la clorosis, etc.

A. Se usa en bebida y baños.

CALDAS DE ESTRAC Ó CALDE-TAS. Pueblo marítimo á una y media legua de Mataró, y media de Arenys de Mar, provincia de Barcelona. La temporada dura desde pri-

mero de junio á fin de setiembre, y tiene médico-director.

Tiene establecimiento de baños con catorce pilas.

P. F. El agua mineral brota de una roca inmediata á la riera; es clara, trasparente, inodora, de sabor amargo casi imperceptible; su temperatura es de 32 á 33° R., y su peso superior al del agua destilada.

An. Ciento veintitres libras de agua contienen:

	gran.
Carbonato de cal.	21
Hidroclorato de cal.	9
Sulfato de cal.	38
Hidroclorato de sosa.	73

y acaso carbonato é hidroclorato de magnesia.

V. M. Son útiles en los dolores reumáticos, erupciones cutáneas, ceática, tumores artríticos, perlesía, enfermedades nerviosas, etc.

CALDAS DE MALAVELLA. Esta villa dista dos y media leguas de Gerona y dos de Santa Coloma de Farnés, provincia de Gerona.

Contiene muchas fuentes de aguas minerales muy calientes y en medio de ellas una fria. Se toman estas aguas desde 15 de mayo á 15 de octubre, y tienen médico-director.

P. F. Las aguas de los principales manantiales son abundantes, claras, insípidas, sin olor al principio, pero dejan un gusto á lejía cuando están calientes; no se diferencian del sabor del agua comun luego que se enfrían; no se conoce su gravedad específica;

dejan por donde corren un cieno de color verde subido, son untuosas al tacto y exhalan muchos vapores inodoros. Su temperatura es de 52⁰³/₄.

La del manantial frio es abundante, diáfana, inodora, pero de sabor algo ácido, amargo y picante, bastante parecido al del sulfato de magnesia. Se desconoce su temperatura y densidad y deja un cieno de color rojo vivo.

En la antigüedad habia baños para tomar las aguas, pero estando destruidos se lleva el agua á las casas para tomarlos.

An. Ciento seis libras y seis onzas de agua contienen:

	p. cúb.
Acido carbónico.	26
	gran.
Cloruro de cal.	418
Cloruro de magnesia.	180
Cloruro de sosa.	144
Sulfato de cal.	144
Carbonato de cal.	144
Carbonato de magnesia.	124
Carbonato de hierro.	54
Glerina.	c. ind.

A poca distancia de la villa se hallan otros manantiales calientes, al parecer de la misma naturaleza, y una fuente acidula fria, de sabor ácido picante y algo amargo, semejante en un todo á la que tiene sulfato de magnesia.

V. M. Han producido buenos efectos en la cardialgia, herpes, parálisis por apoplejia, catarros, induración del tejido celular, oftalmia crónica, reumatismo y gota, infartos de las vísceras abdo-

minales, asma, edema, hidropesías, hemiplegia, ceática y rigidez de los nervios.

A. Se usa en baños, baños de vapor, chorros, y la fria en bebida.

CALDAS ó *Caldes de Montbuy*. Se halla esta villa á cuatro leguas de Barcelona y dos de Granollers, provincia de Barcelona.

Los manantiales mas notables son las fuentes llamadas del Leon, la Canaleta y las Cubellas. Además de estos manantiales públicos, hay varios conductos subterráneos que dirigen el agua á diez establecimientos, que son el hospital de la Caridad, la casa de Rino, la de Garau, la de Broquetas, la de Font, la de Sagrera, la de Alrich, la de Fornes, la de Solá y la de Llobet.

En todos los establecimientos hay estufas ó baños de vapor generales ó particulares y baños de chorro.

P. F. Las aguas de Caldas de Montbuy son salinas, limpias, claras y transparentes; apenas tienen olor ni sabor notable; no se enturbian ni dejan sedimento alguno, pero por los conductos por donde pasan forman algunas incrustaciones; son untuosas y menos pesadas que el agua destilada al salir del manantial, pero despues de frias son mas pesadas. Su temperatura es de 55 á 56° R. en la fuente del Leon, 54° en la Canaleta, 51° en las Cubellas, 52° en el caño del hospital, y en los demás establecimientos varia de 24 á 46°.

A. Segun la análisis de D. Igna-

cio Graells cada dos piés cúbicos de agua mineral contienen :

	p. cúb.
Aire atmosférico.	85,00
Gas ácido carbónico.	240,98
	gran.
Hidroclorato de sosa.	811,0
Hidroclorato de cal.	c. ind.
Sulfato de sosa.	58,0
Sulfato de cal.	24,5
Subcarbonato de sosa.	21,0
Subcarbonato de cal.	42,5
Sílice.	65,0
Alúmina.	11,0
Materia orgánica.	7,0
Pérdida.	4,0

indicios de plétora ni congestión cerebral; en algunos casos de temblores, convulsiones, calambres, hipocondría, melancolía, etc.; enagenaciones, sorderas, oftalmias crónicas, debilidad de la vista por retrocesos de enfermedades cutáneas ó debilidad del nervio óptico ó acústico; en algunas hemicráneas, odontalgia, gastrodinia, cólico de los pintores, cólicos hepáticos ó nefríticos, catarro vesical crónico, disuria por causa reumática, hepática ó cálculosa, clorosis, etc.

Son peligrosas en las mujeres durante la preñez, durante la menstruacion, principalmente si esta es muy abundante ó padecen de metrorragias. Son poco favorables en las afecciones asmáticas, y muy perjudiciales cuando están acompañadas de algun vicio orgánico del corazon ó de los grandes vasos. Perjudican á los hemotóicos y á los predispuestos á hemorragias copiosas. Son muy temibles en los aneurismas internos, inflamaciones agudas y supuracion de las vísceras, en las congestiones cerebrales y en los predispuestos á la apoplejia; dañan en las afecciones reumáticas agudas, durante los paroxismos gotosos, pero son útiles en la declinacion de esta enfermedad.

A. Se pueden usar en bebida, baño, chorro y estufa.

CALDAS DE REYES. Villa á cinco leguas de Santiago, provincia de Pontevedra. La temporada para tomar estas aguas es desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico-director.

V. M. Son muy eficaces contra el reumatismo crónico simple ó gotoso, ó con complicacion sifilítica, al fin del reumatismo agudo, en la gota como profiláctico durante los intervalos de los accesos; en las afecciones herpéticas, lepra, úlceras antiguas, sarna inveterada y otras enfermedades cutáneas; en la anquilosis, rigidez de las articulaciones, tumores blancos ó linfáticos de ellas, relajacion ó contraccion involuntaria de los músculos, encogimiento de los tendones, debilidad, enflaquecimiento, dolores y parálisis de las extremidades por contusiones, dislocaciones, contorsiones, fracturas, quemaduras y heridas, principalmente de armas de fuego; en el estupor, anestesia ó parálisis espontánea de algun miembro, hemiplegia y paraplegia por relajacion de los músculos y debilidad de los nervios, sin

Tiene dos casas de baños.

Casa de baños de Dávila. Hay dos baños generales, uno para hombres y otro para mujeres, en que se pone el agua á 28° R. Paralelos á estos baños existen otras mas pequeños, en uno de los cuales se pone el agua á 32° R., y en el otro á 36⁰³/₄ R. Hay además el baño público, destinado á baños de piernas.

Casa de baños de Acuña. Tiene dos fuentes, una fuera de la casa, cuya agua se usa en bebida, y otra que sirve para llenar unos baños pequeños y otros dos grandes, y de la que tambien se bebe subiendo el agua por medio de una bomba. Hay además otros tres baños separados que se surten de esta última fuente, destinados para los que padecen enfermedades contagiosas.

P. F. Estas aguas no tienen color, son diáfanas, inodora la de la fuente de fuera de Acuña; con un ligero olor á huevos podridos la de dentro de la misma casa y la de Dávila, mas perceptible en la primera, sin sabor fastidioso; su peso específico es mayor que el del agua destilada; la temperatura en la arqueta de Dávila es poco mas de 37° R., en el baño público de 34° R., en la fuente de fuera de Acuña 24° R. y en la de adentro 28° R., cuyas temperaturas son constantes en todas las estaciones. En el fondo del baño público se cria con abundancia una sustancia verde. Esta sustancia se llena poco á poco de burbujitas y sube á la superficie del agua, arrastra comunmente por gruesas bur-

bujas de gas, que se desprenden del fondo del baño.

An. Se componen segun D. Antonio Casares de

Cloruro de sodio.	0,58
Sulfato de cal.	0,04
Sustancia orgánica.	»
Agua.	999,38

La cantidad de sulfuro de sodio es tan corta, que en diez libras de agua mineral solo se encuentra un décimo de grano de azufre.

V. M. Se han recomendado estas aguas en la dispepsia, obstrucciones del hígado, flatuosidades, hidropesías, nefritis, amenorrea, flujos blancos, etc.

A. Se usa en baños y bebida.

CALDELAS DE TUY ó San Martin de Caldelas, feligresía en la provincia de Pontevedra, á siete y media leguas de la capital. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre y tienen médico-director.

A una legua de Tuy, y á medio cuarto de legua del pueblo, se halla el manantial de sus aguas.

P. F. Estas aguas son perfectamente cristalinas, de olor y sabor marcado á huevos podridos; su temperatura es de 37° R., pero dejándola enfriar pierde su mal sabor y se reduce á 15°; son untuosas al tacto; forman unas burbujas gaseosas que se rompen en su superficie; depositan por donde pasan una sustancia blanca, como jabonosa y untuosa, y su peso específico es igual á 1,0006.

An. Segun D. Antonio Casares se componen de

	gran.
Cloruro de sodio.	0,46
Sulfato de cal.	0,11
Sílice.	0,02
Sustancia orgánica.	»
Agua.	999,41

y además una corta cantidad de ácido hidrosulfúrico.

V. M. Estas aguas son un remedio eficaz en la gota, reumatismo, parálisis, neuralgia, histerico, amenorrea, afecciones venéreas crónicas, afecciones cutáneas, úlceras, flegmasias crónicas de las vísceras del bajo vientre y flatuosidades.

A. Se usa en unturas, bebida y baños.

CESTONA ó Guesalada. Se encuentra á cuatro leguas de Tolosa, provincia de Guipúzcoa. A un cuarto de legua del pueblo se hallan estas aguas minerales, que se toman desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

Nace el agua por dos manantiales: el primero surte siete baños, el chorro y la fuente para beber, y el segundo surte solo dos baños. Al lado del establecimiento de baños hay una casa con baños de agua dulce, con habitaciones para hospedarse.

P. F. El agua es diáfana, cristalina é inodora, de sabor salado, ligeramente amargo, algo mas tuosa al tacto; cuando se la deja en quietud se cubre de una te-

la irisante; despues de embotellada despide á veces al destaparla olor á huevos podridos. Su densidad es igual á 1,006449; la temperatura del manantial nuevo, que es el mas abundante, es de 26°,56 R., y el del manantial antiguo es de 25°,12. El agua de los dos manantiales y particularmente la del antiguo arrastran en mayor ó menor cantidad, sobre todo despues de las lluvias, una sustancia de color amarillo rojizo, de aspecto como cuajado, en forma de copos elásticos que se aglutinan ó pierden su forma con dificultad, y esta sustancia se asemeja mucho al hidrato de óxido férrico. En la superficie del agua, particularmente del manantial nuevo, se observa un continuo desprendimiento de burbujas que contienen ázoe.

Los copos se disuelven fácilmente y en frio por el ácido clorhídrico.

Analizados diez granos de esta sustancia desecada, segun D. Justo María Zabala, han dado en cien partes: 55 de óxido férrico; 7,5 de alúmina; 17,5 de sílice y 20 de agua.

An. Segun la análisis de D. Justo María Zabala, en mil partes de agua se han encontrado:

Azoe.	0,2025
Cloruro de sodio.	5,0347
Cloruro de calcio.	0,0792
Cloruro de magnesio.	0,0846
Sulfato de sosa.	0,5208
Sulfato de cal.	1,8137
Sulfato de magnesia.	0,1595
Bicarbonato de cal.	0,0542

Bicarbonato de magne- sia.	0,0509
Fosfato de cal.	0,1953
Silice.	0,0759
Sustancia orgánica.	»

V. M. Son muy útiles en los catarrros crónicos, congestiones linfáticas, esrófulas y lombrices, algunas calenturas intermitentes; son muy eficaces en los reumatismos musculares, articulares y nerviosos, neuralgias y calambres; á veces producen buenos efectos en los gotosos y paralíticos; son útiles en las enfermedades crónicas del conducto digestivo, en las del hígado y del bazo, en los vicios de la digestión, en los infartos glandulosos, en las lesiones de la matriz, cistitis, sobre todo si es producida por una retropulsion reumática, en la anquilosis incompleta, retracciones de los tendones, heridas de armas de fuego, clorosis, ictericia, histérico, anafrodisia, retropulsion de la gota, herpes, etc.

No convienen estas aguas á los de temperamento sanguíneo nervioso muy irritables; dañan en las flegmasias agudas y crónicas del conducto intestinal y aparato respiratorio, en la tisis, en la demacracion general ó supuraciones internas, en los aneurismas del corazon ó de los grandes vasos, y cuando hay disposicion á un ataque apoplético.

A. Se usan en baños, chorro y en bebida á la dosis de dos ó tres vasos.

FITERO. Este establecimiento de aguas minerales está á tres cuar-

tos de legua de la villa de Fitero y cinco de Tudela. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico-director.

El establecimiento tiene varios baños, que reciben el agua por dos conductos, uno que viene del manantial y otro de un estanque, adonde se la deja enfriar para graduar la temperatura del baño. Existe tambien un local para baños á chorro y de vapor.

P. F. El agua es clara, cristalina, sin olor ni color, ó de olor de azufre ligero; forma en su superficie al tiempo de nacer unas burbujas aeriformes; es untuosa al tacto; su temperatura es de 38° R.; es un poco mas pesada que el agua destilada; deposita en los cáuces ó conductos por donde corre posos ó sedimentos salinos.

An. Segun la análisis de D. Ignacio Oliva, cien partes de agua se componen de

Clorhidrato de cal.	0,33
Clorhidrato de sosa.	0,04
Carbonato de cal.	0,15
Sulfato de cal.	0,09
Sulfato de magnesia.	0,07
Sulfato de alúmina.	0,05
Sal de hierro.	0,17
Agua.	99,10

V. M. Es tónica, diurética, aperitiva y fundente; promueve el sudor, la diuresis y las evacuaciones de vientre; y es muy especial contra toda clase de reuma crónico, simple ó complicado con venéreo, dolores ar-

tríticos, heridas de armas de fuego, parálisis parciales ó incompletas sin congestión cerebral, anquilosis falsas, hidrartrosis, fracturas, dislocaciones, afecciones nerviosas, histérico, hipcondría, clorosis, esterilidad, úlceras atónicas y en ciertas afecciones herpéticas, particularmente en las que están sostenidas por vicio sifilítico.

No se las aconsejará á las mujeres durante la preñez; ni en la época menstrual; á los de temperamento muy sanguíneo ó de fibra irritable, á los que presentan síntomas de congestión al cerebro, ni á los dispuestos á las hemorragias activas y en especial á la hemotisis.

A. Se usa en bebida, baños, chorros y estufas.

FORTUNA. Villa en la provincia de Murcia, á tres leguas de la capital y cuatro de Archena.

Nacen las aguas á media legua de la población, y se toman en la primera temporada desde primero de abril á fin de junio, y en la segunda desde primero de setiembre á fin de octubre, y tienen médico director.

En 1839 se construyeron los baños y se perdió el manantial; pero á costa de grandes dispendios se encontró otro, y se han construido diez pilas con su cuarto sudadero inmediato.

P. F. Las aguas son claras, cristalinas, de sabor salado; no se conoce su gravedad específica.

Aguas viejas. Su temperatura era de 28° R. Contienen sulfato

de alúmina, hidrociorato de sosa, betun y hierro. El agua era un poco suave y con sabor salado.

Aguas nuevas. Su temperatura es de 32° R. No han sido analizadas, pero se presume que deben tener las mismas propiedades que las anteriores.

V. M. Están indicadas en las enfermedades por debilidad, afecciones nerviosas; reumatismos crónicos é inveterados, sífilis, clorosis, esterilidad, parálisis, asma, dispepsia; tumores en las articulaciones.

A. Se usan en baños y bebida.

HERMIDA. Lugar situado en la orilla derecha del río Deva, provincia de Santander.

Las aguas minerales nacen por dos manantiales, uno frente de otro, en la orilla del Deva. En algunos años se ha notado otro manantial en el alveo del río, pero no es constante. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. El agua de la fuente de la derecha tiene 49° R.; es clara, trasparente, sin color, olor ni sabor particular, pero dejándola enfriar adquiere un sabor algo salado; es menos pesada que el agua destilada, pero si se enfriase vuelve mas pesada; no desprende burbujas excepto cuando se revuelve ó agita el fondo; el cieno que deja está compuesto de arena y de restos de sustancias vegetales; su color es oscuro y á veces negro, y á dichas sustancias vegetales se atribuyen las burbujas; deja aposar una sustan-

cia salina de color blanco ceniciento, de sabor parecido al de la sal comun.

El agua de la fuente de la izquierda tiene 42° R. y presenta las mismas propiedades físicas que la anterior, pero no se usa por ser hasta ahora suficiente el agua de la primera.

An. D. Antonio Moreno y Don Diego Genaro de Lletget evaporaron veintiseis libras medicinales de agua mineral, y obtuvieron ciento cuatro granos de un residuo salino compuesto de

	gran.
Cloruro de sodio.	83,5
Sulfato de cal.	12,5
Carbonato de cal.	4
Sulfato de magnesia.	1
Sílice.	1
Materia orgánica.	0,5
Pérdida.	1,5

V. M. Son muy eficaces en el reumatismo muscular ó fibroso, en la artritis traumática ó gotosa, en las neuralgias ó dolores sifilíticos en que son un remedio heróico, y en la sífilis constitucional. Aprovechan en la rigidez tendinosa, en los artrocaces ó tumores blancos, en las fiebres intermitentes, baile de San Vito, epilepsia, neurosis, parálisis, amenorrea, hidropesias, catarro pulmonar ó vexical, tumores hemorroidales, hepatitis, gastritis y enteritis leves, escrófulas y úlceras inveteradas, herpes, sarna y erupciones cutáneas.

Dañan en la hemotisis, aneurisma del corazon, en las flegma-

sias graves del conducto digestivo, en los predispuestos á la apoplejía; en los reumatismos acompañados de pericarditis, y en las parálisis por lesiones graves del cerebro ó de la medula espinal, etc.

Se usan en bebida, en chorro, en vapor y en embarro.

HORCAJO. Se hallan las aguas minerales y baños del Horcajo á una legua de Lucena, en la provincia de Córdoba. Se toman estos desde 15 de julio á 8 de setiembre, y tienen médico-director.

Se recogen las aguas en un estanque.

P. F. Las aguas son diáfanas, transparentes, cubiertas de una nata pingüedinososa ó de una telita vistosa de varios matices ó irisada que sobrenada en la superficie; su olor es ingrato, fétido, nidroso, declinante á cenagoso, y excita náuseas cuando se bebe fria en demasía.

An. Segun la análisis una libra medicinal contiene mucho gas hidrógeno carbonado y

	gran.
Sulfato de cal.	556
Cloruro de sosa.	733
Cloruro de potasa.	710
Cloruro de magnesio.	400
Carbonato de magnesia.	671
Carbonato de cal en suspensión.	20
Oxígeno.	910
Materia extractiva vegetal.	305

V. M. Se la aconseja en las enfermedades de la piel.

A. Se usa en baños.

ISLA DE LOUJO, *Toga ó Toja Grande*. Islita á tres leguas de Caldas de Reyes y media de Cambados, provincia de Pontevedra. Se toman estas aguas desde 1.º de junio á fin de setiembre, y tienen médico-director interino.

Se han construido algunas obras para proporcionar comodidad á los concurrentes y recoger fácilmente el agua mineral.

P. F. El agua brota de la superficie de la tierra; es trasparente, sin color ni olor, de sabor salado amargo; su peso específico es de 1,0165 á 12º cent.; su temperatura es de 33 á 36º en el pozo Burga y 20 á 28º en los demás. A poco de estar en contacto del aire se cubre de una película delgada é irisada, y si permanece estancada por algun tiempo deposita copos rojizos.

An. Segun la análisis de D. Antonio Casares, mil partes de agua contienen:

Acido carbónico.	0,28
Cloruro de sodio.	19,15
Cloruro de calcio.	1,41
Cloruro de magnesio.	0,48
Cloruro de potasio.	0,39
Sulfato de cal.	0,68
Carbonato de cal.	0,17
Carbonato de magnes.	0,14
Carbonato de hierro.	0,08
Silice.	0,06
Ioduro alcalino.	indicios.
Agua.	977,22

El gas que se desprende al salir el agua es una mezcla de aire y ácido carbónico, pero predomina este.

En la misma isla se encuentra un manantial de agua potable, que contiene un poco de sal marina y vestigios de sal caliza.

V. M. Las mismas que las demás aguas de igual naturaleza.

A. Se usa en baños y bebida.

Agua artificial de Loujo ó Toja grande.

	granos.
2 Cloruro de sodio.	173
Cloruro de calcio cristalizado.	29 ¹ / ₃
Cloruro de magnesio cristalizado.	8
Cloruro de potasio.	3 ¹ / ₂
Sulfato de hierro cristalizado.	2 ¹ / ₅
Sulfato de cal.	5 ⁴ / ₅
Carbonato de sosa.	6 ¹ / ₃
Ioduro de potasio.	¹ / ₁₀
	onz.
Agua gaseosa con cinco volúmenes de ácido carbónico.	16

Se hacen separadamente soluciones de los cloruros, del carbonato de sosa y de los sulfatos de cal y de hierro; se dividen en botellas, se añade el ioduro de potasio y se llenan inmediatamente con el agua gaseosa.

JABALCUZ. Nacen las aguas de Jabalcuz en la falda de un cerro á media legua de Jaen. Se toman estas aguas desde 20 de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

Se ha construido un baño grande, que llaman de Jerez, cuya agua tiene las mismas propiedades

que la de Jabalcuz; su temperatura es de 21° R. y la usan en baño de recreo. Mas adelante se encuentran los baños minerales El edificio tiene una balsa para hombres y otro para mujeres.

P. F. El agua es cristalina, pero mirada al través de la luz se advierten unos globulitos que suben y se deshacen en su superficie; agitada en una botella hace espuma, y no produce olor alguno, pero al salir por el caño despide uno particular; su sabor es ligeramente estíptico; forma incrustaciones amarillas en los sitios por donde pasan continuamente. La temperatura es de 24¹/₂ R. en el caño, y 24° en la balsa ó estanque.

An. Segun D. Juan Miguel Nieto, veinticinco libras de agua contenian:

	gran.
Hidroclorato de cal.	3
Hidroclorato de sosa.	8
Carbonato de magnesia.	9
Sulfato de magnesia.	82
Sulfato de cal.	81
Sulfato de alúmina.	7
Sílice.	12

y se cree que contiene una cantidad insignificante de gas ácido carbónico.

V. M. Se las recomienda contra el reumatismo muscular y fibroso, gota, neuralgias, histérico, convulsiones, dismenorrea, amenorrea, gastritis crónica, gastro-enteritis crónica, pericarditis, peritonitis, obstrucciones viscerales, nefritis calculosa,

ceática, hemiplegia, contusiones y rigideces de los miembros.

MALÁ. Villa en la provincia de Granada, á dos leguas de la capital.

Hay varios manantiales y el mas notable es el llamado del *Baño*, que está en un edificio á un cuarto de legua del pueblo. Resulta el manantial de la confluencia de otros dos de diversa temperatura, cuyas aguas señalan despues de reunidas 22° R. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 1.º de mayo á 10 de julio, y en la segunda desde 25 de agosto á fin de octubre, y tienen médico-director interino.

An. Se sospecha que tienen algunos cloruros.

V. M. Se las recomienda en las afecciones cutáneas leves no muy inveteradas, afecciones nerviosas histeriformes y en las reumatalgias poco intensas.

MULA. Baños en la provincia de Murcia, á cinco leguas de la capital y una de Mula. Existen dos casas de baños. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 15 de abril á 15 de junio, y en la segunda desde 9 de setiembre á 15 de noviembre, y tienen médico-director.

Se han construido casas para alojar los enfermos.

P. F. Las aguas son transparentes, diáfanas; su sabor en el pozo muy inmediato es un poco estíptico, áspero, pero despues al aire libre es dulce, grato y placentero, y su olor algo percepti-

ble; dejan desprender burbujas llenas de ácido carbónico. Por los puntos donde corre el agua deja un betun ó barniz negruzco, de sabor áspero estíptico. Su temperatura es de 31 á 33° R.; en el pozo y primeras balsas está mas caliente; no se conoce á punto fijo su gravedad específica.

An. Contienen gas ácido carbónico, ázoe, sulfatos y muriatos de sosa y de magnesia, hierro, etc.

V. M. Curan las amenorreas, clorosis, reumatismo, contracciones musculares, parálisis, anquilosis, escrófulas, ligeros padecimientos venéreos y erupciones cutáneas.

A. Se usan en baños y bebidas.

PLOMBIERES, en Francia. Ciudad á cinco leguas de Epinal y tres de Bains, departamento de los Vosgos. La temporada dura desde 15 de mayo á 15 de octubre; tiene médico-director.

Hay muchos manantiales, que se distinguen en frios y termales, y entre los primeros se cuenta el manantial ferruginoso de Boupeille.

P. F. Las aguas son perfectamente transparentes, untuosas é inodoras, sin sabor, á excepcion del manantial ferruginoso; si se las expone durante veinticuatro horas al aire libre y á la luz, toman un gusto fastidioso, nauseoso y muy desagradable; no forman poso mas que el manantial ferruginoso, y es coposo y amarillento. En el baño grande se hallan muchas confervas. La tempera-

tura de los principales manantiales son: Baño grande, 63°,75 cent.; Estufas, 54°,40; los Capuchinos, 52°,50; el Crucifijo, 49°,50; el baño de Damas, 52°,50; el Jabonoso del baño grande, 18°; el Jardin del baño real, 15°; el Ferruginoso, 15°.

An. Segun Vauquelin cada litro de agua contiene:

	gran.
Carbonato de sosa.	0,1269
Carbonato de cal.	0,0287
Sulfato de sosa.	0,1358
Cloruro de sodio.	0,0734
Sílice.	0,0737
Materia animal.	0,0624

Las aguas jabonosas, segun Nicolás, tienen la misma composicion que las termales. El manantial ferruginoso contiene carbonato de hierro.

V. M. Tiene una accion especial sobre las enfermedades crónicas del conducto digestivo, en los vicios de la digestion, tales como las gastralgias, la anorexia, la dispepsia, flatuosidades, los vómitos crónicos, los agrios, los eructos nidorosos, en algunas enfermedades del hígado y del bazo en que serían demasiado estimulantes las aguas de Vichy, en los infartos glandulosos, en las lesiones de la matriz, en la cistitis, sobre todo la producida por retro-pulsion de un reuma. Son tambien útiles en los reumatismos musculares y articulares, en las anquilosis incompletas, en la neuralgia ceática y principalmente en la

maxilar, en diversas parálisis; en algunas enfermedades de la piel, en la clorosis, etc.

Es perjudicial en las enfermedades por irritacion, en la hemotisis, tisis pulmonar y en los escirros.

A. Se usa en baños, chorros, baños de vapor y en bebida, á la dosis de dos á seis vasos.

Estas aguas no se conservan mucho tiempo.

Agua artificial de Plombieres.

	gran.	
∞ Bicarbonato de sosa.	0,221	3
Cloruro de calcio cristalizado.	0,027	1/3
Cloruro de magne- sio cristalizado.	0,011	1/6
Cloruro de sodio.	0,006	1/12
Sulfato de sosa cris- talizado.	0,005	1/16
Sulfato de hierro cristalizado.	0,012	1/6
	onz.	
Agua pura.	1000	20

Se hace primero una solucion del bicarbonato de sosa, del sulfato de sosa, del sulfato de hierro y de la sal marina; se añade despues los cloruros de calcio y de magnesio. El líquido apenas se enturbia.

A. Se dan tres á seis vasos al dia.

QUINTO. Villa en la provincia de Zaragoza, á siete y media leguas de la capital, Se toman estas aguas desde 1.º de junio á fin de setiembre y tienen médico director.

Los manantiales consisten en dos fuentes: la primera nace á trescientos pasos del pueblo, saliendo por el portal de San Miguel; y la segunda á doscientos veinte pasos de la primera, y se las denomina baño Bajo y baño Alto. Ambos manantiales se hallan encañados y su edificio tiene receptáculos.

P. F. Las aguas son claras, diáfanas, de sabor particular, propio de las aguas magnesianas; untuosas al tacto; su peso específico es de 1,0037 y su temperatura es 14º á 17º R. Depositadas por algun tiempo dejan un sedimento muy fino y suave al tacto, y se vuelve mas desabrida y repugnante que cuando sale del manantial; recién extraida de la fuente, se ve en un vaso contra la luz del sol, que se agitan y brillan una infinidad de partículas, que en nada enturbian la trasparencia del agua y que indudablemente forman el sedimento.

An. En cada libra de agua se ha encontrado, segun la análisis de Lletget, Moreno y el actual director, además de un flúido de naturaleza desconocido:

	gran.
Cloruro de magnesio.	0,14
Cloruro de calcio.	0,055
Cloruro de sodio.	5,09
Sulfato de cal.	16,6
Sulfato de magnesia.	2,9
Sulfato de sosa.	4,7
Silice.	0,1

V. M. Tienen mucha reputacion y son muy eficaces en las enfermedades venéreas ó mercuriales,

afecciones de las vias digestivas, como gastrodinia, pirosis, acideces, flatulencia, cólicos, estreñimiento y obstrucciones de las vísceras abdominales, cefalalgias, hemicráneas, vértigos, epilepsia, amagos de apoplejía por causa residente en los órganos digestivos, afecciones de las vias urinarias, afecciones calculosas, retropulsion de los herpes, erisipelas periódicas, oftalmias rebeldes, y generalmente en las herpéticas y sifilíticas.

Dañan en las enfermedades de pecho; son de acción incierta en los flujos sanguíneos y dudosa en las afecciones nerviosas. No convienen cuando las dolencias en que están indicadas están acompañadas de fiebre, demacración, diarrea colicativa ú otro síntoma que manifieste hay una lesión orgánica antigua.

A. Se usa en bebida y baños.

ISABELA. Sitio real y baños conocidos comunmente con el nombre de Sacedon, á legua y cuarto de Sacedon, provincia de Guadaluajara. Estos baños son bastante concurridos, y las aguas se toman principalmente desde 15 de junio á 21 de setiembre; pero se pueden usar con utilidad en cualquier época del año. Tienen médico-director.

La casa de baños está situada á doscientos pasos de la población, tiene quince baños particulares y dos generales para militares y pobres.

P. F. Las aguas manan formando ampollas, son claras y cristalinas; al principio parecen casi in-

sípidas cuando se las bebe, pero á poco tiempo dejan percibir una sensación ligeramente amarga y estíptica, cuyas propiedades pierden cuando se enfrían; son untuosas y grasientas al tacto; conservadas durante algunos días en una vasija de barro, adquieren un sabor semejante al del agua y vino, y dejan en las paredes una especie de lodo suave, de color azul oscuro; las paredes del depósito y de los baños se hallan cubiertas de una materia bituminosa, de color verde oscuro; su temperatura es de 23^o½ R., y su peso específico es igual al del agua destilada.

An. En la análisis practicada en 1844 por D. Manuel Perez Manso y D. Rafael Saez Palacios, cinco libras de agua mineral dieron:

Gas ácido sulfhídrico, indicios.
Acido carbónico, 2 pulg. y una línea.

	gran.
Sulfato de cal.	17,9
Sulfato de magnesia.	9,6
Carbonato de cal.	2,3
Cloruro de magnesio.	1,9
Cloruro de sodio.	4,1
Cloruro de calcio.	1,0
Sílice.	indicios.
Materia orgánica.	indicios.
Materia resinosa.	indicios.

V. M. Pueden prescribirse con grandes esperanzas de obtener un buen resultado en las afecciones reumáticas y artríticas, y en las erupciones cutáneas, aunque no son tan seguros sus efectos. Son excelentes contra las enfermedades en que la principal causa es

el mal estado de la inervacion, á saber, en el histérico, epilepsia, convulsiones, hipocondría, asma, palpitaciones, etc. Producen sorprendentes ventajas en los dolores nerviosos de estómago, dispepsia, inapetencia, cardialgia, alteraciones de las vias digestivas por esta causa, en las gastralgias, enteralgias, en los cólicos nervioso y bilioso, en la dismenorrea, amenorrea, leucorrea, metrorragia atónica y en las demás afecciones del conducto digestivo ó cavidad abdominal. Son muy ventajosas á los que padecen afecciones de las vias urinarias, particularmente los cólicos nefríticos por cálculos. Experimentan cambios favorables los que adolecen de cefaleas nerviosas, jaquecas, vértigos, etc. Se las recomienda en las obstrucciones de las vísceras abdominales. infartos del hígado y del bazo, ictericia, gastro-enteritis crónica, metritis, afecciones escrofulosas, y son principalmente eficaces contra estas dolencias dependientes del sistema sensitivo, y su accion es útil en alto grado en los casos en que los síntomas de este género son secundarios ó producidos por otras alteraciones.

Perjudican en todas las afecciones de pecho, en los catarros y demás lesiones fijas en los órganos respiratorios, á no ser que sean de naturaleza reumática ó nerviosa, y cuando los enfermos están anémicos ó en las enfermedades por empobrecimiento general.

A. Se usan en bebida y en baños.

SEDLITZ, en Bohemia. Ciudad á nueve millas de Praga.

P. F. Las aguas son cristalinas, trasparentes, sin olor, de sabor amargo y salado; su temperatura es de 15° cent., y su peso específico 1,016.

An. Segun Bouillon Lagrange, cada litro de agua contiene :

	litros.
Acido carbónico.	0,068
	gran.
Sulfato de magnesia. . .	31,820
Sulfato de sosa.	0,730
Sulfato de cal.	0,581
Carbonato de cal.	0,220
Carbonato de magnes. . .	0,141
Materia resinosa.	0,084

V. M. Se usan con frecuencia en los casos en que conviene una purgacion ligera, y Hoffmann las recomendaba en los infartos de las vísceras del bajo vientre, en las calenturas intermitentes rebeldes, y las aconsejaba sobre todo á los hipocondriacos y estreñidos.

A. La dosis es de diez y seis á veinte onzas sola, y á veces se añade sal de Seltz.

Agua artificial de Sedlitz.

	dracm.
℥ Sulfato de magnesia cristalizado.	2
	onz.
Agua pura.	20
Gas ácido carbónico. . .	3 vol.

Se disuelve la sal en el agua, se satura la solucion con el ácido carbónico y se embotella.

V. M. Se usa como diurética y más principalmente como purgan-

te, bajo cuyo concepto es un medicamento precioso, porque se tolera fácilmente aun en los casos de irritación leve de las vías digestivas. Parece obrar tanto mejor cuanto más diluida esté en agua.

A. Pueden administrarse cuatro, seis y ocho dracmas, según el efecto que se desee y la disposición del paciente. Generalmente se dan tres vasos por la mañana en ayunas con intervalos de media hora.

SEIDSCHUTZ, en Bohemia. Dista poco de Sedlitz. Según Hoffmann estas aguas son del mismo manantial que las de Sedlitz, y sus propiedades físicas son semejantes.

Conviene en los mismos casos que las de Sedlitz.

SOLARES. Pueblo á legua y media de Santander, provincia de Santander. Se toman estas aguas desde 1.º de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

El manantial nace debajo de la casa de baños, de la concavidad de una peña caliza.

P. F. Las aguas son perfectamente diáfanas, sin olor é insipidas; su temperatura es de 22º½ R.; su densidad es casi igual á la del agua destilada.

An. Del análisis que hizo D. Antonio Moreno resulta que en treinta libras de líquido hay:

	granos.
Carbonato de cal.	1,793
Carbonato de magnesia.	6,14
Sulfato de sosa.	8,27
Hidroclorato de sosa.	69,56

	gran.
Hidroclorato de cal.	5,57
Hidroclorato de magnes.	4,48
Silice.	2
Acido carbónico.	"

V. M. Son muy eficaces en la gastritis, enteritis, gastro-enteritis crónica, hepatitis, esplenitis, peritonitis, irritaciones crónicas del mesenterio, histérico, cólicos, dispepsia, reumatismo, artritis, dolores osteocopos, convulsiones, neuralgias, parálisis, afecciones cutáneas ó del sistema linfático, oftalmias crónicas, escrófulas, clorosis y supresiones de flujos habituales.

A. Se usa en bebida, baños, chorros y émbarrros.

Agua artificial de Solares.

	gran.
2º Cloruro de sodio.	1¼
Cloruro de magnesio	1/8
cristalizado.	1/8
Cloruro de calcio.	1⅔
Sulfato de magnesia.	1/2
Carbonato de sosa.	1½
	onz.
Agua.	16
Acido carbónico.	2 vol.

Se hace una solución con el carbonato de sosa y otra con las demás sales, y se reparten en las botellas que se llenan con el agua gaseosa.

TRILLO. Villa en la provincia de Guadalajara, á diez leguas de la capital y veinte de Madrid.

A un cuarto de legua de la población se hallan los baños de Tri-

llo ó de Cárlos III, cuyas aguas se toman desde 20 de junio á 20 de setiembre bajo direccion facultativa.

En el recinto de los baños hay los del Rey con seis pilas; la casa de baños y hospedería de la Reina con cuatro pilas y doce habitaciones; la casa hospedería del Príncipe y baños del Obispo con dos pilas grandes y diez habitaciones; los de Santa Teresa con cuatro pilas; los de la Princesa con dos pilas; los de la Condesa con una pila; los de la Piscina con dos pilas; la casa de beneficencia con camas para seis hombres y seis mujeres, varias habitaciones accesorias y una casita con otras dos. Además hay la casa hospedería ó de Cárlos III.

Los manantiales del establecimiento de Cárlos III son: el de la Princesa, la fuente del Director, el del Príncipe, la fuente del Rey, el manantial de la Reina, los manantiales de Santa Teresa, el manantial de la Condesa y el de la Piscina.

En el edificio de Santa Teresa hay una pila destinada para baños calientes.

P. F. Las aguas de todos estos manantiales son claras, cristalinas, delgadas y mas ligeras que el agua destilada; se nota un gran número de glóbulos gaseosos que se desprenden de ellas y se rompen en su superficie; no tienen olor ni sabor sensibles, solo en las de la Princesa notan los de paladar delicado un gusto insípido como térreo; en las del Rey, fuente del Rey, Reina, ma-

nantiales de Santa Teresa y Condesa, se nota un sabor ligeramente estíptico; en las del Director es ferruginoso, y en las de la Piscina es un sabor algo desagradable; estas y las del Director ennegrecen los surtidores de metal, y dejan en las paredes de los sitios por donde corren, en las pilas y los puntos de desagüe, unas incrustaciones salinas de color amarillo; en las de la Princesa es de un blanco sucio ó ceniciento, y en las de los otros manantiales es de un color verdoso mas ó menos subido. Estas aguas no cuecen las legumbres y no se usan para bebida ordinaria. Su temperatura es la siguiente: Princesa 24°,5 R.; Reina 24,0; Rey, fuente del Rey, Santa Teresa 23,5; Condesa 23,0; Príncipe 22,5; Piscina 21,5; Director 19,5.

Las aguas de la Princesa son al nacer, segun la nueva clasificacion del Señor Gonzalez Crespo, salino-sulfatadas; las del Rey, fuente del Rey, Reina, Santa Teresa, Príncipe y Condesa, son salino-férreo-sulfatadas; las de la Piscina son salino-sulfato-hidro-sulfatadas, y las del Director salino-férreo-hidro-sulfatadas.

Segun la análisis de D. Mariano José Gonzalez Crespo, un cuartillo de agua del manantial del Rey contiene:

	gran:
Gas oxígeno.	5,3
Azoe.	9,7
Acido carbónico.	3,4
Cloruro de sodio.	6,1
Carbonato de cal.	2,4

gran.
 Carbonato de hierro. 1,7
 Sulfato de cal. 1,6
 Sulfato de magnesia. 1,4
 La misma cantidad de agua de la fuente del Rey, contiene:

granos.
 Oxígeno. 5,4
 Azoe. 9,6
 Acido carbónico. 3,3
 Cloruro de sodio. 6,2
 Carbonato de cal. 2,5
 Carbonato de hierro. 1,9
 Sulfato de cal. 2,6
 Sulfato de magnesia. 0,8

Cada cuartillo de agua de la de la Reina, contiene:

gran.
 Oxígeno. 4,9
 Azoe. 11,0
 Acido carbónico. 2,6
 Cloruro de sodio. 5,5
 Carbonato de cal. 2,6
 Carbonato de hierro. 1,0
 Sulfato de cal. 2,5
 Sulfato de magnesia. 0,6

Cada cuartillo de agua de los manantiales de Santa Teresa, contiene:

gran.
 Gas oxígeno. 5,8
 Azoe. 13,3
 Acido carbónico. 2,4
 Cloruro de sodio. 5,6
 Carbonato de cal. 2,2
 Carbonato de hierro. 2,5
 Sulfato de cal. 2,7

Un cuartillo de agua de el de la Princesa, contiene:

gran.
 Oxígeno. 6,1
 Azoe. 9,2
 Acido carbónico. 0,2
 Cloruro de sodio. 6,9

gran.
 Carbonato de cal. 3,4
 Sulfato de cal. 5,0
 Un cuartillo de agua de el de la Condesa, contiene:

gran.
 Oxígeno. 4,2
 Azoe. 8,3
 Acido carbónico. 1,6
 Cloruro de sodio. 7,9
 Carbonato de cal. 2,9
 Sulfato de cal. 3,8
 Sulfato de magnesia. 2,3

Un cuartillo de agua de el de la Piscina, contiene:

gran.
 Oxígeno. 5,9
 Azoe. 10,7
 Acido carbónico. 0,6
 Acido sulfhídrico. 1,5
 Cloruro de sodio. 2,3
 Sulfato de magnesia. 3,4
 Hidrosulfato de cal. 5,8

Un cuartillo de agua de la fuente del Director, contiene:

gran.
 Oxígeno. 5,0
 Azoe. 12,0
 Acido carbónico. 3,7
 Acido sulfhídrico. 0,5
 Cloruro de sodio. 5,6
 Cloruro de calcio. 4,6
 Carbonato de hierro. 1,5
 Hidrosulfato de cal. 1,2

Además de los manantiales de Santa Teresa y del Director, el Señor Gonzalez Crespo ha descubierto en 1847 el del Príncipe, y segun los ensayos hechos contiene oxígeno, ázoe, ácido carbónico, carbonato de cal, carbonato de hierro y sulfato de cal. V. M. Estas aguas producen excelentes efectos en los reuma-

tismos, artritis y reumatismos artríticos, tumores articulares, anquilosis, parálisis, convulsiones tónicas y clónicas, baile de San Vito, epilepsia, erisipela habitual, péñfigo, diviesos, costra láctea, etc., heridas de armas de fuego, afecciones venéreas y mercuriales, anasarca, edemas, bubones, escrófulas, etc., y en varios casos de melancolía, vértigo, cefalea, hemicránea, neuralgias, oftalmias, amaurosis, catarata, nictalopia y hemeralopia, fístula lagrimal, asma, disnea, tos, afonía, cardialgia, gastrodinia, dispepsia, soda y acedias; en la hipochondría, vómitos, cólicos, enteralgias, obstrucciones del hígado y del bazo, disenteria, diarrea, hepatalgia, esplenalgia, melena y hemorroides; en las lombrices, nefralgia, disuria, estrangurria, hematuria, histérico, dismenorea, amenorrea, leucorrea, blenorragia, varices, calenturas intermitentes, etc.

Los baños y agua de la Piscina producen excelentes efectos para combatir toda clase de enfermedades cutáneas por graves y envejecidas que sean; así son eficacísimas en los herpes, sarna, tiña, úlceras antiguas de esta naturaleza, irritaciones crónicas de la piel de carácter erisipelatoso y pustuloso, comezones insufribles y otras muchas dolencias de la misma índole, aftas, úlceras rebeldes, fungosas, callosas, carcinomatosas, venéreas ó escrofulosas, caries de los huesos, etc.

Están contraindicadas estas aguas en todas las enfermedades

agudas, en la hidropesía ascitis, hidrotorax é hidrocéfalo; en la tisis tuberculosa catarral, y por esputo de sangre; en la hemotisis, en las palpitaciones de corazón y aneurismas, en los cánceres de las entrañas y en las afecciones dependientes de vicios orgánicos de las principales vísceras.

A. Se usan las aguas en bebida, baños generales ó parciales, por inmersión, á chorro ó riego, en lociones, gargarismo y en lavativas.

VILLAVIEJA. Villa en la provincia de Castellón de la Plana, á tres leguas de esta ciudad, siete de Valencia y media hora de Nules. En dicho pueblo se halla el manantial conocido con el nombre de *Fuente ó Font Calda*.

El establecimiento de los baños contiene un hermoso salón de descanso cerrado á bóveda, y los cuartos de los baños están dispuestos en dos galerías, una para cada sexo. Las pilas son de jaspe bien pulimentadas en número de ocho; además hay dos balsas de fábrica destinadas una para los pobres y otra para las enfermedades contagiosas.

P. F. El agua de la fuente no tiene olor ni sabor; su temperatura es de 24° R., y es untuosa al tacto; su densidad es igual á la del agua destilada, disuelve bien el jabón, cuece bien las legumbres y no deja sedimento alguno por donde pasa.

An. Cada libra medicinal contiene, según el análisis de D. José Menchero:

gran.

Subcarbonato de hierro. . . 1½

<p>gran.</p> <p>Subcarbonato de sosa. 2</p> <p>Subcarbonato de cal. 2¹/₄</p> <p>Hidroclorato de sosa. 4</p> <p>Hidroclorato de magnesia. . . 2¹/₂</p> <p>Sulfato de magnesia. 1¹/₂</p> <p>Sílice. 1¹/₂</p> <p>Aire atmosférico y una materia</p> <p>vegeto-animal, que es la que produce la untuosidad que la caracteriza y da la suavidad que adquiere la piel.</p> <p>Dentro de la población hay otros muchos manantiales conocidos con el nombre de <i>baños calientes ó de los pozos</i>.</p> <p>Los cuartos y las pilas de los baños de los pozos, que son de propiedad particular, son de diversa naturaleza, según el gusto y posibilidad de sus dueños.</p> <p><i>P. F.</i> El agua de los pozos públicos, que actualmente son nueve, es clara, trasparente, no tiene olor, y su sabor es igual al que tienen las aguas llamadas gordas; su temperatura varía de 27, 38 ó 40° R., según se sumerge el termómetro á mayor profundidad; no disuelve el jabón ni cuece bien las legumbres; deja en las vasijas y baños un sedimento amarillo silíceo.</p> <p><i>An.</i> Contiene diversas porciones de subcarbonato de hierro, subcarbonato de magnesia, subcarbonato de cal, subcarbonato de sosa, hidroclorato de sosa, sulfatos de cal y magnesia, sulfato ácido de alúmina, deutóxido de hierro y sílice.</p> <p><i>V. M.</i> Las aguas de la fuente producen excelentes y seguros efectos resolutivos en los infartos</p>	<p>crónicos del hígado, bazo y ovarios; favorecen el flujo menstrual y le promueven cuando su entorpecimiento procede de inercia del útero; son muy provechosas en las leucorreas; aumentan la actividad vital del estómago, y por consiguiente desarrollan el apetito, favorecen las digestiones lentas y curan los flatos y acedías. También usadas exteriormente en baño alivian y curan las enfermedades herpéticas, y otras cutáneas, así como la gota y reumas de personas muy pleótóricas. Además de estas enfermedades, en las que principalmente convienen, han sido útiles en bebida en otras afecciones del estómago é intestinos, y de otras vísceras; en las cardialgias, vómitos, cólicos biliosos y nefríticos, diarreas, disenterias, afecciones verminosas, flujos pasivos, hemorroides y demás dolencias nacidas de obstáculos en la vena porta y desórdenes de la túnica mucosa gastrointestinal, como obstrucciones del hígado, ictericia, hipocondría, vicios calculosos del hígado, de los riñones y de sus conductos, desarreglos menstruales, blenorrea, clorosis é histérico. En bebida, con el uso de los baños de los pozos, es útil en las parálisis, estreñimiento, secreción y excreción difícil de orina, y otras consecuencias del cólico de Madrid.</p> <p>En baño aprovechan en los vicios escrofulosos, en los reumas artríticos y musculares, parálisis, impotencia y debilidad viril, y en todas las enferme-</p>
---	--

dades indicadas en el uso interno.

Están contraindicadas en todas las afecciones acompañadas de fiebre, en los flujos sanguíneos activos, y cuando á la extenuacion se une la calentura continua ó una susceptibilidad suma.

A. Se usan en baños y bebida.

El agua de los pozos no se puede beber; pero en baños produce brillantes efectos en toda clase de afectos reumáticos, aun los complicados con sífilis, y gotosos crónicos, anquilosis incompletas, retracciones tendinosas, fracturas no consolidadas, en los infartos consiguientes á las dislocaciones, torceduras, dolores sostenidos por úlceras antiguas y heridas por armas de fuego, facilitando la expulsion de los fragmentos y cuerpos extraños. También convienen en los sugetos de fibra floja, que padecen infartos abdominales, á consecuencia de las fiebres intermitentes, en las supresiones de los menstruos, retenciones y supresiones de orina por vicios calculosos, en la clorosis, en todos los casos de piel dura y poco sensible, y en las parálisis de personas jóvenes.

Están contraindicadas en las enfermedades con extenuacion y fiebre héctica, cuando hay una excesiva susceptibilidad.

Se toman estas aguas en la primera temporada desde 15 de mayo á fin de junio, y en la segunda desde 15 de agosto á 10 de octubre, y tienen médico-director.

AGUA Y BAÑOS DE MAR.

El agua de mar debe ser con-

siderada como una agua mineral salina fria, á causa del número y proporcion de los elementos químicos que la componen.

Los baños de mar se pueden tomar en todas las costas, pero son mas estimados en los sitios en que hay menos guijarros y la arena es mas fina. Se los aconseja comunmente desde 15 de junio á 1.º de setiembre, y se toman en cada temporada de veinte á veinticinco baños.

P. F. El agua de mar tiene diverso color, pues unas veces parece de color plateado mezclado de azul, ó de un tinte azul pardusco, segun la reflexion de la luz; tomada en medio del puerto, en las costas ó en medio del Océano, á cualquier profundidad que sea, es perfectamente diáfana y sin color; tomada á cierta distancia de la costa no tiene olor, pero en la costa desprende un olor particular de ácido clorhídrico; tiene sabor salado y nauseabundo, que resulta de las diversas sales que contiene en disolucion; su temperatura varía en los meses de julio, agosto y setiembre de 13 á 16º cent. (10½ á 12º½ R.) segun la temperatura de la atmósfera y el calor del sol; agitada en la oscuridad en vasos tapados y transparentes es fosforescente; su peso específico segun Gay Lussac es de 1,0286.

An. Varían los principios constituyentes del agua de mar segun se la tome en la superficie ó á mayor profundidad; su principio predominante es el cloruro de sodio que se halla en gran cantidad.

Un litro del agua del Océano Atlántico, según la análisis del doctor Marcet, ha dado:

	gran.
Cloruro de sodio anhidro.	26,600
Cloruro de magnesio anhidro.	5,154
Cloruro de calcio anhidro.	1,232
Sulfato de sosa.	4,660

Según la análisis de Laurens, un litro de agua del mar Mediterráneo contiene:

	litr.
Acido carbónico.	0,200
	gran.
Cloruro de sodio.	27,220
Cloruro de magnesio.	6,140
Sulfato de magnesia.	7,020
Sulfato de cal.	0,150
Carbonato de magnesia y cal.	0,200
Potasa.	0,010
Iodo, probablemente en estado de ioduro de potasio.	c.ind.

Además de estas sustancias se ha descubierto bromo en estado de bromuro de potasio, cloruro de potasio, el de alúmina y el de amoníaco, el ácido muriático libre, el óxido de hierro y mercurio.

V. M. Se usa en bebida como purgante para las personas de temperamento linfático, y se la ha recomendado en los infartos crónicos del hígado, ictericia, escrófulas, obstrucciones de las glándulas del mesenterio, clorosis, etc.

Los baños de mar son refrigerantes y tónicos para las personas

sanas, pues vuelven el valor, fuerza y energía perdida por los calores del estío.

La duración de los baños debe ser de dos á cuatro minutos hasta un cuarto de hora ó mas, y deben ser tanto mas cortos cuanto mas débil sea el que los toma y el baño sea mas frio. Se toman por la mañana en ayunas, ó desde siete á once de la mañana ó al medio-día.

Convienen principalmente en las enfermedades linfáticas nerviosas, con tal que los enfermos tengan fuerzas para reaccionar contra la impresion del frio, y la enfermedad no esté complicada con ningun síntoma inflamatorio. Se deben prohibir á los niños de menos de dos años, á los ancianos, á las mujeres preñadas, á los que tengan plétora sanguínea, aneurismas internos, herpes húmedos, gota aguda ó reumatismo algo inflamatorio. Son eficaces en la raquitis, afecciones escrofulosas, ingurgitaciones de los gánglios cervicales, atrofia mesentérica, úlceras fistulosas, caries de los huesos, oftalmia en estado crónico, clorosis, estado de languidez que sigue al sobrepardo, dislocaciones de la matriz, ingurgitaciones crónicas del cuello de este órgano, flores blancas, esterilidad, amenorrea, dismenorrea, metrorragia por a-tonía general ó local, cefáleas, hemicráneas, neuralgias de la cabeza, usando al mismo tiempo las afusiones; gastralgia con estreñimiento habitual, dolores intestinales con ó sin diarrea, afec-

ciones histéricas, hipocondríacas, corea, etc. Pueden producir buenos efectos en ciertas neurosis de la vista, pérdidas seminales involuntarias, atonía de la piel, debilidad muscular, reumatismo, afecciones farinosas, efélides, varices de las piernas y debilidad de las articulaciones, que sucede á las torceduras, dislocaciones ó fracturas.

A. Se usa en bebida á la dosis de uno á dos vasos para purgar á los adultos, y dos á tres cucharadas para los niños; en lavativas para promover evacuaciones alvinas; en inyecciones y chorros vaginales en la leucorrea, etc.; en afusiones en las neuralgias faciales, y en baños.

El agua de mar se descompone pronto y se altera por el transporte.

AGUA ARTIFICIAL DE MAR.

	dr.	gr.
☞ Sal marina gris desecada.	26,6	6 48
Sulfato de sosa cristalizado.	11,715	3 »
Cloruro de calcio cristaliz.	2,424	» 45
Cloruro de magnesio cristal.	9,854	2 34
	onzas.	
Agua.	1000	32

Para un baño de seiscientos cuartillos se toma:

	libras.
☞ Sal marina.	16
Sulfato de sosa cristalizado.	7
Cloruro de calcio cristaliz.	1
Cloruro de magnesio crist.	5

Se preparan con anticipacion unos polyvos para preparar los baños artificiales de mar. Para saturar doscientos cuartillos de líquido se componen de

	onz.
☞ Sulfato de sosa eflorescido.	15
Cloruro de calcio seco.	4
Cloruro de magnesio desecado.	16

Para preparar el cloruro de magnesio desecado, se pone la sal en una cápsula y se evapora parte de su agua de cristalización sin que por esto se disipe su ácido clorhídrico. Se añaden las demás sales pulverizadas y se guarda todo en un frasco bien tapado. Pueden mas cómodamente tomarse todas las sales cristalizadas y reunir las en un frasco. Se echa esta mezcla en el agua de un baño y se añaden cinco libras y cinco onzas de sal gris.

AGUA GASEOSA DE MAR (Pasquier).

☞ Agua de mar. c. s.
Se filtra y se la carga de cinco veces su volúmen de gas ácido carbónico.

Así preparada se conserva muy bien y se la puede conducir á largas distancias.

V. M. Es un purgante muy suave para los adultos á la dosis de tres á cuatro vasos, y á menor dosis para los niños es un anti-helmíntico muy seguro. Es muy útil contra la atrofia mesentérica, tubérculos, raquitis é infartos crónicos de las glándulas linfáticas.

PARTE QUINTA.

ENVENENAMIENTOS Y ASFIXIAS.



I. ENVENENAMIENTOS.

Se deberá sospechar un envenenamiento siempre que un enfermo se queje de un olor nauseabundo é infecto, ó de un sabor desagradable, ácido, alcalino, acre, estíptico ó amargo, ó de un calor acre quemante en la garganta y en el estómago; si la boca está seca ó espumosa, el aliento es fétido y la garganta está constreñida; si la lengua y las encías están lívidas, de un amarillo limon, blancas, rojas ó negras; si siente un dolor mas ó menos vivo, mas ó menos fijo á lo largo del conducto digestivo, ó en uno de estos puntos mas bien que en otros; si tiene eructos, náuseas ó vómitos mas ó menos frecuentes de materias mucosas, biliosas ó sanguinolentas, blancas, amarillas, verdes, azules, rojas ó parduscas, que hiervan sobre los ladrillos, que enrojezcan ó enverdezcan el color del girasol; si se observa hipo, estreñimiento ó deyecciones alvinas mas ó menos abundantes, con ó sin tenesmo, de diferente color y naturaleza; si la respiracion es difícil, el pulso pequeño, frecuente, concentrado, irregular, comunmente insensible ó fuerte é irregular; si la sed es ardiente, tiene frecuentes escalofrios y la piel y los miembros inferiores están helados ó atormentados por un calor quemante ó una erupcion dolorosa; si los sudores son frios y pegajosos, la emision de la orina difícil, muy rara ó quemante, y se expelen las bebidas del estómago inmediatamente que entran en él. Tambien se tendrá en consideracion la alteracion de la fisionomía, el color pálido, lívido ó aplomado de la cara, la pérdida de la vista y del oido, la rubicundez de los

ojos y la vista fija, la contraccion y el color de la pupila, la agitacion general, los gritos, el delirio, las convulsiones generales ó locales, las contorsiones, la risa sardónica, el trismo, el estupor, el síncope, la pesadez de cabeza, la soñolencia, los vértigos, las parálisis locales ó generales, la postracion de fuerzas, la alteracion de la voz, el priapismo, etc. Por último, el médico comprobará si hay cesacion ó aparicion mas ó menos regular de los diferentes síntomas que acabamos de enumerar.

Tratamiento general. Cuando se vaya á asistir á un envenenado, lo primero que debe hacerse es determinar la naturaleza del veneno, ó averiguarla por todos los indicios posibles. Se examinará con mucho cuidado el estado del enfermo, las materias del vómito y de las deposiciones, y si es necesario se harán algunos ensayos analíticos; pero teniendo presente que si la primera condicion es conocer el veneno, la segunda es obrar con prontitud. Las indicaciones que se deben llenar varían segun el tiempo que ha transcurrido despues de tomar el veneno. Así, si el veneno ha sido tragado hace pocot tiempo y se halla aún en el estómago, ó bien se puede suponer que no ha sido enteramente absorbido, ó en otros términos que el médico es llamado en la primera época de los accidentes, se procurará expeler la porcion de veneno no absorbida, ya por arriba, ya por abajo, por medio de los evacuantes, ó bien neutralizar

sus propiedades venenosas combinándole con una sustancia llamada *contraveneno*. Si la sustancia deletérea ha sido tragada durante cierto tiempo, ó ha sido introducida en la economía por otra via diferente que el estómago, y si se han manifestado los síntomas del envenenamiento, se combatirá la enfermedad por los medios generales apropiados á la naturaleza de los síntomas, al estado del enfermo y de los órganos afectados, al género de veneno, etc.; así, unas veces se recurrirá á los evacuantes, otras á los escitantes, y otras á los debilitantes; en ciertos casos á los evacuantes vomitivos, en otros á los purgantes, etc.

Los debilitantes serán las sangrías, los baños, etc.; se elegirán los excitantes de los aromáticos, de los difusibles, etc.

Los evacuantes que se usan en el primer período de los envenenamientos son: el agua caliente y en gran cantidad, el emético (rara vez), el sulfato de zinc, la pocion vomitiva de Magendie, la titilacion de la campanilla con las barbas de una pluma, las bebidas mucilaginosas y dulcificantes, etc.

Los contravenenos ó *antídotos* son unas sustancias capaces de descomponer ó neutralizar los venenos, combinándose con ellos. Estas sustancias debensersusceptibles de poderse tomar en gran cantidad sin ningun peligro, y su accion debe ser pronta é independiente de los jugos gástricos, mucosos, biliosos, etc., contenidos en el estómago.

Generalmente se dividen los venenos en venenos narcótico-acres, venenos en irritantes, corrosivos y en venenos sépticos. ó cáusticos; en venenos narcóti-

CLASE PRIMERA.

VENENOS IRRITANTES, CORROSIVOS Ó CÁUSTICOS.

1. ACIDOS MINERALES Y VEGETALES. Acido acético, ácido cítrico, ácido hidroestórico, ácido hidrocórico, ácido nítrico (agua fuerte), ácido hidroclo-nítrico (agua régia), ácido fosfórico, ácido oxálico, ácido sulfúrico (aceite de vitriolo), ácido sulfúrico con añil en disolucion (azul en licor), ácido tártrico, cloro.

Contravenenos. Magnesia calcinada diluida en agua ʒj (30 gr.) por ℥ij (1000 gr.) de agua, á la dosis de un vasocada dos minutos; bicarbonato de potasa, bicarbonato de sosa, macerado de la semilla de linaza ó de malvabisco, agua de jabon; jabon medicinal, núm. 2856; jabon animal, número 2858; pocion antiácida de Andry, núm. 6114; pocion del doctor Andry, núm. 6428; lavativas emolientes, polvo absorbente magnesiano, núm. 6776, etc.

Tratamiento. Si no se ha verificado el vómito, lo que es muy raro, se titilará la campanilla con las barbas de una pluma; luego que se haya neutralizado el veneno, que aún no ha tenido lugar de obrar, se recurrirá á los antiflogísticos, á los fomentos emolientes sobre el abdómen, á los baños tibios, á una sangría del brazo y á

las sanguijuelas; si no bastan los primeros remedios, á las bebidas mucilaginosas; y á las sanguijuelas al cuello, si no puede verificarse la deglucion.

Corregidos los accidentes, se prescribirán algunas tazas de caldo de vaca ó de pollo; se favorecerá la convalencia con el uso de la harina de avena monda-da, de las féculas, de las cremas de arroz y de los caldos grasos; se evitarán el vino, los espirituosos y los alimentos sólidos; por último, confirmada la convalencia, se permitirán los alimentos sólidos, pocos á la vez y de fácil digestion.

Si por una causa cualquiera el enfermo no puede tragar ninguno de los medicamentos prescritos, se los introducirá en el estómago por medio de la sonda de Boerhaave modificada.

Remedios dañosos ó inútiles. Los vomitivos.

2. ALCALIS CONCENTRADOS. Amoniaco líquido, cal, potasa por alcohol y potasa por la cal, silicato de potasa, subcarbonato de potasa, sosa, subcarbonato de sosa, sulfuro de potasa.

Contravenenos. Vinagre, zumo de limon dilatado en agua (dos cu-

charadas de café para un vaso de agua), mucha agua caliente y agua albuminosa.

Tratamiento. Se hace vomitar, y despues se recurré á las bebidas, fomentos emolientes, cataplasmas, sanguijuelas etc., si no ceden los accidentes. Véase *Acidos*.

Remedios dañosos ó inútiles. Los vomitivos.

3. PREPARACIONES MERCURIALES.

Deutocloruro de mercurio (sublimado corrosivo), óxido rojo de mercurio, nitrato de mercurio, unguiento mercurial.

Contravenenos. Agua albuminosa, núm. 76; leche dilatada en agua, gluten de Taddei y harina diluida en agua; la harina obrará por su gluten.

El agua albuminosa se prepara con la clara de huevo mas ó menos diluida en agua. Devergie prefiere la yema á la clara de huevo.

El gluten de Taddei se prepara con seis partes de gluten fresco y diez partes de jabon blando (jabon de potasa). Se mezclan, se extiende la mezcla en platos, se deja secar en la estufa, y se la pulveriza. Treinta y seis granos de este polvo diluidos en una onza de agua pueden neutralizar un grano de sublimado.

Tratamiento. Véase *Acidos*.

Remedios dañosos ó inútiles. El hígado de azufre, el cocimiento de quina, el carbon.

4. PREPARACIONES DE ARSÉNICO.

Acido arsenioso ó deutóxido blanco de arsénico, ácido arsénico, arsenitos ó arseniatos de potasa ó de sosa, arseniato de amoniaco, pasta

arsenical, óxido negro de arsénico, sulfuros de arsénico.

Contravenenos. Agua azucarada pura ó mezclada con una tercera parte de agua de cal, pocion aceitosa, leche, albúmina diluida en agua, cocimiento de nuez de agalla ó de quina, polvo de carbon, sulfuros alcalinos, aguas sulfurosas artificiales, hidrato de peróxido de hierro (doce á quince veces el peso presumido del veneno) diluido en agua azucarada. En los casos de envenenamiento por las sales de arsénico, por ejemplo el licor de Fowler, se usará el acetato de hierro con exceso de base, que se obtiene añadiendo ácido acético y agua al peróxido de hierro hidratado.

Tratamiento. Cocimientos emolientes, caldo de vaca ó de pollo, sangrías, etc., si hay fenómenos de sobreirritacion y de irritacion general. Si hay postracion, debilidad, coma, sopor, etc., el ponche officinal, núm. 8187; ¿ la mezcla tónica del doctor Rognetta (caldo seis ú ocho partes, vino cuatro ó cinco partes, y alcohol ó aguardiente dos ó tres partes) que produce buenos efectos en los perros, deberá empleársela en el hombre, ó se quiere que la experiencia sancione este nuevo método de tratamiento? Véase *Acidos*.

Remedios dañosos ó inútiles. La triaca, la quina, el vinagre y el hígado de azufre.

5. PREPARACIONES DE COBRE. Acetato de cobre cristalizado, cloruro de cobre, cloruro de cobre y amoniaco, nitrato de cobre, óxi-

do de cobre, óxido de cobre amoniacal, subacetato de cobre (verde gris), subcarbonato de cobre y sulfato de cobre.

Contravenenos. Persulfuro de peróxido de hierro hidratado húmedo. Segun Dumas el mejor antidoto de las sales de cobre es un electuario formado de limaduras de hierro porfirizadas y miel. Bouchardat dice que existen las mismas propiedades en las limaduras de hierro y zinc. Son útiles la clara de huevo (agua albuminosa, núm. 76), la harina de trigo diluida y el azúcar; pero no son antidotos. Segun los muchos hechos citados por Barbet Lartigues, la albúmina y el azúcar anulan con certidumbre la accion tóxica de las sales de cobre.

6. PREPARACIONES DE ANTIMONIO. Acido antimonioso, cloruro de antimonio, óxido de antimonio, tártaro emético y sulfuro de antimonio.

Contravenenos. Agua tibia en abundancia. Si no se ha verificado el vómito, se administrarán muchas tazas de infusion de nuez de agalla (cinco ó seis nueces de agalla quebrantadas en cuatro cuartillos de agua); á falta de esta un cocimiento fuerte de quina, de corteza de castaño de Indias, de sáuce ó de encina. Se reducirán estos cocimientos hasta las dos terceras partes. Si hay vómitos se prescribe el agua azucarada, el extracto acuoso de opio (una píldora de á grano, 5 cent.) tres ó cuatro veces con un cuarto de hora de intervalo, ó bien algunas cucharadas de café, de jarabe dia-

codion, ó un cocimiento de cabezas de adormideras.

Remedios dañosos ó inútiles. La ipecacuana y el vitriolo blanco ó azul.

Tratamiento. Se combatirá el vómito dando agua azucarada ó muchos vasos de agua que tengan en solucion un grano (5 cent.) de opio, ó una onza (30 gr.) de jarabe de opio. Se podrá reemplazar este líquido con un cocimiento de tres ó cuatro cabezas de adormideras en dos vasos de agua endulzada con azúcar. Si persisten los dolores y los vómitos, se aplicarán algunas sanguijuelas en la region del estómago, ó al rededor del cuello si es difícil la deglucion. Por último, se procederá del mismo modo que en los envenenamientos por los ácidos, si se aumentan ó persisten los dolores intestinales.

7. URANO, CERIO, MANGANESO, IRIDIO, NIQUEL, COBALTO Ó PALADIO, CLORURO DE PLATINO, CROMATO DE POTASA, CLORURO DE CROMO.

Contravenenos. Leche mezclada con agua ó agua albuminosa.

Tratamiento. Véase *Acidos y preparaciones de arsénico.*

8. PREPARACIONES DE PLATA. Nitrato de plata.

Contravenenos. Solucion de sal comun preparada con una cucharada de café de sal comun y dos azumbres (4 kil.) de agua.

Tratamiento. Véase *Acidos.*

9. PREPARACIONES DE ESTAÑO. Estaño metálico, óxido de estaño, sulfuro de estaño, cloruro de estaño.

Contravenenos. Leche dilatada

en agua, tomada en gran cantidad, y á falta de esta, caldo, agua tibia, cocimientos suaves y mucilaginosos, y los opiados en el caso en que se presenten síntomas nerviosos.

10. PREPARACIONES DE ORO, DE ZINC Y DE BISMUTO. Oro metálico, cloruro de oro, cloruro de oro y sodio, cianuro de oro, fulminato de oro, ioduro de oro, óxido de oro y estannato de oro. Zinc metálico, cloruro de zinc, ioduro de zinc, oxisales de zinc y preparaciones de bismuto.

Contravenenos. Los mismos que las preparaciones de arsénico.

Tratamiento. Véase *Acidos* y preparaciones de *arsénico*.

Tratamiento. Véase *Acidos*.

11. NITRATO DE POTASA.

Contravenenos. Los mismos que los de las preparaciones de arsénico, excepto el agua de cal.

Tratamiento. Agua caliente para hacer vomitar, y después combatir la flegmasia por los emolientes, y los síntomas nerviosos por los opiados.

12. HIDROCLORATO DE AMONIACO. Véase *Nitrato de potasa*.

13. HÍGADO DE AZUFRE Ó SULFURO DE POTASA.

Tratamiento. Se favorecerá el vómito por medio de una gran cantidad de agua caliente; después se dará cloro líquido, preparado con una cucharada de cloro líquido por vaso de agua; se calmarán los dolores de vientre con las sanguijuelas, y se procederá después del mismo modo que para los ácidos.

14. AGUA DE JAVELLE. Esta se

prepara con ciento veinticinco granos de cloruro de potasa y dos cuartillos de agua (6 por 1000).

Tratamiento. Se provocará el vómito, se dará agua albuminosa, y se procederá del mismo modo que hemos indicado para los ácidos.

De igual modo se tratan los envenenamientos por el *cloruro de sosa* y el *alumbre*.

15. PREPARACIONES DE BARIO. Oxido, ioduro, bromuro y cloruro de bario, nitrato y carbonato de barita.

Contravenenos. El sulfato de sosa ó de magnesia á dosis purgantes; agua de pozo, que contiene sulfato de cal y soluciones de sulfato de sosa ó de sulfato de magnesia (dos dracmas (8 gr.) de una de estas dos sales en dos cuartillos (1 lit.) de agua).

Tratamiento. Agua azucarada, bebidas emolientes, etc. Véase *Acidos*.

16. PREPARACIONES DE FÓSFORO. Fosfuros y óxidos fosforados.

Contravenenos. Los mismos que los de los ácidos concentrados.

17. IODO, IODURO DE POTASIO, BROMO, BROMURO DE POTASIO. Véase *Acidos*.

18. PREPARACIONES DE PLOMO.

Contravenenos. Las soluciones de sulfato de magnesia, de sulfato de sosa, el agua de pozo y el agua albuminosa, n. 76.

Tratamiento. Sanguijuelas y evacuaciones generales, baños y lavativas emolientes, bebidas mucilaginosas y pociones calmantes. Véase *Cólico de plomo en el Memorial Terapéutico*.

19. VIDRIO Ó ESMALTE.

Tratamiento. Llenar al enfermo de alimentos feculentos á fin de que rodeen al veneno y disminuyan su accion sobre la membrana mucosa del estómago; recurrir despues al vómito, y en seguida á los mucilaginosos, á los dulcificantes, á los fomentos, á los baños emolientes, á las sanguijuelas sobre los puntos doloridos, etc.

20. CANTARIDAS. El polvo, las píldoras, la infusion acuosa, la tintura alcohólica, el aceite de cantáridas y los emplastos vejigatorios.

Tratamiento. Agua tibia y macerado de semilla de linaza, de raiz de malvabisco, etc., en suficiente cantidad para producir vómitos; emulsiones alcanforadas, n. 1899; alcanfor; se inyectarán en la vejiga líquidos mucilaginosos; se harán fricciones en la parte interna de los muslos y de las piernas con aceite alcanforado, si persisten el ardor en la vejiga y la dificultad de orinar; no se darán líquidos aceitosos, que aumentarían los accidentes disolviendo los principios activos de las cantáridas. Si las cantáridas no se han administrado interiormente, y solo se han aplicado sobre la piel ó sobre las heridas, no se debe provocar el vómito, y solo limitarse á dar algunos vasos de agua azucarada, á

un baño general, á fricciones aceitosas y alcanforadas, á algunas sanguijuelas, á los fomentos emolientes sobre los puntos doloridos, etc.

Segun Giacomini la cantaridina es hiposténica, y se combate sus efectos con los estimulantes, el vino, el aguardiente, el ron y el opio á grandes dosis.

21. VENENOS IRRITANTES VEGETALES. Anémona, brionía, coluquintida, clemátide, cohombriillo silvestre, celedonia, creosota, euforbio, graciola, gutagamba, escila, escamonea, torbisco, jalapa, manzanillo, narciso de los prados, croton tiglio, zumaque venenoso, ricino, ranúnculo, sabina, acónito y estafisagria.

Tratamiento. Bebidas emolientes, baños y fomentos emolientes; si no hay dolores abdominales ó son poco intensos, los vómitos son frecuentes y el abatimiento y la sensibilidad muy notables, se darán algunas tazas de infusion de café (dos cuartillos (1 kil.) de agua para ocho onzas (250 gr.) de café en polvo); si hay convulsiones ó delirio se dará el opio. En el caso contrario se procederá como hemos dicho para el sublimado y los ácidos.

Remedios dañosos ó inútiles. El emético, el vinagre y las bebidas irritantes.

CLASE SEGUNDA.

VENENOS NARCÓTICOS.

1. BELEÑO, BELLADONA, MANDRÁGORA, YERBAMORA, LECHUGA VIROSA, ETC.

Tratamiento. Provocar el vómito con medio escrúpulo (6 dec.) de ipecacuana, una cucharada de la poción vomitiva de Magendie, cuatro ó cinco granos (20 ó 25 cent.) de emético, veinte ó veinticuatro granos (10 á 12 dec.) de sulfato de zinc ó tres ó cuatro granos (15 á 20 cent.) de sulfato de cobre, disueltos en un vaso de agua, y favorecer el éxito de uno ú otro de estos remedios, introduciendo los dedos en la garganta, ó estimulando la campanilla con las barbas de una pluma; dar despues del vómito las bebidas aciduladas, preparadas con zumo de limon, vinagre, ácidos vegetales, tartrato ácido de potasa, etc.; combatir el narcotismo con agua de café, con la bebida antinarcótica de Van Mons, con el vinagre de café de Swediaur, núm. 9365, con pociones estimulantes, alcoholizadas, vinosas, amoniacales ó etéreas; por último, son tambien útiles las fricciones secas sobre los miembros y sobre todo el cuerpo, lo mismo que la sangría del brazo ó de la yugular, si el enfermo está atacado de apoplejía, y si los medios ordinarios no han producido ningun alivio.

Si se ha aplicado el veneno ex-

teriormente, se procederá del mismo modo, solo que nos abstendremos de producir vómitos.

Cuando el envenenamiento sea producido por una sustancia que obre por contener un álcali vegetal, se puede usar una solución de tanino ó un cocimiento de nuez de agalla; pero el contraveneno que, segun se asegura, produce muy buenos efectos, es la *solucion de ioduro de potasio iodurada*, que se prepara con dos dracmas (8 gr.) de ioduro de potasio, medio escrúpulo (6 dec.) de iodo y diez y seis onzas (500 gr.) de agua. Se da á medios vasos.

Remedios inútiles ó dañosos. Las bebidas ácidas antes de expulsar el veneno.

2. OPIO, SUS PREPARADOS Y SUS PRODUCTOS.

Tratamiento. Hacer vomitar, dar el cocimiento de nuez de agalla, y despues agua de café; en lo demás se procederá del mismo modo que en el tratamiento por el envenenamiento por el beleño, etc.

3. ACIDO PRÚSICO, CIANURO DE MERCURIO Y CIANURO DE ORO.

Tratamiento. Hacer vomitar, hacer respirar el agua de cloro (cuatro partes de agua y una de cloro líquido), y dar el agua amoniacal (una parte de amoniaco líquido y doce partes de agua);

afusiones de agua muy fria sobre la cabeza, sobre la nuca y sobre todo el trayecto de la columna vertebral; hielo sobre la cabeza, sangría de la yugular ó del brazo, sanguijuelas detrás de las orejas, fricciones en las sienes con tintura de cantáridas y el amoníaco, sinapismos en las plantas de los piés, lavativa de tani-no, núm. 3615, vinagre de café de Swediaur, núm. 9365.

CLASE TERCERA.

VENENOS NARCÓTICOS ACRES.

1. HONGOS VENENOSOS. Hongo carmesí falso, agárico cicuta verde, hongo carmesí amarillento, hongo carmesí blanco, hongo carmesí raton, hongo carmesí cruz de malta, agárico vulboso, agárico de primavera, agárico mortífero, agárico acre, agárico cáustico, agárico estíptico, agárico lechoso, agárico cabeza de medusa, agárico lechoso puntia-gudo, agárico de embudo hueco y venenoso, etc.

Tratamiento. Hacer vomitar prontamente al enfermo con el emético, y despues administrar los purgantes siguientes: una onza (30 gr.) de aceite de ricino y onza y media (45 gr.) de jarabe de flores de melocoton, que el enfermo tomará á cucharadas cada media hora, ó dos onzas (60 gr.) de cañafistula quebrantada, media dracma (2 gr.) de sen mondado, media onza (15 gr.) de sulfato de magnesia y dos cuartillos (1 kil.) de agua, que se usan en lavativa. Se repite este evacuante dos ó tres veces; y si no ha producido ningun efecto, se le reemplaza por un cocimiento de tabaco de tabaco por dos cuartillos (1 kil.) de agua. Despues del vómito, ocasionado casi siempre por las lavativas de tabaco, se dan algunas cucharadas de la pocion siguiente: agua de flores de naranjo cuatro onzas (125 gr.), éter ó licor de Hoffmann dos dracmas (8 gr.) y jarabe simple dos onzas (60 gr.). Si hacen progresos los accidentes, se administrará agua azucarada, una solucion de goma ó un macerado de simiente de linaza ó raiz de malvabisco; se aplicarán fomentos emolientes sobre los puntos doloridos; se meterá al enfermo en un baño; se le pondrán algunas sanguijuelas, y por último, se procederá segun la naturaleza y la violencia de los síntomas.

Si se reclaman muy tarde los socorros, la fiebre es muy intensa, el vientre está inflado y muy dolorido, etc., no se usarán los purgantes, se sangrará al enfermo y se aplicarán sanguijuelas, fomentos emolientes sobre los puntos doloridos, etc. V. *los remedios contra los envenenamientos por los hongos, números 8248 y 8249.*

2. NUEZ VÓMICA, HABA DE SAN IGNACIO, ESTRICNINA, VENENO AMERICANO, COCA DE LEVANTE, UPAS TIEUTÉ, UPAS ANTIAR, ANGUSTURA FALSA, BRUCINA, ALCANFOR, CURARA, WORORA, TICUNOS Y TANGUINO.

Tratamiento. Provocar el vómito por los medios ya indicados; prevenir la asfixia insuflando aire en los pulmones; dar algunas cucharadas de una pocion preparada con dos onzas (60 gr.) de agua, dos dracmas (8 gr.) de éter, dos dracmas (8 gr.) de esencia de trementina y media onza (15 gr.) de jarabe simple.

Si se ha aplicado el veneno sobre una herida, ó se le ha introducido por medio de una flecha ó de un instrumento punzante, etc., se sacarán los cuerpos extraños, se cauterizarán las heridas y se obrará del modo dicho anteriormente, excepto que no se producirán vómitos.

3. TABACO, BELLADONA, CICUTA (mayor y menor), ELÉBOROS, ESTRAMONIO, LAUREL ROSA, ZIZANÑA, CÓLCHICO, DIGITAL, RUDA, ACÓNITO, CEBOLLA ALBARRANA, VERATRINA, SABADILLINA, LAUREL REAL Y ACEITE DE ALMENDRAS AMARGAS.

Tratamiento. Vomitivos, purgantes y sangrías de la yugular

para combatir el estado comatoso; despues del vómito, bebidas acidulas, y por último los antiflogísticos.

4. CORNEZUELO DE CENTENO.

Si los accidentes son ligeros, se prescribirá agua y vinagre, ó agua en la cual se haya exprimido el zumo de un limon; si la gangrena es inminente, se coloca al enfermo en una habitacion seca y caliente y sobre una cama muy caliente, cuyas cubiertas se renuevan frecuentemente, etc.

5. CIANURO DE ORO.

Tratamiento. Se provocará el vómito por medio de bebidas mucilaginosas abundantes; se calmarán los movimientos convulsivos por las fricciones alcohólicas, amoniacales ó etéreas sobre las sienes, ó haciendo respirar estos mismos tópicos; se precaverá el desarrollo de los accidentes inflamatorios por las emisiones sanguíneas locales ó generales.

6. EMBRIAGUEZ. Contra sus efectos, agua tibia en abundancia, hacer vomitar introduciendo una pluma en la boca posterior, despues algunas gotas de amoniaco en un vaso de agua.

7. EMANACIONES DE LAS FLORES.

Aire libre, vinagre, tratamiento de la asfixia.

CLASE CUARTA.

VENENOS SÉPTICOS Ó PÚTRIDOS.

1. MORDEDURAS DE VÍBORAS Y ZÁNGANOS, TÁBANOS, ARAÑAS DE LAS CUEVAS, ABEJONES, MOSCAS Y

SERPIENTES.

Tratamiento externo. Practicar inmediatamente una ligadura no muy apretada encima de la herida; suprimirla cuando ha dado lugar á accidentes; dejar desangrar la herida; comprimirla para favorecer la salida de la sangre y cubrirla con muchas ventosas; lavar la herida, si es posible. Si son mas graves los accidentes y la hinchazon y los dolores son mas considerables, se procederá á la cauterizacion por medio del hierro hecho ascua, del nitrato de plata fundido, de la potasa, del deutocloruro de antimonio, de la pomada amoniaca de Gondret, de la moxa, etc.

Tratamiento interno. Calmantes, sudoríficos y algunos estimulantes difusibles; pociones con la tintura de quina, algunas gotas de amoniaco líquido, zumo de euforbio, tintura alcohólica de hipericon vulneraria de la F. E., agua de Luce, etc.

2. MORDEDURA DE ESCORPION.

Tratamiento. Bebidas y pociones calmantes ó diaforéticas; se aplicarán sobre la herida cataplasmas emolientes rociadas con algunas gotas de amoniaco líquido.

3. PICADURAS HECHAS POR LAS ABEJAS, AVISPAS; TARÁNTULAS,

MOSQUITOS DE TROMPETILLA.

Tratamiento. Si son ligeros el dolor, la hinchazon y la fiebre, se frotarán las partes picadas con una mezcla hecha con dos partes de aceite de almendras dulces y una de amoniaco líquido, y se prescribirá una bebida diaforética. Pero si los síntomas son mas graves, la temperatura muy elevada y el insecto ha chupado el jugo de plantas venenosas, cáveres corrompidos ó animales que han muerto de enfermedades pestilenciales, se aplicará uno de los cáusticos propuestos para las mordeduras de víboras, despues de haber tenido cuidado de registrar la herida y quitar por medio de unas pinzas el aguijon que podria estar clavado. En algunos casos menos graves nos limitaremos á lavar la herida con agua fria ó agua salada, ó con un linimento hecho con partes iguales de aceite y amoniaco. Si el enfermo ha sido atacado de un gran número de mosquitos de trompetilla, se le hará acostar y se le dará una bebida diaforética con algunas gotas de amoniaco líquido ó de agua de Luce.

4. ENVENENAMIENTO POR CIERTOS ANIMALES: *Dorada, congrio, clupea escamosa y almejas.*

Tratamiento. Eméticos, pur-

gantes, éter sobre azúcar, pocion antiespasmódica con éter ó con licor de Hoffmann, vino de opio compuesto, etc.; bebidas acidulas, combatir los dolores de estómago con algunas sanguijuelas, etc.

5. MORDEDURAS DE ANIMALES RABIOSOS.

Tratamiento. Se empezará por desnudar al enfermo; se lavarán los vestidos si se han manchado por la baba; si la herida es reciente y da todavía sangre, se la comprimirá en todos sentidos para desangrarla bien, y se la lavará despues con agua comun, agua de jabon ó agua de sal; si la mordedura es sinuosa y profunda, se la agrandará con el bisturí, se hará salir sangre por medio de la presion ó de una ventosa, y despues se cauterizará la herida muy profundamente, lo mismo que todas las desolladuras que podrian existir, y en todos los casos se tendrá cuidado de respetar los vasos gruesos; siete ú ocho horas despues de haber efectuado la cauterizacion, se cubrirá la escara con un ancho vejigatorio, que se curará despues con un cerato ó con cualquier otro cuerpo graso muy fresco.

Si la herida está en la cabeza, se afeita el cabello para cauterizarla bien. Si la cauterizacion es seguida de hinchazon ó inflamacion, se aplican fomentos emo-

lientes y resolutivos. Si han sido mordidos los párpados, los labios ó las mejillas, etc., se los cauterizará del mismo modo, teniendo la precaucion de conservar el globo del ojo; si este último ha sido tocado por la baba, se pasa ligeramente por encima de él un pincel empapado en un cáustico, y se lava despues el ojo con un líquido mucilaginoso si fuese necesario. Si la mordedura es antigua, está ya cicatrizada y estamos seguros de que está hecha por un animal rabioso, se la abre, se la cauteriza y se la hace supurar. Si se perciben las pústulas sublinguales indicadas por Marochetti, se las abrirá y cauterizará. En cuanto al cocimiento de retama, á los calomelanos, al opio, á las fricciones mercuriales, al alcanfor, á los baños frios por sorpresa, á la sangría, al cloro, etc., alabados para curar la rabia, es necesario preferir como específico la cauterizacion y no emplearlos sino con medios accesorios. Véase el Tratamiento antihidrofóbico por el doctor Gottlieb de Schallern, núm. 9107, tomo III, pág. 144. Pueden usarse además en las diversas circunstancias el baño alcalino ferruginoso de Raspail, núm. 443; los polvos contra la rabia, núm. 7112; el remedio contra la rabia, núm. 8255; el remedio contra la rabia, por Janicher, núm. 8256, y el remedio núm. 8257.

II. ASFIXIAS.

En todos los casos de asfixia es necesario apresurarse á socorrer lo mas pronto posible al enfermo, y continuar prestándole socorros, aun cuando se crea que se van á obtener pocos resultados.

A las personas asfixiadas por el vapor del carbon, por el de los hornos de cal, por las cubas de mosto, de vino y otros liquidos en fermentacion, por los pantanos, por las minas de carbon, por falta de aire respirable, y por último por el gas óxido de carbono y por el ácido carbónico (1), se las sustraerá primero de la causa que ha producido la asfixia; despues habiendo seguridad de que la muerte no es real, se expondrá al paciente al aire libre, se le desnudará ó á lo menos se hará de modo que ninguna parte del cuerpo, sobre todo el pecho, esté comprimida por los vestidos. Se colocará el cuerpo sobre una cama ó sobre cualquier otro plano inclinado, cubierto de un acolchado, de una manta ó de un haz de paja ó de heno; se tendrá cuidado de que la cabeza y el pecho estén mas elevados que

el resto del cuerpo. Se alejarán todas las personas inútiles. Se rociarán la cara y el pecho con agua y vinagre fria; se darán fricciones en el cuerpo, sobre todo en el epigastrio y en el bajo vientre, con pedazos de franela empapados en liquidos alcohólicos y aromáticos, tales como el aguardiente alcanforado, el agua de Colonia, el agua carmelitana; etc. A los cuatro ó cinco minutos se enjugarán las partes mojadadas con toallas calientes; y se darán nuevas fricciones. Se irritarán las plantas de los piés, las palmas de las manos y todo el trayecto de la columna vertebral con un cepillo fuerte.

Se hará respirar con precaucion el gas ácido sulfuroso, dirigiendo á la nariz los vapores de una pajuela ardiendo, y se levantará un poco la cabeza del enfermo: pueden tambien emplearse el amoniaco y el vapor de vinagre ó de alcohol. Se irritará el interior de las narices con las barbas de una pluma ó con cualquier otro cuerpo ligero; se procurará hacer tragar por medio de una sonda de goma elástica introducida en el esófago algunas cucharadas de agua y vinagre (una parte de vinagre y tres de agua), ó se administrará una lavativa de agua fria mezclada con una tercera parte de vinagre; despues otra lavativa de

(1) Las asfixias por el gas ácido sulfuroso, ácido nitroso, ácido hidrofórico, ácido carbónico, óxido de carbono, hidrógeno carbonado, hidrógeno sulfurado é hidrógeno arseniado son verdaderos envenenamientos.

agua fria que contenga dos ó tres onzas (60 á 90 gr.) de sal comun y una onza (30 gr.) de sal de la higuera.

Se insuflará aire en los pulmones, ya con la boca, ya con el fuelle de Gorcy, la cánula de Pia, el tubo laríngeo de Chaussier, la sonda laríngea, etc.; generalmente se prefiere este último medio, que proporciona un aire mas puro y es menos repugnante. La insuflacion del aire debe hacerse con mucha suavidad, porque esta operacion tan útil por sí misma, practicada sin inteligencia y con fuerza, llegaria á ser funesta.

Insuflacion del aire en los pulmones. Deprimida la base de la lengua con el dedo índice de la mano izquierda, se coloca en la laringe la extremidad menor del tubo laríngeo de Chaussier, por ejemplo, teniendo la precaucion de colocar bien sobre la abertura de la laringe el pedazo de piel de búfalo ó de agárico; coloca el operador en su boca la otra extremidad del tubo, y aspira las mucosidades que podrian estar en los bronquios. Es indispensable que el tubo tenga en la mitad de su longitud una parte mas ensanchada, y un diafragma con muchos agujeros; el primero sirve de depósito á las mucosidades aspiradas del estómago, y el segundo impide que estas lleguen á la boca del operador. Llenadas estas indicaciones, se adapta á la extremidad bucal del tubo una vejiga llena de aire ó un fuelle pequeño; se empuja el aire poco

á poco y por tiempos, de modo que se imite á la respiracion; al mismo tiempo se dan fricciones sobre el vientre y sobre el pecho con un pedazo de paño ó de franela.

Si no tenemos á nuestra disposicion el tubo laríngeo de que acabamos de hablar, y no se puede por medio de palancas de boj ó de marfil llegar á separar las mandíbulas del enfermo, se insufla aire en los pulmones por medio de una sonda de goma elástica que se introduce por la nariz en la laringe; por último, si la epiglotis está de tal modo aplicada sobre la laringe que es imposible levantarla tirando de la lengua hácia adelante y haciéndola bajar en su base, se hace una incision en la traquiarteria.

Si todos estos medios no han sido suficientes y el enfermo está sumergido en el sopor, sus ojos están salientes, sus labios hinchados y su cara roja, se practicará una sangría del pié ó de la yugular.

Si el enfermo ha vuelto en sí, se le coloca en una cama caliente y en una habitacion ancha y ventilada, cuyas ventanas estarán abiertas; solo se deja al rededor de él las personas necesarias. Se administran algunas cucharadas de vino de Málaga, de Alicante, de Madera, etc., ó de vino caliente azucarado, de agua destilada aromática ó de una pocion etérea. Si se manifiestan deseos de vomitar, se darán algunas tazas de agua emetizada; pero es mejor

recurrir á una lavativa purgante é irritante preparada con sal comun y sal de la higuera.

Todos estos socorros, cuyo conjunto tiende á restablecer la respiracion, la circulacion y el calor, y despertar la accion nerviosa, la sensibilidad y la irritabilidad del estómago y de los intestinos, deben administrarse con prontitud é inteligencia, y se los debe continuar durante muchas horas. Se ha visto no volver á la vida á algunos asfixiados hasta despues de cinco ó seis horas de socorros continuos.

Entre los medios á propósito para restablecer la irritabilidad y la sensibilidad de los intestinos, tales como el humo de tabaco, los vapores de plantas aromáticas, el gas ácido carbónico, el aire caliente, las lavativas purgantes números 3457, 3568, 3599, 3612, etc., dirigidos al recto, se desecha el tabaco, aconsejado aún por algunos médicos, á causa de sus efectos narcótico-acres. Sin embargo, puede conservarse esta sustancia en las cajas de socorro, y emplearla solamente en aquellos casos en que los demás medios no han producido ningun resultado.

ASFIXIA POR LOS GASES DE LAS LETRINAS, DE LOS POZOS DE AGUAS INMUNDAS Y DE LOS ALBAÑALES.

Para socorrer á los asfixiados por estas causas se recurrirá á la exposicion al aire libre, á las as-

persiones con agua y vinagre, á las fricciones secas, á la inspiracion del cloro, á la compresa clorosa con vinagre de Mialhe, núm. 1362; al emético, á la ipecacuana ó á una tacita de aceite para hacer expeler del estómago las materias que el enfermo haya podido tragar; á una ó dos sangrías del brazo, proporcionadas á la fuerza del enfermo, si los medios anteriores son insuficientes y los latidos del corazon son desordenados; al baño frio y á los antiespasmódicos para calmar los accidentes nerviosos; y por último, á las fricciones en todo el cuerpo, á los sinapismos en las extremidades, etc., si el enfermo está sin conocimiento y sin movimiento.

ASFIXIA POR SUMERSION.

Cuando socorramos á un ahogado, debemos apresurarnos á proporcionarle todos los auxilios del arte, y á continuarlos durante mucho tiempo aunque sean poco numerosos los casos en que se hayan obtenido buenos resultados; porque se ha visto á algunos ahogados volver á la vida despues de haber estado largo tiempo debajo del agua, y siete ú ocho horas despues de haberlos sacado.

Si no hay ningun obstáculo, se empezará el tratamiento á la orilla del rio; en el caso contrario, se colocará el cuerpo con precaucion y sin sacudidas sobre una camilla, unas angarillas ó las

manos juntas de dos ó cuatro personas, y se le transportará, colocado sobre el lado derecho y la cabeza un poco elevada, al sitio mas inmediato y mas conveniente. Allí se desnudará al ahogado, si está vestido, cortando los vestidos con tijeras para no perder tiempo; se le pondrá una camisa y un gorro de lana; se le echará, siempre que sea posible, sobre el lado derecho y con la cabeza un poco alta, sobre una cama mas bien algo elevada (para mayor comodidad de los asistentes) que baja, cubierta de un acolchado y medianamente caliente; se des- embaraza la boca, la nariz, los ojos y los oídos del moco y de los demás cuerpos extraños, teniendo la cabeza un poco inclinada y las mandíbulas algo separadas.

Se reconoce el estado de la superficie del cuerpo para observar si ha recibido alguna herida mortal, lo que haría infructuosas todas las tentativas que se hiciesen para que recobrase la vida.

Siendo la muerte aparente, se aspiran los líquidos contenidos en la tráquea y en los bronquios por medio de una geringuilla que termine en una cánula de goma elástica, que se introduce en una de las narices, mientras que se cierra la otra y la abertura de la boca. Se hacen respirar olores fuertes, se calienta lenta y progresivamente al enfermo, recorriendo las diversas partes de su cuerpo con vejigas llenas de agua caliente, con una plancha calentada, con un calentador también calen-

tado (las planchas y los calentadores estarán cubiertos de rodillas) ó con saquitos llenos de ceniza caliente; se colocará un ladrillo caliente en los piés, en las ingles y en los sobacos; se darán primero fricciones secas y después fricciones con líquidos alcohólicos etéreos, alcanforados ó alcalinos; se harán compresiones ligeras y alternativas sobre el pecho y sobre el bajo vientre, á fin de simular los movimientos del pecho durante la respiración natural. Se titilarán las fosas nasales y la campanilla con una pluma larga, seca ó empapada en álcali volátil debilitado, y algunas veces se hará penetrar esta última en la faringe para extender la irritación en toda la extensión de este conducto y hasta el estómago.

Se insufla aire en los pulmones; se administra una lavativa purgante; y si no mejora el estado del ahogado, se aplican algunas moxas en el hueco del estómago, en los muslos y en los brazos.

Si el paciente ha vuelto en sí y se ha restablecido la deglución, se administrará cada cinco minutos una cucharada de un líquido difusible cualquiera. En el caso contrario, es decir, si el ahogado lejos de volver en sí queda sin conocimiento, si tiene la cara roja, violada ó negra, si los ojos están saltones, en una palabra, si existen todos los signos de una congestión cerebral, una contusión ó una fractura en la cabeza, y los miembros están flexibles y

calientes, se practicará una sangría del brazo ó de la yugular; no debe hacerse esta sangría si el cuerpo y las extremidades están frios.

Si las bebidas que se ha podido hacer tomar al enfermo le producen náuseas, si la lengua está cargada, la boca pastosa y el estómago lleno de alimentos, se facilita el vómito por medio de dos ó tres granos de emético disueltos en un vaso de agua caliente. Si por el contrario los medicamentos producen deposiciones de vientre, se dan algunas cucharadas de vino caliente. Por último, solo se abandona al enfermo cuando ya no hay esperanza de volverle á la vida, y debe tenerse presente que se necesitan siete ú ocho horas de cuidados continuos.

El galbanismo, la electricidad, la electropuntura, la urticacion, la flagelacion y la ustion han sido empleados con buen éxito en los ahogados.

ASFIXIA POR ESTRANGULACION.

Nos conduciremos en este caso con muy poca diferencia como acabamos de decir para los ahogados; solo que es inútil calentar el cuerpo, á no ser que esté colgado hace mucho tiempo y enteramente frio; se cortará el lazo que ha servido para ahorcarle, se cortará el nudo y se hará una sangría del pié ó de la yugular á causa de la ingurgitacion de los vasos

del cerebro determinada por la presion del cuello.

ASFIXIA POR EL FRIO.

Despues de haber trasportado al enfermo, rodeado de una manta y con la cabeza descubierta, del sitio en que se le ha encontrado al punto donde se le pueden suministrar los socorros, se procurará calentarle, pero lentamente y por grados; para esto se le desnudará, se le meterá entre nieve ó en agua muy fria, cuya temperatura se eleva poco á poco, primero por medio de agua fria, despues menos fria y por último tibia.

Colocado de este modo el enfermo en un baño, se le dan fricciones desde el vientre hasta las extremidades, se le hacen aspersiones de agua á la cara, se estimulan los labios y el interior de las narices con un cuerpo ligero, se le insufla aire en los pulmones y se le hace respirar olores fuertes.

Luego que el cuerpo empiece á calentarse, se coloca al enfermo en una cama bien seca; se le administra una lavativa irritante; se le dan bebidas acídulas, inmediatamente que pueda deglutir, y alimentos luego que el enfermo esté completamente restablecido.

Cuando la congelacion es parcial, es decir, cuando solo los miembros se han congelado ó amenazan congelarse, se recurre

al mismo tratamiento, pero local; así no se le sumerge en el baño, solo se dan fricciones en las partes enfermas y se le administran los sudoríficos interiormente.

ASFIXIA POR EL CALOR.

Se coloca al enfermo en un sitio fresco, se le desnuda y se quitan todos los obstáculos que pueden dificultar la circulación de la sangre; se le dan limonadas vegetales y se le administrará una lavativa de agua salada; se aplicarán algunas sanguijuelas en las regiones temporales, y se hará una sangría del pié ó de la yugular; si la respiración está como extinguida, etc. Véanse las *asfixias* por el carbon. Estos son los medios con que se debe esperar salvar al asfixiado por el calor.

ASFIXIA DE LOS RECIEN NACIDOS.

Si el recién nacido no ha llorado, si la cara está pálida y los miembros flácidos y si la respiración es nula, nos apresuraremos á separarle de la madre. Por consiguiente se corta el cordón y se le ata. Por el contrario, nos guardaremos de cortar y de estirar el cordón umbilical si no hay hemorragia, si la placenta no ha empezado aun á desprenderse, y sobre todo si el cordón presenta todavía algunas pulsaciones.

Cualquiera que sea el estado del recién nacido, y si no son evidentes los signos de la putrefacción, se colocará el cuerpo de lado, la cabeza un poco elevada y la cara descubierta; se cubrirán las demás partes con un cobertor de lana; nos aseguraremos de la libertad de la boca y narices, y se quitará todo lo que se oponga á la entrada del aire en los pulmones; se insuflará aire en estos últimos con un fuelle pequeño destinado á esta operación; se practicarán fricciones secas en el espinazo y en las plantas de los piés; se frotarán las demás partes del cuerpo con lienzos mojados en vino ó en líquidos aromáticos; se harán ligeras presiones sobre el cordón umbilical, el vientre y el pecho, y se administrará la cuarta parte de una lavativa ligeramente irritante, preparada con vinagre y algunos granos de sal.

Si todos estos medios son insuficientes, se sumergirá al enfermo hasta los sobacos en un baño de agua tibia, al cual se añadirá vino á la temperatura de 24 ó 28°.

MUERTE APARENTE. SUS SIGNOS GENERALES.

Se sabe por experiencia que la putrefacción ó un principio de ella es un signo cierto de la muerte; pero como no siempre se puede aguardar á estos fenómenos de destrucción, es importante co-

nocer los diversos signos que por su reunion pueden en ciertos casos equivaler casi á la certidumbre. Estos signos son: la falta de la circulacion y de la respiracion, la rigidez del cuerpo, el aspecto cadavérico de la cara tan bien descrito por Hipócrates (1), la blancura, el hundimiento, la flaccidez y el oscurecimiento de los ojos, el frio glacial de todas las partes del cuerpo y la insensibilidad á las incisiones, á las quemaduras, á las vexicaciones y á las cauterizaciones.

Pero aunque no se perciba la circulacion, despues de la exploracion de las arterias, en las diversas partes del cuerpo, como en la parte interna del brazo, en los sobacos, en la parte interior del abdómen, al nivel de la arteria crural, á los lados del cuello, etc., no se debe creer que la muerte sea real; porque está perfectamente probado que se puede vivir muchas horas sin que sea posible sentir el mas ligero movimiento en las diversas regiones que acabamos de citar. Lo mismo diremos de la respiracion, que puede restablecerse al cabo de

cierto tiempo, sin que se haya podido comprobarla por la agitacion de la llama de una vela ó de un cuerpo ligero aproximado á las ventanas de la nariz, ó por el empañamiento de la luna de un espejo colocado delante de la boca y de las fosas nasales.

Aun cuando la *rigidez del cuerpo* sea uno de los signos mas ciertos de la muerte, es menester no olvidar que este signo puede ser producido por la congelacion, por los tétanos, por las convulsiones, por ciertos síncope y por las asfixias. Pero si recordamos que en las personas que se han helado y que pueden ser vueltas á la vida la dureza de los órganos es igual á la de los músculos (en la rigidez cadavérica solo los músculos presentan resistencia); que en la rigidez convulsiva no se puede hacer cambiar á los miembros de posicion sino con la mayor dificultad, y que no pueden quedar fijos cuando se los ha llegado á apartar de su lugar (sucede lo contrario en la rigidez cadavérica); que en el síncope la rigidez es instantánea, y se percibe aun el calor en el vientre y pecho (sucede lo contrario en la rigidez cadavérica); y por último, que en los asfixiados la rigidez es un signo cierto de la muerte (en estos últimos la muerte es pronta y no se manifiesta la rigidez sino despues de diez ó doce horas, tiempo en el cual un asfixiado no puede volver á la vida), no será difícil dar el verdadero valor á la rigidez cadavérica.

Considerada aisladamente la ca-

(1) CARA HIPOCRÁTICA. Frente arrugada y árida, ojos hundidos, nariz afilada, rodeada de un círculo violado ó negruzco, sienes hundidas, huecas, orejas frias y arrugadas y sus pulpejos vueltos ligeramente hácia abajo, labios péndulos, mejillas salientes, barba arrugada, color de la piel aplomado ó violado, pelos de las narices ó de las pestañas cubiertos de una especie de polvo de color blanco amarillento.

ra hipocrática no tiene ningun valor, porque puede preceder á la muerte treinta y seis y aun cuarenta y ocho horas; se sabe tambien que este signo falta comunmente á las personas que han perecido de muerte repentina.

El hundimiento de los ojos en sus órbitas, su blandura, su flacidez y su oscurecimiento son signos que no se observan siempre despues de la muerte. La insensibilidad á los excitantes, á las moxas, etc., es un comprobante de poco valor, porque hay ciertas enfermedades en que los pa-

cientes están incapaces de sufrir ningun dolor.

Por consiguiente solo la putrefaccion es un signo cierto de la muerte, y todos los que hemos examinado no tienen ningun valor cuando están aislados. Ahora ¿quién decidirá si hay ó no principio de putrefaccion? solo el médico que ha aprendido á distinguir las manchas lívidas, las equimosis y el olor infecto de un miembro ó un órgano gangrenado, de los caractéres ciertos de la putrefaccion general.



PARTE SESTA.

MEMORIAL TERAPÉUTICO.



- ABLACTACION ó *Destete*. Bebida. 490, 491. Bolos. 554. Cataplasma. 818. Fomento. 2304, 2331. Lavativa. 3596. Leche. 3641. Linimentos. 3783, 3784, 4026. Papel. 4723. Píldoras. 5022, 5216, 5218, 5924. Pociones. 6540, 6602, 6078, 6646. Polvos. 6779, 7331. Purgante. 8202. Suero. 8542.
- ABORTO. Aguas ferruginosas, IV, 280. Agua. 169. Emplastos. 1735, 1782, 1783. Jarabe. 3088. Lavativa. 3477. Linimentos. 3855, 3963. Píldoras. 5274. Pociones. 6388, 6690. Pomada. 7863. Ungüento. 9163.
- ABSCESOS AGUDOS. Agua. 183. Apocema. 317. Baños. 448, 465, 470. Bolo. 667. Cataplasmas. 743, 747, 750, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 800, 807, 812, 814, 815, 817, 836, 837. Cervezas. 945, 496, 949. Cocimiento. 999. Chorro. 1425. Digestivo. 1431. Emplastos. 1860, 1862. Fomentos. 2287, 2289, 2290. Harinas. 2109, 2132. Infusiones. 2649, 2651. Inyecciones. 2745, 2781. Julepe. 3436. Limonadas. 3757, 3759, 3761, 3765. Linimento. 3895. Lociones. 4029, 4129, 4134. Pociones. 6418, 6719. Pomadas. 7602, 7934, 7957, 8127. Suero. 8526. Tisanas. 8874, 8937, 8991. Tópico. 9067. Ungüentos. 9170, 9171, 9172, 9173, 9188, 9194, 9249, 9292, 9293. Yervas. 2110.
- ABSCESOS CRÓNICOS. Cataplasmas. 820, 829. Cáusticos. 861. Inyecciones. 2782, 2796, 2840. Miel. 4300. Pomada. 8124. Trociscos. 9151, 9152, 9153.
- ACEDIAS. V. *Agrios*.
- ACIDEZ DE LAS PRIMERAS VIAS. V. *Agrios*.
- ACIDOS DEL ESTÓMAGO. V. *Agrios*.
- ACNE. Aguas. 111, 114, 194, 7509. Baños. 460, 465, 470. Cataplasmas. 747, 750, 751, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836. Cerveza. 942. Cocimiento. 999. Chorro. 1425. Emulsión. 1903. Fomento. 2304. Hidromel. 2613. Infusiones. 2644, 2649, 2651. Jarabes. 2940, 2960, 2961, 2967, 3020, 3083, 3108, 3168, 3272, 3306. Lavativa. 3457. Licor. 3707. Limónada. 3748. Linimentos. 3796, 3797, 3895, 3996. Lociones. 4077, 4127, 4153, 4155. Mezcla. 4276. Mistura. 4347. Ojimiél. 4647. Pediluvios. 4987, 4988, 4990, 4991. Píldoras. 5022, 5445. Poción. 6766. Polvos. 6777, 7519, 7570. Pomadas. 7767, 7779, 7780, 7934, 7963, 7964, 7973,

- Sinapismo. 8354. Soluciones. 8371, 8455, 8474, 8478, 8486, Tisana. 9009. Tópicos. 9046, 9050, 9053.
- ACRODINIA ó dolor de la extremidad de un miembro. Baños. 448, 456, 465, 470. Jarabe. 3011. Limonada. 3733, 3757, 3767. Linimentos. 3796, 3797, 3912. Loción. 4029. Píldoras, 5930. Suero. 8531.
- ADENITIS ó inflamacion de las glándulas. Agua. 7509. Bálsamo. 378. Baños. 460, 465, 470. Cataplasmas. 743, 772, 774, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 800, 807, 812, 813, 814, 815, 817, 836, 837, 854. Cáustico. 861. Chocolate. 1400. Chorro. 1425. Emplastos. 1737, 1747, 1772, 1785, 1823, 1838, 1846, 1877, 1894, 1895. Fomentos. 2304, 2317. Harinas. 2132. Linimentos. 3771, 3772, 3933, 3996, 4007. Píldoras. 5672. Pomadas. 7769, 7934, 7973, 8007, 8127. Saquitos, 8348, 8350.
- ADINAMIA. V. *Calenturas adinámicas*.
- AFECCIONES ADINÁMICAS. V. *Calentura adinámica*.
- AFECCIONES ARTRÍTICAS. V. *Gota*.
- AFECCIONES ASTÉNICAS. V. *Astenia*.
- AFECCIONES ATÓNICAS. V. *Astenia*.
- AFECCIONES ATÓNICAS DE LA MUCOSA BUCAL, ETC. V. *Estomatitis, aftas, etc.*
- AFECCIONES CANCEROSAS. V. *Cáncer y carcinoma*.
- AFECCIONES CATARRALES. V. *Catarras pulmonares, neumonia y calenturas catarrales*.
- AFECCIONES COMATOSAS. V. *Coma*.
- AFECCIONES CONVULSIVAS. V. *Convulsiones*.
- AFECCIONES DEL CORAZON. Elettuaric. 1603. Linimento. 3998. Mistura. 4612. Polvo. 6969. Solución. 8438. Vinagre. 9363. V. además hipertrofia del corazon y palpitaciones.
- AFECCIONES CRÓNICAS DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS. V. *Gastritis crónica, diarrea crónica, dispepsia, etc.*
- AFECCIONES CUTÁNEAS. V. *Enfermedades de la piel*.
- AFECCIONES DOLOROSAS DE LAS VIAS URINARIAS. V. *Blenorragia y cistitis*.
- AFECCIONES DE LAS ENCÍAS. V. *Escorbuto*.
- AFECCIONES EPSÓRICAS. V. *Sarna*.
- AFECCIONES ESCAMOSAS. V. *Herpes*.
- AFECCIONES ESCORBÚTICAS. V. *Escorbuto*.
- AFECCIONES ESCROFULOSAS. V. *Escrófulas*.
- AFECCIONES ESPASMÓDICAS. V. *Espasmos y neurosis*.
- AFECCIONES FLATULENTAS. V. *Cólico ventoso y flatuosidades*.
- AFECCIONES GOTOSAS. V. *Gota*.
- AFECCIONES HEMORROIDALES. V. *Hemorroides*.
- AFECCIONES HERPÉTICAS. V. *Herpes*.
- AFECCIONES HISTÉRICAS. V. *Histérico*.
- AFECCIONES INTESTINALES. V. *Diarrea, disenteria y cólicos*.
- AFECCIONES LINFÁTICAS. V. *Escrófulas, etc.*
- AFECCIONES NERVIOSAS. Aguas acidulas, IV, 261. Aguas. 247, 256. Bálsamo. 430. Baños. 440, 469. Bebida. 486. Cataplasma. 757. Cocimientos. 1082, 1111. Emulsion. 1949. Especies. 2120. Eteres. 2176, 2193. Gotas. 2552, 2555, 2559, 2570. Infusion. 2658. Jarabe. 2972. Lavativas. 3498, 3562. Licores. 3671, 3672. Linimentos. 3773, 4017. Píldoras. 5159, 5161, 5164, 5226, 5279, 6037. Polvos. 6857, 6998, 7551. Tinturas. 8623, 8836. Ungüento. 9255. Vinagres. 9350, 9351.
- AFECCIONES NERVIOSAS DEL ES-

TÓMAGO. *V. Gastrodinia y cardialgia.*

AFECCIONES NERVIOSAS DE LOS INTESTINOS. *V. Cólico nervioso.*

AFECCIONES PAPULOSAS. *V. Herpes.*

AFECCIONES PAPULOSAS DE LA CARA. *V. Herpes.*

AFECCIONES DEL PECHO. *V. Neumonía, tisis y bronquitis.*

AFECCIONES DE LA PIEL. *V. Enfermedades de la piel, etc.*

AFECCIONES DE LAS PRIMERAS VIAS. *V. Embarazogástrico é intestinal, dispepsia.*

AFECCIONES PULMONARES. *V. Neumonía, bronquitis y tisis.*

AFECCIONES REUMÁTICAS. *V. Reumatismo.*

AFECCIONES DE LOS RIÑONES. *V. Cálculos urinarios, iscuria y nefritis.*

AFECCIONES SIFILÍTICAS. *V. Sífilis.*

AFECCIONES TIFOIDEAS. *V. Calentura tifoidea y tifo.*

AFECCIONES VENÉREAS. *V. Sífilis.*

AFECCIONES VERMINOSAS. *V. Lombrices y ténia.*

AFECCIONES DE LAS VIAS URINARIAS. *V. Cistitis, blenorragia y cálculos.*

AFONIA. Cataplasma. 796. Cocimiento. 1060. Electuario. 1449. Esencias. 2021, 2040. Eter. 2182. Gargarismos. 2396, 2399, 2415, 2418, 2426, 2431, 2471, 2483, 2500, 2514, 2520. Jarabe. 3162. Linimentos. 3771, 3772. Mermelada. 4243. Miel. 4313. Pastillas. 4875. Pediluvios. 4990, 4991. Pociones, 6331, 6430, 6602, 6609, 6646. Polvo. 7391.

AFTAS BENIGNAS. Baño. 457. Cocimiento. 1046. Colutorios. 1300, 1303, 1304, 1305, 1314, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328, 1329, 1330, 1331, 1339, 1340, 1342, 1343, 1348, 1353. Enjuagatorio. 1999. Esencia. 2040. Fumigacion. 2365. Garga-

rismos. 2386, 2396, 2397, 2404, 2415, 2416, 2427, 2428, 2433, 2434, 2435, 2436, 2438, 2439, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2452, 2457, 2459, 2465, 2466, 2467, 2468, 2473, 2478, 2479, 2480, 2483, 2500, 2512, 2514, 2523. Lavativas. 3474, 3477, 3554, 3628. Licóres. 3670, 3695. Linimentos. 3789, 3805, 4026. Locion. 4068. Mieles. 4297, 4313. Misturas, 4362, 4431, 4464. Ojimiél. 4647. Pastillas. 4832. Pediluvios. 4987, 4988, 4990, 4991. Pociones. 6200, 6201, 6202, 6226, 6332. Pomadas. 7894, 7896, 7897, 7898. Robs. 8290. Soluciones. 8370, 8386, 8432, 8486. Tinturas. 8728, 8729, 8730.

AFTAS CONFLUENTES. Colutorio. 1315. Gargarismo. 2541. Pociones. 6332, 6333.

AGALAXIA. Fomento. 2304. Jarabes. 3132, 3133. Polvos. 7312, 7386, 7428, 7484. Tópico. 9039.

AGRIOS. Aguas sulfurosas, IV, 224. Aguas. 116, 117, 169, 192, 193, 194, 230. Bolos. 627, 632. Cápsulas. 742. Electuarios. 1502, 1580. Infusion. 2670. Jabones. 2856, 2858. Jarábe. 2968. Leche. 3646. Licor. 3689. Looc. 4199. Misturas. 4322, 4499. Pastillas. 4800, 4831, 4840, 4887, 4965. Pildoras. 5072, 5180, 5624, 5803, 5804, 5930. Pociones. 6062, 6063, 6064, 6106, 6115, 6116, 6140, 6439. Polvos. 6771, 6773, 6774, 6776, 6818, 7018, 7053, 7312, 7385, 7386, 7387, 7429, 7430, 7431, 7547, 7548, 7569. Solucion. 8499. Tabletas. 4911, 4912, 4914, 4923, 4942. Trociscos. 9141.

ALBUGO. Agua. 126. Colirio. 1276. Pomada. 8177. *V. Manchas de la córnea.*

ALBUMINURIA. Agua. 7509. Caus-
ticos. 861. Ojimiél. 4652. Pildo-
ras. 5364, 5386, 5422, 5461,
5593, 5768, 5787, 5837. Pocio-
nes. 6065, 6391, 6646, 6663,
6665. Polvos. 6777, 6779, 7202,

7203. Tintura. 8631. Tisana. 8987. Vinos. 9417, 9418.
- ALFOMBRILLA. Emulsiones. 1963, 1965. Poción. 6721. Polvo. 6791. Tabletas. 4825.
- ALIENTO FÉTIDO. *V. Fetidez del aliento.*
- ALMORRANAS. *V. Hemorroides.*
- ALOPECIA. Aceites. 33, 37, 39. Lociones. 4080, 4104. Mistura. 4408. Pomadas. 7700, 7707, 7732, 7781, 7782, 7783, 7786, 7787, 7788, 7909. Tinturas. 8666, 8690, 8762, 8802, 8814. Tratamiento. 9072. Ungüento. 9295.
- ALUCINACIONES. *V. Amaurosis.*
- AMAUROSIS ó *Gota serena.* Agua. 7509. Alcoholatos. 307, 309. Bálsamos. 376, 411, 412, 413. Bolos. 676, 684. Colirios. 1120, 1125, 1175, 1201, 1208, 1210, 1218, 1221, 1234, 1236, 1247. Embrocaciones. 1710, 1714, 1715, 1718, 1720, 1724. Espiritu. 2169. Etiope. 2197. Fomento. 2276. Infusion. 2624. Linimentos. 3774, 3786, 3903, 3910, 3911, 3964, 4019, 4020. Misturas. 4564, 4591. Moscas. 9348, 9349. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5034, 5038, 5073, 5074, 5220, 5328, 5415, 5427, 5447, 5448, 5449, 5557, 5636, 5639, 5640, 5670, 5678, 5796, 5909, 6056. Póciones. 6065, 6089, 6264, 6391, 6504, 6505, 6508, 6512, 6663, 6665. Polvos. 7056, 7099, 7257, 7258, 7259, 7261, 7263. Pomadas. 7665, 7784, 7922, 8007, 8025, 8119, 8173. Sinapismo. 8354. Solucion. 8516. Tinturas. 8625, 8645. Tisana. 8991. Tratamiento. 9092. Vahos. 9331.
- AMBLIOPIA. Colirios. 1202, 1205, 1206, 1208. Linimento. 3964. Pomada. 8173. Solucion. 8516. *V. Amaurosis.*
- AMENORREA. Aceite. 20. Aguas salinas, IV, 296. Aguas ferruginosas, IV, 280. Aguas acidulas, IV, 261. Aguas. 109, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 180, 184, 246. Alcoholatos. 285, 296. Bálsamo. 434. Baños. 454, 460, 462. Bebida. 506. Bolos. 576, 580, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 645, 656, 658. Cataplasmas. 747, 750, 751, 773, 774, 783, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 835, 836. Cervezas. 951, 967. Cocimientos. 987, 1028, 1055, 1102. Confecciones. 1602. Conserva. 1367. Chocolates. 1404, 1405, 1413. Electuarios. 1466, 1511, 1559, 1598. Elixires. 1626, 1629, 1643, 1651, 1672, 1681, 1687, 1688, 1702. Emplastos. 1754, 1880. Emulsiones. 1947, 1959. Esencia. 2042. Especies. 2081, 2086, 2102, 2103. Extracto. 2200. Fumigacion. 2374. Infusion. 2652. Inyecciones. 2705, 2739, 2745, 2779, 2797. Jabones. 2851, 2878. Jarabes. 2944, 2946, 2964, 2965, 2999, 3003, 3060, 3061, 3068, 3149, 3187, 3188, 3189. Julepe. 3369. Lavativas. 3566, 3567. Leche. 3637. Linimento. 3836. Mezcla. 4263. Miel. 4303. Misturas. 4518, 4550. Opiatas. 4701, 4708. Panes. 4712, 4714, 4715. Pastillas. 4818, 4819, 4844, 4845, 4846, 4878, 4887, 4891, 4892. Pediluvio. 4982. Píldoras. 5030, 5094, 5162, 5170, 5226, 5270, 5275, 5335, 5346, 5366, 5369, 5377, 5393, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5607, 5612, 5636, 5659, 5690, 5691, 5699, 5723, 5724, 5747, 5748, 5754, 5755, 5759, 5762, 5764, 5766, 5805, 5885, 5891, 5934, 5935, 5947, 5977, 5978, 5982, 6011, 6016, 6033, 6053. Póciones. 6166, 6170, 6187, 6202, 6302, 6388, 6440, 6441, 6443, 6444, 6446, 6447, 6448, 6449, 6626, 6641, 6742. Polvos. 6777, 6779, 6838, 6975, 7057, 7058, 7205, 7209, 7210, 7211, 7299, 7303, 7304, 7305, 7389, 7390, 7485, 7493, 7537, 7538. Pomadas. 7582, 7628, 7715,

7716, 7963, 7964, 7968. Sacarolados. 8310, 8313. Sacaruros. 8306, 8311. Sinapismos, 8354, 8358. Solucion. 8425. Suero. 8532. Supositorio. 8562. Tabletas. 4816, 4821, 4877, 4893, 4923. Té. 8584. Tinturas. 8591, 8592, 8678, 8679, 8703, 8739, 8752, 8771, 8820, 8838, 8842. Tisana. 8933. Tópico. 9034. Tratamiento. 9073. Trociscos. 9146, 9156. Vinagres. 9366, 9385, 9393. Vinos. 9402, 9403, 9404, 9409, 9410, 9411, 9426, 9439, 9440, 9441, 9451, 9481, 9497, 9503.

AMIGDALITIS. Bálsamo. 427. Colutorios. 1305, 1332, 1343, 1348. Gargarismos. 2387, 2396, 2411, 2430, 2433, 2437, 2441, 2451, 2482, 2498, 2499, 2520, 2526. Mistura. 4494. Píldoras. 5450. Poción. 6226. Tintura. 8652. Zumo. 9557. *V. Angina.*

AMPOLLAS. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836, 837. Fomento, 2304.

ANAFRODIXIA. Aceite. 20. Bálsamo. 394. Diabolines. 1428. Emulsion. 1930. Jarabes. 3247, 3271. Opiata. 4695. Pastillas. 4874, 4883. Píldoras. 5040, 5041, 5065, 5369, 5440. Polvos. 7243, 7245. Tabletas. 4822. Tinturas. 8663, 8701, 8751, 8814. Trociscos. 9158. Vino. 9446.

ANASARCA. Bolos. 608, 619, 666. Cocimientos. 1049, 1050. Emulsion. 1944. Epitema. 2013. Especies. 2086, 2101, 2131. Fomentos. 2300, 2302, 2332. Infusion. 2649. Linimento. 3892. Mistura. 4385. Ojimiél. 4648. Píldoras. 5201, 5258, 5272, 5553, 6056. Pociones. 6105, 6405, 6410, 6418, 6421, 6473, 6559, 6562. Pomadas. 7875, 7904, 7905, 8172. Solucion. 8513. Tinturas. 8606, 8622, 8685, 8837. Tisana. 8921. Vinos. 9469, 9470, 9537. *V. Hidropesias, leucoflegmasia.*

ANEMIA. Aguas. 113, 120, 121, 156, 160, 161, 196, 202. Ba-

ño. 454. Bizcochos. 524, 525. Bolos. 645. Cerveza. 948. Chocolate. 1402. Electuario. 1585. Gargarismo. 2483. Grajea. 2590. Granitos. 2589. Jarabes. 3038, 3057, 3058, 3059, 3147, 3148, 3151, 3184, 3185, 3206, 3311. Limaduras. 7347, 7348. Panes. 4712. Píldoras. 5106, 5107, 5108, 5109, 5376, 5377, 5658, 5664, 5722, 5755, 5766, 5999, 6016. Poción. 6367. Polvos. 6820, 7300, 7314, 7346, 7393. Tintura. 8704. Tisana. 8972.

ANESTESIA. Linimentos. 3837, 3932. Pomada. 8129. Tinturas. 8814.

ANEURISMAS. Agua. 7509. Bolos. 606. Cigarros. 970. Infusion. 2644. Linimento, 3887. Pociones. 6267, 6709. Tópico. 9039.

ANEURISMA DEL CORAZON. Conserva. 1378. Grajea. 2588. Jarabe. 3135. Píldoras. 5541. Maniluvios. 4226. Pociones. 6410, 6421, 6423, 6466. Pomada. 8140. Sinapismos. 8359, 8360, 8361, 8362. *V. Aneurismas é hipertrofia del corazon.*

ANGINA AGUDA Ó CRÓNICA. Bálsamos. 406, 427. Baño. 457. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836. Cerato. 922. Colutorios. 1300, 1304, 1305, 1325, 1329, 1342, 1343. Gargarismos. 2386, 2389, 2393, 2396, 2398, 2399, 2415, 2418, 2424, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2435, 2438, 2439, 2441, 2442, 2454, 2456, 2457, 2475, 2476, 2477, 2478, 2482, 2483, 2484, 2486, 2493, 2494, 2495, 2502, 2512, 2513, 2514, 2517, 2519, 2520, 2524, 2525, 2528, 2529, 2534, 2537. Jabon. 2855. Jarabes. 2954, 3165, 3215, 3314, 3341. Julepe. 3367. Lavativas. 3453, 3457, 3472, 3474, 3477, 3554, 3590, 3596, 3599, 3600, 3628. Linimentos. 3787, 3795, 3796, 3797, 3951. Lociones. 4067, 4143. Miel. 4313. Pediluvios. 4987, 4988, 4990, 4991. Píldoras. 5358.

Pociones. 6166, 6170, 6285, 6457, 6494, 6582, 6595, 6642. Polvo. 6808. Pomadas. 7746, 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 7973, 8007, 8025. Rodomel. 4320. Solucion. 8432. Tabletas. 4805, 4953. Trociscos. 9150. Vahos ó vapores. 9330. Vinagre. 9397. Zumo. 9567.

ANGINA ESCARLATINOSA. Cerato. 922. Gargarismos. 2398, 2399, 2400, 2452, 2493, 2511. *V. Escarlata.*

ANGINA ESTRÍDULA. *V. Crup.*

ANGINA GANGRENOSA. Colutorios. 1314, 1337. Gargarismos. 2386, 2389, 2391, 2392, 2393, 2394, 2413, 2414, 2418, 2452, 2455, 2465, 2473, 2487, 2489, 2490, 2492, 2513, 2518, 2522, 2533, 2535, 2536. Polvo. 6930. Vinagre. 9386.

ANGINA LARÍNGEA. *V. Laringitis.*

ANGINA MALIGNA. *V. Angina gangrenosa.*

ANGINA MEMBRANOSA. *V. Crup.*

ANGINA DE PECHO. Elíxir. 1698. Gotas. 2561. Linimentos. 4018, 4025. Mistura. 4612. Píldoras. 5156, 5163, 5165, 5545. Poción. 6287.

ANGINA SIFILÍTICA. Gargarismos. 2420, 2448, 2478, 2505, 2506, 2507, 2509. Leche. 3647. *V. Ulceras sifilíticas de la garganta.*

ANGIOLEUCITIS. Remedio. 8240.

ANOREXIA. Aceite. 21. Bolos. 627, 628. Cervezas. 946, 957. Conserva, 1367. Electuario. 1563. Elíxires. 1655, 1656, 1666, 1667, 1669, 1674, 1676, 1695. Jarabe. 3168. Maceracion. 4223. Píldoras. 5069, 5071, 5616, 5619, 5620, 5933, 5934. Pociones. 6101, 6386, 6469, 6470, 6475, 6477, 6514, 6515. Polvos. 6942, 7251, 7532. Tinturas. 8607, 8615, 8692, 8693, 8714, 8815. Tópico. 9053. Vino. 9407.

ANOSMIA. Polvos. 7217, 7257, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263.

ANQUILOPS. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Harina. 2132. Tratamiento. 9084.

ANQUILOSIS. Aceite. 17. Aguas sulfurosas, IV, 224. Bálsamo. 432. Baño. 456. Cataplasmas. 751, 807, 812, 815, 817. Fumigaciones. 2365, 2371. Linimentos. 3901, 3919. Pieles. 5007. Vahos. 9331.

ANTEVERSION. Inyecciones. 2732, 2736, 2737, 2779. Lavativa. 3554.

ANTRAX BENIGNO. *V. Divieso.*

ANTRAX MALIGNO. Locion. 4079.

AORTITIS. Poción. 6595. *V. Aneurismas del corazón.*

APOPLEJIA. Aguas. 190, 7509. Alcohol. 272. Alcoholato. 281. Apocema. 335. Bálsamo. 375. Cataplasma. 834. Enemas. 3572, 3576. Eteres. 2177, 2183, 2191. Infusiones. 2624, 2659. Jarabe. 3270. Lavativas. 3460, 3474, 3546, 3548, 3554, 3555, 3556, 3557, 3569, 3570, 3577, 3596, 3599, 3600. Limonadas. 3736, 3750, 3765, 3766. Linimentos. 3783, 3784, 3793, 3795, 3796, 3797, 3808, 3927, 3985. Misturas. 4347, 4588. Pediluvios. 4980, 4987, 4990, 4991. Pociones. 6118, 6488, 6502, 6510, 6663, 6672. Polvos. 7126, 7335. Suero. 8533. Supositorio. 8564. Tinturas. 8669, 8701, 8814, Trociscos. 9140. Vinos. 9421, 9474, 9475, 9477.

APOPLEJIA SEROSA (hidrocéfalo de los ancianos). Agua. 143. Esencia. 2022.

APOPLEJIA DE LOS RECIEN NACIDOS. Cortar el cordón, facilitar la salida de la sangre por medio de fricciones ligeras, baños tibios, etc.

ARACNOIDITIS. Agua. 229. Fomento. 2269. Polvo. 7470. *V. Frenesi.*

ARDORES DE ENTRAÑAS. Julepe. 3430.

ARDOR DE ESTÓMAGO. *V. Agrios.*

ARDORES DE ORINA. *V. Disuria.*

ARENILLAS. Aguas ferruginosas, IV, 280. Aguas sulfurosas, IV, 224. Bebidas. 479, 480. Cataplasma. 794. Looc. 4180. Pociònès. 6298, 6602. Polvo. 7494. Ratafia. 8227. Robs. 8286, 8291. Tintura. 8763. Tisana. 8908.

ARTRALGIA ó dolor en las articulaciones. Emplasto. 1784.

ARTRITIS. V. Gota.

ARTRITIS REUMÁTICA. V. Gota y reumatismo.

ARTROCACE. Baños. 456, 459, 469, 470. Bolo. 667. Cataplasmas. 747, 750, 751, 754, 773, 783, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 806, 814, 815, 836. Emplastos. 1815, 1895. Fumigacion. 2365. Jarabes. 2982, 2992, 3110, 3268. Linimentos. 3795, 3796, 3797, 3855, 4026. Píldoras. 5066, 5081, 5775. Pomadas. 7769, 7934, 7967, 8007, 8025, 8127, 8162. Tinturas. 8628, 8666. Ungüento. 9276.

ARTRODINIA. V. Gota.

ASCÁRIDES. V. Lombrices.

ASCITIS AGUDA. Apocema. 328. Bolos. 608. Cocimientos. 1011, 1028. Electuarios. 1482, 4519, 1567, 1582, 1594. Emulsiones. 1930, 1976. Especies. 2101, 2104. Extracto. 2245. Gotas. 2573. Jabon. 2885. Jarabe. 3123. Lavativas. 3453, 3457, 3612. Linimentos. 3787, 3862, 3893, 3894, 3906. Locion. 4155. Mistura. 4386. Ojimiél. 4656. Píldoras. 5019, 5258, 5495, 5568, 5594, 5686, 5715, 5718, 6009, 6010, 6013. Pociònes. 6105, 6185, 6186, 6273, 6274, 6285, 6286, 6329, 6403, 6415, 6474, 6559, 6562, 6563, 6665. Polvos. 6789, 7234, 7356. Purgante. 8203. Tintura. 8807. Vinagre. 9369. Vinos. 9418, 9469, 9470, 9478, 9479, 9537.

ASCITIS CRÓNICA. V. Hidropesias y ascitis.

ASFIXIA. Compresa. 1362. Lavativas. 3457, 3511, 3568, 3599, 3612. Limònada. 3750. Linimentos. 3771, 3772. Pediluvios. 4990,

4991. Pociònes. 6425, 6502, 6504, 6505, 6510. Vinagres. 9355, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9373, 9374. V. pág. 185. del tomo IV.

ASFIXIA POR ESPUMA BRÓNQUICA.

V. Catarro pulmonar crónico.

ASMA. Aguas sulfurosas, IV, 224. Aceite. 54. Aguas. 247, 256. Bolos. 659. Cremas. 1389, 1392. Cigarros. 970, 971, 973, 975, 979. Electuario. 1573. Elíxires. 1631, 1657, 1684, 1698. Emulsion. 1909. Esencias. 2021, 2037. Especies. 2123, 2128. Eter. 2182. Fumigaciones. 2368, 2370, 2371, 2377. Gotas. 2550. Hidromeles. 2611, 2613. Infusiones. 2646, 2651, 2653. Inhalacion. 2616. Jabon. 2867. Jarabes. 2960, 2961, 2963, 2979, 2980, 2981, 3006, 3007, 3008, 3030, 3048, 3079, 3082, 3084, 3132, 3133, 3135, 3136, 3137, 3210, 3259, 3260, 3266, 3268, 3269, 3276, 3318. Julepes. 3381, 3382, 3386, 3387, 3405, 3424, 3425. Lavativas. 3457, 3474, 3596, 3600. Licores. 3662, 3672. Linimentos. 3771, 3772, 3810, 3998. Loocs. 4189, 4190, 4198. Maniluvios. 4226. Mezclas. 4274. Miel. 4305. Misturas. 4511, 4535, 4544, 4612. Ojimiéles. 4649, 4651, 4652, 4653. Pastas. 4789, 4790, 4791, 4792, 4793. Pastillas. 4888, 4897, 4898. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5067, 5083, 5084, 5152, 5200, 5265, 5266, 5270, 5271, 5275, 5276, 5304, 5313, 5315, 5319, 5327, 5328, 5341, 5350, 5354, 5358, 5395, 5451, 5466, 5594, 5668, 5749, 5894, 6013, 6015. Pociònes. 6084, 6087, 6088, 6121, 6122, 6166, 6167, 6223, 6261, 6263, 6264, 6273, 6274, 6280, 6282, 6285, 6286, 6298, 6309, 6310, 6430, 6483, 6485, 6581, 6595, 6599, 6609, 6632, 6633, 6638, 6639, 6701, 6709, 6716, 6717. Polvos. 6825, 6980, 6982, 6985, 7069, 7188, 7202, 7231, 7273, 7398, 7458, 7470, 7487. Pomadas. 8003, 8172.

Solucion. 8373. Tabletas. 4953.
Tinturas. 8610, 8643, 8646, 8655,
8666, 8667, 8668, 8764, 8795.
Ungüento. 9199.

ASMA CONVULSIVO. V. *Asma*.

ASMA HÚMEDO. Bolos. 539. Jara-
bes. 3256, 3320. Licor. 3663.
Loocs. 4193, 4196, 4204. Mezcla.
4274. Ojimiél. 4655. Píldoras.
5451. Poción. 6569. Polvos. 7229,
7237. Tabletas. 4959. Tintura.
8629. V. *Asma y bronquitis cró-
nicas*.

ASTENIA. Aguas ferruginosas,
IV, 280. Aguas sulfurosas, IV,
224. Aguas acidulas, IV, 261.
Aguas. 113, 194. Alcoholatos.
288, 290, 307. Apocemas. 317,
343. Baños. 442, 448, 454, 457,
459, 460, 464, 472. Bolos, 617,
626. Cervezas, 947, 948, 957,
959. Cocimientos. 1000, 1091.
Confecciones. 1574. Chocolates.
1399, 1400, 1405, 1409, 1410,
1415, 1421. Elixires. 1620, 1625,
1680, 1700. Gargarismo. 2488.
Granos. 2592. Infusion: 2624. Ja-
lea. 2909. Jarabes. 3216, 3217,
3229. Licores. 3662, 3725. Limo-
nadas. 3756, 3768, 3769. Lini-
mento. 3786. Mistura. 4324. Pedi-
ludio. 4984. Píldoras. 5117, 5681,
5794, 5812, 5917, 5933, 6015.
Pociones. 6109, 6122, 6202, 6205,
6219, 6381, 6382, 6383, 6384,
6425, 6507, 6519, 6720, 6734.
Polvos. 7181, 7542. Ponches.
8184, 8185. Robs ó tisana. 8291.
Tabletas. 4822, 4978. Tinturas
8678, 8679, 8707, 8725, 8732,
8781. Tisana. 8944. Trociscos.
9158. Vinos. 9402, 9403, 9404,
9422, 9429, 9522, 9523, 9540.
Zumo. 9547.

ASTENIA DE LA MATRIZ. V. *Ame-
norrea*.

ATAXIA. V. *Calentura atáxica*.

ATEROMAS. V. *Lupias*.

ATONÍA. V. *Astenia*.

ATONÍA DEL CONDUCTO DIGESTI-
VO. V. *Atonia de los órganos diges-
tivos*.

ATONIA DEL ESTÓMAGO. V. *Ato-
nia de los órganos digestivos*.

ATONÍA DE LOS ÓRGANOS DI-
GESTIVOS. Aguas sulfurosas, IV,
224. Aguas acidulas, IV, 261.
Aguas ferruginosas, IV, 280. A-
guas salinas, IV, 296. Aguas,
143, 195, 246, 248, 249. Al-
coholatos. 278, 283, 291, 296.
Apocemas. 318, 319, 354. Bálsa-
mos. 392, 433. Bolos. 536, 629,
630, 647, 679, 680, 683. Cafés.
695, 696. Catecú. 2210. Cataplas-
ma. 850. Cervezas. 843, 944, 950,
966. Cocimientos. 987, 988, 990,
991, 1103. Confeccion: 1488. Con-
servas. 1367, 1380. Cremas.
1383. Electuarios. 1502, 1516,
1546, 1547, 1548, 1563, 1584.
Elixires. 1627, 1653, 1655, 1656,
1666, 1667, 1668, 1669, 1674,
1675, 1676, 1677, 1685, 1689,
1691, 1700, 1702, 1704, 1705.
Emplastos. 1752, 1812, 1813,
1814, 1830, 1884. Escudo. 2006.
Esencia. 2020. Especies. 2086. Ex-
tractos. 2203, 2205, 2209, 2227.
Gotas. 2568. Jarabes. 2959, 2964,
2965, 3003, 3043, 3044, 3045,
3062, 3063, 3072, 3091, 3132,
3133, 3227, 3228, 3233, 3279,
3280, 3281, 3282, 3289, 3312,
3327, 3342. Julepes. 3363, 3435.
Infusiones. 2620, 2627, 2628, 2630,
2633, 2650, 2662, 2667, 2668,
2669, 2670, 2681, 2682, 2686. Li-
cores. 3705, 3799. Maceracion.
4223. Miel. 4303. Misturas. 4445,
4525, 4530, 4539, 4542, 4543,
4550, 4551, 4600, 4622, 4624,
4626, 4630. Opiata. 4695. Pasti-
llas. 4840, 4928, 4955. Píldoras.
5023, 5027, 5071, 5346, 5615,
5617, 5618, 5619, 5620, 5623,
5625, 5807, 5812, 5858, 5859,
5947, 5949, 5977, 6003. Pócio-
nes. 6104, 6218, 6220, 6515, 6720,
6729, 6730, 6731, 6732, 6735,
6743. Polvos. 6775, 6813, 6915,
6943, 7010, 7014, 7023, 7122,
7123, 7124, 7182, 7184, 7185,
7186, 7251, 7252, 7253, 7254,

7255, 7322, 7336, 7353, 7426, 7444, 7461, 7491, 7533, 7534, 7535, 7540. Quinta esencia de ajenjos. 8206. Ratafias. 8207, 8224. Sacarolado. 8331. Sales. 8339, 8340. Tabletas. 4839, 4911, 4927, 4964, 4973. Té. 8584. Tinturas. 8596, 8598, 8599, 8600, 8604, 8606, 8607, 8612, 8615, 8617, 8618, 8647, 8651, 8665, 8670, 8680, 8692, 8693, 8703, 8706, 8707, 8709, 8710, 8712, 8713, 8725, 8726, 8768, 8769, 8771, 8780, 8815, 8816, 8817, 8818, 8821, 8825, 8827, 8832, 8833, 8842. Tisanas. 8851, 8852, 8913, 8942, 9015. Trociscos. 9137, 9148. Ungüento. 9210. Vinos. 9406, 9409, 9410, 9411, 9414, 9416, 9417, 9421, 9442, 9443, 9444, 9445, 9448, 9449, 9450, 9480, 9481, 9482, 9488, 9495, 9499, 9506, 9512, 9515, 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9524, 9525, 9527, 9529, 9530, 9531.

ATONÍA DE LOS ÓRGANOS GENITALES. V. *Anafrodisia*.

ATROFIA. Etiope. 2197. Linimentos. 3789, 3794, 3808, 3924, 3927, 4026. Pociones. 6469, 6475, 6477, 6494, 6508, 6512. Polvo. 6827. Tinturas. 8763, 8785. V. *Marasmo y consuncion*.

ATROFIA MESENTÉRICA. Aguas. 232. Baños. 449, 454, 472. Bebida. 481. Bolos. 543. Café. 696. Cataplasmas. 747, 750, 774, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 836. Electuarios. 1511. Emplasto. 1862. Emulsiones. 1918, 1920. Fomentos. 2304, 2332. Lavativas. 3477, 3554, 3628. Licor. 3702. Linimentos. 3934, 3985. Mermelada. 4248. Miel. 4304. Misturas, 4325, 4381, 4427, 4465, 4466, 4557, 4605. Opiata. 4701. Píldoras. 5439, 5563, 5629, 5662, 6019. Pociones. 6156, 6541, 6542, 6692, 6693. Polvos. 6892, 7059, 7302, 7357, 7358, 7456. Pomadas. 7746, 7757, 7758, 7957,

8007, 8025. Tabletas. 4816, 4833, 4895. Tinturas. 8768, 8769. Ungüentos. 9298, 9322.

ATURDIMIENTO. Apocemas. 345. Pediluvios. 4990, 4991.

BAILE DE SAN VITO. V. *Corea*.

BALANITIS. Cataplasmas, 751, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836. Fomento. 2256. Inyecciones. 2732, 2737, 2775. Soluciones. 8365, 8486, 8488.

BARROS. V. *Herpes*.

BERIBERI. Alcoholato. 274. Jara-
bes. 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3170. Julepe. 3369. Linimentos. 3795, 4026. Mistura. 4534. Píldoras. 5594, 5672, 5692. Pociones. 6084, 6166, 6482, 6595, 6744. Tintura. 8666. Vinos. 9417, 9418.

BLEFARITIS. Aguas. 210, 220. Colirios. 1120, 1121, 1122, 1123, 1138, 1166, 1170, 1176, 1205, 1239, 1241, 1257, 1285, 1289, 1296. Linimento. 3829. Pomadas. 7578, 7581, 7603, 7715, 7796, 7992, 8000, 8042, 8044, 8045, 8046, 8072, 8079, 8119. V. *Oftalmia ó inflamaciones del párpado*.

BLEFARITIS GLANDULAR. Colirios. 1168, 1261. Pomadas. 7703, 8067, 8111, 8115, 8132.

BLEFAROFTALMIA (*Oftalmia de los párpados*). Colirios. 1135, 1254. Pomadas. 8013, 8020, 8181.

BLEFARORREA ESCROFULOSA. V. *Oftalmia escrofulosa*.

BLEFAROPTOSIS ó *caida del párpado*. Colirios. 1202, 1205, 1206. Ungüento. 9283.

BLEFAROSPASMO ó *Espasmos de los párpados*. Cataplasmas. 747, 750, 751, 772, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836, 854. Colirios. 1167, 1169, 1228. Fumigacion. 2365. Linimentos, 3903, 3975. Pomada. 8007.

BLENORRAGIA. Aguas sulfuro-
sas, IV, 224. Aguas. 116, 117, 127. Bálsamos. 385, 386, 387,

434. Bebida. 501. Bolos. 540, 5538, 5632, 5704, 5816, 5817, 550, 551, 564, 568, 571, 588, 5828, 5871, 5953, 5956, 6027, 595, 615, 647, 652, 664, 674, 678. 6042. Pociones. 6095, 6096, 6105, 6159, 6160, 6178, 6240, 6254, 6255, 6335, 6393, 6436, 6600, 6620, 6665, 6719, 6744. Polvos. 6828, 6970, 7198, 7471, 7472, 7568. Pomadas. 7582, 7596, 7684, 7957, 7978, 8025, 8079. Soluciones. 8372, 8410, 8486, 8501, 8511, 8580. Supositorio. 8580. Tinturas. 8641, 8688, 8694. Tisanas. 8937, 8938, 8952, 8992. Tratamientos. 9074, 9075, 9090, 9091. Trociscos. 9145. Ungüento. 9168. Vinos. 9426, 9462, 9463, 9464, 9498.
- BLENORREA. Aguas ferruginosas, IV, 280. Aguas. 84, 140, 148. Apocema. 332. Bálsamos. 385, 386, 387. Bolos. 540, 567, 569, 588, 593, 594, 595, 633, 652, 670. Candelillas. 729, 735, 737, 740. Cápsulas. 741. Cocimientos. 1096, 1097. Confites. 1363, 1364, 2584. Conserva. 1379. Electuarios. 1495, 1499, 1522, 1525, 1539, 1600. Elixires. 1639, 1643, 1649. Emulsiones. 1915, 1939, 1940, 1943, 1997. Esencia. 2032. Especies. 2084, 2089. Espiritu. 2155. Fomento. 2285. Grajeas. 2585, 2586, 2587. Granos. 2596. Hidrolado. 2768. Inyecciones. 2690, 2692, 2698, 2699, 2702, 2703, 2710, 2718, 2719, 2721, 2723, 2725, 2729, 2730, 2732, 2734, 2735, 2736, 2737, 2743, 2751, 2754, 2763, 2766, 2767, 2772, 2775, 2778, 2781, 2785, 2787, 2800, 2801, 2808, 2810, 2825, 2828, 2832, 2835, 2837, 2844, 2847, 2848. Jarabes. 3005, 3096, 3097, 3149, 3150. Julepes. 3376, 3377, 3378. Lavativas. 3480, 3521, 3541, 3616. Limonada. 3737. Lociones. 4062, 4138. Looc. 4176. Mermelada. 4238, 4239. Misturas. 4412, 4413, 4420, 4421, 4432, 4441, 4460, 4477, 4496. Mucilago. 4637. Opiatas. 4665, 4666, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4690, 4700. Piedra. 5004. Pildoras.
- 1633, 1654. Emplasto. 1822. Emulsiones. 1818, 1901, 1902, 1912, 1917, 1922, 1923, 1924, 1927, 1929, 1931, 1936, 1939, 1940, 1943, 1946, 1954, 1963, 1964, 1966, 1987. Esencia. 2032. Espiritu. 2155. Extracto. 2229. Fomento. 2346. Gotas. 2551. Grajeas. 2582, 2585, 2587. Hidrolato. 2768. Infusion. 2642. Inyecciones. 2687, 2688, 2691, 2694, 2699, 2700, 2702, 2703, 2709, 2710, 2711, 2712, 2715, 2720, 2724, 2726, 2727, 2728, 2731, 2732, 2733, 2736, 2737, 2741, 2743, 2744, 2745, 2746, 2748, 2752, 2753, 2754, 2757, 2758, 2759, 2761, 2762, 2765, 2766, 2767, 2769, 2773, 2776, 2780, 2786, 2787, 2794, 2795, 2802, 2803, 2804, 2818, 2820, 2823, 2824, 2826, 2829, 2830, 2831, 2833, 2834, 2836, 2846, 2848. Jabones. 2883, 2884. Jalea. 2894. Jarabes. 2970, 2991, 3001, 3004, 3021, 3029, 3040, 3142, 3299, 3315. Julepes. 3377, 3378. Lavativas. 3454, 3469, 3477, 3480, 3520, 3521, 3522, 3541, 3542, 3606. Licores. 3661, 3673, 3714. Linimento. 4021. Locion. 4066. Loocs. 4162, 4163, 4181. Misturas. 4341, 4354, 4355, 4414, 4415, 4422, 4423, 4424, 4432, 4433, 4434, 4459, 4478. Opiatas. 4669, 4670, 4672, 4677, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688. Pastillas. 4858. Pildoras. 5031, 5045, 5046, 5060, 5088, 5089, 5090, 5091, 5259, 5281, 5282, 5287, 5288, 5289, 5293, 5295, 5297, 5300, 5301, 5312, 5316, 5321, 5322, 5323, 5341, 5383, 5385, 5452, 5480, 5481, 5488, 5489, 5525, 5526,

- 5057, 5061, 5186, 5284, 5285, 5290, 5291, 5292, 5294, 5296, 5308, 5316, 5320, 5321, 5322, 5323, 5518, 5526, 5632, 5754, 5791, 5941, 5953, 5976, 6017, 6026, 6058. Pociones. 6227, 6228, 6229, 6241, 6244, 6256, 6257, 6295, 6393, 6600, 6726. Polvos. 6962, 6963, 7249, 7436, 7462, 7495, 7536. Pomada. 7758, 8042, 8044, 8045, 8046, 8061, 8156. Sacarolado. 8300. Soluciones. 8381, 8386. Suero. 8527. Supositorio. 8561. Tinturas. 8637, 8649, 8666, 8694, 8782, 8830. Tisana. 8879. Vinagres. 9393, 9394, 9400. Vinos. 9436, 9522, 9523.
- Bocio. Bálsamos. 397, 416. Bolos. 543, 581, 648, 650, 651. Cataplasma. 774. Collares. 1360, 1361. Emplastos. 1778, 1785, 1877, 1894. Inyeccion. 2702. Jarabes. 3019, 3193. Linimentos. 3783, 3784, 3789, 3996, 4026. Misturas. 4381, 4425, 4426, 4467, 4620. Opiata. 4708. Pastillas. 4852, 4870. Píldoras. 5139, 5141, 5364, 5453, 5564, 5757, 5759, 5764, 5766, 5775, 5776, 5832, 5837. Pociones. 6155, 6267. Polvos. 6866, 7060, 7239, 7515, 7538. Pomadas. 7640, 7715, 7716, 7785, 7934, 7935, 7957, 7967, 7973, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 8154. Remedio. 8242. Saquitos. 8346, 8348, 8350. Soluciones. 8471, 8472, 8515. Tabletas. 4816, 4833, 4869, 4895. Tafetan. 4739. Tintura. 8748, 8749. Ungüento. 9246. Vino. 9539. *V. Escrófulas.*
- BOTRIOCÉFALO. *V. Lombrices.*
- BRONCORREA. Aceite. 16. Elixir. 1638. Opiata. 4699. Píldoras. 5341. Polvos. 6781, 7518. Sacaruro. 8328.
- BRONQUITIS. Agua. 7509. Bálsamo. 406. Baños. 448, 470. Bebida. 482. Bolos. 535, 582, 603, 635. Café. 698. Caldos. 703, 713, 714, 715, 716. Cataplasmas. 747, 750, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 819, 836. Cigarritos. 971, 977, 979. Clavos. 986. Cocimientos. 1034, 1036, 1037, 1070, 1076, 1086, 1087. Conserva. 1370. Cremas. 1389, 1390, 1391, 1393, 1394. Chocolate. 1407. Electuario. 1442. Elixir. 1631. Emplastos. 1798, 1805, 1810, 1866. Emulsiones. 1897, 1905, 1935, 1948, 1981, 1984, 1997. Esencias. 2028, 2044. Eter. 2182. Especies. 2091, 2129. Flores. 2098. Extracto. 2238. Fumigaciones. 2367, 2371, 2383. Gotas. 2563. Hidromel. 2612. Inhalacion. 2616. Infusiones. 2625, 2660. Gelatina. 2896. Jaleas. 2899, 2909, 2911, 2914, 2924, 2925. Jarabes. 2937, 2938, 2939, 2960, 2961, 2963, 2974, 2981, 2988, 2991, 3009, 3010, 3021, 3034, 3035, 3036, 3037, 3048, 3080, 3082, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3136, 3137, 3162, 3163, 3164, 3174, 3203, 3209, 3214, 3224, 3242, 3243, 3247, 3255, 3260, 3261, 3262, 3263, 3267, 3268, 3276, 3297, 3318, 3329, 3330, 3347, 3352. Julepes. 3369, 3381, 3382, 3396, 3401, 3402, 3409, 3420, 3421, 3422, 3423, 3428. Linimentos. 3771, 3772, 3798. Looc. 4160, 4162, 4164, 4166, 4174, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4184, 4188, 4189, 4192, 4193, 4194, 4196, 4197, 4200, 4203, 4204, 4205, 4209, 4220. Mezcla. 4274. Melito. 4311. Mermeladas. 4242, 4243, 4247, 4248. Misturas. 4357, 4455, 4568, 4585. Ojímieles. 4652, 4654. Palamoud. 2253. Pastas. 4759, 4760, 4761, 4777, 4778, 4786, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796. Pastillas. 4818, 4855, 4859, 4875, 4881, 4884, 4885, 4888, 4889, 4897, 4898, 4900, 4916, 4963. Píldoras. 5044, 5047, 5051, 5056, 5101, 5103, 5104, 5147, 5166, 5284, 5310, 5328, 5340, 5350, 5358, 5359, 5395, 5407, 5408, 5466, 5595, 5687, 5750, 5806, 5849, 5880.

- Pociones. 6077, 6079, 6081, 6082, 6105, 6108, 6124, 6125, 6200, 6201, 6223, 6259, 6263, 6273, 6274, 6286, 6287, 6312, 6396, 6430, 6433, 6479, 6480, 6482, 6487, 6509, 6551, 6567, 6568, 6595, 6609, 6629, 6630, 6631, 6635, 6637, 6638, 6639, 6701, 6716, 6765. Polvos. 6826, 6833, 6980, 6985, 6989, 6994, 6995, 6997, 6999, 7002, 7202, 7203, 7231, 7273, 7354, 7368, 7542. Pomadas. 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7994. Racahout. 2254. Sacaruro. 8328. Solucion. 8496. Sueros. 8537. Tabletas. 4809, 4810, 4813, 4814, 4815, 4828, 4829, 4901, 4918, 4920, 4923, 4925, 4936, 4937, 4952, 4953. Tinturas. 8691, 8731, 8776. Tisanas. 8889, 8934, 8950, 8952, 8978, 8980, 8981, 8982. Ungüento. 9244.
- BRONQUITIS CRÓNICA.** Aceite. 54. Aguas sulfurosas, IV, 224. Aguas. 115, 231, 232, 234, 256. Apocemas. 341, 355. Bálsamo. 402. Bebidas. 482, 514. Bolos. 535, 577, 621, 634, 655. Caldos. 709, 719. Cigarros. 974, 975, 980. Cocimientos. 1074, 1075, 1085, 1087, 1102. Conserva. 1370. Cremas. 1389, 1392. Chocolates. 1407, 1408, 1409, 1410, 1412. Electuarios. 1508, 1509, 1512, 1559, 1571. Elixires. 1634, 1689. Emplasto. 1868. Emulsiones. 1923, 1950, 1997. Especies. 2124, 2125, 2126, 2128, 2138. Frutos. 2113. Fumigaciones. 2369, 2384. Gelatina. 2891, 2896, 2920. Hidromel. 2612, 2613. Infusiones. 2644, 2653. Jabones. 2855, 2867. Jaleas. 2892, 2895, 2908, 2909, 2910, 2911, 2921, 2922, 2925. Jarabes. 2937, 2960, 2961, 3004, 3007, 3012, 3020, 3083, 3098, 3135, 3136, 3137, 3157, 3244, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3263, 3265, 3267, 3268, 3269, 3273, 3285, 3293, 3297, 3317, 3318, 3320, 3329, 3347. Julepes. 3356, 3365, 3399, 3400, 3403, 3410, 3419.
- Leche. 3636. Licor. 3663. Lini-mento. 3998. Looc. 4164, 4171, 4175, 4189, 4193, 4198, 4202, 4205, 4206, 4207, 4214. Merme-lada. 4240, 4241, 4243, 4246. Mezclas. 4251, 4274, 4292. Mie-les. 4300. Melitos. 4311. Mistu-ras. 4356, 4420, 4519, 4544, 4587, 4612, 4629, 4633. Ojimieles. 4647, 4649, 4651, 4655. Opiata. 4705. Pastas. 4753, 4759, 4760, 4776, 4779, 4780, 4781, 4785, 4794, 4795. Pastillas. 4853, 4862, 4881, 4899, 4951. Píldoras. 5098, 5099, 5101, 5102, 5166, 5254, 5263, 5284, 5288, 5306, 5318, 5319, 5451, 5456, 5457, 5541, 5586, 5592, 5594, 5600, 5605, 5695, 5696, 5749, 5751, 5849, 5892, 5893, 5894, 5934, 5971, 5992, 6029. Pociones. 6080, 6105, 6108, 6259, 6260, 6261, 6265, 6296, 6309, 6310, 6481, 6483, 6484, 6485, 6509, 6546, 6547, 6548, 6584, 6569, 6570, 6632, 6633, 6636, 6637, 6638, 6639, 6643, 6678, 6679, 6681, 6705, 6716, 6719, 6720. Polvos. 6781, 6834, 6835, 6836, 6979, 6985, 6997, 7210, 7215, 7229, 7230, 7238, 7241, 7242, 7268, 7269, 7272, 7349, 7437, 7438, 7542. Pomada. 7994. Sacarolado. 8314. Sacaruro. 8328. Solucion. 8373. Tabletas. 4824, 4826, 4828, 4829, 4864, 4907, 4908, 4909, 4910, 4920, 4938, 4949, 4950, 4959. Tintura. 8610, 8629, 8655. Ti-sana. 8855, 8945, 8962, 8971, 8979, 8983. Trociscos. 9144. Vi-nagre. 9382. Vinos. 9481, 9482, 9483. Zumo. 9556.
- BUBONES.** Bálsamo. 405. Cata-plasmas. 808, 813, 827. Emplas-tos. 1751, 1773, 1777, 1809, 1835, 1849, 1850, 1851, 1874. Espadra-po, 2060, 2067. Fomentos. 2337, 2340, 2342. Inyeccion. 2697. Li-nimentos. 3787, 3952, 3954. Mis-tura. 4329. Pomadas. 7726, 7773, 7774, 7775, 7910, 7948, 7970, 7974, 7978, 8082. Soluciones.

8428, 8505. Tintura. 8750. Tratamiento. 9076. Trociscos. 9151, 9152, 9153. Ungüentos. 9195, 9249, 9253, 9263, 9264, 9267, 9297.

BUBON VENEREO INFLAMATORIO. *V. Bubones y sífilis.*

BULIMIA. Café. 696. Chocolates. 1400, 1404, 1405, 1407, 1413. Palamoud. 2253. Pastillas. 4881. Pildoras. 5658, 5755, 5775, 5934. Pociones. 6447, 6742. Polvo. 7480. Racahout. 2254. Tabletas. 4846.

CAIDAS. *V. Contusiones.*

CAIDA DEL RECTO. *V. Protoproctosis.*

CALAMBRES. Linimentos. 3798. 4026.

CALAMBRES DE ESTÓMAGO. *V. Gastralgia.*

CÁLCULOS BILIARIOS. Aguas salinas, VI, 296. Eteres. 2189, 2195. Jabones. 2856, 2861, 2862. Jarabes. 3078, 3211. Linimento. 3912. Misturas. 4560, 4636. Pildoras. 5454, 5689, 6035. Tisana. 8874. Zumos. 9545, 9564.

CÁLCULOS URINARIOS. Aguas ácidas, IV, 261. Aceite. 2. Aguas. 77, 78, 116, 117, 169, 230, 263. Bebidas. 479, 480, 497, 507. Cataplasmas. 747, 750, 751, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836. Cervezas. 946, 960. Fomentos. 2301, 2304. Gotas. 2575. Inyeccion. 2798. Jabones. 2856, 2858, 2880. Jarabes. 2978, 3040, 3240, 3394. Lavativas. 3477, 3554. Lejía. 3656. Licores. 3673, 3715. Locion. 4122. Loocs. 4160, 4180, 4211. Misturas. 4347, 4429, 4559. Pastillas. 4831. Pildoras. 5092, 5689, 5964. Pociones. 6265, 6389, 6439, 6595, 6597, 6598, 6707. Polvos. 7381, 7494, 7570. Robs. 8286, 8291. Solucion. 8499. Suero. 8531. Tabletas. 4804. Tintura. 8701. Tisanas. 8845, 8846, 8847, 8850, 8866, 8911, 8930, 8937, 8974, 8991. Vino. 9460.

CALENTURAS ADINÁMICAS. Acci-

te. 34. Aguas. 104, 140, 147, 189. Alcoholato. 299. Bebidas. 478, 523. Bolos. 535, 680. Cataplasma. 762. Cocimientos. 1000, 1001, 1002, 1004, 1019, 1020, 1038, 1039, 1094, 1095. Electuarios. 1487, 1551. Elixir, 1671. Emulsion. 1956. Esencia. 2019. Infusiones. 2681, 2685. Julepe. 3374. Láudano. 3446. Lavativas. 3467, 3495, 3605. Limonadas. 3748, 3749, 3759, 3761. Locion. 4107. Misturas. 4332, 4566, 4600. Pildoras. 5242, 5931, 5933. Pociones. 6109, 6200, 6201, 6204, 6205, 6325, 6380, 6383, 6519, 6535, 6536, 6537, 6686, 6727, 6728, 6733, 6749. Polvos. 6853, 7367, 7496. Solucion. 8416. Tinturas. 8612, 8836. Tisanas. 8913, 8944, 9016, 9021. Vinagres. 9354, 9387, Vino. 9522, 9523.

CALENTURA AMARILLA. Electuario. 1583. Pildoras. 5610, 5656. Limonada. 3756. Mistura. 4351. Vinagre. 9364.

CALENTURAS ATÁXICAS. Aceite. 34. Ácidos. 67, 70. Alcohol. 272. Bebidas. 478, 523. Bolos. 559, 571, 659. Cocimientos. 1001, 1002, 1019, 1020, 1094, 1095, 1104. Electuarios. 1487, 1551, 1583. Emulsiones. 1899, 1956. Eteres. 2183, 2186, 2191. Jarabes. 3018, 3341. Julepes. 3375, 3415, 3416, 3417. Láudano. 3449. Lavativa. 3493. Limonadas. 3726, 3748, 3749, 3759, 3760, 3761, 3770. Misturas. 4328, 4344, 4345, 4392, 4567, 4568. Pildoras. 5030, 5160, 5275, 5580, 5654, 5658, 5931, 5933, 5934. Pociones. 6109, 6157, 6163, 6164, 6165, 6166, 6168, 6169, 6200, 6201, 6202, 6205, 6273, 6274, 6325, 6380, 6386, 6425, 6535, 6536, 6537, 6564, 6611, 6612, 6727, 6728, 6734, 6749. Polvos. 6853, 6938, 7335, 7496. Ponche. 8184. Tisanas. 8016, 9021. Tinturas. 8612, 8627. Vinagres. 9354, 9364, Vino. 9535.

CALENTURA ATÁXICO-ADINÁMICA.

V. *Calentura atáxica y calentura adinámica.*

CALENTURAS BILIOSAS. Aguas acidulas, IV, 261. Aguas. 187, 188, 7509. Bebida. 523. Conserva. 1371. Elíxires. 1640, 3658. Enema. 3519. Jarabes. 2940, 2952, 2953, 2958, 3321, 3341. Julepes. 3357, 3358, 3380. Lavativas. 3589, 3596. Limonadas. 3730, 3731, 3736, 3759, 3761, 3762. Mistura. 4419. Ojimiél. 4656. Píldoras. 5069. Pociones. 6248, 6509. Polvos. 6789, 7331, 7376, 7450, 7479, 7508, 7510, 7530, 7570. Suero. 8540. Tabletas. 4865, 4979. Tintura. 8755. Tisanas. 8845, 8906, 8907. Zumos. 9546, 9549.

CALENTURAS CATARRALES. Bolos. 559, 603, 626. Misturas. 4502, 4515. Poción. 6226.

CALENTURAS ERUPTIVAS. V. *Escarlatina, sarampion, alfombri-lla, viruelas.*

CALENTURA GÁSTRICA. V. *Calentura biliosa.*

CALENTURAS GRAVES. V. *Calentura nerviosa, calentura pútrida y tifo.*

CALENTURA HÉCTICA. Electuarios. 1500, 1561, 1598. Elíxir. 1700. Esencia. 2019. Jarabes. 3083, 3162, 3266, 3268. Píldoras. 5067. Pociones. 6084, 6102, 6595, 6727, 6728, 6734, 6742. Polvos. 7403, 7547, 7548. Remedio. 8270.

CALENTURA INFLAMATORIA. Aguas. 187, 219. Alcohol. 271. Bebidas. 487, 495, 496. Caldos. 719, 721, 722. Cocimientos. 1033, 1035, 1036, 1037, 1061, 1081. Elíxir. 1640. Emulsiones. 1932, 1962, 1971. Enemas. 3518, 3519. Especies. 2112. Hidrógala. 2609. Jarabes. 2952, 2953, 2971, 3095, 3130. Julepes. 3357, 3358, 3380. Lavativa. 3589. Limonadas. 3729, 3730, 3731, 3733, 3735, 3739, 3756, 3757, 3761, 3762, 3765, 3766. Misturas. 4419, 4501, 4503, 4571, 4601. Pastillas. 4803. Pociones. 6248, 6250, 6523. Polvos.

6888, 7410, 7530. Semillas. 2111. Solucion. 8475. Sueros. 8536, 8540. Tisanas. 8892, 8895, 8898, 8899, 8906, 8907, 8956, 8991, 8997, 9012. Vinagre. 9384. Vino. 9455. Zumos. 9546, 9549.

CALENTURAS INTERMITENTES. Acido. 60. Aguas ferruginosas, IV, 280. Aguas salinas, IV, 296. Aguas. 163, 202, 243. Apocemas. 317, 318, 329, 342, 343. Bolos. 536, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 668, 669. Café. 700. Caldo. 702, 706. Cervezas. 960, 965, 966. Cocimientos. 1042, 1059, 1090, 1098. Electuarios. 1456, 1457, 1458, 1466, 1468, 1485, 1500, 1511, 1521, 1538, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1569, 1570, 1582, 1583, 1595, 1597. Elíxires. 1655, 1656, 1670, 1671, 1704, 1705. Emplastos. 1871, 1872. Emulsiones. 1906, 1951, 1952, 1994. Especies. 2076, 2077. Extracto. 2203. Friccion. 2356. Gelatina. 2928. Gotas. 2571, 2572, 2573. Granos. 2592. Infusiones. 2647, 2651, 2662. Jalea. 2912. Jarabes. 3018, 3050, 3054, 3279, 3280, 3281, 3282, 3312, 3313. Julepe. 3404. Lavativas. 3492, 3496, 3558, 3559, 3560, 3603, 3604, 3610, 3611, 3621. Licores. 3682, 3683, 3684, 3685, 3686. Linimentos. 3793, 3795, 3796, 3797, 3808, 3830, 3868, 3922, 3927, 4003, 4004, 4026. Locion. 4109. Miel. 4305. Misturas. 4504, 4536, 4600, 4617. Opiatas. 4675, 4696, 4697, 4698, 4708. Pastillas. 4873, 4889. Píldoras. 5032, 5047, 5063, 5234, 5235, 5252, 5264, 5279, 5326, 5375, 5388, 5406, 5433, 5435, 5563, 5567, 5616, 5621, 5629, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5655, 5656, 5657, 5658, 5681, 5692, 5755, 5766, 5789, 5801, 5813, 5895, 5896, 5898, 5933, 5934, 5935,

5946, 5954, 5955, 5974, 5980, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5997, 6006, 6007, 6018, 6024, 6040. Pociones. 6109, 6187, 6196, 6218, 6222, 6223, 6224, 6299, 6313, 6314, 6493, 6494, 6495, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6530, 6531, 6532, 6534, 6535, 6536, 6537, 6581, 6589, 6638, 6639, 6665, 6688, 6722, 6723, 6724, 6725. Polvos. 6887, 6924, 6950, 7027, 7040, 7042, 7126, 7276, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7295, 7296, 7301, 7394, 7455, 7460, 7461, 7465, 7466, 7498, 7520, 7531. Pomadas. 7668, 7759, 7894, 7896, 7897, 7898, 7907, 7969, 8102, 8145, 8177. Ratafia. 8207. Remedio. 8272. Robs. 8291. Sacarolado. 8320. Sinapismo. 8354. Soluciones. 8367, 8386, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8420, 8445. Supositorio. 8579. Tabletas. 4805, 4969. Tinturas. 8599, 8603, 8606, 8607, 8612, 8718, 8721, 8725, 8770, 8809, 8810, 8825, 8826. Tisanas. 8874, 8920, 8986. Vinos. 9401, 9409, 9410, 9430, 9488, 9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 9498, 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9526, 9534, 9535, 9538, 9541.

CALENTURAS INTERMITENTES PERNICIOSAS. Linimento. 3831. Polvos. 7292, 7313, 7460.

CALENTURAS INTERMITENTES DE LOS NIÑOS. Jarabes, 3146, 3207, 3283, 3292. Miel. 4310. Pastillas. 4827.

CALENTURAS LARVADAS. Se las tratará del mismo modo que las calenturas intermitentes perniciosas.

CALENTURA LENTA. *V. Calentura héctica.*

CALENTURA MALIGNA. *V. Calentura atáxica.*

CALENTURA MUCOSA. Agua. 7509.

Apocema. 319. Píldoras. 5621. Poción. 6766. Sinapismo. 8354. Vinos. 9405, 9406, 9407.

CALENTURAS NERVIOSAS. *V. Calentura atáxica.*

CALENTURAS NERVIOSAS Y PÚTRIDAS. *V. Calenturas atáxicas y adinámicas.*

CALENTURA PUERPERAL. Linimento. 3798. Mistura. 4468. Poción. 6082. Suero. 8542. Ungüento. 9270.

CALENTURA PÚTRIDA. Aguas acídulas, IV, 261. Acido. 71. Agua. 103. Bolos. 571. Cocimientos. 1001, 1002, 1006, 1007, 1008, 1019, 1020, 1072, 1092. Electuarios. 1583, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611. Emulsion. 1899. Jarabe. 2957. Julepes. 3361, 3375. Lavativa. 3493. Limonadas. 3726, 3760, 3770. Misturas. 4344, 4345. Píldoras. 5160. Pociones. 6157, 6202, 6205, 6318, 6523, 6727, 6728. Polvos. 6938, 6985, 7367. Ponche. 8184. Solución. 8416. Trociscos. 9161. Vinagre. 9399. *V. Calentura adinámica.*

CALENTURAS REMITENTES. Bolos. 637. Jarabe. 3146. Píldoras. 5935. Pociones. 6187, 6523. Polvos. 7281, 7460. *V. además calenturas intermitentes.*

CALENTURAS REUMATICAS. Pediluvios. 4990, 4991. Polvos. 7202, 7203, 7368. *V. Reumatismo.*

CALENTURAS TIFOIDEAS. *V. Tifo.*

CALENTURAS VERMINOSAS. *V. Lombrices.*

CALVICIE. *V. Alopecia.*

CALLOS, CLAVOS. Cataplasmas. 780, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 807, 814, 815, 817, 836. Emplastos. 1726, 1729, 1759, 1786, 1787, 1788, 1789, 1824, 1828, 1836, 1842, 1843, 1844, 1845, 1853. Licor. 3721. Pediluvios. 4981. Pomadas. 7789, 8183. Solución. 8500. Tópico. 9047.

CÁNCER. Aguas. 129, 256. Alcoholaturo. 314. Bálsamo. 421.

Baño. 460. Bolos. 597. Cata-
 plasmas. 747, 750, 751, 755,
 772, 780, 781, 797, 802, 813,
 817, 818, 854. Cáusticos. 855,
 858, 859, 860, 861, 862. Cera-
 tos. 903, 912. Emplastos. 1738,
 1739, 1742, 1743, 1760, 1775,
 1776, 1778, 1799, 1846, 1857,
 1858, 1877, 1894. Especies. 2092,
 2118, 2119. Infusiones. 2623,
 2660. Inyecciones. 2701, 2704. Li-
 cor. 3667. Linimentos. 3837, 3970.
 Lociones. 4045, 4075, 4114. Mez-
 clas. 4250, 4286. Mistura. 4438.
 Pasta. 4774. Piedra. 5003. Píldo-
 ras. 5014, 5015, 5034, 5038,
 5047, 5051, 5093, 5260, 5331,
 5332, 5349, 5353, 5359, 5377,
 5396, 5400, 5431, 5446, 5662,
 5787, 6008, 6053. Pociones. 6312,
 6595. Polvos. 6772, 6796, 6947,
 6984, 7204, 7226. Pomadas. 7602,
 7605, 7675, 7676, 7816, 7870,
 7876, 7925, 7952, 7966, 7991,
 7993, 7996, 7997, 7998, 8007,
 8102, 8143, 8164, 8177. Pulpas.
 8196. Remedios. 8244, 8246. So-
 luciones. 8367, 8386, 8388, 8424,
 8445, 8471, 8472, 8496. Tintu-
 ra. 8716. Tópicos. 9031, 9043.

CÁNCER DE LA MATRIZ. Infusion.
 2660. Inyecciones. 2749, 2762,
 2815, 2816. Locion. 4075. Mezcla.
 4286. Mistura. 4439. Tinturas.
 8715, 8716. V. *Cáncer*.

CÁNCER DE LOS PECHOS. Aceite.
 24. Jabon. 2864. Píldoras. 5767.
 Pomada. 7724. Solucion. 8496.

CAQUEXIA. Aguas. 115. Coci-
 miento. 1088. Chocolate. 1407.
 Electuarios. 1500, 1551. Eli-
 xir. 1697. Gragea. 2592. Infu-
 sion. 2651. Jaleas. 2912, 2923,
 2926. Jarabes. 2962, 3028, 3342.
 Lavativa. 3582. Opiata. 4708. Pas-
 tillas. 4878, 4881. Píldoras. 5047,
 5067, 5377, 5388, 5658, 5754,
 5805, 5808, 5813, 5934, 6025,
 6053. Pociones. 6166, 6742. Pol-
 vos. 6915, 6940, 7388, 7480,
 7496. Sal. 8340. Tabletas. 4877,
 4920. Tinturas. 8599, 8838. Vi-

nos. 9402, 9522, 9523. V. *Astenia*.

CAQUEXIA POR CALENTURAS IN-
 TERMITENTES. V. *Calenturas in-*
termitentes.

CAQUEXIA HEMORROIDAL. V. *He-*
morroides.

CAQUEXIA HIDRÓPICA. V. *Hidro-*
pesias.

CAQUEXIA ESCROFULOSA. V. *Es-*
crofulas.

CAQUEXIA SIFILÍTICA. V. *Sifilis*.

CARBUNCLOS. Fomento. 2292. In-
 fusiones. 2648, 2649, 2663. Inyec-
 ciones. 2828, 2836. Locion. 4131.
 Remedio. 8243.

CARBUNCLO PESTILENCIAL: Cata-
 plasmas. 747, 750, 751, 762, 772,
 796, 801, 802, 807, 854. Digesti-
 vos. 1429, 1431. Inhalacion. 2616.
 Infusion. 2664. Inyecciones. 2813.
 V. *Peste*.

CARCINOMAS. Cáusticos. 861,
 862. Cerato. 870. Etiopes. 2197,
 2198. Infusion. 2654. Pasta. 4774.
 Polvos. 6948, 6949. Tintura. 8674.
 Ungüento. 9245. V. *Cánceres*.

CARDIALGIA, GASTRALGIA. Aguas
 acidulas, IV, 261. Aguas ferru-
 ginosas, IV, 280. Aguas. 77, 116,
 117, 159, 160, 165, 248. Alco-
 holato. 299. Bálsamo. 391. Bolos.
 548, 553, 561, 573, 645, 659,
 674. Cataplasmas. 789, 790, 791,
 795, 797, 799, 814, 815, 819, 836,
 840, 842. Cigarros. 971. Chocola-
 te. 1413. Electuarios. 1585, 1607,
 1608, 1609, 1610, 1611. Elíxires.
 1668, 1713. Emplastos. 1738,
 1739, 1744. Emulsion. 1920. Es-
 cudos. 2005, 2006. Epitemas.
 2012, 2017. Especies. 2093. Espí-
 ritus. 2151. Fomentos. 2317. Go-
 las. 2560. Jarabes. 3057, 3058,
 3059, 3086, 3186, 3394. Julepe.
 3417. Láudanos. 3446, 3449. La-
 vativas. 3453, 3472, 3477, 3495,
 3549, 3550, 3551, 3554, 3590,
 3609. Linimentos. 3771, 3772,
 3783, 3784, 3815, 3855, 3887,
 3968, 3987, 4026. Looc. 4183.
 Mezcla. 4260. Misturas. 4394,
 4405, 4446, 4498, 4562, 4568,

4613. Pediluvios. 4980, 4990, 4227, 4228. Odontina. 4644. Odontálgico. 4645. Pastas. 4751, 4766, 4772. Polvo. 7142. Tópico. 9036. V. *Odontalgia*.
- CARIES SIFILÍTICA. Inyeccion. 2805. Poción. 6571. Tisana. 8965. V. *Sífilis*.
- CARIES DE LAS VÉRTEBRAS. Mal de Pott. V. *Escrófulas*.
- CARNES FUNGOSAS. V. *Ulceras fungosas*.
- CARRASPERA. V. *Angina*.
- CATALEPSIA. V. *Histérico y neurosis*.
- CATARATA. Cataplasmas. 772, 854. Colirios. 1166, 1172, 1173, 1205, 1211, 1212, 1216, 1228, 1229, 1234, 1236, 1248, 1257, 1283, 1284, 1291. Embrocaciones. 1710, 1714, 1724. Linimentos. 3773, 3774. Polvos. 6777, 6779, 7202, 7203, 7358. Pomadas. 7686, 7719, 7746, 7756, 7758, 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 7973, 8007, 8025, 8095, 8173, 8177. Tratamiento. 9077. Ungüento. 9282.
- CATARRO INTESTINAL. V. *Diarrea*.
- CATARRO PULMONAL AGUDO. V. *Bronquitis aguda*.
- CATARRO PULMONAL CRÓNICO. V. *Bronquitis crónica*.
- CATARRO SOFOCANTE. Looc. 4204. Píldoras. 5051.
- CATARRO DE LA URETRA. V. *Cistitis*.
- CATARRO ÚTERO VAGINAL. V. *Leucorrea*.
- CATARRO DE LA VEJIGA Y DEL APARATO URINARIO. V. *Cistitis*.
- CAUTERIOS. V. *Fuentes*.
- CEÁTICA. Aceite. 35. Aguas min. sulfurosas, IV, 224. Agua. 128. Alcoholato. 274. Bálsamos. 360, 361, 377, 414, 417, 435. Baños. 461, 474. Bolos. 609. Cataplasmas. 752, 753, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 802, 814, 836, 854. Emplastos. 1741, 1760, 1837, 1858. Emulsiones. 1980, 1992, 1994. Especies. 2117. Extracto.
4613. Pediluvios. 4980, 4990, 4991. Píldoras. 5059, 5095, 5096, 5097, 5125, 5144, 5147, 5157, 5169, 5170, 5223, 5226, 5329, 5337, 5350, 5358, 5359, 5360, 5361, 5390, 5395, 5484, 5485, 5486, 5487, 5700, 5774, 5779, 5788, 5797, 5866, 5869, 5870, 5880, 5922. Pociones. 6062, 6064, 6084, 6116, 6140, 6167, 6247, 6293, 6311, 6336, 6362, 6363, 6386, 6439, 6549, 6555, 6558, 6595, 6709. Polvos. 6810, 6816, 6829, 6879, 6880, 6889, 6890, 6891, 6994, 6996, 6998, 6999, 7001, 7003, 7018, 7019, 7041, 7061, 7062, 7088, 7090, 7096, 7097, 7098, 7134, 7149, 7201, 7316, 7317, 7341, 7392, 7407, 7482, 7491, 7492, 7569, 7574. Pomada. 7628. Saquitos. 8345, 8346. Tabletas. 4940, 4941. Tinturas. 8661, 8671, 8680, 8735, 8739, 8745, 8833. Tisana. 8894. Vinagres. 9388, 9389. Vinos. 3447, 9402, 9403, 9404. Ungüento. 9276.
- CARDIOPALMIA. V. *Palpitaciones de corazón*.
- CARDITIS. Baño. 456. Bolos. 606, 620. Linimentos. 3771, 3772. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5495, 5554. Pociones. 6403, 6418, 6427, 6595, 6709. Polvos. 7200, 7202, 7203. Pomadas. 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 8007, 8025, 8102.
- CARIES. Aguas min. salinas, IV, 296. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Cocimiento. 1065. Fomentos. 2289, 2306. Inyecciones. 2702, 2774, 2845. Jarabe. 2956. Lociones. 4075, 4134. Piedra. 5003. Píldoras. 5455. Polvo. 7395. Solucion. 8474. Tintura. 8773. Vinagre. 9386.
- CARIES DE LOS DIENTES. Agua. 134. Catecú. 2210. Cimentos. 981, 982, 4646. Elixires. 1665, 1678. Emplasto. 1750. Enjuagatorio. 2004. Eter. 2181. Gargarismo. 2516. Inyeccion. 2738. Masas.

2245. Grasa. 2599. Lavativa. 3619. Licor. 3664. Linimentos. 3783, 3784, 3787, 3789, 3791, 3796, 3797, 3808, 3853, 3931, 3932, 3944, 3945, 3969, 3974, 3987, 4015, 4019, 4020, 4026. Locion. 4133. Looc. 4218. Mielles. 4314, 4315. Misturas. 4620, 4628, 4352. Papeles. 4725, 4726. Píldoras. 5034, 5173, 5527. Pociones. 6084, 6089, 6105, 6212, 6284, 6285, 6418, 6508, 6512, 6534, 6595, 6724, 6725, 6744, 6746. Polvos. 6783, 6978. Pomadas. 7602, 7651, 7790, 7894, 7896, 7897, 7898, 7904, 7905, 7922, 8033, 8034, 8167. Sinapismo. 8358. Soluciones. 8382, 8383. Tafetan. 4739. Tinturas. 8622, 8625, 8626, 8628, 8667, 8668, 8733, 8740. Tratamiento. 9099. Ungüentos. 9270, 9276, 9316. Vinos. 9458, 9460. V. *Neuralgias y reumatismos.*

CEFALALGIA. Aceite. 11. Agua. 92. Alcoholato. 299. Bálsamos. 422, 423. Bolos. 673. Cerveza. 952. Emplastos. 1770, 1771, 1837, 1869, 1884. Epitema. 2011. Esencias. 2022, 2045. Especies. 2097. Fomento. 2261. Frontales. 2358, 2359, 2360. Lavativas. 3474, 3554, 3596, 3599, 3600. Mistura. 4358. Moscas. 9348, 9349. Píldoras. 5026, 5030, 5105, 5185, 5223, 5384, 5406, 5438, 5651, 5755, 5796, 5933, 5934, 5935. Pociones. 6183, 6337, 6519. Polvos. 6819, 6837, 7038, 7218, 7219, 7257, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263, 7521. Pomada. 7602. Soluciones. 8397, 8441. Tinturas. 8643, 8646, 8739. Tópico. 9044.

CEFÁLEA. V. *Cefalalgia.*

CIANOSIS. Agua. 169. Pediluvios. 4980, 4990, 4991. Pocion. 6595. Polvo. 7434.

CICATRICES. Pomada. 7728.

CICATRICES DE LA CórNEA. V. *Manchas de la córnea.*

CIFOSIS. Pomada. 7791.

CISTITIS AGUDA ó *Catarro agudo de la vejiga.* Aguas acidulas, to-

mo IV, pág. 261. Aguas salinas, tomo IV, pág. 296. Apocema. 344. Baños. 448, 474. Bolos. 571, 583, 677. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836. Cerveza. 953. Cocimiento. 1076. Confeccion. 1446. Elixir. 1640. Emulsiones. 1903, 1931, 1932, 1934, 1935, 1944, 1946, 1953, 1954, 1963, 1964, 1967, 1987. Especies. 2112. Fomentos. 2304, 2317. Jarabes. 2970, 3040, 3218, 3247, 3271. Lavativas. 3469, 3554, 3606. Leche. 3652. Licor. 3673. Linimentos. 3783, 3784, 3796, 3797, 3798, 3919, 3987, 3998, 4025, 4026. Loocs. 4160, 4162, 4163, 4177, 4178. Misturas. 4341, 4629. Pediluvios. 4984, 4990, 4991. Píldoras. 5045, 5103, 5304, 5340, 5385, 5458, 5459, 5672, 5689, 5851, 5878, 5956, 6026. Pociones. 6123, 6250, 6436, 6620. Polvos. 7325, 7381, 7434, 7471. Pomadas. 7596, 7894, 7896, 7897, 7898. Robs. 8286. Semillas. 2111. Tisanas. 8866, 8920, 8934, 8935, 8937, 8938, 8939. Trociscos. 9139. Ungüentos. 9168, 9173, 9298.

CISTITIS CRÓNICA. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 140, 141, 142, 225, 234. Cerveza. 947. Emulsiones. 1990, 1991, 1993, 1997. Especies. 2101. Inyecciones. 2742, 2819. Jalea. 2934. Jarabe. 3021. Limonada. 3737. Misturas. 4422, 4423. Píldoras. 5341, 6028, 6029, 6030, 6031. Pociones. 6082, 6553. Polvo. 7381. Zumo. 9553.

CLAVOS. V. *Callos.*

CLOROSIS. Aguas minerales acidulas; IV, 261. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 109, 113, 120, 121, 156, 157, 153, 159, 160, 161, 164, 165, 195, 196, 202. Alcoholato. 285. Apocema. 321. Baños. 454, 462. Bebida. 506. Bizcochos. 524, 525.

- Bolos. 573, 584, 613, 615, 617, 631, 645, 646. Cataplasma. 774. Cerveza, 951. Cocimientos. 987, 1102. Confeccion. 1602. Chocolates. 1402, 1404, 1405, 1413, 1414. Electuarios. 1511, 1582, 1585, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611. Elixires. 1625, 1626, 1629, 1643, 1672, 1680, 1687, 1688. Emplasto. 1754. Emulsion. 1959. Especies. 2078. Gotas. 2579. Grajeas. 2581, 2590. Granitos. 2589. Infusion. 2621. Jabones. 2851, 2878. Jarabes. 2944, 2946, 2982, 3028, 3038, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3063, 3068, 3110, 3147, 3148, 3149, 3151, 3184, 3185, 3191, 3229, 3311. Julepe. 3359. Licor. 3698. Limaduras. 7347, 7348. Misturas. 4537, 4566. Panes. 4712, 4714, 4715. Pasta. 5095. Pastillas. 4844, 4845, 4846, 4861, 4866, 4878, 4887, 4890, 4903, 4904, 4971. Pediluvios. 4982, 4984. Píldoras. 5030, 5094, 5166, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5154, 5273, 5334, 5346, 5374, 5376, 5377, 5378, 5386, 5409, 5460, 5461, 5462, 5572, 5575, 5578, 5580, 5581, 5589, 5593, 5624, 5659, 5660, 5663, 5664, 5685, 5687, 5722, 5723, 5724, 5725, 5727, 5728, 5729, 5748, 5755, 5766, 5793, 5794, 5808, 5809, 5810, 5850, 5885, 5950, 5975, 5982, 5997, 5999, 6011, 6014, 6016, 6018, 6025, 6039, 6053. Pociones. 6338, 6533. Polvos. 6777, 6779, 6820, 6838, 6839, 6840, 6975, 7014, 7191, 7205, 7299, 7300, 7314, 7346, 7389, 7390, 7393, 7444, 7532, 7534, 7535, 7538, 7541. Pomada. 7973. Sacaruros. 8306, 8311. Sacarolado. 8310. Suero. 8532. Tabletas. 4877, 4923. Tinturas. 8591, 8592, 8598, 8603, 8678, 8680, 8704, 8727, 8749, 8760, 8768, 8769, 8771, 8838. Tisana. 8933. Tópico. 9053. Vinagres. 9366, 9385. Vinos. 9402, 9403, 9404, 9405, 9420, 9426, 9439, 9440, 9441, 9451, 9497, 9503, 9505.
- CÓLERA MORBO ASIÁTICO. Elixir. 1666. Jarabe. 2972. Lavativa. 3507. Linimento. 3863. Misturas. 4360, 4527, 4528, 4621, 4625. Píldoras. 5584. Pociones. 6141, 6142. Ponche. 8184. Sinapismos. 8359, 8360, 8361, 8362. Tintura. 8597. Vinagre. 9395.
- CÓLERA MORBO ESPORÁDICO. Agua. 7509. Alcoholato. 302. Elixir. 1707. Emulsion. 1910. Epitema. 9079. Eteres. 2190, 2191. Fomentos. 2270, 2304, 2317. Gotas. 2574. Láudanos. 3446, 3449. Lavativas. 3472, 3476, 3477, 3495, 3511, 3523, 3564, 3590. Linimentos. 3789, 3794, 3808, 3811, 3835, 3902, 3909, 3919, 3931, 3932, 3945, 4002, 4026. Misturas. 4359, 4572, 4589. Pediluvio. 4984. Pociones. 6093, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6140, 6200, 6201, 6202, 6205, 6239, 6243, 6246, 6350, 6498, 6535, 6536, 6537, 6602. Polvos. 6780, 6841, 6848, 6930, 6937, 6991, 6994, 7202, 7203, 7496. Pomadas. 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 8102. Ponche. 8187. Saquito. 8344. Tintura. 8786. Vinagres. 9388, 9389. Vinos. 9429, 9447.
- CÓLICO BILIOSO. Agua. 192. Limonada. 3748.
- CÓLICOS DE ESTÓMAGO. V. *Cardialgias*.
- CÓLICO FLATULENTO Ó VENTOSO. Aceites. 21, 40. Alcoholatos. 293, 299. Bálsamos. 368, 430. Bolos. 575. Cocimientos. 1029, 1030. Elixir. 1688. Embrocacion. 1713. Emplastos. 1746, 1747, 1748, 1790. Especies. 2093, 2095, 2096, 2142. Espiritu. 2157. Eter. 2188. Flores. 2099. Gotas. 2544. Jarabe. 3162. Julepe. 3369. Lavativas. 3501, 3528, 3529, 3579. Linimentos. 3792, 3856, 4025. Loocs. 4160, 4169. Misturas. 4446, 4447. Píldoras. 5381, 5796. Pociones. 6063, 6171, 6470, 6510, 6519.

Ratafia. 8211. Saquito. 8345. Tinturas. 8630, 8633, 8821. Tisanas. 8893, 8894. Ungüento. 9276.

CÓLICOS HEPÁTICOS. *V. Cálculos biliares.*

CÓLICOS HISTÉRICOS. *V. Histérico.*

CÓLICO NEFRÍTICO. *V. Nefritis.*

CÓLICO NERVIOSO, ó cólico espasmódico. Aceites. 24, 27, 28, 30. Agua. 7509. Alcoholatos. 293, 299. Bálsamos. 26, 368. Bolos. 548, 561, 571, 576, 606, 618, 659, 662, 674. Cataplasmas. 775, 842. Cerveza. 950. Cocimiento. 1031. Electuarios. 1507, 1535, 1536, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611. Elixir. 1658. Emplastos. 1753, 1818. Escudo. 2005. Láudanos. 3446, 3449. Lavativas. 3477, 3478, 3479, 3529, 3579, 3617. Limonadas. 3759, 3761, 3765. Linimentos. 3793, 3815, 3816, 3916, 4026. Píldoras. 5034, 5038, 5399, 5400, 5523, 5588, 5880. Pociones. 6065, 6089, 6101, 6102, 6264, 6293, 6294, 6339, 6391, 6563, 6595, 6646. Polvo. 7341. Pomadas. 7627, 8079. Pulpas. 8189, 8195. Solucion. 8397. Tinturas. 8630, 8739, 8745. Tisanas. 8874, 9009, 9011. Ungüentos. 9276, 9285. Vinos. 3447.

CÓLICOS DE LOS NIÑOS. Electuario. 1565. Emulsion. 1928. Especies. 2093. Jarabes. 2960, 2961. Mermelada. 4244. Pociones. 6292, 6429. Tisana. 8994. Yerbas. 2094.

CÓLICO DE LOS PINTORES. *V. Cólico de plomo.*

CÓLICO DE PLOMO. Agua. 122. Apocema. 349. Electuarios. 1567, 1593. Emulsion. 1916. Jarabe. 2957. Julepes. 3362, 3377, 3378. Lavativas. 3453, 3457. Limonadas. 3727, 3760, 3761. Linimento. 3828. Mistura. 4592. Píldoras. 5524, 5561, 5562, 5920. Pociones. 6097, 6100, 6307, 6706. Polvos. 6789, 7063. Purgante. 8203. Tópico. 9068. Tratamientos. 9078, 9079, 9080, 9081.

CÓLICO SATURNINO. *V. Cólico de plomo.*

CÓLICO VENTOSO. *V. Cólico flatulento.*

COLITIS. *V. Enteritis.*

COMA. Lavativas. 3548, 3569, 3599. Poción. 6672. Sinapismo. 8360. Suero. 8533. Vino. 9477.

COMEZON, PRURITO. Infusion. 2678. Lociones. 4073, 4113, 4124, 4157. Mezclas. 4279, 4286. Pomadas. 7677, 7714. Tisana. 8849. Tópicos. 9061, 9066, 9070. *V. Herpes.*

COMEZON DEL ANO. Pomada. 7588. *V. Hemorroides.*

COMEZON DE LOS OJOS. Colirio. 1282.

COMEZON DE LAS PARTES GENITALES. Pomada. 7588.

CONSTRICION ESPASMÓDICA DE LOS ESFÍNTERES. *V. Contraccion espasmódica de los esfínteres.*

CONDILOMAS. *V. Escrescencias sífilíticas.*

CONGELACION. Ceratos. 912, 914. Linimentos. 3783, 3784, 3798, 3987, 3998. Locion. 4102. Pomadas. 7581, 7684, 7685. Ungüento. 9307. Vino. 9540.

CONGESTION. Agua. 169, 229. Baño. 460. Bolos. 579, 580, 606, 645, 656. Cataplasma. 783. Emplasto. 1810. Emulsiones. 1903, 1918, 1964, 1967. Jarabe. 3271. Julepe. 3409. Limonadas. 3759, 3761, 3765, 3766. Pastillas. 4844, 4845, 4851, 4904. Pediluvios. 4984, 4990, 4991. Píldoras. 5755. Pociones. 6267, 6487, 6595. Pomadas. 7715, 7967. Sinapismo. 8354. Tintura. 8701.

CONGESTION CEREBRAL. *V. Aoplejia.*

CONJUNTIVITIS. *V. Oftalmias.*

CONJUNTIVITIS ESCROFULOSA CRÓNICA. *V. Oftalmia escrofulosa.*

CONMOCION. Fomento. 2269. Lavativa. 3556. Pediluvios. 4990, 4991. Supositorio. 8564. Te. 8585. Tintura. 8701.

CONSTIPACION. *V. Estreñimiento.*

CONSUNCIÓN. V. *Marasmo*.
CONTORSIONES. V. *Contracturas*.

CONTRACCIÓN ESPASMÓDICA DE LOS ESFÍNTERES. Cerato. 872. Pomadas. 7694, 7695, 7901.

CONTRACCIÓN ESPASMÓDICA DE LA MATRIZ. Cataplasma. 772. Cerato. 873. Poción. 6625. Pomadas. 7694, 8050.

CONTRACCIÓN ESPASMÓDICA DE LOS PÁRPADOS. Colirios. 1151, 1165.

CONTRACCIÓN ESPASMÓDICA DE LA PUPILA. Colirios. 1154, 1245. Opiata. 4704.

CONTRACCIÓN ESPASMÓDICA DE LA URETRA. Cerato. 872.

CONTRACTURAS. Aceites. 9, 25, 32, 38. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas minerales sulfurosas. IV, 224. Alcoholaturo. 314. Embrocación. 1722. Fomentos. 2310, 2328. Fricción. 2353. Fomento. 2277. Linimento. 3936. Tinturas. 8628, 8757. Vinos. 9431, 9432, 9433, 9434, 9487.

CONTUSIONES. Aguas. 79, 80, 104, 113, 148, 191, 195, 205, 221, 222, 236, 238, 239. Aguardiente. 72. Alcoholes. 267, 269. Alcoholatos. 297, 299. Bálsamos. 408, 420, 421, 435. Baño. 449. Bolas. 534. Cataplasmas. 745, 806, 818. Coágulo. 984. Cocimiento. 1060. Embrocaciones. 1711, 1722. Emplastos. 1842, 1876. Esencia. 2045. Especies. 2143. Fomentos. 2259, 2270, 2271, 2272, 2277, 2284, 2302, 2307, 2310, 2311, 2322, 2323, 2327, 2328, 2329, 2331, 2332, 2335, 2338. Linimentos. 3783, 3784, 3792, 3832, 3938, 3965, 3987. Lociones. 4037, 4139. Oxieratos. 4710, 4711. Polvos. 6939, 6940, 6942, 7390, 7470. Remedio. 8240. Te. 8585. Tinturas. 8643, 8646, 8651, 8667, 8668, 8745, 8756, 8839. Tópicos. 9040, 9049, 9069. Ungüento. 9191. Vinagre. 9352. Vinos. 9408, 9413, 9431, 9432, 9433, 9434, 9487, 9491.

CONVALECENCIA EN GENERAL. Aguas miner. ferruginosas. IV, 280. Apocema. 318. Bolos. 536. Caldos. 701, 703, 710, 719. Cocimientos. 1013, 1014. Confecciones. 1574, 1601. Cremas. 1384, 1386, 1387, 1392, 1397. Chocolates. 1400, 1401, 1404, 1405, 1406, 1412, 1413, 1415, 1416, 1422. Dictamia. 2252. Especies. 2076, 2077. Eter. 2194. Extracto. 2226. Féculas. 2250, 2251. Gelatinas. 2896, 2920, 2933. Infusión. 2681. Jaleas. 2897, 2898, 2900, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2909, 2915, 2916, 2917, 2918, 2921, 2922, 2923, 2926, 2930, 2931, 2932, 2936. Jarabes. 3157, 3158, 3182, 3212, 3213, 3280, 3326. Lavativas. 3474, 3477, 3554, 3596, 3599, 3600. Leche. 3640. Palamoud. 2253. Pildoras. 5063, 5619, 5805, 5933, 5934. Polvos. 7388, 7414, 7480. Racahout. 2254. Tabletas. 4978. Wacaca. 2255. Vinos. 9488, 9522, 9523.

CONVALECENCIA DE LAS CALENTURAS GRAVES. Caldo. 709. Cerveza. 957. Conservas. 1376, 1380. Chocolates. 1399, 1409, 1416, 1421. Elixires. 1655, 1656. Gelatina. 2891. Jarabe. 3342. Leche. 3639, 3641. Limonada. 3726. Polvo. 7496. Ponche. 8184. Robs ó Tisana. 8291. Tintura. 8607. Tisanas. 8852, 8913.

CONVALECENCIA DE LAS CALENTURAS INTERMITENTES. Bebida. 506. Cocimiento. 989. Elixir. 1700. Especies. 2078. Lavativa. 3573. Pildoras. 5904. Polvos. 7129, 7439, 7540. Vino. 9499.

CONVULSIONES. Agua. 253. Electuario. 1465. Elixires. 1621, 1658. Infusión. 2685. Julepe. 3405. Lavativas. 3486, 3491. Linimento. 3836. Misturas. 4379, 4388. Pildoras. 5048, 5160, 5161, 5395, 5406, 5755, 5766, 5868, 5880, 5933, 5934, 5935, 5982. Pociones. 6148, 6269, 6276, 6519, 6520, 6612, 6623, 6770. Polvos. 6857, 6872, 6884, 7041, 7545. Ponche.

8184. Solucion. 8484. Tinturas. 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 8795, 8836. Tisana. 9018. Ungüentos. 9255, 9285.
- CONVULSIONES DE LOS NIÑOS. Collares. 1359. Electuario. 1523. Elixir. 1679. Gotas. 2543. Polvos. 6868, 6874, 7022, 7092, 7335, 7425. Solucion. 8408. Tintura. 8648.
- COQUELUCHE. Aguas. 95, 247. Alcoholaturo. 314. Bolos. 539, 601, 603, 677. Cafés. 696, 698, 699. Cataplasma. 842. Chocolate. 1400. Electuario. 1573. Elixires. 1629, 1684. Embrocación. 1723. Emplasto. 1791. Fumigaciones. 2368, 2377, 2381, 2383. Gotas. 2550. Hidromeles. 2611, 2612. Jarabes. 2960, 2961, 2981, 3006, 3007, 3008, 3009, 3011, 3014, 3015, 3020, 3048, 3073, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3128, 3138, 3173, 3174, 3203, 3224, 3242, 3246, 3255, 3256, 3257, 3263, 3266, 3267, 3268, 3276, 3297, 3318, 3330. Julepes. 3381, 3382, 3384, 3386, 3387, 3424, 3425, 3426. Lavativa. 3491. Licores. 3665, 3672. Linimentos. 3776, 3913, 3998. Medicina. 4233. Mermelada. 4245. Mezclas. 4252, 4292. Misturas. 4372, 4376, 4409, 4461, 4469, 4470. Ojimiél. 4653. Pastas. 4791, 4794, 4795. Pastillas. 4888, 4898, 4900. Pediluvios. 4990, 4991. Pildoras. 5051, 5056, 5265, 5266, 5272, 5328, 5329, 5350, 5356, 5463, 5464, 5465, 5466, 5594, 5606, 5668, 5686, 5765, 5894, 5933, 5934, 6015. Pociones. 6087, 6088, 6103, 6163, 6164, 6165, 6168, 6169, 6223, 6263, 6264, 6273, 6274, 6279, 6280, 6282, 6283, 6285, 6286, 6298, 6312, 6326, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6400, 6482, 6486, 6585, 6595, 6637, 6638, 6639, 6695, 6700, 6703, 6717, 6765, 6766. Polvos. 6974, 6980, 6981, 6987, 6988, 6989, 6995, 6997, 7000, 7005, 7064, 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7341, 7425, 7457, 7503. Pomadas. 7679, 7894, 7896, 7897, 7898, 7994, 8102. Solucion. 8366. Tabletas. 4864, 4897, 4901, 4920, 4950, 4953. Tinturas. 8623, 8795.
- COREA. Agua. 7509. Bolos. 585, 592, 601, 659, 682, 684, 694. Electuarios. 1466, 1598. Eter. 2196. Gotas. 2543. Jabon. 2855. Jarabes. 3170, 3310. Julepes. 3395, 3429. Lavativa. 3491. Linimentos. 3794, 3836, 3864. Lociones. 4142, 4146. Pildoras. 5048, 5114, 5115, 5116, 5160, 5222, 5226, 5270, 5302, 5328, 5357, 5433, 5635, 5636, 5640, 5658, 5765, 5778, 5816, 5817, 5862, 5868, 5937, 5959, 5976, 6058. Pociones. 4371, 6084, 6167, 6212, 6267, 6311, 6312, 6477, 6508, 6512, 6534, 6595, 6611, 6612, 6618, 6619, 6770. Polvos. 6780, 6848, 6853, 6951, 7037, 7042, 7076, 7088, 7357. Soluciones. 8375, 8408, 8427. Tintura. 8614. Tisana. 8013. Tratamiento. 9085.
- CORIZA. Baño. 448. Colutorio. 1337. Emulsion. 1948. Especies. 2124, 2138. Extracto. 2238. Fumigacion. 2383. Gelatina. 2899. Inyecciones. 2776, 2821. Jalea. 2914. Jarabes. 3047, 3242, 3244, 3276. Lavativas. 3474, 3599. Loocs. 4196, 4202. Melito. 4311. Pasta. 4796. Pastillas. 4854, 4898, 4915. Pediluvios. 4990, 4991. Pildoras. 5749. Pociones. 6079, 6260, 6630. Polvos. 6819, 6826, 7231, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7349. Pomadas. 7757, 8007. Sinapismo. 8354. Tabletas. 4949, 4950. Tintura. 8629. Trociscos. 9149. Vahos. 9330.
- COROIDITIS CRÓNICA. V. *Oftalmia crónica*.
- COSMÉTICOS. Aceites. 7, 23, 33, 39, 50. Aguas. 108, 132, 133, 144, 145, 201, 214. Ceratos. 879, 884, 885, 895, 904. Cre-

mas. 1388, 1395. Elíxir. 1686. Emulsiones. 1941, 1942. Jabones. 2854, 2866, 2882. Leches. 3634, 3645, 3649, 3653, 3654, 3655. Linimento. 3898. Lociones. 4098, 4112. Pastas. 4747, 4748, 4749, 4750, 4798, 4799. Polvos. 7130, 7131, 7132, 7432, 7433. Pomadas. 7864, 7865, 7866, 7891, 8092, 8093, 8094, 8130, 8160, 8168. Tinturas. 8653, 8654, 8757, 8774, 8782, 8804, 8805. Ungüento. 9257. Vinagres. 9398, 9400.

COSTRA LÁCTEA. Jarabe. 3268. Polvo. 7171. Solucion. 8394. V. *Tiña*.

COXALGIA. Bolos. 543. Licor. 3702. Misturas. 4325, 4381, 4425, 4426. Píldoras. 5236, 5269, 5564. Poción. 6155. Polvo. 7395.

CRETINISMO. V. *Bocio*.

CRUP. Cataplasma. 794. Cerato. 922. Colirio. 1273. Colutorios. 1301, 1322, 1348. Electuarios. 1447, 1573. Fomentos. 2289, 2304. Gargarismos. 2398, 2399, 2400, 2405, 2414, 2415, 2465, 2471, 2523. Jalea. 2925. Jarabes. 2975, 2981, 3128, 3174, 3314. Julepes. 3381, 3382, 3388, 3398. Lavativas. 3491, 3500. Linimentos. 3771, 3772, 3783, 3784, 3929, 3996. Locion. 4142. Looos. 4214. Misturas. 4376, 4471. Ojimiél. 4652. Pediluvios. 4984. Píldoras. 5051. Pociones. 6098, 6102, 6103, 6132, 6166, 6170, 6172, 6202, 6225, 6298, 6334, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6462, 6582, 6639, 6766. Polvos. 6842, 7077, 7078, 7105. Pomadas. 7596, 7792, 7793, 7922, 7995, 8131. Soluciones. 8370, 8386, 8486.

CUERPOS EXTRAÑOS. Lavativa. 3477. Pomadas. 7756, 7874, 8079, 8172.

CUERPOS EXTRAÑOS EN LA CONJUNTIVA. Colirios. 1223, 1225.

CHINCHES. Ungüento. 9266.

DEBILIDAD GENERAL. V. *Astenia*.

DEBILIDAD DE ESTÓMAGO. V. *Atonía del estómago*.

DEBILIDAD MUSCULAR. V. *Parálisis*.

DEBILIDAD DE LOS ÓRGANOS GENITALES. V. *Anafrodisia*.

DELIRIO TRÉMULO. Lavativa. 3565. Limonadas. 3726, 3759, 3761, 3770. Mistura. 4335. Píldoras. 5584. Poción. 6286. Ponche. 8184.

DENTERA. Polvo. 7079.

DENTICION DIFÍCIL. Baño. 456. Cerato. 923. Colutorio. 1344. Collares. 1359. Lavativas. 3477, 3554, 3583, 3596, 3600. Linimento. 3798. Polvos. 6885, 7041, 7424. Sinapismo. 8354.

DENTÍFRICOS. Aguas. 108, 114, 135, 136, 137, 138, 139, 216. Alcoholato. 308. Colutorio. 1334. Electuarios. 1528, 1529, 1530, 1531. Elíxires. 1617, 1619, 1652, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1678, 1683, 1686, 1696, 1701. Emulsion. 1982. Etiope. 2199. Opiatas. 4692, 4693, 4694. Pasta. 4767. Polvos. 7015, 7016, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170. Remedio. 8273. Tinturas. 8697, 8761. Vinagre. 9383.

DESCENSO DE LA MATRIZ. V. *Histeroptosis*.

DESINFECTANTES. V. *Miasmas*.

DESMAYOS. V. *Sincofes*.

DESTETE. V. *Ablactacion*.

DIABETES SACARINA. Aguas. 169, 194, 231. Baño. 448. Bolos. 600. Cataplasmas. 751, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 836. Cervezas. 942, 945, 946, 949, 960. Chocolates. 1404, 1405, 1415. Jarabe. 3038. Lavativa. 3646. Limonadas. 3732, 3757, 3759, 3761, 3765, 3767. Linimentos. 3794, 3795, 3796, 3797, 3912, 3919, 3927, 4007, 4026. Píldoras. 5117, 5118, 5307, 5309,

- 5320, 5352, 5385, 5700, 5885. 1032, 1099. Confeccion. 1574.
 Pociones. 6273, 6274, 6286, 6395, Conservas. 1376, 1380. Chocola-
 6595. Polvo. 7323. Tintura. 8701. te. 1408. Electuarios. 1455, 1490,
 Vinos. 9405, 9406. 1492, 1493, 1495, 1497, 1498,
 DIARREA. Aguas. 76, 82, 107, 1500, 1515, 1516, 1535, 1536,
 116, 117. Baño. 448. Bolos. 537, 1539, 1575, 1587, 1606. Espe-
 559, 567, 569, 640, 650. Caldo. cies. 2089, 2090, 2093. Jaleas.
 710. Cocimientos. 1021, 1022, 2897, 2898, 2900, 2912, 3000,
 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 3027, 3229, 3284, 3290, 3291.
 1043, 1093, 1105. Conserva. 1379. Gelatinas. 2890, 2899. Granos.
 Confecciones. 1518, 1601. Elec- 2596. Láudanos. 3446, 3449. La-
 tuarios. 1460, 1496, 1517, 1598. vativas. 3502, 3504, 3505, 3507,
 Emplastos. 1753, 1790, 1812. E- 3508, 3509, 3511, 3513, 3514,
 mulsiones. 1933, 1938. Especies. 3516, 3532, 3539, 3582, 3584.
 2095. Extracto. 2235. Fomento. Leche. 3635. Licor. 3668. Looes.
 2289. Jarabes. 3050, 3088, 3165, 4165, 4174, 4182, 4183, 4195.
 3166, 3229, 3233, 3305. Láuda- Mezcla. 4292. Misturas. 4321,
 nos. 3446, 3449. Lavativas. 3461, 4407, 4416, 4417, 4546, 4556.
 3465, 3470, 3471, 3477, 3478, Opiatas. 4691, 4698. Pastillas.
 3482, 3503, 3530, 3547, 3552, 4839, 4880. Pildoras. 5119, 5120,
 3564, 3574, 3616. Limonadas. 5284, 5309, 5338, 5614, 5700,
 3733, 3748, 3756, 3757, 3759, 5880, 5938. Pociones. 6136, 6137,
 3761, 3765. Linimento. 3934. Mis- 6142, 6170, 6221, 6231, 6236,
 turas. 4322, 4323, 4361, 4363, 6243, 6244, 6297, 6308, 6315,
 4498, 4499, 4545, 4572, 4621. 6330, 6389, 6431, 6549, 6587,
 Opiatas. 4675, 4708. Pildoras. 6683, 6690, 6696, 6726, 6734,
 5122, 5257, 5289, 5290, 5291, 6737, 6738, 6739, 6765. Polvos.
 5297, 5383, 5407, 5408, 5442, 6807, 6843, 6844, 6845, 6954,
 5467, 5933, 5934, 5994. Pociones. 6957, 6958, 6959, 6966, 6967,
 6133, 6134, 6227, 6233, 6234, 6968, 7017, 7032, 7080, 7122,
 6235, 6237, 6240, 6308, 6350, 7133, 7459, 7462. Pulpa. 8193.
 6550, 6623, 6727, 6728. Polvos. Suero. 8527. Tabletas. 4864, 4876.
 6798, 6885, 6938, 6989, 7053, Tisanas. 8881, 8993. Vinos. 3447,
 7202, 7203, 7322, 7336, 7351, 9442, 9448, 9466.
 7361, 7403, 7424, 7481, 7496, DIARREA COLICUATIVA DE LOS
 7553. Remedio. 8247. Sacarolado. TÍSICOS. Lavativas. 3466, 3481,
 8315. Soluciones. 8376, 8386. Ta- 3533, 3536, 3538, 3617. Pildo-
 bletas. 4809, 4810, 4911, 4941. ras. 5017, 5018, 5019, 5614,
 Té. 8582. Tintura. 8776. Tisanas. 5961. Pociones. 6215, 6287, 6351.
 8848, 8877, 8879, 8883, 8884, Polvos. 6935, 7249. Tintura. 8641.
 8912, 8936, 8942. Vinos. 3447, DIARREA DE LOS NIÑOS. Lavati-
 9504, 9506, 9527, 9529, 9530. vas. 3503, 3510, 3536, 3537. Li-
 Yerbas. 2094. Zumos. 9546, 9557. nimento. 3836. Mistura. 4362. Po-
 ciones. 6135, 6435, 6596, 6736.
 DIARREA CRÓNICA. Aguas mine- Polvos. 6771, 7352. Pomada.
 rales acidulas, IV, 261. Aguas 7600.
 minerales ferruginosas, IV, 280. DIDIMALGIA. Pomadas. 7704,
 Agua. 84. Apocemas. 329, 332, 7705, 7756, 7957, 8079, 8116,
 333, 334, 352. Baño. 449. Bebi- DIDIMITIS. Espadrupo. 2067. Fo-
 das. 494, 509. Bolos. 541, 562, memento. 2342. Linimento. 3787,
 563, 565, 566, 570, 575, 586, Pasta. 4765. Pildoras. 5365, 5398.
 633. Caldos. 717, 719. Cataplas- Tintura. 8750.

- DIFICULTAD DE MENSTRUAR. V. 1494, 1498, 1515, 1516, 1575.
Dismenorrea.
- DIFTERITIS. V. *Crup.*
- DIGESTION DIFÍCIL. V. *Dispepsia é indigestion.*
- DISENTERIA. Aguas. 76, 82, 107, 171, 175, 7509. Bebida. 483. Bolos. 541, 569, 606, 661. Cataplasmas. 747, 750, 842, 854. Cocimientos. 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1043, 1067, 1089, 1093, 1099, 1105. Confecciones. 1518, 1574. Conserva. 1376. Electuarios. 1459, 1500, 1517, 1535, 1536. Emplasto. 1790. Emulsiones. 1911, 1933, 1938. Epitema. 9079. Especies. 2089, 2090. Extracto. 2235. Fomentos. 2304, 2317. Gotas. 2545. Jarabes. 2972, 3161, 3165, 3166, 3233, 3284, 3305. Julepes. 3366, 3381, 3382, 3385. Láudanos. 3349, 3446, 3449. Lavativas. 3470, 3471, 3477, 3478, 3503, 3506, 3508, 3512, 3517, 3523, 3530, 3547, 3552, 3554, 3564, 4582, 3583. Limonadas. 3749. Linimentos. 3771, 3772, 3793, 3794, 3795, 3808, 3927, 4019, 4020, 4026. Locion. 4134. Lóocs. 4174, 4183. Misturas. 4361, 4363, 4364, 4407, 4442, 4520, 4545, 4572, 4621. Opiata. 4667, 4679, 4691. Pastillas. 4839, 4956. Pildoras. 5061, 5119, 5121, 5122, 5290, 5291, 5328, 5383, 5407, 5408, 5700, 5780, 5874, 5934, 5962, 6058. Pociones. 6084, 6097, 6100, 6137, 6138, 6221, 6264, 6273, 6274, 6286, 6308, 6311, 6312, 6315, 6353, 6354, 6486, 6508, 6512, 6550, 6623, 6676, 6683, 6690, 6711. Polvos. 6816, 6959, 7275, 7351, 7360, 7413, 7547, 7548. Remedios. 8276, 8278. Sacaruro. 8294. Sacarolado. 8315. Soluciones. 8376, 8386. Tabletas. 4810. Tintura. 8595. Tisanas. 8848, 8877, 8905, 8912, 8936, 8952, 8974. Vinos. 3447, 9504.
- DISENTERIA CRÓNICA. Bolos. 566, 663. Caldo. 717. Cocimiento. 1091. Electuarios. 1460, 1492, 1493, 1494, 1498, 1515, 1516, 1575. Infusion. 2628. Jarabe. 3291. Lavativas. 3502, 3509, 3513, 3584. Misturas. 4334, 4556. Opiata. 4678. Pildoras. 5123, 5281, 5284, 5880, 5938, 5976. Pociones. 6133, 6139, 6230, 6549, 6676, 6696. Polvos. 7017. Pomada. 7911. Tabletas. 4876. Tisana. 8882. Vino. 9506.
- DISENTERIA ADINÁMICA ó *maligna.* Lavativa. 3616. Remedio. 8277.
- DISFAGIA. Mistura. 4377.
- DISLOCACIONES ó *luxaciones.* Aguas. 104, 236. Alcohol. 269. Alcoholato. 297. Bálsamo. 369. Baño. 449. Bolas. 534. Cataplasmas. 747, 750, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836. Emplastos. 1779, 1795, 1801. Fomentos. 2272, 2277, 2310, 2323, 2328, 2329, 2332. Linimentos. 3965. Lociones. 4029, 4062, 4066, 4129. Oxicrotos. 4710, 4711. Remedio. 8240.
- DISMENORREA. Agua. 109. Bebida. 506. Bolos. 579, 580, 610, 611, 613, 615, 658, 678. Cocimiento. 987. Confección. 1602. Conserva. 1367. Chocolate. 1404. Electuario. 1507. Elixires. 1629, 1702. Emulsiones. 1903, 1905, 1929, 1984. Fomentos. 2304, 2317. Infusion. 2651. Inyeccion. 2737, 2815, 2816. Jabon. 2855. Jarabes. 2944, 2946, 3060, 3061, 3068, 3233. Lavativas. 3467, 3468, 3566. Misturas. 4518, 4534. Pastillas. 4844, 4845, 4904, 4971. Pildoras. 5026, 5094, 5359, 5412, 5468, 5572, 5581, 5891, 6016. Pociones. 6166, 6170, 6187, 6266, 6352, 6400, 6445, 6469, 6470, 6514. Polvos. 6975, 7041. Sacaruros. 8306, 8311. Sacarolado. 8310. Solucion. 8425. Tinturas. 8592, 8632, 8714, 8735, 8740, 8760.
- DISNEA. Pildoras. 5358, 5395, 5880, 6005. Pocion. 6084, 6298. Tintura. 8739, 8793. V. *Asma y sofocacion.*

- DISPEPSIA. Aguas. 160, 169, 193, 194, 202, 230. Apocemas. 317, 318. Bálsamo. 419 Baño. 449. Bebidas. 498, 506. Bolos. 536, 575, 576, 605, 627, 628, 678, 681, 684. Cervezas. 946, 950, 957, 962. Cigarritos. 971. Cocimiento. 989. Electuarios. 1455, 1519, 1546, 1547, 1548, 1549, 1563, 1584, 1587. Elixires. 1627, 1655, 1656, 1666, 1667, 1669, 1674, 1676, 1677, 1685, 1688, 1691, 1704, 1705. Emplasto, 1753. Especies. 2083, 2093, 2095. Espíritu. 2151. Flores. 2095. Gotas. 2575. Granos. 2596. Infusiones. 2630, 2649, 2681. Jaleas. 2912, 2925. Jarabe. 3152. Licor. 3672. Maceracion. 4223. Misturas. 4488, 4525. Papel. 4723. Pastillas. 4831, 4840, 4844, 4845, 4875, 4876, 4887, 4891, 4892, 4904, 4934, 4971. Píldoras. 5008, 5026, 5027, 5047, 5059, 5069, 5071, 5072, 5337, 5359, 5381, 5395, 5469, 5567, 5611, 5616, 5617, 5619, 5620, 5622, 5625, 5653, 5721, 5790, 5809, 5858, 5924, 5930, 5934, 5965, 6009, 6010, 6011, 6019, 6022, 6023, 6025. Pociones. 6063, 6084, 6102, 6104, 6271, 6273, 6286, 6293, 6330, 6380, 6383, 6386, 6439, 6469, 6502, 6503, 6510, 6514, 6515, 6602, 6683, 6727, 6728, 6734, 6738, 6739, 6741. Polvos. 6773, 6774, 6780, 6942, 6991, 6994, 6995, 6997, 6999, 7023, 7032, 7053, 7181, 7201, 7205, 7215, 7226, 7244, 7251, 7252, 7253, 7254, 7298, 7318, 7386, 7390, 7461, 7480, 7532. Ratafias. 8207, 8211. Tabletas. 4804, 4841, 4893, 4911, 4912, 4913, 4914, 4920, 4923. Tinturas. 8596, 8599, 8605, 8606, 8607, 8615, 8692, 8693, 8696, 8709, 8710, 8714, 8726, 8730, 8740, 8815, 8818, 8833. Trociscos. 9137. Vinos. 9405, 9406, 9407, 9416, 9420, 9442, 9443, 9444, 9445, 9449, 9490, 9499, 9509. Yervas. 2094.
- DISTIQUIASIS. Colirios. 1228, 1234.
- DISURIA. Aceite. 2. Acido. 67. Bolos. 571, 601, 607, 675 Cocimientos. 1061, 1076. Emulsiones. 1905, 1920, 1944, 1946, 1964, 1967. Linimento. 3891. Píldoras. 5351, 5380, 5444, 5552, 5956. Pociones. 6084, 6295, 6409, 6596, 6621. Pomadas. 7596, 7684, 8079, 8172. Tinturas. 8739. Tisana. 8926. Trociscos. 9139. Ungüento. 9168. *V. Iscuria.*
- DIVIOSOS Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 807, 814, 815, 817, 836. Digestivos. 1429, 1431. Harinas. 2132. Linimento. 3998. Pomadas. 7746, 7758. Ungüentos. 9292, 9293. *V. Absceso agudo*
- DOLORES. Aceite. 44. Acidos. 61, 62, 63, 64. Aguas. 128, 231, 257, 261. Bálsamos. 417, 430. Bolos. 660. Cataplasmas. 743, 749. Cocimiento. 1077. Embrocacion. 1709. Emplasto. 1864. Emulsiones. 1908, 1926, 1960, 1961, 1986. Específico. 2144. Fomento. 2309. Jarabes. 3067, 3113, 3114, 3115, 3143, 3171, 3205, 3208, 3230, 3231, 3251, 3300. Julepes. 3364, 3412, 3414, 3415. Láudanos. 3443, 3444, 3446. Lavativas. 3526, 3527. Licores. 3657, 3659, 3674, 3687, 3719. Linimentos. 3943, 3946, 3957. Mezcla. 4286. Misturas. 4436, 4440, 4519. Píldoras. 5014, 5015, 5039, 5852, 5853, 5865. Pociones. 6111, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6276, 6277, 6278, 6327, 6627, 6628, 6748. Pomadas. 7580, 7598, 7720, 7761, 8033. Soluciones. 8364, 8415, 8447. Tabletas. 4944. Tinturas. 8593, 8792, 8793, 8794, 8796, 8797, 8831, 8833. Tópicos. 9043, 9045. Ungüentos. 9167, 9197. Vinagres. 9388, 9389. Vinos. 9489, 9511.
- DOLORES CÓLICOS. *Véase Cólicos.*

- DOLORS DE DIENTES. *V. Odontalgia.*
- DOLORS DE ESTÓMAGO. *V. Gastralgia.*
- DOLORS NEFRÍTICOS. *V. Nefritis.*
- DOLOR DE OIDOS. *V. Otaglia.*
- DOLORS OSTEOCOPOS. Baño, 448. Cataplasmas. 747, 750, 751, 772, 780, 794, 815, 817, 818, 835, 854. Ceratos. 925, 935. Cocimiento. 1079. Embrocacion. 1717. Emplastos. 1738, 1739, 1775, 1776, 1792, 1846, 1858. Epitema. 2009. Especies. 2118, 2119. Fumigacion. 2365. Linimentos. 3774, 3798, 3885, 3969. Pediluvio. 4986. Píldoras. 5035, 5036, 5359, 5400, 5423, 5530, 5531, 5775. Polvos. 7029, 7036, 7176. Pomada. 7738. Solucion. 8474. Tintura. 8590.
- DOLORS REUMÁTICOS. *V. Reumatismo.*
- DOLORS DE TRIPAS. *V. Cólicos.*
- DOTINENTERITIS. *V. Calenturas tifoideas.*
- ECLAMPسيا. Agua. 147. Gotas. 2543. Lavativa. 3487. Poción. 6496. Solucion. 8408. *V. Epilepsia.*
- ECTIMA. Agua. 7509. Baños. 442, 456, 465. Cataplasmas. 778, 797. Cocimientos. 997, 999. Harinas. 2132. Pomadas. 8089, 8098, 8099, 8100, 8101. Tisanas. 8863, 8885, 8990, 9009, 9011. Vino. 9508.
- ECTROPION. Tintura. 8701.
- ECZEMA. Aguas. 200, 236, 7509. Baños. 442, 444, 459, 466. Cataplasmas. 747, 750, 751, 780, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 817, 836. Ceratos. 900, 914. Jabon. 2881. Jarabes. 3083, 3094, 3178, 3250. Licor. 3668. Limonadas. 3748, 3749, 3759, 3761, 3765. Linimentos. 3801, 3808, 4007. Lociones. 4033, 4035, 4041, 4042, 4048, 4067, 4072, 4073, 4075, 4077, 4131, 4134, 4142. Mezclas. 4275, 4277, 4281. Misturas. 4339, 4430, 4618. Píldoras. 5038, 5260, 5261, 5262, 5279, 5304, 5989. Polvos. 6936, 6937. Pomadas. 7581, 7588, 7621, 7637, 7640, 7673, 7684, 7702, 7704, 7709, 7715, 7760, 7769, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7801, 7874, 7939, 7961, 7963, 7964, 7966, 7973, 7994, 8007, 8025, 8035, 8088, 8089, 8114, 8127, 8149, 8150, 8183. Soluciones. 8371, 8386, 8478. Tópicos. 9050, 9064. Ungüento. 9307. Vendaje. 4294.
- ECZEMA CRÓNICO. Aguas minerales salinas, IV, 296. Licor. 3707. Linimento. 3886. Lociones. 4031, 4082. Mezclas. 4282, 4285. Píldoras. 5470. Polvos. 7519, 7525. Pomadas. 7644, 7801, 7953, 8038. Tinturas. 8667, 8668.
- EDEMAS. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Baños. 440, 451, 464. Cocimiento. 1101. Especies. 2143. Fomentos. 2273, 2275, 2279, 2281, 2283, 2286, 2325, 2333. Fumigacion. 2366. Linimentos. 3796, 3797, 3978. 3981. Locion. 4121. Píldoras. 5201, 5904. Polvo. 6925. Remedio. 8240. Solucion. 8503. Tintura. 8628. Tisana. 8921. Tópicos. 9040, 9063. Tratamiento. 9095. Ungüento. 9183. Vinagre. 9352. Vinos. 9418, 9431, 9432, 9433, 9434, 9468, 9469, 9470, 9478, 9479, 9522, 9523.
- EDEMA DEL ESCROTO. Fomentos. 2271, 2308.
- EDEMA DE LOS PÁRPADOS. Colirio. 1282. Fomento. 2271.
- EDEMA DE LOS PULMONES. Bolos. 672. Cigarros. 975. Melito. 4311. Poción. 6569.
- EFELIDES. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 245, 7509. Baños. 448, 461. Ceratos. 903, 906. Chorros. 1425. Linimento. 3962. Locion. 4058. Mezcla. 4272. Pomadas. 7596, 7704, 7746, 7966, 7973, 7975, 8007, 8098, 8099, 8100, 8101, 8127. Tópico. 9061.

- EFIDROSIS Ó SUDORES EXCESIVOS. 1618, 1632, 1659. Emulsiones. 1957, 1971, 1972, 1973, 1974, 4144. Linimentos. 3783, 3784. Locion. 1975. Enema. 3598. Extractos. 4144. Píldoras. 5222, 5658, 5755, 5766, 5982. Pociones, 6089, 6202, 6205.
- ELEFANTIASIS. Baños. 464, 467. Bolos. 618. Esencia. 2047. Infusion. 2663. Jarabes. 2982, 3110, 3237, 3306. Pastillas. 4891, 4892. Píldoras. 5052, 5053, 5260, 5278, 5342, 5368, 5773, 5936, 6059. Polvos. 7226. Pomada. 7993. Tabletetas. 4893. Tisanas. 8863, 8885.
- V. Lepra.*
- EMBALSAMAMIENTOS. *V. tomo II, página 231.* Jabon. 2860. Licor. 3703. Solucion. 8437.
- EMBARAZO GÁSTRICO. Aguas. 162, 224, 7509. Apocema. 340. Bizcochos. 526, 527. Bolos. 665, 667. Cerveza. 962. Cocimiento. 1108. Chocolates. 1417, 1418. Elixir. 1640. Emulsiones. 1903, 1918, 1944, 1964, 1968, 1969, 1977, 1978, 1979. Esencia. 2043. Hidromel. 2610. Jalea. 2927. Jarabes. 2940, 3126, 3127, 3129, 3131, 3202, 3321. Julepes. 3437, 3438. Lavativas. 3596, 3600. Limonadas. 3736, 3745, 3748, 3750. Loocs. 4161, 4170, 4211. Mistura. 4635. Ojimiél. 4656. Píldoras. 5010, 5068, 5069, 5387, 5616, 5788, 5855, 5856, 5924. Pociones. 6193, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6457, 6509, 6580, 6581, 6582, 6601, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6766, 6767, 6768. Polvos. 7126, 7133, 7212, 7213, 7331, 7368, 7479, 7508, 7543, 7570, 7571, 7572, 7573. Pomada. 7777. Purgantes. 8203. Robs. 8286. Sacarolado. 8322. Tabletetas. 4865, 4901, 4979. Tinturas. 8617, 8755, 8815. Tisanas. 8896. Zumo. 9549.
- EMBARAZO GASTRO-INTESTINAL. Aguas. 223, 235. Azúcares. 8327, 8330. Bebida. 503. Confeccion. 1542. Electuarios. 1513, 1577, 1578, 1579, 1586, 1590, 1591, 1592, 1593, 1604, 1605. Elixires. 1618, 1632, 1659. Emulsiones. 1957, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975. Enema. 3598. Extractos. 2202, 2208, 2243. Gragea. 2591. Hidromel. 2615. Infusiones. 2629, 2655, 2656, 2662, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2679, 2680. Jabones. 2850, 2869, 2871. Jalea. 2907. Jarabes. 2947, 2948, 2962, 2973, 2978, 3031, 3041, 3204, 3219, 3223, 3224, 3225, 3277, 3287, 3289, 3301, 3302, 3303. Julepes. 3411, 3427. Lavativas. 3573, 3593, 3594, 3595, 3597, 3601, 3602. Leche. 3651. Licor. 3722. Limonadas. 3728, 3734, 3735, 3746, 3751, 3752, 3753, 3754, 3758, 3763, 3764. Linimentos. 3971, 3972. Loocs. 4199, 4201, 4210, 4212. Medicinas. 4232, 4234, 4235. Mieles. 4295, 4303, 4318. Misturas. 4517, 4558, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4614. Naranjada. 3743. Oleosácaro. 4657. Pastillas. 4806, 4847, 4917, 4921, 4926, 4956, 4962, 4965. Píldoras. 5009, 5025, 5085, 5087, 5325, 5524, 5558, 5560, 5631, 5707, 5708, 5785, 5897, 5910, 5912. Pociones. 6066, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6303, 6304, 6306, 6460, 6464, 6465, 6584, 6588, 6590, 6592, 6593, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6664, 6666, 6667, 6669, 6670, 6671, 6673, 6674, 6675, 6677, 6697, 6698. Polvos. 3755, 6789, 7004, 7025, 7026, 7028, 7054, 7214, 7222, 7223, 7225, 7334, 7345, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7373, 7374, 7375, 7445, 7446, 7447, 7451, 7452, 7453, 7454, 7473, 7499, 7510. Pomada. 8117. Pulpas. 8188, 8191, 8194, 8195. Purgantes. 8197, 8198, 8201. Sacarolados. 8293, 8316. Sal. 8339. Solucion. 8502. Sueros. 8534, 8535, 8538, 8542.

Supositorios. 8575, 8576, 8577.
Tabletas. 4802, 4867, 4868, 4957,
4958. Tinturas. 8695, 8705. Tisa-
nas. 8892, 8898, 8902, 8967,
8968, 8984, 8990, 9012, 9017,
9020. Tópico. 9068. Vinos. 9427,
9428, 9515. Zumo. 9558.

EMBARAZO INTESTINAL. Aguas.
192, 193, 233, 588. Apocemas.
340, 345, 346, 347, 348. Bebi-
das. 512, 515. Bizcochos. 528.
Bolos. 654, 657, 667. Caldos.
711, 718, 723. Cerveza. 968. Ci-
ruelas. 969. Cocimientos. 1068,
1069, 1078, 1103. Conservas.
1371, 1373, 1374, 1381. Chocolá-
tes. 1411, 1419, 1420. Electua-
rios. 1515, 1533. Elixires. 1675,
1694. Infusion. 2618. Lavativa.
3571. Pildoras. 5062, 5603. Polvo.
7448. Tintura. 8816.

ENBRIAGUEZ. Jarabe. 2976. Pe-
diluvios. 4990, 4991. Pildoras.
5500. Pociones. 6105, 6115, 6170,
6357, 6418, 6436, 6507, 6720.
Sinapismo. 8358.

EMPIEMA. Inyecciones. 2736,
2779, 2809. Jarabe. 3320.

ENAGENACION MENTAL. V. *Mania*.

ENCANTIS ó *Tumor de la carúncula
lagrimal*. Poción. 6280. Pomadas.
7581, 7640, 7682, 7684, 7685,
7715, 7716, 7741, 7749, 7978,
8042, 8045, 8046, 8049, 8082,
8162, 8183.

ENCEFALITIS. Aguas. 92, 157.
Bálsamo. 430. Bolos. 536, 606. Cal-
do. 724. Chocolates. 1400, 1404,
1407, 1415, 1420, 1517. Inyeccion.
2813. Lavativas. 3474, 3477, 3546,
3554, 3600. Limonada. 3735. Píl-
doras. 5022. Pociones. 6280, 6400.
Polvos. 6817, 7470. Pomadas.
7651, 7758, 7894, 7896, 7897,
7898, 7922, 8102. Sinapismos.
8359, 8360, 8361, 8362. Ungüen-
to. 9270.

ENDOCARDITIS. Jarabes. 3117,
3118, 3119, 3120, 3121, 3122.
Linimento. 3887. Poción. 6577.

ENFERMEDADES ADINÁMICAS. V.
Calenturas adinámicas.

ENFERMEDAD DE BRIGHT. Polvos.
7207, 7208. Tisana. 8987.

ENFERMEDADES DEL CORAZON. V.
*Aneurismas é hipertrofias del cora-
zan*.

ENFERMEDADES CONVULSIVAS. V.
Convulsiones, epilepsia.

ENFERMEDADES CUTANEAS. V.
*Herpes, sifilides, sarna y otras
enfermedades de la piel*.

ENFERMEDADES DE LAS ENCÍAS.
V. *Escorbuto*.

ENFERMEDADES EPSÓRICAS. V.
Sarna.

ENFERMEDADES ESPASMÓDICAS.
V. *Espasmos*.

ENFERMEDADES ESTÉNICAS. V. *As-
tenia*.

ENFERMEDADES HERPÉTICAS. V.
Herpes.

ENFERMEDADES DEL HÍGADO. V.
Hepatitis.

ENFERMEDADES DE LOS HUESOS.
V. *Necrosis y caries*.

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS.
Agua. 219. Emulsiones. 1934,
1953, 1987. Hidromel. 2610. Ja-
rabe. 2950. Limonadas. 3757,
3767. Poción. 6249. Sueros. 8519,
8520, 8521, 8522, 8524, 8525.
Tisanas. 8895, 8954. V. *Flegma-
siás*.

ENFERMEDADES DE LANGUIDEZ.
V. *Astenia*.

ENFERMEDADES LECHOSAS. V. *A-
fecciones lechosas*.

ENFERMEDADES LINFÁTICAS. V.
Escrófulas, astenia y escorbuto.

ENFERMEDADES NERVIOSAS. V.
Neuroses y espasmos.

ENFERMEDADES DE LOS OJOS. V.
Oftalmias, amaurosis, etc.

ENFERMEDADES DE LOS PÁRPA-
DOS. V. *Oftalmia, conjuntivi-
tis, etc*.

ENFERMEDADES DE PECHO. V.
*Neumonía, pleuresía, bronquitis,
tisis*.

ENFERMEDADES DE LA PIEL. A-
guas minerales sulfurosas; IV,
294. Aguas. 115, 116, 117, 129,
178, 218, 231, 234. Apocemas.

- 322, 323, 325, 350. Bálsamo. 396. Baños. 436, 442, 456, 459, 460, 463, 470, 473, 475, 477. Bebida. 489. Bolos. 598, 602. Caldo. 720. Cocimientos. 1047, 1071, 1088, 1106. Electuarios. 1479, 1589. Emplasto. 1810. Emulsiones. 1941, 1958, 1970. Esencia. 2034. Especies. 2137. Extracto. 2249. Fumigacion. 2385. Gelatina. 2896. Infusion. 2651. Jabones. 2873, 2875. Jarabes. 2982, 2983, 3101, 3102, 3105, 3108, 3110, 3155, 3174, 3178, 3181, 3196, 3272, 3275, 3316, 3317, 3351, 3353. Licores. 3680, 3684, 3686, 3708. Linimentos. 3837, 3842. Lociones. 4078, 4127, 4152. Mezclas. 4278, 4280. Opiata. 4680. Pastillas. 4873. Pildoras. 5047, 5194, 5196, 5197, 5565, 5667, 5711, 5746, 5833, 5841, 5860, 5900, 5901, 5904, 5987, 5992, 6019. Poción. 6222. Polvos. 6801, 6950, 7171, 7172, 7394. Pomadas. 7688, 7708, 7710, 7747, 7771, 7953, 7962, 7975, 8084, 8085, 8090, 8091, 8153, 8157, 8159. Purgante. 8200. Robs. 8282. Soluciones. 8389, 8394, 8441, 8478. Suero. 8542. Tablet. 4820. Tinturas. 8667, 8668, 8753, 8765. Tisanas. 2635, 8849, 8863, 8887, 8948, 8960, 9009, 9020, 9025, 9028. Trociscos. 9140, 9161. Ungüentos. 9187, 9205, 9229, 9258. Vinos. 9474, 9475, 9476. Zumos. 9547, 9561. V. *Herpes, sifilides, sarna.*
- ENFERMEDADES DEL PULMON. V. *Bronquitis, neumonia, tisis.*
- ENFERMEDADES REUMATICAS. V. *Reumatismo.*
- ENFERMEDADES SIFILITICAS. V. *Sifilis y sifilides.*
- ENFERMEDADES SOPOROSAS. V. *Coma y letargo.*
- ENFERMEDADES VENEREAS. V. *Sifilis.*
- ENFERMEDADES VERMINOSAS. V. *Lombrices.*
- ENFERMEDADES DE LAS VIAS URI-
- NARIAS. V. *Cálculos urinarios, cistitis, arenillas é iscuria.*
- ENFISEMA. Alcoholato. 274. Fomentos. 2307, 2331, 2332, 2335. Pildoras. 5359, 5407, 5408, 5880. Pociones. 6273, 6274, 6282, 6286, 6709. Vino. 9538.
- ENFLAQUECIMIENTO. V. *Marasmo.*
- ENFRIAMIENTO. Vino. 9540.
- ENGROSAMIENTO DE LA CORNEA. Polvos. 6787, 6922, 7081.
- ENTERALGIA. V. *Cólico nervioso.*
- ENTERITIS AGUDA. Cataplasma. 761, 789, 790, 791, 792, 795. Ceratos. 893, 894. Cocimientos. 1082, 1089. Elixir. 1658. Inyeccion. 2779. Lavativa. 3478. Licor. 3668. Poción. 6308. Polvo. 7326. Pomadas. 7894, 7896, 7897, 7898. Tisana. 8936.
- ENTERITIS CRÓNICA. Aguas minerales acidulas, IV, 261. Cocimiento. 1021. Emplasto. 1798. Emulsion. 1933. Fomento. 2303. Lavativa. 3470, 3503, 3510, 3549, 3550, 3551. Linimentos. 3825, 4025. Looc. 4160. Pildoras. 5289. Pociones. 6077, 6308. Polvo. 7325. Tisana. 8992. V. *Flegmasias crónicas.*
- ENTROPION. Cataplasmas. 772. 854. Linimento. 3789, 3793, 3796, 3797, 4026. Tintura. 8701.
- ENTUERTOS. Poción. 6397. Polvo. 7082.
- ENURESIS. V. *Incontinencia de orina.*
- ENVENENAMIENTOS. Agua. 129. Café. 696. Cataplasma. 797, 853. Emulsion, 1929. Epitema. 2016. Fomento. 2270. Inyeccion. 2809. Julepes. 3420, 3421, 3422. Lavativas. 3554, 3596. Linimentos. 3771, 3772, 3783, 3784, 3789, 3793, 3795, 3796, 3797, 3831, 3927, 3932, 4019, 4020, 4026. Lociones. 4044, 4131. Pociones. 6078, 6122, 6273, 6274, 6286, 6293, 6425, 6470, 6717, 6720, 6726. Polvos. 6846. Ponche. 8187. Tintura. 8666. V. *pág. 327.*

- EPIDIDIMITIS. *V. Didimitis.*
- EPIFORA. Aguas. 100, 210. Colirios. 1167, 1169.
- EPILEPSIA. Aceite. 1. Bolos. 547, 553, 587, 682, 684. Cerveza. 952. Electuarios. 1461, 1462, 1466, 1467, 1473, 1489, 1519, 1520, 1541, 1598, 1616. Especies. 2080, 2120. Espíritu. 2147. Eteres. 2184, 2196. Fomento. 2270. Gotas. 2545. Infusion. 2683. Jara-be. 3270. Julepe. 3429. Lavativa. 3570. Licor. 3669. Linimento. 4005. Mezcla. 4253. Misturas. 4367, 4472. Píldoras. 5048, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5146, 5158, 5160, 5222, 5227, 5279, 5302, 5428, 5429, 5430, 5432, 5433, 5434, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5636, 5640, 5658, 5673, 5778, 5792, 5816, 5817, 5867, 5868, 5869, 5870, 6038, 6058. Pociones. 6146, 6147, 6148, 6276, 6356, 6508, 6512, 6611, 6612, 6619, 6770. Polvos. 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6872, 6883, 6884, 6951, 6995, 7037, 7042, 7049, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7335, 7545. Pomadas. 7651, 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 8102. Remedio. 8245. Solucion. 8377. Tinturas. 8614, 8636, 8751, 8775, 8835, 8836.
- EPILEPSIA DE LOS NIÑOS. Gotas. 2566. Mistura. 4375. Polvos. 7257, 7258, 7259.
- EPINICTIS. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Pomadas. 7581, 8098, 8099, 8100, 8101.
- EPISTAXIS. Agua. 171. Cocimiento. 1018. Epitema. 2010. Licor. 3696. Pediluvios. 4984, 4990, 4991. Polvos. 6905, 6961, 6964, 7216, 7220, 7319, 7337, 7481. Sinapismo. 8354.
- EQUIMOSIS. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Agua. 148. Bálsamo. 408. Baño. 449. Bolas. 534. Embrocacion. 1711. Especies. 2143. Fomentos. 2259, 2260, 2271, 2284, 2322, 2323, 2328, 2329, 2332, 2338. Linimento. 3983. Locion. 4099. Oxicato. 4710, 4711. Polvo. 7470. Tinturas. 8643, 8646. Tópico. 9061. Vinos. 9431, 9432, 9433, 9434. *V. Contusiones.*
- EQUIMOSIS DE LOS OJOS. Cata-plasmas. 744.
- ERECCIONES. Bolos. 675. Emul-siones. 1901, 1936. Lavativa. 3590. Píldoras. 5045, 5046, 5878. Po-ciones. 6095, 6621. *V. Blenorra-gia aguda.*
- ERETISMO. *V. Espasmos.*
- ERISIPELA. Aceite. 15. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Agua. 7509. Cataplasma. 815. Ce-ratos. 893, 894, 914. Fomentos. 2295, 2334. Lociones. 4038, 4159. Pediluvios. 4990, 4991. Piedra. 5004. Polvo. 6772. Pomadas. 7581, 7596, 7908, 7957, 7973, 8079. Remedio. 8240. Sinapismo. 8354. Soluciones. 8398, 8442, 8483. Tópico. 9030, 9040.
- ERISIPELA EDEMATOSA. Cataplas-ma. 837. Tópicos. 9029, 9040, 9063.
- ERISIPELA DE LOS NIÑOS. Eter. 2179. Tratamiento. 9086.
- ERITEMA. Baños. 447, 448, 453, 460, 470. Cataplasma. 797. Cera-tos. 893, 894, 914. Especies. 2104. Linimento. 3786. Lociones. 4129, 4134. Polvo. 6772. Tópico. 9064.
- ERUCTOS. Infusion. 2668. Polvo. 7181. *V. Flatuosidades.*
- ERUCTOS ÁCIDOS. *V. Agrios.*
- ERUPCIONES CRÓNICAS. *V. Her-pes, etc.*
- ERUPCIONES DE LA PIEL. *V. Her-pes, etc.*
- ERUPCIONES SIFILÍTICAS. *V. Sifi-lides.*
- EXANTEMAS. Cocimiento. 1064. Locion. 4107. Píldoras. 5052, 5053. Pocion. 6721. Vinagre. 9354. *V. Sarampion, viruelas, etc.*

- ESCARLATINA.** Emplasto. 1810. Emulsiones. 1963, 1965. Fumigación. 2365. Gargarismo. 2450. Gotas. 2557. Jarabes. 2960, 2961, 3168, 3179. Lociones. 4044, 4079, 4142, 4143, 4155. Mistura. 4523. Pediluvios. 4982, 4987, 4988, 4990, 4991. Pildoras. 5304, 5328, 5350, 5364, 5366, 5988. Pociones. 6063, 6132, 6166, 6170, 6182, 6562, 6721. Polvos. 6791, 7368, 7439. Sinapismo. 8354. Solución. 8498. Tabletas. 4825. Tintura. 8650.
- ESCARLATINA NERVIOSA.** Jarabe. 3038. Pociones. 6358, 6713.
- ESCIRRO.** Aceite. 24. Bolos. 578. Cataplasmas. 774, 782. Emplastos. 1738, 1739, 1774, 1825, 1829, 1833, 1838. Especies. 2092. Infusión. 2648. Mistura. 4428. Pildoras. 5055, 5135, 5401, 5402, 5403, 5404, 5501, 5629, 5630, 5662. Pociones. 6312, 6543. Pomadas. 7876, 8155. Remedio. 8246. Soluciones. 8418, 8424. Ungüentos. 9206, 9243, 9251. *V. Cáncer.*
- ESCIRRO DEL ESÓFAGO.** Bolos. 578, 648.
- ESCIRRO DEL ESTÓMAGO.** Mistura. 4428. Pildoras. 5566, 5677.
- ESCIRROS DEL HÍGADO.** Pildoras. 5629.
- ESCIRRO DE LAS MAMAS.** Pildoras. 5629.
- ESCIRRO DE LA PRÓSTATA.** Bolos. 578, 648.
- ESCIRRO DEL RECTO.** Bolos. 578, 648.
- ESCIRRO DE LA VAGINA.** Bolos. 578.
- ESCIRRO DE LA VEJIGA.** Bolos. 648.
- ESCLEROMA.** Alcoholato. 274. Linimentos. 3783, 3784, 3789, 4026.
- ESCLEROTITIS.** Bolos. 684. Fomento. 2289. Pomadas. 7704, 7973, 8007, 8025, 8114. *V. Oftalmias.*
- ESCORBUTO.** Acido. 67. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas. 115, 147, 216, 252. Alcoholes. 279, 288, 289, 290, 315, 316. Apocemas. 324, 325, 326, 327. Baños. 454, 457, 466, 472. Bebidas. 484, 521. Bolos. 624. Cervezas. 946, 947, 950, 960, 965. Cocimientos. 995, 996, 999, 1040, 1072, 1100. Colutorios. 1308, 1309, 1310, 1314, 1331, 1334, 1346, 1348, 1358. Conservas. 1368, 1369, 1375. Electuarios. 1464, 1500, 1564, 1597, 1598. Elixires. 1625, 1631, 1635, 1636, 1637, 1645, 1651, 1661, 1672, 1680, 1682, 1688, 1695. Enjuagatorios. 1999, 2000, 2001, Especies. 2079. Espíritu. 2172. Etiope. 2199. Gargarismos. 2390, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2440, 2465, 2472, 2533, 2540. Gotas. 2548. Infusiones. 2644, 2664. Jarabes. 2967, 2982, 3016, 3017, 3042, 3043, 3072, 3105, 3110, 3156, 3161, 3216, 3217, 3261, 3268, 3280, 3305, 3306. Julepes. 3367, 3407. Lavatorios. 3631, 3632. Licor. 3698. Limonada. 3749. Linimento. 3984. Mermelada. 4237. Misturas. 4368, 4369, 4457, 4584. Opiatas. 4668, 4675, 4676, 4708. Oxicrotos. 4710, 4711. Paraguay. 8790. Pastillas. 4839, 4866. Pildoras. 5134, 5641. Pociones. 6149, 6150, 6151, 6200, 6201, 6205, 6317, 6324, 6325, 6383, 6386, 6524, 6534, 6616, 6683, 6685, 6724, 6725. Polvos. 7146, 7157, 7371. Ratafia. 8228. Sacarolado. 8301. Soluciones. 8404, 8423, 8471, 8472, 8474. Sueros. 8529, 8530, 8539. Tinturas. 8596, 8599, 8631, 8652, 8724, 8728, 8729, 8730, 8776, 8789, 8811, 8812. Tisanas. 8015, 8857, 8858, 9022. Tratamiento. 9087. Vinagres. 9356, 9358, 9364, 9375, 9386. Vinos. 9414, 9422, 9423, 9448, 9452, 9453. Zumos. 9547, 9549, 9552, 9562.
- ESCORIACIONES.** Aguas. 116. 117. Ceratos. 874, 893, 903, 937.

- Emplastos. 1733, 1896. Pomadas. 7598, 7726. Tópico. 9061. Ungüentos. 9164, 9165, 9201, 9239, 9301, 9302, 9303, 9308, 9309, 9328. *V. Grietas.*
- ESCORIACIONES DE LA BOCA Y GARGANTA. Jarabe. 3166. Miel. 4308. *V. Estomatitis y aftas.*
- ESCORIACIONES DE LOS LABIOS. Pomadas. 7728, 8000.
- ESCORIACIONES DE LAS MANOS. Pomada. 7728.
- ESCORIACIONES DE LAS NARICES. Pomada. 7728.
- ESCORIACIONES DE LOS NIÑOS. Tópico. 9061.
- ESCORIACIONES DEL OJO. Mucilago. 4643.
- ESCORIACIONES DE LA PIEL. *V. Escoriaciones.*
- ESCORIACIONES DE LA VEJIGA. Polvo. 6809.
- ESCORIACIONES DE LA VULVA. Fomento. 2256.
- ESCRESCENCIAS. Cáustico. 855. Lociones. 4144, 4159. Polvos. 6945, 7029.
- ESCRESCENCIAS SIFILÍTICAS. Aguas. 124, 125, 155. Emplasto. 1852. Licores. 3691, 3692, 3710. Linimento. 3777. Polvos. 7031, 7036, 7227. Pomadas. 7740, 7772, 7773, 8082, 8113. Soluciones. 8409, 8434, 8440, 8443, 8497. Tópico. 9065. Trociscos. 9151, 9152, 9153. Ungüento. 9254. *V. Sifilis.*
- ESCRÓFULAS. Aceites. 8, 34. Acido. 66. Aguas minerales sulfuradas, IV, 224. Aguas. 91, 95, 109, 110, 119, 156, 157, 180, 183, 184, 185, 203, 232. Apocema. 326. Azúcar. 8295. Bálsamos. 358, 414, 416. Baños. 442, 447, 448, 454, 457, 460, 464, 465, 466, 472. Bebidas. 485, 508, 519. Bolos. 543, 557, 573, 579, 580, 645, 648, 650, 651, 658, 680. Cafés. 696, 699. Cataplasma. 780. Cervezas. 942, 945, 946, 947, 948, 951, 960, 965. Cocimientos. 995, 997, 998, 999, 1012, 1028, 1088, 1111. Colutorio. 1328. Collar. 1361. Conserva. 1369. Chocolates. 1400, 1404, 1405, 1413, 1415. Electuarios. 1443, 1511, 1576, 1596. Elixires. 1624, 1625, 1631, 1666, 1672, 1680, 1695. Emplastos. 1778, 1815, 1823, 1824, 1828, 1839, 1840, 1862, 1877, 1894. Emulsion. 1970. Espadrapo. 2070. Especies. 2076, 2077, 2078, 2079, 2086, 2087, 2088, 2100, 2131. Eteres. 2192, 2193. Etiope. 2197. Gotas. 2548. Infusiones. 2621, 2651. Inyeccion. 2760. Jabones. 2867, 2870. Jarabes. 2941, 2942, 2943, 2944, 2946, 2954, 2960, 2961, 2963, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2992, 2993, 3017, 3019, 3021, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3068, 3071, 3085, 3106, 3107, 3110, 3112, 3132, 3133, 3141, 3149, 3156, 3160, 3161, 3173, 3179, 3183, 3184, 3185, 3189, 3191, 3193, 3197, 3198, 3199, 3200, 3206, 3216, 3217, 3218, 3248, 3256, 3261, 3286, 3306, 3316, 3335, 3352. Lavativas. 3566, 3567. Licores. 3670, 3698, 3701, 3702, 3713. Limonada. 3740. Linimentos. 3930, 3933, 3985, 3987, 3996, 4019, 4020. Locion. 4145. Misturas. 4325, 4326, 4340, 4370, 4381, 4425, 4426, 4456, 4554, 4555, 4557, 4590. Panes. 4714, 4715. Pastillas. 4843, 4844, 4845, 4851, 4852, 4860, 4881, 4887, 4889, 4890, 4891, 4892, 4904, 4971, 5142. Píldoras. 5034, 5038, 5042, 5065, 5101, 5136, 5137, 5139, 5140, 5141, 5196, 5236, 5255, 5260, 5269, 5303, 5331, 5339, 5342, 5364, 5366, 5368, 5377, 5393, 5412, 5413, 5414, 5424, 5564, 5659, 5662, 5672, 5727, 5735, 5738, 5740, 5755, 5757, 5758, 5759, 5764, 5765, 5766, 5769, 5773, 5775, 5802, 5805, 5823, 5833, 5860, 5872, 5887, 5901, 5936, 5963, 5976, 5988, 5991, 6003, 6019, 6021, 6053.

- Pociones. 6067, 6068, 6069, 682, 683. Caldo. 704. Cataplasma. 756. Cigarritos. 971. Electuario. 1612. Elixires. 1621, 1622, 1623, 1658, 1668, 1673. Esencia. 2046. Especies. 2086. Espiritus. 2148, 2149, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164. Eteres. 2176, 2178, 2190, 2191, 2194, 2196. Gotas. 2564. Infusion. 2684. Jarabes. 2969, 2987, 3003, 3042, 3043, 3052, 3065, 3091, 3143, 3144, 3153, 3205, 3251, 3334. Julepes. 3359, 3368, 3370, 3372, 3373, 3405, 3412, 3415, 3416, 3417, 3433. Lavativas. 3487, 3488, 3490, 3499, 3581. Licores. 3657, 3660, 3671. Linimentos. 3783, 3784, 3789, 3792, 3793, 3795, 3798, 3912, 3916, 3927, 4007, 4019, 4020, 4026. Misturas. 4373, 4374, 4378, 4380, 4535, 4567, 4631. Opiata. 4708. Pastillas. 4928. Píldoras. 5143, 5145, 5148, 5150, 5153, 5156, 5267, 5382, 5438, 5608, 5666, 5857, 5945, 5971, 6041. Pociones. 6112, 6122, 6162, 6164, 6165, 6166, 6168, 6169, 6170, 6175, 6176, 6264, 6273, 6274, 6277, 6281, 6286, 6288, 6289, 6290, 6291, 6293, 6595, 6717, 6750. Polvos. 6814, 6817, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6875, 6877, 6878, 6879, 6882, 6953, 6973, 7032, 7092, 7545. Pomada. 8138. Sacarolado. 8298. Solucion. 8366. Supositorio. 8547. Té. 8584. Tinturas. 8623, 8627, 8691, 8720, 8760, 8780, 8781, 8793, 8794, 8796, 8797, 8813, 8822, 8823, 8824, 8831, 8836. Tisanas. 8859, 8861. Trociscos. 9146, 9157, 9158. Vinagres. 9388, 9389. Vino. 9512.
- ESOFAGISMO. Bolos. 543. Locion. 4133. Mistura. 4568. Píldoras. 5265, 5270. Pociones. 6166, 6264, 6595.
- ESOFAGITIS Pediluvios. 4990, 4991. Sinapismo. 8354.
- ESOFALMIA. Aceite. 8.
- ESPASMOS. Aceites. 38, 50, 61, 62, 63, 64. Acidos. 65, 67, 71. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas. 92, 123, 146, 157, 231, 250, 254, 258, 259, 260, 265, 266. Alcoholes. 275, 282, 284, 299, 304. Bálsamo. 430. Bolos. 545, 645,
- ESPASMOS DE LA MATRIZ. Cera-to. 872. Pomadas. 7695, 7696, 7901.
- ESPASMOS DE LOS PÁRPADOS. Colirios. 1228, 1234. Fomento. 2291. Linimento. 3818.
- ESPASMOS DEL RECTO. Lavativas. 3529, 3607.
- ESPASMOS DE LA URETRA Y DEL

- CUELLO DE LA VEJIGA. Emulsion. 1900. Inyeccion. 2744. Lavativas. 3454, 3523, 3607. Pomadas. 7694, 7695.
- ESPERMATOCELE. Cataplasmas. 751, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 807, 814, 817, 836.
- ESPIÑA BÍFIDA. *V. Hidrorraquis.*
- ESPERMATORREA. *V. Poluciones nocturnas.*
- ESPIÑA VENTOSA. Baño. 464. Polvo. 7395.
- ESPLENALGIA. Baños. 456, 459. Cataplasmas. 780, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 817, 836. Lavativas. 3477, 3523, 3549, 3550, 3551, 3554, 3582, 3583, 3609. Pociones. 6273, 6274, 6286, 6724, 6725.
- ESPLENITIS. Baño. 459. Bolos. 606, 620, 650, 651. Cataplasmas. 747, 750, 772, 780, 781, 782, 789, 794, 795, 797, 799, 807, 814, 815, 817, 836, 837, 854. Electuarios. 1500, 1519, 1597. Emplastos, 1778, 1894. Jabon. 2880. Jarabes. 2972, 3018, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122. Lavativas. 3474, 3628. Linimento. 3887. Píldoras. 5030, 5044, 5265, 5377, 5381, 5558, 5580, 5607, 5672, 5675, 5679, 5682, 5684, 5687, 5754, 5755, 5933, 5934, 5935, 5997, 6024. Pociones. 6251, 6264, 6267, 6422, 6593, 6709. Pomadas. 7746, 7757, 7934, 7967, 7973, 8025. Tópico. 9035.
- ESPLENITIS CRÓNICA. Aguas minerales acidulas, IV, 261. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aceite. 25. Bebida. 493. Bolos. 603, 606, 648, 649, 651. Caldo. 706. Cataplasma. 794. Cerveza. 960. Cocimientos. 1048, 1109. Electuarios. 1443, 1540, 1576, 1582. Elixir. 1694. Emplastos. 1862, 1871. Especies. 2130. Gotas. 2573. Infusion. 2619. Inyeccion. 2817. Jabones. 2856, 2858, 2879. Jarabes. 2886, 2968, 2997. Julepe. 3363. Lavativa. 3628. Limonada. 3737. Linimento. 3868. Misturas. 4406, 4541, 4542, 4605, 4609. Opiata. 4701. Pediluvios. 4987, 4988. Píldoras. 5026, 5029, 5064, 5491, 5494, 5535, 5536, 5537, 5563, 5653, 5674, 5675, 5685, 5699, 5783, 5784, 5789, 5799, 5904, 5963, 6024, 6052. Pociones. 6085, 6218, 6221, 6343, 6559, 6583. Polvos. 7327, 7439. Pomadas. 7959, 7969. Sal. 8340. Solucion. 8515. Suero. 8541. Tinturas. 8724, 8810. Tisanas. 8874, 8941. Zumo. 9563.
- EXPULSION RETARDADA DE LAS SECUNDINAS. Infusion. 2632. Mistura. 4452. Pociones. 6624, 6626. Trociscos. 9156.
- ESPUTOS DE SANGRE. *V. Hemolisis.*
- ESQUINANCIA. *V. Angina.*
- ESTAFILOMA. Electuario. 1546. Píldoras. 5304. Poción. 6140. Polvo. 6991. Tabletas. 4912, 4914.
- ESTERILIDAD. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296.
- ESTIOMENA. Pasta. 4768. Pomada. 7803. *V. Herpes y Ulceras.*
- ESTOMACACE. Aguas. 114, 139. Alcoholato. 308. Colutorios. 1309, 1310, 1314, 1316, 1321, 1323, 1337. Conservas. 1369, 1375, 1379. Electuarios. 1500, 1546, 1547, 1564, 1588, 1597, 1598. Esencia. 2040. Gargarismos. 2396, 2399, 2405, 2415, 2418, 2440, 2450, 2451, 2452, 2455, 2473, 2490, 2493, 2500, 2520, 2528, 2533, 2535. Julepe. 3367. Opiata. 4708. Paraguay. 8790. Pastillas. 4848, 4889. Pociones. 6150, 6317, 6616. Polvos. 7116, 7152, 7157, 7459. Tabletas. 4838, 4920. Tinturas. 8728, 8729, 8730, 8738, 8789. Vinagre. 9386. Vino. 9453.
- ESTOMATITIS. Alcoholato. 308. Colutorios. 1299, 1323, 1325, 1342, 1343, 1355. Conservas.

- 1369, 1375, 1379. Gargarismos. 1420. Electuarios. 1503, 1504, 2390, 2404, 2485, 2523, 2525. 1513, 1514, 1577, 1578, 1579, 1586, 1590, 1591, 1592, 1593, 7152. Pomadas. 8001, 8031, 8032. 1604, 1605. Elixir. 1618. Emul- siones. 1957, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979. Enemas. 3576, 3598. Esencias. 2026, 2043. Especies. 2127. Extractos. 2200, 2202, 2208, 2243. Fomento. 2317. Gragea. 2591. Hidromel. 2615. Infusiones. 2629, 2655, 2656, 2661, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2679, 2680. Jabones. 2850, 2869, 2871. Jalea. 2907. Jarabes. 2947, 2948, 2960, 2961, 2962, 2973, 2978, 3031, 3041, 3219, 3223, 3224, 3225, 3277, 3287, 3289, 3301, 3302, 3303, 3321. Julepe. 3427. Lavativas. 3453, 3455, 3457, 3458, 3459, 3460, 3535, 3548, 3549, 3550, 3551, 3553, 3554, 3556, 3565, 3571, 3575, 3577, 3578, 3589, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3600, 3601, 3602, 3608, 3609. Leche. 3651. Licor. 3722. Limonadas. 3728, 3734, 3735, 3751, 3752, 3753, 3754, 3758, 3763, 3764. Linimentos. 3771, 3772. Locion. 4137. Looc. 4210. Medicina. 4233, 4234, 4235. Mielles. 4303, 4304. Misturas. 4593, 4597. Naranjada. 3743. O- piatas. 4680, 4706. Pastillas. 4806, 4917. Pildoras. 5025, 5069, 5087, 5523, 5567, 5568, 5603, 5604, 5788, 5797, 5798, 5855, 5856, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919, 5921, 5923, 5924, 5926, 5927, 5928, 5939, 5947, 5948, 5965, 5996, 6005, 6019, 6033. Pocio- nes. 6066, 6078, 6391, 6591, 6594, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6663, 6665, 6670. Polvos. 3755, 7222, 7223, 7317, 7331, 7445, 7446, 7447, 7451, 7452, 7453, 7454, 7473, 7499, 7514. Poma- das. 7777, 8117. Pulpas. 8189, 8191, 8194, 8195. Purgantes. 8197, 8198. Supositorios. 8557,
- 1369, 1375, 1379. Gargarismos. 1420. Electuarios. 1503, 1504, 2390, 2404, 2485, 2523, 2525. Miel. 4308. Pastillas. 4851. Polvo. 7152. Pomadas. 8001, 8031, 8032. Robs. 8290. Solucion. 8432.
- ESTOMATITIS GANGRENOSA. Colu- torio. 1348. Gargarismo. 2390.
- ESTOMATITIS MEMBRANOSA. Co- lutorio. 1348. Gargarismo. 2404. *V. Crup.*
- ESTOMATITIS MERCURIAL. *V. Sa- livacion mercurial.*
- ESTRABISMO. Alcoholatos. 274, 307. Fumigacion. 2365.
- ESTRANGURRIA. Acido. 67. Bo- los. 607. Cocimiento. 1076. Emul- sion. 1946. Linimento. 3891. Pil- doras. 5149. Pociones. 6409, 6419, 6420, 6596, 6707. Té. 8581. Trociscos. 9139. *V. Disuria é Iscuria.*
- ESTRECHECES. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836, 837. Pomada. 7863.
- ESTRECHEZ DE LOS ESFINTERES. *V. Contraccion de los esfinte- res.*
- ESTRECHEZ DEL RECTO. Cande- lillas. 728. Pomada. 7778. *V. Di- latacion simple ó forzada por me- dio de mechas ó de supositorios de belladona.*
- ESTRECHEZ DE LA URETRA. Can- delillas. 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 737, 738. Cáus- ticos. 857. Conserva. 1372. Fumi- gaciones. 2375, 2381. Pomadas, 8043, 8156. Sondas. 8518.
- ESTRECHEZ DE LA VAGINA. Po- mada. 8156.
- ESTREÑIMIENTO. Aceite. 51. A- guas. 87, 162, 192, 193, 204, 205, 224, 233, 235, 7509. Bebi- das. 510, 511, 512. Bizcochos. 526, 527, 528. Bolos. 608, 609, 654, 665. Café. 699. Caldos. 718, 723, 724. Cervezas. 962, 963, 964, 968. Cocimientos. 989, 1056, 1068, 1069, 1078, 1103. Con- feccion. 1542. Conservas. 1371, 1372, 1373, 1374, 1381. Choco- lates. 1411, 1417, 1418, 1419,

8559, 8565, 8566, 8567, 8575, 8576, 8577. Tabletas. 4801, 4802, 4867, 4868, 4957, 4958, 4970. Tinturas. 8588, 8594, 8596, 8598, 8599, 8617, 8759, 8807. Tisanas. 8968, 8985, 8994, 8995, 9012. Ungüento. 9183. Zumo. 9565.

ESTUPOR. Pociones. 6163, 6164, 6165, 6168, 6169. V. *Coma y letargo*.

EXANTEMAS CRÓNICOS. Acido. 67. Linimento. 4028. Polvos. 6800, 7266.

EXÓSTOSIS. Emplastos. 1774, 1792. Fumigacion. 2371. Jarabes. 3105, 3106, 3107, 3108, 3272. Pediluvios. 4986. Pildoras. 5135, 5760. Poción. 6571. Pomadas. 7957, 8011, 8024, 8030, 8123. Solucion. 8474. Tisana. 8965. V. *Sifilis, escrófulas*.

EXUTORIOS ó Fuentes. Ceratos. 871, 877, 878, 892, 917, 925, 926. Espadrapos. 2059, 2073. Guisantes. 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608. Papeles. 4719, 4720, 4722. Pomadas. 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7887, 7923, 8163, 8165. Tafetan. 4738. Ungüentos. 9200, 9250.

FALTA DE APETITO. V. *Anorexia*.

FARINGITIS. Gargarismo. 2481. Poción. 6076. Solucion. 8432. Zumo. 9557.

FABUS. V. *Tiña*.

FETIDEZ DEL ALIENTO. Agua. 139. Alcoholato. 308. Catecú. 2210. Colutorios. 1306, 1329. Esencia. 2040. Gargarismos. 2414, 2452, 2453, 2463, 2491. Granos. 2596. Leche. 3642. Linimento. 3775. Locion. 4072. Misturas. 4473, 4474. Pastillas. 4831, 4839, 4840, 4848, 4849, 4947, 4948. Pildoras. 5072, 5532, 5888. Tabletas. 4836, 4837, 4838, 4841, 4850, 4910, 4913, 4960.

FIEBRE ADINÁMICA. V. *Calenturas adinámicas*.

FIEBRE AMARILLA. V. *Calentura amarilla*.

FIEBRE ATÁXICA. V. *Calentura atáxica*.

FIEBRES BILIOSAS. V. *Calenturas biliosas*.

FIEBRE GÁSTRICA. V. *Calentura biliosa*.

FIEBRES GRAVES. V. *Calentura nerviosa, pútrida ó tifo*.

FIEBRE HÉCTICA. V. *Calentura héctica*.

FIEBRE INFLAMATORIA. V. *Calenturas inflamatorias*.

FIEBRES INTERMITENTES. V. *Calenturas intermitentes*.

FIEBRE LENTA. V. *Calentura héctica*.

FIEBRE PUERPERAL. V. *Calentura puerperal*.

FIEBRE PÚTRIDA Y MALIGNA. V. *Calenturas adinámicas y atáxicas*.

FIEBRES TIFOIDEAS. V. *Tifo*.

FIMOSIS. Cataplasmas. 815, 841. Inyeccion. 2822. Pomadas. 7695, 8014. Solucion. 8488. Tópico. 9042. V. *Parafimosis*.

FISOBLEFARON. Colirios. 1120, 1257, 1258, 1289. Pomadas. 7957, 7967.

FÍSTULAS. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Cocimiento. 1065. Digestivos. 1432, 1439, 1440. Emplasto. 1733. Esponjas. 2173, 2174, 2175. Fomento 2306. Fumigaciones. 2375. Inyecciones. 2702, 2741, 2760, 2779, 2782, 2792, 2793, 2840. Licor. 3690. Lociones. 4038, 4066. Pasta. 4762. Pomadas 7684, 7741, 7957. Soluciones. 8381, 8460, 8486, 8488. Trociscos. 9151, 9152, 9153. Ungüentos. 1441, 9228. V. *Ulceras fistulosas*.

FÍSTULAS DEL ANO. Confeccion. 1587. Supositorio. 8569. V. *Ulceras fistulosas*.

FÍSTULA LAGRIMAL. Inyecciones. 2781, 2783. Tratamiento. 9084.

FLATUOSIDADES. Accites. 40, 48. Aguas. 246, 249, 258. Bálsamo. 391. Bebida. 498. Bolos. 544, 545, 575, 630. Catecú. 2210. Cocimien-

- tos. 1029, 1030. Electuario. 1535. Elixires. 1658, 1689, 1695, 1702. Emplastos. 1753, 1755, 1781, 1812, 1813, 1814, 1818, 1830, 1847, 1848. Esencias. 2020, 2046. Especies. 2142. Espíritu. 2157. Infusion. 2668. Jarabes. 3043, 3091. Lavativa. 3529. Linimento. 3856. Looc. 4168. Misturas. 4551, 4562. Pastillas. 4955, 4965. Píldoras. 5598. Pociones. 6062, 6110, 6301, 6470. Polvos. 6775, 6941, 7023, 7094, 7095, 7181, 7426. Supositorio. 8557. Tabletas. 4927. Tinturas. 8604, 8618, 8621, 8570, 8696, 8711, 8818, 8821, 8842. Tisanas. 8893, 8942. Ungüento. 9202. Yerbas. 2094. *V. Neumato-*
- FLEBITIS.** Bálsamo. 427. Píldoras. 5358, 5364, 5686, 5765, 5766, 5832. Pociones. 6487, 6595. Pomadas. 7651, 7973, 8007, 8025, 8138. Sinapismo. 8354. Tintura. 8685.
- FLEGMASIAS AGUDAS Y CRÓNICAS.** Baños. 456, 459. Cataplasmas. 743, 750, 789, 795, 797, 815. Cocimientos. 992, 1056, 1057, 1073. Elixir. 1640. Especies. 2104, 2105, 2106, 2107, 2108. Fomentos. 2287, 2289, 2315, 2316. Harinas. 2109, 2132. Láudanos. 3446, 3449. Limonadas. 3729, 3757, 3765, 3767. Linimento. 3793. Oxierato. 4710. Papel. 4723. Pasta. 4788. Píldoras. 5064, 5479. Pociones. 6084, 6105, 6273, 6274, 6418, 6551, 6552, 6719. Polvos. 6972, 7007, 7509. Pomadas. 7602, 7894, 7896, 7897, 7898, 7920, 8079, 8102, 8143, 8177. Robs. 8286. Sinapismo. 8354. Solucion. 8441. Sueros. 8526, 8540. Tisanas. 8845, 8897, 8926, 8953, 8991. Ungüentos. 9173, 9292, 9293, 9301, 9302, 9317. Vinos. 3447, 3448, 9468. Yerbas. 2110. Zamo. 9549.
- FLEGMASIA BLANCA DOLOROSA.** Cataplasma. 815. Fomentos. 2290, 2303, 2304, 2317. Poción. 6426.
- Polvo. 7310. Pomadas. 7973, 8007, 8025.
- FLEGMASIA DE LAS VIAS URINARIAS.** *V. Iscuria y catarro de la vejiga.*
- FLEMAS.** Elixires. 1638, 1639. Polvo. 6847.
- FLEMON.** Agua. 79. Cataplasmas. 746, 747, 748, 749, 750, 788, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 807, 810, 812, 814, 823, 828, 836, 839, 843, 844. Harina. 2109. Pomadas. 7957, 8007.
- FLORES BLANCAS.** *V. Leucorrea.*
- FLUJOS CRÓNICOS.** *V. Blenorrea y Leucorrea.*
- FLUJO HEMORROIDAL.** Bolos. 609. Emplasto. 1889. Escudo. 2007. Píldoras. 5049, 5989. Supositorio. 8545.
- FLUXION.** Cataplasmas. 794, 815, 854. Emplasto. 1770. Fumigaciones. 2375. Pediluvios. 4990, 4991.
- FOTOFOBIA.** Colirios. 1130, 1167, 1169, 1170, 1234, 1237, 1249. Pomadas. 7692, 7697, 8015, 8018, 8053, 8070, 8071. Untura. 9329. *V. Oftalmia aguda.*
- FOTOFOBIA ESCROFULOSA.** Colirio. 1161. Mistura. 4454. Tintura. 8664.
- FRACTURAS.** Aguas. 104, 113, 236. Cataplasma. 794. Embrocaciones. 1722. Emplastos. 1779, 1782, 1783, 1801. Fomento. 2323. Linimentos. 3783, 3784. Mezcla. 4293. Mistura. 4606. Oxierato. 4710, 4711. Remedio. 8240. Tópico. 9040. Tratamiento. 9089. Vendaje. 4294. *V. Contusiones.*
- FRENESÍ.** *V. Aracnoiditis.*
- FUENTES.** *V. Exutorios.*
- FUNGO MEDULAR.** Cataplasma. 794. Locion. 4104.
- FUNGOSIDADES.** *V. Ulceras fungosas.*
- FUNGOSIDADES DE LA BOCA Y DE LAS ENCIAS.** Electuario. 1564. Locion. 4032. Mistura. 4475.
- FUMIGATORIOS.** *V. Miasmas.*
- GALACTIRREA.** Bebida. 490. Emplastos. 1879. Mistura. 4476. Pí-

doras. 5069, 5167, 5483. Pociones. 6158, 6665. Robs. 8286. Suro. 8542.

GANGRENA. Aguas. 104, 116, 117. Alcohol. 267. Bálsamo. 395. Cataplasmas. 761, 763, 764, 765, 766, 776, 779, 798, 820, 845, 846, 852. Cerato. 868. Cocimientos. 1001, 1002, 1003, 1094. Digestivo. 1431. Fomentos. 2257, 2268, 2270, 2274, 2278, 2279, 2296, 2320, 2321. Inyeccion. 2714. Licor. 3703. Linimentos. 3834, 3899. Lociones. 4058, 4068, 4072, 4159. Misturas. 4342, 4401, 4453. Pildoras. 5242, 5243. Pociones. 6202, 6534, 6724, 6725. Polvos. 6802, 6929, 6930, 7267, 7459. Vinagres. 9354, 9358, 9396. Vino. 9431, 9432, 9433.

GANGRENA DE LA BOCA. Colutorios. 1300, 1327. Gargarismos. 2462, 2470. Poción. 6379.

GANGRENA DE HOSPITAL. Aguas. 129, 237. Bolos. 566, 569, 601, 603, 680. Cataplasmas. 761, 762, 783, 784, 798, 821, 847. Ceratos. 868, 869, 912. Especies. 2086, 2087, 2088. Fomentos. 2292, 2314. Lociones. 4052, 4075, 4076, 4079, 4133. Loocs. 1218. Misturas. 4568. 4620. Pildoras. 5242, 5482. Pociones. 6200, 6201, 6202, 6205, 6534, 6724, 6725. Polvos. 6774, 6807, 6929, 6940, 7045, 7390, 7459, 7461. Pomada. 8083. Robs. 8291. Soluciones. 8370, 8386, 8420, 8486. Vinagre. 9355. Vino. 9508, 9535.

GANGRENA DE LOS PÁRPADOS. Fomento. 2307.

GASTRALGIA. *V. Cardialgia.*

GASTRITIS. Aguas minerales acidulas, IV, 261. Caldo. 708. Cocimientos. 1033, 1035, 1081. Confeccion. 1446. Emulsiones. 1903, 1918, 1954. Fomento. 2303. Jarabes. 2958, 2970, 3073, 3163, 3164. Julepe. 3369, 3381, 3382, 3413. Lavativas. 3474, 3477, 3549, 3550, 3551, 3554, 3609. Limonadas. 3757, 3767. Looc. 4203. Mis-

turas. 4351, 4403. Pastas. 4777, 4788, 4789, 4790, 4791. Pociones. 6140, 6170, 6595, 6710. Polvos. 6994, 7545. Solucion. 8432. Tisana. 8934. Zumo. 9549.

GASTRITIS CRÓNICA. Caldo. 716. Emplastos. 1847, 1848. Jaleas. 2909, 2912, 2924, 2926. Mistura. 4326. Palamoud. 2553. Pildoras. 5360, 5566, 5869. Pociones. 6439. 6640. Polvo. 7480. Racahout. 2254. Wacaca. 2255.

GASTRO-ENTERITIS. Cocimientos. 1076, 1081. Confeccion. 1446. Emulsiones. 1898, 1903, 1920, 1932, 1934, 1953, 1987. Jalea. 2909. Jarabes. 3163, 3164, 3229. Julepes. 3413, 3430. Lavativas. 3477, 3549, 3550, 3551, 3554, 3609. Limonadas. 3756, 3767. Pasta. 4788. Poción. 6250. Polvos. 7325, 7326. Solucion. 8432. Tisana. 8935. *V. Gastritis.*

GASTRODINIA. *V. Cardialgia.*

GASTROMALACIA. Mistura. 4623. Poción. 6642.

GASTRORRAGIA. *V. Hematemesis.*

GEROFTALMIA ú *oftalmia seca.* Colirios. 1152, 1228, 1285. Eter. 2195. Pildoras. 5658, 5755, 5933. 5982. Pomada. 7722.

GINGIVITIS. Colutorio. 1314. Gargarismo. 2453. Polvo. 7116.

GLAUCOMA. Pomadas. 7579, 7888.

GLOCOSURIA. *V. Diabetes.*

GLOSALGIA. Colutorio. 1305. Gargarismos. 2478, 2480, 2514. Sinapismo. 8358.

GLOSANTRAX. Colutorios. 1305, 1314, 1321, 1337. Sinapismo. 8354.

GLOSITIS. Cataplasma. 794. Colutorios. 1309, 1321. Fumigaciones. 2375. Gargarismos. 2483, 2500, 2518. Linimento 4026. Pildoras. 5358, 5754. Sinapismo. 8354.

GONORREA AGUDA. *V. Blenorragia.*

GONORREA CRÓNICA. *V. Blenorrea.*

- GOTA. Aceites. 3, 13, 25, 27, 6364, 6470, 6534, 6622, 6716, 28, 41. Aguardiente. 74. Aguas 6724, 6725. Polvos. 6819, 6820, minerales salinas. IV, 296. Aguas. 6821, 6822, 6823, 6824, 6926, 142, 224, 263. Alcoholes. 267. 6952, 7006, 7202, 7203, 7304, 268, 274, 297, 307. Apocemas. 7305, 7330, 7398, 7409, 7513. 320, 325. Bálsamos. 26, 359, Pomadas. 7715, 7746, 7874, 7902, 360, 361, 368, 369, 377, 408, 7903, 7904, 7905, 7913, 7958, 414, 417, 434. Baños. 448, 449, 8025, 8033, 8037, 8116, 8172. 453, 461, 465, 469, 470, 474. Ratafias. 8207, 8225. Remedios. 8250, 8251, 8252. Sinapismos. 574. Cataplasmas. 748, 751, 752, 8354, 8358. Soluciones. 8414, 753, 754, 773, 774, 780, 789, 8420, 8455, 8474, 8513, 8515. 790, 791, 792, 795, 797, 799, Sueros. 8539. Tabletas. 4820. Tin- tura. 8598, 8622, 8625, 8628, 8665, 8684, 8685, 8686, 8687, 8714, 8732, 8735, 8736, 8737, 8741, 8757, 8800, 8828, 8837. 950, 956. Cocimientos. 993, 1063, 1064, 1070, 1071, 1079. Electua- rio. 1450. Elixires. 1628, 1629. 1642, 1648, 1693. Emplastos. 1738, 1739, 1810, 1842, 1843, 1844, 1845, 1895. Epitema. 2009. Esencias, 2047, 2048. Especies. 2078, 2086, 2133. Específico. 2145. Eter. 2195. Extractos. 2214, 2219. Fomentos. 2304, 2307. Fu- migaciones. 2365. Gotas. 2546. 2547, 2552, 2579. Harina. 2132. Infusiones. 2651, 2652. Jabones. 2854, 2855, 2856. Jarabes. 2977, 2978, 2989, 2990, 3019, 3100, 3168, 3193, 3306. Julepe. 3389. Licor. 3720. Linimentos. 3794, 3795, 3796, 3797, 3806, 3807, 3808, 3809, 3819, 3831, 3845, 3855, 3866, 3887, 3901, 3912, 3919, 3926, 3931, 3937, 3939, 3945, 3956, 3986, 3989, 3999, 4008, 4010, 4013, 4015, 4019, 4020, 4026. Lociones. 4037, 4134, 4152. Loocs. 4176, 4177, 4178. Miel. 4317. Misturas. 4352, 4353, 4400, 4429, 4440, 4463, 4479, 4533, 4604. Ojímieles. 4648, 4651, 4652. Papeles. 4725, 4726. Pasti- llas. 4831. Pildoras. 5013, 5034, 5035, 5038, 5052, 5053, 5054, 5066, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5240, 5527, 5609, 5624, 5631, 5787, 5932, 5988, 6056. Pociones. 6117, 6119, 6120, 6177, 6328, 6329, 6364, 6470, 6534, 6622, 6716, 6724, 6725. Polvos. 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6926, 6952, 7006, 7202, 7203, 7304, 7305, 7330, 7398, 7409, 7513. Pomadas. 7715, 7746, 7874, 7902, 7903, 7904, 7905, 7913, 7958, 8025, 8033, 8037, 8116, 8172. Ratafias. 8207, 8225. Remedios. 8250, 8251, 8252. Sinapismos. 8354, 8358. Soluciones. 8414, 8420, 8455, 8474, 8513, 8515. Sueros. 8539. Tabletas. 4820. Tin- tura. 8598, 8622, 8625, 8628, 8665, 8684, 8685, 8686, 8687, 8714, 8732, 8735, 8736, 8737, 8741, 8757, 8800, 8828, 8837. Tisanas. 8854, 8885, 8887, 8985, 9004, 9011. Tópico. 9039. Un- güentos. 9276, 9316. Vinos. 9429, 9454, 9455, 9456, 9459, 9460, 9461, 9476. Zumo. 9543.
- GOTA SERENA. V. *Amaurosis*.
- GRANOS DE LA CARA. V. *Herpes*.
- GRANULACIONES DE LA CórNEA. Colirios. 1158, 1220. Lapicero. 3442. Tinturas. 8746, 8747, 8798.
- GRANULACIONES DE LA MATRIZ. Locion. 4157.
- GRIETAS. Bálsamo. 399. Cata- plasma. 797. Ceratos. 897, 898, 907, 914, 924, 927, 937. Inyec- ciones. 2760, 2830. Licor. 3707. Linimentos. 3805, 3876. Pasta. 4748. Poción. 6084. Polvos. 7031, 7115, 7500. Pomadas. 7596, 7693, 7741, 7937, 8079, 8098, 8099, 8100, 8101. Tintura. 8611. Tópi- co. 9065. Ungüentos. 9190, 9292, 9293, 9303. Vino. 9508.
- GRIETAS DEL ANO. Cerato. 906. Infusion. 2671. Inyeccion. 2762. Lavativas. 3515, 3530. Linimen- tos. 3777, 4000. Locion. 4108. Mistura. 4583. Pomadas. 7644, 7684, 7699, 7805, 8031, 8032, 8113, 8139.
- GRIETAS DE LOS LABIOS. Cera- tos. 889, 890, 893, 905, 906, 918, 924. Linimento. 3966. Po- madas. 7683, 7865, 8001. Un- güento. 9198. V. *Grietas*.

GRIETAS DE LAS MANOS. Lini-
mento. 3966. Pomadas. 7806,
7865. Ungüento. 9198. V. *Grietas*.

GRIETAS DE LOS PECHOS. Aguas.
116, 117, 130. Bálsamo. 388.
Ceratos. 886, 889, 890, 893, 900,
904, 905, 906. Fomentos. 2349,
2350. Linimentos. 3840, 3846,
3867, 3929, 3947, 3948, 3949,
3960, 3966, 4011, 4024. Locion.
4076. Polvo. 7328. Pomadas. 7680,
7681, 7683, 7733, 7807, 7808,
7809, 7865. Soluciones. 8411,
8430. Ungüento. 9296.

GRIETAS DE LA PIEL. V. *Grie-
tas*.

GRIETAS SIFILITICAS. Licor.
3691. Mezcla. 4270. Polvo. 7035.
Pomada. 7740. V. *Sifilis*.

GRIPE. Bolos. 535. Cigarritos.
971. Electuario. 1597. Jarabes.
3135, 3136, 3137. Pociones. 6280,
6285, 6563, 6595, 6597, 6665,
6766.

GUTA ROSEA. Tratamiento. 9130.
V. *Herpes*.

HELMINTIASIS. V. *Lombrices*.

HEMACELINOSIS ó *Enfermedad
manchada de Werlhof*. Baño. 457.
Electuario. 1597. Lavativa. 3626.
Lociones. 4104, 4106. Looc. 4203.
Pastillas. 4956. Pociones. 6317,
6616. Té. 8582.

HEMATEMESIS. Agua. 7509. Fo-
mento. 2317. Julepe. 3379. Looc.
4173. Misturas. 4532, 4615. Pe-
diluvios. 4984, 4990, 4991. Pí-
ldoras. 5286, 5700, 5938. Pocio-
nes. 6184, 6557, 6558. Polvo.
6903. Sinapismo. 8354. V. *Hemor-
ragias*.

HEMATEMESIS PASIVA. V. *Hema-
temesis*.

HEMATOCELE ó *Tumor sanguíneo*.
Pociones. 6166, 6267, 6388.

HEMATURIA. Agua. 7509. Emul-
sion. 1967. Inyeccion. 2813. Pí-
ldoras. 5286. Pociones. 6273,
6274, 6286, 6365, 6388, 6646,
Polvo. 6782. Sueros. 8519, 8520.
8521, 8522, 8524, 8525. V. *He-
morrhagias*.

HEMATURIA PASIVA. Pociones.
6244, 6553. V. *Hemorrhagias pa-
sivas*.

HEMERALOPIA. Alcoholato. 307.
Colirios. 1228, 1241, 1257, 1289.
Eter. 2195. Sinapismo. 8354.

HEMICRÁNEA. Aguas. 89, 92,
131, 229. Bálsamo. 423. Bolos.
553. Cerveza. 949. Colirio. 1210.
Electuarios. 1467, 1612. Emplas-
tos. 1757, 1770, 1771, 1885.
Especies. 2081. Fomento. 2261.
Frontales. 2359, 2360. Gotas.
2549, 2564. Infusion. 2683. Licor.
3686. Locion. 4071. Miel. 4305.
Misturas. 4449, 4632. Pedilu-
vios. 4980, 4984, 4990, 4991.
Píldoras. 5168, 5185, 5226, 5982,
6005. Pociones. 6084, 6105, 6182,
6183, 6202, 6264, 6273, 6274,
6286, 6470, 6534, 6595, 6724,
6725. Polvos. 6819, 7219, 7257,
7258, 7259, 7261, 7262, 7263.
Pomadas. 7651, 7722, 7894, 7896,
7897, 7898, 8036, 8138. Sinapis-
mo. 8354. Soluciones. 8388, 8403,
8414, 8445. Tinturas. 8643, 8646.

HEMIPLEGIA. Aceite. 25. Epite-
ma. 2012. Píldoras. 6059, 6060.
Polvos. 7126, 7335. Pomada.
7912. Ungüento. 9285. Vinagre.
9387. V. *Parálisis*.

HEMOTISIS. Aguas. 171, 175.
Apocema. 333. Bálsamos. 378,
401. Bolos. 606, 649, 661. Caldo.
707. Cremas. 1390, 1393, 1394.
Electuarios. 1494, 1496, 1500,
1597. Emulsiones. 1964, 1981.
Especies. 2102. Jarabe. 2974. Ju-
lepe. 3379. Loocs. 4173, 4174.
Maniluvios. 4226. Misturas. 4441,
4615, 4619. Píldoras. 5185, 5186,
5281, 5290. Pociones. 6084, 6174,
6183, 6200, 6201, 6244, 6369,
6534, 6555, 6557, 6558, 6586,
6614, 6709, 6724, 6725, 6726.
Polvos. 6905, 6933, 6934, 7336,
7422, 7481. Robs. 8290. Sinapis-
mo. 8354. Tintura. 8829. Tisana.
8880. V. *Hemorrhagias activas*.

HEMOPTISIS PASIVA. Apocema.
334. Electuario. 1506. Jarabe.

3305. Mistura. 4599. Píldoras. 5490. Poción. 6254. Polvo. 6983, Sueros. 8519, 8520, 8521, 8522, 8524, 8525. *V. Hemorragias pasivas.*

HEMORRAGIAS. Acidos. 67, 70, 71. Aguas. 104, 134, 149, 157, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177. Apocemas. 321, 352. Bebidas. 517, 518. Bolos. 567, 678. Colutorios. 1305, 1329. Electuarios. 1493, 1498, 1606. Elíxires. 1622, 1623, 3658. Emulsion. 1981. Especies. 2090. Extracto. 2235. Fomentos. 2256, 2279, 2305. Infusiones. 2632, 2666. Inyecciones. 2699, 2702. Jarabes. 2957, 3045, 3062, 3092, 3288. Julepes. 3376, 3379. Lavativas. 3508, 3530, 3565. Limonadas. 3749, 3759, 3761. Locion. 4062. Misturas. 4452, 4599. Píldoras. 5295, 5961, 5994. Pociónes. 6227, 6228, 6234, 6368, 6467, 6690, 6726. Polvos. 6804, 6959, 6960, 6964, 6967, 6972, 7032, 7100, 7101, 7250, 7324, 7337, 7422, 7568. Pomadas. 7863, 8079. Sacarolado. 8300. Soluciones. 8371, 8446, 8506. Te. 8582. Tisanas. 8880, 8882, 8883, 8884, 8989. Trociscos. 9159. Vino. 9504.

HEMORRAGIAS PASIVAS. Aguas. 80, 84, 169. Apocemas. 332, 352. Bálsamo. 378. Bebidas. 494, 506. Bolos. 562, 563, 569. Colutorio. 1321. Conserva. 1380. Electuarios. 1501, 1515, 1539. Elíxir. 1620. Esencia. 2023. Especies. 2089. Eter. 2194. Fomento. 2282. Infusiones. 2631, 2665. Jarabes. 3284, 3322, 3323, 3324. Julepes. 3377, 3378. Leche. 3635. Limonadas. 3749, 3759, 3760, 3761. Looc. 4174. Miel. 4300. Misturas. 4384, 4413, 4441, 4619. Píldoras. 5057, 5061, 5283, 5284, 5285, 5288, 5289, 5290, 5292, 5338, 5432, 5938, 6007. Pociónes. 6184, 6229, 6230, 6231, 6232, 6241, 6242, 6245, 6513, 6533, 6555, 6558, 6737. Pol-

vos. 6807, 6904, 6905, 6963, 6968, 7249, 7323, 7459. Suero. 8527. Tisana. 8878. Vinos. 9436, 9448.

HEMORRAGIA CEREBRAL. *V. Apoplejia.*

HEMORRAGIAS DE LAS ENCÍAS. *V. Escorbuto.*

HEMORRAGIAS INTESTINALES. *V. Hemorragias.*

HEMORRAGIAS PERIÓDICAS. Bolos. 566. Píldoras. 5235.

HEMORRAGIAS POR PICADURAS DE SANGUIJUELAS. Polvos. 6955, 6956, 6960, 7340. Solucion. 8365.

HEMORRAGIAS TRAUMÁTICAS. Agua. 148. Mistura. 4460. Piedra. 5003. Polvos. 7248, 7339. Solucion. 8511. *V. Hemorragias activas.*

HEMORRAGIAS UTERINAS. *V. Metrorragia.*

HEMORROIDES. Aceite. 42. Bolos. 589. Candelillas. 725. Ceratos. 906, 914. Cocimiento. 987. Electuarios. 1455, 1478, 1503, 1504, 1587, 1599. Emplasto. 1759. Especies. 2083. Extracto. 2200. Fomentos. 2263, 2285. Fumigaciones. 2375, 2381. Infusion. 2671. Inyecciones. 2713, 2736, 2737, 2747. Lavativas. 3473, 3540, 3547. Linimentos. 3800, 3823, 3824, 3826, 3827, 3861, 3966, 3995, 3998, 3999, 4000. Lociones. 4040, 4041, 4042. Mistura. 4347. Píldoras. 5022, 5030, 5187, 5307, 5358, 5568, 5890, 5891, 5909. Polvos. 6906, 7481. Pomadas. 7581, 7630, 7631, 7632, 7633, 7682, 7683, 7684, 7685, 7706, 7708, 7741, 7756, 8074, 8031, 8032, 8049, 8142, 8161, 8162, 8180. Remedio. 8239. Sueros. 8519, 8520, 8521, 8522, 8524, 8525. Supositorios. 8546, 8552, 8553, 8554, 8556, 8560, 8563, 8568, 8569, 8572, 8573, 8574, 8578. Tinturas. 8745, 8807. Tópico. 9051. Ungüentos. 9166, 9177, 9178, 9179, 9210, 9211, 9231, 9232, 9242, 9248, 9274,

9277, 9278, 9279, 9292, 9293, 9294, 9318.

HEPATALGIA. Cataplasmas. 747, 750, 751, 772, 780, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836, 854. Píldoras. 5506, 5658, 5880, 5933.

HEPATITIS. Aguas. 157, 7509. Apocema. 335. Conserva. 1380. Electuario. 1576. Elixir. 1640. Emplastos. 1823, 1895. Emulsiones. 1903, 1967. Julepe. 3389. Lavativas. 3477, 3582, 3583, 3628. Linimento. 3887. Mistura. 4532. Píldoras. 5026, 5044, 5328, 5364, 5366, 5381, 5383, 5400, 5607, 5653, 5672, 5673, 5675, 5686, 5687, 5837, 5903, 5988, 5997, 6024, 6052. Poción. 6267. Polvo. 7478. Pomadas. 7651, 7973, 8114, 8127. Tisana. 8845. Ungüentos. 9263, 9264, 9267.

HEPATITIS CRÓNICA. Aguas minerales acidulas, IV, 261. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Agua. 256. Alcoholato. 294. Apocema. 328. Baños. 476. Bebida. 493. Bolos. 597, 603, 606, 649, 651. Caldo. 706. Cataplasma. 793. Cáusticos. 861. Cerveza. 960. Cocimientos. 1012, 1048, 1109. Electuarios. 1443, 1519, 1540, 1576, 1582. Emplasto. 1862. Especies. 2130. Eteres. 2188, 2189. Gotas. 2573. Infusion. 2619. Inyeccion. 2817. Jabones. 2856, 2858, 2879, 2880, 2883, 2884, 2885. Jarabes. 2886, 2968, 2997, 3053. Julepe. 3363. Lavativa. 3628. Limonadas. 3737, 3749. Linimento. 3912. Misturas. 4331, 4406, 4541, 4542, 4602, 4605, 4699. Opiata. 4701. Pediluvios. 4987, 4988. Píldoras. 5021, 5026, 5028, 5029, 5050, 5064, 5212, 5362, 5363, 5439, 5491, 5494, 5535, 5536, 5537, 5563, 5674, 5675, 5679, 5682, 5684, 5685, 5689, 5698, 5783, 5784, 5789, 5799, 5904, 5943, 5963,

6024, 6052. Póciones. 6085, 6218, 6221, 6347, 6559, 6583. Polvos. 7327, 7439, 7477. Pomadas. 7906, 7918, 7919, 7959, 8027, 8029. Sal. 8340. Solucion. 8115. Suero. 8541. Tinturas. 8724, 8728. Tisanas. 8874, 8941. Tópicos. 9035. Ungüento. 9298. 9563.

HERIDAS. Aceites. 10, 45. Aguas. 129, 148, 174. Apocema. 336. Bálsamos. 395, 400, 401, 418, 420, 421, 426. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 836. Ceratos. 893, 894, 900, 903, 914, 927, 928. Digestivos. 1429, 1430, 1431, 1438. Emplastos. 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1758, 1762, 1768, 1801. Espadrapos. 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2057, 2059, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2069, 2071. Fomentos. 2314, 2347. Gargarismo. 2463. Inyecciones. 2697, 2741, 2759, 2781, 2840. Linimento. 3933. Lociones. 4041, 4042, 4062, 4106, 4119, 4129, 4131, 4139, 4158. Percalina. 4718. Píldoras. 5621. Polvo. 6940. Pomadas. 7596, 8080, 8150. Soluciones. 8444, 8455. Tinturas. 8651, 8745. Tópico. 9052. Ungüentos. 9181, 9182, 9223, 9240, 9241. Vino. 9508.

HERIDAS DE ARMAS DE FUEGO. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224.

HERIDAS DURANTE LA DISECCION. Licor. 3703. Solucion. 8431.

HERIDAS ENVENENADAS. Loción. 4044. Píldoras. 5260. Pomada. 7914. Solucion. 8389.

HERIDAS DE LOS NERVIOS. Aceites. 35, 38.

HERNIAS. Agua. 236. Cataplasmas. 747, 750, 772, 854. Colirio. 1147. Emplastos. 1795, 1801. Fomento. 2281. Lavativas. 3489, 3583, 3599. Mistura. 4510. Polvo. 7470. Pomadas. 7694, 7704, 7901, 7967, 8161.

HERNIAS ESTRANGULADAS. Lini-

- mento. 3844. Lavativas. 3523, 3524, 3568, 3613. Locion. 4137. Mistura. 4582.
- HERNIAS DEL IRIS. Colirio. 1147, 1153. Pomada. 8183.
- HERNIAS DE LOS NIÑOS. Emplasto. 1728. Pomadas. 8162.
- HERPES. Aceites. 14, 42, 46, 224. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 93, 94, 111, 119, 150, 200, 226, 231, 232. Apocemas. 323, 336, 337. Bálsamos. 396, 425. Baños. 436, 444, 447, 456, 459, 460, 465, 466, 468, 469, 470, 471. Bebida. 489. Bolos. 556, 596, 604, 623. Caldos. 705, 720. Ceratos. 864, 875, 890, 891, 893, 894, 898, 900, 910, 911, 913, 920, 934, 935. Cocimientos. 997, 1054, 1065, 1088, 1114. Electuarios. 1479, 1480, 1481. Embrocacion. 1716. Emulsion. 1941. Esencia. 2035, 2047, 2048. Especies. 2100, 2133, 2134. Extracto. 2249. Fumigaciones. 2371, 2385. Infusion. 2622. Jabones. 2854, 2859, 2863, 2881. Jarabes. 2954, 2968, 2982, 2985, 2991, 3013, 3038, 3071, 3083, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3124, 3174, 3216, 3217, 3237, 3272, 3286, 3306, 3307, 3319, 3332, 3333, 3352, 3355. Licores. 3668, 3675, 3679, 3680, 3682, 3683, 3685, 3716. Linimentos. 3813, 3814, 3841, 3912, 3924, 3940. Lociones. 4033, 4035, 4041, 4042, 4043, 4053, 4063, 4067, 4075, 4077, 4096, 4105, 4113, 4116, 4121, 4127, 4128, 4131, 4143, 4144, 4147, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154. Looc. 4216. Mezcla. 4286. Opiata. 4703. Pastillas. 4891, 4892. Píldoras. 5038, 5051, 5052, 5053, 5187, 5189, 5190, 5192, 5193, 5194, 5195, 5198, 5199, 5261, 5262, 5278, 5280, 5412, 5418, 5424, 5426, 5491, 5528, 5530, 5531, 5642, 5669, 5756, 5823, 5826, 5861, 5902, 5903, 5909, 5936, 5940, 6036, 6059, 6061. Pociones. 6105, 6222, 6322, 6323. Polvos. 6907, 6936, 6973, 7046, 7107, 7226, 7519, 7548. Pomadas. 7588, 7590, 7591, 7621, 7634, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7645, 7647, 7648, 7649, 7650, 7659, 7677, 7681, 7684, 7691, 7702, 7709, 7710, 7711, 7712, 7714, 7726, 7743, 7744, 7746, 7748, 7758, 7760, 7771, 7780, 7795, 7799, 7800, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7852, 7864, 7869, 7874, 7878, 7913, 7915, 7916, 7921, 7936, 7938, 7942, 7943, 7961, 7963, 7964, 7977, 7994, 8002, 8005, 8035, 8039, 8041, 8090, 8091, 8103, 8110, 8112, 8149, 8150, 8153, 8157, 8158, 8159, 8169, 8170, 8171. Pulpa. 8196. Soluciones. 8368, 8371, 8383, 8389, 8390, 8402, 8417, 8429, 8463, 8473, 8481, 8508. Tabletas. 4820, 4824, 4826, 4893. Tinturas. 8675, 8767, 8841. Tisanas. 8363, 8864, 8867, 8885, 8932, 8948, 8972, 8990, 8998, 8999, 9009, 9027. Tópico. 9050. Tratamiento. 9094. Ungüentos. 9169, 9185, 9205, 9212, 9257, 9262, 9269, 9307, 9316. Vinos. 9501.
- HERPES DE LA CARA. Pomadas. 7597, 7727.
- HERPES CORROSIVO. Cataplasma. 821. Pastillas. 4851. Píldoras. 5260, 5427, 5706. Polvos. 6947, 7204. Pomadas. 7961, 8155. Ungüento. 9258.
- HERPES ESCROFULOSOS. Baño. 434. Píldoras. 5829.
- HERPES SIFILÍTICOS. Aguas. 226. Locion. 4113. Píldoras. 5038, 5191, 5829. Polvo. 6937.
- HERPES ULCERADOS. V. *Ulceras herpéticas.*
- HIDRARGIRIA. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Locion. 4116.
- HIDRARTROSIS. Aceite. 14. Fomentos. 2280, 2286. Linimentos. 3887, 3892, 3988, 4006. Pomada.

7794. Solucion. 8448. V. *Hidropesia de las articulaciones.*

HIDROCÉFALO AGUDO. Apocema. 335. Fomento. 2272. Linimentos. 3795, 3887, 3919. Polvos. 6989, 6995, 7093, 7188, 7344, 7516. Pomadas. 8007, 8010. Ungüentos. 9263, 9264, 9267.

HIDROCÉFALO CRÓNICO. Polvos. 7311, 7475.

HIDROCÉFALO DE LOS ANCIANOS. V. *Apoplejia serosa.*

HIDROCELE. Agua. 154. Fomentos. 2258, 2300, 2342. Inyecciones. 2781, 2791, 2796. Linimentos. 3892, 3942. Locion. 4061. Pomadas. 7715, 7934, 8025. Solucion. 8461. Tintura. 8750.

HIDROCELE DE LOS NIÑOS. Cataplasma. 824. Locion. 4030. Mistura. 4603.

HIDROFOBIA. Agua. 129. Gargarismos. 2398, 2400, 2414. Inyeccion. 2815. Linimentos. 3789, 3794. Lociones. 4134. Pociones. 6190, 6211, 6213, 6718. Polvos. 6872, 7545. Soluciones. 8380, 8455, 8515. Tinturas. 8667, 8668, 8745.

HIDROFTALMIA. Colirio. 1139. Fumigaciones. 2365, 2375. Pediluvios. 4990, 4991. Polvo. 7399. Pomadas. 8007, 8025, 8127. Saquitos. 8345, 8346. Sinapismo. 8354. Ungüento. 9270.

HIDROPERICARDIAS. Bolos. 620. Inyecciones. 2737, 2759, 2781, 2813, 2815. Pildoras. 5686. Sinapismo. 8354.

HIDROPESIAS. Aceite. 17. Acidos. 67, 71. Aguas. 140, 141, 263, 7509. Alcohol. 272. Apocemas. 328, 338, 339. Azúcar. 8295. Bebidas. 502, 506. Bolos. 619, 655. Cervezas. 944, 946, 953, 954, 956, 961. Cocimientos. 1011, 1012, 1028, 1041, 1050, 1058, 1071. Conserva. 1375. Electuarios. 1482, 1486, 1510, 1511, 1519, 1537, 1540, 1568, 1570, 1582, 1593, 1594, 1595. Elixires. 1670, 1697. Emulsion. 1964. Epitema. 2013.

Esencias. 2024, 2036, 2037. Especies. 2101, 2139. Espiritus. 2152, 2158. Eter. 2188. Extractos. 2206, 2215, 2220, 2235, 2245. Friccion. 2352. Gotas. 2573. Infusiones. 2636, 2637, 2639, 2640, 2641, 2643. Jabones. 2853, 2883, 2884, 2885. Jarabes. 2953, 2960, 2961, 2962, 2968, 2997, 3007, 3024, 3025, 3026, 3028, 3055, 3056, 3075, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3227. Julepes. 3393, 3397, 3418, 3434. Lavativas. 3457, 3543, 3544, 3545, 3591. Licores. 3689, 3704, 3715. Linimentos. 3869, 3888, 3889, 3890, 3892, 3893, 3895. Lociones. 4100, 4102, 4136, 4155. Mielles. 4300, 4301, 4317. Misturas. 4386, 4450, 4463, 4480, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4514, 4542, 4566, 4571, 4598, 4611. Ojimeles. 4648, 4651, 4656. Pastillas. 4862, 4866, 4872. Pildoras. 5019, 5021, 5026, 5034, 5063, 5071, 5200, 5201, 5258, 5344, 5345, 5346, 5370, 5427, 5492, 5493, 5494, 5523, 5524, 5541, 5543, 5544, 5546, 5547, 5548, 5549, 5551, 5553, 5590, 5591, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5608, 5641, 5684, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5720, 5855, 5856, 5912, 5917, 5925, 5993, 6009, 6010, 6013, 6016, 6018. Pociones. 6065, 6166, 6217, 6273, 6274, 6285, 6286, 6391, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6411, 6412, 6413, 6414, 6416, 6418, 6419, 6422, 6423, 6424, 6426, 6472, 6473, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6566, 6581, 6644, 6692, 6748, 6758. Polvos. 6789, 6993, 7102, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7197, 7198, 7199, 7229, 7232, 7233, 7343, 7344, 7410, 7455. Purgantes. 8203. Remedio. 8271. Sacarolados. 8308, 8312. Sal. 8340. Soluciones. 8467, 8468. Sueros. 8531, 8536,

8541. Tinturas. 8634, 8635, 8656, 8658, 8659, 8666, 8667, 8668, 8698, 8699, 8700, 8812, 8813, 8837, 8838, 8842. Tisanas. 8871, 8872, 8888, 8890, 8900, 8921, 8922, 8923, 8924, 8925, 8926, 8927, 8928, 8929, 8930, 8931, 8987. Tópico. 9068. Trociscos. 9138, 9147. Ungüentos. 9226, 9314. Vinagres. 9367, 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9380, 9381, 9382. Vinos. 9417, 9418, 9419, 9424, 9438, 9454, 9455, 9457, 9458, 9460, 9467, 9468, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9478, 9479, 9483, 9484, 9485, 9486, 9490, 9501, 9502, 9510, 9522, 9523, 9536, 9537. Zumo. 9563.

HIDROPESIAS PASIVAS. Aguas minerales ferruginosas, IV, 270. Alcoholato. 274. Bolos. 666. Electuarios. 1538, 1557, 1559, 1567, 1569. Emulsiones. 1944, 1945. Infusion. 2646. Lavativa. 3453. Misturas. 4513, 4548. Píldoras. 5166, 5202, 5272, 5550, 5554, 5555, 5568, 5601, 5712, 5926. Pociones. 6105, 6385, 6417, 6425, 6466, 7471, 6488. Polvo. 7196. Solucion. 8439. Suero. 8539. Tinturas. 8622, 8807. Tisana. 8928. Vinagres. 9355, 9391. Vino. 9417, 9382.

HIDRORAQUIS ó espina bífida. Cataplasmas. 772, 854. Limonadas. 3726, 3770. Linimentos. 3774, 3969. Píldoras. 5495, 5686. Pociones. 6105, 6273, 6274, 6285, 6286, 6329. Pomadas. 7602, 8007, 8025, 8127. Ungüento. 9270.

HIDROTORAX. Bolos. 539. Infusion. 2646. Loocs. 4205. Mistura. 4509. Ojimiél. 4648. Píldoras. 5272, 5495, 5686, 5836. Pociones. 6285, 6329, 6474. Polvos. 7179, 7236, 7398, 7411, 7449. Tisana. 8929. Vino. 9418. *V. Hidropesias.*

HINCHAZON DE LAS ARTICULACIONES. *V. Tumores blancos, gota, hidrartrosis.*

HINCHAZONES EDEMATOSAS. *V. Edema de los miembros.*

HIPERTROFIA. Bolos. 606. Linimentos. 3887. Píldoras. 5265, 5272, 5773. Poción. 6595.

HIPERTROFIA DEL BAZO. Electuario. 1597. Píldoras. 5331, 5333. Pociones. 6251, 6267, 7487.

HIPERTROFIA DEL CORAZON. Bolos. 620. Jarabes. 3135, 3136, 3137. Julepes. 3432. Linimentos. 4018. Píldoras. 5342, 5542. Pociones. 6251, 6252, 6267, 6702. Soluciones. 8395, 8396, 8471, 8472.

HIPERTROFIA DEL HÍGADO. Baño. 465. Julepe. 3363. Píldoras. 5685, 5686. Poción. 6267. Polvos. 6982, 7487.

HIPERTROFIA DE LA MATRIZ. Poción. 6516. Polvos. 7308.

HIPO. Bolos. 548. Cataplasma. 804. Eter. 2188. Inyeccion. 2739. Linimento. 4026. Píldoras. 5330. Pociones. 6163, 6164, 6165, 6168, 6169, 6293, 6500, 6510, 6595, 6724, 6725. Polvo. 6881, 7273, 7341.

HIPO DE LOS NIÑOS. Linimentos. 3817, 4001.

HIPOCONDRIA. Aceite. 21. Aguas minerales acidulas, IV, 261. Agua. 7509. Alcoholato. 285. Bálsamos. 428, 434. Bolos. 547. Cataplasma. 758. Cerveza. 949. Emplastos. 1746, 1747, 1748, 1754. Emulsion. 1976. Epitema. 2008. Esencia. 2042. Especies. 2096, 2120. Gotas. 2555, 2573, 2579. Jabones. 2856, 2858. Julepe. 3423. Lavativa. 3474. Licor. 3720. Linimentos. 3789, 3792, 3793, 3795, 3796, 3797, 3798, 4019, 4020, 4027. Looc. 4203. Píldoras. 5022, 5067, 5069, 5151, 5265, 5266, 5270, 5275, 5315, 5337, 5381, 5439, 5534, 5607, 5624, 5706, 5721, 5809. Pociones. 6218, 6273, 6274, 6286, 6302, 6510, 6595. Polvos. 7206, 7545. Purgante. 8201. Tinturas. 8770, 8791. Ungüento. 9276. Vinos. 9474, 9475, 9500, 9527.

HIPOPION. Colirios. 1220, 1276. Lociones. 4029, 4052. Píldoras.

5671. Polvos. 7441, 7442. Pomada. 8025. Ungüento. 9270.

HISTERALGIA *ó dolor de la matriz*. Bálsamo. 428. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Emplastos. 1812, 1838. Fomentos. 2304, 2317. Inyecciones. 2745, 2779, 2813, 2814. Linimentos. 3774, 3783, 3784, 3798, 3969. Ungüento. 9305.

HISTÉRICO. Aceites. 5, 21. Acido. 65. Aguas minerales acídulas, IV, 261. Aguas. 250, 253, 254, 259. Alcoholatos. 276, 285, 299, 304. Bálsamos. 371, 376, 377, 423, 428, 434. Bolos. 546, 547, 548, 549, 552, 575, 576, 676, 682, 694. Cataplasmas. 747, 750, 751, 757, 758, 815. Cervezas. 949, 952. Electuarios. 1466, 1467, 1598. Elíxires. 1621, 1673. Emplastos. 1746, 1747, 1748, 1753, 1754, 1755, 1770, 1781, 1818, 1895. Emulsiones. 1903, 1911, 1929, 1985, 1989. Epitemas. 2008, 2012, 2079. Esencias. 2025, 2042. Especies. 2080, 2093, 2095, 2096, 2097, 2120. Espiritus. 2147, 2164. Eteres. 2190, 2191, 2196. Flores. 2099. Gotas. 2545, 2550, 2554, 2555, 2559, 2564, 2570, 2577. Infusiones. 2658, 2683. Inyeccion. 2737. Jarabes. 2987, 3229. Julepes. 3359, 3368, 3369, 3370, 3372, 3373. Lavativas. 3474, 3477, 3487, 3498, 3523, 3528, 3562, 3583, 3590. Linimentos. 3792, 3798, 4019, 4020. Mezcla. 4254. Misturas. 4387, 4388, 4409, 4410, 4535, 4568, 4631. Pastillas. 4818. Píldoras. 5022, 5026, 5030, 5048, 5065, 5144, 5145, 5146, 5147, 5151, 5154, 5156, 5158, 5160, 5161, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5265, 5270, 5271, 5273, 5275, 5276, 5277, 5334, 5335, 5337, 5352, 5359, 5382, 5475, 5496, 5580, 5624, 5635, 5665, 5668, 5679, 5682, 5690, 5691, 5726, 5747,

5775, 5792, 5805, 5808, 5809, 5880, 6014, 6022, 6039, 6058. Pociones. 6084, 6105, 6126, 6134, 6145, 6161, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6187, 6188, 6223, 6225, 6273, 6274, 6276, 6280, 6284, 6285, 6286, 6293, 6302, 6311, 6442, 6519, 6520, 6595, 6611, 6612, 6619, 6716, 6717. Polvos. 6777, 6779, 6780, 6819, 6831, 6853, 6872, 6883, 6884, 6909, 6985, 7088, 7257, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263, 7303, 7304, 7305, 7306, 7545. Sinapismo. 8354. Solucion. 8514. Té. 8584. Tinturas. 8595, 8609, 8619, 8623, 8627, 8632, 8636, 8720, 8760, 8775, 8795, 8836, 8841. Tisana, 8859. Tópico. 9034. Trociscos. 9156. Ungüentos. 9173, 9276. Yervas. 2094.

HISTEROPTOSIS, *Caida ó proci-dencia de la matriz*. Bálsamo. 424. Baño. 465. Fomento. 2281. Inyecciones. 2697, 2699, 2717, 2750, 2815, 2816. Julepe. 3389. Misturas. 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999. Píldoras. 6020. Poción. 6418. Pomada. 8162.

HORRIPILACION. Locion. 4058. Sinapismo. 8354.

ICTERICIA. Aguas minerales acídulas, IV, 261. Aguas minerales salinas, IV, 296. Agua. 7509. Alcoholato. 294. Apocemas. 317, 328, 333. Bebida. 493. Café. 699. Cerveza. 965. Cocimientos. 1102, 1103, 1109. Electuarios. 1443, 1519, 1561, 1576. Elíxir. 1671. Especies. 2130, 2131. Eteres. 2189, 2194. Infusiones. 2651, 2664, 2668, 2670. Jabones. 2853, 2856, 2858. Jarabes. 2940, 2960, 2961, 2962, 3018. Lavativa. 3600. Limonadas. 3750, 3756, 3759, 3761. Linimentos. 3796, 3797, 3912, 4026. Macerado. 4224. Medicina. 4233. Mieles. 4305, 4317. Misturas. 4389, 4457, 4598. Píldoras. 5050, 5063, 5212, 5213,

5214, 5215, 5328, 5344, 5364, 5381, 5439, 5502, 5629, 5672, 5675, 5682, 5684, 5788, 5832, 5837, 5997, 6024, 6052, 6189, 6581, 6641. Polvos. 6908, 6915, 6982, 7331, 7343, 7434, 7487. Sacaruro. 8306. Sal. 8340. Sueros. 8531, 8540, 8541. Tinturas. 8598, 8815. Tisanas. 8845, 8874, 8926, 8990, 8999. Tópico. 9035. Ungüento. 9314. Vino. 9425. Zumo. 9567.

ICTIOSIS. Acido. 66. Baño. 467. Jarabe. 2991. Linimentos. 3797, 4007, 4026. Lociones. 4037, 4058, 4075, 4134. Píldoras. 5340. Pomadas. 7736, 7800.

ILEO. Cataplasmas. 772, 794, 837, 854. Cerato. 873. Emplastos. 1738, 1739. Fomentos. 2289, 2317. Lavativas. 3460, 3472, 3477, 3523, 3546, 3583, 3590, 3613, 3614. Locion. 4058. Mistura. 4451. Píldoras. 5275, 5352, 5359, 5880. Pociones. 6264, 6273, 6274, 6280, 6285, 6286, 6305, 6307, 6662, 6716. Polvo. 6886. Pomada. 8079.

IMPÉTIGO. Acido. 66. Aguas minerales salinas, IV, 296. Bálsamo. 383. Baños. 444, 453, 459. Cataplasmas. 786, 797. Cáusticos. 861. Jarabes. 3094, 3250. Licores. 3668, 3680. Linimento. 3801. Lociones. 4041, 4042, 4072, 4077, 4079, 4116, 4131, 4134. Mezclas. 4275, 4277, 4281. Mistura. 4484. Píldoras. 5364, 5640, 5767, 5903. Poción. 6457. Polvos. 6936, 7103, 7358, 7519. Pomadas. 7640, 7673, 7815, 7855, 7856, 7926, 7963, 7964, 8089, 8149, 8150. Soluciones. 8371, 8478, 8486, 8508. Tópicos. 9039, 9050.

IMPOTENCIA. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Linimento. 3775. Píldoras. 5372. Tabletas. 4807.

INAPETENCIA. Polvo. 7537.

INCONTINENCIA DE ORINA. Baños. 448, 454, 472, 474. Cataplas-

mas. 772, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Chorro. 1425. Inyecciones. 2699, 2736, 2737, 2745, 2751, 2766, 2779, 2813, 2815. Jarabe. 2991. Julepes. 3420, 3421, 3422, 3423. Lavativas. 3549, 3550, 3551, 3609. Linimento. 3794. Misturas. 4418, 4481, 4607. Pasta. 4781. Pastillas. 4851, 4875. Píldoras. 5033, 5217, 5311, 5369, 5371, 5427, 5497, 5498, 5517, 5612, 5613, 5627, 5636, 5637, 5638, 5640, 5706, 5800, 5873, 5874, 5875, 5885, 6056. Pociones. 6084, 6273, 6274, 6285, 6286, 6388, 6508, 6512, 6595. Pomadas. 7863, 7904, 7905. Solucion. 8491. Tinturas. 8603, 8666, 8814. V. *Enuresis*.

INCONTINENCIA DE ORINA EN LOS ANCIANOS. Mistura. 4443. V. *Incontinencia de orina*.

INCONTINENCIA DE ORINA EN LOS NIÑOS. Píldoras. 5499. V. *Incontinencia de orina*.

INDIGESTION. Emulsion. 1976. Jarabes. 3326, 3336. Píldoras. 5622. Té. 8584. Tintura. 8710. Vino. 9407.

INDURACIONES. V. *Tumores y tumores glandulares*.

INERCI A DE LA MATRIZ. V. *Parto laborioso*.

INFARTOS. Baño. 460. Bolos. 651. Cataplasma. 808. Chocolate. 1400. Emplasto. 1842. Especies. 2131. Fomentos. 2269, 2307, 2309. Linimentos. 3779, 3989. Pomada. 7934. Tópico. 9053. Ungüento. 9195.

INFARTOS ABDOMINALES. V. *Hepatitis y esplenitis crónicas*.

INFARTOS CRÓNICOS DE LAS AMÍGDALAS. V. *Amigdalitis y angina*.

INFARTOS DE LAS ARTICULACIONES. V. *Tumores blancos*.

INFARTOS DEL BAZO. V. *Esplenitis crónica*.

INFARTO DEL CUERPO TIROIDEO. V. *Bocio*.

INFARTOS ESCROFULOSOS. V. *Tu-*

- mores escrofulosos y escrófulas.*
- INFARTOS GLANDULOSOS. V. *Tumores glandulosos.*
- INFARTOS DEL HÍGADO. V. *Hepatitis crónica.*
- INFARTOS LÁCTEOS DE LOS PECHOS. V. *Tumores de los pechos.*
- INFARTOS LINFÁTICOS. Aguas minerales salinas, IV, 296. Cocimiento. 1101. Emplastos. 1775, 1838. Etiope. 2197. Fomento. 2331. Harinas. 2132. Infusion. 2651. Jarabe. 3351. Linimentos. 3860, 4019, 4020. Pastillas. 4852. Píldoras. 5038, 5191, 5712, 5764, 5887. Pomadas. 7625, 8007, 8016. Saquito. 8348. Tisanas. 8957, 8964. V. *Escrófulas y atrofia mesentérica.*
- INFARTOS DE LAS MAMAS. V. *Tumores de los pechos.*
- INFARTOS DEL PECHO. V. *Tumores del pecho.*
- INFARTOS SIFILÍTICOS. Cataplasma. 830. Emplastos. 1778, 1877, 1894. Linimento. 3952. Píldoras. 5397.
- INFARTOS DEL SISTEMA LINFÁTICO. V. *Infartos linfáticos.*
- INFARTOS DE LOS TESTÍCULOS. Cataplasmas. 779, 832. Emplastos. 1777, 1834, 1849, 1850, 1874. Espadrado. 2060. Píldoras. 5365, 5759. Pomadas. 7927, 7928, 7935, 7955. Saquito. 8349. V. *Didimitis crónica.*
- INFARTOS VENÉREOS. V. *Infartos sifilíticos.*
- INFARTOS DEL BAJO VIENTRE. V. *Metritis crónica, enteritis, etc.*
- INFARTOS DE LAS VISCERAS ABDOMINALES. V. *Esplenitis y hepatitis crónicas.*
- INFLAMACIONES. V. *Flegmasias.*
- INFLAMACION DE LA BOCA. V. *Estomatitis.*
- INFLAMACIONES CATARRALES. V. *Bronquitis, angina, calenturas catarrales, etc.*
- INFLAMACION CRÓNICA DE LOS PÁRPADOS. V. *Oftalmia crónica.*
- INFLAMACION DE LAS ENCIAS. V. *Estomatitis.*
- INFLAMACION DE LA LENGUA. V. *Flegmasias.*
- INFLAMACIONES DE PECHO. V. *Catarras, neumonia, pleuresia, etc.*
- INFLAMACIONES DE LA PIEL. Agua. 236. Baño. 453. Caldo. 708. Linimento. 3977. Vino. 9501. V. *Erisipela, sarna, herpes.*
- INFLAMACION DE LA RETINA. V. *Oftalmia aguda.*
- INSOLACION. Lociones. 4029, 4129, 4134, 4144. Pediluvios. 4990, 4991. Sinapismo. 8354.
- INSOMNIO. Bálsamo. 422. Electuarios. 1507, 1535. Elíxires. 1630, 1657. Emplastos. 1759, 1794. Emulsiones. 1826, 1908, 1960, 1961, 1988. Específico. 2144. Fricciones. 2351. Frontal. 2358. Jarabes. 3177, 3201, 3208, 3230, 3231, 3251, 3327. Julepes. 3364, 3414. Licor. 3659. Linimentos. 3783, 3798, 3874, 4026. Mistura. 4482. Píldoras. 5047, 5070, 5795, 5884. Pociones. 6084, 6182, 6273, 6274, 6286, 6425, 6595. Polvo. 6997. Tabletas. 4944. Tintura. 8715.
- INTERTRIGO. Linimento. 3786. Pomada. 7818.
- IRITIS CRÓNICA. Colirios. 1152, 1234, 1279. Embrocaciones. 1710, 1714, 1724. Eter. 2190. Linimento. 3774. Pastillas. 4956. Píldoras. 5030, 5038, 5304, 5307, 5359, 5691, 5860, 5880. Poción. 6300. Polvos. 7441, 7442. Pomadas. 7579, 7654, 7746, 7753, 7888, 7973, 8007, 8025. Ungüentos. 9263, 9264, 9267. V. *Oftalmia.*
- IRITIS SENIL. Tratamiento. 9106.
- IRITIS SIFILÍTICA. Píldoras. 5743.
- IRRITACION DE ESTÓMAGO. V. *Gastritis.*
- IRRITACION DE LA GARGANTA. V. *Angina.*
- IRRITACION GASTRO-INTESTINAL. V. *Gastro-enteritis.*
- IRRITACIONES DE LA PIEL. V. *Enfermedades cutáneas.*

- IRRITACION DE LA VEJIGA DE LA ORINA. *V. Cistitis.*
- IRRITACION DE VIENTRE. *V. Gastro-enteritis.*
- ISCURIA. Aceite. 2. Bolos. 607. Cataplasmas. 771, 785, 787. Cocimiento. 1060. Embrocacion. 1712. Emulsion. 1937. Infusion. 2632. Linimentos. 3782, 3848, 3891, 4026. Misturas. 4452, 4581. Pildoras. 5149, 5444, 5597. Pociones. 6403, 6449, 6420, 6427, 6596, 6624, 6626, 6707. Polvo. 7246. Pomada. 7628. Té. 8581. *V. Retencion de orina.*
- ISQUIDROSIS. Pediluvios. 4990, 4991. Polvos. 7202, 7203. Sinapismo. 8354. Tafetan. 4739.
- JAQUECA. *V. Hemicránea.*
- LADILLAS. Aguas. 102, 150. Cocimiento. 1080. Locion. 4130. Pomada. 7829. Ungüentos. 9165, 9265, 9266.
- LARINGITIS. Baños. 448, 461, 470. Cigarros. 974. Clavo. 986. Emplasto. 1866. Eter. 2182. Fumigaciones. 2365, 2383. Gargarismos. 2387, 2398, 2399, 2400, 2426, 2430, 2478, 2480, 2483, 2512. Inyeccion. 2687. Jarabes. 3006, 3007, 3008, 3021, 3317, 3329. Lavativa. 3600. Linimento. 3993. Pediluvios. 4990, 4991. Pociones. 6172, 6173. Pomadas. 7651, 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 8102, 8177. Sinapismo. 8354. Tabletas. 4953.
- LAXITUD DE LAS ENCÍAS. *V. Estomatitis y escorbuto.*
- LEPRA. Acido. 66. Agua. 7509. Bálsamo. 399. Caldo. 720. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Cocimientos. 997, 1047. Digestivos. 1429, 1431. Esencias. 2035, 2047, 2048. Especies. 2100, 2134. Infusiones. 2648, 2664. Jarabes. 2982, 2991, 2993, 3013, 3020, 3071, 3082, 3083, 3105, 3108, 3109, 3110, 3116, 3168, 3173, 3194, 3200, 3237, 3268, 3272, 3306, 3318. Licores. 3668, 3680. Looc.
4218. Mistura. 4620. Pastillas. 4851, 4891, 4892. Pildoras. 5034, 5052, 5053, 5260, 5261, 5262, 5278, 5279, 5280, 5340, 5342, 5358, 5364, 5368, 5406, 5412, 5422, 5530, 5531, 5619, 5629, 5672, 5755, 5767, 5773, 5775, 5924, 5934, 5936, 5988, 6059. Pociones. 6150, 6665. Polvos. 7226. Pomadas. 7599, 7621, 7640, 7652, 7688, 7702, 7709, 7710, 7760, 7769, 7773, 7774, 7775, 7800, 7874, 7953, 7957, 7961, 7963, 7964, 7966, 7967, 7973, 7978, 7993, 8035, 8040, 8041, 8042, 8045, 8046, 8082, 8114, 8153, 8183. Soluciones. 8386, 8390, 8391, 8451, 8452, 8467, 8468, 8508. Tabletas. 4893. Tinturas. 8595, 8767. Tisanas. 2635, 8863, 8867, 8885, 8904, 8975, 8976, 8990. Tratamiento. 9094. Vino. 9501.
- LETARGO. Enemas. 3572, 3576. Espiritu. 2147. Lavativas. 3570, 3577. Mistura. 4390. Poción. 6519. Trociscos. 9140. *V. Coma.*
- LEUCOFLEGMASIA. Baño. 451. Cocimiento. 1070. Esencia. 2024. Eter. 2177. Jarabe. 3123. Pociones. 6471, 6473. Tintura. 8837. Tratamiento. 9093. Vinagres. 9370, 9391, 9417. Vinos. 9418, 9431, 9432, 9433, 9434, 9478, 9479, 9482, 9483, 9522, 9523, 9537, 9538. *V. Anasarca é hidropesías.*
- LEUCORREA ó flores blancas. Acido. 70. Aguas minerales acidulas, IV, 261. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 84, 113, 127, 129, 148, 156, 157, 174, 180, 195, 202. Alcoholatos. 285, 287. Apocemas. 321, 332, 355. Bálsamos. 385, 386, 387. Baños. 448, 454, 460, 461, 462, 464, 474. Bebida. 506. Bolos. 540, 550, 551, 588, 595, 617, 633, 645, 647, 658, 659, 670, 671, 678, 694. Candelillas. 725. Cáp-

- sulas. 741. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 836. Cervezas. 951, 956, 967. Cocimientos. 1096, 1097, 1100. Colirio. 1271. Confeccion. 1602. Confites. 1363, 1364. Conserva. 1379. Chocolates. 1404, 1405, 1413, 1415. Electuarios. 1466, 1491, 1495, 1499, 1500, 1539, 1559, 1567, 1600. Elixires. 1621, 1626, 1643, 1654, 1669, 1671, 1672, 1674, 1702. Emplastos. 1811. Emulsiones. 1922, 1931, 1943, 1997. Especies. 2084. Fomentos. 2304, 2317, 2346. Gotas. 2558. Gragea. 2584. Granos. 2596. Inyecciones. 2693, 2696, 2697, 2699, 2702, 2721, 2725, 2726, 2732, 2735, 2736, 2737, 2741, 2743, 2751, 2756, 2766, 2771, 2772, 2775, 2778, 2781, 2786, 2787, 2788, 2790, 2794, 2795, 2797, 2799, 2802, 2804, 2815, 2816, 8818, 2827, 2828, 2830, 2836, 2838, 2839, 2841, 2842, 2846, 2848, 2849. Jabones. 2851, 2878. Jarabes. 2944, 2946, 2991, 3005, 3028, 3050, 3060, 3061, 3063, 3068, 3092, 3096, 3097, 3142, 3149, 3150, 3186, 3218. Julepes. 3377, 3378. Lavativas. 3477, 3508, 3512, 3530, 3541, 3549, 3550, 3551, 3583, 3609, 3616. Licor. 3661. Limonada. 3737. Lociones. 4062, 4138. Looc. 4176. Mezclas. 4255, 4281. Misturas. 4413, 4415, 4416, 4424, 4432, 4441, 4460, 4566, 4613. Mucilago. 4637. Opiatas. 4665, 4671, 4672, 4682, 4683, 4684, 4690, 4699. Pastillas. 4819, 4839, 4844, 4845, 4878, 4891, 4892, 4904, 4971. Piedra. 5004. Pildoras. 5057, 5061, 5106, 5107, 5109, 5168, 5170, 5186, 5219, 5282, 5285, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5294, 5297, 5298, 5299, 5307, 5308, 5316, 5322, 5323, 5341, 5385, 5405, 5441, 5480, 5481, 5519, 5589, 5613, 5618, 5689, 5701, 5704, 5754, 5757, 5759, 5775, 5791, 5809, 5850, 5851, 5885, 5938, 5941, 5951, 5953, 5976, 6017, 6021, 6022, 6026, 6027, 6058. Pociones. 6227, 6229, 6232, 6234, 6241, 6254, 6255, 6388, 6533, 6553, 6726, 6744. Polvos. 6910, 6963, 6975, 7013, 7060, 7205, 7249, 7298, 7299, 7462, 7538, 7725, 7741, 7778, 7922, 7967, 7968. Ratafia. 8207. Remedio. 8253. Sacarolados. 8300, 8310, Sacaruros. 8306, 8311. Soluciones. 8372, 8380, 8381, 8386, 8410, 8511. Sueros. 8527, 8532. Supositorios. 8561. Tabletas. 4816, 4833, 4846, 4877, 4893, 4895, 4923. Tinturas. 8591, 8592, 8605, 8615, 8632, 8649, 8678, 8679, 8752, 8774, 8782, 8830, 8841. Tisanas. 8865, 8879, 8882, 9022. Tópico. 9036. Tratamiento. 9097. Ungüento. 9180. Vinagres. 9366, 9385, 9393, 9394, 9400. Vinos. 9402, 9403, 9404, 9426, 9436, 9439, 9440, 9441, 9448, 9497, 9498, 9503, 9522, 9523. V. *Clorosis y Astenia*.
- LIENTERIA. Apocema. 355. Bebidas. 494, 509. Bolos. 562, 567, 569. Cocimientos. 1025, 1043, 1105. Electuarios. 1493, 1496. Gelatina. 2899. Jarabe. 3088. Lavativa. 3471. Linimento. 3836. Looc. 4183. Pildoras. 5281, 5383. Poción. 6228. V. *Diarrea*.
- LIPOTIMIAS. Pociones. 6163, 6164, 6165, 6168, 6169.
- LIQUEN. Aguas minerales salinas. IV, 296. Baños. 437, 440, 444, 459, 467. Fumigacion. 2385. Jarabes. 2968, 3178. Licores. 3668, 3680, 3707. Limonadas. 3748, 3749, 3757, 3759, 3761, 3765. Lociones. 4031, 4033, 4034, 4077, 4082. Mezclas. 4276, 4279, 4282, 4285. Misturas. 4339, 4430, 4483, 4484, 4485, 4618. Pildoras. 5260, 5261, 5262, 5279, 5368, 5767, 5990. Pociones. 6150, 6665. Pomadas. 7594, 7702, 7709, 7746, 7750, 7758, 7800, 7811, 7819, 7820, 7855, 7856, 7963, 7964, 7973, 8150. Soluciones. 8371,

- 8388, 8478, 8508. Tisana. 8849. Tópico. 9050.
- LOBANILLOS. *V. Lupias.*
- LOMBRICES INTESTINALES. Aceites. 1, 4, 31. Apocema. 356, 357, Azúcares. 8334, 8335. Bálsamo. 433. Baños. 442, 456. Bebidas. 488, 522. Bizcochos. 529, 530, 531, 532. Bolos. 622, 667, 670, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692. Cala. 8550. Cataplasmas. 757, 819, 848. Cerato. 900. Cerveza. 944. Cocimientos. 987, 1080. Confites. 1366. Conserva. 1367. Chocolates. 1418, 1420, 1423, 1424. Electuarios. 1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1543, 1544, 1613, 1615, 1616. Elixires. 1629, 1641, 1655, 1656, 1669, 1687, 1688, 1703, 1704, 1705. Emplastos. 1892, 1893. Emulsiones. 1913, 1992, 1994, 1995. Enema. 3625. Epitemas. 2012, 2018. Especies. 2082, 2140, 2141. Extracto. 2227. Etiope. 2197. Fomento. 2262. Gotas. 2553, 2564, 2577. Grajeas. 2593, 2594, 2595. Infusiones. 2620, 2650. Inyeccion. 2798. Jabon. 2850. Jaleas. 2919, 2935. Jarabes. 2964, 2966, 2967, 3042, 3043, 3044, 3093, 3139, 3239, 3240, 3279, 3280, 3294, 3295, 3314, 3329, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340. Julepe. 3371. Lavativas. 3453, 3455, 3456, 3463, 3464, 3473, 3474, 3483, 3484, 3485, 3491, 3525, 3531, 3565, 3580, 3592, 3596, 3620, 3622, 3623, 3624, 3626. Linimentos. 3820, 3821, 3822, 4022. Loocs. 4172, 4221. Misturas. 4382, 4383, 4446, 4620, 4634. Opiata. 4709. Pastillas. 4956, 4974, 4975. Píldoras. 5177, 5178, 5179, 5180, 5182, 5183, 5304, 5366, 5427, 5504, 5523, 5524, 5721, 6043, 6044, 6045, 6047, 6048. Pociones. 6065, 6078, 6113, 6179, 6180, 6375, 6391, 6544, 6554, 6565, 6617, 6677, 6689, 6743, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6757. Polvos. 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6976, 7041, 7119, 7225, 7240, 7296, 7297, 7330, 7405, 7450, 7469, 7473, 7501, 7524, 7526, 7527, 7537, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567. Pomadas. 7582, 7583, 7600, 7629, 7770, 7773, 7774, 7775, 7937, 8174, 8175. Purgante. 8205. Ratafia. 8207. Remedio. 8279. Sacarolado. 8299, 8323. Supositorios. 8548, 8549, 8551. Tabletas. 4801, 4817, 4820, 4932, 4935, 4966, 4976, 4977. Tinturas. 8596, 8599, 8604, 8606, 8607, 8615, 8689, 8713, 8742, 8815. Tisanas. 8862. Tópicos. 9068, 9071. Trociscos. 9142. Ungüentos. 9175, 9176, 9183, 9322, 9324, 9325, 9326. Vinagres. 9358, 9373, 9374. Vinos. 9409, 9410, 9411, 9412. Zumos. 9559, 9567.
- V. Ténia.*
- LUNARES. Pasta. 4763.
- LUMBAGO. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Baños. 448, 474. Emplastos. 1741, 1782, 1783, 1808, 1837, 1874. Fumigaciones. 2376. Lavativas. 3546, 3554, 3626. Licor. 3664. Linimentos. 3789, 3791, 3796, 3797, 3798, 3808, 3845, 3853, 3912, 3919, 3927, 3938. Lociones. 4037, 4058. Mielles. 4314, 4315. Mistura. 4620. Papeles. 4725, 4726. Píldoras. 5527. Poción. 6105. Pomadas. 7602, 7704, 7705, 7709, 7722, 7874, 7904, 7905, 8033, 8079. Saquitos. 8343. Solucion. 8397. Tintura. 8740. *V. Reumatismo.*
- LUPIAS. Bálsamos. 398, 432. Digestivo. 1436. Emplastos. 1797, 1824, 1836. Licor. 2154. Linimentos, 3928, 3939, 3986. Locion. 4081. Mantequilla. 4117. Pomada. 8155. Solucion. 8374.
- V. Tumores.*
- LUPUS. Agua. 154. Cataplasmas. 780, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836, 854. Cáusti-

cos. 859, 861, 862. Elíxires. 1637, 1672. Licor. 3668. Pasta 4774. Piedra. 5003. Píldoras. 5065, 5260, 5261, 5262, 5279, 5366, 5368, 5377, 5422, 5754, 5755, 5771, 5773, 5976. Poción. 6150. Polvos. 6936, 6947, 7204, 7226, 7519. Pomadas 7584, 7673, 7757, 7773, 7774, 7775, 7957, 7963, 7964, 7966, 7967, 7973, 7978, 8183. Soluciones. 8421, 8422, 8451, 8452, 8508. Tintura. 8724. Tisana. 8990. Tratamiento. 9098. Ungüento. 9241.

LUXACIONES. V. *Dislocaciones*.

MAL ALIENTO. V. *Fetidez del aliento*.

MAL DE POTT. Guisante. 2605. Pomada. 7721. V. *Caries de las vértebras*.

MAMMITIS. Cataplasmas. 751, 772, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Ceratos. 873, 900, 914. Fomentos. 2307, 2317, 2335. Linimento. 4025. Pediluvios. 4990, 4991. Pomadas. 7596, 7704, 7705, 7722, 7756, 8079, 8172.

MANCHAS DE LA CÓRNEA. Colirios. 1122, 1125, 1131, 1145, 1149, 1158, 1171, 1172, 1173, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1197, 1200, 1201, 1203, 1211, 1212, 1215, 1216, 1222, 1229, 1231, 1233, 1257, 1258, 1264, 1266, 1268, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1283, 1284, 1286, 1289, 1292, 1294. Gotas. 2580. Láudanos. 3446, 3449. Polvos. 6777, 6939, 7106. Pomadas. 7658, 7685, 7715, 7719, 7899, 7906, 7992, 8007, 8020, 8026, 8044, 8054, 8056, 8057, 8069, 8072, 8087, 8115, 8119, 8144, 8177, 8178, 8182, 8183. Soluciones. 8417, 8433, 8501. Tinturas. 8746, 8747, 8798. Vino. 3447. Ungüento. 9286.

MANCHAS HEPÁTICAS. V. *Manchas de la piel*.

MANCHAS DE HIERRO. Sal. 8337.

MANCHAS DE LA PIEL. Alcoholato. 307. Cáustico. 858. Linimento. 3858. Lociones 4041, 4042, 4043, 4099. Pasta. 4763. Pomadas. 7639, 7641, 7682. Solución. 8473. Tópico. 9058. Ungüentos. 9212, 9269.

MANÍA, *enagenacion mental, demencia y monomania*. Baño. 443. Chorros. 1425, 1426. Emulsión. 1930. Lavativa. 3554. Ojimiél. 4652. Polvo. 6872. Pomadas. 7777, 7894, 7896, 7897, 7898. Suero. 8542. Tinturas. 8602, 8701. Tisanas. 8845, 8991. Vinagre. 9379.

MARASMO. Baños. 438, 449. Caldos. 709, 717. Crema. 1392. Chocolates. 1401, 1415. Emplasto. 1811. Extracto. 2226. Ferculum. 2251. Jaleas. 2893, 2896, 2897, 2898, 2900, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2911, 2915, 2916, 2917, 2918, 2920, 2922, 2930, 2931, 2932, 2933, 2936. Jarabes. 3157, 3158, 3182, 3212, 3213. Lavativas. 3563, 3475, 3585, 3586, 3587. Leches. 3639, 3640, 3641, 3642. Mistura. 4350. Palamoud. 2253. Pastillas. 4905. Píldoras. 5047, 5619. Polvos. 6794, 7055, 7247, 7414, 7480. Racahout. 2254. Tabletas. 4834. Tisana. 8912. Wacaca. 2255. V. *Caquexia*.

MARASMO DE LOS NIÑOS. Linimento. 3991. V. *Caquexia y Asenia*.

MAREO. Alcoholato. 299. Cataplasmas. 762, 783, 796, 837. Elíxires. 1687, 1688. Emplastos. 1745, 1823. Espíritu. 2151. Inyecciones. 2736, 2760, 2781. Linimento. 3998. Mistura. 4446. Píldoras. 5218, 5629. Póciones. 6267, 6370, 6403. Pomadas. 7582, 7724, 7778, 7957, 7967, 7978, 7991. Saquitos. 8345, 8346. Suero. 8542. Ungüentos. 9173, 9298.

MELANCOLÍA. Cerveza. 952. Gotas. 2572. Julepe. 3363. Tintura. 8770.

MELANA. Aguas. 171, 175. Elixir. 1621. Lavativas. 3508, 3511, 3530, 3564. Pediluvios. 4990, 4991. Polvo. 7101. Sinapismo. 8354.

MENINGITIS. Linimentos. 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3808, 3853, 3912, 3919, 3927, 3932, 4019, 4020, 4026. Pediluvios. 4980, 4984, 4990, 4991. Poción. 6280. Polvo. 7470. Pomadas. 7602, 7746, 7894, 7896, 7897, 7898, 7973, 8007, 8025, 8102, 8114, 8177. Sinapismo. 8354. Tintura. 8814.

MENTAGRA. Cataplasma. 797. Pomada. 7821. *V. Herpes.*

MENORRAGIA. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Píldoras. 5286. Poción. 6366. Polvo. 7338. *V. Metrorragia.*

METÁSTASIS LECHOSAS. Cocimiento. 1049. Polvo. 7398.

METEORISMO. Especies. 2096. Linimento. 3974. Poción. 6063.

METRITIS. Cataplasmas. 772, 780, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Cerato. 873. Fomentos. 2304, 2317. Fumigaciones. 2375, 2381. Inyecciones. 2687, 2699, 2745, 2750, 2760, 2779, 2790, 2809, 2810, 2815, 2816. Lavativas. 3477, 3549, 3550, 3551, 3554, 3582, 3583, 3609. Linimentos. 3783, 3784, 3798. Mistura. 4500. Píldoras. 5061, 5328, 5400, 5587, 5629, 5754, 5880. Pociiones. 6065, 6078, 6084, 6285, 6391, 6646, 6663, 6665. Polvo. 7434. Pomadas. 7684, 7685, 7741, 7746, 7778, 7973, 8007, 8025, 8156. Suero. 8540. Tintura. 8782. Vahos. 9330. *V. Flegmasias.*

METRORRAGIA. Aceite. 5. Aguas. 109, 122, 148, 157, 183, 195, 236. Bebidas. 517, 518. Bolos. 555, 567, 569. Caldo. 707. Cataplasmas. 751, 772, 780, 794, 815, 842, 854. Ceratos. 873, 912, 914. Embrocacion. 1712. Emplasto. 1760. Extracto. 2216. Fomen-

tos. 2280, 2344. Infusiones. 2632, 2634. Inyecciones. 2699, 2701, 2702, 2704, 2813, 2841. Jarabes. 3089, 3090, 3233. Lavativas. 3523, 3564, 3583, 3588. Limonada. 3749. Linimento. 3836. Lociiones. 4041, 4042, 4072, 4075, 4134, 4159. Misturas. 4324, 4333, 4391, 4452, 4573, 4615. Píldoras. 5186, 5383, 5715, 5863, 5938. Pociiones. 6086, 6097, 6100, 6102, 6134, 6238, 6239, 6243, 6387, 6388, 6549, 6556, 6624, 6625, 6626, 6726. Polvos. 6782, 6807, 6911, 6912, 6954, 6964, 7100, 7337, 7338, 7415, 7459. Pomadas. 7778, 7863, 8183. Solucion. 8506. Sueros. 8527, 8528. *V. Hemorragias.*

METRORRAGIA CRÓNICA. Caldo. 707. Cocimiento. 1016. Conserva. 1380. Inyeccion. 2689. Locion. 4138. Misturas. 4337, 4531. Píldoras. 5020, 5505, 5661. Pociiones. 6099, 6100, 6101, 6191, 6555. Polvos. 6795, 6803, 6806, 7462. *V. Hemorragias pasivas.*

MIASMAS. Agua. 129. Bolas. 533. Fumigaciones. 2361, 2362, 2372, 2373, 2378, 2379. Licor. 3703. Mezcla. 4261. Vinagres. 9352, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9373, 9374, 9392, 9396, 9399.

MIDRIASIS. Colirios. 1117, 1139, 1157, 1204, 1289. Colutorio. 1321. Pediluvios. 4990, 4991. Sinapismo. 8354.

MIELITIS. Baños. 469, 470. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Chorro. 1425. Linimento. 3849.

MILIAR. Píldoras. 5061.

MISERERE. *V. Cólico nervioso.*

MORDEDURAS DE ANIMALES RABIOSOS. *V. Hidrofobia.*

MORDEDURAS DE ANIMALES VENENOSOS. Aguas. 190, 229. Píldoras. 5251. Pociiones. 6211, 6213, 6506, 6718. Trociscos. 9161. *V. pág. 337.*

MOSCAS. Pasta. 4734.

MUERMO. Píldoras. 5021, 5034,

5328, 5400, 5629, 5636, 5880. Pociones. 6264, 6273, 6274, 6280, 6286, 6293, 6534, 6595, 6717, 6724, 6725. Pomadas. 7746, 7757, 8007, 8025, 8114.

NARCOTISMO. Bebida. 492. Cerveza. 959. Poción. 6740. *V. Envenenamientos por los narcóticos.*

NECROSIS. Aguas minerales salinas, IV, 296. Inyecciones. 2774, 2805. Jarabe. 2956. *V. Caries.*

NEFRALGIA. Cataplasma. 794. Emplastos. 1738, 1739. Emulsiones. 1929, 1944. Locion. 4029. Pociones. 6273, 6274, 6280, 6285, 6286, 6293, 6403, 6422.

NEFRITIS. Aguas minerales ácidas, IV, 261. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296. Bálsamo. 427. Bolos. 677. Cataplasmas. 772, 780, 794, 818, 854. Cerato. 903. Confeccion. 1446. Electuario. 1466. Elíxir. 1640. Emplastos. 1754, 1858. Emulsiones. 1903, 1954, 1964, 1967, 1990, 1991, 1992, 1993. Jarabes. 2970, 3247. Lavativas. 3477, 3549, 3550, 3551, 3583, 3590, 3609. Linimento. 3919. Looc. 4180. Píldoras. 5342, 5352, 5359, 5366, 5368, 5668, 5672, 5675, 5679, 5682, 5685, 5783, 6024. Pociones. 6063, 6084, 6123, 6195, 6250, 6273, 6274, 6286, 6355, 6422, 6425, 6434, 6436, 6597. Pomadas. 7693, 7704, 7722, 7904, 7905, 8127. Tintura. 8735. Tisanas. 8937, 8938, 8952. Ungüentos. 9168, 9285, 9316.

NEFRITIS CRÓNICA. Aguas. 141, 225. Cerveza. 947. Electuario. 1483. Emulsion. 1944. Mistura. 4512. Píldoras. 5689, 5783. Zumo. 9553.

NEUMATOSIS. Aceites. 4, 21. Alcoholato. 299. Bolos. 618, 659. Cerato. 914. Cervezas. 949, 950, 956. Elíxires. 1687, 1688, 1700. Embrocacion. 1713. Espíritu. 2151. Emplasto. 1754. Julepe. 3369. Lavativas. 3528, 3549,

3550, 3551, 3583, 3609. Linimentos. 3789, 3792, 3793, 3796, 3797, 3798, 3845, 3912, 3927, 4026. Loocs. 4169, 4180, 4192, 4203. Mermelada. 4244. Mistura. 4446. Píldoras. 5275, 5381, 5407, 5408, 5788, 5797, 5880. Pociones. 6063, 6403, 6418, 6425, 6469, 6475, 6502, 6510, 6514, 6563, 6646, 6719. Polvos. 6773, 6774. Ratafia. 8211. Ungüentos. 9276, 9322. *V. Flatuosidades.*

NEUMONÍA. Aceite. 8. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Agua. 7509. Apocema. 335. Bálsamo. 406. Bolos. 571, 576, 601, 606, 659. Café. 698. Caldos. 713, 716. Cataplasmas. 780, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 819, 836, 854. Cigarros. 977, 979. Cocimientos. 1034, 1036, 1037, 1070, 1086, 1087. Cremas. 1389, 1390, 1391, 1393, 1394. Electuario. 1532. Emplastos. 1785, 1810, 1866. Emulsiones. 1897, 1898, 1903, 1905, 1918, 1920, 1929, 1956, 1981. Esencias. 2028, 2044. Especies. 2091. Flores. 2098. Fumigaciones. 2367. Infusiones. 2644, 2660, 2911, 2914. Jarabes. 2960, 2961, 2970, 2974, 2988, 2991, 3009, 3010, 3020, 3021, 3083, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3132, 3133, 3203, 3240, 3242, 3261, 3262, 3266, 3267, 3268, 3276, 3318, 3329, 3352. Julepes. 3381, 3382, 3386, 3389, 3390, 3391, 3396, 3401, 3409, 3419, 3424, 3425, 3428. Lavativas. 3554, 3613. Loocs. 4160, 4166, 4177, 4178, 4179, 4185, 4186, 4194, 4197, 4203, 4204, 4214. Mermelada. 4247. Misturas. 4568, 4585. Ojimiél. 4654. Pastas. 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793. Pastillas. 4900. Pediluvio. 4982. Píldoras. 5047, 5104, 5319, 5350, 5407, 5408, 5583, 5594, 5686, 5750. Pociones. 6077, 6081, 6082, 6084, 6108, 6192, 6250, 6259, 6263, 6264, 6273,

- 6274, 6280, 6282, 6285, 6286, 775, 789, 790, 791, 792, 795,
6287, 6293, 6359, 6360, 6396, 797, 799, 814, 815, 819, 833,
6422, 6456, 6458, 6480, 6486, 836, 840. Ceratos. 882, 912,
6487, 6489, 6504, 6505, 6509, 922. Electuarios. 1466, 1484,
6510, 6551, 6568, 6595, 6619, 1506, 1597, 1598. Embrocaciones.
6635, 6699, 6709, 6717, 6719, 1709, 1717. Emplastos. 1738,
6728. Polvos. 6980, 6985, 6997, 1739, 1774, 1776, 1806, 1808,
7180, 7188, 7202, 7203, 7238, 1858. Emulsiones. 1918, 1931,
7268, 7271, 7272, 7274, 7354, 1964, 1989. Espadrapo. 2072. Es-
7368, 7398, 7412, 7478, 7542. pecies. 2092, 2125. Extractos.
Pomadas. 7651, 7894, 7896, 7897, 2222, 2245. Fomentos. 2264.
7898, 7922, 7994, 8102. Sinapis- 2318, 2332. Gotas. 2549. Inyec-
mo. 8359, 8360, 8361, 8362. So- cion. 2762. Jabon. 2855. Jarabes.
lucion. 8496. Suero. 8540. Table- 2945, 2950, 2951, 3052, 3067,
tas. 4829, 4901, 4918, 4920. Tin- 3076, 3113, 3114, 3115, 3143,
turas. 8691, 8776. Tisanas. 8935, 3171, 3300. Julepes. 3387, 3412,
8950, 8978, 8980. 3414. Láudanos. 3443, 3444,
3446, 3449. Lavativas. 3467,
3468, 3620, 3626. Licores. 3674,
3676, 3687, 3719. Linimentos.
3771, 3772, 3787, 3798, 3799,
3802, 3825, 3828, 3849, 3880,
3937, 3946, 3959, 3987, 4015.
Lociones. 4075, 4131. Loocs. 4218,
4219. Mielles. 4314, 4315. Mistu-
ras. 4359, 4453, 4534, 4536, 4568,
4620, 4628, 4632. Moscas. 9348.
Opiata. 4707. Papeles. 4725, 4726.
Pastillas. 4873, 4972. Pildoras.
5014, 5015, 5034, 5039, 5048,
5155, 5161, 5173, 5222, 5224,
5225, 5226, 5227, 5228, 5235,
5260, 5265, 5270, 5272, 5275,
5276, 5348, 5349, 5350, 5353,
5359, 5377, 5390, 5400, 5411,
5436, 5437, 5527, 5628, 5635,
5636, 5640, 5644, 5658, 5672,
5775, 5852, 5853, 5854, 5874,
5880, 5885, 5979, 5981, 6000,
6026, 6056, 6058. Pociones. 6084,
6109, 6166, 6170, 6202, 6205,
6278, 6289, 6290, 6299, 6327,
6508, 6512, 6534, 6595, 6610,
6627, 6628, 6687, 6724, 6725,
6747. Polvos. 6783, 6797, 6919,
6920, 6978, 7523. Pomadas. 7579,
7580, 7586, 7587, 7652, 7653,
7654, 7720, 7722, 7753, 7761,
7822, 7824, 7888, 7902, 7903,
7922, 8033, 8036, 8172, 9275.
Sinapismos. 8354, 8358. Solucio-
nes. 8364, 8366, 8382, 8389,
- NEUMONÍA CRÓNICA. Agua. 231.
Bolos. 535, 603, 656, 662. Caldo.
709. Cigarros. 972, 974. Coci-
miento. 1087. Crema. 1392. Cho-
colate. 1407. Especies. 2126. Fru-
tos. 2113. Hidromeles. 2612, 2613.
Inhalacion. 2616. Jabon. 2851. Ja-
lea. 2892. Jarabes. 3006, 3007,
3008, 3037, 3156, 3214, 3254,
3258, 3259, 3260, 3265, 3273,
3285, 3293, 3317, 3347. Julepe.
3356. Loocs. 4192, 4193, 4198,
4205, 4209, 4213, 4220. Merme-
ladas. 4242, 4246, 4248. Mistu-
ras. 4326, 4336, 4340, 4587. O-
piata. 4702. Pastillas. 4881. Po-
ciones. 6482, 6487, 6576, 6634,
6679, 6680, 6681. Polvos. 7269,
7273, 7458. Sacarolado. 8314.
Suero. 8537. Tabletas. 4828,
4916, 4953. Tisanas. 8850, 8971,
8974. Vinagre. 9382. Zumos. 9556.
- NEUMONÍA TIFOIDEA. Polvos.
6781, 6793, 7270, 7440. Sina-
pismo. 8359, 8360, 8361, 8362.
- NEUMONÍA DE LOS NIÑOS. Po-
cion. 6545.
- NEURALGIA. Aceites. 19, 24,
27, 28, 29, 30. Aguas. 128, 255,
257. Alcoholes. 267, 269. Alcoh-
latos. 286, 287, 307, 310, 311.
Bálsamos. 26, 360, 361, 376,
377, 414, 417, 427. Baño. 447.
Bolos. 546, 552, 576, 601, 659,
660, 676, 694. Cataplasmas. 756,

8403, 8414, 8415, 8447, 8513. Tablet. 4944. Tinturas. 8593, 8613. Tratamiento. 9099. Ungüento. 9274. Vinagres. 9350, 9351, 9353, 9388, 9389, 9395. Vinos. 3447, 9460, 9489, 9511.

NEURALGIA FACIAL. Bolos. 553. Epitema. 2012. Fomentos. 2265, 2288. Gotas. 2549, 2560. Licor. 3674. Lociones. 4071, 4083. Mistura. 4632. Píldoras. 5155, 5226, 5350, 5359, 5390, 6056. Pociones. 6284, 6320. Polvos. 6797, 6914, 6919, 7383, 7474, 7523. Pomadas. 7586, 7587, 7652, 7653, 7722, 7735, 7822, 7823, 7825, 8034, 8138. Soluciones. 8382, 8383. Tinturas. 8613, 8661.

NEURALGIAS INTERMITENTES. Bolos. 558, 669. Lavativa. 3492. Linimento. 3831. Poción. 6197.

NEURALGIAS DEL CORAZON. Pomada. 8034.

NEURALGIAS DEL OJO. Emplasto. 1740. Pomada. 8173. Solucion. 8516.

NEURALGIAS REUMÁTICAS. Mistura. 4394. Piel. 5006. Solucion. 8383.

NEURALGIA DE LA URETRA. Inyecciones. 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814.

NEURALGIA DE LA VAGINA. Inyecciones. 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814.

NEURITIS. Bálsamo. 427. Cataplasmas. 772, 794, 854. Cerato. 873. Emplastos. 1738, 1739, 1858. Linimentos. 3796, 3797, 3912, 4026. Looc. 4218. Píldoras. 5672, 6026. Pomadas. 7602, 7651, 8083, 8102, 8177, 9275. Tintura. 8701. Ungüento. 9274.

NEUROSIS. Acido. 65. Aguas. 123, 181. Alcoholaturo. 314. Baños. 469, 470. Bolos. 546, 548, 549, 592, 645, 673. Cataplasma. 815. Especies. 2080, 2120. Espíritu. 2163. Fomento. 2304. Infusiones. 2683, 2684. Jabon. 2854. Jarabes. 2950, 2951, 3144. Julepe. 3360. Lavativa. 3486. Linimentos. 3796,

3797, 3828. Misturas. 4612, 4620. Píldoras. 5157, 5226, 5281, 5284, 5290, 5291, 5302, 5486, 5868, 6040. Pociones. 6166, 6170, 6187, 6273, 6274, 6284, 6285, 6286, 6293, 6770. Pomada. 7751. Sina-pismo. 8354. Vinagre. 9363.

NICTALOPIA. Colirios. 1152, 1220, 1234.

NINFOMANÍA. Ceratos. 912, 914. Emulsiones. 1903, 1905, 1918, 1920, 1929. Opiata. 4689. Pociones. 6084, 6165, 6170, 6264, 6273, 6274, 6286, 6595. Pomadas. 7596, 8098, 8099, 8100, 8101. Ungüento. 9168.

Nodos. Emplasto. 1862.

OBSTRUCCIONES. Agua. 195. E-lectuarios 1511, 1576. Extracto. 2215. Jabon. 2880. Ojimiél. 4649. Píldoras. 5028, 5675, 5683, 5997. Polvo. 7368.

OBSTRUCCIONES DEL BAZO. Emplastos. 1847, 1848. Espíritu. 2152. Jarabes. 2960, 2961, 2962. Píldoras. 5813. Polvo. 6982. Pomada. 8145. Ungüento. 9206.

OBSTRUCCIONES DEL HÍGADO. Cerveza. 947. Emplastos. 1847, 1848. Espíritu. 2152. Extracto. 2205. Jarabes. 2960, 2961, 2962, 3306. Polvos. 6982, 7183. Pomada. 7906. Tisana. 8885. Ungüento. 9206.

OBSTRUCCIONES DE LAS VÍSCERAS ABDOMINALES. Agua. 141. Apocema. 328. Cocimiento. 1011. Elixires. 1651, 1670, 1690. Espíritu. 2152. Fomento. 2332. Infusion. 2651. Inyeccion. 2817. Jabones. 2853, 2861. Jarabes. 3018, 3055, 3056, 3306. Lavativa. 3629. Mistura. 4541. Píldoras. 5021, 5023, 5067, 5439, 5681, 5687, 5689, 5812, 5837, 5947, 5948, 5988. Pociones. 6422, 6692. Polvos. 7033, 7206, 7455. Pomadas. 7894, 7896, 7897, 7898. Suero. 8531. Tinturas. 8637, 8812. Tisana. 8885. Zumos. 9565, 9566. *V. Hepatitis, esplenitis y gastritis crónicas.*

OCENA. Ceratos. 893, 894, 914.

Colutorio. 1337. Inhalacion. 2617. Inyecciones. 2697, 2745, 2764, 2779, 2804. Pastillas. 4811. Polvos. 7107, 7175, 7218. Pomada. 7637. Soluciones. 8386, 8474, 8486.

OTORREA. Aceite. 15. Agua. 75. Bálsamos. 362, 363, 365, 367. Inyecciones. 2738, 2739, 2740. Mezcla. 4249. Polvo. 6923. Pomada. 7826.

ODONTALGIA. Aguas. 89, 97, 98, 114, 139, 198, 207, 216. Alcohol. 267. Alcoholato. 303. Bálsamos. 372, 373, 409, 410. Cimento. 4646. Colutorios. 1298, 1311, 1312, 1343, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354. Elixires. 1637, 1644, 1645, 1646, 1662, 1663, 1665, 1682, 1683. Emplastos. 1749, 1750, 1757, 1770, 1771. Enjuagatorios. 2003, 2004. Epitemas. 2012, 9079. Esencia. 2041. Espíritu. 2168. Eter. 2181. Fumigacion. 2382. Gargarismos. 2412, 2440, 2455, 2493, 2520, 2536. Gotas. 2562, 2565, 2578. Lavatorio. 3630. Linimento. 4019. Masa. 4228. Mezclas. 4256, 4271. Misturas. 4395, 4396, 4397, 4398, 4516, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4613, 4674. Odontálgico. 4645. Opiata. 4673. Pasta. 4754, 4755. Paraguay. 8790. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5877. Polvos. 7032, 7152, 7157, 7459. Sinapismo. 8354. Soluciones. 8384, 8385, 8436, 8492, 8493. Tinturas. 8651, 8667, 8668, 8745, 8787, 8788, 8803, 8819. Tópico. 9037. Vinagre. 9375.

OFTALMIA. Aguas. 79, 257, 7509. Cataplasmas. 744, 759, 772, 816, 854. Clara. 983. Colirios. 1121, 1122, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1136, 1139, 1142, 1143, 1144, 1148, 1151, 1152, 1154, 1157, 1160, 1164, 1173, 1178, 1179, 1181, 1182, 1195, 1198, 1199, 1213, 1214, 1217, 1227, 1228, 1234, 1235,

1237, 1238, 1241, 1242, 1244, 1248, 1249, 1250, 1251, 1257, 1259, 1261, 1262, 1263, 1270, 1279, 1281, 1282, 1284, 1285, 1286, 1289, 1297. Emplasto. 1740. Infusion. 2650. Láudanos. 3446, 3449. Lavativas. 3453, 3457, 3474. Linimentos. 3839, 3870. Lociones. 4116, 4133, 4134. Mucílago. 4643. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5220, 5328, 5364, 5366, 5367, 5368, 5400, 5422, 5629, 5668, 5823, 5824, 5832, 5843, 5860, 5908. Pociones. 6102, 6212, 6312, 6477. Polvos. 7441, 7442. Pomadas. 7595, 7603, 7657, 7662, 7715, 7723, 7746, 7749, 7812, 7874, 7906, 7973, 7988, 7992, 8000, 8015, 8018, 8025, 8053, 8055, 8070, 8071, 8076, 8079, 8114, 8119, 8127, 8173. Saquitos. 8345, 8346. Sinapismo. 8354. Solucion. 8496. Trociscos. 9145. Ungüentos. 9205, 9270, 9282, 9283, 9328, 9329. Vino. 3447.

OFTALMIAS CRÓNICAS. Aguas. 80, 99, 100, 101, 126, 127, 208, 209, 212, 213, 264. Bálsamo. 413. Cerato. 867. Colirios. 1118, 1120, 1122, 1124, 1125, 1139, 1141, 1157, 1158, 1159, 1162, 1173, 1174, 1180, 1194, 1196, 1197, 1207, 1224, 1226, 1242, 1243, 1246, 1252, 1253, 1255, 1256, 1265, 1269, 1272, 1279, 1282, 1284, 1288, 1291, 1297. Licor. 3661. Moscas. 9348, 9349. Poción. 6300. Polvos. 7421, 7443. Pomadas. 7655, 7659, 7660, 7661, 7663, 7664, 7667, 7874, 7999, 8017, 8044, 8052, 8056, 8059, 8060, 8061, 8062, 8064, 8065, 8066, 8074, 8078, 8086, 8120, 8178. Soluciones. 8487, 8511. Ungüentos. 9284, 9286, 9320. Vino. 9429.

OFTALMIA ARTRITICA. V. *Oftalmia gotosa.*

OFTALMIA BLENORRÁGICA. V. *Oftalmias sífilíticas.*

OFTALMIA CATARRAL. Colirios. 1116, 1133, 1182, 1254, 1276,

- 1290, 1292, 1293. Polvos. 6921, 7418, 7419, 7441, 7442. Pomadas. 8044, 8061, 8076. Tratamiento. 9082.
- OFTALMIA EGIPCIA. Pomada. 8073.
- OFTALMIA ESCORBÚTICA. Colirio. 1201.
- OFTALMIA ESCROFULOSA. Cataplasma. 812. Colirios. 1117, 1122, 1133, 1134, 1140, 1146, 1150, 1172, 1186, 1191, 1201, 1221, 1222, 1255, 1257, 1276, 1279, 1280, 1283, 1294. Infusion. 2678. Mistura. 4462. Píldoras. 5138. Polvos. 6865, 6913, 6917, 6918, 7417, 7418. Pomadas. 7656, 7658, 7660, 7666, 7692, 7827, 7992, 8000, 8019, 8044, 8054, 8056, 8061, 8063, 8064, 8066, 8068, 8076, 8086, 8114, 8183. Soluciones. 8419, 8433, 8455, 8458. 8462, 8494. Tintura. 8664. Tratamientos. 9100, 9101.
- OFTALMIA GOTOSA. Polvos. 6921, 7419, 7441, 7442. *V. Gota.*
- OFTALMIA GRANULAR. Pomadas. 8051, 8072.
- OFTALMIA HERPÉTICA. Pomadas. 7646, 8076.
- OFTALMIA PERIÓDICA. Polvos. 7420, 7467.
- OFTALMIA PURULENTA. *V. Oftalmia de los recién nacidos.*
- OFTALMIA DE LOS RECIÉN NACIDOS. Agua. 126. Colirios. 1117, 1157, 1166, 1171, 1190, 1194, 1219, 1220, 1239, 1240, 1241, 1260, 1285, 1287, 1294. Hidromel. 2614. Infusion. 2678. Pomadas. 8031, 8032, 8061. Solucion. 8487. Tratamiento. 9102.
- OFTALMIA REUMÁTICA. Colirio. 1170. Colutorio. 1311. Enjuagatorio. 2002. Gargarismo. 2516. Hidromel. 2614. Linimento. 3787. *V. Reumatismo.*
- OFTALMIA SIFILÍTICA. Agua. 211. Colirios. 1137, 1174, 1192, 1193, 1230, 1232, 1279, 1280, 1283. Inyeccion. 2804. Leche. 3647. Pomadas. 8012, 8074, 8075.
- OFTALMIA VARIOLOSA. Pomadas. 7941, 8077.
- OJOS DE GALLO. *V. Callos.*
- ONIXIS. Cataplasma. 794, 837.
- OPACIDAD DE LA CÓRNEA. Colirio. 1267. Embrocaciones. 1710, 1714, 1724. Linimento. 3774. Polvo. 7416. *V. Manchas de la córnea.*
- ORLIN. *V. Aftas.*
- ORQUITIS. Agua. 236. Cataplasmas. 794, 815, 837. Emplastos. 1730, 1747, 1778, 1824, 1877, 1894. Emulsion. 1916. Espadrapo. 2067. Fomentos. 2284, 2332. Píldoras. 5880. Pomadas. 7957, 7967, 7973, 8007, 8079. Ungüentos. 9263, 9264, 9267.
- ORQUITIS CRÓNICA. Linimentos. 3988. Píldoras. 5683, 5833. Pomada. 7934.
- ORQUITIS SIFILÍTICA. Emplasto. 1751.
- ORTOFENEA. Píldoras. 5395. Pociiones. 6309, 6310, 6632, 6633. *V. Asma.*
- ORZUELO. Cataplasma. 812. *V. Divieso.*
- OSTEITIS. Cataplasma. 754.
- OTALGIA. Aceite. 47. Bálsamos. 362, 365. Especies. 2116, 2117. Gotas. 2542. Inyecciones. 2706, 2707, 2708, 2738, 2739, 2747, 2779, 2813, 2814, 2841. Linimentos. 3773, 3774, 3969, 4020. Pediluvios. 4990, 4991. Sinapismo. 8354. Suero. 8537. Tinturas. 8738, 8745, 8789.
- OTITIS. Agua. 75. Bálsamos. 362, 365. Emplasto. 1846. Especies. 2116, 2117. Fumigaciones. 2375, 2381. Inyecciones. 2706, 2707, 2708, 2738, 2739, 2813, 2814. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 6009, 6010. Pociion. 6665. Polvos. 6819, 7257, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263. Sinapismo. 8354. Tinturas. 8601, 8602. *V. Flegmasias.*
- OTITIS CRÓNICA. Inyeccion. 2716. Mezcla. 4258. Solucion. 8482. Tratamiento. 9103.
- OVARITIS. Agua. 7509. Cataplas-

- mas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Fomento. 2317. Inyeccion. 2815, 2816. Lavativas. 3549, 3550, 3551, 3583, 3609. Pomadas. 7582, 7957, 7967, 8025, 8127. Ungüento. 9270.
- OZENA SIFILÍTICA. Fumigacion. 2371. Gargarismos. 2504, 2509.
- PAJITAS DE HIERRO. Colirio. 1119. *V. Cuerpos extraños en la conjuntiva.*
- PALATITIS. Gargarismo. 2411.
- PALPITACIONES DE CORAZON. Bolos. 548, 571, 606, 620. Conserva. 1378. Emplastos. 1761, 1805, 1866. Emulsion. 1984. Fumigaciones. 2383. Gragea. 2588. Jarabes. 3030, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3135, 3136, 3137, 3210. Licor. 3672. Linimentos. 3783, 3784, 3887, 3998. Misturas. 4437, 4568. Pediluvios. 4984, 4987, 4988. Pildoras. 5147, 5168, 5200, 5358, 5395, 5507, 5543, 5956, 5957, 5958, 6005. Pociones. 6595, 6641, 6709. Polvos. 6876, 6982, 7108, 7487. *V. Aneurisma é hipertrofia del corazon.*
- PANARIZO. Agua. 236. Cataplasmas. 780, 854. Emplasto. 1820. Pildoras. 5880. Poción. 6084. Pomadas. 7764, 8141. Remedio. 8240. Sinapismo. 8354. Tópicos. 9040, 9053. *V. Absceso agudo.*
- PANCREATITIS. Cataplasma. 794. Pildoras. 5064, 5360. Pomada. 7959.
- PANNUS. Pildoras. 5671, 5908. Pomada. 8057.
- PAPERA. *V. Bocio.*
- PARACUSIA. Aceite. 5. Bálsamos. 362, 365. Emplasto. 1858. Gotas. 2542. Inyeccion. 2738.
- PARAFIMOSIS Y FIMOSIS. Cataplasma. 841. Poción. 6148. Pomada. 7695. Tópico. 9042. Ungüento. 9272.
- PARÁLISIS. Aceites. 3, 9, 25, 32, 34, 36. Aguardiente. 72. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 191, 231. Alcohol. 267. Alcoholatos. 274, 286, 287, 297, 299, 307. Apocema. 344. Bálsamos. 390, 419, 430, 431, Baños. 443. Bolos. 552, 559, 571, 576, 624, 625, 659, 676. Cerveza. 952. Cocimientos. 995, 1070. Colirios. 1201, 1208, 1258. Chorros. 1425, 1426, 1427. Emplasto. 1827. Epitemas. 2013, 2014. Esencia. 2045. Especies. 2086, 2087, 2088. Espíritu. 2147. Eter. 2177. Fricciones. 2353, 2354, 2357. Gargarismo. 2455. Gotas. 2569. Infusiones. 2624, 2659, 2685. Inyeccion. 2787. Jarabe. 3270. Lavativas. 3555, 3557, 3620. Linimentos. 3787, 3789, 3790, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3837, 3851, 3852, 3853, 3854, 3899, 3900, 3901, 3904, 3905, 3908, 3912, 3914, 3915, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3927, 3932, 3935, 3941, 3944, 3976, 3989, 4007, 4012. Loocs. 4218. Misturas. 4435, 4486, 4529, 4620. Pildoras. 5034, 5265, 5270, 5343, 5602, 5633, 5640, 5867, 5868, 5873, 5874, 5880, 5895, 5909, 6026, 6056, 6058, 6060, 6061. Pociones. 6089, 6221, 6302, 6371, 6389, 6436, 6504, 6505, 6508, 6512, 6518, 6535, 6536, 6537, 6555, 6716, 6717, 6718, 6720, 6721. Pomadas. 7904, 7905, 7913, 7922, 7996, 9275. Sacaruro. 8326. Suerro. 8539. Tafetan. 4739. Tinturas. 8626, 8651, 8657, 8667, 8668, 8669, 8701, 8745, 8760, 8783, 8784, 8785, 8814. Trociscos. 9158. Ungüentos. 9274, 9276. Vinagres. 9358, 9359, 9360, 9387. Vinos. 9429, 9431, 9432, 9433.
- PARÁLISIS DE LA LENGUA. Elíxir. 1662. Gargarismos. 2405, 2490, 2491, 2496, 2520, 2521, 2532. Polvo. 7391.
- PARÁLISIS DE LOS PÁRPADOS. Aceite. 37. Colirio. 1125. Linimentos. 3903.
- PARÁLISIS DEL RECTO. Mistura. 4486.
- PARÁLISIS DE LA VEJIGA. Bolos.

677. Infusion. 2657. Misturas. 4444, 4486. Píldoras. 5612. Poción. 6389. Tisana. 8970. *V. Incontinencia de orina y parálisis.*

PARAPLEJIA. Infusion. 2632. Mistura. 4452. Pociones. 6372, 6389, 6668. *V. Parálisis.*

PARÓTIDAS. Cataplasmas. 780. 789, 790, 791, 792, 795, 796, 797, 799, 802, 807, 814, 836. Emplastos. 1778, 1877, 1894. *V. Flegmasias.*

PARTOS LABORIOSOS. Infusiones. 2632, 2677. Inyecciones. 2687, 2815. Jarabes. 3089, 3090. Julepe. 3392. Lavativas. 3474, 3477, 3523, 3588. Linimentos. 3798, 3855, 3963. Locion. 4029. Misturas. 4452, 4573. Píldoras. 5889. Pociones. 6232, 6387, 6467, 6624, 6625, 6626, 6714. Polvos. 7128, 7370, 7415. Pomadas. 7863, 8097, 8156. Vino. 9465.

PASMO. Agua. 7509. Pociones. 6089, 6264, 6273, 6274, 6280, 6282, 6285, 6286, 6293, 6720.

PECAS. Agua. 245. Gargarismo. 2541. Lociones. 4072, 4112. Remedio. 8254. Solucion. 8402. Tópico. 9054. Ungüento. 9225. *V. Manchas hepáticas.*

PEDIONALGIA. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799. 814, 836. Embrocaciones. 1717. Eter. 2190. Locion. 4133. Píldoras. 5668, 5880. Pociones. 6084, 6273, 6274, 6286, 6293, 6595. Pomada. 7715.

PELAGRA. Baños. 459, 461, 470.

PÉNFIGO. Baño. 470. Ceratos. 893, 894, 914. Fumigacion. 2365. Gargarismos. 2396, 2441. Pastillas. 4904, 4971. Píldoras. 5342, 5755, 5773, 5976, 5988. Pociones. 6097, 6100. Solucion. 8478.

PERFUMES. Aguas. 214, 215. Alcoholatos. 286, 287, 298, 300, 301, 305. Bálsamo. 403. Clavos. 985, 986. Especies. 2114, 2115, 2121, 2122. Espíritus. 2170, 2171. Pastillas. 4943. Polvo. 6990. Trociscos. 9143.

PERICARDITIS. Jarabes. 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, Poción. 6577.

PERINEUMONIA. *V. Neumonía.*

PERIOSTOSIS. Agua. 238. Emplasto. 1792. Jarabes. 3105, 3106. Píldoras. 5760. Solucion. 8474.

PERIOSTOSIS SIFILITICA. Jarabe. 3107.

PERIOSTITIS. Aguas. 238, 239. Cataplasmas. 754, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Chorro. 1425. Electuario. 1588. Jarabes. 3108, 3272. Pomada. 8021.

PERITONITIS. Cataplasmas. 772, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Cerato. 873. Fomentos. 2303, 2317. Inyecciones. 2779, 2809, 2810, 2813. Lavativas. 3549, 3550, 3551, 3583, 3609. Linimentos. 3798, 3808, 3853, 4026. Pociones. 6084, 6170, 6273, 6274, 6286, 6595, 6665. Pomadas. 7651, 7698, 7746, 7894, 7896, 7897, 7898, 8007, 8114. Tintura. 8701. Ungüento. 9276.

PERITONITIS PUERPERAL. Linimento. 3857. Pociones. 6094, 6656. Pomadas. 7994, 8025. Ungüentos. 9263, 9264, 9266, 9267.

PESADILLA. Poción. 6182.

PESTAÑO. Colirios. 1152, 1228, 1234, 1276.

PESTE. Jarabe. 3134. Saquito. 8344. Trociscos. 9161. Vinagre. 9364.

PIAN. Baños. 469, 470. Digestivos. 1429, 1431. Emplasto. 1762. Gargarismos. 2396, 2535. Jarabe. 3268. Licores. 3711, 3723, 3724. Locion. 4077. Pasta. 4766. Píldoras. 5260, 5261, 5262, 5304. Pomada. 7760, 7769, 7773, 7774, 7775. Soluciones. 8412, 8508. Ungüentos. 9292, 9293.

PICA. Baño. 459. Bolos. 575, 618. Fomento. 2304. Ojimiél. 4652. Pastillas. 4897. Píldoras. 5358, 5366, 5686, 5773, 5933, 5934, 6013, 6025.

- PROJOS. Agua. 102. Cocimiento. 1080. Locion. 4130. Misturas. 4487, 4534. Polvo. 7012. Pomadas. 7678, 7828, 7829, 7872, 7892, 7893. Ungüentos. 9165, 9265, 9266. Vino. 9491.
- PIROSIS. Azúcar. 8295. Aguas. 116, 117. Leche. 3646. Licor. 3689. Misturas. 4488, 4498. Pastillas. 4831. Píldoras. 5804. Pociones. 6062, 6064. Polvos. 6773, 6814, 6994, 6995, 6997, 6999, 7053, 7110, 7134, 7226, 7298, 7385, 7387, 7492, 7569. Tabletas. 4942. Trociscos. 9141. Vinos. 9405, 9406, 9407.
- PITIRIASIS. Baño. 467. Licor. 3707. Lociones. 4084, 4156. Píldoras. 5261, 5262, 5988. Pomadas. 7581, 7635, 7709, 7800, 7811, 8098, 8099, 8100, 8101, 8148, 8150.
- PITUITA. Jabon. 2867. Pastillas. 4897, 4898, 4899, 4900, 4901.
- PLÉTORA. Agua. 166. Apocema. 345. Emulsion. 1964. Lavativas. 3474, 3554, 3596, 3600. Pociones. 6084, 6273, 6274, 6286, 6293, 6298, 6395, 6638, 6709. Sinapismo. 8354. Suero. 8540.
- PLEURESIA. Aceite. 18. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Apocema. 335. Bálsamo. 406. Baños. 456, 461, 470. Bolos. 582. Cataplasmas. 794, 815, 819. Cocimientos. 1034, 1086. Emplasto. 1868. Julepes. 3381, 3382, 3389, 3420, 3421, 3422. Lavativa. 3474. Linimentos. 3771, 3772, 3815, 3927. Loocs. 4177, 4178, 4179, 4203. Opiata. 4675. Papel. 4724. Pastas. 4783, 4789, 4790, 4791. Pediluvios. 4982, 4990, 4991. Píldoras. 5044, 5358, 5359, 5364, 5395, 5554, 5594, 5636, 5880. Pociones. 6084, 6105, 6263, 6264, 6273, 6274, 6280, 6282, 6285, 6286, 6293, 6359, 6360, 6403, 6422, 6425, 6458, 6470, 6473, 6487, 6619, 6717. Polvos. 6816, 7007. Pomadas. 7651, 7758, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7934, 8007. Sinapismo. 8354. Tinturas. 8595, 8666, 8685, 8701.
- PLEURESIA CRÓNICA. Misturas. 4346, 4507, 4515. Píldoras. 5556, 5836. Pocion. 6719.
- PLEURODINIA. Aceites. 18, 43. Baños. 456, 474. Cataplasmas. 760, 780, 819. Especies. 2092. Fomentos. 2272, 2307. Linimentos. 3771, 3772, 3796, 3797, 3912, 3919. Lociones. 4104, 4106, 4155. Pediluvios. 4982, 4984, 4987, 4988, 4990, 4991. Píldoras. 5359. Pocion. 6569. Sinapismos. 8354, 8359, 8360, 8361, 8362. Solucion. 8397. *V. Reumatismo.*
- PLEURONEUMONIA. *V. Neumonía.*
- PLICA. Bálsamo. 424. Baños. 440, 457, 459, 465, 470. Cera-
tos. 934, 935. Jarabes. 2954, 3105, 3106, 3107, 3108, 3272. Linimento. 3845. Lociones. 4076, 4079, 4103, 4104, 4143.
- POLIDIPSIA. Bolos. 571, 601, 606, 659, 662, 684. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 817, 836. Julepes. 3420, 3421, 3422, 3431. Loocs. 4162, 4163. Pastillas. 4945. Píldoras. 5265, 5270, 5358, 5433, 5880. Pociones. 6166, 6170, 6264, 6273, 6274, 6286.
- POLIGALAXIA. Miel. 4313. Pediluvios. 4980, 4990, 4991. Sinapismo. 8354. Ungüento. 9168.
- PÓLIPOS. Inyecciones. 2732, 2737, 2775, 2815, 2828, 2836. Lociones. 4085, 4086.
- POLUCIONES. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Conserva. 1379. Electuario. 1499. Elixir. 1654. Emplasto. 1822. Gotas. 2558. Misturas. 4415, 4424, 4496. Píldoras. 5186, 5508, 5520, 5661. Polvos. 7091, 7109. Tintura. 8641.
- PÓRRIGO. Acido. 66. Aguas minerales salinas, IV, 296. Baños. 459, 465. Linimento. 3801. Locion. 4101. Mezcla. 4283. Poma-

- das. 7581, 7590, 7591, 7592, 7594, 7637, 7674, 7689, 7704, 7711, 7712, 7714, 7937, 7962, 7963, 7964, 7966, 8084, 8090, 8091, 8105, 8106, 8107, 8109, 8150, 8183. Ungüentos. 9222, 9288. *V. Tiña.*
- PRIAPISMO. Bolos. 535. Cataplasmas. 780, 794, 837. Emulsiones. 1903, 1920, 1929, 1964, 1995. Fomentos. 2289, 2317. Jarabes. 2970, 3247, 3271. Lavativas. 3472, 3583, 3590. Licor. 3668. Loocs. 4177, 4178. Píldoras. 5328, 5933. Pomadas. 7596, 7756. Ungüento. 9168.
- PROCIDENCIA DE LA MATRIZ. *V. Histeroptosis.*
- PROCIDENCIA DEL IRIS. Coágulo. 984. Colirio. 1163.
- PROCIDENCIA DEL RECTO. *V. Protoposis.*
- PROCIDENCIA DE LA VAGINA. Baño. 451. Inyección. 2828. Locion. 4138.
- PROLAPSO DEL RECTO. *V. Protoposis.*
- PROSOPALGIA. *V. Neuralgia facial.*
- PROSTATITIS. Bolos. 648, 650, 651. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836. Fomento. 2317. Inyecciones. 2813, 2814, 2820. Píldoras. 5672, 5675, 5682. Polvo. 7358. Pomadas. 7957, 7967, 8007.
- PROTOPTOSIS ó caída del recto. Baño. 451. Cataplasma. 841. Fomento. 2281. Lavativas. 3511, 3512, 3561, 3585, 3600. Lociones. 4062, 4065. Mistura. 4489. Píldoras. 5636, 5874. Poción. 6389. Pomadas. 8049, 8116, 8161, 8162. Solución. 8491. Supositorios. 8552, 8553, 8554.
- PRURIGO. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas. 236, 256. Baños. 437, 442, 461, 466, 469, 470. Bolos. 595. Cocimientos. 997, 999. Fomento. 2317. Fumigaciones. 2371, 2385. Infusión. 2678. Linimentos. 3795, 3886. Lociones. 4033, 4035, 4036, 4051, 4072, 4073, 4074, 4079, 4101, 4116, 4131, 4147. Mezclas. 4278, 4283, 4284. Misturas. 4339, 4399, 4522. Píldoras. 5304, 5672, 6026. Polvo. 6864. Pomadas. 7637, 7669, 7704, 7705, 7706, 7709, 7710, 7746, 7750, 7757, 7830, 7831, 7832, 7921, 7922, 7963, 7964, 8035, 8148, 8149. Solución. 8478. Tisanas. 8849, 8863. Tópico. 9066.
- PRURITO. Bálsamos. 383, 424. Lociones. 4035, 4078, 4128. Mezcla. 4280. Póciones. 6084, 6273, 6274, 6286, 6595. Pomadas. 7748, 7749, 7797. Tópicos. 9055, 9057, 9061.
- PRURITO DEL ANO. Tópico. 9050.
- PRURITO DEL PERINEO. Licor. 3706.
- PRURITO DE LA VULVA. Locion. 4087. Polvo. 7111. Solución. 8407. Tópico. 9050.
- PSORIASIS. *V. Soriasis.*
- PUERROS. *V. Vegetaciones sifilíticas.*
- PULMONÍA. *V. Neumonía.*
- PULMONÍA CRÓNICA. *V. Neumonía crónica.*
- PULMONÍA ATÁXICA. *V. Neumonía atáxica.*
- PURGACIONES. *V. Blenorragia y Sifilis.*
- PÚRPURA. Electuario. 1501. Jarabe. 3280. Poción. 6390. Suero. 8527. Tintura. 8631. Tisana. 8880. Tratamiento. 9087.
- PÚSTULAS. *V. Sifilides.*
- PÚSTULA MALIGNA. Poción. 6490.
- QUEMADURAS. Aguas. 116, 117, 126, 129, 190, 205, 236, 238, 239. Bálsamo. 420. Baño. 452. Cataplasma. 797. Ceratos. 898, 903, 928, 929, 936, 937, 938. Emplastos. 1795, 1843, 1875. Espadrapo. 2066. Fomentos. 2267, 2297, 2333. Inyección. 2820. Linimentos. 3783, 3784, 3838, 3839, 3847, 3871, 3872, 3873, 3896, 3967, 3987. Lociones. 4076, 4139. Pomadas. 7596, 7684, 7724, 7741,

- 7834, 7835, 7991, 8042, 8045, 8046, 8079. Pulpa. 8196. Tintura. 8655. Tratamiento. 9104. Ungüentos. 9164, 9165, 9190, 9191, 9196, 9201, 9213, 9223, 9307, 9309, 9327.
- QUEMADURAS DE LOS NIÑOS. Emplasto. 1734. Tratamiento. 9105.
- QUERATITIS. Colirios. 1117, 1122, 1139, 1157, 1234, 1237, 1239, 1257, 1286, 1289, 1292, 1293. Pildoras. 5400, 5629. Pomadas. 7658, 8144, 8178. Tratamiento. 9106.
- RABIA. *V. Hidrofobia.*
- RAQUIALGIA. Guisante. 2605.
- RAQUITIS. Aceites. 14, 17, 34. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Alcoholato. 307. Bálsamos. 358, 377, 420, 427, 435. Baños. 442, 445, 448, 464, 472. Bebida. 485. Bolos. 543. Café. 696. Cataplasmas. 761, 762. Cerveza. 948. Cocimiento. 998. Electuario. 1606. Emplastos. 1738, 1739. Especies. 2085. Fomentos. 2270, 2272. Jarabes. 2941, 2942, 2943, 2992, 3019, 3050, 3193, 3268. Licor. 3702. Misturas. 4325, 4326, 4340, 4370, 4381, 4425, 4426, 4557. Pildoras. 5236, 5269, 5368, 5621, 5805, 5885, 5976, 6007, 6009, 6010, 6022, 6025. Pociones. 6067, 6068, 6069, 6155, 6198. Polvos. 6827, 6942, 7013, 7060, 7113, 7298, 7388, 7390, 7489, 7538. Pomadas. 7585, 7911. Tisanas. 8870, 8974. Ungüentos. 9168, 9276. Vinos. 9414, 9423, 9431, 9432, 9433, 9434, 9436, 9479, 9501, 9539. *V. Escrófulas.*
- RATONES (*modo de destruirlos*). Pastas. 3733, 4775, 4784. Polvo. 7235.
- REABSORCION PURULENTE. Bolo. 680. Cataplasma. 762. Electuarios. 1487, 1545. Pildoras. 5297. *V. Supuracion.*
- REBLANDECIMIENTO DE LAS ENCÍAS. Gargarismos. 2406, 2409. Jarabes. 2982, 3110. Lavatorio. 3633. Polvo. 7157. Tabletas. 4913, 4960. *V. Escorbuto.*
- REBLANDECIMIENTO GELATINIFORME DEL ESTÓMAGO. *V. Gastritis crónica.*
- RELAJACION. Agua. 80. Bálsamo. 414. Embrocacion. 1711. Emplasto. 1875. *V. Contusiones.*
- RELAJACION DE LAS ARTICULACIONES. Emplasto. 1875. Fomento. 2281. Locion. 4132.
- RELAJACION DE LA CAMPANILLA. Gargarismos. 2395, 2437, 2533. Solucion. 8485.
- RETARDO DE LAS REGLAS. *V. Amenorrea.*
- RETENCION DE ORINA. *V. Iscuria.*
- RETINITIS. Colirios. 1152, 1157, 1234, 1241, 1276, 1284. Tratamiento. 9096.
- RETRACCION DE LOS MIEMBROS. *V. Contracturas.*
- REUMATISMO. Aceites. 3, 9, 14, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 38, 43, 52. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 128, 142, 221, 222, 229, 241, 255. Aguardientes. 73, 74. Alcoholatos. 267, 269, 274, 286, 287, 297, 304, 307, 310, 311. Apocemas. 320, 335, 350, 351. Bálsamos. 26, 374, 399, 408, 414, 415, 417, 427, 434, 435. Baños. 439, 440, 443, 448, 456, 457, 459, 461, 462, 465, 469, 470, 473, 475. Bebida. 507. Bolos. 538, 556, 560, 574, 601, 603, 609, 677. Cataplasmas. 747, 748, 750, 751, 752, 754, 772, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 801, 814, 815, 817, 819, 836, 854. Cerato. 876. Cocimientos. 1051, 1052, 1053, 1060, 1063, 1070, 1100, 1106, 1107, 1113, 1114. Chorros. 1425, 1426, 1427. Electuarios. 1450, 1524. Elíxires. 1629, 1693. Embrocacion. 1721. Emplastos. 1738, 1739, 1747, 1757, 1759, 1760, 1761, 1773, 1808, 1810, 1827, 1842, 1843, 1844, 1845, 1858, 1864, 1868. Emulsiones. 1949,

- 1992, 1996. Espadrapo. 2070. Especies. 2100, 2115, 2116, 2117, 2120, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137. Espíritu. 2165. Eter. 2189. Extractos. 2219, 2245. Flores. 2098. Fomento. 2309. Fumigaciones. 2376, 2381. Gotas. 2546, 2547, 2552. Infusion. 2651. Inyeccion. 2672. Jabones. 2852, 2854, 2855, 2867. Jarabes. 3099, 3100, 3103, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3167, 3168, 3349, 3350, 3351. Julepes. 3389, 3401. Láudanos. 3446, 3449. Licores. 3664, 3666. Limonada. 3748. Linimentos. 3774, 3778, 3780, 3783, 3784, 3786, 3787, 3791, 3792, 3794, 3799, 3800, 3803, 3807, 3809, 3815, 3831, 3832, 3833, 3850, 3854, 3855, 3874, 3899, 3900, 3905, 3907, 3908, 3912, 3931, 3932, 3935, 3936, 3937, 3939, 3941, 3943, 3944, 3945, 3958, 3959, 3968, 3971, 3976, 3986, 3987, 3994, 3996, 3997, 3999, 4006, 4009, 4010, 4012, 4013, 4014, 4017, 4018, 4019, 4020, 4026, 4027. Lociones. 4152, 4155. Loocs. 4185, 4186. Misturas. 4352, 4400, 4440, 4463, 4533, 4547, 4604, 4620. Moscas. 9348, 9349. Ojimieles. 4648, 4651, 4652. Opiata. 4703. Papeles. 4725, 4726. Pielas. 5007. Píldoras. 5034, 5035, 5173, 5220, 5221, 5222, 5238, 5239, 5240, 5241, 5347, 5358, 5395, 5400, 5440, 5523, 5524, 5529, 5533, 5539, 5629, 5636, 5640, 5644, 5658, 5689, 5775, 5787, 5874, 5880, 5900, 5932, 5982, 5988, 6026. Pociones. 6177, 6194, 6199, 6329, 6373, 6456, 6492, 6534, 6574, 6575, 6577, 6622, 6718, 6719, 6720, 6721, 6724, 6725, 6744. Polvos. 6783, 6799, 6819, 6925, 6926, 6927, 6928, 7176, 7177, 7178, 7202, 7203, 7242, 7303, 7304, 7305, 7333, 7369, 7409, 7461, 7504. Pomadas. 7604, 7628, 7651, 7693, 7709, 7715, 7756, 7874, 7894, 7896, 7897, 7898, 7902, 7903, 7904, 7905, 7913, 7996, 8033, 8116. Sinapismo. 8358. Soluciones. 8382, 8406, 8414, 8479, 8515, 8517. Tablet. 4820. Tafetan. 4739. Té. 8584. Tinturas. 8601, 8602, 8625, 8628, 8638, 8639, 8667, 8668, 8686, 8701, 8732, 8736, 8741, 8745, 8756, 8757, 8800, 8806, 8828, 8843. Tisanas. 8845, 8887, 8916, 8919, 8974, 8985, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9007, 9011, 9019, 9022, 9025, 9026, 9028. Tópico. 9039. Ungüentos. 9247, 9276, 9289, 9316, 9317. Vejigatorio. 9345. Vinagres. 9388, 9389. Vinos. 9429, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9460, 9461, 9501.
- REUMATISMO CRÓNICO. Aceites. 20, 32, Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas. 88, 231. Aguardiente. 72. Alcohol. 268. Bálsamos. 360, 361, 368, 369, 427, 431. Baños. 449, 466, 474. Bolos. 574, 592, 602. Cataplasmas. 753, 833. Cocimientos. 993, 1064, 1115. Elixir. 1642. Embrocaciones. 1717, 1722. Emplastos. 1866, 1867, 1895. Esencias. 2045, 2047, 2048. Especies. 2086, 2087, 2088. Eteres. 2177, 2195. Friccion. 2357. Fumigacion. 2365. Gotas. 2570. Infusion. 2685. Jarabes. 3306, 3307, 3308. Linimentos. 3771, 3772, 3788, 3789, 3796, 3797, 3806, 3808, 3853, 3917, 3918, 3924, 3926, 3927, 3938, 3956, 3969, 3989. Locion. 4136. Misturas. 4348, 4393, 4453. Papel. 4724. Píldoras. 5037, 5052, 5053, 5081, 5082, 5237, 5529, 5530, 5531, 5540, 5609, 5635, 6032, 6056, 6061. Pociones. 6319, 6721. Polvos. 6936, 7008, 7202, 7203, 7507. Pomadas. 7602, 7753, 7922, 8129, 8172, 9275. Saquito. 8343. Solucion. 8513. Tinturas. 8622, 8626, 8669, 8735, 8739, 8740, 8758. Tisanas. 8885, 8917, 8957, 8959, 9009, 9023, 9024. Ungüento. 9274. Vinos. 9456, 9457, 9472, 9533, 9542.

- REUMA DEL CEREBRO. *V. Coriza.*
- REVULSIVOS. Emplastos. 1886, 1887. Fomento. 2339. Pasta. 4797.
- RIGIDEZ DE LAS ARTICULACIONES. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Ungüentos. 9292, 9293.
- RIGIDEZ ESPASMÓDICA DE LA MATRIZ. *V. Contraccion espasmódica de la matriz.*
- RIGIDEZ ESPASMÓDICA DE LA URETRA. *V. Contraccion espasmódica de la uretra.*
- RISA CONVULSIVA. Polvo. 7114. *V. Neuroses.*
- ROMADIZO. *V. Coriza.*
- RONQUERA. Bolos. 677. Eter. 2182. Gargarismos. 2396, 2429, 2471, 2478, 2480, 2483, 2500, 2535. Jabon. 2855. Jalea. 2892. Jarabes. 3020, 3048, 3083, 3174, 3215, 3276. Julepes. 3381, 3382, 3386, 3387. Linimentos. 3771, 3772, 3993. Loocs. 4160, 4166, 4177, 4178, 4194, 4197, 4203. Mistura. 4455. Opiata. 4676. Pastillas. 4888. Pediluvios. 4990, 4991. Pociones. 6262, 6312, 6595. Polvos. 6832, 6994, 6999, 7272, 7273. Sinapismo. 8354. *V. Asonia.*
- RUBICUNDEZ DE LOS PÁRPADOS. Colirios. 1252, 1253, 1261. *V. Oftalmia.*
- RUIDO DE OIDOS. *V. Paracusia.*
- RUPIA. Pomadas. 7973, 8007, 8025. Soluciones. 8451, 8452. *V. Herpes.*
- SABAÑONES. Agua. 206. Aguardiente. 72. Alcohol. 267. Alcoholato. 307. Bálsamos. 380, 381, 382, 383, 384, 388, 399, 424. Cataplasmas. 747, 750, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 817, 836. Ceratos. 883, 893, 894, 906, 914, 927. Emplastos. 1756, 1759. Fomentos. 2269, 2280, 2293, 2298, 2331. Jabones. 2865, 2877. Linimentos. 3783, 3784, 3786, 3823, 3845, 3847, 3875, 3876, 3877, 3879, 3880, 3881, 3882, 3887, 3929, 3933, 3955, 3990, 3996, 3998, 4007. Lociones. 4089, 4090, 4102, 4103, 4140. Mistura. 4490. Pasta. 4766. Polvos. 7115, 7500. Pomadas. 7596, 7637, 7693, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7889, 7920, 8007, 8025, 8031, 8032, 8098, 8099, 8100, 8101, 8127, 8136. Remedio. 8275. Tinturas. 8611, 8755, 8807, 8839. Tópicos. 9055, 9056, 9057. Ungüentos. 9168, 9214, 9215, 9292, 9293, 9307.
- SABAÑONES ULCERADOS. Cerato. 883. Emplasto. 1696. Friccion. 2355. Linimento. 3878. Locion. 4088. Pomadas. 7841, 7842, 8135. Tópicos. 9058.
- SALIVACION. *V. Tialismo.*
- SALIVACION MERCURIAL. *V. Tialismo mercurial.*
- SARAMPION. Electuarios. 1607, 1608, 1609, 1610, 1611. Emulsiones. 1963, 1965. Jarabe. 3179. Julepes. 3409, 3420, 3421, 3422, 3423. Locion. 4142. Loocs. 4160, 4204, 4205. Pediluvios. 4982, 4987, 4988, 4990, 4991. Pociones. 6084, 6170, 6273, 6274, 6280, 6286, 6721. Polvos. 6791, 7368. Sinapismo. 8354. Tabletetas. 4825, 4876, 4912, 4914. Trociscos. 9161.
- SARCOCELE. Baños. 440, 461, 470. Emplastos. 1760, 1792. Inyecciones. 2775, 2781. Linimentos. 3853, 3932. Locion. 4068. Pomadas. 7934, 7957, 7967, 7973.
- SARNA. Aceites. 3, 14, 22. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 90, 129, 150, 178, 186, 200, 205. Alcohol. 268. Apocemas. 322, 323, 336. Bálsamos. 370, 425. Baños. 440, 446, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470. Bolos. 542, 556, 572, 604. Ceratos. 834, 866, 935. Cocimientos. 994, 1054. Electuarios. 1450, 1480, 1589. Etiopes. 2197, 2198. Fumigacion. 2385. Inyeccion. 2702. Jabones. 2859, 2863, 2881. Jarabe. 3111. Linimentos. 3781, 3787, 3795, 3812, 3813, 3858, 3859, 3940, 4016. Lociones. 4035, 4039, 4047, 4048, 4049, 4050,

- 4051, 4052, 4057, 4059, 4060, 4079, 4091, 4092, 4093, 4094, 4111, 4115, 4116, 4120, 4123, 4125, 4131, 4132, 4143, 4148, 4149, 4151. Mezcla. 4283. Pasta. 4766. Piedra. 5004. Píldoras. 5038, 5133, 5191, 5539. Polvos. 6860, 6861, 6862, 6863, 6864. Pomadas. 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7688, 7709, 7710, 7711, 7712, 7714, 7742, 7743, 7744, 7757, 7760, 7768, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7871, 7879, 7892, 7925, 7945, 7963, 7964, 7993, 8002, 8003, 8008, 8035, 8041, 8090, 8091, 8109, 8128, 8146, 8147, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8159, 8176, 8179. Soluciones. 8378, 8390, 8478, 8503. Tabletas. 4824, 4826. Tisana. 8856. Tratamientos. 9083, 9094, 9108, 9109, 9110. Ungüentos. 9169, 9174, 9184, 9185, 9186, 9187, 9203, 9204, 9205, 9212, 9216, 9217, 9218, 9229, 9233, 9234, 9235, 9247, 9257, 9266, 9287, 9313, 9316, 9328. Zumo. 9561.
- SATIRIASIS. Emulsion. 1918. Opiata. 4689.
- SED. V. *Polidipsia*.
- SICOSIS. Jarabe. 2967. Pomadas. 7589, 7767.
- SIDRACIA. Baño. 469.
- SIFILIDES. Agua. 245. Apocemas. 323, 328, 336. Baños. 440, 466, 467. Bolos. 623. Ceratos. 911, 933. Chocolate. 1398. Elixires. 1625, 1680. Emplastos. 1782, 1849, 1850. Fumigacion. 2371. Infusion. 2622. Jarabes. 2954, 2963, 2982, 3013, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3116, 3194, 3195, 3196, 3198, 3200, 3237, 3272, 3275, 3335. Licores. 3711, 3723, 3724. Limonada. 3749. Linimento. 3837. Lociones. 4111, 4116, 4143. Píldoras. 5036, 5065, 5220, 5364, 5366, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5427, 5510, 5609, 5634, 5730, 5732, 5734, 5739, 5740, 5746, 5754, 5756, 5765, 5768, 5772, 5774, 5775, 5816, 5821, 5822, 5823, 5824, 5831, 5832, 5843, 5860, 5880, 5903, 5909, 6036. Pociones. 6224, 6267, 6486, 6574, 6575, 6718, 6719, 6720, 6721. Polvos. 6937, 7047, 7049. Pomadas. 7640, 7704, 7716, 7746, 7757, 7773, 7774, 7775, 7851, 7957, 7961, 7963, 7964, 7966, 7967, 7973, 8007, 8025, 8080, 8082, 8084, 8085, 8114, 8127, 8135. Soluciones. 8387, 8390, 8412, 8434, 8449, 8467, 8468, 8481, 8510. Sueros. 8519, 8520, 8521, 8522, 8524, 8525. Tinturas. 8615, 8675. Tisanas. 8867, 8868, 8948, 8957, 8964, 8990, 8996, 8999, 9009, 9011. Ungüentos. 9168, 9269, 9270, 9272.
- SIFILIS. Acido. 66. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 95, 96, 183, 200, 218, 231, 241. Apocemas. 328, 333, 336, 337, 351. Baños. 462, 466. Bebida. 508. Bizcochos. 531. Bolos. 579, 580, 595, 601, 603, 651. Cerato. 933. Cerveza. 956. Cocimientos. 1009, 1044, 1045, 1051, 1052, 1053, 1063, 1064, 1066, 1071, 1080, 1088, 1107, 1112, 1113, 1114. Colutorio. 1309. Confites. 1364. Electuarios. 1549, 1589, 1596. Elixires. 1624, 1625, 1637, 1648, 1666, 1672, 1680. Esencias. 2033, 2035, 2048. Especies. 2100, 2131, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137. Eteres. 2185, 2187, 2192. Extractos. 2219, 2245, 2246, 2247, 2248. Fumigaciones. 2363, 2364, 2380. Gotas. 2556. Inyecciones. 2766, 2808. Jabones. 2872, 2876. Jarabes. 2949, 2960, 2961, 2993, 2994, 2995, 2996, 3013, 3051, 3070, 3071, 3083, 3099, 3100, 3103, 3105, 3106, 3108, 3112, 3145, 3170, 3192, 3194, 3195, 3198, 3199, 3200, 3201, 3234, 3235, 3236, 3237, 3249, 3272, 3286,

- 3307, 3308, 3309, 3335, 3346, 3349, 3350, 3352, 3353. Lavativa. 3497. Licores. 3678, 3679, 3701, 3711, 3716, 3723, 3724. Linimento. 3795. Locion. 4079. Macerado. 4225. Mezclas. 4257, 4290. Misturas. 4331, 4348, 4392, 4393, 4404, 4549, 4555. Pastillas. 4842, 4843, 4851, 4873, 4890, 4894, 4896, 4929, 4930, 4931, 4933. Píldoras. 5016, 5035, 5038, 5198, 5245, 5246, 5248, 5249, 5256, 5257, 5260, 5303, 5324, 5336, 5366, 5389, 5391, 5392, 5393, 5394, 5412, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5425, 5427, 5509, 5518, 5530, 5531, 5634, 5641, 5676, 5706, 5709, 5719, 5731, 5733, 5735, 5736, 5737, 5738, 5741, 5742, 5744, 5745, 5756, 5761, 5768, 5770, 5791, 5811, 5814, 5815, 5818, 5819, 5820, 5822, 5825, 5826, 5827, 5830, 5831, 5833, 5834, 5835, 5838, 5839, 5840, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5860, 5883, 5886, 5899, 5901, 5903, 5904, 5938, 5953, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5973, 6022, 6034, 6054, 6057. Pociones. 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6319, 6323, 6393, 6422, 6432, 6571, 6572, 6573, 6574, 6718, 6719, 6720, 6721. Polvos. 6928, 6932, 7006, 7042, 7043, 7044, 7045, 7049, 7202, 7329, 7357, 7358, 7372, 7395, 7400, 7439, 7443. Pomadas. 7596, 7640, 7715, 7746, 7749, 7757, 7758, 7760, 7769, 7773, 7774, 7775, 7788, 7886, 7934, 7957, 7962, 7963, 7964, 7967, 7973, 7977, 7978, 8006, 8008, 8009, 8022, 8023, 8025, 8030, 8083, 8091, 8104, 8114, 8127, 8164. Robs. 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8289. Sacarolado. 8325. Soluciones. 8387, 8389, 8390, 8401, 8412, 8413, 8468, 8469, 8477, 8509, 8517. Tabletas. 4946. Tinturas. 8631, 8640, 8675, 8724, 8743, 8748, 8751, 8753, 8754, 8843. Tisanas. 8860, 8867, 8868, 8887, 8891, 8916, 8947, 8948, 8957, 8960, 8963, 8965, 8990, 8996, 8999, 9001, 9002, 9003, 9006, 9007, 9009, 9010, 9011, 9020, 9023, 9025, 9026, 9027, 9028. Tratamientos. 9111, 9112, 9113, 9115, 9116, 9117. Ungüentos. 9256, 9257, 9259, 9260, 9261, 9263, 9264, 9266, 9267, 9270. Vinos. 9402, 9403, 9404, 9422, 9533, 9542.
- SIFILIS CONSTITUCIONAL. Apocema. 337. Cocimiento. 1115. Chocolate. 1398. Elixir. 1650. Esencia. 2047. Fumigacion. 2371. Inyeccion. 2774. Jarabe. 2983, 2985, 3019, 3069, 3104, 3105, 3107, 3109, 3116, 3141, 3190, 3193, 3306, 3351, 3352, 3354. Licores. 3677, 3702. Mezcla. 4269. Mistura. 4402. Opiata. 4703. Píldoras. 5038, 5191, 5196, 5244, 5247, 5364, 5423, 5424, 5426, 5564, 5727, 5740, 5765, 5772, 5823, 5824, 5832, 5861, 6032, 6322. Polvos. 6950, 7046, 7977. Robs. 8288. Soluciones. 8451, 8452, 8467, 8474. Tintura. 8642. Tisanas. 8869, 8885, 8932, 8949, 8964, 8972, 9005, 9008, 9019.
- SIFILIS DE LOS NIÑOS. Mistura. 4565. Polvo. 7402. Tratamiento. 9114.
- SÍNCOPE, DESFALLECIMIENTO. Aguas. 92, 190. Alcoholato. 304. Bálsamo. 377. Elixir. 1623. Lavativas. 3596, 3599, 3600. Misturas. 4534, 4538. Pociones. 6163, 6164, 6165, 6166, 6168, 6169, 6170, 6293, 6425, 6519, 6595. Polvos. 6819, 7257, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263. Sinapismo. 8354. Tintura. 8626, 8627. Vinagres. 9350, 9351, 9352, 9353, 9355, 9357, 9358, 9359, 9360, 9363, 9373, 9374, 9392, 9395. Vino. 9535.
- SOFOCACION. Eter. 2182. Poción. 6682. Sinapismos. 8359, 8360, 8361, 8362. *V. Histerismo y neurosis.*

SOITIS. Cataplasma. 794. Lavativa. 3554.

SOÑOLENCIA. Alcohol. 272. Eteres. 2183, 2191.

SORDERA. Aceites. 11, 15, 26. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Bálsamos. 365, 367. Emplasto. 1757. Gargarismos. 2396, 2434, 2441. Gotas. 2542. Inyecciones. 2738, 2739, 2784. Píldoras. 5511. Polvos. 6819, 7257, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263. Solucion. 8381. Tinturas. 8601, 8602, 8745. Vahos. 9331.

SORDERA CATARRAL. Bálsamo. 362. Gargarismo. 2497. Pastillas. 4879.

SORDERA ACCIDENTAL. Bálsamo. 364, 366. Inyecciones. 2695, 2843. Tratamiento. 9118.

SORIASIS. Acido. 66. Baños. 453, 466, 467. Inyeccion. 2760. Licor. 3680. Linimentos. 3796, 3797. Locion. 4133. Misturas. 4491, 4492, 4552. Pastillas. 4873. Píldoras. 5021, 5051, 5260, 5261, 5262, 5279, 5290, 5364, 5366, 5369, 5377, 5422, 5767, 5936, 5989, 6059. Polvos. 6863, 6864, 7226, 7525. Pomadas. 7575, 7602, 7651, 7688, 7709, 7710, 7713, 7758, 7811, 7852, 7853, 7894, 7896, 7897, 7898, 7931, 7932, 7953, 7957, 7963, 7964, 7967, 7973, 8007, 8025, 8035, 8040, 8114, 8153. Soluciones. 8388, 8451, 8452, 8508. Tinturas. 8667, 8668. Tisanas 2635, 8975, 8976. Tópico. 9050. Ungüento. 9298.

SEROFTALMIA. V. *Oftalmia herpética*.

SUDOR INGLÉS. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5406, 5658, 5755, 5766, 5880, 5930, 5933, 5934, 5982. Pociones. 6166, 6170, 6200, 6201, 6202, 6239, 6534, 6595, 6724, 6725. Sinapismo. 8354.

SUDOR DE LOS PIÉS (*Supresion del*). Pediluvios. 4982, 4985. Saquito. 8352.

SUDORES DE LOS TÍSICOS. Acido. 70. Agua. 228. Bebida. 520. Lava-

tiva. 3538. Píldoras. 5017, 5018, 5019, 5186, 5250, 5512, 5559, 5995. Polvos. 6788, 6935, 7502. Tintura. 8641. V. *Tisis*.

SUPRESION DE ORINA. Bolos. 611. Fomentos. 2301, 2302.

SUPRESION DE LAS REGLAS. V. *Amenorrea*.

SUPRESION DE LA TRASPIRACION. Elíxir. 1699. Infusion. 2645. Poción. 6720. Polvo. 6815. Tintura. 8732. Tisanas. 8888, 8914, 8915, 8918. Vinos. 9427, 9428, 9528.

SUPURACION. V. *Reabsorcion purulenta*.

TABES MESENTÉRICA. V. *Atrofia mesentérica*.

TARTAMUDEZ. Se ordenará al enfermo que hable ritmicamente, que retire la lengua hácia la faringe y eleve la punta de este órgano hácia la campanilla, que separe los labios trasversalmente de modo que se alejen las comisuras como si quisiese reir, y hará preceder á cada frase una profunda inspiracion (Colombat).

TELANGIECTASIA. Grageas. 2585, 2587. Inyecciones. 2760, 2781, 2820, 2836. Locion. 4062. Polvo. 7470. Solucion. 8486.

TEMBLOR NERVIOSO. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Baños. 461, 470, 474. Píldoras. 5867, 5868. Pociones. 6273, 6274. Ungüento. 9255. V. *Convulsiones*.

TENESMO. Cocimiento. 1025. Lavativas. 3506, 3617. Mistura. 4361. Pomadas. 7715, 7722, 8033, 8079.

TÉNIA. Aceites. 8, 31, 55. Apocema. 357. Bolos. 622, 688, 690, 693. Cocimiento. 1062. Electuarios. 1471, 1472, 1543, 1544, 1614. Elíxir. 1641. Emulsiones. 1913, 1976, 1994. Gotas. 2577. Jarabe. 3093. Lavativa. 3491. Misturas. 4383, 4627. Píldoras. 5012, 5181, 5183, 5184, 5513, 5524, 5929, 6001, 6002, 6046, 6049. Pociones. 6181, 6374, 6375, 6376, 6745, 6756. Polvos. 6901, 6902,

- 7119, 7330, 7524, 7526, 7527, 7529, 7558, 7561, 7565. Remedios. 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8266, 8267, 8274. Sacaruro. 8333. Tópico. 9068. Tratamientos. 9119, 9120, 9121, 9122.
- TERIGION. Colirios. 1139, 1227, 1229, 1283, 1289. Polvos. 7441, 7442.
- TÉTANOS. Cataplasmas. 751, 761, 772, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836, 854. Cerato. 914. Emplastos. 1738, 1739. Emulsion. 1929. Extracto. 2245. Julepes. 3369, 3406, 3420, 3421, 3422, 3423. Lavativas. 3453, 3474, 3596, 3599, 3613, 3619. Linimentos. 3785, 3796, 3797, 3909, 3912, 3919, 3927, 3932. Looc. 4203. Misturas. 4534, 4567, 4568. Píldoras. 5065, 5081, 5220, 5251, 5270, 5686, 5775, 5933. Pociones. 4371, 6129, 6166, 6170, 6202, 6211, 6212, 6213, 6273, 6274, 6284, 6286, 6293, 6298, 6494, 6595, 6613, 6638, 6715, 6716, 6717, 6718, 6721, 6770. Polvos. 6868. Pomadas. 7651, 7746, 8007, 8177. Tinturas. 8606, 8643, 8646, 8666, 8685, 8714, 8740.
- TIALISMO. Baño. 474. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 836. Colutorios. 1305, 1319, 1321, 1322, 1329, 1343, 1345. Fumigacion. 2365. Gargarismos. 2445, 2460, 2461, 2480, 2483, 2500, 2512, 2514, 2538. Linimentos. 3783, 3784, 3798, 3987. Misturas. 4458. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5710. Poción. 6538. Polvos. 6773, 6774, 6807, 7177, 7386, 7397, 7459, 7528. Remedios. 8263, 8264. Sinapismo. 8354.
- TIALISMO MERCURIAL. Baño. 455. Bebida. 516. Bolos. 590. Colutorios. 1300, 1304, 1306, 1307, 1314, 1320, 1323, 1333, 1345. Gargarismos. 2388, 2397, 2430, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2441, 2452, 2465, 2515, 2527, 3537. Misturas. 4458, 4553. Píldoras. 5710, 5961, 5992. Pociones. 6253, 6478, 6538. Polvos. 6805, 7116, 7522. Tintura. 8631.
- TIFO y calentura tifoidea. Acido. 67. Aguas. 134, 7509. Apocema. 353. Baño. 457. Bebidas. 500, 513. Bolos. 548, 571, 601, 659, 684. Café. 696. Cataplasmas. 761, 762, 772, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Cerveza. 945. Cocimientos. 1000, 1001, 1002, 1006, 1007, 1019, 1020, 1093, 1094, 1095, 1096, 1099, 1104. Electuarios. 1500, 1583, 1597, 1598. Elixir. 1692. Emulsiones. 1899, 1956. Epitema. 2079. Eteres. 2190, 2191. Fumigacion. 2372. Gotas. 2571, 2573. Granos. 2592. Infusion. 2663. Julepe. 3375. Lavativas. 3462, 3493, 3495, 3534, 3549, 3550, 3551, 3554, 3596, 3600, 3604, 3609, 3627. Limonadas. 3726, 3733, 3748, 3749, 3760, 3770. Linimentos. 3783, 3784. Misturas. 4331, 4392, 4417, 4534, 4568, 4599, 4625. Píldoras. 5160. Pociones. 6063, 6093, 6097, 6100, 6102, 6157, 6166, 6170, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6267, 6313, 6316, 6317, 6383, 6400, 6422, 6461, 6468, 6469, 6470, 6475, 6476, 6501, 6502, 6504, 6505, 6506, 6509, 6511, 6517, 6535, 6536, 6537, 6616, 6618, 6665, 6684, 6727, 6728, 6733, 6734, 6769. Polvos. 6810, 6853, 6930, 6938, 6940, 6942, 6991, 7045, 7390, 7460, 7461, 7496. Ponche. 8184. Saquito. 8344. Sinapismos. 8359, 8360, 8361, 8362. Solucion. 8386. Tinturas. 8606, 8612, 8721, 8722, 8723. Tisanas. 8903, 8904, 8944, 8977. Troiscos. 9161. Vinagres. 9355, 9384, 9395. Vino. 9414. Zumo. 9549.
- TIMPANITIS. Confeccion. 1488. Fomento. 2299. Linimentos. 3792, 4025. Píldoras. 5381, 5598. Polvo. 7095.

TINTAS. Tintas. 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136.

TIÑA. Aceites. 42, 46. Agua. 186. Bálsamo. 405. Baños. 440, 459, 461, 465, 470. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 836, 854. Cocimientos. 1054, 1065. Especies. 2104. Fomento. 2341. Infusion. 2651. Licor. 3702. Linimentos. 3795, 3841, 3858, 3859, 3883, 3884, 4028. Lociones. 4035, 4048, 4052, 4070, 4076, 4079, 4095, 4096, 4116, 4131. Mezcla. 4259. Misturas. 4522. Pastas. 4768, 4769, 4770, 4771. Piedra. 5004. Píldoras. 5564, 5642. Polvos. 6863, 6937, 7045, 7047, 7226, 7342. Pomadas. 7593, 7599, 7621, 7637, 7640, 7674, 7690, 7701, 7702, 7709, 7713, 7715, 7732, 7734, 7760, 7769, 7799, 7804, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7868, 7880, 7892, 7927, 7937, 7938, 7939, 7940, 7942, 7943, 7944, 7963, 7964, 7994, 8002, 8035, 8103, 8107, 8149, 8150, 8159, 8183. Remedios. 8265, 8268. Soluciones. 8400, 8420, 8515. Tintura. 8767. Tisana. 8940. Tópicos. 9059, 9060. Tratamiento. 9123. Ungüentos. 9173, 9193, 9205, 9219, 9220, 9221, 9298.

TIÑA DE LOS NIÑOS. Jarabe. 3326. Loción. 4054. Solución. 8394.

TIRIASIS. Baño. 466. Jabon 2881. Pomadas. 7640, 7685. Solución. 8371.

TISIS PULMONAR. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 115, 147, 157, 167, 168, 180, 183, 197, 231, 256. Bálsamo. 400. Bebidas. 485, 499, 514. Bolos. 543, 613, 656. Caldos. 707, 709, 715, 716, 719. Cáusticos. 861. Cigarros. 972, 973, 974, 976, 977, 980. Cocimientos. 995, 1034, 1074, 1075, 1085, 1111. Cremas. 1389, 1390, 1391, 1394. Chocolates. 1404, 1405, 1407, 1409, 1410, 1413, 1415. Electuarios.

1512, 1571. Emplasto. 1810. Emulsiones. 1897, 1903, 1905, 1981, 1997. Esencia. 2028, 2044. Especies. 2123. Ferculum. 2251. Fumigaciones. 2365, 2367, 2368, 2369, 2381, 2383, 2384. Gelatinas. 2890, 2891, 2899, 2920. Infusion. 2660. Inhalaciones. 2617, 2686. Jabon. 2851. Jaleas. 2908, 2909, 2911, 2912, 2913, 2914, 2921, 2922, 2925. Jarabes. 2910, 2954, 2955, 2974, 2985, 3004, 3006, 3007, 3008, 3011, 3012, 3021, 3035, 3036, 3037, 3132, 3133, 3135, 3136, 3137, 3156, 3172, 3174, 3186, 3187, 3188, 3189, 3209, 3214, 3242, 3254, 3256, 3258, 3259, 3260, 3264, 3265, 3266, 3267, 3276, 3297, 3327, 3347. Julepes. 3409, 3410, 3423. Lavativas. 3504, 3566, 3567. Leche. 3642. Licores. 3672, 3702. Linimentos. 3998, 4005. Looc. 4208. Mezclas. 4287, 4289. Misturas. 4325, 4326, 4340, 4381, 4425, 4426, 4493, 4557, 4569, 4586, 4612. Mucilago. 4638. Pastas. 4761, 4774, 4776, 4779, 4780, 4781, 4785, 4786, 4792, 4793. Pastillas. 4835, 4881, 4884, 4885, 4889, 4890, 4951. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5034, 5038, 5042, 5043, 5051, 5052, 5053, 5253, 5254, 5269, 5270, 5310, 5313, 5317, 5318, 5319, 5328, 5340, 5350, 5352, 5359, 5379, 5388, 5395, 5400, 5403, 5407, 5408, 5521, 5541, 5564, 5582, 5608, 5629, 5636, 5640, 5658, 5682, 5705, 5727, 5752, 5880, 5935, 5957, 5958, 5982, 6015. Pociones. 6082, 6107, 6155, 6214, 6258, 6273, 6274, 6286, 6287, 6309, 6310, 6486, 6491, 6535, 6536, 6537, 6539, 6564, 6568, 6595, 6632, 6633, 6634, 6639. Polvos. 6930, 6933, 6934, 6971, 6983, 6994, 6995, 6997, 6999, 7202, 7203, 7241, 7309, 7336, 7368. Pomadas. 7651, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898. Remedios. 8269, 8270. Sacarolados.

- 8303, 8304, 8305. Soluciones. 8464, 8465, 8466, 8496. Suero. 8542. Tabletas. 4816, 4828, 4838, 4850, 4865, 4907, 4908, 4909, 4920, 4936, 4952, 4953. Té. 8583. Tinturas. 8655, 8691, 8744. Tisanas. 8978, 8980. Vinagres. 9377, 9378. Vinos. 9447, 9503. Zumos. 9556, 9567.
- TISIS ESCROFULOSA. Cocimiento. 1010. Poción. 6539. *V. Tisis pulmonar.*
- TISIS LARINGEA. Gargarismos. 2400, 2473. Píldoras. 5521. Pomada. 8166. Solucion. 8370. Trociscos. 9150. *V. Tisis pulmonar.*
- TISIS NERVIOSA. Cocimiento. 1010. Elixir. 1706. *V. Tisis pulmonar.*
- TOFOS. *V. Tumores artríticos.*
- TORCEDURAS. Aguardiente. 72. Aguas. 80, 113, 236, 238. Bálsamos. 399, 414, 417. Baños. 440, 448, 459, 470. Bolas. 534. Cataplasmas. 747, 750, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 817, 836. Fomentos. 2269, 2284, 2311, 2331, 2332. Jabon. 2855. Linimentos. 3789, 3792, 3808, 3931, 3945. Lociones. 4029, 4062, 4066, 4129, 4132, 4139. Polvos. 6939, 6940. Tinturas. 8625, 8745. Tópico. 9040. Tratamiento. 9124. *V. Contusiones.*
- TORTICOLIS. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 817, 836, 854. Embrocacion. 1717. Emplastos. 1738, 1739. Fumigacion. 2381. Linimentos. 3783, 3784, 3789, 4026. Tintura. 8666.
- Tos. Bolos. 591. Cigarros. 971, 979. Electuarios. 1572. Embrocaciones. 1723. Fumigacion. 2370. Gargarismo. 2483. Gotas. 2563, 2567. Hidromel. 2611. Infusion. 2660. Jarabes. 2937, 2938, 2939, 2955, 2974, 3010, 3012, 3014, 3048, 3082, 3087, 3255, 3257, 3259, 3263, 3276, 3330, 3331. Julepes. 3381, 3382, 3396, 3408, 3410. Licor. 3672. Linimentos. 3776, 3798. Loocs. 4160, 4166, 4179, 4187, 4191, 4197. Mezcla. 4274. Pastas. 4753, 4776, 4795. Pastillas. 4855, 4884, 4885, 4899. Píldoras. 5056, 5067, 5313, 5594, 5961, 6005. Pociones. 6076, 6077, 6080, 6081, 6260, 6263, 6273, 6274, 6629, 6635, 6708, 6717. Polvos. 6835, 6836, 6997, 7202, 7203, 7403. Soluciones. 8366, 8496. Tabletas. 4829, 4907, 4908, 4909, 4916, 4920, 4952. Tintura. 8610. Trociscos. 9144, 9160. *V. Catarro pulmonar.*
- TOS CATARRAL. Electuario. 1442. Mezcla. 4288. Mistura. 4521. Píldoras. 5407, 5408, 5726. Polvo. 7272. *V. Bronquitis.*
- TOS CONVULSIVA. *V. Coqueluche.*
- TOS ESPASMÓDICA. Emplasto. 1805. Eter. 2182. Jarabes. 2960, 2961, 2981, 3011, 3020, 3030, 3079, 3083, 3084, 3210, 3268. Julepes. 3386, 3387. Looc. 4172. Misturas. 4409, 4612. Pastillas. 4830, 4856. Píldoras. 5585, 5749, 5972. Pociones. 6087, 6088, 6615, 6708. Polvos. 6981, 7069, 7073, 7272, 7506.
- TOS NERVIOSA. *V. Tos espasmódica.*
- TOSSES PERTINACES. *V. Bronquitis crónica, tos seca.*
- TOS SECA. Cremas. 1389, 1394. Especies. 2091. Jarabes. 3230, 3232. Píldoras. 5585, 5586, 5749. Poción. 6615. Polvos. 6934, 7506. *V. Bronquitis, tisis.*
- TOS SUFOCATIVA. Pociones. 6163, 6164, 6165, 6168, 6169. Polvo. 6987. *V. Coqueluche.*
- TOS DE LOS TÍSICOS. Poción. 6581. *V. Tisis y tos.*
- TRISMO DE LOS RECIEN NACIDOS. Esencia. 2029. Pociones. 6273, 6274, 6286, 6868. Tintura. 8619. *V. Tétanos.*
- TROMBO. *V. Tumores sanguíneos de cabeza en los niños.*
- TUBÉRCULOS DE LA PIEL. Fomento. 2294. Pomadas. 7963, 7964,

7977, 8113, 8122. Soluciones. 8449, 8463. *V. Herpes y Sifilis.*

TUMORES. Aceite. 14. Agua. 236. Aguardiente. 73. Alcoholato. 275. Baño. 449. Cataplasmas. 748, 767, 768, 775, 803, 809, 811, 829, 843, 844, 851. Cáustico. 856. Emplastos. 1725, 1726, 1728, 1729, 1759, 1769, 1772, 1802, 1803, 1804, 1805, 1828, 1829, 1833, 1834, 1839, 1840, 1843, 1856, 1860, 1865, 1878, 1882. Eter. 2177. Fomentos. 2328, 2332, 2337; 2338. Jabon. 2870. Liniamentos. 3839, 3905, 3938. Lociones. 4139, 4141. Píldoras. 5135. Pomadas. 7933, 7982, 8124. Saquito. 8350. Soluciones. 8474, 8503. Tópicos. 9053, 9069. Ungüentos. 9206, 9280, 9281. Vinagre. 9352. Vinos. 9431, 9432.

TUMORES ARTICULARES. *V. Tumores blancos articulares.*

TUMORES ARTRÍTICOS. Bálsamo. 405. Cataplasma. 774. Embrocacion. 1722. Emplasto. 1828. Etiopes. 2197, 2198. Jabon. 2862. Licor. 2154. Linimentos. 3819, 3855, 4009, 4010. Tinturas. 8651, 8745. *V. Gota.*

TUMORES BLANCOS ARTICULARES. Aceite. 32. Agua. 183. Bálsamos. 359, 369, 407. Baño. 441. Bolos. 543. Cataplasmas. 747, 750, 754, 774, 783, 800, 806, 829, 838. Chorros. 1427. Emplastos. 1730, 1760, 1761, 1833, 1836, 1874. Fomento. 2329. Fumigacion. 2366. Licor. 3702. Linimentos. 3787, 3928, 3936, 3965. Misturas. 4325, 4381, 4425, 4426, 4540, 4557. Píldoras. 5236, 5269, 5564, 5757, 5775, 5776, 5876. Poción. 6155. Polvos. 6866, 7060. Pomadas. 7625, 7696, 7967, 8011, 8024, 8047, 8121, 8123, 8127. Remedio. 8241. Soluciones. 8418, 8448. Tinturas. 8667, 8668. Tratamiento. 9125. Ungüento. 9227. Yerbas. 2110.

TUMORES CRÓNICOS. *V. Tumores indolentes.*

TUMORES ENQUISTADOS. *V. Lupias.*

TUMORES ESCIRROSOS. *V. Escirros.*

TUMORES ESCROFULOSOS. Cataplasmas. 774, 783, 793, 813. Emplastos. 1762, 1775. Fomentos. 2312, 2331. Linimento. 3992. Píldoras. 5403, 5501, 5756, 5768. Polvo. 7104. Pomadas. 7715, 7716, 7717, 7718, 7776, 7870, 7917, 7928, 7929, 7935, 7955, 7956, 7957, 7965, 7967, 7979, 7987, 8048, 8123, 8155. Solucion. 8503. Tabletas. 4816, 4820. Tintura. 8763. Ungüentos. 9209, 9249, 9250, 9298. *V. Escrófulas.*

TUMORES FRIOS. *V. Tumores indolentes, etc.*

TUMORES GLANDULOSOS. Bálsamo. 407. Baño. 460. Bolos. 543, 650. Cataplasmas. 773, 783, 800, 839. Cervezas. 944, 947. Electuarios. 1463, 1576. Emplastos. 1793, 1821, 1823. Etiope. 2198. Infusion. 2648. Jalea. 2901. Jarabes. 3019, 3183, 3193. Licores. 3702, 3713. Linimentos. 3804, 3930, 3979, 3988. Lociones. 4037, 4141, 4145. Misturas. 4325, 4381, 4425, 4426, 4557. Píldoras. 5194, 5269, 5503, 5553, 5564, 5629, 5630, 5688, 5735, 5833, 5926, 5942. Poción. 6155. Polvo. 7309. Pomadas. 7817, 7946, 7947, 7957, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 8011, 8024, 8125. Remedio. 8242. Soluciones. 8424, 8515. Tisanas. 8957, 8964. Ungüento. 9299.

TUMORES GLANDULOSOS DEL CUELLO. *V. Escrófulas.*

TUMORES DEL PECHO. Cataplasmas. 774, 777, 779, 822. Emplastos. 1760, 1807, 1819, 1820, 1823. Fomentos. 2313, 2324, 2326, 2327, 2330. Infusion. 2660. Liniamentos. 3787, 3788, 3996. Loción. 4037. Píldoras. 5217, 5218. Pomadas. 7716, 7724, 7762, 7763, 7928, 7929, 7951, 7955, 7991, 8126. Saquito. 8351. Soluciones.

8441, 8496, 8504. Tratamiento. 9126. Ungüento. 9173.

TUMORES HEMORROIDALES. V. *Hemorroides*.

TUMORES INDOLENTES. Aceite. 54. Bálsamos. 432, 434. Baño. 464. Cataplasmas. 770, 825, 826. Digestivo. 1440. Embrocacion. 1722. Emplastos. 1773, 1819, 1862, 1863, 1873. Espadrapos. 2074, 2075. Especies. 2117. Lini-mentos. 3901, 3936, 3980. Lo-cion. 4121. Polvo. 6940. Pomadas. 7948, 7949, 7950, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985. Remedio. 8242. Solucion. 8503. Tabletas. 4816. Tinturas. 8667, 8668. Ungüentos. 9188, 9194, 9247, 9249, 9250. Vino. 9433. V. *Tumores*.

TUMORES INFLAMATORIOS. V. *Flemon*.

TUMOR LAGRIMAL. V. *Anqui-lops*.

TUMORES SANGUÍNEOS DE LA CA- BEZA DE LOS RECIEN NACIDOS. Al-coholato. 274. Cataplasmas. 747, 750, 751, 772, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 837. Fomento. 2327. Lini-mento. 3982. Mezcla. 4291.

TUMORES SIFILÍTICOS. Cataplas- ma. 830. Emplastos. 1736, 1835, 1852. Linimento. 3953. Pediluvio. 4986. Pomadas. 7979, 7986, 8080. V. *Sifilis*.

TUMORES SINOVIALES. V. *Gota y Reumatismo*.

TUMORES VENÉREOS. V. *Tumores sifilíticos*.

ULCERAS. Aceites. 14, 42, 54. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 80, 84, 134, 151, 152, 153, 174. Bálsamos. 393, 395, 399, 400, 420, 426, 429. Baño. 451. Cataplasmas. 794, 815, 837. Ceratos. 865, 881, 887, 888, 889, 893, 894, 897, 901, 902, 907, 914, 915, 919, 920, 929, 932, 933. Digestivos. 1430, 1432, 1440. Electuario. 1587. Emplas- tos. 1725, 1727, 1756, 1799, 1801, 1854, 1856, 1878, 1881,

1896. Espadrapos. 2056, 2057, 2066. Estearato. 930. Fomentos. 2314, 2345, 2348. Fumigacion. 2371. Infusiones. 2622, 2623, 2698. Lociones. 4038, 4041, 4042, 4062, 4075, 4079, 4104, 4144, 4159. Piedras. 5003, 5004, 5005. Pildoras. 5260, 6009, 6010. Pol- vos. 6945, 6947, 7204. Pomadas. 7598, 7760, 7765, 7870, 7943, 7957, 8007, 8025, 8031, 8032, 8042, 8045, 8046, 8080, 8081, 8082, 8134, 8136, 8143, 8162. Pulpa. 8196. Soluciones. 8417, 8480, 8489, 8495, 8512. Tintu- ras. 8599, 8655, 8745. Trociscos. 9152. Ungüentos. 1441, 9162, 9164, 9165, 9170, 9171, 9172, 9181, 9182, 9188, 9192, 9223, 9227, 9228, 9230, 9240, 9241, 9249, 9250, 9252, 9280, 9281, 9286, 9290, 9291, 9294, 9300, 9307, 9310, 9311, 9312, 9315, 9319, 9321, 9323. Vinos. 9435, 9437, 9532.

ULCERAS ANTIGUAS. V. *Ulceras*.

ULCERAS ATÓNICAS. Aceite. 45. Aguas. 148, 149. Cataplasmas. 745, 798, 806, 821, 847. Cera- tos. 868, 912, 920, 927. Colirio. 1295. Digestivos. 1429, 1431, 1436. Emplastos. 1747, 1762, 1815. Espadrapo. 2070. Especies. 2086, 2087, 2088. Fomentos. 2266, 2279, 2292, 2305. Gargarismos. 2451, 2503. Licor. 3670. Linimen- to. 3858. Lociones. 4068, 4106. Piele. 5007. Pildoras. 5061, 5805, 5934, 6019. Pociones. 6386, 6720, 6726, 6727, 6728, 6734, 6742. Polvos. 6939, 7173, 7459. Poma- das. 7900, 8057, 8161, 8162. Soluciones. 8370, 8386, 8442, 8486. Tinturas. 8651, 8773. Un- güentos. 9182, 9195, 9207, 9224. Vinos. 9431, 9432, 9433, 9434, 9507, 9508. V. *Ulceras*.

•ULCERAS CALLOSAS. Aguas mi- nerales sulfurosas, IV, 224. Agua. 151. Emplasto. 1862. Trociscos. 9151.

ULCERAS CANCEROSAS. Agua.

240. Cataplasma. 854. Cocimiento. 1110. Colirios. 1155, 1156. Linimento. 3837. Locion. 4046. Mezcla. 4262. Pastas. 4757, 4787. Polvos. 6830, 6945, 6946, 6949. Pomadas. 7601, 7740, 7756, 7876, 7954, 8164. Ungüento. 9228. V. *Cáncer*.
- ULCERAS CARCINOMATOSAS. V. *Carcinoma*.
- ULCERAS CORROSIVAS. V. *Ulceras fagedénicas*.
- ULCERAS CUTÁNEAS. V. *Ulceras*.
- ULCERAS POR DECÚBITO. Cataplasma. 762. Linimentos. 3786, 3865. Pomadas. 7802, 7873.
- ULCERAS DOLOROSAS. V. *Ulceras*.
- ULCERAS EPSÓRICAS. Locion. 4110. Pomada. 7900. V. *Sarna*.
- ULCERAS ESCORBÚTICAS. Aguas. 116, 117, 118, 149. Cocimiento. 1015. Colutorios. 1300, 1334, 1338, 1341. Fomento. 2280. Solucion. 8432. Tintura. 8773. Ungüento. 9240. V. *Escorbuto*.
- ULCERAS ESCROFULOSAS. Agua. 150. Cataplasmas. 781, 798, 824, 854. Ceratos. 921, 927. Colirio. 1209. Inyeccion. 2760. Licor. 3670. Lociones. 4037, 4069, 4117, 4118. Pomadas. 7577, 7626, 7726, 7752, 7755, 7756, 7946, 7947, 7954, 7956, 7957, 7960, 7961, 7979, 7980, 7987. Soluciones. 8437, 8453, 8455, 8457. Tópico. 9033. V. *Escrófulas*.
- ULCERAS FAGEDÉNICAS. Cataplasmas. 751, 798, 821. Ceratos. 870, 927. Emplasto. 1762. Píldoras. 5767. Pomada. 8164.
- ULCERAS FÉTIDAS. Aguas. 80, 104, 129, 134, 237. Cataplasma. 778. Ceromel. 940. Locion. 4135. Polvo. 7459. Tintura. 8651.
- ULCERAS FISTULOSAS. V. *Fistulas*.
- ULCERAS FUNGOSAS. Aceite. 45. Aguas. 151, 237. Cataplasmas. 794, 817. Ceratos. 868, 925. Colirios. 1226, 1227. Digestivo. 1436. Fomento. 2305. Gargarismo. 2416, Licor. 3690. Locion. 4106. Polvos. 6945, 6948, 6965, 7030, 7034, 7443. Solucion. 8501. Trociscos. 9151, 9152, 9153. Ungüentos. 9207, 9228. Vinos. 9431, 9432, 9433, 9434. V. *Fungosidades*.
- ULCERAS GANGRENOSAS. Aguardiente. 72. Aguas. 79, 129, 199. Bálsamos. 388, 389. Baño. 449. Cataplasmas. 761, 763, 778, 779, 780, 798. Cerato. 869. Ceromel. 939. Cocimientos. 1003, 1094. Digestivos. 1433, 1434, 1438. Fomentos. 2266, 2268, 2270, 2292, 2305, 2314, 2336, 2344, 2347. Fumigacion. 2372. Gargarismos. 2417, 2418, 2539. Licor. 3712. Linimentos. 3834, 3837, 3858, 3859. Lociones. 4055, 4158. Poción. 6361. Polvos. 6931, 6940, 7034, 7120. Pomadas. 7867, 8118, 8161. Solucion. 8423. Ungüentos. 9222, 9240. Vinagre. 9413.
- ULCERAS HERPÉTICAS. Cerato. 935. Inyeccion. 2702. Lociones. 4110, 4114, 4119. Píldoras. 5260. Pomadas. 7939, 7940, 7962, 7963, Ungüento. 9304.
- ULCERAS INDOLENTES. V. *Ulceras*.
- ULCERAS DE MAL CARÁCTER V. *Ulceras gangrenosas*.
- ULCERAS PÚTRIDAS. V. *Ulceras gangrenosas*.
- ULCERAS REBELDES. V. *Ulceras*.
- ULCERAS SANIOSAS. V. *Ulceras fétidas*.
- ULCERAS SIFILITICAS. Aguas. 83, 85, 118, 125, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 170, 199. Bálsamos. 395, 404, 405. Ceratos. 899, 908, 909, 910, 914, 915, 916, 921, 933. Colirios. 1226, 1227. Colutorios. 1316, 1336. Digestivos. 1435, 1437. Emplasto 1852. Espadrapos. 2074, 2075. Etiope. 2197. Fomentos. 2345, 2346. Gargarismos. 2401, 2424, 2447, 2508. Inyecciones. 2759, 2822, 2824. Leches. 3647. Linimentos. 3950, 4021. Lociones. 4056, 4097, 4110, 4119, 4126. Mezcla. 4270. Mieles.

- 4306, 4307, 4309. Mistura. 4403. Píldoras. 5642, 5756, 5765. Polvos. 7029, 7036, 7443. Pomadas. 7670, 7671, 7672, 7687, 7726, 7745, 7747, 7748, 7752, 7771, 7772, 7773, 7946, 7947, 7954, 7970, 7971, 7972, 7976, 7977, 8007, 8081, 8082, 8113, 8120, 8135, 8136. Soluciones. 8449, 8450, 8470, 8481, 8486, 8495, 8510. Tópicos. 9038, 9041. Tratamiento. 9129. Ungüentos. 9208, 9209, 9254, 9268, 9272, 9273, 9304, 9315. Vinos. 9435, 9437.
- ULCERAS SIFILÍTICAS DE LA BOCA. Cigarros. 977, 978. Gargarismo. 2541. Miel. 2496. Solucion. 8432.
- ULCERAS SIFILÍTICAS DE LA GARGANTA. Cigarros. 977, 978. Gargarismos. 2419, 2420, 2421, 2423, 2449, 2458, 2474, 2510. Jarabe. 3252. Lociones. 4056, 4126. Miel. 2496, 4307. Opiata. 4676. Poción. 6571. Polvo. 7307. Solucion. 8449. *V. Sifilis.*
- ULCERAS SIFILÍTICAS DE LAS NARICES. Cigarros. 977, 978. Gargarismo. 2503. Locion. 4126. Miel. 2496. *V. Sifilis.*
- ULCERAS SIFILÍTICAS DE LA URETRA. Inyecciones. 2803, 2806. Solucion. 8450. *V. Sifilis.*
- ULCERAS VENÉREAS DE LA VAGINA. Inyecciones. 2722, 2803, 2806, 2807. Solucion. 8450.
- ULCERAS SÓRDIDAS. Aceite. 25. Aguas. 85, 116, 117, 199. Cocimiento. 1046. Emplastos. 1733, 1737. Ungüento. 9224.
- ULCERAS VARICOSAS. Remedio. 8240. Tópico. 9040.
- ULCERAS VENEREAS. *V. Ulceras sifilíticas.*
- ULCERAS DE LA BOCA. Colutorios. 1300, 1301, 1302, 1313, 1314, 1317, 1318, 1326, 1331, 1334, 1335, 1336, 1356, 1357. Enjuagatorios. 2000. Gargarismos. 2395, 2430, 2435, 2456, 2464, 2466, 2467, 2469, 2524. Linimentos. 3805. Miel. 4297, 4298, 4308. Rodomel. 4320. Tintura. 8674.
- V. Estomatitis y gangrena de la boca.*
- ULCERAS DE LA BOCA DE LOS NIÑOS. *V. Gangrena de la boca.*
- ULCERAS DE LA CÓRNEA. Colirios. 1147, 1153, 1217, 1221, 1237. Píldoras. 5671. Pomadas. 8054, 8076. Tratamiento. 9128.
- ULCERAS DE LA FARINGE. Colutorio. 1353. Gargarismo. 2395, 2415, 2418, 2468, 2503, 2522, 2530, 2531. Pediluvio. 4986. Solucion. 8450. Tintura. 8652. Tisana. 8965. *V. Faringitis.*
- ULCERAS DEL CUELLO DE LA MATRIZ. *V. Ulceras de la matriz.*
- ULCERAS DE LAS ENCIAS. *V. Ulceras de la boca y estomatitis.*
- ULCERAS DE LA GARGANTA. *V. Ulceras de la faringe.*
- ULCERAS DE LA MATRIZ. Cáusticos. 861, 862. Inyeccion. 2777. Píldoras. 5515. Polvos. 7121, 7435, 7476. Pomadas. 7870, 7979. Soluciones. 8380, 8450, 8490. Tintura. 8782. *V. Cáncer de la matriz.*
- ULCERAS DE LAS NARICES. Polvo. 7218. Ungüento. 9198.
- ULCERAS DE LOS PÁRPADOS. Agua. 100. Cerato. 900. Colirios. 1118, 1162, 1230. Pomadas. 8057, 8058, 8076.
- ULCERAS DE LOS PECHOS. *V. Grietas del pecho.*
- ULCERAS DE LAS PIERNAS. Emplastos. 1758, 1841. Espadrapos. 2058, 2064, 2065. Solucion. 8435. Tratamiento. 9127.
- ULCERAS DEL RECTO. Inyeccion. 2722. Pomada. 8113.
- ULCERAS DE LA URETRA. Candelillas. 733. Inyecciones. 2722, 2755.
- ULCERAS DE LA VEJIGA DE LA ORINA. Inyeccion. 2776, 2789. *V. Catarro crónico de la vejiga.*
- UÑERO. Solucion. 8501.
- URETRITIS AGUDA. *V. Blenorragia.*
- URETRITIS CRÓNICA. *V. Catarro del aparato urinario, y blenorragia crónica.*

- URTICARIA. Limonadas. 3759, 3761. Lociones. 4052, 4079, 4144.
- UVOLOPTOSIS. Fomento. 2307. Gargarismos. 2396, 2399, 2400, 2414, 2425, 2426, 2491, 2501, 2537. Inyeccion. 2809. Ungüento. 9241.
- UVULITIS. Gargarismo. 2386, 2481.
- VAHIDOS. *V. Vértigos.*
- VAGINITIS. Inyecciones. 2688, 2701, 2704, 2769. Vahos. 9330.
- VAPORES. *V. Histérico.*
- VARICES. Fomento. 2281. Pomadas. 7785, 7913.
- VARUS. Tratamiento. 9130.
- VEGETACIONES. Polvos. 6939, 6964, 6967, 7030, 7034, 7118. Pomadas. 7737, 7739, 8148, 8149, 8150.
- VEGETACIONES SIFILITICAS. *V. Escrescencias sifilíticas.*
- VEJIGATORIOS. Emplastos. 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1816, 1817, 1889, 1890, 1891. Espadrapo. 2073. Linimento. 4023. Moscas. 9346, 9347, 9348, 9349. Papeles. 4719, 4720, 4721, 4727, 4728, 4730, 4731, 4732, 4733, 4742, 4746. Pomadas. 7576, 7729, 7730, 7731. Sinapismo. 8356. Tafetanes. 4735, 4736, 4737, 4738, 4740, 4741, 4743, 4744, 4745. Tela. 8587. Ungüentos. 9200, 9236, 9237, 9238, 9306. Vejigatorios. 9332, 9333, 9334, 9335, 9336, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345. Vinagre. 9367.
- VÉRTIGOS. Apocema. 345. Bolos. 549. Lavativa. 3557. Linimento. 3843. Loocs. 4162, 4163, 4183. Miel. 4305. Misturas. 4347, 4455, 4534. Pediluvios. 4990, 4991. Pildoras. 5030, 5315, 5580, 5924. Polvos. 7335, 7369.
- VERRUGAS. Cáusticos. 858. Mantequilla. 4717. Polvo. 7036. Pomadas. 7738.
- VIENTOS. *V. Flatuosidades y cólico ventoso.*
- VIRUELAS. Colirio. 1177. Elec-
- tuarios. 1607, 1608, 1609, 1610, 1611. Emplastos. 1738, 1739, 1756, 1838, 1849. Emulsiones. 1963, 1965, 1983. Espadrapos. 2074, 2075. Jarabes. 2954, 2960, 2961, 2992, 3050, 3162, 3168, 3179. Láudanos. 3446, 3449. Linimento. 3961. Lociones. 4066, 4103, 4104, 4106, 4142, 4143. Pildoras. 5907. Pociones. 6251, 6721. Polvos. 6791, 7045, 7047, 7119. Pomadas. 7746, 7833, 7877, 8004, 8007, 8096, 8098, 8099, 8100, 8101, 8114. Remedio. 8280. Sinapismo. 8354. Tópico. 9048. Trociscos. 9161. Ungüentos. 9198, 9259. Vinos. 3447, 9414, 9441, 9538. Zumo. 9548.
- VISCERALGIAS. Bálsamos. 417, 427. Misturas. 4620. Pildoras. 5988.
- VÓLVULO. *V. Ileo.*
- VÓMICA. Jarabes. 3320, 3347. Tablet. 4838, 4850. *V. Neumonia crónica.*
- VÓMITOS. Aguas minerales acídulas, IV, 261. Agua. 78. Bolos. 535, 571, 601, 659. Cataplasmas. 772, 815, 850, 854. Cerato. 873. Electuarios. 1466, 1507, 1535. Emplastos. 1753, 1760, 1812, 1813, 1814, 1830. Emulsiones. 1929, 1964. Escudo. 2005. Eter. 2182. Jarabe. 2957. Julepe. 3383. Linimentos. 3848, 3973. Looc. 4203. Mistura. 4608. Pastillas. 4871. Pildoras. 5022, 5072, 5124, 5265, 5270, 5272. Pociones. 6090, 6116, 6127, 6130, 6142, 6143, 6144, 6145, 6216, 6273, 6274, 6280, 6282, 6285, 6286, 6298, 6377, 6558, 6595, 6638, 6694. Polvos. 6773, 6774, 6784, 6785, 6798, 6847, 6885, 7386, 7508, 7510, 7511.
- VÓMITOS POR ACEDIAS. Aguas. 116, 117. *V. Agrios.*
- VÓMITOS ESPASMÓDICOS. Agua. 169. Cápsulas. 742. Julepe. 3394. Linimentos. 3782, 3811. Loocs. 4162, 4163, 4183, 4214. Mistu-

ras. 4365, 4366, 4405, 4455,	Píldoras. 5514, 5522. Poción.
4568. Píldoras. 5125, 5442, 6005.	6378. Vino. 9415.
Pociones. 6140, 6141, 6293, 6392,	ZONA. Baño. 470. Ceratos. 893,
6437, 6438, 6439, 6510, 6683.	894, 914. Embrocacion. 1717. Lo-
VÓMITOS DE LOS NIÑOS. Mistura.	ciones. 4133, 4144. Pociones.
4322.	6084, 6273, 6274, 6280, 6284,
VÓMITOS DE LAS PREÑADAS. A-	6285, 6286, 6508, 6512, 6595,
gua. 169. Infusion. 2633. Julepe.	6619. Pomadas. 7704, 7732, 7746,
3383. Licor. 3697. Mistura. 4495.	7874, 7939, 8033, 8079.



LISTA DE AUTORES.

A.

ABERNETHY. Inyeccion. 2722.
 ACHARD. Jabon. 9314. Ungüento, 9314.
 ADAMS. Licor. 3673. Locion. 4123.
 ADOLFO DE MITAN. Tratamiento. 9109.
 ADORNE. Píldoras. 5108. Tintura. 8645.
 AGOSTINACHIO. Específico. 2145.
 AGRIPA. Ungüento. 9194.
 AGUILERA. Pomada. 8075.
 AILHAUT. Polvo. 6789.
 AITKEN. Ceromel. 940.
 ALBANO. Pomada. 7910.
 ALBERS. Píldoras. 5096. Pocion. 6132.
 ALBESPEYRES. Papel. 4742.
 ALDERETE. Ungüento. 9169.
 ALHANDAL. Trociscos. 9140.
 ALIBERT. Agua. 226. Bolos. 646, 665. Cosmético. 7864. Electuario. 1547. Emulsion. 1970. Inyeccion. 2695. Lociones. 226, t. I; 4067, 4105. Píldoras. 5053, 5245, 5915. Pocion. 6500. Pomadas. 7599,

7614, 7636, 7864, 8171. Remedio. 8259. Tinturas. 8629, 8755.
 ALIBOUR. Agua. 80.
 ALIES. Tisana. 9004.
 ALTHOF. Píldoras. 5528, 5916.
 ALYON. Agua. 218.
 AMELUNG. Pocion. 6214.
 AMMON. Agua. 227. Colirio. 1133. Emulsion. 1961. Fomento. 2291. Píldoras. 5220, 5671. Pociones. 6128, 6470. Polvos. 5003, 6865, 7030, 7442. Tratamiento. 9102.
 AMPHOUX (Mad.). Licor. 8221.
 ANCELOT. Elíxir. 1682.
 ANDERSON. Colirio. 1175. Píldoras. 5068, 5069, 5604.
 ANDONART. Píldoras. 5645.
 ANDRAL. Mistura. 4517. Píldoras. 5507, 5660. Purgante. 8200.
 S. ANDRES. Pomada. 7603.
 ANDRES DE LA CRUZ. Emplastos. 1728, 1729.
 J. ANDREU. Tintura. 8764.
 ANDRIA. Oxicato. 4710.
 ANDROMACO. Triaca. 1609.
 ANDRY. Linimento. 3823. Mistura. 4595. Pociones. 6114, 6336, 6428, 6654.
 S. ANGEL. Polvo. 7261.
 ANCELOT. Colutorio. 1335.

- ANHALT. Agua. 143.
 ARBEY. Píldoras. 5086.
 ARCEO. Bálsamo. 9181. Ungüento. 9181.
 ARCET. Tabletas. 4831.
 DR. ARCET. Tratamiento. 9089.
 ARCHIDETI. Arcano, 4008.
 AREGON. Ungüento. 9285.
 ARMSTRONG. Mezcla. 4252. Mistura. 4372.
 ARNAL. Píldoras. 5399, 5515, 5588, 5589.
 ARNOUD. Jarabe. 3035. Sacarolado. 8303. Tisana. 8867.
 DR. ARTMANN. Agua. 237.
 ARTUNE. Tabletas. 4807.
 ASTBURY. Electuario. 1449.
 ASTRUC. Caldos. 707, 708. Cataplasma. 833. Julepe. 3431. Looc, 4193. Tisana. 8885.
 AUBERGIER. Jarabe. 3209.
 AUGUSTIN. Mistura. 4352. Píldoras. 5993. Poción. 6457. Polvos. 7248, 7564.
 AUTENRIETH. Pomada. 7896.
 AYENSA. Electuario. 1555.
 AYR. Clavos. 985.
- B.**
- BABEYRAC. Apocema. 321. Bolos. 690. Julepe. 3379. Looc, 4190. Opiata, 4678. Polvo. 7237.
 BACHER. Píldoras. 6009, 6010.
 BAHÍ. Colutorio. 1323.
 BAILEY. Bolos. 582. Pastillas, 4878. Ungüento. 9218.
 BALARDINI. Vino. 9465.
 BALDINGER. Poción. 6189.
 BALDINGIERI. Especies. 2139.
 BAILLY. Baño. 449. Bolos. 543, 546, 676. Electuario. 1493. Granos. 5924. Lavativas. 3461, 3471. Pastillas. 4802. Píldoras. 5198, 5395, 5924. Poción. 6309. Polvos. 6862, 7140, 7567.
 BANBERG. Tintura. 8831.
 BANG. Mistura. 4360.
 BANDOF. Polvo. 7115.
 BANNIES. Cocimiento. 1110.
- BANYER. Pomada. 7690.
 BAÑARES. Aceite. 42. Agua. 109. Emplasto. 1853. Tintura. 8703.
 BARATAUS. Poción. 6655.
 BARBAROJA. Píldoras. 5324.
 BARBETTE. Jarabe. 3321. Emplasto. 1846.
 BARBIER. Píldoras. 6005. Poción. 6569.
 BARCLAY. Píldoras. 5085. 5325.
 BARDIN. Cerato. 895.
 BARLOW. Locion. 4070. Remedio. 8265.
 BARON. Julepe. 3381.
 BARTHER. Poción. 6142. Cerato. 887.
 BARTHEZ. Apocema. 355. Electuarios. 1465, 1494, 1506. Elíxires. 1630, 1657. Emulsion. 1981. Julepes. 3373, 3405. Pastillas. 4975. Píldoras. 5190, 5339, 5381, 5571, 5572, 5862. Tisana. 9013. Tópico. 9034. Saquito. 8349.
 BARTON. Píldoras. 5326.
 BASBILLE. Bálsamo. 379.
 BATAILLE. Pomada. 8004.
 BATH. Bálsamo. 368.
 BATTLEY. Licores. 3676, 3719.
 BAUDELLOCQUE. Colirio. 1134. Píldoras. 5136. Pomadas. 7930, 7956.
 BAUDET. Pastillas. 4919.
 BAUDOT. Emplasto. 1787. Polvo. 7500. Salvado. 7500.
 BAUDRY. Pasta. 4791.
 BAUER. Tintura. 8829.
 BAUMÉ. Azúcar. 8335. Licor. 3714. Pomada. 7891.
 BAUMES. Agua. 215. Electuario. 1463. Linimento. 3842. Locion. 4127. Misturas. 4427, 4466. Pomadas. 7714, 7739, 8135, 8136. Solucion. 8463.
 BAUMGARTNER. Baño. 455.
 BAVEZ. Mistura. 4489.
 BAYLE. Poción. 6258.
 BAYNGTON. Emplasto. 1758.
 BEAUFORT. Agua. 103.
 BEAUMONT. Poción. 6658.
 BECK. Linimento. 3843.
 BECHE. Ungüento. 9256.
 BECKER. Colutorio. 1332. Lini-

- mento. 3982. Mezcla. 4291. Mistura. 4494.
- BECOEUR. Jabon. 2860.
- BEEK. Polvo. 7557.
- BEER. Colirios. 1183, 1273. Inyeccion. 2783. Polvo. 1273.
- BEHREND. Electuario. 1482. Lavativa. 3629. Linimento. 3834. Looc. 4204. Píldoras. 5092, 5147, 5167, 5483. Pociones. 6119, 6134, 6501. Polvos. 6848, 6989, 6995, 7210, 7269, 7475.
- BEIFFER. Agua. 95.
- O. BEIRNE. Macerado. 4225.
- C. BELL. Inyeccion. 2723. Locion. 4063. Píldoras. 5351, 5871.
- BELLECONTRE. Linimento. 3922.
- BELLET. Jarabe. 3013.
- BELLOSTE. Píldoras. 5823.
- BELZERIUS. Píldoras. 6050.
- BENELLI. Agua. 134.
- BENNATI. Gargarismo. 2396.
- BER. Candelillas. 727.
- BERAL. Acetato. 215, t. I. Alcohol. 8620. Alcoholados. 8592, 8624, 8678, 8694. Cervezas. 943, 958. Emulsiones. 1904, 1913, 1921, 1925, 1988, 1998. Esencia. 8694. Eterolado. 8591. Gargarismo. 2500. Hidrolato. 2620. Infusion. 2620. Jabones. 2864, 2885. Jaleas. 2903, 2904. Jarabes. 215, t. I; 2905, 2908, 2944, 2946, 3026, 3060, 3061, 3068, 3185, 3322. Oenolados. 9451, 9542. Papeles. 4731, 4742. Pastillas. 4845. Píldoras. 5410. Polvo. 6993. Sacarolados. 8310, 8318. Sacaruro. 8332. Tabletas. 4881, 4954. Tafetanes. 4731, 4742. Tinturas. 2620, 8591, 8592, 8620, 8624, 8678, 8694, 8822. Tisana. 9026. Tratamiento. 9084. Vinos. 9451, 9534, 9542.
- BERG. Papel. 4726. Polvo. 6932.
- BERENGIER. Píldoras. 5497, 5517.
- BERMET. Locion. 4083.
- BERNDT. Píldoras. 5118, 5352.
- BERNSTEIN. Píldoras. 5400.
- BERTEL. Pomada. 7807.
- BERTHE. Infusion. 2682.
- BERTON. Elixir. 1660. Linimen-
- to. 3875, 3876. Opiatas. 4628, 4682. Pomada. 7700. Píldoras. 5489. Tópico. 9055.
- BESTUCHEF. Tinturas. 8680, 8781.
- BETEMAN. Embrocacion. 1716.
- BICKER. Remedio. 8268.
- BIECHI. Pomada. 7794.
- BIEL. Licor. 3680.
- BIETT. Cataplasmas. 781, 786. Cerato. 899. Jarabe. 3178. Lociones. 4053, 4082, 4084. Mezclas. 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284. Misturas. 4339, 4399, 4430, 4459, 4483, 4491, 4522. Miel. 4309. Píldoras. 5036, 5260, 5261, 5336, 5414, 5445, 5470, 5471, 5730, 5732, 5739, 5821, 5822, 5967, 5990, 5991. Polvos. 6907, 7103, 7519. Pomadas. 7590, 7592, 7637, 7638, 7689, 7745, 7746, 7750, 7767, 7801, 7819, 7820, 7831, 7931, 7961, 7964, 7965, 7971, 7977, 8005, 8041, 8084, 8122, 8157. Soluciones. 8389, 8421, 8480, 8484. Tisana. 8849.
- BIGKER. Pomada. 7701.
- BIHEUS. Cocimiento. 1040.
- BILLARD. Pocion. 6334.
- BINELLI. Agua. 112.
- BIRKMANN. Polvo. 7255.
- BISHOP. Licor. 3682.
- BLACHE. Mezcla. 4253. Mistura. 4375.
- BLAINE. Misturas. 4348, 4393.
- BLASIUS. Locion. 4036. Píldoras. 5796. Tintura. 8638.
- BLAUD. Cocimiento. 1065. Mezcla. 4259. Píldoras. 5106, 5107, 5108, 5109, 5110. Pomada. 7940.
- BLEFELD. Tópico. 9033.
- BLONDEAU. Azúcar. 8295. Polvo. 8295.
- C. LE BLUS. Píldoras. 5330. Ungüento. 9262.
- BOCQUET. Mistura. 4452. Jarabe. 3019.
- BOCHIERI. Agua. 171.
- BOERHAAVE. Alcohol. 8656. Apocema. 341. Cocimiento. 1008. Colirio. 1184. Digestivo. 1434. Elec-

- tuario. 1468. Elixires. 1625, 1631, 1636. Emplastos. 1739, 1751. Espiritu. 2168. Lavativa. 3506. Loción. 4130. Mistura. 4585. Píldoras. 5310. Pociones. 6438, 6608. Suero. 8530. Té. 8583. Tinturas. 8635, 8656. Ungüento. 9176.
- BOGLER. Píldoras. 5420.
- BOILEAU. Tratamiento. 9125.
- BOINET. Píldoras. 5446. Polvos. 7104, 7121, 7435, 7476. Pomadas. 7780, 7816, 7817, 7852, 7853.
- BOIS DE LOURG. Píldoras. 5031.
- BOISIERE. Panes. 4715.
- BONJEAM. Mistura. 4324.
- DR. BONNAFORT. Polvos. 6923, 7337.
- BONCIO. Píldoras. 5713, 5996.
- BONNEAU. Polvo. 7076.
- BONORDEN. Mistura. 4472. Solucion. 8376.
- BONNET. Solucion. 8448.
- BORIES. Caldo. 715. Epitema. 2009. Elixir. 1644. Inyeccion. 2694. Jarabe. 3146. Mistura. 4516. Píldoras. 5066. Polvos. 6935, 7537. Pomada. 7857.
- BOTOT. Agua. 114.
- BOUBBEE. Jarabe. 2990. Linimento. 3819. Tabletas. 4952.
- BOUCHARDAT. Bolos. 600. Inyeccion. 2826. Jarabes. 2988, 3191. Pastillas. 4889. Píldoras. 5172, 5423, 5663, 5755, 5758, 5764, 5766, 5772, 5777. Pociones. 6099, 6242, 6395, 6579. Polvos. 6968, 7355. Tisana. 8927.
- BOUCHERON. Pomadas. 7707, 8092.
- BOUCHET. Jarabes. 2985, 3188, 3193. Píldoras. 5583, 5727, 5998.
- BOUDIN. Cigarros. 973. Lavativa. 3496. Píldoras. 5122, 5262, 5484. Pociones. 6362, 6389, 6461, 6688. Polvo. 6950. Pomadas. 7677, 7907. Solucion. 8390. Supositorio. 8579.
- BOULLAY. Jarabes. 3020, 3081, 3240, 3337.
- BOULLEMEN. Polvo. 7278.
- BOUILLON LAGRANGE. Jarabes. 3013, 3110, 3338.
- BOUNYER. Poción. 6373.
- BOURDIER. Remedio. 8260.
- BOURGE. Linimento. 3872. Píldoras. 5127. Pomadas. 7604, 7790, 7895.
- BOURIERES. Tabletas. 4867.
- BOURON. Pomada. 8099.
- BOUTIGNI. Alcoholado. 8830. Electuario. 1505. Jarabe. 3194. Mezcla. 4265. Opiata. 4686. Píldoras. 5389, 5769. Tintura. 8830.
- BOUTRON RUSEL. Dictamia. 2252.
- BOUVART. Jarabe. 3255.
- BOUVOISIN. Vejigatorio. 9334.
- BOYER. Agua. 175. Cataplasma. 809. Inyeccion. 2713. Linimentos. 3802, 3850. Píldoras. 5135. Pomada. 7708.
- BOYLE. Agua. 209. Colirio. 209. Mistura. 4431.
- BRACHET. Polvos. 6874, 7068, 7092.
- BRANDE. Mistura. 4499.
- BREFELD. Arcano. 7838. Pomadas. 7577, 7838.
- BRENE. Bolos. 547.
- BREMER. Cocimiento. 1042.
- BREMSER. Remedio. 8279.
- BRENECKE. Cerveza. 967.
- BRERA. Bolos. 553, 574, 634, 649, 691. Cocimientos. 1009, 1047, 1114. Emulsion. 1950. Epitema. 2010. Fomento. 2266. Infusion. 2659. Inyeccion. 2800. Linimento. 3821. Polvos. 6773, 6844, 6887, 6911, 6959, 7191, 7538. Tisana. 8916.
- BRESCHET. Jarabe. 3141. Poción. 6490.
- BRESLER. Polvos. 6951, 6849.
- BRETON. Polvo. 7314.
- BRETONNEAU. Lavativa. 3515. Mistura. 4583. Vejigatorio. 9335.
- BRIANT. Jarabe. 2988.
- BRIGHT. Polvos. 7207, 7208.
- BRIERRE DE BOISMONT. Pomada. 7588.
- BRODIE. Fomento. 2326. Linimento. 4006.
- BRODUN. Licor. 3698.

BROMFIELD. Inyeccion. 2801.
 BROOKES. Pomada. 7823.
 BROUSSAIS. Píldoras. 5105, 5353.
 BROUSSONNET. Apocema. 328. Bebida. 488. Febrífugo. 8416. Jarabe. 3051. Pastillas. 4872. Píldoras. 5609. Poción. 6557. Solucion. 8416.
 BROWN. Píldoras. 5608. Ungüento. 1436.
 BRUCKMANN. Ungüento. 9234.
 BRUGNATELLI. Acido. 1620. Locion. 4090. Elixir. 1620. Píldoras. 5825. Polvo. 7558.
 BRUN. Colirio. 1162.
 BRUNERO. Emulsion. 4544.
 BUCHAN. Bolos. 549. Electuarios. 1450, 1459. Inyeccion. 2784. Píldoras. 5050, 5212, 5344, 5752, 5788, 5797, 5939. Tisana. 8889.
 BUCHANAN. Acido. 66.
 BUCHNER. Cantaridina. 133, t. I. Papel. 4720. Polvo. 7539.
 BUCHARD. Poción. 6409.
 BUDIN. Pastillas. 4853.
 BUE. Pastillas. 4905.
 BUENDIA. Electuario. 1556.
 BUETTNER. Poción. 6340.
 BULLY. Vinagre. 9361.
 BUCHARD. Polvos. 6832, 7411.
 BURDACH. Mistura. 4353. Píldoras. 5512, 5559, 5672.
 BURNET. Polvo. 7356.
 BUTTER. Cerveza. 947.
 BUTTNER. Poción. 6279.

C.

CADET. Agua. 102. Emulsion. 1915. Granos. 5924. Jabon. 2857. Jarabe. 3111. Lapicero. 3442. Leche. 3645. Limonada. 3754. Mistura. 4412, 4577. Pastillas. 4898. Píldoras. 5620, 5749, 5826, 5924. Racahout. 2254. Tabletas. 4802, 4834. Tisana. 8992. Ungüentos. 9237, 9294.
 CADET DE VAUX. Chocolate. 1416.

CAILLOT. Jalea. 2894.
 CALDIRINI. Emulsion. 1976.
 CALVE. Pomada. 7824.
 CALLAC. Tisanas. 7113, 8891.
 CALLOUD. Píldoras. 5729.
 CANET. Emplasto. 1762. Ungüento. 1762.
 CANQUOIN. Pasta. 4774. Ungüento. 9251.
 CAP. Jarabes. 2987, 3073, 3206. Pastillas. 4904. Píldoras. 5793, 5794. Poción. 2987.
 CAPURON. Píldoras. 5284.
 CARDENAL DE LUYNES. Agua. 93.
 CARIGNAN (Princesa de). Polvo. 7022.
 CARMICHAEL. Agua. 119. Poción. 6300.
 CARRON DE VILLARDS. Colirio. 1220. Pomadas. 7578, 7657, 7941, 8056, 8077. Tinturas. 8747, 8798.
 CARUS. Misturas. 4397, 4576, 4603.
 CASPARI. Linimento. 3857.
 CAVARRA. Píldoras. 5285.
 CAVENTOU. Jabon. 2850.
 CAYOL. Poción. 6454.
 CAZENAVE. Cáusticos. 857. Cerato. 864. Electuario. 1526. Gargarismo. 2390. Inyeccion. 2700. Jarabes. 3102, 3116, 3196, 3316, 3328. Linimento. 3801. Lociones. 4051, 4059, 4077, 4078, 4120, 4124. Mezclas. 4269, 4285. Misturas. 3116, 4402, 4492, 4552, 4618. Píldoras. 5848. Polvo. 6946. Pomadas. 7589, 7597, 7674, 7727, 7741, 7747, 7771, 7791, 7813, 7814, 7880, 8043, 8088, 8106. Tisana. 9005. Tópicos. 9005, 9070.
 CERILLO. Tópico. 9038.
 CIMA. Poción. 6155.
 CINTRAC. Píldoras. 5333.
 CIRILLO. Mistura. 4403. Pomada. 7758.
 CLARCK. Acido. 62. Inyeccion. 2753. Lavativa. 3473. Polvo. 7044.
 CLARUS. Misturas. 4377, 4425, 4456. Pasta. 4797. Píldoras. 6024.

- Pociones. 6229, 6614. Polvos. 6351. Polvos. 6997, 7309. Pomadas. 7870, 8006. Remedio. 8269. Vino. 9539.
- CLARY. Elixir. 1639.
- CLAUDER. Elixir. 1651. Esencia. 2652.
- CLOMMESNY. Pasta. 4773.
- CLOQUET. Píldoras. 5148. Pomada. 8017.
- CLOSS. Mistura. 4554.
- CLUTTON. Tintura. 8718.
- COLAS. Magnesia. 241, t. I.
- COINDET. Pomada. 7984. Remedio. 8242. Soluciones. 228, t. I; 8472. Tratamiento. 9120.
- COEROLY. Píldoras. 5213.
- COLBATCH. Polvo. 7250.
- COLDEFI-DORLY. Tafetan. 4745.
- COLLEY. Epilatorio. 4771. Pasta. 4771.
- COLLIER. Píldoras. 5719.
- COLLIN. Poción. 6496.
- COLOMBAT. Agua. 164. Confites. 1363. Gargarismo. 2431. Polvo. 7299. Supositorio. 8561.
- CONDE. Espadrapo. 2058. Polvos. 7048, 7054.
- CONDON. Bálsamo. 434.
- CONRAD. Colirio. 1174.
- CONRADI. Agua. 1232. Píldoras. 5149, 5444.
- CONSRUCH. Cerato. 913.
- CONTE. Gragea. 2590.
- CONTENT. Polvo. 7055.
- COOPER. Píldoras. 5516. Solucion. 8470.
- COQUERET. Tintura. 8817.
- CORBEL LAGNEAU. Pastillas. 4894, 4931. Píldoras. 5223. Pomadas. 7639, 7641.
- CORSIN. Emplasto. 1791.
- CORTUM. Colutorio. 1306.
- CORVISART. Medicina. 4235. Vino. 9417.
- CORY. Poción. 6066.
- COTTEREAU. Agua. 260. Bebida. 514. Cidra. 3718. Crema. 1389. Electuario. 1389. Eter. 2181. Jabon. 2877. Jarabe. 3065. Lavativas. 3533, 3566. Licor. 3718. Linimentos. 3878, 3998. Misturas. 4586, 4612. Odontálgico. 4645. Píldoras. 5186, 5662. Poción. 6351. Polvos. 6997, 7309. Pomadas. 7870, 8006. Remedio. 8269. Vino. 9539.
- COUMARTIN. Ratafia. 8227.
- COURDEMANCHE. Hielo. 4266.
- COURCELLES. Alcoholato. 292. Elixir. 1626.
- COURTY. Colirio. 1291. Infusion. 2681. Jarabe. 3256. Píldoras. 6015.
- COUSERAN. Extracto. 2244. Jarabe. 3296.
- CRESPIY. Agua. 99.
- CROLIUS. Elixir. 1702. Pomada. 7871.
- CROSNIER. Jarabe. 3249. Mistura. 4500.
- CRUVEILHIER. Colutorio. 1334. Jarabe. 3336. Misturas. 4346, 4507. Píldoras. 5556, 5836. Poción. 6656. Pomadas. 7809, 7912.
- CUFFER. Poción. 6339.
- CUISINIER. Jarabes. 3307, 3352.
- CULLEN. Pomada. 7631. Píldoras. 5286.
- CULLERIER. Colirio. 1274. Gargarismo. 2453. Inyeccion. 2756. Píldoras. 5045, 5287, 5397, 5830. Pociones. 6572, 6573. Pomadas. 7591, 7642. Solucion. 8476. Tisana. 8963.
- CUNIER. Aceite. 56. Colirios. 1167, 1169. Píldoras. 5415. Pomadas. 7697, 8057. Tratamiento. 9100.
- CURVO. Cocimientos. 1019, 1020. Polvo. 6986.

CH.

- CHABERT. Aceite. 8.
- CHAMET. Píldoras. 5573.
- CHAUCE. Remedio. 8271.
- CHAPMANN. Soluciones. 8384, 8492.
- CHAPTAL. Agua. 130. Tisana. 8882.
- CHARLARD. Polvo. 7141.
- CHARLES. Chocolates. 1418, 4957. Jarabe. 3263. Poción. 6626. Tabletas. 4957.

- CHARVET. Píldoras. 5995.
 CHATARD. Limonada. 3741.
 CHAUSSIER. Bolos. 558, 657, 692. Cocimiento. 1063. Elíxir. 1692. Infusion. 2660. Jabon. 2872. Julepe. 3371. Licores. 3677, 3687. Pastillas. 4859. Pociones. 6141, 6280, 6437. Polvos. 6863, 7434. Pomadas. 7695, 8050. Solucion. 8496. Trociscos. 9150.
 CHAVERLY. Píldoras. 5311. Polvo. 7083. Poción. 6532. Tópicos. 9030, 9053, 9057, 9060, 9063.
 CHERON. Eter. 2187. Jarabe. 3145.
 CHESTER. Tópico. 9031.
 CHESTON. Infusion. 2623. Tintura. 8674.
 CHESELDEN. Poción. 6613.
 CHEVALLIER. Colutorio. 1329. Gargarismo. 2463. Inyeccion. 2772. Jarabes. 2971, 3012, 3137. Pastillas. 4800. Píldoras. 5008. Pociones. 6106, 6115. Polvo. 7142. Pomadas. 7640, 7808. Solucion. 8423. Tabletas. 4838, 4850, 4914.
 CHEVEREAU. Gragea. 2586.
 CHEYNE. Bolos. 557. Polvo. 7394.
 CHIRAC. Caldo. 705. Opiata. 4709.
 CHLEGHORN. Polvo. 7279.
 CHOMEL. Bálsamo. 427. Linimento. 3918. Mistura. 4596. Píldoras. 5386, 5461, 5593, 5827. Pociones. 6511, 6518. Pomada. 7951. Tisana. 8904.
 CHOPART. Poción. 6254.
 CHOULAND. Poción. 6247.
 CHRESTIEN. Jarabes. 3069, 3070. Linimentos. 3816, 3864. Pastillas. 4842, 4843, 4851. Píldoras. 5303, 5425, 5598, 5887. Poción. 6523. Polvo. 7043. Pomadas. 7772, 7774, 7777, 8117. Resina. 317, t. I. Tinturas. 8634, 8794.
 DAFFY. Elíxir. 1659. Tintura. 8695.
- D.**
- DALLAVAY. Locion. 4085.
 DANNEMANN. Linimentos. 3840, 3947.
 DAREL. Tintura. 9531.
 DARAN. Candelillas. 730.
 DARCK. Vejigatorio. 9337.
 DATISBIUS. Tisana. 8913.
 DAUBENTON. Tabletas. 4876, 4901.
 DAUBERGNE. Locion. 4116. Tratamiento. 9130.
 DAVIDSON. Polvo. 7494.
 DEBOURGE. Pomada. 7822.
 DEBREYNE. Fumigacion. 2366. Grasa. 2599. Jarabe. 2986. Píldoras. 5473, 5496, 5549. Pociones. 6377, 6746. Pomadas. 7653, 7832, 8036, 8141, 8142, 8167. Solucion. 8374. Ungüento. 9163. Vino. 9469, 9470.
 DEDÉ. Espadrapo. 2069. Tela. 8586.
 DEFERMOND. Bolos. 588. Poción. 6568.
 DEGLAND. Apocema. 349.
 DEGENETAIS. Pasta. 4793.
 DEHAEN. Diurético. 5548. Elíxir. 1706. Píldoras. 5094, 5548, 5917. Pociones. 6307, 6392.
 DEIMANN. Aceite. 46. Linimento. 3858.
 DELABARRE. Aguas. 137, 216.
 DELAHAYE. Jarabe. 3103.
 DELAURIER. Tabletas. 4813.
 DELESCHAMPS. Tabletas. 4935.
 DELILLE. Apocema. 349. Mistura. 4351. Polvo. 7421.
 DELOCHE. Tafetan. 4737.
 DELPECH. Pociones. 6393, 6178. Tratamiento. 9091.
 DELVINCOURT. Pastillas. 4806, 4965.
 DEMÓCRATES. Masticatorio. 9148.
 DENIS. Pomada. 7612.
 DEUTON. Polvo. 6903.
 DEODAT. Jarabe. 3291.
 DERHEINE. Solucion. 8378.
 DESADE. Linimento. 3885.
 DESAULT. Pomadas. 7659, 7874, 8075.
 DESBOIS. Bolos. 575, 612, 638, 647. Electuario. 1558. Linimento.

3807. Mistura. 4630. Poción. 6443. Suero. 8531.
- DESCHAMPS. Aceite. 8589. Agua. 142. Bálsamo. 358. Elíxir. 1677. Esencia. 2035. Grasas. 2597, 2600. Inyección. 2821. Jabón. 2851. Jarabe. 3155. Píldoras. 5669. Polvos. 7153, 7155. Pomadas. 7915, 7916. Sacarolado. 8323. Solución. 8425. Tabletas. 4849.
- DESESSART. Jarabe. 3202.
- DESFORGES. Bálsamo. 410. Elíxir. 1683. Polvo. 7154.
- DESLANDES. Electuario. 1472. Píldoras. 5533. Poción. 6375, 6376.
- DESMARRES. Colirios. 1153, 1168, 1222, 1237, 1249, 1290. Pomadas. 8018, 8058, 8144. Untura. 9329. Unción. 8018.
- DESRUELLES. Bolos. 675. Inyecciones. 2769, 2773. Pasta. 4765.
- DESSIER. Electuario. 1541.
- DESSIRABODE. Elíxires. 1661, 1701. Polvo. 7143.
- DETHARDING. Inyección. 2843.
- DEUIL. Medicina. 8985. Tisana. 8985.
- DEBAY. Poción. 6750. Píldoras. 6041. Polvo. 6875.
- DEVERGIE. Jarabe. 2968, 3106, 3186. Lavativas. 3466, 3481, 3538. Licor. 3683. Pomadas. 7736, 7798, 7839. Robs. 8289. Solución. 8391. Tratamientos. 9108, 9111.
- DEWEES. Poción. 6624. Tintura. 8739.
- DEYEUX. Extracto. 2234.
- DIDAY. Opiata. 4666. Pomada. 7805.
- DIEFFEMBACH. Mistura. 4435.
- DIEUDONNÉ. Mistura. 4461.
- DINNEFORD. Magnesia, 241, tomo I.
- DIPPEL. Esencia. 2029. Tintura. 8619.
- DIXON. Píldoras. 5087.
- DOBBERAN. Gotas. 2578.
- DORFFURT. Inyección. 2789. Pomada. 8175.
- DUMAS. Jarabe. 3257.
- DONNE. Solución. 8500.
- DONOVAN. Poción. 6432. Solución. 8451, 8452.
- DORFMUELLER. Tintura. 8689.
- DORNBLUETH. Loción. 4092. Tratamiento. 9083.
- DORVAULT. Agua. 128. Café. 700. Cerato. 891. Chocolate. 1411. Digitalina. 172, t. I. Jarabes. 3001, 3210, 3219. Poción. 6350. Pomada. 8101.
- DOUBLE. Eter. 2177. Linimento. 3923. Píldoras. 5038, 5191, 5829, 6032. Polvo. 6876.
- DOUVOWISTHY. Opiata. 4669.
- DOWER. Polvos. 7202, 7203.
- DOYEN. Emplasto. 1725.
- DREYSSIG. Mistura, 4418.
- DROSTE. Electuario. 1453. Píldoras. 5089.
- DUBISSON. Tafetan. 4736.
- DUBLANC. Extracto. 2229. Jarabe. 3008.
- DUBOIS. Bolos. 597. Elíxir. 1624. Inyección. 2760. Jarabe. 2977. Linimentos. 3822, 3860. Mistura. 4626. Poción. 6143. Píldoras. 597, 5146, 5192. Pociones. 4626, 6611. Polvo. 6838. Pomadas. 7643, 8039. Remedio. 8258. Tabletas. 4852, 4870. Tisanas. 8928, 9006. Vino. 9414.
- DUC. Polvo. 7184.
- DUCLOS. Jarabe. 2941. Papel. 4728.
- DUCOUDRAY. Colutorio. 1316.
- DUCHESNE DUPARC. Agua. 9553. Bolos. 598. Jarabe. 2991. Píldoras. 5563. Pomada. 7803. Zumo. 9553.
- DUERR. Colutorio. 1312. Pastas. 4754, 4755.
- DUFRENOY. Mistura. 4452.
- DUHAUMÉ. Electuarios. 1495, 1539.
- DUMAS. Píldoras. 5193, 5863, 6013. Poción. 6558.
- DUMERIL. Mistura. 4378. Píldoras. 5150, 5614, 5972. Saquito. 8350.
- DUNCAN. Emulsión. 1958. Lavativa. 3485. Misturas. 4342.
- DUNGLISSON. Licor. 3659.
- DUQUE. Ungüento. 9227.

DUPASQUIER. Aguas. 167, 168. Jarabes. 3187, 3244, 3188. Looc. 4202. Pastillas. 4892. Píldoras. 5728. Soluciones. 8465, 8466. Tabletas. 4893, 4938.

DUPUIS. Polvo. 7529. Remedio. 8261.

DUPUY. Píldoras. 5200, 5495.

DUPUYTREN. Baño. 471. Bolos. 639. Cataplasma. 763. Colirios. 1185, 1275, 1276. Emplasto. 1825. Inyeccion. 2820. Linimento. 3804. Lociones. 4057, 4094, 4115. Manteca. 7699. Píldoras. 5242, 5246, 5247, 5297, 5422, 5472, 5474, 5482, 5550, 5688, 5931. Polvos. 6899, 6940, 6947, 7204. Pomadas. 7660, 7684, 7699, 7787, 8007, 8024, 8123, 8139. Tisana. 8868. Tratamientos. 9093, 9096, 9112.

DURANDE. Mistura. 4560.

DURR. Locion. 4086.

DURYER. Gotas. 2577.

DUVAL. Jarabe. 3109.

DZONDI. Tratamientos. 9115, 9116.

E.

EBENS. Poción. 6215.

EDWARDS. Tratamiento. 9090.

EICHENHEIMER. Tintura. 8640.

EIMBKE. Cocimiento. 1066.

EISENMANN. Gotas. 2551. Mistura. 4354. Polvo. 6828.

ELLER. Licor. 2552.

ELLIOTSON. Bolos. 585.

ELLIS. Bolos. 567. Píldoras. 5780. Pociones. 6063. Polvo. 7360.

EMERY. Pomadas. 7710, 7711, 7845, 8035, 8108.

ESCOFET. Jarabe. 3242.

ESNAULT. Jarabe. 2961.

ESTANISLAO MARTIN. Jarabe. 3010.

ESTOR. Píldoras. 5828.

EVERMANN. Solucion. 8433.

EYMAEL. Poción. 6667.

F.

FABRE. Píldoras. 5634. Pomadas. 7894. 7906, 7918. Tintura. 8688.

FACES. Electuario. 1480.

FAGES. Emulsion. 1929. Extracto. 2249.

FAHNESTOCK. Linimento. 3907.

FALCK. Candelillas. 735. Cerato. 910. Tintura. 8642. Ungüento. 9242.

FANTONETTI. Baño. 453.

FARGET. Poción. 6328.

FARINIER. Pomadas. 7603, 8178.

FARR. Infusion. 2648.

FARVAGNITI. Colirio. 1135.

FASCIO. Limonada. 3757.

FAURE. Epitema. 2015. Píldoras. 6131. Pomada. 7644. Tintura. 8777.

FAVE. Polvo. 7275.

FEARUNEY. Píldoras. 5584.

FEE. Electuario. 1508.

FEHR. Mistura. 4557.

FEILER. Píldoras. 5269.

FELTZ. Tisanas. 8847, 8848, 8948, 8949.

FERNANDEZ. Colirio. 2698.

FERNELIO. Jarabe. 3034. Poción. 6591.

FERRARI. Jarabe. 3022.

FERRARINI. Electuario. 1613.

FERRIAR. Linimento. 3939.

FEUILLET. Bálsamo. 429. Colutorio. 1351.

FRIECKE. Solucion. 8443. Ungüento. 9273.

FIEVEE. Mistura. 4479. Linimento. 3882.

FIGUIER. Jarabe. 3036. Pasta. 4761. Sacaruro. 8304.

FILHOS. Hielo. 4267. Cáustico. 862.

FIORAVANTI. Alcoholato. 307.

FISCHER. Bolos. 577. Colutorio. 1347. Pociones. 6371, 6372.

FLUCHER. Polvo. 7258.

FLEURI. Gargarismo. 2534.

FLORENT. Pomada. 7654.

- FOLDI. Remedio. 8272.
- FONTANEILLES. Polvo. 7301. Solucion. 8441.
- FORD. Bálsamo. 402. Láudano. 3445.
- FORDYCE. Polvo. 7302. Vino. 9498.
- FORGET. Limonada. 3749. Poción. 6169. Pomada. 7846.
- FORMEY. Píldoras. 5058, 6007.
- FORTIN. Confites. 2584.
- FOSSATI. Sacarolado. 8300.
- FOSBROKE. Gargarismo. 2497. Pastillas. 4879.
- FOTHERGILL. Gotas. 2562. Píldoras. 5667.
- FOUQUET. Caldo. 706. Electuario. 1481. Emplasto. 1878. Escudo. 2005. Jarabes. 3215, 3227. Lavativas. 3526, 3547. Píldoras. 5194.
- FOQUIER. Electuarios. 1510, 1567, 1593, 1614. Fomento. 2339. Julepe. 3432. Lavativa. 3545. Píldoras. 5017, 5574, 5633, 6054. Pociones. 6213, 6230, 6231, 6385, 6410, 6702. Polvo. 7058. Pomadas. 7645, 7722, 7825.
- FOURCROY. Bálsamo. 399.
- FOURNIER. Julepe. 3406. Linimento. 3778. Poción. 6211. Pomada. 7914.
- FOWLER. Infusion. 2646. Licor. 3681.
- FOX. Vinagre. 1352.
- FOY. Agua. 122. Apocema. 325. Bolos. 693. Conserva. 1378. Emulsiones. 1933, 1972. Lavativa. 3599. Misturas. 1933, 4388. Píldoras. 5668, 5691. Poción. 6212. Pomada. 7942. Sacaruros. 8336. Tisana. 8929.
- FRANÇOIS. Licor. 3701.
- FRANCONEAU DUFRESNE. Jarabes. 3078, 3211.
- FRANK. Colutorio. 1320. Granos. 5919. Infusion. 2672. Julepe. 3407. Lavativa. 3462. Linimento. 3983. Locion. 4111. Looc. 4205. Misturas. 4390, 4627. Píldoras. 5033, 5919, 5925. Pociones. 6151, 6524, 6685. Polvos. 7018, 7403. Ungüento. 9225.
- FRANK (J. P.). Cerveza. 954. Electuario. 1537. Emulsion. 1947. Inyeccion. 2689. Licor. 3704. Looc. 4200. Mezcla. 4272. Misturas. 4530, 4624. Poción. 6158. Polvos. 6797, 6836, 6919, 7236, 7479. Suero. 8544. Vinagre. 9351. Ungüentos. 9258, 9269.
- FRANK (J.). Jabon. 2881. Linimento. 3962. Mistura. 4376. Píldoras. 5509. Poción. 6338. Polvo. 7080.
- FRAQUER. Pasta. 4749.
- FRAY COSME. Cola. 8444. Papel. 4757. Polvos. 6830, 7226. Pomada. 7601.
- FRAY FRANCISCO FERRER. Elixir. 1675.
- FREAKE. Pomada. 7997.
- FREER. Lavativa. 3525.
- FREILER. Poción. 6198.
- FRENCH. Infusion. 2678.
- FREYBERG. Licor. 3691. Solucion. 8440.
- FRIARD. Bálsamo. 392. Jarabe. 3324. Poción. 6740.
- FRICKE. Mistura. 4421.
- FRIGERIO. Guisantes. 2602.
- FRICTE. Polvo. 6783.
- FRONMUELLER. Colirio. 1238. Mistura. 4462.
- FULDE. Especies. 2097. Elixir. 1673. Tintura. 1673.
- FULLER. Agua. 141. Electuarios. 1496, 1563. Emulsiones. 1909. 1914. Emplasto. 1863. Julepe. 3417. Mistura. 4422. Píldoras. 5124, 5334, 5335. Vinos. 9424. 9486.
- FURNARI. Colirios. 1164, 1210. Linimento. 3911. Píldoras. 5639. Poción. 6444. Soluciones. 8425, 8458.
- FUSTER. Fumigacion. 2368.

G.

- GAJE. Pasta. 4792.
- GALENO. Cerato. 897.
- GALL. Cocimiento. 1082. Inyec-

- ciones. 2749, 2815. Julepes. 3363, 3402. Locion. 4043. Misturas. 4384, 4621. Píldoras. 5062, 5076, 5090, 5187, 5458, 5491, 5926, 6008. Pociones. 3363, 6366.
- GALLEREUX. Pocion. 6144.
 GALLOT. Looc. 4215.
 GALLOUD. Tablet. 4966.
 GAMA. Píldoras. 5398.
 GAMBA. Pocion. 6232.
 GARD. Espadrapo. 2062.
 GARDANE. Jarabe. 3087.
 GARMANN. Tintura. 8641.
 GARN. Espadrapo. 2062.
 GARNIER. Limonada. 3763.
 GAROSTE. Tela. 8587.
 GAROT. Jarabe. 2947. Limonadas. 3728, 3752.
 GARRIN. Píldoras. 5263.
 GARUS. Alcoholato. 296. Elixir. 1676.
 GAUBE. Infusion. 2641.
 GAUBIUS. Colirio. 1250. Electuario. 1561. Elixires. 1668, 1670. Fumigacion. 2378. Inyeccion. 2775. Loocs. 4187, 4198. Píldoras. 5312. Pociones. 6438, 6560. Polvo. 6956. Zumo. 9548.
 GAUDRIOT. Inyecciones. 2758, 2765. Supositorio. 8580.
 GAUTHIER. Gelatina. 2928.
 GEA PESSINA. Acido. 64.
 GEDDINGS. Gargarismo. 2538.
 GELIS Y COMTÉ. Grajea. 2590.
 GENDRIN. Pocion. 6100. Pomada. 7958. Tratamiento. 9081.
 GENOVEVA. Bálsamo. 393.
 GEOFROY. Agua. 132.
 GERDESSEN. Linimento. 3925.
 S. GERMAN. Especies. 2127.
 GIACOMINI. Pomada. 7920.
 GIBERT. Ceratos. 875, 921. Inyeccion. 2778. Jarabe. 3194. Locion. 4097. Opiata. 4688. Píldoras. 5736. Pomadas. 7594, 7646, 7669, 7671, 7673, 7811, 7932, 8113. Tintura. 8649. Tisana. 8864.
 GILEAD. Bálsamo. 394.
 GILET. Jarabe. 3082.
 GIMBERNAT. Colirios. 1211, 1212.
 GIMELLE. Tisana. 8917.
- GIORDANO. Agua. 94. Pastillas. 4896.
 GIRAUT. Pomadas. 7575, 7617.
 GIRADOUX DE S. GERVAIS. Rob. 8271.
 GIRAULT. Pomada. 7712.
 GIRCKE. Bálsamo. 445.
 GIROUX. Pomada. 7921.
 GIRTANNER. Inyecciones. 2709, 2786.
 GLAUBER. Jarabe. 3127.
 GLOWER. Pomada. 7953.
 GNEPRATTE. Píldoras. 5922. Pocion. 6370.
 GOBLEY. Cerato. 902. Pocion. 6601.
 GOBLIN. Elixires. 1617, 1619, 1696.
 GODEFROY. Cordial. 8731. Pocion. 6347. Tintura. 8731.
 GODELLE. Gargarismo. 2450.
 GOELIS. Cataplasma. 842. Mistura. 4437. Opiata. 4693. Pociones. 6135, 6429, 6545. Polvos. 6892, 7075, 7563.
 GOETZE. Emulsion. 1916.
 GOLA. Polvos. 7280, 7466.
 GOLFIN. Cigarros. 975. Emulsion. 1911. Jarabe. 3085. Píldoras. 5195. Pomadas. 7628, 8010.
 GOLDEFY. Azúcar. 8320.
 GONDRAN. Baño. 439.
 GONDRET. Pomada. 7922. Tratamiento. 9077. Vejigatorio. 9338.
 GORDEN. Linimento. 3926.
 GORDON. Looc. 4196. Té. 8581.
 DR. GOTTLIEB DE SCHALLERN. Tratamiento. 9107.
 GOULARD. Bálsamo. 395. Candelillas. 733. Cerato. 898. Espadrapo. 2070. Piel. 5007.
 GOULT. Dictamia. 2252.
 GOWLAND. Emulsion. 3707. Licor. 3707.
 GRAEFFE. Colirios. 1205, 1215. Emulsiones. 1902, 1912. Fomento. 2327. Gotas. 2546. Jalea. 2892. Linimento. 3915. Pasta. 4762. Píldoras. 5077, 5201. Polvos. 6922, 7081, 7339. Pomada. 7740.
 GRAETZNER. Píldoras. 5427.

- GRAHAM. Píldoras. 5704.
 GRAHL DE HAMBURGO. Tratamiento. 9119.
 GRAMMAIRE. Gargarismo. 2405.
 GRAND JEAN. Pomadas. 7661, 7923.
 GRANT. Purgante. 8201.
 GRAVER. Mistura. 4482.
 GRAVES. Linimento. 3810.
 GREDING. Píldoras. 5502.
 GREENOUGH. Tintura. 8738.
 GREIGEL. Polvo. 6988.
 GREKLER. Linimento. 3984.
 GRESSET. Elixir. 1664.
 GRIESSELICH. Polvo. 7397.
 GRIFFITH. Misturas. 4550, 4566. Píldoras. 5703. Polvos. 6961, 7219.
 GRIMAUD. Electuario. 1473. Licor. 3671. Tintura. 8833.
 GRINDLE. Gotas. 2563.
 GROETZNER. Píldoras. 5706.
 GRONEVELD. Bolos. 607.
 GRUBY. Tratamiento. 9123.
 GUATANICA. Friccion. 2356. Loción. 4109.
 GUERSART. Poción. 6411. Polvo. 7069.
 GUEPIN. Colirios. 1186, 1286. Loción. 4064. Mistura. 4573. Polvo. 7106. Pomadas. 7662, 7723, 8045.
 GUERARD. Poción. 6296.
 GUERIN DE MAMERS. Inyección. 2832.
 GUERLAIN. Agua. 4112.
 GUERSENT. Colutorio. 1314.
 GUIBOURT. Alcoholato. 287. Gragea. 2594. Píldoras. 5137. Pomada. 7887. Solución. 8461.
 GUICHARD. Saquito. 8347.
 GUILBERT. Espadrado. 4738.
 GUILLIE. Elixir. 1638.
 GUILLEMIN. Jarabe. 2973.
 GUILLEN CERVEN. Emplasto. 1876.
 GUILLERMOND. Jarabe. 3136.
 N. GUILLOT. Solución. 154, t. I. Tratamiento. 9106. Ungüento. 9259.
 GUINDRE. Polvo. 7331. Sal. 8339.
- GUITON DE MORVEAU. Fumigación. 2379.
 GUMPRECHT. Polvo. 7503.
 GUNTHER. Emplasto. 1837. Píldoras. 5959.
 GUTETA. Polvo. 7335.
 GUTHRIE. Pomadas. 8044, 8061.
- ## H.
- HAASE. Mistura. 4417.
 HACLESS. Linimento. 3949.
 HACUSTER. Jabon. 2870.
 HAEN. Bebida. 493. Píldoras. 5151.
 HAGEN. Poción. 6103.
 HAHNEMANN. Jarabe. 3170. Licor. 3717. Píldoras. 5709. Polvo. 7433. Solución. 8498.
 HALES. Esencia. 2036.
 HALFORD. Píldoras. 5173.
 HALY. Polvos. 6934, 7336.
 HALLE. Poción. 6412.
 HALLER. Elixires. 1622, 3658. Poción. 6581.
 HANN. Solución. 8485, 8486.
 HAMECH. Confección. 1566.
 HAMILTON. Cataplasma. 813. Gotas. 2543, 8408. Inyección. 2833. Píldoras. 5110. Poción. 6297. Solución. 8408.
 HANAY. Pomada. 7924.
 HANCKE. Licor. 3706. Pomada. 8021. Tópico. 9066.
 HANDEL. Emplasto. 1750. Poción. 6159. Tópico. 9037.
 HANDSCHUH. Jabon. 2875.
 HAOFF. Píldoras. 5360.
 HARGENS. Colirio. 1149.
 HARRINGTON. Emplasto. 1806.
 HARLESS. Acido. 61. Linimento. 3846. Poción. 6474.
 HARLOU. Polvo. 7063.
 HARRISON. Mistura. 4613.
 HARTMANN. Polvos. 6820, 6929, 7014, 7281.
 HASTING. Mistura. 4569.
 HATFIELD. Tintura. 8741.
 HAUSMANN. Píldoras. 5632.

- HEBERT. Jabon. 2873. Jarabe. 3089. Esencia. 2040.
- HECKER. Candelillas. 737. Mistura. 4413. Poción. 6708. Polvos 6904, 7282.
- HEDICROY. Trociscos. 9154.
- HEIM. Licor. 3685. Píldoras. 5083, 5152, 5585, 5715.
- HENN. Poción. 6156.
- HEIM. Poción. 6693. Polvos. 6811, 6886, 7094, 7109, 7110. Solucion. 3685.
- HEINECKE. Licor. 3684.
- HENKE. Pomada. 7926. Solucion. 8445. Ungüento. 9221.
- HEISTER. Electuario. 1474.
- HELMENSTREIT. Píldoras. 5710. Pomada. 7925.
- HELMERICH. Pomada. 7925.
- HALNSCHEL. Locion. 4103.
- HELVECIO. Colirio. 1217. Opiata. 4695. Píldoras. 5057. Poción. 6353. Polvos. 6816, 7296, 7571.
- HENDERSON. Colirio. 1218.
- HERGT. Mistura. 4623.
- HENKE. Mistura. 4521. Poción. 6703.
- HENKENIUS. Aceite. 39.
- HENNING. Píldoras. 5153. Polvos. 6998, 7041, 7341.
- HENRIETTE. Poción. 6369.
- HENROTAY, Píldoras. 5174. Poción. 6364.
- HENRY. Grajea. 2594. Jarabes. 3183, 3197, 3198. Locion. 4113. Masa. 4227. Pasta. 4780. Píldoras. 5137. Pomadas. 7887, 8100.
- HENSCHEL. Bolos. 568. Linimento. 3929. Píldoras. 5647.
- HERISSON. Tintura. 8661.
- HERMANN. Emulsion. 1942.
- HERMEL. Poción. 6687.
- HERSOKMANN. Poción. 6749.
- HESSELBACH. Piedra. 5003.
- HESSER. Píldoras. 5711.
- HEUSTER. Emplasto. 1767.
- HEY. Locion. 4065.
- HEYFELDER. Agua. 179.
- HIFF. Pomada. 7868.
- HIGGINBOTTOU. Solucion. 8483.
- HILDEMBRAND. Bebida. 521. Colutorio. 1321. Mistura. 4509. Píldoras. 5054, 5221, 5238. Polvo. 6850. Tisana. 8866.
- HILL. Bálsamo. 406. Esencia. 2030.
- HIMLY. Colirio. 1261. Espiritu. 2169.
- HIRSCHEL. Polvo. 7349.
- HOEFER. Inyeccion. 2754. Píldoras. 5426. Poción. 6323. Pomada. 7765.
- HOFF. Tisana. 8874.
- HOFFMANN. Alcoholado. 430. Bálsamos. 430, 431. Elíxires. 1656, 1704, 1705, 8607. Licor. 2191. Píldoras. 5314, 5665, 5814, 5815. Pomada. 7975.
- HOME. Linimento. 3808.
- HOMOLLE. Grajea. 2588. Jarabe. 3121. Poción. 6399.
- HONORÉ. Píldoras. 5154. Vino. 9564.
- HOOPER. Misturas. 4556, 4572. Píldoras. 5748.
- HORN. Gotas. 2572. Misturas. 4529, 4533, 4607. Polvo. 7270. Tintura. 8613.
- HORNER. Inyeccion. 2764.
- HOSPITAL. Pomada. 7847.
- HORSE. Píldoras. 5923.
- HOUDBINE. Espadrapo. 2073.
- HOULTON. Misturâ. 4438. Solucion. 8366.
- HUART. Pomada. 8093.
- HUC. Crema. 1390.
- HOWISON. Cocimiento. 1018.
- HUFELAND. Aceite. 51. Bebida. 481. Cerato. 900. Cocimiento. 1050. Colirios. 1165, 1231. Electuario. 1475. Elixir. 1634. Emplasto. 1759. Emulsiones. 1898, 1906. Gotas. 2550, 2571, 2573. Inyeccion. 2802. Licores. 3670, 3674. Linimentos. 3930, 3985. Locion. 4072. Misturas. 4356, 4428, 4449, 4451, 4510, 4540, 4635. Píldoras. 5290, 5508, 5798. Póciones. 6305, 6566, 6596, 6645, 6764. Polvos. 6784, 6785, 6800, 6827, 6837, 6852, 6885, 6935, 6982, 7084, 7351, 7352, 7398, 7430, 7431, 7461, 7474, 7487, 7502. Pomada. 8011. Remedio. 8270. So-

lucion. 8402. Tintura. 8715. Tisasa. 8959. Tópicos. 9054, 9058. Ungüento. 9298.

HUG. Polvo. 7521.

HUILLIER. Aceite. 22. Tratamiento. 9110.

HUISSEN. Jarabe. 3139.

HULM. Píldoras. 5855.

HUNTER. Candelillas. 734. Gargarismo. 2540. Píldoras. 5857. Pociones. 6361, 6379.

HUSSON. Agua. 8686. Remedio. 8273. Tintura. 8686. Vino. 9461.

HUXHAM. Etíope. 2197. Tintura. 8612. Vino. 9528.

I.

IDELER. Opiata. 1466. Solucion. 8514.

ISENSEE. Píldoras. 5648.

IVEL. Agua. 220. Colirio. 1269.

St. IVES. Bálsamo. 413. Pomada. 7666.

J.

JACKSON. Agua. 108.

JACOBI. Licor. 8637.

JACQUOT. Inyeccion. 2701.

JADELOT. Baño. 446. Colirio. 1131. Linimento. 3940. Pociones. 6348, 6349. Polvo. 7288. Pomadas. 3940, 8008, 8063, 8148.

JADIOUX. Píldoras. 5485. Pomada. 7698.

JAEGER. Píldoras. 5073.

JAENICHER. Remedio. 8256.

JAHN. Bolos. 650. Píldoras. 5155, 5156, 5577, 5649, 5941. Pociones. 6102, 6136, 6238, 6420, 6707, 6734. Polvos. 6803, 6835, 6978, 7171, 7311, 7344.

JAMES. Píldoras. 5790. Polvos. 6914, 7367, 7368. Pomadas. 7724, 7991.

JAMET. Elixir. 1678. Polvo. 7147.

JANIN. Colirio. 1224. Emplasto. 1864. Píldoras. 5716. Pomadas.

7992, 8064. Vejigatorio. 9343, 9344.

JANNART. Gargarismo. 2432.

JANNYOT. Baño. 451.

JANISSOT. Crema. 1388.

JARK. Linimento. 3944.

JASSER. Polvo. 7172. Pomadas. 7618, 7993.

JANNET. Crema. 1391.

JOBERT. Candelillas. 726. Pastillas. 4888. Pomada. 8047. Tintura. 8671.

JOBART. Tabletas. 4950.

JOHN. Poción. 6261.

JOLLY. Electuario. 1484. Píldoras. 5390.

JOSAT. Píldoras. 5114. Poción. 6188.

JOSÉ GASCON. Pomada. 7742.

JOSÉ LEON. Linimento. 4011.

JOURDAN. Polvo. 7390.

JOURDAIN. Píldoras. 5994.

JUNCKER. Píldoras. 5138, 5315. Polvo. 7289.

JUNG. Linimentos. 3825, 3849.

JUSSIEU. Poción. 6586.

JUSTAMOND. Fomento. 2313. Polvo. 6945.

K.

KAEMPF. Polvo. 7369.

KAIFFA. Fécula. 2250.

KAHLEISS. Polvos. 6854, 7070, 7086.

KANACHSTEDT. Linimento. 3838.

KAPELER. Cataplasma. 847. Licor. 3667. Julepes. 3362, 3419. Píldoras. 5243.

KAUSSER. Tisana. 8998.

KATIMER. Polvo. 7370.

KENNER. Mistura. 4480.

KEMERER. Polvo. 7148.

KENNEDY. Emplasto. 1788.

KENTISCHE. Linimento. 3978.

KERAUDREN. Jarabe. 3104.

KERNENLD. Cataplasma. 827.

KERS. Poción. 6587.

KERZBERG. Colirio. 1192.

KEUP. Esencia. 2037. Polvo. 6915. Tintura. 8633.

KEYSSER. Confites. 5791. Píldoras. 1365.
 KIRCKKOFF. Polvo. 6855.
 KIESER. Linimento. 3891.
 KIRKLAND. Cerato. 888.
 KIRMER. Colirio. 1119.
 KLAPROTH. Eter. 8760. Tintura. 8760.
 KLEIN. Polvo. 7183.
 KLEIST. Polvo. 7371.
 KLUGE. Agua. 124. Poción. 6478.
 KNACHSTEDT. Ungüento. 9327.
 KNOD. Mezcla. 4262.
 KNOERLZER. Pomada. 7840.
 KNOX. Polvo. 7372.
 KOCH. Colirio. 1170.
 KOEHLIN. Agua. 95. Licor. 3702. Mistura. 4457.
 KOEMPF. Bebida. 509. Especies. 2142. Lavativas. 3573, 3628. Linimento. 3941. Píldoras. 5808.
 KOOPP. Colutorio. 1319. Gargarrismo. 2454. Lavativa. 3580. Linimento. 3859. Misturas. 4409, 4441, 4443. Píldoras. 5196, 5356, 5792, 5833. Pociones. 6253, 6294. Polvos. 6842, 6999, 7000. Pomada. 7994. Remedio. 8253. Soluciones. 8382, 8385, 8479, 8493. Tintura. 8664. Tisana. 8865. Tópico. 9036.
 KORTUM. Electuario. 1576. Poción. 6125.
 KRANISCHFELD. Píldoras. 5047.
 KRAUSE. Píldoras. 5865. Poción. 6427.
 KREYSIG. Polvo. 7200.
 KRIMER. Colirio. 1225. Polvos. 6905, 7100.
 KROYHER. Mistura. 4495.
 KRUGER. Polvo. 7035. Pomada. 7995.
 KUNKEL. Píldoras. 5197. Tabletas. 4820.
 KUENZLI. Mistura. 4379.

L.

LABARRAQUE. Lavativa. 3534. Licor. 3703.

LABELONYE. Cubebino. 167, t. I. Gragea. 2585, 2587. Jarabes. 3097. 3120, 3122. Opiata. 4687. Pastillas. 4862.
 LABORDE. Bálsamo. 399.
 LABORDÉTTE. Supositorios. 8575, 8578.
 LABRACHE. Pomada. 7944.
 LACOMBE. Tabletas. 4953.
 LADY DELBY. Jabon. 2854.
 LAENNEC. Apocema. 335. Bolos. 640. Julepe. 3389.
 LAFERTA. Píldoras. 5274.
 LAFFECTEUR. Robs. 8282, 8283, 8284.
 LAFOREST. Locion. 4098.
 LAGARAYE. Sales. 2237, 8338.
 LAGNEAU. Cerato. 915. Colirios. 1277, 1278. Infusion. 2642. Inyección. 2803. Jarabe. 3235. Mercurio. 255, t. I. Píldoras. 5824, 5834. Pastillas. 4933. Polvo. 7402. Pomadas. 7639, 7641. Ungüento. 9263.
 LAGRESIE. Sal. 8340.
 LAIDLAMO. Poción. 6184.
 LALOUETTE. Láudano. 3448.
 LALLEMAND. Misturas. 4415, 4424.
 LAMOROUX. Jarabe. 3258.
 LAMOTTE. Emplasto. 1820.
 LAMURE. Cocimiento. 1107. Jarabes. 2980, 3320.
 LANCASTRE. Gotas. 2576.
 LANDERER. Mistura. 4408. Tinturas. 8690, 8762, 8802.
 LANDOLFI. Remedio. 8244.
 LANEAU. Pomada. 7943.
 LANFRANC. Colirios. 1226, 1227.
 LANGE. Pomada. 7865.
 LANGEMBECK. Mistura. 4564.
 LANGELOT. Esencia. 8797. Tintura. 8797.
 LANGLEY. Píldoras. 5562.
 LARRA. Elíxir. 1679.
 LARREY. Cerato. 867. Jarabe. 3105. Mistura. 4606. Moxa. 270, t. I. Opiata. 1522. Solucion. 8477.
 LAROCHE. Tópico. 9047.
 LARTIGUES. Aceite. 53. Píldoras. 5176.

- LASSAIGNE. Jarabe. 3151. Pomadas. 7649, 7704.
- LASSONE. Agua. 512. Polvo. 7543.
- LATOUR. Píldoras. 5253.
- LAUGIER. Colirio. 1292.
- LAVACHER. Píldoras. 5656.
- LAVAGNE. Inyeccion. 2797.
- LAVERAN. Píldoras. 5522.
- LAZERME. Vino. 9416.
- LEAKE. Poción. 6185.
- LEAYSSON. Polvo. 1125.
- LECLAYSE. Polvo. 7319.
- LECLERC. Poción. 6599.
- LECOMTE. Vejigatorio. 9339.
- LECTOUR. Bálsamo. 434.
- LECHELLE. Agua. 172.
- LEFOULON. Elixires. 1652, 1662. Pasta. 4751. Polvo. 7149.
- LEGERS. Inyeccion. 2744.
- LEGRAND. Pomada. 8082.
- LEIGERS. Píldoras. 5800.
- LEISTNER. Jarabe. 3039.
- LEJEUNE. Bálsamo. 384.
- LELIEBRE. Bálsamo. 433.
- LELVAY. Esencia. 2043.
- LEMARCHAND. Poción. 6711.
- LEMASSON. Pomada. 7960.
- LEMAZURIER. Mistura. 4398. Píldoras. 5175.
- LEMERY. Polvos. 7186, 7353.
- LEMONIER. Píldoras. 5675.
- LEMORT. Alcoholato. 2025. Elixires. 1649, 1680. Esencia. 2025.
- LENDRICE. Baño. 438.
- LENTIN. Elixir. 1653. Mistura. 4362. Póciones. 6502, 6561, 6662.
- LEPERDRIEL. Guisantes. 2603.
- LEPERE. Alcoholado. 8782. Mistura. 4433. Pastillas. 4854, 4855, 4856. Tintura. 8782.
- LERMINIER. Píldoras. 5492. Poción. 6733. Pomada. 7919.
- LEROUX (J. J.). Píldoras. 5750.
- LEROY. Purgante. 8203.
- LERROY DE LA FAUDIGNIERE. Elixir. 1645.
- LESCOT. Aceite. 34. Pomada. 7911.
- LESCHENAULT DE LATOUR. Eter. 2189.
- LESCURE. Apocema. 327. Bebida. 516. Jarabe. 3083. Opiata. 4697. Píldoras. 5602. Polvo. 7455.
- LEVACHER. Bolos. 542. Linimento. 3785. Poción. 6745. Pomada. 7900. Remedios. 6745. 8262.
- LESPINASSE. Emplasto. 1810.
- LEURET. Píldoras. 5128.
- LEVISTAL. Grajea. 2586.
- LEVRAT. Mistura. 4511. Poción. 6344. Tisana. 8993. Tratamiento. 9095.
- LEWIS. Mistura. 4350. Vino. 9501.
- LHERITIER. Bolos. 633. Jarabe. 3142.
- LIANDET. Bálsamo. 416.
- LIBOSCHITZ. Bálsamo. 374.
- LIEBIG. Mistura. 4561.
- LINCK. Poción. 6365.
- LIPPICH. Bebida. 520. Colutorio. 1333. Emplasto. 1784. Lavativas. 3578. Linimento. 3862. Mistura. 4515. Píldoras. 5650. Solucion. 8397.
- LISEMANN. Bebida. 501. Misturas. 4355, 4478.
- LISFRANC. Digestivo. 1432. Pomada. 8124. Solucion. 8418.
- LISSON. Pomada. 7848.
- LISTON. Espadrapo. 2071. Solucion. 8398.
- LOEBELIUS DE LOEBENSTEIN. Eter. 2186. Tintura. 2186.
- LOCHE. Agua. 100. Vino. 9457.
- LOCKSTOEDT. Emulsion. 1919. Píldoras. 5651, 5801. Poción. 6600.
- LOEBEL DE LOBSTEIN. Bálsamo. 376.
- LOEWENHART. Píldoras. 5465.
- LOMBART. Píldoras. 5157, 5239. Pomada. 7752. Solucion. 8414.
- LOOF. Licor. 6368.
- LOSEN. Polvo. 6856. Tomas. 6856.
- LOUIS. Poción. 6489.
- LOURADOUR. Jarabe. 3008. Moscas. 9346.
- LOUSTONAU. Espadrapo. 2056.
- LOUVEL. Panes. 4714.
- LOUYER-VILLERMAY. Vejigatorio. 9340.

LUCATEL. Bálsamo. 400.
 LUCE. Agua. 190, 8627.
 LUCAS. Remedio. 8252.
 LUDWIG. Agua. 75.
 LUGOL. Agua. 183. Baño. 460.
 Cataplasma. 800. Inyeccion. 2792.
 Jabon. 2863. Pildoras. 5740, 5762.
 Pomadas. 7957, 7973, 8152. Solucion. 8445.
 LUTEROTE. Poción. 6320.
 LUTRAND. Estearato. 930, 931.
 Ceroestearato. 931.
 LYON. Pomadas. 7999, 8000, 8065.

M.

MACARTAN. Poción. 6677.
 MAC DIARMID. Linimento. 3934.
 MACGREGOR. Píldoras. 5214.
 MAD. MARECHALE. Pomada. 7812.
 MAD. BRAUMONT. Agua. 8774.
 MADAMA NOUFFER. Remedio. 8274.
 MADRE TECLA. Emplasto. 9250.
 Ungüentos. 9249, 9250.
 MAERKER. Pomada. 8110.
 MAESTRO JUAN. Colirio. 1187.
 MAETZIUS. Píldoras. 5538. Específico. 7250.
 MAGENDIE. Acido. 63, t. I. Agua. 185. Alcoholes. 8717, 8825, 8826, 8837. Alcoholados. 8657, 8784, 8826, 8837. Cocimiento. 1115. Colirio. 1221. Eter. 2193. Fricciones. 2354. Gargarismo. 2464. Gotas. 2563, 8415. Grama. 8957. Jarabes. 2951, 3054, 3062, 3106, 3129, 3161, 3313. Julepes. 3387, 3404, 3426, 3438. Linimento. 3904. Lociones. 4075, 4114. Mezclas. 4260, 4286, 4287. Miel. 4306. Mistura. 4435. Pastillas. 4947. Píldoras. 5342, 5343, 5437, 5637, 5731, 5735, 5853, 6055. Póciones. 6088, 6252, 6267, 6310, 6505, 6508, 6632, 6763, 6765. Polvos. 6879, 7047, 7160, 7264, 7357, 7383, 7465. Pomadas. 7718, 7773, 7935, 7972, 7976, 7983, 7987, 8172. Soluciones.

8364, 8377, 8395, 8396, 8415, 8468, 8469, 8471, 8513. Tabletas. 4804, 4864, 4865. Tinturas. 8657, 8717, 8727, 8753, 8765, 8784, 8786, 8825, 8826, 8837. Tisana. 8957. Trociscos. 9137. Vinos. 9450, 9535. Zarparrilla. 1115.

MAGNE. Colirio. 1136. Emplasto. 1740. Linimento. 3964.
 MAGNUS HUSS. Bebida. 502.
 MAHON. Pomada. 7927.
 MAJALT. Jarabe. 3107.
 MALATS. Bálsamo. 401.
 MALGAIGNE. Mistura. 4334.
 MALHERBE. Polvo. 7338.
 MALOUE. Opiata. 7471.
 MALOUIN. Etiope. 2198.
 MALOET. Jarabe. 3260.
 MANFREDI. Pastillas. 4920. Tabletas. 4920.
 MANGOTI. Pasta. 4753.
 MANNE. Emulsion. 1974.
 MANSFELD. Mezclas. 109, t. I; 4263.
 MAPPER. Solucion. 8411.
 MAQUIAVELO. Píldoras. 5802.
 MARC. Agua. 202. Bolos. 641. Polvos. 6822, 7074, 7392.
 MARCELLINI. Jalea. 2935.
 MARCIUS. Tintura. 8744.
 MARCUS. Píldoras. 5317. Polvo. 7001.
 MARCHAL DE CALVI. Píldoras. 5224.
 MARCHALL HALL. Píldoras. 5460.
 E. MARCHAND. Poción. 6335.
 SANTA MARIA. Bolos. 604. Cataplasma. 832. Electuario. 1549. Emulsion. 1918. Mezcla. 4288. Píldoras. 5300, 5746, 5953. Polvo. 6840.
 SAINTE MARIE AUX MINES. Panes. 4713.
 MARIANI. Poción. 6314.
 MARINA. Pomada. 7942.
 MARJOLIN. Cinturon. 8343. Mistura. 4490. Pomada. 7882. Saquitto. 8343.
 MARMORAT. Moxas, 270, t. I.
 MAROCHTETI. Remedio. 8245.
 MARONCELLI. Jarabe. 3259.

- MARRYAT. Fomento. 2341. Solucion. 8743.
- MARTIN. Jarabe. 3090. Poción. 6426.
- MARTINET. Miel. 4314. Tratamiento. 9099.
- MARTINIER. Opiata. 4700.
- MARTINITZ. Colirio. 1296.
- MARTIN SOLON. Limonada. 3732. Píldoras. 5861. Pociones. 6075, 6367. Pomada. 8089. Solucion. 8438. Tratamiento. 9080.
- MARTIUS. Vinagre. 9377.
- MASCAGNI. Mercurio. 255, t. I. Tisanas. 8850, 8974.
- MASDEVAL. Electuario. 1583. Opiata. 1583.
- MASIUS. Polvo. 7035.
- MASSAU. Píldoras. 5218.
- MATHIEU. Remedio. 8267.
- MATTHIOLO. Alcoholato 281. Espíritu. 281.
- MAUNOIR. Píldoras. 5158.
- MAURAT. Pasta. 4781.
- MAURY. Electuario. 1530. Lociones. 4093, 4125. Polvos. 3755, 7150.
- MAURICHEAU-BEAUPRÉ. Inyeccion. 2716.
- MAYER. Colutorio. 1298.
- MAYOR. Martillo. 198, t. I.
- MAZUYER. Especies. 2115.
- MEAD. Electuario. 1462.
- MEASED. Píldoras. 5829.
- MEGÉ. Grajea. 4871.
- MEGLIN. Píldoras. 5226.
- MEIRIEU. Agua. 163. Polvo. 7313.
- MEJEAN. Emplasto. 1891.
- MELIER. Pomadas. 7849, 8003.
- MELLIN. Píldoras. 6046.
- MENDACA. Poción. 6209.
- MENDE. Poción. 6306.
- MENIERE. Moscas. 9347. Pomada. 7826. Solucion. 8429.
- MENZER. Polvos. 7300, 7393.
- MERAT. Píldoras. 5816, 5817, 5868. Tratamiento. 9121.
- METTEBERG. Agua. 200.
- METZ. Bálsamo. 429.
- METZINGER. Febrífugo. 5646. Píldoras. 5646.
- MEYER. Bebida. 484. Colutorio. 1310. Electuario. 1538. Esencia. 2041. Especies. 2081, 2084. Linimentos. 3966, 4024. Mistura. 4513. Píldoras. 5850. Pociones. 6417, 6553. Polvo. 7175.
- MEZA. Píldoras. 5207.
- MEZAIZE. Aguardiente. 74.
- MEZUE. Granos. 5625.
- MIALHE. Aceite. 34. Aguas. 165, 166, 184. Bálsamos. 385, 425. Cocimiento. 1026. Colirios. 1142, 1181, 1197. Compresa. 1362. Chocolate. 1419. Elixir. 1663. Emplasto. 1778. Emulsion. 1979. Fomento. 2265. Gargarismos. 2433, 2471. Inyecciones. 2725, 2726. Jarabes. 2943, 3058, 3059, 3152, 3189. Lavativa. 3490. Leche. 3646. Licores. 3711, 3724. Limonadas. 3740, 3746. Medicina. 4234. Mistura. 4361. Nitrato. 261, t. I. Opiata. 4706. Píldoras. 5417, 5429, 5431, 5664, 5756, 5761, 5765, 5928, 5984, 5986, 5989. Pociones. 6255, 6323, 6536, 6661. Polvos. 7167, 7259, 7340. Pomadas. 7764, 7766, 7796, 7947, 7985. Tabletas. 4966. Tópico. 9056. Tisana. 8884. Vejigatorio. 9332.
- MICHALESHUL. Papel. 4720.
- MICHEL. Bebida. 513. Píldoras. 6038.
- MICHU. Opiata. 4702.
- MIGNOT. Electuario. 1509. Lavativa. 3489. Píldoras. 5341. Polvo. 7105. Pomada. 8014. Tópicos. 9042, 9052.
- MILIUS. Ungüento. 9245.
- MILLE. Espadrapo. 2065.
- MILLAR. Lavativa. 3500. Pociones. 6225, 6282. Ungüento. 9199.
- MINSICHT. Cocimiento. 1072. Elixir. 1688.
- MIQUEL. Pomada. 7784. Tisana. 8977.
- MIQUELARD. Granitos. 2589. Hierro. 214, t. I. Pastillas. 4861.
- MISTLER. Jarabe. 2994.
- MOJON. Colirio. 1150.

MOHE. Papel. 4721.
 MOLINARI. Polvo. 6920.
 MOLL. Lavativas. 3546, 3614.
 Linimento. 3973.
 MOMBERT. Colutorio. 1344.
 MONDEZERT. Píldoras. 5450.
 MONDIERE. Bebida. 483. Píldoras. 5875. Sacaruro. 8294. Tisana. 8848.
 MONGENOT. Pociones. 6430, 6609. Polvo. 7354.
 MONOD. Pomada. 8085.
 MONRO. Mistura. 4520.
 MONTAIGU. Píldoras. 5159.
 MONTAIN. Mistura. 4562.
 MONTEROSI. Agua. 177.
 MONTESE. Tópico. 9049.
 MOORE NELIGAN. Mistura. 4453.
 MORAND. Collar. 1361.
 MOREAU. Eter. 2182.
 MORETI. Mercurio. 255, t. I.
 MORGAN. Jarabe. 3128.
 MORISON. Píldoras. 5855, 5856.
 DR. MORRES. Linimento. 3942.
 MORRIES. Mistura. 4385.
 MORRUS. Solucion. 8439. Tinturas. 8705, 8807.
 MORT. Colirio. 1233.
 MORTON. Píldoras. 5318, 5319.
 MOSCATI. Píldoras. 5835. Tintura. 8712.
 MOSELLY. Píldoras. 5859.
 MOST. Baño. 452. Electuario. 1497. Linimento. 3951. Mezcla. 4254. Misturas. 4333, 4335, 4468, 4628. Poción. 6118. Píldoras. 5091, 5233, 5701. Polvo. 7310.
 MOTTE. Gotas. 2579.
 MOUCHON. Azúcar. 8305. Emplasto. 1776. Jalea. 2897. Jarabes. 2942, 2954, 2957, 2981, 3023, 3037, 3095, 3158, 3167, 3179, 3195. Moscas. 9348. Pastas. 4776, 4786. Pastillas. 4835, 4880. Sacaruro. 8307.
 MOUTON. Polvo. 7329.
 MOXON. Magnesia. 241, t. I.
 MULLER. Agua. 173. Polvo. 7040.
 MURRAY. Bolos. 591. Píldoras. 5690.
 MURSINNA. Polvos. 6793, 7274.

MUSTARD. Linimento. 3956.
 MUTZEL. Mistura. 4541.
 MUTIS. Cerveza. 966.
 MYLIUS. Emulsion. 1951.

N.

NANCY. Bo las. 534.
 NARD. Solucion. 8432.
 NASSE. Lavativa. 3587. Vinagre. 9378.
 NATLEY. Tisana. 9018.
 NAUCH. Caldo. 716.
 NAYLOR. Pomada. 8154.
 NEGRIER. Colirio. 1191. Jarabe. 3248. Locion. 4117. Tratamiento. 9088.
 NELJUBIN. Agua. 174.
 NEUBLER. Aceite. 44.
 NEUBER. Miel. 4316.
 NEUMANN. Colirio. 1236. Emplasto. 1744. Fomentos. 2271, 2308. Linimentos. 3814, 3961. Mezcla. 4255. Misturas. 4369, 4394, 4528. Píldoras. 5111, 5236, 5377, 5578. Polvo. 7294. Pomada. 7738. Ungüento. 9295.
 NICATO. Inyeccion. 2705.
 NICOLAI. Polvos. 7019, 7134.
 NIEL. Pomadas. 7687, 7775, 7886. Tópico. 9041.
 NIEMANN. Emulsion. 1952. Misturas. 4496.
 M. V. NIVEL. Píldoras. 5938.
 NOEL THIAVILLE. Sacarolado. 8315.
 NOLL. Poción. 6308.
 NONIN. Mistura. 4442.

O.

OBRIEN. Píldoras. 5876.
 OCKEL. Píldoras. 6020. Poción. 6516.
 ODIER. Polvos. 7098, 7201.
 OFFERT. Jarabe. 3327.
 OLIER. Mermelada. 4239.
 OLIVENCIA. Polvos. 6925.
 OMEARA. Agua. 207.
 ORDINAIRE. Pomada. 7858.

OSIANDER. Pociones. 6191, 6239.
Polvos. 7195, 7485.
OSTERMAIER. Cimento. 982.
OTTO. Polvos. 6962, 7536.
OUDET. Mistura. 4578.
OXLEY. Elixir. 1646.

P.

PADRE BERMUDEZ. Conserva. 1374.

PAGE. Lavativa. 3613. Pomada. 8098.

PAJOT LAFORET. Emplasto. 1786. Opiata. 4670.

PALACIOS. Tintura. 8630.

PALIDEAU. Jarabe. 3086.

PARACELSO. Elixir. 1687. Específico. 2144. Liliun. 8772.

PARENT. Gargarismo. 2449. Píldoras. 5389, 5391, 5392. Poción. 6210. Pomada. 7748. Tintura. 8675.

PARIS. Píldoras. 5606. Ungüentos. 9166, 9278.

PARISET. Píldoras. 5101, 5892.

PARMENTIER. Bolos. 629. Pasta. 4788. Píldoras. 5601. Vino. 9439.

PASSERINI. Tisana. 8996.

PATTERSON. Píldoras. 5774.

PAYAN. Mistura. 4486. Pasta. 4763. Tratamientos. 9105, 9113.

PAYEN. Jarabe. 3182.

PEACOK. Mistura. 4401.

PERCY. Cauterio. 198, t. I.

PEARSON. Licor. 3686. Linimento. 3880.

PELLENGAN. Linimento. 4010.

PELLETIER. Bálsamo. 360. Jabon. 2852. Odontina. 4644. Polvo. 7170.

PENNES. Gragea. 2581, 2582, 2591, 2595.

PENOT. Espiritu. 2152.

PERAIRE. Jarabe. 3021. Polvo. 7333.

PERARD. Poción. 6117.

PEREBOON. Licor. 379.

PERRIN. Polvo. 6808.

PESCHIER. Aceite. 31. Píldoras. 6047, 6048. Tintura. 8742.

PESSINA DE MILAN. Moscas. 9349.
PETER. Píldoras. 5897. Pomada. 7862.

PETTER HOFER. Emplasto. 1732.
PETIT. Jarabe. 3331. Linimento. 3909. Píldoras. 5104, 5160.

PETREQUIN. Gargarismo. 2434. Linimento. 4022. Pomada. 8140.

PETROZ. Caldo. 712.

PETZOLD. Miel. 4310.

PEYRILLO. Elixir. 1685. Jarabes. 3272, 3108.

PEYSSON. Poción. 6494, 6495. Pomada. 8102.

PEZOLE. Píldoras. 5677.

PFEIFER. Jabon. 2876.

PIDERIT. Agua. 170. Infusion. 2651. Píldoras. 5161, 5208. Tópico. 9067.

PIDOUX. Chorros. 1427. Fomento. 2312.

PIEDAGNEL. Píldoras. 5760. Poción. 6397.

PIERQUIN. Agua. 180. Baño. 462. Colutorio. 1331. Confites. 1366. Cremas. 1392, 1393. Chocolates. 1399, 1403, 1420. Fomento. 2328. Gelatina. 2891. Inyeccion. 2797. Licor. 3672. Linimento. 3898. Loción. 4099. Pastillas. 4819. Píldoras. 5041, 5162, 5494, 5676, 5776. Poción. 6160. Pomada. 7968. Rosoli. 8809. Tabletas. 4876. Té. 8582. Tinturas. 8716, 8752, 8809. Tisana. 8855.

PIERRE. Colirio. 1265.

PIESTE. Mistura. 4580. Píldoras. 5655.

PIGEAUX. Licor. 3697. Píldoras. 5468.

PIGNE. Solucion. 8437.

PIOREL. Mezcla. 4257. Pomada. 8104.

PII. Loción. 4052. Poción. 6146. Polvo. 6985.

PINEL GRANDCHAMP. Pomadas. 8107, 7859.

PIRLAS. Lapiceros. 3440, 3441.

PIRWITZ. Papel. 4724.

PITSCHAFF. Mistura. 4537. Píldoras. 5504, 5514, 5567, 5918. Poción. 6283, 6390, 6445, 6640,

6641. Polvos. 6972, 7085, 7395. Pomada. 7785.

PITZCHEFT. Poción. 6343. Polvo. 7071.

PISSIER. Emplasto. 1742. Linimento. 3970.

PLANCHE. Emplastos. 1761, 1775. Leche. 3651. Píldoras. 5840. Polvo. 7510. Pomadas. 7744, 8023.

PLEINDOUX. Fomento. 2258.

PLENCIZ. Píldoras. 5163.

PLENCK. Aguas. 125, 240. Bálsamos. 363, 432. Candelillas. 736. Cataplasmas. 759, 774. Colirio. 1247. Chorro. 1425. Digestivo. 1439. Epilatorio. 4769. Extracto. 2240. Gargarismos. 2509, 2516. Inyección. 2804. Jarabe. 4565. Lavativa. 3592. Leche. 3467. Licor. 3692. Linimentos. 3777, 3829, 4025. Mercurio. 255, t. I. Misturas. 4558, 4604. Pasta. 4769. Píldoras. 5703, 5832, 5840. Poción. 6528. Polvo. 7036. Tisana. 8869. Tintura. 8736. Ungüento. 9214. Vino. 9488.

PLISSON. Bebida. 508. Maceración. 4223. Mistura. 4404. Solución. 8478.

PLUMMER. Píldoras. 5902, 5903, 5904. Polvo. 7439.

PLUNKETT. Polvos. 6948, 7450. Pomada. 7605.

PODRECA. Píldoras. 5129.

POERNER. Extracto. 2200.

POISSON. Polvo. 7166.

POLLAU. Cáustico. 858. Pasta. 858.

POLLINI. Cocimiento. 1088.

POLYA. Polvos. 6936.

POPPER. Solución. 8435.

PORTA. Píldoras. 5371.

PORTAL. Jarabes. 2983, 3275.

PORTER. Licor. 3693.

POTT. Cerato. 920. Jabon. 2154. Linimento. 3986. Pomada. 7721.

POUGENS. Caldo. 704. Remedio. 8275. Tópico. 9044.

POULAIN. Inyección. 2727.

POUZIN. Pomada. 7619.

PRADEL. Poción. 6240.

PRADIER. Cataplasma. 753. Remedio. 753.

PREMIER. Agua. 222.

PRESSAT. Gargarismo. 2435.

PRESSAVIN. Licor. 3716.

PREZIOZI. Bebida. 504. Looc. 4208. Poción. 6491.

PRINCE. Polvo. 7443.

PRINGLE. Bolos. 663. Cocimientos. 1089, 1095. Gargarismo. 2472. Inyección. 2827. Pomadas. 7620, 7621, 8109.

PRIVAT. Poción. 6378.

PRODHOME. Agua. 138.

PUCHE. Bolos. 664. Extracto. 2217. Jarabes. 2993, 3005, 3040, 3096, 3199, 3201, 3315. Linimento. 3883. Píldoras. 5765, 6042. Soluciones. 8450, 8453. Tintura. 8754.

PURMANN. Remedio. 8241.

PUTEGNAT. Remedio. 8240. Tópico. 9040. Tratamiento. 9098.

Q.

QUARIN. Apocema. 320. Cocimiento. 993. Electuarios. 1559, 1568, 1594. Emulsión. 1980. Gargarismos. 2491, 2521. Misturas. 4389, 4588, 4598, 4599. Píldoras. 5130, 5291, 5451, 5475, 5488. Poción. 6123, 6682. Polvo. 7457. Remedios. 8276, 8277. Tisana. 8854.

QUERCETAN. Agua. 225.

QUESTIONAN. Embrocación. 1721.

QUEVENNE. Granillos. 2588, 2589. Jarabe. 3121. Pastillas. 4861. Poción. 6399.

QUINCY. Polvo. 6857.

R.

RADCLIF. Elixir. 1694.

RABEL. Agua. 71.

RACIBORSKI. Poción. 6352.

RADEMACHER. Pomada. 7793.

RADIUS. Bálsamo. 383. Emplasto. 1880. 1920. Especies. 2143.

- Gargarismo. 2494. Jalea. 2893. Lavativa. 3599. Linimento. 3896, 4007. Looc. 4180. Píldoras. 5079, 5111, 5293, 5678, 5951, 5988, 6058. Pociones. 6130, 6244, 6284, 6285, 6477, 6529, 6530. Polvos. 7290, 7539. Pomadas. 7719, 7881, 7966. Tintura. 8590. Tisana. 9009. Vino. 9480.
- RAGOLO. Polvos. 6853, 7089.
- RAMM. Mistura. 4581.
- RAMICH. Trociscos. 8159.
- RANQUE. Agua. 90. Cocimiento. 994. Linimentos. 3828, 3863. Mistura. 4625. Tratamiento. 9079.
- RASORI. Julepes. 3395, 3429. Píldoras. 5937, 5115, 5937.
- RASSIS. Ungüento. 7735.
- RASPAIL. Agua. 229. Baño. 443. Candelillas. 725. Cataplasma. 848. Cigarritos. 971. Espadrapo. 2053. Lavativa. 3624. Pomada. 7598. Vinagre. 9353.
- RAST. Linimento. 3974.
- RATH. Píldoras. 5387.
- RAULINO. Elixir. 1695.
- RAYER. Misturas. 4326, 4444, 4512, 4620. Píldoras. 5043, 5112, 5561, 5920. Pociones. 6492, 6634. Tisana. 8947.
- REBEILLE PARISE. Colirio. 1190.
- REBOUL. Elixir. 1703.
- RECAMIER. Cáustico. 859. Colirio. 1266. Electuario. 1512. Looc. 4218. Miel. 4315. Mistura. 4439. Píldoras. 5059, 5070, 5131, 5225, 5248, 5292, 5456, 5476, 5477, 5684. Pociones. 6260, 6735. Polvos. 6795, 6796, 6809, 6880, 7238, 7407, 7505. Pomada. 7763. Tisana. 8930. Vino. 9434.
- RECHOUX. Cerato. 922.
- REGENT. Pomadas. 8066, 8119, 8120.
- REGIMBEAUD. Cerato. 892.
- REGNARD. Polvo. 7144.
- REGNAULT. Pasta. 4790.
- REIL. Linimentos. 3975, 3903. Ungüentos. 37, 9283.
- REINIGEN. Colirio. 1223.
- REINOLD. Específico. 9459. Vino. 9459.
- REITZ. Remedio. 8246.
- REMER. Mistura. 4381. Pociones. 6139, 6718.
- REYNAUD. Tratamiento. 9076.
- RENAUT. Elixir. 1618. Jarabe. 2948.
- RENOU. Píldoras. 5841, 5940.
- RENER. Poción. 6221.
- REQUIN. Electuario. 1590. Píldoras. 5049. Poción. 6354.
- REUSS. Cataplasma. 766. Electuarios. 1478, 1599. Espíritu. 2164. Polvo. 7545. Supositorio. 8553. Tintura. 8776. Vinagre. 9369.
- REVEILLÉ-PARISÉ. Colirio. 1241. Linimento. 3874. Tratamiento. 9082.
- REY. Tratamiento. 9073.
- REYNAL. Candelillas. 739.
- RHASSIS. Colirios. 1155, 1156. Trociscos. 9145. Ungüentos. 9190, 9191, 9192.
- RIGHINI. Bolos. 594. Emulsion. 1940. Fomento. 2815. Locion. 4119. Pastillas. 4830. Píldoras. 5680.
- RHOTHE. Píldoras. 5726.
- RIBES. Píldoras. 5499.
- RIBKE. Linimento. 3948.
- RICORD. Cerato. 916. Emplastos. 1777, 1792, 1809. Espadrapos. 2060, 2075. Fomentos. 2256, 2294, 2320, 2337, 2340, 2342, 2345, 2346. Gargarismos. 2388, 2397, 2409, 2436, 2458, 2502, 2503, 2510. Inyecciones. 2690, 2691, 2703, 2704, 2715, 2728, 2752, 2795, 2818, 2822, 2837, 2847. Jarabes. 3029, 3109, 3150, 3160, 3190, 3192, 3200, 3308, 3354. Lavativas. 3521, 3524, 3532, 3590. Locion. 4081. Píldoras. 5046, 5365, 5462, 5741, 5742, 5743, 5878. Poción. 6315. Pomadas. 7650, 7713, 7788, 7800. Rob. 3109. Soluciones. 2320, 8365, 8381, 8428, 8488, 8505. Tintura. 8750. Tisanas. 8965, 9013. Tratamientos. 9074, 9075, 9129.
- RICOURT. Bálsamo. 364. Emplasto. 1756. Ungüento. 9300.

- RICHARD. Fomento. 2336. Locion. 4056. Vino. 9484.
- RICHARD DE HAUTENSIERK. Bálsamo. 378. Bolos. 655, 672. Licor. 3678.
- RICHARDIN. Linimentos. 3881, 3990.
- RICHELIEU. Pastillas. 4883.
- RICHTER. Bolos. 616. Cataplasma. 751. Colirios. 1159, 1188, 1206. Emplasto. 1743. Fomento. 2329. Julepe. 3390. Mezclas. 4249, 4251. Mistura. 4364, 4447, 4631. Píldoras. 5084, 5240, 5448, 5679. Pociones. 6138, 6174, 6307, 6458, 6699, 6705. Polvos. 6823, 6839, 6864, 7179, 7440, 7477, 7506.
- RIECKE. Píldoras. 5064. Pomadas. 7679, 7928, 7959.
- RIBES. Píldoras. 5613.
- RIEL. Pocion. 6262.
- RIGATELLI. Sal. 323, t. I.
- RIGHINI. Aceite. 19. Agua. 91. Bolos. 581. Cataplasma. 776. Colutorio. 1345. Electuarios. 1454, 1569. Emulsion. 1986. Jarabe. 3053. Mistura. 4617. Píldoras. 5255, 5490, 5529. Pocion. 6070. Polvo. 7003. Pomada. 7969. Tratamiento. 9104. Ungüento. 9179.
- RILLIET. Píldoras. 5862.
- RING. Mistura. 4321.
- RITTERICH. Pomada. 8013.
- RITTMANN. Píldoras. 5944.
- RITTON. Píldoras. 5219, 5441.
- RIVERIO. Pocion. 6145.
- RIVET. Jarabe. 3261.
- RIVIERE. Aceite. 47. Caldo. 703. Pomada. 7733.
- ROBERT. Píldoras. 5520.
- ROBINET. Jarabe. 3213. Pastillas. 4909. Polvo. 7379. Tabletas. 4909.
- ROBERTO WITH. Tintura. 8832.
- ROBERTO TOMAS DE SALISBURY. Opiata. 4671. Pocion. 6341. Polvo. 7482.
- ROBIQUET. Bebida. 497.
- ROCHE. Embrocacion. 1723.
- RODERBURG. Emplastos. 1839, 1840.
- RODINGTON. Polvo. 7031.
- RODRIGUEZ. Pastillas. 4827.
- ROESCH. Mistura. 4325.
- ROESEBERG. Mistura. 4476.
- ROGNETTA. Inyeccion. 2788. Píldoras. 5405. Pomadas. 7600, 7725.
- ROLB. Pomadas. 8120, 7850.
- RONANDER. Píldoras. 5202, 5652.
- RONCALLI. Linimento. 3992.
- RONZEL. Tratamiento. 9122.
- ROSENSTEIN. Emulsion. 1928. Leche. 3640.
- ROSEN. Linimentos. 3836, 3991. Mermelada. 4243. Píldoras. 5209, 5907. Polvos. 6847, 7484. Pomada. 7818. Soluciones. 2543, 8406. Vino. 9430.
- ROSENTHAL. Pomada. 8181. Polvos. 6858, 7087.
- ROSSIGNON. Aguardiente. 8779. Alcoholado. 8779. Tintura. 8779.
- ROSTAN. Lavativas. 3482, 3539.
- ROTH. Electuario. 1466. Esencia. 1641.
- ROTHAMEL. Pocion. 6710.
- ROUCHER. Apocema. 329. Bolos. 609, 680. Caldo. 702. Cocimiento. 1091. Fomento. 2295. Julepe. 3385. Lavativa. 3517. Looc. 4191. Opiata. 4679. Píldoras. 5540, 5681. Polvo. 7293. Pocion. 6676.
- ROUGIER. Píldoras. 5854, 5960.
- ROUSSELOT. Polvo. 6949.
- ROUSSE. Inyeccion. 2757.
- ROUSSEAU. Láudano. 3449. Opio. 3448. Vinos. 3448, 9401.
- ROUX. Embrocacion. 1715. Jarabe. 3030. Mistura. 4440. Tópico. 9071.
- ROY. Pocion. 6585.
- LE ROY. Purgante. 8203. Vomitivo. 8204.
- J. RUCCO de NÁPOLES. Licor. 3725.
- RUSH. Emulsion. 1957.
- RUE. Píldoras. 5169.
- RUEF. Píldoras. 5869.
- RUETTE. Pediluvio. 4982. Polvo. 6815.
- RUFUS. Píldoras. 5947.
- RULAND. Bálsamo. 54.
- RULLIER. Linimento. 3892.

- RUPIPUS. Polvo. 7478.
 RUSCH. Baño. 450.
 RUSPINI. Tintura. 8819.
 RUSSEL. Bebida. 519. Etiope. 2199. Jalea. 2901.
 RUST. Agua. 213. Colirios. 1145, 1161. Emplastos. 1793, 1796. Inyecciones. 2729, 2739, 2763. Lociones. 4046, 4126, 4153. Mezclas. 4250, 4271. Misturas. 4386, 4591. Píldoras. 5074, 5093, 5455, 5877, 5942. Poción. 6101. Polvos. 6866, 6888, 6910, 6930, 7120, 7199, 7399. Pomadas. 7626, 7672, 7682, 7841, 8076, 8118, 8132.
 RUSTAING. Emplasto. 1879.
 RYAN. Mistura. 4532.
 RYMER. Tintura. 8691.
- S.**
- SACHS. Electuario. 1442. Píldoras 5653. Polvo. 7489.
 SACHSE. Locion. 4104.
 DR. SAFFERT. Tratamiento. 9101.
 SAIFFER. Píldoras. 5927.
 SALAZAR. Bálsamo. 8806.
 SALISBURY. Poción. 6695.
 SALVADORI. Tisana. 8996.
 SAMSON. Solucion. 8489.
 SANCHEZ. Alcoholado. 369. Bálsamo. 369. Píldoras. 5799.
 SANDRAS. Bebida. 499. Julepe. 3400. Píldoras. 5452, 5872. Poción. 6363. Polvo. 7072. Pomadas. 7753, 7905, 8034.
 SANDROCK. Píldoras. 5055.
 SANTOLI. Polvo. 7095.
 SARRASIN. Píldoras. 5249.
 SAUNDERS. Gargarismo. 2437. Lejía. 3656. Píldoras. 5139.
 SAUVAN. Jarabe. 3305.
 SAUVE. Jarabe. 3348.
 SAVE. Pomada. 8009.
 SAVARESI. Jarabe. 2995.
 SAVIARD. Locion. 4106.
 SCARPA. Colirios. 1118, 1143, 1267, 1270. Pomada. 8068.
 SCASSI. Agua. 110.
 SCOTT. Pediluvio. 4987.
- SCUDAMORE. Mistura. 4611. Soluciones. 8506, 8371. Píldoras. 5631.
 SCHAEFFER. Poción. 6541.
 SCHAEUFFELE. Espadrapos. 2052, 2072.
 SCHARN. Locion. 4146.
 SCHLESIER. Polvo 6810. Solucion. 8383.
 SCHMALZ. Licor. 3690. Polvo. 7441.
 SCHMIDTMANN. Poción. 6284.
 SCHMITT. Linimentos. 3894, 3906. Píldoras. 5097. Póciones. 6186, 6415. Polvo. 7415. Pomadas. 8087, 8182. Remedio. 8266.
 SCHMUKER. Fomentos. 2268, 2269. Linimento. 3960. Píldoras. 5182, 5449.
 SCHNEIDER. Misturas. 4475, 4514, 4632, 5116, 5374. Póciones. 6285, 6286. Polvos. 6908, 7436, 7260, 7781.
 SCHOEYS. Polvo. 6805.
 SCHREDER. Acidos. 63, 79, t. I.
 SCHROEDERER. Píldoras. 5997. Póciones. 6102, 6126. Polvos. 6831, 6891.
 SCHUBARTH. Electuario. 1447. Linimento. 3893. Píldoras. 5294, 5943. Poción. 6476. Polvo. 6829.
 SCHULZ. Agua. 176. Mistura. 4358.
 SCHUSSMANN. Poción. 6388.
 SCHUSTER. Linimentos. 3831, 4003, 4004.
 SCHWARTZ. Linimento. 3839. Mistura. 4602. Poción. 6181. Solucion. 8491.
 SCHYRON. Colutorio. 1311.
 SEDILLOT. Píldoras. 5811, 5843.
 SEGOND. Píldoras. 5962.
 SEGUIN. Vino. 9496.
 SEIDEL. Mistura. 4454.
 SELLE. Agua. 210. Colirio. 1243. Conserva. 1369. Electuario. 1476. Emplasto. 1738. Elixires. 1637, 1674, 1697. Jarabes. 3125, 3264, 3269, 8286. Misturas. 4332, 4503, 4539. Píldoras. 5210. Póciones. 6190, 6542. Polvo. 7206.
 SEM. Poción. 6356.

- SENAC. Cocimientos. 1059, 1090. Electuario. 1562.
 SENCY. Polvos. 7060, 7515.
 SERRE. Inyecciones. 2742, 2819. Píldoras. 5257. Poción. 6493.
 SEVIN. Espadrapo. 2051.
 SEYFFER. Polvo. 7516.
 SICARD. Pastillas. 4860. Pomada. 7776.
 SICHEL. Colirios. 1119, 1154, 1160, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182. Embrocaciones. 1718, 1719, 1720. Fomentos. 2276, 2319. Polvos. 6867, 6917, 6918, 6921, 6924, 7417, 7418, 7419, 7420, 7467. Pomadas. 7703, 7665, 8067, 8015, 8069, 8070, 8071, 8115. Soluciones. 8419, 8494.
 SIEBOLD. Linimentos. 3817, 4001.
 SIEDLER. Polvo. 7037.
 SIEGLER. Bolos. 587.
 SIEMERLING. Cosmético. 1941. Emulsion. 1941.
 SILVIO. Alcoholato. 275. Espiritu. 275. Mistura. 4615.
 SIMON. Fricciones. 2351.
 SINOGOWITZ. Electuario. 1570.
 SIREL. Mezcla. 4261.
 SMELLONE. Ungüento. 9284.
 SMITH. Agua. 144. Bolos. 605. Esencia. 2033. Especies. 2136. Extracto. 2246. Fumigación. 2361. Gargarismo. 2423. Mezcla. 4258. Oenolado. 9533. Píldoras. 5622, 5682. Polvo. 6916. Vinos. 2033, 9533.
 SOBREGONDI. Mistura. 4470.
 SOMERVAIL. Emulsion. 1937.
 SOMMERVAL. Polvo. 7246.
 SORBI. Zumo. 9559.
 SORDET. Linimento. 3844.
 SOUBEIRAN. Baño. 442. Jarabes. 2956, 2967, 3154, 3250. Pociiones. 6536, 6537. Solucion. 8508. Vino. 9440.
 SOUBERBIELLE. Macerado. 4224.
 SPINA. Elíxires. 433, 1647.
 SPANGENBERG. Licor. 3679.
 SPEEDIMANN. Píldoras. 5965.
 SPIC. Cigarros. 980.
 SPIEGEL. Polvo. 7422.
 SPIELMANN. Alcoholato. 300. Apocema. 336. Cocimiento. 1667. Electuario. 1615. Gargarismo. 2501. Infusion. 2668. Inyeccion. 2777. Jarabe. 3127. Opiata. 4667. Píldoras. 5717. Pociiones. 6137, 6292, 6712. Tintura. 2668. Vinagre. 9354.
 SPINELLY. Electuario. 1485.
 SQUIRE. Elixir. 1698.
 SPILSBURY. Gotas. 2548.
 DR. C. SPINELLI. Pomada. 7668.
 SPITZLAY. Tabletas. 4968.
 DR. SPITTA. Trociscos. 9149.
 STAHL. Agua. 139. Esencia. 2019. Especies. 2108. Fomento. 2349. Poción. 6358. Polvo. 6973.
 STANDIRK. Tisanas. 8919, 8999.
 STANNAY. Pomada. 7898.
 STARK. Píldoras. 5813.
 STARKEY. Jabones. 2883, 2884.
 STEARNS. Infusion. 2677. Pociiones. 2677, 6714.
 STEEL. Pastillas. 4822.
 STEMBERG. Píldoras. 6021.
 STEVENSON. Polvo. 6782.
 STHAL. Poción. 6713. Polvo. 7229.
 STOLL. Bebida. 487. Linimento. 3989. Píldoras. 5037, 6011. Poción. 6755. Tisana. 8886.
 STOREY. Bizcochos. 532.
 STOKES. Linimento. 4005.
 STORCK. Píldoras. 5215, 5501.
 STOUGTON. Elíxires. 1669, 8615.
 STUTZ. Poción. 6715.
 SUNDELIN. Colutorio. 1318. Emplasto. 1823. Lavativa. 3561. Loción. 4032. Misturas. 4328, 4336, 4337, 4548. Píldoras. 5113, 5298, 5612. Pociiones. 6091, 6241, 6446, 6705. Polvos. 6781, 6801, 7522. Pomada. 8125.
 SUTRO. Pomada. 7835.
 SWEDIAUR. Bebida. 9365. Bolos. 622, 625, 630. Candelillas. 738. Cataplasma. 755. Cocimientos. 1044, 1102. Colutorio. 1299. Electuarios. 1467, 1498, 1616. Embrocacion. 1711. Emplastos. 1768, 1790, 1811. Emulsiones. 1945, 1949, 1995. Fomentos. 2259,

2330. Gargarismos. 2446, 2459, 2486, 2495, 2531, 2541. Gotas. 2575. Inyecciones. 2730, 2782. Jarabe. 3314. Licores. 2695, 3696, 4023. Linimentos. 3837, 4023. Lociones. 4038, 4101. Looc. 4174. Mezcla. 4306. Miel. 4307. Misturas. 4363, 4460. Opiata. 4672. Pasta. 4766. Píldoras. 5295, 5412, 5582, 5722, 6019. Poción. 6064. Polvos. 6931, 7004, 7045, 7410. Pomada. 8170. Solucion. 8511. Suero. 8543. Supositorio. 8551. Tintura. 8654. Tisanas. 8952, 8983. Ungüentos. 9207, 9215, 9235. Vinagres. 492, 9365, 9391. Vinos. 9406, 9429.
- SWINTON. Elixir. 1659.
- SYDENHAM. Cervezas. 964, 968. Cocimientos. 1025, 1026. Electuarios. 1521, 1572. Láudano. 3446, 3447. Linimento. 3884. Mistura. 4380. Píldoras. 5211. Poción. 6249. Tabletas. 4923. Ungüento. 9219.
- SZERLECKI. Polvos. 7097, 7128, 7196. Tomas. 7097.
- T.**
- TABEAU. Cimento. 981.
- TADDEI. Alcoholato. 285. Caldo. 710. Ferculum. 2251. Inyeccion. 2743. Jarabe. 3222. Polvo. 6846.
- TANCHOU. Pasta. 4787. Saquito. 8351. Tratamiento. 9126.
- TANESVILLE. Pomada. 8019.
- TAPIE. Chocolate. 1410.
- TAVERNIER. Inyeccion. 2838.
- TAVIGNOT. Colirio. 1293. Tratamiento. 9128.
- TAYLOR. Botella. 8683.
- TEMPLE. Polvo. 7113.
- TENQUE. Gargarismo. 2532.
- TERBORGH. Pomada. 8166.
- TERRIER. Gotas. 2547. Pomada. 8173. Solucion. 8516.
- TESSIER. Electuario. 1520. Poción. 6668. Vino. 9485.
- TEULLIER. Julepe. 3391.
- THAER. Píldoras. 5013. Polvos. 7180, 7412. Remedio. 5013.
- THEDEN. Agua. 104.
- THIELMANN. Colirio. 1177. Remedio. 8280. Tópico. 9048.
- THIERRY. Cigarros. 978. Pomada. 8163. Tafetan. 4740.
- THILENIUS. Gargarismo. 2496. Mistura. 4391. Poción. 6622.
- THIVAUD. Inyeccion. 2761.
- THOMANN. Pomada. 7622.
- THOMPSON. Cataplasma. 852. Cocimiento. 1045. Píldoras. 5767. Poción. 6073. Tisana. 8975. Tópico. 9045.
- THOREL. Fomento. 2297.
- THORSTEN. Píldoras. 5464.
- TISSOT. Electuarios. 1499, 1560, 1600, 1749. Opiata. 1600, 4698. Pastillas. 4951. Píldoras. 5654.
- TJALINGIUS. Esencia. 2023.
- TODDI. Trociscos. 9141.
- TODDE. Mistura. 4619. Polvo. 6774. Pomada. 8164. Tabletas. 4821.
- TOIRAC. Mezcla. 4256. Mistura. 4579. Polvos. 7151, 7152.
- TORNAMIRA. Bálsamo. 420.
- TORTUÁL. Linimento. 3833. Ungüento. 9202.
- TOTT. Especies. 2103. Linimento. 3988. Mistura. 4367. Polvo. 6859.
- TREVEZ. Agua. 235.
- TRILLER. Licor. 3666.
- TRONCHIN. Bolos. 631. Crema. 1394. Mermelada. 4247. Píldoras. 5454, 5579, 5623, 6035. Tabletas. 4814.
- TROMSDORFF. Elixires. 1653. Tintura. 8682.
- TROUSSEAU. Agua. 160. Apocema. 337. Bolos. 555, 632. Cataplasmas. 754, 834. Cigarros. 974. Colutorio. 1330. Chocolate. 1413. Chorros. 1427. Electuario. 1585. Embrocacion. 1709. Eter. 2179. Fomentos. 2264, 2312. Fumigaciones. 2370, 4274. Inyeccion. 2750. Jarabes. 3015, 3027, 3057, 3084, 3310. Lavativas. 3510, 3515, 3620. Leche. 3634. Linimento. 4000. Lociones. 4074, 4108, 4128.

4147. Looc. 4186. Mezcla. 4274. Papel. 4746. Píldoras. 5103, 5164, 5170, 5228, 5329, 5430, 5466, 6029. Pociones. 6342, 6623. Polvos. 6845, 6912, 7107. Solucion. 8407. Supositorios. 8562. 8574. Tabletas. 4941. Tratamientos. 9086, 9114.

TRUSSEN. Fomento. 2267. Mistura. 4458. Pociones. 6368, 6748. Pomada. 7889.

TSELEPPE. Polvo. 6881.

TSUHIERCHKI. Polvo. 7057.

TULP. Litonríptico. 4559.

TUNEE. Emplasto. 1822.

TUREK. Linimento. 3809. Remedio. 8251.

TURNBULT. Embrocaciones. 1710, 1714, 1724. Linimentos. 3773, 4017, 4018, 4020. Píldoras. 5034, 5385, 6056. Pomada. 7686. Tintura. 8708.

TURNER. Cerato. 937. Píldoras. 6036.

U.

UBERTI. Píldoras. 5479.

UPSHUR. Poción. 6576.

URBAN. Polvo. 6825.

URE. Pomada. 7987.

USTEINAN. Polvo. 7114.

V.

VALCH. Píldoras. 6017.

VALENTIN. Linimento. 4016.

VALDAJOU. Ungüento. 9322.

VALSALVA. Emplasto. 1888. Escudo. 2007. Tópico. 9051.

VALLERAND. Píldoras. 5478.

VALLET. Píldoras. 5376.

VALLEZ. Pomada. 7633. Remedio. 8239.

VANDAMME. Chocolate. 1423. Píldoras. 5910. Tabletas. 4815.

VAN DER ANWIER MULIN. Pomada. 7611.

VANHELMONT. Elixir. 1689. Láudano. 3443. Polvo. 7234.

VANIER. Jarabe. 2992.

VAN MONS. Aguas. 153, 155. Bálsamos. 365, 396, 407. Bebida. 492. Cerato. 886. Hidroclorato. 155, t. I. Ojimiél. 4653. Poción. 1930. Polvo. 7470. Tintura. 8720.

VAN SWIETEN. Licores. 3723, 3724. Mistura. 4549. Poción. 6122. Suero. 8541.

VATLEBLED. Licor. 3721.

VAUMÉ. Confites. 1364.

VAUQUELIN. Bálsamo. 359. Fomento. 4268. Jarabe. 3265. Mezcla. 4268. Sal. 4268.

VAUTERS. Solucion. 8375.

VAYDI. Linimento. 3781.

VEÉ. Bolos. 652. Papel. 4729. Pasta. 4752.

VEINHOLD. Píldoras. 5901.

VELNO. Jarabe. 3335.

VELPEAU. Bolos. 540. Cáustico. 860. Colirios. 1239, 1240, 1279, 1280. Inyeccion. 2791. Lavativas. 3480, 3522, 3542. Mezcla. 4270. Píldoras. 5744, 5745. Pociones. 6584, 6625. Pomadas. 7667, 7795, 7908, 8016, 8067, 8072. Solucion. 8442. Tratamientos. 9097, 9103.

VENOT. Solucion. 8434.

VERDÉ DELISLE. Jabon. 2877. Linimento. 3878. Pomada. 7870.

VERGNES. Bálsamo. 361. Mermelada. 4245.

VERET. Mistura. 4467. Pomada. 7806. Robs. 8287.

VERNIX. Polvo. 7568.

VICAT. Agua. 89.

VICQ DE AZIR. Píldoras. 5078, 5683.

VIDAL DE CASSIS. Inyeccion. 2790. Polvo. 7118.

VIGAROUX. Tisana. 9019.

VIGO. Emplastos. 1849, 1894. Espadrapo. 2074.

VILANOVA. Jabon. 2860.

VILLERMÉ. Jarabe. 3172. Mezcla. 4289.

VILLETTE. Elixir. 1642.

VILLIE. Píldoras. 5453.

VIMMER. Polvo. 7225.

VINACHE. Tisana. 9020.

VINCEGUIERE. Bálsamo. 434.

VIREY. Bálsamos. 366, 371. Droga. 8597. Jarabes. 2949, 3346. Poción. 6635. Tinturas. 8597, 8605.

VIRICEL. Polvo. 7005.

VITZMANN. Pomada. 7899.

VOGEL. Píldoras. 5120. Pociones. 6131, 6324. Polvo. 6806, 6967. Pomada. 8020. Vino. 9538.

VOGLER. Electuario. 1477. Elixir. 1623. Masa. 4228. Polvos. 6926, 6980. Tintura. 8763. Tópico. 9035. Ungüento. 9196.

VOGT. Colutorio. 1307. Fomento. 2336. Fricción. 2357. Gotas. 2569. Inyecciones. 2731, 2740. Misturas. 4426, 4488. Píldoras. 5141, 5241, 5357, 5564. Pociones. 6562, 6736. Polvos. 6802, 6963, 7002, 7173, 7217, 7256, 7328. Solución. 8482.

VOISIN. Emplasto. 1871.

VOLPELIERE. Píldoras. 5999.

VRILLERE. Agua. 308. Alcoholato. 308.

W.

WACHTL. Poción. 6326.

WADELET. Mistura. 4416.

WADEN. Gotas. 392.

WAGENINGE. Píldoras. 5889.

WAHU. Bolos. 551.

WALCH. Píldoras. 5296.

WALKER. Arcano. 7837. Elixir. 1648.

WALSK. Píldoras. 5413.

WANT. Antigotoso. 8687.

WARDELEWORTH. Pociones. 6199, 6575. Tratamiento. 9085.

WALM. Cerato. 936.

WALTER. Colirio. 1200. Píldoras. 5908.

WALLE. Linimento. 3826. Pomada. 7632.

WARD. Esencia. 2045. Opiata. 1455. Pasta. 1587.

WARDROP. Fricciones. 2355.

WARGNER. Licor. 3699.

WARNER. Gotas. 2568. Licor. 3722.

WARTEN. Lavativas. 3540.

WAUTERS. Cocimientos. 1010, 1111. Vejigatorio. 9345.

WEBER. Linimento. 3818. Mistura. 4400. Polvo. 7078. Pomada. 7692.

WEDEKIND. Baño. 467. Píldoras. 5102, 5624.

WEDEL. Aceite. 3. Esencia. 8842. Polvo. 7437. Tintura. 8842.

WEIKARD. Píldoras. 5661. Solución. 8387.

WEINHOLD. Electuario. 1589.

WELLER. Colirios. 1189, 1294. Pomadas. 8012, 8026.

WEISS. Suero. 8542.

WENDT. Colutorios. 1315, 1324. Gargarismo. 2490. Inyección. 2845. Mistura. 4590. Pociones. 6172, 6173, 6398, 6435, 6538, 6738, 6769. Polvos. 7059, 7062, 7090, 7574. Pomada. 8037.

WENZEL. Locion. 4054.

WEPFER. Emplasto. 1799. Polvo. 6882.

WERLHOFF. Elixir. 1655. Mistura. 4633. Polvo. 7129. Pomada. 8176.

WERNECK. Eter. 2185. Píldoras. 6053, 5140. Solución. 8400.

WETZLER. Jabon. 2855. Polvo. 6981.

WHATELY. Inyección. 2844.

WILLIAN. Vino. 9458.

WHITEREAD. Linimento. 4027.

WHITT. Elixir. 1671. Mistura. 4636. Píldoras. 6022.

WIENHOFFLD. Pomada. 7797.

WILDBERG. Mistura. 4523.

WILDE. Píldoras. 5513.

WILKINSON. Electuario. 1460. Linimento. 4028.

WILSON. Mistura. 4493.

WILSIN. Papel. 4734. Tratamiento. 9072.

WILL. Inyección. 2846.

WILLAN. Pomada. 8179. Vino. 9460.

WILLIAMS ADAMS. Pomadas. 8073,

WILLIAMS KERR. Licor. 3668.

Poción. 6431.

WILLIAMS DE NERFORD. Poción. 6195.

WILLIS. Cataplasmas. 802. Elixir. 1699. Emulsion. 1996. Píldoras. 5123. Poción. 6295.

WITH. Tintura. 8609.

WITHERING. Píldoras. 5541.

WITZMANN. Pomada. 8177.

WOHELER. Mistura. 4561.

WOLFF. Polvo. 7449.

WORONEJE. Elixir. 1707.

WRIGHT. Agua. 173. Elixir. 1650.

WRITT. Linimento. 3856.

WRIGHT. Mistura. 4324.

WUTZER. Linimento. 4010. Tintura. 8828.

Y.

YOUNG. Inyeccion. 2693, 2849.

YOTT. Pomada. 8161.

YVEL. Agua. 101.

ST. YVES. Pomada. 7666.

Z.

ZACARIAS. Ungüento. 9244.

ZANETTI. Mermelada. 4248.

ZELLEMBERG. Ungüento. 9297.

ZELLER. Cerato. 911. Píldoras. 6057. Pomada. 7623.

ZITTMANN. Tratamiento. 9117.

ZIMMERMANN. Epitema. 2008.

ZIPP. Píldoras. 5165.

ZOLLICKOFFER. Tintura. 8639.



ÍNDICE ALFABÉTICO

DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTA OBRA.

ADVERTENCIA. Para la mejor distribución de los volúmenes acompaña al tomo I el índice de los medicamentos incluidos en él, y se ha reservado para este índice general solo las formas farmacéuticas de los mismos medicamentos, y los que se incluyeron en las adiciones del tomo I.

A.

- | | |
|---|---|
| Abreviaturas (Explicacion de las), I, LV. | Aceite de almendras dulces tigliado (H. DE M.), II, 12. |
| Aceites, II, 5. | » aloético bátavo, II, 5. |
| » de abrótano, I, 53. | » de ambar, II, 5. |
| » de acíbar, I, 61. | » de ambar gris, I, 83. |
| » de Agripa (F. E.), II, 7. | » de anagálide, I, 88. |
| » de ajenjo, I, 72; II, 11. | » de anís, IV, 6. |
| » de ajenjos trementinado, II, 5. | » de anís sulfurado (F. E.), II, 6. |
| » de alacranes (F. E.), II, 5. | » antihelmíntico de Chabert, II, 6. |
| » de álamo negro, I, 73. | » antihelmíntico de Chabert, (Bremser), IV, 20. |
| » alcanforado, I, 75. | » antiguo, II, 6. |
| » alcanforado (F. F.), II, 5. | » antireumático, II, 6. |
| » alcanforado (F. P.), II, 5. | » de Aparicio (F. E.), II, 6. |
| » de alcaparro, I, 75. | » aromático, II, 6. |
| » de alelí amarillo, I, 77. | |
| » de almendras dulces, I, 78. | |

- Aceite de artanita compuesto (F. E.), II, 6.
- » artrítico alcalino, II, 7.
- » de asfalto, I, 103.
- » de azucena, I, 106; II, 11 y 12.
- » de azufre (F. P.), II, 7.
- » balsámico, II, 7.
- » de balsamina, I, 109.
- » de bálsamo de copaiba, II, 7.
- » de beleño, I, 116.
- » de beleño (F. F.), II, 8.
- » de belladona, I, 118.
- » de belladona (F. F.), II, 8.
- » bezoárdico de Wedel, II, 5.
- » de boj, I, 121.
- » de brea, I, 123.
- » de brionía compuesto (F. E.), II, 7.
- » de cachorros, II, 6.
- » de cade, I, 428.
- » de calabaza pleurítico (F. E.), II, 7.
- » calmante (Righini), II, 7.
- » de cantáridas, I, 133.
- » de cantáridas (F. F.), II, 7.
- » carminativo etéreo, II, 7.
- » de castóreo compuesto, I, 141.
- » de cebadilla (Huillier), II, 8.
- » de Célebes, II, 8.
- » de cicuta, I, 148.
- » de cicuta (F. F.), II, 8.
- » de clavo, II, 12.
- » de coloquintida, I, 161.
- » comun empireumático (F. E.), II, 8.
- » de cornezuelo de centeno, I, 165.
- » de creosota, II, 8.
- » de croton tiglio, I, 428.
- » de cubebas, I, 167.
- » de delfina, I, 170.
- » de escamonea, I, 181.
- » esenciales, II, 13.
- » esencial de abrótano, I, 53.
- » esencial de ajedrea, I, 71.
- » esencial de ajenjo, I, 72; II, 14.
- » esencial de albahaca, I, 74; II, 14.
- » esencial de alcaravea, I, 76.
- Aceite esencial de almendras amargas, I, 78; II, 13.
- » esencial de ambar gris, I, 83.
- » esencial de anís, I, 90; II, 14.
- » esencial de arnica, I, 98.
- » esencial de artemisa, I, 101.
- » esencial de bergamota, II, 14.
- » esencial de canela, I, 132.
- » esencial de canela (F. F.), II, 13.
- » esencial de cardamomo menor, I, 138.
- » esencial de cariofilea, I, 139.
- » esencial de cáscara de naranja, I, 140.
- » esencial de cascarilla, I, 140.
- » esencial de cidra, II, 14.
- » esencial de cilantro, I, 149.
- » esencial de clavo, I, 152; II, 14.
- » esencial de comino, I, 161.
- » de elaterio, I, 174.
- » esencial de bayas de enebro, I, 178; II, 14.
- » esencial de eneldo, I, 178.
- » esencial de énula campana, I, 179.
- » esencial de espliego, I, 185; II, 14.
- » esencial de flores de naranjo, I, 273.
- » esencial de flores de naranjo, (F. F.), II, 14.
- » esencial de gálbano, I, 198.
- » esencial de hinojo, I, 223; II, 14.
- » esencial de hinojo marino, I, 223.
- » esencial de laurel real, I, 232; II, 14.
- » esencial de limon, II, 14.
- » esencial de manzanilla, I, 247; II, 14.
- » esencial de matricaria, I, 249.
- » esencial de melisa, I, 251.
- » esencial de menta piperita, I, 253.

- Aceite esencial de menta piperrita (F. F.), II, 14.
- » esencial de naranjas agrias (F. F.), II, 14.
- » esencial de naranjas dulces (F. F.), II, 14.
- » esencial de nuez moscada, I, 275.
- » esencial de palo de Rodas (F. F.), II, 14.
- » esencial de pimienta de Tabasco, I, 289.
- » esencial de potentilla anti-helmíntica, I, 306.
- » esencial de romero, I, 319.
- » esencial de romero (F. F.), II, 14.
- » esencial de rosa (F. F.), II, 14.
- » esencial de ruda, I, 320.
- » esencial de ruda (F. F.), II, 14.
- » esencial de sabina, I, 322.
- » esencial de salvia, I, 325.
- » esencial de salvia (F. F.), II, 14.
- » esencial de santónico, I, 329.
- » esencial de sasafrás, I, 330.
- » esencial de sasafrás (F. F.), II, 14.
- » esencial de sucino, I, 341.
- » esencial de tanaceto, I, 343.
- » esencial de tanaceto (F. F.), II, 14.
- » esencial de tomillo, I, 347.
- » esencial de tomillo (F. E.), II, 14.
- » esencial de yerbabuena, II, 14.
- » de estramonio (F. F.), II, 8.
- » de estramonio compuesto (F. E.), II, 8.
- » de estriocnina, I, 188.
- » etéreo (F. de L.), II, 9.
- » etéreo de almendras amargas (F. B.), II, 9.
- » etéreo de helecho (Peschier), II, 10.
- » etéreo de helecho macho, I, 211.
- » de euforbio, I, 191.
- Aceite de euforbio (F. E.), II, 10.
- » de eupatorio, I, 191.
- » de fenogreco (F. F.), II, 7.
- » filocomo, II, 10.
- » de filósofos (F. E.), II, 8.
- » fosforado, I, 194.
- » fosforado (Lescot), II, 10.
- » fosforado (Mialhe), II, 10.
- » del fraile (F. E.), II, 12.
- » de gordolobo, I, 206.
- » de guayaco, I, 209.
- » de hipericon, I, 223; II, 11.
- » de hipericon (F. E.), II, 10.
- » de hollin, I, 224 y 428.
- » de hormigas, II, 10.
- » de huesos de noyó, IV, 10.
- » de jazmin, I, 230; II, 12.
- » de ladrillos (F. E.), II, 8.
- » de laurel, I, 232.
- » de laurel compuesto, II, 10.
- » de lirio, II, 12.
- » lombrices (F. E.), II, 10.
- » de Maccasar, II, 11.
- » de madar, I, 240.
- » de mandrágora (F. F.), II, 8.
- » de manzanilla, I, 247.
- » de manzanilla (F. F.), II, 11.
- » manzanilla trementinado, II, 11.
- » de Marte, IV, 91.
- » de meliloto, II, 11.
- » de menta trementinado, II, 11.
- » mercurial oxigenado (Bañares), II, 11.
- » de mucilagos, II, 11.
- » de nuez moscada, I, 275.
- » de nuez sulfurado (F. E.), II, 6.
- » opiado (Neubier), II, 11.
- » otodínico (Rivière), II, 12.
- » de óxido de cobre verde (F. E.), II, 12.
- » oxigenado de Deimann, II, 12.
- » paregórico, II, 12.
- » de patatas, I, 284.
- » de pelitre, II, 12.
- » de piñones de las Indias, I, 290.
- » de propoleos, I, 307.
- » de ricino alcohólico, I, 248.

- Aceite de ricino artificial (Hufeland), II, 12.
 » de romero, II, 11.
 » de rosas, IV, 10.
 » de rosas aromáticas (F. F.), II, 12.
 » rosado, (F. F.), II, 12.
 » de ruda, I, 321.
 » de saúco, II, 11.
 » de semillas de adormideras, I, 68.
 » de succino sulfurado (F. E.), II, 6.
 » de tabaco, I, 342.
 » de tabaco (F. F.) II, 8.
 » de tapsia antireumático (F. E.), II, 12.
 » de torbisco, I, 347.
 » de torbisco (Lartigue), II, 13.
 » de trementina sulfurado (F. E.), II, 13.
 » de vainilla, IV, 10.
 » de valeriana, I, 353.
 » de Venus, IV, 10.
 » de veratrina, II, 13.
 » verde (H. DE M.), II, 12.
 » vermífugo, II, 13.
 » de violeta, II, 12.
 » volátil de limon, I, 235.
 » volátil de limón (Deschamps de Avallon), IV, 63.
 » volátil de naranja, IV, 63.
 » de yerbamora, I, 360.
 » de yerbamora (F. F.), II, 8.
 » de zumaque venenoso, I, 366.
 Acetato de manganeso, I, 434.
 » de plomo, I, 428.
 Acidos, II, 14.
 Acido arsenioso líquido (H. DE A.), II, 14.
 » cianhídrico (Harles), II, 14.
 » cianhídrico alcoholizado (Magendie), I, 63.
 » cianhídrico extemporáneo (Clarck), II, 14.
 » cianhídrico vegetal (Schradder), II, 14.
 » clorhídrico alcoholiz., II, 15.
 » hidriódico (Buchanan), II, 15.
 Acidos hidrocianhídrico vegetal de Schrader, I, 78.
 » nítrico, I, 429.
 » nítrico alcoholizado, I, 106.
 » nítrico alcoholizado (F. F.), II, 15.
 » nítrico dilatado (F. DE L.), II, 15.
 » nítrico mercurial, II, 15.
 » prúsico medicinal (Gea Pes-sina), II, 14.
 » prúsico medicinal (Magendie), I, 63.
 » sulfúrico acuoso (F. E.), II, 15.
 » sulfúrico alcoholizado (F. E. Y F.), II, 15.
 » sulfúrico con alcohol aromático, II, 217.
 » sulfúrico aromático (F. P.), II, 217.
 » sulfúrico líquido, II, 31.
 » valerianico, I, 429.
 Afusiones, I, 68.
 Agentes farmacéuticos, I, 388.
 Aguas, II, 16.
 Agua de acederilla, I, 55.
 » de ácido carbónico (F. F.), II, 29.
 » de ácido carbónico alcanforada (F. E.), II, 29.
 » acidula con bicarbonato de magnesia (F. F.), II, 33.
 » acidula con bicarbonato de potasa (F. E.), II, 17.
 » acidula con bicarbonato de potasa (F. F.), II, 17.
 » acidula con bicarbonato de sosa (F. F.), II, 39.
 » acidula simple (F. F.), II, 29.
 » acústica (Ludwig), II, 16.
 » de agraz, I, 70.
 » de Aguas Buenas, IV, 238.
 » de Aix la Chapelle, IV, 227.
 » artificial de Aix la Chapelle, IV, 228.
 » de Alamilla, IV, 265.
 » de Alange, IV, 263.
 » de Alberto el Grande, II, 17.
 » albuminosa, I, 225; II, 16.
 » albuminosa (H. M.), II, 16.

- Agua alcalina gaseosa , II , 16.
 » alcalina gaseosa (F. F.) , II , 17.
 » alcanforada (F. F.) , I , 75; II , 17.
 » de Alcantud , IV , 263.
 » de Alceda , IV , 228.
 » alexitérea espirituosa , II , 17.
 » de Albama de Aragon , IV , 264.
 » de Alhama de Granada , IV , 228.
 » de Alhama de Murcia , IV , 298.
 » de Alibour , II , 17.
 » alexitérea simple , II , 17.
 » de almendras amargas concentrada (F. A.) , II , 41.
 » de almidon , II , 17.
 » aloética mercurial , II , 17.
 » aluminosa (F. E.) , II , 17.
 » aluminosa compuesta (F. N. P.) , II , 18.
 » aluminosa (H. DE M.) , II , 18.
 » aluminosa de sulfato de zinc (F. E.) , II , 26.
 » de Alzola , IV , 299.
 » amoniacal (F. P.) , II , 18.
 » angélica , II , 18.
 » anodina de Praga , II , 18.
 » anodina de Vicat , II , 18.
 » antiépsórica (H. M.) , II , 18.
 » antiépsórica (H. DE M.) , II , 18.
 » antiépsórica (Ranque) , II , 18.
 » antiescrofulosa (Righini) , II , 18.
 » antihemicránica anisada , II , 18.
 » antiherpética del cardenal de Luynes , II , 18.
 » antiherpética (Giordano) , II , 19.
 » antimiasmática (Beiffer) , II , 19.
 » antimiasmática compuesta , II , 19.
 » antimiasmática (Koechlin) , II , 19.
 » antimonial de sulfato de hierro y magnesia (F. E.) , II , 20.
 Agua antiodontálgica , II , 19.
 » antiostálmica (Crespy) , II , 19.
 » antiostálmica (Loche) , II , 19.
 » antiostálmica (Yvel) , II , 19.
 » antipedicular (F. Cadet Gassicourt) , II , 19.
 » antipútrida de Beaufort , II , 19.
 » apopléctica , II , 218.
 » de Aquisgran , II , 227.
 » de Aramayona , IV , 229.
 » del arcabuzazo de Theden , II , 19.
 » de Archena , IV , 229.
 » de Ardales , IV , 230.
 » de Arechavaleta , IV , 231.
 » artificial de Arechavaleta , IV , 231.
 » de Arenosillo , IV , 231.
 » de Arnedillo , IV , 300.
 » aromática espirituosa (F. A.) , II , 20.
 » aromática de limon (H. M. F.) , II , 20.
 » aromática de menta piperita , II , 20.
 » de arroz , I , 98 ; II , 17.
 » de arroz (H. M. F.) , II , 20.
 » de Arteijo , IV , 299.
 » arterial (F. E.) , II , 26.
 » de avena , I , 104.
 » de azahar (F. F.) , II , 44.
 » de Azcoitia (S. Juan de) , IV , 232.
 » de Baden , IV , 232.
 » de Balaruc , IV , 303.
 » de Balaruc para bebida , IV , 301.
 » balsámica (Jackson) , II , 20.
 » de Bañares (F. E.) , II , 20.
 » de Bañeras de Luchon , IV , 233.
 » artificial de Bañeras de Luchon , IV , 234.
 » de Baños de Montemayor , IV , 234.
 » de Barambio , IV , 235.
 » de Bareges , IV , 235.

- Agua artificial de Bareges , IV, 236.
- » de barita , I, 115.
- » barítica (Scassi) , II, 20.
- » de Baza , IV, 237.
- » bendita contra el cólico de los pintores , IV, 131.
- » bendita de Ruland , IV, 198.
- » de Benimarfull , IV, 237.
- » de Bellús , IV, 301.
- » de benjuí , II, 21.
- » de Benelli (F. P.) , II, 24.
- » de Benzalema , IV, 237.
- » de bicarbonato de sosa (F. F.) , II, 33.
- » de Bilo , IV, 235.
- » de Binelli , II, 21.
- » blanca , I, 295.
- » de bola , II, 21.
- » de Bonnes , IV, 238.
- » artificial de Bonnes , IV, 238.
- » de Botot , II, 21.
- » de Bourbonne , IV, 302.
- » artificial de Bourbonne (F. F.) , IV, 303.
- » de brea , I, 123.
- » de brea (F. F.) , II, 21.
- » bromurada para bebida (F. F.) , IV, 303.
- » de Bussang , IV, 265.
- » artificial de Bussang , IV, 266.
- » de Bussang para bebida , IV, 266.
- » de Busot , IV, 303.
- » de Bayeres de Nava , IV, 255.
- » de cal , I, 129.
- » de cal (F. E.) , II, 21.
- » de cal (F. F.) , II, 21.
- » de cal compuesta (Carmichael) , II, 22.
- » de cal compuesta (F. N. P.) , II, 22.
- » de Caldas de Besaya , IV, 304.
- » de Caldas de Bohi , IV, 238.
- » de Caldas de Cuntis , IV, 239.
- » de Caldas de Estrac , IV, 305.
- » artificial de Caldas de Cuntis , IV, 240.
- Agua de Caldas de Malavella , IV, 305.
- » de Caldas de Mombuy , IV, 306.
- » de Caldes de Monthuy , IV, 306.
- » de Caldas de Oviedo , IV, 266.
- » de Caldas de la Reina , IV, 241.
- » de Caldas de Reyes , IV, 307.
- » de Caldas de Santander , IV, 304.
- » de Caldelas de Tuy , IV, 308.
- » de Caldetas , IV, 305.
- » calibeadá , II, 22.
- » calibeadá de citrato de hierro , II, 22.
- » de canela alcoholizada , I, 132; II, 42.
- » de canela hordeada , I, 132; II, 42.
- » de canela lacticinosa , I, 131; II, 42.
- » de canela vinosa , I, 132; II, 42.
- » de cañafistula , IV, 106.
- » de cañafistula emetizada (Foy) , II, 22.
- » de Carballino , IV, 242.
- » de Carballo , IV, 241.
- » carbónica (H. M.) , II, 29.
- » carmelitana (F. E.) , II, 51.
- » carmelitana (F. F.) , II, 51.
- » carmelitana con esencias , II, 52.
- » de Carratraca , IV, 242.
- » de castoreo (F. A.) , II, 22.
- » caterética de Kluge , II, 22.
- » cáustica (Plenck) , II, 22.
- » de Cauterest , IV, 243.
- » artificial de Cauterest , IV, 245.
- » de cebada (F. F.) , IV, 106.
- » celeste , II, 23.
- » celeste (F. E.) , II, 23.
- » de Cestona , IV, 309.
- » de cicuta , I, 148.
- » cloroformizada de Dorvault , I, 154; II, 23.
- » clorurada , II, 23.

- Agua de cobre amoniacal (F. E.), I, 82;
II, 23.
- » de colofonia, I, 160.
- » de Colonia (F. F.), II, 49.
- » de Contrexeville, IV, 267.
- » artificial de Contrexeville,
IV, 268.
- » de Cortegada, IV, 245.
- » de corteza de cidra lactici-
nosa (F. E.), II, 43.
- » de corteza de naranja, II,
43.
- » cosmética, III, 27.
- » cosmética (Geoffroy), II,
24.
- » cosmética (Guerlain), III,
80.
- » cosmética de Viena, II, 24.
- » de Cransanc, IV, 282.
- » de creosota, I, 166.
- » de creosota (F. P.), II, 24.
- » cristalina, III, 39.
- » cristalina de crémor de tár-
taro, III, 39.
- » de cuasia con los granos, IV,
131.
- » de Chiclana de la Frontera,
IV, 246.
- » dentífricas, II, 24.
- » dentífrica (Delabarre), II,
24.
- » dentífrica (Prodhomme), II,
24.
- » dentífrica (Stahl), II, 24.
- » destiladas, II, 41.
- » destilada (F. F.), II, 41.
- » destilada de aciano, II, 44.
- » destilada de acoro, II, 45.
- » destilada de achicorias, I,
68.
- » destilada de ajenjos, I, 72;
II, 43.
- » destilada de agrimonia, I,
70.
- » destilada de albahaca, I, 74.
- » destilada de alcaravea, I, 76.
- » destilada de almáciga, I, 78.
- » destilada de almendras a-
margas, I, 78.
- » destilada de almendras a-
margas (F. F.), II, 41.
- » destilada de almizcle, I, 80.
- Agua destilada de amapola, I, 82;
II, 45.
- » destilada de anémona, I,
88; II, 42.
- » destilada de angélica, I, 89;
II, 42 y 45.
- » destilada de angelina, I, 89.
- » destilada de anís, I, 90; II,
45.
- » destilada de anís (F. F.), II,
42.
- » destilada de anís estrellado
(F. F.), II, 42.
- » destilada de aquilea, I, 96.
- » destilada de argentina, I,
97.
- » destilada de arnica, I, 98.
- » destilada de artemisa, I,
101; II, 46.
- » destilada de asa fétida, II, 42.
- » destilada de azucena, I, 106.
- » destilada de badiana, I, 109;
II, 45.
- » destilada de bayas de ene-
bro, II, 42 y 45.
- » destilada de becabunga, I,
115.
- » destilada de berros, I, 119;
II, 43.
- » destilada de betónica, I, 119.
- » destilada de biengranada, II,
42.
- » destilada de borraja, I, 122;
II, 44.
- » destilada de camedrios, I,
131.
- » destilada de canela, I, 132.
- » destilada de canela (F. F.),
II, 42.
- » destilada de caña, I, 134.
- » destilada de cardo santo, I,
139.
- » destilada de cascarilla, I,
140; II, 42.
- » destilada de castoreo, II, 42.
- » destilada de centauro menor,
I, 146.
- » destilada de cerezas, I, 147.
- » destilada de cerezas negras,
II, 42.
- » destilada de cidra, I, 149.
- » destilada de cilantro, I, 149.

- Agua destilada de clavel rojo , I, 151.
- » destilada de clavo de especia , I, 152; II, 42.
- » destilada de coclearia , I, 157.
- » destilada de coclearia (F. F.), II, 43.
- » destilada de comino , I, 161.
- » destilada de corteza de cidra (F. E.), II, 43.
- » destilada de culantrillo , I, 167.
- » destilada de enebro , I, 178.
- » destilada de eneldo , I, 178.
- » destilada de escabiosa , I, 180.
- » destilada de escordio , I, 182.
- » destilada de espliego , I, 185.
- » destilada de espliego (F. F.), II, 43.
- » destilada de éter sulfúrico , I, 190.
- » destilada de flor de naranjo (F. F.), II, 44.
- » destilada de fumaría , I, 198.
- » destilada de galio , I, 199.
- » destilada de gatuña , I, 200.
- » destilada de helecho macho , I, 211.
- » destilada de hinojo , I, 223; II, 42 y 45.
- » destilada de hisopo , I, 224; II, 46.
- » destilada de hojas de almendro , II, 43.
- » destilada de hojas de melocoton , II, 43.
- » destilada de hojas de naranjo , I, 273.
- » destilada de imperatoria , I, 225.
- » destilada de lamio blanco , I, 231.
- » destilada de laurel real , I, 232.
- » destilada de laurel real (F. F.), II, 43.
- » destilada de lechuga , I, 233.
- Agua destilada de lechuga (F. F.), II, 44.
- » destilada de lepidio , I, 234.
- » destilada de lirio de los valles , I, 238.
- » destilada de llanten , I, 240; II, 44.
- » destilada de manzanilla , I, 247; II, 44.
- » destilada de marrubio , I, 248.
- » destilada de matricaria , I, 249.
- » destilada de mejorana , I, 251.
- » destilada de meliloto , I, 251; II, 45.
- » destilada de melisa , I, 251; II, 46.
- » destilada de membrillos , II, 43.
- » destilada de menta piperita , I, 253.
- » destilada de mirra , I, 265.
- » destilada de nenúfar blanca , I, 273; II, 5.
- » destilada de ninfea , I, 273; II, 5.
- » destilada de nuez moscada , I, 275.
- » destilada de opio , II, 45.
- » destilada de orégano , II, 45.
- » destilada de parietaria , I, 283; II, 44.
- » destilada de los palos y yemas de pino , I, 290.
- » destilada de peonía , I, 285.
- » destilada de perejil , I, 285; II, 45.
- » destilada de perifollo , I, 286.
- » destilada de pimienta , I, 288.
- » destilada de rábano rusticano (F. F.), II, 45.
- » destilada de raíz de valeriana , II, 42 y 45.
- » destilada de rosas , I, 319.
- » destilada de rosas (F. E.), II, 45.
- » destilada de rosas (F. F.), II, 45.

- Agua destilada de ruda , I , 320.
 » destilada de salvia , I , 325;
 II , 43.
 » destilada de sasafrás , I ,
 330 ; II , 42.
 » destilada de saúco , I , 332;
 II , 45.
 » destilada de semillas de pe-
 rejil (F. F.) , II , 42.
 » destilada de sérpil , II , 44.
 » destilada de tanaceto , I ,
 343 ; II , 43.
 » destilada de tilo , I , 346.
 » destilada de tilo (F. F.) , II ,
 45.
 » destilada de tomillo , I , 347;
 II , 43.
 » destilada de tusilago , I , 350.
 » destilada de valeriana , I ,
 353.
 » destilada de verónica , I ,
 356.
 » destilada de violeta , I , 358.
 » destilada de yedra terrestre ,
 I , 359 ; II , 43.
 » destilada de yerbabuena de
 sabor de pimienta (F. F.) ,
 II , 45.
 » destilada de yerba luisa , I ,
 359.
 » diurética (Duchesne) , IV ,
 214.
 » diurética alcanforada , II ,
 25.
 » diurética alcanforada (Fu-
 ller) , II , 25.
 » diurética gaseosa (Des-
 champs) , II , 25.
 » divina , II , 168 ; IV , 7.
 » de Elorrio , IV , 247.
 » de Encina hermosa , IV , 248.
 » de Enghien , IV , 248.
 » esencial de cidra , I , 149.
 » esencial de cidra (F. E.) , II ,
 43.
 » de Esparraguera , IV , 248.
 » espirituosa de Anhalt , II , 25.
 » de espliego inglesa , II , 25.
 » de espliego (Smith) , II , 25.
 » estagnótica de Monterosi , II ,
 31.
 » estíptica , II , 26.
- Agua estíptica (F. E. y H. DE M.) .
 II , 26.
 » etérea (F. F.) , II , 25.
 » etérea alcanforada , I , 75.
 » etérea alcanforada (F. F.) ,
 II , 26.
 » de extracto de zarzaparrilla ,
 II , 41.
 » fagedénica , II , 26.
 » fagedénica (F. A.) , II , 26.
 » fagedénica (F. E.) , II , 26.
 » fagedénica blanca (Van
 Mons) , II , 26.
 » fagedénica compuesta (Van
 Mons) , II , 27.
 » fagedénica negra , II , 26.
 » ferruginosa , II , 27.
 » ferruginosa acídula , II , 27.
 » ferruginosa artificial (F. P.) ,
 II , 34.
 » ferruginosa (H. DE M.) , II ,
 27.
 » ferruginosa salina (H. DE M.) ,
 II , 27.
 » de Fitero , IV , 310.
 » de flores de naranjo facti-
 cia (Cottereau) , II , 44.
 » de Font santa de San Juan
 de Campos , IV , 259.
 » de Forges , IV , 283.
 » artificial de Forges , IV ,
 284.
 » de Fortuna , IV , 311.
 » de frambuesas , I , 195.
 » de Frailes , IV , 250.
 » de Fuencaliente , IV , 284.
 » de Fuensanta (Hervideros
 de) , IV , 268.
 » de Fuente Alamo , IV , 250.
 » fundente , II , 27.
 » fundente (Lassone) , II , 83.
 » gaseosa , I , 136.
 » gaseosa de carbonato de
 manganeso , I , 435.
 » gaseosa febrífuga (Meirieu) ,
 II , 27.
 » gaseosa ferruginosa (Colom-
 bat) , II , 28.
 » gaseosa ferrurada (Mialhe) ,
 II , 28.
 » gaseosa iodurada (Mialhe) ,
 II , 28.

- Agua gaseosa de protoioduro de hierro (Dupasquier), II, 28.
- » gaseosa simple (F. F.), II, 29.
- » de Gigonza, IV, 251.
- » de goma, IV, 114.
- » de goma (F. F.), IV, 113.
- » de goma arábica, I, 205.
- » de Goulard (F. P.), II, 40.
- » de Graena, IV, 285.
- » de Grávalos, IV, 251.
- » contra las grietas de los pechos (Chaptal), II, 24.
- » gris, II, 29.
- » de Guardavieja, IV, 252.
- » de Guesalaga, IV, 309.
- » de Guesalibar, IV, 258.
- » hemostática (Bochieri), II, 29.
- » hemostática (Boyer), II, 30.
- » hemostática (Lechelle), II, 29.
- » hemostática (Monterosi), II, 31.
- » hemostática (Muller y Wright), II, 30.
- » hemostática (Neljubin), II, 30.
- » hemostática (Schulz), II, 31.
- » hemostática balsámica de Tisserand, II, 29.
- » hepática (H. M. F.), II, 31.
- » de Hermida, IV, 311.
- » de los Hervideros de Fuensanta, IV, 268.
- » artificial de los Hervideros de Fuensanta, IV, 269.
- » de Heyfelder, II, 31.
- » hidriodatada, I, 218.
- » hidrocianica vegetal, II, 31.
- » hidrosulfurada (F. F.), II, 31.
- » higiénica de Menfis, II, 30.
- » de Horcajo, IV, 312.
- » iodada de Lugol, II, 32.
- » iodo ferrurada gaseosa (Mialhe), II, 32.
- » iodurada (H. DE M.), I, 35.
- » iodurada (Magendie), II, 32.
- » de ioduro de hierro (Pierquin), II, 31.
- Agua de Jabalcuz, IV, 313.
- » contra la jaqueca, II, 24.
- » jabonosa (H. DE M.), II, 32.
- » lacticinosa de anís, II, 43.
- » lacticinosa de cáscara de naranja, II, 43.
- » lacticinosa de hinojo, II, 43.
- » de Lanjaron, IV, 288.
- » de Lavanda, II, 25.
- » laxante de Viena (F. A.), II, 356.
- » de Ledesma, IV, 252.
- » de Liérganes, IV, 253.
- » de limon (H. DE M.), II, 32.
- » de limon cremorizada (H. DE M.), II, 32.
- » de limon vinosa (H. DE M.), II, 33.
- » litontriptica (F. E.), II, 17.
- » de Loujo, IV, 313.
- » de Loujo artificial, IV, 313.
- » de Luce, II, 33.
- » de Luce (F. P.), IV, 69.
- » de Luchon, IV, 233.
- » de Lugo, IV, 253.
- » de Madama Beaumont, IV, 91.
- » de magnanimidad, II, 33.
- » magnesiana (F. F.), II, 39.
- » magnesiana gaseosa (F. F.), II, 33.
- » magnesiana saturada, II, 34.
- » de Malá, IV, 314.
- » de mar, I, 70; IV, 324.
- » artificial de mar, IV, 326.
- » de mar gaseosa (Pasquier), IV, 326.
- » marcial (F. P.), II, 34.
- » marcial (H. M. F.), II, 34.
- » marcial gaseosa potás., II, 34.
- » de Marmolejo, IV, 269.
- » de Marte, II, 34.
- » de Martos, IV, 254.
- » medicinal de Husson (F. P.), IV, 78.
- » de melisa compuesta (F. F.), II, 51.
- » de melisa espirituosa (F. F.), IV, 51.
- » mercurial, I, 261.
- » mercurial cáustica (F. F. de 1818), II, 34.

- Agua mercurial de Piderit , II, 29.
- » mercurial simple , II, 153.
 - » de Metteberg , II, 35.
 - » de miel compuesta , II, 52.
 - » de miel olorosa de Londres, II, 35.
 - » minerales , IV, 217.
 - » minerales acídulas , IV, 261.
 - » minerales artificiales , IV, 222.
 - » minerales calientes, IV, 218.
 - » minerales ferruginosas , IV, 286.
 - » mineral ferruginosa (Marc), II, 35.
 - » minerales frias , IV, 218.
 - » mineral iodurada , II, 35.
 - » minerales medicinales , IV, 217.
 - » mineral purgante de citrato de magnesia , II, 35.
 - » minerales salinas , IV, 296.
 - » minerales sulfurosas , IV, 224.
 - » minerales termales , IV, 218.
 - » del Molar , IV, 254.
 - » de Montemayor , IV, 234.
 - » de Mont d'Or (F. F.), IV, 270.
 - » artificial de Mont d'Or , IV, 271.
 - » de Mula , IV, 314.
 - » muriatada (H. DE M.), II, 36.
 - » muriática mercurial roja (F. E.), II, 26.
 - » muriática para los sabañones (H. DE M.), II, 36.
 - » de naranja (H. DE M.), II, 33.
 - » de naranja cremorizada (H. DE M.), II, 33.
 - » de naranja vinosa (H. DE M.), II, 33.
 - » de Nava (Buyeres de) , IV, 255.
 - » de Navalpino , IV, 271.
 - » negra alemana , II, 27.
 - » odontálgica (Omeara) , II, 36.
 - » oftálmica de Boyle , II, 36.
 - » oftálmica (H. DE M.), II, 36.
 - » oftálmica (Rust) , II, 37.
- Agua oftálmica fortificante (Selle), II, 36.
- » oftálmica mercurial , II, 36.
 - » oftálmica mercurial (Conradi) , II, 169.
 - » oftálmica resolutive , II, 36.
 - » para los ojos (Ibel) , II, 37.
 - » de olor , II, 37.
 - » de olor (Beaumé) , II, 37.
 - » de Ontaneda , IV, 256.
 - » oriental (Delabarre) , II, 37.
 - » de oro , II, 37.
 - » oxigenada (Alyon) , II, 37.
 - » de pan , I, 264; II, 37.
 - » de Panticosa , IV, 291.
 - » del Papa (F. E.) , IV, 192.
 - » para la boca , II, 227; IV, 80.
 - » de Paracuellos de Jiloca , IV, 257.
 - » de Partovia (Santiago de) , IV, 257.
 - » de Paterna , IV, 272.
 - » contra las pecas (Guerlain) , III, 80.
 - » de pimienta de Tabasco , I, 289.
 - » de pimienta (F. DE L.), II, 45.
 - » de Plombieres , IV, 315.
 - » artificial de Plombieres , IV, 316.
 - » de Pougues , IV, 272.
 - » artificial de Pougues , IV, 273.
 - » de Praga , II, 38.
 - » de Premier , II, 38.
 - » de primula , I, 306.
 - » protoiodo ferrurada (Dupasquier) , II, 28.
 - » de Puertollano , IV, 274.
 - » artificial de Puertollano , IV, 275.
 - » purgante salina , II, 38.
 - » purgante (H. DE M.), II, 38.
 - » purgante gaseosa , II, 38.
 - » de Quercetan , II, 38.
 - » de Quinto , IV, 316.
 - » de Rabel , II, 15.
 - » de Rabel (H. M.), II, 16.
 - » de la reina de Hungría , II, 52.

- Agua de la reina de Hungría (F. E.), II, 53.
- » de Rivera, IV, 257.
- » roja (Alibert), II, 38.
- » de rosas, IV, 235.
- » rubefaciente (Amnon), II, 38.
- » de ruibarbo, IV, 118; IV, 119.
- » de Sacedon, IV, 317.
- » de sal comun (H. DE M.), II, 36.
- » salina (Lassonne), II, 83.
- » de Santa Agueda, IV, 258.
- » artificial de Santa Agueda, IV, 259.
- » de San Martin de Caldelas, IV, 308.
- » de San Nectario, IV, 275.
- » artificial de San Nectario, IV, 275.
- » de San Salvador, IV, 259.
- » artificial de San Salvador, IV, 260.
- » saturada de cloro, I, 153.
- » saturnina opiada, II, 38.
- » sedante (Raspail), II, 39.
- » de Sedlitz, III, 472; IV, 318.
- » artificial de Sedlitz (F. F.), IV, 318.
- » de Segura, IV, 276.
- » de Seidschutz, IV, 319.
- » de Selten, IV, 276.
- » de Selters, IV, 276.
- » de Seltz, IV, 276.
- » artificial de Seltz (F. F.), IV, 277.
- » de Seltz por mezcla, IV, 277.
- » de Sierra Alamilla, IV, 265.
- » sin igual, II, 49.
- » del sitio de la Isabela, IV, 317.
- » de Solares, IV, 319.
- » artificial de Solares, IV, 319.
- » de Solan de Cabras, IV, 277.
- » artificial de Solan de Cabras, IV, 278.
- » de sosa carbonatada (F. F.), II, 39.
- » de Spa, IV, 293.
- » artificial de Spa, IV, 293.
- Agua de sulfato de alúmina (F. E.), II, 17.
- » de sulfato de cobre con canela, III, 127.
- » de sulfuro de sodio (F. F.), II, 39.
- » sulfurosa artificial (F. F.), II, 39.
- » sulfurosa compuesta, II, 39.
- » de tamarindos emetizada, II, 39.
- » de té, II, 53.
- » tedianá (H. DE M.), II, 20.
- » trementinada, II, 39.
- » de Tiermas, IV, 260.
- » para el tocador (Beaumé), II, 36.
- » de torongil compuesta (F. E.), II, 51.
- » de la Toja grande, IV, 313.
- » artificial de la Toja grande, IV, 313.
- » de Trebez, II, 40.
- » triacal templada, IV, 193.
- » de Trillo, IV, 319.
- » de Urbernaga de Alzola, IV, 299.
- » de la Urillere, II, 53.
- » vegeto-mineral (F. E.), II, 40.
- » vegeto-mineral (F. F.), II, 40.
- » vegeto-mineral (H. DE M.), II, 24.
- » vegeto-mineral de Presavin, I, 264.
- » verde corregida (Dr. Artmann), II, 40.
- » de verdolaga, I, 356.
- » de Vichy, IV, 278.
- » artificial de Vichy (F. F.), VI, 280.
- » de Villar del Pozo, IV, 295.
- » de Villatoya, IV, 295.
- » de Villavieja, IV, 322.
- » de violetas, I, 237.
- » vulneraria, II, 40.
- » vulneraria (Plenk), II, 40.
- » vulneraria con alcohol (F. A.), II, 40.
- » vulneraria espirituosa (F. E.) II, 54.

- Agua vulneraria espirituosa (F. F.), II, 54.
- » vulneraria roja (F. F.), IV, 99.
- » vulneraria de zumos vegetales (F. E.), IV, 192.
- » de Zaragoza, IV, 261.
- » de Zujar, IV, 237.
- Aguardientes, II, 16.
- » alcanforado, I, 75.
- » alcanforado (F. F.), II, 16.
- » aleman (F. F.), IV, 88.
- » aleman aromático, IV, 88.
- » amoniacal, II, 16.
- » de guayaco (F. F.), IV, 95.
- » de nastalina (Rossignon), IV, 91.
- » purgante de Mezaize, II, 16.
- Ajenjo suizo, IV, 5.
- » suizo (Virey), IV, 5.
- Alcali amoniacal espirituoso, II, 46.
- Alcoholes, II, 46.
- Alcohol alcanforado, I, 75.
- » alcanforado (F. E.), II, 46.
- » alcanforado (F. F.), II, 46.
- » de alcanfor jabonoso (F. E.), II, 46.
- » amoniacal, II, 46.
- » amoniacal alcanforado, II, 47.
- » amoniacal ambreado (Beral), IV, 68.
- » amoniacal anisado, II, 46; IV, 68.
- » amoniacal cantaridado, IV, 68.
- » amoniacal cariofilado, II, 46.
- » amoniacal trementinado, IV, 69.
- » de amoniaco, II, 46.
- » de Boerhaave, IV, 73.
- » de cannabina, I, 433.
- » de corteza de cidra (F. F.), II, 48.
- » de émula campana compuesto (F. E.), II, 50.
- » estomacal (F. N. P.), IV, 81.
- » de estricnina (Magendie), IV, 82.
- » de fósforo, IV, 83.
- » de genciana y naranjas amargas compuesto, IV, 82.
- Alcohol de jabon alcanforado (F. DE L.), III, 62.
- » de jabon amoniacal trementinado, III, 58.
- » de mirra (F. N. P.), IV, 90.
- » de morfina, IV, 64.
- » muriático etéreo (F. E.), II, 46.
- » nítrico etéreo (F. E.), II, 46.
- » odontálgico, IV, 93.
- » odontálgico (F. N. P.), IV, 93.
- » de sulfato de cinconina, I, 150.
- » de sulfato de cinconina (Magendie), IV, 97.
- » de sulfato de quinina (Magendie), IV, 97.
- » sulfúrico, II, 15.
- » sulfúrico etéreo, I, 190.
- » sulfúrico etéreo (F. E.), II, 300.
- » de veratrina (Magendie), IV, 99.
- Alcoholado de acetato de hierro (Beral), IV, 63.
- » de ajenos (F. DE F.), IV, 66.
- » de ajenos compuesto, IV, 68.
- » de ajenos con clavo, IV, 5 y 65.
- » de ambargris sucinado (Hoffmann), II, 72.
- » amoniacal fétido (Lemort), II, 277.
- » amoniacal jabonoso, IV, 68.
- » amoniacal sucinado, IV, 68.
- » de amoniaco y ambar (Beral), IV, 68.
- » de amoniaco anisado, IV, 68.
- » de amoniaco con espliego (Beral), IV, 68.
- » antisifilítico (Eichenheimer), IV, 71.
- » de asa fétida alcalino, IV, 66.
- » de brucina (Magendie), IV, 74.
- » de castoreo azafranado (Crolius), II, 230.

- Alcoholado de catecú compuesto (F. P.), IV, 76.
- » de cidra compuesto (F. F.), II, 49.
- » de cinchonina, I, 149.
- » de citrato de hierro (Beral), IV, 77.
- » de cubebas (Beral), IV, 79.
- » de digitalina, IV, 80.
- » de estriquina (Magendie), IV, 82.
- » de extracto de zarzaparrilla, IV, 100.
- » de genciana compuesto (F. P.), IV, 84.
- » jabon animal etéreo (Sanchez), II, 62.
- » de jabon y opio alcanforado (Bath), II, 62.
- » de morfina, IV, 64.
- » de naftalina (Rossignot), IV, 91.
- » de nuez vómica (Magendie), IV, 92.
- » de potasa antimoniado, IV, 90.
- » de potasa carbonatado, IV, 66.
- » de quinina, IV, 95.
- » de rábano rusticano (F. P.), IV, 96.
- » de sulfato de quinina (Magendie), IV, 97.
- » tánico (Boutigni), IV, 98.
- » tónico (Lepère), IV, 92.
- » de veratrina (Magendie), IV, 99.
- Alcoholatos, II, 47.
- Alcoholato de acmella, I, 67.
- » de ajenjos, I, 72; II, 47.
- » de ajenjos y genciana compuesto, II, 224.
- » de albahaca, II, 47.
- » de alcaravea, II, 47.
- » amoniacal fétido, II, 47.
- » de angélica, II, 48.
- » de anís, II, 47.
- » aromático amoniacal (F. F.), II, 47.
- » de azafran, I, 106; II, 48.
- » de badiana, II, 47.
- » de bergamota, II, 48.
- Alcoholato de berro del Pará, I, 119; II, 48.
- » de biengranada, II, 47.
- » de cálamo aromático, I, 127; II, 48.
- » de canela, I, 132.
- » de canela (F. F.), II, 48.
- » de canela compuesto, II, 48.
- » de caña, I, 134.
- » de cáscara de naranja, I, 140.
- » de cáscaras de naranja (F. E.), II, 48.
- » de cáscara de naranja (F. F.), II, 48.
- » de castoreo, II, 49.
- » de castoreo (Taddei), II, 49.
- » de cidra, II, 48.
- » de cidra compuesto (Guibourt), II, 49.
- » de cilantro, II, 47.
- » de coclearia, I, 157.
- » de coclearia (F. E.), II, 49.
- » de coclearia (F. F.), II, 49.
- » de coclearia compuesto (F. F.), II, 50.
- » de coclearia y rábano (F. F.), II, 50.
- » de clavo, II, 48.
- » de enebro compuesto, II, 50.
- » de énula campana compuesto, II, 50.
- » de énula campana compuesto (F. E.), II, 50.
- » de esencia de trementina, II, 51.
- » de espliego, I, 185; II, 47 y 53.
- » de espliego amoniacal, II, 344.
- » de Fioravanti (F. F.), II, 53.
- » de flores de naranjo, I, 273.
- » de frambuesas, II, 51.
- » de fresa, I, 195; II, 51.
- » de galanga mayor, I, 198.
- » de Garus (F. F.), II, 51.
- » de hinojo, II, 48.
- » de bisopo, II, 47.
- » de hojas de naranjo, I, 273.
- » de hormigas, II, 51.

- Alcoholato de jazmin , II , 51.
- » de junquillo , II , 51.
 - » de limon , II , 48.
 - » de macis , II , 48.
 - » de mejorana , II , 47.
 - » de melisa , I , 251 ; II , 47.
 - » de melisa compuesto (F. E.) , II , 51.
 - » de melisa compuesto (F. F.) , II , 51.
 - » de melisa compuesto con esencias , II , 52.
 - » de menta compuesto (Spielmann) , II , 52.
 - » de menta piperita , I , 253.
 - » de menta rizada , II , 47.
 - » de miel compuesto , II , 52.
 - » de mostaza , II , 52.
 - » de nuez moscada , II , 48.
 - » de opio y ásaró compuesto , II , 342.
 - » de palo de Rodas , II , 48.
 - » de pelitre , I , 285 ; II , 52.
 - » de resineona de brea , I , 318.
 - » de romero , I , 317 ; II , 47.
 - » de romero (F. E.) , II , 53.
 - » de romero (F. F.) , II , 52.
 - » de rosas , II , 53.
 - » de salvia , II , 47.
 - » de salvia vulnerario (F. E.) , II , 54.
 - » de sasafrás , I , 330 ; II , 48.
 - » de té , II , 53.
 - » de tomillo , II , 47.
 - » de torongil , II , 53.
 - » de trementina compuesto (F. F.) , II , 53.
 - » de tuberosa , II , 51.
 - » de la Vrillere , II , 53.
 - » de vainilla (F. B.) , II , 53.
 - » vulnerario (F. F.) , II , 54.
 - » de yerbabuena de sabor de pimienta , II , 47 y 53.
- Alcoholaturos , II , 54.
- Alcoholaturo de acónito , I , 66 ; II , 54.
- » de ajenjos (F. DE F.) , IV , 66.
 - » de beleño , I , 116 ; II , 54.
 - » de belladona , I , 117 ; II , 54.
 - » de berro de Pará , II , 55.
- Alcoholaturo de cicuta , II , 54.
- » de digital , II , 54.
 - » de eléboro , II , 54.
 - » de estramonio , II , 54.
 - » de lechuga virosa , I , 233 ; II , 54.
 - » de plantas antiespasmódicas , II , 54.
 - » de zumaque venenoso , I , 366.
 - » de zumaque venenoso (F. F.) , II , 54.
 - » de zumo de belladona , II , 55.
 - » de zumo de berro de Pará , II , 55.
- Aldeido , I , 429.
- Alimentacion antiescorbútica , III , 95.
- Alma de ruibarbo (F. E.) , II , 156.
- Altatain del harem , II , 312.
- Amoniaco alcoholizado , II , 46.
- » diluido (F. E.) , I , 84.
- Antigotoso de Want , IV , 78.
- Apocemas , II , 55.
- Apocema amargo , II , 55.
- » antiartrítico (Quarin) , II , 56.
 - » antiepsórico , II , 56.
 - » antiepsórico de bardana , II , 56.
 - » antiescorbútico , II , 56.
 - » antiescorbútico (Foy) , II , 56.
 - » antiescorbútico (F. F.) , II , 56.
 - » antiescorbútico (H. DE P.) , II , 57.
 - » antiescorbútico (Lescure) , II , 57.
 - » aperitivo (Babeyrac) , II , 56.
 - » aperitivo y fundente (Brousseau) , II , 57.
 - » aperitivo y tónico (Roucher) , II , 57.
 - » astringente , II , 57 y 58.
 - » con carbonato de potasa , II , 58.
 - » de catecú , II , 58.
 - » contraestimulante (Laennec) , II , 58.

- Apocema depurativo (Spielmann), II, 58.
- » depurativo (Trousseau), II, 58.
 - » diurético, II, 58.
 - » emeto-catártico, II, 59.
 - » expectorante (Boerhaave), II, 59.
 - » febrífugo, II, 59.
 - » de gatuña, II, 59.
 - » laxante, II, 59.
 - » minorativo, II, 59.
 - » purgante, II, 59.
 - » purgante (Degland), II, 60.
 - » purgante (F. F.), II, 60.
 - » de raíz de granado (F. F.), II, 61.
 - » sudorífico, II, 60.
 - » sulfúrico, II, 60.
 - » sulfúrico (F. F.), II, 60.
 - » tónico, II, 60.
 - » tónico amargo, II, 60.
 - » tónico y dulcificante (Barthez), II, 60.
 - » vermífugo, II, 61.
 - » vermífugo (F. F.), II, 61.
- Arcano de Archideti, III, 69.
- » cosmético, I, 243.
 - » del cura Walher, III, 508.
 - » contra los sabañones (Brenfeld), III, 509.
- Arenacion, I, 96.
- Arrope de agracejo, I, 73.
- » de moras (F. E.), III, 103.
 - » de saúco (F. E.), III, 104.
 - » de serbal, I, 335.
- Arseniato de sosa líquido (F. F.), III, 32.
- » de manganeso, I, 434.
- Arsenito de potasa (F. F.), III, 31.
- Arsenito de potasa (F. P.), III, 31.
- Arteriotomía, I, 102.
- Asagú, I, 429.
- Asfixias, IV, 339.
- » por el calor, IV, 344.
 - » por extrangulación, IV, 343.
 - » por el frío, IV, 343.
 - » por los gases de los albañales, IV, 341.
 - » por los gases de las letrinas, IV, 341.
 - » por los gases de los pozos de aguas inmundas, IV, 341.
 - » de los recién nacidos, IV, 344.
 - » por sumersión, IV, 341.
- Aspersiones, I, 103.
- Azúcares, IV, 23.
- Azúcar alcalina (Blondeau), IV, 23.
- » de alumbre, IV, 24.
 - » anaranjada purgante, IV, 27.
 - » de berro de Pará, IV, 25.
 - » de cetrarino, I, 147.
 - » clarificada (F. E.), II, 391.
 - » de extracto de cainca, IV, 26.
 - » heliciada de Mouchon, IV, 25.
 - » purgante, IV, 28.
 - » de quina (Goldefy), IV, 27.
 - » rosada, IV, 28.
 - » de rosas pálidas, IV, 28.
 - » vermífugo (F. E.), IV, 29.
 - » vermífugo (F. P.), IV, 29.
 - » vermífugo mercurial (Baumé), IV, 29.
- Azufre dorado líquido (Jacobi), IV, 70.

B.

- Bálsamos, II, 61.
- Bálsamo de aceite de hígado de bacalao (Deschamps), II, 61.
- Bálsamo de acero (Vauquelin), II, 61.
- » acético alcanforado (Pelle-tier), II, 61.

- Bálsamo acético etéreo (Vergnes), Bálsamo de Condom, II, 72.
 II, 61.
- » acústico, II, 62.
 - » acústico (Plenk), II, 62.
 - » acústico (Ricourt), II, 62.
 - » acústico (Van Mons), II, 62.
 - » acústico (Virey), II, 62.
 - » acústico con creosota, II, 62.
 - » anodino (Bath), II, 62.
 - » anodino (F. E.), IV, 94.
 - » antiartrítico (Sanchez), II, 62.
 - » antiépsórico, II, 63.
 - » antiépsórico (Mialhe), II, 70.
 - » antiflogístico de Compingt, II, 30.
 - » antihistérico (F. M.), II, 71.
 - » antihistérico (Virey), II, 63.
 - » antiodontálgico, II, 63.
 - » antireumático (Liboschitz), II, 63.
 - » de Aparicio, II, 6.
 - » apoplectico (F. Wirt), II, 63.
 - » de Arceo (F. E.), IV, 160.
 - » de Arceo alcanforado (F. F.), IV, 160.
 - » de Arceo (H. M.), IV, 160.
 - » de Arceo líquido (F. F.), IV, 160.
 - » aromático (Loebel de Loebestein), II, 64.
 - » aromático etéreo, II, 64.
 - » astringente (Richard de Hautensierk), II, 64.
 - » de azufre (F. P.), II, 7.
 - » de azufre anisado, I, 107.
 - » de azufre anisado (F. E.), II, 6.
 - » de azufre trementinado, I, 107.
 - » de azufre trementinado (F. E.), II, 13.
 - » de azufre trementinado (Ruland), II, 13.
 - » de Basville, II, 64.
 - » de calabaza, IV, 163.
 - » católico (F. E.), IV, 86.
 - » católico (F. F.), IV, 72.
 - » del Comendador de Permes (F. F.), IV, 72.
 - » de copaiba solidificado con la cal, II, 95.
 - » de copaiba solidificado magistral, II, 65.
 - » de copaiba solidificado oficial (Mialhe), II, 65.
 - » chiron, II, 65.
 - » de enebro, II, 65.
 - » de espliego, II, 68.
 - » estimulante (F. H.), II, 65.
 - » estomacal, II, 65.
 - » de Feuillet, II, 71.
 - » de Fioravanti (F. F.), II, 53.
 - » de Fioravanti aceitoso, II, 53.
 - » de Fioravanti negro, II, 53.
 - » de Fourcroy, II, 66.
 - » de Friad, II, 66.
 - » de Genoveva, II, 66.
 - » de Gilead de Salomon, II, 66.
 - » de Goulard, II, 66.
 - » de guayaco (Van Mons), II, 66.
 - » hidriodotado, II, 66.
 - » de jabon, II, 66.
 - » de Laborde, II, 66.
 - » de Lectour, II, 72.
 - » de Lucatel, II, 67.
 - » de Malats, II, 67.
 - » de marrubio (Ford), II, 67.
 - » de mejorana, II, 67.
 - » mercurial, II, 68.
 - » de miel (Hill), II, 68.
 - » de mirra (Van Mons), II, 68.
 - » narcótico, II, 68.
 - » nervino (F. F.), IV, 174.
 - » odontálgico, II, 68.
 - » odóntico, II, 68.
 - » odóntico (Desforges), II, 68.
 - » oftálmico, II, 68.
 - » oftálmico (H. DE M.), II, 68.
 - » oftálmico (St. Ives), II, 69.
 - » oftálmico encarnado (F. DE P.), II, 69.
 - » opodeldoc (F. F.), II, 69.
 - » opodeldoc (H. DE M.), II, 69.
 - » opodeldoc líquido (Girck), II, 69.

- Bálsamo opodeldoc líquido iodura- Baño ácido nitro-muriático (Len-
do (Liandet), II, 69.
» opodeldoc trementinado, II,
70.
» pleurítico (F. E.), II, 7.
» de ruda, II, 68.
» contra los sabañones, II, 64.
» contra los sabañones (Lejeu-
ne), II, 64.
» contra los sabañones (Ra-
dius), II, 64.
» de Salazar (F. E.), IV, 65.
» sajón, II, 70.
» samaritano (H. DE M.), II,
70.
» samaritano (Tornamira), II,
70.
» saturnino, II, 70.
» somnífero (F. DE WURT.), II,
70.
» de succino (F. DE WURT.), II,
70.
» sulfúrico, II, 70.
» sulfuro alcalino (Mialhe), II,
70.
» de la tesorera, II, 71.
» tranquilo (Chomel), II, 71.
» tranquilo (F. E.), II, 8.
» tranquilo (F. F.), II, 9.
» uterino (F. M.), II, 71.
» verde, II, 12.
» verde (H. DE M.), II, 12.
» verde de Metz, II, 71.
» de vida (Hoffmann), II, 72.
» de vida (Lelievre), II, 72.
» de vida externo, III, 58.
» de vida externo (Plenk), II,
72.
» de vida externo espirituoso,
II, 64.
» de vida de Hoffmann (H. DE
M.), II, 72.
» de Vinceguiere, II, 72.
» vulnerario, II, 72.
- Bandolina, I, 252.
Baños, I, 111 y 112; II, 73.
Baño ácido, II, 73.
» ácido bituminoso (Gondran),
II, 73.
» de ácido clorhídrico, I, 153.
» de ácido clorhidrónico, I,
154.
- Baño ácido nitro-muriático (Len-
drice), II, 73.
» de agua corriente, I, 112.
» de agua de salvado, II, 73.
» de aire caliente, I, 112.
» alcalino, II, 73.
» alcalino (H. DE M.), II, 73.
» alcalino (Soubeiran), II, 73.
» alcalino ferruginoso (Ras-
pail), II, 74.
» alcalino gelatinoso, II, 73.
» alcalino muriático (H. DE M.),
II, 73.
» alcalino y tónico, II, 74.
» amiláceo, II, 74.
» amoniacoal ferruginoso, II,
74.
» antiépsórico (H. M.), II, 74.
» antiépsórico (Jadelot), II,
74.
» antiescrofuloso, II, 74.
» antisifilítico, II, 77.
» aromático, II, 74.
» aromático (Bally), II, 74.
» aromático (H. M.), II, 75.
» aromático (Rusch), II, 75.
» de asiento frios, I, 112.
» astringente (F. N. P.), II,
75.
» astringente (Most), II, 75.
» calientes, I, 112.
» de carbonato de sosa, I,
336.
» con la cicuta (Fantonetti),
II, 75.
» de clorhidrato de amoniaco,
I, 86.
» de cloruro de hierro, II, 75.
» de cloruro de sodio, I, 337.
» de corteza de roble alumi-
noso (Janniot), II, 75.
» de chorro, I, 168.
» de deutocloruro de mercurio,
I, 258.
» de deutoioduro de mercurio,
I, 260.
» eléctrico, I, 176.
» emoliente, II, 75.
» estimulante, II, 75.
» fortificante, II, 76.
» frios, I, 111.
» de gelatina, II, 76.

- Baño de hidrosulfato de sosa, II, 77.
- » hidrosulfuroso, II, 76.
 - » de inmersión, I, 113.
 - » iodurado (Lugol), II, 76.
 - » de ioduro de hierro, I, 218; II, 76.
 - » de ioduro de hierro (Pierquin), II, 77.
 - » de ioduro iodurado de potasio, I, 228.
 - » de ioduro de manganeso, I, 437.
 - » de jabon (H. DE P.), II, 77.
 - » de mar, IV, 324.
 - » mercurial, II, 77.
 - » mercurial (Wedekind), II, 77.
 - » de oleada, I, 113.
 - » de orujo, I, 113.
 - » de piés, I, 284.
 - » de protoioduro de mercurio, I, 260.
 - » resolutivo, II, 77.
 - » salino y gelatinoso, II, 77.
 - » contra la salivación mercurial (Baumgartner), II, 75.
 - » de sarmientos, I, 357.
 - » por sorpresa, I, 113.
 - » sulfuroso, II, 77.
 - » sulfuroso (H. DE M.), II, 78.
 - » sulfuroso y gelatinoso, II, 78.
 - » sulfuroso y gelatinoso (Duppuytren), II, 78.
 - » de sulfuro de sosa, I, 340.
 - » de tártaro emético, I, 95.
 - » de tartrato de hierro, II, 78.
 - » templados, I, 112.
 - » tibios, I, 112.
 - » de vapor, I, 112.
 - » de vapor acuosos, II, 78.
 - » de vapor alcanforado, II, 78.
 - » de vapor aromáticos, II, 79.
 - » de vapor clóricos, II, 79.
 - » de vapor sulfurosos, II, 79.
- Baobab, I, 429.
- Barniz para embalsamar (F. F.), II, 232.
- Barras aromáticas rusas, IV, 154.
- Bayas frescas de espinoserval, I, 185.
- Bebidas, II, 79.
- Bebida acidulada, II, 79.
- » alcalina, II, 79.
 - » alcalina con vainilla, II, 79.
 - » antiatrófica (Hufeland), II, 79.
 - » anticatarral, II, 79.
 - » antidisentérica (Mondière), II, 79.
 - » antiescorbútica (Meyer), II, 80.
 - » antiescrofulosa, II, 80.
 - » antiespasmódica, II, 80.
 - » antiflogística, II, 80.
 - » antiflogística (Stoll), II, 80.
 - » antihelmíntica (Broussonnet), II, 80.
 - » antiherpética, II, 80.
 - » antiláctea, II, 80.
 - » antinarcótica (Swediaur), IV, 187.
 - » antinarcótica (Van Mons), II, 81.
 - » aperitiva (Haen), II, 81.
 - » astringente, II, 81.
 - » atemperante, II, 81.
 - » de bicarbonato de sosa (Robiquet), II, 81.
 - » carminativa, II, 81.
 - » de citrato de sosa (Sandras), II, 81.
 - » clorurada, II, 81.
 - » diurética (Magnus Huss), II, 82.
 - » doméstica, II, 135.
 - » emeto-catártica, II, 82.
 - » estibiada (Preziozi), II, 82.
 - » excitante, II, 82.
 - » de extracto de ratania, II, 83.
 - » ferruginosa, II, 82.
 - » de fosfato de amoníaco, II, 82.
 - » contra la gonorrea (Lise-mann), II, 82.
 - » iodurada (Plison), II, 82.
 - » de Koempf, II, 82.
 - » laxante, II, 83.
 - » narcótica estimulante (Michel), II, 83.

- Bebida pectoral (Cottreau), II, 83.
- » purgante, II, 83.
 - » purgante (Lescure), II, 83.
 - » contra la rabia (Jacnich), IV, 15.
 - » de ratania, II, 83.
 - » de Russel, II, 84.
 - » de sulfato de hierro (Lipich), II, 84.
 - » tártaro boratada, II, 83.
 - » tónica etérea (Hildembrand), II, 84.
 - » vermífuga, II, 84.
 - » vinosa, II, 84.
- Bellotas tostadas, I, 178.
- Benzoato de amoniaco líquido, I, 429.
- Biarseniato de amoniaco, I, 429
- Bicloruro de mercurio albuminoso, I, 429.
- Bilis fresca de buey, I, 120.
- Bizcochos, II, 84.
- » ferruginos, II, 84.
 - » de lactato de hierro, II, 84.
 - » purgantes, II, 84 y 85.
 - » purgantes de escamonea, II, 85.
 - » vermífugos, II, 85.
 - » vermífugos (Storey), II, 85.
 - » vermífugos de calomelanos, II, 85.
 - » vermífugos de santónico, II, 85.
- Bolas, II, 85.
- » de Bareges (Montain), IV, 236.
 - » desinfectantes, II, 85.
 - » marciales (F. A.), II, 86.
 - » de Marte (F. F.), II, 85.
 - » de Nancy (F. F.), II, 85.
- Bolos, II, 86.
- » de alcanfor y quermes, II, 86.
 - » alcanforados y nitrados (H. M. F.), II, 90.
 - » amargos, II, 86.
 - » anodino astringentes (F. M.), II, 86.
 - » antiartríticos, II, 89.
 - » antiartríticos antimoniados, II, 85.
- Bolos antiasmáticos, II, 87.
- » antiblenorrágicos (Velpeau), II, 87.
 - » antidisentéricos, II, 87.
 - » antiépsóricos (Levacher), II, 87.
 - » antiescrofulosos (Bailly), II, 87.
 - » antiespasmódicos, II, 87 y 89.
 - » antiespasmódicos (Bally), II, 87.
 - » antiespasmódicos (Brene), II, 87.
 - » antiespasmódicos de Buchan, II, 87 y 88.
 - » antigonorréicos, II, 88.
 - » antigonorréicos (Wahu), II, 88.
 - » antihelmínticos (Babeyrac), II, 101.
 - » antihelmínticos (H. M. F.), II, 101.
 - » antihelmínticos nervinos, II, 101.
 - » antihelmíntico purgante, II, 101.
 - » antihistéricos, II, 88.
 - » antihistéricos (Brera), II, 88.
 - » antilechoso, II, 88.
 - » antimetrorrágico (Trousseau), II, 88.
 - » antimoniales (H. M. F.), II, 88.
 - » antimonio mercurial (Cheyne), II, 88.
 - » antineurálgicos (Chaussier), II, 88.
 - » antiperiódicos (Marc), II, 97.
 - » de arnica, II, 88.
 - » de asa fétida y castóreo, II, 89.
 - » de asa fétida mercuriales, II, 101.
 - » astringentes, II, 89.
 - » astringentes (Ellis), II, 89.
 - » astringentes (Henschel), II, 89.
 - » astringentes (H. DE IT.), II, 89.

- Bolos astringentes (H. DE MOMP.), II, 90.
- » astringentes antiperiódicos, II, 89.
- » atemperantes (H. M. F.), II, 90.
- » de azufre compuestos (H. M. F.), II, 90.
- » contra el bocio (Righini), II, 91.
- » calibeados, II, 90.
- » calmantes diaforéticos (Brera), II, 90.
- » carminativos (Desbois de Rochefort), II, 90.
- » de castóreo, II, 90.
- » contra los catarros (Bally), II, 91.
- » de copaiba, II, 92.
- » de copaiba compuestos (Righini), II, 92.
- » contra la cistitis, II, 91.
- » de clorhidrato de amoniaco (Fischer), II, 90.
- » contra la clorosis, II, 91.
- » de cloruro de bario, II, 90.
- » de cloruro de calcio, II, 90.
- » contra la corea (Elliotson), II, 91.
- » contraestimulantes, II, 92.
- » de cubebas, III, 252.
- » de cubebas, copaiba y trementina (Puche), II, 99.
- » de cubebino, II, 92.
- » deprimentes (F. P.), II, 98.
- » depurativos, II, 92.
- » depurativos (Dubois), II, 92.
- » depurativos (Duchesne Duparc), II, 92.
- » diaforéticos, II, 93.
- » diaforéticos (Bouchardat), II, 93.
- » diaforéticos (Santa María), II, 93.
- » diaforéticos alcanforados, II, 93.
- » diaforéticos ingleses, II, 93.
- » diaforéticos quermetizados, II, 93.
- » contra la diarrea crónica, II, 91.
- » digestivos (Smith), II, 93.
- Bolos de digital, II, 93.
- » diuréticos (Groneveld), II, 93.
- » drásticos (F. N. P.), II, 94.
- » drásticos (Roucher), II, 94.
- » emenagogos, II, 94.
- » emenagogos (Desbois de Rochefort), II, 94.
- » emenagogos (F. P.), II, 94.
- » emenagogos (H. DE IT.), II, 94.
- » emenagogos (Richter), II, 94.
- » emenagogos de manganeso (F. H.), II, 94.
- » emenagogos de sabina, II, 94.
- » de enebro, II, 95.
- » contra la epilepsia (Siegler), II, 91.
- » de escila, II, 95.
- » escilíticos compuestos, II, 95.
- » de estaño (Swediaur), II, 95.
- » estibiado, II, 95.
- » estimulantes (Swediaur), II, 95.
- » estimulante compuesto, II, 95.
- » estimulantes y tónicos, II, 95.
- » estomacales, II, 95.
- » estomacales (Parmentier), II, 96.
- » estomacales (Swediaur), II, 96.
- » estomacales (Trousseau), II, 96.
- » estomacales (Tronchin), II, 96.
- » de estoraque líquido, I, 187.
- » de estoraque (Lheritier), II, 96.
- » excitantes (H. DE A.), II, 95.
- » expectorantes (Brera), II, 96.
- » expectorantes (H. DE IT.), II, 96.
- » febrífugos, II, 96.

- Bolos febrífugos (Desbois de Rochefort), II, 96.
- » febrífugos de Dupuytren, II, 96.
- » febrífugos (Laennec), II, 97.
- » febrífugos (Marc), II, 97.
- » febrífugos amargos, II, 97.
- » febrífugos opiados, II, 97.
- » febrífugos de sulfato de quinina, II, 97.
- » ferruginosos, II, 97.
- » fortificantes (Alibert), II, 97.
- » fortificantes (Desbois), II, 97.
- » fundentes, II, 97.
- » fundentes (Brera), II, 97.
- » fundentes (Jahn), II, 98.
- » fundentes mercuriales, II, 98.
- » gelatinosos de cubebas (Vee), II, 98.
- » contra la gonorrea (Defermon), II, 91.
- » de guayaco, II, 98.
- » de gutagamba, II, 98.
- » contra las hemorroides, II, 92.
- » hidragogos (Richard de Hautensierck), II, 98.
- » de ioduro de calcio (F. P.), II, 98.
- » laxantes (Chaussier), II, 98.
- » de limaduras de hierro, II, 98.
- » moscados, II, 98.
- » de narcotina, II, 99.
- » nauseosos, II, 99.
- » opiados, II, 99.
- » de Pringle, II, 99.
- » de Puche, II, 99.
- » purgantes (Alibert), II, 99.
- » purgantes (H. M. F.), II, 99.
- Bolo purgante mercurial, II, 99.
- » purgante de los pintores, IV, 132.
- » ad quartanam, II, 96.
- » de quina (H. M. F.), II, 99.
- » de quina y ruibarbo, II, 99.
- » de raíz de granado compuesto, II, 100.
- » de ratania, II, 100.
- » de Richard de Autensierck, II, 100.
- » rojo, II, 100.
- » contra la salivacion mercurial, II, 92.
- » sedantes, II, 100.
- » sedantes (Desruelles), II, 100.
- » de sucino (Bally), II, 100.
- » sulfo-trementinado, II, 100.
- » de tartrato de hierro, II, 100.
- » tónicos y compuestos (Rouche), II, 100.
- » tónicos y estomacales, II, 101.
- » de tormentila, II, 100.
- » contra la tos (Murray), II, 92.
- » de valeriana, II, 101.
- » de valeriana (H. M. F.), II, 101.
- » de valeriana y hierro, II, 101.
- » vermífugos, II, 101.
- » vermífugos (Brera), II, 102.
- » vermífugos (Chaussier), II, 102.
- » vermífugos (Foy), II, 102.
- » zincados, II, 102.
- Borato de manganeso, I, 434.
- Botella roja de Taylor, IV, 78.
- Bromuro de manganeso, I, 434.

C.

- Cafés, II, 102.
- Café de bellotas, II, 102.
- » francés, II, 102.
- Café de higos, II, 102.
- » de hollin (H. DE M.), III, 367.

- Café purgante para los niños, II, 102.
 » de quinina (Dorvault), II, 102.
- Calas, IV, 57.
- Cala aloética, IV, 57.
 » anodina (H. DE M.), IV, 57.
 » antiespasmódica, IV, 58.
 » antihelmíntica, IV, 58.
 » antihelmíntica (H. DE M.), IV, 58.
 » comun (H. DE M.), IV, 59.
 » comun (F. E.), IV, 59.
 » comun de miel (F. E.), IV, 59.
 » irritante (F. E.), IV, 59.
 » irritante (H. DE M.), IV, 60.
 » de jabon, IV, 60.
 » purgante, IV, 60.
- Calcitrapa, I, 430.
- Caldos, II, 103.
- Caldo alimenticio, II, 103.
 » amargo y dulcificante (Roucher), II, 103.
 » anticatarral (Rivière), II, 103.
 » antiespasmódico (Pougens), II, 103.
 » antiherpético (Chirac), II, 103.
 » aperitivo (Fouquet), II, 104.
 » de arrow root, I, 98.
 » astringente (Astruc), II, 104.
 » de bofes de ternera (F. F.), II, 106.
 » de cangrejos, I, 133.
 » de cangrejos (Astruc), II, 104.
 » de cangrejos (F. F.), II, 106.
 » de caracoles (F. F.), II, 104.
 » de cuerno de ciervo (Taddei), II, 104.
 » emeto-catártico, II, 104.
 » gomoso (Petroz), II, 104.
 » pectoral, II, 105.
 » pectoral (Bories), II, 105.
 » pectoral (Nauche), II, 105.
 » de pollo (F. F.), II, 106.
- Caldo de pollo valentino (F. E.), II, 106.
 » purgante, I, 339; II, 106.
 » de ranas (F. F.), II, 106.
 » de ternera (F. F.), II, 106.
 » de tortuga, I, 348.
 » de tortuga (F. F.), II, 106.
 » de vaca, II, 106.
 » de vaca emetizado, II, 106.
 » de vaca medicinal, I, 352.
 » de vaca tamarindado, II, 106.
 » de víbora (F. E.), II, 106.
 » de yerbas, II, 106.
 » de yerbas emetizado, II, 107.
 » de yerbas purgante, II, 107.
- Candelillas, II, 107.
 » de acetato de plomo, II, 108.
 » alcanforadas (Raspail), II, 107.
 » aluminosas (Jobert), II, 107.
 » con calomelanos (Bert), II, 107.
 » emolientes, II, 107.
 » emplásticas, II, 107.
 » emplásticas (Daran), II, 107.
 » enceradas, II, 108.
 » de goma elástica, II, 108.
 » de Goulard, II, 108.
 » de Hunter, II, 108.
 » mercuriales (Falck), II, 108.
 » mercuriales (Plenk), II, 108.
 » mercuriales solubles (Hecker), II, 108.
 » de nitrato de mercurio (Swe-diaur), II, 109.
 » portaremedios (Reynal), II, 109.
 » con potasa cáustica, II, 109.
 » saturninas, II, 108.
- Cannabina, I, 432.
- Cañafístula cocida, I, 134.
 » cocida (F. F.), II, 184.
- Cápsulas, II, 109.
 » de bálsamo de copaiba, I, 110.
 » de bicarbonato de sosa, II, 110.
 » de cubebas, III, 252.

- Cápsulas inglesas de Humann , II, 65.
- Carbonato de manganeso, I, 435.
- Carminativo de Dalbi , IV , 180.
- Cataplasmas, II, 110.
- Cataplasma aceitosa , II , 110.
- » de ajo , I , 73.
 - » de almidon , I , 80.
 - » aluminosa (F. P.) , II , 110.
 - » americana (F. P.) , II , 110.
 - » anodina , II , 110.
 - » anodina (F. E.) , II , 111.
 - » anodina (F. F.) , II , 114.
 - » anodina (H. DE AL.) , II , 110.
 - » anodina (H. DE M.) , II , 111.
 - » anodina (Richter) , II , 111.
 - » anodina con harina de simiento de lino (H. DE M.) , II , 111.
 - » anodina de miga de pan (F. E.) , II , 111.
 - » antiartrítica , II , 111.
 - » antiartrítica de Pradier , II , 111.
 - » antiartrítica (Trousseau) , II , 112.
 - » anticancerosa (Swediaur) , II , 112.
 - » antiespasmódica , II , 112.
 - » antihelmíntica y antihistérica , II , 112.
 - » antihistérica , II , 112.
 - » antioftálmica de Plenck , II , 112.
 - » antipleurítica , II , 113.
 - » antiséptica , II , 113.
 - » antiséptica (Dupuytren) , II , 113.
 - » antiséptica (F. P.) , II , 113.
 - » antiséptica (H. DE M.) , II , 113.
 - » antiséptica (H. M. F.) , II , 116.
 - » antiséptica alcanforada de Reuss , II , 113.
 - » de apio , I , 95.
 - » aromática (H. DE M.) , II , 113.
 - » aromática (H. M. F.) , II , 113.
 - » astringente , II , 114.
 - » de avena , I , 104.
 - » de bardana , I , 114.
- Cataplasma de batatas compuesta (F. P.) , II , 114.
- » de beleño , I , 116.
 - » de beleño (H. DE M.) , II , 115.
 - » de belladona , II , 114.
 - » de belladona (H. DE M.) , II , 115.
 - » de brionía , I , 123 ; II , 114.
 - » de brionía (H. DE M.) , II , 115.
 - » de brionía (Plenk) , II , 114.
 - » calmante (F. F.) , II , 114.
 - » calmante y antipútrida (Righini) , II , 114.
 - » calmante resolutive , II , 114.
 - » de camuesas , I , 131.
 - » cantaridada , II , 118.
 - » cantaridada (F. P.) , IV , 32.
 - » de carbon (F. P.) , II , 115.
 - » de cebolla , I , 144.
 - » de cebolla albarrana , I , 145.
 - » de centeno , I , 146.
 - » de cerveza , II , 115.
 - » de cerveza (F. P.) , II , 115.
 - » de cicuta , I , 148 ; II , 115.
 - » de cicuta (Biett) , II , 115.
 - » de cicuta (H. DE M.) , II , 115.
 - » de clemátide , I , 152.
 - » de cloruro de calcio , II , 115.
 - » discuciente de mostaza (F. E.) , IV , 33.
 - » diurética , II , 115.
 - » de dulcamara , I , 174.
 - » dulcificante , II , 116.
 - » emoliente , II , 116.
 - » emoliente (F. F.) , II , 116.
 - » emoliente (H. DE M.) , II , 116.
 - » emoliente (H. M. F.) , II , 116.
 - » emoliente (F. E.) , II , 117.
 - » emoliente y anodina resolutive , II , 117.
 - » emoliente iodurada (H. DE M.) , II , 117.
 - » emoliente de malvabisco (F. E.) , II , 117.
 - » emoliente (F. P.) , II , 119.
 - » de enebro , I , 178.
 - » excitante , II , 117.
 - » de fécula (F. F.) , II , 117.
 - » de fermento de cerveza , II , 117.

- Cataplasma contra la gangrena de hospital, 115.
- » de geranio, I, 202.
- » de gordolobo, I, 206.
- » de harina de cebada (F. E.), II, 117.
- » harinosa (F. E.), II, 117.
- » de hinojo marino, I, 223.
- » para el hipo (F. E.), II, 118.
- » contra el impétigo esparcido (Biett), II, 115.
- » iodurada (Lugol), II, 117.
- » irritante, II, 118.
- » contra la iscuria, II, 115.
- » isquiática (Willis), II, 118.
- » jabonosa, II, 118.
- » de levadura de pan triacal (F. E.), II, 118.
- » de linaza (H. DE M.), II, 118.
- » de linaza con gálbano (F. P.), II, 119.
- » de lino, I, 236.
- » de lombarda, I, 239.
- » de lúpulo, II, 118.
- » madurativas, I, 55; II, 118.
- » madurativa (F. F.), II, 118.
- » madurativa (F. P.), II, 119.
- » madurativa (H. DE AL.), II, 119.
- » madurativa (H. M. F.), II, 116.
- » madurativa (Boyer), II, 118.
- » de malvas, I, 244.
- » de manzanas (F. P.), II, 119.
- » de membrillo, I, 252.
- » mercurial (Hamilton), II, 119.
- » de miga de pan (F. P.), II, 119.
- » de mostaza (F. F.), IV, 33.
- » de mostaza (H. DE M.), IV, 32.
- » narcótica, II, 119.
- » oftálmica (H. DE M.), II, 119.
- » opiada, II, 119.
- » de patatas, I, 284.
- » de perejil, I, 286; II, 119.
- » de perifollo, I, 286.
- » de persicaria, I, 286.
- » de pimienta, I, 288.
- » purgante, II, 120.
- » de quina, I, 311; II, 120.
- Cataplasma resolutive, II, 120.
- » resolutive (Astruc), II, 121.
- » resolutive (Kerndel), II, 120.
- » resolutive (H. DE M.), II, 121.
- » resolutive (Sta. María), II, 121.
- » resolutive amoniaca (H. DE M.), II, 120.
- » resolutive fuerte (H. DE M.), II, 120.
- » resolutive mercurial (H. DE M.), II, 121.
- » rubefaciente (Trousseau), II, 121.
- » rubefaciente (Willis), II, 118.
- » de ruda, II, 321.
- » de sabina, II, 121.
- » de salvado y mucilago, II, 121.
- » saturnina, II, 121.
- » saturnina (H. M.), II, 122.
- » saturnina (H. M. F.), II, 116.
- » sedante, II, 122.
- » sedante (Goelis), 122.
- » sedante y calmante, II, 122.
- » sedante resolutive, II, 122.
- » de sedo acre, I, 333.
- » de siempreviva de los tejados, I, 335.
- » sinapizada, IV, 33.
- » de sombrerera, I, 340.
- » supurante, II, 122.
- » supurativa (H. M.), II, 122.
- » supurante (H. DE M.), II, 122.
- » de tanino alcanforada, II, 116 y 122.
- » tónica (H. DE AL.), II, 122.
- » tónica (H. M. F.), II, 116.
- » tónica (Kapeler), II, 123.
- » de tormentila, I, 348.
- » de tusilago, I, 350.
- » vegeto mineral (H. DE M.), II, 121.
- » de verbena, I, 356.
- » vermífuga (Raspail), II, 123.
- » de vinagre, II, 123.
- » de vinagre y corteza de pan (H. DE M.), II, 123.
- » vinosa, II, 123.
- » vinosa (Thomson), II, 123.

- Cataplasma virosa , II , 123.
 » vomitiva , II , 123.
 » de yerbamora , I , 360.
 » de yerbamora y beleño , II , 123.
 » de zanahoria , I , 360.
 Catecú purificado (F. F.) , II , 303.
 Cáusticos , I , 142 ; II , 123.
 Cáustico argéntico (Cazenave de Burdeos) , II , 124.
 » arsenical , II , 123.
 » blando , II , 124.
 » contra las estrecheces callosas de la uretra (Cazenave de Burdeos) , II , 124.
 » etiópico (Velpeau) , II , 124.
 » de Pollau , II , 124.
 » de Recamier , II , 124.
 » sulfo-azafranado (Velpeau) , II , 124.
 » de Viena (F. F.) , II , 124.
 » de Viena solidificado (Filhos) , II , 125.
 Cera para los dientes cariados , III , 159.
 » verde (F. F.) , II , 235.
 Ceratos , II , 125.
 Cerato de acetato de plomo (F. DE L.) , II , 125.
 » alcanforado (H. M. F.) , II , 132.
 » almidonado (Cazenave) , II , 125.
 » amoniacal , II , 131.
 » anodino , II , 260.
 » anodino (F. E.) , II , 125.
 » anodino (H. M.) , II , 131.
 » antiépsórico , II , 125.
 » antioftálmico de Larrey (H. M. F.) , II , 125.
 » antiséptico , II , 125.
 » antiséptico alcanforado , II , 125.
 » arsenical , II , 126.
 » azafranado (H. M. F.) , II , 132.
 » azufrado (H. M. F.) , II , 132.
 » de barita , II , 126.
 » de belladona , II , 126.
 » blanco (F. F.) , II , 128.
 » de calamina (F. DE L.) , II , 126.
 Cerato calaminar (Gibert) , II , 126.
 » calmante , II , 126.
 » calmante (H. DE M.) , II , 129.
 » de cantáridas , II , 126.
 » de cantáridas (F. DE L.) , II , 126.
 » de cantáridas (F. P.) , II , 126.
 » de caracoles , II , 126.
 » cetrino (F. A.) , II , 126.
 » de colofonia (F. DE L.) , II , 126.
 » cosmético , II , 127.
 » cosmético (Van Mons) , II , 127.
 » desecante (Barther) , II , 127.
 » desecante (Kirkland) , II , 127.
 » emoliente (H. DE M.) , II , 127.
 » emoliente dulcificante , II , 128.
 » emulsivo mercurial (Dorvault) , II , 128.
 » epispástico (Regimbeau) , II , 128.
 » de esperma de ballena , II , 128.
 » de esperma de ballena (F. DE L.) , II , 128.
 » de estearina (Barbin) , II , 128.
 » de estramonio , I , 188.
 » para las fuentes (F. A.) , II , 131.
 » fusco (F. A.) , II , 128.
 » de Galeno (F. F.) , II , 128.
 » de Galeno (H. M. F.) , II , 132.
 » de Goulard (F. F.) , II , 129.
 » de Goulard (H. M. F.) , II , 132.
 » hidrocianico (Bielt) , II , 129.
 » de Hufeland , II , 129.
 » de jabon (F. DE L.) , II , 129.
 » para los labios (F. A.) , II , 131.
 » laudanizado (Gobley) , II , 129.
 » de laurel real , II , 129.
 » de manteca de cacao , II , 129 y 130.

- Cerato de membrillos, II, 130.
 » mercurial, II, 130.
 » mercurial (Falck), II, 130.
 » mercurial (H. DE M.), II, 130.
 » mercurial (Zeller), II, 130.
 » de mercurio compuesto (F. DE L.), II, 130.
 » narcótico balsámico, II, 130.
 » contra las neuralgias, II, 126.
 » nicocianado (Consbruch), II, 130.
 » opiado, II, 130.
 » opiado (H. DE M.), II, 130.
 » opiado (Lagneau), II, 130.
 » opiado con cianuro de mercurio (Ricord), II, 131.
 » de plomo (H. M.), II, 129.
 » de plomo compuesto, II, 131.
 » de Pott, II, 131.
 » de precipitado blanco (Gibert), II, 131.
 » de quina, II, 125.
 » de Rechoux, II, 131.
 » refrigerante (F. M.), II, 131.
 » de resina (F. DE L.), II, 126.
 » de rosa (F. F.), II, 131.
 » rubefaciente, II, 322.
 » contra los sabañones, II, 127.
 » de sábina, II, 132.
 » de sabina (F. DE L.), II, 132.
 » de Saturno, II, 132.
 » de Saturno (F. F.), II, 129.
 » de Saturno (H. M. F.), II, 132.
 » de Saturno alcanforado, II, 132.
 » de Saturno y alcanfor (F. DE L.), II, 131.
 » simple (F. F.), II, 132.
 » simple (F. DE L.), II, 132.
 » simple (H. M. F.), II, 132.
 » de subacetato de plomo (F. F.), II, 129.
 » de sublimado, II, 133.
 » sulfurado, II, 133.
 » sulfurado (F. F.), II, 133.
 » tónico (Walm), II, 133.
 » de Turner, II, 133.
 Cerato de yema de huevo, II, 134.
 Ceroestearato (Lutrand), II, 133.
 Ceromel, II, 134.
 Ceromel (Aitken), II, 134.
 Cervezas, II, 134.
 Cerveza, II, 134.
 » de ajenjos, II, 134.
 » alcanforada, I, 75.
 » alcanforada (Beral), II, 134.
 » amarga, II, 134.
 » amoniaca, II, 134.
 » antiescorbútica, I, 333; II, 134.
 » antiescorbútica (H. DE NIÑOS), II, 135.
 » antiespasmódica, II, 135.
 » antiespasmódica (Butter), II, 135.
 » aromática, II, 135.
 » astringente marcial, II, 135.
 » cefálica inglesa, II, 135.
 » de centaura menor, I, 146.
 » diurética, II, 135.
 » diurética (J. P. Frank), II, 135.
 » doméstica, II, 135.
 » económica, II, 135.
 » de enebro, II, 136.
 » estomacal inglesa, II, 136.
 » de gengibre, I, 202 y 230.
 » de gengibre (Beral), II, 136.
 » de gengibre en polvo, II, 136.
 » negra, II, 136.
 » profiláctica, II, 136.
 » profiláctica (Mutis), II, 137.
 » purgante, II, 136.
 » purgante (Sydenham), II, 137.
 » purgante inglesa, II, 136.
 » de quina, I, 310; II, 137.
 » de quina (Mutis), II, 137.
 » de rábano silvestre (Brenecke), II, 137.
 » de sen y ruibarbo (Sydenham), II, 137.
 » de Sydenham, II, 137.
 Cetrarino, I, 430.
 Cianuro de manganeso, I, 435.
 Cidra artificial (Cottreau), III, 36.
 Cigarros, II, 137.

- Cigarros de alcanfor , II , 137.
- » de alcanfor (Raspail) , II , 138.
 - » aromáticos , II , 138.
 - » arsenicales (Boudin) , II , 138.
 - » arsenicales (Trousseau) , II , 138.
 - » balsámicos (Golfin) , II , 138.
 - » de beleño , II , 137.
 - » de belladona ; I , 118 ; II , 137.
 - » de estramonio , I , 188 ; II , 137.
 - » de mandrágora , II , 137.
 - » medicinales , II , 137.
 - » mercuriales , II , 139.
 - » mercuriales (Tierrhy) , II , 139.
 - » opiados , II , 139.
 - » pectorales (Spic) , II , 139.
 - » de salvia , I , 325.
 - » contra la tisis pulmonar , II , 139.
- Cimentos , II , 139.
- Cimento para los dientes , III , 140.
- » para los dientes (Ostermaier) , II , 139.
 - » oblitérico (Taveau) , 139.
- Cinturon antireumático (Marjolin) , IV , 30.
- Ciruelas , II , 137.
- » purgantes , II , 137.
- Citrato de magnesia , I , 430.
- Claras de huevo , II , 140.
- » de huevo aluminosa (H. DE AL.) , II , 140.
- Clasificación de los medicamentos , I , 367.
- Clavos , II , 140.
- » para sahumar (Ayr) , II , 140.
 - » para sahumar (F. F.) , II , 140.
- Clorato de potasa , I , 430.
- Clorito de cal líquido , I , 128.
- » de cal en polvo , I , 128.
- Cloroformo , I , 430.
- Cloruro amónico mangánico , I , 436.
- » de amoníaco y manganeso , I , 436.
 - » de cal líquido (F. F.) , II , 23.
- Cloruro de manganeso , I , 435.
- Cremas , II , 186.
- » de ajénjos blanca , II , 186.
 - » de almendras , II , 186.
 - » analéptica , II , 187.
 - » de azahar , IV , 7.
 - » de las Barbadas , IV , 10.
 - » de café , IV , 8.
 - » calmante , II , 188.
 - » de chocolate , II , 187.
 - » de flor de naranjo , IV , 7 ; II , 187.
 - » del Libano (Janissot) , II , 187.
 - » de Moca , IV , 8.
 - » para la cara , II , 188 ; III , 539.
 - » pectoral (Cottereau) , II , 187.
 - » pectoral (Huc) , II , 187.
 - » pectoral (Jeannet) , II , 187.
 - » pectoral (Pierquin) , II , 187.
 - » pectoral (Tronchin) , II , 188.
 - » pectoral de ácido prúsico (Pié) , II , 188.
 - » simple , II , 188.
 - » de vainilla , II , 188.
- Coágulos , II , 140.
- » albuminoso (H. DE M.) , II , 140.
- Coca , I , 430.
- Cocimientos , II , 140.
- Cocimiento de abeto , I , 53.
- » de acebo , I , 54.
 - » de acedera , I , 55.
 - » de acederilla , I , 55.
 - » de acelga , I , 60.
 - » de acibar compuesto (F. DE L.) , II , 440.
 - » de achicorias ; I , 67.
 - » de adormideras , I , 68.
 - » de agnocasto , I , 70.
 - » de ajo , I , 72.
 - » de álamo negro , I , 73.
 - » de alazor , I , 73.
 - » alcanforado , I , 75.
 - » de alcaparro , I , 75.
 - » de alcornoque , I , 76.
 - » de alholva , I , 77.
 - » de algarrobo , I , 77.
 - » de almidon , I , 80.
 - » de alquequenje ; I , 80.
 - » de alquimila , I , 81.

- Cocimiento amargo (F. E.), II, 141.
- » amargo (H. DE AL.), II, 141.
- » amargo (H. DE M.), II, 141.
- » amargo (H. M.), II, 141.
- » amargo de camedrios (F. E.), II, 141.
- » amargo purgante (H. DE M.), II, 141.
- » de angélica, I, 89.
- » de angustura verdadera, I, 90.
- » anodino de gordolobo (F. E.), II, 141.
- » antiartrítico (Quarin), II, 141.
- » antiepsórico (Ranque), II, 141.
- » antiescorbútico, II, 142.
- » antiescorbútico (H. M.), II, 142.
- » antiescrofuloso, II, 142.
- » antiescrofuloso (F. A.), II, 142.
- » antiescrofuloso amargo, II, 142.
- » antifebril (F. P.), II, 142.
- » antipútrido (H. DE M.), II, 143.
- » antipútrido alcanfor. (H. DE SAN JUAN DE DIOS), II, 143.
- » antiséptico (Boerhaave), II, 143.
- » antiséptico completo (F. E.), II, 143.
- » antiséptico (H. M.), II, 143.
- » antiséptico incompleto (F. E.), II, 142.
- » antiséptico incompleto (H. DE M.), II, 142.
- » antiséptico de quina (F. E.), II, 142.
- » antiséptico de quina (H. DE M.), II, 142.
- » antiséptico purgante de quina (F. E.), II, 143.
- » antiséptico quinado alcanforado (H. DE M.), II, 143.
- » antiséptico quinado (H. DE SAN JUAN DE DIOS), II, 143.
- » antisifilítico nutritivo (Berra), II, 143.
- Cocimiento antitísico (Wauters), II, 144.
- » aperitivo (F. E.), II, 144.
- » aperitivo (H. DE M.), II, 144.
- » de apio, I, 95.
- » de aquilea, I, 96.
- » de argentina, I, 97.
- » de aristoloquia, I, 97.
- » de arnica, I, 98.
- » de arrowroot, I, 98.
- » de arroz, I, 98.
- » de arroz (H. DE M.), II, 144.
- » de arroz acidulado, II, 144.
- » de asclepias vinctósigo, I, 103.
- » de aspérula, I, 103.
- » de astrágalo, I, 103.
- » astringente (H. DE M.), II, 144.
- » astringente (Howison), II, 145.
- » astringente acetoso (H. DE M.), II, 144.
- » astringente para los niños (H. DE M.), II, 145.
- » de avena, I, 104.
- » de avena mondada, I, 104.
- » de azufaias, I, 106.
- » de baobab, I, 429.
- » de bayas de enebro carminativo (F. E.), II, 147.
- » de beleño, I, 116.
- » bezoárdico completo de Curvo (F. E.), II, 145.
- » bezoárdico incompleto de Curvo (F. E.), II, 145.
- » bezoárdico purgante de escorzonera (F. E.), II, 145.
- » de bignonia catalpa, I, 120.
- » de bistorta, I, 121.
- » blanco gomoso (F. E.), II, 145.
- » blanco gomoso (H. DE M.), II, 145.
- » blanco de Sydenham (F. E.), II, 146.
- » blanco de Sydenham (F. F.), II, 146.
- » blanco de Sydenham (H. DE M.), II, 146.
- » blanco de Sydenham (Mialhe), II, 146.

- Cocimiento blanco ténue (H. DE M.), II, 146.
- » de bolsa de pastor, I, 122.
- » de borraja, I, 122.
- » de brea, I, 123.
- » de brionía, I, 123.
- » de brusco, I, 124.
- » de café sin tostar, I, 126.
- » de cainca, I, 126.
- » de cainca (F. P.), II, 146.
- » de calaguala, I, 127.
- » de caléndula, I, 130.
- » de calmia, I, 130.
- » de camuesas, I, 131.
- » de caña, I, 134.
- » de cañafistula, I, 134.
- » de capuchinas, I, 136.
- » de caracoles, I, 136.
- » de cardiospermo, I, 138.
- » de cardo estrellado, I, 138.
- » de cardo santo, I, 139.
- » de cariofilea, I, 139.
- » carminativo de malvas (F. E.), II, 146.
- » carminativo emoliente (F. E.), II, 146.
- » carminativo de maná, II, 147.
- » de cáscara de granada, I, 207.
- » de cascarilla, I, 140.
- » de castaña de las Indias, I, 141.
- » de catecú, I, 142.
- » de catecú (F. P.), II, 147.
- » de ceanota, I, 143.
- » de cebada, I, 144.
- » de cebada (F. P.), II, 147.
- » de cebada acidulado, I, 153; II, 148.
- » de cebada acidulado (H. DE AL.), II, 148.
- » de cebada compuesto (F. E.), II, 147.
- » de cebada compuesto (F. DE L.), II, 147.
- » de cebada compuesto (F. P.), II, 147.
- » de cebada germinada acidulado (Bremer), II, 148.
- » de cebada perlada, II, 147.
- » de cicuta, I, 148.
- Cocimiento de cinamomo, I, 149.
- » de cinco en rama, I, 149.
- » de cinoglosa, I, 151.
- » de ciruelas pasas, I, 151.
- » de codaga pala, I, 158.
- » de cohate, I, 159.
- » de colombo, I, 160.
- » de coloquintida, I, 161; II, 148.
- » de comptonia, I, 162.
- » de consuelda mayor, I, 162.
- » de corcho, I, 163.
- » de cornejo macho, I, 163.
- » de corregüela, I, 165.
- » de corteza de raíz de granado agrio (H. DE M.), II, 151.
- » de la corteza de la raíz fresca de granado, I, 207.
- » de corteza de saúce compuesto (Bremer), II, 148.
- » de corteza verde de nuez seca, I, 274.
- » de cuerno de ciervo, I, 167.
- » de cuerno de ciervo (F. P.), II, 148.
- » de cuerno de ciervo calcinado, I, 167.
- » de cuerno de ciervo con miga de pan (F. E.), II, 146.
- » de china, I, 168.
- » de china compuesto (Swe-diaur), II, 148.
- » de dafne mecereon (Thompson), II, 148.
- » de dátiles, I, 170.
- » deterativo (H. DE M.), II, 148.
- » diaforético (Brera), II, 149.
- » de diente de leon compuesto, II, 149.
- » de digital, I, 172.
- » diurético (Hufeland), II, 149.
- » diurético alcalino, II, 149.
- » de draconcio fétido, I, 173.
- » de dulcamara, I, 174.
- » de dulcamara compuesto, II, 149.
- » dulzurante de zarzaparrilla (F. E.), II, 149.
- » edulcorante (F. E.), II, 149.

- Cocimiento edulcorante (H. DE M.), II, 149.
- » de eléboro blanco (F. DE L.), II, 150.
- » de eléboro fétido, I, 175.
- » de eléboro negro, I, 175.
- » emenagogo (H. DE AM.), II, 150.
- » emoliente (H. M.), II, 150.
- » emoliente (H. DE M.), II, 150.
- » emoliente de raíz de malva-bisco (F. E.), II, 150.
- » de encina, I, 178.
- » de énula campana, I, 179.
- » de énula campana compuesto, II, 351.
- » de equisetó, I, 179.
- » de escabiosa, I, 180.
- » de escila compuesto (F. AM.), II, 150.
- » de escolopendra, I, 182.
- » de escorzonera, I, 182.
- » de escrofularia, I, 182.
- » de esparraguera, I, 184.
- » de espigelia contra las lombrices, I, 184.
- » de espina de Cristo, I, 184.
- » de espino serval, I, 185.
- » de espuela de caballero, I, 185.
- » de estramonio, I, 187.
- » febrífugo y purgante (Senac), II, 150.
- » de filipéndula, I, 193.
- » de filirea de hoja ancha, I, 193.
- » flojo de Zittmann, IV, 149.
- » de flores de arnica, II, 150.
- » de las flores de ciruelo, I, 151.
- » de frángula, I, 195.
- » de fresno, I, 196.
- » de fumaría, I, 198.
- » fuerte de Zittmann, IV, 149.
- » de galeopsis de hojas grandes, I, 199.
- » de galio, I, 199.
- » de gatuña, I, 200.
- » de gayuba, I, 200.
- » de genciana, I, 201.
- » de genciana chiraita, I, 201.
- Cocimiento de gengibre, I, 230.
- » de geofroya de la Jamaica, I, 202.
- » de geranio, I, 202.
- » de ginesta de tintes, I, 203.
- » de globularia alipo, I, 204.
- » de glúten, I, 204.
- » de goma quino, I, 205.
- » gomoso (H. M.), II, 142.
- » gomoso de cuerno de ciervo (F. E.), II, 145.
- » gomoso ténue de cuerno de ciervo (F. E.), II, 145.
- » de gordolobo, I, 206.
- » de graciola, I, 206.
- » de grama, I, 207; II, 151.
- » de grama compuesto (F. E.), II, 144.
- » de grosellero negro, I, 208.
- » de guayaco, I, 209.
- » de guayaco compuesto (Chaussier), II, 151.
- » de guayaco compuesto (F. P.), II, 152.
- » de guayaco compuesto (F. S.) II, 151.
- » de haya, I, 211.
- » de helecho macho, I, 211.
- » de herniaria lampiña, I, 212.
- » de higos, I, 222.
- » de hojas de laurel, I, 232.
- » de hojas de madre selva, I, 240.
- » de hojas de nogal, I, 274.
- » de hojas de nogal (Negrier), IV, 137.
- » de hojas de olivo, I, 277.
- » de las hojas frescas de zumaque venenoso, I, 366.
- » de hojas secas de soldanella de mar, I, 340.
- » de hojas de taraxacon, I, 345.
- » de hollin, I, 224.
- » de hollin (Blaud), II, 151.
- » de ictiocola compuesto (E-imbke), II, 151.
- » de ipecacuana (Spielmann), II, 151.
- » de juncia avellanada, I, 230.

- Cocimiento de lamio blanco, I, 231.
- » de laurel culivaban, I, 232.
 - » laxante (F. E.), II, 151.
 - » laxante (H. M.), II, 152.
 - » de lechuga, I, 233.
 - » de los leños (F. E.), II, 152.
 - » de los leños (F. P.), II, 152.
 - » de los leños (H. DE M.), II, 152.
 - » de licopodio, I, 234.
 - » de lila, I, 235.
 - » de limones (Minsicht), II, 152.
 - » de linaza compuesto, II, 152.
 - » de lino, I, 236.
 - » de liquen, I, 236.
 - » de liquen con amargo (H. DE M.), II, 152.
 - » de liquen sin amargo (H. DE M.), II, 152.
 - » de lobelia, I, 238.
 - » de lombarda, I, 239.
 - » de lupulina, I, 239.
 - » de lúpulo, I, 239.
 - » de llanten, I, 240.
 - » de malva, I, 244.
 - » de malvabisco, II, 153.
 - » de maná carminativo (F. E.), II, 153.
 - » de maná purgante, II, 153.
 - » de manzanilla, I, 247.
 - » de marrubio negro, I, 248.
 - » de mecereon compuesto (F. P.), II, 153.
 - » de membrillo, I, 252.
 - » de mercurial, I, 153; II, 253.
 - » de mercurio, I, 254.
 - » mucilaginoso (Gall), II, 153.
 - » mucilaginoso (H. M.), II, 153.
 - » de muérdago, I, 271.
 - » de musgo de Córcega, I, 271.
 - » de musgo marino perlado, I, 271.
 - » narcótico, II, 154.
 - » de nenufar blanca, I, 273.
 - » de nogal ceniciento, I, 274.
 - » de nuez de agalla, I, 275.
- Cocimiento de oïmo campestre, I, 277.
- » de paciencia, I, 282.
 - » de palo de Campeche, I, 282.
 - » de palo de Campeche (F. E.), II, 154.
 - » de palo de guayaco compuesto (F. E.), II, 152.
 - » de palo de guayaco compuesto (H. DE M.), II, 152.
 - » de pareira brava, I, 283.
 - » de pasas, II, 284.
 - » pectoral (F. E.), II, 147.
 - » pectoral (H. DE M.), II, 154.
 - » pectoral de azufaias (F. E.), II, 154.
 - » de pelitre, I, 285.
 - » de peonía, I, 285.
 - » de perifollo, I, 286.
 - » de pimpinela saxifraga, I, 289.
 - » de pirola, I, 290.
 - » de polígala (H. DE M.), II, 154.
 - » de polígala de Virginia, I, 297.
 - » de polígala vulgar, I, 298.
 - » de polipodio, I, 298.
 - » de politrico, I, 298.
 - » de Pollini, II, 154.
 - » de potentila antihelmintica, I, 306.
 - » de primo verticilado, I, 306.
 - » de Pringle, II, 155.
 - » purgante (Roucher), II, 155.
 - » purgante de Curvo (F. E.), II, 145.
 - » purgante y antiperiódico (Senac), II, 155.
 - » de quina, I, 310; II, 155.
 - » de quina (H. DE M.), II, 155.
 - » de quina y agrimonia, II, 156.
 - » de quina aluminoso, II, 156.
 - » de quina y arnica, II, 156.
 - » de quina compuesto (F. P.), II, 142.
 - » de quina compuesto (Pringle), II, 155.
 - » de quina opiado, II, 156.

- Cocimiento de quina y ratania, II, 156.
- » quinado (H. M.), II, 155.
 - » de raiz de arnica, I, 98.
 - » de raiz de carlina, I, 139.
 - » de raiz del cardo de Maria, I, 138.
 - » de raiz de escorzonera incompleto (F. E.), II, 145.
 - » de raiz de fresa, I, 195.
 - » de raiz de taraxacon, I, 345.
 - » de raiz de violeta, I, 358.
 - » de rapóntico de los Alpes, I, 316.
 - » de ratania, I, 316.
 - » de remolacha, I, 317.
 - » de renuevos de abeto, vinoso (H. DE AL.), II, 156.
 - » resolutivo (H. DE M.), II, 156.
 - » de rubia, I, 320.
 - » de rubia (Swediaur), II, 156.
 - » de ruibarbo, I, 322.
 - » de ruibarbo (F. E.), II, 156.
 - » de salicaria, I, 323.
 - » de salvado, I, 324.
 - » de salvia, I, 325.
 - » de sándalo, I, 324.
 - » de saponaria, I, 330.
 - » de sasifraga, I, 332.
 - » de sauce, I, 331.
 - » de saúco, I, 332.
 - » de sebesten, I, 332.
 - » de sedo acre, I, 333.
 - » de semillas de sandía, I, 325.
 - » de serpentaria compuesto (H. DE AL.), II, 156.
 - » de simaruba, I, 335.
 - » de simaruba compuesto (F. N. P.), II, 157.
 - » de sombrerera, I, 340.
 - » sudorífico (H. M.), II, 157.
 - » sudorífico (Lamure), II, 157.
 - » de tabaco, I, 342.
 - » de talictro, I, 342.
 - » de tallos de patatas, I, 284.
 - » de tamarindos, I, 343.
 - » de tamarindos (H. DE M.), II, 157.
 - » de tanaceto, I, 343.
- Cocimiento de taraxacon (H. DE M.), II, 157.
- » de tomillo, I, 347.
 - » tónico deterativo (Bannies), II, 157.
 - » de torbisco, I, 347.
 - » de tormentila, I, 347.
 - » de trébol de agua, I, 348.
 - » de trinitaria, I, 350.
 - » de turbit, I, 350.
 - » de tusilago, I, 350.
 - » de valeriana, I, 353.
 - » de verbena, I, 356.
 - » de vetiver, I, 356.
 - » de vulvaria, I, 358.
 - » de Wauters, II, 157.
 - » de yerba mora, I, 360.
 - » de yezgo, I, 360.
 - » de zanahoria, I, 360.
 - » de zantóxilo clava de Hércules, I, 361.
 - » de zarparrilla, I, 362.
 - » de zarzaparrilla (F. E.), II, 158.
 - » de zarzaparrilla de Alemania, I, 362.
 - » de zarzaparrilla compuesto, IV, 120.
 - » de zarzaparrilla compuesto (F. DE L.), II, 157.
 - » de zarzaparrilla y dulcamara (Brera), II, 158.
 - » de zarzaparrilla iodurado (Magendie), II, 158.
 - » de zarzaparrilla de Virginia, I, 362.
 - » de zarzas, I, 361.
 - » de zumaque, I, 366.
- Cola de fray Cosme, IV, 43.
- Cold-Cream, II, 127 y 188.
- Colirios, II, 158.
- Colirio abortivo de las pústulas variólicas (Thielmann), II, 164.
- » de aceite de hígado de bacalao, I, 58.
 - » de acetato de plomo, II, 158.
 - » de acetato de plomo opiado, II, 158.
 - » acético alcoholizado (Scarpa), II, 159.

- Colirio ácido (Kirmer), II, 159.
- » ácido (Sichel), II, 159.
 - » albuminoso (H. DE M.), II, 36.
 - » alcohólico, II, 159.
 - » aluminosos, II, 159.
 - » contra la amaurosis (Anderson), II, 164.
 - » amoniaco (F. E.), II, 159.
 - » anodino, II, 159 y 160.
 - » anodino (H. DE AL.), II, 160.
 - » anodino (H. M.), II, 160.
 - » anodino (H. DE M.), II, 160.
 - » anodino (Jadelot), II, 160.
 - » anticatarral (Farvagnité), II, 160.
 - » antiescrofuloso (Ammon), II, 160.
 - » antiescrofuloso (Baudelocque), II, 160.
 - » antioftálmico (Magne), II, 160.
 - » antisifilitico, II, 161.
 - » de arnica acético, II, 170.
 - » astringente, II, 161.
 - » astringente (H. DE IT.), II, 161.
 - » astringente (H. DE L.), II, 161.
 - » astringente (H. DE M.), II, 161.
 - » astringente (Mialhe), II, 161.
 - » astringente (Scarpa), II, 161.
 - » astringente opiado, II, 161.
 - » astringente opiado (Rust), II, 161.
 - » astringente resolutivo, II, 161.
 - » de atropina, II, 162.
 - » azafranado sedante, II, 162.
 - » azurado, II, 23.
 - » barítico (Hargens), II, 162.
 - » barítico (Mojon), II, 162.
 - » de beleño (H. DE ING.), II, 162.
 - » de beleño (Sichel), II, 162.
 - » de belladona, II, 162.
 - » de belladona (Desmarres), II, 162.
 - » de belladona (Sichel), II, 162.
- Colirio blanco de Rhasis (H. DE M.), II, 162.
- » blanco de Rhasis con opio (H. DE M.), II, 162.
 - » contra la blefaritis (Sichel), II, 164.
 - » boratado, II, 163.
 - » boratado (H. DE AL.), II, 163.
 - » boratado (Richter), II, 163.
 - » boratado (Sichel), II, 163.
 - » de borato de sosa (Rust), II, 163.
 - » de borax, I, 122.
 - » de Boyle, II, 36.
 - » de Brun, II, 163.
 - » de Brun (F. P.), II, 163.
 - » calmante, II, 163.
 - » calmante (Furnarid), II, 163.
 - » calmante (Hufeland), II, 163.
 - » caterético, II, 163.
 - » cianhídrico (Cunier), II, 163.
 - » de cianuro de mercurio (Desmarres), II, 164.
 - » de cianuro de potasio (Cunier), II, 164.
 - » de cianuro de zinc, I, 363.
 - » de cianuro de zinc (Koch), II, 164.
 - » de clorito de cal, II, 164.
 - » de cloruro de bario, I, 114; II, 164.
 - » cobreoso (F. F.), II, 171.
 - » comun (H. M.), II, 164.
 - » contra las cicatrices de las viruelas (Thielman), II, 164.
 - » contra la conjuntivitis, II, 165.
 - » contra la conjuntivitis (Mialhe), II, 165.
 - » contra la conjuntivitis (Sichel), II, 165.
 - » contra la conjuntivitis crónica (Sichel), II, 165.
 - » de Conrad (H. DE M.), II, 164.
 - » deterativo, II, 166.
 - » deterativo (F. M.), II, 166.
 - » deterativo (Mialhe), II, 166.
 - » de deutocloruro de mercurio, I, 258.

Colirio emoliente, II, 166.

- » emoliente (F. N. P.), II, 166.
- » estibiado (Walter), II, 166.
- » de estramonio (Sichel), II, 162.
- etéreo amoniaco, II, 167.
- » excitante, II, 167.
- » excitante (Richter), II, 167.
- » excitante (Graeffe), II, 167.
- » de Fernandez (F. E.), II, 361.
- » de Fernandez (H. DE M.), II, 361.
- » fortificante (H. DE AL.), II, 167.
- » fosforado, II, 167.
- » fundente (H. DE M.), II, 167.
- » gaseoso (Furnari), II, 167.
- » de Gimbernat, II, 167.
- » de Gimbernat (H. DE M.), II, 167.
- » de goma amoniaco, I, 204.
- » gomoso (H. DE M.), II, 167.
- » gomoso astringente (H. M.), II, 167.
- » de Graeffe, II, 168.
- » de Helvecio, II, 168.
- » de Henderson, II, 168.
- » de hollin, I, 224; II, 168.
- » de hollin (Carron de Villards), II, 168.
- » iodurado (Desmarres), II, 168.
- » iodurado (Magendie), II, 168.
- » iodurado (Reinigen), II, 168.
- » de ioduro de amoniaco, I, 86.
- » de ioduro de potasio, I, 227.
- » de Janin, II, 168.
- » de Krimer, II, 168.
- » de lactucario, I, 231.
- » de Lanfrank (F. F.), II, 169.
- » de Lanfrank (H. DE M.), II, 169.
- » de laurel real, II, 169.
- » contra las manchas de la córnea (Beer), II, 165.
- » contra las manchas de la córnea (Boerhaave), II, 165.
- » contra las manchas de la córnea (Dupuytren), II, 165.

Colirio contra las manchas de la

- córnea (Guepin), II, 165.
- » contra las manchas de la córnea (Maestro Juan), II, 165.
- » contra las manchas de la córnea (Richter), II, 165.
- » contra las manchas de la córnea (Weller), II, 166.
- » mercurial, II, 169.
- » mercurial (Conradi), II, 169.
- » mercurial aceitoso (Hufeland), II, 169.
- » mercurial calmante (Conradi), II, 169.
- » mercurial laudanizado (Mort), II, 169.
- » mercurial simple, II, 169.
- » narcótico, II, 170.
- » de Neumann, II, 170.
- » de Neumann (H. DE M.), II, 170.
- » de nitrato de plata, II, 170.
- » de nitrato de plata (Desmarres), II, 170.
- » de nitrato de plata (Fronmueller), II, 170.
- » de nitrato de plata (Reveillé Parisé), II, 171.
- » de nitrato de plata (Velpeau), II, 170.
- » de nitrato de plata cristalizado, I, 293.
- » contra las oftalmias crónicas (Kerzberg), II, 166.
- » contra las oftalmias escrofulosas (Negrier), II, 166; IV, 138.
- » contra la oftalmia purulenta de los recién nacidos (Reveillé Parisé), II, 166.
- » contra las oftalmias sifilíticas (H. DE M.), II, 166.
- » oftálmico (F. M.), II, 171.
- » oftálmico fortificante (Selle), II, 171.
- » opiado, I, 278.
- » opiado (F. F.), II, 171.
- » de óxido de sodio, I, 339.
- » para dilatar la pupila, II, 171.
- » de piedra divina, I, 288.

- Colirio de piedra divina (F. F.), II, 171.
- » de Plenck, II, 171.
- » de potasa cáustica, I, 299.
- » de pulsatila, II, 171.
- » de ratania (Desmarres), II, 171.
- » repercusivo (Gaubius), II, 171.
- » resolutivo, II, 171 y 172.
- » resolutivo (Himly), II, 172.
- » resolutivo argéntico (H. DE M.), II, 172.
- » resolutivo (H. DE M.), II, 173.
- » resolutivo (H. DE NIÑOS), II, 173.
- » resolutivo (Recamier), II, 173.
- » resolutivo (Scarpa), II, 173.
- » resolutivo amoniaco, II, 172.
- » resolutivo anodino (H. DE M.), II, 172.
- » resolutivo mercurial (H. DE M.), II, 173.
- » resolutivo seco (H. DE M.), II, 173.
- » revulsivo, II, 173.
- » revulsivo (Pierre), II, 173.
- » de Scarpa, II, 173.
- » seco, II, 173.
- » seco (Beer), II, 174.
- » seco (Cullerier), II, 174.
- » seco (Dupuytren), II, 174.
- » seco (Velpeau), II, 174.
- » seco de alumbre calcinado, II, 174.
- » seco de Lagneau (H. DE M.), II, 174.
- » seco de mercurio dulce, I, 257.
- » seco de óxido de zinc, I, 364.
- » sedante, II, 174.
- » sedante y astringente, II, 174.
- » de sublimado corrosivo, II, 161.
- » de sublimado corrosivo (H. DE AL.), II, 175.
- » de sulfato de cadmio, II, 175.
- Colirio de sulfato de cobre, II, 175.
- » de sulfato de cobre (Guepin), II, 175.
- » de sulfato de zinc, I, 364; II, 175.
- » de sulfato de zinc (F. F.), II, 175.
- » de tanino, I, 344.
- » de tanino (Desmarres), II, 175.
- » tónico (Courty), II, 175.
- » de trementina (Laugier), II, 175.
- » de tridacio, I, 349.
- » vegeto-mineral (Tavignot), II, 176.
- » verde (H. DE M.), II, 176.
- » de Weller, II, 176.
- » de zinc alcoholizado (Martinet), II, 176.
- » zincado, II, 176.
- Colodion, I, 430.
- Colutorios, II, 176.
- Colutorio acético opiado (Mayer), II, 176.
- » ácido (Swediaur), II, 176.
- » de ácido clorhídrico, II, 177.
- » ácido clorhídrico (F. P.), II, 177.
- » acidulado, II, 177.
- » contra las aftas (Pierquin), II, 180.
- » contra las aftas (Trousseau), II, 179.
- » alcalino, II, 177.
- » de alumbre (F. P.), II, 177.
- » aluminoso, II, 177.
- » aluminoso (Cortum), II, 177.
- » aluminoso (Vogt), II, 177.
- » antiescorbútico (H. DE AL.), II, 177.
- » antiescorbútico (H. DE IT.), II, 177.
- » antiescorbútico (Meyer), II, 177.
- » antiescorbútico astringente (Hildembrand), II, 179.
- » antiodontálgico (Duerr), II, 178.
- » antiodontálgico (Schiron), II, 177.

- Colutorio antiséptico, II, 178.
- » antiséptico (Guersent), II, 178.
 - » antiséptico (Wendt), II, 178.
 - » astringente (Ducoudray), II, 178.
 - » astringente (Frank), II, 179.
 - » astringente (H. DE IT.), II, 178.
 - » astringente (Hildembrand), II, 179.
 - » astringente alcanforado (Sundelin), II, 178.
 - » astringente cobreoso (Kopp), II, 178.
 - » boratado, II, 179.
 - » boratado (Bahi), II, 179.
 - » boratado (Wendt), II, 179.
 - » calmante, II, 179.
 - » de catecú, II, 179.
 - » de clorito de cal (Chevalier), II, 179.
 - » clorurado, II, 179.
 - » de cloruro de calcio (F. P.), II, 179.
 - » dentífrico (Cruvelhier), II, 180.
 - » desinfectante (Angelot), II, 180.
 - » deterativo, II, 180.
 - » deterativo (H. DE IT.), II, 180.
 - » emoliente, II, 180 y 181.
 - » emoliente calmante, II, 181.
 - » gingival sedante (Mombert), II, 181.
 - » hidriodotado (Righini), II, 181.
 - » contra el infarto crónico de las amígdalas (Becker), II, 180.
 - » de mostaza, II, 181.
 - » narcótico (Fischer), II, 181.
 - » de nitrato de plata, II, 181.
 - » odontálgico, II, 181.
 - » odontálgico (Feuillet), II, 181.
 - » odontálgico (Fox), II, 181.
 - » odontálgico (H. DE M.), II, 181.
 - » opiado, II, 182.
 - » de opio (F. P.), II, 182.
- Colutorio para tocar las placas membranosas en las estomatitis, II, 182.
- » saturnino (H. M. F.), II, 182.
 - » de subcarbonato de potasa, (F. P.), II, 182.
 - » sulfúrico (F. M. F.), II, 182.
 - » contra el tialismo mercurial (Lippich), II, 180.
- Collares, II, 182.
- » anodinos, II, 182.
- Collar contra el bocio, II, 182.
- » de Morand, II, 182.
- Compresas, II, 182.
- Compresa clorosa con vinagre (Mialhe), II, 182.
- Compresion, I, 161.
- Confecciones, II, 194.
- Confeccion de almendras (F. DE L.), II, 195.
- » de alquermes (F. DE T.), II, 195.
 - » aromática (F. DE L.), II, 199.
 - » astringente de rosas encarnadas (F. E.), II, 200.
 - » de cáscara de naranja, I, 140.
 - » de cinosbostos (F. DE L.), II, 203.
 - » de escamonea, I, 181.
 - » de escamonea (F. DE L.), II, 206.
 - » de Hamech, II, 209.
 - » de jacintos, II, 201.
 - » del Japon, II, 203.
 - » japónica (H. DE M.), II, 210.
 - » de pasas, II, 212.
 - » de pimienta negra (F. DE L.), II, 212.
 - » de quina antimonial (F. E.), II, 207.
 - » de rosas rojas (F. DE L.), II, 213.
 - » de ruda (F. DE L.), II, 214.
 - » de sándalo cordial (F. E.), II, 214.
- Confites, II, 183.
- » de copaiba (Fortin), II, 346.
 - » contra las flores blancas (Colombat), II, 183.
 - » de fosfato de manganeso, I, 436.

- Confitos de Keysser , I , 255 ; II , 183 ; III , 282.
 » de lactato de hierro , II , 347.
 » de oxalato de manganeso , I , 439.
 » de peróxido de manganeso , I , 434.
 » de tartrato de manganeso , I , 439.
 » vermífugos (Pierquin) , II , 183.
 » del Dr. Vaumé , II , 183.
 Confitura de serval , I , 335.
 Conservas , II , 184.
 Conserva de acedera , I , 55.
 » de acederilla , I , 55.
 » de adormideras , I , 68.
 » de ajeno , I , 72 ; II , 184 y 185.
 » de aleluya , II , 185.
 » de angélica , I , 89 ; II , 185.
 » antiescorbútica , II , 184.
 » antiescorbútica (Selle) , II , 184.
 » de apio , I , 95 ; II , 185.
 » de artemisa , II , 184.
 » de azufaias , II , 184.
 » de becabunga , I , 115.
 » de berros (F. F.) , II , 185.
 » de betónica , I , 119.
 » de borraja , II , 184.
 » de buglosa , I , 125.
 » de cálamo aromático , II , 185.
 » de cañafistula , I , 134.
 » de cañafistula (F. F.) , II , 184.
 » de cinosbastos , I , 151 ; II , 185.
 » de ciruelas , I , 151.
 » de ciruelas (F. E.) , II , 184.
 » de ciruelas , II , 185.
 » de ciruelas purgantes , II , 185.
 » de ciruelas purgantes del P. Bermudez , II , 185.
 » de coclearia , I , 157.
 » de coclearia (F. E.) , II , 185 y 186.
 » de coclearia (F. F.) , II , 185.
 » de cornejo macho , I , 163.
 Conserva de eulantrillo (F. E.) , II , 186.
 » de émula campana , I , 179 ; II , 185.
 » de émula campana (F. F.) , II , 186.
 » de erisimo , I , 180.
 » de escaramujos (F. F.) , II , 185.
 » de escordio (F. E.) , II , 185.
 » de flores de violeta , II , 185.
 » de flores de melocoton , II , 185.
 » de fumaria , I , 198 ; II , 185.
 » de hisopo , II , 184.
 » de laurel real , I , 232.
 » de lepidio (F. E.) , II , 185.
 » de lirio , II , 185.
 » de manzanilla , I , 247.
 » de milpiés , I , 265.
 » del P. Bermudez , II , 185.
 » de pasas laxante , II , 185.
 » pulverulenta de acónito (Foy) , II , 186.
 » pulverulenta de beleño (Foy) , II , 186.
 » pulverulenta de belladona (Foy) , II , 186.
 » pulverulenta de centeno cornezuelo (Foy) , II , 186.
 » pulverulenta de cicuta (Foy) , II , 186.
 » pulverulenta de digital (Foy) , II , 185.
 » pulverulenta de ruda (Foy) , II , 186.
 » de polvo de cornezuelo de centeno , I , 164.
 » de quina , II , 186.
 » de romero , II , 184.
 » de rosas (F. E.) , II , 186.
 » de rosas rojas , I , 319.
 » de rosas rojas (F. F.) , II , 186.
 » de ruda , I , 320 ; II , 184.
 » de sabina , I , 322 ; II , 184.
 » de salvia , I , 325.
 » de tamarindos , I , 343.
 » de tamarindos (F. F.) , II , 185 y 186.
 » de tila , I , 346.

- Conserva de trébol de agua, II, 185.
 » de violetas, I, 358; II, 185.
 » de yedra, II, 185.
 » de yedra terrestre, I, 359.
 » de yedra terrestre (F. E.), II, 186.
 Cordial de Godefroy, IV, 84.
 Cosméticos, I, 165.
 Cosmético de Alibert, III, 512.
 » de Siemerling, II, 267.
 Cotiledon ombligo, I, 431.
 Cuajo, IV, 54.
 » líquido, IV, 54.
 Cuatro flores (F. F.), II, 287.
 Curazao, IV, 8.
 Chelsea pensonier, II, 204.
 Chispa eléctrica, I, 176.
 Chocolates, II, 188.
 Chocolate, I, 125.
 » de almendras, II, 191.
 » antihelmíntico (Vandame), II, 192.
 » antivenéreo, II, 188.
 » de arrowroot (F. F.), II, 192.
 » blanco (Pierquin), II, 188.
 » de café de bellotas, II, 189.
 » de café de bellotas (Mairhofer), II, 189.
 » de catecú, II, 191.
 » de cloruro de plata, I, 292.
 » comun (F. F.), II, 189.
 » ferruginoso, II, 189.
 » ferruginoso (Meirieu), II, 191.
 » de guarana, II, 189.
 » de hierro reducido por el hidrógeno, II, 191.
 » de ioduro de hierro, I, 218; II, 189.
 » de ioduro de hierro (Pierquin), II, 189.
 Chocolate de ioduro de manganeso, I, 436.
 » de lactato de hierro, II, 189.
 » de leche de burra, II, 190.
 » de líquen, II, 190.
 » de líquen (F. s.), II, 190.
 » de líquen (Tapié), II, 190.
 » de líquen islándico (F. F.), II, 190.
 » de magnesia (Dorvault), II, 190.
 » marcial (Trousseau), II, 190.
 » de musgo marino, II, 190.
 » de osmazomo, II, 191.
 » á la polenta (Cadet de Vaux), II, 191.
 » purgante, II, 191.
 » purgante de Charles, II, 191; III, 186.
 » purgante (Mialhe), II, 191.
 » purgante (Pierquin), II, 191.
 » de salep, I, 323.
 » de salep (F. F.), II, 191.
 » de la salud (F. F.), II, 189.
 » de tapioca (F. F.), II, 192.
 » de vainilla (F. F.), II, 192.
 » vermífugo, II, 192.
 Choque eléctrico, I, 176.
 Chorros, I, 168; II, 192.
 Chorro aromático (Plenk), II, 192.
 » ascendentes, I, 168.
 » calientes, I, 168 y 170.
 » calientes sulfurosos, I, 170.
 » descendentes, I, 168.
 » frios, I, 168 y 169.
 » hidrosulfuroso, II, 192.
 » horizontales, I, 168.
 » con sulfuro de sodio (Trousseau y Pidoux), II, 192.
 » templados, I, 168.
 » de vapor, I, 112.

D.

- Dafne mecercon , I, 431.
 Dawamesk , I, 135.
 Deutónitrato de mercurio líquido (F. F. DE 1818), II, 34.
 Deutóxido de manganeso , I, 433.
 Diabolines , II, 193.
 » estimulantes , II, 193.
 Diacatolicon doble (F. F.), II, 202.
 Diaquilon gomado (F. E.), II, 256.
 Diaquilon mayor (F. E.), II, 256.
 Diascordio , I, 278.
 Diascordio (F. E.), II, 205.
 Diascordio (F. F.), II, 205.
 Dictamia (Goull y Boutron Rous-
 sel), II, 311.
 Digestivos , II, 192.
 Digestivo animado , II, 193.
 » animado (F. F.), II, 193.
 » animado opiado , II, 193.
- Digestivo animado opiado (Lis-
 franc), II, 193.
 » antipútrido (H. DE M.), II,
 193.
 » antiséptico (Boerhaave), II,
 193.
 » antisifilítico , II, 193.
 » consuntivo (H. DE M.), II, 194.
 » mercurial (F. F.), II, 194.
 » opiado , II, 194.
 » de Plenck , II, 194.
 » simple (F. F.), II, 194.
 Digital , I, 431.
 » ferruginosa , I, 172.
 Digitalina medicinal , I, 173.
 Diurético de Debaen , III, 254.
 Droga amarga (Virey), IV, 64.
 » amarga contra la gota , IV,
 85.

E.

- Electuarios , II, 149.
 Electuario aceitoso (Sachs) , II,
 194.
 » de acetato de potasa com-
 puesto , II, 194.
 » de acíbar compuesto , II, 195.
 » de agárico blanco , I, 69.
 » de albaricoques , III, 94.
 » alquermes , II, 195.
 » alterante (Schuvanth) , II,
 195.
 » de angelina , II, 210.
 » de angustura verdadera , I,
 90.
 » anodino (F. A.), II, 195.
 » antiafónico (Astbury) , II,
 195.
- Electuario antiartrítico (Buchan) ,
 II, 195.
 » antiblenorrágico , II, 195.
 » antiblenorrágico (Droste), II,
 196.
 » antiblenorrágico (Righini) ,
 II, 196.
 » anticaquético , II, 196.
 » anticuartanario (H. DE M.), II,
 196.
 » anticuartanario ferruginoso
 (H. DE M.), II, 196.
 » anticuartanario purgante (H.
 DE M.), II, 196.
 » antidisent. (Buchan), II, 196.
 » antidisentérico (Wilkenson) ,
 II, 196.

- Electuario antiescorbútico , III, 143.
- » antiepiléptico (H. DE M.), II, 196.
- » antiepiléptico (Mead), II, 197.
- » antiescorbútico (H. DE M.), II, 197.
- » antiescrofuloso (Baumes), II, 197.
- » antiespasmódico (Barthez), II, 197.
- » antiespasmódico (Roth), II, 197.
- » antiespasmódico (Swediaur), II, 197.
- » antifebril , II, 213.
- » antifebril (Boerhaave), II, 197.
- » antihelmíntico , II, 197.
- » antihelmíntico (H. DE M.), II, 197.
- » antihelmíntico (F. DE HANNOVER), II, 197.
- » antihelmíntico (Deslandes), II, 198.
- » antihelmíntico (Grimaud), II, 198.
- » antihelmíntico (Heister), II, 198.
- » antihelmíntico (Hufeland), II, 198.
- » antihelmíntico (Selle), II, 198.
- » antihelmíntico (Vogler), II, 198.
- » antihemorroidal (Reuss), II, 198.
- » antiherpético (Faces), II, 198.
- » antiherpético (Fouquet), II, 199.
- » antiherpético estibiado , II, 198.
- » antinefrítico , II, 199.
- » antineurálgico (Jolly), II, 199.
- » antiperiódico (Spinelli), II, 199.
- » aperitivo , II, 199.
- » de arnica , II, 199.
- » aromático (F. A.), II, 215.
- Electuario aromático con opio (F. A.), II, 195.
- » de artemisa , II, 199.
- » astringente , II, 200.
- » astringente (Bally), II, 200.
- » astringente (Barthez), II, 200.
- » astringente (Duhaume), II, 200.
- » astringente (Most), II, 200.
- » astringente (Swediaur), II, 200.
- » astringente (Tissot), II, 200.
- » astringente de Fuller (F. E.), II, 200.
- » astringente de quina , II, 201.
- » astringente y tónico , II, 201.
- » de azafran compuesto , II, 201.
- » de azufre , II, 201.
- » balsámico y astringente (Barthez), II, 201.
- » de bálsamo de copaiba (Bouigní), II, 201.
- » de beleño opiado (F. E.), II, 202.
- » béquico (Fee), II, 202.
- » de biengranada , I, 120.
- » de brea (Mignéot), II, 202.
- » de cainca (Fouquier), II, 202.
- » contra las calenturas (Sydenham), II, 203.
- » calibeadó , II, 202.
- » calmante y tónico (Recamier), II, 202.
- » de cañafístula (F. P.), II, 202.
- » de cañafístula tamarindado (F. E.), II, 202.
- » de catecú , II, 203.
- » de catecú compuesto , II, 203.
- » católico comun (F. E.), II, 214.
- » de cera , II, 203.
- » de cinosbastos , I, 151.
- » de cloruro de hierro y amoníaco , II, 203.
- » contra las convulsiones de los niños , II, 204.

- Electuario de cubebas, II, 204.
- » de cubebas y copaiba, II, 204.
 - » de cubebas y copaiba (Cazenave), II, 204.
 - » dentífrico, II, 204.
 - » dentífrico (F. F.), II, 204.
 - » dentífrico de mirra (F. S.), II, 205.
 - » dentífrico (Maury), II, 205.
 - » deterativo, II, 205.
 - » diacatolicon (F. F.), II, 202.
 - » diafenicon, II, 205.
 - » diaforético, II, 205.
 - » diascordio (F. E.), II, 205.
 - » diascordio (F. F.), II, 205.
 - » de dilochos, I, 173.
 - » diurético (J. P. Frank), II, 206.
 - » diurético (Meyer), II, 206.
 - » de Duhaume modificado, II, 206.
 - » de enebro, II, 206.
 - » de énula campana, II, 185.
 - » contra la epilepsia (Tessier), II, 203.
 - » de escamonea y turbit compuesto (F. F.), II, 205.
 - » de escordio opiado, I, 278.
 - » de escordio opiado (F. E.), II, 205.
 - » de esencia de trementina (Dessier), II, 206.
 - » de estaño, II, 206.
 - » de estaño amalgamado con mercurio, II, 207.
 - » estimulante, II, 207.
 - » estomacal, II, 207.
 - » estomacal (Alibert), II, 207.
 - » estomacal (H. DE AL.), II, 207.
 - » estomacal (Santa María), II, 207.
 - » febrífugo, II, 207.
 - » febrífugo (Desbois de Rochefort), II, 208.
 - » febrífugo (F. E.), II, 207.
 - » febrífugo (H. DE M.), II, 208.
 - » febrífugo (Quarin), II, 208.
 - » febrífugo (Tissot), II, 208.
 - » febrífugo y aperitivo (Gaubius), II, 208.
- Electuario febrífugo de Ayensa (H. DE M.), II, 208.
- » febrífugo de castaño de Indias, II, 208.
 - » febrífugo del Dr. Buendía (H. DE M.), II, 208.
 - » febrífugo y purgante (Sennac), II, 208.
 - » de Fuller, II, 209.
 - » gingibal, II, 209.
 - » gomoso, II, 209.
 - » contra las gonorreas rebeldes, II, 204.
 - » de Hamech, II, 209.
 - » hidragogo (Fouquier), II, 209.
 - » hidragogo (Quarin), II, 209.
 - » hidragogo (Richter), II, 209.
 - » hidragogo (Sinogowitz), II, 210.
 - » de hinojo acuático, II, 210.
 - » ingrasante (Sydenham), II, 210.
 - » de ipecacuana moscadó, II, 210.
 - » jovial contra la ténia, II, 207.
 - » de Kortum, II, 210.
 - » lenitivo (F. DE AL.), II, 211.
 - » lenitivo (F. E.), II, 202.
 - » lenitivo (F. F.), II, 210.
 - » lenitivo (F. P.), II, 211.
 - » de magnesia, II, 211.
 - » de maná (H. DE AL.), II, 211.
 - » de manteca de cacao (Cotte-reau), II, 187.
 - » marcial, II, 211.
 - » de Masdeval (H. DE M.), II, 211.
 - » mayor (F. E.), II, 214.
 - » de mostaza (H. DE ING.), II, 212.
 - » negro tónico (Trousseau), II, 212.
 - » opiado (F. P.), II, 215.
 - » de pasas, II, 212.
 - » pirolignico, II, 212.
 - » de plombagina compuesto (Weihold), II, 212.
 - » purgante (Fouquier), II, 213.

- Electuario purgante (H. DE AL.), II, 212.
- » purgante (H. DE M.), II, 213.
- » purgante (Quarin), II, 213.
- » purgante (Requin), II, 212.
- » de quina, II, 213.
- » de quina (F. F.), II, 207.
- » de quina alcalino (H. DE M.), II, 213.
- » de quina y valeriana, II, 213.
- » contra la rabia (Jacnichet), IV, 15.
- » de Reuss, II, 213.
- » de rosas compuesto (Tissot), II, 213.
- » de sándalo cordial, II, 214.
- » de sen (F. P.), II, 211.
- » de sen (F. S.), II, 214.
- » de sen compuesto (F. E.), II, 214.
- » de tanino, II, 214.
- » contra la ténia (Mathieu), IV, 18.
- » triacal (F. E.), II, 216.
- » triacal grande (F. E.), II, 214.
- » triaca de los pobres, II, 215.
- » de valeriana, II, 216.
- » vermífugos (Bremser), IV, 20.
- » vermífugo (Ferrarini), II, 216.
- » vermífugo (Fouquier), II, 216.
- » vermífugo (Spielmann), II, 216.
- » vermífugo (Swediaur), II, 216.
- Eleosácaro de aceite volátil de santónico, I, 60.
- » de anís, I, 90.
- » de hinojo, I, 223.
- Elíxires, II, 216.
- Elíxir aceitoso (Goblin), II, 216.
- » de acetato de magnesia (Renaut), II, 217.
- » ácido (Goblin), II, 217.
- » ácido de Haller, II, 217.
- » ácido (Vogler), II, 217.
- Elíxir ácido aromático (Brugnate-lli), II, 217.
- » ácido aromático (F. P.), II, 218.
- » de ajénjos, IV, 65.
- » alcanforado, II, 220.
- » alcanforado de Hartmann, II, 46.
- » amargo, IV, 68.
- » amargo (Boerhaave), II, 217.
- » amargo (A. Dubois), II, 217.
- » americano de Courcelles, II, 50.
- » americano de Courcelles (reformado), II, 218.
- » antiapopléctico de los jacobinos de Ruan, II, 218.
- » antiartrítico, II, 218.
- » antiartrítico (H. DE M.), II, 219.
- » antiartrítico de la isla de Francia, II, 218.
- » antiasmático (Barthez), II, 219.
- » antiasmático (Boerhaave), II, 219.
- » antibilioso, II, 219.
- » antiblenorrágico, II, 219.
- » anticatarral (Hufeland), II, 219.
- » antiescorbútico, II, 219.
- » antiescorbútico (Boerhaave), II, 219.
- » antiescorbútico (Selle), II, 220.
- » antiescrofuloso (F. F.), II, 227; IV, 83.
- » antiflemático, II, 220.
- » antiflemático (Clary), II, 220.
- » antiflemático (Guillé), II, 220.
- » antiflogístico, II, 220.
- » antigotoso de Villette, II, 220.
- » antihelmíntico (F. S.), II, 220.
- » antihidrópico (Behrends), II, 199.
- » antileucorréico, II, 220.

- Elíxir antiodontálgico (Bories), II, 221.
- » antiodontálgico (Lerroy de la Faudigniere), II, 221.
 - » antiodontálgico (Oxley), II, 221.
 - » antipestilencial (Spina), II, 221.
 - » antivenéreo, II, 221.
 - » antivenéreo (Lemort), II, 221.
 - » antivenéreo (Walker), II, 221.
 - » antivenéreo (Wright), II, 221.
 - » aperitivo (Clauder), II, 222.
 - » aromático, II, 222.
 - » balsámico, II, 222.
 - » balsámico (Werlhoff), II, 222.
 - » balsámico atemperante de Hoffmann (F. E.), IV, 66.
 - » balsámico espirituoso (Hoffmann), II, 222.
 - » de Barthez, II, 222.
 - » carminativo (Dalby), II, 223.
 - » de Chaussier contra el tifo, II, 228.
 - » de Daffi, II, 223.
 - » dentífrico (Berton), II, 223.
 - » dentífrico (Desirabode), II, 223.
 - » dentífrico (Gresset), II, 224.
 - » dentífrico (Lefoulon), II, 223.
 - » dentífrico astringente (Mialhe), II, 223.
 - » dentífrico aromático (Lefoulon), II, 222.
 - » dentífrico para cauterizar, II, 224.
 - » del Dr. Larra, II, 226.
 - » de drogas amargas, II, 224.
 - » de drogas amargas de los indios, II, 224.
 - » de escamonea, II, 218.
 - » estomacal (F. E.), IV, 79.
 - » estomacal (F. P.), IV, 84.
 - » estomacal (Gaubius), II, 224.
 - » estomacal (Lentin), II, 222.
- Elíxir estomacal (Stoughton), II, 224.
- » febrífugo (Whitt), II, 225.
 - » febrífugo y aperitivo (Gaubius), II, 225.
 - » ferruginoso, II, 225.
 - » fétido (Fulde), II, 226.
 - » fortificante (Selle), II, 225.
 - » de fray Francisco Ferrer de Santa Catalina, II, 225.
 - » de Garus (F. F.), II, 225.
 - » de genciana (Deschamps), II, 226.
 - » de Jamet, II, 226.
 - » de larga vida, I, 61.
 - » de larga vida (F. F.), IV, 65.
 - » de Lemort, II, 226.
 - » de mirra, II, 226.
 - » odontálgico (Ancelot), II, 226.
 - » odóntico (Desforges), II, 226.
 - » paregórico (F. F.), IV, 93.
 - » paregórico inglés, II, 227.
 - » de pelitre compuesto, II, 227.
 - » de Peyrilho, II, 227.
 - » de propiedad (F. E.), IV, 64.
 - » de propiedad (Minsicht), II, 227.
 - » de propiedad (Paracelso), II, 227.
 - » de propiedad acuoso (Clauder), II, 222.
 - » de propiedad blanco (F. DE WURT.), II, 228.
 - » de propiedad salino, II, 228.
 - » de propiedad de Van Helmont, II, 228.
 - » purgante (F. DE PLENK), II, 228.
 - » purgante oficial de Lavoilley, IV, 88.
 - » de quina y azafran compuesto, II, 228.
 - » de quina y cascarilla etéreo, II, 228.
 - » de Radclif, II, 228.
 - » de Raulino, II, 229.
 - » resinoso (Goblin), II, 229.
 - » resolutivo (Selle), II, 229.

- Elixir sagrado, IV, 96.
- » de Spina, II, 72.
 - » de Squire, II, 229.
 - » de Stoughton, IV, 67.
 - » sudorífico (Willis), II, 229.
 - » tónico, II, 229.
 - » tónico (Desirabode), II, 230.
 - » uterino (Crollius), II, 230.
 - » uterino (Duryer), II, 346.
 - » vermífugo (Reboul), II, 230.
 - » visceral (Hoffmann), II, 230.
 - » visceral de Hoffmann, II, 230.
 - » vitriolo aromático (Dehaen), II, 230.
 - » de vitriolo dulce (F. E.), IV, 97.
 - » vitriólico de Mynsich (F. F.), IV, 72.
 - » de Woroneje contra el cólera, II, 231.
 - » de zarzaparrilla y quina compuesto, II, 220.
- Embalsamamientos, II, 231.
- Embriaguez, IV, 336.
- Embrocaciones, II, 233.
- » de aconitina, I, 66.
 - » de aconitina (Trousseau), II, 233.
 - » de aconitina (Turnbull), II, 233.
 - » amoniacal (Swediaur), II, 233.
 - » astringente, II, 234.
 - » carminativa, II, 234.
 - » de delfina (Turnbull), II, 234.
 - » estimulante (Roux), II, 234.
 - » mercurial (Bateman), II, 234.
 - » narcótica, II, 234.
 - » oftálmica (Sichel), II, 234.
 - » de Questionan, II, 234.
 - » resolutive, II, 234.
 - » de Roche, II, 235.
 - » de veratrina (Turnbull), II, 235.
- Emplastos, II, 235.
- Emplasto del abate Doyen, II, 235.
- » de acetato de cobre (F. F.), II, 235.
- Emplasto de acónito, II, 244.
- » adhesivo, II, 235.
 - » aglutinante (F. F.), II, 235.
 - » aglutinante de Andrés de la Cruz, II, 235.
 - » aglutinante de Baviera, II, 236.
 - » aglutinante inglés, II, 237.
 - » aglutinante de resinas (F. E.), II, 235.
 - » aglutinante sin plomo (Petten Hofer), II, 237.
 - » de albayalde (F. F.), II, 237.
 - » de algarrobas (F. E.), II, 237.
 - » de algarrobas imperial (F. E.), II, 237.
 - » de algarrobas de Valencia (F. E.), II, 251.
 - » de almizcle, I, 80.
 - » de amoniaco mercurial (Selle), II, 237.
 - » de Andrés de la Cruz (F. F.), II, 235.
 - » anglosajon, II, 238.
 - » anodino, II, 238.
 - » anodino (F. E.), II, 259.
 - » anodino (Boerhaave), II, 238.
 - » anodino antioftálmico (Magne), II, 238.
 - » antiartrítico, II, 238.
 - » anticanceroso (Pissier), II, 238.
 - » anticanceroso (Richter), II, 238.
 - » anticardiálgico (Neumann), II, 238.
 - » antiespasmódico, II, 238.
 - » antihistérico, II, 239.
 - » antiodontálgico (Handel), II, 239.
 - » antiodontálgico (Tissot), II, 239.
 - » antivenéreo (Boerhaave), II, 239.
 - » contra la artralgia (Lippich), II, 245.
 - » aromático (F. P.), II, 239.
 - » aromático (F. S.), II, 240.
 - » de asa fétida, II, 240.

- Emplasto de asa fétida matricial (F. E.), II, 240.
- » balsámico, II, 240.
- » de bálsamo de Tolú (Ricour), II, 240.
- » de Baynton, II, 240.
- » de beleño, II, 241.
- » de beleño (Planche), II, 241.
- » de beleño opiado (Hufeland), II, 240.
- » de belladona, II, 244.
- » de belladona (F. DE L.), II, 241.
- » de belladona (H. DE M.), II, 241.
- » de belladona (Planche), II, 241.
- » benedicto (F. E.), II, 242.
- » contra el bocio, II, 245.
- » calmante, II, 255.
- » contra los callos (Kernedy), II, 246.
- » contra los callos (Pajot Laforet), II, 245.
- » de Canet (F. F.), II, 241.
- » de cantáridas (F. E.), II, 241.
- » de cantáridas (F. F.), II, 241.
- » de cantáridas (F. DE L.), II, 242.
- » de cantáridas (F. P.), II, 241.
- » de cantáridas (Heuster), II, 242.
- » de cantáridas inglés (F. F.), II, 242.
- » de carbonato de plomo quemado (F. E.), II, 242.
- » de caoutchu (Swediaur), II, 242.
- » cefálico, II, 243 y 255.
- » de cera (F. F.), II, 243.
- » ceroneo (F. F.), II, 243.
- » cetrino (F. A.), II, 126.
- » de cicuta (F. F.), II, 243.
- » de cicuta (H. M.), II, 243.
- » de cicuta (Mouchon), II, 244.
- » de cicuta (Planche), II, 241 y 243.
- » de cicuta é ioduro de plomo, II, 244.
- » contra los clavos (Baudot), II, 246.
- Emplasto contra los clavos de los piés (F. DE PLENK), II, 246.
- » cloromercúrico (Mialhe), II, 244.
- » de cola para las hernias (F. E.), II, 244.
- » contra el cólico (Swediaur), II, 246.
- » de colofonia (F. DE L.), II, 245.
- » de cominos, II, 245.
- » confortativo, II, 245.
- » confortativo para los lomos, II, 245.
- » contra la coqueluche (Cor-sin), II, 246.
- » de croton tiglio, II, 247.
- » de los cuatro fundentes (F. F.), II, 259.
- » deter-sivo rojo (Wepfer), II, 247.
- » de diapalma (F. E.), II, 247.
- » diapalma (F. F.), II, 247.
- » diaquilon simple (F. A.), II, 248.
- » diaquilon gomado (F. F.), II, 247.
- » diaquilon compuesto (F. A.), II, 247.
- » de digital, II, 248.
- » contra los dolores osteocopos (Ricord), II, 246.
- » eléctrico (Harrington), II, 248.
- » epispástico (F. E.), II, 241.
- » de esperma de ballena (F. E.), II, 248.
- » de esperma de ballena alcanforado, II, 248.
- » estibiado, II, 248.
- » estibiado (Ricord), II, 248.
- » estibiado del Dr. Lespinasse (F. P.), II, 248.
- » estíptico de Swediaur (F. A.), II, 249.
- » estomacal (F. A.), II, 249.
- » estomaticon (F. E.), II, 249.
- » de estoraque azufrado, II, 249.
- » de estoraque estomaticon (F. E.), II, 249.

- Emplasto de estoraque estomati-
con (F. M.), II, 249.
- » de estramonio (Planche), II,
241.
- » de euforbio, II, 249.
- » de euforbio (F. A.), II, 250.
- » fétido, II, 239.
- » fétido (F. S.), II, 250.
- » fundente, II, 250.
- » fundente (Cottereau y Verdé
Delisle), II, 244.
- » fundente (Lamotte), II, 250.
- » fundente (Sundelin), II, 250.
- » fundente (Tunee), II, 250.
- » fundente cobreoso, II, 250.
- » fundente y sedante (Dupuy-
tren), II, 250.
- » de gálbano (F. DE L.), II,
251.
- » de gálbano alcanforado, II,
251.
- » de gálbano azafranado (F.
E.), II, 251.
- » de gálbano corroborante (F.
E.), II, 251.
- » de gálbano simple (F. E.), II,
251.
- » de garrofas (F. E.), II, 251.
- » de garrofas imperial (F. E.),
II, 251.
- » de goma amoniaco, I, 204;
II, 251.
- » de goma amoniaco (F. DE
L.), II, 251.
- » de goma amoniaco compues-
to (F. DE PLENK), II, 252.
- » de goma amoniaco mercuri-
al (F. DE L.), II, 252.
- » de Guillen Cerven (F. E.), II,
259.
- » de Gunther, II, 252.
- » hidriodotado (Roderburg),
II, 252.
- » de hígado de azufre, II, 252.
- » imperial (F. E.), II, 251.
- » contra las induraciones cróni-
cas (Rust), II, 246.
- » contra el insomnio, II, 246.
- » iodado (Roderburg), II, 252.
- » de Isis (H. DE M.), II, 252.
- » de jabon (F. E.), II, 253.
- » de jabon (F. F.), II, 253.
- Emplasto de jabon (F. DE L.), II,
253.
- » jabonoso, II, 253.
- » jabonoso (Barbette), II, 253.
- » de ládano (F. A.), II, 249.
- » contra el mareo, II, 239.
- » matrical (F. E.), II, 240.
- » de meliloto compuesto (F.
E.), II, 254.
- » de meliloto simple (F. E.),
II, 254.
- » mercurial (F. A.), II, 254.
- » mercurial (F. F.), II, 254.
- » mercurial (F. P.), II, 254.
- » mercurial oxigenado de Ba-
ñares, II, 255.
- » mercurial tartarizado, II,
254.
- » de minio (F. E.), II, 255.
- » de minio alcanforado (F. F.),
II, 255.
- » de mucilago, II, 255.
- » de Nuremberg (F. F.), II,
255.
- » odontálgico, II, 255.
- » de opio, II, 244.
- » de opio (F. DE L.), II, 255.
- » de opio compuesto, II, 255.
- » de óxido de plomo diabota-
no (F. E.), II, 256.
- » de óxido de plomo diabota-
no con mercurio, II, 256.
- » de óxido de plomo epulóti-
co (F. E.), II, 247.
- » de óxido de plomo gomado
(F. E.), II, 256.
- » de óxido de plomo jabonoso
(F. E.), II, 253.
- » de óxido de plomo mucila-
ginoso compuesto (F. E.),
II, 256.
- » pardo (F. F.), IV, 170.
- » de pelitre de Fuller (F. B.),
II, 257.
- » perpetuo de Janin (F. DE B.),
II, 257.
- » de pez (F. F.), II, 257.
- » de pez (F. DE L.), II, 257.
- » de pez de Borgoña, I, 287;
II, 257.
- » de pez de Borgoña (F. P.),
II, 257.

- Emplasto de pez compuesto (F. A.), II, 248.
- » de pez emetizado, II, 258.
- » de pez negra regio (F. E.), II, 246.
- » de plomo (F. DE L.), II, 257.
- » de plomo simple (F. A.), II, 248.
- » de plomo gomo-resinoso (F. A.), II, 247.
- » de quinina, II, 258.
- » de quinina (Voisin), II, 258.
- » de ranas (F. E.), II, 258.
- » de ranas con mercurio, (F. E.), II, 258.
- » de ranas con mercurio (H. DE M.), II, 258.
- » de ratania, II, 258.
- » de resina, II, 235.
- » resinoso sulfurado (F. E.), II, 259.
- » resolutivo (F. E.), II, 256.
- » resolutivo (F. F.), II, 259.
- » resolutivo (Fouquet), II, 259.
- » contra rotura (F. E.), II, 244 y 246.
- » de Rustaing, II, 259.
- » contra los sabañones (Rust), II, 247.
- » de sabina (Radius), II, 259.
- » de sebo anodino (F. E.), II, 259.
- » simple (F. F.), II, 260.
- » simple (F. P.), II, 260.
- » simple (H. M.), II, 260.
- » simple (H. M. F.), II, 260.
- » de tabaco (Planche), II, 241.
- » de tacamaca (F. M.), II, 260.
- » de tacamaca (F. DE PLENK), II, 260.
- » tartarizado, II, 260.
- » tartarizado alcanforado, II, 260.
- » temporal, II, 255.
- » contra los tumores enquistados (F. DE PLENK), II, 247.
- » de Valsalva, II, 260.
- » vejigatorio, II, 261.
- » vejigatorio (F. E.), II, 241.
- » vejigatorio (F. F.), II, 241.
- » vejigatorio (F. P.), II, 241.
- Emplasto vejigatorio (Mejean), II, 261.
- » vejigatorio inglés, II, 261.
- » vejigatorio inglés (F. F.), II, 242.
- » vermífugo, II, 261.
- » vermífugo para los niños, II, 261.
- » de Vigo con mercurio, II, 261.
- » de Vigo con mercurio (F. F.), II, 254.
- » volátil resolutivo, II, 262.
- » de yerbamora (Planche), II, 241.
- » de zinc y plomo (F. s.), II, 262.
- Emulsiones, II, 262.
- Emulsion aceitosa, II, 262.
- » aceitosa (Hufeland), II, 262.
- » alcanforada, II, 262.
- » alcanforada (H. M.), II, 262.
- » alcanforada (H. DE M.), II, 262.
- » alcanforada y nitrada (H. DE AL.), II, 262.
- » de alfónsigos (F. F.), II, 272.
- » de almendras amargas, I, 78; II, 263.
- » de almendras con agua de lechuga (Beral), II, 263.
- » de almendras clorurada (Graefe), II, 263.
- » de almendras dulces, II, 263.
- » de almendras mercurial (Beral), II, 263.
- » amarga (Hufeland), II, 263.
- » amoniaca (H. DE AL.), II, 263.
- » anodina (H. DE M.), II, 263.
- » antiasmática (Fuller), II, 263.
- » anticolérica, II, 263.
- » antidisentérica (Golfin), II, 263.
- » antigonorréica (Graefe), II, 264.
- » antihelmíntica de ricino (Beral), II, 264.
- » antibiástica (Fuller), II, 264.

- Emulsion arábica (F. E.), II, 268.
- » arábica (H. DE M.), II, 268.
 - » arábica (H. M.), II, 268.
 - » arábica alcanforada, II, 268.
 - » de asa fétida, III, 26.
 - » astringente (Cadet), II, 264.
 - » atemperante, II, 264.
 - » atemperante (Goetze), II, 264.
 - » atemperante (Locksteedt), II, 264.
 - » atemperante (Radius), II, 265.
 - » atemperante (Santa María), II, 264.
 - » de avellanas, I, 104.
 - » de avellanas (Beral), II, 265.
 - » azafranada (Beral), II, 263.
 - » balsámica, II, 265.
 - » balsámica (H. DE AL.), II, 265.
 - » de bálsamo de copaiba medicinal, II, 265.
 - » de bálsamo de copaiba opiada (Beral), II, 265.
 - » contra la blenorragia, II, 266.
 - » de Brunero (F. E.), III, 128.
 - » de Brunero (H. DE M.), III, 128.
 - » calmante, II, 265.
 - » calmante (Rosenstein), II, 265.
 - » calmante etérea (Fages), II, 265.
 - » de cantáridas, II, 266.
 - » de cantaridina, II, 266.
 - » de cañamones, I, 135; II, 266.
 - » de cañamones (F. F.), II, 272.
 - » de cera (Foy), II, 266.
 - » comun (F. E.), II, 266.
 - » comun (H. DE M.), II, 266.
 - » comun (H. M.), II, 266.
 - » de copaiba, II, 267.
 - » de copaiba (Rhigini), II, 267.
 - » cosmética, II, 267.
 - » cosmética de Gowland, III, 35.
- Emulsion cosmética (Hermann), II, 267.
- » de cubebas, II, 267.
 - » de diacodion, II, 273.
 - » con diacodion (Beral), II, 263.
 - » contra la diarrea, II, 267.
 - » diurética, II, 267.
 - » diurética (Swediaur), II, 267.
 - » diurética y calmante, II, 268.
 - » emenagoga (P. Frank), II, 268.
 - » emoliente, II, 268.
 - » excitante (Swediaur), II, 268.
 - » expectorante (Brera), II, 268.
 - » febrífuga (Mylius), II, 268.
 - » febrífuga (Niemann), II, 268.
 - » de goma amoníaco (F. P.), II, 268.
 - » de goma arábica (F. E.), II, 268.
 - » de goma arábica (F. P.), II, 268.
 - » gomosa, II, 273.
 - » gomosa fosforada, II, 268.
 - » de jalapa, I, 229.
 - » laxante (Rush), II, 269.
 - » de limon, I, 235.
 - » con maná (F. E.), II, 270.
 - » mercurial (Duncan), II, 269.
 - » de mirra marcial, II, 269.
 - » narcótica (Ammon), II, 269.
 - » narcótica (H. DE AL.), II, 269.
 - » nitrada, II, 273.
 - » nitrada (H. DE AL.), II, 269.
 - » nitrada (H. DE M.), II, 269.
 - » nitrada y alcanforada, II, 269.
 - » nitrada compuesta (H. DE AL.), II, 270.
 - » de pepino, I, 285.
 - » pérsica, II, 270.
 - » de piñones (F. F.), I, 290; II, 272.
 - » purgante, II, 270.
 - » purgante (Alibert), II, 270.

- Emulsion purgante (F. E.), II, 270.
- » purgante (Foy), II, 270.
 - » purgante con aceite de croton tiglio, II, 271.
 - » purgante con aceite de ricino (F. F.), II, 270.
 - » purgante con aceite de ricino (Manne), II, 271.
 - » purgante con aceite de tártago (Calderini), II, 271.
 - » purgante con escamonea (F. F.), II, 271.
 - » purgante magnesiana (Mialhe), II, 271.
 - » purgante con resina de jalapa (F. F.), II, 271.
 - » de Quarin, II, 272.
 - » de quina (Barthez), II, 272.
 - » de resina de guayaco, II, 272.
 - » de resina de jalapa (F. P.), II, 271.
 - » contra las retenciones de orina (Somervail), II, 267.
 - » sedante, II, 272.
 - » de semillas de beleño (Righini), II, 272.
 - » de semillas de cardo de María, I, 138.
 - » de semillas frias (F. F.), II, 272.
 - » de semillas de limon, II, 272.
 - » de semillas de melon, I, 252.
 - » de semillas de sandía, I, 325.
 - » simple (F. F.), II, 272.
 - » somnifera (Beral), II, 273.
 - » sucinada, II, 273.
 - » de trementina, II, 273.
 - » de trementina (H. DE MOMP.), II, 273.
 - » con vainilla (Beral), II, 263.
 - » vermífuga, II, 273.
 - » vermífuga (Swediaur), II, 273.
 - » de Willis, II, 273.
 - » de yema de huevo medicinal (Beral), II, 274.
- Enema de almidon (H. DE M.), III, 10.
- Enema atemperante (H. DE M.), III, 14.
- » atemperante acetado (H. DE M.), III, 15.
 - » jabonoso (H. DE M.), III, 19.
 - » laxante (H. DE M.), III, 20.
 - » purgante (H. DE M.), III, 22.
 - » de trementina (H. DE M.), III, 24.
 - » vermífugo (H. DE M.), III, 24.
- Enjuagatorios, II, 274.
- Enjuagatorio antiescorbútico (F. P.), II, 274.
- » odontálgico (F. P.), II, 274.
 - » odontálgico reumático (F. P.), II, 274.
 - » de ratania (F. P.), II, 274.
 - » de ratania compuesto (F. P.), II, 274.
 - » de ruda (F. P.), II, 274.
 - » simple (F. P.), II, 274.
- Envenenamientos, IV, 327.
- Envenenamiento por los ácidos, IV, 329.
- » por el ácido prúsico, IV, 334.
 - » por el acónito, IV, 333, 336.
 - » por el agua de Javelle, IV, 332.
 - » por los álcalis, IV, 329.
 - » por el alcanfor, IV, 336.
 - » por el aceite de almendras amargas, IV, 336.
 - » por la anémona, IV, 333.
 - » por la angustura falsa, IV, 336.
 - » por animales, IV, 337.
 - » por el beleño, IV, 334.
 - » por la belladona, IV, 334, 336.
 - » por la brionía, IV, 333.
 - » por el bromo, IV, 332.
 - » por el bromuro de potasio, IV, 332.
 - » por la brucina, IV, 336.
 - » por las cantáridas, IV, 333.
 - » por la cebolla albarrana, IV, 336.
 - » por la celedonia, IV, 333.
 - » por el cianuro de mercurio, IV, 334.

- Envenenamiento por el cianuro de oro , IV , 334 , 336.
- » por la cicuta , IV , 336.
- » por la cicuta mayor , IV , 336.
- » por la cicuta menor , IV , 336.
- » por la clémátide , IV , 333.
- » por la coca de Levante , IV , 336.
- » por el cohombro silvestre , IV , 333.
- » de cólchico , IV , 336.
- » por la coloquintida , IV , 333.
- » por el cornezuelo de centeno , IV , 336.
- » por la creosota , IV , 333.
- » por el croton tiglio , IV , 333.
- » por la curara , IV , 336.
- » por la digital , IV , 336.
- » por el eléboro , IV , 336.
- » por las emanaciones de las flores , IV , 336.
- » por la escamonea , IV , 333.
- » por la escila , IV , 333.
- » por el esmalte , IV , 333.
- » por la estafisagria , IV , 333.
- » por el estramonio , IV , 336.
- » por la estricnina , IV , 336.
- » por el euforbio , IV , 333.
- » por la graciola , IV , 333.
- » por la gutagamba , IV , 333.
- » por el haba de San Ignacio , IV , 336.
- » por el hidrociorato de amoníaco , IV , 332.
- » por el hígado de azufre , IV , 332.
- » por los hongos , IV , 335.
- » por el iodo , IV , 332.
- » por el ioduro de potasio , IV , 332.
- » por la jalapa , IV , 333.
- » por el laurel real , IV , 336.
- » por el laurel rosa , IV , 336.
- » por la lechuga virosa , IV , 334.
- » por la mandrágora , IV , 334.
- » por el manzanillo , IV , 333.
- » por varios metales , IV , 331.
- » por las mordeduras de escorpion , IV , 337.
- Envenenamiento por el narciso de los prados , IV , 333.
- » por el nitrato de potasa , IV , 332.
- » por la nuez vómica , IV , 336.
- » por el opio , IV , 334.
- » por las preparaciones de antimonio , IV , 331.
- » por las preparaciones de arsénico , IV , 330.
- » por las preparaciones de bario , IV , 332.
- » por las preparaciones de bismuto , IV , 332.
- » por las preparaciones de cobre , IV , 330.
- » por las preparaciones de estaño , IV , 331.
- » por las preparaciones de fósforo , IV , 332.
- » por las preparaciones mercuriales , IV , 330.
- » por las preparaciones del opio , IV , 334.
- » por las preparaciones del oro , IV , 332.
- » por las preparaciones de plata , IV , 331.
- » por las preparaciones de plomo , IV , 332.
- » por las preparaciones de zinc , IV , 332.
- » por el ranúnculo , IV , 333.
- » por el ricino , IV , 333.
- » por la ruda , IV , 336.
- » por la sabadillina , IV , 336.
- » por la sabina , IV , 333.
- » por el sulfato de potasa , IV , 332.
- » por el sulfuro de potasa , IV , 332.
- » por las sustancias irritantes vegetales , IV , 333.
- » por el tabaco , IV , 336.
- » por el taguino , IV , 336.
- » por el ticunos , IV , 336.
- » por el torbisco , IV , 333.
- » por el upas antiar , IV , 336.
- » por el upas tieuté , IV , 336.
- » por el urano , IV , 331.
- » por el veneno americano , IV , 336.

- Envenenamiento por la veratrina, IV, 336.
- » por el vidrio, IV, 333.
 - » por la worora, IV, 336.
 - » por la yerbamora, IV, 334.
 - » por la zizaña, IV, 336.
 - » por el zumaque venenoso, IV, 333.
- Epilatorio de Colley, III, 159.
- » de Plenck, III, 159.
- Epitemas, II, 275.
- Epitema anisado II, 275.
- » antigotoso (Bories), II, 275.
 - » astringente (Brera), II, 275.
 - » calmante, II, 275.
 - » lumbar (Ranque), IV, 133.
 - » opiado y alcanforado, II, 275.
 - » de Ranque (H. DE M.), IV, 135.
 - » de Ranque contra el cólico de plomo, IV, 133.
 - » rubefaciente, II, 275.
 - » rubefaciente (Faure), II, 276.
 - » de tabaco (H. DE I.), II, 276.
 - » de triaca, II, 276.
 - » vermífugo (F. DE H.), II, 276.
- Escarificaciones, I, 181.
- Escubac, IV, 6.
- Escudos, II, 275.
- Escudo antiespasmódico (Fouquet), II, 275.
- » antiespasmódico y tónico, II, 275.
 - » antihemorroidal, II, 275.
 - » para el ombligo (F. E.), II, 251.
- Esencias, II, 276.
- Esencia de abeto compuesta, IV, 100.
- » de ajenos, IV, 65.
 - » alexifarmaca (Stahl), II, 276.
 - » amarga (F. DE WURT.), II, 276.
 - » de ambar, II, 277.
 - » de ambar seca, II, 277.
 - » antihemorrágica, II, 277.
 - » antihidrópica, II, 277.
 - » antihistérica, II, 47.
 - » antihistérica (F. E.), IV, 91.
 - » antihistérica (F. M.), IV, 70.
- Esencia antihistérica (Lemort), II, 277.
- » aromática laxante, II, 277.
 - » balsámica, II, 277 y 278.
 - » balsámica (Dippel), II, 278.
 - » de bardana (Hill), II, 278.
 - » de café, II, 278.
 - » carminativa, IV, 100.
 - » católica de Roth, II, 220.
 - » cefálica (F. F.), IV, 71.
 - » de Clauder, II, 355.
 - » concentrada de cubebas, II, 278.
 - » concentrada de cubebas (Beral), IV, 79.
 - » concentrada de zarzaparrilla (Smith), II, 278.
 - » depurativa de tusilago, II, 278.
 - » de dulcamara (Deschamps), II, 279.
 - » dulce (Hales), II, 279.
 - » escilítica (Keup), II, 279.
 - » de gengibre, II, 279.
 - » gingibal (Hebert), II, 279.
 - » de hollin, II, 355.
 - » de Italia, IV, 74.
 - » de jabon, IV, 88.
 - » de Langelot, IV, 94.
 - » odontálgica (Meyer), II, 279.
 - » real, II, 279.
 - » de sen (Lelvy), II, 280.
 - » de tusilago, II, 280.
 - » de Ward para el dolor de cabeza, II, 280.
 - » de yerbabuena inglesa, II, 280.
 - » de zarzaparrilla, II, 280.
 - » concentrada de zarzaparrilla, I, 362.
- Espadrapos, II, 280.
- Espadrapo, II, 280.
- » aglutinante, II, 280.
 - » aglutinante (Sevin), II, 281.
 - » aglutinante (Shaeciffele), II, 281.
 - » alcanforado (Raspail), II, 281.
 - » amarillo (F. E.), II, 281.
 - » astringente, II, 281.
 - » blanco, II, 281.

- Espadrapo de caoutchu (Conté), II, 282.
- » de caoutchu (Millé), II, 283.
- » de cera (F. F.), II, 282.
- » de cicuta é ioduro de plomo (Ricord), II, 282.
- » de cola de pescado, III, 149.
- » de cola de pescado (F. F.), II, 282.
- » de colofonia (Garn), II, 283.
- » compuesto (H. M. F.), II, 283.
- » comun (F. F.), II, 283.
- » comun (Millé), II, 283.
- » de croton tiglio, II, 247.
- » de diapalma, II, 283.
- » de diaquilon (H. M. F.), II, 283.
- » de emplasto de cicuta, II, 283.
- » epispástico, III, 151 y 153.
- » estibiado (H. DE M.), II, 283.
- » gomoso (Dedé), II, 284.
- » de Goulard, II, 284.
- » de ictiocola, II, 284.
- » de opio (Schaeufelle), II, 284.
- » vejigatorio (Guilbert), III, 153.
- » vejigatorio (Houdbine), II, 284.
- » de Vigo, II, 284.
- » de Vigo con mercurio opiado (Ricord), II, 285.
- Especies, II, 285.
- » amargas, II, 285.
- » amargas (F. F.), II, 285.
- » amargas (H. DE M.), II, 285.
- » antiescorbúticas, II, 285.
- » antiescorbúticas (Meyer), II, 285.
- » antihelmínticas (F. F.), II, 286.
- » antihemorroidales, II, 286.
- » antileucorréicas (Meyer), II, 286.
- » antiraquíticas, II, 286.
- » aperitivas (H. DE M.), II, 288.
- » aromáticas (F. F.), II, 286.
- » aromáticas (H. DE M.), II, 286.
- Especies aromáticas (F. A.), II, 287.
- » astringentes, II, 287.
- » astringentes (F. F.), II, 287.
- » astringentes (H. DE M.), II, 287.
- » béquicas (F. F.), II, 287.
- » calmantes, II, 287.
- » carminativas, II, 287.
- » carminativas amoniacaes, II, 288.
- » carminativas vulgares, II, 287.
- » cefálicas (Fulde), II, 288.
- » cordiales (H. DE M.), II, 288.
- » depurativas, II, 288.
- » diuréticas (F. F.), II, 288.
- » emenagogas, II, 288.
- » emenagogas (Tott), II, 288.
- » emolientes, II, 289.
- » emolientes (F. F.), II, 289.
- » emolientes (F. M.), II, 289.
- » emolientes (H. DE M.), II, 289.
- » emolientes (Stahl), II, 289.
- » emulsivas (H. DE M.), II, 289.
- » para fumar, II, 291.
- » fumigatorias, II, 290.
- » fumigatorias (Mazüyer), II, 290.
- » fumigatorias olorosas, II, 290.
- » narcóticas, II, 290.
- » nervinas, II, 290.
- » olorosas llamadas olla podrida, II, 290.
- » olorosas para perfumar, II, 291.
- » pectorales, II, 291.
- » pectorales (F. F.), II, 291.
- » pectorales (Wirttemberg), II, 292.
- » pectorales de San German, II, 292.
- » pectorales y sudoríficas, II, 292.
- » resolutivas, II, 292.
- » resolutivas con cicuta, II, 292.
- » sudoríficas, II, 292.
- » sudoríficas (F. F.), II, 292.

- Especies sudoríficas (Smith), II, 293.
- » sudoríficas llamadas cuatro leños sudoríficos, II, 293.
 - » sudoríficas para infusión, II, 293.
 - » para té (F. A.), II, 293.
 - » para tisanas de Baldingieri (F. ED.), II, 293.
 - » de los tres sándalos, III, 477.
 - » vermífugas, II, 293.
 - » vermífugas para lavativas (Bremser), IV, 20.
 - » viscerales de Koempf (F. B.), II, 294.
 - » vulnerarias (F. F.), II, 286.
 - » vulnerarias estimulantes (Radius), II, 294.
- Específicos, II, 294.
- Específico anodino (Paracelso), II, 294.
- » antigotoso (Agostinachio), II, 294.
 - » antigotoso (Reinold), IV, 202.
 - » astringente de Maetzius, III, 443.
- Espíritus, II, 295.
- Espíritu acético etéreo, II, 298.
- » de alcaravea (F. DE L.), II, 295.
 - » de amoniaco (F. DE L.), II, 295.
 - » de amoniaco aromático (F. DE L.), II, 295.
 - » de amoniaco fétido (F. DE L.), II, 295.
 - » de anís (F. DE L.), II, 295.
 - » de anís compuesto, II, 295.
 - » de anís compuesto (F. DE ED.), II, 295.
 - » antihistérico, II, 51.
 - » aperitivo (Penot), II, 295.
 - » ardiente de coclearia (F. F.), II, 50.
 - » aromático (F. A.), II, 295.
 - » artrítico (F. DE S.), II, 296.
 - » de bálsamo de copaiba, II, 296.
 - » de canela (F. F.), II, 48.
 - » de canela (F. DE L.), II, 296.
- Espíritu carminativo, II, 296.
- » carminativo (F. E.), II, 50.
 - » de castóreo, II, 49.
 - » de coclearia (F. E.), II, 49.
 - » de coclearia (F. F.), II, 49.
 - » de enebro compuesto, II, 50.
 - » de enebro compuesto (H. DE L.), II, 296.
 - » de espliego (F. DE L.), II, 296.
 - » de espliego compuesto, II, 296.
 - » de éter, II, 296.
 - » de éter sulfúrico, II, 296.
 - » etéreo aromático, II, 296.
 - » de éter nítrico (F. DE L.), II, 296.
 - » de éter sulfúrico compuesto (F. DE L.), II, 297.
 - » de hollin (Reuss), II, 297.
 - » de hormigas, II, 51.
 - » de jabon (F. A.), II, 297.
 - » de menta piperita, I, 253.
 - » de menta piperita (F. DE L.), II, 297.
 - » de miel, II, 52.
 - » de naranja (F. F.), II, 48.
 - » de nitro dulce (F. E.), II, 46.
 - » de nitro dulce (F. F.), II, 15.
 - » de nuez moscada (F. DE L.), II, 297.
 - » odontálgico, II, 297.
 - » oftálmico (Himly), II, 297.
 - » oloroso (F. DE S.), II, 297.
 - » de pelitre, II, 52.
 - » de rábano silvestre compuesto (F. DE L.), II, 297.
 - » de romero (F. F.), II, 52.
 - » de romero (F. DE L.), II, 297.
 - » de rosas, II, 53.
 - » de sal amoniaco acuoso (F. P.), II, 18.
 - » de sal amoniaco anisado, IV, 68.
 - » de sal amoniaco vinoso, II, 46.
 - » de sal dulce (F. E.), II, 46.
 - » de sangüesas, II, 51.
 - » de tomillo, I, 347.

- Espíritu de vida de Matthiolo , II, 48.
- » de vitriolo dulce, II, 15.
 - » de vitriolo ácido (F. E.), II, 15.
 - » volátil aromático oleoso de Silvio (F. F.), II, 47.
- Esponjas, II, 298.
- Esponja preparada (F. E.), II, 298.
- » preparada (F. F.), II, 298.
 - » preparada con cera (F. F.), II, 298.
- Estearato con agua (Lutrand), II, 133.
- » simple (Lutrand), II, 132.
- Estornutatorio de pelitre , I, 285.
- Eteres, II, 298.
- Eter acético alcoholizado , I, 191; II, 298.
- » acético cantaridado (Double), II, 298.
 - » ferruginoso de Klaproth, IV, 88.
 - » acético rubefaciente (Double), II, 298.
 - » alcanforado , II, 299.
 - » alcanforado (Trousseau), II, 299.
 - » amoniacal , II, 299.
 - » amoniacal alcanforado (Cottureau, hijo), II, 299.
 - » balsámico de Tolú (Moreau), II, 299.
 - » cobreoso , II, 299.
 - » clorhídrico alcoholizado , II, 299.
 - » con deutobromuro de mercurio , II, 299.
 - » fosforado , I, 194.
 - » fosforado (F. F.), IV, 83.
 - » fosforado (Loebelius de Loebenstein), II, 300.
 - » fosforado (Pelletier), IV, 83.
 - » mercurial (Cheron), II, 300.
 - » nítrico alcoholizado , I, 190; II, 300.
 - » nítrico trementinado, II, 300.
 - » sulfúrico , I, 432.
 - » sulfúrico alcoholizado , I, 190.
 - » sulfúrico alcoholizado (F. E.), II, 300.
- Eter sulfúrico alcoholizado (F. F.), II, 300.
- » sulfúrico con deutoioduro de mercurio , II, 300.
 - » sulfúrico iodurado , I, 226.
 - » sulfúrico iodurado (Magendie), II, 301.
 - » sulfúrico marcial , II, 301.
 - » trementinado, II, 301.
 - » zincado , I, 363; II, 301.
- Eterolado de acetato de hierro (Beral), IV, 63.
- Etiopes, II, 301.
- Etiope antimonial (Huxham), II, 301.
- » antimonial (Malouin), II, 302.
 - » vegetal de Russel , II, 302.
- Extractos , II, 302.
- Extracto de abedul , I, 53.
- » de abrotano , I, 53.
 - » de acederilla , I, 55.
 - » acético de acíbar , II, 302.
 - » acético de cantáridas , II, 303.
 - » acético de colchico , I, 159.
 - » acético de colchico (F. DE L.), II, 304.
 - » acético de colchico (Scudamore), II, 305.
 - » de acíbar , I, 61.
 - » de acíbar (F. F.), II, 309.
 - » de acónito , I, 66.
 - » acuoso de acónito , I, 66.
 - » acuoso de arnica , I, 98.
 - » acuoso de azafran , I, 105.
 - » acuoso de beleño , I, 116.
 - » acuoso de belladona , I, 117.
 - » acuoso de castaño de Indias , I, 141.
 - » acuoso de cebolla albarrana , I, 145.
 - » acuoso de cicuta , I, 148.
 - » acuoso de coca de Levante , I, 157.
 - » acuoso de colchico , I, 159.
 - » acuoso de colombo , I, 160.
 - » acuoso de coloquintida , I, 161.
 - » acuoso de estramonio , I, 188.

- Extracto acuoso de ipecacuana, II, 306.
- » acuoso de manzanilla, I, 247.
- » acuoso de muérdago, I, 271.
- » acuoso de nuez vómica, I, 276.
- » acuoso de opio, I, 278; II, 307.
- » acuoso de opio (F. E.), III, 8.
- » acuoso de opio (F. F.), II, 307.
- » acuoso de palo de Campeche, I, 283.
- » acuoso de pirola, I, 290.
- » acuoso de poligala vulgar, I, 298.
- » acuoso de quasía amarga, I, 307.
- » acuoso de quina, I, 310.
- » acuoso de ruda, I, 320.
- » acuoso de ruibarbo, I, 321.
- » acuoso de sabina, I, 322.
- » acuoso de sen, I, 334.
- » acuoso de tanaceto, I, 343.
- » acuoso de trébol de agua, I, 348.
- » acuoso de valeriana, I, 353.
- » acuoso de yemas de pino, I, 290.
- » de achicorias, I, 68.
- » de achicorias (F. F.), II, 304.
- » de adormideras (F. DE L.), II, 302.
- » de agárico, II, 305.
- » de agárico blanco (F. F.), II, 310.
- » de agárico aloético (F. E.), II, 302.
- » de agrimonia, I, 70.
- » con el agua y las hojas secas de acónito (F. F.), II, 309.
- » con el agua y las hojas secas de beleño (F. F.), II, 309.
- » con el agua y las hojas secas de belladona (F. F.), II, 309.
- » con el agua y las hojas secas de cicuta (F. F.), II, 309.
- Extracto con el agua y las hojas secas de estramonio (F. F.), II, 309.
- » de alcachofas, I, 74.
- » alcohólico de acónito, I, 66.
- » alcohólico de adormideras, I, 68.
- » alcohólico de agárico blanco, I, 69.
- » alcohólico de ajeno, I, 72.
- » alcohólico de ajeno marino, I, 72.
- » alcohólico de arnica, I, 98.
- » alcohólico de azafran, I, 105.
- » alcohólico de beleño, I, 116.
- » alcohólico de belladona, I, 118.
- » alcohólico de cainca, II, 303.
- » alcohólico de cantáridas (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de castaño de Indias, I, 141.
- » alcohólico de cebolla albarana, I, 145.
- » alcohólico de cicuta, I, 148.
- » alcohólico de cicuta (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de clemátide, I, 152.
- » alcohólico de cólchico, I, 159.
- » alcohólico de colombo, I, 160.
- » alcohólico de coloquintida, I, 161.
- » alcohólico de corteza de quina loja (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de cubebas, I, 167.
- » alcohólico de digital, I, 172.
- » alcohólico de estramonio, I, 188.
- » alcohólico de flores de arnica, II, 304.
- » alcohólico de flores de lúpulo, II, 304.
- » alcohólico de haba de San Ignacio, I, 210.
- » alcohólico de helecho macho, I, 211.

- Extracto alcohólico de hojas de acónito (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de beleño (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de belladona (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de digital (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de estramonio (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de pulsatila, II, 304.
- » alcohólico de hojas de ruda (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de sabina (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de liriodendro, I, 238.
- » alcohólico de liquen, I, 236.
- » alcohólico de manzanilla, I, 247.
- » alcohólico de maravilla de noche, I, 247.
- » alcohólico de narciso de los prados, II, 304.
- » alcohólico de nuez vómica, I, 276.
- » alcohólico de pareira brava, I, 283.
- » alcohólico de pirola, I, 290.
- » alcohólico de poligala vulgar, I, 298.
- » alcohólico de cuasia amarga, I, 307.
- » alcohólico de quina, I, 310.
- » alcohólico de raíz de boj, II, 304.
- » alcohólico de raíz de cainca, II, 304.
- » alcohólico de raíz de cólchico (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de raíz de colombo (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de raíz de eléboro negro (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de raíz de jalapa (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de raíz de granado, I, 207.
- » alcohólico de raíz de granado (F. F.), II, 304.
- Extracto alcohólico de raíz de poligala (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de raíz de valeriana, II, 304.
- » alcohólico de rubia, I, 320.
- » alcohólico de ruda, I, 320.
- » alcohólico de ruibarbo, I, 321.
- » alcohólico de sabadilla, I, 322.
- » alcohólico de sabina, I, 322.
- » alcohólico de saponaria (Couseran), II, 310.
- » alcohólico de sen, I, 334.
- » alcohólico de tanaceto, I, 343.
- » alcohólico de torbisco, I, 347.
- » alcohólico de trébol de agua, I, 348.
- » alcohólico de valeriana, I, 353.
- » alcohólico de yemas de pino, I, 290.
- » alcohólico de zarzaparrilla (F. F.), II, 304.
- » de algarrobo, I, 77.
- » amargo, II, 302.
- » de anémona, I, 88.
- » de angélica, I, 89.
- » de angustura verdadera, I, 90.
- » de aquilea, I, 96.
- » de aristoloquia, I, 97.
- » de artemisa, I, 101.
- » de asa fétida, I, 102.
- » de asagú, I, 429.
- » de ásaro, I, 102.
- » de azafran (F. F.), II, 306.
- » de bardana, I, 113.
- » de bayas de saúco (F. F.), II, 310.
- » de becabunga, I, 115.
- » de beleño, I, 116.
- » de beleño (F. F.), II, 304.
- » de belladona (F. F.), II, 304.
- » de berros, I, 119.
- » de berros (F. F.), II, 304.
- » de bilis de buey, I, 120.
- » de bilis de toro (F. F.), II, 302.

- Extracto de bistorta , I, 121.
- » de boj , I, 121.
 - » de borraja , I, 122.
 - » de borraja (F. F.), II, 309.
 - » de brionía , I, 123.
 - » de buglosa , I, 125.
 - » de cainca , I, 126.
 - » de cálamo aromático , I, 127.
 - » de caléndula , I, 130.
 - » de camedrios , I, 131.
 - » de canela , I, 132.
 - » de cantáridas , I, 133.
 - » de caña , I, 134.
 - » de cañafístula , I, 134.
 - » de cañafístula (F. F.), II, 303.
 - » de cardo estrellado , I, 138.
 - » de cardo santo , I, 139.
 - » de cariofilea , I, 139.
 - » de cáscara de nuez , I, 274.
 - » de cáscaras de nueces , II, 309.
 - » de cascarilla , I, 140.
 - » de catecú , I, 142.
 - » de catecú (F. F.), II, 303.
 - » de catecú de Bolonia , II, 303.
 - » católico , III, 296.
 - » católico (F. E.), II, 302.
 - » de celedonia mayor , I, 145.
 - » de centaurea menor , I, 146.
 - » de cicuta (F. F.), II, 304.
 - » de cicuta con la fécula verde (F. F.), II, 304.
 - » de cicuta preparado sin fécula , I, 148.
 - » de cinoglosa , I, 151.
 - » de coclearia , I, 157.
 - » de colocuántida , II, 305 y 306.
 - » de colocuántida (F. F.), II, 310.
 - » de colocuántida compuesto (F. DE L.), II, 305.
 - » de coclearia (F. F.), II, 304.
 - » de consuelda mayor , I, 162.
 - » de cornezuelo de centeno , II, 305.
 - » de corregüela , I, 165.
- Extracto de corteza de òlivo , I, 277.
- » de cubebas (Puche), II, 305.
 - » de china , I, 168.
 - » de chinsange , I, 168.
 - » de elaterio , I, 174.
 - » de eléboro de Bacher , I, 175.
 - » de eléboro negro , I, 175.
 - » de eléboro negro (F. E.), II, 305.
 - » emplástico de belladona (F. P.), II, 302.
 - » de enebro , I, 178.
 - » de enebro (F. F.), II, 305.
 - » de enebro compuesto (F. DE E.), II, 305.
 - » de énula campana , I, 179.
 - » de escabiosa , I, 180.
 - » de escila (F. F.), II, 306.
 - » de escordio , I, 182.
 - » de espino serval , I, 185.
 - » de escorzonera , I, 182.
 - » de estramonio , I, 188.
 - » de estramonio (F. F.), II, 304.
 - » etéreo de ajenjo marino , I, 72.
 - » con fécula de beleño , I, 116.
 - » con fécula de cicuta , I, 148.
 - » con fécula verde de acónito , I, 66.
 - » con la fécula verde de acónito (F. F.), II, 304.
 - » con la fécula verde de beleño (F. F.), II, 304.
 - » con la fécula verde de belladona , I, 118 (F. F.); II, 304.
 - » con la fécula verde de cicuta , II, 304.
 - » con la fécula verde de estramonio , I, 188.
 - » con la fécula verde de estramonio (F. F.), II, 304.
 - » con la fécula verde de lechuga virosa (F. F.), II, 304.
 - » con la fécula verde de pulsatila (F. F.), II, 304.
 - » con la fécula verde de zumaque venenoso (F. F.), II, 304.

- Extracto de flores de centaurea menor, II, 309.
- » de flores de manzanilla, II, 309.
- » de frutos de saúco, I, 332.
- » de fumaria, I, 198.
- » de fumaria (F. F.), II, 304.
- » de galanga mayor, I, 198.
- » de gayuba, I, 200.
- » de genciana, I, 201.
- » de geofroya de la Jamaica, I, 202.
- » de ginesta de tintes, I, 203.
- » gomoso de jalapa, I, 229.
- » gomoso de opio, I, 278.
- » gomoso de opio (F. E.), II, 307.
- » gomoso de opio (F. F.), II, 307.
- » de grama, I, 207.
- » de graciola, I, 206.
- » graso de cañamo de las Indias, I, 135.
- » de guayaco, I, 209.
- » de guayaco (F. F.), II, 306.
- » hemostático de cornezuelo de centeno, II, 305.
- » hidroalcohólico de guarana, II, 209.
- » hidroalcohólico de zarzaparrilla, II, 310.
- » de hojas de agenjos (F. F.), II, 309.
- » de hojas de artemisa (F. F.), II, 309.
- » de hojas de cameorios (F. F.), II, 309.
- » de hojas de cardo santo (F. F.), II, 309.
- » de hojas de digital (F. F.), II, 309.
- » de hojas de nogal, I, 274.
- » de hojas de sen (F. F.), II, 309.
- » de hojas de trinitaria (F. F.), II, 309.
- » de ipecacuana, I, 228.
- » de ipecacuana de la Carolina, I, 229.
- » de juncia avellanada, I, 230.
- » de lechuga (F. F.), II, 306.
- » de lechuga virosa, I, 233.
- Extracto de legumbres, II, 306.
- » de líquen, II, 307.
- » de ligústica, I, 235.
- » de lobelia, I, 238.
- » de lúpulo, I, 239.
- » de maro, I, 248.
- » de marrubio, I, 248.
- » de Marte (F. F.), II, 307.
- » de melisa, I, 251.
- » de mercurial, I, 253.
- » de mirra, I, 265.
- » de mirra (F. F.), II, 306.
- » de monesia, I, 266.
- » de narciso de los prados, I, 273.
- » de nogal (Negrier), IV, 137.
- » de nuez vómica (F. F.), II, 306.
- » oleo resinoso de cubebas, I, 167.
- » oleo resinoso de cubebas (Dublanc), II, 307.
- » de olmo campestre, I, 277.
- » de opio, I, 278.
- » de opio (F. E.), II, 307.
- » de opio (F. F.), II, 307.
- » de opio azafranado (F. E.), III, 7.
- » de opio cinabarino (F. E.), III, 6.
- » de opio por fermentacion (Deyeux), II, 308.
- » de opio sin narcotina (F. F.), I, 278; II, 308.
- » de opio con regaliz (F. E.), III, 8.
- » de opio con vino (F. F.), II, 308.
- » de ortigas (F. F.), II, 304.
- » de paciencia, I, 282.
- » de palo de Campeche, I, 282.
- » de pámpanos de vid, II, 308.
- » parenquimagogo, II, 310.
- » de parietaria, I, 283.
- » de patatas, I, 284.
- » de peonía, I, 285.
- » de perifollo, I, 286.
- » de pimpinela saxifraga, I, 289.
- » de pirotonide, I, 291.

- Extracto de polígala de Virginia, I, 297.
- » de puntas frescas de esparagos, I, 184.
 - » de quina, I, 310.
 - » de quina amarilla (F. F.), II, 309.
 - » de quina blando (F. F.), II, 308.
 - » de quina calisaya (F. F.), II, 309.
 - » de quina roja (F. F.), II, 309.
 - » de raiz de bardana (F. F.), II, 309.
 - » de raiz de bistorta (F. F.), II, 309.
 - » de raiz de énula campana (F. F.), II, 309.
 - » de raiz de genciana (F. F.), II, 309.
 - » de raiz de grama (F. F.), II, 309.
 - » alcohólico de raiz de ipecacuana (F. F.), II, 304.
 - » de raiz de paciencia (F. F.), II, 309.
 - » de raiz de peregil (F. F.), II, 309.
 - » de raiz de quasía (F. F.), II, 309.
 - » de raiz de ratania (F. F.), II, 309.
 - » de raiz de saponaria (F. F.), II, 309.
 - » de raiz de tormentila, II, 309.
 - » de raiz de valeriana (F. F.), II, 309.
 - » de rapóntico de los Alpes, I, 316.
 - » de ratania, I, 316.
 - » de regaliz, I, 317.
 - » de regaliz (F. F.), II, 309.
 - » de regaliz purificado (F. F.), II, 309.
 - » resinoso de helecho macho, I, 211.
 - » resinoso jabonoso (Plenk), II, 309.
 - » resinoso jabonoso de Plenk, III, 135.
- Extracto de rosas de Alejandria, I, 319.
- » de ruibarbo (F. F.), II, 309.
 - » de ruibarbo compuesto (F. DAN.), II, 310.
 - » de ruibarbo (F. DE L.), II, 310.
 - » de santónico, I, 329.
 - » de saponaria, I, 330.
 - » de sáuce, I, 331.
 - » de salvia, I, 325.
 - » seco de quina, I, 310.
 - » seco de quina, IV, 29; (F. F.), II, 309.
 - » de semillas de beleño, I, 116; (F. F.), II, 306.
 - » de semillas de belladona (F. F.), II, 306.
 - » de las semillas de estramónio, I, 188; (F. F.), II, 306.
 - » de serpentaria de Virginia, I, 334.
 - » de simaruba, I, 335.
 - » sudorífico (Smith), II, 310.
 - » de tabaco, I, 342.
 - » de tallos de dulcamara (F. F.), II, 309.
 - » de taraxacon, I, 345; (F. F.), II, 304.
 - » de té de España, I, 346.
 - » tebáico (F. E.), II, 307.
 - » tebáico (F. F.), II, 307.
 - » de tormentila, I, 347.
 - » de trébol de agua (F. F.), II, 304.
 - » de trinitaria, I, 350.
 - » de tusilago, I, 350.
 - » de verónica, I, 356.
 - » vinoso de opio, I, 278.
 - » vinoso de zarzaparrilla, II, 311.
 - » de yedra terrestre, I, 359.
 - » de yerba meona, I, 359.
 - » de yerba mora, I, 360.
 - » de zanahoria, I, 360.
 - » de zarzaparrilla, I, 362.
 - » de zedoaria, I, 362.
 - » de zumaque, I, 366.
 - » de zumaque venenoso, I, 366.
 - » de zumaque venenoso anti-

- moniado (Fages), II, 311. | Extracto de zumo depurado de belladona, I, 118.
 Extracto de zumo clarificado de belladona, I, 117. | » de zumo de perejil, I, 286.
 Exutorios, I, 192.

F.

- Febrífugo de Metzinger, III, 265. | Fomento aromático (H. DE M.), II, 314.
 Féculas, II, 211. | » aromático (H. M. F.), II, 315.
 » de elaterio, I, 174. | » aromático alcanforado, II, 315.
 » oriental (Kaiffa), II, 311. | » aromático alcanforado (H. DE M.), II, 314.
 » de yaro, I, 358. | » aromático con estricnina (Sichel), II, 315.
 Ferculum de Sajonia, II, 311. | » aromático vinoso (H. DE M.), II, 314.
 Filonio romano (F. E.), II, 202. | » aromático vinoso (H. M. F.), II, 315.
 Flagelacion, I, 193. | » de asa fétida, II, 315.
 Flores cordiales (F. M.), II, 288. | » astringente, II, 315.
 » cordiales cálidas (F. M.), II, 288. | » astringente (H. DE M.), II, 315.
 » cordiales carminativas (F. M.), II, 288. | » astringente amoniacal, II, 315.
 » pectorales, II, 291. | » astringente y tónico, II, 315.
 Fomentos, II, 313. | » astringente vinoso (H. DE M.), II, 316.
 Fomento de acetato de plomo (Ricord), II, 313. | » de beleño, II, 372.
 » de agraz, I, 70. | » de belladona, II, 372.
 » alcanforado, II, 313. | » calmante, II, 316.
 » alcohólico contra el hidrocèle (Pleindoux), II, 313. | » calmante (Ammon), II, 316.
 » amoniacal (Swediaur), II, 313. | » calmante (H. DE M.), II, 316.
 » amoniacal alcanforado (H. DE A.), II, 234 y 313. | » calmante (Righini), II, 372.
 » anodino (F. E.), II, 141. | » carminativo (F. E.), II, 147.
 » anodino (H. DE M.), II, 141. | » de clorito de cal, II, 316.
 » antiespasmódico, II, 313. | » cloroso (H. DE A.), II, 316.
 » antibelmíntico, II, 313. | » de cloruro de sosa debilitado (Ricord), II, 316.
 » antihemorroidal, II, 313. | » discusivo, II, 317.
 » antineurálgico (Mialhe), II, 313. | » diurético, II, 317.
 » antineurálgico (Trousseau), II, 313. | » emoliente, II, 317.
 » antiséptico (Brera), II, 313. | » emoliente (H. DE M.), II, 317.
 » antiséptico (Schmuker), II, 314. | » de especies aromáticas, II, 372.
 » antiséptico (Trusen), II, 314. | » de estramonio, II, 372.
 » antiséptico alcanforado, II, 314.
 » de arnica (Neumann), II, 314.
 » aromático, II, 314.

- Fomento contra la erisipela (Rou-cher), II, 316.
- » excitante, II, 317.
- » excitante (Neumann), II, 318.
- » de flor de saúco (F. F.), II, 318.
- » fortificante, II, 318.
- » contra la gangrena, II, 316.
- » para la gangrena (H. DE M.), II, 319.
- » con las hojas de beleño, II, 319.
- » con las hojas de belladona, II, 319.
- » con las hojas de las especies emolientes, II, 319.
- » con las hojas de estramonio, II, 319.
- » con las hojas de yerbamora, II, 319.
- » irritante (Vogt), II, 323.
- » jabonoso, II, 318.
- » jabonoso (Trousseau y Pidoux), II, 318.
- » de Justamond, II, 318.
- » muriático, II, 318.
- » narcótico, II, 318 y 372.
- » narcótico (F. F.), II, 319.
- » narcótico opiado, III, 82.
- » oftálmico (Sichel), II, 319.
- » opiado (Ricord), II, 319.
- » contra las quemaduras (Thorel), II, 317.
- » refrigerante, II, 319.
- » refrigerante (Vauquelin), III, 99.
- » refrigerante de Schmuker (H. DE M.), II, 314.
- » resolutivo, I, 332; II, 319.
- » resolutivo (Brodie), II, 319.
- » resolutivo (H. DE M.), II, 319.
- » resolutivo (Graeffe), II, 320.
- » resolutivo (Pierquin), II, 320.
- » resolutivo (Richter), II, 320.
- » resolutivo (Swediaur), II, 320.
- » resolutivo alcanforado, II, 320.
- » resolutivo amoniacoal, II, 320.
- Fomento resolutivo para edemas (H. DE M.), II, 320.
- » resolutivo suave (H. DE M.), II, 320.
- » resolutivo vulgar (Vogt), II, 320.
- » de Richard, II, 320.
- » contra sabañones, II, 317.
- » de sal amoniaco, II, 321.
- » saturnino (H. M. F.), II, 321.
- » sinapizado (Fouquier), II, 321.
- » de solucion concentrada de sublimado (Ricord), II, 321.
- » de sulfato de hierro, I, 221.
- » de sulfato de zinc, I, 365.
- » sulfurosos, III, 84.
- » de tabaco alcalino (Manyat), II, 321.
- » de tanino (H. M. F.), II, 321.
- » contra la timpanitis, II, 317.
- » de tintura de iodo (Ricord), II, 321.
- » tónico (H. M. F.), II, 321.
- » de vinagre (F. F.), II, 321.
- » vinoso, II, 322; III, 85.
- » vinoso (F. F.), II, 322.
- » de vino aromático con opio (Ricord), II, 321.
- » de vino aromático con tanino (Ricord), II, 321.
- » vinoso astringente (Strahl), II, 322.
- » vinoso de bayas de enebro, II, 322.
- » vinoso de salvia, II, 322.
- » de yerbamora, II, 372.
- » de amoniaco, I, 432.
- » de manganeso, I, 436.
- Fricciones, I, 196; II, 322.
- » de aceite animal de Dippel, I, 56.
- » de aceite de croton, I, 57.
- » con aceite de tártagos, I, 345.
- » de belladona opiadas (Max. Simon), II, 322.
- » de benjuí, I, 118.
- » de cianuro de oro, I, 280.
- » de clavo de especia, I, 152.
- » de cloruro de oro, I, 280.

- Fricciones de cloruro de oro y sodio, I, 280.
- » de digital, I, 172.
 - » diuréticas, II, 322.
 - » eléctricas, I, 176.
 - » de esencia de trementina, I, 183.
 - » estimulantes, II, 322.
 - » estimulantes (Magendie), II, 322.
 - » estimulantes (Wardrop), II, 322.
 - » de éter acético, I, 191.
 - » de éter sulfúrico, I, 190.
 - » febrífuga, II, 322.
 - » de incienso, I, 226.
 - » de ioduro de oro, I, 281.
 - » de lactucario, I, 231.
 - » de mercurial, I, 254.
- Frontales, II, 323.
- Frontal anodino (F. M.), II, 323.
- » contra la jaqueca, II, 323.
 - » hipnótico, II, 323.
- Frutos béquicos (F. F.), II, 289.
- » pectorales (F. F.), II, 289.
- Fuligocali, I, 432.
- » sulfurado, I, 432.
- Fumigaciones, II, 323.
- Fumigacion de ácido nítrico, I, 106; (F. F.), II, 323; (F. P.), II, 323.
- » antiloímica, II, 325.
 - » antiséptica, II, 323.
 - » antisifilítica (H. DE M.), II, 324.
- Fumigacion antivenérea, II, 324.
- » aromática, II, 324.
 - » aromática (Debreyne), II, 324.
 - » balsámica, II, 324.
 - » de belladona, II, 324.
 - » de benjuí, I, 118.
 - » de brea, II, 324.
 - » calmante (Trousseau), II, 324; III, 99.
 - » de Carmichael Smith, II, 323; (F. F.), II, 323.
 - » de cinabrio, II, 324.
 - » de cloro, I, 153.
 - » de cloro (F. F.), II, 325.
 - » de cloro (H. DE M.), II, 325.
 - » clorurada (H. M.), II, 325.
 - » desinfectante, II, 325.
 - » emenagoga, II, 325.
 - » emolientes, II, 325.
 - » de enebro, I, 178; II, 325.
 - » de estramonio, II, 325.
 - » de Gaubius, II, 325.
 - » Guitoniana (F. F.), II, 325.
 - » Guitoniana (H. M.), II, 326.
 - » de incienso, I, 226.
 - » mercurial, II, 324.
 - » mercuriales (H. DE M.), II, 326.
 - » narcóticas, II, 326.
 - » odontálgica, II, 326.
 - » pulmonares, II, 326.
 - » resinosa, II, 326.
 - » sulfurosa (H. DE M.), II, 326.

G.

- Gargarismos, II, 327.
- Gargarismo acético, II, 327.
- » de ácido acético, I, 62.
 - » de ácido bórico, I, 122; II, 327.
 - » de ácido clorhídrico, I, 153.
 - » de ácido clorhídrico (H. M.), II, 327.
 - » de ácido clorhídrico (Ricord), II, 327.
 - » de ácido sulfúrico, I, 108.
- Gargarismo de ácido sulfúrico (Cazenave), II, 327.
- » acidulado, II, 327.
 - » contra las aftas, I, 434.
 - » alcanforado, II, 327.
 - » de alumbre, II, 327.
 - » aluminoso (Bennati), II, 328.
 - » aluminoso (Ricord), II, 328.
 - » aluminoso (Spielmann), II, 338.
 - » amoniacoal, II, 328.

- Gargarismo amoniacal (H. DE AL.), II, 328.
- » amoniacal astringente, II, 328.
- » anodino, II, 328.
- » antiescorbútico, II, 328 y 329.
- » antiescorbútico (F. E.), II, 329.
- » antiescorbútico (F. F.), II, 329.
- » antiescorbútico (H. M.), II, 329.
- » antiescorbútico (H. DE M.), II, 329.
- » antiescorbútico (Grammaire), II, 329.
- » antiescorbútico (Ricord), II, 329.
- » antiflogístico, II, 329.
- » antiodontálgico, II, 329.
- » antipútrido (H. DE M.), II, 330.
- » antiséptico, II, 329.
- » antiséptico (H. M.), II, 330.
- » antiséptico aceitoso (H. DE M.), II, 330.
- » antiséptico clorurado (H. DE M.), II, 330.
- » antiséptico quinado (H. DE M.), II, 330.
- » antisifilítico, II, 330.
- » antisifilítico (H. M.), II, 330.
- » antisifilítico (H. DE M.), II, 330.
- » antisifilítico (Smith), II, 330.
- » astringente, II, 330 y 331.
- » astringente (Colombat), II, 331.
- » astringente (H. M.), II, 331.
- » astringente (H. DE V.), II, 331.
- » astringente (Jannart), II, 331.
- » astringente (Mialhe), II, 331.
- » astringente (Peterquin), II, 331.
- » astringente (Pressat), II, 332.
- » astringente (Ricord), II, 332.
- Gargarismo astringente (Saunders), II, 332.
- » astringente (Spielmann), II, 338.
- » atemperante (H. M.), II, 332.
- » atemperante (H. DE M.), II, 332.
- » de berros compuesto (F. E.), II, 329.
- » de berro del Pará, II, 332.
- » boratado, II, 332.
- » boratado (H. M.), II, 332.
- » boratado (Swediaur), II, 332.
- » con el borato de sosa, I, 122; II, 332.
- » calmante, II, 333.
- » de cebolla albarrana, I, 145.
- » de cianuro de mercurio (Parent), II, 333.
- » clórico, II, 333.
- » clorhídrico (Godelle), II, 333.
- » clorurado (Cullerier), II, 333.
- » de cloruro de manganeso, I, 245.
- » de cloruro de potasa, I, 303.
- » cobreoso (Kopp), II, 333.
- » de coclearia compuesto, II, 333.
- » desinfectante (Chevalier), II, 334.
- » desinfectante (Magendie), II, 334.
- » detergente (F. F.), II, 334.
- » detergente (H. DE M.), II, 334.
- » detergente nitrado (H. DE M.), II, 334.
- » detergente, II, 335.
- » detergente (H. DE PARIS), II, 335.
- » detergente (Mialhe), II, 335.
- » detergente (Pringle), II, 335.
- » detergente alcanforado, II, 335.
- » de cloruro de mercurio, I, 258.
- » de deutocloruro de mercurio, II, 335.

- Gargarismo dulcificante , II , 335 y 336.
- » emoliente , II , 336.
 - » emoliente (H. M.) , II , 336.
 - » emoliente (F. N. P.) , II , 336.
 - » de escila (Swediaur) , II , 336.
 - » estimulante , II , 337.
 - » estimulante (H. DE ING.) , II , 337.
 - » estimulante (Radius) , II , 337.
 - » estimulante (Swediaur) , II , 337.
 - » estimulante (Thilenius) , II , 337.
 - » excitante , II , 336.
 - » excitante (H. DE AL.) , II , 336 y 337.
 - » excitante (Quarin) , II , 337.
 - » excitante (Wendt) , II , 337.
 - » de Fosbroke , II , 337.
 - » fundente (H. M.) , II , 337.
 - » fundente (H. DE M.) , II , 337.
 - » de gengibre (Beral) , II , 337.
 - » hemostático y tónico (Spielmann) , II , 338.
 - » de hollin , I , 224.
 - » iodado (Ricord) , II , 338.
 - » de iodhidrargirato de iodoro de potasio , II , 338.
 - » iodurado (Ricord) , II , 338.
 - » mercurial , II , 338.
 - » mercurial (H. DE M.) , II , 338.
 - » mercurial (Plenk) , II , 338.
 - » mercurial (Ricord) , II , 339.
 - » mercurial con belladona , II , 339.
 - » mercurial opiado , II , 338.
 - » con miel rosada , II , 333.
 - » con miel rosada (H. DE NIÑOS) , II , 333.
 - » de moras negras , I , 267.
 - » mucilaginoso , II , 339.
 - » muriático (H. DE M.) , II , 339.
 - » narcótico , II , 339.
 - » de nuez de agalla , II , 339.
 - » odontálgico (Plenk) , II , 339.
 - » con ojimiel , II , 339.
- Gargarismo opiado , II , 339.
- » de pelitre , I , 285 ; II , 339.
 - » de pimienta , I , 288.
 - » de pimienta de Tabasco , I , 289.
 - » de Quarin , II , 340.
 - » de quina , II , 340.
 - » de rábano , I , 315.
 - » refrescante , II , 340.
 - » refrescante (H. DE AL.) , II , 340.
 - » resolutivo , II , 340.
 - » resolutivo (H. DE M.) , II , 340.
 - » contra la salivacion mercurial , II , 334.
 - » saturnino , II , 340.
 - » de saxifraga , II , 340.
 - » sedante , II , 340.
 - » sedante (Swediaur) , II , 340.
 - » sialagogo (Tenque) , II , 341.
 - » sinápico , II , 341.
 - » sinapizado (Henry) , II , 341.
 - » sulfúrico , II , 341.
 - » sulfúrico (H. DE LA CARIIDAD) , II , 341.
 - » de Swediaur contra las aftas (H. DE M.) , II , 334.
 - » con sublimado (Ricord) , II , 334.
 - » de tanino , II , 341.
 - » trementinado (Geddings) , II , 341.
 - » contra el tialismo , II , 334.
 - » tónico (H. DE M.) , II , 341.
 - » tónico y astringente (Hunter) , II , 342.
 - » contra las úlceras gangrenosas (H. DE M.) , II , 334.
 - » verde (Swediaur) , II , 342.
 - » con vinagre , II , 387.
- Gelatinas , II , 382.
- Gelatina de almidon (H. DE M.) , II , 383.
- » analéptica y pectoral (Pierquin) , II , 383.
 - » de cuerno de ciervo (F. F.) , II , 384.
 - » de cuerno de ciervo (H. DE M.) , II , 384.
 - » de musgo marino perlado , II , 388.

- Gelatina de quina (Gauthier), II, 389.
- » de salep (H. DE M.), II, 390.
 - » de tapioca (H. DE M.), II, 390.
- Glóbulos marciales (F. A.), II, 86.
- Gotas, II, 342.
- » de aconitina, II, 342.
 - » alcalinas de Hamilton, II, 342; IV, 39.
 - » amargas, II, 342.
 - » anodinas inglesas, II, 342.
 - » antiartriticas (Graefe), II, 342.
 - » antiartriticas (Terrier), II, 342.
 - » antiépilépticas (Marochetti), IV, 12.
 - » antiescorbúticas (Spilsburg), II, 343.
 - » antiespasmódicas (Eller), II, 343.
 - » antiespasmódicas (Hufeland), II, 343.
 - » antigonorréicas (Eisenmann), II, 343.
 - » antihelmínticas, II, 343.
 - » antihistéricas, II, 343.
 - » antineurálgicas, II, 343.
 - » antivenéreas, II, 343.
 - » de atropina, II, 343; IV, 72.
 - » balsámicas inglesas, II, 344.
 - » calmantes, II, 344.
 - » calmantes (Fothergill), II, 344.
 - » calmantes alemanas, II, 343.
 - » calmantes de Magendie, II, 344.
 - » cefálicas inglesas, II, 344.
 - » de color de rosa, IV, 39.
 - » cordiales (Warner), II, 345.
 - » de los cuácaros, II, 345.
 - » de delfina, II, 342.
 - » contra el dolor de muelas, II, 344.
 - » contra la epilepsia de los niños, II, 344.
 - » excitantes (H. DE AL.), II, 345.
 - » excitantes (Vogt), II, 345.
- Gotas febrífugas (Horn), II, 345.
- » febrífugas (Hufeland), II, 345.
 - » fundentes (Hufeland), II, 345.
 - » de Grindle, II, 344.
 - » inglesas, II, 345.
 - » de los jesuitas, II, 221.
 - » de la madre (Duryer), II, 346.
 - » marciales (Swediaur), II, 345.
 - » negras, IV, 191.
 - » negras de Lancastre, II, 345.
 - » odontálgicas (Dobberan), II, 346.
 - » de oro de la Motte, II, 346.
 - » resolutivas, II, 346.
 - » contra la tos, II, 344.
 - » contra la tos (Grindle), II, 344.
 - » uterinas de la reina de España, IV, 92.
 - » de veratrina, II, 342.
 - » de Waden, II, 66.
- Grageas, II, 346.
- Gragea anticlorótica (Pennes), II, 346.
- » antigonorréica (Pennes), II, 346.
 - » antileucorréica (Colombat), II, 183.
 - » de atropina, II, 346.
 - » de Conté, II, 347.
 - » de copaiba (Fortin), II, 346.
 - » de copaiba y cubebino (Labedonye), II, 347.
 - » de cubebas (Chevereau y Levistal), II, 347.
 - » de cubebino (Labelonye), II, 347.
 - » de digitalina (Homolle y Quevenne), II, 347.
 - » de Gelis, II, 347.
 - » mineral (Megé), III, 174.
 - » purgante (Pennes), II, 347.
 - » de quina, II, 347.
 - » vermífuga II, 348.
 - » vermífuga (Henry y Guibourt), II, 348.
 - » vermífuga (Pennes), II, 348.

- Grama iodurada, IV, 114.
 Granillos de digitalina, I, 172.
 » de digitalina (Homolle y Quevenne), II, 347.
 » de hierro, reducidos por el hidrógeno (Miquelard y Quevenne), II, 347.
 Granos, II, 346.
 » de catecú, II, 348; III, 170.
 » de pimienta, I, 288.
 » de salud (Frank), III, 296.
 » de salud (Bally y Cadet), III, 297.
 » de vida (F. F.), III, 200.
 » de vida (Mezue), III, 262.
 Grasas, II, 348.
 Grasa balsámica (Deschamps), II, 348.
 » de benjuí, II, 348.
 » benzinada, II, 348.
 Grasa de fósforo, III, 519.
 » populinada (Deschamps), II, 349.
 » trementinada (Debreyne), II, 348.
 » de yemas de abeto (Deschamps), II, 349.
 Guisantes, II, 349.
 » de cauterio, II, 349.
 » de cauterio (Frigerio), II, 349.
 » elásticos de goma, II, 349.
 » elásticos de malvabisco y torbisco (Leperdriel), II, 349.
 » narcótico, II, 350.
 » para fuentes, II, 350.
 » supurativos, II, 350.
 Gutapercha, I, 432.

H.

- Harina de cebada, I, 144.
 » emolientes (F. F.), II, 289.
 » linaza (F. F.), III, 457.
 » de mostaza (F. F.), III, 460.
 » resolutivas (F. F.), II, 292.
 Haschisch, I, 432.
 Hidriodato de manganeso, I, 436.
 Hidrocianato mangánico, I, 435.
 » de potasa medicinal, I, 301.
 Hidroclorato de manganeso, I, 435.
 Hidrolado de ajénjos (Beral), II, 352.
 » extemporáneo de cubebas, II, 367.
 » de extracto de zarzaparrilla, IV, 53.
 » de semillas de anís (F. F.), II, 42.
 » de zarzaparrilla, II, 41.
 Hidrolato de almendras amargas (F. F.), II, 41.
 » de canela (F. F.), II, 42.
 » de cerezas negras, II, 42.
 » de coclearia, II, 43.
 » de copaiba, II, 367.
 » de cubebas, II, 367.
 Hidrolato de espliego (F. F.), II, 43.
 » extemporáneo de copaiba, II, 367.
 » de flor de naranjo (F. F.), II, 44.
 » de flor de tilo (F. F.), II, 45.
 » de hojas de laurel real (F. F.), II, 43.
 » de lechuga (F. F.), II, 44.
 » de menta piperita (F. F.), II, 45.
 » de raíz de rábano rusticano (F. F.), II, 45.
 » de rosas (F. F.), II, 45.
 Hidrógala, II, 350.
 Hidromeles, II, 350.
 Hidromel, I, 264.
 » antiasmático, II, 350.
 » anticatarral, II, 351.
 » expectorante, II, 351.
 » fermentado y opiado, II, 351.
 » purgante, II, 351.
 » simple (F. F.), II, 350.
 » vinoso, I, 264.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Hiel preparada (F. F.), II, 302. | Hipocrás, IV, 200. |
| Hielo artificial (Courdemanche), III, 98. | Hojas de belladona opiadas, III, 413. |
| » artificial (Filhol), III, 98. | |

I.

- | | |
|--|---|
| Ibéríde amarga, I, 433. | Infusion de ásaro, I, 102. |
| Iman, I, 433. | » de aspérula, I, 103. |
| Infusiones, II, 352. | » de astrágalo, I, 104. |
| Infusion de abedul, I, 53. | » de ayapana, I, 105. |
| » de abrotano, I, 53. | » de azafran, I, 105. |
| » acuosa de opio (Chaussier), II, 356. | » de badiana, I, 109. |
| » de achicorias, I, 68; II, 352. | » de balsamita, I, 109. |
| » de adelfa, I, 68. | » de bardana, I, 113. |
| » de agave, I, 69. | » de bayas de enebro compuesta (H. DE AL.), II, 354. |
| » de agedrea, I, 71. | » de becabunga, I, 115. |
| » de agrimonia, I, 70. | » de beleño, I, 116. |
| » de ajenjo, I, 72. | » de belladona, I, 117. |
| » de ajenjos (Beral), II, 352. | » de bellotas, I, 118. |
| » de ajenjo marino, I, 72. | » béquica, II, 352. |
| » de ajenjo nitrada, II, 352. | » de berro, I, 119. |
| » de álamo negro, I, 73. | » de betónica, I, 119. |
| » de albahaca, I, 74. | » de boj, I, 121. |
| » alcanforada, I, 75. | » de buglosa, I, 124. |
| » de alcaparro, I, 75. | » de café sin tostar, I, 126. |
| » de alcaravea, I, 76. | » de café tostado, I, 126. |
| » de alelí amarillo, I, 77. | » de cainca, I, 126. |
| » de alquequenje, I, 80. | » de cálamo aromático, I, 127. |
| » de alquimila, I, 81. | » de cálamo aromático con cloro (F. B.), II, 352. |
| » de amapola, I, 82. | » de caléndula, I, 130. |
| » amarga (F. P.), II, 352. | » de camedrios, I, 131. |
| » amarga de ruibarbo (H. DE AL.), II, 357. | » de camepíteos, I, 131. |
| » de ambarilla, I, 83. | » de canela, I, 131. |
| » de angélica, I, 89. | » de cantueso, I, 134. |
| » de angelina, I, 89. | » de caña, I, 134. |
| » de anémona, I, 88; II, 352. | » de cañafístula, I, 134. |
| » de anís, I, 90. | » de cañamones, I, 135. |
| » de angustura verdadera, I, 89. | » de cardo corredor, I, 138. |
| » anticancerosa (Cheston), II, 352. | » de cardo estrellado, I, 138. |
| » de opio, I, 95. | » de cardo santo, I, 139. |
| » de aquilea, I, 96. | » de cariofilea, I, 139. |
| » de arnica (H. DE M.), II, 352. | » de cáscara de naranja, I, 140. |
| » de artemisa, I, 101. | » de cáscara de naranjas compuesta (F. DE L.), II, 353. |
| » de asagú, I, 429. | » de cáscaras de naranja compuesta (F. P.), II, 353. |

- Infusion de cáscarilla, I, 140.
 » de cascarilla, II, 353.
 » catártica (F. DE PALACIOS), II, 353.
 » de catecú, I, 142.
 » de catecú compuesta (F. DE ING.), II, 353.
 » de catecú compuesta (F. DE L.), II, 353.
 » de ceanota, I, 143.
 » de cebolla albarrana, I, 145.
 » de centaurea menor, I, 146.
 » de centeno tostado, I, 146.
 » de cicuta, I, 148.
 » de cilantro, I, 149.
 » de ciprés, I, 151.
 » de clavel rojo, I, 151.
 » de clavo de especia, I, 152.
 » de clemátide, I, 152.
 » de coclearia, I, 157.
 » de colombo, I, 160.
 » de colombo compuesta (H. DE AL.), II, 353.
 » de comino, I, 161.
 » de contrayerba, I, 162.
 » de coralina, I, 163.
 » de cornezuelo de centeno, II, 353.
 » de cornezuelo como profiláctica de las hemorragias internas (F. P.), II, 353.
 » de corteza de Winter, I, 165.
 » de costo, I, 165.
 » de couso, I, 166.
 » de cuasia amarga, I, 307.
 » de culantrillo, I, 167.
 » de cúrcuma, I, 168.
 » de chironia angular, I, 168.
 » de digital (F. DE L.), II, 354.
 » de diosma recortada, I, 173.
 » de diosma afestonada compuesta (H. DE ING.), II, 354.
 » diurética, II, 354.
 » diurética (Gaube), II, 354.
 » diurética (H. DE M.), II, 354.
 » de dulcamara, I, 174.
 » de eléboro negro, I, 175.
 » emoliente (Lagneau), II, 354.
 » de encina, I, 178.
 » de enebro, I, 178.
- Infusion de eneldo, I, 178.
 » de émula campana, I, 179.
 » de erisimo, I, 180; II, 354.
 » de eritrea, I, 180.
 » de escabiosa, I, 180.
 » de escordio, I, 182.
 » de espantalobos, I, 183.
 » de especies antihelmínticas, IV, 101.
 » de especies aperitivas, IV, 101.
 » de especies astringentes, IV, 101.
 » de especies béquicas, IV, 101.
 » de especies diuréticas, IV, 101.
 » de especies pectorales, IV, 101.
 » de espliego, I, 185; II, 355.
 » de espuela de caballero, I, 186.
 » de estramonio, I, 187.
 » de eupatoria, I, 191.
 » de faan, I, 193.
 » febrífuga, II, 355.
 » de flores de arnica, I, 98.
 » de flor de borraja, I, 122.
 » de flores de granado, I, 207.
 » de flores de madreselva, I, 240.
 » de flores de malvabisco, I, 244.
 » de flores de melocoton, I, 252.
 » de flores de naranjo, I, 273.
 » de flores de saúco, I, 332.
 » de flores de violeta, I, 358.
 » de folículos de sen, I, 334.
 » de Fowler, II, 355.
 » de frángula, I, 195.
 » de fraxinela, I, 195.
 » de fumaría, I, 198.
 » fundente (Farr), II, 355.
 » de galio, I, 199.
 » de garbanzos, I, 200.
 » de gatuña, I, 200.
 » de gayuba, I, 200.
 » de genciana compuesta, II, 355.

- Infusion de genciana compuesta (F. DE L.), II, 355.
- » de genciana chiraita, I, 201.
- » de gengibre, I, 202.
- » de geranio, I, 202.
- » de gordolobo, I, 206.
- » de guayaco, I, 208.
- » de hinojo, I, 223.
- » de hinojo acuático, I, 223.
- » de hipericon, I, 223.
- » de hisopo; I, 224.
- » de hojas de digital, I, 172.
- » de hojas de digital purpúrea (H. DE M.), II, 354.
- » de hojas de doradilla, I, 173.
- » de hojas de naranjo, I, 272 y 273.
- » de hojas de malvabisco, I, 244.
- » de hojas de taraxacon, I, 345.
- » de hollin compuesta, II, 355.
- » de hollin compuesta (Piderit), II, 355.
- » de imperatoria, I, 225.
- » de ipecacuana compuesta (F. P.), II, 356.
- » de jazmin; I, 230.
- » de juncia avellanada, I, 230.
- » de lamio blanco, I, 231.
- » de laurel real, II, 356.
- » laxante, II, 356.
- » laxante (F. A.), II, 356.
- » de lepidio, I, 234.
- » de levadura de cerveza, I, 234.
- » de ligística, I, 235.
- » de lino, I, 236.
- » de lino cantaridada, II, 356; IV, 115.
- » de lino purgante, I, 236.
- » de lirio de los valles, I, 238.
- » de lupulina, I, 239.
- » de lúpulo, I, 239.
- » de malva, I, 244.
- » de manzanilla, I, 247.
- » de maro, I, 248.
- » de marrubio, I, 248.
- » de matico, I, 439.
- » de matricaria, I, 249.
- » de mechoacan, I, 249.
- Infusion de meliloto, I, 251.
- » de melisa, I, 251.
- » de menta piperita, I, 253.
- » de milpiés, I, 264.
- » de mirtilo, I, 265.
- » de mohó, I, 266.
- » de musgo de Córcega, I, 271.
- » de nenufar blanca, I, 273.
- » nervina (H. DE M.), II, 356.
- » nervina de arnica (Brera), II, 356.
- » de nevada, I, 273.
- » de nuez de agalla, I, 275.
- » de orégano, I, 279.
- » de parietaria, I, 283.
- » de peonía, I, 285.
- » de perejil, I, 285.
- » de persicaria, I, 286.
- » de pié de gato, I, 287.
- » de pimienta, I, 288.
- » de pimpinela saxifraga, I, 289.
- » de poligala de Virginia, I, 297.
- » de poligala vulgar, I, 298.
- » purgante, II, 357.
- » de quina, I, 310.
- » de quina en frio, II, 357.
- » de quina con agua de cal, IV, 117.
- » de quina vinosa y aromática, II, 357.
- » de rábano, I, 315.
- » de rábano rusticano compuesta (F. P.), II, 357.
- » de raiz de malvabisco, I, 244.
- » de ratania, I, 316.
- » de regaliz, I, 317.
- » de rododendro, I, 318.
- » de romero, I, 319.
- » de rosas de Alejandría (F. P.), II, 357.
- » de rosas castellanas (F. E.), II, 357.
- » de rosas rojas, I, 319.
- » de rosas rojas (F. P.), II, 357.
- » de rubia, I, 320.
- » de ruda, I, 320.
- » de ruibarbo, I, 321.

- Infusion de ruibarbo (H. M.), II, 358.
 » de ruibarbo (Spielmann), II, 358.
 » de ruibarbo alcalina (F. P.), II, 358.
 » de sabadilla, I, 322.
 » de sabina, I, 322.
 » de salep, I, 323.
 » de sanguinaria del Canadá, I, 329.
 » de santolina, I, 330.
 » de santónico, I, 329.
 » de salvia, I, 325.
 » de saponaria, I, 330.
 » de sasafrás, I, 330.
 » de sedo acre, II, 358.
 » de sen, I, 333.
 » de sen (F. P.), II, 358.
 » de sen (Frank), II, 358.
 » de sen de América, I, 334.
 » de sen y manito, II, 358.
 » de sen con zumo de limon (H. DE AL.), II, 358.
 » de serpentaria de Virginia, I, 334.
 » de sérpul, I, 334.
 » de simaruba, I, 335.
 » de Stearns, II, 358.
 » de tabaco, I, 342.
 » de tabaco (French), II, 359.
 » de tabaco alcoholizada, II, 355.
 » de tanaceto, I, 343.
 » de tamarindos, I, 343.
 » de tamarindos con maná (F. P.), II, 359.
 » de tamarindos con sen (F. P.), II, 359.
 » de té, I, 346.
 » teiforme de mejorana, I, 250.
 » de té de España, I, 346.
 » de tila, I, 346.
 » de tomillo, I, 347.
 » tónica (Courti), II, 359.
 » tónica de ipecacuana (Berthe), II, 359.
 » de trébol de agua, I, 348.
 » de trinitaria, I, 350.
 » de tusilago, I, 350.
- Infusion de vainilla, I, 352.
 » de valeriana, I, 353.
 » de valeriana (H. DE M.), II, 359.
 » de valeriana compuesta (H. DE AL.), II, 359.
 » de vara de oro, I, 353.
 » de verónica, I, 356.
 » de vetiver, I, 356.
 » de vinca mayor, I, 357.
 » vinosa de arnica, II, 359.
 » de vulvaria, I, 358.
 » de yedra terrestre, I, 359.
 » de yemas de pino, I, 290.
 » de yerbabuena de sabor de pimienta compuesta (H. DE ING.), II, 359.
 » de yerba luisa, I, 359.
 » de yerba meona, I, 359.
 » de yezgo, I, 360.
- Inhalaciones, II, 351.
 Inhalacion balsámica, II, 351.
 » de ioduro de potasio, II, 351.
- Inyecciones, II, 360.
- Inyeccion abortiva (Ricord), II, 366.
 » de acetato de alúmina, II, 360.
 » de acetato de plomo con mirra (P. Frank), II, 360.
 » de acetato de plomo para la uretra, II, 360.
 » de acetato de plomo para la vagina (Ricord), II, 360.
 » de acetato de zinc, II, 360.
 » de acetato de zinc (Ricord), IV, 130.
 » acética saturnina (Young), II, 360.
 » aceitosa, II, 360.
 » de acibar (Bories), II, 360.
 » de ácido clorhídrico, I, 153.
 » acústica (Alibert), II, 360.
 » de adormideras compuesta, II, 360.
 » de agua de cal, II, 361.
 » alcanforada de muriato de mercurio (F. E.), II, 361.
 » aluminosa, II, 361.
 » aluminosa (Cazenave), II, 361.
 » aluminosa (Jacquot), II, 361.

- Inyeccion aluminosa fuliginosa, II, 361.
- » aluminosa para la uretra (Ricord), II, 361.
 - » aluminosa para la vagina (Ricord), II, 361.
 - » amoniacal (Nicato), II, 362.
 - » anodina (F. E.), II, 362.
 - » anodina (H. DE M.), II, 362.
 - » anodina (H. M.), II, 362.
 - » anodina (Girtanner), II, 362.
 - » antiblenorrágica, II, 362.
 - » antiblenorrágica (H. DE M.), II, 362.
 - » antiblenorrágica alcanforada (H. DE M.), II, 362.
 - » antihemorroidal (Boyer), II, 362.
 - » antipútrida (H. M.), II, 362.
 - » antipútrida de quina (F. E.), II, 362.
 - » argéntica (Ricord), II, 362.
 - » argéntica contra la blenorragia (Ricord), IV, 130.
 - » astringente (Mauricheau Beaupré), II, 363.
 - » astringente, II, 363.
 - » astringente (Abernethy), II, 363.
 - » astringente (Bell), II, 363.
 - » astringente (F. E.), II, 374.
 - » astringente (F. DE L.), II, 363.
 - » astringente (H. M.), II, 363.
 - » astringente (Poulain), II, 364.
 - » astringente (Ricord), II, 364; IV, 131.
 - » astringente (Rust), II, 364.
 - » astringente (Swediaur), II, 364.
 - » astringente (Vogt), II, 364.
 - » astringente con alumbre (Mialhe), II, 363.
 - » astringente de catecú, II, 364.
 - » astringente contra la gonorrea, II, 364.
 - » astringente contra la gonorrea crónica (H. DE AL.), II, 364.
- Inyeccion astringente de quino, II, 364.
- » astringente y sedante, II, 364.
 - » astringente con sulfato de cobre (Mialhe), II, 363.
 - » auricular, II, 365.
 - » auricular (Rust), II, 365.
 - » auricular (Vogt), II, 365.
 - » balsámica, II, 365.
 - » balsámica (Serre), II, 365.
 - » balsámica (Taddei), II, 365.
 - » de beleño, II, 372.
 - » de belladona, II, 372.
 - » de belladona (Legers), II, 365.
 - » para la blenorrea (H. DE M.), II, 373.
 - » contra la blenorragia (Dr. Thivaud), II, 367.
 - » de borax, I, 122.
 - » calmante, I, 232; II, 365.
 - » calmante (Trousseau), II, 366.
 - » calmante y astringente (Gall), II, 366.
 - » de cantáridas, II, 366.
 - » de carbonato de potasa, I, 300.
 - » de carbonato de sosa, I, 336.
 - » cáustica de Ricord, II, 366.
 - » de Clarck, II, 366.
 - » clórica, II, 366.
 - » de cloroplatinato de sodio, I, 294.
 - » de cloroplatinato de sodio (Hoeser), II, 366.
 - » clorurada (Cullerier), II, 366.
 - » de cloruro de cal (Rousse), II, 366.
 - » de cloruro de sosa, I, 338.
 - » de cloruro de zinc (Gaudriot), II, 366.
 - » cobreosa, II, 366.
 - » confortante (Dubois), II, 367.
 - » contraestimulante, II, 367.
 - » de copaiba, II, 367.
 - » de cornezuelo de centeno, (Desruelles), II, 367.
 - » de corteza de roble, II, 368.

- Inyeccion de creosota , II , 368.
- » de cubebas , II , 367.
 - » de cubebas (W. Chevallier), II , 368.
 - » cupro arseniada (Desruelles), II , 368.
 - » deterativa , II , 366 y 368.
 - » deterativa (Gaubius), II , 360.
 - » deterativa (Spielmann), II , 368.
 - » del Dr. Gibert , II , 368.
 - » emenagoga (Pierquin) , II , 370.
 - » emoliente , II , 368.
 - » emoliente y anodina , II , 369.
 - » de especies aromáticas , II , 372.
 - » estimulante (Beer) , II , 369.
 - » estimulante (Buchanan), II , 369.
 - » estimulante (H. M.) , II , 370.
 - » estíptica , II , 369.
 - » de estramonio , II , 372.
 - » excitante , II , 369.
 - » excitante (Swediaur) , II , 369.
 - » de Girtanner , II , 369.
 - » de goma quino , II , 369.
 - » contra la gonorrea crónica (Rust), II , 367.
 - » de hipoclorito sódico (H. DE M.) , II , 366.
 - » con las hojas de beleño , II , 319.
 - » con las hojas de belladona , II , 319.
 - » con las hojas de especies aromáticas , II , 319.
 - » con las hojas de estramonio , II , 319.
 - » con las hojas de yerbamora , II , 319.
 - » de deutonitrato de mercurio , I , 261.
 - » de hollin aluminosa (Rognetta) , II , 369.
 - » de ictiocola con mirra (Dorffurt) , II , 369.
 - » intrauterina con hojas de nogal (Vidal de Cassis) , II , 369.
- Inyeccion iodada (Velpéau) , II , 370.
- » iodurada , II , 370.
 - » iodurada (Lugol) , II , 370.
 - » de ioduro de hierro , II , 370.
 - » de ioduro de hierro (Ricord) , II , 370.
 - » de ioduro de potasio , I , 227.
 - » irritante , II , 370.
 - » irritante (Lavagne) , II , 370.
 - » de leche opiada (F. E.) , II , 362.
 - » de leche opiada (H. M.) , II , 362.
 - » litontriptica , II , 370.
 - » mercurial , II , 370.
 - » mercurial (Brera) , II , 370.
 - » mercurial (Bromfield) , II , 371.
 - » mercurial (Hufeland) , II , 371.
 - » mercurial (Lagneau) , II , 371.
 - » mercurial (Plenk) , II , 371.
 - » mercurial aromática , II , 371.
 - » mercurial opiada , II , 371.
 - » mercurial opiada (H. DE M.) , II , 371.
 - » mercurial trémentinada , II , 371.
 - » de mercurio dulce (Bromfield) , II , 371.
 - » mucilaginoso , II , 371.
 - » mucilaginoso (H. M. F.) , II , 372.
 - » narcótica , II , 372.
 - » narcótico astringente (Gall) , II , 372.
 - » narcótica (H. DE M.) , II , 373.
 - » narcótica opiada , II , 372.
 - » nitrada , II , 372.
 - » de nitrato de plata (Ricord) , II , 372.
 - » de nitrato de plata (Serres) , II , 373.
 - » oleocalcárea (Dupuytren) , II , 373.
 - » opiada (Deschamps) , II , 373.
 - » opiada (H. DE M.) , II , 373.

- Inyeccion opiada (Ricord), II, 373.
- » opiada antisifilítica (H. DE M.), II, 373.
- » de óxido de sodio, I, 339.
- » contra la ozena (Horner), II, 367.
- » con pimienta cubebas (Bouchardat), II, 373.
- » de potasa cáustica, I, 299.
- » de Pringle, II, 373.
- » de ratania, II, 373.
- » resolutive, II, 374.
- » saturnina, II, 374.
- » sedante, II, 374.
- » sedante (Guerin de Mamers), II, 374.
- » sedante (Hamilton), II, 374.
- » de sulfato de hierro, I, 221.
- » de sulfato de zinc, I, 364.
- » de sulfato de zinc (F. E.), II, 374.
- » de sulfuro de potasa, I, 305.
- » de sulfuro de sosa, I, 340.
- Inyeccion de tanino, II, 374.
- » de tanino (Ricord), II, 374.
- » de Tavernier, II, 374.
- » tónica, II, 374.
- » tónica (H. DE DIOS), II, 375.
- » tónica deterstiva, II, 375.
- » trementinada, II, 375.
- » trementinada benzóica (De-tharding), II, 375.
- » contra la uretritis (Gaudriot), II, 367.
- » de vino para la uretra (Ricord), II, 375.
- » vinosa de rosas, II, 322.
- » de Whately, II, 375.
- » de Wendt, II, 375.
- » de Will, II, 375.
- » de yemas de abeto, II, 385.
- » de yerbamora, II, 372.
- » de Young, II, 375.
- Ioduro de iodhidrato de quinina, I, 433.
- » de manganeso, I, 436.

J.

- Jabones, II, 376.
- Jabon de aceite de croton tiglio, I, 57.
- » de aceite de croton tiglio (Caventou), II, 376.
- » de aceite de hígado de bacalao iodurado (Deschamps), II, 376.
- » acético etéreo (Pelletier), II, 376.
- » ácido (Achard), IV, 179.
- » ácido de Carminatti, II, 376; IV, 179.
- » de ácido sulfúrico (Achard), IV, 179.
- » alcanforado (Lady Derby), II, 376.
- » alcanforado (Wetzler), II, 376.
- » amigdalino (Cadet), II, 377.
- Jabon amigdalino (F. F.), II, 377.
- » amigdalino (F. P.), II, 377.
- » animal (F. F.), II, 377.
- » antiépsórico, II, 378.
- » arsenical (Recour), II, 378.
- » arsenical (Vilanova), II, 378.
- » artrítico de Pott (F. DE S.), II, 296.
- » azafranado, II, 378.
- » azafranado (Lugol), II, 378.
- » de belladona, II, 378.
- » blando, II, 381.
- » calizo (F. F.), III, 153.
- » de cicuta (Beral), II, 378.
- » cosmético, II, 379.
- » de escamonea, I, 181.
- » estibiado, II, 379.
- » de estramonio, II, 378.

- Jabon de guayaco , II , 379.
- » de gutagamba , I , 210 ; II , 279.
 - » de ioduro de potasio (Hacus-ter) , II , 379.
 - » de jalapa , II , 379.
 - » de jalapa para los niños , II , 379.
 - » medicinal (F. F.) , II , 377.
 - » medicinal (F. P.) , II , 377.
 - » mercurial (Chausier) , II , 379.
 - » mercurial (Heber) , II , 380.
 - » de Nápoles , II , 380.
 - » nitroso (Handschuh) , II , 380.
 - » de potasa , II , 381.
 - » de potasa trementinado (F. E.) , II , 382.
 - » profiláctico (Pfeifer) , II , 380.
 - » resolutivo (Cottereau y Verdé Delisle) , II , 380.
 - » contra los sabañones , II , 378.
 - » de sabiná , II , 381.
 - » de sosa medicinal (F. E.) , II , 381.
 - » de Starkey (F. F.) , II , 382.
 - » sucinado , II , 381.
 - » sulfuroso (J. Frank) , II , 381.
 - » tartáreo de Starkey (F. E.) , II , 382.
 - » de tocador , II , 381.
 - » de trementina (Beral) , II , 382.
 - » de trementina (F. F.) , II , 382.
 - » vegetal , II , 382 ; III , 452.
 - » de Venecia (F. E.) , II , 381.
- Jaboncillo de alcanfor , II , 66.
- » amoniácá (F. E.) , III , 46.
 - » amoniácá (F. F.) , III , 46.
 - » amoniácá (F. P.) , III , 46.
- Jaleas , II , 382.
- Jalea de aceite de hígado de bacalao (Caillot) , II , 384.
- » de aceite de hígado de raya , (Caillot) , II , 384.
 - » de aceite de ricino (Caillot) , II , 384.
 - » alcohólica , II , 382.
 - » de almidón , I , 80 ; II , 383.
- Jalea analéptica , II , 389.
- » antiespasmódica (Radius) , II , 383.
 - » anticatarral (Graeffe) , II , 383.
 - » de bálsamo de copaiba (Caillot) , II , 383.
 - » de bálsamo de Tolú , II , 384.
 - » contra el bocio , II , 66.
 - » de cola de pescado alcohólica , II , 386.
 - » de cuerno de ciervo , I , 167.
 - » de camuesas , I , 131.
 - » de cuerno de ciervo (Mouchon) , II , 384.
 - » de cuerno de ciervo emulsionada , II , 384.
 - » dulcificante , II , 390.
 - » de fécula , II , 384.
 - » fuco vejigoso (Russel) , II , 385.
 - » de grosellas , I , 208 ; II , 385.
 - » de hipocolia (Beral) , II , 385.
 - » de ictiocola (Beral) , II , 385.
 - » de ictiocola con vainilla (Beral) , II , 386.
 - » laxante , II , 386.
 - » de limón , II , 388.
 - » de líquen islándico (F. F.) , II , 386.
 - » de líquen islándico (F. P.) , II , 386.
 - » de líquen islándico (H. DE M.) , II , 387.
 - » de líquen protoiodoferrurada , II , 387.
 - » de líquen con quina (F. S.) , II , 387.
 - » de líquen sin amargor (Beral) , II , 386.
 - » de lombarda , I , 239 ; II , 387.
 - » de manzanas , II , 388.
 - » de membrillo , I , 252.
 - » de membrillos (F. P.) , II , 388.
 - » de mesa con grenetina , II , 388.
 - » de mesa con naranja , II , 388.
 - » de musgo de Córcega , I , 271.

- Jalea de musgo de Córcega (F. F.), II, 388.
- » de musgo marino perlado, I, 271; II, 389.
 - » de musgo perlado de Irlanda, II, 389.
 - » de pan, II, 389.
 - » de patatas, II, 383 y 389.
 - » pectoral, II, 389.
 - » pectoral de polígala, II, 389.
 - » purgante (H. DE AL.), II, 389.
 - » de resineona de brea, II, 389.
 - » de sagú, I, 323; II, 390.
 - » de salep, I, 323; II, 390.
 - » de salep (H. DE M.), II, 390.
 - » seca de líquen (F. F.), II, 387.
 - » seca de líquen islándico, IV, 27.
 - » de trementina, II, 390.
 - » de vaca medicinal, II, 390.
 - » vermífuga (Marcillini), II, 390.
- Jarabes, II, 390.
- Jarabe de abedul, I, 53.
- » de acacia bastarda, I, 54.
 - » de acacia egipcia, I, 54.
 - » de acedera, I, 55.
 - » de acedera (F. F.), II, 425.
 - » de acederilla, I, 55; II, 391.
 - » de aceite de hígado de bacalao, I, 58.
 - » de aceite de hígado de bacalao (Duclos), II, 391.
 - » de aceite de hígado de bacalao (Mouchon), II, 391.
 - » de acetato de amoníaco y hierro, I, 215.
 - » de acetato de amoníaco y hierro (Beral), II, 392.
 - » de acetato de cal, I, 127.
 - » de acetato de codeína, II, 392.
 - » de acetato de hierro, I, 214.
 - » de acetato de hierro (Beral), II, 392.
 - » de acetato de magnesia (Garrot), II, 392.
- Jarabe de acetato de magnesia (Renaut), II, 392.
- » de acetato de morfina, I, 268.
 - » de acetato de morfina (F. F.), II, 392.
 - » de acetato de morfina (Magendie), II, 392.
 - » de ácido acético, I, 62.
 - » de ácido canfórico, II, 393.
 - » de ácido cianmúrico (Mouchon), II, 393.
 - » de ácido cítrico, I, 64.
 - » de ácido cítrico (F. F.), II, 393.
 - » de ácido fosfórico, I, 195.
 - » de ácido fosfórico (Soubeiran), II, 393.
 - » de ácido hidrocianico (F. F.), II, 393.
 - » de ácido hidrocianico (F. P.), II, 393.
 - » de ácido láctico, I, 64.
 - » de ácido succínico, I, 65.
 - » de ácido sulfúrico (Mouchon), II, 393.
 - » de ácido tártrico, I, 65.
 - » de ácido tártrico (F. F.), II, 393.
 - » acuoso del cainca, I, 126.
 - » acuoso de quina, I, 310.
 - » de achicorias, I, 68.
 - » de achicorias (F. F.), II, 425.
 - » de achicorias compuesto, I, 68 y 321.
 - » de achicorias compuesto (F. F.), II, 394.
 - » de achicorias con ruibarbo, I, 321.
 - » de achicorias con ruibarbo (F. E.), II, 394.
 - » de achicorias simple (F. E.), II, 393.
 - » de adormideras (F. E.), II, 419.
 - » de adormideras (F. F.), II, 318.
 - » de agárico blanco, I, 69; II, 394.
 - » de agnocasto, I, 70.
 - » de agracejo, I, 73.

- Jarabe de agracejo (F. F.), II, 436.
- » de agraz (F. F.), II, 436.
- » de aguileña, I, 96.
- » de ajénjos, I, 72; II, 395.
- » de ajénjos (F. F.), II, 395.
- » de ajénjos compuesto, II, 395.
- » de ajo, I, 72.
- » de ajo (Soubeiran), II, 395.
- » de alazor, I, 73.
- » de albahaca, I, 74.
- » alcalino (Devergie), II, 395.
- » de alcohol etéreo, II, 395.
- » alcohólico de limon, I, 235.
- » de aleluya (F. F.), II, 425.
- » de almáciga, I, 78.
- » de almendras, I, 78; II, 421.
- » de almendras (F. F.), II, 395.
- » de almendras con goma y vainilla (Chev. é Idt), II, 396.
- » aloético, II, 396.
- » aloético (Guillemin), II, 396.
- » de altea (F. E.), II, 434.
- » de amapolas, I, 82.
- » de amapolas (F. A.), II, 396.
- » de amapolas (F. E.); II, 453.
- » de amapola (F. F.), II, 453.
- » amargo de cáscara de naranja (F. E.), II, 415.
- » amargo de corteza de cidra (F. E.), II, 415.
- » amargo de corteza de raiz de granado, II, 415.
- » amigdalino, II, 421.
- » amoniaco, II, 396.
- » de amoniaco, II, 396.
- » de angelina, I, 89.
- » de angustura verdadera, I, 90.
- » de anís, I, 90.
- » antiartrítico (Dubois), II, 396.
- » antiartrítico y antihidrópico, II, 397.
- » antiasmático, II, 397.
- » antiasmático (Lamure), II, 397.
- » anticatarra! (Mouchon), II, 397.
- Jarabe antiescorbútico (F. F.), II, 397.
- » antiescorbútico de Portal, II, 398.
- » antiescrofuloso, II, 398.
- » antiescrofuloso (Bouchet), II, 398.
- » antiescrofuloso (Debreyne), II, 398.
- » antiespasmódico, IV, 12.
- » antiespasmódico (Cap), II, 398.
- » antiflogístico (Briant), II, 399.
- » antiflogístico (Bouchardat), II, 399.
- » antigotoso, II, 399.
- » antiherpético (Duchesne Duparc), II, 399.
- » antiraquí!ico (Vanier), II, 399.
- » antireumático (F. E.), II, 416.
- » antisifilítico (Chrestien), II, 411.
- » antisifilítico (Mistter), II, 400.
- » antisifilítico (Savaresi), II, 400.
- » antisifilítico compuesto (Puche), II, 400.
- » antivenéreo mercurial, II, 400.
- » aperitivo, II, 400.
- » de apio, I, 95.
- » de apio (F. F.), II, 428.
- » de apio compuesto (F. E.), II, 409.
- » de aquilea, I, 96.
- » de arándano, II, 400.
- » de arrayan (F. F.), II, 428.
- » de artemisa, I, 101.
- » de artemisa (F. E.), II, 453.
- » de artemisa (F. F.), II, 395.
- » de artemisa compuesto (F. F.), II, 401.
- » astringente, II, 401.
- » atemperante (Dorvault), II, 401.
- » de atropina, II, 402.
- » de avellana, I, 104.

- Jarabe de azafran , I , 105.
- » de azafran (F. F.) , II , 402.
 - » de azúcar (F. F.) , II , 390.
 - » de azufaisas , I , 106.
 - » azul (F. E.) , II , 453.
 - » balsámico (H. DE AL.) , II , 402.
 - » balsámico pectoral , II , 403.
 - » de bálsamo de copaiba , I , 110.
 - » de bálsamo de copaiba (H. DE AL.) , II , 402.
 - » de bálsamo del Perú , I , 111.
 - » de bálsamo de Tolú , I , 111 ; II , 402.
 - » de bálsamo de Tolú (F. F.) , II , 402.
 - » de bardana , I , 114.
 - » de becabunga , I , 115.
 - » de beleño , II , 403.
 - » de beleño (A. Chevallier) , II , 403.
 - » de beleño (F. F.) , II , 403.
 - » de beleño blanco , I , 117.
 - » de belladona , I , 117.
 - » de belladona (F. F.) , II , 403.
 - » de belladona (Trousseau) , II , 403.
 - » de Bell , I , 261.
 - » de Bellet modificado por Bouillon Lagrange , II , 403.
 - » de benjuí , I , 118.
 - » béquico , II , 440.
 - » béquico (Estanislao Martin) , II , 403.
 - » de berros , I , 119 ; II , 404.
 - » de berros (F. F.) , II , 422.
 - » de berro de Pará , II , 404.
 - » de betónica , I , 119.
 - » de bilis de buey , I , 120.
 - » bizantino , II , 404.
 - » contra el bocio (Breschet) , II , 423.
 - » de Bochet , II , 404.
 - » de borraja , I , 122.
 - » de borraja (F. E.) , II , 394.
 - » de Boubeé , II , 399.
 - » de Boullay , II , 404.
 - » de brea , I , 123.
 - » de brea (Péraire) , II , 404.
 - » de brionía , I , 123.
 - » de brionía (F. F.) , II , 425.
- Jarabe de buglosa , I , 125.
- » de café , I , 126.
 - » de café (Ferrari) , II , 404.
 - » de café (Mouchon) , II , 405.
 - » de cainca , II , 405.
 - » de cainca con vino (Beral) , II , 405.
 - » de cal (Trousseau) , II , 405.
 - » de calcar , II , 415.
 - » contra los cálculos biliares (Franconneau Dufresne) , II , 413.
 - » calibeadado , II , 405.
 - » calmante (Ricord) , II , 405.
 - » calmante (Roux) , II , 406.
 - » de camuesas , I , 131.
 - » de camuesas (F. F.) , II , 436.
 - » de camuesas y sen compuesto , II , 406.
 - » de canela , I , 132.
 - » de canela (F. F.) , II , 425.
 - » de canela compuesto , II , 406.
 - » de canela vinoso , II , 406 ; IV , 200.
 - » de los cantores (F. F.) , II , 421.
 - » de cantueso , I , 134.
 - » de cantueso (F. F.) , II , 423.
 - » de cantueso compuesto (Ferneli) , II , 406.
 - » de caña , I , 134.
 - » de caoutchu , II , 408.
 - » de caracoles , I , 136.
 - » de caracoles (Arnaud) , II , 406.
 - » de caracoles (Figuiet) , II , 406.
 - » de caracoles (Mouchon) , II , 407.
 - » de carbonato de amoníaco , II , 407.
 - » de carbonato de hierro (Leisner) , II , 407.
 - » de cardamomo menor , I , 138.
 - » de cártamo solutivo (F. E.) , II , 407.
 - » de cáscara de granada , I , 207.
 - » de cáscaras frescas de limon (F. F.) , II , 408.

- Jarabe de cáscara de naranja , I, 140 ; II , 408.
- » de cáscara de naranja (F. F.) , II , 408.
- » de cáscaras de naranjas amargas (F. F.) , II , 408.
- » de cascarilla , I, 140.
- » de catecú , I, 142 ; II , 408.
- » de catecú con el extracto (F. F.) , II , 450.
- » de cebolla , I, 144 ; II , 408.
- » de cebolla albarrana , I, 145.
- » de cebolla albarrana compuesto , II , 408.
- » de centaurea menor , I, 146 ; II , 409.
- » de cerezas , I, 147.
- » de cerezas (F. F.) , II , 436.
- » cerúleo (F. E.) , II , 453.
- » de cetrarino , II , 409.
- » ciánico , I, 63.
- » de cianuro de oro (Broussonnet) , II , 409.
- » de cianuro de potasio , II , 409.
- » de cicuta (Righini) , II , 409.
- » de cicutina , I, 148.
- » de las cinco raíces (F. E.) , II , 409.
- » de las cinco raíces aperitivas (F. F.) , II , 409.
- » de cinconina (Magendie) , II , 409.
- » de cinoglosa , I, 151.
- » de cinoglosa (F. F.) , II , 435.
- » de ciruelas , I, 151.
- » de citrato ácido de quinina (Magendie) , II , 410.
- » de citrato férrico ácido (Mialhe) , II , 410.
- » de citrato de hierro (Beral) , II , 410.
- » de citrato de hierro alcalino (Mialhe) , II , 410.
- » de citrato de hierro (Trousseau) , II , 410.
- » de citrato de hierro y amoníaco (Beral) , II , 410.
- » de citrato de potasa y hierro , II , 410.
- » de citrato de quinina , I, 312.
- Jarabe de claveles , II , 411.
- » de claveles (F. E.) , II , 453.
- » de claveles (F. F.) , II , 453.
- » de claveles compuesto (Cottureau) , II , 411.
- » de clavel rojo , I, 151.
- » de clavo de especia , I, 152.
- » de clorhidrato de morfina (F. F.) , II , 397.
- » clorhídrico , II , 411.
- » clorhídrico compuesto , II , 427.
- » de cloroformo , I, 154 ; II , 411.
- » de cloruro de amoníaco y manganeso , I, 436.
- » de cloruro de hierro , II , 424.
- » de cloruro de oro y sodio , I, 280.
- » de cloruro de oro y sodio (Chrestien) , II , 411.
- » de cloruro de oro y sodio compuesto , II , 411.
- » de coclearia , I, 157 ; II , 404.
- » de coclearia (F. E.) , II , 412.
- » de coclearia (F. F.) , II , 412 y 422.
- » de codeina , I, 158.
- » de codeina (Cap) , II , 412.
- » de cola de pescado , II , 412.
- » de cólchico , I, 159 ; II , 412.
- » comun de violetas (F. E.) , II , 452.
- » de la Condesa (F. E.) , II , 443.
- » de conicina , II , 412.
- » de consuelda , I, 162 ; II , 412.
- » de contrayerba , I, 163.
- » contra la coqueluche , II , 413.
- » contra la coqueluche (Boullay) , II , 413.
- » contra la coqueluche (Dr. Gilet) , II , 413.
- » contra la coqueluche (Lescure) , II , 413.
- » contra la coqueluche (Trousseau) , II , 414.
- » de coralina , I, 163.

- Jarabe de coral rojo (F. E.), II, 414.
- » de cornezuelo de centeno, I, 164.
- » de cornezuelo de centeno (Hebert), II, 415.
- » de cornezuelo de centeno (Martin), II, 415.
- » de corteza de cidra, I, 149.
- » de corteza de cidra (F. E.), II, 415.
- » de corteza de limon, I, 235.
- » de corteza de olivo, I, 277.
- » de corteza de olmo, II, 415.
- » de corteza peruviana (F. E.), II, 443.
- » de las cuatro flores, II, 440.
- » de las cuatro flores (Estanislao Martin), II, 403.
- » de los cuatro frutos (Mouchon), II, 415.
- » de cubebas (Puche), II, 416.
- » de cubebino (Labelonye), II, 416.
- » de Cuisinier (F. F.), II, 455.
- » de culantrillo, I, 167.
- » de culantrillo (F. E.), II, 453.
- » de culantrillo (F. F.), II, 416.
- » de china, II, 416.
- » de china compuesto (F. E.), II, 416.
- » de dafne mecereon, II, 416.
- » de dafne mecereon (Cazenave), II, 416.
- » de dátiles, I, 170.
- » de diacodion (F. F.), II, 418.
- » de Deodat, II, 445.
- » depurativo (Delahaye), II, 416.
- » depurativo (Devergie), II, 417.
- » depurativo (Keraudren), II, 417.
- » depurativo (Larrey), II, 417.
- » depurativo (Magendie), II, 417.
- » depurativo (Majault), II, 417.
- Jarabe depurativo (Peyrilho), II, 417.
- » depurativo (Ricord y Duval), II, 417.
- » depurativo amargo (Bouillon Lagrange), II, 418.
- » depurativo azafranado (Cadet), II, 418.
- » depurativo de Mompeller, II, 418.
- » de Desessart (F. F.), II, 431.
- » de deutocloruro de hierro, I, 218.
- » de deutoioduro de mercurio (Mouchon), II, 431.
- » de deutoioduro iodurado de mercurio (Boutigni y Gilbert), II, 430.
- » de diacodion, I, 68.
- » de diacodion (F. E.), II, 419.
- » de diacodion anisado, II, 419.
- » diaforético (Cazenave), II, 419.
- » de dictamo (F. F.), II, 428.
- » de digital, II, 419.
- » de digital (F. F.), II, 419.
- » de digital (Labelonye), II, 420.
- » de digital purpúrea, II, 419.
- » de digitalina, I, 172.
- » de digitalina (Homolle y Quevenne), II, 420.
- » de digitalina (Labelonye), II, 420.
- » drástico, II, 420.
- » de dulcamara, I, 174.
- » de dulcamara (F. F.), II, 420.
- » dulcificante (Selle), II, 420.
- » emético, II, 420.
- » emético (Glauber), II, 420.
- » emético (Morgan), II, 420.
- » emético (Spielmann), II, 420.
- » de emetina, I, 177.
- » de emetina (Magendie), II, 421.
- » de emetina de color, I, 177.
- » de emetina pura, II, 421.
- » emulsivo, II, 421.
- » de énula campana, I, 179.
- » de ergotina, I, 179; II, 421.
- » de erisimo, I, 180.

- Jarabe de erisimo (F. F.), II, 421.
- » de erisimo compuesto (F. E.), II, 421.
- » de erisimo compuesto (F. F.), II, 421.
- » de escamonea, I, 181; II, 397.
- » de escordio, I, 182.
- » de escordio (F. E.), II, 453.
- » de escordio (F. F.), II, 428.
- » de escorzonera (F. M.), II, 422.
- » contra las escrófulas (Golfin), II, 414.
- » de espigelia (Huissen), II, 423.
- » de espigelia contra las lombrices, I, 184.
- » de espino serval, I, 185.
- » de espino serval (F. F.), II, 425.
- » de espino serval (F. DE L.), II, 423.
- » esténico (Breschet), II, 423.
- » de estoraque (Lheritier), II, 423.
- » de estoraque líquido, I, 187.
- » de estramonio, I, 187.
- » de estramonio (F. F.), II, 403.
- » de éter (F. F.), II, 423.
- » de éter acético, II, 424.
- » de éter alcoholizado, II, 395.
- » de éter mercurial (Cheron), II, 424.
- » de éter sulfúrico, I, 190.
- » etéreo de acetato de mercurio (Virey), II, 392.
- » expectorante, II, 423.
- » de extracto de beleño, I, 416.
- » de extracto de digital, I, 172.
- » de extracto de opio (F. E.), II, 436.
- » de extracto de opio (F. F.), II, 436.
- » de extracto de zarzaparrilla, II, 454.
- » de faan, I, 193.
- Jarabe febrífugo (Bories), II, 424.
- » febrífugo de quina, II, 444.
- » ferruginoso, II, 424.
- » ferruginoso astringente (Ricord), II, 424.
- » ferruginoso (Lassaigne), II, 424.
- » ferruginoso de tartrato de potasa y hierro (Mialhe), II, 424.
- » de flor de borraja (F. F.), II, 422.
- » de flor de melocoton (F. F.), II, 422.
- » de flores de naranjo, I, 273.
- » de flor de naranjo (F. F.), II, 425.
- » de fosfato de manganeso, I, 436.
- » de frambuesas, I, 195.
- » de frángula, I, 195.
- » de fresas, I, 195.
- » de fresas (Soubeiran), II, 425.
- » de fuligocali sulfurado (Deschamps), II, 425.
- » de fumaría, I, 198.
- » de fumaría (F. E.), II, 394.
- » de fumaría (F. F.), II, 425.
- » contra las gastralgias (Pali-deau), II, 414.
- » de gengibre, I, 230.
- » de gelatina, II, 425.
- » de gelatina de cuerno de ciervo (Mouchon), II, 425.
- » de genciana, I, 201.
- » de genciana (F. F.), II, 425.
- » de genciana iodurado (Ricord), II, 426.
- » de gencianino, I, 201.
- » de gencianino (Magendie), II, 426.
- » de gengibre, I, 202; II, 426.
- » de goma amoníaco, I, 204.
- » de goma arábica, I, 205.
- » de goma arábica (F. F.), II, 426.
- » de goma quino, I, 205.
- » de goma tragacanto, I, 206; II, 426.
- » gomoso de copaiba (Puche), II, 402.

- Jarabe de granada, I, 207; II, 427.
- » de granada (F. E.), II, 427.
- » de granada (F. F.), II, 436.
- » de grosellas, I, 208.
- » de grosellas (F. E.), II, 427.
- » de grosellas (F. F.), II, 436.
- » de grosellero negro, I, 208.
- » de guarana, II, 427.
- » de guayaco, I, 209.
- » de guayaco (Mouchon), II, 427.
- » de guayaco amoniaco, II, 427.
- » de Hanhmann, II, 427.
- » de hidrocianato de potasa, I, 301; II, 409.
- » de hidrocianato de potasa (Villermé), II, 427.
- » de hidrociorato de morfina, I, 268; II, 427.
- » hidrólico de extracto de cainca, II, 405.
- » de hígado de azufre (F. F.), II, 428.
- » de hígado de raya (Mialhe), II, 391.
- » de hinojo, I, 223.
- » de hinojo (F. A.), II, 428.
- » de hinojo acuático, II, 428.
- » hipnótico, II, 428.
- » de hiposulfito de sosa (Bielt), II, 428.
- » hiposulfato de sosa (Mouchon), II, 428.
- » de hisopo, I, 224.
- » de hisopo (F. E.), II, 453.
- » de hisopo (F. F.), II, 428.
- » de hojas de nogal (Negrier), IV, 137.
- » de hollin, II, 428.
- » de horchata, II, 421.
- » de horchata (F. F.), II, 395.
- » de huevos (Payen), II, 429.
- » de infusión de digital, I, 172.
- » de iodato de potasa (Henry), II, 431.
- » de iodhidrargirato de potasa (Puche), II, 431.
- » de iodo, I, 226.
- » de iodo (Henry), II, 429.
- Jarabe iodurado (Bouchet), II, 430.
- » iodurado (Ricord), II, 430.
- » iodo ferrurado (Mialhe), II, 430.
- » de ioduro de hierro, II, 429.
- » de ioduro de hierro (Beral), II, 429.
- » de ioduro de hierro (Devergie), II, 429.
- » de ioduro de hierro y quinina, I, 313.
- » de ioduro de hierro y quinina (Bouchardat), II, 430.
- » de ioduro de manganeso, I, 437.
- » de ioduro de potasio, I, 227.
- » de ioduro de potasio (Cazenave), II, 431.
- » de ioduro de potasio (Ricord), II, 431.
- » de ioduro de potasio iodado (Puche), II, 431.
- » de ioduro de potasio iodurado (Henry), II, 431.
- » de ipecacuana, I, 229.
- » de ipecacuana (F. F.), II, 431.
- » de ipecacuana de la Carolina, I, 229.
- » de ipecacuana compuesto (F. F.), II, 431.
- » de jalapa compuesto, II, 432.
- » de karabé, II, 432 y 436.
- » de karabé (F. F.), II, 439.
- » de Labelonye, II, 420.
- » de lactato de hierro (Cap), II, 432.
- » de lactato de quinina, II, 432.
- » de lactucario, I, 231; II, 432.
- » de lactucario (Aubergier), II, 432.
- » de lamio blanco, I, 231.
- » de larga vida (F. F.), III, 102.
- » de laurel real (Dorvault), II, 433.

- Jarabe laxante fundente (Franco-
neau Dufresne), II, 433.
- » de leche, II, 433.
- » de leche (Robinet), II, 433.
- » de leche de burra, II, 433.
- » de lechuga, I, 233.
- » de lechuga (F. F.), II, 425.
- » de limones (F. E.), II, 327.
- » de limones (F. F.), II, 436.
- » de liquen, I, 236; II, 433.
- » de lirio de los valles, I, 238.
- » de lombarda, I, 239.
- » de lombarda (F. F.), II, 422.
- » de lombarda compuesto (Fouquet), II, 434.
- » de lupulina, I, 239; II, 434.
- » de lúpulo, II, 434.
- » de lúpulo compuesto, II, 434.
- » de llanten (F. E.), II, 394.
- » de madreselva, I, 240.
- » de madreselva (F. F.), II, 453.
- » de magnesia (Dorvault), II, 434.
- » de malato de manganeso, I, 437.
- » de malvabisco, I, 244.
- » de malvabisco (F. E.), II, 434.
- » de malvabisco (F. F.), II, 435.
- » de malvabisco compuesto (Taddei), II, 435.
- » de maná, I, 245; II, 435.
- » de maná compuesto, II, 435.
- » de manito, I, 246; II, 435.
- » de manzanas (F. F.), II, 436.
- » de manzanas compuesto (F. F. ANTIGUA), II, 435.
- » de manzanas con eléboro, II, 435.
- » de manzanilla, I, 247.
- » de manzanilla (F. F.), II, 453.
- » marcial (Fouquet), II, 435.
- » marcial (H. DE AL.), II, 436.
- » marcial astringente, II, 436.
- » de marrubio, I, 248.
- » de marrubio (F. E.), II, 453.
- Jarabe de marrubio (F. F.), II, 428.
- » de meconio, I, 278.
- » de meconio (F. E.), II, 436.
- » de meconio (F. F.), II, 436.
- » de melisa, I, 251.
- » de melocoton, I, 252.
- » de membrillo, I, 252.
- » de membrillos (F. F.), II, 436.
- » de membrillos compuesto, II, 436.
- » de menta piperita, I, 253.
- » de menta piperita (F. F.), II, 425.
- » de mercurial, I, 253.
- » mercurial etéreo, II, 437.
- » mercurial gomoso (Lagneau), II, 437.
- » mercurial de Plenk (H. DE M.), III, 131.
- » de mercurio, I, 254.
- » de mercurio (San Ildefonso), II, 437.
- » de mercurio gomoso de Plenk (F. P.), II, 437.
- » de miel, I, 264.
- » de miel (F. F.), III, 101.
- » de milpiés, I, 264.
- » de mirtilo, I, 265.
- » de monesia, I, 266.
- » de monesia compuesto, II, 437.
- » de moras, I, 361.
- » de moras (F. F.), II, 436.
- » de moras negras, I, 267.
- » de musgo (Boullay), II, 437.
- » de musgo de Córcega, I, 271.
- » de musgo de Córcega (F. F.), II, 437.
- » de musgo marino, II, 437.
- » de musgo marino compuesto (Escofet), II, 438.
- » de nabos, II, 438.
- » de naftalina (Dupasquier), II, 438.
- » de naranja, I, 273; II, 438.
- » de naranjas (F. F.), II, 436.
- » de narciso de los prados, I, 273; II, 438.

- Jarabe de narciso de los prados (F. F.), II, 453.
- » de nenúfar blanca, I, 274.
- » de ninfea, II, 438.
- » de ninfea (F. E.), II, 453.
- » de ninfea (F. F.), II, 453.
- » de nogal (Negrier), II, 438.
- » de nuez de agalla, I, 275.
- » de nuez moscada, I, 275.
- » de olmo (Soubeiran), II, 439.
- » de olmo piramidal (Crosnier), II, 439.
- » de opio, I, 278.
- » de opio succinado (F. F.), II, 439.
- » de oro, I, 279; II, 439.
- » de ortigas (F. E.), II, 394.
- » de ortigas (F. F.), II, 425.
- » de oxálide de tallo grueso, I, 281.
- » de parietaria, I, 283.
- » de pasas, II, 439.
- » pectoral, II, 439 y 440.
- » pectoral (Bouvard), II, 439.
- » pectoral (Courti), II, 439.
- » pectoral (Dumas), II, 439.
- » pectoral (Lamoroux), II, 440.
- » pectoral (Maloet), II, 440.
- » pectoral (Maroncelli), II, 440.
- » pectoral (Rivet), II, 440.
- » pectoral balsámico (Charles), II, 440.
- » pectoral dulcificante (Selle), II, 441.
- » pectoral expectorante, II, 441.
- » pectoral inglés, II, 441.
- » pectoral de quina, II, 441.
- » pectoral resolutivo (Selle), II, 441.
- » de peonia, I, 285.
- » de peonía (F. E.), II, 441.
- » de peonía (F. F.), II, 453.
- » de pepinos, II, 441.
- » de percloruro de hierro (Beral), II, 411.
- » de perejil, I, 286.
- » de perifollo, I, 286.
- » de perifollo (F. F.), II, 422.
- Jarabe de pétalos de violetas (F. E.), II, 453.
- » de Peyrilho, II, 442.
- » de pimienta de Tabasco, I, 289.
- » de polígala, II, 442.
- » de polígala de Virginia, I, 297.
- » de polígala vulgar, I, 298.
- » de ponche con rom, II, 442.
- » de Portal, II, 442.
- » de primula, I, 306.
- » de protoioduro de hierro (F. P.), II, 429.
- » de protoioduro de hierro (Ricord), II, 430.
- » de protoioduro de hierro (Dupasquier), II, 429.
- » de protoioduro de hierro de Dupasquier modificado por Boudet, II, 430.
- » de pulmon de ternera (F. F.), II, 442.
- » de puntas de espárragos, I, 184.
- » de puntas de espárragos (F. F.), II, 422.
- » de puntas de espárragos (Chevalhier), II, 422.
- » de puntas de espárragos (Guillermond), II, 422.
- » purgante de simiente de cártamo (F. E.), II, 443.
- » de quermes animal, II, 443.
- » de quina (F. E.), II, 443.
- » de quina (F. F.), II, 443.
- » de quina con vino (F. F.), II, 443.
- » de rábano, I, 315.
- » de rábano rusticano compuesto (F. F.), II, 397.
- » de raíz de saponaria (Cousseran), II, 446.
- » de rapóntico de los Alpes, I, 316.
- » de ratania, I, 316.
- » de ratania (F. F.), II, 444.
- » de regaliz, I, 317.
- » de regaliz compuesto, II, 444.
- » resolutivo (Selle), II, 444.

- Jarabe de rosas (F. F.), II, 425.
- » de rosas de Alejandría, I, 319.
- » de rosas de Alejandría (F. F.), II, 425.
- » de rosas pálidas (F. E.), II, 444.
- » de rosas rojas, I, 319.
- » de rosas rojas (F. E.), II, 444.
- » de ruda, I, 320.
- » de ruibarbo, I, 321.
- » de ruibarbo (F. F.), II, 444.
- » de ruibarbo compuesto (Es-nault), II, 394.
- » de ruibarbo compuesto (F. F.), II, 394.
- » de ruibarbo y rosas compuesto, II, 445.
- » de ruibarbo y sen, II, 445.
- » de salicina, I, 324; II, 445.
- » de sandía, I, 325.
- » de sangüesas (F. F.), II, 436.
- » de San Ildefonso, II, 400.
- » de sanidad, II, 445.
- » de santónico, I, 329; II, 445.
- » de saponaria, I, 330.
- » de sapos, II, 446.
- » de sasafrás, I, 330.
- » de saúco (F. A.), II, 446.
- » sedante, II, 446.
- » de sen, I, 334; II, 446.
- » de sen (F. DE L.), II, 447.
- » de sen con café, II, 446.
- » serval (Sauvan), II, 447.
- » de siempreviva de los tejados, I, 335.
- » de simaruba, I, 335.
- » simple (F. E.), II, 391.
- » simple (F. F.), II, 390.
- » simple blanco (F. F.), II, 390.
- » simple de cinoglosa (F. M.), II, 422.
- » simple de consuelda (F. M.), II, 422.
- » simple de violetas (F. E.), II, 452.
- » de sinfito (F. E.), II, 434.
- » de sinfito (F. F.), II, 435.
- Jarabe de sinfito mayor, II, 447.
- » de subcarbonato de potasa (Puche), II, 407.
- » de succinato de manganeso, I, 438.
- » de sucino, I, 341.
- » de sucino (F. F.), II, 439.
- » sudorífico, II, 447.
- » sudorífico (Ricord), II, 448.
- » sudorífico de Cuisinier (reformado), II, 447.
- » sudorífico simple, II, 448.
- » de sulfato de cinconina, I, 450.
- » de sulfato de cinconina (F. F.), II, 448.
- » de sulfato de estriquina (Trousseau), II, 448.
- » de sulfato de hierro, I, 221; II, 448.
- » de sulfato de manganeso, I, 438.
- » de sulfato de morfina, I, 268.
- » de sulfato de morfina (F. F.), II, 392.
- » de sulfato de quinina, I, 314.
- » de sulfato de quinina (F. F.), II, 448.
- » de sulfato de quinina (Magendie), II, 448.
- » de sulfidrato de amoníaco, II, 448.
- » sulfurético (Swediaur), II, 448.
- » sulfúrico alcoholizado (Puche), II, 448.
- » de sulfuro de hierro, I, 221.
- » de sulfuro de hierro (Cazenave), II, 449.
- » de sulfuro de magnesio, I, 243; II, 449.
- » de sulfuro de potasio, I, 305.
- » de sulfuro de potasio (F. F.), II, 428.
- » de sulfuro de potasio (F. P.), II, 449.
- » de sulfuro de sosa, I, 340; II, 449.
- » de tabaco, I, 342.

- Jarabe de tabaco (Lamure), II, 449.
- » de tamarindos (Barbet), II, 449.
- » de tanaceto, I, 343.
- » de tanato de hierro, I, 221.
- » de tanato de hierro (Beral), II, 449.
- » de tanino, II, 449.
- » de tanino (Friard), II, 449.
- » de tartrato de hierro y potasa, I, 222.
- » de tartrato de manganeso, I, 439.
- » de te, II, 450.
- » de té Tunka, II, 450.
- » tebaico, I, 278.
- » de tila, I, 346.
- » de Tolú (Louradour Dublanc), II, 402.
- » tónico y somnífero (Offert), II, 450.
- » de torbisco (Cazenave), II, 450.
- » contra la tos (Dr. Gardane), II, 414.
- » de trébol (F. F.), II, 325.
- » de trébol de agua, I, 348.
- » de trébol de agua (F. F.), II, 425.
- » de trementina, I, 349; II, 450.
- » de tridacio, I, 349.
- » de tridacio (F. F.), II, 450.
- » de tridacio (Petit), II, 450.
- » de trinitaria, I, 350.
- » de trinitaria silvestre, II, 450 y 451.
- » de tusilago, I, 350.
- » de tusilago (F. F.), II, 453.
- » de vainilla, I, 352.
- » de valeriana, I, 353.
- » de valeriana (F. F.), II, 451.
- » de valeriana (Schoefer), II, 451.
- » vegetal (Velno), II, 451.
- » vermífugo (Boullay), II, 451.
- » vermífugo (Bouillon Lagrange), II, 452.
- » vermífugo (Cruveilhier), II, 451.
- Jarabe vermífugo de coralina, II, 452.
- » vermífugo y purgante, II, 452.
- » de verónica, I, 356.
- » de vinagre (F. E.), II, 452.
- » de vinagre (F. F.), II, 436.
- » de vinagre antimoniado, I, 90.
- » de vinagre con frambuesas, I, 62.
- » de vinagre con frambuesas (F. F.), II, 436.
- » vinoso de cainca, I, 126.
- » vinoso cardíaco (Wirtemberg), II, 452.
- » vinoso de cascarilla, I, 140.
- » vinoso de larga vida, III, 103.
- » vinoso de limon, I, 235.
- » vinoso de quina, I, 310; II, 443.
- » vinoso de zarzaparrilla, II, 455.
- » de violetas, I, 358.
- » de violetas (F. F.), II, 453.
- » de Virey, II, 453.
- » de yedra terrestre, I, 359.
- » de yedra terrestre (F. E.), II, 453.
- » de yedra terrestre (F. F.), II, 428.
- » de yemas de abeto (Sauve), II, 453.
- » de yemas de pino, I, 290.
- » de verbabuena (F. E.), II, 453.
- » de verbabuena rizada (F. F.), II, 428.
- » de yerba escarchada, I, 359.
- » de zanahoria, I, 360.
- » de zarzaparrilla, I, 362; II, 453.
- » de zarzaparrilla (F. F.), II, 454.
- » de zarzaparrilla compuesto (F. F.), II, 454.
- » de zarzaparrilla iodurado (Ricord), II, 455.
- » de zumaque venenoso, I, 366.

- Jarabe de zumo de beleño, I, 116.
- » de zumo de cicuta, I, 148.
 - » de zumo de digital, I, 172.
 - » de zumo de limon, I, 235.
 - » de zumo de manzanas olorosas (F. E.), II, 452.
 - » de zumo de membrillo (F. E.), II, 452.
 - » de zumo de yerbas, II, 455.
- Julepes, II, 455.
- Julepe con el ácido benzóico (H. DE AL.), II, 455.
- » acidulado, II, 455 y 456.
 - » alcanforado (F. E.), II, 456.
 - » alcanforado (F. P.), II, 456.
 - » alcanforado aceitoso (F. N. P.), II, 456.
 - » aluminoso (Kapeler), II, 456.
 - » amargo (Gall), II, 456.
 - » anodino, II, 456.
 - » anodino y estimulante, II, 456.
 - » antidisentérico, II, 456.
 - » antiescorbútico, II, 457.
 - » antiespasmódico, II, 457.
 - » antihelmíntico (Chaussier), II, 457.
 - » antihistérico, II, 457.
 - » antihistérico (Barthez), II, 457.
 - » antiséptico, II, 457.
 - » antiséptico y tónico alcanforado, II, 457.
 - » astringente, II, 457 y 458.
 - » astringente (Babeyrac), II, 458.
 - » atemperante, II, 458.
 - » de bardana, I, 114.
 - » de belladona (Baron), II, 458.
 - » béquico, II, 459; III, 374.
 - » calmante, II, 458.
 - » calmante (Baron), II, 458.
 - » calmante (F. F.), III, 338.
 - » calmante (Roucher), II, 458.
 - » de codeína, II, 458.
 - » de codeína (Magendie), II, 458.
 - » contraestimulante (Laennec), II, 459.
- Julepe contraestimulante (Teullier), II, 459.
- » contraestimulante (Richter), II, 459.
 - » de cornezuelo de centeno, II, 459.
 - » contra el crup, II, 459.
 - » diurético, II, 459.
 - » del Dr. Fournier, II, 460.
 - » del Dr. Frank, II, 461.
 - » efervescente, II, 459.
 - » emetizado (Rasori), II, 459.
 - » emoliente, II, 459.
 - » escilítico, II, 459.
 - » escocés, II, 460.
 - » estimulante y ligeramente anodino (Gall), II, 460.
 - » estomacal (F. E.), III, 118.
 - » excitante y expectorante, II, 460.
 - » expectorante, II, 459 y 460.
 - » expectorante y calmante (Sandras), II, 460.
 - » expectorante, diaforético y diurético, II, 460.
 - » febrífugo (Magendie), II, 460.
 - » fétido (Barthez), II, 460.
 - » gomoso, II, 461.
 - » gomoso (F. F.), III, 365.
 - » gomoso calmante, II, 461.
 - » hidragogo, II, 461.
 - » laurinado, II, 461.
 - » de limon, II, 461.
 - » de morfina, II, 461.
 - » moscado, II, 461; III, 132.
 - » moscado (F. E.), III, 107.
 - » moscado (F. P.), II, 461.
 - » moscado (Fuller), II, 461.
 - » moscado (H. DE M.), III, 131.
 - » de nitrato de potasa, II, 462.
 - » con ojimiel (Kapeler), II, 462.
 - » opiado y alcanforado, II, 462.
 - » opiado y moscado, II, 462.
 - » pectoral, II, 462.
 - » pectoral (Magendie), II, 462.
 - » purgante, II, 462.

- | | |
|---|--|
| <p>Julepe con quermes, II, 463.</p> <p>» de Rasori, II, 463.</p> <p>» refrigerante, II, 463.</p> <p>» refrigerante (Astruc), II, 463.</p> <p>» sedante (Fouquier), II, 463.</p> <p>» sucinado, II, 463.</p> | <p>Julepe sudorífico, II, 463.</p> <p>» tónico, II, 462.</p> <p>» tónico y alcanforado, II, 463.</p> <p>» vomitivo, II, 463.</p> <p>» vomitivo (Magendie), II, 463.</p> <p>» con zumo de limon, II, 464.</p> |
|---|--|

L.

- | | |
|--|---|
| <p>Lactato de quinina, I, 433.</p> <p>Lapiceros, III, 5.</p> <p>» dermatográficos (Pirlas), III, 5.</p> <p>» de nitrato de plata y potasa (Cadet de Gassicourt), III, 5.</p> <p>Láudanos, III, 6.</p> <p>Láudano cidoniado (Vanhelmont), III, 6.</p> <p>» cinabarino (F. E.), III, 6.</p> <p>» de Ford, III, 6.</p> <p>» de Lalouette, III, 7.</p> <p>» líquido de Sydenham, I, 278.</p> <p>» líquido de Sydenham (F. E.), III, 6.</p> <p>» líquido de Sydenham (F. F.), III, 6.</p> <p>» líquido de Sydenham (F. P.), III, 6.</p> <p>» opiado (F. E.), III, 7.</p> <p>» de Rousseau, I, 278.</p> <p>» de Rousseau (F. P.), III, 7.</p> <p>» de Rousseau (F. F.), III, 7.</p> <p>» simple (F. E.), III, 8.</p> <p>» urinario (F. E.), III, 8.</p> <p>Lavativas, III, 8.</p> <p>Lavativa de acebo, I, 54.</p> <p>» de aceite de adormideras, I, 55.</p> <p>» de aceite comun, I, 56.</p> <p>» de aceite de croton, III, 8.</p> <p>» de aceite de hígado de bacalao, I, 58.</p> <p>» de aceite de linaza, I, 58.</p> <p>» de aceite de opio, III, 8.</p> <p>» de aceite de ricino, I, 59; III, 8.</p> <p>» de aceite de ricino (H. DE ING.), III, 8.</p> <p>» de aceite de tartagos, I, 345; III, 8.</p> | <p>Lavativa aceitosa, III, 8.</p> <p>» aceitosa (H. DE ING.), III, 9.</p> <p>» de acetato de morfina (Bally), III, 9.</p> <p>» acética (Frank), III, 9.</p> <p>» acetosa, III, 9.</p> <p>» de acibar, III, 9.</p> <p>» de acibar (F. DE L.), III, 9.</p> <p>» de ácido acético, I, 62.</p> <p>» de ácido sulfúrico, I, 108.</p> <p>» de adormideras, III, 9.</p> <p>» de adormideras y almidon, III, 9.</p> <p>» de albayalde (Devergie), III, 9.</p> <p>» alcanforada, III, 9.</p> <p>» alcanforada (H. M.), III, 9.</p> <p>» de almidon, I, 80.</p> <p>» de almidon (H. DE M.), III, 10.</p> <p>» de almidon con acetato de morfina (Bally), III, 10.</p> <p>» de almidon laudanizada, III, 20.</p> <p>» con almizcle, III, 10.</p> <p>» aloética (Clarck), III, 10.</p> <p>» aloética salina, III, 10.</p> <p>» amilácea (H. M.), III, 11.</p> <p>» amilácea narcótica (Bally), III, 10.</p> <p>» analéptica, III, 10.</p> <p>» anodina, III, 10.</p> <p>» anodina (H. DE M.), III, 11.</p> <p>» anodina de almidon (F. E.), III, 10.</p> <p>» anodina de los pintores, IV, 131.</p> <p>» antiblenorrágica (Velpeau), III, 11.</p> <p>» antidiarréica (Devergie), III, 11.</p> |
|--|---|

- Lavativa antidiarréica (Rostan), III, 11.
- » antiespasmódica, III, 11.
- » antiespasmódica (H. M.), III, 12.
- » antiespasmódica alcalina (Mialhe), III, 12.
- » antiespasmódica (P. de Mignot), III, 12.
- » antiespasmódica y vermífuga, III, 12.
- » antihelmíntica, III, 11.
- » antihelmíntica (Duncan), III, 11.
- » antineuropática (Ranque), IV, 134.
- » antiperiódica, III, 12.
- » antipútrida (H. M.), III, 12.
- » antiséptica, III, 12 y 24.
- » antisifilítica, III, 12.
- » de arroz, I, 99.
- » de asa fétida, I, 102; III, 13.
- » de asa fétida (H. DE M.), III, 13.
- » de asa fétida (Millar), III, 13.
- » de asa fétida alcanforada, III, 13.
- » arsenical febrífuga (Boudin), III, 12.
- » astringente, III, 13.
- » astringente (Boerhaave), III, 13.
- » astringente (F. E.), III, 14.
- » astringente (H. DE M.), III, 13.
- » astringente (H. DE DIOS.), III, 14.
- » astringente (H. M.), III, 14.
- » astringente (H. DE M.), III, 13.
- » astringente (Trousseau), III, 14.
- » astringente aluminosa, III, 14.
- » astringente de catecú, III, 14.
- » astringente de quino, III, 14.
- » astringente y tónica (Roucher), III, 14.
- » astringente y tónica (Roucher), III, 14.
- » astringente contra las grietas del ano (Bretonneau y Trousseau), III, 14.
- Lavativa de azafran, I, 105.
- » de bálsamo de copaiba, I, 110; III, 15.
- » con el bálsamo de copaiba (Ricord), III, 15.
- » con el bálsamo de copaiba (Velpeau), III, 15.
- » de bardana, I, 114.
- » de belladona, I, 118; III, 15.
- » de belladona (Ricord), III, 15.
- » calcárea (Freer), III, 15.
- » calmante, III, 9 y 15.
- » calmante (Fouquet), III, 15.
- » calibeadada, III, 14.
- » carminativa, III, 15.
- » carminativa (F. M.), III, 15.
- » de cáscara de granada (F. E.), III, 14.
- » de castóreo, I, 141.
- » de catecú, III, 16.
- » de cebadilla, III, 16.
- » de cebolla albarrana, I, 145.
- » con clara de huevo (Ricord), III, 16.
- » clorosa (Cottureau), III, 16.
- » clorurada (Labarraque), III, 16.
- » de cloruro de sodio, I, 337.
- » de coloquintida (F. DE L.), III, 16.
- » de cornezuelo de centeno, I, 163; III, 21.
- » de cubebas, III, 17.
- » de cubebas (Velpeau), III, 17.
- » contra la diarrea, III, 16.
- » contra la diarrea crónica (Bostan), III, 16.
- » contra las diarreas disentericas de los niños, III, 16.
- » contra la diarrea de los tísicos (Devergie), III, 16.
- » diurética, III, 17.
- » diurética (Fouquier), III, 17.

- Lavativa drástica (Moll), III, 17.
- » dulcificante (Fouquet), III, 17.
 - » emetizada, III, 17.
 - » emoliente, III, 17.
 - » emoliente (H. DE M.), III, 18.
 - » emoliente y calmante, III, 18.
 - » emoliente de hojas de malva (F. E.), III, 18.
 - » emoliente y laxante (H. DE AL.), III, 18.
 - » de esencia de trementina, I, 182; III, 24.
 - » de espino serval, I, 185.
 - » estimulante, III, 18.
 - » estimulante (H. DE M.), III, 18.
 - » contra el estreñimiento (Lippich), III, 20.
 - » excitante y antiséptica, III, 18.
 - » de extracto de belladona, I, 118.
 - » febrífuga, III, 18.
 - » febrífuga (H. M.), III, 18.
 - » ferruginosa astringente (Sundelin), III, 18.
 - » fétida (H. DE ING.), III, 18.
 - » gelatinosa, III, 19.
 - » de goma quino, III, 19.
 - » de graciola, III, 19.
 - » contra las hemorroides fluentes (Warten), III, 16.
 - » iodada (Cottureau), III, 19.
 - » irritante (H. M.), III, 19.
 - » irritante antimoniada, III, 19.
 - » irritante de tabaco (H. DE M.), III, 19.
 - » irritante de vino antimoniado (F. E.), III, 19.
 - » de jabon (H. DE IT.), III, 19.
 - » de jalapa, I, 230.
 - » de Koempf, III, 20.
 - » laudanizada, III, 20.
 - » laxante, I, 59; III, 20.
 - » laxante (H. M.), III, 20.
 - » laxante antiespasmódica (Lippich), III, 20.
- Lavativa de manzanilla, III, 20.
- » de melote, I, 251.
 - » mercurial (Kopp), III, 20.
 - » de miel, I, 264.
 - » de monesia, I, 267.
 - » moscada (H. M.), III, 20.
 - » moscada alcanforada, III, 10.
 - » mucilaginosa, III, 20.
 - » de musgo de Córcega, I, 271.
 - » narcótica, III, 20.
 - » de nitrato de plata (Trousseau), III, 14.
 - » de nuez de agalla opiada (H. DE ING.), III, 21.
 - » nutritiva, III, 21.
 - » nutritiva (Nasse), III, 21.
 - » obstétrica, III, 21.
 - » con ojimiel, III, 21.
 - » opiada, I, 278.
 - » opiada y alcanforada (Ricord), III, 21.
 - » de parietaria, III, 21; IV, 283.
 - » de Plenck contra las ascárides, III, 21.
 - » de polvo de quina, I, 311.
 - » protoiodo ferrurada, III, 19.
 - » purgante, III, 21, 22 y 42.
 - » purgante (H. DE M.), III, 22.
 - » purgante emetizada (Foy), III, 22.
 - » purgante emetizada (Radium), III, 22.
 - » purgante de magnesia, III, 22.
 - » purgante de los pintores, IV, 131.
 - » purgante salina, III, 22.
 - » purgante de sen, III, 22.
 - » de quina, III, 22.
 - » de quina (H. DE LA CARIDAD), III, 22.
 - » de quina alcanforada, III, 22.
 - » de ratania, I, 317.
 - » refrescante, III, 23.
 - » salina, III, 23.
 - » de salvado, I, 324.
 - » de santónico, I, 329.

- Lavativa sedante, III, 23.
- » de sen, I, 334; III, 24.
 - » de sen compuesta, III, 21.
 - » de simaruba, I, 335.
 - » de simiente de linaza, III, 23.
 - » de sulfato de magnesia, I, 243.
 - » de sulfato de quinina, III, 23.
 - » de sulfato de sosa, I, 339.
 - » de tabaco (Page), III, 23.
 - » de tabaco y croton (Moll), III, 23.
 - » de tabaco estibiada, III, 23.
 - » de tanino, I, 344; III, 23.
 - » tónica y emoliente, III, 23.
 - » de trementina, I, 349.
 - » de trementina (H. DE AL.), III, 24.
 - » trementinada (Recamier), IV, 142.
 - » trementinada (Trousseau), III, 24.
 - » de valerianato de quinina, III, 24.
 - » vermífuga, III, 24.
 - » vermífuga (Raspail), III, 24.
 - » vermífuga y trementinada, III, 24.
 - » de vinagre (H. M.), III, 24.
 - » visceral (Berends), III, 25.
 - » visceral (Koempf), III, 25.
- Lavatorios, III, 25.
- Lavatorio anodino (H. DE M.), III, 25.
- » antiescorbútico acidulado (H. DE M.), III, 25.
 - » antiescorbútico quinado (H. DE M.), III, 25.
 - » astringente (H. DE M.), III, 25.
- Leches, III, 25.
- Leche de almendras (F. F.), II, 272.
- » de almendras amargas (Trousseau), III, 25.
 - » aluminosa, III, 26.
 - » amoniacal, III, 26.
 - » analéptica de musgo de Irlanda, III, 26.
 - » artificial (Rosenstein), III, 26.
- Leche artificial para los niños, III, 26.
- » de asa fétida, III, 26.
 - » de burra artificial, III, 26.
 - » de cera (Foy), II, 266.
 - » cosmética (F. Cadet), III, 27.
 - » fabricada al instante, III, 26.
 - » de goma amoníaco (F. P.), II, 268.
 - » de magnesia (Mialhe), III, 27.
 - » mercurial de Plenck, III, 27.
 - » nitrada, III, 27.
 - » de plomo, III, 27.
 - » de pollo, III, 27.
 - » purgante (Planche), III, 27.
 - » sodatada, III, 27.
 - » trementinada, III, 27.
 - » con vainilla, III, 27.
 - » virginal, III, 27 y 28.
 - » virginal mineral, III, 28.
- Lejías, III, 28.
- Lejía de jaboneros, I, 339; II, 381.
- » litontríptica (Saunders), III, 28.
- Licores, III, 28.
- Licor acético de morfina (Dun-
glisson), III, 28.
- » acético de opio, III, 28.
 - » ácido de Haller (F. A.), III, 28.
 - » contra las aftas (Swediaur), III, 33.
 - » alcanforado, III, 28.
 - » aluminoso compuesto, III, 28.
 - » amoniacal anisado, IV, 68.
 - » amoniacal anisado (F. B.), III, 29.
 - » amoniacal benzóico, III, 29.
 - » amoniacal estibiado, III, 29.
 - » amoniacal mercurial (F. A.), II, 26.
 - » anodino (Triller), III, 29.
 - » anodino de Hoffmann, I, 190.
 - » anodino mineral (F. F.), II, 300.
 - » anodino mineral de Hoff-
man (F. E.), II, 300.

- Licor anodino nitroso, II, 300.
- » anodino vegetal, II, 298.
- » antiartrítico (Eller), II, 343.
- » anticanceroso (Kapeler), III, 29.
- » antidiarréico (William Kerr), III, 29.
- » antiespasmódico (Grimaud), III, 30.
- » antiepiléptico, III, 30.
- » antierético (Hufeland), III, 30.
- » antiescrofuloso (Hufeland), III, 30.
- » antiespasmódico (Pierquin), III, 30.
- » antiherpético, III, 30.
- » antinefrítico (Adams), III, 30.
- » antineurálgico (Batley), III, 30.
- » antisifilítico (Chaussier), III, 31.
- » antivenéreo (Spargenberg), III, 31.
- » antivenéreo (Richard de Autensierk), III, 31.
- » arsenical (Bielt), III, 31.
- » arsenical (Bishop), III, 31.
- » arsenical (Devergie), III, 31.
- » arsenical de Fowler, III, 31.
- » arsenical de Fowler (F. F.), III, 31.
- » arsenical de Fowler (H. DE M.), III, 31.
- » arsenical de Heim, III, 32.
- » arsenical de Heinecke, III, 31.
- » arsenical de Pearson (F. F.), III, 32.
- » artrítico de Pott, II, 296.
- » bitters de los holandeses, III, 35.
- » calmante de Chaussier, III, 32.
- » de canela, III, 32.
- » de carbonato de potasa, III, 32.
- » de carbonato de potasa (F. DE L.), I, 300.
- Licor caterético (Schmalz), III, 32.
- » cáustico (Freyberg), III, 32.
- » cáustico (Plenk), III, 32.
- » cítrico de morfina, III, 32.
- » de cloruro de calcio, I, 128.
- » de cloruro de plata amoniaca, III, 33.
- » cordial (Brodum), III, 33.
- » cordial (Wargner), III, 33.
- » de cuerno de ciervo sucinado, III, 33.
- » depurativo (François), III, 33.
- » depurativo (Koechlin), III, 34.
- » desinfectante de cloruro de óxido de sodio (Labarraque), III, 34.
- » diurético (J. P. Frank), III, 34.
- » del Dr. Porter, III, 32.
- » dorado, II, 228.
- » de enebro, III, 34.
- » contra la epistaxis (Swediaur), III, 33.
- » espiritoso de tierra foliada de tártaro, III, 37.
- » estíptico de Loof, III, 346.
- » exutorio de Swediaur, III, 71.
- » fundente (Hancke), III, 35.
- » de Gowland, III, 35.
- » hidrosulfurado ácido (F. A.), III, 36.
- » hidrosulfuroso para baños (F. A.), III, 35.
- » de jabon estibiado (Jacobi), IV, 70.
- » de madama Amphoux, IV, 8.
- » mercurial (F. A.), II, 26.
- » mercurial alcanforado (H. DE AL.), III, 35.
- » mercurial normal (Mialhe), III, 35.
- » de mirra (F. B.), III, 35.
- » de muriato de cal, III, 36.
- » nervino de Pereboom, II, 64.
- » de nitro alcanforado (Baumé), III, 36.
- » de potasa (H. I.), III, 36.

- Licor de Pressavin, III, 36.
- » probatorio de Hanhemann, III, 36.
 - » refrigerante (Cottureau), III, 36.
 - » sedante de opio (Battley), III, 37.
 - » de los tiñosos, IV, 89.
 - » de Van Swieten (F. F.), III, 37.
 - » de Van Swieten (H. DE M.), III, 37.
 - » de Van Swieten (F. P.), III, 37.
 - » de Van Swieten reformado (Mialhe), III, 37.
 - » de Vattebled contra los callos, III, 37.
 - » vegetal mercurial de Pressavin, I, 264.
 - » vinoso de amoníaco, II, 46.
 - » vital (J. Rucco de Nápoles), III, 38.
 - » contra el vómito de las preñadas (Pigeaux), III, 33.
 - » de Warner, III, 37.
- Ligaduras, I, 234.
- Lilium de Paracelso, IV, 90.
- Limaduras de estaño, I, 186.
- » de estaño (F. F.), III, 442.
 - » de hierro, I, 214.
 - » de hierro porfirizadas (F. F.), III, 454.
 - » de hierro preparadas (F. F.), III, 454.
- Limonadas, III, 38.
- Limonada, I, 235.
- » de ácido cítrico, I, 64.
 - » de ácido fosfórico, I, 195.
 - » de ácido láctico, I, 64.
 - » de ácido nítrico, I, 106.
 - » de ácido oxálico, I, 64.
 - » de ácido tártrico, I, 65.
 - » alcohólica, III, 38.
 - » aluminosa, III, 38.
 - » de borotartrato de magnesia, III, 44.
 - » de citrato de magnesia (Cadet), III, 42.
 - » de citrato de magnesia (Garot), III, 38 y 42.
 - » cítrica, III, 38.
- Limonada cítrica vinosa, III, 39.
- » clorhídrica (Martin Solon), III, 39.
 - » cocida, III, 44.
 - » compuesta, III, 39.
 - » comun (H. M.), III, 39.
 - » de crémor de tártaro, III, 39.
 - » emetizada, III, 39.
 - » ferruginosa y astringente, III, 39.
 - » gaseosa, II, 29; III, 40.
 - » gaseosa acidula, III, 40.
 - » gaseosa iodurada, II, 28.
 - » gaseosa iodurada (Mialhe), III, 40.
 - » gaseosa líquida (Chatard), III, 40.
 - » gaseosa en polvo, III, 41.
 - » de grosellas, I, 208.
 - » láctica, III, 41.
 - » laxante, III, 41.
 - » magnésiana (Mialhe), III, 41.
 - » de manito, III, 41.
 - » mineral, III, 43.
 - » muriática, III, 41.
 - » nítrica (Forget), III, 42.
 - » nítrica (H. M.), III, 42.
 - » nítrica (H. DE M.), III, 42.
 - » de oxálide de tallo grueso, I, 281.
 - » purgante de citrato de magnesia (Garot), III, 42.
 - » purgante gaseosa, III, 42.
 - » purgante gaseosa en polvo (Cadet), III, 42.
 - » seca (Fascio), III, 43.
 - » seca gaseosa, III, 450.
 - » seca para viajeros, III, 43.
 - » solutiva (F. P.), II, 359; III, 43.
 - » sulfúrica, III, 43.
 - » sulfúrica (H. M.), III, 43.
 - » sulfúrica hordeada (H. DE M.), III, 44.
 - » sulfúrica simple (H. DE M.), III, 44.
 - » de tartrato de magnesia (Garnier), III, 44.
 - » tártrica (F. F.), III, 44.
 - » tártrica seca (H. DE AL.), III, 44.

- Limonada vegetal, III, 44.
 » vegetal comun, III, 39.
 » vinosa, III, 44.
 » vinosa alcohólica, III, 44.
 Linimentos, III, 45.
 Linimento de aceite de croton,
 III, 45.
 » de aconitina, I, 66.
 » de aconitina (Turnbull), III,
 45.
 » afrodisiaco, III, 45.
 » de ajo, III, 45.
 » alcalino (Plenk), III, 45.
 » alcanforado (F. F.), II, 5.
 » de alcanfor (F. DE L.), III, 46.
 » alcanforado (Fournier), III,
 45.
 » alcanforado (F. P.), II, 5.
 » alcanforado (H. DE M.), III,
 45.
 » alcanforado (H. M.), III, 46.
 » alcanforado (Vaidy), III, 46.
 » alcanforado anodino (H. DE
 M.), III, 46.
 » alcanforado y opiado, III, 46.
 » alcanforado y opiado (Leva-
 cher), III, 46.
 » contra las almorranas, III,
 54.
 » aluminoso, III, 46.
 » amigdalino, III, 455.
 » amoniacal (F. E.), III, 46.
 » amoniacal (F. F.), III, 46.
 » amoniacal (F. P.), III, 46.
 » amoniacal (H. DE M.), III, 46,
 » amoniacal alcanforado (H. DE
 M.), III, 47.
 » amoniacal cantaridado, III,
 47.
 » amoniacal cantaridado (H. DE
 IT.), III, 47.
 » amoniacal estibiado, III, 47.
 » amoniacal fétido, III, 47.
 » amoniacal con petróleo, III,
 47.
 » amoniacal de nuez vómica,
 III, 47.
 » amoniacal sulfurado, III, 47.
 » amoniacal trementinado, III,
 47.
 » anodino, III, 48.
 » anodino (Boyer), III, 48.
 Linimento anodino (Cazenave),
 III, 48.
 » anodino y resolutivo (Du-
 puytren), III, 48.
 » anodino (F. P.), III, 63.
 » anodino (H. M.), III, 48.
 » antiastoso, III, 48.
 » antiartrítico, III, 48.
 » antiartrítico (Desbois de Ro-
 chefort), III, 48.
 » antiartrítico (Home), III, 49.
 » antiartrítico (Turck), III, 49,
 » antiasmático (Graves), III,
 49.
 » anticolérico, III, 49,
 » antiepsórico, III, 49.
 » antiepsórico (H. DE IT.), III,
 49.
 » antiescrofuloso de Roncalli,
 III, 68.
 » antiespasmódico (Chrestien),
 III, 50.
 » antiespasmódico (Siebold),
 III, 50.
 » antiespasmódico (Weber),
 III, 50.
 » antiespasmódico de Selle (H.
 DE M.), III, 49.
 » antigotoso (Boubee), III,
 50.
 » antihelmíntico, III, 50.
 » antihelmíntico (Brera), III,
 50.
 » antihelmíntico (Dubois), III,
 50.
 » antihemorroidal (Andry),
 III, 50.
 » antihemorroidal (H. DE M.),
 III, 51.
 » antihemorroidal (H. M.), III,
 50.
 » antihemorroidal (Ware), III,
 51.
 » antiherpético (Neumann),
 III, 49.
 » antineurálgico (Jung), III,
 50.
 » antineuropático (Dr. Ran-
 que), III, 51; IV, 134.
 » antioftálmico (Plenk), III,
 51.
 » antiperiódico, III, 51.

- Linimento antiperiódico (Schuster), III, 51.
- » antireumático (H. DE M.), III, 51.
- » antireumático (Tortual), III, 51.
- » antiséptico (Behrends), III, 51.
- » antivenéreo, III, 64.
- » aromático, III, 52.
- » aromático (Rosen), III, 52.
- » arsenical (Knachstedt), III, 52.
- » arsenical (Swediaur), III, 52.
- » contra las ascitis (Lippich), III, 54.
- » astringente (Schwartz), III, 52.
- » balsámico (Dennemann), III, 52.
- » barítico, III, 52.
- » de Baumes, III, 52.
- » de Beck, III, 52.
- » de belladona (Sordet), III, 52.
- » de benjuí, III, 53.
- » boratado (Harless), III, 53.
- » calcáreo (F. F.), III, 53.
- » calmante, III, 53.
- » calmante (Jung), III, 53.
- » calmante (Reveillé Parissé), III, 55.
- » calmante y resolutivo (Boyer), III, 53.
- » cantaridado, III, 53.
- » de carburo de azufre, III, 53.
- » carminativo (Writt), III, 54.
- » cianurado (Caspari), III, 54.
- » cloroso (Deimann), III, 54.
- » clorurado (Kopp), III, 54.
- » contra el cólera adinámico (Ranque), III, 54.
- » confortante (Dubois), III, 54.
- » contra la corea (Chrestien), III, 54.
- » de Desade, III, 57.
- » desecante y calmante, III, 57.
- » de digital, III, 57.
- Linimento diurético, III, 57.
- » diurético (H. DE IT.), III, 57.
- » diurético (Kiesser), III, 57.
- » diurético (Bullier), III, 57.
- » diurético (Rullier), III, 57.
- » diurético (Schubart), III, 57.
- » diurético (Schmitt), III, 58.
- » diurético compuesto, III, 58.
- » del Dr. Rast, III, 66.
- » dulcificante (Radius), III, 58.
- » emoliente (H. DE M.), III, 58.
- » epilatorio de Pierquin, III, 58.
- » escitodépsico, III, 54.
- » contra las escoriaciones, III, 54.
- » espirituoso anodino, III, 59.
- » espirituoso anodino (Schmith), III, 59.
- » estimulante, III, 58.
- » estimulante (Fievue), III, 56.
- » estimulante (Magendie), III, 59.
- » estimulante balsámico (Reil), III, 59.
- » estimulante inglés, III, 58.
- » estimulante opiado (Fahnestock), III, 57.
- » estimulante resolutivo, III, 59.
- » estimulante rubefaciente (Petit), III, 59.
- » de estriquina, I, 188; III, 59.
- » de estriquina (Furnari), III, 59.
- » etéreo de trementina, III, 59.
- » excitante, III, 58 y 60.
- » excitante (Graeffe), III, 60.
- » excitante (H. DE AL.), III, 60.
- » excitante (H. M. F.), III, 60.
- » excitante cantaridado (Chomel), III, 60.

- Linimento excitante cantaridado (H. M. F.), III, 60.
- » excitante trementinado, III, 60.
- » excitante trementinado (H. DE AL.), III, 60.
- » de extracto de belladona, III, 60.
- » febrifugo (Bellecontre), III, 60.
- » fortificante (Double), III, 61.
- » de fosfato de amoniaco, I, 86.
- » fosforado, III, 61.
- » fosforado (Gerdessen), III, 61.
- » fosforado (Gorden), III, 61.
- » fosforado amoniacal, III, 61.
- » de goma amoniaco, III, 61.
- » contra la gota, III, 55.
- » contra las grietas de los pezones (H. DE AL.), III, 55.
- » de Henschel, III, 61.
- » contra las hidropesías, III, 55.
- » contra la hidropesía pasiva del tegido celular (Dupuytren), IV, 139.
- » contra la hipertrofia del bazo, III, 55.
- » de Hufeland, III, 61.
- » húngaro, III, 61.
- » contra la inflamacion de los cartilagos y de los párpados, III, 55.
- » iodado, III, 62.
- » de iodo (Mac Diarmid), III, 62.
- » irritante, I, 57.
- » irritante cantaridado, III, 62.
- » de jabon compuesto (F. DE L.), III, 62.
- » jabonoso, III, 62.
- » jabonoso (F. E.), II, 46.
- » jabonoso (F. F.), III, 62.
- » jabonoso (Koempf), III, 63.
- » jabonoso alcanforado (Ferrer), III, 62.
- » jabonoso alcanforado (F. N. P.), III, 62.
- Linimento jabonoso hidrosulfurado (F. F.), III, 63.
- » jabonoso iodurado (Dr. Moraes), III, 63.
- » jabonoso opiado (F. P.), III, 63.
- » jabonoso trementin. (Jack), III, 63.
- » de los judíos, III, 63.
- » de Kentish, III, 67.
- » laudanizado, III, 63.
- » mamilar (Dennemann), III, 64.
- » mamilar (Hacless), III, 64.
- » mamilar (Ribke), III, 64.
- » mercurial (Most), III, 64.
- » mercurial amoniacal (H. DE M.), III, 64.
- » mercurial amoniacal alcanforado (H. DE M.), III, 64.
- » mercurial compuesto (F. DE L.), III, 64.
- » mercurial opiado, III, 64.
- » muriático compuesto, III, 64.
- » de Mustard, III, 64.
- » narcótico, III, 65.
- » narcótico (F. F.), III, 65.
- » negro (Schmucker), III, 65.
- » de Neumann, III, 65.
- » contra las neuralgias (Pearson), III, 56.
- » nitro alcanforado (J. Frank), III, 65.
- » de nuez vónica, I, 276.
- » obstétrico, III, 65.
- » oftálmico (Magne), III, 65.
- » oleoso compuesto, III, 65.
- » oleozincado (Meyer), III, 65.
- » opiado, III, 66.
- » de opio (F. DE L.), III, 66.
- » paregórico, III, 66.
- » de Pissier, III, 66.
- » purgante, III, 66.
- » purgante (Moll), III, 66.
- » contra las quemaduras (Bourge), III, 55.
- » para quemaduras (H. DE M.), III, 55.
- » contra las quemaduras (H. M.), III, 55.

- Linimento de Reil , III , 66.
- » resolutivo , III , 66 y 67.
 - » resolutivo (Becker) , III , 67.
 - » resolutivo (F. DE S.) , II , 296.
 - » resolutivo (Frank) , III , 67.
 - » resolutivo (Grekler) , III , 67.
 - » resolutivo (Hufeland) , III , 67.
 - » resolutivo (Pott) , III , 67.
 - » resolutivo alcanforado , III , 67.
 - » resolutivo y estimulante (Stoll) , III , 68.
 - » resolutivo con petróleo (Tott) , III , 67.
 - » resolutivo de Pott (H. DE M.) , III , 67.
 - » contra los reumatismos (Reveillé Parissé) , III , 55.
 - » de Richardin , III , 68.
 - » de Roncalli , III , 68.
 - » de Rosen , III , 68.
 - » rubefaciente , III , 66 y 68.
 - » contra los sabañones , III , 56.
 - » contra los sabañones (Berton) , III , 56.
 - » contra los sabañones (Cottereau y Verdé Delisle) , III , 56.
 - » contra los sabañones (Richardin) , III , 56.
 - » contra los sabañones inminentes , III , 56.
 - » sedante , III , 68.
 - » sedante (Cottereau) , III , 69.
 - » sedante (H. DE M.) , III , 65.
 - » sedante (Trousseau) , III , 69.
 - » sedante con láudano , III , 69.
 - » de sesquicarbonato de amoníaco (F. DE L.) , III , 53.
 - » de Siebold , III , 69.
 - » sinapizado , III , 69.
 - » de Schuster , III , 69.
 - » de Stokes , III , 69.
 - » sulfúrico (Brodie) , III , 69.
 - » de sulfuro de antimonio (Radius) , III , 69.
 - » de sulfuro de cal , III , 69.
- Linimento de sulfuro de calcio , I , 130.
- » de sulfuro de carbono , I , 109.
 - » de sulfuro de carbono alcanforado (H. DE AL.) , III , 70.
 - » de sulfuro de carbono alcanforado (Wutzer y Pellengam) , III , 70.
 - » de sulfuro de potasa , I , 305.
 - » de sulfuro de sosa , I , 340.
 - » de tanato de plomo (José Leon) , III , 70.
 - » con la tintura de cantáridas y alcanfor , III , 70.
 - » contra la tiña (Pourche) , III , 56.
 - » contra la tiña (Sydenham) , III , 57.
 - » trementinado , III , 70.
 - » trementinado (Bellecontre) , III , 60.
 - » trementinado (F. DE L.) , III , 70.
 - » trementinado (Recamier) , IV , 142.
 - » trementinado opiado , III , 70.
 - » de Valentin , III , 70.
 - » de valerianato de quinina , I , 315.
 - » de verde gris (F. DE L.) , III , 71.
 - » de veratrina , I , 355.
 - » de veratrina (Turnbull) , III , 70 y 71.
 - » de veratrina é ioduro de potasio (Turnbull) , III , 70.
 - » de veratrina y mercurio , III , 71.
 - » vermífugo (Petrequin) , III , 71.
 - » vexicante , III , 71.
 - » vinoso balsámico (Meyer) , III , 71.
 - » volátil (F. E.) , III , 46.
 - » volátil (F. F.) , III , 46.
 - » volátil (F. P.) , III , 46.
 - » volátil alcanforado y opiado , III , 71.

- Linimento volátil de Plenck, III, 71.
- » de Whiteread, III, 72.
 - » de Wilkinson, III, 72.
- Litontríptico de Tulp, III, 130.
- Lociones, III, 72.
- Locion aceitosa, III, 72.
- » de acetato de amoniaco, III, 72.
 - » ácida, III, 72 y 82.
 - » de ácido clorhídrico, I, 153.
 - » de ácido clorhidronítrico, I, 154.
 - » de ácido muriático (Sundelin), III, 72.
 - » alcalina, III, 72.
 - » alcalina (F. F.), III, 72.
 - » alcalina sulfurosa (Blasius), III, 72.
 - » alcanforada, III, 72.
 - » alcohólica (Swediaur), III, 73.
 - » alcohólica jabonosa, III, 73.
 - » aloética, III, 73.
 - » aluminosa, III, 73.
 - » aluminosa y sulfurosa (Gall), III, 73.
 - » amoniacal, III, 73.
 - » anticancerosa, III, 73.
 - » anticancerosa (Rust), III, 73.
 - » antiépsórica, III, 73.
 - » antiépsórica (Cazenave), III, 74.
 - » antiépsórica (H. M.), III, 73.
 - » antiépsórica (H. DE SAN LUIS DE PARÍS), III, 74.
 - » antiépsórica de agua de cal (Pii), III, 74.
 - » antiépsórica de Dupuytren (H. DE M.), III, 74.
 - » antiherpética (Bielt), III, 74.
 - » antiherpética (Wenzel), III, 74.
 - » antisifilitica (Richard), III, 74.
 - » antiséptica, III, 74.
 - » aromática, III, 74.
 - » aromática alcoholizada (Cazenave), III, 74.
 - » aromática jabonosa, III, 75.
- Locion astringente, III, 75.
- » astringente (Bell), III, 75.
 - » astringente (Guepin), III, 75.
 - » astringente con agua de cal, III, 75.
 - » astringente alcohólica, III, 75.
 - » astringente alcoholiz. (Hey), III, 75.
 - » astringente y antiherpética (Alibert), III, 75.
 - » astringente opiada, III, 76.
 - » de azufre, I, 107.
 - » de Barlow, III, 76.
 - » de beleño, III, 76.
 - » de bistorta, I, 121.
 - » de borato de sosa (Hufeland), III, 76.
 - » de borax, I, 122.
 - » contra la caída de los cabellos, III, 76.
 - » calcárea y opiada, III, 76.
 - » calmante, I, 232; III, 76.
 - » calmante (Trousseau), III, 76.
 - » de Cazenave, III, 76.
 - » cianhídrica de Magendie, III, 76.
 - » cianurada (Cazenave), III, 76.
 - » de clorito de cal, III, 76.
 - » de cloruro de manganeso, I, 245.
 - » de cloruro de zinc, I, 363.
 - » cosmética (Laforest), III, 78.
 - » cosmética (Pierquin), III, 79.
 - » de deutocloruro de mercurio, I, 258.
 - » diurética, III, 79.
 - » de eléboro (Swediaur), III, 79.
 - » de esencia de trementina, I, 183.
 - » estimulante, III, 79.
 - » estimulante (Sachse), III, 79.
 - » estimulante (Saviard), III, 79.
 - » excitante, III, 79.
 - » excitante y cáustica (Alibert), III, 79.

- Locion excitante (Helmschel), III, 79.
- » de extracto de ratania (Trousseau), III, 79.
- » febrífuga (Guatánica), III, 80.
- » fuliginosa, III, 80.
- » contra los gánglios (Ricord), III, 77.
- » gomosa y mercurial (Frank), III, 80.
- » de Gowland, III, 35.
- » de Guerlain, III, 80.
- » de Henry, III, 80.
- » hidrocianica (Magendie), III, 80.
- » hidrosulfurada (Dupuytren), III, 80.
- » con las hojas de nogal (Negrer), III, 80.
- » iodada, III, 81.
- » ioclorurada (Rhigini), III, 81.
- » iodurada (Ricord), II, 338.
- » iodurada contra la sarna (Cazenave), III, 81.
- » ioduro sulfurosa (Dauvergne), III, 80.
- » de jabon, III, 81.
- » contra el líquen y eczema crónicos (Bielt), III, 77.
- » litontriptica, III, 81.
- » mercurial (Adams), III, 81.
- » mercurial (Alibert), II, 38.
- » mercurial (Cazenave), III, 81.
- » mercurial (Maury), III, 81.
- » mercurial (Rust), III, 81.
- » mercurial alcohólica (Baumes), III, 81.
- » mercurial antiherp. (Trousseau), III, 82.
- » mucilaginoso, III, 82.
- » mundificante (Boerhaave), III, 82.
- » muriatada, III, 82.
- » muriática, III, 82.
- » narcótica, III, 82.
- » contra la neuralgia facial (Bermet), III, 77.
- » nítrica, III, 82.
- » opiada, III, 82.
- Locion de petróleo, III, 82.
- » contra la pitiriasis versicolor (Bielt), III, 77.
- » contra los pólipos de las fosas nasales (Dallavay), III, 77.
- » purgante, III, 82.
- » contra el prurito de la vulva, III, 77.
- » de ratania, I, 317; III, 82.
- » resolutive, III, 83.
- » rubefaciente, III, 83.
- » rubefaciente estibiada, III, 83.
- » contra los sabañones, III, 77.
- » contra los sabañones (Brugnatelli), III, 77.
- » contra los sabañones no ulcerados, III, 77.
- » contra la sarna, III, 77.
- » contra la sarna (Dornblueth), III, 78.
- » contra la sarna (Dupuytren), III, 78.
- » contra la sarna (Maury), III, 78.
- » saturnina, III, 83.
- » de saúco con alcohol alcanforado, III, 83.
- » de Schard, III, 83.
- » de sublimado (Trousseau), III, 83.
- » de sulfato de hierro, I, 221.
- » sulfojabonosa, III, 83.
- » sulfurosa, III, 84.
- » sulfurosa (Dupuytren), III, 80 y 84.
- » sulfurosa (H. DE M.), III, 84.
- » sulfurosa alcanforada (Rust), III, 84.
- » sulfurosa alcalina (H. DE M.), III, 84.
- » de sulfuro de potasa, I, 305.
- » de sulfuro de sosa, I, 340.
- » contra la tiña, III, 78.
- » contra la tiña y herpes (H. DE M.), III, 78.
- » trementinada, III, 84.
- » contra las úlceras venéreas (Gibert), III, 78.
- » con vinagre, III, 84.

- Locion vinosa, III, 85.
 » de zinc, III, 85.
 Lodos minerales, I, 238.
 Loccs, III, 85.
 Looc aceitoso (F. F.), III, 85.
 » aceitoso emético, III, 85.
 » alcanforado, III, 85.
 » alcanforado y nitrado, III, 85.
 » de almendras sucinado, III, 85.
 » de almidon (F. P.), III, 85.
 » amarillo, III, 85.
 » amigdalino, III, 86.
 » anisado, III, 86.
 » anisado con jarabe de ipecacuana, III, 86.
 » anisado para los niños, III, 86.
 » anodino alcanforado (H. DE M.), III, 86.
 » antihelmíntico, III, 86.
 » astringente (F. N. P.), III, 86.
 » astringente (Swediaur), III, 86.
 » de azafran (F. F. ANT.), III, 91.
 » blanco (F. F.), III, 87.
 » blanco (H. DE M.), III, 87.
 » balsámico, III, 87.
 » calmante, III, 87.
 » calmante de agua de cal (Radius), III, 87.
 » de cañamones, III, 87.
 » de catecú y almidon, III, 87.
 » cidoniado, III, 88.
 » compuesto, III, 88.
 » contraestimulante, III, 88.
 » contraestimulante (Trousseau), III, 88.
 » dulcificante (Gaubius), III, 88.
 » escilítico, III, 88.
 » expectorante, III, 88.
 » expectorante (Babeyrac), III, 88.
 » expectorante (Roucher), III, 88.
 » expectorante de ácido benzoico, III, 88.
 Looc expectorante é incisivo (Astruc), III, 89.
 » de goma arábica (F. N. P.), III, 89.
 » gomoso, III, 89.
 » de Gordon, III, 89.
 » de huevo, III, 85.
 » de huevo (F. F. ANT.), III, 89.
 » incrasante (Gaubius), III, 89.
 » jabonoso (F. ED.), III, 89.
 » de J. P. Frank, III, 89.
 » laxante para los niños, III, 89.
 » de naftalina, I, 272.
 » de naftalina (Dupasquier), III, 89.
 » contra la neumonía (Trousseau), III, 88.
 » opiado, III, 90.
 » pectoral (Berends), III, 90.
 » pectoral (Frank), III, 90.
 » pectoral (H. DE AL.), III, 90.
 » pectoral (Preziozi), III, 90.
 » pectoral sulfuro antimoniado, III, 90.
 » purgante, III, 90 y 378.
 » purgante de croton, III, 91.
 » purgante con tártago, III, 90.
 » quermetizado, III, 91.
 » quermetizado alcanforado, III, 91.
 » de resineona compuesto, III, 91.
 » de resineona simple, III, 91.
 » rojo, III, 91.
 » sólido (Gallot), III, 91.
 » trementinado (H. DE M.), III, 91.
 » trementinado (Recamier), III, 91; IV, 142.
 » verde (F. F. ANT.), III, 91.
 » vermífugo, III, 92.
 » de yedra escarchada, III, 92.

M.

- Macarrones purgantes, II, 85.
Maceraciones, III, 92.
Maceracion amarga (Plisson), III, 92.
Macerado de álamo negro, I, 73.
» antihistérico (Souberbielle), III, 92.
» de bistorta, I, 121.
» calcáreo de zarzaparrilla (O. Beirne), III, 92.
» de genciana, I, 201.
» de gordolobo, I, 206.
» de lino, I, 236.
» de polígala vulgar, I, 298.
» de rapóntico de los Alpes, I, 316.
» de ruibarbo, I, 321.
Malato de manganeso, I, 437.
Manganeso, I, 433.
Maniluvios, III, 92.
Manjar blanco, II, 384.
Manteca de belladona y Saturno (Dupuytren), III, 493.
» de cacao, I, 125.
» de nuez moscada, I, 275.
» de ruda (F. E.), IV, 178.
» de Saturno (F. E.), IV, 158.
Mantequilla de papel, III, 149.
Marrasquino de Zara, IV, 9.
Marrubina, I, 439.
Marrubio, I, 439.
Martillo de Mayor, I, 439.
Masas, III, 93.
Masa odontálgica (Handel), II, 239.
» odontálgica (Henry), III, 93.
» odontálgica (Vogler), III, 93.
Masticatorios, III, 93.
Masticatorio aromático, III, 93.
» egipcio (Demócrates), IV, 155.
» indiano, III, 93.
» irritante, III, 93.
» de pelitre, I, 285.
Mático, I, 439.
Medicamentos afrodisiacos, I, 385.
» alterantes, I, 368.
» amargos, I, 368.
» anodinos, I, 390.
» antiepsóricos, I, 392.
» antiescorbúticos, I, 394.
» antiescrofulosos, I, 394.
» antispasmódicos, I, 385.
» antibelmínticos, I, 395.
» antiraquíuticos, I, 394.
» antisifilíticos, I, 391.
» astringentes, I, 370.
» atemperantes, I, 388.
» calmantes, I, 390.
» catárticos, I, 377.
» debilitantes, I, 387.
» dentífricos, I, 396.
» depurativos, I, 368.
» deterivos, I, 370.
» estimulantes generales, I, 372.
» diaforéticos, I, 381.
» diuréticos, I, 379.
» drásticos, I, 378.
» emolientes, I, 388.
» emenagogos, I, 385.
» emetocatórticos, I, 376.
» eméticos, I, 376.
» específicos, I, 391.
» específicos de las afecciones cutáneas, I, 392.
» específicos de las afecciones sífilíticas, I, 391.
» específicos de las afecciones escrofulosas, I, 394.
» específicos de las afecciones escorbúticas, I, 394.
» específicos de las afecciones periódicas, I, 393.
» específicos de las afecciones verminosas, I, 395.
» expectorantes, I, 382.
» estimulantes, I, 372.
» estimulantes del aparato absorbente, I, 383.
» estimulantes del aparato circulatorio, I, 379.

- Medicamentos estimulantes del aparato digestivo, I, 376.
- » estimulantes del aparato respiratorio, I, 379.
- » estimulantes del aparato secretorio, I, 379.
- » estimulantes para el moco nasal, I, 381.
- » estimulantes especiales, I, 376.
- » estimulantes especiales de la matriz, I, 385.
- » estimulantes irritantes, I, 386.
- » estimulantes de la exhalación cutánea, I, 381.
- » estimulantes de las exhalaciones pulmonar ó bronquial, I, 382.
- » estimulantes de los órganos genitales, I, 385.
- » estimulantes de los órganos génito-uritarios del hombre y de la mujer, I, 385.
- » estimulantes propiamente dichos, I, 383.
- » estimulantes del sistema nervioso, I, 383.
- » estípticos, I, 370.
- » estornutatorios, I, 381.
- » febrifugos, I, 393.
- » fundentes, I, 383.
- » hemostáticos, I, 370.
- » hipnóticos, I, 390.
- » irritantes, I, 386.
- » laxantes, I, 377.
- » odontálgicos, I, 396.
- » narcóticos, I, 390.
- » purgantes, I, 377.
- » resolutivos, I, 370.
- » revulsivos, I, 386.
- » rubefacientes, I, 386.
- » sedantes, I, 390.
- » sialagogos, I, 379.
- » sudoríficos, I, 381.
- » vejigatorios, I, 387.
- » vermífugos, I, 395.
- » vexicantes, I, 387.
- » vomitivos, I, 376.
- » tónicos, I, 368.
- Medicinas, III, 93.
- Medicina blanca (Mialhe), III, 94.
- Medicina de café, III, 93.
- » comun (H. M. F.), III, 376.
- » del cura Deuil, IV, 117.
- » de magnesia (Mialhe), III, 94.
- » de maná con frambuesas, III, 93.
- » de Napoleon (Corvisart), III, 94.
- » de ruibarbo, IV, 118.
- Medios dietéticos, I, 387.
- » hemostáticos, I, 249.
- » higiénicos, I, 387.
- » quirúrgicos, I, 388.
- Melito de celedonia, III, 102.
- » de elaterio, III, 102.
- » de escila (F. F.), III, 102.
- » de mercurial (F. F.), III, 102.
- » de rábano rusticano, III, 104.
- » de rosas rojas (F. F.), III, 104.
- » simple (F. F.), III, 101.
- Memorial terapéutico, IV, 347.
- Mercurio animalizado, I, 429.
- Mermeladas, III, 94.
- Mermelada de albaricoques, III, 94.
- » antiescorbútica, III, 95.
- » astringente, III, 95.
- » astringente (Olier), III, 95.
- » benzóica, III, 95.
- » contra los catarros crónicos, III, 95.
- » de ciruelas, III, 94.
- » estimulante, III, 95.
- » expectorante de benjuí, III, 95.
- » expectorante, III, 95.
- » de gengibre, III, 95.
- » jabonosa, III, 95.
- » de melocotones, III, 94.
- » pectoral (Vergnes), III, 95.
- » de Rosen, III, 95.
- » sucinada, III, 96.
- » de Tronchin, III, 96.
- » de Zanetti, III, 96.
- Mezclas, III, 96.
- Mezcla acústica (Richter), III, 96.
- » anticancerosa (Rust), III, 96.

- Mezcla anticatarral (Richter), III, 96.
- » antiespasmódica (Arms-
trong), III, 96.
- » antiespasmódica (Blache),
III, 97.
- » antiespasmódica (Most), III,
97.
- » antileucorréica (Neumann),
III, 97.
- » antiodontálgica (Toirac), III,
97.
- » antisifilítica (Pihorel), III,
97.
- » para los aparatos inmovi-
bles, III, 101.
- » balsámica (Smith), III, 97.
- » de cianuro de zinc (Magen-
die), III, 97.
- » para desengrasar las telas
de seda, III, 99.
- » desinfectante (Knod), III,
98.
- » desinfectante (Siret), III,
97.
- » emenagoga de Mansfeld, I,
109; III, 98.
- » frigorífica, III, 98.
- » frigoríficas (Boutigni de Eu),
III, 98.
- » para fumar (Trousseau), III,
99.
- » para lociones (Biett), III,
99 y 100.
- » para lociones (Cazenave),
III, 100.
- » para lociones (Magendie),
III, 100.
- » marcial, IV, 170.
- » mercurial (Cazenave), III,
99.
- » mercurial (Velpeau), III,
99.
- » odontálgica (Rust), III, 99.
- » oleoseminapizada (P. Frank),
III, 99.
- » pectoral (Magendie), III,
100.
- » pectoral (Santa María), III,
100.
- » pectoral (Villermé), III,
100.
- Mezcla pulverulenta, III, 101.
- » refrigerante inglesa (Vau-
quelin), III, 99.
- » resolutive (Becker), III,
101.
- » contra la tiña (Blaud), III,
97.
- » vomitiva, I, 177.
- » vomitiva (Magendie), III,
101.
- Mieles, III, 101.
- Miel antisifilítica (F. N. P.), III,
101.
- » de bayas de saúco (F. E.),
III, 104.
- » de borax (F. P.), III, 102.
- » de cebolla albarrana, I, 145.
- » de colchico, I, 159.
- » de colchico (F. F.), III, 102.
- » de elaterio, I, 174.
- » de escila compuesta, III,
102.
- » escilítica (F. F.), III, 102.
- » mercurial, I, 253.
- » mercurial (F. F.), III, 102.
- » mercurial (Swediaur), III,
103.
- » mercurial compuesta, I, 253;
III, 103.
- » mercurial compuesta (F. F.),
III, 102.
- » mercurial dulce (Swediaur),
III, 103.
- » de moras (F. E.), III, 103.
- » con protoioduro de mercu-
rio (Biett), III, 104.
- » de quinina (Petzold), III,
104.
- » de romero, III, 102 y 104.
- » rosada, I, 320.
- » rosada (F. E.), III, 105.
- » rosada (F. F.), III, 104.
- » de rosas rojas (F. E.), III,
105.
- » rosada trementinada, III,
104.
- » de salvia (Neuver), III,
104.
- » trementinada (Recamier),
III, 104.
- » de vinagre (F. E.), III, 141.
- » de vinagre (F. F.), III, 141.

- Miel de vinagre (F. P.), III, 141.
- » de vinagre de cebolla albarana (F. E.), III, 141.
 - » de vinagre de cólchico (F. E.), II, 141.
 - » violada, III, 105.
 - » de violetas, I, 358; III, 105.
- Misturas, III, 105.
- Mistura absorvente, III, 105.
- » absorvente aromática (Ring), III, 105.
 - » con aceite etéreo de cornezuelo de centeno (Bonjean y Wright), III, 105.
 - » de aceite de hígado de bacalao (Roesch), III, 105.
 - » de aceite de hígado de bacalao (Rayer), III, 106.
 - » acética (Sundelin), III, 106.
 - » aceitosa calmante (H. DE AL.), III, 106.
 - » ácida, III, 106.
 - » ácida (H. DE AL.), III, 106.
 - » ácida (Selle), III, 106.
 - » ácida con canela (Most), III, 106.
 - » ácida contra las disenterias rebeldes (Malgaine), III, 106.
 - » ácida opiada (Most), III, 106.
 - » de ácido benzóico (Sundelin), III, 107.
 - » con ácido fosfórico (Sundelin), III, 107.
 - » contra las aftas, III, 120.
 - » de aguardiente (F. DE L.), III, 107.
 - » alcalina (Bielt), III, 107.
 - » alcalina de aceite de hígado de bacalao, III, 107.
 - » alcanforada (F. E.), II, 456.
 - » alcanforada (H. DE ING.), III, 107.
 - » alcanforada compuesta (Duncan), III, 107.
 - » de almendras dulces (F. DE L.), III, 107.
 - » almizclada (F. E.), III, 107.
 - » de almizcle (F. DE L.), III, 108.
 - » aloética, III, 108.
- Mistura aloética diurética (Cruveilhier), III, 108.
- » de amoniaco (H. DE AL.), III, 108.
 - » amoniaco mercurial (Blanc), III, 108.
 - » analéptica (Lewis), III, 108.
 - » antiácida y absorvente (Delle), III, 108.
 - » antiartrítica (Augustin), III, 108.
 - » antiartrítica (Burdach), III, 108.
 - » antiblenorrágica (Eissenmann), III, 109.
 - » antiblenorrágica (Lise-mann), III, 109.
 - » anticatarral (Hufeland), III, 109.
 - » anticatarral rusa, III, 109.
 - » anticolérica, III, 109.
 - » anticolérica (Banc), III, 109.
 - » anticefálica (Schultz), III, 109.
 - » antidiarréica (Foy), II, 226.
 - » antidiarréica (Lentin), III, 109.
 - » antidiarréica (Mialhe), III, 109.
 - » antidisentérica (Richter), III, 110.
 - » antidisentérica (Swediaur), III, 110.
 - » antiemética (F. E.), III, 110.
 - » antiemética (H. DE M.), III, 110.
 - » antiepiléptica (Tott), III, 110.
 - » antiescorbútica, III, 110.
 - » antiescorbútica (Neumann), III, 110.
 - » antiescorbútica (Remer), III, 111.
 - » antiescrofulosa, III, 110.
 - » antiespasmódica (Arns-trong), III, 110.
 - » antiespasmódica (Blache), III, 111.
 - » antiespasmódica (Clarus), III, 111.
 - » antiespasmódica (Dumeril), III, 111.

- Mistura antiespasm. (J. Frank), III, 111.
- » antiespasmódica (Kuenzli), III, 111.
- » antiespasmódica (Sydenham), III, 111.
- » antiespasmódica anodina (H. DE M.), III, 111.
- » antiespasmódica simple (H. DE M.), III, 110.
- » antihelmíntica, III, 111.
- » antihemorrágica (Gall), III, 111.
- » antihidrópica (Morries), III, 112.
- » antihidrópica (Rust), III, 112.
- » antihistérica, III, 112.
- » antihistérica (Foy), III, 112.
- » antiictérica (Quarin), III, 112.
- » antiletárgica (Frank), III, 112.
- » antimetrorrágica (Thilenius), III, 112.
- » antimonial de Masdeval (H. DE M.), III, 112.
- » antimonio mercurial (Blanc), III, 112.
- » antineurálgica (Weber), III, 113.
- » antineuropática (Nevermann), III, 112.
- » antiodontálgica, III, 112 y 113.
- » antiodontálgica (Carus), III, 113.
- » antiodontálgica (Lemazurier) III, 113.
- » antipruriginosa (Biett), III, 113.
- » antiséptica (Peacok), III, 113.
- » antisifilítica (Cazenave), III, 113.
- » antisifilítica (Cirillo), III, 113.
- » antisifilítica (Plisson), III, 113.
- » antivomitiva, III, 114.
- » aperitiva, III, 114.
- » aromática, III, 114.
- Mistura aromática (Landerer), III, 114.
- » arsenical, III, 128.
- » de asa fétida (F. DE L.), III, 114.
- » de asa fétida (Kopp), III, 114.
- » astringente, III, 114.
- » astringente (Hecker), III, 114.
- » astringente (H. DE M.), III, 115.
- » astringente (Lallemand), III, 115.
- » astringente (Wadelet), III, 115.
- » astringente alcanforada (Hase), III, 115.
- » astringente de Cadet (H. DE M.), III, 114.
- » astringente vinosa (Dreysig), III, 115.
- » atemperante (H. DE AL.), III, 115.
- » contra la atrofia mesentérica, III, 120.
- » contra la atrofia mesentérica (Baumes), III, 120.
- » balsámica, III, 115.
- » balsámica (F. E.), III, 115.
- » balsámica (Fricke), III, 115.
- » balsámica (H. DE M.), III, 115.
- » balsámica (Lallemand), III, 116.
- » balsámica de Fuller (H. DE M.), III, 115.
- » de bálsamo de copaiba, de Fuller (F. E.), III, 115.
- » barítica amoníaco ferruginosa (Clarus), III, 116.
- » barítica con cicuta (Vogt), III, 116.
- » de Baumes contra la atrofia mesentérica, III, 116.
- » de belladona (Hufeland), III, 116.
- » benzóica, III, 116.
- » de bicarbonato de sosa (Biett), III, 107.
- » de Biett, III, 116.
- » contra el bocio (Veret), III, 120.

- Mistura del Dr. Bories contra el dolor de muelas, III, 126.
- » de Boyle, III, 116.
- » brasileña contra la gonorrea, III, 116.
- » brasileña líquida (Lepère), III, 117.
- » brasileña en pasta, III, 117.
- » de brucina (Diesembach), III, 117.
- » de brucina (Magendie), III, 117.
- » contra la calentura puerperal (Most), III, 120.
- » calmante; III, 117.
- » calmante (Goelis), III, 117.
- » calmante (Houlton), III, 117.
- » calmante (Recamier), III, 117.
- » calmante (Roux), III, 117.
- » calmante astringente (Kopp), III, 118.
- » calmante astringente (Moinin), III, 118.
- » de cantáridas balsámica (Kopp), III, 118.
- » de cantáridas opiada (Rayer), III, 118.
- » de carbonato de ajenjos (F. E.), III, 110.
- » carminativa, III, 118.
- » carminativa (Richter), III, 118.
- » de cascarilla compuesta (F. DE L.), III, 118.
- » de castóreo aloética (Hufeland), III, 118.
- » catártica (Hufeland), III, 119.
- » catártica árabe, III, 118.
- » caterética (F. F.), II, 169.
- » de cicuta (Moore Neligan), III, 119.
- » de cicuta contra la fotofobia escrofulosa (Seidel), III, 119.
- » de cicutina, I, 148.
- » cidoniada, III, 119.
- » cobreosa alcanforada (Swe diaur), III, 120.
- » de cochinilla (Dieudonne), III, 120.
- Mistura colchítica, III, 120.
- » de conicina (Fronmueller), III, 120.
- » de copaiba succinada (Niemann), III, 123.
- » contra la coqueluche, III, 121.
- » contra la coqueluche (Sobregondi), III, 121.
- » de cornezuelo de centeno (Bocquet y Dufrenoy), III, 119.
- » de Clarus, III, 119.
- » cloronítrica (Koechlin), III, 119.
- » clorurada alcohólica (Trusen), III, 119.
- » de cloruro de cal (Bielt), III, 119.
- » de creosota (F. DE ED.), III, 124.
- » cretácea (F. DE L.), III, 124.
- » cretácea (F. P.), III, 124.
- » de creta compuesta (Brande), III, 124.
- » de Cronier, III, 124.
- » contra el crup, III, 121.
- » de cubebas, II, 267.
- » de deutoioduro de mercurio (H. DE M.), III, 130.
- » diaforetica, III, 124.
- » diaforética (Cazenave), II, 419.
- » diaforética (H. DE AL.), III, 124.
- » diaforética (Selle), III, 124.
- » disolvente simple, III, 124.
- » disolvente compuesta (F. POLACA), III, 124.
- » diurética, III, 124 y 125.
- » diurética (Cruveilhier), III, 125.
- » diurética (Hildembrand), III, 125.
- » diurética (H. DE AL.), III, 125.
- » diurética (Hufeland), III, 125.
- » diurética (Levrat), III, 125.
- » diurética (Rayer), III, 125.
- » diurética estibiada (Meyer), III, 125.

- Mistura diurética opiada (Schneider), III, 125.
- » diurética sudorífica (Lippich), III, 125.
- » contra el dolor de muelas, III, 126.
- » drástica (Andral), III, 126.
- » emenagoga, III, 126.
- » emeto-anodina, III, 126.
- » emoliente (Morro), III, 126.
- » emulsiva calmante (Henke), III, 126.
- » contra la epilepsia (Bonorden), III, 121.
- » de escabiosa ácida (Bielt), III, 126.
- » escilítica antimoniada (Wildberg), III, 126.
- » de espíritu de vino (F. DE L.), III, 127.
- » espirituosa (H. DE M.), II, 320.
- » estíptica, III, 127.
- » estíptica (Ryan), III, 127.
- » estibio-estimulante, III, 127.
- » estimulante (Horn), III, 127.
- » estimulante (Neumann), III, 127.
- » estomacal (J. P. Frank), III, 127.
- » estomacal de carbonato de potasa de ajénjos (F. E.), III, 118.
- » éxcitante (H. DE IT.), III, 126.
- » éxcitante (H. DE M.), III, 127.
- » etérea, III, 127.
- » etérea (H. DE M.), III, 128.
- » etérea piro-aceitosa (Horn), III, 127.
- » febrífuga metálica, III, 128.
- » ferruginosa (Pitschaft), III, 128.
- » fétida, III, 128.
- » contra la fetidez del aliento, III, 121.
- » fortificante de Selle (H. DE M.), III, 128.
- » fundente (Hufeland), III, 128.
- » fundente (Mutzel), III, 128.
- Mistura fundente espirituosa, III, 128.
- » contra las fungosidades de las encías (Schneider), III, 121.
- » contra la galactirrea (Roeseberg), III, 121.
- » de genciana compuesta (F. DE L.), III, 128.
- » de goma amoníaco (F. E.), III, 128.
- » de goma amoníaco (H. DE M.), III, 128.
- » de goma arábica (F. DE L.), III, 129.
- » gomosa de sulfato de hierro (F. E.), III, 129.
- » contra la gonorrea (H. DE AL.), III, 121.
- » contra la gonorrea (Lise-mann), III, 122.
- » contra la gota (Fievec), III, 122.
- » de guayaco (F. DE L.), III, 129.
- » hidragoga (Sundelin), III, 129.
- » hidragoga (Van Swieten), III, 129.
- » contra la hidropesía (Kenner), III, 122.
- » de hierro aromática, III, 129.
- » de hierro compuesta de Griffith (F. DE L.), III, 129.
- » de hiposulfito de sosa (Cazenave), III, 130.
- » contra la incontinencia de orina, III, 122.
- » contra el insomnio (Graves), III, 122.
- » iodada, III, 130.
- » iodada (Closs), III, 130.
- » de ipecacuana y creta compuesta (Hooper), III, 130.
- » jabonosa (Fehr), III, 130.
- » jabonosa purgante (Plenk), III, 130.
- » de Liebig y Woheler, III, 131.
- » contra el líquen crónico (Bielt), III, 122.

- Mistura contra el liquen crónico de las mamas, III, 122.
- » litontríptica, III, 130.
- » litontríptica (Durande), III, 130.
- » de magnesia aromática, III, 131.
- » marina (Montain), III, 131.
- » mercurial (Langembeck), III, 131.
- » mercurial de Plenck (H. DE M.), III, 131.
- » de mirra alcalizada (Griffith), III, 131.
- » moscada (H. DE M.), III, 131.
- » moscada y alcanforada, III, 132.
- » de nafta (Hasting), III, 132.
- » de nitrato de plata cristalizado, III, 132.
- » nitrosa, III, 132.
- » nitrosa y opiada contra la disenteria (Hope), III, 132.
- » obstétrica (Goupil), III, 132.
- » odontálgica, III, 132.
- » odontálgica (C. L. Cadet), III, 132.
- » odontálgica (Carus), III, 132.
- » odontálgica (H. DE AL.), III, 132.
- » odontálgica (Oudet), III, 133.
- » odontálgica (Pieste), III, 133.
- » odontálgica (Toirac), III, 133.
- » oleosa ácida (H. DE AL.), III, 133.
- » oleoso-resinosa (Ramm), III, 133.
- » de opio astringente de Silvio (F. E.), III, 136.
- » de opio astringente de Silvio (H. DE M.), III, 132.
- » para las encías, III, 133.
- » para curar las grietas del ano (Bretonneau), III, 133.
- » contra la parálisis (Payan), III, 122.
- Mistura pectoral (Boerhaave), III, 133.
- » pectoral (Cottureau), III, 133.
- » pectoral (H. DE AL.), III, 134.
- » pectoral (Quarin), III, 134.
- » contra los piojos, III, 123.
- » contra la pirosis (Vogt), III, 123.
- » pirotátrica contra el cólera, III, 134.
- » de potasa (Wendt), III, 134.
- » contra el prolapso del recto (Bavez), III, 123.
- » de pulsatila estibiada (Rust), III, 134.
- » purgante, III, 134.
- » purgante (Andry), III, 134.
- » purgante (Chomel), III, 134.
- » purgante con aceite de ricino (H. DE M.), III, 135.
- » de Quarin, III, 135.
- » de Quarin contra la hemotisis, III, 135.
- » de quina, III, 135.
- » refrigerante (H. DE AL.), III, 135.
- » resinoso-jabonosa (Plenk), III, 135.
- » resolutive (Carus), III, 135.
- » resolutive (Schwartz), III, 135.
- » resolutive amoniaca, III, 135.
- » resolutive para los aparatos inamovibles (Larrey), III, 136.
- » contra los sabañones (Marjolin), III, 123.
- » de sabina alcanfor. (Horn), III, 136.
- » salina (H. DE M.), III, 136.
- » salina ferruginosa (H. DE ING.), III, 136.
- » salina simple (F. P.), III, 136.
- » de Scudamore, III, 136.
- » sedante (Cottureau), III, 136.
- » sedante (Harrison), III, 136.

- Mistura de sen compuesta (H. DE ING.), III, 136.
- » de Silvio contra el vómito de sangre (F. E.), III, 136.
- » de Silvio contra el vómito de sangre (H. DE M.), III, 137.
- » contra la soriasis (Cazenave), III, 123.
- » contra la soriasis labial (Bielt), III, 123.
- » sudorífica, III, 137.
- » con el sulfato de quinina tartarizado, III, 137.
- » sulfúrica (Tode), III, 137.
- » sulfurosa (Cazenave), III, 137.
- » contra la tisis (Wilson), III, 123.
- » tónica (Gall), III, 137.
- » tónica (Hergt), III, 137.
- » tónica (H. DE AL.), III, 137.
- » tónica (J. P. Frank), III, 137.
- » tónica y estimulante (Dubois), III, 138.
- » tónica y estimulante (Ranque), III, 138.
- » de trementina (Frank), III, 138.
- » trementinada (H. DE M.), III, 138.
- » trementinada (H. DE SAN JUAN DE DIOS), III, 138.
- » trementinada (Most), III, 138.
- » trementinada y opiada (Rayer), III, 137.
- » triacal (Dubois), III, 138.
- » contra la tumefaccion crónica de las agallas (Becker), III, 123.
- » de valeriana etérea (Schneider), III, 138.
- » de valeriana laudanizada (Richter), III, 138.
- » vermífuga, III, 139.
- » vomitiva (Hufeland), III, 139.
- Mistura contra el vómito de las preñadas (Kroyher), III, 123.
- » de Werlhof, III, 138.
- » de Whitt, III, 139.
- Mordeduras de animales rabiosos, IV, 337.
- » de serpientes, IV, 337.
- » de víboras, IV, 337.
- Moscas de Milán (Louradour), IV, 184.
- » de Milán (Menier), IV, 184.
- » de Milán (Mouchon), IV, 184.
- » de Milán (Pessina), IV, 184.
- Moxas, I, 269.
- » etéreas, I, 439.
- » chino, I, 270.
- » del Japon, I, 270.
- » de Marmorat, I, 270.
- Mucílago, III, 139.
- Mucílago cantaridado (H. DE AL.), III, 139.
- » de caracoles, III, 139.
- » de goma arábica (F. F.), III, 139.
- » de goma arábica (F. P.), III, 139.
- » de goma tragacanto (F. F.), III, 139.
- » de goma tragacanto (F. P.), III, 139.
- » de linaza (F. F.), III, 140.
- » de lino, I, 236.
- » de malvabisco, I, 244.
- » de musgo marino perlado, I, 271; III, 140.
- » oftálmico, III, 140.
- » de raíz de malvabisco, III, 140.
- » de semillas de membrillo, I, 252.
- » de semillas de membrillo (F. F.), III, 140.
- » de zaragatona, I, 361.
- » de zaragatona (F. F.), III, 140.
- Muerte aparente, IV, 344.

N.

Naftalina, I, 439.
 Naranjada, I, 273.
 Naranjadas, III, 38.

Naranjada gaseosa purgante, III,
 147.
 Neroli, I, 273.

O.

Odontálgicos, III, 140.
 Odontálgico alcanforado (Cotte-
 reau, hijo), III, 140.
 » de Pará, II, 55.
 Odontina (Pelletier), III, 140.
 Oenolado de acetato de hierro lí-
 quido, IV, 194.
 » de citrato de hierro (Beral),
 IV, 201.
 » de extracto de zarzaparrilla
 (Beral), IV, 212.
 » sudorífico (Dr. Smith), IV,
 211.
 Ojimieles, III, 141.
 » de ajo, I, 73; III, 141.
 » de cebolla albarrana, I, 145.
 » de cólchico, I, 159.
 » de cólchico (F. E.), III, 141.
 » de cólchico (F. F.), III, 141.
 » de eléboro, III, 141.
 » escilítico (F. E.), III, 141.
 » escilítico (F. F.), III, 141.
 » escilítico (F. P.), III, 141.
 » de narciso de los prados (Van
 Mons), III, 141.
 » pectoral de los Daneses, III,
 142.
 » pectoral de Edimburgo, III,
 141.
 » simple, I, 62.
 » simple (F. E.), III, 141.
 » simple (F. F.), III, 141.
 » simple (F. P.), III, 141.
 » tartaroso, III, 142.
 Oleosácaros, III, 142.
 Oleosácaro de aceite de croton
 tiglio (H. DE AL.), III, 142.
 » de anís (F. F.), III, 142.
 » de bergamota, III, 142.

Oleosácaro de corteza de naranja,
 140.
 » de cidra, III, 142.
 » gomoso, III, 142.
 » gomoso para cubrir las pí-
 doras, III, 142.
 » de limon (F. F.), III, 142.
 » de macis (F. A.), III, 143.
 » de manzanilla, III, 143.
 » de naranjo, III, 142.
 » de santónico, III, 143.
 » de trementina, IV, 29.
 » de yerbabuena de sabor de
 pimienta, III, 143.
 Olla podrida, II, 290.
 Opiatas, III, 143.
 Opiata antiblenorrágica, III, 143.
 » antiblenorrágica (Diday), III,
 143.
 » antiblenorrágica (Swediaur),
 III, 144.
 » antiépiléptica de Idler, II,
 197.
 » antiescorbútica, III, 143.
 » antidisentérica (Spielmann),
 III, 143.
 » antidisentérica balsámica
 (Spielmann), III, 143.
 » antigonorreica (Berton), III,
 145.
 » antigonorreica (Douvowist-
 ky), III, 143.
 » antileucorreica (Roberto To-
 más de Salisbury), III,
 144.
 » antileucorreica (Tissot), II,
 213.
 » antigonorreica (Pajot Lafo-
 ret), III, 144.

- Opiata antileucorréica (Swe-
diaur), III, 144.
» antiodontálgica, III, 144.
» antiperiódica y tónica, III,
144.
» árabe, III, 144.
» arábica, IV, 148.
» astringente, III, 144.
» astringente (Babeyrac), III,
144.
» astringente (Roucher), III,
144.
» azufrada, III, 145.
» balsámica, III, 145.
» balsámica (Berton), III, 145.
» con el bálsamo de copaiba,
III, 145.
» con el bálsamo de copaiba
(Boutigni), III, 145.
» con el bálsamo de copaiba
(Gibert), III, 145.
» con el bálsamo de copaiba
(Lavelonye), III, 145.
» calmante, III, 145.
» de catecú, III, 145.
» de colombo compuesta, III,
146.
» dentífrica ácida de Goelin,
III, 146.
» dentífrica de carbon, III,
146.
» dentífrica tónica, III, 146.
» estomacal (Helvetius), III,
146.
» febrífuga, III, 146.
- Opiata febrífuga (F. F.), II, 207.
» febrífuga (Lescure), III,
146.
» febrífuga (Tissot), III, 146.
» de gengibre, III, 146.
» de Larrey, II, 204.
» de Martinier, III, 147.
» de Masdeval, II, 211.
» mesentérica, III, 147.
» de Michu, III, 147.
» napolitana, III, 147.
» para dilatar la pupila, III,
147.
» pectoral, III, 147.
» sulfuro magnesiana (Mialhe),
III, 148.
» trementinada, III, 148.
» trementinada (Recamier),
IV, 142.
» tónica calibeada, III, 148.
» vermífuga (Chirac), III, 148.
» vermífuga (Malouet), II,
198.
» vermífuga de Malouet (F. R.),
II, 197.
» de Ward, II, 196.
Opio de Rousseau, III, 7.
» de Rousseau (F. P.), III, 7.
Oreja de monje, I, 431.
Oxicroto, I, 62.
Oxicrotos, III, 148.
» de Andria, III, 148.
» (H. DE M.), III, 148.
Oxalato de manganeso, I, 437.
Oxido de manganeso, I, 433.

P.

- Palamoud, II, 311.
Palmirena, II, 312.
Panés, III, 148.
Pan de anís, III, 148.
» de especias, III, 149.
» ferruginoso (Louvel), III, 149.
Pan de lactato de hierro (Bois-
siere), III, 149.
» medicinal, III, 148.
Papel, III, 149.
Papeles, III, 149.
- Papel antireumático, III, 150.
» de cauterio, II, 282; III,
149 y 150.
» de cauterio (Buchner), III,
149.
» de cauterio (F. DE WURT.),
III, 150.
» derivativo de Alemania, III,
150.
» derivativo reumático (Berg),
III, 150.

- Papel derivativo (Pirwitz), III, 150.
- » encerado, III, 150.
 - » epispástico, III, 150 y 151.
 - » epispástico (Albespeyres), III, 154.
 - » epispástico (Beral), III, 151.
 - » epispástico (Vée), III, 151.
 - » epispástico de cantáridas, III, 151.
 - » epispástico de torbisco, III, 152.
 - » espadrápico (Duclos), III, 151.
 - » de Michaleshul, III, 149.
 - » de Mohe; III, 149.
 - » para destruir las moscas (Wilsin), III, 152.
 - » vejigatorio, III, 151 y 153.
 - » vejigatorio (Beral), III, 155.
 - » vejigatorio (Trousseau), III, 154.
- Paraguay con creosota, IV, 93.
- » rojo, IV, 93.
- Pastas, III, 155.
- Pasta de almendras, III, 155.
- » de almendras (Fraquer), III, 155.
 - » de almendras cosmética, III, 430.
 - » de almendras para las manos, III, 155.
 - » aluminosa acética (Lefoulon), III, 155.
 - » amigdalina (Mangoti), III, 156.
 - » amigdalina (Vée), III, 155.
 - » antidontálgica (Duerr), III, 156.
 - » de apio, III, 156.
 - » arsenical para destruir los animales dañinos, III, 157.
 - » arsenical de fray Cosme, III, 156.
 - » de azufaias, I, 106; II, 184.
 - » de azufaias (F. F.), III, 157.
 - » de bofes de ternera, III, 157.
 - » de Calabria, III, 161.
 - » de caracoles (Figuier), III, 158.
 - » cáustica (Graeffe), III, 158.
- Pasta cáustica (Payan), III, 158.
- » cáustica (Pollau), II, 124.
 - » cáustica de sulfato de cobre (Payan), III, 158.
 - » de cloruro de zinc (Canquoin), III, 159.
 - » de dátiles, I, 170; III, 157.
 - » dentífrica, III, 159.
 - » depilatoria, III, 159.
 - » depilatoria (Plenk), III, 159.
 - » contra la epididimitis (Desruelles), III, 158.
 - » escarótica (Canquoin), III, 159.
 - » escilítica para destruir los ratones (Clommesny), III, 159.
 - » fosforada para destruir los animales dañinos, III, 160.
 - » de gelatina de cuerno de ciervo (Mouchon), III, 160.
 - » de goma arábica (F. F.), III, 160.
 - » de lactucario, III, 161.
 - » de líquen (F. F.), III, 161.
 - » de líquen opiada (Henry), III, 161.
 - » magesiana ferruginosa (Maurat), III, 161.
 - » de malvabisco (F. A.), III, 161.
 - » de malvabisco (F. F.), III, 160.
 - » de maná, III, 161.
 - » de musgo marino, III, 162.
 - » de musgo marino (Mouchon), III, 162.
 - » opiada (Tanchou), III, 162.
 - » pectoral (Parmentier), III, 162.
 - » pectoral balsámica, III, 162.
 - » pectoral balsámica (Baudry), III, 163.
 - » pectoral balsámica (Regnault), III, 163.
 - » pectoral de bofes de ternera (Degenetais), III, 163.
 - » pectoral de bofes de ternera (Pablo Gage), III, 163.
 - » para cauterizar las muelas cariadas, III, 158.

- Pasta para los dientes cariados, III, 159.
- » para ennegrecer los cabellos, III, 164.
- » para matar los ratones, III, 162.
- » para teñir el pelo de negro, III, 164.
- » de regaliz blanca, III, 164.
- » de regaliz negra (F. F.), III, 164.
- » de regaliz parda (F. F.), III, 164.
- » rubefaciente (Clarus), III, 164.
- » contra los sabañones (Swe-diaur), III, 158.
- » de Ward (F. DE L.), II, 212.
- Pastillas, III, 165.
- » absorbentes (Chevallier), III, 165.
- » de ácido cítrico, III, 165.
- » acídulas purgantes (Delvincourt), III, 166.
- » de agracejo, I, 73 ; III, 166.
- » de almidon, III, 166.
- » de ambar, III, 166 y 184.
- » amigdalinas, III, 166.
- » anticatarrales (Delaurier), III, 166.
- » antihistéricas, III, 167.
- » antileucorréicas y emenogogas (Pierquin), III, 167.
- » aromáticas (Steel), III, 168.
- » aromáticas de flor de naran-jo (F. F.), III, 182.
- » aromáticas de limon (F. F.), III, 182.
- » aromáticas de rosas (F. F.), III, 182.
- » contra el asma (Boudin), III, 172.
- » de azafran, III, 168.
- » azules (Rodriguez), III, 168.
- » de beleño (Righini), III, 169.
- » de bicarbonato de sosa (F. F.), III, 169.
- » de bicarbonato de sosa (H. DE M.), III, 169.
- » de borax, III, 169.
- Pastillas de Calabria (Manfredi); III, 181.
- » de caracoles (Mouchon), III, 170.
- » de carbonato de cal, III, 184.
- » de catecú, canela y magne-sia, III, 170.
- » de cianuro de oro (Chres-tien), III, 171.
- » de cianuro de oro y chocola-te (Chrestien), III, 171.
- » de citrato de hierro, III, 171.
- » de citrato de hierro (Beral), III, 171.
- » de citrato de magnesia, III, 171.
- » de cloruro de cal, III, 171.
- » de cloruro de oro y sodio (Chrestien), III, 172.
- » de cloruro de plata (Sicard), III, 173.
- » de crémor de tártaro, III, 172.
- » de cubebino, III, 172.
- » de Chaussier, III, 173.
- » de chocolate con cloruro de plata (Sicard), III, 173.
- » de chocolate y hierro redu-cido por el hidrógeno (Mi-quelard y Quevenne), III, 173.
- » divinas, III, 173.
- » de Dubois modificadas, III, 174.
- » efervescentes, III, 174.
- » de emetina, I, 177.
- » de emetina vomitivas, I, 177.
- » de énula campana, III, 173.
- » escilíticas (Broussonnet), III, 174.
- » estibio-arsenicales alteran-tes, III, 174.
- » estimulantes, III, 174.
- » estimulantes de gengibre, III, 175.
- » de extracto alcohólico de di-gital (Labelonye), III, 173.
- » ferruginosas (Bailly), III, 175.
- » de Fosbroke, III, 175.

- Pastillas de fosfato de manganeso, I, 436.
- » de gelatina de cuerno de ciervo (Mouchon), III, 175.
- » de goma, III, 176.
- » de goma arábica (F. F.), III, 176.
- » incisivas quermetizadas (Jobart), III, 176.
- » de iodoformo (Bouchardat), III, 176.
- » de ioduro de hierro, III, 176.
- » de ioduro de hierro (Dupasquier), III, 177.
- » de ioduro de hierro (F. P.), III, 177.
- » de ioduro de manganeso, I, 437.
- » de ioduro de potasio (Giordano), III, 177.
- » de ipecacuana, III, 178.
- » de ipecacuana (F. P.), III, 178.
- » de ipecacuana (L. C. Cadet), III, 178.
- » de ipecacuana con azúcar (F. E.), III, 178.
- » del Japon, III, 178.
- » de lactato de hierro, III, 178.
- » de lactato de hierro (Cap), III, 178.
- » de leche (Del Bue), III, 179.
- » de limon, III, 179.
- » de liquen (Robinet), III, 179.
- » de malato de manganeso, I, 437.
- » de malvabisco (F. F.), III, 180.
- » de malvabisco gomosas (F. E.), III, 180.
- » de maná, III, 180.
- » de maná (Bordet), III, 181.
- » de maná tartarizada (H. DE AL.), III, 181.
- » de manteca de cacao, III, 181.
- » masticatorias, III, 181.
- » de Mechoacan (F. M.), III, 182.
- Pastillas de menta piperita, I, 253.
- » mercuriales, III, 182.
- » mercuriales (Corbel Lagneau), III, 182.
- » mercuriales alterantes, III, 182.
- » de mercurio sacarino (Lagneau), III, 183.
- » mogólicas, III, 183.
- » de naftalina, I, 272.
- » olorosas de Alemania, III, 184.
- » de oxalato de manganeso, I, 439.
- » para desinfectar el aliento (Magendie), III, 184.
- » para perfumar el aliento III, 184.
- » para la sed, III, 165.
- » para la sed (F. F.), III, 184.
- » pectorales (Tissot), III, 185.
- » de peróxido de manganeso, I, 434.
- » de protoioduro de mercurio (Corbel Lagneau), III, 177.
- » de pimienta compuestas, III, 185.
- » purgantes, III, 186.
- » de guarana, III, 176.
- » de regaliz con opio (F. P.), III, 186.
- » de Richelieu, III, 176.
- » contra el romadizo (Lepère), III, 172.
- » de salud (Delvincourt), III, 187.
- » del serrallo, III, 187.
- » de sobreoxalato de potasa (F. F.), III, 184.
- » de sulfato de manganeso, I, 438.
- » de tartrato de manganeso, I, 439.
- » de tartrato de hierro, III, 188.
- » contra la tos (Lepère), III, 172.
- » contra las toses nerviosas, (Lepère), III, 172.
- » de tridacio, III, 188.
- » vermifugas, III, 188.

- Pastillas vermífugas (Barthez), III, 188.
 » vermífugas (F. F.), III, 183.
 Pediluvios, II, 284; III, 189.
 » de ácido clorhídrico, I, 153.
 » de ácido clorhídrico (H. DE M.), III, 189.
 » de ácido clorhidronítrico, I, 154.
 » alcalinos, III, 189.
 » amoniacaes (Ruelle), III, 189.
 » de carbonato de potasa, I, 300.
 » irritantes, III, 189.
 » hidroclicóricos, III, 189.
 » mercurial, III, 189.
 » nitro-muriático (H. DE M.), III, 190.
 » nitro-muriáticos (Scott), III, 189.
 » de rábano, I, 315.
 » con sal, I, 337; III, 190.
 » sinapizado, I, 269; III, 190.
 » sinapizados (H. M.), III, 190.
 Peras marciales (F. F.), II, 85.
 Percalina aglutinante, III, 149.
 Perfecto amor, IV, 10.
 Perla de América, I, 430.
 Peróxido de manganeso, I, 433.
 Persesquitrato de hierro, I, 439.
 Persulfuro de hierro hidratado, I, 440.
 Pesarios, III, 190.
 » de acetato de plomo, III, 191.
 » anodinos, III, 191.
 » astringente, III, 191.
 » de ioduro de plomo, III, 191.
 » medicinales, III, 190.
 » mercuriales, III, 191.
 » de óxido de zinc, III, 190.
 » de tanino, III, 191.
 Pesas y medidas (Nuevo sistema), I, XI.
 Picaduras de las abejas, IV, 337.
 » de los abejones, IV, 337.
 Picaduras de las arañas de las cuevas, IV, 337.
 » de las avispas, IV, 337.
 » de los mosquitos de trompetilla, IV, 337.
 » de los tábanos, IV, 337.
 » de la tarántula, IV, 337.
 » de los zánganos, IV, 337.
 Piedra divina (F. F.), III, 192.
 » estíptica de Hesselbach, III, 193.
 » medicinales, III, 192.
 » medicinal (F. E.), III, 192.
 » oftálmica (F. F.), III, 192.
 » de salud, III, 193.
 » de sulfato de alúmina acetado (F. E.), III, 192.
 » vulneraria, III, 193.
 Pieles, III, 193.
 Piel divina, III, 193.
 » de Goulard, III, 193.
 Píldoras, III, 193.
 » absorventes (Chevalhier), III, 193.
 » de aceite de croton, I, 57; III, 193.
 » de aceite de croton con magnesia, III, 194.
 » de aceite de helecho, III, 194.
 » de aceite de lignito (Thaer), III, 194.
 » de acetato de cobre, III, 194.
 » de acetato de mercurio, III, 194.
 » de acetato de morfina, III, 194.
 » de acetato de plomo, III, 195.
 » de acetato de plomo (Fouquier), III, 194.
 » de acetato de plomo (H. DE M.), III, 194.
 » de acetato de plomo é ipecacuana (H. DE AL.), III, 195.
 » de acetato de potasa, III, 195.
 » de acíbar y asa fétida, III, 195.
 » de acíbar compuestas (F. E.), III, 242.

- Píldoras de acíbar compuestas (F. DE L.), III, 195.
- » de acíbar compuestas (F. P.), III, 195.
 - » de acíbar, genciana y jabon, III, 195.
 - » de acíbar y hierro, III, 196.
 - » de acíbar y hierro (F. P.), III, 196.
 - » de acíbar y jabon (F. F.), III, 196.
 - » de acíbar marciales, III, 196.
 - » de acíbar marciales (F. E.), III, 230.
 - » de acíbar con mirra (F. DE L.), III, 195.
 - » de acíbar y trementina (Bois de Lourt), III, 196.
 - » de acíbar y quina (H. M. F.), III, 262.
 - » de ácido arsenioso, III, 196.
 - » de ácido benzóico (Frank), III, 196.
 - » de aconitina, I, 66.
 - » de aconitina (Turnbull), III, 196.
 - » de acónito, III, 196.
 - » de acónito (Bielt), III, 196.
 - » de acónito antimoniales (F. P.), III, 197.
 - » de acónito mercuriales (Duble), III, 197.
 - » de acónito opiadas (H. M.), III, 197.
 - » contra el acné rosáceo (Bielt), III, 243.
 - » contra las afecciones cancerosas (Boinet), III, 243.
 - » afrodisíacas, III, 197.
 - » afrodisíacas (Pierquin), III, 197.
 - » de agárico blanco, III, 197.
 - » de agárico blanco opiadas (Rayer), III, 197.
 - » de agrimonia, III, 197.
 - » alcanforadas (Cullerier), III, 197.
 - » alcanforadas (Ricord), III, 198.
 - » de almendras amargas (Kranischfeld), III, 198.
- Píldoras de almizcle, III, 198.
- » aloéticas (Requin), III, 198.
 - » aloéticas fundentes (Buchan), III, 198.
 - » aloéticas de sulfato de potasa (F. E.), III, 305.
 - » alterantes, III, 198.
 - » alterantes (Alibert), III, 198.
 - » alterantes (F. M.), III, 199.
 - » alterantes (Hildenbrand), III, 198.
 - » alterantes de Plummer (F. P.), III, 295.
 - » alterantes (Sandrock), III, 199.
 - » alterantes compuestas (F. DE ED.), III, 295.
 - » alterantes simples de Plummer, III, 294.
 - » de alumbre (Formey), III, 199.
 - » de alumbre (Helvecio), III, 199.
 - » de alumbre y tridacio (Recamier), III, 199.
 - » aluminosas, III, 199.
 - » aluminosas opiadas, III, 199.
 - » amargas (Gall), III, 199.
 - » amargas estomacales, III, 199.
 - » amargas fundentes (Riecke), III, 199.
 - » contra la amaurosis, III, 243.
 - » contra la amaurosis (H. DE M.), III, 243.
 - » contra la amaurosis (Richter), III, 243.
 - » contra la amaurosis (Schmucker), III, 243.
 - » de ambar (H. DE AL.), III, 200.
 - » de amoníaco (F. M.), III, 200.
 - » amoniacaes antiartríticas (Bories), III, 200.
 - » de Anderson, III, 200 y 260.
 - » de Anderson (F. F.), III, 200.

- Pildoras contra la angina tonsi-
lar (Mondezert), III, 244.
- » anodinas (Recamier), III, 200.
- » antecibum (F. F.), III, 200.
- » antiácidas, III, 201.
- » antiamauróticas (Jaeger), III, 201.
- » antiamauróticas (Rust), III, 201.
- » antiartríticas, III, 201.
- » antiartríticas (Gall), III, 201.
- » antiartríticas (Graeffe), III, 201.
- » antiartríticas (Radius), III, 201.
- » antiartríticas (Vicq de Azir), III, 201.
- » antiartríticas estibiadas, III, 201.
- » antiartríticas de sulfuro de cal, III, 202.
- » antiasmáticas (Heim), III, 202.
- » antiasmáticas (Richter), III, 202.
- » antibiliosas (Barclay), III, 202.
- » antibiliosas (Dijon), III, 202.
- » antibiliosas (Harbey), III, 202.
- » antibiliosas de Barclay, III, 228.
- » antiblenorrágicas, III, 202.
- » antiblenorrágicas (Droste), III, 202.
- » antiblenorrágicas (Gall), III, 202.
- » antiblenorrágicas (Most), III, 203.
- » anticalculosas (Behrends), III, 203.
- » anticancerosas (Rust), III, 203.
- » anticaquéticas (Dehaen), III, 203.
- » anticardiálgicas, III, 203.
- » anticardiálgicas (Albers), III, 203.
- » anticardiálgicas (Schmitz), III, 203.
- Pildoras anticatarrales, III, 203.
- » anticatarrales (H. DE ESTR.), III, 203.
- » anticatarrales (Pariset), III, 203.
- » anticatarrales (Trousseau), III, 204.
- » anticatarrales (Wedekind), III, 204.
- » anticatarrales y calmantes (Petit), III, 204.
- » anticefálicas (Broussais), III, 204.
- » anticloróticas (Hamilton), III, 205.
- » anticloróticas (Neumann y Radius), III, 205.
- » anticloróticas (Sundelin), III, 205.
- » anticloróticas de Blaud (F. P.), III, 204.
- » anticloróticas de Blaud (H. DE M.), III, 205.
- » anticloróticas de Rayer, III, 205.
- » anticoréicas (Josat), III, 205.
- » anticoréicas (Rasori), III, 205 y 299.
- » anticoréicas (Schneider), III, 205.
- » antidiabéticas, III, 206.
- » antidiabéticas (Berndt), III, 206.
- » antidiaréicas, III, 206.
- » antidiaréicas (Vogel), III, 206.
- » antidisentéricas, III, 206.
- » antidisentéricas (Boudin), III, 206.
- » antidisentéricas (Willis), III, 206.
- » antieméticas (Fuller), III, 206.
- » antieméticas (H. M.), III, 206.
- » antiepilépticas, III, 241.
- » antiepilépticas (Bourge de Rollot), III, 206.
- » antiepilépticas (F. P.), III, 291.
- » antiepilépticas (H. DE M.), III, 206.

- Píldoras antiepilépticas (Leuret), III, 206.
- » antiepilépticas (Marochetti), IV, 12.
- » antiepilépticas (Podreca), III, 207.
- » antiepilépticas (Quarin), III, 207.
- » antiepilépticas (Recamier), III, 207.
- » antiepilépticas inglesas, III, 207.
- » antiepsóricas, III, 207.
- » antiescirrosas (Boyer), III, 207.
- » antiescorbúticas (F. N. P.), III, 207.
- » antiescrofulosas (Baudelocque), III, 207.
- » antiescrofulosas (Henry y Guibourt), III, 207.
- » antiescrofulosas (Jungken), III, 208.
- » antiescrofulosas (Saunders), III, 208.
- » antiescrofulosas (Vogt), III, 208.
- » antiescrofulosas (Werneck), III, 208.
- » antiescrofulosas y tónicas, III, 208.
- » antiespasmódicas, III, 208.
- » antiespasmódicas (Ant. Dubois), III, 208.
- » antiespasmód. (Behrends), III, 208.
- » antiespasmódicas (Cloquet), III, 208.
- » antiespasmódicas (Conradi), III, 209.
- » antiespasmódicas (Dumeril), III, 209.
- » antiespasmódicas (Haen), III, 209.
- » antiespasmódicas (Heim), III, 209.
- » antiespasmódicas (Henning), III, 209.
- » antiespasmódicas (Honoré), III, 209.
- » antiespasmódicas (Jahn), III, 209.
- Píldoras antiespasmódicas (Lombart), III, 209.
- » antiespasmódicas (Maunoir), III, 209.
- » antiespasmódicas (Montaigne), III, 209.
- » antiespasmódicas (Petit), III, 210.
- » antiespasmódicas (Piderit), III, 210.
- » antiespasmódicas (Pierquin), III, 210.
- » antiespasmódicas (Plenciz), III, 210.
- » antiespasmódicas (Trousseau), III, 210.
- » antiespasm. (Zipp), III, 210.
- » antiespasmódicas mercuriales (Jahn), III, 209.
- » antiflemáticas, III, 210.
- » antigalactopoyéticas (Behrends), III, 210.
- » antigastrálgicas, III, 210.
- » antigastrálgicas (La Rue), III, 211.
- » antigastrálgicas (Trousseau), III, 211.
- » antigonorréicas, III, 211.
- » antigotosas (Bouchardat), III, 211.
- » antigotosas (Halford), III, 211.
- » antigotosas (Henrotay), III, 211.
- » antigotosas (Lemazurier), III, 211.
- » antigotosas llamadas de Lartigue, III, 211.
- » antihelmínticas, III, 212.
- » antihelmínticas (H. DE AL.), III, 212.
- » antihelmínticas (Schmuker), III, 212.
- » antihelmínticas fétidas, III, 212.
- » antihelmínticas y purgantes, III, 212.
- » antihemocránicas, III, 212.
- » antihemoptóicas (Cottureau), III, 212.
- » antihemorroidales (Gall), III, 213.

- Píldoras antiherpéticas , III, 213.
- » antiherpéticas (Barthez), III, 213.
- » antiherpéticas (Duble), III, 213.
- » antiherpéticas (Dubois), III, 213.
- » antiherpéticas (Dumas), III, 213.
- » antiherpéticas (Fouquet), III, 214.
- » antiherpéticas (Golfin), III, 214.
- » antiherpéticas (Kopp), III, 214.
- » antiherpéticas (Kunkel), III, 214.
- » antiherpéticas y antisifilíticas (Bally), III, 214.
- » antiherpéticas inglesas, III, 214.
- » antihidrópicas (Dupuy), III, 214.
- » antihidrópicas (Graoffe), III, 214.
- » antihidrópicas (Ronander), III, 215.
- » antihistéricas, III, 215.
- » antihistéricas (Meza), III, 215.
- » antihistéricas (Piderit), III, 215.
- » antihistéricas (Rosenstein), III, 216.
- » antihistéricas (Selle), III, 216.
- » antihistéricas (Sydenham), III, 216.
- » antiictéricas (Buchan), III, 216.
- » antiictéricas (Coeroly), III, 216.
- » antiictéricas (Macgregor), III, 216.
- » antiictéricas (Storck), III, 216.
- » antilácteas (H. DE M.), III, 216.
- » antilechosas, III, 216.
- » antilechosas (Massau), III, 216.
- Píldoras antileucorréicas (Ritto), III, 217.
- » antimoniadas (Ammon), III, 217.
- » antimoniadas (Hildenbrand), III, 217.
- » antineurálgicas, III, 217.
- » antineurálgicas (Corbel Lagneau), III, 217.
- » antineurálgicas (H. DE M.), III, 218.
- » antineurálgicas (H. M.), III, 218.
- » antineurálgicas (Marchal de Calvi), III, 217.
- » antineurálgicas (Recamier), III, 217.
- » antineurálgicas (Trousseau), III, 218.
- » antineurálgicas de Meglin (F. F.), III, 217.
- » antineurálgicas de Meglin (H. DE M.), III, 218.
- » antiodontálgicas, III, 218.
- » antiodont. (Most), III, 218.
- » antiperiódicas, III, 218.
- » antiraquíticas (Neumann), III, 218.
- » antireumáticas, III, 219.
- » antireumáticas (Hildenbrand), III, 219.
- » antireumáticas (Lombard), III, 219.
- » antireumáticas (Richter), III, 219.
- » antireumáticas (Vogt), III, 219.
- » antireumáticas de Stoll (F. P.), III, 197.
- » antisépticas (Dupuytren), III, 219.
- » antisépticas (Kapeler), III, 219.
- » antisifilíticas, III, 219.
- » antisifilíticas (Alibert), III, 219.
- » antisifilíticas (Dupuytren), III, 220.
- » antisifilíticas (Recamier), III, 220.
- » antisifilíticas (Sarrasin), III, 220.

- Píldoras antisudoríficas (H. M.), III, 220.
- » antitetánicas, III, 220.
- » antitípicas (H. M.), III, 220.
- » antisifilíticas (A. Latour), III, 220.
- » antitísicas (F. de Palacios), III, 221.
- » antituberculosas (Righini), III, 221.
- » antivenéreas, III, 221.
- » antivenéreas (Serre), III, 221.
- » aperitivas, III, 196 y 221.
- » arábigas, IV, 148.
- » de Armenia, III, 221.
- » de arseniato de hierro (Biet), III, 221.
- » de arseniato de manganeso, I, 434.
- » de arseniato de sosa (Bielt), III, 221.
- » arsenicales (Boudin), III, 222.
- » arsenicales contra el catarro pulmonar crónico (Garrin), III, 222.
- » de arsénico americanas, III, 222.
- » de asa fétida, III, 222.
- » de asa fétida (H. DE AL.), III, 222.
- » de asa fétida y alcanfor, III, 222.
- » de asa fétida con beleño, III, 222.
- » de asa fétida cobreosas (Feiler), III, 222.
- » de asa fétida compuestas (H. DE ING.), III, 222.
- » de asa fétida escilíticas, III, 223.
- » de asa fétida estibiadas, III, 201.
- » de asa fétida é ioduro de hierro, III, 223.
- » de asa fétida y manzanilla (Laferta), III, 223.
- » de asa fétida moscadas, III, 223.
- » de asa fétida y valeriana, III, 223.
- Píldoras de asclepias, III, 223.
- » asiáticas (F. F.), III, 223.
- » asiáticas (H. DE M.), III, 223.
- » contra el asma (Quarin), III, 244.
- » astringentes, III, 224.
- » astringentes (Capuron), III, 224.
- » astringentes (Cavarra), III, 224.
- » astringentes (Cullerier), III, 224.
- » astringentes (H. DE AL.), III, 224.
- » astringentes (H. DE M.), III, 224.
- » astringentes (Hufeland), III, 225.
- » astringentes (Quarin), III, 225.
- » astringentes (Radius), III, 225.
- » astringentes (Recamier), III, 225.
- » astringentes (Santa María), III, 226.
- » astringentes (Schuvert), III, 225.
- » astringentes (Swediaur), III, 225.
- » astringentes (Walch), III, 225.
- » astringentes y calmantes (Dupuytren), III, 225.
- » astringentes ferruginosas (Sundelin), III, 225.
- » astringentes vitrioladas, III, 225.
- » atemperantes, III, 226.
- » de atropina, III, 226.
- » auríferas (Chrestien), III, 226.
- » de azufre, III, 226.
- » azules, III, 226 y 241.
- » balsámicas, III, 226 y 227.
- » balsámicas (Boerhaave), III, 227.
- » balsámicas (Chaverly), III, 227.
- » balsámicas (F. E.), III, 271.
- » balsámicas (Gaubius), III, 227.

- Píldoras balsámicas (H. DE M.), III, 227.
- » balsámicas (Hoffmann), III, 227.
- » balsámicas (J. Juncker), III, 227.
- » balsámicas astringentes con cubebas, III, 227.
- » balsámicas de Marcus, III, 228.
- » balsámicas de Morton (F. E.), III, 228.
- » balsámicas de Morton (F. F.), III, 228.
- » de bálsamo del Canadá, III, 228.
- » de bálsamo de copaiba, III, 228.
- » de bálsamo de copaiba magistras, III, 228.
- » de bálsamo de copaiba oficiales (F. P.), III, 228.
- » de Barbaroja, III, 228.
- » de Barclay, III, 228.
- » de Barton, III, 229.
- » de beleño y cicuta, III, 229.
- » de beleño ioduradas (Cintrac), III, 229.
- » de belladona, III, 229.
- » de belladona ferruginosas (C. Le Blus), III, 229.
- » de belladona (Trousseau), III, 229.
- » de belladona ioduradas, III, 229.
- » de Belloste (F. F.), III, 285.
- » benedictas de Fuller (F. E.), III, 230.
- » benedictas de Fuller (F. P.), III, 229.
- » benedictas de Fuller (H. DE M.), III, 230.
- » de Biett, III, 230.
- » de bismuto, III, 230.
- » de bistorta, III, 230.
- » blancas (Barthez), III, 230.
- » de Blaud (F. P.), III, 204.
- » de Blaud modificadas, III, 204.
- » de Blaud modificadas por Adorne, III, 205.
- Píldoras de Blaud manganesianas, I, 438.
- » de Blaud de sulfato de manganeso, I, 438.
- » contra la blenorragia (Sandras), III, 244.
- » contra el bocio (Villie), III, 244.
- » de Boncio (F. F.), III, 272.
- » de brea (H. DE IT.), III, 230.
- » de brea (Mignot), III, 230.
- » de bromuro de hierro, I, 215.
- » de bromuro de hierro (Magendie), III, 230.
- » de brucina (Magendie), III, 231.
- » de Buchan, III, 231.
- » de cainca, III, 231.
- » calibeadas, III, 231.
- » contra los cálculos biliares (Tronchin), III, 244.
- » calmantes, III, 231.
- » calmantes (Bell), III, 231.
- » calmantes (Berndt), III, 231.
- » calmantes (Broussais), III, 231.
- » calmantes (H. DE AMER.), III, 232.
- » calmantes (H. DE IT.), III, 232.
- » calmantes (Koop), III, 232.
- » calmantes (Vogt), III, 232.
- » calmantes de digital, III, 232.
- » calmantes y narcóticas, III, 232.
- » calmantes resolutivos (Hauff), III, 232.
- » calmantes y tónicas, III, 232.
- » de calomelanos, III, 232 y 233.
- » de calomelanos y asclepias, III, 233.
- » de calomelanos compuestas (Ricord), III, 233.
- » de calomelanos ferruginosas, III, 233.
- » de calomelanos y polígala, III, 233.

- Píldoras de calomelanos y saponaria, III, 233.
- » de cantáridas, III, 233.
- » de cantáridas (H. DE AL.), III, 233.
- » de cantáridas alcanforadas (Porta), III, 233.
- » de cantáridas opiadas (H. DE AM.), III, 234.
- » de caoutchu, III, 234.
- » cúprico-ferrugin. (Schneider), III, 234.
- » de carbon alcalinas (H. DE AL.), III, 235.
- » de carbonato de cobre y amoníaco, III, 234.
- » de carbonato de hierro (Neumann), III, 235.
- » de carbonato de hierro y potasa, III, 295.
- » de carbonato de manganeso, I, 435.
- » de Carlos Bell, III, 235.
- » carminativas (Barthez), III, 235.
- » contra la caries (Rust), III, 244.
- » de castóreo (H. DE AMER.), III, 235.
- » contra el catarro crónico, III, 244.
- » contra el catarro crónico (Recamier), III, 244.
- » contra el catarro vesical (Gall), III, 245.
- » de catecú compuestas (F. N. P.), III, 236.
- » católicas (F. M.), III, 236.
- » de cebadilla (Turnbull), III, 236.
- » de cebolla albarrana, digital y hierro (Chomel), III, 236.
- » de celedonia purgantes (Bath), III, 236.
- » de cetrarino, III, 236.
- » cianuradas (Parent), III, 237.
- » cianuradas (Parent y Boutigní), III, 236.
- » de cianuro de hierro compuestas (Jolly), III, 236.
- Píldoras de cianuro de mercurio opiadas (Parent), III, 237.
- » de cianuro de mercurio opiadas (F. P.), III, 237.
- » de cianuro de oro opiadas, III, 237.
- » de cianuro de oro y extracto de torbisco, III, 237.
- » de cianuro de potasio (Bally), III, 237.
- » de cicuta y calomelanos (Cullerier), III, 237.
- » de cicuta y calomelanos (Gamma), III, 237.
- » de cicuta compuestas, III, 238.
- » de cicuta compuestas (Bernstein), III, 238.
- » de cicuta compuesta (F. DE L.), III, 238.
- » de cicuta y cornezuelo de centeno (Arnal), III, 238.
- » de cicuta ioduradas, III, 238.
- » de cicuta y quina, III, 238.
- » de cicuta, quinina y hierro (Rognetta), III, 238.
- » de cicuta de Storck (H. DE M.), III, 237.
- » de cinconina, III, 238.
- » de cinoglosa, I, 278.
- » de cinoglosa (F. E.), III, 238.
- » de cinoglosa (F. F.), III, 239.
- » de cinoglosa (H. DE M.), III, 235.
- » de cinoglosa opiadas (F. E.), III, 238.
- » de cinoglosa opiadas (H. DE M.), III, 238.
- » contra la cistitis, III, 245.
- » de citrato de hierro, III, 239.
- » de citrato de hierro y amoníaco (Beral), III, 239.
- » de clorhidrato de morfina, III, 239.
- » cloro-argénticas (Mialhe), III, 241.
- » contra la clorosis (Marchall-Hall), III, 245.

- Pildoras contra la clorosis (Chomel), III, 245.
- » contra la clorosis sífilítica (Ricord), III, 245.
- » cloro-plómbicas (Mialhe), III, 241.
- » de cloruro de bario (Swediaur), III, 239.
- » de cloruro de bario (Walsh), III, 239.
- » de cloruro de hierro (Bielt), III, 239.
- » de cloruro de hierro aloéticas (Cunier), III, 239.
- » de cloruro de manganeso, I, 436.
- » de cloruro de mercurio, III, 240.
- » cloro-mercúricas (Mialhe), III, 240.
- » de cloruro de mercurio compuestas (F. DE L.), III, 240.
- » de cloruro de mercurio y morfina (Bouchardat), III, 240.
- » de cloruro de mercurio y quinina, I, 312.
- » de cloruro de oro (H. DE AL.), III, 240.
- » de cloruro de oro y sodio (F. P.), III, 241.
- » de cloruro de oro y sodio (Groetzner), III, 241.
- » de cloruro de plata, III, 241.
- » de cloruro de plata (Trousseau), III, 241.
- » de cloruro de platino (Hoefler), III, 241.
- » de cobre, III, 241.
- » de cobre amoniacaes, III, 241.
- » de cobre amoniacal (H. DE AL.), III, 242.
- » de cobre amoniacaes glicirizadas, III, 242.
- » cobreosas, III, 241.
- » cóchias (F. E.), III, 242.
- » de codeina, III, 242.
- » de codeina (Magendie), III, 242.
- » colagogas, III, 242.
- Pildoras cólchicas, III, 242.
- » de cólchico (Ritton), III, 242.
- » de colombo, III, 242.
- » de coloquintida y mercurio (H. DE ING.), III, 243.
- » de Conradi, III, 243.
- » contraestimulantes (Uberti), III, 247.
- » de Cooper, III, 251.
- » de copaiba ferruginosas (Bereugier), III, 251.
- » de copaiba mercuriales (H. M.), III, 251.
- » contra la coqueluche, III, 245.
- » contra la coqueluche (Loewenhardt), III, 245.
- » contra la coqueluche (Thornsten), III, 245.
- » contra la coqueluche (Trousseau), III, 245.
- » de cornezuelo de centeno, III, 251.
- » de cornezuelo de cierto alcanforadas (Robert), III, 251.
- » de creosota, III, 251.
- » de creosota (Laveran), III, 251.
- » de croton, III, 251.
- » de croton compuestas, III, 252.
- » de cubebas, III, 252.
- » de Chrestien III, 241.
- » de délfina, III, 252.
- » depurativas (Althof), III, 252.
- » depurativas (Dubois), II, 92.
- » depurativas (Righini), III, 252.
- » depurativas antimoniadas, III, 252.
- » depurativas compuestas, III, 252.
- » desinfectantes, III, 252.
- » de Deslandes, III, 252.
- » desobstruentes, III, 253.
- » desobstruentes (H. M.), III, 253.
- » desobstruentes (H. DE M.), III, 253.

- Píldoras desobstruentes mercuriales (H. DE M.), III, 253.
- » de deutocloruro de mercurio (F. P.), III, 240.
 - » de deutocloruro de mercurio (H. DE AL.), III, 240.
 - » de deutocloruro de mercurio (Dupuytren), III, 240.
 - » de deutoioduro iodurado de mercurio (Gibert), III, 275.
 - » de deutoioduro de mercurio, III, 276.
 - » de deutoioduro de mercurio (Biett), III, 275.
 - » contra la diarrea, III, 245; IV, 13.
 - » diaforéticas, III, 253.
 - » diaforéticas (Roucher), III, 253.
 - » de digital, III, 295.
 - » de digital fétidas de Withering (F. P.), III, 253.
 - » de digitalina, III, 254.
 - » de digitalina, escila y escamonea, III, 254.
 - » contra la dismenorrea (Pigeaux), III, 245.
 - » contra la dispepsia (H. DE AL.), III, 246.
 - » contra la disuria de los ancianos, III, 243.
 - » diuréticas, III, 254.
 - » diuréticas (H. M.), III, 255.
 - » diuréticas (Debreyne), III, 254.
 - » diuréticas (Dehaen), III, 254.
 - » diuréticas (Dupuytren), III, 254.
 - » diuréticas (H. DE IT.), III, 254.
 - » diuréticas alcanforadas, III, 255.
 - » diuréticas alterantes, III, 255.
 - » diuréticas hidragogas de Bouchardat (H. DE M.), III, 255.
 - » diuréticas mercuriales (Cruveilhier), III, 255.
 - » doradas, III, 255.
 - » drásticas, III, 255.
- Píldoras drásticas (Burdach), III, 255.
- » drásticas (H. DE IT.), III, 255.
 - » drásticas (Rayer), III, 255.
 - » drásticas opiadas (Langley), III, 256.
 - » de Duchesne, III, 256.
 - » dulcificantes, III, 256.
 - » de dulcamara ioduradas (Vogt), III, 256.
 - » de dulcamara y sulfuro de antimonio, III, 256.
 - » ecopróticas (Pitschaff), III, 256.
 - » contra el eczema (Biett), III, 246.
 - » de elaterio, III, 256.
 - » de eléboro compuestas, III, 256.
 - » emenagogas, III, 196 y 256.
 - » emenagogas (Barthez), III, 257.
 - » emenagogas (Chamet), III, 257.
 - » emenagogas (H. DE AL.), III, 257.
 - » emenagogas (Fouquier), III, 257.
 - » emenagogas (H. DE LYON), III, 257.
 - » emenagogas (Jahn), III, 257.
 - » emenagogas (Neumann), III, 257.
 - » emenagogas aloéticas, III, 258.
 - » emenagogas fétidas, III, 258.
 - » emenagogas de Lugol, III, 279.
 - » emenagogas (Tronchin), III, 257.
 - » de emético (Boudet), III, 258.
 - » eméticas (Swediaur), III, 258.
 - » de emético, calomelanos y opio (Fearnley), III, 258.
 - » de énula campana compuestas (Heim), III, 258.
 - » de énula y escila, III, 258.
 - » contra la epilepsia (Biett), III, 246.

- Píldoras contra la epilepsia (Drebryne), III, 246.
- » contra la epilepsia (Dupuytren), III, 246.
- » contra la epilepsia (Quarin), III, 246.
- » contra la epilepsia (Recamier), III, 246.
- » contra la epilepsia (Vallebrand), III, 247.
- » de ergotina, III, 258.
- » de ergotina y cicuta (Arnal), III, 258.
- » de ergotina é ioduro de hierro (Arnal), III, 259.
- » de escila amoniaca (F. E.), III, 259.
- » de escila compuestas, III, 259.
- » de escila compuestas (F. DE L.), III, 259.
- » de escila, digital y hierro (Chomel), III, 259.
- » de escila é ipecacuana, III, 259.
- » escilíticas, III, 259.
- » escilíticas (Chrestien), III, 259.
- » escilíticas (F. ED.), III, 259.
- » escilíticas (F. E.), III, 259.
- » escilíticas (F. P.), III, 260.
- » escilíticas (H. DE M.), III, 260.
- » escilíticas (Parmentier), III, 260.
- » escilíticas compuestas (F. P.), III, 273.
- » escocesas, III, 260.
- » escocesas (F. F.), III, 200.
- » escocesas (H. DE M.), III, 200.
- » estibiadas (Broussonet), III, 261.
- » esténicas (Brown), III, 261.
- » estimulantes, III, 261.
- » estimulantes (Ribes), III, 261.
- » estimulantes de cantáridas, III, 261.
- » estimulantes de Sundelin, III, 261.
- Píldoras estípticas (Dumeril), III, 261.
- » esplénicas, III, 260.
- » estomacales, III, 261 y 262.
- » estomacales (Cadet), III, 262.
- » estomacales (F. DE PLENK), III, 261 y 262.
- » estomacales (H. M. F.), III, 262.
- » estomacales (Smith), III, 262.
- » estomacales (Tronchin), III, 262.
- » estomacales (Wedekind), III, 262.
- » de estoraque compuestas (F. DE L.), III, 263.
- » de estramonio, III, 263.
- » estrícnicas, III, 264.
- » de estriquina (Furnari), III, 264.
- » de estriquina (Magendie), III, 264.
- » de estriquina (H. DE M.), III, 264.
- » de estriquina marciales, III, 264.
- » etiópicas (F. M.), III, 264.
- » etiópicas compuestas, III, 264.
- » excitantes (Lescure), III, 260.
- » expectorantes, III, 260.
- » expectorantes (Paris), III, 260.
- » de extracto alcohólico de nuez vómica (Fouquier), III, 263.
- » de extracto alcohólico de nuez vómica (H. DE M.), III, 263.
- » de extracto de belladona, III, 263.
- » de extracto de cicuta mercuriales (H. DE M.), III, 263.
- » de extracto de cicuta y quina, III, 263.
- » de extracto de cólchico (Scudamore), III, 263.

- Pildoras de extracto etéreo de cubebas (Hausmann), III, 263.
- » de extracto de zarzaparrilla del Dr. Fabre, III, 263.
- » febrífugas, III, 264.
- » febrífugas (Andonart), III, 264.
- » febrífugas (Henschel), III, 265.
- » febrífugas (Isensee), III, 265.
- » febrífugas (Jahn), III, 265.
- » febrífugas (Lippich), III, 265.
- » febrífugas (Lochstaedt), III, 265.
- » febrífugas (Metzingen), III, 265.
- » febrífugas (Ronander), III, 265.
- » febrífugas (Sachs), III, 265.
- » febrífugas (Tissot), III, 266.
- » febrífugas amargas (Luciano Pieste), III, 266.
- » febrífugas antisépticas (Levacher), III, 266.
- » febrífugas inglesas, III, 266.
- » de ferrocianato de quinina, III, 266.
- » ferruginosas, III, 266.
- » ferruginosas (Andral), III, 266.
- » ferruginosas con canela (Weikard), III, 266.
- » ferruginosas iodadas (Bouchardat), III, 267.
- » ferruginosas de tartrato férrico-potásico (Mialhe), III, 267.
- » fétidas menores (Hoffmann), III, 267.
- » contra las flores blancas, III, 247.
- » fortificantes, III, 267.
- » de fosfato de manganeso, I, 436.
- » de Fothergill, III, 267.
- » de Foy, III, 267.
- » de fuligocali, III, 267.
- » de fuligocali sulfurado (Deschamps), III, 267.
- » fundentes, III, 268.
- Pildoras fundentes (Ammon), III, 268.
- » fundentes (Burdach), III, 268.
- » fundentes (H. DE AL.), III, 268.
- » fundentes (H. DE M.), III, 268.
- » fundentes (Lemonier), III, 268.
- » fundentes (Pezole), III, 268.
- » fundentes (Pierquin), III, 268.
- » fundentes (Radius), III, 268.
- » fundentes (Richter), III, 268.
- » fundentes (Righini), III, 269.
- » fundentes (Roucher), III, 269.
- » fundentes (Smith), III, 269.
- » fundentes (Vicq d'Azir), III, 269.
- » fundentes aloéticas (Recamier), III, 269.
- » fundentes amoniacaes, III, 269.
- » fundentes de digital, III, 269.
- » fundentes gomosas, III, 270.
- » fundentes opiadas (Dupuytren), III, 270.
- » fundentes de trementina, III, 270.
- » contra la galactirrea (Behrends), III, 247.
- » de gálbano compuestas (Foy), III, 270.
- » de gálbano compuestas, de Murray (F. DE L.), III, 270.
- » contra la gangrena de hospital (Dupuytren), III, 247.
- » contra la gastralgia, III, 248.
- » contra la gastralgia (Boudin), III, 247.
- » contra la gastralgia (Jadieux), III, 247.
- » contra las gastralgias (Lombard), III, 247.

- Píldoras de gencianino , III , 270.
- » glotonas (F. F.), III , 200.
 - » de goma amoniaco , III , 270.
 - » de goma amoniaco balsámicas (F. E.) , III , 271.
 - » de goma amoniaco jabonosas , III , 271.
 - » de goma amoniaco y mirra , III , 271.
 - » de goma fétidas (F. P.) , III , 271.
 - » de goma quino , III , 271.
 - » de goma quino ferruginosas (Most) , III , 271.
 - » gomo-resinosas , III , 271.
 - » gomosas de Plenck (F. P.) , III , 271.
 - » contra la gonorrea (Berton) , III , 248.
 - » contra la gonorrea (Quarin) , III , 248.
 - » contra la gota , IV , 14.
 - » de Graham , III , 271.
 - » de Griffith , III , 271.
 - » de Groetzner , III , 271.
 - » de gutagamba , III , 272.
 - » de gutagamba compuestas (F. DE L.) , III , 272.
 - » de Hahnemann , III , 272.
 - » de Helmenstreit , III , 272.
 - » contra la hemolisis crónica (Righini) , III , 248.
 - » contra la hepatalgia , III , 250.
 - » contra los herpes (Gall) , III , 248.
 - » de Hesser , III , 272.
 - » hidragogas , III , 272.
 - » hidragogas (F. F.) , III , 272.
 - » hidragogas (F. DE L.) , III , 272.
 - » hidragogas (F. P.) , III , 273.
 - » hidragogas (Hein) , III , 273.
 - » hidragogas (Janin de Lion) , III , 273.
 - » hidragogas (Spielmann) , III , 273.
 - » hidragogas contra la ascitis , III , 273.
 - » hidragogas ferruginosas (Collier) , III , 273.
 - » contra la hidropesía , III , 248.
- Píldoras contra la hidropesía (Lerminier) , III , 248.
- » contra la hidropesía (Pierquin) , III , 248.
 - » contra la hidropesía pasiva del tejido celular (Dupuytren) , IV , 139.
 - » contra el hidrotorax (Dupuy) , III , 248.
 - » de hiel de vaca , III , 273.
 - » de hierro (Swediaur) , III , 274.
 - » de hierro aloéticas , III , 274.
 - » de hierro compuestas , III , 196 y 271.
 - » de hierro compuestas (F. DE L.) , III , 274.
 - » de hierro compuestas (F. P.) , III , 274.
 - » de hinojo acuático (Rhothe) , III , 274.
 - » contra el histérico (Debreyne) , III , 249.
 - » histéricas (F. M.) , III , 277.
 - » de Hooper , III , 277.
 - » de Hulm , III , 290.
 - » contra la ictericia (Greding) , III , 249.
 - » incisivas pectorales (Buchan) , III , 277.
 - » incisivas (Cadet) , III , 277.
 - » incisivas (J. J. Leroux) , III , 277.
 - » incisivas expectorantes , III , 277.
 - » contra la incontinencia de orina (Berengier) , III , 249.
 - » contra la incontinencia de orina (H. DE M.) , III , 249.
 - » contra la incontinencia de orina de los niños (Ribes) , III , 249.
 - » contra la indigestion de las bebidas vinosas , III , 249.
 - » contra los infartos escrofulosos y escirrosos (Stoerck) , III , 249.
 - » contra los infartos glandulosos crónicos , III , 249.
 - » inmortales , III , 277.
 - » iodadas , III , 277.

- Pildoras de iodhidrargirato de ioduro de potasio (Mialhe), III, 278.
- » de iodhidrargirato de mercurio y potasio (Mialhe), III, 279.
- » de iodhidrargirato de mercurio y potasio (Puche), III, 279.
- » de iodhidrato de potasa (F. P.), III, 278.
- » de iodo (H. DE M.), III, 278.
- » de iodo argénticas (Mialhe), III, 278.
- » de iodoformo (Bouchardat), III, 279.
- » de ioduro de azufre, I, 227.
- » de ioduro de arsénico (Thompson), III, 279.
- » de ioduro de cloruro mercurioso (Boutigny), III, 279.
- » de ioduro de hierro, III, 280.
- » de ioduro de hierro (Bouchardat), III, 277 y 278.
- » de ioduro de hierro (Lugol), III, 279.
- » de ioduro de hierro (Piedagnel), III, 278.
- » de ioduro de iodhidrato de estriknina, I, 189; III, 279.
- » de ioduro de iodhidrato de morfina, I, 268.
- » de ioduro de iodhidrato de quinina (Bouchardat), III, 279.
- » de ioduro de mercurio (F. DE L.), III, 279.
- » de ioduro de mercurio (F. P.), III, 279.
- » de ioduro de mercurio y morfina (Bouchardat), III, 280.
- » de ioduro de mercurio y quinina, III, 279.
- » de ioduro de plata (Patterson), III, 280.
- » de ioduro de plomo cristalizado (Cottereau), III, 266.
- Pildoras de ioduro de potasio, III, 280.
- » de ioduro de potasio (Pierquin), III, 280.
- » de ioduro de zinc y amoniacó con belladona, III, 280.
- » de ioduro de zinc y estriknina (Bouchardat), I, 189; III, 280.
- » de ioduro de zinc y morfina, I, 268; III, 280.
- » de ipecacuana y opio, III, 281.
- » de ipecacuana, calomelanos y opio (Ellis), III, 280.
- » de ipecacuana compuestas (F. DE L.), III, 281.
- » de jabon (F. F.), III, 281.
- » de jabon aloéticas (H. M. F.), III, 281.
- » de jabon compuestas, III, 281.
- » de jabon compuestas (H. DE AL.), III, 222.
- » de jabon compuestas (H. DE L.), III, 281.
- » de jabon estibiadas, III, 281.
- » jabonosas (Buchan), III, 281.
- » jabonosas (H. DE M.), III, 281.
- » de James, III, 281.
- » de Keysser, I, 255; II, 183; III, 282.
- » de Koopp, III, 282.
- » de lactucario, I, 231; III, 282.
- » de lactato de hierro (Cap), III, 282.
- » de lactato de hierro y quinina (Cap), III, 282.
- » de Lartigues, III, 211.
- » laxantes (Blassius), III, 282.
- » laxantes (Buchan), III, 282.
- » laxantes (Hufeland), III, 282.
- » laxantes y fundentes (Sanchez), III, 282.
- » de Leiger, III, 283.
- » de Lockstaedt, III, 283.

- Pildoras contra las lombrices y las ascáridas (Pitschaff), III, 250.
- » de lupulina, III, 283.
- » de magnesia, III, 283.
- » de magnesia compuestas, III, 283.
- » de malato de hierro, III, 283.
- » de malato de manganeso, I, 437.
- » de manteca de cacao, III, 283.
- » de Maquiavelo, III, 283.
- » marciales (F. E.), III, 284.
- » marciales con mirra (F. N. P.), III, 284.
- » marciales (H. DE M.), III, 284.
- » marciales (Koempf), III, 283.
- » de Mateo Stark, III, 284.
- » mayores de Hoffmann, III, 284.
- » de Meglin (F. F.), III, 217.
- » menores de Hoffmann, III, 284.
- » de Merat, III, 284 y 285.
- » mercuriales, III, 285.
- » mercuriales (Biett), III, 285.
- » mercuriales (Brugnatelly), III, 286.
- » mercuriales (Cadet), III, 286.
- » mercuriales (Chomel), III, 286.
- » mercuriales (Dr. Estork), III, 286.
- » mercuriales (Double), III, 286.
- » mercuriales (F. E.), III, 288.
- » mercuriales (F. F.), III, 285.
- » mercuriales (H. M. F.), III, 287.
- » mercuriales (Lagneau), III, 286 y 287.
- » mercuriales (Moscati), III, 287.
- » mercuriales (Plenk), III, 287.
- Pildoras mercuriales (Renou), III, 288.
- » mercuriales (Sedillot), III, 288.
- » mercuriales con cicuta (Kopp), III, 287.
- » mercuriales de Cullerier (H. M.), III, 286.
- » mercuriales y diuréticas (Cruveilhier), III, 287.
- » mercuriales de escamonea aloéticas (F. F.), III, 285.
- » mercuriales fundentes, III, 287.
- » mercuriales glicirrizadas (F. E.), III, 288.
- » mercuriales de glúten (Nivel), III, 288.
- » mercuriales de Hahnemann, III, 272.
- » mercuriales de Hoffmann, III, 284.
- » mercuriales opiadas (H. M.), III, 288.
- » mercuriales de Plenck, reformadas, III, 288.
- » mercuriales purgantes (F. F.), III, 285.
- » mercuriales de Sedillot, III, 284.
- » mercuriales simples, III, 226.
- » mercuriales solubles de Hahnemann (Cazenave), III, 283.
- » de mercurio, I, 254.
- » de mercurio (F. DE L.), III, 288.
- » de mercurio albuminoso, III, 289.
- » de mercurio animalizado, III, 289.
- » de mercurio edimburgenses (F. E.), III, 289.
- » de mercurio edimburgenses (H. DE M.), III, 289.
- » contra la metrorragia crónica, III, 250.
- » de mirra y beleño, III, 289.
- » de mirra ferruginosas (Meyer), III, 289.
- » de monesia, III, 289.

- Píldoras de morfina, I, 267; III, 289.
- » de morfina (Magendie), III, 289.
 - » de morfina y cianuro de potasio (Rougier), III, 290.
 - » de Morison, III, 290.
 - » moscadas compuestas (Hunter), III, 290.
 - » de Moscou, III, 290.
 - » de Moselly, III, 290.
 - » napolitanas, III, 290.
 - » napolitanas (Martin Solon), III, 290.
 - » narcóticas (Barthez y Rilliet), III, 291.
 - » narcóticas astringentes (Dumars), III, 291.
 - » nauseosas, III, 291.
 - » nervinas (Krause), III, 291.
 - » contra la neuralgia del hígado, III, 250.
 - » de nitrato de plata, III, 291.
 - » de nitrato de plata (F. P.), III, 291.
 - » de nitrato de plata (Merat), III, 291.
 - » de nitrato de plata (Ruff), III, 291.
 - » de nitrato de plata opiadas, III, 291.
 - » nitro-alcanforadas (C. Bell), III, 292.
 - » de nogal (Sandras), III, 292.
 - » de nuez vómica, I, 276; III, 292.
 - » de nuez vómica ferruginosas (Mondiere), III, 292.
 - » de Obrien contra los tumores blancos, III, 292.
 - » odontálgicas (Rust), III, 292.
 - » opiadas alcanforadas (Ricord), III, 292.
 - » de opio antimoniales, III, 292.
 - » de opio y beleño, III, 292.
 - » de opio glicirrizadas, III, 293.
 - » de opio é ipecacuana, III, 293.
 - » orientales, III, 293.
 - » de oro, III, 293.
- Píldoras de oxalato de manganeso, I, 439.
- » de oxicianuro de mercurio compuestas (Parent), III, 237.
 - » de oxicianuro de mercurio opiadas, III, 293.
 - » de óxido negro de hierro, III, 293.
 - » de óxido de oro (Chrestien), III, 293.
 - » contra las palpitaciones (Andral), III, 250.
 - » para desinfectar el aliento, III, 293.
 - » para provocar el parto prematuro artificial (Van Wageninge), III, 293.
 - » para restablecer las hemorroides, III, 293.
 - » para restablecer las reglas, III, 294.
 - » de Pariset (F. P.), III, 294.
 - » pectorales (H. DE AL.), III, 294.
 - » pectorales de énula, III, 294.
 - » de pelitre, III, 294.
 - » de pelitre (H. DE AL.), III, 294.
 - » de percloruro de platino, I, 294.
 - » de peróxido de manganeso, I, 434.
 - » perpetuas, I, 90.
 - » de Peter, III, 294.
 - » de piperino, III, 294.
 - » platínicas, III, 294.
 - » de plombagina, III, 294.
 - » de plombagina mercuriales (Veinhold), III, 294.
 - » de Plummer, III, 294.
 - » de Plummer compuestas (F. DE ED.), III, 295.
 - » de Plummer compuestas (F. P.), III, 295.
 - » de polígala, III, 295.
 - » contra las poluciones (Hufeland), III, 250.
 - » profilácticas de las viruelas (Rosen), III, 295.
 - » de protocarbonato de hierro (F. P.), III, 234.

- Pildoras de protocloruro de mercurio, III, 233.
- » de protocloruro de mercurio compuestas (F. P.), III, 240.
- » de protoioduro de hierro (Boudet), III, 274.
- » de protoioduro de hierro (Calloud), III, 275.
- » de protoioduro de hierro y guayaco (Bielt), III, 275.
- » de protoioduro de hierro de Dupasquier (F. P.), III, 274.
- » de protoioduro de mercurio, I, 260; III, 275.
- » de protoioduro de mercurio, (Bielt), III, 276.
- » de protoioduro de mercurio (H. DE M.), III, 276.
- » de protoioduro de mercurio (Lugol), III, 276.
- » de protoioduro de mercurio (Magendie), III, 275.
- » de protoioduro de mercurio (Ricord), III, 276.
- » de protoioduro de mercurio (Velpeau), III, 276.
- » de protoioduro de mercurio opiadas (Velpeau), III, 276.
- » de protonitrato de mercurio (Santa María), III, 277.
- » de prototartrato antimoniado de potasa (Waller), III, 295.
- » de pulsatila, III, 395.
- » purgantes, III, 296.
- » purgantes (Alibert), III, 296.
- » purgantes (Altoff), III, 296.
- » purgantes (Bally y Cadet), III, 297.
- » purgantes (Dehaen), III, 296.
- » purgantes antiespasmódicas (Gnepratte), III, 297.
- » purgantes (Horse), III, 297.
- » purgantes (Pitschaff), III, 296.
- » purgantes (Rayer), III, 297.
- » purgantes (Vandanme), III, 295.
- Pildoras purgantes (Zittmann), I, 149.
- » purgantes de aceite de croton, III, 297.
- » purgantes y diurét. (Frank), III, 297.
- » purgantes diuréticas (Gall), III, 297.
- » purgantes de Frank, III, 296.
- » purgantes y fundentes (Saifert), III, 297.
- » purgantes de resina de jalapa (Mialhe), III, 297.
- » purgantes vermífugas (Meased), III, 298.
- » de quasia, III, 298.
- » de quermes, III, 298.
- » de quina alcanforadas, III, 298.
- » de quina alcanforadas (Dupuytren), III, 298.
- » de quina compuestas, III, 298.
- » de quinoidina, III, 298.
- » de raiz de toudin, III, 298.
- » de ratania, III, 299.
- » de Rasori, III, 299.
- » relajantes (Buchan), III, 299.
- » de Renou, III, 299.
- » resinosas depurativ. (Jahn), III, 299.
- » resolutivas (Rust), III, 299.
- » resolutivas (Schubarth), III, 299.
- » de Richter, III, 243.
- » de Rittmann, III, 299.
- » de ruda, III, 299.
- » de Rufus (H. DE M.), III, 300.
- » de ruibarbo (F. M.), III, 299.
- » de ruibarbo compuestas (F. DE L.), III, 300.
- » de ruibarbo magnesianas, III, 300.
- » de sabina, III, 300.
- » de sabina ferruginosas (Radium), III, 300.
- » de sagapeno compuestas (F. DE L.), III, 300.
- » de Sainte Marie, III, 300.

- Píldoras de salicina, III, 300.
 » de Schmucker, III, 243.
 » sedantes, III, 300 y 301.
 » sedantes (Gunther), III, 301.
 » sedantes (Rougier), III, 301.
 » sedantes y astringentes, III, 301.
 » de Sedillot, III, 284.
 » de Segond, III, 301.
 » contra la sífilides, III, 250.
 » contra la sífilis (J. Frank), III, 250.
 » solutivas (F. DE F.), III, 301.
 » contra la sordera, III, 250.
 » de sosa (H. DE ING.), III, 301.
 » de Speedimann, III, 301.
 » de sublimado, III, 301.
 » de sublimado y acónito (Bielt), III, 302.
 » de sublimado corrosivo, III, 302.
 » de sublimado corrosivo de Vogler (F. P.), III, 240.
 » de sublimado corrosivo con glúten, III, 302.
 » de succinato de manganeso, I, 437.
 » de succino croton (F. M.), III, 302.
 » contra los sudores de los tísicos (Burdach), III, 250.
 » sudoríficas calmantes (Dumeril), III, 302.
 » suecas, III, 302.
 » de sulfato de antimonio, III, 304.
 » de sulfato de antimonio y calcio (Radius), III, 304.
 » de sulfato de cinconina, III, 302.
 » de sulfato de hierro, III, 303.
 » de sulfato de hierro compuestas, III, 303.
 » de sulfato de hierro compuestas (F. P.), III, 303.
 » de sulfato de hierro y digital, III, 303.
 » de sulfato de manganeso, I, 438.
- Píldoras de sulfato de morfina, III, 303.
 » de sulfato de quinina, III, 303.
 » de sulfato de quinina (Mialhe), III, 303.
 » de sulfato de quinina opiadas, III, 304.
 » de sulfato de quinina soluble (Mialhe), III, 304.
 » de sulfito de manganeso, I, 438.
 » sulfuro-alcaldas (Mialhe), III, 304.
 » de sulfuro de hierro (Bielt), III, 304.
 » de sulfuro de iodo, III, 228.
 » de sulfuro de potasio (F. P.), III, 304.
 » de tabaco (Augustin), III, 304.
 » de tanino compuestas (Jourdain), III, 305.
 » de tanino contra los sudores nocturnos (Charvet), III, 305.
 » tartáreas (Schroederer), III, 305.
 » tartáreas de Boncio (F. E.), III, 305.
 » de tártaro estibiado (Boudet), III, 258.
 » de tártaro emético (Boudet), III, 305.
 » de tartrato de manganeso, I, 439.
 » de tartrato vitriolado de hierro (Volpelière), III, 305.
 » tebaicas, III, 305.
 » de tela de araña, I, 96.
 » contra la ténia (F. P.), III, 250.
 » tenífugas, III, 305.
 » tenífugas de aceite de helécho, III, 306.
 » tónicas, III, 306.
 » tónicas (Barbier), III, 306.
 » tónicas (Formey), III, 306.
 » tónicas (Gall), III, 306.
 » tónicas (H. DE AL.), III, 308.
 » tónicas (H. DE AM.), III, 306.

- Pildoras tónicas (Ockel), III, 308.
- » tónicas (Stemberger), III, 308.
 - » tónicas (Stoll), III, 307.
 - » tónicas (Whytt), III, 308.
 - » tónicas y antiescrofulosas, III, 307.
 - » tónicas y antiespasmódicas (Dumas), III, 307.
 - » tónicas astringentes (Valch), III, 308.
 - » tónicas de Bacher (F. F.), III, 306.
 - » tónicas de Bacher (H. DE M.), III, 307.
 - » tónicas y calmantes (Courti), III, 307.
 - » tónicas y estimulantes, III, 308.
 - » tónicas y estomacales, III, 308.
 - » tónicas fundentes (Clarus), III, 308.
 - » tónicas de Hulm, III, 290.
 - » tónicas y laxantes (Swe-diaur), III, 308.
 - » tónicas de limaduras de hierro, III, 309.
 - » contra la tos (F. M.), III, 199.
 - » de trementina, III, 309.
 - » de trementina (F. F.), III, 309.
 - » de trementina magistral, III, 309.
 - » de trementina mercuriales de Wilde (F. P.), III, 250.
 - » de trementina oficial (Fau-re), III, 310.
 - » de trementina oficinales (F. P.), III, 310.
 - » de trementina (Trousseau), III, 309.
 - » de los tres diablos (Maet-zius), III, 253.
 - » de los tres extractos (Dou-ble), III, 310.
 - » de tribus (H. DE M.), III, 310.
 - » de tribus con ruibarbo (F. M.), III, 310.
 - » de Tronchin, III, 310.
 - » de Turner, III, 310.
- Pildoras contra las ulceraciones herpéticas (Arnal), III, 251.
- » de unguento napolitano (Fou-quier), III, 312.
 - » de valeriana, III, 310.
 - » de valeriana, añil y opio (Michel), III, 310.
 - » de valerianato de hierro, III, 311.
 - » de valerianato de quinina, I, 315; III, 311.
 - » de valerianato de zinc, I, 365.
 - » de valerianato de zinc (De-vay), III, 311.
 - » de Vallett (F. P.), III, 234.
 - » de Vallett con cubebas (Pu-che), III, 311.
 - » de veratrina (Magendie), III, 312.
 - » de veratrina (Turnbull), III, 312.
 - » vermífugas, III, 311.
 - » vermífugas (Mellin), III, 311.
 - » vermífugas (Peschier), III, 311.
 - » vermífugas de corteza de granado, III, 311.
 - » de vida (Belzeri), III, 312.
 - » de vida (FORM. AL.), III, 312.
 - » viscerales, III, 312.
 - » contra el vómito de las pre-ñadas (Pitschaff), III, 251.
 - » de Wernek, III, 312.
 - » de Zeller, III, 312.
 - » zincadas (Radius), III, 313.
 - » de zumaque, III, 313.
 - » de zumaque aromatizadas, III, 313.
 - » de zumaque venenoso, III, 313.
- Pinabeta, II, 134.
- Pociones, III, 313.
- Pocion absorbente (Ellis), III, 313.
- » absorbente (H. M.), III, 313.
 - » absorbente (Swediaur), III, 313.
 - » de aceite de croton, III, 313.

- Pocion de aceite de croton tiglio, III, 314.
- » de aceite de hígado de bacalao, III, 314.
- » de aceite de hígado de raya, III, 314.
- » de aceite de ricino, III, 314.
- » de aceite de ricino (Righini), III, 314.
- » de aceite de ricino emulsionada, III, 314.
- » de aceite de ricino para los niños (Thompson), III, 314.
- » de aceite de sabina, III, 315.
- » de aceite de tártagos (Martin Solon), III, 315.
- » aceitosa, III, 315.
- » aceitosa (H. M. F.), III, 366.
- » aceitosa purgante, III, 315.
- » con el acetato de amoniaco, III, 316.
- » de acetato de morfina, III, 316.
- » con acetato de potasa, III, 316.
- » ácida astringente (H. DE M.), III, 316.
- » de ácido gálico (Steverson), III, 391.
- » de ácido prúsico, III, 316.
- » de ácido prúsico (Magen-die), III, 316.
- » de acónito, III, 316.
- » aerófora (H. DE M.), III, 316.
- » contra la afonía, III, 342.
- » contra las aftas, III, 343.
- » contra las aftas confluentes gangrenosas, III, 343.
- » de agua destilada de almen-dras amargas (Sundelin), III, 316.
- » con el agua de yerbabuena, III, 317.
- » alcalinas, III, 317.
- » alcalina gomosa, III, 317.
- » alcanforada, III, 317.
- » alterante (Hagen), III, 318.
- » aluminosa, III, 317.
- » aluminosa (Bouchardat), III, 317.
- Pocion aluminosa (Gendrin), III, 317.
- » aluminosa excitante (Rust), III, 317.
- » aluminosa tónica (Schroe-der y Jahn), III, 317.
- » amarga, III, 318.
- » amoniacal, III, 318.
- » amoniacal (Chevalhier), III, 318.
- » analéptica y sedante, III, 318.
- » de angélica, III, 318.
- » angélica (F. E.), II, 153.
- » contra la angina peliculosa (Billard), III, 343.
- » de angustura, III, 318.
- » anisada, III, 318.
- » anodina, III, 318.
- » anodina (F. F.), III, 338.
- » anodina (H. M.), III, 318.
- » de anserina, III, 319.
- » antiácida (Andry), III, 319.
- » antiácida (Chevalhier), III, 319.
- » antiácida (H. DE AL.), III, 319.
- » antiácida (H. M.), III, 313.
- » antiapopléctica (Most), III, 319.
- » antiartrítica (Behrends), III, 319.
- » antiartrítica (H. DE AL.), III, 319.
- » antiartrítica (Perard), III, 319.
- » antiasmática, III, 319.
- » antiasmática amoniacal (Van Swieten), III, 319.
- » anticalculosa (Quarin), III, 320.
- » anticataléptica (Schroeder), III, 320.
- » anticatarral, III, 320.
- » anticatarral (Kortum), III, 320.
- » anticolérica, III, 320.
- » anticolérica (Ammann), III, 320.
- » anticolérica (Radius), III, 320.

- Pocion anticolérica (Voger), III, 320.
- » anticolérica estibiada, III, 320.
- » anticrupal (Albers), III, 320.
- » antidiarréica, III, 321.
- » antidiarréica (Berends), III, 321.
- » antidiarréica (Goelis), III, 321.
- » antidiarréica (Jahn), III, 321.
- » antidisentérica (Remer), III, 321.
- » antidisentérica (Richter), III, 321.
- » antidisentérica (Spielmann), III, 321.
- » antiemética, III, 321.
- » antiemética (Chaussier), III, 322.
- » antiemética (Dubois), III, 322.
- » antiemética (Gallereux), III, 322.
- » antiemética (H. DE M.), III, 316.
- » antiemética y astringente (Barthe), III, 322.
- » antiemética de Riverio (F. F.), III, 322.
- » antiepiléptica (Pii), III, 322.
- » antiepiléptica amoniaca, III, 322.
- » antiepiléptica opiada, III, 323.
- » antiescorbútica, III, 323.
- » antiescorbútica (Frank), III, 323.
- » antiescrofulosa, III, 323.
- » antiescrofulosa (Cima), III, 323.
- » antiescrofulosa (Henn), III, 323.
- » antiespasmódica, III, 110, 324 y 325.
- » antiespasmódica (F. F.), III, 324.
- » antiespasmódica (Forget), III, 325.
- » antiespasmódica (Wendt), III, 325.
- Pocion antiespasmódica amoniaca, III, 325.
- » antiespasmódica anisada, III, 325.
- » antiespasmódica emulsiva (Richter), III, 325.
- » antiespasmódica etérea, III, 326.
- » antiespasmódica moscada, III, 325.
- » antifebril (H. DE AL.), III, 323.
- » antiflogística y sudorífica, III, 326.
- » antiyalactopoyética (P. Frank), III, 324.
- » antigonorreica (Delpech), III, 326.
- » antigonorreica (Handel), III, 324.
- » antigonorreica (Pierquin), III, 324.
- » antihelmintica, III, 326.
- » antihelmintica (H. DE M.), III, 326.
- » antihelmintica (Schwart), III, 326.
- » antihemicránica, III, 326.
- » antihemicránica opiada, III, 326.
- » antihemorrágica (Laidlamo), III, 326.
- » antihidrópica (Leake), III, 327.
- » antihidrópica (Schmidt), III, 327.
- » antihistérica (F. F.), III, 327.
- » antihistérica (Josat), III, 327.
- » antiictérica (Baldinger), III, 327.
- » antimetrorrágica (Osiander), III, 327.
- » antimonial, III, 327.
- » antimonial (H. M.), III, 328.
- » de antimonio diaforético, III, 328.
- » antinefritica, III, 328.
- » antineuropática (Ranque), IV, 134.

- Pocion antiperiódica, III, 328.
- » antiraquítica (Freiler), III, 328.
 - » antireumática (Wardeleborth), III, 328.
 - » antiséptica, III, 328 y 329.
 - » antiséptica alcanforada, II, 457; III, 329.
 - » antiséptica tónica, III, 329.
 - » antisifilítica, III, 329.
 - » antisifilítica (H. M.), III, 329.
 - » antisifilítica (H. M. F.), III, 329.
 - » antisifilítica (Mendaca), III, 329.
 - » antisifilítica (Parent), III, 329.
 - » antitetánica (Fournier), III, 330.
 - » antitetánica estibiada (Foy), III, 330.
 - » antitetánica de Fouquier (H. DE M.), III, 330.
 - » antitísica (Amelung), III, 330.
 - » antitísica (Ebens), III, 330.
 - » antitísica (Selle), III, 327.
 - » antivomitiva, III, 330.
 - » aperitiva, III, 330.
 - » de arnica (Rener), III, 331.
 - » aromática, III, 330.
 - » aromática (F. F.), III, 331.
 - » arsenical, III, 331.
 - » de arseniato de amoníaco, III, 331.
 - » de asa fétida (Millar), III, 331.
 - » astringente, III, 331 y 332.
 - » astringente con tanino (Bouchardat), III, 333.
 - » astringente (Clarus), III, 332.
 - » astringente (Fouquier), III, 332.
 - » astringente (Gamba), III, 332.
 - » astringente (H. DE AM.), III, 332.
 - » astringente (H. DE IT.), III, 332.
 - » astringente (H. DE M.), III, 332.
- Pocion astringente aceitosa (H. DE M.), III, 333.
- » astringente (H. DE S. ANT.), III, 332.
 - » astringente (Jahn), III, 332.
 - » astringente (Oslander), III, 333.
 - » astringente (Pradel), III, 333.
 - » astringente de gayuba (Radius), III, 333.
 - » astringente (Sundelin), III, 333.
 - » astringente de catecú, III, 333.
 - » atemperante, III, 333.
 - » atemperante (Choulant), III, 333.
 - » atemperante (H. M.), III, 334.
 - » atrófica, III, 333.
 - » atrófica de Magendie (H. DE M.), III, 334.
 - » atemperante (Sydenham), III, 334.
 - » atemperante amoniacal, III, 334.
 - » azufrada (Kopp), III, 334.
 - » balsámica (Chopart), I, 110; III, 334.
 - » balsámica (Mialhe), III, 334.
 - » balsámica de copaiba, III, 334.
 - » de bálsamo de copaiba emulsionada, III, 335.
 - » de beleño, III, 335.
 - » de belladona, III, 335.
 - » benzóica, III, 335.
 - » béquica (John), III, 335.
 - » béquica (Recamier), III, 335.
 - » béquica (Riel), III, 335.
 - » béquica expectorante, II, 440; III, 335.
 - » contra las blenorragias crónicas (Marchand), III, 343.
 - » boratada, III, 336.
 - » de borato de manganeso, I, 434.
 - » de bromuro de potasio (Magendie), III, 336.
 - » de cantáridas de Van Mons. II, 266.

- Pocion calmante, II, 458; III, 336 y 337.
- » calmante (Buttner), III, 337.
 - » calmante (Chaussier), III, 337.
 - » calmante (F. F.), III, 338.
 - » calmante (H. DE AL.), III, 337.
 - » calmante (Millar), III, 337.
 - » calmante (Pitschaff), III, 337.
 - » calmante (Schneider), III, 338.
 - » calmante y antiespasmódica, III, 338.
 - » calmante y antiespasmódica (Spielmann), III, 338.
 - » calmante etérea, III, 338.
 - » calmante extemporánea (Cap), II, 398.
 - » calmante y laxante (Kopp), III, 339.
 - » calmante de Schmidtman (Radius), III, 337.
 - » calmante de Schneider (Radius), III, 338.
 - » capivi (Willis), III, 339.
 - » de carbonato de amoniaco (Guerard), III, 339.
 - » con el carbonato de amoniaco (Hamilton), III, 339.
 - » de carbonato de potasa, III, 339.
 - » contra la cardialgia (Andry), III, 343.
 - » de cariofilea, III, 339.
 - » de Carmichael, III, 339.
 - » carminativa (Dehaen), III, 340.
 - » de castóreo, III, 340.
 - » catártica, III, 340.
 - » catártica (Hufeland), III, 340.
 - » catártica (Mende), III, 340.
 - » catártica (Richter), III, 340.
 - » contra la cefalalgia, III, 343.
 - » de cera (Noll), III, 340.
 - » de cianuro de potasio (Bally), III, 340.
 - » de cianuro de potasio (Magendie), III, 340.
 - » de cianuro de zinc, III, 341.
- Pocion de cicuta, III, 341.
- » de cinconina, III, 341.
 - » de cinconina (Mariani), III, 341.
 - » de cinosbastos, I, 151.
 - » con clara de huevo (Ricord), III, 341.
 - » de cloro, III, 341.
 - » contra la clorosis, III, 343.
 - » de cloro-platinado de sodio, III, 341.
 - » clórica, III, 341.
 - » de cloruro de bario, III, 341.
 - » de cloruro de bario (Lutero-ti), III, 341.
 - » de cloruro de manganeso, I, 436.
 - » de cloruro de platino, III, 342.
 - » de cochinilla (Wachtl), III, 342.
 - » de coclearia compuesta, III, 342.
 - » de cólchico (Forget), III, 342.
 - » de coclearia cítrica (Vogel), III, 342.
 - » colchítica, III, 342.
 - » de codeina, I, 158; III, 342.
 - » contra los cólicos (Cuffer), III, 343.
 - » de colombo compuesta, III, 342.
 - » contra la coqueluche (Buettner), III, 343.
 - » contra la coqueluche (Lervrat Perreton), III, 344.
 - » contra la coqueluche (Pitzcheff), III, 344.
 - » contra la coqueluche (Roberto Tomas de Salisbury), III, 343.
 - » contra la coqueluche (Trousseau), III, 344.
 - » contraestimulante con quermes, III, 345.
 - » de contrayerba, III, 348.
 - » cordial, III, 348.
 - » cordial (F. F.), III, 331.
 - » cordial (H. DE PARIS), III, 348.

- Pocion cordial diurética, III, 356.
- » cordial y diurética (Fouquier), III, 348.
 - » cordial con vainilla, III, 348.
 - » de cornezuelo de centeno, III, 348.
 - » de cornezuelo de centeno (Boudin), III, 349.
 - » contraestimulante, III, 345.
 - » de cornezuelo de centeno opiada (Schussmann), III, 348.
 - » de creosota (Pitschaff), III, 349.
 - » de croton, III, 349.
 - » contra el crup, III, 344.
 - » contra el crup (Godefroy), III, 344.
 - » contra el crup (Jadelot), III, 344.
 - » de Dehaen, III, 349.
 - » de Delpech, III, 349.
 - » diaforética, III, 349.
 - » diaforética (Bouchardat), III, 349.
 - » diaforética (H. DE M.), III, 349.
 - » contra la diarrea (Dorvault), III, 344.
 - » contra la diarrea de los tísicos (Cottereau), III, 345.
 - » difusible, III, 350.
 - » de digital (Piedagnel), III, 349.
 - » de digital estibiada (Wendt), III, 350.
 - » de digitalina, I, 172.
 - » de digitalina (Homolle y Quevenne), III, 350.
 - » contra la disenteria (Helvetius), III, 345.
 - » contra la dismenorrea (Raciborski), III, 345.
 - » contra la disenteria (Requin), III, 345.
 - » diurética, III, 350 y 351.
 - » diurética (Buchard), III, 351.
 - » diurética (F. F.), III, 357.
 - » diurética (Fouquier), III, 351.
- Pocion diurética (Guersant), III, 351.
- » diurética (H. DE AL.), III, 351.
 - » diurética (Halle), III, 351.
 - » diurética (H. M.), III, 351.
 - » diurética (Schmitt), III, 351.
 - » diurética activa, III, 351.
 - » diurética amarga (Meyer), III, 351.
 - » diurética amoniacal, III, 351.
 - » diurética y calmante, III, 352.
 - » diurética y calmante (Jahn), III, 352.
 - » diurética de la Caridad, III, 352.
 - » diurética colchítica, III, 352.
 - » diurética con digital (H. DE M.), III, 352.
 - » diurética escilitica (H. DE M.), III, 352.
 - » diurética etérea, III, 352.
 - » diurética laxante (Martius), III, 352.
 - » diurética y sedante (Krause), III, 352.
 - » del Dr. Andry contra los envenenamientos por los ácidos minerales, III, 353.
 - » del Dr. Bayle, III, 335.
 - » del Dr. Cory, III, 314.
 - » del Dr. Goelis, III, 353.
 - » del Dr. Mongenot contra la afonía, III, 353.
 - » del Dr. Williams Kerr, III, 353.
 - » contra los dolores nefríticos, III, 345.
 - » de Donovan, III, 353.
 - » drástica (Fischer), III, 347.
 - » drástica (Tessier), III, 347.
 - » dulcificante, III, 353.
 - » dulcificante (H. DE IT.), III, 353.
 - » dulcificante (Wendt), III, 353.
 - » dulcificante amoniacal, III, 353.

- Pocion efervescente (Chaussier), III, 354.
- » efervescente de Gaubius (Boerhaave), III, 354.
- » efervescente para limonada gaseosa, III, 354.
- » contra la hematuria (Linck), III, 346.
- » contra la embriaguez, III, 345.
- » emenagoga, III, 354.
- » emenagoga (Desbois), III, 354.
- » emenagoga (Pischaff), III, 354.
- » emenagoga (Sundelin), III, 354.
- » emenagoga calibeada, III, 355.
- » emenagoga (Furnari), III, 354.
- » emenagoga iodurada, III, 355.
- » emética (H. M.), III, 355.
- » emética (H. DE M.), III, 355.
- » emética (H. DE AL.), III, 355.
- » emética con ipecacuana (H. DE M.), III, 355.
- » con emético (Cayol), III, 355.
- » de emetina, I, 177.
- » emetizada, III, 355.
- » emetizada (Augustin), III, 355.
- » emetizada y nitrada (Richter), III, 356.
- » emeto-catártica (Boudin), III, 356.
- » emeto-catártica (H. DE M.), III, 356.
- » emeto-escilítica, III, 356.
- » de emetina reformada (H. DE M.), III, 356.
- » emulsiva (H. M. F.), III, 356.
- » emulsiva alcanforada (H. M. F.), III, 356.
- » emulsiva de jalapa, III, 356.
- » emulsiva con jalapa (H. M. F.), III, 356.
- » emulsiva de maná, III, 356.
- Pocion emulsiva nitrada (H. M. F.), III, 356.
- » emulsiva opiada (H. M. F.), III, 356.
- » de émula campana compuesta, III, 356.
- » contra la epilepsia (Sem), III, 345.
- » de ergotina, I, 179; III, 356.
- » contra la escarlatina (Sthal), III, 345.
- » escilítica (F. F.), III, 357.
- » escilítica (H. M.), III, 357.
- » escilítica diurética, III, 357.
- » de espino serval, III, 359.
- » estibiada (Breschet), III, 359.
- » estibiada (Louis), III, 359.
- » estibiada (Preziozi), III, 359.
- » estibiada (Rayer), III, 359.
- » estibio-opiada (Collin), III, 359.
- » estibio-opiada (Peyson), III, 359.
- » estibio-opiada (Seré), III, 359.
- » estibio-opiada de Peyson (H. DE M.), III, 359.
- » estimulante, III, 360.
- » estimulante (Alibert), III, 360.
- » estimulante (Berends), III, 360.
- » estimulante (Lentin), III, 360.
- » estimulante de arnica, III, 360.
- » estimulante aromática, III, 360.
- » estimulante de brucina (Magendie), III, 360.
- » estimulante diaforética, III, 360.
- » estimulante con estricnina (Magendie), III, 361.
- » estimulante difusible, III, 360.
- » estimulante de ipecacuana, III, 361.
- » estimulante de menta piperita, III, 361.

- Pocion estíptica, III, 361.
- » estomacal, III, 361.
 - » de estriçnina, III, 361.
 - » de estriçnina (H. DE M.), III, 362.
 - » etérea (H. M.), III, 362.
 - » etérea alcanforada (H. DE AL.), III, 362.
 - » excitante (Harless), III, 357.
 - » excitante (H. DE AL.), III, 357.
 - » excitante (Schubart), III, 358.
 - » excitante alcohólica, III, 357.
 - » excitante amoniaca (Ammon), III, 357.
 - » excitante estibiada (Radius), III, 358.
 - » excitante iodada (Kluge), III, 358.
 - » expectorante, III, 320 y 358.
 - » expectorante (H. DE AL.), III, 358.
 - » expectorante antimoniada, III, 358.
 - » expectorante de digital, III, 359.
 - » de extracto de caléndula (Ockel), III, 362.
 - » con el extracto de quinina (Chomel), III, 361 y 362.
 - » febrífuga, III, 362.
 - » febrífuga (Chrestien), III, 362.
 - » febrífuga (Frank), III, 362.
 - » febrífuga (H. DE AL.), III, 362.
 - » febrífuga (H. DE AM.), III, 363.
 - » febrífuga (H. M. F.), III, 363.
 - » febrífuga (Plenk), III, 363.
 - » febrífuga (Radius), III, 363.
 - » febrífuga alcanforada (H. M. F.), III, 363.
 - » febrífuga amoniaca, III, 363.
 - » febrífuga antiespasmódica (Chaberly), III, 363.
 - » febrífuga etérea (H. M. F.), III, 363.
- Pocion febrífuga opiada (H. M. F.), III, 363.
- » ferruginosa, III, 363.
 - » fosforada, III, 364.
 - » fosforada con éter (Soubeiran), III, 364.
 - » fosforada gomosa (Wendt), III, 364.
 - » de ferrocianato de quinina, III, 363.
 - » fundente, III, 364.
 - » fundente (H. DE IT.), III, 364.
 - » fundente (Selle), III, 364.
 - » fundente (Schaeffer), III, 364.
 - » fundente nervina, III, 364.
 - » contra la gangrena (Hunter), III, 346.
 - » gaseosa (F. F.), III, 322.
 - » contra las gastralgias (Boudin), III, 346.
 - » contra la gastralgia (Sandras), III, 346.
 - » de geofrea, III, 365.
 - » de Goelis, III, 365.
 - » de goma amoniaco, III, 365.
 - » de goma amoniaco (H. DE M.), III, 365.
 - » de goma quino, III, 365.
 - » gomosa (F. F.), III, 365.
 - » gomosa (H. M.), III, 365.
 - » gomosa (H. M. F.), III, 365.
 - » gomosa estimulante (Meyer), III, 366.
 - » contra la gota, IV, 14.
 - » contra la gota (Henrotay), III, 346.
 - » de helecho macho, III, 366.
 - » contra las hemorragias (Henriette), III, 346.
 - » contra las hemorragias (Martin Solon), III, 346.
 - » contra las hemorragias (Trusen), III, 346.
 - » contra las hemorragias atónicas (Gall), III, 346.
 - » hemostática, III, 366.
 - » hemostática (Broussonnet), III, 366.
 - » hemostática (Dumas), III, 366.

- Pocion hidragoga, III, 366.
- » hidragoga (Gaubius), III, 367.
 - » hidragoga (Lentin), III, 367.
 - » hidragoga (Vogt), III, 367.
 - » hidragoga emetizada, III, 367.
 - » hidrocianica (Magendie), III, 374.
 - » de hinojo acuático, III, 367.
 - » con hollin (H. DE M.), III, 367.
 - » de Hufeland contra la hidropesía espasmódica, III, 367.
 - » incidente (H. M.), III, 367.
 - » incisiva (Barbier), III, 367.
 - » incisiva (F. F. DE 1818), III, 368.
 - » iodurada, III, 368.
 - » iodurada (Cullerier), III, 368.
 - » iodurada (Defermon), III, 367.
 - » con ioduro de hierro (Cullerier), III, 368.
 - » con ioduro de potasio, III, 355 y 368.
 - » de ioduro de potasio (Wardewortk), III, 368.
 - » de ioduro de potasio contra la neumonía crónica (Upshur), III, 368.
 - » de ioduro de potasio y digital, III, 368.
 - » de ioduro de zinc y estriquina, I, 189; III, 368.
 - » de ioduro de zinc y morfina, I, 268.
 - » de ioduro de zinc y morfina (Bouchardat), III, 368.
 - » de ipecacuana, III, 368.
 - » de ipecacuana (Haller), III, 369.
 - » de ipecacuana compuesta, III, 369.
 - » de ipecacuana estibiada, III, 369.
 - » de ipecacuana vomitiva, III, 369.
 - » de jabon medicinal, III, 369.
- Pocion de jalapa (Velpeau), III, 369.
- » de Juan Roy contra la coqueluche, III, 369.
 - » de Jussieu contra esputos de sangre, III, 369.
 - » de Kers, III, 369.
 - » de lactato de quinina, III, 369.
 - » de laurel real, III, 370.
 - » laxante, III, 369 y 370.
 - » laxante (Fernelio), III, 370.
 - » laxante (H. DE AL.), III, 370.
 - » laxante de maná (F. E.), II, 151.
 - » laxante de Viena, III, 370.
 - » de licopodio (Hufeland), III, 370.
 - » litontriptica, III, 370.
 - » de lobelia (Leclerc), III, 371.
 - » de Lockstaedt, III, 371.
 - » de magnesia (Gobley), III, 371.
 - » de magnesia compuesta, III, 371.
 - » de maná, III, 371.
 - » de maná compuesta, III, 371.
 - » de manito, III, 371.
 - » contra el mareo (Gnepratte), III, 346.
 - » minorativa (Boerhaave), III, 371.
 - » de Mongenot, III, 371.
 - » morfinosa (H. M.), III, 372.
 - » moscada (Dubois), III, 372.
 - » moscada (H. M.), III, 372.
 - » moscada y opiada (Cheselden), III, 372.
 - » mucilaginosa opiada (Clarus), III, 372.
 - » mucilaginosa y sedante (Hufeland), III, 372.
 - » muriática, III, 372.
 - » de musgo de Córcega, III, 372.
 - » negra (Gall), II, 456.
 - » nervina con valeriana, III, 372.
 - » de ninfea, III, 373.
 - » nitrada, III, 373.

- Pocion nitrada estibiada (Thilenius), III, 373.
- » de nitrato de plata (Trousseau), III, 373.
 - » obstétrica (Dewes), III, 373.
 - » obstétrica (Velpeau), III, 373.
 - » ocítica (Charles), III, 373.
 - » oleo-catártica (H. M.), III, 340.
 - » oleo-fosforada de Souveiran (Mialhe), III, 364.
 - » opiada (H. M.), III, 373.
 - » opiada (H. DE ING.), III, 374.
 - » contra la parálisis (Fischer), III, 347.
 - » contra la paraplegia (Tessier), III, 347.
 - » pectoral, III, 374.
 - » pectoral (F. P.), III, 374.
 - » pectoral (H. M.), III, 374.
 - » pectoral (H. M. F.), III, 365.
 - » pectoral (Magendie), III, 374.
 - » pectoral (Rayer), III, 374.
 - » pectoral accitosa (Virey), III, 374.
 - » pectoral alcanforada (H. M. F.), III, 366.
 - » pectoral amarga, III, 374.
 - » pectoral amoniacoal, III, 375.
 - » pectoral de émula campana, III, 375.
 - » pectoral nitrada (H. M. F.), III, 366.
 - » pectoral opiada (H. M. F.), III, 366.
 - » pectoral tónica, III, 375.
 - » de percloruro de platino (Hoefer), III, 342.
 - » de percloruro de platino (Mialhe), III, 342.
 - » piroacética (Pitschaft), III, 375.
 - » de Pitschaft modificada, III, 375.
 - » pirolignica, III, 375.
 - » platínica (Hoefer), III, 342.
 - » platínica (Mialhe), III, 342.
 - » de poligala, III, 375.
 - » purgante, III, 375 y 376.
 - » purgante (Andry), III, 376.
- Pocion purgante (Barataus), III, 376.
- » purgante (Cory), III, 314.
 - » purgante (Cruveilhier), III, 377.
 - » purgante (F. F.), II, 60; III, 377.
 - » purgante (Beaumont), III, 377.
 - » purgante (H. M. F.), III, 376.
 - » purgante (Martin Solon), IV, 135.
 - » purgante con aceite de ricino, III, 377.
 - » purgante de aceite de ricino y magnesia (Mialhe), III, 377.
 - » purgante de aceite de tartago, III, 377.
 - » purgante aceitosa (Lentin), III, 377.
 - » purgante acídula, III, 377.
 - » purgante agradable, III, 377.
 - » purgante con café, III, 378.
 - » purgante de citrato de magnesia (Eymael), III, 378.
 - » purgante y diurética (Tessier), III, 378.
 - » purgante con jalapa, III, 378.
 - » purgante de maná, III, 315 y 378.
 - » purgante para los niños, III, 378.
 - » purgante de los pintores, IV, 132.
 - » purgante quermetizada, III, 378.
 - » purgante con resina de jalapa, III, 378.
 - » purgante de ruibarbo, III, 379.
 - » purgante de tamarindos, III, 379.
 - » purgante y tónica (Roucher), III, 379.
 - » purgante y vermífuga (Maccartan), III, 379.
 - » de quasia, III, 379.

- Poción de Quarin contra la tos su-
focativa, III, 379.
- » quermetizada, III, 379.
 - » quermetizada (H. M. F.), III, 366.
 - » quermetizada contraestimulante, III, 379.
 - » de quina (H. M. F.), III, 380.
 - » de quina alcanforada (H. M. F.), III, 380.
 - » de quina y canela (Frank), III, 380.
 - » de quina compuesta, III, 380.
 - » de quina compuesta contra las neuralgias (Hermel), III, 380.
 - » de quina etérea (H. M. F.), III, 380.
 - » de quina opiada (H. M. F.), III, 380.
 - » de quina arsenical (Boudin), III, 380.
 - » de raíz de espigelia, III, 380.
 - » de ratania, III, 380.
 - » de resineona, III, 381.
 - » resolutive, III, 381.
 - » resolutive (Hein), III, 381.
 - » contra el reumatismo articular crónico (Bounyer), III, 347.
 - » etérea de Riverio, III, 381.
 - » de Roberto Tomas de Salisbury, III, 381.
 - » de salep, III, 381.
 - » salina (H. M.), III, 381.
 - » salina purgante, III, 381.
 - » saturnina opiada (Ritther), III, 381.
 - » sedante, III, 382.
 - » sedante (F. B.), III, 382.
 - » sedante (Fouquier), III, 382.
 - » sedante (Hlenke), III, 382.
 - » sedante (H. DE IT.), III, 382.
 - » sedante (Richter), III, 382.
 - » sedante emulsiva (Rothamel), III, 383.
 - » sedante (Sundelin), III, 382.
 - » sedante aceitosa (Jahn), III, 382.
- Poción sedante amoniacal (Hecker), III, 382.
- » sedante de digital, III, 382.
 - » de simaruba opiada (Lemarchand), III, 383.
 - » de Spielmann, III, 383.
 - » de Sthal, III, 383.
 - » de Stearns, II, 358; III, 383.
 - » de Stuetz contra el tétanos, III, 383.
 - » sucinada, III, 383.
 - » de succinato de amoniaco, III, 384.
 - » sudorífica (Remer), III, 384.
 - » sudorífica amoniacal, III, 384.
 - » sudorífica antimoniada, III, 384.
 - » de sulfato de manganeso, I, 438.
 - » de sulfato de quinina, III, 384.
 - » de sulfato de quinina (H. DE AM.), III, 385.
 - » de sustancias fétidas (F. F.), III, 327.
 - » de tanino, III, 385.
 - » contra la ténia, III, 347.
 - » contra la ténia (Deslandes), III, 347.
 - » tónica, III, 385.
 - » tónica (H. M.), III, 385.
 - » tónica (H. DE NIÑOS), III, 385.
 - » tónica (H. DE P.), III, 385.
 - » tónica (Jahn), III, 385.
 - » tónica (Lerminier), III, 385.
 - » tónica (Recamier), III, 386.
 - » tónica (Vogt), III, 386.
 - » tónica y astringente, III, 386.
 - » tónica y astringente (Wendt), III, 386.
 - » tónica y estimulante (Dubois), III, 138.
 - » tónica y estomacal, III, 386.
 - » tónica y excitante (Fiard), III, 386.
 - » tónica de malato de hierro, III, 386.
 - » tónica y opiada, III, 386.
 - » tónica vermífuga, III, 386.

- Poción de trementina , III , 387.
- » trementinada (Debreyne) , III , 387.
 - » de trementina contra la ténia (Levache) , III , 387.
 - » de tridacio , III , 387.
 - » de Trusen contra las hidropesías , III , 387.
 - » contra las úlceras cancerosas de la boca de los niños (Hunt) , III , 348.
 - » de vainilla (Hersokmann) , III , 387.
 - » de valerianato de zinc (Devay) , III , 387.
 - » vermífuga , III , 111 , 387 y 388.
 - » vermífuga (Stoll) , III , 388.
 - » vermífuga de esencia de trementina , III , 388.
 - » vermífuga purgante , III , 388.
 - » vinosa de énula campana (H. DE AL.) , III , 388.
 - » vomitiva , III , 388 y 389.
 - » vomitiva (Magendie) , III , 389.
 - » vomitiva compuesta , III , 389.
 - » vomitiva con emético , III , 389.
 - » vomitiva con ipecacuana , III , 389.
 - » vomitiva de Magendie (F. P.) , III , 389.
 - » vomitiva de Magendie (Hufeland) , III , 389.
 - » contra los vómitos (Debreyne) , III , 347.
 - » contra los vómitos de las preñadas (Privat) , III , 347.
 - » de Wendt , III , 389.
 - » de zincater , III , 389.
- Polvos , III , 389.
- Polvo de abrotano , I , 53.
- » absorbente , III , 389 , 390 y 458.
 - » absorbente (Brera) , III , 390.
 - » absorbente magnesiano , III , 390.
 - » absorbente (Tode) , III , 390.
- Polvo absorbente y estomacal , III , 390.
- » de acacia egipcia , I , 54.
 - » de acebo , I , 54.
 - » de acetato de plomo (F.) , III , 461.
 - » de acibar , I , 61 ; III , 390.
 - » de acibar (F. F.) , III , 462.
 - » de acibar compuesto , III , 390.
 - » de acibar compuesto (F. DE L.) , III , 390.
 - » de ácido benzóico (Sundelin) , III , 391.
 - » de ácido benzóico alcanforado , III , 390.
 - » de ácido cáncico , I , 62.
 - » de ácido cítrico (F. F.) , III , 474.
 - » de ácido tártrico (F. F.) , I , 65 ; III , 474.
 - » de acónito , I , 66.
 - » de acónito borácico (Fritze) , III , 391.
 - » de adelfa , I , 68.
 - » aeróforo (Hufeland) , III , 391.
 - » aeróforo (Meirieu) , III , 450.
 - » aeróforo marcial (Hufeland) , III , 391.
 - » de agárico blanco (F. F.) , I , 69 ; III , 391.
 - » de agárico mercurial , III , 391.
 - » de agárico opiado , III , 391.
 - » de agave , I , 69.
 - » de agnocasto , I , 70.
 - » de agrimonia , I , 70.
 - » de ajenjo , I , 71.
 - » de ajenjo marino , I , 72.
 - » de albahaca , I , 74.
 - » de albayalde (F. F.) , III , 458.
 - » alcalino gomoso , II , 382.
 - » de alcanfor , I , 75.
 - » alcanforado , III , 392.
 - » alcanforado (F. F.) , III , 391.
 - » alcanforado (H. DE AL.) , III , 392.
 - » alcanforado antimoniado , III , 392.
 - » de alcaravea , I , 76.

- Polvo de alcornoque, I, 76.
- » de alholvas compuesto (F. F.), II, 292.
 - » de Ailhaut, III, 391.
 - » alimenticio, III, 392.
 - » de almáciga, I, 78.
 - » de almidon iodurado contra la ascitis (Burnet), III, 455.
 - » de almidon y quina aluminoso (Recamier), III, 392.
 - » de almidon y quina con canela (Recamier), III, 392.
 - » de almizcle, I, 80.
 - » de almizcle (F. F.), III, 417.
 - » de almizcle compuesto, III, 477.
 - » de almizcle estibio-mercurial (J. P. Frank), III, 392.
 - » de alquimila, I, 81.
 - » alterante, III, 392.
 - » alterante (F. M.), III, 392.
 - » alterante (Hufeland), III, 392.
 - » alterante (Sundelin), III, 393.
 - » alterante (Vogt), III, 393.
 - » de alumbre (F. F.), III, 417.
 - » de alumbre calcinado, I, 82.
 - » de alumbre y canela (Jahn), III, 393.
 - » de alumbre y catecú, III, 393.
 - » de alumbre y quina (Schoeys), III, 393.
 - » de alumbre y quina (F. P.), III, 443.
 - » de alúmina, I, 81.
 - » aluminoso (H. DE M.), III, 393.
 - » aluminoso (Perrin), III, 393.
 - » aluminoso (Recamier), III, 393.
 - » aluminoso (Vogel), III, 393.
 - » amargo (Schlesier), III, 393.
 - » amargo alcalino (Heim), III, 393.
 - » amargo ferruginoso, III, 402.
- Polvo contra la amaurosis (H. DE M.), III, 421.
- » de ambar compuesto, III, 394.
 - » de ambar gris, I, 83.
 - » de ambar moscado, III, 393.
 - » de ambarilla, I, 83.
 - » contra la amenorrea (Fouquier), III, 421.
 - » contra la amenorrea (Tshierchki), III, 421.
 - » ammonígeno (Ruelle), III, 394.
 - » de amomo racimoso (F. F.), III, 417.
 - » amoniaco alcanforado, III, 394.
 - » de angélica, I, 89.
 - » de angelina, I, 89.
 - » de angustura verdadera, I, 89.
 - » de angustura verdadera (F. F.), III, 467.
 - » de angustura falsa (F. F.), III, 467.
 - » de anís, I, 90.
 - » de anís (F. F.), III, 430.
 - » anodino (Helvetius), III, 394.
 - » antiácido, III, 394 y 458.
 - » antiartrítico, III, 394.
 - » antiartrítico (Hartmann), III, 394.
 - » antiartrítico (H. DE AL.), III, 394.
 - » antiartrítico (Marc), III, 394.
 - » antiartrítico (Richter), III, 395.
 - » antiartrítico purgante, III, 395.
 - » antiartrítico purgante (H. M. F.), III, 473.
 - » antiasmático, III, 395.
 - » antiasmático (Urban), III, 395.
 - » antiatrófico (Hufeland), III, 395.
 - » antiblenorrágico (Eisermann), III, 395.
 - » anticarcinomatoso (Fr. Cosme), III, 395.

- Polvo anticardíalgico (Schubart), III, 395.
- » antidiarréico, III, 397.
- » antidiarréico (Brera), III, 397.
- » anticataléptico (Schroeder), III, 396.
- » anticatarral (Burchard), III, 396.
- » anticatarral (F. A.), III, 396.
- » anticatarral (H. DE AL.), III, 396.
- » anticatarral (Jahn), III, 396.
- » anticatarral (P. Frank), III, 396.
- » anticefálico (Hufeland), III, 396.
- » anticlorótico (Dubois), III, 396.
- » anticlorótico (H. DE AL.), III, 458.
- » anticlorótico (H. DE M.), III, 396.
- » anticlorótico (Richter), III, 397.
- » anticlorótico (Sta. Maria), III, 397.
- » anticolérico, III, 397.
- » anticrupal (Kopp), III, 397.
- » antidiarréico (Trousseau), III, 397.
- » antidotario (Taddei), III, 397.
- » antiemético para los niños (Rosen), III, 397.
- » antiepsórico, III, 399.
- » antiepiléptico (Behrends), III, 397.
- » antiepiléptico (Bresler), III, 397.
- » antiepiléptico (Hufeland), III, 398.
- » antiepiléptico (Hildenbrant), III, 398.
- » antiepiléptico (H. DE AL.), III, 398.
- » antiepiléptico (Kahleiss), III, 398.
- » antiepiléptico (Kirckhoff), III, 398.
- » antiepiléptico (Losen), III, 398.
- Polvo antiepiléptico (Quincy), III, 398.
- » antiepiléptico (Regolo), III, 398.
- » antiepiléptico (Rosensthal), III, 399.
- » antiepiléptico (Tott), III, 399.
- » antiepiléptico de Guteta, III, 453.
- » antiepsórico (Bally), III, 399.
- » antiepsórico (Chaussier), III, 399.
- » antiepsórico (Richter), III, 399.
- » antiescrofuloso (Ammon), III, 399.
- » antiespasmódico, III, 400.
- » antiespasmódico (Brachet), III, 400.
- » antiespasmódico (Devay), III, 400.
- » antiespasmódico (Duble), III, 400.
- » antiespasmódico (H. DE AL.), III, 401.
- » antiescrofuloso (F. DE H.), II, 142.
- » antiespasmódico (H. DE IT.), III, 400.
- » antiespasmódico (Magen-die), III, 401.
- » antiespasmódico (Recamier), III, 401.
- » antiescrofuloso (Rust), III, 399.
- » antiescrofuloso (Sichel), III, 400.
- » antiespasmódico (Tseleppe), III, 401.
- » antiespasmódico (Wepfer), III, 401.
- » antiespasmódico amoniaco, III, 401.
- » antiespasmódico moscado cinabarino, III, 401.
- » antiespasmódico para los niños (Hufeland), III, 401.
- » antiespasmódico purgante (Hems), III, 401.
- » antifebril compuesto (Brera), III, 402.

- Polvo antiflogístico (Rust), III, 402.
- » antigastrálgico, III, 402.
- » antigastrálgico (Scroeder), III, 402.
- » antihéctico (Goelis), III, 402.
- » antihelmíntico, III, 402.
- » antihelmíntico (Dupuytren), III, 403.
- » antihelmíntico (F. N. P.), III, 403.
- » antihelmíntico (H. DE M.), III, 403.
- » antihelmíntico (H. M. F.), III, 402.
- » antihelmínticos de Palacios (F. N. P.), III, 403.
- » antihematémico (Denton), III, 403.
- » antihemorrágico (Hecker), III, 403.
- » antihemorrágico (Krimmer), III, 403.
- » antihemorroidal (H. DE AL.), III, 403.
- » antiherpético (Bielt), III, 403.
- » antiherpético (Polya), III, 408.
- » antihistérico, III, 403.
- » antiictérico (Schneider), III, 403.
- » antileucorréico (Rust), III, 404.
- » antimetrorrágico (Brera), III, 404.
- » antimetrorrágico (Trousseau), III, 404.
- » antimonial, III, 404.
- » antimonial (F. F.), III, 404.
- » antimonial (Sichel), III, 405.
- » antimoniales de escamonea (F. E.), III, 429.
- » antimoniales de escamonea (F. F.), III, 429.
- » antimonial de James, III, 456.
- » de antimonio marcial diaforético (Keup), III, 404.
- » de antimonio mercurial (Smith), III, 405.
- Polvo antineurálgico (J. P. Frank), III, 405.
- » antineurálgico (Molinari), III, 405.
- » antioftálmico opiado (Sichel), III, 405.
- » antioftálmico resolutivo, III, 405.
- » antiotorréico (Dr. Bonafort), III, 405.
- » antiperiódico antimonial (Sichel), III, 405.
- » antireumáticos (F. DE PLENK), III, 406.
- » antireumáticos (H. DE AL.), III, 406.
- » antireumáticos (Vogler), III, 406.
- » antiséptico (Hartmann), III, 407.
- » antiséptico (H. DE AL.), III, 407.
- » antiséptico (Rust), III, 407.
- » antiséptico de quina (F. E.), III, 413.
- » antiséptico de Swediaur (H. DE M.), III, 407.
- » antisifilítico (Berg), III, 407.
- » antitísico, I, 88; III, 407.
- » antitísico (Bories), III, 407.
- » antitísico (F. M.), III, 407.
- » antitísico (Haly), III, 453.
- » antitísico (Hufeland), III, 407.
- » antracocali compuesto, III, 408.
- » antracocali simple (Polya), III, 408.
- » de añil, I, 95.
- » de apio, I, 95.
- » de apocino, I, 96.
- » de aristoloquia, I, 97.
- » de aristoloquia (F. F.), III, 470.
- » de aristoloquia trilobada, I, 97.
- » de arnica (F. F.), III, 470.
- » de arnica compuesto (H. DE AL.), III, 408.
- » aromático, III, 408.

- Polvo aromático (Dupuytren), III, 408.
- » aromático (F. P.), III, 408.
- » aromático especial, IV, 28.
- » aromático estimulante, III, 408.
- » aromático con hierro (F. P.), III, 408.
- » aromáticos rosados (F. M.), III, 392.
- » de arroz (F. F.), III, 408.
- » arsenical (Cazenave), III, 409.
- » arsenical (Dupuytren), III, 409.
- » arsenical (Justamond), III, 409.
- » arsenical (Plunquet), III, 409.
- » arsenical (Rousselot), III, 409.
- » arsenical febrifugo (Boudin), III, 409.
- » de artanita, I, 101.
- » de artemisa, I, 101.
- » de artemisa azucarado, III, 409.
- » artrítico amargo, III, 410.
- » de asa fétida, I, 102; III, 410.
- » de asa fétida (F. F.), III, 451.
- » de asa fétida y gálbano compuesto, III, 403.
- » de ásaro, I, 102.
- » de ásaro (F. F.), III, 477.
- » de ásaro compuesto, III, 444.
- » de asclepias vinctósigo, I, 103.
- » de aspérula olorosa, I, 103.
- » astringente, III, 410.
- » astringente (Brera), III, 410.
- » astringente (F. N. P.), III, 410.
- » astringente (Gaubius), III, 410.
- » astringente (Griffith), III, 410.
- » astringente (H. DE M.), III, 411.
- Polvo astringente (Otto), III, 411.
- » astringente (Vogt), III, 411.
- » astringente hemostático, III, 411.
- » astringente opiado, III, 411.
- » astringente opiado (Bouchar-dat), III, 411.
- » astringente opiado de Vogel, III, 411.
- » atemperante, III, 411 y 412.
- » atemperante (Pitschaft), III, 412.
- » atemperante de Stalh (F. F.), III, 412.
- » contra la atrofia mesentérica (Wendt), III, 421.
- » de atropina, III, 412.
- » de azafran, I, 105.
- » de azafran (F. F.), III, 470.
- » azafranado, III, 412.
- » de azúcar mercurial, III, 412.
- » de azufre y escila (H. M. F.), III, 412.
- » de azufre tartarizado (Jahn), III, 412.
- » de badiana, I, 109.
- » balsámico, III, 412.
- » de bálsamo de Tolú (F. F.), III, 420.
- » de bardana, I, 113.
- » de bardana (F. F.), III, 470.
- » de bayas de laurel, I, 232.
- » de beleño, I, 116.
- » de beleño (Vogler), III, 412.
- » de belladona, I, 117.
- » de belladona compuesto, III, 412.
- » de belladona compuesto (Hufeland), III, 413.
- » de belladona opiado, III, 413.
- » benedictos para el cáncer (H. DE M.), III, 413.
- » de benjuí, I, 118.
- » de benjuí (F. F.), III, 420.
- » de benjuí (Pii), III, 413.
- » de benjuí y almáciga compuesto, III, 449.
- » benzóico antimoniado, III, 413.

- Polvo benzóico astringente (Geigel), III, 413.
- » de Berends, III, 413.
- » de Berlin oloroso, III, 414.
- » de betónica, I, 119.
- » bezoárdicos de Curbo (F. E.), III, 413.
- » de bicarbonato de sosa, III, 414.
- » de bicarbonato de sosa (F. F.), III, 461.
- » de bistorta, I, 121.
- » contra el bocio, III, 421.
- » de bol arménico (F. F.), III, 414.
- » de borax, I, 122.
- » de Bresler, III, 409.
- » de brionía, I, 123.
- » de brionía (F. F.), III, 470.
- » de brucina, I, 124.
- » de cabezas de adormideras (F. F.), III, 420.
- » de cacao compuesto, II, 312.
- » de café no tostado, I, 126.
- » de cainca, I, 126.
- » de cainca (Beral), III, 414.
- » de cal (F. F.), III, 417.
- » de cal viva, III, 416.
- » de calaguala, I, 127.
- » contra los calambres de estómago, III, 421.
- » contra los calambres de estómago (Wendt), III, 422.
- » de cálamo aromático, I, 127.
- » de cálamo aromático (F. F.), III, 470.
- » para calas (F. M.), III, 463.
- » calmante, III, 414.
- » calmante (Berends), III, 414.
- » calmante (Clarus), III, 414.
- » calmante (Cottreau), III, 415.
- » calmante (Henning), III, 415.
- » calmante (Kopp), III, 415.
- » calmante (Marens), III, 415.
- » calmante (Vogt), III, 415.
- » calmante absorbente (Righini), III, 415.
- Polvo calmante contra la coqueluche (Viricel), III, 415.
- » de calomelanos (Swediaur), III, 415.
- » de calomelanos opiados (H. DE AL.), III, 416.
- » de calomelanos con opio (F. P.), III, 416.
- » de camedrios, I, 131.
- » de canela, I, 131.
- » de canela (F. F.), III, 416.
- » de canela azucarado (Duc), III, 435.
- » de canela blanca (F. F.), III, 416.
- » de canela compuesto (F. DE L.), III, 416.
- » de canela y gengibre almizclado, III, 455.
- » de cantáridas, I, 133.
- » de cantáridas (F. F.), III, 416.
- » de caña aromática, I, 134.
- » de cáñamo de las Indias, I, 135.
- » de los capuchinos, III, 416.
- » caquético, III, 416.
- » caquético (Hartmann), III, 416.
- » de carbon con quina, III, 416.
- » de carbon magnesiano, III, 416.
- » de carbon vegetal (F. F.), III, 417.
- » de carbonato de cal, I, 127.
- » de carbonato de cal compuesto (F. DE ED.), III, 417.
- » de carbonato de hierro, I, 215.
- » de carbonato de magnesia (Frank), III, 417.
- » de carbonato de magnesia con la sosa (Nicolás), III, 417.
- » de cardamomo (F. F.), III, 417.
- » de cardamomo menor, III, 138.
- » de cardenillo, III, 417.
- » de cardo estrellado, I, 138.
- » de cardo santo, I, 139.

- Polvo de Carignan , III, 417.
- » de cariofilea , I, 139.
- » de carlina , I, 139.
- » carminativo y estomacal, III, 417.
- » de cáscara de granada , I, 207.
- » de cáscara de naranja , I, 140.
- » de cascarilla , I, 140.
- » de cascarilla (F. F.), III, 467.
- » de castaño de las Indias , I, 140.
- » de castóreo , I, 141.
- » de castóreo (F. F.), III, 417.
- » de castorina , I, 141.
- » catártico , III, 417, 418 y 456.
- » catártico (H. M.), III, 418.
- » catártico febrífugo (H. DE MOMP.), III, 418.
- » de catecú , I, 142.
- » de catecú (F. F.), III, 462.
- » de catecú compuesto (H. DE AL.), III, 418.
- » caterético , III, 418.
- » caterético (Ammon) , III, 418.
- » caterético (H. DE M.), III, 419.
- » caterético (Rodington) , III, 418.
- » católicos de escamonea (F. E.), III, 418.
- » católicos purgantes (F. E.), III, 418.
- » cáustico , III, 418.
- » cáustico (Ammon) , III, 193.
- » cáustico (Dupuytren) , III, 409.
- » cáustico (Gaudiner) , III, 419.
- » cáustico (H. DE M.), III, 419.
- » cáustico (Kruger) , III, 418.
- » cáustico (Masius) , III, 418.
- » cáustico (Plenk) , III, 419.
- » cáustico de Fray Cosme (F. F.), III, 440.
- » cáustico de Rousselot (F. F.), III, 440.
- » de cebadilla (F. F.), III, 430.
- Polvo de cebolla albarrana , I, 145.
- » cefálico (Siedler) , III, 419.
- » cefálico de tabaco , III, 419.
- » de centaurea menor , I, 146.
- » de centaurea menor (F. F.), III, 419.
- » de cetrarino (Muller) , III, 419.
- » cianurado (Henning) , III, 419.
- » de cianuro de hierro , III, 419.
- » de cianuro de oro (Chrestien) , III, 419.
- » de cianuro de plata , I, 291.
- » de cicuta , I, 148.
- » de cilantro , I, 149.
- » de cinabrio , III, 429.
- » de cinco en rama , I, 149.
- » de cinoglosa , I, 151.
- » de ciprés , I, 151.
- » de citrato de cal , I, 128.
- » de Claré , III, 419.
- » de clavo de especia , I, 152.
- » de clemátide , I, 152.
- » de cloruro de bario (Swe diaur) , III, 420.
- » de cloruro de manganeso , I, 435.
- » de cloruro de oro , III, 420.
- » de cloruro de oro y sodio (Magendie) , III, 420.
- » de cloruro de plata , III, 420.
- » de cochinilla , I, 158.
- » de cochinilla (F. F.), III, 416.
- » de codaga pala , I, 158.
- » de codeina , I, 158.
- » de cólchico , I, 259.
- » contra el cólico saturnino (Harlou) , III, 422.
- » de colofonia , I, 159.
- » de colofonia (F. F.), III, 420.
- » de colombo , I, 160; III, 420.
- » de colombo (F. F.), III, 470.
- » de colombo de América , I, 160.

- Polvo de coloquintida, I, 161.
- » de coloquintida (F. F.), III, 420.
- » de coloquintida (H. DE AL.), III, 420.
- » de comino, I, 161.
- » del conde de Palma, III, 420.
- » del conde de Warwick, III, 421.
- » de Content, III, 421.
- » contraestimulante, III, 425.
- » de contrayerba, I, 162; III, 428.
- » de contrayerba (F. F.), III, 477.
- » contra la coqueluche, III, 422.
- » contra la coqueluche (Barchet), III, 422.
- » contra la coqueluche (Goe-lis), III, 423.
- » contra la coqueluche (Guer-sant), III, 422.
- » contra la coqueluche (Kah-leiss), III, 422.
- » contra la coqueluche (Marc), III, 423.
- » contra la coqueluche (Pis-chef), III, 422.
- » contra la coqueluche (San-dras), III, 423.
- » contra la coqueluche y el catarro nervioso, III, 423.
- » cordial, III, 429.
- » de coral anodino (Helvetius), III, 394.
- » de coral rojo (F. F.), III, 429.
- » de coralina, I, 163.
- » cornachinos (F. F.), III, 429.
- » cornachinos (F. E.), III, 429 y 440.
- » de cornezúelo de centeno (F. F.), III, 429.
- » de cornezuelo de centeno, I, 164.
- » de cornezuelo de centeno compuesto (Szerlecki de Mulhouse), III, 429.
- Polvo contra la corea (Bouneau), III, 423.
- » corroborante (Werlhoff), III, 429.
- » de cortezas de canela de Ceilan, II, 416.
- » de corteza de cerezo, I, 147.
- » de corteza de olmo (F. F.), III, 477.
- » de corteza de quina roja (F. F.), III, 467.
- » de corteza de la raiz de granado, I, 207.
- » de corteza de simaruba, III, 477.
- » de corteza de Winter, I, 165; III, 416.
- » cosmético jabonoso, III, 430.
- » cosmético jabonoso para las manos, III, 430.
- » cosmético para las manos (F. DE WURT.), III, 430.
- » de costo, I, 165.
- » de couso, I, 166.
- » de crémor de tártaro, I, 305.
- » de crémor de tártaro (F. F.), III, 417.
- » de crémor de tártaro solu-ble (F. F.), III, 474.
- » de creta compuesto (F. DE L.), III, 430.
- » de creta compuesto con o-pio (F. DE L.), III, 430.
- » de creta con ruibarbo (Ni-colai), III, 430.
- » de creta opiados, III, 430.
- » contra el crup, III, 423.
- » contra el crup (Weber), III, 423.
- » de cuajaleche (F. F.), III, 417.
- » de cuasia amarga, I, 307.
- » de cubebas, I, 166.
- » de cubebas (F. F.), III, 430.
- » de cúrcuma (F. F.), III, 470.
- » de china, I, 168.
- » de chinsange, I, 168.
- » contra la dentera, III, 423.

- Polvo dentífrico, III, 430 y 431.
- » dentífrico (Bally), III, 431.
 - » dentífrico (Charlard), III, 431.
 - » dentífrico (Chevalier), III, 431.
 - » dentífrico ácido (Desforges), III, 432.
 - » dentífr. ácido (Deschamps), III, 432.
 - » dentífrico (Desirabode), III, 431.
 - » dentífrico (Dr. Regnard), III, 431.
 - » dentífrico (F. F.), III, 431.
 - » dentífrico (H. DE AL.), III, 431.
 - » dentífrico (H. M.), III, 433.
 - » dentífrico (Jamet), III, 432.
 - » dentífrico (Kemerer), III, 432.
 - » dentífrico (Lefoulon), III, 432.
 - » dentífrico descolorante (Magendie), III, 433.
 - » dentífrico (Maury), III, 432.
 - » dentífrico (Righini), III, 431.
 - » dentífrico (Toirac), III, 432.
 - » dentífrico alcalino (Deschamps), III, 432.
 - » dentífrico alcanforado, III, 432.
 - » dentífrico antiescorbútico, III, 433.
 - » dentífrico deterativo, III, 433.
 - » deterativo desinfectante, III, 433.
 - » dentífrico inglés, III, 433.
 - » dentífrico con mirra, III, 433.
 - » dentífrico negro (Chevalier), III, 431.
 - » dentífrico peruviano (Poisson), III, 433.
 - » dentífrico de sangre de dragón (F. E.), III, 434.
 - » dentífrico seco (F. E.), III, 434.
 - » dentífrico con tanino (Mialhe), III, 433.
 - » dentífrico tónico, III, 434.
- Polvo dentífrico de sulfato de quinina (Pelletier), III, 434.
- » depurativo (Jahn), III, 434.
 - » depurativo (Jaser), III, 434.
 - » desinfectante, III, 434.
 - » desinfectante (Meyer), III, 434.
 - » deterativo (Vogt), III, 434.
 - » de deutocloruro de mercurio, I, 258.
 - » diaforéticos, III, 434 y 435.
 - » diaforético (Richter), III, 435.
 - » diaforético (Thaer), III, 435.
 - » diaromaton inglés, III, 435.
 - » contra la diarrea crónica (J. P. Frank), III, 423.
 - » digestivo, III, 435.
 - » digestivo (J. P. Frank), III, 469.
 - » digestivo (Klein), III, 435.
 - » digestivo alcalino (Blondeau), IV, 23.
 - » digestivo compuesto, III, 435.
 - » digestivo compuesto (Lameiry), III, 435.
 - » digestivo simple (Duc), III, 435.
 - » de digital, I, 172.
 - » de digital (F. F.), III, 436.
 - » de digital (H. M. DE PRUSIA), III, 436.
 - » de digital compuesto, III, 436.
 - » de diosma recortada, I, 173.
 - » diurético, III, 436.
 - » diurético (Brera), III, 436.
 - » diurético (H. DE AL.), III, 436.
 - » diurético (F. F.), III, 437.
 - » diurético (H. DE ING.), III, 436.
 - » diurético (Szerlecki), III, 436.
 - » diurético (Osiander), III, 436.
 - » diurético atemperante, III, 436.
 - » diurético opiado (Rust), III, 437.

- Polvo diurético resolutivo (Krey-
sig), III, 437.
- » del doctor Odier, III, 437.
- » de dorónico, I, 173.
- » de Dower, I, 278.
- » de Dower (F. E.), III, 437.
- » de Dower (F. F.), III, 437.
- » de Dower (F. P.), III, 437.
- » de Dower (H. DE M.), III, 437.
- » de Dower (H. M.), III, 437.
- » de draconcio fétido, III, 173.
- » de dulcamara, I, 174.
- » de Dupuytren contra los herpes fagedénicos ó corrosivos, III, 437.
- » ecefráctico, III, 438.
- » ecefráctico (Selle), III, 438.
- » de elaterina (Bright), III, 438.
- » de elaterio, I, 174.
- » de elaterio compuesto (Bright), III, 438.
- » de eléboro blanco (F. F.), III, 479.
- » de eléboro negro, I, 175.
- » de eléboro negro (F. F.), III, 477.
- » para embalsamar (F. F.), II, 231.
- » emenagogo, III, 439.
- » emenagogo (Berends), III, 439.
- » emenagogo (H. DE AL.), III, 458.
- » emenagogo (H. DE IT.), III, 439.
- » emético (H. DE M.), III, 439.
- » emético (H. M.), III, 439.
- » de emetina, I, 177.
- » emeto-catártico, III, 439.
- » emulsivo purgante (H. M. F.), III, 356.
- » de encina, I, 178.
- » de enebro, I, 178.
- » de eneldo, I, 178.
- » contra el engrosamiento de la córnea (Graeffe), III, 424.
- » contra los entuertos de las recién paridas, III, 424.
- » de énula (H. DE AL.), III, 439.
- Polvo de énula campana, I, 179; III, 470.
- » contra la epilepsia (Chabery), III, 424.
- » contra la epilepsia (Hufeland), III, 424.
- » contra la epilepsia (Kahleiss), III, 424.
- » contra la epilepsia (Pitschaft), III, 424.
- » contra la epilepsia (Ragolo), III, 425.
- » contra la epilepsia (Rosenthal), III, 424.
- » contra el eretismo de los nervios del estómago (Wendt), III, 425.
- » de erisimo, I, 180.
- » errino (Griffith), III, 439.
- » errino (Vogt), III, 439.
- » de errino astringente, III, 439.
- » de errino hemostático, III, 440.
- » de errino febrífugo, III, 439.
- » de escamonea, I, 181.
- » de escamonea antimoniales (F. E.), III, 440.
- » de escamonea católicos (F. E.), III, 440.
- » de escamonea compuesto, III, 395.
- » de escamonea compuesto (F. DE L.), III, 440.
- » de escamonea compuesto (Vimmer), III, 440.
- » de escamonea y protocloruro de mercurio (F. P.), III, 440.
- » escarótico arsenical (F. F.), III, 440.
- » escarótico contra los condilomas, III, 441.
- » de escila (F. F.), III, 441.
- » de escila y azufre (F. P.), III, 441.
- » de escila y azufre (H. M. F.), III, 441.
- » de escila compuesto (F. DE L.), III, 441.
- » de escila compuesto (F. P.), III, 441.

- Polvo de escila compuesto (Sthal), III, 441.
- » de escila nítrado (Vanhelmont), III, 441.
- » de escila para envenenar los ratones, III, 441.
- » escilitico mercurial (P. Frank), III, 442.
- » de escordio, I, 182.
- » contra los espasmos (Brachet), III, 425.
- » contra la espermatorrea, III, 425.
- » de espigelia contra las lombrices, I, 184.
- » de espliego, I, 185.
- » de esponja calcinada, I, 184.
- » de esponja compuestos, III, 442.
- » de estafisagria, I, 186.
- » de estaño, I, 186.
- » de estaño (F. F.), III, 442.
- » estibio-opiado, III, 442.
- » estimulante, III, 442 y 443.
- » estimulante (Sommervall), III, 443.
- » estimulante y nutritivo, III, 443.
- » estíptico (Augustin), III, 443.
- » estíptico (F. P.), III, 443.
- » estíptico de Colbatch, III, 443.
- » estomacal, III, 443 y 444.
- » estomacal (Birkmann), III, 444.
- » estomacal (Vogt), III, 444.
- » estornutatorio, III, 444.
- » estornutatorio (Flucher), III, 444.
- » estornutatorio (Mialhe), III, 444.
- » estornutatorio (St. Angel), III, 444.
- » estornutatorio (Schneider), III, 444.
- » estornutatorio de betónica, III, 444.
- » estornutatorio de eléboro, III, 445.
- » de estramonio, I, 187.
- » de estriçnina, I, 188.
- Polvo de estriçnina (Magendie), III, 445.
- » de estriçnina y óxido de hierro, III, 445.
- » etiópico, III, 445.
- » de eupatorio, I, 191.
- » excitante, III, 445.
- » expectorante, III, 445.
- » expectorante (Babeyrac), III, 442.
- » expectorante (Berends), III, 445.
- » expectorante (Horn), III, 445.
- » expectorante (H. DE AL.), III, 445.
- » expectorante (Mursinna), III, 446.
- » expectorante (Recamier), III, 442.
- » expectorante amoniacal, III, 445.
- » expectorante antimoniado, III, 446.
- » de extracto de regaliz (F. F.), III, 462.
- » de Fabe, III, 446.
- » febrífugo, III, 446.
- » febrífugo (Boullemer), III, 446.
- » febrífugo (Chleghorn), III, 446.
- » febrífugo (Gola), III, 446.
- » febrífugo (Hartmann), III, 446.
- » febrífugo (Hecker), III, 446.
- » febrífugo (H. DE AL.), III, 447.
- » febrífugo estibio-opiado (H. DE IT.), III, 447.
- » febrífugo (H. DE ING.), III, 447.
- » febrífugo estibiado (H. DE IT.), III, 447.
- » febrífugo (H. DE IT.), III, 447.
- » febrífugo (Jadelot), III, 447.
- » febrífugo (Juncker), III, 447.
- » febrífugo (Radius), III, 447.
- » febrífugo compuesto (H. M.), III, 447.
- » febrífugo francés, III, 446.

- Polvo febrífugo con magnesia, (Roucher), III, 448.
- » febrífugo opiado (Neumann), III, 448.
- » febrífugo de los pobres (H. DE AL.), III, 448.
- » febrífugo y purgante (Helvetius), III, 448.
- » febrífugo simple (H. M.), III, 448.
- » ferruginoso, III, 448.
- » ferruginoso (Colombat), III, 448.
- » ferruginoso de Menzer (F. P.), III, 448.
- » de filipéndula, I, 193.
- » de filirea de hoja ancha, I, 193.
- » contra las flatuosidades (Heim), III, 425.
- » contra las flatuosidades (Santoli), III, 425.
- » de arnica, I, 98.
- » de flores de ginesta de tintes, I, 203.
- » de flores de narciso de los prados, I, 273.
- » de florizino, I, 194.
- » de Fontaneilles, III, 449.
- » de Fordice, III, 449.
- » de fraxinela, I, 195.
- » fumigatorio, III, 449.
- » fumigatorio balsámico, III, 449.
- » fumigatorio fétido, III, 449.
- » fumigatorio mercurial, III, 449.
- » fumigatorio sucinado, III, 474.
- » fundente (Clarus), III, 449.
- » fundente (Cottreau), III, 449.
- » fundente opiado (Jahn), III, 450.
- » fundente opiado (Most), III, 450.
- » galactopoyético, III, 450.
- » de galanga (F. F.), III, 470.
- » de galanga mayor, I, 198.
- » de gálbano, I, 198.
- » de galio, I, 199.
- Polvo gaseoso-febrífugo (Breton), III, 450.
- » gaseoso-febrífugo (Meirieu), III, 450.
- » gaseoso para limonada, III, 450.
- » gasífero, III, 472.
- » gasíferos ferruginosos (H. DE M.), III, 451.
- » gasíferos laxantes (H. DE M.), III, 450.
- » gasíferos purgantes (H. DE M.), III, 450.
- » gasífero simple, III, 473.
- » contra la gastralgia (H. DE M.), III, 425.
- » contra la gastralgia (Szerlecki), III, 425.
- » contra la gastrodinia (Odier), III, 426.
- » de gatuña, I, 200.
- » de gayuba, I, 200.
- » de gayuba (F. F.), III, 471.
- » de genciana, I, 201; III, 451.
- » de genciana (F. F.), III, 470.
- » de genciana chiraita, I, 201.
- » de genciana compuesto, III, 410.
- » de gencianino, I, 201.
- » de gengibre, I, 202.
- » de gengibre (F. F.), III, 470.
- » de geofroya de Jamayca, I, 202.
- » de goma aluminoso (Leclayse), III, 451.
- » de goma amoniaco, I, 204.
- » de goma amoniaco (F. F.), III, 451.
- » de goma arábica, I, 205.
- » de goma arábica (F. F.), III, 451.
- » de goma gálbano, III, 451.
- » de goma quino, I, 205; III, 451.
- » de goma quino (F. F.), III, 462.
- » de goma quino compuesto (F. DE L.), III, 451 y 452.
- » de goma quino compuesto (F. P.), III, 451.

- Polvo de goma tragacanto , I, 206.
- » de goma tragacanto (F. F.), III, 451.
 - » de goma tragacanto compuesto (F. DE L.), III, 452.
 - » de goma tragacanto compuesto (F. P.), III, 452.
 - » gomoso (F. A.), III, 452.
 - » gomoso alcalino , III, 452.
 - » gomoso aluminoso (Vogt), III, 452.
 - » gomoso amigdalino (Haly), III, 453.
 - » gomoso amigdalino (F. M.), III, 407.
 - » gomoso mercurial (Mouton), III, 452.
 - » contra la gota serena , III, 426.
 - » de graciola , I, 206; III, 452.
 - » de grana quermes (F. F.), III, 416.
 - » de guarana , I, 209.
 - » de guayaco , I, 209.
 - » de guayaco (F. F.), III, 452.
 - » de guayaco opiado (Peraire), III, 452.
 - » de Guindre , III, 452.
 - » de gutagamba , I, 210; III, 452.
 - » de Guteta , III, 453.
 - » de haba de S. Ignacio , I, 210.
 - » de Haly , III, 453.
 - » de Haly (F. M.), III, 407.
 - » hannoverianos (F. M.), III, 394.
 - » de helecho macho , I, 211.
 - » de hematitis , III, 429.
 - » contra las hemorragias (Kriemer), III, 426.
 - » contra las hemorragias internas y las excisivas , III, 426.
 - » hemostático (Dr. Benafoux), III, 453.
 - » hemostático (Graeffe), III, 453.
 - » hemostático (Malherbe), III, 453.
- Polvo hemostático (Mialhe), III, 453.
- » de Henning , III, 453.
 - » de los hermanos Mahon contra la tiña , III, 453.
 - » de hierro , I, 214.
 - » de hierro , III, 417.
 - » de hierro y canela , III, 454.
 - » hidragogo , III, 454.
 - » hidragogos (F. M.), III, 453.
 - » hidragogos (Jahn), III, 454.
 - » contra la hidropesía , III, 426.
 - » de hinojo , I, 223.
 - » de hinojo y negrilla compuesto (F. WIRT.), III, 450.
 - » de Hirschel , III, 454.
 - » de hojas de acónito (F. F.), III, 431.
 - » de hojas de beleño (F. F.), III, 430.
 - » de hojas de belladona (F. F.), III, 430.
 - » de hojas de dictamo crético (F. F.), III, 471.
 - » de hojas de naranjo , I, 272.
 - » de hojas de naranjo (F. F.), III, 430.
 - » de las hojas de narciso de los prados , I, 273.
 - » de hojas de nogal , I, 274.
 - » de hojas de sen (F. F.), III, 430.
 - » de las hojas de soldanela de mar , I, 340.
 - » de hojas de té , III, 471.
 - » de hollin , I, 224.
 - » de hongo de Malta , I, 224.
 - » de hueso de jibia , III, 454.
 - » de Hufeland , III, 454.
 - » de Hufeland contra la diarrea de los niños , III, 455.
 - » de imperatoria , I, 225.
 - » imperial de Lemery , III, 455.
 - » contra el impétigo (Bielt), III, 426.
 - » de incienso , I, 225.
 - » de incienso (F. F.), III, 451.
 - » incisivo , III, 395.
 - » incisivo (F. P.), III, 441.

- Polvo incisivo (H. M. F.), III, 412 y 441.
- » incisivo (Mongenot), III, 455.
- » contra los infartos escrofulosos del cuello (Boynet), III, 426.
- » de iodoformo (Bouchardat), III, 455.
- » de ioduro de bario (Magendie), III, 455.
- » de ioduro de plomo, III, 455.
- » de ioduro de hierro y quinina, I, 313.
- » de ipecacuana, I, 228.
- » de ipecacuana (F. F.), III, 455.
- » de ipecacuana de la Carolina, I, 229.
- » de ipecacuana, calomelanos y opio (Ellis), III, 455.
- » de ipecacuana compuesto (F. DE L.), III, 455.
- » de ipecacuana con opio (F. E.), III, 437.
- » de ipecacuana y ruibarbo III, 456.
- » de jalapa, I, 229.
- » de jalapa (F. F.), III, 470.
- » de jalapa anaranjado compuesto, IV, 27.
- » de jalapa compuesto, III, 456.
- » de jalapa compuesto, III, 456.
- » de jalapa compuesto (F. E.), III, 456.
- » de jalapa compuesto (F. DE L.), III, 456.
- » de jalapa y escamonea, III, 418.
- » de jalapa y soldanela compuesto, III, 454.
- » de James, III, 456.
- » de James (F. F.), III, 404.
- » de James (F. P.), III, 456.
- » de gengibre, I, 230.
- » de juncia avellanada, I, 230.
- » de Kaempfer, III, 456.
- » de Katrimer, III, 456.
- » de Kleist, III, 456.
- Polvo de Knox, III, 457.
- » contra la laringitis membranosa (Mignot), III, 426.
- » laxante, III, 457.
- » laxante y atemperante (H. DE AL.), III, 457.
- » de Leayson (F. F.), II, 159.
- » de leche, III, 457.
- » de leño aloes), III, 452.
- » para limonada gaseosa de citrato de magnesia (Maury), III, 43.
- » de linaza (F. F.), III, 457.
- » de liquen, I, 236.
- » de liquen azucarado (Robinet), III, 457.
- » de liquen islándico (F. F.), III, 457.
- » de lirio (F. F.), III, 470.
- » de lirio compuesto, III, 458.
- » de lirio de Florencia, I, 236.
- » de liriodendro, I, 238.
- » de litargirio (F. F.), III, 417.
- » litontriptico (H. DE AM.), III, 458.
- » de lupulina, I, 239.
- » de lupulina (Magendie), III, 458.
- » de lúpulo, I, 239.
- » de llanten, I, 240.
- » de madar, I, 240.
- » de la madre de perlas, III, 429.
- » de magnesia blanca (F. F.), III, 458.
- » de magnesia compuesto, III, 458.
- » de malato de hierro, III, 458.
- » de malvabisco, I, 244.
- » contra las manchas de la córnea (Guepin), III, 426.
- » de manzanilla, I, 247.
- » de manzanilla (F. F.), III, 470.
- » maogon febrífugo, I, 247.
- » de maravilla de noche, I, 247.
- » de Marc, III, 459.
- » marcial (H. DE AL.), III, 458.

- Polvo marcial aromático (H. DE AL.), III, 458.
- » marcial aromático (Jourdan), III, 458.
- » de maro, I, 248.
- » de marrubio, I, 248.
- » de Marsella, III, 465.
- » masticatorio, III, 459.
- » de matricaria, I, 249.
- » de mechoacan, I, 249.
- » de mejorana, I, 250.
- » de menta piperita, I, 253.
- » de Menzer, III, 459.
- » mercurial y de carbonato de magnesia (Cheyne), III, 459.
- » mercurial con cicuta (Pistchaft), III, 459.
- » mercurial lácteo (Griesse-lich), III, 460.
- » mercurial para las mujeres preñadas, III, 460.
- » mercurial opiado (Hufeland), III, 460.
- » mercurial opiado (Rust), III, 460.
- » de mercurio y creta (H. DE ING.), III, 459.
- » de mercurio dulce (F. F.), III, 474.
- » de mercurio sacarino (Lagneau), III, 460.
- » de la mezcla (H. DE M.), III, 411.
- » de mil piés, III, 416.
- » de mirra, I, 265.
- » de mirra y coral compues-to; III, 429.
- » de monesia, I, 266.
- » de morfina, I, 267.
- » de mostaza (F. F.), III, 460.
- » de muérdago, I, 271.
- » de musgo de Córcega, I, 271.
- » de musgo de Córcega (F. F.), III, 460.
- » de musgo de Córcega com-puesto, III, 460.
- » de musgo marino (Frank), III, 460.
- » narcótico y tónico, III, 459.
- » nauseoso, III, 461.
- Polvo nervino (H. M. F.), III, 477.
- » de nitrato de bismuto (Re-camier), III, 461.
- » de nitrato de plata fundido, I, 293.
- » de nitrato de potasa (F. F.), III, 461.
- » de nitro, I, 303.
- » de nitro alcanforado, III, 461.
- » de nitro alcanforado (Swe-diaur), III, 461.
- » de nitro antimonial (Bur-chard), III, 461.
- » de nitro antimoniado y al-canforado (Thaer), III, 461.
- » de nuez de agalla, I, 275.
- » de nuez moscada, I, 275.
- » de nuez vómica; I, 276.
- » de nuez vómica (H. DE AL.), III, 461.
- » nutritivo, III, 461.
- » ocítico (Schmidt), III, 461.
- » oftálmico (Beer), II, 174.
- » oftálmico (Delille), III, 462.
- » oftálmico (F. P.), III, 462.
- » oftálmico (Sichel), III, 462.
- » de ojos de cangrejos (F. F.), III, 429.
- » de Olivencia, III, 406.
- » opiado (Spiegel), III, 462.
- » de opio, I, 278.
- » de opio (F. F.), III, 462.
- » de opio y creta, III, 462.
- » de opoponaco, I, 279.
- » de opoponaco (F. F.), III, 451.
- » de orégano, I, 279.
- » de oro, I, 279.
- » de óxido blanco de zinc, III, 463.
- » de óxido de magnesio, I, 241.
- » contra la ozena (Trousseau), III, 426.
- » de paciencia, I, 282.
- » de paciencia (F. F.), III, 470.
- » contra las palpitaciones del corazon, III, 427.
- » del papa Benedicto (F. M.), III, 463.

- Polvo para corregir la mala calidad de la leche, III, 463.
- » para los niños, III, 463.
- » para los niños (Hufeland), III, 463.
- » para tisana extemporánea (Chaussier), III, 464.
- » de pareira brava, I, 283.
- » de pareira brava (F. F.), III, 468.
- » para las partes escoriadas, IV, 128.
- » pectoral (H. M. F.), III, 464.
- » pectoral (Schneider), III, 464.
- » pectoral (Wedel), III, 464.
- » de pelitre, I, 285.
- » de pelitre (F. F.), III, 470.
- » de peonía, I, 285.
- » de peonía (F. F.), III, 470.
- » contra las pérdidas seminales, III, 425.
- » contra las pérdidas seminales (Heim), III, 427.
- » de perejil, I, 286.
- » de peróxido de manganeso, I, 434.
- » de peróxido de manganeso (F. F.), III, 417.
- » de persicaria, I, 286.
- » de pétalos de violetas (F. F.), III, 470.
- » de piedra calaminar, III, 429.
- » de Pihorel, I, 130.
- » de pimienta, I, 288.
- » de pimienta blanca (F. F.), III, 430.
- » de pimienta larga (F. F.), III, 430.
- » de pimienta negra (F. F.), III, 430.
- » de pimienta de Tabasco, I, 289.
- » de pimientos, I, 289.
- » contra la pirosis (Heim), III, 427.
- » de Plummer, antisifilítico y antiescrofuloso, III, 464.
- » de polígala alcanforado, III, 465.
- Polvo de polígala con magnesia (Schmaltz), III, 465.
- » de polígala tartarizado (Ammon), III, 465.
- » de polígala de Virginia, I, 297.
- » de polígala vulgar, I, 297.
- » de polipodio, I, 298.
- » de potasa (F. F.), III, 417.
- » de primo verticilado, I, 306.
- » de Prince, III, 465.
- » profiláctico de las viruelas (Rosen), III, 295.
- » de proto-citrato de hierro, I, 217.
- » de Provenza, III, 465.
- » purgante, III, 456 y 465.
- » purgante (Bremser), IV, 20.
- » purgante (H. DE M.), III, 465.
- » purgante (Wolff), III, 465.
- » purgante y antihelmíntico (Pringle), III, 466.
- » purgante y atemperante, III, 466.
- » purgante de citrato de magnesia, III, 466.
- » purgante compuesto, III, 466.
- » purgante y diurético (Lescure), III, 466.
- » purgante y tónico, III, 466.
- » contra el prurito de la vulva, III, 427.
- » de Quarin contra la tos convulsiva, III, 466.
- » de quermes alcanforado (H. DE AL.), III, 466.
- » quermetizado (H. DE AL.), III, 445.
- » de quina, I, 310.
- » de quina aluminoso, III, 467.
- » de quina amarilla (F. F.), III, 467.
- » de quina calisaya sin epidermis (F. F.), III, 446.
- » de quina emetizado (Dr. Golla), III, 467.
- » de quina estibiado, III, 467.
- » de quina facticio (Hufeland), III, 467.

- Polvo de quina é ictiocola, III, 467.
- » de quina de Loja (F. F.), III, 467.
- » de quina y magnesia, III, 467.
- » de quina y morfina (Magen-die), III, 467.
- » de quinina oftálmico (Sichel), III, 468.
- » de quinoidina, I, 311.
- » contra la rabia, III, 427.
- » de Ragolo, III, 425.
- » de raiz de angélica (F. F.), III, 477.
- » de raiz de apio (F. F.), III, 470.
- » de raiz de arnica, I, 98.
- » de raiz de arnica (F. F.), III, 477.
- » de raiz de gatuña (F. F.), III, 468.
- » de raiz de helecho macho (F. F.), III, 468.
- » de raiz de malvabisco (F. F.), III, 468.
- » de la raiz de narciso de los prados, I, 273.
- » de raiz de paris de cuatro hojas, I, 284.
- » de raiz de quasía amarga (F. F.), III, 452.
- » de raiz de ratania (F. F.), III, 470.
- » de raiz de serpentaria virgini-ana (F. F.), III, 477.
- » de raiz de soldanela de mar, I, 340.
- » de raiz de violeta, I, 358.
- » de rapóntico de los Alpes, I, 316.
- » contra la raquitis (Temple), III, 427.
- » de ratania, I, 316.
- » refrigerante (Van Mons), III, 468.
- » refrigerante y diurético, III, 468.
- » de regaliz, I, 317.
- » de regaliz (F. F.), III, 468.
- » de regaliz compuesto (H. M. F.), III, 464.
- Polvo de resina de almáciga (F. F.), III, 420.
- » de resina de escamonea, III, 468.
- » de resina de guayaco (F. F.), III, 420.
- » de resina de guayaco com-puesto (Hufeland), III, 468.
- » de resina de jalapa, I, 229.
- » de resina de jalapa (F. F.), III, 420.
- » resolutivo (Berends), III, 469.
- » resolutivo (Boinet), III, 469.
- » resolutivo (J. P. Frank), III, 469.
- » resolutivo (Ivel), II, 173.
- » resolutivo (Richter), III, 469.
- » resolutivo (Rupipus), III, 469.
- » restaurante, III, 469.
- » restrictivos (F. E.), III, 469.
- » revulsivo (Ivel), II, 173.
- » contra la risa convulsiva (Usteinan), III, 428.
- » de Roberto Thomas, III, 469.
- » de rododendro, I, 318.
- » de romero, I, 319.
- » de rosas rojas (F. F.), III, 469.
- » de Rosen de Rosenstein, III, 470.
- » de rubia, I, 320.
- » de rubia y quina (Osiander), III, 470.
- » de ruda, I, 320.
- » de ruibarbo, I, 321.
- » de ruibarbo (F. F.), III, 470.
- » de ruibarbo con belladona (Hufeland), III, 470.
- » de ruibarbo compuesto (F. P.), III, 471.
- » de ruibarbo compuesto (H. DE ING.), III, 470.
- » de ruibarbo ferruginoso (Sachs), III, 470.
- » de ruibarbo y mercurio (H. DE ING.), III, 470.

- Polvo de ruibarbo opiado, III, 470.
- » de sabadilla, I, 322.
 - » contra los sabañones (Bandof), III, 428.
 - » de sabina, I, 322.
 - » de sabina (F. F.), III, 471.
 - » sacarino efervescente (Davidson), III, 471.
 - » de sagapeno, I, 323.
 - » de sagú, I, 323.
 - » de sanguinaria del Canadá, I, 329.
 - » de sangre de drago, I, 325.
 - » de sangre de drago (F. F.), III, 420.
 - » de sal amoníaco, III, 471.
 - » de salvado compuesto (Baudot), III, 471.
 - » de salep, I, 323; III, 471.
 - » de salep (F. F.), III, 471.
 - » contra la salivacion mercurial, III, 428.
 - » de salicaria, I, 323.
 - » de salicina, III, 471.
 - » salino compuesto (H. DE ING.), III, 471.
 - » de salvia, I, 325.
 - » de sándalo cetrino, III, 452.
 - » de sándalo rojo, III, 452.
 - » de santolina, I, 330.
 - » de santónico, I, 329.
 - » de santónico; III, 470.
 - » de santónico compuesto, III, 472.
 - » de sasafrás, I, 330.
 - » de sasafrás (F. F.), III, 452.
 - » saturnino opiado (Hufeland), III, 472.
 - » de saúce, I, 331.
 - » de saúce, III, 477.
 - » de saúco, III, 477.
 - » sedante (Gumprech), III, 472.
 - » sedante (H. DE AL.), III, 472.
 - » sedante (Recamier), III, 472.
 - » sedante azufrado (Richter), III, 472.
- Polvo sedante y diaforético, III, 472.
- » sedante de Wetzler, III, 412.
 - » de Sedlitz, III, 472.
 - » de Sedlitz compuesto (Planche), III, 473.
 - » de Seltz, III, 473.
 - » de sedo acre, I, 333.
 - » de semillas de hinojo acuático, I, 223.
 - » de semillas de potentilla anti-helmíntica, I, 306.
 - » de sen, I, 333.
 - » de sen compuesto (F. P.), III, 473.
 - » de sen compuesto (H. M. F.), III, 473.
 - » de sen y guayaco (Schneider), III, 403.
 - » de Sency, III, 421 y 473.
 - » de serpentaria de Virginia, I, 334.
 - » de Seyffer, III, 474.
 - » de simaruba, I, 335.
 - » de simiente de ameos (F. F.), III, 430.
 - » de sobreoxalato de potasa (F. F.), III, 474.
 - » de sublimado corrosivo (F. F.) III, 474.
 - » de sucino, I, 341.
 - » de sucino, III, 429.
 - » de sucino azucarado, III, 474.
 - » para suero, IV, 54.
 - » de sulfato de amoníaco, I, 87.
 - » de sulfato de cobre, I, 156.
 - » de sulfato de cobre y amoníaco, I, 157.
 - » de sulfato de estriquina, I, 189.
 - » de sulfato de hierro, I, 221.
 - » de sulfato de quinina, III, 474.
 - » de sulfato de quinina y tabaco (Hug), III, 474.
 - » de sulfato de sosa compuesto, IV, 29.
 - » de sulfato de zinc (F. F.), III, 417.

- Polvo sulfuroso acídulo (Sundelin), III, 474.
- » de sulfuro de antimonio, III, 474.
- » de sulfuro de estaño compuesto (F. P.), III, 474.
- » sulfuro magnesiano, III, 475.
- » sulfuro magnesiano (Bielt), III, 474.
- » de sulfuro negro de mercurio compuesto (F. P.), III, 475.
- » de sulfuro de mercurio y estaño (F. P.), III, 475.
- » sulfuro tártrico, III, 475.
- » de sumidades de hipericon (F. F.), III, 417.
- » de tabaco, I, 342.
- » de tanaceto, I, 343.
- » de tártaro emético (F. F.), III, 474.
- » de tartrato de potasa (F. F.), III, 461.
- » de té, I, 346.
- » tenífugo (Dupuis), III, 475.
- » contra la tiña favosa (Petel), III, 512.
- » para teñir el pelo, III, 463.
- » para teñir el pelo de negro (Hanmann), III, 464.
- » tisanífero, III, 475.
- » tónico, III, 475.
- » tónico (H. DE AM.), III, 475.
- » tónico aloético (Bories), III, 476.
- » tónico y astringente (Otto), III, 476.
- » tónico de Brera, III, 476.
- » tónico de Buchner (Radius), III, 476.
- » tónico y estomacal, III, 476.
- » tónico y estimulante, III, 476.
- » tónico y expectorante de benjuí, III, 476.
- » tónico incisivo (Lassone), III, 476.
- » tónico purgante, III, 476.
- » de Tonquin de Reuss, III, 477.
- » de torbisco, I, 347.
- Polvo de torbisco (F. F.), III, 477.
- » de tormentila, I, 347.
- » de tormentila (F. F.), III, 470.
- » de trébol de agua, I, 348.
- » de los tres sándalos, III, 477.
- » de los tres sándalos (F. M.), III, 477.
- » de Tribus (F. E.), III, 429.
- » de Tribus (F. F.), III, 429.
- » de turbit, I, 350.
- » contra las úlceras cancerosas (Rust), III, 428.
- » para las úlceras del cuello de la matriz (Boinet), III, 428 y 464.
- » de vainilla, I, 352.
- » de vainilla (F. F.), III, 477.
- » de valeriana, I, 352.
- » de valeriana (F. F.), III, 477.
- » de valeriana aromático (H. M. F.), III, 477.
- » de valerianato de zinc (Devay), III, 400.
- » de vara de oro, I, 353.
- » contra las vegetaciones (Vidal de Cassis), III, 428.
- » de vencetósigo (F. F.), III, 477.
- » de vetiver, I, 356.
- » vermífugo, III, 477 y 478.
- » vermífugo (Beek), III, 478.
- » vermífugo (Brugnatelly), III, 478.
- » vermífugo (F. F.), III, 478.
- » vermífugo (Goelis), III, 479.
- » vermífugo (H. DE AL.), III, 479.
- » vermífugo (H. M. F.), III, 402.
- » vermífugo de asa fétida (Augustin), III, 479.
- » vermífugo de estaño, III, 479.
- » vermífugo mercurial (F. F. DE 1818), III, 479.
- » vermífugo purgante (Bally), III, 479.
- » vermicida, III, 478.

- Polvo de Vernix , III , 479.
- » de Vichy , III , 479.
 - » de Viena (F. F.) , II , 424.
 - » contra las viruelas , III , 428.
 - » de vitriolo compuesto , III , 479.
 - » vomitivo , III , 480.
 - » vomitivo (Helvetius) , III , 480.
 - » vomitivo (H. DE AL.) , III , 480.
 - » vomitivo compuesto , III , 480.
 - » de Wendt , III , 480.
 - » de yaro , I , 358.
 - » de yaro (F. F.) , III , 470.
 - » de yerba mora , I , 360.
 - » de zantorriza de hoja de apio , I , 361.
 - » de zarzaparrilla , I , 362.
 - » de zarzaparrilla (F. F.) , III , 470.
 - » de zedoaria , I , 362.
 - » de zedoaria (F. F.) , III , 470.
 - » de zumaque , I , 366.
 - » de zumaque venenoso , I , 366.
- Pomadas , III , 480.
- Pomada con aceite de brea (Giraud) , III , 480.
- » de aceite de croton , III , 480.
 - » de aceite de hígado de bacalao (Carron de Villards) , III , 480.
 - » de aceite de hígado de bacalao (Brefeld) , III , 480.
 - » de aceite volátil de almen- dras amargas , III , 481.
 - » de acetato de morfina , III , 481.
 - » de acetato de plomo , I , 295 ; III , 481.
 - » de acibar , I , 61 ; III , 481.
 - » de ácido arsenioso , III , 481.
 - » de ácido fosfórico , I , 195 ; III , 481.
 - » de aconitina , I , 66.
 - » de aconitina (Turnbull) , III , 481.
 - » de acónito , III , 481.
- Pomada contra el acne endure- cido , III , 502.
- » contra el acne rosado (Boi- net) , III , 502.
 - » de álamo negro , I , 73.
 - » alcalina , III , 482.
 - » alcalina (Bielt) , III , 482.
 - » alcalina (Brierre de Bois- mont) , III , 481.
 - » alcalina alcanforada (Caze- nave) , III , 481.
 - » alcalina compuesta (Bielt) , III , 482.
 - » alcalina de Cullerier (F. P.) , III , 482.
 - » alcalina opiada (Gibert) , III , 482.
 - » alcanforada , III , 482.
 - » alcanforada (Cazenave) , III , 482.
 - » alcanforada (Raspail) , III , 482.
 - » de Alibert , III , 482.
 - » aloética (Rognetta) , III , 483.
 - » contra la alopecia , III , 503.
 - » contra la alopecia (Schnei- der) , III , 502.
 - » amarilla de fray Cosme , III , 456 y 483.
 - » contra la amaurosis (Miquel) , III , 503.
 - » amoniaca , III , 483.
 - » anodina (Bourge) , III , 483.
 - » anticancerosa (Plunkett) , III , 483.
 - » antiépsórica , III , 483 y 484.
 - » antiépsórica (Alibert) , III , 484.
 - » antiépsórica (Denis) , III , 484.
 - » antiépsórica (F. F.) , III , 484.
 - » antiépsórica (Giraud) , III , 484.
 - » antiépsórica (H. M. F.) , III , 484.
 - » antiépsórica (H. M.) , III , 484.
 - » antiépsórica (Jasser) , III , 485.
 - » antiépsórica (Pouzin) , III , 485.

- Pomada antiiepsórica (Pringle), III, 485.
- » antiiepsórica (Thomann), III, 485.
- » antiiepsórica (Van Der Anwiermulin), III, 484.
- » antiiepsórica (Zeller), III, 485.
- » antiescabiosa (H. DE M.), III, 485.
- » antiescrofulosa, III, 485.
- » antiescroful. (Rust), III, 485.
- » antiespasmódica, III, 485.
- » antiespasmódica (H. DE M.), III, 493.
- » antiespasmódica (Golfin), III, 486.
- » antihelmíntica, III, 486.
- » antihemorroidal, III, 486.
- » antihemorroidal (Cullen), III, 486.
- » antihemorroidal (Vallez), III, 486.
- » antihemorroidal (Ware), III, 486.
- » antiherpética, III, 486.
- » antiherpética (Alibert), III, 486.
- » antiherpética (Bielt), III, 486 y 487.
- » antiherpética (Corbel y Lagneau), III, 487.
- » antiherpética (Cullerier), III, 487.
- » antiherpética (Chevallier), III, 487.
- » antiherpética (Dubois), III, 487.
- » antiherpética (Faure), III, 487.
- » antiherpética (Fouquier), III, 487.
- » antiherpética (Gibert), III, 487.
- » antiherpética (H. M.), III, 487.
- » antiherpética (H. DE M.), III, 487.
- » antiherpética (Lassaigne), III, 488 y 494.
- » antiherpética (Ricord), III, 488.
- Pomada antiherpética quermetizada, III, 488.
- » antimoniada, III, 488.
- » de antimonio, I, 90.
- » antineurálgica, III, 488.
- » antineurálgica (Debreyne), III, 488.
- » antineurálgica (Florent), III, 488.
- » antioftálmica, III, 488 y 489.
- » antioftálmica (Carron de Villards), III, 488.
- » antioftálmica (Desmarres), III, 489.
- » antioftálmica (Dupuytren), III, 489.
- » antioftálmica (Grand Jean), III, 489.
- » antioftálmica (Guepin), III, 489.
- » antioftálmica (Guttrie), III, 535.
- » antioftálmica (H. DE AL.), III, 489.
- » antioftálmica (H. M.), III, 535.
- » antioftálmica (St. Ives), III, 490.
- » antioftálmica de Dessault (F. F.), III, 489.
- » antiperiódica (Spinelli), III, 490.
- » antipruriginosa (Gibert), III, 490.
- » antisifilítica, III, 490.
- » antisifilítica (Gibert), III, 490.
- » antisifilítica (Rust), III, 490.
- » antracocali (Gibert), III, 491.
- » aromática (Cazenave), III, 491.
- » de arseniato de hierro, I, 99.
- » de arseniato de sosa, III, 491.
- » arsenical, III, 491.
- » arsenical (Boudin), III, 491.
- » arsenical contra los piojos, III, 491.
- » de asa fétida, I, 102.

- Pomada de asa fétida (Riecken), III, 491.
- » astringente, III, 491.
- » astringente (Rust), III, 491.
- » astringente de agraz, III, 491.
- » astringente opiada, III, 492.
- » astringente y sedante (Dupuytren), III, 492.
- » de atropina, III, 492.
- » aurífera (Niel), III, 492.
- » de Autenrieth (F. F.), III, 517.
- » de Autenrieth (H. M.), III, 517.
- » azufrada (F. F.), III, 492.
- » de azufre, I, 107.
- » de azufre y carbon (Bielt), III, 492.
- » de azufre y carbon (F. P.), III, 492.
- » de bardana, I, 114.
- » de Banyer, III, 492.
- » de Bareges, III, 492.
- » de beleño, III, 481, 493 y 518.
- » de beleño (Weber), III, 492.
- » de belladona, I, 118; III, 481 y 493.
- » de belladona (Cunier), III, 493.
- » de belladona (Chaussier), III, 493.
- » de belladona (H. DE M.), III, 493.
- » de belladona y Saturno (Dupuytren), III, 493.
- » de belladona alcanforada (Jadieux), III, 493.
- » de Berton, III, 493.
- » de bicloroioduro de mercurio, III, 500.
- » de Bigker, III, 493.
- » de bioduro de mercurio (Hoffmann), III, 526.
- » de bismuto, III, 494.
- » contra el bocio (Pistchaft), III, 503.
- » boratada, III, 494.
- » de borax, I, 122; III, 494.
- » de borax (Sichel), III, 494.
- Pomada de Boyer, III, 494.
- » de brea, I, 123; III, 494.
- » de brea (Emery), III, 494 y 495.
- » de brea (Girault), III, 495.
- » de brea (Ricord), III, 495.
- » de brea alcanforada (Baumes), III, 495.
- » bromurada, III, 495.
- » de brumuro de calcio, I, 127.
- » de bromuro de hierro, I, 215; III, 495.
- » de bromuro de potasio, I, 299; III, 495.
- » de bromuro de potasio (Magendie), III, 495.
- » de bromuro de potasio bromurado, III, 495.
- » de bromuro de sodio, I, 335.
- » de cadmio (Radius), III, 495.
- » contra la caída de los cabellos, III, 503.
- » contra la caída de los cabellos (Ricord), III, 503.
- » contra la caída de los cabellos (Dupuytren), III, 503.
- » calmante, III, 481, 496 y 545.
- » calmante (Fouquier), III, 496.
- » calmante (Guepin), III, 496.
- » calmante (James), III, 496.
- » calmante (Pott), III, 496.
- » calmante (Rognetta), III, 496.
- » de calomelanos (H. M. F.), III, 496.
- » de calomelanos alcanforada (Cazenave), III, 496.
- » de calomelanos opiada (H. M. F.), III, 496.
- » contra los callos, III, 503.
- » de camuesas, III, 496.
- » de cantáridas (F. P.), IV, 168.
- » de cantaridina, I, 133; III, 497.
- » cantaridada, III, 497.
- » de caracoles, III, 497.

- Pomada de caracoles (Rivière), III, 497.
- » de carbon animal, I, 137.
 - » de carbon y flores de azufre (F. P.), III, 497.
 - » de carbon vegetal, I, 137.
 - » de carbonato de cobre, I, 155.
 - » de carbonato de plomo, I, 295.
 - » de carbonato de plomo (F. E.), III, 497.
 - » de carbonato de potasa, I, 300.
 - » de carbonato de potasa y cal (Devergie), III, 497.
 - » de carbonato de sosa, I, 336.
 - » de carburo de potasio, I, 302.
 - » caterética, III, 497.
 - » caterética (Neumann), III, 497.
 - » cáustica (Baumes), III, 498.
 - » cáustica (Graeffe), III, 498.
 - » de Cazenave, III, 498.
 - » contra la ceática (Bourge), III, 503.
 - » de cebadilla (José Gascon), III, 498.
 - » de cebolla albarrana, I, 145.
 - » cetrina (F. E.), IV, 163.
 - » cetrina (F. F.), III, 498.
 - » cetrina con el aceite de olivas (Planche), III, 498.
 - » de cianuro de hierro y potasa, I, 216.
 - » de cianuro de mercurio, I, 256.
 - » de cianuro de mercurio (Bielt), III, 498 y 499.
 - » de cianuro de mercurio (Cazenave), III, 499.
 - » de cianuro de mercurio (Parent), III, 499.
 - » de cianuro de plata, I, 291; III, 499.
 - » de cianuro de potasio, I, 302; III, 499.
 - » de cianuro de potasio (Bielt), III, 499.
- Pomada de cianuro de potasio (H. M. F.), III, 499.
- » de cianuro de potasio (Sandras), III, 499.
 - » de cianuro de zinc, III, 499.
 - » de cicuta, III, 481 y 499.
 - » contra la cifosis (Cazenave), III, 503.
 - » cinabarina, III, 500.
 - » de Cirillo (F. F.), III, 500.
 - » de Cirillo (F. P.), III, 500.
 - » de Cirillo (H. DE M.), III, 500.
 - » de Cirillo opiada, III, 500.
 - » de citrato de quinina, III, 500.
 - » clorada (F. A.), III, 500.
 - » de clorhidrato de morfina, III, 500.
 - » de clorioduro de mercurio, I, 259.
 - » de clorioduro de mercurio (Recamier), III, 500.
 - » cloro mercúrica (Mialhe), III, 500.
 - » cloro-platinica (Hoefer), III, 501.
 - » cloro-plómbica (Mialhe), III, 501.
 - » de cloruro amoníaco mercurial (Bielt), III, 501.
 - » de cloruro de bario, I, 114.
 - » con el cloruro de cal, III, 501.
 - » de cloruro de calcio, I, 128; III, 501.
 - » de cloruro de estaño, III, 501.
 - » de cloruro de mercurio y amoníaco insoluble, I, 258.
 - » de cloruro de oro (Chrestien), III, 501.
 - » de cloruro de oro y sodio, I, 280.
 - » de cloruro de oro y sodio (Chrestien), III, 502.
 - » de cloruro de oro y sodio (Magendie), III, 501.
 - » de cloruro de oro y sodio (Niel), III, 502.
 - » de cloruro de plata, I, 292.

- Pomada de cloruro de plata (Si-card), III, 502.
- » de coca de Levante, I, 157.
- » de coloquintida, I, 161.
- » de coloquintida (Chrestien), III, 502.
- » de la Condesa, III, 502.
- » de cornezuelo de centeno, III, 512.
- » cosmética, III, 512.
- » cosmética de manteca de cacao (Lange), III, 512.
- » de Cottereau (F. P.), III, 529.
- » de crema para la cara, III, 512.
- » de creosota, III, 512.
- » de creosota (Hiff), III, 513.
- » de creosota (Max. Simon), III, 513.
- » crisócroma (Cottereau y Verdé Delisle), III, 513.
- » de Crolius, III, 513.
- » contra el crup, III, 504.
- » contra el crup (Rademacher), III, 504.
- » de delfina, I, 170; III, 513.
- » depilatoria, III, 482.
- » contra el derrame articular (Biechy), III, 504.
- » desecante, III, 513.
- » de Dessault (H. DE S. J.); III, 513.
- » de deutocloruro de mercurio, I, 258 y 260.
- » de deutoioduro de mercurio (Bielt), III, 526.
- » de deutoioduro de mercurio (H. DE M.), III, 526.
- » de deutoioduro de mercurio (Magendie), III, 526.
- » de deutóxido de mercurio, I, 262.
- » de deutóxido de mercurio (Bielt), III, 538.
- » de deutóxido de mercurio alcanforada (Monod), III, 538.
- » de digital, III, 481 y 513.
- » de digitalina, I, 172; III, 513.
- Pomada del Dr. Boucheron para hacer crecer el pelo, III, 494.
- » ectrótica contra las pústulas variolosas, III, 514.
- » contra el eczema (Bielt), III, 505.
- » contra el eczema (Devergie), III, 504.
- » contra el eczema (Velpeau), III, 504.
- » contra el eczema y ciertos pruritos (Wienhoffld), III, 504.
- » contra el eczema crónico (Mialhe), III, 504.
- » contra el eczema de la piel de la cabeza, III, 504.
- » de eléboro, III, 514.
- » de eléboro blanco, III, 514.
- » de eléboro negro, I, 175.
- » de énula campana, I, 179.
- » epilatoria (Cazenave), III, 514.
- » epispástica (Radius), III, 514.
- » epispástica alcanforada (Marjolin), III, 514.
- » epispástica amarilla (F. F.), III, 514.
- » epispástica suave (F. F.), III, 514.
- » epispástica suave (Henry y Guibourt), III, 515.
- » epispástica con las preparaciones de oro (Niel), III, 515.
- » epispástica de torbisco (F. F.), III, 515.
- » epispástica verde (F. F.), III, 515.
- » contra las erupciones secas (Ricord), III, 504.
- » contra las escoriaciones ocasionadas por permanecer en la cama, III, 505.
- » de esencia de almendras amargas, III, 515.
- » de esperma de ballena, III, 516.
- » de espliego (Baumé), III, 516.

- Pomada de estafisagria, I, 186; III, 508 y 516.
- » de estafisagria (Swediaur), III, 516.
- » estibiada (F. F.), III, 517.
- » estibiada (Fabre), III, 516.
- » estibiada (H. M.), III, 517.
- » estibiada (H. DE M.), III, 517.
- » estibiada con belladona (Bourge de Rollot), III, 516.
- » estibio-ricínica (Vitzmann), III, 517.
- » estibio-mercurial (Stannay), III, 517.
- » contra la estiomena (Duchessne Duparc), III, 505.
- » estimulante (Levacher), III, 517.
- » de estramonio, I, 188; III, 481, 493 y 518.
- » de estriknina, III, 518.
- » de estriknina (Sandras), III, 518.
- » excitante (Trussen), III, 516.
- » de extracto de belladona, III, 517.
- » de extracto de cicuta, III, 518.
- » de extracto de Saturno, I, 295.
- » de Fabre, III, 518.
- » contra el fabus, III, 505.
- » febrífuga con sulfato de quinina (Boudin), III, 518.
- » ferruginosa contra la erisipela (Velpeau), III, 518.
- » filocoma, III, 518.
- » de fitolaca, I, 193.
- » de fosfato de amoníaco, I, 86.
- » de fosfato de mercurio, I, 259.
- » de fosfato de mercurio (Albano), III, 518.
- » fosforada (Lescot), III, 518.
- » fosforada y alcanforada (Cruveilhier), III, 519.
- » de fósforo, I, 194.
- » de fósforo (F. F.), III, 519.
- Pomada contra la fotofobia (Cunier), III, 493.
- » de Fournier, III, 519.
- » de fuligocali (Deschamps), III, 519.
- » de fuligocali sulfurado (Deschamps), III, 519.
- » fundente, III, 519.
- » fundente (Fabre), III, 519.
- » fundente (Lerminier), III, 519.
- » de Giacomini, III, 519.
- » de Giroux, II, 519.
- » de Gondret (F. F.), III, 520.
- » de Gondret (F. P.), III, 520.
- » de Gondret (H. DE M.), III, 520.
- » de Grand Jean, III, 520.
- » contra las grietas de los pechos (Bertel), III, 505.
- » contra las grietas de los pechos (Chevalhier), III, 506.
- » contra las grietas del ano (Deday), III, 505.
- » contra las grietas de las manos (Veret), III, 505.
- » de guarana, I, 209.
- » de Hanay, III, 520.
- » de Helmerich, III, 520.
- » de Helmerich (F. P.), III, 520.
- » de Henke, III, 520.
- » de los hermanos Mahon, III, 520.
- » contra los herpes (Gibert), III, 506.
- » contra los herpes (Mad. Marechale), III, 506.
- » contra el herpes circinatus, III, 506.
- » contra el herpes tonsurans (Cazenave), III, 506.
- » hidriodatada (F. F.), III, 521.
- » hidriodatada (F. P.), III, 521.
- » hidriodatada y iodurada (Baudelocque), III, 524.
- » de hidriodato de amoníaco (Bielt), III, 521.
- » de hidriodato de amoníaco (Gibert), III, 521.

- Pomada hidriodatada (Riecke), III, 521.
- » de hidriodato iodurado de potasa (Magendie), III, 521.
- » de hidriodato de potasa (H. DE M.), III, 521.
- » de hidriodato de potasa y mercurio, III, 521.
- » de higado de azufre, III, 521.
- » de hinojo, I, 223.
- » de hollin, I, 224; III, 521 y 522.
- » de hollin (Blaud), III, 522.
- » de hollin (Carron de Villards), III, 522.
- » de hollin (Foy), III, 522.
- » de hollin (Lagneau), III, 522.
- » de hollin (Marinas), III, 522.
- » de hollin contra la tiña (Lablache), III, 522.
- » contra el impétigo desparamado, III, 506.
- » contra los infartos cancerosos (Boinet), III, 506.
- » contra los infartos glandulares (Boinet), III, 506.
- » contra el intertrigo (Rossen), III, 507.
- » de iodhidrargirato de ioduro de potasio, III, 522.
- » de iodhidrargirato de mercurio y potasio (Mialhe), III, 523.
- » de iodo, I, 226; III, 523.
- » de iodo (H. DE M.), III, 523.
- » de iodo calmante (Chomel), III, 523.
- » de iodoforme, I, 137; III, 523.
- » de iodoforme (Glower), III, 523.
- » iodo-mercurial alcanforada (Golfin), III, 530.
- » iodo-narcótica alcanforada, III, 523.
- » iodurada (Baudelocque), III, 523.
- » iodurada (F. F.), III, 523.
- » iodurada contra la gota (Gendrin), III, 524.
- » iodurada jabonosa (Riecke), III, 524.
- Pomada iodurada de Lugol (F. P.), III, 524.
- » iodurada (Lemasson), III, 524.
- » de ioduro de amoniaco, I, 86.
- » de ioduro de arsénico, I, 100.
- » de ioduro de azufre, I, 227; III, 524.
- » de ioduro de arsénico (Bielt), III, 524 y 525.
- » de ioduro de bario, I, 115.
- » de ioduro de bario (Bielt), III, 525.
- » de ioduro de bario (Radius), III, 525.
- » de ioduro de calcio, I, 129.
- » de ioduro de hierro, I, 218; III, 525.
- » de ioduro de hierro (Pierquin), III, 525.
- » de ioduro de iodhidrato de quinina (Righini), III, 525.
- » de ioduro de manganeso, I, 437.
- » de ioduro de mercurio (H. M.), III, 526.
- » de ioduro de plata, I, 292.
- » de ioduro de plata (F. DE L.), III, 526.
- » de ioduro de plomo, I, 296; III, 526.
- » de ioduro de plomo (F. P.), III, 521.
- » de ioduro de plomo (H. DE M.), III, 526.
- » de ioduro de potasio, I, 227; III, 526 y 527.
- » de ioduro de potasio (H. DE M.), III, 521.
- » de ioduro de potasio (Magendie), III, 527.
- » de ioduro de potasio (Mialhe), III, 527.
- » de ioduro de potasio iodurada (Coindet), III, 527.
- » de ioduro de potasio iodurado (H. DE M.), III, 527.
- » de ioduro de zinc, I, 364.
- » de ioduro de zinc (Magendie), III, 527.

- Pomada de ioduro de zinc (Ure), III, 527.
- » irritante, III, 527.
 - » irritante (H. M.), III, 528.
 - » de Jadelot (F. F.), III, 63.
 - » de James, III, 528.
 - » de Janin (H. DE S. JUAN), III, 528.
 - » de Jasser, III, 528.
 - » de Kopp, III, 528.
 - » de Krugen Hausen, III, 528.
 - » de laurel (F. F.), III, 528.
 - » de laurel real, III, 528.
 - » contra el líquen (Biett), III, 507.
 - » de lupulina, I, 239.
 - » de lupulina (Freake), III, 528.
 - » de lúpulo, I, 239; III, 528.
 - » de Lyon, III, 529.
 - » llamada de los hospitales militares de Francia, contra la sarna, III, 522.
 - » de manganeso, III, 529.
 - » de manteca de cacao (Corbel Lagneau), III, 487.
 - » de manzanas y pasas (F. P.), III, 529.
 - » marcial (Velpeau), III, 518.
 - » de mejorana, I, 251.
 - » de Melier, III, 529.
 - » de meliloto, I, 251.
 - » contra la mentagra, III, 507.
 - » mercurial (Bataille), III, 529.
 - » mercurial (Biett), III, 529.
 - » mercurial (Dupuytren), III, 529.
 - » mercurial (F. F.), IV, 172.
 - » mercurial (F. P.), IV, 172.
 - » mercurial (Weller), III, 532.
 - » mercurial amoniacoal (Dupuytren), III, 532.
 - » mercurial amoniacoal (Hufeland), III, 530.
 - » mercurial anodina (Weller), III, 530.
 - » mercurial astringente (Ritterich), III, 530.
 - » mercurial con belladona (Desmarres), III, 531.
- Pomada mercurial con belladona (P. de Mignot), III, 530.
- » mercurial con belladona (Velpeau), III, 531.
 - » mercurial belladonizada (Sichel), III, 530.
 - » mercurial belladonizada y alcanforada (J. Cloquet), III, 531.
 - » mercurial de Cottereau (Jadelot), III, 530.
 - » mercurial con creosota (Tannesville), III, 531.
 - » mercurial iodurada (Hanche), III, 531.
 - » mercurial laudanizada, III, 531.
 - » mercurial de manteca de cacao, III, 531.
 - » mercurial con manteca de cacao de Planche (F. P.), III, 531.
 - » mercurial opiada, III, 532.
 - » mercurial suave (F. P.), III, 530.
 - » mercurial simple (F. F.), IV, 172.
 - » mercurial con zinc (Vogel), III, 531.
 - » de mercurio dulce, I, 257; III, 532.
 - » de mercurio dulce (Cazenave), III, 501.
 - » de mercurio dulce (F. P.), III, 532.
 - » mineral, III, 532.
 - » de monesia, I, 267; III, 532.
 - » de morfina, III, 532.
 - » de morfina (Sandras), III, 532.
 - » de naftalina, I, 272.
 - » de naftalina (Emery), III, 533.
 - » de nata, II, 127.
 - » nervina (F. F.), IV, 174.
 - » contra las neuralgias (Calve), III, 507.
 - » contra las neuralgias (Debourge), III, 507.
 - » contra las neuralgias (Debreyne), III, 533.

- Pomada contra la neuralgia facial (Fouquier), III, 507.
- » contra la neuralgia facial (Brookes), III, 507.
- » nitrada (F. E.), III, 539.
- » de nitrato de estricnina (Wendt), III, 533.
- » de nitrato de mercurio, I, 261; III, 533.
- » de nitrato de mercurio (Dubois), III, 533.
- » de nitrato de plata, III, 533.
- » de nitrato de plata (Cazenave), III, 533.
- » de nitrato de plata (Guepin), III, 534.
- » de nitrato de plata (Guthrie), III, 533.
- » de nitrato de plata (H. M. F.), III, 534.
- » de nitrato de plata (Jobert), III, 534.
- » de nitrato de protóxido de mercurio y amoniaco, I, 162.
- » nítrica (F. F.), III, 539.
- » nítrica (F. P.), III, 539.
- » de nogal, III, 534.
- » de nogal (Negrier), IV, 137.
- » de nuez de agalla, I, 275; III, 534.
- » nutrida (F. F.), IV, 174.
- » obstétrica (Chaussier), III, 534.
- » contra la otorrea crónica (Meniere), III, 507.
- » oftálmica, III, 534, 535 y 538.
- » oftálmica (Carron de Villards), III, 535.
- » oftálmica (Cunier), III, 535.
- » oftálmica (Desmarres), III, 535.
- » oftálmica (F. P.), III, 535.
- » oftálmica (Guthrie), III, 533 y 535.
- » oftálmica (H. DE M.), III, 535.
- » oftálmica (Jadelot), III, 535.
- » oftálmica (Lyon), III, 536.
- » oftálmica (Regente), III, 536.
- Pomada oftálmica (Scarpa), III, 536.
- » oftálmica (Sichel), III, 489, 536 y 542.
- » oftálmica (St. Ives), III, 490.
- » oftálmica (Velpeau), III, 490 y 536.
- » oftálmica (William Adams), III, 537.
- » oftálmica blanca de Aguilera (H. DE M.), III, 537.
- » oftálmica de Dessault (H. DE M.), III, 537.
- » contra la oftalmia escrofulosa, III, 507.
- » oftálmica excitante (Rust), III, 537.
- » oftálmica con hollin (Carron de Villards), III, 537.
- » oftálmica de Janin (H. DE M.), III, 536.
- » oftálmica de tucia (H. DE M.), III, 537.
- » opiada, III, 537 y 538.
- » de oro, I, 279.
- » de oro (Legrand), III, 538.
- » de oxicianuro de mercurio, I, 257.
- » de óxido de bario, I, 115.
- » de óxido de mercurio, III, 538.
- » de óxido de plata, I, 293; III, 538.
- » de óxido rojo de mercurio, III, 489.
- » de óxido rojo de mercurio (Bielt), III, 538.
- » de óxido de zinc (Cazenave), III, 538.
- » de óxido de zinc (Martin Solon), III, 538.
- » de óxido de zinc (Schmidt), III, 538.
- » oxigenada (F. A.), III, 539.
- » oxigenada (F. F.), III, 539.
- » oxigenada (F. P.), III, 539.
- » oxigenada (H. M.), III, 539.
- » para los cabellos (Bouche-ron), III, 539.
- » para los cabellos (Huart), III, 539.

- Pomada para la cara, II, 188; III, 539.
- » para dilatar la pupila, III, 539.
 - » para hacer abortar las viruelas, III, 540.
 - » para los labios (F. F.), II, 131.
 - » para los reconocimientos, III, 540.
 - » de Pearson, III, 56.
 - » de pepino, I, 285.
 - » de pepinos (Bouron), III, 540.
 - » de pepinos (Dorvault), III, 541.
 - » de pepinos (Henry y Guibourt), III, 540.
 - » de pepinos (Page), III, 540.
 - » de peróxido de manganeso, I, 245.
 - » de Peyson, III, 541.
 - » de picrotoxina, III, 541.
 - » de Pihorel, III, 541.
 - » de pimienta, I, 288; III, 541.
 - » de pimienta (Cazenave), III, 541.
 - » de Pinel Grandchamp, III, 541.
 - » contra los piojos, III, 508.
 - » contra los piojos y las ladillas, III, 508.
 - » de pirlaina de Emery (F. P.), III, 541.
 - » de plombagina (Maerken), III, 542.
 - » de populeon (F. F.), IV, 176.
 - » de precipitado blanco, III, 542.
 - » de precipitado blanco y rojo (Gibert), III, 542.
 - » de precipitado rojo, III, 542.
 - » de precipitado rojo (Sichel), III, 542.
 - » de Pringle, III, 541.
 - » de protoioduro de mercurio, I, 260.
 - » de protoioduro de mercurio (Biett), III, 525.
- Pomada de protoioduro de mercurio (Cazenave), III, 501.
- » de protocloruro de mercurio (H. M. F.), III, 496 y 501.
 - » de protoioduro de mercurio (H. DE M.), III, 525.
 - » de protoioduro de mercurio (Lugol), III, 525.
 - » de protoioduro de mercurio (Magendie), III, 525.
 - » de protoioduro de mercurio de Lugol (F. P.), III, 526.
 - » de protonitrato de mercurio, III, 533.
 - » de protonitrato de mercurio (Biett), III, 533.
 - » contra el prúrigo, III, 508.
 - » contra el prúrigo (Biett), III, 508.
 - » contra el prúrigo (Debreyne), III, 508.
 - » de pulsatila, III, 542.
 - » purgante (Chrestien), III, 542.
 - » contra las pústulas de las viruelas, III, 508.
 - » contra las quemaduras, III, 508.
 - » contra las quemaduras (Sutro), III, 508.
 - » de quermes mineral, I, 92.
 - » de quina amarilla (Rust), III, 542.
 - » del Regente, III, 542.
 - » del Regente (F. F.), III, 543.
 - » de resineona de brea, I, 318.
 - » resolutive, III, 543.
 - » resolutive (Biett), III, 543.
 - » resolutive (Dupuytren), III, 543.
 - » resolutive (Lisfranc), III, 543.
 - » resolutive (Sundelin), III, 543.
 - » resolutive calmante, III, 543.
 - » resolutive mercurial, III, 543.
 - » de Rol, III, 544.

- Pomada de romero compuesta, III, 544.
- » rosada (F. F.), IV, 177.
- » de rosas, III, 544.
- » rubefaciente, III, 544.
- » rubefaciente de pimienta, III, 541.
- » de Rust, III, 544.
- » de sabadilla, I, 322.
- » contra los sabañones, III, 508.
- » contra los sabañones (Berton), III, 505.
- » contra los sabañones (Brefeld), III, 509.
- » contra los sabañones (Devergie), III, 509.
- » contra los sabañones (Knorlizer), III, 509.
- » contra los sabañones (Rust), III, 509.
- » contra los sabañones ulcerados, III, 509.
- » de sabina, III, 544.
- » de San Andrés, III, 483.
- » contra la sarna, III, 509 y 510.
- » contra la sarna (Emery), III, 510.
- » contra la sarna (Forget), III, 510.
- » contra la sarna (HOSPITAL), III, 510.
- » contra la sarna (Lisson), III, 510.
- » contra la sarna (Melier), III, 510.
- » contra la sarna (Rolb), III, 510.
- » saturnina (F. POLACA), III, 544.
- » saturnina alcanforada (Baumés), III, 544.
- » saturnina resolutive (Baumés), III, 544.
- » de Saturno, IV, 178.
- » de Saturno (H. DE M.), IV, 178.
- » de saúco, III, 544.
- » sedante, III, 544 y 545.
- » sedante (Dupuytren), III, 544.
- Pomada sedante (Petrequin), III, 544.
- » sedante y abortiva (Debreyne), III, 545.
- » sedante antihemorroidal (Debreyne), III, 545.
- » de siempreviva de los tejados, I, 335.
- » contra la sífilis escrofulosa (Bielt), III, 510.
- » contra la soriasis (Boinet), III, 510.
- » de sulfato de cobre (Desmarrés), III, 545.
- » de sulfato mercurioso, III, 592.
- » de sulfato de mercurio y amoníaco, I, 262.
- » de sulfato de quinina, I, 314; III, 545.
- » de sulfato de zinc, I, 365.
- » sulfoalcalina, III, 545.
- » sulfoamoniaco, III, 545.
- » sulfojabonosa, III, 520 y 546.
- » sulfojabonosa (Lugol), III, 546.
- » sulfojabonosa con eléboro, III, 546.
- » sulfurada (F. F.), III, 546.
- » sulfúrica (Naylor), III, 546.
- » sulfuroalcalina, III, 545.
- » sulfuroalcalina (Jadelot), III, 545.
- » de sulfuro de arsénico, I, 101.
- » de sulfuro de arsénico y cal, I, 101.
- » de sulfuro de arsénico y calcio (F. P.), III, 546.
- » de sulfuro de calcio, I, 130.
- » de sulfuro de carbono, III, 546.
- » de sulfuro de mercurio, (Bielt), III, 546.
- » de sulfuro de potasa, I, 305.
- » de sulfuro de sodio (F. P.), III, 546.
- » de sulfuro de sosa, I, 340.
- » sulfurosa, III, 546.
- » de la sultana, III, 546.
- » de tabaco, I, 342; III, 493.

- Pomada de tanato de plomo, I, 297.
- » de tanato de plomo (Yott), III, 547.
 - » de tanino, I, 344; III, 547.
 - » de tártaro emético, I, 95.
 - » de Thierry, III, 547.
 - » contra la tiña, III, 511.
 - » contra la tiña (Bories), III, 511.
 - » contra la tiña (Ordinaire), III, 511.
 - » contra la tiña (Pinel Gran-champ), III, 511.
 - » contra la tiña con carbon animal (H. DE M.), III, 511.
 - » contra la tiña con carbon vegetal (H. DE M.), III, 511.
 - » contra la tiña favosa (Petel), III, 512.
 - » de Todde, III, 547.
 - » de torbisco, I, 347.
 - » de torbisco (H. DE M.), III, 547.
 - » de torbisco estibiada (Terborgh), III, 547.
 - » de tormentila, I, 348.
 - » trementinada (Debreyne), III, 547.
 - » de tucia (F. F.), IV, 180.
 - » de tucia (F. P.), IV, 180.
 - » de tuétano de vaca, III, 547.
 - » de turbit (Alibert), III, 547.
 - » de turbit mineral, I, 263; III, 547.
 - » de turbit mineral (Swediaur), III, 547.
 - » de veratrina (Terrier), III, 548.
 - » de veratrina de Magendie (H. DE M.), III, 548.
 - » vermífuga, III, 548.
 - » vermífuga (Doerffurt), III, 548.
 - » vexicante de cantaridina, III, 497.
 - » de la viuda de Farnier, III, 483 y 548.
 - » de Werlhof, III, 548.
 - » de Willam, III, 548.
- Pomada de Witzmann, III, 548.
- » de yemas de álamo, III, 548.
 - » de yerba mora, I, 160; III, 481 y 493.
 - » de zinc, III, 549.
 - » de zinc (Schmidt), III, 549.
 - » zincada (Schmidt), III, 549.
 - » zinco plúmbico opiada (Rosenthal), III, 549.
 - » virginal, III, 502.
 - » de zumaque venenoso, I, 366.
- Ponches, III, 549.
- Ponche contra las calenturas nerviosas de los ancianos, III, 549.
- » español, III, 549.
 - » oficial, III, 549.
- Potasa cáustica con cal (F. F.), II, 124.
- Prólogo, I, IV.
- Protoioduro de manganeso, I, 436.
- Protosulfato de manganeso, I, 438.
- Pulpas, III, 549.
- Pulpa de ajo (F. F.), III, 551.
- » de azucena (F. F.), III, 550.
 - » de azufaixas (F. F.), III, 550.
 - » de berros (F. F.), III, 550.
 - » de cañafistula, I, 134.
 - » de cañafistula (F. F.), III, 549.
 - » de cañafistula (F. P.), III, 549.
 - » de cañafistula compuesta, III, 550.
 - » de cañafistula para lavativas, III, 550.
 - » de cebolla albarrana (F. F.), III, 550.
 - » de cebollas comunes (F. F.), III, 550.
 - » de cebolla de lirio (F. F.), III, 550.
 - » de cicuta (F. F.), III, 550.
 - » de cinosbastos, I, 151; III, 550.
 - » de ciruelas (F. F.), III, 550.
 - » de coclearia (F. F.), III, 550.
 - » de dátiles (F. F.), III, 550.
 - » de escaramujos (F. F.), III, 550.

- | | |
|--|--|
| <p>Pulpa de especies emolientes (F. F.), III, 550.</p> <p>» de membrillos (F. F.), III, 551.</p> <p>» de paciencia (F. F.), III, 551.</p> <p>» de patatas (F. F.), III, 551.</p> <p>» de raiz de énula campana (F. F.), III, 550.</p> <p>» de raiz de malvabisco (F. F.), III, 550.</p> <p>» de rosas rojas (F. F.), III, 550.</p> <p>» de tamarindos, I, 343.</p> | <p>Pulpa de tamarindos (F. F.), III, 550.</p> <p>» de tamarindos artificial, III, 551.</p> <p>» de zanahoria (F. F.), III, 551.</p> <p>Purgantes, III, 551.</p> <p>Purgante ácido, III, 551.</p> <p>» antilechoso, III, 551.</p> <p>» de calomelanos, III, 551.</p> <p>» drástico (Andral), III, 551.</p> <p>» de Grant, III, 551.</p> <p>» lechoso, III, 551.</p> <p>» vermífugo, III, 552.</p> |
|--|--|

Q.

- | | |
|--|---|
| <p>Quintas esencias, IV, 5.</p> <p>Quinta esencia de ajenos, IV, 5 y 65.</p> | <p>Quinta esencia antiépsórica, II, 35.</p> |
|--|---|

R.

- | | |
|---|--|
| <p>Racaout (H. DE M.), II, 312.</p> <p>» de los árabes, II, 312.</p> <p>Raices aperitivas (F. F.), II, 288.</p> <p>Ratafias, IV, 5.</p> <p>Ratafia de ajenos, IV, 5.</p> <p>» de alcaravea compuesta, IV, 6.</p> <p>» de angélica, IV, 6.</p> <p>» de angélica y cilantro compuesta, IV, 6.</p> <p>» de anís, IV, 6.</p> <p>» de anís compuesta, IV, 6.</p> <p>» de anís destilada, IV, 6.</p> <p>» aniseta de Burdeos, IV, 6.</p> <p>» antiescorbútica, IV, 9.</p> <p>» de azafran compuesta, IV, 6.</p> <p>» de azahar, IV, 7.</p> <p>» de azahar compuesta, IV, 7.</p> <p>» de azahar destilada, IV, 7.</p> <p>» de benjuí, IV, 10.</p> <p>» bitter de los holandeses y amargo de los alemanes, IV, 7.</p> <p>» de cacao, IV, 7.</p> <p>» de café, IV, 8.</p> <p>» de café destilada, IV, 8.</p> | <p>Ratafia de canela, IV, 8.</p> <p>» de los Caribes, IV, 8.</p> <p>» de cáscara de naranja, IV, 8.</p> <p>» de cáscara de naranjas amargas, IV, 8.</p> <p>» de cáscara verde de nuez, IV, 8.</p> <p>» de claveles, IV, 9.</p> <p>» del comendador de Coumartin contra las arenillas, IV, 9.</p> <p>» elefante, IV, 10.</p> <p>» elefantina, IV, 10.</p> <p>» de enebro, IV, 8.</p> <p>» de enebro destilada, IV, 6 y 8.</p> <p>» de enebro sin destilar, IV, 6.</p> <p>» de frambuesas, IV, 9.</p> <p>» de frutos, IV, 9.</p> <p>» de grosellas, IV, 9.</p> <p>» de grosellas negras, IV, 9.</p> <p>» de guindas, IV, 9.</p> <p>» de guindas agrias compuesta, IV, 9.</p> <p>» de huesos, IV, 9.</p> <p>» de limon destilada, IV, 10.</p> |
|---|--|

- Ratafia de membrillos, IV, 10.
- » de menta, IV, 8.
 - » de quina, IV, 10.
 - » de rosas, IV, 10.
 - » de té, II, 53.
 - » de Tolú, IV, 10.
 - » de vainilla, IV, 10.
- Remedios, IV, 11.
- Remedio contra los accidentes por los hongos, IV, 13.
- » contra las afecciones crónicas de las articulaciones (Purmann), IV, 11.
 - » antigotoso (Lucas), IV, 14.
 - » antigotoso (Thaer), III, 194.
 - » antihemorroidal (Vallez), IV, 11.
 - » árabe, II, 420.
 - » astringente tónico (Putegnat), IV, 11.
 - » contra el bocio (Dr. Coindet), IV, 11.
 - » contra el cáncer (Landolfi), IV, 12.
 - » contra los carbunclos, IV, 11.
 - » de los Caribes, IV, 8.
 - » del cura Chancé, IV, 19.
 - » contra la diarrea, IV, 13.
 - » contra la disenteria (Quarin), IV, 19.
 - » contra la disenteria maligna (Quarin), IV, 20.
 - » contra el envenenamiento por los hongos, IV, 13.
 - » contra la epilepsia (Marchetti), IV, 12.
 - » contra el escirro y el cáncer (Reitz), IV, 12.
 - » febrífugo (Foldi), IV, 19.
 - » contra las flores blancas (Dr Kopp), IV, 14.
 - » contra la gota, II, 397; IV, 14.
 - » contra la gota (Turck), IV, 14.
 - » contra la lombriz solitaria (Madama Nouffer), IV, 19.
 - » contra las pecas, IV, 14.
 - » de Pradier, II, 111.
 - » preservativo contra las cicatrices de las viruelas (Thielmann), IV, 21.
- Remedio preservativo de Hudson para los dientes y las encías, IV, 19.
- » de Quarin contra la disenteria, IV, 20.
 - » contra la rabia, IV, 15.
 - » contra la rabia (Jacnichel), IV, 15.
 - » contra los sabañones (Pougens), IV, 19.
 - » contra la ténia (Alibert), IV, 16.
 - » contra la ténia (Bourdier), IV, 16.
 - » contra la ténia (Dubois), IV, 15.
 - » contra la ténia (Dupuis), IV, 16.
 - » contra la ténia (Levacher), III, 387; IV, 16.
 - » contra la ténia (Madama Nouffer), IV, 19.
 - » contra la ténia (Schmidt), IV, 17.
 - » contra la ténia (Mathieu), IV, 18.
 - » tenífugo (Schmidt), IV, 17.
 - » contra el tialismo, IV, 17.
 - » contra el tialismo de las preñadas, IV, 17.
 - » contra la tiña (Dr. Barlow), IV, 17.
 - » contra la tiña (Bicker), IV, 18.
 - » contra la tisis (Cottereau), IV, 18.
 - » contra la tisis pulmonar (Hufeland), IV, 18.
 - » vermífugo (Bremser), IV, 20.
- Resina de guayaco, I, 209.
- » de soldanela de mar, I, 340.
 - » verde de torbisco (Coldefy Dorly), III, 154.
 - » de turbit, I, 350.
- Resineona de brea, I, 440.
- Revulsivo de mostaza, I, 60.
- Robs, IV, 21.
- Rob antisifilítico (H. DE M.), IV, 22.
- » antisifilítico de Giradoux de St. Gervais, IV, 21.

- Rob antisifilítico de Laffecteur, IV, 21.
- » antisifilítico de Laffecteur (Bouchardat), IV, 22.
 - » antisifilítico de Laffecteur (Soubeiran), IV, 21.
 - » de arándano, IV, 22.
 - » de Arnoud, IV, 103.
 - » de belladona (F. F.), I, 11; II, 210.
 - » de cáscara de nuez (Veret), IV, 22.
 - » de cerezas, IV, 22.
 - » de cohombriño amargo (F. F.), II, 310.
 - » de corteza verde de nuez (F. F.), II, 310.
 - » depurativo, IV, 23.
 - » depurativo (Devergie), IV, 23.
 - » depurativo (Ricord y Duval), II, 417.
 - » de espinio serval, I, 185; IV, 22 y 23.
 - » de espinio serval (F. F.), II, 310.
- Rob de frambuesas, IV, 22.
- » de fresas, IV, 22.
 - » de frutos de saúco, I, 332.
 - » de grosellas, IV, 22.
 - » de grosellas (F. F.), II, 310.
 - » de mirtilo, I, 265.
 - » de moras, IV, 23.
 - » de moras (F. P.), IV, 23.
 - » de naranjo, IV, 23.
 - » de pasas, IV, 22.
 - » de saúco, IV, 23.
 - » de saúco (F. F.), II, 310.
 - » de ubas (F. F.), II, 310.
 - » de yezgo, IV, 22.
 - » de yezgo (F. A.), IV, 23.
- Rodomel, III, 105.
- » cidoniado, III, 105.
 - » cidoniado (F. E.), III, 105.
- Rodosácara (F. E.), II, 444.
- Rosoli de quina (Pierquin), IV, 95.
- » de las semillas, IV, 6.
- Rusma de los orientales, III, 58.
- » de los turcos, III, 159.

S.

- Sacarocali (Blondeau), IV, 23.
- Sacarolados, III, 23.
- Sacarolado de aceite de croton, IV, 23.
- » de acónito, IV, 26.
 - » de almendras, IV, 24.
 - » de alumbre, IV, 24.
 - » de beleño, IV, 26.
 - » de belladona, IV, 26.
 - » de caracoles (Mouchon), IV, 25.
 - » de cicuta, IV, 26.
 - » de citrato de hierro (Beral), IV, 26.
 - » de cuerno de ciervo (Mouchon), IV, 25.
 - » de digital fresca, IV, 26.
 - » emenagogo, IV, 26.
 - » de estramonio, IV, 26.
 - » expectorante, IV, 26.
- Sacarolado de gelatina de líquen (Beral), IV, 27.
- » gomoceroso de Noel Thia-ville, IV, 26.
 - » de hipocolia, IV, 27.
 - » de jalapa compuesto, IV, 27.
 - » de líquen, IV, 27.
 - » de magnesia, III, 458.
 - » de óxido de zinc, III, 463.
 - » de quina (Goldefy), IV, 27.
 - » de ruda, IV, 26.
 - » de sabina, IV, 26.
 - » tónico, IV, 28.
- Sacaruros, III, 23.
- Sacaruro de acónito (Foy), IV, 29.
- » albuminoso (Mondiere); IV, 23.
 - » antiespasmódico, IV, 24.

- Sacaruro antihelmintico , IV, 24.
- » astringente (Fossati), IV, 24.
 - » de beleño (Foy), IV, 29.
 - » de belladona (Foy), IV, 29.
 - » de berro de Pará, IV, 25.
 - » de cainca , IV, 26.
 - » calmante , IV, 25.
 - » de caracoles (Arnaud), IV, 25.
 - » de caracoles (Figuiet), IV, 25.
 - » de carbonato de hierro , IV, 25.
 - » de cicuta (Foy), IV, 29.
 - » de citrato de hierro , IV, 26.
 - » de citrato de hierro para agua ferrurada , IV, 26.
 - » de cólchico (Foy), IV, 29.
 - » de cornezuelo de centeno (Foy), IV, 29.
 - » de cuerno de ciervo (Mouchon), IV, 25.
 - » de digital (Foy), IV, 29.
 - » de escila (Foy), IV, 29.
 - » de esencia de trementina , IV, 29.
 - » de estramonio (Foy), IV, 29.
 - » de hipocolia , IV, 27.
 - » de ipecacuana , IV, 28.
 - » de musgo de Córcega (Deschamps), IV, 28.
 - » de musgo marino perlado , IV, 28.
 - » de oro , IV, 28.
 - » de pulsatila , IV, 28.
 - » de resineona , I, 318; IV, 28.
 - » de ruda (Foy), IV, 29.
 - » de sabina (Foy), IV, 29.
 - » de tinturas (Beral), IV, 29.
 - » de zumos (Foy), IV, 29.
- Sales , IV, 29.
- Sal esencial de Lagaraye , IV, 29.
- » esencial de Lagaraye (F. F.), II, 309.
 - » marcial de Lagresie , IV, 30.
 - » esencial de limon , IV, 29.
 - » de Guindre , IV, 29.
 - » de Lagaraye , I, 310.
 - » refrigerante (Vauquelin), III, 99.
- Sal volátil aromática , IV, 30.
- » volátil inglesa , IV, 30.
- Salvado de almendras contra los sabañones (Bandoff), III, 428.
- » contra los sabañones (Baudot), III, 471.
- Saquitos , IV, 30.
- » antireumáticos (Marjolin), IV, 30.
- Saquito antiséptico , IV, 30.
- » aromático , IV, 30.
 - » contra el bocio , II, 182.
 - » estomacal , IV, 31.
 - » de Guichard , IV, 31.
 - » de ioduro de potasio y clorhidrato de amoniaco , IV, 31.
 - » resolutivo (Barthez), IV, 31.
 - » resolutivo (Dumeril), IV, 31.
 - » resolutivo (Tanchou), IV, 31.
 - » resolutivo amoniacal , IV, 31.
 - » contra los tumores de pecho (Tanchou), IV, 31.
- Sarmiento de vid , I, 357.
- Sedal , I, 332.
- Sedlitz powders , III, 472.
- Semicupios , IV, 32.
- Semicupio emoliente y calmante , IV, 32.
- Semillas carminativas , II, 287.
- » frias (F. F.), II, 289.
- Sinapismos , I, 269; IV, 32.
- Sinapismo (F. F.), IV, 33.
- » (H. DE M.), IV, 32.
 - » amoniacal , IV, 32.
 - » animado , IV, 32.
 - » cantaridado (F. P.), IV, 32.
 - » isquiático , IV, 32.
 - » mitigado , IV, 33.
 - » para las plantas de los piés , (F. E.), IV, 33.
 - » de pimienta , IV, 33.
 - » de rábano , I, 315.
- Soda powders , III, 473.
- » water (F. F.), II, 39.
- Soluciones , IV, 33.

- Solucion acética (Houlton), IV, 34.
- » de acetato de amoníaco, IV, 33.
- » de acetato de barita, I, 114.
- » de acetato de morfina, I, 268.
- » de acetato de morfina (Magendie), IV, 33.
- » de acetato de plata, I, 291.
- » de acetato de plomo, I, 294.
- » de acetato de plomo (F. DE L.), IV, 38.
- » de acetato de plomo (Ricord), IV, 34.
- » de ácido acético, I, 62.
- » de ácido arsenioso, IV, 34.
- » de ácido sulfúrico, I, 108.
- » de ácido sulfuroso, I, 108.
- » de ácido tártrico, I, 65.
- » acuosa de bromo, I, 124.
- » acuosa de ioduro de potasio, IV, 47.
- » acuosa de opio (Chaussier), IV, 50.
- » contra las afecciones herpéticas del conducto auditivo (Meniere), IV, 41.
- » alcalina, IV, 34.
- » alcohólica de carbonato de amoníaco, IV, 34.
- » alcohólica de carbonato de potasa, IV, 66.
- » alcohólica de creosota, I, 166; IV, 42.
- » alcohólica de deutoioduro de mercurio (H. DE M.), IV, 47.
- » alcohólica de deutoioduro de mercurio (Magendie), IV, 47.
- » alcohólica de elaterina (Morrus), IV, 42.
- » alcohólica de morfina, IV, 64.
- » de alumbre, I, 82; IV, 34.
- » aluminosa (Scudamore), IV, 34.
- » aluminosa compuesta (F. DE L.), IV, 34.
- » amoniacal (H. DE M.), IV, 34.
- Solucion amoniacal fundente (Debreyne), IV, 35.
- » anticoréica (Vauters), IV, 35.
- » antidisentérica (Bonorden), IV, 35.
- » antiepiléptica (Magendie), IV, 35.
- » antiepsórica (Derheines), IV, 35.
- » antiescrofulosa (H. DE AL.), IV, 35.
- » antileucorréica, IV, 35.
- » antileucorréica (Ricord), IV, 35.
- » antineurálgica (Kopp), IV, 35.
- » antineurálgica (Schlesier), IV, 35.
- » antiodontálgica (Chapmann), IV, 36.
- » antiodontálgica (Kopp), IV, 36.
- » antiséptica, IV, 36.
- » antisifilítica de Werneck, II, 299; IV, 38.
- » antivenérea (Weikard), IV, 36.
- » de arseniato de amoníaco, IV, 36.
- » de arseniato de amoníaco (Bielt), IV, 36.
- » de arseniato de magnesia, I, 434.
- » de arseniato de quinina, I, 312.
- » arsenical (A. Devergie), IV, 37.
- » arsenical (Boudin), IV, 36.
- » arsenical de Prusia, IV, 37.
- » de arsenito de potasa (F. DE L.), IV, 37.
- » astringente, IV, 37.
- » atrófica (Magendie), IV, 37.
- » atrófica con la tintura de digital (Magendie), IV, 37.
- » de belladona (Lippic), IV, 38.
- » de belladona (Liston), IV, 38.
- » de bicloruro de mercurio (F. DE L.), IV, 38.

- Solucion de las bolas de Nancy, I, 222.
- » boratada (Hufeland), IV, 38
 - » cálmante, IV, 38.
 - » de Cameron, IV, 38.
 - » de carbonato de cobre y de amoniaco, I, 155.
 - » de carbonato de hierro, I, 216.
 - » de carbonato de potasa (F. DE L.), I, 300.
 - » de carbonato de potasa de Rosenstein, II, 342.
 - » de carbonato de sosa, IV, 39.
 - » de catecú contra los flujos mucosos crónicos, IV, 39.
 - » caterética, IV, 39.
 - » cáustica (Mapper), IV, 39.
 - » cáustica de cloruro de oro (Recamier), II, 124.
 - » de cianohidrgirato de ioduro de mercurio, I, 256.
 - » de cianohidrgirato de ioduro de potasio, I, 302.
 - » cianurada, IV, 39.
 - » de cianuro de mercurio, I, 256.
 - » de cianuro de mercurio (F. P.), IV, 39.
 - » de cianuro de potasio (Lombart), IV, 39.
 - » de cicutina, I, 148.
 - » de citrato de morfina, I, 268.
 - » de citrato de morfina (Magendie), IV, 39.
 - » citro-muriática (Broussonnet), IV, 40.
 - » de cloruro de bario, IV, 40.
 - » de cloruro de bario (F. DE L.), IV, 40.
 - » de cloruro de bario (Lisfranc), IV, 40.
 - » de cloruro de bario (Sichel), IV, 40.
 - » de cloruro de cal alcoholizada (Chevalier), IV, 40.
 - » de cloruro de calcio, IV, 40.
 - » de cloruro de calcio (Bielt), IV, 40.
- Solucion de cloruro de calcio (F. DE L.), IV, 40.
- » de cloruro de cobre y amoniaco, I, 155.
 - » de cloruro de estaño, IV, 41.
 - » de cloruro de mercurio, II, 26.
 - » de cloruro de oro y amonio (Furnari y Deleschamps), IV, 41.
 - » de cloruro de sosa (F. DE L.), IV, 41.
 - » de cobre amoniacal (H. DE IT.), IV, 41.
 - » de Coindet, I, 228.
 - » concentrada de sublimado (Ricord), IV, 41.
 - » de creosota (Pigné), IV, 42.
 - » de deutocloruro de mercurio (F. F.), III, 37.
 - » de deutocloruro de mercurio (F. P.), III, 37.
 - » de dextrina, I, 171.
 - » diurética (Martin Solon), IV, 42.
 - » escarótica (Freiberg), IV, 42.
 - » estibiada (Fontaneilles), IV, 43.
 - » etérea de bromuro de mercurio, IV, 38.
 - » etérea de deutoioduro de mercurio (Magendie), IV, 47.
 - » de extracto de zarzaparrilla, IV, 53.
 - » febrífuga de Broussonnet, IV, 40.
 - » ferruginosa contra la erisipela (Velpeau), IV, 43.
 - » de Fricke contra los condilomas, IV, 43.
 - » de goma, IV, 114.
 - » de goma amoniaco, IV, 43.
 - » de goma arábica, I, 205.
 - » de goma tragacanto, I, 206.
 - » contra las grietas de los pechos, IV, 41.
 - » de Guillot, I, 154.
 - » de Heim, III, 32.

- Solucion de Heincke , IV , 43.
- » hemostática , IV , 43.
 - » contra las heridas hechas durante la diseccion , IV , 41.
 - » de hidrociorato de morfina , IV , 43.
 - » de hidrociorato de morfina y codeina , I , 268.
 - » de Hoefler , I , 294.
 - » contra las inflamaciones de la boca posterior (Nard) , IV , 42.
 - » iodada para combatir las hidropesías y los abscesos de las articulaciones (Bonnet) , IV , 43.
 - » de iodhidrargirato de ioduro de potasio , IV , 43.
 - » de iodhidrargirato de potasa (Puche) , IV , 44.
 - » de iodo , I , 226.
 - » de iodoarsenito de mercurio (Donovan) , IV , 44.
 - » de iodoarseniato de mercurio de Donovan , modificada por Soubeiran , IV , 44.
 - » de iodo cáustica (Puche) , IV , 44.
 - » iodurada , IV , 44.
 - » iodurada (Furnari) , IV , 45.
 - » iodurada cáustica , IV , 45.
 - » iodurada concentrada , IV , 45.
 - » iodurada para fomento , IV , 45.
 - » iodurada para inyeccion (Guibourt) , IV , 45.
 - » iodurada para uso exterior (F. P.) , IV , 44.
 - » iodurada rubefaciente , IV , 46.
 - » iodurada rubefaciente de Lugol (F. P.) , IV , 44.
 - » iodurada sulfurosa (Baumes) , IV , 46.
 - » de ioduro de manganeso , I , 437.
 - » de ioduro de potasio , I , 227.
- Solucion de ioduro de potasio (Cooper) , IV , 47.
- » de ioduro de potasio (Magendie) , IV , 47.
 - » de ioduro de potasio iodurado (Coindet) , IV , 47.
 - » de ioduro de potasio medicinal , I , 301.
 - » de ioduro de potasio opiada , IV , 48.
 - » de ioduro de zinc , I , 364.
 - » de jarabe de agracejos , IV , 48.
 - » de jarabe de cerezas , IV , 48.
 - » de jarabe de frambuesas , IV , 48.
 - » de jarabe de granadas , IV , 48.
 - » de jarabe de grosellas , IV , 48.
 - » de jarabe de limon , IV , 48.
 - » de jarabe de manzanas , IV , 48.
 - » de jarabe de naranjas , IV , 48.
 - » de jarabe de vinagre , IV , 48.
 - » de jarabe de vinagre con frambuesas , IV , 48.
 - » de láudano (Cullerier) , IV , 48.
 - » contra las manchas de la córnea (Evermann) , IV , 42.
 - » mercurial (Larrey) , IV , 48.
 - » mercurial etérea (Kopp) , IV , 48.
 - » mercurial (Marryat) , IV , 86.
 - » mercurial (Plison) , IV , 48.
 - » mercurial iodurada (Bielt) , IV , 48.
 - » mercurial opiada , IV , 49.
 - » mercurial resolutive , IV , 49.
 - » de miel , I , 264.
 - » de mostaza negra , I , 269.
 - » de nitrato de barita , I , 115.
 - » de nitrato de mercurio , I , 261.
 - » de nitrato de plata , IV , 50.

- Solucion de nitrato de plata (Bielt), IV, 49.
- » de nitrato de plata (F. P.), IV, 49.
- » de nitrato de plata (F. DE L.), IV, 49.
- » de nitrato de plata (Hann), IV, 49.
- » de nitrato de plata (H. DE AL.), IV, 49.
- » de nitrato de plata (Ricord), IV, 50.
- » de nitrato de plata (Samson), IV, 50.
- » de nitrato de plata cristalizado, I, 293.
- » de nitrato de plata contra la erisipela (Higginbottou), IV, 49.
- » de nitrato de plata saturada, IV, 50.
- » normal de digitalina, IV, 80.
- » normal de protoioduro de hierro de Dupasquier (F. P.), IV, 46.
- » de nuez vómica (Schwartz), IV, 50.
- » odontálgica (Chapmann), IV, 50.
- » odontálgica (Kopp), IV, 50.
- » oficial de protoioduro de hierro (Dupasquier), IV, 46.
- » oftálmica (Siehel), IV, 50.
- » opiada, IV, 50.
- » opiada (Ricord), II, 319.
- » de opio, I, 278.
- » de opio y cicuta contra las vegetaciones sifilíticas, IV, 51.
- » de oxalato de amoníaco, I, 87.
- » para un baño artificial de Baresges (F. F.), IV, 236.
- » de potasa (F. DE L.), IV, 51.
- » de potasa cáustica, I, 299; IV, 51.
- » de potasa cáustica para calllos (Donné), IV, 51.
- » profiláctica contra la escarlatina (Hanhemann), IV, 51.
- Solucion purgante (H. DE M.), IV, 51.
- » radical de ioduro ferroso, IV, 46.
- » resolutive, IV, 51.
- » resolutive calmante, IV, 51.
- » de sal amoníaco (Ricord), IV, 52.
- » de Scudamore, IV, 52.
- » de sesquicarbonato de amoníaco (F. DE L.), IV, 38.
- » de sosa efervescente (F. DE L.), IV, 52.
- » de Soubeiran, IV, 52.
- » de subcarbonato de potasa (Rosenstein), IV, 38.
- » de subcarbonato de sosa (Trousseau), IV, 39.
- » de sublimado corrosivo (H. DE M.), IV, 52.
- » de succinato de amoníaco, I, 87.
- » de sulfato de cobre, I, 156; IV, 52.
- » de sulfato de cobre alcanforada (Swediaur), IV, 52.
- » de sulfato de cobre y amoníaco, I, 157.
- » de sulfato de cobre y amoníaco (F. DE L.), IV, 52.
- » de sulfato de veratrina (Magendie), IV, 52.
- » de sulfato de zinc (Ideler), VI, 52.
- » de sulfuro de antimonio y calcio (F. B.), IV, 53.
- » de sulfuro de calcio, I, 130.
- » de tartrato de mercurio y potasa, I, 264.
- » contra las úlceras de las piernas (Popper), IV, 42.
- » contra las vegetaciones sifilíticas (Venot), IV, 42.
- » de veratrina (Terrier), IV, 53.
- Sondas, IV, 53.
- Succinato de amoníaco impuro, III, 33.
- » de manganeso, I, 437.
- Sueros, IV, 53.
- Suero, IV, 54.
- Suero (F. F.), IV, 54.

- Suero artificial, IV, 54.
- » aluminoso (F. P.), IV, 55.
 - » aluminoso aromatizado, IV, 55.
 - » antiescorbútico, IV, 55.
 - » antiescorbútico (Boerhaave), IV, 55.
 - » aperitivo (Desbois de Rochefort), IV, 55.
 - » aperitivo de Van Swieten, IV, 57.
 - » calibeadado, IV, 56.
 - » clarificado (F. E.), IV, 54.
 - » de coclearia, IV, 55.
 - » emetizado, IV, 56.
 - » facticio, IV, 55.
 - » gaseoso, IV, 56.
 - » gaseoso y purgante, IV, 56.
 - » nitrado, IV, 56.
 - » nitrado (H. DE M.), IV, 56.
 - » preparado (F. E.), IV, 53.
 - » purgante, IV, 56.
 - » purgante (H. DE AL.), IV, 56.
 - » sinapizado, IV, 56.
 - » tamarindado, I, 343; IV, 56.
 - » tamarindado (H. DE M.), IV, 56.
 - » de Van Swieten, IV, 57.
 - » vinoso (J. P. Frank), IV, 57.
 - » vinoso (Swediaur), IV, 57.
 - » de Weiss, I, 334.
 - » de Weiss reformado, IV, 57.
- Sulfato de cobre aluminoso (F. F.), III, 192.
- » de manganeso, I, 438.
 - » de potasa ferruginoso, IV, 30.
- Sulfhidrato de cal, II, 440.
- Sulfito de manganeso, I, 438.
- Sulfuro de manganeso, I, 438.
- » de sosa líquido, I, 340.
 - » sulfurado de calcio, I, 440.
- Supositorios, IV, 57.
- Supositorio aloético, IV, 57.
- » anodino (H. DE M.), IV, 57.
 - » antiespasmódico, IV, 58.
 - » antihelmíntico, IV, 58.
 - » antihelmíntico (Swediaur), IV, 58.
 - » astringente, IV, 58.
 - » astringente (Reuss), IV, 58.
 - » astringente opiado, IV, 58.
 - » calmante, IV, 58.
 - » calmante (Labordette), IV, 61.
 - » carminativo, IV, 59.
 - » de cicuta, IV, 59.
 - » de coloquintida, I, 161.
 - » comun (F. E.), IV, 59.
 - » de copaiba (Colombat), IV, 59.
 - » emenagogo (Trousseau), IV, 59.
 - » emoliente, IV, 59.
 - » de extracto de ratania, IV, 59.
 - » contra las hemorroides, IV, 59.
 - » irritante (F. E.), IV, 59.
 - » de jabón, IV, 60.
 - » laxante, IV, 60.
 - » de manteca de cacao, IV, 60.
 - » mercurial, IV, 60.
 - » de mercurio dulce, IV, 60.
 - » para calmar los dolores hemorroidales, IV, 60.
 - » para provocar las hemorroides, IV, 60.
 - » para provocar las hemorroides (Trousseau), IV, 60.
 - » purgante, IV, 60 y 61.
 - » de sulfato de quinina (Boudin), IV, 61.
 - » de unguento populeon (Labordette), IV, 61.
 - » vaginal (Gaudriot), IV, 61.
- Sustancia de arroz compuesta (H. DE M.), II, 144.

T.

- Tabla de autores, IV, 425.
- » de las dosis de los medicamentos, I, 48.
- Tabletas, III, 165.
- » de aceite de croton tiglio, III, 165.
 - » de aceite de tártagos (Bally y Cadet), III, 165.
 - » de ácido cítrico (F. F.), III, 184.
 - » de ácido láctico (Magendie), III, 165.
 - » de ácido oxálico, III, 165.
 - » de ácido tártrico (F. F.), III, 184.
 - » afrodisiacas (Artune), III, 166.
 - » de almidon opiada, III, 166.
 - » anticatarrales (Tronchin), III, 167.
 - » anticatarrales (Vandamme), III, 167.
 - » antiescrofulosas (Pierquin), III, 167.
 - » antihelmínticas (H. DE AL.), III, 167.
 - » antihelmínticas de santoni-na, III, 187.
 - » antimoniales de Kumkel (F. F.), III, 167.
 - » aperitivas (Tode), III, 167.
 - » de azufre (F. F.), III, 168.
 - » de azufre (F. P.), III, 168.
 - » de azufre antirubeólicas, III, 168.
 - » de azufre compuestas (F. F. DE 1818), III, 168.
 - » de bálsamo de Tolú, III, 168.
 - » de bálsamo de Tolú (F. F.), III, 168.
 - » contra el bocio (Dubois), III, 172.
 - » de café ioduradas, III, 169.
 - » de café de Moca ioduradas (F. DEL PIAMONTE), III, 169.
- Tabletas de caldo (Cadet), III, 169.
- » de carbon (F. F.), III, 170.
 - » de carbon animal, III, 170.
 - » de carbon y chocolate de A. Chevalhier (F. P.), III, 170.
 - » de catecú (F. F.), III, 170.
 - » de catecú (F. P.), III, 170.
 - » de catecú y magnesia (F. F.), III, 170.
 - » de citrato de hierro, III, 171.
 - » de citrato de magnesia, III, 171.
 - » de cloruro de cal (Chevalhier), III, 172.
 - » de cloruro de cal (Deschamps), III, 171.
 - » de crémor de tártaro soluble, III, 187.
 - » de Daubenton (F. F.), III, 178.
 - » desinfectantes de A. Chevalhier, III, 172.
 - » digestivas d'Arcet (H. DE M.), III, 169.
 - » digestivas de Vichy (H. DE M.), III, 169.
 - » digestivas llamadas de Vichy ó d'Arcet (F. F.), III, 169.
 - » de emetina pectorales (Magendie), III, 173.
 - » de emetina vomitivas (Magendie), III, 173.
 - » de escamonea (Bouvieres), III, 173.
 - » de escamonea y sen, III, 174.
 - » de esponja quemada (F. F.), III, 174.
 - » estomacales (Daubenton), III, 175.
 - » de etiope marcial, III, 175.
 - » de gelatina de líquen (Beral), III, 175.

- Tabletas de gengibre, III, 175.
- » de gingseng, III, 176.
- » de goma arábica (F. F.), III, 176.
- » gomosas quermetizadas, III, 167.
- » de hierro (F. F.), III, 176.
- » de ioduro de potasio con café, III, 177.
- » de ipecacuana y chocolate (F. F.), III, 178.
- » de líquen, III, 179.
- » de líquen (Robinet), III, 179.
- » de líquen islándico (F. F.), III, 179.
- » de lirio, III, 179.
- » de magnesia, III, 179.
- » de magnesia (F. F.), III, 179.
- » de magnesia y catecú (F. F.), III, 180.
- » de magnesia y chocolate (Chevalhier), III, 180.
- » de malato de manganeso, I, 437.
- » de malvabisco (F. F.), III, 180.
- » de maná (F. F.), III, 180.
- » de maná (Manfredi), III, 181.
- » de manteca de cacao, III, 181.
- » marciales (H. DE IT.), III, 181.
- » marciales (F. F.), III, 176.
- » marciales (Sydenham), III, 181.
- » de menta inglesas, III, 182.
- » de menta piperita, I, 253.
- » de menta piperita (F. F.), III, 182.
- » mercuriales, III, 182.
- » de mercurio dulce (F. F.), III, 183.
- » de musgo de Córcega (Deleschamps), III, 183.
- » de musgo marino perlado, III, 183.
- » de naftalina (Dupasquier), III, 183.
- » nitradas, III, 183.
- Tabletas de ojos de cangrejos, III, 184.
- » de opio, III, 184.
- » de óxido de oro, III, 184.
- » pectorales (Bouhel), III, 185.
- » pectorales incisivas, III, 185.
- » pectorales incisivas y calmantes (Jobard), III, 185.
- » de pelitre (Lacombe), III, 185.
- » de piperoides de gengibre (Beral), III, 185.
- » de protoioduro de hierro (Dupasquier), III, 177.
- » purgantes, III, 174.
- » purgantes de chocolate, III, 186.
- » purgantes para los niños, III, 186.
- » de quermes mineral (F. F.), III, 186.
- » de quina (F. F.), III, 186.
- » de ratania, III, 186.
- » refrigerantes y laxantes de citrato de magnesia, III, 186.
- » de ruibarbo (F. F.), III, 187.
- » de santonina, III, 187.
- » contra la sarna (Boudin), III, 172.
- » de Spitzlay, III, 187.
- » de subnitrate de bismuto, III, 183.
- » de subnitrate de bismuto (Trousseau), III, 184.
- » de sulfato de quinina, III, 187.
- » de tartrato bórico potásico, III, 187.
- » de vainilla, III, 188.
- » vermífugas purgantes, III, 188.
- » vermífugas de santónico, III, 188.
- » de vida, III, 188.
- » vomitivas, III, 188.
- Tafetanes, III, 149.
- Tafetan epispástico (Beral), III, 151.
- » inglés, II, 282.

- Tafetan de Inglaterra (F. F.), II, 282.
- » vejigatorio, III, 152 y 154.
 - » vejigatorio (Beral), III, 153.
 - » vejigatorio (Goldefy Dorli), III, 154.
 - » vejigatorio (Deloche), III, 153.
 - » vejigatorio (Dubisson), III, 152.
 - » vejigatorio (F. F.), III, 153.
 - » vejigatorio (Guilbert), III, 153.
 - » vejigatorio (Tierry), III, 153.
- Tanakoub, II, 312.
- Tanato de antimonio, I, 440.
- Taponamiento, I, 344.
- Tartrato de magnesia, I, 440.
- » de manganeso, I, 439.
- Tes, IV, 61.
- Te de abejas contra la estranguria y retencion de orina (Gordon), IV, 61.
- » hemostático (Pierquin), IV, 62.
 - » de las matronas americanas, II, 353.
 - » pectoral (Boerhaave), IV, 62.
 - » de salud, II, 292.
 - » suizo (F. F.), IV, 62.
 - » tunka, IV, 62.
- Telas, IV, 62.
- Tela emplástica epulótica (F. E.), II, 281.
- » emplástica impermeable (Dedé), IV, 62.
 - » de mayo (F. F.), II, 282.
 - » vejigatoria (Garoste), IV, 63.
- Tesoro del pecho, III, 163.
- » para la boca, IV, 93.
- Tintas, IV, 152.
- Tinta amarilla, IV, 153.
- » azul, IV, 152.
 - » encarnada, IV, 153.
 - » para marcar el lienzo, IV, 153.
 - » verde, IV, 153.
- Tinturas, IV, 63.
- Tintura de aceite de croton tiglio, IV, 63.
- » de acetato de cal, I, 127.
 - » de acetato de hierro (Beral), IV, 63.
 - » de acetato de manganeso, I, 434.
 - » de acetato de morfina, IV, 64.
 - » de acetato de morfina (F. F.), II, 344.
 - » de acetato de estriquina (Radius), IV, 63.
 - » acética de opio (F. F.), IV, 191.
 - » de acíbar (F. E.), IV, 97.
 - » de acíbar (H. DE L.), IV, 64.
 - » de acíbar compuesta (F. F.), IV, 65.
 - » de acíbar compuesta (F. DE L.), IV, 64.
 - » de acíbar compuesta (Virey), IV, 64.
 - » de acíbar y mirra, IV, 65.
 - » de acíbar y mirra azafranada (Paracelso), II, 227.
 - » de aconitina, I, 66; IV, 65.
 - » acuosa de acónito, I, 66.
 - » acuosa de ambar gris, I, 83.
 - » acuosa de laca (F. E.), IV, 89.
 - » acuosa de rosas (F. E.), II, 357.
 - » acuosa de ruibarbo, III, 123.
 - » acuosa de ruibarbo (Spielman), II, 358.
 - » de aguileña, I, 96.
 - » de ajénjos (F. DE FERRARA), IV, 66.
 - » de ajénjos compuesta, IV, 65 y 68.
 - » de ajénjo de Suiza compuesta (Virey), IV, 66.
 - » de álamo negro, I, 73.
 - » alcalina, IV, 66.
 - » alcalina de asa fétida, IV, 65.
 - » de alcanfor compuesta, II, 227.

- Tintura de alcanfor compuesta (F. DE L.), IV, 66.
- » de alcaravea, I, 76.
- » alcohólica de acetato de hierro, I, 214.
- » alcohólica de acibar compuesta (F. E.), IV, 64.
- » alcohólica de acónito, I, 66.
- » alcohólica de ajenjos, I, 72.
- » alcohólica de almizcle, I, 80.
- » alcohólica de ambar gris, I, 83.
- » alcohólica de arnica, I, 98.
- » alcohólica de berro de Pará, I, 119.
- » alcohólica de cainca amoniaca, IV, 74.
- » alcohólica de cáscara de naranja (F. E.), IV, 79.
- » alcohólica de castóreo, I, 141.
- » alcohólica de corteza de olivo, I, 277.
- » alcohólica de digital, I, 172.
- » alcohólica de iodo (H. DE M.), IV, 87.
- » alcohólica jabonosa de opio (F. E.), IV, 94.
- » alcohólica de lúpulo, IV, 89.
- » alcohólica de mirra uterina (F. E.), IV, 91.
- » alcohólica de mirtilo (Reiss), IV, 91.
- » alcohólica de mostaza (Fau-re), IV, 91.
- » alcohólica de opio (F. E.), IV, 94.
- » alcohólica de pelitre floja, IV, 95.
- » alcohólica de pez griega compuesta (F. E.), IV, 95.
- » alcohólica de quina compuesta (F. E.), IV, 67.
- » alcohólica de rábano compuesta, IV, 95.
- » alcohólica de sucino (F. E.), IV, 97.
- » alcohólica de sucino (F. F.), IV, 97.
- » alcohólica sulfúrica de genciana compuesta (F. E.), IV, 97.
- Tintura alcohólica de valeriana, I, 353.
- » alcohólica de yemas de abeto, IV, 100.
- » alcohólica de zumaque venenoso, IV, 100.
- » alexifarmaca de Huxham (F. E.), IV, 67.
- » de algalia, I, 77.
- » de almáciga, I, 78.
- » de almáciga compuesta, IV, 67.
- » de almendras amargas (Horn), IV, 67.
- » de almizcle (F. F.), IV, 74.
- » de almizcle artificial, IV, 67.
- » amarga, IV, 65 y 68.
- » amarga (F. A.), IV, 67.
- » amarga (F. P.), IV, 67.
- » amarga (Stoughton), IV, 67.
- » de ambar y almizcle, II, 279.
- » de ambar balsámica (Dippel), IV, 68.
- » de ambar gris (F. F.), IV, 74.
- » amoniaca de cainca, I, 126.
- » amoniaca cantaridada, IV, 68.
- » amoniaca jabonosa, IV, 68.
- » amoniaca succinada, IV, 68.
- » amoniaca succinada (F. P.), IV, 69.
- » amoniaca trementinada, IV, 69.
- » de amoniaco con ambar (Beral), IV, 68.
- » de amoniaco anisada, IV, 68.
- » de amoniaco compuesta (F. DE L.), IV, 68.
- » de amoniaco con espliego (Beral), IV, 68.
- » de angélica, I, 89.
- » de angelina, I, 89.
- » de angustura verdadera, I, 90.
- » de anís, I, 90.
- » anisada (Aliber), IV, 69.
- » anticólica de Palacios (F. E.), IV, 69.
- » antiescorbútica, IV, 95.
- » antiescorbútica (F. F.), IV, 69.

- Tintura antiespasmódica, IV, 70.
- » antiespasmódica (Keup), IV, 70.
- » antiespasmódica con acetato de potasa (Chrestien), IV, 70.
- » antiespasmódica alcanforada (Chrestien), IV, 93.
- » antihidrópica (Boerhaave), IV, 70.
- » antihistérica (F. M.), IV, 70.
- » antimonial (Jacobi), IV, 70.
- » antireumática (Blassius), IV, 70.
- » antireumática (Zollickoffer), IV, 71.
- » antisifilitica (Eichenheimer), IV, 71.
- » antitísica (Garmann), IV, 71.
- » antivenérea (Falck), IV, 71.
- » de aristoloquia trilobada, I, 97.
- » aromática (Adorne), IV, 71.
- » aromática (F. A.), IV, 71.
- » aromática (F. F.), IV, 71.
- » aromática de arnica, IV, 72.
- » aromática sulfúrica (F. F.), IV, 72.
- » de asclepias vinctósigo, I, 103.
- » de asa fétida, I, 102.
- » de asa fétida (F. E.), IV, 97.
- » de asa fétida (F. F.), IV, 73.
- » de asa fétida (F. DE L.), IV, 83.
- » de asa fétida (Van Mons), IV, 83.
- » de asa fétida compuesta, IV, 72.
- » contra las ascárides (Dorfmueller), IV, 78.
- » astringente (Gibert), IV, 72.
- » de atropina, II, 343.
- » de atropina, IV, 72.
- » de azafran, I, 105.
- » de azafran (F. F.), IV, 74.
- » balsámica (F. F.), IV, 72.
- » balsámica para las encías, IV, 73.
- » de bálsamos, IV, 73.
- » de bálsamo de copaiba, I, 110.
- Tintura de bálsamo del Perú, I, 111.
- » de bálsamo de Tolú, I, 111.
- » de bálsamo de Tolú (F. F.), IV, 73.
- » de benjuí, I, 118.
- » de benjuí (F. E.), IV, 97.
- » de benjuí (F. F.), IV, 73.
- » de benjuí compuesta (F. DE L.), IV, 73.
- » de benjuí compuesta (Swe-diaur), IV, 73.
- » de berro de Pará, I, 119.
- » de Bestucheff, I, 218.
- » de Bestucheff (F. F.), IV, 77.
- » de Boerhaave, IV, 73.
- » de brucina, I, 124.
- » de brucina (Magendie), IV, 74.
- » de bulbo de cólchico, I, 159; IV, 78.
- » de bulbo de cólchico (F. F.), IV, 95.
- » de bulbo de escila (F. F.), IV, 95.
- » de cainca, I, 126; IV, 74.
- » de cálamo aromático compuesta, IV, 74 y 78.
- » calmante (Herisson), IV, 74.
- » contra la calvicie (Dr. Landerer), IV, 79.
- » de canela, I, 132.
- » de canela (F. F.), IV, 74.
- » de canela y ambar moscado, IV, 74.
- » de canela compuesta (F. DE L.), IV, 75.
- » de canela con cicuta (Kopp), IV, 74.
- » de canela y sándalos compuesta, II, 218.
- » de cannabina, II, 433.
- » cantaridada, IV, 75.
- » de cantáridas, I, 133.
- » de cantáridas (F. E.), IV, 75.
- » de cantáridas (F. F.), IV, 75.
- » de cantueso, I, 134.
- » de caña, I, 134.

- Tintura de carbonato de potasa y hierro líquido (F. E.), IV, 81.
- » de cardamomo menor, I, 138.
- » de cardamomo compuesta (F. DE L.), IV, 75.
- » de cardo santo, I, 139.
- » de cariofilea, I, 139.
- » de cascarilla, I, 140.
- » de cascarilla (F. F.), IV, 74.
- » de castaño de Indias (Jobert), IV, 76.
- » de castóreo, IV, 74.
- » de castóreo (F. E.), IV, 97.
- » de catecú, I, 142.
- » de catecú (F. F.), IV, 95.
- » de catecú compuesta (F. P.), IV, 76.
- » de cebolla albarrana, I, 145.
- » de centaurea menor, I, 146.
- » de cerezas, I, 147.
- » cianurada (Parent), IV, 76.
- » de cianuro de mercurio (Parent), IV, 76.
- » de cicuta (F. DE L.), IV, 77.
- » de cilantro, I, 149.
- » de citrato de hierro (Beral), IV, 77.
- » de clavo de especia, I, 152.
- » de clavo de especia (F. F.), IV, 74.
- » de cloruro de hierro y amoníaco, I, 218.
- » de cloruro de hierro y amoníaco (F. DE L.), IV, 77.
- » de cloruro de manganeso, I, 436.
- » de cobre amoniacal, III, 34.
- » de cobre amoniacal (Tronsdorff), IV, 77.
- » de coclearia, I, 157.
- » de cochinilla, I, 158.
- » de cólchico compuesta (F. DE L.), IV, 78.
- » de cochinilla aromática, IV, 78.
- » de cólchico (F. P.), IV, 78.
- » de colombo, I, 160.
- » de coloquintida, I, 161.
- » de coloquintida (Fabre), IV, 78.
- Tintura compuesta de acíbar, I, 61.
- » compuesta de gálbano, I, 198.
- » de contrayerba, I, 163.
- » cordial (Rymer), IV, 79.
- » de cornezuelo de centeno, I, 164; II, 415.
- » corroborante de With (F. E.), IV, 79.
- » de corteza de naranjas compuesta (F. E.), IV, 79.
- » de corteza de nuez verde seca, I, 274.
- » de corteza de quina amarilla (F. F.), IV, 95.
- » de corteza de Winter, I, 165.
- » de cuasia amarga (F. F.), IV, 95.
- » de cubebas, I, 167.
- » de cúrcuma, I, 168.
- » de Chreston, IV, 76.
- » de Daffy, IV, 79.
- » de Dalvi, IV, 80.
- » de Darel, IV, 211.
- » de delfina, I, 170.
- » dentífrica con pelitre, IV, 80.
- » de deutoioduro de mercurio (Magendie), IV, 87.
- » de digital, IV, 80.
- » de digital compuesta, IV, 80.
- » de digitalina, IV, 80.
- » de diosma recortada, I, 173.
- » del Dr. Klaproth (F. F.), IV, 77.
- » elástica (Dr. Bañares), IV, 80.
- » elástica (F. E.), IV, 81.
- » de elaterina, I, 174.
- » de elaterina (Morrus), IV, 81 y 95.
- » de eléboro negro, I, 175.
- » de eléboro negro (F. F.), IV, 74.
- » de enebro, I, 178.
- » de énula campana, I, 179; IV, 81.
- » de escamonea, I, 181.

- Tintura de escamonea (F. F.), IV, 73.
- » de escordio, I, 182.
- » de espliego compuesta (F. DE L.), IV, 81.
- » de espuela de caballero, I, 186.
- » de estafisagria, I, 186.
- » de estafisagria (Turnbull), IV, 81.
- » estomacal (F. M.), IV, 81.
- » estomacal (F. V.), IV, 81.
- » estomacal (F. N. F.), IV, 81.
- » estomacal (Moscati), IV, 82.
- » estomacal amarga, IV, 82.
- » estomacal amoniaco, IV, 82.
- » de estramonio, I, 187.
- » de estramonio (Hufeland), IV, 82.
- » de estramonio (Pierquin), IV, 82.
- » de estricnina, I, 188.
- » de estricnina (Magendie), IV, 82.
- » etérea de acetato de hierro, I, 214; IV, 88.
- » etérea de acetato de hierro (Beral), IV, 63.
- » etérea de acibar, IV, 64.
- » etérea de acónito, I, 66; IV, 65.
- » etérea de acónito (F. F.), IV, 76.
- » etérea de almizcle, I, 80.
- » etérea de almizcle (F. F.), IV, 76.
- » etérea de ambar gris, I, 83.
- » etérea de ambar gris (F. F.), IV, 76.
- » etérea de arnica, I, 98.
- » etérea de asa fétida, I, 102.
- » etérea de asa fétida (F. F.), IV, 76.
- » de bálsamo de Tolú (F. F.), IV, 76.
- » etérea de beleño, I, 116.
- » etérea de beleño (F. F.), IV, 76.
- » etérea de belladona, I, 117.
- Tintura etérea de belladona (F. F.), IV, 76.
- » etérea de camedrios, I, 131.
- » etérea de cantáridas, I, 133.
- » etérea de cantáridas (F. F.), IV, 75.
- » etérea de castóreo, I, 141.
- » etérea de castóreo (F. F.), IV, 76.
- » etérea de cicuta, I, 148; IV, 76.
- » etérea de cicuta (F. F.), IV, 76.
- » etérea de comino, I, 161.
- » etérea de deutocloruro de hierro, I, 218.
- » etérea de deutoioduro de mercurio, I, 260.
- » etérea de digital, I, 172.
- » etérea de digital purpúrea (F. F.), IV, 77.
- » etérea de espliego, I, 185.
- » etérea de estramonio, I, 187 y 188.
- » etérea de fósforo (F. F.), IV, 83.
- » etérea de fósforo (Loebius), II, 300.
- » etérea de iodo, I, 226.
- » etérea de Klaproth, IV, 88.
- » etérea de pelitre, IV, 94.
- » etérea de percloruro de hierro (F. F.), IV, 77.
- » etérea de raíces de pelitre (F. F.), IV, 77.
- » etérea de raíces de valeriana (F. F.), IV, 77.
- » etérea de sucino, I, 341.
- » etérea de sucino (Beral), IV, 97.
- » etérea de sucino (F. F.), IV, 76.
- » etérea de sulfuro de zinc, II, 301.
- » etérea de tabaco, I, 342.
- » etérea de tabaco (F. F.), IV, 77.
- » etérea de valeriana, I, 353.
- » etérea de yerbamora (F. F.), IV, 77.

- Tintura de extracto óleo-resinoso
- de cubebas (Beral), IV, 79.
 - » de extracto de opio (F. F.), IV, 94.
 - » de extracto de zarzaparrilla, IV, 100.
 - » de euforbio, I, 191.
 - » febrífuga (Cheston), IV, 83.
 - » de flores de arnica, IV, 77.
 - » fortificante (Bremser), IV, 20.
 - » fosforada, IV, 83.
 - » de fósforo, IV, 83.
 - » de fraxinela, I, 195.
 - » de genciana, I, 201.
 - » de genciana (F. F.), IV, 95.
 - » de genciana amoniaca (F. F.), II, 227; IV, 83.
 - » de genciana compuesta (F. P.), IV, 84.
 - » de genciana compuesta (F. DE L.), IV, 84.
 - » de gencianino, I, 201.
 - » de gencianino (Magendie), IV, 84.
 - » de gengibre, I, 202.
 - » de gengibre (F. F.), IV, 74.
 - » de geofroya de la Jamayca, I, 202.
 - » gingival, IV, 84.
 - » gingival de catecú, IV, 84.
 - » de Godefroy, IV, 84.
 - » de goma amoniaco (F. F.), IV, 73.
 - » de goma quino, I, 205.
 - » de gomoresinas, IV, 73.
 - » de graciola, I, 206.
 - » de Greenough para los dientes, IV, 85.
 - » de grosellero negro, I, 208.
 - » de guayaco, I, 209.
 - » de guayaco (F. DE L.), IV, 84.
 - » de guayaco compuesta, IV, 85.
 - » de guayaco compuesta (F. DE L.), IV, 85.
 - » de guayaco jabonosa (Plenk), IV, 85.
 - » de guayaco y mirra aloética, IV, 85.
 - » de guarana, I, 209.
- Tintura de gutagamba, I, 210.
- » de haschist, I, 433.
 - » de Hatfield, IV, 86.
 - » hidragoga, IV, 19.
 - » hidrocórica mercurial, IV, 86.
 - » hidrónica de ajenjos (Beral), II, 352.
 - » de hinojo, I, 223.
 - » de hinojo acuático, I, 223.
 - » de hinojo acuático (Dr. Marcus), IV, 86.
 - » de hipericon vulneraria (F. E.), IV, 86.
 - » de hojas de acónito (F. F.), I, 66; IV, 95.
 - » de hojas de ajenjos, IV, 95.
 - » de hojas de ásaro, IV, 74.
 - » de hojas de beleño (F. F.), I, 116; IV, 95.
 - » de hojas de belladona (F. F.), I, 117; IV, 95.
 - » de hojas de cicuta (F. F.), I, 148; IV, 95.
 - » de hojas de digital (F. F.), IV, 74.
 - » de hojas de estramonio (F. F.), IV, 95.
 - » de hojas de sen, IV, 95.
 - » de incienso, I, 225.
 - » de iodo, I, 226.
 - » de iodo (F. F.), IV, 87.
 - » de iodo (H. M.), IV, 87.
 - » de iodo compuesta (F. DE L.), IV, 87.
 - » de iodo debilitada (Ricord), IV, 87.
 - » de iodo y quina, IV, 87.
 - » de ioduro de hierro, I, 218.
 - » de ioduro de hierro (Pierquin), IV, 87.
 - » de ioduro de potasio (Puche), IV, 87.
 - » de ipecacuana, I, 228.
 - » de ipecacuana (F. F.), IV, 95.
 - » de ipecacuana anisada (Albert), IV, 88.
 - » de hollin, I, 224; IV, 86.
 - » de hollin (Duvillards), IV, 87.
 - » de hollin fétida, IV, 72.
 - » de jabon, IV, 88.

- Tintura de jabon (F. F.), IV, 88.
- » de jabon sucinada, IV, 88.
 - » de jalapa, I, 229.
 - » de jalapa compuesta (F. F.), IV, 88.
 - » de lactucario, I, 231.
 - » de Lauderer, IV, 89.
 - » de laurel culilaban, I, 232.
 - » de lechuga virosa, I, 233.
 - » legivial (Vogler), IV, 89.
 - » de leño áloes (F. E.), IV, 97.
 - » de ligústica, I, 235.
 - » de lirio de Florencia, I, 237.
 - » de lobelia, I, 238.
 - » de lobelia inflada (J. Andrew), IV, 89.
 - » de lupulina, I, 239.
 - » de lupulina (Magendie), IV, 89.
 - » de lúpulo alcalina, IV, 89.
 - » de malato de hierro, IV, 89.
 - » de malato de hierro (F. A.), IV, 90.
 - » de manzanilla, I, 247.
 - » de marte con eléboro, IV, 90.
 - » de marte tartarizada, I, 222.
 - » de marte tartarizada (F. F.), IV, 90.
 - » de mático, I, 439.
 - » de melisa, I, 251.
 - » de menta piperita, I, 253.
 - » de los metales, IV, 90.
 - » de milpiés, I, 294.
 - » de mirra, I, 265.
 - » de mirra (F. E.), IV, 97.
 - » de mirra (F. F.), IV, 73.
 - » de mirra compuesta, IV, 91.
 - » de mirra compuesta (F. N. P.), IV, 90.
 - » de moho, I, 266.
 - » de monesia, I, 266.
 - » de mostaza (H. DE S. J.), IV, 91.
 - » de nastalina (Rossignon), IV, 91.
 - » nerval y tónica, IV, 91.
 - » nervino tónica (Bestuchef), IV, 91.
 - » de nuez de agalla, I, 275.
 - » de nuez de agalla compuesta, II, 368.
- Tintura de nuez de agalla compuesta (Lepère), IV, 92.
- » de nuez moscada, I, 275.
 - » de nuez vómica, I, 276; IV, 92.
 - » de nuez vómica (F. F.), IV, 74.
 - » de nuez vómica (Magendie), IV, 92.
 - » de nuez vómica amoniacal (Magendie), IV, 92.
 - » odontálgica, IV, 93.
 - » odontálgica (F. E.), IV, 92.
 - » odontálgica (F. N. P.), IV, 93.
 - » de opio, I, 278; IV, 93.
 - » de opio alcanforada, II, 227.
 - » de opio alcanforada (F. P.), IV, 93.
 - » de opio alcanforada (Chretien), IV, 93.
 - » de opio alcanforada (F. P.), IV, 93.
 - » de opio amoniacal, I, 278.
 - » de opio amoniacal (F. F.), IV, 93.
 - » de opio con canela, IV, 94.
 - » de opio cidoniada, IV, 94.
 - » de opio compuesta (Carron de Villards), IV, 94.
 - » de opio fétida (Fulde), II, 225.
 - » de palo de guayaco (F. F.), IV, 95.
 - » para hacer crecer el pelo (Landerer), IV, 94.
 - » paregórica, I, 278.
 - » paregórica (F. E.), IV, 94.
 - » de pareira brava, I, 283.
 - » de patatas, I, 284.
 - » de pelitre, I, 285; IV, 74.
 - » de pelitre fuerte, IV, 95.
 - » de peonía, I, 285.
 - » de pimienta, I, 288.
 - » de pimienta de Tabasco, I, 289.
 - » de pimientos, I, 289.
 - » de pimpinela saxifraga, I, 289.
 - » de piperino, I, 290.
 - » de piscidia eritrina, I, 291.

- Tintura de polígala de Virginia, I, 297.
- » de polígala vulgar, I, 298.
- » de protocloruro de hierro, I, 217.
- » purgante (F. DE PLENK), II, 228.
- » purgante (Morrus), IV, 95.
- » de quasia amarga, I, 307.
- » de quermes animal (F. E.), IV, 97.
- » de quina, I, 310.
- » de quina (Pierquin), IV, 95.
- » de quina calcárea, IV, 117.
- » de quina de Loja (F. F.), IV, 95.
- » de quina roja (F. F.), IV, 95.
- » de quinina, I, 311; IV, 95.
- » de quinoidina, I, 311.
- » de rábano, I, 315.
- » de rábano rusticano (F. P.), IV, 96.
- » de rábano rusticano compuesta (F. F.), IV, 69.
- » de raiz de contrayerba (F. F.), IV, 74.
- » de raiz de émula campana (F. F.), IV, 95.
- » de raiz de jalapa (F. F.), IV, 95.
- » de raiz de pelitre odontálgica (F. E.), IV, 92.
- » de ratania, I, 316.
- » de regaliz, I, 317.
- » de renuevos de helecho macho (Pischier), IV, 86.
- » de resina de guayaco, I, 209.
- » de resina de guayaco (F. F.), IV, 73.
- » de resina de guayaco amoniaco, IV, 86.
- » resolutiva espirituosa, IV, 96.
- » de rododendro, I, 318.
- » rubefaciente, IV, 96.
- » de ruibarbo, I, 321.
- » de ruibarbo (F. F.), IV, 95.
- » de ruibarbo y acíbar compuesta (F. ED.), IV, 96.
- » de ruibarbo compuesta, IV, 96.
- Tintura de ruibarbo compuesta (F. DE L.), IV, 96.
- » de ruibarbo y genciana (F. P.), IV, 67.
- » de Ruspini para los dientes, IV, 97.
- » de sabadilla, I, 322.
- » de sabina, I, 322.
- » de sabina compuesta (F. P.), IV, 97.
- » de sagapeno, I, 323.
- » sagrada, IV, 194.
- » sagrada (F. ED.), IV, 96.
- » de sal de tártaro, IV, 66.
- » de sangre de drago, I, 325.
- » de sanguinaria del Canadá, I, 329.
- » de santónico, I, 329.
- » de sasafrás, I, 330.
- » de sáuce, I, 331.
- » de semillas de beleño, I, 116.
- » de semillas de cólchico, IV, 78.
- » de sen, I, 334.
- » de sen compuesta (F. DE L.), IV, 97.
- » de serpentaria de Virginia, I, 334.
- » de sexquicloruro de hierro (F. DE L.), IV, 77.
- » de sucino, I, 340.
- » de sulfuro de carbono (Wutzer), IV, 98.
- » de sulfato de cinconina, I, 150.
- » de sulfato de cinconina (Magendie), IV, 97.
- » de sulfato de quinina, I, 314.
- » de sulfato de quinina (Magendie), IV, 97.
- » de tabaco (Bauer), IV, 98.
- » de tanino (Boutigni), IV, 98.
- » de tartrato de hierro y potasa, I, 222.
- » tebáica, I, 278.
- » tebáica (Bamber), IV, 98.
- » tónica (Roberto With), IV, 98.
- » tónica y calmante (Grimaud), IV, 98.
- » de tormentila, I, 347.
- » de toxicodendro, II, 54.

- Tintura de trébol de agua, I, 348.
- » de trementina, I, 349.
 - » de trementina (F. F.), IV, 73.
 - » triacal, IV, 99.
 - » de tridacio, I, 349.
 - » de tuya, I, 350.
 - » de urea, I, 351.
 - » de valeriana, IV, 99.
 - » de valeriana (F. F.), IV, 95.
 - » de valeriana compuesta (F. P.), IV, 99.
 - » de vainilla, I, 352.
 - » de vainilla (F. F.), IV, 74.
 - » de veratrina, I, 355.
 - » de veratrina (Magendie), IV, 99.
 - » vinosa de cainca, IV, 199.
 - » vinosa de extracto de ajénjos compuesta (F. E.), IV, 66.
 - » vinosa de hierro tartarizada (F. E.), IV, 99.
 - » vinosa de opio anticólica (F. E.), IV, 69.
 - » vinosa de opio de Sydenham (F. E.), III, 6.
 - » vinosa de ruibarbo compuesta (Coqueret), IV, 96.
 - » volátil de guayaco (Dewees), IV, 85.
 - » vulneraria (F. F.), IV, 99.
 - » de Wilson, IV, 78.
 - » de yemas de abeto, IV, 100.
 - » de yemas de pino, I, 290.
 - » de zantóxilo clava de Hércules, I, 361.
 - » de zedoaria, I, 362.
 - » de zedoaria compuesta, IV, 100.
 - » de zumaque venenoso, I, 366.
 - » de zumos resinosos, IV, 73.
- Tisanas, IV, 100.
- Tisana de acebo, IV, 113.
- » de acibar (F. DE L.), II, 140.
 - » acidulada, IV, 100.
 - » albuminosa (Mondiere), IV, 101.
 - » alcalina, IV, 101.
 - » alcalina (Bielt), IV, 101.
- Tisana alcalina (Mascagni), IV, 101.
- » de alcaparra, IV, 113.
 - » alcohólica (F. E.), II, 147.
 - » de amapola, I, 82.
 - » amarga, IV, 101.
 - » angélica, IV, 101.
 - » de anís, IV, 101.
 - » de anís estrellado, IV, 101.
 - » antiartrítica (Quarin), IV, 101.
 - » anticatarral (Pierquin), IV, 102.
 - » anticólica (F. E.), II, 153.
 - » antiépsórica, IV, 102.
 - » antiescorbútica, IV, 102.
 - » antiescorbútica, II, 55.
 - » antihelmíntica, IV, 102.
 - » antiherpética, IV, 102.
 - » antiherpética (Gibert), IV, 103.
 - » antileucorréica (Kopp), IV, 103.
 - » antinefrítica (Hildembrand), IV, 103.
 - » antiraquílica, IV, 103.
 - » antisifilítica, IV, 103.
 - » antisifilítica (Dupuytren), IV, 103.
 - » antivenérea (Plenk), IV, 103.
 - » aperitiva, IV, 103.
 - » aperitiva (H. DE M.), IV, 104.
 - » aperitiva (H. M.), IV, 104.
 - » aperitiva (Hoff), IV, 104.
 - » contra las arenillas, IV, 108.
 - » de Arnoud, IV, 103.
 - » de arroz, I, 99; IV, 104.
 - » de arroz (F. F.), IV, 107.
 - » de arroz gomosa, IV, 104.
 - » de arroz y catecú, IV, 104.
 - » astringente, IV, 104.
 - » astringente, IV, 105.
 - » astringente (Chaptal), IV, 105.
 - » astringente (H. M.), IV, 105.
 - » astringente de quino (Mialhe), IV, 105.
 - » de Astruc, IV, 105.
 - » atemperante de Stoll (H. DE M.), IV, 105.

- Tisana de avena, I, 104.
 » de avena, IV, 107.
 » de avena mondada, IV, 104.
 » de azufaiñas, IV, 107.
 » de azufaiñas (F. F.), IV, 113.
 » de bardana, I, 114.
 » de bardana (F. F.), IV, 105.
 » de bayas de alquequenje, IV, 113.
 » de bayas de enebro, IV, 101.
 » de borraja (F. F.), IV, 106.
 » de Buchan, IV, 106.
 » de cainca compuesta, IV, 106.
 » de Callac (F. E.), II, 158.
 » de Callac (H. DE M.), IV, 106.
 » de cañafistula (F. F.), IV, 106.
 » de cardo santo, I, 139.
 » carminativa, IV, 106.
 » de cáscara de naranjas amargas, IV, 101.
 » de cebada, I, 144.
 » de cebada (F. F.), IV, 106.
 » de cebada estibiada IV, 107.
 » de cebada gomosa (H. DE M.), IV, 107.
 » de cebada y miel, IV, 107.
 » de cebada y ojimiél, IV, 107.
 » con cebada perlada, IV, 104.
 » de cebolla albarrana compuesta, IV, 107.
 » de ciruelas, IV, 107.
 » de ciruelas pasas, IV, 113.
 » de ciruelas pasas con sen, IV, 107.
 » clorurada, IV, 107.
 » de colombo, IV, 107.
 » clorurada (Chomel), IV, 107.
 » comun, IV, 108.
 » comun (H. DE M.), IV, 108.
 » de corteza de cerezo, I, 147.
 » de corteza de quina, I, 310.
 » de corteza de quina (F. F.), IV, 105.
 » de cuerno de ciervo, IV, 108.
 » de dafne mecereon, II, 354.
 » de dátiles, IV, 107.
 » de dátiles (F. F.), IV, 113.
 » de Datisvius, IV, 108.
- Tisana diaforética, IV, 109.
 » diaforética (Brera), IV, 109.
 » diaforética (Gimelle), IV, 109.
 » diaforética (H. M.), IV, 109.
 » diaforética (Standirk), IV, 109.
 » diaforética de olmo, I, 277.
 » de diosma, I, 113; IV, 113.
 » diurética, IV, 110.
 » diurética (Bouchardat), IV, 110.
 » diurética (Dubois), IV, 110.
 » diurética (Foy), IV, 110.
 » diurética simple (H. DE IT.), IV, 110.
 » diurética (Recamier), IV, 110.
 » diurética, IV, 109.
 » de doradilla, IV, 113.
 » de dulcamara, IV, 110.
 » emenagoga, IV, 111.
 » emoliente, IV, 111.
 » emoliente (H. M.), IV, 111.
 » emoliente (H. DE M.), IV, 111.
 » emulsionada, IV, 111.
 » emulsionada y alcanforada, IV, 111.
 » emulsionada y nitrada, IV, 111.
 » de enebro, IV, 101.
 » de énula campana, I, 179.
 » escabiosa, IV, 111.
 » contra las escrófulas, IV, 108.
 » de esparto de escobas (Kausser), IV, 119.
 » de especies antihelmínticas, IV, 101.
 » de especies aperitivas, IV, 101.
 » de especies astringentes, IV, 101.
 » de especies béquicas, IV, 101.
 » de especies diuréticas, IV, 101.
 » de especies pectorales, IV, 101.
 » estomacal fundente, IV, 112.

- Tisana excitante , IV , 112.
- » excitante alcohólica , IV , 112.
 - » expectorante , IV , 112.
 - » con fécula , IV , 112.
 - » de Feltz (F. F.) , IV , 112.
 - » de Feltz (F. P.) , IV , 112.
 - » de Feltz (H. DE M.) , IV , 113.
 - » de Feltz (Rayer) , IV , 112.
 - » de flores de amapola (F. F.) , IV , 104.
 - » de flor de arnica (F. F.) , IV , 104.
 - » con las flores de centaurea (F. F.) , IV , 114.
 - » de flores de centaurea menor (F. F.) , IV , 121.
 - » de flores de gordolobo (F. F.) , IV , 114 y 121.
 - » con las flores de lúpulo , IV , 114.
 - » con las flores de malva (F. F.) , IV , 114 y 121.
 - » con las flores de malvabisco (F. F.) , IV , 114 y 121.
 - » con las flores de rosas rojas (F. F.) , IV , 114 y 121.
 - » con las flores de tilo (F. F.) , IV , 114 y 121.
 - » con las flores de tusilago (F. F.) , IV , 114 y 121.
 - » de las flores de violetas (F. F.) , IV , 114 y 121.
 - » de frutos pectorales (F. P.) , IV , 113.
 - » de gayuba , IV , 113.
 - » de gatuña , IV , 113.
 - » gelatinosa (Swediaur) , IV , 113.
 - » de goma , IV , 114.
 - » de goma (F. F.) , IV , 113.
 - » de grama , I , 207.
 - » de grama (F. F.) , IV , 114.
 - » de grama iodurada (Magen-die) , IV , 114
 - » de guayaco , I , 209.
 - » de guayaco compuesta (Hufeland) , IV , 114.
 - » de guayaco y dafne mece-reon , IV , 114.
 - » de higos , IV , 107.
- Tisana de hinojo , IV , 113.
- » de hinojo acuático , IV , 101.
 - » de hisopo , IV , 115.
 - » de hisopo y yedra , IV , 115.
 - » de hojas de achicorias (F. F.) , IV , 106.
 - » de hojas de artemisa , IV , 106.
 - » de hojas de verónica (F. F.) , IV , 106.
 - » con las hojas de calaminta , IV , 115.
 - » de hojas de camedrios , IV , 106.
 - » de hojas de cardo santo (F. F.) , IV , 106.
 - » de hojas de culantrillo (F. F.) , IV , 106.
 - » de hojas de escabiosa (F. F.) , IV , 106.
 - » de hojas de escolopendra IV , 106.
 - » de hojas de escordio , IV , 106.
 - » de hojas de fumaria , IV , 106.
 - » con las hojas de marrubio , IV , 115.
 - » con las hojas de melisa , IV , 115.
 - » de hojas de milenrama IV , 106.
 - » de hojas de naranjo (F. F.) , IV , 106.
 - » de hojas de nogal (Negrier) , IV , 137.
 - » con las hojas de orégano , IV , 115.
 - » con las hojas de parietaria IV , 106.
 - » de hojas de saponaria (F. F.) , IV , 106.
 - » de hojas de sen , IV , 106.
 - » de hojas de trinitaria silvestre (F. F.) , IV , 106,
 - » con las hojas de yedra terrestre , IV , 115.
 - » iodurada , IV , 115.
 - » iodurada (Cullerier) , IV , 115.
 - » iodurada (Ricord) , IV , 115.

- Tisana de ioduro de almidon , IV, 115.
- » con jarabe tártrico , III, 44.
- » laxante , IV, 115.
- » laxante (H. DE M.) , IV, 115.
- » de limon compuesta (H. DE AL.), IV, 115.
- » de lino , I, 236.
- » de lino cantaridada , IV, 115.
- » de líquen , IV, 115.
- » lusitana , IV, 116.
- » de malva , I, 244.
- » de manzanilla , IV, 116.
- » de Mascagni , IV, 116.
- » de mecereon (Thompson), IV, 116.
- » de naranjo , IV, 23.
- » narcótica estimulante de Miguel , IV, 116.
- » de oxálide de tallo grueso , I, 281.
- » de paciencia , I, 282.
- » de palo de guayaco (F. F.), IV, 114.
- » de parietaria , IV, 113.
- » de Passerini , IV, 149.
- » pectoral , IV, 116 y 117.
- » pectoral (H. M.), IV, 117.
- » pectoral (H. DE M.), IV, 117.
- » pectoral tónica (Swediaur), IV, 117.
- » de perejil , IV, 113.
- » contra la piedra , IV, 108.
- » de polígono avicular (Leverat), IV, 118.
- » portátil de zarzaparrilla , II, 311.
- » purgante , IV, 117.
- » purgante (H. DE M.), IV, 117.
- » de rábano compuesta , IV, 118.
- » de raiz de achicorias (F. F.), IV, 105.
- » de raiz de angélica , IV, 105.
- » de raiz de apio , IV, 105.
- » de raiz de cardo corredor (F. F.), IV, 105.
- Tisana de raiz de quasia amarga (F. F.), IV, 118.
- » de raiz de énula campana (F. F.), IV, 105.
- » de raiz de espárrago (F. F.), IV, 105.
- » de raiz de fresa (F. F.), IV, 105.
- » de raiz de helecho macho IV, 105.
- » de raiz de paciencia (F. F.), IV, 105.
- » de raiz de polígala de Virginia (F. F.), IV, 118.
- » de raiz de ratania (F. F.), IV, 105.
- » de raiz de regaliz , IV, 108.
- » de raiz de saponaria (F. F.), IV, 105.
- » de raiz de sasafrás (F. F.), IV, 118.
- » de raiz de simaruba (F. F.), IV, 105.
- » de raiz de valeriana (F. F.), IV, 118.
- » de ratania (H. DE IT.), IV, 118.
- » real (F. E.), IV, 118.
- » refrescante , IV, 118.
- » refrigerante y atemperante en polvo , IV, 118.
- » de ruibarbo purgante , IV, 119.
- » de ruibarbo tónica , IV, 118.
- » de sagú , I, 323.
- » de salep , IV, 112.
- » de Salvadori , IV, 119.
- » de sanguinaria mayor , I, 329.
- » de saponaria , I, 330.
- » de saúco , (F. F.), IV, 104.
- » seca (F. F.), III, 437.
- » de semillas de ortigas , IV, 113.
- » de simaruba , I, 335.
- » de simiente de lino , IV, 101.
- » simple (H. M.), IV, 119.
- » de Standisch , IV, 119.
- » sudorífica , IV, 119 y 148.
- » sudorífica (Alies), IV, 120.
- » sudorífica (Cazenave), IV, 120.

- Tisana sudorífica (Dubois), IV, 120.
- » sudorífica (F. F.), II, 60.
 - » sudorífica (H. M.), IV, 120.
 - » sudorífica americana, IV, 120.
 - » sudorífica de bardana (Radium), IV, 120.
 - » sudorífica contra el cólico de los pintores, IV, 132.
 - » sudorífica económica, IV, 120.
 - » sudorífica estibiada, IV, 120.
 - » sudorífica laxante contra el cólico de los pintores, IV, 132.
 - » de tamarindos (F. F.), IV, 121.
 - » de té de España (Rilliet y Barthez), IV, 121.
 - » tónica, IV, 121.
 - » tónica gaseosa, IV, 121.
 - » de vaca tamarindada, IV, 121.
 - » de valeriana y quina (Nattley), IV, 121.
 - » de Vigaroux, IV, 121.
 - » de Vinache, IV, 122.
 - » vinosa, II, 84; IV, 122.
 - » de yemas de álamo (H. M. F.), IV, 122.
 - » de zarzaparrilla, IV, 122 y 123.
 - » de zarzaparrilla (Beral), IV, 123.
 - » de zarzaparrilla (Rayer), IV, 112.
 - » de zarzaparrilla con bardana (H. DE M.), IV, 123.
 - » de zarzaparrilla compuesta, IV, 123.
- Tomas antiépilépticas (Losen), III, 398.
- » de atropina, III, 412.
 - » contra la gastralgia (Szerlecki), III, 425.
- Tópicos, IV, 123.
- Tópico contra el acné, IV, 125.
- » de almidón alcanforado, IV, 123.
 - » de almidón y sal amoníaco (Chaverly), IV, 123.
- Tópico anticanceroso, IV, 124.
- » antiescrofuloso, IV, 124.
 - » antiescrofuloso (Breffeld), IV, 124.
 - » antiespasmódico (Barthez), IV, 124.
 - » antiictérico (Vogler), IV, 124.
 - » antileucorréico (Kopp), IV, 124.
 - » antiodontálgico (Handel), IV, 124.
 - » antisifilítico (Cirillo), IV, 124.
 - » astringente, IV, 124.
 - » astringente (Punegnát), IV, 124.
 - » aurífero (Niel), IV, 125.
 - » de belladona (Mignot), IV, 125.
 - » calmante, IV, 125.
 - » calmante (Pougens), IV, 125.
 - » calmante (Thompson), IV, 125.
 - » contra los callos (Laroche), IV, 125.
 - » contra las cicatrices de las viruelas, IV, 126.
 - » contra las contusiones (Montese), IV, 126.
 - » desecante, IV, 128.
 - » diaforético, IV, 128.
 - » de digital alcanforado (Chaverly), IV, 128.
 - » dulcificante, IV, 128.
 - » contra las enfermedades de la piel (Cazenave), IV, 126.
 - » escarótico y antisifilítico, IV, 128.
 - » de Hañreke, contra las comezones, IV, 128.
 - » contra las hemorroides (Valsalva), IV, 126.
 - » contra las heridas recientes de los dedos (Mignot), IV, 127.
 - » contra los infartos (Chaverly), IV, 127.
 - » contra las inflamaciones de la piel (Chaverly), IV, 127.

- Tópico madurativo (Piderit), IV, 129.
- » contra las manchas hepáticas (Hufeland), IV, 127.
 - » contra el panarizo, I, 348.
 - » pulverulento iodurado (Chaberly), IV, 127.
 - » pulverulento de óxido de zinc (Cazenave), IV, 128.
 - » pulverulento contra la tiña (Chaverly), IV, 128.
 - » purgante, IV, 129.
 - » refrigerante y calmante, IV, 129.
 - » contra los sabañones (Berton), IV, 127.
 - » contra los sabañones (Mialhe), IV, 127.
 - » contra los sabañones ulcerados (Hufeland), IV, 127.
 - » seco alcalino (Cazenave), IV, 129.
 - » contra la tiña, IV, 127.
 - » vermífugo (Roux), IV, 129.
- Tratamientos especiales, IV, 129.
- Tratamientos de los accidentes terciarios de la sífilis (Devergie), IV, 146.
- » de las afecciones escrofulosas (Negrier), IV, 137.
 - » de las alucinaciones con el estramonio, IV, 139.
 - » de la amenorrea (Rey), IV, 129.
 - » antisifilítico de Dupuytren, IV, 146.
 - » antisifilítico de Zittmann, IV, 149.
 - » arábigo (Payan), IV, 147.
 - » de la blenorrea externa (Ricord), IV, 130.
 - » de la blenorragia uretral (Ricord), IV, 130.
 - » de los bubones (Reynaud), IV, 131.
 - » de la Caridad contra el cólico de los pintores, IV, 131.
 - » de la catarata (Gondret), IV, 131.
 - » del cólico de plomo (Gendrin), IV, 135.
- » Tratamiento del cólico de plomo (Martin Solon), IV, 135.
 - » del cólico de plomo (Ranque), IV, 133.
 - » contra la corea (Walrdler-vorth), IV, 136.
 - » de la erisipela de los niños (Trousseau), IV, 137.
 - » del escorbuto y de la púrpura, IV, 137.
 - » de las fracturas con la solución de dextrina (d'Arcet), IV, 138.
 - » de la gonorrea (Edwards), IV, 138.
 - » de la gonorrea (Delpech), IV, 138.
 - » de los herpes con el antracocali, IV, 139.
 - » de la hidropesía pasiva del tegido celular (Dupuytren), IV, 139.
 - » de los infartos edematosos de los miembros inferiores de los locos, IV, 140.
 - » de la inflamación de la retina (Dupuytren), IV, 140.
 - » de la leucorrea (Velpeau), IV, 141.
 - » del lupus (Putegnat), IV, 141.
 - » de las neuralgias por la esencia de trementina (Martinet), IV, 142.
 - » contra la oftalmia catarral crónica (Reveillé Parisé), IV, 136.
 - » de la oftalmia escrofulosa (Cunier), IV, 142.
 - » de la oftalmia escrofulosa (Dr. Saffert), IV, 143.
 - » de la oftalmia de los recién nacidos (Ammon), IV, 143.
 - » de la otitis crónica (Velpeau), IV, 143.
 - » de las quemaduras (Righini), IV, 143.
 - » de las quemaduras de los recién nacidos, IV, 144.
 - » de las queratitis ulcerosas y de las iritis seniles (N. Guillot), IV, 144.

- Tratamiento de la rabia (Dr. Gottlieb de Schallern), IV, 144.
- » contra la sarna (Dornblueth), IV, 136.
 - » de la sarna con el hígado de azufre (Devergie), IV, 145.
 - » de la sarna en tres días (Adolfo de Mitau), IV, 145.
 - » de la sarna por medio de la cebadilla (l'Hulhier), IV, 146.
 - » de la sífilis constitucional de los niños (Trousseau), IV, 148.
 - » de la sífilis (Dzondi), IV, 148.
 - » de la sífilis modificado (Dzondi), IV, 148.
 - » de la sordera accidental, IV, 150.
 - » de la ténia (Guilbert), IV, 16.
 - » de la ténia por el aceite etéreo de helecho (Coindet), IV, 150.
 - » de la ténia por la corteza de granado (Merat), IV, 150.
 - » de la ténia (Grahl de Hamburgo), IV, 150.
 - » de la ténia por el helecho (Ronzel), IV, 150.
 - » de la tiña (Gruby), IV, 151.
 - » tópico contra la alopecia (Wilson), IV, 129.
 - » de los tumores blancos con el aparato de Scott (Boileau), IV, 151.
 - » contra el tumor lagrimal, IV, 136.
 - » contra el tumor lagrimal (Beral), IV, 136.
 - » de los tumores del pecho (Tanchou), IV, 151.
 - » de las torceduras, IV, 151.
 - » de las úlceras de la córnea (Tavignot), IV, 152.
 - » de las úlceras de las piernas, IV, 151.
 - » de la úlcera venérea corrosiva (Ricord), IV, 152.
 - » del varus mentagra y gutta rosea (Dauvergne), IV, 152.
- Trementina cocida, I, 349.
- » cocida (F. F.), I, 349; III, 309.
 - » privada de su aceite esencial, I, 349.
- Triaca, I, 278.
- » de Andrómaco (F. A.), II, 215.
 - » del colegio (F. E.), II, 214.
 - » reformada (F. P.), II, 215.
- Tridacio (F. F.), II, 306.
- Trociscos, IV, 153.
- » de ácido láctico (Magendie), IV, 153.
 - » de agárico (F. E.), IV, 154.
 - » de Alhandal (F. E.), IV, 154.
 - » de alquequenje (F. M.), IV, 154.
 - » antiácidos (Toddi), IV, 154.
 - » antihelmínticos (H. M.), IV, 154.
 - » aromáticos, IV, 154.
 - » béquicos opiados, IV, 155.
 - » blancos de Rhassis (F. E.), IV, 155.
 - » de cálamo aromático de Hedicroy (F. E.), IV, 156.
 - » de carbonato de plomo alcanforado (F. E.), IV, 155.
 - » de castóreo (F. A.), IV, 155.
 - » de cebolla albarrana (F. E.), IV, 155.
 - » cifeos (Demócrates), IV, 155.
 - » de cubebas (Dr. Spitta), IV, 155.
 - » de Chaussier, IV, 156.
 - » de deutoioduro de mercurio (F. E.), IV, 156.
 - » escaróticos (F. E.), IV, 156.
 - » escaróticos (F. F.), IV, 156.
 - » escaróticos de minio (F. P.), IV, 156.
 - » escilíticos (F. E.), IV, 155.
 - » de fruto de coloquintida (F. E.), IV, 154.
 - » de Hedicroy (F. E.), IV, 156.
 - » masticatorios, IV, 157.
 - » de mirra compuestos (F. E.), IV, 157.

- Trociscos moscados (F. DE WURT.), IV, 157.
- » olorosos, IV, 157.
- » de Ramich (F. E.), IV, 157.
- Trociscos de regaliz opiados, IV, 157.
- » de víboras (F. E.), IV, 157.

U.

- Uncion mercurial con belladona (Desmarres), III, 531.
- Unturas contra la fotofobia en las oftalmias agudas (Desmarres), IV, 181.
- Ungüentos, IV, 158.
- Ungüento de la abadía de Bec, IV, 158.
- » abortivo (Debreyne), IV, 158.
- » de acetato de plomo (F. A.), IV, 158.
- » de acetato de plomo (F. E.), IV, 158.
- » de agalla y morfina (F. P.), IV, 158.
- » de Agripa (F. E.), IV, 162.
- » de ajeno, I, 72.
- » alabastrino, IV, 158.
- » de albayalde (F. P.), IV, 163.
- » alcanforado, IV, 158.
- » de Alderete (F. E.), IV, 159.
- » de altea (F. E.), IV, 159.
- » de altea (F. F.), IV, 159.
- » de altea (F. P.), IV, 159.
- » amoniaco (H. DE AL.), IV, 159.
- » antiépsórico, IV, 159.
- » antihelmíntico, IV, 159.
- » antihelmíntico (Boerhaave), IV, 159.
- » antihemorroidal, IV, 160.
- » antihemorroidal (H. DE MOMP.), IV, 160.
- » antihemorroidal (Righini), IV, 160.
- » antileucorréico, IV, 160.
- » antimonial (F. DE L.), IV, 179.
- » de Arceo (F. E.), IV, 160.
- Ungüento de Arceo (F. F.), IV, 160.
- » de Arceo (H. M.), IV, 160.
- » de arrayan compuesto (F. E.), IV, 164.
- » de artanita compuesto (F. E.), IV, 160.
- » de azufre (F. DE L.), IV, 161.
- » de azufre compuesto (F. DE L.), IV, 161.
- » de azufre compuesto (F. P.), IV, 161.
- » de azufre con sulfuro de mercurio (F. P.), IV, 161.
- » basálico (F. E.), IV, 161.
- » basálico (F. P.), IV, 161.
- » basálico negro (F. E.), IV, 161.
- » de bayas de laurel (F. P.), IV, 169.
- » de berengena (F. E.), IV, 161.
- » blanco (H. M.), IV, 162.
- » blanco alcanforado, IV, 162.
- » blanco alcanforado (F. P.), IV, 163.
- » blanco de Rhasis, IV, 162.
- » blanco de Rhasis (F. E.), III, 497; IV, 162.
- » de brea (F. DE L.), IV, 162.
- » de brionía de Agripa (F. E.), IV, 162.
- » de Brown (H. DE M.), II, 194.
- » Bruno (F. F.), IV, 162.
- » de cal (Vogler), IV, 162.
- » de calabaza, IV, 163.
- » de camuesas (F. M.), IV, 163.
- » de Canet (F. F.), II, 241.

- Ungüento de cantáridas (F. E.), IV, 168.
- » de cantáridas (F. DE L.), IV, 163.
- » de cantáridas excitante (Millan), IV, 163.
- » de carbonato de plomo (F. E.), IV, 162.
- » de carbonato de plomo (F. P.), IV, 163.
- » carminativo (Tourtual), IV, 163.
- » cetrino (F. A.), IV, 164.
- » cetrino (F. E.), IV, 163.
- » cetrino (F. F.), III, 498.
- » cetrino (F. P.), IV, 164.
- » de cicuta depilativo (F. E.), IV, 164.
- » cinabarino (F. E.), IV, 179.
- » de cloruro de mercurio y amoníaco (F. DE L.), III, 501.
- » de cobre, IV, 164 y 180.
- » de cobre (Swediaur), IV, 164.
- » de cobre compuesto, IV, 164.
- » de colofonia amarillo (F. E.), IV, 161.
- » de la Condesa (F. E.), IV, 164.
- » de creosota (F. DE L.), IV, 166.
- » deopilativo (F. E.), IV, 164.
- » de deutocloruro de mercurio compuesto (F. E.), IV, 159.
- » de diapalma (F. M.), IV, 166.
- » digestivo (F. M.), II, 194.
- » digestivo (H. DE M.), IV, 166.
- » digestivo simple (F. F.), II, 194.
- » discusivo (Frank), IV, 166.
- » diurético, IV, 166.
- » del Duque, IV, 167.
- » egipciaco (F. E.), IV, 167.
- » egipciaco (F. F.), IV, 167.
- » egipciaco (H. DE M.), IV, 167.
- Ungüento de eléboro blanco (F. DE L.), IV, 167.
- » de elemí (F. DE L.), IV, 167.
- » de enebro, IV, 166.
- » de énula campana, IV, 167.
- » de énula campana (Bruckmann), IV, 168.
- » epilatorio (Swediaur), IV, 168.
- » epispástico, IV, 168.
- » epispástico (Cadet), IV, 168.
- » epispástico (F. E.), IV, 168.
- » de esperma de ballena (F. DE L.), IV, 168.
- » de estoraque (F. F.), IV, 168.
- » de estoraque (H. DE M.), IV, 168.
- » de Falck, IV, 169.
- » fundente de opio, IV, 169.
- » fusco (F. A.), II, 128.
- » fusco, IV, 170.
- » de Genoveva alcanforado, II, 66.
- » gris (F. F.), IV, 172.
- » hemorroidal, IV, 167.
- » hemorroidal (F. M.), IV, 167.
- » contra las hemorroides, IV, 165.
- » del hijo de Zacarías (F. E.), IV, 169.
- » de imperatoria (Milius), IV, 169.
- » de iodo compuesto (F. DE L.) IV, 169.
- » de ioduro de plomo (F. DE L.), IV, 170.
- » de laurel (F. F.), III, 528.
- » de linaria (F. M.), IV, 169.
- » de litargirio (F. A.), IV, 158.
- » de litargirio (F. E.), IV, 174.
- » de la madre Tecla (F. E.), IV, 170.
- » de la madre Tecla (F. F.), IV, 170.
- » madurativo (Canquoin), IV, 170.
- » magistral (F. E.), II, 255; IV, 170.

- Ungüento marcial, IV, 170.
- » marciaton (F. E.), IV, 171.
 - » de medula mucilaginoso (F. E.), IV, 169.
 - » mercurial (Beche), IV, 171.
 - » mercurial blanco, IV, 171.
 - » mercurial blanco (J. P. Frank), IV, 171.
 - » mercurial con brea (Guillot), IV, 171.
 - » mercurial ceniciento (F. A.), IV, 171.
 - » merc. cetrino (F. A.), IV, 164.
 - » merc. compuesto, IV, 171.
 - » merc. doble (F. F.), IV, 172.
 - » merc. doble (F. P.), IV, 172.
 - » mercurial doble (Lagneau), IV, 171.
 - » merc. fuerte (F. A.), IV, 173.
 - » mercurial contra el herpes mentagra (Le Blus), IV, 171.
 - » mercurial opiado, IV, 173.
 - » mercurial rojo (J. P. Frank), IV, 173.
 - » merc. simple (F. F.), IV, 172.
 - » de mercurio (F. E.), IV, 172.
 - » de mercurio dulce, IV, 173.
 - » de mercurio dulce contra los herpes (F. E.), IV, 165.
 - » de merc. duplicado, IV, 172.
 - » de mercurio dulce (Dupuytren), IV, 165.
 - » de mercurio terciado (F. E.), IV, 172.
 - » de mercurio terciado (H. M.), IV, 172.
 - » de minio (F. E.), IV, 170.
 - » de minio (H. M.), IV, 170.
 - » de Mompeller, IV, 173.
 - » de muriato de mercurio oxigenado (F. E.), IV, 159.
 - » napolitano, IV, 173.
 - » napolitano (F. F.), IV, 172.
 - » napolitano (F. P.), IV, 172.
 - » negro (Fricke), IV, 173.
 - » negruzco de óxido de plomo (F. E.), IV, 170.
 - » nervino, IV, 174.
 - » nervino (F. P.), IV, 169.
 - » nervino de lombrices (F. E.), IV, 173.
 - » de nitrato de mercurio (F. E.), IV, 163.
- Ungüento de nitrato de mercurio (F. DE L.), IV, 164.
- » de nitrato de mercurio (F. P.), IV, 164.
 - » nutrido (F. E.), IV, 174.
 - » nutrido (F. F.), IV, 174.
 - » de nuez de agallas (F. P.), IV, 174.
 - » de nuez de agalla compuesto (F. DE L.), IV, 174.
 - » de nuez de agalla y morfina (F. P.), IV, 174.
 - » oftálmico (H. M.), IV, 175.
 - » oftálm. (Reil), II, 10; IV, 175.
 - » oftálm. (Smellome), IV, 175.
 - » de olibarda de Aregon (F. F.), IV, 175.
 - » de óxido de cobre (F. E.), IV, 167.
 - » de óxido de mercurio por el ácido nítrico (F. DE L.), IV, 175.
 - » de óxido de plomo acetado (F. E.), IV, 174.
 - » de óxido de plomo rojo (F. E.), IV, 170.
 - » de óxido de zinc, I, 364.
 - » de óxido de zinc (F. DE L.), IV, 181.
 - » oxigenado, IV, 175.
 - » oxigenado (F. E.), III, 539.
 - » oxigenado mercurial (Bañares), II, 11.
 - » de pan de puerco (F. E.), IV, 161.
 - » de pez negra (F. DE L.), IV, 175.
 - » de Piderit, IV, 175.
 - » de plomo compuesto (F. DE L.), IV, 176.
 - » de plomo negro (F. E.), IV, 176.
 - » populeon, I, 73.
 - » populeon (F. E.), IV, 176.
 - » populeon (F. F.), IV, 176.
 - » de propoleos (Cadet), IV, 176.
 - » de protocloruro de mercurio (F. E.), IV, 165.
 - » contra las quemaduras (H. M.), IV, 165.
 - » de quina balsámico (Neumann), IV, 177.

- Ungüento contra la rabia (Jacnic-cher), IV, 15.
- » de regaliz, IV, 177.
 - » resolutivo (Zellemborg), IV, 177.
 - » resolutivo amoniacal (Hufeland), IV, 177.
 - » resolutivo mercurial (H. DE M.), IV, 177.
 - » de Ricour, IV, 177.
 - » rosado, IV, 178.
 - » rosado (F. E.), IV, 177.
 - » rosado (F. F.), IV, 177.
 - » rosado compuesto, IV, 178.
 - » de ruda (F. E.), IV, 178.
 - » contra los sabañon. (Plenk), IV, 165.
 - » contra los sabañones (Swe-diaur), IV, 165.
 - » de sabina (F. P.), IV, 178.
 - » contra la sarna (Bailey), IV, 166.
 - » contra la sarna (F. A.), IV, 166 y 179.
 - » contra la sarna (H. DE M.), IV, 165.
 - » de Saturno, IV, 178.
 - » de Sat. (H. DE M.), IV, 178.
 - » de saúco, III, 544.
 - » de saúco (F. E.), IV, 178.
 - » de saúco (F. DE L.), IV, 179.
- Ungüento sedante del Dr. París (F. P.), IV, 158 y 174.
- » de tabaco, IV, 179.
 - » de tártaro emético (F. DE L.), IV, 179.
 - » simple (F. A.), IV, 179.
 - » sulfurado (F. A.), IV, 166.
 - » sulfurado (F. A.), IV, 179.
 - » sulfúrico (Achard), IV, 179.
 - » de sulfuro de mercurio (F. E.), IV, 179.
 - » contra la tiña, IV, 166.
 - » id. (Henke), IV, 166.
 - » contra la tiña de la cabeza (Sydenham), IV, 166.
 - » de tomate, IV, 179.
 - » trementinado (F. A.), IV, 180.
 - » de tucia (F. F.), IV, 180.
 - » de tucia (F. P.), IV, 180.
 - » de tuétano de vaca (F. E.), IV, 180.
 - » de unciones (F. E.), IV, 172.
 - » de Valdajou, IV, 180.
 - » verde, IV, 164 y 180.
 - » vermífugo, IV, 180.
 - » verm. (F. BELGA), IV, 180.
 - » verm. (H. DE AL.), IV, 180.
 - » de yemas de álamo negro, (F. E.), IV, 176.
 - » de zinc (F. DE L.), IV, 181.
 - » de zinc con mirra, IV, 181.

V.

- Valerianato de hierro, I, 440.
- Vahos, IV, 181.
- » resolutivos (F. DE PLENK), IV, 181.
- Vapores de ácido acético, I, 61.
- » de ácido nítrico, I, 106.
 - » de ácido sulfuroso, I, 107.
 - » de azufre, I, 107.
 - » emolientes (F. DE PLENK), IV, 181.
 - » medicinales, I, 353.
 - » resolutivo (F. DE PLENK), IV, 181.
- Vejigatorios, I, 354; IV, 181.
- Vejigatorio alcanforado oficial (Mialhe), IV, 181.
- » amoniacal, IV, 182.
 - » de Bouvoisin, IV, 182.
- Vejigatorio de Bretonneau, IV, 182.
- » económico, IV, 182.
 - » extemporáneo amoniacal, (Dr. Darck), IV, 183.
 - » de Gondret, IV, 183.
 - » inglés (F. DE B.), II, 257.
 - » de Lecomte, IV, 183.
 - » de Louyer Villermay, IV, 183.
 - » magistral, IV, 183.
 - » magistral (F. P.), IV, 32.
 - » de moneda, IV, 183.
 - » perpetuo (Janin), IV, 183 y 184.
 - » de Trousseau, III, 154.
 - » de Wauters, IV, 184.
- Vendaje de destrina, III, 101.

- Venenos cáusticos, IV, 329.
- » corrosivos, IV, 329.
 - » irritantes, IV, 329.
 - » narcóticos, IV, 334.
 - » narcóticos-acres, IV, 335.
 - » pútridos, IV, 337.
 - » sépticos, IV, 337.
- Ventosas, I, 354.
- Vespetro, IV, 6.
- Vexicantes, I, 354.
- Vinagres, IV, 184.
- Vinagre de ajo, I, 73; IV, 185 y 191.
- » alcanforado, I, 75; IV, 185.
 - » alcanforado (F. F.), IV, 185.
 - » alcanforado (F. P.), IV, 185.
 - » alcanf. (J. P. Frank), IV, 185.
 - » alcanf. (Raspail), IV, 185.
 - » alcanf. (Spielmann), IV, 185.
 - » de angélica, I, 89.
 - » antiescorbútico, IV, 186.
 - » antiséptico (F. F.), IV, 189.
 - » antiséptico alcanforado (F. E.), IV, 188.
 - » aromático, IV, 186.
 - » aromático y antimefítico (Bully), IV, 187.
 - » aromático fuerte, IV, 187.
 - » arom. inglés (F. F.), IV, 186.
 - » aromático de juncia (F. E.), IV, 186.
 - » de belladona, IV, 187.
 - » benzoico (F. M.), IV, 193.
 - » de berro, IV, 191.
 - » bezoárdico (Berlin), IV, 187.
 - » de café (Swediaur), II, 81; IV, 187.
 - » calibeado, IV, 187.
 - » de cantáridas (F. DE L.), IV, 188.
 - » de cáscara de nar., IV, 191.
 - » de cebolla, IV, 191.
 - » de cebolla albarrana, I, 145.
 - » de cebolla albarrana (F. E.), IV, 188.
 - » de claveles (F. F.), IV, 192.
 - » de colchico, I, 159.
 - » de colchico (F. E.), IV, 188.
 - » de colc. (F. F.), IV, 190.
 - » de colchico (F. P.), IV, 188.
 - » de colchico (Reuss), IV, 188.
 - » de criadillas de tierra, IV, 191.
- Vinagre de los cuatro ladrones (F. E.), IV, 188; (F. F.), IV, 189.
- » dentífrico, IV, 189.
 - » destilado (F. F.), IV, 189.
 - » de digital (Martius), IV, 189.
 - » de digital (Nasse), IV, 189.
 - » de eléboro blanco, IV, 190.
 - » de eléboronegro, I, 175; IV, 190.
 - » epispástico (F. DE L.), IV, 188.
 - » escilítico (F. E.), IV, 188.
 - » escilítico (F. F.), IV, 190.
 - » escilítico (F. P.), IV, 190.
 - » de espliego, I, 185.
 - » de espliego, IV, 190.
 - » de estragon, IV, 191.
 - » etéreo, I, 190.
 - » de flores de espliego (F. F.), IV, 192.
 - » de flores de romero (F. F.), IV, 192.
 - » de flores de salvia (F. F.), IV, 192.
 - » de flores de saúco (F. F.), IV, 192.
 - » de frambuesas (F. F.), IV, 190.
 - » de gengibre, IV, 191.
 - » de hierro, IV, 190.
 - » de mirra, IV, 191.
 - » de mostaza destilado (F. N. P.), IV, 191.
 - » de opio, I, 278; IV, 191.
 - » de opio (F. F.), IV, 191.
 - » de pelitre (Fox), II, 181.
 - » de pepinos, IV, 191.
 - » de pimienta, IV, 191.
 - » de pimienta de Indias (Swediaur), IV, 191.
 - » de pimienta, IV, 191.
 - » pontifical (F. E.), IV, 192.
 - » de romero, I, 319.
 - » rosado, I, 320.
 - » rosado (F. E.), IV, 192.
 - » rosado (F. F.), IV, 192.
 - » rosado (F. P.), IV, 192.
 - » rubefac. (H. M. F.), IV, 192.
 - » de ruda, I, 321.
 - » de ruda (F. A.), IV, 193.
 - » de salvia, I, 325.
 - » de saúco, I, 332; IV, 193.
 - » de semillas de colchico, IV, 188.

- Vinagre sevillano (F. E.), IV, 186.
- » del tocador, IV, 193.
 - » de triaca (F. M.), IV, 193.
 - » virginal, IV, 193.
 - » vulnerario, IV, 186.
- Vinos, IV, 193.
- Vino de acebo (Rousseau), IV, 193.
- » acerado (F. F.), IV, 194.
 - » de acetato de hierro, IV, 194.
 - » de acetato de hierro líquido, IV, 194.
 - » de acíbar, I, 61; IV, 194.
 - » de acíbar (F. DE L.), IV, 194.
 - » de acíbar (F. P.), IV, 194.
 - » de acíbar alcalizado (Swediaur), IV, 194.
 - » de agraz y triaca (H. DE M.), IV, 195.
 - » de ajenjos I, 72; IV, 195.
 - » de ajenjos (F. E.), IV, 195.
 - » de ajenjos (F. F.), IV, 195.
 - » de albahaca, I, 74.
 - » alcanforado, I, 75; IV, 195.
 - » de alcaparro, I, 75.
 - » amargo (Dubois), IV, 195.
 - » id. (H. DE INGL.), IV, 196.
 - » amargo alcoholizado, II, 222.
 - » amargo aromático (Lazermé), IV, 196.
 - » amargo y diurético (Corvisart), IV, 196.
 - » id. escilitico (F. F.), IV, 196.
 - » amoniacal, IV, 196.
 - » de angélica, I, 89; IV, 197.
 - » de angustura verdadera, I, 90.
 - » antiapopléctico, IV, 197.
 - » antiescorbútico (F. F.), IV, 197.
 - » antiesc. (H. DE M.), IV, 197.
 - » antielmíntico, IV, 195.
 - » antihidrópico (Fuller), IV, 197.
 - » antiictérico, IV, 197.
 - » antileucorréico, IV, 198.
 - » antimoniado (F. E.), IV, 198.
 - » antimoniado (F. F.), IV, 198.
 - » antimonial de Huxhan, IV, 198 y 210.
 - » antim. (Swediaur), IV, 198.
 - » antiperiódico (Rosen), IV, 198.
- Vino añejo del Rhin, IV, 209.
- » aromático, IV, 198.
 - » aromático (F. F.), IV, 198.
 - » id. (H. DE S. JOSÉ), IV, 199.
 - » aromático amargo (Reca-
mier), IV, 199.
 - » aromático opiado, IV, 199.
 - » aromát. con tanino, IV, 199.
 - » astringente, IV, 199.
 - » de brionía, I, 123.
 - » de bulbos de cólchico, I, 159.
 - » de bulbos de cólchico (F. F.),
IV, 205.
 - » de cainca, I, 126; IV, 199.
 - » calibeado (F. F.), IV, 194.
 - » calibeado (F. P.), IV, 200.
 - » calib. (Parmentier), IV, 199.
 - » calib. (Soubeiran), IV, 199.
 - » calibeado aromático (F. P.),
IV, 200.
 - » de canela, I, 132; IV, 200.
 - » de canela comp., IV, 200.
 - » de cantáridas, IV, 200.
 - » de caña, I, 134.
 - » de cardo santo, I, 139.
 - » de cariofilea, I, 139.
 - » de cascarilla, I, 140; IV, 200.
 - » de cátequí, I, 142; IV, 200.
 - » de cebolla albarrana, I, 145.
 - » de ceniza de quasia, IV, 201.
 - » de centaurea menor, I, 146.
 - » de cinchonina (Magendie),
I, 201.
 - » de citrato de hierro (Beral),
IV, 201.
 - » de clavo de especia, I, 152.
 - » de coclearia, IV, 201.
 - » de coclearia compuesto, IV,
201.
 - » de colombo, I, 160.
 - » de coloquintida, I, 161; IV,
202.
 - » de cólchico, IV, 201 y 202.
 - » de cólch. (F. DE L.), IV, 201.
 - » de cólchico (F. P.), IV, 201.
 - » de cólchico (Locher Balber),
IV, 202.
 - » de cólch. (Willians), IV, 202.
 - » colchítico, IV, 202.
 - » de copaiba, IV, 202.
 - » cordial, IV, 200.
 - » de cornezuelo de centeno,
I, 164.

- Vino de cornezuelo de centeno, (Balardini), IV, 202.
- » de quasia amarga, I, 307.
- » de diascordio, IV, 203.
- » de digital, I, 172.
- » de digital (F. P.), IV, 203.
- » diurético, IV, 203.
- » diurético amargo de la Caridad (F. F.), IV, 196.
- » diurético inglés, IV, 204.
- » diurético mayor (Debreyne), IV, 203.
- » diurético menor (Debreyne), IV, 203.
- » de eléboro, IV, 204.
- » de eléboro blanco, IV, 204.
- » de eléboro blanco (F. DE L.), IV, 204.
- » emético (F. E.), IV, 198.
- » id. claro (H. DE M.), IV, 198.
- » id. turbio (F. E.), IV, 204.
- » de enebro, IV, 200 y 204.
- » de énula aromatizado (Radus), IV, 204.
- » de énula campana, I, 179.
- » de énula campana (F. F.), IV, 195 y 204.
- » de escila, IV, 209.
- » escilítico (F. F.), IV, 205.
- » escilítico (F. P.), IV, 205.
- » escilít. (H. DE M.), IV, 205.
- » escilítico (Richard), IV, 205.
- » escilítico laudanizado (Tessier), IV, 205.
- » escilítico compuesto (Fuller), IV, 205.
- » de estiércol de gallina, IV, 206.
- » estíptico (F. F.), IV, 205.
- » de estramonio, IV, 206.
- » estomacal (Plenk), IV, 205.
- » excitante, IV, 206.
- » febrífugo, IV, 206.
- » febrífugo de quina, IV, 206.
- » febríf. de Seguin, IV, 206.
- » ferruginoso, IV, 207.
- » de Fordice, IV, 207.
- » de frutos de ciprés compuesto (F. E.), IV, 205.
- » de gallinaza, IV, 206.
- » de genciana, I, 201; IV, 195.
- » de genciana (F. F.), IV, 207.
- Vino de gengibre, I, 202; IV, 200.
- » de graciola, I, 206; IV, 207.
- » de guayaco con eléboro (Levis), IV, 207.
- » hidragogo, IV, 207.
- » hipocrático, IV, 200.
- » de ioduro de hierro, I, 218.
- » de ioduro de hierro (F. P.), IV, 207.
- » de ioduro de hierro (Pierquin), IV, 207.
- » de ipecacuana, I, 229.
- » de id. (F. DE L.), IV, 207.
- » de liriodendro, I, 238.
- » de lúpulo, I, 239.
- » marcial (H. DE M.), IV, 208.
- » medicinal de Husson, IV, 202.
- » medicinal con los extractos (Hoffmann), II, 230.
- » de membrillos, IV, 208.
- » con miel, IV, 208.
- » de miel (H. DE M.), IV, 208.
- » de milpiés, I, 265.
- » de mostaza, IV, 208.
- » nitrado, IV, 208.
- » de nuez de agalla, I, 275.
- » de opio, I, 278.
- » de opio (F. DE L.), IV, 208.
- » de opio compuesto, I, 278.
- » de opio compuesto (F. F.), III, 6.
- » de opio compuesto (F. P.), III, 6.
- » de opio de Lalouette, III, 7.
- » de opio obtenido por fermentacion (F. F.), III, 7.
- » de óxido de antimonio (F. E.), IV, 204.
- » oxigenado, IV, 208.
- » para preparar los vinos medicinales, IV, 208.
- » de pensamiento silvestre, IV, 209.
- » artific. de Portugal, IV, 208.
- » purgante, IV, 209.
- » de quasia amarga, IV, 209.
- » de quina, I, 310; IV, 209.
- » de quina (F. F.), IV, 209.
- » de quina compuesto, IV, 209 y 210.
- » de quina compuesto (F. P.), IV, 210.

- Vino de quina ferruginoso, IV, 209.
- » de quina y valeriana, IV, 210.
 - » quinado (H. DE M.), IV, 210.
 - » rosado, IV, 211.
 - » de rosas rojas, I, 320.
 - » de ruibarbo, I, 321; IV, 210.
 - » de ruib. compuesto, IV, 210.
 - » de ruibarbo y énula campana, IV, 211.
 - » de salvia, I, 325.
 - » de sáuce, I, 331.
 - » de semillas de cólchico, I, 159; IV, 203.
 - » de semillas de cólchico (F. F.), IV, 205.
 - » de semillas de estramonio, I, 188.
 - » de serpentaria de Virginia, I, 334.
 - » sudorífico (Dr. Schmith), IV, 211.
 - » de sulfato de cinconina, I, 150.
- Vino de sulfato de quinina, I, 314.
- » de sulfato de quinina (Beral), IV, 211.
 - » de sulfato de quinina (Magendie), IV, 211.
 - » de tabaco, I, 342.
 - » de tabaco (H. DE M.), IV, 211.
 - » de tartrato de hierro y potasa, I, 222.
 - » tónico (Vogel), IV, 211.
 - » tónico amargo (Cottureau), IV, 212.
 - » tónico y antiperiódico, IV, 209.
 - » trementinado, IV, 211.
 - » triacal, IV, 212.
 - » de tulípero, IV, 212.
 - » de zarzaparrilla, I, 362.
 - » de zarzaparrilla (Beral), IV, 212.
 - » de zarzaparrilla compuesto (Smith), II, 278.
- Vomipurgativo de Le Roy, III, 552.
- Wacaca de los indios, II, 312.

Y.

- Yerbas carminativas (F. M.), II, 287.
- Yerbas emolientes (F. M.), II, 289.

Z.

- Zarzaparrilla iodurada, I, 362.
- » iodurada (Magendie), II, 158.
- Zinkaster de los alemanes, II, 301.
- Zumos, IV, 212.
- Zumo, IV, 212.
- » de acedera, I, 55.
 - » acidulos, IV, 212.
 - » de achicorias, I, 68.
 - » de achicorias (F. E.), IV, 212.
 - » de agracejo, I, 73.
 - » de agracejo (F. F.), IV, 214.
 - » de agraz, I, 70.
 - » de agraz (F. E.), IV, 213.
 - » de agraz (F. F.), IV, 214.
 - » de ajo, I, 72.
- Zumo de alquequenje, I, 80.
- » de alquimila, I, 81.
 - » antiescorbúticos (F. F.), IV, 213.
 - » antiespasmódicos, I, 158.
 - » antiflogístico (Gaubius), IV, 213.
 - » de aquilea, I, 96.
 - » de arándano, IV, 213.
 - » de bayas de saúco (F. F.), IV, 215.
 - » de becabunga, I, 115.
 - » de beleño, IV, 213.
 - » de belladona, I, 118; IV, 213.
 - » de berros, I, 119.
 - » de bolsa de pastor, I, 122.
 - » de borraja, I, 122.

- Zumo de borraja (F. F.), IV, 213.
- » de brionía, I, 123.
 - » de caléndula, I, 130.
 - » de capuchina, I, 136.
 - » de cardo estrellado, I, 138.
 - » de cardo de María, I, 138.
 - » de celedonia mayor, I, 145.
 - » de centaurea menor, I, 146.
 - » de cerezas, I, 147.
 - » de cerezas (F. F.), IV, 214.
 - » de cicuta, I, 148.
 - » de cicuta (F. F.), IV, 213.
 - » de coclearia, I, 157.
 - » de coclearia compuesto, IV, 214.
 - » de cohombro (F. F.), IV, 215.
 - » de corregüela, I, 165.
 - » de corteza de raíz de saúco (F. F.), IV, 213.
 - » de digital, I, 172.
 - » diurético (Duchesne), IV, 214.
 - » de dulcamara, I, 174.
 - » de erisimo, I, 180.
 - » de escabiosa, I, 180.
 - » de escordio, I, 182.
 - » espesado de milpiés, I, 265.
 - » de espino serval, I, 185.
 - » de espino serval (F. F.), IV, 215.
 - » de estramonio, I, 187; IV, 213.
 - » de estramonio (F. F.), IV, 213.
 - » de eupatorio, I, 191.
 - » de frambuesas, I, 195.
 - » de frambuesas (F. F.), IV, 215.
 - » de fresa, I, 195.
 - » de fumaria, I, 198.
 - » de fumaria (F. F.), IV, 213.
 - » de galio, I, 199.
 - » de grama, I, 207.
 - » de granadas (F. F.), IV, 214.
 - » de grosellas, I, 208.
 - » de grosellas (F. F.), IV, 214.
 - » de grosellero negro, I, 208.
 - » de herniaria lampiña, I, 212.
 - » de hinojo marino, I, 223.
 - » de hojas de belladona (F. F.), IV, 213.
- Zumo de hojas de paciencia, I, 282.
- » de hojas de taraxacon, I, 345.
 - » de juncia avellanada, I, 230.
 - » de lamio blanco, I, 231.
 - » de lechuga, I, 233.
 - » de lechuga virosa, I, 233.
 - » de limon, I, 235.
 - » de limones (F. F.), IV, 214.
 - » de lirio de Florencia, I, 236.
 - » de lombarda, I, 239.
 - » de lombarda (F. F.), IV, 214.
 - » de lúpulo, I, 239.
 - » de llanten, I, 240.
 - » de manzanas (F. F.), IV, 214.
 - » de matricaria, I, 249.
 - » de membrillo, I, 252.
 - » de membrillos (F. F.), IV, 214.
 - » de mercurial, I, 253.
 - » de mirtilo, I, 266.
 - » de moras (F. F.), IV, 215.
 - » de moras negras, I, 267.
 - » de oxálide de tallo grueso, I, 281.
 - » de parietaria, I, 283.
 - » de perejil, I, 285.
 - » de perifollo, I, 286.
 - » de pétalos de rosas (F. F.), IV, 213.
 - » de potentilla antihelmíntica, I, 306.
 - » de rábano, I, 315.
 - » de raíz de brionía, IV, 214.
 - » de raíz de saúco, I, 332.
 - » de remolacha, I, 317.
 - » de regaliz vermífugo (Sorbi), IV, 215.
 - » de sangüesas (F. F.), IV, 215.
 - » de saponaria, I, 330.
 - » de sedo acre, I, 333.
 - » de siempreviva de los tejados, I, 335.
 - » de tabaco, IV, 213.
 - » de tanaceto, I, 343.
 - » de trébol de agua, I, 348.
 - » de tusilago, I, 350.
 - » de verdolaga, I, 356.

Zumo de verónica, I, 356.	Zumo de yerbas fundente (Honore), IV, 216.
» de yedra terrestre, I, 359.	» de yerba mora, I, 360; IV, 213.
» de yerbas (F. F.), IV, 215.	» de yerbas purgante, IV, 216.
» de yerbas antiescorbúticas, IV, 215.	» de yezgo, I, 360.
» de yerbas diurético, IV, 215.	» de yezgos (F. F.), IV, 215.
» de yerba escarchada, I, 359.	» de zanahorias (F. F.), IV, 216.

FE DE ERRATAS.

Tom.	Pág.	Col.	Lín.	Dice.	Debe decir.
I.	XXIX	2. ^a	37	3jß	3ß
I.	101	2. ^a	23	contra la amenorrea	y antibistérica
I.	144	2. ^a	6	A.	A. Jarabe
I.	147	2. ^a	17	no astringente	astringente
I.	159	2. ^a	3	1 por	1 de bulbo por
I.	159	2. ^a	22	vinagre	vinagre de colchico
I.	262	2. ^a	20	Piel	Miel
I.	289	2. ^a	26	piño	pino
I.	291	2. ^a	29	Pomada.	Polvo.
I.	422	2. ^a	38	Salvia	Savia
II.	27	2. ^a	17	MERCURIAL	MARCIAL
II.	31	2. ^a	20	HIDRIODATADA	IODURO
II.	77	2. ^a	45	hidrosulfato de sulfuro	hidrosulfato
II.	184	2. ^a	30	blanco	blando
II.	205	2. ^a	29	Tabasa	Tabasco
II.	234	1. ^a	37	oftalmias	amaurosis
II.	364	1. ^a	1	Otra.	I. ASTRINGENTE.
II.	378	2. ^a	19	Otro.	JABON AZUFRAO.
II.	453	1. ^a	5	anterior	siguiente
III.	84	2. ^a	22	sulfurosa alcalina	sulfurosa
III.	184	2. ^a	4	ßij (1000 gr.)	ßij (500 gr.)
III.	270	2. ^a	6	Otras.	P. DE GÁLBANO COMPUESTAS.
III.	307	1. ^a	35	Otras.	P. TÓNICAS.
III.	439	1. ^a	40	3ß	ßviiij
III.	445	2. ^a	27	Otro.	P. EXPECTORANTE Ó QUERMETIZADO.
III.	483	1. ^a	33	Otra.	POMADA AMONICAL.
III.	514	2. ^a	30	5ij	ãã. 3ij
III.	535	2. ^a	3	Otra.	P. OFTÁLMICA.
IV.	73	2. ^a	22	ßjß	ßijß
IV.	86	2. ^a	36	de los oidos,	dolores de los oidos,
IV.	224		25	Falta: Aguas minerales sulfurosas.	Generalidades.
IV.	295		5	estos	los de Fuensanta.







