







舌胎焦黃。體若大燿。神昏氣促。予曰。此仲景傷寒熱症也。邪在陽明少陽二經。其危不啻風中。爰胡時師不認症。察脈徒以夢遺受病。率投補劑。無恠乎轉治轉劇也。幸予至。設遲一日。大事去矣。用石膏五錢。柴胡知母各三錢。炙甘草白芍藥枳殼桔梗黃芩天荅粉各一錢。粳米一撮。急煎飲之。夜半熱稍退。神稍靜。脈之仍數甚。繼以前劑進。天明乃得睡。覺而熱退神清。瀉止。噉寬。惟口尚渴。再用柴胡一錢五分。白芍藥麥門

冬知母各一錢。石膏三錢。甘草五味子各五分。
人參七分。服之。舌潤渴止。餘熱盡退。粥飲始入。
漸向安矣。次日忽兩足指前一截痛如犬噬。不
能耐。以野蓼握入。明礬四兩煎湯薰洗。痛勢
稍緩。又以薏苡仁三錢。木瓜二錢。黃柏牛膝各
一錢。漢防已三分。一帖而愈。後又乾咳嗽。晝夜
不住口。喉且疼。胸脹而體畧熱。此為誤服。參耒
太早之過。用馬兜鈴百部御米壳各用蜜水製
過一錢。五味子甘草各五分。百合二錢。四帖而

愈。五十二

程松逸兄患酒疸。遍身皆黃。尿如糞汁。眼若金裝。
汗出沾衣如染。胸膈痞滿。口不知味。四肢痠軟。
脉濡而數。以四苓散加厚朴陳皮糖球子麦芽
葛根。倍加青蒿水煎。臨服加萱草根自然汁一
小酒杯。四帖其黃渙然脫去。五十三

太學岐原門下幹人名仲諫者。患跨馬瘡。大發寒
熱。紅腫疼痛。嘔惡不納。飲食。外科醫。月餘腫痛
日加。飲食日減。肌肉日消。精神大備。不能起。止。

岐原邀予脉之六部數而無力形氣殊不勝息時
有專科唐氏為渠調劑將進予詰何劑唐曰真
人活命飲也曾服四劑今始加大黃予復詰曰
前此何劑唐曰敗毒散黃連解毒湯予曉之曰
此皆治初起有餘之疾據今症乃氣血不足
者法當大補托而出之庶保終吉唐曰凡此為
實痺為虛今痛正盛脉正數飲食且不進大補
必加飽悶飲食何由進熱毒何由出也予正色
語之曰素問云數脉所主其邪為熱其症為虛

今痛極者皆由寒涼敗毒之劑傷脾胃凝氣於
故飲食減而痛增也又以敗毒之劑進是鴆之
爾安望膿出而全其生乎唐曰補劑迨膿潰之
後或因膿清而後用之今膿未出安可謂虛而
補之吾為專門不敢任其責予顧岐原曰生死
在此一劑不可不慎彼謂膿未出無補理彼排
膿內托散十全大補湯非外科急劑乎大抵凡
病寧使有餘後欲剝之迺為易易今狼狽若此
再株守成法剝削後何以措手岐原曰井蛙之

見豈知有天。惟收命劑。予用黃耆三錢。人參二錢。川芎當歸各一錢。白芷官桂甘草防風各五分。急煎飲之。一帖痛止。而精神回。飲食進。再劑而膿潰。十帖肉生。能動止矣。唐廼拊膺嘖。又語同列曰。今而後知補劑能出膿而加食也。吾儕外科當永識此以為法則。五十四

一婦咳嗽。痰中有紅大便。一日五六度。惡心飲食極難下。鬲總下鬲腹中即不安。立時欲瀉。必盡瀉出乃止。肌肉消瘦。下午發熱。熱將發時四肢

先麻。兩足膝皆戰搖。兩寸關脈滑數。兩尺沉細。此虛中有食積。痰飲之候也。脈雖數。午後雖發熱。不敢輕用寒涼。特為溫補。下元庶閔門有守。瀉可止也。山茱萸兔絲子人參破故紙杜仲山藥茯苓澤瀉桂心砂仁。服下甚安。四劑後。下體不戰。搖矣。但飲食腹中微疼。即欲登廁。前方減去山茱萸。加白朮肉果木香八帖愈。五十五
放姪煌。春溫後。忽鼻衄。寒戰。小水不利。舌上焦黃。目珠極紅。六脈伏而不見。舉室惶又。予曰。此作

汗之兆。由熱極使然也。因先時汗未透徹。陽明
餘熱在經。迫血上行。越出鼻竅。故有此症。以石
膏滑石生地黃升麻赤芍藥牡丹皮麥門冬天
荅粉甘草煎而服之。汗出如兩。直至兩踝。舌潤
而胎盡退。衄亦止。目珠色淡。脈乃漸出。改用人
參麥門冬三味。子白芍藥甘草知母黃芩柴胡
竹葉石膏服下。大便原方。日未通。今亦始行。精
神大轉。飲食亦漸進矣。五十六

富陽汪氏婦對河程門女也。年僅三八。經不行者

半載。腹大如斗。堅如石。時或作痛。里醫盡技以
治。月餘弗瘳。乃舉歛友為翼。又治月餘。腹轉脹
急。小水涓滴不通。乃倣予治孫仲閻法。而用濕
補下元之劑。則脹急欲裂。自經求畫。文學南瀛
憐之。薦予診其脈。兩關洪滑。鼓指按之不下。迺
有餘之候也。症雖重。枕可生。詢其致病之源。由
乃姑治家嚴而過儉。其母極事姑息。常令女童
袖熟鷄牛古之類。私授之。因魅食冷物。積而漸
成鼓脹。前任事者。並不察病源。不審脈候。誤作

氣虛中滿治之。脹而欲裂，宜其然也。乃用積塊丸三下之，而脹消積去。後以丹溪保和丸調養一月而愈。積塊丸列赤水玄珠第五卷虫蠱後五十七。

族侄孫仲登，因與堂兄構訟城中，方歸時，值二月未旬，醉後房事二起，而小溲隨即躋下，作痛水瀉，腸鳴一日十數度，發熱頭痛，里醫進理中湯一帖，反加嘔逆煩躁，口渴，敷予胗之。左脉絃大，右洪大，俱七至。飲食不能下咽，晝夜不得睡，面

赤唇燥，舌上生胎，深厚，胗畢，語予曰：我房失後，陰症傷寒也。小腹痛且漏底，幸叔祖救之。予嘆而應曰：以子所言，決為陰症。以予指下辨之，當是春溫陽症也。且外症亦陽，烏得為有房事而遽以理中進之乎？族中相知者，交為予言。渠病的屬陰症，故嘔吐水瀉，不可因其面赤，便認為陽。顧戴陽症與此近，但幸加察之。吾輩正擬於理中湯內，再加大附子肉桂，庶可保全。予極言不可。仲景有云：桂枝下咽，陽盛則斃。况附子理

中者乎。陰陽寒熱之間辨之不真。生死反掌耳。茲當舍症而從脉也。以温胆湯加姜汁炒黃連。柴胡乾葛與二帖。囑令當夜飲盡。俾明日不它傳也。予別後。渠一服而嘔逆止。餘症悉在。詰朝予診。竟如渠曰。夜來二藥必未服完。不然何兩手之脉洪大。搏指如走。僉曰。因有竹茹黃連。恐非房失。後所宜。故僅一服。予曰。不服黃連。致熱轉劇。今日非石膏不能已。乃與白虎湯加竹茹兩劑。臨別囑渠曰。今之症非昨日可比。用石膏者

豈得已哉。設當用不用。使經中之熱傳入於腑。非大黃不能療。切勿失。時誤事。詎知別後又有惑之者。仍只服一帖。即隨止。餘小腹之痛。其在次日予診畢。語渠曰。昨臨行時。囑之再三。何乃又不服完。今脉洪長堅硬。邪已入腑。柰何柰何。對曰。衆謂石膏太寒。恐小腹加痛。實只服一帖而已。予曰。懼服石膏。今且服大黃矣。皆失時。誤事之過。周金人銘云。熒又不滅。炎炎柰何。其斯之謂歟。思非桃仁承氣湯不可。乃覲面前服。

連飲二劑。下極黑。燥糞五六枚。痛熱俱減。再為
診之。六脉皆緩弱。是病方盡。去改以四君子
湯加白芍藥黃連香附。調養數日而愈。五十八
汪希明。竹山大長君也。年弱冠。性多躁。素有痰火。
舊曾吐紅。張醫用收滋之劑太早。以致痰與瘀
血留滯經絡。釀成痼疾。恬不知覺。且為灸肺俞
膏盲。撼動前疾。止澁無功。滋陰作壅。咳不能睡。
又誤作風邪。而投發散風劑。不思火盛得風。其
勢愈熾。血從口鼻噴出。勢如泉湧。延予為治。

部洪數。身熱而煩。又時當三伏。內外之火夾攻。
縱體質剛勁。寧能堪此銷鑠哉。予思非釜底抽
薪之法。難奪其上。湧之勢。乃以三製大黃三錢。
石膏五錢。黃連苗根。滑石各二錢。牡丹皮一錢。
急煎飲之。大便微行二次。血來少緩。即用石膏
滑石冬青子各三錢。旱蓮草苗根各二錢。黃連
山梔子貝母各一錢。甘草五分。茅草根五錢煎
服。血乃全止。三日後大便結燥。火又上逆。咳
連聲。左關脉絃勁。右關洪滑。與當歸龍會丸下

之而咳始緩改以瓜苗杏仁苗根各一錢五分貝
母阜蓮草麥門冬知母各一錢白芍藥二錢黃
連黃芩各七分青皮甘草各三分仍加茅根後
每遇大便燥結即進龍會丸。迹此調理三月大
定半載全瘳。書云病有六不灸。火盛者不灸。此
由誤灸幾於不保。故特識之。以為好灸者龜鑒。
五十九

德興文學祝弘君公。祝令君叔祖也。在休甯。偶有
陰陽之患。子午潮熱。咳嗽痰多。汗流不止。胸膈

不暢。大便燥結。動作一乏。口渴。以貝母知母瓜
蒞仁桑白皮各一錢。白壳黃連麥門冬各八分。
桔梗柴胡前胡各五。甘草三分。五味子十一
粒。服下。五更微汗。始一十之七。惟痰嗽喘之。改
用瓜蒞仁二錢餘。如六。外以七製化痰丸。夜服。
熱盡退。渠甚喜。以為亡。是以往。可勿藥矣。予曰。
未也。據脉絃數。不減。恐防作瘧。公未為然。予適
東行半月。書報瘧作。咳嗽轉加。所出皆黃粘老
痰。予曰。書云無痰不作瘧。仍用前方。倍加柴胡

貝母為君。加烏梅一介。四劑霍然。良已。公曰。翁之視疾。應若桴鼓。古云。智者不治已病。治未病。五。於翁言徵之。廼以是備言。祝令公。祝令公喜。曰。孫君匪獨得岐黃正脈。其雅誼足稱。叔祖尚。亦前聞。予當賦詩。以贈。於是欣然。手書若干律。以授余。其詩附後第六卷。

汪宥翁年八十有一。因勞倦感冒。胸膈大熱。而痞。口渴。舌上胎白如粉。咳嗽。夜不能睡。此少陽症也。柴胡一錢。桔梗一錢。枳殼一錢。竹茹一錢。知母各八

分。酒連酒。天荖粉各七分。甘草四分。姜三片。服下。乃得睡。口仍渴。痰仍嗽。前方加半夏。麩夜。與二母丸。治其熱嗽而愈。六十一

汪鍊兄內人。經水久不止。內有紫黑血塊。今則胃脘胸腹皆痛。玉戶且腫。手足皆冷。絕不知餓。臍腹之下。有一塊。堅如鉄。脈左數。右沉澁。此血瘀症也。用糖毬子五錢。玄胡索五錢。靈脂香附。麥芽青皮各一錢。水煎服。夜即痛減其半。手足漸溫。後加丹參。川芎。蒲黃。益母草。當歸。四帖而痛全

正。至戶亦消。再四帖而經調。六十二

程相如。文令政。孕四月。頭疼。遍身皆痛。腰痛更甚。惡寒發熱。咳嗽。口渴。六脉浮數。呂小柴胡湯加防風羌活葛根姜朮煎服。夜忽大發寒戰。繼而發熱。五更又發戰。告急於予。予曰。此作汗之兆。俄而汗出口。渴頭疼。身熱皆減。惟胸膈脹悶。此胎氣上逼。而為子懸。以大紫蘓飲與之。紫蘓人參白朮茯苓甘草當歸陳皮大腹皮川芎白芍藥。服後身冷而汗出不止。胸腹脹痛急。呂奪命

丹進服。下嗒然。而睡。覺則痛止。脹消。始能進食。身溫汗止。駭駭向安。奪命丹用白茯苓牡丹皮。挑仁白芍藥桂枝醋水煎服。止痛如神。六十三

余文台。壯年咳嗽吐紅。腹中常痛。夜多口渴。夢遺。背心作脹。兩手脉短弱。兩關絃大。左尺弱。右尺滑。大心血不足。中焦有痰積。膈間有瘀血。陰分有淫火。乃先為清肅上焦。用山梔仁牡丹皮丹參茯苓甘草貝母橘紅益元散。服十帖。背脹漸消。惟咳不止。改用黃芩杏仁半夏麴益元散。黃

連瓜蒌仁其平十帖而嗽止。惟腹疼不除。再呂
遇德丹全丹溪保和丸進之。大便下稠積痰多
甚。後呂人參白茯苓白芍藥紫苑知母麥門冬
甘草當歸五味子調理而愈。六十四

邵伯成丈。大令愛。經水適行。洗浴後感冒風邪。誤
服人參補劑。大發寒熱。嘔吐煩躁。隨即口噤。心
煩不安。循衣摸床。時當仲夏之晦。予謂上焦有
痰。因誤補故阻滯其氣道而然。與加味溫膽湯
半夏四錢橘紅二錢白茯苓枳實竹茹麥門冬

名一錢益元散三錢生薑三片。水煎飲之一帖
而安。後稍勞。復頭疼。痰火上衝。背脹腰痛。以紫
胡薄荷甘草枳壳桔梗酒芍桑皮半夏麥門冬
山梔仁茯苓生薑調養全愈。六十五

金氏婦。蘓雙泉之親媽也。舊秋患崩中。愈後方百
日。時值上巳。因洗浴受風邪。外寒而束。內熱前
後心脹。四肢腫痛。面有浮氣。惡寒發熱。呵欠不
時。大小便欲行不行。口內常甜。六脉浮大而數。
以柴胡紫蘓麻葛桔梗枳壳大腹皮厚朴酒芍

姜黃。服下夜得微汗。胸腹稍安。四肢仍脹。再加
蘿蔔子進之。覺煩躁。且醋心。改用二陳湯加香
附大腹皮桑白皮。至女連枳壳山梔子各八分。益
元散二錢。薏以仁三錢。吳茱萸三分。服下。四肢
消半。面氣全消。覺腰疼。暖氣胸高。嘈辣。用六君
子湯加薏以仁姜連厚朴知母澤瀉鬱金砂仁
枳實。調養半月。四肢悉平。嘈噤尋愈。六十六
文學張雲門三令郎。丁年偶發寒熱。右脇有一塊
隆起疼痛。不可近。下午至夜尤甚。額顱手心

上脈在。陰洪滑。兩尺尤有力。日夜不得睡。迺
倣推氣散例。姜黃桔梗川芎各一錢伍分。枳實
二錢。白芍藥一錢。粉草五分。姜東煎服。外與當
歸龍會丸。其夜大便行一次。頗得睡。三更後先
發寒戰。徐熱。至五鼓微汗。而脇疼寒熱悉減。再
診之。左脈畧絃。舌有黃白厚胎。兩脇重按微疼。
便燥結不行。以小柴胡湯減半夏倍加瓜蒌
蜜甲牡蠣。脇疼全瘳。畢丸畧硬痛。彼自以為無
恙矣。予語渠姐夫徐仲子偉曰。病先起脇下。顧

下為肝之經。後及舉丸硬疼。其舉丸亦肝之
地。論熱未盡。徹故也。而彼已厭藥。以小愈為
全。出淡旬。必有音疾。徐仲子曰。音者若何。

君性急好勝。倘勉強作文。遇勞而發。增

非瘡。囊癰也。予倘東行。子宜識之。別

作文。夜發寒熱。囊漸腫大。其熱如

勝之六部皆數。兩尺且近於洪。知其

貴。後已。彼心甚恐。予曰。無傷。易與

返魂湯加金銀荅為君。兩帖而膿

潰。丹加人參。又兩帖而肌生。十日全愈。方用何

首烏赤芍藥當歸小茴香甘草節木通金銀荅

貝母枳壳白芷。水與酒共煎服之。此方加獨活

治流注尤神。六十七

朱宅內眷。孕已八月。因送殯受驚。胸膈脹悶。嘔逆

不入食。城中時師認為外感。為之發散。嘔惡愈

劇。舉家恐胎有動。延予診視。兩寸脉皆洪滑。兩

尺弱。此亢上不下之候。胸膈脹者。蓋由子懸而

然。此一劑可瘳也。夫曰胎婦難任。峻劑覩其嘔

惡之狀。脹悶之勢。時刻不祗。一劑曷愈。予曰。請試之。與溫胆湯。加姜汁炒黃連。大腹皮。水煎成。送下姜汁益元丸。果一帖而嘔止。高寬即能進食。午後酣寢。貼然若未始有病者。其夫訝曰。溫膽湯何神。若此。幸詳其義。予曰。胎孕之症。重在足少陽。足少陽者。膽也。病起於驚。驚氣逆。痰隨胎氣上逼。故脈亢上不下。在難經為溢候。由木火之性。上而不下。經曰。上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者死。予故云。一劑可愈也。方名溫膽。

溫暖之溫。通溫存之溫。黃連竹茹
之火。全白茯苓而安心神。益元丸壓
下行。火下行而胎因之亦安矣。筠韋公
生認症真。故投劑確。非神乎藥。神乎用也。

不令愛。及筭後。患吐血。每吐碗餘。下午倦怠。
潮熱。嘔吐不食。大便秘結。時師視為陰虛。
投以滋陰之劑。反加飽悶。背心脹痛。予診
脈。寸洪大。兩尺弱。知其有瘀血凝滯。以致

五不得歸經。故滿而溢也。法當消瘀為主。用
芍藥枳壳前胡益元散桃仁紅荅牡丹皮山
貝母水煎。臨服入蘿蔔汁一小酒杯。服後
如舊。大便仍秘。乃以龍會丸通之。更以石
二錢。橘紅半。夏麴。姜連。茜根。竹茹。黃連。枳壳
錢。白茯苓八分。甘草三分。服後大便行三
止。食進。後用二陳湯加滑石。丹參。丹皮。茜
芍藥。香附。二十劑。後經行。熱退。背脹悉愈。
經訣下二逆六十九

汪息石令堂。年可五旬。大怒後。小解。驀然暈厥。口
禁。牙關不省人事。以蘓合香丸灌之。而甦。左手
右足疼痛。不能舉動。用二陳湯加酒芩。五加皮。
秦艽。石菖蒲。防風。蒼朮。以仁紫。荆皮。四帖而愈。七
十

族姪孫君實。壯年患遍身筋骨疼痛。肢節腫痛。其
痛極狀如虎噬。大小便起止。非三五人不能扶。
諸痛處熱如火燎。食飲不入。呻吟床褥。已經二
候。有以疎風之劑投者。不應。又以乳香沒藥活

血止痛之劑投者亦不應。延予診治。六脉浮緊而數。予曰。此周痺也。勢甚惡。俗名白虎。慙節風。廼濕熱所致。丹溪云。腫屬濕。痛屬火。火性速。故痛暴猛若此。以生地黃。紅苓。酒苓。連酒栢。秦艽。防風。羌活。獨活。海桐皮。歲靈。僊耳草。四劑而痛減大半。再加赤芍藥。當歸。蒼耳子。薏苡仁。減去獨活。秦艽。又八劑全愈。七十一

葉子黑。內人患疫。醫為其汗。為其下。罄技不能起。屍寢者已浹旬。家事窶乏。亦不能復。叩醫。鄰人

覩其狀。以生死在須臾間。群然發善愿。科歛助其殯。歛之需。予聞為之。診六部俱微弱。不充指。右關稍滑。精神昏憊。僅一息奄奄。四肢冷厥。口渴。予診畢。語諸鄰曰。據症甚危。據脉邪已盡退。惟虛憊而神氣弱。非大補不能也。諸君苟能以助殯者。其市人參。庶幾可起死而還之生也。諸君既其死。寧不以冀其生乎。予非毫有希。覬顧渠力不贍。願與諸君共圓滿好生善果耳。諸鄰固有善心。激於余言。益忻然相語曰。惟先

生命。即以六君子湯加歸芍補氣血而化痰涎。以麥門冬、五味子復脉通心而生津液。以桂枝溫其四體。午刻進藥。晡刻四肢漸暖。精神渙發。尚無力開聲。改以生脉湯加遠志歸芍以仁山燕窩調理。而愈。諸鄰人大快。七十二

孫如亭令。少年過四十。眼偶赤腫。兩太陽疼痛。大便不行者三日。平時汛期一月僅二日。今行四日。猶且未止。里有開化余雲谷者。自謂眼科捷手。醫治踰候。腫赤不消。而右眼內眦突生一白。

卒死。無憾。予諭之曰。據痛雖甚。眼則不堅。顧今日。適屆冬節。禮曰。先王於至日。閉關。安靜以養。微陽。曷敢以大寒峻劑。而汨天和乎。設不得已。只須柏樹東行根。上白皮一錢。長流水煎飲之。一服可愈也。夜已二鼓。覓而煎服。天明瀉三五行。痛減大半。仍與小建中湯和之。痛又旋減。惟臍下尚不脫然。常以熱手重慰之。大便欲行。及至廁則又不解。知其血少而氣不調。用熟地三錢。白芍一錢。杏仁二錢。烏藥一錢。木香五分。

水煎飲既下。黑糞甚多。十年腹痛沉痾。從此再
不復萌。此後勉坐常語。人曰。吾得孫公五神丸。
柏根皮。小建中湯。三法。不啻脫胎換骨。數年。豈
惟飲食增加。即步履輕便。捷若少壯。皆孫君
賜也。親友有求其三法者。昇而服之。捷若桴鼓。
彼家謂予。殆三生夙緣云。七十五

黃貝子。產未彌月。醉犯房事。血來如崩。執不
可遏。發熱頭暈。大小便俱熱。六脉洪大。以竹茹
黃白芍藥各一錢。香附茯苓側柏葉青蒿各

七分。甘草炮姜艾葉各三分。血止大半。腰猶脹
痛。下午胸高飽悶。改以川芎五分。當歸茯苓破
紙蒲黃香附各八分。姜炭甘草各一分。陳皮
一分。人參一錢。服此血全止。腰痛亦愈。七十六
程心章兄。類腮紅腫。嘔惡發熱。不能進食。下午煩
躁。口苦。夜不能睡。六脉洪大。此俗名鷓鴣瘟。是
也。迺少陽陽明二經之症。法當清解。以柴胡黃
芩各二錢。乾葛竹茹半夏麴各一錢。黃連枳殼
各七分。甘草四分。一帖而瘳。其半再服。腫消食

進而安睡矣。七十七

程六十者。原有喘嗽。今腫發於面。四肢俱浮。大便溏。小便少。時多怔忡。此痰飲症也。以旋覆花湯加桑白皮。葶以仁主之。旋覆花桑白皮各一錢。半夏人參橘紅茯苓各七分。厚朴五分。桂心甘草各三分。薏以仁一錢五分。生姜三片。水煎服。一劑而怔忡除。四劑喘腫俱消。七十八

程七。護大發熱。背痛起於傷酒。醫治三月。反加裏急後重。瀉下紅白稠粘。中脘有塊。自鳩尾至道

百觥不辭。亦以是終為酒困也。嘔惡體熱。胸膈脹悶。腹中疼痛。大便秘結。飲食大減。茗之名醫。如楊調元者。橋梓悉方治之。已三月。或愈或否。延至深秋。肌瘦神瘁。日進米僅二合。胸脇脹。腹中痛。漠然畧無所減。憊然而不可支。兩足皆有浮氣。歸謀於予。左脉沉絃而數。右關結實。大如碧豆。因詰其在。若所服之劑。荅曰。彼謂姪孫稟薄肌脆。宜當理脾。向服多理脾之劑。予曰。否。子所苦者。胸脇脹悶。腹中疼痛。大便秘結。其累大

血後當從滋陰降火之治。逾兩月。盡其法而罔效。反加喘促。洩瀉。辰巳二時發熱。煩躁。師告彼窮。謂喘咳。迺火刑肺金。洩瀉。迺脾胃已蕪。保脾則火愈熾。而喘咳增加。滋陰則洩瀉綿綿。而元氣下脫。經書所記。咳而下洩。上喘者死。此症之謂也。但無可奈何矣。語。見泪潛潛下。予觀其神。神之狀。心不覺惕然動也。市去渠宅五里許。即步去一視。觀其面青。喘足。擡肩擷項。息息連身。而倒。脇背俱疼。日夜不。所伏枕。脉之左澁。右上。

關滑大。脉畢。顯。上兄猶泪盈。昔予撫其背曰。

泪尚可生也。適。而仲子同視。詰予曰。症若此。

予曰。可生何也。丁曰。是非汝所知也。第觀予。

侯奏功。當語汝。以紫苑。茜根。牡丹皮。桃仁。益。

元散。桑白皮。茯苓。令。桔梗。瓜。萋。仁。桂枝。白前。水煎。

臨服加。韭菜汁。干酒杯。服後背脇痛止。瀉減半。

迺得睡。但咳而聲啞不除。次以杏仁。桔梗。紫苑。

甘草。白前。五味子。瓜。萋。乾姜。欵冬。冬。冬。半夏。麴通。

草水煎服。服後聲漸開。瀉全止。惟嗽尚多。再。

半夏麴桔梗茯苓陳皮甘草杏仁桑白皮白前
以仁白芍牡丹皮水煎後以丹溪治嗽吐方用
瀉白散加青皮人參白茯苓五味子調理全愈
次年誕一子是倏也徐仲子之功居多蓋金為
徐仲子友也徐仲子治疾多竒中迺篤信予而
推轂之初投劑人多置議仲子獨贊之曰其必
有見也人人辟易彼許可生安得不望生哉故
金任之不貳功成余明甫查仲修問予曰病起
於吐紅發熱煩躁喘咳皆是火邪前後之師滋

陰降火藥法亦未爽然而病轉增劇其故何也
予荅曰醫不難於用藥而難於認病余明甫查
仲脩曰市人議先生治疾多不循方每每師心
金之倏人皆市為火症而用寒涼先生獨用溫
熱雖成功小子竊為先生恐予曰病原於火其
勢之劇以治之太峻致然夫血之初來勢如湧
泉安能一吐遂盡必有餘血伏於經絡思不及
此而以大寒之劑一帖而止夫大寒之劑豈能

血適

血耳血凝經絡滯於氣道氣滯

血凝日甚一日。氣滯又復生。痰痰與瘀血兩滯。經絡則肺氣不利。故咳嗽聲啞。不加察而為消痰。化痰導血歸經。又以滋陰苦寒之劑施之。則痰痰愈凝。而氣愈不利也。久則胃寒脾弱。反增洩瀉。晝夜喘促。不能臥矣。書云。上熱未除。中寒復生。而為陰盛格陽之症。故咳而嘔吐。予故始以桂枝乾姜之類。溫其胃。以桃仁薤汁丹皮。茜根之類。活其血。而消其痰。故喘止而瀉除。東垣曰。脾胃喜溫而惡寒。信不欺也。古謂藥不

執方。而貴合宜。方即兵家之陣圖。匠氏之規矩也。圖可授人。而不能授人。鬪匠可授人。規矩而不能授人。巧此岳武穆對宗。畱守云。運用之妙。存乎一心也。予遊方之外。亦不失方之內。惟不失方。竊謂知方。知方合法。豈區區能哉。觀古人治虛怯之疾。即不治之症。亦能延之三五載。迺今治虛怯者。不半載而竟殞逝。猶駕言曰。殆今之天元運氣使然。故人多不壽。愚謂天元運氣。則人人皆如是。夫何予母八十有六。予父踰八

望九。予伯母今九十有五。予表伯汪春元東台
之父。年九十餘。疆健不啻少壯。不思速天之由。
皆為滋陰降火之悞。而反歸咎於天。天何尤哉。
緣滋陰降火之法。起於丹溪。繼而王節齋。何大
英之流。倡而和之。以成其風。此當今之大弊。而
人未之警也。我師祖汪石山先生。揭而指之。惜
乎未有繼其言者。一齊衆楚。故滋陰之禍。流而
迨今。救以繼救。無已時也。二三子其識之。徐仲
子其聞之乎。仲脩又問先生何以認是症為中

寒而非陰虛之火。而又認其喘為瘀血也。予曰。
脈與症皆可考。脈經云。澁為氣滯。氣滯則血凝。
盛吐之後。大寒之藥。一帖而止。其未盡之餘血。
為寒涼所凝滯于氣道。為喘。書云。從前來者為
本。從後來者為標。茲用活血消瘀。其本
以溫熱暖胃之劑。治其標。故瀉止而喘定也。若
夫陰虛火動之脈。迺細數之候。今脈滑大。非陰
虛之脈。陰虛喘嗽之症。潮熱於夜。兩頰皆紅。今
熱在辰巳。陽分。而面色帶青。由是以知其非陰

虛之火。逼候用寒涼。激其火而上行也。經曰。水流濕。火就燥。中氣既寒。火愈不能下矣。正如兩驟雷烈。則電光之火愈熾。日出而電光自息也。且陰虛火動。火起九泉。皆自足下湧泉穴起。以漸上升。今膝下冷而上身熱。兩尺脉又弱。蓋由咳而氣升。經曰。形寒飲冷則傷肺。肺氣為寒。藥壅遏不得下降。故咳而吐酸。丹溪纂要云。陰氣在下。陽氣在上。喘咳嘔吐。瀉白散加人參茯苓五味子青皮。故不從河間而用諸嘔吐酸皆屬。

即以六君子湯加。如補
仁石斛以歛汗。一進熱退
三進需需然精神長矣。可
歸。半月全安。先是祝令口
實。以疾辭不及赴。迨季春
賜一級寵。以冠帶扁額。用
後果三年而卒。八十四
孝廉方叔度。令嫂汪氏等
或補或消。或分利。或溫。

手而去。舉家惶惶無所適。昔患此。衆亦束手。比得孫皆歛衽欽服。仲閣伯仲適在發書會。予隨紹嚮往。診得左曰。此李東垣木香化滯湯。合如法按治。可保終吉。悉云不治。先生謂可保者疑殆。良工取焉。是照本方發四帖服訖。

於火之治。况今歲次

酉。水上衰敗之時。內

惡濕。濕多則瀉。濕則生

月令。一槩而用滋陰降

其疾之愈也。丹溪纂要云。實

痰之本也。遵而用之。如鼓

於用藥。而難於認病。有以

族姪合溪年當八旬。春初偶

與芎藭散。即汗出不止。既

續經旬汗日加。既日甚。延
力。重按三五不調。六七至一
語。嗣君敬所曰。尊翁由勞倦
大無力。法當從東垣補中
也。醫迺妄為表散。致汗漏
值此寧不殆乎。即可微俸
耳。敬所勃然俛而對曰。上
虞搆疾羸憊若此。苟保百
必盡。叔祖之賜多矣。若干

痞湯。琥珀調中丸。調理二月全瘳。叔度信予從
此始。每推轂予於諸相知。多有竒中。卒為通家
之好。八十五

昭溪吳天威丈。年七十有三。客邸遠歸。偶墜馬跌
傷。左脇作痛。隨治而愈。後半年。忽左膝腫痛。增
寒作熱。動止極艱。里中諸公有認濕痰者。有認
風氣者。有認濕熱者。總罔効。聞歛外科洪氏能。
且識雜病。迺以為治。居數日。視為疝氣。率投荔
枝核。人小茴香。川練子。橘核之類。痛噪不可當。

迺欲引繩自絕。諸子百般慰解。洪迺辭去。竟不知為疔疾也。其婿汪開之。予之表弟也。邀予診之。六脉浮而洪數。左尺尤甚。驗其痛處。紅腫光浮如靛。撫之烙手。予曰。此便瘡也。洪係外科專門。胡獨忽此。蓋渠素慎重。見患者年高。烏敢認為便瘡治哉。此殆千慮一失。母足悔。諸郎君聞予言。皆駭然。詰予曰。家嚴不御色者十載。顧安得此。願先生再思。予曰。此非近色而得。審臍屬足厥陰肝經。肝為血海。迺昔時墜馬。惡血消之。

未盡。瘀蓄經絡。無門可出。化而為膿。由年高氣虛。又被香燥剋伐太過。不能潰而即出。故散漫浮腫。觀其色。青中隱黑。膿已成腐。必須外用鏡針。引帶出之。內用千金託裏。庶可排膿生肉。但予生平心慈。不能用針。予弟警吾。外科喪手。可延而決之。至即以鏡針深入寸餘。出青黑膿五六椀許。臭穢難近。即語諸郎君曰。使早決三日。可免一月之苦。今即日大補之。非百日不能痊。此俗名石米瘡也。諸郎君及患者見膿色如是。

始信予言不爽。急以請劑。予廼用內託十宣散。參芪每帖三錢。後加至五錢。一日兩進。兩越月。膿盡肉滿而愈。一市稱奇。八十六

文貴者。善為族文學。岐原出入子母者也。寓長興。即中病。發熱晝夜不止。口渴。齒燥。鼻乾。舌胎黃。厚。不得眠。服藥不効。予適至雉城。岐原邀診之。脉俱洪數。嘔惡。胸膈痞懣。小水短而赤。大便下。皆清水。予以石膏七錢。知母五錢。甘草一錢。軟柴胡五錢。葛根三錢。黃芩二錢。枳殼。桔梗。竹茹。

各一錢。連進三帖。嘔惡止。胸膈寬。熱仍未退。無汗。瀉未止也。時有問予者。謂胡不用紫苓湯而退熱止瀉也。服石膏故益瀉耳。予戲之曰。子廼二脚搗耶。能認此為何症。而用紫苓湯也。仍以胡不膏各七錢為君。葛根知母各五錢為臣。黃芩甘草各一錢為佐。生姜五片。速進二帖。汗則津津然出。熱退瀉止。口不渴而眠矣。予因它往。留藥三劑。而囑之曰。胃氣初回。勢必思食。宜謹慎不可多進。若多則餘熱復作。必成食復。治

將費手也。慎之慎之後五日。果以食不慎而復病。予又至。熱較前為重。且加懊懣。夜譫語。如見鬼狀。口大渴。齒燥。舌焦黑。有芒刺。執危甚急。以兩方加枳實。梔子各三錢。淡豆豉二錢煎飲之。心懊懣止。餘症猶然。夜更甚。前方減去豆豉。黃連。麥冬。生地。白芍。一日二帖。舌以井水生。擦去黑胎。用蜜調玄明粉塗之。而胎去矣。服日始得微汗。諸症盡減。再四叮嚀慎飲食。調月而全。岐原問曰。人始皆認此症為漏底。

不用柴苓湯退熱止瀉。而用石膏湯。石膏收功。何也。予曰。此問甚善。蓋此症延少陽。陽明合病也。柴胡白虎湯。為二經對症之藥。服之可解肌熱。止口渴。然此湯為太陽少陽合病之劑。內有五苓散。是太陽經之裏藥。症非太陽。曷敢用之。且其內有人參。白朮。肉桂。皆助熱發燥之味。誤投則必發斑。其齒燥。舌乾而焦黑。又何敢用茯苓澤瀉。猪苓利之。使益亡其津液耶。古人謂以傷寒為

大病不察症而誤投。則生死立見。傷寒論有言。不得汗不得下不得利小便。是謂三禁。故曰少陽陽明不從標本。從乎中治。小柴胡白虎湯中。治劑也。人徒見其大便作瀉。為瀉底。不察瀉皆清水無糟粕者。為熱極所致。症迺春溫時疫也。但為發散。使清氣上升。而微有汗。瀉當自止。此瀉豈五苓散所能止哉。止則悞事。岐原曰。夜重如見鬼者。何以故。予曰。熱入血室。故也。岐原曰。男子亦有血室乎。予曰。血室男婦同之。衝任二

脉為血之海。二脉附於陽明。今病迺陽明之熱。遺入血海也。故加生地白芍而効。余治傷寒用柴葛解肌湯。及柴胡白虎湯。而熱不解者。加此二味。則熱無不退。汗無不出矣。且下午與夜又陰分主事。欲解血海之熱。必投此二味。以收其功。此亦予一得之愚也。岐原曰。善。願記之。以詔後來。八十七

鍾澤有程夢奎孺人者。年將五十。僅一子。念一歲而歿於痘。旦夕哭之。哀且彌月。攬鏡自鑑曰。何

子死而形色不瘁如此。因持鉄如意鉋其胸。絕粒斷漿。肌容日瘁。時為初秋。寒熱交作。嘔噦懊懷。遍身痠。夫為過延。胗視却藥不飲。諸醫百笑。開譬拒而不聽。媳與孫器而懇。姻族就而諭。其不納者。也。惟合曠以待死已。而作色語。其夫曰。瘵才。以曷不延名醫一決生死乎。夫曰。所延皆名士。病者曰。昔常聞程方塘叅軍患瘋三年。而起者誰曰。孫君。又問。吳西源孺人病。年與程道。以脊勞瘵。暈厥誰為

起之。七。前病者。不請孫君決我生死。

夫聞言。色。予。二日而後至。則薄暮矣。病者

猶疑為誕。一。私。至。三家訪予狀。皆曰。魁然長髯

者也。朝覲面胗之畢。則問曰。何日死。予應曰。

病勢危。去死不遠。病者喟然嘆曰。死不足惜。第

九華山香。恣未了。為恨耳。予曰。孺人大愿。不思

何須以此小愿為孜孜也。孺人曰。無大愿。予曰。

人之脩短有數。今年之瘵死者不可勝計。令嗣

之死亦數也。然有二孫可承宗祧。孺人能忍哀

撫孫使其成立。娶婦以蕃後胤。令嗣雖死。猶不
死也。而孺人亦有令名。若不此之思。憂傷以殞。
夫君必娶。娶必少年。繼室生子。則必厚其子。而
薄孺人之孫。晚娘晚爺之誣。獨不聞之耶。孺人
萬金之家。使令孫不得其所。令嗣九泉之下。恐
不能無憾。孺人憂死何益也。愿孰大於此者。予
故謂未之思耳。孺人試思之。誰輕誰重。當自辨
也。語畢。憮然曰。先生言至此。吾如寐者得醒矣。
顧病勢去死不遠。何能得如吾愿。予曰。所謂近

者病也。非脉也。脉左絃細。右關滑。故發熱體痛。
嘔噦。迺秋來癘症。非死脉也。若如前執拗不服
藥。不進飲食。書謂絕穀者亡。殆非虛語。孺人誠
聽予言。以二孫為念。以大體為重。予以活血養
血之劑而治。其傷損。以小柴胡加竹茹滑石。以
陰陽而止。其嘔噦。不一月而可無恙矣。奚憂
乎。果從予言而進食服藥。調理五日。寒熱嘔噦
皆止。後以丹參劉寄奴各三錢為臣。五加皮五
錢為君。香附一錢為佐。入四物煎服。果一月而

全可矣。程孺人病起。而聞者皆曰。七發起太子之病。觀於孫君益信。八十八

歛。潛口汪召南令郎。年十四。患蠱脹。大如覆箕。經醫三十餘人。見症皆駭而去。獨市之幼科汪養直者。調理數數。見效。第此子溺於豢養。縱口腹不守戒忌。病多反復。一日語召南曰。郎君之症。非侏之孫生生者不能成功。召南曰。聞此必多游吳浙。縉紳間。何可以月日致也。養直曰。歸矣。吾有妹適羅田。為方與石丘嫂也。舊歲患症。如

者豈有他腸。為郎君也。召南即浼羅田延予。予

至日已。晡矣。觀病者腹脹大極。青筋縷縷如蚯蚓。大上。寸胸膈至上腕而止。惟喜其不下現也。臍平。四肢面目皆浮大。兩足胫骨上各裂開。大出清水。一日間數為更衣。易被陰囊光腫如泡。淫淫滲濕。發寒熱。脉以手腫不能取。必推開其腫。下指重按。浮而六至。予曰。症可謂重之極矣。僅可恃者。目瞳子有神耳。餘皆陰惡。將何以治。

養直知予至。亟過相陪。宣言曰。病重不必言。引
領先生。欠欠。為投劑。生死無憾。予曰。且先為
理表。若表。稍得微汗。使肺氣必利。則小水可
通。乃南。請藥。廼用紫蘊葉蘊子陳皮麻
黃各一錢。桑白皮八分。防風杏仁各七分。炙其
草。枝各二分。生姜三片。水煎服之。五更。廼有
微汗。次早。面上氣稍消。胸膈青筋皆退。餘症雖
仍舊。訛括則可。一矣。仍投前藥。次日。腹與四肢
皆有縐紋。唯。未利。廼改用破故紙蒼朮赤

苓。鴻桑白皮赤小豆桂心木香二帖。而。不
利。駸駸已。生意。廼以飲食過度。大便作瀉。
又以四君子湯。加以仁破故紙澤瀉山查砂仁
調理而全安。此症予閱歷者不下數十。然青筋
未有如此之粗。足脰出水有之。未有出水處如
鮎魚口之大。而取効亦未有如此之速。蓋此子
體未破而真全。故症雖重而收功速也。數十人
間有五六不能成功者。由其縱慾恣情。不守禁
忌。非藥之罪也。乃南昆仲見人談醫。輒以不佞

為稱首。予咲曰。君得無到處逢人說項斯者耶。
迺汪養直亦醫。嘗治中白眉。迺不收功於後。病者
不忌口過耳。於養直何尤。養直不矜已之功。亦
不恃人之功。所謂忠厚長者非耶。

岩鎮鄭景南。文病卧年餘。百治不效。昔體豐腴。今
瘦骨立。飲食少進。新都名士皆辭不治。其家聞
昔年方士蔡孺人。蠱症時師亦皆辭去。予為起
之。因徵予治。時則一月望也。診其脉。左絃大。右
關滑大。兩尺俱無。惡心。腹瘦削。狀如仰瓦。腸鳴

如雷。晝夜不住。小水不利。肌膚及眼珠色若黃
金。腹中有塊如櫟。動跳不止。足膝以下皆冷。飲
食不入。予詳思其病機。昔肥而今瘦者。痰也。形
雖瘦而目炯炯有神。先以五飲湯。姑試之以觀
其勢。再為加減。因用旋覆花八分。破故紙一錢。
肉桂三分。白朮茯苓澤瀉陳皮半夏各八分。生
姜三片。水煎服之。二帖。惡心腸鳴皆止。次早飲
食稍進。舉家欣忻。色喜。令岳程鍾山公於予為
石交。聞病有起意。心殊異之。不知為予。因而過

訪見予。拊掌大笑稱快曰。吾固知是公也。指其甥而語之。此即所嘗與爾曾言者。聞久為西吳縉紳返晉。不立忌。今歸誠吾婿之幸也。相與談對兩日而別。別之時。景南飲食稍加。小水利。肌膚面目黃氣退。漸生機。不虞逾半月。為拂意事所激。而心復。吐痰。不思飲食。家人驚惶無措。亟請千鈔。兩寸滑。右關絃勁。搏指。右關亦滑。大有方。兩尺沉微。予語之曰。病甚重。脉非前比。且丁。以萬全。許第盡吾心爾。病以藥力而回。君

之福也。時為七月之朔。予因是視七日。日進一劑。劑以人參陳皮半夏茯苓。附白荳仁黃連旋覆苓麥芽甘草與服。服三口。惡心止。大便有稠痰下。其中間有痰血。此皆七怒所致。故經云。怒則傷肝。甚則嘔血。并下洩。上吐。亦或有紅點子在痰中吐出。是其徵也。後改用六君子湯加麥芽黃連枇杷葉白扁豆調理。病勢駸駸向安。腹中如櫟之塊亦漸消去。大僅如指耳。肌肉亦生。能下榻舉足以步。市上之人稱奇。九後聞

新編三卷

服又

七五



