

1  
R229.5  
25

增訂  
驗方新編



3 2285 9747 6

商務印書館發行



校正 增廣 驗方新編序

子長傳扁鵲倉公謂其以禁方精方妙方相授受又備載醫藥已病之狀而孟堅藝文志醫經著錄者七家經方著錄者十一家古之重方書如此降至葛洪肘後思邈千金陸氏集驗外臺祕要著錄者亦夥頤不可枚數後世於方書不講倉卒無以應疾惟鮑氏所輯驗方新編爲時珍異病者按冊稽部按部稽症按症調齊至齊之得猶磁石之取鐵焉既簡既便亦精亦博特麻沙板行五歷訕闕字經三寫轉焉爲烏甚者漫漶不可識別恐如班氏所言以瘡爲劇以生爲死而說者遂訾古方不能已新病也爰覓初雕善本重梓之矚幸舍諸賢任校讐之役兒子席珍士瑜士珩左右襄助斬成善本印墨倭散診籍流傳庶幾僻陋傳舍荒寒鄉邑應病投藥易於施治則中流一壺嚮之殤子今之善民其功用何渠不若古昔諸書乎世有好方如國工聖儒者與置之青囊以時參習成倉公之藝則異日調者求書侍醫校錄此篇庶賴明哲而備祕府方技之采以傳視奕禩焉光緒辛巳仲夏合肥張紹棠識

吳刻原序

古方書如類證普濟本事方太平惠民和劑局方濟生方難峯普濟方皆爲惠人濟世之用宋董汲著旅舍備要方於用尤便顧其書多不甚傳豈古方今病有不相合者耶然則求其相合者而傳之爲不可緩矣驗方新編一書原分金石絲竹匏土草木八冊蒐羅甚富試之輒奇驗粵中人寶之吳紫石明府攜一帙來滬索閱者甚衆摺寄不能繼遂集資若干金重刻之邢君研田深於醫校勘極精審是書出而窮鄉僻壤馬背船唇無不可治之證其爲惠濟不亦大乎孫思邈嘗謂人命至重貴於千金一方濟之德逾於此故所著方書以千金名明府是編殆亦德逾千金矣近余感秀水王秋樵芹生昆季刻良方集腋合璧功用略相等與此則如王玉之

運也明府介無錫余君蓮邨徵序書以歸之同治甲子秋日吳縣馮桂芬序

## 番禺潘氏原序

昔陸宣公在南中撰今古集驗方五十篇惜今不傳而蘇端明復與沈存中撰蘇沈良方一書後人力辨非端明之筆顧端明雜著時言醫理於是事殆亦頗究心蓋方藥之藝術家能習其技而不能知其所以然儒者能明其理而又往往未經試驗卽謂方出存中而端明以博通物理而輾轉代傳其功豈遽出存中下宜迄今千百載以蘇沈齊稱矣明焦弱侯亦嘗欲集古雜記中諸藥方爲一書惜未成祇筆乘中載有數十條耳周樾園書影謂古人非自驗之方未必肯記之於集若依筆乘所載再爲推廣各分症類都爲一集勝刻快書清記諸鄙俚無用之書多矣此書亦不難成留心醫術誌之近善化鮑君成驗方新編一書刻於粵西其視葛洪肘后方孫思邈千金方未知如何而平易近人隨地隨時均可濟物予特重付剞劂以分貽四方諸君子庶益廣流佈更冀人同此心同此理俾立方者與余之願力引伸於不窮或又重刊以輾轉代傳於通邑大都以迄海澨山陬則彌溥功德於無量耳道光己酉小寒節番禺潘仕成識於粵東海山仙館

## 善化鮑氏原序

凡人不能無病病必延醫服藥然醫有時而難逢藥有時而昂貴富者固無慮此貧者時有束手之憂爲方便計自莫良於單方一門矣單方最夥選擇宜精果能方與症對則藥到病除無醫亦可余幼時見人有良方秘不傳世心竊鄙之因立願廣求不遺餘力或見於古今之載籍或得之戚友之傳聞皆手錄之久之蒼萃甚富各門俱備乃刪其不甚經驗及數方相同與夫貴藥不能力致者今之所存期於有是病卽有是方有是方卽有是藥且有不一錢而其效如神者雖至窮鄉僻壤之區馬足船唇之地無不可以倉猝立辦頃刻奏功區

區救世之苦心校讐不倦寢食與俱蓋廿年於茲矣同人見之謂可傳世遂集資以付手民而志其緣起如此後有所得當俟續刻云道光丙午仲春月善化鮑相璈撰於粵西武宣官廨

### 凡例

一是編搜輯考訂垂二十年原委已詳序中其方雖未能一一遍試然偶一施治輒著神奇故敢付梓公諸同好

一是編期於穩妥外治居多即內治諸方亦經斟酌然後入選惟藥性未能盡諳如有紕繆之處尙祈高明正之

一膏藥之家喜服貴藥而庸醫每多迎合草菅人命恬不爲怪不知藥如對症雖搜勃亦見奇功藥不對症即參茸每多貽誤尤須炮製得宜分量較準方能奏效是編貴藥甚少多係眼前常用之物雖窮鄉僻壤購覓良便切勿以平易忽之

一是編隨手綴錄門類不倫有乖體例從俗便也識者諒之

一古今癰疽方書以古吳林屋山人王洪緒先生外科全生集爲最治疽之法尤爲千古獨得之奇其餘雜症諸方亦多神效編中採錄十之八九特爲隨症標明俾資擇用並將全生集序文凡例附錄於後俾閱者知其獨具隻眼濟世深心

一是編方多奇驗藥料亦價廉工省貧富皆宜家置一部最爲方便如能刷印施送較送善書經文功德更大若能釀金翻刻廣爲流傳或按方製藥施送濟世尤非尋常陰鷲可比好善君子尙毋忽諸

### 附內景賦

嘗計夫人生根本兮由乎元氣表裏陰陽兮升降沉浮出入運行兮周而復始神機氣立兮生化無休經絡

今行乎肌表藏府兮通於咽喉喉在前其形堅健咽在後其質和柔喉通呼吸之氣氣行五藏咽爲飲食之  
道六府源頭氣食兮何能不亂主宰者會厭分流從此兮下咽入膈藏府兮陰陽不倖五藏者肺爲華蓋而  
上連喉管肺之下心包所護而君主可求此卽膈中宗氣所從膈膜周蔽清虛上宮脾居膈下中州胃同膜  
聯胃左運化乃工肝葉障於脾後膽府附於葉東兩腎又居脊下腰間有脈相通主閉墊封藏之本爲二陰  
天一之宗此屬喉之前竅精神須賴氣充又如六府陽明胃先腐熟水穀胃腕通咽上口稱爲賁門穀氣從  
而散宣輪脾經而達肺誠藏府之大源歷幽門之下口聯小腸而盤旋再小腸之下際有闌門者在焉此泌  
別之關隘分清濁於後前大腸接其右導滓穢於大便膀胱無上竅由滲泄而通泉羨二陰之和暢皆氣化  
之自然藏府略備三焦未言號孤獨之府擅總司之權體三才而定位法六合而象天上焦如霧兮靄氤氳  
之天氣中焦如瀆兮化營血之新鮮下焦如瀆兮主宣通乎壅滯此所以上焦主內而不出下焦主出而如  
川又總諸藏之所居隔高低之飛類求脈氣之往來果何如而相濟以心主之爲君朝諸經之維系是故怒  
動於心肝從而熾慾念方萌腎經精沸搆難釋之苦思枯脾中之生意肺脈瀉而氣沉爲悲憂於心內惟脈  
絡有以相通故氣得從心而至雖歸藏之歸心實上系之聯肺肺氣何生根從脾胃賴水穀於廩倉化精微  
而爲氣氣旺則精盈精盈則氣盛此是化源根坎裏藏眞命雖內景之緣由尙根苗之當究旣云兩腎之前  
又曰膀胱之後出大腸之上左居小腸之下右其中果何所藏蓄坎離之交媾爲生氣之海爲元陽之寶關  
精血於子宮司人生之天壽稱命門者是也號天根者非謬使能知地下有雷聲方悟得春光彌宇宙

增校 正 驗方新編總目

卷一.....一

頭部  
面部  
眉部  
目部  
耳部  
齒部  
鼻部  
唇部  
口部  
舌部  
咽喉  
鬚部  
下頰  
頸項  
咽喉

卷二.....七

肩部  
手部  
腋部  
乳部  
胸部  
肋部  
心部  
肺部  
各種氣痛  
咳嗽  
勞傷吐血  
哮喘  
脾胃  
痰疾  
三消  
飲食積滯  
噎膈反胃嘔吐附  
呃逆

卷三.....二二七

肚腹  
瘡疾  
蟲疾  
鼓脹  
脇部  
背部  
腰部  
前陰  
小便  
淋症  
遺精  
後陰  
大便  
痢疾  
脫肛  
痔瘡  
兩股  
海底  
腿部

卷四(婦人科).....二〇一

調經(崩帶附)

種子

胎前

產後

雜治

難產良方

臨產急救補遺

卷五(小兒科)

..... 二七九

雜治

驚風

痘症

痲症

卷六

..... 三七一

癰毒

疔瘡

瘡毒

大麻瘋

遊風丹毒

疹風

瘤

痣

癰毒雜治

癰毒諸方

陰疽

內外備用諸方

卷七

..... 四七一

急救凡用環刺喉腫腸出瀉水凍死雷擊痰厥氣閉一切急症皆在此內

解救諸毒

誤吞諸物

煙酒醉傷

人畜蛇蟲咬傷

湯火傷

跌打損傷

刑杖傷

銅鐵竹木雜物入肉

中風

筋骨(皮膚病附)傷寒

感冒風寒

蛇狗咬傷補遺

跌打損傷補遺

卷八

..... 五四七

中暑

痧症

霍亂

瘧疾

黃疸

瘟疫

蠱毒

諸血

諸汗

遍身搔癢

邪怪

奇病

雜治

藥物備要

附愈病法



校正 增廣 驗方新編目錄

●卷一

頭部 新增治頭風各方 偏正頭風 尋常感冒風寒頭痛 雷頭風痛 熱痰頭痛 氣虛頭

痛 厥陰風火上衝頭痛 頭風目痛 終年頭似痛而非痛 腦後作痛 頭腦鳴響 頭腦暈眩

婦人血風頭暈倒地 搖頭下血 腦漏 腎氣上攻頭難轉動 頭面發熱如有光彩 頭面腫大

頭上生瘡如葡萄痛甚 頭頂結核如寡蛋響 頭頂生白色腫塊 頭頂生瘡喉有痰涎或能言或不

能言 髮中生瘡如珠 小兒頭面胎毒 頭面紅癩名曰石癩 頭上軟癩 頭上生瘡乾而無膿 千層

瘡 禿頭瘡又名鷹頭 落頭疽 頭角太陽生瘡色變青紫三日青至心胸而死 太陽出血 髮癩

髮落重生 髮易脫落 髮短而少 髮黃而赤 髮枯不潤 少年白髮 烏鬚黑髮 頭腦內癢漸

至髮落 頭生白屑癢極難忍增補瀧子神方 面上粉刺 面上雀斑 抓破面皮 玉容粉 面生縷

紋 冬天面脣縷破 面上黑氣 面黑皮厚 洗面光彩 腮邊酸痛發腫 腮類穿爛 面腮赤腫

小兒腮腫內有硬核

眉部 眉上生瘡 眉爛毛脫 眉毛不生 眉毛搖動晝夜不睡

目部 新增附後治產後疔風眼 偷針眼 目多 洗眼仙方 雙目不見 青光瞎眼 兩目忽然不見 鑽

精丹 小兒睡人不正 兩目夜不見物 風火眼痛 吹鼻散 肝熱目痛 腎虛目痛 目昏多淚

通治目疾諸方 兩目晝夜不閉 小兒疳積瞎眼生翳 珠目蟹眼 眼生蘿蔔花 眼生星翳

目中齧肉筋膜雲翳 眼中急起齧肉 目中生管 眼生紅子 目中流血 眼中癢極如有蟲行

眼中生蟲 眼邊生蟲 眼邊溼爛紅腫 眼漏流膿 小兒翳睛 眼邊紅腫發癢名倫 眼皮翻出

白眼珠忽然盡黑毛髮堅如鐵能飲食而不能言其形如醉 眼胞生珠生菌 眼胞痰核 眼珠無

故湧出垂下大便下血亦有不便血者 眼珠暴出 眼珠縮入 眼珠傷損 眼被傷損不開 箭頭

入目 蟾酥入目 泥沙入目 塵芒入目 飛絲入目 雜物入目 眼瞳成漏 拳毛倒睫眼毛顛倒

是者 眼中常見異樣禽蟲飛走 增補警目神方

耳部 兩耳聾閉 腎虛耳聾聲響如風水鳴如鐘聲聲 耳內時聞螞蟻戰鬪之聲時開時閉 耳閉不

通又作痛 少壯病後耳閉 風木之鬱耳脹欲閉 膽火上鬱頭重耳脹目微赤 耳鳴耳癢 耳疔

震耳癢耳停耳風耳 耳內膿血腫痛有虛有熱其症不一甚至夜難安枕 耳內膿血不乾 耳內有

蟲膿血不止 耳痔耳聾耳挺 耳內生疔 耳內生粒如棉花子大極痛難忍 耳內有核痛不可忍

耳內如有蟲走或血水流出血或乾痛難忍 耳內外生瘡 耳外溼瘡 耳後銳毒 耳下生瘡 耳

被挖傷 兩耳脫落並治 耳中有物不出 壁虎入耳 蜈蚣入耳 螞蝗入耳 蝨入耳 蛆蟲

入耳 飛蛾入耳 螞蟻入耳 諸蟲入耳 水銀入耳新冬寒耳凍

鼻部 新增鼻血不止 草覆丹 治鼻 鼻血不止 艾柏飲 口鼻流血 鼻忽縮入 鼻忽脫落 鼻孔爛

穿 鼻內生蟲 鼻中生瘡 鼻中生痔 鼻中肉塊名曰 鼻流清涕不止 鼻流臭水名曰鼻淵 鼻塞

出水不聞香臭 鼻塞不通 各項鼻病 鼻中生毛晝夜可長一二尺漸粗如繩痛不可忍 鼻垂紅

綫痛甚欲死 鼻大如拳疼痛欲死 諸物入鼻脹痛不出 鼻外生瘡 鼻梁窒痹 鼻準紅赤名酒

唇部 人中腫大 唇邊口角生紅白顆粒 嘴唇生瘡瘡內長齒 口唇腫黑痛癢不可忍 口唇四圍

瘡如黃蠟 口角生瘡 口唇赤腫發癢或破爛流水 口角四圍乾燥時以舌舐口水滋潤紅腫難堪  
口角流涎浸溼紅赤 口唇緊小 缺唇 唇破生瘡 唇邊生瘡多年不愈 冬月唇乾血出 嘴  
唇陡然翻突形如豬嘴

口部 口生肉毯有根如線捻之其痛入心 口內上腭生癰 上腭生蟲癢不可忍 口舌生瘡 口臭  
難聞 夜臥口渴喉乾 口角流涎浸溼紅赤

舌部 舌脹滿口 凡中木瓜毒其舌亦腫脹 滿口方見解救諸毒門 舌忽腫出口外 傷寒熱病後舌出不收 舌出口角時時搖動

舌忽縮入 舌上出血 舌頭潰爛 舌上生菌 舌硬生衣 舌下重生小舌 舌下細粒如豆

舌下生數尖或遍口生瘡如蓮花又如粟米 舌下腫痛 舌下痰包 小舌落下 小舌生紅泡子

補斷舌法

齒部 牙齒疼痛 玉帶膏 竹葉膏 陰虛牙痛 陰虛邪火上蒸 風熱上蒸牙脹頭痛 風火牙痛

蟲牙作痛 牙根腐爛 名走馬牙疳 牙疼腿痛 名骨腿牙疳 盤根牙癰 牙根腫痛 牙腮疼痛初起不紅不腫

久則潰爛或有骨出 火鬱牙痛結核齲腫 牙縫出膿 牙縫出血 滿口牙齒出血 輕粉毒發齒

縫出血 牙根齧肉漸長 齒長數寸 軟牙瘡 睡臥咬牙聲響 牙齒作酸 取痛牙法 牙齒稀

疎 牙門緊閉 牙落復生 固齒良法

鬚部 烏鬚法 拔白換黑 羊鬚瘡

下頰 下頰脫落

頸項 頸上生瘡大如櫻桃有五色者瘡破則頸皮斷 對口瘡 鯽魚膏 對口之上生瘡 頸項直硬

不能轉側 閃頸促腰

咽喉 咽喉辨治 單雙喉蛾 風火上鬱頸腫喉痛 喉癰治法 外纏喉風 內纏喉風 鎖喉風

小兒鎖喉風 腳根喉風 咽喉腫痛痰如鋸聲 喉腫心痛 閉目不語起首脈散牙緊發謔手足麻

木 喉間作痛爛不收口 喉內生癢鼻孔亦爛 喉瘡已破疼痛難食 飛絲入喉生瘡 喉癰 風

火喉癰 喉內生肉重重疊疊腫起不痛多日方有臭氣透出 喉中結塊水食不通 喉中忽硬一塊

如桂圓大吞吐不出不下 喉中生珠 喉中生瘤 喉間腫大又非癰瘤忽痛忽止外現五色按之半

空 喉中結氣如梅核樣時有時無 老癆喉痛 穢濁上衝咽喉腫痛 喉中作癢 喉症各方 喉

內戳傷飲食不下 驚嚇失言不語 忽然口不能言 咽喉聲啞 咽喉癢痛聲啞 陰虛聲啞 咳

嗽聲啞 喉外生癰 專治咽喉腫痛 喉蛾方 爛喉痧症極效方 新增喉癰腫塞 新增青芝散

新增奪命紅棗丹

●卷一

肩部 擔肩癰瘤 肩甲縫中積痛

手部 蛇頭惡毒生各指頭又足趾頭生者亦是

脫骨疽 甲疽又名杖甲

灌甲初起 油灰指甲 指頭麻木痛癢 指頭

畏冷 手足指頭羅紋生瘡 指頭生瘡 指甲下生瘡 十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠

毛 虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍 手丫枝痛不可忍 手指觸着衣服痛癢破爛 手

指斷落 手被咬傷 手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已 手指手掌皮厚如鐵 掌中紅絲

斷之血流不止 手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛 鵝掌風 手腕生物如豆紅紫疼痛

手臂生瘡腫大如拳 熱毒攻手腫痛欲脫 四肢節脫但有皮連不能舉動 手足作痛 手足生

瘡久不收口 小兒手軟

腋部肩下 腋下腫硬形如鴨蛋 腋下疔瘰音膿 腋下癰瘤 腋下狐臭

乳部 乳頭破裂 乳上溼瘡 乳頭生瘡痛不可忍 乳癰 乳癰多至二三百頭者 乳癰腫及頭面

乳癰日久腫痛不愈 乳癰久不收口 乳岩 男子乳忽壅腫如婦人乳 婦人乳忽縮入 婦人

產後兩乳長細垂下 婦人乳內吹氣有聲 婦人乳孔塞痛 婦人乳汁不通 乳汁自流不止 乳

多發脹 無子食乳腫痛難消

胸部 胸膈閉結不通 胸滿腹脹 胸前生乳 胸旁生瘡 龜胸

肋部 肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭

心部 心氣疼痛 心痛喉腫閉目不語 心氣怔忡 心胸煩滿 水停心中有聲如雷口眼歪斜不省

人事 心膈飽脹腹中又飢又痛 心中饑雜似辣非辣似餓非餓似痛非痛得食暫止或兼噉氣或兼

惡心 一切寒熱痰痞痞水食結住心胸 心下墜大如碗邊是旋盤 心疼忽長肉一條手不可近 心

口生疽 心窩成漏

肺部 肺癰

各種氣痛 心胃氣痛 香鬱散 銀黃散 薑附散 失笑散 腎氣上衝心痛 走注氣痛忽有一處

如打撲之狀痛不可忍走注不定靜時其處冷如霜雪 心胃蟲疾作痛 酒食凝滯攻衝作痛或有形

或無形鄉人稱為穿心箭痛

咳嗽 胸膈脹滿咳嗽不安 咳嗽痰喘 咳嗽氣喘 咳嗽氣喘遇寒即發 諸般咳嗽 肺虛咳嗽 肺痿

咳嗽 咳嗽痰血 寒咳 熱咳 咳嗽噎逆落枕即發 年久咳嗽 咳嗽噎逆 久嗽連至四五十

聲者 年老久嗽不能臥 咳嗽聲啞 小兒晝夜咳嗽食少髮黃  
勞傷吐血 勞症諸方 吐血治法 咳血 咯血痰帶血絲 驗癆蟲法 灸癆蟲法 治癆蟲法 童子癆

新增 咳帶血 血湧不止

哮喘 喉內有聲而氣喘者是 治哮喘妙法 新增哮喘各方

脾胃 惡心吞酸 胃口虛脹手足厥冷 涼藥服多嘔吐惡食 冷水服多 胃脘冷滯 脾胃虛冷不

思飲食 脾家冷積食後胸滿 胸胃積滯 胃寒嘔吐黃水 新增胃熱吞酸 胃氣痛

痰疾 新增回響湯 收呆至神湯 逐呆仙 痰凝 痰飲吐 中痰氣絕 下痰丸 茯苓丸 痰氣結胸 痰飲吐水 痰疾

癡狂 癡笑不止 羊癲風 增補痰迷譫語方

三消瀉而飲水不止為上消 飲水多而瀉作瀉為下消 多食易飢為中消 消渴飲水不止 多年消渴飲水百藥不效 飲水不止小便如膏 飲

水不止小便時流 久病消渴不止 消食易飢 腹中易飢食下片時即吐

飲食積滯 食積外治法 飲食凝滯作痛 飲食過多脹滿不安 魚肉積滯 食魚積滯 生魚積滯

食犬積滯 食牛腹脹 食鴨積滯 鴨蛋積滯 雞蛋積滯 食整煮雞蛋積滯 食鹽蛋積滯

食案粉涼粉積滯 食瓜菓腹脹作痛 食西瓜並諸瓜過傷 食荔枝腹脹 食菱角腹脹 食豆不

消 食麵不消 糯米積滯 飯食凝滯腹痛 食茶成癖 食積痞塊

噎膈 噎膈諸方 傷寒膈食 膈食初愈飲食宜少 反胃嘔吐 上吐下瀉 一二日一吐氣味變酸

一二日一吐或三四五日一吐飲食不飽吐物不化 朝食暮吐暮食朝吐 飢餓嘔吐 乾嘔不出

酒後乾嘔 食物下喉即吐 見食即吐 食後少頃即吐 嘔物不化 嘔吐清水 欲嘔而不嘔

口吐白沫欲嘔而不出 欲嘔而不嘔面紅流淚 聞藥即吐百藥不效 嘔吐不能服藥必有吐在胸膈 脾

胃虛弱食不消化 嘔吐痰水 新增治噎膈

呃逆 偶然呃逆 氣熱呃逆 陰寒呃逆 體虛常呃逆二三聲 呃逆日久不愈一連四五十聲者

新增治呃逆

卷二

肚腹 腹痛辨症 陰症腹痛 寒症腹痛 肚腹畏寒 熱症腹痛 蟲疾腹痛 大人小兒腹中疝疾

蟲疾作痛及男婦痞塊癥瘕各項肚腹脹痛 食滯腹痛 身受寒熱心腹疼痛上下關格不通大便閉

塞小便短澀渾身纏緊手足腰膝僵硬不省人事 忽然肚脹如鼓 腹中緊脹 肚腹麻木 忽然肚

黑 肚腹脹大亮如水晶 睛眼出膿 臍中出水 睛眼出血 肚腹堅硬睛眼出蟲 肚腹左右生

癰 肚臍生癰 少腹疽 小腸疽 臍下二三寸關元丹田二穴冷結小腹有形作痛 腸胃中癢不

可忍 治疝古方 疝積 治痞諸方 腹中堅如鐵石痛如刀割 腹中堅如鐵石臍內出水變作蟲行之狀繞身作咬痛癢

難忍掃撥不盡 婦人血蠱 髮癢好飲清油者是喉中 米癩好食生 肉癢常喜食 虱癢 蛇癢 龜鼈癢

蛟龍癢 腹脹面黃

蟲疾 寸白蟲疾 虬蟲上出口鼻

鼓脹附浮腫 鼓脹辨症 試鼓法 治水鼓法 水鼓小便不通 日滿開鹽法 治氣鼓法 治血鼓

法 各種鼓脹 食物積滯腹脹如鼓 肚腹脹滿飲食如常 十種水腫 通身浮腫 病後浮腫

脇部兩肋之下為脇惡人多有以 左脇有聲作疼嘔水 左脇鬱氣疼痛 怒氣動肝寒熱旬日左脇凝聚作

痛難以舒轉 左脇作痛 右脇有形攻心作痛嘔吐清涎週身寒凜痛止則無形跡 右脇脹痛不食

肝燥脇痛 兩脇不時作痛 脇痛連腰脊不能轉側 脇痛腸出臭穢 脇下生瘡 脇下漏瘡形

驗方新編 目錄

七

如牛眼 兩脇脹滿

背部 發背治法 背癱諸方 背熱如火

腰部 腎虛腰痛 腎虛腰痛脚軟 閃跌毆打腰痛 脾溼腰痛 腰腿風溼冷痛 男婦腰痛如刺面

腫而黑氣血虛憊髮落齒枯唾涕痰涎腰脊痛不能行 各種腰痛 纏腰丹 腰痛牽心氣絕欲死

前陰 男女交合精脫氣絕 陽痿陽物軟而不舉者是 陽舉易洩 陽物挺脹 陽物堅硬精自流出捏之則脆音

痛如針刺 癆病火動陽物易舉 陽強不倒精自流出 老人腎硬 陽物被捆腫大 飛絲纏繞陽

物腫痛 陽物縮入 陽物割斷 陰頭生瘡 陰毛生八脚虱 腎氣由臍下上衝心痛 小腹有塊

直衝心胸叫號疼痛止覺筋硬 小腸氣痛腎子腫墜 腎子痛墜外現紅色 癩疔重墜囊大如斗

疝氣腫脹如斗 腎囊腫痛如斗 陰囊奇癢不止 陰囊陽物肛門作癢 陰囊腫如水晶 陰囊忽

然腫大多因坐地所受風溼 陰囊扑損瘀血積滯 陰囊腫爛腎子落出 下部溼瘡 前後陰之間

生瘡

小便 小便不通 口渴小便不通 小便不通遍身水腫 夫婦交合忍精不放及強忍小便以致不通

或婦女轉胞小便閉塞 心熱如火一熱便入小腸大小便不快 小便不通氣衝心痛 小便白如米

汁 小便短澀渾濁大便多而瀉不思飲食 小便過多 夜睡遺尿 小便出血 小兒小便出血

小便出糞大便出尿 陰陽易病增補

淋症 勞淋 氣淋 熱淋 血淋 石淋 五淋通治 五淋痛不可忍日久不愈 陽物堅硬精流不

止痛如針刺 老人精敗淋痛 小兒淋症一日百餘次 增補石淋沙淋妙方

遺精 遺精諸方 疹後遺濁



後陰 截腸怪病 大腸蟲出不斷 肛門生瘡 蟲食肛門 糞門形如風癬作癢破流黃水浸淫遍體

肛門奇癢難受

大便 大便虛閉 大便熱閉 大小便閉塞不通 大小便不通尾脊骨上下左右疼痛 大小便熱結

不通 大便下血 大便下血百藥不效 大便下五色膿血

泄瀉 寒泄 熱泄 久泄不止 五更瀉瀉 老人五更泄瀉 老人虛瀉 脾虛泄瀉 腎虛久泄

脾泄不止泄出食物完穀不化 腹脹泄瀉不止腐物不化 泄瀉不止腹有硬塊不消 小兒水瀉不

能服藥 泄瀉口渴

痢疾 痢疾三方 微理妙論 裏急後重欲下痢而不出者是 痢疾先紅後白 紅痢不止 孕婦痢疾 噤口痢

疾 久痢不止 多年痢疾 霍亂吐瀉

脫肛大腸頭自裏門出者是 大腸脫肛不收 小兒脫肛

痔瘡 痔瘡難忍 痔痛難忍 內痔不出 內痔腫痛 內痔治法 痔瘡諸方

兩股 坐板瘡 股上生瘡

海底在肛門前陰根後兩相交界之處 懸癬

腿部 腳氣腫痛 腳氣外治法 腳氣衝心 腳氣腿脛紅腫 酒風脚 腿足腫痛拘攣 兩膝疼痛

膝上生癬 腿膝疼痛不能舉步 人面瘡 脚上轉筋暑天腹痛轉筋名霍亂症見霍亂門 腿痛轉筋氣衝入腹 腿

面癩瘡 腿脚浮腫破爛似癩瘡而非癩瘡 腿生瘡破爛多孔 腿足忽然紅腫熱痛或時上時下

或爛或不爛 腿面痛極不紅不腫 大腿內外生疽 小腿腿肚生癰 腿癢難忍 腰臀腿膝疼痛

不已 腿足不能起立能食易飢 兩腿不能動作臥牀不起

足部 足軟難行 腳氣腫痛 腿腳軟弱 酒風瘡 傷寒足痛 兩足痛如刀割 足生疔瘡 腫脹  
骨痛 脚上冷疔初起紫白泡疼痛徹骨漸至腐爛深孔紫黑色水腥臭日久不愈 內外脚踝生瘡  
脚甲腫爛疼痛 脫骨疽 脚丫奇癢難受 脚丫爛瘡 脚趾縫中生毛痛不可忍 脚根作痛 足  
生瘤如斗大 脚底瘡有細孔日久不愈 脚底生瘡 脚底生瘡穿爛 脚底皮肉生泡痛難行走 脚心腫  
起堅硬如鐵不能履地膝上毛孔時時流水身發寒戰惟思酒食 手足心俱腫 脚心生瘡 脚板色  
紅如火不可落地 脚底木硬 脚底開裂 脚上生瘻音 切忌用刀 脚生雞眼 行路脚底生泡  
遠行健步 脚臭脚汗 脚冷如冰

●卷四

婦人科調經門 不及期而經先行 經過期後行 一月而經再行 數月而經一行 經行或前或後  
經行或多或少 逐日經來幾點則止或五日或十日又來數點一月常三四次面色青黃 經行不  
止來往無時 經來不止形如魚腦足痛不能動履 經來不止形如牛膜昏迷倒地 經來不止或下  
血胞大如雞蛋割開內如石榴子昏迷不知人事 經來有白蟲如雞腸滿腹疼痛 經來成塊如葱白  
又如死猪血黑色頭昏目暗唇麻 經來結成一塊如皂角一條痛不可忍不思飲食 腹大如鼓經如  
蝦蟆子 經來如禽獸形 經來過期形如屋漏水頭昏目暗小便作痛更兼白帶喉中臭如魚腥惡心  
吐逆 經來紫色 經來淡色 經如綠水 經如黃水 經來脇內一塊作痛其色深黃 經來全白  
色五心煩熱小便作痛 經來疼痛小便如刀割 經來狂言如見鬼神 經來常嘔吐不思飲食 經  
來食物即吐 經來咳嗽 經來大小便俱出 經來腹痛 經後腹痛 經來潮熱不思飲食 經少  
腹大如漏胎狀 經閉不通 通治經閉 經閉腹大如孕 室女經閉遍身浮腫 室女因開甑爲熱

氣所衝面目腫大經水不通 婦女疝疾經水不調面色黃瘦咳嗽發燒或吐血或不吐血不思飲食精  
 神疲倦 經逆上行從口鼻出 經水從口鼻出咳嗽氣喘 經來房事相撞 血崩不止 老婦血崩  
 崩中漏下五色 崩久成漏連年不休 白帶白濁白淫 赤白帶下 赤白帶下臍腹疼痛 五色帶下  
 婦人科種子門 種子芻言 保命延生種子戒期 求嗣得孕法 種子諸方 子宮寒冷不能受孕  
 婦人科胎前門 保產諸方 孕婦惡食嘔吐 孕婦吞酸 孕婦頭痛 孕婦目鼻咽喉口齒唇舌諸病  
 孕婦口渴 孕婦咳嗽 孕婦心痛不可忍 孕婦心忡 胎上衝心 孕婦乳腫 孕婦腹癢 孕  
 婦腰痛 孕婦小便不通 孕婦大便虛急不出 孕婦泄瀉 孕婦痢疾 孕婦瘧疾 孕婦霍亂 孕  
 孕婦中暑 孕婦中溼 孕婦中風 孕婦癱瘓 孕婦遍身搔癢 子懸 子煩 子癰 子腫 子  
 滿 子淋 子鳴 孕婦無故心虛驚恐悲泣狀如遇邪 孕婦至七八九箇月內忽然聲啞不語 孕  
 婦忽然倒地 胎動不安 胎動下血不止 撲跌胎動腹痛下血 孕婦漏胎 小便多而動紅勢欲  
 小產 誤服藥胎欲墜 臨產須知 催生諸方 臨產胡言亂語 臨產暈絕不省人事 臨產艱難  
 及氣弱或矮小婦女交骨不開 難產 救逆產 救橫產 救側產 救礙產 一切橫生逆產 盤  
 腸生 臨產兒尚未見有物先出形如胎衣 胎衣不下 子死腹中  
 婦人科產後門 產子氣絕不啼 產後宜擠兩乳 產後乳汁不通 產後陰戶垂出肉線長三四尺觸  
 之痛引心腹 產後子腸掉出一截 產後腸出不收 產後子宮脫出 產後尿胞脫出 產後胎膜  
 脫出 產後尿胞損破小便直流 產後癰疽突出 產後陰蟲一對 產後陰戶翻出疼痛 產後陰  
 戶不閉或脫出 產後陰戶腫痛或手足灣屈不能伸轉 產後惡露不止 產後惡露不下 產後血  
 崩 產後一月惡露重來血水不止倒地不省人事 產後癩塊 產後發狂 產後乍見鬼神 產後

眼見黑花昏眩 產後血暈 產後中風 產後中風聲啞不語心口發紅如鏡 產後肝虛風從內生

產後不語 產後風癱 產後鼻血不止 產後口渴 產後口渴痞悶 產後舌出 產後腹脹滿

悶嘔吐惡心 產後嘔水 產後呃逆 產後咳嗽 產後氣喘 產後面赤發喘欲死 產後心痛

產後腹痛 產後腹中有塊上下時動痛不可忍 產後血氣痛不可忍 產後脇痛 產後頭痛 產

後汗出不止兼癡症 產後發熱 產後乍寒乍熱似瘧 產後瘧疾 產後傷寒 產後腰痛 產後遍

身疼痛 產後身有冷處數塊日久不愈 產後浮腫 產後霍亂吐瀉 產後泄瀉 產後痢疾 產

後上吐下痢 產後大便不通 產後小便多及夜睡遺尿在牀 產後小便不通或短少 產後熱淋

溢痛 產後尿血 產後癰疽 回生丹論

婦人科雜治 血風頭痛 烏髮長髮 乳癰乳岩 婦女性妬 陰外生瘡 陰戶生瘡或癢或痛或腫

陰戶生瘡生蟲身發寒熱狀似傷寒又似勞病 陰戶突出一物如蛇如菌或如雞冠 陰戶生物如

茄 陰戶生核腫大不消 吊陰痛不可忍 陰戶翻出仰臥不能轉動 陰戶吹響 陰戶寒冷 陰

戶疼痛 陰毛生入脚鼠 裹小脚法 腳生雞眼

難產神驗良方 生化湯 胞衣不下

臨產急救補遺 正產腸下 產後肉線出 產後肝癢 子死產門 子死腹中 胞衣不下 正產氣

虛血暈 正產血暈不語 正產敗血攻心暈 產後四肢浮腫 久慣小產

●卷五

小兒科雜治 初生去毒開口法 保嬰各法 岐真人兒科祕法 夏禹鑄審小兒顏色苗竅法 兒科

外治法 指紋切要 稀痘並免驚風 初生面紅啼哭不止 晝啼不止 夜啼不止 曲腰啼哭

遍身奇癢叫啼不止 初生遍身發黃 初生遍身紅赤 初生無皮 週身脫皮 兩腿生瘡脫皮  
身如蛇皮鱗甲 初生身如魚泡如水晶 瘡似楊梅破爛有孔 紅絲瘤 顛門腫大 頭縫不合  
初生眼目紅赤腫爛 小兒鬪眼 小兒變蒸 兩腮腫硬 口角生瘡 口流涎水 口腫並生馬牙  
口生白點 初生小兒或兩腮腫硬或口內生瘡或生馬牙或重舌木舌蛇舌吐舌及口不開不食乳  
等症 重舌 木舌 舌忽脹大腫硬即時氣絕 蛇舌 吐舌 頸軟 痰喘有聲 喉嘶聲啞 小  
兒病後口不能言 兒不食乳 吐乳 缺乳 斷乳 龜胸 龜背 並治 腹痛 肚腹脹大亮如水  
晶 肚皮忽然青黑 腹中鳴如蛙聲 肚臍腫出 臍內膿血不乾 預防臍風 臍風 小兒中惡  
以及痰閉火閉氣閉乍然卒死 小兒初發瘧疾 氣喘 吐瀉 暑月水瀉 小兒痢疾 初生陰囊  
過大 忽然陰腫 陰囊赤腫 陰囊腫堅光亮啼哭 陰縮入腹 陽物腫痛 初生小便不通 小  
便數日不通遍身腫滿 大小便不通 初生大小便出血 夜睡遺尿在牀 初生糞門閉塞 足趾  
向後 疳疾 胎毒

小兒科驚風 驚風論 慢驚 慢驚治驗 急驚

小兒科痘症 痘症治法 痘有四宜 痘有四忌 發熱 形色 起脹 養漿 收結 痘毒 痘症

諸方 治驗 辨痘法 看耳法 避穢氣法 暑月出痘 冬月出痘 出痘兒睡不可驚動 二十

四項方 推拿法 痘疔 舌上痘疔 赤斑核 痘出一半忽然不語昏迷不省人事手足冰冷目閉

面青唇白氣息俱涼 熱症方形虛症又現元氣本來虛弱而毒氣猛烈以致痘出不快 上身痘已起

脹下身痘尙未出或出而陷下不起 痘不起漿 痘症黑陷不起 兩頭痘 蛇皮痘 空倉痘 茶

葉痘 血泡痘 白漿痘 漏痘 蛙痘 瑯瑯痘 草尾珠痘 黑痘 頭面頸項諸痘 眼中生痘

免痘入眼 出痘眼目紅腫 出痘症眼有膿血 出痘眼痛 舌與鼻孔有痘 出痘縮舌 舌上  
 有痘 舌上爛痘 出痘口噤不語 出痘腎腫 腎嘴有痘 陰戶有痘 痘症夾斑夾丹夾疹而出  
 痘出不透腹痛黑陷 出痘中風 雜痘一齊湧出 驗痘出齊法 痘症作癢 痘中生蛆癢不可  
 忍 痘症發熱胡言亂語 痘齊熱退愛睡地上日夜不安 狂熱痘毒麻木致死 皮肉紅腫而痘不  
 腫 痘症潰爛膿水淋漓 痘症泄瀉 痘症小便不通 痘症大便不通 痘症耳目口鼻出膿 痘  
 風餘毒入目致生翳筋膜或成珠目蟹眼 痘後風脹或起翳赤紅 痘風眼邊紅爛作癢 痘後兩目  
 難開 痘後耳內腫痛時流膿血 痘後鼻常流涕作臭 痘後唇不蓋齒 痘後唇口生瘡 痘後齒  
 癢或出血 痘後牙齦口舌破爛出血或成走馬牙疳 痘後口角流涎 痘後咽喉腫痛 痘後昏迷  
 亂語 痘後聲啞 痘後心痛不可忍 痘後肚腹腫脹 痘後浮腫 痘後癰毒初起紅腫 痘毒色  
 白 痘後遍身無皮膿水不絕 痘後蟲蝕疔瘡 痘風瘡逢春即發 孕婦痘症 發熱 見點 瀝  
 漿 墮胎 產後出痘 引牛痘說 堅信洋痘說 經驗小兒月內出痘神方歌訣 浴兒免痘 不  
 出天花經驗方

小兒科麻症 麻症論 麻症與傷寒辨 論麻痘輕重 麻症四忌 麻症治法 麻發不起 麻症作  
 癢 新 麻伏髮症

●卷六

癰毒 癰疽論 癰毒治法  
 癰毒諸症 肺癰 腸癰 肚癰 臍癰 懸癰 對口 發背 搭手 魚口便毒 遍身肢節生瘡  
 筋骨疼痛潰爛生瘡 身上忽然紅腫遊走不定或痛或癢 身上疥瘡如塊如核

疔瘡 頭面諸疔 紅絲疔 刀鏟疔 羊毛疔 羊毛疔瘡 疔瘡出血不止 疔瘡走黃 拔疔根法  
 瘡毒 楊梅瘡 避楊梅瘡法 瞎眼瘡 貓眼瘡 天蛇毒 蛇形瘡 纏蛇瘡 又名纏 魚脊瘡 魚  
 臍瘡 蜂窠瘡 蜘蛛瘡 蚯蚓毒 螞蟻瘡 蠅蝮瘡 葡萄毒 瓜藤瘡 癩疽瘡 天泡瘡 黃  
 水瘡 熱瘡 漆瘡 癬瘡 小兒乳癬 皮疔 疥瘡 凍瘡  
 大麻瘋 曾克廣五服方 皂刺散 白花蛇丸 白鹿洞方 秘傳漆黃蟾酥丹 瘋風方  
 避風丹毒

疹風 血風瘡 疹子 瘡子 斑症 白癩瘡 紫癩風 即汗

癩 癩瘡 肉瘡 血瘡 粉刺 漏瘡 虱瘡 腋下癩瘡 肉核 疣瘡 又名瘰子

瘰 肉瘰 血瘰

癰毒雜治 癰毒宜戒 毒氣攻心 瘡痛不寐 瘡癢難忍 瘡自走動 趕移瘡毒 瘡毒腫痛不破

瘡口出血 瘡肉飛落 瘡生鬻肉如飯如菌 瘡中生管 瘡中生蛆 諸物入瘡 驢馬糞入瘡

瘡口堅硬疼痛 瘡口潰爛不堪 瘡不收口 瘡愈復發 瘡毒腹脹如鼓

癰毒諸方 隔蒜灸法 隔蠟灸法 桑木灸法 豆豉灸法 葱熨法 葱蜜膏 糯米膏 神燈照法

麻油飲 菜油飲 護心散 瓜蒂散 菊花飲 水仙膏 鳳仙膏 芙蓉散 馬莧膏 大蒜膏

肥皂膏 赤豈散 大戟膏 遠志膏 銀花飲 糞坑土 石灰散 松香散 牛牙散 牛糞散

雞腰膏 雞蛋飲 雞蛋油 燕泥散 鯽魚膏 蝦蟇散 蝦蟇膏 蝦蟇拔毒法 蜈蚣膏 紅

膏藥 白膏藥 綠膏藥 綠雲膏 綠蠟膏 黃明膏 紫蘆散 銀青散 玉紅膏 金素丹 金

花散 洞天膏 洞天嫩膏 洞天救苦丹 醒消丸 三黃丸 五通丸 五寶散 珍珠散 神仙

驗方新編 目錄

棗 愈瘡散 大棗丸 山蓮散 代刀散 咬頭膏 紫藥 麻藥 藥線 仙方活命飲 降癰活

命散 黃耆湯 託裏解毒湯 千金內託散 四物保元湯 保元湯 四物湯 二陳湯 黃連消

毒飲 化堅二陳丸 橘皮竹茹湯 摩風膏 二味拔毒散 貝葉膏 蘆薈散 生軍散 礬蠟丸

皮金膏 梅花點舌丹 蟾酥丸 萬應紫金膏

陰疽 陰疽論名 陰疽治法

陰疽諸症 石疽 惡核 失榮 癰癤即癰子也 落頭疽 遮腮 骨槽風 乳巖 井泉疽 甲疽

脫骨疽 背疽 少腹疽 小腸疽 多骨疽 附骨疽 咬骨疽 刺骨疽 鶴膝風 橫痃 流注

陰疽諸方 陽和湯 陽和解凝膏 犀黃丸 小金丹 子龍丸 拔毒法 回陽玉龍膏 眞君妙貼

散 鐵製法 風溼灸法 趕毒散 陰疽治驗 陰疽孽報 陰疽無價活命仙丹

內外備用諸方 觀音救苦膏 回生再造丸 太乙紫金錠 青金錠 平安萬應丸 金絲萬應膏

萬應神麴膏 金剛丸 大還丹 彭祖接命丹 無價保眞丸 延壽丹 蒸臍補氣散 陰虛無上

妙方 人乳膏 來復丹 斑龍散 草靈丹 五香丸 三黃寶蠟丸 扁鵲玉壺丸 九製硫磺丸

七製固脂丸 七製香附丸 九製黃耆 代參膏 湧泉膏 附桂膏 法製陳皮 黃瓜霜 神

仙粥 甘露茶 羊肉湯 羊腎酒 烏雞湯 七味鴨 神仙鴨 固脂鴨 種子兜肚方 開關散

土製法 天然透邪丹 仙拈散 十全大補湯 補中益氣湯 逍遙散 金匱腎氣丸 左歸丸

右歸丸 六味地黃湯 八味地黃湯 元麥地黃湯 涼血地黃湯 養香正氣散 六一散 益

元散 甘桔湯 荆防敗毒散 黃連解毒湯 龍膽瀉肝湯 五苓散 新徐氏行軍萬應膏



急救 五絕 弔死 溺死 割喉 腹破腸出 服毒 凍死 壓死 跌死 雷擊死 睡魔死 治夢

魔 中邪死 鬼打死 驚嚇死 痰厥死 氣厥死 中風死 尸厥死 尸厥死腹響如雷 忽然

胡言亂語昏迷倒地 暴厥死 發花風死

解救諸毒 解救百毒 中毒七孔流血 解鴉片煙毒 解砒霜毒 解野菌毒菌音 解斷腸草毒

解黃藤草毒 解野葛毒 解野草毒 水菖蓉毒 解鹽瀆毒 解鹼水毒鹼音 解煤火毒 解迷悶

毒 解百藥毒 解巴豆毒 解附子烏頭天雄毒 解芫花毒 解狼毒毒 解木鼈毒 解硃砂毒

解冰片毒 解水銀毒 解鉛粉毒 解輕粉毒 解斑貓毒 解硫磺毒 解花椒毒 解食桐油

解食蛇毒 解蜈蚣毒 蜈蚣入腹 解各蟲毒 解沙蟲水毒 解蝸蝗毒 解河豚魚毒 解各

色魚毒 解食紫毒 解蝦蟆毒 解黃白鱉毒鱉音 解螃蟹毒 解鷓鴣毒 解大馬肉毒 解馬肉

毒 解食牛肉毒 解鵝鴨毒 解雞肉毒 解野雞毒 解鬱肉瀘脯毒 解豬肝毒 解自死各物

及銅鐵鉛錫等毒 解飲田澗山溪水毒 解百草毒 解木瓜毒 解豆腐毒 解中山洞生金生銀

誤吞諸物 誤吞鐵器 誤吞鐵鏡 誤吞金銀銅鐵錫鉛 誤吞金箔 誤吞銅錢 諸骨卡喉 田螺

卡喉 稻穀卡喉 竹葉卡喉 竹木卡喉 桃杏卡喉 諸豆卡喉 鐵鉞卡喉 鐵鈎卡喉 頭髮

卡喉 蜈蚣卡喉

煙酒醉傷 水旱煙醉傷 洋煙醉傷 酒醉傷 酒醉心痛 酒醉小便不通 酒病大小便不通 酒

病 酒龜 酒後嘔吐視物顛倒不正 戒洋煙癮

人畜蛇蟲咬傷 人咬傷 虎傷 狼傷 獺犬咬傷 家犬咬傷 馬咬傷 豬咬傷 猿猴抓傷 貓

咬傷 鼠咬傷 蛇咬傷 毒蛇纏身不脫 蛇入七竅 蜈蚣咬傷 蠟螫傷 又名虫蟻 壁虎咬傷 黃蜂傷

射工深毒傷 毛蟲傷 狗毛沾身 蜘蛛傷 蟻蛛傷 多足蟲傷 蚯蚓傷 又名地龍 蠶咬傷

烏龍刺傷 仙鶴毒 狐尿刺毒傷 各項毒蟲咬傷

湯火傷 湯泡火傷 火爆傷眼

跌打損傷 損傷諸方 跌壓傷死 破口傷 止血法 跌打吐血不止 破口傷風 割頸漸喉 截

傷腸出 耳鼻打落 手指砍斷 接骨法 跌打傷筋 傷損縮筋年久不愈 跌打損傷愈後行動

不便 腳趾割破久不收口 跌打青腫 跌打青腫內傷 打傷眼睛 閃跌手足 閃跌傷腰 跌

打損傷溼爛不乾 損傷碎骨在內作膿 跌打損傷內有積血大小便不通 跌打損傷胸脹不食

騎馬傷股破爛 跌打損傷百藥不效 舊傷日久作痛 增補止血補傷方 刀箭傷傷身傷跌打一切物打傷無不驗 增補傷

科聖藥七釐散 增補被毆傷風方

刑杖傷 夾棍傷 杖傷

銅鐵竹木雜物入肉 鐵鍼入肉 鐵鍼並銅鐵錫鉛入肉 鐵彈入肉 箭簇銅鐵礮子並一切雜物入

肉 磁片入肉 魚肉各骨入肉 竹木入肉 水銀入肉 銅鐵竹木等物入肉雖已拔去傷口腫爛

不愈 藥箭入肉箭已拔出傷口腫爛不愈 銅鐵入骨 新 鐵鍼不收口 新 能出箭頭 與鉛 增 竹木

刺入眼

中風 中風症 中風諸方 中風口眼喎斜 中風不語 中風不語半身不遂 中風角弓反張 自

頭麻至心而死或自足麻至膝而死 眼珠上翻手足彎曲狀如中風時發時愈 忽然跌倒口吐白沫

不省人事時發時愈 中風癱瘓手足不舉並治風溼脚氣 風溼癱瘓手足難動 風溼癱瘓半身不

遂 腰脚風痛不能履步 風溼癱瘓諸方

筋骨 週身骨軟 週身痛不可忍 服過輕粉筋骨疼痛 風溼疼痛 筋骨疼痛不拘風溼氣滯或楊

梅瘡毒或婦女月經諸病 筋縮不舒疼痛不止 歷節風由下而上逐節疼痛 箭風痛俗名鬼箭打

或頭項肩背手足腰肢等處筋骨疼痛不安 手足筋骨疼痛 肩背筋骨疼痛 腋肋手足腰脇等處

忽如火熱腫硬如石痛不可忍或彎曲不伸 腰脚風痛不能履地四肢筋絡不舒兩手牽絆不能擡起

尾脊骨上下左右疼痛大小便不通 身中忽然一處作痛 皮膚中痛 皮膚偶觸衣物痛徹連心

似乎無皮之狀 身麻皮厚如鐵 皮膚枯如魚鱗

傷寒 傷寒症 傷寒外治諸方 傷寒發狂目不識人或見鬼神 傷寒發狂兼發斑疹 傷寒舌出

傷寒膈食 傷寒口渴不止 傷寒毒攻手足腫痛欲斷 傷寒五六月週身發黃 傷寒後行住坐臥

不定如有鬼神 陰症傷寒 夏月身冷畏寒 增補積受潮溼四肢不仁方

感冒風寒 風寒頭痛燒熱 中寒面色青黑或不能言 風寒作痛 身受風寒心腹疼痛飲食少進大

便閉寒小便短澀上下關格不通渾身綳緊甚至手足攣硬不省人事涼熱難分 閉住風邪體虛不能

發表 暴風身如水冷 發寒發熱或麻木或不麻木

蛇狗咬傷補遺 跌打損傷補遺

●卷八

中暑 中暑論 中暑諸方 夏天道路受熱昏倒 傷暑出丹 夏月身冷畏寒

痧症 各項痧症 痧症諸方

霍亂 霍亂症 霍亂諸方 霍亂腹痛兩腿轉筋 霍亂轉筋入腹 霍亂煩渴 三香寶暑散

秘方新編 目錄

瘡疾後增減氏十 瘡疾須知 瘡疾三方 三陰瘡 隔日瘡 三日瘡 久瘡不愈 二三日瘡年久不愈

愈 久瘡 虛極 隔年瘡 三十年瘡 久瘡成疔 小兒久瘡不愈

黃疸 五種黃疸 發黃欲死不省人事 黃疸吐血 胸滿腹脹黃腫

瘰癧 瘰癧症 瘰癧諸方 瘰癧心腹疼痛 羊毛瘰 大頭瘰 辟瘰諸方

蠱毒 中毒論脈 生蛇蠱 陰蛇毒 浸笋水法 癩蠱 腫蠱 疔蠱 變疔論 中疔既變疔後食

品 中疔既變疔後藥方 中害神 泥蚨蠱 石頭蠱 篾片蠱 金蠱蠱 中疔中蛇中腫中癩諸

方 老人中蛇蠱方 通治蠱毒 辟蠱毒法

瘰癧 解煙瘰毒 辟煙瘰法

諸血 七竅出血 口鼻出血不止 耳鼻流血不止 臍中出血並治齒上出血 毛孔出血不止 毛

孔節次出血不出則皮脹如鼓頃刻口鼻眼目俱脹

諸汗 止諸汗法 自汗 盜汗 身出黃汗

遍身搔癢 身癢難忍 風溼疹子 風熱疹子作癢心下迷悶 風熱疹子作癢成瘡 遍身搔癢抓破

見血 癩子癢痛 癩子作癢抓之又痛難於坐臥

邪怪 男婦病邪與邪物交獨言獨笑悲哭恍惚 驅狐怪法 灸鬼法 制邪鬼法 辟鬼火法 鬼箭

傷 增補驅邪怪法

奇病 頭頂生瘡五色形如櫻桃破則自頂分裂脫皮至足 眉毛搖動晝夜不眠呼喚不應飲食如常

頭面發熱身有光色 面腫如斗眼中見人只三寸長 見一物如有兩物 見一物如兩物三四物又

見桌椅等物平正者視之反歪斜歪斜者視之反平正 醉後嘔吐視物顛倒 眼見諸般飛禽走獸以

手撲捉則無 眼見五色之物忽又變成美女 愛食豬油或生油生菜 口鼻流出臭水以碗蓋之內  
有魚蝦走動捉之即化為水 口鼻中氣出不散凝如黑蓋過十日後漸至肩胸與肉相連堅如鐵石  
身發寒熱四肢堅硬如鐵敲之作鐘聲 週身皮肉內滾滾作波浪聲癢不可忍抓之血出 面如蟲  
行不時燒熱 身如蟲行癢不可忍 身如蛇蟲行走作癢或腹中蛇蟲鳴動 皮膚中如有蟹行走有  
聲如小兒啼哭 皮膚手足之間如蚯蚓鳴 週身發斑眼赤鼻脹氣喘毛髮硬如銅鐵 身上忽現蛇  
形痛不可忍 遍身肉出如錐癢而且痛不能飲食 遍身生瘡泡如甘棠梨破則水流其泡復生內有  
小石一片 自頭麻至心窩而死或自足心麻至膝蓋而死 臨臥遍身虱出血肉俱壞漸生漸多舌尖  
出血身齒俱黑唇動鼻開 忽有人影與己隨行坐臥久則成形與己無異 人前不食背地偷食見人  
則避面色黃瘦 臥牀四肢不能舉動口說大話並喜說食物 瘡癩內有雀鳥出者有鬣髮出者有瓜  
菜出者有雜物出者 人生尾巴

難治 治癩病法 困倦喜睡齒暗無色舌白昏昏不知痛癢處或下痢或不下痢 沉悶無聊若有病狀

夜不能睡 飛絲纏身 身上無故生蛆 除虱子 辟臭蟲 辟蠶魚跳蚤虱子臭蟲白蟻蜈蚣

辟馬蟻 辟白蟻 辟蛇 辟蜈蚣 辟食屍蟲 收蚊蟲 耗鼠竊油 野豬踐食田禾 辟盜賊

刀兵疾病鬼怪虎狼蛇蟲 避難時止小兒啼哭 止火法 救飢法 行路不迷 夜行無恐 客路

須知 暈船暈車 渡江膽怯 罪囚邪術避刑 造屋禳解 解酸酒法 製食物法 收藏食物

試井中毒 耐點燭法 留宿火法 各物污衣 墨污綉綾皮棉衣服 墨污紙絹書畫 去墨法

去硃法 書被水浸 去書畫雨漏痕 辟穢氣 辟油漆氣 阿膠著物臭氣不退 禽獸諸疾

### 附癩病法

藥方新編 目錄  
藥物備要

校正  
增廣 驗方新編卷一

善化鮑相璈雲韶編輯

合肥張紹棠又堂增訂

頭部

偏正頭風 此症發時雖盛暑亦覺畏風痛不可忍用蕎麥粉炒熱加醋再炒乘熱敷

上用布包緊勿令見風冷則隨換日夜不斷有人患頭風十年不愈照此治之其病

若失愈後鼻流黃水數日從此斷根屢試神驗此治頭風第一方也並治尋常傷風

頭痛惟氣虛及風火蟲痛不效 又方 生大烏頭去皮四兩南星泡一兩 共為末每服錢二

用薄荷分七鹽梅一分煎水臨睡調服雖二十年頭風亦效或用生南星生烏頭等分為

末葱汁調貼太陽穴亦可 又方 用手指按頭上有一處按着更酸痛者以硃筆

記之用斑蝥一分去頭翅足研末安於所記痛處以小黃蛻殼或核桃殼蓋上用布紮

好過夜起一小泡以針刺出黃水其痛若失曾治數人愈後多年不發 又方 硫

黃錢一川椒子為末三分二味拌勻鎔成小餅左疼塞左鼻清涕從右鼻出右疼塞右鼻正

疼左右俱塞清涕流盡即愈神驗 又方 葶撥末錢三入猪膽內候乾取出再用

真川芎 白芷 藁本 真青黛 元胡索錢各二為末水和為丸如蓮子大令病人

仰睡用一丸水化灌入鼻中覺藥味至喉微有酸氣令病人坐起口咬銅錢一箇口內有涎出盈盆即愈或加皂角末錢一亦可 又方 白芷五錢兩真川芎 甘草 川

烏頭牛生 明天麻錢各一 共為末每服壹錢食後服細茶薄荷湯下百藥不效者一服

即愈效驗甚速 又方 白芷錢三 天麻 防風錢各一 荆芥五錢 共研末煎服此林屋

山人經驗方也 又方 真蘄艾揉融為丸時時向鼻嗅之以黃水出盡為度 又

方 鳳尾草搗融加麝香分拌勻敷顙門上甚效 又方 都梁丸昔王定國病頭

風至都梁求名醫楊介治之連進三丸即時病去其方用 白芷酒洗為末蜜丸彈子

大清茶或荆芥湯化下食後服忌食各魚 又方 明天麻 白芷為末蜜丸重二

錢每服一丸先將荆芥錢一細辛分三煎湯細嚼甚者不過一丸食後服忌食各色魚

又方 生牛蒡子梗葉無梗葉用取自然汁二碗陳酒一碗食鹽八分共熬成膏搽之

須極力搽熱乃效凡頭風抽掣作痛者用此必愈 又方 到牛車處候牛下糞即

將熱糞數頭上用布包緊快走十里如頭上癢更要快走不可停步亦不可擦動候

癢止解下視之有無數細白蟲伏糞上即愈有人頭癢百藥不效後用此方斷根此

陝西名醫傅青主方也

尋常感冒風寒頭痛 照上偏正頭風第一方治之



雷頭風痛 頭痛而起核塊或頭中如雷鳴者是也用 川芎 白芷 防風 羌活

甘菊 薄荷 甘草等味治之如不見效用 天麻 升麻錢各一 新荷葉一大張

煎服或不省人事 用地膚子同生姜搗爛熱酒沖服取汗即愈 又方 山羊糞

炒枯研每服二錢酒送下百藥不效者服此即愈此林屋山人經驗方也

熱痰頭痛 瓜蒌個一 牛蒡條四兩 共為末每用錢三 食後酒沖服忌食動風發熱之物

氣虛頭痛 春茶葉末水調成膏攤碗內覆轉用巴豆四十粒作兩次燒煙薰之曝乾

研細每服二分滾水沖下食後服 又方 照前烏頭南星方最效

厥陰風火上衝頭痛 肝脈弦者是用消障救睛散部見目 治之神效肝脈不弦者不效

頭風目痛 製香附兩二 藿香 甘草錢各二 共為末每用二錢滾鹽湯下

終年頭似痛而非痛 此腎水不足火邪沖上作痛用 熟地 玉竹各一兩 山菜肉錢四

真山藥 元參 川芎 當歸錢各三 五味 麥冬錢各二 水煎服服後頭痛更甚至重

二劑斷根屢試如神藥味不可加減稍有加減則不效有人患此數年百藥不愈二

劑而安永不復發真奇方也

腦後作痛 此風入腎經所致用 熟地錢五 真山藥炒 雲苓 當歸錢各三 炒芍錢貳 川芎

陳皮 炙草錢各一 天麻錢五 麻黃分三 水煎服

頭腦鳴響 狀如蟲蛀名天白蟻以 春茶子為末別撰茶子亦可攪打油之茶子則不用吹入鼻中取效如不

見效即照頭風各方治之 又方 土茯苓煑猪肉食之神效前後忌茶十日

頭腦暈眩 暈眩雖然小症然而大病皆起於暈眩眼目一時昏花卒致猝倒而不可

救者也宜早治之用 台黨 半夏錢各三 白朮 當歸 熟地 白芍錢各一 川芎

菜肉錢各五 天麻錢一 陳皮分五 水煎服數劑見效此方名防眩湯專治氣血之虛不治頭

目之暈蓋氣血足則陰陽和陰陽和則邪火散自不致於暈眩多服數劑受益無窮

不可因一二劑不能收功便棄而不用也 又方 白菓個二 去殼生搗爛沖滾水空

心服至重五服即安老年更效

婦人血風頭暈欲死倒地不知人事 生蒼耳草嫩心陰乾為末每用一錢酒調服神

驗此物能通頂門故易奏效也

搖頭下血 此肝風甚也用 防風兩三 黃芪錢三 天花粉 羌活 白芍錢各五 犀角碎割 甘

草錢各二 蛇脫赤炙 鈎藤 麻黃錢各一 共研末棗肉和丸梧子大薄荷湯下五七十丸

腦漏 從腦頂一股酸氣由鼻孔流出黃水臭不可聞治法見鼻部鼻淵門

腎氣上攻頭項不能轉動 大熟附子錢二 川椒二十粒用麩塞瓶瓶口內 生姜片七 水煎加鹽少許服

頭面發熱有光彩他人手近之如火燒 葱汁錢五 酒調服吐出如蟲即安

頭面腫大 此名大頭瘟自頸至頂腫成一桶咽喉閉塞治法見卷十五瘟疫門

頭上生瘡如葡萄痛甚參看卷一葡萄瘡方 此名鬚毛毒瘡用 黃柏兩 乳香五分 共為末槐花煎

濃汁調作餅貼於瘡口並用 吳萸研末醋調敷兩足心即愈

頭頂結核如寡蛋響者 此命門火虧也用 寡蛋水酒煑老每食一二箇酒送下服

至數十箇自愈 又方 七製固脂丸見內外備用諸方 每服三錢服至半月必愈或照下頭

頂白色腫塊方治之必愈

頭頂生白色腫塊 小兒頭髮內生白色腫塊名瘡瘡頭多有誤認跌腫漫不加意及

至高大作痛方延醫治庸醫以頭為首陽誤用寒涼解毒是以潰爛者內膿復瘡增

出者不一殊未知此患色白其膿不紅乃陰寒虛弱之症用小金丹初起三服而消

已潰爛者服七丸而愈外貼陽和解凝膏大人患之名曰髮疽服陽和湯自愈小金丹和各方

均見陰疽門 又方 如愈而復發者用綠雲膏見難毒諸方門 貼之最為神效

頭頂生瘡或紅或白甚至紫黑色其人喉有痰涎或能言或不能言 此名劈腦疔瘡

用木鱉子焙枯存性分三 加頂上梅花冰片三四 共為細末吹入喉內即吐出痰涎而

瘡亦愈喉內無痰色不紅紫或先白後紅者仍照前小金丹各方治之

髮中生癩如珠相染不已 此名火珠遲則難治急用 生蘿蔔搗爛好醋泡透敷此

林屋山人經驗方也 又方 內服地丁飲見瘡門一二劑外用菊花葉搗融調蜜敷

或用燕泥散見雜毒通治門敷均效

小兒頭面胎毒 浮水石性暖存研末放碗內童便調勻用艾絨燒煙薰透以裏面均帶

黃色爲止俟冷用麻油調敷雖十年不愈者敷三五日必愈神效無比一切瘡毒年

久不愈者皆可治 又方 白龍散 水牛屎晒乾燒枯存性燒太過不效搽患處即收水

脫痂而愈並治痘後餘毒 又方 桐油調輕粉塗之多年不愈者皆效 又方

用米湯油洗淨取燕子窩泥用麻油調敷數日即愈米湯油即米鍋水面濃汁也

頭面紅癩名曰石癩紫薇花名曰茶糞精猪肉食之可保一年不生 又方 洞天蘚草膏難見

方藥精貼一日全消潰者貼之亦愈用 連翹 花粉 赤芍 銀花 甘草 車前

也 又方 大黃 遠志等分爲末猪膽汁調搽極效 又方 苦蕒菜梗折斷有

白汁出取汁搽之即消初起者最效 又方 黃柏 真川連 黃芩各等分研末

醋調敷效 又方 菊花葉搗汁調白蜜敷之用渣敷四圍留頭不敷俟毒水流盡

即消

頭上軟癬 軟癬愈而復發最難除根用 枳壳一箇鮮者更佳又名臭櫛子無鮮者用乾枳壳蒸融攤冷用剝去瓢以麵糊塗

頭上軟癬 軟癬愈而復發最難除根用 枳壳一箇鮮者更佳又名臭櫛子無鮮者用乾枳壳蒸融攤冷用剝去瓢以麵糊塗

抹枳壳四圍合蓋癬上旁安一燈心以通膿水數日自愈愈後並無疤痕 又方

一野芋頭磨醋敷 又方 舊船底陳石灰研末油調敷 又方 生半夏 生山

藥各等分研末用葱頭搗敷此治初起甚效 又方 豬頭上毛 貓頸上毛各壹撮燒灰

雄鼠糞一種兩頭尖者是 共研末香油調敷雖數年不愈亦效 又方 五倍子箇七研末麻油

兩四熬至一半瀝盡渣搽四五遍即愈切忌水洗

頭上生瘡乾而無膿 抱過雞蛋壳名鳳凰窠燒灰存性研極細麻油調搽

千層瘡 此瘡生在頭面好而復發生生不已故名千層俟破口時用 新鮮橄欖核

無鮮者用鹽微燒灰以水煮去鹽味亦可 燒灰和雞蛋油見雞毒以鴨毛調敷

秃頭瘡又名癩 香黃散 松香二兩為末入葱管內用線扎定水煮熟化去葱研末 黃丹水一兩飛 無名異一錢炒 宮粉一錢炒 輕粉

三分 共為細末香油調搽並治頭面黃水瘡俱極神效 又方 牛牙散見雞毒 敷之

生肌斷根神效之至 又方 白油膏見腫部 貼之雖多年不愈亦效 又方 先用

刀將瘡刺破以熟蕎麵將頭面上四圍高高敷之取一雄雞宰殺以熱血灌入頭頂

數日生肌而愈

落頭疽俗名吹頭瘡 此疽生在腦後由小而大係屬陰症斷不可服涼藥倘醫不得法即腐

爛落頭而死大半係冤孽所致照卷十一陰疽各方治之並查看陰疽孽報見陰疽卷末 為

要

秘方新編 卷一 頭部

頭角太陽生瘡當日頭重如山二日即變青紫三日青至心胸而死 此症有因好服

春方藥而生者有因食煎炒厚味而生者初起用 金銀花<sub>二斤</sub>煎湯飲數十碗方可

少解其毒然必潰爛再用 金銀花 元參<sub>各三兩</sub> 當歸<sub>二兩</sub> 甘草<sub>一斤</sub>水煎日服一劑七

日始可收口又手指指頭生瘡亦多不救亦可以此法治之

太陽出血 有人兩太陽陡起紅瘡用手抓破出血如線不止用 瘦猪肉一厚片貼

之即止或用穿山甲<sub>尾上者佳</sub>炒研細末敷亦止內服元麥地黃湯<sub>見內外篇用諸方</sub>即愈

髮瘤 多生耳後髮下寸許按之不痛用針刺破擠盡粉髮用生肌藥敷之自愈

髮落重生 黑脂麻梗 柳樹枝各等分熬水洗頭髮易生而且潤婦人以此二味泡

油擦頭更妙小兒髮稀洗之亦生 又方 旱蓮草<sub>黑頭名</sub>搗敷易生而多 又方

嫩棗樹皮一大把砍作尺餘長滿插淨磁瓶內勿令到底上面以火燃之下面流汁

水先用溫水洗頭後將棗汁擦之即生髮矣

髮易脫落 榧子<sub>三箇</sub> 核桃<sub>二個又胡桃名</sub> 側柏葉<sub>兩一</sub> 共搗泥泡雪水梳頭髮永不落而且光潤

髮短而少 桑葉 麻葉用淘米水煮汁洗之洗至七次可長數寸

髮黃而赤 生柏葉<sub>研一斤末</sub> 猪油和為丸如彈子大每日用一丸淘米水放開洗之一月

後色黑而潤

髮枯不潤 桑根白皮 柏葉斤各一 宣木瓜斤半 泡油搽頭即潤男子煎水洗數次亦黑

潤

少年白髮 拔去白髮以白蜜塗毛孔中即生黑髮如不見效取 梧桐子搗汁塗上

必黑如白多難拔用 乾柿餅用茅香 枸杞子酒泡 各三兩研末為丸梧子大每服五

十九丸茅香煎湯送下

烏鬚黑髮 草靈丹見內外備用諸方 服之鬚髮可以轉黑神效無比

頭腦內癢漸至髮落 蘆薈 苦楝子錢各一 為末吹入鼻內數次自愈

頭生白屑癢極難忍 藜蘆末煎湯洗頭半乾時再用藜蘆末搽上令入皮內用布紮

緊數日即愈 又方 桑枝燒灰淋水洗甚效 又方 王不留行 白芷錢各三 研

末乾搽一夜梳去即愈

治癩子神方俗名 治好後能長頭髮都證實試 先用米泔水加明礬花椒蔥頭煎湯薰

洗又用黃牛門牙數枚醋泡炭火煨煉七次成炭研細末加熟礬少許亦研末柏油

調搽幾次即愈十數年來不發治脚痔亦用此方甚效

治腦漏神方一名 白鴉鴿翎毛錢 擦生漆絲棉一塊如無絲棉即揩漆布亦可二種

係問漆匠舖買將二味放於瓦上焙脆存性共研細末入冰片少許令病人仰臥用筆管吹入不過三次即愈此余患此症覓得此仙方也用之除根病愈已三十年矣

新增治頭風 頭風疼痛用鮮鵝兒不食草塞鼻甚妙 又方 川芎 白芷 石膏

各一錢研細末茶送下 血虛頭痛 當歸 川芎錢各三 荆芥錢一煎服札記

新增雷頭風痛 頭面疔瘡腫痛憎寒壯熱狀如傷寒 用清震湯治之荷葉一枚升

麻蒼朮各五錢煎服札記

新增長髮不落不白 方用覆盆子榨汁一一塗之

新增治禿頭瘡 方用蔓菁即諸葛菜搗汁醋調用子取汁同效 又方用鷓鴣研末敷之

先以醋泔洗淨效上開

面部

面上生瘡 急尋有殼蝸牛一二條查藥物備要便知搗融攤紙上貼之即愈紙上留一小孔出

氣初起用之神效 又方 鹿角研燒猪膽調搽亦效

面上似疥非疥似癬非癬 若不急治延及遍身不救照上蝸牛方治之或照上鹿角

猪膽方更效 又方 鷓鴣糞 鷓鴣糞 胡桃殼即核熬湯以絹帕蘸湯熱擦即



愈忌羊鵝魚蝦等物一月

面上粉刺 又名酒刺由肺經血熱而生發於面鼻如黍如粟色赤腫痛破出粉汁用

大黃 硫黃等分研末以涼水調敷內服清肺熱藥自愈 又方 輕粉 黃芩

白芷 白附子 防風錢各一 爲末蜜丸每日洗面時多擦數次臨睡時又重洗面

而擦之三日消痕滅跡或用下雀斑附子蛤粉方亦效 又方 紫參 丹參 黨

麥 苦參 沙參兩各一 爲末胡桃肉核又名桃搗融爲丸梧子大每服三十九丸茶送下

面上雀斑 其色或黃或黑碎點無數由火鬱血分風邪外搏而成用時珍玉容散

豬牙皂角 紫背浮萍 青梅 櫻桃兩各一 鷹屎白三錢或錢 共研細末每晚用少

許在手心內水調濃擦面上良久以溫水洗面至七八日後其斑皆去神效或用好

玉時時擦之久則自退 又方 附子 蛤粉 茯苓 白芷 陀僧 山奈錢各五

共爲末蜜調擦面上次日洗去甚效並治酒刺 又方 蒼耳草嫩葉尖和鹽少許

搗爛五六月間日擦十餘次甚效 又方 紫背浮萍 漢防己煎水洗或曬乾爲

末搽之甚效

抓破面皮 橄欖核磨水搽之即愈並無痕跡或用白糖搽之亦妙 又方 生姜自

然汁調輕粉末搽之亦無痕跡

容玉粉 治雀斑酒刺肺風酒糟鼻面上一切斑點 菘豆一升荷花瓣二兩滑石 白

芷 白附子各五錢上冰片 蜜陀僧各二錢 共為細末早晚洗面擦之

面生縐紋 大母猪蹄四箇洗淨煮成膏臥時搽面上次早洗去半月後即不縐矣

冬天面唇皸破 熟豬油夜夜敷之

面上黑氣 半夏研碎米醋調敷不可見風自早至晚不計次數三日後用皂角煎湯洗

下即白 又方 天門冬和蜜搗爛為丸日日洗面即白

面黑皮厚 羊脛骨末雞蛋清調每夜敷早以淘米水洗去十日後面白皮嫩神效

又方 冬瓜箇一竹刀去皮切片酒水各半煮爛瀝渣熬成膏夜夜擦之次早洗去

洗面光彩 西瓜子仁五兩白楊柳皮二兩桃花四兩為末食後米湯調服一匙一日三服一

月面白五十日手足俱白無白楊皮或用橘皮亦可 又方 輕粉 滑石水飛 杏

仁去皮各等分為末蒸過加 冰片少許用雞蛋清去黃調勻洗面敷之一月後色

如紅玉 又方 頂上金色蜜陀僧一兩研極細末用人乳或蜜調如薄漿糊每夜略

蒸待熱敷面次早洗去半月後面光如鏡 又方 冬桑葉煎濃汁收貯冬月早晨

用一酒杯攪入水內洗面光滑如鏡面亦不凍

腮邊酸痛發腫 腮內酸痛名遮腮用洞天鮮草嫩膏敷上次日即愈若病後兩腮發

腫不作酸痛者名發頤用 天麻 白芷 防風 荊芥錢各一 送服醒消丸三錢而

愈此林屋山人方也洞天醒消方均見癰毒諸方門

腮頰穿爛 腮邊穿一小眼時發時愈名曰漏腮內服荊防敗毒散見內外篇用諸方 外用 夜

合花樹皮煎水洗並用夜合樹皮搗融敷再用夜合花根煎濃湯時含口內有人患

此十年不愈照此治之收口斷根

兩腮赤腫 俗名撐耳風又名疔腮用燈火燈心一根點油燒之 在虎口之下寸許手背微窩處燒

一下左腮燒右手右腮燒左手 半日即消腫效或燒少商穴在鼻部鼻血第一方便知 更妙 又方 皂角二兩 生南星錢二

糯米一合 共為末姜汁調敷立效 又方 輕者用靛花或磨鹿角搽重者用 大黃

白芨 五倍子共為末雞蛋清調搽 又方 絲瓜又名水瓜燒存性研末 調水塗之 又方

醋調陳石灰敷之

小兒腮腫內有硬核 見小兒雜治門

眉部

眉上生瘡 肥皂燒存性 枯礬透要燒 各等分為末麻油調塗先用白礬泡水洗淨 又方

分別色之紅白照癰毒陰疽各方治之

眉爛毛脫 此肝經受風所致用側柏葉去梗九蒸九曬磨末蜜丸梧子大每早晚服

一錢開水送下以愈爲度外用兔絲子研末麻油調搽或茆屋上舊草燒灰麻油調搽

眉毛不生 黑脂麻花陰乾爲末以黑脂麻油泡之日搽數次自生 又方 桑葉片七

日日洗之一月復生如舊髮落亦然 又方 旋覆花 天麻 防風錢各一 共研末

麻油調敷 又方 雄黃末兩一 好醋調搽即生 又方 生旱蓮草錢又名 搗敷數日

即生

眉毛搖動晝夜不睡喚之不應但能飲食 大蒜兩二 搗汁兌酒飲自愈

目部

洗眼仙方 此方得自仙傳凡患肝虛目疾雖雙目不見洗至年餘復明平日宜養心

息氣切忌怒惱洗眼方多藥與洗期各有不同惟此方與後方治愈數百人神效非

常不可輕視 青皮五錢乾者色微青暴方是 微紅者係陳皮洗之不效 煎水每逢洗期誠心齋戒早中晚三時先薰後

洗日期正月初叁 二月初肆 三月初肆 四月初玖 五月初陸 六月初肆

七月初叁 八月初玖 九月初拾 十月初貳 十一月初捌 十二月初肆

閏月同期 又方 此方亦由神授專治腎虧目疾業已治愈多人雖雙目不見

亦可復明與前方藥料洗期雖有不同神效則一如照前方洗有一年尙無功效者

即是腎虛照此方洗至年餘必有奇效屢試如神 皮硝錢五淨水鍾二煎成一鍾每逢

洗期早中晚三時誠心齋戒先薰後洗日期列下正月初叁 二月初壹 三月初

叁 四月初肆 五月初伍 六月初四 七月初叁 八月初伍 九月拾貳

十月拾叁 十一月拾肆 十二月拾貳 閏月初貳拾陸兩日

雙目不明後有增補醫目神方凡雙目不見青光瞎眼瞳人反背皆治 黑豆粒一百 黃菊花朵五 皮硝錢六 水一鍾煎七分帶熱薰洗

五日換藥再洗一年後可以復明平日忌茶並戒惱怒 又方 雞膽箇一入蜜半匙

以線紮住再入猪膽內挂房檐下通風不見日處二十一日去猪膽留雞膽先以人

乳點患處潤之少刻用骨簪蘸雞膽點上遍身透涼流淚出汗二三次即明忌茶百

日可將霜降後桑葉煎湯代茶飲並戒怒惱

青光瞎眼 人望如好眼自覺不見者是白羊子肝一副竹刀切片黃連研末兩熟地黃兩二同搗為

丸梧子大食遠茶服七十九日三服崔承元病內障喪明有人以此方報德服之遂

明 又方 兔絲子 補骨脂 巴戟 川牛膝 枸杞 肉蓯蓉各一兩 共為末加

青鹽錢二用猪腰子箇一切開半邊去筋膜入前藥末錢一將線紮緊用陳酒蘸温燒爛

食之初起最效

兩目忽然不見 取地上三尺下黃土攪水澄清洗之此葛仙肘後方也

瞳人反背若眼珠已有白點便不驗 蜜蒙花 蟬蛻 白菊 郁李仁 石膏 生草決明 石決明

甘草 谷精草 白礬錢各四 百部錢二 珍珠四分另 共為末分量不可加減和猪瘦肉

二搗爛煮服即時發冷者其光必轉若光未盡轉再服一劑必愈愈後服鎮精丹一

二劑

鎮精丹 石膏 蟬蛻 梔子 槐花 白菊花錢各一 生地 蒙花錢各二 草決明錢五分

甘草分五煎服

小兒瞳人不正 小兒因跌打損傷頭腦受驚以致瞳人不正觀東則見西觀西則見

東用 石楠葉兩一 甜瓜蒂箇七 藜蘆分三 共研細末吹少許入鼻孔通頂為度日吹三次

並請名醫內服牛黃定驚平肝等藥自愈石楠有雌雄兩種若得雌石楠葉更佳

兩日夜不見物 俗名雞朦眼此肝虛也黃蠟不拘多少溶汁取出入蛤粉相合得宜

每用二錢以猪肝羊肝更妙二兩批開搽藥在內麻繩紮定水一碗同入銅器內煮熟取

出乘熱薰眼候溫連肝食之日服兩次以愈為度其效如神 又方 羊肝兩二 煮熟

點鍋底煙食二三次即愈鍋底煙以燒草者為佳燒煤炭者斷不可用

風火眼痛 凡兩目腫脹赤甚痛甚作癢多淚畏日畏風容易惹人鼻塞腦酸諸病皆

是後列各方治之必愈但洗眼時務在帳內方可避風即帳內脫衣揭被亦有風動

但宜旨意老才龍遠貝才列也

吹鼻散

鵝不食草

五錢曬乾查藥  
物備要便知

真青黛

川芎

錢各一

共為細末將藥少許嚙入鼻中

或新

白布池水煎藥  
入鼻中亦可

口含溫水以淚出為度數次必愈兼散目中星翳

又方

每日望井中

週圍三遍能去火氣

又方

黃丹和白蜜調敷太陽穴立效

又方

輕白蘆甘

以龍浮水者為佳用重氈池一日夜越久越好炭火內燒紅再泡一日再燒一次用一錢

淨礪砂

分五大

硃砂

分四

珍珠

色梅花冰片

製乳香

查藥物備  
要便知

薄荷末

分各二

共為極細末研至無聲放舌上無渣方可用清以骨簪蘸藥少許點眼治風火腫爛一切神效

又方

脂麻

威靈

仙何首烏

苦參

甘草

石菖蒲

錢各三

共為細末每服三錢黃酒下此係武當

山石刻仙方神效無比兼治頭風目疾

又方

苦參

錢半

五倍子

錢一

明礬

薄荷

荊芥穗

分各三

煎水臨睡時用綢絹輕輕避風洗之甚效之至

又方

黑棗

一枚

胆礬

分三

杏仁

即煉藥黃  
豆大二塊

黃柏

分三

水蒸透溫洗四五次冷則再蒸或加銅綠生姜汁少許立試立驗

又方

川連

防風

白菊花

歸尾

錢各一

甘草

銅綠

分各五

胆礬

分三

杏仁

泡水蒸熱照前法洗之甚效

肝熱目痛 龍胆草一味用瓦器熬成膏點入眼內瞽目俱能點去雲翳不可以平淡

而忽之也

又方

夏枯草

炒二兩

香附

炒二兩

生甘草

錢四

共為末每服錢半清茶調

秘方新編 卷一 目錄

一七

下數日即愈屢試如神夜間痛甚者更效此觀音夢授方也

腎虛目痛 四神丸 甘州枸杞上好新紅者一斤 用好酒浸一夜拌炒四起一起以川椒二兩

拌微炒一起以小茴香拌炒一起以黑芝麻拌炒以上三起均去拌者不用再以淨

青鹽二兩研末拌炒鹽即入藥外加 當歸頭 生地 白菊花 白朮 白茯苓

各四兩 共為末每於午飯後開水服三四錢久則目如童子屢試如神百無一失

目昏多淚 生地 熟地 川椒去子閉口者不用 各等分為末蜜丸梧子大每服五十九鹽米

湯空心下兩月後目如童子此呂仙方也

通治目疾諸方 珊瑚紫金膏 白蘆甘石一兩以能浮水者為佳用童便浸七日用炭火鎔銀砂鍋內煨和再入蓋便內浸十日曬乾研細末 黃丹一兩滾水飛過

三次曬乾研細末 乳香 沒藥各二錢俱入砂鍋內加燈心四分 海螵蛸二錢刮去皮甲微火炙過研細末 真白礬砂二錢 青鹽 射

香各五分 頂上牙色梅花冰片三分 以上均研成細末合一處乳鉢研極細然後入射香

冰片二味拌勻再研極細放舌上無渣方合用 用蜂蜜熬成珠先用絹袋瀝淨蜜渣夏老冬嫩春

秋酌看老嫩之間將藥末調入蜜內用磁罐封固以蠟封口不可洩氣此方治七十

二種眼疾屢用如神雖十年不愈者亦效惟瞳人反背而驚散者不效

天賜膏 點眼目障翳兗州朱秀才忽不見物朝夕祈禱夢仙人張三丰傳授此方

好焰硝一分 銅器鎔化入飛黃丹二分 頂上梅花冰片二分 銅篸攪勻入磁瓶收之以蠟封



口勿令洩氣每點少許其效如神 又方 治目疾紅痛日久不愈 蕤仁選白淨者去油不淨者去 調白蜜用骨簪點眼內角即能退紅止痛效驗之至 又方 治目疾時發時不效

愈 不見水羊肝四兩忌鐵器 搗極融爛開水冲服連服數次可保十年不發屢試神效

又方 治目赤腫痛數日不能開者 生薑一塊洗淨去皮用古銅錢刮汁點之初

點頗痛點後即愈 又方 治目赤腫痛 用自己小便乘熱綢帕輕輕蘸洗即閉

目少頃此以真氣而退肝熱之法也小便頭尾不用 又方 老能夜書 每年九

月二十三日用桑葉煎水洗目一次至老永不昏暗且夜能看細書其妙無窮桑葉

須五月五日六月六日立冬日採者為佳同黑脂麻等分蜜丸名為扶桑丸能除風

濕烏鬚明目

兩目晝夜不閉 一婦因受驚嚇兩目晝夜不合用郁李錢三酒煮飲之盡醉即愈神效

小兒疳積瞎眼生翳 草決明四兩曬乾勿見火研細末生雞肝水者不滯將雞肝搗爛和決明末錢三研勻加

酒飯上蒸服如腹脹如鼓加 蕪荑茶錢一目翳腹大加雞內金更妙 又方 火硝

一硃砂分五共為末每用四分不落水生雞肝錢一剖開入藥紮定酒蒸熟空心服輕者

一料重者二三料翳膜推去半邊而愈 又方 小兒科疳疾門內有消疳無價散

服之最妙雖眼瞎亦可復明

珠目蟹眼 蛇脫全者一條馬屁勃兩皂角子十四枚蟲蛀者切不可用共入磁罐內鹽泥封固燒紅勿令

出氣候冷存性出火氣研末每服三錢滾開水調下神效

眼生蘿蔔花 大蘿蔔齒一剗空入生雞蛋白齒一包好種土內待開花結子後取雞蛋白

研細加 白蘆甘石以浮水者為佳照前案金膏製法用一錢真熊膽五分頂上牙色梅花冰片一分共為末調蜜

點眼一日一次七日全愈神效

眼生星翳 白鹽少許燈心蘸點三五次不痛不礙累用有效或用 葶薺搗碎取汁

成粉去渣取粉點之甚效如不見效即照風火眼痛內吹鼻散及前後治雲翳各方

治之無不愈也

目中贅肉紅筋白膜雲翳諸症 消障救睛散 石蟹生研連翹各一錢羚羊角 草決

明 防己 荒蔚子 白蒺藜錢各一龍膽草炒酒木賊草各五分甘菊八分水二鍾煎八分

食遠服此方能消贅肉又紅筋白膜雲翳等症立見功效百無一失並治厥陰風火

上衝頭痛此王晉三所選祕方也體虛者勿服 又方 用老麻雀糞又名雀鉢中研

細以甘草水泡一夜去水與渣焙乾和初生男孩乳用燈心點之即消神效男用雄

麻雀糞尖而雙立者是女用雌麻雀糞圓而倒者是 又方 韭菜根洗淨用橘葉外裹男左女右塞

鼻中過夜即愈屢試神效 又方 麩仁二錢選白淨者去淨油青鹽錢一猪胰子兩共搗融爛用骨

簪點入甚效 又方 青萍少許研爛入頂上梅花冰片少許貼眼皮上過夜漸散

眼中急起翳肉 此症不過半日即遮白眼一日即遮黑眼用 刀上鐵銹滴涼水少

許用筷子頭磨起銹水點患處頻點頻開

目中生管 此即膜內之類 以上各方可治 用生白蜜塗目仰臥半日洗去每日一次自愈 又方 櫻桃

三去核炒研爲末紙捲條燒薰之即消

眼生紅子 有人白眼珠上生一紅顆頃刻頭面皆腫用 真熊膽 二粒 米大 開水調服立

愈

目中流血 用四物湯加龍膽草減半煎服即愈 又一婦眼中血出如射或沿鼻流

下月經不行乃陰虛相火妄動之症用 當歸 炒酒 生地 炒酒 酒芍 黃連 炒 黃柏 炒 知

母 炒 條芩 炒 木通 側柏葉 柴胡 桃仁 尖去皮 紅花 錢各一 水煎食前服次日即愈

眼中如有蟲行癢不可忍 羌活 枯礬 礬砂 入口無渣 方角 共研細末 口水調如米大

時將一丸納入眼中少頃棗湯洗下

眼内生蟲 紅棗去核用黑礬填滿棗內入炭火內煨過研爲細末再用朴硝放砂鍋

內熬煉滴水成珠取出候冷不必研末用棗礬末一二錢朴硝五六分一併和勻開

水對沖露一夜洗之三五次即愈

眼邊生蟲 覆盆子葉一錢末 乾姜一錢末 生礬各五 枯礬一分 共研細蜜調用細片做膏藥貼

眼上一夜揭起蟲黏絀上次晚又將肥猪肉切片貼眼上一夜即愈或照後銅綠方更妙

眼邊溼爛紅腫 名爛弦風眼用 川連四五分銅刀切成米粒大先以茶盃盛蕪艾

絨約半盃許上以薄皮紙封盃口先將其紙用針刺多孔將黃連鋪勻紙上用香火

將艾燃引上用一盃蓋住約俟艾煙燼時方揭去蓋住之盃取黃連十餘粒滴清水

兩三茶匙於飯上蒸過用鴨翎掃擦患處三日除根如不見效照後銅綠方治之無

不愈也 又方 鮮色銅綠三錢末 以生蜜濃調塗粗碗內用艾葉燒煙將碗覆艾煙

上薰之須薰至銅綠焦黑為度取起冷定以人乳調勻飯上薰過擦之諸藥不效者

用此如神百無一失並治痘後風眼

眼淚流膿 龍膽草 當歸各一錢 為末溫酒下 又方 將目閉住用熱牛糞敷一日

數次數日即愈

小兒鬮睛 黑眼珠呆而不動者是用 真西牛黃分五 白附子泡 肉桂 全蝎炒 川芎

石膏各一錢 白芷 藿香各二錢 共研末蜜為丸芩實大每服一二丸薄荷湯下

眼胞忽然紅腫發癢名針眼 背三節骨 有紅點用針挑破即愈如不用針

挑用燈心一燒即愈如不見點用木梳背頻刮之紅點自現出也 又方 臭蟲血每日點敷其效如神 又方 用蛇退皮貼之即愈 又方 白芨磨水點之亦效

眼皮翻出 石膏五錢 梔仁兩一 甘草兩三 豨薟草四兩酒蒸晒乾 防風兩二并微炒 共研細末體壯者每服

二錢弱者一錢小兒減半白滾水送下

白眼珠忽然盡黑毛髮堅如鐵能飲食而不能言其形如醉 此血潰症也用 五靈

脂錢二 研末酒冲服

眼胞生珠生菌音 堅凝不痛 黃丹五分 鯉魚膽汁和如膏點三五次自消 又方 藥

線見毒方 纏之即落 又方 取過江蜘蛛絲纏之即落凡蜘蛛牽絲搭過屋者謂之過江 又方 櫻桃核

磨水搽之自消

眼胞痰核 此症生眼胞皮裏肉外大者如棗小者如豆推之移動皮色如常硬腫不

痛宜服 化堅二陳丸見毒方 外用 生南星和醋磨濃汁時時搽之淺者數日即消

深者多搽數日微微用指甲擠出白粉即愈

眼珠無故湧出垂下大便下血亦有不便血者 名曰肝脹羌活煎濃湯乘熱先薰後

服即入或用羌活燒煙薰之更妙 又方 新井水洗眼數次即入 又方 防風

黃芩 白芷 川芎 蒼朮 細辛 生地 甘草 生姜 棗子 葱白水煎

服仰臥片時眼珠自然收上

眼珠暴出 淫羊霍 威靈仙錢各一 水煎服

眼珠縮入 老姜燒熱數眉心即愈

眼珠傷損 凡眼珠打出或觸傷腫痛或火炮沖傷用 南瓜瓢搗爛厚敷外用布包

好勿動漸次腫消痛定乾則再換如瞳人未破仍能視物瓜以愈老愈佳如無南瓜

用野三七葉敷或用生地黃浸酒搗敷亦可呼為倭瓜 又方 用牛口涎日點二次避

風即愈忌酒並各熱物 又方 如火藥沖眼欲瞎者急用熱小便頻洗即愈或用

野三七葉搗融敷更妙忌酒並熱物 又方 如眼珠受傷突出趕急揉進用 生

豬肉片當歸 赤石脂末少許搽肉上貼之即愈 又方 眼目打傷青腫以 生

半夏為末水調塗之即愈

眼被傷損不開 用前風火眼痛吹鼻散每日吹數次其目自開

箭頭入目 寒食錫糖即寒食所做米糖無則不 點入待其發癢一拔即出

蟾酥入目 紫草取汁點之即消

泥沙入目 頂粗牛膝一條約二寸長本人自行嚼爛如泥吐出搓丸塞於兩眼角其

淚流必多少刻泥沙裏藥盡出其目隨愈左眼以牛膝口內右嚼右眼左嚼雖腫痛欲瞎無不立效屢試如神

塵芒入目 生藕汁滴入自出

飛絲入目 薑汁滴二三點入目其絲自出即諸葛采冬用根同效伯羅札記

好墨磨濃用新筆蘸墨點眼角內閉目片時其絲自然成塊用手輕抹即出雜物入目亦可治并可散翳奇效之至 又方 凡諸藥不

效赤腫痛甚者以滾水一杯入食鹽少許 明礬<sub>錢三</sub>將舌尖浸入水片刻其絲自落

水中而愈 又方 火麻仁<sub>合</sub>搗碎井水一碗泡半刻攪勻將舌浸水中涎沫自出

神效

雜物入目 左手指甲<sub>以刃刮細末</sub>燈草蘸點一二次甚效如不能出即用好墨磨濃點之亦

效

眼瞳成漏 凡眼下空處生瘡出濃流水不乾日久成漏諸藥不應者以 柿餅去皮

取肉搗爛塗之十日全愈

拳毛倒睫<sub>眼毛顛倒捲縮刺目者是</sub> 木鱉子<sub>去壳</sub>為末綿裹塞鼻中左眼塞右右眼塞左一二夜即愈

切不可將毛拔去拔後重出毛硬而更拳將為終身之累 又方 冬天壁上乾蒼

蠅研末時向鼻內嗅之立愈 又方 五倍子為末蜜調敷眼皮上其睫自起

眼中常見異樣禽蟲飛走 棗仁 青箱子花即草決明花 元明粉各一兩 共研末每用二錢滾

水沖服三次自愈

增補瞽目神方 一婦雙目不見夢觀音大士云唸誦 能伏災風火 普明照世間

二語誦至百遍即愈試之雙目復明蓋此婦平日祀大士最虔故神靈默佑而愈  
後有人雙目不見初誦數千遍不效後虔心齋戒誦至數月雙目亦明

新增治產疹痘風眼神妙靈藥 潭州趙太尉母病爛弦疔眼即產風眼 廿餘年百藥不效

有老嫗云此中有蟲當採藥除之入山取草蔓藥咀嚼留汁入筒中以皂紗蒙眼滴

汁漬下弦轉盼閒蟲從紗上出數日下弦乾復如法滴上弦又得蟲數日而愈後又

治疹風痘風眼靈應如響草蔓藥者乃覆盆子葉用嫩葉汁無新葉乾者煎濃汁亦

可收藏之法候有鮮葉時入山採取不拘多少將葉洗淨吹乾水氣搗汁用絹篩過後再用細絹濾清入大磁盆內曬乾為丸如梧子大收貯用時將人乳或白蠟化開搽患上極妙

新增治痘後目瞽 用覆盆子根洗搗澄粉日乾蜜和少許點於瞽丁上日二三自

散須於百日内治之久即難療

新增偷針眼 生南星生地黃各等分同研成膏貼兩太陽穴腫自能消一法治眼圈

邊生胞用南星醋磨擦或紅茶磨亦可時時擦之數日即愈

新增眼目生翳 取鵝兒不食草一名地胡椒採取乾曬燥研末收貯 末搗鼻塞耳去翳神藥也





腎虛耳聾聲響如風水鳴如鐘磬聲 白毛烏骨雄雞一隻甜酒四觔煑食三五隻神

效 又方 真川椒用巴豆萸蒲同研細以松香黃蠟爲丸塞耳一日一換初起者

數日即通神效 又方 黃柏用人乳泡透炒枯研細末以黃酒打麵糊丸桐子大

每服七八十九開水下 又方 真磁石大蛋豆 穿山甲燒研 用綿包裹塞耳口含生

鐵一塊耳中如風雨聲即愈

耳中時聞螞蟻戰鬪之聲時開時閉 此腎水虧極兼怒氣傷肝所致用 柴胡 梔

子 白芥子錢各三 熟地 白芍 棗肉錢各三 麥冬兩一 水煎服方中純是補腎平肝之

聖藥飲之數日其聲漸息服至一月全愈

耳閉不通又作痛 大田螺筒一撥開蓋入麝香分五 自化成水滴入 又方每日平明以

大食指捏住鼻孔勿令泄氣咬牙努目口唇閉緊使氣俱入耳竅悶極放手時

行之久則自效如神

少壯病後耳閉 南棗斤半 桂圓兩四 葱半斤此 煑服三五次自通忌鹽數日

風木之鬱耳脹欲閉 連翹錢二 羚羊角 薄荷梗 苦丁茶 夏枯草 生香附錢各一

黑山梔牛一錢 水煎服

膽火上鬱頭重耳脹目微赤 連翹 牛蒡錢各二 羚羊角 薄荷梗 桑皮錢各一 丹皮

牛錢水煎服

耳鳴耳癢 生烏頭一箇乘濕削如棗核大塞耳日換數次過三五日便愈不然則成聾

耳疔震耳纏耳停耳風耳 各症俱係耳內悶腫出膿但膿色不一而名各異耳疔則

出黑色臭膿震耳則出青膿纏耳則出白膿停耳則出黃膿俱由胃濕與肝火相兼

而成惟風耳則出紅膿偏於肝經血熱俱宜用 醬茄自然油滴入多不宜俟膿浮出

再用核桃仁胡桃又名桃研細擰油去渣每油一分對 冰片分二用少許滴耳自愈風耳內

服四物湯加 丹皮 石菖蒲 餘症內服清肺瀉肝諸藥 又方 新鮮白鰲音

魚腦中枕骨燒紅候冷每兩加冰片錢一共研細麪如灰先用棉花絞淨膿吹藥二三次

即愈此林屋山人經驗方也 又方用 番木鱉磨水滴耳內即愈 又方 大人

小兒耳內生疔出毒之後膿水久久不乾或傷水濕在底停耳成膿臭穢之水時流

出者用麥小粉以醋煎滾打如漿糊晚上搽於耳之前後留出耳上不搽以紙一張

裂縫套耳蓋之免污枕被次早洗去晚上再搽不過三五次膿乾痊愈此法屢試屢

驗 又方 青魚膽和冰片滴之即愈 又方 蛇退燒灰少許吹入極效耳內如

有蟲奔走或流血水或乾痛難忍用之俱效 又方 桑螵蛸一箇燒存性麝香分一研末搽

入神效有膿先絞淨 又方 鱧魚血滴入神效 又方 抱過雞蛋殼內白皮黃妙

研末香油調灌耳內痛卽止 又方 胭脂 枯礬 鐵銹各等分 爲末吹之立效

又方 蟲蛀竹灰加麝香少許吹入極效 又方 用頭髮瓦上燒存性爲細末每

一錢加冰片七釐研末吹少許入耳甚效 又方 白礬研煨入麝香少許綿裹塞耳

中

耳內膿血腫痛有虛有熱其症不一甚至痛不可忍夜難安枕 用以上各方如不見

效用韭菜自然汁灌入百發百中其效如神

耳內膿血不乾 石榴花片瓦上焙枯研末加冰片少許吹入三四次卽愈其痂不必挖動

聽其自落爲妙或用龍骨研末吹入亦可

耳內有蟲膿血不止 雞蛋一箇香酒炒 猪肝三五錢香油炒 黑芝蔴一研升炒 同搗融微火烘煖布裏貼耳

外血蟲出盡卽愈

耳痔耳茸耳挺 耳痔形如櫻桃或如羊奶耳茸形類初生菌子頭大蒂小耳挺形如

棗核細條而長齧出耳外俱由肝經怒火腎經相火胃經積火凝結而成微腫悶痛

色紅皮破觸之痛引頭頂用 硃砂一錢錢 輕粉 雄黃各三錢 冰片五釐 研細末水調濃

用谷草細梗咬毛蘸點患處並用 梔子 川芎 熟石膏 當歸 牛蒡子 柴胡

酒芍 甘草 丹皮錢各二 黃芩 黃連各五分 水煎食後服自愈

耳內生疔 耳內生疔痛如錐刺牽引腮腦亦痛破流血水人多作耳痛治之不知乃

耳疔也 急服蟾酥丸見雜毒方 取其發汗再用 蟾酥丸水調濃汁滴耳內並服黃連

消毒飲見前 立愈或照疔瘡各方治之亦可

耳內生粒如梅花子大極痛名耳疔 人指甲瓦上焙枯存性研末加 牙色梅花冰

片少許吹入極效

耳內有核痛不可忍 燒酒滴入側臥半時即可箝出如不見效即照前耳疔耳痔各

方治之

耳內如有蟲走或血水流或乾痛難忍 蛇退皮燒存性研末吹之立愈

耳內耳外生瘡 蚯蚓糞為末吹入用麻油調搽 又方 黃柏錢五 馬齒莧兩一 為末敷

之

耳外溼瘡 雞腰膏見雜毒方 敷之其效如神 又方 黃丹錢一 松香分八 輕粉 枯礬各一分

共為細末香油調擦甚效 又方 枯礬 輕粉 貝母 銀硃共研勻麻油調塗

甚效

耳後銳毒 患發耳後又名耳後瘡宜別陽實陰虛治無一錯患色白者以陽和丸與

二陳湯同煎服或以小金丹服消色如紅者醒消丸服消諸書不拘紅白概以元參牛蒡等藥治之即紅色者尙服不消偷色白者更遭其害矣南濠葉姓耳下並患惡核一被醫穿生管一大如盃以陽和小金輪服未潰者全消此林屋山人秘法也

又方 南星性燥 爲末醋調敷三次即愈不愈即用前方無不效也陽和諸方見癰毒陰疽各門

耳下生瘡 有人耳下生瘡其大如桃時出膿血數年不愈後用鉛粉搽之三日收功

耳被挖傷 金頭蜈蚣一條瓦上焙存性研末吹入立效 又方 青魚膽箇一紅花錢一

元參 生地錢各二 蒸出濃汁灌入耳內即愈 又方 冰片 胭脂燒粉 牡蠣殼粉 共爲

末用骨簪點香油蘸末入耳內即愈

兩耳脫落並治鼻落 用人髮入瓦罐以鹽泥封固煨過爲末急以所傷耳鼻蘸藥安於舊

處再用老姜嚼融四圍厚敷用綢捆定自安

耳中有物不出 用弓弦或麻繩將一頭搓散用好魚鱗黏着放耳內其物徐徐引出

壁虎入耳 雞冠血滴入即出

蜈蚣入耳 生姜汁或韭菜汁灌入即出 又方 炒肉放耳邊聞香自出烹雞更妙

螞蝗入耳 取田中泥放耳邊自出

蚰蜒入耳 生半夏末麻油調塗耳門蟲聞香卽出 又方 香油和雞冠血滴入卽

出或用水調綠礬灌入蟲卽出 又方 白洋糖又名白沙糖熟水調濃汁滴耳內蚰蜒化

爲水 又方 羊乳滴入亦化爲水流

蛆蟲入耳 用杏仁搗如泥取油滴入耳中非出則死 又方 皂礬搽之卽化爲水

飛蛾入耳 用銅器向耳邊敲打自出

螞蟻入耳 用手將耳扯動卽出或用穿山甲燒灰研末調水灌入卽出

諸蟲入耳 不可驚動用手緊閉耳鼻閉口不言蟲入之耳不閉少頃自出或用好醋

麻油韭汁葱汁姜汁此數種隨便而灌耳中其蟲自出 又方 白雞冠血滴耳中

立出 又方 川椒末醋浸良久取汁灌耳中行二十四步蟲自出 又方 桃葉

作枕枕之蟲自鼻出或火熨桃葉捲之取塞耳立出 又方 如蠅蚊小蟲用麻油

數點滴入耳中蟲卽死取出卽瘥 又方 如在夜間暗入者切勿驚惶响叫逼蟲

內攻宜端坐點燈光向耳竅其蟲見光自出若有人在傍其蟲不出人皆避開方效

水銀入耳 照解救諸毒門水銀毒方治之

新增冬寒耳凍伯禮薑汁熬膏搽之 耳內外紅腫癢痛 浮甘石 海螵蛸 蜜

陀僧 青黛各五分硃砂少許細研敷之如破雞蛋清調敷 耳生毒瘡痛雞子清磨

明攀塗之三四次消即愈

鼻部

鼻血不止 用燈火以燈心一莖點清油燒之在少商穴燒一下立止穴在兩手大指內外甲縫之中不上不下即是左流燒左手右流燒右手雙流雙燒有人鼻血三日不止口內亦流百藥不效勢甚危急用此立止止後半刻復流仍在原處燒之而止如原處起泡將泡刺破燒之止後照後艾栢飲服之方免復發鼻衄方多惟此方百發百中誠救急第一方也

艾栢飲 艾葉

栢子仁去淨油

山萸肉

丹皮

大生地錢各一

白蓮肉去心

真山藥錢各二

澤瀉錢一

生荷葉一張乾者不效

水煎服無論虛實至重不過二三服永不再發屢試如神萬無

一失前方雖妙只可救急不能斷根此方可杜絕源流亦治鼻血湯藥第一方也

又方 四生丸

生地葉無則用生地搗汁亦可

生艾葉

生荷葉乾者不效

生扁栢葉各等分

共搗爲丸

每服三錢有人傷寒病後鼻血三日不止百藥不靈服此立愈屢試如神亦奇方也

又方 用多年尿壺火上烘熱向鼻薰之立止如神百發百中 又方 用線紮

緊手中指第二骨節灣屈之處即止左流紮右右流紮左雙流雙紮極效 又方

急將本人頭髮解開放涼水盆中良久即止仍服涼血清血之藥至神至奇髮浸水



中不可太久心內覺有涼氣卽止久則恐生別病 又方 青苔放顛門上將顛門

向壁頂住立止如神或取本人鼻血以紙撚蘸血點眼角血從左鼻流者點右眼從

右流者點左眼雙流雙點甚妙 又方 韭菜搗汁蒸微溫服甚效 又方 鳳頭

白鴨蒸食數隻斷根極效此鴨出廣東順德縣廣西義甯北流兩縣又真高麗參嚼

食忌蒸煎食至數兩斷根極效

口鼻流血 此亦因鼻血過多以致從口而出照前第一方治之若係婦人恐係月經

閉塞須查婦人科治之

鼻忽縮入 明雄 淨硃砂各三錢 用蒼朮煎水調服將煎過蒼朮搗爛敷鼻上過夜卽

愈

鼻忽脫落 治法見耳部兩耳脫落方

鼻孔爛穿 此名鼻疳用鹿角剉碎 枯礬各一兩 頭髮五錢 共研爲末先用花椒水洗淨

敷藥或用牛牙散見難毒 白油膏見難毒 更爲神妙 又方 杏仁去皮尖 用紙壓去油以

成白粉爲度每杏仁粉通治門 對真輕粉錢一 和勻吹入 又方 五倍子燒灰存性研末

以黃蠟與猪油和勻敷之

鼻內生蟲 金剛藤上疙瘡音隔 數箇 雞蛋一枚煮熟將蛋去殼再煮良久先將藥

罐向鼻薰之再用蛋向鼻滾擦其蟲自出以盡為度極效 又方 雞蛋一箇 豬肝炒 豆豉粒七 搗融新瓦焙乾雞蛋白和勻作餅放鼻孔邊引蟲出盡即愈忌婦人雞犬見 又方 韭菜子燒煙向鼻薰之引蟲出淨自愈 又方 明雄研末向鼻中時時嗅之極效

鼻中生瘡 苡米 東瓜煎湯當茶飲神效無比 又方杏仁尖去皮 搗成膏用人乳調

塞鼻內 又方 黃連膏 黃連 黃柏姜黃錢各三 歸尾錢五 生地兩一 用香油十兩將

各藥熬枯去渣用夏布瀝淨再加黃蠟兩四 溶化離火攪勻候冷鼻內乾燥如火者用

此搽之立效 又方 嫩桃葉搗爛塞鼻無葉用枝亦可 又方 元參研末吹入

或以水將元參泡軟塞鼻亦可 又方 陀僧 白芷錢各二 共研末蠟燭油調搽甚

效

鼻中生痔 甜瓜蒂錢四 甘遂錢一 枯礬 螺殼灰 草烏灰各五分 為末麻油調作丸如鼻

孔大每日以藥塞入一次其痔化為水肉皆爛下即愈照上苡米方治之更妙 又

方 輕粉錢二 杏仁去七粒 白礬錢五 共為末吹入鼻中即化為水 又方 頂上梅花冰

片點之雖痔肉垂下亦入或用生藕節連鬚瓦上焙枯研末和頂上冰片水調敷之

尤妙

鼻中肉塊名曰生藕節連瓦上焙枯研末吹入其肉漸漸自落屢試如神並治鼻中

生瘡 又方 枯礬 生猪油和綿裹塞鼻中數日肉隨藥出

鼻流清涕不止 生花生斤四五入鍋內令本人親手拌炒炒之數次即愈神效

鼻流臭水名曰鼻濁 又名腐漏此症從腦頂一股酸氣由鼻孔而下臭不可聞用 真松花粉時時

嗅入鼻中有人患此數年百藥不效以此方治之半月斷根 又方 乾葫蘆瓦上煨 枯研末

時時嗅入鼻內並用此藥對酒飲或調粥服神效 又方 絲瓜藤又名水瓜 又名綠瓜取近根

下者一尺瓦上煨 枯研末嗅之並沖酒服極效 又方 老刀豆研枯末酒調服三錢重者三服

即愈

鼻塞出水日久不聞香臭 蒺藜兩搗碎煎水先含滿口並以一合滴入鼻中嚏出一

二肉蟲即愈 又方 鐵鎖鬚磨石上取末和生猪油塞入有肉蟲出即愈

鼻塞不通 通草 細辛 附子共為末蜜調綿裹納鼻中

各項鼻病 凡鼻淵鼻痔鼻中肉塊鼻塞鼻瘡等症用 辛夷花苞又名水筆花 又名鼻蓮蓬去赤肉毛

子用芭蕉煎水泡一夜焙乾為末加麝香三釐葱白蘸入鼻孔數次極效

鼻中生毛晝夜可長一二尺漸粗如繩痛不可忍 此食猪牛羊血過多所致用 礪

砂 乳香等分為丸服十粒毛自落 又方 猪毛焙存研末吹入鼻中即愈如食

牛羊血過多者或加牛羊毛亦可

鼻垂紅線尺許痛甚欲死 真硼砂 頂上牙色梅花冰片各一分 爲末以人乳調之輕

輕點在紅線中間頃刻即消

鼻大如拳疼痛欲死 黃芩 生甘草 麥冬 花粉各三分 桔梗 天冬各五分 紫苑二

百部 紫蘇各一錢 水煎服四劑即消

諸物入鼻脹痛不出 牛油如棗核大納鼻中油溶則物潤而隨出矣

鼻外生瘡 杏仁去皮尖 乳汁調搽即愈

鼻梁窄痺 此肺熱也用 知母 川貝母 水梨肉各二兩 水熬膏服 又方 乾荷

葉邊 連翹心 白芷 滑石各三錢 蔓荊子 苦丁茶各一錢 水煎服數劑即愈

鼻準紅赤名酒 食鹽研細每早擦牙噙水漱口吐入手中洗面月餘自愈 又方

白果嚼融和甜酒糟夜敷日洗甚效 又方 蕎麥麵燒灰存性研細麻油敷之

又方 雄黃 硫黃各五錢 水粉二錢 用頭生乳汁調搽三五次即愈 又方 玉容粉

見面 搽之極效

鼻血不止伯禮 搗蒜貼足心引熱下行即止梁上塵嗅之亦效 又方 亂髮燒

灰吹鼻即止

增新

草靈丹 鼻中時流黃色濁涕名曰鼻淵此症因膽經之熱移於腦髓外因風寒凝鬱火邪而成用鮮鵝兒不食草一名地胡椒塞鼻立刻應效久而不愈鼻中淋瀝腥穢血水頭眩虛暈而痛者必蟲蝕勝也名控腦砂亦用鮮草塞鼻數次即愈久則必虛宜內服補中益氣湯方能痊愈

增新

治鼻紅 用鵝兒不食草嫩頭陰乾研細末薄漿爲丸梧子大黑山梔極細末爲衣塞鼻立止

增新

豆粒塞鼻不出編中雅 小兒無知誤將豆粒塞入鼻孔又用手指自挖進入關內豆

增新

因鼻涕放大腫脹痛甚百方不能取出法用二人以一人將兩手掩緊小兒兩耳竅叫小兒眼目閉緊一人用手掩住無物鼻竅以口對小兒之口用力一吹豆即落下

青蛤散 治鼻生粟米瘡 此瘡癢痛破流黃水由脾胃溼熱外搏風邪而成 方用蛤粉錢一煨石膏錢一青黛分三輕粉分五生黃柏分五共研細末先用香油搗融再加香油化開搽上

唇部

應參看口百各部

唇中腫大 生蒲黃錢二川連 頂上梅花冰片錢各一 共爲細末蘇油調敷

唇中及唇邊口角生紅白顆粒 此即疔瘡有頭疼寒熱痛癢等症亦有麻木不知痛

癢者須查疔瘡門趕緊治之

嘴唇生瘡瘡內生齒 此七情憂鬱火動而生此怪症也用 柴胡 白芍 當歸

生地<sup>各錢三</sup> 川連 川芎 黃芩<sup>各錢三</sup> 天花粉<sup>錢二</sup> 白果<sup>十箇</sup> 水煎服外用頂上梅花冰片

分一 蘊蠶末<sup>錢一</sup> 黃柏<sup>二錢</sup> 炒 共為末摻之即愈或照下頭生白腫塊治之必效

口唇腫黑痛癢不可忍 大銅錢<sup>四箇</sup> 於石上磨猪油時時擦之照疔瘡治法亦可

嘴唇四圍瘡如黃蠟 旋覆花放瓦上火煨存性研末用真麻油調搽即愈 又方

葵花根照前焙研麻油調搽雖經年不愈亦效

口角生瘡 燕子窩連泥帶糞研末麻油調 又方 砂仁壳放瓦上火焙研敷即愈

口唇赤腫發癢或破爛流水 銅青<sup>錢五</sup> 宮粉<sup>錢三</sup> 明礬<sup>一分</sup> 冰片<sup>一分</sup> 黃連<sup>二兩</sup> 共熬膏敷臨

用加麝香<sup>一釐</sup> 冰片<sup>五釐</sup>

口角四圍乾燥時以舌舐口水滋潤紅腫難堪 松毛煮豆腐約半日久取豆腐貼之

日換數次雖多年不愈亦能斷根真神方也

口角流涎浸溼紅腫 方見口部

口唇緊小<sup>照後唇齒治之必效</sup> 此名繭唇又名翻唇初起口緊不能飲食若不急治難救用新白

布作捲如酒杯火燒燃放刀口上俟刀口汁出取汁搽之日搽十餘次並以青布燒

灰沖酒服極效 又方 五椀子 蜜陀僧錢各二 甘草分二 共爲末另用黃栢錢二 將各

藥水調敷黃栢在火上烘乾再敷再烘藥盡爲度然後將黃栢冷透作薄片貼上連

換數次過夜卽愈 又方 五椀子 訶子肉分等 爲末香油調敷神效

缺脣 先用麻藥見難毒 敷上然後用刀割開兩邊薄皮用絲線縫好以生蟹黃敷之靜

坐七日勿言勿笑自能收口或用 龍骨 白蠟分等 爲丸搽上用花針穿絲線縫好

外用竹片夾住坐靜室七日勿言勿笑自愈

脣破生瘡 瓦松 生姜汁 搗融入鹽少許敷之

脣邊生瘡多年不愈 藍靛音殿 葉取汁洗之數日卽愈

冬月脣乾血出 桃仁搗爛猪油調敷

嘴脣陡然翻突形如猪嘴 此名脣菌症乃心脾熱毒所致對時必死無藥可救急燒

兩手少商穴查鼻部鼻血 一面用活地龍十條搗爛又名曲蟮 吳萸研二錢 加灰麵少許熱醋

調敷兩脚心用布捆住半日一換以愈爲止又用活癩蝦蟆一箇又名老蟾 破出血仍

照上口脣緊小第一二方治之或可救也 又方 查卷十一癩毒門疔瘡內救脣

湯服之亦可或用溇雞糞敷之亦妙

口部 應與舌齒各部參看小兒口內生瘡見小兒科

口生肉穉有根如線吐出乃能飲食捻之其痛入心 此名血餘症用真麝香錢一研末

作兩次服自愈或用人髮燒灰服亦可

口內上脰生癰 此亦名懸癰生口上脰形如紫葡萄舌難伸縮口難開合鼻內出血

時寒熱急用食鹽燒紅枯礬各等分研細末以篋頭蘸點日三五次自消

上脰生蟲癢不可忍 有人上脰癢極凡遇飲食更甚後有一蟲墜下急忙扯出而愈

竟亦無恙

口舌生瘡 吳茱萸標去研末好醋調敷兩足心過夜便愈性能引熱下行故也 又方

天冬 麥冬心並去 元參分等為末煉蜜丸如彈子大每噙一丸雖連年不愈亦可斷

根此林屋山人經驗方也 又方 五倍子末摻之吐出涎水便可飲食極效 又

方 川連 北細辛各二分 生研極細末以小管吹入瘡上神效此方熱因寒用寒因

熱用功成而無偏勝大人小兒並治切忌入喉 又方 輕粉三分 硃砂 明雄各七分

冰片四分為細末先用薄荷水或茶漱口將藥吹入應驗如神或用人中白散見齒部治

之亦效 又方 黃栢蜜炒研末搽之神效 又方 因服輕粉口破者用三四年

陳醬化水時時含口漱之 又方 口瘡無論新舊夜臥時自將兩腎子以手握緊

左右交手揉三五十遍夜夜揉之勝於服藥



口臭難聞 每夜臨睡時含荔枝肉一二枚次早吐去半月見效 又方 每早洗面

時用白牽牛粉擦牙漱口日久自無此病 又方 益智仁一兩甘草二錢共為末每用

一二錢乾吞下心氣不足口臭者最宜或用蜜陀僧錢一醋調漱口亦可 又方 茴

香煑羹或生食之極效或用鹽梅時時含之

夜臥口渴喉乾 元參片二三 含口中即生津液大有功效

口角流涎浸溼紅赤 此脾冷也用 白朮 青皮 炮薑各五分 法夏 木香 丁香

錢各一 共研細末米湯為丸如粟米小兒一歲者服十九丸大人每服三四錢服完自愈

如不效則係脾熱須照後方服之 又方 治脾熱口角流涎 焦朮 滑石各五分

扁豆 茯苓 石斛錢各三 黃連分二 葛根分一 甘草分一 共為末燈心湯調下小兒每服

一錢大人每服三四錢

### 舌部

舌脹滿口凡中木瓜葉其舌亦腫脹滿口方見解教諸毒門 此症由心經火盛以致卒然舌大腫硬咽喉閉塞即時氣

絕名曰嬰舌至危之症急用皂礬不拘多少放新瓦上火煨紅色攤冷研細以磁調

羹攪開牙關或用鹽梅擦之或用半夏擦之自開將藥擦舌上立效如神再用鍋底

烟三錢以燒畢者為佳燒燻炭者忌用 沖酒送服若舌腫而喉內有痰者即是喉風須查咽喉各方治之

又方 醋調鍋底烟子敷舌上下最效多敷更妙 又方 雄雞冠血擦舌上嚥下

卽愈 又方 蒲黃研末搽之如因寒而得者須斟酌調治爲要 又方 葶麻子

四十粒 紙上取油將油紙燒烟薰舌卽消若舌上出血薰鼻中自止 又方 諸藥不

效者以針刺舌下兩旁血出卽消切勿刺中央刺則血出不止難救若已誤刺醋調

百草霜塗之

舌忽腫出口外或長數寸 此亦心火熱極所致用雄雞冠血一小盞以舌浸之卽縮

或照上舌腫各方治之 又方 真川連錢三四煎濃汁以舌浸之亦效 又方 井

水一桶令人提起一人引病人前來不可說明將近身卽劈面潑去其舌自收此方

暑天始宜收後仍以川連錢二煎水服之

傷寒熱病後舌出寸餘不收 頂上梅花冰片研細搽舌上應手而縮須用五錢方效

舌出口角時時搖動 此名嬰舌風用翠鳥舌舌須取出陰乾備用在兩額上點戳幾下卽愈

舌忽縮入 銀針刺破舌尖出盡惡血以蠟燭油搽之卽愈

舌上出血 舌忽出血如湧泉或紫或黑由心火上炎以致血熱妄行用 六味地黃

丸見內外備用諸方內加 槐花錢三煎服立愈或照以上舌腫諸方治之以鍋底烟子敷之更妙

又方 茅草根 生車前子 亂髮各爲末吹擦立止此林屋山人經驗方也

又方 槐花炒研搽之或用頭髮燒灰醋調敷之

舌頭潰爛 凡舌爛痛極飲食難進宜用吳茱萸三四錢研末好熱醋調敷兩脚心用

布捆好對時一換其效如神或兼用人中白散見齒部治之更妙

舌上生菌 此惡症也初起如豆漸大如菌疼痛紅爛無皮朝輕暮重由心脾熱毒所

致用 礞砂 人中白分各五 瓦上青苔 瓦松 溇雞糞錢各一 用傾銀罐子二箇將

藥裝入封固外用鹽泥封好以炭火煨紅待三炷香為度候冷開罐取出入頂上梅

花冰片 麝香分各一 共研細末臨用時先以磁針刺破血菌用藥少許點之再以蒲

黃末蓋之內服二陳湯見內外備用諸方 加黃連 黃芩 薄荷煎服即愈或用上方地龍吳

茱萸塗足之法更妙 又方 取蜘蛛絲搓作線一條打圈套在菌根上其絲自漸

收緊收至極痛忍耐片時菌落血出用百草霜敷或蒲黃末敷俱效再用 六味地

黃湯加槐花錢三煎服並治重舌甚效

舌硬生衣 犀牛黃 硃砂分各一 玄精石兩二 共研細末將舌尖刺出紫血用此藥搽之

即愈此林屋山人經驗方也

舌下重生小舌參看小兒雜治門重舌各方 照上舌菌第二方治之 又方 黃連 山梔 荊芥

黃芩 連翹 木通 薄荷 牛旁錢各一 甘草分五 燈心一小團水煎服小兒減半服

舌下細粒如豆 此肺癰也查癰毒門肺癰方詳細辨別治之

舌下生數尖或遍口生瘡如蓮花又如粟米 患此症者飲食減少氣喘生痰手足俱

冷用針刺破兩邊尖者中間斷不可刺切切記

舌下腫痛 此亦重舌之類用 蒲黃錢五煎濃汁去渣含口中數次極效

舌下痰包 用無雜色的白馬糞放新瓦上焙乾研末加頂上梅花冰片爲末敷上立

愈或照上舌病各方治之

小舌落下 用鹽橄欖連核燒灰存性研末吹之卽上或用 吊楊塵灰點之或用

食鹽炒熱點之均效總宜先用筷子將大舌根壓住然後吹點方能上也

小舌生紅泡子與咽喉症不同 蛇床子兩二罐內燒烟吸入喉中自消

補斷舌法 凡人遇含刀在口割斷舌頭已垂落而未斷用雞蛋內白軟皮套住舌頭

另以 天花粉兩三赤芍兩二姜黃 白芷兩各一爲末蜜調塗舌根以白蜜調白蠟稀稠

得宜敷在雞蛋皮上日敷數次三日舌自接住去雞蛋皮再用蜜蠟勤敷七日全愈

又方 如跌撲穿斷舌心血出不止以鵝翎蘸米醋頻刷斷處其血卽止 或用

瘦猪肉片貼之更妙仍用 蒲黃 杏仁 硼砂少許爲末蜜調成膏噙化而安

又方 活蟹箇一炙乾爲末敷上卽能生肌藥宜預製以備急用 又方 活蟹灰燒

乳香 沒藥錢各二 塗之即生肉如咬去脣舌用川烏草烏爲末攤紙一條以涼水調合貼之即不覺疼

齒部

牙齒疼痛 牙痛不外風火蟲三項又有虛火實火之分虛火其痛甚緩日輕夜重實火痛不可忍風痛者痛而且腫甚至頭面皆痛呵風亦痛蟲痛者發時必在一處叫號不已亦有虛痛總在一處者治法雖多初服甚效而再發服之不效蓋虛實各有不同故也古方有分別上下左右按經施治之法試之不甚見功效未列入

玉帶膏治疔氣去風邪止火痛固牙齒及搖動不能食物者臨臥時用花椒水漱淨每

用一片貼牙根上次早取出毒重者其色黑毒輕者其色黃方用 生龍骨兩二 宮粉

五錢兩 頂上梅花冰片 麝香 真礪砂各二錢五分 淨黃蠟兩二 除黃蠟外將上五味研細末

和勻聽用先將黃蠟溶化離火即入前藥末攪勻用棉紙將藥傾上用竹刀刮勻如

膏凝難刮又用熱湯薰透使軟再刮勻攤紙上剪作一小指寬一寸長收貯磁瓶內

封固勿令泄氣京市專以此收其利也

竹葉膏 生竹葉去穢淨一斤 生薑兩四 淨白鹽兩六 先將竹葉熬出濃汁又將薑搗汁同熬瀝淨

將鹽同熬乾如遇牙痛用擦一二次即愈其效如神蘇州重兌重換不易得也 又

方 老蒜二錢輕粉錢一同搗融敷經渠穴穴在大指下用蜆殼蓋上紮住用別物男左女

右少頃微覺其辣即便揭去隨起一泡立時痛止泡須挑破措盡毒水曩者年中丞

弱冠時患此每發一次呼號累日飲食不進有喇嗎僧寶如授此方用之數十年不

發真仙方也 又方 上方如不知穴處即用 老蒜搗爛如蠶豆大敷在大指二

指手背下微窩處亦極神效 又方 在肩尖微近後當骨骺陷中以蒜片蓋住

上用艾一小團大如豆燒五次左牙痛燒左肩右牙燒右肩燒後頸必大痛良久齒痛

永不再發百方不效者惟此立驗亦神方也 又方 骨碎補二兩銅刀切細又名毛姜又名猴

食鹽錢五桑椹子錢五瓦鍋內熬成膏去淨渣早晚擦牙良久吐之不惟可治牙痛且能

固齒益髓去骨中毒氣牙動將落者擦一月後再不復動 又方 川椒分三細辛分二

此法必須容準多則頭必牽引作痛 白芷 防風錢各一共用滾開水泡透時時含水入口片刻吐去再含無

論風火蟲牙莫不見效不可輕視 又方 皂角 生薑 地黃 旱蓮 槐角子

荷葉蒂 細辛 青鹽錢各一升麻分五共研末擦之此方西嶽蓮花峯斷碑中抄出屢

用皆效 又方 烏梅燒存性研末加 頂上牙色冰片少許擦之神效冰片用時

方加以免出氣 又方 石膏錢二胡椒粒三共研細末敷之極效

陰虛牙痛者疑痛 枸杞兩一蒸瘦猪肉食一二次神效之至 又方 牛膝去心鹽水炒五錢 猪腰

一衛生者  
養所生者

煮粥食立效 又方 生附子研末口水調敷兩脚心極效 又方 核桃

穀胡 四五筋打至粉碎加川椒食鹽少許熬成濃汁攤冷時時漱齒極效

陰虛邪火上蒸牙痛連及頭項 此症陽明有餘少陰不足宜用玉女煎 熟地錢五 麥

冬心石膏錢各三 知母 牛膝各一錢五分 水煎服

風熱上蒸牙脹頭痛 連翹 滑石 銀花 西瓜青皮 生菘豆皮 活水蘆根各三

水煎服或照後風火牙痛各方治之

風火牙痛屬外發腫者是  
呵風痛者亦是 生地搗爛加潮腦少許不可多 捶勻貼患處吐出涎水神效 又

方 陳鹽梅子含口內吐出涎水數次即愈 又方 五倍子末冷水調敷腮頰甚

效 又方 木患子又名洗  
手葉 三四箇去核用生鹽塞滿加雄黃少許燒成炭研末冷透

火氣加頂上牙色梅花冰片和勻擦牙吐出涎水再擦再吐涎盡自愈極效 又方

生絲瓜一條又名水瓜  
又名絲瓜 擦鹽少許火燒存性研末頻擦涎盡即愈腮腫用水調末敷

之極效 又方 莧菜根燒灰敷之極效 又方 北細辛 北五味各三 共搗爲丸

塞痛處立效如神

蟲牙作痛痛在一處齒縫有  
膿或無膿皆是 明雄末二 真小磨麻油兩四 調勻含口漱片時吐出再漱數次即

愈有人蟲牙痛不可忍飲食不進百治不驗用此斷根屢試神驗此治蟲牙第一方

又方 雄黃末和棗肉爲丸塞牙縫日換數次極驗 又方 五倍子煎濃汁含漱數次其蟲立死其患永除

牙根腐爛

名走馬牙疳

凡大人熱病之後及小兒痘症之後火毒流於胃經致有此患勢

甚危急甚則落牙穿腮透鼻一二日即能致命故有走馬之名言其驟也此症有五不治不食爛舌根不治黑腐如筋者不治白色肉浮者爲胃爛不治牙落穿腮鼻臭不堪聞者不治山根上發紅點者不治如是凶險命在須臾急用 生大黃錢三丁香

錢十菉豆錢二共研末熱醋調敷兩足心最爲神效仍照後金鞭散治之庶幾十可救五

金鞭散

綠礬五兩煨赤透

人中白煨三兩

明雄兩二

真麝香錢一

頂上梅花冰片錢一

先將銀針

挑刮去腐肉紫血然後將藥研末敷之吐出毒血惡涎方能愈也 又方 赤霜散

專治走馬牙疳

紅棗一枚

去核入紅砒一粒如黃豆大

紮好放瓦上炭火炙至棗枯煙盡爲

度取出用碗蓋住候冷加

頂上梅花冰片一分

研末將患處洗淨吹入效速如神久

爛之孔生肌亦速此方較前方簡便而極效驗乃林屋山人祕傳也 又方 生南

星一箇當心剗空入雄黃一塊麵裹燒候雄黃燒融取出用碗蓋住候冷去麵爲末入麝

香少許拂瘡數日甚效此亦林屋山人方也 又方 人中白散治男婦大小走馬

牙疳並咽喉疼痛腐爛紅赤舌腫齟臭映血牙牀潰腐等症極效 人中白 兒茶



真青黛

真礪砂

錢各一

薄荷

元明粉

馬屁勃

分各五

頂上梅花冰片

分二

共研極

細

如灰細放舌上無渣為度

搽之如病重者加真犀牛黃分三珍珠分五其效更速咽喉病用筆管吹入

日三次夜二次更妙

牙痛腿痛

名青腿牙疳

此症兩腿形如雲片或紅或青大小不一痛而腫硬步履艱難其毒

上攻以致牙根腐爛甚至穿腮破唇雖說話高聲亦痛照前走馬牙疳各方治之腿

上腫處用清水膏見湯火治之神效無比或用磁鋒刺破出血以牛肉片貼之日換數

次甚驗或服六味地黃湯見內外備用諸方十餘劑亦可內去山萸肉為要又方一人患此癰毒八年不愈一乞食道人用艾火在耳

門內尖上切蒜片隔住連燒五下立時全愈神妙非常左痛燒右右痛燒左或兩耳全燒無不奇效或不用蒜以燈火燒之更妙

盤根牙癰 牙根破爛甚至牙骨通身脫落須用金素丹見癰毒搽綿紙上捲成紙擦塞

牙根邊久塞可保不脫如遇飲食可去藥條日換數次亦無妨礙

牙根腫痛 紅腫痛甚者名牙癰刺出毒血用珍珠散吹之不吹亦可內服龍膽瀉肝湯見內

外備用即愈倘牙骨及腮內疼痛不腫不紅痛連臉骨者名骨槽風治法見後

牙腮疼痛初起不紅不腫久則潰爛或有骨出 此名骨槽風乃陰疽也初起有誤認

牙疼多服涼藥以致漸變爛至牙根延爛咽喉不救未潰爛者宜用 二陳湯加陽

和丸煎服或服陽和湯消之已潰爛者用陽和湯犀黃丸每日早晚輪服如有多骨

在內用推車散吹入過夜其骨不痛自出俟骨出盡用生肌散吹入內服保元湯加

肉桂 當歸 川烏 生耆 生草收功甚效此林屋山人經驗神妙方也 各方見 難毒陰

痘皮內外癩用諸方各 門推車散見多骨疽門

火鬱牙疼結核鰓腫 夏枯草 犀角 羚羊角 黑梔仁 各一錢 元參 知母 各一錢 連

翹 銀花 各二錢 生甘草 分六 水煎服數劑即愈虛火痛者忌服

牙縫出膿 有膿而不潰爛或似膿非膿痛不可忍者此蟲牙也照蟲牙第一方治之

牙縫出血 此名牙宣症又名牙衄乃陰虛熱極所致發時血出不止若不急治難救

用 黃豆渣 即豆腐店中取過黃豆漿之渣無則用生黃豆嚼碎亦可如不見效仍用豆渣為安並以黃豆為佳黑豆不效店中亦有生黃豆者須問明以免誤事 敷之立止如神內服

六味地黃湯 見內外癩 用諸方門 去山萸肉不用有人患此血出兩日不止熱甚垂危照此治之

其病若失此治牙衄第一神方也載福建某府誌

滿口牙齒出血 前症係一二牙縫血流不止此係滿口出血時有時無用枸杞為末

煎湯漱口然後吞下立愈如血出不止即用前豆渣方治之 又方 馬糞燒灰存

性搽之立愈 又方 蘿蔔含口內嚼之熱則再換另嚼極效

輕粉毒發齒縫出血臭腫 貫衆 錢三 黃連 錢二 煎水候溫加 頂上梅花冰片 分二 時時漱

之

牙根齧肉漸長 此名齒壅症用 生地黃汁一杯皂角片數將皂角燒熱淬盡音地黃汁內

再燒再淬以汁盡爲度曬乾研末敷之即縮或用朴硝末敷之亦消

齒長數寸 此名髓溢症用 真白朮爲末人乳拌蒸服之即愈此孫真人千金方也

軟牙瘡 此症小兒多生用 生蜆三四擣開取肉先將殼燒枯和蜆肉搗爛敷之甚

效

睡臥咬牙聲響 即取所睡蓆下灰塵一捻納入口內勿令本人知之即愈

牙齒作酸因食酸味過多者 胡桃肉又名核桃食之即愈

取牙痛法 牙不宜取取則滿口牙鬆實在痛極礙於飲食方可取之否則不取爲妙

用 大鯽魚一條約重十兩用白信石錢一入腹內縫口掛有風無日貓鼠不到之處陰乾七日

後鱗起白霜取霜收貯約一鱗之霜可取一牙臨用將白霜放膏藥上不論何項膏藥指定痛

處貼上令人咳嗽一聲其牙自落此林屋山人經驗方也 又方 用大蒜箇一搗爛

入白龍骨末一二分拌勻貼痛處半時即下

牙齒稀疎 蘆甘石研煨石膏分等日日擦之不可刷動久則自密

牙關緊閉 鹽梅擦牙上涎出即開此法最妙或用磁調羹擣之亦開切不可用銅鐵

搗動如不能開用物打斷一牙亦可灌藥

牙落復生 見後固齒鼠骨散

固齒良法

前有骨碎補一方甚效

牙痛方藥最多臨時見效甚少即有微效難免復發余自十歲以

後屢患此症每發必數日痛甚不能飲食甚至寒熱交作醫藥不效後得一法平日

小便時咬緊牙關則永無此患依法行之一年之內間發數次久則不復再發其妙

無窮又飯後漱齒晚間洗齒亦良法也 又方 凡人中年及將老時齒多脫落或

搖動不即脫落更為不便務記初落牙時將落下之牙放瓦上用火焙枯研末敷於

滿牙半日下再行吞下可保餘牙永不脫落 又方 大黃錢五 甘松 香附去淨毛 白

芷 生石膏錢各五 真川椒用胡椒 菘豆各四十九粒 細辛錢三 共研細末加食鹽八兩火煨過篩

抹藥末早晚擦牙不獨固齒兼去口中氣味

牙縫出血 按牙縫出血一症不外陰火內燔衝激陽明前方清火涼血解毒諸法亦

云備矣然高年脈弱牙縫紫塊血如泉湧乃真陰失守龍火飛越服前方不應知清

涼解毒不能折服此火宜宗景岳鎮陰煎法收拾浮陽歸根效驗如神方用 大熟

地兩二 麥冬錢三 上桂錢一 炮薑分五 淮牛膝炒三錢 粉甘草錢二 附片錢一 煎濃冷服雖暑熱炎天

皆可服鏡室新增 新增治牙痛點眼法 法用嫩覆盆子葉搗汁點眼皆三四次有蟲隨

眵淚出成塊無新葉乾者煎濃汁亦可 又方 牙痛用大戟燒存性咬痛牙處再

用黑豆<sup>二錢</sup> 葱<sup>三根</sup> 川椒 艾葉<sup>各三分</sup> 煎服效<sup>伯禮札記</sup>

鬚部

烏鬚法 五倍子<sup>一兩</sup> 銅綠<sup>三兩炒紅用醋淨之醋不宜多再炒再淨如此三次研碎</sup> 青礬<sup>二錢炒</sup> 生鹽<sup>五分炒</sup> 先將五倍子研碎用

銅鍋炒至出油成團放地上攤冷再將各藥研碎用好燒酒調成麵糊樣蒸至鏡面

爲度不宜久熱先用皂角水洗鬚一次又用茶洗一次將藥乘熱濃濃染之俟乾用

熱水洗去其鬚光潤如漆可保兩月不白 又方 熟地<sup>三兩</sup> 生何首烏<sup>三兩要白色而長形者</sup> 黑芝

蘇<sup>一兩炒</sup> 萬年青<sup>二片</sup> 桑葉<sup>二兩</sup> 白菓<sup>三十個</sup> 桔梗<sup>三錢</sup> 爲末不可經鐵器爲丸每日早飯後服

一兩一月後鬚即烏黑久服不再白

拔白換黑 先將白鬚拔去用豬膽塗孔中即生黑鬚或用白蠟點孔中不再白也

羊鬚瘡 小紅棗<sup>燒枯存性研末</sup> 清油調敷甚效 又方 雞腰膏<sup>見雞毒通治門</sup> 其效如神 又方 諸

藥不效者以舊棉絮胎燒灰蘇油調搽立愈

下頰

下頰脫落 此症起於腎肺虛損元神不足或談笑高興忘倦一時元氣不能接續所致須平身正坐令人以兩手托住下頰向腦後送上關竅隨用布條兜住務須避風

若受風邪則痰涎上壅口眼歪邪則難治矣外用天南星研末姜汁調敷兩腮頰一

夜即上次日再用 高麗參 白朮 茯苓 製半夏錢各五 當歸錢二 僵蠶錢二 天麻

陳皮錢各一 川芎分八 甘草分三 製附子分六 燈心根十四 生姜片三 水煎服 又方 真烏梅搗

融為餅塞滿牙盡頭處張口流涎隨手撥上 又方 白朮兩一 防風錢五 水煎服半刻

即上其效甚速

### 頸項

頸上生瘡大如櫻桃有五色者瘡破則頸皮斷 黃牛乳日日飲之久則自愈

對口瘡與癰毒諸方參看 生後頸正中處偏生者名偏對口夏秋間取茄子蒂懸掛簷間有風

處吹乾遇生對口者將大銅盤放杉木好炭燒煙盡將茄蒂不拘多寡於炭火內燒

煙令病人仰臥牀邊另放一椅將頭擱住露出瘡口以銅盤位置緊對瘡口任聽茄

蒂煙氣薰之良久瘡口自開即有一線紅絲血流下盤中不可移動恐其斷而不續

須俟紅絲流盡自斷則瘡毒盡矣用 生甘草 金銀花煎湯洗瘡口服調補氣血

藥收功屢試甚驗 又方 鮮茄子蒂箇十四 生紅何首烏兩二 煎服二三劑未破即消

已破拔膿生肌雖根盤八九寸寬大者亦效 又方 水仙膏見癰毒諸方 無論已破未破

屢試如神百無一失 又方 初起者用 嫩桃葉尖 用鐵斧搗融貼之即愈效

驗之至 又方 用爛塘雞糞雞糞更妙 敷數次即愈雞糞大涼最能敗毒加荔枝核研

末調敷尤爲神妙此屢驗方也 又方 明雄錢一 吳茱萸兩一 爲末香油將熬熟調搽  
對口疼痛百藥不效敷此立止真神方也 又方 凡對口根盤寬大不紅不痛或  
微微疼痛色暗不明乃陰疽也斷不可誤用寒涼之藥致成敗症難救須查陰疽各  
方治之爲要不可輕忽

對口之上生瘡 此名落頭瘡紅腫者照對口及癰毒通治各方治之皮色不變平場  
而不甚痛者照陰疽各方治之

頭頸直硬不能轉側 此肝腎二臟受風故也用 宣木瓜二箇取  
蓋去臘 沒藥二兩 乳香五分 同  
入木瓜內加蓋縛定飯上蒸三四次研爛成膏每用叁錢入生地黃汁半盞好熱酒  
二盞化開溫服 又方 黑豆升 蒸融布包作枕自效

閃頸促腰 真珊瑚研粉以燈心蘸點眼角四角淚出卽鬆連點三次卽愈  
新增對口瘡伯瀾  
札記 方用 皂莢一箇去  
筋去子 頭垢三錢即梳篦  
上之垢 麝香三分 同搗敷之立見神效消

腫止痛在頃刻間也

### 咽喉

咽喉辨治 咽喉之患最爲險惡忽然頃刻而痛難忍係屬寒症若悠緩而痛乃爲熱  
症內經云驟起非火緩起非寒虛寒實熱是在明睿者知所區別乃所投而無誤耳

此林屋山人妙論也又凡喉症須於本門先後各方詳細參看斟酌用之為妙

單雙喉蛾 又名喉痹生於咽喉關上者輕關下者重此症喉閉片時即不可救若男

子從鼻梁中心尋至頭頂婦女則從後腦尋至頂上小兒看兩手虎口如有水泡紅

子即用銀針挑穿喉蛾即破忌見燈火一面用老蒜搗融如蠶豆大敷經渠穴穴在大指下

毒氣立刻安痊再服甘桔湯見內外備用方以免後患無藥之處不服亦可此方屢試屢驗

其效無比 又方 皂角蟲蛀者不用研末醋調服一錢重則一錢四五分或用鵝毛蘸藥

入喉攪動亦可並敷喉外乾則隨換少許吐出痰涎即愈此係急症諸藥性緩惟此

功效甚速屢試皆驗喉風第一方也並治九種喉痹愈後仍照以後甘梗湯調理無

藥之處不服亦可 又方 鵝毛一根黏真桐油一分入喉捲攪痰隨油吐服甘草水可解油氣

後有喉症各方俱極效驗

風火上鬱頸腫喉痛 薄荷錢一連翹 射干 牛蒡 馬勃錢各二生萊豆皮錢三水煎服

又方 西瓜青皮 連翹 射干錢各二飛滑石錢三桑皮錢一杏仁錢半虛火痛者忌

服

服



喉痺治法 喉蛾喉閉纏喉風皆曰喉痺者不仁也頃刻而起危急之症痰在喉中

作响响如打鼾舌白而不腫諸書皆稱肺絕不救蓋緣誤服寒涼之藥以致死耳服後桂薑湯立愈 桂薑湯治喉痺頃刻而起毫無別恙者此虛寒陰火之症 肉桂

炮薑

甘草

各五分

共歸碗內取滾水沖入仍將碗頓於滾水內服藥口許慢慢嚥

下立愈或以生附子切片塗白蜜火灸透黑收貯臨用取如棗豆大一粒口啣嚥津亦立刻全愈此林屋山人祕法雖暑天亦宜用切勿遲疑自誤

外纏喉風 此症喉內熱結喉外腫大麻而且癢如蛇纏頸身發寒熱頭目腫痛者卽

是喉內之痰塞滿舌有痰護此痰不出齒作响如鼾喉痺誤服涼藥有此症也如再遲痰塞鼻內氣無出入卽死照前喉蛾皂角桐油各方治之仍用薑桂湯煎見調理而安

內纏喉風 此症發時惡寒惡熱內外無形出氣短促胸前紅腫兩足畏寒乃腎經有

熱水枯不能上潤故也照前外纏喉風治法自愈心前如有紅絲用針挑破爲要喉關如雷響者難治

鎖喉風 喉內無蛾痰聲不響喉內氣急不通者卽是照前喉蛾皂角桐油各方治之

小兒鎖喉風 用芙蓉葉搗汁煮雞蛋一貼額門一貼肚臍卽愈

45

喉方新編 卷一 咽喉

五九

脚根喉風 此症從脚根發起直至喉間或一年一發或半年一發其病一日行一穴

切忌熱物怒氣初起宜用 綠礬三分 真硼砂六分 元明粉五分 頂上梅花冰片一分 真麝

香五釐 共研末吹入少許再用 羌活 獨活 桔梗 防風 黃芪 白芷 甘草

茯苓 陳皮 前胡 柴胡 白芍 元參 牛蒡 煎服如纏惡起泡者難治

咽喉腫痛日輕夜重痰如鋸聲 乃陰虛也用 熟地兩一 茱萸錢肆 麥冬 五味 牛膝

錢各三 茯苓錢五 水煎服下喉一聲亮响火熱俱消或照前薑桂湯服之亦可

喉腫心痛閉目不語起首脈散牙緊發謊手足麻木 此名硃砂症又名心經疔非喉

風也急用紅紙捻燒燃照心窩背心兩處見有紅點用針挑破內有紅筋挑出如無紅點少刻

得者或服藥後再着必有 再用雷擊散見道 治之

喉間作痛爛不收口 此名爛喉痧用 土茯苓煎湯時服之忌茶數日即愈又以

四物湯見內外備用諸方 加 茯苓 黃耆 二十餘劑而安 又方 服櫻桃數十粒即愈

如無新鮮者即蜜餞者亦可此方係嘉慶年間江蘇人得自仙傳救人無數平時宜

向南貨客購買蜜餞櫻桃存貯以備急用 又方 用紅棗散後見 吹入過夜即安或

用 人中白散部見 治之極效

喉內生瘡鼻孔亦爛 若作喉風治立死用 白鹽梅箇一 燒灰存性 枯礬錢一 穿山甲

共一錢 共爲末吹喉中神效或用人中白散見齒部治之

喉瘡已破疼痛難食 猪腦髓蒸熟和醋食之

飛絲入喉生瘡 凡喉瘡日久不愈恐是露天飲食有飛絲落下食之以致咽喉生瘡

急用 白礬 巴豆 燒灰吹入即愈或用後巴豆油薰鼻之法亦妙

喉癰 體虛多鬱者患之喉生苔癬色暗不紅不閉不腫氣出如常微微疼癢有礙飲

食者卽是此係虛火淹纏難愈忌刺畏補用頭胎黃牛屎放新瓦上並用瓦蓋周圍

用文武火煨至煙盡存性連瓦取下用鉢蓋住候冷研末用筆管徐徐吹入自愈

又方 冰片 牛黃各一分 膽礬三分 山豆根錢二 真礬砂 雄精 兒茶各八分 共研細末

另用 鹽梅三個 搗融入藥和勻丸如龍眼大臨臥啣在口內過夜即愈啣至十九

斷根

風火喉癰 此症屢愈屢發並無夜熱咳嗽吐血等症惟止喉痛紅赤或似蝦蟆皮色

圈結喉中用秋蝴蝶花根二兩即射干也此花極葉與春蝴蝶花一樣但春間開者花是藕皮色以秋間開黃花者爲真不可誤取 洗淨搗爛甜酒煎汁

啣口中漱三五次吐出再換再漱可以除根

喉內生肉重重疊疊腫起不痛多日方有臭氣透出 臭橘葉煎服數次即愈 又方

用綿裹筷子頭蘸食鹽點肉上五六次自消再用 桔梗 黃連各一錢五分 枳實炒 前

胡連翹心法陳皮 防風 半夏 柴胡 南星 白附子 牛蒡子研炒 赤芍 莖

朮 元參 甘草錢各一煎服體虛者忌服

喉中結塊不通水食危急欲死 百草霜即錫煙子以鄉村燒草者為佳燒炭者斷不可用 和蜂蜜為丸如芡實大新汲

井水化一丸灌下甚者不過二丸此名百靈丸 又方 膽礬 唧口內惡涎吐盡

自愈

喉中忽硬一塊如桂圓大吞吐不出不下 厚朴 半夏 茯苓 紫蘇錢各一 甘草分五

老薑片一煎服即愈

喉中生珠 丹溪云此非喉症乃是鼻中生一條紅線如髮懸一黑泡大如櫻珠垂掛

到喉門而止如用刀針即死急取活土牛膝根獨條肥大者向生草藥店中買之 搗汁以好醋四

五滴和勻滴入鼻中二三次線斷珠破吐出瘀血立安或用針刺手腕中紫筋或刺

少商穴實後喉症請方便知 去其惡血更為神妙

喉中生瘤 此症生喉間兩旁或單或雙如桂圓大紅絲相裹如瘤因肺經受熱所致

切忌用刀內服 益氣疎風湯 甘草 桔梗 川芎 當歸 生地 升麻 白

芍 花粉 黃芩 麥冬 前胡 青皮 乾葛 連翹 防風 白蒺藜 生煎

服外用 麝香 上冰片各三 川連分二 研末時時吹入或刺手腕中紫筋或刺少商

穴亦妙

喉間腫大又非癭瘤忽痛忽止外現五色按之半空 此痰結也用 海藻 半夏

白芥子 貝母 南星錢各三 高麗參錢三 茯苓錢五 昆布 桔梗 甘草錢各一 製附子錢一

煎服

喉中氣結如梅核樣時有時無 半青半黃梅子每箇用鹽一兩不效少淹一日一夜曬

乾又淹又曬淹至鹽水盡為度每用青銅錢三箇夾鹽梅兩箇麻線捆住裝磁罐內

封口埋地下百日取出每用鹽梅一箇含口中嚥汁入喉半刻即消收一年者佳越

陳越好其妙無窮 又方 子龍丸見陰疽服之最效

老勞喉痛 生雞蛋一箇去黃用白糯稻根鬚洗淨甜白沙參 石斛各一錢五分 麥冬三錢炒 生甘草三錢

穢濁上衝咽喉腫痛 連翹錢三 馬勃 黑梔各一錢五分 杏仁尖去皮 橘紅 竹葉心錢各一 鬱金

八分牛旁錢二水煎服

喉中作癢 此喉管傷寒也不可吃茶酒湯水用 薄荷分二麝香釐五研極細末吹入喉

中吐出涎水碗許再用陳米合二煎湯飲之自愈若先服茶酒等物則難治也又有咽

喉癢痛聲啞方見後

喉症各方 凡一切咽喉急症或閉或痛切忌刀針以免穿透急將兩手膊以手勒四

五十次趕血於大姆指取紫髮繩紮住用針刺在少商穴穴在兩手大指內外甲縫之中不上不下即是處刺破出

血立愈男左手女右手重者兩手齊刺此百發百中救急第一方也 又方 先於

後頸窩處搽油少許用銅錢一文刮之如刮痧樣要順刮切忌倒刮其痛稍緩以便乘勢進藥

輕者不藥亦可此法極妙 又方 生附子或用吳茱亦可熱醋調敷兩脚心無論實火虛火

俱極神效 又方 獨蒜二枚削去兩頭塞鼻中左患塞右右患塞左喉口中血出乃

愈 又方 治咽喉不通牙關緊閉不省人事用巴豆搗爛綿紙包壓取油作捻點

燃吹滅薰鼻中使煙氣薰入喉內即時吐痰涎惡血便愈神效 又方 凡喉症先

一二日胸膈氣緊出氣短促忽然喉痛手足厥冷氣閉此係危症切忌牛黃入口不

救惟用前皂角末服之最效 又方 家麻皮約非菜寬剪下七節每節一寸長用旱煙袋燒燃

當煙吸食即破未破再食一次無不破矣 又方 紅棗散 紅棗肆兩去核搗碎明雄七錢五分勿經

火 枯礬 真犀牛黃 牙色梅花冰片 銅綠煨 真麝香各一分 共研細末收入磁瓶

勿令出氣遇喉風等症以紅紙捲管吹入喉中仰臥少時吐出濃痰以多為妙若爛

喉痧吹入過夜即安屢試神效 又方 黃瓜霜 嫩黃瓜有刺者不論幾條於端

陽午時切開瓜頭挖去瓜瓢用皮硝裝滿仍將瓜頭竹籤蓋好將黃瓜掛檐下勿令

見日候瓜外起霜刷下加冰片研末吹患處止痛如神虛火喉痛忌用 又方 鹽

藕節 平時取新鮮藕節烘乾用鹽醃好封固遇有喉痛者嚼汁咽之極為神效陰  
 虛喉痛更妙 又方 猪膽礬 臘月八日取雄猪膽一箇裝入白礬末陰乾研末  
 次年臘月八日再取猪膽入前猪膽末如此三四次遇患者用一二分吹之凡單乳  
 蛾喉癰喉癰腫痛吞嚥不下命在須臾者屢試如神虛火喉症忌用 又方 蘿蔔纒 凡人  
 於三四月間有喉間病者皆因冬天寒氣鬱結不開至春始發須於初交冬時多買  
 蘿蔔菜攤在瓦上挂在竹簾放露天下更妙 任他風霜雨雪吹打不要收下直到立春前一日收挂  
 在無日處陰乾春二三月收來切碎將醬或鹽放在碗中飯鍋上蒸熟當家常小菜  
 食之一家永無喉患若有人患喉風等症者以此菜煮湯服甚效並治痢疾 又方  
 紫袍散 治咽喉十八症即綠雲散又名石青散虛症忌服 石青 真青黛  
 硃砂 真白礬砂以上各一錢 冰片二錢 明礬 人中白 元胡以上各五錢 山豆根二錢 共為細末收  
 貯磁罐不可洩氣用五六釐吹入喉中立愈 六味湯 治咽喉各症虛火痛者忌  
 服 荆芥穗 薄荷各三錢 炒殭蠶 桔梗 生粉草 防風各二錢 水煎數滾微温含  
 口中緩緩咽下不可大口一氣吃完如一時煎熬不及以滾開水泡之亦可 蘇子  
 湯 鎖喉纏喉乳蛾風火閉住皆治此林屋山人極驗方也 蘇子 前胡 赤芍  
錢各二 桔梗 甘草各一錢 元參 連翹 浙貝各一錢五分 煎服 加減甘桔湯實火宜用之

立愈此林屋山人極驗方也 川連 桔梗 牛蒡子 連翹 黃芩 花粉 射

干 元參 赤芍 荆芥以上各一錢五分 甘草 防風各一錢 水煎服

喉內戳傷飲食不下 雞蛋一箇 鑽一小孔去黃留白入生半夏一箇 微火煨熱將蛋白服之

驚嚇失音不語 有人因受驚嚇失音不語用 陀僧七分 茶調服即愈屢試如神

忽然口不能言 附子研末 吹入喉中即愈 又方 豆豉煮湯加入好酒服之或用人

乳汁合牛 和好酒調服

咽喉聲啞 真礪砂兩一 元明粉 膽星錢各一 訶子肉錢二 冰片分三 共為末外加大烏梅一

兩搗如泥丸如龍眼核大每用一丸噙化數次即愈 又方 猪油二筋熬去滓入

白蜜一筋再煉少頃瀝淨入磁器內俟成膏不拘時挑服一匙兼治肺熱聲啞 又

方 通草水煎服或用橘皮煎濃汁俟冷飲之

咽喉癢痛聲啞 肉桂錢一 杏仁錢五 為末蜜丸櫻桃大綿裹含化嚥汁

陰虛聲啞 人之失音由於色慾過度元氣耗喪雖參茸無能為力惟有未破身十六

七童男女五更早起未食物之前不必漱口爛嚼海南子檳榔一二箇與病者服之

換十人嚼至十次其病自愈男病用童女嚼女病用童男嚼 又方 新好槐花放



新瓦上慢火炒熱放身旁隨行隨坐間送一二粒置口中咀嚼咽之使喉中常有氣味久之自通 又方 生白礬煉蜜爲丸服之

咳嗽聲啞 見咳嗽門

喉外生癰 此症發於頸項結喉俗名喉結之上名結喉癰發於結喉兩旁名夾結癰重則

堵塞咽喉湯水不下若穿爛見喉難治初起未破者內服黃連消毒散外敷二味拔

毒散均見雜毒方如將欲破即照癰毒各方治之

專治咽喉腫痛 月石錢一大生地兩二搗爛和藥爲丸桂圓核大入口任其自化 薄荷

甘草各三分小梅片 西瓜霜各一分吹之

喉蛾方 斷燈草數莖纏指甲就火薰灼俟黃燥將二物研細更用火逼壁虱即臭蟲十

箇一并搗入爲末以銀管向所患處吹之泡即可潰嘔吐膿血即愈 又喉間方覺

脹滿起疱者急以食鹽用搓手掌心鹽乾復易新鹽搓之數刻即消極有效

治爛喉痧症極效方 土牛膝根即吳花根秋間取之勿論多少水洗去泥打自然汁瓦盆

曬熱將汁起入一調羹攪勻曬瓦盆宜多其汁不能過夜一日曬乾刮粉研細末入

瓷瓶用時入冰片少許吹喉吐出稠涎即愈 又新增方 牛黃五釐青黛六分冰片二釐

象牙屑三分指黃指黃甲五釐壁五釐蟾五釐窩五釐真五釐珠五釐研五釐細五釐末五釐吹五釐之五釐

喉癰腫塞 用蝸牛綿裹浸水含嚙須臾立通 又用蝸牛七枚白梅肉三枚研爛

綿裹含嚙立效 又方喉閉用髮指甲煨存性吹之男用女用男髮指甲也 札伯記

青芝散 崑治咽喉風火時邪急症并雙單乳蛾極驗 上川連 五分 廣青黛 二分 梅

花冰片 二分 白礬砂 二分 西瓜霜 錢二 橄欖核 錢三 絲瓜葉 錢二 右藥照法製各研淨末稱準

分兩和勻同研極細無聲為度磁瓶收貯臨用時約半匙許吹患上提出痰涎立愈

慎勿吹多 製藥法 廣青黛 二兩 滾水沖之候飯鍋上用絹篩濾去粗滓水飛四五次提取淨潔澄清日乾去脚 橄欖核 好橄欖去肉取生核搗研細末熟核無用 西瓜

自製如藤頂好老結西瓜一箇藏好俟九十月間西風起日將瓜切下小蓋挖去窰子以馬牙硝四兩頂大瓜窰子以四兩為則撒於瓜內仍將小蓋蓋好以繩結之懸於有風無雨處俟硝從皮流出以雞翎拂下收貯備用

奪命紅棗丹 崑治喉風痺雙單乳蛾等症屢試屢驗方用 當門麝 錢一 梅花冰片

錢一 杜蟾酥 火製乾淨末 巴豆霜 油淨 月石 淨末 山豆根 淨油 老薑粉 三分 用汁澄 右藥照方揀

選道地研細稱準合勻收貯磁瓶臨用時用小紅棗一枚切蒂去核外皮幸勿損傷

入藥黃豆大許將棗切蒂一頭塞入鼻孔即閉口目避風少頃得嚏喉漸通快如出

膿以銀花甘草湯漱之病甚再換一棗必效凡治喉症左蛾塞左右蛾塞右雙蛾更

換塞之塞藥必得一週時方效否則誤事魚葷青菜辛辣等物謹忌一切不可大意

陰虛孕婦忌用

咽喉壅塞 凡咽喉初覺壅塞以紙撚絞鼻或鼻皂角末噴嚏數次可散熱毒仍以

李樹近根皮磨水塗喉外卽愈 又邗江周善庭言其父夏月誤吸隔夜水煙筒中  
毒咽喉壅塞百藥不愈用前食鹽搓手方搓至七次而愈



校正 增廣 驗方新編卷一

善化鮑相璈雲韶編輯

合肥張紹棠又堂增訂

肩部

擔肩癰癤此惟夫有之

五倍子燒存性為細末

加黃丹飛過水

醋調敷甚效

又方

照癰毒各方治之

肩甲縫中積痛

查中風筋骨各方治之

手部

蛇頭惡毒生各指頭又足趾頭生者亦是

此症初起痛甚急用頭髮紮住指根取癩蝦蟆一箇目赤腹無八字文者忌用破

去腸雜不可破腸腸汁沾指更痛

將瘡頭套住用繩紮好並將蝦蟆心肝焙枯研末沖酒服以免毒氣

攻心約一對時破口出膿而愈套住之後瘡頭猶如鍼刺痛更難忍甚至心中難過

遍身發熱或嘔吐惡心不必驚慌急服護心散見雜毒方或服麻油一盞菜子油亦可心自安定

蝦蟆能拔極重惡毒切不可輕易揭去忍耐片時自然破口出膿而愈倘誤將蝦蟆

揭去別藥難醫為害不小去膿後如發昏暈亦不必驚慌用高麗參三四錢以砂罐

煮濃沖服之自然無事參不宜蒸一時蒸不出汁其色只如淡茶煎則其色濃厚易

見功效無力者用好黨參一二兩煎服亦可愈後若再腫痛此毒氣未盡之故再用

蝦蟆套上少頃膿盡卽不再發此瘡最爲陰惡此方極屬神效不可輕視 又方

鳳仙花下半載連根用不用水洗和甜酒糟搗融敷有人指頭生瘡腫大如李痛不可忍用此敷之半

口腫消痛止較蝦蟆方尤爲神速 又方 用磁片將瘡刺破查照疔瘡方內蜘蛛

拔毒治之見難毒諸疾疔瘡門止痛消腫最爲神效 又方 蜈蚣焙枯爲末豬膽調擦神效 又方

雞蛋一箇穿一小孔入信石分套指頭上熱則再換立刻止痛如神較前各方功效

更大 又方 雄黃 枯礬 各等分研末用麻油或醋敷亦極效驗 又方 白

蘿蔔挖孔入雄黃三分蒸半熟套指頭或用真烏梅仁嚼爛敷之均極效驗 又方

如色白者照後脫骨疽陽和湯各方治之 又方 雞子清磨雄黃敷之 又方

陳柿餅雄黃搗敷

脫骨疽 此症生手足各指或云生手足第四指者是或生指頭或生指節指縫初生或白色痛極或如

粟米起一黃泡其皮或如煮熟紅棗黑色不退久則潰爛節節脫落延至手足背腐

爛黑陷痛不可忍古方有截去指頭一法斷不可用宜用 頂大甘草研極細末用

香麻油調敷要敷極厚一日一換不可間斷忌食發物不出十日必愈真神方也再

用 金銀花 元參各三兩當歸二兩甘草一兩水煎服一連十劑永無後患藥味不可減

少減少則不效並忌抓擦爲要 又方 大人用陽和湯小兒用小金湯重則用犀

黃丸均見陰疽諸方色紅者照上蛇頭惡毒方治之此林屋山人百發百中之方也 又方

甘草嚼融厚敷乾則隨換日夜不斷數日必愈神效

甲疽又名嵌甲 凡指甲邊生一赤肉突出時常舉發者甲疽也用狼毒兩黃耆兩醋浸一宿入猪油兩微火上煎取二兩絞去渣退火氣敷之日換三次神效此林屋山人方

也 又方 乳香 膽礬 研細時時敷之此病須剔去甲不藥亦愈若已成瘡久

不愈者此方甚效 又方 皂礬五錢火煎候冷研末先以鹽湯洗瘡拭乾以礬末敷之舊細裹

定一日一換神效或用枯礬亦可惟敷之微覺疼痛 又方 陳皮濃煎湯浸良久

甲肉自相離開輕手剪去肉中爪甲外用蛇退燒灰雄黃錢一為末乾摻或香油調敷

又方 輕粉 乳香 沒藥錢各一 黃丹錢二 赤石脂錢五 寒水石錢三 共為末濕則乾摻

乾則油調最妙 又方 甘草嚼融厚敷乾則隨換數日全愈神效 又方見頭部

頭角太陽生瘡方

灌甲初起 用磁鋒於甲上削去一層並用枯礬末敷之其效如神

油灰指甲 每日取鳳仙花又名指甲花 連根蒂葉搗敷指甲上用布包好一日一換月餘

乃愈此林屋山人方也

指頭麻木痛癢 取蛭蚰查藥物備要便知 和銀硃共搗擦之若延遲不治必生蛇頭蛙節等

疔痛苦難受初起多擦幾遍決不生矣

指頭畏冷 天氣不寒指尖作冷名曰螺瘡用醋和鹽調勻將指頭泡入自愈

手足指頭羅紋生瘡 生橄欖核有鹽者煮去鹽味用切兩段醋磨雞毛蘸擦二十日後漸消

指節生瘡 名曰蛀節生黃豆嚼融敷須先漱口再嚼即愈

指甲下生瘡 名曰蛀甲治與上蛀節同

十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠毛 此名血餘症用 赤茯苓 白茯苓

胡黃連各錢半煎服

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍若不早治即爛入手大指二指間為虎口又名叉指生蒲公英

英槌融敷之數日即愈 又方 生黃豆嚼融敷將口漱淨再嚼甚效 又方 通草為末用

雞蛋清調敷其腫即消 又方 白芨三錢末蟾酥錢一共和雞蛋清擦神效 又方

白芷 滑石 黃丹各等分研極細末敷之神效

手丫枝痛不可忍 通草研末生雞蛋白調敷即愈

手指縫觸着紙角衣角痛癢破爛 雖癢極難受斷斷不可抓擦務必忍住並忌沾水

數日自好倘一經抓擦則纏綿難愈用 白芷 黃丹 滑石各等分研極細末敷

之神效或用玉真散見跌打損傷門敷之亦極效



手指斷落 方見跌打損傷門

手被咬傷 方見人畜蛇蟲咬傷門

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已內必有蟲 猪肝切片和桃葉槲融敷之

神效或用白油膏見腫部貼之更妙

手指手掌皮厚如鐵 苦參酒煎服外用苦參末酒敷極效如神

掌中紅絲斷之血流不止 用燈火燒之自能漸收平愈

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛 此名穿掌又曰擊疽又曰托盤用生

附子切片貼之或用生附子煎水泡之更妙數日後不痛者必然作痛作癢切不可

用手抓仍用附子水泡之或附子切片加輕粉一分貼之必愈 又方 白鹽 花

椒末等分醋和敷之未破者極效已破者勿用 又方 溘雞糞敷之或用鮮桑葉

搗敷均極效如腫而不甚紅又不甚痛者照陰疽各方治之為要

鵝掌風 生手掌上紫白斑點疊起白皮堅硬乾燥甚則疊疊脫皮血肉外露或癢或

痛久則成癬難愈用一大碗以紙緊糊碗口紙上用針刺紙多孔上鋪細米糠二三寸厚手箝燃

炭放糠上緩緩燒之燒至離紙三分光景將炭與糠一并棄去不可將紙燒穿取碗中糠油時

時擦之數日斷根屢試神效有人患此筋肉現露十餘年不愈照此醫痊永不復發

又方 真小磨麻油一兩紅砒一兩敲細入油煎至砒枯煙盡為度去砒留油冷透火氣

用火烘油擦三五次十日即愈血寒者最宜此林屋山人極驗方也 又方 鉛彈

子二箇如核桃大每日在手內搓弄搓熱將彈子握緊晝夜不歇如此十餘日即愈愈後再搓

二月則不復發

手腕生物如豆紅紫疼痛 治法見癰毒門葡萄瘡內

手臂生瘡腫大如拳 以小刀略破其皮或用癰毒門代刀散敷之即破 真礪砂 上冰片各一分

輕粉五釐為末摻之即化為水而愈矣

熱毒攻手腫痛欲脫 猪油和羊糞塗之或水煮馬糞洗之

四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解 黃蘆酒浸一夜焙乾研末每服二錢酒調下頗

效

手足作痛 手足痛人以為脾經之熱不知非脾也乃肝木之鬱結也散其鬱氣則手

足之痛自去用逍遙散見內外備用諸方加梔子三錢製半夏 白芥子各二錢水煎服二劑其痛

若失蓋肝木作祟則脾不敢當其鋒氣散於四肢結而不伸所以作痛今一旦平其

肝氣而脾氣自舒脾舒而痛在手足有不盡除者乎

手足生瘡久不收口 取大路口多人撒尿木板爛成白色者以炭火燉化研細末加

冰片少許搽之即愈或照癰毒門瘡不收口諸方治之

小兒手軟 薏仁 當歸 秦艽 酸棗仁 防風 羌活錢各五 共爲末蜜丸芡實大

荆芥湯化下

增新 不二散採驗方 拔萃

治手足患毒橫紋區處並蛇頭眼腹等症拔毒去腐如神幸勿泛視

牡蠣八錢 乾生研 雄精錢四

上藥兩味共研細末臨用看症輕重酌量同雄豬膽汁調和敷

患上或生指頭將藥入猪膽套在指上如乾加膽汁不二散立刻止痛套三四次即潰潰後搽前藥膏蓋即拔膿去腐再上生肌桃花八寶散收功忌開刀開即翻花綿延難愈灸即痛苦異常萬勿用升降拔提之藥倘誤用致橫肉吊空腫脹實難收口此醫治失宜反增痛苦耳慎之慎之初起用飛龍奪命丹一二服汗之汗之未愈內宜服仙方活命飲外用不二散此余應手治法也

增新 誤斷指頭 用降香細末搽之包以絲棉七日即痊不可落水冒風親試有驗採驗方 拔萃

腋部肩下即是

腋下腫硬形如鴨蛋 色紅者照癰毒各方治之皮色不變者照陰疽各方治之

腋下疔瘡音隔 如豆如米或麻或痛恐是疔瘡查疔瘡門辨別治之

腋下癭瘤 治法見癭瘤門

腋下狐臭 用蒸餅一箇劈作兩片放蜜陀僧細末一二錢急夾在腋下略睡片時候

冷棄去如係一腋狐臭只用一片夾之有人患此二十餘年照治斷根屢試不爽

又方 頂大蜘蛛一箇或用小蜘蛛黃泥包好火內燒紅取出候冷去泥加輕粉一錢共

研末日擦數次輕者二日即愈重則三四日必斷根較前方尤簡便神驗百發百中

又方 蜜陀僧 潮腦各四兩 枯白礬二兩 輕粉三錢 共為細末頻擦兩腋擦至半月見效

不可間斷半年全愈 又方 麝香一分 膽礬二分 水粉三分 取田螺二箇 將麝掩音起開以各

藥入螺中過一夜螺肉即化為水將水擦腋下其臭從大便出宜埋土內恐人聞則

頭眩暈也此方極效不可輕視

乳部

乳頭破裂 胭脂和蛤粉用水調敷 又方 雞屎白炒研每服錢一酒送下三服即愈

乳上溼瘡又方之麻炒焦 男女乳上溼瘡膿血淋漓成片痛痒不休此名火革瘡用 蚌

殼五錢 輕粉五分 冰片一分 共研末用銀花煎湯調擦兩三次結痂收功或照癰毒門溼

瘡黃水瘡各方治之

乳頭生瘡痛不可忍 生鹿角三分 甘草一分 共研末用雞蛋黃箇一入藥攪勻置銅器中

灸溫敷之日二次即愈神驗非常

乳癰

紅腫疼痛者是  
男女皆有此症

炒白芷

製乳香

製沒藥

製法見藥  
物備要門

浙貝

歸身

各等分研末每

服五錢酒送一服全消如已潰爛用醞消丸酒送一服以止痛外貼洞天膏自愈

如色白者照流注治法倘潰爛不堪者以洞天救苦丹按法與服七日後接服大棗

丸收功此林屋山人秘法也醒消諸方見癰毒門 又方 生蒲公英搗爛沖酒服

渣敷乳上略睡片時數次即愈此為乳癰聖藥屢著神奇不可輕視 又方 豆腐

店桌上做豆腐淋下之水一桶入鍋熬乾成膏冷透火氣厚厚敷之乾即再敷乳上

結塊自消五七次必愈屢試神驗有人借貸五百金無力歸還以此方神效奉贈後

試之果驗人稱之五百金方此方雖治乳癰既稱乳上結塊自消則乳岩似亦可治

又方 並治乳吹 葱連根搗爛敷上用瓦罐盛炭火蓋葱上一時蒸熱出汗即愈

穩而神效

乳癰多至二三百頭者

柳樹根刮去皮搗爛蒸熱布包熨之冷則隨換過一宿即愈

此孫真人千金方也

乳癰腫及頭面

照瘟疫門大頭瘟蚯蚓方治之其效如神

乳癰日久腫痛不愈

蝦醬用好醋蒸熱敷之諸藥不效者治之奇效

乳癰久不收口

用茅屋上陳年舊茅草剪尾一加頂上梅花冰片少許敷患處即愈

乳岩

男女皆此症

此症乳內生一小粒初如豆大漸大如塊如棗如圍棋子不癢不痛至一年後或二三年漸漸腫痛臭爛孔深亦有初起色白堅硬一塊作痛此係陰疽最爲險惡因哀哭憂愁患難驚恐所致急宜早治遲則難愈初生用犀黃丸每服錢三酒送十服全愈或以陽和湯加土貝五分煎服數日可消倘誤貼膏藥必漸腫大內作一抽之痛已覺遲治偷皮色變異難以挽回勉以陽和湯日服或以犀黃丸日服或二藥每日早晚輪服服至自破而痛者外用大蟾即蟾六隻每日早晚取一隻破腹刺多孔連腸雜去膽貼於患口以拔其毒一日一換連貼數日若爛孔深大須將蟾腹腸雜填孔每日用葱湯溫洗一次內服千金托裏散三日後接服犀黃丸可救十中三四乳岩最不易治此方極爲穩妥古來名方皆不及此若破後不痛而癢極者無一毫挽回大忌開刀開則翻花最慘萬無一活一婦兩乳皆患乳岩兩載如桂圓大從未醫治因子死悲哭形大如盃以五通犀黃丸每日早晚輪服九日全消又一男子亦患乳岩因用鯽魚膏貼上兩日發大如拳色紅令其揭下與服陽和湯四劑偷色轉白可救色若仍紅無救矣四日患色仍紅哀懇求治以犀黃丸陽和湯輪服至十六日四處皆消獨瘡頭破爛用蟾拔毒之法半月收功又一婦患乳岩寒熱痛甚余以陽和湯同二陳湯煎服止痛安睡連進三服全愈又一婦患亦相同其弟以夏枯

草粉連翹橘葉等藥連服五劑號痛不絕余視白色已變微紅難以全消即用肉桂

炮薑蘇黃加二陳湯煎服服下痛止瘡亦縮小連服數劑瘡頂不痛而破貼陽和解

凝膏收功此林屋山人治驗祕法也犀黃丸諸方見陰門又方 已潰爛者用洞天

救苦丹見雜方每服三錢陳酒送下隔兩日一服數日膿盡收功神效或用陽和解凝

膏貼之或用蝦蟆散見前或照上蝦蟆拔毒之法俱極神效 又方 如初起者用

夏枯草 蒲公英 漏蘆 橘葉 雄鼠糞兩頭尖者是 甘菊 貝母 紫花地丁 山

慈菇 連翹 白芷 瓜蒌仁 炙草 廣皮 茜根 乳香 沒藥 銀花各二

錢研末另用 夏枯草熬膏和勻為丸如梧子大每服五錢滾水送下至重二服全

消屢試神驗此王晉三經驗方也價廉易製貧寒之家最宜

男子乳忽壅腫如婦人乳 金銀花 蒲公英兩各一 花粉 白芥子錢各五 製附子 木

通錢各一柴胡錢二白芍 通草 梔子 茯苓錢各三 水煎服

婦人乳忽縮入 急用兩手緊緊抓住取公雞一隻約重十兩內外連毛破開去腸雜

加真麝香錢一入雞肚內覆肚臍上即愈

婦人產後兩乳伸長細小如腸垂過小腹痛不可忍 川芎 當歸兩各四 瓦器煎水時

時服之另用 川芎 當歸斤各一 一切大塊於爐內慢火燒煙安病人面前桌下務使

煙氣不絕令伏桌上將口鼻及兩乳常吸煙氣如藥盡未痊仍如前法煎服燒薰必安如藥已用過二料兩乳雖縮上而不復舊用冷水磨葶藶子一粒塗頭頂心俟乳縮即洗去

婦人乳吹時時吹氣有聲 硃砂筆寫子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥等字於本婦所

戴簪上本命所屬之字不寫戴之即愈於初起時用之最妙 又方 照上乳癰葱蒸法治之

婦人乳孔塞痛邊看婦人科產後擠乳頭方用核桃肉數顆搗碎滾酒沖服即愈

婦人乳汁不通 貝母 知母 牡蠣粉 各等分爲末用猪蹄湯調服二錢即通此

祕方也 又方 鮮蝦一觔去皮鬚足用肉不拘多少淨磁器內搗爛陳酒熱服盡量

飲之少時有乳再用猪蹄湯飲之日飲幾次乳如湧泉效驗如神但蝦止服一次猪

蹄湯可以長服 又方 內服前藥外用木梳梳乳周圍百餘遍即通

乳汁自流不止 此虛極也宜服十全大補湯見內外備用諸方或請名醫調理

乳多發脹 紅花 歸尾 赤芍 牛膝錢各一煎服即愈

無子食乳腫痛難消 麥芽一兩 川芎錢一 當歸 白芍錢各三 生地錢二煎服即愈 又方

麥芽炒一兩煎水當茶服即止 又方 用本夫穿過包脚布敷乳過夜腫消痛止

而愈或本婦現穿之鞋包乳上過夜亦消



胸部與心脾部各部參看

胸膈閉結不通

按之極痛或通而復結氣喘煩燥狂亂而熱極者取

生蚯蚓

又名曲蟻

四條洗淨研如泥入生薑汁薄荷汁

各一茶調 蜂蜜

牛酒 井水調服若熱甚者加真梅花

冰片一二分服再揉心下片時汗出而愈神效如因寒熱痰痞水食結胸者照卷十

四傷寒門葱薑熨法最妙如因飲食積滯結胸者查飲食積滯門外治法治之若痰

氣結胸查後痰疾各方治之

胸滿腹脹

此脾土衰弱肝木氣旺木來剋土故也甚至身面黃腫亦有不黃腫者用

蒼朮二觔淘米水泡一日兩夜燒存性 甜酒麩四兩燒存性 皂礬一觔醋泡曬乾入瓶內煨存性 加平胃散共為末醋為丸如梧子大每

服三四十九丸酒下亦可湯 日服兩次神效此仙方也

胸前生孔 有人胸生一孔咳嗽則與此孔相應隨有膿血而出此肺痿也用 黨參

生黃耆 當歸 金銀花各三錢 生甘草 連翹各錢 官桂一錢 煎服數次自愈

胸旁生瘡 凡大人小兒胸間兩旁各生紅白瘰泡溼爛疼癢每處直長一條連生十

餘箇不等名曰簾珠倒掛久則難治諸藥不效用端午日人家簷口所挂菖蒲連根

葉切碎瓦上焙枯研末香油調擦五六次即愈屢試屢效

龜胸 龜尿時時擦之久久自平龜尿難得以鏡對龜照之尿自出也

筋部

肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭 此名淵疽症百藥難效惟用 隔蒜灸法見癰毒通治門在

兩小腿陽陵泉穴穴在膝下外邊一寸以臑筋擱有一窩即是各燒七下或十四下即愈如不見效色紅者照癰

毒方治皮色不變者照陰疽方治

心部與胸及脾胃各部參看

心氣疼痛 方見後各種氣痛門

心痛喉腫閉目不語 方見咽喉門

心氣怔忡 龍眼核一斤即桂圓核去黑皮長流水煮極爛加大黑棗一斤去核搗爛如泥為丸每

晨淡鹽湯下三錢即愈 又方 焦白朮時時煎服極效有人心忡百藥不效後一

名醫云是脾虛常服白朮自愈試之果效白朮多食橫中滯氣惟用荷葉包裹久蒸

或用蜜炙則可服也 又方 獾猪心開割者為獾猪心蒸熟切片蘸真硃砂許少飯後食之三五

次即愈硃砂不可多服 又方 白蓮肉去皮煮食久之自愈

心胸煩滿 一人心胸煩滿兩年不愈後服 雄黃錢五並飲清油半碗吐出一蟲而愈

水停心中有聲如雷口眼歪斜不省人事 膽礬分為末温甜酒送下以吐盡痰為度

又一婦人心胸脹悶口流涎沫自言心中有聲如雷亦服此藥吐出一蟲斷之乃一

髮也 又一人患此服膽礬不效後服 雄黃<sup>錢五</sup>清油<sup>碗半</sup>吐出一蟲而愈

心膈飽脹腹中又飢又痛 胡椒<sup>粒七</sup>研末好酒沖服即愈

心中饋雜似辣非辣似餓非餓似痛非痛得食暫止或兼噯氣或兼惡心 乃火動其

痰也 焦朮<sup>兩四</sup>川連<sup>錢五</sup>橘紅<sup>兩一</sup>共爲末神麴煮汁爲丸如菘豆大每服五十丸食

遠薑湯下立效 又方 豬護心油蒸糯米食之即愈

一切寒熱痰痞水食結住心胸 見傷寒門葱薑熨法

心下堅大如碗邊如旋盤 此乃氣分因飲水所結也用 白朮<sup>錢四</sup>枳實<sup>錢二</sup>煎服

心痛忽長肉一條手不可近 此腎火也 真礪砂 真梅花冰片<sup>各一分</sup>點之立化爲

水內服六味地黃丸二料全愈並用吳萸研末醋調敷兩足心過一晝夜一換至數

日止

心口生疽 此名井泉疽又名慢心銳毒初起若心口內有塊漸大心口發高毒陷即

死醫皆縮手諸書亦無藥治之法惟余家祕集載以本人兩手十指以線量其長短

共有若干積於一線放喉管正中處雙環至背脊之中看兩線合攏盡頭處爲中穴

又以本人中指之中一節用竹片量準作一寸放在中穴之左右各遠一寸各以墨

記分立三穴如 $\infty$ 形樣每穴用艾三團一齊火灸灸畢全愈此林屋山人秘方也

心窩成漏 一人胸口一片如碗大無皮潰爛成漏膿血時流經久不愈用 葶薺磨成粉摻之數日即愈神效非常

肺部

肺癰又名肺疽與咳嗽門參看

諸患易識獨肺中患毒難知有人秘傳兩脚骨疼痛者或脚骨不痛而

舌下生如細豆一粒者再心口之上內微痛或兩脇微痛及咳嗽口渴喉乾此皆肺

中生毒之證也即用甘草桔梗各三錢煎服服下如覺稍安肺之患毒無疑矣以犀

黃丸見陰症門服至一料全愈此是預識預治百無一死世人但知脚痛醫脚咳嗽醫嗽

舌下一粒便以刀刺且此一粒癰未成膿定然色淡癰愈亦消重則其色紫黑如用

刀刺利害諸書皆云口吐臭痰胸中發腥作痛者肺癰也又稱症有三不治時吐臭

痰久如硬米飯者不治嘔膿不止者不治白面變赤者不治惟嘔而膿自出者易治

治之之藥惟地黃保生歸脾等湯輪服而已並無預知早治之法直至吐臭痰發腥

始知肺癰猶小舟飄入大洋也此等立論安可為後學津梁余每見此症吐膿膿色

皆白用犀黃丸治無不效貧寒不能治藥者用陳年醃芥菜滷每早取半杯用豆腐

漿沖服服後胸中一塊塞上塞下塞至數次吐出惡膿數日膿盡自愈神效凡患此

症者終身戒食鴨蛋白鰲紅蘿蔔石首魚蒼甲魚食則復發難治此林屋山人秘法

也一 又肺癰腸癰皆吐臭痰用棉花捲竹片上蘸油點火使本人觀之若肺癰着火頭是二箇腸癰火頭只一箇 又方 薏苡仁各炒爲末糯米湯調服或煮粥或水服當下膿血而安 又方 竹葉絞汁一盞服之吐出膿血自愈 又方 元參斤半 天冬兩四 桔梗兩二 炙草兩一 水十碗煎至二碗另加 蒲公英 金銀花錢各五 再煎煎至一碗食後即服初起即消日久即愈極效無比 又方 生芪炒 白芨 銀花 桔梗錢各一 苡仁錢五 貝母六分 陳皮 甘草節各一錢 甜葶藶分炒八 生薑片一 水二鍾煎半食後徐徐服初起者去黃芪加防風錢一 久不愈者加槿樹皮錢一 未成即消已成即潰已潰即愈其效如神

肺癰葦莖湯數劑即愈神效 葦莖湯方 老葦莖即蘆根再老者去節一兩 苡仁錢三 絲瓜瓣即絲瓜子三錢杵碎 單

桃仁去皮尖一錢 水二碗煎一碗服早晚各服一劑甚效

各種氣痛

心胃氣痛 真沉香 木香 公子香 乳香 沒藥 靈脂 前胡以上各一錢 真麝香分一 共研爲末收入磁瓶以蠟封口不可洩氣每服七分開水下此方專治男女心胃各種氣痛有氣痛滴水入口即吐者有痛極難忍抓破衣物者服之即愈神效非常百無一失如不見效即是蟲痛照後蟲積各方治之

驗方新編 卷二 肺部 各種氣痛

香鬱散 此方得自仙傳凡各項心胃氣痛服之止痛如神有人照此方送藥數十年

無不應手奏效 青皮橘子一百箇 香附一斤 鬱金四兩 先將橘子鋪大蒸籠內蒂眼朝上

用新布墊底再將香鬱二味研末摻入於挨晚時蓋好蒸極透熟每橘蒂眼上放生

薑一薄片薑上加艾絨一小團將艾燒燃燒過另換薑艾連燒三次曬過一天次晚

再蒸接連蒸曬九次每蒸一次照前法連燒三次無日曬即風吹亦可製好用磁器

收貯每服連橘帶藥共一錢用水煎一服可煎兩三次宜於冬天配製以免霉壞

銀黃散 專治心胃寒痛年久者三次斷根並治寒痧及肚腹寒痛屢試如神百發百

中 銀硝半斤 黃丹二兩 淨用大銀窩銀店傾 放炭火上火要火又 將銀硝放窩內用銅篥不

住手順攪不可逆 再將黃丹分作數次加入銀硝即化為水攪至半箇時辰硝丹合為

一色傾入冷水內俟冷定取出研細磁瓶收貯埋地下一月收去火毒每用五分體

弱者用三分滾燒酒沖服如不知氣痛是寒是熱先服胡椒末其痛略緩者是寒然

後再服此方必對症也

良附散 良薑酒炒 香附醋炒 共為末米湯為丸每服三四錢食遠服凡心胃一切氣痛立

止如神因寒而痛者良薑加倍用因氣而痛者香附加倍用有人心胃疼痛十數年

不愈服此除根 又方 失笑散 五靈脂三錢 蒲黃二錢 各炒研末好醋煮透加水連

腎氣上衝心痛 方見前陰門

渣服凡男婦老少心腹胸肋瘀血作痛小腹疝氣脚氣及胎前產後血崩血暈一切  
 氣痛屢用皆效真神方也 又方 專治肝氣 夏枯草一兩煎水體虛者加瘦豬  
肉四兩同煮當茶飲  
 服過三四兩斷根此藥能舒肝氣養肝血止肝風故能奏效如神屢試屢驗而本草  
 不言其能治肝病何哉又凡肝病最忌食雞終身忌食椿芽為要 又方 草菓  
 元胡索 五靈脂 沒藥各五錢為末每服三錢酒調下各種氣痛其效如神歌曰  
 草菓元胡索五靈脂沒藥酒調服三錢一似手拈卻 又方 良薑 川樸薑汁  
炒五  
 靈脂各等分研末每服一錢滾醋調下即止神效 又方 丹參一兩檀香 砂仁各  
錢煎服即愈婦人更效 又方 元胡索末錢三酒下極效有人因食蕎麵滯氣心  
 胸痛不可忍大便不通百藥入口即吐後服此藥而愈又一老人下痢腹痛將死棺  
 木已備亦服此藥而愈凡氣痛諸藥不效者服此方必效 又方 生地黃搗爛取  
 汁冷服甚效有人心胃疼痛百藥不效後用此方吐出一蟲而愈又一人服此泄下  
 一蟲斷根 又方 醋泡過二三年大蒜頭食數顆立刻止痛或用生蒜頭煮食亦  
 可 又方 凡氣痛急切無藥以食鹽一撮放刀口上炭火燒紅淬入水中乘熱飲  
 之即愈愈後戒食脚魚 又方 照鼻部鼻血第一方燒少商穴法即愈

驗方新編 卷二 各種氣痛

走注氣痛忽有一處如打撲之狀痛不可忍走注不定靜時其處冷如霜雪 此因暴寒所傷用 楊柳白皮酒煮布包乘熱熨之有赤點處刺出血更妙凡諸急痛熨之皆止

心胃蟲疾作痛 或滴水入口即吐或口渴飲水不止或吐清水者皆是用葱白汁一

杯飲下隨飲真小磨麻油一杯少頃即愈蟲當化水除根雖痛至牙閉欲死者亦效

又方 真川椒 真烏梅 生薑煎湯服即愈 又方 病發時用艾葉十張揉

碎在銅器內炒乾 不住手用 篾撥動 將鹽滷 要豆腐店內 不會加水者 半小酒盃傾入候焙乾倒出研末用熱燒

酒一盃送下俟腹內作響或降氣或吐出清水即愈 此藥須現製現服隔夜即不

效服後戒茶與葷腥三日愈後每逢初一十六日用淡鹽湯吃一服永不再發其效

如神 又方 白鱧 一名 鱧魚 淡煮飽食三五次即愈此魚最能殺蟲故也

酒食凝滯攻衝作痛或有形或無形鄉人稱為穿心箭痛方書無所稽考法宜宣通血

絡用 川練子 去核酒 炒錢半 元胡索 五靈脂 桃仁 去皮 研 蒲黃 各一錢 水煎服其效如神此

葉天士先生方也

胃脘隱痛 胃脘一點隱痛喜按多年不愈用快氣溫胃殺蟲諸治不效者乃肝鬱不

伸胃上受尅久則胃中冲和之氣不供於用辛熱清潤徒刮津壅氣經云下脘不行



上脘不通地氣不升清陽欲結久易延為噎膈之症宜用 整荷葉一箇燒生香附米

研一兩 九香蟲九枚甘草水製研 胡索三錢酒炒研 用大棗去核皮薑一兩煮搗入上藥為丸日服一錢

開水送下

咳嗽 應與前肺癆及後吐血各門參看

胸膈脹滿咳嗽不安並治各項咳嗽 外治法用 宮粉香油入鐵器內熬數滾離火用頭髮一

團蘸粉擦胸膈數次即愈 又方 蕎麵雞蛋清和成團擦之效或用哮喘第一方

亦可

咳嗽痰喘 照後哮喘第一方治之其效如神或照前方亦可 又方 用真蚌殼粉

長者為蚌圖者為蛤須自取蚌殼研粉若用蛤粉則不效 新瓦炒紅入真青黛少許用淡醃菜水滴麻油數點調服二錢神

效有婦人痰喘咳嗽終夜不寐面浮如盤一服即愈 又方 用多年陳白蜆殼名又殼

燒過存性研極細末米湯服一錢一日三服神效 又方 皂角三片肥皂更好蠶姓者忌用

去皮子弦 一片入麻油炒過巴豆十粒 一片入薑汁製過杏仁去皮十粒 一

片入蜜製過小半夏十粒俱用火炙黃色共研末每用五釐安手心臨臥以薑湯送

服神效之至 又方 雪梨兩四生薑兩一共搗汁去渣加蜜兩四共煎數沸入瓷器內封

固不拘時服一劑即愈無病亦可服最能滋陰降火忌食蘿蔔 又方 藕汁 梨

汁 白菓汁各二兩銅鍋內熬成膏隨意服之 又方 元參 生甘草 麥冬 各

兩 金銀花八兩當歸二兩水煎服神效或加白芍三錢亦可兼治肺癰

咳嗽氣喘 生山藥搗半碗甘蔗汁碗半和勻燉微熱服立止

咳嗽氣喘遇寒即發 乾薑泡皂角泡去皮子弦蟲蛀者忌用肉桂紫色者去皮各等分共搗篩白蜜和勻杵三

千下為丸如梧子大每服三丸開水下嗽發即服日服數次忌葱麪油膩其效如神

諸般咳嗽 桔梗炒荊芥炒紫苑飯上蒸一次再炒百部飯上蒸一次再炒白前飯上蒸一次再炒以上各八兩共磨細末每服

三錢臨時開水調服如初感風寒者生薑湯調下 予製此藥普送服者多效或問

藥極細微而取効甚廣何也予曰藥不貴險峻惟期中病而已此方係予苦心揣摩

而出之蓋肺屬金畏火者也遇熱則咳金性剛燥惡冷者也遇寒則咳且肺為嬌臟

攻擊之劑既不任受而外主皮毛最易受邪不行表散則邪氣留連而不解經云微

寒微咳寒之感也若小寇然啓門逐之即愈矣醫者不審妄用清涼酸澹之劑未免

閉門留寇矣寇欲出而無門必致穿窬而走則咳而見紅肺有二竅一在鼻一在喉

鼻竅貴開而不閉喉竅貴閉而不開今鼻竅不開則喉竅將啓能無慮乎此方溫潤

和平不寒不熱既無攻擊過當之虞大有啓門驅賊之勢是以客邪易散肺氣安恬

宜其投之有效也 又方 枇杷膏見後勞傷吐血門最為神效 又方 款冬花 川貝母

知母<sup>各一</sup>煎數滾用冰糖向燈火上溶化滴入藥內服之屢試神效並治咽喉發乾 又方 細茶葉加紅沙拌炒糖乾冷透每服三四錢神效

肺虛咳嗽 凡肺虛胸熱咳嗽氣急煩滿咽燥渴欲飲冷水體倦肌瘦發熱減食喉嚨音嘶不出用 黃蠟溶瀝極淨用酸漿水煮過八兩入銅器內化溶作一百二十丸蛤粉四兩為衣養藥每服一丸核桃半箇細嚼溫水下靜臥閉口不語日服二丸漸漸平愈忌食雞半年 造酸漿水法用清水入飯少許浸四五日即酸或用隔一二日米泔水代之亦可

肺痿咳嗽 凡感受風寒停留肺中或勞力內傷以致咳嗽聲重胸膈隱痛頸項強硬不能轉側此肺癰也久則鼻流清涕咳吐膿痰黃色腥穢重則胸脇脹滿呼吸不及飲食減少脈洪自汗漸至咳吐痰血寒熱往來形體消瘦聲啞喉痛轉為肺痿此危症也用 大瓜萋一箇開一孔內有子多少粒用杏仁<sup>去尖皮</sup>照數配入封好外用黃泥包裹燒紅燒至無烟取出用物蓋住候冷去泥又用川貝母<sup>照瓜萋子粒數配入</sup>共研細末臨臥時每用二錢白蜜調勻燈心煎水送下

咳嗽痰血 涎唾中有少血散漫者此腎經相火炎上之血也若血如紅縷從痰中咳出者此脈絡受熱傷之血也若咳出之血淺紅色似肉似肺者必死又咯出痰中有血絲屬腎經咳嗽有血屬肺經嘔吐成盆成碗者屬胃經自兩脅逆上吐出屬肝經瀉血屬小腸經便血屬大腸經牙宣出血屬胃腎虛火 真青黛 括萋仁<sup>去油</sup> 海石<sup>炒</sup> 山梔<sup>炒</sup> 訶子肉等分蜜為丸噲化嗽甚

驗方新編 卷二 咳嗽

加杏仁 又方 款冬花 百合煨等分爲末蜜丸龍眼大每臥時嚼一丸薑湯下

又方 大柿餅去子箇入 眞青黛錢一綿絮緊飯上蒸熟臨睡時食薄荷湯下極效

獨聖散 治多年咳嗽肺痿咯血紅痰用 白芨兩三爲末每服二錢臨臥糯米湯下

台州獄吏憫一重囚囚感之云吾七犯死罪遭刑拷肺皆傷損得一方用白芨末米

飲調服其效如神後日凌遲剖其胸見肺間竅穴數十皆白芨填補色猶未變也

寒咳 核桃連皮搗爛加冰糖少許開水沖蒸服數次極效或照後蘇兜飲麻黃丸均

妙

熱咳 真柿餅煎水服或用扁栢葉煮豆腐食極效 又方 叭嚙杏仁一兩雙仁者不用泡去

皮尖用新鐫鉢新研搗將杏仁搗爛如泥分爲三服每服內加冰糖錢三共入盞碗用

滾水沖入蓋片刻俟溫連仁末服下早晚各一次數服而愈秋燥熱咳更妙若用苦

杏仁煎服則不效

咳嗽噎逆落枕卽發此受寒也 照後麻黃二方服之最妙

年久咳嗽 扁栢葉陰乾加 紅棗七枚煎濃湯代茶時飲之忌食葷腥煎炒另用

百合兩四冰糖錢四早晚蒸服不可間斷輕則十日可愈重則半月自痊有老人咳嗽

三十餘年服此月餘脫然除根靈驗無比切勿輕視 又方 蘇兜飲 紫蘇兜箇七

煎濃汁早晚沖雞蛋白服雖數十年咳嗽無不神效 又方 麻黃錢一熬濃汁一碗去渣加冰糖二兩熬至滴水成珠爲丸如蓮子大每服二三丸日服數次服完即愈咳嗽喘逆不能落枕者更效 又方 治咳嗽喘逆 淨麻黃 紅棗皮 南薄荷各五分

分上邊桂 紫蘇葉 桑白皮 杏仁去皮尖 大腹皮各四分 炙草分六 水煎服放膽用之百發百中 又方 雄黃研一錢 黃紙張三 用雞蛋白將雄黃調勻搽黃紙上曬乾捲成紙管插入筆管或煙筒內燒燃吸之如吃煙樣少頃嘔吐嗽止一日一次忌食諸物七日惟食白粥此孫真人千金方也神效非常不可輕視如嫌氣味難受食白煮猪肉即解 又方 小豬肺一副不見水去心不用將香油茶約一杯灌入肺管內以線紮管頭入砂罐內加水先夜炖熟早晨空心吃肺不用鹽送先將浮油去淨其湯隨吃幾口餘湯泡飯連吃二肺全愈屢試如神 又方 陳海蟄皮鹽盡 冰糖拌蒸食陰虛久嗽者極效 又方 生地 沙參各二兩 川貝母心去各一兩 元參 黃芩 桔梗 知母 百合 百部 款冬花 天門冬心去 廣皮 枳殼各一兩 甘草分八 用水煎汁去渣再熬成膏每早空心滾水調服甚效 又方 大雪梨箇四 老薑兩四 同搗取汁蜂蜜兩四 黑豆炒一升 研末乘熱和勻七蒸七曬不拘時服 又方 酸醋和水煮鯉魚不用鹽送飯食 又方 猪板油蒸南棗去棗皮惟食棗肉早晚吃三五箇數日

而愈

久嗽連至四五十聲者 生薑汁杯半 白蜜匙二 同放茶碗內滾水沖溫服三四次即愈或

用前紫蘇沖蛋方最效

年老久嗽不能臥 猪板油 糯米糖 蜂蜜各兩四 共熬成膏時常挑服一匙口中噙

化三五日即止 又方 核桃肉皮不去 生薑兩各一 研膏蜜為丸二錢一顆每臥時嚼

一丸薑湯下氣促難臥服此立定 又方 潞黨錢一 陳皮 桔梗 紫蘇各錢半 五味

子粒十五 水煎食遠溫服

咳嗽聲啞 訶子皮 五倍子 五味子 黃芩 甘草 各等分為末蜜丸櫻桃大

每一丸噙化嚥下 又方 訶子皮三錢半生半炒 桔梗五錢半生半炒 甘草二錢半生半炒 木通錢三 水煎去滓入

生地黃汁一小 臨臥嚥下 又方 杏仁去皮尖並去油 搗融兌開水取汁燉熱服切忌煎熬

又方 白菓仁兩四 真白厚茯苓取整箇切用藥店中切成片者皆米粉假造斷不可用 桑白皮錢各二 黑豆升半 白蜜斤半 煮

熟曬乾為末以人乳半杯拌濕九蒸九曬為丸如綠豆大每服三五丸開水下神

効 又方 青蒿錢二 童便煮服極效

小兒晝夜咳嗽食少髮黃 此脾虛也用 真山藥一味 煮熟加糖調服神效之至

勞傷吐血 勞病火動陽物易舉方見前陰門

凡勞傷吐血咳嗽等症忌食椿芽食則病發難愈勞症諸方 枇杷膏 專治勞傷虛損吐血咳嗽發燒身體瘦弱四肢酸軟精神疲倦腰背疼痛飲食不進以及一切不足弱症服之屢效咳嗽尤應驗如神輕者二三料全愈重者四五料除根貧富可用不必另服別藥免致誤用害事即無病常服可保身強神旺此方得自仙授藥極平易功最神奇見者廣傳功德無量

枇杷葉

五十六斤新鮮者更佳洗淨毛

大梨

二箇深齶者佳去皮心切片用

白蜜

半鍾先熬滴水成珠大便乾燥者多加大便瀉瀉者不用以白糖代之

大棗

半斤或黑棗微棗皆可

建蓮肉四兩

不去皮

先將枇杷葉放銅鍋內砂鍋亦可以河水煎出濃湯用細瀝清汁去葉與渣不用後將梨棗蓮蜜和入煎熬以蓮肉融爛爲止用磁瓶收貯隨意溫熱食之凡虛病服藥多則脾胃受傷飲食減少病更加重虛弱咳嗽者若不早治肺損難治惟此方最益臟肺治咳嗽應效如神如虛弱並不咳嗽者枇杷葉不用只用河水同煮咳嗽多痰者加川貝母兩研極細末俟煮熟時入內煮一二滾取起若吐血用藕節二箇搗汁同煮冬月多製久收不壞夏月隨食隨製 飴糖飲 治男婦五勞七傷身體燒熱精神困倦不思飲食等症咳嗽吐血者忌服 好燒酒斤白糯米糖兩核桃肉七箇裝入磁瓶內不可太滿滾湯煮一炷香久埋土內七日去火毒隨便每日服一二杯不可過多大有奇效

元霜膏 治虛勞咳嗽吐血下血燒熱困倦其效如神 真烏梅汁 梨汁 蘿蔔汁

柿霜 白沙糖 白蜜各四兩 薑汁一兩 赤苓末 款冬花乳汁浸 紫苑末各二兩 共入砂

鍋熬成膏為丸每服三錢臨臥時含口中緩緩嚥下 加味四物湯 治癆熱咳嗽

如神 當歸 熟地各三錢 川芎 芍藥各二錢 柳樹根酒炒一兩 水煎服奇效

鵬胡飲 治虛勞咳嗽吐血吐膿雖垂危亦可用也 芫菱細根約三四兩搗碎用好

陳酒煮服每日一二次半月全安

坎離丸 治一切虛勞立見神效 黑豆炒熟研末 紅棗量用煮熟去皮核二味共

搗為丸每服三四錢鹽湯送下或酒下

外治法 治一切虛勞咳嗽吐血燒熱等症但脈息有神無不效應 箭頭砂一兩 明雄

錢五 共研細末綿紙包固選未曾行經十二三歲童女身體壯實無病者將藥貼放童

女臍內用布捆緊過一週時取下稱藥比前多重一二錢者更妙即刻捆於病人臍

上先備人乳十餘碗俟病者口乾發燥飲之渴止然後解去臍上之藥其病自去再

照枇杷膏調養一月百無一失斷不可服別藥以免誤事

人紅丸 專治童子虛勞咳嗽吐血燒熱屢試神驗大人亦治切勿輕視 人龍即就蟲

薑便洗淨瓦上焙乾以黃色為度黑色則不效 不破皮紅棗三十箇飯上 蘿蔔子一錢五分 大熟地五錢 自製真藕粉一錢

煎成膏 大熟地爛成膏 自製真藕粉一錢



真川連

六分酒并炒研末

以上共搗爲丸如桐子大每早以白滾湯送下七粒逐日加增二粒

加至二十一粒爲止服至一料全愈

吐血治法

血吐在水內浮者肺血也羊肺煮熟蘸白芨

末焙研

食沉者肝血也羊肝煮

熟蘸白芨食半沉半浮者脾心血也羊心羊脾煮熟蘸白芨食極效此聖惠摘玄方也脾肺之血係屬氣虛以補氣益脾爲主肝血係屬勞傷以滋陰降火爲主如概用滋陰藥則殺人如草菅矣俗謂非勞病而治成勞病卽此是也吐血最忌用參無論人參高麗參黨參均不可服此係名醫秘傳人多不信後有時醫試之每治吐血之症用參者多不能愈不用參者全活甚多又方凡勞傷咳嗽吐血用童便之清利者日日飲之勿間或自己戒食葱蒜等臭濁之物並戒房事則小便日清去其頭尾數滴日飲二三次每服南棗三箇自不惡心一月見效久服除根身體強健吐血服小使者百無一死服寒涼者百無一生此屢試屢驗良法也又方足紋銀一塊約重五六錢放碗內早起將自己小便去頭尾撒碗內色黃不可用乘熱飲下數日卽止忌酒與酸辣煎炒等物一年愈後將銀傾化已輕而奇臭蓋臊氣被銀收去也又方蓮藕藕節更妙日日煎湯飲之不可間斷輕則三月重則半年斷根無鮮藕時用藕粉亦可藕粉以自製爲真買者多假無益有損又方凡吐血多者用三四兩重大當

歸一枝切細取好陳酒一觔慢火煎至一滿碗候將要吐時口中有血務必含住取藥一口連血嚥下其血必止隨將酒分作幾次飲完卽此一劑而愈後不再發每有醫家阻云吐血尙要戒酒豈可用酒煮藥殊不知神驗非常此方活人甚多從無一誤如一時煎熬不及急用當歸一二寸嚼融帶血吞下卽能漸止不致大吐亦可救急此林屋山人經驗方也 又方 真桂元七枚 豬肺箇一 洗極淨以 硃砂分三 川椒每粒九粒 水煎連菓空心食大有奇效 又方 瓦鉢內蒸出自然汁不用放水連肺食盡灌入再將肺挖七孔每孔安桃仁一粒放瓦鉢內蒸出自然汁不用放水連肺食盡其效如神 又方 薺菜一斤俗各地菜 連根帶葉煮雞蛋三四箇 七晝夜不斷火隨時取食卽愈極效方也 又方 用上白細黏米於清明前後浸水一二日亦可磨細 日曬夜露曬極乾以銅鍋炒黃色不可太過每用滾水和成如指頭大煮熟連湯食不可加鹽與別物或少加白糖亦可 無論時候但覺咳嗽卽服一日須服五六次切莫服藥服後忌茶酒腥辣等物一月戒房事半年有人吐血年餘百藥不效遇一道人指授此方十日卽愈 又方 子雞一隻男用雌雞未生蛋者女用雄雞未曾啼者 先擇無人走動處挖一地坑用竹刀或磁片忌銅鐵將雞在坑內宰殺血滴坑內乾剝去毛破開腸雜收拾乾淨腸雜毛糞均放坑內不可遺一點在地雞亦不可沾水只將乾布內外擦淨取六月雪草按病人年

紀每歲用草嫩頭一箇同雞肝雞肫納入雞腹中用新瓦鉢兩箇合雞在內以紙密密封口再用鐵鍋兩箇合瓦鉢在內並將鍋口封緊鍋中鉢中總要拭乾不要灑水用稻草三大把穀殼七八斤緩緩而煨約半時久雞自爛熟取出檢去六月雪草將雞用手拆碎空心食之食雞三隻總無不愈真奇方也愈後須戒殺放生方免復發

又方 上肉桂去皮五分研末沖服忌火當歸 桔梗 枳殼各七分 大黃酒微 厚樸薑汁炒 川鬱金

真紫蘇各八分 水煎加童便半鍾薑汁二茶匙先服二劑再用 續斷錢一 麥冬去心錢二 遠

志六分 真山藥四分 赤芍七分 益母草三分 川貝母一分去心另研末沖服 水煎服十劑 此二方不論男

女遠年近日血症只要現在吐血之日先服前方二劑後服次方十劑立時全愈永

不再發慎勿加減藥味亦斷不可服寒涼藥如從前誤食寒涼藥以致寒血凝滯者

服此十劑後自然漸次全愈不必再服屢試屢驗功效如神若體弱者服六味地黃

丸空咳不止者服健脾丸即愈

咳血痰內有血出於肺與上咳喉門參看 款冬花 百合 百部蒸 各等分爲末蜜丸龍眼大每臥時薑湯

下一丸 又方 大蘿蔔箇一 切頂剝去肉一半入黃米糖令滿原頂蓋之火內煨熟

食效

咯血痰內有血出於肺與上咳喉門參看 天冬一兩 茯苓 杏仁 貝母 甘草各錢五 共研末煉蜜爲丸梧桐子

大每服三三十丸 又方 柳花研末米湯調服一錢神效

驗癆蟲法 用乳香燒煙薰病人手背男左女右以綢帕蓋手掌心良久有毛從掌中

出白者易治紅者難治黑者不治無毛者即無癆蟲

灸癆蟲法 用溼紙條貼背脊上紙先乾者即癆蟲處以黑點記用老蒜切片貼上以

艾一團放蒜片上燒之多燒為妙無蒜用薑亦可先備火盆鐵鉗如蟲出即用鉗夾火盆內或

遠送野外埋入土內恐飛入人口鼻內須謹防之

治癆蟲法 雄精 硃砂 硫黃去沙泥各一錢麝香分一各研極細末磁罐收貯以頂好燒酒和

勻用獨大蒜頭去蒂蘸藥從尾閭脊骨徐徐逐節擦上如有腫處或極痛之處即係

癆蟲所在須於腫痛處多擦數次其蟲自滅不拘新久一切癆病皆能除根如病重

者須擇天醫吉日總以午時擦之為妙端午日更佳忌戊日己日除日此藥能開背

後三重關竅即虛怯疰夏之人於端午擦之亦能神清氣爽經絡流通大有裨益此

方傳自海外屢試如神又方八月初一日早收取白草頭上露水點膏肓穴在脊上第四節骨左右兩

旁各三寸最為神效

童子癆並治癆貓糞取屋上曬白者用黃土包裹火內煨焦取出用碗蓋住候冷去土研末黃糖

和為丸每服三四錢效若仙丹屢試屢驗此林屋山人方也

噎咳帶血方 如噎咳多帶血便瀆甚至喘滿妨食脈弦無力及豁大無倫已成癆瘵

久服滋清不應者服此方神效蓋此方重在後天脾土以有形而護無形經云見痰

休治痰見血休治血本方毫無血藥而血自止方用 北沙參錢三 生白扁豆兩一 黃芪

皮錢四 炙甘草錢五 叭杏仁錢三 淮山藥錢五 霍石斛錢四 淮牛夕錢酒半 煎服久則見益或加

大補陰丸三錢尤妙錢鏡堂

湧血不止札伯羅 驟然吐血湧注不止急以全當歸四兩無灰酒二大碗煮透飲之如

量小人分日飲之亦可但不可牛飲須細細吞之切切

哮喘喉內有聲而氣喘者是

治哮喘妙法 病發先一時用鳳仙花又名指甲花 連根帶葉熬出濃汁乘熱蘸汁在背心上

用力擦洗冷則隨換以擦至極熱為止無則用生薑擦之 再用 白芥子兩三 輕粉 白芷各三錢

共研為末蜂蜜調勻作餅火上烘熱貼背心第三節骨上貼過熱痛難受正是拔動

病根務必極力忍耐切勿輕易揭去冷則將藥餅啓下烘熱再貼一餅可貼二三日

無論病愈未愈多備藥餅換貼不可間斷輕則貼一二日重則貼三四日或五六日

永不復發有人患哮喘四十餘年貼至數日斷根無論寒熱虛實鹽醬醋酒哮喘皆

治神驗第一方也藥味不可加減並治痰氣結胸及痰喘咳嗽 又方 海螵蛸上瓦

枯煉 爲末大人五錢小人二錢紅沙糖拌勻調服數次斷根

治哮喘方 用雞蛋浸童便內夏三日冬七日取出漂淨日煮一枚食之能斷根 鏡堂新增

又方 四君子各等分煎湯送葶藶大棗丸壯者二錢弱者一錢 鏡堂新增

增新 哮喘經驗方 麥芽糖入高粱酒內浸化 斤酒 冬至起每日隨量飲之 不可間亦不可取醉 盡九

乃止瘥後每年九九飲之匪特不發舊恙且能益人有人患此症峻劑奇方雜進罔

應新城陳分轉季湖 湖 教以此方飲畢九九沉疴若失斯疾嬰身多成宿瘤丸散紛

如取效蓋寡此方和平而有奇效不可忽視 又分轉之兄紹方太守 航 言凡哮喘

猝發用大磨麻油半斤入麥芽糖半斤飯鍋上燉融挑三四錢開水沖服早晚三數

次立效久服亦能斷根已治驗多人太守淵雅好學而耽味靈素與分轉同擅越人

之譽爲時稱重

增新 治哮喘 札伯羅 一女患哮喘不愈後道人教以取瓜蒂七枚爲末服之吐膠痰斗許

三服疾良已取吐諸疾宜天色清明巳午以前爲妙病人先夜勿食猝病不拘

增新 中寒喉間痰涎有聲若齶喘初起者 此寒邪襲肺俞所致失治者大或釀成哮喘

小亦嗆咳不休宜令人用手掌心貼緊肺俞穴 穴在背第 向下推熨至三五十次背椎

作熱即愈或用吳茱萸酒炒熱熨之亦能祛寒

脾胃

惡心吞酸 此脾胃虛冷也 吳黃四錢滾水  
泡去苦味水煎食遠服有人患此多年一服即愈或

加乾薑一錢亦可忌夜食並忌生冷食物 又方 核桃嚼爛薑湯送下

胃口虛脹手足厥冷 山藥半炒半生研細米湯下二錢日二次忌鉄器

涼藥服多嘔吐惡食 前三方及後 鯽魚 橘皮二方均可用

冷水服多 沙子炒焦再加水煮熟澄清飲之即消 又方 食生蒜頭二三枚亦效或

服砂仁一二錢亦可

胃脘冷滯 有人胃中冷滯多年不愈後遇名醫診之曰此尸疰也用死人棺中枕煮

水服之而愈

脾胃虛冷不思飲食 鯽魚和豆豉胡椒老薑陳皮烹煮空心食

脾家冷積食後胸滿兼治一切痰氣 橘皮一斤柑橙  
皮勿用甘草 食鹽各四  
兩水五碗漫火煮

乾焙爲末每服二三錢白滾水沖服有人得此疾百藥不效偶食橘皮散似屬相宜

遂連日服之一日忽覺一物墜下大驚自汗如雨須臾腹痛遺下數塊如鐵彈子臭

不可聞從此胸次霍然其疾頓愈蓋脾之冷積也

胸胃積滯 有人食白煮雞蛋過多胸胃積滯數年不愈後用 大蒜半斤煮食吐出一

團開視已成小雞連服數次吐出十餘團而愈

胃寒嘔吐黃水

進治痰飲吐水

暖胃膏

生薑一斤

搗取自然汁碗許入牛皮膠

乳香末

沒

藥末各五錢

同煎膠化離火將藥作三四大膏藥以一張貼胃脘痛處用綢綁捆三箇

時辰然後取週歲小孩所穿之鞋一雙銅鑼上烘極熱在膏上輪流熨之熨至膏硬

換膏再貼再綁三時再熨至愈為止後用

紫油厚朴

三斤用老薑二斤切片同煮一時去薑不用

乾薑四兩用甘草二兩同煮一

時法甘草不用將二味炒乾為細末黑棗煮湯核去皮為丸每服二錢開水送下久服斷根此方

名熨胃丸功能溫中降氣暖胃消痰大有奇效此林屋山人經驗方也

專治胃熱吞酸方

鏡堂增

惡心吞酸固屬脾胃虛冷而吐酸心辣又當別論經云諸嘔

吐酸皆屬於熱諸逆衝上皆屬於火如服前方不應其為胞絡鬱火乘胃虛而上僭

明矣不可概作虛冷治也宜遵丹溪心法治胃熱嘔吐之方治之方用 北沙參錢一

元胡索錢一 川芎錢六分 生薑錢二 川棟子錢一 橘紅錢一 衣錢一 水炒錢一 梔皮錢一 麥冬錢二 苦桔梗錢一

知母錢一 粉甘草錢五分 水煎溫服有痰加竹茹法夏錢各一

增新胃氣痛札伯備方用烏梅二枚砂仁少許同焙研細末和服

痰疾

中痰氣絕 方見急救門



下痰丸 治一切風痰眩暈癩癱久不愈者 白礬兩一細茶葉錢五爲末煉蜜丸梧子大

食遠薑湯下五十九丸久服痰自大便出

茯苓丸 治痰症手臂疼痛並治婦人產後發喘四肢浮腫 生半夏兩二茯苓兩二枳殼

去鹽 炒五錢風化硝 二錢五分如一時未易成但以朴硝撒在竹盤中少時盛水置薑風處即乾刮取用亦可 共爲細末生薑汁煮糊爲丸如梧子大每

服三十丸薑湯送下有人爲痰所苦夜間咳嗽如人抽搐兩手發戰不能舉物服此

隨愈

痰氣結胸 真淨銀硃錢五明礬兩一同研用熨斗盛火瓦器盛藥鎔化急刮搓丸每服錢一

好茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胸自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀

硃破積故也 又方 梨汁錢一薑汁 白蜜各半薄荷錢三研細末和水煮十餘滾服

降痰如奔馬 又方 照哮喘第一方治之極效

痰飲吐水 凡食冷物過度或氣虛脾弱不能消化飲食入胃皆變成水嘔吐無時名

曰痰飲 好赤石脂研一斤每服二錢酒送下至多服三錢服至一斤則終身不吐痰

水又不下痢此藥能補五臟令人肥健有人痰飲百藥不效服此而愈 又方 暖

胃膏熨胃丸二方見前牌極效

痰疾癩狂 狂病有因傷寒而得之者此一時之狂也照仲景張公傷寒門治之用白

虎湯以瀉火矣更有終年狂病而不愈者或持刀殺人罵官不認父母妻子見水則喜見食則怒此乃心氣之虛而熱邪乘之痰氣侵之遂成狂矣此等欲瀉火而火在心不可瀉也欲消痰而痰在之心之中不易消也惟有補脾胃之氣則心自得養不必祛痰痰自化不必瀉火火自無矣方爲化狂丹 高麗參錢三 白朮錢一 茯神各一兩 甘草錢一 芎藭錢各一 半夏製兔絲子錢各三 附子分一 水煎服一劑狂定二劑病痊此方妙在補心脾胃之三經而化其痰不去瀉火蓋瀉火則心氣愈傷而痰涎愈盛狂將何止乎尤妙在附子一分引補心消痰之劑直入心中而氣尤易補而痰尤易消又何用瀉火之多事乎此所以奏功如神也 又方 青橄欖打十斤 砂鍋內熬十數滾核法 入石臼內搗爛再熬熬至無味去渣熬成膏用白礬錢八 研末加入攪勻每日早晚取膏錢三 開水送下服完自愈凡癡癩羊頭風等症皆痰迷心竅所致服此甚效此林屋山人經驗方也 又方 藜蘆又名藜蘆 煎水多服甚效生者煮食炒食俱妙有婦人風癩每二二年一發或三四年一發久則一日發十餘次昏癡不愈後服此方吐出痰涎二斗汗出如洗更覺昏困三日全愈 又方 真川鬱金兩七 白礬兩三 薄荷水爲丸硃砂爲衣如梧子大每早服一錢開水下有婦人瘋癩十餘年服至四五十日心間如有物脫去再服數十日而愈以鬱金入心去惡血白礬化頑痰硃砂安神故也愈後須

用天王補心丹加減調治方免後患 又方 先將病人綁住在離當心下三指之

處艾火燒七次或九次再燒兩太陽七次用 辰砂 川貝錢各三酒煎服二次再用

海風藤 鳳尾草 川貝各錢半石菖蒲錢三煎服五六劑或再服紫金錠一二錢愈

後用蘆蒂棗肉爲丸每丸三分服至三丸全愈屢試如神 又方 絲綿尺一燒灰開

水下兌酒服更妙

癡笑不止 食鹽紅燒河水煎飲過片時用指入喉抵住舌根使作嘔嘔出熱痰數次即

愈

羊癩風 菜葉放口中亦可青草立時蘇醒仍照前煎橄欖膏服之可以斷根

痰迷譫語方 鮮猪心具一辰砂錢一甘遂錢二二味合研爲末藏猪心中外用牛糞煨熱取

出藥末和作兩丸將猪心煮汁和丸吞下即愈

增新回癩湯 治羊癩忽然倒臥作羊馬之聲口中吐痰如湧痰連心竅因寒而成感寒

則發也一劑全愈永不再發方用 人參錢三白朮兩一茯苓錢五山藥錢三薏仁錢五肉桂錢一

附子錢半夏錢三右藥煎服按此症得之小兒之時居多內傷脾胃外感風寒結成在

胸膈之中所以一遇風寒便發舊痰今純用補正之藥不盡祛痰轉能去其病根也

若作風痰治之雖亦奏效終不能一止而不再發採探

增新

收呆至神湯

採探 雜編

呆病鬱抑不舒憤怒而成者有之羞恚而成者有之方用人參

兩一柴胡

兩一當歸

兩四白芍

兩二半夏

兩二甘草

兩半生棗仁

兩一天南星

兩半附子

錢一菖蒲

兩一神麩

兩半茯苓

兩三鬱金

兩半右水十碗煎

一碗灌之彼不肯飲以雙手執其頭髮兩人拿其左

右手以一人托住下頰一人將羊角去尖插入其口一人以手拿住其頭一人傾藥

入羊角內灌之倘或吐出不妨陸續灌完彼必詈罵少頃人困欲睡聽其自醒切勿

驚動使彼自醒則全愈驚醒則半愈矣

增新

逐呆仙丹

採探 雜編

呆病如癡默默不言如飢而悠悠若失意欲癩而不能心欲狂而

不敢有時睡數日不醒有時坐數日不眠有時將己身衣服密密縫完有時將他人

物件深深藏掩與人言則無語而神遊背人言則低聲而泣訴與之食則厭薄而不

吞不與之食則吞炭而若快此等症皆由痰氣若以尋常二陳湯治之安得獲效方

用 人參

兩一白朮

兩二茯神

兩三半夏

兩半白芥子

兩一附子

分五兔絲子

兩一白薇

錢三丹砂

研末

右先將各藥煎湯調丹砂末與半碗彼不肯服以炭給之欣然服矣又給之又服半

碗然後聽其自便彼必倦怠欲臥矣乘其熟睡將其衣服被褥盡行火化單留身上

所服之衣另用新被蓋之切不可驚醒此一睡有至數日者醒來必覓衣而衣無覓

被而被非故物彼必大哭然後又以前藥與一劑必不肯服即給之炭亦斷不肯矣

不妨以鞭責之動其怒氣用有力之人將藥執而灌之彼必大怒已而又睡去矣此  
時斷須預備新鮮衣服被褥等項半日即醒心中恍然如悟必又大笑而病痊愈  
增新 啓迷丹 探中 獲編 治發厥口不能言眼閉手撒喉中作酣聲痰氣甚盛有一日即死者

有二三日而死者因素有痰氣而發也方用生半夏 兩半 人參 兩半 菖蒲 錢二 兔絲子 兩一 甘  
草 分三 茯神 分三 皂莢 錢一 生薑 錢一 右水煎服

近人氣質薄弱多櫻痰症攻補兩難國工袖手馴至痼廢躬竊閱然串雅 黃君曉密 手錄本 雖  
係走方然既立一方必有所試采入以備一格世有高明或審取斯乃區區所尸祝  
也

增新 痰凝皮裏膜外不紅腫而奇痛外皮反冷方用 白芥子炒研為末用甜酒糟和勻

熱敷患處包裹至一炷香時拂去即愈如久延片刻則熱痛如烙起白泡潰矣切切  
再此恙不急治多見膿潰至骨廢人肢體此方異傳濟人甚溥 伯記

增新 治痰飲方 氣實有餘 者宜之 單瓣桃花三月三日取不拘多少揀淨袋盛陰乾煎服效

二二消 湯而飲水不止為上消飲水多而 作瀉為下消多食易飢為中消

消渴飲水不止 三消湯 真台黨 白朮 當歸 茯苓 生地 各一 黃栢 知母

黃連 麥冬 天花粉 黃芩 各七 甘草 分五 水煎服神效三消皆治

驗方新編 卷二 痰疾 三消

天池膏 天花粉 黃連 真台黨 知母 白朮 五味各三兩 麥冬六兩 生地汁 藕

汁各二兩 人乳 牛乳各一兩 生薑汁二兩 先將天花粉七味切片用淘米水十六碗桑柴

火慢熬出汁盡五六碗瀝清入生地等汁慢慢煎熬加白蜜一兩煎去沫熬如膏收

入磁罐用水浸三日去火毒用二三匙白滾水送下甚效三消通治

兔絲丸 兔絲子酒浸淨 茯苓 蓮肉各三兩 五味子一兩 共為末另研真山藥末六兩酒

煮搗數百杵丸如梧子大每服五十丸空心米湯下三消皆治 又方 綠豆煮汁

並作粥食最妙 又方 好梨日日食之多食必效或多食蘿蔔更妙 又方 蠶

繭殼七箇絲 煎湯當茶飲之神效繅絲水飲一二碗更佳 又方 黨參一兩 蜜炙研末

開水泡透蒸熟為丸如梧子大日服五丸酒下或茄根煎湯下日加五丸加至三十

丸為止不可多服服五六次後以飲水惡心為度惡心時以乾物食之其渴自止奇

效 又方 五倍子煎水飲之或作丸服之久則生津止渴 又方 牛膝五兩 生

地黃五斤 搗融蜜丸梧子大空心酒下三十丸下元虛損宜久服為妙 又方 苦棟

樹根新白皮錢五 切片瓦上焙乾入麝香水少許煎空心飲之有人口渴不止遇道人

傳此方服之下蟲三四條而愈愈後人必困頓用黨參二兩煎水飲之 又方 如

一日飲水至一石者浮萍搗汁服之 又方 如飲水多而小便不澀者葵花根五

兩煎湯清早服之

多年消渴飲水百藥不效 每日食好梨二三箇或食蘿蔔亦可均極效 又方 白

芍甘草等分爲末用一錢開水送下日三服七日愈有人渴飲九年時發時止服此  
斷根

飲水不止小便如膏 茴香妙 苦楝子妙 各一錢研末空心酒調服

飲水不止小便時流以上各方可以通治 雞蛋三箇要頭 去殼攪融用燒酒四兩燒開沖服服後即

蓋被睡醒禁風一日即愈有人一日飲水數桶上飲下流服此而止神效非常

又方 有人日飲水數斗小便時流飯量亦加服消渴諸藥年餘其病更甚後用真

麝香分三 酒爲丸用枳椇子又名棘柗子 煎湯服之遂愈問其故乃食菓成積及飲酒過度

積熱在脾致有此疾麝香能治酒菓棘柗亦治酒病故能奏效也

久病消渴不止並治渾 七味白朮散 白朮 高麗參 眞茯苓 霍香葉 乾葛各

灸草分五 水煎當茶飲另用木香分三 磨汁兌服屢試如神

消食易飢以上消渴各方可通治 好梨日日食之多食自愈 又方 肉蓯蓉 山茱萸 五味子

爲末蜜丸梧子大每服二十九丸鹽水下

腹中易飢食下片刻即吐 此蛇積也用醋泡大蒜汁飲數碗吐出一蛇即愈不吐再

服數碗自愈 又方 雄黃錢五調水服數次即愈

飲食積滯與痞瘕門參看

食積外治法 凡飲食停滯胸膈脹滿或大便不通或大便泄瀉或年老或體虛難以

攻擊內消者用亂髮一團剪斷酒麪一箇小者二三箇亦可葱白七箇老薑二錢胡椒七粒以雞

蛋一箇破殼傾入碗中將各藥搗融和入調勻用隔夜燈油煎成一餅貼病人心坎

下胃脘處先用燈油於胃脘處煎七次再貼如嫌太熱用紙隔貼亦可用布帶束住冷則煎熱再貼約一二時似覺鬆動即

便取去其病立愈此法極穩而效屢試如神若治小兒藥可以稍減又方紫蘇熨法

見傷寒門亦極神效

飲食凝滯攻衝作痛或有形或無形 方見各項氣痛門

飲食過多脹滿不安 用鹽擦牙溫水嗽下二三二次如湯沃雪也

魚肉積滯 狗糞燒存性為末酒服二錢日三服其積自大便出 又方 山查炭研

末為丸每服四錢數次即愈

食魚積滯 紅曲三合煮爛連渣服積從大便出連服三次即愈

生魚積滯 取水中石子數十枚燒紅投冷水中七次即熱飲之三五次其積從大便出

又方 生薑汁和紫蘇汁飲之即消



食犬積滯 山查肉 杏仁尖去皮 各二十四粒煎濃湯飲自化

食牛腹脹 乾稻草一把煎濃湯熱飲自消

食鴨積滯 淘糯米水煮熟飲一盞即消

鴨蛋積滯 治法與上同

雞蛋積滯 飲好醋即消或飲豆豉水亦消

食整煮雞蛋積滯 腹中若有雞子鳴者多食大蒜即可吐出

食鹽蛋積滯 肉豆蔻一箇煨去油煎服連服數箇自消

食素粉涼粉積滯 杏仁五十粒去皮尖 蒸熟搗碎滾開水沖服即消

食瓜菓腹脹作痛 肉桂研末 飯和丸菘豆大每服五分開水下 又方 食鹽湯即愈

食西瓜並諸瓜過傷 瓜皮煎湯解之諸瓜皆同

食荔枝腹脹 荔枝煎水服即消

食菱角腹脹 取生薑汁飲立消

食豆不消 生蘿蔔汁飲之即消

食麪不消 生薑汁沖好酒熱服自化 又方 生蘿蔔取汁炖熱服神效凡食麪用

醋斷不作脹

糯米積滯 神曲炒為末加木香末鹽開水下數日口中聞酒香其積即散

飯食凝滯腹痛 飯搓成團加鹽少許燒枯煎水飲即消

食茶成癖 花椒 脂麻等分為末以蒸麪餅為丸如桐子大每服十丸茶送下百日

遂愈 又方 每日食榧子七箇以愈為度 又方 青礬兩四入小罇內泥封火煨

一夜取出紅棗二斤煮去皮核共搗為丸每服三錢或酒或茶下神效 又方 新

鞋一隻將茶葉盛滿任意食之食完再盛一鞋連食三鞋自不食也男用女鞋女用

男鞋可效

食積痞塊 木賊草錢五研細末每服五分開水空心調服年近者一料即消年遠者不

過兩料全愈屢試如神

噎膈按膈噎各有五五膈氣食酒痰蟲五噎氣食勞憂思也藪膈通治之

此症有氣膈食膈酒膈痰膈蟲膈數種惟氣膈及老人膈食者難治然施治得法亦可

愈

噎膈諸方凡患膈食鼓脹愈後必殺殺放生方免復發至要至要 牛涎丸 專治膈食 糯米粉以老牛口涎拌和為小

丸煮熟食之神效或用牛涎和水服亦妙取牛涎法以水洗盡老牛口角鹽塗之少

頃涎自出愈後終身戒食牛肉 又方 牛反草煎水服其效如神無論何項噎膈

收貯磁瓶遇有患膈食者每早以開水吞胡椒三錢三次即愈神效 又方 生薑

出復食最為難得須令牧牛兒俟吐出時故意搶奪隨搶隨還俟數日搶慣之後乘

其不備搶着走開即可得也若一搶即走牛必怒奪恐致傷人 又方 鹿肚草用活

破腹取其腹內所食之草 陳倉米五年以外的方可用越陳越妙 灶心土以家中自取者為真各三錢 用水煎服五服後飲食如常再將陳

倉米熬湯當茶時飲一盞一月後永不再發如鹿肚草有多者照方服之十餘劑更

妙鹿肚草難以驟得先飲陳倉米湯救急免病加增再覓鹿肚草配藥服之可也無

鹿肚草用牛反草亦可 又方 豬肺管四兩如無鮮藕乾藕節亦可 舊籬底一箇麩鋪所用籬底之黃絲籬底要黃的黑白者不

用 以上三味新瓦上焙枯研細末用生薑一兩搗爛取汁白沙糖一兩沖服初服必

吐吐後再服服至三次即不吐矣服後忌食各色豆一月此方活人甚多神效莫測

珍之寶之並忌食豆腐豆芽菜一月 又方 小兒胎髮一箇以陰陽瓦焙焦存性

研細末陳酒送下極效 又方 先用雄雞一隻去毛與腸雜洗淨裝入大碗內上

用紙數層封固飯上蒸熟取出用鵝管或小竹管將紙上戳破一孔插入以一頭含

口中令熱氣沖入喉內其關自開預先取山羊糞一斗浸瓦缸內三日暑熱天只泡一日 每日

清晨用竹枝攪一次澄清取清水煎後藥服之如係酒膈用葛花三錢 雲苓三錢 製半夏

錢各二 陳皮去錢半 甘草錢一 氣膈用 烏藥 雲苓錢各二 陳皮去錢 砂仁研去錢 香附酒錢 炒製

半夏錢半甘草八分食臍用 神曲二錢 山查肉炒 雲苓各錢半 陳皮八分 法夏錢一 甘草八分

服三劑後即思飲食屢試皆驗 又方 淨牛乳以當面取者為佳 少加白糖時時炖熱飲之

凡患噎膈大便燥結者服此必效 又方 驢尿黑驢更佳 乘熱飲二三合極效此尿有

毒不可過多病重者七日方效 又方 用平地或牆邊人糞要乾枯者稱糞不用 以向東者為

佳取回用陰瓦上焙枯以煙盡為度 研末每服三錢淡酒送下不過三服即思飲食屢試如

神有起死回生之妙 又方 製黃蛆錢半 真細松蘿茶七分 廣木香五分 製豆蔻

四分 共研極細末五更時空心温燒酒半茶鍾調服不飲者用水酒調服戒麪食葷

腥數日雖水米不進者無不應驗 製黃蛆法用糞坑中蛆愈大愈好撈出以長流

水洗淨放瓦罐內鹽水和泥封固木炭火燒一炷香久以蛆至黃色為度如尚未黃

入砂鍋內再炒黃忌銅鐵器 又方 猪毛連粗皮及蹄尖不拘多少曬極乾放淨

石上用明火點之燒至如膏藥樣住火冷定研極細末每服三錢滾開水下此方年

在五十內者百發百中真仙方也 又方 荔枝一枚 去核將蜒蚰一條查藥物備要便知 放荔枝肉

內再摻好冰片三 於蜒蚰上即將荔枝裹好仍放殼內以線縛好病人含口內有冷

涎水滲出徐徐嚥下一時許蜒蚰化完無水滲出吐出只須一次可以立進飲食

又方 用雞蛋內白皮四十九箇加胡椒一斤入好燒酒蒸四十九日曬四十九次

皆治牛食百草之後必將所食之草吐出慢慢嚼食所吐之草即名牛反草此草吐不拘多少五月五日午時用布袋裝好浸於不見天之糞坑內四十九日取起用長流水洗淨懸空吊曬極乾爲末病二年者用薑末三分病一年者用薑末二分入麝香一釐滾開水沖服只須一服而愈忌葷腥鹽醬五十日永不再發此方極效無比存心濟世者宜預製以救人功德無量糞坑要無婦女大小便者方好 又方 陳皮多年者爲佳用數十年之舊壁土拌炒去土取陳皮研末對酒服一二錢數服即愈痰膈氣膈均效 又方 山梔五錢炒黑研末酒沖服一服即愈無論老少神效無比惟胃寒者不宜 又方 逢日食時自初虧起用白乾麪二斤水調揉熟向日和成丸如桂圓核大以日色復元爲止即將麪丸於是日曬乾收好按一歲一丸空心煮食平淡而有奇功麪圓外實內虛尤爲奇異不可輕忽多製可以濟人價廉功大不見日則不效

又方 生藕汁 生薑汁 梨汁 蘿蔔汁 甘蔗汁 蜂蜜 白菓汁 竹瀝

各一和勻飯上蒸熟隨意飲之 又方 韭汁 梨汁 薑汁 人乳各一飯上蒸熟服之三日後再服極效 又方 天生泉水時時熬服極效 又方 白蜜滾水調服每服一兩數服自愈 又方 黑沙糖一斤生薑一斤共搗如泥入磁罐封固埋乾燥地 下七日取出每日調開水送下痰膈食膈均極神效 又方 做米糖鋪內榨過

頭造之糟斤一加生薑兩四共搗爛做成薄餅曬乾磨末磁罐收貯每早以開水調服二

錢其味最美可以代茶 又方 穀樹子又名楮樹煎水服因食甜物而噎膈者服此

最效 又方 一人噎膈飲食不下華陀見之云是蛇瘕用 醋泡大蒜汁佳飲

二三碗並多食大蒜後吐大蛇一條而愈 又方 油透木梳一把燒枯爲末酒調

一鍾服下半日即能飲食此方救人無數不可輕視又方 有肝旺脾弱食即嘔吐

屢治不效者此木剋土也宜用平肝補脾之藥治之必愈不可認爲噎膈也又方

患此症者有蟲藏於肺管時長時縮長則飲食難進或食後小頃即吐皆有蟲也用

靛青葉搗汁無葉即用兌淡酒飲之立愈百不效者此方最爲神效 又方 此症胸

前必有二小骨漸漸交合則不能食而死取生鵝血對口乘熱灌之其骨自化飲食

可進永戒食鵝牛二物一僧患膈食病臨死語其徒云胸中有物作梗死後必爲剖

出其徒剖得一骨後殺鵝血偶滴骨上骨即消化其徒亦患此病因飲鵝血而愈屢

試如神

傷寒膈食 核桃枚十五放砂鍋內水浸核桃高一指深煮四五滾取水飲之

膈食初愈飲食宜少 凡膈食初愈飲食不可驟進須先以米湯飲二日再爲清稀

粥服一二日再以濃粥服一二日每次只可一小碗俟七日方可食乾飯每食不過

一小碗日漸遞加切不可食飽緣胃氣初復驟然飽食反致傷胃則不可救矣卽病人要食生氣亦須聽之愈後忌鹽醬五十日仍請名醫調理

反胃嘔吐凡患嘔吐以上諸病各方可以通治

生薑塊一大

直切薄片勿令斷層層摻鹽以線紮緊外用草紙

七層包之水泡溼慢火烘熟取起搗爛和米煎服立止 又方 生薑汁一盞煎 蜂蜜

四兩煉 每服用薑汁一匙蜜二匙白湯調服每日五六次效 又方 胡椒分八 酒藥一

末 葱頭五 槌融有用熱茶炒貼心窩 又方 用極大枳殼兩半筒去內穰將 眞

阿魏分六七 杏仁十二粒 共搗爛入枳殼內將兩半殼合口外用綿紙裹好線紮緊入滾

水內大火煮半日取起去殼內藥將殼焙乾爲末燒酒送下重者不過二次卽愈又

方 眞頭道糯米酒釀去糟好醬油各半 和勻溫服卽止嘔能進飲食 又方 年

久陳石灰研炒 好醋爲丸如豆大每服七丸薑湯下三日卽愈 又方 柿餅 拌乾

飯蒸熟連食八日不飲滴水極重者八日必愈屢試屢驗萬無一失 又方 藕二

枝陰乾三四日去其頭二三段單吃藕梢一段吞汁吞渣一日一段二日服完卽愈

又方 甘蔗汁一升入生薑汁二合溫熱作五次服甚效 又方 甘蔗搗汁數

碗加乾香櫟煮爛再加白糖四兩搗勻揉碎不拘時服凡積食久而反胃極重者三

四次卽愈 又方 每早用滾開水兌冷水各半碗服之久服斷根 又方 用老

薑一大塊挖孔納紅棗一枚紅棗去核內包砂仁一顆外用黃泥包裹煨透去泥與薑棗只取砂仁嚼食每食數顆數次即愈極效或將薑棗砂仁煎湯服之亦效胃寒者最宜 又方 蚯蚓糞一兩木香錢三大黃錢七為末每服五錢無根水調服忌煎炒酒醋椒薑熱物一二服即愈其效如神因熱而嘔吐者最宜

上吐下瀉此尋常吐瀉也如因暑熱吐瀉不止急服霍亂門治之樟木煎水服立止屢試如神並治霍亂亦效 又方

韭菜搗汁隔水炖熱微服極效 又方 陳鹽梅一個瓦上焙枯加生薑片一大同煎服屢試神驗 又方 一人腹痛上吐下瀉服六和湯藿香正氣散平胃散理中湯皆不效因思傷寒書云胸中有熱而嘔吐胃中有寒而腹痛用 黃連桑黃水炒透黃芩 生

白芍 甘草 黨參 乾薑 法夏 陳皮 雲苓 煎服即愈 又方 小兒吐瀉不止用舊鐵釘有銹者煎水飲入口即止

一二日一吐氣味變酸 有人飲食一二日之後一齊吐出氣味變酸百藥不效用猪板油十兩熬去渣白蜜八兩煉淨二味再入銅鍋內熬數滾入生薑自然汁三兩和勻成膏取起不時挑服含化初服一次尚吐連服三次全愈

一二日一吐或三四五日一吐飲食不飽吐物不化 此名胃囊症生於胃旁其形如囊凡有飲食必入此囊雖食飽而肚仍飢餓因此物間隔於上飲食不能入腹故也

一二日一吐或三四五日一吐飲食不飽吐物不化 此名胃囊症生於胃旁其形如囊凡有飲食必入此囊雖食飽而肚仍飢餓因此物間隔於上飲食不能入腹故也



初起一二日一吐吐出食物並無氣味肉食則化米食不化久則三四日一吐若至五六日一吐則難救矣用 製附子<sup>錢五</sup>雲苓<sup>兩一</sup>每日煎服二次服至三日吐出食物必變氣味再服三日則吐一半再服三日則不吐矣不吐之後用六味地黃湯<sup>見內外</sup>方 加油當歸火麻仁研末煉蜜爲丸每早服五錢晚服芝蔴<sup>錢五</sup>服至數日後胃囊必從大便而出重者形如牛皮輕則如紙此病人多不知諸書不載方係仙傳萬金難得珍之寶之

朝食暮吐暮食朝吐 此腎虛也用 熟地<sup>兩二</sup>山萸肉<sup>兩三</sup>水五碗煎至一碗加肉桂一

錢<sup>末研</sup>兌入空心服一日一劑十日必愈愈後服六味地黃丸一二料方可斷根

飢餓嘔吐 凡人飢餓每有蟪蟲上胃食物必吐若誤用翻胃之藥其吐更甚宜用川

椒煎湯飲即安

乾嘔不出 此極惡之症用甘蔗汁加生薑汁和勻溫熱服

酒後乾嘔 甘蔗汁飲數次極效

食物下喉即吐 此腎水虧也用 熟地<sup>兩二</sup>萸肉<sup>兩三</sup>麥冬<sup>錢三</sup>煎服連服十劑即愈後服

六味地黃丸一二料不致再發

見食即吐 此胃經嘔也紅棗<sup>二箇</sup>胡椒<sup>二粒</sup>紙包煨過煎湯服外用米<sup>一盂</sup>酒藥<sup>炒熟</sup>

一 共研勻貼心窩

食後少頃即吐 此胃脘有蟲也白馬尿飲一二升極效或查卷五蟲疾方治之

嘔物不化 此大腸嘔也黃糖 酒藥 陳壁土共煎湯服外用酒藥二箇半生半棧細茶三錢艾

葉二錢共搗爛茶炒貼心窩

嘔吐清水 此膽經嘔也生薑一塊切開中挖二孔甘草五分末入薑內紙裹合住煨熟取薑內甘草

入薑一片煎湯服外用蠟樹根皮去粗瓦上霜 路旁陳茅草皂角灰共搗碎茶炒貼

心窩

欲嘔而不嘔 此小腸經嘔也楓樹皮甘草煎服外用燕子泥樟樹皮共搗碎有熱用

茶炒無熱用酒炒貼心窩 又方 車前草 燈心 楝木葉煎湯服 又方 如

嘔後小便不利者楓樹漿作膏用皂角灰摻上貼臍眼用燈火在喉下燒三次

口吐白沫欲嘔而不出 此膀胱經嘔也菘豆 糯米 鹽共炒搗碎加黃糖煎服

又方 蚯蚓 胡椒 艾葉 皂角灰共研碎清油炒貼心窩 又方 如嘔後氣

不散者用艾葉搗碎醋炒貼心窩

欲嘔而不嘔面發紅眼流淚 此三焦嘔也生藕洗淨搗汁如無藕節代乳汁 乾柿蒂 鳳凰殼煎

服神效 又方 桑樹皮 茶葉 四季葱共搗爛炒熱貼心窩如二便不通加皂

角灰黃糖水調貼肚臍 又方 黃豆研末童便和勻貼心窩 又方 上不嘔下不

瀉如霍亂者用 菘豆 糯米 鹽胡椒 竈心土共為末以刀燒紅將藥放刀上

陰陽水沖服外用 二酒糟 皂角灰同炒貼心窩如不愈用針刺中指出血即愈

聞藥即吐百藥不效 取家中竈心土藥買者不真則不效水為丸塞兩鼻孔即不吐矣極效

嘔吐不能服藥必有虻在胸膈 川椒炒十粒煎服或於嘔吐藥中加川椒飲之 又方

陳鹽梅二箇和滑石末交搥作餅紙包火上煨枯開水泡服甚效

脾胃虛弱食不消化湯飲不下 粟米升半磨成粉水為丸梧子大每用七粒煮熟入鹽

少許空心和汁服或加醋吞服 又方 眞橘皮研去末五更安五分於掌心餽之即

睡三日必效 又方 大鯽魚一條去腸留鱗入皂礬末令滿泥包煨存性研末每次飲服一

錢日二服 又方 有人因服涼藥過多漸至嘔吐旬日之後進口即吐竟致粒米

不下湯水亦吐已七日矣請醫診視脈不散亂尚有神氣雖因寒涼而阻隔但絕食

以來大便不通小便短濇即用 製大黃 枳殼錢各一煎湯服之竟不吐出亦不思

食次日復進一劑下咽一時後大小便通利而思食矣誠哉藥之對症其效如此

嘔吐痰水 見痰疾門

新治噎膈方伯禮 燕窩之眞者常服自效燕根功同純白無邊無毛者偽如糙米色

者良根色紅紫者良 又鵝血能愈噎隔反胃

呃逆

偶然呃逆 紙撚通鼻取嚏即止

又方 目鼻上視屋樑行數步即止 此蘇溪黃曉窗傳試之頗效新增

氣熱呃逆 柿蒂煎水飲即止

陰寒呃逆 乳香 硫黃 陳艾 錢各二 爲細末用好酒一鍾煎數沸乘熱氣使病人用

鼻嗅之外用生薑擦胸前最效 又方 雄黃 錢二 燒酒 一盞 煎七分急令病人嗅其熱

氣即止 又方 川椒 去子及閉口者炒四兩 麪糊爲丸如桐子大每服十丸醋湯送下食遠服神

效 又方 荔枝 七箇連殼核燒研末 滾水調下食遠服立止 又方 黃蠟燒煙薰二三次即

止 又方 砂仁 研炒 生薑連皮等分搗爛熱酒食遠泡服二錢神效 又方 刀豆

子燒灰存性開水調服二錢即止

體虛常呃逆二三聲 公丁香 七粒 白蓮子 去心二七箇 二味同煮爛去滓加煨薑片糯米 升半

煮粥食即止

呃逆日久不愈一連四五十聲者 用生薑搗汁一合加蜜一匙溫熱服

校正 增廣 驗方新編卷三

善化鮑相璈雲韶編輯

合肥張紹棠又堂增訂

肚腹

腹痛辨症

腹痛各症應與傷寒門參看

臍眼上痛者食痛也臍眼下痛熱手按之不痛或其痛多急或

痛如刀割或吐或瀉或痛甚而覺有冷氣皆寒痛也手按之更痛冷物熨之不痛或自下而痛上或時痛時止腹滿堅結皆熱痛也時發時止痛在一處而不移者或有塊硬起者蟲痛痞痛也又聞煎炒食物香氣則痛痛時口吐清水或口渴者亦蟲痛也

陰症腹痛

男女交合之後或外受風寒或內食生冷等物以致肚腹疼痛腎囊

俗謂卵胞

內縮亦有不縮者手足彎屈紫黑重則牙緊氣絕謂之陰症傷寒治法見卷十四傷

寒門

寒症腹痛

參看陰症傷寒各方

或炒鹽熨之或炒葱姜熨之或用熱灰熨之或用滾水一壺隔布

熨之均止痛妙法也 又方 或飲胡椒湯加糖沖入不可加鹽或飲姜湯均妙

又方 龍眼連壳燒存性研末兌酒服屢試屢驗 又方 白芍錢三甘草錢一各 肉桂一各

驗方新編 卷三 肚腹

二二七

水煎服此張仲景神方也

肚腹畏寒 肚腹容易受寒動輒疼痛不已甚至寒中三陰命在須臾遲則難救此下

部虛損真陽不足命門火弱故也非大加熱品不可有人腹痛畏寒貼附桂膏厚棉

團腰俱不濟事老醫以製附子錢五乾姜錢一上肉桂五分研末兌服無上桂不用亦可水煎連服十餘劑雖

天寒肚腹亦不畏冷再加補中補氣等藥調理全愈附子走而不守得乾姜則守而

不走如不信單用附子一味熬濃汁滴紙上水必散開加乾姜熬之滴紙上則水不

散矣用炮美則不效又方 九製硫磺丸見內外備用諸方門服之神效

熱症腹痛 服六一散最妙或用銅鐵冷物熨之或服痧藥亦可若痛甚者或嘔或瀉

者照霍亂痧症各方治之又上吐下瀉而腹痛者如作霍亂痧症治之不效須照噎

膈反胃門內上吐下瀉方治之

蟲疾腹痛 蟲痛如有塊硬起者用手在硬處久久揉擦揉至一日其蟲即死從大便

而出或查瘡疾門各方治之

大人小兒腹中疝疾蟲疾作痛及男婦痞塊癥瘕各項肚腹脹痛 方見瘡疾門

食滯腹痛 方見飲食滯門

身受寒熱心腹疼痛上下關格不通大便閉塞小便短澀渾身綳緊手足腰膝殭硬不

省人事 照內外備用諸方門土熨法治之最妙

忽然肚脹如鼓 此症肚腹猝脹漸大如鼓此寒極也遲則不救急用武營烏槍藥二錢爆竹藥功緩不效以頂好燒酒煎滾沖服得吐瀉卽生非陡然脹大者不可誤用腹中繫脹腹硬如石痛如刀割見瘵疾門白糖煮酒飲數次卽愈

肚腹麻木 此風襲也多煮葱頭食之並用蔥姜炒熱熨之自愈

忽然肚黑 凡肚皮忽然青黑色此乃血氣失養風寒得以乘之所變怪形真危惡之敗症也若不速治難救急用大青研細末每服一錢五分以好酒調下黑退卽愈否則終危此起死回生之方也 大青多生溪溝旁葉似火麻葉藥店多假生草藥店有之又有小青葉細性味相同功力稍緩 又方 鉛粉和鹽炒焦敷之亦效

肚腹脹大亮如水晶 柚子皮燒灰沖服神效柚子兩廣最多他省頗少以橘紅代之亦可 又方 取癩蝦蟆六隻將四足紮住以蝦蟆肚皮在人肚腹光亮之處輕輕

摩擦幾次再取一癩蝦蟆照前摩擦用至六隻卽愈但蝦蟆眉內有蟾酥須防其迸出射人傷眼宜用紬帕遮住病人兩眼蝦蟆用過之後卽放水中使吐毒氣以救其命至要至要

臍眼出膿 此症先流臭水久則出膿不腫不疼多年不愈用韭菜葉扁柏葉二味共槌取汁一酒杯加童便一茶杯蒸熱服外用蘆甘石藥能淨水者用好醋泡一晝夜瓦上

焙乾研末敷如不見效當請明醫治之不可忽也

臍中出水 龍骨醋泡焙枯研敷或用赤石脂研末敷均效或照臍中出膿方治之更妙

臍眼出血 方見諸血門

肚腹堅硬臍眼出蟲 方見痞疾門

肚腹左右生癰 卽腸癰也須照腸癰方治之

肚臍生癰 肚臍腫大如瓜臍眼高突者是紅赤者照癰毒各方治之不紅不熱者照

陰疽各方治之

少腹疽 生臍下一寸五分氣海穴或生二寸關元穴或生三寸丹田穴皆由七情火

鬱而生也分別紅白陰陽治之

小腸疽 生小腹內按之如掌堅硬而熱微痛小便多出汗畏寒皮色如常或現微腫

脈緊實而有力者是也服犀黃丸見陰疽門卽愈此林屋山人秘法也

臍下二三寸關元丹田二穴冷結膀胱小腹有形滿痛手足厥冷 此厥陰傷寒重症

宜用仲景當歸四逆湯治之 桂枝 當歸錢各二芍藥錢三細辛分三通草錢五分甘草錢八分

大棗枚二水煎服神效其人有久寒者加吳萸分四生姜錢一酒一小杯兌服



腸胃中癢不可忍 此火鬱結不散所致用 柴胡 梔子炒 花粉各三錢 白芍一兩 甘草

二錢煎服即愈

治疔方 苡仁一兩 用東壁土炒黃入水煮爛放沙盆內研成膏每用無灰酒調服二錢 卽

消

痞積

凡腹內瘀血凝結疼痛時發時止謂之痞積又有形者爲癥無形者爲瘕又久瘡不愈

亦成痞積方見瘡疾門

治痞諸方 消痞膏治積年惡痞至重貼兩張卽消屢試神驗 蜜陀僧六兩 阿魏五錢 羌

活 水紅花子各一兩 穿山甲三錢 香油八兩 火候照常熬膏成時下麝香一錢 用布

照痞大小攤貼凡患痞癰處肌膚定無毫毛須看準以筆圈記用膏貼之內用水紅

花子研末三錢燒酒二斤泡之時飲一杯痞消乃止水紅花子卽紅蓼花子以自取

爲真藥店多假用之不效 又方 莧菜十斤不拘紅白均可 洗去泥不必去根以河水煎湯兩

大鉢用活脚魚一個 重十二三兩者不必切碎入莧菜湯連骨煮爛如膏去渣將脚魚

膏薄攤曬乾研末用麻油八兩 熬至滴水成珠下脚魚膏四兩 如脚魚膏不足以鉛粉添

配攪勻成膏收之用青布稍紙一層量塊大小攤貼七日卽消重者貼至兩次永不

再發屢試屢驗 又方 臭椿樹皮在上中者佳要一大束去粗皮止用白皮斤二切碎入鍋內水熬瀝去渣用文武火熬成膏薄攤布上先以生姜搓出垢膩後以膏藥在錫茶壺烘熱貼痞塊上其初微痛半日後即不痛候其自落一張即好永不再發貼膏時微撒麝香少許於膏上然後貼之貼上膏藥週圍破壞出水即愈此方已驗多人即脹滿腹硬過臍者貼一二張即愈真神方也珍之重之孕婦忌用 又方 雄黃 白礬兩各一 爲末麵糊調膏攤布上貼之俟大便脹滿而極多者即愈此秘方也 又方 香附 皂礬兩各一 二味拌勻分三分各用紙包外用黃泥裹成團陰乾若有破裂再以泥補之候乾以大炭火煨之自早至晚過夜冷透取中間不焦者去礬只用香附爲末以棗肉爲丸如棗豆大每早開水下一丸不忌口輕不過三五服重不過七服即愈病自大便而下煨時忌一切人見並不可聞雞犬聲犯則傷人恐致火災切記

腹中陡然堅如鐵石痛如刀割晝夜呼號 牛膝兩三 用好燒酒十兩泡之緊緊封好熬至二兩飲之吐出惡物神效

腹中堅如鐵石臍內出水變作蟲行之狀繞身作咬痛癢難忍掃撥不盡 蒼朮煎濃湯洗之並用蒼朮錢二 麝香錢二 滾水調服

婦人血蠱 馬鞭草及劉寄奴草煎湯服或爲末服此治血蠱神藥也

髮癢 好飲清油者是喉中  
如有蟲上下亦是 白馬尿飲一二碗卽化或以雄黃末服之卽吐出也 又方 有

人腰痛牽心發則氣絕一名醫治之云是髮癢以油灌之吐出一蟲挂壁上滴盡血

水乃一髮也又一婦人胸膈脹悶口流涎沫自言心下有聲如雷後用 胆礬分一爲

末溫酒送下吐出一蟲剪斷視之乃一髮也又一人患此服胆礬不效後服雄黃錢五

清油碗半吐出一蟲而愈

米瘕 好食生  
米者是 雞糞糞安白  
色者佳 白米錢各三 同炒焦爲末煎水服吐出米汁卽愈

肉癥 寒寒食  
肉者是 白馬尿飲二三碗當吐肉出不吐難治

虱癥 人好嚙虱致成虱癥用舊梳舊篦一件各破作兩分以一分燒研爲末以一分

煮水調末服卽下出此孫真人千金方也

蛇癥 一人膈噎飲食不下華陀見之云是蛇癥用醋泡大蒜汁陳者佳飲二三碗並

多食大蒜後吐一大蛇而愈 又方 蜈蚣一條瓦上焙枯研末酒服甚效 又方

如因食蛇肉不消者但揣心腹有蛇形用大黃芒硝合而服之微瀉卽愈 又方

白頸蚯蚓搗汁服之

龜鼈癥 腹中如有龜鼈疼痛堅硬或動或不動者用 殭蠶末錢一白馬尿碗一調服

並敷痛處神效 又方 石灰窰中流結土渣色紅而菜子油調敷數日即消 又方

鉛粉分四用黍米煮湯調服大效 又方 生硫黃末沖服用酒時服之 又方

白母雞一隻先餓一日用豬油炒飯與食取其糞焙乾為末水調服一錢日服三

次數日必愈 又方 生蝦煮食一日二次數日斷根

蛟龍癥 春秋二時蛟龍虺蛇蜥蜴之類遺精入芹菜中人偶食之得病發則似癩面

色青黃肚腹脹滿痛不可忍用 糯米糖時時服之服至數斤後吐出小蟲即愈若

吐虬蟲勿服 又方 明雄 朴硝錢各五滾水調服泄瀉即愈 又方 糯米 香

粳米 杏仁 乳餅煮粥食日食三次吐蛟龍有兩頭可驗

腹脹面黃 有人腹脹面黃百藥不效遇一名醫云是石虬極難醫治取死人棺中枕

煮水與服吐出虬蟲堅如石者數升而愈

蟲疾

寸白蟲疾 此症面色黃瘦飲食少進發時腹痛口吐清水用 尖檳榔個一廣木香錢五

研極細末大人每服五錢小兒三錢開水調下其蟲即隨大便而出先用煎炒香味

令病人聞之然後服藥無不神驗服藥須在月初病重者二三服即愈 又方 連

鬚老葱頭枚麻油調服或炒葱頭食能化蟲為水 又方 榧子個七日服二次服至

七日蟲化為水 又方 鴨蛋一個破一小孔入使君子肉末錢一檳榔末錢一用紙封口蒸熟食之蟲隨大便而出 又方 小兒科雜治門內羊尿脬方治疳疾最效並治大人蟲疾

虻蟲上出口鼻 川椒開口者不用研末沖水服即愈並用川椒含口中更妙

鼓脹 附浮腫

鼓脹辨症 凡患鼓脹隔食愈後必成殺放生方免後發至要至要 手指按之下陷不起者水鼓也隨手即起者氣鼓也週

身老黑色皮內有紫黑斑點者血鼓也身大熱如火者難治身發寒熱如瘧者難治四肢發黑者難治腹脹脉大命絕者難治脣口黑是脾絕者難治缺盆平心絕者難治手足心平腎絕者難治肚臍翻突肺絕者難治背平肝絕者難治陰莖腫爛者難治瀉後身有青筋起者難治大便滑泄者難治週身有破皮者難治先起於四肢後散於腹者難治先起於腹後散於四肢者易治

試鼓法 用鹽兩四炒熟絹包放臍上水鼓鹽化水若食鼓鹽紅色血鼓紫色氣鼓黑色偷氣虛中滿鹽水不改必用白鹽試驗

治水鼓法 手按之下陷不起者是 雄猪肚一個去淨內臟 老絲瓜筋條半 土狗子又名蠅 站十個 小黑公牛糞泡一 紫背浮萍一

以上各藥共裝肚內以麻線縫好放新沙鍋內加水內用桑柴火煮爛去淨浮

油煮好去藥將肚溫水洗淨竹刀切片仍入原湯中再加 赤茯苓皮 大腹皮

生姜皮 廣陳皮 生桑白皮各三錢 甘遂煨 綿大戟煨 芫花各二錢 用文武火再

熬數滾原汁約有一大菜碗將藥去淨猪肚與汁分作二次或三次服下聽其自利

其水由大小便出其鼓立消服此之日務須依法嚴忌鹽醬一百二十天為要每日

用真秋石可代鹽此治水鼓第一神方不可輕忽

水鼓小便不通小便通者亦可治 大田螺四個 大蒜五個 車前子三錢 共為餅貼臍中以帶縛

定水從小便出漸消終身戒食田螺 又方 商陸根葱白搗填臍中小便利腫自

消 又方 甘遂末水調塗肚腹週圍另煎生甘草湯服之其腫自消

日滿開鹽法 鯽魚斤二 食鹽斤三 共用黃泥包固白炭火煨一週時去泥將魚同鹽研細

用此鹽用完再食生鹽方保週身經絡堅固永不復發

治氣鼓法按之隨手即起者是 雄猪肚一個 內裝大癩蝦蟆一個 大砂仁一兩 老絲瓜筋半 破爛敗

鼓皮一塊 紫背浮萍一兩 以麻線縫好入新砂鍋加水用桑柴火煎爛去淨浮油照

前治水鼓煮法煮好去藥將肚洗淨竹刀切片仍入原湯中再加 眞紫油厚朴

台烏藥各五錢 雞心樅榔 大腹皮 眞沈香 枳壳三錢 芫花各二錢 綿大戟煨 上梅

片研 甘遂各二錢 用文武火再熬數滾原汁約有一大菜碗將藥去淨猪肚與湯分作

見解  
諸門

二三次服沈香梅片二味不宜見火臨服時拌肚內食之服後以大便下白沫為驗其鼓即消嚴禁鹽醬一百二十天日滿開鹽亦照前方服之此治氣鼓第一神方不可輕忽。又方 雞內金一 沈香 砂仁各三 陳香櫟五錢 共為末每服一錢五分姜湯下神效。又方 大癩蝦蟆一個 砂仁多不 為末將砂仁裝蟆內令滿縫口黃泥封固炭火煨紅取出候冷將蟆研末作三服陳皮湯送下以放屁多為效二三服全愈。又方 萊蕪子二兩 研末再以生蘿蔔搗爛和子絞取汁將砂仁二兩 浸汁內一宿撈起曬乾再浸再曬七次為度為末每服一錢米飲調下神效。又方 姜汁炒遠志五錢水煎服下氣通即愈。

治血鼓法遇男老黑色皮內有紫黑斑點者是 雄猪肚一個 茜草一兩 雄雞屎四兩 紫背浮萍一兩 老絲瓜筋半條 各

藥共裝肚內用麻線縫好照前水鼓煮法煮好去藥將肚切片仍入原湯再加 馬

蝗燒枯性乾漆三錢蝦 炒蟲查藥物備 真花蕊石研 真血竭各三 紅花 降香各五 甘遂

麵包 綿大戟煨 芫花醋炒各 照前文武火煮好去藥食肚與湯分作二三次服服後

以大便下黑水數次為驗其鼓自消嚴禁鹽醬一百二十天滿日開鹽亦照前方服

之此治血鼓第一神方不可輕忽方內馬蝗必不可少俟病愈後照服馬蝗法解之

各種鼓脹

輕粉錢二 巴豆錢四

去油 生硫黃錢一

共研成餅先以新絲一片放臍上次以藥餅

當臍按之外用布捆緊如人行五六里自瀉下候三五度除去藥餅以溫粥食之久  
患者隔日方去藥餅愈後忌飲涼水此方治水鼓如神其餘鼓脹功力稍緩 又方

凡水鼓氣鼓多食野水鴨最妙 又方 取蓋屋稻草煎湯傾入盆內先坐盆上

熏之待湯溫方洗其腹小便隨下黃水熏洗數次永不再發 又方 黃牛糞男用雌

雞糞四五  
月取淨者

陰乾微火焙黃爲末每用一兩酒三碗煎一碗瀝去糞渣止飲酒三服全愈

又方 公雞一隻用大麥連餵四五日取下雞糞一升炒黃色好酒一瓶浸雞糞煮

作一碗瀝去渣令病人吃一碗少時腹中氣大轉舒作鳴從大便而出其腫漸消如  
利未盡再服一二次必然盡消如泄利不止用田螺四箇酒淬煮吃卽以溫粥食之  
如腫消盡再用腎氣丸六君子湯和平之藥調理可也雞屎善能逐水而又通土性  
無微不至將所蓄之水盡歸大腸而洩此奪造化之原誠萬金不傳之方也此治水  
鼓極效別種鼓脹其功稍遲 又方 獨頭蒜一歲一箇去皮入頂好甜酒六七成  
對燒酒二三成以酒蓋過蒜爲度蒸熟如夏月露一宿仍溫熱用冬月乘熱連酒服  
完從大便出虛氣卽下穢物其腫自然消一服除根不忌鹽醬眞仙方也 又方  
西瓜一箇切去頂若是滿穰挖去穰三成以蒜瓣填滿將原頂蓋上放新砂鍋內再



用新砂鍋合上蒸熟瓜蒜與湯作二三次食盡全消不忌鹽醬 又方 雄豬肚一箇入大蒜四兩煮爛淡食五六箇忌鹽醬醋百日自消奇效 又方 烏魚二斤一條者去腸淨入皂礬二兩外用粗紙打濕包好入穀壳火內煨午時起子時止取出去紙灰骨只用淨魚皂礬研末收貯每服三錢老米湯下此藥行而不泄最妙 又方 蘿蔔一枚週圍鑽七孔入巴豆七粒入土種之待其結子取子又種待蘿蔔成仍鑽七孔入巴豆七粒再種如此三次至第四次將開花時連根拔起陰乾收淨磁器內遇鼓脹者取一枚搥碎煎湯服之重者二枚立愈有心人宜預種之

食物積滯腹脹如鼓 方見解救諸毒門食犬馬肉腹脹方內

肚腹脹滿飲食如常乃濕熱生蟲之象 照蟲疾各方治之

十種水腫 一清水先從左右肋腫起根在肝大戟爲君二赤水先從舌根腫起根在

心葶藶子爲君三黃水從腰腹腫起根在脾甘遂妙爲君四白水從脚腫起根在肺

桑白皮爲君五黑水從腎囊腫起根在腎連翹爲君六玄水從面腫起根在外腎芫

花妙爲君七風水從四肢腫起根在骨澤瀉爲君八石水從腎腫起根在膀胱藁本

爲君九膏水從小腹腫起根在小腸巴豆皮去油爲君十氣水或盛或衰起根在腹紅

飯豆爲君右十般腫病各有根源看十種病根除將君藥加倍餘九味即以上各藥等分研

末蜜丸梧子大用赤茯苓煎湯吞三丸不拘時每日三服愈後再用 肉桂 乾姜

肉豆蔻 赤茯苓 莪朮煮醋 川芎 桔梗各等分爲末每服三錢空心開水下每

日早午晚各一次百發百中功效非常 又方 七星魚又名柴魚 加蔥與冬瓜煮食立

消 又方 青頭雄鴨煮湯飲之或煮粥食之厚蓋被睡臥取汗方宜汗上腫者即愈

通身浮腫 取活癩蝦蟆一隻以巴豆七粒用紙包好納入口中用繩弔在有風無日

之處陰乾剖開去紙將頭足分爲五起肝膽亦分爲五起配勻收入磁瓶勿使洩氣臨用取出焙枯

研末沖酒服從頭吃起病從頭消從前兩足吃起病從兩手消從兩後足吃起病從

兩足消或不必分開亦可輕者一二日消盡重者五日全消終身忌食蝦蟆此治浮

腫秘傳第一神方也珍之寶之忌鹽醬一百二十日各種鼓腫亦可治 又方 活鯉魚一條

重七八兩去鱗將肚剖開去腸淨入好綠礬分五錢 松蘿茶錢三 男子用蒜八瓣婦人用蒜

七瓣共入魚腹內放磁器中蒸熟令病人吃魚連茶蒜食更妙從頭吃起病從頭上

消從尾上吃起即從脚上消其效無比 又方 一童子年十一手足臂腿及指頭

面遍身浮腫數日後漸至沈重氣喘不眠用黃皮柑子一個 同甜酒釀二斤煮至將乾

去柑内核取柑連酒食之二次全愈此林屋山人經驗方也

病後浮腫 老鴨加真川厚朴錢二 蒸食連食三隻即愈神效體虛者勿服 又方 蝦

蟆又名田五隻或用七隻 去皮並去頭與腸肺不去 先入碗內蒸熟再入瓦罐內加水半

小碗煮融加黃酒一杯再煮先食湯後食蝦蟆不用鹽醬連食數次必消永戒食蝦

蟆有人病後腿膝皆腫至夜更甚服此而愈

脇部兩肋之下為脇惡人多有以

左脇有聲作疼常嘔酸水 有人寫字作事身常向左夜愛飲酒睡亦向左飲食多墜

左邊久則左脇下有聲作痛數日必嘔酸水一次每遇暑天右邊有汗左邊無汗百

端醫治二十年不愈後用 蒼朮一斤淘米水泡 芝蔴五錢用二 大棗五十枚 共搗為丸梧子

大每日空心溫水送五十九丸漸加一二百丸忌食桃李雀肉服之三月全愈初服時

如覺熱燥用梔子煎水送下久服自不燥矣

左脇鬱氣疼痛 加味逍遙散 柴胡 白朮 白芍 當歸 雲苓各一錢 丹皮 梔

仁各一錢 薄荷五分 水煎服神效

怒氣動肝寒熱旬日左脇凝聚作痛難以舒轉 此絡脉瘀痺宜通血絡 桃仁尖皮

鬱金各八分 歸鬚 五加皮 澤蘭 丹皮 新絳各一錢 旋覆花粗包 青蔥管寸三 水煎

服

左脇作痛 柴胡舒肝散 柴胡 枳殼 川芎 香附各一錢 陳皮 白芍 甘草

各七 水煎服

右脇有形攻心作痛嘔吐清涎週身寒凜痛止則無形跡 此寒入絡脉氣塞阻逆宜

辛香溫通 川棟子酒炒 半夏姜汁炒 延胡索各一錢 吳萸三分泡蒸 良姜 蒲黃各八分 雲

苓二錢 華撥一錢 水煎服

右脇脹痛不食 推氣散 薑黃 枳壳各一錢五分 肉桂 甘草各七分 水煎服

肝燥脇痛或皮膚起泡 或痛亦是 大瓜萋一個連皮搗爛 甘草二錢 紅花七分 水煎服經云損其肝者緩其中瓜萋

甘緩而潤於鬱不逆此所以奏功如神也

兩脇不時作痛肺經亦兩脇作痛 應與肺經參看 白芥子五錢 研末白滾水下無論痛在左右雖年老虛弱

百藥不效者三服除根或照哮喘門第一方治之亦妙 又方 枳壳 甘草各

等分爲末每服二錢以鹽煎葱白湯調下 又方 小茴香一兩 枳壳五錢 共爲末

每服二錢鹽酒調服立效

脇痛連腰脊不能轉側 六味地黃丸見內外備用諸方 加杜仲續斷或煎服或作丸服如不見

效用八味地黃丸前見同 加小茴自愈

脇痛腸出臭穢 好醋煮熱洗腸雖腸出數日必入用 眞台黨 枸杞各五錢 煎濃湯

淋之皮自合口以羊腰子煮粥食之十日即愈

脇下生瘡 紅腫者照癰毒治色白平塌者照陰疽治

脇下漏瘡形如牛眼膿水不止 用鹽少許放白牛耳內然後取牛耳中垢以敷瘡上

即愈如不用鹽則牛耳不癢其垢難取或分別紅白照癰毒陰疽各方治之

兩脇脹滿 炒鹽布裏熨之

### 背部

發背治法 參看癰毒陰疽各門 發背乃癰疽中大患緣其患位對心對肺對臍故也偏曰搭手因

手可搭而名紅腫痛甚者應稱背癰易治如患色白腫痛者當以流注法治如平塌

不痛者當以陰疽法治此皆陰發背也如悞服寒劑悞敷涼藥悞貼涼膏定然毒攻

內腑不救此林屋山人秘法也

背癰諸方 牛皮膠 兩四 蒸化好酒兌服不飲酒者滾水沖服初起服此毒不內攻不傳

惡症 又方 未成者用活癩蝦蟆一箇繫放瘡上半日蝦蟆受毒必死取放水

中吐出毒氣復活再換一箇仍如前法換至三四箇後則毒散矣屢試極效若勢重者

以活癩蝦蟆一箇或二三箇破開連肚乘熱合瘡上不久必臭不可聞再換二三次

即愈並治一切癰毒屢試如神終身戒食蝦蟆 又方 芝麻油 斤 黃丹 八兩 宮粉

一槐枝 寸數 頭髮 一團 透鏤釘 五七個 銅綠 錢五 將油燒滾入釘熬數滾去釘入槐枝熬枯去

之入髮熬焦又去之入丹粉銅綠熬成膏置水中隔夜取出貼之其效如神百無一失 又方 瓜萋五枚取子去壳眞乳香五塊如桑大者共研細末以白蜜一斤同熬成膏每服三錢温黃酒化服有一桐廬人因母患背癱百藥不效後夢呂仙授此方服之而愈 背熱如火 此虛火也生附子研末口水調敷兩足心

腰部

腎虛腰痛 壯本丹 凡腎虛腰痛久則寒冷此藥壯精骨補元陽利大小便養丹田

功效甚大 肉蓯蓉酒洗杜仲酒洗巴戟酒浸青鹽以上各五錢核桃又名胡桃破故紙炒小茴香

錢各一共爲末用猪腰子一對剖開去白膜入藥在內紮住再用麵包緊入火內燒熟

去藥與麵每服一箇酒送下 又方 青段羊脊髓和蒜炒食以酒送下甚效 又

方 羊腰一對筋去白切片以鹽醃去腥水入杜仲錢三蒸服酒下或用荷葉包火中煨

食亦可 又方 猪腰子破開去白筋入小茴香末錢三紮緊麵包煨熟去藥與麵食之甚效

又方 猪腰一對洗淨破開去白筋眞茯苓錢二切片夾入蒸出自然汁放水不用連腰食盡其效如神

又方 白扁豆根洗淨不拘多少酒煮服立驗並可斷根

腎虛腰痛脚軟 板栗要布袋裝好挂有風處陰乾一日翻動數次方免乾壞每早取七箇細嚼食

再以猪腰子煮粥食之久必強健 又方 杜仲兩一半水半酒煎一大盞服之三日

能行七日全愈 又方 七製故紙丸

見內外備用諸方門

服之神效無比

閃跌毆打腰痛

三仙散

羅裙帶葉

葉長二尺餘花梗長二三尺不等花如龍爪四圍下垂又名龍爪花與金針花相似而略大顏色或紅或白

杉樹皮

槐

樹皮各等分煎水熱洗其渣搗融炒熱布包敷之冷則隨換日夜不斷有人閃跌傷

腰筋已結縮成團多年不愈以此敷洗筋即舒散數次平復 又方 生軍散先以

葱白搗爛炒熱將痛處擦遍隨以生大黃研末姜汁調敷蓋以粗紙一日一換盡量

飲以好酒三日即愈年餘不愈者皆極神效並治閃跌內傷肩挑重物受傷初時不

覺日久忽然疼痛浮面按之不痛或咳嗽牽扯作痛三五年不愈者用此亦效 又

方 真礪砂研極細用燈心點眼睛四角淚出即鬆連點三次全愈 又方 真橙

子核一分錢製香附錢一炒研為末酒服三錢極效 又方 白葡萄乾兩一用好酒煎服

至重者兩服全愈

脾溼腰痛 腰痛人皆以為腎之病也不知非腎乃脾溼之故腰間如繫重物法當去

腰臍之溼則腰痛自除 白朮兩二薏仁錢五水三碗煎湯一碗一氣飲之一服病即

如失多以二劑為止此方不治腎而正所以治腎也

腰腿風溼冷痛 當歸 熟地 白芍 牛膝 石斛 茯苓錢各一 川芎 木瓜 肉

桂 防風 獨活各五分 木香 炙草各三分 薑片一水煎兌酒服雖年久不愈亦效 又

方 吳茱萸研末 以黃酒杯一 拌勻炒熱攤油紙上敷患處用布摺好立時止痛如冷再換

男婦腰痛如刺面腫而黑氣血虛憊髮落齒枯唾涕痰涎腰脊痛不能行 鹿角剉四兩

炒黃為末酒下二錢加牛膝為丸更效或用七製故紙丸見內外備用諸方 方可斷根

各種腰痛 當歸 紅花 牛膝錢各一 威靈仙分五 生桃仁粒七 水一碗煎好加老黃酒一

碗服之即愈 又方 絲瓜根又名水瓜又名絲瓜 燒灰存性每服二錢酒下雖痛不可忍者可

以立止 又方 刀豆壳燒灰沖酒服極效神驗

纏腰丹 方見癱毒諸症門

腰痛牽心氣絕欲死 方見痞疾門髮癥方

前陰

男女交合精脫氣絕 男女交感樂極精脫而死切不可驚走下牀男脫則女以口哺

送其熱氣女脫則男以口哺送其熱氣一連數十口呵之則必悠悠然陽氣重回矣

再用人參附子湯灌之送氣之法先須閉口提丹田之氣上來盡力哺於口中送下喉去可救垂絕於俄頃 若貧者不能得參急用 黃芪兩四

當歸兩二 附子錢五 水煎服亦有生者 又方 用人抱起坐之以人之口氣呵其口又

恐不能入喉急以筆管通其兩頭入病人喉內使女子呵之不必皆妻妾也凡婦人



皆可盡力呵之雖死去亦生

陽痿陽物軟而不舉者是千口一杯飲 此方專治陽痿不舉一杯作二三百口緩緩飲之能生精

養血益氣安神其功不能盡述 高麗參好黨參亦可熟地 枸杞各五錢沙苑蒺藜 淫羊

藿 母丁香各三錢遠志去心沉香各一錢荔枝肉七箇右藥浸好燒酒二斤二日後蒸三炷

香久取起浸冷水中拔出火氣過三十一日飲之 又方 麻雀又名瓦雀肉冬月煮食

功能起陽生子其效無窮或用麻雀蛋煮食更為神妙 又方 新鳳仙花子即指甲花子又

名急性子 研末三錢鴉片煙錢一錢蟾酥分八分真麝香二分此味俟 做丸時加入共為一大丸外用葱白搗爛包裹再加紙

一二層用水泡溼放炭火中煨熱換紙再煨煨至七次去葱紙將藥改為小丸如菘

豆大每於將睡先一二時取二丸用酒化開敷陽頭上半時俟陽物舉起將藥洗去

然後行事堅而且久並能種子其效如神屢試屢驗 又方 大附子一個重一兩 五六錢者鴉片

煙分五錢硫黃末錢二錢穿山甲二片炙 黃研末將附子挖空以各藥納入用好酒半斤和附子用文武

火煮乾取出搗爛如膏先用 麝香三錢放臍眼再將此膏貼上應驗無比 又方

母豬腹內子腸新瓦上焙乾為末每服一錢燒酒送下可管一月 又方 蜂巢新

瓦上焙枯為末新汲水調服一二錢終夜不倒極效

陽舉易洩 有人交合之初陽舉即洩百治不效後用 大蚯蚓又名曲蟥要 韭菜地內者十一條破開

長流水洗淨加韭菜汁搗融滾酒沖服日服一次服至數日即能久戰可望生子

陽物挺脹 甘草梢兩二 小黑豆半升煎濃湯服

陽物堅硬精自流出捏之則脆痛如針刺 此名腎漏又名妬精或云生楊梅瘡多有

此症用 破故紙 韭菜子各一錢五分 黃柏五分煎服若不見效照後強中方治之

癆病火動陽物易舉 皮硝放手心兩手合住其硝自化陽物即不舉矣以燒酒和泥

敷陰毛上陽即復舉總之陽舉即相火妄動其病難愈必致貪色亡身不如不舉安

心靜養為妙保身惜命者宜加意焉

陽強不倒精自流出 此名強中乃陽盛實熱不急治必發癰難治用 生地 黃柏

知母 龍骨 大黃 枳壳各一錢 水煎服若胃虛食少者則用 黃柏 甘草

砂仁各一錢 水煎服

老人腎硬 老人腎藏虛寒內腎結硬雖服補藥不入用羊腰子對一 杜仲一片長二寸寬一寸 煮熟

空心食之腎自柔軟再用補藥調理

陽物被捆腫大 一小兒被人用頭髮繫住龜頭少時氣閉腫大無法可解後將小兒

坐冷水中即刻縮小去髮即愈

飛絲纏繞陽物腫痛不已 威靈仙兩二煎濃汁泡洗即愈

陽物縮入 方見傷寒門陰症傷寒內

陽物割斷 凡陽物割斷傷口不合急用所割陽物焙枯研末用酒沖服立效

陰頭生瘡疔名下 蘆甘石一兩火煨醋淬再煨再淬五次 兒茶錢三 共研末香油調敷立愈 又方 婦人月

經布燒灰 麻油調敷百發百中或加頂上冰片少許更妙 又方 先用 甘草

銀花 葱頭煎湯洗淨用 生橄欖核一箇無則用鹽橄欖核煮淨鹽味亦可 燒存性頂上梅花冰片分一

共為細末麻油調塗雖臭爛不堪敷之即愈屢試如神 又方 大訶子燒灰為末

入麝香少許先用 荆芥 黃栢 甘草 葱白煎湯洗淨然後敷之雖爛至一二

寸亦效並查癰毒門楊梅瘡方內服湯藥為妙 又方 銀青散見癰毒諸方 敷之神效

又方 鼈甲燒灰敷百藥不效者用此如神 又方 五倍子研末 絲瓜搗爛包敷雖

腐爛不堪者亦效

陰毛生入脚虱 白菓嚼融擦之甚效或用桃仁嚼融擦之亦可

腎氣由臍下上衝心痛小便不通 此名心疝用韭菜汁和五苓散見內外備用諸方 藥末以小

尚香煎湯沖服 又方 眞雲苓 小尚香各兩 共研末水為丸梧子大每服三錢

開水下服完即愈其效如神

小腹有塊直衝心胸叫號疼痛止覺筋硬 此名橫梁疝最難醫治婦女患此最多用

補骨脂斤一黑芝兩二蘇兩二拌炒篩去芝蘇只將補骨脂磨末器忌以酒爲丸每服三錢

開水送下或照後絲瓜方及丹溪方更妙

小腸氣痛腎子腫脹偏墜 名曰疝氣用 老絲瓜又名水瓜瓦上焙枯研末熱酒沖服

重者不過三服即愈雖氣痛衝心亦效 又方 凡疝初起必發寒熱疼痛欲成囊

癰者用鮮地骨皮即枸杞之根生姜各四兩共搗如泥用紬包於囊上其癢異常一夕即消永

不再發 又方 陳皮 荔支核焦炒硫黃火中鑿化即投水中去火毒各等分共研末飯爲丸如梧子

大每服十四五丸空心服酒下其疼立止痛甚者加五六丸不可再多雖氣痛衝心

三四服可以斷根此丹溪方也 又方 槐子錢一炒爲末入鹽分三空心熱酒送下腫

消痛止 又方 雌黃分五飛淨爲細末姜湯下止痛如神 又方 將兩脚第二指

對捆一處用豆大艾火從第二脚指頭上合縫處燒之立愈或在足大指外邊甲縫

內中間不上不下之處燒之亦可女男右左 又方 左脚裏側螺螄骨上排起四指是

三陽交穴用艾火燒七次止痛如神並可除根 又方 旱蓮草五錢又名墨旱酒煮服不論

老少久近皆效 又方 栗炭燒紅放碗內加好燒酒半碗以碗蓋住飲之雖痛不

可忍亦可立止 又方 病在左用 荔枝核一粒錢新瓦上焙枯研末空心好酒沖

服病在右用 小茴香錢五鹽水炒研末空心服一日兩次甚效 又方 荔枝核兩四

鹽水炒小 茴香一兩 鹽一兩 同研極細加紅白二糖拌勻為丸如梧子大每服五錢一日三次

四劑後即可斷根 又方 穀樹葉三月三日或五月五日採取 線穿陰乾要擇如雲板式者 每用四錢煎湯服服後即時

小解一二次立愈輕者一服重者兩服全愈神效穀樹又名楮樹又名栝音樹又名

穀皮樹 又方 苦楮樹葉半斤煮滾放罈內先薰後洗每日數次甚效甚速 又

方 生石菖蒲 柑子葉 小茴香各一兩 搗極融爛置酒壺內加開水一碗將壺入

鍋內隔水盪滾於患處隔衣頻熨之止痛如神 又方 青礬三錢 滾水送下立刻

止三服除根 又方 葫蘆巴子兩 鐵鍋內炒黑研末每服三錢滾酒送下出微汗

即消 又方 葶麻子七粒 和飯搗為丸敷脚心左痛敷左右痛敷右雙痛雙敷 又

方 黨參三錢 當歸洗酒 灸氏各二錢 川芎 川棟 小茴 橘核 荔枝各一錢 附子 肉

桂去皮作二三次沖服 川椒各五分 赤芍五分 服一二劑左邊偏墜而不痛者效驗之至 又方

蕎麥麵四兩 葫蘆巴四兩酒浸 小茴香炒一兩 共磨為末酒糊為丸如梧子大每服一錢空

心鹽湯下一日三次服至一月大便必有溼熱之物如膿者乃可斷根 又方 凡

患偏墜如服荔枝核小茴香等藥不效者此熱症也取芙蓉花根去心 用皮搗極融爛

加大黃末敷患處二三日必愈神效

腎子作痛外現紅色而不昇上 此名子癰遲則成功潰爛致命其未成膿時用 枸

橘全川棟 秦艽 陳皮 赤芍 甘草 防風 澤瀉錢各半 一服即愈此林屋山

人經驗方也

癩疔重墜囊大如斗 薏苡仁兩四 陳壁土炒水煮為膏數服即消此一道人祕方也

疝氣腫脹如斗若被爛管子落 出有丸見後 沈香 紫蘇 蘇木 南星錢各五 老香櫟一箇 雄猪尿脬

一洗淨將藥入尿胞內好酒四五斤煮爛搗為丸梧子大酒送下四五十丸藥盡全

愈 又方 照上薏苡仁陳壁土方治之最妙

腎囊腫大如斗痛不可忍 雄黃 白磨兩各二 甘草兩一 煎水時時泡洗即愈

陰囊奇癢不止 名腎囊風又名繡毬風已破者為腎囊癰用 闌過公猪肉四兩取猪 生腎囊之

燒更 妙 胡椒粒十 煎湯洗之一日數次數日即愈屢試如神 又方 包鹽蒲包一塊週

圍約一二尺寬熬水洗之洗畢將水存留焮熱再洗一日數次三日即愈有人患此

二十餘年洗至三日斷根蒲包取有鹽滷者方效 又方 新荷葉一張 連鬚葱頭七箇

煎湯先薰後洗屢試神驗 又方 茄子一枚連根葉煎湯薰洗一周時脫壳如舊

甚驗

陰囊陽物肛門瘙癢難忍 陳葫蘆燒灰 存性 擦搽患處立愈 又方 銀青散見雜毒 諸方 亦神

效

陰囊腫如水晶腎子腫大潮溼

照止痛氣腫大如斗各方治之亦妙

竈心土研碎炒熱鋪橈上再以

川椒

小茴香研末撒在上面將陰囊熏盪冷則再炒三次即愈 又方 綿花子煎湯洗

之即愈 又方 橄欖核箇七燒枯研末土茯苓少許研末加冰片和勻以紗袋盛之

先用土茯苓銀花煎水洗過再用前藥裝入布袋撲之隨撲隨愈

陰囊忽然腫大多因坐地所受風溼或蟲蟻吹着所致 蟬蛻錢五水煎洗腫處二三

即愈 又方 真礬砂煎水熏洗數次立愈 又方 明雄研末頂好燒酒調敷或

用老鴨子口中涎水擦數次即愈或用鴨血亦可 又方 雄黃 枯礬茶調敷隨敷隨效

陰囊撲損瘀血積滯有時疼痛 此名血疝臨睡時自以一手挽其下一手按其上由

輕至重摩弄百回一月之間瘀血盡散滯氣皆行雖年深日久不藥亦愈誠妙術也

陰囊腫爛腎子落下 此名囊脫又名囊癰用紫蘇煎湯日日洗之並用紫蘇葉梗為

末日敷用青荷葉包好內用 黃連分六 歸尾 連翹 雲苓錢各一 甘草 木通錢各一

煎服一人陰囊形大如斗被人治破爛見腎子如鵝蛋大旁有一筋六七寸長腎子

落出臭不可聞用紫蘇湯洗淨筋即爛下問其腎子小便小肚皆不痛難治則照上各

法治之數日後腎子收上爛孔收小內服地黃湯外敷生肌散而愈此林屋山人經

驗方也 又方 鳳仙花子 生甘草錢各二 為末麻油調敷即生肌 又方 有人

腎囊破爛露出腎子百藥不效後用老母雞蒸食而愈

下部溼瘡 馬齒莧<sub>兩四</sub>研爛入青黛一兩和塗則熱痛措去仍服八珍散即愈謹戒酒

與發物犯之必作腸風內痔則難治也

前後陰之間生瘡 此名懸癰方見海底部

胎疝良方 用烏骨雞蛋浸本人小便內七日洗淨每晨空腹煮食一枚十餘枚即愈

愈

腎大如斗<sub>編串 推</sub> 千金不傳韋氏方三服除根並能治疝方用 八角大茴香 青

皮 荔枝核<sub>兩各二</sub> 炒黃色煙盡為度置土上以碗覆之少時取出研末每服二錢無

灰酒下清晨午後臨睡各一服 又方 搗蔓菁<sub>即諸葛菜</sub>敷之冬用根均效<sub>札伯瀾</sub>

夢遺溺白<sub>札伯瀾</sub> 每日空心生吞韭菜子二十粒鹽湯送

冷氣入陰囊腫悶脹痛<sub>札伯瀾</sub> 布裹川椒<sub>熱炒</sub>厚半寸置囊下熱氣大通日再易以消

為度

坐板瘡纏綿前後陰間日久不愈 紅升<sub>錢一</sub> 赤石脂末<sub>錢三</sub> 牙猪脊筋一條將髓和藥

搗融用甘草馬齒莧金銀花煎湯洗淨攤敷週時立愈再發再敷斷根此程達<sub>中道</sub>

屢試屢驗方也



小便 參看 大便門

小便不通 小便不爽及小便出血 白濁均見後淋症門

此症寒熱虛實不同治無一定每用一方俟過一二時不

效方可另治不得性急亂投自誤 猪尿脬 音脬 一箇用鵝毛管插入尿脬孔內線紮

定用口吹氣脹滿以手按往管口將管口插在小便孔上用手捻氣透入孔中小便

即出諸藥不通者此法最妙婦人更效 又方 甘遂末水調敷臍下一寸三分內

以甘草梢煎湯飲之 又方 半夏末加 麝香少許填臍中上用葱白 田螺二

味搗成餅封臍上用布捆定下用 皂角燒煙熏入陰中自通婦女用皂角煎湯洗

陰戶內 又方 食鹽炒熱填臍眼上用 艾火燒五次即通 又方 用乾麵做

一圈子 高寸許 放臍眼上以葱管裝麝香直安臍中圈內以鹽填滿用艾一小圍安葱

頂上燒之或三四次或五七次即通此法極妙 又方 獨頭大蒜 一個 梔子 七個 加鹽

少許搗爛塗紙上貼臍下一寸三分良久即通如不通再塗陰囊上甚效 又方

白鳳仙花連根葉熬水乘熱洗腎囊陽物及兩胯內即通 又方 韭白煎濃汁洗

臍下一寸三分即通 又方 鯽魚一條搗爛用少許擦臍內及臍下一寸三分即

解 又方 烏白樹葉搗融貼臍下重者用根煎湯服其效如神並下水腫不可多

服 又方 猪胆一箇 留汁 以陽物插入胆中少頃汁入自通如婦人以胆汁滴入陰

中 又方，公鼠糞兩頭尖者是研末酒調敷臍下一寸三分 又方 田螺一枚鹽半匙

生搗敷臍下一寸三分雖腹脹如鼓可通 又方 蝸牛宜藥物備要便知搗貼臍下一寸三

分以手摩之加麝香少許更妙 又方 鳳眼草即吳桐子皂角兩四共煎五七沸加麝香

少許沖入磁瓶內將陽物入瓶內熏半炷香久藥氣入竅即通腹脹如鼓百藥不效

者此法最妙 又方 紫蘇煎湯入木盆內坐上熏蒸外用鹽炒敷臍下一寸三分

又方 皮硝不拘多少炒熱用布托臍上將皮硝放在布上敷之再以熱水滴三

五滴即通 又方 蜣螂散見大便門大治之最效 又方 陳棕瓦上焙存性以水酒

服二錢即通屢試屢驗 又方 如臍腹痛急者生牛蒡葉汁生地黃汁合二和勻入

蜜合二每用一合入水半盞煎三五滾調滑石末一錢服 又方 牛膝錢二車前子錢一

同研末水煎空心服 又方 芹菜一把搗融新白布包扭出汁蒸熟溫服即通忌

鐵器 又方 火硝生研為末每服一二錢小麥煎湯調服因寒閉結不通者最效

又方 凡小便不通百藥不效者用後淋症門內增補石淋沙淋妙方必有奇效

又方 舊草帽頂洗淨煎湯飲之立效 葱頭煎湯飲之亦效 又方 有人小

便不通百藥不驗一夕夢神命以螻蛄又名土狗燒灰酒服即通按此溼熱蘊結以溼熱

攻溼熱借其竄利下行之性耳 又方 桐子方見大便門大治之最妙 又方 有種氣

閉小便不通醫家往往以澤瀉木通車前猪苓等藥全無一效惟用 白歸身兩一川

芎錢五柴胡 升麻各二錢五分水二碗煎八分一服即通曾救多人孕婦及老年之人加高

麗參一錢此林屋山人秘方也

口渴小便不通 生地錢二元參錢一麥冬 木通 黃芩 葶藶 桑白皮 天花粉

地骨皮錢各一煎服神效

小便不通遍身水腫欲死 青布十七層貼臍下用滾燒酒一大壺熨之 又方 公

猪後腿淨瘦肉斤三去皮油肥肉切薄片將鍋用灰擦洗極淨燒紅放肉和酒炒乾加

酒再炒如此七次候用先將老米炒黃煎湯送肉食之小便即通腫亦隨消神效之

至

夫婦交合忍精不放及強忍小便以致不通或婦女轉胞小便閉塞 以上小便不通

一二三四方均效第一方最妙 又方 如強忍不通及通後有血點滴出者用尖

柝榔煎濃汁沖白蜜服神效

心熱如火一熱便入小腸大小便不快 有婦人心熱如火一熱便入小腸急去小便

而大便亦隨之而出不甚爽快困苦三年百治不效其脉滑數此相火送入小腸經

絡後用 川芎 當歸 白芍 生地 黃栢炒 小茴 木香煎服四劑而愈

小便不通腎氣上衝心痛 此名心疝治法見前陰門

小便白如米汁 此心脾不調小便在地白如米汁腎氣渾濁故也用 真川朴姜一兩

真茯苓錢一水酒各一碗煎服不飲酒者水煎服極效

小便短澀渾濁大便多而溏不思飲食 此傷食惡食也 生益智五分廣皮 山查

炒澤瀉錢各一真茯苓 白芍二錢水煎數服而愈其效如神

小便過多 此脬音氣不足用 益智仁炒鹽烏藥各等分爲末酒煮山藥爲丸如梧子

大每服七十丸空心淡鹽湯下名縮泉丸或用 益智仁四粒鹽水炒煎服亦效

又方 夜間尿多懶於起動者臨睡服核桃又名數箇甚效 又方 葶藶一兩水泡

透用鹽五錢炒去鹽將葶藶爲末每用二錢滾水沖服並用葱湯日洗糞門數次即

愈雖小便多莖內痛不可忍者亦極效驗或用 葶藶一斤爲末酒調爲丸如梧子大

每服七十丸亦可

夜睡遺尿 夜間遺尿於牀不論大人小兒用白紙一張鋪蓆下俟遺尿於上取紙曬

乾燒灰酒服即愈不愈如法再服一次無不神效此秘方也 又方 大甘草頭煎

湯夜夜飲之自愈或用補骨脂鹽水泡一夜曬乾研末臨睡服五分開水送下甚效

小便出血血出如小便者是若血如點滴者爲血淋須照後血淋門治之 當歸一兩酒煎服雖尿血頭痛難忍效驗如神此林屋山

人經驗方也 又方 蘿蔔葉搗汁加好墨少許飲之甚效 又方 眞柿餅三箇研末

米湯調服 又方 茅草根錢三車前子錢一煎湯調髮灰服或用茅草根一味煎水當

茶飲亦可 又方 黑豆一升炒黑研末熱酒淋之去渣空心飲神效 又方 蒿苳菜搗敷

臍上

小兒小便出血 如一歲小兒者用 大甘草二錢兩水六碗煎至二碗一日服盡即愈

小便出糞大便出尿 斯症乃陰陽拂逆大便前出小便後出肚腹裏急名曰交腸五

苓散主之 又方用 猪苓錢半茯苓錢三澤瀉錢二白朮錢半肉桂分七煎服 又老人陰血

乾枯大腸燥澀便溺均從前出此非交腸乃血液枯涸氣血衰敗之候也多服大劑

八珍湯或可稍延歲月耳見倪澗初論

陰陽易病 此症乃傷寒病後熱毒遺於精髓中無由發泄驟與不病人交合男病傳

女女病傳男故名陰陽易病其人身重少氣小腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭

重不欲舉眼中生花膝脛拘急燒禪散主之 方用褲襠近陰處剪下燒灰以水和

服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈男病取女襯女病取男襯見傷寒論又婦人

病遺男子溫毒傳易病如前症名曰陰易緞鼠糞湯主之 方用 韭菜根把一兩頭

尖錢一水煎服汗出即愈藥性按方寸匕即今之茶匙

老年小便不通悶脹欲死百藥不效 此症乃敗精瘀停窒礙溺道所致 用水銀少

許灌入葱管內令細巧人將葱捻住一頭插入馬口內緩緩擠進少頃即通後用六

味地黃湯減去黃肉加 牛膝炭 車前炭 各二錢 調理此方治驗多人至穩至當蓋

下竅主出不主納不過藉水銀之滑以通其道通後水銀自隨溺同出無遺不比麝

香之竄散也幸勿疑水銀性竄有毒而輕棄之 陸德王鏡 堂新增

淋症 參看小 便門

淋症諸方 淋有五種勞淋氣淋熱淋血淋石淋是也勞淋氣淋屬虛熱淋血淋有虛

有熱石淋或因熱起或因虛起久而成砂石者也

勞淋 勞傷虛損小便不出小腹急痛尿出白汁一點一滴者是 玉鎖丹 見後遺 精門 最效

又方 牛膝 兩一錢 乳香 錢一 酒煮溫服 水煮亦可 諸藥不效痛不可忍服此數劑其效如神

血淋更效如有夢遺失精之症則不可服 又方 核桃 連壳用又 名胡桃 黃泥包裹用小火

將黃泥燒至黑色取淨肉 不用油者 研末早晚用鹽開水空心送下三錢三日即愈甚效

氣淋 小腹急滿小便欲解不出解後常有黏滴者是治法與上勞淋同 又方 甘

蔗上青草梢 兩一 酒煮服三日全愈極效

熱淋 小便熱而赤短而澀臍下急痛者是 滑石 錢六 甘草末 錢一 水沖服日服數次三

日即愈又前小便不通門內猪胆田螺蝸牛蚯蚓各方均解熱毒皆可服之極有效

血淋 小便內有血點或血條者是 淡豆豉錢五煎服雖痛不可忍者無不奇效或用

勞淋牛膝方亦效 又方 浮小麥加童便炒研細末以砂糖調服五錢一服即愈

又方 頭髮燒灰生藕汁調服二錢三日即愈極效或用生藕節搗爛酒沖服亦

可 又方 尖槲榔煎濃汁加 白蜂蜜沖服神效 又方 熱淋石淋各方及小

便出血各方均可酌用

石淋後有增補諸方 又名沙淋小腹急脹莖內痛如刀割苦楚萬狀尿如沙石者是 瓦松瓦即

上無根草煎濃湯乘熱薰洗小腹約兩時即通 又方 銀硝入鍋內隔紙炒至紙焦為度研細用溫水沖

化每服二錢再加 滑石錢二水調服神效無比此藥能化七十二種石塊為治五淋

要藥石淋尤效 又方 核桃肉又名胡桃煮粥多食甚效或服七製故紙丸見備用諸方門更妙

又方 牛角燒灰酒服二錢日服五次奇效 又方 生葱頭同生鹽搗融敷肚

臍上其砂自出 又方 古銅錢煮水服兼治氣淋 又方 田螺一箇連壳搗融

熱酒沖服即通 又方 雞糞取白者曬乾炒為末開水服二錢日服二次甚效 又

方 童男髮燒灰每服一錢井水下 又方 玉米又名包穀根葉煎水時時飲之亦效

此症須忌食鹽方易見效不忌則難愈也

五淋通治 好銀硝研每服二錢勞淋用葵花子煎湯調化服 血淋熱淋冷水調化

服 氣淋木通煎水調化服 石淋服法見前 又方 本門內甘蔗上青草梢及

尖檳榔兩方可以通用牛膝方更爲奇妙 又方 小便不通門外治數方亦可通

用 又方 蘿蔔切片用白蜜泡半刻瓦上焙乾再泡再焙連製三次不可過焦用

鹽開水細細嚼服日服數次甚效 又方 葵花根水煮數滾即服久煮不可其效如神

又方 家麻根五錢水煎服即通大妙

五淋痛不可忍日久不愈生天冬槌汁半盞服之即愈 又方 冬瓜加淡豆豉煮食

一日三五次七日必愈

陽物堅硬精流不止痛如針刺 治法見前陰門

老人精敗淋痛少年亦可 八味丸見內外備用諸方 加牛膝車前服之如神

小兒淋症一日百餘次 大蒜 淡豆豉蒸麵餘各等分搗融爲丸梧子大每服三五

十丸三日必愈

增補石淋沙淋妙方一切淋症屬虛者並小便不通皆治 白豆蔻連殼 砂仁去殼 白胡椒 真川椒不效 以上四味

各等分共研末每用一二錢入小布袋內以好汾酒頂上燒酒亦可熬極滾熱沖入布袋套上



陽頭蓋衣熏之藥冷再沖滾酒再熏一日數次三日必愈熏後陽物及腎囊稍覺辣  
疼熱水洗淨自安一人因騎馬受熱而得淋症日久變成沙淋痛不可忍九月不愈  
後用此方治之三日斷根屢試神驗沙淋本係熱症初起不宜此藥久則雖熱亦虛  
非此不愈

### 遺精

遺精諸方

加減地黃湯

熟地兩六

山萸肉

眞山藥兩各四

芡實

丹皮

雲苓各二

蓮鬚兩一

龍骨生研水飛  
浮三錢

魚鱉四兩蛤粉  
炒成珠

共研末蜜爲丸如梧子大每日早晚服三四錢一

月卽止屢試如神功在諸方之上此林屋山人經驗祕方也

益腎湯 夢遺人以爲心氣之虛不知非心也蓋腎水耗竭上不能通於心中不能潤

於肝下不能滋於腎故相火上灼有燥脾土以致玉關不閉無夢且遺徒責之夢中

寃業誰任其咎法當大劑補腎而少佐以益心益肝益脾之品自然漸漸成功不止

而止也 熟地兩一 棗肉錢四 茯苓 茯神 當歸 白芍錢各二 白朮 薏仁 生棗仁

錢各五 北五味 白芥子錢各一 肉桂 黃連各三 水煎服一劑卽止夢遺十劑全愈此

方妙在心肝腎脾肺五臟兼補不止其遺安其夢尤妙在黃連肉桂同用使心腎

兩交自然魂魄安而精竅閉若不補其五臟而惟是止瀋之則精愈旺而夢益動久

則不須夢而自遺矣此方之所以奇妙而入神也

保精湯 遺久則玉關不閉精盡而亡世人往往用澀精之藥所以不救倫於未曾太

甚之時大用補精補氣何至於此 芡實 真山藥各一兩 蓮子錢五 茯神錢二 棗仁錢三

台黨錢一 水煎服先將藥湯飲之後加 白糖錢五 拌勻連渣同服每日如此不須十日

即止夢不遺矣方中藥味平平淡而不厭收功獨神者蓋芡實山藥固精添髓蓮子

清心止夢茯神棗仁安神利水得人參以運用於無為不必止夢而夢自無不必止

精而精自斷又何致玉關不閉至於天亡哉

玉鎖丹 治腎經虛損心氣不足思慮太多真陽不固溺有餘瀝小便白濁如膏夢中

頻遺骨節拘痛面黑肌瘦盜汗虛煩食減乏力此方性溫不熱極有神效 五倍子

斤一 白茯苓兩四 龍骨兩二 為末水糊丸梧子大每服七十丸食前用鹽湯送下一日三服

猪肚丸 專治夢遺及肌肉消瘦服之遺止發胖神效莫測 白朮八兩飯上蒸炒 苦參六兩酒浸曬七次

牡蠣八兩飯透水飛 用雄猪肚三箇洗淨煮爛搗如泥為丸桐子大每日服二次每服三錢

又新增方 荷葉為末酒服三錢神效伯璠禮記

疹後遺濁 凡人病發疹時觸受穢氣病愈之後遂變遺濁不分晝夜合目則遺諸醫

或補或利或瀉或用升提等法毫不一效此方服之而愈屢試如神 木賊 川芎

各五錢 粉葛<sup>一斤</sup> 蛇蛻<sup>一寸半</sup> 挂壁塵<sup>五錢</sup> 共研細末好酒爲丸每服三錢開水下以酒送之服一料卽止蓋疹發觸穢風毒遏抑不透仍用透解之法故效耳

後陰

截腸怪病 大腸頭出寸餘痛苦難忍乾則自落又出名曰截腸腸盡則不治初截時

用盆盛真脂麻油坐入浸之另飲火麻仁汁數升而愈

大腸蟲出不斷 鶴虱末<sup>錢六</sup>調水服自愈

肛門生瘡 肛門主肺肺熱卽肛塞腫縮生瘡好白蜜<sup>斤一</sup>猪胆<sup>枚一</sup>取汁和勻微火煎乾

作條三寸長候冷塗油納入肛門臥下少時必裏急後重通泄而愈 又方 雞內

金<sup>即雞</sup>燒存性爲末乾敷其效如神 又方 枳壳<sup>炒</sup> 槐角<sup>錢各三</sup> 黃芩 生地<sup>錢各二</sup>

川連<sup>錢半</sup> 穿山甲<sup>炒</sup> 蒲黃 殭蠶<sup>錢各一</sup> 分作二帖煎服

蟲食肛門 蟲食糞門肛破腸穿痛癢無時旁生孔竅用 蜚螂<sup>又名推車蟲七枚</sup> 新牛糞<sup>錢五</sup>

肥羊肉<sup>兩一</sup>炒黃同搗成膏爲丸如蓮子大烘熱棉裹納肛門中半日大便中卽有蟲

出數次卽愈 又方 癩蝦蟆<sup>個一</sup> 雞骨<sup>分二</sup> 燒灰敷之 大效終身忌食蝦蟆

糞門形如風癬作癢破流黃水浸淫徧體 當歸<sup>錢五</sup> 巴豆<sup>錢三</sup> 用香油熬枯瀝淨藥渣

入黃蠟<sup>兩三</sup> 共化離火再入輕粉<sup>錢二</sup> 攪勻搽之神效 又方 銀青散<sup>見雜毒方門</sup> 敷之最妙

肛門奇癢難受 蛇床子 棟樹根錢各三 防風錢二 生甘草錢一 皂角分五 共為細末煉蜜成

條塞肛門聽其自化一二次即止癢而愈幼時被人戲弄致有此病者尤為效驗

大便小便不通外治各方凡大便閉結無論虛熱皆可通用

大便虛閉 連鬚葱頭三個 薑塊錢一 豆豉十餘粒 搗作餅烘熱敷臍中捆定良久氣通即

愈不通再敷必效 又方 食鹽炒熱填臍眼艾火燒五次即通 又方 凡大便

不通多因寒熱不清用老薑寸許如指頭大加紙包裹火內煨熱取出蘸麻油塞糞

門內快則半日遲則一日必通此方最妙不可輕視 又方 張仲景傷寒論云陽

明病自汗小便反利大便不通者津液內竭也用蜜二合銅器中微火煎之乘熱捏

作條大如指長寸半許候冷塗油納糞門中少頃即通或加 皂角細辛為末少許

和蜜作條其效尤速屢試如神 又方 松子仁 栝子仁 芝蔴油俱去 各等分研

如泥白蠟和丸梧子大每服五十丸黃芪煎湯下凡大便先硬後稀者乃脾虛也服

此更效 又方 蘇子 芝蔴各半合研極細用水再研取汁一碗煮粥食此方最

穩其效如神凡老人氣虛或久病或產後不能用藥者用此更妙 又方 有人大

便裏急不通小便短澀而黃服以瀉火通利之藥總不見效後服六味地黃湯加附

子錢一 肉桂分五 一服而愈此因虛寒氣不傳送故也凡患此症審明如非實火宜照此

服之必能見效愈後宜服金匱腎氣丸無好肉桂以炮姜代之六味金匱各方均見  
內外備用諸方

大便熱閉 或口渴或小便短澀黃而臊者是用小竹管插入糞門三寸用猪胆汁加  
好醋少許由管內灌入神效又前大便虛閉外治二方亦可用 又方 牽牛子爲  
末用皂莢熬膏爲丸梧子大每服七丸或十丸卽通有人體肥腸結每十日大便一  
次閉塞不通百藥不愈後用此方甚效不可因牽牛性烈而忽之也 又方 芝蔴  
附大黃錢二好茶葉錢五共研末溫水沖服 又方 桃花瓣一大撮用滾水半碗沖服  
鮮者更佳或採來陰乾以備急用亦可 又方 叭杏仁 松子仁 火麻仁 栝  
子仁錢各三搗爛滾水沖蓋片刻當茶飲加甘蔗汁杯半更妙老年人或患癱毒大便閉  
結者服此最效此林屋山人經驗方也吸鴉片人腸閉燥結用生地五錢銀花錢一泡  
湯浸打汁涼服甚效

大小便閉塞不通 大皂角燒存性爲末粥飲下三錢或以酒和丸梧子大酒下三十  
丸或以病人坐桶上燒皂角煙熏自通 又方 苦楝子 茴香 穿山甲各八分牽  
牛子錢半煮服有人大小便不通不能坐臥立哭呻吟七晝夜百藥不效服此三劑  
全愈此方妙在多用牽牛以其能達右腎命門走精隧故奏效如神人多以爲性烈

棄而不用不知施之得當自能有益無害也 又方 皮硝三錢水化開 香油一小錢 皂角末

分五 共入猪尿胞內用竹管一頭入胞口內用線紮緊一頭按穀道內用力一擠其藥

入臟即通 又方 六七月尋牛糞中大蜣螂十餘枚又名推車蟲又名推糞蟲 線穿陰乾收之臨時

取一箇全者放淨磚上四面以炭火烘乾當腰切斷如大便不通用上截小便不通

用下截二便不通全用各為細末并華水調服 又方 用桐油子一個此打油之桐子非梧桐子也 先

將蒂頭磨或水或酒煖熱飲之即通如通不止者即將桐油子嘴頭磨或水或酒煖

熱飲之即止 又方 雄鼠糞兩頭尖者是 研末納臍中 又方 蜂房燒末酒服二三錢

日二服不拘大人小兒皆治

大小便不通尾脊骨上下左右疼痛 方見筋骨門

大小便熱結不通 大田螺三個 搗爛加青鹽分三 貼臍下一寸三分即通

大便下血 名曰腸紅又名腸風用 猪尾腸寸八 洗極潔淨以 白蓮肉二兩去心不去皮 灌入

用線紮住兩頭煮極爛取蓮肉少加白鹽日食二三次兩日內血即止而食亦漸加

矣猪腸食與不食均可照食七日另用歸脾湯為丸見內外備用諸方 日日服之即可斷根不

服歸脾丸照前煮蓮肉日日食之亦斷根有人下血多年時發時愈百藥不效後服

此方永不復發真神方也 又方 豆腐未嘗入袋取藥者 炒老黃色攤冷每空心服錢三 日服

三次血紫者白洋糖調服血紅者紅沙糖黃糖亦可調服雖患多年面色黃瘦垂危者亦極神效平日多服地黃而下血者百藥難治用此最效 又方 有人大便下血百藥不效勢甚可危後食辣椒又名青椒五六兩一頓食完食少不效不辣亦不效性熱豈知此物能去大腸之熱故奏功如神也 又方 蠶豆葉把一大搗融熱酒沖入去渣服一碗二三次即愈有人便血垂危百藥不效服此遂愈 又方 黑豆微炒搗碎泡水酒飲立效 又方 絲瓜藤又名水瓜又名線瓜燒枯研末淡酒沖服神效 又方 淋症門蜜炙蘿蔔方亦效 又方 眞桂圓肉二個十南棗十四個白木耳兩一好白蜜兩四煎服三次即愈因虛便血者神效 又方 蓬大海二個開水泡發去子加冰糖調服因熱便血者甚效 又方 酒煮鯽魚常食最妙 又方 用寒藥熱藥及補脾藥俱不效者用山渣肉爲末艾葉湯調下應手而愈或葶薺搗汁兩酒盃兌好酒服數日即愈 又方 凡下血好而復發不能永除者用久蒸黑芝麻細嚼食二兩日食數次服至數月不但下血斷根且能補腎益精久服百病不生功效難以盡述大便下血百藥不效日久不愈 恐是休息痢照痢症治自愈大便下五色膿血 此腸癰也照腸癰方治大便蟲出不斷 方見上後陰門

### 泄瀉

寒泄 胡椒末和飯作餅敷貼臍上或熱柴灰布包敷 或炒鹽敷 或糯米酒糟和

鹽炒敷 或酒炒艾絨作餅敷 或胡椒大蒜作餅敷 或艾葉灶心土門斗灰吳

茱萸共爲末醋炒敷均效

熱泄 六一散服之最妙或用菘豆湯溫服亦可

久泄不止 燒天樞二穴難辨遠左右各三寸是氣海穴難辨下寸半是雖泄久垂危不止亦效燒法大蒜瓣切

片安穴上用艾葉一小團大如豆在蒜上燒之或用燈草一根蘸油點燃燒之亦可不

如艾火之妙艾火每穴可燒二次燈火只燒一次 又方 大蒜搗貼足心或貼臍

中此千金方也 又方 大蒜鬚加銀硃搗融敷臍眼內立止如神 又方 木鼈

丸並治痢疾 土木鼈個半母丁香四粒麝香一分共爲細末口水調爲丸如黃豆大納臍

中外用不拘小膏藥貼之立止 又方 新開桃花用針刺取數十朵不可經手麵和作

餅煨熟食米湯送下服後其瀉更甚昏困異常瀉一二日後再飲涼水立止一人因

傷酒有積滑泄數年百治不效用此愈 又方 車前子鹽水炒七次眞山藥炒眞雲苓各

兩炙草錢六共爲末每服二三錢炒糊米煎水調服鳥梅湯更妙此神方也 又方 黃丹飛

過枯礬 黃蠟各一兩將蠟鎔化小銅器內以丹礬二味細末投入乘熱爲丸如豆大



每服二丸空心白滾水下一切久瀉諸藥不效服此一劑即愈 又方 芡實 淮

藥<sup>各二</sup>入豬肚蒸服即愈 又方 白朮<sup>一兩</sup>車前子<sup>錢五</sup>煎服立止此分水神方也

或車前子<sup>一兩</sup>煎服亦可脾胃虛寒者忌服 又方 燒棗丸治小兒泄瀉不止雖

至面黑氣息奄奄者亦立效回生並治泄出食物不化 沈香 木香 公丁香

花椒 官桂 乾姜 紅飯豆<sup>兩而微</sup>砂仁<sup>各四</sup>研為末煮紅棗肉為丸仍以紅棗肉

包之再以麵裹煨熟須看火色俟黑煙轉為藍煙即取出米湯送下

五更瀉瀉 每至五更即瀉瀉一二次經年不止者名為腎瀉此陰盛也用 五味子

<sup>去腰</sup>吳茱萸<sup>湯泡七</sup>同炒香為末每早陳米湯服二錢或為丸服亦可服完一料即愈

不愈即係陰虛用後五神丸治之 五神丸 耑治五更腎泄久不愈者以此丸補

命門相火即以補脾也 破故紙<sup>炒酒浸蒸</sup>核桃肉<sup>去皮</sup>五味子<sup>炒三</sup>吳茱萸<sup>鹽水炒</sup>生

薑煮棗為丸胡椒大每服三錢臨臥鹽湯下

老人五更泄瀉 蓮米散 黃老米<sup>炒三</sup>蓮肉<sup>三兩</sup>猪苓 澤瀉<sup>炒</sup>白朮<sup>土炒各</sup>木香<sup>錢</sup>

白沙糖<sup>兩</sup>乾薑<sup>紙包煨熟</sup>共為細末每服三錢空心白湯下其效如神此方簡便不大

費錢有老親者切宜留心

老人虛瀉 肉豆蔻<sup>三錢細裝煨</sup>乳香<sup>一兩</sup>陳米粉煮糊為丸梧子大每服五七十丸米湯

下

脾虛泄瀉

白朮

土炒 各一兩

白芍

兩炒 冬月加煨肉豆蔻

錢五 共為末飯丸梧子大每服五十丸

米飲下日二服甚效

腎虛欠泄

破故紙

煨乾 末二錢

用猪腰子

一個 去白筋油膜破開將故紙末裝入裏緊蒸熟不用

水食二三自愈極效

脾泄不止泄出食物完穀不化

小兒科痘症門治驗 篇末有妙方應參看

凡大人小兒泄瀉食物不化胃無火也

是胃陽虛

生白朮

真雲苓

各二錢 川厚樸

姜汁炒 砂仁

陳皮

各一錢 生益智

數服即愈

又方 參朮散

七味豆蔻散

均見痘症 瀉瀉方

俱極神效

又方 柿餅燒紅

放地上用碗蓋住

不蓋則成 灰無性

俟冷研末米湯調服二錢即愈有一小兒由六歲至十二

歲泄瀉食物不化百藥不效服三次全愈

腹脹泄瀉不止痢物不化

此胃寒也用 益智仁

二兩 麵裹煨之煎服立愈

泄瀉不止腹有硬塊不治

此症有氣滯血滯之分一人患此照氣滯治之不效後用

桃仁

大黃

芒硝

甘草

桂枝

白芷

水煎服數劑而愈

小兒水瀉不能服藥

亦治痰 亦治痰

巴豆

三錢 黃蠟

錢三 共搗爛成膏貼臍上用絹帕縛住半日即

愈如噤口不食者加麝香

三釐

用前藥同貼

又方

香白芷

乾姜

各一錢 共研細

末以蜜爲膏先用酒洗臍溫微熱後貼膏用鞋底烘熱熨膏上氣通即愈

瀉瀉口渴 七味白朮散見三消門屢試如神

### 痢疾

痢疾最忌黃連服則倒胃難治然倪涵初先生痢疾三方均有此味似不相宜胃弱者

宜斟酌用之

痢疾三方 鮑氏之論固屬慎重然案書按倪方處數百劑施送服者皆如鼓應桴誠良方也

痢爲險惡之症生死所關不惟時醫治之失宜

而古今治法千家多不得其道是以不能速收全效今立方何以爲奇不泥成法故

奇也立論何以爲妙不膠成說故妙也然其藥品又不外乎常用而已有識者切不

可更張勿爲庸醫所誤違而用之百試百效者也

初起煎方 川黃連去蘆 條黃芩 生白芍 山查肉各一錢二分 陳枳壳去穢 紫厚朴去皮姜汁拌炒 堅栝

榔 青皮去穢各八分 當歸 甘草 地榆各五分 紅花三分 桃仁去皮尖研如粉一錢 南木香磨兌三分 水二碗

煎一碗空心服渣再煎服此方或紅或白裏急後重身熱腹痛者俱可服如單白者

去地榆桃仁加橘紅四分 木香三分 如滯澀甚者或加大黃錢二 用酒拌勻炒服一二服仍

除之若一劑滯澀已去不必再服矣古方用之三五日神效用之旬日亦效迨十日

半月外則當加減矣另詳於下 加減煎方 川連 黃芩 白芍各酒炒六分 山查肉錢一

橘紅 青皮 枳榔 地榆分各四 甘草分三 當歸分五 桃仁粉分六 紅花分三 木香分二 水

二碗煎一碗空心服渣再煎服如延至月餘覺脾胃弱而虛滑者法當補理具方於

左 補理煎方 川連 條芩各酒炒 芍藥酒炒 橘紅分六 全當歸 人參無則高麗參好黨參均可 白朮

炒上 炙草分各五 水煎空心服渣再煎服 以上三方隨用輒效其有不效者必初時投

參朮等補劑太早補塞邪氣在內久而正氣已虛邪氣益盛纏綿不已欲補而澀之

則助邪欲清而疎之則愈滑遂至不可救藥雖有奇方無如之何則初投溫補殺之

也如婦人有胎者去桃仁紅花枳榔等味

微理妙論 古今治病皆曰熱則清之寒則溫之初起熱盛則下之有表症則汗之小

便赤澀則分利之此五者舉世信用如規矩準繩之不可易予謂五者惟清熱一法

無忌餘則犯四大忌不可用也今詳於下 一曰忌溫補痢之為病由於濕熱蘊積

膠滯腸胃中而發宜清邪熱導滯氣行瘀血其病即去若用參朮等溫補之藥則熱

愈盛氣愈滯而血亦凝久之正氣虛邪氣盛不可療矣此投溫補之禍為最烈也

一曰忌大下痢因邪熱膠滯腸胃而成與溝渠壅塞相似惟用磨刮疏通則愈若用

承氣湯大下之譬如欲清壅塞之渠而注狂瀾之水壅塞必不可去無不岸崩隄塌

矣治病而大下之膠滯必不可去徒傷胃氣損元氣而已正氣傷損邪氣不可除壯

者猶可弱者危矣 一曰忌發汗痢有頭痛目眩身發寒熱者此非外感乃內毒薰蒸自內達外雖有表症實非表邪也若發汗則正氣既耗卽邪氣益肆且風劑燥熱愈助熱邪表虛於外邪熾於內鮮不斃矣 一曰忌分利利小使者治水瀉之良法也以之治病則大乖矣痢因邪熱膠滯津液枯澀而成如用五苓等藥分利其水則津液愈枯而滯澀愈甚遂至纏綿不已則分利之爲害也若清熱導滯則痢自愈而小便自清又安用分利爲哉予於此一症素畏其險惡用心調治經今二十餘年百試百驗旣而身自患之試驗益精然後能破諸家之迷障而爲奇妙之方論用是述其顛末以拯斯人之疾苦而悉登諸壽域也 以上係倪涵初集中摘錄

又方 痢症每起於暑天之鬱熱而又感以水濕雨露之氣紅白相間如血如膿甚者如屋漏水如魚凍水裏急後重崩逐瘀痛欲下而不能欲不下而不得一日夜數十次甚至百餘次氣息奄奄坐而待斃此痢之概也若驟止其邪則死生頃刻不止其邪則危絕如絲欲補氣而邪氣轉加欲清火則下行更甚此時惟有因勢利導之方可行或疑人已氣血虛敗更加利導恐其難堪不知邪氣一刻不去則正氣一日不安古人治痢無止法信不誣也方用 白芍 當歸各三兩 蘿蔔子兩一 枳殼炒 檳榔 車前子 甘草錢各三 水煎服一劑卽止二劑全安可用飲食矣此方之奇妙全在

重用歸芍蓋水瀉忌當歸之滑而痢疾則正喜其滑也芍藥味酸以平肝木使木不敢再侵脾土又有枳壳檳榔消逐其濕熱之邪又加車前子分利其水溼而又不耗其真陰之水所以功勝於茯苓也尤奇其用蘿蔔子一味蓋蘿蔔子味辣而能逐邪去溼且又能通達上下消食利氣使氣行於血分之中助歸芍以生新血而祛蕩其敗污也少加甘草以和中則無逼烈之患此奏功之神奇實有妙理耳 又方 水瀉痢疾均治百發百中不可輕視 杏仁七十一粒去皮尖去油研 蒼朮六兩淘米水浸炒研 羌活四兩炒研 大黃一兩炒研 草烏二兩炒研 共為細末空心服忌生冷麵食葷腥煎炒發物裝入磁瓶勿令洩氣一二三四歲服一分八九歲服五分十五六歲服二分二十歲服三分四五十歲服五分老年入服一分孕婦忌服 水瀉濃薑湯下 赤痢燈心淡薑湯下 白痢濃薑湯下 赤白痢淡姜湯下重者日二三服 又方 不拘紅白久近皆治有患痢日夜不止越二十八夜不能睡藥窮待斃矣用此一服即安三服全愈 蘿蔔搗取自然汁二酒盃 生老薑自然汁牛酒盃 生蜂蜜一酒盃 細茶陳者佳瀝煎一盃 和勻服若無蘿蔔多用蘿蔔子冷水浸過搗取汁亦可 又方 胡椒一粒打碎 大鯽魚一個去頭尾骨腸 入椒末搗濃敷臍上甚效 又方 巴豆一粒 綠豆 胡椒各三粒 布包槌碎用 紅棗二枚 搗為丸敷臍上其痢即止止後即去藥 又方 見泄瀉門木鼈丸 又方 點眼法 初胎小兒糞五上絲乾二錢 雄黃分四 梅花冰片五 為極

細末水調點兩眼內角無論赤白痢及噤口痢危篤者皆神效 又方 粗草紙捲  
 緊成筒燒燃取下黑灰俟冷加紅糖在石板上錘融為丸如圍棋子大大人每服二  
 三十九分作三五次一日服完小兒服十餘丸三日全愈痢有寒熱之分且黏滯腸  
 胃急難推動若尅伐太甚必傷元氣此方功能推刮積瘀而不傷損無論寒熱虛實  
 至穩至靈百發百中 又方 元胡索末錢三酒調服有人年五十餘下痢腹痛欲死  
 楮木已備服此而愈 又方 真川厚朴錢一煎服一日三次兩日即愈神效 又方  
 生藕節搗爛酒沖服極效 又方 金銀花炒五錢研末不論紅白用開水調白糖  
 空心服用後其痢更甚兩日全愈奇效無比小兒一歲服一分 又方 山查炭末研  
 紅痢加白蜜為丸白痢加紅糖為丸紅白痢加蜜與紅糖為丸空心白開水湯下大  
 人每服八錢小兒每服三錢日服三次三日全愈山查能去積補脾無論虛實久近  
 屢試屢效不可輕視 又方 陳細茶葉 山查炭 紅沙糖 白沙糖各三錢老薑  
錢一煎服一日服盡即愈甚效 又方 木耳兩一紅痢用紅糖炒白痢用白糖炒紅白  
 相並者用紅白糖炒服之極效

裏急後重欲下痢而不出者是川厚朴錢一煎水調檳榔末分八服奇效或單服檳榔亦可 又方 穿

痢疾先紅後白一名曰腸蟲用 淮牛膝二兩搗碎以酒一斤泡之每飲一二盃日服三次極效

紅痢不止 鹽梅一個胡黃連錢一竈下土錢一共為末茶調服或單用鹽梅好醋調服亦妙

有人血痢百餘日用此而愈屢試神驗 又方 馬齒莧又名瓜菜搗汁半茶盃兌蜂蜜

半酒盃空心溫熱食之煮食亦可有人患紅痢數年服之即愈 又方 乾薑燒黑

存性候冷為末每服一錢米湯下 又方 穀樹皮又名構樹荆芥等分為末冷醋調服

一錢極效

孕婦痢疾 雞蛋二個破一孔如指頭大入黃丹分五用銀簪攪勻以紙封口入飯甑內蒸

熟食神效

噤口痢疾 生大附子一個切片貼無根火上俟熱貼病人臍上冷則再換立愈取無根

火法用新石灰一團冷水淋下自有熱氣出 又方 雄黃 巴豆 硃砂 葶麻

子 麝香 各等分搗為細末和蜜為丸如芡實大收好不可洩氣放眉心以膏藥

蓋之一炷香久腹內自響即思飲食去藥而愈此人世傳妙方百發百中活人無數

又方 活癩蝦蟆一隻加上好麝香分三搗勻貼臍上用布束半日即思飲食兩日全

愈 又方 細辛 肥皂各一錢葱三根酒藥子半個大田螺一個共搗成泥敷臍上候乾揭

去自能飲食 又方 田螺 麝香分一連壳搗爛敷臍上 又方 黃瓜藤燒灰存



性香油調敷肚臍上極效經霜之藤更妙 又方 吳萸研末醋調敷兩足心極效此引熱下

行法也 又方 鐵秤錘亦可或礱石 燒紅放瓦缸內好醋淬音入令病人聞之一日數次

極效 又方 真烏梅一觔打碎熬水十數碗入一桶內令病人坐桶上週圍堵塞不

令出氣使熱氣冲上糞門如温即洗其人即睡去隨扶令就枕待醒即思飲食先以

粥湯半盞食之少頃再食即半碗不宜飽食漸漸加食甚妙小兒烏梅減半用之此

神方也 又方 點眼法見前 又方 白蓮肉煮湯時服之即能思食石蓮更

佳 又方 綠豆粉 白沙糖冷水調服其效如神 又方 乾蘿蔔葉煎水加紅

白糖服最妙或用新鮮蘿蔔煎湯服亦可 又方 陳久火腿骨煎濃湯緩緩服其

效如神 又方 子鴨一隻去毛不開破 只將肚皮劃開肚中諸物均不動仰放大碗上蒸透

只服碗內流出自然湯不食鴨肉服後即能服藥吃粥此秘方也神效之至 又方

水鴨去毛與腸雜挂在廚內近煮飯處臘乾愈久更妙每服一大塊煎湯飲之甚

效 又方 用金絲鯉魚一尾重一二觔者洗淨照常用鹽醬葱安排畢入胡椒末

錢三煮熟置病人床前令聞香氣欲盡與之連湯吃一飽病即除根屢治有效 又方

神麪炒 山查 白沙糖各二兩 川連錢一另蒸 真烏梅三個 甘草五分 荔枝肉七個 用水三大碗

煎温服且吐且飲自然思食止痢此方屢試神奇活人無數不可輕視 又方 川

烏草烏各等分 放淘米水中泡四十九日取出烘乾於石臼內搗爛成末最忌鐵器每

服七八分小兒每服三四分紅痢加白糖白痢加紅糖紅白相兼者加紅白糖腹痛者加吳萸末少許此藥性雖猛烈但漂過四十餘日其毒已去分量亦輕且此症係由胃毒內蘊所致非此藥不能見功神效非常百不一失

久痢不止 麻油煎鹹魚食數次甚效此方奇驗莫測其理

多年痢疾息痢 凡痢症腹不作痛惟下膿血兼流黃漿日久不愈此係平素愛飲冷

茶水酒所致取 活鱧魚去腸雜切段 放瓦上焙枯成炭研粉每服錢三 黃糖拌熱陳酒送下

數服全愈不拘老幼無不神效忌食生冷酒水海參海蜇等物此林屋山人經驗方

也 又方 眞烏梅煎水紅白糖調服大有功效或用烏梅薰洗之法見前條 亦妙

又方 凡痢疾多年不愈其積日久下墜竟至大腸下口直腸下口交界之地有小

曲摺隱匿於此爲腸臟最深之處藥所不到之地症則乍輕乍重或愈或發便則乍

紅乍白或硬或溏任是神丹分毫無濟往往有三五年或十數年不愈者由此故也

用 鴉旦子壳去 以桂元肉包之大人每包七粒多則七包少則五包小兒每包三粒

多則五包少則三包空心滾水吞下隨食乾飯一二碗俟大便行時有白痢如魚腦

者卽冷痢之根如無白痢一二日後再服一次或加數粒亦可 此後不必服矣戒食生冷諸物

及甲魚海參海蜇皮蛋鴨肉三月戒葷酒五日永不再發雖十數年不愈者無不神效服至一二日後如腹中作痛用白芍一根甘草一根俱重三錢紙包用水浸濕火內燒熟取出搗爛煎水服立愈 又方 豆腐醋煎常常食之甚效 又方 數十年古松樹上皮研細末稀粥和服一碗日服三次三日必愈

脫肛 大腸頭白糞門出者是

大腸脫肛不收

蝸牛身有螺螄壳頭有雙鬚者是瓦上焙枯研末一兩

猪油調敷立效桑樹蝸牛更好

又方 脚魚

頭焙枯研末麻油調敷或以紙托患處神效 又方 大螺螄 個一頂上梅花冰片 一分

即時水出敷之甚效 又方 蟬退研末香油調搽奇效無比 又方 大蜘蛛 個一

去頭足瓦上焙枯研末燈油調敷半刻即收神效 又方 生鐵 二水煮濃汁日洗

數次雖脫肛多年亦效 又方 葶麻子 粒七去壳搗爛敷顛門上少刻即收收後務

即將藥洗去有人脫肛三月一敷即愈 又方 樛上灰塵 或倒甲塵亦可同鼠糞燒煙於桶

內坐上薰之數次即上 又方 後小兒脫肛辣椒方如百藥不效服之即愈

小兒脫肛 凡小兒脫肛不收久則堅硬難入用連鬚葱 助許煎湯入桶內坐上乘熟薰

之隨後慢慢洗軟再照以上各方用藥敷之即上 又方 五椀子為末鋪紙上捲

成筒燒燃放便桶內令其坐上使煙氣薰入肛門自上 或用五椀子煎湯薰洗亦可後將白礬末擦肛

門上可不再脫 又方 辣椒 又名青椒 又名辣子 多食極效有一小兒脫肛數月百藥不效後食辣椒數次肛即縮上並不再脫屢試如神此物味宜辣食宜多食少而不辣者不效並治大人脫肛及痔瘡腸風下血俱極神驗食後下血更多即易愈也

痔瘡

凡人九竅中有小肉突出為痔故有耳鼻牙痔等名不獨肛門一處也肛門痔有數種

狀亦不一 未發曰痔 已發曰漏 一肛門邊生數瘡腫而突出膿破即散者牝痔 一肛門邊露

肉如珠如鼠如乳時流膿血者牡痔 一腸口顆顆發癩且痛且癢血出淋漓者脉

痔 一肛門內結核有血或發寒熱每遇大便脫肛者腸痔 一酒醉即腫痛流血

者酒痔色痔相同 一每遇大便血流不止者血痔 一肛門腫痛遇怒即發怒息

即安者氣痔

痔癢難忍 蠟子不拘多少燒煙薰之極效

痔痛難忍 木鱉子水磨濃搽 陳醋磨之更妙 初覺痛甚少頃即止痛消腫神效之至或用紙浸

汁貼之亦可 又方 蝦蟆頭陰乾燒煙薰之奇效 又方 鼻涕 蟲形似蝸牛而無壳者即是 搗爛

和陳墨敷之極效

內痔不出 草烏為末口水調點肛門痔即反出乃可用藥敷治

內痔腫痛 猪大腸兩六 蚯蚓十餘條又 煮融去蚓食腸極效

內痔治法 內痔有大如茶杯形如一菌音 糞從菌心而出痛極上面如盆四邊高中

心陷下如菌根糞後用溫水洗淨以洵天膏見雞毒 攤如菜碗大中剪一孔以一邊剪

開熱錫茶壺上盪溶套菌根下貼糞門四邊圍護好肉免沾藥汁用枯痔散後見 一二

分口水調用筆敷菌之外面四旁日夜二次菌之中心通糞門眼不可敷藥敷則大

痛難忍一二日毒水流出血亦漸縮而軟再敷一二日漸硬而黑菌邊亦漸脫落然

後每藥一錢再加硃砂一分照前調敷敷至菌根落盡全愈屢試如神此林屋山人

極驗方也

痔瘡諸方 枯痔散 紅砒欬膏瓦上火取白烟 枯礬錢二 眞烏梅肉燒存性 硃砂飛浮 共研極細

末用時以口浸溼手指蘸藥於痔頭痔身上搓擦一日三次初敷不腫五六日出臭

水出盡其痔乾枯不用上藥輕者七八日全愈重者半月收功諸痔皆效自有此藥

世上斷無不愈之痔人多以砒霜毒藥不肯敷用不知此藥有斷根之功且只用一

錢有益無損切不可疑而自誤也

消管丸 苦參兩四 川連酒炒 當歸 槐花 華澄茄各一 五倍子錢五 各爲細末用小釐

二個約重 眞柿餅兩四 二味共煮溶去蟹骨搗爛入前藥末搗爲丸每空心服四錢滾水

送下其管自出此林屋山人經驗方也

胎元七味丸 專治痔漏不拘遠年近日膿血通腸者服之化管除根此方傳自異人

屢試神驗真奇方也 男孩臍帶 三個瓦上焙乾存性 陳棕 七錢數十年者佳燒灰存性 犀牛黃 三分 槐角子 五錢肥大者瓦上焙乾存性

刺蝟皮 三錢 象皮 四錢 地榆 三錢 共研細末酥油為丸如麻子大若不成丸加糯米粥少許即成每服 七分 空心白滾水下三日化管止痛七日平滿血清膿止十日除根

除痔丸 當歸 川連 眞象牙末 槐花 各五錢 川芎 滴乳香 各二錢 露蜂房 一個槐樹者佳榆樹上灰

炒之 共為末黃蠟 兩 溶化入藥末為丸每空心服 錢三 漏蘆煎湯送下至五日漏孔內退出肉管待二三指長剪去再出再剪管盡肌生而愈神效之至

完善丸 專治痔漏去管生肌 夏枯草 兩八 甘草節 兩四 連翹 兩四 為末金銀花 一兩 煎濃湯為丸每晨鹽湯送下 錢三 初起一料全愈久者兩料除根 又方 白煮整雞蛋蘸眞象牙末 取象牙不效 空心服之每日二次有人患痔二十餘年服至半月斷根 又方

榕樹上吊生之鬚五兩 此樹惟福建兩廣有之 皮硝 錢五 煎水放瓦罈內乘熱坐上先薰後洗數日即愈可以斷根 又方 小茴香 錢二 研末泡水服輕者數次即愈 又方 脫肛門內辣椒方最效

辣

椒

方

最

效

如神千金方

好信石

黃明者三錢打如豆大

明白礬

研一兩

好黃丹

飛淨五錢

蝎梢

七個洗淨瓦上焙乾為末

草烏

光實者去皮生研五錢

右

藥用紫泥研光將炭火煨紅放冷拭淨然後下明礬燒令沸次下信石入礬內拌勻文武火煨候沸再攪勻次看罐通紅煙起為度將罐掇下待冷研為末方入黃丹草烏蝎梢三味再同研極細收好將痔瘡用甘草湯洗淨患處然後用生麻油調藥以鴨毛掃藥痔上每日敷藥三次必去黃水如膠汁則將痔頭漸消年遠者不出十日消盡日近者數日化為黃水連根去盡再搽生肌之藥全愈此方五痔皆可治珍之寶之 又方 臭芙蓉根煎水用瓦罐盛之乘熱先薰後洗數次除根臭芙蓉葉大如桐而厚上面青黑色而光背紫色而毛氣味極臊六七月間開小紫花簇疊盤纏成叢陰溼處多有之緣前方榕樹上吊生之鬚恐江淮間難得故補此以取效而簡便也 鏡堂新增

兩股

坐板瘡 此症又名風疔生股上延及兩腿纏綿不已形如黍豆色紅作癢甚則嫩赤

腫痛初起用 芫花 川椒 黃栢 煎水洗即消已破者無論乾溼照疥瘡各方

治之溼甚者照黃水瘡 均見癰毒諸方 治之久不愈者馬莧膏 見癰毒諸方 最效或用白油膏 見癰毒 治

之更妙

股上生瘡 生股尖者名腎尖亦有生兩旁者色紅腫照癰毒各方治之色白者照陰

疽各方治之

海底

在肛門前陰根後  
兩相交界之處

懸癰 又名騎馬癰生在海底初起細粒漸大如桃李俗呼偷糞老鼠潰爛之後一經

房事走漏即成漏生管體弱者患之更危諸漏易醫獨此難治治則漏管過大難救

未成膿時用 生甘草 熟大黃各三錢 酒煎空心服一劑即愈如已成膿服醒消丸

即愈倘段色白者服小金丹即愈此林屋山人祕方也 又方 用橫紋生甘草一

兩截數段用水泡透文火烘乾再泡再烘以中心水潤為止切細加 當歸兩用酒

煎服日服一次半月後方能消盡 又方 潰爛久不收口未生管者用 水仙膏

見癰毒  
通治門敷之百發百中已生管者照癰毒門諸瘡生管各方治之

腿部

脚氣腫痛 此症始於受溼以及酒色勞傷外感風寒暑熱忽然手足發冷發熱其氣

從脚下而起上衝心腹作痛或頭疼身痛或脹悶或嘔吐或昏迷或大便閉塞或兩

足脛紅腫寒熱如傷寒狀從此或一月一發半月數月一發漸漸四肢攣縮轉筋脚

膝腫大此為脚氣非中風寒也倘不知而誤以傷寒中風治之則為害不淺矣



外治法 白礬二碗地漿水一大碗新杉木片三四煎六七滾用杉木桶新者更佳盛一半浸脚留

一半徐徐添入上用衣被圍身使略有微汗洗完隨飲薄粥如一次未愈再洗一次

照前方加硫黃三錢無不愈矣取地漿法於淨土地上掘二三尺深用新汲水傾入

攪濁少俟澄定取半清半濁者吹去浮沫用之 又方 鹽三觔炒熱包裏痛處並用

一包以脚踏之冷則隨換夜夜用之以脚心熱透爲度加槐白皮同炒更妙 又方

用鹽擦痛處少時用熱水洗之有人患脚氣百藥不效後得此方除根 又方

舊磚燒紅以陳臭淘米水淬撲入乘熱布包三塊用膝夾住棉被蓋緊冷則隨換三

五次即愈 又方 見後腰臀腿膝疼痛蒼朮散方

脚氣衝心 木瓜 檳榔錢各二吳茱萸錢半水煎服或用 黑豆一茶甘草錢三煎濃汁服

更妙 又方 黃芪錢五水煎一二服斷根

脚氣腿脛紅腫 鳳仙花葉 枸杞葉共煎濃湯薰洗並生搗融敷之 又方 大田

螺搗爛敷之

酒風脚 此病發時腿足腫痛難忍因飲酒過多所致百治不效惟用紹興老酒糟兩四

無則用本地陳老酒糟亦可 松鍼一兩即松毛共搗爛加頂好燒酒拌入炒熱敷之用布包緊冷則炒熱再敷

日夜不斷敷至痛止乃已一料只能敷三次輕者三五料即愈重者十餘料斷根永

不復發屢試如神 又方 蒼朮煎酒服卽時能行甚效

腿足腫痛拘攣 威靈仙 牛膝二味各等分爲丸空心開水服數十丸或加酒服更

好切忌服茶久服其病若失威靈仙疎真氣另服補劑以固本元再威靈仙真者甚

少均係蕪本之細者假充以味極苦而色紫黑如黃連狀脆而不軟折之有細塵起

明視之斷處有黑白暈俗謂之有鴿鷓眼此數者備然後爲真服之有奇驗

兩膝疼痛 名鶴膝風風勝則走注作痛寒勝則如錐刺痛溼勝則腫屈無力病在筋

則伸不能屈在骨則移動維艱久則日腫日粗大腿日紐痛而無膿顏色不變成敗

症矣宜早治之用新鮮白芷酒煮成膏磁瓶收貯每日取膏二錢陳酒送服再取二

三錢塗患處至消乃止或內服陽和湯凡陰虛外用大戟甘遂二味研末白蜜調敷或用

白芥子末酒調敷亦可數日卽消此林屋山人秘法也 又方 首烏酒 大何首烏煎酒服以醉

爲度更搗渣敷膝頭數次可愈永遠戒食鰵魚黑魚二物 又方 四神煎 生黃

芪中遠志肉 牛膝各三石斛兩四用水十碗煎二碗再入金銀花兩一煎一碗一氣服

之服後覺兩腿如火之熱卽蓋暖睡汗出如雨待汗散後緩緩去被忌風一服病去

大半再服除根不論久近皆效 又方 五聖散 乳香 沒藥各一兩地骨皮 無名

異錢各五麝香分一爲末車前草搗汁入煮酒調敷患處有人患此五年敷至三日全愈

膝上生癰 名牛頭癰腫而紅者是 連鬚葱頭切碎用糯米飯乘熱拌敷重者五六

次必消或照癰毒各方治之

腿膝疼痛不能舉步 山查肉 白蔘各等分 爲末蜜丸梧子大每服三錢白湯下服

一二觔無不愈者

人面瘡 此瘡生在兩膝亦有生在兩手彎者眼口能動能食此係冤孽所致急宜改

過誠心懺悔再用 雷丸錢三 輕粉 眞茯苓錢各一 共爲細末敷上即愈此岐伯天師

方也 又方 貝母末敷之亦效並參看陰疽孽報門末見陰疽

脚上轉筋暑天腫痛轉筋名 霍亂症見霍亂門 黃蠟半 融化攤舊綢上隨患大小乘熱纏脚須當脚心便着襪

裹之冷則隨換並貼兩手心

腿痛轉筋氣衝入腹 此寒極也若不急治痛衝入心難救急用 木瓜 茱萸各二錢

食鹽分五 水煎服即愈 又方 鍋底煙子以燒草者爲佳 一錢和酒服 又方 用河邊大水

後所掛樹上浮草煎水洗二三次愈

腿面腫瘡生小 此瘡多因溼熱而起又被手甲風毒抓傷破爛淋漓纏綿不已欲求

速愈切忌手抓自易痊也初起者用濃茶洗淨再用好乾茶葉嚼融將口漱淨再嚼 敷之 又

方 龍眼核柱圍核亦可 去核外之皮研細用油調敷 又方 木耳瓦上焙枯研末敷以

上三方如不見效卽照後方治之 白油膏 治臙瘡數十年不愈者數日卽可收功捷如影響並治禿頭瘡坐板瘡及一切年久溼熱諸瘡膿血不止久不收口等症此方百發百中神妙非常乃臙瘡第一方也 眞桐油<sup>兩三</sup> 防風 白芷<sup>各錢</sup> 放油內泡一夜入鐵器內漫火熬枯去藥瀝淨渣將油再熬俟將開時用雞蛋<sup>一個</sup> 放油內炸至深黃色去蛋不用再將油用火慢慢熬俟油色極明能照見人鬚眉入白蠟六分黃蠟四分鎔化趕緊用竹紙十餘張乘熱浸入油內一張一放一起冷透火氣須張張隔開風前吹透若放在一處雖數日火氣難退貼上毒氣內逼難以收功視瘡收小裁紙貼上頃刻膿黏滿紙棄去再換一日換十餘次數日膿盡肉滿生肌<sup>膿盡後不貼亦可生肌</sup> 膿多者黃蠟六分白蠟五分不生肌者用白蠟六分黃蠟五分不得稍有增減 黃香膏 治臙瘡屢試如神並一切癰毒大瘡日久不愈亦效松香白水煮透取出放冷水內搓洗數十下再煮再洗如此九次倒地待冷取起每一兩加輕粉三錢銀硃一錢白蜜少許煉老成珠加菜油少許燉熱攪勻看瘡之大小作餅置瘡上將綢條紮住一周時取下用滾水搓洗極淨翻轉再貼周時取下再洗再貼只要一箇藥餅直貼到好不須另換待瘡好將此藥餅洗淨收好如遇此瘡再與別人貼仍照前一周時一洗一貼此餅若遇醫過三人之後貼上卽好若醫過十人貼上更能速愈奇

絕妙絕 夾紙膏 專治臙瘡 樟腦<sup>錢三</sup> 銅綠<sup>錢一</sup> 用猪板油和藥搗爛以油紙夾之  
貼患處一二日翻轉貼三四日膿盡而愈如四日後膿尙未盡再換一紙無不愈矣  
腿脚浮腫破爛似臙瘡而非臙瘡 有人腿脚浮腫破爛十餘年不愈後用生黃豆將  
口漱淨自行嚼爛敷之數日全愈

腿上生瘡破爛多孔 照臙瘡方治之如不見效用鳳仙花連根葉熬水洗數日必愈  
腿足忽然紅腫熱痛或時上或時下或爛或不爛 此游風丹毒也用 清涼膏<sup>見湯火</sup>  
敷之忌食猪肉半月其效如神此林屋山人經驗方也

腿面不紅不腫痛極難忍 此症他人按之極冷病人只叫腿熱此濕熱伏於經絡也  
用馬蘭膏<sup>見遊</sup>敷之神效或照遊風丹毒各方治之如病人不叫腿熱恐是附骨疽  
症須辨別施治爲妥

大腿內外生疽 查陰疽門附骨疽各方治之

小腿腿肚生癰 名魚肚癰此乃肉緊筋橫在一身用力之處最痛難忍外以紫藥紫  
上內以五通丸醒消丸每日早晚輪服初起立消最忌開刀以藥敷穿庶不傷筋而  
無縮脚之損色白者應照陰疽忌用紫藥孕婦忌紫紫則墮胎此林屋山人經驗  
方也紫藥五通諸方均見癰毒諸方

腿癢難忍 名寒毛瘡方用做過豆腐之渣炒熱敷以布包緊冷則隨換過一夜即愈

腰腎腿膝疼痛不已 蒼朮散 眞茅山蒼朮糯米水浸一日夜曬乾鹽水炒五錢 黃柏去粗皮酒浸一夜炙焦五錢 水煎空心

服日服二三次其效如神並治一切脚氣極驗

腿足不能起立能食易飢 凡人腿足無力不能起立而口又健飯如少忍飢餓即時

頭面皆熱有咳嗽不已者此痿症也乃陽明胃火上衝於肺金而肺金爲火所逼不

能傳清肅之氣於下焦而腎水燥乾骨中髓少故不能起立而胃火又焚燒故能食

善飢久則水盡水乾而難治矣可不急瀉其胃中之火哉然而瀉火不補水則胃火

無制未易息也方用起痿至神湯 熟地 山藥 元參 甘菊花各一兩 白芥子錢三

當歸 白芍 台黨各五錢 神麪錢二 水煎服一劑火減二劑火退十劑而痿有起色二

十劑可全愈也此方奇在菊花爲君瀉陽明之火而又不損胃氣其餘不過補腎水

生肝血健脾氣消痰涎而已蓋治痿以陽明爲主瀉陽明而佐諸藥自易成功耳

兩腿不能動作臥牀不起 此亦痿症如不起牀蓆已成廢人者內火熾盛以熬乾腎

水也苟不補腎惟圖降火亦無生機雖治痿獨取陽明是胃火不可不降而腎水尤

不可不補也今傳一奇方補水於火中降火於水內合胃與腎而兩治之自然骨髓

增添燔熱盡散不治痿而痿自愈方名降補丹 熟地 元參 麥冬各一兩 甘菊花

生地 沙參 地骨皮各五錢 車前子二錢 台黨一錢 水煎服此方降中有補補中有降

所以為妙胃火不生自不耗腎中之陰腎水既足自能制胃中之熱兩相濟而兩相

成起痿之功孰有過於此者乎 又方 羊腎酒見婦人科 最為神妙 又方 用粟

子兩箇又名板栗兩面俱屬者若一面屬一面屬者食之不效 於四更將盡初交五更時睡在枕下不必坐起先取一粟

緩緩細嚼不可吞咽口宜緊閉不飲茶水不可言語嚼至融化如漿緩緩運氣吞下

送至丹田在肚臍下再取一粟照前細嚼融化運氣送下食完聽其睡熟食至半月後不

必服藥自能漸漸行動百日內外平復如常本年有浙江錢君福建吳君均患此症

先經醫治日久不效後各食粟三十餘枚至百日外全愈每日只服兩箇不可服多

此神方也不可輕忽

### 足部

足軟難行 足軟不能步履人為腎水之虧不知非腎也蓋氣虛不能運用耳方用

補中益氣湯見內外備用諸方 加 牛膝三錢 蜜製黃耆兩一錢 台黨二錢 水煎服四劑即能行走此方

內有石斛一味經名醫刪去更見功效 又方 杜仲兩 半酒半水煎連服數劑三

日能行五日全愈腎虛脚軟痛極者服此最效

脚氣腫痛 腿足軟弱 酒風脚均見腿部

驗方新編 卷三 足部

傷寒足痛 樟木一段打碎 遠年尿桶砂兩 爲末和陳小粉調敷在大熱痛處有奪命之

功

兩足痛如刀割 先用生薑切片蘸香油擦痛處隨用生薑火燒熟搗爛敷患處痛立

止

足生疥瘡音隔 腫脹骨痛 獨頭蒜切片鋪痛處每蒜一片用艾灸二壯去蒜再換再

灸痛自愈

脚上冷疔初起紫白泡疼痛澈骨漸至腐爛深孔紫黑色水腥臭日久不愈 黑鉛兩四

銅器內化開傾入水內取起再化如此百遍以鉛盡爲度去水取澄者三錢再入松

香錢一 黃丹飛水 輕粉各五 麝香分一 共爲細末先用葱湯洗淨方用麻油調藥攪勻塗瘡

口油紙蓋之或用足部白油膏更妙

內外脚踝生瘡 此名驢眼瘡又名螺眼瘡俗呼夾棍疽未潰色白以疽治紅腫以癰

治如潰爛日久形如驢眼者當問初起紅白分別癰疽治之

脚甲腫爛疼痛 或因割甲傷肉或因甲長入肉腫爛不已甚至五趾俱爛延至脚背

膿泡四起痛不可忍先用陳皮煎水洗淨膿血久洗甲自離肉輕輕剪去再用 綠

礬燒至汁盡研末 厚敷爛處用紬包好每日一換換二三次後不用再換如有膿泡之處擦



破敷之敷時務必忍痛十日即愈屢試如神或照手部脫骨疽甘草方敷更妙用腿  
部白油膏尤為神效 又方 蜈蚣焙研末敷外用南星末醋調敷四圍甚效

脫骨疽 此症生兩足各趾頭又云只生手足第四指者是或生指節或生指縫初生或白色痛極或如

粟米起一黃泡其皮或如蒸熟紅棗黑色不退久則潰爛節節脫落延至足背腿膝

腐爛黑陷痛不可忍治法見手部脫骨疽方

脚丫奇癢難受 此有蟲而作癢也用火爐放瓦一塊撒韭菜子於瓦上加入麻油兩

足向上薰之用布圍住勿令透風少刻癢止有蟲落瓦上即愈 又方 癢則用硫

磺擦之擦後再用硫磺厚敷布包穿襪一日一換數日斷根切不可用手抓擦

脚丫爛瘡 此溼熱而有蟲也輕者用硫磺擦數不必抓動三日自愈抓則不效重者

先用 苦參 甘草 銀花 蒼朮 生地錢各三葱頭七箇煎水一日洗一次另用

黃丹 明雄 滑石錢各一研細如香灰樣不細擦之前痛敷上如能勤洗不敷亦可再用薏米

煎二茯苓煎服三次雖破爛見骨亦效如日久不愈用腿部白油膏必效兩脚

總宜平攤雖大小便亦不可下地如下地則必潰爛最宜忍癢謹戒抓動抓一次必

爛數日不若聽其生水作膿結痂七八日後無不愈也屢試神驗如已結痂不可洗又枯

方 用陳火腿骨米泔水漂盡鹽味燒枯研末敷立效 又方 牛牙散見雜毒敷之

極爲神效 又方 平時洗足將水拭乾遲遲穿襪即無此患

脚趾縫中生毛拂著痛不可忍 眞桐油煎熟滴一點于毛上毛即脫落忍痛片時即愈

愈

脚根作痛

柳葉把一杏仁粒三枯礬錢二共搗爛敷極效

又方 一人脚根腫痛諸醫莫

識徐之才曰蛤精疾也由乘船入海垂脚水中而得爲剖出二蛤而愈

又方

一人脚根腫痛諸醫莫

足生瘤如斗大

用針輕刺一小孔以

礪砂

冰片各一分

輕粉各五分爲末敷之以毒水

流盡爲止一面用

黃芪

白芥子各三兩生甘草

脚底瘡有細孔日久不愈

此名蟻瘦

又名鼠瘻

用

穿山甲片十四

燒枯研末

猪油調敷神

效如若不愈照瘰癧門鼠瘻各方治之

脚底生瘡

有人脚底生瘡其大如豆痛不可忍用

眞紅芽大戟去心嚼融敷之

將口漱淨再嚼

即愈數日復發痛甚於前再用前藥治之收功神效之至

脚底生瘡穿爛

頂上盧甘石取紅用黃連黃柏荆芥煎水淬入再服再淬共七次焙乾研乳香

沒藥去油頂上梅花冰片各二錢

龍骨竹葉池水黃丹各三錢白蠟另研五錢共研末

連白蠟和勻撒患處外用生雞蛋白麻油

煎成薄薄蛋皮剪貼藥上用布紮住次日解開用葱頭煎湯洗或用銀花湯洗亦可

另撒藥末加貼蛋皮數日全愈神效或用腿部白油膏最爲神妙

煎成薄薄蛋皮剪貼藥上用布紮住次日解開用葱頭煎湯洗或用銀花湯洗亦可

另撒藥末加貼蛋皮數日全愈神效或用腿部白油膏最爲神妙

另撒藥末加貼蛋皮數日全愈神效或用腿部白油膏最爲神妙

另撒藥末加貼蛋皮數日全愈神效或用腿部白油膏最爲神妙

另撒藥末加貼蛋皮數日全愈神效或用腿部白油膏最爲神妙

另撒藥末加貼蛋皮數日全愈神效或用腿部白油膏最爲神妙

另撒藥末加貼蛋皮數日全愈神效或用腿部白油膏最爲神妙

另撒藥末加貼蛋皮數日全愈神效或用腿部白油膏最爲神妙

另撒藥末加貼蛋皮數日全愈神效或用腿部白油膏最爲神妙

另撒藥末加貼蛋皮數日全愈神效或用腿部白油膏最爲神妙

脚底皮肉生泡痛難行走 此名牛繩蹇宜略去老皮用 生草烏酒磨敷上立愈此

林屋山人方也

脚心腫起堅硬如鐵不能履地膝上毛孔時時流水身發寒戰惟思酒食 此是肝腎之氣冷熱相并用炒草烏頭研末敷並用炒韭菜子三錢煎服即愈

手足心俱痛 方見手部

脚心生瘡 脚心名湧泉穴最為要害之處如有瘡癩初起色白不甚疼痛無論已破

未破須查陰疽各方加意治之

脚板色紅如火不可落地 熟地<sup>兩三</sup> 黃肉 菊花 茯苓 五味 丹皮 牛膝 澤

瀉 車前子<sup>各三錢</sup> 麥冬 元參 沙參 石斛<sup>各一兩</sup> 葶撥<sup>二錢</sup> 水煎服二十劑忌房事

三月

脚底木硬 牛皮膠以生薑汁化開調南星末塗上烘物熨之

脚底開裂 蛇脫 亂頭髮 猪板油<sup>各二兩</sup> 清水十二碗用鐵鍋安露天熬煎以棍

類攪至水氣全去蛇脫與髮無形再入黃蠟<sup>兩四</sup> 俟蠟化傾入磁鉢待其自凝先以温

湯洗足睡時敷滿裂縫立能定痛潤燥 又方 白芨<sup>剉取</sup> 末用口水調敷有挑夫脚

底破一寬縫寸步難移此藥敷之立刻止痛能行神妙無比

脚上生瘰音切忌用刀 荸薺半箇貼患處過夜次晚再貼五六次其瘰連根脫出

又方 葱頭荸薺共搗汁一碗煎再用松香兩四麻油筋半熬至滴水成珠方入煎汁攤

膏藥貼上即落 又方 用蜈蚣條一礪砂等分放鍾內拌勻埋地七日取出銀簪點

上即脫

脚生雞眼 眞烏梅肉搗爛入醋少許加鹽水調勻貼之即消 又方 荸薺個一蕎麵

錢一共搗融貼上一晝夜自落 又方 取活蜈蚣用香麻油泡一二日取出搗爛敷

之過夜根即拔出不致再發並治 又方 乳香錢一輕粉分五黃丹水飛淨生橄欖核個三

燒枯共研細末香油調敷甚效 又方 滿天星又名遍地金錢又名破銅錢生階砌及花盆上搗融厚敷一日一

夜根自拔出極效 又方 地骨皮紅花二味研細敷之立愈 又方 京城礪砂

膏藥貼之亦能除根 又方 生白蘿蔔口嚼如泥敷之止痛如神 又方 鯽魚

膏貼之即效

行路脚底起泡 生灰麵水調敷一夜即平

遠行健步 細辛 防風 白芷 草烏 各等分共爲細末凡人將行遠路者先將

鞋底內用水微噴溼將此藥摻勻於內雖日行數百里脚不腫痛 又方 蘿蔔子

炒研白礬末研共鋪鞋底內遠行脚不作痛極效

脚臭脚汗 蘿菔煎水洗數次即愈

脚冷如冰 生附子錢二好酒錢三共爲末燒酒調敷足心甚妙

附青腿牙疳神效方 白馬乳每早捺取一茶碗乘熱飲之一月全愈

治脚氣神效方 雞鳴散 檳榔枚七木瓜兩一吳茱萸錢三桔梗錢五紫蘇葉錢三生薑錢五用水

三大碗煎至一碗半取渣再用水二碗煎至一小碗兩汁相和五更時三五次冷服  
如急脚氣上衝立即煎服分兩可以酌減但仍須冷服



校正 增廣 驗方新編卷四

善化鮑相璈雲韶編輯

合肥張紹棠又堂增訂

婦科調經門

凡服調經之藥宜於行經時多服數劑下次經期即準矣若丸藥則宜常久服之乃效不及期而經先行如德性溫和平素無他疾者則其血盛且有熱也用歸身川芎

各七分赤芍生地知母麥冬地骨皮錢各一甘草分五水煎空心服如性急燥

多怨多妬者則其氣血俱熱且有鬱也用製香附研炒歸身川芎白芍條芩

炒黃連錢各一生草分五生地分七水煎服如形瘦素無他疾者則其血熱也用歸身

生地川芎赤芍黃芩黃連炒黃連錢各一生草分五水煎食前服兼服三補丸和之

三補丸專治血熱黃芩黃柏黃連俱炒各蜜丸開水下如形瘦素多疾且熱者則其

衝任內傷也用四物人參知母湯歸身白芍台黨熟地知母麥冬各一

錢川芎分七炙草分五薑棗引水煎食前服更宜常服地黃丸地黃丸治女子衝任

損傷及腎虛血枯血少血閉之症用熟地兩八山藥兩四山萸肉兩四白茯苓丹皮去

澤瀉法去毛蜜爲丸空心開水下如曾誤服辛熱煖宮之藥者則其衝任伏火也用

四物加黃柏知母湯 歸身 赤芍 生地 黃柏炒 知母 木通各一錢 川芎七分 生

草五分 水煎食前服更服三補丸前見 和之 如形肥多痰多鬱者則其血虛氣熱也用

歸身 川芎 生地各七分 陳皮白去 法半夏 雲苓 生草各五分 條芩炒 香附童便

黃連錢各一 薑引水煎服

經過期後行 如德性溫和素無疾者則其氣血虛少也用八物湯 川芎 白芍

茯苓 台黨 歸身 生草 生地 白朮各等分 薑棗引水煎食後服 如性急燥

多怒多妬者則其氣逆血少也照上八物湯加香附炒 青皮各等分 水煎服兼常服蒼

沙丸以調之 蒼沙丸和中開鬱 蒼朮米泔浸 香附童便浸一日 條芩酒炒 共為末湯浸

蒸餅為丸開水下 如形瘦素無他疾者則其氣血俱不足也用十全大補湯 台

黨 白朮炒 茯苓 炙草 當歸 川芎 白芍俱酒炒 熟地 炙薯各一錢 肉桂五分 薑

棗引水煎服 如形瘦食少則其脾胃衰弱氣血虛少也用異功散加當歸川芎湯

台黨 白朮 茯苓 炙草 陳皮 歸身 川芎錢各一 薑棗引兼服地黃丸前見

如肥人及飲食過多之人則其溼痰壅滯軀肢迫塞也用六君子加歸芎湯 台

黨 白朮 茯苓 炙草 陳皮 半夏製 歸身 川芎 香附各一錢 薑引兼服蒼

沙丸前見 如素多痰者則其脾胃虛損氣血失養也用參朮大補丸 台黨 川芎



砂仁 石菖蒲各五錢 白朮 茯苓 陳皮 蓮肉 歸身名五分 炙草三錢 山藥一兩 共爲末薄荷包米煮飯爲丸米湯下

一月而經再行 如性急多怒氣者則其傷肝以動衝任之脈用四物加柴胡湯 歸

身 川芎 百芍 生地 柴胡 黨參 條芩 生草 黃連煎服更宜常服補

陰丸以瀉衝任之火補陰丸 黃柏 知母去皮炒 各等分蜜爲丸每服五十丸 如

曾服辛熱之藥者用 四物加黃柏知母湯及三補丸前見 如傷衝任之脈者用

四物黨參知母麥冬湯及地黃丸前見

數月而經一行 瘦人則其脾胃弱氣血虛用十全大補湯及地黃丸前見 肥人則其

多痰兼氣血虛用六君子加蒼莎導痰丸 黨參 川芎 半夏各七分製 甘草五分 白朮

雲苓 陳皮 蒼朮米泔浸 歸身 香附童便炒 枳殼錢各一 薑引 蒼莎導痰丸 香

附童便炒 蒼朮各二兩 陳皮 雲苓各一兩 枳殼 半夏製 南星 炙草各一兩 生薑自然汁

浸麵餅爲丸淡薑湯下

經行或前或後 悉從虛治用加減八物湯 台黨 白朮 茯苓 炙草 當歸

川芎 陳皮 丹參 香附製 丹皮錢各一 薑棗引水煎服 烏雞丸 此丸崑治婦

人脾胃虛弱衝任損傷血氣不足經候不調以致無子者服之屢驗 白毛烏骨雄

雞一隻查藥物備要便知以糯米餵養七日勿令食蟲蟻野物用繩弔死去毛與腸雜以一觔

為奉用 生地 熟地 天冬 麥冬各二兩放雞肚內甜美酒十碗入砂罐煮

爛取出再用桑柴火上焙去藥更以餘酒淹盡焙至焦枯研細末再加 杜仲二兩水炒去

台黨 炙草 肉蓯蓉酒洗固脂炒 小茴炒 砂仁各一錢 川芎 白朮 丹參 歸身

茯苓各二兩 香附四兩種浸三日焙 共研末和上末酒調麪糊為丸每服五十丸空心溫酒下

或米湯下 烏雞湯 與上烏雞丸同功 白毛烏骨雞一隻一切與上同 益母

草兩 小黑豆一杯 共放雞腹內水酒各半蒸熟空心食雞與湯食一二次以後月經

時刻不差其效無比

經行或多或少 瘦人經水來少者則其氣血虛少也用四物加人參湯台黨 川芎

白芍 歸身 生地 香附童便炒 炙草各二錢 薑棗引水煎服 肥人經水來少者

則其痰礙經隧也用二陳加芎歸湯陳皮 茯苓 歸身 川芎 香附童便炒 枳殼

錢各一 半夏八分 甘草五分 滑石三分 薑引水煎服 凡經水來太多者不問肥瘦皆屬熱

也用四物加苓連湯 歸身 白芍 知母 生地 條芩 黃連各一錢 川芎 熟

地各五分 黃柏七分 水煎服兼服三補丸前見

逐日經來幾點則止或五日或十日又來數點一月常三四次面色青黃 宜用艾膠

湯 阿膠炒 熟地錢各一 艾葉錢二 川芎分八 棗三枚 水煎空心服三劑再用 陳皮錢五 良薑 枳殼 三稜 烏藥分各八 檳榔 砂仁 紅花 莪朮錢各六 共爲末煮粥爲丸  
如梧子大每服三四十九丸卽愈

經行不止往來無時 竹紙三十張燒灰淡酒半觔和勻頓清溫服

經來不止形如魚腦足痛不能動履 乃下元虛冷更兼風邪所致宜用疏風止痛散

當歸 天麻 僵蠶 烏藥 牛膝 獨活 石南藤 乳香 紫荊花 骨碎

補錢各一 川芎分五 薑片三 葱白三箇 酒煎空心服

經來不止形如牛膜昏迷倒地 硃砂錢一 白茯苓兩一 水和爲丸薑湯送下五十粒立效

經來不止或下血胞大如雞蛋割開內如石榴子其婦昏迷不知人事 此虛症也宜

用十全大補湯前見 薑棗引水煎空心服三五帖立效內有甘草肉桂末二味米炒令

老肉桂味辛恐動血宜加減用之爲要

經來有白蟲如雞腸滿腹疼痛 宜殺蟲由大便出先用追蟲丸後用建中湯補之

追蟲丸 續隨子 檳榔 牽牛 大戟分各五 麝香分三 甘遂 堯花錢各一 米糊爲丸

如桐子大每服十丸酒送下建中湯 白芍兩一 黃芪 肉桂 甘草錢各五 共爲末米

湯下

經來成塊如葱白色又如死猪血黑色頭昏目暗唇麻此虛症也用補內當歸丸後見甚效

經來結成一塊如皂角一條痛不可忍不思飲食 此血滯也用 元胡錢四 髮灰錢三 共

為末酒調送下服至半月其塊自消

腹大如鼓經來如蝦蟆子 此症二三月經水不來以致七八月腹大如鼓人以爲孕

一日崩下血其胞血中有物如蝦蟆子昏迷不知人事宜服十全大補湯前見

經來如禽獸形 月經如禽獸形欲來傷人先將綿塞陰戶用 沒藥兩研末滾開水

調下即愈

月經過期形如屋漏水頭昏目暗小腹作痛更兼白帶喉中臭如魚腥惡心吐逆 先

用理經四物湯後用補內當歸丸自愈 理經四物湯 當歸錢二 川芎分八 生地錢三 柴

胡分七 香附醋炒 元胡醋炒 白芍酒炒 焦白朮各一錢 黃芩酒炒 補內當歸丸 當歸錢二 續斷

白芷 阿膠 厚朴 茯苓 肉蓯蓉潔淨 蒲黃炒 黃肉各一兩 川芎錢八 熟地錢五

甘草 乾薑各五錢 附子錢二 蜜為丸空心溫酒下七八十丸

經來紫色 色紫者熱也用四物加香附黃連湯 歸尾 川芎 赤芍 香附製生

地 黃連 甘草 丹皮各一錢 水煎服

經來淡色 色淡者虛也 台黨 白朮 茯苓 歸身 川芎 白芍 熟地 炙

菝 香附製各一錢 炙草分五 薑棗引水煎服並常服地黃丸前見

經如綠水 此症全無血色乃大虛大寒不可用涼藥宜用附子烏雞丸服之半月非

但病愈又能懷孕 附子烏雞丸 附子錢三 鹿茸無則用鹿膠一兩 真山藥 蓯蓉 肉桂

蒲黃炒黑 當歸 黃肉各五分 白芍兩一 熟地五錢 淨烏雞肉去皮油酒蒸三兩 米糊為丸空心酒送

下百丸

經如黃水 此係虛症不可用涼藥須煖其經以和其血次月血勝而愈宜用加味四

物湯 當歸 烏藥 川芎 元胡 小茴 白芍各八分 熟地錢一 薑棗引水煎空心

服

經來脇內一塊作痛其色深黃 宜治塊為先用四物元胡湯 當歸 川芎 白芍

各八分 元胡錢一 熟地五錢 薑三片酒煎加 沉香分三 磨兌食後服

經來全白色五心煩熱小便作痛 此氣血虛也宜用前附子烏雞丸

經來疼痛小便如刀割 此血門不開宜用 牛膝兩三 乳香錢一 麝香分二 水一碗半煎牛

膝至一碗臨服磨乳香麝香入內空心服一劑即愈如係火症用辰砂益元散見備用方

經來狂言如見鬼神 此症經來或因家事觸怒逆血攻心不知人事狂言鬼神先用

麝香分二 辰砂 遠志心去 甘草錢各一 柴胡 桔梗 茯神錢各二 木香分五 台黨分八 水煎

不拘時服後用茯苓丸即愈 茯苓丸 茯苓 茯神錢各八 遠志去骨 硃砂錢三 猪心

一箇稀粥爲丸如桐子大用金銀花湯送五十丸即愈

經來常嘔吐不思飲食 丁香 乾薑分各五 白朮錢一 爲末每清晨米湯下

經來食物即吐 此症乃痰在胸膈飲食不能下胃先用烏梅丸化去痰涎後用九仙

奪命丹 烏梅丸 木香 雄黃錢各五 草菓個一 乳香 沒藥錢各一 烏梅爲丸如彈子

大每早口含化一丸 九仙奪命丹 草菓個一 厚朴 茯苓錢各一 枳殼 木香 山

查 陳皮 蒼朮錢各一 共爲末薑湯下

經來咳嗽 此症喉中出血乃肺金枯燥急用茯苓湯退其嗽再用烏蘇丸除其根

茯苓湯 茯苓 川芎 蘇葉 前胡 半夏製 桔梗 枳殼 乾薑 陳皮分各八

當歸 生地 白芍錢各一 台黨分五 桑白皮分六 甘草分三 薑三片水煎空心服 烏蘇丸

萊菔子錢九 貝母兩四 共爲末蜜丸桐子大空心滾開水送下五十丸

經來大小便俱出 此名蹉經因吃熱物過多積久而成宜用分利五苓散去其熱毒

調其陰陽即安 分利五苓散 猪苓 澤瀉 白朮 赤苓錢各一 阿膠炒 當歸

川芎分各八 水煎空心服即愈

行經腹痛 凡經水將行腰脹腹痛者此氣滯血實也用桃仁四物湯 歸尾 川芎

赤芍 丹皮 香附製 元胡索錢各一 生地 紅花各五分 桃仁二十粒 水煎服 如瘦

人則其有火加黃連炒 黃芩炒 各一錢肥人則其有痰加枳殼蒼朮各一錢

經後腹痛 凡經水過後腹中痛者此虛中有滯也用加減八物湯 台黨 白朮

香附炒 茯苓 歸身 川芎 白芍 生地各一錢 炙草 木香各五分 青皮七分 薑棗水

煎服

經來二三日徧身疼痛及寒邪入骨或熱或不熱 宜解表發汗用烏藥順氣散 烏

藥蠶 白芷 陳皮 枳殼各八分 乾薑 甘草各五分 麻黃三分去節此味宜稱準不可多用如係春天只服一二分足矣 薑片

葱根水煎服即愈

經來潮熱不思飲食 此症經來胃氣不開不思飲食須開胃不宜別樣只取雄雞頭

頂上血調酒飲立效

經少腹大如漏胎狀 此名腸覃因經行之時寒氣自肛門而入客於大腸以致經血

凝澀月信雖行而血卻少其腹漸大如孕子狀為胎漏狀壯盛婦人半年以後氣盛

而除虛怯者必成脹病用桂枝桃仁湯 桂枝 檳榔各一錢五分 白芍 生地 枳殼各一

錢 桃仁二十粒 炙草五分 薑棗引水煎服更宜常服四製香附丸後見 此症載靈樞經內人

鮮知者特表而出之

經閉不通 婦人女子經閉不行其候有三凡脾胃傷損飲食減少氣耗血枯而不行者法當補其脾胃養其氣血以待氣充血生經自行矣不可妄用通經之劑則中氣益損陰血益乾致成癆瘵之疾而不可救所謂索千金於乞丐箠楚日加徒斃其生而已一則憂愁思慮惱怒怨恨氣鬱血滯而經不行者法當開鬱氣行滯血而經自行苟用補劑則氣得補而益結血益凝聚致成癥瘕脹滿之疾所謂養虎自遺患也一則軀肢迫塞痰涎壅滯而經不行者法當行氣導痰使經得行斯之謂良工矣

通治經閉 蠶沙飲 蠶沙兩四炒半黃色用黃酒一觔半亦可酒用瓦罐煎滾瀝去蠶沙

將酒入瓶封好溫飲一二杯即通甚效 如因脾胃損傷血枯不行者用加減補中

益氣湯、台黨 白朮各二錢 炙耆 柴胡各七錢 歸身 白芍 川芎 陳皮各一錢

如因氣鬱血閉不行者用開鬱二陳湯 陳皮 茯苓 蒼朮 香附製 川芎各一錢

半夏製 青皮 莪朮 檳榔各七錢 甘草 木香各五分 薑引水煎服更宜服四製香

附丸以經行為度 四製香附丸 此婦人常用之要藥也 淨香附一觔用酒醋

鹽水童便各浸三日焙研烏藥八兩共為末醋糊為丸開水下如因痰者用前蒼莎



導痰丸更服上開鬱二陳湯去莪朮加枳殼一錢服之 有愆期未嫁之女偏房失寵之妾寡居之婦菴院之尼欲動而不能得遂憾憤而不能伸多有閉經之疾含羞則強忍不欲人知致成癆瘵之病終不可救者宜用四製香附丸參朮大補丸攻補兼行庶幾可瘳此七情之變無以法治者也 有經閉不行骨蒸潮熱脈虛者用增減八物柴胡湯 台黨 茯苓錢各一 炙草錢各五 歸身 白芍 生地 麥冬 知母 柴胡 有汗加地骨皮 無汗加牡丹皮錢各二 淡竹葉片十五 水煎服凡婦人血虛有熱者皆可服之如熱太甚服此不平者加黑乾薑一錢神效 有經閉發熱喉燥唇乾脈實者用四物涼膈散 歸身 川芎 赤芍 生地 黃芩酒炒 黃連酒炒 山梔黑炒 連翹 桔梗錢各一 生甘草 薄荷葉各五分 淡竹葉十瓣 水煎服凡血實形盛脈有力也皆可服之

經閉腹大如孕 此名石瘕因行經之時寒氣自陰戶而入客於胞門以致經血凝聚月信不行其腹漸大如孕子狀婦人壯盛者半年之後小水長而消矣若虛怯者必成腫病用溫經湯 歸身 川芎 赤芍 莪朮 台黨 炙草各五分 川牛膝 故紙 小茴炒各錢一 薑棗引水煎服更宜常服四製香附丸前見 此靈樞經祕方也

室女經閉偏身浮腫 室女月水初行不識保養誤用冷水洗手血見冷水則凝不出

面色青黃偏身浮腫作水腫治之不效用通經丸通血消腫即愈 通經丸 三稜

莪朮 赤芍 川芎 當歸 紫苑 劉寄奴各八分 穿山甲一片 共為末米糊為丸

酒送下

婦女因開甑為熱氣所衝面目腫大經水不通 舊蒸飯布越舊越好燒灰用鍋蓋上氣水飯蓋上氣水亦

可調敷隨敷隨消經水亦通無蒸飯布甑底燒灰亦可

婦女疝疾經水不調面色黃瘦咳嗽燒熱或吐血或不吐血不思飲食精神疲倦 熟

地 乾薑 當歸 蒲黃 赤芍 甘草各三錢 小黑豆五錢 共研細末另用 肉桂三錢

去皮研末入藥拌勻每用二錢外加男子指甲七箇瓦上焙黃研細入藥內臨睡時用

熱淡黃酒沖服出汗不要受風每日服一劑共服四劑其效如神此四日只要開水

紅糖拌飯食或食稀粥千萬不可另吃別物並忌受驚氣惱是所至要

經逆上行從口鼻出 此因食椒薑熱毒之物其血亂行急用犀角地黃湯 犀角

白芍 丹皮 枳實各一錢 黃芩 橘紅 百草霜即鍋底煙子以燒草者為佳燒炭者斷不可用 桔梗各八分 生地二錢

甘草三分 水煎空心服數劑即愈 又方 用韭菜搗汁一盞入童便半盞蒸熱服極

效若無童便其功稍緩 又方 先以好陳墨磨水一盞服其血立止次用 歸尾

紅花各三錢 水一鍾半煎八分服

經水從口鼻出咳嗽氣緊 宜推血下行當用紅花散七帖次用冬花散止嗽下氣不

須五六帖熱去自安 紅花散 紅花 黃芩 蘇木各八分 花粉分六 水煎空心服

冬花散 冬花蕊 粟殼 桔梗 枳殼 蘇子 紫苑 知母各八分 桑皮炒 石膏

杏仁各一錢 水煎服

經來房事相撞 俗名撞紅用 明雄水飛淨三錢 好酒沖服一次即愈

血崩不止蓋者後老婦血崩方 燈心一根蘸香油點燃燒大敦穴十下即止穴在兩足大趾外側

甲縫內中間不上不下即是如止而又崩即在原處燒之若原處起泡將泡挑破燒之無不止矣此治崩症神效第一方也止後再請名醫用藥調理以免復發 又方

凡婦人有血崩血枯之症其頭頂心必有紅髮數根拔之燒灰酒調空心服甚效

又方 陳蓮蓬殼燒灰存性五錢 棉花子燒灰存性三錢 共研末米酒沖服奇效非常此仙人尹蓬頭

方也 又方 膠血飲見後老婦血崩方 最為神效 又方 木耳炭火焙存性一錢 崩輕用熱酒調服

崩重以鐵秤鉞燒紅投入酒內俟酒熱調服立效 又方 肥羊肉三觔 用水三十六

碗煮至十五碗加入真大生地黃一觔 乾薑 當歸各三兩 煮至三大碗分作數次

服之甚效此孫真人方也 又方 製貫衆末二錢製法見後赤白帶下第二方 酒沖服因溼熱而崩者極

效 又方 鍋底煙子以燒草者為佳燒煤炭者斷不可用 熱酒沖服二三錢立止 又方 真大生地兩切

片用好紹酒浸透搗爛如膏取汁再用 當歸 川芎錢各五煎好和生地汁搗勻服

之遇危險者如心口熱可救 又方 旱蓮草查藥物備要便知煮雞湯食之立效 又方

好肉桂去皮瓦上煨存性研末空心米湯調服三錢虛寒血崩極為神效 又方

小公雞一隻重半觔上下去毛並肚雜入好田州三七三錢砂鍋內蒸極融爛空心

服食即愈有人患此百藥不效服此二次而愈 又方 陳棕燒存性空心淡酒沖

服三錢 又方 谷樹皮又名檣樹又名構樹荆芥錢各二煎服神效無比 又方 蓋牆頭之破

缸搗碎如豆大砂鍋內炒熱加醋淬音入取醋飲之立效 又方 蠶沙砂鍋內炒

黃為末酒調服三四錢效 又方 核桃肉五十箇燈火上燒存性搗融燈用麻油別油忌用作

一次空心嚼食神效 又方 黃耆 真山藥炒苡仁米錢各七當歸炭錢四阿膠蛤粉炒

蓮蓬炭 老棕炭錢各三炒芍錢二荆芥炭五錢煎服日久不愈者服之甚效 又方

甜杏仁苦者即桃仁斷不可用去皮尖燒存性為末每服三錢空心熱酒服諸藥不效者服此立

止 老婦血崩 凡婦人老年驟然血海大崩不止名曰倒經速投此方一劑其崩立止如

仍發熱以六安州茶葉三錢如無即用別項茶葉亦可煎服一次身熱即退再用六君子湯加當歸白

芍調理而安 陳阿膠一兩米粉并炒成珠無則以陳黃明膠代之終不如阿膠之妙全當歸兩西紅花錢八冬瓜子錢五用天泉水

煎服其渣再煎服之方名膠紅飲此方傳自異人每治老婦血崩屢試如神後見少  
婦大崩不止屢服大料補劑血流反多飲食不下昏暈幾次勢甚危篤照此方減去  
紅花一半服之仍用六君子湯加當歸白芍調理全愈葉天士云初崩宜塞久崩宜  
通卽此義也紅花能去瘀生新不與桃仁同用並不害事切勿疑誤

崩中漏下五色 蜂窩焙枯研末五分温酒下神效此張文仲方也

崩久成漏連年不休 此中氣下陷元氣不固也宜用前加味補中益氣湯兼服鹿角

霜丸 鹿角霜 柏子仁炒去殼 當歸身 茯神 龍骨煨 阿膠蛤粉炒成 川芎錢七 香附

二兩製 炙草錢五 川續斷錢五 共爲末山藥五兩研末煮糊爲丸每服五十丸空心温酒

下

白帶白濁白淫 婦人常有白帶白濁白淫諸疾症固不同治亦有別白帶者時常流

出清冷稠黏此下元虛損症也白濁者濁隨小便而乘渾濁如米泔水此胃中濁氣

滲入膀胱也白淫者常在小便之後來亦不多此男精不攝滑而自出不治亦愈也

治白濁方 陳皮 半夏製 白茯苓 白朮 益志仁鹽水炒研 蒼朮錢各一 炙草分五 升

麻 柴胡分各七 薑引水煎服

赤白帶下 帶久不止者專以補虛爲主宜服十全大補湯去地黃加陳皮半夏乾薑

更服參朮大補丸前俱見以補脾胃之虛及服補宮丸以補下元之耗 補宮丸 鹿

角霜 茯苓 白朮 白芍 白芷 牡蠣煨童便炒真山藥 龍骨煨赤石脂各五錢 乾

薑炒二錢五分 醋煮爲丸空心米湯下 又方 白朮五錢 真雲苓二錢 車前子一錢 雞冠花三錢 水

煎服無論久近其效如神百發百中赤帶用白雞冠花白帶用赤雞冠花反之爲妙

又方 赤白帶下諸藥不效年久不愈此乃濕熱也 貫衆一箇去皮毛 以好陳醋泡透

漫火燒熟爲末空心米湯下每服二錢亦百發百中之方也

赤白帶下臍腹疼痛 白芍二兩炒 乾薑五錢 共爲細末每服三錢空心溫米湯下效驗如

神

五色帶下 年久古磚一塊燒極紅赤以油煎麵餅七箇安放磚上再用黃瓜根研末

鋪麵餅上加布兩層令病人坐上使藥氣薰入腹中當有蟲出治三五次蟲盡即愈

婦科種子門

種子芻言 方書每載種子一門誠屬綿延宗祀之苦衷竊謂子孫蕃衍皆由祖宗積

德已身修善上天錫以嗣息使獲多男之慶得遂燕翼之謀所關非淺豈可強求每

見富貴之家年未四十托名無子藉號體虛廣蓄姬妾徧覓奇方金石雜投辛溫並

進以爲毓麟有望誰知腎火熾而情欲肆情欲肆而津液漓神衰形喪終歎無兒兼

之年壽不永中道崩殂而與寡慾多男之說不大謬哉上天好生挽回甚速奉勸艱嗣君子深體天心廣行陰鷲出言醞天地之和居心存忠厚之意肅房幃而勿求美色淡嗜慾而毋斷乃躬或敦宗睦本或濟急扶危或流傳善書或創修寺院或興義學或恤孤嫠或施樁助葬或饋藥送衣或有力而獨爲或無資而勸募一切善事次第力行自然螽斯載詠麟趾呈祥也況夫人而求子原爲家業無人可付宗祧無人可守耳如有家業而乏子嗣財已無主不思修爲專圖腴刻繼嗣覬奪構訟多端身未寒而家已破仍飽他人之腹徒增一己之愆愚孰甚焉何如以無主之財而作有用之事乎伏願求子者勿恃藥餌堅守仁心身其康彊子孫其逢吉矣卽或不然早立應嗣飲之食之教之誨之雖毛裏不屬而恃怙有恩如同己出亦可守祧也有心求嗣者當不河漢斯言

保命延生種子戒期 娶婦必期偕老生子必望長成乃人有伉儷極篤而中道死亡產育艱難而半途夭折者祇因肆情縱慾暗犯禁忌而不自知也道經云男女交媾最有禁忌若犯所忌天奪其算神降之殃生子醜貌怪相性行不良殘疾夭折實有明驗故君子不獨外色鋤之務盡卽房幃之內琴瑟之歡俱有克治之道焉茲將正色戒期錄出以爲卻病保生之一助也

正月初一 一名天臘皇帝下界校世人殊命犯者削祿奪紀 初三 萬神都會犯者奪紀 初五 五耗 初六 六耗 初七 上會 初九 玉帝誕犯者奪紀 十四 三元下降犯者

初十 三元下降犯者 十五 天官 十六 三元下降 二十五 每月二十五日為月晦日犯者減壽 二十七 每月二十七日北斗下降犯者奪紀 二十八 每月二十八日人神在陰犯者得惡疾

三十 每月三十日司命奏事犯者減壽月小即或二十九日

二月初一 犯者奪紀 初二 文昌帝君聖誕 十五 老君誕犯者奪紀 十八 先師孔子諱辰犯者削祿 十九 觀音聖誕 二十五

二十七 犯者奪紀 二十八 每朔如此 三十 俱同

三月初一 前同 初三 玄天上帝誕 初九 牛鬼神出世犯者奪紀 十五 同 十六 準提菩薩誕 十八 中岳帝誕 二十五

十七 俱同 二十八 東岳帝誕 三十 同

四月初一 犯者奪紀 初二 俱同 初四 萬神善化 初八 釋迦佛誕又善惡童子降犯者血死 十四 呂純陽祖師誕 十五 鍾正陽仙師 二十

五 二十七 俱同 二十八 前同 三十 俱同

五月初一 南極長生大帝誕犯者減年 初三 前同 初五 名地臘五帝考校生人 初七 以上九日名九毒日犯者得病損壽若十五日子時犯者主三年內 十五 十六

十七 二神聖者君降 二十五 二神聖者奪紀 二十六 官爵犯者削祿奪紀 二十七 夫婦皆死經驗多人十六為天地造化地物之辰尤忌犯者大凶 三十 俱同

六月初一 二神聖者奪紀 初三 前同 十五 俱同 十九 觀音 二十二 火神 二十四 關聖誕 二十五 雷祖 二十七 二

十七 二神聖者奪紀 二十八 前同 三十 俱同

七月初一 初三 初七 道德臘五帝校 初十 陰毒 十五 中元地官校 二十五 二 二十七 二

初七 善惡犯者奪紀 初十 陰毒 十五 中元地官校 二十五 二 二十七 二

初七 善惡犯者奪紀 初十 陰毒 十五 中元地官校 二十五 二 二十七 二

初七 善惡犯者奪紀 初十 陰毒 十五 中元地官校 二十五 二 二十七 二

初七 善惡犯者奪紀 初十 陰毒 十五 中元地官校 二十五 二 二十七 二



十八前俱同三十地蔵菩薩誕

八月初一同初三君誕犯者重病者紀初十北岳帝誕十五大陰朝元之辰宜焚香守夜犯者大凶二十五前二十七聖

先彌孔子誕犯者則祿奪紀或云二十一非二十七日未知孰是

九月初一南斗降神初一至初九此九日爲北斗下降日宜齋戒又初九斗母誕犯者男女俱陷黑簿亥時犯者夫婦雙亡十五同十七金龍四十九觀音出家犯者

若二十五名滿臘犯二十七同二十八前三十佛誕

十月初一者奪紀初三同初五諸神下會初六天曹考察初十西天王降十五下元水官校二十五

北斗紫微大帝二十七誕犯者奪紀二十八同三十前

十一月初一同初三同初六西岳十一天尊誕十五同十七阿彌陀佛誕十九太陽誕犯二

披剃大夫降二十五犯者奪紀二十七同二十八同三十前

十二月初一同初三同初七犯者奪紀初八王侯臘初旬戊日十五同十六南嶽二十天地交泰

司命上奏二十四同二十五玉帝三清巡視諸天定來二十七亦是犯者得病二十八同除夕諸神考察犯

每歲四立二分二至社日三伏日庚申甲子日祭祀前齋戒日父母誕日諱日夫婦誕

日本命日疾風暴雨雷電晦暝日月薄蝕犯者大凶酷暑嚴寒病餘產後過醉空腹遠

行鬱怒犯者得病損身停燈行房最干神怒以上各期先夜即須謹戒蓋半夜交子晝長夜短

者二更後即將交子時不可不慎謹按禮記月令日夜分雷乃發聲先雷三日奮木

驗方新編 卷四 婦科種子門

二一九

鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災可知禁忌自古有之日長至則曰止聲色毋或進日短至則曰去聲色禁嗜慾蓋冬夏二至陰陽相爭之時最難保護前後數日皆宜絕慾至於高山大川之上日月星辰之下神廟寺觀之內井竈尸柩之旁及一切非其地非其時俱宜嚴戒 茲刻始於拙菴秦太史流傳已徧此本校定最準刪繁就簡止擇最重者錄之蓋禁忌太繁奉行恐怠也若能避忌必臻上壽若反是無不受禍語云樂極生悲縱慾成患謹勸世人須爲長久之歡弗逞暫時之樂蓋慾濃則暫慾淡則長其理不爽其事不誣也篤信者另以小紙將日期錄貼於壁上每逢禁忌必謹遵之

求嗣得孕法 昔褚澄言男精洩於先而女精後至則陰裏陽主男孕女精洩於先而男精後至則陽裏陰主女孕又云月信初盡其濁氣未清而交媾卽女務待經止兩足日則女體虛而濁氣盡再男子保養月餘陽勝於陰定成男孕又論子宮左右如男精洩於婦人之左生男右則生女男清女濁男左女右陽壯陰衰之至論也夫疾風暴雨或醉飽或服春藥而受胎者多夭必俟天氣晴明日暖風和明星亮月而受胎者多聰明富貴倘時令不正或迷霧氣怒而受胎者多愚蠢貧賤或雷電之候而受胎者定生怪狀之物誠不可不慎也

種子諸方

調經種子湯

歸身

川芎

黃肉

熟地

製香附

酒芍

茯苓

苓

丹皮各八分

延胡索

陳皮

生薑

若經水先期者色必紫加

條芩

過

期者色必淡加

官桂

乾薑

熟艾

水一碗半煎八分經水至日空心服渣

續斷

沙

再煎臥服一日一劑服至經止兩三日交媾即孕經期准而不孕者用

續斷

沙

參

杜仲

當歸

益母草

製香附

川芎

橘紅

砂仁

紅花

經來

時煎服四劑下期再服必孕

又經通不受胎者

丹參

囉粉

每日用二錢陳酒送

下兩月內即孕無有不靈

丁公仙枕方

丁公諱其泰康熙時人曾任山西總兵

年逾七十無嗣遇異人授此方不二年精力強壯至八十一歲已生二十一子矣其

方用槐木薄板做枕一箇高三寸三分寬四寸五分長一尺二寸如天蓋地一面上

鑽孔一百二十八箇如桐子大用後藥裝入枕中百日後諸病消除精神倍長壽高

多子真仙方也如夫婦皆以此作枕更見奇效其藥料三五箇月一換 真川椒

桔梗

荆實子

柏子仁

薑黃

吳茱萸

白朮

薄荷

肉桂

川芎

智仁

枳實

全當歸

川烏

千年健

五加皮

蒺藜

羌活

防風

辛夷

白

芷

附子

白芍

藁本

菝葜

北細辛

豬牙皂

蕪夷

甘草

荆芥

菊

花

杜仲

烏藥

半夏共三十四味每味一兩務要頂好鮮明咀片研爲細末絹

袋盛之裝入枕中 赤脚大仙魚鰾種子丸 此方係雲南大理府周姓年老無子

遇異人傳授此方服至月餘自覺目明身健髮黑鬚烏連生七子壽至九十有七此

方專治身體虛弱老少酒色過度頭眩耳鳴目花腰膝酸疼四肢無力自汗盜汗下

元虛損夢遺精滑陽痿或男子精寒腎虛陽物不舉不能久堅元陽衰敗或女人血

寒氣弱子宮久冷赤白崩帶經水不調久不受孕服此立效有子者服之亦可卻病

保元 肥當歸酒洗淫羊藿去枝梗刺白蓮蕊揀淨肉蓯蓉酒洗川杜仲去皮青鹽兔絲

子淘淨灰土用甜酒浸一宿又以水浸再合酒煮成餅曬乾沙苑蒺藜分四股青鹽人乳老酒蜜便各并二兩微炒各八兩 眞雲苓去皮切片人

枸杞紅色肉厚者各四兩 牛膝肥長者佳去蘆故紙揀淨青各六兩 上白魚鰾一觔牡蠣粉上肉

桂二兩去粗皮大附子二箇每個重一兩肆錢去腐切四塊以甘草水浸七日每此附桂二味年老並虛弱者

可用壯實者少用以上諸藥各依泡製共爲細末煉蜜爲丸如梧子大每早服百丸

鹽開水下晚服百丸陳黃酒下甜酒亦可 四奇種子丸 粉龍骨五色者佳 鎖陽洗

北細辛水泡一陽起石見太陽飛動早黃桂花并曬旱地浮萍要肥吳茱萸糯泡過上肉桂皮去

各二 紫梢花色酒蒸石榴皮瓦上砂仁去殼揀淨肉蓯蓉紅色者佳焙乾川椒要開枸杞去核麝香

門子用當白芷銅器內鬧楊花焙象皮末 眞鴉片錢各一高麗參錢五葶藶子四十九粒去共爲

末煉蜜爲丸如小龍眼肉大丁香油爲衣每於經淨七日之內先放一丸入陰戶內

待一頓飯時藥化然後行事緊暖如御處女十產九男神應無比不可輕視然種子務宜節慾若藉此淫佚無度不惟無子且恐傷生不可不慎 種玉酒 凡婦女經水不調血氣不和不能受孕或生過一胎之後停隔多年服此藥酒百日即能受孕如氣血不足經滯痰凝者服至半年自然見效若受胎之後須服保胎磐石散見前門可保無病神應非常 全當歸五兩切片此能培養血氣遠志肉五兩用甘草湯洗一次此能散血中之滯行氣滯痰二味用稀夏布袋盛之以好甜酒十觔安藥浸之蓋好浸過七日後晚上溫服隨量飲之慎勿間斷服完照方再製再月經來時於淨之後每日用青殼鴨蛋一箇以鍼刺孔七箇用蕪艾五分水一碗將蛋安於艾水碗內飯鍋上蒸熟食之每月多則吃五六箇少則二三箇亦可 羊腎酒 湧泉膏 種子兜肚方均見備用諸方門

子宮寒冷不能受孕 吳萸 川椒各八兩 共為末煉蜜為丸如彈子大棉裹入陰戶中日夜一換一月後子宮和暖即可成孕 又方 硫黃煎水常洗效

婦科胎前門

保產諸方 保產無憂方 專治一切產症有胎即能安胎臨產即能催生不拘月分凡胎動不安腰痠腹痛一服即安再服全愈 臨盆艱危者一服即生 橫生逆產六七日不下及兒死在腹中命在須臾者亦一服即下懷孕者七箇月即宜預服七

箇月服一劑八箇月服二劑九箇月服三劑十箇月亦服三劑臨產服一劑斷無難

產之患百發百中功效如神 紫厚朴薑汁炒 蘄艾醋炒各七分 當歸酒炒 川芎各一分 生耆 荆

芥穗各八分 川貝母去心淨為末不入煎以藥沖服 兔絲子揀淨酒泡各一錢 川羌活 生甘草各五分 枳殼麵炒六分 白芍

酒炒三錢冬月只用一錢 藥須照方揀選泡製後用戥秤準不可加減分毫引用老生薑三片水二大

鍾煎至八分服預服者空心溫服 臨產及胎動不安並勢欲小產者皆臨時熱服

如人虛極再加人參三五分更妙已產後此藥一滴不可入口切勿誤服此方藥劑

分量雖輕功效甚大不論強弱老少皆宜 佛手散 治胎氣受傷或子死腹中疼

痛不已口噤昏悶或心腹脹滿血上衝心服之生胎即安死胎即下又治橫生倒產

須先安臥將此藥煎服再行安臥自然順生 若兒手足在外未能收入不可亂動惟少以食鹽塗兒掌用指輕輕極之並以鹽摩母腹安臥一時自然收入 藥宜

早備以資急用 當歸一兩 川芎錢七 水七分酒三分同煎至七分服若治橫生倒產及

死胎則加黑馬料豆一合炒焦乘熱音 淬入水中加童便一半煎藥服少頃再服一

劑神效此方又治產後腹痛發熱頭痛能逐敗血生新血除諸疾 加味芎歸湯

專治難產又陰氣虛弱交骨不開催生如神藥宜早備以資急用 當歸一兩 川芎錢七

生龜板 手大一塊隨尖研末藥店多以熟過龜板混用必自行看過實係生龜板方能見效 婦人亂髮 蛋大一團 用水二碗煎一碗如人行五里

之久即生若死胎亦即下也有人產門不開兩日未生服此一劑即產真聖藥也

安胎飲 專治婦人慣於墮胎屢試神驗平時無小產之患者服此亦妙一婦人小

產六次百藥不效後服此方連生數子無恙屢試如神百發百中真保胎第一方也

蓮肉去心不去皮 家用青苧麻洗淨 糯米各三錢 水煎去麻每早連湯服一次或服湯不服

蓮肉糯米亦可 小產由於房勞傷損足三陰腎傷則精氣不固肝傷則血熱妄行

脾傷則胎元自墮蓮肉清君相之火而能固澀真氣苧麻利小便而通子戶清淫慾

之痰熱糯米補益脾陰能實陽明空竅使胎不妄動而胎氣自安以五穀果實為方

誠王道之劑也 泰山磐石散 治婦人氣血兩虛或肥而不實或瘦而血熱或肝

脾素虧倦怠少食屢有墮胎之患此方和平兼養脾胃氣血覺有熱者倍黃芩少用

砂仁覺有胃弱者多用砂仁少加黃芩更宜戒惱怒事屏酒醋辛熱之物可保無

墮 台黨 炙者 川芎 黃芩 川續斷各一錢 白芍酒炒熟地各八分 白朮土炒 炙草

砂仁各五分 糯米三錢 用泉水煎服但覺有孕隔三五日常用一服過四箇月方保無

虞其藥渣可傾入河池內與魚食之以有糯米故也 徐東皋曰婦女凡懷胎兩三

箇月慣要墮落名曰小產此由體弱氣血兩虛臟腑火多血分受熱所致醫家安胎

多用艾附砂仁熱補之劑是速其墮矣殊不知血氣清和無火煎燦則胎自安大抵

氣虛則提攝不住血熱則溢溢妄行欲其不墮得乎香附雖云快氣開鬱多用則損

正氣砂仁快脾多用亦耗正氣况香燥之性血氣兩傷求以安胎適所以損胎也惟泰山磐石散千金保孕丸二方能奪化工之妙百發百中神效非常 千金保孕丸

治妊婦腰痛慣於小產服此可免墮胎之患 厚杜仲四兩切片用日糯米炒斷絲 川續斷酒并炒

共為末以山藥六兩煮糊為丸如桐子大每服八九十九丸用米湯空心送下戒惱怒

忌食酒醋猪肝發火等物 小產保胎方 杜仲一切片鹽水浸七日其水每日一

換銅鍋緩火炒斷絲研細末另用黑棗一以陳黃酒二煎亦可煮極化去皮核和杜仲末

杵為丸如桐子大每日早起用淡鹽湯送下三錢此方百試百驗切勿妄行增減如

向在三月內小產者服至六七月可止如在五七月小產者服至八九月可止

孕婦惡食嘔吐 其症顏色如故脈息平和但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣

好食酸鹹甚者或作寒熱心中憤悶嘔吐痰水胸膈煩滿恍惚不能支持輕者不服

藥無妨乃常病也如重而不能飲食者用 台黨 砂仁研炒甘草錢各一白朮 香附

炒重真烏梅 陳皮各錢薑引水煎食遠服 又方 食鹽三煨薑六竹茹三老米

炒砂糖三煎水徐徐食之如有虻蟲吐出加花椒分二烏梅箇三煎服立效

孕婦吞酸 孕婦傷食腹滿吞酸惡心不喜食者用加味六君子湯 台黨 白朮

半夏 陳皮 茯苓 炙草 枳實炒神麩炒砂仁五薑引水煎食後服



孕婦頭痛 因外感頭痛者此虛也加味芎歸湯 川芎 當歸各錢 黃芩酒炒 白朮各一

錢二 細茶葉錢二 水煎食後服

孕婦目鼻咽喉唇口諸病 孕婦專以清熱為主目鼻咽喉唇口諸病多屬熱也用

吳茱萸錢五 研末好温醋調敷兩足心用布包好過一日夜足心如覺發熱即愈如尚

未愈連換數次再敷一日夜無不愈矣屢試如神 或用涼膈散各隨其症加減用

之 涼膈散 條芩 川連 梔子各酒炒 連翹 甘草 桔梗各一 薄荷五分 水煎服

目赤痛者前方加 當歸 川芎 羌活 防風 菊花錢各一 竹葉引 鼻血不止

者前方加當歸生地各一錢茅花一大團薑引或照卷一鼻部第一方治之萬無一

失 咽喉痛者前方加牛蒡子炒碎 錢一 口舌生瘡者只依本方薑引

孕婦口渴 此血少三焦火熾所致用 歸身 白芍 川芎 生地 熟地 川柏

錢各一 水煎服

孕婦咳嗽 如初得之惡風發寒熱鼻塞或流清涕者宜發散用加減參蘇飲 台黨

紫蘇 陳皮 茯苓 甘草 枳殼 桔梗 黃芩 前胡錢各一 薑引薄荷葉少

許水煎食後服得微汗即愈 如久嗽不已謂之子嗽引動其氣恐其墮胎用 台

黨 白朮 茯苓 炙草 蘇葉 阿膠 桔梗 各等分水煎食後服 又方

川貝母去心炒黃 去麵研末砂糖爲丸如芡實子大口中含化一丸極妙又咳嗽門內杏

仁百合各方亦可用

孕婦心痛不可忍 此胎氣不順宜用 順胎散 草菓箇元胡分八五靈脂錢一滑石分八

酒煎半飢服

孕婦心忡 猪心一箇不下水用水一碗煎湯硃砂飛淨三分調服或用加味參麥散見產後門

不語方

胎上衝心 葡萄一兩煎湯服卽下或用前吳萸敷脚心方更妙胎安卽洗去爲要

孕婦乳腫 或兩乳或一乳腫痛作冷作熱名曰內吃用 皂角一條燒枯存性酒送

下立消不復發矣其乳癰乳岩各症均見乳部內

孕婦腹癢 取鐵箭頭毒用針線袋亦可安臥蓆下勿令婦知及他人知又肚腹部有腸癢方可

用

孕婦腰痛 猪腰一對要一猪所生者去白膜青鹽錢四入猪腰內火內燒枯研末蜜爲丸空心酒送下卽

愈或用前千金保孕丸更妙

孕婦小便不通 此胎壓尿胞不得小便心煩不臥名曰轉胞用保生無憂方前見服一

劑胎卽升上自能小便百發百中神效非常 又方 貝母 苦參 當歸等分爲

末煉蜜爲丸黃豆大每服三丸多至十丸卽愈 又方 猪尿脬吹脹以翎管安上  
插入陰戶小便孔內捻脬氣吹入卽通極效如小便少而澀痛查後子淋方治之

孕婦大便虛急不出 此症脾土燥大腸澀不可用硝黃等藥宜用枳實二兩水二碗煎  
七分不拘時服體弱少服

孕婦泄瀉 以補中安胎爲主 白芍二錢生地 川芎 當歸各一錢水煎服 如發熱

而渴者爲熱本方加條芩一錢不渴者爲寒本方加 乾薑分五烏梅箇一爲引 如渴泄

久不止者 台黨二錢白朮三錢甘草分八白芍炒酒茯苓各半錢訶子肉 乾薑炒一錢烏梅箇一

水煎食前服 如久泄大渴者 茯苓 炙草各一錢藿香分五木香 乾薑錢各半水煎

時時服之

孕婦痢疾 以清熱和胎行氣養血爲主虛坐努力者防其損胎用 當歸黃芩芍藥

湯 當歸 黃芩 黃連 白芍 焦朮 枳殼 茯苓 生地 陳皮 生草各一錢

木香分五烏梅箇一水煎空心服 如久痢不止用黃連阿膠湯 黃連炒阿膠炒台

黨 白朮 茯苓各一錢乾薑炒炙草各五分木香分七烏梅箇三薑棗引水煎食前服 又

方 用雞蛋一箇破孔如指頭頂大以銀簪攪勻加入黃丹分五用紙封口在飯上蒸

熟食之卽愈神效非常 又方 荷葉蒂箇七燒枯存性研末酒下極效

孕婦瘧疾 凡孕婦病瘧不可輕用截藥恐致損胎用柴胡知母湯 柴胡錢半 台黨

黃芩 歸身 知母 白朮錢各一 甘草分五 薑棗引水煎多服以平為期 如瘧久不

退轉甚者用七聖散 柴胡 黃芩 炙草 知母 常山酒炒 草果仁錢半 真烏梅三箇

核去 水酒各半煎臨發五更服之宜露一夜邊溫服忌生冷雞魚或用瘧疾門外治各

方最穩而效

孕婦霍亂 其症心腹絞痛上吐下泄用紫蘇 條芩 白朮各錢半 藿香葉 陳皮

甘草錢各一 砂仁分炒五 薑棗引水煎服

孕婦中暑 凡盛暑時中其暑熱之毒者其症發熱而渴自汗精神昏憤四體倦怠少

氣用清神和胎飲 台黨 白朮 炙草 炙芪 黃芩 黃連 知母 麥冬各一

錢 五味粒十五 水煎服

孕婦中溼 凡孕婦或早行感霧露之氣或冒雨或久居潮溼之地或汗出取冷水浴

之其症發熱骨節煩疼體重頭痛鼻塞用黃芩白朮湯 條芩 白朮各錢五 蘇葉錢二

分五 生薑五片煎水服

孕婦中風 凡孕婦中風或手足拘攣強直或卒倒昏悶口眼喎斜手足痲癱口噤不

語不可用常治中風之法只以補虛安胎為本兼用搜風之劑 台黨 川芎 白

芍 茯苓 生地 白朮 歸身 炙草 黃芩 炙芪 防風 羌活 秦艽 各二

枯 薑棗引水煎多服以平為度 如牙關緊閉痰氣塞滿不知人事先用 黃蠟

枯礬 麻黃 各四分 為末共鎔化擦上牙關再用上方服之

孕婦癱瘓 此症手足不能動乃胃中有痰凝聚氣血所致宜用烏藥順氣散 見調經門內 或

照癱瘓門外治各方治之

孕婦遍身瘙癢 此風症不可服藥用樟腦調酒擦即愈或照遍身瘙癢外治各方治

之

子懸 前五篇有吳興數足心方用之神效胎安即洗去為要 孕婦五六月以後胎氣不和上湊心腹脹滿疼痛者謂之子

懸用紫蘇飲 紫蘇 陳皮 大腹皮 川芎 白芍 歸身 各一錢 潞黨 炙草 各五

分 薑片 葱白 寸七 水煎空心服

子煩 孕婦心驚膽怯終日煩悶不安者謂之子煩用人參麥冬散 黨參 茯苓

麥冬 黃芩 知母 生地 炙草 各一錢 竹茹一大團水煎空心服

子瀉 孕婦忽然眩暈卒倒口噤不能言狀如中風須臾即醒醒而復發謂之子瀉乃

氣虛挾痰挾火症也用清神湯 台黨 白朮 茯苓 炙芪 炙草 麥冬 歸

身 各一錢 薑棗引水煎食遠服兼服琥珀壽星丸 琥珀壽星丸 安神定志去風化

131

驗方新編 卷四 婦科胎前門

痰天南星一觔掘地作坑深二尺用炭火二十觔於坑內燒紅去炭掃淨以好酒五升燒之將南星趁熱於坑內用瓦盆急蓋定以黃泥封固經一宿取出焙乾為末入琥珀末一兩硃砂末五錢和勻以生薑自然汁煮如麵糊熟再用獾豬心血三箇開對者為積者攪勻末為丸如梧子大硃砂為衣每服五十丸黨參煎湯下日服三次神效

子腫 孕婦面目身體四肢浮腫者此胎泛溢謂之子腫用加味五皮湯大腹皮 生

薑皮 桑白皮 白茯苓皮 白朮 紫蘇各味等分棗引核去水煎另用木香磨濃汁三

匙入內 又孕婦腹大有水氣者亦名子腫用鯉魚湯 白朮二錢茯苓半錢歸身 白

芍錢各一生薑 陳皮各五分活鯉魚一箇約重八九兩煮汁一盞半去魚以魚湯煎藥

服甚效 孕婦自六七箇月以來兩足腫大行步艱難脚指間有黃水出此名子氣

亦多有之未備醫治生子之後其腫自消重者用茯苓湯 雲苓 白朮 陳皮

香附 烏藥錢各一炙草分五紫蘇分五木瓜分三薑引水煎空心服

子滿 孕婦至七八箇月胎已長成腹大腹滿逼迫子戶坐臥不安謂之子滿用東胎

飲 白朮 黃芩 蘇葉 枳殼 大腹皮各錢半砂仁五分連殼略研炙草分三薑引水煎空心

服

子淋 孕婦小便少又澀痛者謂之子淋用加味木通湯 木通 生地 條芩 甘

草梢 麥冬 赤芍 黨參錢各一 淡竹葉十 燈心一 水煎空心服

子鳴 氣足時子在腹中鳴謂之子鳴此由孕婦或欠身向高處取物子在腹中脫口

中所含疙瘡故啼治法或令孕婦作男子拜狀或以豆撒地令孕婦檢之子復含著則止

孕婦無故心虛驚恐悲泣狀若遇邪 此臟燥症也用 甘草兩三 小麥升一 大棗十 用水

六升煎三升去渣分三服溫服即效再服竹茹湯數服以和之 竹茹湯 台黨

麥冬 茯苓 炙草錢各一 小麥合一 青竹茹雞子大一團薑片三 棗五 水煎食後服

孕婦至七八九箇月內忽然聲啞不語 此少陰血脈下養乎胎不能上榮於舌生子

之後自能言語非病也不可服藥莫信庸醫圖利只以飲食補之

孕婦忽然倒地 此乃血養兒胎母欠精神承胎不住眼目昏花一時倒地不須服藥

只以飲食補之可也

胎動不安 用前吳萸散足心方投炒胎安即洗去為要 絲瓜二箇又名水瓜又名線瓜煎水服即愈如無絲瓜或

藤亦可或用保生無憂方最妙

胎動下血不止 保生無憂方服之即止 又方 取白蠟一團如雞子大煎三五滾

對好酒服立愈十日內忌食雞 又方 五梧子末酒調服二錢神效

撲跌動胎腹痛下血 砂仁不拘多少放熨斗內漫火炒熱透去筋膜為末每服二錢

熱酒下即安功最神效

孕婦漏胎 漏胎者謂既有孕而復下血也女子之血在上為乳汁在下為經水一朝

有孕而乳汁經水俱不行者聚之子宮以養胎也今胎漏下則是氣虛血虛胞中有

熱下元不固也宜用台黨 白朮 歸身 赤芍 熟地 黃柏 知母 阿膠

艾葉 條芩 炙草各等分 薑棗引水煎食遠服兼用杜仲丸 杜仲丸 杜仲薑汁炒

川續斷酒炒各三兩 共為末棗肉搗和為丸如梧子大每服三十丸宜與後胡連丸煎服

胡連丸 安胎聖藥也 條芩四兩以沉水為佳 白朮四兩無油者 蓮肉去心二兩 砂仁微炒 炙草各一兩 共為

末用山藥多煮糊為丸米湯下

小便多而動紅勢欲小產 葱頭一大把約二三十根煎水服立止如神 止後仍用

前保生無憂方服之

服藥胎欲墮 生白扁豆去皮為末米湯調服即安或煎濃汁服亦可此症胎氣已

動未墮口噤自汗手強頭低似乎中風人多不識若作風治必死慎之慎之或用保

生無憂方前見服之極為妥效

臨產須知 凡孕婦未產數日前胎必墮下小水頻數此欲產也慎重之家於合用藥



物慣熟穰婆預宜備之以防不虞又乾漆渣及破漆器產時燒之使產母聞其氣無血暈之疾又燒紅石放盆內以好醋燒之房中轉遊數次產母常聞醋氣亦無血暈又取生韭菜一握放在小嘴瓦瓶中以熱醋燒浸塞其大口以嘴向產母鼻嗅之亦止血暈又取無病童男小便五六碗淨器收貯臨產之時即溫一二盃飲之自無血暈產母房中只令穰母一二人緊閉門戶勿使雜人往來更禁人無事詢問大驚小怪直待包漿已動兒身已轉逼近子門不須用力當此之時產母獲痛其身傾側護生者不可約束其腰恐致損兒但扶其肩膊勿令困倒臨產時如白蜜滾開水薄粥美膳常要齊備如渴則取白蜜半盞開水化開飲之可以潤燥滑胎令其易產如飢即以薄粥美膳與食之令其中氣不乏自然易生如夏月盛暑之時必用冰水灑掃房間解其鬱蒸之氣四面窗牖大開以薄紙帳遮之使產婦溫涼得宜庶新血不致妄行可免血暈如冬月嚴寒之時必於房中四處燃火常使和煖之氣如春更要閉其戶牖塞其穴隙使邪氣不入庶免風寒之疾臨產之時凡合用水火柴炭鍋錐剪刀麻繩線布無一不備

**催生諸方** 凡催生須當正產之候如臨月忽然腹痛或作或止或一二日或三五日胎水已來腹痛不止者名曰弄胎又曰試痛非當產也有一月前忽然腹痛如欲即

產卻又不產此名試月亦非當產也不問胎水來與不來但不妨事但當寬心待時至時瓜熟蒂落即臨盆之際腹中氣痛轉胎氣壯者轉身易胎虛者轉身難延緩時刻腹痛不已俱非正產之時切不可預先驚動混服催藥直至腰腹一陣痛似一陣痛極難忍冀門挺急如欲大便眼中時見金光漿破血來方是正產之候若未至產時誤用催藥轉動非時以致倒產橫生爲害不小催生之方最多世傳兔腦鼠腎等丸雖屬靈驗果當正產服之自然有效若非正產如瓜菓之未熟而摘必致傷生害命斷不可用惟保生無憂方服之當生即生不生亦能安胎即橫生倒產胎死腹中亦能順生毫無苦楚百發百中萬應萬靈其藥甚平其功最大誠千古不磨之方切不可好奇而輕忽也 朱丹溪先生云 佛手散前見爲催生聖藥又穩當又效捷與保生無憂散功力相同凡老婦並矮小女子及體弱交骨不開者服加味歸芎湯前見尤極相宜催生之藥惟此三方最穩最靈萬無一失切勿亂用別藥又牛膝一物催生斷不可用服之氣血下墮必致兩腿疼痛叫號不已慘不忍聞無藥可治死而後已此名醫祕傳也 又方 陳麥草須露天者更妙無則用舊草精之草亦可 每用一兩洗去塵灰剪寸斷煎湯服難產極效此方須傳窮鄉僻壤醫藥不便及無力醫藥者全活一命陰功莫大又方 用新硃筆在黃紙上無硃筆用新製筆亦可寫語忘敬遺四字貼牀柱及門窗上凡有門

窗之處各貼一張臨產令產婦默念此四字卽產可免邪祟 又方 用本年黃歷面上欽天監印花燒灰白開水送下勿令人知屢試屢驗 又方 用新筆墨紙淨硯寫日月如箭急共五字貼產婦房口房內如仍未生下卽用火焚此五字於淨水中與服卽下矣寫此五字不宜挑勾 又方 急採樹葉一片或花或草葉皆好要新鮮青的以淨水貼在牀背勿令人知

臨產胡言亂語 用四炷燈火加硃砂入盞內點之卽安四炷者一盞內用四燈頭是也

臨產暈絕不省人事 生半夏如豆大研末吹鼻中得嚏卽活

臨產艱難及氣弱或矮小婦女交骨不開 一時難覓醫藥用白蜜麻油或半盞煎至

一半服之立效終不若加味歸芎湯見前之妙

難產 難產者多因產母倉皇坐草太早或胞漿雖破兒身未轉或轉未順被母用力勞責以致足先來者謂之逆產手先來者謂之橫生或漏其肩與耳與額者謂之側產或被臍帶纏絆不得下者謂之礙產倉卒之間二命所係不可無端囂鬧大驚小怪更不許穩婆混行動手總以鎮靜爲主無論逆產橫產礙產將兒輕輕送入用前佛手散服之最穩最靈並照以後各法救之

救逆產 令產母正身仰臥務要定心定神不可驚懼却求慣熟穩婆剪去指甲以香油潤手將兒足輕輕送入又再推上兒身必轉直待身轉頭正然後服此催生之藥渴則飲以蜜水 飢則食以薄粥然後扶掖起身用力一送兒卽生矣此在穩婆之良若粗率蠢人斷不可用更不可使鍼刺足心兒痛上緊母命難存

救橫生 一切照上仍將兒手輕輕送入再推上摸定兒肩漸漸扶正卽下矣忌用鍼刺

救側產 亦令產母仰臥俱如前法穩婆用燈審視或肩或額或左或右務得其真以手法輕輕扶撥令正仍服藥食如前法起身用力兒卽下矣

救礙產 產母仰臥穩婆用燈審視看臍帶絆著兒之何處仔細以手法輕輕脫取服藥食如前法扶起用力一送卽下矣

一切橫生逆產 佛手散前見最穩最效 又方 竈心中土兩旁取者不效研細酒調服一錢仍擦產母臍中極效 又方 用手中指點鍋底煙子於小兒足心畫一叉卽刻順生

又方 蜂蜜眞麻油各半鍾煎至一半服立下

盤腸生 當產之時子腸先出盤露於外子隨後生產後而腸不收此謂盤腸生也蓋由平日氣虛不能斂束血熱易於流動下元不固關鍵不牢以致如此救治之法於

子下衣來之後卻令產母仰臥穩婆先將子腸溫水洗淨然後托起輕輕送入推而上之却令產母兩足夾緊谷道其腸自收上也或取葶麻子四十九粒去殼搗爛貼在頂心候腸收盡而急去之次者或用冷水和醋令人噴產婦面一噴一收以漸收之此法最妙或照後腸出各方治之欲免其苦者宜於此後無孕時多服地黃丸加五味子一兩肉桂一兩以固下元之關鍵及有孕時多服胡連丸加台黨一兩以補氣又服三補丸以涼血凡滑胎瘦胎之藥不可輕服如八月之時再服八物湯加訶子 麥冬 粟殼服十餘劑庶可免矣各方俱見前 如腸乾不上諸藥不效者以刀磨水少許灑潤腸上另用真磁石煎水一杯兌酒服自然收上此扁鵲神方也

臨產兒尙未生有物先出形如胞衣 乃子宮也此時兒尙未生切勿用葶麻子塗在頂心以致誤事速將子宮納入服以補藥用前保生無靈散最妙 靜候兒生母子無恙

胞衣不下 此因產母力乏氣不轉運或因血少乾澀或因子宮空虛而不下者急用

芡實葉又名雞頭菜

一張扯作二三塊煎之服胎衣即破作二三塊而下又蓮蓬殼一箇

扯作二三塊煎水服用荷葉扯碎功亦相同神效無比此數物須平時收存以備

急用 又方 明礬三分研末開水沖服立下 又方 用竹桿於堂中正樑上戳

三下即下 又方 用雄雞一隻連毛破開去腸雜蓋孕婦臍上雞頭向上以布紮

縛卽下神效 又方 生雞蛋兩箇去黃用白好陳醋燒開沖服卽下 又方 草

麻子十四粒去殼搗爛敷兩足心胎衣卽下衣下後趕急將藥洗去久則恐腸出也如腸已

出仍用此藥敷額門上腸自收入藥隨洗去勿遲

子死腹中 產母脣舌俱紅者母無事脣青舌紅者母死子活脣紅舌青者母活子

死脣舌俱青者母子俱死用平胃散最爲神效 平胃散 專治胎死腹中 蒼朮

淘米水 紫川厚朴薑汁炒 陳皮各二錢 炙草五分 酒水各一鍾煎至一半加朴硝末錢五再煎三

五滾去渣溫服其胎卽化爲水而出矣若倉卒製藥不及只用朴硝五錢以溫童便

調下亦效如胎未死產婦舌不青黑不可亂用凡貓犬生子不下而叫號者亦以此

藥灌之 又方 用醋炒黃牛糞敷肚腹上用布捆好卽下神效

婦科產後門 胎衣不下 胎前門 產後不問有病無病用童便好酒煎熱服之百病不作

產子氣絕不啼 胎衣來時切勿斷臍卽取小鍋燒水以胎衣放熱水中並以水澆臍

帶俟暖氣入腹兒氣卽回啼聲發出矣若先斷臍帶不可救矣並參看小兒科保嬰

各法

產後宜擠兩乳 凡婦人初產卽將兩乳放溫熱淘米水內揉洗良久將乳擠出乳孔

內有白絲數條用手扯去方與兒食則小兒易於吸食可免吹乳乳癰等病此秘法

也

產後乳汁不通 或初產之婦則乳方長乳脈未行或產多之婦則氣血虛弱乳汁短

少並用加味四物湯 歸身 黨參 川芎 赤芍 生地 桔梗 甘草 麥冬

白芷錢各一 水煎服如因乳不行身體壯熱胸膈脹悶頭目昏眩者加木通滑石末

煎水食後服更煮猪蹄湯食之則乳汁自通猪蹄一對洗淨煮爛入蔥調和並汁食

之又云要入香油炒過穿山甲共煮去甲食之神效或查乳部內通乳各方治之

產後陰戶垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹 老薑三觔連皮搗爛入真麻油二觔

炒乾先用舊綢五尺摺疊輕輕盛起肉線使之屈作二三團納入陰戶再用綢衣盛

薑使薑氣就近薰之冷則隨換薰一日夜收入大半二日收盡神效非常肉線切不

可斷斷則不治並宜禁風

產後子腸掉出一截 凡婦人產後胞衣已下有腸出一截俗名外衣或腸上胎衣脫落未

盡不必驚慌不必服藥用枳殼煎湯洗之切宜避風若怕風寒不洗亦可三五日後

自然爛落近日有人經驗甚多並不礙事亦無後患若腸出多者則照後方治之

產後腸出不收 真麻油三觔煉熟入盆內候溫令產婦坐盆中另用皂角尖燒枯去

皮研細末吹鼻中作嚏即收 又方 枳殼煎湯溫浸良久自入冷則隨換或照肉

線方見前治之或照後子宮墜出方亦可 又方 新鮮鯽魚頭焙枯研細末一半搽

腸一半酒服即時收上

產後子宮脫出 產後下一物如合鉢狀有兩塊者子宮也名陰癩又名癩葫蘆用補

中益氣湯見內外備用諸方去柴胡連服二三大劑一響而收並用 荆芥穗 藿香葉 臭

椿樹白皮炙 各六七錢煎湯時時洗之再用 熟地 歸身各二錢 川芎 白芍各錢

台黨錢三 水煎服數劑可免後患或照上腸出不收鯽魚方最效

產後尿脬音胞脫出 棕樹根和豬瘦肉久煮去根食肉與湯三五次自然收入其效如

神

產後胎膜墜出後補傳音主產後肝癩一方最效 產後出一物如手帕因臨產用力太過或肝癩所致有黏

席不得上者乃胎膜也照上子宮脫出方治之即入

產後尿脬音胞破損小便直流 黃絲絹天生黃者三尺用炭灰淋汁煮 黃蠟錢五 白蜜錢一 白茅根

馬屁勃錢各二 水二盞煎一盞 空心服服時須斂氣不得開口作聲如作聲則不效

又方 生成黃色絲絹一尺服煎製法 白牡丹根木研一錢 白芨研一錢 水二鍾煮至絹爛加糖

食之不宜作聲此名補脬散其補法有不可思議之妙生絲造者白絹色黃者入血

丹皮連木者入裏色白者走氣二者皆能瀉膀胱之火引清氣以達外竅白芨性黏



功專收瀆能補五臟之破損服之不作聲乃有效者蓋聲出於五臟有聲則五臟之氣動而來迎無聲則五臟之氣靜而安謐所服之藥不由五臟分布入肺竟從胃口關門分別清濁之處由脂膜之絡滲入膀胱之外膜使白芨得以護外而為固也本草載台州大辟剖出肺傷之處皆白芨所補信有是夫 又方 雲苓 陳皮 桃仁各一錢 台黨二錢 炙苡半錢 炙草五分 用猪尿脬羊尿脬亦可 洗淨煮湯去脬入藥煎好空心服亦不作聲多服乃效血虛者加 川芎 當歸 又方 大鯉魚一條取魚鱗用油煎極酥脆音 加鹽醋薑汁拌鱗蒸食亦效

產後癥疽突出 先用連翹散後用黃蠟膏立效 連翹散 炙苡 連翹 花粉 防風 梔子各一錢 甘草三分 水煎服 黃蠟膏 黃蠟 枯礬 麻黃以上各四分 共為末用開水沖服或用前子宮脫出諸方亦妙

產後陰戶生蟲一對 此蟲約長寸餘埋入土中數日開視暴大如拳名子母蟲以後月生一對 苦參一兩淘米水浸一夜蒸熟曬乾 使君子錢五 共研末煉蜜為丸每空心服三錢服完再生一對再服一料即可斷根

產後陰戶翻出疼痛 名曰翻花用澤蘭葉兩 煎湯薰洗二三次再加枯礬煎洗即安 又方 見後雜治門 又方 產後陰腫搗桃仁如泥敷之效

產後陰戶不閉或脫出 石灰一斗炒黃色以水二斗加入攪勻澄清乘熱薰之 又

方 溫水洗軟用雄鼠屎兩頭尖者是燒煙薰之即愈 如陰戶破爛久不收口 白芨

白龍骨 訶子 爛蜂巢 黃柏炒各一錢研末先用野紫蘇煎水洗拭乾再用此藥敷

之或銀青散見難毒諸方門敷之均效

產後陰戶腫痛或手足彎屈不能伸舒 此下體受風故也用 葱白加乳香同搗成

餅敷之一二日即愈 又方 羌活 防風兩各一煎湯薰洗亦效

產後惡露不止 產後衝任損傷氣血虛憊舊血未盡新血不斂相併而下日久不止

漸成虛勞者大補氣血使舊血得行新血得生不可輕用固澀之劑使敗血凝聚變

為癥瘕反為終身之害用十全大補湯見前調經門如小腹刺痛者四物湯加 元胡索

蒲黃炒 乾薑炒 各等分水煎服

產後惡露不下 此有二症治之不同或因子宮素冷停滯不行者宜用 黑神散後見

方血暈 此必小腹脹滿氣痛無時也或因脾胃素弱中氣本虛敗血亦少氣乏血阻不

能盡下其症乍痛乍止痛亦不甚用加減八珍湯 台黨 白朮 雲苓 炙草

歸身 川芎 赤芍 熟地 元胡 香附 薑棗引水煎食前服 又方 大黑

豆炒令煙絕酒淋服即下兼治產後中風危篤

產後血崩 產後衝任已傷氣血未復或恣情慾勞動胞脈或食辛熱鼓動相火或因  
惡露未盡固澀太速以致停留一旦復行須要詳審先用四物湯倍加芎歸再加黨  
參作大劑服之扶其正氣然後隨其所傷加減調治 因於房勞者本方加黃耆  
炙草 阿膠炒 艾葉同服 因於心熱者本方加白朮 茯苓 甘草 黃連炒  
因於固澀者本方加香附桃仁 如崩久不止只用本方調石灰散服之或用前調  
經門血崩各方仍用前四物湯大劑扶其正氣蓋崩本非輕病產婦得之是謂重虛  
尤不可忽也 又方 荊芥穗五錢炒黑煎服立止

產後一月惡露重來血水不止倒地不省人事 此乃夫婦交媾搖動骨節血崩不止  
急照上產後血崩因於房勞方治之或照前調經門血崩各方施治亦可

產後癥痞 此惡露不盡之害也蓋由產婦惡露不來或來不盡或產婦畏藥雖有病  
苦強忍不言或主人與醫堅執產後虛補之說不可輕用去血之藥以致敗血停留  
久而不散結成塊依附子宮妨礙月水阻絕嗣息夭其天年照痞疾門各方治之最  
效

產後發狂 家苧麻兜洗淨切片煎濃汁服熱退狂止或用傷寒發狂外治方更妙  
產後乍見鬼神 心主血血去太多心神恍惚睡臥不安言語失度如見鬼神俗醫不

知呼爲邪崇誤人多矣宜用茯神散 茯神 柏子仁 遠志 黨參 當歸 生

地 炙草錢各一 肉桂分五 獾猪心一箇開剖者爲數猪 水酒各一盞煎至一半入童便一鍾調辰砂

一錢食後服 如心下脹悶煩躁昏亂狂言妄語如見鬼神者此敗血停積上攻於

心心不受濁便成此症用芎歸瀉心湯 歸尾 川芎 元胡索 蒲黃 丹皮各

錢 肉桂分七 水煎調五靈脂末一錢食後服

產後眼見黑花昏眩昏眩出汗見後 此敗血流入肝經故眼見黑花諸風振掉皆屬肝木始爲

昏眩用後清魂散加丹皮二錢水酒各一盞煎至一半入童便一鍾同服

產後血暈用地黄蒲芎同取汁入童便煎飲甚效 產後昏眩卒倒不省人事口噤氣冷謂之血暈此惡候也不

可救者多若誤作暗風痛醫直殺之耳蓋由坐草之時不知用前防血暈等方所以

有此其症有二當分治之 如血來太多卒然昏仆者此氣血兩虛也急用韭醋嗅

法見前條產須知 以待其醒用 澤蘭葉 黨參錢各一 荊芥穗 川芎 歸身錢各一 炙草分八 水

酒各一盞煎一盞入童便一鍾同服 如血去少惡露未盡腹中有痛而昏眩者用

上法令醒再用黑神散 黑豆炒一合 熟地 當歸 肉桂皮去 乾薑炒 炙草 白芍炒 酒

蒲黃錢各二 如上法煎服 又方 提起頭髮坐定不可倒眠急以燒紅栗炭或磚石

秤錘等物投入陳醋內對鼻孔薰之自醒另入當歸錢六 川芎錢三 荊芥穗錢三 水煎臨

服入好酒童便利服神效之至 又方 五靈脂半生半炒爲末每服一錢白滾水調下如口噤者用磁調羹攪開灌之入喉卽愈或用失笑散見各種氣痛門更妙 又方 白紙三十張燒灰熱酒沖服雖已死一日打去一牙灌之亦活 又方 乾漆渣破漆器燒煙薰之卽醒或乾荷葉燒灰溫酒調服 又方 照後華陀愈風散治之最爲神妙

產後中風 產後正氣暴虛百節開張風邪易入調理失宜風卽中之不省人事口目

蠕動手足攣曲身如角弓此風外中者也用愈風湯 羌活 防風 當歸洗酒 川芎

白芍酒炒 肉桂 黃芪 天麻 秦艽各二錢 薑棗引水煎服 又方 荊芥穗除根不

末研每服三錢童便調服口噤則打開一牙灌入或用荊芥五錢不必研末以童便煎

好待微溫灌入鼻中其效如神或心頭倒築吐瀉欲死亦效此華陀愈風散也 又

方 黑豆一茶鍾炒至煙起再入連根蔥頭五箇同炒隨入好紹酒一鍾或甜酒亦可 水鍾

半煎至一鍾溫服出汗卽愈無論如何危急莫不神效此孫眞人大豆紫湯也 又

方 一婦產後弓背反張服大豆紫湯及獨活湯而愈後又於產後忽作此症頭足

相反相去幾二尺數人強拘之不直急用獨活湯連進三劑而愈 獨活湯 獨活

羌活 半夏 台黨 茯神 遠志 防風 肉桂 白薇 當歸 川芎 葛

蒲各一錢 細辛七分 炙草五分 薑三片 棗三枚 水煎服 又方 此症曾見兪魯堂先生醫治兩

產母一在嚴寒一在盛暑其症均在危篤偏身發腫惡露不行牙關緊閉諸醫均用

補劑罔效兪見此症毋庸診脈卽令先覓糞坑陳年磚一塊用活水洗淨眞陳紹酒

五觔亦可 放在鉢內用栗炭火將磚燒透浸在酒內提出復燒如此三遍其酒不過

二觔候酒溫卽令產母服一二杯過半日其腫漸消惡露頻頻卽通餘酒陸續飲完

腫已全消病已全愈據兪醫云產後驚風皆係誤投補劑及三朝後多食油膩以致

發熱惡露不行今糞磚得清氣能通經絡以酒行之經絡一舒惡露亦通腫消病去

矣再如產母素不飲酒卽用天泉水亦可此係得諸異人傳授屢試屢驗慎勿輕視

再陳年糞坑磚又治麻痘不起或忽然沈陷醫不能治卽用此磚如前法或用天泉

水製之亦神效也

產後中風聲啞不語心口發紅如鏡 此症若紫色卽重黑色則難救矣宜用訶子三

四箇搗爛先炒過後煎濃水灌之少刻其婦人卽大吐痰涎重則再進一服卽愈如

不見效照前糞磚方並各方治之 又方 用家中二三年陳米醋渣要黏米的一

把拌鹽炒焦沖水一碗服下其人少刻吐出痰涎一二尺長者卽愈 又方 魚鱈

燒灰每服三錢淡酒送連服二日卽止

產後肝虛風從内生 諸風振掉皆屬肝木肝爲血海胞之主也產後去瘀過多肝氣暴虛內則不能養神外則不能養筋以致神昏氣少汗出身冷眩暈卒倒手足扯動此肝虛自内生也用當歸建中湯見產後腹痛加炙芪 台黨錢各一製附子錢五薑棗引水煎服不可飲熱茶水如痰迷心竅神氣不清恍惚昏眩者用琥珀壽星丸見胎前門子細方 台黨煎湯下

產後不語 人心有七孔三毛產後虛弱敗血停積閉於心竅神志不能明了故多昏

曠又心氣通於舌心氣閉則舌強不語也用七珍散 台黨 菖蒲 生地 川芎

錢各一 細辛分三 防風 辰砂分各五 水煎調辰砂食後服又有言語不清含糊蹇澀者蓋

心主血血去太多心血虛弱舌乃心之苗其血不能上榮於舌故語之不出也用加

味麥麥散 台黨 麥冬 歸身 生地 炙草 石菖蒲錢各一 五味子粒十三 先用

猪心一箇破開用水二盞煎至一半去心入前藥煎七分食後服並治怔忡有效

產後風癱 名曰產痿蓋由衝任血虛心脾失養故宗筋放弛不能束骨而利機關令

人手足痿弱痰忡目眩俗名產癱若以降火滋陰破氣破血爲治榮衛愈傷終身廢

棄再莫能挽初起之時宜加味四君子湯 台黨 當歸錢各三 黃芪 白朮錢各二 茯

苓錢一 半夏 陳皮 炙草分各五 水煎空心服 又方 大紅野薔薇花子兩一 酒煎服

初起者一服即愈如日久兩手不能提舉以薔薇花四兩當歸二兩紅花一兩浸酒  
五觔何酒不論每日酒隨量飲最凶者兩料全愈如癱瘓在兩月外者其功稍緩

產後鼻血不止 荊芥穗炒研末用童便調服三錢即愈或照鼻部各方治之更妙

產後口渴 產後去血甚多津液內耗胃氣暴虛頓生內熱故口燥喉乾而渴也用人

麥冬湯 台黨 麥冬 生地 瓜萑根 炙草錢各二先取淡竹葉十粳米合一煎

湯一碗去米葉加生薑片三棗三枚煎七分溫服或用熟蜜調開水服最妙

產後口渴痞悶 此由氣血太虛中氣未足食麵太早脾胃不能消化麵毒聚於胃上

薰胸中是以有此症也慎勿下之宜用睨睨丸後見若其臟氣本虛宿夾積冷胸腹脹

痛嘔吐惡心飲食減少亦因新產血氣暴虛風冷乘之以致寒邪內勝宿疾益加用

吳茱萸湯 吳茱萸半錢 桔梗 乾薑炒 炙草 半夏錢各一 細辛分六當歸 茯苓

肉桂 陳皮分各八 薑引水煎熱服

產後舌出 一婦產後舌出不收百治不效後用硃砂點其舌令作產兒之狀用人扶

住一人悄悄在窗外將大瓦器擲地打碎婦聞響聲而驚舌即收入

產後腹脹滿悶嘔吐惡心 敗血散於脾胃脾受不能運化精液而成腹脹胃受則不

能受水穀而生嘔逆若以平常治脹治嘔之劑則藥不對症反增其病用 赤芍



半夏製 澤蘭葉 陳皮白去 黨參錢各二 炙草錢一 生薑分焙五 水煎服 亦有傷食而腹脹

嘔逆者以脈辨之因於血則脈弦濇不惡食而嘔多血腥因於食則脈弦滑而嘔多

食臭宜加味平胃散 蒼朮米泔水 厚朴炒 陳皮 神麴 香附炒 黨參錢各一 炙草

生薑焙各五分 水煎熱服或用睨睨丸亦佳 睨睨丸 良薑炒 薑黃炒 華澄茄 陳皮

白朮去 朮去 三稜煨 黨參分各等 共為末用蘿蔔慢火煮熟搗融和藥將餘汁打麵糊為

丸蘿蔔湯下 加味六君子湯 治產後傷食嘔吐腹脹 茯苓 黨參 炙草

陳皮 白朮 製半夏錢各一 枳實炒 山查分各五 薑黃分三 生薑片三 水煎食遠服

產後嘔水 產後因怒哭傷肝嘔吐清水用韭菜搗取汁加薑汁少許和飲即愈

產後呃逆 此氣從胃中出上衝賁門呃忒而作聲也有胃氣虛者有中氣不足衝任

之火直犯清道而上者有飲水過多水停而逆者有大小便閉下焦不通其氣上逆

者有胃絕者大約產後呃逆乃胃虛氣寒症用加味理中湯 台黨 白朮 炙草

炮薑 陳皮錢各一 丁香分三 乾柿蒂錢二 有熱去丁香分各五 為末桃仁煎湯沖服數次必愈

少呃逆者胃絕也難治 又方 白朮去 丁香分各五 為末桃仁煎湯沖服數次必愈

有熱者忌服

產後咳嗽 產後多因惡露上攻流入肺經乃成咳嗽其症胸膈脹悶宜服二母湯

知母 貝母 雲苓 黨參 杏仁 桃仁 錢各一 水煎食後溫服 又肺主氣上為

衛所以充皮毛宣腠理也產後氣虛衛虛皮毛不充腠理不密風寒襲之先入於肺

亦成咳嗽其症發熱惡寒鼻塞聲重或多噴嚏鼻流清涕用旋覆花湯 旋覆花包

赤芍 前胡 半夏 芥穗 甘草 杏仁 茯苓 錢各一 麻黃 去根 五味 各五分 薑棗

引水煎食後溫服有汗者去麻黃加桂枝 如咳久不止涕唾稠黏用加味甘桔湯

甘草 桔梗 款冬 貝母 前胡 枳殼 雲苓 五味 麥冬 各等分淡

竹葉十五瓣煎服如前或用咳嗽各方治之更妙 如產後吃鹽太早者難治

產後氣喘 產後血下過多營血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰

最為難治急取鞋底燒熱於小腹上下熨之次用 奪命丹 熟附子 錢五 丹皮 乾

漆渣 抄煉盡 各一兩 共為末用醋一升大黃末 兩一 同熬成膏和末為丸梧子大每服五十丸溫

酒下

產後面赤發喘欲死 此血入於肺也用蘇木 兩二 水二盞煎一盞去蘇木加台黨 研一兩末

隨時加減調服效難盡述

產後心痛 心者血之主其人宿寒內伏因產後虛寒血凝不行上衝心之絡脈故心

痛也但以大岩蜜湯治之寒去則血脈行而經絡通心痛自止若誤以為敗血攻之

則虛極寒益甚漸傳心之正經變爲真心痛而死矣 大岩蜜湯 生地 歸身

獨活 吳茱萸炒 白芍酒炒 乾薑炒 小草 肉桂 甘草錢各一 細辛分五 水煎熱服如

不見效即係瘀血用黑神散前見或失笑散氣痛門少少服之效則再服必愈

產後腹痛 產婦中氣多虛不能行血血斯凝滯或閉而不來或來而不盡敗血入腹

故爲腹痛乍作乍止其痛如刺手不可近宜用黑神散前見或用失笑散氣痛門或後羊

肉湯妙俱或產後血虛外受風冷之氣內傷寒冷之物以致腹痛者得人按摩則止或

熱物熨之則止者是也用當歸建中湯 歸身 白芍 肉桂 炙草錢各二 生薑片五

大棗枚三水煎入米湯三匙攪勻熱服 或小腹痛者臍下胞胎所係之處血之所聚

也產後血去不盡即成痛症其症無時刺痛痛則有形須臾痛止又不見形宜用黑

神散或失笑散及後羊肉湯更佳 又有因產時寒氣客於子門入於小腹或坐臥

不謹使風寒之氣乘虛而入此寒症也但不作脹且無形影用金鈴子散 川練子

去核小茴 補骨脂 肉桂錢各一 木香分四磨兌薑引水煎食前熱服或後羊肉湯更妙

產後腹中有塊上下時動痛不可忍 此由產前聚血產後氣虛惡露未盡新血與舊

血相搏俗謂之兒枕痛即血瘕之類也用當歸元胡索湯 歸尾 元胡索牛各錢五

靈脂 蒲黃錢各一 赤芍 肉桂 紅花分各五 水酒各一煎一盞入童便一盞同服或

用山查肉一兩水煎一鍾加紅沙糖五六錢好酒一二小杯空心熱服催下敗血即

安或用 失笑散見各種氣痛門亦妙 羊肉湯 通治上腹痛小腹痛兒枕痛之神方也

精羊肉助牛當歸 川芎錢各五 生薑一兩水十盞煎三盞服或用羊肉燉老薑食或炖

製附子均妙

產後血氣痛不可忍用各種氣痛門失笑散最妙 有婦人產後血氣痛極百藥不效後用紅諸又名黃蘗於

柴炭火中燒熟食之而愈諸為滯氣之物食之反效殊不可解

產後脇痛 此亦敗血流入肝經厥陰之脈循行脇肋故為脇痛症有虛實宜分治之

不可誤也如脇下脹手不可按是瘀血宜去其血用芎歸瀉肝湯 歸尾 川芎

青皮 枳殼 香附童便 紅花 桃仁各二錢 水煎入童便一鍾酒一鍾服如脇下痛

喜人按其氣閃動筋骨狀若奔豚者此去血太多肝臟虛也用當歸地黃湯 歸身

白芍 熟地洗俱酒 黨參 甘草 陳皮 肉桂各一錢 薑棗引水煎服

產後頭痛 產後去血過多陰血已虧陽氣失守頭者諸陽之會上湊於頭故為頭痛

但補陰血則陽氣得行而頭痛自止宜芎歸湯 川芎 當歸各五錢俱不洗炒 連鬚葱頭五錢

生薑焙乾片 水煎食後服 又敗血停留子宮厥陰之位其脈上貫頭項作痛宜用黑

神散前見

產後汗出不止兼變症 產後去血過多營血不足衛氣夫守不能斂皮毛固腠理故汗洩而易出也宜急止之恐風寒乘虛而入必變生他疾宜用麻黃根湯 歸身洗酒 蜜瑩 麻黃根 台黨 炙草各錢 水二盞以浮小麥一合煎至一盞去麥入藥再煎至七分調牡蠣粉二錢服之又十全大補湯見前調 加防風煎服亦效 如眩暈汗出者此名胃汗虛極也急用炙者 台黨更人參 炙草錢各二 熟附子錢一 水煎攪開口灌之大抵此危症皆不可救 如汗不止風邪乘之忽然悶倒口眼喎斜手足彎曲如角弓反張者此危症也急用桂枝 葛根 白芍 甘草 炙者 歸身錢各二 熟附子分五 攪開口灌之此亦危症不治者多

產後發熱 產後血虛則陰虛陰虛生內熱其症心胸煩滿呼吸氣短頭痛悶亂將晚轉甚與大病後虛煩相似用 台黨 歸身 熟地 肉桂 酒芍各錢 麥冬錢一 水二盞先以粳米一合淡竹葉十瓣煎至一盞去米葉入藥並棗三枚煎七分溫服熱甚加炒乾薑一錢 產後大熱必用乾薑何也此非有餘之熱乃陰虛生內熱也故以補陰藥大劑服之且乾薑能入肺和肺氣入肝引血藥生血然不可獨用必與補陰藥同用此造化自然之妙惟天下至神可以語此

產後乍寒乍熱似瘧 敗血未盡陰陽不和皆能發寒熱也何以別之曰敗血為病則

小腹刺痛此為異耳故敗血未盡者以去滯為主陰陽不和者以補虛為主若作瘧治誤矣 敗血未盡乍寒乍熱者何也敗血留滯則經脈皆閉營衛不通閉於營則血甚而寒閉於衛則陽甚而熱營衛俱閉則寒熱交作營衛氣行則即解矣惟黑神散前見卷荷散為去滯氣血之要藥也 卷荷散 初出卷荷葉乾焙紅花 歸尾 蒲黃 丹皮 生地各一錢 生薑三片 童便一碗 水煎熱服 陰陽不和乍寒乍熱者何也產後氣血虧損陰陽俱虛陰虛則陽勝而熱陽虛則陰勝而寒陰陽俱虛則乍寒乍熱用增損八物湯 歸身 白芍各酒洗 乾薑炒焦 川芎 台黨各一錢 炙草五分 薑三片 棗三枚 水煎服寒多熱少者加肉桂一錢熱多寒少者加柴胡一錢乾薑減半煩渴者加知母麥冬各一錢 食少者加陳皮白朮各一錢 虛倦甚者加炙草一錢 似瘧真瘧何以別也似瘧寒不凜凜熱不蒸蒸發作無時亦不甚苦此正氣虛而無邪氣也真瘧者寒則湯火不能禦熱則冰水不能解發作有時煩苦困頓此正氣虛而邪氣相搏者也產後瘧疾 氣血俱虛營衛不固脾胃未復或外感風寒內傷飲食皆能成瘧又有胎前病瘧產後未愈者產後之瘧最難調理只以補虛扶正為主正氣勝則邪氣日衰不可輕用截藥重虛正氣為害甚大用增損柴胡四物湯 台黨 北柴胡 半夏 炙草 歸身酒洗 川芎 乾薑三分 棗三枚不拘時服 久瘧加鱉甲炙醋 炙耆各一錢

產後傷寒 氣血俱虛營衛不守起居失節調養不宜傷於風則衛受之傷於寒則榮

受之而成傷寒也 只以補虛為主餘症以末治之用五物湯 台黨 川芎 歸身

白芍炒酒 炙草等分薑片三 葱白三 水煎服 有汗曰傷風本方加桂枝防風 無汗

曰傷寒本方加麻黃蘇葉 寒熱往來本方加柴胡 頭痛本方加藁本細辛 徧

身痛本方加羌活蒼朮 但熱不惡寒加柴胡葛根 發熱而渴加知母麥冬淡竹

葉

產後腰痛 女人之腎胞脈所系產後下血過多則胞脈虛脈虛則腎氣虛腎主腰故

令腰疼其症隱隱作痛用補腎地黃湯 熟地 歸身 杜仲青鹽水炒去絲 獨活 肉桂

續斷錢各一 生薑三片棗二枚水煎空心服或照腰部腎虛腰痛各方治之 又敗血

流入腎經帶脈阻塞有腰疼者其症脹痛如刺時作時止手不可近用加味復元通

氣散 歸身 川芎 小茴炒 故紙炒 元胡索 牛膝 肉桂 丹皮錢各一 水煎

另用木香末乳香末沒藥末分各五 調勻空心服 有因產時起伏挫閃腎氣及帶脈

者亦或腰痛用上加味復元通氣散方治之

產後偏身疼痛 產時骨節開張血脈流散正氣衰弱則經絡肉分之間血多凝滯骨

節不利筋脈不和故腰背不能轉側手足不能屈伸而痛也勿用風寒發汗之劑宜

用趁痛散 當歸 肉桂 白朮 牛膝 黃耆 獨活 生薑錢各一 炙草 薤白

分各五 水煎熱服 又有因新產氣虛久坐多語運動用力遂致頭目昏眩四肢疼痛

寒熱如瘧自汗名曰蓐勞勿作傷寒誤投汗劑用白茯苓散 雲苓 歸身 川芎

肉桂 白芍酒炒 炙芪 黨參 熟地錢各一 獐猪腰子一對開剖者為獐猪 去油膜切片煎湯一

盞去腰加薑三片棗二枚同藥煎服 按蓐勞之症或因臨產之時生理不順憂恐

思慮內傷其神展轉闌閩外傷其形內外俱傷形神皆瘁或因新產之後氣血未復

飲食未充起居無度語言不止調攝失宜情欲失禁外感風寒內傷飲食漸成羸瘦

百病併作苟非良工妙劑未有不戩勞瘵而斃者必宜服十全大補湯又早用地黃

丸加 歸身 牛膝 肉蓯蓉酒炒 五味 柏子仁錢各二 日服人參白朮散作丸服

之常煮腰子粥以助之大效煮粥法取獐猪腰子一對去脂膜薄切如柳葉大用鹽

酒拌合一時水三盞粳米三合五罐煮粥入蔥花椒末調和得宜食之

產後身有冷處數塊日久不愈 此食黍粥過多所致用八珍湯去地黃加橘絡橘內白筋即是

入薑汁竹瀝各一鍾煎服十劑即愈

產後浮腫 新產之後敗血未盡乘虛流入經絡與氣相雜凝滯不行腐化為水故令

四肢浮腫乍寒乍熱勿作水氣治之輕用滲利之劑但服調經湯使氣血流行其腫



自消 調經湯 歸身炒酒 丹皮 肉桂 赤苓 甘草 陳皮錢各一 細辛 乾薑各炒

五分 薑片三 水煎服 又有產後虛弱腠理不密調理失宜外受風溼面目虛浮四肢腫

者用加味五皮湯 桑白皮 陳皮 茯苓皮 大腹皮 漢防己 枳殼炒 豬苓

炙草錢各一 薑片三 水煎服 若四肢浮腫而氣喘者用茯苓丸疾門最效

產後霍亂吐瀉 產後血去氣損脾胃亦虛風冷易乘飲食易傷少失調理即有霍亂

心腹絞痛手足逆冷吐瀉並作用加味理中湯 黨參 白朮 炙草 乾薑煨 陳

皮 藿香 厚樸 薑三片水煎時時溫服

產後泄瀉 產後中氣虛損寒邪易侵若失調理外傷風寒內傷生冷以致脾胃疼痛

泄瀉不止用上理中湯如泄不止者再加肉桂 豆蔻煨 共為末蜜丸米湯下

產後痢疾 溼多成泄暴注下迫皆屬於熱赤白痢者乃溼熱所為也故赤者屬熱自

小腸而來白者屬溼從大腸而來俗云赤為熱白為寒非也無積不成痢蓋由產母

平日不肯忌口傷於飲食停滯於中以至中氣虛損不能調理宿積發動而為痢也

亦有因子下之時多食雞蛋與雞致傷脾胃難以剋化停滯而成痢也務宜詳審斟

酌以施治法庶不誤人 如果新產之時飲食過傷者其症腹中脹痛裏急窘迫身

熱口渴六脈數實宜下之用加味小承氣湯 枳實炒 厚樸薑炒各 大黃酒炒二分 炙草錢一

檳榔半錢生薑片三水煎服以快便為度痢愈即止後用四君子湯加陳皮服之 如新

產後未有所傷其脈其症與上卻同者此宿食為病也宜消而去之用枳實湯 枳

實炒木香 炙草錢各一厚樸錢二檳榔半錢生薑片三水煎服快利為度後四君子湯

加陳皮服之 如無新舊食積下痢赤白腹痛窘迫脈沉數者此虛痢也宜行氣和

血為主用當歸芍藥湯 歸身 黨參 陳皮 白芍炒茯苓錢各一炙草 炮薑

木香各五分枳殼分炒七烏梅箇一水煎食前服 如久痢不止者此氣虛血少腸滑不禁

也用四君子湯加 白芍 烏梅 瞿麥 御米殼 又有產後惡露不下以致敗

血滲入大腸而利鮮血者腹中刺痛裏不急後不重是也 枳殼錢半芥穗錢半水

煎服神效 以上痢症如恐用藥錯誤用山查錢三以陳竈心土拌炒成炭去土將山

查研末加紅糖米湯調服其效如神或照痢疾門各方斟酌治之

產後上吐下痢 田螺一箇搗碎入麝香錢一吳萸分一為末掩在臍上即不嘔吐若嘔既

止速以當歸兩一白芍錢三甘草錢一枳殼 檳榔分各三煎服二劑再以四君子湯調理而

安如不見效即照痢疾門內噤口痢外治各方治之

產後大便不通 產後氣虛而不運血虛而不潤以致大便不通乃虛秘也不可誤用

下劑又加閉澀宜用潤燥湯 台黨 甘草分各五歸尾 生地 火麻子錢去殼枳殼

各一 桃泥即桃仁搗為泥三錢 檳榔五分 先將上六味煎好後入桃泥並檳榔汁服 又方 真

蘇子一合 火麻子三合 共搗爛以水一盞沖入又搗取汁用汁和米煮粥食之甚效

老人虛秘尤宜常用 又方 大麥芽研炒 每服三錢 滾開水調服或自調粥服自通

產後小便多及夜睡遺尿在牀 產後氣血虛脫小便故多而遺也宜用升陽調元湯

合桑螵蛸散 炙菝 炙草 益智子去殼炒 升麻錢一 薑棗引水煎調桑螵蛸散服

桑螵蛸散 真桑螵蛸 白龍骨煨 牡蠣左顧者各錢半 研細末每用三錢入湯調服

產後小便不通或短少 產後氣虛不能運化流通津液故使小便不通雖通而亦短

少也勿作淋秘輕用滲利之藥其氣益虛病亦甚宜加味四君子湯 黨參 白朮

雲苓 炙草 麥冬 車前子錢各一 肉桂五分 薑三片水煎食前服 又有惡露不

來敗血停滯小便不通其症小腹脹滿刺痛乍寒乍熱煩悶不安用加味五苓散

猪苓 白朮 澤瀉 茯苓 肉桂錢各一 桃仁尖去皮 紅花錢各二 水煎空心服

產後熱淋澀痛 此亦血去陰虛生內熱症也蓋腎為至陰主行水道去血過多真陰

虧損一水不足二火更甚故生內熱小便成淋而澀痛也用加味導赤散 生地

赤芍 木通皮去 甘草梢 麥冬 黃柏 知母 肉桂錢各一 燈心七寸 水煎調益元

散見內外備用諸方 二錢服

產後尿血 尿血而小腹痛乃敗血流入膀胱小腹不痛但尿時虛痛者乃內熱也並

用小薊湯 小薊根 生地 赤芍 木通 甘草梢 蒲黃 竹葉 錢各一 滑石 錢二

燈心 九寸 水煎服 敗血加歸尾 紅花 錢各一 兼內熱加黃芩 麥冬 錢各一

產後癰疽 產後氣血經絡俱虛若生癰疽最為險症宜大補扶助根本兼以活瘀生

新為要其餘以未治之藥宜純善和平最忌汗下峻劑重者惟降癰活命飲 見癰毒方 最

為神效輕者照癰毒門外治各方治之

回生丹論 何集庵曰回生丹保產之良方也數年前有修合施人者臨產服一丸坦

然快便不覺其功但聞製藥時必先齋戒虔心發願普濟然後擇一淨室如法遵行

同學馬禹架久在吳門製五百餘丸蒙以十丸見贈余歸即隨手與人癸丑冬月有

一難產者子死腹中余聞而急檢箝中尙有一丸送與服之死胎立下母命保全人

咸驚嘆余即發心即日修製廣施迄今丙辰業已四載其間產中艱難諸症無不立

效但此方不知始自何人編簡方書惟萬病回春有之記云長葛孫奎臺經驗較余

所傳之方尙有所缺治法湯引亦未講明余特為議述之列方於後 回生丹 專

治產後百病其效如神 錦紋大黃 一筋末 蘇木 三兩剉碎用河水五碗煎汁三碗服用 大黑豆 三升水浸取殼用絹袋盛

炒乾其汁服用 紅花 三兩炒黃色入好酒四碗煎三五滾去渣存汁服用 陳米醋 九筋 先將大黃末一筋入淨鍋下米醋三筋文

火熬之以長木篾不住手攪之成膏再加醋三觔熬之又加醋三觔次第加完然後下黑豆汁三碗再熬次下蘇木汁再熬又次下紅花汁熬成大黃膏取入瓦盆盛之鍋底蒸枯大黃亦煎下入後藥同煎 又用 熟地 台黨二兩 當歸二兩 川芎二兩 香附二兩 元胡索二兩 蒼朮二兩 朮二兩 蒲黃二兩 桃仁二兩 茯苓二兩 地榆二兩 羌活二兩 橘紅 白芍 山萸肉二兩 五靈脂二兩 黃三稜二兩 川牛膝二兩 馬鞭草二兩 炙甘草二兩 良薑 木香二兩 秋葵子 青皮二兩 炒 白朮二兩 木瓜二兩 乳香 沒藥二兩 益母草二兩 台烏藥二兩 以上各藥並前丸重二錢七八分淨室陰乾須二十餘日不可日曬不可火烘乾後只重二錢有零用蠟包好所謂蠟丸也用時去蠟殼調服其湯又各有所宜開列於後 一子死腹中因產母染熱病所致用車前子一錢煎湯調服一丸或二丸若服至三丸無不下者若因血下太早以致子死用台黨三錢或用人參二錢更好 車前子一錢 煎湯服或用陳酒少許和車前煎湯亦可 一胎衣不下用炒鹽少許泡湯調服一丸或二三丸立下 一產畢血暈用薄荷湯調服一丸即醒 以上乃臨產緊要關頭一時即有名醫措手不及起死回生此丹必須預備按此丹原本有臨產服之易生一條據名醫云胎前斷不可用臨產更忌服此故刪 一產後三日血氣未定還走五臟奔充於肝血暈起止

不得眠見黑花以滾水調服此丹卽愈 一產後七日氣血未定因食物與血結聚胸中口乾心悶煩渴以滾開水服此丹卽愈 一產後虛弱血入於心肺熱入於脾胃寒熱似瘧實非瘧也以滾水服此丹卽愈 一產後敗血走注五臟轉滿四肢停留化爲浮腫漸而四肢覺寒乃血腫非虛腫也服此丹愈 一產後敗血熱極中心煩燥言語癩狂如見鬼神非風邪也以滾水服此丹卽愈 一產後敗血流入心孔閉塞失音不語用甘菊花三分桔梗三分煎湯調服 一產後未滿月誤食酸寒堅硬之物與物相搏流入大腸不得化泄痢膿血用山查煎湯調服亦可 一生產時百節開張血入經絡停留日久虛脹酸痛非溼症也用蘇梗三分煎湯調服此丹卽愈 一產後月中飲食不得應時兼致怒氣餘血流入小腸閉塞水道小便澀結溺血如雞肝者用木通四分煎湯調服此丹又或流入大腸閉卻肛門大便澀結有瘀成塊如雞肝者用廣皮三分煎湯調服此丹 一產後惡露未盡飲食寒熱不得調和以致崩漏形如肝色潮熱往來臂膊拘急用白朮三分廣皮二分煎湯調服此丹 一產後敗血入五臟六腑並走肌膚四肢面黃口乾鼻中流血徧身斑點危症也陳酒化服此丹可愈 一產後小便澀大便閉乍寒乍熱如醉如癡滾水調服此丹以上各條皆產後敗血爲害也此丹最有奇功至產後一切異症醫所不語人所

未經但服此丹無不立安一丸未應二丸三丸必效無疑凡經水不通行經腹痛及室女經閉等症俱效

婦人科雜治 此內立方無多仍照委看各門治法乃備

血風頭痛 方見頭部

烏髮長髮 與上同

乳癰乳巖 方見乳部

婦女性妬 取本婦月經布包蝦蟆一隻離茅廁前一尺遠埋之即不妬也

陰外生瘡 黃柏炒 兒茶 白微炒 蚯蚓糞炒 鉛粉炒 乳香炒去油 樟腦以上香三錢 冰片二分

香一分 輕粉五分 調勻以藥末摻上雖日久不愈者五日全愈神效之至或照以後各方

治之銀青散 見雜症詳方 更妙

陰戶生瘡或癢或痛或腫 地骨皮 蛇牀子煎水常洗甚效 又方 當歸五錢 梔子

牛錢 白芍 茯苓各二錢五分 柴胡六分 棟樹根三分 水煎服極效此方之妙皆是平肝去溼之品

無論有火無火有風有溼俱奏奇效正不必問其若何癢若何痛若何腫若何爛此

暗治之必宜知者也有痰加白芥子錢一 有火加黃芩錢一 有寒加肉桂六分 又方 防

風 蒼朮 膽草 柴胡各二錢 木通 黃柏 知母 連翹 赤苓各錢半 芥穗 獨

驗方新編 卷四 婦科雜治門

二六五

活赤芍錢各一黃連分八甘草分三水煎服其效如神 又方 蘆薈 黃柏 苦參

蛇牀子 荆芥 防風 花椒 明礬錢各三煎水薰洗數次神效 又方 吳茱萸

苦參 蛇牀子兩各一用水煎濃薰洗一日數次再用生豬肝一片用針刺多孔雞或

可肝亦納入陰戶中引蟲出盡即愈

陰戶生瘡生蟲身發寒熱狀似傷寒又似癩病 此蟲食臟腑也宜用逍遙散煎湯見內

外備用吞服蘆薈丸外用白菓搗融塞陰戶殺蟲止癢 又方 蝦蟆散見雜毒兔糞各

等分爲末敷之陰中生蟲內爛盡者皆效此葛仙翁方也如若不愈查射工溪毒湯

見入毒蛇 蟲咬傷門 各方治之

陰戶突出一物如蛇如菌或如雞冠後陰毒方 亦可治 此名陰挺 蛇牀子錢五眞烏梅九煎水

薰洗又以猪油調藜蘆末敷之內服逍遙散自消以下陰疝各方亦可治 又方

白菓嚼融敷之極效 又方 水仙花兜交紅糖搗極融爛敷之神效無比 又方

芝麻嚼爛敷之大效 又方 大蒜煎湯洗之以愈爲度 又方 鯽魚生煎煉

油搽之極效或用鯽魚膽搽之亦效 又方 眞五加皮泡酒服不飲酒者煎汁日

服數次仍用汁日洗數次極效 又方 槐白皮炒煎水日洗數次極效 又方

白鱧鱧一名魚淡煮飽食並用白鱧肉納入陰戶日換數次極效又方硫磺研末麻油調



搽陰戶生瘡最效

陰戶生物如茄冰片末一錢置生蚌殼內待涎出用鷄翎蘸敷神效 鏡堂驗方

此名陰茄亦陰挺也茄樹根燒灰爲末香油搽

內服逍遙散見內外備用諸方

即愈 又方 烏頭研燒枯末加醋煎熱薰洗 又方 鱧魚一條

火燒存性用油搽茄數次重則灸百會一壯輕則不灸後服補中益氣湯見內外備用諸方 二

三劑愈

陰中生核腫大不消 此亦陰挺類也用蚌蛤肉塞陰戶中換數次早服補中益氣湯

見內外備用諸方 晚服龍膽瀉肝湯見同上 連服數日自消消後再用四物湯見同上 加柴胡 山

梔 龍膽草調理而安

吊陰痛不可忍 此症兩條筋從陰吊起至乳上疼痛身上發熱宜用川棟湯 川棟

子 猪苓 檳榔 澤瀉各八分 麻黃六分春天只用三分 木香三分 小茴 白朮 烏藥 乳香

元胡 大茴錢各一 薑三片葱一根水煎對火服發汗二劑即愈

陰戶翻出仰臥不能轉動 此真陰不足或慾事過多所致名曰翻花疼痛異常用

大鯨一箇重二觔者破去腸雜連頭整箇水煮極爛將汁碗盛用舊綢蘸汁滴患處

使其滲入其骨連頭頸煨灰研末夜間拭淨搽之其肉作羹令病者食之三日即愈

老年脫肛諸藥不能治者用此方亦神效

陰戶吹響 名曰陰吹乃陰戶放空如撒尿之聲也金匱云乃胃氣下泄陰吹而正噎

此穀氣之實也 猪板油八兩亂髮雞子大三箇以肥皂水洗淨同熬髮鎔分兩次服病從小便出此治

陽明少陰之方也並治男子女癆黃疸

陰戶寒冷 方見種子門

陰戶疼痛 此受寒也食鹽炒熱青布包裹熨之效 又方葱頭加乳香搗融敷之極

效

陰毛生入脚虱 白菓搗融搽之極效

裹小脚法 皮硝 鳳仙花子即指甲花子又名急性子以家中取者為真石榴皮錢各五茵陳錢四煎水洗不可用手洗脚自

柔軟易裹 又方 鳳仙花連根一併搗爛煎湯常常洗之脚亦柔軟不受痛苦屢

試甚效 又方 杏仁錢一桑白皮錢四水五碗新砂罐煎至三碗加入 皮硝錢五乳香

錢一用紙封口煎化將脚先薰後洗三日一次十餘次後軟而易裹

脚生雞眼 方見足部

難產神驗良方

大熟地一兩 甘枸杞子一兩 白歸身三錢 潞黨參一兩 蜜炙黃耆一兩

白茯神三錢 川芎藭一兩 酒炒白芍三錢 炙甘草一錢 醋炙龜板三錢

如交骨不開  
可加至一兩  
右藥十味秤足分兩不可增減產久不下連服此方四五劑卽下如神但用  
頭汁不用次汁必須濃煎滿飲少則未效如產已下此方斷不可服 凡鄉居遠市  
者須於臨月時預買四五劑留家備用 產本無難瓜熟蒂落達生編詳言之矣然  
而有難產者何哉蓋氣以成質血以成形夫人而知之矣產婦自受胎而後氣以運  
胎血以養胎十月滿足然後臨盆到這時候產婦氣血亦云竭矣每見難產之家張  
皇失措動以破血散氣諸劑速之使下不知氣愈散則產愈難間有用藏香等物竄  
觸使下不知香能散氣亦能提氣氣愈提則產愈難甚至聽信穩婆手探刀割母子  
性命存亡頃刻此種惡習尤爲可慘此方專補氣血氣足則易於送胎出門血足則  
易於滑胎落地此理甚明人所易曉第恐難產之家或淆於旁人之議論或拘於產  
婦之體質或嫌製方之平常或嫌藥味之太重故置論辨數則於後 一或問產婦  
氣質不同虛者固宜峻補實者此方亦可服乎答曰可婦人臨產如臨敵醫生用藥  
如用兵譬如萬夫不當之將到對壘時不無氣喘神危得一勇士拔刀相助自然全  
勝婦人臨產時骨開肉裂血破氣下平時雖屬有餘臨時斷無不虛服此方是助一  
臂之力也 一或問臨產受感冒此方亦可服乎答曰可感冒者風邪也治之不外  
汗吐下三法臨產斂息屏氣上部毛竅齊開卽有感冒邪從外解矣下部交骨已開

胞水迸流卽有感冒邪從下解矣服此方是以正辟邪也 一或問臨產服人參不較此方更妙乎答曰人參之力緩此方之力速人參之力如和風甘雨此方如烈風暴雨譬如大旱必須大雨譬如凍餓待斃之人給之以錢何如給之以衣食爲速活乎無論近時人參絕少佳者卽有好參亦不敵此方之妙假如富家有力量用參照方去黨參用人參二錢另煎和汁未爲不可若獨用參湯斷不濟事 一或問產痛與試痛異乎答曰異產痛者兒身已轉交骨已開胞水已破腹痛而腰如墜也試痛者兒身內轉交骨未開胞水未破腹痛而腰不墜也此方無論試痛產痛俱可服余媳於癸卯年分晚三日不下幾至殞命舉家驚慌蒙友人以此方見贈連服七劑并立願刊施一千張安臥片時覺精神稍健次日突然而產則此方之神驗更可知矣產已下此方斷不可服急用生化湯二劑以去惡露爲要附方於後

生化湯

治產後兒枕骨痛及惡露不行腹痛等症

當歸六錢 川芎五分 炒乾薑五分 桃仁泥四錢 炙甘草五分 右藥五味水一鍾黃酒一鍾煎至一鍾熱服對入童便一鍾更妙若惡露已行腹痛已止去桃仁再服數劑 居家以勿藥爲喜然而有不得不服藥者婦女爲居家必有之人產

育爲居家必有之事萬一不慎生死係之予得難產第一良方歷數年來獲效如神百不失一誠神道資生之橐籥也 古越姚文田秋農氏識 醫者意也意明理達然後可以言醫右難產良方簡而不繁正而不譎予試驗久矣歲戊子旅居京邸秋農姚君繕讐成帙喜其辨論詳明瞭如指掌願同志者輒轉傳布雖小道亦足以不朽云 吳興李宗昉芝齡氏跋 余於京邸得此方屢試屢驗親友家有難產者勸服此方無不立效洵催生良藥也爰重刊之以廣其傳戊午中秋後五日姚江邵燦又村氏識於淮安節署

### 胞衣不下妙方

胞衣不下由於氣虛一切方藥恐倉卒間未必應用卽用之亦未必速效若用頭髮探喉恐一嘔之後其氣更虛倘再不下危矣余得妙方於錢唐高太史處屢試屢驗百不失一其方用高麗參三錢於臨產日預煎備用俟兒已產卽令服下其效如神切莫聽庸醫之言謂已產不宜服參致令誤事此亦生死關頭不可不慎故附及之又村氏又識 辛酉季冬又村邵先生由滬北上寓余處敘論岐黃一道視以保產良方然是方用藥發明異常卽授此方迨以試之余妾前產艱險驚惶百方救護

仍落死胎今歲季夏臨盆之際將此方連服三劑平安無恙得一子且產後產婦甚為健旺余深信此方之神驗勝於大生要旨其效十倍爰付剞劂以保婦人之難產焉

同治元年季夏月 浙慈馮祖恩澤夫氏識於滬上旅舍

### 臨產急救補遺

婦人免乳大故十死一生變起倉卒於何求醫輯方備檢至為便易本編產子門頗有所未盡適仲兄瑾卿藏有傳徵君名山字青圭有醫仙之目尤精婦科婦科摘要祕本嚴命哀輯免身變症數方聊補遺漏亦未能詳盡也士珩謹誌

正產腸下凡方內用人參者以別枝季代之或台黨亦可產婦腸下乃氣虛下陷而不能收也但補其氣氣旺而腸

自收矣方用補氣升腸飲 人參一兩生黃芪一兩當歸酒洗一兩白朮五錢川芎酒炒三錢升

麻一分○升麻之為用少則氣升多則血升水煎服一劑而腸升矣 又方 葶麻仁九粒搗塗頂心以提之

腸升即刻洗去時久則恐吐血又凡子未下腸先下者名盤腸生勿遽服前方急取一淨盆用開水將盆洗熱置腸盆內靜待勿懼子下後腸即徐徐收回若時久盆與腸俱冷不能速收急用開水一盆待溫以入得手為度將溫水傾於置腸盆內腸熱

氣充即可收起矣若子先下者宜急服前方少遲恐氣脫不救

產後肉線出 產後水道中出肉線一條長二三尺動之則疼痛欲絕乃帶脈之虛脫也帶脈束於任督之間任脈前而督脈後二脈有力則帶脈堅牢無力則帶脈崩墜產後去血過多無血以養任督而帶脈崩墜力難升舉故隨溺而下也帶脈下垂每痛於腰臍之間況下墜者而出於產門之外其失於關鍵更甚方用兩收湯 人參兩一 白朮土炒二兩 川芎酒洗三錢 熟地二兩 山藥炒二兩 山黃四錢 芡實炒五錢 扁豆炒五錢 巴戟三錢 澤水 杜仲炒五錢 白果搗碎十粒 水煎服一劑而收半二劑而全收矣此方腎虛腰痛遺尿皆可治甚勿輕易

產後肝癢 產後陰戶中垂下一物其形如帕或有角或二歧人以爲產顏也孰知是肝癢之故乎皆因產前勞役過傷又觸動怪怒以致肝不藏血血亡太多故肝之脂膜隨血崩墜其形似子宮而非子宮蓋子宮之下墜狀如茄子只到產門而不能越出產門之外惟肝之脂膜往往出產門外至六七寸許且有黏席乾落一片如手掌大者如是子宮墜落人立死矣治法宜大補其氣血而少加升提之品方用收膜湯 生黃芪兩一 人參錢五 白朮土炒五錢 白芍炒五錢 土當歸酒洗三錢 升麻錢一 水煎服一劑即收

152 子死產門難產 生產三四日兒已到產門交骨不開兒不得下子死而母未亡者服

開骨之藥不驗子在產門亦有死亡之虞宜用推送之法補血以生水補氣以生血則死子可出而母命可存若徒用降子之劑以墜之則死子未必下而母氣先脫矣  
當用救母丹活人頗多方用 人參兩一當歸酒二兩川芎兩一益母草兩一赤石脂錢一芥穗三錢炒黑水煎服一劑而死子下矣此方用芎歸以補血人參以補氣氣旺血旺則上能升而下能降氣能推而血能送況益母又善下死胎石脂能下瘀血自然一湧而出矣

子死腹中難產 有生產六七日胞衣已破而子不見下疑為難產不知子已死腹中矣夫兒死於產門之邊易辨而死於腹中難識蓋兒已到產門未死者頭必能伸能縮已死者必然不動即以手推之亦必不動如果實係未死用手少拔其兒之髮兒必退入故曰易辨若兒死在腹中何從而知之然亦有辨而知之者凡子死腹中而母可救者產母之面必無煤黑之氣子死腹中而母難救產母之面必有煙熏之氣以此辨死生斷斷不爽既知兒死腹中不能用藥以降之危道也若用霸道以洩之亦危道也蓋生產至六七日氣必甚困乏荷用霸道以強逐其死子恐死子下而母亦亡矣必須仍補其母使母之氣血旺而死子自下也方用療兒散 人參兩一當歸兩一川牛膝錢五鬼白三錢乳香二錢水煎服一劑死子下而母生矣凡兒之生必先



轉其頭原因其母氣血之虛以致兒不能轉頭以向下世人用催生之藥以耗兒之氣血則兒之氣不能通達反致閉悶而死於腹中此實庸醫殺之也大凡難產之症斷斷不可用催生之藥只宜補氣補血以壯其母而全活嬰兒之命正無窮矣此方救死兒之母仍大補氣血所以救其本然救本即所以催生也

胞衣不下 兒已下地胞衣尚留滯於腹中二三日不下心煩意燥時欲昏暈人疑胞

帶未斷豈曉血少乾枯黏連於腹中耶但胞衣不下瘀血難行恐成血暈治法仍宜

大補其氣血則胞衣自然活潤易下方用送胞湯 當歸酒洗兩錢川芎錢五益母草兩一乳

香一兩不芥穗炒三錢麝香五釐研沒藥一兩不水煎服立下 又有子下地五六日而胞衣

留於腹中百計不下而又絕無昏暈煩燥之狀又非瘀血之黏連乃是氣虛不能推

送之故夫瘀血在腹必然作祟或至發暈今安然無恙是血已淨矣血淨宜清氣升

而濁氣降今胞衣不下是清氣下降而難升遂至濁氣上浮而難降惟濁氣上升又

必有煩燥之病今亦安然者是清濁之氣兩不能升也然則補其氣不慮濁氣之上

升乎不知清升而濁降者一定之理未有清升而濁亦升者也苟能於清清之中仍

分其清濁之氣則升清正所以降濁也方用補中益氣湯 人參錢三生黃芪兩一柴葫

分三炙草分一當歸錢五白朮五分升麻分三陳皮分二萊菔子分五水煎服一劑極效

驗方新編 卷四 臨產急救補遺

正產氣虛血暈 產後忽然眼目昏花嘔惡欲吐或神魂外越正由氣欲脫非惡血沖心也蓋新產血虧心中之血前已蔭胎胎下而心中之血隨胎而墮心無血養所賴者幾微之氣以固之耳今氣又虛而欲脫心君無護所剩殘血欲奔回救主而血非正血不能歸經血暈宜矣治法必須大補氣血斷不可單治血暈或疑血暈是熱血上沖而更補其血不愈助其上沖之勢乎不知新血不生舊血不散補血以生新血正活血以逐舊血也方用補氣解暈湯 人參兩一生黃芪兩一當歸兩一黑芥穗錢三薑炭錢一水煎服一劑而暈止二劑而心定三劑而血生四劑而血旺再不暈矣

正產血量不語 子方下地而昏暈不語此氣血兩脫本在不救然救之得法有得生者山曾得祕訣何敢隱而不宣乎當斯之時急用銀針刺其眉心心得血出則語矣然後以人參一兩煎湯灌之無不生者或用黃芪二兩當歸一兩名當歸補血湯煎湯一碗灌之亦得生惟不可於二方之中輕加附子蓋附子無經不達反引氣血之藥走而不守不得專注於胞胎不若人參歸芪直救其氣血之絕聚而不散也蓋產婦血暈全是血室空虛無以養心以致昏暈舌爲心苗心既無主舌又安能出聲耶眉心之血上通於腦下通於舌而其系則連於心刺其眉心則腦與舌俱通心之清氣上升瘀血自然下降然後以補氣生血之品進則氣與血接續又何至於死亡乎雖單用參芪

當歸亦有能生者然終不若先刺眉心之妙世人但知灸眉心之法不知刺勝於灸蓋灸緩而刺急緩則難於救絕急則易於回生也

正產敗血攻心暈狂 產後二三日發熱惡露不行敗血攻心狂言呼叫甚至發狂奔走或以邪熱在胃所致不知乃血虛心不得養也夫產後之血盡隨胞胎外越血室空虛臟腑皆無血養只有心中之血尙存幾微以護心君而臟腑失其所養皆欲取給於心心包爲心君之宰相攔絕各臟腑之氣不許入心始得心神安靜是護心者全藉心包之力也使心包亦虛不能障心則各臟腑之氣遂直入於心以分取乎心血心包既不能內顧其君又不能外禦乎衆於是大聲疾呼號鳴勤王而其迹象反近狂悖故病狀似熱而實非熱也治法須大補心中之血使各臟腑分取以自養不得再擾乎心君則心君泰然而心包亦安矣方用安心湯 當歸一兩 川芎一兩 生地錢五 丹皮錢五 生蒲黃錢二 乾荷葉片一 水煎服一劑而狂定此方用芎歸以養血何以又用生地丹皮之涼血似非產後所宜不知惡露奔心亦因虛熱相犯於補中涼之雖涼不害也

此方只可暫用以定狂不可久服以取告單藥狂定後宜服加味生化湯當歸酒洗一兩二錢川芎三錢桃仁錢半研荆藎炒炭一錢丹皮錢半服三四劑最妙

產後四肢浮腫 產後四肢浮腫寒熱往來氣喘咳嗽胸膈不利口吐酸水兩脅疼痛

人皆曰敗血流於經絡滲於四肢以致氣逆也誰知是肝腎兩虛陰不得出之陽乎

夫氣血大虧自然腎水不足腎火沸騰水不足則不能養肝而肝木大燥木中乏津木燥火發腎火有黨子母<sub>肝腎</sub>兩焚火焰直冲而上尅肺金金受火刑力難制肝而咳嗽喘滿之病生焉肝火既旺而下剋脾土土受木刑力難制水而四肢浮腫之病出焉然而肝木之火旺乃假象而非真旺也假旺之氣若盛而實不足故時而熱時而寒往來無定乃隨之盛衰以爲寒熱而寒非真寒熱亦非真熱是以氣逆於胸膈之間而不舒耳兩脅者肝之部位也酸者肝之氣味也吐酸脅之疼痛皆肝虛而腎不能榮之象也治法宜補血以養肝補精以生血精血足而氣自順寒嗽浮腫之病悉退矣方用轉氣湯 人參<sub>三錢</sub> 茯苓<sub>三錢</sub> 白朮<sub>三錢</sub> 當歸<sub>五錢</sub> 白芍<sub>五錢</sub> 熟地<sub>三錢</sub> 山黃<sub>三錢</sub> 山藥<sub>五錢</sub> 芡實<sub>三錢</sub> 故紙<sub>二錢</sub> 柴胡<sub>五分</sub> 此方甚妙不可加減白芍宜炒炭用

治久慣小產神效膏

觀陽孫仲山

當歸<sub>兩一</sub> 生地<sub>兩八</sub> 白朮<sub>錢六</sub> 甘草<sub>錢三</sub> 續斷<sub>錢六</sub> 條芩<sub>酒炒一兩</sub> 白芍<sub>酒炒一兩</sub>

芍<sub>五錢</sub> 黃耆<sub>錢五</sub> 肉蓯蓉<sub>錢五</sub> 益母草<sub>兩一</sub> 右藥用麻油二斤浸七日熬成膏加白蠟一兩

再熬三四滾加淨黃丹四兩五錢再熬再加飛過龍骨一兩攪勻用時以緞攤碗口

大貼丹田上十四日一換貼過八箇月爲妙保胎萬全

新增

校正  
增廣 驗方新編卷五

善化鮑相璈雲韶編輯

合肥張紹棠又堂增訂

小兒科雜治

初生去毒開口法 小兒初離母體口有液毒形如血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門他日發爲驚熱瘡疾惡痘等症須於未啼時急用絲棉裹指挖去口內濁穢以清臟腑 又方 新產小兒飲食未開胃氣未動是混一清虛之府以甘草細切少許將潔淨細絹包裹用滾開水泡浸蓋內不宜太甜乃用軟帛裹指蘸汁徧拭口中去其穢濁隨用胡桃肉一名桃核去皮研極爛以稀絹或薄紗包如小棗納兒口中任其吮汁吮盡方可食乳非獨和中且能養臟最佳法也 又方 熟軍 枳壳 歸尾 生甘草各五分 紅花三分 桃仁三分 此藥須早預備兒初生時卽以水一茶鍾煎至半鍾以新棉花一塊放藥水內泡透取出裹指上納兒口中吮之再泡再吮不吮則已過片時小兒解下黑糞再與吮之以糞色不黑爲止此藥必於下地六箇時辰內服之服後方可食乳此方最能去毒免疾有益無損 又方 凡小兒落地時燒橄欖核一枚存性研末硃砂和勻嚼生芝蔴一口津吐和藥絹包如棗核大安兒口中待

嘔一時頃方可與乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾出痘亦稀少也 又方 淡豆  
豉 甘草錢各三 濃煎汁屢屢與食以一酒盃爲度其毒自下又能助養脾氣且免驚  
風 又方 若母體氣素寒小兒清弱者及產時收生遲慢致受風寒者兒必面色  
晁白唇色淡紅只以淡薑湯服之最能去胃寒通神明並可免吐瀉之患此法最妙  
人所未知服後仍照各前方治之

保嬰各法 凡天寒孩兒生下不哭或已哭不響宜急用衣物包裹再用香油紙撚將  
臍帶艾火灸斷使煖氣入腹漸漸作聲而活倘或剪斷臍帶氣絕死矣 有悶臍生  
者見糞門有一膜閉住其氣故不能出聲當以手微拍之則膜破而能哭如拍之不  
破須用女人之輕巧者以銀簪輕輕挑破或不能挑者急用煖衣緊抱勿令散放用  
藥水浸其胞衣天寒則加火熱之久則熱氣內鼓其膜自破出聲而甦 兒生三日  
有於髮際中間灸者乃灸其風路也然此法因西北地土多寒故宜若東南地土多  
溫斷不宜灸 兒生次日卽看口中上脛有白泡點子卽以銀針輕輕刮破將泡內  
白米取出勿令落入喉中仍以陳墨擦之如次日不取則泡堅難破誤事又有馬牙  
在牙齦上白點如碎米亦須急急挑出以墨擦之間日再看再生再挑 兒生三日  
相傳洗三若受風寒臍風由此起雖夏日亦宜避風冬日尤慎之又慎況初生亦

宜戒浴欲其勿受外邪也 兒生下時欲斷臍帶必以蕪艾一小丸用香油浸溼薰燒至焦方斷其束臍須用軟棉帕裹束勿令兒尿溼臍此預防風疔第一要法 小兒臍帶落下卽用淨板刷洗將臍帶取置新瓦上用炭火四圍燒至煙將盡取出安置新瓦上用碗蓋之存性研爲細末將透明硃砂研末水飛過加臍帶灰四分用硃砂二分和勻蜜糖拌塗乳婦乳頭上令兒吮食使穢氣胎毒卽從大便遺下箇箇保全此延生妙法臍帶內有蟲當去之 小兒初生兩乳必有核子以散爲度否則腫硬成毒啼哭不已如初生洗浴時卽將兩乳揉去乳汁其核自消 小兒初生每日用茶加鹽少許蘸拭其口二三次此法至穩至妙世多忽之不知兒之胎毒從黏涎中抹去可免疳腮馬牙驚口重舌木舌等症至簡至易之良方也倘兒面脣色淡以淡薑湯代茶鹽湯可也 月內小兒不可聞啼卽抱一啼便乳須常令啼哭則胎中所受熱毒從此而散胎中驚氣從此而解期月之間無重舌木舌口噤胎風胎熱之病 小兒同母睡時切忌鼻風口氣吹兒顙門恐成風疾 初生小兒形骸雖具筋骨甚柔氣質未實猶木之柔條軟梗可使或曲或直或俯或仰也故百日之內不可豎抱豎抱則易於悲驚且必頭傾項輓有天柱倒側之虞半歲前不可獨坐獨坐則風邪入背脊骨受傷有龜背偃僂之疾慎之 兒生兩月後若遇晴和天氣令乳母

抱兒時見風日則血氣剛強肌肉緻密可耐風露若厚衣煖被藏於重幃密室則筋骨輕脆不任風寒多易致病所以貧兒堅勁無疾富兒柔脆多災譬諸草木方生以物蓋緊密不令兒風日雨露則萎黃柔弱矣 小兒衣裳須七八十歲老人舊衣改作冷小兒多壽雖富貴之家切不可新製綾羅縫裳凡受客宴賀尤戒殺生 小兒四五箇月內只與吃乳六箇月後方可哺稀粥週歲以前不可吃葷腥油膩生冷兩三歲後纔與葷腥切忌食肉太早食後不可與乳乳後不可與食凡哭笑之後莫卽與乳 洗浴當護兒背風寒皆自背心入防成癩風故兒忌多浴洗浴又須掩好肚臍勿令潮溼恐生撮口臍風偷臍中有溼將大紅呢燒灰摻上紮好 小兒無病切忌服藥免致舛錯誤事 小兒衣服自初生至十歲不可夜露易惹邪祟又有鳥名天地如一名隱飛鳥最喜陰雨夜過落羽人家庭簷置兒衣中令兒成癩病如衣經夜露可卽用醋薰之 剃頭須就暖處剃後用薄荷分三杏仁去皮尖搗爛入生麻油三四滴和勻拌頭上擦之可避風邪剃頭宜丑寅日吉丁未日凶 小兒四五歲只會叫人不能言語以眞赤小豆直藥物備要研末酒調塗於舌下二三次卽能說話

岐真人兒科秘法

山根之上有青筋直現者乃肝熱也柴胡 半夏各分三 白芍 茯苓

苓各錢一

當歸

白朮各分五

山查肉粒三

甘草分一

水煎服

山根上有青筋橫現者亦肝



熱也但直者風上行橫者風下行用前方多加柴胡分二加麥芽分一乾薑分一有紅筋直  
 現者乃心熱也亦用前方加黃連分一麥冬分五桑白皮分三天花粉分二去半夏不用 有  
 紅筋斜現者亦心熱也用前方加黃連分二去半夏不用蓋熱極於胞中也或加桑白  
 皮 花粉 黃筋現於山根或皮色黃者不論橫直總皆脾胃之症或水瀉或上吐  
 或下瀉或腹痛或不思飲食今定一方皆可服之無不神效 白朮 茯苓各五分陳  
 皮 黨參 麥芽各二分神麴 甘草各一分水一鍾煎半酒盞分二次服用痰加半夏  
 分一或白芥子分三或花粉分三有熱若口渴者加麥冬分三黃芩分一有寒加乾薑分一如吐者  
 加白豆蔻粒一瀉者加豬苓分五腹痛如小兒自家捧腹是須用手按之大叫呼痛者乃  
 食積也加大黃分三枳實分一如按之不痛不呼號者乃寒也再加乾薑分三如身發熱者  
 此方不可用

夏禹鑄審小兒顏色苗竅法 內有五臟心肝脾肺腎也五臟不可望惟望五臟之苗  
 與竅 舌乃心之苗紅紫心熱也腫黑心火極也淡白虛也 鼻準與牙牀乃脾之  
 竅鼻紅燥脾熱也慘黃脾敗也牙牀紅腫熱也破爛胃火也唇乃脾之竅紅紫熱也  
 淡白虛也黑者脾將絕也口右扯肝風也左扯脾之痰也 鼻孔肺之竅乾燥熱也  
 流清涕寒也 耳與齒乃腎之竅耳鳴氣不和也耳流膿腎熱也齒如黃豆腎氣絕

也 目乃肝之竅直視而睛轉者風也直視而睛不轉者肝氣將絕也以目分言之  
又屬五臟之竅黑珠屬肝純見黃色凶證也白珠屬肺色青肝風傷肺也淡黃色脾  
有積滯也老黃色乃肺受溼也瞳人屬腎無光彩又兼髮黃腎氣虛也 目外角屬  
大腸破爛肺有風也 目內角屬小腸破爛有心熱也 上胞屬脾腫則脾傷也下  
胞屬胃青色胃有風也睡而露睛者脾有熱也 小便短黃澀痛心熱也清長而利  
心虛也 唇紅而吐胃熱也唇慘白而吐胃虛也唇色平常而吐作傷胃論 大腸  
閉結肺有火也肺無熱而便秘血枯也不可攻下脫肛肺虛也 口苦膽火也 聞  
聲作驚肝虛也 又面有五色面紅病在心有熱 面青病在肝多腹痛 面黃病  
在脾脾傷 面白病在肺中寒 面黑病在腎黑而無潤色腎氣敗也望其色若異  
於平日而苗竅之色與面色不相符則臟腑虛實無有不驗者矣

兒科外治法 疎表法 小兒發熱不拘風寒飲食時行痘疹以葱一握搗爛取汁少  
加麻油在內和勻指蘸葱油摩運兒之心口頭項背脊諸處每處摩擦十數下運完  
以厚衣裹之蒙其頭略疎微汗但不可令其大汗此法最能疎通腠理宣行經絡使  
邪氣外出不致久羈營衛而又不傷正氣誠良法也 清裏法 小兒發熱二三日  
邪已入裏或乳食停滯內成鬱熱其候五心煩熱睡臥不安口渴多啼胸滿氣急面

赤脣焦大小便祕此爲內熱以雞蛋一枚去黃取清以碗盛之入麻油約與蛋清等再加雄黃細末錢攪勻復以婦女頭髮一團蘸染蛋清於小兒胃口拍之寒天以火烘暖不可冷用自胸中推至臍口只須推半時之久仍以頭髮敷於胃口以布紮之一炷香久取下一切諸熱皆能退去蓋蛋清能滋陰退熱麻油雄黃又能拔毒涼肌故也此身有熱者用之偷身無熱惟啼哭焦煩神志不安者不用蛋清專以麻油雄黃亂髮推之仍敷胃口即時安臥屢試屢驗 解煩法 凡小兒實熱之症及麻症毒甚熱甚者其候面赤口渴五心煩熱啼哭焦擾身熱如火上氣喘急揚手擲足一時藥不能及用水粉一兩以雞蛋清調勻略稀塗兒胃口及兩手心復以釀酒小麪十數枚研爛熱酒和作二餅貼兩足心用布紮之少頃其熱散於四肢心內清涼不復啼擾或用雞蛋清調菘豆粉貼足心亦佳 開閉法 凡小兒風痰閉塞昏沈不醒藥不能入甚至用艾火灸之亦不知痛者蓋因痰塞其脾之大絡截其陰陽升散之鑿道也原非死症用生菖蒲生艾葉生薑葱各一握共搗如泥以麻油好醋同煎四味炒熱布包之從頭頂背胸四肢乘熱往下熨之其痰亦豁然而醒此方不特治小兒凡閉症皆效 引痰法 凡小兒痰嗽上氣喘急有升無降喉中牽鋸之聲須引而下行用生礬一兩研末少入麵粉米粉亦可蓋生礬見醋卽化成水入麵粉取其膠黏

故也好醋和作二小餅貼兩足心布包之一宿其痰自下 通脈法 凡小兒忽爾手足厥冷此由表邪閉其經絡或風痰阻其榮衛又或大病後陽不布和散於四肢速用生薑煨熱搗汁半小盃略入麻油調勻以指蘸薑油塗兒手足往下搓挪以通其經絡俟熱回以指拭去 煖痰法 凡小兒胸有寒痰不時昏絕醒則吐出如菘豆粉濃厚而帶青色此寒極之痰前法皆不能化惟有生附子一枚生薑兩同搗極爛炒熱一包熨背心及胸前熨完將薑附捻成一餅貼於胃口良久其痰自下 納氣法 凡小兒虛脫大症上氣喘急真氣浮散不得歸元諸藥莫效用吳茱萸五分酒和作餅封肚臍以帶繫之其氣自順 定痛法 凡小兒胸中飽悶臍腹疼痛一時不得用藥將食鹽一碗鍋內炒極熱布包之向胸腹從上熨下蓋鹽走血分最能軟堅取以止痛冷則又炒又熨痛定乃止此方男婦氣痛皆可治

指紋切要 小兒自彌月而至三歲猶未可以診切非無脈可診蓋診之難而虛實不易定也小兒每怯生人切見無不啼叫呼吸先亂神志倉忙而遲數大小已失本來之象矣診之何益不若以指紋之可見者與面色病狀相印證此亦醫中望切兩兼之意也令人抱兒對立於向光之處以我左手握兒食指以我右手拇指推兒三關察其形色細心體認亦惟辨其表裏寒熱虛實足之矣世人好異不從實地用功以

此為淺近之談不屑留意不知臨證能辨此六者便為至高之手蓋表裏清則知病



之在經在府而汗下無誤寒熱明則知用寒近熱用熱近寒或寒因寒用熱因熱用因事制宜無不當虛實辨則知大虛有盛候大實有羸狀不為假證眩惑凡真虛真實易知假虛假實難明真假既明則無虛虛實實之患於此切要關頭不知體會但以不經之言欺世誑俗謂何者為人驚何者

為畜驚不特欺人而且自欺不特無益治療而且誤人生命是誰之咎哉

### 三關部位歌

部位未可以定輕重安危因古有三關之說始存之耳

初起風關證未央氣關紋現急須防乍臨命位誠危

### 急射甲通關病勢彰

紋現風關為病邪初入之象證尚輕微體亦未因治之誠易紋現氣關邪氣正盛病已沈重治之宜速病元氣無所容高而不能降為元

難有悔之藥治之者切宜留心慎勿輕視

### 浮沈分表裏歌

指紋何故乍然浮邪在皮膚未足愁腠理不通名表證急行疎解汗

社紋與太瀰脈相通凡有外邪太瀰脈浮此紋亦浮蓋邪在皮毛腠理之間故指紋亦顯露之投於外謂之表證速宜疏散啓其皮毛開其腠理使邪隨微汗而解一劑成功何嫌而不投哉

忽爾關紋漸漸沈已知

### 入裏病方深莫將風藥輕相試須向陽明裏證尋

指紋見沈知邪入裏但有淺深之別若往來寒熱指紋半已入於陽明胃府速宜攻下庶醫見其身熱猶以風藥治之蓋病在內治其外非其治也不特病邪不服適足以燥其陰血愈增其困耳

驗方新編 卷五 小兒科雜治

### 紅紫辨寒熱歌 身安定見紅黃色紅豔多從寒裏得淡紅隱隱本虛寒莫待深紅化

**為熱** 神氣泰然管衛謹定見太平景象蓋黃為中和之氣紅乃文明之色紅黃隱隱景物昭昭焉有不安之理寒邪初入皮毛絡絡乍

應至謂深紅化熱其理安在紅本寒因豈能化熱由其寒閉皮毛腠理不通蓋人身內臟之氣時與皮毛之氣相通實無一

息之暫停今寒閉汗孔內出之氣無所洩鬱於皮毛之間漸積漸厚而化為熱矣此內出之氣為熱非外受之寒能變熱也**關紋見紫**

**熱之徵青色為風古所稱傷食紫青痰氣逆三關青黑禍難勝** 其陰營之道所以絞紫紫為熱絞

千古定評也少陽甲木其色本青肝膽受邪絞見青色此傷風候也夫青者木之色內經有在天為風在地為木之言所以絞紫紫為熱絞

邪絞必現紫色而兼青食傷候蓋食飲有形之物阻抑中焦壅遏脾氣不能宣布故風水乘其因而悔之所以痰氣上逆也疎通滯滯令其

流利可也倘抑鬱既久脾氣愈不運營衛愈見滯則風痰食熱固結中焦**指紋淡淡亦堪驚總為先天賦稟輕脾**

所以青而兼紫此抑鬱之至也急宜攻下庶有生機誤認驚風百無一救**指紋淡淡亦堪驚總為先天賦稟輕脾**

**胃本虛中氣弱切防攻伐損胎嬰** 小兒稟受陽虛肌骨兒白唇舌淡者指紋四時皆淡雖有病亦只淡紅淡青淡紫

病纏綿於虛一毒攻伐不致輕用**關紋瀑滯甚因由邪遏陰營衛氣留食鬱中焦風熱熾不行**

倘誤投剋劑復水難收悔之晚矣**關紋瀑滯甚因由邪遏陰營衛氣留食鬱中焦風熱熾不行**

**推蕩更何求** 病邪阻營衛運行遲滯升降羈留所以指紋推之轉瀑全無活潑流利之象由食飲風

熱相搏是為實證急宜推蕩去其穢蓋其根亦易若三關純黑推之不動死證也不治

**紋形主病歌 腹痛紋入掌中心彎內風寒次第侵紋向外彎痰食熱水形脾肺兩傷**

**陰** 掌心包絡所主紋入掌中邪從內臟由中氣寒也故為腹痛紋若彎弓內外有別其紋之兩頭彎向中指為內為順證為外感風寒治之

安能有水字之形曰不觀太瀾之脈亦止一線何以傷難推陽陰陰皆左右彈石豈

非水字之形乎脈有左右安知紋無左右也但能觸類旁通無非理豈特指紋為然哉**凡看指紋以我之大拇指側**

**面推兒食指三關切不可覆指而推蓋螺紋有火剋制肺金紋必變色又只可從命**

**關推上風關切不可從風關推出命關此紋愈推愈出其紋在先原未透關今誤推**

**而出之大損肺氣慎之戒之** 以上表裏寒熱虛實鑿鑿有據但能於臨證時認

稀痘並免驚風 小兒初生三日內用雞蛋一箇打放盤中務於無風之處以手指蘸

蛋清自腦後風門骨頸後高拱骨即風門骨至尾闕背背骨甚處即尾闕男左旋女右旋按背脊骨逐節

輕揉週而復始不可由下揉有黑毛出如髮愈揉愈出務令揉盡終身可免出痘即出亦少

且免驚風六日九日再揉並揉前心手足心兩肩井穴手平按見肩上有窩處即是又稀痘法 孕

婦懷胎時用生白芝麻多不拘置來往處隨便撮食之及十月滿足生下子女不受胎

毒出痘甚稀 又方 銀花金者不用陰乾飯鍋粬每一升入銀花一兩共研末用洋糖或做糕餅或開水

調和日令小兒食之 又方 用橄欖一味不拘新陳愈陳愈妙按一年二十四節

將橄欖於火上焙乾研末清滾水送下每節橄欖一箇不可間斷服之一年小兒永

不出痘如逢節偶忘須於下年照所忘之節補食一箇 又方冬至時辰在於屋內出入行走之地掘一坑約深尺半將新生雞蛋

十五個埋於坑中兩頭各用磚一塊以厚竹片排鋪於磚上用蘆片蓋之仍將泥填好以便行走至立春時刻取起每日以煮豆一撮煮雞蛋一個令兒食之不可間斷若依法服三次則終身不出痘痲瘡方多惟此有應

浴兒免痘法 除夕黃昏時用大烏魚一尾小者二三尾煮湯浴兒徧身七竅俱到

不可嫌腥以清水洗去也若不信但留一手或一足不洗遇出痘時則未洗處偏多

也 小兒初生面紅啼哭不止 此熱極也宜急治之如過三日難治用 枳壳 梔子炒

扁柏葉炒 川連各三分 黃柏二分 生甘草四分 薄荷四分 水煎去渣入蜜糖四茶匙和勻以鴨

驗方新編 卷五 小兒科雜治

毛點舌上下兩旁數次面色變淡紅色者可止或用吳茱萸錢四好醋調敷兩足心日換數次過一夜即愈此法最妙

晝啼不止 台烏藥一錢水煎服神效

夜啼不止 多因穿蓋過暖加以父母同牀熱極所致諺云若要小兒安常帶三分飢

與寒取雞糞塗兒臍中男用雄雞糞女用雌雞糞極妙 又方 硃砂磨新汲水塗心窩及兩手足心五

處最驗 又方 蟬退七個去頭足取下半截炒研末以薄荷二三分煎水調服立止如神如若不信

將上半截為末與服復啼如初矣 又方 雞窩中草安蓆下勿令母知或用乾牛

糞亦可若諸方不效仍復夜啼看面色青白手冷者用 川芎 當歸 茯苓 茯

神 白芍 甘草 木香 鉤藤 紅棗引煎服面赤唇紅身熱者生地黃芩生甘

草木通燈心竹葉引煎服或用前吳茱萸敷足最妙面赤唇口紅者可用 又方

面赤心熱也青黛分二燈心分十煎服 又方 燈花五朵研末塗娘乳上令小兒喫乳

又方 五椀子研末口水和作餅納肚臍內以帶紫之效 又方 竈心土錢三硃

砂分一麝香蓋一蜜水調每服分五 又方 硃砂寫子午二字貼肚臍上即止 又方

晝驢子一箇倒貼在小兒牀頭壁上自愈 又方 用小兒初穿汗衣放瓶內自不

哭矣 又方 用其父母指甲二釐燒灰綠蔥頭一錢煎水飲效 又方 用本家



撥火棍或燒殘柴火頭一箇削平焦處如無即取柴棍撥火數日用之亦可用硃砂向上寫云撥火杖撥火杖天上五雷公差來作神將捉住夜啼鬼打殺不要放急急如律令勅寫畢勿令人知安立牀前脚下男左女右此黃澹翁所傳也 又方 烏藥分五煎服亦效 又方 明鏡掛牀脚下自止 又方 硃砂新汲水磨之塗心口及兩手足心最驗

曲腰啼哭 此受寒腹痛也 淡豆豉 生薑 葱白細切鹽共炒熟以布包熨肚上立

止 徧身奇癢叫啼不止 生薑搗爛稀布包擦甚效

初生徧身發黃 此胎中濕熱也名胎黃用 生地 花粉 茵陳錢分一煎服或用黃

疸門黃臘紙筒方治之穩而且妙

初生徧身紅赤 此胎中熱毒也名胎赤用 生地 花粉 甘草 連翹錢各一水煎

服外用浮萍水苔搗爛絞汁調朴硝赭石敷之

初生無皮 小兒初生周身赤肉無皮如懷胎在樓上居住未受地氣者將兒安於泥

地上臥一宿即長皮矣 又方 早稻米磨粉乾撲之候生皮乃止

週身脫皮 此症因生時觸風滿身皮屑落下一層又一層名曰脫殼若作丹毒火疹

治之則誤矣宜用 木通 藿香 黃芩各六分 麥冬半錢 加燈草煎服

兩腿生瘡脫皮 兩大腿近小腹處生瘡皮脫開漸延小腹則不救此名胎剝宜用黃

柏炙焦研末和豬膽汁敷或用伏龍肝即龍心土口水調敷亦可

身如蛇皮鱗甲 名胎垢又名蛇胎用白殭蠶法為末煎湯洗或加蛇蛻研末和入亦

可

初生身如魚泡如水晶 此症破則水流用蜜陀僧為末搽之

瘡似楊梅破爛有孔 凡小兒或頭面徧身形似楊梅瘡破爛有孔用飯甑上滴下氣

水以盤盛取搽之百藥不效者用此如神

紅絲瘤 一人生子一歲生紅絲瘤而死連生四子皆然一醫云此胃中有伏火胎毒

故也遂令男服滋腎丸見內外備用諸方女服六味地黃丸見同上後生子皆無此患

顛門腫大 黃柏末水調貼兩足心即愈

頭縫不合 名曰解顛此腎氣不足也用 乾薑錢七細辛錢三肉桂錢五共為末薑汁和敷

顛上小兒面赤即愈 又方 南星為微池為末醋調攤舊網上貼顛門用熱手時時熨之

乾則用熱醋潤溼 又方 栢子仁 防風 南星各四兩為末每用一錢醋調攤紅

網上看顛門大小剪貼一日一換乾則以熱醋潤之 又方 茵陳 車前子 百

合錢各五為末烏牛乳汁調塗足心及頭縫開處用綢包裹二日一換

初生眼目紅赤腫爛 此胎中受熱也以蚯蚓泥又名曲蟻搗敷額門乾則再換不過三次

即愈或以生南星生大黃等分爲末用醋調塗兩足心亦愈 又方 甘草豬膽汁

泡過焙乾研末每用一二分乳汁調服 又方 熊胆少許蒸水洗眼上一日七次

如三日不開宜服 乾地黃 赤芍 川芎 炙草 歸身 花粉各一爲末燈心

湯調灌之 又方 雄雞膽燈心蘸點極效或用人乳蒸川連點之亦效 又方

胡黃連錢一研末人乳調敷足心男女左右神效 又方 黃連 黃栢 當歸 赤芍各二

杏仁錢五分打碎以乳汁泡一夜蒸熟取濃汁點眼內

小兒鬪眼 黑眼珠呆而不動者是方見目部

小兒變蒸 自生下之日起三十二日爲一變六十四日爲一蒸再過三十二日爲一

變再過六十四日爲一蒸至五百七十六日而止當蒸變之日身發微熱不必服藥

兩腮腫硬 新產月內小兒有噤口不乳啼聲難出兩腮腫硬有核名螳螂子又曰疔

腮熟諳穩婆將利刃於口內兩腮剖開挖出堅光惡肉形狀頗肖桑螵蛸傷處搽藥

自愈若割治少遲時刻則腫延喉鼻不可救矣多有割傷致命者終非良法今得一

方用 麝香錢一硃砂錢五分螺螄七個同搗如泥敷額門上俟乾時自落切勿剝去若重者

將針微刺患處出血以好陳墨搽之自愈或清雞糞塗之更妙切勿妄用刀割致傷

兒命後有芙蓉花諸方最為神妙 又方 蝟涎一條查藥物備要便知銀硃錢牛同研爛搽腫硬處

勿擦去即消 又方 桑柴灰少許入雄雞冠血二三滴再加鹽滷一匙和勻時時

搽之 又方 青橄欖核又名青果如無以鹽搗核泡去鹽味用亦可好醋磨汁搽之 又方 紅飯豆紅者是七

粒研末好醋調敷效

口角生瘡 亂髮燒灰猪油調搽

口流涎水 方見口部

口腫並生馬牙 小兒口中腫起如菌名乳菌牙齦生白泡子名馬牙疳致兒不能喫

乳以指摘去其頭倘有血出以綿拭去輕者京墨搽之即愈重者急以彊蠶三條去人

中白分四冰片分一共研細擦患處略停片刻用絹蘸茶洗淨再擦一日三四次自愈如

未愈方中加礪砂血竭青黛各三分兒茶分半藥珠一分各為細末和入前藥每日

洗擦三四次無不愈者或用馬齒莧根瓦上焙乾少加雄黃研末吹之並用後芙蓉

花諸方更妙

口生白點 初生百日口中口內白點不計其數拭之則去少刻復有滿口纏徧內竄入

喉日夜啼哭不乳俗名雪口又名鵝口疳用甘草黃連等分煎湯以綢裹指拭去取

桑皮中白汁塗之立愈或用陳墨點之亦可再以辰砂益元散見備用燈心湯調下則

不再發 又方 檳榔燒枯研末點之立見功效並用後芙蓉花諸方更妙

初生小兒或兩腮腫硬或口內生瘡或生馬牙或重舌木舌蛇舌吐舌及口不開不食

乳等症 芙蓉花或葉或皮或根均可用 搗極融爛用雞蛋二個和勻煎熟候冷敷心口肚臍用布紫

緊屢試如神 又方 生香附 生半夏錢各二 研末生雞蛋白調作餅貼兩足心一

週時即愈此林屋山人引熟下行經驗方也或用吳茱萸四錢好醋調敷兩足心亦

效如口舌破爛者用活鯽魚以尾入口中頻頻搖擺隨擺隨換此方能去口中熱毒

初用時兒尙啼哭用一二次後口中生涼兒自不啼尾雖有刺甚輕並不傷人治後

即能食乳不過三日全愈屢試甚驗真奇方也要用活魚方效仍用前方敷足要為

重舌 舌根肉壅腫疊出短小如舌者是用黃柏和竹瀝泡一夜取汁點之 又方

巴豆粒半飯粒四五 共搗爛為餅如黃豆大貼在印堂中待四圍起泡去之即愈各項舌

病皆效並用前芙蓉花諸方更妙

木舌 舌尖腫大塞滿口中直硬如木不能轉動者是用葶麻子肉搗爛以紙取油將

紙搓條點火吹滅以煙向舌薰之即消若舌下腫起用銀針挑破出血以鍋墨煙草以

更佳和鹽醋厚調敷之脫去再敷或用水調敷亦可 又方 蒲黃研末時敷舌上

其腫自消 又方 蠶蠶為末吹入吐痰甚效並用前芙蓉花諸方更妙

舌忽脹大腫硬即時氣絕 名曰嬰舌用皂礬不拘多少新瓦上火煨紅色為度放地

上候冷研細擦舌上立效兼治重舌木舌 又方 頂上梅花冰片研爛敷或以食

鹽百草霜共為末井水調敷即效 又方 百草霜酒調塗舌上即消 又方 乾

薑蒲黃各等分為末乾擦患處並用前芙蓉花諸方更妙

蛇舌 川煎芙蓉 諸方甚妙 其舌常捲兩邊口角者是用明雄研末點舌數次即安或用燈心泡水

服重則用川連一分蒸水服即愈

吐舌 人中白冰片和勻鵝毛刷上再用好川連一二分煎服舌自收入 冰片 雄

黃 礪砂 共為末乳調塗舌上亦效

頸輓 乃肝腎虛風襲入用生附子去皮生南星各二錢為末薑汁調攤貼天柱骨上

痰喘有聲 胡桃又名桃核連皮搗爛麥芽煎水加冰糖沖服喘止痰消此觀音夢授方也

或照前引痰法治之更妙 又方 巴豆一粒搗爛綿裹塞鼻男左女右痰即自下立

愈

喉嘶聲啞 甘草 薄荷各五分 桔梗 麥冬各一錢 水煎服立愈 又方 蝦蟆膽取汁

點舌上立愈

小兒病後口不能言 大生南星一箇泡去為末每用二三分或四五分量兒大小用之取豬膽

汁調濕再用熱淡薑湯沖服即能言矣

兒不食乳 乃心熱也用大蔥頭一切四片用乳汁半盞同蒸分作四服即能食乳並

用前芙蓉花諸方治之更妙 又方 黃連分二煎湯灌小兒數匙即食乳矣神效若

臍旁青色及口撮緊者此臍風症也 即照後臍風諸方趕緊治之遲則難救

吐乳 米七粒黑水杯半酒杯半煎至五分服極效

缺乳 凡小兒無乳百物不食無法可施用離核棗於飯上蒸熟與兒食之食至筋餘

即思飲食雖無乳亦可活矣離核棗即真南棗持三五枚向耳旁搖之響者即是無

則用大黑棗亦可

斷乳 山梔一個燒存性雄黃 硃砂各二分輕粉一分麝香一分共為極細末擇伏斷日後見候兒睡

著用麻油將藥調勻搽兩眉毛上醒來便不食乳如不效再加黃丹五分再擦必效神

驗非常惟肝氣盛者難驗聽其自落勿令小兒知忌見生人夏天不宜並忌逢五逢七日方名

畫眉丹 伏斷日 子日虛丑日斗寅日室卯日女辰日箕巳日房午日角未日張

申日鬼酉日星戌日胃亥日星

龜胸 大黃酒并九蒸丸曬桑白皮 甜葶藶 熟石膏各八分天冬 杏仁去皮木通各一分水煎

臥時服或用蜜為丸服更妙

驗方新編 卷五 小兒科雜治

龜背

龜胸治

用龜尿摩其胸背久久自愈取龜尿法以鏡對龜照之即有尿出 又方

龜尿調首烏末敷背上日久自愈

腹痛 小兒驟然腹痛其症不同有挾熱而痛者其痛多緩或一日只痛數次甚者或

自下而痛上痛過一陣則有時不痛良久又痛宜用涼藥加疎利藥治之有感寒挾

食而痛者其痛多急連綿少有停止甚者或如刀割欲吐不吐欲瀉不瀉手足冷而

色青宜用升發藥加消導藥急治之外有蟲痛者聞煎炙食物香氣則痛宜用苦棟

皮使君子肉等藥以殺其蟲則痛自止查蟲疾門斟酌治之 枳連導滯湯 治熱

痛 陳枳殼炒去穢 黃連 山梔仁炒黑色各六分 赤芍 前胡 連翹去心蒂各四分 三稜 莪朮俱醋炒

檳榔 甘草各三分 水煎飢服覺熱盛大便秘者加酒炒大黃一錢二分微利之三稜

莪朮不用亦可 升消平胃散 治感寒挾食痛 小川芎 炒香附 蒼朮 紫

蘇 薑汁 炒厚朴各五分 藿香 砂仁研碎 白芷 陳皮去白各三分 炙草二分 炒麥芽六分 山查

肉錢一 加羌活 防風各三分 生薑片三 水煎熱服

肚腹脹大亮如水晶 方見肚腹部

肚皮忽然青黑 方與上同

腹中鳴如蛙聲 淡豆豉 生薑各二錢切碎 葱五莖 食鹽兩一 同炒熱置臍上熨之效 又方



葱薑煎濃湯洗肚腹另用葱薑搗爛炒熱作餅貼臍上良久即愈 又方 枳殼錢一  
檳榔個一沈香 廣香小各一點煎水服 又方 乳香沒藥分各等 共爲細末木香磨水用  
滾水調服

肚臍腫出 小兒月內臍突光腫如吹捻動微響赤腫可畏由斷臍在前洗浴在後或

束縛不緊風溼入內所致用牡蠣煨 大黃錢各五 朴硝錢一爲末多用田螺浸水調錢二

數臍上其水從小便而消如啼哭不止用台烏藥煎水服即止 又方 茯苓 車

前子錢各一 甘草分二 陳皮 通草分各二 共煎湯灌之一劑即安 又方 紅飯豆 淡

豆豉 南星去皮 白斂錢各一 共爲末用芭蕉自然汁調敷臍四旁即愈

膿血不乾 龍骨煨 輕粉分五 黃連錢一 枯礬分五 麝香錢五 爲末乾摻臍中 又方 大紅

呢燒灰爲末敷之效 又方 馬齒莧焙枯爲末敷之 又方 草屋上舊茅草研

末敷極效 又方 枯礬 水龍骨即舊船底 共爲末敷甚效 又方 車前子炒焦

爲末敷之即愈

預防臍風 凡將斷臍必須先用熱湯浴過不使水氣入內一手握帶一手向臍推臍

三四次使胞血貫滿臍穴離胞寸許用線紮緊以磁鋒割斷勿使臍血外流則兒血

旺易育若弗用割臍單衣咬斷又將暖氣呵七日以免臍風之疾不用刀者蓋鐵器

寒冷恐傷生氣也或用前燒斷之法亦妙 又方 枯礬 礪砂各二錢 硃砂二錢 冰片

麝香各五 共爲末凡小兒下地洗過後用此末搽臍上每日換尿布時仍搽此末搽

完一料永無臍風等症

臍風 小兒生七日內面赤喘噎是爲臍風臍上定起有青筋一條自臍而上衝心口

若此筋已至心十難救一二矣看此筋未至心口時用艾絨在此青筋頭上燒之此

筋卽縮下寸許再從縮下之筋上燒之此筋卽消而病痊矣屢試屢驗艾圓不過如

小黑豆大或麥子大或用燈火燒之亦可又牙齦有小泡以綿裹指擦破卽活 又

方 雞蛋白用手指蘸擦背心良久有毛出刺手長分許卽止若長至寸許用細包

緊俟有轉機再擦兩太陽及口角則口自開矣神效 又方 小兒初生惟臍風最

爲惡候或因剪臍太短或結束不緊致外風侵入臍中或水溼寒冷所乘昔人有預


防臍風之訣謂三朝一七看兒兩眼角黃必有臍風此法尙恐未確惟摸兒兩乳乳

內有一小核是其候也然乳內有核發臍風者固多亦竟有不發者此法亦有三四

分不確自應輕輕將乳核擠出白漿自愈惟看小兒不時噴嚏更多啼哭吮乳口鬆

是真候也急用夏禹鑄先生臍風燈火救之 其訣曰臍風初發吮乳必口鬆兩眼

角挨眉心處忽有黃色宜急治之黃色到鼻治之仍易到人中承漿治之稍難口不



撮微有吹噓猶可治也至唇口收束鎖緊舌強頭直不必治矣一見眉心鼻準有黃色吮乳口鬆神情與常有異即用燈草蘸香油乾溼得中點燃於額門燒一燻人中承漿兩手大姆指端少商各燒一燻臍輪繞臍燒六燻臍帶未落於帶口燒一燻既落於落處燒一燻共一十三燻風便止而黃即退矣神效非常

先宜以黑點定穴道然後用火額門穴在頭頂處吸處人中穴在鼻下正中承漿穴在下牙乘下處正中少商穴在兩大拇指指外側內側亦是甲縫中不上不下即是臍輪穴即臍之四葉近臍帶之所廣風燈火額門眉心人中承漿兩手大指甲上名少商臍輪及臍心共十三燻有起死回生之功

小兒中惡以及痰閉火閉氣閉忽然卒死

一時無藥即以五指掐其人中穴病

輕者一掐即啼哭而醒儻不應再掐合

谷穴在大指二指合縫處又不應掐中衝穴在兩中指端離甲處若再

不應其病至重則以艾丸如蘿蔔子大

安於中衝穴灸之火到即活

小兒初發瘧疾 名曰胎瘧每日冰糖五

錢煎湯飲之雖隔兩日發瘧一次十日

必愈或以蟬退二兩包好作枕與兒睡

之其瘧亦止神效之至

氣喘 人家動土沖犯土神以致小兒氣喘人多不知宜請人查明九宮看太陽宮在

何處取此處之土煎水服仍須安謝土神即愈若不見效則非沖犯須請名醫治之

吐瀉

與脾胃及淡瀉者均參看

小兒吐瀉其證不一最宜詳審有因傷食吐瀉者有因感寒停食而吐

瀉者夏月則有因伏暑吐瀉者有傷食吐瀉者其吐有酸氣其瀉糞狀如糟粕亦有酸臭氣者宜消導之感寒停食而吐瀉者或食後感冒風寒則其食停滯不化或脾胃先受風寒而後飲食則其食亦停滯不化或飲食後悞食寒冷之物則其食亦停滯不化雖致病不同其爲感寒停食則一也此宜發散而兼消導然此吐瀉或多胸腹刺痛即霍亂吐瀉是也治法亦同伏暑吐瀉者小水必不利必兼煩渴當以暑治之吐甚者煎香薷散調益元散瀉甚者煎四苓散調益元散須斟酌用之然而吐瀉交作最是小兒危證若其屢作不止則不論何因皆當用參朮等急救胃氣不惟傷食停食者當急救之即伏暑者亦當急救之蓋其初雖有暑氣而多吐多瀉之後則熱氣已散而胃氣驟虛若不用溫補急救恐中氣頓絕則虛痰上湧而須臾告變矣且多吐之後胃氣大虛氣不歸元而陽浮於外反有面赤頭熱身熱作渴而似熱症者俗醫不知其理悞認爲熱而投以涼藥殺人如反掌甚可畏也故治吐瀉而藥不中病者與其失之寒涼不若失之溫補猶可救療失之寒涼其禍甚速多不及救也

加味平胃散 治傷食吐瀉

蒼朮水浸米厚朴去皮薑汁炒

山查肉各六分陳皮白去青皮

麥芽炒香附米炒砂仁研小川芎各四分甘草分二生薑片三水鍾半煎七分分二三

緩緩服 藿香和中湯 治感寒停食吐瀉 藿香 紫蘇 炒香附 製蒼朮

製厚朴 山查肉 小川芎各六分羌活 砂仁 麥芽炒白芷 陳皮去白各四分炙甘草

二分生薑片三煎服法俱同前 香薷散 以下三方伏暑吐瀉用 大花香薷錢二白扁

豆打碎製厚朴錢各一水煎候微溫調益元散二匙服 四苓散 赤苓去皮猪苓澤

瀉各一分白朮八分木通 車前微炒各五分水煎候溫調益元散二三匙 辰砂益元散 滑

石飛過甘草末兩一辰砂飛過共和勻每服小兒一錢大人二錢燈心湯下 錢氏白

朮散 治吐瀉已久虛火作渴者 黨參 白朮 茯苓 炙草 乾葛各五分南木

香二分薑片一水煎溫服 參砂和胃散 治虛寒嘔吐不止 黨參 砂仁細研製半夏

分四 白朮炒茯苓各五分藿香 陳皮各三分炙草分二煨薑三片水煎熱服 薑米湯

吐多而胃氣欲絕者用此安胃 老生薑一塊兩重煨熟去皮研爛用水一碗陳米

二撮同入瓦罐煎好候溫緩緩與服其嘔即止 凡嘔吐交作者止吐為急吐而不

瀉者均用生薑米湯最效 燒針丸 治吐瀉如神 黃丹飛水硃砂飛水枯礬 各等

分爲末紅棗爲丸黃豆大每服三四丸戳針尖上燈火上燒存性研爛淘米水調服

驗方新編 卷五 小兒科雜治

瀉者食前服吐者不拘時服外用菘豆磨成調雞蛋白吐者敷兩足心瀉者敷顛門神效或照脾胃門各方治之

暑月水瀉 凡小兒暑月水瀉小便赤澀或小便不通用 猪苓錢一赤苓 澤瀉錢各一

木瓜分六白朮分六木通分八車前子四分燈心一團水煎加鹽少許飢時服小便自通其

瀉亦止 又方 見泄瀉門

小兒痢疾 方見痢疾門

初生陰囊過大 凡小兒新生陰囊甚大名曰胎疝日後長成恐變水疝如過滿月外

或一歲以內俟端午日午時以脚盆盛熱水安於中堂隨抱小兒將陰囊放水內一

浸再將小兒在於中門檻中間一擱其陰囊上之水印痕於檻將艾火在檻上溼印

處燒三次其囊遂漸收小如故其效如神真奇方也 又方 石蟹用好醋磨汁搽

之亦效

忽然陰腫 此係被蚯蚓吹腫令婦人以吹火筒吹之即消 又方 真硼砂研末水

調敷甚效或用二味拔毒散見雜毒 諸方門亦效

陰囊赤腫 用老杉木燒灰存性加宮粉和清油調敷

陰囊腫墜光亮啼哭疼痛 蟬退兩一煎湯洗再用生紫蘇葉搗成泥包之而愈或用乾

紫蘇研末溼則乾敷乾則香油調敷雖皮破子出悉有神效

陰縮入腹 初生六七日後陰囊收縮啼哭不止者此受寒所致用硫黃 吳茱萸<sup>各五</sup>

<sup>錢</sup>爲細末研大蒜調塗臍下仍以蛇床子微炒布包熨臍卽下

陽物腫痛 小兒陽物眼上忽腫小便時腫痛甚者用燈草煎湯不拘時服腫消痛止

初生小便不通 用猪毛於陽物眼上刺去薄皮卽通屢試屢驗如陽物眼上並無薄

皮卽係胎熱用大葱頭一箇切四片用乳汁半盞同蒸分作四服卽通

小便數日不通遍身腫滿 蘇葉一斤煎濃湯一盆抱小兒向盆中熏之冷則再換熱

湯外用炒鹽熨臍上及遍身腫處卽愈 又方 連鬚葱白<sup>一觔</sup>搗融炒熱分作二包

輪流熱熨臍下 又方 皂角末吹些須入鼻令其噴嚏百藥不效者用此卽通

大小便不通 初生大小便不通腹脹欲絕者急令人溫湯漱淨口吸嘔兒之前後心

臍下兩手足心共七處吸曬五七口取紅赤色氣透爲度氣透則便自通 又方

連鬚葱頭<sup>七個</sup>生薑塊<sup>一大</sup> 豆豉 食鹽<sup>各三錢</sup> 同搗作一餅焙熱掩肚臍上帶紫良久自

通

初生大小便出血 此由胎氣熱盛所致或母食酒麵煎炒熱毒等物流入心肺兒在

胎內受之熱毒亦傳於心肺女子熱入於心故小便出血男子熱入於肺故大便出

血用生地黃取自然汁入蜜少許和勻溫服男女皆效

夜睡遺尿在牀 方見小便門

初生糞門閉塞 以金銀簪挑開一孔不可過深用油紙擦套住免其再合

足趾向後 兒初生足趾俱向後曲因母懷孕時日日盤坐兒在母腹一氣相通形隨

氣化故亦如是用軟綿捲如棍子安兒膝後灣內用木瓜煎湯常洗熨之日久筋長

舒展則自能伸由此觀之則知胎前調養不可不慎古人所以重胎教也

疳疾 凡小兒乳汁不足食物雜亂或口渴飲水或貪食不飽或喜食泥土雜物或睡

沉不醒或眼帶藍色或眼珠不明或頭往下垂或面色黃瘦或青筋暴露或肚腹脹

大或泄瀉不止種種不一此因傷食腹內生蟲名曰疳積必服殺蟲之藥方有效驗

然藥多尅伐恐傷脾胃率多不救今得祕傳外治二方既可斷根又不傷損萬無一

失並治大人蟲疾腹痛珍之寶之羊尿脬胞音吹起陰乾入頂好汾酒一二兩無汾酒

用頂好燒酒亦可用線紮緊挂小兒心口胃脘之間疳疾重者不過數時其酒氣自

然消滅必須經過方知滅否酒滅再換換至數次酒不消滅病即愈矣偏僻之處羊尿脬最爲

難得須於春秋祭祀時預爲買出備用少則三四箇多則用七八箇無羊之處用猪

尿脬亦可然未經試過恐難見功總不如羊尿脬之效驗神速也 又方 葱白每箇



多統寸 苦杏仁 生黃梔子 紅棗各七 皮硝錢三 真頭道酒糟兩一 白灰麵錢三 以上七味  
 用石槽搗爛成泥五寸寬白布兩塊攤膏藥兩張貼肚臍後貼背上要對正肚臍之處 用布摺  
 好貼三日肉見青色即好如未見再換一次無不愈矣 消疔無價散 石決明兩一  
五錢 蘆甘石五錢常便泡一日夜燒透以能浮水者為佳 滑石錢五 雄黃錢二 硃砂錢一 冰片錢五 海螵蛸五錢煨去壳 共為細末  
 量兒大小或三四分或五六分用不落水雞肝一副竹刀切破上開下連搽藥在內  
 用線紮好加淘米水入砂罐煮熟連湯食盡雖疔積眼瞎可以復明神效之至 消  
 疔丸 蒼朮米泔水浸去皮炒 白朮土炒 當歸酒洗 白芍酒炒 麥冬去心 薏仁 山查肉去核 石斛去蘆根 神  
 麵炒 麥芽炒 半夏麵 枳殼 蘿蔔子炒 陳皮 厚朴 使君子肉 茯苓 檳榔  
 炙莖兩各一 青皮 莪朮 木香 砂仁錢各五 炒乾為末蜜丸彈子大米湯送下一  
 丸 專治小兒泄瀉無度嗜食無厭肚大青筋四肢羸瘦或發夜熱或腫面目或腫  
 手足瘦弱垂死者但能進食瀉止食調肌肉自生小兒周歲後乳食夾雜則易成疔  
 預服此丸脾胃充實保無疔症或缺乳成疔者亦應服之此藥大和脾胃生氣血多  
 服有益無病真妙方也

胎毒

參看頭部及癰毒方

初生數月或一二歲內頭面忽生熱瘡甚至延及遍身此胎毒也用雞

蛋二三枚蒸熱煮去白留黃加亂髮一團如蛋大於鐵器中炭火乾煎初甚乾枯少

時髮焦蛋有油出俟冷取油和苦參末搽之數日即愈如蛋油難取俟煎枯後用滾

開水少許沖入油浮水面可取 又方 紫甘蔗皮一兩粉口兒茶五錢血竭二錢頂上梅

花冰片四分共為末豬膽汁調搽甚效 又方 陳石灰以十數年者為佳黃柏研末滑石各五錢

桐油調搽神效 又方 雞腰膏見難尋方初起者神效又頭部尚有方亦效 又小兒雜治方治食

積五疳頭頂結核臂瘦髮稀發熱作渴口疳目翳小便色白腹大青筋等症 白朮

三兩黃土炒使君子肉炒神麩炒麥芽炒山查肉炒山藥炒蓮肉炒歸身酒炒各二兩青皮肉炒豆

蔻通糊枳實炒黃連薑汁浸炒木香一兩不見火共為末合勻每服二錢米飲調空心時服如

蒸熱腹脹痛精神疲乏面有虛熱口吐清水是脾積化蟲加乾蟾煨吞性五枚胡黃連 白

雷丸 白蕪荑仁兩各一共研和勻與服此方救過小兒極有靈應茲特補刻於後吳本

小兒緊唇 用赤莧取汁洗之又用雞屎白研末數有涎換去 小兒頭爛不愈名瘡

癩頭 方用銅青一錢瀝青松香各一錢葶麻子四錢共搗勻視患大小布攤藥貼

之 小兒赤遊行於上下至心不治 用黃芽菜搗敷神效要白黃色嫩脆者乃真

小兒赤丹用胡荽汁塗之良 遊風丹腫用油菜搗貼效 小兒筒瀉不止 用

背陰扁栢葉搗汁半鍾溫服即止或加蜜二茶匙調服亦可 小兒血痢 蔓菁即

菜搗汁或用子濃煎汁亦可入蜜和服 小兒閃癩生食頭髮黃豎凜癩瘦弱者

用林檎紅乾花爲末醋和敷之多食發熱閉百脉 小兒疳瘡 生嚼栗子敷之

### 小兒科驚風

驚風論 驚風有急慢兩症急驚屬實熱宜用清涼慢驚屬虛寒宜用溫補二病若霄壤之相隔治法若冰炭之相反諸書多用一藥兼治急慢兩症謬妄太甚貽害無窮不可不審辨也

慢驚 莊在田曰慢驚之症緣小兒吐瀉得之爲最多或久瘧久痢或痘後或疹後或因風寒飲食積滯過用攻伐傷脾或秉賦本虛或誤服涼藥或因急驚而用藥攻降太甚或失於調理皆可致此症也其症神昏氣喘或大熱不退眼開驚搐或乍寒乍熱或三陽晦暗或面色淡白青黃或大小便清白或口脣雖開裂出血而口中氣冷或瀉利冷汗或完穀不化或四肢冰冷並至腹中氣嚮喉內痰鳴角弓反張目光昏暗此虛症也亦危症也俗名天弔風虛風慢驚風慢脾風皆此症也若再用寒涼再行消導或用膽星抱龍以除痰或用天麻全蝎以驅風或用知栢苓連以清火或用巴豆大黃以去積殺人如反掌實可畏也若治風而風無可治治驚而驚亦無可治此實因脾氣虛寒孤陽外越元氣無根陰寒至極風之所由動也治宜先用辛熱再加溫補蓋補土所以敵木治本卽所以治標凡小兒一經吐瀉交作卽是最危之症

若其屢作不止無論痘後疹後病後不拘何因皆當急用參朮以救胃氣薑桂杞熟等藥以救腎氣不惟傷食當急救之卽傷寒傷暑亦當急救之蓋其先雖有寒暑實邪一經吐瀉業已全除脾胃空虛倉廩空乏若不急救恐虛痰上湧命在頃刻矣庸醫見之皆誤指爲熱爲食投以清火去積涼藥立時告變爲之奈何與其失之寒涼斷難生活不若失之溫補猶可救療此語發明吐瀉驚風之理最爲明透後之君子願無忽諸今將慢驚辨症臚列於後 一慢驚吐瀉脾胃虛寒也 一慢驚身冷陽氣抑遏不出也照涼藥之後往往致此 一慢驚鼻孔煽動真陰失守虛火燦肺也 一慢驚面色青黃及白氣血兩虛也 一慢驚口鼻中氣冷中寒也 一慢驚大小便清白腎與大腸全無火也 一慢驚昏睡露睛神氣不足也 一慢驚手足抽掣血不行於四肢也 一慢驚角弓反張血虛筋急也 一慢驚乍熱乍涼陰血虛少陰陽錯亂也 一慢驚汗出如洗陽虛而表不固也 一慢驚手足痠癱血不足以養筋也 一慢驚顛門下陷虛至極也 一慢驚身雖發熱口唇焦裂出血却不喜飲冷茶水進以寒涼愈增危篤以及所吐之乳所瀉之物皆不甚消化脾胃無火可知唇之焦黑乃真陰之不足也明矣 大凡因發熱不退及吐瀉而成者總屬陰虛陽越必成慢驚並非感冒風寒發熱可比故不宜發散治宜培元救本加薑桂以引火歸源必先

用辛熱沖開寒痰再進溫補方爲得法經驗二方列後 逐寒蕩驚湯 此方藥性  
 溫煖專治小兒氣體本虛或久病不愈或痘後疹後或誤服寒涼泄瀉嘔吐轉爲慢  
 驚清熱散風愈治危速宜服此能開寒痰寬胸膈止嘔吐蕩驚邪所謂回元氣於  
 無有之鄉二劑後嘔吐漸止卽其驗也認明但係虛寒卽宜服之不必疑畏也 胡  
 椒 炮薑 肉桂錢各一 丁香粒十 右四味研爲細末以竈心土三兩煮水澄極清煎藥  
 大半茶盃頻頻灌之接服後方定獲奇效加味理中地黃湯 此方助氣補血却病  
 回陽專治小兒精神已虧氣血大壞形狀狼狽瘦弱至極皆可挽回如法濃煎頻頻  
 與服參天救本之功有難以盡述者 熟地錢五 焦朮錢二 黨參 當歸 炙芪 故紙  
 棗仁研炒 枸杞錢各二 炮薑 黃肉 炙草 肉桂錢各一 加生薑三片紅棗三枚胡桃  
 二箇打碎爲引仍用竈心土二兩煮水煎藥取濃汁一茶盃加附子五分煎水攪入  
 量兒大小分數次灌之如咳嗽不止者加粟殼一錢金櫻子一錢如大熱不退加白  
 芍一錢泄瀉不止加丁香六分只服一劑卽去附子止用丁香粒七 隔二三日只用附  
 子分二三 蓋因附子太熱中病者卽宜去之也如用附子太多則小便閉塞不出不用  
 附子則沈寒肺腑固結不開如不用丁香則泄瀉不止若小兒虛寒至極附子又不  
 妨用至一二錢此所謂神而明之存乎其人用者審之此方乃救陰固本之要藥治

小兒慢驚稱爲神劑若小兒吐瀉不至已甚或微見驚搐胃中尙可受藥吃乳便利者並不必服逐寒蕩驚湯只服此藥一劑而風定神清矣如小兒尙未成驚不過昏睡發熱不退或時熱時止或日間安靜夜間發熱以及午後發熱等症總屬陰虛均宜服之若新病壯實之小兒眼紅口渴者乃實火之症方可暫行清解但果係實火必大便閉結氣壯聲洪且喜多飲冷水若吐瀉交作則非實火可知矣此方補造化陰陽所不足實回生起死有神功倘大虛之後服一劑無效必須大劑多服爲妙

近來所賣之抱龍牛黃等丸皆清熱化痰之藥急驚最爲對症若慢驚之甚者下喉卽死如鄉村製藥不及急取雞鴨窩要養雞鴨已數十年者糞泥下淨土一撮去糞數寸者不要有糞煎水服立愈屢試如神

**慢驚治驗** 一北平黃孝廉女甫週歲病久不愈余視之瘦弱已極熱仍不退頃之羣醫畢集俱商用山查神糲荊芥防風等味皆消導藥也余竊謂不然因憶內經有云實者瀉之虛者補之此女瘦弱已極豈實症乎然衆論譁然未可與辯越三日余又往看視黃曰我女昨大瀉黃沫且角弓反張不知其故余曰此皆涼藥毒也黃曰然前服山查等藥不效復加黃連二分遂劇前醫在側甚慚強余立方余辭之歸次日黃以衆方請正余閱之乃五苓散仍加消導發散之味彼時欲另立一方但又恐醫

家撓阻黃亦未必深信因就原方加註剖明某藥可用某藥難投總本張景岳直救真陰之說黃亦心折因謂衆醫曰我女病久必須滋陰爲上乃大加熟地二錢連進二劑其熱陡退病亦漸愈緣前此刻劑太甚復原較遲 一鄰友方元興有子歲餘常見其持單買藥詢之方曰兒病已久更數醫矣今又延某醫包治此其藥單也逾數日泣謂余曰某醫悔口子不生矣君其有術乎細叩其故方曰我子體熱已久近日氣弱神昏腹中膨脹吐瀉發喘兩目上視命在須臾邀余往視見其子顙門下陷面色青黃取向日醫方閱之悉是去積發散涼血之藥與症相反余曰得之矣用理中地黃湯去附子澤瀉加枸杞故紙一劑而安十餘劑而健壯矣 一余胞姪乳名文豹素甚壯實週歲後發熱兼旬不退咳嗽時以手捫口喉痛可知後數日晝夜昏睡不醒因延本地時醫投以清熱解表涼藥一劑而熱立止逾時體冷徹骨熱復大作再投前劑則無效矣又延他醫投以苓連石斛等藥非惟熱不能解且面色青黃三陽黑暗大喘大瀉愈增危篤醫亦束手余查痘疹諸書皆云疹係熱症宜用寒涼其說亦與症不符姑用救陰固本平補之藥一劑灌之悉皆吐出余母顧兒謂余曰腹中作響風已動矣喉如雞聲痰已塞矣且喫乳卽吐頭搖睛泛氣促神昏兩目無光面無人色敗症現矣急請前醫皆裹足不至徧查各書俱載痘疹後發熱不退而

頭搖睛泛吐瀉神昏乃慢脾風不治之症然亦不忍坐視不救細思喉中作響必係寒痰蓋緣真陽外越寒生於中如係實火則前此苓連之藥何至反劇外雖極熱內實真寒非用大辛大熱之品不能沖開寒痰故前投諸藥皆吐而不受因取附子薑桂煎湯欲灌余母曰此兒現在發熱且唇已開裂出血何可再用附子余思內經云假者反之此症非用辛熱之品終不能引火歸源以消寒滯也雖易去附子仍改用胡椒一錢肉桂一錢炮薑四片似覺平淡以期老母不疑煎湯灌下痰聲立止又取伏龍肝沖水灌之吐亦漸止少頃兒忽眼動呵欠咳嗽時卽不以手捫口又頃連湯小便稠濁紫黑疹後邪毒節次盡下似有起色因用附子理中湯合六味地黃湯去澤瀉丹皮加故紙枸杞一劑而敗症全除惟大熱未退乃於前湯內復加棗仁五味白芍斂陰之藥一劑而安此正內經所云治風先治血及甘溫退大熱之義也其後細審此症咳嗽喉痛心火燦肺金也嘔吐泄瀉脾腎虛寒也用胡椒薑桂所以開湧喉之塞痰也用竈心土者補土所以敵木也木平則風息土旺則金生金旣得生火不能尅則向者尅肺之邪火仍反而歸心心爲君主之官邪不能犯心與小腸相表裏故疹毒傳入膀胱下溺爲紫黑色也余弟云此兒疹後發熱誤服涼藥命幾不測得吾兄方藥真不啻起白骨而肉之實如再生爰更其名藥生將來卽取字曰佩伯



誌不忘也 一余胞姪鈞守南陽時生一女偶爾傷食中州醫者必以九製大黃推蕩之每月一二次屢經剋伐至二歲此女脾胃太傷瘦弱至極陰虛夜熱昏睡露睛忽成慢驚庸醫尙不知其爲不足症乃以五苓散加黃連四分下咽卽結胸不語次日斃命中虛生寒再進黃連未有不斃者 一余姻親家人之子甫二歲其母已逝乳母哺之飲食不調髮黃氣短發熱腹脹虛弱之形已現奈醫者堅稱內熱進以寒涼吐瀉不止遂成慢驚有鄰人授以福幼編一本其父與醫商醫曰小兒純陽之體何可用此熱藥乃向藥包中取出抱龍丸一粒研而灌之尙未灌完而已斃矣 一余外甥關霖家使女十歲出疹稠密成片隱隱不出三日後絕口不食臥於西廊面無人色將成慢驚余二女往彼問及霖曰使女患疹湯水不入置之此間已經二日只待氣絕送出埋之二女曰何不於遂生編內求方治之因照大補元煎本方用附子一錢肉桂二錢濃煎節次灌之一劑能食粥一酒杯二劑脾胃漸健於是遞減附子數劑全愈尙以疹爲熱症進以寒涼豈能生乎 一六安廣文程公之子九歲久病不愈泄瀉抽搐懨懨一息醫曰已成慢驚雖神醫來此亦難爲力廣文呼號求救幾不欲生同學宋孝廉以余向贈之福幼編授程閱而疑之宋曰此子已無生理舍此更無他術服此溫補之劑或可挽回倉猝問無肉桂遂以桂子四錢研碎加味

理中地黃湯內如法濃煎頻頻與服二劑驚止又三劑全愈乾隆壬子年余回六安宋孝廉親口言之也 一裕州刺史徐公獨子十歲氣體本虛病後大熱不退屢服涼藥泄瀉嘔吐角弓反張諸症作矣羣醫畢至仍係清熱解表病熱更加萬無生理少府史某者詣署求見司閹曰本官有少爺染患慢驚命懸旦夕不暇會晤史曰我之來因慢驚非公事也即延之入徐曰小兒慢驚壞症醫技已窮君能救之乎史袖出福幼編曰此前莊本府之胞叔所著專治慢驚但其方與古書不同應否與服堂翁其自主之徐曰著書人斷無孟浪之理即遵照編內之方不減分毫用逐寒蕩驚湯一劑喉間寒痰已開接服理中地黃湯四劑驚止熱退全愈余胞弟一鵬彼時在南陽已知大略後史尉至湖北親口言之更詳

自丁酉至今二十餘年此編愈人甚多聊記數條以社衆感閱者可堅信無致貽誤也以上見福幼篇

**急驚** 聶久吾曰急驚之候身熱面赤搐搦上視牙關緊硬口鼻中氣熱痰涎潮壅忽然而發發過容色如故有偶因驚嚇而發者有不因驚嚇而發者然多是身先有熱而後發驚搐未有身涼而發者也此陽症也蓋熱生於痰痰盛生驚生風宜用涼劑以除熱而化其痰則驚風自除矣切不可用辛燥驅風之藥反助心火而爲害也當其搐搦大作時但可扶持不可把捉恐風痰流入經絡或至手足拘攣也又不可驚惶失措輒用艾火灸之燈火燒之此陽症大不宜於火攻曾見有火攻而壞事者矣

戒之戒之此症雖急若從容服清涼之劑調理自可平安不可聽信時醫峻用攻擊如巴豆輕粉之類以取速效傷害不小古諺云急驚風慢醫此邇言之切當而可用者也 幼兒將要出痘有發熱二三日全無痘點形影而忽然驚搐狀與急驚風一樣醫者不知而誤作急驚風施治若以寒涼之劑或以驅痰峻藥下之必致難救遇有此症宜留心辨別以免誤事 清熱鎮驚湯 連翹去心 柴胡 地骨皮 龍膽草 鉤藤 黃連 梔仁炒 酒芩 麥冬去心 木通 赤苓皮去 車前子 枳實炒 甘草 薄荷各分 滑石末八分 燈心一團 淡竹葉三片 水煎分數次服凡急驚初起宜服此劑如服後痰熱未除者以後二方隨用一方泄一二次即愈若此方已效後方即不必服 加減涼膈散 連翹 酒芩 梔仁炒 枳實炒 前胡各五分 大黃酒炒 薄荷 甘草各二分 水煎分數次服泄一二次痰熱自退已泄則不必服 宣風散 陳皮去末 檳榔末各五錢 甘草末五分 黑牽牛四兩半生半炒取頭末一兩二錢五分 共和勻一歲以下服三分二歲以上服五分五歲以上服七分俱用蜜水調服微泄一二次為妙已泄則不必服又益元散抱龍丸牛黃丸均極神效以上見活幼心法 天保采薇湯 專治急驚神效 羌活 獨活 蒼朮 前胡 升麻 葛根 陳皮 厚樸 甘草 黃芩 川芎 柴胡 桔梗 半夏 枳殼 藿香 芍藥各五分 薑棗引水煎服 又方 龍眼壳

十二箇又名泡圓以帶栗色為佳深黃者忌用

細茶錢三 陳皮錢三 薑皮分三 白鹽分三 用水一碗煎至五六分灌入口內忽

然發戰其兒必生此方平常其功甚速雖已死可活方名開棺斧 又方 生車前

草並子搗爛瀝汁對白蜜滾水令服其風即止屢試神效如無生車前草即用車前

子煎湯調蜜服亦可 又方 生石膏兩一 辰砂錢一 各研末和勻大人每服一錢小兒

一歲至三歲服五分以次遞加生蜜調下 又方 明雄黃錢五 砂仁分六 梔子五枚 冰

片五 共為細末以雞蛋清調敷肚子四圍如碗口大安臍眼入麝香五 上用綿紙蓋

好再以輭綿絮之一晝夜後溫水洗去神效 又方 甜杏仁粒六 桃仁粒六 黃梔子七

右藥研爛加燒酒雞蛋清白乾麵量兒年歲作丸如元宵樣大小置於手足二心布

條紮緊一週時手足心均青藍色則病已除但須切記男左女右不可錯置是所至

要萬應萬驗真有起死回生之功 又方 取芙蓉嫩葉男雙 搗爛用雞蛋和入煎

熟作餅貼兒臍上冷則隨換立愈 又方 慢驚風亦可治用白絲毛雞烏管絲耳又名絨毛雞又名白

鳳凰多出江 以雞尾糞門向小兒肚臍上無風雞則遠去有風雞必貼緊吸拔風毒少時

即愈神效之至愈後須用麻油灌入雞口以解其毒 又方 慢驚亦可治用燈火

在手心足心男女 各燒三焦即愈 又方 有數歲小兒偶患驚風頭足往後扯成

彎曲謂之角弓反張叫喚難聞百藥無效後服活絡丸一顆即刻安睡再服數顆脫

然全愈神效無比此丸以廣東省城大南門己未牌坊老陳李濟店爲真別店多假用之不效 又方 速用艾二小丸於左右手背接腕穴上燒三次頭足卽不反矣

又方 見中風門

### 小兒科痘症

痘症治法 莊在田曰痘科一症順者不必治逆者不能治可治者惟險症耳險症治之得法則生不得法則不生是治法之不可不精也內經未嘗言及今行世諸書皆本之於諸瘡痛癢皆屬於熱入字所以立意先言解毒開方定用寒涼在其父母聞之解毒最爲入耳寒涼似亦應然殊不知痘瘡全以發透爲吉起發必賴氣血滋培方能自內達外齊苗灌漿結痂無非陽氣爲之主也寒涼則血滯尅削則氣破血滯氣破毒氣乘虛深入此痘症陷塌之所由來也譬之猪脬即尿若欲其脹滿必需以氣充之散其氣立卽陷矣此理相同顯而易見痘之始終全憑氣血但得氣血充足則易出易結血氣不足則變症百出痘之欲出陽氣蒸騰小兒發熱正是痘欲見苗斯時氣虛者宜服補中益氣湯血虛者宜服荊防地黃湯兼寒者宜服大溫中飲或大補元煎察其體氣之虛實酌而用之所謂培補氣血疎通經絡無不立奏全功時師不明此理定言用補太早則補住毒氣乃愚陋之見也不知補中卽所以托毒灌

175

根卽所以發苗萬無補住之理且有散藥在內此實先哲治痘之心傳高明者必以爲然淺學者何能窺其萬一要之治痘之法總不外乎虛寒實熱四字何者爲虛寒凡小兒向日氣體薄弱面色青黃唇淡畏寒大便溏而不結小便清白飲食減少或不甚消化等症知腹中火少出痘時必難灌漿亦難結痂氣血不足之故是名虛寒速宜培補元陽以防變症也何者爲實熱或小兒氣體壯實飲食易消出痘時大便結而燥小便赤而臊口鼻中出氣如火惡熱喜涼等症是名實熱察明果是內熱方可暫行清解荆防地黃湯用生地加大黃一二劑而火退矣然不可以虛火誤認爲實火察虛火實火之法全憑大小便爲主小便清白大便不燥身雖大熱乃是中宮有寒火無所依浮而在外誤服寒涼亦有此症不得以身熱便認爲實火虛火者十中八九實火者數十之中一二耳

痘有四宜 一宜補氣 真陽充足力能送毒出外以成痘倘痘頂不起等症皆元氣不足之故宜服黨參白朮黃耆甘草之類以補之 二宜補血 真陰充盛方能隨氣到苗以成漿空壳無膿等症皆陰血不足之故宜於補氣藥中加熟地當歸丹參川芎之類以補之 三宜補脾腎 一脾土壯健氣血自充飲食減少口淡無味等症皆脾土虛弱之故須脾腎雙補卽於前氣血藥中加枸杞故紙附子肉桂等藥痘

瘡自無陷塌泄瀉之患經云虛則補其母此之謂也 四宜察虛實 小兒飲食有味二便如常不服藥最爲穩當設或灌漿不滿燒漿不乾等症必察其氣分血分何處虧虛照症調補不可妄用涼藥必口鼻臭尿臊便結有實火可據者方可暫行清解

瘡有四忌 一忌清熱敗毒 一胎中陰毒必賴陽氣托送方能發出陽氣被清陰毒內歸痘之場陷實由於此是連翹生地黃芩澤瀉等藥非有實火者萬不可用 二忌尅伐氣血 氣血充暢痘易成功尅削下咽中氣虧而毒乘虛深入泄瀉場陷諸症作矣是大黃芒硝山甲山查等藥在所必禁者也 三忌妄投醫藥 小兒出痘延醫診治求其有益也豈知近代醫師不分虛實總是涼藥毒輕者幾死毒重者不生是以不如不服藥之爲妙客問曰痘之順症可以不藥我知之矣痘之險症可以不藥乎余曰若純用涼藥以治險症但見治斃未見治愈也客猛然省悟而去 四忌吞服醫家小丸 近代痘師所帶小丸總是巴豆丸彼以爲痘是胎毒巴豆下行自必可以瀉去之豈知中虛下陷性命休矣小丸數粒斷非溫補氣血之藥卽抱龍牛黃等丸亦與痘症大有妨礙是以最不可悞服親友處受此害者甚多目擊心傷故特表而出之耳 至於前人所製人牙散獨聖散雞冠血桑蟲之類逼毒外出旋

卽收陷皆非正理何曾見其治愈一人斷不可用

發熱 痘者胎中之陰毒也必賴陽氣以成之小兒出痘大約發熱三日肌肉鬆透然後能見點苗齊熱退乃真陽內伏交會於陰復發熱三日是運水到苗以成清漿漿足熱退及至養漿真陽外出發熱三日化毒以成膿膿成熱退而陽伏毒旣化膿又必發熱蒸乾方能結痂痂落後真陽外出蒸化斑點謂之燒斑倘有黑斑乃是火衰並非因喫鹽醬之故所謂痘稟於陰而成於陽也如此治痘之法始終當以補氣血扶陽氣爲第一義用藥以溫補少加發散爲首務否則氣不足則痘頂不起火不足則漿不稠且恐厥逆腹痛陰寒起而壞症作矣 或問曰痘宜溫補此理甚明若兼發散豈不傷氣不知純用散藥汗多則傷氣少加發散藥於溫補藥中則血脈疎通痘瘡易出無壅滯之患受解散之功所以古方補中益氣湯內有升麻柴胡大溫中飲內有麻黃溫中補氣尙用散藥可見古人用心之妙痘之初出是斷不可減去散藥者也 或又問曰痘宜溫補兼散此理已明後開大補元煎六味回陽飲此二方重用附桂並無散藥兼用龍骨粟殼收瀉之藥其義何取不知溫補兼散乃治尋常痘瘡之法更有一種小兒發熱一二日卽徧身出痘古書無方時師袖手此乃陰毒太重陽氣太虛陰毒一發陽氣已消故瀉痢不止瀉出之物多作青黑色肝氣所化



胃氣將竭之兆速宜大補元煎六味回陽飲二方大劑連進可以扶元陽可以消陰毒操起死回生之功有鬼神莫測之妙二方合煎名返魂丹治痘收效指不勝屈余治外甥汪陵醫案所當細閱 至於清火解毒涼藥必察明果有實火者方可暫用若悞用於齊苗時則水不能升而頂陷若悞用於養漿時則漿不能稠而癢塌癢塌者真火衰也明矣當前速宜參熟並用附桂同煎脾腎雙補大劑疊進尙可挽回否則寒戰咬牙吐瀉交作不可爲矣至於身涼而膿不乾痂落而斑不化及痘後發毒皆因悞服生地銀花澤瀉連翹等涼藥之故不可不知熱有邪正必當體察正熱者陽氣蒸騰自內達外喜露頭而不惡寒時熱時止兼有小汗手足溫和飲食有味二便如常所謂內外無邪不必服藥邪熱者偶受風寒頭痛惡寒四肢冷而無汗荆防地黃湯內加肉桂二錢一二劑儘可解散表邪而愈古人云熱不可盡除真格言也形色痘以飽滿爲形紅活爲色頂陷不起是氣虛色不鮮明是血虛宜培補氣血爲主真陽虛者乃無紅暈甚至通身皆白身涼不溫宜大補元煎陽回身溫轉白爲紅矣又有一種偏身血泡者此非血多乃氣少不能統血故血妄行急當大補元煎陽氣充滿血泡變白而成功矣庸醫不明此理謬言血熱悞用寒涼變症日增形與色外象也必要飲食有味二便如常知其無內病可以不服藥若二便不調飲食不下

煩躁悶亂夜中不甯形色雖好亦甚可憂必當察其病情何如小心用藥挽回方妙形色不佳多半是氣體虛寒手足厥冷頭重神疲便清泄瀉等症必當大補元煎兼用附桂若泄瀉不止並當添入龍骨粟殼等藥以收瀋之方可回生 痘以紅爲貴有圈紅暎紅鋪紅之別圈紅者一線紅圈緊附痘根最爲佳兆暎紅者痘根血色隱隱散漫亦氣不收之故速宜大補氣血鋪紅者一片平鋪無痘之處亦紅所謂地界不分若兼不惡寒口臭而渴小便燥而短大便燥而結內熱有據宜白虎地黃湯以利之熱退身涼卽宜平補不可多劑又有一種錫光痘身涼不溫色白不紅此乃陽虛陰象也宜大補氣血附桂同施氣足陽回痘根紅而漿稠痂結矣又有一種根無紅盤頂含黑水者乃陽氣大虛陰氣凝結亦宜大補元煎兼用附桂黑水化而爲膿矣痘有五泡曰水泡膿泡灰泡血泡紫泡痘有五陷曰白陷灰陷血陷紫陷黑陷水泡者皮薄而明經言氣熱生水要知清漿皆水何以不成膿火少故也必當薑桂附子等藥大劑陡進水必成膿若誤用涼藥作瀉後轉爲白陷膿泡失治則破流膿水灰泡失治轉爲灰陷二症亦宜參熟附桂大劑多進若有小顆粒發出謂之子救母生意在焉血泡者乃氣虛非血熱亦宜大補元陽否則變爲血陷紫泡者其症有二紫中帶青者亦因氣虛不能攝血陰血凝結而成其人必身倦惡寒舌胎白飲食不

多大小便清白速宜大補元陽否則變爲紫陷又有一種紫黑焦枯者乃純陽無陰之症其人必口乾惡寒小便短大便結此實火也宜清涼解毒白虎地黃湯酌加大黃以行之但得灌漿尙可望生失治轉爲黑陷又有一種小兒因服涼藥腹中作痛嘔吐瀉利將成慢驚頭面大熱唇焦舌黑亦似實火此乃火不歸元之故實火者二便燥閉虛火者瀉利不止全在細心體察方得其真經云有者求之無者求之實者責之虛者責之蓋言萬病皆當體察寒熱虛實醫治痘症可概云實火肆用苦寒剋削以斃人性命耶

起脹 痘至開盤頭面腮頰亦腫謂之起脹至膿成漿足痘回而脹消謂之收脹蓋緣毒氣由內達外此時尙在肌膚之間故腮頰亦隨之而腫迨至膿成漿足毒氣盡化爲膿而脹日消亦必脾胃強健方能如此若當起脹而不起脹乃由元氣內虛不能送毒外出之故宜用大補氣血之藥少加發散大補元煎大溫中飲相間服之盤自開而脹自起若痘未開盤而頭面先腫乃元氣大虛此乃虛腫非起脹也其痘必不能起脹亦宜大補元氣腫自消而脹自起又有痘已回而腫不消乃元氣大虛不能攝毒餘毒留於肌肉之間不能盡化爲膿所致亦宜大補元煎大溫中飲相間服之餘毒盡化而脹消矣痘書云痘出稠密封眼者有救不封眼者無救此言不確起脹

者有救不起脹者無救此言甚確封眼者眼弦多痘胭脂水塗之仍可以不封眼不起脹者乃元氣大虛何以送毒外出必當大補元煎附子肉桂大劑多進脹起而毒化一定之理也

養漿 痘之緊要全在養漿漿成則毒化漿不成痘斯壞矣自發熱見點齊苗灌漿無非爲養漿而設若顆粒稀疏根盤紅潤精神爽健二便如常乃上等痘也可以不藥偷形色平常全憑用藥助其氣血以養其漿最怕者無熱全仗真陽充足出而用事方能化毒成膿設陽氣不足何以蒸化其毒宜大補陽氣實爲上策緊防泄瀉瀉則中虛陽氣一虧毒必內陷定當預爲隄防補其陽氣助其脾胃漿乾痂結而成功矣煎藥方無非補中益氣湯大補元煎之類相兼服之萬不失一而世之面麻者皆因不明是理養漿時被庸醫悞用消伐之藥中氣下虧所致若於養漿時大劑溫補氣血充足落痂後斷無面麻之患又有一種小兒痘後滿頭潰爛名曰虛陽貫頂又曰髮疽經年不愈此乃出痘時悞用涼藥胃中受寒陽無所依上沖頭頂譬之火爐中以水潑之則熱氣必上沖此理無二速用大補元煎大溫中飲相間服之引火歸元旬日可愈

收結 收者漿回而脹收也結者膿乾而痂結也收結如法其功成矣倘漿回而腫不

消膿成而痂不結亦是真陽不足身無熱不能乾漿化毒之故膿漿充足必賴陽氣薰蒸方能結痂陽氣二字豈非痘症始終必需之至寶設此時氣體虛弱不能結痂必相其虛實無非培補氣血無不立見奇功又有一種漿不能乾而生蛆謂之蛆痘總由陽氣不足之故俱宜大補元煎大溫中飲相間服之膿自乾而蛆自化痂結而愈

**痘毒** 痘本胎毒自內達外若出痘時盡化為膿痘後無餘毒矣當其初總宜培補元陽兼用散藥毒氣方能盡出化而為膿時師用黃芩連翹澤瀉等藥在彼以為涼藥可以解毒豈知痘乃胎中陰毒得陽氣則行得涼藥則滯毒氣因涼藥留滯於肌肉之內痘後所以發為大疽名之曰痘毒皮色不變者居多宜大溫中飲數劑全愈其色紅白相兼者半陽半陰症也荆防地黃湯與大溫中飲相間服之數日亦愈倘已潰爛亦以荆防地黃湯與大溫中飲相兼服之計日可愈荆防解其凝結薑桂散其寒涼所以可愈倘時醫見之不分陰陽統言火毒仍用生地連翹銀花等藥以致堅腫不消潰爛不斂清膿淋漓久而不愈漸至泄瀉不食脾胃一敗不斃鮮矣若紅而帶紫者乃陽症也方可以荆防地黃湯愈之大便秘結者下之然陰症多陽症少痘後並未見有陽症之毒也又後有痘毒色白方最效

痘症諸方 補中益氣湯 此乃補氣散毒氣虛者初出痘時服三四劑痘易起發痘

頂陷者亦宜服之 黨參錢三 黃耆錢二 白朮錢半 炙甘草錢一 當歸錢二 陳皮分五 升麻分三 柴胡分三

加薑煎可與荆防地黃湯相間服之 荆防地黃湯 此方補血散毒血虛者初出

痘時服三四劑痘易灌漿與前後各方相間服無所不可 荆芥錢一 熟地錢四 山藥錢二

丹皮 防風 雲苓 山黃肉 生草錢各一 加生薑二大片為引加黃酒並沖服

大溫中飲 此方補氣血散寒邪提痘漿散痘毒凡痘頂不起空殼無膿嘔吐泄瀉

脾胃不開痘色不紅將欲塌陷速宜煎服並與大補元煎相間大劑連進溫中散寒

立時起發功難盡述 熟地錢五 白朮錢三 山藥錢二 黨參錢三 黃耆錢二 炙甘草錢一 柴胡錢二 麻黃

錢一 肉桂錢一 炮薑錢一 加生薑三片竈心土水煎濃用夏布搗出藥汁少加黃酒多次灌

之不可減去麻黃汗多者減之 大補元煎 此方大補氣血耑治痘症誤用涼藥

嘔吐泄瀉痘不起發危在旦夕速宜大劑連進不可減去附子與六味回陽飲相間

服之立見奇功有鬼神莫測之妙倫二三劑後泄瀉不止酌加附子更加龍骨粟殼

各一錢倫泄瀉全止減去附子若附子太多則小便閉塞 熟地錢五 黨參錢三 山藥錢二

杜仲錢二 棗仁錢二 枸杞錢二 黃肉錢一 炙甘草錢二 故紙錢二 白朮錢三 肉桂錢二 附子錢一 加生薑三大

片好核桃仁三箇打碎為引痘後減去附子只用肉桂數分調理數劑計日可復元

六味回陽飲

此方大補元陽治小兒氣血本虛痘瘡白場或誤服涼藥嘔吐

泄瀉將成慢驚危在頃刻速宜服此方倘有轉頭即加入大補元煎之內同煎疊進

名返魂丹 附子錢一炮薑錢一當歸錢三肉桂錢二黨參錢三炙草錢一加胡椒細末三分竈心

土水澄清煎藥或減去附子亦名六味回陽飲以多進為妙 白虎地黃湯 此方

去實火解邪熱治小兒出痘發熱不退口渴喜冷痘瘡黑陷小便赤臊大便閉結

口鼻氣熱等症酌加大黃以行為度若二便清白不喜飲冷身雖大熱乃是虛火仍

宜溫補所謂甘溫退大熱不可妄投此藥此乃備而不可輕用之方也 石膏錢三生

地錢二當歸錢三枳殼錢一大黃半錢木通錢二生草錢一澤瀉錢一加燈心為引熱退身涼即宜以

荆防地黃湯調理之

治驗 一余外甥孫汪宣六歲向日體氣虛弱偶爾感寒或食涼物即喘瀉發熱素知

其中虛生寒宜用溫補不宜寒涼乾隆甲寅年出痘醫師開方皆是生地銀花等藥

余曰藥性與氣體相違何能對症因改用補中益氣湯加薑桂四劑痘瘡結痂而愈

●一江姓子二歲發熱三日痘已出齊亦不甚多痘科欲以大黃連翹等藥灌之余

曰此藥灌下作瀉一二次痘即收矣彼不信作瀉後痘果收痘科用雞鷓子煮水灌

之次日忽有小痘暴出余曰宜用補也明矣奈痘師仍用小藥數粒瀉利不止而斃

一使女喜連五歲發熱一日紅點徧身成片痘師曰此名火燎苗十二日症也萬不一活堅云不必服藥余佯應之乃以大補元煎二劑脾胃較健四劑苗齊漿足惟形色晦暗且不結痂七劑而痂結十劑而全愈矣醫曰此痘能生萬不可解 一余胞姪文豹週歲出疹失於表散疊用寒涼泄瀉嘔吐脣焦舌黑已成慢驚危在呼吸余往視之謂醫曰此涼藥逼火上沖之故外雖極熱內實真寒醫曰脣焦舌黑豈非實火余曰泄瀉便清豈非虛寒天下豈有大便瀉小便清之實火乎醫不能答用大補元煎加胡椒細末同煎一劑驚止十劑全愈乾隆丁酉年余著福幼編內附載醫案甚詳 一魏明府之子三歲出痘甚稀痘科用涼數劑幸此兒體旺雖未大瀉而黑斑不退知其真火被清也痘後月餘頂間忽發一毒皮色不變大如酒盃此涼藥凝滯故也全用大溫中飲數劑而消 一舒友子十歲滿頭潰爛清膿血水幾數十處其父云此痘毒也半年不愈取出向日藥方都是連翹生地等涼藥乃知是寒涼入胃火無所依上沖頭頂此卽所謂虛陽貫頂也宜引火歸源之法用大補元煎兼加散藥每日一劑十日全愈 一余胞姪七歲在常州出痘甚稀醫師以涼藥敗毒當時雖未塌陷而形狀已狼狽不堪一月後右腿發一大痘皮色不變醫師堅稱火毒仍以生地銀花黃芩山查山梔等藥治之一劑而脾胃更減神氣昏沉二劑而



嘔吐泄瀉三劑而隨服隨吐庸醫不知藥不對症故胃中不受而曰吐藥不吐味以致瘡色晦暗數日不潰而殤 一六安僧人某者風雅能詩二句外發熱出痘予往視之見顆粒稀疏根盤紅活問其飲食有味二便如常彼求方藥予曰如此好痘可以不藥次日有痘師往彼爲之瀉火各種涼藥每劑加大黃三錢連服三劑瀉利不止痘瘡場陷絕口不食數日而逝虛弱人出痘悞服大黃真是毒藥試驗甚確未敢隱諱治痘者切宜猛省 一予外甥汪陵丙辰五月尙未一週向日便溏腰軟氣血不足可知忽發熱一日週身出痘稠密成片痘頂各有小孔破流黃水目瞠不能暫瞑晝夜下利十餘次乳汁入口卽從下竅流出肛門無沿空洞一穴痘書云肛門如竹筒者不治羣醫袖手余曰此卽前發熱論中所謂陰毒太重陽氣大虛症也非大加溫補萬不能生卽將大補元煎每劑用附子二錢肉桂三錢炮薑一錢五分丁香末五分胡椒末三分濃煎摭汁晝夜頻灌之藥汁入口已從下竅流出一連九次灌完一劑見者曰不必再灌待時而已幸母細心體貼曰藥雖流出似覺較少且灌藥一次目瞑片刻定是效驗於是照原方不改分毫如前法每日一劑又三劑此兒竟能假寐片時瀉下之物青黑中帶有黃色知其胃氣生動也照原方又進三劑肛門有沿瀉利稍止痘頂小孔長滿且已起發全灌清漿照原方加龍骨末粟殼各一

錢又進四劑痘已全然結痂至第十三日痘痂落盡斑點全無肚腹亦好聞者莫不稱奇余識得此兒是虛寒之症用藥得宜故有效耳尋常進瀉重者亦可治以上見遂生編

辨痘法 小兒發熱五指梢及中指冷是痘疹中指熱是風寒

看耳法 耳後紅筋痘必輕紫筋起處重沉沉兼青帶黑尤難治用藥精詳也得生

辟穢氣法 凡犯房事經水生產穢氣以大棗燒煙解之若防發癢者以樺皮和大棗燒煙解之被酒氣犯者以葛根茵陳蒿燒煙解之犯五辛氣者以生薑燒煙解之被死屍屍氣及癘氣所犯者以大黃蒼朮燒煙解之被狐臭犬羊氣犯者則燒楓樹葉解之若遇風雨時者則燒蒼朮楓樹葉解之若血少而漿難之痘則忌燒蒼朮蓋恐愈燥而漿愈難耳若遇諸惡氣則以乳香燒煙熏之以胡荽酒噴之浴有煮醋熏痘者以醋能活血殊不知醋能收斂大非所宜也

暑月出痘 房中多置涼水以收熱氣心自清涼

冬月出痘 房中多置炭火以除寒氣使血氣和暢爲妙

出痘兒睡不可驚動 此最要緊一經驚動則易成痘前痘後驚風抑且停漿不發

### 二十四項方

一腎經發痘初熱腰痛身如大傷背不能伸或連尾脊骨痛 雄雞一隻剖開雞腹取

出肝腸立將燒酒一杯噴雞腹內安放腰上用帶緊縛限一炷香久爲度其雞卽青臭不可聞連用二三隻其痛自止痘亦出

凡用此方必戒殺放生以爲小兒種福

二心經發痘忽然抽掣 此症與急驚相同用桃樹皮 葱子 燈心共搗爛敷顛門肚臍及手心足心限一炷香爲度則驚自醒而痘自出又於手足合骨處用燈火各燒一下以散風痰

三小兒體性怯弱或因吐瀉之後元氣愈虧不能勝毒汗出如珠四肢厥冷似睡非睡

眼中露白此痘與慢驚相似乃危症也 急用大附子錢四 乾薑錢四 丁香錢三 陳淡豆豉

錢三 小雄雞一隻 共搗爛再用燒酒略炒溫敷臍上及兩足心急換一二次其痘自出若有泄瀉加竈心土三錢

四後生輩或失陽之症方發痘欲出不出狂言亂語 此痘毒不出鬱火攻心既不敢

用清涼之藥以解毒又恐驟用補劑以助火此最難措手之症急用雄雞一隻生剖

開腹去腸雜以燒酒噴之敷於臍上其痘自出其語亦止凡欲補而不敢補其痘不

能出者俱用此方此從外托內神妙無比切勿視爲尋常或遍身疼痛乃毒出腎經

用黑豆一升煮熟搗敷腰上卽止蓋黑豆能解腎經痘毒也

五少年出痘或當色後悞爲發散傳爲陰症 新生雞蛋三箇取蛋白調乳服用再用艾

火灸肚臍四圍及臍下寸餘又扯起陽物離糞門各一半灸七燂其陽自回

六女人天癸已至當出痘之際經水忽行一則懼其穢氣相沖二則慮其血衰而不能

化毒 此最危險之症 急取桃樹上寄生播爛敷足心三炷香久為度經水自回

痘亦萬全 又方 月月紅花又名月季花 取花與枝葉煎酒服並煎濃湯週身洗浴神效

又方 老杉樹皮 舊棕 胎髮 共燒灰調酒服立止

七孕婦出痘激動其胎又不得下或胎死腹中而不能出 此至危之候宜取路上推

車蟲又名推屎蟲即蝼蛄也 及所推泥丸一並焙乾研為細末加威靈仙同研用酒調為丸納臍中

將膏藥貼住不論何項膏藥 三炷香久為度其胎即下如經不通亦可以通

八孕婦出痘腹中作痛乃胎動也若不頂住一經臨產則氣血兩敗痘必不全 急宜

內服安胎散照婦科內安胎方服之 外用蓮蓬殼 益母草各三錢燒灰存性 艾葉三錢 共為末醋調敷臍中連

換三次其胎自安

九少年出痘吐血或鼻血不止此虛火上炎血不歸經 宜取白菓搗水服後將柏樹

上寄生兩二 山梔根去兩根 共播爛敷臍中連換三次其血即止未止即照鼻部鼻血各

方治之自愈

十痘當起脹之時忽然便血 血既下漏安能起脹最危急也用 地榆 生大黃

紅花根 共爲末燒酒調勻敷尾脊骨三炷香久爲度連換三次其血自止如痘內夾有斑痘或夾丹症形如斑點皆是用土硃紫草爲末敷之即退

十一肝經出痘大便下血眼紅氣粗丹痧滿面紫黑不起 白頸蚯蚓七條瓜蒞仁十三

油粒去

杏仁十五粒去尖

共研末陳茶調勻作餅貼臍一炷香久爲度連換數次各症俱退

十二肺經出痘滑精夢遺咳嗽失音不省人事 取新生雞蛋一箇略開一孔去黃白

只用蛋殼將元參一兩取汁灌於蛋殼之中用紙封固再將熟黑豆搗爛包裹蛋殼置火中煨一炷香久爲度取出冷透火氣將元參汁與服其音自清而嗽亦止

十三小腸經出痘遍身發斑片紅片紫如雲如霞無痘出見不省人事 急將雪梨與

食又將芙蓉花 川椒 胡椒 共爲末紙捲爲條蘸麻油用燈盞盛之照於被內

覆蓋一時其斑自退而痘自出矣

十四胃經出痘咽喉閉塞或致失聲不思飲食上吐蛔蟲下瀉惡蟲 急將菘豆爲末

以雞蛋白調之喉閉則敷於頸吐蛔則敷於臍上瀉血則敷臍下

十五命門出痘鎖眉刺心煩悶不安大熱不退 生艾葉兩一黑豆一白芥子三錢醋煎一

滾爲度共播爛作餅敷胸前連換數次熱退心安

十六腎經出痘尾脊骨疼痛日夜不安 芙蓉根 馬鞭草 共播爛炒溫敷尾脊骨

上其痛立止

十七時值癩疾而復出痘口吐白涎咳嗽失聲 生薑片切包大附子煨再取薑汁和當

歸生地白芍共搗爛敷臍中二炷香久爲度白涎自止

十八痘見脾經甚爲美也然防禁不周穢汚相冲痘不起發狂言亂語徧身癢塌抓破

出血聲啞氣急 急用石膏 寒水石 麝香 鬱金 甘草共煮透去草滓又煮

乾爲末用蜜調敷胸前謔語自止而痘亦起發矣

十九痘出太陽舌心黑口氣臭大小便不利痘色紅紫 青黛 防風 全蝎 石膏

熱大黃 合勻爲末作餅敷臍中痘色自活諸症自退

二十痘出太陰夾斑夾疹胡言亂語或失聲不語 雪梨水磨真象牙與服則安靜聲

清斑疹亦退其痘自出矣 又夾斑而出者有紅赤點隨出隨收又夾丹而出者紅

赤成片俱用 玄參 升麻各二分 甘草八分 防風 荆芥 牛蒡子各六分 煎服如夾麻

疹而出者照上方加桔梗黃芩酒炒各六分 煎服均極效驗後尙有外治一方

二十一痘出胸腰疼痛叫喚不安 豆豉兩三錢 胡椒錢一 共搗爛又將生薑兩四錢 搗汁調勻炒

溫敷於胸腰二處其痛立止

二十二痘出腎經腰腹絞痛吐瀉交作手足冰冷大汗如注此陰盛陽衰 此最危險

急用乳香 沒藥 人參各一錢爲末作丸納臍中又將艾葉炒熱敷於丸上其症自平

二十三痘出不快煩渴悶亂臥睡不安咳嗽失聲 艾葉一胡椒三十搗爛調水取汁熬膏作餅敷臍中諸症自退

二十四痘如麻子一片成氈癢甚此爲風毒非真痘也因風寒閉塞皮膚以致真痘不出 菱荇子煮水洗浴再用貓爪荔枝燒煙薰之則真痘出而癢自至矣

推拿法 初發熱或爲風寒所閉一時無表散之藥須用推拿法以鬆肌表其毒自出又或其兒素性怯弱爲風寒所束固不得不發又恐表虛用藥發表有傷元氣亦用推拿之法又或其兒既服表藥依然身無微汗寒邪閉錮其症不退欲復用表散之劑又恐過表以損元神亦須用推拿之法蓋發散之藥多能耗氣推拿之法不過鬆肌發竅運動筋骸而已竅開則氣通筋運則血行氣血通暢而邪自出勿謂推拿之無益也余常用之其效甚捷故備其法 取溫水一碗先用大指蘸水於小兒兩鼻孔洗擦而上推者二十四下謂之洗井竈再於印堂用兩手指分開擦二十四下謂之開天門又於小兒兩手食指擦下三十六下以瀉三關之火又於中指擦下三十六下以瀉心經與肝之邪又將小指數擺謂之烏龍擺尾再於脈門擦下三十六下

復擦上十二下又於掌上順運八卦週旋擦一百二十下然後於虎口及手足凡接骨之處其穴有窩於各穴窩間用力俱捏一下臍下丹田各捏一下背上兩飯匙骨下及背脊每骨節間各捏一下任其啼叫令汗出而肌鬆痘毒亦從而出矣但推拿後宜令兒睡發汗不可見風腠理既開恐風邪復入也

或用前項方將桃樹皮與薑葱搗爛炒溫敷於臍上一柱香久爲度亦取其發表之義也

**痘疔** 痘中有紫黑乾硬暴脹獨大脚無紅暈或疼或不疼者卽痘疔也痘疔能閉諸毒未齊有疔則諸症不能出現既齊有疔則諸症不能起脹行漿時有疔則諸症必致倒陷故初出時見有紫黑獨大之點恐其成疔卽宜以銀針刺破吸盡黑血然後以拔疔散敷之次日復看若再硬脹仍然刺破以前藥敷之必轉紅活方可已也若針挑不動手捻有核則成疔矣須用針從四邊剗開以小鉗鉗出其形如疔有半寸許長拔去其疔仍以前藥敷滿瘡口乃可無虞又手足四肢有痘慘暗堅硬而甚痛或外無痘而內有核作痛者亦痘疔也宜以艾火燒之卽愈或以燈火烙之亦效若不急治則其痘深陷穿筋透髓而爛見骨甚可畏也又天庭有黑點心窩舌上必有疔地角有黑點陰囊必有疔兩顴有黑點兩腋必有疔準頭有黑點四肢必有疔此觀顯可知其穩又不可不詳也一婦人出痘稀疎朗潤似爲順症俱熱不退已而明潤者漸覺慘暗其人亦煩悶不安詳觀面部見地角一痘紫黑色焦察其陰中有痘



疔形如黑豆一顆此乃疔也用銀針剔破鉗出痘疔以拔疔散敷之其熱遂退諸症悉皆潤澤起脹而愈 拔疔散 明雄<sup>錢二</sup>胭脂米<sup>錢五</sup>無則胭脂膏亦可共為細末凡遇痘疔賊痘刺出黑血敷之 又方 京城油胭脂敷之立能止痛其效如神 又方 明雄<sup>錢一</sup>紫草<sup>錢三</sup>共為細末多用頂上胭脂汁調勻用銀針挑破搽之神效與油胭脂同 又方 將疔挑破出紫血蒲公英熬膏放水中日一夜冷透火氣敷之 又方 馬齒莧交猪骨髓少許搗融敷於四圍頃刻止痛不數日能拔疔根屢試屢驗 又方 大蒜頭切三分厚安痘疔上用艾葉一團如豆大在蒜上灸之每五次換蒜再灸若紫血出後腫痛不止尤當用灸痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散

舌上痘疔 銅綠 雄黃 硃砂 銀硃 人中白 共研勻擦之

赤斑核 小兒出痘有名赤斑核者形如癩癰發無定處多在活肉筋骨間則周身之痘皆不發起盡歸於有癩癰一處危症也治法將癩癰用手撮起以紅繩緊緊繫住然後用獨蒜瓣貼於患處艾灸七次務將癩癰灸至不知痛癢除其艾蒜庶痘可發生通身紅活矣此即痘疔之類照痘疔各方治之亦可

痘出一半忽然不語昏迷不省人事手足冰冷目閉面青唇白氣息俱涼 此厥陰症

也用雄雞一隻生剖開去腸雜以燒酒噴雞肚內敷臍上用布紮緊約一炷香久取出連換數雞其痘乃齊其人自愈其效如神

熱症方形虛症又現元氣本來虛弱而毒氣猛烈以致痘出不快 此症解毒既恐傷

元扶元又恐助熱頗難用藥照上方用雞數臍上屢用如神萬無一失

上身痘已起脹下身痘尙未出或出而陷下不起 頂好熱燒酒用油蘸酒乘熱熨之其痘自出屢試皆驗如不見效卽照前方用雞數臍之法無不效也

痘不起漿 凡痘不起漿或漿起復收急取癩蝦蟆一箇用手捉住將蝦蟆頭對住小

兒之口用細將小兒眼遮住以免蝦蟆吐漿入內離二三寸遠約一頓飯久放去另換一箇仍向兒口對之連換

三次其毒已被蝦蟆吸盡卽灌漿收功此法起死回生神效之至 又方 頂好熱燒酒用綢帕蘸透時時熨之輕者此法最妙

痘症黑陷不起 凡心煩氣喘妄語見鬼以不落水猪心血和冰片丸如芡實大每服

一丸以紫草煎酒下少刻下瘀血神清瘡卽紅活透出此醫所不能治者百發百中神應非常

又方 升麻一味先煎濃湯去渣用胭脂十餘張於湯內繅出紅汁加明雄黃末錢餘卽以胭脂綿蘸湯於瘡上拭之胭脂紅花膏所染故能活血散毒也如瘡不起發拭之亦可神效非常

兩頭痘 自胸以上自臍以下俱有中間一截全無者名兩頭痘此氣血不能貫通於上下而腰臍之間恐為寒毒凝滯也若不急治七日之後必變灰白之症矣見點時急用 生耆 當歸 赤芍 桔梗 防風 厚樸 續斷 白芷 山查 木通 入黃豆三十粒煎服之後中間有痘乃可無虞

蛇皮痘 頭面徧身俱無空地狀若蛇皮故以是名必乾枯不能作漿至十二三日而死昔予孫女出痘如此發熱之時寒戰咬牙口氣臭甚常如食物余曰此惡候也急與解毒用解毒湯日進三四服及痘出密如蠶種顆粒不明乃用 前胡 川芎

丹皮 梔子黑炒 紫草茸 人中黃 連翹 牛蒡 黃芩 紅花 連進數服乃分顆粒其後加生耆白芷去人中黃紫草黃芩紅花等藥其水漸升乃用參歸鹿茸湯加丁桂白芷白芍次加白朮其漿自足漿起之候竟似蛇皮落痂之際或片連皮而去徧身如蛇退殼手足指甲無一未落毛髮悉皆脫換其症果蛇皮也善以治之亦竟安全可見不治之症亦勿棄而不治也但症遇惡烈藥必猛攻而遷延觀望豈能救乎

空倉痘 痘雖肥滿內是乾枯全無血水乃空倉也其痘硬者名鐵殼空倉症至如是其必死矣此等之症其氣雖盛其血必虧或又以前失於解毒致毒火內熾其血愈

濁漿汁乃血之所化血枯故是空倉 一兒出痘甚多體性又弱醫人不明氣血之  
 理只謂保元湯乃治痘至穩之劑人參用去數錢其痘竟無漿汁請余往視余曰此  
 空倉也汝試以針刺之剔破之痘俱無血水其家大驚余曰無妨此氣有餘而血不  
 足也人參可以不用乃用 川芎 炙耆 白芷 牛蒡 肉桂各八錢 歸身 鹿茸  
各二錢 大生地三錢 白朮一錢 穿山甲四分 連進二服漿腳來矣乃去牛蒡而又以補血為君  
 補氣為臣其漿乃足而愈

菜黃痘 其痘不甚起脹四弦起而中略陷痘有亂紋於頂上形若菜黃名菜黃痘其  
 後必空漿倒陷而死此毒盛而中氣又虛故痘頂有紋而不尖圓也 一兒出痘如  
 此諸醫皆云難治請余視之見痘中間多有黑眼余曰以毒凝而氣不能升其毒將  
 入臟腑急為解毒行氣猶為可救蓋此時祇六日也乃用 生耆 牛蒡 連翹各  
錢 赤芍八分 升麻 白芷各六分 黃芩五分 黃連二分 甘草二分 川芎一分 蟬退二箇 外以楊柳煎水  
 洗之連服數劑其痘漸圓淨紋與黑眼俱無其後以補氣為君補血為臣治之竟愈  
 余治此症甚多其先必須解毒行氣菜黃紋乃可除也

血泡痘 滿泡通紅其內是血故名血泡此血熱毒熾不能運化以成漿故有此症急  
 宜涼血清毒為主用 生地 赤芍 紅花 紫草 丹皮 牛蒡 黃芩 白芷

弱者忌服查前看形色法斟酌用之爲要

白漿痘 初起發時瘡痘卽有白漿其後必成灰白癢場而死蓋漿必由脚而起乃爲

順症此毒參陽分而陰血不能運化故不久而卽陷伏也但初起之際間有數點卽

刺去其漿隨刺隨長有漿則又刺去時時看視不可怠玩內服千金內托散大補氣

血乃可無虞若遍身如此則難治矣慎之慎之或照前看形色法大補元煎治之更

妙 千金內托散 人參 當歸 炙芪各錢 白芍 肉桂各六分 川芎 炙草各四分

白芷分七 山查分八 木香 防風 厚樸各三分

漏痘參看各病篇 痘未成漿頂上有孔漏出汁水堆聚而結形若癩頭俗呼漏瘡此因表虛

不能養漿故不傷而自潰也急宜補氣健脾固其肌肉乃可救也若偏身俱潰則必

死矣須用 人參 炙耆 當歸 官桂 川芎 白朮 白芷 炙草 丁香

淮山藥 龍眼蓮子同煎

蛙痘 痘有小孔如針嘴大似蟲蛙之眼故曰蛙痘此腠理不密乃有是痘若不急治

大泄元氣必成灰陷而死須用 人參 炙芪 當歸 炙草 肉桂 丁香 加

荔枝爲引必孔祕而痘乃起脹行漿也仍參看各前篇爲要

瑠璃痘 痘雖光亮全無血色明若瑠璃略擦卽破內俱清水而或出血總無膿漿此

氣血不能運化毒氣而然也後必音啞而死痘若起脹見有此等急取其尤者而刺去其水再用實漿散 人參 黃芪 當歸 鹿茸 白朮 淮山藥 山查 扁

豆 白芷 炙草 加黃豆四十九粒或用大補元煎各方更妙

草尾珠痘 徧身俱陷惟尾脊骨一團飽滿潤澤且明如珠猶之草尾露珠也蓋脊骨為腎部此必腎強精髓充足急用內托之劑則徧身之痘旋復起矣

黑痘與各前篇並者施治為要

痘毒隨血而出毒盛血熱之甚故其痘黑也生必死之症古方雖有數條總以涼血解毒為主姑載於後以備參用 初見黑點在皮膚之間者用硃砂冰

片牛黃或用猪尾血調人牙散好酒同服 初出點便黑者用紫草茸二三錢好酒

調服 又皮膚發青紫紋者川紫草錢一紅花 荊芥 防風 牛蒡 生芪各八分

香 甘草各三分 升麻分五 又黑痕并黑靨者用蟬退錢五紫草茸錢一又黑如煤炭血不紅

活者用紫草 生地 牛蒡 赤芍 又黑而軟者氣弱血熱也用保元湯加紅花

紅花 紫草 生地 又焦黑潮熱煩躁者用小無比散三錢加紫草 生地

紅花 磨犀角調服 人牙散 人牙者自落 火煨存性入韭菜汁音之研為末加

麝香五穿山甲分二用鷄冠血葱白煎酒調服 保元湯 人參 黃耆 當歸 川

芎 紫草 紅花 肉桂 防風 小無比散 滑石兩六石膏一兩寒水石 煨鬱金

甘草水煎  
透焙乾

甘草各五錢 共為末

頭面頸項諸痘

與各前篇參看

諸痘未出獨於印堂先現一顆者名曉星報點此痘能閉諸毒

急宜以燈火燒之但小兒畏燈則必然躲閃須用銅錢一箇印於痘上令痘從錢眼暴出然後燒之乃不差誤一兒出痘稀疎潮熱亦退余見天庭有痘二顆其大異常余曰此宜去之其家不信余言至次晚復來請余謂其兒潮熱復作煩躁驚詭痘皆變色余往剔去其痘以藥敷之熱退人安痘遂起脹勿謂此為無害也 痘出點稠密其天庭地角雖然明朗而兩顴甚密一片丹紅不分界地此毒在肝肺若不急治一經咳嗽失聲則難救用 前胡 赤芍 紫草茸 生地 丹皮 牛蒡 連翹

川芎 黃芩 黃連 木通 甘草煎服外用冰柳草煎水時時洗面其痘立即

轉色又或以胭脂米搗水擦痘上亦能解毒活血但更難於辨色耳 嘴角有黑豆一粒而獨大者名單鎖口兩嘴角俱有黑痘者名雙鎖口皆惡候也此毒凝於胃主不食而死見此須宜剔破用口吸去惡血以拔疔散見前痘方內敷之或可救也鼻孔邊有痘名攔門痘鼻孔內有痘見後此為凶痘承漿即人中廣額先有數點者亦凶喉窩之痘主煩悶耳後窩頸項窩有痘皆不吉又或不拘何處有痘獨大異常者非賊痘即疔疔能閉通身痘毒俱宜速以燈火燒之或挑破用口吸盡惡血以拔疔散見前敷之 痘出而

驗方新編 卷五 小兒科痘症

三四五

喉窩及頸窩甚多者名猪頸又名鎖頸竟至於頤者又名托頤主飲食不進或喉爛或聲啞而死急用 山豆根 知母 桔梗 甘草 生地 川芎 歸尾 木通

牛蒡煎服緩則毒結於喉必難治也

眼中生痘 真新象牙磨水點眼其痘自退可免瞎眼 又方 頂上胭脂取汁點之

最妙 又方 蜒蚰蟲又名鼻淵蟲 放眼皮上周圍走動吐涎水其痘自散屢試如神

又方 照後痘後風眼起翳紅赤鱗尾血方最妙 又方 鯉魚膽點之鯉魚膽亦可

又方 細茶葉口咀敷眼外 又方 益母草熬水點之

免痘入眼 牛蒡子搗爛敷顙門痘不入眼

出痘眼目紅腫 細茶葉 菘豆 淨銀花口嚼敷之或以有膏黃紙塗鷄蛋白貼之

自退最忌食雞 又方 人乳汁蒸熱點之 又方 金銀花 胭脂 人乳汁

取燈心蘸點之

出痘症眼有膿血 兔子糞清油調搽

出痘眼痛 翳音異子草搗爛左眼痛塞右鼻右眼痛塞左鼻

舌與鼻孔有痘 黃丹 老土磚共爲細末吹之 又方 青扣布燒灰吹之 又方

珊瑚 檀香枯燒共爲末吹之 又方 先用皂角末吹入再用黃蠟塞鼻 又方



栢葉煎水服

出痘縮舌 蟬退 雄黃水煎木香磨茶調服

舌上有痘舌上痘 人中白焙 硼砂 兒茶 共為末搽舌上 又方 先用茶洗淨將

金黑磨水粉調塗之 又方 先用鹽茶洗淨用黃栢 黃連 元參 苦參 共

為末蜜調塗之 又方 鴨蛋燒灰研末鴨毛蘸搽之

舌上爛痘用油調服 黃栢 黃連 元參 共研末蜜糖調擦舌上 又方 人中白焙

枯為末搽之 又方 硼砂飛水 冰片點之

出痘噤口不語 吳茱萸煎水服

出痘腎腫 桑樹皮 細茶 生薑 槐樹皮 共搗清油拌炒包之 又方 若腎

紅腫取藍靛殿音 腳汁擦之 又方 如風腫者用鹽炒熱熨之或用槐花葉炒熱敷

之

腎嘴有痘 公鴨嘎氣數次即消

陰戶有痘 雄黃研末清油攪勻以鴨毛蘸藥擦之

痘症夾斑夾丹夾疹而出 如恐內服涼藥有礙正痘即以細密有膏之青扣布塗雄

黃麻油貼於紅處如難遍貼即於太陽太陰胸背貼之

痘出不透腹痛甚或黑陷 急用前鷄敷肚臍方最為神妙或照各前方施治必有效也

出痘中風 其症眼目直視牙關緊閉勿用驅風峻藥宜急用附子乾薑濃煎灌下令

出微汗而愈 若手足扭動急宜前急驚門各條細看為要

雜痘一齊湧出 楊柳葉 柑子葉 老艾葉 臘樹葉 煎水遍身洗之即退 又

方 鮮紅花 嫩紫草 金銀花 煎水徧身一洗 又方 水楊柳 桃枝 槐

枝 各三條 紫背浮萍煮水徧身一洗將燈火徧身一燒即出痘毒而正痘現 又方

清油 五 白蠟 生薑汁 硃砂 雄黃 共熬熱從頭起遍身一揩雜痘盡退正痘

即見

驗痘出齊法 五六日後痘當出齊凡看痘齊與否必以脚心為驗脚心有痘則出齊

矣然痘稀少者亦不拘此總以熱退而痘為出齊矣若熱未退雖四肢有痘終恐未

齊不可謂毒輕痘少漫不加意也

痘症作癢 抓成瘡疱欲落不落用好油蜜調開水時時以鵝翎掃之其瘡易落且無

疤痕 又方 川椒 艾葉 紅棗 核去 芫荽 茵陳 乳香 白芷梢 陳香櫞

安息香 各二錢 共為細末作紙燃薰照雖癢場之痘火到癢除安息香亦可此神燈照

法也 又方 荆芥穗爲末撒紙上捲成筒糊粘紙頭燈上燒燃在癢處略燒一下甚妙或薰照亦可

痘中生蛆癢不可忍 用針挑去蛆蟲自愈或用嫩柳葉鋪牀上睡臥其蛆自出 又

方 鹽醋湯服之或用癰毒門瘡中生蛆方治之最妙 又方 醋湯遍身噴之

痘症發熱胡言亂語 干脚泥搗碎鷄蛋白調敷臍上 又方 藍靛音殿脚汁音孟燕子

泥調敷臍上燒五寸香久取去 又方 小雄雞一隻生剖開用雄黃麻油塗入雞

肚內將雞敷臍上最穩最妙並用前芙蓉敷足各方更爲神效 又方 生蘿蔔搗

爛和鉛粉作餅敷脚心亦妙 又方 燕子窩泥雞蛋白調餅敷臍上 又方 熱

甚恐起驚風用小針刺男左女右中指取血爲妙

痘齊熱退愛睡地上日夜不安 此火伏中焦也用前項方剖雞敷臍上自安

狂熱痘毒麻木致死 此症有由脚麻至小腹而死或由頭麻至心口而死一日死甦

幾次藥宜早製以備急用冬月取小男孩糞要乾結者爲佳稀者不用陰乾用泥裹好燒成炭去泥取

糞研末每用錢三豆腐調服神效並用吳茱萸末熱醋調敷足心亦神方也

皮肉紅腫而痘不腫 三豆散 黑豆 菘豆 紅飯豆查藥物備要便知 共研細末再將醋研

爲濃汁以鵝毛掃之神效

痘症潰爛膿水淋漓 多年蓋屋茅草洗淨焙乾為末搽之神效 又方 松花粉搽

之亦效 又方 黃牛糞焙乾研末清油調敷無論如何潰爛皆能收功 又方 紫草麻油熬成膏加

白蠟再熬數滾取起敷之神效 又方 京城油胭脂敷之亦神驗也

痘症泄瀉參看前痘症治驗未篇為要 男左女右在肚角上有一窩即止瀉之火穴也其法用本人之

手下垂肚角然後將其手曲轉令手莫動以曲骨下為下此處必有一窩即於窩中

用燈火連燒三次其泄自止但痘前吐瀉總勿亂治恐滯毒氣若痘出而泄瀉不止

則宜施治慮中氣虛則痘難起脹也 泄有兩端泄而糞黃臭穢小便赤澀者此毒

氣奔越熱泄也痘色必紅紫加味四苓散主之泄而糞青白滑利者虛寒也痘色必

淡白參朮散主之如虛泄不止兼用七味豆蔻丸無不止矣此聶久吾先生痘症經

驗方也 加味四苓散 治痘症熱泄如神虛泄者斷不可服 猪苓 木通各八分

澤瀉 赤茯苓各七分 川連炒 黃芩炒 牛蒡煉淨炒 車前子各五分 燈心一團 水煎空心服

參朮散 治痘症虛泄並尋常脾虛泄瀉屢試如神 白朮土炒 軟黨參高麗參 白茯苓

苓 砂仁 炙甘草 薏仁炒 白蓮肉去心 真神麩 查肉各五分 肉豆蔻輕裏煨熟去殼切細紙包打去

油訶子火內煨去核 廣陳皮去筋各四錢 南木香錢三 共為細末每用二錢米湯調空心服小兒如不肯服或調稀粥服亦可 七味豆蔻丸治與參朮散同 肉蔻 訶子俱照前製 砂仁

白龍骨煨南木香各錢五赤石脂煨枯礬各錢七共爲末稀粥爲丸如菉豆大量兒大小

每服二十九或三十九丸米湯送下如不能吞丸或不肯服者研碎和稀粥服若服丸

後仍從大便秘滯泄出而不化者亦研碎和粥服之其瀉立止屢試如神

痘症小便不通 細茶嚼融紙包敷臍上 又方 樟樹皮 薑 葱 老艾共搗爛

炒熱敷小肚上女人放陰門上即通

痘症大便不通 葱一把搗作餅敷臍上用錫壺盛滾水熨葱上即通

痘症耳目口鼻出膿 行漿之際有眼耳出膿鼻竅流膿口吐臭膿者皆其內中有痘

不能結痂潰而出膿不必施治內痘成膿則毒已化自可無虞

痘風餘毒入目致生翳筋膜或成珠目蟹眼 蛇蛻全者一條馬勃兩皂角子十四粒蟲蛀者切不可用共入

瓦罐用泥封固泥內加鹽少許以免出氣連罐燒紅存性候冷透火氣取出研末每服三錢滾水送下

神效

痘後風眼或起翳或紅赤 經霜大桑葉七片或冬至收或立冬收蒸水半鍾加入食鹽少許早晚

洗 又方 頂上胭脂泡水鋪紙上以新筆在紙上蘸水一日點三次三日即愈極

效 又方 仰臥牀上取黃鱉音尾上血滴入閉目少頃拭去一日三五次即愈重

者數日全愈但必須鱉魚尾血每次換一鱉用過即可放去諸藥不效者用此極驗

痘風眼邊紅爛作癢 照目部眼邊溼爛紅腫第二方治之最為神效 陳糞坑拖尾

蛆清水漂淨竹刀破尾取水點眼邊二三次即愈端午日治之尤妙

痘後兩目難開 兔糞<sub>錢二</sub>蜜蒙花 蟬退<sub>足去</sub>穀精草<sub>錢各一</sub> 共為末用豬肝竹刀切開每

肝<sub>附一</sub>入末<sub>錢一</sub>包肝內蒸熟去藥飲汁食肝神效 又方 燈心蘸清油潤眼上 又

方 黃柏<sub>末</sub>入水久浸將紙染溼鋪眼胞 又方 黃連 黃柏 黃芩 元參

乳汁調勻飯上蒸擦之 又方 黃豆口嚼成餅敷之 又方 自己熱小便黃紙

浸溼貼之

痘後耳內腫痛時流膿血 先用棉花攪淨膿血然後用黑砂糖調水少許滴入耳中

其痛立止其汁自乾戒勿抓挖而自愈矣或照耳部各方治之

痘後鼻常常流涕臭不可聞 此名鼻淵乃熱毒乘於肺經而熱蒸肺竅也 絲瓜近

蒂<sub>五</sub>黃芩 梔子仁 牛蒡 甘草同煮服外用絲瓜藤燒灰為末吹入鼻中並以

絲瓜燒灰調酒服亦可 又方 照鼻部松花粉治之甚效

痘後唇不蓋齒 此氣血兩虛急宜大加培補斷不可服涼藥否則必成慢驚之症則

更費手須請名醫加意調理不可忽略若頂門下陷尤宜急治

痘後唇口生瘡 上唇有瘡蟲食其臟其名曰狐下唇有瘡蟲食其腑其名曰惑皆由

裏熱生蟲內食臟腑乃有此瘡形也必其人昏昏好睡不思飲食其聲嘶啞而音不亮即狐惑也此最惡之候必致鼻崩毛落失聲而死宜用除隱丸治之 黃連錢二 蘆薈錢三 使君子肉錢三 白蕪荑錢五 蟬退錢三 川練子肉錢一 共爲末用真烏梅洗淨去核搗爛和末爲丸米湯下

痘後齒癢或出血 此餘毒留於胃經將成走馬牙疳也若不急治其後牙齦腐爛日落一齒滿口落盡而死當發癢之時急宜用 連翹 牛蒡 慈菇 石膏 生地

銀花 紅花 甘草 煎水時含口內

痘後牙齦口舌破爛出血或成走馬牙疳 人中白錢一 銅綠錢半 麝香分一 共研末先將濃茶洗淨口牙後用指頭蘸藥敷立愈或照齒部各方治之 又方 生香附 生

半夏各等分 爲末生鷄蛋白調作餅敷兩足心一週時洗去重者連敷數日其效如神

痘後口角流涎 細茶葉末 白沙糖調服 又方 鹽薑細茶葉同嚼食 又方 照

口部口角流涎方治之

痘後咽喉腫痛 甘草 桔梗各五分 防風 元參 鼠黏子 升麻 射干各三分 水煎服

痘後昏迷亂語 當毒氣已散元氣未復精神疲倦故昏昏睡即呼之不醒亦自無

妨若連日不醒口中喃喃自言自語形如罪人每多妄語者此邪熱乘於心胞也宜

以導赤解毒湯或以安神丸主之 導赤解毒湯 木通 車前 生地 門冬

甘草 茯苓 石菖蒲 梔子 人參 燈心湯下 安神丸 牛黃分五錢五黃連錢五當

歸 炒梔錢各半二共為末入猪心血和勻為丸硃砂為衣燈心湯下無真牛黃則加川

貝膽星琥珀

痘後聲啞 杉樹節 訶子 生薑 地坊下土若寒加胡椒煎湯竹油調服 又方

葱 薑 清油合炒熱徧身搯之再用燈火喉下一灸胸膛三灸兩乳下一灸

痘後心痛不可忍 此餘毒歸心也用 乳香錢二水煎服並用白沙糖兩四酒沖服水沖亦可

或服護心散見雜毒方亦妙

痘後肚腹腫脹 黃栢 苦參 共為末清油調勻熬過作膏貼之 又方 桐子葉

淡水池軟水用清油雄黃塗葉上貼三五次效 又方 燈花數十朵入鹽炒過加鉛粉調

成餅貼臍上

痘後浮腫 照鼓脹門病後浮腫方治之最為簡便妥穩如不見效照後各症治之

痘後膿血去盡脾土已虧氣血俱衰邪易入而食易傷故或感風溼或傷飲食或滯

餘毒皆發為浮腫然感冒風寒者多自面目先腫而身熱口渴宜用 升麻 柴胡

茯苓 木通 車前 防風 大腹皮 甘草 薑 葱汁引煎服微汗而腫自



退矣 有感溼氣而腫者多在足下先腫其形光亮以手按之而卽有窩其起亦緩  
 且其人好飲而小便赤澀以水洗之而更腫者此水腫也治當健脾利水爲主宜用  
 蒼朮 厚樸 木通 車前 滑石 瞿麥 澤瀉 豬苓 茯苓皮 大腹皮  
 使小便清利其腫自消外用蒼朮檀香燒煙熏之以被蒙蓋令出溼水其腫自退  
 又有食積而兼滯毒者多自腹先腫起必腹中隱隱作痛不思飲食且腹有微熱大  
 便黃臭小便赤澀者滯積而腫也治當消導解毒爲主宜用 蒼朮 厚樸 陳皮  
 大腹皮 香附 川芎 山查 神麴 牛蒡 連翹 木通 車前 茯苓  
 半夏 甘草 又有脾氣不行而浮腫者其皮如鼓按之難下乃氣腫也治當理氣  
 爲主宜用人參五皮散治之 人參 白朮 官桂 麥冬 大腹皮 陳皮 桑  
 皮 薑皮 茯苓皮 木香 澤瀉 車前 木通 又有血不行而腫者其皮膚  
 之內隱隱皆有血路是血腫也治當以活血爲主用四物湯加 人參 陳皮 香  
 附 木通 茯苓治之使血行而腫自退矣 又有面目四肢腫者屬脾因表虛爲  
 風寒所侵而腫宜發汗而腫自消用加味五皮散主之 羌活 防風 桂枝 防  
 己 蒼朮 木通 五加皮 桑皮 大腹皮 茯苓皮 薑皮 豬苓 甘草  
 又有腹脹如鼓眼胞微腫者屬脾因脾胃素虛土弱不能制水以行水蓄而不行故

浮腫也 又或傷食滯積脾不能消以致溼熱內蓄而腫者俱以厚樸湯治之 蒼

朮 厚樸 陳皮 大腹皮 茯苓皮 猪苓 木香 水腫者其陰囊赤腫加

澤瀉 滑石 車前 木通 葶藶 積滯腫者加 山查 神麩 三稜 莪朮

萊菔丸 通治一切浮腫 萊菔子炒胡椒 厚樸各五錢 白朮兩共爲末作丸以

陳皮煎湯送下 又虛弱而氣不行者用肉桂磨酒服外用燒酒搽之卽愈

痘後癰毒初起紅腫 照前三豆散治之其效如神

痘毒色白 此因小兒出痘多服涼藥血寒氣滯以致毒發色白若再以涼藥服之其

痘流走患生不久則生管成漏漏久必生多骨害人不淺凡遇此症須用小金丹

見陰服之神效有秦姓子生痘毒色白醫用清火解毒藥其毒日增後生毒二十處

至第二年孔皆生管日流臭水右足縮不能行坐臥三載始來就治余以陽和丸小

金丹犀黃丸等藥與服內用化管藥半月已愈一半一月管化孔內有多骨者已出

盡後秦姓帶子回家與以生肌散及調和氣血之丸帶回不料任子率性不服不洗

不敷並以酸橙石榴等菓食之以致臭不可聞其管復舊仍照前治之而愈此林屋

山人秘法也 又方 蝦蟆灰散見癰毒 敷之亦極神效

痘後偏身無皮膿水不絕 茶葉去梗熱水泡透鋪牀上睡一夜膿水自乾

痘後蟲蝕疔瘡膿水不絕 出蛾蠶繭不拘多少將生明礬末入內填滿燒令汁盡成

灰爲末摻之即愈

痘風瘡逢春即發 黃丹 黃芩 黃柏 大黃 輕粉 共爲末猪油調敷

孕婦痘症 妊娠出痘痘家最忌蓋痘毒出於五臟痘毒發越則風火相搏必致動胎

胎動則氣血耗散勢必不能送毒行漿况痘家用藥多主溫補如半夏肉桂之類皆

妊娠所忌而黃芩烏藥又非痘家所宜此孕婦出痘所以難治也遇此總以清熱安

胎爲主

發熱 有孕之婦遇出痘時急宜遠出迴避若至出痘當發熱時即以保胎爲本以托

痘爲標仍用升麻葛根湯加酒炒黃芩土炒白朮以保護其胎元夫黃芩寒涼易至

冰毒若無孕仍不敢早用然有孕而毒火薰蒸不用黃芩以清內熱胎必不能保矣

至於出齊熱或未清黃芩亦不妨再用

見點 孕婦出痘始終以安胎爲主故見點後多服安胎飲爲佳若口渴者則用人參

白朮散加減滯者則用黃芩湯合四君子湯加訶子血動者用芩連四物湯腰痛者

保胎散宜早服總之不問輕重悉以清熱安胎爲主 安胎飲 台黨 白朮 條

芩 當歸 白芍 川芎 砂仁 蘇葉 陳皮 熟地 甘草 生薑 片三紅棗 枚

水煎溫服 黃芩湯合四君子湯 黃芩 白芍 人參 茯苓 白朮 甘草

訶子 芩連 四物湯 當歸 白芍 地黃 川芎 黃芩 黃連 保胎散

玉竹 酒洗 當歸 酒洗 續斷 酒炒 杜仲 各錢半 水炒 茯苓 黃芩 酒炒 白朮 各一錢 去炒 川芎 甘草 各八

煎服

灌漿 長漿之際痘暈紅紫此血分有熱必用清毒活血湯內有黃芩外加白朮五六

分以固胎元胎必不動若痘暈淡紅以及淡白必用千金內托散 前見 倍加參耆去肉

桂外加白朮一錢以固胎元胎必不動此母子兼治之法也

墮胎 孕婦出痘以安胎為主若從前不能按法調治至熱氣內蒸而墮胎者多矣遇

此等症令老成穩婆撐扶產母以熱水淨沐下身扶其上牀不要倒睡必須強坐一

二刻用滾水兌白酒一鍾入童便半盞和服行其瘀血若痘稠密用加味保元湯氣

血虛甚用十全大補湯若小腹急痛瘀血未盡者宜黑神散以滌除之寒涼切不可

用 味加 保元湯 台黨 黃耆 當歸 川芎 白芷 桔梗 上厚朴 紫草

防風 牛蒡 白芍 肉桂 黑神散 熟地 當歸 川芎 甘草 肉桂 炮

薑 蒲黃 炒 黑豆 香附 炙 童便酒煎服

產後出痘 婦人產後出痘只以大補氣血為主十全大補湯是此時要方方中白芍

亦用好酒炒熟不可妄用寒涼以傷生發之意也

引牛痘說 痘何以曰牛也痘之種自牛來也外洋向無此疾後由他處傳染患亦滋多惟畜牛取乳之家獨不沾染醫人欲窮其故見牛乳傍有青藍小疱形與痘類因悟牛之患痘必輕以之傳人必然無害於是按古針刺法取牛痘之漿種人兩臂消燂清冷淵兩穴旬日果於所刺之處隨出數顆按日灌水按日滿漿按日結痂落醫無一損傷無一復出蓋牛土畜也人之脾屬土以土引土同氣相感同類相生故能取效若此痘種自牛而來故曰牛痘也 其曰引何也曰痘之爲毒受於先天感於時氣散於經絡男女交感之會先天胎毒既有淺深感時行之氣復有善惡而散於經絡分配五臟又有輕重正痘有發熱卽現點者最險之症腎經之毒也由腎而肝而心而肺而脾傳經既多其症亦遞減故痘之發毒腎最重脾最輕按古痘苗寒鼻孔法亦必五臟傳徧始能發熱緣鼻者肺之外竅也苗塞鼻孔其氣先傳於肺肺主皮毛肺傳於心心主血脈心傳於脾脾主肌肉脾傳於肝肝主筋肝傳於腎腎主骨痘毒藏骨髓之內感苗氣而發其毒自骨髓盡達於筋腎藏之毒解矣自筋盡達於肌肉肝藏之毒解矣自肌肉盡達於血脈脾藏之毒解矣自血脈盡達於皮毛心藏之毒解矣自皮毛盡達於顆粒肺藏之毒解矣苗氣必歷五臟層遞而入內毒亦必

195

歷五臟層遞而出此傳送之次序也今種牛痘法擇於兩臂中消燦清冷淵二穴上下交連之處種之似與塞鼻孔法有異殊不知二穴部位乃手少陽三焦經也三焦者人身最關要之府如天地之三元總領五臟六腑營衛經絡通內外左右上下之氣三焦通則內外左右上下皆通得其關要之處引之直從皮毛血脈肌肉經絡同時直傳而入使縱有胎毒深藏於腎亦自然同時引挈而出如引路然引諸坦途則無顛躓之患如引絲然引其端緒則無棼亂之憂金鑑所謂引其毒於未發之先者即此意張遜玉種痘新書所謂以佳苗而引胎毒斯毒不橫而症自順者亦此意故凡種痘皆用引法而引毒從皮毛血脈肌肉筋骨同時而出則牛痘爲最捷也痘爲小兒一大病當天行時人人尙思遠避今無故取嬰孩而與之以病可乎曰非也譬之捕盜乘其羽翼未成就而擒之甚易矣譬之去莠及其滋蔓未延芟而除之甚易矣人家小兒出痘如遇險症延醫服藥舉家日夕守視多少酸辛問卜求神多少驚恐其輕者亦須多方調護今牛痘則止種四顆或六顆小兒嬉笑飲食一切如常旬日之外告厥成功無災無害不惟小兒省卻疾苦卽育子者亦省却憂勞法誠善也或問種牛痘有死者否曰斷無致死之理予少時未出天花洋醫爲予種時年三十二歲今已十有三年矣經予手所種小兒不下萬千皆根基長養以至娶妻生

子不能悉數卽如南城賓谷曾大中丞年近六旬艱於得嗣前開藩吾粵時舉一子命予爲種痘隨手奏效蒙贈以勿藥有喜四字扁額其他所種萬無一失人所共知若非身試無誤敢以爲兒戲乎

堅信洋痘說 人誰不愛兒女愛兒女誰不念及出痘一事必要過了這箇關頭方算得是自己兒女今有種洋痘一法不避風不禁口行所無事萬無一失豈不大好奈何猶不能盛行只是人不能堅信怕出了洋痘遇着天行痘子又會復染夫廣東行此近三十年予所問廣東人多矣皆言從未有復出者廣東三十年來所生之人在外省仕宦商賈者不少未聞有再染天行痘子者就是湘潭雖未盛行前三四年也有十數家出洋痘何曾再染天行痘子來且今年有幾家出了洋痘信不的確又吹苗試之並不復出此亦實實信得過了或謂種洋痘者過十年當復出果爾則十年一回百年不過十回穩穩當當也不費力況乎必無此理也試想他從兩臂點苗略刺皮膚微見血點到次日已無形迹了若不是直達臟腑如何過了三四日方見紅影又三日長水三日灌漿三日結痂如期不爽與吹苗一般長得晶圓飽滿比吹苗之痘更好看些蓋先天之毒蘊於無形以氣引氣而痘出焉吹苗是以氣引氣點苗也是以氣引氣爲何獨信吹苗而不信點苗乎但點痘之家主人必須留心其結痂

之後痂是尖頂斜脚則毒氣未出必要點過方能算得卽不尖頂斜脚而當長水瀉漿時小兒氣血不足或有泄瀉之病不能長到飽滿毒氣須出而未盡出必須重服者尤等藥補脾助氣使他長得十分飽滿方好誠恐本要再點而主人自以爲算得過了業痘科者亦照管不到則萬中或有一二復出者蓋此法原有引至兩次三次之說不可顛預了事也若因本要再點未及再點遇天行痘或又復染則人皆藉口益無有復信之者矣豈不大可惜哉予考醫書中所載嬰兒生數日刺出臂上汚血終身可免出痘一條後穴道刀法皆失傳今之點痘或其遺法也夫以萬全之法失傳已久而今復行者大約前此劫數未滿而今日洋煙入中國害人不可勝計把那劫數抵過了故此法亦從洋來得以保全嬰兒之年壽耳若不堅信而遵行之是違天而自外於生生之理矣予家中今年小兒出洋痘者十餘人目擊其事深察其所以然堅信不疑欲以堅天下人之信因以理淺之詞爲堅信洋痘說 按洋痘之術道光丁亥行之吾鄉全活嬰孩甚衆吳子獻廷其術尤精所點不下數千人以吾親友所見所聞二十年來從無一重出者誠保赤之妙手也

經驗小兒月內出痘神方歌訣 小兒出痘得祕傳 十日之後休遲延 過十八日則不驗 未過十日兒力絀 金銀花與荊芥穗 紅花桃仁各一錢 生地當歸



共赤芍 各用二錢不須添 再加五分生甘草 兩茶盃水同相煎 煎成一小  
酒盃滿 切莫近於煤火邊 藥引即用兒臍帶 約二三寸瓦焙研 研末調入  
藥內服 與兒數次分服全 頭日服藥次日出 三日收功自安然 不灌漿亦  
不結蓋 徧體色吐紅活鮮 喂乳之人不忌嘴 小兒微熱如常眠 醫不延請  
神不供 不忌生人不忌言 小兒毒輕祇出痘 毒重痘後疹相連 此方屢試  
既屢驗 特為傳播歌一篇 方用 金銀花 紅花 桃仁錢各一 生地 赤芍各二  
錢 荆芥穗錢一 生甘草分五 當歸錢二 水二茶杯煎一酒杯用本孩臍帶約二三寸焙乾用  
煤 研末調入藥內令小兒分數次服盡頭日服藥次日出痘三日收功不灌漿亦不  
結蓋而形色紅活與正痘無異但須於十八日內用之若過十八日則不驗矣 按  
方藥極平淡不過清疏活血之常品而奏效如是之捷者良由甫生嬰孩氣血渾  
融腠理通達引以本身臍帶火焙之力運動命陽故能將胎毒發出理殊可信邦  
江金陵鏤板印送者皆僕述其效因採入以廣福幼之意焉又堂誌

浴兒免痘 除夕黃昏時用大烏魚一尾小者用二三尾煮湯浴小兒徧體須七竅俱  
到可免出痘不可嫌腥而另以清水洗去如不信試留一手一足不洗他時痘多出  
在不洗處此方異人所傳不可輕視新

不出天花經驗方

天麻子

三十粒去殼  
衣揀用大者

硃砂

一錢揀  
明透者

麝香

五釐揀  
真淨者

右三味先將硃砂麝香研細

末後入天麻子共研成膏於五月五日午時擦小兒頭頂心前後心兩手心兩足心兩脚彎兩脇共十一處俱要擦到不可短少擦如錢大勿使藥有餘剩擦後不可洗動聽其自落本年擦過一次出痘數粒次年端午再擦一次出痘三粒再次年端午再擦一次永不出痘如未過週歲小兒於七月七日九月九日依法擦之更效男女治法皆同傳方之家不出天花三世矣

增新

### 小兒科癩症

癩症論 癩症初起多有咳嗽噴嚏鼻流清涕眼淚汪汪兩胞浮腫身體漸熱二三日或四五日始見點於皮膚之上形如癩粒色若桃花間有類於痘大者惟見形之後形尖稀疎漸次稠密有顆粒而無根量微起泛而不生漿大異於痘也雖云較痘稍輕而變化則速始終調治俱宜留神總之初起宜先表法透澈最忌寒涼已出時當用清利收散後貴於養血兼雜症者則隨症參治之溫疹症見傷寒也若發於未痘之先為癩疹月內為爛衣瘡百日內為百日瘡發則徧身紅點如粟米之狀乃兒在母腹受熱所致調攝謹慎自能速愈痘方愈而疹隨出為蓋痘疹發徧身出疹色赤作癩始如粟米漸成雲片因痘後餘毒未盡更兼恣意飲食外受風寒之所致宜疎

風清熱爲主至疹出多癢色紅赤隱於皮膚中爲癩疹乃心火灼於肺經更兼外受風溼而成治宜先散風溼後清熱毒斯得其法皆非癩疹稟諸胎元毒也

癩症與傷寒辨 發熱之初寒熱往來咳嗽噴嚏鼻塞聲重且流清涕其症與傷寒無異但癩症則眼胞略腫目淚汪汪面浮腮赤惡心乾嘔此爲異耳若見此症必是發疹須宜謹風寒節飲食避厭穢戒葷酒忌辛熱用藥表散使肌膚通暢腠理開張或身有微汗則邪從汗解而毒則易出耳熱至三日癩當出矣一日出三遍三日出九遍至六日間當出盡矣乃出至足頭面將收收靨之處其熱即退疹子漸次收下熱赤漸次而退至八九日癩始收齊而熱乃退盡也若發不出者固危出不盡者亦險出而旋收者更險治之其可緩乎

論癩症輕重 或熱或退而無他症者輕 頭面不出者輕 出透三日而後漸收者

輕 紅活潤澤頭面勻淨而多者輕 紅紫慘暗乾焦不潤者重 移熱大腸變痢者重 黑暗乾枯一出即沒者難治 紅紫慘暗乾焦不潤者重 移熱大腸變痢難治 胸高氣喘心前扇動者難治 鼻青糞黑者難治 鼻扇口張目無神光者口鼻出血人事不清大小便秘狂亂不甯舌苔黃黑口氣腥臭此名閉症毒滯於中而不得出將作內攻最危候也急以清毒解表湯主之若疹能出可救疹不能出難

救方用升麻 防風 荊芥 麻黃 連翹 牛蒡 桔梗 石膏 知母 黃芩

黃連 蟬退 麥冬 甘草 水煎服 一癩症鼻出血者毒重口出血者毒尤

重口鼻血出不必止任血出則熱毒解散矣初起手足心如火熱者毒亦重初起失於清解則熱蘊於胃口鼻腥

臭必生牙疳毒入大腸則生痢痲發表太過元氣損傷則成疳積若或失治於前其

必貽患於後雖明初發之重輕宜顧後來之生死雖謂癩也祇詳於前而不可不思其

後乎 一感風熱而出癩者俗謂飄癩此皮膚小恙不致傷人祇散風清熱而即愈

矣 一小兒初生彌月之內而出癩者俗謂胎癩可不藥而愈

癩症四忌 一忌葷腥生冷風寒 夫穀氣通肉氣滯凡是葷腥俱能滯毒所以忌也

菓生則難尅化物冷則能冰伏冰伏不化毒乃滯留又當忌也若風寒閉塞毛竅不

開則毒氣何由出乎此數端者俱不可犯也 一忌驟用寒涼 癩雖熱症固不宜

用辛熱之劑然初熱之際虛實之症未形輕重之勢未見遂驟以苦寒之藥而峻攻

之幾何不冰伏其毒而不得出其反至於內攻乎故善治者惟達毒而不鬱毒祇解

毒而不冰毒也 一忌誤用辛熱 癩本熱症若復投辛熱之藥是猶火上復加薪

也以火助火其毒不愈橫乎然癩症初起之時亦有四肢厥冷者然熱極似寒之故

切不可妄認虛寒而妄投以熱藥也即遇天時大寒亦宜置煖室切不可因嚴寒而

遂投以辛熱之物以濟腹中之火也 一忌誤用補澀 毒火之發最要疎通尤嫌補澀蓋疎通則毒得外洩而解補澀則毒滯內留爲殃但初發之時症多吐瀉愚夫愚婦急欲止之若誤用參朮砂仁補澀之藥則關門閉盜毒滯於中必作內攻之禍矣

**癩症治法** 夫痘爲陰毒其勢更緩或死或生尙判之於成漿之日癩爲陽毒其熱甚烈若存若沒早定之於方出之時故發熱三日癩當現於皮膚若腠理緊祕風寒嚴束氣滯於中毒凝於內不能出現則毒作內攻須臾告變故痘則慮難成漿癩則懼其不出癩前痘後最爲緊要此古今之通議也當發熱三日之間急宜觀形察色審聲辨症以爲調理之方如聲重鼻塞肌粟惡寒是爲風寒所束宜用加味升麻湯

升麻 乾葛 防風 荊芥 牛蒡 連翹 桔梗 木通 赤芍 甘草 柴胡

黃芩 陳皮 蟬退 元參 加葱白水煎熱服令取微汗一二服間其癩卽出

如大熱薰蒸肌膚乾燥目赤脣紫毛髮焦豎煩渴不安驚狂癩譫二便秘結而出不快者乃熱毒盛壅故也宜用梔仁解毒湯 梔子 黃芩 黃連 石膏 知母 牛蒡 連翹 升麻 柴胡 防風 赤芍 甘草 大便秘加酒大黃煩躁加麥冬嗽甚者加杏仁桔梗花粉驚譫用抱龍丸或牛黃丸無汗腠理祕加大黃再用紫

蘇煎水令熱氣蒸之或用酒徧身擦之然後以被蓋片時其癩卽出治風寒閉者亦如是若爲穢氣所觸而出不快則用沉香檀香荆芥燒烟薰之 又有毒氣本盛元氣又虧而出不快者宜用人參白虎湯 合黨參錢二石膏錢四知母錢五加升麻 防

風 牛蒡 炒芥 水煎服 孟氏治癩方 石膏二兩荆芥 地骨皮 桔梗各

錢 赤芍 牛蒡 薄荷 陳皮 枳殼各六錢川貝 甘草各四錢紅花三錢乾葛 歸尾

桑白皮錢各一共爲末每服三錢開水下此方能發表透肌清毒活血理肺消痰清

胃解結不拘四時皆可服誠治癩之良方也

癩發不起江周善庭言其女癩伏不見將殆矣照此方治之頃刻卽發其效如神 凡癩發不透氣喘欲死卽用脂麻五合以滾水泡

之趁熱薰頭面卽發起死回生之妙法也用水盆置榻中坐兒其上薰之庶無風邪襲入 又方 小米即粟米粟紅壳煎水

不拘時服看似平淡功效異常 又方 櫻桃四五斤入磁瓶內密封埋土中過兩

三月俱化爲水遇此症危急者取此汁一盃略溫灌下垂死回生經驗無比不可忽

視有志仁人多預製以濟人功德不小 又方 沉香 木香 檀香 不拘多少

於大盆內焚之抱小兒於烟上薰之卽起

癩症作癢 好白蜜調水以鵝鴿時時薰掃

癩伏變症 按癩症將見因風轉伏目張鼻煽抽掣其勢危險在頃刻藥之猶有不及

惟急用芫荽菜斤許煎熱湯盛以木盆放兒身傍熏之用細巾灑湯絞乾乘熱揩其頭面胸背手脚冷則再換仍須避風此方簡便而極效經驗屢屢萬勿輕視





增廣 驗方新編卷六

善化鮑相璈雲韶編輯

合肥張紹棠又堂增訂

癰毒

癰疽論 王洪緒曰癰疽二毒由於心生蓋心主血而行氣氣血凝滯而發毒毒借部位而名藥宗經治而誤患盤而踰徑寸者紅腫稱癰癰發六腑若其形止數分乃言小癰按之陷而不卽高頂雖溫而不甚熱者膿尙未成按之隨指而起頂已軟而熱甚者膿已滿足無膿宜消散有膿勿久留醒消一品立能消腫止疼爲療癰之聖藥白陷稱疽疽發五臟故疽根深而癰毒淺根紅散漫者氣虛不能拘血緊附也紅活光潤者氣血拘毒出外也外紅裏黑者毒滯於內也紫點不明者氣血不充不能化毒成膿也膿色濃厚者氣血旺也膿色清淡者氣血衰也未出膿前癰有腠裏火毒之滯疽有腠裏寒痰之凝卽出膿後癰有熱毒未盡宜託疽有寒凝未解宜溫卽患寒疽酷暑仍宜溫暖如生熱毒嚴冬尤喜寒涼然陰虛陽實之治迥別閱古書總未詳因立其旨備覽焉諸疽白陷者乃氣血虛寒凝滯所致其初起毒陷陰分非陽和通腠何能解其寒凝已潰而陰血乾枯非滋陰溫陽何能厚其膿漿蓋氣以成形血

201

驗方新編 卷六 癰毒

以華色故諸疽平場不能逐毒者陽和一轉則陰分凝結之毒自能化解血虛不能化毒者尤宜溫補排膿故當潰膿毒氣未盡之時通其腠裏之功仍不可緩一容一縱毒卽逗留一解一逐毒卽消散開腠裏而不兼溫補氣血虛寒何以成膿猶無米之炊也滋補而不兼開腠僅可補其虛弱則寒凝之毒何能覓路行消且毒盛者則反受其助猶車粟以助盜糧矣滋補不兼溫煖則血凝氣滯孰作釀膿之具猶之造酒不暖何以成漿造飯無火何以得熟世人但知一概清火以解毒殊不知毒卽是寒解寒而毒自化清火而毒愈凝然毒之化必由膿膿之來必由氣血氣血之化必由溫也豈可涼乎況清涼之劑僅可施於紅腫癰癤若遇陰寒險穴之疽溫補尙虞不暇安可妄行清解反傷胃氣甚至陽和不振難潰難消毒攻內腑可不畏歟蓋脾胃有關生死故首貴止痛次宜健脾痛止則惡氣自化脾健則肌肉自生陽和轉盛紅潤肌生調和補氣養血之劑仍以犀角羚羊連翹等性寒之藥始終咸當禁服癰之與疽截然兩途陽症爲癰陰症爲疽治法迥別世人以癰疽連呼並治貽害無窮古今方書雖有陰陽虛實之分治法難期盡善惟王洪緒先生別號林屋山人所著外科全生一書乃世傳祕本剖析陰陽虛實之理至精且備不施昇降不用刀針經歷四十餘年用藥從無一誤開卷瞭於指掌可以不學而能書只前後兩集其價甚廉板

存江南省城湖南湖北坊間間亦有賣者各宜購置一部不惟自便亦可濟人留心  
瘍醫者尙毋忽諸

**癰毒治法** 凡患色紅腫痛根盤寸餘者是癰毒發三四日尙未作膿以洞天嫩膏貼  
之內服醒消丸熱陳酒送下三錢卽止其痛夜間得睡次日皮卽起皴再服全消如  
過四五日將要作膿亦服醒消丸腫消痛止如作膿腫脹未破者用代刀散酒服卽  
穿外貼洞天膏數日收功如根盤數寸者在背心腦後腰腹肚腋陰囊等險要處用  
五通丸醒消丸早晚輪服一次用散毒湯送下皮皴痛息若已穿破用託毒散醒消丸早晚輪  
服自有奇效如根盤不滿一寸亦紅腫者名癰用蟾酥丸梅花點舌丹卽愈此林屋  
山人經驗方也

**癰毒諸症**

**腸癰** 腸癰有生於腸內者腹內脹急大小便牽痛如淋轉側搖之如水聲潰後則膿  
從大便出有生腸外者肚臍腫痛作脹或一足彎曲口有臭氣或膿自臍出甚則腸  
穿有蟲自臍中出勢難爲計初起宜用牡丹皮散以消之潰爛則用參芪內託之劑  
牡丹皮散 丹皮錢五 苡仁兩一 瓜蒌仁二錢 桃仁去皮尖研 水煎服此孫真人千金方  
也 又方 多服六一散見內外備用諸方 膿血從大便出膿盡卽愈至神至穩之方也 又

方 皂角刺一兩至少 用八錢 酒煎至七分溫服血膿從大小便出而愈不飲酒者水煎亦可

又方 大黃炒 朴硝各一錢 丹皮 白芥子 桃仁各二錢 空心煎服小腹堅硬而熱

按之則痛肉色不變或紅赤微腫出汗畏寒小便亦多脈緊實而有力服此神效

肚癰 肚腹生癰即腸癰也照上腸癰各方治之

肺癰 方見肺部 臍癰 方見肚腹部 懸癰 方見海底部 對口 方見頸項

部 發背 搭手 均見背部 魚口便毒 方見陰疽門橫痃症

偏身肢節生瘡 此名疔蝕因風寒所搏氣血凝滯故也用蠶繭每繭一個入白礬五

分火煨過之後每礬一兩另加陀僧五錢白芷一錢研末用蜜調敷

筋骨疼痛潰爛生瘡 此因誤服輕粉及丹石諸藥以致毒凝筋骨日久不愈查解救

諸毒門輕粉毒方治之

身上忽然紅腫遊走不定或痛或癢 此丹毒也照後遊風丹毒各方治之

身上疥癩如塊如核 此流注也與遊風丹毒忽然而發者不同照陰疽門流注方治之

疔瘡 凡疔瘡好而復發此疔根未出故也若不急治再發則根深難治有拔疔根法見後

疔瘡發之最速有朝發夕死隨發隨死有二日五日而不死至一月半月而終死者其

毒最烈或發寒熱或發麻木或嘔吐或煩躁或頭暈眼花或舌硬口乾或手足青黑

或心腹脹悶或精神沉困或言語顛倒此皆生疔之症其形或大或小或長或圓其色或白或黃或紅或紫或有紅絲名色甚多治法則一倘辨別不清以生黃豆令本人嚼之如無豆腥之味卽是疔瘡 疔瘡多生暗處或痛或不痛或癢或不癢發時人多不覺若不早治最易誤事有發寒熱數日而後生者有當時生者初起如粟米大或大小不一如發寒熱及麻癢嘔吐等症卽於徧身留心尋認凡鬚髮眼耳口鼻脣下兩腋手足甲縫糞門陰戶等處更宜細看一日須看數次有則照方醫治若前心坎後背心有紅點者卽照後羊毛疔方治之如尋覓不見取盃中氣垢少許納口中必有一處痛甚卽知疔瘡所在須急宜刺出惡血以見好血而止諸瘡及刀鏃疔忌用刀針餘疔不忌如毒重者急服護心散見毒方或菜子油一碗真麻油亦可以免毒氣攻心若服菊花飲亦可

蜘蛛拔毒法 先將疔頭用磁片刺破尋活蜘蛛一個越越好放疔瘡上蜘蛛一見自能

奔往吸拔其毒少時蜘蛛不動卽取放冷水中自活如疔未愈可用蜘蛛再行吸拔或另取蜘蛛用之以毒盡爲止無論疔在何處雖毒重痛極不省人事命在垂危立可回生此急救第一良法凡手指生蛇頭瘡及毒蛇毒蟲咬傷皆可照此拔毒 菊

花飲 白菊花葉連根搗取自然汁一茶鍾滾酒兌服用酒煮服亦可不如生汁爲妙 毒重者宜多服

敷患處留頭不敷蓋被睡臥出汗其毒自散無論生在何處雖欲氣絕亦可起死回  
生至穩至便至靈諸方皆不及此不可遲疑自誤無葉用根如無即用藥店中乾白  
菊花四兩少甘草錢四酒煮溫服亦可 大戟膏見雜毒敷之即愈再發再敷無不神效

地丁飲 紫花地丁兩一白礬 甘草錢各三 銀花兩三煎服各疔俱效有人生紅絲疔已

走至乳旁服之立愈真神方也 葱礬散 明礬研三錢葱白筒七二味共研爛分作七

塊每塊以熱酒一鍾送下服完即睡蓋被取汗如無汗再服葱頭湯一鍾少頃汗出

如淋其病若失此方不但治疔一切惡症皆治初起未成膿者更妙 煙油膏 用

煙桿中煙油厚敷四圍留頭不敷少刻疔破出水而愈奇效如有紅絲者用煙油離

絲三分處敷之絲即不走 又方 黃色漚雞糞厚敷四圍將疔頭挑破不敷極效

又方 生黃豆嚼爛敷之極效

頭面諸疔 救辱湯 紫花地丁 金銀花兩各一 白菓二十箇 桔梗 生甘草 知母各三

水煎服至重三劑必愈此方治頭面口角疔毒俱效辱疔更妙 又方 一人唇

口生疔七個頭腫如斗心悶神昏百藥不效後有人云此名七星趕月用蛔蟲搗爛

敷之頃刻瘡口出黃水腫消神清次日全愈如無蛔蟲以五穀蟲一錢瓦上焙研末

白礬三分蟾酥三分以燒酒溶化調勻敷疔上少刻疔亦破流毒水而愈 又方

凡口唇生疔看大腿彎中如有紫筋用銀針刺出血卽愈有人不知疔在何處但唇內癢極須臾半面腫硬痛甚見腿後起有紫筋刺之立效 又方 雄雞冠血點上其效如神 又方 大蝦蟆<sup>一</sup>取肝貼之立消兼治面上生疔對口疔等症 又方 生蜆<sup>去壳</sup>搗融敷卽效 又方 烏色草魚去鱗取皮切片貼之隨貼隨乾乾則另換換至數十次卽破口而愈矣

紅絲疔 此疔流走最快生於足者其紅絲漸長至臍生於手者紅絲漸長至心生於唇面者紅絲漸長至喉至則不可救矣手足兩處可用頭髮離絲一二寸遠緊繫捆住並將絲頭刺破或用燈火或用艾火在絲頭燒之絲卽退散而愈不散再燒以散爲度其效如神或照各前方治之亦可

刀鏹疔 疔形如韭菜寬長一二寸肉色紫黑者是忌用針刺用前蔥礬散服之並瀉雞糞敷之卽愈遲則毒歸心腑致命

羊毛疔 初起頭痛身發寒熱前心坎後背心有紅點如疹子形先用針挑破取出羊毛再用明雄末二錢青布包紮薰熱燒酒於前心坎瘡上一二寸外四圍團團擦之漸漸擦入瘡眼其毛卽奔至後背心再於背心照前擦之其羊毛俱拔於布上卽埋入土中內服菊花飲或蔥白飲地丁飲<sup>俱見</sup>護心散<sup>見毒方</sup>俱可

204

生疔方新編 卷六 疔毒

羊毛疔瘤 此症忽起一泡其形如瘤內有羊毛亦名羊疔初起或頭痛或發寒熱卽是用黑豆蕎麥各等分研末挑破敷之毛落卽愈內服菊花飲亦可

疔瘡出血不止 飲真麻油一大碗卽止或飲菜子油更妙

疔瘡走黃 凡疔毒腫痛神昏甚至不省人事謂之走黃急用芭蕉根搥汁服之立可回生或照前菊花飲地丁飲服之均妙

拔疔根法 疔毒重者好而復發此疔根未出故也若不急治再發則根愈深而難治矣 草麻子一粒 乳香一分 共搗爛用飯和爲餅貼之少時疔根自出 又方 葱

白加蜜搥融將疔刺破敷之如人行五里其根自出又癰毒諸方門紅膏藥方拔疔最妙

### 瘡毒

楊梅瘡 此瘡最毒治不得法多致纏綿不救且最忌服輕粉服則毒留筋骨難以斷根抑且不能生子如已服者可用解輕粉方見解毒門治之 紅棗丸 紅棗三斤以杉木作柴煮之煮熟剝皮去核多取燒過杉柴枯灰磨細末和棗肉搗勻爲丸加彈子大每日任意食之不可間斷雖瘡毒滿周身或服過輕粉及一切丹石隱藥致成結毒穿頂穿鼻潰爛不已多年不愈者服之大有奇效至穩至靈此治楊梅結毒第一



方也愈後再服一兩月斷根紅棗能解丹石之毒杉木專祛溼熱之侵是以奏功如反掌也忌醋與辣椒又名青椒及一切發物半年外用蝦蟆散 又方 土茯苓一兩木通

白蘚皮 防風錢各一 宣木瓜 薏苡仁 金銀花錢各二 皂角子分四 水煎服每日服一

劑以愈爲度外用蝦蟆散見雜毒方 敷之無論久近輕重潰爛穿頂屢試如神百發百中

最忌食茶不服藥則忌並忌醋與辣椒及一切發物半年終身戒食蝦蟆如不服藥即服前

紅棗丸外用蝦蟆散敷之亦可 又方 大黃兩一 穿山甲炒 川厚朴 白芷 大楓

子仁 花椒 甘草錢各三 水煎兌酒服毒氣從大便出七日全愈忌食一切與上同

惟不忌茶與蝦蟆無論輕重屢試神驗不可輕視 又洗藥方 生甘草 金銀花

蒼朮 白芷 藿香 槐花錢各二 共煎水洗輕者內服前方外用此藥洗之即愈

避楊梅瘡法 凡生楊梅瘡在傍伺候親近之人難免傳染用雄黃川椒去子各五錢研末 杏仁

百粒藥末去皮尖炒 研末燒酒打麪糊爲丸梧子大每服十五丸開水下於病人初發時服即可

免也

瞎眼瘡 上高下深顆顆疊垂如瞎眼其中帶青頭上各露一舌者是也用回陽玉龍

膏真君妙貼散見雜毒方 敷之必效如仍不愈用蝦蟆散見雜毒方門 治之或後陰疽方更妙

猫眼瘡 瘡似猫兒眼有光采無膿血痛癢不常飲食減少名曰寒瘡照上瞎眼瘡治

之

天蛇毒

有人偏身潰爛似癩非癩呼號不已一僧視之曰此天蛇毒非癩也用秦皮

又名蛇皮又名鱗皮又名石鱗又名苦澀煮汁一斗日服十餘碗三日全愈 又草花間蜘蛛螫人為露水所

濡乃生此瘡者亦名天蛇毒瘡可用此方治之天蛇大如箸而扁長三四尺色黃赤

人遭其螫不治必死

蛇形瘡

一人生瘡如蛇長數寸外用雄黃麻油調敷內用雄黃沖酒飲即愈

纏蛇瘡

又名纏腰龍

此丹毒也生腰下長一二寸或碎如粟或紅腫堅硬用燈火向兩頭燒

五次並用雄黃外敷內服極效 又方 陳石灰麻油調敷即愈 又方 舊糞桶

箍篾燒灰麻油調敷其效尤速或照遊風丹毒各方治之

魚脊瘡

多生筋骨之間堅凝作痛初起白泡漸長狀如魚脊破流黃水此陰症也初

起時無論已潰未潰宜用隔蒜灸法見難毒方門以通陽氣外用回陽玉龍散真君妙貼散

見陰毒方門敷之或用後陰疽諸方更妙

魚臍瘡

瘡而長腫而黑者是

此因風毒蘊結或氣血凝滯或誤食人汗所致用臘豬頭骨燒枯研

末生雞蛋白調搽數日即愈

蜂窠瘡

不拘何處形如蜂子窠者是

用罐鑿一小孔納碎布數團火燒取煙從小孔出向患處薰之二

三次即愈 又方 愈而復發者用鉛粉硃砂和蜜調敷神效

蜘蛛瘡 形如蛛網癢不可忍用 豆腐衣又名豆腐皮燒枯存性香油調搽

蚯蚓毒 此症鬚眉皆落形似癩瘋或夜間身上有蚯蚓聲用食鹽數斤熬湯洗身數

次內服淡鹽水一二碗極效不可誤為癩瘋如真是癩瘋令病人站立打銅鐵之風

爐火傍望其臉紅者是癩瘋臉綠者非也手足大指合攏處肉平塌者亦是

螞蟻毒 形如珠顆成片成串或紅或白破則流水好而復發用穿山甲瓦上焙枯研末香油調

敷雖多年不愈者無不神效

蠟螻瘡 蠟螻又名搔甲子俗名偷油凜又名髒蠅其瘡初如粟米漸大如豆更如火

烙漿泡疼痛至甚者以春茶葉研末麻油調搽神效 又方 燕子窠泥和豬膽加

酒調搽或照後癩疽毒各方治之

葡萄酒 一小兒年五六歲額上忽起一顆紫色光亮形如葡萄頃刻周身皆有一老

醫見之云此乃葡萄酒一見鼻血即死因小兒飲食言笑如故病家不信至夜半

忽鼻中血如湧泉而死 又一男子手腕上忽起一粒如紫葡萄半日亦見鼻血而

死俱無藥救附錄於此以俟博識者立方施治 又一女子年十四手腕軟處生物

如豆半在肉中紅紫色痛甚百方不效後用水銀四兩白紙二張將水銀揉熟擦之

三日自落合而觀之前症似可照此施治 再前症即名疔毒又見鼻血其為熱毒  
內蘊無疑水銀擦之如不見效應急照前癰毒諸方門內菊花飲菜油飲二方治之  
或可救也並用吳萸末熱醋調敷兩脚心一日一換此引熱下行至妙法也

瓜藤瘡 一身上餘

尖尾芋

茄子葉

五月艾

葱

薑 共搗爛醋煮敷擦

癩疽瘡 手足肩背纍纍如豆如米大者如梅如李或赤或黑或白或青初生有痂一  
層痂內有核核有深根能爛筋骨毒入臟腑即死此熱毒也先將痂挑破用醋和微  
溫淘米水洗淨以芙蓉散 見癰毒 治之自流毒水內服真菜子油 亦可極效 又方

燕子窩連泥帶糞和初生百日內男孩糞調搽或真菜子油或麻油亦可極效此孫  
真人千金方也 又方 豬膽汁敷之流出毒水極效 又方 鯽魚長三四寸者

一條亂髮一團 如雞 大豬油半斤同煎膏用罐裝好放水中拔其火氣三日後敷之極  
效 又方 男子尿桶中白霜敷之立刻清涼止痛乾則再敷 又方 鍋黑煙 燒以

茶葉各方治之至效 軍者佳燒煉此者不可用桐油麻油菜油均可調搽即愈 又方 照遊風丹毒門防風升麻湯菜子油六安州

天泡瘡 形如水泡者是用蓮蓬 即蓮 燒枯研末并泥調敷神效或用荷花瓣貼之或  
照後黃水瘡各方及癰毒諸方門松香散雞腰膏治之更妙 又遇身生瘡泡如甘棠梨破則水流復生內有小石一片方見奇病門

黃水瘡 初如粟米癢而兼痛破流黃水浸淫成片流處卽生由脾胃溼熱外受風邪相搏而成發於心下者若不早治難救宜用青蛤散 蛤粉一兩 真青黛錢三 熟石膏錢二 輕粉 黃栢錢各五 共研細末先用香油調成塊次用涼水調稀塗之神效並治鼻中生蟲 又方 蠶豆殼瓦上焙 加黃丹少許以真菜油調敷麻油亦可乾則再敷三日卽愈屢試如神 又方 紅棗燒炭錢八 飛黃丹 松香 枯礬錢各四 右共爲末麻油調搽立效 又方 輕粉 樟腦錢各二 大楓子殼去 川椒各四十粒 杏仁錢一 共爲細末和柏油燭搗勻敷之功效如神柏油又名捲油又名柏油卽烏柏子油也或用癰毒門松蠟散蘆薈散燕泥散雞腰膏均極神效

熱瘡 其色紅而作痛者是用男子尿桶中白霜敷上立刻清涼止痛乾則再敷或照上瘰疽瘡各方治之亦可

漆瘡 杉木屑煎水洗用 活螞蟻黃 滑石和蜜調敷甚效此林屋山人方也有漆之處先嚼川椒數鼻孔可免漆瘡 又方 貫衆研末 香油調敷或用葦菜搗汁敷或用白羊乳搽之均效 又方 白菓樹葉煎水洗立刻消三次全愈或用新荷葉煎水洗亦極神效 又方 活螞蟻槌汁滴入使毒水流出自愈如已腫爛取生蟹黃塗之其爛更甚數日卽愈若再不效用生大黃錢三 枳壳錢二 水煎服二劑腹泄而愈

不泄加芒硝<sup>錢二</sup>以泄爲度緣漆瘡火盛則重非泄不能愈也

癬瘡 凡癬內有蟲治好復發非藥不靈蟲未盡也發後再治無不愈矣頭面生癬如

入眼內卽成大麻瘋矣宜急治之新鮮皂角刺一二斤搗爛熬至將成膏時加好醋

熬稠將癬刺破敷之日刺日敷自有毒水流流出流盡再敷十日雖數十年陰頑惡癬

無不斷根此林屋山人屢試神方 又方 斑蝥<sup>分五</sup>生半夏末<sup>錢一</sup>雞蛋油調搽數次

則必愈 此方非經醫生指  
示用法倘弗輕用再發再搽雖多年惡癬無不斷根取雞蛋油法見癰毒諸方

又方 青礬<sup>塊炒成</sup>研細末加豬膽汁和融再炒再研用老薑一塊切開蘸藥擦之大

痛卽愈再發再搽雖多年頑癬亦可除根 又方 大蜂窩<sup>箇一</sup>以白礬末填孔內火

煨以礬融化爲度研勻將癬抓破以牙硝水調搽一二次痛則必愈再發再搽必能

除根 又方 荔枝核磨醋將癬抓破搽之雖痛不妨數日卽愈再發再搽斷根

又方 用新棉花扯成如紙薄一層量癬寬大將棉花鋪貼用火向花上一點頃刻

燃盡當卽止癢而且並不焦痛不須用藥極簡易極效驗只須一次全愈倘次年再

發照治一回斷根 又方 珠蘭花葉時時擦之半月斷根

小兒乳癬 小兒初生症類疥癬先起手足次遍腹背纏綿不已先用鹽蠶不拘多少

去嘴研末煎湯浴之或一日一次或一日二次毒出再用 真青黛 黃柏 枯礬

雄黃百藥煎硫黃分各等 研末溼則乾搽乾則香油調搽以愈爲度名換形散

皮注 杏仁去皮尖 研如醬搽上即愈或照癬瘡各方治之

疥瘡 疥有五種乾疥溼疥蟲疥灰疥膿俗名膿泡瘡又名黃膿泡瘡 疥是也由各經蘊毒日久生火兼受

風溼而成數日延及遍身最易傳染或癢或痛癢者內必有蟲不獨蟲疥然也治法

雖多有效有不效有此用之而效彼用之而不效者後列各方五種疥瘡皆治古方

有燻藥一法瘡雖易愈然毒盡歸腹定成鼓脹危症切宜戒之如已成鼓脹查癰毒

雜治門本方治之 黃香散 硫黃 川椒錢各五 共研末加葱薑頭各五錢和生豬

板油搗融用布包好烘熱時時擦之其效甚速 又方 整塊川厚樸以真香油磨

濃如醬加枯礬少許搽之數日退盡此膿窠疥瘡神方也 合掌散 硫黃兩一 鐵銹

錢一 紅砒分六 共研極細細如灰 葱汁調敷大碗內周圍數寸勿厚勿薄 以碗覆瓦上取艾放碗下燒薰

薰至藥乾敲之如空碗聲爲度取藥再研細每藥一錢可敷數次臨用以右手中指

粘滿香油再粘藥搽入左手心合掌摩擦止有藥氣不見藥形然後以兩手擦瘡每

日早晚二次三日掃光再擦三四日即不發矣屢試如神並治陰囊溼癢 二美散

吳茱萸 硫黃 各等分研細如麪粉照上合掌散法摩擦每日二次愈後再擦

三四日專治膿疥神效此方與上合掌散均林屋山人經驗方也 又方 油胡桃

又名核桃紅棗肉各一兩 水銀五錢 冰片不拘多少 真小磨麻油 猪肉各用四錢 共搗熔用綢包裹

擦之擦過即能止癢止痛時向鼻中聞之數日即愈屢試神驗 又方 田螺煮熟

酒炒食可除一身疥瘡 又方 松香三錢 枯礬 五倍子各一錢 以上共研末加頭髮

錢三生豬板油錢五用青布包好向燈火上燒之有油用碗接住候冷用針挑破疥瘡將

膿擠出用茶洗淨勿沾生水候乾取油搽抹不過三日全愈永不復發 又方 硫

黃錢五放銅器內燒燃存性倒在地上候冷錢三槌碎器加水銀麻油拌勻用布包好烘熱

時時擦之二日即愈簡便而極效驗 又方 核桃仁連皮用一兩 大楓子仁錢五 水銀錢三

共槌極融爛先用此藥一二錢不可過多放在手心中擦勻將左手心在肚臍眼上順著

摩擦不可倒擦擦至手心發熱即止再用此藥一二錢放右手心中擦勻在肚臍眼

上照前摩擦擦至肚腹滾熱即止每日一次瘡上不擦輕者二日即愈至重三日斷

根有人遍身膿疥時發時愈纏延三載百藥不效用此三日而愈從此斷根此治五

種疥瘡第一神方一切溼熱瘡疾皆治珍之寶之愈後宜食愈瘡棗見後雜以補脾土

或另服健脾之藥亦可如恐水銀入腹為害病愈體壯之後每早用真川椒要開七

粒滾水空心吞服連服三日其水銀自入椒內由大便而出或用真川椒研末鋪牀

上蓋被睡臥水銀即由毛孔而入椒內矣此法最妙



凍瘡 橄欖核燒灰存性研末加輕粉少許香油調搽神效 又方 以蚶子殼煨研極細以麻油調搽溼則乾摻數月全愈此秘方也 蚶子殼即五楞子 又方 陽和解凝膏 陰見 貼一夜即愈潰爛者貼三張收功此林屋山人方也 又方 白芨磨敷即愈 又方 馬糞煮水泡之半日即愈 又方 蘿蔔菜橘皮煎湯先洗用蟹殼燒灰研麻油調敷 又方 暑伏時搗大蒜爲泥敷在上年生過凍瘡之處過一日一夜洗去遲三四日再敷一次若連日敷之則肉上起泡破皮矣本年冬雖極寒亦不再生凍瘡凡小兒手足各處雖未凍過亦敷兩次可以耐寒此法可傳船夫脚夫亦一德也

### 大麻瘋

此症各方凡殺蛇治愈者務戒殺放生方能全愈

麻瘋者身上必有麻木之處針之不痛然後發現於外若不麻木則非麻瘋徧身雖麻木數月即發現於外雖重易治若年久病深壞形變貌鼻塌肉崩手指脫落足底穿爛則難治矣江西蕭曉亭著有麻門全書二本專治麻瘋所論病源最爲透徹其治法亦極神妙板存廣東省城雙門底刻字店 麻瘋諺云正報似非妄談若自信罪愆難逃果能矢志爲善人力可以回天即自信並無過惡亦當力行善事所謂善事者守禮守法常存善念見善必爲尤宜謹戒殺生並須放生果能如此不但病易愈

且爲後嗣種福所益多矣

曾克廣五服方 昔在萬安縣百嘉地方遇一良醫善治瘋癩惡疾活人甚衆余甚奇

之具金百餘求得此方歸家後適鄉鄰有患此症者依方用之數月而愈頻年以來

遠近用此方者十愈八九屢試屢驗真神妙方也 初服方 羌活 蒼朮 荆芥

防風 銀柴胡 元參 赤芍 黃芩 白蘚皮 枳殼 銀花 甘草水煎服

四劑 次服方 羌活 細辛 白芷 生地 防風 知母 黃芩 川芎 甘

草水煎服二劑 三服方 大黃 朴硝 銀花 桃仁 枳殼 黃連 黃柏

黃芩 元參水煎服三劑 四服方 荆芥 防風 川烏童便浸後 白附子薑汁 天

麻 蘆蠶薑汁 蒺藜水提過 獨活 元參 火麻仁土洗去 苦參 赤芍 黃柏 銀花

甘草 枳殼 大楓子水煎服十劑 以上依次空心服俱不加引 五服丸

元參 枳殼 白芷各二錢 赤芍 銀花各一兩 火麻仁 蒺藜 大楓子各一斤 獨活二錢

製川烏箇一 北防風兩十 以上共研細末斬蛇兩十二 去頭尾用熱酒浸二三日秋冬浸五

六日浸鬆後去骨蒸熟焙乾研末和前藥蜜爲丸每日早午晚三次各服四錢茶送

下

皂刺散 一人得麻瘋惡疾雙目風盲眉髮俱落鼻梁倒塌遇異人傳方用皂角刺斤三

燒枯蒸一時久曬乾爲末每日飯後服錢二大黃煎濃湯調下半年後眉髮再生目明肌潤

白花蛇丸 丹陽上舍得麻瘋疾一僧療之而愈以數百金求方不肯傳館賓袁生窺

藏衲衣領中因醉而竊錄焉用者多效 白花蛇一條烏梢蛇一條並去防風 蟬蛻泥去

土生地 川芎 苦參 枸杞 槐花 銀花以上各二兩白蒺藜 全蝎鹽浸一日細辛

蔓荆子 威靈仙 何首烏 胡麻仁香炒金毛狗脊 川牛膝 烏藥 天花粉

川連 黃芩 梔子 黃柏 連翹 牛蒡子以上各一兩炒漏蘆半斤去苗荆芥穗五錢上頭

面者加白芷一兩肌膚潰爛者加大皂角一兩共研末米糊爲丸桐子大每服五六

十丸茶送下午後臨臥各一服

白鹿洞方 治大麻瘋眉毛脫落手足拳攣皮骨潰爛唇翻眼綻口歪身麻肉不痛癢

面生紫斑並治如神 真斬蛇八兩去皮骨獨活 蘇薄荷 全蝎鹽洗去蟬蛻足去殭蠶炙去

赤芍以上各六兩楓子肉油去淨天麻酒浸防風 白芷酒浸金毛狗脊酒浸白菊花 漢防己

何首烏鐵當歸酒苦參以上各四兩金頭蜈蚣頭足去穿山甲燒大川芎 梔子炒連翹 白

蘇以上各二兩共爲末酒糊爲丸梧子大每服七八十九空心用好酒送下臨臥再一服忌

氣怒房事油膩煎炒雞魚蝦蟹芋頭山藥糟魚肉鵝生冷酸食冬月亦不可烘火宜

蘇煖淨室坐定保守性命節飲食斷妄想服藥時宜仰臥令藥力徧行有功如不守禁忌徒勞心力亦無效也服此藥只宜食鴨鰾魚牛肉俱宜淡食

秘傳漆黃蟾酥丹 鮮蟬蟹四真生漆斤一真蟾酥 明雄黃兩各二 先將磁罐裝蟹次入

漆封口埋在土中十四日足方取開看二物俱化成水去渣淨將水入鍋慢慢火煮

焙乾為細末方入雄黃蟾酥二味末攪勻磁罐收之每日空心臨臥各一服好酒送

下二錢不過一月其瘡全好除根妙不可言治大麻瘋如手取之妙況所費不多莫輕忽修合亦勿妄傳匪人祕之

癘風方、鎮江丁參領得此祕傳治之全愈又以醫治多人無不取效如神但患此症

者眉毛若盡脫落其症難治若眉毛未脫雖手足節骨有塌損者皆可取效若初起未深之症百試百效也先用湯藥四劑每日一劑服完再服丸藥每丸一錢加楓子

膏春秋八釐夏六釐冬一分 湯藥方 陳皮 白芷 苦參 天麻 秦艽 川

續斷 防風 荊芥 羌活 風藤 薏米 牛膝 當歸 海桐皮 蒼朮 木

香 桂枝 連翹 甘草錢各三 黑棗二枚生薑一片水二碗煎至一碗服渣再煎二

次服 丸藥方 大胡椒 小胡麻 白蒺藜各一斤 苦參斤一 防風 荊芥各八 當歸

蒼朮各六 薏米 續斷 牛膝各四 共研細末水泛為丸每日早午晚三服每服三

錢或二錢照數加楓子膏撚圓攪和以細茶送服 楓子膏 大楓子去壳取仁銅鍋內炒至三分紅色七分黑色爲恰好太過無力不及傷眼炒後研成細膏如紅沙糖一樣用銅鍋器盛向火上熬四五滾倒在紙上放地上面以物蓋之聽用如上面霉變拭去仍照常服用一年內切忌房事切忌食鹽犯之不愈並忌醬醋酒及一切雞魚發氣動風等物 又方 活蛇一條要粗如酒盞大 竹刀破去腸雜切片段豎起放瓦上以火炙之蛇段跌倒者無毒取炙存性不倒者勿用磨成粉拌入飯內與一徧身白毛鴨食之次日鴨毛盡脫以鴨殺之砂鍋內煮爛分作四五日食初食其腫更甚食至二三日後漸漸平愈雖潰爛不堪食之亦效此林屋山人經驗方也 又方 明淨松香數斤取甘淡泉水用淨鍋煮化不住扯拔卽傾冷水內用手分扯俟凝冷另換清水再煮再扯幾次只以松香潔白水色極清不苦方可陰乾研極細用每料二斤日以白米作粥候溫入藥末和勻服飢則再食不可更吃硬飯忌一切油鹽葷酒菓菜糖麪第一渴勿吃茶以滾水候半冷調藥飲每日數錢半月後作嘔胸中嘈逆難過大便下毒必須多服不可中止遠年者一料全愈初起只須一斤生鬚眉舒筋骨矣一生忌食發物神效非常較前方尤簡便奇驗也 又方 桑皮 大黃 芒硝 各一撮水煎於無風處日洗二三次如有蟲加鷓鴣糞同煎如爛用琥珀末搽患處此

神方也

### 遊風丹毒

名天火又名流水俗謂風疱瘋疔瘡是也此症身上忽然紅腫或大或小或痛或癢甚至徧身皆有遊走無定有初起白斑漸透黃色光亮皮中恍如有水脹墜破流黃水溼爛多痛爲水丹又名風丹多生腿膝屬脾肺有熱而夾溼也又色赤而乾發熱作癢形如雲片爲赤遊丹屬血分有火而受風也又徧起小白泡無熱無痛遊走不定爲冷瘰卽冷丹由火毒未發肌膚外受寒鬱而致也 又有腰間紅腫一道名纏腰丹又名纏蛇瘡方見雜毒諸毒門 又有雞冠丹茱萸丹兩種丹名雖多總屬心火三焦風邪而成其發甚速自胸腹起於四肢者順而易治從四肢起於胸腹者宜急治之遲則難治 防風升麻湯 防風 升麻 梔仁 麥冬 荊芥 木通 乾葛 薄荷 元參 牛蒡子 甘草錢各一 燈心十莖水煎服大便閉者加大黃枳殼錢各一 水煎服忌魚腥雞鵝動風煖血之物犯則難治丹毒重者攻入心胃難救先服此藥以解內毒次用磁針刺去惡血則毒隨血散至神至捷百發百中 磁針刺法 取磁器輕輕敲破取鋒利者一小塊用竹篸將篸頭破開橫夾磁片露鋒於外將線紮緊以磁鋒正對丹毒之處另用篸於磁鋒篸上輕輕敲之其血自出不可刺深傷肉未愈

不妨再刺以紅消腫散為度毒輕者不必刺 又方 如服上防風升麻湯不效即  
用四物消風飲 生地錢三當歸錢二荊芥 防風半各錢赤芍 川芎 白蘚皮 蟬脫

薄荷各一錢獨活 柴胡各七錢紅棗二枚水煎服必能見功此消風毒要藥也 又方

清涼膏見湯火傷門敷之極為神效 又方 馬蘭膏 治新生小兒紅赤遊風丹毒百不

失一並治大人丹毒或兩腿溼熱伏於經絡皮面上不紅不腫其疼異常病者只叫

腿熱他人按之極冷者此膏搽之立愈屢試皆效 馬蘭頭不拘多少。季無葉取根亦可江浙人謂之馬蘭頭他省不知呼為何名

用水洗去泥搗爛絞汁以雞毛蘸汁搽之乾則再換或調飛浮六一散搽之亦可

又方 蚯蚓數條又名曲蟻放碗中加入白糖用碗蓋住半日後至遲一日即化為水搽之極效無蚯

蚓用錢亦錢可

疹風

血風瘡 疹子 痲子音均見偏身搔癢門

斑症 人有一時身熱即便身冷而滿體生斑如疹者及火從外泄而不得盡泄於皮

膚故鬱而生斑人盡以為熱也用寒涼泄火之藥不效有斑不得消而死者亦可傷

也用 元參 麥冬各一兩白芥子 沙參各三錢升麻錢二白芷錢一丹皮錢五水煎服一劑

斑勢減二劑斑紋散三劑斑影盡消矣此方妙在用元參麥冬以消斑尤妙在升麻

多用服二三劑升麻宜減半引元參麥冬以入於皮膚使羣藥奏功而斑無不消也又傷寒門蝦蟆

燕泥二方亦極效驗又週身發斑眼赤鼻脹氣喘毛髮硬如銅鐵方見奇病門

白癩風又名白癩風多生於面西白如雲片者是用白鱉油搽之無則取白鱉曬乾煎枯取油搽之即愈 又方

土蒺藜子兩六生磨爲末忌鐵每服二錢一日二次開水送下外用小麥攤石上燒

鐵器壓出油搽之半月後白處現有紅點一月後斷根 又方猪肝一副白煮不

用鹽一頓食盡忌房事一月漸漸自愈並治紫癩風春季猪肝有毒勿用

紫癩風即汗斑硫黃 輕粉 密陀僧 斑蝥性烈存樟腦各等分共研極細末俟出汗

時用老薑蘸擦患處兩三日洗去即除根神效或用密陀僧爲末黃瓜蒂擦之亦效

又方 陀僧 乾葛 硫黃 海螵蛸 川椒共研細末先用老薑切片擦患處

後以藥擦之永不復發再用浮小麥煎水洗澡一次更妙

瘡

癭瘰 漸長漸大軟而不硬方書云其種有五色肉不變爲肉癭筋脈現露爲筋癭筋

脈交絡色紫赤者爲血癭隨憂惱消長爲氣癭堅硬不消爲石癭有大如碗者長而

下垂者又有粉瘤湯瘤風瘤各種 又有羊毛疔形亦如瘡者治法見前疔瘡門

消癭五海飲 海帶 海藻 昆布 海蛤 海癭蛸錢各五煎湯當茶飲甚效 又方



櫻桃核好醋磨敷即消初起者甚效 又方 石榴樹上寄生醋磨擦之極效生

頸上者更妙 又方 川黃柏 海藻各一兩 共為細末收貯每用五分放手心上以

舌舐之一日三五次即消生頸上者更妙 又方 黃藥子兩十斤 好燒酒三斤 共入瓶中

封口用糠火煨一週時或鍋內蒸半日亦可 將瓶放冷水中過七日後每日隨時少少飲之務使

酒氣不斷無論生在何處皆效如神飲後時時照鏡消即勿飲飲多恐頸項細小也

黃藥子又名黃藥以江西萬州產者為佳廣西慶遠府亦有

肉瘤 每夜將睡時用新熟熱飯敷上冷則另換每晚連敷三次久而自愈凡新起肉

瘤如小彈子者治之屢見功效不可輕視

血瘤 甘草熬膏用筆蘸圈瘤四圍又用芫花 大戟 甘遂等分為末醋調另用新

筆蘸塗於甘草圈內務須離甘草一圈不可太近蓋藥性相反切勿誤相攙和塗後

次日瘤當縮小再如前法塗三四次即愈愈後須請名醫服藥消散以免復發

粉瘤 用蜘蛛網纏住瘤根次日又換新蛛絲再纏約換四五次則瘤自消內有結實

小白粉用手取去不腫不痛 又方 天花粉兩一錢 陳壁土五錢 穿山甲 川貝母各三錢

共為末和勻搽膏藥上何不論 貼之即穿出粉渣而愈

漏瘡 時出黃水好而復發癢不可忍查腿部臙瘡白油膏方治之

虱瘤 此瘤其癢徹骨破開有虱無數內有極大一虱用針挑盡外貼玉紅膏見難毒方白愈

腋下癭瘤 長靶音霸壺蘆燒枯研末油調敷以消為度一人腋下生瘤如長壺蘆樣久

而破爛用此敷之出水消盡而愈

肉核 真烏梅去核燒存性研末搽數日即消 又方 生蘿蔔皮貼之連貼數次即

愈如再不愈照陰疽門惡核方治之

又通身肉出如錐痛而且癢方見奇病門

疣癩又名癩子拔之則絲長三四寸 薑汁和好醋時時搽之有人生疣癩屢治屢發

照此治之三日斷根 又方 地膚子 白礬 煎湯洗數次即消 又方 松香

栢樹枝上油和勻敷之過夜即落 又方 苦菜折之有白汁出點之自落 又

方 牛口涎時塗之即落

痣

肉痣子小黑 用針挑破以鹼水泡石灰點之即消

血痣 初起如痣色紅漸大如豆觸破時流鮮血用 黃鱗善音 血同蒜汁好墨汁頻塗

之血出甚者內服涼血地黃湯

癰毒雜治

癰毒宜戒 一戒走泄 凡患癰毒紅腫潰爛或已生管無論久近大小最忌走泄真

元如有遺精及房事不謹醫治最難見功必先將遺精病症醫治全愈仍令夫婦分

臥謹戒房事然後按方施治自易收功 一戒污穢 凡大癰惡毒一經污穢腫痛

更甚難以收功婦女產後及行經時切戒近前以免污穢若婦女自患癰疽瘡癤遇

行經時醫治鮮效必俟行經後始能見功 一戒燻罨 諸瘡有燻罨一法瘡雖易

愈然毒盡歸腹定成鼓脹難治惟神燈照法不忌 一戒沐浴 凡溼熱諸瘡膿血

淋漓或癢或痛莫不以沐浴為快然浴則溼氣更重難以速痊惟有溫泉之處不忌

毒氣攻心 凡患瘡毒心中難過或欲嘔吐或神昏不語此毒氣攻心也急用護心散

見癰毒 諸方 時時服之服至大半嘔止神清再服醒消丸 見同 以平其勢護心散如製不及

急服白砂糖三四兩亦可 又方 癩蝦蟆破開蓋心口上亦妙無癩蝦蟆用雞亦

可然終不如蝦蟆之妙

瘡痛不寐 有人遍身生瘡疼痛手足尤甚並黏著衣被不能安睡用萹蒲 二三斤曬乾為末 搽

臥席上仍以被蓋臥且不黏衣又能得睡數日即愈 又方 大蒜膏糞坑土 見癰毒 諸方

均效

瘡癢難忍 金銀散 專治惡瘡癢極 硫磺 兩一 入銅器內在燈火上焙化 切忌放爐火及火爐上

加頂上銀硃錢五攪勻離火倒油紙上候冷研極細如香灰細不好醋調敷其癢立止如破

爛孔內癢極者用白蜜調此藥敷之神效 白花膏 專治惡瘡癢極見骨者 香

油斤一青槐枝枝一百陸續入油熬極枯黑去槐枝瀝盡渣加黃蠟兩鉛粉兩離火微温

再下 製乳香錢製沒藥製法見藥白花蛇無則用烏兒茶錢各三潮腦兩真麝香用亦可共

研極細末加入攪勻成膏浸水中三日拔去火氣再聽用以上二方乃林屋山人祕

法如一時製藥不及切忌手扯用鹽連瘡頭薄敷之已破者用鹽敷於四圍 又

方 皂角片的要整火上烘熱熨之即止已破者艾葉煎濃湯洗之甚效

瘡自走動 硃砂塊一研末取倒回蟲數條共放手心研如泥敷瘡上即時收回原處倒

回蟲多生舊墻基鹹土中穴如螻蛄穴其蟲倒行名爲倒回蟲撒土尋之自見此方

傳之西域老僧屢試屢驗

趕移瘡毒 移山過海散 治毒生於致命處用此移於無害部位甚效 雄黃 小

麥麩 新鮮蚯蚓糞共爲末用好醋調勻漸漸敷於致命處半邊自能移過不致命

處 移毒散 凡毒發於骨節間用此藥移之或上或下使無殘疾之患屢試屢驗

白芨六錢一兩紫花地丁錢八烏雞骨 硃砂 雄黃 輕粉錢各一五倍子錢二大黃錢二

猪牙皂角分八共爲末用好醋調敷毒之上截即移至下半截仍照人虛實內服藥餌

趕毒散

又名神和散

凡大腿內外及兩膝貼骨等處漫腫無頭皮色不變微覺酸痛

曲乃感受風溼所致若不急治變生貼骨等疽難以收功須用此藥祛寒逐溼透出外絡提移他處出毒即有成管成漏亦能逐漸收功此方與移毒散相等屢用皆效

紫荆皮

五兩炒

赤芍

二兩炒

香白芷

一兩曬乾切忌火炒

獨活

一兩五錢炒

石菖蒲

一兩五錢曬乾切忌火炒

以上共磨爲末

篩細以好酒和葱頭五箇煎滾調搽不必留頂一日一換以消腫不痛爲度

瘡毒腫痛不破 隔皮取膿法 凡患瘡毒腫脹不穿疼痛難受而患處難以用刀或

畏懼開刀者俟膿熟時用 驢蹄皮一兩要脚底刮下者用砂炒 蕎麥麪一兩草烏皮研 共爲末和勻加

食鹽五錢水糊作薄餅瓦上炙微黃色再研細以醋調攤紙上貼之其膿水從毛孔

而出或瘡旁好肉之處自會穿破出膿最爲奇驗 又方 公老鼠糞兩頭尖者是 和紅糖

搗融敷即破口出膿而愈極效 又方 蠶蛾繭即出過子之繭 一箇燒灰存性用酒調服

瘡頭自破切不可多用如用二三箇即生二三口矣又紅膏藥代刀散咬頭瘡均見雜方

俱效

瘡口出血 螻螂查藥備備要便知 燒枯研末用油調搽極效此係真人千金方也 又方 飲

真麻油一大鍾甚妙真菜子油更佳或用黃芩炒酒 一二錢煎服亦可

瘡肉飛落 此因艾火灸瘡痂落瘡內肉片如蝶飛出痛不可言是血肉俱熱怪症也

朴硝大黃各五錢  
為末 水調服一泄即愈體虛忌服飲真麻油一碗並用吳萸末醋調敷

脚心

瘡生贅肉如飯如菌 黑龍丹 治一切惡瘡怪毒因擠膿用力太過以致贅肉突出

小或如飯粒大或如梅如菌翻花紅赤久不縮入此名毒根乃損傷氣脈使然人多

用降藥爛去其痛異常體弱難受且爛去復生經年累月終不全愈用 大熟地片切

烘乾炒  
枯一兩 真烏梅肉炒成炭三錢烏梅多有以李核  
充用之不效必以自製為佳 共研勻碾極細摻膏藥上不論何  
項膏藥 貼之不過三五日

贅肉自收用收口生肌藥完功屢試神效如陰虛脫肛諸藥不效者用此丹以防風

升麻各一錢煎湯調擦立即收上再服補腎之藥後不再發亦奇驗也 又方 先

用平安餅貼上再以陽和解凝膏見陰道  
見陰道 加上貼之無此膏不  
貼亦可 一日一換輕者二三日重

者六七日不癢不疼毒根自落較前方更佳貼餅時內服千金托毒散俟毒根落後

服保元四物二湯收功 平安餅 真烏梅肉錢一 輕粉錢五 和勻研不見粉亮為度如

硬加白蜜少許不可用水研至成膏為餅輕者只用此餅貼之不加陽和解凝膏亦

可或只用烏梅肉燒存性研末候冷敷之過夜即愈更為捷速 又方 馬齒莧燒

枯研末以豬油調敷輕者甚效永戒食鵝

瘡中生管 退管丸 廟宇內陳年舊琉璃底三錢鉄皮  
并炒透 辰砂水飛  
另研 人指甲鉄皮  
并炒 真象牙

末各一錢 蟬蛻分錢五 製乳香 製沒藥製法見藥物備要 枯礬各八分 各研細末共和勻用黃蠟三

錢溶化入藥攪勻乘熱作速作丸如菘豆大初服十粒逐日漸加一粒加至十六粒

以後不必再加酒送下患上身者加川芎六分患下身者加牛膝六分遠年者服一

料全愈近年者半料收功雖患至二十年者亦效屢試如神忌食葱與有管之物百

日並戒走泄查前癰毒宜戒便知 又方 蟹甲炒為末麻油調敷其管即出甚效

管生年久者其功稍遲 又方 京城礪砂膏貼之淺者七八日即出深者半月即

出無論久近皆效

瘡中生蛆一方先用濃茶洗淨再以麻油調汁敷上甚效 諸瘡因蒼蠅飛聚而生蛆者用 寒水石細末搽之如管灰細不細

作痛 如無蒼蠅而生蛆者係陰溼所化也用海參燒枯研極細末搽之或用皂礬飛

過為末搽之其蛆即化為水

諸物入瘡 驢馬汗入瘡或毛或尾入瘡或閉膿馬汗氣而發者同治 急宜刺出紫血以真烏梅嚼爛塗之若腫悶

發熱則宜防毒入腹以致不救急用真菜子油或真麻油飲之或用醱酒煎馬齒莧

飲之盡醉為效但竟性寬滑凡瘡潰未合氣血未復而又受以汗毒必量人壯弱用

一兩或五錢切勿太過或用護心散金蟾散見雜毒諸方 治之 又方 粟米根燒灰淋汁

洗之出盡白沫即愈極效 又方 冬瓜皮曬乾研末敷並熬湯洗之

驢馬糞入瘡 照驢馬汗入瘡各方施治或用蝦蟆散紅膏藥見同各方更妙

竹木刺及雜物入瘡用 蚌蟬散見銅鐵竹木刺入肉門內或紅膏藥均效

瘡口堅硬疼痛 凡瘡毒久不收功瘡口堅硬疼痛名曰翻花起肛取癩蝦蟆口紅腫無入字文勿用

破腹刺數孔難用蓋瘡口輕者日換一次重者日換二次內服醒消丸見雜毒方止其疼

痛每服三錢陳酒送下偷口硬孔深取生牛蒡子草連根無則取紫花地丁藥草亦可搗爛敷之其效

如神 宜興馮悠也右足背連小腿彎處初起不過湯毒而成爛腿三十餘年瘡口

四圍堅硬小腿與足腫如斗爛口可容大拳有時出血所流臭漿滿室難聞每以布

包如磚一塊以填孔內否則空痛時年七十有四雍正六年延余治余以老蟾即蟾

破腹蟾身刺數孔以腸雜填入孔內蟾身覆蓋孔外每日煎葱椒湯俟溫早晚各洗

一次換蟾再貼內用醒消丸早晚二服三日後取生牛蒡子草又名大力子草及生紫花地丁

草搗爛填孔外仍以醒消丸早晚與服瘡口皮中有清水出以洞天嫩膏加五美散

敷內有發癢者以白花膏貼之內有塊硬如石者以生商陸搗爛敷之因孔內常有

血出先以三七末撒入次用生紫花地丁生牛蒡各葉根搗爛填入如此二十餘日

腫消癢止而硬口及硬塊皆平皮色退黑內肉鮮紅瘡口亦收小平淺以五寶散撒

上因老翁精神不衰飲食不減始終不補收功此林屋山人經驗秘法也



瘡毒潰爛不堪 凡諸瘡潰爛不堪難以收功者用洞天救苦丹見雜書 每服三錢陳酒

送下蓋被取汗隔二日再服一次再隔兩日再服一次所空隔之日以醒消丸見同

每日一服服後毒水流盡七日後再服醒消丸兩次接服大棗丸見同 每日各進五

錢最危險者可奏奇效此林屋山人經驗方也 又方 拔毒法見陰道 連敷數日漸

漸平愈或用蝦蟆散見後敷滿瘡口亦可或用玉紅膏見後亦效 又前瘡口堅硬疼痛

各方應參看

瘡不收口與後瘡應復發各方參看 一切瘡毒久不收口內必有蟲照後各方治之必愈如再不愈瘡

內必有細骨照多骨疽各方治之若百藥不效者恐是中邪用乾狗糞白色者燒煙

熏之或流毒水或出別物自愈 石灰水 整塊石灰一斤放盆內以清水八斤燒

滾傾入盆內待石灰化開用棍攪勻俟水澄清將水輕輕傾入別器石不用再用細布

瀝清收貯瓶內聽用凡瘡毒日久不能收口或不能生肌量瘡大小剪新白布一塊

浸入水內一刻即起即貼患處俟一二時辰再換一塊日換二三次數日收功神效

莫測此西洋祕方也 地龍水 白頸蚯蚓又名地龍又名曲蟻不拘多少放磁碗內加白沙糖

一撮蓋好一二日化成清水挑少許入瘡內敷日收口 又方 蜈蚣一條焙乾爲

末麻油調敷數日收口止痛如神 又方 蟹甲瓦上焙枯存性研細末摻之即收

口生肌神效 又方 鯽魚破去腸雜用羯羊糞焙枯填滿魚肚瓦上焙枯為末乾

搽上瘡口自收有人生發背瘡口深大不能收口照此治愈 又方 龍眼肉桂圓肉更好

男用女人人口嚼女用男人人口嚼務使融爛成膏貼上無論久近皆效 又方 當歸

一錢以香油熬枯研為細末用真生香油調勻填入瘡口漸長漸愈而且止痛神效

又方 五倍子焙枯研末好醋調勻攤布上貼之用細布糊紙一層以免出氣 神效 又方 鉛粉

搽上即愈有人耳下生瘡膿血淋漓數年不愈後用此方三日收口 又癩毒諸方

內凡生肌收口諸法均極效驗內水仙膏蝦蟆膏蝦蟆散蜈蚣膏更有奇功又腿部

白油膏亦神效也 又瘡口堅硬疼痛前見及瘡愈復發後見各方均應參看

瘡愈復發 有人頭上生瘡好而復發名千層瘡不能斷根後用鮮橄欖核燒灰和雞

蛋油製雞蛋油法見癩毒諸方搽之永不復發各項瘡毒時愈時發者或亦可治 又有人兩足生瘡

冬月則愈夏月則發臭爛疼痛久不斷根一道人云是蛇毒用活蝦蟆搗爛敷之日

換三次後見一小蛇在瘡中取出而愈 又生瘡出水好而復發不能收口恐是蟻

毒照癩毒諸症門螞蟻毒方治之 又瘡形如蜂窠者亦時愈時發照癩毒諸症門

蜂窠瘡治之

瘡毒腹脹如鼓 此名瘡鼓由患瘡疥爛罨之後其毒歸腹而成宜戒沐浴用白殭蠶

大紅棗各五錢先用水煮棗一二滾取棗湯將殭蠶洗淨將棗去皮核搗爛取淨肉

二兩以殭蠶曬乾為末二兩共搗為丸仍用紅棗湯送服服完全愈倘鼓脹危急不

及待藥與服用大活蟹四五隻約重斤餘蒸食飲酒蓋暖睡下半日後身上發瘡更甚而

鼓全消然後將瘡治愈夫瘡鼓死症也瘡發易愈也 又方 鼓脹如不能愈照鼓

脹門內蝦蟆巴豆方及病後浮腫蝦蟆方治之必效

增新 熱毒諸火熱極不能退札伯儒 熱毒勞熱諸火熱極不能退用菘豆不拘多少寬湯

煮糜爛入鹽或蜜少許冷透任意食之神效其性非苦寒不傷脾胃解毒除煩退熱

止渴利小水乃淺近中最佳之品而取效甚捷 附牙疳奇效方 爛嘴牙疳極險

者用大黃生三錢 菘豆炒二錢 丁香研十粒 三味和勻開水調塗兩足心即愈

增新 太乙一筆鈎方 治癰疽發背疔瘡 生軍兩三 藤黃兩一 蟾酥錢五 白礬錢五 原寸錢二 乳香

錢二 沒藥錢二 共為細末以人乳或燒酒化同和搗融加蝸牛數十條搗爛成錠用醋磨

塗神效此京肆秘方得於黃曉齋手摺

增新 八寶黑虎散 統治一切無名腫毒疔瘡瘡瘻合日 冰片分一 水銀錢一 宮粉錢一 明雄分五 麝

香分一 鉛錢一 輕粉分六 百草霜錢一 先將水銀鉛放銅勺內火煉好研末次將百草霜用勺

另炒候煙盡為度再將各藥合研極細收磁瓶內勿令洩氣用時以少許置膏藥上

不拘何項青癰無論已潰未潰初起無不奏效至重用至四次亦無不愈某得此方於粵東苦  
靳不出其友肢篋錄之展轉流傳濟人無算全椒王寶齋錕賜先生身行半天下時合  
此贈人歷有治驗特補入為職瘍醫者贈一副殺之良劑焉

### 癰毒諸方

隔蒜灸法 一切癰疽腫毒惡瘡初起即用此法使毒氣解散用藥施治亦易見功輕

者灸過即愈 大蒜頭去皮又名老蒜切片如三文錢厚無蒜用煮熟雞蛋白或生薑亦可究竟不如蒜好安瘡頭上用艾一團

大則約用一分小則如豆子大於蒜上燒之蒜壞另換若難辨瘡頭先以溼紙貼瘡上先乾處即是瘡頭

或有十數頭生一處將蒜搗爛攤瘡頭上鋪艾燒之艾火不論次數或十數次數十

次或百餘次總以痛者燒至不痛不痛者燒至痛惟頭不宜灸宜向足三里穴穴在膝下三寸

餘骨外兩節內灸之灸多者宜先服護心散後見以防火毒入內 一陰瘡色白不痛又不作癢

或頑瘡久不收口灸之最妙倘灸後血出不止手冷欲絕者照癰毒雜治門瘡口出

血各方治之 一痘疔毒氣使諸痘不能起發或麻木疼痛安蒜片於痘疔上灸之

毒隨火散若紫血出後腫痛不止者尤當用灸 一跌打損傷破口傷風牙關緊閉

腰背反張命在頃刻攤蒜於傷處多灸更灸百會等穴立甦 一凡蛇蝎蜈蚣以及

瘋犬咬傷各毒攤蒜於傷處鋪艾多燒之至不痛為度拔出其毒以免內攻 本草

綱目載史源記蒜灸之功云母氏背癰作癢有赤暈半寸白粒如黍用蒜片艾火灸二七壯其赤隨消次日有赤暈流下長二寸舉家歸咎於灸後用艾火灸四旁赤處每一壯燼則赤隨縮入數十餘壯赤暈收退至夜則大瘡滿背比曉色黑腫高三四寸上有百數小孔調理而安蓋腫者毒外出也小孔多毒不聚也色黑皮肉壞也非艾火出其毒於壞肉之裏則內逼五臟而症必危矣

**隔蠟灸法** 治一切癰疽腫毒發背對口等瘡甚效 先看毒聚處水調麪作圈依腫處大小圍圈高寸餘實貼皮上勿令滲泄本人安身勿動圈內鋪極好黃蠟丸層上以炭火灸至黃蠟融化毒淺者皮上覺熱痛不受灸便止毒深者全不覺熱痛再下黃蠟隨化隨添至圈滿仍前熱火灸至蠟沸初覺癢後覺痛久之不可忍乃去火以少水微澆滾蠟上俟冷去蠟蠟近皮者俱帶青黑色此毒隨蠟拔去淺者一二灸便內消深者三四灸亦立解或瘡口雖破而皮尙堅硬膿未出者不必用刀針惟灸之膿出腫消或膿出而瘡口潰爛者即於瘡口下圈再灸蠟氣從口而入愈深愈妙

**桑木灸法** 治一切癰疽疔癤並治癩癰流注頑瘡久不愈者俱有神效 乾桑木劈碎紮作小把燒燃一頭吹熄持近患處灸之每灸片時日三五次以瘡肉腐動爲度大抵未潰則解熱毒止疼痛消瘀腫已潰則補陽氣散餘毒生肌肉若陽症腫痛

或重負如山用此法出毒水卽內消日久者用之雖潰亦淺且無苦楚陰疽不起者一灸卽起

豆豉灸法 治一切癰毒既潰不斂瘡色黑黯 淡香豆豉升一入熟水搗成泥照瘡大

小作餅厚三分安瘡上鋪艾灸之但使溫溫覺熱痛急去之患當減快一日灸二次

如瘡有孔留孔勿覆列艾其旁灸之聽其出膿爲妙

葱熨法 治虛怯人肢體患腫塊或作痛或不痛或風襲經絡肢體疼痛或四肢筋攣

骨痛又治流注及婦人乳吹乳癰及便毒初起 葱白 搗爛炒熱布包熨患處冷

則易之再熨再易之數次腫痛卽止而愈永戒食龜肉

葱蜜膏 治無名腫毒初起腫痛尙未成膿者極效 葱頭 灰麩 白蜜各等分搗

融烘熱敷之

糯米膏 凡腋肋臂膊腰腿等處忽如火熱腫硬如石痛不可忍百藥不效者一二次

卽愈神效 熱糯米飯少加葱與鹽共搗融敷過夜卽鬆或用熱糯米酒糟亦可其

渣務傾魚池或入河內

神燈照法 治發背對口乳癰乳巖魚口便毒及一切無名瘡毒不論已成未成已破

未破破者尤妙 明雄 硃砂 眞血竭 沒藥錢各一 麝香分二 共爲細末綿紙裹藥

捲成撚約一尺長每撚入藥三分以真麻油潤透燒撚離瘡半寸許自外而內周圍緩緩照之瘡毒隨藥氣解散不致內攻初用三條漸加至五七條瘡勢漸平又漸減之每日照一次重者不過六七次大略腐盡新生即不必再照外貼膏藥內服託裏之劑收功凡陰瘡不能起發又頭面等處難用艾灸者用此照之有起死回生之力真神方也

麻油飲 治癰疽疔瘡一切大毒 真麻油斤一砂鍋內煎數十滾傾出兌酒二碗隨口

熱飲一二碗少頃再飲急則一日飲盡緩則分二日飲無有不愈打獵者凡中毒藥急飲麻油藥毒即消其效如此

菜油飲 治發背對口乳癰疔瘡及一切無名瘡毒重症 陳久菜子油三大杯一時飲盡並以菜油煎葱白至黑色趁熱圍塗患處止痛而愈

護心散 凡患疔瘡及一切大癰大毒神昏嘔吐此毒氣攻心急用此藥服之神效

菘豆研成粉 乳香五錢用燈心一錢二分 燈心炭 加泥封好放殼壳火內燒至竹成一炭取竹內燈心用三錢 共研末用

甘草一兩煎水送下分數次服輕者即愈重者再服醒消丸後見以平其勢或用蝦蟆

拔毒法後見更妙 又方 飲真麻油一大杯真菜子油亦可或用白沙糖三四兩開水調服亦可

瓜蒂散 治癰疽大毒及一切無名惡症並治乳巖 陳年老南瓜蒂燒成炭酒沖服

再用麻油調此炭敷之立愈如治乳巖每服瓜蒂炭一箇重者四五次立愈幸勿泛

視

菊花飲 此乃治疔毒聖藥有起死回生之功凡對口發背一切無名紅腫熱毒亦極

神效陰疽色白平塌者勿用 白菊花葉連根用搗取自然汁一茶鍾滾酒沖服用

酒煮服亦可不如生汁為妙毒重者多服蓋被睡臥出汗其毒自散並用渣敷患處

留頭不敷無葉用根無根用藥店中乾白菊花兩四甘草錢四酒煮溫服亦可

水仙膏 治對口發背乳癰魚口便毒及一切惡毒無論已破未破均極神效凡懸癰

及諸瘡久不收口者立能止痛生肌百發百中 水仙花兜用黃糖紅沙糖亦可和搗如泥

敷之此物鮮者平時難得乾則力緩須存放陰溼之處入土不可以備急用

鳳仙膏 治對口發背魚口便毒及一切無名惡毒並瘰癧初起其效如神 鳳仙花

俗名指甲花連根洗淨風乾搗取自然汁入銅鍋內器忌鐵不用加水儘原汁熬稠敷患處一

日一換諸毒初起雖腫大如碗二三次日即消已破者勿用根花白者良

芙蓉散 一切癰瘡疔癰熱毒皆治瘡色白者勿用 秋芙蓉葉或生研或乾研加蜂

蜜調敷周圍留瘡頭不敷乾則隨換或取汁和酒飲之更妙初起者即消已成者易



穿已穿者易斂或用花或用根皮俱奇效再加眞赤小豆末查藥物備要便知一錢其效更速但無蜜則黏緊難揭

馬莧膏 治瘡毒日久膿水不止腫痛不已大有神效初起未久敷之反不見功 馬

齒莧又名瓜子菜搗爛厚敷數日即愈

大蒜膏 治惡瘡腫痛叫號不眠 獨蒜頭數顆搗爛麻油拌和厚敷瘡上乾又換敷毒消痛止無不神效

肥皂膏 治一切無名惡毒 生肥皂去子放搗爛好醋和敷立愈不愈再敷奇驗無比

赤豆散 治一切瘡毒未成即消已成即愈 眞赤小豆查藥物備要便知四十九粒爲末加野

芋麻根和雞蛋白調敷一日一換

大戟膏 治一切惡瘡及疔毒痛不可忍者其效如神不痛敷之亦愈陰疽尤屬相宜

眞紅芽大戟查藥物備要便知

敷收功嚼時藥汁不可吞下 用整枝的温茶洗淨去心嚼融敷之立刻止痛而愈再發再

遠志膏 治一切癰毒初起屢試神驗 遠志肉二兩去心酒煮搗爛如泥敷之用油紙隔

布紮定過夜即消

銀花飲 治對口發背魚口便毒及一切無名腫毒大有奇功 忍冬藤即金銀花藤生採五

兩忌鐵器搗爛加甘草節一兩同入砂罐內水二碗慢火煎至一碗入無灰酒一碗再煎十數沸去渣分爲三服一日夜服盡重者一日二劑以大小便通利爲效再將藤上花葉滴取一把搗爛少入白酒調塗四圍中留一孔洩氣

糞坑土 治發背及諸惡毒瘡疼痛 糞坑底泥土陰乾新水調敷其痛立止

石灰散 治一切瘡毒無論已破未破並治跌打損傷無不奇效 石灰要陳一年者愈陳愈妙 韭菜

各等分於端午日午時或六月六日同搗極爛爲餅陰乾凡遇一切瘡毒乾敷油調均可

松香散 治小兒胎毒並蠟梨頭瘡及男婦一切溼瘡有人施送四十餘年神效無比

老松香二兩炒 黃丹一兩炒 鉛粉五錢炒淨勿留鉛氣 真青黛一兩 白礬二兩入頭髮少許同燒以枯爲度 共研細末溼則乾

敷乾則用麻油調搽

牛牙散 治一切癰毒大瘡初起並治蠟梨頭瘡及腳丫破爛神效 取已死黃牛門

牙數枚以三錢爲度將牙燒紅浸醋內燒三次浸三次研末候冷如病人有一斤酒

量者用酒二斤將牙灰沖入飲之蓋被睡一夜即出大汗次日全消或腹瀉再用敗

毒散服之立愈初起三日內俱可治活人無算若治蠟梨頭瘡並腳丫爛多年者

用真麻油或雞蛋油後見調敷

牛糞散 治溼熱諸瘡毒水淋漓久不收口並小兒痘瘡破爛百藥不效者用此如神

黃牛糞炒熱數冷則隨換數次即愈且無疤痕取糞面上尖頭用

雞腰膏 治小兒胎毒及頭面耳前耳後一切溼瘡並羊鬚瘡屢試如神 大雞腰子

一對蒸熟去皮 枯礬分三 共搗融加頂上冰片分一二 敷之

雞蛋飲 凡腸癰發背臙毒魚口等症初起三天之內照服一方即行消散如毒勢旺

者接連三服無不盡消真神方也皮色不變者勿服 雞蛋一箇傾入碗內攪勻入

芒硝二錢蒸服用好酒送下

雞蛋油 此油最能殺蟲諸瘡破爛癢不可忍或不收口者搽之大有神效 雞蛋數

箇整箇煮熟去白用黃乾煎枯焦以滾開水半茶鍾沖入油浮水面取出冷透火氣

聽用

燕泥散 治一切熱瘡惡毒腫痛及小兒胎毒甚效皮色不變及先白後紅者勿用

燕子窩連泥帶糞研細麻油調敷瘡色赤色者加黃栢末調敷小兒胎毒先用米湯

油即米鍋內浮面油洗淨再敷

鯽魚膏 治諸瘡腫毒潰破流膿並治脚生雞眼俱極神效乳巖及一切色白陰疽忌

用淨巴豆肉六兩 草麻子六兩 香油斤半 蝦蟆兩箇每箇重 活大鯽魚條五 先將巴豆肉草麻子

入油內浸三日再將蝦蟆浸一宿臨熬時入活鱒魚共熬枯去渣淨慢火熬油滴水成珠離火傾乾淨鍋內再加鉛粉二斤半乳香末五錢不時攪動冷定為度用時重湯炖化薄紙攤貼永戒食蝦蟆

蝦蟆散 治一切無名腫毒惡瘡久不收口凡陰疽鼠癰楊梅結毒等症百藥不效者

惟此最宜 硫黃三錢胡椒二錢共研細末調勻取癩蝦蟆一箇眼紅腫無八字紋者勿用將藥納入口內用

線將口捆緊外用黃泥包裹入炭火中燒之俟泥團紅透取出用碗蓋住候冷去泥

取蝦蟆磨為細末忌鐵器調真小磨麻油用淨鴨翎舊筆亦可蘸敷候瘡出毒水數日毒盡

而愈百發百中寶之重之永戒食蝦蟆

蝦蟆膏 治一切無名腫毒大小瘡癤或腿腫溼氣俱貼患處並治大人小兒食積痞

塊疔疾身瘦肚大俱貼肚臍上痞塊貼患處百發百中其效如神瘡毒無論已成未

成俱效 真小磨麻油十兩槐樹枝青而肥嫩者鉛粉四兩臨用須曬極乾過篩大癩蝦蟆一箇須多者佳小則二箇要數月前預取陰乾眼紅腫無

不然則貼之作痛次下槐枝煎枯亦須撈淨然後下鉛粉用大槐枝二根順攪微火

熬熬俟滴水成珠為度取起用磁器收貯臨用攤貼或瘡毒痛甚不及熬膏即剝取

癩蝦蟆皮不用足皮貼上皮膚自黏緊即能拔膿生肌止痛聽其自落不必揭動此簡便法

也終不如熬膏之妙永戒食蝦蟆又背部背癱方內及陰疽門內各有蝦蟆拔毒之法亦極效驗

蝦蟆拔毒法 治一切心腹脹悶或痧症氣閉或傷寒煩躁或發斑發疹或生癰毒氣內攻嘔吐等症俱極神效應參背部及陰疽門蝦蟆拔毒法 取活癩蝦蟆一隻紅眼

腹無八字紋者勿用

破開去腸雜貼心坎上

腹脹者並貼肚臍

或取蝦蟆肝煎水服之更妙輕者不服亦可

戒食蝦蟆

蜈蚣膏 治一切已破無名惡毒無論久近輕重貼之數日即能拔毒生肌有起死回

生之妙並治毒蛇瘋犬及百蟲咬傷俱極神效 大蜈蚣長四五寸者八條小者用二十條 土木鱉子四二箇

真小磨麻油一斤 將蜈蚣木鱉放麻油內泡三日用文武火熬起清煙將渣撈淨不淨則

加入黃丹四兩用柳枝不住手攪動熬至滴水成珠用罐收貯浸冷水中數日拔去

火毒用時以布攤貼

紅膏藥 專治疔瘡瘍羊音子即瘰及一切無名腫毒並銅鐵竹木瓦石入瘡入肉屢試

如神 銀硃水飛曬乾二錢 草麻仁錢二 嫩松香錢五 黃丹水飛曬乾一錢 輕粉分五 共搗如泥如治疔瘡以銀

針將疔瘡頭挑破用此藥作一小丸如黃豆大安膏藥上不論何項膏藥當中貼之疔即拔出

或畏疼者不必挑破即以此膏攤開如錢大貼之亦可凡無名腫毒已破未破不必

挑動均照拔疔之法用之自能拔毒收功銅鐵等物入瘡入肉亦用此紅藥一小丸加別膏藥上貼之自出瘍羊音子未破者用此藥一小丸加別膏藥貼在最大之瘍子上或貼初起之瘍子上亦可貼後癢而微疼至第三日啓去另換此藥丸與膏藥貼上換至數次後皮自微破用瘦猪肉煮湯洗之不用或用金銀花煎水洗亦可再換此藥丸與膏藥貼之每二日一洗一換貼至數日瘍子之根即黏膏藥上矣根淺者易出根深者功緩出後仍用肉湯洗之其餘鄰近未破之瘍子仍用此藥丸與別膏藥貼在已破之瘍子原口照前治之可以一一後此而出如未破瘍子相隔尚遠或有筋膜隔住即在未破之處貼之俟各瘍子拔盡另用生肌膏藥貼緊數日收口而愈此藥初貼稍覺作痛煩躁亦屬無妨宜忌發物勿受風熱爲要

白膏藥 治一切無名腫毒並小兒胎毒黃水溼瘡功能拔毒生肌屢試神驗凡溼瘡無皮紅肉現露日久不愈者更效 頂上蘆甘石以輕淨水者佳 炭火內燒三五炷香久研

末攤地上一日冷透火氣用生猪板油和勻搗融攤貼

綠膏藥又名紫靨膏 治諸色頑瘡溼痰溼氣並新久杖傷及一切無名腫毒未成即消已成

即破已破即愈又瘍羊音子即瘰癧初起未成者貼之自消已成未破者貼之自破已破其根核尚存者貼之核自拔出其效如神 松香一斤入蔥管內煮二日取葱管內水再煮一箇時辰不用放蔥取放冷水中再批百餘下再煮

第七次  
每度

真小磨麻油

銅綠各四兩

先將麻油熬起清煙加入松香熬至將要成膏再加銅綠熬至滴水成珠用罐收貯浸水中拔去火毒用時薄攤紙上加頂上牙色梅花冰片二三釐研極細摻膏上貼之不細貼之作痛

綠雲膏

治瘡癩頭時發時愈者並治疔瘡已破膿尙未盡及一切無名腫毒貼之立

能拔膿散毒消腫止痛屢試如神

真麻油

三兩草麻子四十九粒入麻油內熬結去草麻子不用要淨渣不淨貼之作痛製松香上綠膏

法製

大猪膽汁

三兩銅綠二兩

研細

先將松香放銅鍋內火上融化再下各藥熬勻搗千餘

下烘融放水手中用手扯拔百餘遍愈拔其色愈綠收瓦鉢內用時以油紙攤貼若治瘡癩頭毒用細布攤貼一次全愈不必再換此毒多屬陰症膏內所用猪膽大不相宜而用之屢著神效或不盡為陰症也

綠蠟膏

治已破一切無名腫毒日久不愈者敷之數日即能生肌收功百發百中

黃蠟

六錢

白蠟

四錢

銅綠

五錢

真小磨麻油

二兩

先將麻油熬至滴水成珠再將各藥加入攪

勻熬二三滾用罐收貯浸於水中拔去火毒用紙攤貼少刻膿黏滿紙起去再換日換數次自愈

黃明膏

治對口發背魚口便毒及一切癰疽腫毒未成即消已成即拔膿生肌最為

神效此世傳祕方也

牛皮膠

一兩

入銅器內好醋和煮用筷子時時攪動煮好加鉛

粉黃丹各二錢攪勻收入罐內放水中拔去火毒用布攤貼

紫蘆散 治小兒胎毒肉赤無皮或膿血淋漓及胎中受父母楊梅瘡毒者並治婦女

為丈夫梅瘡所過結毒之氣漸至陰戶肛門腫硬破爛膿血不乾疼痛不止此藥搽之  
最妙如小便將藥衝出須要勤搽漸漸自愈極驗如神若毒勢重者務加配珍珠

分七西牛黃分三其效更速 輕白蘆甘石一兩煨淨入黃連汁內再煨再淨共三厚川黃柏七錢以猪膽

甘蔗皮五錢煨淨粉口兒茶五錢菘豆七錢末赤石脂五錢頂上梅花冰片分五共研細末另

用真麻油二兩入雞蛋黃一箇煎黑去黃候油冷透一日調此藥敷上自能止痛而

愈油不冷透搽之反作痛也

銀青散 治男子陰頭生瘡腐爛疼痛女子陰戶兩旁生瘡溼爛腫痛發癢並治小兒

痘疤腫爛並痘後餘毒不清滿頭黃泡等瘡用此皆效 白螺殼取殼頭上白色者佳去淨

欖核火煨存性研寒水石另研極細取淨末二錢頂上牙色梅花冰片臨時每藥二錢配冰片一錢共研勻以磁瓶盛貯勿

使出氣臨用時以麻油調搽溼處乾搽神效無比

玉紅膏 治一切癰疽發背對口大毒腐去孔深洞見膜膈者用此填塞瘡口自能生

肌長肉收口誠外科聖藥也 當歸兩二白芷錢五紫草錢二甘草兩二用真麻油一斤將

前藥浸五日煎至藥枯瀝淨渣將油再熬至滴水成珠下血竭細末錢四攪勻再下白



蠟二融化離火微冷再下輕粉四待成膏蓋好放水中三日拔去火氣聽用愈陳愈佳凡瘡口深陷以新綿花蘸塗此膏塞之

金素丹

又名黃靈丹

治一切癰疽大毒發背對口腰疽臂癰腐肉暗黑死肌堅硬臭穢難聞

用此摻之膏藥蓋上過夜即周圍裂縫與好肉分界膿流肌活黑色轉紅疼痛稍緩其腐自化自脫不用刀鉗剪割並無穢氣神效無比凡牙癰潰爛齒欲脫落用此亦效 生白礬六錢 枯白礬三錢 明雄黃一錢 共研極細篩過再碾千餘下愈碾其色愈美裝磁瓶內臨用取出勿使染塵凡去腐肉儘可用之若新長肉上摻之要痛片刻一見膿水溼氣即不痛矣如良腐間混須先將金花散摻好肉面上再用金素丹摻腐肉上自不痛也否則其痛難受

金花散

治爛腿臃瘡連年不愈臭爛不堪並治一切癰瘡瘡毒功能去腐生肌 熟

石膏

一斤研

飛淨黃丹兩和勻再篩再研用真香油調搽上蓋油紙一日一換不可用

茶水洗如有膿水流開隨用藥敷水流之處以免爛開若婦女一見月信雖愈復發發後再搽自有功效

洞天膏

治一切紅腫熱毒癰癤其效如神此林屋山人經驗方也以下十七方皆同

先用壯年頭髮一斤

菜子油三斤

入鍋熬至髮枯去渣聽用再用活牛蒡草又名大力草

生菊

花連根 活蒼耳草連根 生金銀藤 生馬鞭草又名龍牙齒 生仙人對坐草各一斤各草如雞

可入菜子油兩十熬至草枯瀝盡渣再加 白芷 甘草 五靈脂 當歸各半 入鍋

熬至藥枯瀝盡渣俟油冷將前熬頭髮之油合共稱過斤兩每油一斤用炒透黃丹

兩七入油內攪勻再熬熬至滴水成珠以不黏指為度離火冷透收貯聽用

洞天嫩膏 治遮腮及小兒遊風丹毒並治紅腫癰癤初起尙未作膿者均極效驗

照前煮法每斤油內入炒透黃丹兩四熬黑收起聽用不必熬至滴水成珠以嫩為度

太稠則不嫩也

洞天救苦丹 治乳癰乳巖及瘰癧破爛神效 露天有子蜂窠無子不效 雄鼠糞兩頭尖者是 青

皮 苦棟子立冬後者佳 各放新瓦上焙存性各等分研末和勻每服三錢陳酒送服隔兩

日再服不可日日連服也

醒消丸 治疔瘡及一切大熱癰毒腫痛不已立能消腫止痛乃療癰之聖藥孕婦忌

服 製乳香 製沒藥各一兩製法見藥物要 麝香三錢不 雄精五錢 共研細用黃米飯一兩和搗為

如粟米大曬乾忌火 每服三錢熱陳酒送服蓋被取汗為妙

三黃丸 治懸癰紅腫並熱毒大癰楊梅結毒火毒疼痛等症孕婦忌服 熟大黃兩三

汁酒磨 製沒藥 製乳香各一兩製法見同上 雄精五錢 麝香 犀牛黃各三錢 共為末和大黃汁搗融

爲丸如梧子大每服五錢

五通丸 治大癰生於緊要穴道將欲大發之時服此甚效如與三黃丸間服更妙

廣木香 五靈脂 麻黃 製乳香 製沒藥共爲末各等分用飯搗和爲丸如梧

子大每服五錢另用 川芎 當歸 赤芍 連翹 甘草各錢半煎湯送下

五寶散 此生肌藥屢用有效 人指甲錢五用紅棗錢五包甲以長髮錢五將棗搗紮同象

皮薄片錢五放瓦上炭火內炙融成團存性加麝香分七上冰片分三共研細如香灰收貯

聽用

珍珠散 治口瘡牙根紅腫實火喉痛各症每用一二分吹入神效 雄精 真硼砂

川連 兒茶 人中白 頂上牙色梅花冰片 薄荷 黃栢錢各一破大珍珠分五

各研極細末如香灰細不和勻收入磁瓶不可洩氣

神仙棗 凡生瘡毒日久體虛瘡極重者內服外敷大有奇功 紅棗斤二銀花 歸身

各一甘草錢三僵蠶 白芷 乳香末 五倍子 黃耆錢各五水六碗煎半倒出再如

煎半共煎湯六碗去藥留棗再煎分作四五日連棗與湯吃完全愈

愈瘡棗 治與神仙棗功同 紅棗斤三猪板油加一陳酒斤三共入砂鍋內煮乾加水斤三煮

至半乾時時取食完瘡愈若暑天分作數日煮食

大棗丸 專治諸瘡潰爛久不收口大有神效 山羊糞曬乾炒成炭存性磨成細粉

用大棗去皮核如泥再入前粉搗成丸每用四錢黑棗煎湯送服

山蓮散 治瘡毒潰爛不堪內腑止隔一膜者撒立見奇功 大活鱧魚一條破腹去

腸雜以山羊糞塞滿魚腹放瓦上慢火焙乾存性加麝香錢一研極細麩如灰收貯聽用

代刀散 治瘡毒腫脹疼痛服此即破 皂角刺 生黃耆炒各一兩生甘草 乳香錢各五

共為末每用三錢酒服

咬頭膏 專治瘡毒腫脹不破甚效 銅綠 松香 製乳香 製沒藥製法見藥物備要 杏仁

生木鱉研末草麻子去壳各一錢巴豆去油不白砒分一共搗成膏為丸如葶豆大每用一粒放

瘡頭上另用不拘何項膏藥蓋上破即用茶洗淨分別症候另用藥治孕婦胎前產

後忌用

紫藥 專治瘡毒紅腫作痛極效 草麻子去壳搗如泥鋪舊綉上照瘡毒大小鋪之又取一綉蓋

上然後紫瘡毒上拔毒止痛惟紅腫非常者用之痛止即去凡皮色不變陰疽並孕

婦胎前產後忌用 以上共十五方均林屋山人屢試屢驗方也

麻藥 凡割毒瘡或取箭頭槍子敷之麻木不痛 川烏尖 草烏尖 生半夏 生

南星 草撥各二錢五分蟾酥錢二胡椒 細辛錢各五共為細末酒調搽 又方 公麻雀糞

突而豎  
胡椒粒七  
研末燒酒調敷

藥線 治齒上生鋸並瘡痔癭瘤頂大蒂小之症及尾脊之處生尾突出神效 芫花

二分錢 要有子者一錢即壁上罅  
五分錢 珠實白如錢大者是也 白絲細線 五分錢 用水一碗慢火熬至水乾為度取線陰乾

小者用線一根大者用線二根繫蒂根上雙扣捆紮留出線頭每日漸漸收緊

仙方活命飲 專治一切癰疽初起一服即消已成易潰此外科之良方 穿山甲 大三

炒片 皂刺 五分 防風 七分 貝母 生甘草 乳香 沒藥 去油 花粉 白芷 錢各一 陳皮 去白歸

尾 錢各一 銀花 錢三 各藥用淡陳酒三茶鐘煎好溫服瘡生上身飯後服瘡生下部空心服

降癰活命飲 治一切無名腫毒無論陰症陽症初起能益氣和血解毒托裏破後能

排膿去腐生肌長肉瘡科始終之聖藥功在仙方活命飲之上產後生癰毒者更妙

大當歸 錢八 生黃耆 金銀花 錢各五 甘草 錢三 酒煎濃汁服服後睡臥出汗即愈 毒

在上加川芎 錢二 在中加桔梗 錢一 在下加牛膝 錢二 泄瀉加蒼白朮 錢各二 嘔吐惡心加陳

皮半夏 錢各一 不思飲食加白朮 錢三 陳皮 錢一 氣虛加黨參者 錢各五 陰疽肉白色淡無

論冬夏加陳皮麻黃 分各六 肉桂炮薑 分各一錢 斷不可妄行加減 排膿加白芷 錢三 欲破

加皂刺 分各一錢

黃耆湯 治搭手發背對口癰疽及一切大小無名腫毒未成者散已成者潰已潰者

驗方新編 卷六 癰毒諸方

易收口輕者一服重者二服全愈此方得自仙授大有功效小兒減半孕婦忌服

生黃耆 歸身 甘草 白芍 穿山甲錢各五 上部加川芎錢五 中部加杜仲錢五 下部

加牛膝錢五 各藥用淡陳酒一茶碗水一碗煎至一碗熱服避風蓋被暖睡汗出即愈

未出汗時忌一切冷熱湯水汗出一時後不忌

托裏解毒湯 治一切紅腫癰毒 金銀花錢三 當歸錢五 生者錢二 花粉 連翹 黃芩

赤芍各一錢五分 大黃 牡蠣 生甘草錢各一 枳殼分八 皂刺五分已破者不用 水煎服

千金內托散 治同上 台黨 生者錢各四 防風 厚朴 川芎各一錢五分 白芷 桔梗

當歸錢各二 肉桂 生甘草錢各一 水煎服

四物保元湯 白芍炒酒 川芎各一錢五分 生地 台黨 生者錢各五 當歸錢二 炙草錢一 水煎服

保元湯 肉桂錢二 生者錢四 生甘草錢一 水煎服

四物湯 治同上 白芍炒酒 川芎各一錢五分 生地 生者錢各五 當歸 白芷各二錢 雲苓 台

黨錢各三 五味分八 肉桂分六 水煎服

二陳湯 治同上 橘紅錢五 半夏 白芥子研各二錢 雲苓半錢 甘草錢一 水煎服

黃連消毒飲 治喉外生癰並治耳疔俱效 黃芩 黃柏 防己 藁本 桔梗各五 防風 知母 獨活 連翹 生地 歸尾各四分 黨參 甘草各三分 蘇木 陳皮

澤瀉各二 羌活分 黃連錢一 生黃耆錢二 水煎食遠溫服

化堅二陳丸 治眼胞痰核甚效 陳皮 製半夏各一 生甘草 川連各三 白殭蠶

二白茯苓兩 共研細末荷葉熬濃汁為丸如梧子大每服二錢白滾水下外用生南

星利醋磨濃汁搽之

橘皮竹茹湯 治一切瘡毒已破胃火上逆氣衝時時呃逆身熱口渴唇焦此熱呃也

服之最效 橘紅 竹茹各一 生薑 黨參各一 黃連分八 柿蒂箇七 水煎空心服

摩風膏 治面上或身上風熱浮腫癢如蟲行肌膚乾燥時起白屑次後極癢抓破時

流黃水或破爛見血痛楚難堪此膏抹搽十日必愈屢試如神此風熱作癢第一方

也 麻黃錢五 羌活兩二 升麻錢二 白檀香 白芨 防風 歸身各一 用香油兩五 將各藥

浸泡五日慢火熬枯去藥用紬瀝淨渣加黃蠟錢五 再熬數滾啓起冷透火毒聽用

二味拔毒散 治一切毒蟲咬傷無論腫痛癢敷之即止其效神速 雄黃 枯礬

各等分為末先用薑汁洗淨用茶調敷

貝葉膏 治對口發背魚口一切潰爛癰毒與腿部白油膏功同屢試神效 淨麻油

斤一 亂髮雞子大 將髮入油中以文火熬化去渣再入白蠟二兩鎔化用紙浸油內取起

再浸再起以油盡為度紙要張張隔開放在風前冷透一日用貼患處少刻膿黏滿

紙日換十餘次數日膿盡生肌

蘆薈散 治諸瘡毒水淋漓不乾並治坐板瘡甚效 蘆薈<sub>兩</sub>甘草<sub>兩</sub>共研細末先用

店中做豆腐之水洗淨將藥敷上數日即愈此西域老僧方也

生軍散 治一切未破大小火熱瘡癰紅腫焮痛神效此葛仙方也 生大黃 好醋

磨汁敷乾則隨換皮色不變者忌用

礬蠟丸 此托裏消毒固臟腑止痛妙藥凡一切癰毒潰爛之後最宜服此若腸肺

生癰及遍身生瘡狀類蛇頭者更有排膿托裏之效 白礬<sub>三兩</sub>研<sub>末</sub>黃蠟<sub>兩</sub>二先將蠟鎔

化離火加入礬末攪勻用多人趕急擦作丸如梧子大遲則堅凝難擦每日服一百

丸分三次空心酒送下忌食雞三月

皮金膏 治撲跌擦損或鞋底墊傷脚板或刀傷破爛紅腫光皮潮溼或瘡癰將愈新

肉易破或疼瘡腫爛皆效 廣東羊皮金紙 以金面貼傷處三日必愈聽其自落

為妙或用包銀硃烏金紙亦可其功稍緩

梅花點舌丹 治疔瘡及紅腫癰癩一切無名熱毒初起並實火牙疼喉痛喉蛾喉風

口舌諸瘡又治小兒急驚風俱極效驗若慢驚風及陰疽陰虛口舌牙喉等症萬不

可用孕婦尤忌服 製乳香 製沒藥<sub>製法見藥</sub> 真礪砂 明雄 真熊膽 真血竭



葶藶 真沉香 頂上梅花冰片錢各一 麝香門子當 硃砂 犀牛黃錢各二 破大珍珠錢三 以上共為細末另用真蟾酥錢二 以人乳化開和勻搗融作五百丸如大菘豆大金箔為衣蠟壳收好每用一丸入葱白內打碎酒送服睡臥蓋暖取汗三箇時辰毒消而愈或數亦可

蟾酥丸 功與梅花點舌丹同孕婦忌服 真蟾酥二錢 輕粉 銅綠 膽礬 枯礬

寒水石服 製乳香 製沒藥製法見藥 雄黃錢各一 麝香分七 硃砂錢三 蝸牛二十一箇有壳 各

藥於端午日午時若要急用隨時可製 在淨室先將蝸牛研爛同蟾酥和研稠黏再入各藥搗勻

為丸如菘豆大每服三丸用葱白五寸病者自己嚼爛吐入手心男用左手女用右手將藥丸裹入葱內用陳熱酒一茶鍾送下蓋被睡臥約人行五六里路病者出汗為度重者再服一服必效如若外用將丸作餅隨症用之修合時忌婦人雞犬見

萬應紫金膏 此膏能治百病凡男婦大小瘰癧痰核對口發背乳癰魚口便毒腫瘡

熱癩手足腰背疼痛閃挫傷損及一切無名腫毒俱貼患處哮喘咳嗽貼心窩瀉痢

貼臍眼百發百中功效無窮 赤芍 當歸 紅花 黃芩 防風 荊芥 連翹

黃栢 殭蠶 蟬退 白芷 甘草 胎髮 大黃 銀花 蜈蚣 川烏 草

烏 羌活 蒼朮 細辛 川椒 秦艽 乳香 沒藥 骨碎補 首烏 蛇牀

子 木鱉子 大楓子 生南星 生半夏以上各五錢 用豬油麻油桐油各半斤將前藥浸入油內如春夏天浸三日秋冬浸七日傾銅器內文武火熬至藥色焦黑取起瀝渣再熬加炒黃丹十兩用槐枝不住手攪動熬至滴水成珠再加白蠟五錢隨即取起用槐枝攪勻收入瓶罐浸水中拔去火毒用時以布攤貼

### 陰疽

陰疽論名

與癰毒門癰疽論參看

王洪緒曰陰毒之症皆皮色不變然有腫與不腫者有痛與不痛者有堅硬難移有柔軟如棉者不可不爲之辨夫腫而不堅痛而難忍者流注也腫而堅硬微痛者貼骨鶴膝橫痃骨槽等類也不腫而痛骨節麻木手足不仁者風溼也堅硬如核初起不痛者乳巖癰癩也不痛而堅形大如拳者惡核失榮也不痛不堅軟而漸大者癭瘤也不痛而堅堅如金石形大如升斗者石疽也此等症候盡屬陰虛無論平塌大小毒發五臟皆曰陰疽如其疼痛者易消重按不痛而堅者毒根深固消之不易則治之尤不容緩也

陰疽治法

王洪緒曰初起之形寬大平塌根盤散漫不痛不腫色不明亮此陰疽最險之症倘誤服寒涼其色變如隔夜豬肝毒攻內腑神昏即死夫色之不明而散漫者乃氣血兩虛也患之不痛而平塌者毒痰凝結也治之之法非麻黃不能開其腠

裏非肉桂炮薑不能解其凝結此三味雖酷暑不能缺一也膜裏一開凝結一解氣血能行行則凝結之毒隨消乃一定而不可移之法後列陽和湯陽和膏犀黃丸小金丹諸方均爲陰疽要藥照方治之萬無一失如若增減定無功效 又曰小孩如患各種陰疽不能服藥初起以小金丹化服至消乃止如已成膿亦須日日服之可使不痛而穿俟毒去盡用保元湯見雜加肉桂分五水煎日服收功 又曰凡患一應色白大小等疽忌用洞天膏又膏藥熬太嫩者貼則寒凝愈結又膏藥有巴豆葶麻萬不可貼貼則被其提拔成功每見橫痃乳巖貼至致命孕婦貼則墮胎凡陰疽潰後宜貼陽和解凝膏爲妙

### 陰疽諸症

石疽 初起一核漸大如拳堅硬如石急以陽和湯犀黃丸每日早晚輪服可消如遲至大如升斗者仍如石硬不痛日久現出紅筋則不能治若生斑片潰爛在卽潰後卽放血三日而死若現青筋可治內服陽和湯外用活商陸根搗爛加食鹽些少敷之數日作癢半月皴皮日敷日軟有膿袋下垂以銀針穿破用千金托裏散加熟地生者各一兩煎服十劑後用陽和解凝膏貼上空出針穿之眼膏外用布捆緊務使皮膜相連內服十全大補湯或保元湯參耆俱生服用至收功爲止各方見後如毒氣未

230

盡忌服補劑此林屋山人秘法也 又方 蛇皮貼之亦效

黑核 大者稱惡核小者痰核與石疽初起相同然其寒凝甚結毒根最深却不易潰未潰之前忌貼涼膏忌服涼藥內服陽和犀黃丸可消亦有以大田螺搗爛敷塗消之者大忌開刀如已開刀瘡口堅硬卽照癰毒雜治門瘡口堅硬疼痛各方治之仍內服溫補托毒消痰之劑犀黃丸儘可收功丸內有麝香孕婦忌服見後方此林屋山人秘法也

失榮 此患多生肩甲以上初起微腫皮色不變日久漸大堅硬如石推之不移按之不動其症與石疽相同急照石疽各方治之

瘰癧

卽瘰癧子也 瘰癧子也

小者爲瘰癧大者爲癧名色甚多項前爲痰瘰項後爲濕瘰左右兩側形

軟遇怒卽腫爲氣癧堅硬筋縮爲筋癧若連縣如貫珠者爲瘰癧又有馬刀是形子

母重台蛇盤鎖項蜂窩蕪燕窩瓜藤瘻癩流注單窠蓮子各門及風石鼠癧鼠癧

卽俗云鼠瘻形名各異受病固不外痰溼風熱氣毒而成然必兼毒忿怒鬱憂滯謀

慮不遂而致也初起用煙桿中黑煙油或鳳仙膏見雜毒敷之三日卽消屢試神效

凡痰癧未破者用子龍丸後見每服三分淡薑湯下每日三次至消乃止倫小兒不善

服丸每日用小金丹一丸後見布包放石上隔布搗細入杯冷陳酒化開用銀器研臨

睡以熱陳酒沖服蓋被取汗以消為度數年內忌食香椽橙橘食則復發 凡瘰癧  
 內有潰爛間有成膿未潰者亦有未成膿者宜服犀黃丸後見止其已潰之痛鬆其成  
 膿未潰之脹消其未成膿之核已成膿者用咬頭膏見雜毒貼之即穿內服溫補祛痰  
 通腠活血壯氣之藥外貼陽和解凝膏後見而愈凡瘰癧延爛至肩胸脅下不堪之極  
 者用洞天救苦丹見雜毒三服犀黃丸六服此丸須隔兩日一服服完九服後皮色變白孔內紅活  
 接服大棗丸見雜毒肌肉漸長用生肌散收功凡瘰癧爛至咽喉如飲熱湯外覺熱痛  
 者乃危險至極稍遲則爛穿咽喉不救急取柴心一根量本人中指量其三指共積  
 一柴心上隨其長短男左女右就手之左右即在手下之脚骨正中骨頂之處定準  
 一直量上盡頭以墨點記用艾團大如豆燒三次隔蒜燒或隔紙亦可以膏藥蓋住不論何項膏藥可保咽喉  
 不穿內仍照前服洞天犀黃大棗各丹丸外用荊芥煎湯洗之並用樟腦雄黃研細  
 調敷未成膿者燒之即消已潰爛者即易收口以上各條乃林屋山人祕法屢試如  
 神萬無一失

銀黝膏 治瘰癧及一切無名腫毒無論已破未破並治腰痛俱極神效先用 真麻

油一斤慢火熬開再下 銀黝音幼四兩用桑枝不住手擾動俟清煙起時再下 黃

丹五兩熬至滴水成珠放水中一二日拔去火氣隨症用布攤貼 又方 用銅錢

一枚和蚰蜒蟲即無壳蝸牛 俗名臭蝸蟲搗融以銅化為止敷之即愈其效無比 又方 黑鉛三兩炒 成炭

醋和勻攤舊布上貼之一日一換半月之後不痛不破內消而愈 又方 頂好陳

醋熬至滴水成珠加生半夏末錢一調勻敷之過夜再換兩日即消神效 又方 夏

枯草 金銀花 蒲公英錢各五酒水煎時時當茶服之 名三妙散 治結核瘰癧

徧滿脖項服之十日即消如若再發即於肩顛穴在肩端 兩臂間 曲池穴在肘外輔骨屈肘曲 骨之中以手拱胸取之二穴用艾

火各燒七次在左燒左在右燒右左右俱病俱燒斷根神效 又方 元參蒸 牡礪

煨酒 炒 貝母去心蒸 各四兩共為末煉蜜為丸每服三錢開水下日二服服之即消屢試奇效

又方 凡瘰癧已破者先將破處麵糊作餅貼上用小砂壺二箇燒酒煎滾去酒以

熱壺口覆於麵餅上熏瘡如拔火壺一樣壺冷再換一壺如此數次將毒氣拔盡即

愈熏後用猪膽熬成膏貼瘡口奇效 又方 集成白玉丹 專治瘰癧破爛連及

胸腋臭穢難聞十數載不愈者藥到病起其效如神 新出窰石灰一塊滴水化開

成粉用真生桐油調勻乾溼得中先以花椒煎湯洗淨以此敷之 又方 荊芥

要近根下一段必須向 藥店中買回自取為真 剪碎煎湯溫洗良久看爛處紫黑針刺去血再洗三四次用樟腦雄

黃等分為末麻油調掃上出水次日再洗再掃以愈為度凡瘰癧延至胸前腋下及

兩肩頸項不能轉動四五年不愈者皆治其效如神 又方 冰蝦散 大田螺五

去壳線  
穿曬乾 白砒 一錢二分  
麩裏煨熟

頂上牙色梅花冰片 一分 真硃砂 二分 共爲細末和勻再研磁瓶收貯

以蠟封口不可洩氣先將瘰癧用隔艾灸法 見雜毒方 灸七次候灸處起泡用小針挑破

將此藥一二釐口水調成餅貼上上用膏藥蓋之 不論何項膏藥 一日一換七日後四邊裂縫

再貼七日其核自粘膏藥而出矣瘰癧形長者及根大頭小者忌用並治瘰癧頭大根

小者亦效 又方 紅膏藥綠膏藥 見雜毒方 未破能消已破能拔出根核均極神效

又方 瘰癧破爛兒有黑筋如鐵線者名鐵線瘡 羊音 最難醫治用物籍出筋頭緩緩

扯出長一二尺或數尺不等總要筋根拔盡方可斷根

鼠癧 此症瘡口已合旁邊有眼出膿不止卽是又有頸項生之不已復從脚底而生

俗謂鼠子打洞其症尤惡用老鼠 一個去毛搗爛 亂髮 團一 用火腿把肉煎出油入鼠髮二物熬

至消盡爲度以一半敷瘡眼一半沖酒服神效之至永遠戒食鼠鵝兔肉再無後患

又方 蝦蟆散 見雜毒方 敷之極效 又方 用老貓頭骨火煨爲末麻油調搽效或

用蝮 音南 蛇油搽之亦效 又方 白蘚皮煮汁服一二碗當吐惡物如鼠子雖已破

出膿亦效此葛仙翁方也

九子瘍 羊音 生頸上一連九箇者是用雞蛋 箇一 淨水煮熟破爲兩片去黃以真麝香 一分

冰片 五分 搽在瘍子上 從初生第一瓣子起 將雞蛋一邊蓋上外以乾艾一大團燒蛋外總以瘍子

大痛爲度如痛不可忍則將艾暫除痛止又燒蛋乾又換每日夜約燒五六次次日

又換新冰麪仍用新蛋照前法燒之再用 蒲公英 夏枯草 金銀花錢各三 甘草

節五錢 水煎服數劑效驗非常 又兩耳下頸筋繫繫若貫珠或痛或不痛此乃少

陽膽汁不充脾胃虛弱相火乘虛上僭最忌純用苦寒瀉火及劫藥針砭穿筋竅骨

變爲潰爛癩癧馬刀串頸之惡候難救應遵葉天士先生補太陰泄少陽之法治之

誠爲王道之治多服久服絕無貽患經治多人神效無比幸勿輕視方用 西黨參

茯苓錢各三 粉草五錢 桑葉錢次一 生白朮錢三 丹皮錢二 梔皮錢五分 水煎溫服錢堂

落頭疽 方見頭部 遮腮 方見面部 骨槽風 方見齒部 乳巖 方見乳部

井泉疽 方見心部 甲疽 脫骨疽 方見手足各部 背疽 方見背部

少腹疽 小腸疽 方均見腹部

多骨疽 一人瘡內生一大骨用舊爛棺木底板研末紙捲燒煙熏之而愈或用乾狗

糞燒熏亦妙

諸瘡出膿後久不收口內必有多骨也宜用推車散 蜣螂俗名推車蟲 又名推屎蟲 炙研極細末每一

錢入乾薑細末分五 要細如灰麵入瘡孔內次日自有骨出骨盡自愈或用蜣螂腦和

灰麵敷亦效此林屋山人經驗方也 又方 烏母雞一隻去肉取生骨燒成炭再



取鄰右三家所用甌底及砧案各刮下垢屑一兩俱燒枯共研爲細末納入瘡口其碎骨卽盡出而愈 又方 蜜陀僧研末麻油調稠攤布貼之甚效 又方 大癩蝦蟆一個亂髮如雞翎大二兩猪油斤半熬枯去渣再熬成膏先以桑根皮烏頭煎湯洗淨用龍骨末撒瘡口四邊再以此膏貼之一日一換俟骨出盡卽愈

附骨疽 生大腿外側又名貼骨疽又名縮脚疽初起不熱不紅甚則錐痛難以屈伸轉動不便久則寒鬱爲熱熱甚作膿而無頭皮色不變漸透紅亮一點則爲內膿已成潰則收功甚難用白芥子研末燒酒調敷或以 大戟 甘遂二末白蜜調敷內服陽和湯每日一劑四五服可消消後再服子龍丸或小金丹以杜患根大忌開刀開則定成縮脚損疾此林屋山人祕法也各後方

咬骨疽 生大腿裏側治法與附骨疽同

剩骨疽 此症一名朽骨疽多生腮脰牙牀眼胞頰下手足腿膊等處其症與附骨疽大約相同亦陰症也又初生小兒身內卽有如脆骨者其人長大後是處突腫生疽潰後骨脫其口方收 生附子爲末調作餅如三箇錢厚貼瘡上以艾絨一團四五分燒之但令微熱勿令疼痛如餅乾則再換藥餅燒之務以瘡口紅活爲度餘照附骨疽及陰疽各方治之

鶴膝風 方見腿部

橫痃 與前癰毒門諸梅毒方並看

又名魚口便毒又名外疔生小腹兩旁大腿縫中形如腰子皮色不

變按之堅硬而微痛者是也每日用皂角刺錢六研末布袋裝好同糯米二煮粥時時

服之三四日全消或用子龍丸後見每服三分日服三次全愈乃止大忌開刀開則惟

出白漿三百日內而死此林屋山人祕法也紅腫者查癰毒諸方治之內鳳仙膏黃

明膏尤為神妙 又方 五椀子新瓦上焙乾研末好陳醋調勻攤布貼之布上加紙一層過夜即消潰

爛久不收口貼之亦效屢試如神

流注 流注發無定處如塊如核漫腫無頭皮色不變或痛或不痛久則破而流走是

也若忽熱身生捻括紅腫遊走名此症毒發陰分因痰塞清道氣血虛寒凝結一曰寒凝一曰氣

毒初起用二陳湯見備用加陽和丸同煎數服全消消後接服小金丹七丸以免復發

如皮色稍變極痛難忍者須服陽和湯以止痛使已成膿者不痛而破此乃以大

疽變小之法如患處稍軟可用針刺破膿多白色以陽和膏貼之但此症破後毒痰

流走患生不一故初破之後五日內仍服小金丹十丸以免後患接用犀黃丸陽和

湯每日早晚輪服使毒痰消盡為度可必收功屢試屢驗 倘小兒不能服煎劑者

初起以小金丹化服至消乃止如已成膿者亦須日日服此可使不痛而穿俟其毒

氣去盡用保元湯見癰門加肉桂分五日服收功神效莫測 如係孕婦患之當問胎懷月分倘未滿六箇月犀黃丸有麝香不可服用防墜胎當以陽和湯愈之愈後再服三四劑以代小金丹免致流走至穩至靈均林屋山人祕法也

陰疽諸方後有增補仙方應參看

陽和湯 治乳巖失榮石疽惡核痰核癰癤流注橫痃並治一切色白平塌陰疽等症

此為陰疽聖藥萬應萬靈從無一失珍之寶之 熟地兩一真鹿角膠錢三上肉桂 甘

草錢各一炮薑 麻黃分各五水煎服服後再飲好酒數杯謹戒房事服至病愈為止無

論冬夏皆宜不可妄行增減體虛極者肉桂炮薑可加一二倍用或加附子更妙又

癰毒諸方內降癰活命飲亦治陰疽方內肉桂炮薑各用至一錢五分之多誠以陰

寒凝結非此不為功也宜參看酌用

陽和解凝膏 治一切已破陰疽惡毒效若仙丹萬金難得不可輕視並治瘡疾凍瘡

皆效 新鮮大力子根葉梗三斤又名牛蒡子活白鳳仙花梗四兩又名指甲花用麻油十斤將二味熬

枯去渣次日以附子 桂枝 大黃 當歸 肉桂 官桂 草烏 川烏 地龍

又名延胡 又名曲蘗 殭蠶 赤芍 白芷 白蘇 白芨 白芩 川芎兩各二續斷 防風 荆芥 五

靈脂 木香 香圓 陳皮各一兩 共入油熬枯瀝渣過夜油冷秤過斤兩每油一斤

加炒透黃丹七兩攪勻文火漫熬至滴水成珠越老越好以油鍋移放冷處取製

過乳香沒藥末各二兩製法見法製藥物門 蘇合油四兩 麝香一兩 研細入膏攪和半日後攤貼一應爛潰

陰疽神效凍瘡貼一夜全消潰者三張全愈瘡疾貼背心此方惟麝香最貴如無力

配製熬膏時不用俟用膏時每張加麝香數釐貼之亦可

犀黃丸 治石疽惡核失榮癰癩乳巖流注橫痃肺癰小腸癰一切腐爛陰疽屢試神

驗百發百中之仙方也 製乳香 製沒藥各二兩製法見藥物備要 麝香一兩 犀牛角各三錢 共為細

末取黃米飯一兩搗爛與各藥末和勻為丸如粟米子大曬乾忌火 每服三錢熱陳

酒送下患生上部臨睡時服下部空心服

小金丹 治流注惡核痰核癰癩乳巖橫痃及一切無名陰疽初起屢試如神萬無一

失內有五靈脂不可與人參高麗參黨參同日而服 白膠香即楓樹油香 草烏 五靈脂

地龍即蚯蚓又名曲蟮 製木鱉各淨末一兩五錢 製沒藥 製乳香製法見藥物備要 歸身各淨末七錢五分 麝香一錢 陳墨

二分錢 用糯米粉二錢煮稠和入各藥末搗千捶為丸如芡實大一料約二百五十丸

曬乾忌火 磁瓶收貯以蠟封口勿令洩氣臨用取一丸布包好放平石上隔布敲碎

入杯內以好酒浸入用酒杯蓋住一二時以熱陳酒送服盡醉蓋被臥取汗即愈患

生下部空心服上部臨睡服一切陰疽初起服至消散爲止如流注等症成功將欲潰爛及潰爛日久者以十丸分作五日早晚服之以免流走若小孩不能服煎劑及丸藥者服此最妙

子龍丸

即陳無擇三因方中之控涎丹也

治頸項胸肋腰背筋骨牽引鈎痛流走不定手足冷水氣脈不通

此乃痰涎在胸膈上下不可誤認爲風癱也並治喉中結氣似若梅核時有時無沖喉悶絕又偏身或起筋塊如瘤如栗皮色不變不疼不痛但覺酸麻或自潰串爛流水如涎經年不愈有若管漏此乃痰滯經絡所致又治瘰癧魚口便毒貼骨一切陰疽屢試神效 製甘遂 製法見藥 大戟 煮透去骨晒乾息火炒 白芥子 炒 各等分爲末煉蜜爲丸梧子大每服三分淡薑湯下忌與甘草之藥同日而服此乃治痰之本痰之本水也溼也得氣與火則結爲痰大戟能泄臟腑水溼甘遂能行經隧水溼直達水氣所結之處以攻決爲用白芥子能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收奇效也

拔毒法

治陰疽惡毒瘡潰爛久不愈者神效 活癩蝦蟆 眼紅膜無八字紋者勿用 破腹刺數孔 連用

貼蓋瘡口輕者日換一次重者日換二次數日平愈 以上各方乃林屋山人歷代家用陰疽良法爲千古獨得之祕藥到病除應手奏效真有起死回生之功古今諸家所立陰疽各方皆不及此存心濟世者加意寶之不可忽視

回陽玉龍膏 治一切陰疽惡毒敷之痛者能止不痛者即痛而速愈已破亦能收功

凡遇各項陰疽如前陽和等膏製之不及或貧寒力不能製者此膏與後眞君妙貼

散皆有奇效如乳巖及各陰疽險惡之症不能收功者仍用陽和等膏爲妥 生首

烏兩三生薑二兩白芷炒生南星各一兩肉桂五錢不見火共爲末用頂好燒酒調敷

眞君妙貼散 與上玉龍膏功同 好硫黃兩三蕎麥兩二灰麵兩一共爲細末水和捏作小

餅曬乾收之用時研細新汲水調敷破者麻油調敷

鐵熨法 治乳巖流注失榮癰癤惡核痰核一切陰疽初起未成者 用敲火所用鐵

鑷二三在石上敲令極熱在患處時時輪流熨之宜順熨不宜倒熨初熨微痛久則痛止毒消

無論何項陰疽無不神效

風溼灸法 治一切陰疽初起神效 方見筋骨門

趕毒散 治腿膝貼骨等處初起漫腫無頭皮色不變微覺酸疼或日久成管成漏等

症 方見癰毒雜治門趕移瘡毒內

陰疽治驗 王姓媳頸生癰癤數箇兩腋生惡核三箇大腿患一毒不作疼癢百餘日

後日漸發大形大如斗按之如石皮現青筋常作抽痛經治數人皆稱曰瘤余曰瘤

乃軟者世無石硬之瘤也此是石疽陰症也問可治否答曰初起時皆可消日久發

大上現筋紋雖按之如石然其根下已成膿矣如偶作一抽之痛乃是有膿之證也上現青筋者其內已作黃漿可治如上現小塊高低如石巖者不治三百日後主發大痛不潰而死如現紅筋者其內已通血海不治偷生斑點卽自潰之證潰卽放血三日內斃今患所現青筋醫其至軟爲半功潰後膿變膿厚可冀收功也外以活商陸搗塗內服陽和湯十日則止一抽之痛十三劑裏外作癢十六劑頂軟十八劑通患軟其頸項之癭塊兩腋之惡核盡行消散一無形跡止剩石疽立起內膿袋下令服參一錢因在經絡之處先以銀針刺穿後以刀闊其口以紙釘塞入孔內次日兩次流水斗許大劑滋補托裏刪去大參倍增生芪連進十劑相安已極適有伊戚亦行外科道者令其芪草換炙服不三日四圍發腫內作疼痛復延余治余令以照前方服又服二十餘劑外以陽和膏隨其根盤貼滿獨留患孔以布細綁人問因何用膏貼又加細綁答曰凡屬陰疽外皮活內膜生故開刀傷膜膜爛則死所出之膿在皮裏膜外僅似空術又不能生肌藥放入故內服溫補滋陰活血之劑外貼活血溫暖膏藥加之以細使其皮膜相連易於膿盡且又易於連接生肌裏綁後數日內膿濃厚加參服兩月收功 閩門龔姓腰生一疽根盤寬二尺餘前接腹後接背不紅不腫不痛不軟按之如木初延余治以肉桂炮薑書於方首後另延三四名家衆視

余方皆曰酷暑安可用此熱藥大以爲非議用攻托清涼之劑連治五六日病者神昏胃敗復延余治患仍不痛色如隔夜猪肝言語不清飲食不進余曰能過今晚再議是夜卽死不久伊戚亦患此症延余治以陽和湯服下次日覺鬆再服疽消小半乃以犀黃丸與陽和湯逐日早晚輪服服至第五日全愈後有背疽相同者亦照治而愈 木瀆鎮譚姓婦背生一疽如碗初起色白後轉紅痛甚時正三伏余以陽和湯服旁人云此暑天何用麻黃發表及姜桂熱藥余曰此陰症也彼云色旣轉紅陰已變陽余曰無妨服後不一時痛止接服四劑不痛而破五日收功 宜興徐姓子年歲半太陽一毒背上心臍對處二毒頸後對口一毒腰腹二毒兩腿五毒皆皮色不變其大腿二毒已經別醫開刀割破延余往治因孩小不能服藥用小金丹日服二次第五日消去九毒又以小金丹日服一次並添一乳母十日後所破二孔皆紅潤以保元湯加肉桂三分煎一杯另水煎參六分兌服服至半月後將莖草灸過用之一月收功 興邑路姓子年七歲頂門上寸許大連生三疽潰爛久不收口孔如棋子大淺而無膿乾而色灰人倦無神飲食少進因服涼藥過多所致延余往治余曰色似香灰氣血兩盡乾枯無膿精神已絕何能治之次日而天 山塘姚姓婦年二十九小產月餘左肩手搭處先發一毒週圍尺五半月後背脊添生一毒自上至



下長一尺三寸青色白低陷十日後始請余治勢甚危險連服陽和湯三劑人能起坐五劑自能大小便十二劑以後發者全消先發之搭手四圍皆消止其項膿足不痛而穿四日收功復言背上如負一板舒轉不快以小金丹十九日服二丸全愈一人身患楊梅瘡又患魚口余思魚口乃陰虛之症藥宜溫補楊梅係火毒之症藥宜涼解二症相反必兩相宜之藥非犀黃丸不可令其每日空心時酒送三錢十服二症全愈後一人患亦相同因毒重二十服收功程姓母年七十膝下患一流注陰疽潰爛數月患下及旁接連又起硬腫二塊延一醫以新發之毒認爲舊患旁腫不識流注竟以消毒之劑與服以致新發者被托發痛始延余治余以陽和湯服三劑新發二毒皆消接服小金丹十九丸後進滋陰溫補以杏仁散敷半月膿厚服保元湯加肉桂十餘劑而愈一婦頸生痰核三處年久生管余以拔管藥納入日換一次半月已愈兩處有一次管已醫淺不意伊夫遠歸兩日管深如舊余曰此刻治定無功效俟伊夫出外半月方可收功數日後婦回母家延余往治而愈洞庭秦卜年頸上及兩腋生惡核十二處破爛三載不愈余以陽和湯犀黃丸輪服半月十已愈八喜甚帶藥而回路遇涼粉買食歸家又食冷水過麵次日大小便閉第五日死此其自不惜命故記以爲病者之戒楓鎮閔姓年十七患瘰癧爛成一片延爛耳

腋及腰如手掌大者數處瘦弱異常初以洞天救苦丹服之毒水大流十日後以陽和湯醒消丸每日早晚各服一次十日頸項即能舒轉飲食日增外貼陽和膏內服大棗丸始終用荆芥湯洗以山蓮散敷九十日收功因未服子龍小金二丸毒根未除後腋復生惡核仍以子龍丸消之

陰疽孽報 凡落頭對口發背腰花人面等疽及一切陰疽惡毒如果醫治無效恐係

冤孽所侵偶憶王漁洋池北偶談內載歛人胡半庵順治丙午兩膝患人面瘡延醫一百三十餘人瀕死者數矣瘡忽人言曰汝前生將我害死今日報汝醫何能為詣佛懺悔可耳胡即書誦經卷而愈他書所載似此甚夥可見虔心懺悔自能立起沉疴報應分明捷如影響急宜恐懼修省或可延年却病也

陰疽無價活命仙丹補增 此丹通治落頭疽耳後銳毒遮腮骨槽風陰對口陰發背乳

巖惡核石疽失榮鶴膝風魚口便毒瘰癧流注一切陰疽內不必服藥病重者仍服前藥和湯更妙 外

不必敷藥惟用此藥一丸放手中緊緊握住用布帶將手指捆攏不緊不鬆免使藥丸移動捆至六箇時辰將藥丸埋入土中不可使雞犬嗅食則必死 再換一丸照前捆好日夜不斷

不論如何腫痛潰爛用至數丸自能收口生肌輕者一二丸立見功效忌食雞鵝魚蝦發物已愈不忌惟女色宜謹戒半年道光二十年間京都孫姓腦後生一落頭疽

百藥不效頭已下垂勢將待斃後用此藥數日而愈又一婦人亦生此疽潰爛生蛆頭低不起亦用此藥而愈其餘各種陰疽照此治愈不一而足此方補造化陰陽所不及實上下古今所罕聞傳自蒙古名醫貴重無價較之林屋山人陰疽諸方尤爲簡便神效見者宜抄方傳佈功德無窮若藉以居奇必有奇禍方用 頂上真麝香一種此藥真者最貴或三四分或五六分均可不知不見效乃用一錢爲要 火硝 白礬 淨黃丹各三錢 胡椒兩一以上共研細末用熟蜜和爲兩丸病在左放左手病在右放右手病在中男左女右病在腰以下放脚心仍分左右中爲要孕婦忌用陰疽多屬險症必須早治方效或潰爛太甚或誤服涼藥或患處色如隔夜猪肝神色昏迷言語不清飲食少進已成敗症雖用此丹亦難見效若瘡内生蛆查癰毒門瘡中生蛆方將蛆治盡一面用此丹治之瘡內有骨查本門多骨疽方將骨治盡亦用此丹治之

### 內外備用諸方

觀音救苦膏 此膏能治百病或貼或服應驗如神外治者用布攤貼內服者作丸如菜豆大每服七粒切不可多孕婦忌用 大黃 甘遂研 葶麻子研各兩 木鱉研二兩 生地 川烏 草烏 三稜 莪朮各一兩 巴豆研 羌活 黃柏 麻黃 皂角 肉桂

238 枳實 眞紅芽大戟性藥物備要便知 白芷各八錢 香附 芫花 厚朴 杏仁研 穿山甲

防風 天花粉 獨活 全蝎 檳榔 桃仁 研 細辛 研 五梧子 元參 各七 蛇脫

黃連 各五 當歸 一兩 蜈蚣 條十 右藥合三十六天罡之數預先齋戒將麻油五六

斤浸五日後用火熬藥時忌婦人雞犬並忌污穢齋戒沐浴於淨室內供觀音大

士神位默誦大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩寶號一千遍用柳枝攪勻

熬至滴水成珠再加水飛黃丹二斤四兩蜜陀僧四兩不老不嫩收入磁瓶放水

中 拔盡火氣聽用 一偏正頭風左患貼左右患貼右正患貼印堂兼捲條塞鼻孔中

口含甘草湯咽之 一眼科七十二症腫病將耳上角針刺血出貼之星障翳膜捲

毛倒睫迎風落淚等症捲條左患塞左右患塞右鼻孔中常飲甘草湯 一牙痛貼

牙上 一喉嚨三十六症單蛾雙蛾喉閉喉風俱貼喉上口含甘草水如要速效開

水送服七丸不可飲甘草水 一咳嗽哮喘吐痰貼前後心勿吞服 一噎膈貼胃

口並服七丸 一吐血鼻血貼兩腳心並服甘草湯 一中風用磁調羹擣開口滾

水灌下七丸 一膨脹貼臍下丹田並服七丸 一癆病有蟲貼脊背尾闕肚腹飲

甘草湯七日癆蟲盡死 一瘡疾一二三等日俱貼肚臍飲甘草湯如發過四五次

者早晨時服下七丸飲熱酒數盃即日便止 一傷寒葱白湯服七丸一汗而愈

大小便閉俱貼肚臍飲甘草水自通如數日不通危在旦夕開水送服七丸小腹用

葱汁甘草汁調敷立下勿用甘草水 一各種痢疾俱貼胃口肚臍四五日不愈者紅痢用龍眼壳核七箇打碎煎湯送下七丸如白痢用荔枝壳核七枚打碎煎湯送七丸赤白兼者用龍眼荔枝壳核各七枚打碎煎湯送七丸 一便血腸風夢遺白濁俱貼肚臍 一痔漏內則捲條插入外則貼之 一婦人難產逆生胞衣不下作丸熱酒送下七丸立刻便產產門小腹煎甘草水頻洗不可服 一婦人赤白帶下貼肚臍下及丹田常服甘草湯 一血塊痞疾貼患處體壯者服七丸即瀉出矣 一小兒驚風作條塞鼻並服七丸 一小兒諸般疳症貼肚臍口疳貼牙牀

回生再造丸 治男婦中痰中風口眼歪斜手足拘攣言語不清左癱右瘓筋骨疼痛

半身不遂步履艱難初起氣絕者服之即可回生久病者平復如常功同再造故名

孕婦忌服 眞水安息四兩 人參二兩 眞蘇蛇寸酒浸炙取淨末四兩 當歸 川芎 川連 羌

活 防風 元參以上 藿香 白芷 茯苓 麻黃 天麻 川葶藶 片子薑黃

以上 甘草 炙 肉桂研不見火 白蒺藜研不見火 首烏料豆水并熬九次 西琥珀研 黃耆蜜炙 大黃酒蒸 草薢仁

雄鼠糞兩頭尖者 熟地以上二十三味各二兩 穿山甲前後四足各用五錢 全蝎去頭尾 威靈仙炒 葛根炒 桑寄生

生兩錢 細辛 赤芍 烏藥炒 青皮炒 於朮炒 僵蠶炒 乳香去油 沒藥 辰砂 骨

碎補酒炒 香附去皮毛 天竺黃 製附片 生龜板火炙熬過者不用 沉香 母丁香 膽星以上十

驗方新編 卷六 內外備用諸方

四四七

一紅花酒浸犀角尖各八錢厚朴 地龍炙松香各九錢廣木香各五錢梅花冰片四錢犀牛

黃各二錢血竭八分虎脛骨一對共為末煉蜜和勻搗數千槌為丸每丸重一錢金箔

為衣蠟壳封固每服一丸生薑湯下

太乙紫金錠 此藥能治百病效驗如神凡居家遠出不可無此 山慈姑去皮洗極淨焙二兩五

梔子洗刮焙千金子仁白者研紙壓去油一兩紅芽大戟去蘆洗焙麝香三錢以端午七夕重陽或天德月

德黃道上吉日預先齋戒虔心製藥為末陳設拜禱過重羅令勻用糯米濃湯和勻

入木臼內杵千下作一錢一錠病甚者連服數錠瀉一二次隨食溫粥即止矣 一

切中飲食藥毒蠱毒瘴氣河豚土菌死牛馬等毒並用涼水磨服一錠或吐或利即

愈 一癰疽發背疔腫楊梅等一切惡症風癩赤遊痔瘡並用溫水或酒磨日塗數

次立消 一男婦陰症傷寒狂亂瘟疫喉痺喉風並用冰水入薄荷汁數匙化下

一心胃及一切氣痛用淡酒化下 一泄瀉痢疾霍亂絞腸痧用佩蘭湯下 一中

風中氣口緊眼歪五癩五癩鬼邪鬼胎筋攣骨節痛並暖酒下 一自溢溺水心頭

溫者冷水磨灌下 一傳尸癆瘵涼水化服取下惡物蟲積為妙 一久近瘧疾將

發時東流水煎桃枝湯化服 一婦女經閉紅花酒化服 一小兒驚風五疳五痢

薄荷湯下慢服一頭風頭痛酒研貼兩太陽上 一諸腹鼓脹麥芽湯化下 一風

蟲牙痛酒磨塗之亦吞少許 一打扑傷損松節煎酒下 一湯泡火傷毒蛇惡犬咬傷並冷水磨塗仍服之

青金錠 治男婦風痰痰厥牙關緊閉不能開口難以服藥並乳蛾不能言者以及小兒驚風痰迷將此藥一錠取井水磨開將藥滴入鼻孔即進喉內痰即吐出立刻得生效驗如神 元胡索錢二青黛分六牙皂火礬十右爲細末入麝香一分再研清水調成錠每錠五分陰乾用

平安萬應丸 此即塘棲痧藥治法見後孕婦忌服 茅山蒼朮米泔水浸軟切丁香不拘公 麝香錢三蟾酥兩壹甘草去皮炒二大黃切片焙明天麻焙切片麻黃去節雄黃研細硃砂研細水共爲細末糯米漿爲丸如梧桐子大硃砂爲衣磁瓶裝貯以蠟封口不可洩氣每服三九日久味薄者或加倍服亦可 一瀉痢以滾水送下三九立止如神 一寒暑痧脹肚痛頭眩眼黑以三九放舌尖上閉口候舌微麻咽下 一受寒受暑痧脹甚重絞腸肚痛心口閉悶不省人事以三九研細吹入鼻內再以三九放舌上候少頃溫水送下如不愈再用即愈 一中寒中暑痧脹吐瀉手足厥冷並吐瀉不出先以三九研末吹入鼻內再以三九放舌上候微麻咽下如昏迷不能咽下即研末

溫水灌下即愈 一山嵐瘴氣夏月途行空心觸受穢氣口含三九使邪氣不能侵

24 驗方新編 卷六 內外備用諸方 四四九

入 一感冒風寒惡心頭痛或肚腹飽脹及風痰等症以三丸放舌尖上微麻咽下即愈 一胃口疼痛氣痛以三丸放舌尖上微麻咽下即愈 一鼓脹噎隔以三丸放舌尖上微麻咽下即愈 一癰疽疔毒蛇蝎蠱諸蟲咬傷俱以數丸研末好酒調敷即愈 一小兒急驚風牙關緊閉不能服藥以四五丸研末吹入鼻內即醒隨以三丸溫水調灌即愈若慢驚風萬不可服 一跌打至死驚死斃魅氣悶至死痰厥冷厥等症凡有微氣急以數丸研末吹入鼻內灌口可望復醒遇自縊之人勿割斷繩輕輕解下即以數丸研末吹入鼻內若胸口略有微氣者皆可活也

金絲萬應膏

治一切風寒溼熱手足拘攣骨節疼痛男子痞積女人血瘕及腰痛諸

般疼痛結核轉筋痧癰頑瘡積年不愈腫毒初發楊梅腫塊未破者俱貼患處肚腹疼痛瀉痢瘧疾俱貼臍上痢白而寒者尤效咳嗽哮喘受寒惡心胸膈脹悶男婦面色痿黃脾胃虛寒等症及心疼俱貼前心負重傷力渾身拘痛者貼後心與腰眼諸疝小腸氣等症貼臍下無不神效 木香 川芎 牛膝 生地 細辛 白芷 枳殼 秦艽 獨活 防風 歸尾 大楓子 黃芩 南星 羌活 半夏 赤芍 貝母 杏仁 草麻子 白蘇 蒼朮 艾葉 川烏 肉桂 良薑 續斷 兩頭尖 連翹 甘草節 藁本 丁香 青皮 藿香 烏藥 荆芥 蘇木



元參 疆蠶 桃仁 山梔 紅花 牙皂 威靈仙 苦參 文蛤 蟬蛻  
 草烏 蜂房 鱉甲 全蝎 金銀花 麻黃 白芨 大黃 青風藤以上各 蜈蚣  
二白蘚皮 五加皮 川山甲 降真節 骨碎補 蒼耳頭以上各 蛇蛻兩 桃柳榆  
 槐桑棟楮七色樹枝各 各藥切為粗片用真麻油十二斤浸藥在內夏浸三宿春五宿秋  
 七宿冬十宿方用火熬以藥枯油黑為度去藥瀝淨滓貯磁器內另以片子松香不  
 拘多少先下淨鍋鎔化後方加藥油量香二斤用油四兩試水軟硬仍澆入水缸中  
 令人抽扯色如黃金即成膏矣每製一料計膏七十斤約用銀數兩量攤中大膏藥  
 一萬有餘可濟數千人所費者少所濟者衆此膏功效如神屢用不爽蓋不止於百  
 試百驗矣

萬應神麵糕 此麵能搜風解表開胸快膈調胃健脾消積進食解酒止瀉利水並治  
 四時不正之氣感冒發熱頭眩咳嗽及傷食腹痛痞滿氣痛嘔吐泄瀉痢疾飲食不  
 進不服水土等症大人每服三錢小兒一錢多則錢半水煎服外感發熱咳嗽瘧疾  
 嘔吐俱加生薑同煎泄瀉加真烏梅同煎痢疾大人用四五錢小兒用二三錢加陳  
 茶葉同煎效驗非常屢試不爽此福建泉州府祕方也 前胡 大黃 良薑 蒼  
 朮 菝朮 防風 薑黃 山查 柴胡 厚樸 紫蘇 豆蔻 葛根 檳榔

驗方新編 卷六 內外備用諸方

苡米 黃芩 荊芥 麻黃 青皮 使君子 甘草 黃栢 百合 梔子 薄荷

羌活 陳皮 蒲黃 扁豆 杏仁 車前 砂仁 澤蘭 獨活 木香

益母草 麥芽 烏藥 桔梗 訶子 腹皮 猪苓 茯苓 三稜 芡實 草

菓 半夏 淮藥 木通 枳實 藿香 建瀉 香茹 菖蒲 黃連 木瓜

香附 枳殼 小豆 花椒 以上各四兩共為細末 又用鮮青蒿四觔 鳳尾

草二觔 蒼耳草三觔 大蓼草二觔 小蓼草三觔 以上五味同煎濃汁 又

用小麥十五觔洗淨略蒸曬乾酒麴粉六兩五月五日或六月六日或七夕重陽或

天德月德黃道吉日均可製配臨時先將藥與麴粉同拌勻入草藥水拌揉成塊

子外用荷葉包好以苧麻紮緊上籠蒸一個時辰取出涼三四時以冷為度裝入桶

內一層稻禾草一層神麴蓋密須十二天取出曬過月餘極乾然後刷去荷葉再露

七夜曬七日乾透收藏聽用每月亦須曬數次以免霉壞

金剛丸 專治腎虛骨痿不能起牀服此神效 葶藶有紅點者佳 杜仲薑炒去絲 肉蓯蓉酒洗去鹽甲焙乾

兔絲酒煮以上各等分 共為細末用酒煮猪腰子搗為丸桐子大每服二錢

大還丹 此丹水火兼補服之壯元陽暖丹田益精神飲食加增筋力強健百症不生

功效難以盡述 淫羊藿剪去邊毛羊油炒十兩 地黃酒泡九蒸十二兩 金櫻去心毛酒浸 破故紙酒浸 仙茅酒浸各八兩 當歸

酒浸各  
 石斛六兩  
 兔絲子五兩  
 麥冬去心  
 白菊花各四兩  
 杜仲鹽水  
 肉蓯蓉酒洗去筋  
 山萸肉  
 酒浸各  
 枸杞子  
 瑣陽酒浸  
 眞山藥炒  
 白蒺藜炒  
 沙苑蒺藜炒  
 續斷炒  
 青鹽各三兩  
 巴戟  
 酒洗  
 肉苁蓉  
 牡丹皮炒  
 小茴香炒  
 楮實子酒浸  
 覆盆子酒浸  
 淮牛膝酒浸  
 遠志肉甘草  
 酒洗  
 白茯苓  
 天冬酒乾二兩  
 北五味炒  
 胡蘆巴酒浸  
 核桃肉各胡桃  
 豬腰子箇十二  
 羊  
 腰子十二  
 各藥磨成細末將腰子切開以藥塞滿麻線縛定放蒸籠內蒸熱曬乾連  
 腰子搗成細末用白蜜六七斤煉熟和藥爲丸如桐子大每早晚用二三錢淡鹽湯  
 送下腰子內藥末以塞滿爲度不必盡入其中也

**彭祖接命丹**

此丹最能添精補髓固精不泄善助元陽滋潤皮膚壯筋骨理腰膝下  
 元虛冷五勞七傷半身不遂或下部虛冷膀胱氣痛脚膝酸麻陽事不舉男子服之  
 行走康健氣力倍添奔走如飛女人服之能除赤白帶下血崩兼通二十四道血脈  
 功效無窮難以盡述 何首烏 白茯苓 赤茯苓 兔絲子去灰 牛膝 當歸 破  
 故紙 覆盆子 以上每味十兩不犯鐵器用石臼杵爲細末煉蜜調黃酒爲丸如  
 梧桐子大每服二錢空心黃酒送下早午晚進三服七日後每服三錢 忌服芸薹  
即油菜廣西  
呼爲菜花  
 菜子油即油菜  
 子油 蘿蔔

**保眞丸**

治一切勞損諸疾服至一月面目光潤半年後返老還童飲食房事無

異少年百病不生冬月手足不冷夏月身體不熱男子鬚髮不白婦人能多生育益

精補髓功效無窮 九製熟地忌鐵 全當歸酒浸二兩五錢 川芎酒浸炒 杜仲薑汁炒去絲一兩半 白茯苓乳

甘草酒炒一兩 金櫻子酒浸去皮子一兩 金石斛酒製三兩 淫羊藿去邊梗酥炙或羊油炒一兩 以上各藥俱用頂好

燒酒製惟服藥不拘何酒杜仲另研為末同各藥末加入生白蜜共搗一千杵丸如

桐子大每服三錢空心好酒下昔四川一刺史年方壯患五癆七傷四肢無力沉困

瘦軟面目無光交合之時陽痿不舉下元虛冷夜夢遺精得此方合藥未及服而病

卒有院工戈禹年七十六亦患此症即以此藥與之服至十日舊症若失每夜房事

不絕後戈禹以淫行被主處死折骨視之果然骨髓充滿方信此藥效驗

延壽丹 此方久服添精補髓健脾養胃烏鬚延壽體健身輕返老還童中陽復興少

陽復起痔漏瘡毒服之即愈能調婦人經水煖下安胎專治赤白帶下妙不可言治

藥時忌婦人僧道雞犬見並忌食牛馬肉 白朮炒土 青皮 生地 厚樸薑汁 杜仲

故紙紙 廣皮白 川椒 青鹽 黑豆升二 巴戟肉心去 白茯苓 小茴香 肉蓯

蓉竹刀刮去鱗黃酒洗曬乾 以上各一兩製好入銅鍋或砂鍋亦可用水二十小碗桑柴文武火煎至

十小碗將水盛出復煎藥渣用水十小碗煎至五小碗去渣不用惟用兩次藥水十

五碗將黑豆放鍋內用火緩緩煎至水乾盛起俟冷入磁罐裝貯每早空心服三錢

開水送下不可間斷婦人受胎之後不可再服恐受雙胎

蒸臍補氣散

此藥治氣虛體倦肚腹畏寒下元虛冷等症極效 五靈脂 夜明砂

枯礬

各一

共爲細末分四包存貯聽用每逢春分秋分夏至冬至先一日用溫水

避風先將臍眼洗淨納麝香五釐於臍內將蕎麵爲圈烘微溫安臍上用藥一包鋪圈內以薪艾絨作團每團重一分或六七釐放藥末上用香火燒燃若干歲卽燒若干團燒完用蕎麵作餅蓋圈上俟藥冷緩緩取下忌茶七日麵圈深寸許橫逕一寸六七分麵餅如圈大如無蕎麵卽麥麵亦可久久行之不可間斷受益無窮切忌婦女經手

陰虛無上妙方 天一生水命曰真陰真陰不能制火以致心火上炎而尅肺金咳嗽

者火刑金吐痰者腎水虛泛而爲痰如鍋中之水熱甚則騰溼也豈區區草木之功所能濟哉必須取華池之水頻頻吞嚥以靜治於無形然後以湯丸佐之庶幾水升火降而成地天交泰之象耳主方在吞津液華池之水人身之金液也敷佈五臟灑陳六腑然後注之於腎而爲精腎中陰虧則真水上泛而爲痰將並華池之水一擁俱出痰愈多而肌愈瘦病誠可畏今處一法二六時中常以舌抵上腭令華池之水充滿口中乃正體舒氣以意用力送至丹田口復一口數十乃止此所謂以真水補

真陰同氣相求必然之理也每見今之治陰虛專主六味地黃等味以為滋陰壯水之法未為不善而獨不知於本源之水取其點滴以自相灌溉是舍真求假不得為保生十全之計此余諄諄為是言也衛生君子尚明聽之

人乳膏 血虛火旺消補兩難者服此神效 人乳男用女胎乳藕汁 白蜜 甜酒原汁

各等分同煎加童便熬至滴水成珠每日空心服半盞病深者多服若服寒涼藥則不效

來復丹 治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水霍亂嘔吐不止六脈隱伏如無遍體

冷如冰鐵飲湯難受薑附熱藥難投急服此丹立效如神 太陰元精石 取龜背形者佳研細水飛淨一

兩 五靈脂 水澄去沙曬乾二兩 洋硫黃 土黃不效 硝石 各一兩與硫黃同研為末放磁罐內微用火炒用柳枝攪勻火勿太過再研為末 陳皮 青皮 各二兩 先

將陳皮青皮研細末再入硫黃硝石元精石各末再研千餘下好醋煎滾為丸如桐

子大每服三十丸開水送下

斑龍散 治精血耗涸耳聾口渴腰痛白濁上熱下寒不受峻補者 鹿茸 一兩酒泡透交麻研末此味要整碎

者茸片多假宜藥物備要便知 真烏梅煮成膏和搗為丸如桐子大每服五十丸米湯調下

草靈丹 此藥益壽延年添精補髓烏鬚髮固齒牙強筋骨壯氣血服之一月乃見其

效如要試驗拌飯與白犬食之一月變成黑犬此其驗也老人服至十日便不夜起

服藥者不可因此多行房事返致耗精損神忌食黑羊肉鷄鵲桃李 真川椒去子炒  
茅山蒼朮各四兩酒浸焙乾 茴香鹽水炒 白茯苓各二兩去皮炒 川烏去皮 炙甘草各一兩 熟地酒 真山藥各三兩  
共為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸至四五十丸空心溫酒下服後以乾食物壓之

五香丸 此方仙傳秘於道藏善能消食消積消痞消痰消氣消滯消腫消痛消血消

痢消蠱消隔消脹消悶藥料尋常功效甚大並治痰迷心竅每服七八分或一錢薑

湯送下臨睡先一服次早一服其效如神 五靈脂一斤 香附子去淨毛一斤 黑丑二兩 白丑

二共研細末以一半微火炒熟以一半生用和勻醋糊為丸如蘿蔔子大此藥費小

功大願同志者修合濟人功德無量再黑丑白丑性雖猛烈然服之不多並不礙事

三黃寶蠟丸 治跌打損傷刀傷箭傷鎗傷一切刑傷破皮瘀血奔心及癩狗咬傷蛇

蟲毒物咬傷墜馬跌傷瘀血凝滯及女人產後惡露不盡痰迷心竅致生怪症危在

頃刻其效如神真濟世良方也 藤黃四兩 天竺黃 明雄黃 紅牙大戟 水粉宜即

粉 劉寄奴 真血竭 乳香 兒茶各三兩 歸尾 樸硝各一兩 血珀 水銀 麝香各

錢 共為末用頂淨黃蠟二十四兩將銅鍋裝蠟下滾水面浮其銅鍋待蠟融化隨下

前藥末攪勻半冷能作丸輕者一丸若遇久有瘀血凝滯可服數丸多飲酒幾杯蓋

被取汗而愈外敷者用香油隔滾水開化敷之如久病勢重者服數丸甚能舒筋活絡去瘀生新有起死回生之功忌食生冷及生菓發物三日

扁鵲玉壺丸 玉壺指人身而言道書曰金精滿鼎氣歸根玉液盈壺神入室元壽先

生曰硫是礬之液礬是鐵之精生於溫泉產於山旁有水火既濟之妙本草止治陰寒惡疾不言治鼓令人用治火衰陽氣暴絕寒水鼓脹却有神功獨是難於製配余

得異授並諸製法以廣仁術 硫黃兩八配真香麻油兩八以硫黃打碎入冷油內放爐

上炭火宜微以桑枝緩緩攪動候硫融盡即傾入水缸內急攪去面上浮油取缸底

淨硫稱過若干兩再配真麻油若干兩照前火候再融再傾連前共製三次第四次

用真棉花子油自取棉花子向油榨坊製油爲真配硫若干兩照前火候再溶再傾入水缸內急攪去面

上浮油第五次用肥皂四兩水中同煮六時第六次用皂莢四兩放水同煮六時

拔淨油氣第七次用爐中炭火淋音水製六時第八次用水豆腐同煮六時拔淨

皂鱗之性第九次用田字草搗汁田字草出水蒸稻田中葉如田字秋天採和水煮六時曬乾研細如香灰凡淨

硫一兩配炒糯米粉二兩煮汁爲丸每服八分漸加至三錢開水送下硫磺以外洋

者爲佳土硫磺斷不可用

九製硫磺丸 凡人一身以命門先天真火爲主火旺則脾土及五臟俱壯爲人一家



之主人富強則百事俱強也此火一虛則脾胃虛弱飲食少進無精液以養臟則五臟自弱以致百病易生且老尤甚年老之人火必衰久服附桂至無效故有耳聾眼花齒落髮白等症是非此丸難除此症此丸專補先天本元能健脾胃壯筋骨治虛弱齒落陽痿却百病久服面如童顏老當益壯惟藥性云硫磺爲純陽之物與鹿茸並功但其性太熱有毒又云硫磺性雖熱而疎利大腸與燥瀆者不同又云熱藥多秘惟磺暖而能通寒藥多泄惟黃連肥腸而止瀉人多謂服之久必發毒皆因藥店中製之不精如自製得法自然無礙磺用外洋者良若土磺斷不可用 一製用老白豆腐將磺研末用淨砂鍋以竹籬夾鍋底籬上蓋豆腐一層鋪磺一層疊鋪鋪好入水煮至豆腐黑黃色爲度用清水漂淨腐渣再煮二次每磺一觔豆腐一觔或黑豆拌煮亦可 二製用大個蘿蔔挖空將磺末入內蓋緊縛好慢火煮至蘿蔔黃黑爛爲度清水漂淨復煮二次或蘿蔔切片拌亦可一磺二蔔 三製將紫背鮮浮萍洗淨拌磺末煮至磺腐爛爲度但萍根鬚葉最多清水漂淨或打爛取汁拌煮亦可一磺三萍 四製用新綠豆揀淘洗淨以磺末拌煮至豆爛爲度清水漂淨一磺二豆 五製用石菖蒲或萹蒲洗淨切小段拌磺末入水煮至爛爲度取汁拌煮更妙 六製松柏葉各半洗淨去枝用葉剪碎拌磺煮至葉爛爲度清水漂淨 七製或

藕或梨或藕梨各半切片同礮煎至藕梨爛爲度 八製肥壯猪大腸洗淨氣味將礮末研細漂淨裝入大腸兩頭紮緊勿令走漏煮至大腸熟爛爲度清水泡過夜澄出陰乾 九製地黃兩全歸 天冬 麥冬各一兩 川芎 陳皮 枸杞 杜仲 茯苓 炙草 前胡 防風 澤瀉 蛇床子 五加皮各五錢 每礮一觔用藥一料照礮遞加用清水煎濃將礮末投入煎至藥汁乾起出陰乾用糯米煮粥拌爲丸如菘豆大陰乾用磁瓶裝收每早用鹽湯送服一月用三分第二月四分三月六分四月八分五月一錢每月遞加至二錢爲度如恐服久發毒病愈則止自無妨礙忌一切牲畜血及細辛

### 七製固脂丸

治命門火虧下元虛損耳聾眼花腰痛腿軟腎冷精流陽痿不舉小便

過多筋骨疼痛肚腹畏寒脾胃虛弱飲食難消夜多盜汗精神疲倦時愛躺臥等症功能補火壯陽固精種子保真元壯筋骨健脾胃長精神除疾病功效不能盡述無論男婦皆治每早空心服一錢淡鹽水送下每服至一月後加三分加至二錢爲止忌食羊血油菜又名芸菜廣西呼爲菜花菜油即油菜子所出之油若陰虛水虧者早服此藥晚服六味地黃丸則水火兼補不致偏枯服至半年後方效 固脂十觔 一製淘米水泡一夜曬七日 二製黃柏二觔熬濃汁泡一夜曬七日 三製杜仲二觔照前 四製生鹽二觔

照前 五製魚膠三觔照前 六製核桃肉六觔又名胡桃照前 七製黑棗三觔糯米

三觔共煮粥將固脂磨細末忌鐵器和勻搗融為丸如桐子大

七製香附丸 專治心血虧虛火不下降水不上升以致心腎不交夜夢遺精百藥不

效者服此大有奇功 香附洗一斤 一製淘米水泡一夜石上擦去毛曬乾 二製

陳酒泡一夜曬乾 三製童便照前 四製鹽水照前 五製牛乳照前 六製小

扁黑豆煮水照前 七製真茯神六兩去皮去木心二味共為末煉蜜為丸如彈子

大每早空心服一丸

九製黃芪 此藥製後可與人參同功虛者服之最佳婦人體虛血崩及產婦虛症服

之更妙 頂上棉箭芪一觔洗淨切片烘乾 第一次用木通二兩煎水泡一夜曬乾 二次升

麻一兩照前 三次丹皮四錢照前 四次沙參五錢照前 五次玉竹六錢照前

六次附子一兩照前 七次五味二兩照前 八次防風二兩照前 九次蜜糖三兩拌炒

製完蒸過七日可服每用二錢水一杯飯上蒸好臨食對酒少許服渣再煎服

代參膏 此膏大補氣血可代參用 嫩黃芪壯嫩而箭樣者用對片 白歸身截去頭尾酒洗淨泥各五錢 肥玉竹一兩化

州橘紅三錢知無真者用新會陳皮去淨白亦可 共入砂鍋內用天泉水熬成膏每早滾水調服

湧泉膏又名湧泉膏 專治男婦下元虛損五勞七傷咳嗽痰喘氣急左癱右瘓手足麻木偏

方新編 卷六 內外備用諸方

身筋骨疼痛腰脚軟弱肚腹受寒男子遺精白濁婦人赤白帶下等症貼至半年步履如飛下身不甚畏冷貼至一年氣貫泥宮雖老年亦能種子可免雜病並除風溼眞神方也 大海龍一對 雄黑雌黃長尺餘者佳如無用海馬亦可終不如海龍之妙 大生附子 一箇重一箇五錢切去薑頭童便甘草水各浸一日洗淨 零陵香

大穿山甲 三錢要 鎖陽 三錢 各藥切碎用眞香麻油一觔四兩將藥浸入春五日夏三

日秋七日冬十日然後木炭火熬至藥枯去淨渣將油再熬至將要滴水成珠時稱準分兩每油一斤加飛淨黃丹 五錢兩 用小火熬至滴水成珠 火不要大膏不要太稠切記切記 用槐枝不住

手攪動再下製眞陽起石末 眞麝香末 錢各五 冬蟲夏草末 好野高麗參末 眞

川椒末 母丁香末 錢各三 攪極勻埋入土內七日去火毒每用膏三分攤如錢大貼

兩足心十日一換不可間斷此膏五十歲內外貼之方見功效若少年無病者貼之

足心作癢起泡反無益也

附桂膏 治感受風溼手足麻木筋骨疼痛等症貼之神效肚腹畏寒者更妙 眞香

麻油 斤三 栢枝尖 松毛心 斤各五 生大附子 片切 肉桂 研極細末 各半斤 黃丹 鉛粉 各十兩 先將麻

油入鍋燒滾下栢枝松毛附子次第入油鍋熬枯去渣下肉桂末再熬下黃丹鉛粉

不住手攪動至滴水成珠入瓦器內浸水中拔去火毒用布攤貼肚腹畏寒者貼肚

臍用大張連臍眼貼並貼背後腎俞穴其餘筋骨麻木痠痛俱貼患處

法製陳皮 善能消痰化氣止渴生津 陳皮一斤清水泡七日去淨白 甘草各六兩 同煮一日去

參草留陳皮 加川貝母研細半兩 青鹽兩三 拌勻再用慢火煮一日夜以乾爲度

黃瓜霜 治急心痛最爲神效並治實火牙痛喉痛皆效因寒心痛及牙喉虛火忌用

黃瓜一條破兩邊去肉去子入生白礬末填入合住線捆懸挂有風無日之處陰

乾候皮外起白霜取下研細收磁瓶內用蠟封口如急心痛欲死者口有微氣用此

霜點眼四角立愈喉痛者吹入牙痛用霜擦之

神仙粥 此方專治感冒風寒頭痛骨疼並四時疫氣流行等症初得病兩三日服此

卽愈 糯米三合生薑五大片河水兩碗於砂鍋內煮二滾次入帶鬚葱白五七根

或煮至米熟再加米醋小半盞入內和勻乘熱吃粥或止吃粥湯蓋被睡臥謹避風

寒以出汗爲度屢驗非尋常表藥可比

甘露茶 此茶疎風清熱去滯逐邪治一切感冒時氣頭痛腹脹不服水土等症 陳

皮四錢鹽水洗 穀芽炒一兩 神麴一兩 山查五錢 烏藥 厚樸 枳壳各八錢 陳茶葉三兩 共爲粗

末每服二三錢生薑湯煎服

羊肉湯 治寒勞虛羸及產後受寒心腹疝痛諸症甚效 肥羊肉一斤 水煮入當歸兩五

黃芪兩八 生薑兩六 再煮分四服此張仲景方也

247

驗方新編 卷六 內外備用諸方

四六三

羊腎酒 此酒能種子延齡烏鬚黑髮強筋骨壯氣血添精補髓返老還童有七十老

翁腿足無力寸步難移將此甫服四月即能行走如常後至九旬筋力不衰其方祕

而不傳董文敏公重價得之凡艱於嗣續者服之即能生子屢試如神百無一失

生羊腰一對沙苑蒺藜四兩隔紙微炒真桂元肉四兩淫羊藿四兩用錫刀去逸毛羊油拌炒仙茅四兩要真者用淘糯米汁泡去赤油薏仁四兩

滴花燒酒二十觔浸七日隨量時時飲之

烏雞湯 治男婦虛弱或病後或產後或瘡毒久不收口脾胃不健一切諸損 白毛

烏骨雞又名太和雞查藥物備要便知不論雌雄去毛破腹去腸雜洗淨 大生地四兩洗飴糖四兩即麥芽米糖 俱

納腹內瓦鉢裝好放銅鍋內忌鐵鍋隔水蒸爛食之一月兩次為妙

七味鴨 治陰虛勞傷咳嗽痰喘神效 生地 熟地 歸身 茯神 白朮各三錢土炒 川

貝母二錢地骨皮四錢用老鴨一隻去毛原湯洗淨去肚雜不可再見水將前藥加陳甜

酒一碗生曬醬油三酒盃同入鴨肚內縫緊用瓦蓋盆盛貯盆內不可放水蓋好以

棉紙將盆蓋縫封固放在鍋內亦不可放水鍋蓋蓋好稻草三觔打成小草結對鍋

臍慢慢燒之如鍋太熱少停再燒草完鴨爛可吃能飲再加老酒送服 雍正二年

客自江西回廣有兄弟二人弟患虛損垂危即到城鎮不能停泊延醫又無方藥可

服惟有待斃而已客憫之出此方令其兄照法製與服之竟得平愈

神仙鴨

治勞傷虛弱無病食之亦能健脾益精功效甚大

烏嘴白鴨一隻去淨毛破脚

用水或用白

白棗即南棗四十

白菓四十九

建蓮四十九

人參錢一

陳甜酒酒三

好醬油二

各放鴨

肚內不用放水瓦鉢裝好封緊蒸爛陳酒送服無參用玉竹四錢九分加薑汁少許

亦可

固脂鴨

治腎虛吐血及腎虛咳嗽氣虛喘一切虛不受補者效驗如神有人腎虛吐

血三年百藥不效連食此鴨三隻斷根

老鴨一隻

去毛與腸雜洗淨用

固脂三錢

先用黃帶六分煎水泡固脂一夜曬乾烘乾亦可再用鹽

水炒核桃肉三錢又名胡桃

陳甜酒一茶碗陳

好醬油三

共入鴨肚內

以線縫好放瓦鉢內不用

放水蓋好加紙封口放鍋內蒸極融爛去藥連湯食如不見效即用七製固脂丸前見

蒸鴨食必有奇驗

種子兜肚方

此方能調經種子並治赤白帶下腰腿酸痛子宮寒冷男子肚腹畏寒

遺精白濁偏墜疝氣一切下部虛寒等症

附子一箇重二兩切片燒酒煮過曬乾聽用

大茴炒

小茴炒

丁香

五味子以上各

升麻

木香

甘草

甘遂各四

沉香錢一

共為末用新蘄艾四兩搓

融曬乾將前藥放在艾中間用線密縫兜肚置丹田上外用手帕包固晝夜縛定不

可換動一二月後則去之或加麝香二三分更妙

24

關散 治硃砂症並治感冒風寒及各項痧症凡脈散牙緊發慌手足麻木閉目不

驗方新編 卷六 內外備用諸方

四六五

語喉腫心痛醫多不識此症誤認爲喉風此名爲硃砂症又名心經疔用此藥三分先吹入鼻孔內再將藥秤足一錢薑湯沖服服後用紅紙捻照心窩背心二處見有紅點發現用針挑破內有紅筋挑出方保無事此方神效不可忽視 牙皂 細辛

各三錢明雄牛二錢法夏各三錢廣木香各三錢陳皮 藿香 桔梗 薄荷 貫衆 白芷

防風 甘草各二錢枯礬五分各藥共研細末磁瓶收貯用蠟封口不可洩氣

土熨法 治身受寒熱心腹疼痛醫家辨症不清涼熱混投或鄉僻之地無藥調治漸

至飲食不進大便閉塞小便短澀上下關格不通渾身綳緊或六脈沉伏或緊數之

極甚至手足腰膝僵硬不省人事此危篤之症急用 陳乾土磚搗成粗末約二觔

許以鍋炒大溫熱用青布包好以半揉熨胸腹腰背等處冷則另換一半周流揉熨

約半時久自覺胸腹氣流通而愈或再用皂角末少許吹入鼻中得噴嚏則氣隨通

楊

天然透邪丹 治感受風寒暑溼及四時不正之氣以致頭痛脹悶鼻塞不通胸膈不

舒等症 鵝不食草宜藥物備要便知曬乾研細末磁瓶收貯以蠟封口每用少許吹鼻中即

刻打嚏氣通而愈功同痧藥冬月用之尤妙

仙拈散 治男女遠年風溼血風皮蛀寒溼浸淫流水發癢搔之疼痛兩腿黑腫似爛



非爛或時熱烘麻木等症 寒水石研另 飛滑石研另 白芷 百部蒸炒 白蘚皮各三 蛇

牀子 地膚子 東白薇各四 炙鱉甲 大黃酒炒各 樟腦臨用時加 共研細末灰如香 麻

油調敷一日一換不可洗浴一月即愈至遲三月斷根神效無比

十全大補湯 治氣血俱虛並老弱人癱疽等症 台黨 炙芪 熟地各四 白芍炒酒

焦朮 茯苓 上桂研末 當歸各二 川芎半錢 炙草錢一 水煎服

補中益氣湯 治陽虛自汗或瘡癩脾虛久不愈並一切清陽下陷中氣不足之症

炙芪中錢 高麗參錢二 炙草錢一 焦朮半錢 陳皮留白 當歸分五 升麻 柴胡各三 薑片三 棗三 水

煎服

逍遙散 治血虛肝燥骨蒸熱咳嗽寒熱口乾便澀月經不調等症 柴胡 當歸

白芍酒炒 焦朮 雲苓錢各一 炙草分五 煨薑片三 薄荷分三 水煎服

金匱腎氣丸 治腰痛脚腫小便不利嘔吐脹痛四肢虛浮痰重喘急脾腎虛實水泛

為痰非此不救此仲景神方也風溼重者須先去風溼然後服此以免關門殺賊之

患 熟地兩四 茯苓兩三 牛膝 肉桂 澤瀉 車前 萊萸 山藥 丹皮兩各一 附子

錢五 為末煉蜜丸如梧子大每服八九十九丸空心米飲下急病分作數劑煎服亦可臨

臥服補中益氣湯可收全功

249 驗方新編 卷六 內外備用諸方

左歸丸 治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒懶言惡食或喘或渴或陽虛自汗或氣虛

不能攝血或瘧痢脾虛久不能愈一切清陽下陷中氣不足等症 蜜芪錢一 台黨錢一

炙草錢一 白朮炒土 陳皮 當歸各五分 升麻 柴胡各三分 薑片三 棗枚二 引小兒照服大人分

兩加倍

右歸丸 治元陽不足陽衰陰盛益火之劑 熟地錢八 山藥錢四 棗皮錢三 枸杞鹽水炒 鹿

膠酒兌服 兔絲錢四 杜仲鹽水炒 當歸酒炒 肉桂去皮研末

六味地黃湯 治肝腎不足真陰虧損精血枯竭腰痛足酸自汗盜汗遺精便血消渴

淋瀝舌燥喉痛虛火牙痛下部癰疽等症 九製熟地 山茱萸 真山藥 眞雲

苓 丹皮 澤瀉 水煎服

八味地黃湯 治命門火虧虛弱少氣尺脈弱者宜服之 照上六味地黃湯加附子

肉桂水煎服

元麥地黃湯 治陰虛心火狂燥腎水不足此即六味地黃湯之變方也加麥冬元參

降火益水 熟地錢八 雲苓錢三 丹皮錢三 建瀉錢三 淮藥錢四 元參錢二 麥冬去心 山茱萸錢四

涼血地黃湯 治胃火熱盛吐血衄血嗽血便血蓄血如狂嗽水不欲嚥及陽毒發斑

等症 生地錢四 白芍錢二 丹皮錢一 犀角錢一錢要尖者能 黃芩錢二 甘草分五 梔子錢炒 二 黃連錢一 川柏錢二

藿香正氣散 治上吐下瀉霍亂急症及各項痧症並四時不正之氣以及不服水土

脾胃不和飲食停滯惡心胸滿等症 藿香<sub>錢二</sub> 白芷 桔梗 法夏 紫蘇 焦朮

大腹皮 川樸<sub>薑汁炒</sub> 陳皮 茯苓<sub>錢各一</sub> 炙草<sub>分五</sub> 薑片<sub>三</sub> 棗<sub>三枚</sub> 水煎服

六一散 中暑煩燥口渴小便不通瀉痢熱瘧霍亂吐瀉等症 滑石<sub>水飛淨六兩</sub> 甘草<sub>兩一</sub> 爲末每服三四錢涼水調下

益元散 治與上同 照上六一散加辰砂少許

甘桔湯 治喉痛喉痺肺癰吐膿乾咳無痰火鬱在肺等症 金銀花<sub>錢二</sub> 甘草<sub>錢一</sub> 桔梗<sub>分八</sub> 牛蒡<sub>半錢</sub> 水煎服

荆防敗毒散 治腫腮漏腮 荆芥 防風 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎

枳殼 桔梗 茯苓<sub>錢各一</sub> 甘草<sub>分五</sub> 薄荷<sub>分三</sub> 水煎服

黃連解毒湯 治一切火熱表裏俱盛狂躁煩心口燥喉乾大熱乾嘔吐血衄血熱甚

發斑等症如非實火不可輕服 黃連 黃芩 黃柏 梔子<sub>各等分</sub> 水煎服

龍膽瀉肝湯 治肝膽經實火溼熱脇痛耳聾等症 龍膽草<sub>炒酒</sub> 歸尾<sub>各錢半</sub> 黃芩<sub>炒酒</sub> 澤瀉

瀉 木通 車前子 生地<sub>炒酒</sub> 生甘草<sub>錢各一</sub> 水煎服

五苓散 治腹滿水飲水腫小便不通等症 豬苓 茯苓 白朮<sub>錢各一</sub> 澤瀉<sub>半錢</sub> 肉桂

250 驗方新編 卷六 內外備用諸方 四六九

秘方新編 卷六 內外備用諸方

四七〇

徐氏行軍萬應膏

涪縣徐見隆都督

選邦

刊急救良方以惠士卒載有此膏蓋得之祕

傳者治跌打損傷及一切無名腫毒癰癤瘍核痰核積瘀氣痞風寒溼困各等症無

不神效

增新

生白附子

兩三

生川烏

生草烏

兩各二

木鱉子

八箇五十

金銀花

兩二

茅蒼朮

西赤芍

淨連翹

條子苓

生首烏

錢各五

大楓子肉

八箇五十

杭白芷

兩一

火麻仁

麻仁

粒二百

西乾薑

兩八

西歸尾

西川椒

兩各一

淨血餘

兩二

骨碎補

錢五

大蜈蚣

蠶

兩一

青防風

北細辛

錢各五

蟬衣脫

生南星

生半夏

兩各二

馬前子

八箇十

川黃柏

川獨活

兩一

荊芥穗

薺紅花

淨西葦

蛇牀子

孩兒茶

建姜黃

錢各五

西粉

草

兩一

豬油

斤一

桐油

斤一

右藥三十六味入油內浸三日後熬去渣再煉成滴

水成珠先以廣丹十兩收就後藥研末再收為膏

如用鉛粉

掃粉

飛甘石

乳香

油去

沒藥

油去

鞭竭

水銀

錢各五

枯礬

兩一

後八味研極細無聲為佳臨用時隔水

嫩化用紅布攤膏

終

校正  
增廣  
驗方新編卷七

善化鮑相璈雲韶編輯

合肥張紹棠又堂增訂

急救

凡自刎縊死溺死及一切自盡等症人多畏懼不救亦有以為已死不能復活者不知救治得法亦可回生救得一人可全兩家性命後列各方果能如法施治必有奇效即使萬無生理亦當盡人事而聽天命不可見死而不救也

五絕 凡五絕卒死急取韭菜搗汁灌鼻中或加皂角末麝香同灌更為快捷

弔死 回生丹見後跌打損傷門灌之立活真良丹也 又方 不可割斷繩索急以衣裹手緊

抵冀門若是婦女則連陰戶抵住緩緩抱住解下安被放倒急將所弔繩索用碗裝好用火蒸之其活更快一人踏

其兩肩以手緊提其髮不可使頭垂下一人微微撚整喉嚨一人擦按心胸又輕輕

摩其肚腹一人摩擦手足緩緩彎動若已硬直但漸漸強彎屈之又用脚裹衣緊抵

冀門陰戶不使洩氣以兩人用竹管吹其兩耳不可住口或用雞冠血滴鼻中男左

女右男用雞雞女用雌雞如此一飯之久即有氣從口出不可鬆手少頃以淡薑湯或清粥與食

令潤咽喉漸漸能動乃止凡弔死從早至晚雖已冷可活自夜至早稍覺難救總之

身體稍軟心下微溫者雖一日以上若依此救法多吹多摸無不活者勿謂已冷忽略不救 又方 照前法救治再將其兩手大拇指並排平正以小帶縛定於兩指縫中離指甲角一分半之處名鬼哭穴用艾火燒三七次並燒兩腳心三次即活凡無故中邪而自縊者以多燒鬼哭穴爲要 又方 炒熱生鹽二大包從頸喉熨至臍下冷則隨換不可住手其痰盡下並用人對口以氣灌之其活更快 又方 陳皮分八厚朴 製半夏錢各一肉桂 乾薑分各五甘草分三水煎服 又方 葱心刺耳鼻中有血出即活 又方 用手緊掩其口勿令通氣兩時許氣急即活 又方 用皂角細辛等分爲末如豆大許吹兩鼻孔 又方 用真野山羊血二三分研極細以好酒灌下立活

溺水死 撈起時急急將口撬開橫啣筷子一根使可出水以竹管吹其兩耳碾生牛夏末如豆大吹其鼻孔又用皂角末置管中吹其穀道如係夏月將溺人肚腹橫覆牛背之上兩邊使人扶住牽牛緩緩而行腹中之水自然從口中並大小便流出再用生薑湯調蘇合丸灌之或生薑汁灌之並用生薑擦牙若無牛用一人覆臥躬腰令溺人如前將肚腹橫覆於活人身上令活人微微搖動水亦可出或用大鍋一口覆寬凳上將溺人覆於鍋上亦可要將溺人臍對鍋臍俯臥手托其頭如係冬月即

將溼衣更換一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取竈內草灰多多鋪於被褥之上令溺人覆臥於上臍下墊以棉枕一箇仍以草灰將渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰暍於眼內其嚙口啣筷灌蘇合丸生薑湯吹耳鼻穀道等事俱照夏天法冬天甦醒後宜少飲湯酒夏天宜少飲粥湯按灰性煖而能拔水凡蒼蠅溺水死者以灰埋之少頃即活此明驗也溺人倘或微笑必急掩其口鼻如不掩住則笑不可止不能救矣又不可急於見火一見必大笑而死又以酒罈一箇紙片一把燒放罈內急以罈口覆臍上冷即燒紙片放罈內覆臍去水即活又初救起時尙有微氣或胸前尙煖速令生人脫貼身熱衣爲之更換抱擔身上將屍微微倒側之令其腹內水流若水往外流即有生機一面用粗紙燒燃取煙熏其鼻竅稍熏片時即用皂角研細末吹入鼻竅但得微有噴嚏即可得生又灌酒湯不可太熱恐傷齒盡落又方 先打壁泥一堵置地上以溺人仰臥其上更以壁土覆之止露口眼自然水氣喻入泥間其人遂甦雖身僵氣絕用此法亦可救 又醋灌鼻中綿裹石灰納糞門及陰戶水即出 又方 鴨血灌之即活終身戒食鵝鴨

割喉 腹破腸出 均見跌打損傷門

服毒 方見後解救諸毒門

凍死 冬月凍極之人雖人事不知但胸前有微溫皆可救倘或微笑必為急掩其口

鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令近火但一見火則必大笑而死 凍

死四肢直口噤有微氣者用生半夏末如豆大小許入耳鼻內又用大鍋炒灰布包

熨心腹上冷則換之候目開以溫酒及清粥少少與之不可太熱恐傷齒盡落如已

救活用生薑碎搗陳皮碎搗各等分用水三碗煎一碗溫服 又方 用氈或草薦捲之

繩索繫定放在平穩處令二人相對踏令滾轉往來如扞氈法候四肢溫即活 又

方 用雄黃焰硝等分為末點兩眼內角

壓死跌死 急扶起盤腳坐地以手提其髮將生半夏末大約豆吹兩鼻中以生薑汁灌

之只要心頭微溫雖至一日亦活再用白糖調水與服散其瘀血或加童便灌之

又方 回生丹見後跌打灌之立活

雷擊死 蚯蚓又名曲蟮搗融敷臍上半日即活仍禱謝雷神虔心懺悔或用回生丹後見

跌打損傷灌之亦可活也須戒殺生

睡魔死與後中邪死鬼原有燈即存燈無燈切不可用燈照急用生半夏末豆約大吹入兩

鼻取母雞冠血擦面上乾則再擦即醒 又方 樟木燒煙熏之即醒 又方 不

得用燈火照並不得近前急喚但痛咬其足跟及足大拇指頻頻呼其名以口水唾



其面再灌薑湯必活 又方 移動些小臥處徐徐喚之即醒 又用管吹其兩耳  
以皂角末如豆大許吹兩鼻得噴嚏則氣通三四日者尙可救 又方 酒調蘇合  
丸灌之 又方 用艾燒兩足大拇指向上生毛處三七次或燒鬼哭穴亦可鬼哭穴見前

治夢魘 大塊明雄更妙戴頭上並繫左腋下可免鬼魅並解惡夢 又方 臥時以

鞋一仰一覆或以紅氈紅布之類枕頭即安

中邪死 用韭菜心於男左女右鼻內刺入六七寸令目開血出即活或搗韭汁灌鼻

更視上脣內有如粟米粒者以鍼挑破取出 或皂角末或生半夏末如豆大各吹

兩鼻中燒炭一爐以陳醋潑炭上使患者聞得醋氣即活須捉其兩手勿令驚或灌

醋於鼻內或用樟木燒煙熏之亦可

鬼打死睡寃死中邪死俱可用此方 白毛烏骨雞血擦心前並將雞煮湯灌之極效 或用雞冠血滴

口中仍破此雞捺心下冷即將雞埋之甚效

驚嚇死 回生丹見跌打損傷門灌之立活 又方 醇酒一二杯溫熱灌之自活或用生半夏

末大豆吹兩鼻中亦可

痰厥死 巴豆搗爛綿紙包壓取板油作捻燒煙熏鼻中片刻吐出痰血即愈或用生

半夏末吹兩鼻中

氣厥死 照上痰厥方治之

中風死 方見中風門或照上痰厥方治之

尸厥死

由入胸中者  
則病而得者

附子

七錢重者泡熱  
去皮臍為末

分二服每服酒三盞煎一盞如無附子生薑汁半盞

和酒同煎百滾連灌二服即醒或照上痰厥方亦可

尸厥死腹響如雷 硫磺一錢焰硝五錢研細分作三服好酒煎至煙起則止候溫灌下片

時再服即安

忽然胡言亂語昏迷跌倒 此症不省人事切勿挪動則難治急用大爆竹放頭脚

兩處

頭頂透一箇  
脚底一箇

一齊點放其人自醒無恙大小皆治屢試如神

暴厥死 凡人卒然倒仆急扶入煖室扶住正坐用火炭沃醋使醋氣沖入鼻中良久

自醒或搗韭菜汁灌鼻或用皂角末吹鼻得噴嚏即醒如倉卒無藥急於人中穴及

兩足大拇指離甲一韭葉許各用艾火灸三五次即活

發花風死

此症多死於牀上見腎俞穴

背脊下腰  
眼處即是

有一紅扁者可治若黑者不治急用

麝香填於臍眼加薑一片蓋麝上艾火灸而生

解救諸毒

凡解毒藥俱宜冷服大忌飲熱湯水飲熱則不可救矣若見酒必死

解救百毒

乾淨地上黃土地更好

挖三尺深入水一桶用棍攪動名曰地漿能解百毒凡食

隔夜菓餅菜蔬茶水酒漿等物或食田塘溪澗井溝之水誤中無名百毒者取飲數

碗極為神效愈後戒食鱸魚善音 又方 巴牆草搗爛煎湯冷服能解百毒屢試屢

驗

中毒七孔流血 刺蝟皮性暖存 為末每服三錢酒調下立止

解鴉片煙毒 急用活鴨血多多灌之凡服鴉片煙者最為神效若身冷氣絕似乎已

死如身體柔軟則臟腑經絡之氣尚在流通實未死也乃鴉片烈性昏迷之故耳將

其人放在潮溼陰地用筷子撬開牙齒或用磁調羹撬開或用烏梅擦之亦開若用鋼鐵等物反不能開矣 以筷子橫放口內使口

常開以冷水時時灌之或白沙糖調冷水灌之更妙外用手帕二三條以冷水泡透

放胸前輪流更換或用整塊豆腐亦可又用冷水一盆將頭髮散放盆內時時換水

切不可見太陽一見日照即不可救三四日後鴉片之氣散盡即活如身不硬雖七

日內亦可回生切不可以為無救遽行棺殮此法曾救多人無論服毒輕重雖手足

青黑照此救法無不活也切忌灌服醬油恐受鹽滷之毒反致誤事若服藥雜亂亦

不可救慎之慎之活後多服白沙糖水及生菜豆末沖水服最效 有老倅作云檢

服鴉片煙屍骨伏者居多側者亦常有之平仰者甚少蓋因其人埋在土中鴉片毒氣退盡仍復生活輾轉棺中不能復出久則真死矣故其骨殖不伏即側實為服鴉片煙可救之確證也道光七八年間廣東省有吳姓者寄居客店窮極無聊吞鴉片煙而死店主人不敢收殮知此人有親屬在三水縣地方遣人往告其親屬四日後始至而此人已於前一日活矣 又有人吞服鴉片煙百藥不效死後降乩云當日因用藥雜亂是以不效惟用真南礪砂黃色如膠者為真冷水調服可以立解試之屢有奇驗 又方 用清油灌之立解緣鴉片煙黏滯腸胃見油即散也 又方 巴牆草搗

爛煎湯冷服屢解如神

解砒霜毒

即信石也此症如用鴨血治法終身戒食鴨

防風兩研末冷水調服或用四兩冷水搗汁灌服亦可屢

試如神萬無一失 又方 殺白鴨取血對口急急灌下即活遲則血冷如已服防風必能回生可以不必服此以免雜亂反致不救

解野菌毒

菌音郡

照前取地漿水三四碗入喉即活至神至妙切勿輕視亦不必用別

藥

解斷腸草毒

此症治好須戒殺生

此草有尖圓兩種如服尖葉者不過一二日肉即消化急用活

羊血灌一二碗即活最有神妙有人以此草放豬尿胞內草自走動胞漸澆薄後以

羊血灌入即不動矣或服羊油二三兩亦妙此草惟羊食之最肥故飲羊血羊油即

解 又方 蕪菜音蕪菜搥汁灌之其效如神如不見信以蕪菜汁灑生斷腸草上草即

萎黃而死 又方 韭菜汁灌入亦效 又方 用抱過雞蛋兩三箇破開和清油

灌入或未抱過雞蛋亦可 又方 照後解野葛毒方治之神效

解黃藤草毒即水莽草或云即斷腸草 黑豆升一煮濃汁候冷透飲之立解或照前解斷腸草毒及後野

葛毒方治之均極神效

解野葛毒 殺鴨更白鴨取自然熱血對口急急灌入即活屢試如神不可灌遲遲則血

冷恐難見功終身戒食鴨

解野草毒 照上解斷腸草及解野葛毒各方治之或飲甘草水或飲地漿前見均效

水菘若毒 菜中有水菘若圓而光誤食發狂狀如中風或作嘔吐用甘草煮汁冷服

即解或飲地漿亦可

解鹽滷毒 生豆腐漿冷服二三碗至神至妙如一時難得以黃豆搗碎沖冷水去渣

服之或用活鵝鴨血多多灌之即解鵝鴨食 又方 白沙糖五六兩用冷水調服亦

極效驗 又方 淘米水冷服三四碗亦可

解鹼水毒鹼音 照上解鹽滷毒各方治之

解煤火毒 中煤炭毒土坑漏火氣而臭穢者人受薰蒸不覺自斃其屍極軟與夜臥

夢魘不能復覺者相似房中置水一盆並使牖戶有透氣處則煤炭雖臭不能爲害

飲冷水可解或蘿蔔搗汁灌口鼻移向風吹便醒

解迷悶藥 飲涼水即解重則飲藍錠音殿汁立愈如牙關緊閉由鼻灌之亦可 又方

白沙糖調冷水服更妙

解百藥毒 凡服藥過多致生瘡毒頭腫如斗脣破流血或心口脹悶或肚腹撮痛者

用小黑豆 菘豆升各一煮濃汁冷服即解 又方 甘草熬膏日服數次解毒如神

雖然泄瀉亦無害也 又方 糯米糖食之即解此孫真人方也或食白沙糖亦可

又方 如已氣絕只要心間溫煖者乃是熱物犯之只用防風二錢煎水冷服即

活 又方 照前解百毒方治之極效

解巴豆毒 口渴面赤五心煩躁泄痢不止者是用黑豆升一煮汁冷飲即解 又方

川黃連煎水冷服亦效

解附子烏頭天雄毒 防風錢二煎水飲或照前解百毒方治之

解芫花毒 治法與上附子毒同

解狼毒毒 狼毒藥名飲鹽水可解或照前解百毒方治之

解木驚毒 身發抖戰者是急用好肉桂錢二煎服立愈或用香油一盞和白沙糖兩一灌之亦可或照前解百毒方治之

解硃砂毒 藍錠殿音韭汁飲之即解

解冰片毒 服冰片過多口渴心煩飲地漿一碗冷服即解

解水銀毒 服水銀欲死者用真川椒斤數炒熱鋪蓆下令患者脫衣蓋被睡之過一夜

水銀從毛孔中鑽入花椒內矣真奇方也

解鉛粉毒 婦人因打胎而服鉛粉生子癡呆身體多發瘡毒用活鴨血乘熱服之極

為神效 又方 白沙糖三四兩冷水調服或用蘿蔔搥汁飲之均極效驗

解輕粉毒 輕粉性最燥烈楊梅等瘡服此雖易收功其毒竄入經絡或口齒腫爛或

筋骨疼痛攣縮久而潰爛經年累月甚至終身不愈致成殘廢用 土茯苓兩一苡米

銀花 防風 木通 白蘚皮錢各一 木瓜錢半 皂莢子錢四 氣虛加頂上黨參錢一 血虛

加當歸分七煎服日服三次忌食茶並牛羊雞鵝魚肉燒酒麪食辣椒及一切發物並

謹戒房事半年服至十日漸次痊愈功效異常 又方 紅棗丸見難毒諸症服之最為

神效 又方 用黑鉛打成酒壺一把約五六斤重 內盛好燒酒斤十五 土茯苓斤半 乳香錢三 封

固隔水煮一日夜埋土中七日出火毒早晚隨量飲用瓦盆接小便可看有粉出為驗

256

服至筋骨不痛乃止屢試如神

解斑貓毒 黑豆一斤煮濃汁冷飲即解 又方 涼水調六一散七錢服二三必痛

止而愈 又方 玉簪花根煎水冷服即解 又方 照前解百毒方治之

解硫磺毒方內生半血為解硫磺神藥愈後須戒殺生並戒食羊肉為要 真烏梅肉焙乾一兩烏梅有李子假充者以索製為真 白沙糖錢五煎服 又方 白

羊生熱血飲一碗神效 又方 黑鉛兩二煎湯服即解 又方 防己錢二煎水冷服

即解

解花椒毒 口吐白沫身冷氣欲絕者是照前解百毒方治之即愈

解食桐油 急飲熱酒即解 又方 乾柿餅食之亦解 又方 蓮蓬煎水服甚效

又方 糯米蒸熟曬乾炒泡食之

解食蛇毒 煙油又名煙屎即煙裨中煙氣結成如醬者是煙裨中用過多年者佳 用冷水洗出二三碗飲之凡受蛇毒飲之其味

必甜並不難飲屢試如神或蛇遺毒在食物內亦效 又方 雄黃調水冷服效

又方 照前野葛方治之 又方 蜈蚣一條焙枯研末冷水調服一服即解如恐

蜈蚣有毒過一二日後照後解蜈蚣毒各方治之決無後患

解蜈蚣毒 凡誤食蜈蚣毒者用樟樹葉煎水冷服極效 又方 十指甲磨冷水多

飲之其效無比 又方 照前地漿及野葛方治之均效



蜈蚣入腹 生雞血灌之甚效 又方 食生雞蛋二三箇略過半刻再飲生油一盃 卽吐出絕妙方也

解各蟲毒 照前野葛方治之極效

解沙蟲水毒 蒿苳菜即蒿菜搗汁飲之卽解 又方 照前解百毒方治之

解螞蝗毒又名水姓 此物入腹久必生子食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦不治必死用

桂圓肉荔枝肉亦可 包煙油煙油者上解毒方便知 吞之卽死隨於大便而出屢試如神此經驗第一方也

又方 用白蜜頻頻食之至一二觔方愈螞蝗火燒爲末見水卽活惟以蜜浸之

卽化爲水故服蜜最佳以多爲妙少則不效如食蜜不愈卽食羊肉可化如不信將

螞蝗入羊肉內亦化爲水白蜜體虛不可多服不如第一方之妙 又方 田中泥

一雄黃錢二爲丸分作四服開水下其蟲入泥隨大便而出有時螞蝗行至鼻孔血流

不止只用田泥泡水一碗放鼻孔前必然乘泥而下 又方 活小魚條數猪板油兩

加黃泥共搗爲丸涼水下螞蝗卽和泥而出 又方 青靛靛音調水飲卽瀉出 又

方 蘆藜即蘆藜炒爲末水調服一錢必吐出

解河豚魚毒 槐花微炒與乾胭脂等分同搗成粉冷水調服極效 又方 多食橄欖

并用橄欖核磨水服極效 又方 飲真麻油一二杯亦效 又方 照前解百毒

方治之如口渴不止者服小便坑中水一小盞數次即止

解各色魚毒 紫蘇煎濃汁冷服極效以多為妙 又方 多食橄欖又名青果並用橄欖

核磨水服最效 又方 冬瓜生搗汁飲之 又方 魚鱗燒灰冷水調服二錢

又方 食魚過多腹脹面黃者用紅麴合三煮爛連渣服即從大便出臭不可聞連服

三次愈

解食蟹毒又名甲魚水 魚脚魚團魚 飲藍靛音殿汁即解 又方 冷水調鹽飲之效 又方 淡豆豉

合一 搗爛冷水沖入取汁服即愈 又方 白馬尿飲之即解蟹與莧菜同食者此方

尤妙

解蝦蟆毒又名青蛙又名田雞又名水雞 照上蟹毒各方治之即解

解黃白鱗毒音鱗 照上蟹毒各方治之 又方 生螃蟹搗融沖冷水飲之極驗

解螃蟹毒 紫蘇煎濃汁冷服二三碗即解生藕汁生大蒜汁生冬瓜汁生黑豆汁俱

可解 又食蟹牙根肉腫出者用牙皂角數條火上燒焦泡生地黃汁內半日取出

再燒再泡三次後焙乾研末冷透敷之

解鷓鴣毒 有人好食鷓鴣後喉間生癰潰爛膿血不止百藥不效一醫令先用老薑

一斤陸續煎水服完然後下藥治之遂愈蓋此鳥好食半夏係因半夏毒發故以薑

治愈

解犬馬肉毒 凡食犬馬肉腹脹口渴發熱亂言者用淡豆豉<sub>二</sub>杏仁<sub>三</sub>同蒸搗爛服

之日服二三次或煮蘆茅根飲之俱效 又方 杏仁<sub>二</sub>去皮蒸熱研爛用滾水和

勻取汁服用後必然吐泄俟泄三次後再服冷醋一茶鍾或冷粥一碗即愈 又方

葶薺皮<sub>末七分</sub>紫背浮萍<sub>末三分</sub>共和勻開水調服有人食犬停滯久而肚腹腫脹數

月不愈後服此方腹響如雷大吐大泄而愈各種食積腹脹如鼓者服之皆效

解馬肉毒 人乳飲之即解或照前解百毒方治之

解食牛肉毒 苦瓜皮搗爛沖水服神效 又方 牛腸中未化草<sub>色如青</sub>煎汁調薑鹽

醋服之即解 又方 烏柏樹根皮酒煎服或菊花連根搗汁酒服均效 又方

人乳飲之即解 又方 蘆茅根煮汁溫服甚妙 又方 照前解百毒方治之

解鵝鴨毒 糯米半觔淘水去米溫服一碗即愈

解雞肉毒 地漿飲之可解

解野雞毒 此症吐泄不止用生犀角末三分冷水調服即解

解鬱肉漏脯毒 凡各肉密器緊蓋過夜者為鬱肉屋漏沾著者為漏脯皆有毒韭菜

搗汁飲之即解

解豬肝毒 照前解百毒方地漿飲之極效 又方 熟豬油斤拌飯或炒飯亦可分

作一二日食盡此一二日內勿食別物爲要

解自死各物毒 黃柏研末冷水調服一二錢即解或飲人乳一碗極效

解藥箭射傷鳥獸肉毒 先以鹽水服之次以黑豆煮濃汁飲之即解 又方 蘆茅

根煮熟連湯食極效 又方 照前解百毒方治之更妙

解杏仁毒 杏仁生熟食之都不爲害若火炒不透半生半熟者服十數粒即死其屍

眼閉舌唇耳竅手足十指俱青色肚腹有青色塊每有食以詐人者人不易防最難

禁化惟急取吐吐出可解用杏樹皮煎湯飲之雖迷亂將死亦可救或用麝香分一沖

水服

解百菓毒 麝香分一煎湯服即解 又方 白鴦頭煎湯服一二次即愈

解木瓜毒 舌大滿口者是用好醋調黃糖紅糖亦可含口中吐出涎水數次即愈

解豆腐毒 蘿蔔煎湯飲之即解

解中山洞生金生銀及銅鐵鉛錫等毒 照前解野葛方鴨血灌之即活

解飲田澗山溪水毒 凡田澗山溪往往有蛇遺毒在內如誤飲其水用水調雄黃多

服數次自愈

解隔夜茶水毒 服雄黃或地漿均可解

### 諸毒須知

飯落水缸毒 飯落水缸日久生毛食之生疔難治最宜留心檢點

久閉空房毒 凡屋宇久閉陰溼閉結不散或邪魅借以潛踪蛇虺惡獸從而盤踞宜

大張聲勢或先以火驚散

山洞園林毒 凡偏僻山洞及年久園林藤蘿花樹之下不可飲食恐有蛇虺毒蟲遊

行其上遺毒於食物中爲害不小

衣有暑毒 夏日汗透之衣向日中曬晾忽暴雨將至急爲收檢則烈日之毒即蘊於

內如遇酷暑汗出時偶一衣之則暑以引暑立中其毒又夏秋曬晾冬衣必須冷透

收檢若未攤冷而收入箱篋將來穿着必受暑毒宜於臨穿先一時當風吹透方免

其害

草藥毒 山有毒草入山採藥須細心揀淨

瓶花水毒 凡瓶內插過花枝其毒最甚不可誤飲

隔夜茶水食物毒 凡夜閒茶水食物未經蓋好必有蟲鼠遺毒不可誤飲

雞毒 雞食蜈蚣百蟲久則食之傷人故養生家雞老不食又夏不食雞又黃蠟白蠟

炒雞食之脹悶氣塞三日而死無可救也凡食藥有蠟者前後十日忌食

鱒魚毒鱒音 白鱒黃鱒昂頭出水者食之必死

魚荊並食毒 昔一婦以魚湯米飯餉夫路過荊林荊花落於湯中食之遂死凡服藥

有荊芥者前後數日忌食魚蝦等物

蜜鮓並食毒 韶州有僧飽食新蜜還至半道遇賣鮓者買食半劬至家而死

河鮓藥並食毒 凡服藥前後數日俱不可食河鮓食之有毒

鰲莧毒 鰲與莧菜同食腹生小鰲即死飲白馬尿即化

游波蟲毒 凡食海蛤慎防游波蟲其殼骨相似惟以面上無光可辨若誤食之令人

狂走欲投水似有崇狀惟醋解之立愈

屋漏水毒 屋漏滴食物上食之有毒

獸雙尾及蟹獨螯羊一角雞四足白鳥烏首烏雞白首白馬青蹄黑蹄肉落地不沾塵

經宿尚暖曝炙不燥入水自動又皮肉無異腸臟變改者如肝色青黯腎氣紫黑魚

無腸膽牛肝孤葉鮓魚同鹿肉羊肉同鱸酪羊肝同生椒多食猪肉得胡荽俱殺人

生魚同酥乳變諸蟲牛猪肉同食成寸白蟲猪羊肉以桑楮柴煮炙食之亦成寸

白蟲 柿子同蟹食羊肉食必致患痢腹痛或至不救 諸菓有異樣者根下必有

毒蛇菓未成核者食之發癰瘡並發寒熱菓落地有蟲緣過者食之生九漏有雙蒂者有雙子者有沉水者均有毒不可食

猪肉忌 蕎麥 葵菜 胡荽 梅子 炒豆 木瓜 鵝鶉 驢馬肉

羊肉忌 梅子 豆 蕎麥 魚膾 柿餅

牛肉忌 栗子 韭菜 薑子 犬肉 黍米

犬肉忌 菱角 牛肉 鷄肉 鯉魚 鱒魚 鯽魚 蒜 葱

驢肉忌 荆芥食之有大毒

兔肉忌 生薑 橘皮 芥菜 雞 鹿 獺

雞肉忌 黃蠟食之必死 蒜 芥菜 李子 獺 兔 犬 鰲 野雞

鴨忌 李 鰲

鵝鶉忌 菌子 木耳 猪肉

雀忌 李 醬 牛肝 鰲

諸色魚忌 荆芥食之死見前又忌棗

鱒魚忌 猪肝 芥菜 蒜 糖

鰲忌 莧菜食之死前見 雞 雞蛋 鴨 兔 雀 桃李 薄荷 芥菜

鱒音者 鱒忌 桑柴火煮

螃蟹忌 荊芥 柿 橘 棗

諸瓜忌 油餅

蕎麥忌 猪 羊 鯉魚

菜豆忌 樞子食之必死 鯉魚鮓

核桃忌 酒 野雞

笋忌 糖 鯉魚 羊心肝

葱忌 蜜食之斷腸 雞 犬 棗 楊梅

### 救解鴉片煙及諸毒良方

方用廣東廣州府所產木棉花六錢介卒不可得可於廣東香牛皮墊褥內取之然總以預蓄為妙 撕鬆用潔淨大瓦鉢將鐵火鉗

叉開架於鉢口置棉鉗上火燒淨煙成灰用箸挑裝方燒得透燒灰時務須避風倘灰被風吹耗則藥力微矣 放在鉢內加食鹽二

錢用木棍搗灰並鹽成極細末開水半碗沖入鉢內用手將鉢內四面之灰洗入湯

內復用箸在鉢內調勻連灰帶湯概行服下鉢底餘灰均須調服 片刻之間煙毒可吐出矣吞煙

至六七錢者連灌此藥二副三四刻許煙毒亦可嘔出若吞至一兩零者連灌此藥

三副藥性行到自能漸漸還陽大吐而愈間有不吐者則從大便瀉出煙毒亦自解



去凡遇救人之際不可慌亂須照此方細心製之果能製藥如法救人無不神效他若水粉鉛粉砒霜蟲藥野菰諸毒解救亦皆神效但只用木棉燒灰搗末調開水服不可用鹽

誤吞諸物

誤吞鐵器 炭皮研末調粥二三碗食之炭末即裹鐵器由大便而出神效第一方也

誤吞鐵鍼 鐵鍼字喉見後 蠶豆煮韭菜同食鍼與菜從大便而出 無蠶豆用雞蛋亦可 又方 生癩蝦蟆

眼珠一對冷水整吞下其鍼兩頭穿珠立刻吐出或大便而出神效永戒食蝦蟆

又方 照前木炭皮研末和粥食之亦出

誤吞金銀銅鐵錫鉛 羊脛骨 即羊前腿膝蓋骨也 燒枯為末米湯調服二三錢一日必出有人吞

金鑽三日不下服此即出屢試神驗真百發百中之方也 又方 橄欖核燒枯研

末開水調服自出神效 又方 糯米糖食半觔亦效 又方 韭菜一把滾水煮

軟不切斷淡食之少頃即吐出從大便而出

誤吞金箔 此物吞下或閉喉管或閉肺管遲則難救急取羊血灌之最為神效

誤吞銅錢 多食葶藶自然消化其效無比 又方 砂仁 兩 煎湯服之亦可化也或

照上誤吞金銀等方治之亦可

諸骨卡喉 此症宜急治之若飲食難進餓倒胃氣亦屬難救凡係獸骨及雞鴨等骨

卡者用狗一隻倒吊取涎緩緩嚥下其骨卽化屢試如神以狗善食諸骨之故也

又方 虎骨未研水調服亦佳 又方 魚骨卡者用鷓鴣或鴨子倒掛垂取涎令患

人仰臥時時灌下其骨盡化 又方 有人被魚骨橫梗胸中半月不下疼痛叫喚

用橄欖核磨濃汁滾水調服愈真仙方也 又方 灰麪兩四用冷水調稠敷兩膝頭

上一時之久不知其骨化於何處真奇方也 一切禽魚獸骨皆治 又方 有人因

一骨梗喉百藥不下夢人告之服真南礪砂黃色如膠者真最妙遂取一塊含之即愈礪砂多

有假充如非真者亦不見效如咽喉腫爛用真南礪砂加頂上梅冰片和勻吹入藥

店中冰礪散斷不可用亦恐其假而無功也 又方 食山查膏甚效或以山查煎

濃汁服之亦可緣雞骨入山查膏卽化故能治一切骨梗也 又方 貫衆焙枯末每

服一二錢神效或煎濃湯含口中緩緩嚥下亦可 又方 人指甲瓦上焙枯末吹入極效

又方 大蒜塞鼻不令透氣其骨自下 又方 白糖含口中令其自消則骨與

俱化矣 又方 魚骨卡者以木魚骨插耳尖縫內左卡插左右卡插右或藏髮中

亦可神效 又方 家用苧麻根搗融爲丸如桂圓大魚骨用魚湯下雞骨用雞湯

下或用苧麻根搗汁飲之亦可 又方 栗子肉薄皮瓦上焙枯存性研末吹入喉

中即下栗子又名板栗 又方 砂仁 草菓 威靈仙<sup>各三錢</sup> 加白糖<sup>一兩</sup> 水煎連服

三四碗無論何骨俱化神效此林屋山人極驗仙方也 又方 製燈心炭<sup>製法見藥物備要</sup>

研極細吹入三四吹神效此亦林屋山人極驗方也 又方 藟斗<sup>音子</sup>子<sup>又名藟頭</sup> 食之

即下 又方 魚膽飲 冬天取鱖<sup>音桂</sup>魚膽懸掛陰乾遇有各骨卡喉即取一個<sup>者大</sup>

<sup>亦中調</sup>水煎溫溫服下少時嘔吐骨即隨出如尙未吐再服溫酒以吐爲度酒隨量飲

若再未出再飲魚膽服之無不出者如各骨在腹內日久刺疼黃瘦者服之皆出草

魚鯽魚膽皆可竹木卡喉者服之亦極效驗存心濟人者宜收藏以救急也 又方

吳茱萸煎濃汁飲一碗骨刺腹中者亦軟而易下 又方 五月五日午時在韭

菜地內面東勿語取蚯蚓泥<sup>又名曲糲</sup>收之每用少許擦喉外其骨自消 又方 鯉魚

背脊鱗<sup>式上焙研末</sup>涼水服之其刺自跳出雖三四日不出者亦神效諸色魚鱗皆可用

又方 凡卡某魚之骨即用某魚生眼珠以豆皮<sup>又名豆麩</sup>包好拚命吞之無不神效

又方 輕者用糯米糖爲丸吞之即下

田螺卡喉 鴨<sup>一隻</sup>以水灌口少頃將鴨倒吊取涎與服即化

稻穀卡喉 急取鵝口中涎灌之即下蓋鵝涎能化穀也鴨涎亦可 又方 紫花地

丁細嚼吞之神效 又方 食糯米糖亦下或照前魚膽飲燈心炭各方亦可

竹葉卡喉 此物易閉喉管遲則難救急取牛口涎以滾水對服即化此外夷秘傳也

竹木卡喉 老絲瓜又名水瓜絲瓜燒灰每服三錢兌酒下 又方 照前各骨卡喉魚膽飲方

服之極效 又方 木卡喉者鐵斧磨水灌下即愈或用鐵鋸放炭火內燒紅淬入

黃酒亦可酒服之亦可勿令人見 又方 竹卡喉者製燈草炭製法見前諸骨卡喉方內開水送下即

愈外用燈草灰放膏藥上貼喉痛處一夜即消 又方 舊籬笆竹燒灰沖水服亦可

桃杏卡喉 狗頭煮湯服並搽頭頂即愈

諸豆卡喉 土狗蟲數個又名蠅搗爛敷喉外腫處其豆自下

鐵鉞卡喉 用癩蝦蟆數箇將頭剝去倒垂流血以盃接之得一盃許灌入喉中移時

連鉞吐出鉞自軟曲永戒食蝦蟆

鐵鈎卡喉 照上鐵鉞卡喉方治之 又方 有童子誤吞鈎鈎將鈎線一扯鈎已穿

入喉管片時頸如斗大後用佛珠大香珠亦可穿入鈎線漸漸將珠挨進直至喉管輕輕將

珠向內一推其鈎已脫出在珠上緊緊執着珠繩抽出即安

頭髮卡喉 舊木梳燒枯為末酒沖服 又方 亂髮燒灰水調一錢服髮灰須令燒盡

如有生髮未經燒者食之害人

蜈蚣卡喉 急取生豬血飲之少頃以清油灌口中蜈蚣滾在血中即吐出後以雄

黃末水調服以解其毒

煙酒醉傷

水旱煙醉傷 胡黃連錢一煎水兌茶服即解

洋煙醉傷 飲鹽水即解或飲醬油或飲糖水均效

酒醉傷 凡酒醉死者急解醉人頭髮放新汲井水盆內將衣解開用豆腐遍身貼之

無用布 溫灌之即醒或用樟木兩煎水服亦可此仙方也屢試如神 又方 樟樹子錢四酒三盃煎滾候

無用布 氣衝上之水半盞灌下半時即醒如牙關緊閉用烏梅搽牙以磁調羹子即匙擣開灌

下或打開一牙灌入切不可以身冷氣絕而不救也 又方 麝香分半放口中即醒

又方 黑豆升一煮汁乘溫灌下三盞即醒 又方 白蘿蔔汁或熱尿灌之俱效

又方 急用生蚌瀝水灌之

酒醉心痛 白沙糖兩三四淡酒沖服止痛如神

酒醉小便不通 葛花錢三燈心根七酒煮服即通

酒病大小便不通 生薑汁錢一黃蠟錢一白礬分五共煎滾加燒酒一碗沖入飲之立能

止痛再用藤菜煎水燻前後陰大小便即通百藥不效者此方用之如神忌食雞肉

263

秘方新編 卷七 煙酒醉傷

十日

酒病 好飲之人酒毒發作頭痛目眩咽喉閉悶或下痢清水日數十次形神痿頓若

誤作陰寒自痢妄用溫熱之劑者非矣宜用 陳皮錢五甘草錢二川連錢三以上三味俱

微炒為末再配松花粉兩一和勻每服二錢早晚以開水送下一服兩日即愈 又方

麥粉即小粉炒黃研末白湯調服不過一二次即止其效如神

酒龜 用麻雀一對又名瓦雀連毛搗爛煮酒服少時酒龜自出從此滴酒不飲亦無恙也

又方 一人好飲酒每飲二三杯必奔走三五十次有時心痛口吐黃水後用藥

吐出一物如蛇乃酒癥也 又一人好飲酒終日沉醉無酒則叫號不絕日就瘦弱

家中令人用繩縛住手足取好酒一罈於口邊使酒氣衝入口中須臾吐出一物如

猪肝樣上有多孔其人從此不飲亦無他恙

醉後嘔吐視物顛倒不正 甜瓜蒂 藜蘆即蘆葦煎水服使再嘔吐而愈蓋醉傷嘔吐

倒瞻視物倒顛服藥再吐以正其膽自安

戒洋煙癮 四物飲 赤沙糖斤一生甘草斤一川貝母一兩去心研細老薑兩四先用鴉片灰錢五熬膏

再入前藥同熬去渣如一錢癮者食藥五錢逐日減少並以赤沙糖沖水代茶即斷

如癮極重者取已煎之汁重煎之十杯煎成一杯再服必效有人二十餘年老癮照

此戒斷不可輕視 又方 南瓜藤取汁調紅糖黃糖亦可飲之神效 又已戒煙癮之人平時多食南瓜免生別病否則煙雖戒斷一二年外仍有後患此西洋秘傳也 南瓜北人呼爲倭瓜 又方 粟壳斤半 台黨參斤一 川杜仲兩六 鹽砂仁研末兩 炮薑兩五 廣陳皮兩二 堅雲苓兩四 焦查肉兩六 用水一大鍋煮半日許將渣瀝淨再用微火熬成膏將砂仁末攪入磁罐收貯癮發時隨癮之大小白開水化服無論癮之新久無不斷也 癮來時腹痛加肉桂兩一 炙草兩一 咳嗽加苦杏仁成泥兩研 麥冬兩一 蜂蜜兩四 陳皮兩二 渾身發癱黨參加倍 瀉者加茯苓 炮薑加倍 腰痛者加杜仲兩三 不欲食者加砂仁兩一 氣下墜者黨參加倍 大便滯者加蜂蜜兩三 肝氣發者加當歸兩四 薑香附兩二 又方 眞淮山藥 茯苓 法夏 杜仲 鶴虱 旋覆花包精 款冬花以上各三錢 加大煙灰錢三 河水熬成一麪碗去渣分十餘次兌酒服早癮早服晚癮晚服無論新久無不斷者已驗多人甚效 又方 罌粟壳錢八 陳皮分八 查灰錢一 焦朮分五 炮薑分八 杜仲錢一 甘草錢二 炙芪錢三 香附分七 眞台黨兩一 以上藥每日一服服至月餘其癮必斷已驗多人並無後患 又方 每日用鱧魚一二條滴血沖酒輕者吃四五十條重者百餘條飲此酒大補氣血魚又可以膾食依此飲之癮不斷自斷見煙遠避 又方 用甘草一味熬膏調入煙中吸食二三日即漸不欲吸此方最易既不費錢又不傷人斷後並無

煙痢之疾癮深者照法治之一月即斷 又方 頂上台黨二兩 金銀花 旋覆花包

大生地錢各五 麥冬 天冬 炒白芍 眞靈苓 木瓜錢各一 吳萸 柴胡 沙苑此味以皮貨店

均係各藥店 杜仲錢各四 加煙灰錢二 同熬煎煙 或加紅糖錢五 亦可以後每一料減煙灰分五 至

第五料則不用煙灰癮重者四五料即斷輕者三料除根有人食煙二十餘年百藥

不效照此服之五料即安然戒斷並無難過之處無論早中晚癮總於飯前熱水沖

服如一錢癮者每服二錢戒煙方多且多有用鹿茸人參及各補藥方能見效者此

方藥極平淡不拘體氣壯弱服之有效無害屢著奇功不可輕視

### 人畜蛇蟲咬傷

凡各物咬傷日久不愈者人咬傷第二方甘草治之極效

人咬傷 凡被人咬傷其牙最毒若有牙黃入肉則痛不可忍咬手指者指與手掌俱

漸漸爛落年久難愈重則喪命無論日久初起雖至腫爛總宜用童便用淘米水 洗淨

汚血洗時雖痛至不省人事亦須忍 用人糞敷之或用人中黃煎湯時洗較諸治尤覺神妙不可

嫌汚穢而自誤也 又方 照前洗淨之後用甘草自己嚼融厚敷乾則隨換日夜

不斷三日必愈屢試奇驗並治各物咬傷亦效有人被鼠咬指數年不愈照此洗淨

敷治三日收功眞神方也 又方 蟹甲燒灰敷之奇效 又方 先用童便洗淨



用荔枝核焙研篩細摻之外用荔肉蓋貼雖入水不爛神效之極 又方 好柿餅一個令人漱口潔淨將餅嚼爛盛碗內飯鍋上再蒸極爛敷之三日全愈治過多人 皆效仍先用童便洗淨汚血方能見效

虎傷 凡被虎咬傷血必大出傷口立時潰爛疼不可當急用猪肉貼之隨貼隨化隨化隨換速用地榆一觔爲細末加入三七末三兩苦參末四兩和勻摻之隨濕隨摻血即止而痛即定蓋地榆涼血苦參止痛三七末止血合三者之長故奏效如神

又方 樟樹嫩葉嚼食並令人將此葉嚼融敷之絕無後患 又方 但飲酒常令大醉當吐毛出而愈或用白沙糖調水多食極效 又方 嫩松毛槌融如泥將傷口內塞滿極效 又方 韭菜白搗汁飲之渣敷傷處 又方 內服生薑汁外以薑汁洗過用白礬末敷之

狼傷 乾薑末敷或胡椒末敷初覺腫痛少刻即腫消痛止三日而安

癩犬咬傷 此症最怕七日一發發時天本無風病者俱覺風大入帳蒙頭躲避此非吉兆過三七之日無此畏風情形方爲可治被咬時先看頭頂如有紅髮二三根趕緊拔去最爲緊要隨於無風處以冷茶洗淨汚血用杏仁搗融敷之內服韭菜汁一

265 碗隔七日再服一碗四十九日共服七碗傷口上再用煮熟雞蛋白蓋上用艾絨在

上燒數十次百日內忌鹽醋一年內忌猪肉魚腥酒色終身忌食狗肉蠶蛹紅飯豆  
方得保全否則十有九死此係葛仙妙方有癩犬一日咬三人止一人用此方得活  
親見有效切不可誤吃斑蝥毒藥以致小便疼痛難忍欲解斑蝥之毒查解救諸毒  
門本方治 又方 花盆內栽種之萬年青連根搗融絞汁灌之腹內如有小犬變  
成血塊由大便而出不論久近皆治一切不忌眞仙方也萬年青其葉寬約一二寸  
高約八九寸老而且厚者是 又方 從來瘋犬咬人不治必死投以打藥則小便  
痛不可忍百日內忌聞鑼礮聲又藥有斑蝥者終身忌近苧麻處否則即發今得一  
方服之能陰消又忌鑼礮苧麻但半年內忌酒色並忌猪肉魚腥鹽醋葱蒜薑頭  
及一切發物方用點銅錫三錢明雄三錢馬前子一箇甘草三錢長燈心一根用長流水  
煎服屢試如神切不可疑而自誤也 又方 初被咬時即用砂酒壺兩個內盛好  
燒酒盪滾去酒以壺按在傷口拔出汚黑血水滿則自落再以一壺去酒仍按傷口  
輪流提拔以盡爲度奇效無比或用 癩蝦蟆即蟾蜍目紅腹無八字紋者不可用破開肚連腸雜敷傷口  
一日一換換過即並另取癩蝦蟆煮食最爲神效仍照前忌食一切終身忌食蝦蟆  
又方 被咬時即用豆豉研末香油調稠爲丸如彈子大常在傷處時時滾擦丸內  
如有茸茸狗毛此係毒氣已出換丸再擦至無毛爲止神效仍照前禁忌一切常食

杏仁以防其毒或用蚯蚓糞又名曲蟾香油調爲丸擦之亦可 又方 核桃壳半邊將

人糞填滿取槐樹皮蓋傷口再將核桃壳覆上用艾火在核桃壳上燒之燒至遍身

汗出其人大困而愈簡便而極神效或用人糞厚敷傷口以煮熟雞蛋白蓋之用艾

火燒數十次更佳 又方 龍牙齒又名馬齒草和葶薺煎水飲之神效至極 又方 照

後毒蛇咬傷服煙油之法治之煙油味辣服之味不辣者即可治緣犬因嗅蛇毒而

瘋故可與蛇咬同治 又方 地骨皮根搗爛熬酒服一二日當茶飲永無後患

又方 凡癩狗毒蛇咬傷者只以人糞塗傷處新糞尤佳諸藥不及此方載在

寄園寄所寄 又方 專治毒蛇瘋犬咬傷點眼神妙百發百中之仙方也用 上

火硝五分製蘆甘石一錢上雄精五分當門子三分大冰片三分右藥研極細末乳碎須洗極

淨研極細末將藥點兩眼角視傷處有黃水流出流淨即愈甚效甚速其妙非常真

仙方也慎勿輕視

家犬咬傷 胡椒末敷之雖傷重亦不過數日收功惟初敷必痛而且腫少刻痛止

腫消有人被犬咬傷血流不止用此藥隨敷隨流數至第三次後血止數日而愈其

效如神 又方 用木一截向傷處指定以火在木尾燒之問其痛否痛則多燒數

次不痛乃愈犬本屬土此木能剋土之意也 又方 甘草煎水洗淨毒氣以熱牛

糞敷之即時痛止 又方 番木鱉切片瓦上炙焦存性研末搽上二三日收功破

爛日久者半月必愈 又方 刮肉店枯板上油膩拌白糖敷之效 又方 甜杏

仁去皮嚼爛敷之甚效

馬咬傷 白煮猪肉一大片同飯本人自嚼貼患處立時止痛即愈 又方 先以艾

火炙患處復用馬糞及人糞燒存性猪油調搽即愈 又方 馬齒莧一握煎湯日

日服之以愈爲度外栗子嚼爛敷之 又方 打馬鞭子或籠頭索燒灰搽之即愈

其毒入心者此二方亦效 又方 益母草搗爛調醋烘熱敷之 又方 雞冠血

塗之牝馬用雌雞牡馬用雄雞效

猪咬傷 生龜板炙研細麻油調搽即愈藥店多以熬過龜板假充必不見效須用生

的自炙爲要 又方 熟松香貼傷處數日愈

猿猴抓傷 金毛狗脊藥名焙研末搽之或用麻油調搽立愈

貓咬傷 用薄荷煎水洗之或用川椒煎水洗之 又方 陳薑頭嚼爛敷之次日結

痂神效一名蒜

鼠咬傷 荔枝嚼融敷即愈或用斑貓燒灰加麝香少許口津調敷或用斑貓口水搽

之

蛇咬傷

煙精膏

凡遇毒蛇咬傷惡毒攻心半日必死急取竹木桿煙筒內煙油

名又

煙尿其色如油

用冷水洗出飲一二碗受毒重者其味必甜而不辣以多飲為佳傷口痛甚者

內有蛇牙多用煙油搽擦必出此為蛇咬第一仙方 不可疑而自悞道光八九年

間粵西崇善縣地方有農人被毒蛇咬住繞纏不放急服煙油水數碗並以煙油滴

蛇口內蛇即鬆口落地而死其人無恙 又方 有人被蛇咬傷即刻昏死臂腫如

股少頃遍身皮脹黃黑色一道人以新汲水調香白芷末一片灌之覺臍中聲響黃

水從傷口流出良久便愈 又一人蛇傷一足百藥不效後用新汲水洗淨腐肉以

白芷末加膽礬麝香少許搽之惡水流出一月平復 又方 川貝母末酒調盡量

飲之少刻酒自傷口流出候流盡以渣敷上垂死亦效 又方 用兩刀在水內相

磨取水飲之雖痛苦欲死可救此蛇醫化人所傳方也 又方 用雞蛋破一孔對

傷口按住少刻蛋內色即變黑黑則又換以蛋色不變為止 要雞蛋不 有人被蛇咬傷

即刻腫大異常當將腫處用頭髮捆緊毒氣不致散開照此方治之立愈至穩至便

百發百中之方也或內服煙油外用此法更妙 又方 用蝦蟆拔毒法 見雞毒 治之

或用蜘蛛拔毒法 部見手 治之均極神效 又方 五靈脂 一兩 雄黃 五錢 共為細末每服

二錢酒調服不飲酒者開水調服並敷傷處雖至垂危亦可救也 又方 嫩黃荊

葉生於野地生藥店有賣  
採取生者以七葉為佳搗汁敷之極效

毒蛇纏身不脫 蛇纏人身愈纏愈緊最難解脫急令其人在地遍身轉滾蛇自骨軟

而解放也神效 又方 用草刺蛇尾上小眼亦極神效

蛇入七竅 割母猪尾血滴入即出 又方 以胡椒末入蛇尾小眼內蛇自退出或

用草刺蛇尾小眼亦妙

蜈蚣咬傷 十指甲磨水敷立效如神萬無一失有人被蜈蚣咬傷其色碧綠腫大如

碗痛不可忍百藥隨敷隨乾其毒不散後用此方治之應手而愈此法最為簡便毋

庸第二方也各項毒物咬傷雖未試過想亦可治

蠍螫傷 雄者傷人痛在一處雌者傷人痛牽遍體用井底泥敷之乾則再換或用新

汲水以青布隨痛處搭之濕則再換亦效 又方 用二味拔毒散見雜毒  
諸方更妙 又

方 痛牽遍身者用屋上瓦溝底泥調水敷之 又方 晝地作十字取土煎水服

少許亦可 又方 用木碗蓋於痛處過半日即愈神驗之至 又方 蝸牛 搗

融敷之其痛立止或照上蜈蚣咬傷方治之

壁虎咬傷名守  
堂桑葉煎濃汁調白礬末敷之或照前蜈蚣咬傷方治之

黃蜂傷 蚯蚓糞井水調敷其痛立止 又方 芋頭梗搗融敷極效 又方 如傷

處麻木難過用臭蟲血塗之立愈 又方 用二味拔毒散見雜毒諸方敷之最效或照前蜈蚣咬傷方治之

射工溪毒傷

世水中射工又有樹上毛蟲亦名射工者見後毛蟲傷方

射工一名溪鬼蟲又名射影又名水弩出南方有溪

毒處長二三寸寬寸許形扁前寬後窄腹軟背硬如蟬又如蟹六七月甲下有翅能飛作鏗鏗聲寬頭尖嘴嘴頭有角如爪長一二分有六足如蟹足兩足在嘴下大前一爪四足在腹下小而雙爪口有弩形以氣射人影去人三四步即中令人發瘡不治即死病有四種初得皆如傷寒或似中惡一種遍身有黑鱗子四邊微紅犯之如刺一種作瘡久則穿陷一種突起如石一種如火燒狀又有溪毒中人一名中水一名中溪一名水病似射工而不見形春月多有此病症頭痛惡寒狀如傷寒二三日腹中生蟲食人下部漸食五臟注下不禁雖良醫難治初得則下部有瘡紅赤形如截肉爲陽毒最急若瘡如蟲嚙爲陰毒其勢稍緩皆能殺人過二十日不治方家用藥與傷寒瘟病相似須用蒼耳草絞汁服一二升並用棉蘸汁濃敷下部或以小蒜煮微熱湯不可太熱太熱則無力洗之若身發赤斑其毒已出也 又方 取歧母蟲一枚含入口中立愈雖死亦活或用鹽梅裹含之亦可此葛仙肘後方也 歧母蟲一名歧蟲光黑大如豆浮遊水上者卽是 又方 猪血飲之卽解 又方 知母連根葉研末服

或投絞汁飲一二升煮湯洗浴亦佳夏月出行多帶知母連根搗碎投水上流可辟

此毒 又方 雞糞色白者爲糯米糖調敷效 又方 蒼耳草嫩苗生草藥店有買取汁和酒

溫灌之其渣厚敷傷處甚效 又方 芥菜子末和酒厚敷半日止痛 又方 馬

齒莧搗汁一升服以渣敷之日四五次 又方 皂角長尺餘者好醋煮濃汁如膏

敷之 又方 白鶴血飲之並敷其身極效 又方 夜睡時以手摩身體有刺痛

熱視當有赤點如針頭急捻之以芋頭葉入內刮出細沙以蒜敷之即愈 又痛處

有刺如蝦鬚用芋頭葉甘蔗葉屈角入肉勾出其根則愈遲則其根入骨難治

毛蟲傷 毛蟲俗名楊辣子又名射工能放毛射人初癢次痛勢如火燒久則外癢內

痛骨肉皆爛諸藥罔效用豆豉搗融清油調敷少時則有毛出去豆豉用白芷煎湯

洗之如肉已爛用海蝶蛸末搽之即愈 又方 二味拔毒散見雜毒方最效或照前蜈

蚣咬傷方治之 又方 先以水洗之隨用馬齒莧搗爛敷之一二次即愈或以熟

蜜搽之

狗毛沾身 因搔癢而破爛者用 青菓即穉穉絞汁搽數次即愈或照上毛蟲傷人各

方治之更妙

蜘蛛傷 有人蜘蛛咬傷腹大如鼓遍身生絲飲白羊乳數日而愈 又方 藍靛汁



一碗入雄黃 麝香少許點患處並服其汁神異之至一人被傷頭面腫痛幾致不救服此而愈蜘蛛投入藍靛即化為水故有此奇效也 又方 用羊肝遍體擦極效 又方 飲好酒至醉則肉中自出小蟲而愈 又方 熱甜酒洗之即消或照前蜈蚣咬傷方治之

蟻蛛傷 此物形似蜘蛛而大一名壁錢又名壁鏡又名蟻子時作白窠如錢大貼壁上咬人最毒不治必死用桑樹枝燒枯煎濃汁調白礬末敷之極效 又方 用花益內鋪地錦敷或用陳醋搗敷即愈 又方 以刀燒紅置白礬於上汁出乘熱滴之立愈神驗之至或照前蜈蚣咬傷方治之

多足蟲傷 一名蠓螻又名即是搔甲子藏於壁間以尿射人若誤中其毒令人皮膚起燎漿泡痛如火烙初如飯粒次如豆大若不早治傷處周圍交合則難救急用棉蘸熱鹽水敷數次即消甚者則毒延及遍身瘙癢不止宜用二味拔毒散<sup>見雜毒方</sup>敷之神效或用大黃末敷亦效或照前蜈蚣咬傷方治之

蚯蚓毒 一名曲蟮 一名地龍 凡受蚯蚓毒形如癩瘋髮眉脫落或夜間身體作鳴急以鹽湯或石灰煎湯時時洗之其毒自去或以白鴨血搽之或用白鴨糞和雞蛋清調搽更妙或

照前蜈蚣咬傷方治之

蠶咬傷 凡蠶嚙人毒入肉中令人發寒熱以家用苧麻葉搗汁塗之 又方

蜜調麝香敷之亦效或照蜈蚣咬傷方治之

烏龍刺傷 烏龍刺又名火毒刺入泥中人若足上簽踏比蛇咬更毒從腳腫至大腿猶然

可效若至肚腹則無救矣急用蛔蟲無則用蠶統數條搗爛敷患處消腫刺出而愈

仙鶴毒 仙鶴其毒在頂養鶴之家其鶴或傍樹枝或臥叢草將頭搔癢遺有頂毒黏

在樹草間人或不知誤以手摸腳踏登時赤腫疼痛異常急以青松毛和糯米飯同

搗敷之立愈

狐尿刺毒 一名狐狸刺由螻螂盛暑交媾精汁染於諸物乾久有毒人之手足誤觸

之則成此患初起紅紫斑黑肌膚乾燥悶腫掀痛不眠時至十日後腐開則瘡口日

寬初起未潰者以蒲公英連根煎濃溫洗若得鮮者搗汁塗之更妙內服黃連解毒

湯即愈若已潰爛照前人咬傷甘草諸方治之或照癰毒諸方治之 又方 腫痛

欲死者用雄雞破開敷之或照前蜈蚣咬傷

各項毒蟲咬傷 用二味拔毒散見雜毒方敷之其效甚速 又方 照前人咬傷甘草方

敷之神效 又方 如毒重者急照疔瘡方內蜘蛛拔毒法治之見手部最為神效或

照前蜈蚣咬傷方治之

# 湯火傷

湯泡火傷 凡湯泡火傷無論輕重急用童便灌之以免火毒攻心或用白沙糖熱水調服或用蜂蜜調熱水灌之均可第一不可用冷水及井泥溝等物即便痛極難受亦必忍耐倘誤用冷水淋之則熱氣內逼輕則爛人筋骨手足彎縮纏綿難愈重則直攻入心必難救矣先用真麻油敷之再用糯米淘水去米取汁加真麻油一茶鍾多加更妙用筷子順攪一二千下少切莫攪可以挑起成絲用舊筆蘸油搽上立刻止痛愈後並無疤痕神效無比 又方 尿桶中陳尿亦可或泡或淋一時之久再用蜂蜜和真麻油加上敷之 又方 先用真桐油亦可敷之敷後上加食鹽少許再用生大黃研末搽上立刻清涼止痛愈後亦無疤痕至神至驗 又方 蚯蚓俗名鼻加白糖拌入用碗蓋住半日即化為水搽之神效且速無蚯蚓用蜒蟻俗名鼻亦可 又方 鴉片煙敷之立刻清涼止痛有人火藥燒傷百藥不效痛不能止後用此方而愈 又方 清涼膏 新出窰石灰用冷水化開水宜多不宜少次日水面上結一層如薄冰樣者取起以真桐油和入調極濃厚敷之立刻清涼止痛日敷三五次無論初起日久皆效有人被火燒傷起泡臭爛數月不愈用此敷之五日收功屢試神效並治一切遊風丹毒破與不破皆效驗真仙方也 又方 先用麻油熬滾次入白蠟熬數

滾再入白蜜熬勻放水半日拔去火氣用鴨毛亦可調敷其痛即止若傷重者並可內服不至攻心 又方 豬毛一籃入鍋內炒之俟豬毛化成黑汁取起冷定加大黃數錢共研末再加冰片一分香油茶油蠟燭油俱可調搽至神至驗之方也

又方 用蚶子殼又名瓦楞子煨枯研極細末配冰片少許濕則搽敷乾處麻油調搽數次收功真仙方也 又方 湯火傷治不得法以致痲赤腫痛毒腐成膿用麻油兩當

歸一兩入麻油內煎焦去渣再入黃蠟兩攪化隔水拔火氣以布攤貼立能止痛生肌神效之至 又方 人乳和鹽敷之 以上各方簡便神效雖傷及徧身勢在垂危或潰爛已久均有奇效 又方 蟲蛀竹灰平時收存用時以麻油調搽極效 又方 茶葉嚼爛

將口漱淨再嚼敷之立愈 又方 南瓜用罈裝貯埋土內數月即化為水愈陳愈佳遇有湯火傷者取水搽之隨手而愈南瓜北人呼為倭瓜倭音窩或用王瓜亦可屢試如神

又方 葵花泡油搽之越陳越好 又方 眞麻油或生大黃切半銅鍋熬至藥色焦黑瓦罐連渣收貯遇有湯火傷者用雞毛亦可蘸油搽之止痛如神二日即愈平時預製可備急用

火爆傷眼 三七葉搗汁點入數次即愈或用三七磨水滴入亦可屢試如神 又方 南瓜水葵花油點入亦極神效 又方 跌打損傷打傷眼睛南瓜方亦效

時預製可備急用

又方 跌打損傷打傷眼睛南瓜方亦效

湯火傷立刻止痛方 生芋芳搗融敷傷處芋熱再換數次即愈立能止痛拔毒雖極重者亦不至潰爛廬陵鍾受百數江右國手也為說此方經驗屢屢

### 跌打損傷

損傷諸方 回生第一仙丹 治跌傷壓傷打傷刀傷銃傷割喉吊死驚死溺水死等

症雷擊死雖未試過想亦可治 雖遍體重傷死已數日只要身體稍軟用此丹灌服少刻即有微氣再服一次即活大便如下紫血更妙惟身體僵硬者難救此係豫章彭竹樓民部家傳

秘方道光初年民部宰直隸時有人被毆死已三日矣民部往驗見其肢體尚軟打開一齒以此丹灌服一分五釐少刻其屍微動再灌一分五釐而活其餘甫經毆殺

或毆死一二日者全活尤多終歲無一命案維時磁州地震壓斃甚眾民部製丹遣人馳往救活不下千人大有起死回生之妙誠千古第一仙丹如能施藥傳方救得

一人之生可全兩人之命造福真無量也 活土驚蟲 又名地驚又名驚蟻蟲形扁不能飛大小不等色黑而亮背有橫楞輪前窄後寬以大大如指頭為佳小者功緩雄的更好用刀截為兩節放地上以碗蓋住過夜其蟲自接而活方是雄的隨處皆有

蠶卵冬天蠶脚更多或生麵舖或油榨坊並空屋乾燥之處總在糞土內尋覓以活的去足放瓦上小火焙黃研細用淨末五錢死的不效乾的實一有便知自然銅 九次研末要親身自製藥店內製多不效取出再燒再洋連製 眞乳香 以形如乳頭黃色如膠者為眞不眞不效每壹兩用燈草

二錢五分同炒枯與燈草同研細吹去燈草待淨末二錢 眞陳血竭 飛淨 眞硃砂 二錢 飛淨 眞巴豆 去壳研用紙包壓數次 眞麝香 三分要 眞麝香 當門子 以上各藥揀選明淨眼同研極細末收入小口磁瓶口大藥易洩氣用蠟封口不可洩氣大人每

用一分五釐小兒七釐酒沖服牙關不開者打開一齒灌之必活要藥標準方效灌時多用水酒使藥下喉為效

後宜避風調養若傷後受凍而死須放煖室中最忌見火仍照急救門凍死法參酌

治之如活轉心腹疼痛此瘀血未淨服白糖飲自愈見後 玉真散 治跌打損傷

已破口者無論傷口大小不省人事或傷口潰爛進風口眼喎斜手足扯動形如彎

弓只要心前微溫用此藥敷傷口如膿多者用溫茶送服洗淨再敷無膿不必洗另用熱酒沖服三錢不飲酒者滾

水沖服亦能起死回生惟嘔吐者難治藥雖平淡效最神奇功在七釐鐵扇諸方之

上藥料易覓無假其價亦廉或傳方或施藥功德亦非淺也 明天麻 羌活 防

風 生南星薑汁炒 白芷各一兩 白附子十二兩 以上藥料須揀選明淨眼同研極細末收

入小口磁瓶以蠟封口不可洩氣 如溼爛不能收口用熟石膏錢二 黃丹分二 共研極

細加入敷之 當歸湯 治跌打損傷未破口者功能散瘀活血雖已氣絕打去一

牙灌之亦活此少林寺教師方也 當歸 澤瀉各錢五 川芎 紅花 桃仁 丹皮

各三錢 好蘇木錢二 酒水各一碗煎六分服 頭傷加藁本錢一 手傷加桂枝錢一 腰傷加杜

仲 脇傷加白芥子錢一 腳傷加牛膝錢一 白糖飲 凡跌打損傷如已氣絕牙關緊

閉先用半夏在兩腮邊擦之牙關自開急用熱酒沖白沙糖二三兩灌入不飲酒者

水服亦可愈多愈妙無論受傷輕重服之可免瘀血攻心至穩至靈不可輕忽 又

方 如氣絕不省人事者急用生半夏研末水調黃豆大塞鼻孔立能蘇醒男左女右醒後鼻痛用老薑汁擦過卽不痛也 又方 先用活雞連毛破開去腸雜不用着水數罨傷處雖至垂危只要胸前微溫卽時立醒然後用藥治之仍服白糖爲要 又方 野菊花連根陰乾每用一兩加酒與童便各一碗煎服但有一絲之氣無不活也 又方 仙桃草連根陰乾研末每服一二錢開水送下雖傷重垂危服之立見功效江南一盜身受多傷躺臥道傍一人路過見而憐之村中乞水與飲隨出此藥調水服下服後半刻遍身傷處作響立刻起而行矣詢之此草生麥地中葉小根紅有子如胡椒大內有一蟲在小暑節內前後十五日採之早則蟲尙未生遲則蟲已飛去無蟲則無功效聞廣西陽朔一帶亦有此種名麥桿草八九月內方有蟲生可採

跌壓傷死 凡跌壓傷重之人口耳出血昏暈不醒只要身體尙軟皆可救活切忌人多嘈雜只令親人呼而扶之且就坐於地緊爲抱定曲其手足如和尙打坐樣隨以熱童便灌之馮尿更妙或用白糖沖熱酒灌之用水調灌亦可尤爲神妙但能強灌得一二杯下喉便好然後輕移於懷中抱入室內如前坐法更以足緊抵龔門若係婦女連陰戶一並頂住恐其氣從下洩以致不救並將窗櫺遮住以房中黑暗爲佳並查照前

後各方取簡便者用之傷重者瘀血必多用前當歸湯白糖飲最妙其餘簡便易得者不妨兼用急切不可令出大便恐其氣脫而死必俟其腹中動而有聲上下往來數遍急不能待方可使解所下盡是紫血毒已解下方可令睡倘瘀血未盡當歸湯白糖飲尤宜多服 又一切撲折及從高墜下木石傾壓落馬墜車以致瘀血凝滯氣絕欲死者倉卒無藥急以熱小便灌之免惡血攻心或服白糖更佳再取地上三尺下黃土數升搗碎甑蒸熱舊布重包二包輪流熨傷處數次痛止傷消但不可太熱恐傷皮肉

破口傷 龍眼核剝去光皮不用將核研極細摻瘡口卽定痛止血此西秦巴里坤營中急救方也大有功效如口渴者不可飲水但食油膩之物以解其渴更忌食粥食則血必湧出而死或用前玉真散最妙 又方 魚子蘭葉珠蘭葉更妙搗融敷之立刻收口接骨傷口寬大者加白鹽少許第二次敷卽不用鹽其效非常功在諸方之上 又方 月季花又名月月紅取葉搗爛敷之立能止血消腫雖斷筋亦可速愈 又方 葱白沙糖等分搗爛研如泥敷傷口其疼立止又無疤痕屢試神驗 又方 生半夏研末敷上卽刻止痛且易收口 又方 生松香熟松香和勻敷之立愈或加生半夏末亦可此軍營急救方也 又方 老薑嚼融敷之數日平復如常此方屢試屢



驗可保不致進風惟敷時痛極忍耐片時可耳 又方 胡椒末敷之不惟速愈且免縮筋忍痛必效 又方 端午日採野麻葉去筋髓融如綿遇破口傷敷之立能止血結痂又後接骨白炭方治破口傷亦效

止血法 瘦猪肉切厚片貼上無論傷口大小血流不止者立效如神或用猪皮亦可此急救止血第一方也 又方 穿山甲片枯炒研末候冷敷上此亦止血神藥凡身上毛孔無故血出不止此二方俱有奇效平時製出以備急用最妙不可洩氣 又方 草紙燒灰候冷敷上亦止 又方 老薑燒枯存性研末敷亦神效也

跌打吐血不止 乾荷花焙乾研末酒調服一日二三次數日即愈其效如神乾荷葉亦可或多服白糖飲更妙前見

破口傷風 凡破傷風寒熱交作口閉咬牙或吐白沫手足扯動或頭足扯如彎弓傷口平塌者最爲險症用前玉真散可以起死回生最爲神妙如倉卒製藥不及用手指甲脚趾甲各一錢香油炒黃研末熱酒調服汗出即愈終不如玉真散之妙 凡破傷風先以自手三指並連直插入病人之口如可插入者易治若止有二指插入者其症必危即婦人產後驚風亦用此法驗之可知生死 凡人或以煙筒竹木等物戳傷喉嚨恐呼吸之氣出入亦有風攝如項頸漫腫口張不大飲食難下亦防破

傷風此是內吸風終不息無藥可治醫者遇此先須明告病家庶免歸咎

割頸斷喉 急宜早救遲則額冷氣絕乘初割時輕輕扶住使仰睡將頭墊起合攏刀

口將血拭去用大雄雞一隻快手輕去其毛生剝其皮乘熱貼傷口內服玉真散前見

自愈愈後雞皮自落 又方 照前扶住仰睡合攏刀口用生松香熟松香各半或

加生半夏末亦可將傷口厚厚敷緊或用葱頭和白蜜搗融敷亦可外用膏藥不論何項膏藥周圍連好肉一併粘

貼再用布條圍裹鈎線縫好每日服玉真散三錢前見覺傷處生肌即不必服未生

肌則日日常服無論食噤氣噤俱斷一月必愈屢試如神若食氣噤俱未斷照前傷

損各方治之亦可如氣噤已斷氣絕只要身體微軟一面照前敷治一面以回生丹

前見服之亦可活也

截傷腸出 好醋煮熟洗之不可太熱亦不可冷隨洗隨入外用活撥雞皮乘熱貼上再服玉真散

前見自愈有人腸出三日腐變如法治之而愈愈後雞皮自落

耳鼻打落 治法見耳鼻各部

手指砍斷 將指接上用蘇木細末敷之外用蠶繭包縛牢固數日即愈 又方 老

薑嚼融敷之舊棉包裹簡便神效不可以平淡而輕忽也

接骨法 杉木炭研極細末用白沙糖蒸極融化將炭末和勻攤紙上乘熱貼之無論

破骨傷筋斷指折足數日可愈屢試屢驗不可輕視忌食生冷發物無杉木炭用杉木燒枯亦可 又方 凡骨斷痛極者先用鳳仙花根一寸以開磨酒服之操動則不知痛然後可用藥治或用麻藥見雜毒敷之亦不痛也 又方 當歸五分川芎錢五乳香 沒藥錢各半木香錢一川烏五分黃丹錢六骨碎補錢五古錢照前製法三錢共為細末入香油一兩五錢調成膏貼患處雖骨碎筋斷能續神效 又方 旱公牛角一個火上炙乾黃米麵不拘多少榆樹內白皮多少不拘川椒粒六七楊樹葉不拘多少如無不用亦可共研細末以陳醞醋熬成稀糊用青布攤貼再用長薄柳木片纏住時刻聞骨內響聲不絕俟定即接如牛馬跌傷及樹木被風吹折者以此藥治之俱效 又方 古銅錢燒紅淬音入好醋內再燒再淬連製七次研末用酒沖服二錢傷大者服三錢其骨自接無古銅錢用新銅錢亦可不如古錢之妙有人因雞足折斷如法試之果接續如故及烹此雞驗其骨折處銅末周圍束住又有人脚骨折斷以銅末沖酒服之即愈後因病故十餘年改葬視其骨骨折處亦有銅末束之真神方也 又方 大紅月月紅又名月季花採花瓣陰乾為末一歲一釐好酒調服蓋被睡臥一個時辰渾身骨響此是接骨不必畏懼 又方 公雞一隻重十兩上下白毛鳥骨者更妙用手扭斷頭竹刀割下不用水乾拔去毛竹刀割開去肚臍不用剝下皮去骨將肉放石臼內加真五加皮二兩骨碎

補二錢桂枝一錢生大黃三錢松香一錢共爲細末同搗融爛先將傷骨整好將藥敷上將雞皮包在藥外用杉木皮夾好過一對時取去久則必生多骨 又方

五加皮兩四小雄雞一隻去毛連骨不去血不沾水同搗極爛敷斷處骨即發響聽至不響即將藥刮去遲

則多生骨矣 又方 活螃蟹一二隻生搗爛滾酒沖服極爲神效 又方 取路

傍牆腳來往人小便處日久碎瓦片洗淨燒紅淬入好醋內再燒再淬連製五次刀

刮爲細末每服三錢好酒下雖骨折筋斷痛不可忍者亦極神效

跌打傷筋 用韭菜搗爛敷過一夜即愈或照前月季花及碎瓦片方治之亦可 又

方 生旋覆花根搗汁滴入並敷日換三次至半月雖筋斷亦續其效如神

傷損縮筋年久不愈 楊梅樹皮曬乾研末和頂好燒酒蒸熟調敷用布紮好每日一

換不過三五次即愈屢試如神不可輕視 又方 見腰部三仙方最爲神效

跌打損傷愈後行動不便 罐盛小便火上燒熱時時熏之熏至數次即愈有人手骨

跌斷愈後其手直硬不能活動照此熏之平復如常

腳趾割破久不收口行走不便 雞脚骨枯燒研末敷即愈

跌打青腫 整塊生大黃用生薑汁磨濃敷之一夜紫者轉黑黑者即白矣一日一換

其效如神 又方 生半夏水調敷一夜即消

跌打青腫內傷 凡一切跌打損傷遍身青腫瘀停作痛及墮撲內傷一服即愈用白

木耳四兩 如無白者 黑亦可用 焙乾爲細末服一兩麻油拌勻好酒送服已服二次藥完其患若

失百發百中神妙非常

打傷眼睛 火燒傷眼見 湯火傷門 凡眼睛打出或跌傷或碰傷或火爆傷用南瓜瓢搗爛厚封外用

布包好勿動漸即腫消痛定乾則再換如瞳人未破仍能視也瓜以愈老愈佳有鮮

地黃處用地黃亦可南瓜北人呼爲倭瓜 倭音 又方 生猪肉一片以當歸赤石

脂二味研末摻肉上貼之拔出瘀血眼即無恙

閃跌手足 生薑 葱白搗融和灰麩炒熱敷之或用生大黃和生薑汁磨敷均妙

閃跌傷腰 方見腰部

跌打損傷濕爛不乾 並治凍瘡濕爛 羊皮金紙以金面貼傷處過夜即愈神效之至 又方

寒水石二錢煨研細末敷之立見功效

損傷碎骨在內作膿 田螺搗爛加酒糟和勻敷四圍中留一孔其骨即出

跌打損傷內有積血大小便不通 歸尾 錢二 生地 川芎 桃仁 生大黃 紅花 各

錢 酒水各半煎服不飲酒者無酒亦可

跌打損傷胸膈脹痛不食 白沙糖用酒沖服 水沖服亦可 以多爲妙

2 驗方新編 卷七 跌打損傷

騎馬傷股破爛 鳳凰衣即抱過雞蛋壳新瓦上焙枯研末磨油調搽即愈或照跌打破口方治

之

跌打損傷百藥不效 恐是中邪照邪怪門鬼擊傷方治之內有狗糞燒熏一法尤妙

舊傷日久作痛或天陰作痛 治法見腰部閃跌毆打腰痛方 又方 益母草熬膏

忌鐵器 爲丸每服數錢熱酒送下十日全愈其效如神

增補止血補傷方刀箭傷馬跌傷跌傷一切物打傷均效驗 生白附子十二兩 白芷 天麻 生南星 防風 羌

活各一兩 共研極細就破處敷上傷重者用黃酒浸服數錢青腫者水調敷一切破爛

皆可敷之即愈地方官平時預製以治鬪傷可活兩命價不昂而藥易得亦極便之

陰功也

增補傷科聖藥七釐散 上硃砂一錢二分水飛淨 真麝香二分 梅花冰片一分 淨乳香一分 紅

花五分 明沒藥五分 瓜兒血竭一分 粉口兒茶四分 以上各藥須揀選道地於五月五

日午時共研爲極細末磁瓶收貯黃蠟封口貯久更妙每服七釐不可多服孕婦忌

服 右藥專治金瘡跌打損傷骨斷筋折血流不止者先以藥七釐燒酒沖服復

用藥以燒酒調敷傷處如金刃傷重或食噤割斷不須雞皮包紮急用此藥乾搽定

痛止血立時見效並治一切無名腫毒亦用前法調服得此方者調治鬪毆諸傷無

不應手立痊 凡受傷之時或倉卒無藥或鄉僻無良醫恐傷輕變重傷重致死者多矣地方官平日如虔合此藥遇有驗傷隨時施用不獨傷輕者立愈即傷重者亦可救救一人不啻救二命實陰德無量也

增補被毆傷風方

荆芥

黃蠟

魚鱈

炒黃

三味各五錢艾葉三片入無灰酒一碗

煮一炷香熱飲之汗出立愈惟百日內不得食雞肉耳凡被毆後以傷風致死者在保辜限內於律不得不擬抵此一方可活二命須廣布之

### 刑杖傷

夾棍傷 速用熱童便一盆將足浸入如便冷燒紅磚二塊淬音妻之即熱直浸至童便面上浮起白沫其傷盡出矣再用跌打損傷各方治之自愈如已骨損亦照跌打損傷門內接骨方治之

杖傷

血竭

錢一輕粉

黃丹

水飛淨各二錢

白礬

錢一

共爲末搽上忍痛一時次日其肉四圍生起

兩日即平杖傷久爛不愈中有深眼不能收口用此最效或照跌打損傷各方治之亦可 又方 杖後即飲童便一碗或用酒沖白糖服之不飲酒者水服亦可以免瘀血攻心再用熱豆腐鋪在杖傷處其氣如蒸其腐即紫換腐數次令紫色散盡轉淡紅色爲度若杖後腫疼用明雄二分蜜陀僧一分水研調數極妙又受刑杖極重

276

驗方新編

卷七

跌打損傷

刑杖傷

五二一

者杖後日用白芨末米湯飲下神效

### 銅鐵竹木雜物傷

鐵鍼入肉

用燒蠟蟲方治亦效

鍼入肉內隨氣遊走若走至心窩甚險急用烏鴉翎數根瓦上焙

焦黃色研細末酒調服一錢外用車輪上油垢調真磁石末攤紙上如錢大貼之每

日一換自出 又方 真磁石兩研末用菜油調敷皮外離鍼入處寸許漸漸移至

鍼口由受傷原處而出神效 又方 生癩蝦蟆眼珠放鍼口半日後自出神效

鐵鍼並銅鐵錫鉛入肉

陳醃肉皮皮更妙

搗融敷之即出極效

鐵彈入肉

扁魚肚膽

俗呼魚煮融和糯米飯搗爛敷之換兩三次即出此在手足及兩

股用之若在身上及肚腹內用土狗又名同扁魚肚煮融搗爛敷之雖不能取出其

彈漸落下部不能為害矣

箭簇銅鐵砲子並一切雜物入肉

蜣螂

三箇俗名推車蟲

巴豆

四共搗如泥敷傷處先止

痛後作癢少刻其物必出神效之至 又方 搔蟻子

又名搗甲蟲又名俞油理江蘇人呼為勝蟻

搗融敷之

一日即出神效 又方 南瓜

北人呼為倭瓜江蘇等處亦有呼為北瓜者倭首箇

搗融四圍敷之隔日必出極效 又

方 乾莧菜搗爛和紅沙糖敷之自出奇效 又方 眞象牙刮末水調敷乾則加

水潤之甚驗 又方 紅膏藥

見雜毒

敷之無不出也



磁片入肉

白菓 要三角形者 去壳與心

不拘多少浸菜子油內取出搥融貼之日換一次雖入肉多

年爛而不出者二次即愈

魚肉各骨入肉

以上各 方通治

山查研末調敷如在口中牙縫等處山查煎濃汁含一二時自

出

竹木入肉

以上各 方通治

鹿角

性枯

研末以水調敷久不出者不過一夜即出 又方 松香

敷上用布包裹三日必出不痛不癢甚妙 又方 生蒲公英搗敷雖腫爛日久亦

效 又方 鮮牛膝搗爛敷縱傷口已合刺亦自出 又方 葶麻子搗爛敷之痛

止即出

水銀入肉 真川椒研末生雞蛋白調敷用布包緊過夜即出

銅鐵竹木等物入肉雖已拔去傷口腫爛不愈 葱頭和白沙糖 又名洋糖 又名鹽糖 搗融敷之極

效如再不愈即用玉真散 見跌打 損傷門 治之無不愈也

藥箭入肉箭已拔出傷口腫爛不愈 明雄末敷之有水流即愈

銅鐵入骨 有人箭中左目入骨拔之不出痛苦欲死其家廣修佛事夢一僧告以用

寒食錫敷之發癢時將本人捆縛牀柱用力拔之即出無寒食錫即平日所做米糖

亦可

277

新 針戳釀膿 用煤炭搗末白沙糖拌融敷雖腫痛釀膿者亦效指疔掌心疔螺紋疔

治之尤有奇驗

新 取箭頭方采中推編 用天水牛一箇獨角小者以瓶盛之礪砂一錢研細用水些少滴

在內浸自然化水以藥水滴傷處箭頭自出

新 小兒誤將竹木刺入眼內 用白頭頸曲蟻指斷滴血入眼刺即出 又竹木刺入

肉搗白梅如泥罨之即出瘡中贅肉同治

中風與筋骨

中風症 凡中風忽然昏倒不省人事須先順氣然後治風用竹瀝薑汁調蘇合丸如

口噤攔開灌之如攔不開急用牙皂生半夏細辛為末吹入鼻內有嚏可治無嚏則

死最要分別閉與脫二證如牙關緊閉兩手握固即是閉證用蘇合香丸藥店有或三

生飲見後治之若口開心絕也手撒脾絕也眼合肝絕也遺尿腎絕也即是脫證更有吐

丸牛黃至寶之類即不可救矣惟中風之症是閉而非脫者宜蘇合香丸牛黃至寶

內脫筋骨痛髮直搖頭上搥面赤如血汗出如珠皆脫絕之症宜大劑理中湯灌之及灸臍下亦可救十中之一若誤服蘇合香

中風諸方

三生飲 治中風牙關緊閉兩手握緊若口開手撒則不可服 生南星錢二生川烏皮去

生附子去皮 木香分四 氣虛加人參煎服如無人參用高麗參真台參亦可

稀涎散 中風昏昏如醉口開手撒或口角流涎頃刻不救急用此散灌之得吐即愈

新皂角四條去黑皮筋 明礬兩四 共為末每用一錢或一錢半溫水緩緩調灌毋使大吐恐過

劑傷人屢效不可具述醒後再用藥調理方免後患

開關散 中風卒患先用此藥開關 皂角錢二 北細辛分三 共研細末吹少許入鼻中即

醒如買細辛不及即皂角一味亦可

磁鍼砭法 用鋒利碎磁片刺少商穴使出血即解 少商穴在兩大指頭甲之兩傍

與出指甲之處相齊只離指甲兩邊各一韭菜葉寬是也先從手臂上抹至指間使

血行下方刺 須破竹篸頭夾住磁片只露磁鋒一分在外用線繫緊以兩指捏着

篸梢直接穴上再用竹篸一隻橫敲繫線處使磁鋒刺入則輕重有準此為不善刺

者說法

柏葉飲 治中風不省人事得病之日即服此免成廢人 側柏葉把一 葱白連鬚把一 共

搗如泥用無灰酒一大碗煎一二十沸去渣候溫灌服不善飲者分數次服中風脫

證忌服 又方 中風中痰皆治 生石膏兩一 辰砂分五 各研末和勻每服三錢用生

蜂蜜調下立效中風脫證忌服 又方 生薑嚼碎不拘多少向患者面上天庭等

處類擦又以生薑汁滴男左女右眼內角即醒

中風口眼喎斜 用活鱖音善魚一條搗爛左斜敷右右斜敷左嘴正即將鱖魚血洗淨

免口又扯斜一邊屢試皆驗 又方 皂角爲末陳米醋調塗口上左斜敷右右斜

敷左乾則頻換數次即愈 又方 草蘇子三錢去壳冰片五分共搗融左扯貼右右扯貼

左以正爲止或照後癱瘓各方治之

中風不語 用泥捏成圈圍住肚臍令人撒尿在圈內一時甦醒然後用藥 又方

黃耆 防風各數兩煎水一大盆放牀前使熱氣薰之時時不斷薰至一日即能語其

效如神 又方 見咽喉部

中風不語半身不遂 草烏一兩菘豆升半同煮以豆熟爲度去豆將草烏刮去皮切片曬

乾爲末燒酒對服雖老年久病亦愈此係人家祖傳祕方屢試皆驗

中風角弓反張 凡中風頭足往後扯動彎屈不伸其形如弓名角弓反張 雞屎白

三錢酒五杯用竹篾順攪一千遍飲之小兒減半日服二次此葛仙方也 又方 見小

兒科

自頭麻至心而死或自足麻至膝而死此症有類中風故列此 小兒糞要乾的不陰乾放瓦上燒枯燒

至煙盡爲止每服用八錢生豆腐調服或用豆腐漿調服亦可甚效 又方 吳萸

末<sup>錢</sup>熱醋調敷兩脚心一週時一換以愈爲止

眼珠上翻手足彎曲狀如中風時發時愈 此症名拘攣 生木耳<sup>滾水發開</sup>病未發時取

木耳細嚼一二兩飲黃酒三四盃蓋被睡出微汗服至二三筋除根

忽然跌倒口吐白沫不省人事時發時愈 此名羊癲風 用菜葉<sup>何不論</sup>或青草塞

口中即醒屢用極效

中風癱瘓手足不舉並治風溼脚氣 穿山甲<sup>左癱用右甲右癱用左甲</sup>大川烏頭 紅海蛤<sup>子大</sup>各二

兩爲末每用五錢搗葱白汁和成厚餅徑寸半隨左右貼脚心縛定密室安坐以脚

浸滾水盆中待身麻汗出急去藥宜謹避風自然手足可舉半月再行一次除根須

忌口並女色一年

風溼癱瘓手足不能舉動 癩蝦蟆一隻打死後方去頭足剝皮剖開去肚腹腸膽須

淨洗過略砍碎用搗鉢搗極融細以燒酒沖入攪勻用布瀝淨渣其酒炖熱飲之連

服十餘箇其效無窮因飲酒多而得此疾者更效蝦蟆如紅目紅皮腹無八字紋者

有毒切不可用其膽最宜取淨膽破者不用再蝦蟆口噴毒氣不惟沾着生瘡瘡愈

至期仍發須謹防之愈後終身戒食蝦蟆又腿足無力寸步難移者飲羊腎酒<sup>見內外備用諸</sup>

方數日即能行走神妙非常

風溼癱瘓半身不遂 有人風癱一身四肢不能轉動百藥不效後服馮了性藥酒一錢渾身出汗上嘔下瀉半日後行動如常用藥調理霍然全愈神效非常又有一少年風癱先飲此酒五錢不效後漸加至一兩始見功效此少年體壯者飲之無礙若體虛及老年人不宜多飲是所切囑此酒廣西佛山鎮並省城及廣西省城有賣有並凡患風癱先飲一錢如不見效酌量加飲總以見效為度此酒性烈不可過多體虛者不飲為妙若照單飲之必致誤事慎之慎之再此酒飲後汗出不止此病從毛孔出也切勿止汗聽其自收

腰脚溼風作痛不能履地 松毛燒灰布包乘熱熨之神效無比洵奇方也 又方

松毛筋搗如泥用燒酒三觔泡七日隨量飲甚妙 又方 生川烏頭三箇去皮為末醋

調用布攤貼立能止痛 又方 黃荊根四五月間生於野地藥店少有須向生藥店採取生者入罈中燒煙熏兩足心

及痛處汗出即愈 又方 威靈仙洗淨焙乾為末入竹筒內以酒潤之九蒸九曬乾則加酒

製過用白蜜為丸梧子大每服二十丸温酒下有人手足不遂不能下地者數十年

服之數日便能步履久服全愈體虛者少服

風溼癱瘓諸方

薰藥法 治左癱右瘓半身不遂手足腰肢疼痛並酒風脚痛等症 真降香 真干

年健 生草烏 鬪楊花錢各一 生川烏錢三 真麝香三分要 陳艾錢六 鑽地風分五 百草霜錢二

即獨此 共研細末攤紙上捲成筒用麪糊緊外用烏金紙包好紮緊以火點燃薰患處

薰時用棉祴隔住漸薰漸痛痛則風濕易出越痛越好務必忍住薰半時後暫歇用

手在患處四圍揉擦如有一處擦之不甚痛者即於此處再薰風溼即從此而出薰

完此藥一料即愈有人風癱年餘照此治愈愈後戒食魚腥生冷等物一月體虛者

其功稍緩

藤蓼毯 此藥明目烏鬚健脾胃壯筋骨能治中風口眼喎斜骨節疼痛腰膝無力手

足癱瘓等症屢試神驗 五月五日採藤蓼草去根花併子淨用莖葉加酒與蜜拌

勻三炷香久取出曬一日加酒蜜再拌再蒸以九次為度曬乾磨細末煉蜜為丸如

梧子大每服三錢米湯送下或六月七月七八月八月九月九日修合俱可本草藤

蓼草有二種南北不同南方一方花菜

藤桐丸 治男婦感受風溼或嗜飲冒風內溼外邪傳於四肢脈絡壅塞不舒以致兩

足輒痠疼痛不能步履或兩手牽絆不能仰舉凡辛勞之人常患此症狀似風癱服

此丸立能全愈其藥價廉而效速誠秘方也幸勿輕視 地梧桐 俗謂臭梧桐不論花葉梗子俱可用採取切片曬乾炒磨

木子 藤蓼草 炒曬末 二味和勻煉蜜為丸如桐子大早晚以白滾湯送下四錢忌食豬肝

驗方新編 卷七 中風

五二九

羊血番芋等物或單用臭梧桐二兩煎湯飲以酒送下連服十劑其痛即愈或煎湯洗手足亦可

狗脊飲 治氣血俱虧手足麻木感受風溼不能行動無論男女一方分作五服每日

一服六日全愈如未全愈用酒十觔將藥泡服此方經驗甚廣神效非常不可輕忽

金毛狗脊 川牛膝 海風藤 宣木瓜 桑枝 松樹節 續斷 杜仲 秦

芫 桂枝 上身不要 要用下身 熟地 錢各一 大歸身 兩二 虎骨膠 一兩此味 不用亦可 用河水二碗煎六分紹酒一

小盃同飲

癱瘓藥酒 治一切風溼癱瘓甚效 蒼朮 白芷 羌活 獨活 黃芩 川芎

薄荷 厚樸 荊芥 木瓜 桑寄生 白細辛 錢各二 杜仲 牛膝 續斷 當歸

靈仙 鑽地風 千年健 各半錢 防風 二錢 川烏 草烏 五加皮 秦芫 桂枝

錢各一 猪筋 兩四 用雄雞一隻重一觔者為率輕重俱不合用殺之燻去毛不可見水不

要腸臟用瓦鍋同前藥入糟燒酒五觔蒸好取雞先食酒早晚隨便飲忌生冷寒涼

滯氣等物宜逸不宜勞宜避風溼節房事病輕者服雞後即愈重者飲酒完即愈極

重者再服一料全愈但飲酒時其痛更甚須要忍耐痛止即痊

松豆酒 治風氣骨節疼痛半身不遂 黑料豆 一升小扁如 壓子燒者佳 油松節 四兩碎 白蜂蜜 一觔 好燒



酒十五觔蒸一炷香久取出浸水中過十四日早晚隨量飲有人癱瘓不能行動飲此半月行走如常其效無比

二妙湯 治一切風溼癱瘓筋骨疼痛無不神效 生甘草 威靈仙各一 用水一石將藥煎五六滾入大缸內用板橙坐其中周圍用布圍住乘熱薰之待水溫渾身洗透務使汗出謹避風寒即愈

筋骨 皮膚病附後與腿足及中風各門參看

周身骨軟 一人愛食燒炙炒煎厚味以致周身筋骨疼痛軟弱漸至手足不能舉動經年不愈後食冬瓜一二百觔而愈

周身痛不可忍 一人遍身作痛或云中風或云中溼或云脚氣百藥不效後一醫云是氣血凝滯用延胡當歸肉桂等分爲末溫酒調服四錢而愈或加天麻亦可

服過輕粉筋骨疼痛 凡生楊梅等瘡服過輕粉之人必致筋骨疼痛攣縮或破爛日久不愈查解救諸毒門治輕粉毒方治之

風溼疼痛 生紫蘇 一把如無鮮者即乾的亦可 葱頭連鬚 把 生老薑 塊一 大 陳皮 錢二 共搗爛用菜子油一

茶盃放鍋內煎過再加灰麵攪勻作成一餅乘熱敷上冷則解下再用菜子油少許放鍋內將舊藥餅溫熱再敷冷則隨換日夜不斷其風即散而愈矣有人手痛不能

擄起十年不愈敷至數日全安不用菜子油用頂好燒酒亦可 又方 薑汁兩葱

汁兩陳米醋錢五牛皮膠兩三另用陳皮八錢熬濃汁去渣和入慢火煮成膏冷透火氣

青布攤貼止痛神效 又方 糯米春極熱糯米有粘糯兩種以糯為佳炒熱用布包好於痛處頻

頻熨之其痛立止糯米其色嫩黃如蘇子大又名聚米又名秣米 又方 老薑一塊切去二面用廣東馮了性藥酒炒透取

出另用馮了性藥酒焮熱以薑蘸酒於痛處避風擦之極效 又方 樟樹皮切細

加老薑搗融和糯米酒糟炒熱冷則再換日夜不斷三日全愈 又方 真淨銀硃

錢三 枯礬錢四為末鋪紙上作紙撚三條每早以一撚蘸麻油點火向肚臍薰之蓋被睡

取汗即愈

風溼灸法 凡肩背腰脇手臂腿膝環跳大腸外側貼骨等處感受風寒溼氣以致漫腫

無頭皮色不變惟痠疼麻木筋拘抽痛不能轉側動搖等症即將手按捺其着骨極

痛之處用墨點記隨後依法灸之即能消散若耽延日久致生腫毒難以收功 沉

香研 丁香研 木香研各五分麝香研二分 乳香研六分 穿山甲研末五分 臨用時共研勻以大核

桃壳半箇將藥末裝滿覆於墨記之處再用乾麪水調做成饅頭麵式作一圈子圍

住核桃壳不致移卸上用溼荷葉一張蓋護以防火星落下於核桃壳處挖一孔再

將艾絨作龍眼核大放桃壳上以線香點火灸之初灸一二次不覺其熱至五六次

方有艾熱之氣鑽透於內能受熱者可灸十四次不能受熱者止灸十一次灸過其毒自消如病甚者加灸兩三次決不成毒灸畢隨愈屢治多人應驗之至

子龍丸 治人忽患胸背手足腰項筋骨牽引鉤痛走易不定或手足冷痺氣脈不通

此乃痰涎在胸膈上下誤認癱瘓非也又治喉中結氣狀如梅核條有條無沖咽悶

絕又治腳氣疼痛及遍身或起筋塊如瘤如粟皮色不變不疼不痛但覺酸麻或自

潰串爛流水如涎經年不愈有若管漏此乃痰滯經絡所致常服此丸自能全愈

方見陰疽門每服三分淡薑湯送下痰猛加數丸如腳氣加檳榔木瓜 松枝 卷

柏 熱痰加 益硝 寒痰加 胡椒 丁香 乾薑 肉桂

筋骨疼痛不拘風溼氣滯或楊梅瘡毒或婦女月經諸病 先用此藥止痛然後調理

乾馬齒莧 一筋又名瓜子菜 生馬齒莧 二筋 五加皮 半筋 茅山蒼朮 四兩 共舂碎煎湯洗之洗後

急用葱頭生薑搗爛沖滾開水服三碗避風睡臥取汗立時止痛

筋縮不舒疼痛不止 當歸 兩 白芍 苡仁 生地 元參 各錢五 柴胡 錢一 水煎服神效

如脚膝轉筋加木瓜五錢極妙

歷節風由下而上逐節疼痛 凡男婦先自兩踝骨節起次日流上於膝三日流於兩

股上至於肩流於肘肘流於後彎每至一骨節或如槌鑽或如蟲竄痛不可忍日

輕夜重諸藥不效六脈緊此名歷節風又名白虎風用 炭灰五 蚯蚓糞一筋又名曲 紅

花錢三和醋炒熱布包作兩起輪流熨之甚效 又方 真紅川椒去子及以草紙二層

隔住炒出汗放地上用瓦鉢蓋住四圍用熱灰遮住約一時久取出研末用酒和米

糕爲丸梧子大每服四十丸空心鹽水送下服至一筋自愈神效體虛者少服

箭痛俗名鬼箭打或頭項肩背手足腰肢等處筋骨疼痛不安 川山甲左邊痛用右邊

甲邊一錢炒黃研 澤蘭葉錢三酒煎服此藥專行血絡痛瘀散邪屢試如神永不再發

又方 延胡索 肉桂 五靈脂 當歸 白芷 防風錢各一 水煎服另用 木

香錢一水磨兌服極效此林屋山人經驗方也

手足筋骨疼痛 熟地兩四搗爛浸入頂好燒酒二蒸熱用竹篾攪勻放水中三日取出

每日隨量飲至愈爲止並取所泡熟地送酒甚效此林屋山人經驗方也

肩背筋骨疼痛 槐花子 胡桃又名 脂麻俗名 細茶葉錢各五 用水五碗煎至一半熱

服神效

腋助手足腰脇等處忽如火熱腫硬如石痛不可忍或彎曲不伸 急用熱糯米飯加

食鹽葱頭少許敷之冷則蒸熱再敷敷至過夜即鬆連敷兩日全愈其糯飯洗淨喂

鼠喂魚不可暴棄

腰脚風痛不能履地四肢筋絡不舒兩手牽絆不能擡起 俱見前中風門

尾脊骨上下左右疼痛大小便不通 服八味地黃湯見備用甚效再發再服如不見效

加左歸丸右歸丸上見同合服必愈此症水火俱虧初愈仍當以八味地黃湯作丸常

服方可斷根

身中忽有一處作痛 膚面不痛按之覺痛或咳嗽牽扯作痛此平時閃跌內傷氣血

凝滯或肩挑重物傷損初時不覺日久始發也照腰部閃跌毆打傷腰第二方治之

皮膚中痛 名癥注用醋調燕窩泥敷之甚效 又方 杏仁炒黑研如泥敷之即愈

皮膚偶觸衣物痛徹連心似乎無皮之狀 此名腠尖音痛乃暴寒襲入肌膚故也用

胡椒研四錢好燒酒兩四錢煎滾用布蘸酒乘熱擦之

身麻皮厚如鐵 苦參錢二酒煎服外用苦參研末酒調敷之久敷自愈極效

皮膚枯如魚鱗 牛骨髓用真蘇合油煎炒空心熟酒服一酒杯半月即愈

積受潮溼四肢不仁方 歌訣云十大功勞三兩重八稜麻根五錢輕淫羊藿與千年

健紅花當歸五茄皮陳皮六筋足再加無灰酒十筋封鱧七月隨量飲一月之後見

奇功

傷寒

**傷寒症** 傷寒傳變症候繁多大抵自霜降後春分前寒邪所感者爲正傷寒春夏別感者謂之四時傷寒而兼雜症惟得病之初宜先審辨則調理不差夫傷寒症候大類傷暑但傷寒惡寒而身寒傷暑惡熱而身熱脈緊惡寒謂之傷寒脈緩惡風謂之傷風脈盛壯熱謂之熱病脈虛身熱謂之傷暑傷暑脈浮大而散或弦而遲蓋熱傷氣散而脈虛也外症見頭痛身熱煩渴口乾面垢自汗倦怠少氣或背寒惡寒甚則迷悶不省手足抽動或嘔瀉腹痛下血發黃出斑等症行路得之爲中熱靜室得之爲傷暑又胸膈脹滿頭痛發熱時有止歇者勞役食積也惟頭痛惡寒發熱身足酸痛晝夜不歇傷寒也依此看過果係傷寒若無良醫幸莫用藥蓋此症死於病者少而死於醫者多惟宜密室避風勿食粥飯米粒謹靜自守只以薑汁熱酒或薑茶等類與飲待七日傳遍經絡雖不服藥亦自然痊愈古云傷寒不藥得中醫正所謂也至於過經傳膈經傳兩感傳之症病本至危尤非良醫不治若用藥一誤是速之死耳可不慎歟

**傷寒外治諸方**

**點眼法** 粉甘草分六頂上梅花冰片分四共研細末凡傷寒病起一日至六日用此藥點眼內角男左女右點之出汗而愈如過七日不論男女兩眼並點神效

葱薑熨法 治傷寒胸膈不寬作痛一切寒結熱結食結痰結痞結水結等症並中心氣

虛弱不堪攻擊內消者須以此法熨之則滯行邪散其效如神 連鬚葱頭把一大

生薑塊二大 生蘿蔔四五箇無則以薑子一合代之 三味共搗爛炒熱酒炒更妙用布作兩包輪換久久審熨心

胸膈下痛處自能豁然開散汗出而愈乾則加酒炒不宜太熱恐炮烙難受若大便

結兼熨臍腹又飲食停滯門有外治一法亦可用

葱熨法 寒中三陰口禁失音四肢強直攣急疼痛兩手無脈似乎中風者或厥逆脣

青男子腎囊俗名卵胞縮入婦人乳頭縮入或男婦交合後氣絕等症俱用葱白一微搗

炒熱分二包輪換熨肚臍下久久俟煖氣透入自愈並以葱白三寸搗爛酒煎灌之

陽氣即回此華陀救急方也或用確裝熱火或裝滾水放炒熱葱上熨之更妙症重

者更以艾丸如豆大燒氣海穴臍下一寸五分關元穴臍下三寸各七次則脈漸現手足漸溫可得

生矣

蛋熨法 傷寒症不能分陰陽醫生不識不能下藥目定口呆不省人事及身熱大小

便不通而無汗者用雞蛋十箇煮熟留殼切去一頭留七八分合在病人臍上用銀

簪插入雞蛋內取出黑色蛋冷即換俟銀簪不黑病人大汗即愈用神仙粥見備用諸方調

養可無後患此秘方也或照後陰症傷寒外治各方亦妙

吳萸熨法 治法同上用吳茱萸一升酒拌溼布袋二箇分包甌蒸透多熨兩足心兼

熨肚臍下候氣透手足煖爲度或加麥麪食鹽葱白等分同炒熱熨亦可冷則再換  
紫蘇熨法 傷寒內傷積食小腹硬脹大小便不通不能言語神思欲脫兩目直視手

足強直症候危篤難以下藥者用紫蘇數兩煎滾熱湯將手巾在湯內泡扭熱乾乘  
熱攤病人肚上及小肚上令人以手在手巾上盤旋摩擦冷則隨換如此數次一切

宿糞硬塊積血自下其效如神如肚門閉結不通以蜜糖和猪膽煎成條子徐徐插  
入此法屢效但積糞下後須用藥調理 又方 土熨法見備用方亦妙 又方 野芋

頭切片磨擦背上第三節骨如覺痛癢者即非傷寒若不知痛癢即是仍用野芋頭  
片周身骨節用力擦勻並用芋片炒熱煎濃汁服二三次即愈忌食葷並飯 又方

急取巴豆十粒搗爛入麪一錢捻作餅安臍以小艾火灸五次氣達即通  
傷寒發狂目不識人或見鬼神 大蚯蚓半觔去泥用童便煮汁飲或生絞汁兌童便

飲亦可此葛仙方也 又方 用新抱出雞子的蛋壳煎湯服即安奇方也 又方  
竈心土煎水日服三次即愈或用癩蝦蟆貼心上方最妙

傷寒發狂兼發斑疹不發斑疹者亦效斑重者多用癩蝦蟆貼之惟肝不宜多用 凡傷寒發狂赤舌強或發斑發疹急用銅  
錢於脊背兩手彎兩乳傍兩腿彎刮出青紫色隨取癩蝦蟆一隻目紅皮紅腹無八字紋者勿用 破開去



腸肚等物貼心坎上取蝦蟆肝煎水服之並用煮熟雞蛋去壳於刮傷處乘熱滾擦隨滾隨換其病頓減有起死回生之功滾過雞蛋埋入土內不可使雞犬誤食此苗人秘方也無癩蝦蟆用雞亦可不必食肝終不如蝦蟆之妙 又方 先用紋銀放臍上再取燕子窩泥搗融和雞蛋煎成一餅敷上冷則隨換數次即愈

傷寒舌出 巴豆一粒研細去油以紙捲納鼻中舌即收上 又方 頂上梅花冰片

以牙色者為佳 半分為末擦之即收

傷寒隔食 方見噎膈門

傷寒口渴不止 百合一觔水泡一夜煮湯洗身並以百合食之

傷寒毒攻手足腫痛欲斷 水牛肉貼之腫消痛止或用清涼膏敷最妙見湯火傷門 或用菜

子油敷或用六安州茶葉研末別項茶葉亦可惟功效稍緩耳調菜子油敷或用馬齒莧又名瓜子菜搗融敷或

用螺螄入鹽少許搗融敷均效

傷寒五六日周身發黃 生薑去火燥皮布包扭汁蘸香油點兩目大小眼角效或照黃疸

各方治之最妙

傷寒後行住坐臥不定如有鬼神 名百合病如已發汗者用 百合七箇用泉水泡一

夜次日另用泉水煮汁一升再用 知母二兩用泉水二升煮汁一升同百合汁再煮

取汁一升半分服 已經吐後者用百合七箇照前泡煮入雞蛋黃去白一分服 已經下後者用百合七箇照前泡煮再用 赭石兩一滑石兩二水二升煮汁一升同百合汁再煮取汁一升半分服 未經汗吐下者用百合七箇照前泡煮加入 生地汁一升同煮取汁一升半分服此仲景方也

陰症傷寒

以下各方非因陰症而起者無論男女亦治

男女交合後或外受風寒或內食生冷等物以致肚腹疼

痛男子腎囊

俗名

卵胞

內縮婦女乳頭內縮或手足攣曲紫黑甚則牙緊氣絕謂之陰症

傷寒又名夾色傷寒急用磚燒紅隔布數層在肚腹上熨之或照前葱熨法治之輕

則用前蛋熨法治之 又方 男婦交合後陽物縮入絞痛欲死者急取本婦陰毛

燒灰水調服並取洗陰戶水飲之此急救良方不可嫌穢自誤以速爲妙遲不能救

矣 又方 紋銀一塊捶扁燒紅如病人未絕氣止燒滾熱放在臍上再用雞一隻

連毛破開不去腸包於銀上用布縛住以手按緊即愈若人已死揭雞看視如雞青

銀黑另換雞銀再包即愈如無銀只用雞亦可 又方 胡椒四十九粒連鬚蔥頭

四十九箇共搗成泥加鍋底煙

又名百草霜

一撮再搗勻分二處布攤一貼臍上一貼龜

頭用線捆住少頃即愈 又方 胡椒九粒飛礬錢一黃丹錢一共研細末以好酒和爲

丸男置左手心女置右手心正對陰眼合之緊緊按定少頃腹內燥熱不可搖動即

愈女人尤效 又方 以布貼臍上取滾水一壺熨之 又方急使小兒溺小便於病人牀前令人用足女男右左將尿浸溼泥推擦成團為餅敷臍上再用滾水一罐在泥餅上熨之甚效 又方 用武營烏鎗火藥錢二研碎滾水沖服熱酒沖服更妙如得吐瀉即可回生此症寒中三陰命在須臾非此猛烈之藥驅寒回陽不能急救此方屢試甚驗不可遲疑誤事此藥必以武營為佳爆竹店火藥功緩無力 又方 純陽救苦湯 生薑一塊約二三兩者切片 大黑豆炒三合 用水三碗同黑豆煮數滾瀝去薑豆不用取汁服之汗出即愈神效 又方 白朮兩三 肉桂錢三 丁香 吳萸錢各一 水煎服一劑而陰消陽回不必再劑此方名蕩寒湯妙在獨用白朮之多則腰臍之氣大利又用肉桂以溫熱其命門之火丁香吳萸更止嘔逆而反厥逆則陰寒之邪自然潛消故一劑而即愈也 又方 人參錢五 白朮兩三 附子兩一 乾薑錢五 肉桂錢六 水煎急灌之此症最重最急若不用此等猛烈大熱重劑斬關直入何以逐陰寒而追亡魂祛毒氣而奪陽魂故人參猶可少用而朮附不可不多況貧寒之家無力買參故方中又特多用白朮以驅駕桂附以成其祛除掃蕩之功而奏返魄還魂之效無人參以高麗參代之或用頂上黨參一兩亦可 又方 蛤蚧蟲七隻湯即 搗爛滾水沖隔去渣溫服有起死回生之功

夏月身冷畏寒 症候治法見中暑門

感冒風寒

此偶為風寒所感其症較輕於前傷寒症不同或照前傷寒外治各方治之亦可

風寒頭痛燒熱 用蕎麥散見頭部敷之最效或用黃糖紅沙糖亦可加老薑蔥頭煎湯或加豆

豉並酒煎服或用豆豉蔥薑煮麪亦可宜避風蓋被睡臥取汗為妙或照以後各方

治之

中寒面色青黑或不能言語 食鹽一撮放刀口上燒枯用好汾酒或燒酒一鍾煎滾

服之立效如神 又方 核桃連壳打碎 連鬚蔥頭各七錢細茶葉三錢共入大碗中

用滾開水沖入向頭面薰之通口飲盡蓋被睡臥汗出即愈加生薑煎服亦可 又

方 黑豆一合炒焦以酒沖入熱飲微醺蓋被睡之汗出即愈

風寒作痛 橘子葉老薑蔥頭不拘多少和酒炒熱用布包裹於患處連熨之其病若

失身受風寒心腹疼痛飲食少進大便閉塞小便短澀上下關格不通渾軍綑緊甚

至手足癱硬不省人事涼熱難分 用土熨法見內外篇治之最妙又身發寒熱四肢

堅硬如石敲之作鐘磬聲方見奇病門

閉住風邪體虛不能發表 有人外感風寒誤服補藥致將風邪閉住體極虛弱難以

發表後用大藥店中整包細辛中泥土一觔多煎水乘熱先薰周身用布圍住取氣  
薰身後洗發汗而愈洗時避風爲要

暴風身如水冷 用蠟鎔化攤舊綉上布亦可 隨患大小貼之並裹貼兩手足心冷則隨

換甚效或用土熨法見內外篇用諸方 亦可

發寒發熱或麻木或不麻木 此症恐是疔瘡其形大小不一隨處皆生急於遍身尋

認凡鬚髮眼耳口鼻肩下兩腋手足甲縫臍眼前後陰處尤宜一一細看如有形跡

雖小如粟米亦是急查疔瘡各方治之

### 蛇狗咬傷補遺

增新 土公蛇咬仙方 方用 蟬蛻 甘草 威靈仙 歸尾 萬蟲 木瓜 連翹

桂枝 金銀花各一錢五分 野菊花根五分 蜈蚣去頭一條 引用白花酒半斤和木煨要本人自己

煎透聞藥之氣味當時止痛吃此藥點水不可漏失

增新 蛇咬傷札伯羅記 取鳳仙花連莖根葉取汁飲渣敷神效先用甘草湯淨洗然後敷之

白花者更妙 又用赤莧取汁一升飲之渣敷亦效

增新 治癩狗咬傷毒發欲死經驗救急神效方 每年驚蟄後桃花正開蟲蛇出洞霜降

後梅花正開蟲蛇入洞其出也必呼氣其入也必吸氣吐納之毒氣常流於洞口犬

性喜艱適感觸其毒從口鼻吸入遂病癩名獬犬春夏日桃花癩秋冬日梅花癩犬性義而善守癩則不識人不守家頸硬頭低耳落尾驪直向前行不能返身顧後闖入人家不拘生熟遇人見犬無不亂齧好犬被齧卽觸毒而癩若人不善避或被齧或啣衣卽觸毒氣設自昧不覺未經早治或治之又未中肯急則七日發作緩則七日至百日定當發作卒病心腹絞痛如刀割裂神識不清痛劇中心無賴自抓其胸膺嚼其舌齧其指齧其膚甚至嚼衣服磁瓦不過三時卽死慘狀難言欲辨病證是否須以葵扇卽蒲扇向病人重扇見風卽身縮戰慄畏甚又急鳴鑼聞聲卽心驚惕不安確是中癩犬毒無疑卽驗犬是否病癩亦以葵扇風試見風卽戰慄又以鑼聲試聞聲卽亂竄確是癩犬無疑當其觸毒尙未發作一聞鑼聲其癩卽激發矣人與犬皆然僕曾見數人患此在旁觀皆不忍入目束手無策遍考方書並無起死回生良法間有先用螫蝥及草藥攻打追逐惡血從溺激出痛割難禁雖不卽死亦於死中求活似此誠非良法也道光二十六年冬僕在湘潭經過沙灣目擊一米船有幫夥卒病心腹絞痛心無依賴亂抓亂齧百藥罔效醫亦不識爲何疾萬分危急會鄰船醴陵人以葵扇向病人一扇大呼曰殆哉此中癩犬毒發作死證也能謝六千錢我有秘方立可治愈船主告哀當幫夥者身工無多允謝四千船幫人咸苦勸謂救

人急難是大善行醴人以不遂所索竟袖手不救由是衆怒甚僉惡其心  
 縛其手足置病者側醴人畏抓齧及身甚自悔願治不索謝請解縛毋與病者  
 不允謂此忍人也得縛解定食言必傳出眞方能包不死乃可醴人亦無如衆何  
 報用大劑人參敗毒散加生地榆一兩紫竹根一大握濃煎如病人牙關已緊須用  
 槌擊去門牙急灌一劑盡而神識清醒兩劑盡其病若失此僕親目所擊經驗者據  
 醴人云凡癩犬來家或遇諸塗不及趨避或被齧或啣衣感觸毒氣自覺有恙畏扇  
 風畏鑼聲或在七日進藥一劑至二七日嚼生黃豆試驗有無留毒如嚼豆時口中  
 作生氣令心惡欲嘔是毒已盡除不必再服若嚼豆時口中不作生氣如食熟豆可  
 吞不令心惡欲嘔急再進一劑至三七日仍用黃豆照前嚼試服至三劑留毒必盡  
 永保無患即好犬被齧於未發癩之先亦用此方再加烏藥一兩濃煎拌飯與食斷  
 不致癩僕迨後照方施治應手取效即孕婦都可服愈不惟保其無虞且無他患屢  
 經神效方之靈驗不可思議每有途遠奔赴寒舍求方迨得方購藥還家遲遲莫及  
 病者已斃僕聞之殊甚慘悼不置茲特細述得方緣由與效驗如響斯應刊刻印送  
 送冀知方者多隨遇即可施治更乞善士仁人廣爲傳播俾病此者救急於萬死一  
 生則幸甚方臚於後 真紋黨 羌活 獨活 前胡 茯苓 甘草 生薑 紅

柴胡各三錢 枳殼炒 桔梗 撫芎各二錢 生地榆一兩 紫竹根一大握 濃煎溫服

### 跌打損傷補遺

增補同安西册潘氏家傳跌打秘方 血竭 煨礪砂 地鼈 煨沒藥 自然銅

骨碎補 茶匙瘻 以上藥各一錢共為細末磁瓶封固勿致出味失性凡遇傷重

甚一貼服完全愈 右用無灰好酒熱沖藥末乘熱服下碗底必有藥末服未盡者

可將未盡之藥末向傷處推極久其氣乃可速行如徧身及手足舉動誤失傷筋如

法推服一二時立效

新 增 金瘡出血經驗方伯禮 象皮五錢切 龍骨五錢白者生用 老材香一兩即棺中所塗之松香黃蠟也山陝難得漆

寸柏香一兩松香中 松香一兩 同寸柏香同化打勻傾水中候冷取出白礬一兩入 同為細末

密藏勿洩氣遇受傷出血如注搽藥急搨血凝結痂無痕無病妙不可言切勿不可使

傷者坐臥煖地夏宜涼處冬忌火爐傷處如腫先用黃連水雞翎蘸洗倘不流血不

必用扇無論傷重倘有氣息收效不出數日即斷指墮地但指倘溫能接如常破傷

者腫潰危急亦治如無老材香即數十年陳石灰亦效此方見效不可枚舉修令

施送功德無量再創口忌布紮綿包與置身煖處恐得煖則血難凝結收效遲



校正 增廣 驗方新編卷八

善化鮑相璈雲韶編輯

合肥張紹棠又堂增訂

中暑

與痧症霍亂各門參看

中暑論 中暑者靜而得之如避暑深堂大廈爲陰寒所遏暑不得越故也外症見身熱頭痛煩躁不安或咳嗽發熱汗出不止然必熱有進退脇下有汗方爲傷暑若久熱不止脇下無汗便是夏月傷寒症雖少見不可不詳辨而妄投湯藥也又腹痛嘔瀉爲冒暑宜涼解清利四肢困倦不思飲食爲熱傷元氣宜補忽然昏仆不省人事爲暑風宜清涼而加風經藥不可概從中暑治也

中暑諸方

蒜頭

二顆

取路上熱土

日曬熱處淨土若汚泥不可用

攪新汲井水調勻服一碗甚效

又黑

妙

芝蔴

炒

井水搗汁灌下即愈

又豆葉搗汁飲亦效

又六一散益元散

見內外備用諸方

均

夏天道路受熱忽然昏倒

名中熱

又名中暈

切不可誤用冷水噴灌一受寒冷則不可救

急用稻草節結爲長帶曲盤肚臍外用熱土搓碎圍之使人撒尿其中令溫氣入腹久之自愈 又方 草紙捲成筒點火向口鼻間薰之即活其效如神 又方 用

布蘸滾水更換熨之熨臍與臍下三寸為要醒後仍忌飲冷水飲之復死 又方

皂角燒存性 生甘草錢各一 共為末溫水調灌 又方 白礬末陰陽水調服一錢

即醒神效

傷暑出丹 凡暑月身熱昏沈未明症候恐是出丹用 生白扁豆數粒食之如不知

腥味則以生白扁豆水泡溼研汁一小杯調水一盞服之即愈

夏月身冷畏寒 有人夏月身冷畏寒身蓋重被尚發抖戰一醫欲作傷寒治之一醫

以為不可云是中暑用清暑益氣湯見內外傷用諸方 調理而愈

痧症與霍亂症全者

各項痧症 痧症有陰痧陽痧烏痧斑痧絞腸等症初起多半腹痛亦有並不痛只覺

昏沈脹悶者切忌服薑急用南蛇藤名草藥 煎水兌酒服之立可起死回生最為神效

若或吐或瀉者名霍亂症用之亦效仍照後霍亂門各方治之

痧症諸方 刮痧法 擇一光滑細口磁碗另用熱水一鍾入香油一二匙將碗口蘸

油水令其緩而且滑兩手覆執其碗於病人背心上輕輕向下順刮倒切忌 以漸加重

碗乾則再蘸再刮良久覺胸中脹滯下行始能出聲頃之腹中大響大瀉如注其痛

遂減睡後通身搔癢或發出疙瘡徧身而愈今有於頸臂刮痧者亦能治病然五臟

霍亂症 上吐下瀉者是無論冬夏皆有又有吐而不瀉瀉而不吐者亦是又有吐瀉

霍亂

之系咸附於背向下刮之邪氣隨降故毒深病重者非刮背不可也此為痧症起死回生簡便良方最靈最穩 又方 刺少商穴委中穴二處其法見霍亂門 又方以食鹽一握揉擦兩手腕兩脇兩足心並心窩背心八處擦出許多紫紅點漸覺鬆快而愈一切痧脹及中暑霍亂等症雖垂死亦活此第一簡便良方也 又方嫩車前草根七揉輒塞鼻孔內男左女右 又方 用紅紙撚看身上如有紅斑紅點名斑痧即用燈火在斑點上燒之務將斑點燒盡以免復發或用食鹽加二炒熱用青布裹作二包在胸腹及背上熨之冷則隨換此法最妙再用蕎麥錢五煎服惟藿香正氣丸斷不可服別項痧症可服以內有除皮紫蘇甘草半夏等藥為斑痧所忌也 又方 生白礬為末每服一錢不拘男婦用陰陽水調下各項痧症及受暑昏暈不省人事者服之立可回生此物能升清降濁故奏效如神存心濟人者宜佩帶身旁或路道或深夜可當仙丹 又方 急用生芋頭芋又名芋食之如非痧則生澀難食若是痧則食之味美連食二箇即愈屢試神效尋常腹痛食之亦效 又方 藿香正氣散見內外方服之穩而且效惟斑痧症萬不可服

不出者名乾霍亂治不得法皆不可救凡遇此症斷不可與飯食即米湯亦不可飲  
並忌食薑一入口即不救須俟愈後平定久久方可進食些少亦不宜多

霍亂諸方 食鹽一撮放刀口上燒紅以陰陽水一鍾沖服牛滾水半冷後腹痛漸止再服

藿香正氣散見內外備用諸方全愈 又方 陳皮 藿香錢各五黃土澄水二鍾煎服雖垂死

立生 又方 炒鹽填臍內用艾放鹽上燒之以燒至止痛病醒為度已死而心頭

微溫者亦可活也 又方 細看病人背上如有黑點用鍼一一挑破出血即愈若

遲一日則不能救矣 又方 用鋒利磁碎片刺少商穴委中穴二處使出血即愈

百發百中少商穴在兩大拇指甲之兩傍與出指甲之處相齊只離指甲兩旁邊各一

韭菜葉寬是也先從手臂膊上揉至指間使血氣下行方刺委中穴在腿彎先用手

蘸溫水拍打打出紫紅紋是也從紫紅紋上刺之 又方 白礬末陰陽水調服一

二錢神效此華陀方也 又方 楓樹皮煎濃湯代茶飲其效如神 又方 樟木

舊杉木 舊鐵釘 掃帚梗 車繩如無用風麻亦可竈心土 蘇葉各等分加鹽一撮炒

焦沖水一大碗煎濃當茶飲吐瀉立止有起死回生之功方名七星茶或用樟木一

味煎濃汁飲之亦止吐瀉而愈更為簡便神效 又方 藿香 蘇梗各三錢煎服吐

瀉立止屢試如神 又方 嘔吐難以進藥者加真川椒末兌入藥內一滴一口緩

緩服之自能平愈或飲烏梅水少許然後服藥皆極神效

霍亂腹痛兩腿轉筋 藿香 蒼朮 柴胡 羌活錢各二 澤瀉 木通錢各一 神麩 陳

茶葉錢各三 老葱連根兩條水煎服此四川呂祖廟內碑刻神方輕者服一二劑至重

四劑全愈活人無算屢試如神 又方 男子以手挽其陽物向上女子以手牽其

乳向兩旁即愈甚效 又方 芥菜子研細末填臍內立效如神 又方 熱醋煮

青布抹之或用布蘸極滾水抹之冷則隨換 又方 大蒜頭搗爛敷兩足心立愈

又方 皂角末吹一豆大入鼻取嚏即安 又方 令病人面牆直立一人以手

蘸溫熱水在腿彎上拍打數十下有青筋現出即將針刺出黑血即止 又方 以

墨書木瓜二字於痛處仍令病人口呼木瓜隨聲而愈屢試甚效或用木瓜煎服亦

可 又方 勉強站起直立少頃即愈屢驗

霍亂轉筋入腹 吳茱萸炒二分 酒二盞煎一盞分二服得下即安

霍亂煩渴 真烏梅煎水和蜜飲之

三香寶暑散 專治七十二種痧症霍亂轉筋尤為神妙涼茶吞服忌米飲每服一錢

重者二錢立愈小兒減半同治癸亥年上海救活無數皆此方也幸勿輕視方用

細辛錢三 荊芥錢四 鬱金錢一 檀香錢三 降香錢三 沉香錢三 右藥生曬研末滾水調丸如菘豆大

或研末用亦可勿令洩氣只可少服 按霍亂吐瀉固屬清濁相干然夏月溼土司

命太陰重寒亦有似霍亂者 真霍亂脈實必見代散冷必戰抖或牙關緊閉似霍亂者舌上粗白苔脈緩而無力泄下不見黃糜不標射 方用 黨參<sup>三錢</sup> 乾薑

牛錢 白朮<sup>三錢</sup> 炒 炙草<sup>三錢</sup> 舌尖紅者加川連<sup>三錢</sup> 洩清長去黃連加附片六分 鏡堂

瘧疾

瘧疾須知 凡瘧疾口渴切不可飲冷水冷茶並一切生冷之物犯之其疾更甚惟以

薑湯乘熱飲之此良法也 凡瘧疾熱未全退不可飲食必俟其熱退盡方可食之

不然必成痞積 凡服截瘧之藥必俟發瘧過後方可食物若食早瘧必再發下次

截瘧無靈矣 凡小兒瘧疾多有穢氣必薰燒檀香蒼朮等藥以辟其邪更常薰其

衣物穢氣去而邪易除矣

瘧疾三方 倪涵初曰瘧之為害南人患之北人尤甚弱者患之強者尤甚雖不致遽

傷其命然不治則發無已不得其道則惡邪內伏正氣日虛久而久之遂不可藥予

所定三方甚為平易無奇絕不入常山草菓等刮劑且不必分陰瘧陽瘧一日二日

三日及非時瘧人無老幼病無久近此三方不用加減惟按其次第服之無不應手

而愈 第一方 廣陳皮 陳半夏 薑汁 白茯苓 威靈仙 各一錢 蒼朮 米泔水浸一日切炒 真紫

樸 薑汁炒 柴胡 黃芩 各八分 青皮 檳榔 各六分 炙草 三錢 生薑三片井水河水各一鍾煎

九分飢時服渣再煎服如頭痛加白芷一錢此方平胃消痰理氣除溼有疏導開先之功受病輕者二服而愈勿再藥若三服後病勢雖減而不全愈用第二方少則三服多則五服 第二方 生首烏錢三 陳皮 柴胡 白茯苓 黃芩各八分 白朮炒 當歸 威靈仙錢各一 知母 鱉甲醋炙蘇研粉各二錢 炙草分三 生薑三片井水河水各一鍾煎八分加無灰酒五分再煎一滾空心服渣再煎服此方妙在補瀉互用虛實得宜不用人參黃芪屏去常山草菓平平無奇實有神效即極弱之人纏極重之病十服後立奏奇功萬無一失所云加減一二即不靈應者正此方也 第三方 人參錢一 白朮炒 炙芪 當歸各二錢 陳皮 柴胡各八分 炙草分三 升麻分四 或加首烏錢二 知母錢一 或加青蒿子分八 麥芽錢一 生薑一片大棗一枚水二鍾煎八分半飢時服用三五服元氣充實永不發矣方雖有三第二方實為主治良方既不刻削亦不峻補是以功獨歸之其第三方崑為有力者而設貧家安得有參宜多服第二方可也 又方 青蒿兩四 真川貝母錢七 青皮 檳榔 厚樸 神麴 半夏各二兩 甘草錢二 共為末薑汁為丸菴豆大以硃砂為衣於未發前三箇時辰每服三錢薑湯送下勿經婦人手此方屢試屢驗神效非常不可輕忽 又方 真川貝六兩 生半夏兩四 各為細末端陽午時合和銅鍋微火炒至嫩黃色冷定收貯磁瓶勿令洩氣每用生薑汁調藥二分蒸熱於

病發先一時服之輕者一服重則三服必愈後忌食發物及雞鴨南瓜芋芴等物  
 三月此方有人施藥多年屢著神效 又方 牛皮膠二兩熬化加生薑三兩攪勻熬  
 成膏聽用於病發之先一時用皂角水洗淨背脊拭乾再以生薑一大塊揉擦極熱  
 用寬長細布一大塊將膏攤上貼之從衣領處貼起過一二日病即痊愈後五日方將膏藥  
 揭去有人患此三年一貼即愈簡便而極效也 又方 用草從左手中指頂尖處  
 量至中指根處為止將草摘斷即用此草從根量至掌再從掌量至腕為度以墨點  
 記用獨頭大蒜研爛敷於墨點處用核桃壳蓋上以布紮上一箇時辰即去之神效  
 又方 信石分五巴豆粒七雄黃分七共為末於端午日午時丸如麻子大三陰瘡貼額  
 中餘男左女右貼之 又方 巴豆粒二南星箇一白麵少許水調捻餅用膏藥貼額  
 上 又方 灑地金錢草又名偏地金錢又名破銅錢又名滿天星清早塞兩鼻孔中各一丸雖三日一發之瘡  
 可以立愈 又方 桃頭七箇向天者獨頭蒜箇七胡椒九粒五家粽尖五月五日午時共搗  
 為丸雄黃為衣紮肚臍內一週時即愈 又方 常山 草菓 丁香許少用上好酒  
 半茶盃煎數滾盛鍾內熱薰鼻孔即愈 又方 當歸 川芎 防風 甘草 陳  
 皮 蒼朮 杜仲 檳榔 草菓 半夏 常山 荆芥 知母各一錢真烏梅五錢熱打碎  
 將藥共放鍋內炒熱於瘡未發時用稀布包裹搗紫臍上臍內先以藥末三分填滿



其發必輕再炒再搗無有不效間日瘧者更效輕者一服重者兩服必愈老年人不

肯服藥者用此最效 又方 龍眼樹葉男用十二片 女用十三片加白芝麻錢三煎濃汁於瘧發先半

時服用後蓋被臥片時汗出即愈諸藥不效者用此最妙

三陰瘧午時以後發者是 青皮 陳皮 當歸 知母錢各三 真烏梅錢五 水二碗煎八分露一宿臨

發日炖熱服其效如神

隔日瘧 旱蓮草研碎如黃豆大以紫蘇葉裹之男左女右塞鼻孔內半日即出涕淚輕

者立愈重者漸次而愈或照以上各方治之旱蓮草宜藥 物備要便知

三日瘧 首烏錢五 蒼朮錢三 白朮錢二 甘草錢一 知母錢五分 水四碗煎碗半雞鳴時服立止如不

愈即照以上各方治之

久瘧不愈前外治各方 可治久瘧 蟹甲醋炙研末酒服二錢隔夜一服清早一服臨時一服無不斷

者入雄黃少許更佳此葛仙肘後方也 又方 牛膝一大把水四碗煎二碗未來

時一服來過時一服即愈 又方 或一日二發或一日二三發或二三日一發用

五靈脂 頭上油膩錢各一 陳石灰錢二 研末飯為丸如蠶豆大每服一丸五更無根

水下即止神效方也 又方 大南棗皮核去 斑貓二箇 焙研同入棗內研勻加熟豬油

少許捏成餅子指頭大貼在兩眉中間印堂上一週時即愈 又方 常山酒炙 乾 知

母 貝母 草菓各錢 水煎五更熱服此方有人用之三十餘年奇效不能盡述切

勿妄為加減 平瘧養脾丸 不論遠年近日百發百中誠治瘧之王道也久瘧體

虛者非此莫愈 人參無則用高麗參 焦朮 漂蒼朮 茯苓人乳 陳皮炒酒 青皮炒醋 製半夏

紫川樸製薑 北柴胡 炙黃芪 猪苓炒 澤瀉炒 桂枝焙 常山焙 鱉甲炙醋 白當歸炒酒 炙

甘草 草菓仁製薑 川芎炒酒 各等分共為細末酒煮麵糊為丸如米粒大每服一二錢

米湯下有痞者加三錢莪朮

二三日瘧年久不愈 當歸 半夏錢各五 常山 檳榔錢各二 紅棗半觔 好酒觔一 井水觔一

共入砂罐忌鐵 煮爛露一宿次日清晨炖微温連棗作數次食完即愈屢驗如神忌

雞與雞蛋發物三月 又方 青蒿兩二 長流水煎服伏暑在肝發瘧一二年不愈者

一服愈

久瘧虛極 人參錢五 生薑錢五 水二碗煎一碗露一宿次日五更温服當日即止無力用

參者以白朮兩一 生薑兩一 如前煎服二服即止或用平瘧養脾丸前見 亦效

隔年瘧 乾薑錢五 白朮錢三 煎服愈 又方 雄黃錢三 生龜板一箇去兩旁 放火上將雄黃末

徐徐鋪在龜板上煨黑碗蓋存性取起研末酒服厚被蓋臥出汗即愈

三十年瘧 常山 黃連錢各五 酒一觔泡一夜瓦罐熬至七分發日早飲一半發時再

飲一半或嘔或瀉即愈

久瘡成痞物屬高起者是又名癰母

毛脚芹菜

大蒜

銀硃同搗爛塗患處以油紙蓋上紮住半日

皮上疼痛口中有蒜氣出其塊自消

又方

大蒜一箇曬乾研末

朴硝三錢研末

獨頭蒜共搗融

成膏貼上自消

又方

獨頭蒜一箇黃丹一錢番木鱉五分

共搗成餅放患處紮好口

中有蒜氣出即去之內自消矣

小兒久瘡不愈 鱉魚煮食多則二次無不立愈

又方

大鱉甲

小不用

用醋炙枯研

末每服一錢或錢半隔夜一服清早一服將發時一服無不愈也

又方 赭石三錢

燒紅硃砂五分

砒霜一大豆

各藥用紙包七層水浸溼火中煨乾研末加麝香五釐香油調

搽鼻尖眉心及手足心神效

新

十錢已瘡方

引用生薑二片

柴胡八分

半夏五分

廣皮八分

前胡八分

枳壳五分

防風八分

白芷五分

甘草八分

查肉五分青皮八分此方得之甘泉萬贈翁善之不分陰瘡陽瘡一日二日三日人無老

幼病無久近重者二劑至重三劑無不愈矣劑輕價廉功效甚巨截後又不轉症誠

良方也

瘡瘻 閱治瘡諸方亦云備矣然夏末秋深熱多寒少似瘡之症名曰暑溫溼溫乃金

匱之瘡瘻係其人陰氣先傷陽氣獨發伏暑充斥三焦肺胃均屬手六經現症少陽

及足六經藥似不相宜此症最易糾纏惟葉天士吳鞠通喻嘉言諸先生論之精切  
 大旨本河間三焦仍祖仲聖桂枝白虎意苦辛寒淡與常瘡治法迥不相侔是開暑  
 瘧溫症一大法門也方極平淡功極神奇方用 苦杏仁去皮尖 淡竹葉錢二 花粉錢二 肥  
 知母一分 麥冬錢二 生甘草錢一 川貝母去心 滑石錢三 橘紅錢一 頭痛煩躁加淡豆豉錢三 熱  
 盛汗多加石膏錢三 舌胎白膩加法夏五分 嘔吐加白薏分三 便堅咽痛加元參錢二 梨皮

錢三增附

### 黃疸

#### 五種黃疸

此症有陰黃陽黃之分如用黃蠟方不效即係陽黃用滿天星方治之無不愈也

黃疸穀疸酒疸女疸勞疸此五種也身黃如金

或兼腫脹嘔吐或眼目赤黃急用薄草紙以筆管捲如爆竹樣將一頭以紙封緊用

黃蠟用編器煉化

將紙筒四圍澆勻不可使蠟入筒內令病人仰臥將蠟筒罩肚臍上封以

過二頭 再用灰麵作圈護住筒根勿令倒下勿令洩氣筒頭上點火燒至筒根麵圈處

取出另換一筒再燒看臍中有黃水如雞蛋黃者取出輕者燒七八筒重者數十筒

日燒二次總以取盡黃水為度有人黃疸身如金色徧身腫脹飲食入口即吐百藥

不效照此治之三日全愈真仙方也珍之寶之 又方 蒼耳子 薄荷 木通

綿茵陳錢各三 用陳酒入各藥煎汁一碗另用炒砂仁末錢三 沖服小便赤如血者加黃

連<sup>絲</sup>同煎神效此林屋山人方也 又方 苦丁香爲細末噓鼻內一時鼻出黃水

水盡卽止三日後再噓一次全愈 又方 滿天星 葉小而光多生花盆及墻下 連根洗淨約半茶鍾

搗融煮猪肉數兩食湯與肉一二次黃退而愈屢試如神 又方 先用麝香<sup>分一</sup>放

臍眼內再取黃皮癩蝦蟆破開連腸雜覆肚臍上用布捆住數日愈孕婦不用麝香

又方 生茅草根煮猪肉食數次卽愈 又方 水芹取汁服或者煮食或生食多

### 食極效

發黃欲死不省人事 此腸黃也 用白毛烏骨雞一隻卽絨花雞又名白鳳凰一名絲毛雞

乾擇去毛破開去腸雜鋪心頭上少頃卽活再照前蠟筒方治之再照前滿天星治

之無不愈也

黃疸吐血 此亦腸黃 病後身面俱黃吐血成盆諸藥不效用 田螺十箇水漂去泥搗爛

露一宿五更取清汁服二三次血止黃退卽愈黃如不退仍照前滿天星方治之最

妙

胸滿腹脹黃腫 方見胸部 滿天星 又名移星草又名金錢草 醫黃疸病聖藥也醫法照前

脾憊陰黃 按黃疸症溼熱蒸罨爲陽黃固多然久病脾憊內失守而泛出陰黃者亦

間有之當宗喻嘉言先生溫補脾腎是又與陽黃治法恣用苦寒清利者不啻霄壤

矣方用 附片錢一白朮錢一炙草錢一乾薑錢三西茵陳錢三煎濃溫服或吞桂附八味丸四

錢錢一新錢一增錢一堂

### 瘟疫

瘟疫症 此症多發於春分之後夏至之前故曰瘟疫如有鬼癘之氣又曰癘疫以衆

人所患相同又曰天行時疫其症與傷寒相似傳經表裏亦無不同惟時令已煖毒

氣鬱蒸與傷寒微異發散宜用辛平等劑又有四時瘟疫治法大略相同

瘟疫諸方 薑糖飲 黃沙糖杯一生薑自然汁杯一用白滾水一大杯調勻乘熱急服蓋

被出汗即愈四時瘟疫皆治 又方 白粳米合三連鬚葱頭根十煮成稠粥加好醋一

酒鍾再煮一二滾食一碗熱服取汗自愈已出汗者不用 又方 松毛切碎搗每

用二錢酒沖服日三服極妥極效 又方 凡聞病人汗氣入鼻透腦即散布經絡

初覺頭痛即用芥菜子末研溫水稠調填肚臍中隔布一二層上以壺盛熱水熨之至

汗出而愈 又方 並治大頭瘟 蒼朮 良薑 桔礬 各等分爲末每用一錢

以葱白一大箇搗勻塗手心男左女右將手掩肚臍手須窩起勿使藥着臍又以一

手兜住外腎前陰女子亦如之煎菘豆湯一碗飲之點線香半炷久可得汗如無汗

再飲菘豆湯催之汗出自愈 又刺少商穴即愈法見雀觀門

除疫救苦丹 治一切瘟疫時症並傷寒感冒無論已傳經未傳經大人一丸小兒半丸涼水調服出汗即愈重者連進二服服後未汗切忌食熱湯熱物汗後不忌此丹寒熱並用功極神奇百試百效有力者宜修合以濟人 麻黃 乾薑 明天麻 萊豆研成粉 松蘿茶各一兩 生甘草 明亮硃砂 明雄黃錢各八 生大黃兩二 共爲細末蜜丸彈子大

酒熨法 治瘟疫傷寒時症或飯後氣惱心口脹悶填塞不舒 上好燒酒炖熱將布

二塊蘸酒自胸向下擦抹布冷再換熱布輪替擦抹如此數次其氣自通而愈

雷擊散 治瘟疫並治忽然腹痛手足厥逆面色青黑並上吐下瀉霍亂硃砂症以及

一切痧症此方於乾隆元年間貴州省疫癘甚行忽於丹平山石壁上雷火擊書此

方活人無數道光元年江南各省輒脚瘟疫盛行亦照此方活之神效無比 牙皂

北細辛錢各三 硃砂 明雄錢各二 藿香錢三 枯礬 白芷錢各一 桔梗 防風 木香 貫

衆 陳皮 蘇薄荷 法夏 甘草錢各二 共研極細末貯瓶中勿洩氣隨帶身邊凡

遇急症取二三分吹入鼻中再用一二錢薑湯沖服後安臥片時汗出而愈

菩提救苦丸 專治春夏感冒風寒時行瘟疫暑溼頭痛口渴身熱目脹筋骨疼痛惡

心怯寒脈息洪數等症屢試神驗 紫蘇 葛根 羌活各四兩 蒼朮 赤芍 香附

花粉 元參各三兩 陳皮 生地 白芷 防風 川芎 黃芩 厚樸各二兩 甘草

細辛各一兩 共研爲末新荷梗荷葉煎水爲丸每丸重二錢半內傷飲食外感風寒

者炒神麩煎湯化下餘俱用生薑湯或用開水下惟受暑勿用薑大人一丸小兒半

丸日久藥味發變更妙

辟瘟散 此方專治傷寒傷風憎寒壯熱頭痛身痛項痛脊強腰痛腹脹鼻塞重風

痰咳嗽上嘔下瀉口渴便赤內傷飲食及感冒四時不正之氣發痧瘟疫瘴癘鬼瘧

瘟瘧赤眼口瘡溼毒流注脚腫腮腫風火喉痺毒痢風熱斑疹並治硃砂症又名心

經疔其症初起脈散牙緊手足麻木發輦閉目不語喉腫心疼心慌等症急視前後

心有紅點用鍼刺破出血如有紅絲即挑出可免無事惟此症傳染甚急頃刻不救

藥宜早備 製蒼朮錢五 桔梗 神麩錢各三 貫衆 滑石 熟大黃 明雄 厚樸汁薑

炒生甘草 法半夏 川芎 藿香錢各二 羌活 白芷 柴胡炒 防風 荊芥 細

辛 前胡 枳殼炒 薄荷 陳皮白去 皂角子去筋 硃砂 石菖蒲 公丁香 廣木香

草葉子煨用 香薷錢各一 研極細末磁瓶收貯勿令洩氣每遇患者先用二三分吹入

鼻內再用三錢滾薑湯沖服體虛者加台黨參錢四 煎湯沖服小兒每服一錢凡病重

者三服即愈此方屢經試驗活人甚多不可以藥味多而輕視也藥味每料須錢百



餘文可治十餘人費錢無多功德甚大

瘟疫心腹疼痛

與後羊毛  
瘟疫者

白烏骨雞殺之破開去腸雜撲心上即愈或用血塗心上亦

可並用雞肉煮湯食極效或用癩蝦蟆破開撲心上亦可愈後須戒殺放生免再傳

染

羊毛瘟

與雞毒門羊  
毛疔者

凡男婦大小陡然腹痛不過一二時即死醫藥不及用鍼灸不及施

惟有速往十字街心或十字路心於衆人日逐往來之處挖泥土數升以冷水和丸

如雞蛋大即在病人臍旁及心窩內外磨擦良久俟泥丸稍熱破開看之如丸中有

羊毛是其症無疑矣另換泥丸再擦以不見羊毛爲度雖已氣絕身未冷者皆可治

若擦之並無羊毛即非此症當另求醫藥施治 又方 用蕎麵照上法治之更妙

大頭瘟

此症頭面腫大咽喉閉塞急用 延胡索半錢皂角 川芎錢各一藜蘆五分躑躅

花牛二分

共爲末用紙撚蘸藥推入鼻中取嚏日三五次甚效嚏出膿血者更妙無嚏

者難治左右看病之人用此取嚏亦不傳染 又方 蚯蚓又名曲蟮十餘條以白糖拌

入碗碟蓋好半日即化爲水至遲一日必化用鴨毛蘸水敷之即消百發百中之仙方也如無

白糖之處用蚯蚓糞井水調敷亦可須戒殺生 又方 燕子窩連泥帶糞搗融醋

調敷立愈 又方 靛花三錢編述者爲佳 雞蛋清箇燒酒一盃調服神效 又方 黑豆二合

煎炙甘草錢一水二鍾煎八分熱服神效 又方 吳萸研末醋調敷足心一週時取  
下即消如未愈再敷一週時必效

辟瘟諸方 立春後庚子日煎蔓菁汁即諸葛菜不拘多少舉家大小人溫服可免時疫

又方 六月六日採馬齒莧曬乾收藏於元旦日煮熟鹽醋醃食一年可免時疫

又方 馬骨一塊裝紅布小袋內佩帶身旁男左女右 又方 每年臘月二十四

日五更取井花水平旦第一汲者盛淨器中計家中人口多少浸乳香至元旦五更

煎水從幼者起至老人每人以乳香一小塊飲水三口咽下則不染時症矣 又方

五更時投黑豆一大握於井中勿使人見凡飲水家俱無傳染若食河水之處各

家於每日清晨投黑豆一撮於水缸內全家無恙 又方 雷丸各四兩飛金

箔三十張硃砂三錢生明礬一兩共研末以水為丸每服二錢乾隆丙子瘟鬼被雷擊匿

於江蘇長洲主簿署中所授此方服之可免瘟疫活人無算屢試如神 又方 貫

衆一箇白礬塊一放水缸內亦效 又方 向東桃枝煎湯日浴二次自然不染 又方

蒼朮 雄黃 丹參 桔梗 白朮 川芎 白芷 藜蘆 菖蒲 皂角 川

烏 甘草 薄荷各五錢細辛 燕夷各三錢以上俱用生料曬乾研末燒薰可辟瘟疫

屢試神驗 又方 紅棗二兩茵陳八兩大黃八兩共燒煙薰可免瘟疫 又方 蒼

朮、紅棗共搗爲丸如彈子大時時燒之可免時疫不染。又方：凡入病家用香油調雄黃蒼朮末塗鼻，既出用紙條刺鼻孔取噴嚏，再飲雄黃酒一杯，決無傳染。又方：雄黃研細末水調多敷鼻孔，中與病人同牀，亦不傳染，神方也。

### 蠱毒

**中蠱論脈** 中蠱之脈多係陽分盛蓋蠱家毒藥皆於端午日製之乘其陽氣極盛之時以製藥故中其毒者脈皆強旺所以利用清涼之藥。一切蠱毒皆忌補藥又蠱藥皆屬蛇末故治之皆以殺蛇發表爲主知脈者先切其脈用藥隨脈加減肝脈強者多加柴胡槐花白芷青蒿心脈強者多加連翹麥冬脾脈旺者多加茨菇菜腎脈強者多加生地元參肺脈強者多加條參而紫蘇薄荷則凡中蛇中癩中腫中疳治方斷不可少者至蠱毒將愈肺心脈平和則紫蘇少放肝脈平和則薄荷少放不知脈者卽照後篇成方治服亦可。

**生蛇蠱** 人初中其毒或肚痛極作吐作瀉自後凡遇肚痛時行動則皮內或肚內有物堅實夜臥以手按之則肚皮內有物腫起長二三寸微覺跳動心煩涎溢得吃肉則止或移入左脇右脇則飯食減少或跳上心則心脹欲作吐又此物在身時有時無至四五年則成形會咬又有變成肉鱉肉龜以作咬者至蛇老時在皮內肚內行

咬有日咬二三十次者命在頃刻此時內蛇翻動作咬則通身發熱額焦頭痛如有  
髮刺蟻咬夜則更甚此乃蠱家之外蛇從風而至也內蛇咬臟腑外蛇入毛孔其蛇  
無形亦無數用雄黃<sub>研五錢</sub>生菖蒲<sub>兩四</sub>蒜子<sub>兩四</sub>搗爛三味缺一不可同放浴盆內倒熱  
水於內令病者自頭至腳處處洗到隔日一洗以禦外蛇再用馬兜鈴<sub>四</sub>同水久煨  
多服服藥後忌食茶水飲食半日若蛇不吐出瀉下仍將蘇荷湯四方<sub>後見</sub>加減治服  
過半月復用馬兜鈴半觔煎濃湯服如此三五次其蛇自化不見愈後仍戒雞鴨二  
年魚蝦螺蚌等戒三年終身戒食蛇蛤 有李姓妻者中此毒內蛇長五六寸日咬  
數十次照方服藥不戒鹽葷兩月而愈 又路姓二人中生蛇蠱尙未見咬服馬兜  
鈴兼服蘇荷湯一月而愈後因食魚復發慎之慎之

陰蛇蠱 中此毒者不出三十日多死初中時或吐或瀉以後則肚腹膨脹不想飲食  
口極腥甚則額熱而紅頭面上筋起如蟲行蚓行或耳鼻內如有一二蟲乃藥氣衝  
上非蟲也或肚內如蛇翻有聲大便秘結若酒醉後在酒中受毒者不獨腸臟青黑  
卽肺肝心脾俱染黑氣服敗毒發毒解毒之藥受毒重則糞黑受毒輕則糞藍若不  
知解藥則因黑氣而變成黑星黑星有一顆則肚內如鍼刺有十餘顆便開成蛇口  
如蛇咬狀咬上心出恭瀉血多不可救又加以癩藥則人多昏憤又加以腫藥則一

耳常滿塞一耳少紅厚如有一二蟲行樣服解藥則黑氣隨糞出黑氣一毫不淨須要戒口不然一翻則腸臟內如有數十顆黑星如兩三隻蛇口在肚內咬而外蛇亦從風而至病人夜不得臥者亦用雄黃末蒜子菖蒲搗爛放熱水內洗身以禦外蛇若在酒內中毒斷不可用酒釀煨藥犯之必翻愈翻則毒入愈深茶內中毒戒茶病痊後可吃病重時戒吃太飽戒生冷煎炒戒吃一切補藥戒雨淋溼身溼脚戒遠行戒忿怒照後中疳方調治戒葷鹽每餐用笋水一茶杯煮菜吃無力者常煎紫蘇薄荷二味作茶吃卽是要藥或兼田內茨菇菜更妙有力者照後蘇荷湯四方加減治法其餘所食之物俱與後中疳篇同但看食物全不變如吃菜痢菜甚至吃飯則痢成類飯則毒淨矣自此以後過三四日食物仍變出恭轉黃開吃葷鹽生冷酒醋煎炒無妨惟雞鴨宜戒二年生雞戒三年魚蝦螺蚌等腥物宜戒三四年蛇蛤終身不可食後中疳篇同此戒口。又水內之物惟鱉可食無妨。按初中一二日有吃馬肉而愈者。又中蟲者不肯戒葷鹽則飲食中鹽宜少放葷少吃但戒雞鴨魚蝦等物可也。

**浸笋水法** 凡笋皆可浸惟味苦而豔者尤妙笋用淨刀淨砧板切片放瓦罈內用午後水浸之不可犯葷犯嫩糠水將浸過笋不可多後添生笋則添生水。又按初中

蠱時有吃雄黃蒜子菖蒲同滾水服取吐再用紫蘇薄荷笋水同滾水服取瀉吐則

上部毒淨瀉則下部毒淨自愈

癩蠱

受毒者肚必滑叫如在臟外叫服藥則在臟內叫

種俗埋蛇土中取菌毒食則人心昏頭眩笑罵無常或遇飲酒

時藥毒輒發忿怒兇狠不可制者名曰癩蠱照後薄荷湯四方治之必須戒色下條

同

腫蠱

受毒者肚必滑叫

腫蠱者種俗謂之放腫腹大肚鳴大便結秘甚則一耳常塞一耳少厚

治方見後蘇荷湯四方若病危甚時必戒鹽葷方效 外用茨菇菜煎水洗之

疔蠱 疔蠱者匪人謂之放蛋又謂之放疔又謂之放蜂惟兩粵最多端午日取蜈蚣

與各小蛇馬蟻蟬蚯蚓蟞蟲頭髮等研末其人常刻一小五瘟神像在房內或箱

內奉之常將毒藥置於神前若將蛇蟲等末放肉菜酒飯內與人吃亦有放在路上

踏著卽入人身則藥末粘於腸臟之上初吃輕則腹略脹肚微叫如粥滾狀如欲瀉

狀而出恭仍結實頭帶黑色若受藥重則肚痛肚常鳴毒氣衝上或鼻內如有一二

蟲或耳內如有一蟲臥則肚大鳴如蛇翻狀出恭漸少或一日一次或二日二次帶

黑色出亦不多人必瘦黑久或靜坐頭髮內如有蟻咬以手搓之則無或夜臥靜聽

面上如蟲行如髮纏如蚤咬或肉忽跳或身上如蟻咬或肛門如有小蟲小蛆三四

隻動或身上如蚓行或口旁如有蟒蜒蟲粘上拭之則無跡可尋或忽然一手麻極一脚麻極或半手麻極或半脚麻極此皆藥毒到處使然或初受毒至三四月後或因洗身或因靜坐於外如有蜂飛來咬靜聽片刻身上如有數十蟻咬者搓之則氣散不見此必吃着人蠱藥不知者未有不疑爲風症也但此蠱藥在內治不得法斷不瀉出其藥化一點染在臟腑之上則藥氣行於週身氣到處卽如蟲咬非眞蟲也氣降於肛門卽如蟲動蛆動氣隨糞出非黑卽藍亦非眞蟲受蠱至七八月藥未化盡肚鳴不歇其氣衝上如蛇翻狀週身如蟲行蟻咬頂心髮涼極如有蟲出入肉內如有蟲行蟻行小蜈蚣行而蠱家平日所毒死之冤鬼與其陰蛇陰蟲隨而陰附之病者如聞有飛集之聲而旁人不聞一見風則更甚如蟲出入毛孔鼻門如有數十蟲飛集甚則下陰脚底如蟻咬此皆藥氣行於週身非眞蟲也至此時則手脚麻木週身如麻布通風腠理毛孔皆開或手指脚指扯開或脣掀或身上肉跳又加以腫藥則一耳常滿一耳少焦紅厚又加以癩藥則頭眩心昏肚脹又加以悶香則面起紫泡凡中此蠱者務宜戒色若不知戒色小便一見白濁則穢毒引入膀胱變成五疳則疳蟲生於下部此時則實有蟲矣往往以楊梅瘡概之不出數月必死若止知戒色而不知藥方治服小便雖未見白濁終死於腫此皆得之蠱醫之言屢經驗者

治法見後蘇荷湯四方 一中疳蠱小便未見白濁勢雖極危果能持戒照方服藥

無有不愈或玉莖旁溼爛外用槐花一兩白礬二錢膽草一錢煎水洗之可也 一

中疳蠱小便未見白濁週身雖如蟻蚤行咬乃藥氣行走並無蟲也不必疑懼同室

之人任其同臥同食斷不傳染病者首宜戒色戒鹽葷戒煎炒甜食紅棗甘蔗一切

招疳之物與一切飛禽水族鱗蟲腥物 一中疳受毒甚者小便未見白濁宜食各

物 疳中蠱 豆腐 苧菜 蒜 紫蘇 薄荷 笋 馬肉 甚 青菜 白菜 薑 青瓜

吃少 白瓜 吃少 黃瓜 吃少 芋苗 芋頭 吃少 細粉 芥菜 苦蕒 木耳 茨菇 此味能瀉脾胃之毒亦能殺蛇解蠱消腫

敗毒每藥同 龍眼 龍眼宜成顆剝 荔枝 惟此二味可吃 笋水 每碗放一茶 以上諸品中毒甚者皆可吃蓋

毒甚則心肺肝脾皆受傷帶黑氣週身之血皆被毒藥染黑故宜靜養服藥先瀉大

腸脾胃之黑氣後瀉肺肝心之黑氣最後則週身血液瀝入肺肝心脾由肺肝心

脾瀝下胃與大腸隨糞而出於是臟腑復生惡血瀉盡新血充滿自愈而薄荷紫蘇

尤為要品二味皆殺蛇且表其毒氣出於外笋水亦殺蛇但笋水止及腸胃而蘇荷

則追及心肺肝脾要之三位不可缺一若每餐菜用茶油煎開水放生紫蘇葉與薄

荷葉及笋水一茶杯同各品菜煮吃即是要藥無生葉即取根梗煎水同笋水茶油

煮菜吃亦妙若無蘇荷但用笋水煮菜亦驗 一疳蠱受毒未至極危及雖極危既



服藥月餘病漸減凡辣椒芹菜<sup>少</sup>蘿蔔<sup>不可吃菜藥</sup>金鍼蓬蒿蒿苣胡椒醋<sup>少</sup>韭菜羊肉等物皆可吃柑橘棠梨石榴蘿蔔葛薯李荸薺西瓜皆可吃一凡中疳受藥輕者或見風則面上如蟻行發癢以手搓之則散見火煤之則止者或隔數日靜聽肛門如有三四小蟲動或時而耳內如有一小蛆跳入時而鼻內如有一小蛆跳入或一手麻極一脚麻極一月一次一月幾次或肚時鳴而出恭結實或因吃發毒之物藥氣表於外面上如蝨行如髮纏身上如蚤咬或以上諸病時有時無者俱不宜近色一疳蟲服解毒敗毒發毒之藥則大便結祕者蓋藥毒在身逢解藥則降下大腸毒甚者初出恭黑次出恭青次出恭藍或出恭有惡物如爛木耳者此乃身上之惡血隨腸臟瀝出也亦有服藥二三劑而瀉血兩三日者病愈更速蓋蟲藥在身其毒氣週流通身之血皆黑服藥之後舊血瀉盡新血自生不足畏也亦有服藥月餘毒氣大減時而糞黃時而糞轉黑或藍者蓋惡血不瀉則糞黃惡血一瀉則糞藍惡血一點未淨則出恭尚時帶藍色然受毒雖極重依方持戒服藥至四五箇月後糞雖不能盡黃開葷近色無妨但鹽與煎炒尚宜戒之卽不戒亦可惟鴨雞宜戒三年魚蝦等腥物宜戒五年然糞不至於純黃則耳內肛門尚有藥氣出如蟲行狀通身或頭面上或髮內亦間有藥氣行動如小蟻咬式此斷不可疑懼乃身上之惡血未能

淨盡故也但照後方服藥受毒極重者開葷鹽後其藥仍宜常服無力者常將紫蘇薄荷茨菇菜三味煨水當茶吃可也但看出恭食物全不變則不用服藥矣 一服藥將愈之時一遇食飯通身發癢此乃飯氣到處新血與舊血戰也食畢氣靜如常 一將愈之時凡所食之物出恭半不變或肛門常脹者此乃蠱毒將淨不可服補藥俟至食物全不變則毒淨以後出恭必黃而病愈矣 一凡出恭如有蟲三五隻隨恭出視之不見者其糞不黑則藍否則必帶血絲此乃毒藥之氣非真蟲也不必疑懼 一凡蠱毒既淨脾胃虛寒宜服補藥然既服補藥之後時而出恭轉藍此乃餘毒未淨即取紫蘇薄荷二味加笋水一茶杯沖水煎服可也不用戒葷鹽煎炒又受毒輕者出恭仍黃服解藥後或略帶灰白色耳 一中疳蠱初服藥一二劑通身發紅紫塊者無妨再服藥十餘劑自消 一酒醉後在酒中吃着蠱毒肺肝心脾受毒太重照方服藥月餘蠱毒既退酒毒忽發口舌熱爛則笋水與蘇荷等暫停半月宜用連翹生芪甘草生地柴胡槐花黃柏黃連元參石膏等藥用酒與水煎服俟火退後仍照原方調治 一凡中疳蠱或因吃魚蝦腥物而毒發於身成癩者或毒發於脚而成腫瘡者或毒發於下部溼熱潰爛者或毒發於手背虎口手指間如疥瘡出干經年不愈者或因吃馬肉發毒之品表其毒出於鼻門出汗者或時而脚麻時

而肚痛時而脚酸者但果中其毒人多瘦黑身上必有如蚤咬蝨行者治方與前同不用戒色亦不用戒葷鹽 一中疔或一二人或三五人同在一處受蠱毒或各在一處受蠱毒其一人受毒重者先發作一二月或先發半年諸人漸次方知者人或疑爲傳染此決不可信予蓋得之於蠱醫之言兼歷試之於中蠱之人者至一切方書之論蠱論病者皆不得其詳不足信也 一中疔受毒極重者必吃着藥多次照方持戒服藥至兩箇月可吃生冷醋煮物件至六箇月雖出恭尙帶藍色開葷鹽煎炒近色無妨依舊照方加減服藥但看出恭食物皆不變則毒淨盡以後出恭必黃可以食鴨惟雞宜戒一年魚蝦螺蚌一切水內腥物戒三年蛇蛤終身不可食中毒輕者不用戒葷鹽煎炒但戒雞魚等物可也常將紫蘇薄荷二味沖筍水少許同水煎服久服自愈 一凡中疔惟肺經受毒重不宜近色蓋肺金生腎水肺受毒重一近色則濁氣引入腎小便一變白濁卽變五疔若肺經不受毒及服藥後肺經毒既淨雖身上肉尙跳尙有如蚤咬蟻咬無妨也按中毒輕者則肚不大鳴雖不吃藥不持戒雞魚亦無妨但覺身上不快耳 一疔蠱當受毒重時夜則身熱頭痛不得眠治方用雄黃末五錢同菖蒲蒜子搗爛放盆中用熱水沖入處處洗到亦能禦之

3.12

**變疖論** 按中疖蠱不知持戒小便見白濁遂變五疖先從下部腐蝕生蟲後至口內腐爛生蟲而蠱毒在身一見風來如有羣蟲飛集到此時則五臟受傷一切發毒之藥如紫蘇薄荷川芎薑蒜及馬肉羊肉蓬蒿蒿萑等菜斷不可食亦斷不可服補藥然亦難挽回矣但此症決不傳染人只恐疖汁滴上旁人手脚用紫蘇薄荷槐花苦參蒜子雄黃煎湯洗之無妨臨終時孝子家人皆近得如有汁滴上人手脚亦用前方治之此皆得之蠱醫之言者

**中疖既變疖後藥方** 凡藥宜溫服不可冷服恐變別症 生地 槐花 元參 條參 連翹 百合 白芍

青蒿 決明子 澤瀉 貝母 茯苓 花粉 麥冬 黃連 梔子 黃柏

天冬 膽草 知母 以上二十味俱可酌用 槐連湯 連翹 條參 青蒿

生地 錢五 槐花 兩一 元參 錢五 黃連 錢二 貝母 錢五 黃芩 錢五 水煎服 因病加減不外以上二十

味全在人神而明之皮破者用茨菇葉煎水洗按連翹條參治蠱之品槐花元參治疖之品其餘可以類推

**中疖既變疖後食品** 豆腐 青菜 莧菜 冬瓜 竹筍 茨菇 葛薯 白菜

苦蕒 蓮藕 細粉 以上諸菜每食用笋水二茶杯同菜煮食妙

**中疖既變疖後藥方** 一既變疖後五經皆有疖蟲照方持戒服藥每日一劑隨時斟

酌加減不出上二十味之藥服至三箇月後各經疔毒盡去惟腎經疔毒尙難驟愈再服藥持戒十箇月必然全愈開葷鹽無妨或開葷戒鹽更妙仍舊時服藥但看小便常清並無白濁則疔毒已盡肉內並無髮芒時刺身上並無蟻咬則蠱毒亦將淨雖或時有蝨行蚤咬乃蠱毒之餘氣血液未盡淨故也此時可開吃煎炒燒肉近色無妨仍不時服藥俟至出恭食物全不變則蠱毒亦淨盡矣此時一切發毒之物如馬肉羊肉等開吃無妨雞鴨魚蝦螺蚌等戒二年一切飛禽水族鱗蟲仍戒數年終身戒食蛇蛤 又按一變疔之後照方服藥病勢漸減即當嚴爲戒口若持戒不嚴則病必翻愈翻則毒入愈深再治亦不甚見效矣慎之慎之

中害神

放害神亦蠱類也人中其藥則額必焦口腥神昏性躁目見邪鬼形耳聞邪

鬼聲如犯大罪如見惡役持鍊鎖至如有刀兵健卒追趕常思自盡不知醫十無一

生治方用柴胡湯加減服宜戒鹽葷俟毒淨自愈愈後不用戒魚蝦等物 柴胡湯

生地錢四白芍錢三知母錢三天冬錢一青蒿錢六柴胡兩一元參錢三生芪錢三連翹錢三百合錢五水

煎服 又方 夏枯草兩二紫背浮萍錢三水煎服 一中毒神先用竈心土同涼水攪

澄清服取吐或用白礬細茶葉研末涼水攪和飲之取吐在茶酒內中毒者必吐黑

星數十顆在肉內中毒者心吐出肉一二塊此黑星與肉勿令狗吃用火燒之則反

著放蠱之人死矣蛇蠱同此治法

病人夜不得睡亦用蒜子菖蒲雄黃搗爛放熱水內洗身甚妙

泥鰍蠱

蠱家用竹葉放水同蠱藥浸之即變泥鰍魚煮與客食吃畢肚內如有鰍

魚三五隻行走時而衝上喉嚨時而走下肛門大便不通不知治必死治方用雄黃

蒜子菖蒲同滾水生咬吃得瀉而愈後戒魚蝦等一二年

石頭蠱

聞蠱俗將在頭一塊放於路上結茅標一二箇人行過則石跳上人身或入

肚內初中肚內硬實至三四箇月則會動肚鳴大便結祕人漸瘦弱時而此石飛入

兩手時而此石走入兩腳奇怪之至不出三五年其人必死治方用雄黃蒜子菖蒲

滾水生咬吃得吐與瀉自愈

不用戒葷鹽愈後仍戒魚蝦等一二年

篾片蠱

聞蠱俗將竹篾一片約四五寸放於路上人行過則此篾跳上脚腿痛不可

忍久則此篾入於膝蓋脚漸小如鶴膝不出四五年其人必死治此方用雄黃蒜子

菖蒲生咬吃滾水送下得吐與瀉自愈後用雄黃末五錢蒜子一觔菖蒲一觔同搗

爛放滾水內湯洗脚膝數次自愈不用戒口

金蠶蠱

此蠱金色其形如蠶能入人腹食人腸胃其糞亦能毒人養蠱之家蓄以害

人用金銀等物將蠱送之路旁有人遇之蠱即隨往謂之嫁金蠶此蠱不畏水火刀

鎗最難滅除惟畏刺蝟中此蠱者食白礬味甜嚼黑豆不腥者即是又初吃藥後週

身皮肉如有數百蟲行癢極難忍者亦是用石榴皮根煎湯飲之可以吐出或用刺  
蝟皮燒枯研末用水調服一二錢亦可 刺蝟又名毛刺又名蝟鼠其頭嘴似鼠身  
有豪毛似豪猪箭 又方 常山錢四山荳根錢五蜈蚣一條乾烘黃柏錢五蜘蛛烘乾穿山  
甲錢五白鴿血一隻全以上七味同研末分三次泡滾酒服其毒自化毒重者服此方必  
愈不用戒口按以上五蠱未曾經驗即用蘇荷湯服之想亦可以取效

中疖中蛇中腫中癩諸方

蘇荷湯

紫蘇

南薄荷

青蒿兩各一

條參

連翹錢各八

槐花

元參錢各七

柴胡錢六

芎

生芪錢五

蛇蠱加白芷兩一三七

受毒重者水煎服藥之後病漸減者即是對

症久服自愈大便祕結加茨菇菜一兩更妙

右方條參清肺火消腫脹連翹瀉心

火敗毒紫蘇入肺心脾殺蛇發表薄荷入肝殺蠱槐花清肝火解毒生黃芪敗毒發

表元參清腎火解毒川芎發表青蒿殺蠱解毒凡中蠱治方大要不外殺蛇解毒發

毒敗毒之品 按初中毒服藥得吐瀉者皆妙受毒者如不能戒鹽葷但戒雞鴨魚

蝦蚌蛤等可也

槐芪湯

凡口乾火盛者此方主之

槐花

青蒿兩各一

生地

紫蘇

南薄荷

連

翹錢各七

生黃芪

天冬

元參

花粉錢各五

黃柏錢三

頭痛加白芷錢三

川芎錢二

水煎服

歸連湯 當歸 生白芍錢各三 生地 連翹 百合 紫蘇 蘇薄荷錢各五 川芎 槐

花 黃連 生甘草錢各二 水煎服 肚脹除甘草 大便結祕加茨菇菜一兩

參芪湯 條參錢七 生黃芪 紫蘇 南薄荷 麥冬去心 青蒿錢各五 川芎 茯苓錢三 百合

生地錢各二 連翹錢一 水煎服 以上四方皆治蠱要藥治疳蠱更效受毒者隨時加

減服藥不外四方內藥品受毒極重者戒鹽葷女色服藥數月後開葷鹽近色無妨

仍舊照方服藥一年或兩三年俟至出恭食物全不變則毒淨盡矣體虛者分兩酌

量減用

蘇荷生地湯 紫蘇 南薄荷 青蒿兩各一 生地 條參 連翹錢各八 槐花錢七 柴胡錢六

川芎錢二 生黃芪錢五 此中蛇中疳中腫中癩良方也與前四方同功大便結祕者重

加槐花黃柏黃芩茨菇菜等味 小便赤者加元參梔子茯苓 肝火盛者加生白

芍 頭痛加白芷 蛇蠱加白芷一兩三七二錢 帶熱嗽或咳血者紫蘇薄荷減

半加百合麥冬生芍各一兩 或時而傷風帶寒嗽者去條參連翹槐花青蒿生地

加乾薑當歸半夏陳皮白芷 或人弱帶痢者去條參連翹槐花柴胡生芪青蒿生

地加百合白芍茯苓麥冬砂仁白朮乾薑 總之神而明之存乎其人但蠱毒未淨

不可服補藥與收斂藥或兼有別病則兼治之而紫蘇薄荷則斷不可去也 又舌



或熱爛實火炎上則去紫蘇薄荷重加槐花黃柏黃芩茯苓白芍元參澤瀉天冬石  
膏等味酒水煨服 中疝一症有毒氣走在手者時而移上頭者或初服藥通身發  
紅片者有通身麻木肉大跳者有頭面上血忽開忽合者或腦內有聲者治方同  
蛇蠱一症有在兩脇皮內痛忽移上兩肩下皮內痛永不出汗怕寒服藥後如有聲  
走入肚內者有在肚內痛會動會移者有在心上脹口涎出痛而不移大便常下虵  
蟲者或偏身如風走竄臥則手脚跳起者治方同

老人中蛇蠱方 百合錢四蘇子 南薄荷 當歸 茯苓 白芷 白芍錢各三 麥冬

連翹錢各二 水煎服 又方 南薄荷 蘇子 麥冬 白芷 當歸錢各三 三七 生

首烏錢各二 連翹錢四 廣陳皮 木香分各五 百合錢五 水煎服 老人血氣既衰不可全用

峻利之品與太寒涼之藥故斟酌平和之劑集成兩方但照方服藥之後內毒不安  
仍然在內走竄而靜聽其毒漸漸墜下不能升上即是對症服藥不必太急急則內  
毒跳起病人不安但當戒食雞鴨飛禽魚蝦螺蚌蛇蛤水族穿山甲鱗蟲等物久服  
藥或吐出肉二三塊或吐出黑星如豆大十餘顆者或瀉下虵蟲數條者或瀉下黃  
泥水者瀉淨自愈愈後仍戒食雞鴨魚蝦等物數年終身戒食蛇蛤 一服藥時凡  
一切發毒之物並豬牛馬羊肉及菓品煎炒皆可食惟糖棗甘蔗宜戒以上見治蠱

新方

通治蠱毒

梅師士云凡中蠱毒或下血如鵝肝或吐血或心腹切痛如有物咬不即

治之食人五臟即死欲知是蠱但令病人吐水沈者是浮者非也用舊鼓皮燒灰酒

服一二錢須臾自呼蠱主姓名 又方 舊鼓皮寬五寸長一尺薔薇根五寸如拇

指大水一升酒三升煮二升服之當下 又方 斑蝥四隻去翅足炙熱 桃樹皮五月初五日采取去黑皮陰乾 紅

芽大戟去骨各爲末此二味比斑蝥分兩各加一倍共爲丸如棗核大用米湯送下必

吐出蠱一服不好十日再服必愈此人祖傳秘方神效無比斑蝥有毒病愈後用解

斑蝥毒方見解毒諸毒門服之 又方 毒在上者用升麻煎湯吐之在肚者用鬱金煎湯下

之或合二味服之不吐則瀉活人甚捷 又方 一覺腹中不快卽以生黃豆食之

入口不聞腥氣者此中蠱也卽以升麻煎濃湯飲以手探吐卽愈極效如食豆而腥

者卽非蠱也 又方 蚯蚓十四條好醋泡至蚓死取醋汁服如肝爛已死者皆可

治此葛仙方也 又方 馬齒莧又名瓜子菜搗汁一升飲渣敷痛處日飲四五次甚效

又方 先取炙甘草一寸嚼之嚥汁若中蠱毒隨卽吐出仍以炙甘草兩三生薑四兩

水煎日三服若含甘草而不吐者則非蠱毒此蓄蠱家祕傳 又方 凡中蠱毒無

論年代遠近但煮一雞蛋插銀器於內含入口中約一時久取出蛋銀俱黑者卽中

蠱也方用 五梘子兩 硫黃末錢一 甘草寸一 丁香 木香 麝香各一分 輕粉三分

米二十粒 入小砂罐內煎服水香忌火 水免服 服後用高枕平正仰臥腹中如有物衝心不必驚

動預備瓦鉢以便嘔吐吐出如魚鰾之類乃是惡物吐罷飲茶一杯瀉亦無妨少時

服食白粥忌生冷油膩酢醬十日後再服解毒丸兩三粒即愈

辟蠱毒法 凡人家房屋潔淨並無灰塵蛛網者即係有蠱之家勿與往來以免受害

又方 凡食茶菜飯等物將要食時用筷子向杯碗上敲動並向主人問云食

內果有蠱毒否一經問破則可免害 又方 將食時自帶生大蒜頭食之有蠱必

當場吐出不吐則死主人畏累則不敢下蠱 又方 大荸薺不拘多少切片曬乾

為末每早空心白滾湯調下二錢入蠱家無害此神方也 又方 凡不飲酒之人

受蠱輕而易治飲酒者受蠱重而難治蠱毒多在煙瘴邊地凡有煙瘴之處又宜飲

酒以辟瘴氣是亦不能不飲總之在家多飲出外少飲為妙

### 瘴癘

解煙瘴毒 用磁瓦有鋒者或刺額上或刺眉叢或刺兩手膊出血一血即解血紅而

多者輕血紫而少者重 又方 白朮 陳皮 茯苓 半夏 梔仁 山查 神

麵錢各一 連翹 前胡 蒼朮各七分 生甘草四分 生薑引煎服數劑神效凡客遊不服水

方新編 卷八 瘴癘

土者亦效 又方 生熟大蒜各七片共食之少頃腹鳴或吐血或大便即愈

辟煙瘴癘 凡雲貴兩廣等省地方忽有一股香味撲鼻即是瘴氣斷不可聞以免生病 又方 凡有瘴氣之處飲食不可過飽每日須飲酒數杯不飲酒亦強勉飲之

可辟瘴氣有三人早行山霧中一死一病一安然無恙後乃知死者過於食飽病者係空腹無恙者乃飲酒也

### 諸血

七竅出血 凡耳目鼻口一齊出血名曰上虛下竭死在須臾不及用藥先將冷水當面噴幾口或婦女急分開頭髮以水噴之男子無髮可分用粗紙數層冷醋浸透搭在顛門其血即止或用鼻部鼻血第一方立止如神隨用補血湯 灸黃芪一兩當歸

五錢煎濃湯加沉香五分童便一盞服血自歸經再加調理多有全活

口鼻出血不止吐血見勞傷吐血門用多年尿壺火上烘熱向鼻薰之立止如神屢試屢驗或照

鼻部鼻血第一方治之更爲神妙 又方 韭菜搗自然汁半碗飲之立見功效

又方 生地 麥冬各一兩煎服亦效 又方 因酒色過多口鼻出血如泉湧者

荆草燒枯末陳皮煎湯調服二錢即愈

耳鼻流血不止 照上口鼻出血各方治之

臍中出血並治齒上出血 俱用六味湯加骨碎補一錢飲之即愈蓋臍齒亦俱是腎經之位而出血俱是腎火之外越也六味湯滋其水則火自息焰矣骨碎補尚能止竅補骨中之漏者也故加入相宜或用鼻部鼻血第一方亦效

毛孔出血不止 猪瘦肉一厚片貼之即止如神猪皮亦可 又方 煮酒罍上紙扯

極細碎如楊花樣攤在出血處按之即止 又方 草紙燒灰候冷敷之亦止 又

方 穿山甲炒研細末敷之用布紮住即止隨取補血湯前見數劑全安有人手背毛

孔出血數日不止又一人腎囊上毛孔流血數日均用此方而愈效若仙丹凡油篋

破漏小孔油出不止者用此亦極效驗

毛孔節次出血不出皮脹如鼓頃刻口鼻眼目俱脹 此名脈溢症飲生薑汁二盞即

愈

### 諸汗

止諸汗法 健猪肚洗淨以糯米裝滿用線縫口放砂鍋內水煮極爛將肚與湯食盡

糯米曬乾爲末每用小盞空心米湯調服極效

自汗帶出者 鬱金研末臥時蜜調塗於兩乳即止 又方 何首烏末口水調封臍中

用布捆定即止 又方 五倍子 枯礬等分爲末口水調勻填臍中用布縛定亦

效 又方 舊蒲扇燒灰和粉撲之或用酒調服一錢極效

盜汗 睡中出者 爲盜汗

五倍子 研末

用人乳調蒸熟丸如龍眼大每用一丸貼臍上外以核桃壳

蓋之用布捆定一週時取下再換貼至十日後即止 又方 帶露桑葉瓦上焙乾

爲末空心米湯調服二錢數次全愈有人睡後汗出遍身衣被皆透二十年不愈後

照此方服至數日斷根真神方也 又方 雞蛋 個五 將壳輕輕敲破勿破內之白皮

浸童便內一晝夜用冷水漸漸細火煮熟食之數日即愈 又方 蓮子 眞浙江

黑棗 個各七

浮小麥 馬料豆 各一合

水煎服數次全愈其效如神

身出黃汗 此溼熱也將變黃疸照黃疸門各方治之

汗出不止 牡蠣 研一兩 絹袋撲之即止神效

### 遍身搔癢

身癢難忍 或癢如蟲行抓破見血或風熱疹子成顆成片後列各方皆治 消風散

荆芥 防風 當歸 生地 苦參 蒼朮 炒 蟬脫 胡麻仁 牛蒡 研炒 石膏 煨

知母 錢各一 甘草 木通 分各五 水煎服癢極者宜服此藥以消風熱即愈極重者外用

摩風膏 見雜毒 磨方 搽之極爲神效體虛者前藥斷不可服只用摩風膏外敷可也 又

方 白花益母草熬濃湯服並洗浴數次神效血虛者忌服只須洗浴可也 又方

胡麻仁 威靈仙 何首烏 苦參 菖蒲錢各三 甘草錢三 共爲末每服三錢淡酒

送下此武當山碑刻神方也 又方 荆芥 防風錢各一 赤芍 銀花 小生地各八

分木通分五 甘草分三 水煎服極效此葉天士先生方也 又方 蒼耳子煎水洗極效

或用生車前子研末水調搽或蜜調搽俱妙 又方 好熟白蜜酒調服並用蜜調

熱水搽之 又方 鹽升二 水石一 熬至一半候溫洗浴三五次能消一切風氣 又方

香附草又名莎草園地階墀處皆有其草只有兩莖高不過三四寸根名香附子用苗不用根 取苗二十觔少則不效 切細煎濃湯乘熱薰洗數次

汗出癢止常用即可斷根其效如神一切風熱發癢皆治 又方 赭石研末酒調

一錢空心服甚效 又用後南瓜方治之亦極效驗 一人夜靜面上皮內癢不可

忍諸藥不效 用滾水盪洗略住後用好醋煮滾加硫黃和入時時擦之而愈 又

方 一人田間收稻忽然遍身癢入骨髓用食鹽九錢以滾開水分作三碗泡之每

飲一碗以手抵住舌根使自嘔吐三飲三吐而愈 又方 一人渾身上下四肢俱

生風熱疹子成顆成片耳孔鼻孔俱已生滿心中發熱悶躁頭眼俱腫以滾水盪之

自在一時少刻又癢百藥不效後以燈火燒背脊兩傍共六下心口一下乳下二下

輒脇眼左右二下肩尖左右二下手灣上左右二下脈門左右二下虎口左右二下

小指節縫中左右二下圓膝下外左右二下腿肚之下左右二下大脚指丫左右二

驗方新編 卷八 遍身瘙癢

五八五

下天庭中太陽共五下隨用糯米搗漿調水服一茶碗精神鬆爽並用糯米漿以鷄翎蘸掃渾身二三次方愈 又一小兒身癢用生薑搗爛布包擦之而愈

風溼疹子 疹乃熱也不可用人參白朮當理血而不宜散血疹初起必發熱口渴狀

如紅雲一片與斑相同但斑無頭粒而疹有頭粒如蟲咬之狀用 元參錢三當歸錢二

升麻分五甘草分五葛根錢一水煎服 心火加黃連分三肝火加梔子分六肺火加黃芩 麥

冬錢各一 又方 生地 牛蒡 丹參錢各三 荊芥 防風 木通錢各半 石斛 連翹

錢各二 紫草絨 蟬脫 鬱金 犀角錢各一 西河柳葉五錢又名觀音柳 水煎服此葉天士先生

方也屢試如神西河柳能達皮膚非此不效體虛者少服

風熱疹子作癢心下迷悶 巴豆五十粒去皮煮濃汁以布蘸抹即愈

風熱疹子作癢成瘡 蠶沙一升水五斗煮取一斗二升去滓洗浴避風

遍身搔癢抓破見血 名血風瘡 老南瓜北人呼為倭瓜 去皮搗爛布包擠去水厚敷之

三日收功 又方 內服消風散前見外用黃連膏見鼻部鼻內生癰門 或摩風膏見癰毒 敷之極爲

神效 又方 楓子肉 蛇牀子錢各五 枯礬 點銅錫錢各一 共爲末加水銀錢二 和生

猪油搗融搽之並治坐板瘡及癬瘡蟲瘡其效甚速

痱子癢痛痱音 滑石錢五 菘豆四兩研成粉微炒 和勻以棉撲之



痲子作癢抓之又痛難於坐臥 苦參<sup>四兩</sup>大菖蒲<sup>二兩</sup>河水五瓢同煎數沸添水二瓢蓋片時臨洗和入雄豬膽汁四五枚洗之避風甚效或照各前方治之

邪怪

男婦病邪與邪物交獨言獨笑悲哭恍惚 明雄黃<sup>研</sup>蒼朮<sup>各一兩</sup>松香<sup>二兩</sup>先將松香燒化以虎爪和各藥末為丸如彈子大夜燒火籠中令病人坐其上以被蒙住露頭在外扶住薰之連薰三夜邪物自去愈後必然泄瀉多服平胃散<sup>見內外備用諸方</sup>自愈內有蒼朮最能辟邪此仙方也終身忌食螃蟹

驅狐怪法 凡狐怪作祟擾人用硃筆寫關聖大帝在此六字貼之如仍不去即誠心向關聖廟拜禱必去或立九天應元雷聲普化天尊牌位供奉中堂誠心拜禱或赴雷神廟禱告一切邪怪皆退緣關帝雷神能制邪魔誠求必應 又方 凡狐迷男女白日用口吸精夜間交媾如人用桐油擦陰處自去或用珠蘭根擦之則獸自死即將獸肉曬乾為末服之更妙

灸鬼法 治一切邪祟癲狂胡言亂語踰牆上屋尋死等症以病人兩手大拇指用線齊頭捆攏用艾絨於兩指縫中離指甲角一半分之處<sup>名鬼哭穴</sup>半在甲上半在肉上四處盡燒一處不燒其疾不愈神效不可量也 又方 絲綿<sup>一尺</sup>燒灰兌酒服或開水

驗方新編 卷八 邪怪

下均效

制邪鬼法 端午日午時用猪頭血和明雄曬乾收之或燒煙薰或帶身旁即能制鬼

又方 端午日以雄黃擦狗口鼻用樟木燒煙薰之此狗即能制鬼

辟鬼火法 夜行時見碧火出沒此鬼火也能奪人精氣用鐵馬鐙敲動作響即滅

鬼箭傷 鬼打傷死見急教門 身痛有青色用亂髮擦之髮捲成團而硬者即是用金銀花 煎水

飲之即愈 又方 山梔 炒 灰麪 炒 桃枝尖 個七 共搗融作餅貼之次日將餅取下分

作七丸放炭火中燒之燒時聲響即愈不愈再燒以愈為止 又方 狗骨燒灰 錢二

梔子 個七 灰麵 椿芽 兩各一 共為末醋調敷切忌鍼刺 又方 有人為鬼氣所中腿

上生瘡百藥不愈後用乾狗糞枯而白者燒煙向瘡口薰之拔出清水數碗亂髮十

餘團而愈又有一人折足腫痛不能履地屢治不效亦用狗糞薰之初次不效二次

拔出肉疔三箇而愈 又方 鐵渣 取細淨者二兩 核桃 又名胡桃取淨肉一觔 桃仁 兩八 同入磁瓶內加好酒

四觔蒸熟每日不拘時隨量飲酒蓋被取汗服後痛甚無妨越痛越好服完自愈

增補驅邪怪法 取州縣官堂上硃筆在病人心上寫一正字頸上寫一刀字兩手寫

兩火字即愈蘇州韓氏家僕遇邪以此法治之寫至左手火字其人張目大呼曰勿

燒我我即去也自此怪絕事載子不語集 又一婦為怪所迷百計不去後設法將

怪推入婦女屎桶中變朽木燒之遂絕 又一人忽見黑氣入褲中似覺婦人陰戶一接而精即流出符藥不愈其人平日虔祀呂祖忽一道人教佩麝香可愈初佩麝假而少不效後用真麝香兩餘佩帶身旁其怪遂絕

奇病

頭頂生瘡五色形如櫻桃破則自頂分裂連皮剝脫至足 此症名肉人常服牛乳自

愈或照頭部葡萄瘡治之亦效

眉毛搖動晝夜不眠呼喚不應飲食如常 大蒜<sub>兩</sub>搗汁兌酒飲自愈

頭面發熱身有光色 大蒜汁<sub>錢五</sub>酒調服吐物如蛇即愈

面腫如斗眼中見人只三寸長 此痰症也用 瓜蒂<sub>炒</sub>紅飯豆<sub>錢各一</sub>水煎服一二劑

使痰吐盡腫消而愈再用 黨參 焦朮 茯苓 半夏<sub>錢各三</sub> 甘草<sub>錢一</sub> 陳皮<sub>分五</sub> 水煎

服

見一物如有兩物 此好食魚鮮所致食薑醋加紫蘇水數日而愈

見一物如兩物或三四物又見桌椅等物平正者視之反歪斜歪斜者視之反平正

或用補藥瀉藥寒藥熱藥皆不效又服滾痰丸更不效者此胸膈有伏痰也用 常

山<sub>五錢</sub> 酒<sub>錢</sub> 黨參<sub>錢三</sub> 蘆<sub>錢三</sub> 甘草<sub>錢一</sub> 生薑五片水二碗煎八分食遠服吐痰而愈

驗方新編 卷八 奇病

五八九

酒後嘔吐視物顛倒、治法見煙酒醉傷門

眼見諸般飛禽走獸以手撲捉則無 此膽肝邪火也用 棗仁 羌活 青葙子花

即草決元明粉各一 共為末每服二兩水一碗煎七分和渣飲之一日三服即愈

眼見五色之物忽又變成美女 此色慾過度虛極所致急請明醫診治必愈

愛食猪油或生油生菜 均見痞癰門

口鼻流出臭水以碗盛之內有魚蝦走動捉之即化為水 此肉壞也多食雞自愈

口鼻中氣常出不散凝如黑蓋過十日後漸漸至肩胸與肉相連堅如鐵石 澤瀉煎

湯日飲三盞連服五日即安

身發寒熱四肢堅硬如石敲之作鐘磬聲 吳萸二錢先用熱水泡過 煎水 木香二錢 研末兌服自

愈

週身皮肉內滾滾如波浪聲癢不可忍抓之血出 此名氣奔症用 虎杖又名苦杖大蟲杖酸杖其梗似

紅蓮其葉圓似杏其枝黃似柳其花似菊 其色如桃花其樹高數丈或丈餘不等 台黨 青鹽各二錢 細辛七分 水煎緩緩服

面如蟲行不時燒熱 此症恐是麻風查麻風症辨明治之

身如蟲行癢不可忍 此風熱也照前遍身搔癢方治之

身如蛇蟲行走作咬或腹中蛇蟲鳴動 此症恐是蠱毒查前蠱毒方治之

皮膚中如有蟹行走有聲如小兒啼哭 此筋肉之化也用 雷丸 雄黃錢各五 共爲末 搽猪肉片上火中燒熟食之即愈 又肋下生瘡有聲如小兒啼哭治法見肋部內

皮膚手足之間如蚯蚓鳴 此水溼生蟲也用蚯蚓糞敷於患處一寸厚鳴止再用

薏苡仁 芡實兩各一 白朮錢五 生甘草錢三 黃芩錢二 附子分三 防風分五 水煎服即愈此治溼則蟲無以養又有生甘草以解毒殺蟲防風去風而逐瘀附子斬關而搗邪所以奏功如神

週身發斑眼赤鼻脹氣喘毛髮硬如銅鐵 此胃中熱毒結於下焦用滑石 白礬各兩 水二碗煎至一碗冷服即愈外用吳茱萸末熱醋調敷兩脚心 遇時一換以愈爲止此法最妙

身上忽現蛇形痛不可忍 外用雄黃末猪油調搽內用托裏解毒湯見內外備用諸方門 即愈氣旺者用荆防敗毒散見同上 更妙 又方 取雨滴礫石上苔痕用水融化噉之即消 又癰毒門內有蛇形瘡方可參看

週身忽然肉出如錐癢而且痛不能飲食 此名血攤症不速治則潰爛膿出急用赤皮葱燒灰淋洗內服淡豆豉湯數盞自安

1 遍身生燎泡如甘棠梨破則水流其泡復生內有小石一片如指甲大 此症抽盡肌

肉難治 三稜 莪朮錢各一 爲末酒調服效

自頭麻至心窩而死或自足心麻至膝蓋而死 小孩糞乾結者佳 稀者不用 陰乾瓦上燒枯燒至

煙盡爲止每服三錢豆腐漿調服或用豆腐調服亦可甚效 又方 川棟子燒灰

爲末每服一錢黃酒調下不如前方之妙外用吳黃末熱醋調敷兩脚心一 遇時一換以愈爲止此法最妙

臨臥遍身虱出血肉俱壞漸生漸多舌尖出血身齒俱黑唇動鼻開 日飲鹽醋湯數

碗十日自愈

忽有人影與己隨行坐臥則成形與己無異 此名離魂症用 黨參五錢有力者用人參一錢 或用高麗參三錢亦可

辰砂 茯苓錢各三 煎服數劑俟形影不見再服十全大補湯以免後患

人前不食背地偷食見人則避面色黃瘦 此名鼠膈病乃食過夜鼠饑之涎所致用

十大功勞葉一名鼠 葉似蒲扇有五角角有刺焙乾爲末每早空心服一錢酒下服

至半月即愈

臥牀四肢不能舉動口說大話並喜說食物 此名失說物望病也病人如說食肉便

云與爾食猪肉一頓病人聞之即喜以肉放病人前臨要吃却不與吃此乃失他物

望也不必服藥其人睡中口流涎出自愈

瘡癩內有雀鳥出者有亂髮出者有瓜菜出者有雜物出者 此邪祟也用 狗糞乾要

而色白者燒煙薰之越出越多出盡自愈

人生尾巴 用藥線 見雜毒 摑住尾根漸漸摑緊半月自落落後再請名醫診脈多服補

陰之劑以免復發

### 雜治

治熱病法 外用吳黃末熱醋調敷兩脚心一遇時一換以愈為止此法極妙 凡熱病有心胸煩悶者有日久沉睡不言者此火伏

於內也用菘豆和建橘餅煎湯溫服一面服以清涼之藥一面以此湯飲之自易奏

效再以好梨食之更妙

困倦喜睡齒暗無色舌白昏昏不知痛癢處或下痢或不下痢 此蟲食肛門症也用

桃仁 十五粒 去皮尖 好醋 一碗 鹽 三錢 煎熱連桃仁服

沉悶無聊若有病狀 一人沉悶無聊若有病狀遇一名醫云此熱症已極氣血消燦

不急治一二年後必發大癰而死惟每日食好梨一個服至一年不可間斷依法服

之而愈梨久易壞照後收藏食物法可以久留

夜不能睡 生地三錢 麥冬二錢 北五味七粒 水煎連服三日必愈 燈草一兩煎水當茶飲向晚不可飲茶

飛絲纏身 飛絲纏住耳鼻手足等處腫痛不已用 威靈仙煎濃湯洗即愈

身上無故生蛆 蛇脫研末麻油調擦蛆出自愈

除虱子 一人臨睡周身虱出數升血肉俱壞每宿漸多癢極難言舌尖血出不止身

齒俱黑唇動鼻開用鹽醋湯飲之十日而愈尋常生虱子者用後銀硃方神效

辟臭蟲 臭蟲多則迷人耗損氣血須將門窗關閉緊密無縫用宣木瓜燒薰極效居

客店者尤宜蒸之 又方 硫磺錢數為末和棉花子燒煙薰之二三次即去又後有

銀硃方最效

辟蠹魚跳蚤虱子臭蟲 七里香即芸香置書中及蓆下自去 又方 頂上銀硃一兩紙

捲燒薰一切蟲蟻蜈蚣聞之即死真妙方也

辟螞蟻 粵西螞蟻最多有入衣箱及被褥者一見大蒜即去或勤加點檢亦去

辟白蟻 梔子能消白蟻為水或用前銀硃方極效

辟蛇 香白芷栽植園中蛇不敢入 又方 獨腳蓮草初發生時便似蓮房栽植園

中蛇虺不敢過其下 又方 用雄黃如桐子大燒煙以薰衣服被褥之類則蛇不

敢近

辟蜈蚣 頭髮燒煙薰牀下或廚房蜈蚣聞之入土三尺或用前銀硃方尤效

辟食屍蟲 有種怪蟲愛食死屍揮之不去惟用豹皮將尸掩蓋則散

收蚊蟲 五月五日取癩蝦蟆一隻剖開不去腸埋入十字街心六月六日取出將蝦蟆



肉在房中壁上畫一圈其蚊盡入圈內此房永無蚊患 又方 五月五日五更時  
使一人在堂中向空扇一人問云扇甚麼答云扇蚊子凡七問七答不可嘻笑一夏  
永無蚊入此山西九十老人黃澹翁所傳也

耗鼠竊油 香油加一入桐油兩三點燈鼠不敢竊

野豬踐食田禾 用機軸織器具置放田中自去

辟盜賊刀兵疾病鬼怪虎狼蛇蟲 螢火蟲 鬼箭羽 蒺藜兩各一 雄黃 雌黃各二

羚羊角煨存性一兩五錢 枯礬兩二 鐵錘上木柄取錘眼中苦燒魚一兩五錢 共爲細末加雄雞冠一具雞蛋數枚

黃丹五錢和搗一千下爲丸如杏仁大用三角形絳色綉包每盛五丸入病人家帶

左臂上從軍繫腰中居家掛門上行船掛船頭可避賊盜刀兵疾病鬼怪虎狼蛇蟲

有人在軍中配帶此藥賊放箭礮離身數尺即落不能傷人此務成子方也見本草

綱目螢火註

避難時止小兒啼哭 預備綿爲小毯隨兒大小爲之以甘草煎濃汁或用熟棗膏浸

過有甜味者隨身帶之臨時以口津潤透放兒口中兒不啼哭免賊搜尋賊過則去

之前朝靖康年間有神人書於通衢救人甚衆

止火法 凡遇火起之處用雞蛋三箇每箇大頭寫溫字小頭寫瓊字向火焰絕高處

儘力擲去口念 敷施發潤天尊連擲連念其蛋落處火焰自低矣 又方 火起之處不論遠近各家男婦大小每人持米一盤誠心向天搖簸口念 敷施發潤天尊其火自熄康熙年間山西伍某事母極孝一日母病禱於神夢神人告曰爾母病易愈惟爾村中月內當有火災可速遷避某因事未及遷居後屢夢神人促之某問神禳解法神即以前二法告之數日後村中火起某告村衆如法施之其火頓熄此亦黃澹翁所傳

救飢法

凡幾年官民設廠施粥多有奸徒攪和石灰串通濶利南北皆然不可不察

糯米三升水淘慢火炒熟 芝蔴三升水淘慢火炒熟先

將糯米磨粉後入芝蔴同磨爲末 又用 紅棗三斤煮爛去皮核搗和爲丸每重錢五

日食一丸滾水送下可以不飢 如無糯米紅棗即粳米黑棗亦可飢年製送功德

無量 又方 板栗皮去紅棗皮去胡桃核去皮即柿餅帶去各等分蒸一二時取出放石臼中

搗極融爛捻爲厚餅以冬月吉日修合曬乾收貯一餅可耐三四日不飢過三四日

再服一餅便能耐久此藥補腎健脾潤肺清肝須細嚼爲妙 又方 黑豆升七芝蔴

升三水淘過即蒸不可泡久蒸過曬乾去壳再蒸以三蒸三曬爲度搗爲丸如龍眼大

每服一九三日不飢 又方 紅薯洗淨蒸熟候半乾搗爛加糯米粥和如泥糊竹

籬上愈久愈堅不蛀不壞如遇荒年取手大一塊煮清粥一大鍋食之能耐飢或做

土塊樣砌成牆壁留下更妙 又凡遇凶年施粥飢民急於得食若過於沸熱必傷腸胃往往食後百步間即撲倒而死宜於夜間煮粥盛大甕中次早以木棍攪勻與食最妙 又餓極之人不可食乾飯乾物宜以極清稀粥少少與食一日食數十次總不宜多或以稀粥潑桌上令其漸漸吮食食至數日後方可稍食乾飯亦不宜多緣飢久腸細飽食往往脹死乾隆戊戌年間湖南省歲歉施粥飢民貪食死者甚多後用此法活人無算

行路不迷 帶龜而行雖入深山無人處至三叉路口將龜放下依龜而行自不迷路夜行無恐 用右手中指在左手心寫我是鬼三字將手握緊自不畏懼黃澹翁傳

客路須知 凡水陸舟車孤村野岸之處有一種悶香賊匪稍不防備即被迷悶竊掠

一空臨睡時口含冰糖沙糖片糖亦可或含甘草可免如或吞下必須添含其門腳窗縫多撒

白沙糖黃沙糖亦可爲妙或用清水一盆置房中亦免昏迷並辟邪鬼如被迷悶不醒飲冷

水或糖水甘草水均可解 又睡時用明雄塊要大戴頭上或繫左腋下亦能辟邪

又客店人多屋少之處多有人死未及殮埋將屍藏匿榻下尤宜詳細看

暈船暈車 凡坐船頭暈嘔吐者開船時向 天后宮或江神水神之處誠心拜禱即安或飲童便最妙飲白沙糖水亦可或用撐船竹篙水滴碗中以滾開水沖服亦效

又方 下船時將竈心土一塊藏髮中勿使人知即安或寫土字於手心坐船即不恐懼取土能掩水之義暈車嘔吐者亦飲童便為妙或白沙糖水亦可

渡江膽怯 用黃紙以硃砂寫禹字戴身旁自安黃澹翁傳

罪囚邪術避刑

有口含藥物或帶身旁或貼差役內侍德運尤宜加意關防

黃紙上用硃砂水印二顆先將印用皂角洗淨油一貼罪囚背上

一貼心口並用菜豆煎水與服水破甚效 又方 用細竹條出其不意撲之或於夜靜忽然提訊猝不及防亦可破也又有運氣自耳鼻及糞門出者塞其耳鼻糞門

自招

造屋禳解 凡起造房屋先請善觀陰陽者逐細查看屋內如有邪怪即將瓦椽折去

用牛將地犁過一次若有古塚必須作文祭禱起遷另葬為要

解酸酒法 頭二蠶沙乾者量酒多少加減酌用布包放酒中封固三日後開飲味好

且能益人 又方 紅飯豆扁而微紅者是炒香量酒多少用布包入酒中味即轉正 又方

如酒一觔加鹼水一二滴試過再加不可多亦不可少加後即炖熱飲久則味變

酒店多用石灰解之飲之傷人

製食物法 煮肉用籬上舊竹篾捆之則易融爛 煮肉燒肉忌用桑柴火 蒸腊肉

或火腿取燒紅炭放皮上略燒片刻則皮易爛 煮臭肉須切用短稻草同煮其臭

氣盡入草內 暑天煮凍肉將肉煮透放灰中過夜即凍 又方 用洋菜煮融和入亦可 夏月肉用醋煮可留數日 炖羊肉加青草一把易爛而不羶 煮雜色羊肉加松子數粒則不毒投竈邊瓦一片易爛 煮老鴨放竈邊瓦一片亦易爛 洗猪肚猪臟用鹽或用糖則不臭用麵同洗亦可 煮魚臨熟入川椒數粒則去腥用枳實數片或鳳仙花子數粒則骨軟下木香亦不腥 造魚鮮先用鹽並礬醃洗去涎再用炒鹽紅曲末醃透入罈則經久味佳 糟蟹用皂角一寸置罈底則黃不沙亦不散或入白芷黃亦不散 醃薑片用蟬蛻泡水洗再用蟬蛻數箇入罈底雖薑老亦無筋 煮笋入薄荷加鹽則不老而味更鮮 醃茄入石綠數顆則切開不黑 食蒜與生薑棗子同食則不臭 洗象牙器或用豆腐渣浸擦或用人乳浸半日洗之 象箸油透插入芭蕉梗內則淨白如新 伽楠香枯以新荷葉包裹露過夜即發香如新 寫石碑用皂角水調硃寫上不落

收藏食物

米中放螃蟹壳日久不蛀 梨用蘿蔔隔開

小蘿蔔整用大蘿蔔切開用

勿使相着用竹篾

收藏

器木

經年不壞屢試甚驗 香櫟收法與梨同

橙橘以菜豆拌收經久不壞

用松毛包藏三四月不乾用有蓋新瓦罐每罐放一箇密封藏樓上更可經久此法

最妙

書中藏芸香

又名七里香

可辟蠹枝葉皆可用

筆用硫磺水浸過收藏不蛀或用

川椒水貯筆套內 硯水當嚴寒時用荔枝壳煎湯或川椒煎湯寫字不凍 瓶花水夏日入火燒瓦一片不臭冬月入硫磺不凍 皮衣包裹緊密不使透風箱內四角各放浮水之蘆甘石一塊可收溼氣永不生蟲

試井中毒 凡古井及五月井中恐有毒淘井者不可輕入先以雞毛投入試之毛直

下者無毒回旋者有毒

以好熱醋數斗傾入則可下矣

耐點燭法 黃臘 松香 槐花 浮水石各一 共為細末鎔化用燈心澆成燭一晝

夜止點一寸

留宿火法 胡桃一箇又各核桃 燒半紅埋熱灰中三五日不燼

各物污衣 凡衣被污壞總以先用滾水泡透再照後開各方加洗 墨污者飯洗或

棗洗或燈草洗 黃泥污者薑汁洗 血污者蘿蔔湯洗或小便洗 瘡毒膿血污

者牛皮膠洗 漆污者先用油洗水搓再用杏仁嚼洗 藍靛污者杏仁嚼洗 膏

藥污者或用油洗或用滾酒或用竈心土 檳榔水污者白醋洗 酒醬醋污藕汁

洗 清油污者蜜洗或蘿蔔水洗 豬油污者栗子洗 牛羊油污者石灰洗 桐

油污者豆腐渣洗 煙油煙又名屎污者瓜子嚼洗或用米洗

墨污絨綾皮棉衣服 滑石為極細末和水調上乾即掃去自除或用赤石脂末更妙

墨污紙絹書畫 燈草水洗 又方 礪砂錢一百草霜分二明礬分五用雞蛋箇一去黃留白

將藥爲末調和裝入雞蛋內曬乾用時塗字背面待半乾用指輕彈墨自落

去墨法 用西瓜一箇半熟者約重三觔蒂邊開一孔入官礪砂錢五礪砂錢四共爲細

末入瓜孔內將孔蓋塞懸一七白霜自出以翎毛掃下又一七收取用時先將清水

溼墨以藥蘸上待乾用翎掃淨紙白如新

去礪法 黃瓜一條蒂邊開一孔入官礪砂一兩依上去墨法取霜用之

書被水浸 揭不起者蒸片時可揭

去書畫雨漏痕 大甌中蒸片時取出曬乾至一二次後用物壓平其痕自退十分之

八

辟穢氣 零陵香草 生大黃兩各四 蒼朮 白芷兩各三 沉香 芸香 山奈 辛夷

甘松兩各二 共爲細末燒之大可辟穢

辟油漆氣 凡房屋器皿新經油漆者其氣難聞將菘豆煮滾取器薰之其氣漸收或

以菘豆汁洗之更妙

阿膠着物臭氣不退 牆壁舊紅對聯紙燒煙薰之即退

禽獸諸疾

驗方新編 卷八 雜治

鶴病 蛇牀子和大麥煮熟餵之

鹿病 用鹽拌料豆餵之豌豆亦佳

百鳥瘡 鳥飲惡水臭生爛瘡甜瓜蒂爲末敷之即愈

百鳥翅足折損 餵以芝麻油嚼敷患處自愈

雞病 眞麻油灌之立愈若中蜈蚣毒則研茱萸汁灌之

雞瘟 巴豆一粒搗極碎香油調灌入口即愈又菜豆磨粉水和成條餵數次愈 又

方 生硫磺灌食極效

雞病 眞香麻油灌之

犬病 以水調平胃散見內外備用諸方灌之

貓犬生癩 硫磺拌飯與食極效或用硫磺納豬腸內煮熟餵之或用百部煎水塗之

狗蠅多者以香油遍擦立愈

貓病 烏藥磨水灌之如被人踏傷蘇木煎湯洗小貓啼叫不止陳皮研末塗貓鼻即

止

豬病 割去尾尖出血即愈若瘟疫用蘿蔔菜或同樟樹葉與食之不食則難救

豬瘟 大黃錢五朴硝錢五共泡湯一罐傾出候溫竹筒灌下瀉出毒即愈 又方 貫衆



三猪牙皂<sub>兩</sub> 一水四五碗煎二三十滾再用朴硝末三兩煮一二滾候溫灌下亦效  
牛猪病 大黃 黃芩 黃柏 梔子 連翹 柴胡 蒼朮<sub>兩各三</sub> 水三大碗煎一碗  
灌之自愈

牛羊猪瘧 牙皂 細辛 川烏 草烏 雄黃同燒灰研末吹入鼻中五六分即愈  
加麝香二三釐更妙

牛馬疥癩 蕎麥桿燒灰淋汁洗又藜蘆爲末水調塗甚妙

羊生疥癩 鍋底煙子及鹽與桐油各二兩調勻塗之

馬病 用白鳳仙花連根葉搗汁熬膏有病抹其眼四角上即汗出而愈

### 附愈病法

凡人有病如照方醫治即愈大屬妙事若患病危篤醫藥罔效不拘老幼但能放生百萬無不起死回生蓋放生延生事本一貫救生免死理自不誣無奈世人扭於師巫邪說殺生祀神者頗多言及放生則羣笑爲迂而不顧世俗皆然鄉農更甚殊不知人之與物知疼覺苦總是一般試思物之將殺而望救何異人之將死而求生乎我能救物命於臨危而我命自必增延於欲絕理固必然報無或爽請以殺生祀神之費用以放生必能勿藥有喜也茲將放生可以愈病感應略錄數事於後 武林周

志學生八子六子俱夭死餘二子亦孱弱多病時有不育之慮志學年逾五十心甚不快後至西湖遇一道裝鶴髮童顏者謂曰子若重有憂者周告以故且求小兒延壽之方曰人物雖殊生理本一爲父母者於小兒生日及每月本命日誠心爲之放生則生機相感命自我召生兒永無夭殤之患志學謝之由是凡遇小兒生日及每月本命日買魚鱗螺蛤雀鳥之類或一二三百文六七八十文虔心放之甫一年二子並彊健漸而成立志學徧告同人仿而行之者百試百驗 嘉興李涵春舟泊鎮江夜聞蛙聲竟夜不寐黎明起視見傍岸一船載青蛙數萬問之乃云販去江北賣者李心惻然盡買放之江潏歸及其妻言子病幾死於某日忽愈李驚喜因憶放蛙之日即病痊之日也由是放生益力 長沙張裕後素行善事年四十歲患病夢神告曰子逾年當死能救活十萬命尙可延張驚醒即廣買水族放生逾旬復夢神人告曰子放生之數已滿命可延矣病遂愈由是放生益力壽至九十五歲無病而逝 杭州顧迴東敬事一神將迴東孫女痘危不治率子禱神將前子忽仆地良久乃甦曰適隨神將至一處云大士殿命我跪伏聞殿上語曰速召痘神張公少頃痘神至則一童子約十五六歲向大士行庭參禮大士索冊視之應於本月初六日子時死大士以筆判放生二字於下痘神辭出有頭戴尖帽者二人及青衣數百人向痘

神求保神曰已知因以册示我命歸卽甦是夕孫女痘卽轉不一日竟愈蓋迴東於是日途遇漁者得二鰲及青螺數百買而放之卽得是報

### 藥物備要

地黃 以懷慶產者爲上聞彼處頂上者每觔需銀一兩有奇近來兩湖兩廣每觔不過三五百文至多亦不過七八百文焉能無假忍以透心黑者爲佳中心微黃者次之有以紅白蘿蔔以地黃汁浸透假充尤宜細辨

白朮 於潛產者爲上然貴而難得此外以朮內色白者可用不白卽係蒼朮用之有損

茯苓 取整箇切片照之微有筋膜爲眞近來多以米粉和苓末咀片假充又有以米粉包裹松根種成整箇者亦宜細辨

茯神 眞者本心或在旁或在中亦不止一心切開有筋膜者是也假者本心在中且止一心而無筋膜

人參 參最易蛀見風尤易蛀惟納新器中封緊經年不壞若炒米包藏須攤過一夜方用否則參亦易壞然炒米不能生蟲或用新綿包之又參最忌日曬惟火烘不妨煎參須用流水用止水功緩參本多假難以辨認無力尤不易得是故集中少用

高麗參 多以東洋參及別藥假充法用大紅縐紬包裹蒸之使縐紋顏色透入再用桂圓肉汁拌入烘乾色味與真高麗參無異欲試真假以氣虛及昏暈時服之即可知矣

黨參 色黃味甜枝軟菊花心爲佳有以一種甜黨染色假充者功緩無力

鶴不食草 又名石胡荽野園荽雞腸草地胡椒地桐薑葉小花黃子如胡椒塔砌及平地隨處皆有

旱蓮草 又名鱧腸草墨頭草墨斗草墨東草其莖微紅折斷處卽變黑

紅芽大戟 肉色微紅者眞色白者名綿大戟瘡毒用之不效

穀樹 又名楮樹楮樹葉有兩杈如雲板樣亦有無杈者以刀紮樹身有漿流出者是甘遂 味苦寒每觔用甘草四兩煎湯浸入三日後去湯用河水淘洗後用淨水浸之

每日數次三日後去心再淘再浸四五日取一撮入白磁盆內隔一宿看盆中水色不變乃妥再淘三四次瀝乾以麵如團入糠火內煨煨去麵團四面皆黃內藥熟透

取出曬乾入鍋炒透磨粉其苦寒之毒經製則淨不苦而甜不寒而溫專消堅結痰

塊核毒

木鱉 水浸半月入鍋煮數滾再浸熱湯中數日刮去皮心每日辰時入香油鍋中煮

去油沫盡再煮百滾透心黑脆以鐵絲篩撈出卽拌入炒紅土磚細粉內拌至土粉有油氣入粗篩篩去油土再換炒紅土粉拌一時再篩去土連製十日時刻不可錯亂以木鑿同細土鍋內再炒入盆拌罨一夜取鑿去土磨粉用此物能搜筋骨入髓之風溫祛皮裏膜外凝結之毒痰所煎之油可入熬膏用此物最毒倘炮製不透服之必發戰而死是不可不慎也

乳香 如乳頭明透者良近來多以楓香假充性粘難研每兩用燈心二錢五分同炒炒至圓脆可粉爲度扇去燈心取香磨細用

沒藥 色赤如琥珀者良亦用燈心同炒與製乳香同

冰片 多以樟腦假充以牙色如梅花片者良用杉木炭養之則不損耗

血竭 味甜鹹色赤以染透指甲者爲真若味太鹹有腥氣者是海母血假充  
阿魏 味極臭取少許沾銅器上過夜沾處色白如膠者真

珊瑚 色黃如膠者真

沙苑蒺藜 以潼關產者良皮貨店所帶形扁如腰子色綠者真

赤小豆 又名飯豆扁而紅者是若半紅半黑名鬼眼豆無益有損斷不可用

烏梅 生青梅蒸熟用稻草灰拌入曬乾卽是店中多以小李假充必須自製用之方

效

柿餅 以大者爲佳有以小野柿假充用之有損

痺麻子油 草麻子五升搗爛用水一斗煮有白沫卽取起待沫盡乃止去水將沫熬

至點燈不炸爲度

燈心炭 取活竹一段兩頭留節中間開一眼以燈心塞滿外將原刻竹仍填原眼加

泥裹好入糠火內煨至竹成一炭取內燈心炭用

阿膠 味不臭者佳色綠者爲上有氣味者必假不如好牛膠代之

鹿茸 茸有數種佳者頗不易得茸片尤假一人與茸客至交因體虛向客索得血片

一觔服之體虛如故毫不見功怪而問之茸客醉後吐實係用牛尾豬血和藥做成

其片放手心亦能捲動與眞茸無異

鹿膠 凡膠以自熬爲眞鹿膠須眞關東鹿角熬服方效若川角魚角色白而長者無

力

龜膠 此膠亦宜自熬板以厚而黑者爲佳黃而薄者無力

龜板 龜板生用有力藥店多以熬過龜板混充不可不辨

癩蝦蟆 又名癩團又名老蟾目大腹無八字文者不可用

蜣螂 又名推車蟲推屎蟲以人糞一團如推車者是  
搔蛺子 本名蛸蛺蟲又名偷油漣江蘇人呼爲髒娘有翅能飛其色紫如油竈邊及  
有食物之處最多

蜣蚰 本名蛞蝓又名鼻涕蟲其形似也

蝸牛 頭有鬚尾有螺壳者是

螻蛄 又名螻蛄卽土狗也

蠃蟲 大如蜜蜂腹四扁微黃綠色喜食牛馬血





## 張序

痧字書皆不載右台仙館筆記謂集韻有瘧字音蘇疾也痧字或當作瘧痧與瘧乃一聲之轉也集韻又有瘧字亦云疾也今世有瘧痧之疾或古作瘧瘧歟又說文有疝字注腹中急也廣韻音古巧切與絞同音即古絞腸痧矣按疝方書云穢氣感觸邪熱而發之病是爲今之痧症無疑然古今方書汗牛充棟宇論述此症者多賅於時疫專言主治者卒渺景岳全書雖問一及之未深切著明坊行析微理化全書亦流傳未遍林氏藥權痧症要法析理明論症審詳宜忌便施治誠瘧瘧之元龜疝症之指南也夫穢濁之氣閭閻浩穢爲尤甚望溪之誌陳馭虛也述其言曰京師人畜駢闐食腥葷溷區偏側溝渠污濁無大川廣壑以流其惡方春時地氣值盈上達淫雨汎溢炎陽蒸之中人膈臆困憊忿蓄而爲厲疫大江以南地益卑溼黴雨霪人炎曦敲蒸加以射工伺影飛絲觸肌燥溼寒暑迭乘爲災所謂愾溷鬱邑毆溫致溼中心慘怛生病造熱殆爲斯地發矣故氓庶熙攘嗚踏於塵埃者相屬卽竹皮韋帶之士襪襪觸熱亦往往不免懸壺之客束手莫措進帛布單衣輩奏其剝摩砭刺之術技工者亦能稍定其脅亂而邪氣結轉精神越濞縣縣延延茶然不能自振使早以林氏是書從事灑練臟腑輸寫澳濁已泯然而汗霍然而愈矣此古所以致慨於醫之所病病道少也余雕驗方新編竣事有以續編請者因考其字義而兼識此書之有益於南中人士云

## 王序

凡著述之有裨日用者皆足以傳世行遠而莫切近於醫沙症書尤切近中之切近者也余曩於一切藝術頗未措意乙卯丙辰侍先大父疾兩載粗究醫藥之事旣而終天抱恨亦遂置之辛巳承乏泉南會沙疫流行夏

秋才劇雖多方拯救十嘗六七不治如皋吳渭泉大兄素精軒岐馳譽日下客秋觀察來閩亟以此症相詢渭泉出閩人林藥樵所著痧症全書見示且云刺藥並施業已行之有成效余按溫疫痧症相爲表裏明季吳又可著溫疫論上下卷已收入欽定四庫全書獨林氏書較晚出未被甄采而實足補吳書所未備因德惠重刊以廣流布他日家置一編按方求治不致倉卒無所措手用仰副聖天子痼瘼在抱之至意未必非是書之功也鳩工有日渭泉行將去茲士余乃屬諸槐坡重加校勘付諸剞劂以成渭泉之志於其行也祖道城西濡筆而爲之序

道光壬午仲冬上澣福建鹽運使司鹽法道仁和王楚堂識

### 吳序

道光辛巳夏余自皖赴閩任假歸雒泉展視松楸時淮揚間沙疫流行猝不及治過吳門尤甚晤姑蘇諸名醫詢以治療之方據云沙症時有特未見如是之奇且驟者一患吐瀉卽脈沉支冷眼弔足攣投溫散涼解均無效近張子壽田刊林藥樵痧症全書方藥詳備且有剞劂諸法甚效亟索一卷于途中閱之信然予甚珍之壬午夏泉州郡亢旱沙疫復行延及省垣諸槐坡明府精岐黃術憐沙症猝死之多云閩醫涼熱兼投十不一活豈斯症果不可救耶余出此書示之去旬日復來云刺藥並施所濟甚多是此書不爲無功于世矣嘗考醫學原本內經東漢張仲景出著傷寒方論立三百九十七法一百一十三方以濟天下後世醫林尊爲神聖嗣是以後諸名家著書立言於十三科病症分門別類殆已備論無遺而溫疫沙症則古無專書發明者鮮明季洞庭吳又可著溫疫方論國朝康熙初閩人林藥樵著痧症全書二君可謂補前人之未備而成一家言者也顧吳又可溫疫論已遍行海內而林藥樵痧症全書傳者獨少故治痧症視溫疫較難其斃較速且邇來春夏之

交多溫疫夏秋之際沙症尤多按古方沙症醫法祇附見於絞腸痧乾霍亂吐瀉諸症門中至刮沙鍼刺諸法景岳全書雖亦言之然卷帙浩繁讀者忽而不講今閱林藥樵所著痧症全書其中經絡刮刺方藥宜忌一皆採集羣書惟沙症名目不見古書意作者自出心裁以新聞見而議論中肯治藥不偏將方改爲八音分紀編成歌訣極其簡明洵醫津之寶筏不特操是業者當讀卽鄉居行旅倉猝無醫得此全書按病求方不致茫無措手其所濟不尤博耶按景岳全書所載刮沙鍼刺諸法此書未詳茲附刊于後以備取法

道光二年歲次壬午仲夏中浣福建督糧道分巡福州福甯兼管水利事務加三級如臬渭泉氏吳儂識

### 宋序

嘉慶庚辰秋人多吐瀉之疾次年辛巳其病更劇不移時而殞者比比皆是此症始自廣東今歲福建臺灣患者尤甚或云自船趨風來（按趨竹角切音琢風名吳中梅雨旣過清風彌旬謂之船趨風蘇軾有船趨風詩）此言未盡無稽病起卒暴多致天橫拯救無方殊堪憐憫適沈君月枝自通州攜來痧症全書三卷係閩中林君藥樵氏所著內載青筋白虎霍亂等名皆以痧治先用鍼刺宣泄壅閉之邪然後另施湯藥因思今之時行吐瀉頃刻之間轉筋脈伏醫藥所不及救急之法莫速於鍼刺且景岳全書霍亂門中載有此法如法試之屢獲奇效因屬張子壽田重校付梓並補繪應刺經穴之圖俾倉猝之間便於按經鍼刺以廣其傳想仁人君子有同心也是爲序

道光元年七月望日分巡常鎮通海等處地方兵備道兼管河務加三級仁圃宋如林識

### 刪訂痧書何序

古無痧字本作沙今俗作痧又省作痧

痧無專書雖古有絞腸痧乾霍亂青筋白虎中惡等症治而禁忌未明剖析未盡千古如在暗室醫家詫爲怪

322

驗方彙編 序

六一三

症稍知推拿焯刮者又禁人服藥迷訣就斃可勝悼哉康熙初林藥樵始以痧書授王養吾丙寅刻晰微補化全書未廣流傳乾隆丙午江甯有重梓施送者沈氏尊生書亦已收入而見者卒鮮爰爲刪纂開雕較原書詞理簡淨視沈刻眉目清疏中有疊出數見者便於倉猝檢閱對症施治毋嫌煩複也方名原取六十四卦今改八音分紀省字數易記查耳家置一冊庶幾識所忌宜無誤身命倘有同志益廣其傳可也  
嘉慶三年歲次戊午泰輿何汾丹流氏誌

附原書正誤一條

醫家不信有痧頭痛則用紫蘇麻黃發汗腹痛則用木香枳實溫中不語直視則認爲陰症而用桂附乾薑卒倒脈伏認爲中風而用牛黃蘇合小兒則誤作驚風痘疹婦人則誤爲經阻血凝立刻殺人可勝惜哉人祇知絞腸痛是痧不知有不肚疼而種種雜症之兼現疑似之間必當詳究也

### 原叙 節錄

吾師林姓其先閩人諱森號藥樵自號深山野人性韜晦有山水癖佳句妙楷時與邱壑爭奇一日遇於荆溪之南岳拂石對語片嚮投洽徐而叩之凡天文術數地理方藥無不精貫予追隨不忍釋野人曰偉男子立身行己豈得虛生於天地必將世上人維持調護所費一點真心耳出痧書一冊付予曰子知醫是書不道人所已言不經人所已試持此以往可與古人頡頏霄漢間矣既又授我手法予復綜核古今卽所聞見編成是書幸得張子一菴詳加訂釋紫崖詹子慨爲梓傳二十年來始得相與有成以廣野人之惠澤豈偶然哉  
康熙丙寅養吾山人王凱偉仙誌

海甯王君諱治行號服吾新建之裔博學多才晚以醫名甲申鼎革老卒於常其子凱號養吾遂家毗陵工

詞賦性慷慨博通醫理得林氏傳刻痧書救世近時痧症尤多從此人知治法藥樵養吾自當俎豆醫林云  
近復得驗方百十條已紮纂入書內適李義門先生示以痧書愈麟生廉訪遺以喉症書皆罕觀之祕因并  
付梓列後於療治急症不無小補云  
同治元年夏日海山仙館主人識



校正 增廣 驗方續編痧症全書目錄

痧原大略第一 痧無補法第二 分經絡第三 看涼熱第四 分表裏第五 審脈第六 論吐下第

七 急症第八 緒論第九 手法第十碎則 放痧十處 用藥大法第十一 藥忌 藥宜 宜忌相

半 補原本未列藥 飲食第十二 食忌 食宜 救急小方第十三試痧法在內

痧分症治第十四 風痧 暑痧 陰痧 陽痧 紅痧 斑痧 癘痧 吐痧 瀉痧即水 緊痧 慢

痧即白 暈痧 絞腸痧 抽筋痧 暗痧 悶痧 落弓痧 噤口痧 撲蛾痧即喉 角弓痧附方

瀘痧 滿痧 脫陽痧附方 羊毛痧附標法 羊筋痧附挑法 紫疱痧 瘋痧 血沫痧附方 蛔結痧

銅痧即發黃 鐵痧 痧塊 身重痧 心煩嗜睡痧 偏身青筋痧 遍身腫脹痧

痧別兼類變第十五 傷寒兼痧 痧類傷寒 傷風咳嗽痧 咳嗽嘔噦痧 霍亂痧 痧痢 痧類瘧

疾 瘧疾兼痧 頭痛痧 心痛痧 腰痛痧 小腹痛痧 頭眩偏痛痧 流火流痰痧 痰喘毒急

痧 半身不遂痧 膨脹兼痧 痧變臃脹 老病兼痧 弱症兼痧 內傷兼痧 痧變勞瘵案附方

痧變血衄便紅 痧變發斑 痧小不通 眼目怪症痧 痧後牙疳 痧後胸膈痛 婦人倒經痧

附胎產痧論 胎前痧痛附用藥 產後痧痛附用藥 小兒夾驚痧 痘前痧脹 痘後痧脹 瘡症兼

痧 痧變腫毒 附痧後調理

六十四方第十六加註 金石 絲 竹 匏 土 草 木各八方附竹六 麻蘆

應用羣方第十七 玉樞丹 牛黃八寶丹 仙方腦麝丸 鬱金丸 煉石丹 硫礬丸 附華陀危病

方 潤下丸 治臟香蘇丸 大羌活湯 加減聖效散 如聖散 失笑散 普濟消毒飲 祛瘴辟

瘧丹 白虎湯竹葉石膏湯 異症方案 加味活命飲 六一散 治腹痛法二

補原本末列方 五苓散加減 胃苓湯 六和湯 藿香正氣散

續附絡痛方案 附景岳刮痧新案 鍼灸法 救急良方霍亂絞腸痧

### 咽喉祕集目錄

總論 喉症分經 咽喉治法要論 四絕症 十六絕形 脈式 針穴

吳氏咽喉二十四大症歌訣今存廿二症 喉痹 喉閉 纏喉風 噎喉風 啞喉風 弄舌 喉風 爛喉風

單乳蛾 雙乳蛾 喉癰 牙疔 牙宣 木舌 重舌 重膈 走馬牙疳 痧痘口疳 螞蝗疔

連珠風 陰虛喉風 楊梅喉癰 咬牙風 籠珠喉 噎食啞喉 內外腫喉 風熱喉 紫色虛喉 喉癰

氏七十二症治圖說 咽喉門十一症 籠珠喉 噎食啞喉 內外腫喉 風熱喉 紫色虛喉 喉癰

喉疳 飛揚喉 虛啞喉 聲啞喉 爛沙喉 乳蛾門七症 雙乳蛾 單乳蛾 爛乳蛾 風寒蛾

白色乳蛾 石蛾 伏寒喉蛾 喉癰門七症 爛喉痹 白色喉痹 寒伏喉痹 雙喉痹 單喉痹

淡紅喉痹 走馬喉痹 喉風門十二症 內腫鎖喉風 纏喉風 匣舌喉風 虛爛喉風 白色喉風

酒毒喉風 勞碌喉風 酒寒喉風 腫爛喉風 肺寒喉風 辛苦喉風 淡紅喉風 喉癰門十一症

伏寒喉癰 腫爛喉癰 淡白喉癰 大紅喉癰 聲啞喉癰 單喉癰 外症喉癰 兜腮喉癰

舌上癰 舌下癰 上膈癰 舌門十三症 木舌 白腫舌 爛邊舌 紅點紫舌 純紫舌 座舌

蓮花 重舌 蓮花舌 焦黃舌 舌上珠 舌下珠 左雀舌 右雀舌 小舌門五症 胃火小舌

胃毒小舌 積熱小舌 純白小舌 懸旗小舌 雜症門八症 松子喉疔 走馬牙疳 喉單 喉菌



喉瘤 又喉瘤 左陰瘡 右陰瘡

張氏湯藥列方 吳氏丹藥列方

咽喉口齒各有專科此書既備二科宜題曰喉齒祕集茲仍其舊者亦名從主人義也古味齋說

附白喉治法忌表抉微目錄

前論 遵定藥將二表 後論 白喉症治養陰忌表歌括

320

喉方攷釋 目錄

六一九



校正  
增廣 驗方續編

閩中林 森藥樵傳授

毘陵王 凱養吾編輯

合肥張紹棠又堂增訂

### 痧症全書

#### 痧原大略第一

先吐瀉而心腹絞痛者其痧從穢氣發者多先心腹絞痛而吐瀉者從暑氣發者多心  
胸昏悶痰涎膠結從傷伏熱發者多遍身腫脹疼痛四肢不舉舌強不言從寒氣冰伏  
過時鬱爲火毒而發者多

#### 痧無補法第二

痧者厲氣也入氣分則作腫作脹入血分則爲蓄爲瘀遇食積痰火則氣阻血滯最忌  
熱湯熱酒不論犯者虛實皆以有餘治絕無補法用藥尅削病自當之中病卽已

#### 分經絡第三

腰背顛項連及風府脹痛難忍足太陽膀胱經痧 兩目赤腫唇乾鼻燥腹中絞痛足  
陽明胃經痧 脇肋腫脹痛連兩耳足少陽膽經痧 腹脹板痛不能屈伸四肢無力

336

驗方續編 痧症

泄瀉不已足太陰脾經痧 心胸弔痛身重難移作腫作脹足厥陰肝經痧 痛連腰

腎也外腎小腹脹硬足少陰腎經痧 咳嗽聲啞氣逆發噎手太陰肺經痧 半身疼痛

麻木左足不能屈伸手太陽小腸經痧 半身脹痛廢俛仰右足不能屈伸手陽明大

腸經痧 病重昏沉或狂言不省人事手少陰心經痧 或醒或寐或獨語一二句手

厥陰心胞絡經痧 胸腹熱脹揭去衣被乾燥無極手少陽三焦經痧

按十二經受病見症隨症施治其引經藥亦不可少今通列手足經脈後

手少陰心循手小指內側出其端 手太陽小腸起手小指端循外側上行 手少陽

三焦起手無名指端 手厥陰心胞絡又名手心主出中指端 手陽即大腸起手食

指端 手太陰肺出手大指端 足厥陰肝起足大指聚毛上 足太陰脾起足大指

端 足陽明胃起足次指外間又一支亦入大指端又一支入中指外間 足少陽膽

起足四指間 足太陽膀胱起足小指外側端 足少陰腎起足小指下

閱此便於針刺

足太陽膀胱 蓋本 黃柏 陽明胃 足少陰腎

手太陽小腸 大腸 三焦 手少陰心 太陰脾 厥陰肝

足太陽膀胱 蓋本 黃柏 足少陽膽 手太陽小腸 羌活少用 足厥陰肝 柴胡青皮

足陽明胃

葛根石膏沈作厚槩

手少陽三焦川芎少用沈有丹皮

手陽明大腸白芷少用去升麻

手厥陰心胞絡

足太陰脾

酒白芍去升麻

手太陰肺蘇白沈有桔梗白芷少用去升麻

足少陰腎獨活鹽酒去桂

手少陰心獨活細辛

勝小薰柏羌些須胃大葛樸芷區區脾芍腎獨鹽酒俱膽肝焦絡柴丹青川芎宜少

再丁甯肺葱桔芷心獨辛羌芎白芷少為貴胃腸脾肺升麻廢腎尤切戒毋加桂

### 看涼熱第四

痧犯太陽則頭痛發熱犯少陽則耳旁腫脹寒熱往來犯陽明則面目如火但熱不寒犯太陰則腹痛犯厥陰則小腹或胸脇痛犯少陰則腰痛以上皆身涼犯肺則咳嗽痰喘微熱甚則鼻衄犯心則心痛或心脹頭額冷汗如珠而身或熱或涼犯膀胱則小便溺血甚則身熱犯大腸則痢下膿血重則嘔吐身熱犯肝則沉重不能轉側哺熱內熱甚則吐血犯三焦則熱毒內攻上則口渴下則便結 凡痧氣壅阻發而為熱若誤為外感傳經熱症而發汗溫飲雖慢痧遲緩亦必變出頭汗發狂譫語種種重症不知外感之脈浮數而緊熱症之脈洪數有力痧症之脈終有不同或有可疑須看痧筋有無辨之

痧症身涼而內熱者宜攻其裏表實者宜透其肌用藥隨時活變故不立主方

### 分表裏第五

痧感肌表人不自知則入半表半裏故胸中作悶或作嘔吐而腹痛生焉此可焮刮而愈不愈用金四金五方 痧毒入裏故欲吐不吐欲瀉不瀉衝心則心胸大痛攻腹則盤腸疝痛可放痧而愈不愈用絲三石六方 痧毒中深逆攻心脅立時發暈氣血不流放亦無紫血卽有亦不多惟當審脈辨症的係風寒暑溼氣血食積痰飲施治令甦氣血流動然後扶起放痧如不醒擇用絲五匏一土五方如此重症立時連進湯丸方能有效 痧阻於氣分宜刮壅於血分宜放痛而絞動者阻於食積之氣分也痛而不移者壅於血分而有瘀也發於頭面上部毒氣上壅也纏於手足下部毒血下注也上吐下瀉痧氣衝激也煩悶氣脹痧氣壅塞也惡寒發熱痧氣遏於肌表也胸膈偏痛毒血滯於經絡也爲腫爲脹食積血瘀結滯腸胃也吐血便血痧氣泛溢而憂潰敗也咳嗽喘急痧壅氣分而生痰逆也立時悶絕者毒血攻心也手足軟而不能運者毒血注下也腰脇俱痛者偏痛半身者身重不能轉側者皆毒血壅瘀也變成腫毒潰爛者毒血凝滯攻壞肌表也

審脈第六

痧脈多微緩細澁有時弦數縱浮大亦虛而無力疾徐不倫時或六脈俱伏伏亦無妨痧退脈卽漸還如頭疼壯熱脈應洪實而反微遲者痧也厥冷不語脈應沉細而反滑

數者痧也脈症不符便舍症而從脈診痧盡此兩言 按傷寒雜病自有本脈若一兼痧其脈必變病必凶暴然兼痧之脈可知也傷食痧脈多緊實傷血痧脈多芤滑傷暑痧脈多洪滑而疾數傷風痧脈多沉微穢觸痧脈多變異不常傷氣痧脈多沉伏或如雀啄傷寒溼痧脈多沉細或有痧脈似陰症者尤不可不辨如傷寒脈沉遲無力是直中三陰治用熱藥何疑惟傷寒兼痧脈似陰症一服溫補熱藥痧毒變幻悔無及矣故於其外見症候稍有不合便取痧筋驗之有則爲痧無則爲陰涼熱異施且放痧服藥後經絡無阻脈便不復沉伏然後按脈辨症治其傷寒無不效者至雜病兼痧有沉伏之脈亦準此法

凡痧脈微細者生實大急數者重洪大無倫者凶一部無脈者輕一手無脈者重兩手無脈者死六脈無根及諸怪脈見而放痧服藥不應者不治 丹溪治雜症以氣血痰爲先痧脹何能離此痧有氣塞者爲喘急爲脹滿爲嘔噦爲頭眼脹其痛緊脈必洪數屬陽有氣閉者爲昏冒口噤目翻厥冷雖痛口不能言脈必沉伏屬陰痧有血熱者爲煩躁爲紫斑爲頭面赤爲衄口出紅沫脈必實大屬陽有血阻者腰痛脇痛攻心痛手足青紫脈必緊牢乍大乍小屬陰痧有痰塞者喉中漉漉有聲吐咯不出嘔吐酸水清涎脈必弦滑屬陽有痰厥者卒倒手足厥冷肌膚芒刺遍身青筋坐臥不能轉側脈必

微細似有似無屬陰亦不得謂陽痧則生陰痧則死痧有脈伏三日亦得救活者在得其竅而已

論吐下第七

傷寒食未化下之太早反引寒邪入胃變爲熱邪固結所食乃成結胸若痧症新食以吐爲先至所食既久驟然痧脹雖食消未盡下之無礙蓋因痧本火毒在腸胃腸胃部分肌肉作腫作脹盤腸絞痛徧及臟腑故外宜刮放以洩毒於表內可卽下以攻毒於裏則腫自當潛消食積因之通利非有寒邪入胃變成結胸之可憂也但下之必兼消散食積又宜以漸而進中病卽止 霍亂症惡心肚痛上吐下瀉瀉如水注此感受暑火暴發升降不利清濁不分所瀉皆五臟津液宜急用五苓散或胃苓湯以分利陰陽清暑火之氣有夾食積者亦不可過下恐津液暴涸元氣損傷也更有吐瀉無物亦有上下關閉竟不吐瀉者爲乾霍亂惟心腹絞痛令人立斃急以炒鹽湯探吐通則可救卽定後過時勿進粒米得食復發慎之卽如嘔盡洩空倦極當用六和湯調理

方見補藥方末

急症第八

急症昏迷先觀唇舌色黑者凶黃者重淡紅者略輕蓋黃知內熱黑知熱極淡紅雖熱用藥不可太冷又要看舌胎施治 痧症危急放血不流若審無食積血痰阻滯於中



用陰陽水或泥漿水晚蠶沙水細辛水白沙糖梅水擇一飲之稍醒扶起再治若有食積血痰破瘀用桃仁紅花童便之類去新食用鹽湯礬湯吐之食久痧脹用查蔔麥芽消之有積阻用檳榔大黃驅之金七方治之或痰血凝結昏迷不省用菜油麝香調下立甦阻滯去痧氣行筋自現而後可刮可放當藥卽藥蓋緣痧症初發未攻壞臟腑故耳 凡痧藥得宜倘有不效者蓋湯劑多帶冷冷則直入腸胃未能達於肌膚血肉故治先刮放也刮放而藥仍不效必刮放未盡也刮已到放已盡而痧猶在則毒惟在陽明胃及脾肝腎三陰經絡非藥何以治之

昏迷不醒難施刮放當用藥救夫湯藥帶冷雖未能卽周血肉然當熱毒攻心正遇帶冷之藥順流而下昏迷自醒有不醒乃食積血痰所阻攻而下之無不醒者

痧發無寒症然亦有時爲寒非真寒也蓋因痧熱而服大寒之劑以至此夫痧必無食積血阻於中方可服寒飲得效若一有之而飲大寒則食不消積不行血不散而毒反冰伏矣嘗見巖谷中行旅感暑渴飲澗泉而卽斃者是名寒痧蓋飲寒毒結多致不救也若幸遇放痧之人毒血一行便無阻滯故方書有服陰陽水者不獨取井水卽此故耳是以久服涼飲痧有未瘥者略用三香溫和之劑實爲權宜之術若驟用桂附乾薑吳萸參茸之屬則又誤矣 痧皆屬火火有君相之別手少陰君火也右腎命門爲手

心主乃手厥陰胸絡之臟經言心之原出於太陵凡刺太陵穴者以瀉手心主相火之原耳又有手少陽三焦合爲表裏神脈同出現於右尺二經代君行令故相火之爲病居多火性炎烈以致三焦阻塞六脈全乖昏冒痰喘然相火作病猶有可回若犯心君殞在須臾莫謂術疏耳 痧犯咽喉則痰喘如鋸先放痧急用薄荷牛蒡山豆根童便之類清之兼吹竹一方餘症且緩治 痧症危急大便不通急宜放痧用潤下丸以攻之小便不通宜放痧用土四方以分利之 痧有心胸高起如餓餒者不治 曾用竹六方愈二婦 心胸左右或背心一點痛者凶角弓反張者死腰腎一片痛者死脇肋痛者四肢腫痛者難治鼻如煙煤者舌卷囊縮者環口鰓黑者頭汗如珠喘而不休者昏迷甚放無血服藥不應者痧塊大痛服藥不應者俱死此皆實熱之爲害耳

緒論第九

在北曰青筋曰馬頭瘟江浙則爲痧閩廣則爲瘴氣其實一也宜生料平胃散加草果檳榔 閩廣瘴氣由蛇獸惡餒而成凡山行見有黑氣飛過急伏地掩其口鼻俟過再行若嗅其毒卽腹疼寒熱臉甲青紫急用平胃散加檳榔紫蘇半夏葱薑煎服汗出爲度玉樞丹亦妙 傳聞浦口張總戎和征緬甸時帶兵數百人路遇風作桂花香略嗅之至晚腦痛昏沉有守備係土人進謁曰不可爲矣是名檳榔瘴蛇食檳榔花毒與

香俱也踰日果卒兵從亦半損避之之法伏地屏氣與前法同也

聞江南溪澗有射工蟲含沙射人影卽寒熱頭疼筋急體強悶亂呻吟涎流咳嗽始中便不能言朝輕暮重不識者指爲傷寒土人曰此痧病也用真正玉樞丹磨服一錠卽安凡渡有毒蟲處先用竹竿擊水而急渡則無妨 按射工溪毒中病者狀如傷寒寒熱發瘡偏在一處用紅莧莖葉搗汁飲一升日再服以渣敷之馬齒莧同惟鵝喜食此蟲故鄰近家多畜鵝

嶺南煙瘴尤多痧病乃溪毒沙蝨水弩射工蟻短狐蝦鬚之類俱能含沙射人被其毒者憎寒壯熱百體分解肢節酸痛似傷寒初發狀彼土人治法手捫痛處用角筒入肉以口吸出其砂外以大蒜煨熱搗膏封貼瘡口卽愈諸蟲惟蝦鬚最毒若不早治十死八九其毒入骨狀若蝦鬚瘡類疔腫彼地有鸚鵡等鳥專食諸蟲以此鳥毛糞煨灰服之及籠此鳥於被毒人身畔吸之其沙聞氣自出而愈其餘治法詳前後各條 瘟疫與痧脹皆氣爲之或因風雨寒煖不時山澤溼熱蒸動又兵荒積尸之氣隨天地升降流行人在氣交中無可逃避轉相漸染故痧有觸穢一症也凡人尤忌夜行多致犯痧以受陰濁之氣故耳 明末癸未京師大疫有胸腹滿生白毛者有頭大如斗眼鼻俱沒者有兩腮紅腫痰喘壅塞者呼吸間死以萬計皆痧類也針挑血出隨愈頃之

變爲嗽喘症雖輕不半日隨斃用前法挑之亦隨愈放痧之法由來久矣 按所謂大

頭瘟者下非不病特甚於上耳疙痞瘟內非不病特見于外耳蝦蟆瘟腹非不病特

痺于喉耳症類多端惟以清熱解毒爲主治之先上先下從內從外自當因症而施

以上諸症用普濟消毒飲最好或新增祛瘴辟瘟湯亦效

方見補  
藥方末

辛酉一婦孕幾八月夫不在家黃昏時忽飢不可忍卽炊米一升爲飯食盡而睡少頃

隔房聽兒啼三聲以爲產矣呼之不應持燈照之婦已死腹內依然如此怪症焉知非

痧然亦不及措手矣

解痧症 解者骨節解散者筋不收束似寒似熱困怠煩懣腹疼飲食不美嘔吐酸

水或因傷酒中溼或感風寒房勞女人經水不調血氣不和皆能成此症卽痧類非傷

寒也宜先用熱水蘸搭臂膊以苧麻刮之甚者刺十指委中出血或以香油燈照身背

有紅點處烙之使腠理開通血氣舒暢而愈又宜服蘇合香丸 按解痧不盡爲痧然

暗痧慢痧每似解痧人所當知名醫類案更解痧以沙名未爲無見但後附載杭氏

說力辯解痧非痧適與庸醫之見同勿爲所誤

白虎病 凡太歲後一位爲白虎如太歲在巳則白虎在辰太歲在申則白虎在未其

神所值之方小兒出入居處或有觸犯則病其身微熱或冷有時啼叫屈指如數物狀

以集香湯治之用沉降檀乳四香參草茯神棗仁水煎臨服入麝香少許存滓房內燒之。至如小兒出瘡疹一名癩又名痧散見於皮膚與沙粒相似小兒出痧必先身熱咳嗽或嘔吐腹痛時隱時見三日乃平今時痧症亦有細粟紅點或隱或顯額上最多胸脇頸項次之手足腰背又次之在內則心腹脹痛在外則肌膚芒刺其原皆因血熱毒熾故與小兒之痧疹同名若小兒果係痧疹必從本科正治又不當混入此痧症也。

治痧當明雜症其於兼痧類痧等症方能兼治無誤。繆仲淳曰絞腸痧屬胃氣虛猝中邪穢鬱遏不能吐瀉以致絞腸異常胸腹驟脹遍體紫黑細尋頭頂心必有紅髮速拔去之急以三稜鏝針刺委中擠出熱血可立蘇次用新汲涼水入鹽兩許忝飲得吐瀉卽止。蛇蟲傷亦  
有紅髮

### 手法第十

脈不明不可亂用藥症不明不可輕用藥手法不明卽藥亦不能速效故手法爲治痧要著。一曰焮。痧在肌表未發出者以燈照之隱隱膚間且慢焮若既發出狀如蚊咬粒如痞疔疎則紊紊密則連片更有發過一層復發兩三層者焮法看頭額及胸前兩邊或腹上與肩膊處照定紅點以紙撚條或大燈草微蘸香油點灼焮之卽時爆響焮畢便覺胸腹寬鬆痛亦隨減。一曰刮。痧在膚裏發不出者則用刮若背脊頸骨

上下及胸前脇肋兩肩彎用銅錢或碗口蘸香油刮之若在頭額項後兩肘臂膝腕用綿紗線或苧麻繩蘸油戛見紅紫血點起方止大小腹輭肉內痧用食鹽以手擦之痧既刮出痛楚亦輕矣 一曰刺 古言東南卑溼利用砭以針刺放毒血卽砭道也痧重者經鐵氣難解放痧當用銀針銀性無毒

放痧有十處

頭頂心百會穴 只挑破略見微血以洩毒氣不用針入 印堂 頭痛甚者用之針鋒微微入肉不須深入 兩太陽穴 太陽痛甚者用之針入一二分許 喉中兩旁惟蝦蟆大頭瘟可用亦勿輕用 舌下兩旁 惟急喉風喉蛾痧可用急吐惡血不可咽下 兩乳 乳頭垂下盡處是穴此處不宜多用不如看有青筋在乳上下者刺之 手十指頭 用他人兩手切下不計遍數捏緊近脈處刺十指頭出血一法用線繫十指根刺指背近甲處出血或謂針刺手足無如指頂爲妙指頂勿太近用令人頭眩 兩臂彎 臂彎中名曲澤腿彎中名委中先蘸溫水拍打其筋自出然後迎刺 足十指頭 同手 兩腿彎 細看腿彎上下前後有細筋深青或紫紅者名痧眼卽迎其來處刺之如無青筋用熱水拍打腿彎直刺委中惟此穴可深寸許其腿上大筋不可刺刺亦無血令人心煩腿兩邊硬筋不可刺恐令筋弔至臂彎筋色亦如此辨之

痧筋見者毒入血分宜放乍隱乍見者毒入氣分及見而放微見者乃毒阻氣分治宜通其腸胃痧筋自見至伏而不見者必從脈症辨之血則散食則消痰積則驅結既解而筋復見然後刺放可也 痧筋或見數處或一處必刺去惡血令痧毒盡洩或誤飲熱湯痧筋反隱不見略見亦刮放不出急飲冷水解之後可刮放痧爲食積所阻刮放不出者當先消食積而再刮放熱極血凝瘀阻胸腹刮放不盡者當先散瘀血而再刮放痧發兼遇惱怒傷肝作脹刮放難盡者又當先用破氣藥而再刮放如此痧毒皆可漸消矣

### 用藥大法第十一

痧氣阻塞作痛作脹用荊防之類從表而散用青陳之類從中而消枳實大黃之類從大便而下木通澤瀉之類從小便而行查葛之類治食阻銀花紅花之類治血壅檳榔蓬蘞之類所以治積之滯也 無食積血瘀而痧氣壅盛者藥須冷服有食積而無血瘀者稍冷服毒盛血瘀者微溫服 稍冷者九分冷也微冷者八分冷也微溫者七分冷也

藥忌 用藥一差凶危立見先知其忌則思過半矣

參芪白朮山藥 恐補毒氣痧所大禁 熟地白芍 補血斂血痧所大忌 甘草

用之恐成痧塊難治 一應甘甜之味俱不宜 茯苓豬苓 恐其滲溼轉實痧氣俱

在禁例 半夏白芷蒼朮 性燥忌用 升麻 禁用恐提痧氣上升難遏 麻黃

發表太過禁用 肉桂附子吳茱萸 禁用恐助毒立時有變 乾薑 能助熱毒常

忌 過服冷水宜少 用以善散寒氣 五味子木瓜 酸斂忌用 竹瀝 性寒忌用須薑汁方走經絡不

如弗用為佳 杜仲補骨脂枸杞子 即腰疼不可用 茯神柏子仁酸棗仁 即虛

煩不寐亦不可用 菴蓉巴戟 尤所大忌

評半夏藿香止吐 凡治吐症用半夏藿香獨痧症作吐半夏性燥須防益助火邪必

不可用藿香惟取其正氣以治穢觸偷腸胃有食積血瘀阻滯痧毒驟用此以止吐

反有閉門逐盜之憂

藥宜

陳皮青皮 陳行痧氣青伐肝氣痧氣壅阻鬱結不行者非此不利

枳殼枳實 破痧氣驅毒氣除脹氣下食氣積滯壅塞者非此不開 枳殼性緩枳實性速各有所宜

荊芥 透肌發表散痧毒痧筋隱隱不發者非此不見

防風 透肌發表為臣使之助寒熱往來痧毒壅滯鬱遏不發者非此不清

柴胡 和解表裏專治少陽膽經寒熱往來 前胡 疎風消痰治嗽表熱者宜用



乾葛 散陽明胃經之邪兼能解渴 紫樸 寬中治嘔消痰下氣

薄荷 辛涼利竅消腫解毒清氣清喉 紫蘇 疎風順氣身熱當用

獨活 發散治熱其性至頸而還力不能過發且可活血解痧毒是最要之味

細辛 透竅散痧之妙藥勿以其味辛而疑之 按細辛極散真氣過服即能殺人壯

實而痧重者多止錢許老穉單弱者酌減少用痧輕者可弗用

桔梗 入肺經其性上而復下故能引枳殼破胸中至高之氣

香附 行血中之氣恐香燥須尿製行血酒炒斂血醋炒

延胡索 活血行氣理血氣凝滯作痛 五靈脂 善消宿血血塊凝滯非此不

破

鬱金 能入心經散鬱消瘀痧毒攻心者非此不能奏功 時以價高用薑黃代之終不妙

木香 行滯氣燥溼氣驅寒氣開鬱氣痧後腹痛不解此要藥也

砂仁 順氣開鬱散痧消食始終可用 梔子 涼心去火發斑並痧根紅者可

用

烏藥 善行周身之氣凡痧氣阻滯者得此無處不到

秦艽 活血驅風消痧毒筋骨疼痛壯實不清者非此不解

連翹 消痧毒解諸經火邪清熱而不滯治痧要藥

貝母 川貝專消熱痰土貝兼破瘀血 白芥子 脇下之痰非此不達

天冬麥冬 潤肺消痰一治本一治標心去 杏仁 瀉肺潤腸胃利氣消痰涎尖去皮

桑皮兜鈴 治嗽瀉肺 按兜鈴清熱降氣但肺虛挾寒者大忌曾聞之世醫者云凡

治嗽禁用訶子兜鈴紫苑白芍五味等藥小兒尤忌能令肺縮小即貝母亦非風寒

溼滯諸痰症所宜誤用反令不愈附識於此以俟別擇

赤芍 血熱發斑者可用 陳香蘇 破結氣可用

丹參 亦活血之劑 紅花茜草銀花 活血解痧毒

山查葡萄子麥芽神麴 痧為食壅善消而不暴

桃仁 破瘀活血痧為血阻非此不流痧為血滯非此不順

蘇木 取惡血新瘀者莫及 牛膝 活血引痧氣下行

荆三稜蓬莪蘆 食積心痛痧毒阻滯痞悶者宜用

香薷 通上徹下利水氣治暑傷之要藥脫詳金三方

牛蒡子 解痧毒清喉痧中要藥 劉寄奴 散瘀血解痧毒下氣消脹破血仙藥多服令人下痢

紫花地丁 解毒化斑 澤蘭葉 解痧毒

益母草 女人胎產俱宜

菊花 清心解熱毒 葉亦可用

晚蠶沙 解痧毒治熱

穿山甲 透痧消痰破瘀托毒善走經絡之神劑經絡諸藥所不到者非此不達末

乳香沒藥 消瘀血而不傷新血痧症以治血結

角刺 透毒能引諸藥至于痧毒血瘀之所 大麻仁 潤大腸腸胃燥結者宜用

雄黃牛黃膽星天竺黃 消痰丸中宜用 麝香 開竅散痧功亦甚大

明礬 解痧毒消痰定痛用之探吐宿食甚妙

石膏 病痧暑天最多自汗大渴用白虎湯即解

鼈甲 破宿血在胸用上截在下用下截去筋酥

蠶蠶 治血分之痰佐山甲透經絡以破瘀毒一二分 須炒末用

童便 解痧毒消痰降火最速定痛治血痢痢下血水諸藥莫及

板藍根 葉即能 普濟消毒飲用之以解瘟毒 小青草 一名血見愁清熱除疹最速

梅花 得一元之氣治痧上品 取大牛開者紙籠當風 處陰乾 桃花亦可

天仙子 即紅蓼子治痧塊多用亦去痞積 紫荆皮 絲一絲七俱用作引 惟絲有之

334

驗方 瘧 痧症

評荊芥細辛防風 痧症寒熱不由外感其毒從鼻吸入搏擊肌表荊芥細辛善能透

竅使由竅入者亦由竅泄防風臣使為佐不比麻黃羌活專主發表有升發火毒之

慮也

宜忌相半

羌活 痧忌發表太過若頭痛或因寒起更兼痧症欲引太陽經用半分至二分

川芎 上行頭目頭角骨痛者必需下通血海肝臟不華者當用一分至三分止 多則惡

藿香 痧症作吐取其正氣以治穢觸然必痧毒無阻乃可俟冷飲之

沉香檀香丁香 痧始發忌用若痧後心腹疼痛不休胸脇脹悶寒凝氣滯得此可舒

用一分至三分

生地 涼血血熱者可用血瘀者非宜 當歸 頭身尾各有所宜用須斟酌 歸尾不妨

黃連 心脈洪實者可用能解熱毒 黃芩 肌熱不退者可用 上二味冷性凝滯 痧中忌用須酒炒

元參 咽痛犯腫毒者可用色黑止血痧有瘀血忌用亦能清氣消痰滋陰潤肺

花粉 口乾渴連飲水不能止者可用性沉寒痧毒未清者忌恐凝滯痧氣也

木通車前澤瀉 痧氣鬱阻小便不利在所當求若熱鬱太重不因小水禁用

黑丑 通上徹下痧毒脹滿必須用此丸散中奏效凡破氣之味俱莫能及但耗散真

氣恐人有宜有不宜故方中不載

大黃 治食積阻滯毒爲丸以備急用其功莫大若痧脹之極必須急服此以攻之恐

病有宜有不宜故方中雖載不及細加

補原本未列藥

注取本草

薑黃 理血中之氣破血下氣性烈於鬱金血虛者勿用 片子者入手臂 金七石一 三竹五土二 三六革八

檳榔 破滯散邪消食行痰墜諸氣至於下極氣虛下陷者勿用 金七石六 三竹七 七石六 三

白蒺藜 散肝風瀉肺氣破血消癥通乳墮胎 去刺酒蒸 石四 四六竹五 四六革一 五

降香 辟邪惡瘵傷創止血定痛消腫生肌 金七石二 五絲四竹五

丹皮 瀉陰胞中火治無汗骨蒸 地骨治有汗骨蒸 六竹二土四 革二 金

蒲黃 性滑行血消瘀通經脈利小便無瘀勿服 炒黑性滑止一切 絲六七土三四 血

白荳蔻 利三焦暖脾胃散滯氣消酒積若火升作嘔因熱腹痛氣虛諸症咸宜禁之

金八石 一絲一

旋覆花 輒墜下氣行痰水通血脈肺與大腸藥虛者勿多服冷利大腸宜戒 精一包 金一土六

瓜蒌 降痰治嗽蕩熱滌垢清咽利腸胃虛脾泄者忌 金一加石 七歌竹八

大腹皮 下氣行水治痞脹稍涉虛者勿用 酒洗再黑大豆汁洗曬 灰火煨 金一加竹四

35 驗方攪編 痧症

威靈仙 善走十二經絡治諸風痰積浮腫閉結大走真氣耗血忌茶鹽金一加

飲食第十二

痧氣壅滿胸膈甚者十日五日不飲食亦無妨惟俟痧氣盡然後與之初退覺餓設驟進飲食立能變重必忍耐一兩日乃可萬全痧後戒葷腥數日庶無屢發之患痛後亦有不喜食者有食而作脹復疼者又或疑傷寒而餓壞者其間飲食最要斟酌宜忌不可不審

食忌

生薑痧所大忌勿作藥引 眼圓大棗俱忌 辣醬 花胡椒 煙 茶 火酒 醋 麪 索粉 麪筋 糯米團粽 猪羊肉 雞魚 葱蒜 芥菜 瓜茄 水紅菱 糖食 桃梅李杏 發痧若飲粥湯熱湯熱酒輕者必重重者必危吃米食諸物恐結成痧塊日久變出他疾難於救療 忌用熱湯洗澡愈洗愈將毒氣趕入腹內

食宜

黑砂糖 活痧血解痧毒凡瘀血作痛者得此則安 食鹽 解痧毒定痛用之吐去新食 芋芳 治痧熱解毒有痧患者生食之甘美 燈心湯 口渴者飲之作藥引可用 蘆粟湯 山查湯 蘿蔔子湯 蘆柴根湯

荸薺 百合 藕 西瓜

待痛止後知餓方可吃飯湯清水米粥米糊湯亦宜少用且須冷吃不然則復發 陳大麥煮粥爲妙

救急小方第十三

芋苳帶毛生嚼不麻口 生黃豆細嚼不豆腥 上二方可試痧亦解毒

燒鹽湯待冷灌下探吐或鹽放鏟頭燒紅淬水中飲 明礬末陰陽水調服二錢多至

三錢 上二方乃吐新食阻隔痧毒之法必多飲吐

陰陽湯 涼水滾湯各半對沖 陰陽水 井水河水各半中喝者可飲 泥漿水服

路上受暑起脹用仰天皮水攪清飲之 白沙糖攪梅水服 細辛末同砂仁湯冷

服 此法治氣阻受寒痧 晚蠶沙爲末白滾湯冷服 羊糞一把滾湯泡以碗對合

一時許瀘去渣待冷極飲之 童便連飲碗許 蘿蔔英子煎湯飲 蘆柴根煎湯微

溫服 蘆粟子或粟梗煎湯待冷服 菜豆煎湯溫服 做菘豆粉泔水亦可 生豆

腐漿吃碗許 麻油一盞灌下 菜油二兩麝香一錢昏迷欲死者調下立甦 絲瓜

葉搗汁飲又可止 伏龍肝即竈心土泡水飲吐止 蚱蜢五六箇煎湯溫服 陳樟木

陳皮等分東壁土水煎連進三四服 銀硃搗細點眼角愈 蕎麥炒焦去殼爲末溫

湯調三錢服

誌參與此辨相反日後  
謹防有犯者此方勿用

痧分症治第十四

痧不盡係六氣七情或因飢飽勞逸或為穢觸疫染皆可成痧痧無定脈凡脈與症不應者即為痧脈亦無定症不論風食勞痰而以本症治之不效者皆痧症也

風痧 頭疼腿酸身熱自汗咳嗽腹痛此時氣所感不可同傷風治法純用疎風當刮

痧為先用金一方

暑痧 頭眩惡心自汗如雨脈洪拍拍上吐下瀉腹痛或緊或慢金二方主之暑脹不

已者金三方如竹葉石膏湯六一散俱可選用

陰痧 腹痛而手足冷宜焯或因穢觸用金四方

陽痧 腹痛而手足暖出血即安或因鬱氣不通用金五方

紅痧 膚隱紅點如瘡疹痧在肌表外用焯刮內服金五方

斑痧 頭眩眼花惡心嘔吐身有紫斑痧在血肉急用刮放遲則入裏生變當用金六

方

瀉痧 滿身脹痛面色塵黑身有黑斑毒在臟腑氣滯血凝以致疼痛難忍用金七丸

吐痧 湯水入口即吐研伏龍肝泡水澄飲即定藥亦以此水煎用金四方



瀉痧 水瀉不計遍數不可下又不可止澁惟分理陰陽用五苓散去桂白朮換蒼朮加車前木通之類

緊痧 急痛霎時暈倒半刻即死急爲放痧烙刮服滌痧丸亦得救活

慢痧 痧之慢者或十日半月而死甚至三四月而死必須速治遲則痧毒蔓延滯結在內者先壞臟腑在中者先損經絡在表者先潰肌肉一若失治便成死症 初犯痧症邪氣勝元氣衰或旬日輒發久則日近一日蓋由胃氣本弱故爾數犯俟痧退後當用木八方充其胃氣則痧自斷矣

暈痧 一時暈昏跌倒乃痧毒所攻毒血一衝必壞臟腑蓋毒血與食積痰氣結聚心腹胸膈之間而經絡不轉氣血不通雖欲刮放而痧不出治法視其食積痰血氣阻及暑熱伏熱穢觸之類急用藥消散俟胸膈一鬆昏迷自醒然後驗筋刺之用金入石一丸

絞腸痧 心腹絞腸大痛如板硬如繩縛如筋弔如錐如割輕者亦微微絞痛脹悶非常放痧可愈若不愈必審脈症辨暑穢食積血痰所阻施治須連進數劑俟少安方可漸爲調理 至石二 一婦絞痛危急刮放不愈右手脈伏放痧三十針用石二末金丸清茶飲之並用石三方服下熟睡愈 一婦口吐痰涎腹中絞痛刮之少安用

藥不效次日復昏沉大痛先刺指頭出血用石四末沖砂仁湯下並用金一方加丹  
參山豆根茜銀查蔔服下即安 一人盤腸絞痛脈伏刮痧用石五石六方稍愈黃  
昏復絞痛叫喊又用石七石八方而痊

抽筋痧 兩足抽筋疼甚忽至一身青筋脹起如箸粗將處處大放毒血用絲一九

暗痧、心中悶悶不已欲食不食行坐如常即飲溫熱不見凶處並無心腹腰背疼痛  
但憔悴日甚若不知治亦成大害此痧之慢而輕者放之即愈更有頭痛發熱心中  
作脹類於傷寒有寒熱往來似瘧非瘧悶悶不已有咳嗽煩悶似乎傷風有頭面腫  
脹兩目如火有四肢紅腫身體重滯不能轉側此痧之慢而重者誤吃熱物遂沉重  
昏迷或喘急狂亂此等當審脈辨症在表者刮在中者放在裏者或丸散或煎劑須  
連進數服俟少安漸爲調理<sup>三絲二</sup> 一孀婦四月間忽昏迷沉重顏色變黑左脈洪  
大右脈沉微此暗痧也腿彎青筋三條刺紫黑血如注不醒次日用石二方稍甦至  
五日復刺痧用絲二方乃能大醒再調理愈 一病人六月發熱沉重昏迷不省舌  
上黑胎芒刺狂罵不絕六脈俱伏刺血不流用石二方絲三方稍冷飲之又用金三  
方次日少甦但身重如石胎刺不退用金六方而痊 一少婦重娠夜聞火下樓墜  
仆悶絕竟不作聲安胎治驚藥俱不效經兩日而死胎下延予診之無脈細按如蛛

絲但四體溫軟如睡急放手足血便作呻吟投滌痧散一服遂甦更用絲三並絲四方而痊 一十二歲婢六日不食頭面微腫索消食方予曰脈微面腫其殆痧乎刺腿彎二針用石二方一服愈

**悶痧** 痧毒沖心發暈悶地似中暑中風卽時而斃此痧之急者如略有甦醒扶起放痧不愈審脈服藥施療若不醒扶不能起必辨症的確用藥數劑灌醒扶起放痧再爲調理 一五旬外女人目閉牙噤冷至肩膊但胸腹微煖六脈毫無間忽睜目苦叫數聲灌藥亦稍受如此三日醫用烏藥順氣散牛黃丸罔效予爲去十指血紫黑相間投滌痧丸一服呻吟再服脈起或云是瘧症用他藥脈伏病如初又來索丸與之人漸醒脈復起投石二方石一方而愈

**落弓痧** 倏忽昏迷不醒或痰喘眼弔形如小兒落弓症此暗痧難識必審脈辨症再看身體涼熱唇舌潤燥何如然後治之 六絲七五 一人發熱口渴昏悶不醒兩目上翻六脈微細而伏用石二方砂仁湯冷下而甦扶起放痧用石七方痧尙未盡又用絲五方加銀花丹參山查而痊 一人時常身熱微渴煎滾茶飲之條然沉重昏迷左尺沉細動止不勻右寸浮而芤此腎虛而痧犯之腎水之痧逆行于肺故痰氣壅盛而發暈也用絲六方加牛膝貝母和童便飲更用絲七方而醒然後扶起放痧愈

噤口痧、默默不語語亦無聲此乃痧氣壅盛熱痰上升阻逆氣管咽喉閉塞而然宜先放痧審肺腎脾三經脈次推詳餘經八絲一女日爲後母所罾痧脹煩悶昏沉左關有力右脈沉伏語無聲乃傷氣痧也煎陳香櫟一箇微冷飲稍有聲次日左關弦長而動蓋因怒傷肝痧氣猶阻肝經之故刺腿彎三針血如注又刺頂心臂指十餘針乃用絲二方與絲八方加延胡香附微溫服乃痊

撲蛾痧 痰涎壅盛喘急如鋸痛若喉蛾但喉蛾喉內腫脹痧只痛而無腫脹形若急喉風但喉痛而不移痧則痛無一定且痧有痧筋可辨也二竹一一人痰氣壅盛脈

多怪異吹弔痰藥益凶暴痛極此三焦命門痧也刺臂指腿彎青筋紫黑血甚多不愈用石五絲五方外吹竹一方又用竹二方三服而愈 一人喉痛極痰涎壅盛余視之痧也不信延喉科治之且飲熱湯至夕殂 此症用竹三方必效

角弓痧 心胸脹極痧毒內攻故頭項向上形如角弓反張是臟腑已壞死症也急用

滴燒酒將毛青布蘸抹手足拘急處再噴其遍體少頃鬆動然後用藥或可回生藥用石二絲二之類 附歌 手拘足縮角弓張臟腑攻沖毒勢強火酒遍噴兼蘸抹

死中求活石絲方

瘟痧 寒氣鬱伏肌肉間至春而發暑熱凝滯血肉中至秋而發皆名瘟痧秋瘟尤易

傳染其症寒熱似瘧腹或痛或不痛或喘急飽悶頭面腫脹或變下痢膿血輕者纏綿重者危急宜放痧消食積爲主俟痧毒已洩然後和解清理除其寒熱健脾養血補其中虛四竹一人於九月惡寒發熱痰嗽煩悶口渴舌胎刺血不流臥牀沉重此誤飲熱也用陰陽水加明礬一錢飲之又用消食去積藥加熟軍二錢微冷飲少愈次日復刺臂指痧筋去血用活血解毒藥漸愈 其妻同時寒熱煩悶頭面腫脹脈伏放痧不愈飲微冷礬湯次用透竅消毒下氣藥加牛膝三錢二服愈 其子亦寒熱如瘧心腹絞痛吐瀉不已六脈沉緊用石一方並竹四方入大黃一錢次日再服愈

滿痧 初起跌倒牙關緊閉不省人事捧心拱起鼻煽耳鳴急爲大放毒血金七石一

丸竹五末五竹

脫陽痧 小腹急痛腎縮面黑氣喘出冷汗名爲脫陽有似發痧用蓮鬚葱白三莖研

爛酒四碗煮二碗作三服又炒鹽熨臍下氣穴令氣熱

羊毛痧 腹脹連背心或腰胯如芒刺痛用燒酒瓶頭泥研篩細和燒酒作團輟擦痛

處卽有細白毛黏團上

羊筋痧 腹脹渾身板痛 此二症胸前或腰背用小針穿皮挑出筋毛自愈只揀疼

339

驗方橫編 痧症

處看有毫毛聚起者便是藥用滌痧丸普濟消毒飲 一人偃僕不前自謂鬼箭打藥樵視其疼處用小針貫紅綠結線就膚間穿過二三分許即拽斷亦不見血豁處露毳毛狀挑三四針後其行如駛

紫疱痧 痧不內攻則外潰為腫為毒之外又有發為紫疱血者亦異症也 六竹 一養媳手足下半身俱腫大腹亦脹發出兩腿足紫血疱如圓眼密布皆云爛麻瘋服藥益甚及見腿彎痧筋發現遂放五針又指頭十餘針盡去毒血診脈俱和用竹六方二服結痂愈

瘋痧 一人犯大麻瘋眉髮脫面目敗手足攣遇老人為放痧三次曰此麻瘋也傳一方日日服之以漸而痊 方附竹 六後

血沫痧 脹悶廢食兩脇疼甚口出淡血沫如西瓜瓢 用薰陸香為君佐以寄奴茜草之類治之即愈 薰陸即丹陽所產零陵香 聞京師曾傳患時症凡吐唾淡紅色旋病不數日死有乩仙傳方但知其和猪膽汁作錠錠可活三人適一醫用猪膽作引亦立愈遂屢用得效症與此類因附記之

蛔結痧 痧毒攻胃蛔死入大腸與宿糞相結腹中大痛又有胃中熱脹之甚蛔不能存因而上湧乘吐而出或蛔結腹痛不大便或由大便出與傷寒吐蛔伏陰在內者

不同治宜清痧脹爲主加熟大黃<sup>七竹</sup> 一女痧發痛極頭汗如雨脈孔而洪實放刮不出用竹二方次日筋現放痧用石七方下死蛔三條結糞亦下腹痛遂止 一婦發熱心疼口多痰涎吐蛔二條投竹七方痰遂退

銅痧 渾身上下頭面眼珠盡如薑黃色者邪熱攻乎脾胃而土之本色現乎外也蓋

脾爲陰臟已土主燥胃爲陽腑戊土主溼一溼一燥溼熱熏蒸如醋麪狀故發黃也<sup>八竹</sup> 一羽士時疫七八日遍身發黃目瞪體僵六脈如無忽又如沸二便久閉淹淹待斃以滌痧散搗灌刺臂指血點滴如墨委中絕無勉與竹八方竟霍然 按本草從新云黃疸須分陰陽黃宜茵陳陰黃須溫補若用茵陳多致不救葉氏臨證指南論之尤詳此書專爲痧症言之痧皆屬火如前所言羽士脈症故當無陰陽之分也其稍輕者非便閉亦不必大黃又可參用五苓之類

鐵痧 頭面手足十指如鍋煤色不治以血凝也或用火酒擦身法委中刺出紫黑血兩茶杯竟有立愈者

痧塊 氣痞痛血塊痛食積塊痛皆因刮放未盡不用藥消以致痧毒留滯成塊治法在氣分用沉香砂仁之類血分用桃仁紅花之類食積用檳榔之類相兼者當併治<sup>二竹</sup> 一又有不忌食物痧毒裹食成塊兩脇下痛其痧塊變症甚多故爲難治且治痧

惟在初發若飲熱湯毒血凝結卽慢痧不致脹急傷人亦成脇痛痧之日久勢必難散 一婦腹痛放痧二次忽左脇有塊屢痛不止坐臥不安脈乳沉微此毒滯不行之故用竹五並匏一方與石一方加貝母白芥子二服而痊 一人身熱吐痰脇痛喘嘔不已左脈洪數右脈似伏刺過二針服童便喘嘔稍減用金七丸潤下丸身熱吐痰俱已又用匏二方三服而痊

身重痧 痧症始發雖暴未必身重若飲熱毒阻遍身重痛不能轉側放痧後急宜消瘀解毒久則難治放痧不效者死<sup>四匏三</sup> 一人臘月腹微痛嘔酸水飲薑湯大痛脹重不能轉側右脈伏放痧用匏三方痧減又放痧服匏四方愈

心煩嗜睡痧 痧沖心胸故心煩或嗜睡此等俱慢痧若誤以心煩嗜睡治之日甚一日倘飲熱物必漸凶險遂成不起之疾治法刺血爲主可不藥而痊

遍身青筋痧 一羸瘦人慣發痧一月數發發則面青如靛滿身青筋脹起如箸痛自小腹攻上胸脇困倦難狀向作虛損溫補億益甚針曲池委中黯血如注少甦用火酒進滌痧丸立效後連進數服竟絕根

偏身腫脹痧 暑熱疫毒攻裏則爲痰喘爲血瘀昏迷不省若元氣實內不受邪卽散於肌肉爲腫爲脹誤飲熱湯便成大害此痧之暗者宜從脈異處辨之 一女手足



俱腫將逮於腹六脈弦細沉遲此慢痧變症緣不肯放血數日腫脹益甚勉強放廿餘針紫黑血出用石二方並散痧解毒消瘀順氣藥以痧久綿延服十餘帖腫脹始消一婢久患瘡腹大如膨手足俱腫左脈微數右歇止夫瘡毒入內腫脹脈必洪數有力今脈症不合此慢痧爲患也腿彎果有青筋刺五針未愈又刺指頭十餘針用石二方並匏四方五服遂如舊

### 痧別兼類變第十五

痧有兼症類症變症非望聞問切所能盡惟看痧筋辨之夫痧筋所見者青紫之色也痧症所原者血中之毒也血中之毒既無可消則百病生治之自宜刮放刮放不盡則宜用藥先去其痧後理其病其或當兼治當預防者務詳審之

傷寒兼痧 凡傷寒頭痛寒熱諸症或受暑觸穢感疫忽兼犯痧惟認脈看筋必先治

痧退乃治傷寒若誤飲熱湯薑引慢者猶可緊者立見凶危五匏一人傷寒十四

日忽昏沉身重醫治不醒予曰痧氣沖心故昏迷痧入血分經絡故不能轉側先放

痧用匏五方痧退治傷寒而痊 一女頭痛發熱屬太陽症用羌活沖和湯稍愈至

四日藥忽不應更面赤身熱煩悶六脈洪大無倫此傷寒兼犯痧症刺青筋一針流

紫黑血餘細筋隱服匏二方兩帖稍鬆次日痧筋大現刺九針服絲七方少安後

驟進飲食復發熱面赤又刺兩足青筋用匏二方兩帖稍愈偶飲溫茶立刻狂言令

痧類傷寒 傷寒集中有四症類傷寒未若痧類傷寒之凶暴夫傷寒頭痛寒熱屬足

太陽膀胱經是寒從肌表而入故宜發散爲先若痧症頭痛是毒氣上攻不因外感寒氣其寒熱雖在肌表乃時氣由呼吸而入鬱爲熱毒搏擊肌表內熱則外寒故亦惡寒宜先刺顛頂放痧洩毒用藥透竅解毒順氣爲主若誤用羌活麻黃發表太甚反助痧勢必攻衝腫脹立時見凶要知痧症宜清涼則痧毒可內解傷寒宜辛散則寒氣可外舒斷不可以互混七六 一人寒熱昏沉面色紅黑指頭青黑脈洪數皆曰新昏症必屬陰予曰非也脈洪數痧毒搏擊也指青黑毒血流注也面紅黑痧毒升發頭面三陽也視痧筋放之微有紫黑血用石二方晚蠶沙湯服漸醒復刺血如注但發熱身重肩背痛用大劑匏六方漸能轉運猶身熱大便不通用葡萄實軍朴麥芽桃仁溫服便通熱減痊 一婦頭痛寒熱煩悶喘渴頭汗如雨面黑指青氣口脈虛歇止左三部洪數無倫若非痧而有是脈恐不能生刺頂心一針臂腿數針不愈彼因飯後起病用礬湯吐之煩悶喘汗俱除餘症未愈用匏七方二帖大便通而安後十餘日腹中大痛口吐涎沫又因穢觸而然刮痧用金四方愈

傷風咳嗽痧 痧感時氣咳嗽肺經受傷不可同傷風治法當刮痧爲先清喉順氣涼肺散痧爲主八說 一人傷風咳嗽日晡微寒發熱脈乳虛而無力乃肺經痧也刮放稍可不服藥至十餘日嗽不止用匏八方加前胡山豆根愈

咳嗽嘔噦痧 痧凌肺經氣逆發噎痰涎嘔噦或面目浮腫或心胸煩悶此熱毒入氣分痧筋往往不現當刮之間有入血分者必待痧筋方刺之急宜理其痧毒若從傷風治則誤 一人噎不絕聲面目腫嘔痰不已更吐鮮血脈弦緊且數此痧氣搏激于筋脈間令多刮之用石二方加童便微冷服又用絲四方而痊 一女子發熱咳嗽嘔吐痰涎胸中脹悶面目浮腫服風嗽藥心益脹悶延及一月知爲痧之變症刮訖用金一方加貝母薄荷童便飲之即愈

霍亂痧 痛而不吐瀉者名乾霍亂毒入血分宜放痧新食宜吐久食宜消食消下結宜攻痛而吐瀉者毒入氣分宜刮痧有痧筋則放宜調其陰陽之氣須知腸胃食積宜驅不宜止止則益痛若吐瀉而後痛者此因瀉糞穢觸宜用藿香正氣須防食積血滯或消或攻或活血彼山藥茯苓及燥溼之劑溫暖之藥皆不可亂投乾霍亂盤腸大痛先放痧用石二方與潤下丸妙 一人晚覺腹痛吐瀉數十次痛益甚宿食雖吐瀉盡乃毒入血分血瘀作痛也用絲六絲七方少平次日再服愈

**痧痢** 夏傷於暑秋必瘧痢痢初必先泄瀉腸胃空虛則易感穢氣卽成痧痛或炎熱疫癘因積而發亦致痧痛夫痢不兼痧積去便輕若一兼犯必絞痛異常止治痢無效或變如豬肝色如屋漏水或惟血水或變噤口不食嘔噦凶危或休息久痢綿延歲月惟先治痧兼治積則痧消而積易去積去而痧可清矣 一人發熱痢血水日百餘次肛門窘迫腹痛異常嘔噦不食六脈遲數不常或時歇止此痧痢也刮放後痛減半用石一方砂仁湯下煎用竹六方去赤白滯甚多諸症悉愈 一人發熱脹悶沉重痢下紫血醫但治痢甚危篤見六脈洪大不勻刮痧用匏三方入童便飲次以蘇木紅花五靈脂茜草烏藥香附當歸導瘀乃安

**痧類瘧疾** 痧有寒熱往來類乎瘧疾或昏沉或狂亂或痰喘或煩悶叫喊或嘔噦吐痰睡臥不安或大小便結舌黑生芒如此重極脈必有變不與瘧同宜細辨 一人日晡寒熱昏沉脹悶大便不通舌焦胎厚左脈浮大而虛右沉細而濇不似瘧脈視乳下有青筋刺出毒血用散痧消毒活血藥諸症退又用潤下丸二錢大便通惟寒熱未退用小柴胡湯而瘥

**瘧疾兼痧** 瘧忽兼犯乎痧瘧必因痧而變苟以爲瘧而忽視之必至傷人是非先治其痧卽輕痧亦必有遺患<sup>土</sup> 一少男患瘧凶暴驗筋放痧稍鬆用石二金八方兩

服扶而起次日傷食患益甚更放痧用散痧消食順氣解毒藥三服稍安後又傷食發熱用查蔔青陳紫樸白芥四服大便不通加大黃枳實便通熱減但病久虛暈心跳用棗仁茯神參芪熟地之類調補一月痊 一婦瘧八日忽壯熱不已昏沉不醒左脈不勻右虛瀟非瘧脈也刺臂青筋流紫黑血不愈服金五方加養樸檳蔔並土一方稍醒次日又刺指頭服金五方加軍枳熱退後用絲二方運動其氣痊

**頭痛痧** 毒中臟腑之氣閉塞不通上攻三陽顛頂故痛入腦髓發暈沉重不省人事名眞頭痛旦夕死急刺顛頂洩毒藥惟破毒清臟爲主毒中臟腑之血壅瘀不流上沖三陽頭面肌肉故肌肉腫脹目閉耳塞心胸煩悶急刺顛頂及其餘青筋藥宜清血分破壅阻爲要<sub>三土二</sub> 一人頭痛發暈沉重脈伏刺顛頂及痧筋少魁脈沉實而上魚際用土二方 一婦頭面紅腫發熱頭疼迷悶脈芤而疾刺左腿彎三針血如注冷服紅花膏半杯用土三方

**心痛痧** 屬氣則時疼時止痰涎迷悶刺手臂服順氣藥爲主屬血則大痛不已昏沉不醒刺腿彎服活血藥爲主遲則難救 一人心中暴痛痰涎迷悶兩寸沉伏關尺洪緊刺痧筋二十針用石三方四帖而安

**腰痛痧** 痧毒入腎腰痛不能俛仰若誤飲熱必煩躁昏迷搦搖舌短耳聾垂斃而已

一婦腰中大痛板硬誤飲熱酒發熱煩躁昏沉痰湧左尺虛微右尺洪實脈兼歇  
止刺血不流用石四方腿彎筋現刺二針血流再服二帖痛減

小腹痛痧 毒入大小腸則小腹痛不止形如板推絞絞不已治須分左右二股屈

伸爲驗四 夏月不頭痛發熱但小腹痛或心腹俱痛脹痞不能屈伸此皆暑火流

注臟腑故先小腹痛徧及心腹宜六和湯清解之四苓加香薷木瓜紫蘇和散之或

正氣散加黑梔或炒鹽和陰陽水探吐痰涎可耳 一少年少腹大痛每臥左

足不能屈伸太陽小腸經痧也服土四方三帖筋始現刺左腿彎二針用絲七方冷

服愈 一人小腹大痛每右臥右足不能屈伸陽明大腸經痧也刺腿彎青筋四

針血流不愈用竹八方冷服半夜痧退而安

頭眩偏痛痧 痧氣慢者常覺頭眩內熱或半邊頭痛心煩不安宜刮痧不愈用清熱

下氣之劑

流火流痰痧 痧毒傳變忽足忽手忽發肌膚忽爲痰喘隱現無定來去不常而痧脈

又不現最難識認有熱似流火腫似流痰而不比流火流痰之輕緩或痛極難忍或

癢痛不已此等驗於痧筋發現刺之無疑然後憑脈驗所犯風寒暑溼及食積痰血

氣阻分治之斯能有效 一婦日間左小腿紅腫大痛暮即腹痛而足痛止次日右

小腿紅腫大痛腹痛又止六脈如常難據爲痧腿彎有青筋三條刺血甚多反加痰喘此放痧未盡之故用竹二方加土貝母二錢兩腿稍愈次日左腿彎又刺痧筋一條顛頂一針服前湯加牛膝三錢痧卽退更服絲七方俱痊 一人晚間右腿紅腫痛方已喉旁腫痛不覺爲痧只見時症犯此者多細看兩臂痧筋刺血用石八方倍查荀加大黃一錢食消便下而安

痰喘氣急痧 先有痰喘氣急痧脹因之先治痧後治痰氣無令痧爲本病之助先有痧脹痰喘氣急因之但治痧而痰氣自愈若痧有寒熱不清痰喘氣急者兼和解痧有但熱無寒喘急者兼消食順氣有大便不通小便不利喘急者又有痢下膿血喘急者俱急攻裏有瘀血凝滯小便利大便黑喘急者當慮痧毒攻壞臟腑不痛可治痛而不易難治服藥不應者死<sup>五土</sup> 一人發熱頭痛脹悶昏迷痰喘氣急六脈無根若痧脹則有救因放痧用石五方絲四方稍冷服又用土五方一服昏迷卽醒脹喘俱平更用金一方加青翹查荀熟軍發熱頭疼俱已脈復舊 一婦痰喘氣急脹悶不已刺乳下二針出紫黑血稍可用竹四方三服愈 一人痰喘氣急發熱身重腹中絞痛刮放不愈用金四方並石六方加大黃服之愈

半身不遂痧 慢痧遲緩中於血分未至攻心留滯經絡或在左在右半身疼痛或麻

痺遂成半身不遂見痧筋急刺破用藥散毒活血消淤六士一人朝涼夜熱氣急半

年服藥不應加右半身疼不能俯仰痰嗽食減成勞弱病然脈症不符闕痧筋刺廿

餘針用土六方二服後疼痛吐痰俱除後朝用六味丸夕用補中益氣寒熱愈

噤脹兼痧 先有噤脹忽痧乘之噤脹益甚痧宜早治 一人臍突筋青心坎將平知

爲血噤其指頭黑色兼痧無疑刺廿餘鍼腿臂血出略鬆服絲三方臍下青筋漸退

後用噤症藥導去惡水日服治噤香櫟丸二月餘噤症盡平

痧變噤脹 慢痧遷延時日留滯肌膚腸胃中若不早治即成真噤 一人急氣作脹

飽悶臍下青筋突起心坎將平此慢痧成噤也出毒血廿餘鍼臍筋即淡腹內覺鬆

用石二方脹漸消

老病兼痧 先有痰火嗽疾忽喘急如鋸或頭汗如油煩悶莫狀雖是痰火危篤然有

兼感時氣穢觸驟然勢盛者必宜察脈按症先清痧次治痰漸補氣血可耳 一嫗

素抱痰火老弱病忽痰壅喘急如鋸六脈不勻如雀啄此兼痧症尚有挽回刺出惡

血用散痧消食豁痰順氣藥並進土五方漸安後大補氣血而痊

弱症兼痧 先有勞弱症或時吐血或微乾嗽顙唇鮮紅或骨蒸發熱不已一染時氣

穢觸必兼痧症或痰喘或喉鯁或脹悶煩熱較平時不足之症益覺沉重宜治痧爲



主令痧退盡方治本症 一勞弱吐紅症脈洪實有力醫謂此脈是症之所忌予見勢暴疑焉視腿彎筋青色先放痧脈和症平又用散痧消食去積藥飲食漸進後用六味丸及十全湯勞弱亦愈蓋向病俱從痧氣而洩所以用補得效也 一婦吐血乾嗽晝涼夜熱已久因怒午後忽發熱脹悶痰喘昏迷左關微緩餘脈應指不勻夫怒氣左關必有力勞弱脈亦宜弦數內有鬱血寸關亦當見芤脈不對症兼痧明矣刺痧筋倍用石二方清茶飲之神清喘已但勞弱未愈耳

內傷氣痧 先變痧症治其標後審內傷治其本<sup>七上</sup> 一老婦爭產相毆發熱痰胸中脹悶診知內傷兼痧刺痧筋廿餘鍼服石二方稍鬆用土七方治其內傷服後下黑糞瘀消症平後用木六方並前虛症亦除

痧變勞瘵 痧惡飲熱有反喜熱湯者症益莫識慢痧所以漸成勞熱也毒入氣分傷肺喘嗽吐痰發熱聲啞肺爲嬌臟若不知治變爲百日緊勞輕者數年終殆毒入血分重者兆變在卽輕者歲月延捱若毒瘀胃口必須去盡乃愈毒瘀肝經損壞內潰吐血數發勢極必危毒瘀心胞絡更加凶險不待時日毒瘀腎經腰脊疼痛嗽痰咯血日甚一日凡痧毒遺患總成勞瘵治須識之於始莫咎其終 一人痧脹不服藥惟放痧三次胃脘間成一塊咳嗽吐痰發熱不食日漸尪瘦右關芤而緊餘俱數此

內有瘀血必吐出方解用桃仁蘇木澤蘭白蔞香附烏藥酒煎服吐出紫黑血碗許更用活血引下之劑加童便酒服愈

痧變吐血鼻衄便紅 痧毒沖心則昏迷痧毒沖肺則氣喘痰壅甚則鼻衄痧毒入肝則胸脇疼痛不與轉側甚而血湧吐出痧毒流於大腸則大便秘血流於膀胱則小便血治宜先清痧毒順其所出之路則氣自順而血自寧矣革一八 一人放痧不服藥變筋骨疼痛十日後吐血甚多疼痛不愈診其脈芤此痧退尙存瘀血用匏四方

一幼兒痧痛大便紅令放痧用土八方 一女痧痛溺血甚多放痧不愈用革一方加銀花連翹牛膝益母而痊 一人痧脹鼻衄是痧氣由衄而泄用金六方

痧變發斑 痧粒不過紅點而已至有渾身成片斑爛發熱頭暈者金五方主之

痧患小便不通 毒結膀胱溺水利小腹痛難忍用土四方 一八歲小兒發熱眼竄不語或以驚風治以傷寒治一無效予用滌痧散燈心湯調灌下便作呻吟已經十日大小便秘小腹脹急手不可按用潤下丸五分小便去數升再用一錢大去宿糞愈

眼目怪症痧 毒火上沖幸心君不受邪而逆侵厥陰肝母故兩目紅腫如桃甚則眼珠突出然他症患目惟在於目痧必心中煩悶而目疾因之苟不早治則痧毒已參

陽位其火勢炎極輕則壞目重則殞命宜先刺顛頂以洩毒氣用清火活血順氣之劑加牛膝石斛以引火歸原 若心中煩熱頭眩兩目紅腫大痛眼珠掛出左目尤甚至晚卽昏暈用革二方加童便服眼珠始收 若兩目通紅甚至起障翳此痧之餘毒在肝用革三方加燈心白芙蓉葉水煎溫服 一婦頭疼身熱眼珠突出半寸痛不可忍眼科療之更甚予爲刺頂門一鍼太陽晴明合谷三穴各二鍼痛減半竟投痧症藥珠收痛止惜治已遲竟失明矣

痧後牙疳 用革四方神效

痧後胸膈痛 痧已退盡留瘀胸膈作痛用失笑散

婦人倒經痧 遇痧經阻或鼻紅或吐紅腹腫脹不能轉側者是也腹不痛亦爲暗痧

若攻壞臟腑不治急放痧再用藥

五革

附胎產痧論 孕婦痧易傷胎產後痧防惡阻救療俱爲尤急若暗痧陡發則胎前痧

脈滯於有孕產後痧脈雜於惡阻又無心腹痛據須究症候察聲色看有痧筋急宜

刺破肌膚痧壅焮刮兼施攻壞臟腑莫能挽矣

胎前痧痛 胎前痧痛衝絞可畏凡安胎藥如白朮當歸茯苓之類痧所大禁其治痧

破氣破血之劑又胎所忌斟酌其間活血解毒用銀花丹參益母紅花寄生順氣用

香附陳皮紫樸砂仁烏藥散痧用荊芥防風獨活細辛消食積用查蘆神麩麥芽採擇於中最高為穩當若勢盛難效權用一兩味克伐恐於胎氣有妨不可不慎六辛紅花細

婦娠六月寒熱煩悶痧在初發未現用藥不應忽爾昏沉次日左手脈伏面目微

黑乃刺腿彎六鍼少愈服革六方而安後用小柴胡湯退熱又參茸歸地健脾養血乃痊

產後痧痛 產後藥須溫暖痧脹藥惟清涼既屬相反則方毋執一今製方為臨症法

散瘀用獨活細辛破血用桃仁紅花順氣用香附烏藥陳皮解毒用銀花紫地丁消食用查蘆神麩麥芽如產後利用薑炭肉桂以溫血痧症所禁也痧症利用荊芥防

風以散痧連翹薄荷以清熱產後不宜也況痧症脹極尤貴大黃枳實檳榔以通積滯而產後之藥更不可用蓋痧而用溫脹者益脹產而用冷瘀者益瘀惟取微溫之

氣則兩不相妨更加童便以清熱消瘀豈非良法乎八辛七 一產婦三日後腹絞痛

脹如皴惡露不通夫產後痛當在小腹今大腹絞痛異常非產婦本病脈洪數有力兼痧無疑先飲童便一杯少甦刺出毒血痛稍定用絲六方痧退而惡露通 一產

後數日去血過多忽寒熱脹悶甚危脈洪大無倫念惡血去盡不宜得此脈視痧筋果有紅紫二條放過便不復洪大又刺指臂十餘鍼用革七方四服痊 一產婦六

日遍體疼痛寒熱如瘧昏悶異常六脈歇止見指甲帶黑刺指七鍼舌底紫黑血一鍼稍緩用革八方四服全瘳

小兒夾驚痧 小兒一時痰壅氣急不語眼目上翻發搐脹滿人盡作驚治不愈速看痧筋放血額上現痧急用火焯先令痧退然後治驚用土五方可也若執驚風治必死

痘前痧脹 痘本先天因時而發痧亦時氣所感而胎元之毒因之俱發凡痘未見點前痧脹必煩悶痰涎甚至昏迷沉重不省人事此其候也小兒滑疾之脈類於痧症厥厥動搖之脈雖若疑似難明然有痧筋可辨不可鍼單用藥清之宜木一方透痧兼發其痘痧自退痘自起矣若痘點既形觸穢痘隱者諸痘科自悉

痘後痧脹 痘後氣虛尤宜防護嘗有收醫結痂安然無事一遇暑侵穢觸卽成痧脹忽然生變人多誤爲惡痘所致大誤 一七歲子脫痂光潔飲食行步如舊迨二十五朝忽叫喊發暈脈微細而伏若惡痘餘毒兆變脈當沉緊有力今脈症不合痧筋歷歷可指用竹二合竹四方卽甦後小腹痛變痢用當歸<sub>錢五</sub>山查<sub>錢一</sub>熟軍<sub>分五</sub>童便微溫飲之卽愈 痘前痘後見有痧筋止可用藥切忌鍼刺

瘡症兼痧 瘡痛者心火血熱所致膿腫作痛必漸而來非若兼痧之驟而可畏况瘡

脈多洪數兼痧脈固不同筋又可驗 一女患瘡半載一日酒後血熱且食雞鵝膿瘡大盛與涼血解毒藥更覺昏迷飽悶脈不洪數反沉微必痧使然刺頭頂一鍼指頂數鍼稍清爽猶脹悶用木二方木三方愈

痧變腫毒

痧毒留滯腠理即成腫毒宜先放痧用解毒散痧藥以除其根然後審十

二經絡臟腑分陰陽寒熱處治輕則消之重則托之虛則補之實則瀉之紅腫甚者

屬陽用木三方白色平腫不起發者屬陰用木四方毒有半陽半陰用木二方穿破

後貼太乙膏若無膿止流毒水或膿少血多用飛龍奪命丹研碎些須填太乙膏中

拔去毒水膿血後單貼膏毒口難收搽紅玉散五木四一人遍身疼痛背發一毒黑

爛痛苦脈沉微指頭黑色而惡熱飲此痧變惡毒用冷圍藥而成背疽也令去圍藥

放痧訖俟痧氣已絕用木四方溫托之外敷如前法另有木五方選用

附痧後調理 說見後木六七八方

六十四方第十六 加雜歌

風暑陰陽斑烏暈金接石頭絞腸並絲首抽筋尾噤痰暗痧落弓中各三入竹三喉次  
瘟滿六疱七蛔八黃痘匏中塊重症俱重傷寒兼類又傷風土瘡頭痛小腹痛更有不  
遂傷紅轉革連血目牙婦科木排痘瘍痧後和按七十二症絲方者半或一症數方或一方數症今症案專彙中卷歌方另編下卷分類以便查閱

金一 風痧腹痛類頭疼汗熱腿酸臻荆防細殼陳旋等煩嗽早先匏八陳痧服香

荆芥 防風 細辛 枳殼 陳皮 旋覆花分等 水二盃煎七分稍冷服飲湯

尤甚故 首服醫 冷溫見用 藥第十一

加減法大同小異 餘可類推 頭面腫時荷與菊腫歸手足膝威銀渴須花粉吐須便知母連翹內

熱清 貝萋並力治痰多寒熱須將柴獨和茜草丹皮行血滯射干山豆屬喉科

腹皮厚樸皆消脹食積疼時查蓄強心痛延胡蓬蓬妙青皮小腹脹疼良 薄荷藿

香清穢觸面黑紅花與蘇木痧兼痢疾赤白同加用檳榔效自速而黑血 痧也 放痧不出

弗須驚蘇木桃仁血可行荆芥細辛加倍用其餘對症再論評細辛不得 過五分 頭面腫加薄荷

手足腫牛膝威 癩銀花 口渴吐不止便童 內熱知母 痰多貝母 寒熱柴胡 血滯茜草 喉腫射干山

腹脹大腹皮 食積腹痛山查 心痛元胡 小腹脹痛青穢 穢觸薄荷 面黑蘇木 赤白痢檳榔 放

痧不出加倍荆芥細辛

金二 暑痧金二治頭眩自汗如傾吐瀉兼藿荷翹通銀與樸澤車瓜豆藿憑添頭眩者 必微心

藿豆木瓜 香薷 薄荷 連翹各一 木通 銀花 紫樸各七 水煎冷服原歌無銀夾列澤車 藿而藿瓜豆作添

金三 暑脹金三自可平藿藿查樸殼陳青紫蘇催汗隨加減竹葉膏湯用亦靈 藿

子 香薷 山查 紫樸 枳殼 陳皮 青皮 紫蘇分等 冷服 汗多去紫蘇

驗方續編 痧症

六六五

本草從新云貪涼飲冷陽氣爲陰邪所遏宜香薰溫散利溼若飲食勞役內傷暑症宜清暑益氣及人參白虎等湯無表邪而誤服香薰重虛其表反益之熱矣審之

金四 腹疼肢冷宜金四泮後查翹枳索荷藿附可加砂與木陰痧穢觸最爲多 山

查 連翹 枳殼 延胡索 錢各一 薄荷 分七 藿香 香附 分各四 冷服 歌加砂 仁木香

金五 金五陽痧手足煖荆防翹鬱與陳青芎妨喉痛心煩熱服痛多般加減靈 原歌有 鬱無芎

荆芥 防風 錢各一 連翹 陳皮 青皮 分各八 川芎 分三 稍冷服 食不消 加查 食積

有積 擲痰多 芥貝 咳嗽 喉痛 氣壅 烏藥 血壅 紅花 鬱悶不舒 辛細 大便不通 大積 黃小 便

不通 木通 藹暑熱 厚樸 喉痛 去川芎加薄荷射干牛蒡 心煩躁 去芎加 黑梔

金六 退痧熱之劑 金六頭眩嘔發斑速行刮放免奇患粉丹荷骨梔元細帶冷湯

將血熱刪 花粉 丹皮 薄荷 地骨皮 山梔 元參 細辛 分等 稍冷服

金七 治食積壅阻痧青疼痛難忍頭面手足腫胸腹脹悶 癘痧金七水丸方蘇索

脂仙 葡萄最強稜菴陳檳實樸烏香沉降魏砂湯 蘇木 延胡 五靈脂 天仙

子 葡萄子 兩各一 三稜 莢菴 薑黃 陳皮 檳榔 枳實 厚樸 錢各七 烏藥 錢五 香

附 錢四 沉香 降香 錢各三 阿魏 錢二 水法爲丸如菜豆大每服十五丸砂仁湯稍冷下

金八 治痧氣急胸腹脹痛迷悶昏沉 金八暈痧萊實樸仙陳稜菴沉檳菴烏廣



木香丸就湯用砂仁急脹平十一味同上多蒞 萊菔子 枳實 厚樸各七錢 仙子

廣皮 三稜 莪蕪錢各六 薑黃 沉香 檳榔錢各五 白蔻 烏藥錢各四 木香錢三 水丸

菘豆大每用丸砂仁湯稍冷下

石一 治氣壅血阻昏迷不醒遍身沉重不能轉側 石一 暈痧先廣脂薑仙稜蕪與

青宜枳烏蔻木沉阿魏丸進氣壅血阻時八味同二方脂魏同 廣皮 靈脂兩各一 薑黃

仙子 三稜 莪蕪 青皮錢各七 枳實錢六 烏藥 白蔻仁錢各五 木香 沉香錢各二

阿魏錢一 丸法服法同上加貝芥

石二 治痧仙劑 石二 仙方治絞腸細辛荆穗降真香鬱金共末清茶冷寸七毋多

怕有傷 細辛兩一 荆芥錢五 降香錢三 鬱金錢二 共為細末每服三匙清茶稍冷服以下七方相聯酌用

石三 治痧氣內攻 脈伏石三 痧內攻元胡葛芥與稜蓬青烏枳殼紅香附任是盤

腸可奏功 元胡 蕪子 白芥 三稜 蓬蕪錢各一 青皮 烏藥 枳殼各八 紅

花分七 香附分四 水煎稍冷服

石四 治痧毒中腎 石四 腰疼中腎痧懷牛白蒺鳳仙花桃紅降末調糖黑童便沖

來力更加歌原注作桃仁童 牛膝兩二 白蒺兩一 大紅鳳仙花 桃花 紅花錢各七 降香

錢五 共末黑砂糖童便沖服

驗方攪編 痧症

石五 治痧氣寒凝 石五寒凝腹痛方辛烏降鬱木沉香冷調細末三分服通下三

條可迭嘗可與石二絲 二飽一參看 細辛錢五 烏藥錢三 降香錢二 鬱金 木香 沉香錢各一 共細末每

三分冷服砂仁湯下

石六 痧因食積主方 石六痧緣食積因消除腹痛力堪憑青烏檳葡蓬稜實依類

還將查麵增 青皮 烏藥 檳榔 葡萄子 蓬蘽 三稜 枳實錢各一 水煎歌加

石七 治痧大便乾結氣血不通煩悶昏沉 便結昏沉石七通燈心湯佐水丸功桃

麻軍實青辛樸青去萘和酌量中原歌有 萘無青 桃仁尖去皮 麻仁 大黃 枳實 青皮

細辛 厚樸分等 水法丸燈心湯冷服一錢至三錢

石八 治痧食氣壅盛 食氣壅時石八方絞腸七劑此分詳青陳查樸蓬稜實辛葡

翹煎帶冷湯流火流痰案倍 查煎加大黃 青皮 陳皮 山查 紫樸 蓬蘽 三稜 枳實

細辛 葡萄子 連翹分等 水煎稍冷服

絲一 治食積成塊痛久不已推上移下筋脈抽掣 抽筋絲一荆湯下丸麵查脂服

實青蓬樸稜檳薑藥蔻木沉阿魏又加丁 神麵 查肉 靈脂 葡萄子 枳實

青皮各一 蓬蘽 厚樸錢各八 三稜 檳榔錢各七 薑黃 烏藥 蔻仁錢各五 木香 沉

香錢各三 阿魏錢二 丁香錢一 水丸菘豆大每十丸紫荆皮煎湯下

絲二 治過飲冷水痧不愈者 絲二砂湯末細羅木沉檀共五分多暗痧暑被寒冰

激刮放棄施氣可和 木香 沉香 檀香分等 共細末每五分砂仁湯微冷下

絲三 治食積血瘀成塊日久不愈 絲三瘀食成痧塊痰索脂桃末最宜茜蕝薑蘭

查土貝銀檳烏藥並青皮 白蒺去刺 延胡二兩 靈脂各兩 桃仁去皮尖 茜草 蕝子

薑黃 澤蘭 查肉 土貝母淨一兩 銀花八錢 檳榔七錢 烏藥 青皮各六錢 共末每一錢

溫酒下

絲四 治血鬱不散 暗痧絲四與前通血鬱桃仁痰索攻細沒降香均作末一錢酒

下與前同 桃仁去皮 白蒺去刺 延胡各一兩 細辛四錢 沒藥去油 降香各三錢 爲末酒下

一錢

加歌 落弓痧症頗難知痰喘昏迷眼弔時絲五方仍聯六七放痧去血復何疑

絲五 治痧氣鬱悶 未成絲五鬱堪排枳葡萄烏翹與鬱偕更擬銀丹查作輔清茶冷

下致爲佳 枳實 葡萄各一兩 烏藥 連翹各八錢 鬱金二錢 爲末清茶稍冷下歌照案加銀花丹麥山查

絲六 痧因血鬱主方 絲六專攻血鬱方桃紅獨痰索蒲黃烏兼殼附成方外膝貝

加來入便良 桃仁 紅花 獨活 白蒺末炒 延胡 蒲黃 烏藥各一錢 枳殼分七香

附三水煎微溫服案加膝貝重便

驗方 續編 痧症

六六九

絲七 治血痰 絲七昏迷治血痰青紅蒲殼用宜譜無多香附些須貝記取落弓症

第三 青皮 紅花 蒲黃各錢 枳殼分六 香附分四 貝母分二 溫服

絲八 痧因氣阻主方 噤痰絲八語無聲氣阻須兼刺放行烏藥青陳查紫樸痰痰

汗渴再加增 烏藥 青皮 陳皮 山查 紫樸分等 稍冷服 血瘀加元胡香附桃仁 痰多

加歌 痰涎壅盛撲蛾痧莫認喉蛾用藥差竹一二三求救治外吹內服妙堪誇

竹一 治痧咽喉腫痛 咽喉竹一熱方升天竺礮硃明粉冰腫痛吹消聲拽鋸煎方

有二次相承 天竺黃 礮砂錢各二 硃砂分一 元明粉錢八 冰片錢五 共末吹喉

竹二 治血滯 竹二喉疼血滯生寄奴紅赤茜丹荆蒺藜烏藥兼香附氣急痰壅不

用驚流火流痰案加貝母加牛膝 寄奴 紅花 赤芍 茜草 丹皮 荆芥錢各一 白痰搗刺 烏

藥分五 香附分三 水煎微溫服

竹三 痧症咽喉腫痛主方 喉痛竹三理命焦菊莠荷梗貝銀翹殼加桔梗和烏藥

童便沖來腫即消煎歌無薄荷 甘菊 牛蒡 薄荷 老蘇梗 川貝 銀花 連翹

枳殼錢各一 桔梗分五 烏藥分四 微溫沖童便服

竹四 治痧氣食結胸中飽悶腹中絞痛 瘟痧竹四雜牽纏細麥前陳奮腹錢二兩

山查 膿作汁藥宜消食放宜先 細辛 麥牙 前胡 陳皮 薔子 腹皮 黑豆湯泡洗各

一先將山查二兩濃煎湯次入六味煎稍冷飲

竹五 治痧毒血瘀成塊堅硬突起不移者 滿痧竹五突堅持蘇木紅桃索疾脂薑

黃降赤軍烏附稜 蕤青陳角獨節 蘇木 二兩 紅花 桃仁 尖去皮 延胡 白蔞 各一靈

脂 錢七 薑黃 降香 赤芍 錢各六 大黃 錢五 烏藥 酒炒香附 三稜 蓬蘞 青皮

陳皮 角刺 錢各四 獨活 錢三 細末每二錢溫酒下

竹六 竹六痧成紫胞羅須從血治用蓬莖蘭紅芎桔桃烏膝放血先覘脈已和 莖

蕤 澤蘭 紅花 川芎 桔梗 桃仁 烏藥 牛膝 水煎溫服

麻瘋痧方 重用銀花及苦參懷牛生地赤紅芎角鉞酒水頻煎飲痧似麻瘋放幾鉞

銀花 錢六 苦參 錢四 牛膝 錢三 生地 赤芍 紅花 錢各二 黃芩 錢五 角刺 錢一 酒水各半煎

竹七 治痧食積氣阻 竹七攻蛔結食傷更兼氣阻痛難當檳陳查薔荷翹附砂末

同沖廣木香 檳榔 陳皮 山查 薔子 薄荷 連翹 香附 以上等分煎好 加砂仁末

分五木香 磨沖 稍冷服 又症案加熟軍

竹八 治痧毒結於大腸 竹八能消遍體黃軍除腸毒起垂殭茵翹藁實桃青赤更

共銀芩梔子涼 原歌無銀花 大黃 錢三 茵陳 連翹 瓜萋 枳實 桃仁 青皮 赤芍

驗方 檳榔 痧症

銀花 酒苓 山梔錢各一 水煎微溫服

匏一 治過服冷水痞悶者 匏一飲寒結塊多丸須砂藷與脂和木沉更倚檀香力

痞悶時兼竹石瘥案兼用竹五石一絲一二三亦可參看 砂仁 藷子錢各八 五靈脂錢六 木香 沉香錢各五

檀香錢六 水法丸每五分白湯下

匏二 治痧因血實 匏二痧因血實瘀更將脇塊與消除軍查青貝桃脂赤香附紅

花滯可疏 大黃 山查 青皮 貝母 桃仁 靈脂 赤芍錢各一 香附 紅花

錢各四 水煎微溫服

匏三 消食順氣和血 身重匏三解毒先散瘀順氣食消兼藷查赤殼同歸尾厚樸

相和用水煎 藷子 山查錢各二 赤芍 枳殼 歸尾錢各一 紫樸分八 微冷服

匏四 治血結不散 更因身重尋匏四血結痧宜白蒺藜蘇寄桃紅青獨活略加烏

藥助排擠 白蒺錢去刺搗 蘇木 寄奴 桃仁 紅花錢各一 青皮分八 獨活分六 烏藥分四 微

溫服

匏五 治痧因食積血滯 傷寒匏五療兼痧藷芎檳翹銀與查桔梗防烏延枳殼先

疏積滯法無差 藷子錢二 赤芍 檳榔 連翹 銀花 山查錢各一 桔梗 防風

烏藥 延胡 枳殼各七分

匏六 匏六類寒發熱攻頭疼煩悶症何凶澤蘭香附桃蘇木獨蒺查烏並有功 澤

蘭 香附 桃仁 蘇木 獨活 白蒺末 山查 烏藥 微温服

匏七 治先因傷食發熱口乾等症 匏七類寒傷食先口乾身熱狀同前柴翹查薑

紅荊粉枳實將軍酒製煎 柴胡 連翹 山查 薑子 紅花 荊芥 花粉

枳實分數白 酒製大黃二錢 微冷服

匏八 治痧似傷風咳嗽 匏八傷風咳嗽痧荷桑桔殼菊銀花射干鈴粉元參貝嗽

甚還須童便加與金一症 薄荷 桑皮 桔梗 枳殼 甘菊 銀花 射干 兜

鈴 花粉 元參 貝母分等 温服 嗽甚加童便飲

土一 治痧痰氣壅盛 土一痧防暑瘧兼熱寒迷悶壅痰涎葛柴知殼青陳樸貝霍

檳榔十味全原貝歌 葛根 柴胡 知母 枳殼 青皮 陳皮 厚樸 川貝

藿香 檳榔 温飲

土二 治痰氣壅塞 土二眞頭痛有方清痰理氣貝薑黃橘辛青樸荊烏藥煎就沖

和砂末涼 貝母錢二 薑黃錢一 橘紅 細辛各八分 青皮 紫樸各七分 荊芥分六 烏藥分五 沖

砂仁末分五 微冷服

土三 散瘀毒引火下行 頭痛土三因症施除瘀引火下行時牛翹獨殼查桃澤赤

芍 薑 蒲 並 所 宜 牛 膝 錢 二 連 翹 獨 活 枳 殼 山 查 桃 仁 澤 蘭 赤 芍 薑

黃 蒲 黃 錢 各 一 微 冷 服

土 四 治 痧 毒 入 小 腸 土 四 功 同 竹 八 分 痛 拘 小 腹 左 難 伸 膝 蒲 翹 芩 通 銀 索 蘭 細

丹 皮 入 便 溫 大 腸 痧 病 在 右 足 用 竹 八 方 錢 三 牛 膝 錢 三 蒲 黃 連 翹 白 朮 木 通 銀 花 延 胡 澤 蘭

細 辛 丹 皮 錢 各 一 加 童 便 微 溫 服

土 五 治 痰 涎 喘 急 痰 涎 土 五 喘 如 奔 星 竺 雄 硃 共 一 門 麝 與 牛 黃 丸 草 水 淡 薑 湯

每 進 雙 元 膽 星 竺 黃 錢 各 三 雄 黃 硃 砂 分 各 五 麝 香 牛 黃 分 各 三 甘 草 水 丸 梧 子

大 每 二 九 淡 薑 湯 稍 冷 下

土 六 土 六 半 身 不 遂 痧 丹 參 旋 覆 與 山 查 橘 蘭 角 甲 薑 延 芍 散 毒 消 瘀 解 痛 麻 丹

參 旋 覆 山 查 橘 紅 澤 蘭 角 刺 山 甲 薑 黃 延 胡 赤 芍 水 煎

土 七 土 七 煩 勞 與 嗽 痰 內 傷 痧 症 要 兼 諳 丹 紅 烏 赤 桃 蘭 索 獨 活 陳 皮 一 例 參 丹

參 紅 花 烏 藥 赤 芍 桃 仁 澤 蘭 延 胡 獨 活 陳 皮 溫 服

土 八 養 血 和 中 吐 衄 便 紅 推 土 八 歸 身 斷 續 與 丹 參 青 紅 茜 赤 查 翹 殼 養 血 和 中

力 自 深 歸 身 續 斷 丹 參 青 皮 紅 花 茜 草 赤 芍 查 肉 連 翹 枳

殼 微 溫 服



革一 治痧氣血阻塞 革一同前血阻明肝心肺部患非輕疾荆荷赤青陳等案有

銀翹膝益名 白蒺末 荆芥黑炒 薄荷 赤芍 青皮 陳皮分等 微冷服兩血案加銀花連翹牛膝益母

革二 眼目奇痧革二方梔翹丹決斛銀涼殼牛芍茜加童便外有當歸可酌量原歌夾列當歸

黑梔 連翹 丹皮 草決明 石斛 銀花 枳殼 牛膝 赤芍 茜草

臨服加童便

革三 目症革三須穀精連通菊賊芍羌荆羚羊生地兼生草更有將軍望月明 穀

精草 黃連 木通 甘菊 木賊 赤芍 羌活 荆芥 羚角 生地 生草

大黃 望月沙 煎服

革四 革四牙疳中白主官礪粉黛共肩差二茶荷草黃連等冰片珠牛拭腐吹原歌秧兩煎茶

人中白錢三 官礪 花粉 青黛錢各一 兒茶 雨前茶 薄荷 甘草 黃連五各

分 冰片分一 珠子分一 牛黃各半 研無聲濃拭淨去腐吹

革五 行經散痧 倒經革五婦人科腹脹痧攻吐衄多桃附青紅查獨細放痧煎用

便冲和 桃仁 香附 青皮 紅花 山查 獨活 細辛 水煎加童便飲

革六 胎前革六解痧虞益附紅荆葡麵俱桑寄難求辛略減煎成冲服與砂須紅花赤少用

益母 香附 紅花 荆芥 葡子 神麵 桑寄生 細辛 冲砂仁末服

驗方續編 痧症

六七五

革七 革七原知產後虛散痧須是帶消瘀查銀丹益柴牛獨烏斛陳辛絞痛除 山

查 銀花 丹參 益母 柴胡 牛膝 獨活 烏藥 石斛 陳皮 細辛

水煎

革八 革八仍前產症求查銀丹益獨柴牛別加桃艾蘇薑附縱有諸邪不用憂 山

查 銀花 丹參 益母 獨活 柴胡 牛膝 桃仁 艾葉 蘇木 薑黃

香附

木一 痘前木一看筋先翹殼荆防用必兼莠桔青紅查薊子散痧發痘自安全 連

翹 枳殼 荆芥 防風 牛蒡 桔梗 青皮 紅花 山查 薊子 牛蒡原歌有方無

木二 治痧後熱青流連不已 木二瘡瘍熱青攻羌莠歸膝翹通青皮蟬退紅花

合腫痛都隨痧氣空 羌活 牛蒡 當歸 牛膝 荆穗 連翹 木通 青皮

蟬蛻 紅花 分等 温服

木三 消痧後餘毒竊發 紅腫純陽用木三荆莠土貝菊銀甘翹通紅紫兼桃肉竊

發無虞痧毒酣 原歌少紅花 荆芥 牛蒡 土貝 甘菊 銀花 甘草 連翹 木通

紅花 紫花地丁 分等 胡桃肉 一枚 温服

木四 治痧後餘毒流連氣血不能即潰者 木四留癰毒潰遲銀花歸草貝參芪芷

查角膝胡桃肉莫使流連氣血移少原歌 銀花 紅花 當歸 甘草 貝母 人

參 黃芪 白芷 山查 角刺少原歌 牛膝 加桃肉一箇煎七分空心温服

木五 痧後熱毒癰疔疼痛不已 木五癰疔芍大黃粉連乳沒貝雄莠穿山甲與生

甘草研末五分調蜜湯原歌少 赤芍錢二 大黃錢一 花粉 黃連 乳香淨 沒藥淨 川

貝炒去心 雄黃 牛蒡炒 穿山甲土 生甘草分七 共研末蜜湯調服五分

木六 痧氣退盡氣血虛弱者用木六七方補之 木六防邪痧後滋芎歸地芍補虛

贏參苓朮草陳芪並好待痧清應候施 川芎 當歸 熟地 白芍 人參 茯

苓 白朮 生甘草 陳皮 黃芪 水煎空心服

木七 痧退調理 木七再商痧後藥銀莠貝藥扁歸查人參甘草無多用蓮肉胡桃

作引加 銀花 牛蒡 土貝 山藥 白扁豆 當歸 山查錢各一 人參分四 甘草

分三 蓮肉枚六 胡桃肉箇一 空心服

木八 治數患痧者必待全愈然後服之以絕其根若痧氣未除則不可服恐甘者作

脹熱者助邪耳 木八能教痧絕根待他全愈妙方存鹽礬烏草乾薑共米飯爲丸

湯帶温 食鹽炒 明礬火飛各 川烏炮 甘草錢各五 乾薑錢三 共爲細末米飯爲丸每服一

錢白湯温下新犯痧者一二服即愈久犯痧者十服全愈蓋甘草以助胃薑烏以充

生 驗方 續編 痧症

胃明礬以解毒食鹽以斷痧誠為良方人屬虛寒必加倍多服方能有效

八丸

金七八五七絲  
一飽一十五木八

九末

石二四五絲二三  
四五竹五木五

兩吹

石一  
辛四

四十六湯

內附  
藥方

加減法

金一五  
絲八

### 應用羣方第十七

玉樞丹 治瘴氣蟲毒解惡藥服砒毒菌河豚死牛馬肉狐狸鼠蟻之毒蛇犬惡蟲所

傷一切癰疽發背瘡疹赤腫諸瘤不服水土隨手取應 山茨菇 俗名金燈籠葉似蓮花  
似燈籠色白上有黑點

結子三錢二月苗三月花四月枯於苗時記地秋冬 文蛤 即五倍子搗破  
洗焙浮秤三兩 紅芽大戟 去蘆焙  
乾兩半 千金子

空得之上有毛髮此味不真則不效去皮焙二兩 麝香 研末三錢上三味為  
末入千金麝香研勻 和糯米濃飲木白內杵千餘分為四十錠宜

去油取霜一兩 端午七夕重陽淨室修製毋令女人孝子雞犬見每用一餅薑汁薄荷湯研服并華

水冷磨亦得通利兩次無妨用溫粥補 孕婦不可服 癰疽發背未破時用涼水

磨塗並服良久覺癢即消 陰陽二毒傷寒心悶狂亂胸滿邪毒未發並瘟疫嵐瘴

纏喉風痧脹腹痛冷水入薄荷一小葉同磨下 急中風顛鬼胎鬼氣用無灰酒下

縊溺心頭暖者驚死鬼迷未隔宿者並井水磨灌 蛇犬蜈蚣傷冷水磨塗 新

久諸癩當日桃柳枝煎湯磨下 小兒急慢驚風五疳二痢蜜水薄荷同磨下牙關

緊急磨塗並服 牙痛含少許吞下 湯火傷東流水磨塗 跌打傷損炒松節無

灰酒下 頭疼太陽痛酒磨爛塗紙貼太陽穴 諸癩口喎斜脣眼掣及夜睡多涎

言語蹇澁卒中風口噤筋攣肢節腫痛並用酒磨下

牛黃八寶丹 治痧發斑發狂渾身赤紫痧後毒瘍隨消 元參五錢 明雄黃各五錢 羌活

川連炒土 犀角 羚羊角 川貝母炒去心 乳香淨 沒藥各三錢 青黛水澄 珍珠四錢 勞砂

五錢 牛黃 冰片各二錢 右法製細末外將揀淨銀花 甘菊 紫地丁各二錢 甘草五錢

長流水五碗砂鍋慢火煎至半取汁絞濾清桑柴熬膏入煉蜜蓋許再熬粘箸和前

末丸每丸三分幼一丸長二丸蜜湯調服牛黃冰片過多擬用二分

仙方腦麝丸 治嵐瘴解茶痰酒渴除伏暑退心熱止喉疼開赤霧及赤白痢一切火

症神效 黃藥子 白藥子各三兩 天花粉二兩 川連一兩 用心擇過碾末篩細止用頭末

廣木香三錢 沉香二錢 麝香五分 片腦三分 豬膽調蒸為丸每丸一分 瘴氣痰渴老年痰

火臨臥噲化三丸暑路常噲一丸止渴消暑如感大熱用五七丸同好茶一撮鹽梅

一箇搗碎并華水調下心熱頭疼目霧噲化三五丸赤痢用茅根汁搗七丸白痢用

茶梅搗服痧脹面赤身熱喘急昏迷者服下即甦

鬱金丸 隨常痧症腹痛者一服見功且治九種心疼 五靈脂醋炒 元胡索八錢 砂仁

生明礬各五錢 木香不見火 真鬱金勿用薑黃代 雄黃為衣各三錢 神麩糊丸 藟子大每三四十

丸唾津咽下須少用溫水

驗方續編 痧症

煉石丹 痧脹通用 水不可丸竟用 神體糊亦得 千年石 即陳石灰 水飛一兩 松根石 即真硫 水飛三錢 水骨石 即白滑石 水飛二錢 水滴

爲丸表熱煩躁者青黛爲衣眩暈心悶者硃砂爲衣每二錢垂頭蘆粟湯下

硫礬丸 硫黃 明礬 各四兩 同入罐用豆腐漿煮一日夜去腐渣再慢火熬至乾燥連

罐埋地三尺三日取出成紫金色下一層有泥渣不用 茯苓 山藥 各三兩 二味同

蒸曬乾露一宿 當歸 酒洗炒 燥四兩 白蒺藜 酒浸一宿 燥四兩 烏藥 略炒 三兩 半夏 水浸一宿入薑汁二兩明礬五錢角刺切碎一兩同煮多用

三兩 杏仁 焙兩半 去皮尖 陳皮 去白 一兩 小茴 炒燥 一兩 共研細末同製硫礬用膠棗肉丸菘豆大每清

晨鹽湯下錢半臨臥白湯下一錢 有人病痧十年發則叫喊暈死或用醋炭熏鼻

或鹽湯探吐並用華陀危病方略得解醒後服此丸全愈除根予屢行多效真神方也

附華陀危病方 吳茱萸 木瓜 食鹽 各五錢 同炒焦 砂罐水三碗煮百沸隨病人冷熱任意

服之即甦

瀉下丸 治大腸燥實二便秘結痧毒壅盛者 大黃 酒製 四兩 黑丑炒 頭末 二兩 牙皂煎汁丸

鳳仙子大每服一錢多至二錢燈心湯下 不獨潤腸兼利小便

治敵香櫛丸 或水或食或氣俱治 蘿蔔子 兩炒 六兩 陳香櫛 兩四兩 醋製香附 兩三兩 廣皮 去白 一兩 荆

三稜 炒 兩 蓬莪莖 炒 兩 澤瀉 茯苓 各二兩 山查 核去 一兩 青皮 去穢 各一兩 神麴糊丸豌豆大每服五六

十九米飲下

大羌活湯 經云兩感者死不治一曰太陽與少陰俱病頭痛發熱惡寒口乾煩懣而

渴太陽者府也自背俞而入人所共知少陰者藏也自鼻息而入人所不知也鼻氣

通於天故寒邪無形之氣從鼻而入腎為水水流溼故受腎之又云天之邪氣感則

害人五臟以是知內外兩感藏府俱病欲表之則有裏欲下之則有表表裏既不能

一治故死矣然所稟有虛實所感有淺深虛而感之深必死實而感之淺猶或可治

羌活 獨活 防風 防己 黃芩 黃連 蒼朮 白朮 細辛 炙草 各等分

知母 川芎 生地 之倍 俱片每服兩半煎一大盞熱飲之不解再服 此解利兩感

神方也若痧症與此彷彿亦以是方加減而選用之

加減聖效散 治傷寒時疫風溼陰陽兩感表裏未辨或外熱內寒或外寒內熱肢節

拘急頭項腰脊疼痛發熱惡寒嘔逆喘咳鼻塞聲重及食飲生冷傷在胃脘胸膈飽

懣腸脇脹痛心下痞結手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消小溲不利等症 東坡渣杭

多疫設劑活衆原名聖散子今有痧症相類療之悉效 荀子 炒 砂仁 研炒 檳榔 陳

皮 元胡 錢各八 厚樸 防風 蒼朮 藁本 藿香葉 柴胡 獨活 石菖蒲

澤瀉 枳殼 細辛 錢各五 草豆蔻 去殼十箇 共粗末每五錢水盞半煎一盞去滓溫服不

嗽方 雜編 痧症

六八一

計時候取遍身微汗即愈時氣不和空心飲之可辟邪疫

如聖散 治當心而痛遍身骨節牽疼或嘔吐惡心不時發作者兼治疝氣勞根此方

可補痧脹所不逮 枳殼三兩炒 小茴三錢炒 鹽磚紅三分 爲細末每服二錢温酒調下如

不止再服一錢

失笑散 治血迷心竅不知人事婦人產後心腹絞痛及腹中瘀積作痛者男婦憤發

痧脹服此永不再犯 靈脂炒去砂 蒲黃炒分 爲末每一二錢温酒調下

普濟消毒飲 泰和間疫癘初增寒壯熱體重次傳頭面腫盛目合喉喘舌乾口燥俗

云大頭傷寒諸藥莫治東垣云身半以上天之氣也邪熱客於心肺上攻頭面而爲

腫耳製方活衆刻石以傳方集解此 黃芩 黃連各酒炒 牛蒡 大黃各三 陳皮白去

元參 生草 連翹錢二 板藍根錢二 馬勃錢一 川芎 防風各八分 僵蠶炒 升麻 柴胡各七

薄荷五分 桔梗分三 共細末半用湯調頻服半用蜜丸噙化盡劑而愈或水煎食遠温

服原無大黃便 藥加用酒 燥

祛瘴辟瘟丹 治時疫痧瘴老幼男婦皆同者 厚樸 蒼朮 羌活 防風 陳皮

枳實 香附 牛蒡子錢各一 檳榔 白芷各八分 藿香 川芎各五分 細辛分四 甘草分三

薑葱煎服 無汗加蘇葉 口渴花根 身重汗出石防已 温瘧柴胡 遍身疙瘡腫痛薑葱煎 肌



肉發紅黑紫斑元李天大便祕結黃先中熱又中暑加白虎頭疼川風温身體灼熱梔子

咳嗽涕唾頭目昏眩荆芥金沸草金

白虎湯 治温病身熱自汗口乾脈來洪大霍亂傷暑發痧神妙 石膏錢五知母錢三

甘草錢一粳米一先煮石膏數十沸再投藥米米熟湯成温服 病在陽明肌肉則巨

陽之表邪已解故外不惡寒又無頭痛身疼之症但自汗而發熱也經曰熱淫所勝

佐以苦甘以知母甘草解其熱蓋熱則傷氣用粳米甘草之甘以益其氣且治不眠

煩燥也煩者肺燥者腎也以石膏為君佐知母之苦以清腎之源因石膏體堅而重

墜知母沉寒而走下故用米草之甘以緩之使不速達於下焦也白虎金神司秋者

也暑火至秋而衰且知母苦寒又能保太陰肺金之氣故名白虎以為三陽經一解

表藥耳雖是三陽解表藥切記有汗當施無汗當戒蓋無汗必須柴葛升麻以解表

邪不可見其身熱誤用白虎以鬱遏其熱使不能外越也 嘗驗温病久而無汗有

必兼白虎乃解者温瘧宜桂枝白虎醫方集解明言之矣至於柴葛升麻亦自各有

所宜傷寒論注等書自悉

配異症方案一條 靖江劉姓年四旬遇疫遭數喪自外歸母病旋卒遂成驚悸不寐

略睡去即叫跳其心如蕩如撞服天王補心丹之類半月不效用奇方製就琥珀丸

驗方續編 痧症

三服遂定每服三分三釐共一錢 又變怪症飲食如故忽然目翻涎流喊如羊其頭側過左肩手

亦向左反張突起旋走面如土色食頃稍甦日夜百番或曰羊癩曰瘡病然癩症當

見怪脈今無此脈非癩可知若作瘡治用麻黃發汗續命驅風恐立斃耳予書原載

角弓痧症略相似即投煉石丹一服日夜各減半二服日全不發晚止數次三服全

愈但面色不正另立丸方調理而痊 眞琥珀同燈心研四錢 辰砂研細取猪心血和仍放入心內溼紙包煨心熱為度取出曬乾五錢

整大半夏各一兩洗淨同薑汁半盞牙皂白礬各三錢煮透心極熱曬乾用八錢 膽星六錢 石菖蒲各一兩 炙草各五錢 棗仁二兩 遠志肉

白茯神 橘紅 歸身 柏子仁 山藥 麥冬各一兩 煮棗肉 丸梧子 大金箔為衣

每服三十九丸臨臥圓眼燈心湯下 此丸兼治怔忡健忘驚悸顛癩等症

加味活命飲 一切痧後留滯熱毒發為癰腫發背疔疽 穿山甲土炒 銀花 大黃各三錢

歸身 陳皮各錢半 花粉 赤芍 生地 薄荷 防風 白芷 貝母 甘草節

乳香各錢 沒藥淨 角刺各五分 以毒在背加角刺半 在腹加芷 在胸加棗仁 在頭面手足

六一散 降火利竅解煩渴無溼者多服反耗津液加瀉 水飛滑石六兩 粉草末一兩 夏月涼水調飲加

硃砂名益元散 治小兒身熱咳嗽微帶驚風燈心湯調服屢效

治腹痛法 取大公雞一隻其人仰臥放肚上雞即伏好疼止自跳下而愈此法試過

亦驗 又法 凡痧屬肝經者多肝附於背第七骨節間遇犯痧者先循其七節骨  
縫中將大指甲重掐入候內骨節響方止以鹽塗之如不響將鹽重擦必使透入遂  
能止疼

補原本未列方 五苓胃苓六和正氣見論吐  
下瀉痧霍亂痧小腹痛痧

五苓散加減 去桂即四苓白朮  
換若朮加末二味 豬苓 茯苓 澤瀉 蒼朮 溼滯 車前 木通

胃苓湯 去白朮  
桂枝 即前上四味加製厚樸陳皮去白

六和湯 厚樸 錢五 赤苓 藿香 扁豆 木瓜 蒼朮 錢各一 砂仁 半夏 人參

杏仁 甘草 分各五 暑加香薷冷加紫蘇一方無蒼朮一方有白朮

藿香正氣散 藿香 紫蘇 白芷 茯苓 腹皮 錢各三 桔梗 紫蘇 陳皮 白朮

土 半夏 麵 錢各二 甘草 錢一 每五錢水煎 此與六和薑  
棗引勿輕用 或酌加木瓜 傷食重者加消食藥

元氣虛弱人慎用

附錄 絡痛方案 一客匠年十六發熱久之胸脇痛脈細弱或作勞怯治嘔噦便閉小腹

脹急或參用左金便溺通而痛愈緊夜尤甚小便赤色投痧症藥亦未效儒醫孫敬

承云脈無變而胸前不可手近其痛在絡用金鈴子肉 筒一元胡  
錢一 萹皮 錢一 生香附 牛錢

陳大麥仁 錢三 煎飲一服而愈金鈴入絡佐以元胡氣血俱通似於痧宜而書中未收

驗方 續編 痧症

六八五

附記於此

又海浮石治疼甚妙並附後 金鈴子 即子川 苦寒能導小腸膀胱之熱因引心包相

火下行通利小便 脾胃虛寒者忌 內與核不並用 海石 一名浮石 鹹軟堅寒潤下止嗽止渴通淋化上

焦老痰消結核 多服損人血氣

原敘言康熙庚戌有滌痧丸引刻於毘陵此書症案中屢言滌痧散而方竟失載續

當訪補

附景岳刮痧新按

向余荆人年及四旬於八月終初寒之時偶因暴雨後中陰寒痧毒之氣忽於二鼓時上為嘔惡下為胸腹攪痛勢不可當時值暮夜藥餌不及因以鹽湯探吐之痛不為滅遂連吐數次其氣愈升則其痛愈劇因而上塞喉隘甚至聲不能出水藥毫不可入危在頃刻間矣余忽憶先年曾得祕傳刮沙法乃擇一光滑細口磁碗別用熱湯一鍾入香油一二匙却將碗口罐油湯內令其煖而且滑乃兩手覆執其碗於病者背心輕輕向下刮之以漸加重碗乾而寒則再浸再刮良久覺胸中脹滯漸有下行之意稍見寬舒始能出聲頃之忽腹中大響遂大瀉如傾其痛遂減幸而得活瀉後得睡一飯頃復通身搔癢之極隨發出疙瘩風餅如錢大者不計其數至四鼓而退

愈後細窮其義蓋以五臟之繫咸附於背故向下刮之則邪氣亦隨而降凡毒氣上行則逆下行則順改逆爲順所以得愈雖近有兩臂刮痧之法亦能治痛然毒深病急者非治背不可也至若風餅疙瘡之由正以寒毒之氣充塞表裏經臟俱閉故致危劇今其臟毒既解然後經氣得行而表裏俱散也可見寒邪外感之毒凡臟氣未調則表亦不解表邪未散則臟必不和此其表裏相關義自如此故治分緩急權衡在人矣繼後數日一魏姓者亦於二鼓忽患此症治不得法竟至五鼓痛極而斃遇與不遇此其所以爲命也

又鍼灸法 刺委中穴出血或刺十指頭出血皆是良法今西北人凡病傷寒熱入血分而不解者悉刺兩手臑中出血謂之打寒蓋寒隨血去亦卽紅汗之類也故凡病後寒霍亂者亦宜此法治之今東南人有刮痧之法以治心腹急痛蓋使寒隨血散則邪達於外而臟氣始安此亦出血之意也 霍亂吐瀉不止灸天樞氣海中脘三穴立愈 霍亂危急將死用鹽填臍中灸二七壯立愈 轉筋十指拘攣不能屈伸灸足外踝骨尖上七壯

### 救急良方

霍亂絞腸痧 以針刺其手指近甲處一分半許出血卽安仍先自兩臂捋下令惡血

驗方 霍亂 痧症

六八七

驗方新編 癰疽

聚於指頭後刺之

驗方續編癰疽終

## 跋林藥樵痧症全書

痧症全書閩人林藥樵所著也康熙初刻以行世歲月既久印板寢廢傳者少焉辛巳歲閩中痧疫盛行死者載道治是症者涼則岑連熱則蓋附方藥雜投一無成效壬午夏是症又作時適吳觀察渭泉先生莅任在閩觀察素精醫理謁見之餘論及此症謂涼熱均非此症出林藥樵痧症全書示予余讀之見其中察脈審音治症處方用藥不偏一一皆有矩矱而其要尤在梓刮刺三字手法蓋以痧症之發原由氣血內閉宣通脈絡以洩毒邪誠治痧症入手第一要訣依法治之全活不少觀察憫邇來痧疫之多將以此書付梓廣示心傳並採景岳書中刮放諸法附後余知此書出而治是症者得所折衷誠足以衣被醫林而觀察救世之心亦並傳不朽矣謹附數言卷末以誌欣幸云繡州槐坡氏諸汝卿跋

# 咽喉祕集序

十三科內喉齒有專科豈不以會厭之關爲十一經絡穀式飲式食或消或息所係綦重非寬脾大輒比然業擅專門治一症必斷斷責值投方寸匕藥取刀貝至不營病者翌噬膳啗不能嚙於口瘡瘡呼善不可須臾忍聞有能已之者大願免於患苦倒廩傾困葉拱以進無毫毛顧藉心乃稍效之以見其功遼緩之以引其時必斬盈豁整而後屬糜嗟嗟養人之患以爲利藪此巫匠之心也躬竊憫然思有以激勵之顧無所得方有以張氏吳氏咽喉祕集本見示寫圖備症述原處方昭哲無疑雖使不習術推者操藥以脩其效可跼足而待其便益有三焉資舟資車卒然遭疾檢書按症能辨其輕重危險不至適適規規驚懼憂疑便益一操不律書赫蹏呼童市之肆咄嗟立具無大藥苦乏之患便益二肘後之祕傳於副墨上池之水遍丐醫門柔存剛亡之宜五臟六腑之滙誦習其書忸怩其說千金之劍必不獨知濟辭之方無所市重便益三衷是三端亟授二氏以激厲夫享帝自珍者雖然諺有之肺腑而能語醫師色如土是書行恐世其業者以祕密藏中休糧方爲張吳兩先生發其覆當有分行無所之歎也

光緒癸未仲秋合肥張紹棠又堂甫書於醉秋檻



校正 驗方續編

張氏原本

海山仙館編

合肥張紹棠又堂增訂

咽喉祕集 上

總論

夫左為咽屬胃右為喉屬肺乃一身百節之關呼吸出入之門內經云一陰一陽結而為痺一陰者手少陰君火心之脈氣也一陽者手少陽相火三焦之脈氣也二脈共絡於喉氣熱則內結甚則腫脹甚則氣痺痺者不仁之謂此喉痺之所由名而乳蛾喉閉纏喉等症皆痺類也吳氏說有風寒火溼毒虛之別或風火相搏或寒暑相聚其症變幻不一如漫腫而多痰風與溼也淡白而牙緊風寒也紫色不腫而爛者風伏寒也紅腫而脈浮者風火也脈沉實爛而不腫者毒也脈細數而浮者虛火也脈細而緩者虛寒也六者之象可類推也大凡初起之症診右寸洪緊肺風也兩關浮數胃火肝風也左寸浮洪心火也右寸沉遲肺伏寒也右寸沉細肺伏熱也右尺洪大三焦火旺也左尺浮洪而有力腎虛火炎也六脈大略論治俱可用六味湯加減症若凶險脈宜細

診再察形窮原對症用藥自然可愈經云神聖功巧不過望聞問切細心推詳庶無差

誤耳

張氏說

### 喉症分經

喉有二孔左爲咽屬胃納食之關右爲喉屬肺納氣之關口內上腭屬胃陰下腭屬脾陽舌之中屬心四圍屬脾舌根亦屬心小舌又名帶丁屬胃喉之左右舌根屬肝外兩耳垂下亦屬肝牙根上屬胃下屬脾舌胎白主寒黃主熱焦熱甚黑熱極凡舌胎不單論色但有津者非真熱不可概投涼藥宜引火歸原大紅舌邊乃脾火可用清涼之劑喉癰地位屬肝再連內寸許或爛或腫俱屬脾胃火毒之症結毒亦有之但結毒者兩關脈必沉兩關脈浮非結毒也此分經大略再考圖形便悉

張氏說

### 咽喉治法要論

醫者當審其病由參之時令必須大湧其痰去痰之法先備溫水使病人漱口如點刺或吹藥令其垂頭流去痰涎俟痰涎少止仍以溫水頻頻漱之如虛弱人及病勢重者須要着人扶好或用銀針刺其患處風熱則散之火症則清之甚者下之陰寒者溫之若初起驟用寒涼之藥則上熱未除中寒復生其毒乘虛而入卽喘不休死不救矣大抵風熱症十之七火症十之三寒症十無一二也病昏沉痰多氣急飲食不進發

熱不退牙關緊閉脈息微弱者症必重 人事不省痰氣上攻聲如雷噎食眼張天柱  
倒陷面墨色焦鼻如煙煤張煽不定目睛突出汗發如雨咽喉乾痛聲啞無痰手足麻  
至膝蓋發喘及呃脈息如絲乃死症也 臨症用藥生死反掌醫者不可懷希冀之心  
故意延挨病者不可起懈怠之念以致決裂古云走馬看咽喉不待少頃者卽此謂也  
遇症用藥後痰少腫退卽愈如已潰用藥後越兩日卽可進飲食者三日後無不收  
功 喉癰用藥後患處要變紅色知痛癢有津液潤澤者可治用刀針須向自己勾來  
不可向病人口內剔去 咽喉忌下刀之地有四處 嚙化 啞門穴 喉關兩項上  
舌下筋 若用刀其刀頭上須蘸已藥或亥申藥庶不作痛 臨症先診其脈象輕  
重後看其患處深淺若脈絕脈怪脈死則毋須用藥矣因毒已入腹非藥力所能挽回  
也 纏喉風及陰虛喉癰二症最險而難治至危而不易識纏喉風內外無形其患在  
關內上面有紅絲如未入心尙可用藥已入心則不治凡遇此症宜早治在一日半日  
之內可保無虞陰虛喉癰如癆蝦皮形有青白點子高低大小狀如暑天瘡子其症雖  
危延日最久或一年半載而死或一月或半月而死如起病數日之前治之十症可得  
九愈看喉腫處其色變紅者卽成膿之候可不刺而自潰也 喉症用糯米泔水或甘  
桔湯或薄荷湯俱要溫和爲主山查焙燥磨細末煎藥內可加一撮乃消腫去毒治咽

喉之要藥也以上十四條 病人壯者藥可猛弱者攻宜緩 動針不可傷小舌要緊 夜

晚看症宜倍加細心藥用六味湯天明復看再為加減凡針舌下兩邊青筋血紅生血

黑死服宜清膈消痰解毒之劑以上四條

四絕症

走馬喉風 鎖喉風 走馬牙疳 纏喉風 此皆凶險之症若不吐瀉針之無血

藥不能入皆為不治慎之慎之

十六絕形

舌捲囊縮 角弓反張 油汗如珠 十指無血 喉啞噎食 喉乾無痰 吐血喉

癰 六脈沉細 聲如鋸拽十日大便 不通 鼻煽唇青 天柱倒塌 脈細身涼 兩

目直視 壅痰氣塞 喉菌不治

左手脈式

右手脈式

心脈悠揚緩散寸心包絡小腸

命門脈緩而悠揚尺命門三焦

肝脈沉而弦長關肝膽

脾脈緩而散大關脾胃

腎脈虛細而宜大尺腎

肺脈浮濇而短寸肺

凡診脈一呼一吸四五至者平和

脈遲則寒脈數則熱細緩則虛寒

脈也三至為遲六至為數病脈也

細數則虛熱六脈一理

針穴凡六穴應病行針

頭面

頰車穴

在耳垂下八分

足陽明胃經

少商穴

在大指內甲角

手太陰肺經

右手

中沖穴

在中指內甲角

手厥陰心包絡經

少沖穴

在小指內甲角

手太陽小腸經

左手

商陽穴

在食指內甲角

手陽明大腸經

關沖穴

在無名指外甲角

手少陽三焦經

吳氏咽喉二十四大症歌訣今存十二症

喉痹

鬱火攻兮喉痹成或生左右小棋形鮮紅酒毒光如鏡瘡在喉間風熱勝 其

症形小而圓初起或消或刺皆可如其色紫紅平塌光如鏡者不可刺宜內消因其

毒發於本源故也

喉閉

積熱風痰喉欲閉因生血泡在喉間忽然壅塞櫻桃似點刺流涎病即安 其

驗方彙編 咽喉秘集上

六九五

症宜發表清熱先用針點後吹子丑二藥

纏喉風 惡寒惡痛名陰毒內外無形氣短促胸前紅腫足多寒若見紅絲針貴刺

藥宜發表吹藥先用已藥如見紅絲卽刺斷再用子藥

噲喉風 此症謂之飛絲毒口中發泡丑藥覆燥極點痰熱在心忽然噲食終非福

用針挑破血泡後上丑藥兼吹子藥煎藥宜清熱祛痰

啞喉風 啞瘡喉症犯咽隔口不言兮牙關塞面紫唇青冷涕流風疎痰降卽無厄

其症牙關緊閉先用已藥後用申藥前後抹之風痰去盡爲度煎藥先發表後清熱

弄舌喉風 體發熱兮口內腫舌出頻將兩手弄筆針患處去痰涎解毒疎風清熱壅

用三稜針刺破少商穴先用已藥後用子藥

爛喉風 爛喉風症頻頻熱唇若塗硃口內裂看其患處淺和深藥宜子丑兼調攝

子丑二藥和勻上之再用已藥收功煎藥宜清熱

單乳蛾 喉內瘡如桃李形或左或右單蛾名此症早治可速退痰消毒散自然平

此症不論已成未成皆可刺其形大而長初用已藥後用子丑二藥收功煎藥先發

表後清熱

喉癰 七情鬱結病成癰六日之內可刺膿不治須防成冷瘻已申藥到定收功 其

患在喉嚨化合後之正中到四五日後可刺早刺防復腫未刺前及未潰前吹藥先用巳字後用申字潰後用子丑二藥煎藥先發表後清熱

牙疔 太陰脾土足陽明二火交攻疔即成患在牙齦如豆大排針點破即安寧 先用申藥後用子藥

牙宣 此症起時因胃熱壅而宣露常流血藥吹酉未即能除清胃煎來功奏捷 先用子藥後用酉藥未藥二種止血煎藥宜清胃火

木舌 舌病心經受風熱忽然腫破口難說看時左右共宜針藥用梔連火氣滅 吹申藥看紫色處用小刀點之出血後吹子藥

重舌 蓮花之症看如何三舌攢在舌底疔戍藥頻擦宜更點清心瀉火莫蹉跎 用申藥吹之不退再用戍藥上三症用清熱解毒煎藥

重脣 體雖不熱獨心勞舌上生來似小桃藥用黃連解毒吹宜冰片不須刀 用子藥吹之

走馬牙疳 小兒疳症屬於脾黑腐沿開臭不宜子丑合參兼卯藥穿腮落齒總難醫 先用米泔水洗淨或溫水亦可藥用子丑和勻敷上如不應乃險症也煎藥用解毒

毒

痧痘口疳 痘餘痧後口生疳爛在牙齦痘毒傳若是見痧生滿口須從心胃二經參

吹子丑卯藥煎藥宜瀉心胃二火

雙乳蛾 雙蛾兩兩生喉間關上輕兮關下難氣吹好似紅李子輕消重刺去風痰

形與雙單蛾同刺不論已成未成先吹已藥不退再點子藥煎藥先發表後清熱

螞蝗疔 疼而微白螞蝗疔腭上生來韭菜形內不腫兮發寒熱速宜針刺自然平

用申藥點去惡血後上子藥煎藥有表發表無表解毒瀉火

連珠風 兩坳深處患連珠初起沿開白色餘日久漸成八九點藥和子丑病當除

和勻子丑已藥吹之兼上寅藥煎藥宜清熱解毒

陰虛喉風 癰症原來因損肺斑生苔癰若蝦皮時待發熱頻頻嗽面赤聲嘶病可虞

其症虛弱不宜發表須用滋補兼解毒上半月痛甚者乃氣虛下半月痛甚者乃

血虛吹卯藥並上丑酉二藥如日久不減者不治

楊梅喉癰 楊梅結毒癰由生片白喉中穢氣聞白色變黃纔可治酉隨子丑共追尋

和勻子丑二藥吹入後用酉藥收功煎藥宜解毒

咬牙風 咬牙卽是鎖喉風毒在牙齦胃火攻不治恐成牙漏症開關辰藥子收功

先用辰藥擦牙齦縫中如腫不退再用子藥煎宜清熱解毒




咽喉門二

噎食啞喉



咽喉門一

簾珠喉



張氏咽喉七十二症治圖說


簾珠喉滿喉如白網細狀兩邊微腫根有白點帶紅色小舌紅腫嚙水大痛此症因鬱積熱毒而發其脈兩寸浮洪兩尺亦數大而洪此上盛下虛之症也宜清火用六味湯加鹽炒黃柏二錢酒炒黃芩一錢鹽炒知母二錢熟石膏錢五山豆根二錢鹽炒元參二錢梔一錢木通一錢生地二錢服一劑來日再加連翹三錢紫花地丁三錢熟地二錢丹皮二錢草河車二錢川連一錢金汁一盅或煎柏枝汁一盅沖服乃妙外吹藥六七日可愈

噎食啞喉 此症因伏邪在肺聲啞噎食六脈遲細甚屬險症余曾治一人年二十患此三年飲食少進病在將危余診視再三病雖久脈尚有力有根或可治用六味湯加麻黃錢三桂枝錢一蘇葉錢三木通錢一細辛錢二白芷錢一訶子錢三皂核錢三姜炒半夏錢二連服五六日病雖退而聲啞未除換加桔梗兩訶子錢七甘草錢七薄荷一錢以上俱童便炒麻黃錢一煎數沸噎嗽徐徐嚙下服十劑乃愈後服補藥健脾

喉方類編 咽喉秘集上

### 三門喉咽


喉腫外內



內外腫喉 此症生於喉關之下陰陽相結內外皆腫或有爛斑火鬱之症用六味湯加炒黃芩錢三熟軍錢五海浮石錢二外吹藥來日換加丹皮牛錢一生地錢二酒炒黃芩錢二生石膏錢三炒山梔錢一木通錢一即針少商商陽兩手四穴如背寒加羌活胃泛加葛根柏枝汁亦可漱之

### 四門喉咽


喉熱風



風熱喉 此症感風熱而起滿喉發細紅點根帶淡白舌下兩邊三四塊六脈洪緊用六味湯加鹽炒元參錢二酒炒黃芩錢三山梔錢一花粉錢一一服可愈外用吹藥兼服八仙散

### 五門喉咽

喉虛色紫



紫色虛喉 喉間紫紅久之變爛如生漆色因初起早服寒涼之藥故也此症肺胃伏寒平而不腫飲食難進吐出乃腐肉者宜急治之如誤認爲火熱之症反以三黃犀角羚羊角等藥則喫成死症矣余見此等紫色之症不論名色喉間絕無影形滿喉皆紫脈緩身涼者用六味湯加細辛分五葛根錢一蘇葉錢一白芷川芎麻黃錢各一服後紫變爲紅換加鹽炒元參錢二酒炒黃芩錢二花粉錢二即愈


七門喉咽

疔 喉



六門喉咽

癰 喉




驗方續編 咽喉秘集上

喉癰 此症因腎虛火旺發癰於喉不腫而微紅上有斑點青  
 白不一如芥子大或針孔菴荳大每點生芒刺入水大痛喉間  
 聲啞咳嗽無痰六脈細數者用知柏地黃湯兼四物湯加麥冬  
 炒元參鹽炒女貞子枸杞人參洋參用二參或煎藥不  
入丸藥亦可首烏阿膠各二錢  
 十服後用附桂八味丸加女貞枸杞二參俱鹽炒淡鹽湯下每服  
錢四如前知柏地黃湯四物湯服後不應酌加附桂每服各三錢冷  
 服此引火歸原之法也如六脈洪數恐難脫體外兼用吹藥治  
 之

喉疔 此症腎虛火旺沸騰上部而發喉間上腭有青白紅點  
 平坦無刺故名喉疔聲不啞不咳兩尺脈虛者是也先用六味  
 湯去荆防蠶三味加鹽炒元參錢一酒炒黃芩錢二丹皮錢二生地錢二  
 鹽炒山梔錢一鹽炒水拌再炒女貞半錢鹽炒知母錢半男加龜板錢五  
 女加鼈甲錢五服五劑或十劑如不愈再加附桂各三錢另煎入藥  
 冷服愈後合附桂八味丸加元參知母女貞枸杞各藥俱鹽水炒一料可  
 愈外用吹藥

### 八門喉咽


喉揚飛



飛揚喉 此症風熱上壅上腭紅腫氣不能通嚥物不下從小舌中飛揚滿口此係凶惡之症急針患處出血泄氣吹藥內服六味湯加連翹葛根黃柏山梔木通錢各一生石膏錢四一二服可愈

### 九門喉咽

喉啞虛



虛啞喉 喉間不腫兩邊關內少有紅點聲啞不明牙關不開此症乃內外風火因喜食酸滯之物肺氣不清故也用六味湯加細辛錢三蘇葉錢二服一劑聲音不啞換加生地丹皮錢各二鹽水炒山梔木通花粉錢各一二服愈矣

### 十門喉咽

喉啞聲



聲啞喉 此症寒伏肺腑不腫不紅又無爛點惟覺乾痛難於飲食用六味湯加蘇葉麻黃錢各二細辛分五二服後麻黃蘇葉各減半再二日換加花粉黃芩羌活姜炒半夏錢各一皂核粒二十子錢二桔梗錢五甘草錢五皆并童便炒四五服乃愈初起不可用涼藥此症非三四月不能求痊

二門蛾乳


蛾乳單



單乳蛾 此症生於雙蛾地部之旁或左或右六脈浮數因傷寒後邪未散盡身熱惡心恐見痧疹用六味湯加葛根錢二蘇葉錢一羌活錢二鮮芫荽錢五無鮮者用子錢三一服退半來日再加黃芩錢二酒炒花粉錢二山梔赤芍木通錢各一即愈

壹七凡一門蛾乳

蛾乳雙



雙乳蛾 此症感冒肺二經而發生於關口上部兩邊如櫻桃大肺胃之症也身發寒熱六脈弦數先針少商商陽兩手四穴或挑破患處出血亦妙先用六味湯加陳皮海浮石蘇葉羌活各錢半兩服可愈如腫不退六脈有力加大黃錢三

一十門喉咽


喉沙爛



爛沙喉 此症發於傷寒之後表邪未盡生喉關內腫爛右關脈急肺脾之症可知用六味湯半服加酒炒黃芩錢一花粉錢一鹽炒元參錢二葛根錢一生石膏錢二淡竹葉錢二草河車錢二連服四劑如爛斑不退加生大黃錢三津化八仙散玉樞丹每服五分三服可收功


三門蛾乳

蛾乳爛




四門蛾乳

蛾寒風



五門蛾乳

蛾乳色白



爛乳蛾 此症因肺胃鬱熱紅腫爛斑大痛難食六脈弦緊宜

急針少商商陽兩手四穴用六味湯加葛根錢二蘇葉鹽炒元參

錢各一炒黃芩錢二沖柏枝汁一杯漱喉間徐徐嚥下再用八仙散

一服津化下來日去蘇葛二味加山梔木通生地丹皮浮石花

粉錢各二脈大有力加生大黃錢三脈虛用八仙散同柏枝汁照前

喫法三四日可愈如聲啞背寒六味湯加葛根錢二蘇葉錢一羌活

錢一細辛分三治之

風寒蛾 此症因風寒而起腫大如李頭不能下視氣塞不通

寸關之脈浮緊肺胃之症也即針少商商陽少沖兩手六穴用

六味湯加蘇葉錢三羌活錢一一服可愈若早用涼藥則不能退矣

白色乳蛾 腫塞滿口身發寒熱六脈浮弦因肺受風寒之症

也六味湯加蘇葉錢二細辛分三羌活錢二一服可愈

喉痺一門凡七  
喉痺

乳蛾七門  
伏寒喉蛾

乳蛾六門  
石蛾



驗方攢編 咽喉秘集上


石蛾 此症因胎生本原不足所致生於乳蛾地位少進半寸  
初生不可用涼藥不可動針刀此乃肝火老痰結成惡血凡遇  
辛苦即發用六味湯加貝母錢一生地錢二牛蒡錢一麥冬錢一木通錢一  
服四五劑如不退去六味用生地半錢丹皮錢一象貝母錢二甘草  
牛蒡錢各一桔梗分八麥冬錢一木通分六薄荷錢二燈心分二服以愈爲度  
外吹退腫藥

伏寒喉蛾 凡伏寒之症其色紫治法同紫色喉癰門如孕婦  
喉癰慮服藥有礙將藥煎濃漱喉吐去亦可愈

爛喉痺 此症因肝胃熱毒外感時邪而發形如花瓣爛腫白  
斑痛叫不食目睛上泛六脈洪大速針少商商陽關沖少冲兩  
手八穴有血生無血死用六味湯加生大黃錢一鹽炒黃芩酒少許  
元參錢二鹽炒生地錢二丹皮錢二海浮石錢二山梔錢一木通錢一兩服後  
去大黃用六味湯再加生石膏錢三訶子半錢整柏子仁柏枝汁製二錢四服  
可愈并服八仙散錢二津化下此症若脈細身涼不治

### 二門瘰喉


瘰喉色白



白色喉瘰 此症因肺胃受寒脈遲身熱用六味湯加細辛三分  
羌活二分蘇葉陳皮錢各一 二服可愈若變紅色乾痛去前四味換  
加山梔木通酒炒黃芩生地黃柏錢各一 痰多加海浮石半夏花  
粉錢各一

### 三門瘰喉


瘰喉伏寒



寒伏喉瘰 此症肺經脈緩寒重色紫亦不大腫若誤服涼劑  
久之必爛凡遇紫色者不可作火治用六味湯加細辛五分麻黃  
桂枝蘇葉瓜蒌訶子牛蒡錢各一 甚者吐出紫血塊治法亦同未  
爛者加蘇葉錢二分細辛五分柴胡海浮石錢各一 腫與不腫同治

### 四門瘰喉

瘰喉雙




雙喉瘰 生於上脰關內兩邊形如欖核痛而難食胃經積熱  
所致或發寒熱兩關脈洪大者是也速針患處或少商穴亦可  
先用六味湯一服來日再加黃芩山梔木通炒元參各錢半 一服  
可退爛者不可針但於患處用吹藥




七門癰喉

癰喉馬走




六門癰喉

癰喉紅淡



五門癰喉

癰喉單



喉方續編 咽喉秘集上


單喉癰 或左或右治法同雙喉癰

淡紅喉癰 腫如雞子飲食不下身發寒熱眼紅嘔吐恐有斑毒在內急鍼少商商陽關沖少沖左右八穴或患處挑破用六味湯加蘇葉羌活葛根錢各二鮮芫荽錢五服一劑滿身發出痧疹嘔吐即止或身熱不退喉外亦腫此內火外洩也用六味湯換加生大黃錢三葛根黃芩山梔元參花粉錢各二生石膏錢五滑石錢二二服後去大黃石膏再服四五劑可愈有爛斑用八仙散一服津化下兼服柏枝汁此症因傷寒時邪未消之故兩關脈沉細兩寸尺四脈虛數者是也

走馬喉痺 內外俱腫此係急症肝脾火閉不通而為痺或發寒熱脈洪大者生沉細者死用六味湯加葛根錢二柴胡錢一細辛分五之再加角刺錢二歸尾錢二赤芍二草河車錢二生軍錢五痰多加海浮石錢三製半夏錢二身熱背寒加羌活錢一蘇葉錢一急刺少商商陽關沖兩手六穴血多為妙

一門風喉

風喉鎖內



內腫鎖喉風 此症由肺胃兩經陰陽相結內塞不通外無形跡喉內多痰而喘治法兼見下纏喉風門灌吐法再用六味湯加麻黃錢二生軍錢五細辛錢一蘇葉錢二桂枝錢一羌活錢二煎數沸服或瀉或吐為妙如不吐瀉鍼少商商陽關沖曲池合谷左右十穴有血者生無血者死左右關寸脈弦緊洪大者生沉遲者死吹弔痰藥 曲池穴在肘曲橫紋頭臂之外側 合谷穴在虎口背大指食指合界之端宛宛中央

二門風喉

風喉纏




纏喉風 因肺感時邪風痰上壅陰陽閉結內外不通如蛇纏緊關下壅塞甚者角弓反張牙關緊閉先用開關藥吹鼻擦牙以吐為度再速鍼頰車左右二穴灸艾數壯或用雞蛋清沖白礬灌之以上諸法如不吐再鍼少商商陽關沖少沖少陰五穴有血為度無血不治用六味湯加生軍兩一麻黃羌活蘇葉訶子錢各二煎灌或瀉或吐皆妙如不吐即鍼之鍼而無血六脈沉細者不治吹用膽礬去痰藥


五門風喉  
風喉色白



四門風喉  
風喉爛虛



三門風喉  
風喉舌匝



匝舌喉風 此症生於喉之上下兩邊迫於小舌有泡或紅或紫外臉皆腫喉內不腫舌捲粗大此惡症也疼者甚少用六味湯加黃連錢一黃芩錢二生軍錢四連翹錢二沖玉樞丹錢一急進三四服或有可生如牙關黑腫齒落頭搖不治此症乃肺肝積毒所致

虛爛喉風 此症因本源不足虛火上炎生於喉之關內上下紅色白斑痛爛不腫六脈細數是也初起用六味湯加鹽炒元參錢二酒炒黃芩錢二炒山梔花粉錢各一生地錢三丹皮錢二二服後去六味湯加鹽炒知母黃柏錢各一服五劑如兩關脈大作結毒治用藥照下胃熱毒門外吹藥并服八仙散

白色喉風 此症因寒包火伏於肺經白而不腫上有紅紫爛斑脈象不數身熱怕寒火欲外發用六味湯加葛根錢一麻黃錢一蘇葉錢一柴胡分五花粉錢半桂枝羌活錢各一一二服兼八味神仙散一服津化下患處變紅色換加鹽炒元參錢二酒炒黃芩錢二炒山梔木通錢各一二服可全愈紫色喉風同此治法

六門風喉  
風喉毒酒



酒毒喉風 此症因醇酒厚味所致生於關內紅腫痰多嘔物不下肺脈獨遲兩關皆大用六味湯加甘草兩葛根錢一海浮石錢三花粉錢二枳椇子錢二山梔錢一煎湯漱之來日再加鹽炒元參生地丹皮錢各二四服可整吹退腫藥

七門風喉  
風喉碌勞




勞碌喉風 此症肝腎兩虛發於關內滿口有紅點根白不腫常有血腥氣勞碌即發脈象數而中空為乳脈是也用六味湯加鹽炒黃黑色元參錢二鹽炒知母錢二生地錢二丹皮木通錢各一來日再加連翹酒炒黃芩花粉錢各一山梔錢一兩日後去六味湯換煎方鹽炒元參錢二女貞子半錢半生地半錢半麥冬錢一炒黃芩錢一丹皮錢二枸杞錢二龜板錢三生首烏錢五生甘草錢一服可愈外吹消散藥

八門風喉  
風喉寒酒




酒寒喉風 因酒後受寒關內兩邊平而不腫有淡紅塊四五粒嘔物覺痛身無寒熱六脈洪大用六味湯加花粉錢二枳椇子錢二酒炒黃芩錢二葛根錢一服可愈

一十門風喉  
風喉苦辛




辛苦喉風 此症因日夜勞苦而發不腫不大紅但微紅而痛  
小舌左右常出血上部之脈洪緊用六味湯加鹽炒元參酒炒  
黃芩錢各一 山梔錢二 木通錢一 連翹錢二 火重者加生地錢二 鹽炒知母  
錢二 丹皮 澤瀉 花粉錢各一 三服可愈外吹消散藥

十門風喉  
風喉寒肺



肺寒喉風 此症因肺受重寒生在關內下部兩邊如扁豆壳  
樣平而不腫大痛難食不穿不爛背寒怕冷右寸關弦緊用六  
味湯加羌活蘇葉錢各二 當歸柴胡牛蒡桂枝錢各一 細辛分五 二服  
可愈

九門風喉  
風喉爛腫



腫爛喉風 此症因風火內熾肺胃脈洪數用六味湯加葛根  
花粉錢各一 如紅爛不退藥不能入再用六味湯加淡豆豉木通  
山梔鹽炒知母錢各二 花粉當歸柏子仁錢各一 丹皮錢二 生地半錢 海  
浮石錢三 兼柏枝汁一杯沖藥服五六劑而安外吹消散藥

二十門風喉


風喉紅淡



喉方攪編 咽喉秘集上


淡紅喉風 此症肺胃感冒風邪而發腫連小舌喉塞不通聲  
 音不清右手關脈弦緊宜針少商關沖少沖兩手六穴急者患  
 處亦可挑破用六味湯加羌活蘇葉葛根錢各二一服可愈

一門癰喉  
癰喉寒伏




伏寒喉癰 因積寒在內外感時邪而發其色紅腫或帶紫色脈浮不數用六味湯加羌活葛根草河車穿山甲赤芍歸尾各一錢細辛三分二服後去羌活葛根加山梔錢一五日可痊

二門癰喉  
癰喉爛腫



腫爛喉癰 此症因脾家積熱而生紅腫潰爛兩手關脈洪大者是也針少商商陽關沖少沖兩手八穴血多為妙先服八仙散放舌上津化下再用六味湯加鹽炒元參錢二鹽炒黃柏錢一酒炒黃芩半錢生大黃錢三山梔木通錢各一草河車錢二煎服瀉過去大黃再服三日後用十八味神藥柏枝汁嚥漱即愈外兼用吹藥

三門癰喉  
癰喉白淡




淡白喉癰 此症因脾肺受寒其色不紅若用涼劑七日之內必成膿有膿即針破初起腫針少商商陽兩手四穴出紫血用六味湯加蘇葉赤芍歸尾錢各半一服加穿山甲皂角刺草河車錢各二再服可愈此症六脈緊身發寒熱者是也

372

喉方搜毒 咽喉祕集下

四門癰喉


癰喉紅大



大紅喉癰 此症脾肺積熱其色鮮紅腫脹關內六脈洪大身發寒熱急針少商商陽穴或患處出惡血用六味湯加山梔木通錢各一海浮石生大黃錢各三歸尾角針草河車錢各三赤芍花粉黃芩牛各錢先將十一味煎二三十沸後下六味湯同煎二服可安

五門癰喉


癰喉啞聲



聲啞喉癰 此症因受寒太重肺脈閉塞以致聲啞飲食難進或有爛斑右寸脈沉瀆脾胃脈洪大背寒身熱用六味湯加羌活錢二葛根蘇葉錢各一漱之二日後聲音不啞換加花粉錢一乳香分五葛根酒炒黃芩歸尾赤芍穿山甲角針錢各三再服八仙散玉樞丹二服可愈

六門癰喉

癰喉單




單喉癰 或左或右身熱背寒脾胃之症也有紅點風熱無紅點風寒脈象如前六味湯加蘇葉羌活錢各二漱嚥一服來日再加赤芍歸尾山豆根山梔牛各錢服一劑可愈



九門癰喉

癰上舌



八門癰喉

癰喉腮兜



七門癰喉

癰喉症外




外症喉癰 此症生於頷下天突穴之上內外皆腫  
飲食有礙初起無痰涎內不見形跡此風毒之癰也  
六味湯加黃芩角針山甲歸尾赤芍草河車錢各二紅  
花葛根錢各一乳香分五連三服以消爲度已成出膿必  
成漏管用十全大補湯收功

兜腮喉癰 生於腮下其名懸癰因鬱積寒氣而發  
外用灸法二壯用六味湯加山甲歸尾角針川芎白  
芷錢各一升麻分三紅花乳香分各五以消爲度有膿針之  
若成漏多用參苓內託或可收功此症不可輕忽


舌上癰 生於舌中心如梅子大  
不能言語此症熱入心包絡而發  
左寸脈宜洪大數不宜細緩紅腫  
可治黑者不治六味湯加川連  
連翹草河車錢各五生軍錢四地丁錢三  
外吹牛黃消散藥以愈爲度

### 喉癰十門 舌下瘰



舌下癰 乃脾腎積熱而發然舌  
下有金津玉液二穴通於腎經水  
枯方生此症診其左尺洪數者是  
也六味湯加生地草河車錢各二  
根花粉丹皮錢各一元參錢二服用  
十八味神藥收功吹藥如前

### 喉癰十門 上腭瘰



上腭癰 高如桃核挂下不能飲  
食因肺家灸燔之毒積久而發宜  
用解毒之劑加草河車錢三石膏分五  
地丁生地錢各二歸尾山甲赤芍角  
針各錢半丹皮花粉葛根錢各一七八  
服兼玉樞丹每日分五并用吹藥據  
理或遲至二三月收功亦有之

舌門一 凡三十一


木舌



木舌 因心脾肝三經積熱舌粗紫脹不能言語此多食炙煇所致急砭出紫血擦吹藥大承氣湯兼黃連解毒湯加山梔木通連翹花粉各二 赤芍草河車各三二服不應加生軍瀉毒再用六味湯漱口吐出左右寸關脈洪大者實症可治六脈細者虛症難治

舌門二

白腫舌




白腫舌 因風寒積內六脈弦緊舌瘡硬痛六味湯加細辛<sub>分三</sub>蘇葉<sub>錢一</sub>白芷<sub>錢一</sub>當歸<sub>半錢</sub>川芎葛根<sub>各一錢</sub>如有白胎黑點而滑者用淡附子乾薑<sub>各五分</sub>煎服外用乾薑冰片麝香青皮等分爲末擦患處

374

驗方攷編 咽喉秘集下


三門舌

舌邊爛



四門舌

舌紫點紅



爛邊舌 因脾經溼熱不清大舌

邊上發瘡白點而爛六味湯加小

生地錢二滑石錢三淡竹葉錢一苡仁猪

苓各半錢澤瀉車前甘草梢各錢一服

二劑外用吹藥唇牙內腫爛同此

治法

紅點紫舌 因心脾二經熱極所

致滿口紅點紫色作爛而痛或身

有赤斑六味湯加熟石膏兩葛根


半錢川連錢一黃芩錢二黃柏錢二木通山

梔各錢一甚者加生軍錢三如六脈不

數不可用此方外用吹藥擦患處

七門舌

舌重




重舌 大舌之下又生小舌以致大舌反粗短小舌長痛此心脾之毒左寸右關兩部脈洪大者是也久之必爛爛則難痊初起即針出惡血搽吹藥服黃連解毒湯加生軍錢五如瀉五六日即愈玉樞丹十八味神藥亦可服

七一九

六門舌


花蓮舌座



收功 生地錢二穿山甲錢一生石膏錢五服二劑如不退用十八味神藥  
 草河車錢二歸尾赤芍錢各一川連連翹錢各一生軍錢三山梔木通各一  
 花一座急針患處出血擦吹藥再針左右少商穴用六味湯加


五門舌

舌紫純



純紫舌 因傷寒用葱酒發汗酒毒入心以致大舌純紫宜用升麻葛根錢各一枳椇子錢二石膏錢二川連半錢滑石人中黃錢各三木通錢一如心煩加山梔淡豆豉錢各一惡心欲吐恐防發斑加芫荽兩一又用芫荽沖燒酒握背心為妙外用吹藥  
 座舌蓮花 因脾經熱毒積久而發生於牙根內面走竄如蓮


八門舌  
舌花蓮



蓮花舌 因心肺之火飛騰舌底  
即針刺小舌出血吹藥用三黃石  
膏湯加甘草分五草河車錢二外針商  
陽穴即愈


七二〇

九門舌  
舌黃焦



焦黃舌 因嗜酒太過遇寒而起大舌乾黃三黃湯加枳椇子  
生石膏人中黃身發寒熱用大柴胡湯加羌活半錢如嘔吐心煩  
脈象洪大加生軍錢四佐以牛蒡赤芍乾葛之類再無不應


十門舌  
珠上舌



舌上珠 此心脾積熱舌生白泡大小不一六脈洪大擦吹藥  
用三黃湯加石膏錢五草河車錢二地丁錢一兼服玉樞丹分五如六脈  
遲細者不可用前藥

三十門舌


舌雀右



右雀舌 亦因積毒治法如左雀舌大同小異用六味湯加犀角地黃湯治之擦藥同前

二十門舌


舌雀左



左雀舌 因多食煎炒炙博之物積毒於胃故發於舌之旁似生小舌位近牙根初起針破出血擦吹藥用六味湯加三黃湯清膈散治之久之必爛用龍骨生肌散收功


六門舌

珠下舌




舌下珠 此脾腎兩虛之症六味湯加鹽炒元參生地鹽炒知母黃柏木通等分煎服兼擦吹藥餘藥照前


小舌一門凡五症  
小舌火胃



小舌二門  
小舌毒胃



小舌三門  
小舌熱積




胃火小舌 因脾經火毒鬱久而發小舌生白點爛胃脈浮洪六味湯加生石膏<sup>兩四</sup>酒炒黃芩<sup>錢二</sup>花粉<sup>錢三</sup>葛根<sup>錢二</sup>山梔<sup>錢一</sup>二服如不愈用吹藥兼服柏枝汁此乃多食炙煇醇酒厚味或魚骨刺傷非結毒可比須診脈浮洪者屬胃火脈沉實者屬結毒詳辨爲要

胃毒小舌 因毒結胃經發於小舌形如前症胃脈沉實而洪大者是結毒臨症不可忽有紅腫爛者治法亦同前用十八味神藥同玉樞丹<sup>錢一</sup>土茯苓每日<sup>兩四</sup>煎湯代水多吃爲妙如一月不愈宜合結毒紫金丹一料沖玉樞丹同服土茯苓湯下每晚三錢可收功

積熱小舌 因肝胃二經火毒飛騰所以小舌長硬白衣裏滿曠物不下右關之脈浮大六味湯加山梔<sup>錢一</sup>連翹<sup>錢二</sup>酒炒黃芩<sup>錢二</sup>黃柏<sup>半錢</sup>生石膏<sup>錢三</sup>滑石<sup>錢二</sup>赤芍木通葛根<sup>錢各一</sup>草河車<sup>錢二</sup>外吹藥兼用玉樞丹二三夜無不愈




松子喉疔




小舌五門

懸旗小舌



小舌四門

純白小舌



喉方續編 咽喉諸集下


松子喉疔 生於關內小舌左右兩邊形如松子淡紅而硬大痛難食背寒身熱兩寸關脈緊盛乃風火鬱積之症也六味湯加蘇葉赤芍羌活連翹穿山甲草河車錢各一來日去蘇葉羌活二味加乳香分三玉樞丹錢一研細沖服二日可愈外兼用吹藥

懸旗風 生小舌下垂尖頭似圓眼核大紅如櫻桃因多食厚味火酒以至胃火鬱盛而發六味湯加甘草分五枳椇子錢二赤芍錢二草河車錢二二服可愈如腫處出血用吹藥胃脈浮洪者是也

純白小舌 因胃經積毒小舌忽變白色軟大而腫痛右關之脈洪沉先用玉樞丹每服七分或十服或五服再用土茯苓煎湯代水後用廣瘡藥二十一服銀花湯下如胃脈不沉反洪大作火症着用六味湯加生石膏錢三酒炒黃芩車前錢各二山梔錢一木通錢一滑石錢三葛根錢三天花粉錢一山豆根錢二三服此即一症兩治之法臨症細參脈理然後用藥慎之慎之


二門症雜

疔牙馬走




三門症雜

單喉



四門症雜

菌喉



走馬牙疔 因脾經積受熱毒太重而起牙肉先腫日久腐爛

此為急症齒落肉黑不治脈浮洪者生沉細者死脈大而有

尚可用重劑救之脈遲細者藥不能投臨症詳脈治之初起未

爛即針腫處出血搽吹藥已爛不必針搽吹藥用川連葛根連  
翹犀角生地錢各二白蘚皮甘草貝母花粉各錢半生石膏兩一草河

車兩一入大鍋煎服三四碗連三劑如脈數便結加生軍兩一或可

救遲則不治矣  
喉單 此症係由肝火鬱熱動風而生其關口上部下垂根大

頭小紅色大痛先針兩邊患處出血吹藥漱六味湯一服來日

加柴胡勾藤赤芍生地丹皮草河車錢各二連翹黃芩黃連錢各一  
煎服可愈

喉菌 此症因胎毒所致或因心胃火邪生於喉內如菌樣故

名喉菌不可用刀針服黃連解毒湯玉樞丹可使其不發熱然

未見全消者

七門症雜  
瘡陰左




左陰瘡 生於頰車之下內熱外寒皮色不變身發寒熱腫大如鰻鯉瘰六味湯加萬靈丹同藥化下如變紅色用喉癰藥治之便結加生軍錢三玉樞丹亦可服症屬少陰心腎則如此若症屬少陽膽三焦用柴胡牛蒡並六味湯漱之

六門症雜  
瘤喉又



又喉瘤 生於關外亦名瘤治法同前因部位各別故繪圖備閱

五門症雜  
瘡喉



喉瘡 因鬱怒傷肝或迎風高叫或本原不足或誦讀太急以致氣血相凝生於關內不時而發治以調本養原之藥玉樞丹地黃丸俱可常服難許速痊外用吹藥

雜症八門  
右陰瘡



右陰瘡 治法如左陰瘡

張氏湯藥列方

七十二症主治六味湯不論紅白初起漱一服後再加減 桔梗 生甘草 防風

荊芥穗 僵蠶 薄荷

八仙散 喉中爛破者服 人中白一兩生軍二錢生石膏錢五元參兩一黃芩錢一兩四元明粉

僵蠶錢三瓜硝錢八輕粉錢一錢宜審慎不可輕用 共為末用煉蜜為錠每重二錢舌津化下連連不

斷則爛自去矣

玉樞丹 治一切喉毒 山茨菇二兩洗淨為末麝香錢三大戟錢五淨末草河車錢五淨末雄黃錢五五倍子

兩二千金子淨末 共為末米飲調和搗千餘下為度每服五六分甚者一錢

十八味神藥 川連分五白蘚皮分五黃芩錢二地丁錢二當歸錢二草河車錢二山梔錢半生龜板

木通錢一生甘草錢二川芎錢半連翹錢二乳香五分銀花錢半角針錢半知母錢二水炒 結毒加

土茯苓鮮首烏火症爛喉加生石膏大黃錢各四

知柏地黃丸 治陰虛火動骨痿髓枯能壯水制火尺脈旺者宜之即六味地黃湯加

知母黃柏 地黃 山萸肉 山藥 茯苓 丹皮 澤瀉 知母 黃柏

犀角地黃湯 即六味地黃丸加石膏犀角 石膏 熟地 犀角 山萸 丹皮

澤瀉 茯苓 淮藥

三黃湯 治火症 黃連 黃柏 黃芩水俱加石膏 炒山梔

涼膈散 治心火上盛中焦燥實煩躁口渴目赤頭眩口瘡唇裂吐血衄血大小便秘

諸風癱瘓胃熱發斑發狂及小兒驚急痘瘡黑陷等症 連翹錢一大黃錢三芒硝錢一甘

草錢一炒山梔半錢黃芩半錢薄荷錢一竹葉片十

四物湯 治一切血虛症 川芎 當歸 生地 白芍

附桂八味丸 治相火不足虛羸少氣能益陽消陰尺脈弱者宜之即六味地黃丸加

附子肉桂各五分

大承氣湯 治傷寒陽邪入裏胃實不大便發熱譫語自汗不惡寒痞滿燥實堅全見

雜病三焦大熱脈沉實者亦治陽明剛痙 大黃錢五芒硝錢三厚樸錢半枳實錢半

黃連解毒湯 治一切火熱表裏俱盛狂躁煩心口燥咽乾大熱乾嘔吐血衄血熱甚

349 驗方搜羅 咽喉諸集下

七二七

發斑等症 黃連錢一炒山梔分八黃柏分八黃芩錢一

大柴胡湯 治傷寒發熱汗出不解陽邪熱結在裏嘔利寒熱煩渴譫妄腹滿便秘表

症未除裏症又急脈洪或沉實弦數之症 大黃 黃芩 半夏 白芍 柴胡

枳實 引加薑棗

吳氏丹藥列方

子藥 明礞砂分六礞砂錢五梅冰片分五元明粉錢五 研末治喉中潰爛長肉生肌生新去

腐

丑藥 雄精錢一梅冰片分五膽礬分二 研末治口內腐爛用少許不宜多孕婦忌

寅藥 青黛兩一人中白錢五黑山梔錢五梅冰片錢一厚樸厚切片用黑棗去核三兩包 研末治口疳

如神如遇傷寒後口疳另加坑磚一角火煨研末五錢

卯藥 梅冰片錢一雄精錢一靛花錢二元明粉錢二礞砂錢五粉甘草錢一川黃連錢二人中白三錢煨

銅青錢五黃柏錢二雞內金錢一鈔紙二張上寫年月日合煨存性 枯礬錢一鹿角霜兩一 研末能解毒退

腫生肌去腐治陰虛喉癰更佳

辰藥 上好膽礬下月取青魚膽汁和勻成塊陰乾刮 研末治牙關緊閉食不能進口不能

開用雞毛蘸抹兩牙底令其流出痰涎少頃即開矣

已藥 梅花冰片二分 雄精二錢 焙硝一兩五錢要 已藥之性與申藥同論其功更速如痛

癰者先用已藥後用申藥吹之 治單雙蛾初起一二日用此藥開痰即愈未潰可

用已潰不可用孕婦忌

午藥 川黃連錢一 明礬錢一 牙皂一錢去皮弦新瓦上焙 研末吹患處扶好病人囑其垂頭流

去痰涎其藥不可多用如聲似雷音以温水調藥徐徐漱之治喉中痰塞其功與辰

藥同但其性太猛不宜輕用不如用辰藥平穩臨時看症酌之孕婦忌

未藥 雄精錢二 樸硝錢五 硼砂錢二 研末如喉嚨緊閉不能吹藥用此藥吹入鼻內其口即

開開後或點或刺或消腫用已申之藥如腐爛用子藥一切喉症皆可用

申藥 元明粉兩一 雄精錢一 去痰消腫不剛不柔神妙莫測孕婦及虛弱人病勢沉重者

皆不可用

酉藥 雞內金錢一 瓦上焙乾為末 梅冰片一分 研末吹患處可止痛如腐爛疼痛加子藥若要

收口加兒茶二錢

戌藥 硼砂錢三 元明粉錢二 青鹽錢一 地錢一 上用火煨紅放在 研末擦重舌蓮花舌名紫雪丹餘症不

可用

亥藥 巴豆廿一 生礬一兩入銀罐內滾 每一兩礬加小薑黃末一錢麵糊為丸用雄黃

末二錢為衣丸如桐子大每服七粒薑湯下用辰藥後可服此丸重者用之輕者不用此丹開關竅降痰乃起死回生之靈丹也名回生丹

青金錠 元胡索三錢或一枚 牙皂十四條去皮 研末加青黛六分 麝香五分 用水丸重五分遇症用新

汲井水磨化以綿紙條蘸藥入鼻內如病沉重者研末吹之中風及小兒驚風皆可用

鎖匙散 卽已藥去雄黃 專治雙乳蛾其效如神

玉鎖匙 明礬兩一 銀罐內溶化卽下巴豆二十一粒俟礬枯取起放在地上越宿次早

去巴豆用礬研末治症同上孕婦忌

綠袍散 厚黃柏兩二 青魚膽兩一 黃柏火上炙乾取起以魚膽塗上再炙再塗以膽盡為

度切片研末加入人中白錢三 青黛錢三 梅冰片錢三 膽礬錢三 硼砂錢三 研末治口疳疔瘡

喉蛾穿方 人指甲清水洗淨瓦上焙黃色為度每甲末一分加梅冰片一釐 又方

用壁錢窩將銀簪夾住向燈上燒灰研末吹之

牙宣 七葉一枝花卽三七用七分 加牛膝三分 梅片少許研末吹之如神

通閉散 青鹽錢一 白礬錢一 硼砂錢五分 咽喉瘡痛滴水不下吹之止疼

走馬牙疳方 梅冰片三分 人中白錢三 煨赤砥錢半 黑棗七個去核將砒分作七處入棗內炭火煨煙將盡取出存性 用米泔



水洗淨患處將藥抹上如在晚上擦更妥

附方 牛蒡子 元參 防風 皂角刺 蔓荊子 蟬蛻 石膏 擦過前藥用

此方白水煎服三劑忌發物煎

穿蛾方 土大黃鹽乾研 用箸頭蘸藥點之蛾即破

喉蛾方 麝香二分 梅片二分 臙硃五分 牛黃二分 黃連五分 硃砂五分 兒茶五分 血竭二分 硼砂二分 共為末吹患處

附漱口方 防風 甘草 銀花 薄荷 荊芥 鹽梅 栗蒲壳 先煎此藥漱口

後吹前藥忌發物煎

治喉痺喉癰喉蛾等症回雪品雪呂雪三方

回雪 麝香一分 冰片二分 牙硝錢一 硼砂錢四

品雪 冰片二分 牙硝錢二 硼砂錢四

呂雪 牙硝錢二 硼砂錢四

以上諸藥不見火研極細末每次吹一二分奇效

治喉風喉痺喉蛾等症喉科第一要藥凡遇不治之症吹此藥即可開關

真牛黃錢一 露蜂房五錢 大冰片錢二 青黛錢二 硼砂錢二 熊膽錢二 要五月五日午時合

喉方續編 咽喉秘集下

驗方續編 咽喉祕集下

七三二

又方 真牛黃分一 冰片分二 硼砂分二 雄黃分二 川連錢一 黃柏錢一 硃砂錢二 青黛錢二 青魚膽個二

治喉風

蛇蛻 不拘多少 陰陽瓦焙灰吹之即愈

驗方續編咽喉祕集終

## 白喉治法忌表抉微

余素未習醫咽喉一症尤屬茫然今年正月余三兒自至戚汪犬令處染患白喉延同鄉某甲醫診治據曰此喉痺也切不可破破則不治方用牛蒡桔梗僵蠶杏仁荆芥防風等藥一劑而汗出然鼻塞矣再劑而熱退然音瘖矣又延診之則曰邪退其半矣以前方略加增減一劑而白塊自落矣再劑而鼻流鮮血矣又接服之則曰邪皆外出矣又以原方去荆防杏仁加射干黃芩一劑而喉外暴腫再劑而喉內全爛且頑痰上壅骨節漲滿神志煩悶睡寤恍惚始知藥誤急改延某乙醫來視曰誤服表藥受患過深不可救矣姑以龍虎二仙湯灌之卒無效未幾而汪之女及婢相繼患此鑿於甲醫之失不敢服藥令老嫗挖去白塊出涎血升許尋愈幾不解其何理嗣於友人處假得鄭梅澗先生重樓玉鑰一書閱之乃知白喉一症只可滋陰不可發表甲醫所用之藥全在禁忌之列而鼻塞音瘖與白塊自落鼻孔流血紅皆爲誤表不治之症惟不可破一語則與甲醫相合更無解於汪氏女婢之因破而愈也方思摘其大要刊布流傳免世滋誤乃未一月而汪君亦病此仍不敢延甲醫亦倩嫗挖破而病不減另延某丙醫診治其所用藥與重樓玉鑰中所載養陰清肺一方大同

小異因未大效又復倍用生地惟尙不免有一二禁藥攙入服更不效病家以爲生地之誤又另延一僉醫者全用藥表散連劑並進而種種敗象一時俱見知爲內陷仍歸咎於養陰亦改延乙醫觀之並未出前方相示乙醫以爲症由風邪失未表散亦投蠶蟬芳勃等藥竟不救余時亦未見僉醫之方近始索觀而知當日但謂病有兩歧藥難一致前所欲摘要刊布者至此遂不敢下筆矣又一月而余妾亦病始則骨節疼痛渾身發熱喉間乾痛而無白點乃立意延乙醫診視以其向治喉症類能分別透澈必可辨悉病源及診脈象云是浮緊恐係風邪略應表散然一劑而音瘖再劑而氣逆似覺不合適有某丁醫過訪請其覆按瞿然曰此白纏喉也如何可表速服養陰清肺湯方可補救時熱尙未退探視喉間微有白象乃於養陰清肺湯中加蠶食過桑葉孔多者三片青麟丸五分爲引一劑之後卽照原方不必加引至愈而止當卽遵服次日卽大解一次色赤黃並發斑疹遍體皆是此種斑疹乃白喉症所便乃是吉象切勿誤認尋常斑疹不致滋陰改服表散以致大誤此種熱已全退而喉間白塊遍滿矣余始終守此方五日而瘳長次兩兒次第傳染審其情狀症亦相同深信不疑卽以養陰清肺湯投服或便粘痰或發斑疹服三劑而熱清喉間均稍露白點不移時而退盡竟未大發乃堅信養陰忌表四字爲治白喉者應却不磨之論

前論

白喉古無此症故少專書世稱難治然非難也未明其理耳人但知肺之灼而不知由於胃之蒸人即知胃之熱而不知由於腸之寒腸寒則下焦凝滯胃氣不能下行而上灼於肺咽喉一線之地上當其衝終日蒸騰無有休息不急治與治之不當則腫且潰潰且閉矣

捷要云白喉初起惡寒發熱頭痛背脹遍身骨節疼痛喉內或極痛或微痛或不痛而喉內微

治之之法惟有以厚重之藥鎮其上層如以巨甌蓋鼎使燄不上騰復以清涼之藥潤其次層如以溼綿禦燄使火不內射極盛者再掃除其中宮以抽柴薪開通其下道以漏炸炭醫者之能事畢矣夫自上至中至下本有可通之路而必開其旁門反使四塞左矣邪毒之內蘊火也實煙也尋常表邪輕煙而已此則如蠻雲毒霧蒼蒼鬱鬱一經表散僅能紛竄於經絡之中而不能透出於皮毛之外愈入愈深有入無出迨自知其誤翻然改計不先追其藥毒而徒盡其當然無益也解表藥之毒春用蠶食過桑葉孔多者三片夏用荷花蒂連鬚者七箇秋用葶藶苗稍黃者九枝各寸許冬用生青果核磨汁或打碎五枚不必拘定四時但有現成鮮者可用即用之加入養陰清肺湯中為引一劑後照全方服不加引

捷要云如有辨症未清誤服升提開散辛溫之劑視病之輕重以生藥豆

服藥則誤服之劑即能解除矣等語

如以上四引不現成即用此法亦效

此症起時發熱者多症之輕者脈不甚洪實初不見白

者不察往往誤爲風邪用表藥而熱退方謂其效也及白點既見而病已增重大半矣  
據要云白喉初起惡寒發熱乃毒氣初作於內至二三日喉內見白寒熱自除或者不悟以爲表藥有功而不知不服表藥其熱亦自退也至改服養陰一二劑而不見速效又復反覆改圖一誤再誤病其有不殆者乎故認症旣的尤以守方爲第一義也  
云如有內熱及發熱照方服去其熱自除即白有加仍勿改藥蓋內病不除自何能淨愈發白愈守方久久服之自有效驗切勿求速而表散吾謂風邪之症亦宜清解亦不宜於表散表之過當不外出而內竄勢易也且立意不用表藥則中下之醫不能辨症於初起者亦不致大誤而殺人玉鑰書中忌用諸藥出於名醫手定人嫌其選擇之過泥吾猶謂其徵引之未全細辛升麻桂枝蘇葉之不可用固不待言即殭蠶蟬退馬勃等品治喉家所奉爲至寶者皆殺人之具也各宜守之如厲禁視之如酖毒庶不誤矣查汪某之病亦是白喉藥不誤於前此之滋陰而誤於後來之表散况黃芩一味涼入細竅猶投炭於瓶而嚴塞其口火雖滅而煙留再以厚重之藥並用而鎖之愈塞愈緊非特不能交濟其功抑且相助爲虐其毒至死而不能出者職是故也至其女與婢之病亦均纏喉惟係輕者童體氣盛故以搥破而效然非通法不可爲訓若以治弱人則頃刻而靡矣汪某之病胡獨不誤於此耶三郎所遇之醫學淺性泥更不足道當其來診之初白塊已遍滿但稍經涉獵者即可辨認况行道有年而猶妄用表散一再不已是何故也至三日而毒竄已深雖有神仙亦不能救甚矣牛蒡射干等藥之爲禍烈

也耐修經此數端聞吾之言大旨當可明曉其擇近時喉症書之近穩者細觀各方中之用藥刪其應忌之品不可容留一孽以可用者分爲正將猛將次將三表每表分作四層上層爲鎮藥如龍膽草石膏生地元參之類次層爲潤藥如瓜蒌貝母丹皮天冬之類又次層爲消藥加厚樸神麴枳殼麥芽之類下層爲導藥如大黃元明粉車前澤瀉之類約藥四五十種按症輕重分別施治亦已足矣其中消導之藥非熱極便結不可輕用但能鎮潤得宜則中下自會通暢不可不知表後列忌用諸藥添入前人漏列者七八種注明害處俾盡人一目瞭然胸有成竹設遇醫者開方觀其所用之藥如有不列於藥隊者以及妄用禁藥者或病輕而遽用猛將者皆不可服更以服禁藥後所現不治症象臚列於後庶可觸目驚心也

遵定藥將三表

係乙乙醫  
某君審正

三將之中以正將爲定法而猛將馭其重次將馭其輕四層之中又以鎮潤爲定法而以消藥去其滯導藥利其行鎮潤之中又以養陰清肺爲定法而以他藥濟病之偏頗輔方之不足審定主賓因症施治若網在綱有條不紊至於禁忌之藥萬不可一試卽偶雜一二於良藥之中猶致全羹俱壞况專恃之以爲定法乎其不現種種敗象而逼悶以斃者鮮矣法戒具備行道者其詳而審焉

方 續編 白喉治法忌表抉微

白喉正將 此係大中正之藥極種極效惟中下層藥非熱甚之症大便閉結者尚須慎用

<p>上層鎮藥</p> <p>大生地 元參 煨石膏 麥冬</p>	<p>次層潤藥</p> <p>天冬 當歸 白芍 丹皮 貝母 薄荷 生甘草</p>	<p>中層消藥</p> <p>大木通 神麴 焦查肉 陳皮 砂仁</p>	<p>下層導藥</p> <p>郁李仁 知母 生土牛膝兜 澤瀉 青寧丸</p>
--	--	---	--

養陰清肺湯 日服二劑重者日服三劑若病勢無增即白加甚仍照方服始終守定不可移易 大生地一兩 麥冬六錢去心 白

芍四錢炒 薄荷二錢五分 元參八錢 丹皮四錢 貝母四錢去心 生甘草

二錢此方乃治白喉 聖藥翼然八柱顛撲不破其中但有鎮潤而無消導蓋所謂

鎮潤得宜下元自會通暢無所用其消導也分兩悉照原方不可輕重小兒減半守

方服去自然全愈切勿中改 如喉間腫甚者加煨石膏四錢 大便燥結數日不



通者加清寧丸二錢 元明粉二錢 胸中漲悶者加神麩二錢 焦查二錢 小便短赤者加大木通一錢 澤瀉二錢 知母二錢 燥渴者加天冬三錢 馬兜鈴三錢 面赤身熱或舌苔黃色者加銀花四錢 連翹二錢

白喉猛將非極重之症以及誤服禁忌之藥漸見敗象者不可輕用揭而出之所以使人之儆也

<p>上層鎮藥</p> <p>龍膽草 生石膏 犀角</p>	<p>次層潤藥</p> <p>瓜蒌 生梔仁 連翹 川黃柏 馬兜鈴 藍草根</p>	<p>中層消藥</p> <p>川樸 枳實 萊服子</p>	<p>下層導藥</p> <p>生大黃 元明粉</p>
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------

神仙活命湯重者日服三劑俟病稍減仍服養陰清肺湯 龍膽草二錢 元參八錢 馬兜鈴三錢 板藍根三錢 生石膏五錢 白芍三錢 川黃柏一錢五分 生甘草一錢 大生地一兩

方續編 白喉治法忌表抉微

瓜蒌二錢 生梔子二錢 凡白喉初起即極疼且閉飲水即噎眼紅聲啞白點立見口出臭氣者方可照此方煎服或已延誤二三日症已危急或誤服表藥現出敗象非輕劑所能挽回者均須此方以洩其毒 如舌有芒刺謔語神昏者加犀角鎊二錢 大便閉塞胸下滿悶者加中樸二錢枳實二錢 便閉甚者再加萊服子二錢生大黃二錢 小便短赤者加知母二錢澤瀉二錢車前子三錢

白喉次將 此表為白喉初起辨別未明及症之輕者與凡風邪之症皆以此等藥清解之切不可發表表則不可救

<p>上層鎮藥</p> <p>次生地</p> <p>粉葛根</p>	<p>次層潤藥</p> <p>金銀花</p> <p>冬桑葉</p> <p>藿梗</p> <p>枇杷葉</p> <p>紫苑</p> <p>柿霜</p>	<p>中層消藥</p> <p>小木通</p> <p>枳殼</p> <p>炒麥芽</p> <p>竹葉</p>	<p>下層導藥</p> <p>車前子</p> <p>燈心</p> <p>蓮子心</p>
-----------------------------------	--	---	---

除瘟化毒湯 日服一二劑如症加重即服養陰清肺湯 粉葛根二錢 金銀花二錢 枇杷葉錢半去毛蜜炙

薄荷五分 次生地二錢 冬桑葉二錢 小木通八分 竹葉一錢 貝母二

錢去心 生甘草八分 白喉初起症象輕而白未見即服此方俟一見白象 時甚

微須詳細探看但有星星白點即是 即改服養陰清肺湯勿遲誤如不白即服此方均勿發表 如大便

閉者加瓜蒌二錢 郁李仁二錢 胸下脹悶者加炒枳殼一錢五分 炒麥芽二

錢 小便短赤者加車前子三錢燈心一錢

以上三方加味各法均須隨時斟酌若見症不甚重者或於所備二三味或以分兩

減輕庶無偏誤

白喉一切禁忌之藥 白喉初起發熱居多往往服此等藥而熱退以見為效而病已內陷矣可畏哉 麻黃 誤用音啞不可救 桑白皮 肺已虛不宜瀉 紫荊

皮 被血不可用 杏仁 苦脾不可用 牛蒡子 通十二經不可用 山豆根 不可用 射干 妄用音啞 天花粉 不宜用 羌活 過表不可用 荊

芥 不可用 防風 不可用 黃芩 過涼不可用 桔梗 肺虛不可用 柴胡 升散不可用 前胡 發散不可用 升麻 升散不可用 僵蠶 涼散過甚不可用

蟬退 升散不可用 桂枝 辛散不可用 細辛 辛散不可用 蘇葉 不可用 馬勃 不可用 柴胡以下此次所增玉鑰論

中有凡諸喉症四字可見禁用此等藥不獨白喉也

白喉誤服禁忌諸藥所現各種敗象 白喉症論中但指為無治之症而不知係誤服藥所成 七日滿白不退 服藥

大便不通 頷下發腫不消 服藥嘔吐不止 音啞鼻塞 鼻孔流血 喉乾無

驗方續編 白喉治法彙表抉微

七四一

涎 白塊自落 天庭黑暗 兩目直視 面脣俱青 角弓反張 痰壅氣喘

汗出如漿 藥不能下 肢漲神倦 乙醫曰以上各象重者用猛方輕者用王方以期待補救惟脾瀉之症宜兼顧脾藥須另設

未服藥大便泄 用生地五錢麥冬三錢丹皮錢半元參二錢半薄荷七分藿香錢半

砂仁二粒研沖炒麥芽三錢

服藥腹瀉不止 用酒炒生地二錢麥冬二錢川貝二錢白芍二錢半甘草一錢藿香

錢半砂仁二粒研沖炒麥芽二錢

後論 答乙醫某生問

白喉初起發熱此時鬱勃之火全集於肺胃二經故脈象未有不浮緊者迨熱退白現而肺虛之本象見於是始有塌陷之形某生所見各症大率在二三日之後故僅知有塌陷而不知其先必從浮緊來也雙單蛾症亦屬於裏凡肺之本色上現於喉始有此象豈有皮毛之症而能顯此形色於吭舌之間乎惟肺氣虛損未形故脈象浮緊之日多輕者略用表散尚不至於大誤或症本重或表散過當勢亦至於虛敗而脈塌陷表而愈者其暫表而誤者其常故不如養陰而兼清解為速效而無弊也證異治同世醫不有言之者乎 捷要云雙單蛾症治之稍緩則氣閉不起宜用生土牛膝兜引熱下行大便閉結用大黃與白喉症異治同倫不預防轉為白喉為禍甚烈可見此症與白喉同治更不宜於表散也

白喉用藥鎮之潤之原欲其入於胃入於腸以尋去路也惟下焦不甚窒塞者既鎮且

潤火毒自駸馴而下行原無所用其消導若火毒蘊結下焦不通其勢不能不宣洩之  
 蓋既鎮之不使上行潤之不使旁達倘不入於胃不入於腸將安歸乎某生所謂恐毒  
 陷胃者尙非探本之言捷要云須從上焦引至中焦由中焦引至下焦從大小腸若宜消而不消  
 宜導而不導或消導而未能得宜既不能上又不能下則惟內陷於胃而已矣耐修子曰  
陰清肺湯而不見速效甚至倍用鎮藥而更不效者此乃熱結中焦火毒不能下達之故並非滋陰之誤其症  
 象必係胸膈脹滿大便閉結此時只宜加入消導之藥一二種使下關通利病即去其大半且加藥分兩無須  
 過重蓋此時鎮潤之力已足稍開一隙即如建瓴而下勢甚易若改用表散則如至云上熱下寒者宜  
 金堤驍虞橫決四溢其勢洶湧不可復救害更甚於初起時之表散狂病即誤於此以熱藥冷服此指真寒假熱而言白喉之症係真熱假寒何所忌於寒涼乎火毒既攻  
 於中上則下元不寒而自寒樸麩查麥固皆帶溫之品輔以清降之藥引使下行本最  
 有益若熱極盛則非硝黃不足通道路猛藥疾馳而下裹熱以行性不流連腸胃何致  
 受病猶以一器盛沸湯而置冰塊於中傾入一冷蓋內水熱固以大減而以手按冷蓋  
 則反涼為熱矣此借敵作導之法用其停熱以為行熱固不害於腸之假寒也惟非極  
 險之症不必輕用此猛藥耳向來治溫症者有涼降無表散白喉乃溫症中最重之一  
 端敵兵已至城下重兵以圖之猶慮不勝尙能以談言微中解其紛乎故諸溫症中尙  
 有參用蠶蟬芩桔荊防諸品者若用之強兵壓境如白喉勢直同於玩敵矣有不滋蔓  
 燎原者乎故鎮之者重兵以扼之也潤之者恩言以勸之也威德並用敵可解矣而猶

未濟則惟有直掃其老巢仍留其歸路敵自不逞而退矣此百戰百勝之法也若升提之則火以扇而愈熾表散之則火以分而愈多即或不然用清涼平淡之品以澆灑之不能息其燄抑且揚其烽而上下左右莫不受害矣其猶可剪除撲滅乎擬表妥適三表之後可各立一方正將後用養陰清肺湯此方出自大名醫之手不特藥味不可移易即分兩亦不可重輕耐修子曰此句須看活假如生地本係一兩如用一兩二錢則統加二成如用兩不可偏嗜耳玉輪原方本僅五成之一據其八折是也人體有強弱病有重輕則藥不能無增損但照原配分太輕不足取病茲照單刻方定數用者酌之如病有偏頗則擇三表中應用之藥加一二味以爲引足矣總宜以此方爲坐守之老營決無喪師失律之大辱惟誤置一二禁藥於其中則害且變本而加厲慎之慎之某生欲以白芍易桑葉此大不可桑葉固有時可加白芍則萬不宜去入五臟之密邇肺胃者惟心與肝不有以護之害且立至白芍乃固守心肝之要藥具見立方者之苦心豈宜移動耶猛將後按神仙活命湯去其禁藥增猛潤藥以足之次將後按除瘟化毒湯去其禁藥增次潤藥以足之凡鎮藥宜重用潤藥次之消導藥宜輕用猶之軍行萬里但有一人一騎以爲嚮導足矣多則紀律不整反滋事端三表中則猛將宜輕用正將宜重用次將亦宜輕用蓋正將守其常猛將出其變而次將用於暫也神而明之存乎其人吾言亦盡於此矣此症本不難治治之不善而種種敗象見非此症之本象實投禁藥者有以造成之也與生而致死同一線幽

微氣不能透因而逼斃其心不即死也故死於此症者最慘行醫者當思患病之人或爲孝子之父母或爲慈親之子女或爲待育之壯丁或爲守成之家督或爲無父之孤兒或爲數家之獨子當其病劇呼天籲地拜佛求神無所不至一經不起合門長幼痛哭失聲肝腸寸斷抱此奇慘而言及醫家猶以本有割股之心相諒置不與爭故醫者雖殺多人終不能自知其失然受害者諒之愈深造孽者積而愈重雖曰無心而漫不經心之罪豈能擢髮數哉若一朝誤治退而深思以期萬一之當則死者雖不能生生者猶可不死乃有始終執拗狃於一偏人命之大憯焉不加察吾不知其本心之仁安在焉自有此論而猶有固執已見視人命如草芥者直以有心殺人陰律有所不貸吾亦末如之何也已矣歐陽公曰求其生而不得則死者與我皆無憾焉言治獄也而吾謂行醫亦然再定一吹藥方以成全璧 白填鴨散 此方以血肉沖和濟金石寒烈膩養於金水二令之間虛實皆宜或稍兼顧可救命

於奇險時勿 用純白公鴨一隻自霜降日起每日用麩麪和蝸牛地龍柿霜瓜萋霜古錢醋煨爲末各等分 計揆七 成捏成小團卯酉時各填十二箇關閉籠內不使多走所遺之糞另以一器收好至小雪日交節之時宰取喉頸骨連喉管肺管及肺 宰時以刃刺腹勿割其喉忌見水

置瓦上焙乾爲炭存性另以一月內所遺鴨糞用清水漂去其垢澄去其土至淨爲度帶水研至極細澄定瀝去水亦置瓦上焙乾爲炭存性與前炭置一處共研細末加蝸

358

方續編 白喉治法忠表表微

七四五

牛焙黃四十九箇用舊壽州煙斗口門七箇用此起處勿用一洗淨煙漬火上微烘二物同研

極細再與兩炭合研拌勻磁餅封固置低潮處以去火氣臨用時加入冰片礪砂人指

甲煨人中白鴨嘴膽礬五種細末各少許計前炭七成後藥三成頻頻吹之雖已閉之喉猶能開通

一線即以蜜水沖少許服亦良佳真萬金之聖藥八洞之秘方也此論專爲濟急而

設糾謬而設至善後之方用當歸茯苓玉竹女貞等藥時醫優爲之吾可無須饒舌矣

耐修子曰讀前後二論知昔人論白喉者以鄭梅澗先生重樓玉鑰所載最爲謹嚴

細慎特寥寥數語未能剖悉源流行醫家每多未見卽見亦習焉不察耳近有專刻

其養陰清肺一方印送者按此施治全活衆多至張善吾白喉捷要蕭海雍白喉證

論雖亦主於養陰忌表立論多中肯綮而所立各方中如殭蠶蟬蛻豆根黃芩牛蒡

馬勃諸禁藥猶未盡去時醫宗之流弊尙不能免此論一出洵如赤日當天無微不至

照利濟羣生豈淺鮮哉余在奉天隨侍賑壇一載習聞緒論而白喉秘旨及今始得

聞之若早明此理三兒可不至死然猶幸余妾之轉危爲安長次兩兒之獲治卽愈

也北地此症盛行不救者多大率皆服表藥之誤其得愈者皆守玉鑰書中養陰清

肺湯方者也如或攙入一二禁藥者雖服此而亦不治今得此論流傳家喻戶曉則

此症雖危弗危矣乙醫勇於知過默契慈心丁醫決於當幾暗合妙旨皆爲當時賢



者卽如甲醫之久執一偏丙醫之未達一間苟見此書必當廢然思返油然有進堅持此意立心活人安知不終爲通人所許可哉光緒辛卯五月敬跋

子午香室主人曰白喉一症罕有能言其詳者卽時醫中認症無差用藥不誤者亦但能行其當然而不能知其所以然彼妄投表散殺人如草者更不知此症爲何物矣此書一出使數十年之醫障昭若發矇上焉者可臻變化之神下焉者更不致有歧途之誤卽不行醫者按此治人或以自治亦可十不失一矣此症盛於北數省有志濟人者能刊印流傳遍及窮鄉僻壤其活人功德當不在散財施粟下也 壽民曰此後億萬人胸中各有養陰忌表四字在則患白喉者從可免倉遑無主之虞亦可免胡亂求醫之誤善哉 乙醫曰其服養陰而不能速效者乃不知加味與加味不當之故宜細察其症之輕重照方後加味法斟酌施治無有不效切勿改圖以致債事間有服表散而若有效者乃體本壯或症本輕尙未受其大誤非藥之功萬毋據其偶然者以爲法

### 白喉症治養陰忌表歌括

忌表挾微書已成帙復作是歌以便記憶刊此印布更易爲力仁人廣傳功德無極  
養陰清肺湯始終要守方隨症酌加味連服效自彰

3.9

驗方續編 白喉治法忌表挾微

養陰清肺湯 大生地兩一錢 麥冬六錢 杭白菊四錢 薄荷五分 元參八錢 貝母四錢 丹皮四錢

生甘草錢二 此方為白喉大中之至正之藥不可妄擬增刪初起發熱照方服去其熱

自除即白加甚仍須守方如發斑疹係藥見功始終服此至愈而至重者每日三劑

輕者二劑切忌妄用表散 如胸下脹悶者加神麩錢二 焦查錢二 大便燥結數日不通

者加清甯丸錢二 元明粉錢二 小便短赤者加大木通錢一 澤瀉錢二 知母錢二 燥渴者加天冬

錢三 馬兜鈴錢三 面赤身熱或舌苔黃色者加銀花錢四 連翹錢二 如有脾泄之症勢宜兼

顧脾土須酌為加減另立藥方

未服藥大便泄 用生地五錢 麥冬三錢 丹皮一錢 五分 元參二錢 五分 薄荷七分 加

藿香一錢 五分 砂仁二粒 研沖炒麥芽三錢

服藥腹瀉不止 用生地酒炒二錢 麥冬二錢 川貝母二錢 白芍二錢 五分 甘草一錢

加藿香一錢 五分 砂仁二粒 研沖麥芽二錢

若遇極重症或被表散誤神仙活命湯冀可得生路

神仙活命湯 龍膽草錢二 元參錢八 川黃柏錢五 板藍根錢三 生石膏錢三 杭白菊錢三 生梔子

錢二 生甘草錢一 大生地兩一 瓜蒌錢三 馬兜鈴錢三 凡白喉初起疼痛且閉飲水即噎眼紅

聲啞白點立見口出臭氣者方見照此煎服或已延誤二三日症已危急或誤服表

藥現出白象非輕劑所能挽回者均服此方以洩其毒重者日二劑至症象見輕仍服養陰清肺湯慎勿改服表散 如舌有芒刺謔語神昏者加犀角鎊錢二連翹錢二大便祕塞胸下滿悶者加中樸錢二枳實錢二便秘甚者再加萊菔子錢二生大黃錢二小便短赤者加知母錢三澤瀉錢二車前子布包錢三

其或病本輕以及風邪侵只須清解藥除瘟化毒靈

除瘟化毒湯 粉葛根錢二冬桑葉錢二小木通分八竹葉錢一次生地錢二金銀花錢二薄荷錢一生

甘草分八貝母去心錢二枇杷葉去毛蜜炙錢五分凡白喉初起症象尚輕喉間尚未見白不能辨

認是否白喉即服此方俟一見白象即改服養陰清肺湯如係風邪之症則始終服此自然全愈萬不可以表散 如胸下脹悶者加炒枳壳錢五分炒麥芽錢二大便祕者

加瓜蒌錢二郁李仁錢二小便短赤者加車前子布包錢三燈心札一凡是風瘟即非喉症服

此亦神效

雙單起喉蛾治與纏喉同照方均可愈表散防終凶

雙單蛾症亦屬於裏惟肺象虛損較白纏喉稍輕若治之不當變為纏喉更不易救

時人不察以為表症輒用升散害不可言凡治此症亦宜以養陰清肺湯為主日二

劑重者用神仙活命湯與白喉治同均不宜於表散

驗方攷編 白喉治法忌表訣

一切禁忌藥避之如酖毒入口難挽回千萬勿誤服

白喉一切禁忌之藥

麻黃

誤用哮喘不可救

桑白皮

肺已虛不宜瀉

紫荊皮

破血不可用

防風

不可用

杏仁

苦降更不宜用

牛蒡子

能通十二經萬不可用

山豆根

不可用

黃芩

為涼不為燥

射干

妄用即嘔

花粉

不可用

羌活

過發表不可用

桔梗

肺虛不宜升

荊芥

不可用

紫胡

不可用

前胡

不可用

桂枝

辛散不可用

升麻

升散不可用

蘇葉

發散不可用

僵蠶

涼散不可用

蟬退

升表不可用

馬勃

為散不可用

以上諸藥千萬不可一試即於前列諸良方中偶攙一二亦立見大害凜

之慎之

白喉誤服禁忌藥後所見各種敗象 七日滿白不退大便秘結不通未服藥大便秘

服藥後連瀉不止頷下發腫不消音啞鼻塞服藥嘔吐不止白塊自落肢漲神倦鼻

孔流血喉乾無涎天庭黑暗兩目直視面唇俱青角弓反張汗出如漿藥不能下

以上各象均極危險大都誤服表藥而成除脾泄二症前已另列方藥外重者用神

仙活命湯輕者用養陰清肺湯加入解表毒之藥為引一劑後去引服

解表藥毒法

春用蠶食過大桑葉孔多者

三片夏用荷花蒂連鬚者

七片秋用葶薺苗稍

黃者九枝各寸許

冬用生青果核磨汁

或打碎三枚

又方 生葦豆碾細末重者一茶

碗輕者一酒杯冷水調服再煮白米粥一碗先服粥後服藥則誤服之劑即解除矣

總而言之切勿誤投表散症非難治一投表散則難治矣切戒切囑

卷終

實價 幣壹元貳角

加印

