

巢氏諸病源候總論

八

中國醫學大成第五集

通治類

巢氏諸病源候總論

八

上海大東書局印行

曹炳章主編
中國大學大成
巢氏諸病源候總論

全八冊 實價國幣壹元貳角五分

中華民國二十五年十一月初版

原著者 隋·巢元方

發行人 沈駿聲
上海北福建路三三一號

印刷者 大東書局
上海北福建路三三一號

總發行所 大東書局
上海福州路三一〇號

分發行所
開封 安慶 常州 無錫 信陽
南京 北平 天津 濟南 梧州 廈門
長沙 漢口 衡陽 杭州 重慶
徐州 南昌 蕪湖 哈爾濱
汕頭 廣州 衡陽 哈爾濱
大東書局

(材晉朱者對校書本)

巢氏諸病源候總論

隋 太醫博士巢元方撰

鄞縣曹赤電炳章圈點

卷四十四

婦人產後病諸候下 凡四十一論

產後月水不利候

手太陽少陰之經。主下爲月水。太陽小腸之經。少陰心之經也。心主血脈。因產傷動血氣。其後虛損未復。而爲風冷客於經絡。冷搏於血。則血凝澀。故令月水不利也。

產後月水不調候

夫產傷動血氣。虛損未復。而風邪冷熱之氣。客于經絡。乍冷乍熱。冷則血結。熱則血消。故令血或多或少。乍在月前。乍在月後。故爲不調也。

產後月水不通候

夫產傷動血氣。其後虛損未平復。爲風冷所傷。血之爲性。得冷則凝結。故風冷傷經血。結於胞絡之間。故令月水不通也。凡血結月水不通。則變成血瘕。水血相并。後遇脾胃衰弱。肌肉虛者。變水腫也。

產後帶下候

帶下之病。由任脈虛損。任脈爲經絡之海。產後血氣勞損未平復。爲風冷所乘。傷於任脈。冷熱相交。冷多則白多。熱多則赤多也。相兼爲帶下也。又云。帶下有三門。一曰胞門。二曰龍門。三曰玉門。產後屬胞門。謂因產傷損胞絡故也。

產後崩中惡露不盡候

產傷於經血。其後虛損未平復。或勞役損動而血暴崩下。遂因淋瀝不斷時來。故謂崩中惡露不盡。凡崩中若小腹急滿。爲內有瘀血。不可斷之。斷之終不斷。而加小腹脹滿爲難愈。若無瘀血。則可斷易治也。

產後利候

產後虛損未平復。而起早傷於風冷。冷風乘虛入於大腸。腸虛則泄。故令利也。產後利若變爲血利。則難治。世謂之產子利也。

產後利腫候

因產勞傷榮衛。脾胃虛弱。風冷乘之。水穀不結。大腸虛則洩成利也。利而腫者。脾主土。候肌肉。土性本剋水。今脾氣衰微。不能剋消於水。水氣流溢。散在皮膚。故令腫也。

產後虛冷洞利候

產勞傷而血氣虛極。風冷乘之。入於腸胃。腸胃虛而暴得冷。腸虛則泄。遇冷極虛。故變洞利也。

產後滯利候

產後虛損。冷熱之氣客於腸胃。熱乘血。血滲於腸則赤。冷搏腸間。津液則變白。其冷熱相交。故赤白相雜。連滯不止。故謂滯利也。

產後冷熱利候

產後臟虛。而冷熱之氣入於腸胃。腸虛則泄。故成冷熱利。凡利色青與白爲冷。黃與赤爲熱。久不止熱。甚則變生血冷。極則生白膿。膿血相雜。冷熱不調。則變滯利也。

產後客熱利候

產後臟虛。而熱氣乘之。熱入於腸。腸虛則洩。故爲客熱。利色黃是也。熱甚則黃赤。

而有血也。

產後赤利候

赤利血利也。因產後血虛。爲熱氣所乘。熱搏血滲入腸。腸虛而洩爲血利。凡血利皆是多熱。熱血不止。蘊瘀成膿血利也。

產後陰下脫候

產而陰脫者。由宿有虛冷。因產用力過度。其氣下衝。則陰下脫也。

產後陰道痛腫候

臟氣宿虛。因產風邪乘於陰。邪與血氣相搏。在其腠理。故令痛。血氣爲邪所壅。否故腫也。

產後陰道開候

子臟宿虛。因產冷氣乘之。血氣得冷。不能相榮。故令開也。

產後遺尿候

因產用氣。傷於膀胱。而冷氣入胞囊。胞囊缺漏。不禁小便。故遺尿多。因產難所致。

產後淋候

因產虛損。而熱氣客胞內。虛則起數。熱則洩少。故成淋也。

產後渴利候

渴利者。渴而引飲。隨飲隨小便。而謂之渴利也。膀胱與腎為表裏。膀胱為津液之府。婦人以腎繫胞。產則血水俱下。傷損腎與膀胱之氣。津液竭燥。故令渴也。而腎氣下通於陰。腎虛則不能制水。故小便數。是為渴利也。

產後小便數候

胞內宿有冷。因產氣虛而冷發動。冷氣入胞。虛弱不能制其小便。故令數。

產後尿血候

夫產傷損血氣。血氣則虛而挾於熱。搏於血。血得熱流。散滲於胞。故血隨尿出。是爲尿血。

產後大小便不通候

夫產傷動血氣。腑臟勞損。血傷未復而挾於熱。血得熱則妄行。大腸及胞囊。虛者則血滲入之。故因大小便而血出也。

產後大小便不通候

大小腸宿有熱。因產則血水俱下。津液暴竭。本挾于熱。大小腸未調和。故令大小便澀結不通也。

產後大便不通候

腸胃本挾於熱。因產又水血俱下。津液竭燥。腸胃否澀。熱結腸胃。故大便不通也。

產後小便不通候

因產動氣。氣衝於胞。胞轉屈辟。不得小便故也。亦有小腸本挾於熱。因產水血俱下。液津竭燥。胞內熱結。則小便不通也。然胞轉則小腹脹滿。氣急絞痛。若虛熱津液竭燥者。則不甚脹急。但不通津液。生氣和。則小便也。

產後小便難候

產則津液空竭。血氣皆虛。有熱客於胞者。熱停積。故小便否澀而難出。

產後嘔候

胃爲水穀之海。水穀之精。以爲血氣。血氣榮潤腑臟。因產則腑臟傷動。有血虛而氣獨盛者。氣乘腸胃。腸胃燥澀。其氣則逆。故嘔不下食也。

產後欬嗽候

肺感微寒。則成效嗽。而肺主氣。因產氣虛。風冷傷於肺。故令效嗽也。

產後時氣熱病候

四時之間。忽有非節之氣而為病者。謂之時氣。產後體虛。而非節之熱氣傷之。故為產後時氣熱病也。診其脈弦小者。足溫則生。足寒則死。凡熱病脈應浮滑。而反懸急。為不順。手足應溫而反冷。為四逆。必死也。

產後傷寒候

觸冒寒氣而為病。謂之傷寒。產婦血氣俱虛。日月未滿。而起早勞動。為寒所傷。則嗇嗇惡寒。吸吸微熱。數日乃歇。重者頭及骨節皆痛。七八日乃瘥也。

產後寒熱候

因產勞傷血氣。使陰陽不和。互相乘剋。陽勝則熱。陰勝則寒。陰陽相加。故發寒熱。凡產餘血在內。亦令寒熱。其腹時刺痛者是也。

產後瘧候

夫瘧者由夏傷于暑。客在皮膚。至秋因勞動血氣。腠理虛而風邪乘之。動前暑熱。正氣相擊。陰陽交爭。陽盛則熱。陰盛則寒。陰陽更盛。故發寒熱。陰陽相離。則寒熱俱歇。若邪動氣至交爭復發。故瘧休作有時。其發時節漸晏者。此由邪客於風府。邪循膂而下。衛氣一日一夜常大會于風府。其明日下一節。故其作日晏。其發早者。衛氣之行風府。日下一節。二十一日至尾骶。二十二日入脊內。上注于伏衝之脈。其行九日出于缺盆之內。其氣既上。故其病發更早。其間日發者。由邪氣內薄五臟。橫連募原。其道遠。其氣深。其行遲。不能日作。故間日蓄積乃發。產後血氣損傷。而宿經傷暑熱。今因產虛。復遇風邪相折。陰陽交爭。邪正相干。故發作成瘧也。

產後積聚候

積者陰氣。五臟所生。聚者陽氣。六腑所成。皆由飲食失節。冷熱不調。致五臟之氣積。六腑之氣聚。積者痛不離其部。聚者其痛無有常處。所以然者。積爲陰氣。陰性

沉伏。故痛不離其部。聚爲陽氣。陽性浮動。故痛無常處。產婦血氣傷損。腑臟虛弱。爲風冷所乘。搏於臟腑。與氣血相結。故成積聚也。

產後癥候

癥病之候。腹內塊按之牢強。推之不移動是也。產後而有癥者。由臟虛餘血不盡。爲風冷所乘。血則凝結而成癥也。

產後癖候

癖病之狀。脅下弦急刺痛是也。皆由飲食冷熱不調。停積不消所成。產後臟虛。爲風冷搏于停飲結聚。故成癖也。

產後內極七病候

產後血氣傷竭。爲內極七病。則舊方所云七害也。一者害食。二者害氣。三者害冷。四者害勞。五者害房。六者害任。七者害睡。皆產時傷動血氣。其後虛極未平復。犯

此七條而生諸病。凡產後氣血內極。其人羸疲萎黃。冷則心腹絞痛。熱則肢體煩疼。經血否澀變爲積聚癥瘕也。

產後目瞑候

目不痛不腫。但視物不明。謂之目瞑。肝藏血。候應于目。產則血虛。肝氣不足。故目瞑也。

產後耳聾候

腎氣通耳。而婦人以腎繫胞。因產血氣傷損。則腎氣虛。其經爲風邪所乘。故令耳聾也。

產後虛熱口生瘡候

產後口生瘡者。心藏虛熱。心開竅於口。而主血脈。產則血氣虛。臟有客熱。氣上腫胸膈重發於口。故生瘡也。

產後身生瘡候

也。產則血氣傷損。腠理虛。爲風所乘。風邪與血氣相搏。臟腑生熱。熏發肌膚。故生瘡也。

產後乳無汁候

婦人手太陽少陰之脈。下爲月水。上爲乳汁。妊娠之人。月水不通。初以養胎。既產則水血俱下。津液暴竭。經血不足者。故無乳汁也。

產後乳汁溢候

婦人手太陰少陰之脈。上爲乳汁。其產雖血水俱下。其經血盛者。則津液有餘。故乳汁多而溢出也。

巢氏諸病源候總論 卷四十四 婦人產後病諸候下

巢氏諸病源候總論

隋 太醫博士巢元方撰

鄞縣曹赤電炳章圈點

卷四十五

小兒雜病諸候一 凡二十九論

養小兒候

經說年六歲已上爲小兒。十八已上爲少年。二十已上爲壯年。五十已上爲老年也。其六歲已還者。經所不載。是以乳下嬰兒。病難治者。皆無所承按故也。中古有巫方立小兒顛顛經以占夭壽。判疾病死生。世所相傳。有小兒方焉。逮乎晉宋。推諸蘇家傳。襲有驗。流於人間。小兒始生。肌膚未成。不可暖衣。暖衣則令筋骨緩弱。宜時見風日。若都不見風日。則令肌膚脆軟。便易傷損。皆當以故絮著衣。莫用新

綿也。天和暖無風之時。令母將抱日中嬉戲。數見風日。則血凝氣剛。肌肉硬密。堪耐風寒。不致疾病。若常藏在幃帳之內。重衣溫暖。譬如陰地之草木。不見風日。軟脆不任風寒。又當薄衣。薄衣之法。當從秋習之。不可以春夏卒減其衣。則令中風寒。從秋習之。以漸稍寒。如此則必耐寒。冬月但當著兩薄襦。一複裳耳。非不忍見其寒。適當佳耳。愛而暖之。適所以害也。又當消息。無令汗出。汗出則致虛損。便受風寒。晝夜寤寢。皆當慎之。其飲乳食哺。不能無疲癖。常當節適。乳哺若微不進。仍當將護之。凡不能進乳哺。則宜下之。如此則終不致寒熱也。又小兒始生。生氣尙盛。無有虛勞。微惡則須下之。所損不足言。及其愈病。則致深益。若不時下。則成大疾。疾成則難治矣。其冬月下之難將護。然有疾者。不可不下。夏月下之後。腹中常當小脹滿。故當節哺。乳將護之數日間。又節哺之。當令多少有常劑。兒稍大食哺。亦當稍增。若減少者。此是腹中已有小不調也。便當微將藥。勿復哺之。但當乳之。甚者十許日。輕者五六日。自當如常。若都不肯食哺。而但飲乳者。此是有癖。爲疾重要當下之。不可不下。不下則致寒熱。或吐而發熱。或致下利。此皆病重不早下之所爲也。則難治。先治其輕時。兒不耗損而病速除矣。小兒所以少病癘者。其母

懷娠時。時勞役運動骨血。則氣強胎養盛。故也。若侍御多。血氣微。胎養弱。則兒軟脆。易傷。故多病。癩兒。皆須著帽。項衣。取燥菊花爲枕。枕之。兒母乳兒。三時摸兒項風池。若壯熱者。卽須熨使微汗。微汗不瘥。便灸兩風池。及背第三椎。第五椎。第七椎。第九椎。兩邊各二壯。與風池。凡爲十壯。一歲兒七壯。兒大者。以意節度。增壯數。可至三十壯。惟風池。特令多。七歲已上。可百壯。小兒常須慎護風池。諺云。戒養小兒。慎護風池。風池在頸項筋兩轅之邊。有病乃治之。疾微。慎不欲妄針灸。亦不用輒吐下。所以然者。針灸傷經絡。吐下動腑臟。故也。但當以除熱湯浴之。除熱散粉之。除熱赤膏摩之。又以臍中膏塗之。令兒在涼處。勿禁水洗。常以新水洗。新生無疾。慎不可逆針灸。逆針灸。則忍痛動經脈。因喜成癩。河洛間土地多寒。兒喜病瘳。其俗生兒三日。喜逆灸以防之。又灸頰以防噤。凡噤者。舌下脈急。牙車筋急。其土地寒。皆決舌下去血。灸頰以防噤。江東地溫。無此疾。古方旣傳有逆針灸之法。今人不詳。南北之殊。便按方用之。多害於小兒。是以田舍小兒。任自然。皆得無橫夭。又云。春夏決定不得下。小兒所以爾者。小兒腑臟之氣軟弱。易虛。易實。下則下焦必益虛。上焦生熱。熱則增痰。痰則成病。自非當病不可下也。

變蒸蒸候

小兒變蒸者。以長血氣也。變者上氣。蒸者體熱。變蒸有輕重。其輕者體微而熱驚耳。冷體亦冷。上唇頭白泡起。如死魚目珠子。微汗出。而近者五日而歇。遠者八九日乃歇。其重者體壯熱而脈亂。或汗或不汗。不欲食。食輒吐。無所苦也。變蒸之時。目白睛微赤。黑睛微白。亦無所苦。蒸畢自明了矣。先變五日。後蒸五日。爲十日之中熱。乃除。變蒸之時。不欲驚動。勿令傍邊多人。變蒸或早或晚。依時如法者少也。初變之時。或熱甚者。連日數不歇。審計日數。必是變蒸。服黑散發汗。熱不止者。服紫雙丸。小瘥便止。勿復服之。其變蒸之時。遇寒加之。則寒熱交爭。腹痛夭矯。啼不止者。熨之則愈。變蒸與溫壯傷寒相似。若非變蒸。身熱耳熱。體亦熱。此乃爲他病。可爲餘治。審是變蒸。不得爲餘治。其變日數。從初生至三十二日一變。六十四日再變。變且蒸。九十六日三變。變者丹孔出而泄也。至一百二十八日四變。變且蒸。一百六十日五變。一百九十二日六變。變且蒸。二百二十四日七變。二百五十六日八變。變且蒸。二百八十八日九變。三百二十日十變。變且蒸。積三百三十日。

小蒸畢後六十四日。大蒸後百二十八日復蒸。積五百七十六日。大小蒸畢也。

溫壯候

小兒溫壯者。由腑臟不調。內有伏熱。或挾宿寒。皆搏於胃氣。足陽明爲胃之經。主身之肌肉。其胃不和調。則氣行壅澀。故蘊積體熱。名爲溫壯候。小兒大便。其糞黃而臭。此腹內有伏熱。宜將服龍鬚湯。若糞白而酢臭。則挾宿寒不消。當服紫雙丸。輕者少服藥。令默除之。甚者小增藥。令微利。皆當節乳哺數日。令胃氣和調。若不節乳哺。則病易復。復則傷其胃氣。令腹滿。再三利尙可。過此則傷小兒矣。

壯熱候

小兒壯熱者。是小兒血氣盛。五臟生熱。熏發于外。故令身體壯熱。大體與溫壯相似。而有小異。或挾伏熱。或挾宿寒。其挾伏熱者。大便黃而臭。挾宿寒者。糞白而有酸氣。此二者。府藏不調。冷熱之氣。俱乘腸胃。蘊積染漸。而發溫溫。然熱不甚。是溫壯也。其壯熱者。是血氣盛。熏發於外。其發無漸。壯熱甚。以此爲異。若壯熱不歇。

則變爲驚。極重者亦變癇也。

驚候

小兒驚者。由血氣不和。熱實在內。心神不定。所以發驚。甚者掣縮。變成癇。又小兒變蒸亦微驚。所以然者。亦由熱氣所爲。但須微發驚。以長血脈。不欲大驚。大驚乃灸驚脈。若五六十日灸者。驚復更甚。生百日後灸驚脈乃善耳。

欲發癇候

夫小兒未發癇。欲發之候。或溫壯連滯。或搖頭弄舌。或睡裏驚掣。數齧齒。如此是欲發癇之證也。

癇候

癇者小兒病也。十歲已上爲癲。十歲已下爲癇。其發之狀。或口眼相引而目睛上搖。或手足掣縱。或背脊強直。或頸項反折。諸方說癲名證不同。大體其發之源。皆

因三種。三種者。風癩。驚癩。食癩是也。風癩者。因衣厚汗出而風入爲之。驚癩者。因驚怖大啼乃發。食癩者。因乳哺不節所成。然小兒氣血微弱。易爲傷動。因此三種。變作諸癩。凡諸癩正發。手足掣縮。慎勿捉持之。捉則令曲突不隨也。

發癩瘥後身體頭面悉腫滿候

凡癩發之狀。或口眼相引。或目睛上搖。或手足掣縱。或背脊強直。或頭項反折。或屈指如數。皆由以兒當風取涼。乳哺失節之所爲也。其癩瘥後而腫滿者。是風癩。風癩因小兒厚衣汗出。因風取涼而得之。初發之狀。屈指如數。然後掣縮是也。其癩雖瘥。氣血尙虛而熱未盡。在皮膚與氣相搏。致令氣不宣泄。故停并成腫也。

發癩瘥後六七十歲不能語候

凡癩發之狀。口眼相引。或目睛上搖。或手足痠痠。或脊背強直。或頭項反折。或屈指如數。皆由以兒當風取涼。乳哺失節所爲也。而癩發瘥後。不能語者。是風癩。風癩因兒衣厚汗出。以兒乘風取涼太過。爲風所傷得之。其初發之狀。屈指如數。然

後發瘕瘕是也。心之聲爲言。開竅于口。其癇發雖止。風冷之氣猶滯心之絡脈。使心氣不和。其聲不發。故不能言也。

驚癇候

驚癇者。起於驚怖大啼。精神傷動。氣脈不定。因驚而發。作成癇也。初覺兒欲驚。急持抱之。驚自止。故養小兒常慎驚。勿聞大聲。每持抱之間。常當安徐。勿令怖。又雷鳴時常塞兒耳。并作餘細聲以亂之。驚癇當按圖灸之。摩膏不可大下。何者。驚癇心氣不定。下之內虛。則甚難治。凡諸癇正發。手足掣縮。慎不可捉持之。捉之則令曲突不隨也。

風癇候

風癇者。由乳養失理。血氣不和。風邪所中。或衣厚汗出。腠理開。風因而入。初得之時。先屈指如數。乃發掣縮是也。當與純心湯。又病先身熱瘕瘕。驚啼喚而後發癇。脈浮者爲陽癇。內在六府。外在肌膚。猶易治。病先身冷。不驚瘕。不啼喚。乃成病發。

時脈沉者爲陰癇。內在五藏。外在骨髓。極者難治。病發時身軟。時醒者。謂之癇。身強直反張如尸。不時醒者。謂之瘳。診其心脈滿大。癇瘳筋攣。肝脈小急。亦癇瘳筋攣。尺寸脈俱浮。直上直下。此爲督脈。腰背強直。不得俛仰。小兒風癇。三部脈緊急。癇可治。小兒脈多似雀鬪。要以三部脈爲主。若緊者必風癇。凡諸癇發手足掣縮。慎勿持之。捉則令曲突不隨也。

患癇瘳後更發候

癇發之狀。或口眼相引。目睛上搖。或手足瘳瘳。或背脊強直。或頭項反折。或屈指如數。皆由當風取涼。乳哺失節之所爲。其瘳之後而更發者。是餘勢未盡。小兒血氣軟弱。或因乳食不節。或風冷不調。或受驚動。因而重發。如此者。多成常瘳。凡諸癇正發。手足掣縮。慎勿持之。捉則令曲突不隨也。

傷寒候

傷寒者。冬時嚴寒。而人觸冒之。寒氣入腠理。搏于血氣。則發寒熱。頭痛體疼。謂之

傷寒。又春時應暖而反寒。此非其時有其氣。傷人卽發病。謂之時行傷寒者。小兒不能觸冒寒氣。而病傷寒者。多由大人解脫之時久。故令寒氣傷之。是以小兒亦病之。診其脈來一投而止者。便是得病一日。假令六投而止者。便是得病六日。其脈來洪者易治。細微者難治也。

傷寒解肌發汗候

傷寒是寒氣客于皮膚。寒從外搏於血氣。腠理閉密。冷氣在內。不得外泄。蘊積。故頭痛壯熱體疼。所以須解其肌膚。令腠理開。津液爲汗。發泄其氣。則熱歇。凡傷寒無間長幼男女。於春夏宜發汗。又脈浮大宜發汗。所以然者。病在表故也。

傷寒挾實壯熱候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。故頭痛體疼而壯熱。其人本藏氣實者。則寒氣與實氣相搏。而壯熱者。謂之挾實。實者有二種。有冷有熱。其熱實糞黃而臭。其冷實食不消。糞白而酸氣。此候知之。其內雖有冷熱。

之殊。外皮膚皆壯熱也。

傷寒兼驚候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。使腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。故頭疼體痛。而壯熱也。其兼驚者。是熱乘心。心主血脈。小兒血氣軟弱。心神易動。爲熱所乘。故發驚。驚不止。則變驚癇也。

傷寒大小便不通候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。使腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。故頭痛體疼。而壯熱。其大便不通。是寒搏於氣而生熱。熱流入大小腸。故澀結不通。凡大小便不通。則內熱不歇。或乾嘔。或言語而氣還逆上。則心腹脹滿也。

傷寒腹滿候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。使腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。故頭痛體疼。

而壯熱。其腹滿者。是熱入腹。傳於藏。藏氣結聚。故令腹滿。若挾毒者。則腹滿。心煩。懊悶。多死。

傷寒咽喉痛候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。使腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。故頭痛體疼。而壯熱。其咽喉痛者。是心胸熱盛。氣上衝於咽喉。故令痛。若挾毒則喉痛結腫。水漿不入。毒還入心。煩悶者死。

傷寒嗽候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。使腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。故頭痛體疼。而壯熱。其嗽者。邪在肺。肺候身之皮毛。而主氣。傷寒邪氣先客皮膚。隨氣入肺。故令嗽。重者有膿血也。

傷寒後嗽候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。使腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。故頭痛壯熱。體疼也。瘥後而猶嗽者。是邪氣猶停在肺未盡也。寒之傷人。先客皮毛。皮毛肺之候。肺主氣。寒搏肺。氣入五藏六府。故表裏俱熱。熱退之後。肺尚未和。邪猶未盡。邪隨氣入肺。與肺氣相搏。故傷寒後猶病嗽也。

傷寒汗出候

傷寒者。是寒氣客於皮膚。搏於血氣。使腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。故頭痛體疼。壯熱也。而汗出者。陽虛受邪。邪搏於氣。故發熱。陰氣又虛。邪又乘於陰。陰陽俱虛。不能制其津液。所以傷寒而汗出也。

傷寒餘熱往來候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。使頭痛體疼。而壯熱也。其餘熱往來者。是邪氣與正氣交爭。正氣勝則邪氣卻散。故寒熱俱歇。若邪氣未盡者。時干于正氣。正氣為邪氣所干。則壅否還熱。故餘熱往來不已也。

傷寒已得下後熱不除候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。使腠理閉密。不得宣泄。蘊積生熱。故頭痛體疼。而壯熱也。若四五日後。熱歸入裏。則宜下之。得利後熱猶不除者。餘熱未盡。故其狀肉常溫溫而熱也。

傷寒嘔候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。故頭痛體疼。而壯熱。其嘔者。是胃氣虛熱乘虛入胃。胃得熱則氣逆。故嘔也。

傷寒熱渴候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。故頭痛體疼。而壯熱。其渴者。是熱入臟。臟得熱則津液竭燥。故令渴也。

傷寒口內生瘡候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。腠理閉密。氣不宣泄。蘊積生熱。故頭痛體疼而壯熱。其口生瘡。熱毒氣在臟。上衝胸膈。氣發於口。故生瘡也。

傷寒鼻衄候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。腠理閉密。氣不得宣泄。蘊積毒氣。故頭痛體疼而壯熱。其鼻衄是熱搏於氣而乘於血也。肺候身之皮毛。其氣開竅於鼻。寒先客於皮膚。搏於氣而成熱。熱乘於血。血得熱而妄行。發從鼻出者。名鼻衄也。凡候熱病而應衄者。其人壯熱。煩發汗不止。或未及發汗而鼻燥喘息。鼻氣鳴即衄。凡衄小兒止一升或數合。則熱因之爲減。若一升二升者死。

傷寒後下利候

傷寒是寒氣客於皮膚。搏於血氣。使腠理閉密。氣不宣泄。蘊積毒氣。頭痛體疼而壯熱也。其熱歇後而利者。是熱從表入裏故也。表熱雖得解。而裏熱猶停。腸胃與水穀相并。腸胃虛則泄利。其狀利色黃。若壯熱不止。則變爲血利。若重遇冷。則冷

熱相加。則變赤白瀉利也。

巢氏諸病源候總論

隋 太醫博士巢元方撰

鄞縣曹赤電炳章圈點

卷四十六

小兒雜病諸候 一凡三十四論

時氣病候

時氣病者。是四時之間。忽有非節之氣。如春時應暖而寒。夏時應熱而冷。秋時應涼而熱。冬時應寒而溫。其氣傷人爲病。亦頭痛壯熱。大體與傷寒相似。無問長幼。其病形證略同。言此時通行此氣。故名時氣。亦呼爲天行。

天行病發黃候

四時之間。忽有非節之氣傷人。謂之天行。大體似傷寒。亦頭痛壯熱。其熱入於脾胃。停滯則發黃也。脾與胃合。俱象土。其色黃。而候於肌肉。熱氣蘊積。其色蒸發於外。故發黃也。

時氣腹滿候

時氣之病。是四時之間。忽有非節之氣傷人。其病狀似傷寒。亦頭痛壯熱也。而腹滿者。是熱入腹。與臟氣相搏。氣否澀在內。故令腹滿。若毒而滿者。毒氣乘心。煩懊者死。

時氣結熱候

時氣之病。是四時之間。忽有非節之氣傷人。其病狀似傷寒。亦頭痛壯熱。熱入腹內。與腑臟之氣相結。謂之結熱。熱則大小腸否澀。大小便難。而苦煩熱是也。

敗時氣病候

時氣之病。是四時之間。忽有非節之氣傷人。其病狀似傷寒。亦頭痛壯熱。若施治早晚失時。投藥不與病相會。致令病連滯不已。乍瘥乍劇。或寒或熱。敗壞之證。無常是也。

時氣病兼瘧候

時氣之病。是四時之間。忽有非節之氣傷人。其病狀似傷寒。亦頭痛壯熱。而又兼瘧者。是日數未滿。本常壯熱而邪不退。或乘於陰。或乘於陽。其乘於陽。陽爭則熱。其乘於陰。陰爭則寒。陰陽之氣。為邪所并。互相乘加。故發寒熱成瘧也。

時氣病得吐下後猶熱候

時氣之病。是四時之間。忽有非節之氣傷人。其病似傷寒。亦頭痛壯熱。而得吐下之後。壯熱猶不歇者。是腸胃宿虛。而又吐利。則為重虛。其熱乘虛而入裏。則表裏俱熱。停滯不歇。故雖吐下而猶熱也。

時氣病後不嗜食面青候

時氣之病。是四時之間。忽有非節之氣傷人。客於肌膚。與血氣相搏。故頭痛壯熱。熱歇之後。不嗜食而面青者。是胃內餘熱未盡。氣滿故不嗜食也。諸陽之氣俱上榮於面。陽虛未復。本帶風邪。風邪挾冷。冷搏於血氣。故令面青也。

時氣病發復候

時氣之病發復者。是四時之間。忽有非節之氣傷人。客於肌膚。搏於血氣。蘊積則變壯熱頭痛。熱退之後。氣血未和。腑臟熱勢未盡。或起早勞動。或飲食不節。故其病重發。謂之復也。然發復多重於初病者。血氣已虛。重傷故也。

溫病候

溫病者。是冬時嚴寒。人有觸冒之。寒氣入肌肉。當時不即發。至春得暖氣而發。則頭痛壯熱。謂之溫病。又冬時應寒而反暖。其氣傷人即發。亦使人頭痛壯熱。謂之冬溫病。凡邪之傷人。皆由觸冒。所以感之。小兒雖不能觸冒。其乳母抱持解脫。不避風邪。冷熱之氣。所以感病也。

溫病下利候

溫病是冬時嚴寒。人有觸冒之。寒氣入肌肉。當時不即發。至春成病。得暖氣而發。則頭痛壯熱。謂之溫病。又冬時應寒而反溫。其氣傷人。即發成病。使人頭痛壯熱。謂之冬溫病也。其下利者。是腸胃宿虛。而感於溫熱之病。熱氣入於腸胃。與水穀相搏。腸虛則泄。故下利也。

溫上病鼻衄候

溫病者。是冬時嚴寒。人有觸冒之。寒氣入肌肉。當時不即發。至春得暖氣而發。則頭痛壯熱。謂之溫病。又冬時應寒而反溫。其氣傷人。即發成病。謂之冬溫病。並皆頭痛壯熱。其鼻衄者。熱乘於氣而入血也。肺候身之皮毛。主於氣。開竅於鼻。溫病則邪先客皮膚。而搏於氣。結聚成熱。熱乘於血。血得熱則流散。發從鼻出者為衄也。凡候熱病鼻欲衄。其數發汗。汗不出。或初染病已來。都不汗而鼻燥。喘息鼻氣有聲。如此者必衄也。小兒衄止。至一升數合。熱因得歇。若至一斗數升。則死矣。

溫病胸結候

溫病是冬時嚴寒。人有觸冒之。寒氣入肌肉。當時不即發。至春得暖氣而發。則頭痛壯熱。謂之溫病。又冬時應寒而反溫。其氣傷人。即發成病。謂之冬溫病。並皆頭痛壯熱。凡溫熱之病。四五日之後。熱入裏。內熱腹滿者。宜下之。若熱未入裏而下之。早者。裏虛氣逆。熱結胸上。則胸否滿短氣。謂之結胸也。

患斑毒立病候

斑毒之病。是熱氣入胃。而胃主肌肉。其熱挾毒。蘊積於胃。毒氣熏發於肌肉。狀如蚊蚤所嚙。赤斑起周匝徧體。此病或是傷寒。或時氣。或溫病。皆由熱不時歇。故熱入胃變成毒。及發斑也。凡發赤斑者。十生一死。黑者十死一生。

黃病候

黃病者。是熱入脾胃。熱氣蘊積。與穀氣相搏。蒸發於外。故皮膚悉黃。眼亦黃。脾與

胃合俱象土。候肌肉。其色黃。故脾胃內熱。積蒸發。令肌膚黃。此或是傷寒。或時行。或溫病。皆由熱不時解。所以入胃也。凡發黃而下利。心腹滿者死。診其脈沈細者死。又有百日半歲小兒。非關傷寒溫病。而身微黃者。亦是胃熱。慎不可灸也。灸之則熱甚。此是將息過度所爲。微薄其衣。數與除熱粉散粉之自歇。不得妄與湯藥及灸也。

黃疸病候

黃疸之病。由脾胃氣實。而外有溫氣乘之。變生熱。脾與胃合。候肌肉。俱象土。其色黃。胃爲水穀之海。熱搏水穀。氣蘊積成黃。蒸發於外。身疼。臍背強。大小便澁。皮膚面目齒爪皆黃。小便如屋塵色。著物皆黃是也。小便宣利者易治。若心腹滿。小便澁者。多難治也。不渴者易治。渴者難治。脈沈細而腹滿者死也。

胎疸候

小兒在胎。其母臟氣有熱。熏蒸於胎。至生下小兒。體皆黃。謂之胎疸也。

瘡疔病候

瘡病者。由夏傷於暑。客於皮膚。至秋因勞動血氣。腠理虛而邪乘之。動前暑熱。正邪相擊。陰陽交爭。陽盛則熱。陰盛則寒。陰陽更盛更虛。故發寒熱。陰陽相離。則寒熱俱歇。若邪動氣至。交爭復發。故瘡休作有時。其發時節漸晏者。此由邪客於風府。邪循膂而下。衛氣一日一夜常大會於風府。其明日日下一節。故其作日晏。其發早者。衛氣之行風府。日下一節。二十一日下至尾骶。二十二日入脊內。上注於伏衝之脈。其行九日。出於缺盆之內。其氣日上。故其病發更早。其間日發者。由邪氣內薄五臟。橫連募原。其道遠。其氣深。其行遲。不能日作。故間日蓄積乃發也。小兒未能觸冒於暑。而亦病瘡者。是乳母抱持解脫不避風者也。

瘡後餘熱候

夫風邪所傷。是客於皮膚。而痰飲漬於臟腑。致令血氣不和。陰陽交爭。若真氣勝。則邪氣退。邪氣未盡。故發瘡也。邪氣雖退。氣血尙虛。邪氣干於真氣。臟腑壅否。熱

氣未散。故餘熱往來也。

患瘧後脇內結硬候

瘧是夏傷於暑熱。客於皮膚。至秋復爲風邪所折。陰陽交爭。故發寒熱。其病正發寒熱交爭之時。熱氣乘臟。臟則燥而渴。渴而引飲。飲停成癖。結於脇下。故瘧後脇內結硬也。

瘧後內熱渴引飲候

瘧病者。是夏傷於暑熱。客於皮膚。至秋復爲風邪所折。陰陽交爭。故發寒熱成瘧。凡瘧發欲解則汗。汗則津液減耗。又熱乘於臟。臟虛燥。其瘧瘥之後。臟腑未和。津液未復。故內猶熱。渴而引飲也。若引飲不止。小便澀者。則變成癖也。

寒熱往來候

風邪外客於皮膚。內而痰飲漬於腑臟。致令血氣不和。陰陽更相乘剋。陽勝則熱。

陰勝則寒。陰陽之氣。爲邪所乘。邪與正相干。陰陽交爭。時發時止。則寒熱往來也。

寒熱往來五臟煩滿候

風邪外客於皮膚內。而痰飲漬於腑臟。致令血氣不和。陰陽交爭。故寒熱往來。而熱乘五臟。氣積不泄。故寒熱往來。而五臟煩滿。

寒熱往來腹痛候

風邪外客於皮膚內。而痰飲漬於腑臟。血氣不和。則陰陽交爭。故寒熱往來。而臟虛本挾宿寒。邪入於臟。與寒相搏。而擊於臟氣。故寒熱往來而腹痛也。

寒熱結實候

外爲風邪客於皮膚內。而痰飲漬於腑臟。使血氣不和。陰陽交爭。則發寒熱。而臟氣本實。復爲寒熱所乘。則積氣在內。使人胸脇心腹煩熱而滿。大便苦難。小便赤澁。是爲寒熱結實。

寒熱往來食不消候

風邪外客於皮膚。內有痰飲瀆於腑臟。使血氣不和。陰陽交爭。則寒熱往來。其脾胃之氣。宿挾虛冷。表雖寒熱。而內冷發動。故食不消也。

寒熱往來能食不生肌肉候

風邪外客於皮膚。內而痰飲瀆於腑臟。使血氣不和。陰陽交爭。故發寒熱往來。胃氣挾熱。熱則消穀。穀消則引食。陰陽交爭。爲血氣不和。血氣不和。則不能充養身體。故寒熱往來。雖能食而不生肌肉也。

胃中有熱候

小兒血氣俱盛者。則腑臟皆實。故胃中生熱。其狀大便則黃。四肢溫壯。翕然體熱。

熱煩候

小兒臟腑實。血氣盛者。表裏俱熱。則苦煩躁不安。皮膚壯熱也。

熱渴候

小兒血氣盛者。則臟腑生熱。熱則臟燥。故令渴。

中客忤候

小兒中客忤者。是小兒神氣軟弱。忽有非常之物。或未經識見之人觸之。與鬼神氣相忤而發病。謂之客忤也。亦名中客。又名中人。其狀吐下青黃白色。水穀解離腹痛。反倒夭矯。面變易五色。其狀似癇。但眼不上搖耳。其脈弦急數者是也。若失時不治。久則難治。若乳母飲酒過度。醉及房勞。喘後乳者最劇。能殺兒也。

爲鬼所持候

小兒神氣軟弱。精爽微羸。而神魂被鬼所持錄。其狀不覺有餘疾。直爾萎黃。多大啼喚。口氣常臭是也。

卒死候

小兒卒死者。是三虛而遇賊風。故無病倉卒而死也。三虛者。乘年之衰一也。逢月之空二也。失時之和三也。有人因此三虛。復爲賊風所傷。使陰氣偏竭於內。陽氣阻隔於外。而氣壅閉。陰陽不通。故暴絕而死也。若腑臟未竭。良久乃蘇。亦有兼挾鬼神氣者。皆有頃邪退乃生也。凡中客忤及中惡卒死。而邪氣不盡。停滯心腹。久乃發動。多變成注也。

中惡候

小兒中惡者。是鬼邪之氣。卒中於人也。無問大小。若陰陽順理。榮衛平和。神守則強。邪不干正。若精氣衰弱。則鬼毒惡氣中之。其狀先無他病。卒然心腹刺痛。悶亂欲死是也。凡中惡腹大而滿。脈緊大而浮者死。緊細而微者生。餘勢不盡。停滯臟腑之間。更發後變爲注也。

巢氏諸病源候總論 卷四十六 小兒雜病諸候二

巢氏諸病源候總論

隋 太醫博士巢元方撰

鄞縣曹赤電炳章圈點

卷四十七

小兒雜病諸候二凡四十五論

注候

注之言住也。謂其風邪氣留人身內也。人無問大小。若血氣虛衰。則陰陽失守。風邪鬼氣。因而客之。留在肌肉之間。連滯腑臟之內。或皮膚掣動。遊易無常。或心腹刺痛。或體熱皮腫。沈滯至死。死又注易傍人。故爲注也。小兒不能觸冒風邪。多因乳母解脫之時。不避溫涼暑濕。或抱持出入早晚。其神魂軟弱。而爲鬼氣所傷。故病也。

尸注候

尸注者。是五尸之中一尸注也。人無問大小。腹內皆有尸蟲。尸蟲爲性忌惡。多接引外邪。共爲患害。小兒血氣衰弱者。精神亦羸。故尸注因而爲病。其狀沈默。不知病處。或寒熱淋瀝。涉引歲月。遂至於死。死又注易傍人。故名之爲尸注也。

蠱注候

人聚蟲蛇雜類。以器皿盛之。令相噉食。餘一存者。卽名爲蠱。能變化或隨飲食入腹。食人五臟。小兒有中者。病狀與大人老子無異。則心腹刺痛。懊悶急者卽死。緩者涉歷歲月。漸深羸困。食心藏盡。利血心藏爛。乃至死。死又注易傍人。故爲蠱注也。

陰腫候

足少陰爲腎之經。其氣下通於陰。小兒有少陰之經。虛而受風邪者。邪氣衝於陰。

與血氣相搏。結則陰墮也。

腹脹候

腹脹是冷氣客於藏故也。小兒腑臟嫩弱。有風冷邪氣客之。搏於臟氣。則令腹脹。若脾虛冷。移入於胃。食則不消。若腸虛冷。氣乘之。則變下利。

霍亂候

霍亂者。陰陽清濁二氣相干。謂之氣亂。氣亂於腸胃之間。爲霍亂也。小兒腸胃嫩弱。因解脫逢風冷。乳哺不消而變吐利也。或乳母觸冒風冷。食飲生冷物。皆冷氣流入乳。令乳變敗。兒若飲之。亦成霍亂吐利。皆是觸犯腑臟。使清濁之氣相干。故霍亂也。挾風而絡實者。則身發熱。頭痛。骨疼。而復吐利。凡小兒霍亂。皆須暫斷乳。亦以藥與乳母服。令血氣調適。乳汁溫和故也。小兒吐利不止。血氣變亂。卽發驚癇也。

吐利候

吐利者。由腸虛而胃氣逆故也。小兒有解脫。而風冷入腸胃。腸胃虛則泄利。胃氣逆則嘔吐。此大體與霍亂相似。而小兒不劇悶頓。故直云吐利。亦不呼爲霍亂也。

服湯中毒氣吐下候

春夏以湯下小兒。其腸胃脆嫩。不勝藥勢。遂吐下不止。藥氣熏臟腑。乃煩懊頓乏者。謂此爲中毒。毒氣吐下也。

嘔吐逆候

兒啼未定。氣息未調。乳母忽遽以乳飲之。其氣尙逆。乳不得下。停滯胸膈。則胸滿氣急。令兒嘔逆變吐。又乳母將息取冷。冷氣入乳。乳變壞不捨除之。仍以飲兒。冷乳入腹。與胃氣相逆。則腹脹痛。氣息喘急。亦令嘔吐。又解脫換易衣裳。及洗浴露兒身體。不避風冷。風冷因客膚腠。搏血氣則冷入於胃。則腹脹痛而嘔吐也。凡如此風冷變壞之乳。非直令嘔吐。胃虛冷入於大腸。則爲利也。

噦候

小兒噦由哺乳冷。冷氣入胃。與胃氣相逆。冷折胃氣不通。則令噦也。

吐血候

小兒吐血者。是有熱氣盛而血虛。熱乘於血。血性得熱。則流散妄行。氣逆卽血隨氣上。故令吐血也。

難乳候

凡小兒初產。看產人見兒出。急以手料拭兒口。無令惡血得入兒口。則兒腹內調和。無有疾病。若料拭不及時。則惡血穢露。兒咽入腹。令心腹吞滿短氣。兒不能飲乳。謂之難乳。

又云。兒在胎之時。母取冷過度。冷氣入胞。令兒著冷。至兒生出。則喜腹痛。不肯飲乳。此則胎寒。亦名難乳也。

吐衄候

小兒吐哕者。由乳哺冷熱不調故也。兒乳哺不調。則停積胸膈。因更飲乳哺。前後相觸。氣不得宣流。故吐哕出。診其脈浮者無苦也。

百病候

小兒百病者。由將養乖節。或犯寒溫。乳哺失時。乍傷飢飽。致令血氣不理。腸胃不調。或欲發驚癇。或欲成伏熱。小兒氣血脆弱。病易動變。證候百端。若見其微證。卽便治之。使不成衆病。故謂之百病也。治之若晚。其病則成。凡諸病至於困者。汗出如珠。著身不流者死也。病如胸陷者。其口脣乾。目反張。口中氣出冷。足與頭相抵。臥不舉手足。四肢垂。其臥正直如縛狀。其掌中冷。至十日必死。不可治也。

頭身喜汗出候

小兒有血氣未實者。膚腠則疎。若厚衣溫臥。腑臟生熱。蒸發腠理。津液泄越。故令頭身喜汗也。

盜汗候

盜汗者。眠睡而汗自出也。小兒陰陽之氣嫩弱。腠理易開。若將養過溫。因睡臥陰陽氣交。津液發泄。而汗自出也。

痰候

痰者。水飲停積胸膈之間而結聚也。小兒飲乳。因冷熱不調。停積胸膈之間。結聚成痰。痰多則令兒飲乳不下。吐涎沫。變結而微壯熱也。痰實壯熱不止。則發驚癇。

胸膈有寒候

三焦不調。則寒氣獨留。膈上不通。則令兒乳哺不得消下。噫氣酸臭。胸膈否滿。甚則氣息喘急。

癥瘕癖結候

五臟不和。三焦不調。有寒冷之氣客之。則令乳哺不消化。結聚成癥瘕也。其狀按之不動。有形段者癥也。推之浮移者瘕也。其弦急牢強。或在左或在右癖也。皆由

冷氣痰水食飲結聚所成。故云癥瘕癖結也。

不吐結候

否者塞也。小兒胸膈熱實。腹內有留飲。致令榮衛否塞。腑臟之氣不宣通。其病腹內氣結脹滿。或時壯熱是也。

宿食不消候

小兒宿食不消者。脾胃冷故也。小兒乳哺。飲食取冷過度。冷氣積於脾胃。脾胃則冷。胃爲水穀之海。脾氣磨而消之。胃氣和調。則乳哺消化。若傷於冷。則宿食不消。診其三部脈沈者。乳不消也。

傷飽候

小兒食不可過飽。飽則傷脾。脾傷不能磨消於食。令小兒四肢沉重。身體苦熱。面黃腹大是也。

食不知飽候

小兒有嗜食。食已仍不知飽足。又不生肌肉。其但腹大。其大便數而多泄。亦呼爲豁泄。此腸胃不守故也。

哺露候

小兒乳哺不調。傷於脾胃。脾胃衰弱。不能飲食。血氣減損。不榮肌肉。而柴辟羸露。其腑臟之不宜。則吸呼苦熱。謂之哺露也。

大腹丁奚候

小兒丁奚病者。由哺食過度。而脾胃尙弱。不能磨消故也。哺食不消。則水穀之精減損。無以榮其氣血。致肌肉消瘠。其病腹大頸小黃瘦是也。若久不瘥。則變成穀癥。傷飽一名哺露。一名丁奚。三種大體相似。輕重立名也。

洞泄下利候

春傷於風。夏爲洞泄。小兒有春時解脫衣服。爲風冷所傷。藏在肌肉。至夏因飲食居處不調。又被風冷入於腸胃。先後重沓。爲風邪所乘。則下利也。其冷氣盛利甚爲洞泄。洞泄不止爲注下也。凡注下不止者。多變驚癇。所以然者。本挾風邪。因利臟虛。風邪乘之故也。亦變眼痛生障。下焦偏冷。熱結上焦。熏於肝故也。

利後虛羸候

腸胃虛弱。受風冷則下利。利斷之後。脾胃尙虛。穀氣猶少。不能榮血氣。故虛羸也。

赤白滯下候

小兒體本挾熱。忽爲寒所折。氣血不調。大腸虛弱者。則冷熱俱乘之。熱搏血滲腸間。其利則赤。冷搏腸津液凝。其利則白。冷熱相交。血滯相雜。腸虛者泄。故爲赤白滯下也。

赤利候

也。小兒有挾客熱。客熱入於經絡。而血得熱則流散。滲入大腸。腸虛則泄。故爲赤利也。

熱利候

也。小兒本挾虛熱。而爲風所乘。風熱俱入於大腸而利。是水穀利而色黃者。爲熱利也。

冷利候

小兒腸胃虛。或解脫遇冷。或飲食傷冷。冷氣入於腸胃而利。其色白是爲冷利也。冷甚則利青也。

冷熱利候

小兒先因飲食有冷氣在腸胃之間。而復爲熱氣所傷。而腸胃宿虛。故受於熱。冷熱相交而變下利。乍黃乍白。或水或穀。是爲冷熱利也。

卒利候

小兒卒利者。由腸胃虛暴爲冷熱之氣所傷。而爲卒利。熱則色黃赤。冷則色青白。若冷熱相交。則變爲赤白滯利也。

久利候

春傷於風。至夏爲洞泄。小兒春時解脫。爲風所傷。藏在肌肉。至夏因爲水穀利。經久連滯不瘥也。凡水穀利久。腸胃虛。易爲冷熱。得冷則變白膿。得熱則變赤血。若冷熱相加。則赤白相雜。利久則變腫滿。亦變病蠱。亦令嘔噦。皆由利久脾胃虛所爲也。

重下利候

重下利者。此是赤白滯下利而挾熱多者。熱結肛門。利不時下。而久嘔氣。謂之重下利也。

利如膏血候

此是赤利腸虛極。腸間脂與血俱下。故謂利如膏血也。

蠱毒利候

歲時寒暑不調。而有毒厲之氣。小兒解脫。爲其所傷。邪與血氣相搏。入於腸胃。毒氣蘊積。值大腸虛者。則變利血。其利狀血色。蘊瘀如雞鴨肝片。隨利下。此是毒氣盛。熱食於人臟。解如中蠱。故謂之蠱毒利也。

利兼渴候

此是水穀利津液枯竭。腑臟虛燥。則引飲。若大便快者。利斷渴則止。若小便澀。水不行於小腸。滲入腸胃。渴亦不止。利亦不斷。凡如此者。皆身體浮腫。脾氣弱。不能尅水故也。亦必眼痛生障。小兒上焦本熱。今又利下焦虛。上焦熱。氣轉盛。熱氣熏肝故也。

被魃候

小兒所以有魃病者。婦人懷娠。有惡神導其腹中。胎妬嫉而制伏他。小兒令病也。娠婦人不必悉能致魃。人時有此耳。魃之爲疾。喜微微下。寒熱有去來。毫毛髮擊擊不悅。是其證也。

驚啼候

小兒驚啼者。是於眠睡裏忽然啼而驚覺也。由風熱邪氣乘於心。則心臟生熱。精神不定。故臥不安。則驚而啼也。

夜啼候

小兒夜啼者。藏冷故也。夜陰氣盛。與冷相搏。則冷動。冷動與藏氣相并。或煩或痛。故令小兒夜啼也。然亦有犯觸禁忌。亦令兒夜啼。則可法術斷之。

軀啼候

小兒在胎時。其母將養傷於風冷。邪氣入胞。傷兒臟腑。故兒生之後。邪猶在兒腹內。邪動與正氣相搏。則腹痛。故兒軀張感氣而啼。

胎寒候

小兒在胎時。其母將養取冷過度。冷氣入胞。傷兒腸胃。故兒生之後。冷氣猶在腸胃之間。其狀兒腸胃冷。不能消乳哺。或腹脹。或時穀利。令兒顏色素肥時啼者。是胎寒故也。

腹痛候

小兒腹痛。多由冷熱不調。冷熱之氣。與臟腑相擊。故痛也。其熱而痛者。則面赤或壯熱。四肢煩。手足心熱是也。冷而痛者。面色或青或白。甚者乃至面黑。唇口爪皆青是也。

心腹痛候

小兒心腹痛者。腸胃宿挾冷。又暴爲寒氣所加。前後冷氣重沓。動與藏氣相搏。隨氣上下。衝擊心腹之間。故令心腹痛也。

巢氏諸病源候總論

隋 太醫博士巢元方撰

鄞縣曹赤電炳章圈點

卷四十八

小兒雜病諸候四凡四十六論

解顱候

解顱者。其狀小兒年大。顱應合而不合。頭縫開解是也。由腎氣不成故也。腎主骨髓。而腦爲髓海。腎氣不成。則髓腦不足。不能結成。故頭顱開解也。

囟填候

小兒囟填。由乳哺不時。飢飽不節。或熱或寒。乘於脾胃。致腑臟不調。其氣上衝所

爲也。其狀凶張如物填。其上汗出。毛髮黃而短者是也。若寒氣上衝卽牢鞣。熱氣上衝卽柔軟。又小兒脇下有積。又氣滿而體熱。熱氣乘於藏。藏氣上衝於腦。凶亦致凶填。又欬且啼而氣乘藏上衝。亦病之。啼甚久。其氣未定。因而乳之。亦令凶填。所以然者。方啼之時。陰陽氣逆上衝故也。

凶陷候

此謂凶陷下不平也。由腸內有熱。熱氣熏臟。臟熱卽渴引飲。而小便洩利者。卽腑臟血氣虛弱。不能上充髓腦。故凶陷也。

重舌候

小兒重舌者。心脾熱故也。心候於舌。而主於血。脾之絡脈。又出舌下。心火脾土二臟母子也。有熱卽血氣俱盛。其狀附舌下近舌根生。形如舌而短。故謂之重舌。

滯頤候

滯頤之病。是小兒多涎唾流出。漬於頤下。此由脾冷液多故也。脾之液爲涎。脾氣冷。不能收制其津液。故令涎流出。滯漬於頤也。

中風候

小兒血氣未定。肌膚脆弱。若將養乖宜。寒溫失度。腠理虛開。卽爲風所中也。凡中風皆從背諸臟俞入。若心中風。但得偃臥。不得傾側。汗出唇赤。若汗流者可治。急灸心俞。若唇或青或白。或黃或黑。此是心壞爲水。面目亭亭。時悚動。皆不復可治。五六日而死。若肝中風。踞坐不得低頭。若繞兩目連額上色微有青。唇色青而面黃。可治。急灸肝俞。若大青黑面。一黃一白者。是肝已傷。不可復治。數日而死。若脾中風。踞而腹滿身通黃。吐鹹汁出者可治。急灸脾俞。若手足青者。不可復治也。若腎中風。踞而腰痛。視脇左右未有黃色。如餅糒大者可治。急灸腎俞。若齒黃赤鬢髮直。面土色。不可治也。肺中風。偃臥而胸滿短氣。冒悶汗出。視目下鼻上下兩邊下行至口。色白可治。急灸肺俞。若黃爲肺已傷。化爲血。不可復治也。其人當要掇空。或自拈衣。如此數日而死。此五臟之中風也。其年長成童者。灸皆百壯。若五六

歲已下。至於嬰兒。灸者以意消息之。凡嬰兒若中於風。則的成癩癩也。

中風四肢拘攣候

小兒肌肉脆弱。易傷於風。風冷中於膚腠。入於經絡。風冷搏於筋脈。筋脈得冷卽急。故使四肢拘攣也。

中風不隨候

夫風邪中於肢卽。經於筋脈。若風挾寒氣者。卽拘急攣痛。若挾於熱。卽緩縱不隨。

白虎候

按堪輿歷遊年圖有白虎神。云太歲在卯。卽白虎在寅。準此推之。知其神所在。小兒有居處觸犯此神者。便能爲病。其狀身微熱。有時啼哭。有時身小冷。屈指如數。似風癩。但手足不痠癢耳。

卒失音不能語候

喉嚨者。氣之道路。喉厭者。音聲之門戶。有暴寒氣客於喉厭。喉厭得寒。卽不能發聲。故卒然失音也。不能語者。語聲不出。非牙關噤也。

中風口噤候

小兒中風口噤者。是風入頷頰之筋故也。手三陽之筋入結頷頰。足陽明之筋上夾於口。膚腠虛受風冷。客於諸陽之筋。筋得寒冷則攣急。故機關不利而口噤也。

中風口喎邪僻候

小兒中風口喎邪僻。是風入於頷頰之筋故也。足陽明之筋上夾於口。手三陽之脈偏急而口喎邪僻也。

中風瘳候

小兒風瘳之病。狀如癩。而背脊項頸強直。是風傷太陽之經。小兒解脫之時。臍瘡未合。爲風所傷。皆令發瘳。

羸瘦候

夫羸瘦不生肌膚。皆爲脾胃不和。不能飲食。故血氣衰弱。不能榮於肌膚。凡小兒在胎而遇寒冷。或生而挾伏熱。皆令兒不能飲食。故羸瘦也。挾熱者。卽溫壯身熱。肌肉微黃。其挾冷者。卽時時下利。唇口青皸。

虛羸候

此謂小兒經諸大病。或驚癇。或傷寒。或溫壯而服藥。或吐利發汗。病瘥之後。血氣尙虛。脾胃猶弱。不能傳化穀氣。以榮身體。故氣力虛而羸也。

嗽候

嗽者由風寒傷於肺也。肺主氣候皮毛。而俞在於背。小兒解脫。風寒傷皮毛。故因從肺俞入傷肺。肺感微寒卽嗽也。故小兒生須常暖背。夏月亦須單背襠。若背冷得嗽。月內不可治。百日內嗽者。十中一兩瘥耳。

欬逆候

欬逆由乳哺無度。因挾風冷傷於肺故也。肺主氣。爲五臟上蓋。在胸間。小兒啼氣未定。因而飲乳。乳與氣相逆。氣相引。乳射於肺。故欬而氣逆。謂之欬逆也。冷乳冷哺傷於肺。搏於肺氣。亦令欬逆也。

病氣候

肺主氣。肺氣有餘。卽喘欬上氣。若又爲風冷所加。卽氣聚於肺。令肺脹。卽胸滿氣急也。

腫滿候

小兒腫滿。由將養不調。腎脾二臟俱虛也。腎主水。其氣下通於陰。脾主土。候肌肉。而剋水。腎虛不能傳其水液。脾虛不能剋制於水。故水氣流溢於皮膚。故令腫滿。其挾水腫者。卽皮薄如熟李之狀也。若皮膚受風。風搏而氣致腫者。但虛腫如吹。

此風氣腫也。

毒腫候

毒腫是風熱溫氣搏於皮膚。使血氣澀不行。蘊積成毒。其腫赤而熱是也。

耳聾候

小兒患耳聾。是風入頭腦所爲也。手太陽之經入於耳內。頭腦有風。風邪隨氣入乘其脈。與氣相搏。風邪停積。卽令耳聾。

耳鳴候

手太陽之經脈入於耳內。小兒頭腦有風者。風入乘其脈。與氣相擊。故令耳鳴。則邪氣與正氣相擊。久卽邪氣停滯。皆成聾也。

中風掣痛候

小兒耳鳴及風掣痛。其風染而皆起於頭腦有風。其風入經脈。與氣相動而作。故令掣痛。其風染而漸至。與正氣相擊。輕者動作幾微。故但鳴也。其風暴至。正氣又盛。相擊則其動作疾急。故掣痛也。若不止。則風不散。津液壅聚。熱氣加之。則生黃汁。甚者亦有薄膿也。

聾耳候

耳宗脈之所聚。腎氣之所通。小兒腎臟盛而有熱者。熱氣上衝於耳。津液壅結。卽生膿汁。亦有因沐浴水入耳內。而不傾瀝令盡。水濕停積。搏於血氣。蘊結成熱。亦令膿汁出。皆謂之聾耳。久不瘥。卽變成聾也。

目赤痛候

肝氣通於目臟。內客熱與胸膈痰飲相搏。熏漬於肝。肝熱氣衝發於目。故令目赤痛也。甚則生翳。

眼障翳候

眼是腑臟之精華。肝之外候。而肝氣通於眼也。小兒腑臟痰熱。熏漬於肝。衝發於眼。初只熱痛。熱氣蘊積。變生障翳。熱氣輕者。止生白翳。結聚小者如黍粟。大者如麻豆。隨其輕重。輕者止生一翳。重者乃至兩三翳也。若不生翳而生白障者。是疾重極。徧覆黑睛。滿眼悉白。則失明也。其障亦有輕重。輕者黑睛邊微有白膜來侵。黑睛漸染散漫。若不急治。熱勢即重。滿目併生白障也。

日盲候

眼無障翳而不見物。謂之盲。此由小兒臟內有停飲而無熱。但有飲水積漬於肝也。目是五臟之精華。肝之外候也。肝氣通於目。爲停飲水漬。臟氣不宣和。精華不明。審故不赤痛。亦無障翳。而不見物。故名青盲也。

雀目候

人有晝而精明。至暝便不見物。謂之雀目。言如鳥雀。暝便無所見也。

緣目生瘡候

風邪客於臉背之間。與血氣相搏。挾熱卽生瘡。浸漬緣目。赤而有汁。時瘥時發。世云小兒初生之時。洗浴兒不淨。使穢露津液。浸漬眼臉。睫背。後遇風邪。發卽目赤爛生瘡。喜難瘥。瘥後還發成疹。世人謂之胎赤。

鼻衄候

小兒經脈血氣有熱。喜令鼻衄。夫血之隨氣。循行經脈。通遊腑臟。若冷熱調和。行依其常度。無有壅滯。亦不流溢也。血性得寒。卽凝澀結聚。得熱。卽流散妄行。小兒熱盛者。熱乘於血。血隨氣發溢於鼻者。謂之鼻衄。凡人血虛受熱。卽血失其常度。發溢妄行。乃至發於七竅。謂之大衄也。

鼷鼻候

鼷鼻之狀。鼻下兩邊赤。發時微有瘡而痒是也。亦名赤鼻。亦名疳鼻。然鼻是肺氣所通。肺候皮毛。其氣不和。風邪客於皮毛。次於血氣。夫邪在血氣。隨虛處而入。停之。其停於鼻兩邊。與血氣相搏成瘡者。謂之鼷鼻也。

腦鼻候

肺主氣而通於鼻。而氣爲陽。諸陽之氣上榮頭面。若氣虛受風冷。風冷客於頭腦。卽其氣不和。令氣停滯。搏於津液。膿涕結聚。卽鼻不聞香臭。謂之腦。

鼻塞候

肺氣通於鼻。而氣爲陽。諸陽之氣上榮頭面。其氣不和。受風冷。風冷邪氣入於腦。停滯鼻間。卽氣不宣和。結聚不通。故鼻塞也。

喉痺候

喉痺是風毒之氣。客於咽喉之間。與血氣相搏而結腫塞。飲粥不下。乃成膿血。若毒入心。心卽煩悶懊懣。不可堪忍。如此者死。

馬痺候

馬痺與喉痺相似。亦是風熱毒氣客於咽喉。頷頰之間。與血氣相搏。結聚腫痛。其狀從頷下腫。連頰下。應喉內腫痛塞。水漿不下。甚者膿潰。毒若攻心。則心煩懊悶。致死。

齒不生候

齒是骨之所終。而爲髓之所養也。小兒有稟氣不足者。髓卽不能充於齒骨。故齒久不生。

齒痛風齩候

手陽明足太陽之脈。並入於齒。風氣入其經脈。與血氣相搏。齒卽腫痛。濃汁出。謂之風齩。

齒根血出候

手陽明足太陽之脈。並入於齒。小兒風氣入其經脈。與血相搏。血氣虛熱。卽齒根

血出也。

數歲不能行候

小兒生自變蒸。至於能語。隨日數。血脈骨節備成。其牘骨成。即能行。骨是髓之所養。若稟生血氣不足者。即髓不充強。故其骨不即成。而數歲不能行也。

鶴節候

小兒稟生血氣不足。即肌肉不充。肢體柴瘦。骨節皆露。如鶴之脚節也。

頭髮黃候

足少陰爲腎之經。其血氣華於髮。若血氣不足。則不能潤悅於髮。故髮黃也。

頭髮不生候

足少陰爲腎之經。其華在髮。小兒有稟性少陰之血氣不足。即髮疎薄不生。亦有

因頭瘡而禿落不生者。皆由傷損其血。血氣損少。不能榮於髮也。

惛塞候

人有稟性陰陽不和。而心神惛塞者。亦有因病而精采闇鈍。皆由陰陽之氣不足。致神識不分明。

落牀損瘀候

血之在身。隨氣而行。常無停積。若因墮落損傷。卽血行失度。隨傷損之處。卽停積。若流入腹內。亦積聚不散。皆成瘀血。凡瘀血在內。顏色萎黃。氣息微喘。濇濇小寒。噲噲微熱。或時損痛也。

唇青候

小兒臟氣不和。血虛爲冷所乘。卽口唇青絕。亦有臟氣熱。唇生瘡。而風冷之氣入。瘡雖瘥之後。血色不復。故令唇青。

無辜病候

小兒面黃髮直。時壯熱。飲食不生肌膚。積經日月。遂致死者。謂之無辜。言天上有鳥名無辜。晝伏夜遊。洗浣小兒衣席。露之經宿。此鳥即飛從上過。而取此衣與小兒著。并席與小兒臥。便令兒著此病。

巢氏諸病源候總論

隋 太醫博士巢元方撰

鄞縣曹赤電炳章圈點

卷四十九

小兒雜病諸候五凡五十論

丹候

風熱毒氣客於腠理。熱毒搏於血氣。蒸發於外。其皮上熱而赤如丹之塗。故謂之丹也。若久不瘥。卽肌肉爛傷。

五色丹候

五色丹發而改變無常。或青黃白黑赤。此由風毒之熱。有盛有衰。或冷或熱。故發

爲五色丹也。

赤黑丹候

丹病本是毒熱折於血氣。蘊蒸色赤。而得有冷氣乘之。冷熱互交。更相積瘀。令色赤黑。

白丹候

丹初是熱毒挾風熱搏於血積蒸發赤也。熱輕而挾風多者。則其色微白也。

丹火候

丹火之狀。發赤如火之燒。須臾燦漿起是也。

天火丹候

丹發竟身體斑赤如火之燒。故謂之天火丹也。

伊火丹候

丹發於膀。青黑色謂之伊火丹也。

漂火丹候

丹發於臂。背穀道者。謂之漂火丹也。

骨火丹候

丹發初在臂。起正赤若黑。謂之骨火丹也。

厲火丹候

丹發初從髓下起。皆赤能移走。謂之厲火丹也。

火丹候

火丹之狀。往往如傷赤著身而日漸大者。謂之火丹也。

飛火丹候

丹著兩臂及背膝。謂之飛火丹也。

遊火丹候

丹發兩臂及背如火灸者。謂之遊火丹也。

殃火丹候

丹發兩脇及腋下髑上。謂之殃火丹也。

尿竈火丹候

丹發膝上從兩股起及臍間。走入陰頭。謂之尿竈火丹也。

風火丹候

丹初發肉黑忽腫起。謂之風火丹也。

暴火丹候

暴火丹之狀。帶黑皴色。謂之暴火丹也。

留火丹候

留火丹之狀。發一日一夜便成瘡。如棗大。正赤色。謂之留火丹也。

朱田火丹候

丹先發背起。徧身。一日一夜而成瘡。謂之朱田火丹也。

鬱火丹候

丹發從背起。謂之鬱火丹也。

神火丹候

丹發兩脛。不過一日便赤黑。謂之神火丹也。

天竈火丹候

丹發兩脛裏尻間。正赤。流陰頭赤腫血出。謂之天竈火丹也。

鬼火丹候

丹發兩臂。赤起如李子。謂之鬼火丹也。

石火丹候

丹發通身自突起。如細粟大。色青黑。謂之石火丹也。

野火丹候

丹發赤斑斑。如梅子。竟背腹。謂之野火丹也。

茱萸火丹候

丹發初從背起。徧身如細纈。謂之茱萸火丹也。

家火丹候

丹初發著兩腋下。兩膀上。名之曰家火丹也。

廢竈火丹候

丹發從足趺起。正赤者。謂之廢竈火丹也。

營火丹候

丹發如灼。在脅下正赤。初從髂起。而長上痛。是螢火丹也。

赤丹候

此謂丹之純赤色者。則是熱毒搏血氣所爲也。

風瘙隱疹候

小兒因汗解脫衣裳。風入腠理。與血氣相搏。結聚起相連成隱胗。風氣止在腠理浮淺。其勢微。故不腫不痛。但成隱胗癢痒耳。

卒腹皮青黑候

小兒因汗。腠理則開。而為風冷所乘。搏於血。隨肌肉虛處停之。則血氣沈澀。不能榮其皮膚。而風冷客於腹皮。故青黑。

藍注候

小兒為風冷乘其血脈。血得冷則結聚成核。其皮肉色如藍。乃經久不歇。世謂之藍注。

身有赤處候

小兒因汗。為風邪毒氣所傷。與血氣相搏。熱氣蒸發於外。其肉色赤面壯熱是也。

赤遊腫候

小兒有肌肉虛者。爲風毒熱氣所乘。熱毒搏於血氣。則皮膚赤而腫起。其風隨氣行遊不定。故名赤遊腫也。

大便不通候

小兒大便不通者。腑臟有熱乘於大腸故也。脾胃爲水穀之海。水穀之精華。化爲血氣。其糟粕行於大腸。若三焦五臟不調和。熱氣歸於大腸。熱實故大便燥澀不通也。

大小便不利候

小兒大小便不利者。腑臟冷熱不調。大小腸有遊氣。氣壅在大小腸。不得宣散。故大小便澀不流利也。

大小便血候

心主血脈。心臟有熱。熱乘於血。血性得熱。流散妄行。不依常度。其流滲於大小腸

者。故大小便血也。

尿血候

血性得寒則凝澀。得熱則疏散。而心主於血。小兒心臟有熱乘於血。血滲於小腸。故尿血也。

痔候

痔有牡痔、牝痔、脈痔、腸痔、血痔、酒痔。皆因勞傷過度。損動血氣所生。小兒未有虛損而患痔止。是大便有血出。腸內有結熱故也。

小便不通利候

小便不通利者。腎與膀胱熱故也。此二經爲表裏俱主水。水行於小腸。入胞爲小便。熱氣在其臟腑。水氣則澀。故小便不通利也。

大小便數候

脾與胃合。胃爲水穀之海。水穀之精化爲血氣。以行經脈。其糟粕水液行之於大小腸。若三焦平和。則三臟調適。虛實冷熱不偏。其脾胃氣弱。大小腸偏虛。下焦偏冷。不能制於水穀者。故令大小便數也。

諸淋候

小兒諸淋者。腎與膀胱熱也。膀胱與腎爲表裏。俱主水。水入小腸。下於胞。行於陰。爲小便也。腎氣下通於陰。陰水液之道路。膀胱津液之府。膀胱熱。津液內溢而流於澤。水道不通。水不上不下。停積於胞。腎氣不通於陰。腎熱其氣則澀。故令水道不利。小便淋瀝。故謂爲淋。其狀小便出少。起數。小腹急痛引臍是也。又有石淋。氣淋。熱淋。血淋。寒淋。諸淋形證。隨名具說於後章。而以一方治之者。故謂諸淋也。

石淋候

石淋者。淋而出石也。腎主水。水結則化爲石。故腎客砂石。腎爲熱所乘。熱則成淋。其狀小便莖中痛。尿不能卒出。時自痛引小腸膀胱裏急。砂石從小便道出。甚者

水道塞。痛令悶絕。

氣淋候

氣淋者。腎虛膀胱受肺之熱氣。氣在膀胱。膀胱則脹。肺主氣。氣爲熱所乘。故流入膀胱。膀胱與腎爲表裏。膀胱熱則氣壅不散。小腹氣滿。水不宣利。故小便澀成淋也。其狀膀胱小腹滿尿澀。常有餘瀝是也。亦曰氣癢。診其少陰脈數者。男子則氣淋也。

熱淋候

熱淋者。三焦有熱。氣傳於腎與膀胱。而熱氣流入於胞而成淋也。

血淋候

血淋者。是熱之甚盛者。則尿血。謂之血淋。心主血。血之行身通徧經絡。循環腑臟。其熱甚者。血卽散失其常經。溢滲入胞而成血淋矣。

寒淋候

寒淋者。其病狀先寒戰。然後尿是也。小兒取冷過度。下焦受之。冷氣入胞與正氣交爭。寒氣勝則戰寒。正氣勝則戰寒解。故得小便也。

小便數候

小便數者。膀胱與腎俱有客熱乘之故也。腎與膀胱爲表裏。俱主水。腎氣下通於陰。此二經既受客熱。則水行澀。故小便不快而起數也。

遺尿候

遺尿者。此由膀胱有冷。不能約於水故也。足太陽爲膀胱之經。足少陰爲腎之經。此二經爲表裏。腎主水。腎氣下通於陰。小便者。水液之餘也。膀胱爲津液之府。既冷氣衰弱。不能約水。故遺尿也。

巢氏諸病源候總論 卷四十九 小兒雜病諸候五

巢氏諸病源候總論

隋 太醫博士巢元方撰

鄭縣曹赤電炳章圈點

卷五十

小兒雜病諸候六凡五十一論

二蟲候

三蟲者。長蟲、赤蟲、蟯蟲。爲三蟲也。猶是九蟲之數也。長蟲、虯蟲也。長一尺。動則吐清水而心痛。貫心卽死。赤蟲狀如生肉。動則腸鳴。蟯蟲至細微。形如菜蟲也。居腸間。多則爲痔。劇則爲癩。因人瘡處以生諸癰疽癬癩癢疥齩蟲。無所不爲。此旣九蟲之內三者。而今則別立名。當以其三種偏發動成病。故謂之三蟲也。

虯蟲候

蛭蟲者。九蟲內之一蟲也。長一尺。亦有長五六寸者。或因腑臟虛弱而動。或因食甘肥而動。其動則腹中痛。發作腫聚。行來上下痛有休止。亦攻心痛。口喜吐涎。及清水。貫傷心者則死。診其脈。腹中痛。其脈法當沈弱而弦。今反脈洪而大。則是蛭蟲也。

蟯蟲候

蟯蟲者。九蟲內之一蟲也。形甚細小。如今之癆蟲狀。亦因腑臟虛弱而致發。甚者則成痔瘻疥癩也。

寸白蟲候

寸白者。九蟲內之一蟲也。長一寸而色白。形小褊。因腑臟虛弱而能發動。故云飲白酒。一云以桑樹枝貫串牛肉炙。并食生粟所作。或云食生魚後即食乳酪。亦令生之。其發動則損人精氣。腰脚疼弱。又云此蟲生長一尺。則令人死也。

脫肛候

脫肛者。肛門脫出也。肛門大腸之候。小兒患肛門脫出。多因利久腸虛冷。兼用軀氣。故肛門脫出。謂之脫肛也。

疝瘻候

瘻者。陰核氣結腫大也。小兒患此者。多因啼哭軀氣不止。動於陰氣。陰氣而擊結聚不散所成也。

差瘻候

差瘻者。陰核偏腫大。亦由啼哭軀氣擊於下所致。其偏腫者。氣偏乘虛而行。故偏結腫也。

狐臭候

人有血氣不和。腋下有如野狐之氣。謂之狐臭。而此氣能染易著於人。小兒多是乳養之人。先有此病染著小兒。

四五歲不能語候

人之五臟有五聲。心之聲爲言。小兒四五歲不能言者。由在胎之時。其母卒有驚怖。內動於兒臟。邪氣乘其心。令心氣不和。至四五歲不能言語也。

氣癭候

氣癭之狀。頸下皮寬內結突起。臄臄然。亦漸長大。氣結所成也。小兒啼未止。因以乳飲之。令氣息喘逆。不得消散。故結聚成癭也。

胸脇滿痛候

看養小兒。有失節度。而爲寒冷所傷。寒氣入腹內。乘虛停積。後因乳哺。冷熱不調。觸冒宿寒。與氣相擊不散。在於胸脇之間。故令滿痛也。

服湯藥中毒候

小兒有疹。患服湯藥。其腸胃脆嫩。不勝藥氣。便致煩毒也。故謂之中毒。

蠖蝮毒繞腰痛候

蠖蝮蟲長一寸許。身有毛。如毫毛。長五六分。脚長而甚細。多處屋壁之間。云其遊走。遇人則尿人影。隨所尿著影處。人身即應之生瘡。世病之者。多著腰瘡。初生之狀。匝匝起初結痞癰。小者如黍粟。大者如麻豆。染漸生長闊大。繞腰生膿汁成瘡也。

疣目候

人有附皮肉生。與肉色無異。如麥豆大。謂之疣子。即疣目也。亦有三數相聚生者。割破裏狀如筋而強。亦微有血。而亦復生。此多由風邪客於皮膚。血氣變化所生。故亦有藥治之瘥者。亦有法術治之瘥者。而多生於手足也。

頭瘡候

腑臟有熱。熱氣上腫於頭。而復有風濕乘之。濕熱相搏。折於血氣。而變生瘡也。

頭多疔蝨生瘡候

蝨者。按九蟲論云。蟻蟲多所變化。亦變爲蝨。而小兒頭櫛沐不時。則蝨生。滋長偏多。嚙頭遂至生瘡。瘡處蝨聚也。謂之蝨窠。然人體性自有偏多蝨者。

白禿候

白禿之候。頭上白點斑剝。初似癬。而上有白皮屑。久則生痂。癩成瘡。遂至偏頭。洗刮除其痂。頭皮瘡孔如筋。頭大。裏有膿汁出。不痛而有微痒時。其裏有蟲。甚細微難見。九蟲論亦云。是蟻蟲動作而成此瘡。乃至自小及長大不瘥。頭髮禿落。故謂之白禿也。

頭面身體諸瘡候

腑臟熱甚。熱氣衝發皮膚。而外有風濕折之。與血氣相搏。則生瘡甚壯。初亦起瘡。

癩。後乃生膿汁。隨癢隨發。或生身體。或出頭面。或身體頭面皆有也。

惡瘡候

夫人身體生瘡。皆是臟熱衝外。外有風濕相搏所生。而風濕之氣。有挾熱毒者。其瘡則痛痒腫焮。久不瘥。故名惡瘡也。

皛瘡候

小兒爲風熱毒氣所傷。客於皮膚生皛漿而潰成瘡。名爲皛瘡也。

瘰癧候

小兒身生熱瘡。必生瘰癧。其狀作結核。在皮肉間。三兩個相連累也。是風邪搏於血氣。焮結所生也。

惡核候

惡核者。是風熱毒氣與血氣相搏。結成核。生頸邊。又遇風寒所折。遂不消不潰。名爲惡核也。

漆瘡候

人無問男女大小。有稟性不耐漆者。見漆及新漆器。便着漆毒。令頭面身體腫起。隱胗色赤。生瘡痒痛是也。

癰瘡候

六腑不和。寒氣客於皮膚。寒搏於血。則壅遏不通。稽留於經絡之間。結腫而成癰。其狀腫上皮膚而澤是也。熱氣乘之。熱勝於寒。則肉血腐敗化爲膿。膿潰之後。其瘡不瘥。故曰癰瘡。

腸癰候

腸癰之狀。小腸微強而痛是也。由寒熱氣搏於腸間。血氣否結所生也。

癰候

腫結長一寸至二寸。名之爲癰。赤如癰熱痛。久則膿潰。捻膿血盡便瘥。亦是風熱之氣。客於皮膚。血氣壅結所成。凡癰癤捻膿血不盡。而瘡口便合。其惡汁在裏。雖瘥終能更發。變成漏也。

疽候

五臟不調則生疽。亦是寒氣客於皮膚。折於血氣。血氣否澀不通。結聚所成。大體與癰相似。所可爲異。其上如牛領之皮而硬是也。癰則浮淺。疽則深也。至於變敗膿潰重於癰也。傷骨爛筋。遂至於死。

疽瘡候

此疽瘡者。非癰疽也。是癘之類。世謂之癘疽。多發於指節脚脛間。相對生作細痞。瀰子。而細孔瘡裏有蟲。痒痛。搔之有黃汁出。隨瘥隨發也。

癩候

寒熱邪氣客於經絡。使血氣否澀。初生作細癩癧。或作梅李核大。或如箭乾。或圓或長者。至五六分。不過一寸。或一或兩三相連。時發寒熱。仍膿血不止。謂之漏也。是皆五臟六腑之氣不和。致血氣不足。而受寒熱邪氣。然癩者有鼠癩、螻蛄癩、蚯蚓癩、蟻螬等癩。以其於當病名處說之也。

癩候

癩者風濕搏於血氣所成。多著手足節腕間。而而然。搔之痒痛。浸淫生長。世謂之癩。以其瘡有細蟲。如癩蟲故也。

疥候

疥瘡多生手足指間。染漸生。至於身體。痒有膿汁。按九蟲論云。蟻蟲多所變化。亦變作疥。其瘡裏有細蟲甚難見。小兒多因乳養之人病疥。而染着小兒也。

癬候

癬病由風邪與血氣相搏於皮膚之間不散。變生隱軫。軫上如粟粒。大作匡郭。或邪或圓。浸淫長大。痒痛。搔之有汁。名之爲癬。小兒面上癬皮如甲錯起乾燥。謂之乳癬。言兒飲乳。乳汁漬污兒面。變生此症。仍以乳汁洗之便瘥。

赤疵候

小兒有血氣不和。肌肉變生赤色。染漸長大無定。或如錢大。或闊三數寸是也。

臍瘡候

臍瘡由初生斷臍洗浴不卽拭燥。濕氣在臍中。因解脫遇風。風濕相搏。故臍瘡久不瘥也。臍瘡不瘥。風氣入傷經脈。則變爲癩也。

蟲胞候

小兒初生。頭卽患瘡。乃至徧身。其瘡有蟲。故因名蟲胞也。

口瘡候

小兒口瘡由血氣盛。兼將養過溫。心有客熱。熏上焦令口生瘡也。

鵝口候

小兒初生。口裏白屑起。乃至舌上生瘡。如鵝口裏。世謂之鵝口。此由在胎時受穀氣盛。心脾熱氣熏發於口故也。

燕口生瘡候

此由脾胃有客熱。熱氣熏發於口。兩吻生瘡。其瘡白色。如燕子之吻。故名爲燕口瘡也。

口下黃肥瘡候

也。小兒有涎唾多者。其汁流溢浸漬於頤生瘡。黃汁出浸淫肥爛。挾熱者。瘡汁則多也。

舌上瘡候

心候於舌。若心臟有熱。則舌上生瘡也。

舌腫候

心候舌。脾之絡脈出舌下。心脾俱熱。氣發於口。故舌腫也。

噤候

小兒初生。口裏忽結聚。生於舌上。如黍粟大。令兒不能取乳。名之曰噤。此由在胎時熱入兒臟。心氣偏受熱故也。

凍爛瘡候

小兒冬月爲寒氣傷於肌膚。搏於血氣。血氣壅滯。因卽生瘡。其瘡亦焮腫而難瘥。乃至皮肉爛。謂之爲凍爛瘡也。

金瘡候

小兒爲金刃所傷。謂之金瘡。若傷於經脈。則血出不止。乃至悶頓。若傷於諸臟俞募。亦不可治。自餘腹破腸出。頭碎腦露。並不難治。其傷於肌膚。淺則成瘡。終不慮死。而金瘡得風則變瘳。

卒驚瘡候

此由金瘡未瘥。忽爲外物所觸。及大啼呼。謂爲驚瘡也。凡瘡驚則更血出也。

月食瘡候

小兒耳鼻口間生瘡。世謂之月食瘡。隨月生死。因以爲名也。世云小兒見月初生。以手指指之。則令耳下生瘡。故呼爲月食瘡也。

耳瘡候

瘡生於小兒兩耳。時瘥時發。亦有膿汁。此是風濕搏於血氣所生。世亦呼之爲月食瘡也。

浸淫瘡候

小兒五臟有熱。熏發皮膚。外爲風濕所折。濕熱相搏身體。其瘡初出甚小。後有膿汁。浸淫漸大。故謂之浸淫瘡也。

王灼惡瘡候

腑臟有熱。熱熏皮膚。外爲濕氣所乘。則變生瘡。其熱盛者。其瘡發勢亦盛。初生如麻子。須臾王大汁流潰。如湯火所灼。故名王灼瘡。

疳濕瘡候

疳濕之病。多因久利。脾胃虛弱。腸胃之間。蟲動侵蝕五臟。使人心煩惱悶。其上蝕者。則口鼻齒斷生瘡。其下蝕者。則肛門傷爛。皆難治。或因久利。或因臟熱。嗜眠。或好食甘美之食。並令蟲動。致生此病也。

陰腫成瘡候

陰腫下焦熱。熱氣衝陰。陰頭忽腫。令不得小便。乃至生瘡。俗云尿灰火所爲也。

巢氏諸病源候總論終

