

醫方類聚卷之二百三十四

婦人門 二十九

產後 五

聖惠方 三

治產後虛羸諸方

夫產後氣血虛竭藏腑勞傷若人年齒少盛  
能節慎將養滿月便得平復如產多血氣虛  
弱雖逾日月猶當疲乏或因飲食不節調適  
失宜爲風冷邪氣所侵搏於氣血流注於五



臟六腑則令肌膚不榮顏容萎瘁故曰虛羸也

治產後虛羸脾胃乏弱四肢無力全不思食心腹氣脹人參散方

人參口兩去黃耆一兩白朮半兩當歸半兩  
 炒厚朴壹兩去薑汁炙令香熟白茯苓半兩木香  
 兩芎藭半兩荳蔻壹兩白芍藥兩訶黎勒  
 皮參分桂心兩附子壹兩炮裂陳橘皮冬分  
 去白微赤甘草半兩炙高良薑參分

右件藥搗羅為散每服四錢以水壹中  
 盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不  
 計時候溫服神巧萬全方同  
 治產後虛羸短氣不能飲食宜服熟乾地黃  
 散方

熟乾地黃二人人參壹兩去芎藭參分澤蘭參分  
 續斷參分黃耆參分五味子壹兩當歸參分  
 白茯苓壹兩鹿角膠壹兩炒令黃燥白朮兩石斛  
 壹兩去附子壹兩炮裂桂心

右件藥搗羅羅為散每服三錢婦人大全良方四錢

以水壹斗蒸入生薑半分良方棗三枚良方

壹枚聖濟煎至六分去滓不計時候溫服

治產後體虛乏力四肢羸瘦不思飲食黃耆

散方

黃耆壹兩白朮兩半續斷兩半人參兩半去熟

乾地黃兩壹茯神兩半附子兩半去皮裂當歸兩半

剉微肉桂叁分去皮五味子兩半白芍藥兩半赤

石脂兩半陳橘皮兩半湯浸去白瓢焙麥門冬壹兩去

甘草壹分炙乾薑半兩炮裂剉

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壹斗

盪入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候溫服

治產後虛羸乏力短氣羊腎湯方

羊腎壹對切羊角屑兩半熟乾地黃兩壹人

參叁分去麥門冬半兩去心茯神兩半五味子兩半

桂心兩半附子兩半去皮續斷兩半黃耆兩半剉

當歸兩半剉乾薑叁分炮芎藭兩半

右件藥搗篩為散每服先以小壹大蒸半  
 煮腎至壹蒸大腎入藥五錢椒二七粒生  
 薑半分棗三枚煎至五分去滓空心溫服  
 治產後體虛羸弱不思飲食遠視無力起立  
 不得白朮散方

白朮壹兩 黃耆壹兩 五味子半兩 石斛壹兩  
剉 防風半兩 去人參叁分 去酸棗半兩 牛膝半兩 木香半兩 桂心半兩 當歸半兩 白茯苓半兩  
去苗 熟乾地黄壹兩 芎藭半兩 羚羊角屑半兩 附

子叁分 炮裂裂 甘草壹分 乾薑半兩  
去皮臍 微赤剉 裂剉 右件藥搗篩羅為散每服四錢以水壹中  
 盞入棗三枚煎至六分去滓溫服日三服  
 治產後虛羸腑臟氣乏食飲不進宜服人參  
 散方

人參壹兩 去當歸半兩 剉五味子叁分 黃耆壹兩  
剉 芎藭叁分 桂心叁分 續斷叁分 白茯苓叁分 熟  
 乾地黄壹兩 白朮半兩 麥門冬半兩 去甘草壹分  
剉 赤

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞  
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服  
日三服

治產後虛羸不思飲食多卧少起精神昏悶

續斷散方

續斷壹兩芎藭半兩防風半兩去人參去盧頭

黃耆半兩羌活半兩○聖濟白茯苓叁分熟

乾地黄壹兩○錄焙五味子半兩當歸半兩炒酸

棗人半兩甘草壹分炙赤判

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分棗三枚總錄貳煎至六分

去滓溫服日三服

治產後虛羸乏弱頭目昏悶不思飲食羚羊

角散方

羚羊角屑叁分防風半兩去盧頭附子叁分炮裂

人參叁分去盧頭白朮叁分石斛叁分去熟乾地

黃白茯苓叁分陳橘皮叁分湯浸芎藭叁

桂心叁分黃耆壹兩五味子叁分甘草壹分炙赤判

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中  
 盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓温  
 服日三服

治產後虛羸乏弱無力喘急汗出腹中疝痛

宜服羊肉當歸湯方

肥羊肉二斤當歸半兩剉白芍藥半兩附子參  
 炮裂去龜骨參熟乾地黃壹兩白朮參桂心  
 皮臍參芎藭參黃耆三分人參參蘆頭參  
 右件藥搗麤羅為散先以水五大盞煎羊

肉取汁二大盞每服川汁壹中盞入藥四

錢生薑半分棗三枚煎至六分去滓温服

日三服婦人大全良方薑參片棗壹枚煎至七分去滓温服

治產後虛羸腹痛宜服黃雌雞湯方

小黃雌雞壹隻去頭足翅當歸半兩剉白  
 木半兩桂心兩黃耆半兩熟乾地黃兩

右件藥搗篩為散先以水七升煮雞至三  
 升每服四錢以雞汁壹中盞煎至六分去

滓温服利巧萬全方同日三服

治產後虛羸四肢瘦弱不能飲食羊肉黃者湯方

羊肉五斤黃耆一兩剉白茯苓壹兩白芍藥一兩當歸壹兩

歸壹兩半續斷壹兩五味子壹兩草薢一兩桂

心壹兩熟乾地黄壹兩麥門冬壹兩半

右件藥搗麤羅為散用水壹斗煮羊肉取

汁五升每服用肉汁壹中盞藥末四錢

三枚生薑半分煎至六分去滓溫服日三

服

治產後虛羸四肢無力不思飲食黃雌雞湯方

肥黃雌雞一隻去頭足翅羽及腸洗當歸壹兩剉人參

叁分去桂心半兩甘草壹分熟乾地黄壹兩

蘆頭半兩芎藭叁分白芍藥叁分麥門冬壹兩半去心焙黃耆

一兩半剉

右件藥搗麤羅為散先以水七升煮雞取

汁三升每服用汁壹中盞入藥四錢煎至

六分去滓溫服日三服

治產婦七日後宜服補虛羸強氣力消滯血  
羊肉地黄湯方

白羊肉斤參熟乾地黄二兩當歸壹兩白芍

藥半甘草壹分人參壹兩芎藭壹兩桂心壹兩

桂心壹兩

右件藥搗瓮羅為散以水七升煮羊肉取

汁三升每服用肉汁壹中盞入藥四錢煎

至六分去滓溫服日三服

治產後虛羸不思飲食及風虛勞等卷栢丸

方

卷栢一兩麥門冬一兩澤瀉三兩熟乾地黄

一兩牛膝一兩人參壹兩黃耆壹兩丹參

三分白茯苓叁分當歸半兩芎藭半兩防風半兩

去蘆頭牡丹半兩桂心半兩五味子半兩白朮半兩

辛半兩赤石脂壹兩羌活半兩薏苡仁半兩續斷半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大每服以粥飲下三十九日三

服

婦科

七

頭

治產後虛羸寒熱四肢瘦弱不思飲食心神  
虛煩夜卧不安五石丸方

紫石英 壹兩半細研水飛過 鍾乳粉 壹兩半 白石英 壹兩

半細研 赤石脂 壹兩半細研 石膏 一兩細研 五味

子 一兩 熟乾地黄 壹兩 麥門冬 一兩半 黃耆

壹兩 白茯苓 壹兩 白朮 壹兩 當歸 一兩 人參

一兩去 甘草 半兩炙 桂心 壹兩 芎藭 壹兩

右件藥搗羅為末入研了藥都研令勻鍊  
蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以

薤白湯下三十九日三服

治產後虛羸及壹切餘疾並宜服熟乾地黄

丸方

熟乾地黄 壹兩 當歸 三分 防風 半兩 去草

薤 壹兩 黃耆 壹兩 續斷 壹兩 澤蘭 壹兩 芎藭 壹兩

五味子 三分 白朮 叁分 甘草 半兩炙 附子 壹兩

去皮 白薇 半兩 細辛 半兩 桂心 半兩 人參 半兩 去

栝子人 叁分 白茯苓 叁分

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大每服以温酒下三十九日三服

治產後虛羸乏弱宜服補益紫石英丸方

紫石英一兩細研水飛過白石英壹兩細研水飛過澤蘭

叁分木香兩附子壹兩炮裂去皮臍熟乾地黄兩芎

藟三分栢子人叁分桂心叁分防風半兩去蘆頭牛膝

叁分續斷叁分人參叁分去蘆頭白茯苓叁分羌活

兩黃耆叁分白朮叁分當歸叁分微炒甘草壹

赤微白薇叁分杜仲叁分去微黃剉乾薑半兩炮裂

制川椒半兩大目及閉口者微炒去汗

右件藥搗羅爲末入研了藥都研令勻鍊

蜜和搗五七百杵凡如梧桐子大每於空

心及晚食前以温酒下三十九

治產後虛羸血氣不調四肢瘦弱面色萎黃

飲食不進宜服補益澤蘭丸方

澤蘭兩熟乾地黄壹兩半白茯苓叁分

總錄木香叁分草薢叁分附子叁分炮裂

桂心半兩赤石脂兩牛膝壹兩

藥集

七

浸切 芎藭 半兩 人參 壹兩 去蘆頭 黃耆 壹兩 白朮 半兩 乾薑 半兩 炮 續斷 叁分 當歸 半兩 到 甘草 半兩 炙 微赤到

微赤到

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每於空心及晚食前以粥飲

下三十九

治產後虛羸瘦弱食少熟乾地黄丸方

熟乾地黄 壹兩 當歸 半兩 到 附子 壹兩 地裂 黃耆 壹兩 續斷 半兩 白朮 半兩 桂心 半兩 肉蓯蓉 壹兩 到

叁分酒浸壹宿刮人參 去分去 蘆頭 赤石脂 壹兩 去皺皮炙令乾

麥門冬 一兩 半 芎藭 叁分 白茯苓 叁分 五味子 叁分 栢子 人壹兩

分栢子人兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每於空心及晚食前以温酒下三十九

治產後風虛勞損諸方

夫產則血氣勞傷腑臟虛弱而風冷客之風冷搏於血氣血氣不能温於肌膚使人虛乏

類身言

疲頓致羸損不平復若久不平復若久不差風冷入於子藏則胞藏冷亦使無子謂之風虛勞損也

治產後風虛勞損羸瘦不思飲食四肢疼痛黃耆散方

黃耆壹兩到○婦人白朮好羚羊角屑半兩木香半兩人參半兩去蘆頭當歸半兩到桂心半兩白芍藥半兩芎藭半兩白茯苓半兩甘草一分炙右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞

人生薑半分棗三枚煎至六分片滓溫服日三服良方每服參錢木香益薑叁片治產後風虛勞損四肢煩疼夜卧不安漸加羸瘦熟乾地黃散方

熟乾地黃兩羚羊角屑兩羌活兩酸棗仁半兩半兩黃耆壹兩當歸叁分到人參叁分去微炒微炒麥門冬叁分白芍藥叁分防風半兩去蘆頭芎藭一分白茯苓叁分甘草半兩炙右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞

頁三

二

本草綱目卷之二十一  
十二

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服  
日三服

治產後風虛勞損四肢疼痛不欲飲食當歸

散方

當歸壹兩剉 白芍藥壹兩 芎藭壹兩 黃耆壹兩

防風壹兩 人參壹兩 熟乾地黃二兩 甘草二兩

草半兩炙 白茯苓一兩

右件藥搗羅為散用羊肉二斤棗二十

枚先以水五升煮至二升半每服用肉汁

壹中盞入藥四錢煎至六分去滓溫服日

三服

治產後風虛勞損身體疼痛時有煩熱不思

飲食四肢少力羌活散方

羌活叁分 赤箭叁分 防風叁分 白芷半兩 芎藭

分叁分 白芍藥半兩 羚羊角半兩 當歸半兩 牛

膝半兩 骨碎補半兩 熟乾地黃壹兩 白茯苓叁分

黃耆叁分 桂心半兩 細辛半兩

右件藥搗羅為散勿服三錢以水壹中

蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候  
溫服

治產後風虛勞損氣攻心腹四肢疼痛不思  
飲食木香散方

木香壹兩 附子壹兩 地裂壹兩 熟乾地黄壹兩 當歸壹兩  
陳橘皮壹分 易浸壹分 人參壹分 薑壹分 白  
茯苓壹分 芎藭壹分 黃耆壹分 白芍藥壹分 桂心壹分  
半白朮半兩 甘草一分 炙一分  
右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生薑半分棗三枚煎至六分婦人夫  
全良方  
姜三片棗壹  
枚煎至七分 去滓不計時候溫服  
治產後風虛勞損羸瘦四肢無力不思飲食  
人參散方

人參壹兩 去壹兩 桂心半兩 黃耆壹兩 熟乾地黄壹兩  
當歸半兩 芎藭半兩 防風半兩 去半兩 羚羊  
角一分 五味子半兩 白茯苓半兩 白朮半兩 甘草壹分 炙  
微赤判  
右件藥搗篩為散每服用獾猪腎壹對切

去脂膜生薑半分棗三枚先以水二大盞煎至壹盞去滓入藥末五錢婦人大全良方三錢煎至四分去滓食前溫服

治產後風虛勞損四肢羸弱心神虛煩不能飲食少得眠卧栝子人丸方

栝子人兩熟乾地黄壹兩防風三分去人

參叁分去蘆頭麥門冬一兩半黃耆三分當歸

半兩到續斷叁分羚羊角屑兩半白茯苓叁分澤

蘭一兩桂心兩半芍藥兩半白朮兩半酸棗人叁分微炒

紫石英壹兩細研附子叁分炮裂甘草一分

炙微赤到

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和搗三二百杵凡如梧桐子大每於空心及晚食前以溫酒下三十丸

治產後風虛勞損體瘦乏弱肢節疼痛不欲飲食黃耆丸方

黃耆一兩赤箭叁分熟乾地黄壹兩羌活叁分人

參壹兩去頭去羚羊角屑叁分五加皮叁分白茯苓

類聚

十一

壹兩防風半兩去當歸半兩到白朮叁分桂心

兩附子壹兩炮裂酸棗人半兩白鮮皮兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大不計時候以溫酒下三十九

治產後風虛勞損四肢疼痛心神虛煩不欲

飲食枸杞子丸方

枸杞子兩牛膝壹兩熟乾地黃兩漏蘆叁分

○神巧萬全方當歸叁分到微炒○酸棗

甘菊花二分人參壹兩防風三分去

萬全方二分

萬全方貳分羚羊角屑叁分○萬全方

貳分白茯苓兩黃耆壹兩羌活叁分○萬全方

門冬壹兩五加皮三分○萬全方

全方芎藭叁分○萬全方

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗參二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三

十九荆芥湯下亦得婦人大全

治產後風虛勞損腹內冷氣脚膝無力而色

萎黃飲食減少日漸羸瘦補益白微丸方

藥譜

卷之

白微兩木香兩當歸兩桂心兩澤蘭

牛膝兩熟地黃兩牡丹兩人參兩

去蘆芎藭兩厚朴兩白茯苓兩細辛兩吳茱

兩枳殼兩赤石脂兩龍骨兩禹餘糧

黃兩附子兩黃耆兩續斷

壹兩兩附子兩黃耆兩續斷

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大每於空心及晚食前以溫酒

下三十丸

治產後風虛勞損腑藏乏弱四肢羸困不思

飲食牛膝丸方

牛膝兩栢子兩白薇兩杜仲兩細辛兩

乾薑兩附子兩黃耆兩續斷

椒兩澤蘭兩厚朴兩生薑兩炙甘草兩

熟紫苑兩五味子兩草薺兩紫石英兩

歸兩五味子兩草薺兩紫石英兩

歸兩五味子兩草薺兩紫石英兩

歸兩五味子兩草薺兩紫石英兩

歸兩五味子兩草薺兩紫石英兩

藥譜

細研水 白茯苓 參 甘草 半兩炙 飛過 分 微赤剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵凡  
如梧桐子大每於空心及晚食前以溫酒  
下三十丸

治產後風虛勞損氣攻臍腹痛紫桂丸方

紫桂 壹兩半 當歸 二分剉 人參 參分去 白  
木香 半兩 羌活 兩 酸棗 人 參分 熟乾地  
黃 兩 栢子 人 兩 乾薑 半兩 炮 牡丹 壹兩 羴羊  
角 屑 兩 白芍藥 兩 白薇 兩 細辛 兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵凡  
如梧桐子大不計時候以溫酒下三十丸

治產後風虛勞損寒熱發歇血脈虛竭四肢

羸弱飲食無味白薇丸方

白薇 參分 栢子 人 兩 牡丹 參分 熟乾地 黃 兩 芍

藥 兩 羌活 兩 甘草 一分炙 肉苳蓉 參分酒 剉去 微 當歸 參分剉 黃耆 參分 人參 參分 去 蘆

皮炙乾 附子 參分剉 桂心 參分 附子 參分剉 石斛 參分去 白

茯苓 兩 白芍藥 兩 五味子 兩 白木 參分

藥 兩 芍藥 兩 五味子 兩 白木 參分

藥譜

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三五百杵丸  
如梧桐子大每於空心及晚食前以溫酒  
下三十九

治產後虛損夾風勞氣喫食減少面色萎黃  
腹內冷疼四肢乏力澤蘭丸方

澤蘭二兩黃耆二兩白朮二兩栝子二兩厚朴二兩  
二兩去鹿皮塗生赤石脂二兩白礬壹兩薑汁壹合香熟  
桂心壹兩木香壹兩人參壹兩去薑頭壹兩羌活叁分白茯苓壹兩附子壹兩去地裂壹兩芍藥壹兩芎藭壹兩川椒壹兩

一兩去目及閉常歸壹兩剉細辛壹兩陳橘  
口者微炒去汗壹兩皮半兩湯浸壹兩龜骨壹兩藁本半兩乾薑半兩炮  
右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗五七百杵丸  
如梧桐子大每於空心及晚食前以溫酒  
下三十九

治產後乳無汁下乳汁諸方

夫手太陽少陰之脉下爲月水上爲乳汁妊  
娠之人月水不通初以養胎既產則水血俱  
下津液暴竭而不足者故無乳汁也

治產後氣血虛津液少令乳無汁木通散方

木通二兩裂 菡萏根一兩 漏蘆一兩 麥門冬一兩

心半兩 薑根三分 人參半兩 赤茯苓半兩 大腹

皮一分 陳橘皮半兩 湯去白 煎湯 茅根三分 甘草

一分炙 微赤 剉

右件藥搗倉羅為散每服四錢以水壹中

盞入葱白五寸煎至六分去滓不計時候

溫服

治產後乳無汁菡萏散方

菡萏根一兩 漏蘆一兩 枳殼三分 麩一分 赤芍藥

參二分 甘草一分 神巧 萬全 方三 分 桑根白皮三分

黃芩一分 木通一分

右件藥搗倉羅為散每服四錢以水壹中

蒸煎至六分去滓不計時候溫服

又方鍾乳粉一分 消石一分 木通二分 桔梗一分

去蘆 頭

右件藥先搗後三味羅為散每服四錢

以水壹中盞入葱白七寸生薑半分煎至

頭

頭

頭

六分去滓不計時候調下鍾乳粉壹錢

治產後乳汁不下心胃妨滿漏蘆散方

漏蘆一木通壹兩半 瓜根二兩 滑石壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入葱白五寸煎至六分去滓不計時候溫

服

又方菰蘆根一兩 澤瀉一兩 麥門冬一兩 葱白一握

豬蹄四枚 木通一兩

右件藥以水三大盞煎取壹盞半去滓不

計時候分為四服

治產後乳汁不下鯽魚酒方

鯽魚一枚長五寸 豬脂貳兩 漏蘆一兩 鍾乳粉一兩

一兩

右件藥以酒三大盞煮取壹盞半去滓不

計時候分為三服

又方鼠肉貳兩 羊人次 羊肉叁兩 麋

肉四兩 良方八兩

右三味為臠食之勿令病人知立効

治產後乳汁少及不下神效方

治產後上膈壅熱乳脉不通葫蘆根散方

又方漏蘆分叁 菰蘆根一兩 木通貳兩 鱗鱒五枚

土瓜根兩壹

右件藥搗細羅爲散不計時候以温酒調

下壹錢

治產後上膈壅熱乳脉不通葫蘆根散方

葫蘆根生 白藥 漏蘆 麥門冬去心焙

兩半

右件藥搗細羅爲散不計時候以葱湯調

下二錢

治產後乳汁少及不下神效方

麥門冬去心焙 鍾乳粉半兩 理石半兩 土瓜根

半兩 花桑椹兩半 鱗鱒半兩

右件藥搗細羅爲散不計時候以温酒調

下壹錢

又方菰蘆根兩壹 鍾乳粉壹兩 漏蘆兩半 滑石兩半

木通去分

右件藥搗細羅爲散不計時候以温酒調

下一錢

類聚 卷五 三十一

又方漏蘆二兩木通二兩鍾乳粉壹兩

右件藥搗倉羅為散每服五錢以水壹大盞入黍米半合煎至五分去滓不計時候

溫服

治產後乳汁不通神效方

葵子壹分土瓜根壹兩漏蘆壹兩

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下二錢神功萬全方同

又方葡萄根末壹分萵苣子末壹分

右件藥以水壹大盞煎至七分去滓分二

服冬用根秋夏用心葉

又方王不留行 土瓜根已上各壹兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下二錢

又方猪蹄四隻葱白壹握木通二兩

右件藥以水三大盞煎取壹盞半去滓分

溫四服壹日服盡神效神功萬全方同

又方鱉蟾三枚

右以漿水壹大盞入葱白二七寸煎至八分去葱下蟻螬更煎三兩沸分溫二服

又方烏油麻

三合炒熟用湯研取汁

右件藥不計時候服壹小盞神効

又方穿山甲

塗醋炙令黃色

右搗羅爲末不計時候以溫酒調下壹錢服之○衛生易簡方治乳汁少用穿山甲五錢爲末米泔水調服

又方右以葫蘆根搗羅爲末不計時候以溫

### 酒調下二錢

#### 治吹妳諸方

夫產後吹妳者因兒喫妳之次兒忽自睡鳴氣不通乳不時洩穢積在內結成腫壅閉乳道致使津液不通腐結疼痛名曰吹妳若不急治腫甚成癰也

治吹妳因兒鼻中氣吹着妳房更遇體熱結聚或如桃李核疼痛者宜服此連翹散消之卽免作膿方

治吹妳腫硬疼痛口夜不歇穿山甲丸方

連翹壹兩 犀角屑壹兩 川大黃壹兩 升麻壹兩 木通壹兩 赤芍藥壹兩 黃耆壹兩 黃壹兩

升麻壹兩 木通壹兩 赤芍藥壹兩 黃耆壹兩 黃壹兩

芩壹兩 川芒消二兩

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞入淡竹葉二七片煎至六分去滓不計時

候溫服神功萬全方同

治吹妳及乳癰腫痛升麻散方

川升麻叁分 連翹壹兩 玄參叁分 赤芍藥叁分 甘草叁分

一分射干 兩半生乾地黃 壹分蓬麥 兩

右件藥擣麝羅為散每服四錢以水壹中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治吹妳腫硬疼痛口夜不歇穿山甲丸方

穿山甲燒 猪牙皂莢燒 王不留行 皂莢

汁炙 自然銅細 蟬殼 蛤粉 胡桃瓢

燒灰已上 各半兩

右件藥擣雜為末以車脂和丸如梧桐子大不計時候以熱酒下二十丸

治吹妳疼痛不可忍方

穿山甲一兩炙自然銅半兩細研○衛木生易簡方生用

通壹兩

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下二錢

治吹妳方

根花叁分蛤粉叁分麝香肆分

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

治吹妳疼痛不止或時寒熱露蜂房散方

露蜂房一兩鹿角一兩

右件藥並燒為灰細研不計時候以熱酒

調下二錢

又方葛布五尺

右細研為散不計時候以熱酒調下二錢

日三服

又方烏蛇二兩酒浸去皮骨炙微黃穿山甲壹兩炙

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下一錢

治吹妳癰腫疼痛寒熱發歇晝夜叫喚蛇蛻皮散方

蛇蛻皮燒灰半兩麝香壹錢

右件藥同研令細每服以熱酒調下壹錢併進三四服神効

又方葶荆子壹合炒車脂一兩

右以麵糊和丸如棗豆大不計時候以溫酒下十九

又方蛇蛻皮壹兩赤小豆一兩

右件藥擣細羅為散以雞子白和調傅之

又方桑螵蛸叁枚燒令斷煙皂莢壹寸去黑皮塗麻炙微黃去子

右件藥同擣為末用酒壹中盞煎至六分去滓溫服

又方狗糞中骨燒灰半兩麝香壹錢

右件藥同研令細不計時候以熱酒調下壹錢

治吹妳不痒不痛腫硬如石蛤粉丸方

蛤粉半兩

右用車脂和丸如小豆大每服以溫酒下  
二十九不過三服差

又方青橘皮二兩湯浸  
去白瓤焙

右搗細羅為散不計時候以溫酒調下二  
錢

又方薤骨壹兩

右細研為散每服以熱葱酒調下壹錢日  
三四服

又方右以無子皂莢刺壹斤點火燒候火著

撒蔓荆子四兩在內待物為灰即細研每  
服以熱酒調下二錢服了便按妳三二十  
下不過再服效神巧萬  
全方同

又方右以胡桃燒令煙盡去皮每壹顆胡桃  
瓢用金薄壹片同細研以熱酒調服服了  
以手漸按乳上令消如有頭即外破如無  
頭只內消日三五度服之以得效為度

又方半夏壹兩湯洗  
七遍去滑

右搗細羅為散以生薑汁壹匙和酒煖壹

小蓋調下膏錢

又方右以角蒿朮二錢醋漿水壹大盞煎至

六分放溫頓服相次服熱酒一盞即差

又方雀糞壹十枚丁香三枚

右同研如粉以熱酒調服之

治妬乳諸方

夫妬乳者山新產後兒未能飲之及飲乳不洩或乳脹捏其汁不盡皆令乳汁穢結與血氣相搏即壯熱大渴引飲牢強掣痛手不得

近是也初覺便以手助捏去汁并令傍人助啣引之不令或作瘡有膿其熱勢盛則成癰也

治產後妬乳腫痛壯熱欲結成癰宜服連翹散方

連翹兩一杏仁壹兩湯浸去皮尖川升麻壹兩

漢防已兩壹黃芩兩壹川大黃一兩兩川芎消

兩柴胡壹兩赤芍藥兩壹甘草一兩炙犀角

屑兩一

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水壹中  
盞煎至六分去滓每於食後溫服

又方麝香 薰陸香 木香 雞舌香 已上各壹兩

右件藥搗細羅爲散每於食後以溫水調  
下壹錢

又方茜苳 兩一 白飲 兩一 赤芍藥 兩一

右件藥搗羅爲細散每於食後以溫漿水  
調下二錢

又方葵子 兩壹

右件藥搗細羅爲散每於食後以溫水調  
下壹錢

治產後妬乳生瘡方

露蜂房 車轍中土 猪甲中土 已上等分

右件藥搗細羅爲散以醋調塗之

治產後兒不自飲乳及失兒無兒飲乳令乳  
積積不洩致乳上結腫者宜服此方

赤小豆 二合

右件藥搗羅為末以雞子白和塗乳上令消結也若飲兒乳不洩者數捏去之亦可令大人含冷水使為吮取乳汁此去之不令水吮有熱氣喜令乳頭作瘡治產後乳頭生小熱瘡搔之黃汁出浸滌百療不差名為妬乳者方

斛樹白皮升 剉叁

右以水壹斗煮取五升復冷用之秋冬溫用之日二度以洗乳及瘡

又方天麻草切五升

右以水壹斗煮取六升去滓微煖用洗乳以煞痒為度此草葉如麻冬生夏花如鼠尾花也亦以洗浸滌黃爛熱瘡疽濕陰蝕小兒頭瘡洗之並差

治產後妬乳乳硬欲結膿方右以鹿角於石上著水磨取白汁旋塗於上乾即又塗仍令大人吮却妳中黃汁差神巧萬全方同

治產後妬乳腫痛方右取檀香以醋濃磨塗

乳上即差

又方右以川升麻醋磨塗之

又方右以柳白皮剉搗令爛酒拌炒以物裏熨之

又方右以生地黃爛熨傳之

治產後兒枕腹痛諸方

夫兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血則破散與兒俱下則無患也若產婦藏腑風冷使血凝滯在於小腹不能流通則令結聚

疼痛名曰兒枕也

治新產兒枕上下刺痛壯熱口乾煩渴頭痛汗出或大小便不利未得便下但與生薑童子小便頻服其病亦順若風血相搏其病未愈宜服牡丹散方

牡丹半兩桃人半兩湯浸去皮尖玄參半兩黃

芩半兩芎藭半兩射干半兩赤芍藥分川大黃分

微炒蓬麥兩海藻半兩洗去鹹味蜜蟲一分炒令

足水蛭一分炒黃蠶蟪蟪微炒

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中  
盞入生薑半分薄荷三七葉煎至六分去  
滓溫服日三四服

治產後心腹不利兒枕痲木香散方

木香壹分當歸壹兩剉微炒赤芍藥兩芎藭三分桂  
心兩半

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水酒各  
半中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服  
日三四服

治產後腹中有凝血不散疔刺疼痛名為兒  
枕宜服騏驎竭散方

騏驎竭兩半當歸兩半剉微炒桂心兩半荷葉兩半川  
大黃兩半剉碎微

右件藥搗細羅為散不計時候以紅藍花  
湯調下壹錢

又方牡丹兩半水蛭壹分剉微炒當歸兩半剉微炒沒藥  
兩半川大黃兩半剉碎微炒

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下壹錢

又方益母草兩 生乾地黃兩 牛膝兩 當歸兩

一兩到 川大黃兩 碎微炒 桂心兩

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下壹錢

又方蒲黃兩 桃人兩 雙兩 湯浸片 桂心兩

川大黃兩 碎微炒 當歸兩 牡丹兩

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下壹錢

又方菴藷子兩 當歸兩 赤芍藥兩 薑黃兩

半兩 芎藭兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

治產後兒枕攻刺腹肚疼痛不止桂心散方

桂心三分 赤芍藥兩 琥珀兩 白芷兩 當歸兩

三分到 微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水壺中盪

入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計

時候温服

治產後敗血不散結聚成塊俗呼兒枕疼痛  
發歇不可忍當歸散方

當歸一兩剉 鬼箭羽一兩 紅藍花壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以酒壹中盞  
煎至六分去滓不計時候温服

治產後兒枕攻上下心腹疼痛延胡索散方

延胡索壹兩剉 桂心壹兩

右件藥搗羅為散每服三錢以童子小

便酒各半中盞入生薑半分煎至六分去  
滓不計時候温服

治產後心痛諸方

夫產後心痛者是藏虛遇風冷客之與血氣  
相搏而氣逆者上攻於心之絡則心痛比心  
痛乍歇乍甚心之支別絡為邪所傷也若邪  
傷心之正經則為真心痛朝發夕死夕發朝  
死所以然者心為諸藏之主不受邪傷邪傷  
即死也

治產後血氣上攻心痛四肢厥冷不納飲食  
熟乾地黃散方

熟乾地黃壹兩當歸三分白朮半兩甘草壹分

炙散赤芍藥兩半桂心兩半小草兩半細辛兩半芎

藟兩半吳茱萸一分湯浸七編焙乾微炒

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水壹中  
盞煎至六分去滓不計時候溫服

治產後內傷冷氣腹中及心下切痛不能飲  
食四肢無力木香散方

木香分當歸兩半青橘皮叁分湯浸甘

草半兩炙厚朴壹兩去麤皮生芎藭叁分

赤芍藥叁分白朮分高良薑兩

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水壹中  
盞煎至六分去滓不計時候稍熱服

治產後血刺連心疼痛當歸散方

當歸一兩判微炒胡椒一分蓬莪茂兩白朮分木

香兩半

右件藥擣細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

治產後敗血不散上衝心腹痛不可忍桃人散方

桃人半兩湯浸去皮尖蓬莪茂三分桂心半兩

當歸壹兩剉微炒

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

治產後血氣與冷氣相搏上攻心痛芎藭散方

芎藭兩桂心兩木香兩當歸一兩剉微炒桃人兩

青兩湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

治產後血氣攻心痛青橘皮散方

青橘皮叁分湯浸木香叁分蓬莪茂一分乾薑一分

半兩炮桃人壹兩湯浸去皮尖當歸壹兩剉微炒

桂心兩烏藥叁分紫蘇子叁分

右件藥搗細羅為散以熱酒調下二錢

治產後血氣衝心疼痛桂心散方

桂心壹兩芫花壹兩香墨二挺木香壹兩

右件藥以醞醋二升先煎芫花為膏次入

木香并墨桂和丸如梧桐子大每服以熱

酒下十九

治產後血氣衝心悶絕疼痛吳茱萸散方

吳茱萸半兩湯浸七丁香半兩熟乾地黃壹兩

當歸半兩微炒

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下三錢

又方藜蘆子壹兩當歸壹兩微炒

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

治產後心腹痛諸方

夫產後心腹痛者由產後氣血俱虛過風寒

乘之與血氣相擊隨氣上衝於心或下攻於

腹故令心腹痛若久痛不止則變成疝瘕也

治產後氣力疲乏心腹脹痛澤蘭散方

澤蘭壹兩當歸叁分到赤芍藥叁分桂心叁分白

木叁分芎藭叁分熟乾地黄兩甘草壹分炙

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治產後冷氣攻心腹疼痛四肢不和少思飲

食白朮散方

白朮叁分附子叁分炮裂叁分當歸叁分到陳橘

皮叁分湯浸叁分人參叁分去叁分桂心兩薄乾兩

去兩白兩煎兩焙兩

炮裂木香兩檳榔兩赤芍藥兩吳茱萸壹分

易壹分乾壹分炒壹分芎藭壹分厚朴壹分薑汁壹分炙壹分香熟壹分

甘草壹分微赤壹分

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍

熱服神巧萬全方同

治產後氣血不和心腹疴痛痰逆不思飲食

芍藥散方

赤芍藥壹兩川椒壹兩去壹兩皮壹兩閉壹兩半夏壹兩湯壹兩洗

七遍當歸壹兩到桂心兩草薹叁分去皮廿  
草半兩微赤判

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中  
蓋入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不  
計時候稍熱服

治產後惡血未盡攻心腹痛宜服此桃仁散  
方

桃仁一兩湯浸去尖赤芍藥一兩芎藭一兩  
雙人炒微黃當歸壹兩到乾漆二兩搗碎桂心一兩甘草一兩  
微炒令煙出

半兩天乾薑叁分炮裂判

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中  
蓋煎至六分去滓不計時候稍熱服

治產後血氣不散心腹刺痛脹滿喘促當歸  
散方

當歸叁分到鬼箭羽壹兩白朮叁分木香叁分桂  
心半兩川大黃壹兩到碎微炒

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中  
蓋入生薑半分生地黃壹分煎至五分次

入酒罇小蒸更煎三兩沸去滓稍熱服

治產後惡血未盡心腹疔痛桂心散方

桂心壹兩水蛭半兩牡丹半兩延胡索兩硫黃

半兩細研

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下壹錢

治產後心腹疔痛不可忍芫花散方

芫花一兩醋拌炒令乾硃砂半兩當歸半兩到硃

黃壹兩細研沒藥

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

治產後心腹疔刺疼痛不可忍定痛散方

當歸壹兩到赤芍藥兩芫花兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱生薑

酒調下壹錢

治產後腹中有餘血不散致心腹疔痛硃砂

丸方

硃砂壹兩細研芫花兩醋拌當歸半兩到赤

芍藥兩半 木香兩半 沒藥兩半 狗脊壹分 白芷一分

蓬莪茂兩半

右件藥搗羅爲末用醞醋壹升同熬成膏候可丸卽丸如豌豆大不計時候以當歸酒下五丸

治產後心腹有宿冷疼痛蓬莪茂丸方

蓬莪茂兩壹 五靈脂兩叁 醋壹升

右件藥搗羅爲末以醋熬爲膏候可丸卽丸如梧桐子大不計時候以藁香湯下十

丸熱酒下亦得

治產後小腹痛諸方

夫產後小腹痛者此由產時惡露下小胞絡之間有餘血與氣相擊搏令小腹痛也因重遇於冷則血結變成血瘕亦月水不利也治產後餘血不散致小腹痛疼痛不可忍雄黃散方

雄黃兩一 硃砂兩半 麝香一分 熊膽壹分 石炭兩二  
水蛭兩一 微炒

右件藥都細研為散不計時候以熱酒調下中錢

治產後惡血不盡小腹扭撮疼痛沒藥散方  
沒藥兩赤芍藥兩壹兩桂心兩壹兩當歸兩壹兩到  
白芷兩芎藭兩牡丹兩壹兩川大黃兩壹兩到  
右件藥擣細羅為散不計時候以熱酒調下二錢

治產後惡血不盡結聚小腹疼痛琥珀散方  
琥珀兩當歸兩壹兩到  
沒藥兩壹兩青橘皮兩壹兩湯浸

去白兩赤芍藥兩木香兩半兩桂心兩半兩香附子兩壹兩  
右件藥擣細羅為散不計時候以熱酒調下壹錢

又方鯉魚皮灰兩半兩亂髮灰兩半兩益智子兩壹兩去皮兩蟲兩壹兩分兩水蛭兩壹兩分兩當歸兩壹兩分兩到  
右件藥擣細羅為散不計時候以熱酒調下壹錢

治產後血不散小腹疼痛紅藍花散方  
紅藍花兩壹兩當歸兩壹兩到  
琥珀兩壹兩沒藥兩壹兩桂

心參蒲黃壹分

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下一錢

又方婦人大全良方治產後臍下疼痛不止釜底墨醋拌炒延

胡索 劉寄奴 桂心 菴藷子已上各一兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下二錢

又方沒藥一分乾漆一分搗碎芫花一分醋拌炒令煙出

五靈脂壹分琥珀壹分

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下半錢

治產後惡血攻刺小腹疼痛騏驎竭散方

騏驎竭半兩芫花半兩醋拌炒令乾延胡索半兩常歸

半兩到微炒消石半兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

又方鯉魚鱗燒灰益母草燒灰頭髮燒灰常歸微炒

香墨已上各壹兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調下壹錢

又方劉寄奴 芫花醋拌炒 當歸剉微炒 桂心

已上各壹兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調下壹錢

又方當歸壹兩剉 芍藥壹兩 蒲黃半兩 赤芍藥壹兩

苦棟子壹兩 硃砂壹兩 細研

右件藥搗羅為末以醋熬硃砂如傷和丸

如梧桐子大不計時候溫酒下十九

又方鯉魚鱗三兩 亂髮一兩 故絳帛一兩

右件藥都入瓶子內以瓦子蓋鹽泥泥縫漸次著大火燒通赤為度候冷取出細研為散入麴末壹兩更同研令勻不計時候以熱酒調下二錢

又方菴藷子半兩 桃人半兩 湯浸去皮尖雙入 麴炒微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大不計時候以熱酒下二十九

又方赤箭兩芸薹子一兩  
微炒

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調下壹錢

又方礪砂壹兩  
細研

右用醋壹升熬成膏別入生礪砂末壹兩丸如梧桐子大不計時候以熱酒下五丸如月經不通先宜利過後以熱酒服五丸立効

又方右以乾地黃壹味炒令煙出狀如石炭

搗細羅為散不計時候煖童子小便壹小盞入牛蠶自然汁半匙調二錢服之

治產後兩脇脹滿諸方

夫產後兩脇脹滿者由膀胱宿有停水因產惡露下不盡水壅痞與氣相搏積在膀胱故令脇肋脹滿氣與水相擊故令痛也  
治產後血氣攻脇肋脹滿疼痛當歸散方

當歸壹兩  
微炒 赤芍藥兩 桔梗壹兩 蘆頭壹兩 乾漆  
壹兩 搗碎 牛膝壹兩 桂心壹兩 木香壹兩 白朮壹兩  
炒令煙出 去苗

壹兩川大黃壹兩判

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下壹錢

治產後兩脇脹滿氣壅煩悶枳實散方

枳實叁分木香叁分桂心半兩當歸叁分判

檳榔一兩白朮半兩牡丹叁分益母草半兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食前

溫服

治產後兩脇脹滿胃腹妨悶不下飲食厚朴散方

厚朴壹兩去麤皮壹兩塗生壹兩赤茯苓叁分人參叁分

去麤壹兩當歸叁分判甘草一分訶梨勒皮微赤判

陳橘皮叁分白甄壹分

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不

計時候溫服

治產後藏腑氣虛兩脇脹滿不思飲食四肢

無力白芫莖散方

白芫莖半兩 人參半兩 蘆頭去 桂心半 夏半

湯洗七 白朮壹兩 陳橘皮壹兩 枳殼分

麥炒 微廿 甘草壹分 微赤

右件藥搗羅羅爲散每服三錢以水壹中

盪入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候溫服

治產後兩脇脹滿心腹壅悶不思飲食陳橘皮散方

皮散方

陳橘皮叁分 湯浸去白 赤茯苓叁分 枳實叁分 炒微黃

人參半兩 木香半兩 前胡叁分 去蘆頭 白朮叁分

厚朴叁分 薑汁炙 香熟生 檳榔叁分 桂心半 芩

藎半兩 甘草壹分 微赤

右件藥搗羅羅爲散每服三錢以水壹中

盪入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候溫服

治產後兩脇脹滿小腹疼痛不思飲食桔梗散方

散方

桔梗半兩去蘆頭 當歸半兩剉 芍藥半兩 大腹皮

剉 桂心半兩 陳橘皮半兩湯浸去白瓢焙 赤芍藥半兩

赤茯苓半兩 延胡索半兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治產後兩肋脹滿小腹疼痛木香丸

木香壹兩 當歸壹兩剉 白朮壹兩 白芷半兩 芍藥

壹兩 檳榔半兩 桂心半兩 桃人壹分湯浸去皮尖 雙人壹分湯浸去皮尖 炒微黃

乾薑半兩剉 厚朴半兩去蘆皮塗生 芫花

半兩醋拌炒令乾

右件藥搗羅為末以醋煮麪糊和化如梧

桐子大每於食前以生薑酒下二十九

治產後兩肋下及心腹脹滿宿有冷氣攻注

膀胱致使脹痛厚朴丸方

厚朴壹兩去蘆皮塗生 訶梨勒壹兩半 赤

茯苓壹兩 乾薑壹兩剉 桂心壹兩 木香壹兩 赤

芍藥壹兩 當歸壹兩剉 陳橘皮壹兩去白瓢焙 吳

茱萸參分湯浸七 京三稜青兩散 白朮分

右件藥搗羅為末以醋煮麵糊和丸如梧

桐子大每於食前以生薑湯下三十九

又方桂心壹兩到 乾薑半兩炮 芫花

半兩酒拌 木香兩

右件藥搗細羅為散每服食前以熱酒調

下膏錢

和劑局方

澤蘭圓治產後勞傷藏腑虛羸末腹氣血不

調肢體瘦弱困乏少力面色萎黃心常驚悸  
多汗嗜回飲食不進產後百日內每日常服  
壯氣益血暖下藏進飲食

白茯苓去皮 附子炮去 木香 革薺管見大

酒浸壹 續斷各參 黃耆去蘆 澤蘭去大

牛膝去苗酒浸壹 赤石脂煨 人參去蘆各

肉桂去蘆 當歸去蘆酒浸壹宿判 碎微炒 甘

草微炙 乾薑炮 芫蕘 白朮各半 熟地黃

草者淨洗酒酒 蒸焙一兩半

右為末鍊蜜和圓如梧桐子大每服叁拾圓溫米飲下空心食前

當歸圓治產後虛羸及傷血過多虛竭少氣臍腹拘急痛引腰背面白脫色嗜卧不眠唇口乾燥心忪煩倦手足寒熱頭重目眩可思飲食或勞傷衝任內積風冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急痛及治男子婦人從高墜下內有瘀血吐血下血等病

白芍藥 肉桂 各貳兩 阿膠 搗碎 當歸 去蘆

乾薑 炮 甘草 炙微 續斷 芎藭 各四兩 白芷

附子 炮去皮 白朮 各叁兩 地黃 熟乾者拾兩 真蒲黃

炒叁分 吳茱萸 湯洗七次焙乾微炒叁分

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服二十圓食前溫酒下漸加至五十圓○簡易

方內補當歸元芎藭川續斷乾薑 炮川當

歸 去蘆酒 甘草 炙 阿膠 搗碎蚌粉炒成珠

熟乾地黃 酒浸五兩 附子 炮裂去白朮川白

芷吳茱萸湯泡七次致炒肉桂去粗皮白芍

藥各壹兩真蒲黃微炒壹兩右末煉蜜和元如

梧桐子大每三十元漸加至五十元食前

溫酒送下

芎藭湯治產後去血過多運悶不省及傷胎

去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去

血多不止懸虛心煩眩運頭重目暗耳聾滿

塞舉頭欲倒而皆治之嚴氏濟生方大產小產對證加添服餌

當歸去蘆洗焙○胎產救急力首尾皆用了芎藭各等分

右為麤末每服三錢衛生寶鑑五錢水壹盞半煎

至壹盞寶鑑煎至八分去滓稍熱服不拘時候御藥

院方○救急方有寒熱加柴胡煎 腹痛

加煨生薑三片炒地黃根約三寸許有熱

只用生薑生地黃濟生方右等分咬咀每

服三錢水壹盞半煎至七分去滓溫服不

拘時候腹中刺痛加白芍藥煎 口乾煩

渴加烏梅麥門冬煎 發寒熱加乾薑白

芍藥煎水停心下微嘔逆加茯苓生薑煎

虛煩不得眠加人參竹葉煎 大便秘澀  
 加熟地黃橘紅杏仁煎 小便不利加車  
 前子煎腹脇膨脹加厚朴煎 血崩不止  
 加香附子煎 咳嗽痰多加紫苑半夏生  
 薑煎 腰痛脚痛加牛膝煎心下疼痛加  
 玄胡索煎 惡血不下腰腹重痛加牡丹  
 皮煎 醫方集成南北經  
 驗方袖珍方同 玉機微義右咳咀  
 每半兩水煎服腹疼加桂名桂香散膏名  
 琥珀散治腹中痛急自汗頭眩少氣加羊

肉名羊肉湯是齋醫方治產後惡露不下  
 腹中疼痛下血太多眩暈不能支吾及姪  
 娠胎動不安腹痛下血芍藥當歸右等分  
 為麤末每服三錢水豈大蒸入酒少許同  
 煎至六分去滓服不拘時候 經驗良方同  
 當歸散治產後敗血不散兒枕塊硬疼痛發  
 歇及新產乘虛風寒內搏惡露不快臍腹堅  
 脹 豈本作  
 堅痛

紅藍花 當歸 去苗  
 炒 鬼箭 各壹兩〇一本  
 去中心木三因

方取羽  
用之

右為龍散每服參錢酒壹大盞煎至七分  
粥食前溫服

漏蘆散治乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡  
凝滯乳內脹痛留畜邪毒或作癰腫此藥服  
之自然內消乳汁通行

漏蘆 二兩半 ○醫方集成一蛇蛻 十條炙

兩半衛生易簡方半兩 方參條經驗 故蘆 十筒急火燒令焦存性

良方壹條 良方壹條 ○易簡方參筒良方一

右為細散每服二錢溫酒調服不拘時良

久喫 三因方嚴氏濟生方醫方大 熱羹湯

投之 得效 ○婦人大全良方此下云服藥

後即以猪蹄羹投之經驗方有牡蠣並燒

存性 一方只用牡蠣煨為末酒調下二

錢 永類鈞

黑神散 得效方玉機微 治婦人產後惡露不

盡胞衣不下攻衝心胃痞滿或臍腹堅脹撮

疼及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾 因

方藏氏濟生方澹  
療方治產後諸疾

黑豆炒半斤○備甘草參因方醫方集成

方地黃熟乾者○一本酒浸微義生地黃

之乾薑炮肉桂去龜皮○參因方婦芍藥

參因方當歸酒製蒲黃炒各四兩○

右為細末每服貳錢按粹方酒半盞童子

小便半盞同煎調下集或經驗方油珍方

便尤佳濟生方除蒲黃加附子承有急患

不拘時候連服二服○三因方右為末溫

酒或小便任意調下空心服忌如常書法

去蒲黃如附子濟生方當歸去蘆芍藥乾

薑炮官桂不見甘草炙生地黃洗各一兩

熟地黑豆淨炒去皮附子炮去皮右研羅為

細末每服二錢匕溫酒調下又方不用附

子入蒲黃二物并用尤佳得效方熟地黃

生亦蒲黃當歸乾薑炮桂心芍藥甘草兩

黑豆半升炒去皮右為末每服二錢酒半盞童

便半盞同煎調下或去蒲黃用蘇附量虛

實用之簡奇方產後血暈酒調黑神散最  
佳

濟危上丹 保慶集第貳十壹論 論產後所下過多虛極

生風者蓋皆緣婦人以榮血為主因產血下

太多氣無所主脣青肉冷汗出目瞑神昏命

在須臾者不可誤用風藥急宜服此

太陰玄精

五靈脂

壹本去沙石

硫黃

老紅乳色者

香 壹本

已上四味各等分慢火炒結成砂研極細

桑寄生

壹本須要真者 阿膠

蛤粉炒

陳皮

去白○壹本淨秤

卷柏 去根生用

已上四味各等分修事了焙乾為末

右八味同研用生地黄汁和搗盡千下圓

如梧桐子大溫酒或當歸酒下貳拾圓食

前服○嚴氏濟生方太陰玄精石 別乳香

別研○澹寮方弱 五靈脂 管見大全良方

葉上炒蠅研細 硫黃 別 桑寄生 陳皮 去 阿膠 蛤粉炒

石者 方 多澹 卷柏 生各 石將前四味同研勻石

器內管見大全良方婦人微火炒勿令焦

了漁寮方云動再研極細後入餘藥末用

生地黃汁煮糊為圓如梧桐子大每服五

寸圓三因方管見大全良方婦人食前

溫酒吞下當歸酒下亦得醫方集成南北

生地黄汁九如梧桐子大永類鈴方乳香

每服五十元當歸酒下研五靈脂糖心香潤者生硫黃別玄精石

別研極細四味和阿膠炒生卷栢焙桑寄

生無以續陳皮淨各右後四味細末和前

藥生地黄汁和元梧子大每二十元空心

當歸酒下

琥珀黑龍丹治產後一切血疾淋露不快兒

枕不散積瘕堅聚按之攬手疼痛攻心困頓

垂死者婦人入全良方得效方簡奇方黑龍

危急惡疾丹治產後膏切血疾產難胎衣不下但灌藥無有不效驗不可言

玉靈脂去沙川芎簡易方當歸去良薑

乾地黄生者○三因方簡易方各一兩良

已上各等分入沙合內赤石脂泥縫紙

筋搥泥固濟封合炭火十斤煨通紅去  
火候冷開取合子看成黑槽乃取出細  
研入後藥一本云用椽頭沙合

花乳石

煨○良方簡易方得琥珀研各壹  
效方簡奇方花藥石錢○簡

易方  
真底香乳

研別  
研各壹錢半○硫黃  
簡易方紅色者百草霜

別切  
五兩

右同為末米醋煮糊圓如彈子大每服壹  
圓炭火燒通紅投生姜自然汁與無灰酒  
各壹合小便簡易方童  
子小便半盞研開頓服簡易

方云應有危證灌  
此入口無不作效○簡易方又云李賓王

云得此方於廬陵隱士治壹切產難臨產  
產後惡患血氣諸疾死胎胞衣不下以生  
姜汁童尿無灰酒合壹盞煖調服即效良  
方右五味並細研與前五味再研如法修  
製和勻以米醋煮麩糊圓如彈子大每服  
壹圓炭火燒令通赤投於生薑自然汁與  
童子小便入酒漉出控乾研細只用此酒  
調下得效方簡  
奇方同茂恂熙寧初從事漢上幕

府郡之辱醫胡者爲予言數政之前有朱  
汴水部施黑龍丹凡產後諸病危甚垂死  
者無不愈郡中及村落人賴以全活者甚  
衆汴受代歸婦人數千號泣遮道送行尙  
有壹二粒末之施也先人自三峯謫官淮  
陽家嫂馬氏孀中大病醫者康從變投丹  
立愈訪之乃得於汴也且言每鬻壹粒輒  
受千錢必其獲厚利不欲求之後起守汝  
海從變餞別壹驛臨行出此方爲獻每以

救人無不驗者盧道原侍郎再師涇原時  
姨母姪娠至臨潼就蓐後數日有盜夜入  
其室驚怖成疾衆醫不能治乃以恠弟嘗  
遺此藥服之遂安家人金華君在秦生文  
度數日苦頭痛未止又心痛痛發兩股上  
下走注痰勢甚惡昏躁煩憤目視燈如金  
色勺飲不下服藥甚衆無效恠弟曰黑竜  
丹可服初以半粒投之卽能飲粥而他藥  
入輒吐出不受覺痛稍緩又投半粒又得

安眠自中夜服藥至五鼓下惡物數升頭痛頓減又至食時復下數升渙然醒愈蓋敗血所致其效如此建中靖國元年五月二十日郭茂恂記仲氏嫂金華君在秦產七日而不食始言頭痛頭痛而心痛作既而自睛痛如割如是者更作更止相去纔瞬息間每頭痛甚欲取大石壓食久漸定心痛作則以十指抓壁血流掌痛定自復痛又以兩手自剜取之如是者十日不已

國醫二三輩郡官中有善醫者亦數人相顧無以爲計且言某藥犯芎可以愈頭痛犯藜黃可以治心痛率皆悠悠不根之言竟不知病本所起張益困頓醫盈術殫予度疾勢危矣非神丹不可愈方治藥而張召予夫婦付以諸子與仲氏別慘怛不復言予瞋目戒張曰弟安心養疾亟出召伯氏曰事急矣進此丹可乎仲氏尙遲遲以兩旬不食恐不勝任黃昏進半粒疾少間

中夜再服藥下瞑目寢如平昔平旦豈行  
豈一升許如蝗虫于三疾減半已刻又行  
如前則頓愈矣遣荆釵輩視之奄殆無氣  
午後體方涼氣方屬乃微言索飲自此遂  
平復大抵產者以去敗惡爲先血滯不快  
乃至是爾後生夫婦不習此理老媪庸醫  
不能中病所以疾苦之人十死八大數  
雖定豈得無夭不遇良醫終抱遺恨今以  
施人俾終天年非祈于報者所冀救疾苦

養性命爾崇寧元年五月五日郭忱序朱

氏集驗方常歸五靈脂川芎良薑生乾地

黃各二兩右各淨洗剉入砂合內以赤石脂

泥縫再用紙筋搃泥固濟以炭十斤煨通

紅候取看如黑槽色乃藥成也細研再入

百草霜五兩硫黃紅老色者滴乳香各一

錢枯乳石琥珀丸燒通赤以生薑自然汁

無灰酒各壹合童子小便半盞攪調投藥

于中研化頓服產後垂死開口灌之難產

者服之立生血氣攻衝灌者卽下此方張  
提舉得之戴教授屢有効驗吳氏集驗方  
當歸夫五靈脂川芎生地黃高良薑右各  
淨取壹兩細剉入頭砂合子內赤石脂紙  
筋搯泥固濟炭十斤煨通赤候冷開合下  
看成黑糟取出細研入細百草霜五兩硫  
黃乳香各半錢花藥石琥珀一錢同研細  
醋糊圓彈子大每服一粒投炭火煨赤投  
生薑汁小酒內研碎調下嚴氏濟生方治

妊娠臨產難生或胎衣不下產後血暈不  
省人事狀如中風血崩惡露不止腹中刺  
痛血滯浮腫血入心經語言顛倒如見鬼  
神血風相搏身熱頭痛或類瘧狀胎前產  
後一切危急狼狽垂死以此藥灌三四圓  
無不救活者五靈脂當歸去蘆生地黃川  
芎高良薑州各右細剉入沙鍋內紙筋搯  
泥固濟炭火煨通紅候火滅冷取出細研  
入後藥百草霜乳香生硫黃琥珀花藥石

右五味計一兩一錢細末同前藥和勻米醋煮麵糊爲圓如彈子大要服用炭火煨藥通紅投入生薑自然汁浸碎之以無灰酒併合童子小便頓服神效不可盡述烏金散治產後血迷血運敗血不止淋瀝不斷臍腹疼痛頭目昏眩無玄無力多汗又治崩中下血過多不止並宜服之

騏驎竭 赤芍藥 松墨 煨醋 亂髮 要男  
燒百草霜 延胡索 肉桂 去 當歸 去

鯉魚鱗 燒爲末

右搗羅爲末每服貳錢溫酒調下

調經散治產後敗血乘虛停積於五臟循經流入於四肢留滯日深腐壞如水漸致身體面目浮腫又治因產敗血上干於心不受觸致心煩躁卧起不安如見鬼神言語顛倒並宜服之

芍藥 赤 沒藥 別 肉桂 去 琥珀 別 當歸 去  
麝香 別 細辛 去 各 各 兩 兩



當歸去蘆酒浸 麝香半錢 細辛洗半錢 甘草

錢二 右為細末每服半錢重生薑汁溫酒

各少許調勻服方同 黑龍丹方見產後

乍見鬼神者何答曰肝能藏血心能主血

因產走耗其血勞動肝心敗血奔衝邪滯

於心所以乍見鬼神言語顛倒非風邪也

但服調經散加生龍腦膏捻煎服得睡即

安黑龍丹亦能治療管見大全良方產後

乍見鬼神者何答曰心主身之血脉因產

傷耗血脉心氣虛則敗血停積上干於心

心不受觸遂致心中煩躁附起不安乍見

鬼神言語顛錯醫人不識呼為風邪如此

治之必不得愈但服調經散每服加龍腦

膏捻研入得睡即安參因奪命丹亦妙沒

藥琥珀並細研 桂心各青錢 芍藥常歸去蘆各

參因方已上 麝香研細辛 去苗各右為細

末每服半錢生薑汁溫酒各少許調服婦人

大全良方永 醫方集成治產後敗血停積

五臟流入四肢令人浮腫不可作水氣治  
 之但調其經水腫自消又有去血過多心  
 虛易驚加生龍腦壹握煎服琥珀二錢○  
 驗方袖珍方洗半細辛錢沒藥研別肉桂不見  
 別研膏錢錢甘草錢香麝一錢別研  
 寶胎方各膏錢錢赤芍藥當歸去蘆酒浸右為末每  
 半錢方服二錢生姜汁溫酒米飲調下

調中湯治產後腸胃虛怯寒邪所侵及米滿  
 月飲冷當風乘虛襲留於盲膜散於腹脇腹

痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化  
 洞瀉腸鳴或下赤白祛脇腹脹或走痛不定  
 急宜服之○嚴氏濟生方產後腹痛又瀉痢  
 者何荅曰因產血氣勞傷外則稜理空疎內  
 則腸胃虛怯參因方婦人大全良方若未滿  
 月飲冷當風邪毒乘虛進襲留於分肉之間  
 布於腸胃之內遂致腹脇疝痛痛如刀刺流  
 入大腸腸鳴洞泄洞泄不已痢下赤白宜服  
 調中湯又有食肉太早強食過多停積不化

臍腹疼痛而成泄瀉者誠有之矣法當消化  
停滯則愈取之則調不旋踵謹之謹之但

不可用牽牛巴豆峻劑以虛血氣見現圓最  
佳方見參倉卒未能辨此用局方中治中湯

加縮砂仁煎服

甘草炙半當歸去蘆○濟生方醫方集成

肉桂去蘆皮○參因方良芍藥白附子○

諸方炮良薑炒諸方川芎各一兩○濟生方

方承加人參半兩

右為判散每服三錢匕水三盞濟生方煎

至壹盞去滓熱服簡易方同諸方水壹

旋覆花湯治產後傷風得效方產感寒暑濕

欬嗽喘滿痰涎壅塞坐臥不寧

半夏麩芍藥赤麻黃去節甘草炙五味子

淨茯苓去皮荆芥去梗前胡 旋覆花 杏仁

炒各等分

右為麩末每服四大錢水壹盞半醫方集

經方珍方青蓋 萬五片棗壹个煎七分去滓食

臍腹疼痛而成泄瀉者誠有之矣法當消化

停滯則愈參因方良方若醫者以為積滯但取之則禍不旋踵謹之謹之

不可用牽牛巴豆峻劑以虛血氣見現圓最

佳方見參因方倉卒未能辨此用局方中治中湯

加縮砂仁煎服

甘草炙半兩當歸去蘆○濟生方醫方集成南北經驗方油珍方酒浸

肉桂去麩皮○參因方良方不見火芍藥白附子○

諸方炮良薑諸方川芎各一兩○濟生方

去支方承去支鈞方加人參半兩

右為判散每服三錢匕水三盞濟生方煎

至壹盞去滓熱服簡易方同諸方水壹盞煎服濟生方空心

旋覆花湯治產後傷風得效方產後血風感寒暑濕

欬嗽喘滿痰涎壅塞坐臥不寧

半夏麴者赤芍藥去節甘草炙五味子

淨茯苓去皮荆芥去梗前胡 旋覆花 杏仁

去其尖炒炒各等分

右為麩末每服四大錢水壹盞半醫方集成南北

珍方醫方膏蓋 葛五片棗壹个煎七分去滓食

前服 簡易方經驗良方同婦人大全良方承類鈔方有汗者勿服

人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱內熱曰煩其證心胃煩滿吸吸短氣頭痛 玉機微義心煩短氣自汗頭痛 悶亂骨節疼痛喘時輒甚與大病後虛煩相類急宜服之

麥門冬 大心 肉桂 去麤皮 人參 去蘆 當歸 去蘆

效方 乾地黃 各壹兩 芍藥 白者二兩 ○ 薑方

右為麤散每服四大錢 微義 水貳盞先將

杭米壹合 集成粳米壹字 淡竹葉十片煎至壹盞

去米葉入藥并棗叁个 良方二枚 煎七分去滓

食前服地黃宜用牛乾者虛甚則用熟者

承類鈔方同集成細珍方熱其香加生地黃

當歸養血圓治產後惡血不散發歇疼痛及惡露不快臍腹堅脹兼室女經候不勻赤白帶下心腹腰脚疼痛○醫方集成治產後惡血不盡發熱身痛經閉者並治之 袖珍方承類鈔方同

延胡索 火 牡丹皮 當歸 去蘆 赤芍藥 各貳兩

肉桂 壹兩 ○ 叁因方 得效方桂心

右為細末蜜圓如梧桐子大溫酒米飲下

參拾圓參因方得效方參五九集食前溫

服痛甚細嚼嚥下○鈴方云壹方加川芎

莪朮乾薑可作咬咀

當歸黃芪湯大治產後醫方集成袖珍方腰

脚疼痛不可轉側壯熱自汗身體強氣短

當歸去苗黃芪參因方芍藥合二兩○玉

壹兩半炒

右為麤末每服四大錢微義水一盞半集

袖珍方薑五片煎七分去滓食前溫服易

方得效方同

神授散治產後一切疾病不問大小以至危

篤者

青皮去牡丹皮 白芍藥 陳皮去桂心

各五兩○三神麴炒人參去麥藥炒各參

因方各半兩百合水浸乾薑炮甘草炙當歸

參錢川芎各二兩半○參紅花壹兩半○參

右為末每服貳錢水壹盞薑參片壹棗个

煎至七分空心服孕婦不可服用紅花

熟乾地黃湯治產後虛渴不止少氣脚弱眼

昏頭眩飲食無味

麥門冬去心貳兩○得效方人參去虛參

奪方南北經方神熱乾地黃淨洗酒浸

珍方二兩集成一兩熟乾地黃蒸焙壹兩

○禾類鈔括樓根四甘草炙半

右為到散每服四錢水貳盞集或經驗方

半糯米壹撮鈔方梗生薑三片棗三枚煎

七勿去滓食前服去因

阿膠枳殼圓治產後虛羸大便秘澀

滑石研飛阿膠碎枳殼長去穢麩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓

溫水下承類鈔半日來未通再服參因方

方全良○得效方治產時水血俱下腸胃虛

竭津液不足大便秘澀阿膠蚌粉枳殼各

分石為末煉蜜圓梧桐子大別研滑石為

衣溫水下二十圓半日未通再服又壹方

蜜兌法見大全利

失笑散治產後胎產救急方產心腹痛欲死

者百藥不効服此頓愈亦類鈴方此下云

蒲黃炒香○救急方微炒下血少者只五

靈脂酒研淘去砂土各等分救

右為末先用醋醋調貳錢熬成膏入水壹

盞煎七分食前熱服三因方婦人大全良方按粹方醫方集成

袖珍方經○救急方右末每壹錢入醋兩

三滴略拌熱湯調開服玉機微義云一方

兒枕痛各單服

成煉鍾乳散羅氏濟生方治乳婦氣少血衰

脉澀不行乳汁絕少

鍾乳粉

右用煉成者參因方研細濟生方細每服

貳錢濃煎漏蘆湯調下得效方同濟生方

王嶽產書

產後保理法

孫真人曰凡婦人非止臨產保養及產後大須將慎危篤之至其在於斯勿以產時無疾

便乃縱心任意多所觸犯犯時微若秋毫感  
 病大於嵩岳信產後之病難於他病也子母  
 祕錄云凡婦人分免產進藥須有次第若藥  
 病相投即應時疾愈如不相應乃反倒其病  
 也纔產了不論胞衣下與未下尋便服青麻  
 飲子壹盞若衣未下服飲子便下若衣隨兒  
 落時亦但服飲子保無諸疾其方  
 在預備次餘蒲黃小便壹盞亦須候服飲子  
 方中  
 了腹稍空即喫小便小便喫壹茶碗川調蒲  
 黃半匙近代多以蜀中  
 西山松花為蒲黃然形貌相似服之無效其  
 貨藥者亦作蒲黃與人宜自選買之須求州

士喫小便了心中稍空即喫白粥皆宜須預  
 前貯備勿  
 令使產婦飢及每與產婦煮粥時仍  
 大忌蔭濕氣其所用物皆要乾淨一頓粥  
 了良久服地黃生薑小便壹盞地黃汁參合  
 點生薑汁少  
 許煎令熟  
 投小便服若覺熱則不用著薑汁冷則用薑  
 汁投小便時看其寒溫勿使放冷相次後頓  
 喫粥了却以蒲黃小便間服之產後三兩日  
 內祇服此更不須別服諸藥大凡產後不論  
 須以蒲黃小便  
 服但十日內每日祇以常小便服得叁五  
 盞最為上也若更以上件二味服尤妙凡  
 產婦自初產了常通赤燒江石十餘顆輪次

取之於產婦前淬醋令其醋氣猛烈兼令產婦以頭面就醋氣及開口含之甚妙楊氏曰產婦雖大健一臘之內其醋氣不得暫離面前常令鼻聞猛烈醋氣又產婦三日內喫蒲黃小便地黃小便後猶覺有餘血水氣者煖烏豆酒服兩合在後豆淋酒方是凡產婦三日內慎不得側卧及睡晝夜常須膏人在前看喚令覺又不欲多語若困倦其欲得睡即須令承其食後尚飽喫一服地黃小便了然後放教

略睡仍專看如食頓間須喚覺亦不欲多語直至滿月每仰豎膝不得令脚根近產門若犯必患墜氣又不得將血汗衣裳於星月下擁曝切慎三日內不得留諸穢汗物在牀下常要燒安悉香白朮皂莢等四日已後直至壹月預修合者地黃煎日以好酒調一服地黃煎方在預備藥物篇凡產後百日之內臟腑全虛脾胃氣微弱初產十日之內唯宜喫粥貴易化切不得便食硬飯及難消之物稍有留滯積久

成疾終爲大患然又須要五臟膏壹臘後可  
食鯽魚粥或軟熟炊飯白羊肉鯽魚黃雌鷄  
葱薤作羹直兩臘後覺微熱猶宜服地黃小  
便仍不得多語多坐夫產婦雖經三臘雖云  
洗濯潔淨身體尚帶腥氣於出入之間須宜  
防慎邪惡欺凌凡欲大小便切不可往登廁  
豈則風冷所侵亦恐成患最畏邪氣所干立  
爲災殃凡欲所往且須未出房室三臘後雖  
然大健必不得起行少年悶倦便起離狀當

時雖不覺便損滿月後必手脚及腰冷疼生  
往如風入骨髓颼颼然悔無及也又壹月之  
內切戒喜怒憂恚悲愁必立致疾患此更難  
醫也凡產婦壹月之內寢卧常須蓋覆衣被  
縱值暑月亦不得少露身體里俗多昧保攝  
或有時俗云若蓋覆則恐後度產時慣其體  
候此深爲誤說不可信用直要避風冷濕蔭  
之氣又產婦至於澡洗沐頭亦須出三箇月  
外方可也今人縱不能依此亦須六十日後

方可大段使水沐浴凡產後壹月之內不得  
 多啜茶宜作紅花子湯喫紅花子貳兩已來微炒令香搗末入  
 少許鹽煎無時喫又楊氏曰凡言滿月是首  
 尾三箇月非三十日也俗習既久謬誤益深  
 至於宴賀聚會則任隨之將息之道不得違  
 此大凡壹百日內保持方可平復焉  
 黑豆五升熬之令煙絕出於坩器中等半修合之煎升半豆五升酒亦得  
 右煖熱酒膏對沃之取汗時任意飲之  
 產後破血氣安養五臟方

好酒 生地黃汁各五合 生薑汁二合 小便貳升  
 右相袞前五七沸每服壹盞加當歸末壹錢妙

產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血運連心頭硬及寒熱不禁方

續骨木破之如筭子一握  
 右件一味以水一升煎取半升分溫兩服  
 千金方云或小便數惡而不止服之即差  
 此木煮得二遍其力一般此是起死人方

又方延胡索熬搗為末酒服一錢匕

又方治血不止菖蒲貳兩以好酒貳升煮分作兩服即止

產後嘔逆方夫產後嘔逆飲食難進五臟轉虛諸疾悉起此為大患宜急理之

人參半兩 乾薑叁銖

右二味切如豆顆以蜜少許同慢火熬候密乾不得令焦細搗為末以粳米一合煮飲每服壹錢匕日三兩服

治產後百日內心腹脹滿頭痛壯熱口乾百節疼痛或下痢嘔逆飲食漸少方

生地黄升 汁一 小便升 生薑升 汁叁 蒲黃貳

右三味相袞煎五七沸分為四服蒲黃亦分作四度入

治產後水瀉方

神麴末五 乾地黄叁 人參貳 枳殼貳 分去

赤石脂分 白朮貳

右件判熬搗篩為散空心米飲調壹錢匕

治產後諸般痢久不差無問赤白方

陳粟米半升淨擇淘炒常歸貳兩剉熬

右搗篩為散空心粳米飲調壹錢匕日五

服

治產後一切痢方

當歸參分白朮貳分甘草貳分炮桂心壹分生用細辛

捌人參一分桑白皮捌生薑屑二分

右件剉熬搗羅煉蜜為丸空心溫酒下十

丸漸加至二十九日四服

治產後大便秘方產婦兩脇之內大便秘無

所損但緩慢以藥通之勿別作諸般治勿以

冷藥服之

大黃參分水浸一夕切如散芎藭拾

右二味搗羅為末空心溫酒調壹錢匕取

通住服

治產後惡露下多心悶氣短帖然無力食少

方

當歸 艾葉各二分人參 地榆各壹分乾地

黃生薑各叁分

右剉作者散每劑重半兩以水壹大盞煎取半盞濾過溫喫滓重煎如人行十里進壹服

治產後渴方蜜不計多少煉過煎熟水放溫調蜜服即止

產後連絕方

崔氏曰凡運者皆是虛熱血氣奔併腹中空虛所致

治產後連絕方半夏壹兩擣為末冷水和丸

如大豆內鼻中則愈此是扁鵲法

治血運欲狼狽兼主產後萬病方

劉寄奴壹兩甘草壹兩

右以水壹升半煎取半升入酒半升又煎祇取半升分溫作兩服

治產後低迷不醒唇口冷脈已絕面青不語此為鬼神所侵血氣上衝心可用驗醋二合雞子一枚先煎醋壹兩沸投之於雞子

梳中勻熟攪服之眼開別用藥治之

治產後血暈不識人或鬼語氣絕方

荷葉兩甘草壹兩白蜜匙一生地黃汁叁蒲

黃兩

右先以水二升煮荷葉甘草二件取一升去滓方下蒲黃蜜地黃汁放溫分作四服蜀公主產後無血結為塊後攻心痛四肢煩熱時乃腹中如刺手足沉重口乾舌急不生肌肉欲成勞疾服此方後獲安

鬼翦 當歸 甘草炮 牛膝酒浸壹夕已

乾地黄捌 烏梅十 白薇叁 白朮拾 虎杖

銖分 牡丹皮十 蒲黃八

右件剉熬擣羅煉蜜為丸空心熟酒下三十丸日進四服有塊堅硬加大黃鼈甲各十銖血不下加薑漆二分

治產後壹切諸疾芎煎方

胡桃芎貳 當歸一 麝香叁

右芎當歸兩件剉熬擣羅為末入麝香相

衾用無灰酒壹斤於埴器內入藥煉如飴  
空心米飲調壹匙頭如產後血氣痛加延  
胡索壹分爲末同煎如加嘔逆入桂半兩  
爲末同煎常服出顏色長肌膚暖官臟神  
效

治產後膏切諸疾神授烏金散方

遠取仙人騎鯉魚皮也志搜公子魂猪肝衣

陶家親客至頭髮叁件鍛過元喬蠶中存白蠶

附桂心雖切桂白附子當香墨自論當歸香墨

突然煙盡出竈突土膜樵父屋無門竈門膜

右件各等分三件鍛過出火毒了細研七

味判熬擣篩成散却同三味衾合每服兩

錢日有藥使難產榆皮湯下木通草亦得兒枕

小便下 惡露不下酒下 血蓮小便下

血風抽掣人參湯下 傷寒熱水下 產

後乍見鬼神桃仁湯下 血風不識人米

囊花煎湯下 產後四肢浮腫馬糞汁下

一切疾並用酒下

紅阿膠丸治產後十日至百日內一切風并  
血虛保安五臟出顏色強筋力神效方

紅阿膠牛兩木香一分人參青分麝香四銖茵

桂青分龍腦二銖虎骨十銖海桐皮拾麻

黃牛黃者兩白蘇皮捌附子半兩茯苓

芩十銖當歸捌白芷捌半貝八銖薑汁芎

菊半兩蟬殼二銖犀角一分天南星捌銖酒白

殭蠶一分羚羊角一分防風八銖白花蛇壹兩酒

去烏蛇蘇多去骨蟬螂首足麩炒桔梗

捌銖乾薑四銖天麻一分

右件各依法製細到焙過擣羅為散煉蜜

合和却入臼內擣壹千杵丸如彈子大每

空心無灰酒研下一粒產後日常服壹粒

保無疾丈夫急中風并攤緩風並宜服餌

治產後血虛齒斷宣露搖動疼痛宜舍地骨

皮湯

地骨皮兩半柳枝半細辛兩半防風兩半杏仁兩

去尖生地黃兩葶兩菴荆子兩半

右件細剉如煮散每用壹兩以水壹大盞  
酒壹盞同煎取膏盡濾過熱舍就疼處浸  
良久吐之舍一盞盡為度日用兩度

產後齒脚尚虛不竹用齒刷揩齒散方

猪牙皂<sup>半兩</sup> 燒過 夜合枝 槐枝 皂莢枝

<sup>各壹尺</sup> 寒水石<sup>半兩</sup> 石膏<sup>壹兩</sup> 升麻<sup>半兩</sup>

芎藭 甘松 藿香<sup>一分</sup> 丁香<sup>一分</sup>

右件升麻等剉熬擣細羅相袞合每依常  
揩齒後用菹湯漱口

大全本草

經驗方治產後煩躁禹餘糧一枚狀如酸餠

者入地理一平四面緊築用炭一秤發頂

火壹斤煨去火三分耗二為度用濕砂土

罨壹宿方取打去外面一重只使裏內細

研水淘澄五七度將紙襯乾再研數千遍

患者用甘草煎湯調二錢匕只一服立效

研朱石槌主妬乳煮令熟熨乳上取二槌更

互用之以巾覆乳上令熱徹內數十遍取

差爲度也

婦人妬乳乳癰取車脂熬令熱塗之亦和熱酒服

經驗方治吹妳以水調麪煮如糊欲熟卽投無灰酒膏盞共覽之亟熱令如稀粥可飲卽熱喫仍令人徐徐安之藥行卽差也

產寶治妬乳及癰葵莖及子爲末酒服方寸匕愈

治產後餘疹刺痛三十六候取劍鏡鼻七枚

投醋中熬過呷之亦可入當歸芍藥煎服之

產後血刺心痛欲死取燂猪湯一盞溫服之治產後血邪安心止驚悸自然銅以酒摩服子母祕錄治產後陰脫燒車釭頭脂內酒中分溫三服亦治咳嗽

子母祕錄治產後血暈心氣絕益母草研絞汁服一錢妙

鑿菜產後腹痛煮汁服之亦搗碎傅了瘡生

江南國蔭地似益母方莖對節白花中  
甜汁飲之如蜜

陳藏器云地錦主產後血結婦人瘦損不能  
飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行  
心悶並煎服之亦浸酒生淮南林下葉如  
鴨掌藤蔓著地節處有根亦緣樹石冬月  
不死山人產後用之壹名地噤蘇恭注曰  
絡石石血亦此類也

楊氏產乳胎後血上衝心生薑五兩切以水

八升煮取三升分三服

食療云產後瀉血不止取乾艾葉半兩炙熟  
老生薑半兩濃煎湯壹服便止妙

紅藍花主產後血運口噤腹內惡血不盡絞  
痛胎死腹中並酒煮服

簡要濟衆產後血暈心悶氣絕紅花壹兩麝  
爲末分作兩服酒二盞煎取膏壹併服  
如口噤斡關灌之子母祕錄同

外臺祕要下乳汁取京三稜三箇以水二椀

煎取青椀洗妳取汁爲度極妙

產書治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈  
連心頭硬及寒熱不禁延胡索熬搗爲末  
酒服酒錢匕

斗門方治產後瀉痢用小龍牙根壹握濃煎  
服之甚効蛇全昇也

陳藏器云芎破血清芎與產婦溫服之將芎  
麻與產婦枕之止血暈產後腹痛以芎安  
腹上則止

經驗方治產後血氣衝心煩渴紫葛三兩以  
水二升煎取壹升去滓呷之

梅師方治產後不自乳兒畜積乳汁結作癰  
取蒲公英搗傅腫上日三四度易之

敗芒箔主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡  
月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒  
煮服之亦燒爲末洒下彌久著煙者佳今  
東人作箔多草爲之爾雅云芒似茅可以  
爲索新補見陳藏器

兵部手集子腸脫出菜莢三升酒五升煎取二升分溫三服

子母祕錄治產後血暈心悶氣絕以丈夫小便濃研墨服膏升

子母祕錄治產後痢墨石子一箇燒爲末和酒服方寸匕冷卽酒服熱卽飲下

蘇方木主破血產後血脹悶欲死者水煮若酒煮五兩取濃汁服之效

子母祕錄產後寒熱心悶極脹及百病馬通

絞取汁壹盞以酒和服之差

食療又婦人無乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三兩日有汁下無限若中年壯盛者食之良

羊血主女人中風血虛悶產後血運悶欲絕者生飲壹升卽活

梅師方治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕新羊血壹盞飲之三兩服妙

子母祕錄療產後寒熱心悶極脹百病殺羊  
角燒末酒服方寸匕未差再服

牡狗四脚蹄煮飲之下乳汁

子母祕錄主乳無汁麋肉臠食勿令婦人知

野猪脂酒服下乳汁可乳五兒

梅師方治產後虛勞骨節疼痛汗出不止取

猪腎造稀臠葱豉米如法食之

食療野猪脂主婦人無乳者服之卽乳下木

來無乳者服之亦有青蹄者不可食

千金翼方治產後煩悶不能食白犬骨膏味  
燒研以水服方寸匕

孟詵云產後血不止以鷄子三枚醋半升好

酒二升煎取膏升分爲四服如人行三二

里微煖進之又新產婦可取一隻理如食

法和五味炒熟香卽投二升酒中封口經

宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升蒸

令黃香末之入酒酒盡極効

黑雌鷄孟詵云治新產婦可取一隻理如食

法和五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬令黃香末之入酒酒尽極效

陳藏器云雞子一枚以濁水攪煮兩沸合水服之主產後痢

又云雞子取一枚打開取白醎醋如白之半攪調吞之主產後血閉不下

又云取鷄卵三枚醋半升酒二升攪和煮取二升分四服主產後血下不止

圖經曰赤鯉魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之兼治血氣雜諸藥用之

產書下乳汁以鼠作臛勿令知與食

產寶治產後咳逆經三五日不止欲死方煎壁鏡窠三五箇呷差

治婦人產後逆以青橘皮爲末葱白童子小便煎服之

陳藏器云主產後肌浮柑皮爲末酒下

子母祕錄產後穢污不盡腹滿麻子三兩酒五升煮取二升分溫二服當下惡物

子母祕錄主產後中風困篤或背強口噤或但煩熱苦渴或身頭背重或身痒極嘔逆直視此皆虛熱中風大豆三升熬令極熟候無聲器盛以酒五升沃之熱投可得二升盡服之溫覆令少汗出身潤卽愈產後得依常稍服之以防風氣又消結血

治產後血塊蘩萁炒熱和童子小便服良服

惡血盡出

兵部手集治產後秘結鼓脹不通轉氣急坐卧不安供奉輔大初與崔家方以麥蘩末壹合和酒服食良久通轉崔郎中云神驗圖經曰治產後血暈築心眼倒風縮欲死者取乾荆芥穗擣篩每用末二錢上童子小便壹酒盞調熱服立效口噤者挑齒閉者灌鼻中皆効

經驗方產後中風眼反折四肢搐搦下藥可

立待應効如聖散荆芥穗子爲末酒服二錢七効

治產後壯熱頭痛頰赤口乾唇焦多煩燥渴昏悶不爽松花川芎當歸石膏蒲黃五物等同爲末每服二錢水二合紅花二捻同煎七分去滓粥後溫溫細呷

人溺須童男者產後溫壹杯飲壓下敗血惡物

治產後血暈身痙直帶眼口角與目外眇向

上牽急不知人取丹雄雞子壹枚去殼分清以荆芥末二錢調服遂安

乳脉不行研麝蟲壹枚水半合濾清服勿使服藥人知

治產後血暈及中風目帶上四肢強直假蘇穗爲末二三錢童子小便一小盞調下嚙良久卽活甚有驗

陳藏器云蘩蕒主破血產婦煮食之及下乳汁產後腹中有塊痛以酒少絞取汁溫服

又取暴乾為末醋煎為丸空腹服三十九下惡血

三因方一

產後血暈者何荅曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此治之病心難愈但服清魄散自差

清魄散

簡易方管見大全良方婦人大全良方拔粹方永類鈔方名清魄散

澤蘭葉

壹分○管見大 荆芥穗

川芎

半兩○管見大全良方婦人大全良方拔粹方永類鈔方加甘草二錢

右為末溫酒熱湯各半盞調壹錢拔粹方

急灌之下咽即開眼氣定省人事鈔方又

湯可兼服仍用 ○嚴氏濟生方產後血暈

者何荅曰產後血暈因產所下過多血氣

虛極是致暈悶甚則昏塞不知人氣息欲

絕暈悶不止則能斃人若作暗風治之誠

為謬矣但服清魄散自差如芎藭湯黑竜

丹皆要藥也或以乾漆燒煙熏其鼻更於

產婦房室中頻澹寮方作預用醋炭為佳清魂

散澤蘭葉經驗良方澤蘭孫人參去蘆各壹兩荆芥穗

四川芎兩二錢甘草錢八右為細末每服一錢

重醫方集成南北經驗方熱湯溫酒各小

半補珍方玉彬我義二錢蒸調勻急灌之下咽喉則眼開氣定省

人事芎藭湯澹寮方云即芎歸湯及黑龍丹方方並

劑局方良方右為細末每服叁錢重熱湯

訣下痰盛加姜製半夏壹錢姜五片水一

盞半煎一盞熱服口不開灌服

產後眩暈頃刻害人須量虛實為治若胃中

宿有痰飲阻病不除產後多致眩暈又血盛

氣弱氣不使血逆而上攻此等皆非清魄可

療痰暈仍用半夏茯苓湯血壅須用牡丹散

但缺藥尤難輒用當識輕重所謂擾平可擾

擾亦無擾若氣血平人因去血多致暈者芎

藭湯尤佳

半夏茯苓湯方見

牡丹散治產後血暈悶絕狼狽若口噤則拗

開灌之必効

牡丹皮

大黃

蒸

芒硝

各一兩

冬瓜子

半升

杏仁

七粒

去皮尖

右為剉散每服五錢水三盞煎至盞半去滓入芒硝又煎分二服欲產先煎下以備

緩急

得效方同

金匱以此治腸癰但分兩少異

芎藭湯

方見和劑局方

產後口乾痞悶者何荅曰產後榮衛大虛血氣未定食麪大早胃不能消化麪毒結聚於

胃脘上熏胃中是以口乾燥渴心下痞悶醫

者不識認為胃膈壅滯以藥下之萬不得一

但服見現圓

管見大全良方此下云或先以四物湯去地黃加人參烏梅煎

服亦妙○嚴氏濟生方產後口乾痞悶者何荅

曰產後血氣暴虛脾胃頓弱食麪太早停聚

胃脘麪毒上熏於肺是以口乾煩悶心下痞

滿宜服見現圓以消化之或有產後勞傷虛

羸因事觸忤怒氣上逆以致胃膈痞塞口乾

煩悶者亦宜服見現圓蓋其間藥味皆是順

蘇氏

蘇氏

氣快膈之劑紫蘇飲亦可服之

見現圓

姜黃 管見大全良方 京三稜 煎 華澄茄

陳皮 濟生方 人參 良方 高良薑 濟生方 蓬

木 炮各 壹兩

右為末用蘿蔔慢火煮爛研細將汁 濟生方

方集成 煮麵糊丸如梧子大 濟生方 不用

羅蔔湯下三十丸 婦人大全良方 永類鈔

經驗方 袖珍方 或加至五十九

產後口乾痞悶未必止因食麵或產母內積

憂煩外傷燥熱飲食甘辛使口乾痞悶當隨

其所因調之可也煩心宜四物湯去地黃加

人參烏梅煎若外傷燥熱看屬何經當隨經

為治難以備舉飲食所傷見現圓却能作効

婦人大全良方 同

四物湯 方見 後

產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不

散能令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和

陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞臟腑血弱不得宜越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別之荅曰時有刺痛者敗血但寒熱無他證有陰陽不和增損四物湯不一皆隨病加減管見長方云陳無擇以五積散加少醋煎服之間有效者○嚴氏濟生方產後乍寒乍熱者何荅曰因產勞傷血氣蓋血

屬於陰氣屬於陽血氣一傷陰陽互相乘剋所以乍寒乍熱此特論陰陽不和之所由致者亦有因產惡露下少留滯胞絡亦令人寒熱但小腹痛急爲異爾陰陽不和宜服增損四物湯敗血停留宜服奪命丹方見產難或黑龍丹方見產後增損四物湯亦可兼進

當歸管見大全良方酒洗濟生人參良方  
去蘆芍藥醫方集成南北經驗方袖珍方川  
蘆永類鈔方經驗良方白芍藥

芎 乾姜 地各壹兩 甘草 炙四錢 ○濟生方集

方良方 半兩

右剉散每服四錢水壹盞姜三片煎六分

大全良方婦人大全良方煎七分 去滓熱服不以時候 得效

方同

乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不

散豈止入脾肺二臟耶大抵壹陰閉壹陽即

作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血須

經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛

氣解則休遇又會而復作大調經散五積散

入醋煎 婦人人全良方同

大調經散治產後血虛惡露未消氣為敗濁

凝滯榮衛不調陰陽相乘憎寒發熱或自汗

或腫滿皆氣血未平之所為也 簡易方治產後腫滿喘急

煩渴小便不利

大豆 炒去皮 茯苓 壹兩 ○經驗 真琥珀 壹錢

右為末濃煎烏豆紫蘇湯調下 婦人人全良方神珍

方永類 ○得效方云喘急煩滿小便不利

者亦效

五積散 方見大方科傷寒門入醋煎妙

產後四肢浮腫者何荅曰產後敗血乘虛停積於五臟循經流入四肢留滯日深却還不  
得麻壞如水故令四肢面目浮腫醫人不識  
便作水氣治之凡治水氣多用導水藥極虛  
人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往  
因致天柱但服調經散血行腫消即愈

調經散 婦人大全良方名小調經散得效方治產後因驚敗血上干於心乍見鬼

神言語顛倒昏悶發狂煩燥附起不安

沒藥 研別 琥珀 研別 桂心 赤芍藥 當歸 各

錢 ○得效 細辛 麝香 各半錢

右為末每服半錢匕生薑汁溫酒各少許

調勻服 方同 ○得效方右為末每服半

錢匕加上龍腦少許生薑自然汁溫酒少

許調勻服服後三藥亦効管見大全良方

小調經散治產後四肢浮腫沒藥 研 琥珀

研 桂心 當歸 去蘆 芍藥 各半 細辛 去苗

香各分右為細末每服半錢七薑汁少許  
溫酒一合調停服

產後浮腫多端有自懷妊腫至產後不退者  
亦有產後失於將理外感寒暑風濕內作毒  
怒憂驚血與氣搏留滯經絡氣分血分不可  
不辨要當隨所因脉證治之宜得其情調經  
散治血分固効但力淺難憑不若吳茱萸湯  
枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也  
加減茱萸湯治婦人臟氣本虛宿挾風冷育

隔滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身而

虛浮惡寒戰慄或泄利不止少氣羸困及因

生產臟氣暴虛邪冷內勝宿疾轉甚永類  
方治產

後臟氣暴虛邪冷內勝宿  
疾轉增并治婦人諸疾

吳茱萸湯洗七次 桔梗 乾姜炮 甘草炙

麥門冬去心 半夏湯洗七次 防風 細辛 當歸

酒浸 茯苓婦人大全良方 牡丹皮 桂心

冬半

右麤末每服四錢水壹盞半煎七分去滓

食前熱服

枳木湯治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所  
作名曰氣分

枳實麩炒去穢 白朮參

右剉散每服四錢水盞半煎七分去滓溫

服朱氏集腹中軟即當散也婦人大全良方得效方永

類鈞方同

奪魂散治婦人產後虛腫喘促利小便則愈

牛蒡參兩 白麵參兩 半夏七介湯洗

右以生姜汁搜麩裏半夏為小簡易方婦人大全良

方作餅子炙焦熟為末熟水調壹錢小便

利為效得效方同

大調經散最治產後腫滿喘急煩渴小便不

利方見前永類鈞方同

產後乍見鬼神者何答曰云云得睡即安詳見

和劑局方

調經散方見和劑局方

產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後

類鈞方同

婦人大全良方

類鈞方同

婦人大全良方

虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明  
了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故  
令不語如此但服七珍散管見大全良方  
下云孤鳳散妙  
七珍散

人參管見大全  
良方去蘆石菖蒲大全良方  
去毛川芎 生

乾地黄各一兩  
地黃戀隔以當歸代細辛身方

大全良方婦人大全良方  
去苗壹錢防風管見大全良方  
去蘆義

朱砂各等兩  
別研

右爲末每服壹錢薄荷湯調下不以時服

得效方袖  
珍方同 ○鈴方云濟生加我甘草半兩  
名八珍散

醫方類聚卷之二百三十四