

内	開	文	庫
和	三〇二八七	一	二冊
書	類	一四架	函

冬
三

醫學
9

廿五
卷卷

内閣文庫	
番號	和 30287
冊數	15 (9)
函號	195 283



Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19




© Kodak, 2007 TM: Kodak



糊などで貼り付けられている部分がめくれない箇所あり

榛齋宇田川先生著



遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌



遠西醫方名物考標目

卷二十五

麝香

麝形狀

產地

香囊

麝香

鑒法


偽品

香說

主治

幾那麝香丸
魏角麝香丸
排毒蘭麝香飲
麝香鎮痙飲

製造麝香



遠西醫方名物考

卷二十五 標目

風雲堂藏

製造麝香テニキ丁香テタル爾

附 龍涎香

試法 偽品

產地 秤量

試質 原始

主治 龍涎香テニキ丁香テタル爾
龍麝膏

遠西醫方名物考標目

卷二十六

失歇篤シキウ

靈貓 產地 性情 食料

香囊 採香 香質

主治

失鳩答シキウ

形狀 性 解毒法

主治 失鳩答膏シキウ

失鳩答シキウ越幾斯劑 服量

遠西醫方名物考 卷二十六 標目 厚雪堂藏

附 荳蔻

形狀 性 主治

服量

荳蔻散

龍麝荳蔻散

荳蔻越幾斯劑

蒸餾醋

製法 試法 醇精醋

性 主治

雙酸清涼飲 香竄醋

香醋飲

外敷諸法

遠西醫方名物考標目

卷二十七

蒸餾水

失格列^シ列^レ乙^一 失格列^シ列^レ乙^一越^エ幾^キ斯^ス劑

西瑪爾^シ爾^マ拔^ル皮^バ

紫堇^シ越^エ幾^キ斯^ス劑 紫堇^シ昆^コ設^セ爾^ル弗^フ

瀉利鹽^シ 瀉利鹽^シ 舍利別^シ 收斂鐵液^シ

收斂亞^シ的^レ兒^一 收斂^シ皓^レ礬^一水^ス 升鐵鹽^シ

升汞^シ 升汞^シ撒^ル爾^ル弗^フ 赤降汞^シ

惠^シ 諸厄^シ利^レ斯^ス 瀉利鹽^シ

越栗失爾剝祿布利怛

鉛糖

鉛醋

附 密陀醋

越列密

越列密膏

阨日多膏

越没里膏

燕窩

依蘭苔

附圖

甘草蘭苔飲

幾那蘭苔飲

越栗失爾

楮篤立沃利

石膽

越扶屋布斯密涅刺

列水銀條

越扶屋布斯末爾扶亞栗斯鐵條

遠西醫方名物考卷二十五

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

麝香

麝香 麝香

麝

麝 麝

麝形狀

形牝鹿ノ如ク又野羊ニ似タリ長三尺許身

幹狹窄頭面長ク尖リ牙口外ニ出テ野猪ノ如シ耳

長ク兔ニ似タリ尾短ク二拇指長アリ脚瘦一尺許

蹄分裂ス毛長サ一拇指半横徑許背毛三拇指横徑

許他獸ニ比スレバ太ク且縋縮シ乾剛ニメ折レ易

ク楯白色駁雜ス


產地 支那ノ東京或ハ榜葛刺止白里勃烏丹百兒西
亞其他亞細亞洲ノ諸國及ヒ魯西亞地方ノ山林ニ
住ム。東京勃烏丹ノ産ヲ上品トス。榜葛刺産。是ニ次
グ。魯西亞ノ産ヲ下品トス。

杏囊 麝ノ臍下。陰處ノ邊ニ一膜囊アリ。形圓ク大サ
鴿卵ノ如ク。大ナルハ雞卵ノ如シ。腹皮内ニ在テ囊
底僅ニ一拇指横徑許。皮外ニ隆起ス。或云其囊臍邊
ト陰處トノ間ニ在リ。或云腹ノ下部陰處ノ傍ニ在
リ。或云後脚ニ近キ處ニアリ。或云囊長三拇指横徑
横徑許。指獵戶此獸ヲ獲レバ其囊ヲ剝出シ曝乾シ
或ハ囊ヲ截テ杏液ヲ出シ曝乾ノ復囊ニ内レ四方

ニ貨ス。故ニ其截タル處。絲ニテ縫合セル者アリ。是
ト呼ブ者。○囊。黯灰色ニシテ其底ニ毛皮著ク者多
シ。是真麝ノ囊タルヲ見スガ爲ナリ。是レ囊底ノ毛
ス者ナリ。其餘周圍ハ腹○囊ヨク乾キ大ナラズ膜
内ニアル故ニ毛皮ナシ。○囊ヨク乾キ大ナラズ膜
薄ク囊ヲ成ス。其毛少ク赭褐色ニシテ短ク捲縮スル
ヲ上品トス。是東京勃烏丹榜葛刺ニ出ル者トス。杏
氣尤烈ニシテ價モ亦貴シ。是レ藥舖ニテ囊大ニシテ膜
厚ク白毛多クメ太ク長キハ下品トス。是レ止白里
魯西亞等ニ出ル者トス。或云榜葛刺産ノ者ハ白毛
者。皮厚ク毛多キホド。下品トス。或云偽品。或ハ囊ニ小

孔ヲ穿テ鉛ヲ入レ秤量ヲ重クスル者アリ○囊中
薄膜アル者ヲ真品トス。香液此膜ニ著テ凝結スレ
バナリ或云。囊ノ外邊ニ一種ノ腺アリテ香液ヲ血
中ヨリ分泌シ一種ノ脉管ヨリ囊中ニ送り
薄膜ニ著テ凝結ス或云。囊中
ニ細腺アリテ香液ヲ分泌ス
麝香其質。硫黃氣。油氣。揮發鹽ヲ混和ノ成ル所ノ膽
液様ノ液ナリ。香囊中ニ在テ釀熟シ凝結ノ殆ト敗
血ノ如シ。麝死ノ直ニ其囊ヲ剖キ見レバ黯赭色ノ
凝血ノ如シ。是ヲ曝乾スレバ鬆疏輕脆ニノ碎屑ト
ナリ乾ケル血ノ如シ。真好ノ品ハ碎屑中ニ多少顆
粒ヲ雜ヘ其質華爾斯ノ如シ乾ケル粘潤アリ是漢
人所


謂當門子ナリ黯赭色或黯鐵鏽色ニノ微光澤アリ或云。煤
黯灰色ニノ赭ヲ帶ブ。或
云。黑灰色ニノ紫ヲ帶ブ香氣極テ竄透シ味苦シ○
大抵一囊ニ乾ル麝香一錢ヨリ三錢許アリ○麝香
ハ囊ニアルヲ用ベシ是ヲ取出シ販者ハ偽品多シ
鑿法麝香少許ヲ取テ烙鐵上ニ置バ唯其香氣ノニ
ニノ異臭ナク。速ニ燃テ其質殘ル下必ク或ハ盡ク
消スルハ真品トス。速ニ燃ス炭ノ如クニ多ク殘
ルハ偽品トス。或ハ絲ヲ葱汁ニ浸シ是ニ針ヲ附テ
香囊ヲ貫キ通シ其絲ノ葱ノ氣味盡ク消スルハ真
品トス否サルハ偽品トス或ハ小刀ヲ以テ擦リ或



ニテ縫合シ形扁クノ大ナリ其絲ヲ截リ開キ見
バ其内空廬ニノ偏面ニ過ク三寸許ノ白毛アリ是
其毛アル皮ヲ翻ノ最上ノ麝香アリ其皮ノ底ヲ截
皮ト膜ト紫黒色ニ最上ノ麝香アリ又往年稀ニ朝
ノ如ク呼フ者アリ麝香形今ノ鮮毛ト呼フ者如ク
香ト呼フ者長ク其内ノ麝香甚ダ鮮ナリト聞
ニノ毛及ビ麝香ノ形色本口ト同様ナレ山ト呼
者ハ囊及ビ麝香ノ形色本口ト同様ナレ山ト呼
ク粗劣ニ清爽ノ氣ナク鬱敗ノ氣アリ又濕リ軟
ノ泥ノ如シ年ヲ經テ乾固スル者モ本口ト異
ナリ故ニ中品トス是本口ノ下品ナル者ナリ○本
口麝香一斤ニテ囊三十許アリ大抵上品者ナリ○
ハ其餘ハトト間山ト雜ル者ナリ或ハ一斤ノ麝
香悉クベトト者アリ○囊ノ偏面ニ取リタル者
ハ此獸ノ皮ヲ其囊ニ附テ截リ取リタル者ノ麝
シ○白麝香ヲ雜ヘタル者アリ是ハ上品ノ麝
香ニ俗説ニ鹿ノ膝皮ニテ白毛麝香ノ雜ハタル
非ス○赤豆ノ燒酒以テ加ヘ煉合ヌ麝香ヲ偽造
ノ洗汁ニ浸シ燒酒以テ許ヲ加ヘ煉合ヌ麝香ヲ偽造

スト云、凡未ダ詳ナラズ土麝香或ハウツシ麝香ト
呼フ者アリ此亦右ノ類ニ近シ○麝香ヲ齧テ味微
苦ク香氣清煖ニテ強ク或ハ火ニ投ノ臭氣ナク唯
麝香ノ氣ハニテ微腥臭アルヲ上品トス○齧テ氣
味微ク或ハ火ニ投ノ香氣ナク或ハ鬱敗ノ氣アル
トス○麝香ハ總テ清船舶ナリ洋船ニハ稀ナリ
香說 香囊ヲ取リ乾スニ兩三日ノ間ハ其氣酷烈ニ
メ當リ難シ其乾ケル者モ多ク麝ク片ハ其氣烈ニ
メ臭ニ近シ但香氣減シ或ハ他物ニ加ヘ或ハ遠ク
隔ツ片ハ甚ダ芬芳馥郁ニメ賞スベシ是香氣過多
ナレハ其精微ノ氣烈ク竄透シ麝神經ヲ刺戟スル
ヲ甚フメ牽縮セシムル故ニ自ラ厭ヒ惡テ臭氣ヲ
覺ルナリ香氣微ナレバ其精微ノ氣散漫シ徐々ニ

覺ルナリ。香氣微ナレバ其精微ノ氣散漫シ徐々ニ



麝神經ヲ開達ノ精氣ヲ健運セシムル故ニ自ラ爽
 快ニシテ佳香ヲ覺ルナリ○或云。麝香ノ香氣脱スル
 者ハ是ヲ圍房ノ天井ニ掛ルヲ數日ニシテ故ニ復ス。
 是レ麝香ハ屎ト同性ナレバナリ。故ニ凡、屎ヲ食フ禽
 獸ノ屎ハ麝香ノ氣アル者多シ○麝香ハヨク風化
 ノ香氣速ニ消散ス。故ニ硝子曇若、ハ鉛盒ニ收メ固
 封シ貯フベシ。乾耗セズノ香氣脱スルヲナシ○或
 云。勃烏丹特立。鞞而鞞中ノ圖多ク麝ヲ産ス。其地冬
 月積雪丈餘。此獸深山幽谷ニ蟄ス。春末漸ク積雪消
 スルニ至テ林麓山趾ニ出テ縱嗽ス。故ニ春末夏初

多ク是ヲ捕フ。此時ハ其血沸騰ノ酷熱スル故ニ其
 香更ニ酷烈ニシテ數日曝乾セザレバ其氣ニ耐難シ
 ト○或云。此獸遊牝ノ時至レバ香囊腫起ノ痒悶ニ
 堪ズ自ラ木石ニ觸テ其囊ヲ擦破シ香液漓リ下ル
 者日乾テ凝固シ此香ヲ成ス或云。麝遊牝ノ時至レ
 バ香囊腫脹ヲ生シ搔痒ニ堪ズ自ラ木石ニ觸テ其
 囊ヲ剥破シ膿淋漓シ下テ乾固シ香ヲ成スト。右兩
 件ノ事絶テナシト言ベカラズト雖モ是偶然ルノ
 云。其故ハ凡、麝香ハ悉ク其淋漓セル香液ヲ採ル者
 ナルニハ或ハ此獸ノ蹄跡ヲ蹤蹟ノ深山幽谷峻阻

ノ地ニ跋渉シ或ハ泥濘沙礫等ノ步履シ難キ處ニ
 採ル故ニ膏ニ甚ダ得難キノ云ナラズ價亦極テ貴
 クノ尋常ノ比ニ非ルベシ又麝香ハ膿汁ノ乾固セ
 ル者ナル片ハ皆必ズ灰白色ナルベキナリ叔云和
 ニ於テハ未ダ香囊ヲ開カザル者ハ其量一多ヲ以テモ
 テニギルデニ九個ニ販ク麝香ノ量一多ヲ以テモ
 デニ十二個ニ販クト按ニギルデニハ和蘭通用銀
 錢ノ名一個ニ本邦ノ五錢目ニ充ツ○按ニ香囊及ビ
 皮毛ノ形色大小一様ナラズ且上品ト雖モ其香中
 ニ毛雜リ其氣味質色等亦種々異同アルヲ以テ觀
 レバ是レ麝皮糞ノ他獸ノ皮ニテ香囊ヲ擬造シ一
 囊ノ香ニ他物ヲ夾雜ノ數十個ノ囊ニ分テ充ル者
 ニ似タリ又藥舖販ク所麝香一斤ノ香囊大約三
 十個アリ毎年本邦ニ輸ス所ノ斤數少カラズ其
 他支那印度地方及ビ四大洲ノ諸國ニ輸ス者毎年
 幾十萬斤ニ香囊亦幾十萬個ナルヲ知フズ且其深

山幽谷ニ住ム異獸尋常獲易カラザル者皆一麝ニ
 一囊ヲ採テ悉ク其數ニ供給スベキニ非ズ故ニ其
 夾雜ノ有無ニ於テハ姑
 ク疑ヲ存ノ後考ヲ俟ツ

○按ニ往年月池君西哲列墨カ伊著ス所ノ獨祿
 厥烈印ニ就テ自ラ麝ノ圖ヲ摹ノ先考槐園先生
 ニ贈ラル。先生又其書ニ就テ麝香ノ説ヲ譯シ且
 首ニ西説ノ覈實ナルヲ贊シ併テ其圖ニ題セリ
 因テ是ヲ左ニ舉テ考證ニ備フ
 ○夫詢事考言必與名與物苟外乎此徒事鼓頰也
 則空理之亡藝終始反復誰居不眩其亡端倪者此
 其究必至利嘴長舌卒得擅場燦金銷骨之言市虎


卵毛之辯紛紜乎不可窮詰否則齊是非同彼此厲
與西施昏皆爲伍楚之與楹道通爲一此其理雖可
悅辭雖可觀亦唯玉卮之亡當均之歸於不濟用耳
故衆言之淆亂折諸聖聖也者一乎夫實者也而非
有希夷窈妙之道存焉於其間天下之事一斷諸實
辟由引繩墨而正枉曲乎握規挈矩而懸權衡以爲
方圓以校輕重乎誕罔講張奇衷狹儉之徒莫不入
焉而弱且窮矣亡他故斷諸實而已是故能言而要
諸實者方外聖人之徒也能言而不歸諸實者洙泗
蠻貉也予驪于月池君君語次必及其所爲翻譯之

事每稱蘭人所以精絕乎衆者曰事必顯門人不貳
能其操心以爲與其飾不我狎者名吾技則豈不得
以其毋以名技者乎則病者乎是以有所不爲然後
有以爲也爲之弗能明覈彰著於名與物以獲其實
弗措也予於是乎感述彼西土之子鳩其古而左其
社猶且進於技於實之果然乎則殆乎亡害爲聖人
之徒矣會君就西書自摹壽圖以見贈予譯其說以
題之列墨力伊獨祿厥烈印者志藥物者也其言曰
壽之杳也取諸一胞大如雞卵此其膽液質之敗血
替滿其胞乃成是物其爲獸也如牝鹿然其毛曲局

長視。小兒指。常處山林。人獲之。輒剔取其胞。傾出其香。以暴諸日。及其乾。鬆如粉。色成黯赤。而後還實諸胞中。以居。以貨亞細亞諸國。並有之。而勃烏丹最多焉。其捕之。必於春夏之交。云地多雪。積至十尺。若十
二尺者。貫乎時而不釋也。麝阻食。迨春末流澌之時。承其怒飢之後。大嚼縱噉。以逞貪婪也。則鬱攸之所。煽血液之所。蒸其香以成矣。捕之之所以必於春夏之交也。得香之始。不風不暴。則氣過乎烈。不可得而當焉。或云麝父方遊牝之時。苦其胞腫痒。不可忍也。自觸木石以救其憊。香液潰而下。其所淋漓亦結成


香

主治 性温。極テ揮發竄透之稍衝動之腦。神經。心ヲ強壯。之瘕ヲ鎮メ稠厚ノ血液ヲ稀釋シ汗ヲ發シ風氣ヲ驅リ精力乏弱ヲ復シ精神鬱重ヲ欣慰爽快ス。○失氣眩暈昏冒。心動悸。寒性ノ昏睡病。卒厥。肢體顫振。鬱憂病。發狂。癩。疝腹痛。痛風。傷冷毒痛。內攻。虛弱ノ肺嗽衝。我效。壞疽。一切咬傷毒等ヲ療シ陰具。虛寒ヲ温壯ス。○服量輕症ハ一匁ヨリ四匁ニ至ル。小兒ハ一匁ヨリ三匁ニ至ル。但六匁マテ用テ害ナシ。然レ輕症ニハ少許用テ効アリ大人ハ一時或一時半毎ニ



四尺ヨリ十六尺マデ用フ。或ハ半錢マデ用テ危篤ノ諸症ヲ救フコトアリ。服量少許ニテハ捷効ナシ。大抵十六尺マデ用レバ大ニ發汗ノ諸症寛解ス極テ。虛罷セル患者ハ四分時ニ六尺ヨリ十尺マデ用フ。或云。一次ニ六尺ヨリ少ク用レバ効ナシ。是ヨリ加テ十尺餘ニ至レバ峻効アリヨク表發ノ蒸氣ヲ排泄ノ熱ヲ誘發セズ精神ヲ爽快シ痛ヲ止メ發汗ノ安眠セシム。或ハ其汗麝香氣アリ或ハ發汗十五時若クハ二十時モ止ザル者アリ然レ安眠メ發スル汗ナレバ患者虚脱ノ恐ナシ。○麝香ニ沙糖二三倍

ヲ研和シ用ヒ或ハ阿芙蓉。龍腦ヲ加ヘ散劑若ハ丸藥トシ用ヒ或ハ葡萄酒若ハ適宜ノ蒸餾油ニ溶シ用ヒ或ハ桂。丁幾去爾ニ加ヘ用テ尤効アリ。麝香ハ總テ尋常ノ飲液ニハ溶化シ難ク且是ヲ服スレバ其未咽喉口舌ニ著テ氣味久ク口中ニ残り患者嫌惡ムコト多シ。但燒酒ニ浸セバヨク溶化スル故ニ丁幾去爾ト爲シ用ヒ。製法。葛私多僕。或ハ桂。丁幾去爾ニ和スレバヨク溶化シ味佳クノ服シ易シ。○或云。麝香ニ阿芙蓉ヲ加ヘ老人ノ虚衰セル寒壞疽ニ大効アリト。然レ其効アルハ多ク阿芙蓉ノ關ル所



ナリ故ニ此症ハ麝香ヲ用ルニ及バ不適宜ノ香竈
藥ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用テ良効アリ○總テ壯實多血
ノ人ニ麝香ヲ用レバ上衝焮熱頭痛等ヲ發ス婦人
ハ殊ニ嫌ヒ惡ム者多シ○凡、虛衰セル熱病發斑熱
腐敗熱神經熱其他荏苒タル病ニ用テ神經ヲ強壯
シ精力ヲ回復スルニ偉効アリ然レ其病既ニ危篤
ニ至リ生氣脱メ挽回シ難キニ至テハ効ナシ○壯
熱剽盛ニメ脉強實ノ症及ビ壯實ナル焮衝ノ諸症
ハ皆用テ害アリ然レ其病日ヲ經テ漸ク虛弱ニ涉
リ或ハ患者素ヨリ虛弱ニメ病性淹滯シ脉小數ニ

ノ弦ヲ帶ビ呼吸不利ノ苦煩シ小便驟澹色病毒化熱セザ
候ニメ多ク通シ若クハ濃色ニメ艱澁シ精力逾虚
損スル者或ハ神經熱腐敗熱右ノ諸症ヲ發スル者
ハヨク胃腸ノ汚物ヲ淨掃メ後此藥ヲ用テ良効ア
リ總テ衰弱ノ候逾カシ者ハ神經劑ニ此藥ヲ兼用
メ尤良○痙攣ノ運動搖掣ノ諸症筋惕肉瞤等ヲ發
シ殊ニ口角牽引スル症ニ効アリ是病毒腦中ニ侵
襲スル候ナレバナリ○麝香ニ中和鹽ノ類及清涼
酸收ノ藥ヲ加用レバ効ナシ是性能相反スルガ故
ニ麝香ノ効力ヲ減損スレバナリ○麝香ハ揮發竈



ル者ハ効ナシ但其發作セザル時。是ヲ神經強壯劑トシ用テ良驗アリ右ノ諸症ハ左ノ劑尤良

幾那麝香丸

麝香 一錢

幾那越幾斯劑 二錢

右三良ヲ一丸トシ銀箔ヲ衣トシ硝子壘ニ内レ貯五丸宛用ル一日四次○神思鬱憂病ノ不寐或ハ痲ヨリ起ル狂症ニ麝香八分マデ用ヒ。或ハ鬱憂病ノ頭眩暈。或ハ神經ノ症多キ胃瘕ニ用テ殊効アリ○痲ニ多ク奇効ヲ稱ス。然レ病因一ナラザル故ニ

悉ク適應スルニ非ズ○卒厥ノ肢體強直。必モ轉側シ難キ症ハ是ヲ用テ捷効アリ○發止時アル喘息ニ用テ驗多シ。小兒此症ヲ發シ甚ダ危篤ニモ。死ト救ハレザル者。麝香二分ヲ少許ノ沙糖ニ研和シ一服トシ一時ニ一服宛用テ奇効ヲ得ルアリ。但上品ノ麝香ニ非レバ効ナシ○痲瘵ノ運動ヨリ發スル喘急。初發惡寒ノ痰沫ヲ吐キ終ニ發汗ノ解スル症ニハ麝香ヲ用テ多ク治ス○痛風ノ酷厲毒ヨリ發スル喘急ニ用テ多ク殊効ヲ稱ス。此症並ニ總テ麝香ヲ用ベキ症ハ左ノ方殊効アリ

魏角麝香丸

阿魏

纈草越幾斯劑

各一錢○根ヲ以テ製ス製法

麝香

各十瓦

結爾蔑斯密涅刺列

安質没出

阿芙蓉

各五瓦

右調和シ二瓦ヲ一丸トシ蜩蛄石末ヲ衣トス一時
二三丸若ハ四丸宛用フ殊ニ麝香ノ的當スル症ハ
其量ヲ增加フベシ○痛風傷冷毒痛等ノ患者虛弱

ニノ其毒ヲ排泄スルコ能ハス。潜伏内攻メ胸中苦
悶。胃痛劇キ等ノ症ヲ發スル者ハ麝香ヲ燒酒少許
ニ加ヘ用テ大効アリ或ハ左ノ方亦良

排毒蘭麝飲

薄荷水 三瓦

橙皮舍利別 半瓦

雜腹蘭 一瓦

麝香 二十五瓦

亞的兒 一瓦

右調和シ四分時ニ一匙宛用ニ病毒發泄シ諸症解

遠西名物考 卷二十五 風雲堂藏

散スルヲ度トス○諸發斑熱痘瘡等ノ内攻及諸瘡
瘍發出ノ多少ヲ論セズ患者虚弱ナルハ脉ノ遲
數ニ隨ヒ右ノ如キ劑ノ服量ヲ加減シ用テ峻効ア
リ○患者虚弱ニ因リ或ハ痙攣ノ運動ニ因テ發出
スベキ瘡疹快發セズ若ハ潛伏内攻スル者モ亦右
ノ如キ劑ヲ用テ捷効アリ但其諸症ハ雜腹蘭丁幾
去爾前ニ峻効アル故ニ是ニ亞的兒及ヒ亞兒加利
鹽ノ揮發精鹿角精ヲ加テ麝香ニ代用ノ殊効ア
リ○麝香ノ効略阿芙蓉ニ似タリ然レモ阿芙蓉ヲ服
スレバ神思鬱重肢體勞倦等ノ症ヲ發スル故ニ是

ニ比スレバ麝香ハ害ナシトス但麝香ノ性功甚ダ
實百兒油鹿角精ニ近シ○凡睡ラシムベキ諸症ニ
ノ阿芙蓉ノ害アル症ハ麝香ヲ用テ良○一婦人四
十三歳體質薄弱ニノ子宮衝逆ニ乾喘ヲ兼子患ル
一數年偶春末痛風ヲ發シ四肢劇痛ノ轉側スル
能ハズ又頭痛胃痛心腹ヲ發シ十一月三日ニ至テ
胃痛増劇シ又呃逆及ビ搖掣ヲ發シ背ニ甚キ鼓動
ヲ覺エ攀急漸ク喉ニ上衝ノ呼吸窒塞センヲ恐
レ日夜臥ス一能ハズノ机ニ靠リ稍頭ヲ傾側スレ
ハ痛殊ニ甚クノ常ニ頭ヲ扶持セシム又脚大ニ腫

遠西名物考 卷二十五 風雲堂藏

遠西行傳 卷二十五 十六

起ス。但脚腫微減スレバ喘ヲ發ス。患婦從前諸藥驗
ナキ故ニ唯温煖ニ保護シ葡萄酒少許宛用テ其劇
キ胃痛ノ減スルヲ俟ノ云。同月二十一日ノ夜ニ至
テ予始テ左ノ劑ヲ與フ 次ノ麝香鎮
瘕飲ヲ云 但患者甚ダ虚
羸セル故ニ半劑ヲ用ヒ次テ燒酒少許ヲ與フ。其後
胃痛呃逆搐掣頓ニ解散ス。三時ヲ經テ又半劑ヲ用
ヒ。翌朝一劑ヲ一次ニ用ヒ爾後二時ニ一劑宛用フ。
四劑ヲ用ルニ至テ大ニ發汗シ次テ机ヲ去リ卧床
ニ就テ安眠スルヲ得タリ。其後前症發セズ其汗
二十二日ノ午後ヨリ連綿ノ二十四日ノ夜ニ至テ

止ム。其後此劑ヲ止メ清涼飲ハ多ニ麝香十二匁ヲ
加ヘ用ヒ 清涼飲ノ一方桂露四匁。
砂糖ニ多。水十匁。調和ス。 前症逾快愈シ脚
腫亦消ス。但二十七日ニ至テ患者復胃痛ヲ發セン
トスルヲ覺ユ。因テ前方鎮瘕飲一劑ヲ與ヘ燒酒少
許ヲ飲シメ翌日又一劑ヲ用フ。其後諸症再發セズ
十二月四日ニ至テ患者卧蓐ヲ除キ平復ヲ告グ

麝香鎮瘕飲

銀朱 五十匁
麝香 上好者 十六匁
舍利別 適宜

遠西行傳 卷二十五 十六

右研和シ一劑トス此方右ノ如キ神經病ニ數治驗
ヲ得タリ○狂犬咬傷ニ麝香銀朱各十六氏調和
一服トシ用テ大効ヲ稱ス嚙下シ難キ症ハ吉利詞
參兒トシ直腸ニ注輸スベシ○咬傷毒及ビ創傷ニ
由テ瘰ヲ發スル者ハ麝香ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用テ驗
多シ阿芙蓉一味用ルニ比スレバ良効アリ○麝香
ヲ綿ニ包ニ耳中ニ挿テ間聾ヲ治ス
製造麝香
上好ノ麝香ハ貴價ニノ尋常多ク用難シ故ニ一種
ノ藥劑ヲ製ノ麝香ニ代用ス是ヲ製造麝香ト曰フ

伍按叔布
依福揭裴

性功麝香ト同一般ナル故ニ麝香ヲ用ベキ病ニ多
ク施スヲ得但眞品ニ比スレバ氣味差佳ナラズ
或云眞品ニ比スレバ功力差劣
レリ故ニ服量ヲ増シ用フベシ故ニ丸藥トシ用ヒ
或ハ丁幾去爾トシ與ベシ神經及瘰癧ノ諸症牙關
緊急疫效等麝香ヲ用テ効ナキ症ニモ間殊効アリ

製法

琥珀油

再餾者

消石精

六弓ニ作ル

右琥珀油ヲ磁盃ニ内レ消石精ヲ一二滴宛加ヘ每
滴硝子棍ヲ以テ速ニ攪和スレハ滾動沸騰シ大ニ
蒸氣ヲ發ス故ニ風氣開達ノ處ニテ製シ其蒸氣ヲ

本草綱目卷之二十一 十八

避クベシ。右二品ヨク混和スレバ稠厚ノ液トナル。是ヲ静定スルヲ十二時自ラ凝結シ上面黄色ニノ華爾斯様ノ質トナリ麝香ノ氣アリ。其底ニ酸味ノ液アリ。其華爾斯様ノ者ヲ取り剥ボツ篤ト亞ア斯スノ稀キ溶リ液ヲ剥リ篤ト亞ア斯ス少許ヲ以テ洗淨ノ盡ク其粘著セル酸味ノ液ヲ去リ。次ニ温湯ニテヨク洗ヒ。其湯必モ酸味ナキニ至テ乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯ス。

製造麝香丁幾知爾

製造麝香 適宜

燒酒 八倍

右調和ソ溶化セシム。○服量六滴ヨリ四十滴マデ葡萄酒等ニ點服ス。

○按ニ龍涎香ハ性功大抵麝香ト同シ。和蘭近來是ヲ用ルレ稀ナレル古方書ニ多ク載テ奇効ヲ稱シ且本邦沿海諸地モ亦是ヲ産ス。蘭山本草啓蒙云。九州海面ニハ自ラ浮ベル者多シ又云。今肥前平戸土州羽根浦及ビ紀州熊野三輪崎大地浦等ニテハママカクジラ一名シジャカウクジラ真域ハ甲鯨ト呼フ左ノ譯説ニノ腹中ヨリ取出ス。他鯨ニハ所謂加カ失シ礪リ篤トナリノ腹中ヨリ取出ス。其形ナシ。即チ有大魚腹中剖得者珍時ト云モノナリ。其形

本草綱目卷之二十一 十八

遠西名物考 卷二十五 一十九 廣雲堂

凝結ノ松脂ノ如シ。色白キ者ヲ「シラフ」州ト云。色淡赤ナルヲ「アカフト」云。黑白相間ルモノヲ「ゴマフト」云。以上啓予紀州ノ海邊ニ漁スル真甲鯨ヨリ取ル者ヲ見ルニ西説ニ舉ル灰色ニノ上好ノ品ナリ。藥用ニ供スベシ。故ニ左ニ是ヲ附録ノ考

證ニ備フ

龍涎香

アムブラゲレシア 蘭

○此物大小塊片ヲ成シ上品ハ淨潔ニノ乾キ。蠟ノ如ク凝固シ脂氣アリ。嚼バ柔ニノ蠟ノ如ク齒ニ粘著ス。然レ輕クノ水ニ投スレバ浮ニ又破碎シ易ク粉末トナリ易シ或

ハ薄片ヲ層疊ノ成ル如キ者アリ。外面粗糙灰色或ハ黑色ヲ帶ビ。裏灰白色ニノ黑色ノ斑點及ビ條紋若クハ小白點アリ。或云顯微鏡ニテ觀レハ灰白ノ芒狀ノ條理アリ或ハ黒著キ味ナク又香氣微ナリ。白黄ノ斑點條紋アリ。然レ是ヲ摩擦シ或ハ掌中ニ温メ或ハ微火氣ヲ被レバ柔ナル「蠟」ノ如クニノ微甘樣ノ香氣ヲ發ス。或ハ末トシ他藥ニ加レバ芬香ヲ生ス。或ハ是ヲ火ニ投スレバ速ニ燃テ鮮明ノ焰ヲ發シ其烟灰色ニノ佳香アリ。或云燈火ニ燃セバ鮮明ノ焰ヲ發ス。ヨク燃レバ烟火ナシ。

試法 此物少許ヲ取テ熱セル小刀上ニ置バ溶テ蠟

遠西名物考 卷二十五 廣雲堂

ノ如ク。佳香アリ或ハ是ヲ銀匙ニ入レ蠟燭ノ火上
ニ置、バ盡ク焔テ泡沫ナク黄色若クハ灰白トナリ
或ハ烙鐵版上ニ置、バ烟ヲ生シ燃テ其質殆ト消シ
灰残ル、其甚ダ少キハ皆上品トス其灰多ク或ハ石
灰様ノ白土残ルハ偽品トス或ハ此物ニ燒針ヲ刺
シ貫テ香氣アル粘脂流出シ或ハ其針ヲ貫クニ粘
著澁滯セザルハ上品トス。或ハ磁壺ニ沸湯ヲ盛リ
此物ヲ刮リ入テ暫ク蓋閉スレバ盡ク溶化ノ上面
ニ浮ムハ上品トス○白色ニシテ香氣微ナルハ未ダ
熟セザル者ニシテ効力劣レリ。藥舗ニ是ヲウツテア

ムベル白龍涎ト名ク或ハ黑色滑澤ニシテ鑿ニ類シ
重實ニシテ華爾斯ノ如ク是ヲ破、バ裏黑色或ハ楮黑
ニシテ斑點條紋ナキハ總テスワルテ。アムベル黑龍
ノト名ク。或ハ鬆疏ニシテ水棉ノ如キアリ。共ニ皆下
品ニシテ藥用トセズ。其性龍涎香ニ似タレ、其質硬固
ニシテ速ニ溶化セズ泥土等ノ渣塗多シ。此品榜葛刺
哥魯漫得爾亞細亞ノ海ニ多ク出ツ○
總テ淨潔ナラズ汚物雜リ軟ニシテ濕者ハ下品トス
偽品此物偽品多シ或ハ蠟ニ蘇合香。安息香。其他芳
香ノ油ヲ加テ造リ或ハ蠟ニ滿、華爾斯松等ノ脂ヲ

遠西名物考 卷二十五 風雲堂

二十

云^ヲニ蘇合香。麝香ヲ加製シ或ハ麝香。失歇^シ篤^ト出^ツニ沈香。蘇合香ヲ以テ贗造ス或ハ是ヲ採テ未ダ日ヲ經ズ軟ナル時他物ヲ雜ヘ造ル者多シ然^レモ是ヲ燒^クハ皆其香氣ヲ以テ偽リ雜ル品ヲ知ルベキナリ

產地 亞細亞洲諸國ノ海邊ニ多シ。上品ハ蘇門答刺^ラ麻打葛失葛爾^ル亞細亞洲島ノ名ノ海濱ニ出ツ其他^ハ麻刺拔^ハ爾馬路古島^ク亞細亞洲島ノ名ノ海濱ニ出ツ其他^ハ麻刺拔^ハ黑海^ノ歐羅巴亞細亞洲島ノ名ノ海濱ニ出ツ其他^ハ麻刺拔^ハ諾耳勿入亞莫斯箇未亞^ア等ノ海ニ出ツ

秤量 其最モ大ナルハ秤量百八十二比。或ハ百九十

四比或ハ二百比許アルヲ採ル^トアリ。檢弗兒^ル名ノ説ニ日本ノ海濱ニテ百三十比及ビ百八十五比アルヲ採ル^トアリト云

試質 此物。水ニハ溶化セズ。沸湯ニ浸セバ漸ク溶^トテ油ノ如シ。尋常ノ燒酒ニハ是ヲ加テ煮ルニ非レバ溶化セズ。亞爾箇兒^ル純粹^ニ燒酒ニハ溶化ス。是ヲ火ニ上セ温^ムレバ殊ニヨク溶化ス然^レモ^レ如キ黑色ノ^ニ生^ルシ其溶^トタル者モ漸ク稠クナリ。時ヲ經レバ雲ノ如ク白キ^ニ生^ルシ稍凝結ス。是レ其燒酒漸ク風化メ消散スレバナリ。其凝結セル者ヲ取テ乾カセバ光澤

本草綱目卷之五
蘇合香

アル脂トナリ其質宛モ斯百兒麻攝的スパールマセテ失碌篤ノ一種加カヨリ取ル脂ナノ如シ或ハ此物ヲ亞爾箇兒ニ投シアールカノアリ部ニ出ツノ如シ或ハ此物ヲ亞爾箇兒ニ投シアールカノ亞兒加利鹽若クハ蒸餾油ヲ加テ研和スレバヨクアールカノ溶化メ丁幾去爾トナル榨油ニハ溶化セズ蒸餾油ニハ溶化ス亞的兒ノ綠蓂ニハ速ニ溶化ス是ニ燒酒ヲ加レバ白クメ蠟ノ如キ者沈ム此物ヲ蒸餾スレバ初メニ水液出ツ次ニ酸精出ツ是ニ甚ダ香氣アル帶黃色ノ稠キ油及ビ鹹酸味ノ揮發鹽雜ルト宛モ琥珀精ノ如シ或云龍涎香一錢ヨ其列篤兒多ノ底ニ黑色光澤アル渣塊殘ル是即チ昆黝密那ニ琥珀條ニ註ス

西行雜記 卷之十一 五十二 風雲堂藏

ナリ。則チ其質琥珀ノ如クナルヲ以テアムベル。グレイスノ名アリアムベルハ琥珀ナリグレイスハ珉ヲ蒸餾スレバ右ノ如キ酸然レ琥珀ハ滑澤透亮化ノ精油揮發鹽出レバナリ然レ琥珀ハ滑澤透亮ニノ香氣ナシ。龍涎香ハ是ニ及ス。然レバ此物ハ唯許多ノ粗朴ナル鹽質ト昆黝密那質トヲ以テ精微揮發ノ油鹽ヲ包攝ノ一種ノ精微香竄ノ硫黃質ヲ成ス者ナリ昆黝密那及油ニ硫黃ヲ含有ス凡シス者ナリ芳香ノ者ハ皆精微ノ硫黃質トス

原始 龍涎香ハ多ク海上ニ漂漾シ或ハ海巖ニ懸留シ或ハ海濱ニ簸揚シ或ハ鯨ノ一種カ如失碌篤ト上ニニ眞甲鯨ナリ。斯百兒麻ノ腸ニアリ。然レ其說古來一攝的ノ條ニ詳ナリ

西行雜記 卷之十一 五十二 風雲堂藏

西名考 卷二十一 二十三


様ナラス。今是ヲ左ニ歴舉シ。就テ其原由ヲ論定ス
○或云。亞細亞地方ノ蜂。窠ヲ海岸ノ巖窟ニ作り其
蜜及蠟。風波ニ蕩滌セラレテ海ニ流レ泡沫トナリ
大陽ノ暖氣ト海鹽トニ由テ化釀シ凝固ノ此物ト
爲ル故ニ稀ニ其塊。半バ蠟ヲ雜ヘ或ハ蠟ト蜂巢ト
雜ル者アリ。是其未ダ熟セザル者ナリ又龍涎香ヲ
純粹ノ燒酒ニ浸セバ稠厚ノ液其底ニ沈テ宛モ蜜
ノ如シ或ハ加失碌篤ノ腹中ヨリ出ル者モ蠟ノ如
キ者雜ルヲアリト○或云。麻打葛失葛爾及ビ馬兒
地襪。諸島萬ニ於テ香草ヲ食フ諸鳥ノ屎。海ニ入テ

凝固シ此物トナル加失碌篤其鳥屎ヲ吞ム六ハ糞
トナリ海ニ浮漾ノ是ヲ成スト○或云。一種ノ膠粘
ナル樹脂。海岸ヨリ海ニ流溢シ凝固ノ成ルト。或云。
是レ香氣アル樹脂ニノ羯布羅ノ一種ナリト。或云。
此物。草木ノ脂類ナル片ハ琥珀ノ塊片ノ如クナル
ベシ。龍涎香ノ如クナルベカラズト。或云。委亞那南
墨利加洲ニ産スルモト名クル樹脂ハ香氣龍涎
ノ國名ニ産スルモト名クル樹脂ハ香氣龍涎
香ノ如シ。是ヲ蒸餾ノ出ル精及ビ油。龍涎香ノ精及
ビ油ト同シ。此樹脂ノ碎塊。暴風雨ニテ海中ニ流レ
大魚是ヲ吞テ其腹中ニ凝結シ或ハ糞トナリ海上

西名考 卷二十一 二十三

ニ漾ヒ此物トナルト○或云。鯨ノ交接ノ精液海中
 ニ流溢シ時ヲ經テ凝固シ是ヲ成スト○或云。此物
 ハ加失碌カシロク篤ト註上ニノ膀胱中ニアリ膀胱ハ長三四尺
 許。潤二三尺許。其内ニ橙皮色ニノ油ノ如キ液アリ。
 液中圓塊アリ。多キモ四個ニ過ズ。其小ナルハ三拇
 指横徑許。大ナルハ十二拇指横徑許。秤量一匕半ヨ
 リ二十七匕許アリ是ヲ破レバ薄片層疊シ葱蒜ノ
 根ノ如シ。其膀胱中ニアル片ハ臭氣甚ダシ。是ヲ取
 出シ日ヲ經テ乾ケバ佳香アリ。是自ラ膀胱ヨリ海
 中ニ通洩スレバ數個粘著ノ自ラ大塊トナル。或云。

是レ結石ノ類ニ多ク是ヲ生スレバ其魚病テ死
 ス。人ノ膀胱ニ結石ヲ生スルガ如シ○或云。加失碌カシロク
 篤トハ好テ烏鰂。蝸牛ヲ吞ム故ニ大塊ノ龍涎香中ニ
 偶、烏鰂ノ嘴。蝸牛殼雜ル者アリ。是レ龍涎香ハ此魚
 ニ生スル明證ナリト。又云。烏鰂ノ膽液質ノ汁。此魚
 ノ糞ニ雜リ凝固ノ龍涎香トナル。凡ソ尿類ニ含メ
 ル膽液。久ク日ヲ經テ化釀スレバ其臭變ノ香竄ノ
 氣ヲ生スト○或云。此物ハ加失碌カシロク篤トノ腸ヨリ分泌
 シ出ル一種ノ脂液凝結ノ其糞ニ雜リ海中ニ通洩
 スル者ナリ故ニ此魚ナキ海邊ニハ龍涎香ヲ産セ



又此魚ノ腸中ニ一塊八十比或八百比ノ龍涎香
 ヲ得ルコアリ又檢弗兒名ノ説ニ日本海ニテ一塊
 百三十比アルヲ此魚ノ腸ヨリ採ルコアリ又其糞
 トナリテ大塊ヲ成シ其海邊ニ漾フ者ヲ採ルコア
 リ其新ナルハ軟ニ牛屎ノ如シ日本ニテ是ヲ鯨
 糞ト名ク其他亞細亞地方東南ノ諸島ニテハ是ヲ
 魚糞ト名ク按ニ猶若水本網別集載大魚腹中剖出
 如斗大焚之清香可愛貨於蘇門答刺之
 市○時珍綱目云有大魚腹中剖得者其狀初若脂膠
 黃白色乾則成塊黃黑色○山村氏增譯采覽異言四
 明并子ノ説ヲ引テ云我邦ニテ鯨ヲクシラト呼
 フハ加知磔馬ノ轉ニテ則カシロナラシト云リト

○或云一種ノ技爾撒謨様ノ脂液海巖ノ罅隙ヨリ

海中ニ流溢シ鹽氣ニテ凝固シ此物トナルト○龍
 涎香ノ繇テ生スル所ノ諸説異同アルコ右ニ舉ル
 如シト雖モ製煉術ニテ是ヲ蒸餾シ蒸餾ノ説
 前ニ出ツ其質
 毘黠密那土中
 脂油ヲ研究スレバ此物ハ地中ヨリ出ル
 ニノ一種ノ華爾斯ナリ是レ地中ノ火氣及ビ太陽
 ノ暖氣ニテ海底ヨリ湧出シ初ハ油ノ如ク流動シ
 膠粘ニ潮水ノ沫ニ混和シ或云油質ノ液潮水ニ
 和ノ一種ノ沫トナル
 宛モ黑海ニ浮ベ波濤ノ漂蕩海鹽ノ泡釀太陽ノ
 ル油様ノ沫ノ如シ暖氣ニ因テ漸ク化熱シ凝結ノ體ヲ成シ海上ニ浮
 漾ス故ニ或ハ鯨類ノ大魚其沫ヲ吞ム片ハ腹中ニ

テ漸ク烹釀凝固ノ此物ヲ成シ或ハ糞トナリ復マ海
上ニ漂漾ス或云加カ失レ礫ト此沫ヲ吞テ吐下セズ腹
游動セズ其海底ニ出ル脂液モ其地ニ隨テ一様ナ
死ストラズ故ニ此物モ或ハ灰色ニノ輕ク或ハ黑色ニノ
重キ毘ビ黠ト密ミ那ナ鑿ゾノ如キアリ或ハ稀ニ小石角骨爪
甲介殼魚嘴蜂巢等此物ノ中心ニ在ル者アリ是レ
海中或ハ魚腹中ニテ其膠粘ノ脂液右ノ諸物ニ纏
著ノ凝固シ塊ヲ成ス者ナリ按ニ物理小識云外紀
出如脂至海凝塊有千斤者
主治大抵麝香ノ如シ故ニ麝香ノ的當スル諸症ニ

用フ。麝香ニ比スレバ刺戟スルト少キ故ニ體質感
動シ易キ患者ニ用テ腦神經ヲ強壯シ精神ヲ爽快
シ鎮痙ノ効ヲ稱ス又神思鬱憂病ニ殊効アリ○精
力消耗シ元運生氣ノ怠慢虛乏ナルヲ回復ス○失
氣眩冒等ノ神經諸病總テ衰弱枯瘦セル患者ニ偉
効ヲ稱シ男女陰具ノ虛弱ナルヲ強壯ス○此藥麝
香ニ比スレバ効劣弱ナリ故ニ近來是ヲ用ルト稀
ナリ唯香料並ニ粧顏料ニ加ヘ用フ○服量通例豌豆
豆大ヲ用ヒ或ハ二匁ヨリ一月マデ用フ。但レ是ヨリ
多ク用レ疋較著ノ害ナシ或ハ冰糖雞卵葡萄酒等

本草綱目卷之二十一 麝香 二十六

ニ和シ用フ或ハ一匁ヲ取り乾淨消石十匁ニ加ヘ
 毎日用フ○天質薄弱ニノ感動シ易キ人及ビ婦人
 ハ此藥ノ香氣ヲ嫌フ者アリ。斯ノ如キ人ノ眩運昏
 冒子宮衝逆。心動悸。鬱憂病。脾病等ニハ是ヲ用テ害
 アリ○一味燒酒ニ浸シテイキタル丁幾去爾トシ渣ヲ去リニ
 三滴ヨリ十滴マデ葡萄酒或ハ桂露ニ點服ノ良或
 ハ複方テイキタル丁幾去爾ヲ製シ用フ左ノ如シ

龍涎香 テイキタル 二匁
テイキタル 麝香 一匁
テイキタル 沙糖 一錢
テイキタル 桂油 六滴

燒酒 橙花ヲ浸ス者
四弓半

右龍涎香ヲ燒酒ニ加ヘ煮テ溶トカシ次ニ餘藥ヲ加ヘ
 浸シ硝子壘ニ内レ固封シ大陽ニ暴サラシ或ハ煖處ニ
 置テ數日ニノ藥氣ヲ出シ漉過シ固封シ貯ヘ十滴
 マデ白湯ニ點服ス○左ノ方亦峻効アリ

龍麝膏

龍涎香 一錢
 麝香 十匁
 桂油 五滴
 薔薇露ニ浸ス
 沙糖 二弓

右研和シ硝子壘ニ收メ貯ヘ。十匁ヨリ二十匁マデ
 用フ○右ニ方。精神ヲ爽快シ胃ヲ健運シ神思鬱憂

遠西名物考 卷二十一

遠西醫方名物考 卷二十五 二十八

病。脾病。等ハ對症ノ解凝劑及ビ下劑ヲ與ヘテ後。此劑ヲ用テ其神經ノ諸症ヲ治シ元運生氣ヲ强健ニス一二滴。諸飲液ニ加テ佳香ヲ賞ス子宮病及ビ新媿ノ婦人ハ此劑ノ香氣ニ堪ヘズ或ハ脾病鬱憂病ノ感動シ易キ患者ニ是ヲ用レバ眩運嘔噦ヲ發スルアリ 揭叔福 叔伍依

遠西醫方名物考卷二十五終

遠西醫方名物考卷二十六

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補

失歇篤蘭 シベテウム 羅

○按ニ失歇篤ハ靈貓ノ兩陰間ニアル囊中ノ香液ナリ靈貓一名香狸。和蘭ニモスクス。カト又シヘト。カトト名クモスクスハ麝香ナリカトハ貓ナリ失歇篤ノ氣麝香ニ似タルヲ以テナリ本邦ニテ是ヲジャカウ子コト呼ブニ相符ス和産詳ナラズ薩州及ビ長崎ニハ稀ニ舶來アリト云

遠西醫方名物考 卷二十六

遠西名物考 卷二十六
靈貓

靈貓形ナ猫ニ似テ稍大。鼻端ヨリ尾ノ端マデ二尺餘。頭短ク鼻長ク眼小、稍長シ。耳小、貓耳ニ似テ尖ラズ。牙尖利ニノ狗ノ如シ。脚短小。前脚殊ニ短ク五指横徑許。五指アリ。爪直ニメ尖リ黒シ。全軀ノ毛ニ様アリ。一ハ長ク硬粗ニメ黑白茶褐ノ三色雜リ。黒斑及ビ條紋ヲ爲ス。一ハ短ク柔細。灰色ニメ赭色ヲ帶ビ。縷縮ノ長毛ニ間ル。頭ノ兩脇ニ大ナル黒斑アリテ眼ヲ圍ム。體軀、頸及ビ尾ハ毛長ク硬粗ナリ。頭ハ毛短ク灰色ニメ黒色間ル。鼻灰白。其端黒色。耳ノ外面黒ク。裏白シ。頸、黒白ノ斑ヲ爲シ。吐ト腹ハ黒シ。

尾ノ上面ハ黒色。兩側及ビ下面ハ白毛雜リ。或ハ黒白ノ輪紋ヲ爲ス。脚ハ毛短ク頭ノ如シ。

產地 此獸ハ亞弗利加洲ノ諸國殊ニ加依魯、厄日多

爲、匿亞、亞墨利加洲ノ伯西兒、新伊斯把泥亞、字露、或

ハ支那、其他亞細亞洲、諸國ノ山野ニ穴居ス。多ク子

ヲ産ム。小獸諸鳥ヲ食トシ。缺レバ果類、菜草ヲ食フ

係蹄ヲ以テ捕ヘ。鐵檻ニ内レ。他邦ニ貨ス。

性情 性兇悍ニメ馴レ難ク。人是ニ觸レハ抓破シ。或

ハ咬傷ス。但、幼ヨリ畜テ檻ヲ放チ。漸ク慣レシムレ

バ。馴レテ戲ル。猫ノ如シ。然レ必ク怒レバ動モスレ

遠西名物考 卷二十六 風雲堂藏

近西各物考 卷二十六

ハ人ヲ咬ム其狀貌柔弱懶惰ナル如シト雖モ蟲鼠鳥類ヲ捕ルニハ奔跳飛越ノ輕敏ナルト貓ニ減セズ。夜視眼光アルト亦貓ト同シ

食料牛乳及ビ雞卵ヲ最良トス。肉類及ビ穀果蔬菜等ニテ畜ヘバ失歇篤ノ性能香氣劣弱ナリ是ヲ他國ニ輸ルト雖モ意ヲ用テ良食ヲ與ヘ畜ヘハヨク生育ノ失歇篤ヲ取ルト產地ニ異ナラズ然レ元來暖國ノ産ナル故ニ寒地及ビ寒暖中和ノ國ニ來レバ精力稍減ノ子ヲ産セズ

香囊牝牡凡ニ陰具ト肛門トノ間ニ一披溝アリ内

ニ短毛被^{オホ}フ其左右ニ膜囊アリテ皮上ニ隆起シ。溝ノ唇ヲ爲ス。其囊長三拇指橫徑許。潤ニ拇指半橫徑許。其内。鵝卵ヲ容ルベシ或云此囊牡ハ大ニノ牝ニ倍スト囊ノ内外幾多ノ腺アリ又溝内ノ左右ニ二腺アリテ共ニ失歇篤ヲ分泌シ囊中ニ藏ム。溝内ノ兩側ニ各一孔アリテ兩囊ニ通シ失歇篤ヲ溝ニ流泄ス

採香失歇篤ヲ取ルニハ其檻ノ前ヨリ棍ヲ入テ是ヲ後邊ニ逐行リ檻後ノ格子ノ間ヨリ其尾ヲ把住シボツ板二枚ヲ檻ニ入レ此獸ノ兩脇ヲ夾テ動搖セザラシメ。後脚ヲ格子ニ結縛シ小匙ヲ以テ徐々ニ溝内

近西各物考 卷二十六 風雲堂藏

遠西名物考 卷二十六

ヲ刮^{ツク}ゲ其液ヲ抄^{スク}ヒ取ルナリ。或ハ時候ノ寒暖ニ隨テ其液出ル^ト多少アリ故ニ毎日或ハ隔日或ハ三日ニ一次^{イナド}取り大抵二日ニ一錢許出ツ。此獸山野ニ在テハ自ラ木石ニ觸^レテ此液ヲ剔出スト云

香質 失^シ歇^ト篤^トハ其質蜜ノ如ク牛酪ニ似タル稠厚ノ液ナリ新鮮上好ノ品ハ白色及^ビ黃白色。其氣烈ニシテ麝香ノ如ク且^ツ琥珀油ノ如キ臭ヲ帶ブ。味苦シ。上品ハ白色ナレ^レ時ヲ經レバ漸ク黃色トナリ終ニ赭色トナル。或ハ帶黃灰色或ハ赤色ヲ帶ル者アリ。凡^ソ赭色多キホド逾^ク下品トス是ヲ紙ニ攤^クテ平等ニシ

粒塊ナク脂ノ腐敗セル如キ臭氣ナキヲ上品トス此液ニ酪及^ビ脂類ヲ雜ヘ偽リ販ク者多シ○乳汁及^ビ雞卵ヲ以テ畜フ者ハ失^シ歇^ト篤^ト白色ニシテ上品ナリ。肉類果菜ヲ以テ畜フ者ハ其液赭色ニシテ其香及^ビ性功劣レリ

主治 油氣揮發鹽多シ。鎮痛。解凝。緩和ノ良効ヲ奏シ神經ヲ強壯ス。疝痛。小兒腹痛。子宮硬腫及^ビ衝逆等ニ是ヲ臍ニ擦テ偉効アリ。但^シ婦人ハ此香氣ヲ嫌フ者多シ○多ク香料ニ用フ。少許ヲ取テ他ノ香料ニ加^レレバ佳香ヲ生メ麝香ノ如シ○此物燒酒ニハ溶

遠西名物考 卷二十六 風雲堂

化セズ。油脂類ニハヨク溶化ス 依 叔 伍 叔

失鳩答羅

レケルフル又ゲフヲクテシケルリク蘭

形状 此草高二三尺許。圓莖滑澤ニ中虛。苗香ノ莖ニ似テ太ク。節アリ。是ヨリ傍枝ヲ生メ逐次ニ小挺ヲ分ツ。淡綠色ニメ紅紫若ハ赭色ノ斑アリ宛モ蛇皮ノ如シ葉ハ芹葉ニメ粗糙光澤アリテ羊齒狀ヲ爲シ面綠色ニメ背淡綠色。揉テ嗅ゲバ嫌ヒ惡ムベキ毒様ノ臭氣アリ。貓尿若ハ芫菁ノ臭ノ如シ。味辛苦ニメ微甘。莖枝共ニ莖衣アリ。葉柄ノ著ク處ハ凹

ニノ莖ヲ包圍ス莖枝頭ニ五瓣ノ小白花ヲ開キ大ナル繖ヲ爲ス。花後子ヲ結ブ過泥子テ差大ニ似テ白ク五縱道アリ根太サ指ノ如ク二三寸若ハ七八寸許。白色。其氣苛烈ニメ味微甘ヲ帶ブ。嫩根ハ乳白色ノ汁ヲ含リ平原荒野ノ陰地。路傍。溝池ノ邊ニ生シ二年ニノ枯レ新苗生ス。園生ノ者ハ藥用トセズ。○此草種類多ク相似テ真ヲ亂ル。ヨク擇ムベシ莖ニ斑アレハ臭氣ナキハ本種ニ非ズ。斯ス篤爾窟ルノ人ノ説ニ此根ノ生汁ヲ舌ニ滴スレバ苦辛ニメ舌麻痺シ次テ腫痛拘強ノ言フヲ能ハズ。本種ニ非レバ

遠西名物考 卷二十六 風雲堂藏

此苛烈ノ味ナシト云リ一種ギフチヘ。ワトルシケ
ルリングト名ル草アリ全形失鳩答ノ如クニノ莖
ニ斑ナク葉ノ臭氣微ナリ。莖ニ稜及ビ條理アリ。根
ニ近キ處赤色ヲ帯ビ葉差長ク鋸齒アリ。根黑色。拇
指大ニノ末尖リ鬚根アリ。截レバ焦黄色ノ汁出ツ。
味苦シ榕按ニ是レ本邦ニ和蘭及ビ勿能泥亞都
ニ於テモ誤テ是ヲ失鳩答ニ充テ用テ効驗ナシト
スル者多シ一種ベドウルムデトイン。シケルリン
グト名ル者ハ葉黒綠色ニノ背光澤アリ一種ベド
ウルムデ。パイプロイドト名ル者ハ莖葉共ニ毛

茸アリテ粗糙ナリ又一種根太クノ卵圓形ノ者ア
リ此皆其種類ニメ藥用トセズ○凡ソ野草ヲ食フ
獸類ハ自ラ此草ノ毒アルヲ知テ是ヲ避ク
○榕按ニ本邦ニオホセリドクセリ大芹毒芹芹葉鈎吻ト呼ブ草。
毒アリテ形狀失鳩答ニ似タリ故ニ失鳩答ニ充
ル者アレ凡其莖ニ斑ナク。葉ニ貓尿ノ如キ苛烈
ノ臭氣ナシ。是右ノ譯說ニ舉ル一種ニメ藥用ニ
充ザル者ナリ。和蘭ニ於テモ誤テ是ヲ本種トシ
用テ効ナシトスル者アリト云江戶郊外ニ於テ
未本種ニ充ベキ者ヲ見ズ故ニ姑ク其形狀ヲ記

ノ後來充當ノ考證トス。福云失鳩答越幾斯劑ノ
 効用雙蘭菊越幾斯劑前ニ出ヅノ如シト。又莨菪モ一
 種ノ毒草ニシテ瘰癧毒。腺腫ヲ治スル効失鳩答ノ
 如シ。故ニ是ヲ失鳩答主治ノ後ニ附ノ參考ニ備
 性失鳩答ハ一種ノ酷厲毒アリテ過服スレバ眩暈
 昏冒麻痺搐掣精神錯亂或ハ吐利心腹痛胃腸焮衝
 ヲ發シ速ニ救療ヲ加ヘザレバ死ス。其麻痺酷厲毒
 ノ性莨菪番木鱉ノ類ニ屬シ凝體諸器ヲ溶解シ血
 液ヲ渙崩シ神經ヲ虛衰セシムル。自餘ノ酷厲毒
 ル麻痺毒アリテ解凝ノ効ヲ爲ス諸藥ノ如シ。故ニ

虛弱ノ人及ビ神經感動シ易キ者ニ是ヲ用フレバ
 兼用ノ藥ヲ以テ其害ヲ防クベシ
 解毒法 若シ是ヲ過用ノ瞑眩烈キ者ハ微温湯ニ油
 若ハ蜜ヲ加ヘ與テ吐セシメ或ハ吐劑ヲ用テ其毒
 ヲ除ケバ治ス。或ハ橙汁醋等酸味ノ液ヲ與フベシ
 ヲク其毒ヲ解ス。海葱蜜モ亦良。又清涼緩和ノ吉利
 詞ハテ兒ヲ施メ腸ノ焮衝ヲ治スベシ
 主治 刺戟衝動シ麻痺セシメ疼ヲ止メ睡ラシメ。血
 中ノ酷厲毒ヲ驅除ス。○凝結ヲ溶解稀釋スル峻藥
 トス。癌瘰ノ硬腫。頑固ノ腺腫瘰癧ヲ消散ス。○斯篤

遠西名物考 卷二十六 七 風雲堂藏

爾^ル窟^ク人^名此藥ヲ用テ癌腫ニ奇効ヲ奏シ其經驗說甚多シ然レ^レ醫家或ハ是ヲ用テ効ナク或ハ潰破ノ癌瘡ニハ却テ腐敗ヲ增長ノ害アリトシ是ヲ詆誹スル者少カラズ是究竟癌腫ト腺腫トノ區別明白ナラザレバナリ眞ノ癌腫ハ失鳩^{シキウ}答^タ及^ヒ莨若^{リョウニョク}等ニテ治スルヲ稀^コナリ唯癌ニ似タル腺ノ硬腫瘰癧腫ニハ効驗アルヲ毫疑ナシ患者甚ダ衰弱スレ^レ比較著ノ酷厲毒鬱蓄セル候ナク其腺劇キ炊^ク衝^クナキ者ハ是ヲ用テ殊効アリ○酷厲ナル瘰癧毒ヨリ來ル腺ノ硬腫ハ此藥ヲ用テ治スルヲ古今明哲ノ經驗甚ダ

多シ傑^{ケツ}泄^セ兒^ル人^名云一患者乳房ニ瘰癧毒ノ硬腫ヲ發シ宛モ乳癌ノ如シ諸醫多ク不治トス此藥ヲ内服セシメテ其腫半消散シ半善膿ヲ釀ノ潰破シ治スト其他瘰癧腫及其毒ヨリ發スル諸惡症或ハ乳癌ノ如キ症ヲ治シ或ハ幾^キ那^ナヲ加ヘ用テ効アル經驗說甚ダ多シ○頑固ノ腺腫瘰癧腫ハ外敷藥ニテ愈スヲナク唯此藥ヲ内服セシメテ消散シ或ハ潰破シ善膿ヲ生ノ治スル者多シ○或云癌瘡様ノ潰瘍臭氣近クベカラス劇痛燒^クカ如キ症ニ此藥ヲ内服外敷シ其酷厲稀涼ノ敗血漿ヲ和解ノ善膿ト爲シ

遠西名物考 卷二十六 風雲堂藏

治スルヲアリ。内服ニハ是ヲ越幾斯劑トシ用ルヲ
良トス。小兒ハ沙糖ヲ加、舍利別トシ或ハ昆設爾弗
ト爲シ用ベシ。○子宮口ノ硬結腫痛ノ漸、癌瘡ノ如
ク臭穢ノ汚液流泄ノ悪性ノ白帶下トナル者ハ此
越幾斯劑ヲ用テ全治スル者多シ。○瘰癧毒ニ因テ
唇ニ癌様ノ腫ヲ發スル者多シ。其症下唇ヨリハ上
唇多ク腫起シ中間坼裂ノ疼痛シ其毒漸、眼ニ浸淫
シ焮痛ノ潰爛ス。便チ此越幾斯劑ニ越謨安没尼亞
幾ノ乳劑製法扁桃乳ト同シヲ加用テ多ク治ス。是尋常失苟
兒陪苦ノ毒ヨリ發スル症ト異ナリ。○癌様ノ硬結

セル腺腫ニ此藥ヲ外敷ノ消散シ其痛ヲ甘解ス或
ハ此草ヲ末トシ玫瑰蜜ニ和シ癌様ノ硬腫潰瘍等
ノ邊圍ニ塗テ剝痛ヲ解散ス或ハ頑固ノ乳房硬腫
ニ此越幾斯劑ノ膏藥ノ如クシ貼ノ消散スル者多
シ。乳房ニ乳汁凝結ノ發スル硬腫ハ殊ニヨク消散
ス或ハ打撲傷其他外傷ニ因テ硬腫トナリ疼アル
者右ノ諸症何モ是ヲ貼メ發泡スルト火傷ノ如キ
者ハ其泡自乾マデ其膏ヲ貼レハ消散ス。若シ發泡
セザル者ハ數是ヲ貼メ發泡セシメ乾シ愈スベシ
○内藏諸腺ノ壅塞硬腫ニ峻効アリ。ヨク其凝結ヲ

溶解シ壅滯ヲ疏散ス小兒ノ肝脾腸間膜等ノ腺壅塞ノ腹肚臍脹硬滿シ肢體羸瘦スル症ニ良驗アリ
○瘰癧毒ヨリ發スル勞效ニ間偉効アリ然レ病勢既ニ增長スル者ハ驗ナシ○肝脾腸間膜等ノ硬腫ニ此藥ヲ蒸溺劑トシ或ハ此越幾斯劑ヲ膏藥ノ如クシ貼メヨク消散ス○或云眞ノ癌腫ハ固ヨリ治スベカラズト雖モ古今ノ醫家此藥ノ治驗ヲ稱スルヲ甚ダ多シ或ハ癌ト腺腫ト相似テ混同スル故ニ癌様ノ腫ト雖モ未增長セズ甚ダ危險ニ至ラザル症ハ先此藥ヲ試用ベシ縱ハ良効ヲ得スト雖モ

他ニ治スベキ藥ナケレバナリ是ヲ用テ諸症逾増進スルキハ唯緩和鎮痛ノ劑ヲ投メ當時ノ患苦ヲ安撫シ劇症ヲ甘解シ其酷厲稀涼ノ液ヲ化熟メ稠膿トナラシメ腐敗ヲ防護シ精力ヲ保續セシムベシト○或云醫家此藥ヲ用テ良驗ヲ得ガル所以ノ者數件アリ是レハ眞ノ尖鳩答ヲ鑒識セズメ誤テ其種類ヲ充用ルニ因リ一ハ患者虛羸シ此毒藥ニ堪ズノ久服スルヲ能ハザルニ因リ一ハ病毒極テ猛惡ニノ藥力是ヲ剋制スルヲ能ハザルニ因リ是猶水銀幾那阿芙蓉等モ百發的當ノ効ヲ得難キカ

如シ。或ハ患者ノ稟賦異常ニ峻攻ノ藥ト雖モ効
ナキコアリ譬バ徽毒ニ水銀ヲ用テ寸効ナク又毫
モ瞑眩セザル者アルガ如シ○此藥ハ酷厲毒ノ各
部ニ凝結ノ牢固頑滯スルヲ溶解シ疏散スルノ峻
効アリ故ニ痛風傷冷毒痛經久治セズ腫痛甚ク諸
藥効ナキ症ニ用テ捷効ヲ得ル者多シ或ハ頑固ノ
臂痛。諸藥効ナキ者初ニ此越幾斯劑少許ヲ用ヒ漸
加テ日ニ半錢ニ至リ三週ニ全治スル者アリ或
ハ此越幾斯劑ヲ膏藥ノ如クシ髑股等ノ痛風ニ貼
ノ消散スル者多シ○徽毒ニ因テ諸部疼痛荏苒ト

ノ解セズ或ハ徽毒經久ノ潰瘍。癰癤硬腫。鼻中潰爛
ノ骨ヲ腐蝕スル等。其他諸惡症。水銀劑升汞等ヲ多
ク用テ効ナキ者ハ此越幾斯劑ヲ與テ大効ヲ得ル
コト多シ。或ハ越幾斯劑効ナキ者ハ此葉ノ末一錢ヲ
取テ蜜一弓ニ和シ用テ速ニ治スルコトアリ其劇痛
休マザル症ハ此越幾斯劑ニ阿芙蓉ヲ加用テ捷効
アリ○此藥ハ凝結ヲ溶解シ蒸氣ヲ發泄シ疼痛ヲ
止ル効アル故ニ徽毒ノ潰瘍ノミナラズ總テ經久
惡厲ノ潰瘍。腐骨疽等ニ内服外敷ノ間併効アリ或
ハ脚ノ癩瘡。諸藥効ナキ者ニ是ヲ用テ速ニ治スル

トアリ○惡厲ノ疥癬。頭瘡。經久ノ瘡瘍。頑固ノ皮病。尋常ノ藥劑ニテ治セザル者ハ是ヲ用テ驗多シ○經久ノ瘡瘍。一切頑固ノ皮病ニ左ノ方。殊効アリ

失鳩答膏

失鳩答 末 二錢

白蜜 二勺

右調和シ一卵匙宛服スル。日二次○痘瘡後。其毒滯著ノ諸惡症ヲ發シ或ハ小兒佝僂或ハ頑固ノ黃疽。水腫。癩。久効。惡性ノ白帶下。黑障眼ノ初發。經久ノ陰痿等解凝ノ諸藥寸効ナキ症ニ左ノ越幾斯劑ヲ

用テ間奇効ヲ得ル。トアリ

失鳩答。越幾斯劑

失鳩答 生鮮者

エキスタラクト。ハン。ドルレケルフル蘭

右花候前ニ莖葉ヲ採リ搗爛シ布袋ニ内レ絞テ汁ヲ取リ磁鍋ニ内レ火ニ上セ手ヲ住メズ攪セ煎熬ノ蜜ノ稠ト爲シ放冷シ此膏二十多ニ失鳩答乾葉ノ細末五多ヲ攪和シ丸藥ト爲ベキ稠ト爲シ固封シ貯フ。○或ハ乾葉ノ末ヲ加ズ絞汁ノニ煎熬ノ膏ト爲モ良大約絞汁六比ニテ此劑一比ヲ製ス。服量 此越幾斯劑ハ日一頁ヲ用ヒ漸加テ一錢ニ至

ル或ハ二日ヲ一丸トシ朝夕一丸宛茶湯ニテ送下
シ三日毎ニ一丸宛増加テ患者頭目困重昏暈惡心
等。瞑眩ノ症アルヲ度トシ服量ヲ減シ若ハ暫ク休
其症治ノ復用ベシ。此藥ハ瞑眩スル許ニ用テ諸器
血液ノ運動ヲ變化セシムルニ非レバ頑固ノ壅塞
ヲ溶解スルコト能ハザレバナリ或云。日一錢或ハ一
錢半宛用テ瞑眩セザル者アリ或ハ日三錢宛一年
半用或ハ日一多宛數月用テ必モ害ナキ者アリ又
一婦人病中此劑五十比許用テ必モ惡症ヲ發セザ
ル者アリト。是漸此劑ニ慣テ瞑眩セズ又越幾斯劑

ハ煎熬ノ製スル故ニ苛烈ノ藥氣蒸散スレバナリ
○服量度ニ過ギ或ハ患者ノ資稟此毒ニ堪ヘズ或
ハ病性ニ的當セザレバ是ヲ用テ惡症ヲ發ス○丸
藥ヲ嫌フ者ハ此越幾斯劑ニ沙糖若ハ蜜ヲ加テ煉
膏トシ用ベシ○或ハ花候前ニ生草ヲ取り火氣ニ
テ速ニ乾シ太キ莖ヲ去リ末トシ硝子壤ニ内レ貯
用フ。服量越幾斯劑ト同シ。但越幾斯劑ニ比スレバ
藥力差峻ナリ或ハ乾葉一握ヲ取テ沸湯二十多ニ
投シ泡湯トシ朝夕小茶碗ニ二碗宛用フ生草ハ尤
酷烈ナリ○或云。此草ノ花ヲ越幾斯劑トシ用テ利

遠西名物考 卷二十六

本草綱目卷二十六
十三

水ノ峻効アリ。殊ニ肢節ノ水腫ニ良。或云。此越幾
斯劑ノ性功大約。雙鸞菊越幾斯劑ノ如シ。○外敷
ノ腫瘍。堅硬腫ヲ消散シ。潰瘍ヲ淨刷シ治ス。此草ノ
濃キ泡湯ヲ蒸溺劑トシ。或ハ此草ヲ煮テ毳布トシ
貼シ。或ハ越幾斯劑ヲ膏藥ノ如ク貼シ。或ハ是ヲ石
灰水ニ溶シ布ニ濕ノ貼シ。或ハ生草ノ絞汁ヲ取テ
硬膏。軟膏トシ貼シ。或ハ生絞汁ニ蜜ヲ和シ煮テ稠
膏トシ外敷シ。或ハ此草ト花ヲ採リ蒸餾ノ露水ヲ
取り施ス等ナリ。
度物淑依核
叔布伍福
ベルラドンナヌアトラハベルラドンナヌドル
マケンデナクトシカデ蘭。和名ハシリトコロ

葦若

〔形状〕此草。圓莖叢生シ高廿二三尺許。直立シ黯赤色
粗糙。枝多シ。葉龍葵葉ニ似テ大ナル。三倍。柔ニシ
汁多シ粗糙ニシ毛茸アリ短梗著ク。葉間數梗ヲ抽
テ花生ス筒様五出。黯紫或ハ黄白色。萼五出。花後圓
子ヲ結ブ大サ葡萄ノ如シ熟スレバ黑色ニシ光澤
アリ。裏ニ汁アリ味甘ヲ帶ブ。數核アリ。根太ク長ク
塊節様ニシ極アリ淡白色或ハ黄色ヲ帶ブ。葉根子
共ニ較著ノ氣味ナシ。或云。葉根共ニ臭氣。是龍葵ノ
一種ナリ山林原野及ビ垣籬ノ陰地ニ生ス。
〔性〕葉根子共ニ大毒アリ少許服スレバ咽喉乾燥。舌

本草綱目卷二十六
風雲堂藏

遠西名物考 卷二十六 十四 風雲堂藏

拘強煩悶シ。次テ眼昏眩運。睡眠ノ後大ニ蒸氣ヲ發
泄ス。多ク服スレバ精神錯亂。發瘧。咽喉胃腸劇痛シ
次テ皮膚及ヒ肺肝腸間膜等焮衝ノ内外壯熱。耐忍
ビ難ク。大渴ノ嚥下ス。能ハズ。食ヲ惡ク。肢體頑麻
不遂昏聩。搐搦ヲ發メ死ス。其屍速ニ腐壞シ肢體各
部紫黑色。肌皮圻裂シ諸竅ヨリ敗血汚液漏泄ノ臭
氣甚シ。或云此草四錢ヲ服スレバ死ス。此草ハ酷烈
ナル麻痺毒ヲ含メリ根殊ニ甚シ。或云。此子五六個
ヲ服スレバ發狂シ口眼掣引メ大ニ笑ヒ。總身漸ク
搐搦シ。發熱燠クカ如シ速ニ救療セザレバ十二時

中ニ死ス。○此毒ヲ解スルニハ酸味ノ液。醋。橙汁等
ヲ多ク飲シムベシ。失鳩答解毒法ト同シ。
〔主治〕葉ヲ藥用トス。或ハ根ヲ用フ。揮發鹽及油アリ
葉・内服ノ解凝緩和ノ藥トス。或ハ生葉ノ絞汁ニ
沙糖ヲ加ヘ舍利別トシ用テ鎮痛催睡ノ効ヲ稱シ
外敷ノ焮腫ヲ消散ス。生葉ヲ貼メ止痛消散ノ効ア
リ。○癌様ノ硬腫ニ内服外敷ノ焮痛等ノ惡症ヲ緩
解ス。然レ眞ノ癌腫ハ効ナキ。失鳩答ノ如シ。○腺
ノ硬腫。瘰癧様腫ニ試用ルニ少モ害ナク。毎ニ良驗
ヲ奏ス。其腫。癌瘡トナラズ。ノ惡性ノ潰瘍トナル症

遠西名物考 卷二十六 十四 風雲堂藏

遠西名物考 卷二十六 十五 腫瘍

モ此根ヲ用レバ腐蝕セズ增長スルヲナシ總テ腺ノ腫瘍。瘰癧様ノ壅塞ヨリ發スル諸症ハ皆峻効アリ是ヲ用テ驗ナキハ此草ノ陳久脫性ノ者若ハ園生及ビ肥土ニ培養セル者ヲ用レバナリ然レ患者甚ダ薄弱ニノ病毒極テ惡厲ナルキハ此藥モ効ナク漸ク惡症ヲ發スベシ故ニ仔細ニ診察ノ是ヲ施スヲ肝要ナリ○子宮口ノ硬腫ノ初發ニ用テヨク其腫ヲ消散ス。此症增長スレバ瘡瘍様ノ白帶下トナリテ治シ難シ子宮ヨリ惡性ノ汚液漏泄ノ頑固ノ白帶下トナル者ハ此葉ノ末一味用ヒ或ハ水銀

劑ヲ加用テ治驗多シ一婦人子宮口ニ惡性ノ硬腫ヲ生シ交媾ヲ妨ルヲ數年。此葉ノ末ヲ用テ全治セリ○葉ヲ水煎ノ内服外敷ニ或ハ乾葉ヲ末トシ少許ヲ取テ水ニ和シ服シ或ハ葉ヲ搗貼ス。腺ノ硬腫ヲ溶解シ惡性ノ潰瘍ヲ治ス○發狂及ビ神思鬱憂病ハ腹部諸藏ノ壅塞若ハ痔血。月經産後惡露等ノ閉滯及ビ瘡瘍ノ内攻ヨリ發スル者甚ダ多シ皆此藥ヲ用テ間大効アリ○鬱憂悲悶シ人ヲ避テ沈黙獨處ヲ好ム狂症ハ此藥多ク良効アリ。然レ狂躁暴亂大甚キ症ニ用レバ搗製ヲ發スルヲアリ或云。此

遠西名物考 卷二十六 風雲堂藏

遠西名物考 卷二十一 十六 用雲

子ノ絞汁ニ沙糖ヲ加ヘ舍利別トシ發在ニ用テ奇効ヲ得ルヲアリト○痢ヨリ發スル狂ハ此藥ヲ用テ治スル者多シ○痢モ亦良驗アリ但此藥ニ慣ル片ハ再發スルヲアリ○痙攣搐掣ノ諸症及ヒ痲不遂モ亦治驗必カラズ或ハ疫效ニ間奇効ヲ得ルヲアリ○子宮水腫ヨリ發スル小便閉ニ甚ダ驗アリ○黴毒頑固ノ諸症ニ効多シ或ハ甘汞ヲ加用フ殊ニ其侵蝕スル潰瘍ヲ治ス○乾癬ニ尤効アリ大黃ヲ加用テ殊ニ良又總テ頑固惡厲ノ皮病ヲ治ス○黑障眼ニ効アルヲ失鳩答ノ如シ

服量 多ク越幾斯劑トシ用フ葉ノ末ニ比スレバ効差緩ナリ日一匁ヨリ四匁マデ用フ或ハ初ハ日半匁若ハ一匁ヲ用ヒ漸加テ瞑眩スルニ至ル○或ハ葉半月ヨリ一月マデ沸湯十匁ニ浸スヲ八分時瀉テ其液ヲ取り毎朝二匙宛服ス○服量少許與ルニハ根末良トス葉ニ比スレバ其効差峻ナリ○漸ク服量ヲ加テ患者咽喉乾燥頭眩暈眼花閃發スルヲ覺ルハ藥力充足ノ良効アル徵トス是ヨリ服量ヲ増ス勿レ但其症甚キ者ハ服量ヲ減シ或ハ暫休テ温乳汁ヲ與ベシ若シ服量ヲ加用レ右ノ諸症

遠西名物考 卷二十一 十六 用雲

ヲ發セザルハ此藥ノ性力脱セル者ヲ用ルカ或ハ
服量仍足ザル候トス。故ニ其新鮮ノ草ヲ採_レ用_ヒ或
ハ其三分一ノ量ヲ増_レ與_{ベシ}○或ハ生草ノ絞汁ヲ
煎熬ノ蜜ノ稠ト爲シ或ハ此草ヲ蒸餾ノ露水ヲ取_リ
一匙宛用_フ或云根二錢マデ用_テ瞑眩セザル者ア
リ此葉ノ末ヲ醋ニ加_ヘ服スレバ吐劑トナル○近
來犬咬傷其他諸獸咬傷ニ此根ヲ經驗ノ奇効ヲ奏
ス。是ヲ用_レバ其症增長セズ狂躁等ノ惡症ヲ發セ
ズメ治ス。又宜_ク的當ノ外治法ヲ兼_テ施スベシ。是ヲ
用_テ瞑眩甚_キ者ハ三四日モ此藥ヲ休_メテ復_テ用_ヒ斯

ノ如クノ數週用_{ベシ}。此病既ニ發狂シ飲液ヲ服シ
難_キ等ノ症ヲ發スル者ハ差_テ其服量ヲ増_シ數日服
セシムベシ。發汗利尿吐涎等ニ因_テ速ニ其毒ヲ排
泄シ治ス。此根ヲ細末トシ野生者ノ宿根ヲ採_リ陰乾ス四歳以下
ノ兒ハ二晝夜ニ一匁ヨリ三匁マデ用_フ。四歳ヨリ
六歳マデノ兒ハ五匁マデ用_フ。大人ハ五匁ヨリ十
五匁マデ大黃ヲ加_用ヒ或ハ阿芙蓉麝香ヲ加_テ良
効アリ。或ハ初半匁ヨリ一匁マデ用_ヒ漸_ク加_テ患者
咽喉乾燥。眼花閃發スルヲ度トシ其量ヲ増_ス勿_レ
或云大人ハ五匁ヨリ十六匁マデ一服トシ二晝夜

過テ復^マ其量ヲ用^フベシ。其後咽喉大ニ乾燥スルハ服量過度ノ候トス動^カモスレバ是ニ次テ精神錯亂眼昏等ヲ發スルコアリ若^シ此症ヲ發セバ吐劑ヲ用^フヒ。吐ヲ發セバ水若^クハ乳汁ヲ多ク冷飲セシムレバ速ニ治ス○荏苒タル間歇熱ハ左ノ方偉効アリ

〔荏苒散〕

荏苒葉 末 八匁

砂糖 二匁

右調和シ分テ四服トシ間日ニ朝夕一服宛飲液ニテ送下ス○左ノ方亦良

〔龍麝荏苒散〕

荏苒葉 末 十六匁

麝香

龍腦 各四十匁

砂糖 四匁

右調和シ分テ八服トシ一服宛用^フ日ニ三次○總テ荏苒ヲ用^フハ大便ヨク通スルヲ肝要トス故ニ右ノ散劑ヲ用^フ間ハ時々大黃或^ハ梅那等ノ末ヲ用^フベシ
〔荏苒越幾斯劑〕製法失^シ鳩^タ答^タ越^エ幾^キ斯^ス劑ト同シ
〔叔〕〔叔〕〔揭〕〔依〕

〔福〕〔布〕

蒸餾醋

アセラム、ディスティルラテウム、アセイン、
フシール、又、オフルゲール、アセイン、
アセイン、

○按ニ西洋ニ於テハ通例葡萄酒ヲ以テ醋ヲ造
ル但、葡萄酒ヲ産セザル國ニテハ穀類ヲ以テ造釀
シ日用飲膳及ビ藥劑ニ供スト云然ハ采醋亦藥
用ニ供スベシ

製法

醋 適宜

木炭 極細末
醋ノ十六分一

右攪和シ硝子若ハ磁製列篤兒多ニ内レ兜及ビ承
餾壘ヲ接合シ沙火ニテ慢緩ニ蒸餾シ或云、重湯ニ
ハ焦著初ニ出ル淡薄ノ液ヲ除キ蒸餾ノ初ニ出ル
セズ

淡薄ノ液ハ此ヲ除クト、但、醋ニ強弱アレバ承餾壘
其氣味ヲ試テ是ヲ除クニ多少アルベシ
ヲ換ヘ火ヲ増シ蒸餾ノ焦臭生スレバ速ニ火ヲ下
シ蒸餾醋ヲ取り硝子壘ニ收メ固封シ貯フ此醋ヲ
餾スレバ氣味淡薄トナリ格兒弗ニ殘ル醋ハ醇厚ナリ

試法

蒸餾醋ニ醃蓬鹽晶ノ末八分一ノ量ヲ加テ其

沸騰止シ少シモ滾動セザルハ上好適宜ノ醋トス云
右ノ如ク醃蓬鹽晶ヲ加ヘ少シモ滾動セザルニ至テ
放冷シ透明ノ芒ヲ結ブハ其醋上好適宜ノ候ナリ
ト依云、蒸餾醋ニ多ニ剥剝亞斯亞斯一錢ヲ加ヘテ沸騰
止シ少シモ滾動セザルハ其醋尤尤悍烈ノ候ナリト
醃蓬鹽晶ヲ加ル一錢ニ至ラズノ沸騰止ム者ハ
其醋薄弱ノ候トス、是ヲ加ル一錢ニ至レテ沸騰

遠西名物考 卷二十六 二十

仍止ザルハ其醋過大ダ悍烈ナル候トス。故ニ其薄弱ナル者ハ醇精醋出次ニヲ加テ悍弱クシ。悍烈ニ過ル者ハ初餾ノ淡薄ナル液ヲ加ヘ若ハ水ヲ加ヘ復前法ノ如ク鹽晶ヲ加ヘ試テ適宜ノ度トナルニ至リ硝子壘ノ口マデ滿シメ固封シ貯フ。

醇精醋

アゼテム。ラダカレ。羅アゼインシウル。又
ホーグストフルステルケンデアゼイン蘭
是醋ノ極テ悍烈ナル者ノ義
精製剥篤
亞斯ニ作ル

蒸餾醋

各適宜

右鹽晶ヲ取り少許宛醋ニ加テ少モ滾動セザルニ

製法

至リ磁壺ニ入。文火ニ上セ煎熬ノ乾固ノ鹽ト爲シ是ヲ列篤兒多ニ内テ半ニ充シメ。再餾綠蓉油石膽ノ條ヲ取テ徐々ニ是ニ滴シテ右ノ鹹蓬鹽量ノ半ヲ加ルニ至リ。潤大ナル硝子ノ承餾壘ヲ其列篤兒多ニ接合シ。其合際ヲ塗封ノ沙火ニ内レ。初メ文火トシ漸ク火ヲ加テ武火ト爲シ蒸餾ノ終ニ霧ノ如キ蒸氣承餾壘ニ透見セズ且列篤兒多ノ頸ニ少モ蒸露ヲ見ハス。ナキニ至テ火ヲ下シ承餾壘ヲ故テ其醋ヲ取り硝子壘ニ内レ固封シ貯フ。是醋ノ極テ悍烈ナル者ナリ。○其列篤兒多ニ殘リタル渣塊ヲ取

本草綱目卷之三十六
三十一
本草綱目卷之三十六
三十一

水ニ溶シ是ニ剥篤ボツト亞斯ノ末ヲ加テ少モ沸騰セガ
ルニ至リ紙ニテ憑テ其液ヲ取り文火ニ上セ煮テ
上面ニ膜ヲ生スルニ至リ放冷ノ芒ヲ結バシム。是
即孕礬酒石ナリ。按是酒石ノ條ニ舉ル孕礬酒石ト
同シ依云醋ハ酒石酸性鹽燒酒
水ヲ合和ノ成ル即チ酒石一北燒酒再餾者一北半
沸湯十六北右酒石ヲ湯ニ溶化シ故冷ノ燒酒ヲ和
シ硝子壘ニ内紙ニテ其口ヲ蓋ヒ上ニ小孔ヲ穿ク暖
處ニ置テ化釀セシムレバ醋トナルヲ以テ知ルベシ

性醋ノ性ハ酒ト相反ス酒ヲ蒸餾スレバ初ニ銳烈
ノ精液燒酒出テ後ニ淡水出ツ。醋ヲ蒸餾スレバ初ニ
淡水出テ後ニ銳烈ノ醋出ツ。燒酒ニ火ヲ點スレバ
燄ヲ發ス。醋ニ火ヲ點スレバ撲滅ス。酒ハ血ノ運行

ヲ増盛シ熱ヲ生シ人ヲノ醉眠セシム。醋ハ血ノ強
盛ナル運行ヲ靜止シ清涼ニシ酪酐ヲ解ス。燒酒ヲ
血中ノ湧ヒ乙イ刺絡ノ出ルニ加レバ忽チ凝固ス。是ニ
蒸餾醋ヲ加レハ速ニ溶解スル等ヲ以テ知ルベシ

主治清涼滋潤シ津ヲ生シ渴ヲ止メ汗ヲ發シ凝血
ヲ稀釋シ腐敗ヲ過メ精神ヲ爽快ニシ燥熱ヲ解スル
良藥トス。○蒸餾醋ハ尋常ノ醋ニ比スレバ氣味緩
和ナレ其質精微ニノヨク竄透シ味好クノ服シ
易ク諸飲劑ニ加ヘ用ルニ宜シ。○醋ニ水ヲ加テ稀
クシ或ハ沙糖ヲ加ヘ甘美トシ諸熱病ノ飲料トシ

本草綱目卷之三十六
三十一

渴ヲ止メ燥ヲ潤シ熱ヲ解ス○虛憊ニ屬スル諸疫
熱腐敗熱惡性熱ヲ治ス○喉衝病ノ膽液過多及腐
敗ヲ帶ル症ニ尤良但尋常壯實多血ノ喉衝病ハ初
發ニ發汗ノ害アリ故ニ初發ハ是ヲ斟酌スベシ○
清涼ノ血液腐敗ヲ遏ルニ峻効アリ故ニ膽液熱
腐敗ノ發汗ニ屬スル諸症及腐敗熱血液腐敗
ノ熱ニ尤驗アリ○醋ニ蜜ヲ加テ屋施ハチ兒ル前ニト
爲シ膽液熱ニ多ク用フ○膽液熱及膽液腐敗ノ酷
厲ナルヨリ發スル腹痛下利ニ左ノ方尤驗アリ

雙酸清涼飲

蒸餾醋 二勺
密涅刺爾鎮痛液 二勺
酒石鹽 一錢
舍利別 四錢
沸湯 四勺

右調和シ半時ニ一匙宛用フ○發斑熱及ヒ冒寒傷
冷毒ノ諸症ニ醋ヲ用テ汗ヲ發シ熱ヲ解シ腐敗ヲ
防テ良効アリ。殊ニ龍腦ヲ加テ發汗防腐ノ功尤峻
ナリ。腐敗熱ニハ胃腸ヲ淨刷ノ後是ヲ用フベシ。又右
ノ諸病ニ於テ專ラ蒸氣及ヒ汗ヲ發スベキ症ハ左

本草綱目卷之二十六
三十三
風雲堂

ノ方良効アリ

香竄醋

アゼ左ムアンチセベチモム羅
スベセレイアゼイン蘭

菖蒲根

白芷 各六錢

亞爾鮮 二弓半

撒爾非亞 三弓半

芸香葉 二弓

府利 二錢

蒸餾醋 八北

右硝子壘ニ内紙ニテ其口ヲ固封シ慢火上ニ置テ

浸スヲ二日。絞テ其液ヲ取り紙ニテ漉シ左ノ藥液

ヲ加フ

羯布羅丁幾去爾 四錢

右合和シ固封シ貯フ。又此劑傳染疫毒ヲ驅散シ

腐敗ヲ防ク効アル故ニ傳染病流行ノ時。毎日數一

匙宛内服シ或ハ鼻孔ニ塗リ或ハ是ヲ温メ蒸氣ヲ

居室ニ薰スレバ其病ニ傳染スルヲ無シ。○發斑熱。

惡性熱。冒寒傷冷毒等ノ蒸氣及ビ汗ヲ發スベキ症

ハ左ノ方亦良効アリ

香醋飲

本草綱目卷之二十六
風雲堂

本草綱目卷之二十一
香竄醋
接骨木花
密涅刺爾鎮痛飲
沸湯

香竄醋

二勺半
前二出

接骨木花

二勺

密涅刺爾鎮痛飲

一錢半

沸湯

一匕

右調勻シ半時ニ二匙若ハ三匙宛服ス
○傳滌腐敗熱惡性熱ハ醋ヲ一匙宛飲液ニ加用テ精神ヲ清爽シ汗ヲ發ノ病毒ヲ排泄シ血液ノ腐敗ヲ防護ス凡熱病ノ患者虛罷ノ煩渴シ津液燥涸スル症ハ醋一匙ヨリ二勺マデ一服トシ用テ良
○痘瘡麻疹ノ腐敗ヲ帶ル症及狂犬蝮蛇等ノ咬傷ニ醋ヲ用テ峻

効アリ或ハ的里亞加ニ加ヘ内服ノ解毒ノ効ヲ稱ス
○腐敗熱痘瘡等ノ血液腐壞焯崩ノ酷厲トナリ血脉ヲ穿蝕ノ下血吐血衄血尿血ヲ發スルニ用テ腐敗ヲ遏メ血液ヲ收斂ノ其症ヲ治ス
○血液運行怠慢ニノ腐敗セルヨリ發スル失苟兒陪苦ヲ治ス
航海ノ徒ノ如キ身體ヲ運動セズノ此症ヲ發スル者多シ
○醋ハ氣味竄透シ清涼收斂スルヲ以テ鎮痙ノ良効アリ
蒸餾醋ニ舍利別ト密涅刺爾鎮痛液少許ヲ攪和シ用テ諸痙攣ノ症及上衝頭痛不寐或ハ神思鬱憂病狂癩ニ良驗ヲ奏シ又爽涼降鎮ノ効アルヲ以テ阿芙蓉劑ノ用ヒ

本草綱目卷之二十一
香竄醋
接骨木花
密涅刺爾鎮痛飲
沸湯

難キ諸症ニ尤効アリ○醋。橙汁及醋ノ製劑ハ皆過酒ノ沈酔スルヲ解ス。醋ニ水ヲ加テ服シ或ハ鼻孔ニ塗テ良。又阿芙蓉毒ノ瞑眩ニ内服ノ速効アリ其他亞兒加利性ノ辛熱酷厲ニノ麻痺昏睡發狂セシムル諸藥即チ雙鸞菊^{トリカブト}失鳩^{シキウダ}答^ト巔^ト茹^ト莨^ト菪^ト等及甲介類ノ毒ヲ解ス。但中毒ノ甚キ者ハ初メニ先ツ吐劑ヲ與ヘ快吐セシメテ後醋劑ヲ用ベシ。又烟氣ニ咽テ呼吸窒塞スルニ即効アリ○醋ハ凝血ヲ溶解スト雖モ乳汁及ビ脂油質ノ液ニ加レバ忽チ凝固ス故ニ乳汁ヲ服スル人或ハ乳養ノ兒ニ是ヲ與フレバ乳

汁。胃中ニ凝固ノ消化セズ停滯ノ酸敗液トナリ病患ヲ發ス

外敷 頭眩暈或ハ昏冒卒倒等ハ患者ニ醋ヲ嗅シメ或ハ鼻孔ニ塗リ或ハ面ニ噴テ醒解ス。是ニ用ルニハ悍^{ソコ}キ醋ヲ良トス。ヨク竄透スレバナリ。醋ニ銅^カ精ノ末少許宛加テ必モ沸騰セザルニ至リ磁製ノ格兒弗ニテ蒸餾スレバ其醋甚ダ悍烈ナリ是ヲ硝子壘ニ收メ固封シ貯テ聽用スベシ。是諸金ヲ腐蝕スルニ用フ○劇^シキ頭痛ニハ醋ヲ温メテ嗅シメ或ハ醋ニ水ヲ加ヘ消石ト硃砂各少許ヲ研和シ布片

ニ蘸^ニノ貼シ或ハ頭ニ匝^ニテ捷効アリ○醋ハ竄透刺
戟ノ脉管ヲ收斂シ止血ノ効アリ。是ヲ維^ニニ浸シ深
ク鼻孔ニ挿^ニテ衄血ヲ止ム。是ヲ布片ニ蘸^ニテ頭ヲ縛
スルモ良○醋ニ水ヲ加ヘ温メ含漱ノ斷頸等ノ出
血ヲ止ム。外傷ノ輕キ出血モ是ヲ貼メ効アリ○婦
人崩漏。孕婦及産後ノ崩血ハ醋ニ水ヲ加ヘ稀クシ
温メ水鏡ヲ以テ子宮ニ注輸メ治ス或ハ産後子宮
收縮セズメ崩血止ザル症ハ冷醋ヲ布片ニ蘸^ニシ腹
部ニ貼メ効アリ○醋ハ凝血ヲ溶解ス。故ニ打撲傷
ニテ血絡破裂シ其血。皮中ニ泛濫メ青斑ヲ發スル

者。及ビ諸焮腫ヲ消散シ痛ヲ止ム。醋ニ水ヲ加テ稀^ク
クシ温メテ布片ニ蘸^ニメ數換貼ス或ハ燒酒或ハ消
石硃砂各少許ヲ加テ研和シ施スモ良○金創ヲ洗
フニハ醋ニ多ク温湯ヲ加フベシ否ラザレバ大ニ
刺戟ノ焮熱ヲ發ス○醋ハ骨ヲ軟ニシ硬骨ヲメ軟
骨ノ如クナラシム。故ニ骨傷ニ久ク是ヲ外敷スレ
バ骨ノ堅剛ノ質ヲ失ヒ回復セザラシム。又佝僂病
アル小兒ニ酸味ノ飲食ヲ與フレバ諸骨逾軟弱ニ
メ其病增長ス但胼胝様ノ硬腫ハ是ヲ外敷メヨク
軟化シ消散ス骨ハ土質ヲ以テ成ル。酸物ハ土質ヲ
溶化ス故ニヨク骨ヲ軟化ス。魚骨等

遠西名物考 卷二十六 風雲堂藏

遠西醫方名物考卷二十六
二十七
風雲堂

酢ハ酸醋ニ淹セバ軟ナルヲ以テ知ルベシ。是ニ反ノ燒酒ハ纖維ヲ硬固シ軟肉ヲノ胼胝様ノ硬肉トナラム。○醋ニ苦味收瀋ノ藥品ヲ加テ外敷スレバ殊ニヨク腐敗ヲ遏ム。幾那ノ末ヲ加レバ其効尤峻ナリ。諸潰瘍ノ腐壞ヲ遏ルニ用フ。或云夏月肉類ヲ醋ニアルヲ以テ防腐ノ効。○真珠。蜾蛄石。珊瑚。蠣殼。卵殼等ヲ醃醋ニ淹セバ軟化ス。○疫熱流行ノ時。石ヲ燒テ醋ヲ撒ケ其蒸氣ニテ居室ヲ薰シ傳染惡氣ヲ驅逐スルノ効ヲ稱ス。叔福伍按

遠西醫方名物考卷二十六終

遠西醫方名物考卷二十七

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補

蒸餾水

アイク。デステイルラタ。ゲソイフルデ。ワートル。又。オフルゲイルデ。ワートル。蘭

製法

雨水ヲ取り硝子若ハ磁製ノ格兒弗ヲ以テ蒸餾ノ其水ノ四分ノ三ヲ取り或云初ニ出ル硝子壘ノ口マデ滿シメ固封シ貯フ水少許ヲ除ク其クニ至レバ罐底ニ泥土殘ル。故ニ數ク蒸餾ノ必モ土氣ナキニ至ルベシト。○凡水ハ臭味ナク淨潔ナルガ如シト雖モ土氣鹽氣。硫氣ヲ含ミ或ハ諸礦氣ヲ帶ル者アリ。故ニ蒸餾ノ其汚物ヲ去

遠西醫方名物考卷二十七
風雲堂

遠西名物考 卷二十七 風雲堂藏

藥用ニ供スベシ○水ノ臭味アル者或ハ濁テ異色ヲ帶ル者或ハ是ヲ貯テ泥土粘汚ノ塗ヲ生スル者ハ皆惡水ニ汚物多ク雜ル候トス飲料ニ用ルル勿レ○雨水ハ天造ノ蒸餾水ナル故ニ最モ輕清淨潔ナリ但大氣中ノ酸性鹽ニ固性礫砂ト固性消石トヲ含故ニ自餘ノ水ニ比スレバ竄透シ粘膩脂膏ヲ淨刷シ且ヨク物ヲ溶解ス故ニ諸藥ヲ浸シ或ハ蒸餾スル等其他製煉術ニ多ク用フ然レ早後ノ暴雨ハ夥ク蒸氣ヲ含ミ且土氣等ノ汚物ヲ夾ム故ニ淨潔ナラズ○雪水モ亦雨水ノ如ク固性ノ二鹽ヲ

含故ニ大抵雨水ト同シ但大氣中ノ酸性鹽ヲ含ムナシ固云泉河雨雪露ノ水ハ石灰質○泉水ノ岩罅石縫ヨリ迸出スル者ハ土氣即結固性礫砂海鹽酸性鹽ヲ帶ブ泉ノ沙中ヨリ出ル者ハ土氣及固性礫砂ヲ脫除ノ海鹽ト酸性鹽少許ヲ帶ルノニ凡泉ハ直ニ地中ヨリ滲出スル故ニ極テ清冽ニ夕澄明ナレレ瀾熟セズ飲液ニ用テ凝固シ易ク消化シ難クノ停滯ス常ニ是ヲ用レバ細絡織管ニ壅塞ノ痲痛風疝痛結石等ヲ患ル者アリ或ハ銅鐵鉛等諸金類ノ氣ヲ帶ビ或ハ硫黃石膽明礬等ヲ含ム者アリ故

遠西名物考 卷二十七 風雲堂藏

ニ異常ノ氣味アル水ハ皆飲料ニ用ルヲ勿レ○井
水ノ石縫ヨリ湧出スル者ハ泉ニ含メル三種ノ鹽
氣ヲ帶ビ或ハ石灰及ビ消石氣ヲ含ニ或ハ諸礦氣
ヲ帶ル者アリ。故ニ泉ト同シ○河水ハ右ノ諸物ヲ
含ト雖モ沙上ニ長流渙瀾ノヨク泡熟シ且大陽ノ
照耀煦温ノ氣ヲ含テ融解シヨク滑利流動ノ汚物
ヲ淨除ス。故ニ消化シ易シ。但微鹽氣ヲ帶ル故ニ開
達微利ノ効アリ。資稟壯實ニノ膽液多キ人ハ早旦
空心ニ一二碗ヲ服ノ胸中ヲ潤涼シ酷厲液ヲ和解
シ大小便ヲ利ス。但沙氣泥臭アルハ用ルヲ勿レ又

泉井ノ水ニ比スレバ融解瀾熟スル故ニヨク石鹼
ト合和シ脂垢ヲ滌刷ス。故ニ布帛ヲ晒シ石鹼ヲ造
ルニ多ク用ヒ又画家洙匠ハ大抵河水ヲ用テヨク
碧綠黃等ノ色ヲ鮮麗ニス但絳赤等ノ收瀦ノ宜キ
色ハ井泉ヲ用フ○湖澤陂池ノ水ハ前ニ舉ル諸物
ヲ含ノニナラズ草木蟲類多ク水底ニ沈テ腐敗シ
又硫氣鐵氣及油鹽等多シ。故ニ飲料ニ用ルヲ勿レ
○凡、良性ノ水ハ澄清淨潔ニ秤量輕ク。火ニ上テ
速ニ煮沸シ又速ニ冷へ。穀肉蔬菜ヲ煮テ速ニ化熟
ス。故ニ飲液ニ用テ消化シ易ク速ニ運輸ノ胃ニ重

滯セズヨク諸竅ニ排泄ス水ノ量輕キハ土氣粘脂
等ノ汚物雜ラザレバナリ或云水ニ風化揮發ノ物
及銳烈慄悍ノ物ヲ含クハ其量輕シ故ニ輕清ノ水
ト雖モ純潔ナラザル者アリト然レ水中多ク右ノ
如キ精微ノ物質ヲ含クハ其氣揮發竄透スル故ニ
必ズ香臭アリ然レ輕清ニモ香臭ナキ水ハ設令精
微ノ物混スルコトアリモ甚微少ニモ水ノ良性ヲ害
スルニ足ラズト謂ベシ○沙ヲ以テ水ヲ濾スルハ汚
濁塵土等皆沙ニ留リテ其水清潔ナリ然レ是モ亦
全純粹トナルニ非ズ其故ハ水氣ノ漸漬浸透セル

細沙自剥裂ノ石質ノ液トナリ水ニ和メ滲漏ス故
其液承溜甕ノ底ニ粘著シ時日ヲ經ルニ隨ヒ漸凝
固ノ石英狀ヲ成者アリ又水中ニ含所ノ精微ノ物
質ハ水ニ混メ洞然トシ沙隙ヲ透過シ下ヲ以テ唯
其夾雜セル粗大ノ汚物ヲ除ノミナレバナリ○水
ノ汚物ヲ去ルハ蒸餾スルヲ最良法トス然レ是モ亦
其夾雜セル凝體物ヲ除ノミ其故ハ水中ニ含所ノ
極テ精微ニモ水ノ如キ物質ハ水トモ蒸升シ出
レバナリ但シ沙ヲ以テ濾過スルニ比スレバ蒸升氣
化ノ出ルガ故ニ一切凝體ノ物質ヲ脱メ最淨潔ナ

遠西名物考 卷二十七 風雲堂藏

リ。但文火ニテ蒸餾シ唯精微ノ蒸氣慢緩ニ升化シ
徐々ニ餾滴スルヲ度トスベシ。若火候ニ意ヲ加ス
忽卒ニ蒸餾スレバ汚物モ共ニ蒸升シ出ス。斯ノ如ク
蒸餾ノ其格兒弗ニ少モ渣渣ナキハ其水大抵汚物
ナキ候トス。○温湯ハ内飲外用ニ緩和スル効アリ
○浴湯ノ主用ハ第一。皮膚ノ汗管ヲ淨除メ蒸氣
ヲ開達シ第二。凝體纖維。脉管ノ強硬急ヲ縱緩弛
解シ疼痛ヲ止ム。假令ハ勞動步趨メ肢體拘急孿痛
スル者湯ニ浴メ治スルガ如シ第三。血液ヲ融解渙
釋ノ運行ヲ進輸増盛シ蒸氣及ビ汗ヲ發ス。故ニ血

液ヲ衝動メ沸騰シ運行ヲ増進ノ害アル病ニハ是
ヲ禁スベシ **叔** **揭** **叔** **伍**

失格列乙シ蘭コシリウム羅

○按ニ此草。洋萵苣ノ一種ナリ **物** **叔** **度** 云。此草洋
萵苣ニ比スレバ葉粗糙ニメ差長ク。缺裂深クメ
且、宿根ス。○性功大抵洋萵苣及ビ蒲公英ト同シ。
此二品多ク失格列乙主治ノ病ニ用フ **淑** 云。此草
ノ性功。蒲公英。羊鬚 譯名。花戸。ヤガタラ
皆代用スベシ 斯劑ノ條ニ出併セ考ベシ

遠西名物考 卷二十七 風雲堂藏

遠西名物考 卷二十七 五 風雲堂

〔形状〕此草二種アリ○第一種ハ春月葉生シ洋萵苣
葉ノ如クノ差深ク缺裂ス。但其淺深多少一様ナラ
ズ或ハ缺又少キモアリ。淡綠色ニシテ稍粗糙或ハ黯
赭ノ斑紋生ス。梢葉ハ小クノ缺裂少ク或ハ刻缺ナ
シ葉間太キ圓莖ヲ抽テ二三尺許中虛粗糙。稍轉換
シ枝ヲ分テ葉多ク生ズ。枝梢ノ葉間ニ重瓣美碧色ノ
花簇生シ瓣端ニ鋸齒アリ。花白色或ハ黃色ノ者アリ。
後變ノ毛絮トナリ萼中ニ子ヲ結ブ。白色ニシテ稜
アリ根白ク長ク太サ指ノ如ク鬚アリ根葉莖皆味
苦ク折レバ乳様ノ白汁出ツ。此草原野ニ生シ或ハ

種ヲ下シ培植ス。二三年宿根ス根葉共ニ蔬菜ニ用
フ○第二種ハ葉小ニシテ缺裂深ク莖短ク白刺アリ
其他第一種ト同シ沙地海邊ニ多ク生ス。宿根セズ
〔主治〕根或ハ莖葉花モ用テ性涼。收斂ス。消石様ノ鹽氣
ヲ含テ清涼滋潤シ軟化稀釋シ稍刺戟ス粘稠液内藏
ニ壅塞シ殊ニ腸。腸間膜ニ滯著スルヲ疏解シ間歇
熱ヲ治ス○膽液ノ油質稠厚ナルヲ稀渙シ其敗液
ヲ大小便ニ排除ス故ニ膽液腐敗ノ酷厲毒ヨリ發ス
ル諸症ニ効アリ○血中ノ惡液ヲ淨刷シ清血ノ良
藥トス。故ニ肝脾ノ壅塞硬腫ヲ疏散シ。脾病。依剥昆垤

遠西名物考 卷二十七 風雲堂

兒鬱憂病。黃疸。水腫。粘液腫ヲ治ス。○焮衝病ノ酷厲ナル血ヲ涼解シ壯熱。焮衝熱。肝脾焮衝。遊走熱。胃熱鬱蒸。嘈雜及勞瘦。消耗熱ヲ解散ス。○胃腸粘液。酸敗液ヲ驅除シ蟲ヲ下ス。○蒸餾ノ露水ヲ取。眼ニ點メ焮腫赤爛ヲ祛。翳膜ヲ消ス。○根。水煎シ或露水。舍利別。昆設爾弗等ニ製用フ。葉及花モ亦効アリ。○大黃ヲ加。舍利別トシ用テ諸焮衝ヲ涼解シ膽液過多及胃中不化。敗液ヲ滌除シ黃疸尤効アリ。又初生兒胎尿ヲ下スニ多用。○根。末トシ酒石英ヲ加。黃疸及水腫ニ用テ殊効アリ。○子ニ大麥煎汁ヲ加。搗テ汁ヲ絞。

取乳劑トシ熱病ニ用テ清涼滋潤シ渴ヲ止ム。

失格列乙。越幾斯劑。製法。蒲公英。越幾斯劑ト同シ。

主治。失格列乙。主治所説ト同シ。

西瑪爾。拔皮。シマロウバ。シマロウバ。シマロウバ。

是ハ南亞墨利加洲ニ産スル一種ノ喬木。皮ナリ其

狀菩提樹皮ノ如ク厚。輕柔。韌ニノ革ノ如シ。表皮粗

糙ニノ皺アリ。帶黃白色。ノ香氣ナク。味苦。稍收瀋ス。

拔爾撒謨。樣油氣アリ。或云是根。皮ナリ。一尺許ニ裁。

主治。緩和ノ收瀋シ腸ノ攣急腹痛ヲ解シ。腫症ノ赤

遠西各物考 卷二十一
八
頭雲堂

劑好質浸批若波列等ノ用ハ安ヲ加へ用テ殊ニ効アリ

○間歇熱ニ良驗ヲ稱ス○肝脾門脉ノ壅塞ヲ兼ル

胸脇焮衝熱ヲ治ス○黃疸ニ効多シ殊ニ粘液多ク

胃腸ニ鬱滯ノ大便通セズ腹部痞悶ヲ覺ル者ハ下

劑ヲ加へ用ベシ○腎痛結石ニハ大黃石鹼勿ハ

ヲ加へ用テ殊効アリ福主治蒲公英ト同此草味

煎湯トシ用ヒテ亦効同シ按亞福

紫堇昆設爾弗製法生葉ヲ以テ製ス其法山蒼菜昆設

爾弗ト同シ主治紫堇越幾斯劑ト同シ

惠 諳厄利斯瀉利鹽

サルカタルチキム又サルアンケ
リキム羅 エンゲルスピルゲル
ソウト蘭

○榕按ニ是即チ漢人所謂凝水石ナリ時珍綱目

凝水石條別錄曰生常山山谷時珍曰別錄言凝水

鹽之精也陶氏亦云鹵地所生碎之似朴消范子計

然云出河東河東鹵地也獨孤泊丹房鑑源云鹽精

出鹽地狀如水精摠此諸說則凝水即鹽精石也一

名泥精昔人謂之鹽枕今人謂之鹽根生於鹵地積

鹽之下精液滲入土中年久至泉結而成石大塊有

齒稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者皆至

遠西各物考 卷二十一

本草綱目卷之九 九

暑月田潤入水浸久亦化○小野蘭山本草綱目啓
蒙云凝水石ハ真ノ寒水石ニメ即鹽ノニガリノ
凝テ石ノ如キ者ナリ年久ク食鹽ヲ多ク積置シ
下或ハ土中ニアリテ白色透明ナル石蜜明礬
ノ輩ノ如クノ重カラズ味微苦ニメ鹹ナラズ暑
中ニモ解ケズ濕ラズ水中ニ投スルヲ久ケレバ
融化ス諸州鹽戶ニ多シ市中鹽販ニモアリ又播
州赤穂ニ氷柱ノ如クニメ長廿五寸許中ニ稻草
一條ヲ包モノアリ○榕按ニ下總小松川ノ邊ニ
テ海鹽ヲ以テ和芒硝ヲ製シ亦凝水石ヲモ製シ

多ク藥舗ニ販ク左ノ譯説ト參考ノ知ルベシ
瀉利鹽ハ一種ノ泉鹽泉ヲ煮テ取ル鹽ノ總稱ニメ
天造人工ノ二種アリ天造ノ者ハ諸厄利亞國ノ越
貌宋ト云ル鑛泉ノ傍ニ凝結シ或ハ山谷中ニ生メ
消石ノ如ク凝結ス其天造ノ越貌宋鹽ハ鑛性ノ亞
兒加利鹽ト礬性ノ酸收鹽ト抱合セル一種ノ中和
鹽ナリ人工ノ者ハ古昔ハ越貌宋ノ泉ヲ煎熬メ結
芒セシメ製ス然レ此鹽ヲ得ルヲ必キ故ニ今ハ諸
厄利亞ノ製煉家海水ヲ煮テ食鹽ヲ取りタル後ニ
殘ル苦汁ヲ以テ製ス此亦礬性ノ酸性鹽ト苦味ノ

本草綱目卷之九 九

土トヲ以テ成ル一種ノ中和鹽ニ其性天造ノ品ト同シ此鹽潔白光瑩殆ト雪ノ如ク味苦クノ滲透シ乾固ナルヲ上品トス其質消石ニ類シ瀉利ノ効アリヨク水ニ溶化ス火ニ投スレバ焔テ泡起シ焔ヲ發セズ爆聲ナク重固ノ質消シ輕虚ニ綿絮ノ如シ亞兒加利鹽液ニハ溶化セズ大氣ニ觸テ風化セズ○是ヲ水ニ溶シ汚物ヲ淨凍ノ精製後ニ出クスレハ芒ヲ結テ潔白瑩徹稜ヲ成シ或ハ方形ヲ成シ瓦老別里鹽前ニ出クノ如シ故ニ藥局家はヲ瓦老別里鹽ニ代テ取クトアリ

製法

海水ヲ取り是ニ粗朴ノ海鹽ヲ適宜ニ加テ溶シ火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾固ノ鹽ト爲シ此鹽ヲ取テ再ビ水ニ溶シ瀉テ火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ上面膜ヲ生スルニ至テ放冷ノ芒ヲ結ハシメ其芒ヲ取り乾シ貯フ是ヲ瓦老別里鹽ト名ク其剩餘ノ芒ヲ結バザル液ヲ取り火ニ上セ水氣ヲ消ノ上面膜ヲ生スルニ至リ故冷シ芒ヲ結バシメ其芒ヲ取り乾シ貯フ此即チ瀉利鹽ナリ後云諸厄利斯及ヒ煮テ食鹽ヲ製スル後ニ殘ル苦汁ヲ以テ造ル

精製法

尋常ノ諸厄利斯瀉利鹽ヲ適宜ニ取是ト

等分ノ沸湯ヲ加テ溶シ温ニ乘メ濾過シ放冷メ芒
 ヲ結バシメ其芒ヲ取り貯ヘ又其汁ヲ火ニ上テ水
 氣ヲ蒸散シ試ニ是ヲ冷石上ニ滴メ凝結スルヲ度
 トシ其液ヲ放冷メ芒ヲ結バシム。數斯ノ如クメ終
 ニ必モ結芒セザルニ至テ悉ク其芒ヲ取り集メ乾
 シ貯フ其剩餘ノ汁ハ麻^マ掘^グ涅^ヂ失^シ亞^ア過^オ爾^ル技^バヲ製スル
 ニ用ベシ按

又法 瀉利鹽 一匁 沸湯 三匁 右溶化メ火ニ上

セ煮テ上面膜ヲ生スルニ至リ。紙ニテ濾シ放冷メ
 芒ヲ結バシメ大約半匁許ノ芒ヲ取ルベシ。潔白透

瑩。水ニ溶化シ易キヲ上品トス亞 ○此鹽ハ氣ニ觸
 レバ濕ル故ニ固封シ貯フベシ ○瓦^カ老^{ラウ}別^{ベリ}里鹽ノ下
 品ナルヲ此鹽ニ充テ偽り販ク者アリヨク擇ムベ
 シ是ヲ驗スル法其鹽ヲ水ニ溶シ。剥^{ボツ}篤^ト亞^ア斯^スヲ水ニ
 溶シタル液少許ヲ取テ是ニ滴シ加ルニ忽チ其底
 ニ苦味ノ涎ヲ生スルハ眞品トス。其水澄清ニメ塗
 ナキハ下品トス

主治 清涼下劑トス。味苦ク稍刺戟シ効力峻ナラズ
 メヨク瀉下ス。華^ハ爾^ル斯^ス質^シノ下劑鷹^ヤ會^ク藥^{ヤク}刺^シ巴^バ龍^{リウ}骨^{コク}木^{モク}脂^シ蘇^ソ甘^{カン}沒^{モク}拊^フ等^{トウ}ヲ云
 ハ多ク腹攣急絞痛ヲ發スレ此鹽ハ必モ腹痛ヲ

發セズ。又嘔吐ヲ起スナシ。故ニ稽留熱。腎焮衝。酷
 烈ナル傷冷毒痛。脾病。水腫。黃疸。等ノ熱症ノ兩便不
 利及ヒ内藏ノ壅塞ヨリ發スル荏苒タル諸病。疝痛
 等ニ用テ大便ヲ利スルニ尤良。是ヲ服ノ嘔氣ヲ發
 スル者ハ香竄ノ藥ヲ加ヘ與フベシ。桂。姜。益。智。等ヲ云。○服
 量一錢ヨリ一多マデ水若ハ適宜ノ飲液ニ溶シ或
 ハ飲劑ニ加ヘ用フ。依。按。裴。亞。

越粟失爾。剥祿。布利。恒。
エリキシル。ハ。ン。ア。ロ。エ。又。テ。イ。ン。キ。テ。ラ。ア。ロ。
エリキシル。ハ。ン。ア。ロ。エ。又。テ。イ。ン。キ。テ。ラ。ア。ロ。
エリキシル。ハ。ン。ア。ロ。エ。又。テ。イ。ン。キ。テ。ラ。ア。ロ。
エリキシル。ハ。ン。ア。ロ。エ。又。テ。イ。ン。キ。テ。ラ。ア。ロ。
エリキシル。ハ。ン。ア。ロ。エ。又。テ。イ。ン。キ。テ。ラ。ア。ロ。
エリキシル。ハ。ン。ア。ロ。エ。又。テ。イ。ン。キ。テ。ラ。ア。ロ。
エリキシル。ハ。ン。ア。ロ。エ。又。テ。イ。ン。キ。テ。ラ。ア。ロ。
エリキシル。ハ。ン。ア。ロ。エ。又。テ。イ。ン。キ。テ。ラ。ア。ロ。
エリキシル。ハ。ン。ア。ロ。エ。又。テ。イ。ン。キ。テ。ラ。ア。ロ。
エリキシル。ハ。ン。ア。ロ。エ。又。テ。イ。ン。キ。テ。ラ。ア。ロ。

製法

盧會 末

沒藥 末

雜腹蘭 各一多

燒酒 二十度者 三十多

右雜腹蘭ヲ細ニ剉シ硝子壘ニ内レ燒酒ヲ加ヘ微
 火上ニテ浸ス。十二時。漉テ液ヲ取り。盧會。沒藥ヲ
 加ヘ時々振蕩シ淹ス。三日。紙ニテ漉シ其液ヲ取
 硝子壘ニ内固封シ貯フ。

又法

前方ノ藥液一多ヲ取り硫黃精若ハ綠礬精

遠西名物考 卷三十一

遠西徭雅... 卷二十一... 十三... 屏雲堂...

十滴ヲ加フ

又法 前方中ノ没藥ヲ硝子燬ニ内レ硫黄精ヲ加
濕シ置、二日ニノ廬會雜腹蘭ヲ加ヘ。是ニ燒酒ヲ
注キ加テ其藥料ノ三指橫徑上ニ至リ。微温沙火中
ニ置、七八日。其間數振蕩シ其浸赤セル燒酒ヲ他ノ
硝子燬ニ寫シ内レ。其滓ニ又前ノ半分量ノ燒酒ヲ
加ヘ浸ス、前法ノ如クシ。終ニ其兩回ノ燒酒ヲ取
テ合和シ硝子燬ニ收メ固封シ貯フ。右後ノ二方ヲ
エリキシル。ポロプリタチス。キム。アシチムト名ク。
是レ方中ニ酸收ヲ加ルノ
義ナリ。酸收ハ硫黄精ヲ云。○右ノ方中、硫黄精ヲ加

ヘズ。酒石液二錢ヲ以テ右ノ三味ノ藥末ニ加ヘ濕
ス。十二時ニノ燒酒ヲ加ヘ復浸ス、前法ノ如ク
ス。是ヲエリキシル。ポロプリタチス。キム。アルカリ
又ムト名ク。是レ方中亞兒加利液ヲ加ル義
用テ害アル諸症ハ此方ヲ用ルナリ。

主治 健胃ノ要藥トス。又内藏ノ壅塞ヲ開達シ粘液
ヲ稀解シ大便ヲ利シ。汗ヲ發シ腐敗ヲ遏メ飲食ヲ
消化シ血中ノ惡液ヲ祛キ蛇蟲ヲ殺シ寒粘液質ノ
人及ヒ子宮病。經閉ニ良驗アリ。○内外創傷。潰瘍ヲ
淨制シ愈スニ尤効アリ。此症ニハ硫黄精若クハ酒
石液ヲ加ヘガハル方ニ宜シ

藏西徭雅... 卷二十一... 屏雲堂...

遠西銘物考 卷二十一 十四

○服量三十滴ヨリ五十滴マデ適宜ノ飲液ニ點服ス効用大約律比丸出前ト同シ叔伍

又法 盧會

沒藥 各一弓

右細末トシ硝子壘ニ内レ孕鹼酒石液若ハ酒石葉液一弓ヲ加ヘ固封シ微温沙火中ニ置キ泡熟ノ藥料ヨク溶化スルニ至リ。燒酒度者二比ヲ加ヘ浸ス六時ニ其液ヲ他ノ硝子壘ニ寫シ内レ其渣ニ又新ニ燒酒ヲ加ヘ浸メ其液ヲ取ル前法ノ如クシ。數斯ノ如クメ其渣盡ク消化シ唯汚物ノ云殘ル

ニ至テ其液ヲ合シ文火ニ上セ其量ノ半ヲ減耗シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ

主治 是レ開達疏通ノ峻効アル藥ニメ纖維細管ニ竄透シ凝結ノ敗液ヲ溶解シ經久頑固ノ壅塞ヲ疏解シ荏苒淹滯ノ廢疾ニ殊効アリ○的里亞加テヲ加ヘ用テ汗ヲ發シ下劑ニ加テ汚滯ヲ滌除シ。乳清ニ和シ服メ小便ヲ利ス疾

鉛糖 「サ、カリム、サ、左ルニ羅

製法 鉛粉 一比

遠西銘物考 卷二十一

遠西醫物考 卷二十七 十五 鳳雲堂

蒸餾醋 十北

右鉛粉ヲ磁鍋ニ内レ蒸餾醋ヲ加ヘ煮テ酸味消シ
甘味トナルニ至テ紙ニテ漉其液ヲ文火ニ上水氣
ヲ蒸散メ上面膜ヲ生スルニ至リ再漉シ放冷メ芒
ヲ結シメ其芒ヲ取貯フ又其餘ノ液ヲ煮テ結芒セ
シマルト前法ノ如シ其芒ヲ取集乾シ貯フ○鉛丹
若ハ黑錫ニテ前法ノ如ク製スル者アレバ鉛粉ニ
テ製スルヲ上品トス○此藥ハ一種礦性ノ中和鹽
ニメ潔白微透亮ノ芒針ヲ結ビヨク水ニ溶化ス若
潔白ナラザル者ハ蒸餾醋ト水ト等分ニ合是ニ其

芒ヲ投メヨク溶シ紙ニテ漉火ニ上水氣ヲ蒸散メ
結芒セシタルト前法ノ如スレバ潔白トナルナリ

主治味甘收斂清涼ス外敷メ焮熱ヲ涼解シ血液ノ
酷厲毒ヲ甘和シ疼痛ヲ止ム故ニ一切焮熱腫痛及
ビ小胞赤疹等ヲ收斂メ消散シ潰瘍ノ侵蝕スル敗
膿ヲ淨掃シ乾愈ス○焮腫眼ニ是ヲ蕃薇水ニ溶メ
眼ニ點シ或ハ鉛糖兩砂各四匁水八匁ニ研和シ眼
ニ點メ殊効アリ○咽喉焮腫ニ管ヲ以テ此末ヲ咽
喉ニ吹入テヨク腫痛ヲ消散ス○淋疾ノ酷厲毒ヲ
消シ焮腫ヲ止ルニ蕃薇水若ハ乳汁ニ鉛糖一二匁

遠西醫物考 卷二十七 鳳雲堂

本草綱目卷之二十一 十六

ヲ和シ水銃ニテ陰莖ニ注入ノ驗アリ○是ヲ薔薇
水ニ溶シ面部ニ塗テ皮膚ヲ美澤ニシ汚斑瘡痕小
胞赤疹等ヲ消散ス○膏藥及ビ塗藥ニ和シ外敷ス
水ニ溶シ用テ効力羅度宛篤爾出ツノ如シ篤爾ノ
主治ト參 ○羅斯其他焮腫瘡瘍類皮表ニ發越ノ病
考スベシ ○羅斯其他焮腫瘡瘍類皮表ニ發越ノ病
毒排泄シ治スベキ症ニ此藥ヲ外敷ノ消散セシム
レバ其毒忽チ内攻ノ諸惡症ヲ發ス云云鉛糖鉛粉
其他諸鉛劑ノ
性功大抵同様ナリ外敷ノ收斂シ濕ヲ乾シ臭汗及
ビ腋臭ヲ消シ羅斯焮腫等ヲ治スレバ其毒ヲ潛伏
ノ内攻セシムルヲアル故 ○此藥一日ニ半匁ヨリ
ニ常ニ戒慎ヲ加施スベシ
五六匁マデ内服ノ痙攣ノ運動ヨリ發スル諸症癩

及ビ痙急ニ因テ嚙下ヲ妨ル症ニ効ヲ稱シ又纖維
諸脉ノ弛緩虚弱ニノ感動シ易キヨリ起ル諸症ニ
良効ヲ稱ス然レ其鉛毒ニ因テ動モスレバ内藏ヲ
閉塞シ烈キ疝痛疝不遂等ヲ發スルヲアル故ニ内
服スルヲ稀ナリ醫醫醫醫
鉛醋 エキスタラクトサ左ルニ又アゼ左ムサ左ル
ニ羅ステルクフルイエントアセイニフテ
ルロド蘭

製法 密陀醋 次ニ出ツ 適宜

右磁鍋ニ内レ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ油若クハ
蜜ノ稠ト爲ス

本草綱目卷之二十一 十六

遠西名物考 卷二十七 十七

又法 密陀僧 適宜

蒸餾醋 四倍

右磁鍋ニ内レ文火ニ上セ煮テ酸味ナキニ至リ紙ニテ瀝シ文火ニ上セ水氣ヲ耗散ノ蜜ノ稠ト爲ス

又法 密陀僧 一匕

醋 二匕

右文火ニ上セ攪セ煮テ半ヲ減ス

主治 密陀醋ト同シ。但收斂ノ効峻烈ナルノニ

爾ト參考スベシ

密陀醋

アゼ左ム、リタリゲイリ又アゼ左ム、プリムビ、羅ゴウド、ゲリット、アゼイン、又フル

製法

イエン、ト、アゼイニフ、シ、ル、ロド、蘭密陀僧 十多

醋 四十多

右頸。窄キ硝子ノ格兒弗ニ内レ數、振蕩ノ淹ス

二時。慢火ニ上セ二時煮テ放冷シ是ヲ青紙ニ浸少モ色不變ニ至紙テ瀝去渣硝子壘固封貯

又法

密陀僧 半匕

醋 二匕

右磁壺ニ内レ數攪和シ酸味消スルニ至テ靜定シ其上清ヲ取り硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

遠西名物考

卷二十七

風雲堂藏

主治 收斂ノ嘔スベキ甘味アリ。外敷ノ收斂清涼シ
 焮腫ヲ消散ス。焮腫眼ニ點シ。咽喉焮腫ノ救藥トシ
 痔、焮痛、湯火傷、凍瘡、疥癩瘡、指疽、腺腫等ヲ治ス。水ヲ
 加ヘ稀クシ皮膚顔面ニ塗テ赤皰小疹及ビ腫瘍潰
 瘍、毒螫刺咬ヲ愈シ長途歩行ノ踵蹠焮熱、水疱腫痛
 スルヲ治ス或ハ洗藥、蒸濕藥トシ或ハ油ヲ和ノ軟
 膏硬膏トス 暹 底

越列密 ゴム、エレニ、又、エレムニ 羅
 是ハ黑地兀皮亞 亞弗利加洲ノ國名 伯西兒 新伊 斯巴尼亞 共

亞墨利加洲ノ國名ニ産スルアルボル、エレムニヘラト名ル
 樹ヨリ自然ニ流滴シ或ハ其樹皮ヲ鑽刻ノ取ル華
 爾斯ナリ。其樹阿利機樹ノ如ク葉長狹、淡綠色或ハ
 銀色ヲ帶ビ小赤花ヲ開ク。實亦阿利機ノ如シ 或云是レ
 阿利機ノ一樹ニノ黑地 兀皮亞、阿利機ト名ク 其樹皮縦ニ坼裂スル處多
 クノ宛モ鑽刻スルガ如シ。是ヨリ華爾斯多ク流溢
 ス。上品ハ淨潔ニノ微透亮、淡黄色ニノ綠色ヲ帶ビ
 且、白色ニノ透亮セザル顆粒間錯ノ大塊ヲ爲シ。質
 重ク外面乾キ。裏軟ニノ粘潤アリ。味苦ク。香氣技爾
 撒謨様ニノ茴香ノ如シ 依云、灰色ニノ綠色ヲ帶ビ
 其氣兀爾拔奴謨ノ如シ

蘭蕉葉或ハ椰樹葉ニ卷テ四方ニ貨ス○或ハ伯西
 兒新伊^{ダントシ}斯^バ巴^{ニア}其他南亞墨^ア利^カ洲ノ諸島ニ産ス
 ルイ^イシカリバト名クル樹ノ華爾斯^スヲ越列密^ト名
 ケ販ク者アリ其樹葉梨樹ノ葉ノ如シ淡黃花ヲ開
 キ實ハ阿利^イ襪^ノ如シ其華爾斯^ス微黃透亮軟ニノ粘
 リ甚ダ松脂ニ似タリ久ヲ經レバ乾固ノ磨碎スベ
 シ前種ニ比スレバ下品トス又火ニ温メテ香氣的
 列^レ泣^ニ底^イ那^ナノ如キハ偽品トス

○按ニ此樹脂和漢產未詳ナラズ舶來ヲ用ベシ

主治 性温油氣鹽氣多シ外敷ノ凝結ヲ疏解スル殊

効アリ膏藥若ハ塗藥トシ稍衝動ノ腫瘍ヲ消散シ
 疼痛ヲ止メ堅硬ヲ軟ゲ或ハ膿ヲ釀シ腐敗ヲ淨除
 シ創ヲ愈ス良藥トス又神經ヲ強壯シ頭創神經創
 及ビ骨傷脱臼ニ尤^モ驗アリ頭痛齒痛肩背痛等ノ患
 部ニ外敷ノ其疼ヲ消散ス燒酒若ハ油ニ溶^カシ塗テ
 良○内服ノ粘液ヲ稀釋シ汚液ヲ淨除シ痛ヲ止ル
 良効ヲ稱ス雞子黃ニ研和シ用フ或ハ水ヲ加ヘ蒸
 餾ノ芳香ノ露水及ビ精微ノ油ヲ取ル右ノ諸症ニ
 偉効アリ或云蒸餾ノ十六
 越列密膏分一ノ油出ツ
エムプラストエレニ
羅

製法 越列密ヲ取リ文火ニ溶若把兒麻膏ニ煉和ス
主治 越列密主治ニ舉ル諸症ニ外敷ノ良驗アリ

厄日多膏 ユンギンエンナム、エゲブテキム、エゲイブチセ、サルフ、蘭

製法 銅線細末一比
酒石英 三比

右水適宜ニ加ヘ煮テ盡ク溶化スルニ至リ。瀝テ汁
ヲ取リ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ乾クニ至リ。又風
日ニ曝メ自ラ溶化セシメ。瀝テ滓ヲ去リ蜜十二比
ヲ加ヘ攪和シ軟膏ト爲ス

又法 銅線細末五弓

醋 七弓
蜜 十四弓

右文火ニ上セ手ヲ住メズ攪セ煮テ軟膏ト爲ス

主治 汚穢腐爛ノ潰瘍ヲ淨掃シ。膿ヲ排ヒ壞肉ヲ祛
キ好肉ヲ生シ。水棉様肉ヲ除キ。熱壞疽。癌様及ビ微
毒ノ腺腫潰瘍。口中斷頸。爪。諸骨ノ腐爛ヲ淨除スル
ニ貼メ良驗アリ

越没里膏 ユングエンナム、エモリン、ス、羅、エ、ン、ケ、ル、ホ、ウ、ダ、ヘ、サ、ル、フ、蘭

遠西銘物考 卷三十七 楓雲堂藏

本草綱目卷之二十一 二十一 風雲堂藏

製法

阿利襪油 五多

白蠟 二多

右文火ニ上セ烱化シ攪和ノ軟膏ト爲ス

〔按〕

〔主治〕外敷ノ緩和止痛ノ捷効ヲ奏シ堅硬ヲ軟化シ

焮熱腫痛ヲ消散シ或ハ善膿ヲ釀メ潰破セシメ或

ハ皮膚皴揭甲錯枯澁汚斑赤皰小疹瘡痕火傷凍瘡

等ヲ治シ肌膚ヲ滑澤ニス○他ノ藥品ヲ加テ諸膏

藥ヲ製スルニ用フ

〔叔〕

〔布〕

燕窩 スワル子スト

蘭○人家屋簷ニ架スル燕巢ナリ燕窩菜ニ非ズ

〔主治〕堅硬ヲ軟化シ凝結ヲ疏散ス。琶布トシ頸ニ貼

ノ咽喉焮腫ヲ消散ス。是レ燕屎ニ酷厲ナル鹽氣土

氣アリテ凝血及ビ粘液ヲ驅散スレバナリ

〔叔〕

〔英〕

依蘭苔

リセンイスラランダモス蘭

○榕按ニ是和名ハナゴケト呼ブ一種ノ苔ナリ

深山巖石林中地上老木等ニ生ス西洋ニ於テハ

往昔始テ依蘭地歐羅巴洲ニ採リ和蘭ニテエリス

ランドセモスト名クモスハ苔ノ義即チ依蘭地

苔ナリ今是ヲ略譯ノ依蘭苔ト名ク

遠西名物考

卷二十七

風雲堂藏

本草綱目 卷二十七 二十二

形狀 形ノ鹿角菜ノ如ク花又ヲ爲シ
分テ大ハアリ
 圖ノ邊ニ微細ノ毛刺アリ
或云一面ハ淡緑若ハ
 黯赭味苦微收瀋粘滑ニノ香氣ナシ
 水ニ浸シ若ハ水煎スレハ粘汁出テ鹿角菜ノ如シ
 日乾シ或ハ水若ハ沸湯ニ浸シ淘洗スレバ苦味減ス

依蘭苔圖



產地 此苔往古ハ依蘭地ニ採ルト雖モ今ハ歐羅巴洲ノ北方諸國ノ山地巖石。礫确瘠土。荒野及ビ松林中ニ多ク生ス

主治 油。酸性鹽。許多ノ水。及ビ些少ノ土ヲ含ニ又護及ビ華爾斯アリテ其苦味ヲ生ス○人及ビ畜類共ニ食料トシヨク身體ヲ榮養ス生鮮ノ者ハ微利ノ効アリ一晝夜水ニ浸セバ苦味消シ下利ノ効去テ唯粘液ノニ殘ル
此粘液ヲ以テ諸蒸餾油及ビ龍腦ニ研和シ水ニ加レバヨク水ト混和ス但乾腊ノ者ヲ用フレバ下利スルヲ稀ナリ○
 此藥内服ノ消化シ易ク大ニ滋養シ虛損ヲ補充シ

藥西名物考 卷二十七 風雲堂藏

諸酷厲液ヲ包攝綏和スル殊能アリ。故ニ飲食消化ノ力衰へ羸瘦スル諸病及ビ勞瘵ノ要藥トス。○勞瘵ノ初發及ビ經久頑固ノ欬嗽ヲ治スルニ近來是ヲ用テ經驗甚ダ多シ。○水煎ノ粘液ニ乳汁ヲ加ヘテ稀クシ。勞瘵様ノ病ニ毎日飲料トシ用テ全治スル者少カラズ。○胃ノ虛弱ナル者ハ乳汁ト雖モ消化シ難シ。此藥ハ良性ノ榮養液ヲ醸生スル殊効アルヲ以テ乳汁ヲ消化シ易カラシム。故ニ此藥一味乳汁ニ煮テ用。或ハ左ノ如キ劑ニ乳汁又加用フベシ。

甘草蘭苔飲


依蘭苔 一多

甘草 三錢

右苔ニ水一坵半ヲ加ヘ煮テ十四多ト爲シ。火ヲ下シ甘草ヲ加ヘ浸ス。十六分時ニノ瀝過シ用フ。○羸瘦消耗熱。肺傷久欬。血液ノ虛損ヨリ發スル荏苒タル虛羸病。下利止マズ。瘦削スル等ヲ治ス。○傷冷毒ノ酷厲液。肺ヲ刺戟シ欬劇クノ虛憊セル症ニ的當トス。患人體稟薄弱ナル者殊ニ良。或ハ是ヲ用テ效治セザル者モ唯肺及ビ全軀ヲ滋養シ精力ヲ保

續ノ虚脱セシメザル爲ニ用テ良驗アリ○效嗽及
ビ勞效ニ効アレハ嗽衝ニ傾ク症ニハ適應セズ。脉
弦數ニノ頗ル力アリ。舌及ビ皮膚乾キ。總テ纖維充
張ノ候アル者ハ此藥ノ粘液質ハ妨ゲザレハ其收
滿強壯ノ効ハ害アレバナリ唯患者ノ天質。薄弱ニ
ノ感動シ易ク。且、腹部ノ諸藏及ビ肺虚損ノ粘痰多
ク湊リ少モ嗽衝ノ候ナキ症。或ハ傷冷毒ノ酷厲液
刺戟ノ肺虚損スル症ハ此藥ヲ用テ大ニ輕快ヲ致
スナリ○肺虚弱ニノ感觸シ易キヨリ漸ク勞效ニ
罹^カリ吐痰過多ナル症ハ此藥大効アリ。但、他ノ病毒

ヲ夾テ肺ヲ刺戟スル者ハ先ツ對症ノ藥ヲ與ヘ其
毒ヲ驅除ノ後。是ヲ用テ殊ニ的當ス○肺嗽衝ノ劇
キ諸症退テ後。每ニ是ヲ用テ効多シ。是レ一ニハ肺ノ
虚損ヲ回復シ。一ニハ肺ニ壅滯セル膿ヲ排ヒ腐爛
ヲ除キ淨掃ノ愈セバナリ○凡ソ肺瘍大ニ膿潰ス
ル症ハ此藥ヲ用テ曾テ害アル者ヲ見ズ○總テ嗽
衝ヲ兼ザル勞效ハ是ヲ用テ肺ノ虚損ヲ補充シ膿
質ノ酷厲液ヲ消ス○勞效ニ幾那ヲ用テ應セザル
片ハ此藥ヲ加ヘテ幾那ノ効ヲ扶ケ用テ良効ヲ得
ルヲ多シ○肺ノ虚弱ナルヨリ勞效ニ罹^カリ夥ク粘



痰ヲ略ク症ハ幾那ヲ加ヘ殊効アリ。假令^{タトヘ}バ左ノ方
ノ如シ

幾那蘭苔飲

幾那 一弓
依蘭苔 四錢

右水二比ヲ加ヘ煮ル^ト四分時ニノ十六弓ト爲シ
濃過ノ滓ヲ去リ過爾託亞^{タア}舍利別。一弓ヲ調和シ一
時^ト毎ニ一小茶碗ヲ温服ス。○肺瘍勞效ノ既ニ膿ヲ
成ス症ハ軼^ガモスレバ痰甚ダ膠粘ニシテ略出シ易カ
ラザル者多シ。此症ハ總テ強壯收瀰ノ藥ハ害アリ

故ニ右ノ飲劑ノミナラズ此藥一味與フト雖モ呼
吸促進煩悶等ノ惡症ヲ増發ス。○乾效及ビ痰^キ略出
シ難キ勞效。麻疹後ノ乾效休マザル症ハ此藥四錢
ヲ取り甘草二錢ヲ加ヘ水二比ヲ以テ煮テ十六弓
ト爲シ半時^ト毎ニ一小茶碗ヲ温服ノ殊効アリ。多ク
痰ヲ略^カシムベキ症ハ海葱蜜少許ヲ加フベシ。假令^{タトヘ}
バ此藥一弓ヲ取り水十六弓ヲ以テ煮テ一比ト爲
シ海葱蜜四錢マデ加ヘ一時ニ一弓宛^{ツク}用フ。總テ羸
瘦消耗熱ハ效ノ有無ヲ論セズ右ノ飲劑ヲ與ヘテ
患者ノ精力ヲ保護シ消耗脫泄ノ汗ヲ止ムベシ。又

左ノ泡劑良驗アリ

治勞蘭苔飲

依蘭苔 一弓

甘草

蜀羊泉 各六錢

黧失刺蘘葉

乙切草 各三錢

茴香穗 二錢

右件調勻シ沸湯ニ泡出ス○肺ニ害ナキ諸般ノ羸瘦病ニ亦病毒ノ所在ニ拘ラズ依蘭苔ヲ用テ多ク

効アリ○腹部ノ諸藏若クハ腸間膜腺ニ膿瘍等ヲ生スルニ因テ荏苒タル内伏熱ヲ發シ。身體消耗枯瘦スル症ニ是ヲ用テ治驗多シ○此藥腐敗熱ニハ峻効ナシ是防腐ノ性力慢緩ナレバナリ。然レ病毒漸ク退キ。唯其榮養ノ虧損スルヲ培補シ精力ノ虛缺ヲ回復スベキ症ニハ大効アリ○殮泄下利肝崩等ノ脱泄ニ因テ胃腸ノ運化虛衰シ全軀ノ榮養ヲ失フ者ハ此藥甚ダ驗アリ。其病性分明ナラザル者モ是ヲ連服セシメテ効ヲ得ルコト多シ○痛痢赤痢ノ初發ハ此藥的當セズ。先ヅ吐劑或ハ大黃劑ヲ用

テ胃腸ノ酷厲毒ヲ驅除スベシ。否ラズノ早ク此粘
 涎ノ強壯藥ヲ投スレバ其毒逾壅鬱ノ病患淹滯シ
 惡性トナレバナリ。故ニヨク胃腸ヲ淨掃メ是ヲ用
 レハ腸中ノ粘液剝脫ノ傷爛セルヲ填補シ精力ヲ
 強壯ノ大効アリ。○赤痢ノ膿ヲ下ス症ハ此藥良驗
 アリ石灰水石灰ノ條ニ出ニ煮テ用レハ殊ニ良。○痢疾惡
 性ナラズ。唯傷冷毒ヨリ發メ其酷厲液ヲ和解スベ
 キ症。及ビ患者疲勞シ胃腸虛衰スルガ爲ニ荏苒ト
 ノ治セザル症ハ此藥ヲ用テ偉効アリ。亞兒尼加アールニカモシ若
 クハ幾那キナヲ加ヘテ殊ニ良。

服法 此藥一弓ヲ取り水一匕ニテ煮ル。四分時。布
 巾ニテ絞リ瀝セバ大約七八弓ノ粘汁トナル。或ハ
 茲養ノ効ヲ取ルニハ乳汁キシ若クハ乳清一匕ヲ和シ
 毎日飲料トス。○苦味ヲ惡ム者ハ沸湯ニ浸ス。八
 分時ニメ苦味ヲ去リ水煎シ服スベシ。効力脱スル
 下ナシ小兒ニ與ルニハ右ノ如ク苦味ヲ去リ水煎
 ノ稀ウスキ粘汁ト爲シ。桂水少許ト砂糖トヲ加ヘ一茶
 匙宛數用フベシ。○此藥ヲ連服ノ味ヲ惡ム者ハ乳
 汁ヲ以テ煮テ用ヒ。或ハ水煎ノ砂糖ヲ加ヘ甘美ト
 爲シ。或ハ香竄ノ諸藥ヲ加ヘ水煎ノ消化シ易カラ

遠西醫方名物考卷二十七終
千八
麻雲堂

シムベシ○或云。泡劑ト爲セバ効力醇厚ナラズ濃煎スレバ甚ダ膠粘ニノ是ヲ服ノ細絡織管ニ滲入シ難シ或云。水ニ浸シ用レバ味淡薄ニノ服シ易シ

依叔
福我



遠西醫方名物考卷二十七終



