


無錫顧鳴猷編



實驗  
良法

房中一醫

上海文藝編譯社印行



# 最新種子法

全書一冊

價洋三角

多男固生人奢願而強種實多男要素無錫願鳴盛特撰是編爲我黃人謀增進戶口之計用意至深遠也全書共分九章第一章總論第二章論男女之成熟第三章論男女陰之解剖生理第四章論月經第五章論婚姻第六章論愛情第七章論色慾第八章論交合第九章論姙孕末附淋病花柳病之豫防養生法各若干則說理確而且精出筆雅而不俗誠居家不可不備之書

(丙六十三)



# 小兒按年養育法

全書一冊

價洋三角

編兒科書視他科書特難太詳則不易卒讀太略則一覽無遺過深則難於索解過淺則棄若唾餘欲求一詳略適當深淺合宜之本已憂憂難難欲求其按年歷論若物之有本事之有終益不可得詎非有子女者之一大憾事耶無錫願鳴盛有鑒於此特編是書博採羣經精心結撰說養育既悉按年齡論醫治亦一依時代全書分十一章曰生後一月至一歲之小兒後四日至一個月之小兒曰生後一月至一歲之小兒曰生後二歲之小兒曰生後三歲之小兒曰生後四歲至七歲之小兒曰生後八歲至十二歲之小兒曰生後十三歲至十六歲之小兒曰小兒食物烹調法曰小兒救急法曰種痘術末附小兒用西文藥名小兒內服藥用量表牟尼一串層次井然誠破天荒之兒科書也至其詳略之適當深淺之合宜猶其餘事

(丙六十四)

上海棋盤街文明書局及各省中華書局發行



上海進步書局出版

全書 一册  
**賣** = **春** = **害**  
 價洋 三角

此書詳於花柳病之歷史一章論賣春婦之生活程度如賣春之定義賣春婦之種類出身終局毒害及存廢之問題等二章論檢梅毒法歷舉日本檢梅之制度與其成績並臚列各表以資攷鏡抒陳意見以備採擇三章記德京柏林四章記普魯士五章記奧京維也納六章記丹麥卑納七章記意京羅馬八章記法京巴黎九章記比京不律悉十章記荷蘭十一章記瑞士十二章記英美兩國十三章記日本東京讀之可以知東西洋文明各國風俗之真淫法令之寬嚴治療之優劣廿四章記大同醫院診療十五章記神州醫院診療皆經驗之談讀之可知娼妓之害疾病之來未附梅毒經過之大略并揭顯以明之振聵發聵用意深遠維持風化有功社會不淺凡我國民不可不家置一編也

(丙六十五)

全書 一册  
**慾** = **海**  
 價洋 三角

本書為德國產科大家海嘉氏所著備言色慾之害與不節其慾之尤害人生短折疾病胥由於此其言女子有病之宜節慾異種結婚之斷血統尤為獨到之見經驗之談列表凡七證據確實茲經醫學大家錫山顧叔惠先生逐譯成書言言藥石字字鍼砭警切著明為青年衛生第一要書幸勿泛泛讀過

(丙六十六)

上海棋盤街明文書局及各省市中華書局發行

上海文書局發行

# 小說界之破天荒

包天笑  
主任

小說大觀

出版

季刊一冊約三百餘頁定價一元

全年四冊三元六角郵費每冊七分半

大本洋裝紙張潔白堅韌

本社痛晚近小說之日趨墮落乃發願辦一宗旨純正興味濃郁之小說雜誌名曰小說大觀爰請包天笑先生主任其事每季出一集都二十萬言每年四集都百二十餘萬言所載小說均當世有名文家詢有價值之作每集短篇必在十篇以上長篇必在二四種以上均首尾完全者勿令人有斷續中止減少興味之憾其他雜記隨筆新劇院本種種名稿無美不備誠小說界破天荒之傑作也

第一集現已出版

(丙五十八)

各省中華書局代售

# 房中醫提要

無錫顧鳴盛撰

世無不病之人體無不病之部我國習慣下部有病往往諱疾忌醫遷延不治致害生命此書專論男女隱疾共分五編第一編述男子生殖器之解剖生理第二編述男子生殖器之疾病而橫痃痔瘡脫肛諸病附焉第三編述女子生殖器之解剖生理第四編述女子生殖器之疾病而乳岩乳痛諸病附焉第五編論藥物使人人辨其性能列處方使人人自知抉擇舉術語使人人毫無疑難人手一卷則夫妻可互相護救子女可自任治療自有此書男女隱疾除必須開刀外皆可不接醫師之目不觸醫師之手居家行旅隨地隨時病起即治既省金錢又多利便

本書爲錫山顧叔惠先生所編先生邃于醫理溝通中外甬滬懸壺大名鼎鼎近更一意著述此爲臨証經驗之方尙有種子術慾海賣春害三種皆確有心得之作與種子之強弱風俗之貞淫煞有關係非他書之撮拾皮毛者可比



## 例言

一本書論病。不論爲花柳病與非花柳病。不問在生殖器與在泌尿器。但專恃外治。及須內外兼治者。無不採入。他如僅內服可愈之遺尿等。雖亦下體之病證。概付闕如。以符房中醫之名義。是本書論病。精詳之特色一。

一本書分類。區爲男女兩大部。先解剖。次生理。又次疾病。述解剖。明構造也。言生理。舉功用也。疾病以部位別之。益井井有條也。終以雜部爲全書之結束。而本書之價值愈著。是本書分類。明晰之特色二。

一本書蒐集材料。都凡二十四種。舉東西醫藥學家之新編巨帙。盡攝之於一小小冊子中。刪繁就簡。取精用宏。間更參以八年來臨證之經驗。是本書取材。宏富之特色三。

一本書引用學理。至精且深。著者盡以淺顯之筆。達出之。務使男女青

年。中。下。社。會。都。能。了。解。對。之。不。厭。倦。讀。之。有。餘。味。是。本。書。說。理。淺。顯。之。特。色。四。

一。本。書。注。重。實。理。不。尚。詞。華。以。端。重。莊。嚴。之。筆。發。而。爲。誠。懇。篤。實。之。文。辭。無。風。月。不。虞。貽。誚。大。方。義。託。砭。鍼。非。可。視。同。小。說。是。本。書。持。論。正。宗。之。特。色。五。

一。本。書。圖。畫。應。有。盡。有。惟。妙。惟。肖。健。全。無。病。之。人。觀。之。可。觸。目。驚。心。相。戒。弗。任。侵。犯。疾。病。顛。連。之。輩。覽。之。若。禹。鼎。秦。鏡。自。療。益。有。憑。依。是。本。書。插。畫。精。良。之。特。色。六。

# 序言

藐然七尺何藏不病諱疾忌醫求死之道願見聞所及抱隱疾者厥數  
什九至堪驚蹶沈思潛索迺知有由蓋裸體示醫盡人難堪苟非得已  
必守秘密區區自重本諸羞惡人禽之判文野之分胥此道也我國文  
明爲世界冠人尙廉恥家重禮教故辱在輿臺下至婢媪人道摻疾甯  
死弗治名門子弟大家閨秀豈惟拒醫抑且結舌則以言不雅馴搢紳  
先生難言之也

人身臟器或宰循環或主呼吸或掌消化或營運動或司生殖效用雖  
異基質則同以嬌嫩細密之組織出而受塵世凡百之刺戟刺戟無窮  
而抵抗有盡以有盡應無窮不病者幾希矣他部如此生殖亦然  
夫病在他部治療惟先者身爲貴也病在陰部放棄恐後者名爲重也  
名爲重則甯喪厥身毋墮其名是固然矣抑思造物必先畀我以身而

后。獲。此。名。耶。是。故。名。與。身。實。同。立。於。神。聖。之。地。位。者。欲。保。其。身。欲。保。其。名。有。兩。全。之。道。以。處。之。其。道。維。何。自。治。是。已。

常。人。有。病。患。在。不。自。知。研。究。生。殖。一。部。之。解。剖。生。理。斯。病。無。不。知。知。之。矣。患。在。不。能。治。研。究。生。殖。一。部。之。醫。學。藥。學。斯。病。無。不。治。比。年。來。坊。間。所。售。生。殖。器。病。書。種。類。亦。頗。夥。願。或。體。例。蕪。雜。或。文。辭。猥。鄙。不。足。以。詔。當。世。昭。來。茲。予。是。以。有。房。中。醫。之。作。

無錫顧鳴盛序

# 目次

緒言	一
第一編 男子部	二
解剖生理篇	二
第一章 內生殖器之解剖	三
第一節 睪丸之構造	三
第二節 副睪丸之構造	四
第三節 輸精管之構造	四
第四節 精囊之構造	五
第五節 精絲之構造	五
第二章 內生殖器之生理	五
第一節 睪丸之機能	五

第二節	副睪丸之機能	六
第三節	輸精管之機能	六
第四節	精囊之機能	六
第五節	精液之機能及成分	六
第三章	外生殖器之解剖	七
第一節	攝護腺之構造	七
第二節	哥啤爾氏腺之構造	八
第三節	陰莖之構造	八
第四章	外生殖器之生理	一〇
第一節	攝護腺之機能	一〇
第二節	哥啤爾氏腺之機能	一〇
第三節	陰莖之機能	一一
第二編	男子部	一二

	疾病篇	一一
	第一章 內生殖器之疾病	一一
	第一節 舉丸病	一一
	一 舉丸停滯	一一
	二 先天性舉丸水腫	一三
	三 舉丸血瘤	一四
	四 舉丸炎	一四
	五 舉丸梅毒	一七
	六 舉丸結核	一一
	七 舉丸寒冷	一三
	第二節 副舉丸病	一三
	一 副舉丸肉腫	一三
	二 淋毒性副舉丸炎	一四

---

第三節	輸精管病	二六
一	輸精管炎	二六
二	精系水腫	二六
三	精系靜脈瘤	二七
第四節	精囊病	二八
一	精囊炎	二八
二	精囊結核	二〇
第五節	精液病	二一
一	遺精	二一
二	滑精	二五
三	精液缺乏	二六
第二章	外生殖器之疾病	二七
第一節	攝護腺病	二七

一	攝護腺肥大	三七
二	攝護腺炎	三九
三	攝護腺漏	四三
四	攝護腺結核	四四
第二節 陰莖病		
一	陰莖短小	四四
二	陰萎	四七
三	陰莖強直症	四九
四	包莖	五一
五	嵌頓包莖	五三
六	包皮炎	五四
七	龜頭淋	五五
八	軟下疳	五八

---

九	硬下疳	六四
十	海綿體炎	六七
十一	尿道淋	六八
十二	尿道創傷	八四
第三節	陰囊病	八六
一	陰囊水腫	八六
二	陰囊乳糜腫·血腫·精液腫	八九
三	陰囊創傷	九〇
四	陰囊濕疹	九一
五	陰囊象皮病	九二
六	陰囊丹毒	九三
七	陰囊蜂窩織炎	九五
八	陰囊疝	九六

九 陰囊弛緩……………九七

第四節 其他諸病……………九八

一 橫痃……………九八

二 尖圭濕疣……………一〇二

三 扁平濕疣……………一〇五

四 直腸淋……………一〇七

五 痔核……………一〇九

六 痔管……………一一三

七 脫肛……………一一五

八 毛虱……………一一六

第三編 女子部……………一一八

解剖生理篇……………一一八

第一章 內生殖器之解剖……………一一八

第一節	卵巢之構造	一一八
第二節	輸卵管之構造	一二〇
第三節	子宮之構造	一二〇
第四節	卵子之構造	一二一
第二章	內生殖器之生理	一二一
第一節	卵巢之機能	一二一
第二節	輸卵管之機能	一二一
第三節	剪綵之機能	一二二
第四節	子宮之機能	一二三
第五節	月經之機能及成分	一二三
第三章	外生殖器之解剖	一二四
第一節	陰道之構造	一二四
第二節	巴爾氏腺之構造	一二六

第三節	陰核之構造	.....	一一六
第四節	前庭之構造	.....	一二六
第五節	陰唇之構造	.....	一二七
第四章	外生殖器之生理	.....	一二八
第一節	陰道之機能	.....	一二八
第二節	巴爾氏腺之機能	.....	一二八
第三節	陰核之機能	.....	一二八
第四節	陰唇之機能	.....	一二九
第五章	男女生殖器之比較	.....	一二九
第四編	女子部	.....	一三〇
疾病篇	.....	.....	一三〇
第一章	內生殖器之疾病	.....	一三〇
第一節	卵巢病	.....	一三〇

---

一	卵巢變位	一三〇
二	卵巢囊腫	一三一
三	卵巢炎	一三三
第二節 喇叭管病		一三六
一	喇叭管鬼胎	一三六
第三節 子宮病		一三八
一	子宮筋腫	一三八
二	子宮癌	一四〇
三	血崩	一四二
四	子宮實質炎	一四三
五	子宮內膜炎	一四五
六	子宮外膜炎	一四八
七	子宮脫	一五〇

八	子宮內翻	.....	一五一
第四節	月經病	.....	一五二
一	痛經	.....	一五二
二	月經過多	.....	一五五
三	無月經	.....	一五六
第二章	外生殖器之疾病	.....	一五七
第一節	陰道病	.....	一五七
一	陰道癌	.....	一五七
二	陰道排氣響	.....	一五八
三	陰道閉鎖	.....	一五八
四	無陰道	.....	一五九
五	鏡陰	.....	一六一
六	陰道炎	.....	一六二

七	白帶下	一六四
八	陰道脫	一六六
九	陰道異物	一六七
十	陰道乾燥	一六八
第二節	巴爾氏腺病	一六九
一	巴爾氏腺炎	一六九
第三節	陰核病	一七〇
一	陰核肥大	一七〇
二	陰核癌	一七一
第四節	陰唇病	一七一
一	陰門癌	一七一
二	陰門囊腫	一七一
三	陰門炎	一七二

四	陰門象皮病	一七五
五	軟下疳	一七六
六	硬下疳	一七七
七	陰門侵蝕性潰瘍	一七九
八	陰門狼瘡	一八〇
九	陰門癢	一八一
十	陰陽體	一八二
十一	陰門白癬	一八四
十二	陰門惡臭	一八四
十三	尿道淋	一八五
十四	尿道脫	一八八
第五節	其他諸病	一八九
一	陰道鎖肛	一八九

---

二	會陰破裂	一八九
三	流產	一九一
四	乳腺炎	一九四
五	乳房痛	一九六
六	乳癌	一九六
第五編	雜部	一九八
	藥物篇	一九八
第一章	麻醉藥	一九九
第二章	興奮藥	二〇一
第三章	退熱藥	二〇二
第四章	清涼藥	二〇四
第五章	防腐及消毒藥	二〇四
第六章	驅蟲藥	二〇六

第七章	變質藥	.....	二〇六
第八章	強壯藥	.....	二〇八
第九章	收斂藥	.....	二〇九
第十章	刺戟藥	.....	二一一
第十一章	下劑	.....	二一二
第十二章	利尿藥	.....	二一三
第十三章	發汗藥	.....	二一四
第十四章	緩和藥	.....	二一四
處方篇	.....	.....	二一六
第一章	內服藥	.....	二一七
第二章	外用藥	.....	二二六
語術篇	.....	.....	二四〇

---

目次終

# 房中醫

無錫顧鳴盛撰

## 緒言

生。存。兩。大。而。隸。於。動。物。界。者。上。自。人。類。下。至。昆。蟲。種。族。莫。不。繁。殖。繁。殖。莫。不。旺。盛。願。欲。種。族。之。繁。殖。旺。盛。非。具。有。靈。妙。之。機。能。不。可。也。此。靈。妙。之。機。能。謂。之。生。殖。機。能。其。營。此。機。能。之。器。謂。之。生。殖。器。研。究。關。係。此。機。能。之。學。科。謂。之。生。殖。生。理。研。究。該。器。構。造。位。置。等。之。學。科。謂。之。生。殖。解。剖。

人。類。之。繁。殖。旺。盛。乃。社。會。最。慶。幸。之。事。亦。人。生。最。貴。重。之。事。也。願。常。人。識。見。淺。陋。動。以。爲。陰。不。孤。則。無。不。生。陽。非。獨。則。無。不。育。搆。精。化。生。自。然。之。理。故。中。年。以。後。似。續。尙。虛。者。在。夫。恒。歸。過。於。妻。室。在。婦。恒。乞。嗣。於。神。明。其。不。孕。之。理。切。身。之。患。則。茫。乎。其。不。知。也。愚。孰。甚。焉。敢。告。人。夫。必。一。



繁殖之器具具有內生殖器與外生殖器之別。述如次。

第一章 內生殖器之解剖


內生殖器一名蕃殖器。屬此者有四。一曰睪丸。二曰副睪丸。三曰輸精管。四曰精囊。精液附焉。

第一節 睪丸

之構造

睪丸在陰囊之內。形圓似卵。為腺質之體。左右各一。長約寸餘。廣半之厚五分許。重錢半至二錢餘。左睪略大。中皆藏腺。自二百至四百。其所以大小不同者。防步

第二圖 睪丸及副睪丸



行疾走等時。有衝突之害。故也。左右兩辜丸間。與其周圍。俱有膜三層。包之提之一。爲莢膜。形似半開之囊。中盛液體。二爲白膜。亦稱辜丸膜。由白色之纖維組織而成。用以摺壓辜丸。使出精液。三爲漿液膜。成於血管。用以供給血液於辜丸而營養之也。

### 第二節 副辜丸之構造

副辜丸。在辜丸之後上部。爲柔軟之組織。長而稍帶扁圓。蓋覆辜丸。狀頗似帽。具有頭、體、尾三部。頭在上端。其形鈍圓。體部爲三稜形。尾在下。頗狹小。

### 第三節 輸精管之構造

輸精管。起於辜丸。爲彈力最足之管。係堅厚緻密之膜所成。在陰囊及小骨盤內。故有陰囊部與小骨盤部之別。在陰囊部者。自副辜丸之下端。紆曲斜上。合血管而成精系。以入於鼠蹊管內。在小骨盤部者。出內鼠蹊輪。與下腹壁動脈交叉而下。至膀胱底部。與精囊相聯絡。管膜共

分三層。外層爲纖維膜。中層爲筋組織。內層爲結液膜。與射精管無異。

#### 第四節 精囊之構造

精囊與輸精管同一系統。睪丸製成之精液。卽儲蓄於此。在攝護腺之後。膀胱底之兩側。相當於直腸膀胱之間。爲凹凸不平。而又卷縮之小膜囊。形長而一端狹小。穿攝護腺而開口於尿道。

#### 第五節 精絲之構造

精絲一名精子。亦曰生元。俗稱精蟲。形圓尾長。形似科斗。長約一釐。千分之五。頭部有核。中後部爲細胞原形質。游泳精液間。運動如鞭。異常活潑。精液一滴之中。有無量數。生活之精絲焉。

### 第二章 內生殖器之生理

#### ○ 第一節 睪丸之機能

男子之睪丸。猶女子之卵巢。具製造精液之機能。善營其微妙。不可思

議之動作。血液爲精液。經極微之細精管而送於輸精管。乃最重要之蕃殖器也。辜丸之製造精液。與卵巢之製造卵子不同。蓋男子既屆成熟之期。苟無病患。該機能斷不中絕。故年雖衰老。精液仍源源而來也。假令不知愛護。致罹病患。精液製造之機能終必廢止而絕。子孫繁衍之希望焉。

### 第二節 副辜丸之機能

副辜丸之生理衛生與辜丸同。

### 第三節 輸精管之機能

輸精管之機能。一似女子之喇叭管。能將辜丸中製出之精液。輸送於精囊。若精系有病。則精液梗滯。必不能向外射出。

### 第四節 精囊之機能

精囊專容受輸精管送來之精液而儲藏之。

### 第五節 精液之機能及成分

精液爲混濁之液體。實男子生殖之原質也。色白性粘。有特異之臭。百分中含水八十二至九十。固形成分十至十八。所謂固形成分者。蛋白質、脂肪、鹽類等是也。男子一星期內。如僅交媾一次。其精液必濃厚。有力。凝而不流。質最佳良。

### 第三章 外生殖器之解剖

外生殖器。一名交接器。屬此者有三。一曰攝護腺。二曰哥啤兒氏腺。三曰陰莖。

#### 第一節 攝護腺之構造

攝護腺。在膀胱之尖端。圍繞尿道之上部。兩鼠蹊部之間。其狀如栗。有基底。尖端與前後兩面之別。基底寬大而向上。尖端狹小。適對尿道。前稍平坦。外抵恥骨。後面豐隆。內接直腸。係纖維膜、筋組織腺質所成。膜包於腺之表面。筋成自筋纖維。用以纏絡腺質。腺質狀若海綿。成自葡萄狀腺。造成數多之小葉。與排泄管。而開孔於精阜之周圍。此腺受病。則肥大。

擠壓尿道妨害小便之通利。

第二節 哥啤兒氏腺之構造

哥啤兒氏腺在尿道三角韌帶之兩葉間。狀似小豆。色帶紅黃。亦葡萄狀腺體之一也。爲結締組織及平滑纖維所纏絡。

第三節 陰莖之構造

陰莖在恥骨之下。陰囊之前。爲弧三角形之肉柱。懸於兩股之間。乃最要之交接器也。體爲海綿質所成。勃起之時。長約可四寸。全體分三部。一爲龜頭。在陰莖之最下端。形若圓錐。其圓徑較陰莖稍大。爲陰莖中之主要部分。後端隆起。謂之龜頭冠。亦稱龜頭鏢。該部色帶綠。謂之龜頭綠。尿道口在其頭端。神經血管兩皆饒多。二爲頸部。卽龜頭頸。頸內有無數小腺。分泌白色物質。有特異之臭。三爲幹部。卽自頸部至陰莖根之謂也。此部有皮包之。直至頸部而止。惟頸部前面之皮。與頸部不相粘連。寬鬆而可以翻轉。露出全頸。謂之包皮。其在後面者。則直至龜

頭尖端爲止。尖端中央部。別有韌帶繫之。緊張而不能翻轉。謂之包皮。繫帶。試剖陰莖全部視之。則見上部稍大。是爲蜂窩體。下部稍小。是爲海綿體。當骨盤之前。會陰之下。是爲陰莖。其附屬於陰莖者。尙有數種。列如次。

一、射精管。係強厚之膜所成。上起精囊。斜行而下。通攝護腺之前。而開口於尿道。

二、尿道。亦由膜造成之管也。起於膀胱下端之尿道口。開口於陰莖之尖端。此陰莖尖端開口之部。即謂之尿道口。爲排精與放尿之公器。故又名生殖泌尿器。

三、陰囊。爲保護辜丸之具。然副辜丸。輸精管等。皆囊括焉。中分內外二層。內層爲膜。外層爲皮。外皮色黑褐。多皺紋。有彈力性。善隨氣候之變化。與意識之感動。而自在漲縮。其在腹筋直下之一筋層。有提舉辜丸之力。謂之提舉筋。

四、陰<sup>△</sup>阜及陰<sup>△</sup>毛。陰阜在恥骨表面稍稍隆起。脂肪充盛。故以指按之。儼似柔軟之墊。陰毛叢生其上。下則延及陰囊。但稀少耳。

五、會陰。自肛門至陰莖根間之謂。此部多血管神經。爲軀幹終止之端。乃最重要之所也。

#### 第四章 外生殖器之生理

##### 第一節 攝護腺之機能

攝護腺分泌透明之粘液。無色。無臭。呈鹼性。故味微鹹。謂之攝護腺液。

##### 第二節 哥啤兒氏腺之機能

哥啤兒氏腺亦分泌一種液體。謂之哥啤兒氏腺液。形性與攝護腺液相類似。精液射出之時。該兩液即相與混和。以增加精蟲運動之勢力。平時僅分泌少許。以濕潤尿道。使放尿之際。尿道不受其刺戟。但當春情發動之時。亦常分泌多量。彼觀淫書淫畫。而尿道口泄出膠液者。卽此也。

### 第三節 陰莖之機能

陰莖之組織以其爲海綿狀體。且多血管。故血液得於一時間輻湊而來。一若海綿之浸於水中。然陰莖之勃起。卽由於血液之充漲也。又多神經。故一經交媾。陰莖與腔壁互相摩擦。遂覺快適無比。而龜頭尤甚。故龜頭別稱快美小體。考陰莖之機能有二。一以注射精液於女陰之內。二以排泄小便於身體之外。

一、射精管 射精管專將精囊中所儲藏之精液。因射精中樞神經之刺戟。而注射於尿道。

二、尿道 尿道本流通小便之處。然當交媾之際。則依諸神經之作用。將來自射精管之精液。注於女陰。或體外。

三、陰囊 陰囊以有彈力性之故。平時雖多寬鬆。稍稍下垂。然至交媾時。則筋力異常收縮。幾若核桃。使睪丸得緊貼小骨盤部。射精遂愈有力。倘此筋力不足。射精必不能及遠。致爲不孕之原因。又身體強健。

者。陰囊必緊而皺紋多。體弱者則寬而皺紋少。

四、陰阜及陰毛。交媾之際。男女兩恥骨雖相觸。而不至猛烈。因以

負傷者。實以有陰阜之故。陰毛能增進交接之快美。故亦屬必要。

五、會陰。會陰之筋層。亦於交媾時起收縮之作用。使舉丸上升。增

加射精之勢力。

## 第二編 男子部

### 疾病篇

#### 第一章 內生殖器之疾病

##### 第一節 舉丸病

###### 一 舉丸停滯

定義。男兒生後。舉丸卽下降陰囊之內。其已屆成熟之期。而尙在腹

中者。則謂之舉丸停滯。

病原。大都由於遺傳性。其因與腹膜結合。致中途停滯者。亦有之。

證候。有一側與兩側之別。陰囊中洞虛無物。  
治法。於春情發動以前。常常按摩腹部。即可促舉丸之下降。或將舉丸引出。緊束疝氣帶亦佳。

二 先天性舉丸水腫

病原。舉丸下降之後。腹膜囊突起。不復閉合。腹腔與舉丸鞏膜腔互相貫通。致腹腔內之漿液。下沈於舉丸膜中。遂成先天性水腫。  
證候。沿舉丸及精系之部。俱有腫塊。試行打診。覺其中空虛。以指按之。則發咕嚕之音。無殊小腸疝。然該液體不能驟還入腹腔也。必遲遲自細小之通路還流。腫塊乃得縮小。間亦有與小腸疝併發者。  
診斷。此病與小腸疝不同者。小腸疝之腫塊。在上液體在下。舉丸水腫則反之。  
治法。有時液體自然消退。或腹膜囊突起。至晚年閉合。其一部自然治愈者。治之之法。可以用手按捺。使漿液還入腹腔。然後加疝氣帶舉

丸部則纏象皮膏創卽紿務以絕其貫通之路爲度如尙不愈乃乞醫生以細小針穿刺數次放出漿液至於手術必萬不得已時始可行之

三 舉丸血瘤

病原 舉丸諸膜及精系猝受跌打諸傷血液瀦留於舉丸總膜間則成舉丸血腫舉丸亦受損傷血液瀦留於白膜間則成舉丸血瘤  
證候 舉丸俱傷者疼痛非常或竟失神若祇陰囊挫傷痛雖稍減而出血又殊多腹部及陰莖之皮下均得見之考陰囊及舉丸諸膜溢血尋常多漸漸吸收有時或變壞疽或成膿瘍或起焮衝殊不一致  
治法 宜安靜身體高舉陰莖用鉛糖水硼酸水等施冷罨法若妄加壓迫繃帶促血液速卽吸收不惟無效轉易變爲壞疽不可不慎其有焮衝之症狀者恐起蜂窩織炎是非受治於醫生不可

四 舉丸炎

定義 凡病之兼有紅腫熱痛者皆謂之炎症舉丸炎者卽具有此四

症候者。也有急性慢性之別。

病原。患淋病、外傷、尿道狹窄、攝護腺病、膀胱炎諸症者。均足使舉丸誘發炎衝。亦有繼室扶斯、僕麻質斯、間歇熱等熱性病而來者。有係耳下腺炎所轉移者。

證候。舉丸腫大按之發痛。或不按自痛。其猛烈者。即仰臥不動。亦不能略減。且牽及腰背諸部。同時副舉丸因舉丸肥大之故。亦從而延長。隆起如側阜。如此之腫脹。有一日而已。大如鵝卵者。全身症狀。障害亦甚。入暮則體發熱候。甚至高至四十度。其來自淋病者。輒踵副舉丸炎而起。脹痛俱劇。由於外傷者。來勢雖猛。消散則速。經過又佳。爲轉移性者。耳下腺炎向愈。則舉丸之腫脹亦一旦若失。

診斷。副舉丸炎與陰囊水腫之區別。第一。在行觸診。患陰囊水腫者。腫塊必透明。副舉丸有特別之形狀。如係舉丸炎。副舉丸必延長而波動。

豫後。約二三星期之久。腫消痛滅。熱亦下降。惟辜丸萎縮。則大不幸。而其最惡者。尤莫如化膿。將來往往波及精系。或續發腹膜炎。敗血症等。未可知也。

治法。務安靜身體。患部施冰罨法。並提舉丸。內服安知必林、水楊酸等藥。副辜丸及精系部牽引發劇痛者。內服歇魯茵、莫比等。外塗擦劑。若係慢性。宜投沃剝。二百瓦水。促炎症之吸收。

一 沃剝 二〇〇 硫苦 一六〇 餾水 二〇〇〇

右一日三次。每次一格。二日分(解毒飲)

二 安知必林 三〇〇 乳糖 二〇〇

右分六包。一日三次。每次一包。二日分(退熱散)

三 次醋酸鉛液 五〇 餾水 二〇〇〇

右混和外用罨法(消腫液)

四 鹽酸莫兒比涅 〇〇三 乳糖 一·五

右研勻分三包。每日輕者一包。重者三包。(無憂散)

五 鹽酸歇魯茵 〇〇六 乳糖 一·五

右研勻分六包。一日三次。每次一包。二日分。鎮痛散

六 荳蔻越幾斯、二〇〇 華攝林 二〇〇

右調和外用。搽擦陰囊(鎮痛膏)

七 依比知阿兒 二〇〇 甘油 二〇〇

右調和外用。搽擦陰囊(鎮痛消腫蜜)

### 五 舉丸梅毒

定義 舉丸梅毒有二種。一爲舉丸間質炎。舉丸實質。初雖腫脹。後乃萎縮。狀若胼胝。大如櫻桃。二爲護謨腫性舉丸炎。初時症狀頗同。迨後

舉丸之被膜與皮膚。均受其毒。化膿自潰。浸淫而成潰瘍。證候。此病之來。殊爲遲緩。或竟毫無病象。或則沿精系至腰部。稍發

放散性之鈍痛。試以指按捺精系。痛亦不劇。又舉丸不自覺重。故病者每不自知。間有舉丸增大者。然甚少。若護謨腫消退。舉丸或反縮小。如不消退。便化膿而漏泄於外。變成梅毒性菌腫。倘兩舉同病。生殖必無望。經過。往往有二三年之久。診斷。一酷似舉丸結核。然結核每先發於副舉丸。而後及於舉丸。成狀似漏斗之管。現潰瘍。面分泌稀薄之液。其疼痛則中等。梅毒不然。此外尚有他種之梅毒症。候可辨別之。二淋毒性舉丸。必與副舉丸炎。同時併發。且舉丸疼痛甚。腫脹中等。此病則否。三舉丸癌腫。必起一種特發性之疼痛。壓之亦痛。且舉丸之硬度不同。有硬者。有軟者。有具彈力性者。容積之增加。不過一部分。無治愈之期。梅毒非是。故診斷不難也。豫後。行驅梅法。豫後佳良。然遷延過久。波及兩舉。遂不能生殖矣。

治法 當以水銀劑與沃度劑同時並用。行有力之全身驅梅毒患者。則另貼水銀硬膏。其自潰者宜撒布沃度。仿謨成壞疽而荒廢甚者。則非割去該學丸不可。

處方 一 沃度加里 二〇 苦丁 二〇 餾水 二〇〇〇

二 沃剝 三〇 龍膽末 龍膽越 各適宜

右爲丸六十粒。一日三次。每次五粒至十粒（驅梅丸）

### 水銀塗擦法

第一日 採水銀軟膏。置右手掌面。自左肩至左前膊之中央。輕輕塗

擦。經十五分至二十分鐘之久。然後洗滌右手。

第二日 採水銀軟膏。置左手掌面。自右肩至右前膊之中央。如法塗擦。

第三日 仍如第一日之用右手塗擦左大腿。

第四日 仍如第二日之用左手塗擦右大腿。

第五日 又用右手取水銀軟膏塗擦左下腿。

第六日 又用左手取水銀軟膏塗擦右下腿。

第七日 停止搽藥。全身入浴。

第八日 依次塗擦如前。周而復始。

是爲水銀塗法。卽外用水銀以驅除梅毒之法也。但第一日搽藥之前亦須淨身。每次所用之水銀軟膏約以五分至錢半爲佳。塗擦之位務選面積廣大而又無毛處之皮膚。若不依前記之位則當如下所述。第一日塗擦兩前膊之屈曲面。第二日塗擦兩下腿之屈曲面。第三日塗擦兩上膊之屈曲面。第四日塗擦兩大腿之內面。第五日塗擦腹部兩旁。第六日塗擦背部尋常須繼續塗擦三十次。星卽星期五當能奏效。不效勿中輟也。惟塗擦中有應注意者。數事第一不可吸菸。如萬不能。

禁亦當減少。第二口中務須清潔。食後必漱口。附處方如下處方。

一 木炭細末 五〇〇 葛蒲根末 五〇

右作牙粉(特製牙粉)

二 鹽素酸加里 五〇 常水 二〇〇〇

右作漱口水(防毒液)

### 六 辜丸結核

定義 結核病。俗稱癆瘵病。故肺結核即為肺癆。腸結核則為腸癆。但臟器之易犯癆者。不僅肺腸已也。即生殖器中之辜丸。亦得以感染焉。病原 或由於轉移。或自然發生。其由於轉移者。大都來自腎臟。下降而受其侵及。其誘發之原因。要不外淋病與外傷二者。證候 大都不痛。惟變結節迅速者。略痛。經過最遲。病人多不自覺。必偶然觸及。或無意壓迫。或見陰囊加大。而後知之。試觸診副辜丸之頸。

部及尾部。則覺有一結節。或數結節。更觸診精系。逆溯而上。至鼠蹊管。無甚變化。或則生紡錘狀之隆起。久之該結節與鄰近互相粘連。或則變軟。皮膚亦漸變薄。終遂自外穿潰而成管。常漏液體。極不易愈。既而此管與病竈之間。變成一條似索之物。他如發熱。及一般症狀。則皆闕如。

診斷。此病與他種辜丸疾病不同者有五。一、經過遲緩。二、毫不發痛。三、腫塊之表面並不凹凸。四、發病之部位在副辜丸且粘連皮膚而成。管以是鑑別不難。若見有結核性病竈。則診斷尤確實矣。

豫後。因情形之不同而有差異。但侵副辜丸者。雖侵及辜丸。而祇一側者。大都。有治愈之望。反是。則皆不良。

治法。舉丸結核爲局處病。施以治療。萬無加重之理。成管之處。須乞醫生割開搔爬。或加燒灼。終以沃度仿謨撒布。創面自可治愈。對於全身。則宜行強壯療法。

七 辜丸寒冷

病。原。不。能。明。悉。恐。係。辜。丸。之。營。養。缺。乏。所。致。耳。

證。候。自。覺。辜。丸。畏。寒。其。他。別。無。症。狀。

治。法。當。探。究。其。致。病。之。原。因。對。症。治。之。外。用。綿。花。或。法。蘭。絨。妥。爲。包。裹。使。血。液。循。環。佳。良。更。進。相。當。之。滋。養。物。

第二節 副辜丸病

一 副辜丸肉腫

定。義。肉。腫。爲。腫。瘍。之。一。猶。言。肉。瘤。也。生。於。副。辜。丸。者。惟。此。爲。普。通。耳。

病。原。有。謂。起。於。外。傷。者。未。知。孰。是。

證。候。初。發。之。時。辜。丸。非。常。脹。大。不。久。即。移。於。副。辜。丸。腫。塊。形。圓。終。遂。

破。壞。辜。丸。白。膜。與。皮。膚。粘。連。而。穿。孔。於。外。若。沿。精。系。而。向。鼠。蹊。腺。上。行。則。更。轉。移。而。蔓。延。於。他。部。

治。法。雖。生。肉。腫。而。辜。丸。白。膜。尙。未。破。壞。者。固。能。自。愈。然。究。以。及。早。割。

去病。舉爲佳。倘業已轉移。卽割去。舉丸無益也。

二 淋毒性副舉丸炎

病原 此爲淋病合併之症。每踵後淋卽後尿道炎也而發。就中以左舉爲多。亦有急慢兩種。

證候 傳染後二星期至五星期。卽便發生。病之來也。有先呈倦怠。惡寒。少食。尿意頻數。鼠蹊部脹痛等前兆者。有並無此等前兆。卽猝然發熱。舉丸疼痛者。其際尿道口泄出之白濁。暫時銳減。指按該副舉。疼痛劇烈。腫脹之度。小者似榛實。大則若胡桃。若腫脹愈甚。卽該側之陰囊亦必加大。皮膚緊張。灼熱發赤。當病勢極盛之時。往往兼患遺精。及炎症消退。亦輒浸潤而兼肥厚。炎症進而蔓延於精系全部。則輸精管必變硬。蔓延於舉丸白膜間。則舉丸起水腫。

診斷 症狀顯著。故易診斷。

療後 尋常多不甚危險。然亦間有化膿。或灌腹膜炎者。又虛弱之人。

當急。性。時。亦。須。注。意。

治。法。當。靜。臥。數。日。用。特。有。之。提。舉。帶。提。舉。丸。如。此。則。舉。丸。不。下。垂。

精。系。不。為。所。牽。引。疼。痛。可。略。減。也。如。仍。劇。痛。可。以。冰。囊。或。浸。於。冰。水。中。

之。濕。布。貼。於。陰。囊。之。外。痛。自。輕。減。但。須。翻。乾。毛。巾。兩。層。不。可。直。接。皮。膚。

否。則。該。部。必。變。壞。疽。此。外。則。留。意。食。物。整。齊。大。便。並。內。服。骨。泝。波。若。已。

成。慢。性。則。須。變。治。法。硬。塊。較。小。者。可。施。布。里。氏。罨。法。兼。用。刺。戟。性。藥。解。

散。其。凝。結。之。浸。潤。硬。塊。頑。固。者。宜。行。按。摩。法。每。日。於。副。辜。丸。上。漸。次。加。

壓。且。按。摩。精。系。約。五。分。鐘。之。久。

處。方。

- 一 沃度丁幾 一〇〇 沃度加里軟膏 三〇〇

右外用塗布陰囊(解凝膏)

- 二 沃度加里 二〇〇 沃度 〇・二 甘油 一八〇 橄欖油

二一〇

右調和。每日搽一二次。消腫蜜油。

右藥兩種。均須在罨法前用之。

第三節 輸精管病

一 輸精管炎

病原。輸精管之發炎。每與淋毒性副睪丸炎、或精液囊腫同時並至。鮮有單純發生者。

證候。手觸睪丸之上。覺有堅硬如筆之物。與腫脹之副睪丸相連者。即發炎之輸精管也。其時脹痛俱甚。然不久即一併消散。祇餘嘔吐及疼痛。此痛有時偶發而已。

治法。安靜身體。當可自愈。毋事張皇也。

二 精系水腫

定義。腹膜突起。張而不翕。則有性似漿液之物。滲出而瀦蓄於精系之中。乃成此病。

病原。有由於先天者。有由於外傷者。而外傷爲多。  
證候。自鼠蹊內孔。沿精系而達於辜丸之上部。其間忽生一腫塊。有時在辜丸之後。大似雞卵。不甚透明。打之不覺波動。壓之不能還納。變換身體之位置。毫不變化。咳嗽、噴嚏、嘔吐等時。亦不加。大。  
診斷。此病之症狀。種種與陰囊疝相反。故殊易鑑別。  
治法。惟有乞醫生。穿刺放去其液。或一次。或數次。視病之輕重而定。  
注射。石炭酸。掘里設林。亦可。然常人不能也。

### 三 精系靜脈瘤

定義。精系靜脈管中之血。一旦加多。致該血管之一部。脹粗成瘤。故名。

病原。本病多發於左側。因左辜丸之下墜。輒較右者略甚。故血管亦稍延長。生殖器官起興奮。靜脈充血。遂成此病。患者惟壯男。  
證候。全無一定。以手觸之。患部成瀰漫性之腫脹。延長肥硬。凹凸不

平。其甚者擴張蜿蜒如蟲之蟠繞指間。直立加甚。橫臥略減。牽引辜丸。微覺不適。間發劇痛。此外則無甚病狀。

豫後。於生命上毫無危險。惟兩側俱發者。辜丸有萎縮之虞。或更發。不堪之痛苦。

治法。輕症可加適合之提舉。帶坐時。兩股毋相疊。免壓迫牽引之害。陰囊部用冷水反復洗滌。久之自可減輕。或竟全治。非藥石所能療也。

#### 第四節 精囊病

##### 一 精囊炎

病原。精囊深藏體內。不惟外部之傷害。不易侵及。即鄰近臟器之病。患亦難遺其影響。其發炎之故有二。一因結石之嵌入。精囊或穿刺膀胱。間接而蒙其害。是為原發症。一因淋病菌自尿道入射。精管經輸精管而達於精囊。是為續發症。

證候。視急性慢性而異。急性者有自覺與他覺兩症狀。時時起痛楚。

難忍之尿意。來疼痛性之遺精。大便之際。會陰及直腸部。時覺刺痛。時覺快適。精液漏出。與膿液相混。和而成膿性精液。雜尿中而排出。亦有於精液之中。和以血液。而成血性精液。此自覺之症狀也。手觸攝護腺上。有或硬或軟。細長灼熱之腫塊。試按捺之。則發大痛。壓迫尿道。有膿流出。同時副睪丸。及輸精管。亦有波及者。此他覺之症狀也。慢性者。平時除腫脹依然。便時泄精外。毫無其他痛苦。僅射精或壓迫攝護腺時。隱隱作痛而已。

經過。種種不同。最輕者。如滲出性精囊炎。不過八日。或十日。已可治愈。如出血性精囊炎。至少須三四星期。方能消退。

診斷。據上述之證候。如尿意頻數。會陰直腸起痙攣性痛。時泄膿精。血精。疼痛性遺精。細長隆起之腫塊等。已得斷之。為精囊炎。又溺後可擠出精液。更不容疑矣。若與淋毒性副睪丸炎。併發。益知為續發之淋毒性精囊炎。

豫後。急性者。多佳。良慢性者。亦類能治愈。但不免有精液漏。精囊萎縮之症。若化膿部之周圍。破潰則危險。實甚。

治法。尋常輕症。祇須安靜。會陰部施冷罨法。已可重症。則受診於外科醫。

## 二 精囊結核

病原。精囊突然患結核者極少。多自膀胱、尿道、攝護腺、副睪丸、輸精管等部轉移而來。

證候。初時潛伏。至難發見。必至脹大異常。射精障害。乃始曉然。試以手指入直腸觸診之。知精囊較尋常大三四倍。堅硬而凹凸不平。既而灌膿融合。則生波動。終且變軟。性似乾酪。又與鄰接之臟器粘連。成管於直腸之一端。此局所之症狀也。病機漸進。至於中期。形銷骨立。心身衰弱。熱候稽留。入夜則昇。小便混濁。此全身之症狀也。

診斷。此病既大半續發。故一切當如治肺癆法治之。病中須注意者。

第一。爲。營。養。宜。常。進。牛。乳。雞。卵。等。滋。養。物。兼。服。肝。油。飲。酒。類。以。維。持。其。體。力。第二。爲。運。動。每。日。宜。動。作。片。時。以。佳。良。其。血。行。此。外。則。投。藥。劑。處。方。

一 炭酸瓜野哥爾 一〇 乳糖 二〇

右分六包。一日三次。每次一包。二日分。殺菌散

二 別臘蜜童 一〇 乳糖 二〇

右爲三包。一日分三次服。退熱散

三 肝油 一五〇

右臨臥時服。滋陰膠

第五節 精液病

一 遺精

定。義。並。未。交。媾。而。精。液。泄。出。既。不。自。知。亦。不。能。自。制。者。皆。謂。之。遺。精。病。原。房。勞。手。淫。二。者。爲。遺。精。最。大。之。原。因。其。他。壯。年。無。室。鏗。居。過。久。

腦力疲乏。淫情勃發。或就眠之後。膀胱緊滿。腸管充實。或膀胱結石。尿道患淋。肛門裂傷。包莖痔疾。或素有腦病。肺病。如肺癆精神病。如羊癲風之人。或繼大熱病。如傷寒之後。或過用煙酒茶諸品。皆足以致之。

證候。此病有生理與疾病二種。睡夢之中。恍惚與所愛者交媾。因之陰莖勃起。精液射出。即夢遺也。古稱交夢。俗稱走陽。遺精之後。立即驚覺。當時雖似懊喪。事後轉覺爽適。如此者。約一二月一次。是為生理之遺精。其次數較多者。則為疾病之遺精。疾病之遺精。更有夜中遺精。晝間遺精之別。夜中遺精者。初無好夢。亦乏春興。故陰莖毫不勃起。即勃起亦不完全。而條已泄出。泄後亦不醒覺。朝晨起牀。自覺身體疲乏。頭痛眩暈。心胸苦悶。怔忡不甯。呼吸促迫。其遺泄次數。則或十日一次。或五日一次。或每夜數次。此時聽其自然。神經衰弱之症。必將接踵而至。晝間遺精者。不必合眼入眠。遺泄於衾褥間也。即稍動身體。或微觸陰莖。或纔淫觀書。淫畫。或乍見美婦少女。不遑動情。遽已走泄。馴至絕無美感。而但汨汨。

其來或且溺亦遺精便亦遺精成精液漏之症病者念及將來恐怖殆無涯涘然交媾之樂手淫之美卒不能或廢也此時如仍不治縱云康健如恒久之面色蒼白形銷骨立徹夜不眠口闢鼻尖睛珠少神眼華閃發呼氣帶臭四肢震顛昏亂健忘精神恍惚時而惶惶時而戚戚終必陷于精神症狀而後已。

診斷 遺精與攝護腺漏尿道液漏淋病諸症雖相類而實不同若用顯微鏡檢查又確有精蟲故鑑別殊易

豫後 雖無生命之危害衰弱輒為疾病遺精之結果因而患陰萎者亦不少惟自來強壯之人受害較淺病之基於手淫者力矯惡癖當易治愈

治法 當先探遺精之原因而治療之如由於濫行手淫者則立即改行荒淫無度者則力求寡慾患淋病包莖蠟蟲痔疾諸症者則務去本病其他晚餐務節飲夜半毋忍溺清晨必早起日間必運動寢具弗厚



右分九包。一日三次。每服一包。三日分。忌茶。生精補血丹。

五 臭剝 九〇 糖漿 八〇 鱈水 三〇〇〇

右一日三次。每次一格。三日分。固精露。

## 二 滑精

定義。交媾尙未達十分酣暢之境。而精液已出。或陰莖方至陰門。未入腔腔。而遽即射精。是曰滑精。一名早漏。或曰早洩。

病原。大半與遺精無異。而包莖尤爲最多之原因。考尋常因交媾而射出精液之理。因分布於陰莖龜頭間之快美神經。以兩相摩擦而頻受刺戟。至快美達於極度。於是脊髓之射精中樞。指揮射精神經。注射精液。射精中樞既不在腦。而在脊髓。故射精萬不隨己之意。志而遲速也。然一朝以其他之原因。致快美神經之機能遲鈍。而射精神經之機能銳敏。二者之調和失其平均。遂有滑精之病。所謂其他之原因。何即包莖是已。蓋包莖者之包皮。多延長寬鬆。平時龜頭全藏包皮之中。絕

不外露。故龜頭頸部之表皮。已極薄弱。又以不觸空氣之故。頸之周圍。常生有不潔之液。浸潤而刺戟之。因此交媾之際。一進腔口。稍稍摩擦。精神上之缺美。猶未充足。而肉體上之感覺。早已過敏。精液遂忽然滑走也。

證候。不耐久戰。三五縱送。便即蕙事。因是而懊喪者頗多。

治法。宜節房事。戒手淫。沿脊柱用冷水灌注。向患包莖者。務將包皮翻轉向後。使龜頭全行露出。除去不潔物。使皮膚之抵抗力強固。若包皮延長。惟有乞醫生剪去之。看似等閒。其實重要。毋輕忽也。

### 三 精液缺乏

定義。此非射精之不足。殆由於三種生殖液精液 攝護腺液 哥啤兒氏液之分泌過少耳。

病原。殊不一致。舉其要者。如舉丸先天發育不全。濫行手淫。房事過度。繼淋病後之舉丸。副舉丸。炎。舉丸梅毒。舉丸結核。輸精管或舉丸之

細精管。因跌打損傷之故。結癥而收縮。致妨害精液之排洩。以及因患生他種疾病。致全身衰弱。營養不良等。俱能使精液缺乏也。

證候。男子即持躬端正。平素絕迹花叢。陰部亦初無異常。而亦有不射精者。故不能使女子受胎。

治法。養生之法。第一節。慾房事。手淫。概應廢止。常進牛乳。雞卵。肉湯。等滋養物。或於粥湯中攪雞蛋。兩個連服。一二星期。大足以增長精力。雖醫藥弗若也。其他按摩。電氣諸療法。俱如前述。

## 第二章 外生殖器之疾病

### 第一節 攝護腺病

#### 一 攝護腺肥大

定義。此病雖不過攝護腺之組織。筋肉。結締組織肥大。然終必使膀胱。及腎臟之官能。蒙其影響。致減少生活上之快樂。故不容等閒視之也。病原。多因淋病梅毒而來。而犯房勞。及動脈變硬者。亦往往有之。

證候。初起之時。至輕極微。病人初無甚自覺症。必至發如鑽如刺之痛苦。會陰及膀胱部。同時亦痛。洩溺增多。尿線加細。此等障害。續續發生。而後察覺。踵醫者之門。而求治焉。該病每至夜中。輒卽加劇。若遷延經久。便旋必非常艱難。甚者竟至尿閉。僅點滴淋瀝而已。

診斷。據此病狀。診斷非難。高年之人。雖有排尿障害之症。然祇發於夜中。明乎其非攝護腺肥大也。至患膀胱結石。或因尿道狹窄而成石淋者。入夜轉覺安靜。無其障害。故亦得確定之。

豫後。攝護腺之肥大。固不能不決其斷不加劇。然苟能施十分相當之處置。亦得去其困難。除其危險。

治法。凡足以增進病勢者。除之務盡。食物須擇淡泊。而無刺戟性者。茶湯之類。概當節飲。酒類尤須力戒。不可長久。偃息宜運動。宜體操。宜整齊。大便宜用冷水摩擦。久久厲行。或者輕減。未可知也。至於治法。雖有割除一術。惜效果仍不確實。故略之。

## 二 攝護腺炎

病原。凡患淋病者。尿道粘膜。無不發炎。既乃直接波及攝護腺。初發者爲急性。歷久不治。則變慢性。

證候。此病之急性者。其證候有四。第一種。攝護腺之外皮剝落。或發炎而化膿。試以手指探入肛門觸之。既不覺痛。其大小硬軟又如常。然指壓攝護腺。即有粘稠似精之液泄出。其中混有膿球。與淋菌。此急性攝護腺加答兒。凡發炎之輕微者皆此也。第二種。淋毒內犯濾胞。濾胞之內壁即腫脹。旋化膿而停滯其中。繼則膿栓緊塞該濾胞口。中梗泄膿之道。從而發炎益劇。濾胞遂發赤且痛。有豌豆大之塊。一似霰彈之嵌於柔軟組織中者然。乃至內部之化膿愈甚。乃現波動。膿液自潰穿之濾胞口迸射而出。是謂之假性膿瘍。此假性膿瘍。非特攝護腺炎有之。即前尿道炎。海綿體炎。哥啤兒氏腺炎。亦無不有之。設由是更波及一射精管。則精液必減少。波及兩射精管。則精液必缺如此急性濾胞炎。

也。第三種。裏急後重。二便頻催。實則無有。會陰艱重如壓。尿線細小。溺必努責。便則大痛。其痛起自直腸。尿道。會陰。放散於腰。臀。大腿諸部。病人又自覺直腸部。生有胡桃大之腫塊。時時發痛。因之不敢少坐。常伸兩腿側臥。指壓會陰部。亦痛楚異常。四五日後。諸症益復加甚。故便溺亦抱隱憂。大抵一星期內。外。遂先後消散。亦有病勢加重。至於惡寒。戰慄。攝護腺腫脹增大。馴至化膿。起搏動性之疼痛。三四日後。波動顯著。潰穿尿道。膿血隨二便而出者。幸化膿者尙稀。大半多徐徐消散。遺攝護腺肥大之症。此實。質。攝。護。腺。炎。也。第四種。發炎之處。不僅攝護腺之實質。更侵及周圍之組織。與靜脈管。其侵及周圍組織者。先是該腺後下部之結締組織。發炎。瀦膿。繼經攝護腺。與直腸間而廣延前上。再瀦膿於會陰部。至於潰穿尿道球。及會陰部而出。亦有瀦膿於尿道。與攝護腺間者。但較少。其證候酷似急性攝護腺炎。其侵及周圍靜脈管者。該處之靜脈叢。因充積凝血之故。遂生凹凸堅硬之腫塊。指探肛門。觸攝

護腺。卽可知之。病人體來壯熱。鬪牙。戰慄。精神恍惚。及其末也。恐不免成敗血之險症。此攝護腺。周圍。蜂窩。織炎。及靜脈炎也。慢性之證候。以攝護腺漏。及生殖器神經衰弱症爲主。

診斷。急性者。必現特有之證候。故鑑別。尙不甚難。僅急性後尿道。炎。易與此病混同耳。然一經細心檢查。亦易下確實之診斷也。慢性者。可

以生殖器神經衰弱症。有無爲斷。豫後。有加答兒。濾胞炎。實質炎。各症者。類能自行消散。但非旦夕可期。就中。惟實質炎。有陷於重症者。在慢性症。局處。症狀。雖已消散。而衰弱。仍如舊者。則尙宜留意。

治法。病初發時。安靜第一。多飲牛乳。化膿之前。內服瀉藥。外則置冰。囊於會陰部。盡力消炎。淋病之局。所注射法。則當暫停疼痛。以藥劑。寬解之。若業已化膿。或潰穿。成管。則爲大不幸之事。非乞精練之醫家。施行手術。不可也。在慢性症。惟有忌房事。戒勞動。避提神。及香味。諸飲食。

品。至於藥劑。僅二三兩種錠子適用之。  
處方。

一 鹽酸莫兒比線 ○○三 乳糖 ○五

右研極細。勻分三包。一日服二包至三包。(無憂散)

二 荳蔻越幾斯 ○一 依比知阿兒 二一 椰子油 適宜

右溶製勻淨。作坐藥十個。塞入肛門。每次一個。一日二三。

(第一切痛錠子)

三 荳蔻越幾斯 ○○五 沃度加里 ○二 椰子油 二○

右溶製勻淨。作坐藥一個。塞入肛門。早晚各用一個。(第二

切痛錠子)

四 依比知阿兒 四○ 椰子油 四○

右溶製勻淨。作坐藥二十個。塞入肛門。早晚各用一個。(第

三切痛錠子)

五 沃度加里 一〇〇 臭素加里 八〇至一〇〇 荳蔻越

幾斯 〇六 蒸餾水 三〇〇〇

右溶和分作二十次灌腸(甯神洗)

三 攝護腺漏

病原 此爲慢性攝護腺炎重要之症候。是其原因於炎症可知。但不盡然。衰老之人。其攝護腺每易肥大。因而漏液者。亦有之。繼淋病或貧血病之後而發者。亦有之。

證候 勃起之時。大便之後。咳嗽之際。努責之餘。動輒有膠粘似精。或混濁若乳之液。自尿道口漏出。有精液之臭。乾則粘附尿道口。試以手指入直腸內。向直腸前壁逼壓攝護腺。亦立即泄流。病人誤作精液。往往非常懼怯。而不知其爲攝護腺液也。

豫後 此非危險之症。可毋疑慮。

治法 治其本病。此症自愈。

四 攝護腺結核

病原。此亦泌尿生殖器結核之一。或與其他臟器之結核併發。該腺一似口中之扁桃腺。或自中央向末梢傳染。或自末端向中樞傳染。蓋不一致。普通多發於中年。

證候。自會陰膀胱頸部發生疼痛。放散至於辜丸。溺時自覺灼熱。而且痙攣。往往尿閉。腺肥大而形不正。壓之則痛。時或變軟。尿道中常流出似白濁之物。或和血液。曾無幾時。衰弱異常。

診斷。突然。患者及初發者。俱難診斷。若其他臟器已有結核之證據。則大半可以釋疑。倘更自攝護腺液中檢得結核菌。診斷益可確實矣。治法。病勢重篤者。惟有行對症法。疼痛則用麻醉劑以解之。

第二節 陰莖病

一 陰莖短小

定義。尋常男子屆成熟之年齡。陰莖之發育。亦從而完全。長約三寸。

七八分至四寸許。大小亦適相稱。恰合女陰。便於交媾。有不及此者。則爲此病。所謂天闊是也。

病原。此卽陰莖發育不全之病也。但此發育不全。有本諸先天者。有原於後天者。先天之發育不全。名曰不具。後天之發育不全。係在發育之際。受複雜之原因。障害發育之機能。致不能達於普通之長大。諸原因中之最多者。尤莫如濫行手淫。房事過度。全身衰弱。因患猩紅熱麻三大端。良以此等情事。皆足以減少精液之製造。遲緩春情之興起。薄弱勃起之能力。故陰莖海綿體之空隙間血液。亦常不充足。營養既缺。發育自止。此理之當然也。

證候。陰莖綿叢。卽勃然興起。長不滿二寸。且迅卽下垂。頽然無力。或兼患包莖。龜不外露。驗其體格。貌似壯健。而面色蒼白。顛預健忘。腦神經衰弱之症。已顯示其朕兆。

治法。先天者宜多運動。浴冷水。進滋養物。鄉僻之地。素乏良醫。可買

牛。羊。豚。之。舉。丸。切。碎。加。鹽。許。少。榨。取。液。汁。生。吸。食。之。頗。有。奇。驗。熟。則。無。效。  
初。食。雖。覺。腥。膻。久。久。自。然。習。慣。一。法。先。誘。陰。莖。勃。起。隨。取。柔。軟。布。條。緊。  
縛。根。部。使。熱。血。奔。奏。經。一。定。時。乃。弛。前。縛。久。久。亦。效。所。謂。鬱。血。療。法。也。  
或。每。日。約。二。三。次。不。等。先。施。溫。罨。法。以。法。蘭。絨。毛。巾。之。類。浸。熱。水。中。絞。  
乾。罨。覆。陰。莖。少。頃。乃。去。更。以。柔。軟。布。輕。摩。擦。陰。莖。良。佳。所。謂。刺。戟。療。  
法。也。此。外。治。法。尚。有。三。種。一。曰。眞。空。療。法。行。此。須。置。備。特。別。之。器。械。二。  
曰。電。氣。療。法。通。以。平。流。電。氣。皆。所。以。使。血。液。湊。集。常。人。苟。有。此。等。器。械。  
並。洞。曉。其。用。法。固。不。難。自。行。醫。治。也。三。曰。藥。物。療。法。有。鹽。酸。育。興。賓。斯。  
丕。爾。明。兩。種。育。興。賓。爲。植。物。性。藥。乃。一。種。茜。草。科。之。草。精。斯。丕。爾。明。即。  
畢。丸。液。爲。動。物。性。藥。二。者。不。論。內。服。與。注。射。皮。下。俱。有。速。成。偉。器。之。效。  
而。注。射。尤。爲。神。速。惜。非。醫。者。莫。解。此。手。術。耳。後。天。者。除。如。前。施。治。外。並。  
須。寡。慾。清。心。休。養。精。力。

處。方。

鹽酸育興賓溶液 一〇

右為滴劑一日三次每次服五滴至十滴(純陽露)

二 陰萎

定義。陰莖之勃起作用。或失其全部。或缺其一部。不能入女陰而實行交媾者。謂之陰萎。中醫所謂陽痿。又曰陰器縱痿者。即此。

病原。原因頻繁。綜其大要。不外五種。第一。由於器質之變化。如陰莖

短小。陰囊水腫。陰囊疝氣。陰莖彎曲。陰莖腫瘍。龜頭損傷。舉丸萎縮。舉

丸損傷等是。第二。由於諸物之中毒。如酒精。樟腦。芫菁。此兩藥凡壯陽藥中多有之

臭剝。水楊酸。嗎啡等是。第三。由於神經之衰弱。如脊髓癆。神經衰弱。濫

行手淫。房事過度是。第四。由於全身之疾病。如腳氣病。腎臟萎縮。糖尿

病。貧血。肥胖病是。第五。由於精神之感動。如羞恥。恐懼。憤怒。悲傷等是。

凡此諸病。皆足以奮勃起之勢力。而使之日就衰弱也。

證候。或舉而不堅。或中途萎縮。或纔交即洩。或精液缺。如體交疲。蒸

或狎妓生愛遇妻無情

豫後 視其病原之如何與時日之短長而異

治法 屬於第一種之陰萎治其本病自然向愈中毒性陰萎速停止

勿服 兼解其毒神經性陰萎務節慾毋荒淫進滋養品服神經藥用冷

水摩 擦貧血衰弱性陰萎亦以去本病為急進牛乳雞卵肉湯服鐵劑

精神 之陰萎母躁急母怨抑務除去仇儷間之障害以誘發雙方之愛

情愉快 一己之精神兼用藥劑持之有素固未必始終絕望也其他依

處 陰莖短小之法治之亦佳

處方

一 臭素樟腦 〇五 乳糖 一〇

右分三包 一日分三次服 (將軍散)

二 磷酸亞鉛 〇六 番木鱉越 二〇

右為丸百粒 一日三次 每服一粒 (中興丸)

三 育興賓溶液 (二%) 五〇〇

右貯遮光瓶中。一日三次。每服五滴至十五滴。(純陽露)

四 育興賓錠

右一日三次。每服一錠。(純陽錠)

五 臭剝 六〇 龍丁 二〇 餹水 二〇〇〇

右一日六次。每次半格。二日分。(貌龍湯)

三 陰莖強直症

定義 陰莖之勃起也。以有種種之原因。刺戟勃起神經之故。若刺戟不已。陰莖海綿體之血行鬱滯。卽患此病。其爲淫慾亢進無疑。一名疼痛性陰莖勃起。舊稱陽強不倒。亦曰莖中痛。

病原 大都因服壯陽藥。誤中芫青之毒而起。其由於疾病者。則如脊髓癆、淋病等是。

證候 毫無情意。而陰莖昂舉。甚者角弓反張。痛苦萬狀。

豫後無妨。

治法當靜攝精神屏絕邪思食雞卵牛乳雞肉等物適宜運動以旺盛全身之循環禁用烟酒以減退局部之興奮此衛生法也至於治法有冷罨法與冷水摩擦法可如法行之此外則用藥劑處方。

一 鹽酸古加乙涅 〇·一 錫水 五〇

右溶成五十倍之古加乙涅水滴入尿道一日四五次每次一滴至二滴。(止痛液)

二 荳蔻越幾斯 一〇 羊毛脂 八〇 華攝林 二〇

右調勻搽會陰部及陰莖上。(解痛膏)

三 純酒石 三分 硝酸加里 一分 白糖 六分

右研和爲散一日數次每服一分二厘。(制淫散)

四 臭剝 六〇 苦丁 三〇 錫水 一〇〇〇

右一日分三次服（鎮陽湯）

四 包莖

定義。陰莖之包皮口狹窄。包皮不能十分翻轉至龜頭之上。故曰包莖。有完全包莖與粘合性包莖之別。

證候。包皮之前緣狹窄。龜頭不能脫穎而出。其甚者。即尿道口亦全不外露。故溺時尿不成線。僅點滴而下。包皮內面與龜頭溝之周圍。頻受尿酸之刺戟。遂不免發生炎症。又其龜頭平時爲包皮所覆。不常與外物觸接。知覺本已銳敏。一旦交媾。龜頭深入。女陰稍稍摩擦。即便洩精。不惟減少。純正之快感。轉覺不無障害。其洩精也。則多滯積於包皮龜頭之間。大殺迸射之勢力。以是有不孕之症。且其龜頭及包皮之內面。每較柔弱。故交媾之際。往往發痛。包皮口緣動易裂傷。淫津及分泌之污物。包藏而浸潤其間。色紅而癢。刺戟頻繁。其臭甚惡。尤易爲病毒細菌發育之巢窟。來淋病梅毒感染之誘因。他如陰莖瘡遺尿頑固之

症亦有緣茲而起者。其在兒童。龜頭固尙深藏。然過甚則必放尿困難。設用力努責。即痛楚異常。而尿線且至細也。

治法。龜頭溝之周圍。宜用清水。或石炭酸溶液。常常洗滌。去其不潔。發炎甚者。用冷罨法。續撒布藥。未惟先天包莖萬難翻轉者。則須乞外科醫割開。或剪除之。乃可。

處方

- 一 精製石炭酸 二·五 餾水 一〇〇·〇  
右製成溶液。每日洗滌患處。(第一消毒水)
- 二 過滿俺酸加里 一·〇 餾水 五〇〇·〇  
右製成溶液。外用洗滌。(第二消毒水)
- 三 醋酸鉛 五·〇 餾水 二〇〇·〇  
右製成溶液。爲罨法料。罨覆包皮內面。及龜頭溝部。(鉛水)
- 四 硼酸 八·〇 亞鉛華 一·五 單寧酸 〇·五

右研極細。先將包皮內面諸部洗淨。綿花拭乾。撒布此粉其上。  
(完陰丹)

五 嵌頓包莖

定義。此病與前症相反。包皮翻轉至龜頭之上。捋之不下。不復能縮。龜頭而復於舊也。故有嵌頓之名。

病原。非因包皮之口徑太小。即由龜頭之繫帶過長。此亦先天者爲多。

證候。包皮一經翻轉。即緊約於冠狀溝部。因而紅腫發痛。甚者皮綻

流血。龜頭多成壞疽。

治法。包皮內面之腫脹不甚者。不難即整復之。劇甚者。囑令平臥。用

鉛水等冷器。該部候紅腫稍退而後整復。小兒之包皮口過小者。可用

消息子徐徐插入包皮內面。與龜頭面之間。使其分離。乃試將包皮翻

過。亦能漸漸寬弛。

處方

一 醋酸鉛 五〇 餾水 二〇〇〇

右爲罨法料 (鉛水)

二 硼酸 二〇 餾水 二〇〇〇

右製成溶液爲罨法料罨覆患部。整復後用以洗滌亦佳。

(硼水)

六 包皮灸

病原 因感染淋病或梅毒而來。

證候 病毒之侵入上皮膚表面也。初不過一微隆之泡。乃一晝夜間即膨脹而狀若浮腫。包皮緊脹如鼓。不復能踰龜頭冠而下。強勉翻轉。即發劇痛。輕症雖能復舊。而焮衝紅腫灼痛轉劇。或者併發龜頭淋。惡性者腫脹部糜爛。或成壞疽。此時若放任不治。病毒更內犯而深入皮下。結締織。則前此緊張之部。愈益堅硬。包皮失其彈力。龜頭頸部被其約

東如遇勃起。陰莖海綿體之血液充漲。其狀宛似葫蘆。疼痛益甚。其原於第一期梅毒者。疔瘡之膿液。沾污於包皮內面。龜頭頸。陰莖繫帶諸部。包皮非常緊張。乍見外形。酷肖甘薯。翻之則發大痛。其自疔瘡中泄出之膿液。又充滿於龜頭頸圍。及包皮內面。無何。此柔軟之上皮。次第糜爛。

治法。初期之輕微者。務先用第一消毒水。洗淨龜頭頸部之膿液。及惡臭物。塗搽荳蔻越幾斯。依比知阿兒等。或以浸鉛水之濕布。纏包該部。靜俟消散。必真潰爛。不堪方。可乞醫生割除之。

處方。

一 荳蔻越幾斯 ○一 依比知阿兒 二○ 華攝林 適宜

右調勻。取少許搽患部。外覆棉紗條。再加繃帶。一日二三。

(二) 聖膏

七 龜頭淋

定義。龜頭表面及包內膜起一種加答兒性之炎症。謂之龜頭淋。原病。因龜頭及包皮內膜之皮脂過多。或繼淋病。軟性下疳。梅毒而來。證候。翻轉龜頭及包皮內面。但見色紅浮腫。遍生細絨。時泄稀薄似乳之膿。其臭甚惡。洗淨拭乾。上皮易落。指觸稍猛。往往出血。冠狀溝部大都如是。龜頭部則時泄漿液。脫皮之處。每覺煩癢。一旦勃起。則緊張而疼痛。若浮腫更甚。包皮即嵌頓於冠狀溝之內。倘因而障害血行。且成壞疽。該處常常濕潤。頻泄惡臭之液。及後炎症消退。包皮但餘肥硬之物。一經交媾。輒起皸裂。有時包皮內膜粘連龜頭。或則併發橫痃。潰瘍。診斷。試翻轉包皮視之。如見龜頭及包皮內面紅腫。上皮剝脫者。龜頭淋也。與尿道炎。軟下疳。初期硬結。護膜腫。癌腫。諸症。截然不同。治法。僅患此病。而無包莖淋病合併者。祇須用硼酸水等藥液洗淨。

其膿拭乾間以清潔之綿花已可撒布藥粉亦妙加上皮剝脫則宜用  
 硝酸銀桿腐蝕該部或塗擦二十倍硝酸銀液紅腫太甚則宜安靜身  
 體高舉陰莖塗擦灰白軟膏包皮內注射制腐藥或施冷罨水罨水欲行  
 法患部必須纏乾布三等消炎之法如仍無效然後奏刀不遲  
 處方

一 硼酸 六〇 餾水 二〇〇〇

右外用洗滌 (硼水)

二 格魯兒酸加里 二〇 餾水 二〇〇〇

右外用洗滌 (防毒液)

三 醋酸鉛 五〇 餾水 二〇〇〇

右爲洗滌料 (鉛水)

四 甘汞 澱粉 各五〇

右爲撒布料 (宣毒丹)

五 鞣酸 濃粉 各五〇

右爲撒布料 (神效散)

八 軟下疳

定·義· 病發於男女之下部而疳蝕之者。謂之下疳。往時醫學未精。以爲下疳初無區別。後人精細研究。始分爲軟硬二種。一曰硬下疳。爲第一期梅毒之症候。故又名梅毒性潰瘍。一曰軟下疳。爲獨立之花柳病。故又名花柳病性潰瘍。但亦有始爲軟性。後變硬性。而成混合下疳者。則又不屬於此矣。

病·原· 此爲局部之觸接傳染病。大都因與娼妓等不潔之婦交媾。將其下疳毒傳染而來。生於冠狀溝、龜頭、包皮、繫帶等部最多。其險惡者。有丹毒狀、實扶的里性、蠶食性、蛇行性諸種。

證·候· 宿娼之後。速者三日。遲者一二星期。陰部先發生小結節。旋變膿泡。潰則覆以黃色痂皮。痂皮剝落。遂成深蝕之潰瘍。邊緣峻銳。形若

斷崖。又似火山中之噴火孔。顯呈紅色。常常濕潤。其底部則帶灰白色。時泄多量之不潔物。有如豚脂。潰瘍之大小不一。或若豌豆。或若指頭。數日。或數星期後。其大可增至三四倍。其形不一。有正圓者。有橢圓者。該部稍痛。時或微癢。若壓迫之。立發大痛。或觸接之。且易出血。是謂之潰瘍。性軟下疳。有時皮膚隆起。則謂之隆起。性軟下疳。大約三星期至五星期。乃漸治愈。倘細分之。又各隨其部位而異。在陰莖外皮者。輒易融合而成淺凹之潰瘍。在包皮內面者。潰瘍淺而大。形正圓。或橢圓。其大如豆。在包皮邊緣。及尿道口者。多深入尿道而起浸潤。在龜頭部者。潰瘍小而不易融合。在龜頭繫帶者。往往潰穿繫帶。或破毀尿道。甚者鼠蹊腺亦從而腫脹。凡此所述。皆良性之證候也。倘係惡性病。毒益烈。病勢益劇。茲更舉其要者。一曰壞疽。性下疳。亦名蠶食。性下疳。就中尚分二種。第一種。因病者不加治療。不尚清潔。不守衛生。助其發炎。寔致腫起。障害。血行。遂成壞疽。病之來也。先是包皮非常腫脹。繼則誘發包

莖或嵌頓包莖。泄出多量稀薄似膿之惡臭液。痛楚異常。時則夜中不寐。兼發熱候。終則包皮外膜。因患生嵌頓包莖之故。其絞榨之周圍。色變青黑。漸露壞疽之象。無何。波及全部。竟至龜頭盡潰。成哥舒半段之槍。或且陰莖全沒。若閹人之去勢。第二種潰瘍底面。變爲壞疽。結灰白。或黑色之痂。迅即延及深部。壞疽部之周圍。異常濕潤。時則該部痛甚。體來壯熱。不寐。少納。數日之後。壞疽脫落。繼以出血。如不醫治。或失血太多。或續患敗血。二曰蛇行性潰瘍。潰瘍之邊緣。依次向外蔓延。其形屈曲。迨他處波及。初發之部。即漸向愈。與第三期梅毒之皮膚潰瘍。最易混同。三日實扶的里性下疳。潰瘍底面。每覆有污穢膠粘之壞疽片。然液體極少。四曰丹毒狀潰瘍。患部之周圍充血。狀若浮腫。皮膚緊張。光而發赤。動易破壞。此即潰瘍性軟下疳所變也。

經過。軟下疳之全經過。大約少則三星期。多則五星期。壞疽性下疳。遲早不定。有祇數星期者。有須數個月者。甚有延至年餘者。蛇行性下疳。

瘡。之。經。過。與。壞。疽。性。者。同。實。扶。的。里。性。下。疳。月。餘。亦。尙。不。治。  
 診。斷。軟。下。疳。常。與。硬。下。疳。併。發。而。成。混。合。下。疳。故。診。斷。大。難。因。而。須。  
 鑑。別。者。約。如。下。第。一。硬。下。疳。性。較。硬。不。痛。或。微。痛。第。二。陰。部。泡。疹。糜。爛。  
 面。不。深。蝕。用。撒。布。藥。未。幾。即。愈。第。三。糜。爛。性。包。皮。炎。亦。頗。輕。微。第。四。護。  
 謨。腫。性。潰。瘍。先。發。護。謨。腫。後。乃。崩。潰。而。成。潰。瘍。第。五。上。皮。癌。先。呈。乾。燥。  
 之。結。節。後。崩。潰。而。成。顆。粒。狀。之。淺。瘡。面。周。圍。隆。起。其。狀。如。堤。第。六。疥。癬。  
 膿。泡。疹。異。常。煩。癢。他。部。亦。生。疥。癬。第。七。小。膿。瘍。膿。液。既。淨。隨。即。治。愈。不。  
 成。潰。瘍。也。第。八。皸。裂。及。小。裂。傷。包。皮。之。內。繫。帶。之。上。因。交。接。而。裂。傷。者。  
 該。部。之。周。圍。微。帶。浸。潤。覆。以。似。膿。之。皮。膜。一。經。治。療。數。日。即。愈。第。九。單。  
 純。濾。胞。炎。時。時。發。癢。膿。出。即。治。第。十。龜。頭。淋。祇。表。皮。破。壞。侵。蝕。部。之。邊。  
 緣。如。鋸。齒。治。愈。亦。速。第。十。一。破。潰。梅。毒。邱。疹。無。粘。附。之。痂。苔。邱。疹。之。破。  
 潰。先。中。央。而。後。邊。緣。潰。瘍。之。外。尙。有。新。發。之。邱。疹。  
 豫。後。軟。下。疳。之。豫。後。大。都。佳。良。然。設。續。發。橫。痃。則。治。愈。需。時。壞。疽。性。

者一發即治亦無危害蛇行性者較為不良

治法宜先以二%古加乙涅液此液極微中宜加塗敷瘡面使該部麻木

然後以石炭酸液或硫酸銅液腐蝕之或用綿花浸四十%之石炭酸

水貼置瘡面亦可腐蝕終則撒布沃度仿謨或施沃度仿謨帶若病

勢增進蔓延周圍致起浮腫浸潤者則可用鉛水行冷罨法腐蝕法有

三種舉如下

第一法用一%石炭酸液消毒清潔之後取綿花一小片濕五%古

加乙涅液貼置瘡面約五分至八分時久候甚麻木隨用細棒一條末

端捲綿粘取結晶石炭酸少許塗之則可不蝕及他部取效頗著腐蝕

之後攤敷礪酸軟膏一日換藥二次其因腐蝕而泄出之液汁洗拭務

淨母任沾及周圍

第二法一切處置如前惟腐蝕藥不用結晶石炭酸而用過格魯兒

鐵液但慎防延及好部

第三法 消毒、麻醉仍如第一法。續以棉花小片浸濃厚之硫酸銅液貼置瘡面。經二時之久換貼第二片。又二時再換貼第三片。直至明晨然後除去。別用棉花浸熱水洗拭。此時該瘡面遂成青色之痂皮。痂皮脫落。但用潔淨棉花包纏之外。加繃帶。已可若痂皮脫去。潰瘍面發露。仍先以前項石炭酸液消毒洗滌。終撒布沃度。仿謨等而加繃帶。亦有良效。若其潰瘍過久。醫治太晚。則宜每日二次。先用前項微溫之二石炭酸液洗滌。患部續撒布沃度。仿謨等。滅其惡臭。至漸近恢復然後用。○一。昇汞液洗之。其他壞疽性蛇行性諸種疔瘡治法亦同。

處方  
 一 石炭酸 一〇 餾水 一〇〇〇

右外用爲洗滌料 (制腐液)

二 鹽酸古加乙脛 〇五 純眞蒸餾水 一〇〇

右製爲五%溶液。入遮光瓶中待用。(定痛精)

三 石炭酸 一〇〇〇 餾水 一〇〇〇

右外用。爲腐蝕藥。(甲種截瘡水)

四 硫酸銅 五〇 餾水 一五〇

右製成溶液。爲腐蝕藥。(完瘡液)

五 沃度仿謨 五〇

右外用。爲撒布料。一日二三次。(二金散)

六 沃度仿謨 二〇 薄荷油 二滴 羊毛脂 八〇 萘攝


林 二〇

右調製成膏。塗敷瘡面。(生肌膏)

九 硬下疳

定義。硬下疳者。實陰部之梅毒也。爲梅毒第一期之證候。故有梅毒性潰瘍之名。又以其以硬塊而始也。故又有初期硬節之名。

第 三 圖  
軟 下 疳



第 四 圖  
硬 下 疳



病原。亦因交媾之際。感染梅毒菌而發。其患生之部位。爲包皮內面。冠狀溝。龜頭。繫帶。陰莖皮膚等。尿道較少。陰囊亦少。證候。尋常交媾之十日。至月餘後。陰部即發生結節。色紅。或紅褐。大如粟粒。其形圓。硬若軟骨。頗有光澤。未幾。頂上之表皮脫落。則破潰而成瘡面。底部覆苔。一層。其色灰白。狀似豚脂。體質虛弱者。且深蝕成孔。儼似噴火口。瘡面鮮紅。周圍堅硬。邊緣屹立。觸之不痛。大腿上端之兩旁。即鼠兼發便毒。亦不發痛。統計約三四星期。漸結癩而自愈。但不治而自愈者。癩痕之堅。韌多。永不消散耳。別有所謂羊紙狀硬結者。多局生於龜頭。傳染之後。每潛伏二三期之久。過此則龜頭上之皮。一旦剝離。顯呈錯落不正之境界。邊緣顯然隆起。色紅褐。而似豚脂。微泄如水之液。試觸診。剝皮部之底面。宛若羊紙。又似厚紙地圖。倘覆以乾燥之綿花。保護。而使其清潔。即易生上。皮而結癩痕。

治法。硬塊初發之時。可敷水銀軟膏。或硬膏。已成潰瘍。亦以用結晶。

石炭酸腐蝕為佳。其後則撒布沃度仿謨，或甘汞、次硝酸蒼諸藥消毒之處。藥改用福爾馬林液亦妙。

一 福爾馬林 一滴 餾水 一〇〇〇

右外用為洗滌料。入廣口玻璃瓶中。將陰莖插入。繫瓶脰。一日二次。每次約十分時。(洗疳湯)

二 過滿俺酸加里 一〇 餾水 一〇〇

右外用為腐蝕藥。(乙種截疳水)

三 沃度仿謨 五〇

右外用為撒布料。一日二三次。(二金散)

四 甘汞 埡魯瑪德兒 各五〇

右外用為撒布料。(黃白丹)

五 甘汞 一〇 次硝酸蒼鉛 一〇〇

右外用爲撒布料。(蠶毒散)

六 硼酸 四〇 餾水 四〇〇〇

右外用爲洗滌料。(硼水)

十 海綿體炎

病。原。患淋病者。尿道灌膿破潰。尿道海綿體。受蓄膿液之刺戟。先起一局部之浸潤。繼則發生焮衝。尿道球部。最易患之。證候。陰莖濾胞之發炎破潰也。所生結節。全然扁平。外觀頗似治愈。乃一二日後。該結節忽又增大。而且發痛。寢假而蔓延於海綿體之大部分。則皮膚腫脹發紅。溺必大痛。尿線細小。海綿體腫脹。勃起之時。陰莖彎曲。海綿體孔因焮衝而狹小。血液不能如普通之輸入。幸而徐徐吸收。仍必遺堅硬之結節。或則留扁平堅韌之物。謂之花柳病。素雖有彈性。而不能伸展。故稍一勃起。即起障礙。致爲交媾之害。惟不痛耳。診斷。上述症候。既瞭明。若是又加觸診。鑑別何難。

豫。後。急。性。發。炎。之。時。破。潰。甚。者。有。成。尿。廔。孔。變。膿。毒。症。之。虞。已。成。慢。  
 性。硬。結。治。療。殊。形。棘。手。終。致。不。能。交。媾。但。於。生。命。固。無。關。也。  
 治。法。首。須。靜。攝。身。心。斷。絕。淫。念。整。齊。大。便。擇。善。良。無。刺。戟。性。之。飲。食。  
 物。用。之。淋。病。之。尿。道。注。射。暫。時。停。止。當。初。發。之。時。尚。未。變。軟。或。呈。波。動。  
 者。速。施。冷。罨。法。俟。疼。痛。稍。退。即。塗。擦。灰。白。軟。膏。促。其。吸。收。

十一 尿道淋

定。義。淋。淋。瀝。也。尿。道。發。炎。溺。不。通。暢。必。淋。瀝。而。下。也。故。曰。尿。道。淋。隋。  
 巢。元。方。病。源。候。論。中。已。言。及。之。俗。所。稱。白。濁。是。也。往。昔。西。醫。學。家。無。不。  
 以。淋。病。梅。毒。目。為。一。症。今。乃。知。其。非。是。實。獨。立。之。症。候。也。  
 病。原。因。交。媾。之。故。淋。毒。由。尿。道。中。侵。入。遂。發。此。病。與。石。淋。等。迥。別。不。  
 可。不。知。  
 證。候。以。時。期。論。則。有。急。淋。慢。淋。之。別。以。部。位。論。則。有。前。淋。後。淋。之。分。  
 急。淋。者。初。次。所。發。生。也。慢。淋。者。急。淋。所。轉。移。也。前。淋。者。病。在。前。尿。道。也。

後淋者。病在後尿道也。尿道前長陰莖後尿道之內端凡初次發生之前淋。謂之急性前尿道炎。其後淋即謂之急性後尿道炎。急淋轉移之前淋。謂之慢性前尿道炎。其後淋則謂之慢性後尿道炎。茲更分別言之。  
 甲、急性前尿道炎。淋毒傳染之後。普通潛伏二三日。至遲不過一晝夜長自四日至九日即來前驅期之症狀。溺時。自覺尿道口微熱而癢。又發紅腫。尿道口唇常有透明似膠之液粘附之。或且雜有白絲於其間。神經質之人。此時已有倦怠。少納等輕微之全身症狀。約二日後。即移於旺盛期。尿道漏泄之液。逐漸加多。即其性質。亦漸自粘液而變為膿液。常常由外尿道口溢出。膿頗稠厚。其色黃綠。沾污下衣。點點如斑。尿道口覺灼熱。又痛若鑽刺。溺時尤甚。陽強不倒。謂之疼痛性陰莖勃起入夜加劇。淫興勃發。痛楚殊恒。因妨酣臥。精神沈鬱。或則洩精。甚則出血。尿道粘膜以腫脹之故。尿道狹小。尿線遂細小而無力。甚者中絕。大約一星期後。炎症由外尿道口。漸進而侵及海綿體全部。至第二星期之終。或第三

星期之始。前尿道通體液及病勢達於極度。外尿道口紅腫愈甚。粘膜外翻。小便混濁。間有來龜頭浮腫。包皮浮腫。炎性包莖。包皮嵌頓。龜頭炎諸症者。其自覺症狀亦漸次增劇。會陰部壓重。便時爲最。日晡微熱。全身違和。體力倦怠。食思減退。約十八九日後。諸症漸退。膿液減少。且稀薄而還爲粘液。又經二三星期。乃全治愈。統計全經過約六星期。可以告終。若病人體質自來薄弱。或不事休養。仍貪房事。或照常執務。過勞身心。或勃起遺精頻頻刺戟。則足使炎症益劇。病期延長。

乙。急性後尿道炎。前尿道部之炎症。踰尿道壓迫筋而波及後尿道部。遂患後尿道炎。前後一併發炎。故又名全尿道炎。前淋減退之際。後淋誘發。則前淋且得僥倖速愈。其發生也。或全然隱晦。或呈特有之症狀。所謂特有之症狀者。尿意頻數。每五分至十分急切不得通利。祇可點滴淋瀝。膀胱壓重。尿道灼熱。又兼痛癢。會陰。肛門。痛癢亦如之。有時尿尾帶血。病至精阜。則數數洩精。便旋及射精後。會陰部必發痛。壅

引而至於肛門。全身症狀一似前淋。惟尿意屢催者。大便往往秘結。又後尿道與攝護腺、精囊、副睪丸、膀胱等密相鄰接。炎症亦動易延及焉。丙、慢性前尿道炎。急性前淋減退之期。或停止注射過早。或藥液刺戟太甚。或滯滯是好。過勞少眠。或獵艷漁色。縱慾無度。或轟飲豪舉。恣情罔顧。坐是在再數月。久而不治。前此焮衝諸症。雖皆消滅。而膿液之泄漏猶如故也。惟其量較少。僅晨起時。有帶黃或乳白色之膿滴少許。自外尿道口泄出而已。此蓋夜中所積者也。日間屢屢洩溺。故祇有粘液少許。膠封外尿道口。其自覺症狀。但餘尿道部之微熱輕癢。間或會陰、肛門、睪丸諸部。亦略起相同之感覺。丁、慢性後尿道炎。飲水雖極少。而頻頻思洩。交媾則非獨無快美之感。且肛門及尿道深部。皆痛如鍼刺。或交即滑精。或數數遺泄。或勃起無力。或神經衰弱。如腎部壓重。疹痛。脊椎部有如蟻行。又時冷時熱。消化障礙。頭重。怔忡。精神沈鬱。禪於就事等。皆是。經過。急性前淋之經過。約六星期。已如前述。急性後淋。則較爲遲緩。

何則。因常於全經。過中再三。反復。故也。倘併發他症。益遷延時日。慢性。前後淋之。經過時間。更無一定。以其時發時愈。倏來倏往。故有經數星期。或數月之久。似已全治。一旦有交媾。放飲。過勞。感冒等事。故洩出之。液重復增加。且變膿性。故遲速尤難豫決矣。診斷所患。是否淋病。可診查其既往症。與現在症。而知之。然須先審其證候。經過而辨其為急為慢。更進而斷其在前在後。急慢之辨。初不甚難。前後之分。不容稍忽。今有一簡便之法。備玻璃杯兩個。並列於前。遺溺其中。一杯既滿。更及他杯。洩畢視之。第一杯之尿混濁。第二杯澄。清者前淋也。第一杯之水極混。第二杯稍混者。後淋也。若第二杯之尿。極混。或兩杯皆極混。則不但前後尿道俱患淋病。且為膀胱炎之徵矣。是謂之二杯驗尿法。憑此斷其前後百不爽一。但淋病與類似之症。亦不可不精細鑑別也。類似之症。有六。第一。非淋性尿道炎。無潛伏期。病勢一至極度。條即消散。且部位不廣。時日不長。第二。龜頭包皮淋。兼包

莖指壓繫帶部上下龜頭絕不覺痛指壓龜頭冠左右龜頭即便發痛  
溺時尿道內不灼熱不疼第三尿道內軟下疳展視尿道口唇必有  
特異之潰瘍洩膿不多第四梅毒必有硬結橫痃及其餘梅毒之症狀  
第五攝護腺漏大便時必洩出濃稠白色之液臭如精液且攝護腺堅  
硬肥大第六精液漏常繼二便而出量亦甚多其性質其臭氣皆精液  
也一二三四與急性淋迥殊五六二者又與慢性淋大異從而斷之自  
涇渭莫混矣

豫後亦隨急慢而異急淋苟醫法得宜調護合度約六星期即已痊  
可惟有併發之症則經過延長豫後亦必不良慢淋則全視病人之攝  
衛何如毫無標準縱十分珍攝靜心保養奏效猶非旦夕間事脫令縱  
慾如故藥石中輟甯惟危身且害妻孥可不懼哉

治法尿道淋之治法有三一曰攝生二曰服藥三曰注射尿道攝生  
法中酒色最忌他如飲食之香辣煎炒運動之馳馬超躍動情之書畫

戲劇亦當一律嚴禁。不論急慢均應如此。惟急淋兼須用提舉帶整齊大便。茲將內服及注射各種藥劑。歷舉如下。

(甲)內服藥 有利尿、鎮痙、鎮痛、止血諸種。各藥又有優劣之分。述如次。

一 白檀油 ○三至○五

右入膠囊一個。一日三次。每服一個。食後。(檀香油)此藥害腸胃之害

副作用少然往往使腎臟充血誘發劇痛

二 骨湃波拔爾撒謨 ○二

右入一個小膠囊中。一日服六個。每次二個。(骨湃油)

三 骨湃波拔爾撒謨 三○○ 葶澄茄末 六○○

右拌研勻淨。一日服五茶匙。各包以澱粉紙吞服。(骨葶散)

葶澄茄及骨湃波拔爾撒謨皆極害腸胃且誘發腎臟充血腎臟炎等故凡有急性慢性腎炎者均忌用

三 楊曹 六○ 苦丁 三○ 糖漿 一○ 饅水 二○

〇〇

右一日三次。每次一格。二日分。(水楊飲)凡尿酸雖含酸增性其服

酸性然免不後楊曹作用之強且骨華散骨華散道而改免增性其服

四

撒魯兒 〇五至一〇

右為一包。共製六包。一日三次。二日分。食後。(代楊散)此喜惟

勝水膀胱之發炎乃急性淋之酸最良劑也

五

烏華烏爾失葉煎 (二〇〇) 一八〇〇 楊曹 六〇 苦

丁 四〇 糖漿 二〇〇

右一日三次。每次一格。二日分。(三利煎)此煎較骨華為不

用恒

六

菲沃斯越幾斯 〇三 印度大麻越幾斯 〇三 白糖

三〇

右研勻。共分十包。每三時服一包。(鎮瘧散) 炎症增劇且尿頻數者宜之。

七 臭剝 五〇至七五 比林 二・五

右分五包。每晚服一包至二包。食後。(逍遙散) 陰莖勃起兼發疼痛且患

宜選精者之

八 臭曹 三〇〇 精製樟腦 三〇 愛爾柯欽 〇・三

右研極細。共分十包。一日一二次。每服一包。食後。(鎮元散)

功用同逍遙散

九 麥角越幾斯 一〇 白糖 二〇

右研勻。共分十包。每三時服一包。(止血散) 血之

十 流動希特拉斯越幾斯 二〇〇

右為滴劑。一日三次。每服三十滴。(剪紅飲) 此味功用同止血藥

(附外用藥)

一 荳蔻越幾斯 〇・一五至〇・二 椰子油 灰白軟膏 各等

分適宜

右調勻製坐藥十個塞入肛門一日用二三個（不痛錠子）

內服錠子功效時兼外

二 二%蛋白化銀 椰子油 各適宜

右溶和製小桿六枝塞入尿道中一日三次每次一個（卵

銀條）急用之前淋

（乙）注射藥 凡注射尿道第一須慎選相宜之藥料第二須使用適

當之方法乃得使該藥料奏效於尿道注射藥分三種曰殺菌

藥有撲滅細菌之作用者曰殺菌收斂藥有撲滅細菌兼剝

離細胞之作用者曰收斂藥有剝離細胞之作用者也此外

尚有三種曰止痛藥有消散疼痛之作用者也曰消炎藥有滅

退炎症之作用者也曰止血藥有收縮血管之作用者也更依

次舉如下

(菌殺) 一 蛋白化銀 〇.五 安知必林 六.〇 甘油 二.〇 餾水

二〇〇〇

右貯黑瓶中。一日二三次。每次注射尿道一筒。(銀安液)此殺菌藥也。然刺戟頗甚。故必加安知必林以減其痛急性用之。

二 抱銀乾酪素 一.〇 餾水 二〇〇〇

右貯黑瓶中。用法同前。(銀酪漿)此藥與銀安液相似。任用其一可也。

(殺菌) 三 依比知阿兒 一.〇 至二.〇 餾水 二〇〇〇

右爲尿道注射料。用法同前。(臭黑液)此殺菌收斂藥也。有消除痲衝之功。惜殺菌之力不甚。強大此缺點。故不甚用。

(飲收) 四 過滿俺酸加里 〇.〇 二 餾水 二〇〇〇

右爲尿道注射料。臨用熱至微溫。用法同前。(滿剝液)此藥收斂也。現今常用之。所用分量尚有多於此者。因過濃反多危害。常人所用依此爲佳。

五 皓礬 一.〇 餾水 二〇〇〇

右爲尿道注射料（神功水）按鉛亦通用收斂之品  
其性較稠液平易  
用以收功洵推上品

六 鉛糖 皓礬 各一〇 餾水 二〇〇〇

右爲尿道注射料。臨用將瓶搖動。使藥混和。用法同前。二

鉛水（前方單用皓礬一味見功用之）  
兩種併用治愈可速余常用之

七 明礬 皓礬 各〇四 餾水 二〇〇〇

右爲尿道注射料。用法同前。（雙礬泉）與第八方

八 硫酸銅 〇一 餾水 二〇〇〇

右爲尿道注射料。（膽礬水）此藥功在糖惟液之者上性如稍烈  
剝液之多耳

多耳

血止 九 過格魯兒鐵液 二五 餾水 二五〇〇


右爲尿道注射料。用法同前。（止血液）此藥當與內服同止  
並用神效如神

上列各藥。不論急淋、慢淋、前淋、後淋。概屬相宜。惟殺菌藥之分量。急淋、前淋。宜輕。慢淋、後淋。宜重。收斂藥。可無歧異。其殺菌而又兼收斂者。近人大率不用。惟欲止痛消炎。則莫此藥若耳。論諸藥之功效。殆皆卓著。但各人之稟賦不同。有用甲種。其功不顯。用乙種。而明效大驗者。有在初時。其效極著。迨中途。即不甚有用者。是在病人精密審酌。變換。倘試用某藥。各症非徒不能輕減。且轉加劇。或奏效遲緩。展延時日。或始雖奇驗。繼又中止。均應酌改他藥。慎毋膠柱鼓瑟。咎藥石之無靈也。此外殺菌藥中。尚有拉兒金、與亞爾巴魯金、殺菌、收斂藥中。尚有硫基。依比知阿兒安母尼亞、依篤羅爾、硝酸銀、亞爾根特、阿明等。收斂藥中。尚有硫基、石炭酸、亞鉛、過滿、俺酸、亞鉛、醋酸、亞鉛、次硝酸、蒼鉛等。或尚係新藥。習用未久。或性太猛烈。流弊滋多。或效能薄弱。較遜其他。況常以他病更復何堪。余故刪繁就簡。以便齊民焉。

中醫治淋。但恃服藥。不知注射。夫服藥之功。上在利尿。中在制淫。固精。並解痛苦。止血。抑其末也。若滅菌。掃毒。制腐。抑膿。曾無此力。故事倍功。半患淋者。往往由急而慢。自前而後。庸醫誤人。比比皆是。西醫內外兼治。內重服用。譬彼治河。必清其源。流自暢也。外重注射。譬彼伐木。先拔其本。枝自下也。故事半功倍。患淋者。往往易重而輕。不遲而速。惟注射雖盡人。優爲之。然用法有優劣。時期有宜忌。器械有良窳。次數有少。藥性有強弱。要在神而明之。勿事孟浪。先論方法。病人宜先放尿。正坐伸兩足。如箕舌。乃用微溫水。或二芴硼酸水。數洗滌龜頭。尿道口。注射尿道內。去其粘附之膿。然後以左手之無名指。中指挾住龜頭。使其昂舉。以拇指示指展開尿道口唇。右手持滿吸藥液之注射器。恰對龜頭。插入嘴管。徐徐注射藥液。切勿猛進。則水向後射。膿液必因之俱進也。注射既終。用敏捷之手段。須速重。尿道負傷。去注射器。以左手之拇指示指。中指擒龜頭。而緊閉尿道口。阻止藥液流出。經十分至十

五分時去指開尿道口任其流出再入陰莖於微溫水洗淨放置次論時期用殺菌藥宜在初時愈早愈佳然龜頭及外尿道口假令浮腫或患包莖或漏血膿則當暫停不可仍如前注射致令炎病加劇用殺菌收斂藥宜在急性之第二期其時膿雖漸少而瘀衝尙存施以此藥獲益匪淺用收斂藥宜在疼痛稍退膿亦大減僅淋毒未盡之時蓋細胞剝離則潛伏深部之病菌自亦從而肅清也或與殺菌藥並用亦可要之炎病愈甚則注射之藥愈應和緩此不二法門也次論器械尿道注射器之形式大小質料種種不一從前東西洋所造者長大笨重藥液亦嫌浪費嗣改爲短小筒係玻璃製中心及把柄嘴管統用黑色硬橡皮造成嘴管之形式以求適合尿道之故迭經改良近年來醫學家又因此項改造之器其中心之桿與尖端之嘴管均以硬橡皮製成易於藏垢難於消毒乃別出新法全體悉用玻璃製成圓筒之內面與中心之外面盡係毛玻璃既混合無間亦滑澤善走其嘴管與筒身一氣呵成

第五圖 尿道注射器並管



二也。藥液毫無浪費。三也。消毒可以充足。四也。尿道無虞。損傷五也。故海內外咸風行焉。惟尿道之注射器。祇適用於急慢之前。淋至後。淋則別有器械。以用法頗難。常人不易精曉。茲姑勿論。次論次數。注射之次數。固不可太少。亦不容過多。大約每日自二次至三次。最為適宜。至多六次。尚不為害。然已覺煩瑣。六次以上。轉使炎症加劇。是宜切戒。當急

尿道器中容盛藥液。可六瓦至十瓦。使用此器。其利有五。尿管不煩。裝卸一也。內容得以洞見。錐形不必深入。尿道器中容盛

淋旺盛之時。注射殺菌藥。宜一晝夜三次。適八時一次。迨稍稍輕減。宜減為二次。若小便澄清。僅略混淋絲。則宜日中注射收斂藥二次。夜間注射殺菌藥一次。至膿液全止。則但注射收斂藥。計須九日。第一、三日內宜每日三次。第二、三日內宜每日二次。最後、三日內宜每日一次。夫連用九日者。所以防將來之復發。或變為慢性也。分期遞減者。所以表現在之治愈。與促其竣事也。終論藥性。炎症極盛之時。注射殺菌藥之蛋白化銀。須溶成四百倍之液。藥一分水二分後。可改為二百倍。藥一分水二分又三四日。可再加濃厚。改為五十倍。藥一分水一分或三十倍。藥一分水一分更經八日。尿道如習受此性。無甚大效。則換用他藥。凡此五端。皆當始終循行。寶如玉律。又當及時。迅掃。還我健康。戒之勉之。

十二 尿道創傷

定義 尿道被創。事固偶然。然跌撲刺割等外傷之來。往往出於俄頃之間。是固未可逆料而豫防之也。惟後部為多耳。就其種類分之。則有

挫傷、刺傷、割傷、裂傷四種。

病原。挫傷有前後部之分。前部挫傷多出於打撲、傾跌、馬蹄踐踏等。後部挫傷多由於鈍圓堅硬物體之拋擲而來。刺傷原於尖銳物體之觸接。割傷基於兵刃。裂傷極少。原因不明。有謂交媾時或發之。

證候。挫傷者雖表皮如常而宛轉呼痛甚者暈絕。上牽膀胱。下延龜頭。裏急後重。又兼溺血。若球部負創流血必益多。輕症則但見溢血。惟血瘤漸大發炎亦甚。故異常障害。其有化膿之勢者迅即蔓延。終結癥而狹窄。刺傷者在皮膚損傷多小。巨創則大抵側斜。然流血究少。若海綿體亦被刺傷則出血必甚。皮下所生之血瘤亦大。當時發痛。後乃消散。割傷者如係橫斷傷口哆開必大。不急治之必續來。其他險症也。裂傷者與挫傷同。

診斷。僅受微傷無出血及放尿困難諸症者診斷至不易也。然尙可追問外傷時之動力。景況。方向等而定之。頗有當時無血旋因他之運

動而後出血者不可不辨。

豫後尿道不論受何種之傷。即係輕症。亦不容漠視。苟腫瘤能變硬縮小。經過亦既良好。不幸而狹窄化膿。蔓延而至體發熱候。來峰窩織炎症狀。終必潰穿尿道。變成壞疽。若溺凝血之尿。則傷口難免不傳染。病毒併發。症中以尿浸潤最爲危險。治法輕症之挫傷局部宜速施冷罨法。可以鎮痛消炎重症急受治於醫生刺傷以止血爲第一要義。消炎次之餘如割傷裂傷均非醫生莫屬也。速治勿延可已。

第三節 陰囊病

一 陰囊水腫

定義 舉丸之間有莢膜焉。猝然發炎。滲出物潴積其間。陰囊從而漸大。遂成水腫之病。方書謂之水癩。有急慢二種。急性者又謂之急性莢膜炎。慢性者又謂之慢性莢膜水腫。

病原。舉丸莢膜之發炎外傷爲其第一。繼淋毒性舉丸炎及副舉丸炎而發者次之。不論急慢原因皆同。間有本於先天者。若轉自急性。多發于一側。小兒及成人之人俱有之。

證候。隨急慢兩性而異。急性症中。又有漿液性、纖維性、化膿性之分。然其來也。皆以發熱、中倦怠、疼痛等全身症狀而始。無何陰囊部即滲出多量之物。腫脹立現。漿液性者。緊張若豬脬。色帶潮紅。透明且生波動。舉丸隱其後。纖維性者。有纖維素沉澱底部。非絮非雲。或似顆粒。以手觸之。顯呈軋音。化膿性者。全身症狀重篤。是其特徵。試觸陰囊。痛楚難忍。透明略減。此殆漿液性。或纖維性所轉移也。慢性症中。僅有漿液性。與纖維性二種。化膿者無之。漿液性者。陰囊腫脹。形絕似梨。尖端向下。底則在上。尖端帶圓。大如人頭。莢膜在舉丸之前。掩蔽舉丸。故舉丸被逼至腫處之後。下端試觸陰囊。卽覺波動。且有彈力。光澤瑩然。宛如腹水中滯之液體。透明作琥珀色。若存留過久。則暗濁不明。兼呈血色。

甚者或褐或深褐。纖維性者。係因血漿變明爲暗。與莢膜壁由軟而硬所致。蓋莢膜發炎。自必生出一種纖維性物質也。該纖維物半浮液中。半爲絨毛而止於莢膜壁上。久之遂成莢膜鼠。觸之必呈軋音。及後水腫益大。陰囊膨亨如栲栳。溺時。每爲尿尾所汚。因之誘發濕疹。其最不幸者。莫若舉丸萎縮。腸管脫出。莢膜與腹合粘膜更因重其自覺症狀。爲墜重不堪。故步履蹣跚。洩溺沾濡。交媾困難。

診斷 第一與脫腸之鑑別。脫腸必呈鼓音。僅網膜下垂。或脫出不含。瓦斯之腸管。亦必發濁音。又不透明。無波動。咳嗽。努責之時。必加劇。壓之。必發痛。能還納。此病。則有鼓音。無濁音。透明。呈波動。表面平均。圓滑。咳嗽時。不加劇。亦不能還納。卽有時。腹腔加大。與脫腸無異。然亦自下而上。第二與舉丸副舉丸腫瘍之鑑別。腫瘍之形狀。多不一。定不透明。不緊張。此病。則形皆似梨。透明而緊張。第三與舉丸副舉丸炎之鑑別。亦以波動。透明與否。而診定之。若依據種種。確定其爲水腫。而尙欲斷。

其孰爲急性孰爲慢性孰爲漿液性孰爲纖維性則較易著手陡然發生者急性也潛移默化者慢性也全身熟候極高者漿液性也  
茨膜鼠有軋音者纖維性也

豫後 概良但障害頗多耳若陷於化膿皮膚必潰爛

治法 急性水腫宜安靜身體施提舉帶高舉陰囊兼用冷罨法疼痛塗搽莨菪水銀軟膏焮衝塗搽依比知阿兒軟膏候炎症消退乃先敷羊毛脂於陰囊面更施壓迫繃帶中襯綿花以保護之慢性水腫自能治愈否則另延醫家穿刺放水內服外敷皆無益也

## 二 陰囊乳糜腫、血腫、精液腫

病原 乳糜腫之原因不詳血腫或由於外傷或由於穿刺或因陰囊水者或由於捻振腫亦因水精液腫大都因舉丸副舉丸之或受外傷或發炎症而來  
證候 外觀酷似水腫然非漿液而爲色似乳汁之液即乳糜謂之乳

糜腫液中兼含有脂肪者則謂之脂肪腫。內容爲血者謂之血腫。內容爲精液者謂之精液腫。

診斷 乳糜腫及血腫。診斷皆易。何則水腫來勢迅急永無愈期。乳糜腫反之。水腫透明柔軟如故。自覺疼痛。血腫不透明。雖波動而內壁肥硬。無自覺症。惟精液腫必刺取其液。檢查有無精絲與蛋白。乃可確定。豫後 血腫有使學丸萎縮之虞。餘尙無害。

治法 三種腫瘍輕症及初發時速用壓迫提舉帶間有消散治愈之望。重症必就專門醫生穿刺或割除之。

### 三 陰囊創傷

定義 陰囊負創較尿道爲易挫傷。裂傷尤居多數。挫傷之中尙有皮下挫傷與複雜挫傷之別。

病原 亦不外打撲、跌落、衝突、坍塌等外傷。

證候 陰囊如受挫傷。因血管饒多之故。出血必甚。瀰漫皮下。及皮下

組織中。此即內舉丸諸膜及精系亦受損傷。必瀦血於舉丸總膜間而成血瘤。舉丸亦受損傷。必瀦血於舉丸膜間而成舉丸血腫。或瀦血於白膜內而成舉丸血瘤。凡舉丸負創者。疼痛異常。往往失神。傷在陰囊。痛雖輕而出血甚。腹部及陰莖之皮下。均了然可見。此等陰囊及舉丸諸膜之溢血。尋常多自能吸收。其變壞疽成膿瘍。發炎症者甚少也。治法。速安靜身體。高舉陰莖。並用鉛糖水。硼酸水等。施冷罨法。壓迫繃帶。不可妄用。否則非徒血瘤不能吸收。轉使陷於壞疽。不可不戒。

#### 四 陰囊濕疹

病原。陰囊之皮膚柔軟。毛囊及皮脂腺。並皆豐富。肥滿而易發汗。故多此病。夏日及不潔之人。最易患之。外科正宗謂之腎囊風。證候。亦有急慢之分。初時膚色潮紅。微腫而癢。漸成紅而硬之小結節。爲扁平隆起之邱疹。是爲邱疹期。旣而邱疹變小水泡。透明似水。周緣色赤。是爲水泡期。無何透明似水之內容液。忽又混濁而悉變膿泡。

是為膿泡期。膿泡破綻。洩出漿液。浸潤皮膚。然一觸空氣。即乾涸結痂。痂皮色微黃。儼似蜂蜜。質半透明。或不透明。是為濕潤結痂期。痂皮脫落。表皮成白色之鱗屑。是為鱗屑期。凡生濕疹。殆必經此。其刺戟甚者。蕾疹。膿泡之後。即便落屑。此項濕疹。往往賡續散布。滋蔓難圖。

經過。早者一星期可治。遲須五六星期。急性者刺戟而已。治法失宜。輒成慢性。

治法。嚴禁搔爬。陰囊。切勿與大腿接觸。股間設法。隔以綿紗。免皮膚之刺戟。時時以加里石鹼洗滌。清潔。或施鉛糖罨法。或撒布亞鉛華。澱粉。或塗敷硼酸。蒼鉛。亞鉛。華。硫。黃。水。楊。酸。等。軟。膏。外。加。繃。帶。頑。固。之。症。用腐蝕藥。並服。肝。油。鐵。劑。等。滋。養。物。

五 陰囊象皮病

定義。陰囊皮膚。增殖肥厚。有如象皮。故名。

病原。因有一種絲狀蟲寄生皮膚內層。而後發生。間亦由於其他之

原因者。

證候。陰囊皮膚。通體肥大。表皮尤厚。最易皸裂。摩其表面。凹凸不平。治法。以綿紗浸水楊酸酒精溶液。包裹陰囊。外加繃帶。此姑息之治法也。如仍不愈。乃乞醫治。

### 六 陰囊丹毒

定義。丹毒爲一部之皮膚發紅疼痛。兼發壯熱。乃傳染性極強之創傷傳染病也。

病原。因有一種微生物。名曰丹毒球菌。自極微之傷口。侵入陰囊皮膚。

證候。丹毒之潛伏期極短。不過八九時。俄而寒戰。體溫暴昇。頭痛。倦怠。食慾不振。惡心。嘔吐。陰囊部之皮膚浮腫殊甚。疼痛亦烈。惟色不甚紅。往往變爲壞疽。

經過。速者僅一晝夜。平均亦不過六日至十日。

診斷。寒戰壯熱是其主眼。故診斷尚不甚難。

豫後。如無合併症。概屬佳良。惟小兒及衰弱者。不免危險。

治法。首重隔離。以免傳染。對於全身。務圖安靜。服退熱劑。對於同處。

嚴重。消毒。高舉。陰囊。施冰。罨法。冷罨法。防腐。罨法。塗敷。依此。知阿兒軟。

膏等。其周圍部。則塗搽。沃度。丁。幾等。以防蔓延。

處方。

一 過滿俺酸加里 一〇 餾水 一〇〇〇

右外用。為防腐罨法料。綿紗浸濕。貼陰囊上。(第二消毒水)

將初發之時用之。可將病勢截止。顯效。

二 依比知阿兒 一〇 華攝林 五〇

右調勻。製成軟膏。塗敷患處。(臭黑油) 鎮痛消炎神效

三 石炭酸 五〇 羊毛脂 猪油 各二五〇

右調勻。塗敷陰囊。一日二次。(清涼油) 患處清涼。快此適立

四 列曹爾珍 一〇〇 猪油 三〇〇

右調勻製成軟膏塗敷患處一日四次。(列曹膏)此藥功用與清涼油

仿相

五 楊曹 一·五 乳糖 一·五

右研分三包一日分三次服。(楊曹散)服此體熱即可漸退

六 比林 一·五 乳糖 二〇

右用法同前。(清涼散)與楊曹散同

七 陰囊蜂窩織炎

病原 起於尿浸潤者最多。其發於負創後之傷面者亦有之。  
證候 病以戰慄大熱而始。陰囊十分腫脹。皮膚發紅。壓之則痛。上擠尿道。放尿困難。未幾即生瀰漫性之黑色壞疽。終至潰爛。及壞死之組織脫離。乃漸治愈。有時發敗血症之熱。則不可為矣。  
治法 初發之時安靜。高舉。施防腐。法一切與丹毒同。腫脹至不能。

堪。則非進刀。圭不可。

八 陰囊疝

定義。腸管不在原有之位置。脫出而至於他處。曰脫腸。厥病曰疝。譯稱歇爾尼亞。惟脫腸之部位不同。故有鼠蹊歇爾尼亞。股歇爾尼亞。陰囊歇爾尼亞諸名。所謂陰囊歇爾尼亞者。卽陰囊疝也。腸管脫出而墜於陰囊也。嚴用和云。男子有七疝。寒水筋血氣狐癩是也。又曰陰癩之證有四。一曰腸癩。二曰氣癩。三曰卵癩。四曰水癩。狐疝腸癩皆此病也。餘皆不得以癩疝概之。中醫定名之混。若是宜初學之迷茫矣。

病原。腸在腹中。腹膜包之。本不能脫出也。然腹膜最下之中央部。開有一孔。謂之卵圓孔。若腹膜之發育不全。該孔不能緊閉。腸卽由該孔隙脫出。此本諸先天也。腹膜雖頗堅厚。然內臟及腹壁中。每有抵抗微弱之部。若扛挑重物。或咳嗽劇烈。或大聲呼號。或用力努責。加壓力於腹部。致腹膜忽生罅隙。腸卽由各罅隙脫出。此來自後天也。陰囊適當

腹膜最下之中央部。故腸管最易脫出。而成陰囊疝。

證候。其狀如瓦。行立及咳嗽。努責。則出小腹而入陰囊。靜臥則漸收縮。而入小腹。還納之時。指頭一併送入。可以觸知其出入之門。其大者。

雖手指亦得深入腹中。試於陰囊打診。則發鼓音。

診斷。疝與水腫不同之點。在於能還納。還納時。有聲如鷓鴣動。則甚無波動。故鑑別頗易。

豫後。非嵌頓性者。於生命無妨。惟難根治耳。

治法。整齊大便。母久立。母疾走。母荷重。母劇嗽。母努責。施脫腸帶。阻其下墜。果仍無效。方行手術。

### 九 陰囊弛緩

病原。大病之後。疲勞之餘。往往有之。有暫時弛緩者。有永久弛緩者。不一定。

證候。陰囊並不腫大。亦無其他異常。僅頽然下垂。舉丸亦從之。夏日

尤甚。惟交媾及寒冷時。方漸緊縮。

豫後。別無障害。要皆為不甚健全之徵而已。

治法。宜食滋養物。適宜運動。治法之最有效者。莫如用冷水灌注。冷水

水。按摩。通以電氣。亦佳。

第四節 其他諸病

一 橫痃

定義。生於腿膝小腹之間。生理學上名該部為鼠蹊部。鼠蹊部內面。

有無數之水脈腺。水脈腺者。淋巴腺也。鼠蹊淋巴腺。腫脹成核。即為此

病。舊稱便毒是也。指為血疔。見圖書集成醫部卷二百一則大謬矣。

病原。多繼軟下疳而發。或一側或兩旁。多不一致。亦有與淋病梅毒

並發者。

證候。來自軟下疳者。鼠蹊部先覺微痛。該側之下股。亦牽引而不能

十分伸展。行動尤痛。一二日後。痛益劇烈。微來寒熱。試行觸診。乃知有

數個淋巴腺。腫脹成核。其痛。卽原於此。然爾時該部之皮膚。尙未潮紅也。若能。力圖。安靜。兼加。治療。腫消。痛止。數日。間事。耳。過此。則膚色。轉紅。鄰近之淋巴腺。亦從而。腫脹。腺之周圍。更誘發。炎症。與周圍之組織。粘。合爲一。遂不堪。行動矣。於是。時也。腺內之物。先後。化膿。痛亦。最甚。膚色。紫赤。波動。顯然。至皮膚。益薄。痛乃。銳減。終則。皮破。膿洩。寢成。瘻孔。時出。少許。膿液。或粘稠。液。約數。星期。或數。月。漸次。自愈。其不。成瘻。孔者。瘡口。即崩潰。加大。一似。軟下。疳之。潰爛。面。是謂。下疳。橫痃。或名。有。毒。性。橫痃。發於。梅毒。者。來勢。極慢。不。疼痛。不。灼熱。不。化膿。是謂。之。無。痛。性。橫痃。原。於。淋。病。者。條。起。條。滅。最。輕。微。矣。

診斷。診斷。橫痃。第一。須。細。檢。其。下。肢。之。小。創。因。此。等。小。創。必。起。於。橫。痃。之。後。也。第二。須。周。察。其。陰。部。之。淋。病。及。軟。硬。下。疳。因。此。等。疾。病。必。發。於。橫。痃。之。前。也。其。與。他。症。之。應。鑑。別。者。有。四。種。第一。副。辜。丸。炎。辜。丸。多。下。降。於。陰。囊。內。橫。痃。則。無。關。於。辜。丸。第二。脫。腸。捺。之。則。縮。小。雖。腫。脹。而。

而。明。三。化。銀。水。治。且。豫。之。雖。脈。有。有。  
 穩。日。次。濃。軟。番。法。患。後。極。小。彈。有。  
 妥。又。一。乃。膏。法。敗。雖。而。力。因。  
 在。注。二。引。貼。皮。血。多。數。咳。  
 諸。射。兩。置。膚。症。佳。惡。心。嗽。  
 法。如。次。水。未。即。以。至。良。然。加。  
 中。前。注。起。宜。於。死。全。大。  
 堪。其。射。變。安。於。死。全。大。  
 推。後。後。化。靜。醫。是。亦。未。可。輕。視。也。  
 上。但。立。以。前。治。施。冷。罨。冰。罨。壓。迫。諸。法。已。發。焮。衝。宜。施。鉛。  
 乘。加。即。消。散。果。不。奏。效。則。改。用。溫。罨。法。促。其。早。日。  
 他。繃。放。出。三。次。注。射。乃。留。置。之。外。加。防。腐。繃。帶。  
 若。已。可。收。功。此。所。謂。待。期。法。也。取。效。神。  
 血。療。法。既。無。煩。奏。刀。更。不。需。用。藥。  
 雖。極。相。似。然。陰。部。之。原。發。症。截。然。不。同。橫。痃。則。全。然。歧。異。憑。此。可。斷。確。  
 脈。小。而。數。惡。心。嘔。吐。大。便。燥。結。橫。痃。則。諸。症。缺。如。第。四。癌。腫。崩。潰。之。後。  
 有。彈。力。因。咳。嗽。而。加。大。橫。痃。則。始。終。如。一。且。無。彈。力。第。三。嵌。頓。脫。腸。多。

處方。余嚮者屢屢用之無一不著奇驗亦良法也。

一 鉛糖 五〇 餾水 二〇〇〇

右外用爲罨法料。罨覆橫痃上。(鉛水)

二 粗製明礬 五〇 二五%鉛水 二五〇 餾水 二〇〇〇

〇

右用法同前。(礬鉛水)以此冷罨患部消散可加速

三 沃丁 二〇〇

右外用爲塗搽料。(一味酒)此藥善解凝橫痃自能消散

四 沃丁 五倍子丁 各一〇〇

右調和爲塗搽料。一日三次。每次輕輕塗搽。以二三分時爲

度。(沃倍酒)功效視一味尤著

五 沃丁 一〇〇 萇若丁 一〇

右調和爲塗搽料。  
**沃荳酒** 沃丁解凝莫若丁止痛故亦奏奇效

六 沃度仿謨 一〇〇 椰子油 二〇〇 扁桃油 適宜

右溶和攪勻製成小桿十枝。插入瘡孔中。  
**二金條** 凡已橫

症時波膿水久不收功者宜之但須先用石炭酸水等洗淨瘡孔乃可

二 尖圭濕疣

病原 一名尖圭胼胝腫。又名尖圭息肉。患淋病者。怠於洗拭。膿液粘及他處之皮膚。粘膜而刺戟之。於是皮膚粘膜之乳嘴體。即伸長而分歧。儼若贅疣。故名尖圭。象形也。示與扁平濕疣有別之義。其發生之部位。多在於肛門。而龜頭。冠狀溝及包皮內膜間亦有之。  
證候 肛門周圍等部皮膚之表面。逐漸隆起。試諦視之。或若楊梅。或似花菜。或如雞冠。或如天鵝絨。加大而成小結節。遂如贅疣。各疹亦有迅速向上生長。根部細小而成莖者。既而疹之表面糜爛。泄似漿似膿之液。浸潤。惡臭。該隆起普通甚小。間有大至手拳者。其自覺症候。祇灼

熱。煩。癢。他無所覺。惟大者。發劇痛耳。若生於龜頭。及包皮內面等部。致  
 患。包莖。或因緊張而成壞疽。則於便溺。交媾。俱不無障礙。  
 診。斷。類。似。之。症。有。二。第。一。扁。平。濕。疣。與。梅。毒。有。原。因。上。之。關。係。且。其。  
 乳。嘴。體。非。生。自。皮。膚。乃。先。有。扁。平。之。濕。疣。而。後。發。露。於。表。面。也。尖。圭。濕。  
 疣。則。與。淋。病。有。原。因。上。之。關。係。乳。嘴。體。之。基。底。即。生。於。皮。膚。之。表。面。也。  
 第。二。癌。腫。乳。嘴。之。增。殖。不。速。亦。不。甚。然。必。發。痛。且。破。潰。自。鼠。蹊。腺。轉。移。  
 而。來。亦。得。顯。然。區。別。之。  
 治。法。發。生。數。多。之。小。濕。疣。可。外。用。強。性。之。腐。蝕。藥。惟。周。圍。健。全。之。部。  
 慎。弗。沾。及。以。免。潰。爛。  
 處。方。

一 過格魯魯兒鐵液 五〇 水 二〇〇

右塗布患部 (過鐵液)

二 列曹爾珍 一〇〇

右撒布患部。一日一次。繼續數日。  
藥依法連用數日。該濕疣即微覺灼熱。而此藥行兩日之後。便酸軟。即可治愈。若恐其腐蝕過度。撒布此藥。兩日之後。便敷。仍軟。更番用之。刺。

三 明礬 薩莖那末 各一〇〇 硫酸銅 一〇〇

右研和爲撒布料。一日一次。  
塗華攝林以保護之。但必痛甚。祇可一小部。又撒布之後。須力。上須蓋棉花。生於皮。頭冠狀溝等。一部者。撒布之後。如其。包皮有三厘。情則珍水之。此藥改。

四 酸化鉛 〇五 三三 苛性加里水 七五

右爲塗布料。細木棒捲綿。浸透塗之。  
似黑組之。而。

五 酸化鉛 二分 苛性加里 八分

右製成桿條。塗擦濕疣上。  
法或用水。速度。帶收功極速。綱。

(金剛桿)用此腐蝕之後。患部變

(勝軍液)此藥患部狀過

六 沃丁 一〇〇 五倍子丁 五〇 沃度 〇一

右外用。爲塗布料。每日早晚一次。(雙沃五倍酒)

七 薩菴那末 華攝林 各一〇〇 松節油 五〇

右外用。爲塗布料。(無名油) 効力視三  
蝕丹微弱

三 扁平濕疣

定義 一名扁平贅肉。又名扁平息肉。或稱扁平胼胝腫。亦曰濕性邱疹。爲第二期梅毒症候之一。原屬於邱疹性梅毒疹。其發生之部位。多在兩皮膚面。時相摩擦。且易受分泌液刺戟之處。如會陰、肛門諸部是也。

病原 既屬於邱疹性梅毒疹。則其原因於梅毒可知。

證候 邱疹性梅毒疹。頻經摩擦。又受濕潤。其表皮之細胞。膨脹變軟。繼以脫落。該疹表面。色紅而濕。稍稍隆起。而摩擦濕潤。仍無已時。則由其刺戟之甚。增加邱疹內之濕潤。而漸向周圍擴大。於是該隆起。小者

如大豆。大者似銅幣。最大者若銀貨。扁平濕疣。完全成立。其色灰白。或帶紅褐。表面有極平滑者。有成顆粒者。時洩稀薄之液。或膿液。故永無乾燥之期。惡臭陣陣。撲鼻而來。運動之際。腿股摩擦加甚。輒即發痛。在知覺過敏者。雖微動亦發大痛。以是憚於步行。一經診治。卽知爲此病也。若聽而不治。疹之中心。必成潰瘍。徐徐向周圍蠶食。至延及全面而止。亦有變紅色雞冠狀之隆起而成尖圭濕疣者。


經過。需數月。或年餘之久。若去濕潤。避摩。擦。自可縮短。祇一二日。便能減退。其蔓延廣者。不出十日。亦但留暗斑而消失。經過長久者。洩出之液。體傳染之力。非常強大。

診斷。與尖圭濕疣之鑑別。見前。不贅。與陰部濕疹之鑑別。濕疹之炎。症。部。中。央。斷。無。大。如。小。豆。或。銅。元。之。濕。疣。故。疹。斷。至。爲。簡。易。

豫後。是不過局處之病。豫後多佳。惟有屢發之虞耳。

治法。除行全身驅梅法外。更隨其濕潤之情形。與其在每日以三。

第六圖  
扁平溼疣



十倍石炭酸水洗滌清潔。續用鹽水或格魯兒水潤之。終撒甘汞等覆以綿花外加繃帶。此種處置專指在會陰處方。

一 甘汞 五〇 澱粉 五〇

右研勻爲撒布料。(宣毒丹) 濕潤亦不痛也

#### 四 直腸淋

病原 淋毒內犯攝護腺諸部。寢成膿瘍。破潰之後。流入直腸。遂亦患淋。由於雞姦者亦有之。

證候 直腸粘膜腫脹。平時發癢。便則大痛。裏急後重。洩出多量惡臭之液。既而表皮剝脫。或起皸裂。甚者肛門周圍。又因之而發炎。終成直腸潰瘍。或來直腸狹窄。

經過 頑固難治。故甚遲緩。

診斷 急性尙易證明。慢性則難發見。

治法 宜安靜。身體投莖麻油。旃那等輕瀉藥。使大便通暢。進液狀。食物數日為度。行癢皮煎等坐浴。裏急後重。用荳蔻阿片。或依比知阿兒等坐藥。以鎮瘳止痛。糜爛皸裂。先點滴古加乙液。使患部麻木。繼用硝酸銀腐蝕之。

一 一%或五%依比知阿兒水 三〇〇

右溶和為一次灌腸料。一日二三次。須微溫。勿冷。(消炎洗)

二 蛋白化銀 五〇 椰子油 適宜

右溶和製成坐藥十個。塞入肛門。一日兩個。(卵銀條)

三 硝酸銀 〇.二 秘露脂 羊毛脂 各二〇 黃華攝林

八〇

右先將結晶硝酸銀。入小乳鉢。水少許。花開。續加各藥。調成軟膏。各藥極須攪塗。敷肛門周圍。(完肌膏)治表皮皸裂。

五 痔核

定義。肛門及直腸下端之靜脈叢。脹大如瘤者。曰痔核。老痔靜脈中本無瓣膜。又居於體之下部。故易鬱血而使之脹大焉。妨礙該靜脈血液之還流使鬱

滯其間則血則

病原。有一部之原因。有全身之原因。一部之原因。如便秘、直腸瘰、慢性直腸炎、攝護腺肥大、及房事過度、久坐、騎馬是。全身之原因。如慢性心臟病、慢性呼吸器病、及荷重、肥胖、嗜酒、美食是。

證候。痔核有內外之分。在內者。謂之內痔核。在外者。謂之外痔核。內痔隱直腸內。非觸診不知之。外痔在肛門之周圍。微覺緊張。且現青色之核。小者若豌豆。大者若胡桃。努責則漲大。指捺則縮小。約一星期。可以消散。初起之時。常覺頭痛、不寐、消化不良。直腸壓重。肛門奇癢。閱若干時。約月餘核漸加大。便則發痛。兼覺灼熱。裏急後重。而直腸下部之粘膜。即躍之而發炎。靜脈管亦破裂。在外痔。則皮膚愈益緊張。變為極

薄終至皮膚與靜脈壁兩相分離。摩擦至破。於是粘液膿血等物與便俱下而出。血尤頻繁。下衣汚染。臀部不適。實主要之證候也。蓋血液之鬱滯。既多。脈管之脹大。自甚。一旦爆裂。遂出血矣。當未出血之前。必先有特異之前驅症。頭痛而張。輒發眩暈。頭內搏動。心悸亢進。呼吸緊促。心胸苦悶。常懷恐怖。肛門屢癢。又發掣痛。內覺緊滿。外感搏動。是名痔疾。性苦惱症。及一朝便血。則諸症立止。身心怡適。故病人多誤爲體中之汚液。必去之。而後快者。痔血之量。多少不一。然止之不易。其失血甚者。必陷於貧血。面色蒼白。頭痛眩暈。心悸亢進。至可危也。其潰破之核。如一任自然。亦難保不嵌頓。而發劇痛。嵌頓痔核者。本係內痔。因便努責。墜脫於外。爲肛門括約筋緊密嵌住。故名。其時肛門必發奇痛。病人咬牙蹙額。呼號呻吟。縮脚偏臥。避肛門之緊張。如不速行還納。將來必成壞疽。或直腸周圍。由漸化膿。或則成管。或則裂傷。或發全身病之膿毒症。腐敗熟等。以至於死。別有一種。非內非外。名曰盲痔。亦稱粘液性。

痔疾。僅直腸粘膜。時漏膿液。一日之中。數數如廁。苦悶症狀。酷似痔疾。惟此種不多。

診斷。外痔。一望便知。內痔。須以手指塗油探入肛門。試行觸診。有柔軟之隆起者。是也。然在年老之人。又必須檢其有無癌腫焉。

豫後。於生命雖無危害。然頑固不治。頗爲終身之累。其可治與不可治。均與原因有關。

治法。痔核第一須注意者。莫如原因療法。務整齊大便。淨拭肛門。毋貪麴糞。毋犯房勞。毋過運動。常便秘者。投以藥劑。使大便變爲柔軟。平時痔核外覆棉花等物。以避摩擦。疼痛用阿片。莨菪。越古。加乙。涅等配合製成坐藥塞入肛門。炎症施冰罨法。便血內服止血藥。外用收斂藥。並急以綿塊緊抵肛門。外痔可用結紮法。以除之。嵌頓之痔核。須用潔淨之油浸布片托住該核。徐徐納入。果誠不能還納。則以浸有微溫之千倍昇汞水掩蔽之。候其自行凋落。

處方

一 精製硫黃 二〇至四〇 酒石英 六〇至八〇 枸櫞油 糖 二〇

右研勻分作六包一日分六次服。(潤腸藥)

二 煨製苦土 純精酒石 各一五〇 茴香油糖 二〇〇

右一日一次至三次一次一茶匙。(通順散)潤腸藥功用同

三 鹽酸古加乙滷 〇三至〇五 羊毛脂 華攝林 各五〇

右拌勻製成軟膏臨用先將肥皂水洗淨肛門然後敷上

(痔痛膏)鎮痛用

四 沃度仿謨 〇三 莧蓉越 〇六 華攝林 二五〇

右如法製成軟膏先用五十倍之石炭酸水洗淨痔核然後將此藥攤布片上注意塗敷(沃莧膏)止痛鎮痛用

五 依比知阿兒 〇・二 沃度仿謨 〇・三 椰子油 二・〇

右溶和製坐藥一個塞入肛門每日一個（不二桿）此桿消炎防

佳腐良

六 明礬 一〇〇 葇蓉越 〇・三 椰子油 適宜

右溶和製坐藥十個塞入肛門（止血條）此項藥條准

七 流動希特拉斯越幾斯 一〇〇

右為滴劑一日三次每次服十五滴至二十滴（剪紅飲）用外

此止血條時兼服此飲功效益著

六 痔管

定義 肛門及直腸下部之周圍發生塵管曰痔管即痔瘻也一名直

腸瘻

病原 大都為痔核所轉移他如肛門周圍之割瘍膿瘍慢性直腸炎

直腸周圍炎直腸結核直腸淋毒直腸梅毒諸病亦能生成痔管

證候。痔管有

不全外痔管

不全內痔管

全

痔管

完全與不完全

之別。不全之痔

管。又有內外二

種。僅肛門周圍

之皮膚。穿孔成

管。直腸壁尙未

穿孔者。不全外

者。不全內痔管

相通者。全痔管




漸加多。乃始注

殊劇。

診斷。

與直腸梅毒、直腸淋病、直腸癌、直腸炎諸症。俱各有特異之徵。

第七圖 痔管



可直定之也。

豫後。其危險甚於痔核。且萬無自愈者。故豫後未可逆料。治法。痔管用姑息治法。無甚大效。是必商諸精練之醫家。施行手術。以絕根株。

### 七脫肛

定義。肛門內口。適嵌直腸。既非游離。何由脫出。脫肛云者。直腸脫也。仍而不改。亦從俗耳。

病原。習於便秘者。便時努責過度。則此病最多。他如直腸急慢性炎、痔核、雞姦等等。亦爲脫肛之原因。

證候。始不過肛門內面之膜。膜即粘稍稍外翻而脫出。至於極度。直腸

遂全然脫出。臨牀上於此分爲二種。僅肛門粘膜外翻者。謂之脫肛。直腸全管盡脫者。謂之直腸脫。脫出之後。固易整復。然因便溺咳嗽行動之用力。與坐立體位之變換。而仍易墜下。其經久者。局部每變潰瘍。其

長大者。大便往往失禁。或則嵌頓而成壞疽。至招危害。

治法。第一。須探求致病之原因。而豫防之。第二。須選擇飲食。忌酒類。辛辣。鹽漬。及麻油等食品。第三。須安靜身體。忌房勞。及遠足。乘馬踏車。游泳。旅行。諸運動。輕微者。指塗油脂。徐徐送入肛門內。內服通順丸。使大便通利。經久者。宜用固定法。疼痛及患痔核。痔管者。宜用葇荳。坐藥。或塗敷軟膏。肛門裂傷者。宜用埤爾馬德兒坐藥。

八 毛虱

定義。毛虱亦頭虱。衣虱之類。而其狀迥異。形扁平而短。色帶黃。有足三對。第一對較短。供鉤引皮膚毛根之用。行於毛上。望而知之。然當緊接皮膚之際。則非熟視不見也。所產卵子。與他種同。

病原。大率因與不潔之婦交媾而來。


證候。先棲息於陰毛間。該部之皮膚。奇癢不堪。兼發青斑。乍視無睹。細察毛根。然後發見。加以搔爬。施以剔抉。不惟堅附。且加引痛。又毛根

部。輒產卵子一二顆於其上。亦難墜落。久之。更自陰部經軀幹而上。蔓延於腋窩。鬚鬚。眉毛。睫毛之間。發生相同之症。

第八毛

治法。每晚先用肥皂水洗淨陰毛部。續用灰白軟膏。或秘露脂等緩緩塗擦。外覆綿花。以免汚染。明晨仍用肥皂水。滌去。約二三日。即殲滅無遺。卵子亦死不復為患。

圖虱



一 灰白軟膏 五〇 華攝林 五〇

右調勻製成軟膏。為塗敷料。每晚一次。  
 (殺蟲藥) 殺毛虱有之

力故用之最宜加華  
 攝林則塗敷較易

二 秘露脂 一〇 火油 二〇〇

右調和塗搽患部一日二三次。(立死油)此藥性質較猛用殺蟲藥而恐中水

銀毒者用之良便

### 第三編 女子部

#### 解剖生理篇

女子生殖器在下腹骨盤之內。骨盤大而扁。與男子迥異。則以其負有製造胚胎。生育兒女之重任。故也。其實貴可知。其內外兩部之區別亦如之。


#### 第一章 內生殖器之解剖

屬於內生殖器者有三。一曰卵巢。二曰輸卵管。三曰子宮。卵子附焉。

##### 第一節 卵巢之構造

卵巢在小骨盤內。左右各一分。占子宮兩旁。扁平如卵。又若扁桃。長八分至一寸。廣七分半。厚三分半。弱幼時作薔薇色。長則變灰白色。有光如臙。表面平滑。僅二三處凹凸不平。有細管通連子宮。為三種膜皮所

第九圖 女子生殖器官神經面



神經極枝圍繞血管。成稠密之網叢。而為卵巢間質主要之成分。女子

成一為胚種上。皮。最外之層也。二為白韌。在中層。其有如臍之。光者即此。三為實質層。中含無數濾胞。卵巢門向輸卵管。其動脈係由子宮動脈。與精系動脈分歧而來。直入卵巢門中。同時

生殖器中此實握其樞紐與男子之舉丸無異。卵巢之外尚有副卵巢。相當於男子之副舉丸。但無甚作用。故在成長之女子。僅留遺跡而已。

### 第二節 輸卵管之構造

輸卵管之職務。係將卵巢中已成熟之卵子。運輸子宮之內。故名。形似喇叭。故一稱喇叭管。亦左右各一。自子宮兩旁之後上端。循圓韌帶。橫斜而向卵巢。管腔與子宮內腔。直接通連。管之全部。可分爲三。一曰腹腔部。管之起點也。緊接卵巢。管內粘膜炎。外翻而成漏斗之狀。此一無依附之粘膜炎。摺成無數皺紋。形似剪綵。邊緣現鋸齒之痕。二曰韌帶部。爲入於兩廣韌帶之部。長與腹腔部相等。管腔至此。已漸狹小。皺紋亦低而少。三曰子宮部。橫貫子宮筋層而穿通之。管腔益狹。僅通羊毛。構造此管之筋。有內外二層。外層爲縱走纖維。內層爲圓輪纖維。其在最內之粘膜炎。則爲氈毛上皮。與男子之輸精管。初無二致。

### 第三節 子宮之構造

子宮。爲卵子發育之所。在膻之奧窔部。倒懸於小骨盤之中央。直腸膀胱。前後挾之。形似茄子。又如無花果。長二寸半強。廣一寸七八分。厚八分。重約十三兩。其上部覆以圓韌帶。且由是支持之。後上部之兩旁。各開一小孔。爲輸卵管開口之部。其下部之末端。又有一孔。謂之子宮口。循子宮口而上。至於最高之處。可區分爲三部。一曰子宮頸。在子宮口上。二曰子宮體。在子宮頸上。三曰子宮底。居全部之巔頂。界於體頸兩部之內腔者。曰子宮內口。在頸部內腔之外端者。曰子宮外口。復循子宮外口而下。則爲陰道矣。其內面之腺體中。常生有透明粘稠之液。

#### 第四節 卵子之構造

卵子。在卵巢之巨大濾胞中。女子屆成熟之年。每經二十八日。或三十日。該濾胞必破裂一次。其有受胎能力之卵子。遂溢出而至輸卵管。更由剪綵之運動而入於子宮。卵子之成立也。由於細胞之分裂作用。原始卵子成長。爲第一次卵子母細胞。又分裂之。則爲第二次卵子母細

胞亦曰極細胞。此極細胞即成熟卵子也。

第二章 內生殖器之生理

第一節 卵巢之機能

卵巢有製造卵子之功能。實與男子之舉丸具同一之作用。童年萎小。泊乎破瓜普通約十歲。內之細胞一旦發育。故卵巢亦從而膨大。終至卵子破濾胞而迸出。卵巢既具此功能。故為最貴重之臟器。

第二節 輸卵管之機能

輸卵管所以容受來自卵巢之卵子。且借剪綵同起顫動之作用。輸送於子宮內。猶男子輸精管之輸送精液也。而精絲與卵子之會合亦實在此焉。

第三節 剪綵之機能

剪綵能將卵巢中溢出之卵子立即握住。使不入腹腔。而送於輸卵管內。其把握卵子也。係漸次卷縮。一若張手握物者然。

第四節 子宮之機能

子宮擔負之責任在諸生殖器中最為重大。能將輸卵管送來已會合之精絲。卵子容受而孕育之中經二百八十日。胎兒發育期滿更起分娩之作用。故子宮之變化最易其保護亦最難。

第五節 月經之機能及成分

月經俗稱癸水為女子生殖器成熟之證據。每四星期必來潮一次。經血色暗紅性稀薄不凝固與子宮頸部之粘液稍稍混和故有特異之臭。平均約三兩弱。每次繼續數日。先後多終又漸少。至於停止間時。自子宮外口徐徐洩出。經行之際無甚障害。間或於經前或來潮時微覺腰腹墜重。膀胱起逼壓之感。腰腿有些微之痛而已。當有娠及哺乳時期。以內月經通例停止。考子宮之按時出血者。由子宮內面之粘膜。上皮受卵巢中濾胞破裂之刺戟而充血。充血不已。由漸剝脫細血管。又從而破裂。故出血也。迨一次經完粘膜上再新生。上皮其時苟適有。

兩性會合之生殖素。子即精絲與者卵客。此新生之上皮。即擁護而育成胎兒焉。

### 第三章 外生殖器之解剖


屬於外生殖器者有五。一曰陰道。二曰巴爾氏腺。三曰陰核。四曰前庭。五曰陰唇。尿道附焉。

#### 第一節 陰道之構造

陰道學語謂之腔。乃厚膜所成之管也。前爲尿道及膀胱之一部。後界直腸。上圍子宮口。與內腔相通。下達前庭。開口而直抵外界。平時狀扁平。前後兩面相對接觸。媾合則成圓柱形。中空而適容陰莖。其形似弓。微向前彎。前壁長二寸三分許。後壁長二寸六分至二寸九分。受孕則稍加長。陰道之管壁頗厚。性善放大。普通帶蒼赤色。受孕則現暗青紅色。或杏子色。陰道之上端。謂之子宮腔部。突向陰道。狀若鯢魚之膺。循是稍下。則爲穹窿部。全陰道中。惟此最廣。該部有前後左右之別。而後穹

時。有一形似半月之膜鎖之。但開一正圓、或卵圓之小孔。交通外界。一

第十圖 女子之外陰



窟尤為深長。緊接子宮頸部。全體由三層組織造成之。內層為上皮。中層為皮。下結締組織。外層為筋層。凡處女、少婦之陰道。其下半之內面。皆生有無數皺紋。又常泄出一種粘液以滋潤之。謂之陰液。血管神經。分部繁密。陰道下端之開口部。當處女

經媾合。即破裂而祇餘故蹟。故有處女膜之名。開口之部。謂之腔孔。在外陰部之下端。孔之周圍。有括約筋鎖之。一若肛門之閉鎖然。

### 第二節 巴爾氏腺之構造

巴爾氏腺。在前庭之下部。適當兩大陰唇後部三分之一。爲一種複管狀腺。左右各一。大擬蠶豆。色帶紅黃。管口開於處女膜痕。與小陰唇之間。常泌出一種液體。性狀似乳。放特異之騷臭。

### 第三節 陰核之構造

陰核。亦稱陰挺。在尿道上部。大小陰唇連合部之間。擁包於陰核包皮之內。隆起如小豆。爲海綿體所成。性善勃起。具快美小體。與男子陰莖同。

### 第四節 前庭之構造

前庭。一稱挺孔。在左右小陰唇之間隙處。上界陰核。後抵兩小陰唇。略成三角形。尿道即開口於其中央。靜脈之所匯也。

第五節 陰唇之構造

陰唇一稱陰門。大小各一對。皆左右翕張。在內者謂之小陰唇。在外者謂之大陰唇。形狀相同。但有大小之別。小陰唇在大陰唇內面。成小皺紋兩條。陰核卽擁包其間。至下則漸狹小。色帶淡紅。破瓜則微帶紫色。大陰唇蔽於小陰唇之外。爲陰道、陰門之屏障。隆起分兩長條。上下連合。在上者謂之前連合。在下者謂之後連合。其外皮亦起皺紋。富有脂肪。作暗褐色。外面略生陰毛。內則爲紅色之粘膜。常常濕潤。當處女時。兩陰唇閉合尙緊。

此外尙有附屬者。述如次。

一、尿道。在大小陰唇之內部。開口於腔孔。陰核間。口係鈍三角形。以視男子。短淺多矣。

二、陰阜及陰毛。陰阜爲恥骨縫際之外面。卽小腹皮膚之下部。有肥厚脂肪之墊。故隆起如阜。卷曲細軟之陰毛。卽綿密叢生其上。而大

陰唇亦稍稍有之。

三 會陰 陰門之後。肛門之前。謂之會陰。亦甚短淺。血管、神經、兩皆富有。且為軀幹之底部。其貴重。曾不讓男子。

第四章 外生殖器之生理

第一節 陰道之機能

陰道能起交媾之作用。兼為分娩胎兒之通路。周圍覆以括約筋。故能伸縮自在。若橡皮之有彈力。內面之粘液膜。俱起強厚之皺紋。一受龜頭之摩擦。即發無上之快美。又泌出腔液。以滑澤陰道。使陰莖得出入自由。

第二節 巴爾氏腺之機能

巴爾氏腺無甚大用。僅分泌一種液體。以潤澤陰道口部。俾無乾燥之虞。

第三節 陰核之機能

陰核。既如男子之龜頭。故多血管。神經亦有擴張。勃起之功能。一受摩擦。則血液奔湊。匯注興起。而生快美之感覺。

#### 第四節 陰唇之機能

陰唇之分大小。具至妙之機能。小陰唇在內。包庇陰道。巴爾氏腺及陰核等。大陰唇在外。更保護小陰唇。使外物莫由接觸。且外燥內濕。俾諸生殖器均得完全其機能。

一、尿道 女子之尿道。與男子不同。專司排尿。於蕃殖交媾。皆無與焉。

二、陰阜及陰毛 陰阜之效用。見男子部。不贅。陰毛。不惟免陰部之外露。致彰其私。又足防塵埃之內侵。俾弗罹病。

三、會陰 女子之會陰。亦能於交感時起收縮之作用。促陰道之緊約。以增加男女之快美。

### 第五章 男女生殖器之比較

男女兩性之生殖器雖相反而實相同。試舉其大者言之。舉丸製造精。絲猶卵巢之產。生卵子也。輸精管輸送精液。猶輸卵管之轉運。卵子也。精囊儲藏精液。猶子宮之容受。胚種也。龜頭以摩擦而勃起。猶陰核之以觸接而快適也。攝護腺液因媾合而泄出。猶腔液之因交接而分泌。也是故論兩性生殖器之效用。舉丸如卵巢。輸精管如輸卵管。子宮如精囊。陰莖龜頭如陰核。攝護腺液如腔液。哥啤爾氏腺如巴爾氏腺。

第四編 女子部

疾病篇

第一章 內生殖器之疾病

第一節 卵巢病

一 卵巢變位

定義。卵巢本為子宮靱帶所聯結。設子宮轉換其位置。卵巢遂從而移動焉。

證候。卵巢之變位也。下垂爲最多。謂之卵巢下垂。交媾之時。非常疼痛。如仍耽淫。不戒房事。則爲卵巢所牽引之。靱帶必現鬱血症狀而起。充血漸成慢性炎症。卵巢腫大。病人遂痛苦愈甚。間有下垂至兩股間者。

治法。急性者。靜臥。弗動。嚴禁房事。整齊大便。施冷罨法。疼痛稍減。行溫水坐浴。浴湯略加鹽。尤妙。或用溫水灌注陰道內。亦佳。惟所用水當先微溫。遞次加熱。至尋常沐湯溫度而止。

## 二 卵巢囊腫

病原。囊腫爲腫瘤之一。其原因複雜。且殊隱晦。故難言之。

證候。初時絕無症狀。故毫不自覺。必該腫塊增大。逼壓小骨盤。及周圍之臟器。而後知之。病婦偶於牀褥間。猝然變身體之位置。忽若有一圓球。在小腹轉動者。然腹部薦骨時發鈍痛。骨盤充滿。旣而該腫瘤出小骨盤而至大骨盤。前之種種感覺。一旦消釋。然又覺小腹脹滿。試隔

腹壁而觸之。竟顯然發露腫瘤。未幾、腹部再起疼痛。膀胱及其他臟器。均因受腫瘤之擠壓。而發種種症狀。若腫瘤漸加大向上。遂宛似妊娠子宮。然又呈中等之波動。腫瘤之移動甚者。子宮亦略可移動。但與腫瘤決不粘連。亦並不加大。外觀腹壁。緊張有光。或兼水臌。若子宮亦大。上擡橫隔膜。逾於孕婦之子宮。壓肺則妨呼吸而氣促。壓胃則害營養。而血衰。外觀腹壁。亦有腺條。妊娠線也。臍窩外凸。若腫瘤更大。腹部皮膚。枯燥易破。皮下靜脈。條條怒張。可洞見之。間有乳房亦發腫脹。且出初乳一二滴者。病婦因疼痛而不寐。少納。日益羸瘦。形容枯槁。是爲卵巢面貌。至是若尙不處置。荏苒經年。腫瘤往往轉爲惡性。或成惡液質。若腫瘤不幸破裂。成莖蒂捻捩。輒起腹膜炎而死。

診斷 囊腫。非精細診查。萬難確定。而類似之症。又有種種。益不可不鑑別也。第一、臌躁病。婦人之羣。擬腫瘍。施打診法。必發鼓音。一經麻醉。卽消失也。第二、腹水。打診之音。仰臥則前爲鼓音。腹旁爲濁音。倒臥則

上。側。鼓。音。下。側。濁。音。囊。腫。則。身。體。不。論。如。何。位。置。腹。面。皆。呈。濁。音。腹。旁。皆。爲。鼓。音。又。腹。水。腹。面。平。坦。兩。側。凸。隆。囊。腫。則。腹。面。凸。隆。此。特。徵。也。第。三。妊。娠。子。宮。必。有。心。音。覺。胎。動。而。囊。腫。無。之。

治。法。往。昔。治。此。病。者。每。用。鹽。化。金。屬。沃。度。水。銀。諸。藥。劑。與。夫。溫。泉。電。氣。諸。療。法。冀。腫。瘤。之。吸。收。既。乃。知。其。絕。無。效。驗。故。已。廢。而。不。用。今。人。於。腫。瘤。尙。小。之。時。初。無。治。療。之。法。惟。有。嚴。重。攝。生。進。滋。養。物。服。強。壯。劑。以。維。持。其。體。力。外。用。彈。力。性。腹。帶。以。支。持。腫。瘤。之。重。量。及。逐。漸。加。大。充。滿。腹。中。全。腹。膨。亨。一。如。孕。婦。則。非。剖。腹。摘。去。之。不。可。矣。

### 三 卵巢炎

定。義。此。病。自。廣。義。言。之。凡。血。行。及。其。終。局。之。水。腫。出。血。概。括。其。中。自。狹。義。言。之。要。不。外。卵。巢。組。織。之。細。胞。體。因。受。傷。害。而。起。變。化。

病。原。急。性。卵。巢。炎。因。感。冒。產。褥。熱。淋。病。腹。膜。炎。輸。卵。管。炎。子。宮。外。膜。炎。子。宮。內。膜。炎。等。而。發。慢。性。卵。巢。炎。因。經。中。交。媾。房。事。過。度。經。中。感。冒。

白帶下、子宮內膜炎、神經過勞、營養不良等而來。

證候。急性之症候爲該原病之症所掩覆。每不能示其特徵。但於患側發一定之卵巢痛。慢性者亦以疼痛爲主要之症候。降階之際。下樓之時。微搖軀體。痛即隨之。惟種類不同。性質亦殊。或痛如鑽刺。或痛且痙攣。或骨盤深部。純然灼熱。或平時尙輕。直立乃劇。或痛雖缺如。小腹緊滿。或經前脹痛。或經後腹痛。或因交媾而痛。或因壓迫而痛。至不一也。若發炎之卵巢。粘連直腸。則大便秘結。痛苦難忍。粘連膀胱。則小便淋瀝。裏急後重。粘連腹膜。則兩膀疼痛。不能屈曲。諸般症狀。因痛加甚。病婦必少納。不寐。眼現青暈。皮膚蒼白。肢體羸瘦。筋力消失。月經不潮。終身不妊。遂漸由神經衰弱症。而轉爲臟躁症。

經過。非傳染性之卵巢炎。視其病原之性質而異。遲早不一。傳染性者。動經數年。

診斷。診斷卵巢炎。有三大特徵。曰卵巢異常壓痛。曰卵巢增大。曰卵

巢與他臟器粘連是也。治法：急性卵巢炎不問為傳染性非傳染性均應十分安靜臥床。至少須數星期戒房事。通大便。進粉塊狀之食物。除其劇甚之努責。內服：蓖麻油、人工鹽等。輕瀉藥。然蓋雖婦科常用之藥。去其堅硬之糞塊。外施：冷罨灌注。內陰道各種消炎法。促其炎症之吸收。疼痛用嗎啡或阿片等坐藥塞入直腸。慢性卵巢炎之攝生法。一切如前。房事不能禁絕。亦當節減腹部塗沃。丁陰道內塞依比知阿兒綿球行溫坐浴。施灌注法。內陰道因痛失眠。投鎮痛藥。然非用阿片。因易於習慣也。處方：

一 阿片越幾斯 ○○二五至○○五 椰子油 二○

右溶和製成坐藥一個。一日三次。每次一個。塞入直腸一點。

鐘放出 (芙蓉桿) 阿片止痛用之效最勝於

二 依比知阿兒 一○○○ 甘油 一○○○

右調勻。綿花作小球。浸濕。塞陰道內。(臭黑綿球)直腸中塞芙蓉桿時

前陰兼用此綿球則奏功較著急用之

三 磷酸古堉乙涅 ○九 甘草越 甘草末 各等分適宜

右調勻。製丸三十粒。一日三次。每服一粒。(磷古丸)常用如止痛無用

阿片成癮之害慢性用之

四 臭剝 二○ 苦丁 一○ 硫苦 一○○ 餹水 一○

○

右調勻。一日分三次服。(甯神通利飲)硫酸苦土之功與安人

眠流皆宜輕瀉急慢皆宜之

第二節 喇叭管病

一 喇叭管鬼胎

定義。受胎之卵子。不發育於子宮內。而妊娠於子宮外。終成血瘤。是

名鬼胎。一名喇叭管胎囊血腫。

病原。非因喇叭管患有疾病。卽由於先天之畸形。二者必居其一也。證候。一次經淨。病婦或自覺有娠。中經二三月之久。毫無痛苦。或經水又復來潮。而以猛烈之陣痛爲其先兆。經血旺盛。差似血崩。其色暗黑。其性似水中雜塊片。與之俱下。一星期內。反復繼續。此時徵論病婦。卽產婆。醫生。亦無不信爲小產也。當出血之際。投以藥劑。非徒無效。且轉加劇。過此以往。少腹。臀部。先後發痛。病婦至是。方知非孕。亦有經停之後。腹不痛。而迅速。緊張。腹壁脹大。血液滲漏於內。而不流於外。雖號稱多血之婦。竟能於俄頃之間。立轉蒼白。人事不省。脈細如絲。險象之來。迅如奔馬。猛若狂飈。幾令人無從捉摸。幸此種極少。尋常皆慢性耳。診斷。胎囊未破裂之時。症狀至爲隱晦。大半無由發見之。至疼痛出血。乃始顯然。

豫後。大抵凶多吉少。若起內出血。則危險更甚。

治法。病婦一經發覺。立即靜養。行待期治法。避劇甚之動作。禁陰部。

之刺戟使血壓不至昇騰。滲液得以吸收。第一期陣痛出血之時宜用冰囊貼置腹部。第二期痛止血少之時即換用溫水罨法。或行溫坐浴。腹部塗擦沃丁陰道內填塞。依比知阿兒。儒利。設林。綿球。麥角。及希特。拉斯等止血藥。萬萬不可妄用。否則反催進陣痛。使喇叭管收縮。或且起內出血之險症也。慎之。

第三節 子宮病

一 子宮筋腫

定義 腫瘤發於子宮之筋層。謂之子宮筋腫。女子生殖器中。惟子宮筋層生腫瘤者。最易亦最多。曰筋層者。別乎纖維腫。纖維筋腫。肉腫。腺腫。癌腫。上皮腫等而言也。  
病原 原因不能明悉。現今多數學者。咸以為本於遺傳。或因壯年之時。強勉抑制情慾而來。未知孰是。患此者。以四十至五十歲之婦人為最多。

證候。子宮脹大。或前屈。或後屈。月經不調。或則過多。喇叭管閉塞。月經止後。亦時出血。此間質性筋腫也。赤白帶下。屢起陣痛。前逼膀胱。洩溺疼痛。後壓直腸。大便秘結。上迫胸腔。呼吸緊促。下阻血管。腿足浮腫。此漿液膜下性筋腫也。月經困難。赤白帶下。此粘膜下性筋腫也。診斷。不論何種出血疼痛。爲其主徵。要當細心診查之。

豫後。往往變爲惡性。故多不佳。良。

治法。治本之法。不外將腫瘤割去。對症之法。以止血解痛爲要。義內服麥角。及其製劑。外用撒里矢爾酸綿球。或沃度仿謨綿紗填塞。兼以熱水。五攝氏表洗滌陰道。尤妙。若沃度丁幾等腐蝕藥。慎弗濫用也。處方。

一 新鮮麥角 ○五至一○

右研爲末。一日數次。適宜服用。(截紅散)

二 斯智普智珍 ○○五 白糖 ○五

右爲一包。共製十五包。一日四五次。每服一包。（最新止血散）

三 斯智普智珍 一·五 甘草末 甘草羔 各適宜

右調勻。製丸三十粒。一日四五次。每服一粒。（最新止血丸）

二 子宮癌

定。義。女。子。最。易。發。癌。腫。如。胃。癌。乳。癌。陰。道。癌。等。是。也。子。宮。癌。亦。癌。腫。之。一。婦。人。患。此。者。有。三。分。之。一。云。

病。原。遺。傳。病。毒。轉。移。房。事。過。多。等。皆。爲。此。病。之。原。因。多。發。於。四。十。歲。以。上。之。貧。婦。

證。候。子。宮。頸。癌。腫。有。形。似。肉。汁。之。帶。下。奇。臭。不。堪。經。水。不。多。經。前。經。後。因。交。媾。等。事。而。屢。屢。出。血。子。宮。體。癌。腫。出。血。頻。頻。終。洩。敗。膿。或。患。失。血。症。或。成。惡。液。質。子。宮。腔。部。癌。腫。其。初。不。覺。痛。苦。及。後。腰。部。忽。覺。不。適。骨。盤。亦。非。常。壓。重。病。婦。自。以。爲。陷。于。悲。苦。之。境。永。晝。永。夜。了。無。樂。趣。至。

於徹夜不寐。陰部則膿血並下。陣陣惡臭。終至貧血。或發重篤之尿毒症而死。

經過。往往有年餘之久。甚者延至半年。以衰弱而就斃。

診斷。女子自三十以至四十。為最易生癌腫之時代。苟於其時發

見。類似此病之症狀。一己之診斷不足恃。更須就診於名醫。以定治療

之方。針慎勿因循自誤。至於不救。

治法。初時若診查確實。惟有剖腹截去。以絕根株。雖有因奏刀而死

者。百人之中。不過五人耳。倘發見已晚。入於絕望之域。則舍對症治法

外。別無他策。要不過清潔陰部。勵行消毒。防腐之法。平時力避精神。身

體之勞動。常進滋養品。並服強壯藥。以維持其生活。出血。用收斂藥。灌

注。疼痛。投鎮痛藥。失眠。用催眠藥。惡心。嘔吐。吞細冰塊。飲曹達水。杏仁

水等。惡臭。填塞硼酸水。宜加綿球一言以蔽之曰。姑息而已。

處方。

一 鹽莫 〇・一 白糖 三・〇

右研爲散。分作十包。早晚服一包。至二包。  
（無痛散） 疼痛亦用

二 鹽酸歇魯菌 〇・〇 五至 〇・〇 一 乳糖 〇・三

右研和爲一包。頓服。  
（鎮痛散） 功用與無

三 血崩

定。義。血崩者何。子宮出血也。孫思邈所謂崩中漏下。陳自明所謂暴崩下血是也。續續而下。久而不止。故以崩名之。與產後之惡露。平時之赤帶。下有間。病原。產後胞衣不下。子宮收縮不全。子宮發生筋腫。息肉。纖維腫。癌腫。腺腫等腫瘤。子宮實質。或內膜發炎。皆爲血崩之起原。證候。隨各種之病原而不同。故殊無一定。經過豫後亦如之。治法。治其本病。是爲第一。靜養。身體。慎選。飲食。亦不容少忽也。其他。

則下腹施冷罨法。陰道注射白礬水。內服麥角等止血藥處方。

一 麥角末 二〇〇 乳糖 三〇〇

右研爲散。分作十包。每一點鐘服一包。(截紅散)此爲生殖器出血最

普通之藥

二 流動希特拉斯越幾斯 二〇〇

右一日數次。每服二十滴至三十滴。(剪紅飲)服此則免其方

重複也

三 明礬 五〇 餾水 二〇〇〇

右溶和爲注射料。注陰道中。(白礬水)亦有收縮血管之效

四 子宮實質炎

定義。子宮實質者在內膜之外。外膜之內。乃子宮中層固有之筋質也。該筋層發炎。則謂之子宮實質炎。

病原。大都因淋毒自子宮內膜內犯實質而來。或產後罹創傷傳染病而發。此急性症也。慢性者多由於下腹受寒，月經中不善衛生，行房過度，陰陽倒置，濫行手淫等而來。間有爲急性所轉移者。

證候。急性實質炎之證候。子宮腫大。有如手拳。充血色紅。觸之柔軟。初時惡寒發熱。若傷風然。繼則腰腹腹下劇痛。加以微動咳嗽發言噴嚏諸動作。疼痛尤甚。或且放散於腕、肩、股、腿諸部。至於不能屈伸。在經時發病者。月事俄焉中止。數日之後。忽更來潮。或則月經非常增多。慢性實質炎之證候。骨盤壓重。腰腹疼痛。洩惡臭物。雜以血液。成赤帶。下尿意頻數。大便秘結。子宮橫廣。陰門哆開。

診斷。帶下增加。月經過多。或子宮出血。皆其主眼。也可更從而探索之。

治法。急性症以安靜爲主。腰下填枕。高舉骨盤。下腹部施冰罨。法行坐浴。用藥性平和之溶液注陰道中。兼用消毒藥洗滌。疼痛服阿片。莨

若越幾斯等便秘投輕瀉藥慢性症灌注消毒藥外並行局部坐浴  
 湯須攝氏三十四五度之溫度內加鹽白礬皓礬等收斂藥坐浴十分  
 至二十分鐘常常如此久必有效用海水治法亦頗能吸收  
 處方

一 硫苦 二〇〇 苦丁 二〇 餾水 二〇〇〇

右一日六次每次一格二日分 (洋朴硝飲) 此為輕瀉藥  
便秘者用之

二 蓖麻油 二〇〇

右傾浮溫茶面上大口吞服 (潤腸油) 較硫苦尤佳  
惜不易服耳

三 依比知阿兒 羊毛脂 各一〇〇

右調勻製成油狀塗敷下腹部 (止帶膏) 此藥有吸收塗敷出  
物之功故雖塗敷出

腹部亦漸  
能奏效

五 子宮內膜炎

定義 內膜炎與實質相同而又較易尋常婦人多患之

病原。未成年之女兒。每與痘瘡。麻疹。猩紅。熱。諸傳染病同發。已長成之少女。經水初至。不知衛生。誤將污穢之綿塊。紙片。揩拭。污及陰道。不論已嫁未嫁之婦人。妄行手淫。或裸體。宣淫。致下體受寒。或勞動過度。致間接受害。或傳染淋毒。內犯子宮。或胞衣雖下。惡露不淨。皆其原因也。

證候。亦有急慢之別。急性者。惡寒。發熱。頭痛。少納。腰部壓重。又如緊滿。陰部劇痛。宛似陣痛。手壓小腹。頭痛難忍。壓子宮口。頭痛似之。二便困難。帶下奇臭。先稀如水。漸稠似膿。迨諸症減退。即變慢性。帶下全係膿性。月經亦來變化。若更詳細分之。其所現之證候。又各視發炎之部位而殊。在子宮頸部者。除顯呈上述諸症狀外。漏出之物。忽焉暫止。既又如前排泄。其量多而性稀。有時忽帶血色。而成赤白帶下。若當經來始發。則頸部粘膜。必起腫脹。使宮口狹小。或且閉合。致經來異常困難。而呈惡寒。發熱。腹痛。裏急後重。尿意頻數。諸普通症狀。雖微動身體。或

排便、交媾、俱發劇痛。體中之養分，因洩漏多而消耗甚，從而全身衰弱。高年之婦，往往然也。在子宮體部者，痛亦異常猛烈。然一旦出血，痛即大減。下腹知覺過敏，故便溺同起，障害漏出之物，由水變膿，膿血之下也。或與經並至，或經前經後，初無一定。要之內膜發炎，必無受孕之望。一因泌出液體性酸而易撲殺精絲，一因粘膜變化不能粘附卵子，精絲故也。他如在消化器上，則有惡心、嘔吐、噯氣、少食、胃痛、腹脹、便秘諸障害。在神經精神上，則有頭痛、眩暈、悒鬱諸症狀。

豫後 無合併症，則尚佳良。

治法 一切如實質炎、瘀痛、塞綿球、或陰道坐藥處方。

一 荳蔻越幾斯 ○一 椰子油 三〇〇

右溶和，製成陰道綿球十個，每二十四時內，取二個至四個。

塞陰道內(定痛球)

六 子宮外膜炎

定。義。子。宮。外。膜。最。難。發。炎。苟。不。幸。波。及。則。症。亦。最。重。蓋。炎。症。所。至。之。秩。序。先。內。膜。次。實。質。後。乃。及。外。膜。也。婦。人。罹。之。者。幸。尙。不。多。

病。原。大。率。爲。傳。染。性。如。淋。毒。菌。釀。膿。菌。等。蔓。延。子。宮。內。部。則。爲。外。膜。發。炎。之。主。因。

證。候。由。於。釀。膿。菌。者。病。發。必。係。急。性。寒。戰。鬩。牙。體。發。壯。熱。脈。搏。疾。速。頻。頻。嘔。吐。少。腹。裂。痛。滲。漏。之。液。漸。成。膿。性。利。尿。困。難。大。便。秘。結。此。種。屬。腐。敗。性。產。後。陰。部。不。知。清。潔。往。往。患。之。大。都。不。治。由。於。淋。毒。菌。者。病。來。多。爲。慢。性。初。發。之。時。尿。意。頻。數。大。便。秘。結。或。則。泄。瀉。體。溫。如。常。並。無。熱。候。中。經。時。日。前。症。消。散。惟。經。來。及。排。便。交。媾。之。時。少。腹。作。痛。而。已。

豫。後。概。不。佳。良。

治。法。月。經。之。中。妊。娠。之。際。分。娩。之。後。慎。弗。以。不。潔。之。物。送。入。陰。中。一。面。安。靜。身。體。禁。止。交。媾。整。齊。大。便。進。滋。養。物。急。性。症。下。腹。貼。置。冰。囊。內。

服阿片。丁。幾。以。解。其。痛。候。炎。症。消。退。乃。以。微。溫。水。洗。滌。惟。水。中。須。略。加。收。斂。藥。如。硫。酸。亞。鉛。等。塞。入。依。比。知。阿。兒。等。綿。球。內。陰。道。兼。服。輕。瀉。藥。以。通。其。便。慢。性。症。外。行。坐。浴。加。按。摩。內。服。臭。剝。癩。草。丁。幾。等。神。經。藥。貧。血。進。鐵。劑。疼。痛。用。荳。蓉。越。等。

處方

一 依比知阿兒 二〇〇 羊毛脂 二〇〇

右調勻製成油狀綿球飽蘸塞陰道內每日一二次 (臭黑

綿球) 以急性用

二 依比知阿兒 一〇〇 華攝林 一〇〇

右調成軟膏塗敷下腹部 (外消膏) 製法如止帶膏但和藥不  
同且其效用亦異故併存  
之

三 沃度加里 二〇 苦丁 三〇 餹水 二〇〇

右一日六次每次一格二日分沃剝飲 (慢用之)

七 子宮脫

定。義。子。宮。在。生。理。之。位。置。上。爲。骨。盤。底。諸。組。織。緊。密。聯。合。下。爲。陰。道。所。襯。託。相。維。相。繫。萬。無。脫。出。之。理。然。一。旦。以。分。娩。之。故。產。道。大。開。翻。轉。脫。出。將。子。宮。牽。引。相。下。而。骨。盤。底。諸。組。織。復。弛。緩。疏。鬆。無。維。持。子。宮。之。力。乃。至。脫。出。

病。原。多。因。妊。娠。之。中。努。責。過。甚。或。初。次。分。娩。不。守。安。靜。行。房。過。早。或。離。牀。太。促。或。運。動。劇。甚。所。致。貧。家。婦。女。最。多。此。病。不。可。不。防。

證。候。子。宮。挺。出。而。暴。露。陰。門。之。外。愈。垂。愈。下。牽。引。少。腹。壓。重。疼。痛。行。立。兩。難。腰。部。亦。痛。二。便。障。害。孕。婦。患。此。必。至。小。產。產。後。墜。下。終。至。潰。爛。妊。娠。無。望。且。害。消。化。肌。力。消。瘦。體。力。沈。衰。

治。法。孕。婦。有。娠。四。個。月。而。患。此。者。與。雖。脫。出。而。極。輕。者。尚。不。難。整。復。也。偷。脫。至。陰。門。之。外。瞭。然。可。見。則。惟。有。靜。臥。弗。動。嚴。禁。交。媾。力。戒。努。責。通。利。便。溺。臀。下。墊。枕。高。舉。骨。盤。以。消。毒。之。手。指。輕。輕。整。復。外。加。丁。字。帶。


以防脫出。常用潔淨之冷水洗滌外陰部。或以溫水徐徐注陰道內。更進滋養物以強壯體力。若脫出尤甚。速受治於良醫。

八 子宮內翻

定義 子宮底部下降而翻轉於陰道中。謂之子宮內翻。就中尚有二種。子宮底部雖降至陰道中。尙未超過子宮口者。不全內翻也。翻轉之子宮底部。顯露於子宮口外。或且降至陰門外者。全內翻也。

病原 或妄牽臍帶。或臍帶太短。或直立胎下。或不破而胎已產出。或逼出胞衣之法惡劣。皆足使子宮內翻。惟產婦有之。證候 猝然發生者。

第十圖 子宮內翻



(一之分三大然天)

必流血如注。暈厥失神。人事不省。脈搏細數。嘔吐。搖擲。往往不及措手。已溘然長逝。幸而出血漸止。而內翻下降之子宮體。又輒嵌頓陰道之內。不能復舊。寔成壞疽。致發大熱而死。

治法。全內翻症。速取綿紗塊。浸一%列曹仿謨水。蓋覆脫出之部。若見子宮底部。暴露陰門之外。先將兩手消毒。徐徐托住。送入且輕支之。防其再脫。出血甚者。更須將手指十分消毒。輕握翻轉之部。徐徐送入。而整復之。

第四節 月經病

一 痛經

定義。女子一屆成年。卽有月經來潮。乃生殖器成熟之證據。妊娠之媒介也。既生理所固有。自無所謂痛苦。必內生殖器因病充血。或起機械之障。害經血滯鬱。多量。或鬱積於狹小子宮口之後。排出之時。子宮須耗費強大之努責力。以致經來困難。而發疼痛。故自病象言之。又有

月經。疝痛之名。自病變言之。又有月經困難之稱。

病原。因卵巢炎、子宮內膜炎、子宮外膜炎、子宮前屈、子宮頸管狹窄、子宮頸管腫瘍而來。

證候。月經來時。骨盤壓重。薦骨牽掣。腰腹攣痛。波及內股。甚者遠至背部。壓之稍減。或陣陣劇痛。或隱隱鈍痛。或間時而至。或經久不解。或時輕時重。或先痛後行。經來即止。或經至始痛。經前不覺。外此則尿意頻數。利尿困難。嘔氣。嘔吐。有時便秘。患偏頭痛。

治法。第一須探索其本病而解除之。次則力求安靜。謹防興奮。下腹部施溫罨法。或行坐浴。有便秘者宜投輕瀉藥。疼痛下腹部塗敷依比知阿兒軟膏。若痛不稍減。乃進阿片丁。幾鹽酸。古加乙。涅等鎮痙藥處方。

一 歇那設診 ○五

右爲一包。共製四包。一日二次。每次一包。二日分。(如神散)

二 磷酸古堉乙理 一〇〇 乳糖 二〇〇

右研勻分作五包。一日三次。每服一包。(抑氣散)用無效或雖

有效而不著則改此方

三 印度大麻越幾斯 〇・二 白糖 五〇

右研勻爲散。分作十包。每三時服一包。(印麻散)痛之經常

四 加密列花浸 一五〇〇 阿片丁幾 十五滴 薄荷糖漿

一五〇

右調和。每時服一大匙。(二)神湯以此代之亦效

五 海狸丁幾 番木鱉丁幾 各五〇〇

右溶和。一日四次。每服二十滴。於經前八日服起。至經淨止。

(暖宮飲)特效藥

六 流動希特拉斯越幾斯 七〇 苦丁 四〇 餾水 二〇

〇〇

右一日分三次服 (萬全湯) 婦科最善

二月經過多

定義 健康無病之婦人每次經水之量不過二兩半至五兩其有過

於此者則謂之月經過多

病原 慢性便秘營養衰弱脂肪過多精神劇動房事過度及肺癆心

病胃病肝病諸生殖器病如子宮新生物慢性子宮炎等皆其原因也

證候 病初來時腹部雖不覺痛而知覺往往過敏頭痛羞明嫌忌雜

響嗅覺異常及其末也子宮薄而弛緩陰道糜爛頻頻帶下卵巢腫大

時發疼痛血液虧乏面黃似蠟終致全身衰弱成臟躁病

治法 當安身心慎房事忌刺戟物食滋養品進強壯劑下腹貼水囊

或用溫水灌腸陰部灌注明礬等收斂藥或塞沃度仿謨綿球內服止

處方

血藥

一 愛爾柯欽錠 六片

右一日三次。每次一片。二日分。(調經片)此藥較麥角為優。月經過多者服之。

二 臭剝 三〇 依的兒 二〇 苦丁 三〇 餵水 一〇

〇〇

右一日分三次服。(逍遙湯)併服之立疼者

三 無月經

定義。女子及歲。信水不來。張從政所謂月事不來。西醫所謂月經不潮也。成長之後。天癸曾至中道。停閉。儼入老境。李經所謂月事不通。西醫所謂月經閉止也。二者皆包涵之。

病原。有由於先天者。如生殖器閉鎖、子宮畸形、子宮全不發育、卵巢發育不全諸病是。有由於後天者。如萎黃病、貧血、癆瘵、胃病、慢性子宮實質炎是。

證候。期至無經。而頭痛、眩暈、時時耳鳴、心胸苦悶、消化不良、腰部作

痛甚且衄血咯血吐血便血來代償性月經世俗所稱謂倒經者是也。治法養生為第一要義宜用滋養之食物著溫之衣服吸新鮮之空氣營適宜之運動亦操居高燥之房屋通利二便溫摩小腹以溫水常行溫水坐浴或於微溫水中加鹽少許灌注陰部行之既久其效自著。勿藥亦無傷也。惟向有萎黃病貧血癆瘵胃炎後天諸病者須兼服健胃強壯劑。

一 林擒鐵丁幾 六〇 百布聖 二〇 饑水 一〇〇〇

右一日分三次服 (滋血飲) 常服奇效

第二章 外生殖器之疾病

第一節 陰道病

一 陰道癌

定義 陰道癌腫雖為稀有之症然實則不易發見耳非真稀少也。病原 原因與子宮癌同患此者多在三十至四十歲之間。

證候。平時洩膿。如或破壞。乘流粘液。一度行房。後必出血。間或發痛。  
治法。治本之法。同子宮。癌若對症。治法。究不過姑息。

二 陰道排氣響

定義。陰道中之氣體。向外逃竄。隨發一種音響。故名。舊稱陰吹。  
病原。常。人。腸。管。之。中。無。不。有。大。腸。菌。棲。息。其。間。發。生。氣。體。滿。則。排。之。  
放屁。是。也。若。此。腸。菌。侵。入。陰。道。之。中。亦。必。發。生。氣。體。排。泄。生。響。與。腸。無。  
異。金。匱。云。胃。氣。下。泄。陰。吹。而。正。喧。穀。氣。之。實。也。是。誠。盲。談。  
證候。婦人自平臥之位。置。猝。然。變。換。其。軀。體。其。際。陰。道。不。及。十。分。閉。  
緊。空。氣。先。竄。入。既。而。又。逃。出。遂。發。聲。如。放。屁。  
治法。不。必。服。藥。以。小。綿。球。濕。溷。利。設。林。納。陰。門。口。外。加。繃。帶。阻。絕。空。  
氣。自。無。音。響。中。方。猪。油。亂。髮。熬。溶。分。服。豈。惟。毫。無。影。響。而。且。障。害。消。化。  
不可用。

三 陰道閉鎖

定義。陰道為一管狀之器。若前後粘連。或左右粘連。即閉鎖而不通。

有局部閉鎖者。有通體閉鎖者。

病原。或因焮衝而轉變。或為外傷之結果。鮮有屬先天者。

證候。陰道既鎖。月經不潮。陰道開通之上部。或子宮頸管之下部。發

生血瘤。自腹壁。診外觸或直腸。診內觸精細捺之。即觸有柔軟如球之物。上

抵骨盤入口。大小不一。每經四星期。必發痛一次。且便溺俱難。此皆特

異之症候也。其尤顯著者。為不能交媾。

診斷。陰道及外陰部全體。壅塞發生血瘤。不能交媾。故易與他病鑑

別。

豫後。不良。若併發喇叭管血瘤。加重病勢。難免無腹膜炎之危險。故

不可輕視。

治法。是惟有乞婦人科醫生。進以刀圭。乃得達治愈之目的。

#### 四 無陰道

定義。女子之生殖器尿道。在上。陰道在下。既不交通。亦不假借。若其

尿道之下。廣部尙存。有寬廣之泌尿。生殖。竇未會分裂。則尿道與直腸之間。無發生陰道之餘地。而此寬廣之尿道口。又有酷肖處女膜之粘膜。爲之隄防。

病原。此爲先天畸形。決無有來自後天者。

證候。少小之時。尙屬疑似。及其成長。臀部豐大。乳房圓滿。種種女子

之特質。無不十分發育。獨外陰部無陰道口。但見尿道口廣大。哆開。月

經不潮。或來倒經。其月經不下。行而上。行如或來。衄血。或自交媾之時。陰

莖每誤入尿道口。強行摩擦。且不能深入。故男女皆不起快美。因之抑

鬱寡歡。甚且反目。終陷於悲慘之地。今世所謂石女。即此也。

治法。陰道口雖有。而陷太深。不與尿道口並行者。能向下緩緩交

媾。久之亦能完全達其目的。曩者德國嘉爾醫生。治一病婦。囑其常常

交媾。年餘之久。竟得如願。此明徵也。若陰道口全然缺。如則宜由婦人

科專門醫生。於直腸膀胱之間。造一人工陰道。

五 鎖陰

定義。女子之陰道中空如一圓管。既如前所述矣。陰道口有筋約束之。謂之括約筋。又有膜一層隔之。謂之處女膜。此外尚有肛門舉筋。肛門括約筋。與男子交媾之時。皆能起收縮之作用。增進快美之意。味然設處女膜生來堅厚。或初次交媾。狂暴躁進。或男陰偉大。鑿柄難容。處女膜之知覺太銳。受男陰之刺戟。衝突立即反射。而諸筋。瘳。攣。陰莖。遂愈不能入。不啻丸泥之封函谷也。故曰鎖陰。學語稱曰腔瘳。

病原。見定義中。不贅述。惟初婚之婦有之。

證候。一觸龜頭。立即疼痛。鎖眉結舌。婉言求免。若強行交媾。則兩腿震動。盡力堅拒。宛轉呼號。繼之以泣。故事後。每有臥牀不起者。觸以手指。痛亦如之。避之惟恐不速。病婦設不解。所以振其勇氣。自以手指伸入探之。即可觸得陰道括約筋十分收縮。又令他人窺視肛門。亦得見該處括約筋十分收縮。

診斷。以手指伸入陰門口。試行內診。或即在陰部外。試行觸診。可以定之。若但據彼青年夫婦不能交媾之陳訴。尙未可遽指爲此病。何則。因男子無經驗者。不知交媾之方法。往往不能達其目的也。又男子有輕微之陰萎症者。亦或如此。

治法。輕症須知交媾之方法。婦人臀下用薄枕墊高。男子則於陰莖薄塗脂肪。緩緩插入。當可奏效。處女膜之知覺過於銳敏者。可先塗古加乙。俾水然後插入。陰莖數次之後。亦得如願。或用嗎啡、荳蓉等坐藥。塞入陰門。或行微溫坐浴。或以苦扁桃水、亞麻仁煎等和入微溫水中。常灌注陰道內。兼調順大便。定有驗也。

六 陰道炎

病原。尋常多由於淋毒傳染而來。否則因濫行手淫。或因經來時。以敵絮、故紙等不潔物充填陰門之內。或因子宮內膜炎之帶下。或因強姦、感冒、房勞、蟻蟲寄生等事故。亦皆能刺戟而使之發炎。

證候。亦有急慢二種。急性者。初起之時。先發微癢。或覺快美。引動春思。不得已。時以手指摩擦。未幾。惡寒發熱。尿意頻數。交接排便。亦皆障害。泄漏粘液。症狀加重。又未幾。粘膜變紅。腫脹隆起。觸以指頭。痛不可耐。上皮剝脫。粘液變膿。數星期後。腫痛俱退。此時如不善保養。急於好合。症狀勢必復劇。或則轉爲慢性。雖無自覺之症狀。而經前經後。帶下加多。血液薄弱。大便秘結。食慾不振。交媾不快。甚且陰道變爲狹小。粘膜肥厚而乾燥。

治法。一切衛生治療之法。概如子宮實質炎。子宮內膜炎。急性。嚴禁交媾。安心靜養。忌酒類辛辣等飲食物。用冷罨法。或以冷水灌注陰道。體發熱候。兼進酸性飲料。慢性。陰道內灌注收斂藥。或塞沃度仿。謨坐藥。或塞藥液。綿球對於全身。則服肝油。規尼。涅等強壯藥。灌注藥水。所用之器。卽稱灌注器。俗名白帶筒。係玻璃製成。外有金屬所製之架。托之有掛於壁間者。有懸於空中者。上覆木蓋。底部有孔。孔之外突。

出。一。嘴。橡。皮。管。附。焉。管。之。他。端。綴。一。嘴。管。嘴。管。大。半。為。黑。色。硬。橡。皮。所。成。長。二。寸。半。內。外。微。彎。曲。嘴。管。之。根。部。更。具。一。活。塞。開。則。筒。中。藥。液。自。橡。皮。管。中。汨。汨。而。來。閉。則。水。流。立。止。嘴。管。與。活。塞。之。部。各。分。二。截。可。裝。可。卸。但。此。項。嘴。管。於。消。毒。尚。嫌。不。能。充。足。其。最。可。恃。者。究。不。如。用。玻。璃。所。製。者。灌。注。既。終。隨。將。此。嘴。管。插。於。盛。有。火。酒。之。玻。璃。器。中。免。其。沾。污。嘴。管。插。入。陰。門。約。以。寸。半。為。度。再。進。恐。損。傷。子。宮。過。淺。恐。藥。液。不。及。皆。屬。不。宜。西。洋。婦。女。幾。皆。有。此。器。且。善。自。用。然。在。我。國。婦。人。向。來。未。曾。習。見。遑。論。使。用。之。法。無。已。不。如。由。其。夫。處。置。之。為。愈。也。

七 白帶下

定。義。以。病。象。言。之。謂。之。白。帶。下。以。病。變。言。之。謂。之。子。宮。陰。道。炎。蓋。白。帶。下。者。實。即。子。宮。陰。道。炎。之。一。症。也。以。屬。主。要。故。特。論。之。

病。原。除。後。天。種。種。之。原。因。外。尚。有。本。諸。先。天。者。如。彼。瘰。癧。性。體。質。之。少。女。常。患。帶。下。者。是。學。語。謂。之。腺。病。性。腔。加。答。兒。

證候。不論經前經後。常有似水似膿之液體。自陰道口洩出。其色或白或黃。其質或稀或稠。其量或多或少。時時浸潤外陰部。故外陰部每發惡臭。甚且濕及兩股。致生濕疹而發癢。全身倦怠。食慾不振。媾合不歡。孕育絕望。

治法。有全身局所二種。全身治法。慎擇易消化之滋養物。服健胃。強壯藥。局所治法。用防腐藥。殺菌藥。收斂藥等。視病情之如何而斟酌。加減尋常應用最多者。防腐藥中。莫如硼酸水。殺菌藥中。莫如蛋白化銀水。收斂藥中。莫如皓礬水。及明礬水。

一 硼酸 五〇 餾水 二〇〇〇

右溶和爲防腐料。洗滌陰道。(硼水)

二 粗製明礬 一〇〇 餾水 五〇〇〇

右溶和爲灌注料。注陰道內。(白礬水) 性能抑制滲漏。故頗著效。

三 硫酸亞鉛 二〇〇 饋水 二〇〇〇

右溶和為灌注料注陰道內 (神功水) 此藥之功與白礬水相伯仲白

八 陰道脫

定義 陰道四面擴張之力微弱致倒垂而脫於陰門之外謂之陰道

脫中名翻花其理與子宮脫相同

病原 此病多起於子宮後屈之後於產婦恒見之

證候 陰門外有物挺出厥狀如茄便旋困難行動障礙脫下之部往

往糜爛

診斷 當與子宮脫鑑別較大者子宮也否則為陰道

治法 首禁房事戒行動安靜身體攝養精神脫出不甚者可以手整

復其位置但須先用二%石炭酸水消毒其手否則恐汚及脫出部來

發炎之虞也其屢屢脫出者下體宜常常溫暖陰部常覆法蘭絨或綿

花等外加丁字帶以保持之弗使受冷兼行溫浴服與奮藥

九 陰道異物

病原。種種不一。有由於手淫者。如寡婦及中年之婦人。以蘿蔔、芋頭、雞蛋、橘子、人工陰莖等物。塞陰道中。抽送以圖快樂。迨甜美之極。骨盤底諸筋忽然收縮。此等異物。竄入深部。遂致無法取出。有由於玩弄者。如小女兒。知識未開。戲以豆類、棋子、玩具等物。塞入陰中。以爲笑樂。偶爾脫手。遽即逸入。有由於治療者。如醫家以綿花、綿紗、海綿等異物。塞入子宮頸管。及後不能盡出。有由於防經者。如成長婦人。於月經來時。每以紙片、綿花、布塊等抵塞陰中。一經破碎。遂致遺留於內。有由於竊盜者。如傭婦竊取主人。或他人之戒指、金表、銀洋等寶貴物。藏匿陰中。以免敗露。事後遂不能取出。有由於寄生蟲者。如肛門內之蟻蟲。匍匐而更寄生於陰道內。

證候。一視該異物之形狀。大小長短。軟硬。而發現輕重不等之症狀。或漏粘液。或洩漿液。或流膿液。其局部組織。則或發炎症。或變潰瘍。或

成壞疽。陰道瘰癧。月經困難。疼痛便秘。終且誘發神經症狀。  
治法。是必請婦人科醫生用陰道鏡。或子宮鏡。插入檢視。妥為除去。  
乃可常。人不能也。

十 陰道乾燥

定義。婦人陰道中本有一種液體。名腔液者。供交媾時滑澤。陰道之用。俗所謂淫津是也。該液泌出如少。即覺枯燥無味。

病原。有神經衰弱之症。或患慢淋。皆能使腔液缺少。

證候。平時尚不甚覺。一遇交媾。陰莖之控縱。既不能如志。在婦人亦

自覺內腔瀟滯。久久尚無興味。因之春情漸淡。厭倦肉體之戀愛。

豫後。看似微疴。實則影響於妊娠者甚大。亦可漠然置之。

治法。法當自強壯身體。入手如食滋養物。服強壯藥是也。不此之圖。

而但於臨事。注粘滑液。如護等未或甘油少許。雖便宜。一時究不足以

善其後也。

第二節 巴爾氏腺病

一 巴爾氏腺炎

定義。巴爾氏腺。爲複管狀腺體。在陰道口之兩旁。本不易發生炎症。必外而陰唇。內而陰道。上而尿道。發炎於前。乃波及之。病原。淋毒傳染。是其主因。證候。巴爾氏腺體部。先發生小紅點。無何粘液。膿液。充積其間。試以拇指與食指。擠擦該腺之開口部。卽有膿水洩出。然已尙不甚覺也。又無何。腺體亦漸化膿。於是體來微熱。腺部紅腫。灼熱疼痛。膿益加多。突陰道口而外出。異常惡臭。必該腺全部化膿。而後中止。經過。少者數月。遲則年餘。治法。初期症狀輕微者。可撒布。堽魯瑪德兒。外覆綿花。加丁字帶。急性病勢。猛進者。速安臥。撥開陰唇。發露兩腺部。綿紗浸冷水。冷罨之。俟紅腫稍退。乃撒布。堽魯瑪德兒。或沃度。仿謨等。若全體化膿。用消毒藥。

洗滌用殺菌藥收斂藥灌注俱如治子宮陰道炎之法治之或撒布甘  
汞末和甘汞一分須亦妙

第三節 陰核病

一 陰核肥大

定義 生殖器發育完全之女子其陰核大僅如豆有大於此者則以  
陰核肥大名之

病原 由於先天者為畸形之一種由於後天者多係濫行手淫所致  
證候 妙齡處女標梅愈期思春不得聊以手指撫摩陰核為望梅止  
渴之計或則兩女偎抱聳陰相擦磨鏡以逞淫樂始尙偶爾一試後乃  
朝夕為之陰核以頻受刺戟勃起肥大不克復其故常雖間為衣禪所  
觸淫興便即大發故有夫者必且且獻身求歡無偶者必皇皇求牡野  
合苟或不遂強忍欲死成色情狂病症禍患所及勢必損傷陰部妨害  
孕育

治法務當約束身心屏除非禮寢不尸以避接觸與必蚤以遏亂萌呼吸新鮮之空氣營爲規定之動作攝取滋養之食餌施行局部之冷浴則庶乎其有效矣

## 二 陰核癌

定義 與子宮陰道發生之癌初無二致

病原 有單純發生者有自內生殖器蔓延而來者亦以老婦爲最多  
證候 先是陰部發一種至不堪受之煩癢未幾即於該處生疼痛性之硬核來白帶下或流血液陰核部續患扁平之小腫物表面狀如粟粒色作黃赤兩股間之鼠蹊腺亦起硬塊大擬蠶豆  
治法 惟有割除一法其實有不能奏刀之勢者務必十分清潔力囑病婦平臥弗輕離牀常行坐浴果成潰瘍則以乾燥爲貴宜撒布垓魯瑪德兒或沃度仿謨末等

## 第四節 陰唇病

### 一 陰門癌

病原。陰門癌每與陰核癌同時並發。其性最惡。證候。與陰核癌無殊。若潰瘍廣大。洩必灼痛。且漏血水。迨後更來特發之疼痛。治法。依據陰核癌治法處置之。

### 二 陰門囊腫

定義。陰門囊腫。多自巴爾氏腺發生。蓋巴爾氏腺之排泄管。忽然狹窄。否則壅塞。分泌之物。停滯其中。腺體脹大而成。一似囊之巨胞。故名病原。巴爾氏腺傳染淋毒。發生炎症。遂變囊腫。方醫所謂陰挺。陰疝。陰中生核。卽此也。證候。忽然小陰唇內約三分之一所在。生一腫瘤。初起纔如蠶豆。既乃漸次長大。竟有大如人頭。龐然下垂於兩股間者。陰門爲所掩覆。無論放尿。交媾。行動。並來障害。初起之時。但癢不痛。不久卽浸潤周圍。頽

敗而發特異之惡臭。同時白帶增多。異常不適。  
治法。除割開外亦無其他妙法。惟有請婦人科醫生堅決爲之。

### 三 陰門炎

定義。女子之陰門炎。相當於男子之龜頭淋。單獨發生者極少。多與尿道或其他之部先後發生。

病原。以淋毒之傳染爲主。但是否由於有毒膿液之刺戟而來。尙不可知。惟在小兒。乃有純真之原發性淋毒陰門炎。他如陰部不潔。白帶下。子宮炎。尿道瘻。直腸瘻。外傷。手淫。房事過度。腺病。糖尿病等。亦間有之。

證候。急性陰門炎。先覺發癢。灼熱。繼則發痛。放尿之時。行動之際。疼痛愈劇。湧出多量惡臭之膿。檢視陰部。則見大陰唇紅腫。灼熱。濕潤。糜爛。污膿覆之。邊緣乾而生痂。陰毛因而膠粘。同時小陰唇。陰核。前庭諸部。亦皆發炎。巴爾氏腺之排泄管口。與其濾胞。又殊紅腫。稍稍隆起。此

時不治。每成慢性。慢性陰門炎。漏液加多。時發微癢。陰唇肥厚。變灰黃色。或則專侵粘液腺。粘膜下發生細核。常出少許之膿液。或粘液。其覆於上面之粘膜。亦輒發紅。

診斷。陰門炎之診斷。不難。以其證候顯然。一見自明也。所難者。是否爲淋毒性耳。女兒患此。雖知其爲原發。然非明證。淋菌終難確定。若在成人。當陰門發炎之時。尿道、陰道、子宮、頸管諸部亦罹同病者。淋毒性也。但有陰門炎。而其他諸部健全如常者。非淋毒性也。

治法。急性症。宜行微溫坐浴。或用鉛水。施冷罨法。陰唇內宜常填塞綿花。防患部之接觸。便膿液之吸收。俟炎症消退。隨用收斂藥。促其治愈。所謂收斂藥者。仍不外○五至一○%之皓礬、明礬水。是也。炎症僅限於大陰唇間者。宜先用稍強之石炭酸水洗滌。消毒。續用○五至四○%之硝酸銀水塗於患部。一分鐘後。迅即用鹽水洗去。而覆以乾綿花。慢性症之尙有限。局竈。或濾胞化膿者。宜塗十倍水藥。十分至五倍。

藥五分。濃厚之。硝酸銀水。或過格魯兒。鐵液。以腐蝕之。然此方亦僅指病在大陰唇間者而言。若內犯深部甯改用前述之收斂藥較爲穩妥。毋孟浪以招害也。

#### 四 陰門象皮病

定義。大小陰唇及陰核之角質層變爲肥大。皮膚及皮膚結締織之圓形細胞同時浸潤。淋巴管擴張而漏出淋巴液。遂完全成立此病。病原。熱帶地方有一種絲狀蟲。喜寄生四肢之淋巴管中。壅滯淋巴管。使不得通暢。卽致此病。其因丹毒、梅毒、淋病等。傳毒於淋巴管。或鼠蹊腺。使先化膿而後崩壞。終亦有成此病者。尋常多生於二十歲以上。四十歲以下之婦人。

證候。生於大陰唇。則兩面肥厚。凹凸不平。有如象皮。發育盛者。其量頗重。可下垂至兩股間。生於小陰唇。則兩唇披離。兼生平坦之潰瘍。陰道口暴露於外。厚皮環之。每逢月事。必發疼痛。二便來時。亦殊苦悶。陰

部。罹此惡疾。全身因而異常。

診斷。與象皮病疑似之症。祇侵蝕性潰瘍一種。乍觀極似。細視迥別。何則。以潰瘍破爛甚而腫脹微。此病則腫脹甚而破爛微。二者適成反比例。故不難鑑定之。

治法。非割除不爲功。藥物無益也。

### 五 軟下疳


定義。與男子所患者無異。其種類頗多。有慢性潰瘍、弛緩性潰瘍、隆起性潰瘍、蠶食性潰瘍、蛇行性潰瘍等。

病原。一種傳染病。毒爲惟一之原因。多發於大陰唇之後繫帶。小陰唇、陰核次之。

證候。初生之時。外觀如癩。漸次加大。平時痛尙不著。運動及加以壓迫。則痛加劇。既而一旦破潰。成噴火孔之深潰瘍。或正圓。或橢圓。形狀不一。周緣形似鋸齒。底面附有猪油狀污物。大陰唇非常浮腫。其發於

第二十圖

小陰唇象皮病



動。小陰唇及陰核者。腫脹亦甚。同時少腹兩旁發生橫痃。堅硬而不能移。

經過。苟能清潔。處置大約四星期至六星期。或可治愈。若污穢不治。

或用藥。失當或種種刺戟。則尙須延長。

診斷。此病與侵蝕性潰瘍尤易混淆。然試內服沃度劑。外用水銀劑。

治法。一切與男子同。

六 硬下疳

病原。因與患者梅毒之男子交媾而得之。大小陰唇發生最多。子宮及陰道較少。


證候。大陰唇生之。則全部浮腫。按之頗硬。指觸內面更有硬塊。皮膚

變紅褐色。微帶光澤。小陰唇生之。則起限局性之硬塊。一如生於男子之包皮者然。餘參看男子部。

經過細小之硬塊約三四星期可以全治其大者雖至發全身梅毒之時尙未消散當非經數月之久不治也平均則約五六星期迨見有肉芽面覆之乃知治愈之期不遠矣

診斷第一與軟下疳之鑑別軟下疳潛伏期長平均交媾之後可隱伏二十日之久無硬塊有膿泡且甚多潰瘍之周緣不正潰瘍深底面有似猪油之不潔物壓之卽痛無全身症此病之潛伏期通常不過三日有硬塊無膿泡僅漏漿液潰瘍之周緣扁平或微隆起底面色紅帶光澤現極小之顆粒壓之不痛多續發全身症第二與陰部泡疹之鑑別專發於小陰唇他部不波及必發灼熱覺癢現潮紅成水泡無硬塊數日卽愈此病不熱不癢不紅有硬塊無水泡多時不治第三與癌腫之鑑別癌腫專發於老婦潰瘍周緣隆起若隄防底面不平滑似絨毛侵蝕極深且不規則附近之淋巴腺久之始腫脹非去其全部必不治此病專發於壯年潰瘍之周緣非隄狀底面現極小之顆粒硬塊

第三十圖  
陰門侵蝕性潰瘍



不。及。於。深。部。淋。巴。腺。之。腫。脹。幾。於。同。時。並。發。治。之。適。當。潰。瘍。即。愈。有。此。種。種。特。點。自。能。如。掌。上。觀。紋。豫。後。此。不。過。爲。梅。毒。初。期。之。症。候。對。於。局。部。豫。後。固。良。然。終。必。續。發。全。身。症。又。其。變。壞。疽。者。往。往。爲。全。身。衰。弱。之。原。因。

治。法。

見。男。子。部。不。贅。述。

### 七 陰門侵蝕性潰瘍

定。義。與。象。皮。病。同。一。階。級。常。與。直。腸。狹。窄。合。併。而。來。

病。原。

淋。巴。液。鬱。滯。實。其。主。要。之。病。原。有。梅。毒。與。非。梅。毒。之。別。舟。狀。窩。

最。多。

陰。唇。間。及。尿。道。口。亦。有。之。

證。候。

潰。瘍。愈。犯。愈。深。竟。有。穿。孔。之。情。勢。惟。蔓。延。極。緩。周。緣。及。底。部。皆。

緊。張。有。光。儼。如。水。腫。硬。若。猪。油。外。陰。部。破。潰。之。面。積。頗。爲。廣。大。如。或。交。媾。必。破。裂。見。血。每。遇。放。尿。必。灼。熱。疼。痛。若。前。襲。膀。胱。則。膀。胱。成。洞。後。侵。直。腸。則。直。腸。成。管。

經過。無治愈之望。

診斷。雖成潰瘍。而又增殖不已。且狀若水腫。此其特異之處也。軟硬。

下疳。決無之。

治法。或撒布列曹爾珍末。或應用格魯謨酸。一時雖有腐蝕之效力。終不能冀其全治也。

八 陰門狼瘡

病原。此因結核侵入陰門之皮

膚而發。但不甚多耳。

證候。大小陰唇之皮膚粘膜俱

各崩壞。增殖若干細核而成狼瘡。

內則波及陰核。與陰道口。下則蔓

延會陰部。濕潤之漿液。沾污兩股


間。及臀部。大腿。久之。遂生狀若光

第 陰

十 門

四 狼

圖 瘡



芒之癢痕。

豫後延遷難治且能蔓延。

治法。是惟有受治於醫家用刺針搔爬烙鐵剪割諸法以絕其根株。

九 陰門癢

病原。手淫白帶下妊娠寄生蟻蟲貧血糖尿病淋病梅毒等膿液汚

染皆是。多發於二十歲前後之處女或少婦。

證候。大小陰唇及陰道口諸部奇癢不堪挑撥淫心夜則輾轉牀褥

日則狂奔庭室如堤之決弗克自制不遂所欲殆必發癩故雖圍人走

卒亦往往強與之歡穢德彰聞在所弗恤其尙知保全名譽者則汲汲

以手淫解其困苦久之陰門灼熱腫起濕潤糜爛兼有放尿困難之症

治法。當先探其原因之所在分別治之。本病如愈癢症自瘥由於貧

血者須服鐵劑或臭素劑用微溫水坐浴一日二次外用左方

處方。

一 石炭酸 三〇 餾水 一〇〇〇

右溶和綿花浸濕。罨覆患部。(制淫液)

二 硝酸銀 一〇 餾水 三〇〇

右溶和淨毛筆濡之塗上。(硝酸水)此水較前方猛烈宜慎之

三 鹽酸古加乙涅 〇・一五 薄荷腦 一〇 橄欖油 二〇

羊毛脂 三八〇

右調勻製成軟膏塗敷患部。(貞女膏)

四 石炭酸 純酒精 各一〇〇

右溶和塗敷患部。(脫胎液)頑固難治之癩症每隔六日或擦後隨用下方

用下方

五 華攝林軟膏 五〇〇 亞鉛華 鯨蠟 各三〇

右調勻製成軟膏塗敷患部。(再生膏)已用脫胎液者必須須用此方

十 陰陽體

定。義。非男非女。亦男亦女。曰陰陽體。南中方言曰雌婆雄。  
證。候。陰陽體之女子。其下尿道破裂。尿道與陰道間並無障隔。尿道  
之上部極短。儼似陰道。陰核後端披裂。有生殖突起。固有之原型。陰核  
肥大。稍稍突出。大陰唇外。暹肖龜頭。故在無識者視之。輒誤以在上之  
尿道爲陰道。以在下之陰核爲縮入之龜頭。以大陰唇爲伸縮自在之  
陰囊。以舉丸爲深藏不露。惟其容體尙不近似男子。一旦結禱。乃忽反  
陽爲陰。棄室人而外求情。夫陰陽體之男子。其下尿道破裂。開口於龜  
頭之下。小便精液。皆自尿道流出。儼似陰道。陰莖短小。龜頭游離。而無  
孔。暹肖陰核。有陰囊。無舉丸。兩乳高聳。宛然女子。故在無識者視之。輒  
誤以在下之尿道爲陰道。以在上之龜頭爲肥大之陰核。以陰囊爲無  
獨有偶之。大陰唇且其性質亦暗合女子。故無有疑爲男子者。少小命  
以女名。長大卽爲相攸。及旣遣嫁。忽焉顛鸞倒鳳。舍其夫而惟牝是求。  
此等鐵鑄大錯之事。所在都有。自來有牧民之責者。往往目爲人妖。又

以。其。有。犯。姦。之。嫌。疑。故。一。經。逮。案。無。不。立。予。杖。斂。謂。維。持。風。化。也。不。知。陰。陽。體。不。過。生。殖。器。之。畸。形。構。造。雖。反。乎。經。常。性。能。固。絕。未。謬。誤。易。男。而。女。咎。在。父。母。雌。雄。撲。朔。已。豈。知。情。犯。姦。有。據。重。檢。查。拘。罰。為。應。受。常。刑。杖。斂。非。人。道。主。義。深。願。後。之。有。司。旁。通。生。理。兼。習。法。醫。毋。徒。以。察。為。明。也。因。述。證。候。併。論。及。之。

十一 陰門白癬

病。原。有。人。謂。係。皮。膚。營。養。不。足。所。致。是。否。尙。難。決。定。

證。候。大。陰。唇。之。兩。面。同。時。發。癢。抑。之。不。止。搔。之。落。屑。皮。現。白。色。枯。而

不。濕。有。時。且。延。及。兩。股。

治。法。可。先。浴。淨。取。肝。油。橄。欖。油。扁。桃。油。胡。麻。油。等。注。白。癬。面。令。其。濕。

潤。以。細。毛。刷。摩。擦。之。或。以。吳。亞。末。拌。華。攝。林。製。成。軟。膏。塗。敷。患。部。俱。有。

奇。效。塗。搽。綠。石。鹼。溶。液。治。愈。亦。速。

十二 陰門惡臭

定義。女子生殖器中。有巴爾氏腺者。常泌出一種灰白色液體。具特異之臭。此人人皆然也。此液體。泌出過多。則惡臭特甚。

病原。大都皆不潔所致。其因患子宮內膜炎。子宮實質炎。子宮癌。陰道炎諸症而來惡臭者。則與巴爾氏腺之液體無關。

治法。宜用微溫水。或五十倍硼酸水。洗滌陰部。一日數次。自愈。如仍無效。以檫皮。水。楊皮。茶葉等煎湯洗之。則無不治矣。

### 十三 尿道淋

定義。女子之尿道。較男子短。而帶直。構造亦簡單。故病發略輕。然犯之最易。且易進而波及膀胱焉。

病原。與男子同。

證候。急性尿道淋。多發於感染之二日至六日後。全身小有不適。惡寒。微熱。同時每遇便旋。必覺尿道內稍熱。兼覺微癢。又似蟻行。尿意頻數。三四日後。尿道口紅腫。以指入陰道中。向上沿尿道觸之。即探得一

較硬之條。按之發痛。並有性似漿液之物。由尿道內泄出。又七八日。洩出愈多。且加濃厚。純然膿液。此時試分溺兩杯。以檢視之。第一杯之尿。必混濁。第二杯之尿。必澄清。若見第二杯之尿。亦混濁。則爲併發膀胱炎。無疑。約經三星期之久。前症陸續消退。遂移於慢性症。慢性尿道炎。但有他覺之症狀。而無自覺之症狀。尿道口粘膜。現青蒼色。試忍溺數小時之久。以手指當尿道口。由後向前按之。卽有稀薄似乳之膿水少許。擠出。拭淨陰門。放尿檢視。則見尿仍混濁。或交淋絲。若更侵及尿道。及尿道口之濾胞。及細胞之尿道口最多。卽造成小硬核。而患濾胞炎。此小硬核。觸之則痛。將來或吸收。或化膿。俱不一定。不幸化膿。尿道與前庭間。必穿一孔。或尿道與陰道間。洞穿成孔。

經過。急性症。大約三星期。慢性症。無定期。

診斷。急慢之鑑別。以檢尿定之。已如前述。與膀胱炎之鑑別。亦以檢尿爲確。與濾胞炎之鑑別。在於排膿。放尿之後。按尿道兩側。有膿排出。

者。瀘。胞。炎。也。瀘。胞。排。膿。之。後。仍。有。膿。自。尿。道。出。或。放。尿。混。濁。交。雜。淋。絲。  
 者。尿。道。淋。也。  
 豫。後。於。生。命。固。無。妨。害。然。往。往。蔓。延。生。殖。器。全。部。荏。苒。不。治。終。致。奪。  
 身。體。之。健。康。失。家。庭。之。幸。福。  
 治。法。養。生。治。療。之。法。一。切。無。異。男。子。內。服。外。用。之。藥。亦。可。無。須。更。張。  
 惟。內。服。藥。中。應。兼。用。鐵。劑。規。那。丁。幾。規。那。皮。等。強。壯。藥。防。身。體。之。衰。弱。  
 又。注。射。尿。道。宜。特。別。注。意。注。射。尿。道。之。法。當。先。令。病。婦。放。尿。即。以。男。子。  
 用。之。尿。道。注。射。器。吸。滿。消。毒。液。之。類。酸。水。以。左。手。指。尖。向。陰。核。之。直。下。陰。  
 道。口。之。上。端。徐。徐。撥。開。尿。道。將。注。射。器。之。尖。端。插。入。一。半。緩。緩。注。入。藥。  
 液。以。洗。滌。之。洗。滌。既。終。再。注。射。殺。菌。收。斂。諸。種。藥。液。如。在。慢。性。注。射。又。  
 須。稍。進。不。然。效。力。不。及。也。偷。淋。毒。侵。及。陰。道。併。發。子。宮。內。膜。炎。陰。道。炎。  
 諸。症。則。宜。改。用。婦。人。用。之。玻。璃。注。射。器。係。此。器。之。共。端。插。入。陰。道。約。寸。半。  
 內。外。注。射。藥。液。若。即。以。男。子。用。之。注。射。器。代。之。祇。可。插。入。尖。端。之。細。部。

分。且須輕須緩。注射所用之力亦準。此餘參看男子部。

十四 尿道脫

定義。尿道之前壁固定於恥骨縫際部絕無移動之虞。然尿道如果發炎日久粘膜疏鬆則溺時竟能脫下。但亦不過脫離其一部或墜落其一圈無全管俱脫者。

病原。患膀胱炎、膀胱結石諸症。尿道每因起痙攣而脫下。娼妓及多產婦有之。

證候。前庭之下部突然挺出一物。大如雞卵。形若半月。色作暗紅。腫物上有交通尿道之孔。脫出一圈者。該孔在中央。脫出一部者。該孔在

一隅。

診斷。與子宮脫陰道脫之鑑別可依其脫出之所在而定之。

治法。初脫之時迅速還納。並塞收斂性坐藥。立效。其經久者與雖還納而仍脫出者皆非專門醫生不為功。當就而診治之。

第五節 其他諸病

一 陰道鎖肛

定義 腸與陰道共開一口。成一總溝。肛門向外之一面。閉鎖不開。反內向陰道開口。故又有陰道肛門之稱。

病原 此先天之畸形也。

證候 無肛門而開口於陰道內者。當時無危險之症狀。故往往不覺。至發育完全之後。始發見之。大便失禁。排自陰道。屁亦出焉。譬猶連珠。無可力制。

治法 當請專家。施以刀圭。別造肛門。縫合內口。不可放置。爲終身之累也。

二 會陰破裂

定義 肛門陰門之間。肌肉生焉。厥名會陰。障而不通。所以界前後也。因故破裂。即不能保障矣。中有全破裂。與不全破裂之別。

病原。婦人多基於分娩。室女則由於強姦。證候。不全之會陰破裂者。當用力努責之時。每自覺該部有物下墜。又若陰唇間有物脫落。陰道後部粘膜垂而向外。因濕潤而極不遂意。常誤認爲白帶下。肛門周圍長此浸潤。知覺既已過敏。兼受衣褲之摩擦。終糜爛而成潰瘍。其破裂之盡處。稍稍結生癢痕。此癢痕部。時覺快美。有似交媾時覺痛楚。無可名狀。百感交集。因苦生悲。又交媾之際。大便之時。微經努責。癢痕再綻。每一便旋。灼痛異常。自疑爲膀胱炎。更有一種特殊之症狀。則排氣響是也。動作營爲之下。稠人廣衆之前。皆有聲嘖嘖。貽笑羣倫。其理與陰道排氣響無異。惟部位不同耳。陰道後部粘膜。寬弛無力。故交媾。輒不歡。而散終至。秋扇捐棄。完全之會陰破裂者。糞無軟硬。一至直腸。毫無滯機。放屁亦然。竟有俗所謂屁屎直流之情況。蓋肛門括約筋之功能。全然消失。故至此也。終至消化異常障礙。全身因而衰弱。

治法 治此後天畸形之方法亦惟有乞諸良醫之手。

### 三 流產

定義 婦人自妊娠至分娩平均須二百九十日此通例也不滿七月而即分娩者謂之早產不滿二十八個星期而即分娩者謂之流產俗稱小產又名滑胎是也與早產顯有區別。

病原 流產之原因有種種一爲胎兒死亡如兒體傳染梅毒痘瘡母體有窒息高熱血壓低降諸症胎兒畸形臍帶異常胎盤疾病子宮內膜炎卵及卵膜變異等皆足使胎兒死亡而流產也二爲母體疾病如子宮後屈子宮及卵巢腫瘍生殖器變常妨害子宮之增大妊娠雙胎胎盤位置異常子宮內膜炎羊水過多以及體溫昇騰急性貧血諸症在妊娠之初雖無害於胎兒後則誘起收縮而使之流產三爲外傷如傾跌打撲驚恐是四爲藥劑如麥角越幾斯蘆薈薩菴那是一次流產便易成癰以後度如是故孕婦不可不慎之於始。

證候。妊娠纔數星期而流產者，不過略覺疼痛，同時下血，似經而多。血塊之中，卵交雜焉。妊娠至第二個月末，或第三個月初而流產者，下血殊多，陣陣作痛。與分娩時之痛相似。排出之卵，或包以卵膜，完全產下，或卵膜破裂，留子宮內，卵既產下，出血如故，久而不止。

豫後。母體無傷，但於胎兒為不良耳。

治法。孕婦宜清潔身體，攝養精神，節少房事，慎選易消化無刺戟之食物，謹避荷重，提舉，諸運動，毋遠行，毋乘車，有梅毒之疑者，速行驅梅毒。法。患熱性病者，速用退熱法，曾流產一次者，速攻治子宮內膜炎，整復子宮。後。屈流產成癥，不明原因，而又幸有娠者，速投藥劑，雖有流產之兆，而卵尚健，存否不能確知，其卵之健者，速安靜身心，並進阿片劑，以止其排出。流產不能防禦，下血已頗劇烈者，速限制其流血，並使卵全然排出。其最完備最穩妥者，莫如陰道栓塞法，先用一%之列費兒水，或三%之石炭酸水，洗滌陰道，次取水楊酸綿球數個，填塞陰道內。

球貼緊。腔穹窿。及子宮外口。後球又貼緊。前球每十二時。替換一次。則不惟有制止出血之效。兼善增加陣痛。催促排卵。勿輕視也。屢用。栓塞法。後子宮口雖大開。而卵之排出。仍遲緩者。則請醫生行雙合壓。出法。惡露不淨。惡露奇臭者。亦以由醫士治之。爲良。己勿輕易著手。處方。

一 阿魏 三〇 護謨漿 適宜

右調勻成丸五十粒。初時每二日服兩粒。一星期後。每五日服兩粒。兩個月後。每十日服兩粒。逐漸遞減。至分娩止。(阿

魏丸) 不論何種原因致流產者皆宜

二 阿片丁幾 十五滴至二十滴 蒸餾水

右一次頓服。(芙蓉飲) 腹痛者用之

三 阿片末 〇三 白糖 三〇

右研勻分作十包。每二時至四時服一包。(芙蓉散) 無芙蓉飲則以

此代之方

四 麥角越幾斯 二〇 甘草末 適宜

右製丸二十粒。一日三四次。每服一粒。(脫花丸)善止血。凡善

血多而下胎。雞者宜用之。

五 愛爾柯欽 五〇 餾水 三五〇 水楊酸 〇一 甘油

一〇〇

右每取一茶匙。和溫水兩食匙。大便後。灌注直腸內。一日一

次。(達生洗)丸如不願內服。脫花

四 乳腺炎

病原。乳房皸裂。或生潰瘍。或被咬傷。釀膿菌乘機侵乳腺內。因而發炎。此惟授乳之婦人爲多。亦間有發於孕婦。及妙齡之室女者。  
證候。乳房之內。先起硬塊。痛楚殊甚。馴至紅腫。遂呈波動。聽而不治。必自潰而洩膿。或則不化膿而消散。如在重症。則每兼寒熱往來。

豫後。輕症而易消散者。開刀不失時。機者。豫後皆良。惟自潰者。過於

經久。則乳腺有萎縮之虞。

治法。宜塗搽水銀軟膏。或塗敷依

比知阿兒軟膏。施溫罌法。用吸乳器

吸其乳汁。其尙未化膿者。則用三角

繃帶。提舉乳房。且束擔布於患側之

上肢。疼痛劇烈。停止授乳。欲減其乳

宜投瀉藥。其不能消散者。宜速奏刀

而加以防腐繃帶。余則喜用鬱血治


法。其功效遠逾於開刀云。

處方。

- 一 規那皮煎 (一〇〇) 一五〇〇 糖漿 三〇〇

右調和。每晨服一半。或一頓服完。(強身飲)

第十圖 提乳帶



五 乳房痛

病。原。乳。汁。過。多。往。往。脹。痛。患。臟。躁。病。之。婦。人。及。有。生。殖。器。病。者。亦。每。作。痛。

證。候。乳。房。腫。脹。不。紅。而。痛。宛。似。搏。動。

治。法。亦。宜。用。繃。帶。以。輕。減。乳。房。之。重。量。纏。法。蘭。絨。等。柔。軟。物。以。除。

其。原。因。或。溫。包。乳。房。劇。痛。塗。搽。藥。劑。

處。方。

一 石鹼硬膏 葇蓉越幾斯 各一〇〇

右勻攤布片貼乳房上 (護心膏)

二 葇蓉丁幾 五〇 濃厚苦扁桃水 二〇〇 忽布滿氏鎮

痛液 二〇

右調和每日早晚塗搽 (三醉液) 兩用方效能提乳帶

六 乳癌

病原。胎前產後之乳房炎。實爲此病之誘因。三十五歲後之婦人。患此者最多。中名乳巖是也。或謂四十至四十五歲爲最多云。

證候。乳房內部。先起原核。繼漸增大。自腋下至乳邊。遂發生強劇之疼痛。食氣不振。表面塊霽不平。與皮膚相粘連。乳嘴陷凹。腋窩鎖骨上窩。鎖骨下窩。諸淋巴腺。先後腫脹。終現惡液質諸症狀。如放置之。一年至二年半必死。

豫後。行外科手術。盡去患部。則爲佳。良不然。危篤。

治法。從速開刀。治愈可早。若與胸廓粘連。部位廣大。或已侵入鎖骨部之淋巴腺。或且與腋窩腺之周圍軟部血管神經一併粘連。或轉移遠隔之部。則不能施行手術。此時惟有保守清潔兼用防腐劑。或更須斟酌情形。內服鎮痛強壯諸藥。

一 沃剝 一分 純沃度 一釐 羊毛脂 錢半 華攝林

五分

右調和製成軟膏塗敷患處  
(外敷消毒膏)

二 鹽剝 五分 餾水 二百分

右溶和爲洗滌料  
(防腐水)

三 滿剝 一分 餾水 二百分

右溶和爲洗滌料  
(滅臭液)

四 石炭酸 二分 餾水 二百分

右溶和爲洗滌料  
(制腐液)上方均用以防腐

五 格魯兒亞鉛 二錢 亞鉛華 五分 澱粉 錢半 餾水

適宜

右調勻製粥泥狀貼乳房上  
(雙銻餅)專用以收斂

第五編 雜部

藥物篇

西藥之多。千有餘種。試讀藥物顯書。當知其繁曠矣。況比年來推陳出新。有加無已。苟綜覈之。尙不止此數也。顧其間有效用微弱者。有毒性劇烈者。有價直昂貴者。悉汰除之。所餘遂鱗鱗可數矣。茲編所用諸藥。種類益鮮少。然不可不悉其形性。不可不明其功用。爰依藥物分類法。揭形性。功用之大概。備考鏡焉。作藥物篇。

### 第一章 麻醉藥

〔阿片末〕 卽阿片也。一名阿芙蓉。乾之製成褐色之粉末。臭味苛烈。劇藥也。善催眠。鎮痙。鎮痛。鎮靜。止血。頓服二分。六釐。至五分。二釐。必中毒而死。

〔鹽酸莫兒比涅〕 省稱鹽莫。亦曰莫比。俗名嗎啡。乃阿片之精。毒藥也。作用同阿片。麻醉之效特著。惟不能止瀉。止血稍遜阿片耳。頓服至一分。立死。

〔阿片丁幾〕 爲紅褐之乾粉。效能同阿片末。用量亦同。

〔鹽酸歇魯茵〕爲結晶之白粉。劇藥也。有鎮痛、化痰、解慢性莫比中毒之效。

〔鹽酸古加乙涅〕一名古加咽。亦劇藥也。形性頗似鹽酸歇魯茵。色白。無臭。凡欲消失一部分之疼痛者。以此麻醉之最佳。

〔磷酸古垓乙涅〕爲微細之結晶。色白。味苦。作用似鹽酸歇魯茵。

〔萇若越幾斯〕以萇若草製之。能鎮痛。鎮痙。

〔萇若丁幾〕一名顛茄酒。功用似越幾斯。每服一滴至十滴。

〔菲沃斯越幾斯〕菲沃斯即鬧羊花。故一名鬧羊花膏。帶綠褐色。劇藥也。鎮痙。止咳。愈諸般疼痛。

〔印度大麻越幾斯〕爲稠厚之越幾斯。色黑綠。鎮痛。鎮痙。催眠。

〔臭素加留謨〕即臭素加里。一名貌羅謨加留謨。省稱臭剝。或名鉀溴。

結晶爲骰子形塊。色白。有光澤。味鹹而苦。普通藥也。貯必塞緊。否則易潮解。制止生殖器痛。催眠。鎮痙。

〔臭素樟腦〕爲無色柱狀。或針狀之結晶體。受空氣亦不變化。香味似樟腦而稍弱。劇藥也。治陰萎。則興奮。治遺精。則鎮靜。

〔杏仁水〕一名苦扁桃水。又名老利兒水。省稱老水。止痛。鎮痙。鎮吐。

## 第二章 興奮藥

〔酒精〕一名亞爾個保兒。通稱火酒。氣竄透。味燒灼。普通藥也。提神。強身。退熱。健胃。催眠。弔炎。防腐。凡溶製藥品。大都用之。

〔忽布滿氏鎮痛液〕省稱忽布滿液。卽依的兒精也。爲無色澄清之液。性易揮散。須塞緊。置冷暗之處。一部發痛。搽此便解。

〔依的兒〕一名以脫。或稱伊打。爲澄明無色之液。香味特異。性易發散。興奮。鎮痛。鎮痙。局所麻醉。

〔麥角越幾斯〕麥角一作耳臥達。麥角越幾斯稍稀薄。故亦名耳臥達水膏。劇藥也。其色褐。溶於水則澄明。有收縮血管而使止血之效。

〔斯智普智珍〕功用似麥角而較爲優勝。乃麥角之新製劑也。

〔流動希特拉越幾斯〕北美產草一種。名曰希特拉斯知斯。以其根研粉。製成越幾斯。色深褐。味苦。治婦人生殖器出血。稱特效藥。

〔愛爾柯欽〕愛爾柯欽。爲麥角中所含主要之成分。其收縮血管之效。與麥角相匹敵。

〔番木鱉丁幾〕黃色澄清之液也。味頗苦。爲健胃藥。治胃痛、慢性胃炎、消化不良、泄下、便秘諸症。

〔海狸丁幾〕海狸。卽海狗。海狸香。一名膾膈臍。又作葛斯篤留謨。以製丁幾。善於鎮痙。生殖器劑也。婦人科常用之藥。

〔阿魏〕成塊。色褐。臭如葱。甚惡。其味苦。有臟躁病者必用之。

〔纈草丁幾〕爲黃褐色之液。以酒製成。亦患臟躁病之女人用之。

### 第三章 退熱藥

〔鹽酸規尼涅〕舊名金雞納霜。色白如霜。細軟成團。味特苦。爲截瘧聖藥。亦治諸般熱病。及神經痛。每服一瓦百分之三至十分之一之少。

量。則又爲健胃強壯藥。

〔硫酸規尼涅〕與鹽酸規尼涅無異。

〔規那皮〕一種樹皮也。研製成粉。色淺黃。專用作強壯劑。治全身衰弱。萎黃病。但每與鐵劑並用。

〔規那丁幾〕以規那末浸酒精中而製之。功用同規那皮。

〔安知必林〕省作比林。一名解火水。劇藥也。解熱。鎮痛。均著特效。

〔歐那設珍〕又名弗那攝精。成小葉狀之結晶。無色。無臭。頗有光澤。劇藥也。除退熱外。兼能止痛。

〔水楊酸〕一名撒里矢爾酸。又作柳酸。爲結晶狀之粉。色白。質輕鬆。無臭。味甘酸。微帶苛辣。普通藥也。退熱。防腐。

〔楊曹〕一名撒里矢爾酸曹達。又稱撒里矢爾酸那篤。或作水楊酸曹達。粉末作鱗屑狀。色白。無臭。味甘鹹。微帶苛辣。退熱。止痛。利小便。

〔撒魯兒〕一種結晶狀之粉。色白。氣微香。普通藥也。退熱。止痛。防腐。滅臭。

〔別臘蜜童〕爲微細之結晶粉。色白。味微苦。劇藥也。退熱。止痛。鎮靜。而退熱之效尤著。

#### 第四章 清涼藥

〔稀鹽酸〕澄明之液體也。透明無色。有增進消化之力。故常與健胃藥配合同服。

#### 第五章 防腐及消毒藥

〔石炭酸〕精製者爲結晶細長之塊。凝結時無色。稍和以水。溶則略現紅色。味如燒灼。其味特異。外科中最重要之藥也。

〔沃度仿謨〕或名埃多方。爲金黃色之粉末。別具一種臭氣。用於傷部潰瘍。下疳。橫痃。腺腫。及種種皮膚病。皆能顯其防腐之力。

〔埏魯瑪德兒〕形狀酷似沃度仿謨。功效雖不及前藥。然毫無臭氣。故

欲用無臭之藥。以此代之最佳。

〔列曹兒〕一作來蘇。係黑褐色液體。消毒滅臭。

〔列曹爾珍〕又名列曹兒聖。爲無色或帶紅色之結晶。味大辛。又微帶甘。臭氣特異。劇藥也。腐蝕弱於石炭酸。制酵防腐。內外並用。外用於子宮病爲多。

〔福爾馬林〕此係透明無色之水。其臭竄鼻。劇藥也。腐蝕之力。視石炭酸尤稍強大。外用消毒洗滌。

〔硼酸〕爲鱗屑狀之粉末。又似小葉。色白。有眞珠光澤。無臭。無味。亦無刺戟性。普通藥也。外用宜以之洗滌。含漱。能防腐。

〔過滿俺酸加里〕省稱滿剝。一名過滿俺酸加留謨。爲稜柱狀之結晶塊。質乾燥。色紫黑。有金類光澤。亦普通藥。腐蝕之力極大。防腐滅臭。解毒。

〔鹽素酸加里〕省稱鹽剝。一名格魯兒酸加里。又作鹽酸加里。晶塊細

小。無色。有光澤。味微甘。止痛。防腐。滅臭。含漱。洗滌。用。

〔炭酸瓜野哥爾〕一作炭酸卡野古羅。爲白色粉藥。無甚臭味。專殺肺

癆蟲。癆蟲即  
結核菌

### 第六章 驅蟲藥

〔秘魯脂〕卽百露拔爾撒謨。又名秘魯漿。係一種喬木之脂液。色作深

褐。粘之不牽絲。薄則澄明。香氣爽快。味辛微苦。善毒殺疥癬蟲。

〔依比知阿兒〕亦係一種液體。稠厚如漿。色帶紅褐。有焦木臭。於各種

皮膚病。粘膜病。善消炎。止痛。神效無比。供外用。

〔石鹼〕一稱番鹼。俗名洋鹼水。有藥用石鹼。油製石鹼。常用石鹼。參見

石鹼。石鹼精等製劑。亦有驅蟲之性。

〔吳亞末〕一名護亞末。爲除蟲菊之一。善殺蚊。蠅。及皮膚寄生蟲。

### 第七章 變質藥

〔水銀軟膏〕一名灰白軟膏。又稱灰白水銀軟膏。作鼠色。驅梅毒。消炎。殺

蟲外用藥也。

〔昇汞〕一名過格魯兒汞。又稱白降丹。或名汞綠毒藥。結塊成片。色白。質半透明。有光芒狀。性最重毒藥也。爲強烈之防腐消毒藥。外用。腐蝕。洗滌。灌注。塗搽。罨覆。含漱。洗浴。點眼。功用難罄。惟毒性猛烈。用之宜慎。

〔甘汞〕一名格過兒化汞。或稱單綠汞。又名水銀粉。藥粉極細。色白。微帶黃。劇藥也。驅梅。輕瀉。又爲撒布藥。吹口藥。孕婦忌內服。

〔沃度丁幾〕省稱沃丁。亦名海碘酒。爲深褐色之液體。其臭特殊。亦劇藥也。外用。治諸般皮膚病。粘膜病亦間有之。

〔沃度加里〕省稱沃剝。一名沃度加榴謨。或曰鉀碘。結塊如骰子。色白。瓶收須塞緊。否則易受濕溶化。劇藥也。驅梅。解凝。變質。俱推獨步。

〔重碳酸曹達〕省稱重曹。一名重碳酸那篤榴謨。爲白色之結晶粉。味鹹。無毒。受氣不變化。助消化。化痰涎。清潔皮膚。應用極廣。內外宜之。

〔次硝酸蒼鉛〕省稱硝酸蒼。一名鹽基性硝酸蒼鉛。爲白色之細粉。無臭。無味。性較重。內服。止瀉。外用。止淋。神效無比。惟價值極貴。

〔食鹽〕即格魯兒那篤僂謨。一名鹽化那篤僂謨。爲骰子形之細塊。色白。味苦鹹。普通藥也。止血。解毒。催吐。止帶。輕瀉。亦內外兼用。

第八章 強壯藥

〔律布林〕一名葦草粉。又稱忽布腺。乃自歐洲所產植物子實中得之。爲帶褐黑色之粉末。收貯宜避光。且勿洩氣。健胃。固精。制淫。麻醉。

〔龍膽丁幾〕龍膽。一名健質亞那。故又名健質亞那丁幾。爲黃色之液體。味極苦。健胃之效頗著。

〔苦味丁幾〕以細剉之龍膽。橙皮各五分。小豆蔻粗末二分。火酒百分。浸漉而成。係黃褐之液體。味苦。臭芳香。爲苦味健胃劑。助消化。功頗著。惟單用者少。

〔薄荷油〕此油入藥之目的。僅調味而已。

〔過格魯兒鐵液〕一名一半格魯兒化鐵液。或稱淡鐵綠水。爲黃褐色之液體。腐蝕。止血。專供外用。

〔林擒鐵丁幾〕爲褐而帶黑之酒。係將林擒與鐵製合而成。治萎黃病。貧血。大病後。大出血後。過淫。久痢後。瘰癧。橫痃。但有肺病。心病。胃病者忌用。

〔肝油〕即魚肝油也。性流動。不凝固。色黃似麥桿。又若金黃。臭稍稍特異。味緩和滋養。強壯。

〔百布聖〕一名胃液素。乃取自牛豚等之胃粘膜間。爲似灰色之細粉。味微鹹。健胃。治肺癆。貧血。

〔育興賓〕此自一種植物中採取而得者。乃強壯藥之新劑也。治陰萎。遺精。不淫。功用遠在臭素樟腦諸藥之上。

### 第九章 收斂藥

〔醋酸鉛〕一名鉛糖。又稱鉛霜。或名鉛醋鹽。結晶成塊。色白。味甘。其臭

如醋。性收斂。受氣則風化。劇藥也。內服止血。止瀉。外用止帶。止淋。治皮膚病。

〔酸化鉛〕一名蜜陀僧。爲白色。或帶黃紅色之粉末。性極重。治諸般皮膚病。腐蝕收斂。

〔酸化亞鉛〕一名亞鉛華。或稱銚養。爲白色藥粉。狀似石灰。間或帶黃。無味。無臭。外用收濕。有神效。治皮膚病。

〔硫酸亞鉛〕即皓礬也。一名鐸礬。自成細塊。無色。劇藥也。止血。止帶。止淋。又爲點眼藥。

〔硫酸銅〕即膽礬也。一名藍礬。又名丹鉛。或稱硫酸銅。結晶大塊。質能透映。色藍。劇藥也。腐蝕收斂。催吐解毒。外用。溶製水藥。

〔硝酸銀〕一各銀丹。或稱硝強銀。結晶成板片狀。無色。有光輝。受光即起變化。宜收入黑色瓶中。膚觸之。立變白色。倏又變黑。亦屬劇藥。收斂腐蝕。止血。外用爲多。

〔蛋白化銀〕一名銀脛礬。爲淡黃色之粉末。臭似牛肉汁。一種銀製之新藥也。殺淋毒之力極大。惟單用必痛。故必和安知必林。以去其刺戟之性。

〔拖銀乾酪素〕譯名亞爾克林。熱水乃溶化。滅殺淋毒之力亦大。濃厚之液。稍有刺戟性。依藥用量。則不覺痛。

〔明礬〕即白礬也。俗稱生礬。一名硫酸亞爾密紐。加榴謨。或爲白色粉末。或爲堅硬之塊。味微甘而殊濇。普通藥也。止血。止帶。止淋。

〔單甯酸〕一名鞣酸。或稱丹仁酸。又作炭匿酸。係黃白色粉末。或爲疏松之鱗屑片。無色而有閃光。味甚穡。質甚輕。止血。收濕。止帶。解毒。

〔五倍子丁幾〕五倍子。亦名鹽麩子。又稱無食子。以製丁幾。即成此藥。內含單甯酸。故效能相同。

〔烏華烏爾失葉煎〕此藥雖含有鞣酸。然尙有一種成分。該成分名曰亞爾伯聖。能利尿。治淋病。膀胱炎。

第十章 刺戟藥

〔薩昆那末〕一名沙墳末。又名西墳末。外用。專治尖圭濕疣。

〔苛性加里〕一名腐蝕加里。或稱水酸化。加留謨。爲乾燥之塊片。或小

挺子。受氣則還潮。劇藥也。腐蝕力最猛烈。

〔格魯謨酸〕結晶成塊。色作深紅褐。有銅類光澤。受氣易潮解。腐蝕性

似苛性加里而稍弱。治皮膚粘膜病之須令變硬者。

第十一章 下劑

〔蓖麻子油〕省稱蓖麻油。係一種之油類。色微黃。臭味特異。潤腸通便。

緩下劑之最良者也。

〔硫酸苦土〕卽瀉利鹽也。省稱硫苦。一名舍利鹽。又名硫酸麻侃涅叟

謨。俗稱洋朴硝。爲無色之細屑。味大苦。普通藥也。瀉性亦不甚猛烈。

且不害消化。不起腹痛。五六時後。卽奏其效。

〔煨製苦土〕一名酸化苦土。或稱酸化麻侃涅叟謨。白色之粉藥也。質

極輕。故容積大。功效與硫酸苦土同。

〔人工鹽〕一名人工加兒爾斯泉鹽。或省稱人加兒。亦白色之粉末。味辛鹹。

〔純精酒石〕一名重酒石酸加里。或稱重酒石酸加儂謨。爲堅硬之小塊。或成粉末。色白。味微酸。熱水始溶化。輕瀉。利尿。清涼。止渴。與上述諸種同屬緩下劑。

第十二章 利尿藥

〔葶澄茄〕一作印度葶澄茄。係植物未熟之果實。色黑褐。臭甚香。爲淋病之利尿藥。

〔骨泮波拔爾撒謨〕一名哥拜把。爲南美洲所產一種之樹脂。係稍濃厚之液。色黃。又微帶褐。味大辛。微苦。香氣特異。功能利尿。淋病用之。與葶澄茄同。

〔白檀油〕即檀香油。係稠厚之油。色黃。或微黃。與前二種皆普通藥也。

治急性淋。視骨泝液爲優。

第十三章 發汗藥

〔加密列花浸〕 止痛。鎮痙。發汗。治感冒。

第十四章 緩和藥

〔蒸餾水〕 省稱餾水。爲澄明之液。無色。無臭。無味。係用蒸餾器蒸餾而成。故名。專用以溶製藥品。他無用也。

〔澱粉〕 即小麥粉也。葛。慈姑。番薯等。亦可爲之。用以調和藥品。增加藥劑之容積。

〔白糖〕 專爲調味藥。

〔糖漿〕 即單舍利別。以白糖六十五分。沖煮沸蒸餾水尋常可沸三十五分。俟其溶化。濾過而取其液。卽成。效用與白糖同。

〔乳糖〕 一名奶糖。味微甘。性不易受濕潤。故可代白糖。用爲調味藥。及散劑之配合藥。

〔甘草末〕 卽甘草根之皮。研製粉末而用之者也。爲調味藥。丸劑之配合藥亦用之。

〔甘草羔〕 卽甘草膏。熬煉成膏。有調味。成形兩作用。

〔護謨漿〕 樹膠也。此護謨漿係取亞拉昆亞護謨末爲之。故亦名阿刺伯樹膠。溶爲水液。性頗粘滑。注射。合丸俱用之。

〔亞麻仁油〕 一名胡麻子油。澄明色黃。有固有之臭。亦緩和用。

〔橄欖油〕 一名阿列布油。色黃。或帶淡綠。略具特異之臭。味緩和。性難腐敗。外用。塗擦。灌腸。

〔扁桃油〕 被覆之緩和藥也。湯火傷。外傷。等用之。

〔椰子油〕 一名柯柯阿脂。或稱柯柯阿酪。製坐藥。及軟膏。必需之。

〔華攝林〕 一名花士林。俗稱凡士林。有黃白二種。白者之起腐敗。較易於黃者。似豬油而不凝。且稍有膠粘性。無刺戟性。作膏藥料。最稱佳良。

〔羊毛脂〕一名濕羊毛脂。又稱含水刺納林。或名含水絨脂。成塊似軟膏。色帶黃白。無臭。亦調製軟膏用。

〔猪油〕即豚脂也。冷則全體均勻柔軟。爲塊餅狀。效能同上述二種。但易燥敗。製爲軟膏。不能經久耳。

〔鯨蠟〕一名鯨油。即鯨魚體中之脂肪也。功用與猪油同。

〔甘油〕一名偈利設林。亦稱里私林。俗名洋蜜。爲稍濃厚之液。透明無色。味甘。調味。灌腸。又可使堅硬之物質。化爲柔軟。需用極廣。

〔單軟膏〕以黃蠟一分。胡麻油二分。熬滾。候冷。用力攪拌。即成。供調和軟硬膏之用。

〔綠石鹼〕爲柔軟粘滑之塊。質透明。色黃褐。或微帶綠。故名。外用塗搽。洗滌。貧家便之。

處方篇

醫師療病。處方爲先。蓋醫師用藥之優劣。實於處方之良否。視之。此處。

方所以有專學。不論中西無二致也。編中所處各藥方。隨證下筆。有同有異。在有素養者。固一見可定。方針在一般社會。雖百讀猶虞紊亂。故特參酌處方調劑兩學科之體例。先分內服外用二大綱。更舉合劑散劑諸細目。以區別之。且每一處方皆特定相當之名稱。爲應用上之便利。則庶乎若蛛絲馬足之可尋矣。作處方篇。

第一章 內服藥

〔解毒飲〕 主治慢性腺體炎症

沃剝 二〇 硫苦 一六〇 餹水 二〇〇〇

〔沃剝飲〕 主治第二期及第三期梅毒子宮炎

沃剝 二〇 苦丁 二〇至三〇 餹水 二〇〇〇

〔天補飲〕 主治遺精滑精

流動希特拉斯越幾斯 二〇至三〇 苦丁 二〇 糖漿 八

〇 餹水 一〇〇〇

〔萬全湯〕 主治痛經

流動希特拉斯越幾斯 七〇 苦丁 四〇 餾水 二〇〇〇

〔固本湯〕 主治遺精·房勞·手淫·萎黃病

規那丁幾 一〇 稀酸鹽 〇四 糖漿 五〇 餾水 一〇

〇〇

〔強身飲〕 主治後天衰弱·痛病中

規那皮煎一〇〇 一五〇〇 糖漿 三〇〇

〔固精露〕 主治遺精·滑精

臭剝 九〇 糖漿 八〇 餾水 三〇〇〇

〔貌龍湯〕 主治陰萎

臭剝 六〇 龍丁 二〇 餾水 二〇〇〇

〔鎮龍湯〕 主治陰莖強直·莖中痛

臭剝 六〇 苦丁 三〇 餾水 一〇〇〇

〔甯神通利飲〕 主治婦人生殖器急性炎

臭剝 二〇〇 苦丁 一〇〇 硫苦 一〇〇 餵水 一〇〇〇

〔逍遙湯〕 主治女人痛經月經過多月經不調腰腹痛諸症

臭剝 三〇〇 依的兒 二〇〇 苦丁 三〇〇 餵水 一〇〇〇

〔洋朴硝飲〕 主治婦人生殖器急性炎

硫苦 二〇〇 苦丁 二〇〇 餵水 二〇〇〇

水楊飲〕 主治淋毒結石

楊曹 六〇 苦丁 三〇 糖漿 一〇〇 餵水 二〇〇〇

〔三利煎〕 主治淋病

烏華烏爾失葉煎 二〇〇 一八〇 楊曹 六〇 苦丁 四〇

糖漿 二〇〇

〔三神湯〕 主治婦人生殖器因炎症而起之疼痛

加密列花浸 一五〇 阿片丁幾 十五滴 薄荷糖漿 一

五〇

〔潤腸油〕 主治諸般慢性炎症婦人尤宜

蓖麻油 二〇〇

〔滋血飲〕 主治婦人萎黃病房勞無月經肺癆生殖器官病營養衰弱消化不良

林擒鐵丁幾 六〇 百布聖 二〇 餉水 一〇〇〇

〔滋陰膠〕 主治癆瘵全身衰弱諸症

肝油 一五〇

右合劑

〔純陽露〕 主治陰莖短小陰萎早泄遺精不淫房勞諸症

鹽酸育興賓溶液 五〇

〔剪紅飲〕 主治溺血痔血婦人血崩月經過多

流動希特拉斯越幾斯 一〇〇至二〇〇

〔暖宮飲〕 主治婦女月經病有臆躁症者尤佳

海狸丁幾 番木鱉丁幾 各五〇〇

〔芙蓉飲〕 主治小產腹痛

阿片丁幾 十五滴至二十滴

右滴劑

〔檀香油〕 主治急性淋病

白檀油 〇三至〇五

〔骨泔波〕 主治同前

骨泔波拔爾撒謨 〇二

右膠囊劑

〔無憂散〕 主治諸般痛症

鹽莫 〇〇三 乳糖 一·五

〔無痛散〕 主治同前

鹽莫 〇・一 白糖 三・〇

〔芙蓉散〕 主治同前婦人尤宜

阿片末 〇・三 白糖 三・〇

〔鎮痛散〕 主治諸般痛症

鹽酸歇魯茵 〇・〇六 乳糖 一・五

〔抑氣散〕 主治同前

磷古堉 一・〇 乳糖 二・〇

〔如神散〕 主治疼痛發熱痙攣諸症

歇那設珍 〇・五

〔鎮陽散〕 主治遺精陰萎房事過度手淫衰弱諸症

律布林 〇・二 白糖 一・〇

〔將軍散〕 主治陰萎滑精遺精

臭素樟腦 〇・五 乳糖 一・〇

〔制淫散〕 主治陽強不倒

純酒石 三分 硝剝 一分 白糖 六分

〔代楊散〕 主治急性淋病之尿意頻數者

撒魯兒 〇·五至一·〇

〔骨華散〕 主治急性淋病

骨湃波拔爾撒謨 三〇〇 華澄茄末 六〇〇

〔鎮痙散〕 主治疼痛痙攣等症

菲沃斯越 〇·三 印度大麻越 〇·三 白糖 三〇

〔逍遙散〕 主治陽強不倒莖中痛遺精滑精

臭剝 五〇至七〇 比林 二·五

〔鎮元散〕 主治同前

臭曹 三〇〇 精製樟腦 三〇 受爾柯欽 〇·三

〔止血散〕 主治溺血

麥角越 一〇 白糖 二〇

〔楊曹散〕 主治諸般熱病

楊曹 一五 乳糖 一五

〔清涼散〕 主治諸般熱病痛病

比林 一五 乳糖 一五

〔潤腸藥〕 主治便秘痔疾

精製硫黃 二〇至四〇 酒石英 六〇至八〇 枸橼油糖

二〇

〔通順散〕 主治同前

煨製苦土 純精酒石 各一五〇 茴香油糖 二〇〇

〔截紅散〕 主治婦人血崩月經過多

新鮮麥角 〇五至一〇

〔最新止血散〕 主治同前

斯智普智珍 ○○五 白糖 ○五

〔生精補血丹〕 主治遺精滑精陰萎過淫營養衰弱

硫規 酸化鐵 乳糖 各○九

右散劑

〔驅梅丸〕 主治第二期及第三期梅毒

沃剝 三○ 龍膽末 龍膽越 各適宜

〔中興丸〕 主治陰萎遺精滑精過淫諸般症候

磷酸亞鉛 ○六 番木鱉越 二○

〔燐古丸〕 主治諸般痛症

磷酸古堦乙涅 ○九 甘草越 甘草末 各等分適宜

〔最新止血丸〕 主治一切血證婦人尤宜

斯智普智珍 一五 甘草末 甘草羔 各適宜

〔脫花丸〕 主治流產難產

麥角越 二〇 甘草末 適宜

〔阿魏丸〕 主治流產及臟躁病

阿魏 三〇 護謨漿 適宜

右丸劑

〔純陽錠〕 主治陰萎遺精過淫不淫諸生殖器病

育興賓錠

〔調經片〕 主治婦人月經過多血崩

愛爾柯欽錠 六片

右錠劑

第二章 外用藥

〔第一消毒水〕 主治一切不潔惡臭

精製石炭酸 三五 餾水 一〇〇〇

〔制腐液〕 主治皮膚諸般潰瘍

石炭酸 一〇 餾水 一〇〇〇

〔洗疥湯〕 主治諸般皮膚病

福爾馬林 一滴 餾水 一〇〇〇

〔消毒液〕 主治同前兼防水銀中毒

鹽剝 二〇至五〇 餾水 二〇〇〇

〔第二消毒水〕 主治同第一消毒水

過滿俺酸加里 一〇 餾水 五〇〇〇至一〇〇〇〇

〔滅臭液〕 主治同第二消毒水惟分量稍稍增加

滿剝 一分 餾水 二百分

〔硼水〕 主治同以上諸方防腐之力稍弱然無刺戟性男婦生殖器洗

滌宜之

硼酸 二〇至六〇 餾水 二〇〇〇

右消毒用之合劑

〔鉛水〕 主治皮膚粘膜紅腫發炎

醋酸鉛 五〇 餾水 二〇〇〇

〔神功水〕 主治皮膚粘膜潰爛久不收功

皓礬 一〇至二〇 餾水 二〇〇〇

〔消腫液〕 主治同鉛水

次醋酸鉛液 五〇 餾水 二〇〇〇

〔止血液〕 主治因淋溺血

過格魯兒鐵液 二・五 餾水 二五〇〇

〔二鉛水〕 主治同神功水而較優

鉛糖 皓礬 各一〇 餾水 二〇〇〇

〔雙礬泉〕 主治同二鉛水

明礬 皓礬 各〇・四 餾水 二〇〇〇

〔礬鉛水〕 主治諸般腫瘍

粗製明礬 五〇 二・五%鉛水 二五〇 餾水 二〇〇〇

〔白礬水〕 主治同雙礬水

明礬 五〇 餾水 二〇〇〇

〔膽礬水〕 主治淋病之炎症退而尙未收功者

硫酸銅 〇・一 餾水 二〇〇〇

右收斂用之合劑

〔甲種截瘡水〕 主治軟硬下疳以及頑固難治之皮膚病

石炭酸 一〇〇〇 餾水 一〇〇〇

〔脫胎液〕 主治頑固難治之癢症

石炭酸 純酒精 各一〇〇

〔制淫液〕 主治陰門陰囊癢症

石炭酸 三〇 餾水 一〇〇〇

〔完瘡液〕 主治同甲種截瘡水

硫酸銅 五〇 餾水 一五〇

〔乙種截疔水〕 主治同甲種截疔水

過滿俺酸加里 一〇 餾水 一〇〇

〔過鐵液〕 主治息肉痣斑等症

過格魯兒鐵液 五〇 水 二〇〇

〔勝軍液〕 主治同過鐵液

酸化鉛 〇五 三三%苛性加里水 七五

〔硝銀水〕 主治同脫胎液

硝酸銀 一〇 餾水 三〇〇

右腐蝕用之合劑

〔止痛液〕 主治陰莖強直

鹽酸古加乙涅 〇一 餾水 五〇

〔定痛精〕 主治似止痛液惟用量加重用於軟下疳特效

鹽酸古加乙涅 〇.五 純眞蒸餾水 一〇〇

〔三醉液〕 主治種種神經痛

莨菪丁幾 五〇 濃厚苦扁桃水 二〇〇 忽布滿氏鎮痛液

二〇

右鎮痛用之合劑

〔鎮痛消腫蜜〕 主治諸般紅腫疼痛

依比知阿兒 二〇 甘油 二〇〇

右鎮痛兼消炎用之合劑

〔消腫蜜油〕 主治舉丸副舉丸紅腫發炎

沃剝 二〇 沃度 〇.二 甘油 一八〇 橄欖油 二〇

〔二味酒〕 主治橫痃詳見第二編

沃丁 二〇〇

〔沃倍酒〕 主治同一味酒

沃丁 五倍子丁 各一〇〇

〔沃蕒酒〕 主治同前

沃丁 一〇〇 蕒若丁 一〇

〔雙沃五倍酒〕 主治尖圭息肉橫痃

沃丁 一〇〇 五倍子丁 五〇 沃度 〇一

右吸收兼腐蝕用之合劑

〔銀安液〕 主治急慢性淋病

蛋白化銀 〇五 安知必林 六〇 甘油 二〇 餾水 二〇

〇〇〇

〔銀酪漿〕 主治同銀安液

抱銀乾酪素 一〇 餾水 二〇〇〇

〔冥黑液〕 主治潰膿疼痛癩瘡

依比知阿兒 一〇至二〇 餾水 二〇〇〇

右殺菌用之合劑

〔甯神洗〕 主治腹部臟器因病不安

沃剝 一〇〇 臭剝 八〇至一〇〇 黃荳越 〇六 餾水

三〇〇〇

〔消炎洗〕 主治直腸淋病

一%或五% 依比知阿兒水 三〇〇

〔達生洗〕 主治血崩流產

愛爾柯欽 五〇 餾水 三五〇 水楊酸 〇一 甘油 一

〇〇

右灌腸用之合劑

〔宣毒丹〕 主治龜頭淋病軟硬下疳

甘汞 五〇 澱粉 五〇

〔黃白丹〕 主治同宣毒丹而尤完備

甘汞 五〇 埕魯瑪德兒 五〇

〔獨毒散〕 主治同黃白丹

甘汞 一〇 次硝蒼 一〇〇

〔二金散〕 主治皮膚粘膜諸般潰瘍膿水浸潤沾汚發臭

沃度仿謨 五〇

右消毒用之散劑

〔完陰丹〕 主治潰瘍將愈不易收功

硼酸 八〇 亞鉛華 一五 單甯酸 〇五

〔神效散〕 主治同完陰丹但較猛烈

單甯酸 五〇 澱粉 五〇

右收斂用之散劑

〔養疣上散〕 主治息肉增殖功用與過鐵液相仿

列曹爾珍 一〇〇

〔三蝕丹〕 主治同前

明礬 一〇〇 薩毘那末 一〇〇 膽礬 一〇

右腐蝕用之散劑

〔清涼油〕 主治丹毒之紅腫灼熱者

石炭酸 五〇 羊毛脂 豬油 各二五〇

〔列曹爾珍〕 主治同清涼油

列曹爾珍 一〇〇 豬油 三〇〇

〔生肌膏〕 主治軟硬下疳橫痃及諸般皮膚粘膜潰爛

沃度仿謨 二〇 薄荷油 二滴 羊毛脂 八〇 華攝林

二〇

〔沃莨膏〕 主治痔核之已破者及其潰爛疼痛諸症

沃度仿謨 〇三 莨菪越 〇六 黃華攝林 二五〇

〔外敷消毒膏〕 主治一切皮膚病

沃剝 一分 純沃度 一釐 羊毛脂 錢半 華攝林 五分

〔解凝膏〕 主治淋毒性辜丸副辜丸炎

沃度丁幾 一〇 沃剝軟膏 三〇〇

〔護心膏〕 主治諸般痛症·炎症

石鹼硬膏 芫荈越 各一〇〇

〔二聖膏〕 主治同護心膏

芫荈越 〇·一 依比知阿兒 二〇 華攝林 適宜

〔鎮痛膏〕 主治諸般神經痛

芫荈越 二〇 華攝林 二〇〇

〔解痛膏〕 主治同前用量亦無甚增減

芫荈越 一〇 羊毛脂 八〇 華攝林 二〇

〔臭黑油〕 主治各種紅腫之症丹毒尤佳

依比知阿兒 一〇 華攝林 五〇

〔外消膏〕 主治同前

依比知阿兒 一〇〇〇 華攝林 一〇〇〇

〔止帶膏〕 主治同前

依比知阿兒 羊毛脂 各一〇〇

〔痔痛膏〕 主治諸般痛症

鹽酸古加乙涅 〇三至〇五 羊毛脂 華攝林 各五〇〇

〔貞女膏〕 主治陰囊陰門癢症

鹽酸古加乙涅 〇一五 薄荷腦 一〇 橄欖油 二〇 羊

毛脂 三八〇

〔完肌膏〕 主治直腸淋病

硝酸銀 〇二 秘露脂 羊毛脂 各二〇 黃華攝林 八〇

〔再生膏〕 主治陰門陰囊癢症同貞女膏

華攝林軟膏 五〇〇 亞鉛華 鯨蠟 各三〇

〔無名油〕 主治息肉、疣、痣、斑點

薩毘那末 華攝林 各一〇〇 松節油 五〇

〔殺蟲藥〕 主治諸般寄生蟲如頭虱、毛虱、疥癬蟲等

灰白水銀軟膏 五〇 華攝林 五〇

〔立死油〕 主治蚤虱及疥癬蟲

秘露脂 一〇 火油 二〇〇

右軟膏劑

〔金剛桿〕 主治息肉增殖同無名油

酸化鉛 二分 苛性加里 八分

右膠桿

〔二金條〕 主治膿瘍、潰瘍、濕潤、惡臭

沃度仿謨 一〇〇 椰子油 二〇〇 扁桃油 適宜

〔不二桿〕 主治痔管及痔核之已破者

依比知阿兒 ○一 沃度仿謨 ○三 椰子油 二〇〇

〔第一劫痛錠子〕 主治生殖器炎

黃蓉越 ○一 依比知阿兒 二二 椰子油 適宜

〔第二劫痛錠子〕 主治同前

黃蓉越 ○〇五 沃度加里 ○二 椰子油 二〇〇

〔第三劫痛錠子〕 主治同前

依比知阿兒 四〇 椰子油 四〇〇

〔不痛錠子〕 主治尿道疼痛

黃蓉越 ○一至〇二 椰子油 灰白軟膏 各等分適宜

〔止血條〕 主治痔核之已破者

明礬 一〇〇 黃蓉越 ○三 椰子油 適宜

〔芙蓉桿〕 主治婦人內生殖器諸般炎症

阿片越 ○〇二五至〇〇五 椰子油 適宜

右坐藥

〔臭黑綿球〕 主治婦人內外生殖器紅腫發炎

依比知阿兒 一〇〇 甘油 一〇〇〇

〔定痛球〕 主治婦人內外生殖器疼痛

荳蔻越 〇一 椰子油 三〇〇

右綿球

〔雙銻泥〕 主治乳癌

格魯兒亞鉛 二錢 亞鉛華 五分 澱粉 錢半 餾水 適

宜

右粥泥劑

術語篇

術語者何學術上之專門名詞也今之嗜新醫學者平時抵掌空談則眉飛色舞偶爾開卷諷誦又瞪目搖舌甯始勤終怠敷衍術語爲之梗

耳。惟術語視科目而殊。有解剖之術語。有生理之術語。有病理之術語。醫學上之術語。不適於藥學。內科學之術語。或見諸外科。不得真詮。奚翹老嫗。諷經。苟知精義。庶幾蠹魚食字。用為註釋。以便讀者。作術語篇。

機能 猶言功能也

內生殖器 在內生殖器之

蕃殖器 蕃殖之用。故曰蕃殖

器殖

腺 腺丸亦腺之質。所謂成之腺

腺丸

彈力 曰能放能收

緻密 也細密

小骨盤 即骨盤之下口也

精系 謂凡精液所通之系統處

也

鼠蹊 小腹兩旁與鼠蹊大

粘液 液之自粘膜面分泌

出而

脂肪 也油質

交接器 即需用者時

恥骨 之遮陰具也。在小腹

分泌 出也。泌

勃起 謂陰莖之舉

中樞 謂神經之別中樞神經

分布深部末梢

疝氣帶 帶一名歇爾尼亞

售出

漿液 厚者曰液。稠

蜂窩織 之肉種織

室扶斯 有腸室扶斯之別發

腸室扶斯會所國小

謂傷寒致發所一室扶

僂麻質斯 亦傳染之病。別有

間歇熱 也。疾

屈曲面內即之腿一臂面等向	前膊也上膊也	菌腫菌腫也似也	診斷診之察也而決	護謨腫護謨腫該組皮	實質各該器原之則有質係	敗血症亦全身血液病變壞	腹膜炎腹之膜內發腸管之筋	耳下腺下者名耳之部在腺耳
--------------	--------	---------	----------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

結石沙尿或成塊則名成	經干過死自發其病不治愈或	豫後之豫後來病	瀾漫散漫也	解凝凝解除也其	提舉帶雨將舉丸過	腫瘍塊也腫	血液循環無	病竈生處之發
------------	--------------	---------	-------	---------	----------	-------	-------	--------

會陰底即部	官能與同機	結締織亦一組種織	按壓西之洋推按摩特法微即有吾	蕨事完結也	射精中樞一專掌射精之	平流混電氣有別感傳其一流	轉地易也養	秘戲圖春片也	石結
-------	-------	----------	----------------	-------	------------	--------------	-------	--------	----

便旋小 膿栓膿 濾胞大細胞 尿道球在尿道前 急性之病初發 慢性謂凡病急愈 慢謂延緩 加答兒名輕症 局所全身而分 坐藥形如鏡 尿道陰滑 泌尿器便分 瘵攣之拘義

綿叢細小 猩紅熱俗名疹子 麻疹似與猩紅熱一症候相 膏髓癆一癆證之 荒菁甲殼蟲也 糖尿病名中消 貧血血液虧 肥胖病塊子也 神經藥剝安臭也 龜頭溝在龜頭上端

細菌俗名微生動物 尿酸既下而能入 皸裂裂音君 腐蝕織而壞 冷罨覆以冷水 冰罨覆以水 表皮二人之皮 邱疹形如邱陵 繃帶帶患部

勞責 凡軋軋音讀如若車力必起之便  
 軋音 軋軋音讀如若車力必起之便  
 波動 之動起搖伏如波也  
 沈澱 滓澱下音沈電渣也  
 潮紅 來紅如色潮依沙定之時至而  
 併發 症合併之症而  
 熱候 熱言之體時有發  
 哆開 也哆音開修張說開文張口  
 紫血 出血曰在溢血下其色不青流  
 梅毒 菌之發細生菌也毒  
 蛇行 性蛇行屈曲如  
 浸潤 潤猶也濕

神經 也病兆 質知顯者皆偏於甚  
 前驅 期或病前所兆現之言  
 痲衝 痲衝灼熱也痲  
 此 痲衝灼熱也痲  
 皮脂 腺之皮膚實所來自出  
 毛囊 生毛該囊中發  
 壓迫 解經故使用即帶寬同所紫  
 織維 素織維之原也  
 血 瘳血時拒皆動之作  
 瘳血 瘳血雖出而器不中外曰留

脫腸 帶帶即見前氣  
 刺戟 同刺  
 挫傷 傷之挫傷打損傷以皆謂扭  
 細胞 剝離細胞膜為藥上力皮  
 石炭 酸尿毒者其尿酸  
 攝生 衛便旋與也  
 洩溺 便小旋與也  
 荏苒 展延轉意也  
 誘發 而後發者曰誘發  
 神人 經質

姑息治法	雞姦門代男子陰之也	腐敗熱而發液熱腐也	名症	膿毒症中血受其毒是	直腸緊接大腸門內終端	辛一拿名	旃那藥名用草俗稱瀉物葉	息肉贅也生之	乳乳嘴房也上之	瘦孔也管孔	弛緩也
頭脚痛醫	所謂頭也	女子陰之也		血膿菌侵毒是			藥名用草俗稱瀉物葉	也生之	似乳嘴房也上之	也管孔	

彈力性腹帶	則止無有孕	妊娠線直在恥骨中央部	坐浴一湯至臍下骨縫部	充血實液充	腔形讀而會意象	兩性男女性與	成分猶言該物之分	間質之組織一層曰間質	臃處骨指有連之附	鹽漬物鹹貨	治也對言根本
種腹帶之緊一											

淋毒菌亦發細菌之種	如其形	少納也	痘瘡名天花痘也	惡液質變壞之質也	失血症名出血太多	攝氏表暑表寒	陣痛與他種疼謂之陣痛	陣痛將分作	歇的私里作	臟躁症經病人學有名比之神	之廠器也患腫瘰者及必用部

丁字帶 凡兩條一條由橫  
 後向 前用兜轉如馬通布  
 女人大一腿之向  
 內股內一面向  
 癖習也 成  
 月事 經月  
 大腸菌 非細菌之一種  
 閉鎖也 住  
 觸診 以察之手指之觸接而診  
 壅塞也 塞  
 人工陰道 以之人工造  
 蟻蟲 寄生蟲之一種  
 灌注 與注同  
 酸性飲料 如水等

綴也 連  
 病變 組織起病  
 肥厚 大與肥  
 澱粉 乾小麵粉是俗稱  
 磨鏡 兩日陰鏡  
 礪同 確  
 限局性 言限於一  
 尿道 俗呼尿管  
 % 羅百生特之省稱號一仙名如布  
 一茶匙 約半合強中量  
 一食匙 約七合中量  
 三角繙帶 摺以疊成帶巾

吸乳器 玻璃為之頂有  
 下玻璃罩 徐徐流出  
 有肆中之多  
 防腐繙帶 即尋常之藥繙  
 丁幾也 成即酒  
 越幾斯也 膏  
 舍利別也 漿  
 劇藥 毒烈之藥 減弱  
 一○ 一○ 一○ 一○ 一○  
 權每 一○ 一○ 一○ 一○  
 一○ 一○ 一○ 一○ 一○  
 量即 二十錢六分中



---

房中醫終

---

---

中華民國四年七月初版

(房中醫)全一冊

定價大洋壹元貳角

此書有著作權  
必究

分售處

中

北京 天津 保定 奉天 長春  
雲南 西安 成都 重慶 漢口 武昌  
溫州 長沙 福州 常德 廣州 汕頭 南昌 南京 濟南 杭州 石庄

華書局

編輯者 發行所 印刷所

中華書局

文藝編譯社

文藝編譯社印刷部

文藝編譯社

