

本草綱目草部第十七卷下

草之六

天雄

本經下品

釋名白幕

本經

時珍曰

天雄乃種附子而生出或

出其形長而不生子故曰天雄其長

而尖者謂之

天錐

象形也

集解

別錄曰

天雄生少室山谷二月采根陰乾

宏

景曰今采用八月中旬旬

天雄似附子細而長

乃至三四寸許此與烏頭附子三種本出建平故

謂之三建今宜都恨山者最好

謂爲西建錢塘間

者謂爲東建氣力小弱不相似故曰西水猶勝東

白也其用灰殺之時有水强者不佳恭曰天雄附

子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有力

弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也烏

頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有力

弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也烏

頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有力

弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也烏

頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有力

弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也烏

頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有力

弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也烏

頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有力

弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也烏

頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有力

頭苗名莖音斬爾雅云芨莖草是也今訛莖爲建
遂以建平譯之矣承曰天雄諸說悉備但始種而
不生附子側子經年獨長大者是也蜀人種之尤
忌生此以爲不利如養蠶而成白殭之意時珍曰
天雄有二種一種是蜀人種附子而生出長者或
種附子而盡變成長者卽如種芋形狀不一之類
一種是他處草烏頭之類自生者故別錄註烏
喙云長三寸已上者爲天雄是也入藥須用蜀產
曾經釀制者或云須重一兩半

曾絰眼者乃佳餘見附子下

脩治 敦曰宜炮皴去皮尖底用或陰制如附子法
生使甚佳時珍曰熟用一法每十兩以酒浸七日
掘土坑用炭半杵煅赤去火以醋二升沃之候乾
乘熱入天雄在內小盆合一夜取出去臍用之

氣味辛溫有大毒

別錄

曰甘大溫權曰大熱宜乾薑制之○之才曰遠志爲之使

惡腐婢
忌攻汁

主治大風寒溼痹，節痛拘攣，緩急破積聚，邪氣
金瘡，強筋骨，輕身健行。本經療頭面風，去來疼痛心

腹結聚，關節重，不能行步。除骨閒痛，長陰氣，強志。

令人武勇力作不倦。

別錄禹錫曰按淮南子云天雄雞志氣益注云取天雄

一枚納雄雞腸中，搗食之，令人勇。

治風痰冷痹，軟腳毒，風能止氣。

喘促急殺禽蟲毒。

甄權

治一切風，一切氣，助陽道，暖

水臟，補腰膝，益精明目，通九竅，利皮膚，調血脈。

四肢不遂，下胸膈水，破痃癖癰結，排膿止痛，續骨消

瘀血背脊僵霍亂轉筋發汗止陰汗炮食治喉

癥大明

發明

宗奭曰補虛寒須用附子風家多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取

其敷散也

元素曰非天雄不能補上焦之陽虛震亨曰天雄烏頭氣壯形偉可爲下部之佐時珍曰

烏附天雄皆是補下焦命門陽虛之藥補下所

以益上也若是上焦陽虛卽屬心脾之分當用參芪

不當用天雄也且烏附天雄之尖皆是向下生者

其氣下行其臍乃向上生苗之處寇宗奭言其不肯就下張元素言其補上焦虛皆是誤認尖爲

上爾惟朱震亨以爲下部之佐者得之而未發出

此義雷斂炮炙論序云咳逆數數酒

服熟雄謂以天雄炮研酒服一錢也

附方

新三建湯治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小便白渾六脈沈微

除涸冷扶元氣及傷寒陰毒用烏頭附子天雄并炮裂去皮臍等分咬咀每服四錢水二盞薑十五

片煎八分溫服肘後方男子失精天雄三兩炮白朮八兩桂枝六兩龍骨三兩爲散每

酒服半錢仲景金匱要畧張大風惡癩天雄烏頭苗及根去土勿洗搗汁

漬細粒黑豆摩去皮不落者一夜取出曬乾又浸如此七次初吞三枚漸加至六七枚禁房室豬肉

雞蒜之即死

側子

下品別錄

釋名煎子

時珍曰生于附子之側故名許慎說文作煎子

集解

宏景曰此附子邊角之大者削取之昔時不用比來醫家以療腳氣多驗恭曰側子附子

皆是烏頭下旁出者以小者爲側子大者爲附子今以附子角爲側子理必不然若當陽以下江左

山南嵩高齊魯閒附子時復有角如大豆許夔州
以上劍南所出者附子之角但如黍粟豈可充用
比來都下皆用細附子有效未嘗取角也保昇曰
今附子邊果有角如大棗核及檳榔以來者形狀
自是二顆且不小乃烏頭旁出附子旁出側
子甚明時珍曰側子乃附子旁黏連小者爾故吳
普陶宏景皆指爲附子角之大者其又小于側子
者卽漏籃子矣故楊氏附子記言側子漏籃園人
皆不重之以乞役夫同附

脩治

子同附

氣味辛大熱有大毒

〔普曰〕神農岐伯有大毒八月采畏惡與附子同

主治

癰腫風痹節腰腳疼冷寒熱鼠癰又墮胎

別錄療

腳氣冷風溼痹大風筋骨攀急

〔權〕勦冷酒調服治遍

身風癱神妙

雷敷

發明

機曰烏頭乃原生之腦得母之氣守而不移居乎中者也側子散生旁側體無定在其氣

輕揚

宜其發散四肢充達皮毛爲治風之藥天雄長而尖其氣親上宜其補上焦之陽虛木鼈子則

餘氣所結其形摧殘宜其不入湯服令人喪目也

時珍曰唐元希聲侍郎治癱瘓風有側子湯見外

臺秘要藥

多不錄

漏籃子

目綱

釋名

木鼈子

炮炙論

虎掌

日華

時珍曰

此乃附子之

瑣細未成者

小而漏籃故

之故亦同名大

名南星之最

小者名虎掌

此物類之

故亦同名大

明會典載四

川成都府歲貢

天雄二十對

附子五

十對烏頭五十

對漏

籃二十

効不知何用

氣味苦辛有毒 數日服之 主治惡痢冷漏瘡惡瘡

令人喪目

癘風

時珍

發明

時珍曰 按楊士瀛直指方云 凡漏瘡年久者復其元陽當用漏籃子輩加減用之如不當

用而輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而爲害尤甚也 又按類編云 一人兩足生瘡臭潰難近夜宿

五夫人祠下夢神授方用漏籃子一枚生研爲末入膩粉少許井水調塗依法治之果愈蓋此物不堪服餌止宜

入瘡科也

附方

新

一切惡痢

雜下及休息痢百歲丸用漏籃子一箇大者阿膠木香黃連瞿

粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許爲末糊丸梧子大每一歲一丸米飲下 羅天益衛生寶鑑

烏頭本品

校正

併入拾遺白草

釋名

烏喙

本經卽

草烏頭

本經耿

子

吳普

毒公

吳普又名帝秋

金鴉

綱目

苗名荳

音艮亥

及莖

音近獨

白草

拾遺

鴛鴦菊

綱目

汁煎名射罔

普曰

烏頭

形如烏頭

也有兩歧相

合

如烏之喙者

名曰烏喙

喙卽烏頭異名也

此有三歧者

然兩歧者少若烏

頭兩歧者復何以名

恭曰烏

之時

珍曰

此卽烏頭之野生子

他處者俗謂之草

烏頭亦曰竹節

烏頭出江北者曰淮

烏頭日華子

所謂土附子者是也

烏喙

卽偶生兩歧者

今俗呼

爲兩頭尖因形而名

其實乃一物也

附子天雄之偶生兩歧者亦謂之烏喙功亦同于天雄非此烏

頭也

蘿

恭不知此義故反疑之

草烏頭取汁曬爲

毒藥

射禽獸故有射罔之稱

後魏書言遼東塞外

秋收烏頭爲毒藥

射禽獸陳藏器所引續漢五行

志言西國生獨白草煎爲藥敷箭射人卽死者皆

兩頭尖

草烏頭

目綱目

土附子

音華

奚毒

本經耿

此烏頭非川烏頭也菊譜
云鴛鴦菊卽烏喙苗也

集解

別錄曰烏頭烏喙生朝陵山谷正月二月采

陰

乾長三寸已上者爲天雄

普曰

正月始生

葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似

宏景曰今

人以傅箭射禽獸十步卽倒中人亦死宜速解之

采用四月亦以八月采搗莖汁

日煎爲射罔獵去皮搗濾汁澄

朝陵屬汝南郡

大明曰土附子生去皮搗濾汁澄

時珍曰處

清旋添曬乾

取膏名爲射罔以作毒箭

時珍曰處

處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生

又無釀造之法其根外黑內白皺而枯燥爲異爾

然毒則甚焉

段成式酉陽雜俎言雀芋狀如雀頭

置乾地反溼溼地反乾

飛鳥觸之墮走獸遇之僵

似亦草烏之類而毒更甚也

又言建甯郡烏勾山

有牧靡草

鳥鵲誤食烏喙中毒必急

食此草

以解之牧靡不知何藥也

時珍曰草烏頭或生用或炮用

脩治時珍曰草烏頭或生用或炮用

或以烏大豆同煮熟去其毒用

烏頭氣味辛溫有大毒

別錄曰甘大熱大毒普曰神農雷公桐君黃帝甘有

毒權旦苦辛大熱有大毒大明曰味薌辛熱有毒之才曰莽草遠志爲之使反半夏栝樓貝母白蘞

白芨惡藜蘆時珍曰伏丹砂砒石忌

豉汁畏飴糖黑豆冷水能解其毒

主治中風惡

風洗洗出汗除寒溼痹欬逆上氣破積聚寒熱其

汁煎之名射罔殺禽獸

本經消胸上痰冷食不下心

腹冷痰躋間痛不可俛仰目中痛不可久視又墮

胎別錄主惡風憎寒冷痰包心腸腹病痛痃癖氣塊

齒痛益陽事強志

甄權治頭風喉痹癰腫疔毒

時珍

烏喙一名兩頭尖氣味辛微溫有大毒

普曰雷公桐君

神農

黃帝有毒權曰苦辛主治

大熱○畏惡同烏頭

別錄

男子腎氣衰弱陰汗癩癪歲月不消

甄權主大風

寒熱厯節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎

別錄

主大風

頑痹

時珍

射罔氣味

苦有大毒之才曰溫

大明日人中射罔

冷水

薺

荳皆

主治

戶疰癥堅及頭中風痺

別錄

瘻瘍

可一味禦之

戶疰癥堅及頭中風痺

別錄

瘻瘍

瘡根結核癰癧毒腫及蛇咬先取塗肉四畔漸漸

近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水塗之若無

膿水有生血及新傷破卽不可塗立殺人

器藏

發明

時珍曰草烏頭射罔乃至毒之藥非若川烏頭附子人所栽種加以釀制殺其毒性之比

自非風頑急疾不可輕投甄權藥性論言其益陽事治男子腎氣衰弱者未可遽然也此類止能搜風勝溼開頑痰治頑瘡以毒攻毒而已豈有川烏頭附子補右腎命門之功哉吾斬郝知府自負知醫因病風癬服草烏頭木鱉子藥過多甫入腹而麻痹遂至不救可不慎乎權曰烏喙形如烏嘴其氣鋒銳宜其通經絡利關節尋蹊達徑而直抵病所煎爲射罔能殺禽獸非氣之鋒銳捷利能如是乎楊清叟曰凡風寒溼痹骨內冷痛及損傷入骨年久發痛或一切陰疽腫毒並宜草烏頭南星等分少加肉桂爲末薑汁熱酒調塗未破者能內消久潰者能去黑爛二藥性味辛烈能破惡塊逐寒熱遇冷卽消遇熱卽潰

附方

舊四新

陰毒傷寒

生草烏頭爲末以葱頭蘸藥納穀道中名提盆散

王海藏陰證畧

二便不通

卽上方名

中風癱瘓

手足掉言語

蹇濤左經丸

用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去

皮二兩乳香沒藥各一兩爲末生烏豆一升以斑

蝥三七箇去頭翅同煮豆熟去蝥取豆焙乾爲末

和勻以醋麵糊丸梧子大每服三十丸溫酒下

簡易癱瘓頑風

骨節疼痛下元虛冷諸風痔漏下

方尖各三錢硫黃麝香丁香各一錢木鼈子五箇爲末

以熟蘄艾揉軟合成一處用草紙包裹燒熏痛

處名雷丸

孫天仁集效方

諸風不遂

宋氏集驗方

頭晚蠶沙等分爲末取

湯生地龍搗和入少醋糊丸梧子大每服四五丸白

湯下甚妙勿多服恐麻人名鄂渚小金丹○經驗

濟世方用草烏頭四兩去皮大豆半升鹽一兩同

以沙瓶煮三伏時去豆將烏頭入木臼搗三百杵

作餅焙乾爲末酒糊丸梧子大

每空心鹽湯下十丸名至寶丹

一切頑風

神應丹用生草

烏頭生天麻各洗等分搗爛絞汁領盆中砌一小坑其下燒火將盆放坑上每日用竹片攬一次夜則露之曬至成膏作成小錠子每一錠分作三服用心葱薑自然汁和好酒熱服乾坤秘韞

切風證 不問頭風痛風黃鴉吊腳風癆生淮烏頭
一斤生川烏頭一枚生附子一枚並爲末
葱三斤薑一斤搗如泥和作餅子以草鋪盤內加
楮葉於上安餅於葉上又鋪草葉蓋之待出汗黃
一日夜乃曬之春爲末以生薑取汁煮麵糊和丸
梧子大初服三十丸日二服服後身癆汗出卽愈
避風坤秘韞乾

破傷風病 壽域方用草烏頭爲末每以一二分溫酒服之出汗○儒門事親方用草烏尖白芷并生研末每服半錢冷
酒一盞入葱白一根同煎服少頃以葱白熱粥投
之汗出卽愈

年久麻痺 或歷節走氣疼痛不仁不拘男女神授散用草烏頭半斤去皮冷
爲末以袋一箇盛豆腐半袋入烏末在內再將豆腐填滿壓乾入鍋中煮一夜其藥卽堅如石取出

曬乾爲末每服五分冷風溼氣以生薑湯下之活人心統

風溼痹

木

黑神丸草烏頭連皮生研五靈脂等分爲末六月六日滴水丸彈子大四十歲以下分六服病

甚

一丸作二服薄荷湯化

下覺微麻爲度

本事方風溼走痛

兩頭尖五靈脂

脂各

大每服十丸至三十丸臨臥溫酒下忌油膩溼麪

孕婦勿服

瑞竹堂方腰腳冷痛

烏頭三箇去皮臍研末醋

瑞竹堂方

腰腳冷痛調貼須臾痛止

十便良

方

膝風作痛及安護膝內能除風溼健步扶壽

方

膝風作痛及安護膝內能除風溼健步扶壽

方

遠行腳腫如草鞋以水微溼摻之用之可行千

里甚

妙腳氣掣痛或膀胱有核生草烏頭大黃木

經驗

籠子作末薑汁煎茶調貼之○

又法草烏一味爲末

或酒糟同搗貼之永類方溼滯足腫用草烏頭重

一兩以生薑一兩同研交感一宿各焙乾爲末酒糊丸梧子白一兩同研交感一宿各焙乾爲末酒糊丸梧子

大每服五十丸酒下

除風去溼

治脾胃虛弱久積冷氣飲食減少用

草烏頭一斤蒼朮二斤以去白陳皮半斤生甘草四兩黑豆三升水一勺同煮乾只揀烏朮曬焙爲

末酒糊丸梧子大焙乾收之每空心溫酒下二偏三十丸覺麻卽漸減之名烏朮丸

集簡方偏

正頭風草烏頭四兩川芎蕎四兩蒼朮半斤生薑四兩連鬚生葱一把搗爛同入瓷瓶封固

理土中春五夏三秋五冬七日取出曬乾揀去葱薑爲末醋麵糊和丸梧子大每服九丸臨臥溫酒

下立效戴久患頭風草烏頭尖生用一分赤小豆三十五粒麝香一字爲

古渝經驗方

方

久患頭風

草烏頭尖生用一分赤小豆三十五粒麝香一字爲

末每服半錢薄荷湯冷服更隨左右噙鼻指南方

風痰頭痛

體虛傷風停聚痰飲上厥

頭痛或偏或正草烏頭炮去皮尖半兩川烏頭生去皮尖一兩藿香乳香三皐子大爲末每服二錢

薄荷薑湯下食後

女人頭痛

血風證草烏頭梔子等分爲末自然葱汁

隨左右調塗

太陽及額上

腦洩臭穢

草烏去皮半兩蒼朮一兩

勿過眼避風

濟生方

耳鳴耳癢

川芎二兩並生研末麵糊丸綠豆大

每服十丸茶下忌一切熱物

聖濟總錄

如流水及風聲不治成聾用生烏頭掘得乘溼削

如棗核大塞之日易二次不三日愈

千金方

喉痹口噤

不開欲死草烏頭阜莢等分爲末入麝香少許擦牙并噙鼻內

牙關自開也○

濟生方用草烏尖石膽等分爲末每用一錢醋煮

阜莢汁調稀掃入腫上流涎數次其毒即破也○

虛壅口瘡

滿口連舌者草烏一箇南星一箇生薑

一大塊爲末睡時以醋調塗手心足心

或以草烏頭吳茱萸等分爲末蜜調塗足心

本事方

分爲瘡蝕口鼻穿透者草烏炒黑一兩細辛一錢

爲末點之入麝香等分

風蟲牙痛草烏炒黑一兩細辛一錢

爲末揩之吐出涎○一方

草烏食鹽同炒黑
掺之海上方

寒氣心疝

三十年者射罔食茱萸等分爲末蜜丸一

巴豆一

麻子大每酒下二丸日三服

劉國

寒瘡積瘡

一枚去心

皮射罔去皮如巴豆大大棗去皮一枚搗成丸梧子大滿旦先發時每服一丸白湯下

肘後方

脾寒厥瘡

先寒後熱名寒瘡但寒不熱面色黑者

名厥瘡寒多熱少面黃腹痛名脾瘡三

者並宜服此賈耘老用之二十年累試有效不蛀

草烏頭削去皮沸湯泡二七度以蓋蓋良久切焙

研稀糊丸梧子大每服三十丸薑十片棗三枚葱

三根煎湯清早服以棗壓之如人行十里許再一

服絕勿飲湯便不發也

蘇東坡良方

腹中癥結

害妨飲食羸瘦射罔二兩椒三百粒

鴉末雞蛋白和丸麻子大每服十丸以愈爲度

大漸至三丸時後方

水泄寒痢

大草烏一

兩以一半生研一半燒灰醋糊和丸綠豆大每服

卷丸井華水下忌生冷魚肉十便良方

本草綱目卷一百一十一
痢注下

莊神丸治清濁不分泄瀉注下或赤或白腹臍刺痛裏急後重用草烏頭三箇去皮

尖以一箇火炮一箇醋煮一箇燒灰爲末醋糊丸

緣豆大每服二十丸水瀉流水下赤痢甘草湯下

白痢薑湯下忌魚腥

生冷和劑局方

結陰下血

腹痛草烏頭蛤粉炒去皮臍切一兩

茴香炒三兩每用三錢水一盞入鹽少許煎八分去滓露一夜五更冷服

聖濟錄老人遺

屎不知出者草烏頭一兩童便浸七日去皮同鹽

炒爲末酒糊丸緣豆大每服二十丸鹽湯下

曹濟不知出者草烏頭爲末津調點肛門內痔卽反出

乃用枯痔藥點之外科集驗方

疔毒初起

草烏頭七箇川烏頭三箇杏仁九箇飛羅麪一兩爲末無根水調搽留口以紙

蓋之乾則以水潤

疔毒惡腫生烏頭切片醋熬成膏攤貼次日根出○

之唐瑤經驗方

又方兩頭尖一兩巴豆四箇

搗點疗自拔出

曹濟方

疔瘡發背草烏頭去皮爲末用

葱白連鬚和搗丸豌豆大以雄黃爲末每服一丸先將葱一根細嚼以熱酒送下或有惡心嘔三四

口用冷水一口止之卽臥以被厚蓋汗出爲度亦治頭風乾坤秘韞

背疔瘡便毒等證二烏膏用草烏頭川烏頭于瓦上以井華水磨汁塗之如有口卽塗四邊乾再上

亦可單用草烏磨醋塗之永類方大風癬瘡遍身黑色肌體麻木

斤刮洗去皮極淨攤乾以清油四兩鹽四兩同入

銚內炒令深黃色傾出剩油只留鹽并藥再炒令黑烟出爲度取一枚擘破心內如米一點白者始

好自多再炒乘熱杵羅爲末醋麪糊丸梧子大每服三十丸空心溫酒下草烏性毒難制五七

日間以黑豆煮粥食解其毒繼洪澹寮方遍身陰囊兩腳尤甚者草烏一箇去膜煨熟竹刀

一切搗醋糊丸緣豆大每服三丸空心鹽湯下澹寮方一切諸瘡未破者草

十九丸搗醋糊丸緣豆大每服三丸空心鹽湯下澹寮方一切諸瘡未破者草

入輕粉少許臘豬初作未破作寒熱草烏頭油和搽普濟方癰癩初作半兩木鼈子二箇以

米醋磨細入搗爛葱頭蚯蚓糞少許調勻傳上以紙條貼令通氣孔妙醫林正宗馬汗入

瘡腫急療之遲則毒深以生烏頭末傳瘡口良久有黃水出卽愈靈苑方蛇蠍蟄

人射罔傳之頻易血中沙蠶毒射罔傳之
出愈梅師方佳干金

白附子

別錄
下品

釋名

見後發
明下

集解

別錄曰白附子生蜀郡三月采宏景曰此物

久絕無復真者恭曰本出高麗今出涼州以西蜀郡不復有生砂磧下溼地獨莖似鼠尾草細葉周匝生於穗間根形似天雄珣曰徐袁南州異

物記云生東海新羅國及遼東苗與附子相似時根正如草烏頭之小者長寸許乾者皺文有節

氣味辛甘大溫有小毒

保昇曰甘辛溫大明曰無毒珣曰小毒入藥炮用果

藥勢上行

主治

心痛血痹面上百病行

藥勢

別錄中

風失音

一切冷風氣面肝癰疵

明諸風冷氣足弱

無力疥癬風瘡陰下溼癰頭面痕入面脂用

李補

肝風虛

好風痰震亨

發明

時珍曰白附子乃陽明經藥因與附子相似故得此名實非附子類也按楚國先賢傳云

孔休傷頰有癰王莽賜玉屑白附子香與之消癰

附方

新十

中風口喎

半身不遂牽正散用白附子白僵蠶全蠍並等分生研爲

末每服二錢熱酒調

小兒暑風

暑毒入心痰塞心孔昏迷搐搦此乃楊氏家藏方

危急之證非此丸生料瞑眩之劑不能伐之三生丸用白附子天南星半夏並去皮等分生研豬膽汁和丸黍米大量兒大小以薄荷湯下令兒側臥嘔出痰水卽甦全幼心鑑頭痛氣鬱胸膈不利白附子炮去皮膚半斤石膏燬紅半斤硃砂二兩二錢半龍腦一錢爲末粟米飯丸小豆大每服三十丸食後茶酒任下御藥院方

偏正頭風

白附子天

角去皮等分爲末

食後茶清

痰厥頭痛

白附子天

服仰臥少頃普濟本事方

等分生研爲末

生薑自然汁浸蒸餅丸

南星半夏

豆大每服四十丸食後薑湯下

濟生方

綠

子爲

斑白附子硫黃等分爲末

薑汁調

面上膏

自附

稀茄蒂蘡擦日數次

簡便方

赤白汗

子爲

末臥時漿水洗面以白蜜和塗紙

耳出膿水

白附

子炮

羌活一兩爲末

豬羊腎各一箇

入末半

聖濟錄

溼紙包煨熟五更食溫酒下

一箇每箇入末半

喉痹

腫痛

白附子末枯礬等分研末塗舌上有涎吐出

偏墜疝氣

白附子一箇爲末津調填臍上以艾灸三

箇或五壯卽愈

楊起簡便方

小兒吐逆

不定虛風喘急

白附子末

附子藿香等分

保幼大全方

每米半兩天南星

慢脾驚風

白附子半

水煎服亦治大人風虛止吐化痰宣和閒真

二錢生薑

兩天南星

下半錢

保幼大全方

並炮去皮爲末

每服二錢生薑

全方

慢脾驚風

白附子半

水煎服亦治大人風虛止吐化痰宣和閒真

二錢生薑

兩天南星

五片水煎服亦治大人風虛止吐化痰宣和閒真

並炮去皮爲末

每服二錢生薑

全方

慢脾驚風

白附子半

水煎服亦治大人風虛止吐化痰宣和閒真

二錢生薑

全方

慢脾驚風

虎掌

本品經

天南星

宋開寶

釋名

虎膏

綱目

鬼蒟蒻

日華

恭曰其根四畔有圓牙

看如虎掌故有此名

領曰天

南星

卽本草虎掌也

小者名由跋古方多用虎掌

近出唐人中風痰毒方中用之

不言天南星南星

出唐人中風痰毒方中用之

乃後人採用別立此名爾時珍曰虎掌因葉形似

之非根也南星因根圓白形如老人星狀故名南

星

因根圓白形如老人星狀故名南

星

本品經

天南星

宋開寶

星卽虎掌也蘇恭說甚明白宋開寶不當重出南星條今併入

集解

別錄曰

虎掌生漢中山谷及兔甸

二月八月

近道亦有形似半夏但大而

三四片方藥不甚

形似半夏但大而

三四片方藥不甚

形似半夏但大而

三四片方藥不甚

四邊有子如虎掌今用多破作三四片方藥不甚

用也恭曰此是由跋宿根其苗一莖莖頭一葉枝

丫扶莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿四畔

有圓牙看如虎掌由跋是新根大如半夏二三倍

有四畔無子牙陶說似半夏乃由跋也保昇曰莖頭

藏器曰天南星生安東山谷

初生根如豆大漸長大似半夏而扁年久者根圓及

寸大者如雞卵周匝生圓芽三四枚或五六枚三

四月生苗高尺餘獨莖上有葉如爪五六出分佈

三尖而圓一莖時出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙莖作房旁開一口上下尖中

地有花微青褐色結實如麻子大熟卽白色自落布子生一窠九月苗殘取根今冀州人菜圃中

種之呼爲天南星又曰天南星處處平澤有之二
月生苗似荷梗其莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝
相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石
榴子紅色二月八月采根似芋而圓扁與蒟蒻相
類人多誤采了不可辨但蒟蒻莖斑花紫南星根
掌也大者四邊皆有牙子采時削去之江州一種
草葉大如掌面青背紫四畔有牙如虎掌生三四
葉爲一本冬青不結花實治心疼寒熱積氣亦與
虎掌同名故附見之時珍曰大者爲虎掌南星小
者爲鬼臼小者爲南星殊爲謬誤

脩治

七日換三四遍洗去涎暴乾用或再火炮
裂用時珍曰凡天南星須用一兩以上者佳治風
痰有生用者須用溫湯洗淨仍以白礬湯或入阜
角汁浸三日夜日換水暴乾用若熟用者須與
黃土地掘一小坑深五六寸以炭火燒赤以好酒

沃之安南星於內瓦盆覆定灰泥固濟一夜取出
用急用卽以溼紙包於塘灰火中炮裂也一法治
風熱痰以酒浸一箇桑柴火蒸之常灑酒入飯內
令氣猛一伏時取出竹刀切開味不麻舌爲熟未
熟再蒸至不麻乃止脾虛多痰則以生薑渣和黃
泥包南星煨熟去泥焙用造南星麴法以薑汁礬
湯和南星末作小餅子安籃內楮葉包蓋待上黃
衣乃取曬收之造膽星法以南星生研末臘月取
繫懸黃牯牛膽汁和劑納入膽中
風處乾之年久者彌佳

氣味苦溫有大毒

別錄曰

微寒

普曰

虎掌神農雷

公苦有毒岐伯桐君

辛有有毒大

明曰平

杲曰

苦辛有毒

陰中之陽可升可降

乃肺經之本藥震亨曰欲其下行以黃藥引之之

才曰蜀漆爲之使惡莽草大明曰畏附子乾薑生

薑時珍曰得防風則不麻得牛膽則不燥得火炮

則不毒生能伏

雄黃丹砂焰消

主治

心痛寒熱結氣積聚伏梁傷

筋痿拘緩利水道

本經

除陰下溼風眩

別錄

主癥瘕腸

痛傷寒時疾強陰

甄權

天南星主中風麻痺除痰下

氣利腎膈攻堅積消癰腫散血墮胎

開寶

金瘡折傷

瘀血擣傅之

藏器

蛇蟲咬疥癬惡瘡

大明

去上焦瘀及

眩運

元素

主破傷風口噤身強

李杲

補肝風虛治痰功

同半夏

好古

治驚癇口眼喎斜喉痹口舌瘡糜結核

解顱

時珍

發明

時珍

日虎掌天南星乃手足太陰脾肺之藥

溼除涎性緊而毒故能攻積拔腫而治口喎舌糜

楊士瀛直指方

云諸風口噤宜用南星更以人參

石菖蒲

附方

舊十新

中風口噤

目暝無門下藥者開關散用天南星爲末入白龍腦

等分五月五日午時合之每用中指點末揩齒二十遍揩大牙左右其口自開又名破棺散

經

三十指大牙左右其口自開又名破棺散

驗方諸風口噤

天南星炮剉大人三錢小兒三字生薑五片蘇葉

一錢水煎減半入雄豬膽汁少許溫服

膽汁少許溫服

仁齋直指方小兒口噤

牙關不開天南星一枚煨熟紙裏斜包翦一小孔透氣于口中牙關自開也○

孔透氣于口中牙關自開也○

方用生南星同薑汁擦之自開

小兒驚風墜涎

天南星一兩重一箇換酒浸七伏時取出安新瓦

上週迴炭火炙裂合溼地出火毒爲末入硃砂一

分每服半錢荆芥湯調下每日一服

空心一服午時一服

經驗方吐瀉慢驚

天王散治小兒

吐瀉或誤服冷藥脾虛生風痰慢驚天南星一

錢者去臍黃土坑深三寸炭火五斤煅赤

入好酒半盞安南星在內仍架炭三條在上候發裂取剉再炒熟爲末用五錢天麻煨熟研末一錢

麝香一字和勻三歲小兒用半錢以生薑防風煎湯調下亦治久嗽惡心一錢乙小兒方

風癇

疾迷墜痰丸用天南星九蒸九曬爲末一錢乙小兒方

風癇

夢冬湯亦可丸梧子大每服二十丸人參湯下石菖蒲麥

調服衛生寶鑑二字○治癩利痰天南星煨香一兩硃砂一

全幼心鑑每防風湯化下口眼喎斜天南星生研末自然薑

一丸普濟方

汁調之左貼右右貼左

存方仁角弓反張灌下一錢仍灸印堂摘玄方破

傷中風及破傷風傷溼發病強直如癩狀者天南

星防風等分爲末水調敷瘡出水爲妙仍以溫酒調服一錢已死心尚溫者熱童便調灌二錢

內傷墜壓者酒和童便連灌三服卽甦亦可煎服

三因方

破傷風瘡

生南星末水調

塗瘡四圍水出

婦人頭風

攻目作痛天南星一箇掘地坑燒赤安藥於中

有效以醋一盞沃之蓋定勿令透氣候冷研末

每服一字以酒調下重者半錢

千金方風痰頭

痛不可忍天南星一兩荆芥葉一兩爲末薑汁糊

丸梧子大每食後薑湯下二十丸○又上清丸

用天南星茴香等分生研末鹽醋煮麵

糊丸如上法服並出經效濟世方

目眩吐逆煩憊飲食不下玉壺丸用生南星生半

夏各一兩天麻一兩白麪一兩爲末水丸梧子大

每服三十丸以水先煎沸入藥煮五七沸

瀝出放溫以薑湯吞之

惠民和劑局方腦風流

涕邪風入腦鼻內結硬遂流髓涕大白南星切片

沸湯泡二次焙乾每用二錢棗七箇甘草五分

同煎服三四服其硬物自出腦氣流轉髓涕自收

以大蒜華芨末作餅隔紗貼額前熨斗熨之或以

香附
鼻中直指方

小兒風痰

熱毒壅滯涼心壓驚抱龍丸用牛膽南星

一兩入金錢薄荷十片丹砂一錢半龍腦麝香各一字研末煉蜜丸芡子大每服一丸竹葉湯化下

全幼壯人風痰及中風中氣初起星香飲用南心鑑

十四片煎六分溫王碩易簡方

痰迷心竅壽星丸治心膽被驚

服竅恍惚健忘妄言妄見天南星一斤先掘土坑一尺以炭火三十斤燒赤入酒五升滲乾乃安南星

在內益覆定以灰塞之勿令走氣次日取出爲末

琥珀一兩硃砂二兩爲末生薑汁打麪糊丸梧子

大每服三十丸至五十丸煎人參石菖蒲湯下一日三服

和劑局方

風痰注痛方

羊鷄下痰溼臂痛右邊者天南星蒼朮等分生薑

三片水煎服之摘玄方

風痰

欬嗽大天南星一枚炮製研末每日早晚各一服

薑三分溫服

薑三片煎五分溫服每日早晚各一服

抱龍丸用牛膽南星

十全博濟

氣痰欬嗽

玉粉虫南星麴半夏麴陳橘皮各

子大每服四十丸

薑湯下

自然薑汁打糊丸如梧

橘皮

加官桂

東垣

蘭室秘藏

清氣化痰丸治

中脘

氣滯痰涎煩悶

頭目不清生南星去皮半夏

各五錢並湯炮

七次爲末自然薑汁和作餅鋪竹

篩內以楮葉包覆待生黃成麴曬乾每用二兩入

香附末一兩糊丸梧子大每服四十丸

食後薑湯炮各一兩砂仁二錢半爲末

百合一選方

王璆溫中散滯消導飲食天南星炮高良薑

薑汁糊丸梧子大每五

十丸薑湯下和劑方

酒積酒毒服此卽解天南

南星一斤土坑燒赤沃酒一斗

入坑放南星盆覆

泥固濟一夜取出酒和水洗淨切片焙乾爲末入

硃砂末一兩薑汁麵糊丸梧子大每服五十丸薑

湯下蔡丞呂丞相嘗用有驗楊氏家藏方

吐泄不止名回陽散

四肢厥逆虛風不省人事服此則陽回

天南星爲末每服三錢京東回

三枚

水二鍾煎八分溫服未省再服○

醋調南星末貼足心

普濟方

腸風瀉血

不

諸藥

丸梧子大每酒下二十丸

普濟方

炒焦黃色爲末酒

吐血

不

止

天南星一兩剉如豆大

以爐灰汁浸一宿洗焙

研末每服一錢以自然銅磨酒調下

勝金方

初生貼頤

頭熱鼻塞者

天南星炮爲末水

調危氏得效方

小兒

解顱

頤開不合鼻塞不通

天南星炮去皮爲末淡

醋調紺帛上貼頤門炙手頻熨之立效

錢

乙小兒直訣

解顱脫臼

不能收上用南星末

塗兩頰一夜卽上

醫說

小兒口瘡

白屑如鶯口

不須服藥以生天南星去皮

兒口瘡

白屑如鶯

臍研末醋調塗足心

男左女右

閻孝忠

集效走馬疳

透骨穿腮生南星一箇

當心剜空

方以蓋子合定出火毒

去麴爲末入麝

風蟲牙痛

當心剜空

少許拂瘡數日甚效

香以蓋子合定出火毒

去麴爲末入麝

風蟲牙痛

當心剜空

經驗方

南

末塞孔以霜梅署

摘玄方

喉風喉痺

天南星七枚

白僵蠶紙包煨

入人皮

熟研末薑汁調服一錢

甚者灌聖散

博濟方

癰瘤結核

南星膏治人皮

入人皮

肌頭面上生瘤及結核

大者如拳小者如栗或鮀

或硬不疼不癢宜用此藥不可輒用鍼灸生天南

星大者一枚研爛滴好醋五七點如無生者以乾

者爲末醋調先用鍼刺令氣透乃貼之覺癢則頻

貼取效

生方嚴子之

醋調南星末塗

簡易方

由跋

本經下品

釋名

集解

恭曰由跋是虎掌新根大于半夏一二倍四

生林下苗高一尺似蒟蒻根如雞卵保昇曰春抽

莖端有八九葉根圓扁而肉白時珍曰此卽

畔未有子牙其宿根卽虎掌也藏器曰由跋

莖下苗高一尺似蒟蒻根如雞卵保昇曰春抽

時珍曰此卽

天南星之小者其氣未足不堪服食故醫方罕用
惟重八九錢至一兩餘者氣足乃佳正如附子之
側子不如附子之義也

正誤

宏景曰由跋本出始興今人亦種之狀如烏
翫而布地花紫色根似附子苦酒磨塗腫亦

效恭曰陶氏所說乃鳶尾根卽鳶頭也又言虎掌
似半夏是以鳶尾爲由跋以由跋爲半夏非惟不
識半夏亦不識鳶尾與由跋也今南人猶以由跋
爲半夏時珍曰陳延之小品方亦以東海鳶頭爲
由跋則其訛誤久矣

氣味辛苦溫有毒主治毒腫結熱

本

蒟蒻

宋開

釋名

蒟蒻

開

鬼芋

圖經

鬼頭

集解

志曰：蕷頭出吳蜀，葉似由跋半夏，根大如盤，生陰地，雨滴葉下生子，又有斑杖苗相似，至

秋有花直出，生赤子根，如蕷頭毒猛不堪食，虎杖亦名斑杖，與此不同。頌曰：江南吳中出白蕷，蕷亦

曰鬼芋，生平澤極多人采以爲天南星，了不可辨，市中所收往往是此，但南星肌細膩而蕷蕷莖斑

花紫，南星莖無斑花黃爲異爾。時珍曰：蕷出蜀中，施州亦有之，呼爲鬼頭，閩中人亦種之，宜樹陰

下掘坑積糞，春時生苗至五月移之，長一二尺，與

南星苗相似，但多斑點，宿根亦自生苗，其滴露之說，蓋不然。經二年者，根大如盤，及芋魁，其外理白

味亦麻，人秋後采根須淨擦或搗或片段以釀灰汁，煮十餘沸，以水淘洗換水更煮五六遍，即成凍

子切片，以苦酒五味淹食，不以灰汁則不成也。切作細絲，沸湯汋過，五味調食，狀如水母絲，馬志言

其苗似半夏，楊慎丹鉛錄言：蒟蒻卽此者皆誤也。王禎農書云：救荒之法，山有粉葛、蒟蒻、橡栗之利，則此物亦有益于民者也。其斑杖卽天南星之類。

有班

根氣味辛寒有毒

李廷飛曰性冷甚不益人冷氣人少食之生則戟人喉出血

主治癰腫風毒摩傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五

味調食主消渴

開寶

發明

機曰按三元延壽書云有人患瘻百物不忌見隣家脩菊弱求食之美遂多食而瘻愈又

有病腮癰者數人多食之亦皆愈

附錄菩薩草

宋圖經頌曰生江浙州郡凌冬不凋

根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傳之婦人妊娠嗽搗篩蜜丸服效

半夏

本經下品

釋名守田

本經水玉

本經地文

別錄和姑

本經時珍曰禮

記月令五月半

夏生蓋當夏之半也故名守田會意水玉因形

集解

別錄曰乾

普曰半夏生

槐里川谷

五月八月采根暴

白花圓上

宏景曰槐里屬扶風

今第一出青

野中二月始生葉三三

州

相偶吳申亦有以肉白者爲佳不厭陳久恭曰所在

皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白爲勝然江

者大乃徑寸南人特重之頃來互用功狀殊異其

苗似是由跋誤以爲半夏也

頌曰在處有之以齊

州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似

竹葉而生江南者似芍藥葉根下相重上大下小

皮黃肉白五月八月采根以灰裹二日湯洗暴乾

蜀圖經云五月采則虛小八月采乃實大其平澤

生者甚小名羊眼半夏由跋絕類半夏而苗不同數曰白傍蕤子真似半夏

只是咬着微酸不入藥用

脩治

宏景曰 凡用以湯洗十許過令滑盡不爾有

毒載人咽喉方中有半夏必須用生薑者以

兩

鹽醋六兩攬濁將半夏投中洗三遍用之若洗

制其毒故也

敷曰脩事半夏四兩用白芥子末二

洗去皮垢以湯泡浸七日逐日換湯泡乾切片薑

汁拌焙入藥或研爲末以薑汁入湯浸澄三日瀝

去涎水曬乾用謂之半夏粉或研末以薑汁和作

餅子曬乾用謂之半夏餅或研末以薑汁白礬湯

和作餅楮葉包置籃中待生黃衣曬乾用謂之半

夏麴白飛霞醫通云痰分之病半夏爲主造而爲

麴尤佳治溼痰以薑汁白礬湯和之治風痰以薑

汁及阜莢煮汁和之治火痰以薑汁竹沥或荆沥

和之治寒痰以薑汁礬湯入白芥子末和之此皆

法也 造麴妙

根氣味辛平有毒

別錄

曰 生微寒熟溫生令人吐

熟令人下湯洗盡滑用元素

味辛苦性溫氣味俱薄沈而降陰中陽也好古曰
辛厚苦輕陽中陰也入足陽明太陰少陰三經之
才曰射干爲之使惡阜莢畏雄黃生薑乾薑秦皮
龜甲反烏頭權曰柴胡爲之使忌羊血海藻飴糖
元素曰熱痰佐以黃芩風痰佐以南星寒痰佐以
乾薑痰痞佐以陳皮白朮多用則瀉脾胃諸血證
及口渴者禁用爲其燥津液也孕婦忌之用生薑則無害
主治傷寒寒熱心下堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗 本經消氣嘔逆消癰腫瘻黃悅澤面目墮胎錄 別經消
心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時
肺氣開胃健脾止嘔吐去胸中痰滿生者摩癰腫
除瘤癰氣甄權治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘻

大明治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬消胸中痞膈上

痰除胸寒和胃氣燥脾溼治痰厥頭痛消腫散結

元素

治眉稜骨痛

震亨

補肝風虛

好古

除腹脹目不得瞑

白濁夢遺帶下

時珍

發明

權曰半夏使也虛而有痰氣宜加用之頌曰胃冷嘔噦方藥之最要成無己曰辛者散也

潤也半夏之辛以散逆氣結氣除煩嘔發音聲行水氣而潤腎燥好古曰經云腎主五液化爲五溼

自入爲唾入肝爲泣入心爲汗入脾爲痰入肺爲涕有痰曰嗽無痰曰欬痰者因欬而動脾之溼也

半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以爲流溼

潤燥也俗以半夏爲肺藥非也止嘔吐爲足陽明除痰爲足太陰柴胡爲之使故今柴胡湯中用之

雖爲止嘔亦助柴胡黃芩主往來寒熱是又爲足少陽陽明也〔宗奭曰〕今人惟知半夏去痰不言益脾蓋能分水故也脾惡溼溼則濡困則不能治水經云水勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩半夏大棗各三十枚水一升瓷瓶中慢火燒爲熟水時呷之便已也〔趙繼宗曰〕丹溪言二陳湯治一身之痰世醫執之凡有痰者皆用夫二陳內有半夏其性燥烈若風痰寒痰溼痰食痰則相宜至于勞痰失血諸痰用之反能燥血而加病不可不知〔機曰〕俗以半夏性燥有毒多以貝母代之貝母乃太陰肺經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃經之藥何可代也夫欬嗽吐痰虛勞吐血或痰中見血諸鬱咽痛喉痹肺癰肺痿癰疽婦人乳難此皆貝母爲向導半夏乃禁用之藥若涎者脾之液美味膏粱炙燉皆能生脾胃溼熱故涎化爲痰久則痰火上攻令人昏憒口噤偏廢僵仆蹇濶不語生死旦夕自非半夏南星曷可治乎若以貝母代之則翹首待斃矣〔時珍曰〕脾無留溼不生痰故脾

爲生痰之源肺爲貯痰之器半夏能主痰飲及腹脹者爲其體滑而味辛性溫也涎滑能潤辛溫能散亦能潤故行溼而通大便利竅而泄小便所謂辛走氣能化液辛以潤之是矣潔古張氏云半夏南星治其痰而欬嗽自愈丹溪朱氏云二陳湯能使大便潤而小便長聊攝成氏云半夏辛而散行水氣而潤腎燥又和劑局方用半硫丸治老人虛秘皆取其滑潤也世俗皆以南星半夏爲性燥誤矣溼去則土燥痰涎不生非二物之性燥也古方治咽痛喉痹吐血多用二物非禁劑也二物亦能散血故破傷打撲皆主之惟陰虛勞損則非溼熱之邪而用利竅行溼之藥是乃重竭其津液醫之罪也豈藥之咎哉甲乙經用治夜不眠是果性燥者乎岐伯云衛氣行于陽陽氣滿不得入于陰陰氣虛故目不得瞑治法飲以半夏湯一劑陰陽既通其臥立至方用流冰千里者八升揚之萬遍取清五升煮之炊以葦薪大沸入秫米一升半夏五合煮一升半飲汁一盃日三以知爲度病新

發者覆盆則臥汗蹟
則已久者三飲而已

附方

舊十五新

法制半夏

清痰化飲壯脾順氣用
大半夏湯洗七次焙乾

再洗如此七轉以濃米泔浸一日夜每一兩用白
礬一兩半溫水化浸五日焙乾以鉛白霜一錢溫
水化又浸七日以漿水慢火內煮沸焙乾收

夏法

消風熱清痰涎降氣利咽大半夏湯浸焙制

如上法每一兩入龍腦五分硃砂爲衣染之

先鋪燈草一重約一指厚排半夏于上再以燈草
蓋一指厚以炒豆焙之候乾取出每嚼一兩粒溫
水送下○
化痰鎮心 祛風利膈辰砂半夏丸用半
御藥院方 夏一斤湯泡七次爲末篩過
以水浸三日生絹瀘去滓澄清去水曬乾一兩入
辰砂一錢薑汁打糊丸梧子大每薑湯下七十丸
此周府方珍化痰利氣見虎掌下方消痰開胃去胸
也 袖珍化痰利氣三仙丸方下消痰開胃壅滯主

門方用半夏湯泡焙乾爲末自然薑汁和作餅溼紙裹煨香以熱水二盞同餅二錢入鹽五分煎一盞服之大壓痰毒及酒食傷極驗○經驗用半夏天南星各二兩爲末水五升入罐內浸一宿去清

水焙乾重研每服二錢

中焦痰涎

利咽清頭目進飲食半夏泡七

水二盞

薑三片煎服

梧子大每薑湯下十五丸

寒痰加丁香五錢熱痰

次四兩枯礬一兩爲末薑汁打糊或煮棗肉和丸

加寒水石煅四兩名

玉液丸和劑局方老人風痰

大腑熱不識人及

夏泡七次焙消石半兩爲末入白麪搗勻

水和丸緣豆大每薑湯下五十丸

普濟膈壅風

半夏泡七次焙消石半兩爲末入白麪搗勻

曬乾爲末漿水搜作餅曬乾再研爲末每五兩

人生龍腦一錢以漿水濃腳和丸雞頭子大紗袋

盛避風處陰乾每服一丸好茶或薄荷湯嚼下

御藥方搜風化痰定志安神利頭目辰砂化痰丸用

半夏泡二兩天南星泡一兩辰砂

院方搜風化痰定志安神利頭目辰砂化痰丸用

半夏泡二兩天南星泡一兩辰砂

枯礬各半兩爲末薑汁打糊丸梧子大每服三十丸食後薑湯送下和劑局方

痰厥中

風省風湯用半夏湯泡八兩甘草炙二兩防風四兩每服半兩薑二十片水二盞煎服

奇效方

風痰頭運

丸用生半夏

生天南星寒水石煅各一

餅水煮浮起漉出搗丸梧子大每服五十丸薑湯

下極效亦治風痰

欬嗽二便不通

風痰溼痛丸半

夏一斤天南星半兩各湯泡曬乾爲末

薑汁和作半兩枳實末二兩薑

餅焙乾入神麴半兩白朮末

十丸薑湯下葉氏方

風痰喘逆

元欲倒半夏

一兩雄黃三錢爲末薑汁浸蒸餅丸梧子大每服三十丸

薑湯下已吐者加檳榔活法機要風

痰喘逆各一千緝湯用半夏湯洗七箇甘草炙阜莢炒

和一寸薑二片水一盞煎七分溫服

劑局

上焦熱痰嗽

錢薑汁打糊丸緣豆大每服七十二片黃芩末二

丸淡薑湯

食後服此周憲

王親制方也

袖珍方

末薑汁打糊丸

梧子大每服二三十丸

濟生方

熱痰嗽

仁各一兩爲

白湯下或以栝樓瓢煮熟丸

心痛脈洪數者小黃丸用半夏天

南星各一兩黃芩一兩半爲末

薑汁浸蒸餅丸梧

煩熱面赤口燥

心痛脈洪數者小黃丸用半夏天

子大每服五七十丸食後

下潔古活法機要

小兒痰熱

驚悸半夏南星等分

丸緣豆大每服三五丸

薑湯下摘元方

溼痰嗽

嗽面黃體重嗜臥驚兼食不消脈緩者

白朮一兩半爲末

薄糊丸梧

半夏南星各一兩白朮一兩半爲末

薑湯下活法機要

氣痰嗽

面白氣促酒漸惡寒愁憂不樂脈濇

者玉粉丸用半夏南星各一兩官桂半兩爲末

糊丸梧子大每服五十丸

薑湯下活法機要

小

結胸痛

正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主之半夏半斤黃連一兩栝樓實大者一

箇水六升先煮栝樓至三升去滓內二

味煮取二升分三服仲景傷寒論

溼瘀心痛

喘急者半夏油炒爲末粥糊丸綠豆

大每服二十丸薑湯下丹溪心法

急傷寒病

半夏

四錢生薑

七片酒一盞煎

結痰不出

語音不清年久者亦宜玉

粉丸半夏半兩桂心一字草烏頭一

浸蒸餅丸芡子大每服一丸夜臥含

藥一丸爲末薑汁活法機

要停痰冷飲

嘔逆橘皮各一兩每服四錢生薑

七片水熬熟陳水

二盞煎一盞溫

服和劑局方

停痰留飲胸膈滿悶氣短惡心飲

服和劑局方

半夏湯用半夏泡五兩茯苓三兩每服四錢薑

支甚捷徑和劑局方

七片水二鍾半煎七分

水支不喘似嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘

不嘔似嘔不嘔心下憒憒並宜

飲作嘔

不喘似嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘

不嘔似嘔不嘔心下憒憒並宜

小半夏湯用半夏泡七次一升生薑半升水
七升煮一升五合分服 張仲景金匱要略 嘘逆

欲死之卽上方也 半夏生薑湯主 痘瘡噦氣方 同

得下半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓五
兩切以水七升煎一升半分溫服之 金匱要畧

目不得眠 見發明下心下悸忪 等分爲末蜜丸小豆大
每服三十丸日服一錢七分半夏熟洗研末生薑湯

三金匱要畧傷寒乾椀 服一錢七分半夏熟洗研末生薑湯

嘔逆厥逆 內有寒痰半夏一升洗滑焙研小麥麪
一升水和作彈丸水煮熟初吞四五枚

忌羊肉餡糖此乃許仁則方也 外臺秘要
日三服稍增至十五枚旋煮旋吞覺病減再作嘔

吐反胃 大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升
水一斗二升和搗之一百二十遍煮取三升

升半溫服一升日再服亦治膈閒支飲 金匱要畧停痰留飲藿

半夏湯泡炒黃二兩藿香葉一兩丁香半兩
每服四錢水一盞薑七片煎服和劑局方

小兒

吐瀉

脾胃虛寒齊州半夏泡七次陳粟米各一錢
半薑十片水殘半煎八分溫服

錢乙小兒

小兒痰吐

或風壅所致或欬嗽發熱飲食卽吐半夏泡

和包丁香用麪重包煨熟去麪爲末生薑

自然汁和丸麻子大每服二三十丸陳皮湯下活幼口

妊娠嘔吐

半夏二兩人參乾薑各一兩爲末薑汁

仲景霍亂腹脹

半夏桂等分爲末水

金匱要略

腹脹服方寸匕肘後方

小兒腹

脹

半夏末少許酒和丸粟米大每服二丸薑湯下

不瘥加之或以火炮研末薑汁調貼臍亦佳

小便自利不可除熱半夏生薑各

子母秘錄

黃疸喘滿半斤水七升煮一升五合分再服

有人氣結而死心下暖以此

張仲景方伏暑引飲脾胃不利

少許入口遂活

消暑丸用

半夏醋煮一斤茯苓半斤生甘草半斤爲末薑汁
麪糊丸梧子大每服五十丸熱湯下和劑局方

老人虛秘

冷秘及痃癖冷氣半硫丸半夏泡炒生硫黃等分爲末自然薑汁煮糊丸如梧

子大每空心溫酒下

五十丸和劑局方失血喘急吐血下血崩中滿宿瘀用半夏追扁以薑汁和麴包煨黃研末米糊丸梧子大每服三十丸白湯下直指方

濁夢遺

炒黃出火毒去豬苓入煅過牡蠣一兩以半夏一兩洗十次切破以木豬苓二兩同山藥糊丸梧子大每服三十丸茯苓湯送下腎氣閉而一身精氣無所管攝妄行而遺者宜用此方

益半夏有利性豬苓導水使腎氣通也

與下元虛憊者不同許學士本事方八般頭風

三次見效半夏末入百草霜少許作紙撲燒烟就

鼻內噙之口中含水有涎吐去再含衛生寶鑑

少陰咽痛

生瘡不能言語聲不出者苦酒湯主之半夏七枚打碎雞子一枚頭開一竅去

黃納

苦酒令小滿入半夏在內以鑑子坐于炭火上煎三沸去滓置盃中時時薰之極驗未瘥更作

生半夏末噙鼻內

時時薰之極驗未瘥更作

傷寒

○仲景論

喉痹腫塞

涎出效

集簡方

骨哽在咽

半夏煎

白芷

等分爲末水服方寸匕

羊內外臺秘要

重舌木舌

脹大塞口

半夏煎

當嘔

出忌

羊內外臺秘要

重舌木舌

脹大塞口

半夏煎

兒癩陷

乃冷也水調半

夏末塗足心

面上黑氣

半夏焙研米醋

調敷不可見風

不計

遍數從早至晚如

此三日阜

摘元方

癩風眉落

生半夏羊

角湯

洗下面瑩如玉也

摘元方

癩風眉落

生半夏羊

屎燒焦

等分爲末自然

聖濟錄盤腸生產

產時子腸先出

盤腸產

以半夏末頻噙鼻

婦人

中則上也

婦人

貞方

產後運絕

半夏末冷水和丸大豆

納鼻中

卽愈此扁

法也

肘後方

小兒驚風

生半夏一錢卽大入鼻

名嘵驚散卽卒死不寤半夏末吹鼻中卽活南岳
甦直指方

卒死不寤

半夏末吹鼻中卽活南岳

夫人紫靈魏元君方也

五絕急病

一曰自縊二曰牆壓三曰溺水四曰魘
入鼻中心溫者一日癰疽發背及乳瘡半夏末雞
可活也子母秘錄隨左右噙鼻效

後吹嬾腫痛

半夏一箇研酒服立愈一方以末
打撲瘀痕卽沒也水調半夏末塗之一宿遠行足趼方同

金刃不出

入骨脈中者半夏白蘋等分爲末酒
服方寸匕日三服至二十日自出

李筌太飛蟲入耳

生半夏末麻油調塗耳門外本事方
白經

半夏末水調塗之立

錢相公篋中方相通者半夏末水
調塗之日二聖

咽喉骨哽

半夏白芷等分爲末水服方寸當嚙出
急牽肉外臺秘要

莖挺主治煉取塗髮眉墮落者卽生

雷數

蚤休

本經下品

釋名

蚩休

別錄華紫河車

圖經

重臺

唐本

重樓金線

唐三層草

綱目七葉一枝花

蒙筌草

甘遂

唐本

白甘遂

時珍

曰蟲蛇之毒得此治之卽休故有蚩休蟄休諸名
重臺三層因其葉狀也金線重樓因其花狀也甘
遂因其根狀也紫

河車因其功用也

集解

別錄曰蚩休生山陽川谷及冤句恭曰今謂

重樓金線者是也一名重臺南人名草甘遂

王孫鬼白蕨麻輩葉有二三層根

似鬼白牡丹年

參皮黃肉白五月采根曬乾

如肥大菖蒲細肌脆白保昇曰葉似鬼白牡丹年
久者二三重根如紫參皮黃肉白五月采根曬乾
大明曰根如尺二蜈蚣又如肥紫菖蒲頌曰卽紫

河車也今河中河陽華鳳文州及江淮閒亦有之
葉似王孫鬼臼等作二三層六月開黃紫花蕊赤
黃色上有金絲垂下秋結紅子根似肥薑皮赤肉
白四月五月采之宗奭曰蚤休無旁枝止一莖挺
生高尺餘巔有四五葉葉有歧似虎杖中心又起
莖亦如是生葉惟根入藥用時珍曰重樓金線處
處有之生于深山陰溼之地一莖獨上莖當葉心
葉綠色似芍藥凡二三層每一層七葉莖頭夏月
開花一花七瓣有金絲蕊長三四寸王屋山產者
至五七層根如鬼臼狀外紫中白有黏糯二
種外丹家采制三黃砂汞入藥洗切焙用俗諺云
七葉一枝花深山是我家癰疽如遇著一似手拈
擎是也

根氣味苦微寒有毒

大明日冷無毒伏雄黃丹砂蓬砂及鹽

主治驚

癰搖頭弄舌熱氣在腹中

本經

癰瘍瘻陰蝕下三

蟲去蛇毒

別錄

生食一升利水

唐本治胎風

手足搐能

吐泄癧癰

大明

去癧疾寒熱

時珍

發明

恭曰摩車足厥陰經藥也

甚有效時珍曰紫河

腫者宜之而道家有服食法不知果有益否也

附方

新五

服食法

紫河車根以竹刀刮去皮切作骰子大塊麪裹入瓷瓶中水煮候浮

漉出凝冷入新布袋中懸風處待乾

每服三丸五更初面東念咒并水下連進三服卽能休根若要

飲食先以黑豆煎湯飲之次以藥丸煮稀粥漸漸

食之咒曰天朗氣清金雞鳴吾今服藥欲長生吾

今不飢復不渴賴得神仙草有靈

下○慢驚發搐

小兒胎風

手足搐搦用蚤休半

錢冷水

衛生易簡方

慢驚發搐

帶有陽證者白甘遂末

休一錢枯樓根末二錢

同于慢火上炒焦黃研勻每服一字中鼠莽毒線
煎麝香薄荷湯調下 錢乙小兒方

中鼠莽毒

金線

重樓根磨水服 咽喉穀賊 腫痛用重臺赤色者川
卽愈 集簡方 咽喉穀賊 大黃炒木籠子仁馬牙

消半兩半夏泡一分爲末蜜丸 茗子大含之

聖惠方

鬼臼

本經下品

校正

餅入圖經 瑣田草

釋名九臼

本經天臼

別錄鬼藥

綱目解毒

別錄爵犀

本經馬目

毒公

本經害母草

圖經羞天花

綱目朮律草

綱目璫田草

獨腳蓮

土宿草

獨荷草

土宿

山荷葉

綱目旱荷

綱目八角盤

綱目唐婆鏡

宏景曰

鬼臼根如射干白而味甘

九臼相連有毛者良故名

時珍曰此物有毒

而曰如馬眼故名馬目

毒公殺蠱解毒故有犀名

其葉如鏡如盤如荷而新苗生則舊苗死故有鏡

盤荷蓮害母諸名蘇東坡詩集云璣田草俗號唐婆鏡卽本草鬼臼也歲生一日如黃精根而堅瘦唐可以辟穀宋祁劍南方物贊云羞天花蜀地處處有之依莖綴花蔽葉自隱俗名羞天子改爲羞寒花卽本草鬼臼也贊云冒寒而茂莖脩葉廣附莖作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀○別有羞天草與此不同卽海芋也

集解

別錄曰鬼臼生九真山谷及冤句二月八月采根宏景曰鬼臼生山谷中八月采陰乾似射干朮輩又似鉤吻有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者大而味苦無叢毛力劣今馬目毒公狀如黃精根其臼處似馬眼而柔潤今方家多用鬼臼而少用毒公不知此那復乖越如此恭曰鬼臼生深山巖石之陰葉如蓖麻莖枯則爲一日假令生來二十年則有二十日豈惟九日耶根肉皮鬚並似射干今俗用多是射干莖重樓輩生一莖莖端一葉亦有兩歧者年長一莖

而江南別送一物非真者今荊州當陽縣峽州遠安縣襄州荆山縣山中並貢之亦極難得頌曰今江甯府滁舒商齊杭襄峽州荆門軍亦有之並如蘇恭所說花生莖聞赤色三月開後結實又一說鬼曰生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如繖旦時東南及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未常見日一年生一莖旣枯則生一曰及八九年則八九曰矣害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之一曰腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然曰形淺薄與鬼曰大異鬼曰如八九個南星側比相疊而色理正如射干用者當使人求苗采之市中不復有也時珍曰鬼曰根如天南星相疊之狀故市人通謂小者爲南星大者爲鬼曰殊爲謬誤按黃山谷集云唐婆鏡葉底開花俗名羞天花卽鬼曰也歲生一日滿十二歲則可爲藥今方家乃以鬼燈檠爲鬼目誤矣鄭樵通志云

鬼曰葉如小荷形如鳥掌年長一莖莖枯則根爲
一日亦名八角盤以其葉似之也據此二說則似
是今人所謂獨腳蓮者也又名山荷葉獨荷草旱
荷葉八角鏡南方處處深山陰密處有之北方惟
龍門山王屋山有之一莖獨上莖生葉心而中空
一莖七葉圓如初生小荷葉面青背紫採其葉作
瓜李香開花在葉下亦有無花者其根全似蒼朮
紫河車丹爐家采根制三黃砂汞或云其葉八角
者更靈或云其根與紫河車一樣但以白色者爲
河車赤色者爲鬼曰恐亦不然而庚辛玉冊謂蚤
休陽草旱荷陰草亦有分別陶宏景以馬目毒公
與鬼曰爲二物殊不知正是一物而有二種也又
唐獨孤滔丹房鑑源云朮律草有二種根皆似南
星赤莖直上莖端生葉一種葉凡七瓣一種葉作
數層葉似朮麻面青背紫而有細毛葉下附莖開
一花狀如鈴鐸倒垂青白色黃蕊中空結黃子風
吹不動無風自搖可制砂汞按此卽鬼曰之二種也其說形狀甚明

根氣味辛溫有毒

別錄曰微溫。宏景曰甘溫。有
毒權曰苦之才曰畏垣衣。

主治殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒
本經

殺大毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目

中膚翳不入湯

別錄

主尸疰殮爛勞疾傳尸瘦疾

甄權

下死胎治邪癰癰疽蛇毒射工毒

時珍

發明

頌曰古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之又
曰今福州人三月采瑞田草根葉焙乾搗末

蜜丸服

治風疾

附方

新

子死腹中

胞破不生此方累效救人歲萬數也鬼目不拘多少黃色者去

毛爲細末不用篩羅只撚之如粉爲度每服一錢無灰酒一盞同煎八分通口服立生如神名一字

神散人良方 婦射工中人 寒熱發瘡鬼臼葉一把苦酒

潰搗取汁服一升日二次

千金黑黃急病

沈若青脈入口者死宜烙口中黑黃面黑黃身如土色不妨食脈

方 脹耳會玉泉章門心俞用生鬼臼搗汁一

小蓋服乾者爲末水服

三十六黃方

射干

本經下品

釋名烏扇

本經

烏翫

別錄

烏吹

別錄

烏蒲

本經

鳳翼

拾遺

鬼扇

土宿

扁竹

綱目

仙人掌

土宿

紫金牛

土宿

野萱花

綱目

草薑

別錄

黃遠

吳普宏景曰形莖梗疎長正如射之長竿之狀

書多音夜

頌曰射干之

方

得名由此

爾而陶氏以夜音爲疑蓋古字音多通呼

若漢官僕射主射事而亦音夜非有別義也時珍曰其葉

叢生橫鋪一面如鳥翅及扇之狀故有烏扇烏翫

鳳翼鬼扇仙人掌諸名俗呼扁竹謂其葉扁生而

根如竹也根葉又如蠻薑故曰草薑○翫音所甲切扇也

集解

別錄曰射干生南陽山谷田野三月三日采根陰乾宏景曰此是烏翫根黃色庭臺多種

之人言其葉是鳶尾而復有鳶頭此若相似爾恐非烏翫也又別有射干相似而花白莖長似射人

之執竿者故阮公詩云射干臨層城此不入藥用

恭曰鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根

似高良薑而肉白名鳶頭保昇曰射干高二三尺花黃實黑根多鬚皮黃黑肉黃赤所在皆有二月

八月采根去皮日乾藏器曰射干鳶尾二物相似人多不分射干卽人閒所種爲花卉名鳳翼者葉

如鳥翅秋生紅花赤點鳶尾亦人閒所種苗低下於射干狀如鳶尾夏生紫碧花者是也大明曰射

干根潤形似高良薑大小赤黃色淡硬五六七八月采穎曰今在處有之家種之春生苗高一二

尺葉大類蠻薑而狹長橫張疎如翅羽狀故名烏翫葉中抽莖似萱草莖而強硬六月開花黃紅色

瓣上有細文秋結實作房中子黑色一說射干多
生山崖之閒其莖雖細小亦類木故荀子云西方
有木名曰射干莖長四寸生於高山之上是也陶
宏景所說花白者自是射干之類震亨曰根爲射
干葉爲烏翫紫花者是紅花者非機曰按諸注則
射干非一種有花白者花黃者花紫者花紅者丹
溪獨取紫花者必會試有驗也時珍曰射干卽今
扁竹也今人所種多是紫花者呼爲紫蝴蝶其花
三四年開六出大如萱花結房大如拇指頗似泡
桐子一房四隔一隔十餘子子大如胡椒而色紫
極硬咬之不破七月始枯陶宏景謂射干鳶尾是
一種蘇恭陳藏器謂紫碧花者是鳶尾紅花者是
射干韓保昇謂黃花者是射干蘇頌謂花紅黃者
是射干白花者亦其類朱震亨謂紫花者是射干
紅花者非各執一說何以憑依謹按張揖廣雅云
鳶尾射干也易通卦驗云冬至射干生土宿眞君
本草云射干卽扁竹葉扁生如側手掌形莖亦如
之青綠色一種紫花一種黃花一種碧花多生江如

南湖廣川浙平陸閒八月取汁煮雄黃伏雌黃制丹砂能拒火據此則鳶尾射干本是一類但花色不同正如牡丹芍藥菊花之類其色各異皆是同屬也大抵入藥功不相遠藏器曰射干之名有三佛經射干貂蟉此是惡獸似青黃狗食人能緣木阮公云射干臨層城者是樹殊有高大者本草射干是草卽今人所種者也

根脩治

教曰凡采根先以米泔水浸一宿漉出然後以簾竹葉煮之從午至亥日乾用

氣味苦平有毒

別錄曰微寒權曰微溫久服令人虛保昇曰

陰也時珍曰

主治

欬逆上氣喉痹咽痛不得消息

散結氣腹中邪逆食飲大熱

本經

療老血在心脾閒

欬唾言語氣臭散胸中熱氣

別錄

苦酒摩塗毒痛

宏景

治症氣消瘀血通女人月閉

甄

消痰破癥結胸膈

滿腹脹氣喘痃癖開胃下食鎮肝明目

大明

治肺氣

喉痹爲佳

宗願

去胃中癰瘍

元素

利積痰疝毒消結核

震亨

降竇火利大腸治瘧母

時珍

發明

震亨曰射干屬金有木與火行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷又治便毒此足厥陰

溼氣因疲勞而發取射干三寸與生薑同煎食前

服利三兩行甚效時珍曰射干能降火故古方治

喉痹咽痛爲要藥孫真人千金方治喉痹有烏翹膏張仲景金匱玉函方治欬而上氣喉中作水雞

聲有射干麻黃湯又治瘧母鼈甲煎丸亦用烏扇燒過皆取其降厥陰相火也火降則血散腫消而

瘕自除矣

癥

附方

舊二新八

咽喉腫痛

射干花根山豆根陰乾爲末吹之如神

袖珍方

傷

寒咽閉

腫痛用生射干豬脂各四兩合煎令焦去滓每噙棗許取瘥

龐安常傷寒論喉

瘻不通

良○漿水不入外臺秘要用射干一片含嚥汁

瞬動卽解或醋研汁噙引涎出亦妙○便民方用

紫蝴蝶根一錢黃芩生甘草桔梗各五分爲末水

調頓服立愈

諸藥不效紫花扁竹根生

名奪命散通○曾濟○

二便不通

水邊者佳研汁一盞服卽

大動搖水聲皮膚黑用鬼扇根搗

通○普濟○

汁服一盃水卽下○肘後方

疝腫刺

發時腫痛如刺用生射干搗汁

與服取利亦可丸服○肘後方

扁竹根如殭蠶者同萱草根爲末蜜調傳之神效

永類方

中射工毒生瘡者以滓傅瘡上○姚僧坦集驗方

麻各二兩水三升煎二升溫服

本草綱目草部卷十七下射干 蒼尾

姚僧坦集驗方

烏翹升

鳥尾

本經下品

釋名烏園

本經

根名鳶頭

時珍曰並以形命

名烏園當作烏鳶

集解別錄曰烏鳶生九嶷山谷五月采宏景曰方用鳶頭當是其根療體相似而本草不題恭曰此草所在有之家亦種葉似射干而闊短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白嚼之戟人咽喉與射干全別射干花紅抽莖長根黃有白保昇曰草名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶根葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數個相連九月十月采根日乾時珍曰此卽射干之苗非別一種也肥地者莖長根粗瘠地者莖短根瘦其花自有數色諸家皆是強分陳延之小品方言東海鳶頭卽由跋者亦訛也東海出之故耳

氣味苦平有毒

恭曰有

主治蠱毒邪氣鬼疰諸毒

小毒

破癥瘕積聚去水下三蟲

本經殺鬼魅療頭眩

別錄

附方

舊一新一

飛尸遊蠱

着喉中氣欲絕者

鳶尾根削去皮納喉中

摩病處令血出

器本草拾遺

鳶頭散東海鳶頭黃

牙卽金牙

莨菪子防葵爲

末酒服方寸七欲令病人見鬼增一分立驗不可多服

知鬼又增一分立驗

牙卽金牙

莨菪子防葵爲

牙卽金牙

莨菪子防葵爲

牙卽金牙

莨菪子防葵爲

牙卽金牙

莨菪子防葵爲

牙卽金牙

莨菪子防葵爲

玉簪

綱目

釋名

白鶴仙

時珍曰並以花象命名

集解

時珍曰玉簪處處人家栽爲花草二月生苗

成叢高尺許柔莖如白菘其葉大如掌團而

有尖葉上紋如車前葉青白色頗嬌瑩六七月抽

莖

莖上有細葉中出花朵十數枚長二三寸本小

未大未開時正如白玉搔頭簪形又如羊肚蘑菇

之狀開時微綻四出中吐黃蕊頗香不結子其根

連生如鬼曰射干生薑輩有鬚毛舊莖死則根有一曰射干新根生則舊根腐亦有紫花者葉微狹皆鬼之屬

根氣味甘辛寒有毒主治搗汁服解一切毒下骨哽塗癰腫時珍

附方

新

乳癰初起

內消花

卽玉簪花取根擂酒服以渣傅之

海上方婦人

斷產

白鶴仙

根白鳳仙子各一錢半

紫葳二錢半

砂二錢

搗末蜜和丸梧子大

產內三十日

以酒半盞服之

不可着牙

摘玄方解斑蝥毒

玉簪根擂水

齒能損牙齒也

趙眞人

下魚骨哽

玉簪

花根山裏紅果根同搗自

濟急方

下不可着牙齒

○

刮骨取牙

玉簪

根乾者一錢白

臘仙

乾坤生意

○

下

魚骨哽

然

汁以竹筒灌入咽中其骨自

下

不可着牙齒

○

刮骨取牙

玉簪

根乾者一錢白

砒三分白硇七分蓬

砂二分威靈仙三分草烏頭一分半爲末以少許點疼處卽自落也余居士選奇方

葉氣味

根同

主治蛇虺蟄傷搗汁和酒服以渣傅之

中心留孔洩氣

時珍

鳳仙

目綱

釋名急性子

救荒

旱珍珠

目綱

金鳳花

目綱

小桃紅

救荒

夾

竹桃

救荒

海薑

音納

染指甲草

救荒

菊婢

時珍

其花頭翅尾足俱翹翹

甲

然如鳳

狀故以

名之女人

采其花及葉包

染指

甲

其實狀如小

桃老則

迸裂故有

指甲急

性小桃諸

名宋光宗李后

諱鳳宮中呼

爲好女兒

花張宛丘

呼爲菊婢

韋居

呼爲羽客

時珍曰

鳳仙人家多種

之極易生

二月下子

集解五月可再種

苗高二三尺莖

有紅白二色其

本草綱目草部

卷之七下

鳳仙

是

大如指中空而胞葉長而尖似桃柳葉而有鋸齒
桺閒開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自
變易狀如飛禽自夏初至秋盡開謝相續結實纍
然大如櫻桃其形微長色如毛桃生青熟黃犯之
卽自裂皮卷如拳苞中有子似蘿蔔子而小褐色
人采其肥莖汋肥以充葛筍嫩華酒浸一宿亦可
食但此草不生蟲蠹蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也

子氣味微苦溫有小毒主治產難積塊噎膈下骨
哽透骨通竅

珍時

發明時珍曰鳳仙子其性急速故能透骨軟堅胞
緣其透骨最能損齒與玉簪根同凡人烹魚肉硬者投數粒卽易軟爛是其驗也
服者不可着齒也多用亦軟人咽

附方新產難催生鳳仙子二錢研末水服勿近牙
五外以朢麻子隨年數搗塗足心

○集方 噎食不下

鳳仙花子酒浸三宿曬乾爲末酒
丸綠豆大每服八粒溫酒下不可

多用卽急性子

咽中骨哽 欲死者白鳳仙子研水
一大呷以竹筒灌入咽

爲末吹之

普濟方 牙齒欲取金鳳花子研末
少許點疼

牙根取之

急 性 子 水 莊花子 大黃各一
兩俱生研末每味取五錢外

用皮消一兩拌勻將白鶲鵠一個或白鶲亦可去

毛屎剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用綿紗

定沙鍋內入水三盞重重紙封以小火煮乾將鶲

鶲翻調焙黃色冷定早辰食之日西時疾歟三日

大便下血病去矣忌冷物

百日孫天仁集效方

花氣味甘滑溫無毒

主治蛇傷擂酒服卽解又治

腰脇引痛不可忍者研餅曬乾爲末空心每酒服

三錢活血消積

珍時

附方

新風溼臥牀不起用金鳳花柏子仁朴消木瓜煎湯洗浴每日二三次內服

獨活寄生湯

吳旻扶壽精方

根葉氣味苦甘辛有小毒主治雞魚骨哽誤吞銅

鐵杖撲腫痛散血通經軟堅透骨

珍時

附方

新

咽喉物哽

金鳳花根嚼爛噙嚥骨自下雞骨尤效卽以溫水漱口免損齒

也亦治誤吞銅鐵

打杖腫痛

鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上一

夜血散卽愈冬月收取乾者研末

馬患諸病

白鳳仙花

水和塗之葉廷器通變要法

連根葉熬膏遇馬有病抹其眼

四

衛生易簡方

坐擎草宋圖經

集解 頌曰 生江西及滁州六月開紫花結實采其苗入藥甚易得後因人用有效今頗貴重時珍曰按一統志云出吉安永豐縣

氣味辛熱有毒主治風癆壯筋骨兼治打撲傷損

頌蘇

發明 頌曰 神醫普救方治風藥中已有用者時珍曰危氏得效方麻藥煮酒方中用之聖濟錄

治膈上虛熱咽喉噎塞小便赤澀神困多睡有坐擎丸用坐擎草大黃赤芍藥木香升麻麥鬱冬黃

芪木通酸棗仁薏苡仁枳殼等分爲末

蜜丸

梧子大每服二十丸麥鬱冬湯下

附錄 押不蘆

時珍曰 按周密癸辛雜志云漢北回地方有草名押不蘆土人以少許

磨酒飲卽通身麻痺而死加以刀斧亦不知至三日則以少藥投之卽活御藥院中亦儲之貪官汚吏罪甚者則服百日丹皆用此也昔華陀能剗腸滌胃豈不有此等藥耶

曼陀羅花

綱目

釋名

綱目

風茄兒

時珍曰

法華經言佛說法

山茄子

時天雨

曼陀羅花又道家

北斗有陀羅星使者手執此花故後人因以名花

曼陀羅梵言雜色也

茄乃囚葉形爾姚伯聲花品

呼爲惡客

集解

時珍曰

曼陀羅生北土

人家亦栽之

春生夏

長獨莖

直上高

四五尺

生不旁

引綠莖

碧葉

葉如茄葉

八月開白花

凡六瓣狀

如牽牛花而大

攢花中

坼駢葉外

包而朝開

夜合結實圓

而有丁

採花中

有小子

八月

采花九月

采實

花子氣味辛溫有毒主治諸風及寒溼腳氣煎湯

洗之又主驚癇及脫肛并入麻藥

時珍

發明時珍曰相傳此花笑采釀酒飲令人笑舞采人或笑或舞引之乃驗也八月采此花七月采火麻子花陰乾等分爲末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉割瘡灸火宜先服此則不覺苦也

附方

新

面上生瘡

曼陀羅花曬乾研末少許貼之

衛生易簡方

小兒慢

驚

曼陀

羅花七朵重一錢

天南星炮丹砂乳香各二錢半爲末全蠍炒十

衛生易簡方

小兒慢

半金蠍炒十

服半

服半

服半

服半

服半

服半

服半

錢薄

荷葉

湯調下

大腸臘肛

曼陀羅子連殼一對橡

半

半

半

半

半

半

半

半

御藥院

方

大腸臘肛

曼陀羅子連殼一對橡

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

洗之

入朴消少許

儒門事親

羊躡躅

本經下品

釋名

黃躡躅

綱目

黃杜鵑

攀

羊不食草

拾

羊花

綱目

驚羊花

綱目老虎花

綱目玉枝

別錄

宏景曰

羊食其葉而死故名

飼當作

惱惱亂也

集解

別錄曰羊躡躅生太行山川谷及淮南山

三月采花陰乾

宏景曰近道諸山皆有之

花黃似鹿葱不可近眼

恭曰花亦不似鹿葱正似旋花

色黃者也

保昇曰小樹高二尺葉似桃葉花黃似

瓜花三月四月采花日乾

頌曰所在有之春生苗

似鹿葱葉似紅花莖高三四尺夏開花似凌霄花

似山石榴

輩正黃色羊食之則死

今嶺南蜀道山谷遍生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥時珍

曰韓保昇所說似桃葉者最的其花五出蕊瓣皆

黃氣味皆惡蘇頌所謂深紅色者卽山石榴名紅皆

躑躅者無毒與此別類張揖廣雅謂躑躅一名決光者誤矣決光決明也按唐李紳文集言駱谷多山桃杷毒能殺人其花明豔與杜鵑花相似樵者識之其說似羊躑躅未知是否要亦其類耳

花氣味辛溫有大毒

權曰惡諸石及麴不入湯使伏丹砂硇砂雌黃畏巵子

主治賊風在皮膚中淫淫痛溫瘡惡毒諸癆

經本

邪

氣鬼疰蠱毒

錄別

發明

頌曰古之大方多用躑躅如胡洽治時行赤散及治五嗽四滿丸之類并治風諸酒方皆

雜用之又治百病風溼等魯王酒中亦用躑躅花今醫方將腳湯中多用之南方治蠱毒下血有躑躅花散云甚勝時珍曰

此物有大毒會有人以其根入酒飲遂至於斃也和劑局方治東風癰瘍伏虎丹中亦用

之不多服耳

附方

新 風癓注痛

鄆躅花天南星並生時同搗作

餅飪上蒸四五遍以稀葛囊盛

之臨時取焙爲末蒸餅丸梧子大每服三丸溫酒

下腰腳骨痛空心服手臂痛食後服大良

續傳

信

痛風走注

黃躑躅根一把糯米一盞黑豆半盞

酒水各一盞徐徐服大吐大泄

便能動也

醫學集成

風溼痹痛

手足身體收攝不遂肢節

拌蒸一炊久曬乾爲末每以牛乳

拌蒸一合酒二合調服五分

草烏頭二錢半爲末化臘丸大

綿包一丸咬之追涎

海上仙方

附錄

山躑躅

時珍曰處處山谷有之高者四五尺

低者一二尺春生苗葉淺綠色枝葉

而花繁一枝數萼二月始開花如羊

躑躅而蒂如

石榴花有紅者紫者五出者千葉者

小兒食其花

味酸無毒一名紅躑躅一名山石榴一名映山

紅一名杜鵑花其黃色者卽有毒

羊躑躅也

羊

不喫草

拾遺藏器曰生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是也味苦辛溫無毒主一切

風血補益攻諸病煮之亦浸酒服時珍曰

此草似羊躡躅而云無毒蓋別有此也

莞花

本經下品

校正

自木部移入此

釋名

杜莞

別錄

赤莞

吳本經

毒魚

別錄

頭痛花

綱目兒

草

吳普敗華

吳本經

去水

吳本經

蜀桑

別錄

頭痛花

詳去水言其功

魚言其性大戟言其似也俗人

因其氣惡呼爲頭痛花

山海經云首山其草多莞

也是也

集解

別錄曰莞花生淮源川谷三月三日采花陰乾

普曰莞根生鄖

二月生葉青色加厚則

葉乃生三月采花

五月采葉八月九月采根陰乾保昇曰近道處處

葉乃生三月采花

有之苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑
根正月二月花發紫碧色葉未生時收采日乾葉
生花落卽不堪用也頌曰在處有之宿根舊枝莖
紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生
苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荆
而作穗又似藤花而細今絳州出者花黃謂之黃
莞花時珍曰顧野王玉篇云莞木出豫章煎汁藏
果及卵不壞洪邁容齋隨筆云今饒州處處有之
莖榦不純是木小人爭鬪者取葉搘擦皮膚輒作
赤腫如被傷以誣人至和鹽擦卵則又染其外若
赭色也

脩治

宏景曰用當微熬不可近眼時珍曰莞花留
數年陳久者良用時以好醋煮十數沸去醋
以水浸一宿曬乾用則毒

減也或以醋炒者次之

氣味

根

辛溫有小毒

別錄曰苦微溫

曾曰神農

黃帝雷公苦

有毒扁鵲岐伯

苦

苦

溫

曾曰

神農

黃

黃

李當之有大毒多服令人洩
之才曰決明爲之使反甘草

主治欬逆上氣喉鳴

喘咽腫短氣蟲毒鬼瘡痘癰腫殺蟲魚

本經消胸

中痰水喜唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒

毒肉毒根療疥瘡可用毒魚

別錄治心腹脹滿去水

氣寒痰涕唾如膠通利血脈治惡瘡風癆溼一切

毒風四肢攣急不能行步

甄權療欬嗽瘴瘧

大明治水

飲痰澼脇下痛

時珍

發明

時珍曰張仲景治傷寒太陽證表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或喘或利者小青龍湯主之若表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者十乘湯主之蓋小

青龍治未發散表邪使水氣自毛竅而出乃內經所謂開鬼門法也十棗湯驅逐裏邪使水氣自大便而洩乃內經所謂潔淨府去陳莝法也夫飲有五皆由內啜水漿外受溼氣鬱蓄而爲留飲流于肺則爲支飲令人喘欬寒熱吐沫背寒流于肝則爲懸飲令人欬唾痛引缺盆兩脇流于心下則爲伏飲令人胸滿嘔吐寒熱眩運流于腸胃則爲痰飲令人腹鳴吐水胸脇支滿或作泄瀉忽肥忽瘦流于經絡則爲溢飲令人沈重注痛或作水氣附腫芫花大戟甘遂之性逐水洩溼能直達水飲巢囊隱僻之處但可徐徐用之取效甚捷不可過劑洩人真元也陳言三因方以十棗湯藥爲末用棗肉和丸以治水氣喘急浮腫之證蓋善變通者也楊士瀛直指方云破癥須用芫花行水後便養胃可也古曰水者肺腎脾三經所主有五臟六腑十二經之部分上而頭中而四肢下而腰腳外而皮毛中而肌肉內而筋骨脈有尺寸之殊浮沈之別不可輕瀉當知病在何經何臟方可用之

誤投之則害深矣。芫花與甘草相反而胡治居士方治瘧癬飲癖以甘遂大戟芫花大黃甘草同用蓋欲其大吐以泄溼因相反而相激也。

正誤

慎微曰三國志云魏初平中有青牛先生常服芫花年百餘歲常如五六十年時珍曰芫花乃下品毒物豈堪久服此

附方

舊五新十九卒得欬嗽

芫花一升水三升煮汁一升以棗十四枚煮汁乾日

食五枚必

肘後卒嗽有痰

芫花一兩炒水一升煮四沸去渣白糖入半斤每服棗許

勿食酸鹹物。

張文仲備急方喘嗽失音

暴傷寒冷喘嗽失音取芫花連根一虎口切暴

乾令病人以薦自裏春令灰

飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆轉待芫根盡乃止病卽愈

古今

錄乾嘔脇痛

傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇

乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未

和也十棗湯主之芫花熬甘遂大戟各等分爲散
以大棗十枚水一升半煮取八合去渣納藥強人
服一錢羸人半錢平旦服之當下利病除如不除明旦更服仲景傷寒論水腫支飲

及滲飲用十棗湯加大黃甘草五物各一兩大棗
十枚同煮如法服一方加芒消一兩胡洽百病

方天行煩亂凝雪湯治天行毒病七八日熱積胸

取一升半瀆故布薄胸上不過再三薄
熱則除當溫四肢護厥逆也千金方久瘡結癬

在腹脇堅痛者芫花炒二兩硃砂五錢爲
末蜜丸梧子大每服十九粒湯下直指水蠱脹

滿芫花枳殼等分以醋煮芫花至爛乃下枳殼煮
爛搗丸梧子大每服三十丸白湯下普濟方

酒疸尿黃發黃心懊痛足脰滿芫花椒目等
分燒末水服半錢日二服肘後傳之如

閒痛一點痛不可忍者芫花根末米醋調傅之如
不住以帛束之婦人產後有此尤宜袖珍

諸般氣痛

芫花醋煮半兩延胡索炒一兩半爲末每服一錢男子元臟痛葱酒下瘧疾烏

梅湯

下婦人血氣痛當歸酒下

諸氣痛香附湯

下小腸氣痛

茴香湯

下

瘧疾烏

經候不通

芫花根三兩剉炒黃爲末每服一錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈

聖惠方

存仁

鬼胎癥瘕

去胎

芫花根剝皮以綿裹點麝香套入陰穴三寸卽下攝生妙用方

產後惡物

不下

芫花當歸等分炒爲末調一錢服保命集

心痛有蟲

芫花一兩醋炒雄黃一錢

爲末

每服一字溫醋湯下乾坤生意

牙痛難忍

諸藥不效芫花末擦之令熱痛定以

溫水漱之

永類方

白禿頭瘡

芫花末豬脂和癰塗之

末和膠塗

千金癰癩已潰

傳之

集效方

癰腫初起

芫花生合令膿易竭也

痔瘡乳核

芫根汁於石器中慢火煎成膏將絲線於膏

花

搗洗淨入木臼搗爛入少水絞

集簡方

膏

內度過以線繫痔當微痛候痔乾落以紙擦薰膏納竅內去根當永除根也一方只搗汁浸線一夜晚用不得使療癰初起氣壯人用芫根擂水一盞服水經驗便毒初起氣壯人用芫根擂水一盞服傳集簡方瀕湖便毒初起芫根擂水服以渣傳之得下集簡方瀕湖便毒初起即消黃州熊珍所傳乃用芫草煎膏筆粧瘤之四圍上三次次調別以筆粧其中勿近甘草次日縮小又以甘草膏粧小暉三次如前仍上此藥自然焦縮危氏得效一切菌毒因蛇蟲毒氣熏蒸所致用芫花生方氏效方得

蕘花

音饒○本經下品

釋名

時珍曰蕘者饒也其花繁饒也

集解

別錄曰蕘花生咸陽川谷及河南中牟六月采花陰乾宏景曰中牟者時從河上來形似

芫花而極細白色恭曰苗似胡荽莖無刺花細黃色四月五月收與芫花全不相似也保昇曰所在有之以雍州者爲好生岡原上苗高二尺許宗奭曰今京洛間甚多時珍曰按蘇頌圖經言絳州所出芫花黃色謂之黃芫花其圖小株花成簇生恐卽此蕘花也生時色黃乾則如白故陶氏言細白也或言無蕘花以桃花代之取其利耳

氣味

苦寒有毒

別錄曰辛微寒有毒

主治傷寒溫瘧下十二

水破積聚大堅癥瘕

蕩滌胸中留癖飲食寒熱邪

氣利水道

本經療痰飲欬嗽

別錄治欬嗽逆上氣喉中腫

滿症氣蠱毒瘻癰氣塊

甄權

發明

宗奭曰張仲景傷寒論以蕘花治利者取其行水也水去則利止其意如此今用之當斟酌不可過使與不及也須有是證乃用之好古曰

仲景小青龍湯云若微利去麻黃加蕘花如雞子

大熬令赤色用之蓋利水也

時珍曰蕘花亦芫花之類氣味主治大略相近

醉魚草

目綱

釋名

闌魚花

目綱

魚尾草

目綱

櫟木

集解

時珍曰醉魚草南方處處有之多在塹岸邊

作小株生高者三四尺

根狀如枸杞莖似黃

荆有微稜外有薄黃皮枝易繁衍葉似水楊對節

而生經冬不凋七八月開花成穗紅紫色儼如芫

花一樣結細子漁人采花及葉以毒魚盡圍圍而

死呼爲醉魚兒草池沼邊不可種之此花色狀氣

中味並如芫花毒魚亦同但花開不同時爲異爾按

中山經云熊耳山有草焉其狀如蘇而赤華名曰

葶苈可以毒魚
其此草之類與

花葉氣味辛苦溫有小毒主治痰飲成齁遇寒便
發取花研末和米粉作糗炙熟食之卽效又治誤
食石斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鰓者搗汁和
冷水少許嚥之吐卽止骨卽化也久瘧成癬者以
花填鯽魚腹中溼紙裹煨熟空心食之仍以花和
海粉搗貼便消

時珍

莽草

本經下品

校正

自木部移入此

釋名

藺草

音芒

芒草

山海圖經

鼠莽

宏景曰莽本作藺字

俗訛呼爾時珍曰此

物有毒食之令人迷罔故名山人以毒鼠謂之鼠莽

正誤

別錄曰

一名薺

一名春草

禹錫曰

按爾雅云

郭璞云

注云一名芒草所見異也

時珍曰

薺音尾白薇也

白薇下云

一名春草而此

此

又以爲薺草蓋因孫

炎之誤也今正之

集解

別錄曰

莽草生上谷

山谷及冤句

五月采葉

陰乾

宏景曰

今東閭處處皆有葉青辛烈者

良又用搗以和陳粟米粉納水

中魚吞卽死浮出

人取食之無妨

頌曰今南中州郡及蜀川皆有之

木若石南而葉稀無花實

五月七月采葉陰乾一

說藤生繞木石間旣謂之草乃蔓生者是也

宗奭曰

莽草諸家皆謂之草而本草居木部

今世所有

皆木葉如石南葉枝梗乾則皺

揉之其臭如椒穀

曰凡用葉勿用尖及攀生者

時珍曰

范子計然云莽草出三輔青色者善

葉脩治

數曰凡使取葉細剉以生甘草水蓼二味同盛入生稀絹袋中甑中蒸一日去二件

曬乾

用

氣味辛溫有毒

普曰神農辛雷公桐君苦有毒時珍曰莽草制雌黃雄黃而有毒誤

食害人惟紫河車磨水服及黑豆煮汁

可解豆汁澆其根卽爛性相制也

主治風毒

癰腫乳癰疣除結氣疥瘻殺蟲魚

本經療喉瘻不

通乳難頭風瘻可用沐勿令人眼

別錄治風疽疝氣

腫墜凝血治瘰癧除溼風不入湯服主頭瘻白禿

殺蟲與白斂赤小豆爲末雞子白調如糊傅毒腫

乾更易上

甄權

治皮膚麻癆煎濃湯淋風蟲牙痛

明大

發明

頌曰

古方治風毒癆厥諸酒皆用蘭草今醫

取葉煎湯熱含少頃吐之治牙齒風蟲及

喉癆甚效宗奭曰濃煎湯淋渫皮膚麻癆周禮翦

氏掌除蟲物以莽草熏之則死

時珍曰古方治小兒傷寒有莽草湯又瑣碎錄云思村王氏之子生

七日而兩腎縮入二醫云此受寒氣而然也以硫

黃茱萸大蒜研塗其腹以蘭草蛇牀子燒烟熏其下部而愈也

附方

舊四

新五 賊風腫癆

風入五臟恍惚宜莽草膏主

各二兩切以水和醋一升漬

一宿豬脂一斤煎三

上三下絞去滓向火以手摩病

上三百度應手卽

瘡若耳鼻疾可以綿裹塞之

疥癬雜瘡並宜摩之

附後 小兒風癆

掣癰戴眼極者日數

十發又治大人賊風

莽草雷丸各一雞子黃大化

豬脂一斤煎七沸去滓摩痛處勿近目及陰日凡

三四次外臺秘要

莽草煎湯沐之勿

風蟲牙痛令入目聖惠方

頭風久痛

莽草煎湯沐之勿

風蟲牙痛令入目

肘後方用莽草煎湯熱漱冷吐○一加山椒皮○一加獨活○一加郁李仁○一加芫花○一加川

兩椒細辛各等分煎湯熱漱冷吐○聖惠用莽草半兩阜角三挺去皮子漢椒七粒爲末棗肉丸芥子白

大每以一丸塞孔中吐涎取效○**瘰癧結核**蘭草一兩爲末雞子白

取效止○癰瘡未潰方同上得痛爲良○**乳腫不消**莽草小

爲末苦酒和傳之衛生易簡狗咬昏悶浸椒水調莽草末○**便民圖纂**

茵芋

本經下品

釋名莞草

別錄**卑共**別錄時珍曰茵芋本作因預
未詳其義莞草與蒲莞名同

集解

別錄曰茵蕡生太山川谷三月三日采葉陰乾宏景曰好者出彭城今近道亦有莖葉狀

似莽草而細軟連細莖采之方用甚稀惟合療風酒大明曰出自海鹽形似石楠樹生葉厚五六七

月采頌曰今雍州絳州華州杭州亦有之春生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實三月四月七月采莖葉日乾

莖葉氣味苦溫有毒

別錄曰微溫有毒

權曰苦辛有小毒

主治五臟

邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風溼痺痛

本經

療久風溼走四肢腳弱

別錄

治男子女人

軟腳毒風拘急攣痛

甄權

一切冷風筋骨怯弱羸顫

入藥炙用

大明

發明

時珍曰千金外臺諸古方治風癇有茵蕷丸治風癰有茵蕷酒治婦人產後中風有茵蕷

膏風溼諸方多用之茵蕷石南莽草皆古

人治風妙品而近世罕知亦醫家疎缺也

附方

舊一
新二

茵蕷酒

治賊風手足枯痺拘攣用茵蕷附子天雄烏頭秦艽女萎防風

防己石南葉躑躅花細辛桂心各一兩十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七夏三春秋五日藥成每服一合日二服以微瘳爲度方

出胡洽居士百病方 圖經本草 茵芋丸 治風氣積滯成腳氣發則痛者茵芋葉炒薏苡仁各半兩郁李仁一兩牽牛子三兩生研末半兩右爲末煉蜜丸如梧子大每服二十丸五更薑棗湯下取利未利再服取快 本事方

煎五兩木防己半斤苦酒九升漬一宿豬脂四斤三上三下膏成每服熱摩千遍 千金方

石龍芮

本經中品

校正

併入菜部水莖

釋名地棟

本經天豆別錄

石能

別錄

魯果能

別錄

水堇

吳普音謹

又音芹

苦堇

爾雅

堇葵

郭璞

胡椒菜

救荒

彭根

別錄宏景曰生於石上其

葉芮芮短小故名
參曰實如桑椹故名地椹禹
曰爾雅云齧苦堇也郭璞云卽堇葵也本草言
甘而此云苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也叶
珍曰芮芮細兒其椹之子細芮故名地椹以下皆
子名也水堇以下皆苗名也苗作蔬食味辛而滑
故有椒葵之名唐本草菜部水堇係重出今依吳

普本草合

併爲一

集解別錄曰石龍芮生太山川澤石邊五月五日
采子二月八月采皮陰乾宏景曰今出近道
子形粗似蛇牀子而扁非眞好者人言是蕷菜子
也東山石上所生者其葉芮芮短小其子狀如葶
蔥黃色而味小辛此乃是眞也恭曰今用者俗名
水堇苗似附子實如桑椹生下溼地五月熟葉子
皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如葶
蔥氣力劣於山南者陶以細者爲眞未爲通論又
曰堇菜野生非人所種葉似蕺花紫色藏器曰爾
雅云芟堇草注云烏頭苗也蘇恭注天雄亦云石

龍芮葉似堇草故名水堇據此則堇草是烏頭苗
水堇定是石龍芮更非別草也頌曰今惟出兗州
一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉短小多刻缺
子如蓼穗而色黃蘇恭所說乃水堇非石龍芮也
兗州所生者正與本草及陶氏說合爲得其眞宗
奭曰石龍芮有兩種水中生者葉光而子圓陸地
天生者葉毛而子銳入藥須水生者陸生者又謂之
天生矣而補不足莖冷失精時珍曰蘇恭言水堇卽
石龍芮蘇頌非之非矣按漢吳普本草石龍芮一
名水堇其說甚明唐本草菜部所出水堇言其苗
也本經石龍芮言其子也寇宗奭所言陸生者乃
是毛茛有大毒不可食水堇卽俗稱胡椒菜者處
處有之多生近水下溼地高者尺許其根如薺三
月生苗叢生圓莖分枝一枝三葉葉青而光滑有
三尖多細缺江淮人三四月采苗淪過曬蒸黑色
爲蔬四五開細黃花結小實大如豆狀如初生
桑椹青綠色搓散則子甚細如蓼穗子卽石龍芮
也宜半老時采之范子計然云石龍芮出三輔色

黃者

子根皮

氣味苦平無毒

普曰神農苦平岐伯酸扁鵲大寒雷公鹹無毒之才

曰大戟爲之使

畏茱萸蛇蛻皮

主治風寒溼痹心腹邪氣利關節

止煩滿久服輕身明目不老

本經

平腎胃氣補陰氣

不足失精莖冷令人皮膚光澤有子

別錄

逐諸風除

心熱燥

大明

發明

時珍曰石龍芮乃平補之藥古方多用之其功與枸杞覆盆子相埒而世人不知用何哉

水莖氣味

甘寒無毒

時珍曰微辛苦澀

主治搗汁洗馬毒瘡并服之又塗蛇蠍毒及癰腫

唐本

久食除心下煩

熱主寒熱鼠登癧癰生瘡結核聚氣下瘀血止霍亂又生搗汁半升服能殺鬼毒卽吐出

孟說

發明

說曰堇葉止霍亂與香荳同功香荳卽香薷也

附方

舊二新一結核氣

堇菜日乾爲末油煎成膏摩之日三五度便瘥

孟說食療

蛇咬傷瘡

生堇杵汁塗之萬畢術

血癥初起

胡椒菜葉搾按採之集簡方

毛茛

音良拾遺○

校正

併入毛建草

釋名

毛建草

拾遺目綱

水茛

音芹

天灸

衍義

自灸

綱目

猴

蒜

時珍曰

貞乃草烏頭之苗此草形狀及毒皆似

蒜之故名

後方謂之水

茛又名毛建亦貞字音

訛也俗名毛堇似水堇而有毛也

山人截瘡采葉

搘貼寸口一夜作泡如火燎故呼爲天灸自灸

集解

藏器曰陶注鉤吻云或是毛茛蘇恭云毛茛

葛洪百

毒蟹多

一方云菜中有水茛葉圓而光生水旁有毒蟹多食之人誤食之狂亂如中風狀或吐血以甘草汁

解之又曰毛建草生江東地田野澤畔葉如芥而大上

有毛花黃色子如蒺藜時珍曰毛建毛茛卽毛莖也下溼處卽多春生苗高者尺餘一枝三

葉葉有三尖及細缺與石龍芮莖葉一樣但有細毛爲別四五月開小黃花五出甚光豔結實狀如

欲綻青桑椹如有尖鈞與石龍芮子不同人以爲鶩不食草者大誤也方士取汁煮砂伏硫沈存中

筆談所謂石龍芮有兩種水生者葉光而未圓陸

生者葉毛而未銳此卽葉毛者宜辨之

附錄海薑陰命

藏器曰陶注鉤吻云海薑生海中赤色狀如石龍芮有大毒又曰陰

命生海中赤色着木懸其子有大毒今無的識者

葉及子氣味辛溫有毒主治惡瘡癰腫疼痛未潰

搗葉傅之不得入瘡令肉爛又患瘧人以一握微
碎縛於臂上男左女右勿令近內卽便成瘡和薑

搗塗腹破冷氣

藏器

牛扁

本經下品

釋名

扁特

唐本

扁毒

唐本

集解

別錄曰

牛扁生桂陽川谷

宏景曰今人不復

識恭曰

此藥似革草石

龍芮輩根如秦艽

而細生平澤下地田野人名爲牛扁療牛蟲甚效

太常名

扁特或名扁毒

孫昇曰

今出甯州

葉似石

龍芮附子等二月八月采根日乾

頌曰今潞州一

種便特六月有花八月結實采其根苗

搗末油調

殺蟻蟲主療大都相似疑卽
扁特也但聲近而字訛耳

氣味苦微寒無毒主治身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蟲小蟲又療牛病

本經

附錄蟲建草

拾遺藏器曰苦無毒主蟻蟲挾汁沐頭蟲盡死人有誤吞蟲成病者搗汁

服一 小合亦主諸蟲瘡生山足溼地發葉似山丹
微赤高一二尺又有水竹葉生水中葉如竹葉而短小可生食亦去蟻蟲

蕁麻

宋音尋○

釋名毛蕁

時珍曰蕁字本作蕁杜子美有除蕁草詩是也

集解

頌曰蕁麻生江甯府山野中時珍曰川黔諸處甚多其莖有刺高二三尺葉似花桑或青

或紫背紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂蠍蟄
蟲以人溺濯之卽解有花無實冒冬不凋挾投水
中能毒魚

氣味辛苦寒有大毒吐利人不止主治蛇毒搗塗
之
頌風癱初起以此點之一夜皆失

時珍

格注草

唐本草

集解

恭曰出齊魯山澤間葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許二月八月采根五月六月

采苗日乾用

氣味辛苦溫有大毒主治蠱疰諸毒疼痛等

唐本

海芋

綱目

釋名觀音蓮

綱目

差天草

玉冊

天荷

綱目

隔河仙

見下

集解

時珍曰

海芋生蜀中

今亦處處有之

春生苗

高四五尺

太葉如芋葉而有榦

夏秋閒抽莖

開花如一瓣

蓮花碧色

花中有蕊長作穗

如觀音

像在圓光之狀

故俗呼爲觀音

蓮方士號爲隔河

仙云可變金

其根似芋魁大者如升盆

長六七寸

蓋野芋之類也

庚辛玉冊云

羞天草陰草也

生江

廣深谷澗邊其葉極大

可以禦雨

葉背紫色

花如蓮花

根葉皆有大毒

可煅粉霜

硃砂小者名野芋

宋祁海芋贊云木

芋葉擁腫盤

辰農經弗載

可以治癆

氣味

辛有大毒

主治

瘧瘴

毒腫

風癩

伏硇砂

時珍曰

附錄透山根

時珍曰

按岣嶝神書云

透山根生蜀

中山谷草類蘚蕪

可以點鐵成金

昔人采藥誤斫

此草刀忽黃軟

成金也又庚辛玉

冊云透山根出武都

取汁點鐵立成黃金

有大毒

人誤食之化爲紫水又有金英草亦生蜀中狀如馬齒莧而色紅指鐵成金亦有大毒入口殺人須臾爲紫水也又何遠春渚紀聞云劉均父吏部罷官歸成都有水銀一篋過峽篋漏急取渡旁叢草澤塞之久而開視盡成黃金矣宋初有軍士在澤州臨安僧法堅言有客過於潛山中見一蛇腹脹一草以腹磨之而消念此草必能消脹取置篋中一夜宿旅館聞隣房有人病腹脹呻吟以釜煎藥一盃與服頓之不復聞聲念已安矣至旦視之其人血肉俱化爲水獨骸骨在牀爾視其釜則通體成金矣觀何氏所載卽是透山根乃金英草之類如此毒草不可不知故備載之耳

鉤吻

本品經

釋名野葛

本經

毒根

吳普

胡蔓草

圖經

斷腸草

綱目

黃藤

綱目

火把花

宏景曰言其入口則鉤人喉吻也或言吻當作挽字牽挽人腸而絕之也時珍曰此

草雖名野葛非葛根之野者也

或作治葛王充論衡云治地名也在東南其說甚通廣人謂之胡蔓

草亦曰斷腸草

入人畜腹內卽黏腸上半日則黑爛又名爛腸草滇人謂之火把花因其花紅而性

熱如火也

岳州謂之黃藤

集解

別錄曰鉤吻生傅高山谷及會稽東野折之青烟出者名固活二月八月采

普曰秦鉤吻葉如葛赤

一名除辛生南越山及寒石山或益州

葉大如箭而方根黃色正月采之普曰野葛生桂

州以南村墟閭巷間皆有彼人通名鉤吻亦謂苗

爲鉤吻根名野葛蔓生其葉如柿其根新采者皮

白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防己皮節斷者良

正與白花藤相類不深別者頗亦惑之新者折之無塵氣經年以後則有塵起從骨之細孔中出今

折枸杞根亦然本草言折之青烟起者名固活爲

良亦不達之言也人誤食其葉者致死而羊食其
苗大肥物有相伏如此博物志云鉤吻蔓生葉似
鳧葵是也時珍曰嵇含南方草木狀云野葛蔓生
葉如羅勒光而厚一名胡蔓草人以雜生蔬中毒
人半日輒死段成式酉陽雜俎云胡蔓草生邕州
容州之間叢生花扁如厄子而稍大不成朵色黃
白其葉稍黑又按嶺南衛生方云胡蔓草葉如茶
其花黃而小一葉入口百竅潰血人無復生也時
珍又訪之南人云鉤吻卽胡蔓草今人謂之斷腸
草是也蔓生葉圓而光春夏嫩苗毒甚秋冬枯老
稍緩五六月開花似櫟柳花數十朵作穗生嶺南
者花黃生滇南者花紅呼爲火把花此數說皆與
吳普蘇恭說相合陶宏景等別生分辨並正于下

正誤

宏景曰五符經亦言鉤吻是野葛覈事而言
似是兩物野葛是根狀如牡丹所生處亦有一
毒飛鳥不得集今人用合膏服之無嫌鉤吻別是
一物葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生極類

黃精故人采多藏之遂致死生之反或云鉤吻是毛茛參錯不同未詳云何斂曰凡使黃精勿用鉤吻真似黃精只是葉有毛鉤子二個黃精葉似竹葉又曰凡使鉤吻勿用地精莖苗相同鉤吻治人身身上惡毒瘡其地精殺人也恭曰鉤吻蔓生葉如柏陶言飛鳥不集者妄也黃精直生葉似柳及龍膽草殊非比類毛茛乃有毛石龍芮與鉤吻何干頌曰江南人說黃精莖苗稍類鉤吻但鉤吻葉頭極大而根細與蘇恭所說不同恐南北之產異也禹錫曰陶說鉤吻似黃精者當是蘇說似柏葉者別是一物也又言苗名鉤吻根名野葛者亦非通論時珍曰神農本草鉤吻一名野葛一句已明草木狀又名胡蔓草顯是藤生吳普蘇恭所說正合本文陶氏以藤生爲野葛又指小草爲鉤吻復疑是毛茛乃祖雷敷之說諸家遂無定見不辨其蔓生小草相去遠也然陶雷所說亦是一種有毒小草但不得指爲鉤吻爾昔天姥對黃帝言黃精益壽鉤吻殺人乃是以二草善惡比對而言陶氏不益

審疑是相似遂有此說也餘見黃精下

氣味辛溫大有毒

普曰神農辛雷公有毒殺人時其性大熱本草毒藥止云

有大毒此獨變文曰大有毒可見其毒之異常也之才曰半夏爲之使惡黃芩

主治金瘡

乳瘡中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒

本經破癥

積除腳膝痹痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸搗汁

入膏中不入湯飲

別錄

主喉痹咽塞聲音變

吳普

發明

藏器曰鉤吻食葉飲冷水卽死冷水發其毒也彼土毒死人懸尸樹上汁滴地上生菌子

收之名菌藥烈於野葛也蘿蔔搗汁解野葛毒取

汁滴野葛苗卽萎死南人先食蘿蔔後食野葛二物相伏自然無苦魏武帝噉野葛至尺先食此菜也時珍曰按李石續博物志云胡蔓草出二廣廣

人負債急每食此草而死以誣人以急水吞卽死
急慢水吞死稍緩或取毒蛇殺之覆以此草澆水
生菌爲毒藥害人葛洪肘後方云凡中野葛毒口
不可開者取大竹筒洞節以頭挂其兩脇及臍中
灌冷水入筒中數易水須臾口開乃可下藥解之
惟多飲甘草汁人屎汁白鴨或自鷺斷頭瀝血入
口中或羊血灌之嶺南衛生方云卽時取雞卵抱
未成雛者研爛和麻油灌之吐出毒物乃生稍遲
卽死也

本草綱目草部第十七卷下終