

科
簡
效
方

錦
記



四科簡效方乙集目次

外科通治

癰瘍初起

癰赤腫痛為
癰瘍陽證也

已成不潰

癰生數處

四毒發
面赤中央

徧體浸淫

身面疥瘡

洋徽瘡

多年惡瘡

已成未成

膿淨不合

徧體火瘡

面熱瘡

身風癩

結毒

翻花瘡



瘡瘡努肉

諸瘡成管

瘡久成漏

漆瘡

魚臍疔

已成未成

疔疽內陷

隔皮取膿法

白駁

俗名癩花風
又名蛇皮癩

諸瘡生蛆

瘡爛成孔

瘡痕不滅

疔

疽

石疽

移毒法

疽瘡骨出

瘙癢

身面赤腫
瘙癢痛也

四面赤中央
黑凹者是

生黃豆與病
之不腥者是

毒自臍發外
焮腫陰證也

如石堅硬
不作膿者



南京中醫藥大學圖書館版權所有

丹毒

遊風赤疹也

牛皮頑癬

赤癩

指諸瘡

上部諸證

頭瘡

口貴

肥瘡

諸瘡

眉疔

諸瘡

耳後月蝕

鼻瘡膿臭

諸癬

赤白癩風

白癩

禿瘡

天泡瘡

偷鍼

玉枕瘡

鼻蝕穿唇



唇瘡

羊鬚瘡

天柱瘡

頸項結核

癰癤已潰

贅疣

水中部諸證

肩疽

腋疣

口瘡

對口

疔腮

癰癤馬刀

瘦氣

點痣

白癰

腋癰

癰疽



南京中醫藥大學圖書館版權所有

臂疔

蛇頭

代指 俗名瘰癧爪

發背

乳癰

脇癰

腋疽見臟

脇腰丹毒

蛇纏

腸癰

小腹痛腫痛小便似淋或大便艱澀下膿腳

不能伸者是

下部諸證

便癰

凡便毒微瘡皆發于外腎上橫骨乃督任二脈之病也

囊癰

囊瘡



莖瘡

下疳

懸癩

生于肛前囊後
俗名偷糞老鼠

痔

痔漏

指諸瘻

坐板瘡

醫瘡

指諸瘻

附骨疽

臙瘡

指諸瘻

靛肚瘡

毒熱足腫

足跟瘡

甲疽

指諸瘻

肉刺

趾潰

指諸瘻

跌打傷



通治 跌打

傷骨

傷眼

穿斷舌心

囊破

閃挫腰痛

杖傷

金刃傷

通治 內傷

傷筋 跌打

傷腦

擦落耳鼻

腸出

破傷風 金瘡 傷同

閃拗手足

跌打

跌打

出血不止



瘀血內漏

血出閃絕

指斷

莖斷

箭簇不出

鍼折入肉

湯火傷

通治

未起泡者

瘀血在腹

發腫疼痛

腸出

箭傷

槍子入肉

徧體傷者

已起泡者



泡破

爛見骨

滾油潑傷

爆竹炸傷

火藥傷

煤炭毒

烟熏悶絕

灸瘡

人物傷

人齧

馬齧

豬齧

犬齧

貓齧

鼠齧

虎齧

虎熊狼爪傷



蛇齧

蛇入人齧

辟蛇法

蝎螫

蜘蛛齧

蠶齧

蟻螫

蚯蚓呵

蛇纏不解

蛇骨刺入

壁虎齧

蜈蚣齧

壁鏡齧

蜂螫

或螫毒

諸蟲齧

一名楊辣
一名瓦辣



四科簡效方乙集

海甯王士雄孟英選 會稽徐樹蘭仲邦校刊

外科通治

癰瘍初起

嫩赤腫痛爲癰陽證也

生大黃研末篩細醋和塗之燥即易不過三次即

消散不復作膿

花粉 赤豆等分研末醋調圍之

木芙蓉

花葉根皆可用或采花浸鹽瀉內藏以待用

柞爛

乾者研末圍蜜調亦可

之中間留頭乾則頻易初起者即消散已成者即



膿聚而潰已潰者易斂生肌或加赤豆末同圍其
功更大除陰毒貼骨疽之外無不神效

已成未成

牛皮膠

一名黃明膠

一片水漬軟當頭開孔貼之

未膿

自消已膿潰出

已成不潰

取白雞兩翅下第一羽各一莖燒灰研末水調下
雀屎取堅硬者酒調塗之即破
蠶繭已出蛾者燒灰酒服用一枚出一頭二枚出



二頭

膿淨不合

先以槐枝、葱白煎湯洗後用瓦松陰乾爲末傅

或用經霜桑葉研傅或秦艽研末糝

濃煎棗湯洗之再以鼈甲煨存性研糝

絲瓜杵汁頻塗

瘡生數處

牛糞燒灰研雞子清或醋調塗

遍體火瘡



初起似癩漸如水泡熱似火燒瘡色紫赤不治殺

人藁薑葉

即油

搗汁調大黃

芒硝

生鐵鏽等

分塗

徧體浸淫

凡猝得毒氣攻身瘡赤癢痛上下周匝煩悶欲死此浸淫瘡也起于心下者最險不早治殺人以雞

冠血塗之日四五次

新羊糞絞汁塗

胡燕窠中土研末水和敷



身面熱瘡

銀鱗餅以煙頭骨擊碎煎藥不

榆白皮研末油和塗

連半我消愈

苦參末粟米飲丸梧子大每五十丸空心米飲下

身面疥瘡

各研和勻再研每二錢食遠温酒下瘡

樺樹皮

燒灰

枳殼

去穰各四兩

荆芥穗

二兩

炙甘草

五錢

杏仁

水煮過去皮三兩

各研和勻再研每二錢食遠温酒下瘡

甚者日三服

白藥此病萬不可服升丹

菖蒲煎湯洗併研鋪席臥豆米詳其方合日三

遍身風癩



濃煮浮萍湯頻浴浴須半日俾毒氣外泄再以苦
參五兩切片好酒三斗漬三十日每飲一合日
服常服不絕自瘥

洋黴瘡

土茯苓

一兩

生苡仁

一兩

銀花

一兩

防風

木瓜

一兩

木通

白蘚皮

各五分

皂角子

四分

氣虛者加人參

七分

血虛者

七分

加當歸

加當歸

七分

水二大椀煎飲日三忌飲茶及牛羊雞

鵝魚肉燒酒法麪房事半月即愈病深者月餘必

愈若誤服輕粉以致筋骨攣痛癱瘓不能動履者



者服此亦效

鮮生地

生苡仁

各五錢

銀花

三錢

花粉

連翹

蘇皮

威靈仙

角刺

蟬蛻

各二錢

白芷

錢

生後

草錢半生白果仁

紅棗肉

各十枚

以鮮土茯苓四兩

水六椀煎減半取水煎藥毒甚者加大黃三錢發

在頭者加升麻五分發在足者加川牛膝三錢日

服一劑以愈為度此病萬不可服升丹隱藥以圖

速效誠恐引毒入臟後發莫救惟此三方最穩最

效餘詳願體醫話



結毒

紅棗五斤以杉木作柴煑之熟去皮核即取杉柴炭

研細末和棗肉杵勻丸彈子大每日任意食之不

可閒斷雖瘡毒滿身或服過輕粉及丹石隱藥以

致穿頂穿鼻腐爛不已多年不愈者服此大效

極穩當然愈後須再服一二月以刈根株忌醋辣

椒即食茱萸
一名辣茄及一切發物

多年惡瘡

鉛粉 硃砂等分爲末蜜和塗



諸藥不瘥者馬齒莧搗爛傅之

翻花瘡

柳枝葉三斤水五升煎汁一二升熬如錫日三塗
蒼耳葉搗汁塗日一二塗

瘡瘡努肉

烏梅肉燒存性研傅惡肉上一夜可消大半再上
一日而平
凡擠膿用力太過以致努肉突出如梅如粟久不
縮入乃損傷氣脈使然若用降藥雖腐去其小者



復又突出大者屢蝕屢突經年不愈宜以大熟地

炒枯兩大烏梅肉炒炭三錢共研細糝膏藥貼之

不過數日即收再用粉霜收口併治陰虛脫肛用

防風升麻各一錢煎湯調搽即收

諸瘡生蛆

綠礬研末糝之即化為水

生麻油渣貼之

柏枝節燒瀝取油塗之數次即愈亦治牛馬疥

諸瘡成管



大蒜梗燒灰搽卽脫

瘡爛成孔

稷米甑上氣汗水以次盤承滴額搽

瘡久成漏

金銀花浸酒常飲

瘡痕不滅

燕蓐草燒灰鷹屎白等分研人乳和塗

鮮橄欖切斷燕蓐香少許漆之無癢

漆瘡



嚼川椒塗口鼻則免患

杉木

紫蘇

萹菜

白礬

乾荷葉

川椒皆

可煎湯洗

以生黃豆與病人嚙之不濕者是疔

疔

金銀花或菊花連莖葉搗絞自然汁半椀
服之以滓傅患處或嚼生黃豆塗之或取烟桿中
烟油厚敷四圍留頭不敷少刻疔破出水而痊
青石末同荔枝肉杵爛以雌雞屎調塗其根自拔
水疔色黃麻木不痛暗疔瘡凸色紅使人昏狂並



以三稜鍼

疔瘡忌鐵或金
鍼銀鍼皆可用

刺患處四畔

後用

去殼浸油中年久者杵爛罨之

此藥甚效甚大

須

濟世兼治鍼刺入肉諸藥所不能出者
及勞苦遠行人壹鋒嵌入腳內皆效

魚臍疔

四面赤中央黑凹者是

臘猪頭燒灰雞子清調傅日數易

葱白 蜂蜜杵塗四圍

毒自臟發外不焮腫陰證也

疽

獨蒜杵爛麻油和厚傅之

初起未成者先以艾灸為妙其法用溼紙搗上先



乾處是頭便用大獨蒜切如錢厚放毒頂上以陳
艾揉熟作炷灸之三壯一易蒜片不計壯數以痛
者灸至不痛不痛者灸至極痛爲率此法
不開大二使內肉不壞三使瘡口易合功
惟頭項之毒不可灸陽證癰瘍不可灸耳

已成未成

草烏 南星等分爲末少加肉桂和勻生薑汁熱
酒調塗未成者內消已成者卽潰久潰者能去腐
爛



石疽 如石堅硬不作膿者

醋五升以粗黃石如鵝卵者猛火燒赤焙
再燒再焯至醋減半將焯過之石搗細末即以此

醋和厚塗患處以消為度

黃耆 人參 各一兩 為末入冰片 錢一 生藕汁丸綠豆

大每二十九溫水下

疔疽內陷

凡疔疽最慮毒不外達而反內攻初起三日內用
真綠豆粉 一兩 乳香 五錢 燈和勻每一錢濃煎生甘



草湯調時時呷之使常在膈間若兼嘔逆卽毒氣
內攻之漸尤宜亟服設鼻生瘡菌飲食不進卽危
矣四五日後猶宜閒服之

移毒法

凡毒生要害不便出膿之處此藥能移之或上或

下俾無後患用白芨

一兩六錢

紫花地丁

八錢

五倍子

二錢

好硃砂

明雄黃

輕粉

各一錢

牙皂

八分

烏雞骨

一錢

煨

共研末以醋調傅毒之上截卽能移至下截傅

下則移上極效



雄黃 飛麩 蚯蚓糞共研細醋調漸漸塗而高
之自能移過要害處也

隔皮取膿法

凡疽毒深遠膿難直取或患人畏用刀鍼者膿熟

白時用此法甚妙驢蹄皮

即腳底別下者炒

莖麥麩

各一兩 草

烏

刮去破四錢

共研勻加食鹽

五錢

水調和成薄餅瓦上

炙微黃再研細醋調攤白紙上貼患處膿即從毛

孔而出蓋以草紙滲溼即換膿淨紙燥腫亦自消

如膿不從毛孔出則塗藥之旁自然潰出一孔神



南京中醫藥大學圖書版權所有

妙無比

疽瘡骨出

黃連 牡蠣等分研末先以鹽酒洗過傅之

蜜陀僧研末桐油調勻攤貼

白駿

俗名癩花風又名蛇皮癬

先以布擦透後用醋磨石硫黃 附子塗之或硫

黃 白礬擦之

先以皂角湯洗再煎茵陳湯洗後以醋調蛇蛻灰
搽若頭面先起漸長如癬急用穿山甲片刮令燥



痛以炙熱豬脂頻擦卽愈

瘙癢

身面赤腫癢痛也

茵陳煎濃汁洗

鐵鏽磨水塗

荊芥穗赤豆等分研雞子調塗

丹毒

遊風赤疹也

無名異研末葱汁調塗

芭蕉擣爛塗

羚羊角燒灰雞子清和塗



諸癬

五倍子去蟲白礬燒過等分研末溼者

油調

生白果仁或薑黃頻擦

韭根炒存性研猪油和塗

牛皮頑癬

藜蘆末生油和塗

烟膠而寒水石

各三錢

白礬

二錢

花椒

半錢

共研末猪油

調塗



赤白癩風

貝母

南星等分爲末生薑帶汁擦之

猪脰

一具酒浸一時飯上蒸熟食不過十具愈

桑枝

十斤益母草三斤水熬成膏每卧時酒服一二兩

赤癩

醋磨知母擦之日三

白癩

白蒺藜六兩生研末每服二錢日二半月白處見

紅點一月絕根

用醋煎一兩日三至五半蜜忌生



生胡麻研末每用酒服一兩日三至五斗瘥忌生
冷雞猪魚蒜等百日

上部諸證

頭瘡

先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗裏乾
草霜細研入鉛粉少許生油調搽
五倍子白芷等分研末青油調傅上溼者糝之
鴿屎研末醋調搽最妙用生蘆菝柝爛米醋泡透
敷



禿瘡

殺豬時取其肚破去屎乘熱反罨頭上須臾蟲出著肚若不盡再作至無蟲以皂角湯熱洗次用蘆末豬油調塗如嫌肚穢則用羊肉切大厚片如常炙香乘熱徧貼亦可取蟲盡以鹽湯洗之再用雄黃末和豬膽汁塗之

肥瘡

天鉛粉

煨

松香

各三錢

飛礬

二錢

黃丹

一錢

共研麻油二兩

熬膏塗



廣夫更推

雞子黃熬油搽

天泡瘡

生百合搗塗

蓮蓬殼燒存性研并泥調塗

眉疽

生綠豆 五倍子等分研末醋調搽

偷鍼

南星 地黃各三錢研成膏貼兩太陽

耳後月蝕



蚯蚓屎煨研豬油調搽

玉枕瘡

原蠶蛾炒石葦等分爲末搽之

鼻瘡膿臭

苦參 枯礬各一兩生地汁三合水二錢煎至二合少

少滴之

鼻蝕穿唇

銀屑一兩水三升銅器內煎至一升日洗三四次

唇瘡



旋覆花煨存性研麻油調搽

口瘡

五倍子

錢八

蜜陀僧

錢四

黃檗

錢二

銅綠

錢一

研末

和勻

色赤者花粉研末糝

色白者黃檗 萹撥等分研糝

羊鬚瘡

舊綿絮煨灰麻油調搽

對口

枸橘

三枚

瓦焙存性黃酒衝服儘量飲微醉卧蓋厚



被得汗卽解

白菊花

甘草

各四兩

水煎服

天柱瘡

生脊大椎上大如錢出水用驢蹄甲

二片鉛粉二熬

錢麝香少許爲末醋和塗乾則糝

疔腮

葱煎濃湯儘洗

赤豆研末醋調敷

頸項結核



野菊花搗爛煎酒服渣敷患處

連翹 脂麻等分爲末時時頻服

生薯蕷 挺一 蓖麻子 粒二 各去皮研勻攤貼

瘰癧馬刀

胡桃劈開去肉入去鉤全蝎一尾合好紮緊瓦
炙存性研每日一枚溫酒調下至愈卽止

瘰癧已潰

牛皮油鞣底燒灰麻油調塗

陳年破明角燈燒存性研菜油和塗



瘦氣

牆上白螺螯殼研末敷

以餅糊和

貼

昆布

鹽

海藻等分研蜜丸龍眼大時時含之嚙汗

鐵砂入水缸浸之飲食皆用此水十日一換砂半

年自愈

諸症

亦宜有刺去腐爛以酒和麴餅

贅疣

諸費血正靈識越飛變之

蜜陀僧爾桑白皮等分研新汲水調塗

生南星大者一枚研爛醋調先以鍼刺令氣透貼

之類出血用刺東墨百草露等公醫之



館版權所有

疣破出血用陳京墨煨百草霜等分罨之

點痣

石灰一兩

熟

桑柴灰淋汁熬成膏刺破點

贅血痣潰血五靈脂炒研糝之

手中部諸證

肩疽

吳萸鹽淹過炒研醋調塗

腋癰

池塘爛泥

一杯桐油

三杯和勻以鵝翎時時掃塗勿令



南京中醫藥大學圖書館版權所有

乾

腋疣

長柄瓠瓠燒存性研末搽長三箇愈

癩疽

肩臂累累如赤豆者剝去瘡痂以酒和麩傅

臂疔

紅絲疔多生臂肘先用鍼挑斷紅絲隨將多年糞

坑上碎椽木煨灰研細飴糖和塗紅絲並疔四圍

中留小頭疔卽拔出治遲無救絲爛不表可治



烟桿中烟油離絲三分處敷之絲卽不走

蛇頭

雄黃

蜈蚣

全蝎

各一錢

共研瘡口開入

藥名

以小帛抹油拴住乾則頻以油潤

代指

俗名癩爪

烏梅入醋研浸患處

生雞子開一孔將指浸之浸三箇愈

忍冬藤 蒲公英煎濃汁浸或以甘草濃湯漬

發背



大甘草

兩

微炙搗碎水一大升浸之器上橫

小

刀子置露中經宿平明以物攪令沫出吹沫服之

兼治一切瘡腫

末水調塗

紫荆皮爲末酒調籬住自然撮小不開再用乾柞

木葉

乾荷蒂

乾萱草根

地榆

甘草節各四

兩

細剉每服五錢水二椀早晚各一服未成卽散

已成亦漸乾乃救貧良劑忌一切飲食毒物

冬瓜一箇切去一頭合患處瓜爛切去一圈再合

之瓜未完而卽愈此仙方也發背欲死者可治



乳癰

葱白杵傅併絞汁服

苳根擣傅之

脇瘡

如牛眼狀者以鹽少許入牛耳取其垢傅之

脇疽見臟

赤豆 苳根爲末水調塗

脇腰丹毒

赤腫如霞者榆白皮研末雞子清和塗甚至徧身



蛇纏

青紫者羚羊角煨研雞子清和塗

雄黃末醋調傅

糯米嚼爛和鹽傅

舊糞桶穰煨研麻油調塗

腸癰

小腹痛小便似淋或大便艱澀下膿脚不能伸者是

大棗連核煨存性百藥煎等分爲末每一錢温酒

下

甜瓜子

一合

當歸

炒一兩

蛇蛻

一條

咬咀

每服

四錢

水

送



半煎一瓊食前服取下惡物

下部諸證

便癩

凡便毒微瘡皆發于外腎上橫骨乃督任

二脈

俗謂左魚口右便毒又統名曰騎馬瘡雄黃

乳

香各二錢黃檗一錢共研新汲水調塗

牛皮膠醋煮烱塗

瓦松研末雞子清和塗

囊癧

銀花六兩甘草一兩川棟子二枚去核水煎服能飲者加酒



更妙

生地

當歸

各一兩

以麻油二兩煎至藥枯

去渣

入白蠟溶化攪勻冷卽成膏已潰者貼之卽愈兼治一切癰疽發背湯火傷皆效若加乳香沒藥

龍骨

血竭

兒茶

輕粉則生肌長肉尤著

其神

囊瘡

川椒

七粒

葱頭

七箇

煎湯洗

甘草湯洗過臘茶爲末糝或油和塗



中國醫藥大學圖書館版權所有

莖瘡

炙甘草研末頻頻塗之

鼈甲煨研雞子清和傅

下疳

甘草

三兩

葱

三莖

槐枝

一把

黑豆

一合

水煎豆熟為度濾清

汁乘熱淋洗冷則易

牝豬糞黃泥包煨存性為末先以米泔水洗淨搽

之立效

泔水洗後以兒茶研末傅



南京中醫藥大學圖書館版權所有

懸癧

生于肛前囊後俗名偷糞老鼠

連節粉甘草

兩四

以東流水一碗將甘草浸兩夜

而浸水完爲度研末入皂角灰少許分四服白湯

下或酒煎服頻服自消

瓦上曬白猫屎研細酒下併蜜和塗

痔

槐根或桃根或蘆薈或冬瓜皆可煎湯頻洗又每
登圍後取河水或井水冷沃良久雖年久諸藥不
瘳者頻沃漸愈



蜒蚰杵爛搽立效

明礬錢五 蜈蚣條七 皂礬煨赤 其入銀罐內文火煨末

入硃砂分四 冰片釐五 同研細麻油調敷十八日瘰癧

枯痔祕方也然非外科所樂聞者

痔漏

痔漏臟毒成管者用胡黃連薑汁炒 刺蝟皮炙各一兩 爲

末入麝香二分研勻飯丸麻子大每服一錢名追

管丸服完後再用胡黃連炒取淨末二兩 穿山甲麻油炒黃取淨末

石決明煨取淨末 槐米微炒取淨末各一兩 其研勻煉蜜丸麻

續末



子大每早晚服一錢清米湯下至重者四十日
名消管丸如瘡口四邊有硬肉突出者方
加麩
繭二十枚炒研和入

若服追管消管三丸愈後不守禁忌或食豬肝番

薯犯酒色而瘡患復萌者急用夏枯花十兩連翹殼

甘草節各五兩淨銀花四兩其研細末另以淨銀花

一斤熬濃汁法丸綠豆大每晨空腹淡鹽湯送三

錢起漏一二三年者服一料三五年者服二料病可

斷根不發名完善丸



坐板瘡

生脂麻嚼傅

滑石 生大黃 人中白 蜜陀僧 其研

醫瘡

葱白杵爛蜜和傅

芙蓉葉入鹽冰片各少許杵爛圍貼

附骨疽

槲樹皮燒存性研米飲下

臙瘡

入香早調取油煎米湯至重香稠日愈



南京中醫藥大學圖書館版權所有

棉花子炒脆取末填滿瘡內紮好不可開看自然
痂愈

馬齒莧煎汁一鍋去滓入黃蠟五兩慢火熬膏塗
之

骹肚瘡

先以貫眾煎湯洗之後用百藥煎研末唾和圍之
人乳 桐油等分和搗

毒熱足腫

酒煮苦參湯漬之痛即止



足跟瘡

鹽漿水溫洗後以白朮研細糝

甲疽

硼砂

乳香

黃丹

各一錢

鉛粉

五分

橄欖核

三枚燒存性

其研麻油調搽先用鹽湯洗淨拭乾再上藥

黃檗 烏頭尖等分研洗淨敷貼

陳皮嚼爛貼之乾即易

肉刺

因穿窄履而生足趾礙痛不能著履以大棗肉杵



貼候爛剔去

趾潰

芒硝煎湯洗淨以烏梅核中仁為末醋調成膏塗

之

豬脂調蚯蚓糞傅

跌打傷

通治

熱童便先灌再以麻油醋酒各一盞碗同煎數沸服

之臥于煖炕厚蓋衣被一夜痛止腫消併無傷痕



中國醫藥大學圖書館版權所有

采桑甚封置瓶內取塗患處立愈亦治杖傷

乾冬瓜皮

牛皮膠

各一兩

剉入鍋內炒存性研末

每五錢熱酒下能飲者酒宜多飲厚蓋取微汗痛

卽止一宿而痊

瓜兒

血竭

各一兩

粉口兒茶

二錢四分

淨乳香

淨沒藥

子紅花

各一錢五分

飛淨上硃砂

一錢二分

梅花冰片

麝香

當門子

各一分

于端午日午時各研極細

再研勻藏瓷餅內蠟封口陳久愈佳每服七釐童

便溫酒隨下名七釐散不可多服孕婦忌服亦可



外傳患處

傷筋

絲瓜開花時侵晨日未曬過不老不嫩肥厚之葉

採取陰乾研末收藏糝跌打傷筋離斷者可續且

消腫止痛兼治金瘡併惡瘡癰皆妙

生蠟一隻搗絞汁微熬塗之筋自續亦治金刃斷

筋

傷骨

南星一木鼈

各四兩

乳香沒藥

官桂

各一兩

研末



生薑一斤去皮搗汁入醋少許加白麪共調爲糊

攤紙上貼之外以帛纏杉木夾縛

稷米

升一

皂角

切碎半升

青錢

百枚

同炒焦黑去錢

研末酒

調貼之

人中白醋

滓爲末每五分酒下若自然銅之類雖

有接骨之功而燥散之害烈于刀劍用者慎之

傷腦

凡跌打傷而腦子偏者最難治其人頭暈嘔吐看其頭左右偏大者卽腦偏也急將人頭扶正攙起



立直用細帶一條圈頭所餘之帶須約三四尺長
繫在柱上仍將人身扶直以細棍敲帶之中
即正此蒙古治法最妙

腦骨破者葱白和蜜杵勻厚封

傷眼

青紫腫痛者用大黃爲末生薑汁調敷

擦落耳鼻

以亂髮燒灰研乘急將所落耳鼻蘸髮灰綴定用

軟帛縛定被人獸齧下者亦治



穿斷舌心

以雞翎蘸醋刷患處血卽止隨用硼砂入杏仁蒲黃炭研末蜜調含化

腸出

急以麻油潤瘡口輕手納入再搐鼻取嚏或冷
噴其面其腸自收隨以桑白皮縫將腹皮縫合外
用生肌藥敷貼

藥破

畢丸墜出者宜緩緩托入多取壁錢兒卽喜厚貼傷



處

破傷風

金瘡傷同

魚鱧煨存性研細每一錢温酒下外以自己小便

頻洗

蟬蛻研細葱汁和塗患處

南星 防風等分爲末温酒服一錢重者童便調

閃灌二錢雖已死但心口尚温者亦可活外卽以此

藥傳之

閃挫腰疼



北京中醫藥大學圖書館版權所有

西瓜青皮陰乾研末收藏每三錢鹽酒調下

蒔蘿研末酒服二錢

閃拗手足

當歸

荆芥

葱白煎湯洗

一錢重

生薑

葱白搗爛和麩炒熱罨之

杖傷

凡受傷後忌卧草竹席及熱炕

白蠟一兩細切滾酒泡服預服之受杖不疼既杖

先以童便醱酒各一碗和服

杖後腫痛鳳仙葉杵爛貼乾則易

或取葉陰乾研末藏之用時水



和塗

葱白杵爛炒熱罨冷即易

杖後青腫用溼棉紙鋪傷處將燒酒糟杵爛厚鋪紙上或用豆腐切片貼

杖瘡未破用乾黃土童溺入雞子清和塗乾即以熱水洗去復刷復洗數十次以色紫轉紅爲度仍刷兩跨防血攻陰

杖瘡已破用雞子黃熬油搽

杖瘡出血用豬油一升石灰七升和煅再以水和



中國醫藥大學圖書館版權所有

丸煨凡三次研傅

夾傷用小蝦蟆

五箇

生薑

一兩

芒硝

三分

酒糟

一椀

搗傅

飛麪

卮子末

水和

塗外

護以紙

綠豆粉炒令紫色

以熱酒

或熱醋

調塗

金刃傷

通治

石膏煨研傅

韭菜石灰杵和貼牆上

曬乾

研末

收藏

糝上

卽愈

葱白砂糖搗爛封之

或以鮮桑葉杵爛封

桑根白

冬月取

桑根白

取

取

取



南京中醫藥大學圖書館藏

皮亦凡金瘡血去過多其人必渴宜忍之
可食或啖肥脂以止其渴若恣飲湯粥必致
忌飲冷水恐血凝也其熱酒熱羹鹽醋喜怒勞動
房事則人皆知禁也

出血不止

白芍炒研米飲或酒服二錢漸加之仍以末敷患處

飛麪和白沙糖罨之

瘀血內漏



好雄黃半豆大納之再以童便調服五錢血皆化
水丹皮爲末服亦可

瘀血在腹

葱白

二十

麻子

三升

水煎服

血出悶絕

蒲黃末五錢熱酒調灌

發腫疼痛

薔薇根煨研白湯下一錢日三

桑柴細灰傅



南京中醫藥大學圖書館版權所有

指斷

急宜接上以蘇木末敷之裹以蠶繭紮好數日全

愈

腸出

小麥五升水九升煮四升棉濾淨汁待極冷含汁
嚙其背則腸自入嚙時勿令病者知及多人在旁
言語如未入擡病者臥席四角輕搖則自入若腸
已斷者以桑白皮綫或麻綫均用麻油潤過從裏
縫之縫好再用麻油潤腸活滑推入腹內乃縫肚



皮不可縫縫好以血竭末敷之若傷破肚皮腸與

脂膏並出者先服芎歸湯用手臂去脂膏

此是腸

去然後推腸入腹用綫縫之縫好後均以

清膏

束慎勿驚動使瘡口復迸更須頻服通

瀉丸

大小便閉最為喫緊

莖斷

瘡口流血不合卽以斷莖煨研酒調服下蠶室者

治亦同

箭傷



女人月經布燒灰傅

若拔箭無血者最危急宰一羊取出熱心割
子對傷口吸住其血自流

中藥箭者纔傷皮肉便覺悶膿沸爛宜急服糞清
併以人糞塗之或急飲麻油數椀

藕 蘆根 生地 黑豆皆可煮汁飲

箭簇不出

丹皮 白欵等分研細酒服三錢日三

瓜婁根杵塗患處



乾莧菜同沙糖搗塗

槍子入肉

南瓜瓢傅之

鍼折入肉

刮象牙末水和罨患處或熱小便漬之

竹木刺以頭垢罨之

湯火傷

通治

好燒酒冷淋之



南京中醫藥大學圖書館版權所有

泡過茶葉不拘粗細用壺盛放朝北地上
愈陳愈妙不論未潰已潰搽之即愈

徧體傷者

缸注酒浸之併內飲麻油

未起泡者

陳醬塗

鹽敷

溺漬洗

已起泡者



龍眼殼焙灰研桐油和傅

生蘆薈或梨杵罨

生大黃 地榆等分研油調塗

泡破

西瓜皮入瓷餅埋土中化水收藏塗上卽愈

豬油杵米粉或杵飛麵塗

白蜜 雞子清 生豆漿皆可塗

爛見骨

百草霜二兩輕粉一兩研勻麻油調搽



鐵鏽磨水搽

滾油潑傷

陳麩糊或白蜜塗之

麩皮炒黑研傅

蟹殼煨灰麻油調搽並宜飲童便

爆竹炸傷

鮮柏枝搗爛麻油和傅

火藥傷

石炭

卽煤炭

燒紅研末醋和塗



生南瓜杵爛塗

煤炭毒

房中置清水一盆則無患

新汲水或蘆菔汁灌之

烟熏悶絕

蘆菔汁灌或溫水調蜜灌

灸瘡

血出不止者酒炒黃芩二錢爲末酒調下
腫痛者伏龍肝煮汁淋洗



南京中醫藥大學圖書館版權所有

火毒入內兩股生瘡者薄荷汁塗之

人物傷

人齧

熱湯洗去牙黃瘀血再取溏雞屎塗生粟不生白

果柿餅皆可嚼爛塗

豬脊髓葱白鼠屎共搗傅

蘆菔葉嚼傅

馬齧

豬肉同飯自嚼傅



薄荷汁搽

皂角子燒灰麻油和塗

豬齧

松香熬貼

龜板燒研麻油調搽

犬齧

紫蘇葉嚼傅

婦人溺淋洗

白沙糖杵葱白塗



南京中醫藥大學圖書館版權所有

狗犬

即瘋犬

齧者急于無風處冷水洗淨隨服並吐

一椀七日又服一椀四十九日共服七椀

鹹酸一年忌魚腥終身忌狗肉蠶蛹

傷處無血用雞屎搽有血用沙糖明礬末研勻

搽再狗犬齧者頂心必有紅髮務必拔去渴煎陳

麥楷或綠豆湯代茶

猫齧

薄荷汁塗

雄鼠屎燒灰麻油調傅

鼠齧

猫頭毛燒灰油調傅

麝香罨

香椿樹皮搗汁一杯黃酒和服

虎齧

酒恣飲嚼栗塗

沙糖恣服併塗傷處

眞麻油灌併洗患處

虎熊狼爪傷



南京中醫藥大學圖書館版權所有

蛇齧

生鐵煮水洗再嚼小米塗或乾薑末傅

稻草或茭白燒灰菜油調塗

婦人尿或煖酒淋洗隨用扁豆葉或金絲荷葉或
大蒜杵爛塗

紫蘇葉搗汁飲外以人糞塗之

蛇纏不解

熱湯淋之卽脫纏足者令人就蛇尿之卽解

蛇入人竅



刀割蛇尾納川椒數粒裏定卽出

蛇骨刺人

鐵精粉一豆許吹入瘡內

辟蛇法

畏蛇者麝香

雄黃

乾薑等分搗勻絳囊盛佩

男左女右

階庭種鳳仙花

房中燒雄黃或龍眼殼核

壁虎齧



青苔塗

礬末傅

蝎螯

麻油塗

白沙糖按揉

芋頭 荷梗皆可擦

蜈蚣齧

菖蒲

桑皮

獨蒜皆可擦

雄雞冠血 蚯蚓糞 頭垢皆可搽



竹瀝 薄荷汁 桑葉汁 皆可塗

蜘蛛齧

雄黃研擦

油和鹽糝

身上生絲者飲羊乳或牛乳

壁鏡齧

醋磨雄黃或大黃塗

蟻齧

芫根煎汁飲外以麝香蜜和塗



南京中醫藥大學圖書館版權所有

蜂螫

熱尿淋洗菜油擦之

嚼青蒿或頭垢封之

芋梗擦之

蟻螫

梳垢封

截蚤毒

一名楊辣 一名瓦辣

菜油塗忌用熱湯洗

蚯蚓呵



濃煎鹽湯頻洗

諸蟲齧

生脂麻嚼敷

南星末醋和塗

生榧子頻食

...

...



南京中醫藥大學圖書館版權所有