

蘭台軒範

徐靈胎醫書三十二種

凡例

一每病先叙病原首內經次金匱傷寒次病源千全外臺宋以後亦間有採者前人已有之論則後者不錄若一病之中為病不一則即詳著於總名之下不復另立病名方之次第亦然

一一病必有一方專治者名曰主方而一病又有幾種每種亦各有主方此先聖相傳之法莫之能易也俱載本病之下其有此病之主方而他病亦可用者則他病下祇載方名並治法註云見某病門以便翻閱

一專治一病為主方如一方而所治之病甚多者則為通治之方先立通治方一卷以俟隨證據用變而通之全在乎人服食養生皆在其中矣

一金匱諸方非南陽所自造乃上古聖人相傳之方所謂經方是也此乃羣方之祖神妙淵微不可思議分載於各證之下學者當精思熟識以為準的

一傷寒一科宜將傷寒論諸條字字體認其一百十三方亦當字字參悟余已將一百十三方編成類方一書矣此書無病不載豈可獨遺傷寒故略取六經主病之方隨證分錄其外諸方兼治雜病者俱分載各證條下蓋傷寒諸方當時本不專治傷寒南陽取以治傷寒之變證耳學者當合金匱傷寒兩書相參並觀乃能深通其義而所投輒效矣

一後世諸方其精實切病者皆附於古方之後其有將古方增減一二味即另立方名者殊屬僭妄蓋加減之法稍知醫理者皆能之若易一二味即自名一方則方名不可勝窮矣今一概不錄或有雜藥奇法據稱得之秘傳而其理不可解則有效有害皆未可知一概不錄或方中有難得之藥及無人能識之藥并違禁少藥如胎骨之類一概不錄其有飛鎗禁咒等方既乏師承又屬渺茫一概不錄至於大藥重

劑藥品既多修治艱鉅此乃腹食之大藥非救病之急劑學者平時查考以廣見聞可也一概不錄學務窮經志切師古不尚奇功祇求實效此書之志如是而已

一凡事最忌耳食孔子所謂道聽而途說也如治浮火者當引火歸元乃指腎臟虛寒火不能納非治實火及別臟之火也如類中風用地黃引子乃治少陰純虛之症證非治風火痰厥之中風也如暑天用大順散乃治夏日貪冷中寒之證非治暑熱正病也如大便不通用蘆薈丸乃治廣腸堅結諸藥不效之病非治津枯液燥之病也虛勞用建中湯乃治陽虛脉遲之證非治陰虛火旺之證也近人耳聞有此數方並不細審病因惘然施用受禍必烈集中俱為標出此外不止一端學者所當痛省

一通天地人謂之儒百家藝術皆士大夫所宜究心况疾病乃身命所關豈可輕以譖人此集溯本窮源簡括明備人人易曉病者醫者對證尋方互相考證則是非立辨不致以性命輕擲未始非衛生之一助云

蘭臺軌範總目

卷一

通治方

卷二

風

虛勞

卷三

傷寒

霍亂筋附轉

卷四

濕

癲癇癇

卷五

喘

噎膈嘔吐附關

卷六

積聚癥痞

卷七

蟲附狐

痺厯節

消證附強中

百合

症

渴
痰飲

渴

痰飲

痿

感膏

瘡閉利淋

瘡瘍

咳喉附肺

肺痿附肺

諸痛頭心胃

脚氣筋附轉

寒熱

痢

瘡

諸血

五穀病
叫目鼻

情志臥夢

諸痘汗
附黃

疫癘鬼疰

雜病

卷八

婦人

小兒

卷一

龍溪動範目錄

小建中湯

入味地黃丸

竹葉石膏湯

七味白朮散

保元湯

虎潛丸

七寶美髯丹

羊肉粥方

黑地黃丸

感喜丸

亡血脫血方

四物湯

柴胡四物湯

服牛乳方

盜汗方

二腎散

黃耆建中湯

資生腎氣丸

脾約丸

六君子湯

生脉飲

資生丸

無比山藥丸

三才丸

元精丹

靈砂

當歸補血湯

八珍湯

菟絲子丸

生地黃煎

止汗紅粉

逍遙丹

大建中湯

六味地黃丸

四君子湯

獨參湯

歸脾湯

龜鹿二仙膠

還少丹

天玉補心丹

青州白丸

二神丸

益血潤腸丸

十全大補湯

蕤英菟絲子丸

阿伽陀藥

當歸六黃湯

平胃散

炙甘草湯

當歸生薑羊肉湯

五味異功散

參附湯

補中益氣湯

三才封髓丹

羊腎丸

祕方補心丸

指迷茯苓丸

導赤散

芎歸膠艾湯

人參養榮湯

餌朮方

王屏風散

麥門冬湯

五苓散

二陳湯

加減思食丸

藿香正氣散

三黃湯

龍膽瀉肝湯

大順散

礞石滾痰丸

蘇合香丸

酒風

頭風摩散

近效止附湯

蒸半身不遂方

又方

卒不得語方

稀簽丸

銀液丹

黃耆桂枝五物湯

枳壳丸

越鞠湯丸

天水散

涼膈散

甘露飲

十精丸

黑錫丹

瓊玉膏

侯氏黑散

越婢湯

地黃煎

治風懿方

開心肥健方

中風不語方

控涎丹

癟風方
以上

桂枝芍藥知母湯

瀉黃散

四磨飲

二氣丹

四物二連湯

清心蓮子飲

成煉鍾乳粉

龍腦雞蘇丸

大活絡丹

風引湯

小續命湯

三黃湯

口眼喎僻方

一切風虛方

地黃飲子

滌痰散

痺證方

烏頭湯

保和丸

妙香丸

瀉白散

左金丸

瀉執拗子煎

王霜圓

至寶丹

紫雪

錄驗續命湯

風痱方

又方

竹瀝湯

稀涎散

勝金丸

獨活寄生湯

寒痺熨法

獨活寄生湯

舒筋飲

虎骨四助丸

思仙續斷圓

以上瘻

戶礪方

大黃䗪蟲丸

骨蒸方

秦艽蠶甲散

人參蛤蚧散

犀角紫河車丸

以上虛勞

黃連圓治渴方

卷三

桂枝湯

葛根湯

桂枝加桂湯

小承氣湯

抵當丸

白虎湯

四逆加入參湯

拔痔膏

加減四助丸

戶礪方

白微湯

以上瘻

治夢洩精方

救急療瘦疾方

秦艽扶羸湯

金鎖固精丸

文蛤散

桑根湯

麻黃湯

葛根芩芩黃連湯

小柴胡湯

調胃承氣湯

大陷胸湯

麻黃附子細辛湯

通脉四逆湯

史國公酒方

以上癆

煨腎丸

赤圓

桂枝加龍骨牡蠣湯

羌活補髓丸

口乾方

十味煎

金鎖丹

消渴方

神效散

百花煎

桂枝麻黃各半湯

桂枝加芍藥湯

大柴胡湯

桃核承氣湯

大陷胸丸

通脉四逆加豬膽汁湯

續骨丹

茯苓甘草湯

薯蕷丸

肘後懶肝散

傳屍勞方

百花煎

金鎖正元丹

茯神湯

猪腎齊尾湯

以上消症

桂枝加葛根湯

大青龍湯

大承氣湯

抵當湯

小陷胸湯

四逆湯

當歸四逆湯

理中丸及湯

大黃連瀉心湯

附子瀉心湯
白通湯

梔子豉湯
白通加豬膽汁湯

真武湯
豬膚湯

甘草湯

旋覆代赭湯

苦酒湯

枳實梔子豉湯

麻黃升麻湯
竹葉石膏湯

燒棍散

豬膽導法

蜜煎導法

治男子新病起房內復者方

竹皮湯

療食勞方

治交接勞復陰卵腫縮人腹絞痛便欲犯方

蠶甲散

升麻蠶甲湯

治結胸爻法
升麻蠶甲去雄黃蜀椒方

梔子仁湯

還陽湯

姜蕤湯

白虎加蒼朮湯
百合滑石散

墨膏傷寒以上

百合知母湯

滑石代豬湯

百合雞子湯
百合滑石散

九味羌活湯

敗毒散

梔子牡蠣散

參蘇飲以上感冒

天行熱病方

百合洗方

凝雪湯

百合滑石散以上

薰身法以上寒熱

苦參湯

升麻蠶甲去雄黃蜀椒方

白虎加蒼朮湯
大黃湯

又方

五苓散

梔子桂枝湯

霍亂轉筋入腹方
麻黃加獨活防風湯

茱萸湯

又方

滑石白魚散

霍亂轉筋入腹方
麻黃加獨活防風湯以上產

括囊瞿麥圓

石葦散

胞轉方

治療小便難方

石葦散

四汁飲

治小便失禁方

治尿牀以上經開利淋

牛膝膏

夜多小便方

蘇寧煎

治石淋方

八正散

家非子丸

縮泉丸

桂枝附子湯

卷四

麻黃加虎湯

白朮附子湯

一物瓜蒂湯

枇杷散

鼈甲煎丸

柴胡桂薑湯

療瘧常山湯

烏梅引子

集驗瘧必從四肢始療方

桃花湯

甘草瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

療熱毒痢血片臍下絞刺痛方

薤白湯

防己黃耆湯

甘草附子湯

香薷飲

蟾酥丸

白虎加桂枝湯

蜀漆丸

千金丹

牡蠣湯

蜀漆散

陵鯉湯

清脾湯

紫參湯

黃芩加半夏生薑湯

柴胡加芒硝湯

主赤白痢方

生鐵洛為飲

麻黃杏仁薏苡甘草湯

桂枝附子湯

白虎人參湯

十味香薷飲

又刮痧法

黃連香薷飲

柴胡去半夏加桔梗湯

療瘧病醫不能救者方

常山飲

四獸湯

以上瘧

訶梨勒散

乾薑黃連黃芩人參湯

瓜萎散

療五疳藥下痢方

桂枝玄芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

良姜子散

抱膽丸

獨效苦丁香散

甘遂散

甘遂半夏湯

十乘湯

木防己去石膏加茯苓硝湯

小青龍湯

小半夏加茯苓湯

葶藶大棗瀉肺湯

苓甘五味薑半夏湯

苓甘五味加薑半夏杏仁大黃湯

苓甘五味加薑半夏杏仁大黃湯

赤石脂散

金珠化癩丸

葛花解醒湯以上飲

厚朴麻黃湯

澤漆湯

杏仁煎

射干麻黃湯

觀音應夢散

十味丸

蘇子煎

蘇子降氣湯

烏頭桂枝湯

蜘蛛散

麝香大戟丸

濟生橘核丸

蟬脫散以上症

柴胡加龍骨牡蠣湯

琥珀壽星丸

控涎丹

苦參丸以上癩
狂癲

苓桂甘朮湯

小青龍湯

木防己湯

澤瀉湯

小半夏湯

桂苓五味甘草湯

苓甘五味薑半夏湯

厚朴大黃湯

痰飲頭痛住來寒熱方

范汪大甘遂丸

射干麻黃湯

射干麻黃湯

礞石湯

越婢加半夏湯

皂莢丸

療上氣方

小青龍加石膏湯

清音丸

葶藶丸

治久嗽上氣心胸煩熱吐膿血方以上咳嗽

洗陰腫核痛

大烏頭煎方

礞砂圓

來久湯

皺肺丸

甘草麻黃湯

枳朮湯

大腹水腫方

大聖濱川丸

療患氣黃水身面腫癰兒方

治蠱脹方

烏鯉魚湯

甘草乾薑湯

血枯方

治吐血百治不瘥療十瘧神騷不傳方

四生丸

諸竅出血方

療齒斷血出

黃連散

茅花湯

瞿麥散

桂枝加厚朴杏子湯

清燥救肺湯喘以上

麻黃附子湯

麻黃散

麻豆湯

木香散

敷藥

小胃丹

桂枝芍藥加皂莢湯

柏葉湯

鴻心湯

犀角地黃湯

禹餘糧丸以上腹

白芨枇杷丸

療舌上出血如孔鑽者

療舌血不止

療酒醉牙齒湧血

地黃散

療滿口齒血出

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

己椒苈黃圓

十水丸

葶苈丸

沉香琥珀丸

煨腎散

韋蘆湯

禹餘糧丸以上腹

皮膚血汗方

桔梗白散肺痙

滋血潤腸湯

治牙宣方

治療淋血方

治療鼻瀝血三升氣欲絕方

療小便出血方

王肩散

麻黃杏仁甘草石膏湯

定喘湯

防已茯苓湯

牡蠣澤瀉散

舟車神祐方

療水病洪腫氣脹不消食

五皮散

調榮飲

禹餘糧丸以上腹

桔梗白散肺痙

滋血潤腸湯

犀角地黃湯

治牙縫出血

紫霜丸

治牙宣方

治療鼻瀝血三升氣欲絕方

療小便出血方

鹿角膠丸

猪臘丸

半夏瀉心湯

大黃甘草湯

半夏乾薑散

黃連湯

又方

卒嘯

反胃方

溫脾湯

附子理中丸以上泄瀉

卷六

奔豚湯

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

療食鱠傷

椒熨方

廣濟療米癰

治食索粉積方

黃土湯

又猪臘丸以上諸血

黃芩加半夏生薑湯

茯苓澤瀉湯

葛根加半夏湯

昆布丸

中風客熱嘯方

廣濟檳榔散

丁香柿蒂湯

荊梨勒丸

附子理中丸以上瀉

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝加桂湯

蛟龍病方

療鱠

破辟湯

療米癰羸瘦至冗

易簡紅丸

赤小豆當歸散

茱萸湯

猪苓散

文蛤湯

橘皮湯

生薑半夏湯

橘皮竹茹湯

崔氏方

治冷呃方

香草丸

崔氏方

治冷呃方

桂枝加桂湯

蛟龍病方

療鱠

備急癰癥方

廣濟療癰

大七氣湯

牛角鰓灰散

生薑瀉心湯

大半夏湯

生薑半夏湯

橘皮竹茹湯

千金理諸噎方

消穀丸

深師治噎方

撞氣阿魏丸以上噎

固腸丸

阿魏丸以上嘔吐

備急丸

療犬肉傷

療十年瘻僻方

廣濟療瘻

積塊丸

半硫圓

髮癩飲油方

食髮成癩方

酒發元氣血醫方

蛇癩方

蛟龍病方

虱瘕

婦人狐痕方

以上積聚癥

療蛇蟲攻心腹痛

下蟲丸

療蛔蟲

甘草瀉心湯

療心痛飲丸

厥頭痛吐方

止痛太陽丹

麝犀湯

玉真圓

枳實薤桂枝湯

桂枝生薑枳實湯

療胸脾心痛方

失笑散以上心胃痛

摩腰膏

藥暴子以上腰痛

蛇瘕

婦人狐痕方

以上積聚癥

療蟲蝕下部

療寸白蟲

療百蟲方

苦參湯

蕪荑散以上蟲

石膏散

氣攻頭痛方

祕方貼頭風熱病

茶調散以上頭痛

茯苓杏仁甘草湯

赤石脂丸

熨背法

甘薯芩水湯

療腰痛方

厚朴七物湯

腹內蛇癩方

甘草粉蜜湯

烏梅丸

療傷寒憲病

追蟲丸

鶴虱散

雄黃頭痛方

透頂散

治頭痛方

清震湯

桔梗薤白白酒湯

橘皮枳實生薑湯

九痛丸

療心痛方

青娥丸

又方

附子粳米湯

血瘕方

海蛤丸

治療內如蟲蛀響

薏苡仁附子散

大建中湯

海蛤丸

加味小柴胡湯

蒸臍法

糜草丸

厚朴三物湯

烏麻酒

檳榔散

延效療轉筋

卷七

小金丹方

雄黃粉

茵陳蒿湯

猪膏髮煎

黃疸方

牛痘煎

麻黃連翹赤小豆湯

半夏麻黃丸

溫胆湯

療虛煩不可攻方
以上情志卧夢補腎治五龍方

磁石豬腎羹

補肝丸

蟬花散

大黃附子湯腹痛以上

茱萸木瓜湯

礬石湯

杉木湯

木瓜散

轉筋爻法以上脚氣

雞屎白散

療轉筋方

還魂湯

治瘧方

消石礬石散

茵陳五苓散

赤苓散

急救三十種黃方

黃耆芍藥桂枝苦酒湯以上諸症

桂枝救逆湯

治多忘

通耳法以上取

磁硃丸

洗眼藥以上目

石斛夜光丸

通草散

又方

辟瘟殺鬼丸

梔子大黃湯

大黃硝石湯

寒水石散

療黃疸方

黃連阿膠湯

黃連阿膠湯

枕中方

從容丸

七寶散

石斛夜光丸

羚羊角散

瓶鼻方

第一竹懸湯

外臺走馬湯

八毒赤丸以上瘡瘍

桂枝加黃耆湯

麻黃醇酒湯

外臺走馬湯

八毒赤丸以上瘡瘍

半夏秫米湯

酸棗仁湯

近效瓜蒂散

鎮心首睡益智方

麝香佛手散

去翳方

消鼻痔方

凌霄花散

蒼耳散

鼻中瘻肉
以上

治鼻漏方

又方

又方

口甘方

口苦方

療口瘡

口氣鼻穢方

口中臭方

口香去臭方

推頰車法

塗唇方

刺舌法

口瘻方

療童舌

療舌脹方

療舌腫方

療馬喉癆
敷面屬方

琥珀犀角膏

治療方

治牙疾方

如神散

細辛散
以上齒

卷八

桂枝茯苓圓

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

葵子茯苓散

當歸貝母苦參丸

當歸散

白朮散

枳實芍藥散

下瘀血湯

竹葉湯

白朮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

半夏厚朴湯

甘參大棗湯

溫經湯

土瓜根散

旋覆花湯

大黃甘遂湯

竹皮大丸

紅藍花酒

蛇床子散

狼牙湯

三物黃芩湯

當歸建中湯

佛手散

回生丹

開骨散

奪命散

下死胎方

交加散

護胎方

海蛤散

小柴胡加地黃湯

烏雞煎圓

豬蹄湯

紫石英丸

催生丹

小調經散

二味參蘇飲

紫蘇飲

紫散

秦桂丸

求嗣方

黃龍湯婦人

瀉青丸

導赤散

生犀散

瀉黃散

五味異功散

益黃散

瀉白散

阿膠散

地黃丸

四君子湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

丸味蘆薈丸

補中益氣湯

香砂助胃膏

肥兒丸

蘭香散

木香丸

胡黃連丸

仙方活命飲

安蟲散

白玉散

蟾蜍丸

五苓散

消積丸

白玉散

柳華散

小柴胡湯

白虎湯

地黃清肺飲

參蘇飲

黃連香薷飲

加味道遙散

地黃清肺飲

四神丸

福銀丸

金匱加減腎氣丸

龍膽瀉肝湯

斷癩丹

太青膏

利驚丸

小續命湯

雄黃散

歸脾湯

百祥丸

牛李膏

安神丸

蟬蛻鉤藤散

羚羊角丸

止汗散

當歸大黃湯

團參湯

參附湯

人參養榮湯

浴體法

神效當歸膏
治痘出眼中方

保命散

治瘡積方

治赤痛方
治遺尿方

治牙疳方

治吐乳方

治螳螂子方

損

吳江徐靈胎迴溪著

通治方雖云通治亦當細切病情不得籠統施用也

小建中湯
桂枝去皮甘草炙各三兩大棗十二枚芍藥六兩生薑三兩膠鴟一升右六味以水七升煮取三升去滓

桂枝去皮甘草炙各三兩大棗十二枚芍藥六兩生薑三兩膠鴟一升此方治陰寒陽衰之虛勞正與陰虛火旺之病相反庸納膠鴟更上微火稍解溫服一升日三服

醫誤用害人甚多此咽乾口燥乃津液少非有火也

黃耆建中湯桂枝去皮甘草炙各三兩大棗十二枚芍藥六兩生薑三兩膠鴟一升虛勞裏急諸不足者主之

大建中湯桂枝去皮甘草炙各三兩大棗十二枚芍藥六兩生薑三兩膠鴟一升治內虛裏急少氣手足厥冷小腹繫急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或腹中寒痛不堪口乾精出或手足乍寒乍熱而煩冤酸痛不能久立

黃耆

當歸

桂心

芍藥

人參

甘草

各一半夏炮

黑附子

炮各二錢五分

右藥每

服五錢加薑三斤棗二枚煎服

此非金匱大建中湯全匱方入腹痛門時所用之肉桂心地此方兼治下焦虛寒之症不但建立中宮

炙甘草湯傷寒論一
名復脉湯

治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十一日死

甘草

炙桂枝

生薑各三

麥門冬半斤

麻仁半斤阿膠

人參各二

大棗三十生

地黃一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓

納膠消盡溫服一升日三服

此治血脈空竭方用酒所以和血脉凡脉見

結悸者雖行動如常亦不出百日必死若復危急不能行動則過十日必死語極明白從前解者多誤

八味地黃丸

崔氏

虛勞腰痛少腹拘急小便不利者主之又婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息者此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈此亦主之

乾地黃

八兩為度搗膏

乾山藥

山萸肉

丹皮

白茯苓

澤瀉各三

桂枝

附子各一

右八味為末。煉蜜丸如桐子大。酒下十五丸。日再服。此方亦治腳氣。乃驅邪水以益正水之法也。此之妙固非一端。但近人以此一方治天下之病。則又大失此方之義也。

資生腎氣丸

治肺腎虛。腰重脚輕。小便不利。或肚腹腫脹。四肢浮腫。或喘急痰盛。已成蟲證。於前八

味丸加車前子。牛膝各一兩。餘依前法。

六味地黃丸。錢氏治腎陰不足。發熱作渴。小便淋閉。氣壅痰渴。頭目眩暉。眼花耳聾。咽乾舌痛。齒牙不固。腰腿痠軟。自汗盜汗。便血諸症。水泛為痰。血虛發熱等證。於前方去肉桂附子。餘依前法。此方錢氏當歸生薑羊肉湯。金匱。治產後腹中瘀痛並治腹中寒疝虛勞不足。

當歸三兩。生薑五兩。羊肉一斤。右以水八升。煮取三升。溫服七合。日三服。若寒多者。加生薑成一斤。痛多而嘔者。加陳皮二兩。白朮一兩。如加生薑等。煮亦加水五升。煮取三升。二合服之。精不足者。

是也

竹葉石膏湯

湯寒

治傷寒解後虛羸少氣。逆欲吐者。

竹葉二把。石膏碎一斤。半夏半斤。人參三兩。甘草二兩。麥門冬一升。梗米半斤。右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。納粳米煮熟。湯成。去米。溫服一升。日三服。集驗載此方。加生薑治嘔最良。此治三陽解後人俱概用峻補。以留其邪。亦治傷暑發渴。脉虛。暑病有虛熱者。宜之。若吐。則元氣不能驟。腹愈補。愈虛矣。逆。醫亂之症。則大誤矣。

脾約丸

金匱即另研

治腸胃熱燥。大便祕結。

送下二十九丸

大便利即止。此潤腸之主方。

麻仁五兩

大黃一斤。厚朴。薑炒。枳實。鈍炒。芍藥。炒各五兩。杏仁五兩。

右為末。蜜丸梧子大。臨睡用白湯

四君子湯

治面色痿白。言語輕微。四肢無力。脈來虛弱者。若內傷虛熱。或飲食難化。須加炮薑。

送下二十九丸

大便利即止。此潤腸之主方。

人參

白朮

茯苓

甘草

錢

右加薑棗水煎服

此補脾之主方

五味異功散

錢

調理脾胃

於四君子湯加陳皮一錢為末。每服二錢。白湯調服。

七味白朮丸

治一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦

於四君子湯加霍香半兩

葛根一兩。木香二錢半為末。每服二錢。白湯調下。

六君子湯

治氣虛有痰。脾虛腹脹。即前方加陳皮半夏餘依前法。

更加霍香沙仁為香砂六君子湯。

獨參湯

治元氣大虛。昏厥脉微欲絕。及婦人崩產脫血血暈。

人參分兩隨人體症

右一味須上棟者濃煎頓服。待元氣漸回隨證加減。此一時急救之法服。

參附湯

治陰陽血氣暴脫證。

人參一兩。附子

錢五

右加薑棗水煎服。此亦急本方去人參加黃耆名者附湯。

保元湯

黃耆三錢

人參五錢

麥門冬

五味子各三

肉桂秋冬季六七分

右四味水煎服

氣血虛寒者用之。純虛寒之症病誤甚。觀方下治證並無一字治暑邪者。此乃宋以後之方故

生脉飲

錢五

治熱傷元氣氣短倦急口渴出汗。

人參五錢

麥門冬

五味子各三

右三味水煎服

此方傷暑之後存其津液庸醫即以之治暑病誤甚。觀方下治證並無一字治暑邪者。此乃宋以後之方故

歸脾湯

生

治思慮傷脾或健忘怔忡驚悸盜汗寤而不寐或心脾作痛嗜臥少食及婦女月經不調

人參

龍眼肉

黃耆各二錢半

甘草五分

白朮二錢半

茯苓二錢半

木香五分

當歸

酸棗仁砂研

右加薑三片水煎服。補脾有二法。一補心以生脾血。一補腎以壯脾氣。此

遠志各一錢

右加薑三片水煎服

補脾有二法。一補心以生脾血。一補腎以壯脾氣。此

補中益氣湯東垣 治陰虛內熱頭痛口渴表熱自汗不任風寒脉洪大心煩不安四肢困倦懶於言語無氣以動動則氣高而喘

黃耆炙

人參

雲虎炒各一錢五分

甘草炙一錢五分

陳皮五分

當歸一錢

柴胡各五錢

右八味加

生薑三片

丹溪

太棗二枚

水煎溫服

為合度苦

氣高而喘則非升柴所宜學者不可誤用也

虎潛丸丹溪

治腎陰不足筋骨痺不能步履

龜板

黃柏各四兩

知母

熟地各三兩

牛膝五錢

鎖陽

虎骨

當歸

芍藥各一兩

五錢

陳皮七錢

冬月加熟薑五錢

右為末

煮羯羊肉搗為丸桐子大淡鹽湯下

文此方最為合度後人

以溫補治瘧則相反矣

瘧證又有

屬痰濕風寒外邪者此方又非所宜

資生丸

治婦人妊娠三月脾虛嘔吐或胎滑不固兼丈夫調中養胃飢能使飽飽能使飢神速難述

人參三兩

茯苓二兩

雲朮三兩

山藥二兩

薏仁一兩半

蓮肉二兩

芡實一兩半

甘草一兩

陳皮

麥蘖

神麴各二兩

砂仁一兩半

白芷

蔻蔻八錢

桔梗一兩

藿香一兩

川黃連四錢

白扁豆

山楂各一兩半

右十

八味為細末

煉蜜丸彈子大每服二丸米飲下

此方治懷孕氣阻用兼消兼補之法意亦可取

今人不知其全無法度姑

存之以備一格

龜鹿二仙膠

鹿角血者

角板自敗者

以上二味另熬膏

枸杞子甘州者三十兩

人參十五

右用鉛鑄如法熬膠

三才封髓丹寶鑑

除心火益腎水滋陰養血潤補不燥

能通督任填補之法此為最穩

天冬

熟地

人參各五

黃柏三兩砂仁一兩

甘草錢七

右為末

麵糊丸梧子大每服五十

丸用從容半兩切作片酒浸一宿次日煎三四沸空心食前送下老人便結者為宜

七寶美髯丹邵應

補腎氣烏鬚髮延年益壽

何首烏赤白雌雄牛膝八兩以何首烏先用米泔水浸一日夜以竹刀刮去粗皮切作大片用黑豆覆之以豆熟為度去豆鋪乾中一層却補何首烏一層每鋪豆一層重疊相間上鋪乳拌浸透亦茯苓半斤黑牛乳兔絲子半斤酒浸一宿洗乾蒸熟乾蒸三次當歸尾酒洗白茯苓用人

右共為末蜜丸龍眼大

無比山藥丸金治丈夫久虛百損五勞七傷頭痛目眩支厥或煩熱或脾疼腰臍不隨飲食不生肌肉或少食而脹滿體無光澤陽氣衰絕陰氣不行

熟地酒浸赤石脂

巴戟去心茯苓

牛膝酒浸山茱萸肉

澤瀉各三乾山藥二兩

五味子六兩肉從容酒浸免絲子

杜仲炒各三兩

右藥煉蜜丸桐子大每服二十九至三十九食

前溫酒或米飲下服七日後令人身體健潤面光音響為驗此通中藥入腦算必酸疼勿怪此收攝腎氣之方最

安穩

還少丹楊氏

大補心腎脾胃虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁及真氣虧損肌體羸瘦肢節倦怠等證

山藥

牛膝

遠志

山萸肉

茯苓

五味子

楮實子

巴戟

酒浸去心

肉蓯蓉

酒浸

石菖蒲

杜仲

薑汁酒同拌炒

茴香酪

枸杞子

熟地

各二分

右共為細末

煉蜜同裹

肉為丸梧子大每服三十丸溫酒或鹽湯下日三服

此交通心

腎丸

治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利夢寐驚悸小便不利

羊腎丸

治腎勞虛寒

面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利夢寐驚悸小便不利

熟地

杜仲

菟絲子

另研石斛

黃耆

斷續

肉桂

牛膝

磁石

淬煅醋

沉香

五加皮

山藥炒各一兩

右為末。雄羊腎兩對。以葱椒酒煮爛。入少酒糊杵丸。梧子大。每

服七十丸。空心鹽湯送下。

此降納腎氣之方

羊肉粥方

書養老

治老人虛損羸瘦。助陽壯筋骨。

羊肉二斤

黃耆一兩生用

人參二兩

白茯苓一兩

太米五枚梗米三合

加生薑少許尤佳

梗米入桃去殼去

氣亦可

右先以肉取

脂皮。取精髓。肉留四兩細切。餘一斤十二兩。以水五太盞。並黃耆等。煎取汁三盞。去滓。入米煮粥。臨熟

下切生肉。更煮入五味調和。空心服之。

此古人服食之方也

三才丸

潔古

治脾肺虛欬嗽。

人參

天王補心丹

道藏

治心血不足。神志不寧。津液枯竭。健忘怔忡。大便不利。口舌生瘡等證。

天門冬

地黃各等

右為末。煉蜜丸。空心服。

此方與嗽證非宜。必上

下純虛而不嗽者可服

桔梗

遠志各五錢

當歸

證非宜。必上

右為末。煉蜜丸。如椒目大白湯下。

此養心之主方

人參

白茯苓

元參

丹參

酸棗仁各一兩

柏子仁一兩

右為末。煉蜜丸。如椒目大白湯下。

此養心之主方

一方有

麥冬

天冬

石菖蒲四錢。無五味子。一方有川連甘草。

祕方補心丸

治心虛手振。

當歸一兩

川芎

粉甘草各一兩

生地一兩

遠志二兩

棗仁炒

柏子仁去油各

人參

膽星

一方有

硃砂

另研各五錢

金箔二十片

麝香一錢

琥珀三錢

茯苓七錢

石菖蒲六錢

右為末。餅糊丸。

菉豆大硃砂

黑地黃丸

治陽盛陰衰。脾胃不足。房室虛損。形瘦無力。面多青黃。而無常色。此補腎益胃之劑也。

蒼朮

浸熟地一斤

五味子半斤

乾薑

五錢。秋冬一兩。夏七錢。

右為末。棗肉丸。梧子大。食前米飲服百丸。治

血虛久痔甚妙。按此治脫血脾寒之聖藥。

元精丹

北方黑氣入通於腎，竅於二陰。藏精於腎，味鹹，其類水，其病在骨，此藥主之。

血餘煮水洗淨，務期無油氣為佳。將髮扯斷，每洗髮一斤用川椒四兩，擦去梗核，於大鍋內。

一層糊一層和勻，以中鍋蓋，蓋鹽泥固濟勿令泄氣，桑柴慢煮。

三柱香即退火，待冷取出，約重四兩，有餘於無風處研為細末。

黑芝、麻丸，蒸九個，取女真寶四兩，炒取淨，破故紙末四兩，生地膏入藥熟地各八兩。

黑芝、麻丸，蒸九個，取女真寶四兩，炒取淨，破故紙末四兩，生地膏入藥熟地各八兩。

黑芝、麻丸，蒸九個，取女真寶四兩，炒取淨，破故紙末四兩，生地膏入藥熟地各八兩。

黑芝、麻丸，蒸九個，取女真寶四兩，炒取淨，破故紙末四兩，生地膏入藥熟地各八兩。

千餘下，為丸梧子大，每服六十九空心用首烏釀酒三杯送下，日三服。

青州白丸方 治一切風及小兒驚風，婦人血風，大人頭風。

南星三兩，白附子二兩，半夏七兩，川烏半兩，各生用。

右為細末，放磁器中，日曬夜露，春五夏三秋七冬。

十日以糯米粉煮粥，丸薑湯下。風證溫酒下，驚風薄荷湯下。

此四味以水研取漿，澄粉晒露七日。

指迷茯苓丸 治中脘留伏痰飲，臂痛難舉，手足不能轉移。

茯苓二兩，半夏一兩，枳殼半兩，風化硝二錢，炒半。

右為末，薑汁和丸桐子大，每服三十九丸，薑湯下。

按方極和。

平而義精效速，方內半夏宜生研，澄粉用。

咸喜丸方 治飲食積滯，蟲癰脹滿，久痢久瘧，沉冷積寒。

廣木香 肉豆蔻各四錢，乾薑包炒二錢，巴豆二十粒去皮，杏仁四十粒去皮，百草霜五錢加茯苓亦可。

四味為末，入百草霜同研，後入杏仁巴豆霜研，黃蠟一兩五錢，酒煮一時，去酒，將蠟加麻油七錢，鎔化。

拌藥研勻，乘熱丸如菉豆大，每服二三十丸。

用黃蠟之義，最精。凡治積新病，宜急下久病。

宜緩下。此方治久患寒積之證，乃緩下法也。

靈砂方 治上盛下虛，痰壅盛，最能鎮降，升降陰陽，和五臟助元氣。

靈砂方 治上盛下虛，痰壅盛，最能鎮降，升降陰陽，和五臟助元氣。

桑椹各取淨汁。

水銀一斤硫黃四兩右二味用新鐵錠炒成砂子或有烟燄即以醋灑候研細入水火鼎醋調亦石脂封口鐵線扎縛曬乾鹽泥固濟用炭二十斤煅如鼎子烈筆蘸赤石脂頻抹其處火盡為度經宿取出研為細末糯米糊為丸如麻子大每服三丸空心棗湯水飲井花水人參湯任下量病輕重增至五七丸此鎮墜之藥若用黑丹則此方可不備

二神丸本事 治腰痛腎虛全不進食

破故紙

四兩
炒生

丸鹽湯下

此治腎家有本方加五味子吳茱萸各二兩為四神丸寒濕之方

導赤散錢氏

治心熱口糜舌瘡小便黃赤莖中作痛熱淋不利

生地

木通

甘草梢各等分

右三味水煎服此鴻心火從小腸中心出也

止血脫血方

千金翼

治亡血脫血鼻頭白色唇白去血無力者

生地黃

十斤

右一味搗以酒一斗絞取汁令極盡去渣微火煎減半納白蜜五升棗膏一升以攪之勿止令可丸酒服如雞子一丸日三久服不已老而更少萬病除愈千金又以此二味加阿膠甘草

作煎服亦可用

當歸補血湯寶 治男婦血虛似白虛證肌熱面赤煩渴引飲脉來洪大而虛重按則微

當歸

二錢

黃耆

一兩

右二味水煎服此補表血之方

益血潤腸丸

治津液亡大腸祕老人虛人皆可服並祛風養血

熟地

六兩

杏仁

炒

麻仁

各三兩

俱炒去殼

當歸

橘紅

淨各二兩

阿膠

肉蓯蓉

各一兩半

蘇子

荆芥

各一兩

右為末以前二味膏同杵千餘下仍加蜜丸梧子大每服五六十九空心白

湯下此脾藥丸之變法

芎當膠艾湯主之。婦人有漏下者，有半產後因續下血不絕者，有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛為胞阻。

膠艾湯金匱

甘草略二

芍藥四兩

乾地黃六兩

右六味水五升清酒

三升合煮取三升去滓納膠令消盡溫服一升日三服不瘥更作

四物湯方 治一切血熱血虛血燥諸證。

當歸

熟地各三

川芎一錢

白芍二錢

黃耆水煎服此血病之主方

當歸各三

芍藥四兩

乾地黃六兩

八珍湯 治心肺虛損氣血兩虛即四君子湯合四物湯餘依上法

十全大補湯方

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛

夜夢遺精面色痿黃脚膝無力即八珍湯加桂心陳皮。

人參養榮湯方

治脾胃俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉

人參

白朮

茯苓

甘草

黃耆

陳皮

當歸各一

熟地半分

白芍一錢

柴胡一錢

人參

黃耆

甘草

桂心

一錢遠志

五分五味子

七分半

右十二味

加薑三片

大棗二枚

此即十全大補湯去川芎加

柴胡四物湯方

治日久虛勞微有寒熱脉沉而數

川芎

當歸

白芍

熟地各一

錢用生地

柴胡一錢

人參

黃耆

甘草

半夏

錢各三

右為末水煎服

柴胡加入

補藥俱不相合獨此為宜

柴胡通少陽調和營衛非專於散風也

免絲子丸

治腎氣虛損五勞七傷

腳膝酸痛面目黧黑

耳鳴心衝氣短時有盜汗小便數滑

免絲子

鹿茸酥

去毛澤鴻

石龍芮去土淨

再桂枝

附子各一

石斛斛斛

熟地

附子各一

桂枝

附子各一

石斛斛斛

熟地

附子各一

桂枝

牛膝酒浸山茱萸肉

續斷

防風

杜仲

肉蓯蓉酒浸

補骨脂酒炒

巴戟

沉香

菖蒲炒各七錢五分

五味子

川芎

桑螵蛸酒浸

覆盆子各五錢

右為細末酒煮

澱粉糊為

丸梧子大每服三十丸

溫酒下或鹽湯下此等方不過陰陽兼補之法泛而無統近時補劑盡如此然能多而不雜尚屬可取

蕤英絲子丸

此方不寒不熱助陰生子

肉蓯蓉一兩

覆盆子

川芎

當歸

菟絲子各一兩

白芍一兩

牡蠣鹽泥固煅

烏鰡魚骨各八錢

五味子

防風

艾葉三錢條芩五錢

右為末煉蜜丸如梧子大

每服三四

餌丸方

千金翼真於尤尤佳此

此乃婦人溫經之主方也

十九鹽湯下早晚皆可服

此乃婦人溫

生虎削去皮炭火急炎令熟空肚飽食之全無藥氣可以當食不假山糧得飲水神祕之

餌丸方

千金翼傳

真於尤尤佳此

此乃婦人溫經之主方也

服牛乳方

千金翼

能補虛破氣

牛乳三升

華撥半兩末

右二味於銅器中水三升和乳合煎取三升頓服日三七日除一切氣

生地黃煎外

主補虛損填骨髓長肌肉去客熱

生地汁五升

棗膏六合白蜜七合酒一升牛酥四合

生薑汁二合紫蘇子一升以酒一升綿煎取汁

鹿角膠四兩

右煎地黃等六味汁三分減一納蜜調入膠末候煎成以器盛之酒和服

阿伽陀藥

千金翼主諸種病及將息服法久服益人神色無諸病方類此等即所謂海上奇方如紫金錠之

其所治之證皆與本草不相合而

確有神驗真

不可思議也

紫檀用蘇木亦可

小檗石榴萬草亦名山萬草

鬱金

胡椒各五

右為末水和納白中更搗一萬杵丸好

陰乾用

諸咽喉口中熱瘡以水煮升麻湯下桐子大一丸旦服之諸面腫心悶因風起者煮防風湯

服一丸。諸四體痠疼或寒或熱。麻黃湯一丸。諸瘡下部有瘡。吞一丸。又煮艾槐白皮湯研一丸灌下部。諸卒死冷水服二丸。諸被厭擣當心帶一丸。又水研一丸三服。諸被蛇及惡獸等毒。以麝香如相思子研藥一丸服。並以紫檀磨汁和藥塗患處。諸被鬼撓亂失心癲狂。艾汁下。如無青艾。乾艾取汁亦可。并隨身帶一丸。諸傳戾水磨雄黃下。諸消渴朴硝湯下。諸淋水服二丸。諸疔腫元參湯下。諸卒胸膈熱苦竹葉湯下。諸難產以蓀蔣二匕水煮服一丸。薑黃亦得。諸執瘡大黃取汁服。又以大黃和藥調金。諸吐血若因熱吐者。服之並瘥。因冷吐者。菖蒲汁下。諸算中血刺劍汁下。並研灌鼻。諸噎病括囊汁下。諸赤白帶下。以丹皮刺劍根各三分煮服。後補法。以地榆桑螵蛸桑耳各二分。水二升。煮取一升。分作二服。取汁一合。研藥一二丸服之。諸藥毒惡忤研服。惡瘧恆山湯下。瘟疫時氣。元參湯下。諸瘡疳濕及心風心驚。戰慄多忘。恍惚嘔吐。黃疸失音。風癭臍下絞痛。霍亂吐痢。小兒驚啼。產後血結。並宜服之。

玉屏風散得效

治風邪久留而不散者。自汗不止者。亦宜

防風

黃耆

白朮各等分或加炒糯米

右為細末。酒調服。此能固表使風邪不易

盜汗方外

黃耆

白朮各等分或加炒糯米

右為細末。酒調服。入加牡蠣名白朮散

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣各三錢

人參各五錢

龍骨各五

右為末。以絹袋盛貯。如扑粉用之。

六升煮取二升。五合分六服。

人參各三錢

龍骨各五錢

狗杞根

白皮各四

太棗七枚

右以水

當歸六黃湯

治陰虛有火。盜汗發熱。

當歸一兩

生地一兩

熟地一兩

黃芩一錢

黃連一錢

黃柏等分

黃耆加倍。右水煎服。凡止汗方內俱

當歸一兩

牡蠣各一兩。赤石脂一兩。

龍骨各五錢

右為末。以絹袋盛貯。如扑粉用之。

當歸六黃湯

治陰虛有火。盜汗發熱。

當歸一兩

生地一兩

熟地一兩

黃芩一錢

黃連一錢

黃柏等分

黃耆加倍。右水煎服。凡止汗方內俱

麥門冬湯四 治漏氣因上焦傷風。開其腠理上焦之氣。慄惶滑移。遇開即出。經氣失道。邪氣內著。故有是證。

麥冬

生蘆根

竹茹

白朮

甘草炙

茯苓各二

人參

陳皮

威蕤各三

右九味。每服四錢。薑五片。陳米一撮。煎熟服之。

不論冬夏頭汗自出謂

二腎丸

治積塊。進飲食。

橘紅

一片。甘草四兩。鹽五錢。

右以水煮爛。乾為末。淡鹽湯下。有塊加薑黃半兩。

同前藥煮。氣滯帶加香附二兩。氣虛加沉香半兩。另入噤口痢。加蓮肉二兩。

逍遙散。局治肝家血虛。大旺頭痛目眩。煩亦口苦。倦怠煩渴。抑鬱不樂。兩肋作痛。寒熱小腹重墜。婦人經水不調。脈弦大而虛。

芍藥酒炒當歸

白朮炒

茯苓

甘草炙

柴胡各二

本方加丹皮梔子。即加味道逍遙散。

加煨薑三片。薄荷少許。煎服。此陳通肝脾之方

平胃散。陳治濕淫於內。脾胃不能克制。有積飲痞膈中滿者。

蒼朮

浸七日。米泔。陳皮去白。厚朴各三斤。薑汁炒。甘草三十克。

右為末。

每服二錢。薑湯下。日三服。或水煎。母服。

五錢。如小便赤澀。如茯苓澤瀉。水穀不化。飲食傷多。枳殼。厚朴。心下痞悶。腹脹者。加厚朴。甘草減半。遇夏加炒黃芩。遇雨水濕潤時。加茯苓澤瀉。如有痰涎。加半夏。陳皮。欬嗽飲食減少。脉細。加當歸黃耆。脉洪大緩。加黃芩。黃連。大便硬。加大黃三錢。芒硝三錢。先嚼熟炒桃仁。爛以藥送下。本方加皂礬。即皂礬平胃丸。消食積蟲瘡

五苓散。治瘦人臍下有悸。吐涎沫而癲眩。此水也。此方主之。

此乃散方近人用作湯。往往鮮效。

澤瀉一兩 猪苓去皮白术

茯苓各三桂二分 分去皮

右五味為末。白飲服方寸匕。日三服。多飲暖水。

汗出愈。傷寒論以此方治太陽表裏未清之證。所謂表裏者經與府也。故此方為刮膀胱水道之主藥。

二陳湯加治肥盛之人。濕痰為患。喘嗽脹滿。

半夏製 茯苓各三 陳皮去白甘草一錢

枳朮丸

治痞積消食強胃

金匱名枳朮湯治

心中堅大如盤

枳實一兩 白朮二兩

澁黃散 治脾胃伏火。口燥唇乾。口瘡口臭煩渴。

藿香七錢 山梔一兩 甘草二兩 防風四兩

保和丸丹 治食積酒積。

山楂二兩 半夏製橘紅

神曲

麥芽

茯苓各一連翹

茱萸子炒

黃連各半

右為末。水丸。加白朮二兩。名大安丸。

此治脾胃濕大氣阻之方

加減思食丸 治脾胃俱虛。水穀不化。胸膈痞悶。腹脇時脹。食減嗜臥。口苦無味。虛羸少氣。胸中有寒。飲食不下。反胃惡心。及病後心虛不勝穀氣。食不服常。並宜服之。

神曲炒黃麥芽炒黃各烏梅四兩 乾木瓜半兩 白茯苓

甘草炒各二錢半

右為末。蜜丸。櫻桃大。每

服一丸。細嚼白湯送下。如渴時噙化一丸。此收納胃氣之方。

用烏梅木瓜甚巧

越鞠湯丸丹 治一切濕痰食火。食血諸鬱。

香附

蒼朮

撫芎各二

神鈞

山梔仁各一兩

右以水煎服。或作丸。茱萸大。每服百丸。白

滾湯下

四磨飲濟 治七情傷感。上氣喘急。胸膈不快。妨悶不食。

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水。取七分煎三五沸。空心溫服。

藥汁使
藥存留

妙香丸治局 古製方之法也

胸中不及下達亦

妙香丸治時疾傷寒解五毒。治潮熱積熱及小兒驚癇百病。

巴豆

研如麩。按巴豆三百十五粒去殼心膜炒熟。太多宜酌減。

牛黃

研

龍腦

研

膩粉

麝香

研各三兩。辰砂研飛。

金箔研九

兩

金箔研九

十片

麝香三兩。辰砂研飛。金箔研九。兩

金箔研九

十片

右合研勻。煉黃蠟六兩。入白蜜三分。同煉勻為丸。每兩作三十九。如治潮熱積熱。傷寒結胸。發黃。狂走。

躁熱口乾面赤。大小便不通。大黃。甘草湯下一丸。毒痢下血。黃連湯調膩粉少許。如患酒毒食毒茶

毒氣毒風痰伏痞吐逆等證。並用膩粉龍腦米飲下。中毒吐血。悶亂煩燥欲死者。用生人血下立愈。小

兒百病。驚癇急慢驚風。涎潮搐搦。用龍腦膩粉蜜湯下。菉豆大二丸。諸積食積。煩亦煩躁。睡卧不甯。驚

哭瀉痢。並用金銀薄荷湯下。更量歲數加減。如男婦因病傷寒時。疫陰陽氣交結。毒伏氣。胃中喘燥。眼

赤潮發。經七八日至半月日未安。醫所不明。證候脉息交亂者。可服一丸。或分作三丸。亦可並用龍腦

膩粉水飲調下。一服取轉下。一切惡毒涎並藥丸瀉下。如要藥。即行用鍼刺一孔。冷水浸少時服之。其

效更速。凡用蠟丸之藥既不可化開服。則三分一丸之大丸。不能下瀉。宜作一分一丸之小丸。每次服三丸。為妥。

藿香正氣散局

治外受四時不正之氣。內停飲食頭痛寒熱。或霍亂吐泄。或作瘧疾。

厚朴

陳皮

桔梗

半夏各二兩

甘草一兩

大腹皮

換檳榔

白芷

茯苓

蘇葉各三兩

藿香三兩

右十味加薑棗水煎熟服。

此方可治時疫

天水散

河間亦名益元。一散

治夏時中暑。熱傷元氣。內外俱熱。無氣以動。煩渴欲飲。腸胃枯固者。又能催

汗。

此方可治時疫

下乳積聚水蓄急後重暑注下迫者宜之

桂府滑石六兩水飛甘草一兩辰砂三錢

滑利清涼通達水道

而不傷陰所以為佳

二氣丹丸

治內虛裡寒。胸腹滿痛泄利無度。嘔吐自汗。小便不禁。陽氣漸微。手足厥冷及傷寒陰症。霍亂轉筋。久下冷痢。少氣羸困。一切虛寒痼冷。

肉桂

硫黃細研各乾薑泡

硃砂另研為衣黑附子錢五錢

右為末。麵糊丸桐子大。每服三十

丸艾湯或鹽湯下

此治下焦無陽
積寒犯腎之症

瀉白散錢

治肺熱咳嗽

桑皮炒地骨皮各一兩甘草五錢

右為末。每服一二錢。入糯米百粒。水煎。

此方能治肺中之飲

三黃湯

本事

治三焦實熱。一切有餘火症。大便祕結者。

黃芩

大黃

黃連各等分

右三味水煎服

涼膈散

局方

治心火上盛。中焦燥實。煩躁口渴。目赤頭眩。口瘡唇裂。吐血衄血。大小便祕。諸風瘻癰發斑

發狂及小兒驚風痘瘡黑脣

連翹

四兩大黃酒浸芒硝

甘草一兩

黃芩酒炒薄荷

梔子一兩

右為末。每服二錢。加竹

葉生靈煎

此瀉中上二焦之火。即承氣加疏風清火之品也

元

治血虛五心煩熱。晝則明了。夜則發熱。

四物二連湯

威元治血虛五心煩熱。晝則明了。夜則發熱。

當歸

白芍炒生地各一兩

川芎七分黃連三分

胡黃連三分

右六味水煎服

血中有實熱
此方主之

左金丸

治肝藏火實。左脇作痛

黃連六兩

吳茱萸一兩洗泡

右為末作丸。吳茱萸仲景用以治嘔逆吐涎等証。腸痛亦效

而兩脇皆屬於府。此方亦不專治左脇

龍膽瀉肝湯局 治腸痛口苦耳聾耳腫筋痿陰濕熱癢陰腫白濁溲血

龍膽酒炒

黃芩炒

梔子酒炒澤瀉一錢

車前子各五分

當歸酒洗

柴胡一錢

甘草

甘草炙

生地三分

酒炒各

右十味水煎服

此瀉中上焦之火純用苦味

甘草

生地

天冬

枳殼

茵陳

石斛

甘草

甘草炙

甘草

甘草炙

甘草

甘露飲竭 治丈夫小兒胃中客熱牙宣齒爛目垂欲閉饑不欲食及目赤腫痛口瘡咽腫瘍疹已發未發入療脾胃濕熱醉飽房勞黃疸腹滿或時身熱並宜服之

枇杷葉

熟地

天冬

枳殼

茵陳

生地

麥冬

石斛

甘草

甘草炙

甘草

甘草炙

甘草

甘草炙

甘草

甘草炙

甘草

甘草

甘露飲竭 作飲者此乃以散

清心蓮子飲竭

治心虛有熱小便赤澀

黃芩

麥門冬去心

地骨皮

甘草

炙

車前子

各半兩

石蓮肉去心

白茯苓去皮

黃耆

蜜炙

人參各七錢半

右剉散

每三錢另用

麥門冬十粒

水煎八分

水中沉冷空心服

發熱加柴胡薄荷亦

作飲者

治膽府實熱精神不守

瀉熱梔子煎

外

梔子二十枚

竹茹一枚

香豉六合

大青

橘略二

赤蜜三合

右六味以水六升煮取一升七合去滓下蜜再微煎二三沸分再服

大順散

方治

胃暑伏熱引飲過多

脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐

臟腑不調

同炒令薑裂次入杏仁又同炒候不作聲為度

篩淨後入肉桂一處搗為散每服二錢水煎溫服如煩躁井花水調下不拘時沸湯調亦得

此治暑天內傷冷飲之症非治暑也又甘草多於諸藥八倍亦非

此等病百不得一隅用之耳而製藥四十

二斤又止服二錢其

甘草三十斤剝去長乾薑

杏仁去皮

肉桂去粗皮各四斤

右先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟次入乾薑

同炒令薑裂次入杏仁又同炒候不作聲為度

篩淨後入肉桂一處搗為散每服二錢水煎溫服如煩

躁井花水調下不拘時沸湯調亦得

此治暑天內傷冷飲之症非治暑也又甘草多於諸藥八倍亦非

此等病百不得一隅用之耳而製藥四十

二斤又止服二錢其

意何居其方本不足取而後之庸醫竟以治燥火之暑病殺人無算故錄此以證其非

十精丸

元和紀用經
又名保真丸

免綠子人精長陰發陽

酒浸一宿

濕搗

甘菊花

月精二味

五加皮

去皮

柏子仁

木精明目通

白朮

肉精長

人參

藥精鎮心療驚

石斛山精治筋骨

如金釦者酥炙

鹿茸血精止腰痛

肉蓯蓉地精破癥

消食

巴戟智紫色者去心

酒浸一宿蒸用

加一味秋

加一味冬

加一味加味

右十味等分

隨四季各加分兩

為末

煉蜜

寬梧桐子大空心

溫酒或鹽湯下二十五粒

至三十粒忌牛肉生葱

翼金

此世所謂丹藥

也溫平補益

此世所謂丹藥

成鍊鍾乳粉半金

主五勞七傷欬逆上氣

治寒嗽通音聲

明日益精安五臟

通百節利九竅下乳汁

益氣補虛療脚弱冷疼

下焦傷竭強陰久服

延年益壽令人有子

鍾乳不拘多少

置鍾乳於金銀器中

即以大鑪著水沉金

銀器於鑪中煮之

常令如魚眼沸

水減即添薄乳

三日三夜粗厚管者

七日七夜候乳色變黃白

即熟

如疑生更煮滿十日

最佳出金銀器中

更著清水更煮浸半日

許即出之水色清不變則止

即於磁鉢

中用玉匙著水研之

每日攪水攪令勻勿使著鉢

勿使纖塵入內研覺乾澀

即更添水常令如稀米

泔狀乳細者皆浮在上

粗者皆沉下復繞鉢四邊研之

狀若乳汁研指上如書中白魚膩即成澄取

曝乾每服秤半兩分為三服用溫酒調下空腹服

更量病輕重加減服之亦可和為丸服之

此鎮心強

身壯陽

唐人最重之

玉霜圓局

治真氣虛憊下焦傷竭臍腹弦急腰脚疼痛精神困倦

面色枯槁或亡血盜汗遺泄失精二

便滑數肌消陽痿久服續骨聯筋秘精堅髓安魂定魄輕身壯陽

白龍骨

一斤細搗羅研水飛三次晒乾用黑牡蠣火煅

成粉紫稍花如無以木賊代之各三兩牛膝酒浸炙

磁石

七次醋淬

紫巴戟

穿心澤瀉宿

酒浸一伏時

石斛吳茱萸研飛肉

從容火乾各二兩

去皮酒浸一宿

茴香微炒肉桂一兩各

菟絲子研朱砂研飛肉

去皮酒浸一宿

茴香微炒肉桂去皮各

菟絲子研朱砂研飛肉

去皮酒浸一宿

茴香微炒肉桂去皮各

子蒸於土壠中

半兩酒浸一伏時

鹿茸半兩酒浸一伏時

韭子微炒天雄淨以醋

十兩酒浸七日掘一地坑

以炭燒赤速去大令

宿後取出去皮臍

精納氣歸中陽虛

者最宜亦丹藥也

右為細末煉酒蜜各半

和丸如桐子大每服三十丸空心日晚食前溫酒下

按此藥治

礞石滾痰丸

養生主論

治實熱老痰之峻劑

虛寒者不可用

黃芩

大黃

酒蒸各

礞石一兩

酒消過沉香五錢

埋地內七日

沉香忌火

右四味為細末水丸川椒大量人大小用

之用溫水一口送過咽即仰人令藥徐徐而下

半日不可飲食勿起身行動言語待藥氣自胃口漸下

二腸然後動作飲食服後喉間稠黏壅滯不快此藥力相攻

故痰氣從上也少頃藥力至而漸逐惡物

入腹下腸効如響應

下結疾之主方

黑錫丹局

治脾元久冷上實下虛胸中痰飲或上攻頭目及奔豚

上氣兩脅膨脹並陰陽氣不升降五

種水氣脚氣上攻或卒暴中風痰潮上膈等症

沉香

附子

胡蘆巴

肉桂各半

茴香

破故紙

肉豆蔻

金鈴子

木香各一黑錫

硫黃

與黑錫結砂子各三兩

右為末同研酒煮麵糊為丸梧子大陰乾以布袋擦令光

瑩每服四十丸薑湯下此鎮納上越之陽氣為醫家必備之要藥

龍腦雞蘇丸局

治上焦熱除煩解勞去肺熱咳嗽血熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出口苦腎熱

神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩

薄荷一斤生地

另為末六兩甘草一兩黃連一兩

右為末好蜜二斤先煎一二沸然後下生地末不住手攪時加

通沸湯浸

日夜絞汁

新蒲黃炒麥冬

阿膠炒人參俱為末

銀柴胡各二兩

水通木通

銀柴胡各二兩

水通木通

水通木通

木通柴胡。治慢火熬膏。勿令火緊。膏成後加藥末和丸。豌豆大。每服二十九。白湯下。此精妙虛勞虛煩。梔子湯下。肺熱黃芩湯下。心熱悸動恍惚。人參湯下。衄血吐血。麥冬湯下。肝熱。防風湯下。腎熱。黃柏湯下。以上並食後臨臥服。治五淋及婦人漏下。車前湯下。痰嗽者。生薑湯下。薑中痛者。蒲黃滑石水一鍾調下。氣逆橘皮湯下。室女虛勞寒熱。潮作。柴胡人參湯下。按生地末不若鮮者一斤同蜜熬成膏尤薄荷太多宜減十分之九。想製方之人所用薄荷乃他處之薄荷非蘇州之真龍腦也。真龍腦芳烈透腦發魂。太過反有所害。故醫者不可不知藥也。

至寶丹丸。治中惡氣絕。中風不語。中諸物毒。熱疫。煩躁氣喘吐逆。難產悶亂。死胎不下。以上並用童便一合。生薑自然汁三五滴。和溫化下。三丸至五丸。神效。又治肝肺積熱。嘔吐邪氣攻心。大腸風祕。神魂恍惚。頭目昏眩。口乾不眠。傷寒狂語。並治之。

生烏犀屑

生玳瑁屑

琥珀研

朱砂研飛

雄黃研細各一兩

龍腦

麝香研各一分

牛黃研五錢

安息香

一兩半為末。酒研飛淨。

一銀箔

金箔各五十斤

研細為衣。

右將生犀

玳瑁為細末。

入餘藥研勻。

將安

息香膏。重湯煮凝成後。入諸藥中。和搗成劑。丸如桐子大。用人參湯化下。三丸至五丸。又治小兒諸癇急驚。心熱卒中。客忤不得眠。煩躁。風涎搐搦。每二歲兒服二丸。人參湯下。本事方中。多人參。南星。天竺黃。

安神定魄必備
神丹也

蘇合香丸。療傳屍骨蒸。確葉肺痿。疰忤鬼氣。卒心痛。霍亂吐利。時氣瘴瘧。赤白暴利。瘀血口閉。痃癖丁腫。驚癲。小兒吐乳。大人狐狸等疾。

蘇合香油

五錢入安息香內。安息香一兩另為末用。

無

丁香

青木香

白檀香

沉香

薰陸香

片腦

研各麝香七錢。

右為細末。入安

息香膏。煉蜜和劑。圓如豆實大。每四丸空心用沸湯化下。溫酒下亦得。冰麝太多宜減大半。

息香膏

煉蜜和劑

圓如豆實大。

每四丸空心用沸湯化下。

溫酒下亦得。

冰麝太多宜減大半。

瓊玉膏

生先

治虛勞乾欬

生地黃

四斤若取鮮生地汁須用十斤

白茯苓

十二兩

白蜜

二斤人參六兩有加沉香血珀粉各一錢五分

右以地黃汁同蜜熬沸用

絹濾過將參茯為細末入前汁和勻以磁瓶用綿紙十數層加箬葉封瓶口入砂鍋內以長流水沒瓶

頸桑柴火煮三晝夜取出換紙紮口以蠟封固懸井中一日取起仍煮半日湯調服

此方別本製法各一斤接乾淮生地四斤浸透可取自然汁一斤若浙地則十斤祇取自須三十斤方可配諸藥故修合之法當隨地變通也

然

大活絡丹

濟聖

治一切中風癱瘓痙攣拘攣疼痛癰疽流注跌撲損傷小兒驚癇婦人停經

白花蛇

烏梢蛇

威靈仙

兩頭尖

俱酒浸

草烏

天麻根

全蝎

去毒首烏黑豆水浸

烏藥

天麻根

黃連

熟地

龜板

炙

麻黃

葛仲以上各

炙草

羌活

官桂

藿香

烏藥

天麻根

全蝎

去毒首烏黑豆水浸

大黃

蒸木香

沉香

二兩以上各

細辛

赤芍

沒藥

另研去油丁香乳香另研

黑附子

附子製

黃芩

蒸

茯苓

虎脛骨炙

當歸

各一兩半

血竭

另研七錢

天南星

蓋製

青皮

骨碎補

白蔻

安息香酒熬

黑附子

附子製

黃芩

蒸

茯苓

香附

焙酒浸

元參

以上各

細辛

白朮

一兩

防風

二兩

葛根

另研

虎脛骨炙

當歸

各一兩半

血竭

另研七錢

地龍

炙

犀角

麝香另研

松脂

各五

牛黃

另研

片腦

另研各五分

人參

三兩

右共五十味

為末

紫雪

方

療脚氣

口中生瘡

狂易走

瘡瘍毒癰

卒死

溫瘡

五戶

五注

心腹諸疾

疔瘍

及解諸熱毒藥

邪

熱卒黃等症

并解蟲鬼魅野道

熱毒

人治小兒驚癇百病

黃金

一百

寒水石

磁石

石膏

滑石各三

以上並搗碎

用水一斛

煮至四斗

去滓入下

藥

羚羊角屑

犀角屑

之方不堪用也

青木香

沉香

各五

丁香

一兩

元參

升麻

斤一

甘草八兩
炎以上入前藥汁中。再煮取一斗五升去渣。入下藥。朴硝十斤。硝石四斤。二味入前藥汁。

中微火上煎柳木箆攪。不住手候有七升。投在木盒中。半日欲凝入下藥。

錢半

硃砂三兩。上藥入前藥中。攪調令勻。磁器收藏。藥成霜雪紫色。水調下。按二硝太多當只用十分之
一則藥力方厚丁香用二兩

解毒萬病丹

一名紫金綻

邪火毒火穿經

入臟無藥可治

此能消解其效如神妙

治療一切藥毒。瓠子。鳳莽。惡菌。疫犯牛馬河豚等毒。及時行瘟疫。山嵐障瘡。纏喉風。癰疽。黃疸。赤眼瘡癧。熱毒上攻。或自縊溺水。打撲傷損。癰疽發背。魚臍瘡腫。百蟲蛇犬所傷。男子婦人癲

邪狂走。鬼胎鬼氣並宜服之。

山茱姑去皮洗淨

培二兩

川文蛤

一名五倍子搘破

千金子

去殼用紙包裹換紙研數

十麝香細研

盡油成霜二兩

紅芽大戟

洗培一兩

右各研細末和勻

以糯米粥為劑

每料分作四十粒

於端午

七夕重陽合

如欲急

用。辰日亦得於木臼中杵數十下。不得令婦人孝服人不具手足人及雞犬之類見之。此秘藥中之第一方也用藥

之奇不可思議或入加硃砂雄黃各五錢尤效

生地。生西片者，白根，白茎，白花，三万株。

右以地黃行同莖葉。

根皮過熟參次，根木入煎，水以硫硝用節，根子如活葉封口，入砂鍋內以火煮，不

可燒，根子在土中，日取根，仍煮半升湯服，保力，利淨氣，

此根子燒半升，水煎服，亦可。根子燒半升，水煎服，亦可。根子燒半升，水煎服，亦可。

大考各身量，一切之風氣寒暑寒暑，拘急，久病，難症，流注，跌撲，僵仆，久病，而人停經。

感並仙而頭大頭痛。

草烏 天麻根 全鳴六味百鳥丸。

熟地黃根，白根，白茎，白花，三萬株。

久草 茯苓 宮桂 有子 菊花

根子白根，白茎，白花，三萬株。

天麻 附子

根子大根，白根，白茎，白花，三萬株。

附子

吳江徐靈胎洞溪著

風

靈素

素問風論。黃帝問曰。風之傷人也。或為寒熱。或為熱中。或為寒中。或為癘風。或為偏枯。或為風也。其病各異。其名不同。或內至五臟六腑。不知其解。願聞其說。岐伯對曰。風氣藏於皮膚之間。內不得通。外不得泄。風者善行而數變。腠理開則灑然寒。閉則熱而悶其寒也。則衰食飲其熱也。則消肌肉。故使人恍慄而不能食。名曰寒熱。風氣與陽明入胃。循脈而上至日內皆其人肥。則風氣不得外泄。則為熱中。而目黃。人瘦。則外泄而寒。則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入。行諸脉俞。散於分肉之間。與衛氣相干。其道不利。故使肌肉憤悶而有瘍。衛風有所凝而不行。故其肉有不仁也。瘍者。有榮氣熱腑。其氣不清。故使鼻柱壞而色敗。皮膚瘍潰。風寒客於脉而不去。名曰瘍風。或名寒熱。以春甲子傷於風者。為肝風。以夏丙丁傷於風者。為心風。以季夏戊己傷於邪者。為脾風。各入其門戶。所中則為偏風。風氣循風府而上。則為腦風。風入係頭。則為目。臟六腑之俞。亦為臟腑之風。各入其門戶。所中則為偏風。風氣循風府而上。則為腦風。風入係頭。則為目。風眼寒。飲酒中風。則為漏風。入房汗出中風。則為內風。新沐中風。則為首風。久風入中。則為腸風。飧泄。外在腠理。則為泄風。故風者。百病之長也。至其變化。乃為他病也。肺風之狀。多汗惡風。面色皎然白。時欬短氣。晝日則差。暮則甚。診在眉上。其色白。心風之狀。多汗惡風。焦絕善怒。赤色病其則言不可。快診在其口。其色赤。肝風之狀。多汗惡風。善悲。色微蒼。嗌乾。善怒。時憎。女子診目下。其色青。脾風之狀。多汗惡風。身體怠惰。四肢不欲動。色薄微黃。不嗜食。診在鼻上。其色黃。腎風之狀。多汗惡風。面龐然浮腫。脊痛不能正立。其

色照隱曲不利。診在肌上。其色黑。胃風之狀。頸多汗。惡風。食飲不下。膈塞不通。腹善滿。失衣則脹。脈食寒則泄。診形瘦而腹大。首風之狀。頭面多汗。惡風。當先風一日。則病其頭痛。不可以出納。至其風日。則病少愈。痛風之狀。或多汗。常不可單衣。食則汗出。甚則身汗喘息。惡風。衣常濡。口乾善渴。不能勞事。泄風之狀。多汗。汗出泄衣上。口中乾。上潰其風。不能勞事。身體盡痛。則寒。諸風病狀各殊。其多汗惡風同傷風畏風傷風自汗。凡七情六淫之病必有現症能至悞治也。

平人氣象論。面腫曰風。

風厥勞風

評熱病論。岐伯曰。汗出而身熱者。風也。汗出而煩滿不解者。厥也。病名曰風厥。

氣逆甚即名風厥。帝

曰。願卒聞之。

岐伯曰。巨陽生氣。故先受邪。少陰與其為表裏也。得熱則上從之。從之則厥也。

必少陰之氣上乃能厥

帝白治之奈何。岐伯曰。表裏刺之。飲之眼湯。帝曰。勞風為病何如。岐伯曰。勞風法在肺下。其為病也。使人強上冥視。唾出若涕。惡風而振寒。此為勞風之病。帝曰。治之奈何。岐伯曰。以救逆仰巨陽引精者三日中

年者五日。不精者七日。欬出青黃涕。其狀如膿。大如彈丸。從口中若鼻中出。不出則傷肺。傷肺則死也。

此等治必塗其緩者

病最當體認。若認以為肺癰。肺癰則失之遠矣。蓋肺癰乃肺癰。肺癰則風寒入肺疾。涎凝結也。

酒風

病能論。帝曰。有病身熱。解墮汗出。如浴。惡風少氣。此為何病。岐伯曰。病名曰酒風。

偏枯

生氣通天論。汗出偏沮。使人偏枯。

痳

靈樞。熱病痳之為病。身無痛者。四肢不收。智亂。不其其言微。知可治。甚則不能言。不可治也。

金匱

夫風之為病。當半身不遂。或但臂不遂者。此為濶脉微而數。中風使然。寸口脉浮而緊。緊則為寒。浮則

為虛。寒虛相搏。邪在皮膚。浮為血虛。絡脉空虛。邪不瀉。或左或右。邪氣反緩。正氣即急。治療必塗其緩處。故外正氣引邪。喝辟不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。即重不勝。邪入於腑。即不識人。邪入於腑。古即難言。

口吐涎此辨証之要証寸口脈遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經則身癢而癰疹心氣不足邪氣入中則胸滿而短氣

傷寒論

脉浮而大浮為風虛大為氣強風氣相搏必成癰疹身體為瘡癰者名泄風久風為癥癱

病源

風癰 風邪之氣若先發於陰病發於五臟者其狀奄忽不知人喉裏噫噫然有聲舌強不能言發汗身軟者可治眼下及鼻人中左右上白者可治黑赤吐沫者不可治汗不出體直者七日死
口噤 諸陽經筋皆在於頭三陽之筋并絡入領頸夾於口諸陽為風寒所客則筋急故口噤不開也證其脉遲者生

舌強 脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今脾一臟受風邪故舌強不得語也

賊風 冬至之日有疾風從南方來名曰虛風其傷人也但痛不可按扣轉動傷風冷則骨解深痛按之乃應骨痛也但覺身內索索冷欲得熱物熨痛處即小窓時有汙不去重遇冷氣相搏結成癰癰及偏枯遇風熱相搏乃變附骨疽也附骨疽亦由風冷所致

風瘻 口噤不開背強而直如發瘻之狀其重者耳中篤篤痛卒然身體瘻直者死也由風邪傷於太陽經復遇寒濕則發瘻也此與病後瘻證之症不同

角弓反張 風邪傷人令腰背反折不能俛仰似角弓者由邪入諸陽經故也

柔風 血氣俱虛風邪并入在於陽則皮膚緩在於陰則肢肉急牽風之狀四肢不能收曳急不能仰不仁 由榮氣虛衛氣實風寒入於肌肉使血氣不宣流其狀搔之皮膚如隔夜是也

風驚悸。由心氣不足。心府為風邪所乘。則驚不自安。悸動不定。其狀目精不轉。而不得呼。

刺風。由體虛膚腠開為風所侵。如刀錐所刺也。

盜風。由體虛受風。其風在於皮膚。淫淫躍躍。若刺一身。盡痛。侵傷氣血。其動作如盜毒也。

鬚眉墮落。皆由風濕冷得之。邪客於經絡。與血氣相干。使榮衛不和。故面色敗。皮膚傷。鼻棗壞。鬚眉落。此乃腐風也。

惡風。風病有四百四種。總不出五種。黃風青風赤風白風黑風。人身有八萬戶蟲。若無八萬戶蟲。人身不成不立。復有諸惡橫病。諸風害人。所謂五種風生五種蟲能害於人。

口渴。養生方云。夜卧當耳勿得有孔風入耳中。喜食口渴。口渴見金匱。此又是一病。

外臺

風猥退。四肢不收。身體疼痛。肌肉虛滿。骨節懈怠。腰脚緩弱。由分肉流於血脉。久成風水之病。

蟬曳。肢體弛緩。不收攝也。人以胃氣養肌肉。經脈胃氣。長損則經脈虛而肋肉懈惰。故風邪搏於筋而使蟬曳也。

風毒發。眼疼脚縱。中指疼。連肘邊。牽心裏。悶脇脹少。氣喘氣急。絕不能食。

風方

酒治身熱。解憇汗出。如浴惡氣之風。

問素

澤瀉

白朮

各十

麋術

五分

合以三指撮為後飯

平微寒主治風濕

三指為一撮約二三錢飯後

服在飯後非飯

本草細參藥性

乃能深知其義

金匱

先為後飯

按麋術疑即鹿脚草為後飯服在飯後非飯

本草細參藥性

乃能深知其義

金匱

前也凡古才須將神農本草細參藥性

乃能深知其義

金匱

候氏黑散

金匱

苦

侯氏黑散
治大風四肢煩重心中惡寒不足者

菊花分四

五

當歸

白朮十分

細辛三分

茯苓三分

杜鵑三分

桔梗八分

防風十分

人參各三

礬石各三

分

二十日溫酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷服。六十日止。即藥積在腹中不下也。熱食即下矣。冷食自能助藥力。腸腹空虛則邪易留此填。滿空隙使邪氣不能容。

風引湯

金匱

除熱癰瘍。

巢氏云。脚氣宜風引湯。

大黃

乾薑

龍骨

各四兩

桂枝

三兩

甘草

牡蠣

各二兩

寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

紫石英

石膏

各六兩

右十二味杵粗節以葦囊盛之取三指撮

井花水三升煮三

防己地黃湯

金匱

治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脉浮。

防己一分桂枝

防風各二分甘草一分

右四味以酒一杯浸之一宿絞取汁生地黃二斤㕮咀

蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服。此方他藥輕而生地獨重乃治血中之風也。此等法最宜細玩。凡風勝則燥又風能發

沸溫服一升。

此乃臟腑之熱非草木之品所

能散故以金石重藥清其裏。

頭風摩散

金匱

大附子一枚

鹽等分

泡鹽

等分

桂枝

二分

甘草

一分

右二味為散沐了以方寸匕已摩床上令藥力行。

越婢湯

金匱

風水惡風一身悉腫

脈浮不渴續自汗出無大汗者主之。

麻黃

六兩

石膏半斤

生薑三兩

甘草二兩

大棗十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫納諸藥。

煮取三升分溫三服惡風加附子一枚本方加白朮四兩即越婢加朮湯。

越婢寒散之才也。治風熱在表之證。

小續命湯

金匱

治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能言奄奄忽忽精神悶亂諸風服之皆驗。

麻黃

金匱

防己

人參

黃芩

桂心

芍藥

甘草

川芎

杏仁

各一兩

防風半兩附子一枚生薑五兩
三升分三服不度更合三四劑隨人風輕重虛實脚弱服之亦瘥恍惚者加茯神遠志骨節夜煩有熱者去附子倍芍藥外臺加白朮一兩石膏當歸各一兩無防已續命為中風之主方因證加減變化由義人自為說流弊無窮必貴見其有寒象而後可加然尤宜於西北人若東南人則當詳審勿輕試錄驗續命湯治中風痱身體不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側

麻黃

桂枝

當歸

人參

石膏

乾薑

甘草各三

川芎

杏仁四十枚

右

九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊馮几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治但伏不得臥咳逆上氣面目浮腫

此治痱證之主方

近效朮附湯治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣

白朮二兩附子一枚去皮甘草一兩

右三味剉每五錢匕薑五片棗一枚水盃半煎七分去滓溫服

此治中風後陽虛之證按古今錄驗近效二種乃唐以前之方書今全多金匱要略宋人枝書者往往以本集申載方太少故亦採取二書并千金外臺之外擇其精要者附一二方於每病之後而方首亦必不沒其所本之書古人之不苟如此令人見其方載入金匱中即以為仲景所定之方誤矣須知之

地黃煎治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食方

生地黃汁

枸杞根汁各二兩

生薑汁

酥升各三荆懸

竹懸各五

天門冬

人參各八兩

茯苓六兩大黃

梔子各四

右十一味搗篩五物為散先煎地黃等汁成膏納散攪勻每服一

七日再漸加至三七覺利減

風行必燥古人治風必用潤藥乃真訣也今人反剛以燥辛熱之品治之是益其疾也

三黃湯針治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不飲食

麻黃五分獨活四分細辛

黃耆各二兩

黃芩三分

右五味以水六升煮取二升分溫三服一服

小汗。二服大汗。心熱加大黃二分。腹滿加枳實一枚。氣逆加入參三分。悸加牡蠣三分。渴加括薑根三分。先有寒。加附子一枚。此方專以驅風為治

風癰方

千金

治手足不遂彊直。伏龍肝五升為末。冷水八升。攪取汁飲之。能盡為善。

治半身不遂方

千金

蠶沙兩石熟蒸。分作直袋三枚。熱盛一袋。著患處。如冷換熱者數易之。瘥後須羊肚

釀梗米葱白薑椒豉等。

爛煮熟喫。日食一具。十日止。

按此法廢庫證亦良

治風懿方

竹瀝一升

治半身不遂。手足拘急。身冷強直。不語。或狂言角弓反張。或食或不食。或大小便不利。

治風懿之法與治風癰之法不相遠

口眼喎僻方

翼千金

治中風面目相引。偏僻牙車急舌不轉。

牡蠣

熟

礬石

燒

附子

泡去皮

伏龍肝

等分

右四味搗篩為散。以三歲雄雞血和藥敷上。預候看。

勿令太過。偏右塗左。偏左塗右。正則洗去之。

又方 大皂莢

皮子五兩去

搗篩以三年大醋和金緩處。

又方 千金翼

治風著人面。引口偏着耳牙車急舌不得轉。

生地黃汁

升各一

竹瀝各一

獨活

三兩

右三味合煎取一升。頓服之即愈。

經活血

開心肥健方

千金翼

升各一

人參

五兩

大豬肪

八枚

右二味搗入參為散。豬肪煎取凝。每服以人參一分。豬脂十分。以酒半升

和服之。

一百日骨髓充盈。日記千言。身體潤澤去熱。風冷心頭等風月服二升半。即有大效。

此方治老人民及

最宜風燥者

杏仁

九升去尖及

曝乾

及

右一味搗為末。以水九升。研濾如作粥。緩火煎令如麻浮上。匙取和羹粥酒

一切風虛方

千金翼

升各一

杏仁

九升去尖及

曝乾及

內一匙服之。每食即服。不限多少。服七日後。大汗出。二十日後。汗止。慎風冷。猪魚雞蒜大醋。一劑後。諸風減差。春夏恐酸少作服之。秋九月後。煎之。此法神妙。可深祕。此即作杏酪之法。服食最宜。

竹瀝湯外臺 治諸中風。

竹瀝二升 生葛根一升 按生薑汁三合 亦當用汁。

右三味分三服。日三。

此通經絡之法

卒不得語方寶臺

鑑

以苦酒煮芥子薄頸一周。

以衣包之。

一日一夕乃解瘥。

中風不語方寶臺

鑑

取龜尿點石。

取龜尿法置龜於新荷葉上。

以猪髮鼻內截之。

立出。

地黃飲子宣

治中風舌瘡不能言。

足廢不能行。

此少陰氣厥不至。

名曰風痱急當溫之。

熟地

山茱萸

五味子

旋容

酒浸

石斛

麥冬

石菖蒲

遠志

茯苓

桂心

附子炮

巴戟

去心薄荷

七葉

右十三味。

每服三錢。

生薑五片。

棗一枚。

煎服。

此治少陰氣厥之方。

所謂類中風也。

故全屬補腎之藥。

庸醫不察。

竟以

之治一

切中風之證。

輕則永無

愈期。

甚則益其病而致死。

醫者病家終身不悟也。

稀涎散局方

治中風牙關緊急。

并治單鰓雙鰓。

江子仁

六粒

牙皂

三錢

明礬

一兩

右先化開礬。

入二味。

待礬枯為末。

每用三分。

吹入喉中。

此急救

而疾開

稀發丸本草方

稀發

治口眼喎斜。

偏風失音不語。

時時吐涎。

久服并眼目清明。

毛鬚烏黑。

筋骨強健。

荳瀝汁熬膏打末為丸

有力此緩治之劑

非一時救病之法

控涎丹三方

甘遂

大戟

白芥子

等分

右為末。

煮糊丸桐子大。

曬乾。

臥時淡薑湯或熱湯下五七丸至

十九此乃下疾之方人

實者用之

滌痰散

此

治中風痰迷心竅舌強不能言。

南星

薑製

半夏各二錢牛枳實

茯苓各二錢橘紅五分石菖蒲

人參錢竹茹七分甘草五分

右九味加薑五片水煎服

此治心經之疾

勝金丸

本事方

治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮於上膈氣閉不通。

生薄荷

半兩

猪牙皂角一錢搗碎水一升二味

瓜蒂末一錢浸取汁研成膏

黎蘆

二錢

硃砂五錢

許研

分與二味研勻用膏子搗和丸如龍眼大

以硃砂一分為衣溫酒化下一丸其著二丸以吐為度得吐

即醒不醒者不治

實見其疾在上膈則可用否

則提氣上升反成厥冒等疾

銀液丹

局方

治諸風痰涎蘊結心膈滿悶頭痛目運面熱心忪痰唾稠黏精神昏憒及風涎搐並宜服

之。

天南星

三分硃砂

李丙研飛鐵粉

水銀結砂三兩

膩粉一兩

黑鉛

煉十遍秤三兩

與水銀結砂為水

右研勻麵糊丸梧桐子大每服二丸

同薄荷蜜湯下

生薑湯亦可微為度

食後服如治風癇不計時候

服此方

逆上用此鎮壓亦不可少

前方提之使

出此方鎮之下隨宜施治全在辨證之確

鴟風方

治眉落鼻瘞偏體生瘡

出神仙感遇傳

角刺

一二升燒灰

大黃九分

研末

右為末再煎大黃湯服方寸匕旬日即愈。

青州白圓

局方見通治

痺厯節

靈素

靈周痺論。黃帝曰：願聞衆痺。岐伯對曰：此各在其處更發更止，更居更起，以右應左，以左應右，非能固也。更發更休也。帝曰：善。願聞周痺何如？岐伯對曰：周痺者，在於血脈之中，隨脈以上，隨脈以下，不能左右。各當其所。帝曰：善。此痛安在？何因而有名？岐伯對曰：風寒濕氣客於外分肉之間，迫切而為沫，沫得寒則聚，聚則排分肉而分裂也。經中無疚字
沫即疚也 分裂則痛，痛則神歸之。神歸之則熱，熱則痛解，痛解則厥，厥則他痺發。發則如是。此內不在臟，而外未發於皮，獨居分肉之間，真氣不能周，故曰周痺。

深痺

九鍼十二原篇八風傷人，內舍於骨解腰脊節腠理之間，為深痺。

風痺

壽天剛柔篇。病在陽者，命曰風病；在陰者，命曰痺。陰陽俱病者，命曰風痺。

二病之殊
兩言而定

寒痺

壽天剛柔篇。寒痺之為病也，留而不去，時痛而皮不仁。

素問

痺論。帝問痺之安生。岐伯對曰：風、寒、濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者，為行痺；寒氣勝者，為痛。

痺者，脉不通。

濕氣勝者，為著痺。凡痺之客五臟者，客五臟，脾氣入肺 脈不通，煩則心下

鼓暴上氣而喘。

乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，喜脹，夙從

踵脊以代頭。

脾痺者，四肢解墮，發咳嘔，汁上為大寒。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄，胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澣於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡。飲食自倍，腸胃乃傷，淫

氣喘息。

痺聚在肺，淫氣憂思。痺聚在心，淫氣遺溺。痺聚在腎，淫氣之竭。痺聚在肝，淫氣肌絕。痺聚在脾，諸

氣不已。

亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺其時有死者，有疫久者，有易已者，其故何也？岐伯曰：

其入臟者死。

其留連筋骨間者，疫久。其留皮膚間者，易已。帝曰：其客於六腑者何也？岐伯曰：此亦其食飲

居處為其病本也。

帝曰：榮衛之氣，亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五臟，灑陳於六腑，乃

能入於脉也。

故循脉上下，貫五臟六腑也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脉也。故循皮

膚之中分肉之間重於肓。膽散於胸腹其氣則病從其氣則愈。不論風寒濕不論故不為瘡。帝曰善。瘡久入深。榮衛之行滯。經絡時疎。故不通。皮膚不榮。故為不仁。其寒者。陽氣少。陰氣多。與病相益。故寒其熱者。陽氣多。陰氣少。病氣勝陽。遭陰。故為瘡熱。其多汗而濡者。此其逢濕甚也。陽氣少。陰氣盛。兩氣相感。故汗出而濡也。帝曰。夫瘡之為病。不痛何也。岐伯曰。瘡在於骨則重。在於脉則血凝而不流。在於筋則屈不伸。在於肉則不仁。在於皮則寒。故具此五者。則不痛也。凡瘡之類。逢寒則蟲。逢熱則縱。陰瘡。至真要大論。陰瘡者。按之不得。腰脊頭頂痛。時眩。大便難。陰氣不用。饑不欲食。咳唾則有血心如懸病。本於腎。

筋肌骨痺。長刺節論。病在筋。筋蠻節痛。不可以行。名曰筋痺。病在肌膚。肌膚盡痛。名曰肌痺。病在骨。骨重不可舉。骨髓酸痛。寒氣至。名曰骨痺。

肉苛。逆調論。帝曰。人之肉苛者。雖近於衣絮。猶尚苛也。是為何疾。岐伯曰。榮氣實也。榮氣虛則不仁。衛氣虛則不用。榮衛俱虛則不仁且不用。肉如故也。人身與志不相有曰死。

金匱

問曰。血痺病從何得之。師曰。夫尊榮人。骨弱肌膚盛重。因疲勞汗出。卧不時動搖。加被微風。遂得之。但以脉自微濇。在寸口關上小緊。宜鍼引陽氣。令脉和緊去。則愈。寸口脉沉而弱。沉即主骨。弱即主筋。沉即為腎。弱即為肝。汗出入水中。如水傷心。歷節痛。黃汗出。故曰歷節。少陰脉浮而弱。弱則血不足。浮則為風。風血相搏。即疼痛如掣。盛人脉濇小短氣。自汗出。歷節疼。不可屈伸。此皆飲酒汗出。當風所致。味酸則傷筋。筋傷則緩。名曰泄。鹹則傷骨。骨傷則痿。名曰枯。枯泄相搏。名曰斷泄。榮氣不通。衛不獨行。榮衛

俱微。三焦無所御。四屬斷絕。身體羸瘦。獨足腫大。黃汗出。脛冷。假令發熱。便為歷節。

痺歷節方

痺症方

靈樞

治之以馬膏。膏其急者。以白酒和桂。以塗其緩者。以桑鈎鈎之。即以生桑炭置之坎中。高下

人坐等以膏熨急煩。且飲美酒。啜美炙肉。不飲酒者。自強也。為之三拊而已。馬膏馬脂也。其性味甘平。柔潤能養筋。治痺故可。膏其急者。白酒。桂性味辛溫。能通經絡。行血脉。故可以塗其緩者。桑之性平。能利關節。除風寒濕痺。諸痛故以桑鈎鈎之者。鈎正其口也。復以生桑大炭置之地坎之中。高下以坐者。欲其淺深適中。便易之。三拊而已。言再三拊摩其患處。則病亦已矣。筋骨之病。總在經絡。古法多用外治。今人不能知矣。

寒痺熨法

靈樞

用醇酒二十升。蜀椒一升。乾薑一斤。桂心一斤。凡四種皆㕮咀。瀆酒中用。綿絮一斤。細白

布四丈。并納酒中。置酒馬矢瘞中。馬矢瘞中者。馬屎而燥之也。蓋封塗勿使泄。五日五夜出布。綿絮曝乾之。乾後復

瀆。以盡其汗。每瀆必醉。醉周日也。其日乃出乾。并用滓與綿絮複布為複巾。重布為中。如令之夾袋。所以盛貯。綿絮藥滓也。長六尺。為六七巾。則用生桑炭炙巾。以熨寒痺所刺之處。令熟入。至於病所。熨寒痺所刺。則知先已刺過。然後熨之。若不刺而徒熨。恐藥性

不易入。則刺法亦當考明。寒復炙巾以熨之。三十遍而止。汗出以巾拭身。亦二十遍而止。

黃耆桂枝五物湯

靈金匱

治血痺。陰陽俱微。寸口關上微尺。中小緊。外證身體不仁。如風痺狀。

黃耆

芍藥

桂枝各三兩

生薑六兩

大棗十二枚

右五味以水六升。煮取二升。溫服七合。日三

桂枝芍藥知母湯

金匱

衛虛榮弱之方。因衛即以護榮。

桂枝四兩

芍藥三兩

甘草

治肢節疼痛。身體尪羸。脚腫如脫。頭眩短氣。溫溫欲吐。

桂枝

四兩

芍藥三兩

甘草

附子炮各

二兩

生薑

白朮

各五兩

知母

四兩

右九味以水

七升煮取二升。溫服七合。日三服。

此為陽虛之症。

烏頭湯

金匱

治歷節疼。痛不可屈伸。

烏頭

金匱

治歷節疼。痛不可屈伸。

麻黃

芍藥

黃耆

甘草

炙甘草

三兩

烏頭

三枚

咬咀以蜜二升

右五味咬咀四味水三升煮

其煎法精妙可師風寒入

取一升去滓納蜜煎中更煎之服七合不知更服之

節非此不能通達陽氣

入

其煎法精妙可師風寒入

節非此不能通達陽氣

入

其煎法精妙可師風寒入

右五味咬咀四味水三升煮

其煎法精妙可師風寒入

獨活寄生湯

金千

治風寒濕痺偏枯脚氣

獨活

三兩

桑寄生

秦艽

細辛

歸身

生地

白芍

川芎

桂心

茯苓

杜仲

牛膝

人參

甘草

各等分

一方有防風

右十四味為粗末每服四錢煎

舒筋飲

片薑黃

二錢如無以

赤芍

當歸

海桐皮

去粗皮

白朮各一錢

羌活

炙甘草各一錢

右七

味加薑三片前服磨沖沉香汁少許

拔瘡膏

用生半夏為末同廣膠等分先用薑汁將膏煎

史國公酒方

聖惠

治中風語言謇澀手足拘攣

半身不遂

瘡不仁

史國公酒方

聖惠

治中風語言謇澀手足拘攣

半身不遂

瘡不仁

當歸

酒洗

虎脰骨

酒浸一日燒乾醋炙

羌活

鼈甲

草薢

防風

秦艽

牛膝

松節

晚蠶沙

二兩

枸杞子

五兩醋蒸

茄根

八兩蒸

右為粗末

絹袋盛

浸無灰酒一斗

十日取飲

半身不遂外治方

大活絡丹

指迷茯苓丸

俱見通治

痿

素問

素問痿論黃帝問曰五臟使人痿何也岐伯對曰肺主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨骼故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄者則生痿躯也心氣熱而下脉厥而上上則下脉

虛虛則生。脉痿。樞折。掣脛縱而不任地也。肝氣熱則膽泄口苦。筋膜乾筋膜乾則脛急而彎。發為筋痿。脾氣熱則胃乾而渴。肌肉不仁。發為肉痿。腎氣熱則腰脊不舉。骨枯而體減。發為骨痿。帝曰。何以得之。岐伯曰。肺者臟之長也。為心之蓋也。有所失。有所失。所求不得。則發肺鳴。鳴則肺熱葉焦。故曰五臟因肺熱葉焦。發為痿躄。此之謂也。人治痿而用燥熱之藥。俱誤悲哀太甚。則胞絡絕。胞絡絕則陽氣內動。發則心下崩。數溲血也。故本病曰大經空虛發為肌痺。傳為脉痿。思想無窮。所願不得意。淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。及為白淫。故下經曰筋痿者。生於肝。使內也有漸於濕。以水為事。若有所留。居處相濕。肌肉濡漬。瘡而不仁。發為肉痿。故下經曰肉痿者。得之濕地也。有所遠行勞倦。逢大熱而渴渴。則陽氣內伐。內伐則熱。舍於腎。腎者水臟也。今水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不任身。發為骨痿。故下經曰骨痿者。生於大熱也。黃帝曰。何以別之。岐伯曰。肺熱者。色白而毛散。心熱者。色赤而絡溢。肝熱者。色蒼而爪枯。脾熱者。色黃而肉蠕動。腎熱者。色黑而齒槁。帝曰。如夫子言可矣。論言治痿者。獨取陽明。何也。岐伯曰。陽明者。五臟六腑之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機闊也。衝脈者。經脈之海也。主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。陰陽總宗筋之會。會於氣街。氣街一名氣衝。足陽明經穴在毛際兩旁膚上一寸動脈處。而陽明為之長。皆屬於帶脉而絡於督脈。故陽明虛實。和其順逆。筋脉骨肉。各以其時受月。則病已矣。時受月王冰注謂病所。生氣通天論。濕熱不攘。大筋弛緩之時月未知是否。

難經

五損損於骨。骨痿不能起於牀。

痿方

金剛丸保命 治督損骨痿不能起於牀

草薢

杜仲炒去絲

等分

右為末。酒煮膠子搗丸如桐子大。每服五十九。溫酒下。

虎骨四助丸保命 方

治脚癆。

宣木瓜

天麻

旋容

牛膝各培乾一斤

附子

虎骨各一兩

酥火

右以上各如法修製。先將

前四味用無灰酒浸春秋五日。

夏三冬十日取出焙乾入附子虎骨共研為末。用浸藥酒打麵糊丸

梧子大。每服五十九。食前鹽湯下。

加減四助丸因 三

治腎肝虛熱淫於內。致筋骨痿弱。足不任地。驚恐戰掉。潮熱時作。飲食無味。不生氣力。

肉蓯蓉

酒浸牛膝酒浸

木瓜乾

鹿茸酥炙熟地

五味子

酒浸各等分

右為末。煉蜜

九桐子大。每服五十九。溫酒米飲下。一方不用五味。有杜仲。

懷腎丸保命

治腎肝虛及脾損。穀不化。

牛膝

草薢

杜仲炒去絲

白蒺藜

防風

免絲子酒浸

旋容酒浸

葫蘆巴

破故紙

等分桂枝減半

右為末。將猪腰子製如食法。搗爛蜜丸如桐子大。每服五十九。溫酒送

下。又治腰痛不起。亦治腎瘻

續骨丹本

治兩脚軟弱虛羸無力。及小兒不能行。

天麻

酒浸

白附子

牛膝

木鼈子

各半

羌活

半兩烏頭泡

一錢

地龍去土

一分乳香

沒藥各二錢

硃砂

一錢

右以生南星末一兩。無灰酒炙糊丸。雞頭大硃砂為衣。

此加味活絡丹

也。舒筋最宜。

事

治肝腎風虛氣弱。脚不可踐地。腰脊疼痛。風毒流注下經。行止艱難。小便餘瀝。此補五

臟內傷。

中益精涼血堅強筋骨。益智輕身耐老。

思仙續斷圓本

治肝腎風虛氣弱。脚不可踐地。腰脊疼痛。風毒流注下經。行止艱難。小便餘瀝。此補五

臟內傷。

中益精涼血堅強筋骨。益智輕身耐老。

事

治肝腎風虛氣弱。脚不可踐地。腰脊疼痛。風毒流注下經。行止艱難。小便餘瀝。此補五

臟內傷。

中益精涼血堅強筋骨。益智輕身耐老。

思仙丸

生地

各五兩

五加皮

防風

米仁

羌活

川斷

牛膝

各三兩

草薢四兩

右為細末。好酒三升化青鹽三兩用大木瓜半斤去皮子以鹽酒煮木瓜成膏

丸如桐子大每服三

四十九空心食前溫酒鹽湯下膏少和酒可也

此方治下焦風濕脚氣亦效

內經針灸之法猶取陽明以陽明為諸筋總會也而用藥則補腎為多以腎為

筋骨之總司也養其精血而逐其風疾則大略無誤矣

虎潛丸

丹溪

大活絡丹

俱見通治二方

厥

靈素

厥之象如此甚
則不知人矣

靈癲狂篇厥逆為病也足暴清胸若將裂腸若將以刀切之煩而不能食脉大小皆濶厥之象如此甚
則不知人矣

素厥論黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥帝曰熱厥
之為熱也必起於足下者何也岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脈者集於足下而聚於足心故陽氣勝
則足下熱也帝曰寒厥之為寒也必從五指而上於膝者何也岐伯曰陰氣起於五指之裏集於膝下而
聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也不從外皆從內也解精微論厥則目無所見夫人厥
則陽氣并於上陰氣並於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脹也上若不能通陰納陽
而用辛熱滿之無病調經論血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死

陽明脉解

論厥逆連藏則死連經則生

瘡俳前厥

素脉解篇

內奪而厥則為瘡俳

此腎虛也少陰不至者厥也

肝氣當治而未得故善怒善怒

者名曰煎厥

劉河間地黃引

子真治瘡俳

生氣通天論陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥此當治肝

薄厥

素生氣通天論陽氣者

大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥此當治

血逆

陽明厥 素陽明脉解論。陽明厥則喘而惋惋則惡人。

少陰厥 素脈要精微論。脉俱沉細數者。少陰厥也。

風厥 素評熱論。汗出而身熱者。風也。汗出而煩滿不解者。厥也。病名曰風厥。此當治風

尸厥 素繆刺論。五絡俱竭。令人身脉皆動。而形無知也。其狀若尸。名曰尸厥。

難經

督之為病。脊強而厥。

金匱

問曰。寸脉沉大而滑。沉則為實。滑則為氣實。氣相搏。血氣入臟即死。入腑即愈。此為卒厥。何謂也。師曰。唇口青身冷。為入臟。即死。如身和汗自出。為入腑。即愈。卒厥之症類似中風。一或誤治死不旋踵。

傷寒論

寸口諸微亡陽。諸濡亡血。諸弱發熱。諸緊為寒。諸乘寒者。則為厥。禁冒不仁。以胃無穀。氣脾滯不通。口急不能言。戰而慄也。少陰脉不至。腎氣微少。精血奔氣促迫。上入胸膈。宗氣反聚。血結心下。陽氣退下。熱歸陰股。與陰相動。令身不仁。此為尸厥。少陽厥陰俱病。耳聾囊縮而厥水漿不入。不知人者。六日死。此為厥之由。致厥者。手足逆冷是也。此厥傷寒脉微而厥至七八日。膚冷。

諸四逆厥者。不可下之。虛家亦然。以下所論諸條皆指傷寒症。手足傷寒始發熱。六日厥反九日而利。凡逆冷而言。非氣逆。不知人之厥也。厥利者。當不能食。今反能食者。恐為除中。食以索餅。不發熱者。知胃氣尚勝。必愈。傷寒一二日至四五日而厥者。必發熱。前熱者後必厥。厥深者熱亦深。厥微者熱亦微。厥應下之。而反發汗者。必口傷爛赤。此熱厥者。陰陽氣不相順接。便為厥。此象傷寒脉微而厥至七八日。膚冷。

人躁無暫安時者。此為臟厥。傷寒熱少厥微。指頭寒。默默不欲食。煩躁數。小便利。色白者。此熱除也。欲得食。其病為愈。若厥而嘔。胸脅煩滿。其後必便血。病者手足厥冷。言我不結胸。小腹滿。按之痛者。此冷結在膀胱關元也。傷寒發熱。下利厥逆。躁不卧者死。傷寒發熱。下利至甚。厥不止者死。傷寒五六日不結胸。腹滿脉虛。復厥者不可下。此為亡血。下之死。傷寒脉促。手足厥逆者可灸之。下利手足厥冷無脉者。灸之不溫。若脉不還。反微喘者死。虛寒之厥。下利後脉絕。手足厥冷。眸時脉還手足溫者。生脉不可不潛心體察。凡一病其變態不同如此。何可執一說以人命為兒戲耶。

厥方

戶厥方素問

以竹管吹其兩耳鬚。鬚刺同

其左角之髮方一寸。燔治飲以美酒。燔治燒為末也

茯苓

半夏各四兩

一方用桂洗泡

烏頭二兩細辛一兩

作人參

金

右六味末之。內真朱為色。煉蜜丸如麻子大。

右六味末也

先食酒飲下三丸。日再夜一服。不知稍增之。以知為度。

真朱即硃砂

茯苓

湯論

傷寒厥而心下悸者。宜先治水。當服此湯。却治其厥。不爾。水濱入胃。必作利也。

茯苓

二兩

桂枝二兩生草一兩

生薑二兩

右四味水四升。煮取二升。分溫三服。

戶厥方金匱

治戶厥脉動而無氣。氣閉不通。故靜而死也。草蒲屑內鼻兩孔中吹之。令人以桂屑著舌下。

白薇湯本事

人平居無苦疾。忽如死。人身不動搖。默默不知人。目閉不能開。口瘡不能言。或微知人。或

惡聞人聲。但如眩冒。移時方寤。此由出汗過多。血少氣併於陽。獨上而不下。氣壅塞而不行。故身如死。氣過血還。陰陽復通。移時方寤。名曰鬱冒。亦名血厥。婦人多有之。宜服。

白薇

當歸酒一
人參

甘草錢一

右為粗末。每服五錢水二盞。煎至一盞。去滓溫服。此病

最多。

而婦科皆不
知無不誤治

四逆湯傷寒

下利厥逆而惡寒者。主之。大汗若大下利而冷厥者。亦主之。傷寒

方見

通脉四逆湯傷寒

下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。主之。方見

通治

腹中痛者。去葱。加芍藥二兩。

嘔者。加生薑二兩。

咽痛者。去芍藥。加桔梗一兩。

利止脉不出者去

桔梗。加人參一兩。

當歸四逆湯傷寒

手足厥冷。脉細欲絕者。主之。方見傷寒

以上三方皆治寒

傷寒

瓜蒂散。白虎湯此治熱厥二

烏梅丸此治姦厥

蘇合香丸此治氣厥

四磨飲。至寶丹以三上方俱見通治

虛勞

金匱

夫男子平人。脉大為勞。極虛亦為勞。男子面色薄者。主渴。及亡血。卒喘悸。脉浮者。更虛也。男子脉虛沉弦。無寒熱。短氣。裏急。小便不利。面赤白。時目瞑。兼効少腹滿。此為勞使之然。勞之為病。其脉浮大。手足煩。春夏劇。秋冬瘥。陰精自出。酸削不能行。男子脉浮弱而濇。為無子。精氣清冷。男子平人脉虛弱。細微者。喜盜汗也。人年五六十。其病脉大者。瘦。俠背行。若腸鳴馬刀。俠瘦者。皆為勞得之。脉沉小遲。名脫氣。其人疾行。則喘渴。手足逆寒。腹滿甚。則溏泄。食不消化也。脉弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為虛。虛寒相搏。此名為革。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。古人所謂虛勞。皆是純虛無吐血咳嗽者。正相反誤治必斃。近日吐血咳嗽之病。乃是血症。有似虛勞。其實非虛勞也。

病源

夫虛勞者。五勞六極七傷是也。五勞者。一曰志勞。二曰思勞。三曰心勞。四曰憂勞。五曰瘦勞。六極者。一曰氣極。二曰血極。三曰筋極。四曰骨極。五曰肌極。六曰精極。七傷者。一曰陰寒。二曰陰暑。三曰陰急。四曰精連連。五曰精少。陰下濕。六曰精清。七曰小便苦。數臨事不卒。

五蒸一骨蒸。根在腎。二脉蒸。根在心。三皮蒸。根在肺。四肉蒸。根在脾。五肉蒸亦名血蒸。必外寒而內熱。把手附骨而內熱其根在五臟六腑。又有二十三蒸各有證名。

肺勞者。短氣面腫。鼻不聞香臭。肝勞者。面目乾黑。口苦精神不守。恐畏不能獨卧。目視不明。心勞者。忽忽喜忘。大便苦難。或時鴨溏。口內生瘡。脾勞者。舌苦直不能咽唾。腎勞者。背難以俛仰。小便不利。色赤黃而有餘瀝。並內痛陰濕囊生瘡。小腹滿急。此乃五臟之勞

虛勞方

桂枝加龍骨牡蠣湯金匱 失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩。頭髮落。脈極虛芤遲。為清穀亡血失精。脉

得諸芤動微緊。男子失精。女子夢交。此湯主之。

桂枝二兩

芍藥三兩

生薑各一兩

甘草二兩

大棗十二枚

龍骨十二

牡蠣各三

頭痛。眼痛。

髮落。脈極虛芤遲。為清穀亡血失精。脉

三升分溫三服。脉極虛芤遲乃為虛寒之症。故用桂枝及建中等湯。

若嘔血而脈數者。乃陰虛之症。與此相反誤用必斃。

薯蕷丸金匱 虛勞諸不足。風氣百疾主之。

薯蕷三十

當歸二兩

桂枝二兩

麥門冬各六

柴胡二兩

桔梗二兩

茯苓各五

阿膠七分

杏仁六分

乾薑三分

甘草二十

豆蔻卷各十

甘草八分

人參十分

芎藭一分

白斂二分

防風六分

大棗一百枚

為膏

右二十一味。末之。煉蜜和丸如彈子大。空腹酒服一丸。一百丸為劑。

六黃蠶丸金匱 五勞虛極羸瘦。腹滿不能飲食。食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷。經絡榮衛氣傷。內乾

血肌膚甲錯。目暗。此丸主之。

大黃十分蒸黃芩二兩甘草三兩桃仁一升杏仁一升芍藥四兩乾地黃十兩蟾蜍一升乾漆一兩

蟲蟲一升水蛭百枚廬蟲半升右十二味為末。煉蜜為丸。小豆大。酒飲服五丸。日三服。

血朝則納。而不散。非此方專治瘀血也。

治夢洩精方

金

韭子一升

右為末。酒服方寸匕。日三服。立效。

羌活補髓丸

金

羌活。療髓虛。腦痛不安。膽附中寒。

川芎

當歸各三兩

桂心二兩

人參四兩酥一升

大麻仁二升研脂

棗肉一斤

牛髓研脂

羊髓各一升

右十味先節前五味為散。後用棗肉。麻仁打勻。再下二髓及酥。重湯煮之。為丸桐子大。

酒服三十丸。日再服。

肘後癲肝散

金匱

治冷勞。又主鬼疰。一門相染。

獵干一具

附方

龍膽

右水服方寸匕。日三服。

骨蒸方

金匱

療虛熱。骨蒸。羸瘦煩悶。短氣喘息。兩鼻孔張。日西即發。

黃連

括蕘各一兩

梔子二七枚芒硝半兩青葙子

苦參

大黃

黃芩

芍藥各半兩

右十一味。搗篩為末。煉蜜和丸如梧子大。飲服十九日。二服以知為度。

此為純寒之劑。實熱者宜之。

救急療瘦疾方

外臺

炙甘草三兩

右一味。小便煮服。

用小便奇此方亦治咽痛。

口乾方

外

療脾熱。腸痛。熱滿不歇。目赤不止。口唇乾裂。

石膏碎綿生地汁 赤蜜各一 淡竹葉五升 右四味水一斗五升。先煮竹葉取七升。去滓煮石膏取一升五合。去滓納地黃汁。煮二三沸。下蜜煎三升細服。

傳屍勞方

臺外

懶肝一具破乾矣 鱉甲一枚野狸頭一枚紫苑四分漢防已半 蜀漆洗
搗篩已成煉烊羊腎脂一分合蜜一分烊令和丸桐子大每服十九丸加至十五丸日再其藥合和分一分懸門額上一分著頭邊一分繫臂上先服頭邊次服臂上次服門上大驗。

秦光鼈甲散寶鑑 治骨蒸壯熱。肌肉消瘦。舌紅煩赤氣粗因倦盜汗。

鱉甲

柴胡

地骨皮各一

秦光

知母

當歸各五錢

右為末。每半兩入烏梅一枚。青

蒿五葉同煎臨臥空心溫服。

秦光扶羸湯直指 治肺痿骨蒸勞嗽。聲嘎自汗體倦。

鱉甲

秦光

當歸

人參各一錢半

柴胡二錢

地骨皮

紫苑

半夏

甘草各一錢

右九味加葛根煎服。

十味煎外臺

治凡病在胸膈上者。宜飽服而在夜肺既居上。則病在上。晝宜服丸。夜宜合桑白皮汁等服。

桑白皮

一升

地骨皮

三升

二味以水七升煮取三升。去渣澄清。

生地汁

五升

麥冬汁

二升

生薑汁一升

竹瀝

生葛根汁各三升

白蜜一升

牛酥三合

大棗一升

生薑汁

一升

經此為第

少許

根以上和前減半。則內桑皮等和煎之三分減一。則內酥蜜等藥攪之勿停手。如稠飴狀。每服胡桃

一枚哈之。

滋潤肺

宜用少許

百花煎類方

治吐血咳嗽補肺。

生地汁

藕汁

黃牛乳各一升

胡桃十枚

黃明膠

阿膠末半兩

生薑汁半斤

乾柿五枚

細研

人參蛤蚧散

蜜罐

清酒一升

秦艽半兩

當用薄荷或蘇子汁

杏仁三兩

研細

養成入磁器服一匙米飲調下日三

宜減去大半

人參蛤蚧散

蜜罐

清酒一升

秦艽半兩

當用薄荷或蘇子汁

杏仁三兩

研細

右藥煎減半

入好蜜四兩

漫火

大棗二十枚煮

去皮核研爛

水浸五宿逐

日換水洗去腥氣

水黃杏仁五兩

甘草三兩

人參一兩

茯苓一兩

貝母一兩

知母一兩

右藥煎減半

入茶點服神效

金鎖固精丸

治夢遺滑精

芡實

蓮鬚

蒺藜各二

龍骨一兩

牡蠣殼四

白龍骨各一

破故紙炒

白龍骨丙

木香一兩

五錢

胡桃三十個

研膏

羊腎三對

切開用鹽

龍骨各三

右

金鎖丹

本事一

治夢泄遺精關鎖不固

茴香

葫蘆巴

破故紙炒

白龍骨丙

木香一兩

五錢

胡桃三十個

研膏

羊腎三對

切開用鹽

龍骨各三

右

右以蓮子粉糊丸服鹽湯送下

為末和二膏研

研

酒浸煮熟

丸桐子大

每服三十五丸

鹽湯下

金鎖正元丹

局方

治真氣不足

元臟虛弱

四肢倦怠

百節酸疼

精神昏困

手足多冷

心忪盜汗

飲食減少

小便滑數遺精白濁

五倍子

茯苓各二

補骨脂

十四

微炒

紫巴戟去心

葫蘆巴炒

從蓉洗淨

各硃砂

別研

龍骨各三

右

右為細末入研令勻

酒糊為丸如桐子大

每服十五丸至二十丸

空心食前

溫酒或鹽湯下

犀角紫河車丸

研末一具米泔浸

一盞甲酥炙枯梗

胡黃連

白芍

敗鼓皮心

醋炙

大黃

貝母

龍膽草宿洗淨焙乾

各二

右為末

蜜丸桐子大

硃砂爲

錢研

知母各二

右為末

蜜丸桐子大

硃砂各二

右

衣空心溫酒服二十九。如膈熱食後服重病不遇一料。

小建中湯

金匱

黃耆建中湯

金匱

災甘草湯

金匱

附方

大建中湯

元成

以上九

八味地黃丸

金匱

人參養榮湯

方

消證方

瓊玉膏

金匱

生地黃煎

外臺

四物二連湯

元成

以上九

方俱見通治

消證方

靈素

靈師傳篇。胃中熱則消穀。令人懸心善饑。素氣厥論。心移寒於肺。肺消。肺消者飲一溲。二死不治。陽陰別論。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳為風消。其傳為息責。死不治。氣厥論。心移熱于肺。傳為膈消。

金匱

厥陰之為病。消渴。氣上衝心。心中疼熱。飢而不欲食。食即吐。或下之不肯止。此症不可誤認就厥。

病源

夫消渴者。渴不止。少便多是也。其病變多發癰疽。此坐熱氣留於經絡。血氣壅澀。故成癰膿。內消病者。不渴而小便多是也。利多不得潤養五臟。臟衰則生諸病。由腎盛之時。恣意快情。致使虛耗。故不渴而小便多也。強中病者。莖長興盛。不痿精液自出。由少服五石。熱往於腎中。下焦虛少壯之時。血氣尚豐。能制於五石。及至年衰。血氣減少。腎虛不復能制津液。若精液竭。則諸病生矣。

消證方

文蛤散

金匱

渴欲飲水不止者

主之

傷寒論

治心煩肉上粟起

意欲飲水。反不渴者。

中藥

飲水不止者

主之

治心煩肉上粟起

意欲飲水。反不渴者。

中藥

飲水不止者

主之

治心煩肉上粟起

意欲飲水。反不渴者。

消渴方

栝萎根

生薑

麥冬

蘆根切各半升
茅根切三升

右五味。㕮咀以水一斗煮取三升分三服。

茯神湯

金 滅熱止渴治胃腑實熱引飲常渴者。

茯神

二兩

栝萎根

五兩

生麥冬

五兩

知母

四兩

生地黃

六兩

小麥仁

二升

大棗

二十枚

淡竹葉

升切三

右九味

以水三斗煮小麥竹葉取九升去渣下藥煮取四升

分四服

不問早晚但渴

即進通治渴患熱者。

黃連圓治渴方

金

黃連

一斤

生地黃

一斤

右二味

絞地黃汁

浸黃連出

曝燥復內

汁中令汁盡

乾搗末

蜜丸桐子大

服二十丸

日三食前後無拘

亦可為散酒服方寸匕

此治胃中有伏火之方

製法神妙

本事方用冬

瓜汁收入

黃連內為丸

即以冬瓜汁煎

大麥仁湯

下亦仿此義則知

多吃冬瓜亦妙也

桑根湯

翼金十全

主日飲一石水方

桑根白皮

切五升入地

良久令黃黑尺

神效散

本事方

治渴疾飲水不止

白浮石

蛤粉

蟬蛻各等

右一味水煮以味濃為度適寒溫任性飲戒食鹽

猪腎齊危湯

金一具

強中之病莖長興盛不交精液自出消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服

猪腎

一升

齊危三兩

大豆

一升

齊危三兩

人參

石膏各三錢

伏神磁石

綿裹知母

葛根

黃芩

甘草

栝萎根各二

以水三升

此合

一劑

病勢漸歇即止

此清胃之主方

生薑

麥冬

蘆根切各半升

茅根切三升

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

通治方

腎氣丸

見通治

白虎人參湯

乾裂方

見虛勞