

已4
86<31

聖濟總錄
吳錫璫著



大德重校聖濟總錄卷第一百二十九

癰疽門

腸癰

論曰腸癰由恚怒不節憂思過甚腸胃虛弱寒溫不調邪熱交攻故榮衛相干血為敗濁流滲入腸不能傳導蓄結成癰津液腐化變為膿汁其候少腹鞭滿按之內痛小便淋數汗出惡寒身皮甲錯腹滿如腫動搖轉側聲如裏水或達臍生瘡膿從瘡出或膿出臍中或大便下膿血宜急治之不爾則邪毒內攻爛爛腸胃不可救矣診其脉洪數者膿已成設脉遲緊雖膿未就已有瘀血也治腸癰少腹堅腫大如掌而熱按之則痛其上色或赤或白小便稠數汗出憎寒其脉遲緊者未成膿如脉數則膿已成大黃湯方

大黃

炒

牡丹皮

消石

研

桃人

湯浸去雙人皮尖炒

芥子

各兩半

右五味麞擣篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓空心溫服以利下膿血

為度未利再服

治腸癰木占斯散方

木占斯

厚朴
去麌皮生
薑汁炙

甘草
剉炙

細辛
去苗葉

桔樓
去皮

防風
去叉

乾薑
炮

人參

桔梗
炒剉

敗醬
各壹兩

防風
去叉

乾薑
炮

人參

右十味搗羅為散每服二錢匕空心日晚溫酒調下
治腸癱牡丹湯方

牡丹皮
壹兩

芍藥

丹參

生乾地黃
切焙各兩

甘草
剉炙

薏苡仁
去黑皮

桔梗
炒剉各壹兩

麥門冬
去心焙各半

甘草
剉炙

右十味麞搗篩每服五錢匕水二盞入生薑五片煎至一盞去滓空心日晚
溫服

治腸癱犀角九方

犀角屑
半壹兩

巴豆
拾粒去油皮

大黃
叁分蒸

蜀椒
剉去目并閉口

者炒出汗口

黃芩
去黑心

防風
去叉

人參

當歸
切

黃耆
剉細

藜蘆
去頭

山梔子
去皮

黃連
去須

甘草
剉炙

升麻
各半

右十四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三九空心米飲下加至四五

丸利下黃水為度

治腸癰裏急隱痛大便祕澀梅人湯方

梅核人

肆拾玖箇
去皮尖
兩半

大黃

參

牡丹皮

壹兩

冬瓜人

肆

兩分

犀角

壹
兩
錢
鑄

芒消

貳
兩
半

右六味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服以下膿血三兩行為度

治腸癰附子湯方

附子

炮
皮
臍
裂
去
半

敗醬

各
參

薏苡仁

壹
兩
半

右三味㕮咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至六分去滓空心日晚溫服下膿血即差

治腸癰雞毛散方

雄雞項上毛

燒
灰
壹
錢

雄雞屎

燒
灰
各
壹
兩

右二味細研為散空心溫酒二合調下一錢匕日晚再服

又方

右截檜頭尖少許燒作灰水調服即穴出膿

治腸癰壯熱惡寒微汗氣急少腹痛小便澀或大便如刀錐刺痛或有膿腹中已成膿瓜子人汁方

瓜子人卷合與水陸合
同研绞取汁

當歸切焙壹兩搗末

蛇蛻壹條燒灰研

右三味將二味末和勻分作二服用瓜子汁調下空心日午服下膿血即差治腸癰大黃牡丹湯方

大黃剉炒

牡丹皮各貳兩

桃人湯浸去皮尖雙人炒半兩

芒消研壹兩

冬瓜人卷合

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心溫服以利下膿血為度治腸癰薏苡人湯方

薏苡人壹兩

牡丹皮

桃人湯浸去皮尖雙人炒各壹兩半

瓜子人半兩

右四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓空心日晚溫服

胃脘癰

論曰內經謂人病胃脘癰者當候胃脉其脉沉細者氣逆氣逆者人迎甚盛甚盛則熱人迎者胃脉也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘為癰也夫陰陽

升降則榮衛流通氣逆而隔則留結為癰胃脘癰者由寒氣隔陽熱聚胃口寒
熱不調故血肉腐壞以氣逆於胃故胃脉沉細以陽氣不得下通故頸人迎甚
盛令人寒熱如瘧身皮甲錯或欬或嘔或唾膿血觀伏梁之病亦有俠胃脘內
癰者以其裏大膿血居腸胃之外故也

治熱聚胃脘留結為癰連翹升麻湯方

連翹

升麻

射干去毛

獨活去蘆頭

桑寄生

木通

剉各貳
兩半

大黃上搗微炒貳兩

以爲麩末

木香

沉香搗研爲細末

薰陸香

丁香

麝香各等分以上

右十二味每抄前藥五錢匕水二盞煎至一盞半去滓入後五香末二錢匕
再煎至一盞溫服日三服以快利為度

治胃腑實熱留結為癰陽氣不得下胃脉沉細者犀角湯方

犀角

鋤去毛

梔子仁

赤芍藥

赤茯苓去黑皮

黃芩去黑心

右七味麞擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入蜜一匙攪勻再煎
一兩沸食後溫服

射干去毛

大黃剉炒各壹兩

各

治榮衛不流熱聚胃口肉腐壞胃院成癰射干湯方

射干

去毛
各一
半

梔子人

赤茯苓

去皮
各一
半

升麻

各一
半

赤芍藥

右六味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入生地黃汁一合蜜半合再煎三沸溫服不拘時候日二服

治熱氣留聚胃院內結成癰麥門冬湯方

麥門冬

去心
焙

犀角

鋤

姜蕤

薺莞

赤芍藥

石膏

各一
半

甘草

炙
剉

紅雪

各一
半

右八味麌搏篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入竹憑一合再煎三兩沸溫服

治胃脘蓄熱結聚成癰芍藥湯方

赤芍藥

剉
生

犀角

鋤

木通

剉
碎

石膏

碎

升麻

各一
半

甘草

剉
生

朴消

玄參

麥門冬

去心
焙

各一
半

右九味麌搏篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候

緩疽

半

論曰緩疽者以寒氣客於經絡榮衛凝澀其寒氣盛則腫痛深伏其狀無頭尾大如拳小如桃李與皮肉相附著其腫與肉色相似亦不甚赤積日不潰久乃變紫黯色皮肉俱爛如牛領瘡以其初勢緩慢故名緩疽以其腫色與肉色相似故亦名肉色疽

治緩疽木占斯散方

木占斯

乾薑

炮裂

桂皮

去麤

細辛

去苗葉

敗醬

防風

去叉

桔梗

炒

桔梗

去皮各半兩

甘草

炙三分

人參

壹兩

厚朴

去麤皮炙剉

參分

右十一味擣羅為散每服二錢匕空心溫酒調下日晚再服
治緩疽芍藥湯方

芍藥

當歸各一錢

黃耆

剉

生乾地黃

焙赤茯苓

去黑皮各壹兩半

人參

甘草

炙各三分

右七味麞擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎棗二枚擘破同煎

至八分去滓空心溫服晚再服

治緩疽及諸癰腫膿血結聚皮肉堅厚日久不潰疼痛黃耆湯方

卷之二十一
黃耆

沉香

薰陸香

連翹各參

羚羊角屑壹兩

雞舌香

漏蘆去蘆頭各半

黃芩去黑心

梔子人

甘草生剉

防風去叉

桔梗根各半

甘草去黑心

右十二味麞擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓不計時候溫服治緩疽日久穿潰出膿水不盡排膿散方

貝齒

壹兩

黃耆剉

當歸炒微

赤芍藥

生乾地黃焙

黃連

湏去

升麻

細研

桂去蕊

白欽

犀角屑各參

甘草

半兩

麝香

壹分

桂去蕊

白欽

犀角屑各參

右十二味擣研為散拌勻再羅每服溫酒調下二錢七不計時候治緩疽初結微腫疼痛塗貼莽草散方

莽草

鹿角屑

白欽

白及

半夏

天南星

附子

生去皮鹽各壹兩

蛇蛻皮

壹條

皂莢皮及子去黑

右九味擣羅為散用醋麪薄糊調為膏塗貼腫處乾即再上以腫散為度治緩疽蛇牀散方

蛇牀子末

杏人湯浸去皮尖雙人研細入

黃連去湏

乳香細研各半兩

鹽壹分
研

蔓菁根參兩
爛研

切

右六味以蔓菁根和藥末細研令勻塗傅腫上乾即易之
治緩疽惡瘡蝕惡肉飛黃散方

丹砂

雌黃

磁石

曾青

白石英

礬石

石膏

石鍾乳

雄黃各兩

雲母粉參一錢

右十味各細研為散用瓦盆一口丹砂安南雌黃安中磁石向北曾青在東
白石英在西礬石當上石膏次更下鍾乳雄黃雲母覆蓋更用一盆覆蓋定
以泥封厚一寸於竈底以陳葦燒一日取出看取飛上者研細傅瘡上日二
度即差

治緩疽以飛黃散蝕惡肉盡用雄黃散熏方

雄黃

乾雞屎白

藜蘆去蘆頭

丹砂細研

乾鰐鱗魚炙焦各一錢

右五味擣羅為散以青布裹之安小土竈內燒熏患處如是熏三日即止後
用黃耆散常法傅之

治緩疽黃耆散方

黃耆兩

聖濟錄 錄卷二十九
右一味細剉擣羅為散傅瘡上日一度

又方

漆頭闇姑貳兩

右一味擣羅為散傅瘡上日二度

石疽

論曰石疽與石癰之證同比石癰為深以寒客經絡氣血結聚而不得散隱於皮膚之內重按如石故謂之石疽癰疽皆熱氣所作今寒氣為梗故凝結不化其毒內著結鞭如石治宜溫其經絡使熱氣得通其毒外泄故能腐熟而發散化膿血而出也

治石疽堅硬皮色深赤惡寒壯熱一二日未膿者下之升麻湯方

升麻

連翹

玄參

大青

大黃

剉微炒各壹兩

敗醬

絡石

白欵各半兩

生地黃貳兩

右九味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分入芒消一錢去滓空心溫服微利三兩行未利再服

治石疽結堅若壞若未壞或已成疽者占斯散方



木占斯

厚朴

去麌
薑汁

生乾地黃

培

桔樓

乾皮

敗醬

防風

去叉

桔梗

炒

人參

細辛

去苗葉各壹兩

桂

去麌皮半兩

右十味擣羅為散每服二錢匕溫酒調下食前治石疽腫毒結鞭口乾煩熱四肢拘急不得卧沉香湯方

沉香

防風

去叉

木香

各參分

地骨皮

麥門冬

去心培

當歸

切培

升麻

玄參

枳殼

去瓢炒

羚羊角屑

大黃

獨活

去蘆剉

甘草

生剉

赤芍藥

各壹兩

大黃

剉炒兩

右十四味麤擣篩每服四錢匕水一盞半煎取七分去滓不計時候溫服

治石疽堅硬不消地黃前方

生地黃

淨洗參斤

右一味剉碎細研以布絞取汁入銅器內盛重湯上煮柳籠攪勻如糖以資

合盛每日空心取一丸如彈子大溫酒調下日午晚間再服即差

治疽發堅如石核復大色不變鹿角散方

鹿角

燒過貳兩

白欽

壹兩

麤理黃石

伍兩中再燒入醋

令赤色投醋

右三味擣羅為散以釀醋調如糊塗傅腫上乾即再傅以差為度

聖濟錄卷二十九

治石疽堅如石不作膿商陸根貼方

生商陸根半斤

右一味爛搗如泥於故帛上塗貼乾即易之

治石疽狀如瘻癧而皮厚者楮實塗方

楮實不以少

右一味搗羅為末以醋調如糊塗患上乾即易之

治石疽堅硬皮色紫赤惡寒壯熱一二日未成膿者下之後宜用木香散貼方

木香

大黃生

升麻

白斂

芒消

赤小豆

葛半兩

右六味搗羅為散以榆白皮汁入水少許調和如糊以故帛上塗貼日二上即差

又方

鹿角

右一味於石上水磨如泥塗患上日三五度即差

又方



半夏

壹兩

右一味搗羅為末以水調如糊塗患上日三五度即差

治石疽塗傳方

蜀漆

乾者半兩

桑根白皮

貳兩

右二味搗羅為末鎔牛膠更以酒調和塗傳腫上日三五度即差

又方

萸菪子

貳兩

右一味搗羅為散以醋調和如糊塗傳腫上乾即再塗取差

又方

梁上塵

葵莖灰

兩一
壹

右一味搗羅為散以醋調如糊塗傳腫上日三兩度即差

又方

蛇蛻皮

右一味燒灰細研以醋調如糊塗腫上乾即易之

附骨疽



論曰骨疽者由風入骨解與熱相搏復為冷濕所折風熱伏結不得發散蘊積成毒故附骨而為疽喜發於大節解間按之應骨皮肉微急洪洪如肌而不外見是也治之宜急稍緩則膿不得潰而肢體變青黯者不可治

治附骨疽漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

升麻

連翹

麻黃去根節各壹兩

大黃剉炒各半

防已

木香

白斂

沉香各分各參

右九味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入竹葉一七片煎至八分再入芒消一錢攪勻去滓空心溫服取利三兩行未利再服

治附骨疽連翹湯方

連翹

射干

升麻

防已

黃芩去黑心

大黃剉炒

甘草炙

芍藥

杏人湯浸去皮尖

茈胡去苗貳兩

右十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分入芒消一錢匕去滓空心

溫服

治附骨疽敗醬湯方

敗醫

貳兩

大黃

剉炒
壹兩

桃人

貳兩

右三味麞擣篩每服五錢匕先取皂莢刺一兩剉碎以水二盞煎至一盞半
漉出下藥及朴消一錢同煎至八分去滓空心溫服

治附骨疽亂髮湯洗方

亂髮灰

半兩

杏人

椎碎
拾壹粒

甘草

剉伍寸

鹽花

半兩

治附骨疽瘡及陰瘡久不差天靈蓋散塗傅方

天靈蓋

酥炙
壹兩

狗骨

燒灰
兩半

白礬

燒灰
兩半

麝香

研壹錢

右四味擣研為散乾傅瘡口日三五上以差為度

治附骨疽天南星散塗傅方

天南星

炮
壹

附子

炮裂去
皮
壹

黃蘖

去麞皮
各半兩

鉛丹

研壹分

麝香

研半分

右五味除麝香鉛丹外擣羅為散入二味和勻乾傅瘡上日三五度
治附骨疽久不差麝香散塗傅方

麝香

研壹分

駢驥竭

研壹兩

蜜陀僧

煅各半兩

右三味細研為散先用鹽湯洗瘡拭乾取活鱈魚一條剉細研揭瘡上一宿
明日揭看有蟲即去再拭乾塗傳散子日三五度即差

治附骨疽內消小豆散方

赤小豆壹合

糯米

炒黑伍合

右二味擣羅為散水調如糊攤故帛上塗貼乾即易之

治附骨疽驥麟竭散塗傳方

驥麟竭

檳榔剉

黃連去法

馬腸根各壹兩

右四味擣羅為散先以油炒葱豉入膩粉半錢和搗捻作餅子一片用鹽漿
水洗瘡後用餅搗瘡上以生帛縛定三日後再用鹽湯洗即塗傳散子日三
五次

治附骨疽久不差骨從瘡口出烏雞散塗傳方

烏雞雞骨燒灰

牛倍木刮燒灰

參家者

右三味合和研細塗傳瘡上日三五度碎骨出即差

治附骨疽久不差或差年歲再發秦艽散塗傳方

秦艽去土苗

右一味擣羅為散塗傅瘡上以帛縛定口二三次

治附骨疽積年發膿骨出不差牛膠散塗傅方

水牛皮膠炙焦

右一味細研為散塗傅瘡上用生鯉魚破開外面貼定時看有小蟲出更以鹽湯洗傅上藥再以魚貼蟲出盡更傅藥

治附骨疽楸葉塗傅方

楸葉陰乾壹兩

豬膽半兩

右二味相和擣爛塗於瘡上封之即差

又方

黃丹

細研

膩粉各參錢研

雞子

伍枚去白用熟黃

右三味先將雞子黃於銚子內以慢火炒令黑候自然為膏瀝於蓋內入黃丹膩粉和勻用時先以米泔煎湯洗患處拭乾用藥傅之妙

又方

新枸杞子自然汁

白礬枯別研

右二味先將枸杞汁慢火熬成煎後入白礬團令堅實陰乾擣羅為末每用

時以甘草水洗之拭乾先唾塗瘡上次用藥末周匝傅之

治附骨疽久不愈及碎骨皆從瘡孔中出者雞骨散方

一歲烏雌雞骨

壹兩
燒灰

三家桐材屑

壹兩
燒灰

三家炊單

壹兩
燒灰

右三味都研令細每用少許內於瘡中碎骨當出即愈

治附骨疽及魚眼瘡方

杏人

伍拾枚
燒為灰

亂髮灰

壹兩

膩粉

分

右三味同研令細入油三合蠟半兩煎攪令勻入瓷器盛淨洗貼之

治附骨疽腫痛有膿久不差天靈蓋散方

天靈蓋

壹兩
燒灰

狗頭骨

半兩
燒灰

白礬

半兩
燒灰
令汁盡

麝香

壹錢
細研

黃連

壹分
去須

黃蘖

分

右六味搗羅為細散入麝香令勻每用先煎甘草湯洗拭乾用生油調塗之

風疽

論曰風疽者本由風濕之氣入於腠理流注血脉凝滯不利攀曲腫起發作瘡疽所以疼痛經久不差者是也蓋風勝則動故其疽留止無常得之醉卧汗出當風風入膚腠客於經絡與榮衛相搏而成

治風毒結腫聚為惡膿瘀血毒壅不散發作成疽五香連翹湯方

連翹

射干

獨活

去蘆頭

桑寄生

木通

升麻

各貳兩

大黃

參兩

丁香

壹兩

木香

沉香

薰陸香

麝香

各貳兩

方

防風

去叉

茈胡

苗

白芷

桔梗

炒

木通

剉

當歸

切焙各半

羌活

去蘆頭

麻黃

去根節煎沫焙

附子

炮裂去皮臍

甘草

炙剉各半

右十味㕮咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服食後臨卧各一如欲出汗空心併兩服後以熱薑稀粥投蓋覆取汗慎外風治熱毒風結成疽腫痛行履不得海桐皮浸酒方

海桐皮

剉

五加皮

剉

獨活

去蘆頭

防風

去叉

乾蠍

炒

右十二味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一盞入竹瀝半合再煎取沸去滓溫服未差再服

治風毒中人留血脉不散與榮衛相搏結成風疽身體煩熱昏冒腫痛防風湯



中国药科大学图书馆藏所有

杜仲

去塵
皮切

牛膝

浸苗培酒

薏苡人

炒各
壹兩

生乾地黃

焙參
兩

右九味麤擣篩生絹囊貯以好酒一斗五升浸於瓷瓶中密封秋夏三日春冬七日開取食前溫酒三合加至四五回不拘時甚者常令酒氣相續

參
中
半

治熱毒風腫成疽日夜熱痛大豆酒方

大豆

緊小者
參升

麻子人

研碎
參升

烏蛇

壹條去頭尾
骨重肆兩椎皮碎

右三味相和令勻就釀內蒸臨熟去釀底湯將好酒一斗五升就釀中淋候酒熱又淋凡七八偏入瓷瓶內密封候冷量性飲之常帶酒氣佳治醉酒汗出風入經絡成風疽麻黃湯方

麻黃

去根
參兩

五加皮

壹兩
半

防風

去
火

獨活

去蘆頭

桂

去
麤皮

當歸

切

芎藭

炮各
兩

乾薑

炮各
兩

附子

生去皮
壹枚

牛膝

貳兩
半

杏人

去皮尖
人
兩枚

右十一味各細剉以水九升先煎麻黃掠去沫內諸藥煎取三升絞去滓每用一盞溫服併三服溫覆微汗慎外風治風毒氣客經絡成風疽秦艽丸方

秦艽

土去

苦參

升麻

黃芩

去黑心

枳殼

麸炒

防風

去火

惡實

肆分

烏蛇

酒浸去皮骨炙

蒺藜子

炒各伍分

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大早晚食後以蒺藜子煎湯下二十九

治酒醉汗出風入經絡久成風疽黃耆丸方

黃耆

剉生

犀角

鋸各參兩

黃連

去須

茯神

去木

當歸

切倍

防風

去火

芍藥

升麻別研

升麻

去黑心各伍分

黃芩

去黑心各伍分

木通

切

甘草

生剉半分

麝香

別研半分

黃芩

去黑心各伍分

木通

切

右十二味搗研為末拌勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空腹生薑湯下食後再服即煎麥門冬湯下

治風疽搔之黃水出大豆汁塗方

大豆

壹升

馬尿

貳升

白蜜

半斤

右三味拌令勻用青竹筒盛實築架在炭火上當中慢燒將資椀兩頭盛取汁先用泔清入鹽少許和溫洗瘡上拭乾後以藥汁塗日三五度

又方

胡麻子

右一味細嚼塗傳疽上以綿裹縛之日三兩上以差為度

甲疽

論曰足三陰經皆起於足氣血沮而不行潰於指甲之間能成甲疽凡以經絡之所流注非特肌肉之病也故或得於剪甲傷肌或得於中長侵肉或得於屢駕之不適使血氣沮遏不通故腐潰為疽久則浸淫爛指上引於腕膝之間而瘡疤者是已然病在四末不必治其內惟塗傳滌濯去惡而除穢及適其行履則愈

治甲疽日夜倍增赤肉生甲邊裏甲者蘭姑膏方

大毒如二十九空鄭主醫書

蘭姑

黃耆

兩貳

豬脂

斤半

右三味先㕮咀如豆以苦酒浸一宿與豬脂一處微火上煎取三合絞去滓以塗瘡上日三兩度其赤肉即消散

治甲疽腫爛生脚指甲邊赤肉努出時差時發方

雄黃

半兩

蛇蛻皮

燒灰壹分

右二味同研如粉每用先以溫泔洗瘡令軟以尖刀子割去甲角拭乾以藥傅之用軟帛裹之半日許藥濕即易之一日即除其痛便止

治甲疽及諸癰疽惡瘡有肉息豬蹄湯方

豬蹄壹隻
生者

白芷

狼牙

芍藥各貳兩

黃連

黃芩

大黃

獨活

各貳兩

右八味㕮咀如豆先以水三升煮豬蹄水至一升二去蹄後入藥更煮至五升候溫洗瘡日三度

治甲疽努肉裏甲膿血疼痛不差乳香散傳方

乳香研

膽礬燒灰研

右二味等分再同研極細時時傅之大凡此疾須是剔去甲不癧亦愈或已成瘡久不差即用此方

治甲疽綠礬散傳方

綠礬貳兩

右一味熨斗內以炭火燒令通赤去火研令極細先以鹽湯洗瘡拭乾旋傅瘡上將軟帛裹縛如瘡急痛即以酥塗瘡上令潤日三五度用

治甲疽努肉疼痛膿血不止石膽散傳方

石膽半兩

右一味煅過細研傳瘡上日三兩度

治甲疽白礬散傳方

白礬

燒灰
壹兩

麝香

盧會

蚺蛇膽各半分

右四味合研極細先以漿水洗瘡拭乾傳之日三兩上以差為度
治甲疽多年不差努肉膿血疼痛烏梅散傳方

烏梅

燒灰
拾枚

右一味研為散傳瘡上日三易

治甲疽黃耆散傳方

黃耆

剉

蛇蛻皮

炙令焦
各壹兩

右二味擣羅為散傳瘡上日三五度

治甲疽馬齒散傳方

牆上馬齒菜

陰乾
壹兩

木香

丹砂

研

鹽

研細各
壹分

右四味除丹砂鹽外剉碎拌令勻於熨斗內以炭火燒過取出細研即入丹砂鹽末再研勻旋取傳瘡上日三兩度

癰疽

論曰字書凡字從票皆有疾轉之義瘰疽為病毒發疾轉不旋踵而害人故其字從票音同於飄風之飄治之不可稍緩也古人謂人受惡風入於肌肤變成斯病蓋厲氣蘊伏初未知覺毒鬱既發則若火之熾烈不可嚮通是以其狀隱小而深實黯黑而不明其痛復應於心毒氣已深故其證如此惟痛取利可以僅存欲頓飲藍青升麻葵根竹瀝之類以沃其熱毒甚則斷指割肉灼肌以除之凡以毒氣疾轉稍緩則入藏故也

治療瘰枳實湯方

枳實

炒

射干

升麻

生乾地黃

焙

黃芩

去黑心

前胡

去蘆頭

犀角屑

大黃

剉

甘草

炙剉

各二兩

右九味麞搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓入麝香半字攬勻空心

溫服日三

治療瘰初覺宜速取利犀角丸方

犀角屑

壹兩半

大黃

剉

黃芩

各參分

防風

去

人參

當歸

切

黃耆

剉

梔子人

各

黃連

去須

乾藍

甘草

炙剉半兩

巴豆

拾

或研皮心去

蘿蔴門

右六味搗羅為散每服一錢匕空心溫酒調服日再加至二錢匕

治療疽浸淫多日漸長大黃連散方

黃連去須
壹兩

胡粉

甘草炙
剉

蘭茹各半
兩

右四味除胡粉外搗羅為散入胡粉令勻塗傅瘡上日三五度

治療疽丹砂膏方

丹砂細
研

犀角屑

射干

大黃炒
剉

芎藭

黃芩去黑
心
半斤

升麻

前胡去蘆
頭
半分

沉香

木香各半
兩

豬脂貳斤
半

生地黃貳
兩

麝香

研

右十三味除丹砂麝香豬脂外剉碎以醋半升和勻浸一宿先熬脂令沸次下諸藥煎候地黃赤黑色以綿絞去滓入丹砂麝香末以柳籠攪勻瓷器盛傳患處日三五上又取棗大以溫酒調下空心日午服

治療疽熾甚消毒散方

藜蘆

大黃剉
炒

黃藥去麤
皮

黃連

當歸

甘草各半
壹

右六味㕮咀如麻豆以水一升煮至五升去滓浸淋瘡處即差

治療疽方

竈室塵

竈突中墨

竈金下土各一升

右三味以水九升煮三沸取汁以洗瘡口三四度

又方

胡粉

貳兩

青木香

滑石

龍骨

各半兩

米粉

壹兩

右五味搗羅為細末稍以粉瘡上日三治癩疽著手足肩背忽發累累如赤豆剥之汁出者方

麻子

不以多少

右一味細研用水煎取沫摩於瘡上即差

治癩疽潰後皂莢散方

皂莢

貳錢去皮子燒為灰

右一味細研為散用鹽湯洗瘡令淨乾摻傅日三

治癩疽似癰小異去膿明日還滿血如小豆汁者芸薹熨方

芸薹葉

不拘多少

右一味爛搗炒熱以布袋二枚盛更互熱熨之冷即換冬用乾者又將甘草湯洗瘡令淨乾以黃藥末塗傅熨了即用以差為度

終

大德重校聖濟總錄卷第一百三十

癰疽門

癰疽潰後蝕惡肉

論曰癰疽已潰久而良肉不生者由氣血未平惡肉有以害之也惡肉雖得於風氣外搏亦以餘毒未盡故死肌敗壞侵蝕良肉治宜以藥蝕去之治發背癰疽及諸惡瘡生惡肉麝香膏方

麝香

研

雄黃

研

真珠

研各量

豬脂

用量

右四味研勻鎔豬脂調如糊塗傅惡肉上日再

治癰疽諸瘡惡肉藜蘆散方

藜蘆

去蘆頭研各分

鴟茹

兩各半

馬齒礬

研

石硫黃

研

雄黃

研

麝香

研各分

右六味除研者外搗羅為散再和勻每用少許傅瘡日三五次以惡肉盡為

度

治癰疽瘡大黃蝕肉膏方

大黃

附子

皮裂去

莽草

芎藭

雄黃

研

雌黃 研

真珠 研

白礬 研

黃芩 去黑

蘭茹 各壹
兩 半 斤

豬脂 貳
斤

右十二味除研者并豬脂外剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候赤黑色綿濾去滓下研者藥攪勻傾出資器盛每日塗瘡日三五次以惡肉盡為度治發背癰疽及惡瘡不生肌肉敗壞其色黑蝕惡肉白礬散方

白礬 研 半
兩

蘭茹 末
壹
兩

膩粉 研
壹
分

雄黃 研

當歸 末
各
壹
兩

右五味合研勻取少許傅瘡日三次

治癰疽瘡蝕惡肉疏黃散方

疏黃 研

馬齒礬 研

蘭茹 末

丹砂 研
各
半
兩

麝香 研
壹
錢

雄黃 研

雌黃 研

白礬 研
半
兩

右八味合研勻每用少許傅瘡日三兩次以惡肉盡為度

治癰疽敗壞生肉生地黃膏方

生地黃 肆
兩

辛夷

獨活 去蘆
頭

當歸 切

大黃

芎藭

黃耆

白芷

芍藥

黃芩 去黑
心
各半
兩

續斷 壓
兩

豬脂 貳
斤

薤白 貳
半
兩

右十三味除豬脂外並剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷赤黑色以綿絞去滓資合盛塗瘡日三兩次

治癰疽始作便壞熱毒發瘡羊髓膏方

羊髓

壹
兩

甘草

胡粉

各貳
兩

大黃

壹
半

豬脂

壹
斤

右五味除羊髓豬脂胡粉外剉碎先熬羊髓豬脂令沸下甘草大黃煎令赤黑色綿濾去滓下胡粉攪令勻資合盛每用塗傅瘡日三四次

治癰疽敗壞生肉莽草膏方

莽草

當歸

薤白

黃芩

去黑
心

甘草

白芷

大黃

續斷

各壹
兩

豬脂

貳
斤

右九味除豬脂外剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷赤黑色以綿絞去滓資合盛塗瘡日三次

治癰疽惡肉瘡蝕盡生肌芍藥膏方

芍藥

大黃

黃耆

獨活

去蘆
頭

白芷

當歸

各壹
兩

薤白

兩

生地黃

壹
推碎
半

豬脂

壹
斤

右九味將八味剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷赤黑色綿濾去滓每取

少許塗傳瘡日三五度

治癰疽發背後生肉膏方

生地黃壹斤

辛夷貳兩

獨活去蘆頭

當歸焙

大黃炒

黃耆剉

芎藭

白芷

芍藥

黃芩去黑心

續斷各壹兩

薤白伍兩

右十二味㕮咀以臘月豬脂煎膏傳瘡立差

治癰疽發背去惡肉麝香膏方

麝香研

雄黃研

白礬燒枯研

蘭茹各壹兩

右四味搗研細羅為末以豬蹄煎膏調如泥傳之惡肉盡為止

癰疽大小便不通

論曰癰疽之人經絡壅閼氣血結聚榮衛津液因以虧燥邪熱內鼓流注於大小腸氣不疎通故大小便俱不通治法宜通其閉塞導去邪毒使勢無深入穿通腑臟茲治之要也

治發背一切惡瘡及乳癰結聚腫硬熱痛臟腑餘毒閉滯可服通泄調氣解毒木香丸方

木香

檳榔

芎藭

羌活

大黃

大黃

附子

炮裂去
皮臍

人參

各半

枳殼

去瓢
炒參

牽牛

壹兩半

陳橘皮

湯去
焙半兩

右十味擣羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大以資合內盛之每日空心粥飲下三十九通利一兩行如不利加至四十九五十丸以通疎為度甚者夜卧時更服二十五丸

治發背諸癰腫丹石藥毒頭痛壯熱大小便不利玄參丸方

玄參

壹

升麻

梔子人

黃芩

去黑心
各半兩

黃耆

細剉
參分

大黃

剉炒

吳藍

兩半

犀角

鋸屑

木通

剉貳

連翹

分

朴消

研

壹

右十一味先以十味擣羅為細末再同朴消研勻鍊蜜和丸梧桐子大每日空心米飲下十五丸如不利加至二十九取快利三兩行為度瀉下膿化為黃水即差

治年未及四十氣血強壯常苦癰疽無定大小便不通五利大黃湯方

大黃

炒剉微

升麻

各貳

黃芩

去黑心

梔子

拾枚

右四味麞擣篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓下芒消一錢匕空

心溫服快利三兩行為度未利再服

治癰疽瘡發大小便秘澁不通朴消丸方

朴消研

大黃炒剉

杏人湯浸去皮尖
雙人炒研

草薢子微炒各
兩半

右四味先以三味搗羅為細末入朴消和勻鍊蜜為丸如梧桐子大每食後煎黃耆湯下二十九以通利為度未利再服

治表裏俱熱三焦不通發背疽瘡及癰癧大小便不利山梔子湯方

山梔子人拾伍
枝

大黃剉微
兩

黃芩去黑心
壹兩半

知母焙

甘草炙剉各
壹兩

右五味麌搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓下芒消一錢匕空心溫服日再

治發背癰疽及乳癰毒氣攻臟腑大小便不通木通湯方

木通剉

黃芩去黑心
各壹兩

山梔子去
皮

漏蘆根

土瓜根

大黃炒剉

甘草炙剉各
參分

右七味麌搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓下朴消一錢匕再煎三兩沸空心溫服未利再服

治癰疽取利下後熱微退小便不利小麥湯方

小麥參合

人參

甘草剉

芍藥

石膏碎

生乾地黃焙

黃耆細剉

木通剉

升麻

黃芩去黑心

前胡去蘆頭各半兩

麥門冬去心培參分

桂皮去麤

赤小豆

芎藭

右十二味麞擣篩每服五錢匕用水一盞半入竹葉七片大棗二枚擘破同煎至一盞去滓空心溫服日晚再服
治發背癰疽排膿止痛利小便瞿麥散方

瞿麥穗

芍藥

桂皮去麤

赤小豆

芎藭

白斂

黃耆細剉

當歸切焙各半兩

麥門冬去心壹分

右九味擣羅為細散每服二錢匕溫酒調下空心日晚各一服

諸癰疽托裏法

論曰癰疽諸瘡氣血虛微肌寒肉冷膿汁清稀毒氣不出瘡久不合或聚腫不赤結鞭無膿外證不見者並宜托裏邪氣外散膿汁早成毒有所泄而不內攻

也

治癰疽諸瘡潰後膿出多內虛托裏黃耆湯方

黃耆

細剉

白茯苓

去黑皮

桂

去麌皮

麥門冬

去心培

當歸

切

人參

甘草

炙

遠志

去心各壹兩

五味子

壹兩半

右九味麌搗篩每服四錢匕水一盞半煎取一盞去滓溫服不計時候日二治發背癰疽久冷不差托裏生肌芎藶散方

芎藶

貳兩

黃耆

細剉壹兩

白芷

半兩

赤芍藥

壹兩

桂

去麌皮三分

人參

丁香

當歸

切培各半兩

右八味搗羅為細散每服二錢匕粥飲調下空心日晚再服以差為度治癰疽發背膿血穿潰疼痛托裏止痛當歸湯方

當歸

切培

黃耆

細剉

人參

各壹兩

桂

去麌皮

赤芍藥

甘草

剉炙

生乾地黃

培各分

二夜一

治發背癰疽一切瘡腫托裏排膿木香散方

木香

黃耆

細剉細

白歛

木占斯

芎藶

當歸

切培

細辛

葉剉細

桔梗

炒

赤芍藥

檳榔

剉生

敗醬

甘草

桂皮

羌活

白芷

右十五味搗羅為細散每服二錢匕甘草煎酒調下空心午時日晚各一服
以差為度

治一切瘡內托散方

甘草

炒

人參

甘菊花

壹半生
壹半炒

玄參

各壹
兩

右四味搗羅為細散每服二錢匕煎菜荳湯調下
治諸瘡熱退膿不止托裏內補防風散方

防風

去叉

白茯苓

去黑
皮

白芷

桔梗

炒

遠志

心去

甘草

炙

人參

芎藭

當歸

培切

黃耆

剉各
兩

附子

炮裂去
皮

厚朴

去蘆皮
蜜汁

赤小豆

酒浸壹宿
半升

桂半兩

去蘆皮

右十四味搗羅為細散每服一錢匕溫酒調下日二夜一
治癰疽潰後膿血太多托裏除虛熱黃耆茯苓湯方

黃耆

剉細

麥門冬

去心
各參
兩

芎藭

白茯苓

去黑
皮

桂各二兩

去蘆皮

五味子

武兩
半

癰疽門

右六味蠶搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑棗煎取七分去滓溫服不拘時候

治癰疽托裏六倍散方

黃耆

細剉壹兩
分膿多倍之

赤小豆

參分口乾倍之

芎藭

半兩若生倍之

白斂

參分瘡口不合倍之

桔梗

去皮參分便不利倍之

當歸

切焙壹兩若疼倍之

右六味搗羅為細散溫酒服方寸匕日三夜二凡癰疽大堅者未有膿半堅半有膿當上薄皮都有膿便可破之所破之法宜下逆上破之令膿易出膿深難見上肉厚宜火針之若外不別有膿可當上按之内便隱痛中央堅者未有膿按之更疼於前者已熟也

治癰疽內攻五臟煩悶不安排毒托裏五香散方

沉香

剉

乳香

研

丁香

木香

藿香

各壹兩

右五味以四味搗羅為細散入乳香和勻先以清酒五升黃耆五兩寸截餅內封閉浸一宿旋取一盞微溫調下一錢匕日三夜二不可犯鐵器治癰疽日漸漸長內塞散方

熟乾地黃

培續斷

人參

芍藥

附子

炮裂去皮臍

枳殼

去瓤
炒

甘草

炙

芎藭

細辛

去苗

桂

去麌皮
各壹兩

檳榔

剉壹
兩半

黃耆

剉

當歸

切培各
兩

蜀椒

去目并合口
者
炒出汗半兩

肉蓯蓉

酒浸切分

右十五味搗羅為散每服三錢匕空心溫酒調下日再服

治諸癰疽疎轉後宜補虛助氣飲方

黃耆

剉貳
兩

人參

白茯苓

去黑
皮

甘草

炙

五味子

芎藭

剉

獨活

去蘆
頭

桂

去麌
皮

青橘皮

湯浸去白
各壹兩

麥門冬

去心
培

杏人

去皮尖
雙人炒黃

熟乾地黃

培各壹
兩半

右十三味麌擣篩每服五錢匕水一盞半生薑三片大棗二枚去核煎至八

分去滓不拘時溫服

治癰腫瘡癥排膿連翹飲方

連翹

防風去
叉

玄參

白芍藥

薺芭

黃芩

去黑心
各貳兩

桑根白皮

剉炒貳
兩半

前胡

去蘆
頭

人參

甘草

剉
炙

桔梗

炒

白茯苓

去黑
皮各壹
兩

黃耆

剉肆
兩

右十三味麌搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓溫服日二

癰疽等瘡內消法

論曰治病必先求其本而後治其標癰疽諸瘡雖發於外而本乎中熱之所出始覺經絡壅滯氣血悶鬱有瘡疽之證則熱氣初作榮衛未礙肌肉未腫脹而未腐之時特可疎濬風熱通導而去之逮其毒氣已結則不可論內消法恐誤毒不出反以內攻適所以傷之先後遲速之用不可不審

治發背癰疽腫毒痛苦不可忍者內消散方

車螯

壹枚背上紫色光厚者是用黃泥裹定火煅通赤放冷去泥搗為末

右一味以枯櫻一枚打碎用酒一椀於銀石鍋內慢火熬及一盞瀝去滓入
膩粉一錢匕同以酒調晚後服之取下如魚涎為驗

治發背癰腫腸癰乳癰一切毒腫內消化毒犀角丸方

犀角屑

壹兩半

升麻

切

黃芩

去黑心

大黃

炒剉

防風

去叉

人參

切

當歸

焙

黃耆

剉

藜蘆

去蘆頭

黃連

去須

甘草

炙

梔子

人各半兩

巴豆

拾貳粒炒令黃細研

右十三味除巴豆外搗羅為末入研了巴豆和勻鍊蜜為丸如梧桐子大每
日空心粥飲下五丸以利為度未利加至七八丸利下黃沫惡物為効

治瘡腫久不愈內消散方

皂莢刺壹兩
為末

乳香研貳
錢

右二味末和勻每服二錢匕酒一盞煎七分溫服其毒內消或微利是効大治瘡癩癰腫內消漏蘆煮散方

漏蘆去絲
半

白斂

黃芩去黑心
半

麻黃去根節
半

白薇洗
半

枳實炒
半

升麻

芍藥

大黃炒
半

甘草炙各
半

右十味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至七分溫服
治癰疽始發未變膿令內消花藥石散方

花藥石火煅
半

黃蜀葵花

龍骨研去土
半

烏賊魚骨

甲子人去梔子人

草龍膽去土
半

鬱金剉
半

胡粉

大黃剉各
半

右九味搗羅為散量多少以津唾調成稀膏傅之頰以唾潤日一易
治諸癰腫初發及火灼乳癰令內消乳香散方

乳香半
兩

水銀粉壹分
半

黃檗壹兩
半

白及壹分
半

白斂

鉛丹

大黃各壹
半

右七味搗羅為細散水調貼之有膿時乾摻



治癰疽發背一切熱毒氣結腫疼痛腑臟壅滯踝轉枳殼丸方

枳殼

去瓢
炒

青橘皮

去白
焙各半兩

牽牛子

炒共參分壹半生壹半

木香

壹分

甘草

炙

大黃

剉炒壹兩各

皂莢

不
升
浸
按
取
汁
絞
瀝
去
澤
壹
大

右七味除皂莢外搗羅為末先以皂莢汁於火上煎成膏即入藥末搜和為丸如梧桐子大空心服二十九葱茶下以利為度未利再服

治癰疽內消防風散方

防風

去叉

升麻

白欵

黃芩

去黑

豬苓

皮去黑

黃耆

剉

瞿麥穗

各壹兩各

薏苡仁

壹兩半

當歸

切

甘草

炙各半兩

右十二味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下日晚再服

治癰疽內消升麻湯方

升麻

甘草

大黃

炒

黃芩

去黑

當歸

焙

枳殼

去瓢
炒各壹兩

右七味麞搗篩每服五錢匕以水二盞煎至一盞去滓空心溫服日晚再服
治癰疽已成膿水內消木占斯散方

木占斯

桂

去
皮

人參

細辛

葉

敗醫

乾薑

炮

厚朴

去
皮

防風

去
根

桔梗

炒
剉

甘草

炙
各
兩

人參

去
皮

細辛

葉

敗醫

右十味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下食前服未成膿即去敗醫一味治癰疽始作赤焮熱長甚速木香搭方

木香

去
皮

犀角屑

各
一
錢

大黃

去
黑

升麻

心

黃芩

去
黑

射干

心

黃芩

去
黑

地黃汁

伍
合

黃藥

去
皮

紫檀香

去
皮

甘草

去
皮

羚羊角屑

各
一
錢

白斂

各
一
錢

芒消

各
一
錢

射干

心

麝香

研
八
分

右十六味㕮咀以水二升煮取一升用故帛兩重內湯中蘸搭腫上乾即又蘸搭之日夜數百度

治腫毒癰疽未潰令內消已潰令速愈草烏頭散方

右取草烏頭末水調雞羽掃腫上有瘡者先以膏藥貼定無令藥着人初塗病人覺冷如水瘡乃不痛

治一切癰疽瘡癧焮腫未穴先疎通臍腑牽牛子散方

牽牛子

貳兩
生薑半
炒半兩

木香

青橘皮

湯浸去
白焰去

陳麴

炒各半兩

右四味搗羅為散每服三錢尤五更初以生薑茶調下至天明通轉三兩行

自止後以薤白粥補之

一切癰疽諸瘡膏藥

論曰諸瘡之證成腫或潰或鞭或久不差者皆藉以膏劑去壞腐排惡汗化死

肌生良肉者正以此也附方于後

治一切瘡腫及傷折雲母膏方

雲母

消石

細研

甘草

各肆兩

槐枝

柏葉

柳枝

桑根白皮

各貳兩

菖蒲

桔梗

防風

桂皮

去麴

蒼朮

厚朴

去麴

菖蒲

高良薑

黃芩

去黑心

茈胡

去麴

厚朴

去麴

松脂

蜀椒

去目并口者

芍藥

龍膽

白芷

白及

白欵

黃耆

芎藭

白茯苓

去黑皮

夜合花

附子

去皮鹽半兩

鹽花

人參

當歸

培切

木香

驥麟竭

沒藥

麝香

乳香

各半
兩

橘皮

去白
壹兩

鉛丹

壹拾
肆兩

水銀

貳
兩

右三十九味依次第用各麞剉勿令太細免煎易焦黑先以清油四十兩於鑕內鍊令香熟下雲母用柳籠不住手攬候十數沸即以罩籬濾出次下消石亦準前法次下柏葉焦黃色為度亦濾出一味味煎相次下柳槐枝次下鹽花及人參諸藥候藥盡後提鑕離火候微冷以綿濾過再入鑕內便下鉛丹急以柳籠子攬須臾色變即止却將鑕火上加火煎之色黑稠以柳籠取少許滴於水上凝結不黏手是藥已成先須炙一瓷器令熱即傾藥在內候膏藥如人體溫方入麝香仍以絹袋子盛水銀以手彈膏藥上如鍼頭細再以柳籠攬勻此是養藥母也如人收此藥防身以蠟紙裹不令風乾可三十年並無損動若發背先以敗蒲二斤用水三升煮三五十沸將蒲湯洗瘡拭乾貼藥又以藥一兩分為三服溫酒下未成膿者立差乳癰瘰癧骨疽毒穿至骨者用藥一兩分作三服溫酒下甚者即瀉出惡物兼外貼差腸癰以藥半兩分為五服用甘草湯下未成膿者當時便消已成膿者膿隨藥下膿出後每日酒下五丸如梧桐子大膿止即止風眼貼兩太陽穴一切惡蟲咬外貼留瘡口發腦發鬚鬚發眉發耳臍癰牙疼並外貼腎癰馬陸傷筋骨疼不

可忍者但以酒下半兩老少臨時加減外更膏藥包裹當時痛止箭頭在內不出者外貼每日喫少爛菜豆箭頭自出虎豹所傷先以甘草湯洗然後貼膏每旦換不過三貼狗咬蛇咬外貼又以生油下十九如梧桐子大難產三日三日不分免者溫酒下一分血運欲死以薑汁和小便半升溫酒下十九死胎在腹以榆白皮湯下半兩小腸氣炒鹽香子溫酒下婦人血氣當歸酒下中毒藥者洗襪酒下各一分許中毒之人即吐瀉出惡物差一切腫癰瘤贊藥利即差只忌羊血

治一切瘡腫保安膏方

- | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 當歸 <small>切培</small> | 附子 <small>去皮臍</small> | 芎藭 | 防風 <small>去叉</small> | 白斂 |
| 升麻 | 細辛 <small>去葉苗</small> | 側柏 | 草薢 <small>各一兩</small> | 桃人 <small>去皮</small> |
| 甘草 | 桑根白皮 | 垂柳枝 | 白芨 | 黃耆 |
| 白芷 | 白僵蠶 <small>各半兩</small> | 鉛丹 <small>研伍兩</small> | 雄黃 <small>研</small> | 麝香 <small>研</small> |
| 硫黃 <small>研各半兩</small> | 杏人 <small>去皮參分</small> | 丹砂 <small>研壹分</small> | | |

右二十三味㕮咀以麻油二斤於新瓷器內浸藥一宿次日內鎔中文武火鍊候稀稠得所以綿濾去滓入雄黃鉛丹丹砂麝香硫黃等物再煎須臾息火別

入黃蠟四兩凝藥候稍過傾入熱瓷器內盛之勿令塵汚發背酒調兩匙日兩
服外貼二日一換瘰癧瘻瘍瘡風腫乾癬癩癬腎癬濕癬發癢發腦發牙
蛇蟲咬皆貼之折傷筋骨酒服半匙箭入骨貼之自出喉閉含之即通難產
并胎死腹中並酒化下半兩血氣衝心生薑自然汁加小便同煎溫酒化下
一匙但諸惡瘡數年不痊者以鹽湯先洗然後貼之

治一切惡瘡瘰癧瘻瘍瘡風灸瘡湯火瘡閃撲損烏犀膏方

白芷

板藍根

苦參

芎藭

并細剉各
壹兩半

鉛丹

陸

清麻油

壹拾
兩

右六味先將油并前四味藥用慢火同煎令藥焦黑用綿濾去滓再入鍋內
亦用文武火煎沸下鉛丹在內用柳木篦子攪勻滴水內成珠為度即傾在
資器內密收如用以無灰紙攤貼所患處

治一切瘡腫紫金膏方

皂莢

不艸者
挺去皮
壹

葱

伍莖去根
煎令焦黃以
綿濾去滓
內

鉛丹

研肆

團粉

研肆

松脂

研貳

右五味用清油半斤先煎前二味去滓次下鉛丹又下團粉松脂以柳木篦

卷二十三
不住攬滴水中成珠為度隨瘡大小貼之

治一切惡瘡腫烏金膏方

麻油

壹斤

鉛丹

肆兩
月陸兩
冬蠟兩

頭髮

雜子大
壹圓

右四味先炒鉛丹令黑即下油及髮以柳木篦不住攬滴水中候可丸即止便下蠟更煎蠟銷後即盛資器內隨瘡大小貼之

治一切瘡腫傷損湯火燒摩風止痛痒用薄絹攤貼之口瘡含化一豆大風毒氣眼臉赤爛疼痛不可忍者用藥塗之口面風癬以藥塗擦熱徹為度耳鼻中肉鈴用紙燃點一豆大一月取下並不疼痛仍除瘢痕退黓黯等神應膏方

桔樓

壹枚
去皮

零陵香

藿香

芍藥

甘草

黃耆

半壹兩

清油

陸丙

杏人

去皮各壹分

白芷

參分

龍腦

麝香

并研各壹錢

黃蠟

半兩

右十二味除龍腦麝香外並細剉於臘日用油浸七日却出藥將油鍊令香熟放冷秤六兩却再入諸藥煎令黃用夾絹袋瀝去滓再入鍋內旋旋下蠟攪勻滴水中成珠即止去火候溫入龍腦麝香打勻傾出熱資合內依前病用之

治一切惡瘡三仙膏方

麻油兩

鉛丹

定粉各研
壹兩

右三味先鍊油熟將鉛丹定粉同羅過同煎用槐枝攪勻候稀稠得所滴水內如珠即止每用隨瘡大小貼之

治一切癰腫瘡癤乳香膏方

清油斤

皂莢伍握去皮剉

壹

葱白伍握剉

壹

當歸壹

兩

鉛丹

桂心錢

壹

團粉各陸
兩

右九味先將清油於銚子內慢火煎熱入皂莢葱白桂心以前令黃赤色濾去滓後下松脂乳香沸下粉鉛丹當歸同熬成膏滴在水碗中成珠子於資合內盛以故帛上攤每日早晚換之

治一切癰疽發背疼痛不止木通膏方

木通貳

壹兩

黃丹伍

兩

細辛壹

兩

茵陳壹

兩

琥珀半

兩

朱砂貳

細研兩

清麻油拾

兩

右七味先煎油令沸即下細辛木通茵陳煎五七沸去滓即入琥珀朱砂末更煎用柳木篦攪候滴於水中成珠子膏成收於資合中每用攤膏於故帛上

貼日二易之

治一切癰疽發背疼痛不可忍丁香膏方

丁香半兩

麻油一斤

黃丹一兩

丈夫頭髮一兩
蠟一錢

桂心半兩

當歸半兩

未

右七味先鍊油令香下髮煎令髮盡次下蠟以綿瀝過却入鑄中下黃丹不
住手攪候色黑滴在水內如珠子即下丁香桂心當歸等末攪令勻以資合
盛用故帛上攤貼日二易之

治一切癰疽發背日夜發歇疼痛不止胡粉膏方

胡粉肆兩

油半斤

蠟貳兩

乳香半兩

細研

麝香壹錢

沒藥半兩

細研

半兩

麝香半兩

細研

麝香壹錢

右六味以文火煎令油熟下胡粉後下蠟臨成下麝香乳香沒藥攪勿住手
待似星花上來即住以資器內盛於故帛上塗貼日二易之
治一切癰疽發背潰後肌肉不生宜用此排膿生肌神効膏方

當歸兩

白芷半兩

乳香參分

松脂壹兩

細研

麝香壹錢

白斂半兩

緋帛灰半兩

亂髮灰半兩

甘草半兩

細研

黃丹半兩

木鼈子參拾枚去殼

杏人壹兩湯浸去皮尖雙人

木香壹半

黃蠟貳兩

麻油貳升

皮尖雙人

右十五味先取油安鑄內鍊令香熟將八味藥細剉下油中浸一宿以文火煎白芷色黑赤瀝去滓下松脂蠟乳香緋帛髮灰等更煎令消以綿瀝去滓入鑄內下黃丹不住手攪變黑光色滴在水中為珠子膏成用資器盛每用以故帛攤貼日二易之

治一切癰腫潰後肌肉不生宜用此排膿生肌乳香膏方

乾死鼠壹個形者

大黃壹兩

乳香半兩

杏人半兩去皮尖

雞子黃壹兩

亂髮如雞子

鉛丹陸兩

蠟兩

水銀半兩

油壹斤

右十味先熬油令沸下亂髮並鼠大黃煎候鼠焦色綿布絞去滓再下鉛丹蠟杏人煎以柳葉攪令黑色即下雞子黃水銀乳香等攪令勻滴水中成珠得所以資合盛用故帛攤貼

治一切惡瘡發背毒腫烏金膏方

油半斤

鹽花壹兩

黃蠟參兩

柳枝剉兩

右四味先熬油令沸下柳枝煎候焦黃漉出綿布絞去滓再煎下蠟鹽花以
柳籠攬令稀稠得所以資合盛用故帛上攤貼若三日内未成膿便消已成
膿頭未破者即潰不須鍼灸其瘡變痛成痒是藥力也色如猶皮孔濶濶有
黃水若是惡瘡發背用藥貼出膿血及黃水赤小豆汁貼膏令出盡以差為
度

治一切瘡癆腫毒至聖膏方

夜合花白皮 蒴蘆

大黃

當歸

白斂

槐白皮

白芷

細辛

去葉苗

杏人

天麻

芎藭

槐枝

柳枝

敗龜

虎骨

附子

去皮臍各半兩

乳香

細研壹兩

麝香

細研貳錢

砒霜

細研半分

自然銅

細研壹分

膩粉

研半分

牛黃

細研貳錢

定粉

研半分

鉛丹

拾貳錢兩

清油

貳斤半

右二十五味除研藥丹粉外細剉先熬油令沸次下諸藥煎候白芷赤黑以
綿絞去滓再煎下丹柳籠攬候變黑色滴水中成珠輒鞏得所次下乳香等
研藥更攬令勻次資合盛發背魚臍瘰疬並以膏貼日二上以差為度
治一切瘡毒無名異膏方

治一切瘡毒無名異膏方

無名異細研

駢鱗竭細研各

柳枝剉參

蠟壹

鉛丹伍兩

油拾貳

柳枝剉參

蠟壹

右六味先熬油令沸下柳枝煎候赤黑色以綿濾過再煎下丹蠟攪候變黑色滴水中成珠得所下駢鱗竭無名異末更攪令勻瀉冷水中捻作梃子一切惡瘡發背諸毒瘡並宜塗貼以差為度

治諸瘡一切打損腫毒走馬膏方

皂莢去皮者

牙者拾挺椎碎

芫花伍兩

生薑伍兩取自然汁

生地黃壹斤取自然汁

右四味先以米醋一斗入諸藥煎至三升絞去滓再煎以柳籠攪候稀稠得所如膏以資合盛埋地內五日取出以故帛上塗貼日二上以差為度

治一切瘡腫癰毒佛手膏方

清麻油半斤

半斤

鉛丹參

兩

柳白皮兩

兩

皂莢刺肆拾玖

剉

肆拾玖

當歸半兩

半兩

白及壹分

壹分

黃蠟半兩

兩

朱紅壹分

壹分

生紺帛伍寸

灰細研

右九味先熬油令沸下柳皮皂莢刺煎候赤黑色以綿濾過下丹煎以柳籠攪候變黑色即下諸藥未攪令勻滴水中成珠得所以資合盛用故帛塗貼

日二上以差為度

治一切惡瘡癧毒如聖膏方

薔薇根

剉

乳香

研

阿魏

研各
壹兩

鉛丹

陸
兩

柳枝

參兩剉
長壹寸

清油

壹斤

右六味先熬油令沸下柳枝薔薇根煎候黃黑色以綿濾過下丹煎攪候變黑色次下乳香阿魏更攪令勻一切瘡腫並用故帛上塗貼之如患赤眼頭痛眼溢貼太陽兩穴驢傷馬墜婦人血氣並當歸酒下三九如梧桐子大癬瘡先抓破取膏塗貼以差為度

治癰疽及諸種瘡腫應痛膏方

當歸

秦艽

何首烏

敗龜

白斂

白及

白术

白芷

杏人

去皮尖

木鼈子

去殼

芎藭

延胡索

蜜陀僧

研各半兩

杏人黃黑色為度

麻油調兩

熬前藥令

乳香

研

麒麟竭

研

沒藥

研

楓香脂

研各半

分

鉛丹

參

右十八味先用油煎前十三味去滓入後五味再熬用柳枝子攪勻令黑色成膏為度如是發背加附子末一分同熬勻用紙花子貼瘡上

治癰疽惡瘡生肌引膿排毒氣蝕惡肉除死肌雄黃膏方

雄黃

細半兩研

巨勝油

染兩

丹砂

細研

蜜陀僧

蝦半兩研各

鉛丹

參兩

蠟

壹兩

蛇黃

半兩蝦偏搗未淬

牡蠣

參研各

右八味研和令勻先熬油令沸下蠟鎔盡次下丹以柳籠攬候變黑色即下諸藥末攬令勻滴水中成珠子以資合盛故帛上塗貼日二上以差為度治一切瘡腫垂柳膏方

垂柳枝白皮

貳兩剉

葫蘆根

肆兩剉

丹砂

壹分細研

熟雞子黃

壹枚

鉛丹

肆兩

熊膽

半兩研

故青帛

柒寸灰研燒

蠟

壹兩

清油

壹斤

右九味先熬油令沸下柳皮蘚蘿根煎候赤黑色濾出以綿濾去滓下丹蠟煎以柳籠攬候變黑色下四味研藥更攬令勻滴水中成珠子以資合盛用故帛上攏貼日二上腸癰以綿裹半棗許含化嚥津以差為度眼暗捏作餅予以鍼刺作孔三五十箇貼眼上便差耳聾作挺子當中刺為孔塞耳中日二換即差打損取膏塗貼疼痛處以差為度

治發背瘡口未合大聖膏方

當歸

切各兩

柳根白皮

切各兩

桂

剉壹分

槐實

白斂

劉

沒藥

藥皮

去麤皮
脂半斤

到各壹兩用臘月豬

滓再入後藥

去

盧會

兩

鉛丹

研

乳香

研各

麝香

研壹分

右十二味先煎前八味去滓再入後四味熬成膏以瓷瓶盛入地內七七日取出將熟絹片留眼貼膏在瘡口上去盡惡物瘡口自合

治發背癰腫惡瘡楸葉膏方

楸葉

劉拾斤

馬齒莧

劉壹斤

烏犀角末

貳沉香末

壹兩

右四味先取馬齒莧楸葉以水五升煎至一升濾去滓更煎至一升半下二味藥末以柳籠攬候稀稠得所以故帛上塗貼日二上即差

治癰疽瘡癧能舒筋脉消腫毒止疼痛黃耆膏方

黃耆

劉半兩

零陵香

壹分

赤芍藥

劉各

半錢

芎藭

劉

天麻

劉

防風

劉去叉半兩

生乾地黃

劉各壹錢

黃蠟

貳兩

清油

半斤

右九味除蠟外都一處用銀石器內以油浸七日用文武火煎焦黃色以綿濾去滓下黃蠟再煎令蠟化盛於瓷器中每用以軟帛薄攤貼之如皮膚瘻
痒筋脉緊急用少許塗摩尤効

治癰瘡久不差百靈膏方

槐花子炒焦為末

松柏各壹兩

乳香

膩粉各壹分

右四味細研拌勻用清油黃蠟各一兩資器內慢火熬成膏貼之治一切癰瘡及上攻下注風毒瘻瘡疼痛焮腫等疾敗毒膏方

巴豆

碎陸和殼椎兩

麻油拾貳兩

鉛丹

炒令紫參兩

右三味先將油煮巴豆慢火養一二日滴入水中成珠則止濾去滓却將其滓在一長餅內捲起餅一頭令高下以火燒逼得巴豆內膏油流下以器盛併入前藥油內同煎攪勻入鉛丹更熬令色紫去火令冷入資合內密封地孔藏七日出火毒並以故絹攤貼之

治一切癰瘡惡瘡生肌長肉膏方

清油拾兩

龍骨研貳兩

木香

檳榔

黃連

去須味同各參分參細各取

右五味先將油入鍋內慢火熬滴水成珠子下龍骨末更熬如稀膏則止去火候稍溫即下三味藥末不得住手攪候冷以資合內收隨瘡大小貼之治癰瘡發背及一切瘡腫乳香膏方

乳香貳兩

附子生用伍兩

烏頭生用

木鼈子去殼各貳兩

各取



當歸

秦光各壹

紫草

去苗參兩

蘇枋木

剉伍兩

頭髮灰

壹兩

清油

貳拾兩

各細剉入油慢火熬候

諸藥焦黑色為度去滓入後藥

楓香脂

伍兩

松脂

貳兩

黃蠟

伍兩

鉛丹

貳兩

沒藥

壹兩半研

右十五味先煎前九味候色黑去滓次下乳香等六味依次等逐味下用慢火熬用柳木箆不住手攬候熬成膏滴水中成珠為度攤紙花子上看瘡大
小用之

治瘡腫疼痛辟風欽瘡紫金挺方

當歸

續斷

骨碎補

桂去麌皮

附子

澤蘭

芍藥

白及

牛膝

羌活

芎藭

木香

麒麟竭

生乾地黃

白僵蠶

白附子

各壹兩

沉香

丁香各半兩

桔梗

貳枚

烏蛇肉

白欵

白芷

玄參

貳拾參味壹處各壹兩

杏人

桃人

貳味去皮細研各參分

右二十五味都一處入麻油四斤豬脂一斤半野馳脂三兩用文武火鍋內
煎黑去滓再入乳香末三兩松脂六兩更煎烊後又濾去滓細羅鉛丹三斤

別炒令紫色旋入藥油內煎柳枝子攪令紫色去火滴水內成珠即傾入
資器內盛每使時看瘡大小用之

治一切瘡腫烏賊骨膏方

烏賊魚骨去甲

研末

舊船灰研末各

壹兩

鉛丹研參

兩

清油拾貳兩

右四味先熬油令沸下鉛丹以柳木篦攬候黑色即將前二味藥末再攬令
勻滴水內成珠子得所以資合盛故帛上攤貼日二上以差為度

治一切癰疽瘡腫玄參散方

玄參

黃芩去黑心

羊蹄根

芍藥

白芷

丁香

木香

消石碎

半夏湯洗
柒編

白斂

木鼈子去殼

莽草各壹兩

右十二味搗羅為散醋調塗瘡上日三四次腫消為度

又方

甜寧麌半兩

木通半兩

川大黃半兩

剉生莽草半兩

右四味搗羅為細散以水和如稀膏塗腫上乾即更塗以差為度

治一切癰疽發背熱毒猛異攻肌肉赤色腫痛不可忍欲成膿及已成膿并風
毒熱在關節欲結成癰便令內消寒水石膏方

寒水石(貳兩)

羊蹄根

消石(壹兩)

川大黃(壹兩)

白斂(貳兩)

木香(參分)

附子(參分)

去皮臍(壹兩)

丁香(參分)

榆白皮(參分)

莽草(參分)

赤小豆(壹合)

漢防已(壹兩)

半夏(參分)

玄參(壹兩)

甘草(壹兩)

生薑(對生)

右十六味搗羅為細散每用時以生蜜一合地黃汁一合旋調以成膏攤於
生絹上貼乾即易腫消為度

治一切瘡癥癰腫及瘻瘍杖痕等並宜貼不發直至較白膏方

定粉(參分)

清油(肆兩)

取參(兩)

熟

鉛丹(貳錢)

商陸根(參分)

暴

蠟(兩)

白柳枝(半兩)

青白而葉大者

是二月採去蘆

皮(取內白皮切作片子暴乾秤)

右六味先以熟油熬商陸柳枝令色變後入粉蠟丹攪之不住手直至滴
水內為珠子成攤帛上貼之熬時始則色微紅次微青乃熟也取出久而色
白冬色愈白

治諸瘡腫四時可用若未成膿即消已成膿即破木通膏方

春用

木通參

白芷

細辛去苗葉

摩勒香各貳兩

夏用

木通

續斷各參兩

白芷貳兩半

芍藥各貳兩

秋用

木通

薰陸香各參兩

黃耆貳兩

白芷壹兩半

芍藥各貳兩

冬用

木通

薰陸香各參兩

黃耆貳兩

當歸剉焙兩

芍藥壹兩半

木通

薰陸香壹兩

黃耆貳兩

當歸剉焙兩

芍藥壹兩半

摩勒香參兩

薰陸香壹兩

黃耆貳兩

當歸剉焙兩

芍藥壹兩半

右各依四時並咬咀以清麻油二升煎候白芷黃色即去滓絞取油放冷下
黃蠟五兩候消盡更入鉛丹十兩先下六七兩看軟軟得所即止亦不須入
盡十兩以急火煎用柳籠攪勿令住手點物上其色如漆即膏成欲用藥先
嚼少鹽擦瘡上次貼之

治初患癰腫瘡癧熱焮疼痛消腫毒清涼膏方

右搗大黃為末漿水調攤貼之醋摩亦得

又方

右取地龍屎以小便和塗貼之乾即易

又方

右取井底泥塗瘡上乾即易

又方

右搗惡實根貼之乾即易

又方

右搗地黃貼之日再易

又方

右搗馬齒菜貼之乾即易

又方

右搗龍葵菜貼之

又方

右搗車前葉貼之

又方



右搗蔓菁根貼之

又方

右搗雞腸草貼之

又方

右搗芭蕉根貼之



大德重校聖濟總錄卷第一百三十

聖濟經金

卷二十三

十八



南京中医药大学图书馆藏

大德重校聖濟總錄卷第一百三十一

癰疽門

癰疽發腦統論

論曰癰疽者乳石之疾多發於陽部故在背則發府俞之間在頭則發腦以頭者諸陽所會而足太陽之經絡腦故也然腦為髓海精血之所湊而腦戶風府瘻門三穴不可妄行灸刺令人有瘡疽之病灸刺猶不可況癰疽之所發乎古人謂五發之病背腦為重始發皮膚若黍米然亦腫傍焮耳項痛楚寒熱當急治之稍縱不治則毒氣深入銷鑠腦髓化為膿血不可及已故經曰癰疽不得頃時回

發腦

論曰發腦者六府不和經絡否瀉氣血不行壅結所成也此皆藏府蘊積熱毒或乳石發動毒氣上攻於腦發於皮膚頭如黍米四畔焮赤腫鞭偏於耳項寒熱疼痛若不急治毒氣傷於血肉血肉腐壞化為膿水從腦中出血肉既竭必致危殆

治發腦及一切熱毒氣結鞭腫痛通利藏府壅滯大黃丸方

黃耆

細剉
分

木通

剉
丙半

右七味麌擣篩每服五錢匕水二盞煎至七分下朴消一錢匕濾去滓空心溫服日晚再服未愈更入玄參三分去黃耆治發腦瘡腫焮赤腫痛煩躁沉香湯方

沉香

參分

赤芍藥

玄參

甘草

生

麥門冬

去心

升麻

前胡

去蘆頭

大黃

炒
各半

枳實

炒
分

升麻

研壹分

前胡

去蘆頭

大黃

炒
各半

生乾地黃

炮
各半

生地黃

炮
各半

生地黃

犀角

鋸參分

麝香

研壹分

姜蕤

去心

黃耆

細剉
各半

右十四味除麝香外麌擣篩每服四錢匕水一大盞煎至七分去滓再入麝

香少許溫服不拘時

治癰發腦拔去瘡中毒羊桃根散貼方

羊桃根

剉參各半

消石

研各半

凝水石

壹分各半

木杏

各半

天靈蓋

慢火燒絕

白斂

各半

右六味擣羅為散清水調如糊攤於故帛上貼之乾即易痒則差

治發腦始結疼痛妨悶欲成癰疽燙之令內消方

消石

研貳兩半

木通

剉丙半

紫檀香

各半

白斂

各半

甜葶藶

陽紙

莽草各壹

兩

大黃參

兩

右七味擣羅為末每用漿水旋調得所塗於腫上乾即易

治癰疽初生如黃枳實破後如盞底深半寸許乳石散方

花乳石研

赤石脂研

滑石研

爐甘石研

蜜陀僧研

乳香研

壹

右六味擣研為細散未破者醋調傅之已破者即乾貼

治癰疽腫疼發腦發背方

柳樹上白木耳

黃連去

乳香

杏人去皮去核各壹分

鹽花少許

新蔓菁根壹握

如無以菘菜代之不得用隔旬者

蛇牀子少許

右七味擣羅為末似覺有腫以溫水調傅乾即易之

發背

論曰發背者熱毒之氣發於背俞為癰疽是也此內本於五藏外傳諸府故熱氣攻發必生於府俞之間得之乳石發動及肥甘滋味之過藏府壅熱經絡為之不通毒氣凝滯必因俞穴而出是以服石之人於居處衣食嗜慾喜怒尤宜節慎一有過舉則毒氣乘隙而發初如芥粟治之稍緩則盈尺寸而難圖故始

覺熱搏於分肉痛傷於經絡宜速治之蓋其脉不通則腫毒增甚經所謂榮氣不從逆於肉理乃生癰腫是也血敗肉腐為患不一實則為癰浮則為腫深則為疽然發於背者兩胛間初起甚微或痒或痛往往忽之數日遂致不救昔人治此始則度其腫之正中而灸之壯數逾百使惡氣外出次以藥疎利府藏決其邪毒則有可治之理

治發背腫癰疽惡風結膿血連翹散方

連翹子

獨活去蘆頭

木香

射干洛參

甘草

桑寄生炒剉

升麻

雞舌香

沉香

乳香研

大黃

炒剉去頭炒

麝香研

右一十二味麞擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分入淡竹瀝半合去滓空心溫服快利三五行為度未利再服

治發背癰腫消膿桔梗散方

桔梗去蘆頭炒

木占斯

防風去叉

甘草

剉

厚朴去麞皮

敗醬

桂皮去麞

人參

細辛去苗葉

乾薑炮各

右一十味擣羅為散每服二錢匕空心溫酒調下日三以差為度

治初發背上似琴絃抽痛有頭射干湯方

射干

犀角鏗

玄參

麥門冬去心
培

黃芩

去黑心

大黃

剉炒壹兩

各山梔子人

半兩

右八味龐擣篩每服五錢匕水一盞半淡竹葉二七片煎至八分入苦消末一錢匕去滓空心溫服快利三兩行為度未利再服

治初發背上似琴絃抽痛有頭犀角湯方

犀角鏗

人參

黃芩

去黑心

山梔子人

木通剉

連翹

升麻

芍藥絡參

甘草根

大黃

剉炒半兩各

右一十味龐擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治發背乳癰已服利湯後服此麥門冬湯方

麥門冬

去心培

黃耆剉

芍藥

生乾地黃

絡壹

前胡

去蘆頭

黃芩

去黑心

升麻

遠志

去心

桔梗

去皮各分

當歸

半兩內

小麥

壹合

右一十一味龐擣篩每服五錢匕水一盞半棗一枚擘破生薑一棗大柏碎

竹葉二七片同煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治發背人參當歸散方

當歸

人參

蜜陀僧

沒藥

雄黃各半

丹砂一錢

枯樓
赤箇去穎
取子生用

右七味擣研為散每服二錢匕用甘草煎酒放溫調下日三

治五毒發背金星酒方

金星草

和根淨洗慢
大倍乾肆兩

甘草一錢

右一味擣羅為末分作四貼每貼用酒一升煎三兩沸後更以冷酒二升相和入瓶器中封却時取飲之

治發背癰疽一切惡毒瘡腫去毒散方

車蠍

紫脣先厚者
鹽泥固濟煅赤去泥

右一味為細末每服三錢匕入膩粉一錢匕甘草末二錢匕和勻別用枯樓一枚細剗以酒二盞慢火煎及一盞去滓於五更初溫前酒調下取下黏滑惡物即是病根本也

治發背金鍼散方



皂莢

鐵
青時取壹半
黑者

右一味不拘多少暴乾搗羅為散先任意飲食訖用藥三錢匕酒調服之三差未退再服

治發背鉛酒方

黑鉛

壹
甘草

參
炙剉

右二味用酒一斗置一空瓶在傍先以甘草入酒中然後鎔鉛投之却濾出酒在空瓶內取鉛依前鎔投如此九度并甘草去之留酒恣飲醉寢即愈治發背欲結不結四肢寒熱消毒散方

車蠍

壹
兩消者可盛

朴消

兩
歲

右二味以消入車蠍內濕紙裹黃泥固濟麻皮纏之蝦亦候冷去泥同研如麪將絹鋪地薄攤藥末於上盆蓋一食久入乳香地龍末各一分白僵蠶甘草末各半分和勻每服半兩酒調去滓服能飲酒者多與之其滓塗患處一食久即轉下惡物只兩服或消或破別服補藥治發背熱盛速用此止痛藥方

金櫻根洗去麞皮剉擣一盞生甘草半兩同杵用水三椀煎至一椀半入酒

一椀或一盞更煎至一椀又入童子小便一椀煎至八分椀去滓旋入銀盞
內溫服取盡如心中覺逆食少白梅則止次服後藥

大黃生

甘草桂各半

麝香研壹字

木香壹分

丹砂錢研壹

鬼腰帶根

金櫻根半

洗剉各半

右七味都用水五椀煎至兩椀半入酒一椀半更煎至一椀去滓旋入銀盞
內溫服令盡取下惡物如覺差即去甘草大黃餘藥休前分兩入水四椀煎
至兩椀入酒一椀更煎至一椀去滓旋入銀盞內溫服令盡如未差更依前
方合一料服之無有不差者若瘡已破用生肌膏藥貼及捲後藥斂瘡口龍
骨散方

龍骨

煅赤地上去大毒研

赤芍藥半兩為末各

鉛丹一分

胡粉半錢

右四味同研勻細先以葱湯洗瘡後拭乾以藥捲之

治發背瘡如葡萄破後瘡孔無數狼毒膏方

狼毒

藍根

龍膽各半

定風草半兩

乳香錢

水銀粉抄壹

右六味為末蜜調成膏攤帛上貼瘡

治背癰如鐵底又如蒲扇疼痛不止藍根膏方

板藍根

黃芩去黑心

黃連去須

大黃各一兩

白及一分

乳香半兩

右六味搗研為末用新汲水調成膏量大小貼之日四夜二

治一切發背救生膏方

蜜陀僧碎炒

黃檗傍根金州厚者用黃柏一彈子

大吳塗盡為度各貳兩以

膩粉半錢

烏賊魚骨白者去甲半兩以

參味搗研極細

右四味和勻每用新汲水調攤紙上先令患人口溫酸漿水洗瘡然後貼每日一換

治發背疼痛日夜不可忍塗傳大黃膏方

大黃剉

雄黃研

芎藭

黃連去須

白芷

檳榔剉

當歸切

木香

桂皮去麤

黃檗去麤

芍藥

附子臍去皮

乳香研

麒麟竭各半兩

雞舌香

麝香洛壹

豬脂壹斤



右一十七味擣研十六味為末拌勻先於銀器內熬豬脂令沸去筋膜下諸藥末調成膏塗患處日三上以差為度

治發背瘡神金膏方

白及

蜜陀僧研

甘草

黃蘖皮去麌

黃連去須

膩粉各半

麝香研壹

右七味擣研為末用津唾調成膏以無灰白薄紙看瘡大小塗紙上貼之無力即換

治發背金線膏方

楸葉伍斤如無即
用楸白皮剉

馬齒莧貳斤去根切

右二味以水五升熬至一升去滓入鑄內以柳枝攬熬如餳盛在瓷器內先以荆芥湯洗瘡次用雞翎掃藥於瘡上令勻以薄紙貼之更用酒調二錢七服之

治發背癰瘡化毒散方

白礬灰研

鉛丹研

蜜陀僧研

木鼈子各壹

右四味同入瓷合煅赤於冷地上紙襯盆蓋一時辰細研以菜子油調貼其

聖濟經方

卷之二

治發背瘡腫痛牛齒膏方

水牛牙齒研細
赤

太陰玄精石硝壹錢

乳香研壹錢

右三味擣研為末每用絳絹量瘡大小剪以津唾調藥攤絹上貼之
治發背瘡衝破疼痛不可忍麝香散方

麝香研半錢

蒺藜子

紫背荷葉各半兩

右三味擣研為散每量瘡大小臨時乾貼瘡上
治發背生肌肉止痛五倍子散方

五倍子

地龍去土

黃連去須

乳香研各壹分

木香半錢

蜜陀僧

檳榔剉各半錢

右七味擣研為散每用少許乾貼瘡上

治發背熱毒結聚焮赤疼痛消腫解毒金花散方

雌黃研細
參分

黃連九節者半兩

檳榔剉

麝香各半錢

鬱金

大黃各半兩

右六味擣羅四味為散入麝香雌黃同研勻細每取生油調如糊塗患處日



二上即差

治發背五靈脂散方

五靈脂半兩 烏賊魚骨去甲壹兩

右一味擣研為散凡患者初覺時以水調掃腫處如已大作者入醋麪同調傳之

治發背瘡黃石散方

癰黃石如鷺卵大

右一味猛火煅赤投醋中因有屑落醋中再煅再投石盡為度取屑暴乾擣散以醋調傳背上無不愈

治發背成瘡龍葵根散方

龍葵根剉兩瓣研壹

右一味先將龍葵根擣羅為末入麝香同研令勻水調塗於瘡上

治發背癰疽瘡金粉膏方

錫臍兩用板瓦盛炭火安錫在上扇之候錫成灰研末

用炭火煅不間藥氣為度取出放冷

右二味同研極細量瘡大小臨時入臘粉少許以雞子黃調如膏攤在瘡上
以紺帛蓋

治發背癰疽已潰未潰鼓餅炙方

鼓

右一味研細入水和熟如泥量腫大小捻餅子厚三分蓋於腫上鼓餅已有
孔穴勿覆之安艾炷於上灸令溫熱不可破肉痛急易之未潰者內消已潰
者汁出差如不痛一日二日灸之

治發背已結成膿枯樓塗方

生枯樓根

右一味細剉擣研如糊塗之日三五度即差

治發背瘡癰疽桃花汁方

桃花
一杯少少

右一味於平旦承露採取以釀醋研絞去滓取汁塗傳瘡上有蟲即出無花
但桃葉亦得以臘月豬脂和塗亦佳

治發背瘡腫方

治發背瘡腫方

白麪

右一味取泥拌和圍腫四畔令童子七人尿圍中浸腫處即差

又方

新馬糞

右一味厚塗腫上乾即易之亦癩發乳

又方

益母草

右一味爛擣絞汁三合服之滓傅瘡上熱即易之

治發背乳香貼方

乳香研

黃蠟糊

右二味等分同入銚子鎔化瀉入水內斟酌瘡大小取劑再於大上鎔化攤於帛上或紙上貼之不住以手按令着肉為此藥易乾故也一日三易腫消痛止如已有頭欲破者亦漸縮減

治發背麥餅方

大麥

炒熟
兩

甘草

參生用
兩



右二味同為末用加酥少許和勻微有酥氣仍以百沸湯拌和作餅劑方圓大小如瘡腫大熱傅之以油單并故紙密裹勿令通風冷即換之常須啜黃耆米粥甚妙

治發背赤燃疼痛消石搥方

消石

伍

右一味用湯一斗浸消待冷取故青布兩片更互浸搥日三五度治發背神効薜荔散方

薜荔葉

右一味不拘多少陰乾搗羅為散每服三錢匕水一盞煎五七沸溫服更用葉煎湯洗瘡甚妙

又方

荳種甘草等分為末每服二錢匕溫酒調下立差

又方

糯米不拘多少炒熟細研以井華水調塗四面乾即易之

又方

木芙蓉葉自落者經霜然後收之碾末淡醋調於掌上如膏苔色為妙絹帛塗貼瘡上

治諸發背腦疽及一切惡瘡先須用托裏藥使毒氣皆出然後用藥上傳粗工不知便以冷藥傳貼趕逐毒氣投歸于心十死八九世俗謂發背無生人殊不知初覺之時多服大黃甘草等藥疎轉藏府導其毒氣次以傳藥消之治發背內潰及諸惡毒衝心嘔痛托裏湯方

乳香

通明者壹兩
浸以乳鉢研細

真茱豆粉

研肆兩

右二味合研極細每服一錢匕新水調下水不可多要藥在胸膈上也次用一醉膏

一醉膏方

沒藥

研壹分

枯樓皮

者去壹枚

甘草

生者去
末半兩

右三味用無灰酒三升熬至一升去滓放溫作一服飲之如一飲不盡分二三盞連續飲盡次用紫雪膏傅之以收其量

紫雪膏方

蜀椒

研炒去目并
出汗為末

清麻油

壹兩

酒蠟

半兩

杏仁

皮去雙人炒

皮

拾壹粒去

右五味麝擣篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓溫服取快利便止

治發背癰疽瘡瘻乳香膏方

油膶

桑枝

槐枝各肆兩慢火煎令黃熟
去桑槐枝後下諸藥

蜥蜴參

當歸

芎藭

白芷

細辛去葉

烏蛇肉各分

鬱金香

木香

沉香各半

桂去皮

藁本去苗上壹兩以下

拾壹味剉碎入前油內煎令焦黃濁

出澄過取清油

貳拾兩入鍋中徐徐大煎次下後藥末

鉛丹剉

蠟陸

雄黃別研

乳香研

沒藥末

麒麟竭末各分

麝香研壹

水銀粉半

右二十二味次第煎熬用文武火再煎前項膏先下鉛丹蠟不住手攬次下諸藥末候成膏入合內盛封閉於井底出火毒七日應患一切毒瘡攤帛上貼三日一換次服連翹湯一方

治發背初覺腫恐不知定處以濕紙貼之先乾處即是若病根多速覓水蛭濕令入病處食血數易甚良治一切癰腫及發背疼痛不可忍但未成膿者犀角丸方

犀角

鱗參

大黃剉

黃芩

去黑心壹兩壹分

升麻



防風去人參當歸炮黃耆剉

甘草剉黃連去角乾藍各壹

巴豆去皮心熬

黃耆剉梔子人

右一十三味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空腹未飲下五丸取利即愈覺虛即減丸數

治癰疽發背一切毒腫宜服化膿為水犀角丸方

犀角_{镑參兩}大黃_{剉壹分}巴豆_{去皮心膜炒黃研出油參茶桂}

升麻

蜀椒_{去目并合炒出汗}黃芩_{去黑心}防風去人參當歸炮

甘草_{剉壹兩}

藜蘆山梔子_{去皮}黃連去角

右十四味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸未飲下食前服微利為度

治癰疽發背虎牙散方

虎牙乾薑炮當歸炮防風去附子_{泡裂去皮臍}

王不留行甘草剉桂_{去麤皮}白茯苓_{去黑皮}各壹兩

右九味擣羅為散每服三錢匕未飲調下

治發背癰腫一切惡瘡膏方



生烏麻油

鉛丹研

黃蠟各肆
兩

熊脂

松脂各壹
兩

水銀

硫黃研

芒消研各
兩

右八味取五月四日早於淨室中用銀石器炭火上微煎至初五日早勿令息火膏成看瘡腫大小以故帛攤貼之未作膿便消無不差者合時忌婦人雞犬見臘月臘日合亦良其水銀熊脂於掌中研入諸藥

治發背發鬚乳癰及諸毒腫神方

黃連

去
角
花

蛇牀子

乳香別搗各壹
兩

蔓菁子

杏人

參米炒去皮
六雙人炒研

人糞
大少

右七味擣和作餅子厚如五錢麪布攤貼之每日三四度易夜亦然每易時以甘草湯洗藥便撮作頭如巴穴及膿水亦貼肌漸生膿自出

治發背癰疽一切膿腫還魂丸方

膩粉

水銀

硫黃各壹分

巴豆人
研
巴
豆
人
研

右四味將巴豆單覆排鉗底以三物按上巴豆令平以盞蓋之四面濕紙搭合勿令氣洩炭火四向緩燒之時於水中蘸鉗底少頃又燒又蘸其盞上底內滴水一點如大豆乾則復滴以三滴乾為度候冷研陳未飯丸作二十

三丸每服一丸熟水吞下疎下惡物以白粥補之比藥一丸活一人曾無失者才取下即時不痛其瘡亦乾

治發背毒腫紫黑堅鍼疼痛方

蛇蛻

芸薹子

窖中不着水搏末

右三味擣羅為末以釀醋和細細塗腫痛立定

治發背自內出外熱毒中膈上下不通蒸背上虛處先三五日癰胗妨悶積漸成腫出於皮膚結聚成膿三神膏方

白麥飯石

色黃白類麥飯曾作磨刀者佳佳
研醋淬拾編為末

白斂末

各壹鹿角參貳寸截之不
用自脫者凡帶

腦骨者即非自脫炭大燒令性盡為度研為末

貳兩

右三味再同研令勻細取多年米醋於鑄中煎令魚眼沸起即下前藥末調如稀餳以篦子塗傅腫上只當瘡頭留一指面大勿令合以出熱氣如未有膿當內消若已作頭當漸小若日久瘡甚肌肉損爛筋骨出露者即於布上多塗藥貼之瘡上乾即再換但以膈中不穴無不差瘡切忌手觸宜慎之治發背癰疽一切瘡熱痛不可忍者百草霜膏方

百草霜

生蠷螬等

右二味同研細貼之如冰痛即止

治發背初覺腫痛方

赤小豆

右一味擣羅為末和豬膽汁塗之乾即易

治發背及一切熱瘡腫方

芸薹

搗

右一味切和酥炒熱傅瘡上冷即易日三度

癰疽發背發渴

論曰癰疽煩渴之證由熱氣熏灼五藏津液不足於內也蓋榮衛氣血腐化為膿血則津液不得不耗津液既耗熱氣復盛則心神內煩而引飲不止然或為嘔噦下利者以五藏虛熱飲水過度氣不足以勝之故氣逆於上則嘔噦腸胃不固則變下利也此屬癰疽惡證

治諸瘡腫發渴托裏黃耆湯方

綿黃耆

拾兩

甘草

壹兩

右二味並剉如麻豆每服五錢匕水一盞煎五七沸去滓溫熱隨意服不拘



時候

治癰疽虛熱大渴地黃湯方

生地黃

芍藥

升麻

木通

甘草炙

大黃
剉微

知母

人參

赤茯苓
去黑皮

當歸
焙各一兩

黃芩
去黑心

黃耆各壹
兩半

小麥半升

桔梗根
去黑皮

前胡
去蘆頭一兩半

右十五味㕮咀如麻豆每服五錢匕用水一盞半入竹葉七片前至八分去滓空心溫服如小便利除木通大熱加人參晚再服以差為度

治癰疽熱盛口燥發渴除熱止渴黃耆湯方

黃耆

桔梗根

生乾地黃

培升麻各壹

麥門冬
去心焙一兩半

梔子人壹
兩

芍藥半
壹兩

黃芩
去黑心一兩

右八味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心溫服日晚再

服

治發背癰疽熱渴悶亂枸杞湯方

枸杞枝葉伍
兩

石膏末

桔梗根

黃連
須去

甘草炙各
兩

右五味咬咀如麻豆每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓空心溫服日晚再

服

枸杞枝葉伍
兩

石膏末

桔梗根

黃連
須去

甘草炙各
兩



晚再服

治發背乾嘔吐此因先患熱渴飲冷大過胃寒所致宜服溫脾平胃陳粟湯方

陳粟米

機炒
壹合
乾薑炮裂半兩

甘草

炙肆兩

右三味㕮咀如麻豆每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓空心溫服日晚再服以差為度

治發背癰疽發大渴口乾不可止凝水石煎方

凝水石

石膏

蜜

洛半

右三味先搗二味石藥羅為末以水五升煎令稠即下蜜更煎成煎用瓷合盛每日空心取一棗大含化嚥津日五七服

治癰疽發背四肢虛熱大渴竹葉湯方

竹葉

壹握
煎取汁
淨洗剉參
盞

生地黃

貳兩

黃芩

去黑心

人參

芍藥

知母

甘草

炙

赤茯苓

去黑皮各壹兩半

升麻

黃耆

桔梗根

麥門冬

去心培各壹兩半

右一二味除竹葉外剉如麻豆每服三錢匕以竹葉汁一盞入棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服一日三服早晨午時夜臥各一

治癰疽發背兼渴竹葉黃耆湯方

淡竹葉

壹
握

黃耆

炒
切

甘草

炒
切

黃芩

去黑
心

麥門冬

去心
培

芍藥

兩
各參

當歸

培
切

人參

石膏

碎

芎藭

半夏

湯洗
滑培

柔
各
兩

生地黃

炒
培

右一十二味麌擣篩每服五錢匕以水一盞半入生薑一分拍碎大棗五枚擘破竹葉七片煎取八分去滓溫服日三夜一

治諸癰腫藏府壅滯口乾脚冷寒熱頭痛嘔逆不下食煩渴引飲麥門冬湯方

生麥門冬

去心
培

葛根

剉
切

蘆根

碎

石膏

碎

甘草

壹
兩

姜桂

薺苓

芍藥

碎

淡竹葉

切

右一十味麌擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞入消石一錢匕去滓溫服不拘時

癰疽發背作寒熱

論曰癰疽發背病為急切然五藏腑皆在背發於何部宜精詳之其作也邪毒內鼓寒熱交攻氣血壅滯陰陽相干故令人身熱而惡寒也當以藥癰疽之法

治之

治癰疽發背時作寒熱疼痛不食解毒地黃丸方

生乾地黃

培貳兩

黃耆

剉各壹兩半

桔樓根

去黑心

黃芩

去黑心

麥門冬

去心培各壹兩半

升麻

去黑心

人參

去黑心

桑螵蛸

拾伍枚剉炒

大黃煙

去黑心

敗醬

去黑心

遠志

去黑心

芍藥

去黑心

桔梗

去黑心

梔子人

肉蓯蓉

前胡

升麻

芍藥

桔梗

敗醬

遠志

桔梗

去黑心

桔梗

去黑心

地脈草

各半兩

乾棗

以蜜壹拾伍枚湯浸去皮核

和蒸成膏

核

右一十九味擣羅十八味為末入棗膏和丸如梧桐子大每服三十丸加至五十丸空心米飲下日晚再服

治癰腫初結頭痛寒熱氣急木香湯方

木香

藿香葉

沉香

薰陸香

丁香

各壹兩

甘草

剉各半兩

胡粉

研

桔梗

去黑心

大黃

剉各半兩

豬脂

半斤

上日二

治癰疽始作便敗壞發寒熱疼痛羊髓膏方

羊髓

甘草

剉各半兩

胡粉

研

大黃

剉各半兩

豬脂

半斤

桔梗

去黑心

大黃

去黑心

半斤

桔梗

去黑心

大黃

右五味先熬脂髓令沸下甘草大黃煎候甘草黑色綿濾去滓入胡粉以柳
莢攬勻瓷合盛每曰三五度塗傅瘡上以差為度

治發背癰疽一切瘡腫乳癰口乾脚冷發作寒熱頭痛嘔噦不下食葛根湯方

葛根

剉麥門冬

去心焙
各一兩

犀角

鋸半

萎蕤

各一兩

薺虎

芍藥

甘草

炙

蘆根

參分

石膏

炙一兩

右九味麞擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分下竹瀝半合紅雪一分更
煎三兩沸去滓空心日晚溫服

治癰疽始作堅硬皮色紫赤惡寒壯熱一二日未成膿者升麻湯方

升麻

連翹

大黃

生地黃

切各一兩

木香

各一兩

白斂

玄參

各一兩

右七味麞擣篩每服五錢匕水二盞煎至一盞入芒消末半錢匕去滓空心

溫服取利為度未利再服

治發背癰疽一切瘡腫未穴時攻刺疼痛或發寒熱渴躁不食解毒勻氣犀角

散方

犀角

各一兩

人參

大黃

一兩

桔梗實培

甘草

各一兩

葛根剉

赤茯苓皮去黑
檳榔剉

木香洛參

芎窮壹兩

右一十味擣羅為散每服二錢匕空心晚間粥飲調下以差為度

治發背未成膿身體寒熱人參散方

人參

當歸培

蜜陀僧煅

沒藥研

雄黃半兩研各

丹砂錢壹

桔樓實貳枚去核取

皮子生用取

右七味擣研為細散每服二錢匕用甘草煎湯放溫調下日三

治發背未成膿身體寒熱黃蘖散方

黃蘖

煙熏壁土

多_年者
各貳兩

右二味為細散每服二錢匕茅根煎湯調下仍用生薑汁調藥傅之

治發背作寒熱車蠍酒方

車螯

紫色光厚者以黃泥固濟
煅赤候冷為末取參錢匕

膩粉壹錢

甘草末貳匕

桔樓實壹枝

右四味先將前三味和勻次將桔樓用酒二盞煎至一盞去滓調下前藥三

錢匕取下惡物差

治發背未成膿身體寒熱苦茄散方

苦茄種

甘草

炙各
壹兩

右二味為細散每服二錢匕甘草湯調下

治熱毒癰腫血不散初覺憎寒乾渴四肢煩悶能令速消茈胡煎方

茈胡

去苗
壹兩

知母

培壹
兩

木通

壹兩半

瞿麥穗

壹兩

淡竹葉

壹兩

連翹

壹兩

防風

貳兩

大黃

細剉
兩

生麥門冬

湯
壹兩

生藕汁

參合
湯

甜消

肆兩
湯

治癰疽發脳發背腫癰寒熱疼痛忍冬飲方

忍冬嫩苗一握

葉大圓蔓生莖葉皆有毛生田野籬落間多有之兩葉對生春夏新葉稍大而色嫩綠柔薄秋冬即堅厚色深而圓

得霜則葉卷而色紫經冬不凋四月開花極芬芳香數步初開色白則數日變黃每枝黃白相雜故一名金銀花花開曳蕪數莖如絲故一名老翁須一名金鎖股冬間葉圓厚似薜荔故名大薜荔可移植庭檻間以備急花氣可愛似未利瑞香輩

甘草

半兩
生剉

右二味爛研忍冬同甘草入酒一升半沙錠中塞口煮兩食項溫服一日服盡若倉卒求不獲只用乾葉為散每服三方寸匕甘草方寸匕酒煮服之亦

可但不及生者耳

發背潰後

論曰發背已潰毒氣外泄或有逆證難治者蓋以府藏之傷也有白睛青黑而眼小服藥而嘔傷痛渴甚體項中不便音嘶色敗者是為五逆其餘熱渴利嘔與膿潰不愈皆以餘毒攻擊榮衛傷壞津液未復惟當隨證治之

治發背已潰去膿汁理虛勞內補黃耆湯方

黃耆

細剉

麥門冬

去心培
各壹兩

人參

熟乾地黃培
各半兩

白茯苓

去黑皮

甘草

炙剉各半兩

芍藥

芎藭

桂皮

去麤

遠志

去心各半兩

右十一味麤擣篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎棗二枚擘破同煎至五分去滓空心溫服日晚再服

治發背癰疽已潰排膿生肉當歸散方

當歸

剉

桂皮

去麤

人參

防風

去叉各半兩

厚朴

去麤皮生

桔梗

剉炒各半兩

芎藭

剉

甘草

炙剉各半兩

白芷

桔梗

剉炒各半兩

右九味擣羅為細散每服二錢匕空心溫酒調下日晚再服



治發背已潰爛下不住白石脂湯方

白石脂炮

龍骨炮各一兩

當歸剉

桔梗剉炒各一兩

白頭翁各一兩

黃連去須各一兩

乾薑炮

甘草炙剉各半分

右九味麞搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓空心溫服

日午晚後各一服

治發背後服大黃湯方

大黃

朴消各參錢

右一味麞搗篩水一盞濃煎熱服即瀉出毒氣

治發背先穿破出膿水不住傷外風冷毒散痛淋洗當歸湯方

當歸剉

甘草炙剉

芍藥

葛根剉

細辛葉去苗

黃蘖去麞皮

麻黃去根

苦參

白芷

蜀椒口者炒

桂去麞皮

防風去叉各一兩

右一十二味麞搗篩以水六升煎取三升濾去滓溫洗瘡上日再

治發背癰疽已潰積毒惡肉未去豬蹄湯淋洗方

豬蹄壹隻

黃耆

黃連去須

芍藥

黃芩去黑心各壹分

狼牙根

薔薇根各半

兩

右七味剉碎先以水煮豬蹄令熟取汁五升下藥煎至三升去滓放溫淋洗瘡候水冷即貼蓀蓉膏痛不止加當歸半兩甘草半兩和煎洗瘡治發背癰疽已潰不生肉緩肌乾瘡蓀蓉膏方

肉蓀蓉

皮去皴

半夏性

熟乾地黃

各一

兩

當歸

細辛

去苗

烏喙去皮

桂

去麌皮

各半兩

薑白

茶

豬脂

貳

分

白芷

蜀椒

去目并開口

出汗

大

中

醫

右一十三味除豬脂外剉碎以醋半升拌藥一宿先熬脂令沸次下諸藥煎候白芷赤黑色漉出綿濾盞合盛取塗瘡上日三次立效治發背潰後毒氣未散膿不絕露蜂房散方

露蜂房

貳兩

燒灰

亂髮灰

壹兩

蛇皮灰

分

赤小豆

貳兩

炒熟

川大黃

參兩半

剉

研微炒

桂心

分

白芷

半兩

赤芍藥

壹兩

桂心

分

右八味擣羅為細散每服二錢匕煎黃耆湯調下不計時候治發背潰後膿水不絕托裏生肌散方

川芎

貳兩

黃耆

貳兩

白芷

半兩

赤芍藥

壹兩

桂心

分

大黃

半兩

研微炒

桂心

分

白芷

半兩

赤芍藥

壹兩

桂心

分

人參半兩去
蘆頭 丁香半兩

當歸壹
兩

右八味擣篩為散每二錢匕粥飲調下

治癰腫發背惡瘡生肌後用力勞動努傷出血不止麒麟竭散方

麒麟竭半兩

黃連參

檳榔半兩

黃蘖半兩

白及半兩

诃梨勒皮一分

右六味擣羅為細散雞子白調塗瘡口上以白薄紙貼之藥乾即換忌用力勞動

治癰疽發背瘡腫或已潰或未潰連翹飲方

連翹

山梔子人

黃耆炒

防風去
叉

升麻

羚羊角镑

漏蘆去
蘆頭

甘草炙

大黃剉

枸杞根皮各壹
兩

右一十味藥擣篩拌令勻每服五錢匕用水一盞半煎取八分去滓空心溫

服

治發背發腦疼痛侵潰黑錫煎方

黑錫一斤先鎔令浮乘熱研成泥以無灰酒一斗煎錫至三升瓷瓶中盛每服一盞調生甘草末二錢七日三服甚者一偏差終