特 7
39
188

訂正東醫寶鑑

雜病篇十

婦人

十八

国立国会図書館　　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』

ガラス使用

国立国会図書館　　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷緘灸篇一卷目録二卷』

ガラス使用

伊藤大記

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之十

御醫思勤員亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 敎撰

婦人

求嗣

生一人之道始於求子求子之法莫先調經每見婦人之無子者其經必或後或多或少或將行作痛或行後作痛或黑或淡或凝而不調不孕心○求嗣之道婦人調則血氣平爭不能成孕丹心要經調男子要神足又寡慾清心爲上一節寡慾則不交合積氣儲精待時而動故能有子是以慾寡則神完不惟多子抑亦多壽入門○男子陽精微薄則雖遇血海虛靜流而不能直射子宮多不成胎蓋因平時嗜慾不節施泄太多宜補精元兼用靜工存養無令火動候陽精充實依時而合一舉而成矣入門○男子陽脫痿弱精冷而薄宜固本健陽丹續嗣丹溫腎丸五子衍宗丸入門○男子

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

脉微弱而澁爲無子精氣清冷也宜陽起石丸脉經○女不宜鼓動微陽宜玉鎞啓榮丸螽斯丸煖宮螽斯丸○婦人無子多由血少不能攝精宜調養經血宜百子附歸丸琥珀調經丸加味養榮丸加味益母丸濟陰丹勝金丹調經種玉湯先天歸一湯神仙附益丹調經養血丸溫經湯○婦人陰血衰弱雖投真精不能攝入子宮雖交不孕雖孕不育是以男女配合必當其年入門○無子婦人瘦怯者乃子宮乾澁宜滋陰養血四物湯方見血門加香附黃芩肥盛軀脂滿溢子宮宜行痰燥痰南星半夏川芎滑石防己羌活或導痰湯方見痰門○丹心

相女法

未算之婦陰氣未完慾盛之婦所生多女性行和平者調經易孕性行妒者月水不勻相貌惡者刑重顏容美者福薄太肥脂滿子宮太瘦子宮無血俱不宜孕○右不可不知入門

脉法

求嗣之脉專責於尺○右尺偏旺火動好色○左尺偏旺陰虛非福○惟沈滑勻易爲生息○微澁精清兼遲冷極○若見微濡入房無力○女不好生亦尺脉濇同春○男子脉微弱而濇爲無子精氣清冷也脉經

固本健陽丹

凡人無子多是精血清冷或房勞過傷以致腎水久虛不能直射子宮故爾豈可專責於毋血之不足虛寒耶熟地黃山茱萸各二兩巴戟二兩兎絲子續斷酒浸遠志製蛇床子炒各一兩半白茯神山藥酒蒸牛膝酒洗杜仲酒洗切酥炒去絲當歸身酒洗肉蓯蓉酒浸五味子益智仁鹽水炒鹿茸酥炙各一兩加枸杞子三兩人參二兩右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯或溫酒下五七十丸臨臥再服

續嗣丹

無子宜服山茱萸天門冬麥門冬各二兩半破故紙炒四兩兎絲子枸杞子覆盆子蛇床子巴戟熟地黃韭子炒各一兩半龍骨黃芪牡蠣山藥當歸蒺藜陽各一兩人參杜仲各七錢半陳皮

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

白朮各五錢黃狗外腎酥炙二一具蒸製同門冬一地黃爛搗他藥並爲細末煉蜜和丸梧子大每取百丸空心及臨臥以溫酒或鹽湯任意吞下 入門

溫腎丸

服之有子山茱萸熟地黃各二兩巴戟二兩兔絲子當歸鹿茸益智杜仲生乾地黃茯神山藥遠志續斷蛇床子各一兩右爲末蜜丸梧子大空心溫酒下五七十丸精不堅倍鹿茸加龍骨壯陽 入門

五子衍宗丸

治男子無嗣枸杞子九兩兔絲子酒浸製七兩覆盆子五兩車前子三兩五味子大空心溫酒吞下九十丸臨臥鹽湯吞下五十丸春丙丁巳午夏戊己辰戌丑未秋壬癸亥子冬甲乙寅卯須上旬晴日合忌見僧尼寡女孝子六畜不淨之物婦人遺精者去車前子代蓮子 入門

陽起石丸

治丈夫精冷眞精氣不濃不孕不育陽起石火煅研兔絲子酒浸製蒸焙天雄炮韭子炒肉蓯蓉酒浸石斛桑寄生沈香原蠶蛾各一錢右爲末煮糯米粥和丸梧子大空心鹽湯下七九十丸得效

玉鑰啓榮丸

治婦人無子香附子三日炒乾細末十五兩當歸二兩白芍藥川芎赤石脂蒙本人參壯丹皮白茯苓白薇桂心白芷白朮玄胡索沒藥各一兩右除石脂沒藥外餘藥剉酒浸三日焙乾爲末足十五兩重羅極細入別研赤石脂沒藥末煉蜜和丸彈子大每取一丸空心雞未鳴時先以溫茶或薄荷湯漱口後細嚼溫酒或白湯送下以乾物壓下服至一月即效廣嗣○一名女金丹無不孕妊心有熟地黃治婦人無子或無癸水火等疾經候亦調容顏不減但久久無孕乃子宮有陰無陽不能生發宜服此藥動微陽一月即效或赤白帶下崩漏及血風血氣虛勞諸

證無所不治眞女中之金丹也 入門

龜斯丸

經云補之受之補之者服七日即交合孕後勿服香附子白薇半夏白茯苓杜仲厚朴當歸泰艽各二兩防風肉桂乾薑牛膝沙參各一兩半細辛人參各二錢三分右爲末煉蜜和丸梧子大空心酒下五七十丸 入門

煖宮龜斯丸

婦人無子者服之厚朴一兩二錢半吳茱萸當歸熟地黃阿膠珠陳艾葉各二兩右爲末用石榴一枚連皮搗碎煎水打糊和丸梧子大每百丸空心醋湯下 廣嗣

琥珀調經丸

治婦人脬冷無子者服之厚朴一兩二錢半吳茱萸白芍藥白薇白蘞石菖蒲白附子桂心人參沒藥各一兩細辛乳香當歸酒浸牛膝酒洗各七錢半右爲末蜜丸小豆大酒下一二十丸壬子日修合○一名壬子丸 集略

百子附歸丸

久服有孕及治月水參差不調四製香附末十二兩製法見胞門川芎白芍藥當歸熟地黃阿膠珠陳艾葉各二兩右爲末用石榴一枚連皮搗碎煎水打糊和丸梧子大每百丸空心醋湯下 廣嗣

加味養榮丸

治經脉來前外潮內煩咳嗽食少頭昏目眩帶下血風血氣久無嗣息一切疾病火等證服之有孕又治胎前胎動胎漏常服可無小產之患熟地黃當歸白芍藥川芎黃芩香附子各二兩白朮各一兩白芍藥川芎陳皮貝母白茯苓麥門冬各一兩阿膠七錢甘艸五錢黑豆炒去皮四十九粒右爲末蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯下七九十九忌食諸血 入門

加味益母丸

服之百日有孕益母艸半斤加當歸赤芍藥木香各二兩右爲末蜜丸梧子大

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

白湯下一百
丸 入門

濟陰丹 治下婦人久冷無子及數經墮胎皆因衝在虛損胞內宿疾病經候不調或崩漏帶下三十六疾皆令孕育不成以至絕嗣亦治產後百病令人有孕及生子充實無病蒼朮八兩香附子熟地黃澤蘭各四兩人參桔梗蕃退石斛藁本秦艽甘艸各二兩當歸桂心乾薑細辛牡丹皮川芎各一兩半木香白芷茯苓京墨燒赤桃仁各一兩川椒山藥各七錢半糯米炒一升大豆黃卷炒半升右爲末煉蜜和丸如梧子大每服一百丸 何方

勝金丹 治一月水衍期久無子及血癖氣痛百般諸疾牡丹皮藁本人參當歸白芷茯苓赤芍藥白芷肉桂白薇川芎玄胡索白芍藥白朮各一兩沈香甘艸各五錢右爲末蜜丸彈子大每一丸空心溫酒嚼下服二十丸 得效方

調經種玉湯 治婦人無子多因七情所傷致經水不調不能受孕熟地黃當歸身酒洗吳茱萸黃川芎各四錢白芍藥陳皮玄胡索牡丹皮乾薑炒各三錢官桂熟艾各二錢右剉分作四貼每二一貼入薑三片水煎空心服待經至之日服起一日一貼此藥百發百中 醫鑑 ○ 回春無薑桂艾三味

先天歸一湯 當歸酒洗一兩二錢白朮炒白茯苓生地黃酒洗川芎各八錢縮砂炒牛膝酒洗各八錢甘艸四錢七錢陳皮六錢右剉分作十貼薑三片水煎空心服渣再煎臨臥服經行先服五貼經行後服五貼藥盡即效經調脈和即當有孕矣 醫鑑

神仙附益丹 香附米一斤童便浸透再露再晒如此三次用好醋浸透一宿晒乾爲末 ○ 益母艸十二兩東流水洗淨烘乾爲末右別以香附四兩艾葉一兩煮取汁用二分

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

醋七分和二前ノ二味一末ニ爲レ丸下ス梧子ノ大サ空心臥淡醋湯ニ下ス七九十九不レ惟治ニ婦人百病一而生レ育之功效如レ神醫鑑

調經養血丸

治ニ經脉不レ調久不レ受レ孕ヲ香附子十二兩酒醋鹽湯童便各浸ス二日焙レ乾當歸酒洗白芍藥酒炒生乾地黃酒洗牡丹皮酒洗各二兩川芎白朮茯苓白芷乾薑炒肉桂紅花桃仁沒藥半夏油炒阿膠珠各一兩玄胡索六錢蓬朮煨醋炒甘艸炙各五錢曲香炒二錢右爲ニ末醋糊和レ丸ニ梧子ノ大ニ空心白湯或温酒下ス百丸有レ孕勿レ服ス同春

温經湯

治ニ衝任虛損月事不レ調或ハ前ニ或ハ後ニ或ハ多ク或ハ少ク或ハ逾ニ月ヲ不レ至或ハ一月ニ再ニ至リ或ハ曾テ經ニ半産ヲ瘀血停留ニ唇口乾燥五心煩熱小腹冷痛久ク不レ受レ胎ヲ方見ニ胞門一ニ一名調經散正傳○一名大温經湯入門

一方

男子陽旺則能ク直射ニ子宮ヲ種子之仙方也又治ニ男子精冷無レ子兎絲子酒浸煮製細末雀卵清爲レ丸梧子ノ大ニ空心温酒送下ス用レ之ヲ屢ク驗

又方

○雀肉久食令ニ人有レ子本艸○男子無レ嗣者多ク炙ニ臍中一有レ效綱目

胎孕

凡ソ欲レ求レ嗣ノ必ス先ツ視ニ其ノ婦ノ之經脉調否ヲ其或ハ未レ調必以レ藥而調レ之ニ經脉既調ヘ宮以ニ人事ヲ副レ之ニ按ニ其ノ法ヲ而行レ之庶不レ失ニ其候ヲ也蓋シ婦人月經方ニ絶金水纔生此ノ時子宮正ニ開キ乃受ニ父ノ精ヲ結ニ胎ヲ之過ニ此ノ佳期ヲ則子宮閉テ而不レ受レ胎ヲ矣正傳○月經行ヲ後一日三日五日交會者成レ男二日四日六日交會者成レ女過レ此則不レ孕矣亦要ニ在レ子時ノ後方可レ也正傳○婦人經水來時有ニ兩日一半ノ淨キ者三日而淨キ者一日半ノ淨キ者一日半ノ淨キ者一日ノ淨キ者一日ノ淨キ者一日

于户口取而貝之金色者佳期也鮮紅者未淨不及也淡者太過也惟以敗血去而淨新血生之如金者爲佳期此時交合無不成矣 回春 ○夫人之始生也血海始淨一日二日三日精勝其血則爲男子四日五日六日血脉已旺精不勝血則爲女子乃二儀物相薄長先身生謂之神又謂之精道與釋二門謂之本來面貝是也 東垣 ○欲求子者但待婦人月經絶後一日三日五日擇其旺相日如春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸以生氣時夜半後乃施瀉有子必女過六日後勿施瀉可也 得效

陰陽交合避忌

凡男女交會當避丙丁日及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑大雷電大霹靂震天地晦冥日月薄蝕虹霓地動則損人神不吉損男百倍令女得病有子必癲痫頑愚瘖瘂聾瞶孿跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月星辰火光之下神廟佛寺之中井竈圊厠之側塚墓尸柩之傍皆所不可夫交合如法則有福德大智善人降託胎中仍令性行調順家道貝隆若不如法則薄福愚痴惡人來託胎中令性行凶險所作不成家道貝否禍福之應有如影響可不戒哉 千金

十月養胎

婦人懷胎一月之時足厥陰肝養○二月足少陽膽養○三月手心主脉養○四月手少陽脉養○五月足太陰脾養○六月足陽明脉養○七月手太陰肺養○八月手陽明脉養○九月足少陰腎脉養○十月足太陽脉養○諸陰陽各養其一月之胎養於肝膽也 良方 ○雄婦不可灸刺其經必墮胎 良方

一月

父之精潮適至陰幕既翕如布帛紋紐而精血來衝氣自然旋轉不息如蜣螂之滾糞丸成一團圓璇璣九貝一息不停然後陰陽大定玄黄相包外似纏綿瑪瑙其中自然虚成一竅空洞虚圓與雞子黄中一穴相似而團圓之外氣自凝

結爲胞一衣之初漸漸厚如彼米飲豆漿之面上自結一
皮之中竅日生從無入有精血日化從有入無九月
之後次九又九凡二十七日即成一月之數竅自
然凝成一粒如露珠然乃太極動而生陽天一生水
謂之胚此月經閉無潮無痛飲食稍異平日不可觸犯及輕率服藥入門

二月足少陽脈養胎又三九二十七日即二月之數此
露珠變成赤色如桃花瓣子乃太極靜而生陰
地二生火謂之膜此月腹中或動或不動猶可孤
疑若吐逆思酸名曰惡阻有孕明矣或偏嗜一物
乃一藏之虛如愛酸物乃肝
藏正能養血而虛也入門

三月手心主心包絡脈養胎又三九二十七日即三
月之數百日間變成男女形影如清鼻涕中有白
絨相似以成人形鼻與雌雄二竅先分明其諸
全體隱然可悉斯謂之胎乃太極之乾道成男坤
道成女也此時胎最易動芩朮九方見下頻服最妙入門

四月手少陽三焦脈養胎是月男女已分始受氣
以成血脈形像具六府順成若胎動下血宜用
安胎飲方見下○入門

五月足太陰脾脈養胎始受火精以成陰陽
之氣筋骨四肢已成毛髮始生入門

六月足陽明胃脈養胎始受金精以成筋
目皆成若胎動安胎飲入門

七月手太陰肺脈養胎始受木精以成骨
皮毛已成遊其魂能動左手入門

八月手陽明大腸脈養胎始受土精以成皮膚形
骸漸長九竅皆成遊其魄能動右手入門

九月足少陰腎脈養胎始受氣足五藏六府齊通納
皮毛百節畢備神氣入身入門

十月足太陽膀胱脈養胎受氣五藏六府齊通納
天地之氣於丹田使關節人神皆備待時而生○
惟手少陰手太陽無所專主者以君主之官無爲
而已○其有延月而生者富貴而壽有月不足者

貧賤而夭○一云延月而產必生貴子入門

妊娠脉

婦人足少陰脉動甚者妊子也 內經○全元起作足少陰王氷本作手少陰全本爲是動甚者動搖太甚也 綱目○陰搏陽別謂之有子註曰陰謂尺中也搏謂搏擊於手也別陽氣挺然則爲有妊之兆何者陰中有別陽故也 內經○經脉不行已經二三月者尺脉不止者是胎也 同春○脉滑疾重以手按之散者胎已三月也脉重手按之不滑者五月也○婦人三部脉浮沈正等按之無絶者妊娠也 脉經○妊娠八月一云六七月脉實大牢強弦緊者生沈細者死○妊婦脉細勻易產大浮緩氣散難產 脉經

驗胎法

婦人二三月經不行疑是兩身卻疑血滯心煩寒熱恍惚宜用神方驗胎散之 海藏○艾醋湯亦可 驗胎 醫鑑

神方驗胎散

眞雀腦芎一兩當歸全用重一兩者只用七錢右二味細末分作二服濃煎艾湯一盞調下或好酒調下或好酒調下二三時間覺腹癖微動仍頻即有胎也動罷即愈如不覺效再煎紅花湯調下必有神效 海藏

艾醋湯

驗胎有無以好醋煮艾葉服半盞腹中大痛是孕不痛無孕 醫鑑

辨男女法

婦人有孕令人摸之如覆盂者則男也如肘頸參差起者女也 脉經○婦人有娠左乳房有核是男右乳房有核是女也 醫鑑○遺孕婦面南行還寢呼之左回首者是男右回首者是女○看妊婦上圓時夫從後急呼之左回首者是男右回首者是女蓋男胎在左故回首時愼護重處而就右也女胎在右則右重故回首時愼護重處而就左也女胎在右則血氣護胎而盛於左故脉亦從之而左疾爲男左則血氣護胎而盛於右故脉亦從

之而右疾爲女右大爲女也

陰陽之理自然如是 脈經

脈法

婦人妊娠四月欲知男女俱滑而疾也 脈經 ○尺脈左偏大爲男右偏大爲女左右俱大產二子之脈經

○左手沈實爲男右手浮大爲女左右手俱沈實猥生二男左右手俱浮大猥生二女之脈經 ○男女之別以左右取左疾爲男右疾爲女沈實在左浮大在右以預剖脈訣可以預剖

雙胎品胎

成胎以精血之後先分男女者褚澄之論也愚竊惑焉東垣曰經斷後一二日精勝血者成男四五日血勝精者成女此亦未瑩易曰乾道成男坤道成女夫乾坤陰陽之道路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而會精之泄陽之施也血能攝之陰之化也精成其子此萬物之資始於乾元也血成其胞此萬物之資生於坤元也陰陽交媾胎孕乃凝胎之所居名曰

子宮一云系在下上有兩岐一云達於左一云達於右精勝其血及剛日陽時感者則陽爲之主受氣於左子宮而男形成精不勝血及柔日陰時感者則陰爲之主受氣於右子宮而女形成矣或曰分男分女吾知之矣其有雙胎者何也曰精氣有餘一岐而分之血因而攝之故也若夫男女同孕者剛日陽時柔日陰時感則陰陽混雜不屬左右受氣於兩岐之間者也亦有三胎四胎五胎六胎者猶是而已或曰其有男不可爲父女不可爲母與男女之兼形者又若何而分之耶曰男不可爲父女不可爲母得陽氣之全者男也女不可兼形者也女不可兼形而爲男母得陰氣之全者也兼形者由陰陽駁氣所乘而爲狀不一以女兼男形者有二則遇男爲妻遇女爲夫一則可妻而不可夫又有下爲女體上具男之全形此又駁之甚者也或曰駁氣所乘獨見於陰而所成之形又若是之不向耶予曰陰體虛駁氣易於乘也駁氣所乘陽相混無所爲主不可屬左不可屬右受氣於兩岐之間隨所得駁氣之輕重而成形故所

兼之形有不可得而同也 丹溪 ○ 丹溪此論極造精微 綱目 ○ 又法左右尺脈俱沈實爲生二十男不爾女作男生左右尺脈俱浮大爲生二十女不爾男作女生也此乃男女兼形之說也 綱目

轉女爲男法

是時男女未定故服藥方術轉令生男也 得效 ○ 始覺有孕以灸置孕婦床下勿令知之若不信待雞抱卵以灸懸窠下則一窠盡是雄雞可驗 入門 ○ 石雄黃一兩絳囊盛帶孕婦左膝上滿二十一日解之 ○ 萱草花一名宜男雄雞長尾拔二三莖置孕婦臥席下勿令知 ○ 取夫頭髮手足爪甲鋪孕婦席下勿令知良方

惡阻

惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也 綱目 ○ 婦人不能食無寒熱名曰妊娠於法六十日當有此證設有醫治逆者則一月加吐下者則絕之註曰絕者絕其醫治俟其自安也 仲景 ○ 妊娠稟受怯弱

便有阻病其狀顏色如故脈息和順但覺肢體沈重頭目昏眩擇食惡開食氣好食鹹酸甚者或作寒熱心中潰悶嘔吐痰水悉吐之惡阻良方 ○ 惡阻者或大吐或時吐清水惡聞食臭由子宮經絡於胃口故逢食氣引動精氣乃安亦有誤交合而子衝上必食吐盡而後精氣漸消之露 入門 ○ 妊娠之初經脈內閉子宮穢盛者過百日即愈 入門 養胎息腸胃沮洳散入焦膈若素有痰飲則飲與血搏食飲輒吐頭目旋暈憎聞食氣喜啖酸鹹四肢倦怠多臥少起厭厭困懶名曰惡露蓋惡者不善之後胞外餘血敗瘀流利名曰惡露蓋惡者不淨之義阻者阻節之阻血搏痰飲當漸消之露者露水之露當急逐之由是而知胎前曰惡阻產後曰惡露古人命名之意深有以也 易簡 ○ 惡阻有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治肥者有痰瘦者有熱 丹心 ○ 瘦人熱加竹茹生薑熟加竹茹連翹生湯入口吐清水不安參橘散保生湯 ○ 惡阻宜

用半夏茯苓湯歸原散竹茹湯一綱目
○懷孕愛噉一物乃藏之虛如血氣弱不能榮
肝肝虛故愛噉酸物心方○雜婦惡食
但以所思之物任意與之必愈局方

二陳湯

婦人月事不行全不入食日就瘦弱全似虛勞然而穀雖不入果子雜物常喜食之卻只是有孕諸所謂孕婦做得百般病者此也但以二陳湯加縮砂梔樒入薑棗烏梅煎服消痰順氣自然安平直指○大全方論半夏動脾而不用仲景方皆用半夏豈不知此而用乎予治阻病累用半夏豈製炒黃用之未嘗動脾經云有故無殞是也心方

參橘散

治惡阻病嘔吐痰水入食橘皮赤茯苓各一錢半麥門冬白朮厚朴人參甘草各一錢右剉作一貼入薑七片青竹茹雞子大同煎服按粹○一名人參橘皮湯聖惠

白朮散

治惡阻吐清水十餘日粥藥不入白朮五錢人參二錢半丁香一錢二分甘艸五分右剉作一貼入薑七片水煎服心方

保生湯

治婦人月經不行身無病似病脈滑大而六脈俱勻乃孕婦之脈也精神如故惡聞食氣或但嗜一物或大吐或時吐此白朮香附子烏藥橘紅各一錢右剉作一貼入薑三片水煎服良方

半夏茯苓湯

治惡阻病嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣喜食酸鹹多臥少起百節煩疼羸瘦痰盛半夏一錢半赤茯苓熟地黃各一錢橘紅梗甘艸各七分右剉作一貼入薑七片水煎服心方

苓連半夏湯

治惡阻病胃脘痛黃芩一錢二分半覆花人參白芍藥川芎桔梗各一錢赤茯苓七分半黃連一貼入薑七片水煎服心方

陳皮當歸梔子枳殼香附人參蒼朮縮砂甘艸各五分右剉作一貼入薑七片水煎服永類

歸元散 治惡阻全不入食白朮白茯苓陳皮各一錢半半夏一錢人參川芎當歸白芍藥丁香甘草各五分桔梗枳殼各二分半右剉作一貼入薑五棗二枚水煎服之綱目○一名復元湯 醫鑑

竹茹湯 治惡阻青竹茹麥門冬各二錢前胡二錢橘皮一錢蘆根半握右剉作一貼水煎服之聖惠

一方 一婦孕兩月嘔吐頭眩用參朮川芎陳皮茯苓服之愈重脈弦左爲甚此怒氣所激惡阻病也問之果然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所宜以茯苓湯下二十丸方見二十一粒數服而愈丹心火門

妊娠禁忌 受孕之後大忌男女交合入門○妊婦切忌飲酒及以酒調藥服酒散百脉致成諸疾正用水煎服爲好得效○受孕之後切宜避忌胎殺所遊如隣家繕修亦宜避之經云刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣甚至毋殞驗若反掌得效

飲食禁忌 食驢馬肉過月難產○食犬肉令子無聲食兎肉令子缺脣○食無鱗魚難產○

食螃蟹令子橫生○食羊肝令子多厄○食雞肉及卵令子生寸白虫○食鴨肉及卵令子倒生心寒○食雀肉令子多淫無恥或生多指○食薏苡令墮胎○食蒜消胎氣○食鮎魚令子生疳蝕瘡○食諸一門

藥物禁忌 歌曰芫芫青斑附子與天雄○貝蛾代赭蛇蜕黃雌雄雌黃雄黃○牙硝芒硝壯丹桂桂皮○槐花牽牛皂角同○半夏南星與通草○野葛水銀並巴豆○牛膝薑蟹甲爪○硇砂乾漆兼桃仁○地膽芫根莫用好正傳○又忌蹶蹠花螻蛄牛黃黎蘆金箔銀箔胡粉蜥蜴飛生蟬殼龍腦蝟皮鬼箭羽猪雞馬刀衣魚大蒜神麴葵子犀角大黃局方

妊娠將理法

衣毋太溫一〇食無太飽一〇飲無大醉一〇勿
妄服湯藥一〇勿妄用鍼灸一〇勿舉重登高
涉險一〇勿勞力過傷一〇勿多睡臥須時時行步一〇
心有大驚子必癲癎入門○臨月不可洗頭一〇勿
登高厠
正傳

胎漏胎動

胎漏謂有胎而血漏下也血氣虛有熱四物
湯方見血門加阿膠珠白朮條芩縮砂香附
炒黑艾葉少許加糯米煎服正傳○犯房下血者
眞漏胎也八物湯方見虛勞加阿膠艾葉救之入
門○胎漏胎動皆令下血而胎動有腹痛胎漏無腹
痛此爲異耳胎漏宜清熱胎動宜行氣入門○胎
漏者自人門下血尿血入門○胎動不安者由衝任經虛受胎不實故也亦有飲酒
房室而傷胎者有喜怒而傷胎者有觸犯而胎動者但治母病其胎自
熱藥而傷胎者因母病而胎動不安有胎不堅固動致母疾者但當安胎其母自愈
良方○孕婦內傷勞役以致小腹常墮甚則子宮

墮出者氣陷也宜用補中益氣湯方見內傷知母
房勞者八物湯加酒炒黃芪爲君防風升麻爲使
入門○胎漏胎動皆令墮胎胎漏宜用枳殼湯小
膠艾湯膠艾湯膠艾芎歸湯膠艾四物湯常歸寄
生湯桑寄生散○胎動不安宜用杜續丸常歸地
黃湯安胎散安胎飲黃芩湯
丸生地黃粥蔥白湯諸方
粥蔥白湯

枳殼湯

治胎漏下血白朮三錢半枳殼黃芩各
一錢七分半右剉作一貼水煎服保命

小膠艾湯

治胎動下血阿膠作一貼水煎服
四錢右剉作一貼水煎

膠艾湯

治胎漏安胎極妙熟地黃艾葉當歸川芎阿
膠珠甘艸炙黃芪各一錢右剉作一貼水煎
服日二次正傳○局
方無黃芪有白芍藥

膠艾芎歸湯

治胎動下血在八九月內二者及治孕產
後因續下血不絕者阿膠珠艾葉川芎

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

當歸各二錢甘艸炙一錢右㕮咀作一貼水煎服○胎動腹痛或下黃汁如漆如豆汁者野苧根金銀花根各五錢水酒相半煎服入門

膠艾四物湯 治胎漏腹痛熟地黃當歸川芎白芍藥阿膠珠條芩白术縮砂艾葉香附子炒各一錢右㕮咀作一貼入糯米一撮水煎空心服四春

當歸寄生湯 治胎漏下血人參桑寄生熟地黃續斷各一錢半當歸川芎白术艾葉各七分半右㕮咀作一貼水煎服得效

桑寄生散 治胎漏及經血妄行桑寄生續斷川芎當歸白术香附子阿膠珠茯神各一錢人參甘艸各五分右㕮咀作一貼入薑三片水煎服入門

杜續丸 治胎動不安腰痛以此防其欲墮杜仲炒續斷各二兩右爲末棗肉二和丸梧子大米飲下五十丸入門

當歸地黃湯 治胎痛熟地黃四錢當歸二錢右㕮咀作一貼水煎空心頻服正傳

安胎散 治因驚胎動腹痛下血熟地黃三錢川芎枳殼各一錢半糯米一合右㕮咀作一貼薑三棗二水煎服正傳

安胎飲 治胎動不安五六箇月常服數貼甚妙白术二錢條芩一錢半當歸白芍藥熟地黃縮砂研陳皮各一錢川芎紫蘇葉各八分甘艸四分右㕮咀作一貼水煎服醫鑑○一方有人參無熟地黃代生地黃入門○胎不安加阿膠胎痛加縮砂○黃芩安胎者降火也縮砂安胎者行氣也若血虛而胎不安阿膠主之丹心

黃芩湯 治胎動不安黃芩白术縮砂當歸各一錢半右㕮咀作一貼水煎服得效

內補丸 治ス衝任脈虛補ヒ血ヲ安ス胎ヲ熟地黃二兩當歸一兩微炒右爲ヽ末ト蜜ヲ丸シ梧子ノ大サ空心溫酒ヲ下ス五七十丸

本事

獨聖散 治ス因ニ墮落傷損ニ致シ胎動不レ安腹痛不レ可レ忍ヲ縮砂不レ以ヲ多少ヲ爲ヒ末ト每ニ二錢熱酒ヲ調下ス須ク臾覺ニ腹內極熱ヲ胎已ニ安ニ矣神效不レ飮レ酒ヲ者米飮調下ス 正傳 ○胎痛用ヒ縮砂ヲ以テ能ク止ム痛行レ氣ヲ安ス胎ヲ也 丹心

知母丸 治ス雜病胎月未タ足而欲ス產ル者腹痛知母爲ヒ末ト蜜ヲ丸シ梧子ノ大ニ米飮下ス二十丸日ニ三ニ服ス不レ拘ニ時ヲ 綱目

生地黃粥 治ス胎漏糯米二合煮レ粥臨レ熟ニ入ル生地黃汁一合ヲ調服ス空心 入門

蔥豉 治ス胎動氣欲レ上ント衝ヒ心ヲ或ハ下レ血ヲ葱白濃ク煮レ汁ニ飮レ之ヲ主シ安ス胎ヲ若シ胎已ニ死ス即出ス海藏

佛手散 安ス腹痛ノ方見レ下ニ ○ 綱目

一名立效散 治ス胎動不レ安ラ

一方 治ス胎動不レ安ラ一月ハ用ニ烏雌雞ヲ二月ハ用ニ赤雄雞ヲ三月ハ用ニ鯉魚ヲ煮レ汁ニ入レ藥ヲ煎服ス

神妙入門

半產 墮胎乃ヒ血氣虛損不レ能レ榮ニ養スル而自墮猶ホ枝枯則果落ヲ藤萎ル則花墮ツ有ニ因ニ勞怒傷レ情ヲ內火便動ス亦能ク墮胎猶ホ風撼ニ其ノ木ヲ人折ニ其ノ枝ヲ也火能ク消ス物ヲ造ニ化ヲ自然ニ病源乃謂ニ風冷傷ニ於子藏ニ此レ未タ得ニ病情ヲ者也大抵屬レ虛屬レ熱當ニ視テ其ノ輕重ヲ而治ス之ヲ 丹心 ○正產一證正如ニ果中栗熟其ノ殼自開テ兩無ニ所レ損ス半產則比ス之ヲ

又方 孕婦爲ス夫ノ所レ困ス胎動氣欲レ產ント腹痛者梔子蒲黃等分爲ヒ末ト蜜ヲ丸シ梧子ノ大ニ酒ヲ下ス三十丸以テ止ムヲ爲ヒ度ト 丹心

採研新栗一碎其膚殼一損其皮膜然後取得其實以其胎藏傷損胞系斷去而後胎墜下大抵半產須加十倍調治○復有市井村落之間恣情妄作偷生不正或多男女厭於養育往往以草藥毒之驚見敗血不下衝心悶亂喘汗交作死者用記須以解毒行血藥救之宜用白扁豆散得效○婦人受孕遇三五七陽月必墮宜服苓朮湯安胎丸以清其熱若氣血不足則預服八物湯方見虛勞以防墮落○半產多在三五七月內若前次三箇月而墮則其後必如期復然凡半產後須多服養氣血固胎元之藥以補其虛厥後有胎先於兩箇月半後即服清熟安胎藥數貼以防過五月又至六箇半月箇半月之後再服八九貼以防過五月又至六箇半月之後再服五七貼以防七月及至九箇月可保無虞○半產宜用金匱當歸散芎藭神朮湯安胎丸和痛湯諸方

白扁豆散

治懷孕四五月常墮不止

白扁豆 攻胎藥毒衝心悶握拳自汗不省其脉浮而軟十次一生白扁豆生爲末

新汲水調下二三錢即甦口禁者斡開灌之得效

苓朮湯

治懷孕四五月常墮不安胎者內熱甚故也子苓朮湯乃安胎之聖藥也凡孕三五服緩則五日十日一服安胎易產所生之兒又無胎毒蓋胎孕脾土運化遲滯則生澁澁則生熟故以黃苓清熟以養血白朮健脾以燥澁安胎丸金匱當歸散皆此之方而稚之也 入門

白朮 同上 苓朮湯材爲末粥丸

安胎丸

梧子大白湯下五七十丸 入門

孕婦宜常服養血清熱素慣半產者宜服以清其源而無後患也黃苓白朮當歸川芎白芍藥各一兩右爲末每三錢溫酒調下或酒糊和丸米飲下五七十丸 入門○婦人有孕則胎脾運化遲滯而生熱古人用白朮黃苓爲安胎之聖藥蓋白朮補脾燥澁黃苓清熱故也

兒難娠煩悶血虛者此方尤爲備也服此藥則易產所生男女兼無胎毒則瘡疹亦稀無病易育而聰明智慧不假言矣累試累驗（丹心）

五味安胎丸 素慣半產者宜服之養血清熱當歸川芎芍藥各一兩白朮五錢右爲末酒糊丸梧子大每服七十丸（四春）

芎歸補中湯 治懷孕氣血虛弱不能榮養以致胎漏每數月而墮胎黃芪當歸白朮杜仲白芍藥各一錢乾薑阿膠珠川芎五味子木香人參甘草各五分右㕮咀作一貼水煎服（入門）○一方無木香正傳

安榮湯 治胎氣不固時常小產宜以此預防固胎熟地黃白芍藥川芎當歸阿膠珠香附子桑寄生白朮黃芩縮砂各一錢糯米百粒右㕮咀作一貼水煎服（正傳）

千金保胎丸 凡婦人受胎經二三月而墮者雖氣血不足乃中衝脈有傷中衝即陽明胃脈供養胎孕至此時必須謹節飲食絕色慾戒惱怒服此藥勿免半產之患矣杜仲薑汁炒白朮土炒各二兩當歸酒洗熟地黃薑汁炒阿膠蛤粉炒成珠各條芩炒益母草續斷酒洗香附米以酒醋鹽水童便各浸一宿乾各一兩川芎艾葉醋煮陳皮各五錢縮砂二錢半右爲末以棗肉和丸梧子大每二百丸空心米飲吞下（醫鑑）

和痛湯 治小產心腹痛當歸川芎白芍藥酒炒熟地黃各一錢三分玄胡索一錢澤蘭香附子青皮各八分桃仁紅花各五分右㕮咀作一貼以水一鍾童便清酒各半鍾煎服（醫鑑）

一方 一婦人每懷孕至三四五年老母雞煮湯入紅棗小黃米煮粥食之必墮不服藥子以不數月而胎固至月滿而生男（回春）

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

又方 一婦人有孕至二三月之左右必墮予教以濃煎白朮湯調黃芩末一錢服二三四十貼遂得保全蓋孕至二三月正屬相火所以易墮不然何以黃芩白朮爲安胎之藥耶 丹心

脉法 半產漏下革脉主之弱則血耗亡見危脉訣

○少陰之脉浮而緊緊則痾痛腹中痛半產而墮傷脉經

卒墮胎 孕婦六七月暴下多故今暴下而墮胎也脉經

此非時孤漿預下故也○胎漏者徐徐下水其胎必倚而墮知胎漏者徐徐下水

察色驗胎生死 胎動不安甚者當以母之形色察之母面青舌赤口中沫出者母死子活唇舌俱青兩邊沫出者母子俱死良方○孕婦腹痛胎不動欲知生死在何面冷者爲死溫者爲生脉經○胎死腹中則產母面青指甲青脣舌青口鼻如兩臉微紅則母

活子死丹心○孕婦舌黑者子已死矣全以舌爲證驗一佛手散救之方見下○回春

欲產候 妊婦月滿脉離經離經之脉見下爲欲產也脉經

○孕婦臍下腎繫於腰中生火此是兒轉蓋腎繫於腰傳○孕婦入八月腹痛或作或止名曰弄痛非正產之候或腹雖痛而腰不甚痛非正產之候或腰胞緊於腎故也正

臍下者非正產之候挺逆者非正產之候氷水漿未破血未出者非正產之候且令扶行熟忍不可坐草良方

○凡孕婦直待胎氣臍下子逼陰戶腰重痛極眼中生火穀道挺迸此正欲產之候方上卅用力良方

脉法 歌曰欲產之婦脉離經沈細而滑也同名夜半覺痛應分誕來日午後定知生脉訣○難經云一呼三至曰離經一呼一至亦曰離經婦人欲產者脉皆離經夜半覺痛日中即生也綱目○尺脉轉急如切繩轉珠者即產也脉經○離經六

至沈細而滑陣痛連腰胎即時脫丹心

保產

難產之婦皆是八九箇月內不能謹慾以致氣血虛耗故也（心）○大凡生產自有時候切不可強行服藥催生滑胎等藥又不可坐草早及令坐婆亂用手法良方○世之難產者多見於富貴安逸之人其貧賤辛苦者無有也古方有瘦胎飲（即千金一散本）爲胡陽公主作也以其奉養厚而氣盛故製此方以耗其氣實非極至之論也一婦人苦於難產後遇胎孕則觸而去之予以大全紫蘇飲加補氣藥與十數貼後得男而甚快因名其方曰達生散（丹心）○懷孕之婦不能轉動以致有橫生逆產甚則子死腹中慎之（丹心）○凡月數滿足方覺腹痛不可驚動大抵早令產母恐怖蓋恐則氣怯怯則上焦閉下焦悶氣乃不行以致難產急服紫蘇飲方見下以寬其氣（正傳）○子在母腹中全賴藥水之滋養十月數足而出夫胞漿者本胞內養兒之水也若胎元壯健者胞既堅牢破即隨漿而下故易產也其困弱者轉頭遲慢胞漿既乾汚血閉塞道路是以難產宜用催生如聖散催生丹神效乳珠丹佛手散如神散黑神散二退散三退散三退散六十散鬼腦丸龍蛻散黑龍丹催生散（諸方）○臨產飲食令人扶策徐徐而行若不得則倚物而立痛陣轉密產候將至然後坐草且進催生之藥直待兒頭逼產門用方一下自然易產（得效）○坐草之時驀然目翻口噤吐沫者宜用靈砂丹入門

瘦胎令易產

孕婦氣血虛弱者九十月之際不能謹守養胎而不能轉運者宜用達生散瘦胎丸神寢丸則自然滑而不能轉運者或肥盛以致氣血凝滯散佛手散益母丸縮胎丸束胎丸則易產無病大腹皮酒一錢人參陳皮紫蘇葉枳殼縮砂研各五分右㕮咀作一貼入青蔥五葉水煎服○或以煎水吞下末

達生散

孕婦臨月服二十餘貼易產無病大腹皮酒洗二錢甘州炙一錢半當歸白朮白芍藥各

母丸一尤佳 丹心 ○一名縮胎飲 丹心

瘦胎枳甘散 孕婦八九月內胎氣壅滿宜常服之令滑胎易產枳殼五兩甘草一兩右爲末每二錢白湯調服或加香附一兩尤妙 入門 ○一名枳殼散 直指

救生散 孕婦八月服之瘦胎易產勝於枳殼散人參訶子肉神麴麥芽白朮橘紅各等分右麪末每二錢水煎服 按將事

佛手散 孕婦臨月服之則縮胎易產自無難產之患當歸六錢川芎四錢右剉作一貼水煎臨熟去滓入酒少許再煎溫服若加入益母草三錢尤妙 入門 同春 ○一名芎歸湯即芎歸等分也

益母丸 催生神效益母艸於五月五日六月六日花正開時收採陰乾不犯鐵器搗爲末蜜丸彈子大每取五七十丸梧子大每服一丸白湯化下或丸如梧子溫酒或白湯下種杏 ○一名返魂丹催生易產

又治橫逆產產後百病入門

縮胎丸 孕婦八九箇月用之縮胎易產春秋七錢冬五錢炒赤芍藥白朮二兩陳皮三兩右爲末粥丸梧子大白湯下五七十丸 丹心

束胎丸 令縮胎易產白朮枳殼各等分右爲末以水浸燒餅和丸梧子大八九月每服五十丸白湯下 保命

神寢丸 能瘦胎易產枳殼二兩乳香一兩右爲末以煉蜜丸梧子大酒下三十丸 ○一名寤生丸 得效

十產候

十產候者一日正產二日坐產三日臥產四日橫產五日逆產六日偏產七日碍產八日盤腸產九日熱產十日凍產方良 ○又有傷產催產 同春

正產 正產、謂ニ月數已ニ滿忽然臍腹陣痛胎孕陷ー下漿水淋下ノ用ル力一一努其ノ兒遂ニ生ルヲ良方

坐產 謂下臨ー產孕婦疲倦久ク坐ニ椅凳ニ兒抵ニ生路ニ不ル能ニ下ー生ニ當ニ於ニ高處ニ懸ニ吊ル手巾ヲ令ニ產婦攀引ニ輕輕ニ扈ル足ヲ兒即順ー生ス良方

臥產 謂ニ產ー母臥定ニ背平ニ着ケ席ニ體不ニ優典則兒不ル失ニ其ノ道ヲ自然ニ易ニ產ス良方

橫產 謂下兒先ッ露ニ手或ハ臂ノ者上治法當ニ令ニ產ー母ヲ仰ル面ヲ安ニ臥收ニ生ノ之人徐ニ徐ニ先推ル兒ノ下ー截ノ令ニ直ニ上ー冲ス一通ル手以中ー捎ノ摩ニ其ノ肩ヲ推ル上ル而正ス之ヲ漸ノ引ル手ヲ攀テ其ノ耳ニ令ル頭ヲ正ス候テ兒ー身正ノ門路順ル卻服ニ催生ノ藥ヲ安ー祥ノ上ル草ニ自然ニ易ン產ス正傳

逆產 逆ー產、者先ッ露ル足橫ー產、者先ッ露ル手坐ー產ハ者先ッ露ル臀皆用ル力太ダ早キ之過ニ也若ニ手ー足先ッ露ル者、用テ細ー鍼ノ刺ニ兒ノ手ー足ノ心ヲ入ル一ー二ー分ニ三ー四灸刺之以ル塩ヲ塗ル其ノ上ニ輕ー輕ニ送ル入ル兒得テ痛ヲ驚キ轉ル一縮ル卽順ニ生ー下ス又兒ノ脚先ッ生ルヲ者、謂ニ之ヲ蹈ー蓮ー花生ノ急ニ以ル鹽ヲ塗ル兒ノ脚ー心ニ因テ急ニ撥キ之併ニ以ル鹽ヲ摩ニ母ノ腹ー上ニ則自然ニ正生ス矣正傳

偏產 謂ニ兒ー頭偏ー柱スル一傍ニ雖逼ニ近ル產ー門ニ初非露ニ正ー頂ニ止ル兒ノ近ル上ニ以ル手ノ正ス其ノ頭ノ令ル兒ノ頭頂端正ニ向ニ產ー門ニ一ー遍ル卽下ル○又有下兒ー頭後骨偏ニ柱スル穀ー道ニ者當ニ以ル綿ー衣ノ灸テ火ニ令ル熱セ裹ル手ヲ急ニ於テ穀ー道ノ外傍ニ徐ー徐ニ推ス之ヲ漸ー漸近ル上ニ令ニ頭ノ正カ然ル後ニ上ル卅ニ卽產ス正傳

礙產 謂下兒ー頭雖正ト產門已ニ露ス其ノ頂ヲ而不ル能ニ生ー下ス者ル此因テ兒轉ス之時臍帶擧テ掛ル兒ノ肩ニ致ス不ル能ニ生ス治法令ル產ー母仰ル卧收ニ生ノ之人輕ー輕推ル兒ノ近ル上ニ徐ー徐ニ通ス手ヲ以中ー按ス兒ノ兩肩ヲ理ス脫ル臍帶ノ候テ兒ー身正ー順ヲ用テ力一ー送ル卽產ス正傳

盤腸產 謂下孕婦臨ー產時子腸先ッ出テ兒卽隨テ產ス治法頂上貼ス如ル聖ー膏ノ方ハ見ル下自ー然收縮ノ卽以ル水ヲ洗ス去如ル腸ー頭爲ル風ノ吹キ乾ノ不ル能ハ收入ス以テ磨ル力水ヲ微ー温潤ス腸ヲ煎ル好ー磁右ー湯ヲ一ー盃產ー母飮ス之ヲ則其腸自收ル○又法

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

以溫湯一潤其腸一令產母仰臥一以言安慰卻用好醋半盞新汲水七分調和忽噦產母之面或背則收每一噦一縮三噦三縮腸已盡收矣 正傳

熱產 臨產時當盛暑宜居涼幽靜室日色遠處開窓戶多貯清水照水以防發熱之患 正傳

凍產 謂嚴冬解產宜密閉房戶內外生火常令煖氣如春仍厚覆下體常使溫和免致難產 正傳

傷產 傷產者過月而產有經一二年至二三四五年而產者或蒼皇用力太早漿水先下敗血暴注宜用勝金散或新汲水磨京墨一服之墨聚兒即出 入門

催產 臨產日久產母困倦宜服催生藥以助氣血氣令兒速生 回春

交骨不開難產 難產垂死及矮右女子交骨不開者用龜殼散兒腦丸來甦加味芎歸湯入門虛也亦用加味芎歸湯回春 ○凡產時交骨不開者陰氣虛也產前軟腰方烏梅生薑甘艸各等分剉

煎服便令腰骨軟易產不痛得效

催生如聖散 治難產及漏血胎乾者立效黃蜀葵子研爲末每取二錢以酒調濾去渣溫服 丹心 ○一方用蜀葵花爲末熱酒調下一錢即效 正傳 ○歌曰黃葵子炒百餘粒研爛酒調濟窘急若患臨危難產時免得全家俱哭泣 正傳

催生丹 治產難及橫產逆產臟腑皮膜研如泥乳香細末二錢麝香二分半右拌勻和丸二雞頭實大乾油紙裹每取一丸溫水二錢半磨化服即產隨男左女右手握藥出是驗也

神效乳珠丹 催生神效又治子死腹中不下明乳香晒乾每一丸冷酒化下未下再服 綱目

如神散 催產極驗臨產時令人取路傍草鞋一隻炙令熱取鼻絡小耳繩燒灰溫酒調服即產得左足者生男右足者生女覆者兒亦側者有驚自然之理也○一名神驗散 得效

二退散 治產難蛇退全者一條香白芷各一兩右爲末溫酒調下 丹心

治產難及橫逆產或子死腹中蛇退全者一條蟬退全者十四枚男子頭髮雞子大右俱燒存性爲末二服溫酒調下 入門○一名催生散 丹心○一名蛻散 得效

三退六一散 催生神效益元散一兩男子頭髮雞子大者香油熬化蛇退全者一條蟬退全者五枚穿山甲一片右各燒存性爲末用蠶水二盞煎沸入髮灰調服立下 入門○一名滑胎散 丹心

兎腦丸 治產難日久血乾宜用此滑之臘月兎腦髓一枚鼠肉腎一部母十一香益母草各一錢乳香二錢半麝香二分半右爲末兎髓和丸芡實大朱砂爲衣油紙裹陰乾每一丸醋湯化下即產男左手女右手握藥出是驗 入門

龍蛻散 催生祕傳蟬退一兩大蛇蛻一條並燒存性滑石各半麝香各一兩右爲末每二錢順流水微溫調服不可使熱湯得效

黑神散 治產難及橫逆產凡坐草日久漿水多下則其血必乾子道艱澀如舟坐灘須湧水而後可通服此藥再固其血則如魚得水之自轉生百卉霜白芷各等分右爲末每取二錢大棗三枚煎沸熟服不過再服即驗良方○一法服此藥後外用蔥白二斤搗爛鋪於小腹上取急水灘頭沙一斗炒熱布裹於蔥上輕輕熨之即產入門○一名催生如神散 一名神應黑散 丹心

黑龍丹 治產難及死胎不下胎衣不下產後兒枕痛血迷血暈一切危急垂死者灌藥得下無不

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

活神驗不可言五靈脂當歸川芎良薑熟地黃各一兩右剉盛砂盒紙筋鹽泥固濟炭十斤煅候冷取出卻入百艸霜三錢硫黃乳香各一錢半花藥石煆琥珀各一錢右研細末醋麪糊和丸彈子大每一丸入薑汁童便溫酒中細研服之丹心○一方靈脂當歸川芎良薑生乾地黃各一錢入雞子殼內鹽泥固濟火煆百艸霜一兩硫黃乳香各二錢琥珀花藥右各一錢製法同上正傳

催生散

治產難白芷炒黑百艸霜滑石各等分右爲末芎歸湯煎水調下二三錢正傳

勝金散

治產難及橫逆產隨鹽豉一錢右末秤鍾燒紅淬酒調下存性入麝香一錢一方良方

霹靂丹

治臨產驚然氣喪目翻口噤面黑唇青口中沫出子母俱殞兩腋微紅子死母活急用此救之一蛇一條盃退紙苴燒存性各二錢男子頭髮燒灰一路上左腳草鞋燒存性各二錢乳香五分黑鉛二錢半水銀七分半二物入銚中火上熔化結砂子研細右爲末以豬猪心血和丸梧子大一金箔爲衣每取二三丸倒流水送下如不下正傳化開灌之入門○一名霹靂奪命丹治產難日久不生男女婦人頭髮一握燒存性川芎當歸各一兩右爲末每三錢水一煎良久生胎永胎俱下入門

來蘇散

治臨產用力太過氣衰脈微精神昏暈口噤面青不省人事木香膠白芍藥各一錢芎根甘艸各三錢糯米一合加生薑三片煎服連用爲妙或斡開口灌下入門

加味芎歸湯

治臨產交骨不開難產即上龜殼散方也同春

催生安用滑利藥

凡催生多用滑利迅速之藥如鬼腦髓筆頭灰蛇退之類是也○若水血多下子道乾澁者如猪脂香油蜂蜜醇酒童尿葵子牛乳滑石榆白皮之類是也○若風冷或

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

入ㇾ氣血凝滯ㇾ者牛膝蔥白桂心生薑之類是也○若ㇾ觸ㇾ犯ㇾ惡氣心煩躁悶而難ㇾ產者宜ㇾ麝香朱砂乳香青竹茹之類ㇾ是也正傳○難產日久漿水多ㇾ下胞乾兒不ㇾ得ㇾ下香油清蜜各一ㇾ椀火上ㇾ微沸ㇾ調ㇾ滑石末一兩ㇾ攪ㇾ服之ㇾ外以ㇾ油蜜ㇾ摩ㇾ母臍上ㇾ即驗醫鑑○油蜜童尿和ㇾ服ㇾ最ㇾ治ㇾ難產ㇾ和ㇾ益母膏ㇾ尤妙○

榆白皮湯

榆白皮湯亦可ㇾ用丹心

治ㇾ產難胞乾不ㇾ下榆白皮冬葵子瞿麥各二錢牛膝麻仁去ㇾ殼各一錢

右剉作ㇾ一貼水煎服

禳法

臨產之初先脫ㇾ產婦壽衣常所ㇾ穿ㇾ以ㇾ籠ㇾ籠頭及籠口則易ㇾ產勿ㇾ令ㇾ產母知ㇾ得效○臨產取ㇾ赤馬皮ㇾ鋪之ㇾ令ㇾ產母坐ㇾ其上ㇾ則催生易ㇾ產○又法取ㇾ鼷鼠皮毛ㇾ即飛生也產母手ㇾ持之即奔產又海馬或石燕子兩手各把ㇾ一枚ㇾ即驗ㇾ本州

外貼法

凡ㇾ難產催生內服ㇾ湯丸ㇾ外用ㇾ藥ㇾ付貼ㇾ疾ㇾ有ㇾ十一全之效宜ㇾ如神丹遇仙丹諸方

如神丹

巴豆三枚草麻子七粒草麻子去ㇾ皮一兩雄黃二錢同研成膏塗ㇾ頂上ㇾ腸自入亦名如聖膏得效

捏作ㇾ餅子貼ㇾ臍中分產即以溫湯洗去○歌曰巴豆三草七脫ㇾ衣嘗ㇾ細研如泥入麝香捏作ㇾ彈丸貼臍下貼須臾子母便分危急者巴豆十六枚去ㇾ殼麝香二錢同搗如泥攤ㇾ絹帛上貼ㇾ臍上一時產下即洗去入門

如聖膏

治ㇾ難產及死胎不ㇾ下十九箇去ㇾ殼草麻子四十九粒去ㇾ殼入ㇾ朱砂末一方草麻子去ㇾ皮一兩雄黃研爲細末入ㇾ朱砂末ㇾ如ㇾ深桃花ㇾ色每ㇾ用三分井水調ㇾ如ㇾ薄糊用紙花剪ㇾ如ㇾ杏葉大攤ㇾ貼臍心候乾再易不ㇾ過三上效產母得效

遇仙丹

治法同上草麻子十四粒去ㇾ殼朱砂雄黃各一錢半蛇蛻一條燒存性爲末漿水飯和丸彈

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

子ノ大ニ歸ヲ用ヒ先ッ以テ椒湯ヲ漱キ漬ケ臍下ニ次ニ安ンジ藥一丸於ケ臍中ニ以テ蠟紙ヲ覆ヒ上ヲ以テ鼻ヲ繫リ定ム須臾ニシテ生ス下ス急ニ取リ去ル藥ヲ易ヘ之ヲ○胎死スル則チ母ノ舌必ス黑ンジ外證指甲青黒心腹脹悶口中極テ臭ク平胃散方ハ見ヘ五十藏一丸貼加ヘ朴硝五錢ヲ酒水相半煎服ス其ノ胎即化シ血水ニ而下ル得效○雙胎一死一生服スル此ヲ則チ死ス者出テ生ル者安ンジ蟹爪一升大甘艸五錢半生半炒東流水十盞煎ジ至ニ三盞ニ去ル滓ヲ入テ阿膠二兩半生半炒令ニ消化シ分ニ二三次ニ頓服ス即チ出ッ藥寵宜ク東ニ向テ用ヒ葦ヲ爲ス薪ト類聚○死胎著テ脊ニ不ル出氣欲ス升醇酒二升右ノ合ヒ煎メ取ニ二升ヲ分チ溫メ兩服ニ服ス即チ下ル良方○死胎不ル下ラ宜ク用ヒ佛手散三錢退散方ハ見ヘ上香桂散桂香散方ハ見ヘ上奪命丸烏金散催生散方ハ見ヘ上

佛手散 治ス胎傷心腹痛口噤欲ス絕ント用テ此ヲ探ル之ヲ胎不ル損則チ痛止子母俱ニ安ン若シ胎死スル則チ死ス立ニ便ニ逐ヒ下ス神效方ハ見ヘ上香桂散下ス死胎ヲ桂心三錢麝香半錢右爲ス末ト作ス一貼ト溫酒ニ調下ス須臾ニシテ即チ下ル正傳

桂香丸 下ス死胎ヲ肉桂一兩麝香一錢右爲ス末ト飯ニ丸ス菉豆ノ大ニ白湯ニ下ス十五丸入門

奪命丸 治ス胎死スル腹中ニ搶ク心ヲ悶絕シ欲ス死或ハ食ス惡物ヲ或ハ誤服ス草藥ヲ傷動胎氣ヲ胎未ダ損服之可シ安胎已ニ死ス可シ取リ出ッ此ノ方至テ効桂枝赤茯苓牡丹皮赤芍藥桃仁各等分蜜丸ス茯苓實ノ大ニ空心服ス三丸ヲ或ハ丸如ク彈子ノ大淡醋湯化シ下ス一丸ヲ○即仲景方桂枝茯苓丸也治ス婦人宿ニ有テ癥病ヲ而孕ム胎及ヒ三月ニ而漏血不ル止胎動在ル臍上ニ者爲ス癥ヲ害ス娠ヲ胎ヲ凡ソ胎動多ク在テ當ル臍ニ今動テ在ル臍上ニ者故ニ知ル是レ癥也當下其癥ヲ安ンジ胎ヲ用ヒ桂枝茯苓丸丹溪亦稱ス効良方

烏金散 治ス難産胎乾キ子死ス危急ノ者先ッ進テ佛手散ヲ探ル之ヲ的ニ知ル胎死スル則チ進ム此ノ藥ヲ後ニ更ニ進ム香桂散ヲ即チ下ス上ノ黒丸神散ノ名忠

一方 炙胎不下取烏雞一隻去尾細剉水三升煮取二升去雞用手巾蘸湯摩臍下即出 正傳 ○ 又黃牯牛糞熱塗產母之腹上即下 方見上

胞衣不下 凡產後胞衣不下稍久則血流入胞中胞爲血所脹上衝心胸喘急疼痛必致危篤宜急斷臍帶以小物繫帶牢固然後切斷使惡血不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱延數日亦不害人只要產母心懷安樂勿進粥飯終日下矣累試有驗 良方 ○ 胞衣不下切不可令坐婆妄用手法探取或因此而祖或損破尿胞爲終身之害可不謹歟 正傳 ○ 兒之初生惡血流入衣中衣爲血所脹塞故不能下須臾衝上逼心即死急服奪命丹貼如聖膏方見上 ○ 胞衣不下宜用黑龍丹 方見上 花蕊石散 飲返魂丹 方見上 一字神散

奪命丹 治產後血入胞衣脹滿衝心日久不下危急者附子炮五錢牡丹皮乾漆炒各一兩右爲末以醋一升入大黃末一兩熬成膏和丸梧子大酒下五十丸 丹心

花蕊石散 胞衣不下惟花蕊石散最爲要緊若胎衣上衝至死但心頭煖急以童便調一錢服之取下敗血如猪肝或化出其胞衣即下 方見諸傷 ○ 良方

牛膝湯 治產後胞衣不下腹滿即殺人服此即爛下滑石末二錢木通當歸牛膝瞿麥各一錢半冬葵子二錢右剉作一貼水煎服 局方

三退飲 治胞衣不下神效蛇退一條全者蚕退紙一方蟬退四十九箇右並燒存性爲末順流水調下立出 正傳

一字神散 治胞衣不下鬼臼黃色者研如粉不用羅過以手指撚之每服二錢至二八分服之立生如神此方救人幾萬數得效

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

一方 治胞衣不下猪脂白蜜清油各半盞於火上熔化溫分二服便下極驗一云但多多服猪脂亦佳（產書）○又方取三七姓家雞卵二枚三姓家水各一盞相和頓服仍探口令嘔即下（俗方）○又方童尿一升生薑葱白各二十錢右煎數沸熱服之（本草）○又以葱白濃煎湯薰洗下部即下（本草）○又法取初洗兒湯一盞服之勿令產母知之（產母之兒下同要）

產前諸證 有子癎子煩子癰子癱子淋子嘛子痢子瘧子懸癰

子癎 雖婦中風項背强直筋脈攣急口禁語澀痰盛昏迷時作時止或發搐不省人事名曰子癎（本草）亦曰兒癎甚則角弓反張宜用羚羊角湯輕者四物湯（方俗）見血門加葛根牡丹皮泰艽細辛防風竹瀝（入門）

羚羊角湯 羚羊角鎊獨活酸棗仁五加皮各一錢二分防風薏苡仁當歸川芎茯神杏仁各七分木香甘艸各五分右㕮咀作二貼薑三片水煎服（正傳）

子煩 雖婦心煩躁悶謂之子煩多於受胎後四五月間相火用事或值天令君火大行暑熱之時俱能發煩躁或胎動不安宜用竹葉湯竹瀝湯（入門）

竹葉湯 白茯苓二十錢麥門冬黃芩各一錢半防風一錢半甘草七片水煎服（同春）

竹瀝湯 赤茯苓一兩剉右以水一升半煎至半去滓和竹瀝一合服○又竹瀝細細飲之最妙（本草）

子腫 孕婦因胎中有水多於五六箇月以致遍身浮腫腹脹喘急或腹大異常高過心胷氣逆不安若不治必損其胎宜用鯉魚湯因常食鯉魚粥又茯苓湯防己湯全生白朮散亦佳○或頭面不腫兩腳微浮甚則自腳面腫至膝腿足指間有黃水出者謂之子氣亦曰脫脚平胃散加赤茯苓

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

桑白皮一煎一服入門

鯉魚湯 治子腫ヲ白朮赤茯苓各二錢白芍藥當歸各一錢半橘紅五分右㕮咀作一貼先ッ取鯉魚一箇ヲ修事如ク食法ノ水ニテ煮取清汁一盞半ヲ入藥及薑七片ヲ煎ヘ至一盞空心溫服ス以テ水盡腫消ヌヲ爲レ度良方

茯苓湯 治子腫ヲ當歸川芎白芍藥熟地黃白朮赤茯苓澤瀉條芩梔子炒ル麥門冬厚朴甘草各七分右㕮咀作一貼薑五片ヲ入煎服ス醫鑑

防己湯 治同レ上桑白皮赤茯苓紫蘇葉各二錢防己一錢半木香五分右㕮咀作一貼入薑五片ヲ水煎レ服ス綱目

全生白朮散 治同レ上白朮一兩生薑皮大腹皮陳皮茯苓皮桑白皮各五錢右爲レ末每二錢水一盞煮レ飲ニ調ヘ服ス正傳

一方 治子腫ヲ山梔子仁炒ル爲レ末每二錢米飲ニ調服ス不拘レ時ニ正傳 ○桑白皮五錢赤小豆三十合水煎服ス治ス子氣ヲ入門

子淋 妊婦熱積ニ膀胱一或ハ胎氣壅滿小便淋瀝作レ痛ヲ名ヲ曰ニ子淋一又謂ニ之ヲ子滿一宜シク澤瀉湯安榮散地膚子湯葵子茯苓散忘憂散或芎歸湯 方ハ見レ下 加木通麥門冬人參燈心甘草ヲ臨ニ月ハ加滑石ヲ煎服ス入門 ○轉胞ヲ一證胎婦禀受弱キ者憂悶多キ者性急躁者食味厚者大率有レ之因テ思ヲ胞爲ニ胎所レ壓轉メ在ニ一邊一胞系了戾メ不レ通耳胎若レ舉起ス懸テ在ニ中央一胞系得レ疎則水道自行宜シク用ニ參朮飲一空心煎レ飲ムニ隨テ以レ指ヲ探リ吐ス候テ氣定ルヲ又與又吐小便立ニ通ス歷レ試ニ皆效アリ丹心 ○妊婦胞轉不レ得レ尿ヲ腎氣丸 方ハ見ニ雜一勞ニ土ル之ヲ即八味丸 仲景正傳

澤瀉湯 治子淋ヲ澤瀉桑白皮赤茯苓木通各一錢半右㕮咀作一貼入薑五片ヲ空心煎服

安榮散 治同上人參川芎麥門冬木通滑石當歸燈心甘草各一錢右剉作一貼水煎空心服（得效）

地膚子湯 治同上地膚子車前子各一錢半知母黃芩枳殼赤茯苓白芍藥各一錢升麻通草各七分右剉作一貼水煎服（正傳）

葵子茯苓散 治孕婦小便不利冬葵子赤茯苓各等分右爲末每二錢米飲調下（仲景）

捻憂散 治子淋瑿珀爲末每半錢取灯草根一握煎湯調下（正傳）

參朮飲 治孕婦轉胞尿閉四物湯方見血門一材各一錢加人參白朮半夏陳皮各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三片水煎飲後探吐之又與又吐小便立通神效（丹心）

一方 治轉胞尿閉蔥白細切和鹽炒熱熨臍下立通（入門）

一法 治轉胞尿閉脹急令產婆香油塗手自產門入探起其胎則尿出如注脹急即解（丹心）○又法將孕婦倒豎起則尿自出亦妙（丹心）

子嗽 妊娠外感風寒久嗽不止謂之子嗽宜紫菀湯（入門）冬飲（諸方）

紫菀湯 治妊娠天門冬麥門冬各二錢桔梗一錢半杏仁桑白皮甘草各一錢右剉作一貼入竹茹雞子大水一盞煎七分去滓入蜜半匙再煎一沸溫服（綱目）

百合散 治子嗽百合紫菀茸貝母白芍藥前胡赤茯苓桔梗各一錢甘草五分右剉作一貼入薑五片水一盞煎服（得效方）

天門冬飲 治子嗽氣壅喘急胸膈痞滿蘇葉各一錢二分馬兜鈴桔梗各七分半右剉作一貼入薑三片水煎服（良方）

馬兜鈴散 治子嗽氣壅喘急胸膈痞滿天門冬麥門冬桑白皮各一錢半五味子甘州各七分半右剉作一貼入薑三片水煎服（良方）

天門冬飲 治子嗽天門冬麥門冬紫菀茸知母桑白皮各一錢半五味子桔梗各一錢右剉作一貼水

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

煎レ服ス
正傳

一方 治ス子ノ痢ノ貝母去レ心炒黃ヲ爲レ末ト以ヲ砂糖一屑ヲ拌セ和レ作ス丸ト櫻桃ノ大サ常ニ用テ含化ス神效ヲ得

子痢 雖レ振下痢赤白腹中疗痛裏急後重名ヲ曰ニ子痢一宜シ
當歸芍藥湯白芍藥湯白朮湯雞黃散鴨子煎○雖レ振泄瀉

宜シク用ニ訶ノ朮
散大寧ノ散ヲ

當歸芍藥湯 治ス子ノ痢ヲ白芍藥
茯苓澤瀉條芩各一錢半當歸白朮各一錢木香檳榔黃連
甘艸各七分右剉作ニ一貼ト水煎レ服ス
○白痢腹痛去レ芩連ヲ加レ乾薑ヲ正傳

白朮湯 治ニ孕婦下痢膿血ヲ白朮當歸黃芩
各三錢右剉作ニ一貼ト水煎レ服ス正傳

雞黃散 治ス子痢ヲ烏雞卵一箇傾ニ出シ清ヲ留レ黃黃丹一錢
入ニ雞子殼內ニ攪セ勻厚紙糊レ口ニ鹽泥固濟レ火煅キ
研テ爲レ末ト右每ニ取リ二錢米飲ニ調下ス一
服ヲ愈ル者ハ是レ男二服ヲ愈ル者ハ是レ女
本事

鴨子煎 治同レ上ニ生薑半斤少ノ者ハ百錢半老者ハ二百錢搗
取リ白然汁ヲ鴨子一箇打破レ入レ薑汁ノ內ニ攪セ勻右
同ク煎メ至ニ八分ニ入ニ蒲黃三錢ヲ再煎
五七沸空心溫服ス立ニ效ア本事

訶朮散 治雖レ振泄瀉由ニ食レ生冷ヲ當ニ風涼ニ所レ致ス訶子皮
白朮各一錢半陳皮良薑木香白芍藥酒炒
肉豆蔻煨甘草炙各一錢右
剉作ニ一貼ト薑五水煎レ服正傳

大寧散 治ニ雖レ振下痢赤白或ハ泄瀉腹痛垂レ久者ヲ黑豆
三十五粒罌粟殼二兩半生半炒甘草二十兩
半生炒右爲ニ麁末ト都作ニ一貼ト入レ
薑三片ヲ同煎空心服神效ア綱目

子癇 雖レ振婦患レ癇寒熱往來謂ニ之ヲ子癇一宜シ醒脾飲
子露薑飲方見ニ癇門一驅邪湯
生石膏湯

醒脾飲子 治ニ子癇寒癇ノ厚朴草豆蔻研各五錢乾薑
三分甘草二分右剉作ニ一貼ト入ニ薑五棗二
同煎空心
服ス入門

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

驅邪湯 治妊娠感冷發瘧良薑白朮草果橘紅藿香縮砂白茯苓各一錢甘草五分右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服丹心

濟生石膏湯 治妊娠熱瘧渴飲無度石膏二錢生地黃一錢半黃芩麥門冬人參知母乾葛各一錢甘草五分右剉作一貼入烏梅一箇同煎服丹心

子懸 妊婦胎氣不和逆上心胷脹滿疼痛謂之子懸宜用紫蘇飲蔥白湯本事

紫蘇飲 治子懸及臨產驚惶氣結難產最妙紫蘇葉二錢半人參大腹皮川芎陳皮白芍葉當歸各一錢甘草五分右剉作一貼入薑四片蔥白三莖水一升半煎服旅方

蔥白湯 治子懸蔥白二十莖卽二十握右以水一升半於銀石器內煮至半取汁頓服食蔥盡愈卽愈良方

感寒 孕婦傷寒產前安胎產後補血爲主治法無犯胃氣及上二焦爲三禁謂不可汗不可下不可利小便也但當和解小柴胡湯主之方見寒門一名三黃龍湯保命○妊婦感冒風寒頭痛煩熱宜芎藭散蛤粉藍根等分爲末貼臍上安胎極妙得效

芎蘇散 川芎紫蘇葉白芍藥白朮麥門冬陳皮乾葛各一錢甘艸五分右剉作一貼入薑五莖水煎服濟生

黃龍湯 治孕婦感寒熱如瘧柴胡四錢黃芩人參甘草各一錢右剉作一貼水煎溫服立效

保安白朮散 治孕婦傷寒安胎白朮黃芩各等分剉一煎水調下或同煎服亦可最妙寶鑑

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

蔥白湯 姙娠傷寒當發散宜用此湯蔥白十莖生薑切二兩右㕮咀以水一煎連服取汗活人

梔子大青湯 治姙婦熱病發癍黃芩升麻梔子各二錢大青杏仁各五分右㕮咀作一貼蔥白三莖同煎服綱目

孕婦不語 內經曰人有重身九月而瘖此爲何病岐伯對曰胞之絡脈絕也胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言無治也當十月復註曰分娩則自能言勿藥可也○孕婦瘖症不能言四物湯方見血門加大黃芩硝各一錢水煎去滓入蜜少許沈冷時時呷服心火下降肺金自清則能言矣入門

兒在腹中哭 兒在腹中哭者母膀帶上疾痛乃兒口中含者因姙母登高取物脫出兒口以此作聲也令姙母曲腰向一地捻物使兒復得含入口中則其聲即止正傳○一方黃連濃煎汁令母呷服亦止得效○又方多年空屋下鼠穴中土一塊令姙婦嚙之即止丹心

孕婦腹中鍾鳴 孕婦腹中作鍾鳴取多年空屋下鼠穴中土爲末酒服或乾嚙之即止入門

產後諸證 有兒枕腹痛血暈血崩血啼嗽咳逆產後不語產後見鬼譫妄產後發熱產後乳癰證下乳汁產後陰脫產後鬱冒產後風痙產後頭痛產後心腹腰脇痛產後嘔逆產後淋瀝遺尿產後泄痢產後浮腫結產後祕

兒枕痛 胎側有成形塊爲兒枕子欲生時枕破血下若敗血不下則成塊上作痛不可忍乃血瘕也宜用失笑散紫金丸三聖散黑龍丹方見諸傷起枕散立效散方見上花藥石散蓬朮玄胡索牡丹皮桃仁紅花煎服即效良方

失笑散 治產後兒枕腹痛欲死百藥不效五靈脂蒲黃炒各等分右爲末每二錢和醋煎成膏

入水一盞煎至七分熱服立效 句方

紫金丸 治同上右以失笑散末和醋熬膏丸如櫻桃大每二丸童便溫酒各半盞調服良方

三聖散 治產後兒枕痛極苦當歸白芍藥各二錢川芎一錢心各半兩右爲末每二錢童便或熱酒調下正傳○一名玄胡索散 得效

起枕散 治兒枕痛極苦當歸白芍藥各二十錢川芎一錢半白芷桂心蒲黃牡丹皮玄胡索五靈脂沒藥各七分右到作一貼水煎入好醋空心服醫鑑

立效散 治兒枕痛五靈脂炒爲末每二錢溫酒調下良方

一方 治兒枕痛百藥不效螃蟹一箇燒存性研爲末空心溫酒一盞調服立止生男用尖臍蟹生女用團臍蟹○一方螃蟹爛搗和酒服種本○又方眞蒲黃二錢白湯調下又大斧燒赤投酒中溫服

血暈 產後血暈由氣血暴虛血隨氣上迷亂心神故眼前生花甚者悶絕口噤神昏氣冷牙關緊用清魂散良方○產後血暈有二有下血多而暈者但昏悶煩亂而已當補血牙用芎歸湯方見下有下血少而暈者乃惡露上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人當破血行血牙奪命散花藥右散二方見諸傷良方○產後血暈牙用四味湯荊芥散醋墨法諸方

清魂散 治產後血暈荊芥穗五錢川芎二錢半人參澤蘭葉各一錢二分半甘草一錢右爲末以溫酒熱湯各半盞調二錢灌之下咽即甦良方

奪命散 治血暈譫妄沒藥血竭各等分右爲末每二錢以童便好酒各半盞煎數沸調服神效○一名血竭散丹心

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

四味湯 治産後血暈ヲ當歸玄胡索血竭沒藥各一錢右麁末ト童便ニ煎ル服ス丹心○或細末每ニ二錢童便ニ調下ス名ヲ曰ヲ四味散入門

荊芥散 治ス血暈ヲ如シ神荊芥穗搗テ爲ル末ト每ニ二錢童便一盞調ヲ熱ク服ス口噤ム幹開灌之ヲ湯液

醋墨法 防ク血暈ヲ墨半錠燒赤シ投ニ醋中ニ研細シ每ニ五分淡醋湯調下ス卽效ア良方

一方 醋破ル血暈ヲ取ニ羙淸醋ヲ熱シ煎ル稍冷ヲ含シ之卽愈又以醋ヲ噀ニ其ノ面ニ醒來與ル醋細ニ呷之又炊火沃ル醋ヲ常ニ聞ニ其ノ氣ヲ良方○又乾漆或舊漆器燒烟熏ス鼻ニ卽醒良方○又韭菜細切盛ル瓶中以熟醋沃シ之ヲ向テ産婦ノ面ニ熏ス其ノ氣ヲ卽醒良方○産婦房中常ニ得ル醋氣ヲ爲ル生ト酸ヲ益ル血ヲ故ニ也本草○又治ス血暈悶絶紅花一兩酒ニ煎服ス卽甦本草

又方 治産後忽昏悶不省人事者暴虛故ナリ也生雞卵二枚呑之若未醒童便一升飲之又不醒竹瀝

服ス五合ヲ日三五次卽甦因以未或吹ル鼻中令ル嚏ヲ良方

血崩 産後血崩不止是謂ニ重傷ナリ宜ク大劑芎歸湯方ハ見ル下加ニ芍藥ヲ煎服ス之ヲ若小腹滿痛是肝藏已壞ル爲ル難治ス得ル效○産後血崩不止四物湯方見ル血門加ニ蒲黃生地黃汁阿膠蓟根陳艾白芷ヲ煎服ス雲岐○産時下ル血過多虛極生ル風ヲ唇青ヲ肉冷汗出ル目瞤命在ル須臾ニ切ニ不可ニ用正風藥ヲ反ヲ投ス乳香硫黃五靈脂大黃陰玄精石膏等分右將ニ前四石ヲ方ニ入ニ後四藥ヲ爲ニ末ト以ニ生地黃汁ヲ和ニ丸ニ梧子ノ大ニ溫酒下ス二三十丸得ル效

濟危上丹 治ス産時下ル血過多虛極生ル風ヲ唇青ヲ肉冷汗出ル目瞤命在ル須臾ニ切ニ不可ニ用正風藥ヲ反ヲ投ス乳香硫黃五靈脂大黃陰玄精石膏等分右將ニ前四石ヲ方ニ入ニ後四藥ヲ爲ニ末ト以ニ生地黃汁ヲ和ニ丸ニ梧子ノ大ニ溫酒下ス二三十丸得ル效

補氣養血湯 治ス小産後下ル血不止人參黃芪當歸白朮白芍藥酒炒芎藭艾葉阿膠川芎青皮香

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

附子炒、綿砂研、甘艸炙、各一
錢右一劑作一貼水煎服、同春

一方 治産後血崩、取木耳及二十斤、或半斤、者、燒存性、
爲末、入麝香末一錢、煨枳殼末二十錢右和勻、每
取一錢、以烏梅煎
湯調下、即止、丹心

衄血 産後口鼻黑色起、及鼻衄者名曰胃絶肺敗、此證
不可治、急用荊芥散方見上及攘法良方○産後
氣血散亂、入於諸經、不得還元、故口鼻黑色起、及
變鼻衄、名曰胃絶肺敗、宜用犀角地黄湯救之方
見血門○入門

攘法 急取絛線一條、拉産母頂心髮兩
條、緊緊繫産母手中指節、即止良方
産寶○産後喉中氣急喘促
産後喘極危多死也産寶
喘欬 者、因所下過多、榮血暴竭、衛氣無主、獨聚肺中、故
令喘也此名孤陽絶陰、爲難治、宜用大劑芎歸湯小
參蘇飲細目○産後喘急命在須臾、宜用奪命散

方、見上童便好酒各半盞、調和、熱服、惡血即下、喘
自定、或用獨參湯亦可方見氣門○入門○或人
參茯苓水煎服○産後咳
入肺、二母散感、宜旋覆花湯入門
二母散 治産後惡露流入肺經、咳嗽多是瘀血
苓人參各一錢桃仁杏仁各二錢右剉作一
貼水煎
服聖惠

小參蘇飲 治産後敗血入肺、面黑發喘欲死者、蘇木
二兩剉、水二椀煎至一椀、調人參細末二
錢服之
景岳

咳逆 産後咳逆不止、欲死者、桂五錢剉、薑汁二合、右同
煎溫服、二合以手疾摩背上、令熟時、塗藥汁盡

旋覆花湯 治産後感冒風寒、咳喘痰盛、旋覆花赤芍
藥荊芥穗半夏麻五味子麻黄赤茯苓杏
仁前胡甘草各一錢右剉作一
貼入薑三棗二水煎服三四

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

爲末。每服一錢。煎人參白朮湯調下。○一方。煎人參白朮湯調服。加甘草一錢。名曰八珍散。產寶

孤鳳散 治產後閉目不語。顚倒此由敗血干心。心氣閉塞。故舌强不語。宜七珍散。取一錢。熱水調下。不以時。產寶

產後見鬼譫妄 產後見鬼言語譫妄。昏暈宜八物湯加琥珀朱砂金銀箔各少許。服之。○療血迷心

各七分半右剉作一貼入薑二棗二水煎服正傳

栢子仁散 治產後譫言妄語皆心血虛熱所致栢子仁遠志人參桑寄生防風琥珀當歸熟地黃甘草各等分右剉每五錢先以白羊心一枚煮汁取二盞乃入藥煎至一盞去滓溫服正傳

產後發熱 產後血虛熱入血室以致發熱煩躁晝輕夜重或譫語如見鬼或往來寒熱宜用柴胡四物湯涼血地黃湯牛黃膏俱下命○產後發熱有五有去血過多者脈必虛大無力腹內無痛宜芎歸調血飲○有惡露不盡者必太小腹有塊作痛宜桃黑神散○有感風寒者當消導發散○有蒸乳者乳汁自愈醫鑒○產後因傷寒熱病熱入血室或有瘀血宜柴胡破瘀湯或柴胡地黃湯○產後發熱因風寒則宜用柴胡防歸湯竹葉防風湯○產後熱渴宜熟地黃湯人參當歸散入門○大小產熱入血室小柴胡加五靈脂佐以黃連赤芍藥清心涼血即效直指

柴胡四物湯 治產後發熱及熱入血室柴胡生地黃各二錢川芎赤芍藥當歸人參半夏甘草各五分右剉作一貼入薑三片水煎服○一名三元湯俱下命

涼血地黃湯 治產後發熱生地黃二錢赤芍藥當歸川芎各一錢半右剉作一貼水煎服和珍

牛黃膏 治產後熱入血室朱砂鬱金各三錢牛黃二錢龍腦五分右爲末蜜丸皂子大每一丸井水化下玉機

芎歸調血飲 治產後去血過多以致發熱心煩腹痛頭暈眼花或口噤神昏當歸川芎白芍白朮白茯苓熟地黃陳皮便香附烏藥乾薑甘草牡丹皮甘艸各七分半右剉作一貼入薑五棗二煎

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

服醫鑒

黑神散 治產每惡露不下以致發熱煩躁當歸熟地黃白芍藥酒炒肉桂甘艸炙各五錢沈香棕櫚灰蒲黃沒藥各二錢半乳香一錢半赤芍藥一錢血竭五分右爲末每二錢好溫酒調下

柴胡破瘀湯 治產後因傷寒熱病熱入血室或惡露不下者柴胡黃芩半夏甘草赤芍藥當歸生地黃各一錢桃仁五十箇五分右剉作一貼水煎服入血靈脂各

柴胡地黃湯 治產後熱入血室寒熱譫妄如見鬼柴胡生地黃各二錢人參半夏黃芩各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服得效

柴胡防歸湯 治產後發熱不因於血蓄血傷食蒸乳四證外果係風寒表證則用此當歸三錢川芎一錢半柴胡人參各一錢半夏陳皮防風各八分甘艸五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服入門

竹葉防風湯 治產後傷風頭痛發熱青竹葉二十片防風人參桂枝桔梗前胡陳皮赤茯苓各一錢右剉作一貼入薑三棗二水煎服入門

熟地黃湯 治產後虛渴天花粉二錢人參麥門冬各一錢半熟地黃一錢甘草五分右剉作一貼入糯米百粒薑三棗二水煎服得效

人參當歸散 治產後血生內熱煩渴當歸熟地黃白芍藥人參麥門冬各一錢桂皮五分右剉作一貼先以糯米一合煎至一盞去米葉乃入前藥及薑三棗二再煎服入門

一方 治產後發熱煩渴生地藕汁飲二升二合生地黃汁尤妙本州○又竹瀝飲一盃甚妙丹心○婦人

月經水飲之ヲ最妙俗方

產後乳懸證 詳見乳部

下乳汁 產後乳汁不行有二有氣血盛而壅閉不行者有氣血弱而枯涸不行者壅閉則宜用通乳湯二方並見乳部猪蹄粥良方○產後乳脉不行身體壯熱宜用玉露散良方下乳汁治法當參考乳部用之

玉露散 涼膈壓乳下乳汁藥一錢半人參赤茯苓甘草各一錢當歸五分右㕮咀作一貼水煎服良方

猪蹄粥 治乳無汁猪蹄四隻治如食法右水二斗煮取一斗去蹄入土瓜根通草漏蘆各三兩㕮咀煮取六升去滓入葱豉及小米煮作稀粥食之本草

一方 下乳汁立效茼苣子糯米各一合右細研水一椀攪勻入甘草末一錢煎頻頻呷服妙雲岐○又麥門冬末二錢酒磨屋角汁一盞調服又赤小豆煮汁飲又鯉魚羹食之本草

又方 治乳無汁猪蹄四隻治如食法右水二斗煮取一斗去蹄入土瓜根通草漏蘆各三兩㕮咀煮取六升去滓入葱豉及小米煮作稀粥食之本草

產後陰脫 產後陰門脫出蓋緣努力大過所致若脫肛狀逼迫腫痛清水續續小便淋露宜用當歸黃芪飲外用硫黃烏賊骨各五錢生腸不收入物湯方未付患處即效丹心○產後用酒炒黃芪爲君煎服外見虛勞加防風升麻須用酒炒黃芪爲君煎服外以檳根白皮五錢荊芥升麻藿香各二錢煎湯熏洗患處即入又枳殼二兩煎湯溫浸良久納入丹心○產後陰户突出四物湯方見血門加龍骨無則用五倍子連用二貼外以香油和湯洗患處且取如聖膏方見上貼頂上入門○產後陰户兩傍

腫痛手足不能舒伸用四季蔥入乳香末同搗成餅安於陰戶兩傍良久即愈 入門 ○子宮大痛不可忍五倍子白礬等分煎湯熏洗又爲末摻之入門 ○產後玉門不斂宜用硫黃湯○一法香油五斤煎熱盛盆坐其中一食頃以皂角末吹鼻作嚏即收 丹心 ○又取大紙揉爛醯油點火吹滅以煙熏產母鼻即上良方

當歸黃芪飲 治產後陰脫黃芪酒炒三錢人參當歸升麻各二錢甘草一錢右剉作一貼水煎服日二 丹心

硫黃湯 治產後玉門不斂硫黃四兩吳茱萸兔絲子各一兩半蛇床子一兩右研每五錢水一椀煎湯熏洗患處自斂正傳

陰脫治驗 一婦人產後陰戶中下一物如合蓮狀有二岐此子宮也必氣血弱而下墜遂用升麻當歸黃芪大料二貼與之半日已收但乾破一片如掌大落在席上其婦恐腸破哭泣予思之此非腸胃乃糟粕也肌肉破尚可補完若氣血充盛必可生滿用補中益氣湯 方見內傷去柴胡連進二三大劑而收後以四物湯加人參百餘貼連服三年後復生子 丹心

又法 聽產驚動用九太過以致盲膜有傷陰戶中垂出肉線一條長三四尺牽引心腹痛不可忍以羊微動則痛苦欲絕先服失笑散方見上數貼仍用生薑三兩斤淨洗不去皮搗爛清油二斤拌勻炒熟以油乾爲度卻用熟絹五尺摺作數層令婦人輕輕盛起肉線使之屈曲作一團納在水道口卻用絹袋裹油薑含稍溫付在肉線上熏之覺薑冷又用熨斗火熨之如薑氣已盡又用新者如此熏熨一日一夜其肉線已縮夜半再用前法越兩日肉線盡入腹中其病全安卻再服失笑散芎歸湯調理不可切斷肉線節不可治矣得效

鬱冒

婦人經水適下而發其汗則鬱冒不知人何也師曰經水下故爲裏虛而發其汗則表亦虛此爲表裏俱虛故令鬱冒也脈經○產後氣血昏冒不省移時方悟名曰鬱冒亦名血暈宜用參朮散噀鼻令嚏內服白薇湯二方並見救急門○婦人產後氣血昏冒不省瞑目無所知蓋因血暴去心神無所養故也瞑目合眼之病悉屬於陰去血補血又何疑焉參朮生活血湯主之方見胞門○東垣

產後風痙

凡產後發熱若舌寒唇急手指微動便急作風名曰痙痙之爲病口噤牙緊手足瘛瘲欲成破傷風宜歸荊湯加減用之○產後風痙口噤反張延潮者爲產宜交加散豆淋酒紫湯入門○產後痙血氣大虛不宜發表但用防風當歸散最效細目○產後風痙因虛遇風挾痰而作宜服人參竹瀝之類又竹瀝一升頻服大效千金○產後中風必當大補氣血然後治痰切不可作中風治而用發表出汗之藥八物湯方見虛勞加減用之爲可

歸荊湯

治產後風痙荊芥穗微炒當歸身尾各等分右爲末每三錢豆淋酒調下入門

獨活酒

治產後風痙獨活白鮮皮各五錢右剉酒二升煎取一升分二服本草

愈風散

治產後中風荊芥炒爲末每三錢豆淋酒調下入門

交加散

治產後痙生地黃汁炒生地黃汁炒生地黃各一斤生薑十二兩各搗自然汁以生地黃汁炒作一塊焙乾爲末每三錢溫酒調服入門

豆淋酒

治產後風黑豆一升炒熟乘熱投二升清酒中密封隨量飲之本草

紫湯

治產後痙生地黃各盞煮取七分去豆空心頓服良方

防風當歸散

治產後痙防風當歸川芎熟地黃各二錢半右剉作一貼水煎服海藏

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

血風湯 治產後諸風攣急或瘈瘲弱川芎當歸熟地黃白朮白芍白茯苓各一兩白芷藥秦艽羌活白芷各七錢防風五錢右以一半爲細末溫酒調下二錢以一半爲末蜜丸梧子大溫酒吞下五七十丸丹心

產後頭痛 凡產後發熱身痛頭疼不可便作感冒治之此等多是血虛或敗血作祟宜玉露散方見上或四物湯加柴胡煎服良方○產後頭痛宜用一奇散即芎歸湯也加荊芥穗二錢煎服必效○一婦產後患頭痛與心痛互作苦極欲死用黑龍丹方見上一丸下咽蝗虫子惡物三升許即愈良方

產後心腹腰脇痛 產後心腹疼痛全是瘀血宜八味黑神散四味散方見上失笑散方見上○入門○產後惡露斷絕腰腹重痛宜桃仁湯桃桂當歸丸良方○產後胃腹脇腰痛此惡血爲患

四物湯倍芎歸加鬼箭羽紅花玄胡索各一錢煎冰調沒藥散服之即效○保命○產後血佐肝丸右脇痛宜養血丸醫鑑○冬月解產臍下痛宜羊肉湯仲景○產後血痩痛無定處童尿三升生地黃汁生藕汁各一升生薑汁二升右先煎三味約三升減一分乃下薑汁慢火煎如稀餳每取一合溫酒調服良方

八味黑神散 治產後惡露不盡心胷腹撮痛及血迷血暈蒲黃赤芍藥乾薑肉桂當歸熟地黃甘艸各一兩黑豆四兩炒右爲末每二錢童便溫酒調下局方○本方加百草霜五錢又名烏金散得效

桃仁湯 治產後惡露不行忽然斷絕腰腹重痛或流注腿股作痛桃仁蘇木生地黃各五錢蜣虫水蛭並炒各三十枚右爲麁末每三錢水一盞煎至六分去滓溫服惡血下即止如有大痛處必作

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

癰疽、宜取五香連翹湯方、見癰疽
去大黃水煎入竹瀝服之良方

桃柱當歸丸 治產後惡露方行忽然斷絕驟作寒熱
臍腹百脉皆痛狀如錐刺桂心赤芍藥
各五錢當歸桃仁沒藥各二錢半蛀虫水蛭並炒
各三十枚右爲末醋糊和丸豌豆大醋湯下二三
十丸
良方

沒藥散 治產後血瘀作痛沒藥二錢蛀虫炒二錢水
保命 蛭炒一錢麝香一字右爲末每取二錢服之

養血佐肝丸 治產後左脇脹悶一塊痛臥不著席香
附醋炒一兩當歸川芎白芍藥酒炒陳
皮半夏油炒白朮炒青皮油炒神麴炒蘿蔔子炒
牡丹皮紅花白茯苓各一兩柴胡酒炒桃仁炒各
八錢草龍膽酒洗六錢三稜蓬朮並醋炒各五錢
右爲末酒糊和丸梧子大空心白湯下百丸 醫鑑

推氣養血丸 治產後右脇膨脹有塊如豎弦一條着
冷便疼便香附二兩當歸川芎白芍藥
酒炒白朮土炒青皮油炒神麴乾薑炒黑白芥子炒
各八錢麥芽炒肉桂各六錢木香三錢右爲末
醋糊和丸梧子大空心以米飲吞下百丸 醫鑑

羊肉湯 冬月解產寒氣入產門臍下脹痛手不可近
此寒疝也羊肉四兩當歸陳皮各二兩生薑
一兩右剉水三椀酒一盞煎至一椀去滓分二次溫服 正傳

產後嘔逆 產後腹脹滿悶嘔吐不定此由敗血入脾胃
故不能飲食也宜用抵聖湯香靈丸 正傳

抵聖湯 治產後嘔逆惡心不能飲食赤芍藥半夏澤
蘭葉人參陳皮各一錢半甘草五分右剉作
二貼入薑七片水煎服滓
生○一名拒勝湯 正傳

香靈丸 治產後嘔不止丁香辰砂別研各六分五靈
脂一錢右研勻用狗膽或猪膽和丸芡實大

以生薑陳皮煎湯磨化一丸服之本事

產後淋瀝遺尿 婦人產理不順致傷遺尿無時宜用參朮膏丹心○產後遺尿宜桑螵蛸散○產後淋宜用茅根湯三因

參朮膏 治產後脬損成淋人參二錢半白朮二錢黃芪一錢半陳皮白茯苓各一錢甘草五分右㊀劑作一貼水煎猪羊脬一個後入藥再煎去渣溫服空心○一產婦因收生者不謹損破尿脬而致淋瀝不禁遂爲廢疾因思肌肉在外而破尚可補完診其脈虛甚試與峻補之服參朮膏至一月而安蓋血氣驟長其脬自完恐稍遲求難成功丹心

茅根湯 治產後淋白茅根四兩白茯苓二兩雞子人參各一兩白朮二錢半黃芪甘草各五錢桃膠滑石甘草各五錢紫貝五箇石膏魚頭中石十六箇右爲末每二錢木通湯調下或爲麪末三錢燈心同煎服亦可三因

桑螵蛸散 治產後淋數及遺尿桑螵蛸十五箇燒灰存性不得犯油火入麝香少許研爲末每取一錢沸湯一二呷調服神效得效

產後大便祕結 產後有二種疾鬱冒則多汗汗多則大便難蓋新產血虛多汗出致胃燥以津液

茸酥炙黃芪各一兩半壯蠣粉人參赤石脂厚朴各一兩右爲末空心以米飲調下二錢雲岐○又桑螵蛸酒炒爲末薑湯調下二錢亦效綱目

黃芪芍藥湯 治產後遺尿不禁黃芪當歸尾白芍藥甘草各一錢半白朮一錢人參陳皮各五分右㊀劑作一貼水煎空心服三因

產後泄痢 產後泄瀉宜的奇散煎方見上又四物湯加桃仁黃連木香主之入門○當歸芍藥散亦可方見通治

的奇散 治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸爲瀉下青黑色物是驗大荊芥穗於蓋內燃火燒存性不得犯油火入麝香少許研爲末每取一錢沸湯一二呷調服神效得效

產後大便祕結 產後有二種疾鬱冒則多汗汗多則大便難蓋新產血虛多汗出致胃燥以津

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

液故大便祕結宜蘇麻粥方見大便及滋腸五仁丸正傳○產後大便不通膨滿氣急難以坐臥取麥蘗末酒調下一合神效并心

滋腸五仁丸 治產後陰血虛耗大便閉澀橘紅末四兩杏仁桃仁各一兩栢子仁五錢松子仁二錢半郁李仁一錢右各別研爲膏合橘紅末蜜丸梧子大一二錢下五十六十丸正傳

產後浮腫 產後浮腫此由敗血循經流入四肢故也血行腫消即愈或敗血停蓄血化爲水而浮腫宜大調經散小調經散正脾散良方○產後浮腫必大補氣血爲主四君子湯方見氣門加蒼朮煎服忌峻利之劑或用五味白朮散心

大調經散 治產後腫滿喘急尿澀黑豆炒一兩茯神五錢琥珀一錢右爲末烏豆紫蘇葉煎湯調下二錢良方

小調經散 治產後浮腫當歸一兩桂心赤芍藥各五錢沒藥琥珀甘草各二錢細辛麝香各一錢右爲末每二錢燈心木通湯調下

正脾散 治產後通身浮腫蓬朮炮香附子陳皮茴香甘草炙各等分右爲末每二錢溫薑棗湯調下正傳

五味白朮散 治產後腫澤蘭防己各等分右爲末每二錢溫酒或醋湯調下心

陳皮一錢半木通川芎赤茯苓各一錢右剉作一貼入水煎呑下與黑丸方見火門二十五丸心

澤蘭散 治產後風腫水腫澤蘭防己各等分右爲末每二錢溫酒或醋湯調下心

產後脉法

婦人產後之脉洪實不調者死沈微附骨不絕者生○診婦人新產脉沈小者生實大堅強急者死脉經○新產之脉緩滑吉實大弦急者死來侵又云沈細附骨不絕生脉訣

產後治法

產後當ニ大ニ補ニ氣血ヲ爲ス先ト宜シク用ユ補虛湯ヲ雖レ有ニ雜證ニ以未タ治セ之ヲ○又云胎前ハ毋滯ル產後ハ毋虛ス產後切ニ不レ可ヲ發ル表ヲ又不レ可ヲ用ユ芳藥ヲ以ヲ性味酸寒能ク伐ツ生發之氣ヲ故也丹心○產後必ス先ツ逐イ瘀ヲ補テ虛ヲ爲レ主ト瘀消ス然ル後ニ方ニ可シ行シ補ヲ如シ不レ逐ハ瘀ヲ邊ニ服ス參芪ノ之屬ヲ或ハ致ス瘀血攻テ心ヲ卽危キヲ入門○產後用ユ補虛湯ヲ如シ發熱ス輕スレハ則加テ茯苓ヲ淡滲之ヲ重スレハ則加レ乾薑或ハ問ヲ大熱用ユ乾薑ヲ何ソ也曰此非ス有餘之邪乃陰虛生ス內熱ヲ耳蓋シ乾薑能ク入テ肺ニ分利ス肺氣ヲ又能ク入テ肝ニ經ニ引ス衆藥ヲ生ス血ヲ然必與ニ補陰藥ニ同ク用レ之此ニ造化之妙非ス天下之至神ニ其レ能ク與ニ於此ニ哉丹心○大抵產後病天行則用ユ增損柴胡ヲ卽小柴胡湯也雜病則用レ加減四物ヲ卽四物湯也四物加減法春倍ス當歸ヲ夏倍ス芎藥ヲ秋倍ス地黃ヲ冬倍ス當歸川芎ヲ夏倍ス人參白朮各一錢半當歸川芎黃芪陳皮各一錢甘草七分右剉作レ一貼入レ薑三片ヲ水煎服ス熱輕ス倍ニ加茯苓ヲ熱重ス加ニ酒芩ヲ熱甚ス加レ乾薑炒黑ニ引ス諸藥ヲ入テ肝經ニ生ス血ヲ入門

補虛湯

一錢甘草七分右剉作レ一貼入レ薑三片ヲ水煎服ス熱輕ス倍ニ加茯苓ヲ熱重ス加ニ酒芩ヲ熱甚ス加レ乾薑炒黑ニ引ス諸藥ヲ入テ肝經ニ生ス血ヲ入門

產後虛勞

產後未レ滿ル月ニ不レ宜下多ク用ユ七情勞倦行動ヲ或ハ作レ咳嗽頭目昏痛發レ渴盜汗寒熱如レ瘧十全大補湯方ハ見レ虛勞去川芎ヲ加ニ續斷牛膝龜甲桑寄生桃仁爲ス飴末先ツ將ニ猪腎一對薑至ニ一盞半ニ入前藥ノ末三錢及ヒ蔥白三寸烏梅一箇荊芥五穗ヲ再煎ス至ニ七分ニ去レ滓空心溫服ス入門○產後蓐勞宜シク用ユ當歸建中湯方ハ見レ虛勞增損四物湯人參龜甲散熟乾地黃散諸方

當歸羊肉湯

治ス蓐勞ヲ肥羊肉四兩當歸川芎黃芪各一兩二錢半生薑一兩半右剉水九盞煎ス至ニ三盞ニ分ニ三服ス良方無羊肉代ユ以ニ猪肉腎一雙ヲ入門

增損四物湯

治ス產後ニ血勞虛損乍レ寒乍レ熱ヲ四物湯去レ熟地黃加ニ人參乾薑甘艸等ニ分ニ煎

服濟生

人參鼈甲散 治產後虛勞黃芪鼈甲各一錢二十分半牛膝一錢人參桂心桑寄生當歸白芍藥桃仁熟地黃麥門冬甘草各七分半續斷五分右㕮咀作一貼空心水煎服得效

熟乾地黃散 治產後氣血未復而有房事勞損下血頭目沈重熟地黃一錢半當歸蟹爪微炒鹿角膠珠男子褪布燒存性各一錢伏龍肝七分半蒲黃炒白芍藥白芍藥各五分桂心甘艸各二分半右㕮咀作一貼入青竹茹一錢水煎服正傳

過月不產 妊娠之婦有按月行經而胎自長者有二三箇月間其血大下而胎不墮者或及期而分娩或逾月而始產其理何歟曰其按月行經而胎自長者名曰盛胎蓋其婦氣血充盛養胎之外其血尤有餘故也其有數月胎而血大下者謂之漏胎蓋因事觸動經脈故血下而未傷於子宮故也雖然孕中失血胎雖不墮其氣亦虛多致逾月不產予曾見有二十七八月或二十四五箇月生者往往有之俱是氣血不足胎難長故爾凡十月之後未產者當服大補氣血之藥以培養之庶分娩之無虞也正傳

○過月不產用八物湯方見虛勞加黃芪鹿角膠珠煎服峻補之正傳

○又方四物湯方見血門加香附桃仁枳殼縮砂紫蘇葉水煎服即產

妊娠通治 宜用芎歸湯四物湯方見血門保安丸當歸芍藥散益母丸方見上

芎歸湯 治產前產後諸疾及血暈不省橫生逆產死胎不下血崩不止臨月服之則縮胞易產產後服之則惡血自下川芎當歸各五錢右㕮咀作一貼水煎服日二三次○又治氣血多崩中去血多金瘡去血多一切去血過多眩暈悶絕不省人事者連進數服即甦得效○當歸六錢川芎四錢名佛手散方見上

保安丸

治產前產後諸疾生乾地黃別爲末馬鳴退炙卽酥炙退紙各一兩赤茯苓藥各七錢半川芎細辛人參肉桂當歸牛膝白芷木香藁本麻黃澤蘭葉附子炮甘草炙風桔梗蟬退各五錢石葦黃芩各二錢右爲末蜜丸彈子大酒下一丸

當歸芍藥散

治胞痕心腹痛及泄痢產前產後通用歸赤茯苓白朮各七分半右㕮咀白芍藥二錢半川芎澤瀉各一錢半當水煎服或爲細末溫酒調下二錢局方

益母丸

一名濟陰丹治產前產後一切諸病及難產橫逆能行血養血安胎順氣又能活血行氣有補陰之妙故名益母方見上○丹心

益母膏

一名返魂丹通治胞痕諸病及催生神效又治橫生逆產及死胎不出胞衣不下益母草重午日不犯鐵器採取洗淨搗取汁銀石器熬成膏石每取二大匙溫酒或白湯化下○丹心

斷產

婦人產育艱難或一產可以此少間之四物湯加芒硝臺子一撮煎於經行後空心服得效○母門○胞衣不下因疾病胎不能安有宿疾終不可保胎者牛膝四分曜麥桂心蟹爪各二分爲末空心溫酒調服以下之免害其母入麥芽神麴各半升和水煮服之卽下神效○又方附子二枚爲末醋調塗母右足心大良○又方好酒五升打糊作糊煮至二升半以絹濾去滓作三服候月經將來日晚服一服次日五更服一服天明服一服月經卽行終身不產○又方故氈方圓一尺燒存性爲末酒調服終身不復懷孕良方○又方油煎水銀空心服如棗核大一丸永斷不損人良方

寡婦師尼之病異乎妻妾

宋諸證療師尼寡婦別製方蓋有謂也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭作寒作熱全類溫瘧久則爲勞史記倉公傳載濟北王侍人

轟女病腰背痛寒熱衆醫多以爲寒熱倉公曰病得之欲男子不可得也何以知之蓋男子以精爲主婦人以血爲主男子精盛以思室婦人血盛以懷胎如厥陰脈弦出寸口又上魚際則陰盛可知故知諸氏之言有謬矣（寶鑑）○寡婦師尼鬱抑成病其證惡風體倦作寒作熱面赤心煩或時自汗肝脈弦長而出寸口宜柴胡抑肝湯芙蓉散抑陰地黃丸越鞠丸方見積聚○每日上午神思昏憒怕見明處惡聞人聲至午後方可頭昏腹痛驚惕稍涉勞動與月經來時其證尤劇此不得遂志之故也宜清神養榮以四物湯加人參茯神陳皮柴胡羌活香附子甘草煎服○或有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脈遲伏或如雀啄顏色不變者宜茯神黃芪

柴胡抑肝湯

治寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂以致寒熱類瘧柴胡二錢青皮一錢半赤芍藥牡丹皮各一錢地骨皮香附子梔子蒼朮各七分川芎神麴炒各五分生地黃連翹各三分甘

芙蓉散

治男無室女無夫思慾動火以致贅痛自汗煩赤脈亂用芙蓉葉有花帶花有子帶子採一朵搗爛和井水濾去滓服之即效入門

抑陰地黃丸

治寡婦勞證生乾地黃二兩赤芍藥一兩柴胡黃芩秦艽各五錢右爲末蜜丸梧子大烏梅湯下三五十丸入門

茯神黃芪湯

茯神羌活蔓荊子防風薏苡仁黃芪五味子麥門冬石菖蒲黃芩各一錢甘卅五分右剉作一貼水煎服入門

藏燥證

婦人藏燥悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大棗湯主之仲景○有自哭自笑者紅棗燒

存性米飲入門調服

甘麥大棗湯 甘草一兩小麥三合大棗七枚右㕮作一貼水二升煎至一升溫服產前產後皆可用仲景

治驗 鄉里有一婦人數次無故悲泣不止或謂之有祟祈禳請禱皆不應予急以甘麥大棗湯服之二貼而愈本事

臨產預備藥物

芎歸湯 ○四物湯 ○催生丹 ○香桂散 ○紫蘇飲 ○花蕊石散 ○失笑散 ○奪命散 ○三退散 ○益母丸 ○返魂丹 ○如神散 ○凉血地黃湯 ○黑龍丹 ○霹靂丹 ○催生如聖散 ○犀角地黃湯 ○如聖膏 ○生蔥 ○生薑 ○革麻子 ○海馬 ○石燕子 ○猪脂 ○香油 ○益母草 ○白蜜 ○阿膠 ○雞卵 ○清酒 ○米醋 ○竹瀝 ○紅花 ○荊芥 ○蒲黃 ○陳大艾 ○生地黃 ○滑石 ○麝香 ○朱砂 ○皂莢 ○鼷鼠皮

婦人雜病

婦人者衆陰之所集常與淫君十五以上陰氣浮溢百想經心內傷五藏外損姿容月水不行凝中道斷絶其中傷墮不去留前後交牙瘀血停滯方寸而論所以婦人別立方者以其氣血不調胎娠產生崩傷之異故也婦人之病與男子十倍難療以其嗜慾多於丈夫感病之倍於男子加以疾妒憂恚慈戀愛憎淚著堅牢情不自抑所以爲病根深也聖惠 ○七癥八瘕九種之心痛十二帶下共三十六病雖有名數莫詳證狀推原其理無非血病得效 ○婦人氣盛於血所以無子且變生諸證頭暈腸滿宜抑氣散異香四神散入門 ○婦人虛勞宜用滋陰百補丸人參荊芥散逍遙散加味逍遙散滋血湯滋陰地黃丸茯神湯三合湯 ○身有血線宜橘歸丸 ○百病通治宜神仙聚寶丹濟陰丹方見上益母丸益母膏方並見上 ○虛勞熱嗽無汗宜補心湯治虛勞至寶湯治虛勞熱

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

嗽有汗
同春

和氣散 香附子四兩陳皮二兩茯神甘草各一兩右爲末每二錢沸湯點服入門

異香四神散 香附子四錢陳皮三錢烏藥二錢甘草各一錢右㊀作一貼入薑二片棗二枚水煎服入門

滋陰百補丸 治氣血不足作寒作熱不思飲食肌羸無力四製香附末八兩（四製之法詳見胞門）蒼朮草末四兩當歸三兩川芎熟地黃白朮各二兩白芍藥一兩半白茯苓人參玄胡索各一兩甘草五錢右爲末蜜丸梧子大或酒或醋湯或白湯下五七十丸入門

人參荊芥散 治血風體痛寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胃滿或月水不調臟腹疼痛疫癖成塊人參荊芥生乾地黃柴胡鼈甲酸棗仁炒枳殼羚羊角白朮各七分半桂心川芎當歸防風牡丹皮赤芍藥甘草各五分右㊀作一貼入薑三片水煎服入門

逍遙散 治月經不調及血虛五心煩熱寒熱如瘧白朮白芍藥白茯苓甘草薄荷各五分右㊀作一貼入薑三片水煎服入門

加味逍遙散 藥白朮各一錢二分知母地骨皮當歸各一錢白茯苓麥門冬生地黃各八分梔子黃柏各五分桔梗甘草各三分右㊀作一貼水煎服入門

滋血湯 治婦人心肺俱損血脈虛弱皮聚毛落或月水愆期當歸白芍藥山藥黃芪熟地黃各一錢半人參川芎白茯苓各七分半右㊀作一貼水煎服丹心

滋陰地黃丸 治虛勞吐衄血發熱痰嗽盜汗心悸或經水不調不通熟地黃薑汁浸焙四兩山茱萸山藥天門冬麥門冬生乾地黃酒洗知母酒炒貝母炒當歸酒洗香附米童便浸炒各

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雜病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

二十兩白芍藥牡丹皮澤瀉各一兩半右爲
末蜜丸梧子大空心鹽湯下百丸醫鑑

芎神湯 治婦人風虛夢與鬼交妄有所見言語譫亂
白芎神一錢半白芍藥人參石菖蒲各一錢
赤芍藥五分右剉作一貼水煎空心服醫鑑

三合湯 治婦人虛勞鍼灸不效者白芍藥當歸白芍藥
黃芪白芍藥熟地黃川芎各一錢柴胡人參
各七分半黃芩半夏甘草各五分半右剉作一貼
入薑三棗二水煎服保命○即八物湯合小柴胡
湯三方合劑也一
名三分散入門

橘歸丸 治婦人肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝
血失常經故也橘紅四兩當歸二兩右爲末
蜜丸梧子大溫酒下五七十丸入門

神仙聚寶丹 治經候不調及血氣攻注腹脇疼痛積
聚成塊及婦人諸疾琥珀當歸各一兩
沒藥乳香各二錢半辰砂末滴水爲丸每兩作十五丸每一丸溫酒磨下
方同

滋陰至寶湯 治婦人諸虛百損五勞七傷經脉不調
寒熱羸瘦當歸白朮各一錢白芍藥芩陳
皮知母貝母便香附地骨皮麥門冬白芍藥酒炒
各八分柴胡薄荷甘草各五分右剉作一貼薑三
水煎服
醫鑑

安產至寶 妊娠入月便爲產圖一本貼掛產母房內北壁上
隨月換圖不用入節之日只於朔日貼之良
方○又貼催
生符借地法

安產方位圖


庚寅甲卯乙辰
大將軍
雷船
時藤
東
未
丁
坤
丙
午
正月圖
凶
凶
凶

月空壬庚丙甲壬庚丙
生氣子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

催生符



右符以朱砂書之貼於房內北壁上遇坐草之時
劑於鍼上就燈燒之不得飛揚溫水調服妙良方

體玄子借地法

咒曰東借十步　南借十步　西借十步　北借十步
上借十步　下借十步

步壁房之口四十餘步安產借地恐有穢汚或有
東海神王或有西海神王或有南海神王或有北
海神王或有日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅
招搖樂高十丈大符地軸入地十丈令此地空閑
產婦某氏安居無所妨碍無所畏忌諸神擁
護百邪逐去急急如律令勅讀三遍得效

月遊胎殺所在

正月在房上　二月在門堂　三月在竈　四月在
月在床倉　七月在碓磨　八月在廁戶　九月
在門房　十月在床房　十一月在爐竈　十二
月在床
房局方

日遊胎殺所在

甲己日在門　乙庚日在碓磨竈　丙
辛日在井竈　丁壬日在廚廁　戊癸
日在米倉　子丑日在中堂　寅卯辰西日在竈
巳午日在門　未申日在籬下　戌亥日在房
凡胎殺所在不可修整雖隣家興動孕婦當避
縱不墮胎令兒破形色青體攣竅塞或至夭殞可

不戒之局方

房中日遊神所在

癸巳甲午壬未丙申丁酉日在二房內一北二〇癸卯日在二房內一西二〇甲辰乙巳丙午丁未日在二房內一東二〇庚子辛丑壬寅日在二房內一南二〇凡遊神所在忌安レ床換レ帳致レ動レ物於床中一必主二傷レ產墮レ胎一宜方

推二婦人行年一法

逐レ一排レ行年吉凶于後按ス右件七神詳二斷吉凶一局方

宜・宜　生　禍絕開八反懸
臥　著　氣害命肚疰支尸
方　衣　方方方方月方方

十三歲庚申　西南黃衣坤離巽辛甲正七辰戊

十四歲己未　正南赤衣離坤兌壬癸二八卯酉

十五歲戊午　正北黑衣坎乾艮癸壬三九寅申

十六歲丁巳　正東青衣震艮乾甲辛四十丑未

十七歲丙辰　東北黃衣艮震坎乙庚五十子午

十八歲乙卯　西北黑衣乾坎震丙丁六十二巳亥

十九歲甲寅　正西白衣兌巽離丁丙正七辰戊

二十歲癸丑　東南黃衣巽兌坤庚乙二八卯酉

二十一歲壬子　西南黃衣坤離巽辛甲三九寅申

二十二歲辛亥　正南赤衣離坤兌壬癸四十丑未

二十三歲庚戌　正北黑衣坎乾艮癸壬五十一子午

二十四歲 巳酉
正東青衣 震艮
乾甲辛六十二巳亥

二十五歲 戊申
東北黃衣 艮震
坎乙庚正七辰戊

二十六歲 丁未
西北白衣 乾坎
震丙丁二八卯酉

二十七歲 丙午
正西白衣 兌巽
離丁丙三九寅申

二十八歲 乙巳
東南青衣 巽兌
坤庚甲四十丑未

二十九歲 甲辰
西南黃衣 坤離
巽辛乙五十子午

三十歲 癸卯
正南赤衣 離坤
兌壬癸六十一巳亥

三十一歲 壬寅
正北黑衣 坎乾
艮癸壬七辰戌

三十二歲 辛丑
正東青衣 震艮
乾甲辛八十九卯酉

三十三歲 庚子
東北黃衣 艮震
坎乙庚三九寅申

三十四歲 己亥
西北白衣 乾坎
震丙丁四十丑未

三十五歲 戊戌
正西白衣 兌巽
離丁丙五十一子午

三十六歲 丁酉
東南黃衣 巽兌
坤庚乙六十二巳亥

三十七歲 丙申
西南黃衣 坤離
巽辛甲正七辰戌

三十八歲 乙未
正南赤衣 離坤
兌壬癸二八卯酉

三十九歲 甲午
正北黑衣 坎乾
艮癸壬三九寅申

四十歲 癸巳
正東青衣 震艮
乾甲辛四十丑未

四十一歲 壬辰
東北黃衣 艮震
坎乙庚五十一子午

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

四十二歲辛卯　西北黃衣乾坎震丙丁六十二巳亥
四十三歲庚寅　正西白衣兌巽离丁丙正七辰戌
四十四歲己丑　東南黃衣巽兌坤庚乙二八卯酉
四十五歲戊子　西南黃衣坤离巽辛甲三九寅申
四十六歲丁亥　正南赤衣离坤艮癸壬五十子午
四十七歲丙戌　正北黑衣坎乾艮癸壬五十子午
四十八歲乙酉　正東青衣震艮乾甲辛六十巳亥
四十九歲甲申　東北黃衣艮震坎乙庚正七辰戌

一生氣方　產婦安牀向之坐臥及床帳向之開門大吉　局方

二反支月　週此月即鋪灰用牛皮或馬驢皮訖鋪草勿令惡血汚地吉　局方

三禍害月　不得於其上產又不得向之大小便避之大吉　局方

四絕命方　不得於其上產又不得向之大小便避之大吉　局方

五懸尸方　週此日產不得舉繩安懸馬鞦攀之大吉　局方

六閉肚方　臨月及滿月並不得向之便及棄不淨之水謹之吉　局方

七八莊方　產帳不得向之開門忌之大吉　局方

小兒初生救急　凡十八條

小兒　初生氣欲絕不能啼必是難產或冒寒所致急以綿絮包置懷中勿斷臍帶且將胞衣置爐火中燒之仍作大紙撚蘸油點火於臍帶下熏之令氣入腹更以熱醋湯灑洗臍帶須令氣回啼哭

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

如常方可斷乳
臍帶三寸因

小兒 初生面青身冷口噤乃胎寒也用白殭蠶散急救之白殭蠶木香肉桂陳皮檳榔甘艸炙各一錢分布剉水煎取汁以綿蘸入兒口中入門

小兒 初生有卵horizontal者急看兒口中懸雍前膊上有泡如石榴子以指摘破出血以帛拭去髮灰摻之若惡血入口中即horizontal入門

小兒 初生忽患撮口不飮乳名曰馬牙不治則百無一生候看兒齒齦上有小泡子如粟米狀急以鍼挑出血用墨磨薄荷汁塗之勿飮乳一時墨遍口內擦之勿飮乳一時許即差入門○俗呼此泡爲齒蠆以鍼或指爪掐破點以生蜜亦效俗方

小兒 初生穀道無孔不得大便急用金玉簪尖看其的處刺穿作孔以蘇合香丸少許作鋌納孔中或以油紙撚作

不令再合俗方

小兒 初生不飮乳不小便大蔥白一寸四破之以乳汁煎銀石器灌入口中立效得效

小兒 初生嘔吐不能飮乳乃穢惡入口用黃連枳殼赤茯苓等分爲末蜜丸梧子大乳汁調一丸灌入口中又木瓜煎湯灌口中亦效入門

小兒 初生大小便不通腹脹氣欲絕急令婦人以溫水漱口了咂兒前後心並臍下手足心共七處每一處凡咂三五次漱口更咂三四○又蔥白汁乳汁各半須臾自通不爾則死

調勻抹兒口中與乳咂下即通回春

小兒 初生小便不通急用生地龍數條蜜少許同研勻敷陰莖上內用蔥退紙燒灰入朱砂龍腦麝香各少許麥門冬燈心煎湯調灌口中即通入門

小兒初生大便不通先以葱尖紉入肛門內如不下用朱砂丸朱砂水飛南星炮巴豆霜各等分右爲末糊丸黍米大薄荷煎湯灌下一丸即通（田氏方）

小兒初生撮口不乳飲取牛黃二分半調竹瀝灌入口中妙○又方赤足蜈蚣一條去頭足炙焦研如粉每五分以猪乳汁二合和勻分二次灌口中得效

小兒初生口內白屑滿舌上不能吮乳謂之鵝口急以亂髮纏指頭蘸薄荷汁或井華水拭淨如不脫用雄黃二錢鵬砂二錢甘草一錢龍腦二分半爲末蜜水調塗或乾糝之妙（湯氏）○又方鼠婦一枚取汁塗之又白楊樹枝燒取灰塗之神效（正傳）

小兒初生遍身無皮但是紅肉以白早米粉撲之候生皮乃止（入門）

小兒初生遍身如魚泡如水晶碎則水流以蜜陀僧爲末摻之因服蘇合香丸（入門）

小兒初生鼻塞不通乳不得下取猪牙皂角草烏各等分右爲末葱涎調成膏貼顖門上○又天南星爲末薑汁調和貼顖門上得效（入門）

小兒初生外腎縮入取疏黃吳茱萸各五錢爲末以大蒜汁調塗臍腹上仍以蛇床子燒烟微熏之（妙入門）

小兒初生遍體發丹毒赤腫遊走若入腹入腎則必死名曰赤遊乃胎毒也宜以細鍼或砂鍼隨赤暈周匝刺出惡血最妙仍以芭蕉汁蟾蜍汁塗之○又赤小豆末和雞子白塗之○又焰硝一分冷水調和塗之○又溝渠中小鰕搗爛付之（本草）

小兒初生發驚乃胎驚也朱砂雄黃各等分右爲末取少許猪乳汁調抹口中即效入麝香少許尤妙（丹心）

單方 凡五十二種

朱砂 治產後敗血入心如見鬼祟朱砂一二錢乳汁一合調和納活地龍一條于藥盞內轉取去地龍入好酒與乳汁和合七分盞重湯溫服神效良方

大斧 治產後血痕痛取斧燒赤淬酒飲之本草如鐵杵或杵錘皆可燒赤淬酒飲不出其母氣欲絕取中水調下其兒當頭戴土出

伏龍肝 治橫逆產及子死腹中伏龍肝一二錢以水調下其兒當頭戴土出甚妙○難產三日不下伏龍肝細末一錢酒調服丹心

朴硝 治久胎不下朴硝細研半兩童便調服即效熁硝亦可丹心

石燕子 主難產孕婦臨產兩手各把一枚立驗本草

生地黃 治胎漏血不止胞乾即灰取生地黃汁一升酒五合煮三五沸服一二三次本草

芝蔚 即益母草也主產前產後百病能行血養血採取莖葉搗取汁於銀石器熬成膏和酒服之最治難產及死胎胞衣不下或搗取汁一小盞和酒一合溫服本草○天行不息所以生生而不窮芝蔚子活血行氣有補陰之功命名益母以其行中有補也故曰胎前無滯產後無虛丹心

蒲黃 治產後出血太多發渴入口眞蒲黃二錢白湯調下本草

當歸 治婦人百病又治產後腹痛當歸末三錢水煎服名獨聖湯良方○血刺痛用當歸乃和血之藥若血積刺痛宜用桃仁紅花當歸頭丹心

芍藥 主婦人諸疾並產前後諸病又治血虛腹痛酒水煎服本州

艾葉 使婦人有胎又能安胎胎漏生艾汁二盞阿膠白蜜各二兩煎至半服之又治胎動不安或腰痛下血不止艾葉半兩以酒煮服醋煮亦良本草

黃芩 產前安胎黃芩白朮治瘧藥也○黃芩安胎者能降火下行也○條芩安胎聖藥也俗人妄以胎殊不知產前宜清熱養血治血猶須細挼沈實者用之熱之藥可養胎殊不知產前宜清熱養血治血猶須細挼沈實者用之經而不安行故能養胎也必取細挼沈實者用之芩朮丸是也 丹心

紅花 主產後血暈口噤悶絕紅花一兩酒二盞煎至一盞分二服立效十三方

玄胡索 主產後血暈及惡血衝心或兒枕痛欲絕末酒服一錢立止○又玄胡索桂心各半兩當歸一兩右爲末每二錢童便或熱酒調下立得效

桂心 治產後血瘕痛悶欲絕桂心爲末狗膽汁和丸櫻桃大熟酒磨下二九木草

桑寄生 治胎漏不止能安胎令胎牢固或煎服或爲末服並佳木草

蘇木 治產後血暈及惡露不下痛悶欲死外蘇木一兩剉酒水煎服本草

桑螵蛸 主婦人小便數不禁右爲末每二錢空心米飲調下得效

治產後血瘕痛取鱗燒灰研酒服一錢能破滯血本草

鯉魚鱗 主婦人絕嗣無子久食令人有子○此魚腹中

烏賊魚肉 有墨主婦人血崩心痛小產下血過多而心痛者名曰殺血心痛甚者燒灰入然取墨爲末醋湯調下良方

淡菜 主產後血結腹痛或因產瘕痛血氣積聚可煮食之木草

治產不順手足先見者蛇蛻一條全者燒灰二錢空心酒服一錢立效

蛇蛻 麝香一字面東酒服一錢以餘滓塗兒手足即順生本草

藕汁 主產後煩悶及血上衝心痛生藕汁飲二升凡產後忌生冷惟藕不忌者爲其能破血故也本草

柑子皮 主產後浮腫酒煎服之雷公云產後肌浮柑皮酒服是也本草

蒲萄根 治孕婦子上衝心取根濃煮汁欲飲之即下而其胎亦安 本草

桃仁 主婦人產後百病又治暑月產乳取涼大多成 婦人產後陰腫痛桃仁去皮尖雙仁熬搗五倍子枯白礬爲末研桃仁爲膏塗之 正傳

胡麻油 胡麻即黑荏子也主胞衣不下 本草

生搗苧取汁煎取汁

大麻根 催生令易產麻根以水濃煎取汁頓服立產胎衣不下亦效 本草

孕婦月數未足子必腹中母欲悶絶及胞衣不下黑豆三升醋煮取濃汁頓服立出 本草

黑豆 落胎並下鬼胎取末二錢和水服又濃煎取汁服 本草

神麴 能催生令落胎取藥一兩水煎服即產 ○

大麥蘗 又孕婦有病欲去胎服之即下 本草

醋 治孕婦胎死不出醋三升煮黑豆一升取汁服二升兒立出 本草

冬葵子 主難產取子一合搗碎水煮服立產

又治胎不安或胎上搶心煩悶蔥白大者二十莖濃煮汁飲之胎未死即安已死即出 神效 本草

蔥白 治胎動不安或胎上搶心煩悶蔥白大者二十莖濃煮汁飲之胎未死即安已死即出 神效 本草

馬齒莧 主產後血痢腹痛搗取汁三合煎一沸下蜜一合攪服之 本草

蘩蔞 主產後有血塊腹痛搗取汁和童尿溫服惡血盡下 本草

雞子 主產後血暈風痙身强直口目喎斜雞子二枚取清調荊芥末二錢調下及胞衣不下雞子二枚破入醋攪服立產 本草

鹿角膠 能安胎止痛炒成珠作末以米飲調下二錢 本草

阿膠 治難產困乏明膠二兩好酒一升半微火令消入生雞子一枚鹽一錢攪勻溫頓服產良 方

鹿角 主ㇾ小ㇾ胎不ㇾ出鹿角細屑一兩水一盞蔥白五莖豆豉半合同ㇾ煎ㇾ服ㇾ立ㇾ出本草

兔頭骨 主ㇾ催ㇾ生ㇾ落ㇾ胞並ㇾ產後惡血不ㇾ下兔頭骨和ㇾ毛髓燒ㇾ爲ㇾ灰作ㇾ末酒下一錢妙本草

猫頭骨 治ㇾ難ㇾ產催ㇾ生ㇾ甚驗猫頭骨兔頭骨各一箇火煆ㇾ研爲ㇾ末每二錢苧歸湯煎水調下即ㇾ產猩頭骨 尤妙 正傳

羊腎 主ㇾ產後虛羸瘦弱無ㇾ力羊腎一雙炮ㇾ熟細切和五味作ㇾ羹或作ㇾ粥ㇾ食良本草

猪腎 治ㇾ產後虛勞骨節痛汗不ㇾ止猪腎細切造ㇾ稀臛和五味入ㇾ米煮作ㇾ粥ㇾ食之本草○難產清油白蜜等分以ㇾ猪肝煮汁調服即效入門

麝香 療ㇾ產難又催ㇾ生ㇾ墮ㇾ胎令ㇾ產ㇾ易取麝香一錢水調下本草

榆白皮 療胎死腹中或母病欲ㇾ去ㇾ胎榆白皮煮汁服二升即下○婦人臨ㇾ產月取末一錢日二服

甘竹根 治ㇾ胎動不ㇾ安甘竹根煮ㇾ汁服ㇾ之本草

苧根 治ㇾ產難婦胎動欲ㇾ墮腹痛不ㇾ可ㇾ忍苧根二兩剉ㇾ銀石器酒水相半煎ㇾ服妙 附後

瞿麥 破ㇾ胞墮ㇾ子ㇾ○治ㇾ產難經ㇾ日ㇾ不ㇾ出或ㇾ子死腹中ㇾ幷欲ㇾ死瞿麥煮取濃汁服ㇾ之本草

車前子 治ㇾ難產及橫逆產不ㇾ得ㇾ出ㇾ燃爲末酒服二錢本草

水銀 治ㇾ胎死腹中不ㇾ出其母氣絶ㇾ取水銀二兩吞ㇾ之立ㇾ出本草

大黃 治ㇾ產後惡血衝ㇾ心或ㇾ胎衣不ㇾ下腹中成ㇾ塊ㇾ大黃一兩爲末醋半升同煮成膏丸如梧子大以溫醋化ㇾ五丸服ㇾ之良久血下即愈本草

鍼灸法 男子無ㇾ嗣者以ㇾ鹽塡ㇾ臍艾炷灸ㇾ之連日灸ㇾ至二七二百壯必效 綱目○婦人絶ㇾ嗣灸ㇾ關元二三十壯

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

可ㇾ報ㇾ灸ㇾ之ㇷ゚○婦人妊ㇾ子不ㇾ成數墮胎ㇾ灸ㇾ脚門子戶二各五十壯脚門在ㇾ關元左邊二ㇾ寸ㇾ子戶在ㇾ關ㇾ元左邊二ㇾ寸ㇾ子戶一名氣門得效○灸ㇾ子宮三十七壯或鍼ㇾ入」一ㇾ寸穴在ㇾ中ㇾ極傍左右各開ㇾ三ㇾ寸ㇾ綱目○無ㇾ子取ㇾ陰交石門關元中ㇾ極涌泉築賓商丘陰廉甲乙○催生難產及ㇾ下ㇾ衣胎取ㇾ大衝神合谷補ㇾ三陰交ㇾ瀉立時分解ㇾ○子上衝ㇾ逼ㇾ心ㇾ取巨闕令ㇾ產母正坐使ㇾ人抱ㇾ頭抱ㇾ腰微偃鍼ㇾ入」六ㇾ分留」七呼得ㇾ氣即瀉ㇾ立ㇾ甦如ㇾ子擲ㇾ母心ㇾ生ㇾ下ㇾ兒ㇾ手心有ㇾ鍼痕子頂母心兒ㇾ人中有ㇾ鍼痕向ㇾ後則枕骨ㇾ有ㇾ鍼痕是其驗也神效方綱目○一婦人產後暴卒其ㇾ母爲ㇾ灸ㇾ會陰三陰交ㇾ瀉立ㇾ甦其ㇾ母蓋名醫女也資生○橫生逆產諸藥不ㇾ效急ㇾ於ㇾ產母右胸ㇾ小指尖頭上ㇾ灸ㇾ二ㇾ壯即」產ㇾ亦治ㇾ胞衣不ㇾ下ㇷ゚醫鑑云即至陰穴得效○胞衣不ㇾ下取ㇾ二陰交中極照海內關崑崙綱目○產後血暈取ㇾ三里三陰交神門關元綱目○產後陰下脫灸ㇾ臍下橫紋ㇾ二ㇾ七ㇾ壯又取ㇾ照海良方○婦人無ㇾ子或產後久不ㇾ再孕取ㇾ稈心一條ㇾ長ㇾ同身一ㇾ寸ㇾ之四ㇾ寸令ㇾ婦人仰ㇾ臥ㇾ舒ㇾ手ㇾ足ㇷ゚以ㇾ所ㇾ量稈心ㇾ自臍ㇾ心直ㇾ垂ㇾ下ㇾ盡ㇾ頭處以墨ㇾ點ㇾ記ㇾ後以ㇾ此稈ㇾ心ㇾ平摺橫ㇾ安ㇾ前ㇾ點ㇾ處ㇾ兩頭盡處是穴ㇾ按ㇾ之自有ㇾ動脈應ㇾ手ㇾ灸各ㇾ灸ㇾ三ㇾ七ㇾ壯神驗方即上ㇾ所ㇾ云ㇷ゚胞門子戶穴也醫鑑

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

特7
24
188

国立国会図書館　　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷緘灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

国立国会図書館　　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷緘灸篇一卷目録二卷』

ガラス使用