

詳校官助教 李巖

臣紀昀覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十三

喘門

總論

明周王朱楠撰

夫五臟皆有上氣喘咳但肺為五臟華蓋百脉取氣於肺喘既動氣故以肺為主病者右手寸口氣口以前脉陰實者手大陰經肺實也肺必脹上氣喘逆咽中塞如

欲嘔卜狀自汗皆肺實證若氣口以前脉虛者必咽乾
無津少氣不足以息此乃肺虛氣乏也且夫諸氣者皆
屬於肺諸喘者亦屬於肺是以人之一呼一吸謂之息
呼吸之間脾受其氣通乎榮衛合乎陰陽周流一身無
過不及然後權衡得其平矣將理失宜六淫所傷七情
所感或因墜墮驚恐度水失跌仆飽食過傷動則用力
遂使臟氣不和榮衛失其常度不隨陰陽出入以成息
促迫於肺不得宣通而為喘也診其肺滑手足溫者生

脉濇四肢寒者死數者亦死謂其形損故也亦有疾停
胃腕痰與氣搏肺道壅塞亦令上氣夫有肺虛挾寒而
喘者有肺實挾實而喘者有水氣乘肺而喘者有驚憂
氣鬱肺脹而喘者又有胃絡不和喘出於陽明之氣逆
貞元耗損喘生於腎氣之上奔如是等類皆當審證而
主治之肺虛肺寒必有氣之表怯冷痰如水之證法當
溫補如官桂阿膠之類是也肺實肺熱必有壅盛胃滿
外關上炎之狀法當清利如桑白皮葶藶之類是也水

氣者漉漉有聲怔忡浮腫與之逐水利小便如小半夏
茯苓湯五苓散革驚憂者惕惕悶悶引息鼻張與之寬
中下氣如四七湯桔梗枳殼湯輩陽明之氣下行令逆
而上行古人以通利為利如分氣紫蘓飲指迷七氣湯
加半夏二陳湯加宿砂施之為當真陽虛憊腎氣不得
歸元固有以金石鎮墜助陽接真而愈者然亦不可峻
驟且先與安腎丸八味丸輩否則人參煎湯下養正丹
主之雄黃麻黃馬兜零漢防已鷄內金諸品非不主喘

也如前治法大要究其受病之源至若傷寒發喘表汗
裏下脚氣喘滿疏導收功此則但療本病其喘自安然
喘有利下而愈者亦有因瀉而殞者喘有數年沉痾而
復瘳者亦有忽因他痰大喘而不救者汗出髮潤喘者
為肺絕身汗如油喘者為命絕直視讖語喘滿者不治
諸有篤病正氣欲絕之時邪氣盛行多壅逆而為喘然
則喘之危惡又安可以尋常目之乎婦人產後喘急為
病尤亟因產所不過多榮血暴竭衛氣無所生獨聚於

肺故令喘急謂之孤陽難治治法當推所感詳虛實冷熱治之縱是得愈必年年遇此時必發喘急者有之千金云治肺熱悶不止胃中喘急客熱往來欲死不堪服藥此可以治胃中喘用桃皮芫花各一升二物以水四升煮取一升半去滓以布蘸汁薄膈中再蘸再薄即効大凡上喘中滿酸心腹脹時作聲痞氣上下不能宣暢叔和云氣壅三焦不得昌也可用獨聖散吐之次用導水禹功散輕瀉三五行使上下無礙氣血宣通並無壅

滯後服平胃散五苓散益元甘露散分陰陽利水道之藥則愈矣

方

團參丸 出簡易方 治五臟相乘榮衛失度不能隨陰陽出入

以成呼吸故氣經於臟不能受納諸氣促迫上併於肺壅管溢而氣爭則喘

桑白皮剉炒 團參各兩 人參 白朮 杏仁去皮炒

麥門冬去心 桂心 陳皮 訶子炮去核 附子炮去皮臍

大腹皮炒檳榔炒芫花炒澤瀉 枳實炒 吳茱

萸 半夏麩 各半

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大每服二十九丸食前

米飲下未効漸加至三十丸

紫蘓子湯出危氏方治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促

煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而濇

紫蘓一兩一方大腹皮 草果仁 半夏湯浸洗

白朮 枳實去穢人參 甘草各半厚朴去皮薑

木香不見火 陳皮 木通

右剉散每服四錢水一盞姜三片棗二枚煎至七分

服不拘時

杏參飲出濟生方治因墜墮驚恐度水跌仆疲極筋力喘急

不安

人參 桑白皮 橘紅 大腹皮 檳榔 白朮

訶子麩半夏湯泡桂心不見火杏仁去皮炒紫菀

洗甘草炙

取肉

善濟方

右等分哎咀每服四錢水一盞半生薑五片入紫蘓葉七葉煎至七分去滓溫服不拘時候

玉華散指出直指方治咳嗽上喘調順肺經清利噎膈安和神

氣

甜葶藶焙香桑白皮炒天門冬去心馬兜鈴 半夏製

紫莞 杏仁去皮尖貝母炮百合 人參各半百部

甘草炙各一分

右判散每服二錢半薑四片大棗三枚服一方無生

薑煎

神祕湯指出直指方治水氣作喘

陳皮 北梗 紫蘓 人參 五味子 檳榔

桑白皮炒半夏製甘草炙各等分

右判散每服三錢薑五片煎服

雄黃丸指出直指方治喘

雄黃研白礬煨木香 生葶藶各一分馬兜鈴去殼鷄

內金 淡豆豉各三錢半信礪絳芒營者研生用一錢半

右各取實分數並細末研米漿煮糊為丸如胡椒大
每服五丸清茶稍冷臨卧送下至七丸次日飲食勿
用熱菜豆生嚼解砒霜毒

加減瀉白散出按治陰氣在下陽氣在上咳嗽喘促

桑白皮一兩甘草五錢陳皮 五味子 人參各五錢地

骨皮七錢青皮二錢白茯苓一錢

右以咀每服四錢水一盞半入粳米拾粒煎至一盞
去滓食後服之

加味控涎丸出危氏方治風熱上壅或中脘停留水飲喘急

及四肢浮腫脚氣入腹平常腹中痰熱諸氣結聚服之
得利則効

大戟 芫花 甘遂 甜葶藶 巴豆各一兩黑

牽牛三兩炒兩白芥子炒二兩

右為末米糊為丸粟米大每服三七丸清茶送下或
溫水亦可服後莫可服甘草藥及熱水

五味子湯出直指方治寒熱喘

北五味子 杏仁 橘紅 麻黃 甘草

炙生乾薑 辣桂 各半

右分鹿末每服二錢半蘓三葉煎服肺虛加炒阿膠

喘甚加馬兜鈴

五味子散 出百一 選方 治肺虛寒理喘下氣去痰飲務觀郎

中姊發喘嗽服諸藥皆不瘥得此三服遂愈

乾薑 炮半兩 甘草 炙半兩 陳皮 去白三分 茯苓 五味

子 各一兩

右劉為散每服五錢水一大盞煎至六分熱服

麥門冬湯 出三方 治嘔逆上氣喘急咽喉不利止逆下氣

麥門冬 去心一兩 半夏 製六錢 人參 一分 甘草 炙一分 粳米

二錢 大棗

右為麤散每服四錢水三盞棗三箇煎至六分去滓

空心服之

五味子湯 出百一 選方 治寒喘

橘皮 三兩 甘草 半兩 麻黃 根節去 杏仁 去皮尖真

北五味子二兩重

右為麤末水一盞半藥末二錢煎七分去滓通口服不拘時如喘甚加藥末入馬兜零桑白皮同煎夏月減麻黃一兩無不効者昔日高中之每苦喘疾發甚時非此不能治

祕方黃丸子出簡易方治消痰定喘

雄黃研雌黃研各一錢

山梔七枚去皮

菉豆四十粒

信砒許少

右為末麵糊和為丸菉豆大每服兩丸生薄荷清茶

臨卧之時送下

神祕散

一名神祕湯出三因方

治定喘嗽補心腎下氣

阿膠

三分炒

鷄胫胫半兩

白仙朮

半兩米泔浸三宿曬乾炒團

參分

右為末每服二錢糯米飲空心下

八寶丹出朱氏集驗方治痰實發喘

雄黃

雌黃

朱砂

信砒

並生用

白礬飛菉豆粉

黑豆生

巴豆去油

皂角

各一錢去黑皮

右為細末煮糊為丸如菜豆大磨刀水下一丸至三
丸

四磨湯出濟生方治七情傷感上氣喘息妨氣不食

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右各濃磨水和作七分蓋煎三五沸稍溫服或下養

正丹黑錫丹

杏參散一名杏參湯 出和劑方治上氣喘滿咳嗽倚息不能卧除

痰下氣胃脇脹滿神思昏憤並宜服之

杏仁

桃仁並麩炒 去皮尖桑白皮

蜜炙三度 泔浸一宿 控乾各一兩 人

參一兩

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一箇煎至七分

服不拘時

五靈丸出直指方治肺喘久不愈漸成息賁

木香兩馬兜零炒去殼葶藶微炒各一分川五靈二兩半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九杏仁

二枚

槌碎薑三片煎湯下一方棗肉為丸

人參丸 治喘

人參二錢 苦葶藶炒五兩 南星三錢 半夏三兩

右為細末生薑自然汁麵糊為丸如黍米大每服五十丸薑送下漸加亦可小兒減數服之

坎離湯出朱氏集驗方 專定喘

草澄茄 石菖蒲各半錢 白朮 茯苓 杏仁各一錢

甘草 半夏炮七次 紫蘊子各二錢

右為末水一盞半煎不用薑

二黃丸出濟生方 治停痰在胃喘息不通呼吸欲絕

雌黃一錢 雄黃一錢

右研末羅極細鎔黃蠟為丸如彈子大每服一丸半夜時候熱煮糯米粥乘熱以藥投在粥內攪轉和粥喫之

棗杏丸出朱氏集驗方 治喘

大棗五十箇 葶藶黃者二兩 杏仁三兩 去核 微炒 皮尖

右搗細末取棗肉研成膏為丸如梧桐子大每服三十丸桑白皮湯下當令人大便鴨溏不妨

杏參散出仁存方治喘氣息

桃仁 杏仁並去皮尖炒 人參 知母 貝母 桑白

皮米泔浸蜜炙三度

右等分為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分食後服

菖蒲煎 治肺中風喘鳴肩息

菖蒲 款冬花 紫苑 人參 桂心各等分

右為細末煉蜜和丸皂角子大每服一丸煎糯米飲化下

紫參湯散出拔葶方治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安卧

米殼二兩蜜炮黃色 麻黃 桔梗 五味子 甘草炙紫

參各一兩

右為細末每服四錢水煎臨卧服

神祕湯出拔葶方若病人不得卧卧則喘盖喘者水氣逆行

上乘於肺肺得水浮使氣不通流其脉沉大宜服之

橘皮洗 生薑 紫蘓葉或用子 人參 桑白皮炒各半兩

右以咀以水三升煎至一升去滓分作三服温用一

方有白茯苓木香各二錢指迷方以五味子湯加去

桑白皮

玉蟬散出仁存方 治氣發喘坐卧不得

人參 單麻葉 霜桑葉各半兩 訶子肉半兩 鍾乳粉

一兩

右搗羅細每服二錢温糯米粥飲調下每於食後服

之

理氣丸 治氣不足動便喘吸遠行久立皆不任汗出

鼻乾心下急痛苦悲傷睡卧不安

杏仁炒去皮尖 桂枝去皮各一兩 益智去皮 乾薑炮各二兩

右為末蜜丸如桐子大以鍾乳粉為衣每服三十丸

空心米湯送下

宣肺湯出百一選方 治喘

細辛 甘草各一兩 防風二兩 麻黃四兩
去根節

右咬咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

天南星散出本定喘

南星 半夏 青皮並炒 白礬煨并同

右為末每服一錢好北棗去核入藥在內細嚼嚥下

治久患肺氣喘急至妙

用杏仁去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月一日三四換浸半月取焙乾研爛極細每服一棗大丸

薄荷一葉蜜一鷄頭大水一中盞同煎取七分食後

溫服甚者不過一劑瘥永不發動忌腥

棗杏丸一名大乾 治喘方見咳嗽門

大黃散出肘後方 治大熱行極及食熱餅竟欲飲水過多衝

咽不即消仍以氣呼吸喘息方瘥

大黃 乾薑 巴豆各等分

右為末每服半錢若得吐下即愈

五礬散 治喘并痰嗽一名炙肝散

五倍子 白礬

右各等分為末和勻每服三錢以生豬肺火上炙熟
蘸藥末細嚼喫食後服一方用生豬肝蘸藥亦可漢
陽公庫兵黃六者舊若此病百藥不効於岳陽路上
遇一道人傳此方兩服病不復發

杏仁飲 治喘

馬兜零一兩杏仁皮一兩
兩尖炒去

右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓食後服之

定喘飲子

訶子肉三兩麻黃四兩
兩去節不

右為麤末每服四錢水二盞煎至一盞二分去滓入
好臘茶一錢再同研至七分通口不拘時候臨卧服
之尤佳立如神効老幼可服一方加入參二兩名訶
參散本方只兩味

如神湯 治喘

茱根一握生生判生臨生桑白皮
時取炒

右等分用水一碗煎至八分一服即止甚者三服

竹葉橘皮湯 治大走馬及奔趨喘乏便飲冷水因得上氣發熱方

竹葉三橘皮三

右件藥以水一斗煮取三升濾去滓分為三服令三

日服一劑

神祕方 治喘

右以猪爪甲二枚燒灰細研入麝香當門子一枚同

研臘茶清調下

故錦散 治喘

右燒故錦一寸燒灰茶清調服神効

菰萋散 治喘

右用菰萋二箇入明礬一塊如棗子大入菰萋內燒煨存性為末將蘿蔔爛煮蘸藥末服之汁過口藥盡病除

大黃散 治肺喘

右用川大黃為末以新水調下

踈鑿飲子 治下氣定喘導泉消腫

人參 木通 半夏 附子炮 草薹仁 木瓜

秦艽 檳榔 杏仁 赤茯苓連皮 紅橘各一兩 厚朴

一兩半 木香 甘草各半兩

右哎咀每服半兩水一盞半生薑七片煎至八分去

滓服不拘時

加減滲溫湯集出朱氏方先用靈砂合來復丹服若只丹服

靈砂則祕合則通次用後藥

嫩蒼朮三錢炒 白朮三錢 赤茯苓四錢 丁香 縮砂仁

木瓜 神麴 綿薑 陳皮 草果 厚朴製炒各三

錢甘草二錢半

右前哎咀薑棗煎厲端明得喘疾醫下痰踈道之藥

引客邪腎經而兩足并外腎發腫有僧云此脾腎虛

用此則大小便自流利

妙方出鮑氏方治喘息諸方治不効者

代赭石

煨末

一兩

牡礪

粉一

皂角

去皮尖

貝母

兩半

右為末每服二錢壺水入麻油一二點調下

葶藶丸

出本

事方定喘急肺積

苦葶藶

一兩

當歸

肉桂

白茯苓

乾薑

川烏

頭

吳茱萸

鱉甲

大杏仁

茯苓

人參

各

兩 檳榔

一兩

右為細末煮棗肉和杵丸如梧桐子大每服二三十丸薑棗湯下日進三四服不拘時候

皺肺丸

貝母

炒

知母

秦艽

阿膠

炒

款冬花

紫苑茸

百部

去心

糯米

炒各

一兩

杏仁

去皮尖

別

研四兩

右為末將羊肺一箇先以水濯洗看容得水多少即以許水更添些煮杏仁冷沸瀘過灌入肺中繫定以糯米泔煮熟研細成膏搜和前藥末杵數千下丸如梧桐子大每服五十丸食前桑白皮湯下

三分茶

出儒門

茶分二蜜兩蕎麥麵麵四兩

右以新水一大碗約打千餘數連飲之飲畢良久下氣不可傳人喘自止妙矣

葶藶散出仁存方治氣喘滿急腹脹不得卧

黃葶藶炒搗細一兩桑白皮一兩陳皮去白一兩

右末每服三錢水一盞棗兒二箇煎至七分去滓服之

人參胡桃湯一名觀音散出直指方治胃滿喘急不能睡卧方見嗽

門疾嗽類

神應丹出危氏方治肺氣喘急晨夕不得睡卧不問久新一

服見効

砒石一兩菜豆六兩

右同煮以豆爛為度取出砒石入黃丹一兩同研爛用紙做捲五七重如豆筒又入砒石黃丹以黃堊固濟復燒紅為度又入黃丹一兩麵四分為丸如粟米大又以黃丹二兩為衣每服二粒新井花水下得効

即止

真應散出三方治遠年喘氣急不能眠卧百藥無効者

右白石英四兩通明者以生絹袋盛用雄猪肚一箇以藥入線縫定煮熟取藥出再用猪膈一箇如前法煮三煮了取藥出挖乾研為末以官局款冬花散二錢更以桑白皮二寸生薑三片棗二箇水一盞半煎至七分通口服猪肚亦可喫只不得用醬醋椒薑等調和

治喘急妙方 北五味子 大甘草等分為末

右用生薑自然汁調安在手心喫

葶藶散出濟生方治過食煎煨或飲酒過度致壅喘不得卧及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶藶炒 桔梗去芦 菘萋子 川升麻 薏苡仁

桑白皮炙 葛根各一兩 甘草炙半兩

右以咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後温服

瀉肺湯出御藥院方治肺氣逆上甚

防已 陳皮湯浸去穰 桔梗去芦頭 赤茯苓 杏仁湯浸去皮

尖生用 苦苧藤二錢半

右以咀每服一錢水一盞半同煎至六分去滓食後
溫服日進二錢或三服亦可

黃牛散出仁存方治肺熱脉滑大氣急喘滿

大黃一兩 白牽牛二兩

右為末蜜水調二錢立止又用皂角膏為丸亦可

半夏湯出仁存方治定喘下痰

半夏一兩 甘草三錢 皂角炙去皮子半兩

右以咀每服三錢水一盞半生薑三片煎至七分去
滓食後溫服

治痰喘方出百一選方

右以胡桃肉三箇薑三片是夜服之湯熱下即睡自
旦嗽上喘亦不作神驗如此未瘥再嚼胡桃并薑如
前數且飲湯勿行動就枕即愈

定喘化痰 出肘後方

右用猪蹄甲四十九箇洗淨挖乾每箇指甲內半夏白礬各一字入磁罐子內封閉勿令煙出火煨赤去火細研入麝香一錢人有上氣咳嗽喘急用糯米飲下小兒半錢至妙

芫花散 出百一選方 治實喘肺氣脹喘急心胃滿若氣虛而

喘者不可服

芫花 不以多少醋浸一宿取出醋炒令黑焦研為細末 大麥麴 一方作麵

右等分和拌極勻以濃煎柳枝酒調下立定一方不用酒水煎食後服之

葶藶湯 出朱氏集驗方 治肺壅氣喘急不得睡卧飲食不進

右用葶藶子三兩炒令黃搗為細末以水三升煮大棗三十枚得汁一升內藥中每服如棗大煎取七合頓服一方大人分三服小兒分四服

治氣喘痰盛

右以檳榔為末湯調下

木防已湯出本草方療人膈間肢滿其人喘滿心下痞堅面
黧黑其脉沉緊得之數十日吐下之乃愈

用大防已二兩石膏二枚鷄子大碎綿裹桂心二兩
人參四兩四味以水六升煮取二升分再服虛者便
愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加
芒硝三合以水六升煮三味取二升去滓內芒硝分
再服微下利則愈禁生蔥孫思邈療遺溺小溲澀亦
用三物木防已湯

葶藶散 治上氣喘急偏身浮腫方見咳嗽門咳

四七湯出直指方治驚憂氣過上喘

半夏製二兩半茯苓二兩厚朴製一兩半紫蘓葉一兩

右咬咀每服三錢半薑七片棗二枚煎服

五味子湯出活人書治喘促脉浮而厥者

五味兩半人參 麥門冬 杏仁 橘皮去白生薑各

錢棗三枚破

右咬咀以水二盞煎至一盞去滓分作二服用之

玉液散出指南方治喘

團參 川芎 茯苓 官桂 知母 杏仁 葶

藶 柴胡 半夏各一兩 麻黃 石膏 橘皮 白

朮各一兩 訶子 羌活 秦艽 甘草各半兩

右為麤末每服五錢水二盞薑五片棗一箇煎一盞

去滓溫服

平肺湯出指南方

天門冬 馬兜零 百部各半兩

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

定喘餅子出衛生鑑寶方累經神驗

芫花醋浸一宿炒黃 桑白皮炒 吳茱萸炒 陳皮去白以上各一兩

白牽牛半生半炒取末二兩 馬兜零一兩 寒食麪三兩

右件五味先杵為末細入牽牛頭末共麪拌勻羅過滴水為丸如櫻桃大捏作餅子取熟灰半碗在鐸內同餅子熟每服一餅嚼爛煎馬兜零湯下夜卧服之如患人心頭快加上一餅至明微痢下神効婦人有

胎者不可服

平氣散出衛生寶鑑

治盛則為喘已未歲初秋三日奉詔至

六盤山至八月中霖雨時承上命治不憐吉吳元帥夫
人年踰五十身體肥盛因過飲酒及鐘乳腹脹喘滿聲
聞舍外不得安卧大小便澀滯氣口脉大兩倍於人迎
關脉沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱濕熱大盛
上攻於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則實實者宜下
之故製平氣散以下

白牽牛二兩半生半炒青皮三錢大黃七錢雞心檳

榔三錢陳皮半兩

內經曰肺若氣上逆急食若以泄之曰牽牛苦寒瀉
氣分濕熱上攻為喘故以為君陳皮苦溫體浮理其
肺氣青皮苦辛散肺中滯氣為臣檳榔辛溫性沉重
下痰降氣大黃苦寒蕩滌滿實故以為使
右為末每服三錢煎生薑湯一大盞調下無時一服
減半再服喘愈止有胃膈不利煩熱口乾時時咳嗽

以加減瀉白散主之

加減瀉白散 出衛生寶鑑

桑白皮 一兩 地骨皮 五錢 知母 五錢 青皮 去白二錢 陳皮 三錢

細黃芩 三錢 桔梗 五錢 甘草 炙三錢

右件剉如麻豆每服秤五錢水二大盞煎至一盞去滓食後溫服數服良愈華陀云盛則為喘減則為枯活人書云發喘者氣有餘也凡看文字須要會得本意盛而為喘者非肺氣盛也喘為氣有餘者亦非肺

氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作促肺氣果盛又為有餘當清肅下行而不喘以其火入於肺衰而不足為喘焉故言盛非言肺氣盛也言肺中之火盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中火有餘也故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺中之火實補肺氣用者不可不知

蘓子降氣湯 出如宜方 治喘虛陽上攻喘促

當歸 甘草 厚朴 製 前胡 各二兩 陳皮 製 桂 各二兩

蘓子 半夏 各五兩

右吹咀薑棗煎

杏仁膏 治氣喘促浮腫小便澀

右用杏仁一兩去皮尖熬研和米煮粥極熟空心喫

二合

人參散 若猶覺停滯在心胃隔中不利者 方見咳嗽門

氣唾膿血類

獨聖散 又名必効散 得効定喘

右用訶子大者為末每服一錢糯米飲調下

治卒上氣喘息鳴息便欲絕

用人參末服之日五六服

治喘殊妙

右用路蜂房一枚須取似蓋大者燒灰存性入白丁香七粒即雄雀糞每服一錢半濃煎人參湯調下立

止不拘時候

喘嗽 附論

夫五臟者皆稟於肺若肺氣虛為風冷所乘使經絡
否澁氣不宣通則肺壅脹則氣逆則心胃滿塞故令
咳嗽喘急也夫喘為五臟六腑之華蓋主行氣於皮
毛形寒飲冷則傷於肺肺一受邪安能統攝諸氣氣
亂胃中而疾生焉重則為喘輕則為嗽喘之為病由
痰實而氣不散上激咽喉哮呷作聲咯不出噤不下
憧憧而急渴渴而數張口擡肩搖身輒吐嗽之為疾
病由氣急而痰隨上浮風生喉厭面淫淫如痒習習

如硬涕唾稠濃聲音重濁甚則續續不已坐卧不安
諸方定喘嗽皆以三物拗湯為主麻黃散冷杏仁下
氣甘草和中故九寶湯一方於中皆增六品深有理
焉本草云麻黃久服令人虛患喘人無時而發此方
中有肉桂實表不致亡陽薄荷桑皮清利膈道紫蘓
陳皮大腹寬和氣宇造化精深政如千金方小續命
湯用麻黃佐肉桂云久服不令人虛亦此意也

方

神効散 治老幼喘嗽神効

杏仁 去皮尖炒 甘草 炙 旋覆花 各三兩 白朮 蓮肉

去皮 麝干 米泔浸 前胡 御米 炒 百合 水浸去沫 白扁豆

炒 川芎 各三兩 人參 白茯苓 各四兩 神麩 炒 五桑白

皮炒 乾葛 桔梗 各六兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一箇煎至

七分食後溫服

知母茯苓湯 出醫方大成 治肺痿喘嗽否塞往來寒熱自汗

方在肺臟門肺痿類

調降湯 出直指方 治喘嗽

枳殼 製一兩 半夏 製 北梗 青皮 陳皮 真蘇子

檳榔 茯苓 葶藶 隔紙炒 木香 白豆蔻仁

縮砂仁 紫蘇葉 各二錢半 甘草 炙三分

右剉散每服三錢薑五片食前服

神應丹 出御藥院方 治諸遠年喘嗽

麻黃 一十觔走水洗淨去土爛搗用河水 桔萎 大者

筒一定去皮皂角二定去皮貝母心炒去桑白皮去紫蘓子

款冬花 桔梗 知母各二兩以上八味搗爛入

淨澄取清汁白茯苓去皮阿膠杵碎炒為末秤入紫

菀洗去土天麻 人參去芦三味為末各一兩

右件十四味以藥末搜和前膏杵熟為丸如小彈大每服一丸溫薑汁化開臨卧飲之便去枕仰卧不許久坐如不得睡乃藥之効也此治嗽較慢如治喘不以新久如神服此藥三服後似見利一般

平肺湯出簡易方治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾口燥

陳皮兩一半夏洗七次苦梗炒薄荷各七錢紫蘓 烏梅

去核紫菀 知母 桑白皮炒杏仁炒五味子 罌

粟殼蜜炒各七錢半甘草炙半兩

右為粗末每服三錢生薑三片水煎六分食後溫服

加味白朮散出危氏方

陳皮 半夏 人參 白茯苓 白朮 甘草炙

欽定四庫全書

卷一百六十三

山藥炮各二兩 白扁豆製一兩半 縮砂 桔梗炒 石蓮肉

薏苡仁各一兩

右判散治喘嗽每遇飲酒必發生薑桑白皮煎服効

杏蘓飲出直指方 治上氣喘嗽浮腫

紫蘓葉二兩 五味子 大腹皮 烏梅肉 杏仁去皮

尖各一兩半 陳皮 北梗 麻黃去節 桑白皮炒 阿膠各

三分 紫菀 甘草炒各一兩

右吹咀每服三錢薑五片煎服

參蘓半夏湯出御藥院方 治咳嗽痰涎咽膈不利喘滿氣不

宣通

人參 桂去粗皮 甘草炙 木香各一兩 五味子 桑白

皮炒 陳皮去白 白朮 紫蘓葉 半夏生薑製各二兩

右為末每服五錢水一大盞半生薑十片煎至八分

去滓食後溫服

定肺湯出直指方 治上氣喘嗽

紫菀茸 北五味子 橘紅 杏仁去皮尖 真蘓

欽定四庫全書

普濟方

三十一

子炒桑白皮炒半夏製枳殼製等分

右為末每服三錢薑五片紫蘓五葉食後煎服

八仙丸 治喘嗽神効

棗三箇去核紙裹已天南星炮一兩半夏洗小皂角

炙黃去甘草炒款冬花 白礬枯各半兩巴豆七箇杏仁

皮子 三十五箇 去皮尖

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二三十丸温

菜蘘汁下喘嗽細嚼燒蘿蔔栗子生薑湯下

五靈蟬退丸出本方治年久近日喘嗽

蟬退一兩去頭足五靈脂半兩生用砒半兩雄黃生杏仁去皮

尖各輕粉一兩淡豆豉九粒馬兜零一兩生

右件除輕粉研為末用生薑葶藶自然汁合粉藥丸

如龍眼大每服一丸臨卧細嚼生薑湯送下忌毒

人參蛤蚧散出濟生治三二十年間肺氣上喘嗽咯唾

膿血滿面生瘡徧身黃腫悉皆治之亦治肺痿咳嗽及

肺壅咽燥

蛤蚧一對全者以河水浸五宿逐日換水淨浸去腥氣酥炙香熟甘草炒杏仁

炒去皮尖人參 茯苓 貝母 桑白皮 知母

各五兩 各二兩

右為細末淨磁盒子內盛每日如茶點服一料永除

神効一方有生薑二斤煎服

青金丹 治涎喘嗽胃脇刺痛久積痰飲舌塞噎悶

五靈脂 豆鼓各半兩生杏仁 生半夏各四筒生巴

豆二筒生白礬各一錢半青黛為衣

右為細末蜜煉為丸如豌豆大每服一丸菜葉裹溫

蘆汁送下食後臨時服以青黛為衣

款花貝母散 治喘嗽虛弱病

款冬花 人參 半夏薑製知母 貝母 甜葶藶

炒御米殼蜜炒烏梅肉以上各等分

右為末每服一錢水一盞生薑五片煎至七分食後

溫服

平肺湯 治肺與腎皆以至陰積水喘嘈咳嗽蓋水乘

之

葶藶微炒桑白皮炒北梗枳殼製紫蘓葉半

夏製各一兩麻黃去節三分甘草炒半兩

右剉散每服三錢薑五片煎服腎水用青木香丸

紫蘓半夏湯出御藥院方治喘痰涎寒熱往來

紫蘓葉湯洗七次半夏湯洗七次紫菀茸五味子各半陳皮各半

桑白皮炙一兩半杏仁去皮尖麩炒黃色一兩

右為粗末每服三錢水二盞生薑七片煎至一盞去

滓取六分青汁食後臨卧熱服日進三次

神應丹出宣論治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及痢下血兼

婦人帶下病一切脇肋痛滿

薄荷葉錢四甘草錢四巴豆去皮燈燒存性用五靈脂盆硝

各二錢豆鼓一兩慢火燒

右研勻鍊蜜為丸如梧桐子大食後溫薑汁一椀

許化下一丸續後空嚥津三五次禁飲食少時須覺

咽喉微熱即効或飲子過多送藥在胃中即効少以

引子少炒或咽喉過熱即少少吸冷水解之如止心
 腹急痛熱酒或熱醋少許化下兩丸無時未効再服
 得利尤良或利後痛未止者每服一丸以為度止痢
 溫米飲下兩丸食前日進三服治帶下溫酒下兩丸
 或大便利後每服一丸

理肺散 治喘嗽脇肋刺痛不得眠睡

杏仁去皮 馬兜零炒 漢防已 茯苓 陳皮 桔

梗各一 葶藶分一

右為末每服三錢水一盞半生薑五片煎至七分和
 滓食後溫服

沉香散出傳信 定喘治嗽適用方

好陳香兩半 阿膠半兩蛤粉 結實人參一兩 桑白皮一

兩微炒氣 陳皮兩半 紫蘓兩半 甘草一分

右為細末每服二錢生薑三片水一大盞煎至七分
 去滓通口服元方只以棗湯調下

硃砂丸出楊氏 治老人小兒喘嗽咯痰等證晝夜不

得眠

輕粉

雄黃

另研各二錢

桑白皮

半夏

薑製

甜

葶藶

隔紙炒各三錢

右為細末麩糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服六

七丸食後睡時生薑湯下病大者三十丸

賺氣散

出御藥院方

治新久喘嗽不已

御米殼

用鹽鼓一兩沸湯浸一時許取浸

人參

杏仁

湯浸去皮尖

烏梅肉

三錢

甘草

炒 桔梗

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓稍熱服不

拘時

安肺散 治涎喘嗽日夜不止

款冬花

五味子

烏梅肉

焙微黃

紫菀茸

各一兩 甘

草

炒半兩 御米殼

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後溫

服日進二服癆嗽加人參二錢

人參款冬花散

出濟生

治喘嗽久不已者咳謂無痰而

有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽謂有痰有聲也

人參 款冬花各半兩 知母 貝母 半夏各三錢 御

米殼二兩炒黃色

右為粗末每服五錢烏梅同煎臨卧服之

人參理肺散出醫方大成 治喘嗽不止

麻黃一兩炒去節 御米殼三錢炒 人參炒二兩 當歸 木香

各一兩 杏仁二兩炒

右為粗末每服四錢水煎服之

玉液散出危氏方 治久近喘嗽口乾作渴

苾萋根一兩 知母去心炒一兩 甘草炙半兩 人參半兩

右為末每服二錢先鎔下黃蠟二錢同入米飲調下

食後服

阿膠散出傳信通用方 治一切咳嗽定喘補肺化痰

阿膠炒一兩 紫團參一兩 半夏湯洗七遍同生薑捏作餅子一兩 鱉甲

半兩亂洗 甘草半兩 淨醋煮黃

右為細末每服二錢水一盞薑二片煎至七分通口服如癆盛加薑白二寸同煎熟先嚼薑次呷藥

人參針頭丸 專治風飲喘嗽

巴豆 五箇 去皮 半夏 五箇 研湯 洗七次 杏仁 五箇 去皮尖 草麻 五箇 去皮

白礬 二錢

右為細末棗肉為丸針簽藥於燈焰上燎過青煙起吹息藥蘼菜葉裹之漿水送下臨卧服之

訶子散 海上名方 治喘嗽

漢防已 一兩 去根 麻黃 節 訶子 炮 杏仁 麩炒 去皮尖 各半兩

右為粗末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓入好茶一錢再煎至七分食後溫服

知母丸 治一切遠年上氣喘嗽 方見咳嗽門 咳不得卧類

右劉散生薑三片煎後臨睡服之

清膈散 出危氏方 治喘嗽吐唾不利膈熱口中苦氣

南星 一兩 鉛白霜 少 桑白皮 半兩 白附子 五錢

右劉為散生薑三片煎食後臨卧服之

安神散出宣明論治遠年近日喘嗽不已

御米殼炒蜜 陳皮去白 人參 甘草炙各一兩

右為末每服一錢烏梅湯下臨卧服之

百部散 百部 款冬花 麻黃去根節 杏仁去皮尖炒各一兩

右為末入杏仁拌勻每服二錢水一盞半糯米二十粒同煎米軟食後温服

馬兜零散 治喘嗽咯膿涎

馬兜零炒 甘草炒 百部 杏仁去皮尖炒熟各一兩

右為末每服三錢水一盞半煎至七分去滓食後温服

白雲換肺丸 專治遠年近日喘嗽不止

款冬花一兩 半夏一兩 明礬 寒水石各二兩

右為細末生薑汁糊為丸如梧桐子大每服三四十丸薑湯下

黑神丹一名青金丹 治氣喘咳嗽方見咳嗽門五藏諸咳嗽類

天南星散出本事方 治氣喘咳嗽

天南星大者二箇 蚌粉 甘草各等分

右為末每服一錢水一盞薑三片煎至七分臨卧溫服

防已丸出宣明論 治肺不足喘嗽久不已者調理血氣清消

化痰涎

防已 木香各二錢 杏仁三錢

右為末鍊蜜和丸如小豆大每服二十九丸煎桑白皮湯下如大便利加葶藶一兩食後服之

馬兜零湯 治喘嗽咽燥煩渴咳濃血腫臭

桔梗三兩 甘草炒一兩 馬兜零二兩

右為末每服五錢水二盞糯米一合同煎至七分去滓溫服浮腫者加茯苓白朮各半兩

馬兜鈴散出肘後方 治肺氣喘嗽

馬兜鈴二兩只用裏面子去殼 酥半兩入碗內拌和勻慢火炒乾 甘草一兩

右為末每服一錢水一盞煎至六分溫呷或以藥末含嚥津亦得

大黃葶藶丸 出本事方 治氣喘咳嗽

大黃 半兩 炒 葶藶子 一兩 洗淨 丸上炒

右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服五七丸桑白皮

湯下

又方 出本事方 草烏 五錢 重 麻黃 三錢 重

右為末每服三大錢蘿蔔一箇同煮令熟只喫蘿蔔

妙

殭蚕湯 出瑞竹堂 治嗽喘喉中如鋸不能睡卧

好茶末 一兩 白殭蚕 一兩

右為細末放碗內用蓋蓋定傾沸湯一小盞臨卧再

添湯點服

治諸般嗽喘 出傳信通用方

罌粟殼 十箇大者用新瓦一片 細拍碎於瓦上炒黃 大白梅 五箇湯浸三五次去

鹽味

右件用生薑五片棗二箇水二盞煎至一盞去滓臨

卧服留滓天明再煎服之

治大人小兒喘嗽齁齁

出經驗良方

右用糯米泔少許磨茶子滴入鼻中令吸入口服之口橫咬竹管片時則口只與鼻中涎出如線當日即愈不過三二次絕其根源屢試驗

治遠年近日喘嗽

出本方

右用皂角不蛀者三大莖一味刮去黑皮刀切開去子每子倉內入巴豆肉一粒合就麻皮縛定用生薑自然汁和蜜塗令匣慢火炙又塗又炙以焦黃為度

擘開去巴豆不用以好明礬一兩枯過草麻七箇薑汁和蜜塗炙前三味為末却以杏仁二兩去皮尖研成膏却與前藥和勻每服一錢用柿子乾炙過候冷點藥細嚼臨卧服忌熱毒魚鮓鮓油麪酒米醋煎燂熱毒等物

神効散

一名神効湯出危氏方

治一切喘嗽

用不蛀大皂角一條作兩邊去子每孔入巴豆肉一粒線繫定童子小便浸一宿火炙令焦黃去巴豆不

用或入一二粒亦不妨卻以杏仁半夏各一合入麻油內煎令折裂為度同為細末每服一字乾柿點藥細嚼或用白糖點喫亦可臨卧時服服了不可喫湯水一應物妙不可言

蛤蚧膏出御藥院方治遠年近日咳嗽上氣喘滿如神

蛤蚧一對用雌雄各半兩半泔刷洗淨二十遍酥炙黃色潞參一兩紫菀茸

麻黃一兩去根節艾葉 槐角二味炒陳皮 枇杷葉去毛

桑白皮 甜葶藶 款冬花 杏仁去皮尖薄荷葉

佛耳草 五味子 紫蘊葉 皂角去皮子貝母各半

兩

右件除蛤蚧潞參外取十六味搗羅為粗末用河水三斗於鍋內慢火熬至一斗半搗搗勻濾去滓令極再用生絹袋濾過以文武火再熬成膏然後入蛤蚧潞參細末與膏和勻丸如彈子大每服一丸任意湯磨下食後臨卧服之

馬兜鈴散出聖惠方治咳嗽喘急面目四肢浮腫

馬兜鈴一人 人參一兩 去頭 貝母一兩 微黃 甘草一兩 微赤色

甜葶藶一兩 隔紙炒 杏仁一兩 去皮尖雙仁炒微黃 五靈脂一兩 葳

靈仙一兩 桑白皮一兩 款冬花一兩 陳橘皮一兩 湯浸去白穰 黃

明膠二兩 搗碎炒令黃

右為散每服五錢以淡漿水一中盞煎至六分去滓

溫服不拘時

天門冬丸一名調肺丸 治肺臟客熱喘促咳嗽心神煩

悶方在肺臟門 肺臟壅熱類

紫苑散出聖惠方 治咳嗽喘急咽喉不和胸中似物妨塞

紫苑一兩 去苗土 桑白皮一兩 款冬花半兩 葳蕤半兩 紫

胡三分 桔梗一兩 去苗頭 甘草半兩 炙微赤 赤茯苓一兩 川升

麻三分 麝干半兩 枳殼一兩 麩炒去穰

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去

滓不計時溫服

百部丸出和劑方 治肺氣不調咳嗽喘急胃膈煩悶唇乾口

燥面目浮腫咽嗑不利積久不瘥咯唾膿血者亦宜服

之方見咳嗽門熱嗽類

人參清肺湯

治肺胃虛寒咳嗽喘急坐卧不安胃隔

噎悶脇肋脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽噎引痛及療肺

痿癆嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出腠肉消瘦倦怠

減食

地骨皮 人參 甘草 阿膠麩炒杏仁去皮尖麩炒 桑

白皮 知母 烏梅去核 罌粟殼去蒂蓋 桔梗去芦

右等分為散每服三錢水一盞半烏梅棗兒各一枚

同煎至一盞去滓食後臨卧加蜜半匙攪勻澄清吸服効一方無桔梗

紫蘘子煎 治咳嗽喘急形體虛羸不思飲食

紫蘘子五合 生地黃汁升一 麥門冬五合 白前一兩 生薑

汁二合 貝母二兩 煨人參一兩 白蜜升一 杏仁五兩 湯

尖雙仁 麩炒 紫苑二兩 去苗土 五味子一兩

右六味為末以諸藥入杏膏等同於銀鍋中攪勻以慢火煎成膏於不津器中盛不計時候服一茶匙含

化嚥下津

桑白皮湯 治咳嗽胃滿氣急

桑根白皮剉 紫蘓連莖 知母焙 貝母去心 款冬花

梗 半夏湯浸七遍焙乾 五味子各一兩 厚朴去粗皮生薑汁炙 甘草

炙 人參各半兩

右搗篩每服三錢水一盞薑三片同煎至七分去滓

日三溫服

紫苑湯 治咳嗽喘急胃腹脇肋脹悶痛疼

紫苑去苗 桔梗剉炒 款冬花梗去 枳殼麩炒去穢 陳皮

去白焙 赤茯苓去黑皮 赤芍藥 百合各一兩 大腹子

二枚

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

日進三服

人參紫苑湯 治肺氣不調咳嗽喘急胃隔煩悶痰涎

不利坐卧不安晝夜不止久不愈者以致形容瘦減力

氣羸劣者並宜服之蘓司法再三禱之於滕舉二方

人參 五味子 甘草 桂枝各一分 京紫苑 款

冬花 杏仁各半兩 縮砂仁 罌粟殼去頂稜用薑汁炒各一兩

右為散每服四錢水一盞半薑五片烏梅二箇煎七

分溫服

加減三奇湯 治咳嗽上氣痰涎喘促胃隔不利方見

門咳嗽上氣類

人參 知母 貝母 半夏 杏仁生用 馬兜鈴十箇

麻黃不去節各半兩 天仙籐二兩

右為粗末每服三錢用烏梅一箇水二盞蜜一匙煎至八分去滓食後溫服忌酒醋鷄麩酸生冷等物

葶藶散 治痰嗽喘急

葶藶半兩 半夏半兩薑汁浸軟切片 巴豆四十九粒去殼同上

夏黃色為度去巴豆不用之

右以前二味為細末每服一錢 用薑汁蜜同調食

前嚥下

人參散 治諸咳嗽喘急語言不出年久者四五服日

近者三四服

人參定喘湯 治丈夫婦人遠年近日肺氣咳嗽氣急
喉中涎聲胃滿昏沉氣逆坐卧不安飲食不下及治肺
感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

人參片切麻黃去節甘草炙阿膠炒半夏麩各一
桑白

皮 五味子各一兩半罌粟殼蜜刷各二兩

右為粗末入人參片拌勻每服三錢水一盞半入生
薑三片煎至七分去滓食後溫服又治小兒久病肺

氣喘急喉中涎聲胃隔不利嘔吐痰沫更量歲數加
減服之一方無桑白皮

辰砂利膈丸 治胃膈痞滿痰飲氣滯上焦窒塞肺氣
不利咳嗽喘滿嘔吐痰涎咽噎不利風熱相搏頭目昏
痛精神困倦並皆治之

天南星炮白茯苓 乾生薑 生犀各二兩半夏半

白礬半生半枯乾山藥各三兩皂角一觔去皮子絃

右為細末用皂角膏子和丸如梧桐子大硃砂為衣

每服六十九至七十九食後生薑湯下

細辛五味湯一名小青龍湯治肺氣不利咳嗽喘急胸膈煩悶

痰盛涎多喉中有聲鼻塞涕頭痛目眩肢體倦怠咽

噎不利嘔逆惡心方見咳嗽門咳嗽不得卧類

人參潤肺湯 治肺氣迫促喘急咳嗽不已并傷寒頭

疼憎寒壯熱四肢疼痛

人參 桔梗 白芷 麻黃去節 乾葛 白朮 甘

草各一兩 白薑半兩

右為末每服二錢生薑三片葱白二寸水一盞煎至

八分如出汗連進二服通口溫服

馬兜鈴散 治咳嗽喘急胃膈煩悶

馬兜鈴一兩 桑白皮一兩 川升麻半兩 燈心三分 甘草三分

炙微赤剉 枳殼一兩 麩炒去穢

右為散每服五錢水一盞生薑半分煎至五分去滓

溫服

杏仁丸 治咳嗽喘急腹肋堅脹小便不利

杏仁 三兩湯浸去皮尖 桂心 一兩 馬兜鈴 一兩 枳殼 一兩

微炒 藿麥穗 一兩 甜葶藶 一兩隔紙炒紫色 木通 一兩 大腹

皮 一兩

右為末以杏仁膏入少許鍊蜜同和丸如梧桐子大每服三十丸不計時候煎棗湯下

養肺丸 治脾胃呼吸風冷咳嗽上氣喘急語聲不出

喉中似噎

人參 去芦頭取淨 官桂 去粗皮 甘草 炒 五味子 乾薑

紫苑 去土取淨 細辛 去苗葉各一兩

右為細末鍊蜜和丸每兩作二十九丸每服一丸綿子裏口內含化隨津液下之食後服

麻黃散 治男婦久近肺氣咳嗽喘急上冲坐卧不安

痰涎壅塞咳唾稠粘脚手冷痺心脇疼脹兼傷風咳嗽

膈上不快

訶子皮 去核 款冬花 去梗 甘草 各五兩 麻黃 去根節一兩

肉桂 六兩去皮不見火 杏仁 去皮尖

右為末每服二錢水一盞入好茶一錢同煎八分
食後夜卧通口服之如夜半不能煎但以藥末入
茶和勻沸湯點或乾嚥亦得忌魚酒炙煨猪肉腥
燥物

紫團參丸 治肺氣有餘咳嗽喘急胸脇痞痛短氣噎
悶下焦不利腿膝微腫

潞州人參二錢 蛤蚧一對 白牽牛 苦葶藶一兩
微炒 木香 微炒 甜葶藶微炒 上二味各半兩

右為末用熟棗肉為丸如梧桐子大每服四十九食
後煎人參桑白皮湯送下

白朮湯 治五臟受濕咳嗽痰多上氣喘急身體痛腫
脉來濡細

白朮二兩 五味子 半夏湯洗七次 白茯苓去皮 紅橘各一兩
甘草炙半兩 人參 桑白皮各半兩

右為呔咀每服四錢水盞半生薑五片煎至八分去
滓温服不拘時候此方比三因多橘紅

定喘丹 治男女久患咳嗽肺喘促倚息不得睡卧動
艱嗽亦宜服之累年不瘥漸致面目虛浮

杏仁 去皮尖 炒別研 馬兜鈴 蟬蛻 先去土并足 翅各一兩 煨礞石 二錢

研別

右為末蒸棗肉為丸如葵子大每服六七丸臨卧苦
茶清於冷送下忌熟物半日一名定喘瑞應丹

漢椒丸 治咳嗽喘急坐卧不得宜服

漢椒 一兩去目及閉 口者炒出汗 猪牙皂角 一兩去黑皮 酥炙黃去子 乾薑

三分 炮對 甜葶藶 三分 紙隔 炒紫色

右為末用棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸不拘
時以桑白皮湯送下

三拗湯 治寒燥不常人多暴嗽咽痛聲啞鼻塞痰稠

喘急

麻黃 不去節 杏仁 不去皮尖 甘草 不炙各二兩

右以咀每服三錢薑五片煎七分去滓無時服有汗

即愈

團參散 治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參 欵冬花 紫菀茸 以上各等分兩

右為末每服二錢水一盞烏梅一箇煎至七分去滓食後溫服

寧肺湯 治咳嗽喘急不問久新悉皆療治

嬰房 半兩去枝梗 五味子 去枝梗 烏梅 去核

右為粗散每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓食後溫服

玉津丸 治久年喘急咳嗽困憊欲死者

雄黃 雌黃 硫黃 信砒 各一錢 南星 七錢

右為末薑汁調攤盤內大皂角七八條燒煙覆盤其上盤極熱煙盡冷取出丸如梧桐子大大人一服四丸小兒一服一二丸服時含薑片津滿口去薑以津下藥訖便睡神効

甜葶藶散 治咳嗽喘急方

甜葶藶 一兩隔紙炒紫色 桑根白皮 一兩剉

右為散每服二錢水一中盞入燈心一束大棗五枚煎至六分去滓食後調下

人參散一名人參散治咳嗽上氣喘急嗽血吐血宜服

此藥

右以人參好者搗為末每服三錢鷄子清調之五更初服便睡去枕仰卧只一服愈年深者再服忌腥鹹鮓醬麪等并勿過醉飽將息

導痰丸出經驗良方治痰飲氣滯胃膈不利喘嗽氣促脇肋

之 滿脹咳嗽多痰鼻塞稠涕氣不升降胃膈痞結並宜服

天南星 大半夏各不白明礬 生薑各半勅洗

猪牙皂角四兩皂角四兩無虫蛀

以上六味一處用瓦罐以水浸過為度煮乾令透去白礬生薑皂角止取南星半夏剉焙同後藥同研為末

真紫蘘子 蘿蔔子 麥蘖各四兩 糖毬子四兩

即山果子又名候楂此藥名
楊氏家藏方橘核散內見

右為末麩糊為丸每服五六十丸淡薑湯下不拘時

候服

祛痰丸 出瑞竹堂 治風痰喘嗽

人參 木香 天麻 白朮 煨 茯苓 青皮 去穢 陳

皮 去白以上 槐角子 半夏 各七分 猪牙皂角 去皮

各五錢

右為末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服五

七十丸食後臨卧温酒送下薑湯亦可

人參半夏丸 出宣明論 治一切痰飲喘嗽不已

白礬 天南星 半夏 各半 甘草 二錢 人參 二錢 赤

小豆 九粒 杏仁 四十九粒 猪牙皂角 一錢

右為末秫子三合醋一升熬粥和丸如梧桐子大每

服十五丸炒蘿蔔子湯臨卧送下

神御散 出百一選方 治痰盛喘乏咳嗽不已

御米殼 出頂帶密炙 款冬花 去枝 佛耳草 甘草 炙

人參 陳皮去白 阿膠蛤粉炒 杏仁去皮尖雙仁麩炒各一兩

右為末每服五錢水一盞半生薑三片肥烏梅一箇拍碎煎至七分去滓溫服不拘時臨卧服尤妙

安神散 治痰涎喘嗽久不愈

款冬花 佛耳草各三錢 鍾乳石 白礬 甘草各生

分一

右為末每服二錢水一盞入蠟少許煎至七分和滓溫服食後每日二服

郁李仁丸 治水氣乘肺動痰作喘面微腫方見咳嗽門

目浮腫類

辰砂半夏丸 治大人小兒肺壅痰實咳嗽喘急胃膈痞滿心忪煩悶痰涎不利呀呷有聲

半夏湯炮 葶藶別研 杏仁去皮尖別研各半兩 五靈脂 硃砂別研

各一兩

右將五靈脂半夏為細末却入杏仁葶藶硃砂末攪勻生薑汁打糊為丸如梧桐子大每服二十九食後

蘿蔔湯下

葶藶散出宣明論治肺氣喘滿痰嗽睡卧不安不思飲食

苦葶藶 蛤蚧粉各三錢 桑白皮 山梔子 人參

各五分 荊芥穗 薄荷葉 赤茯苓 桔梗 杏仁

去皮 甘草以上各半兩

右為末每服三錢水一大盞生薑三片煎至六分去

滓食後溫服

參蘓溫肺湯 治形寒飲冷傷肺喘嗽煩心胃滿氣不

得動暢

人參 紫蘓葉 甘草各五分 肉桂 五味子 木

香各四兩 陳皮 白朮各六錢 半夏薑製 白茯苓去皮各半兩

桑白皮一兩

右為麤末每服五錢水一盞半生薑三片煎至八分

去滓大溫服食後如冬寒每服中加不去節麻黃半

錢先洗去沫下諸藥

九寶湯出澹寮方治老人小兒婦人室女素有喘疾過寒暄

不常發則連綿不已喘嗽哮吼夜不得睡

麻黃 薄荷 陳皮各一兩 官桂 紫蘓 杏仁去皮

尖桑白皮 甘草 大腹子連皮各半兩

右以咀每服三錢水一盞半生薑三片烏梅半箇煎至六分去滓專心服餌其效甚著或入童子小便半盞尤佳感冒鼻流清涕亦効病各有主對不可疑其發散耗氣之說惟虛勞自汗不當用之一方嬰粟殼二箇去頂人參少許

救生丹 治大人小兒喘嗽甚効如神

號丹 馬牙硝 人言各一錢細研一宿用 甜葶藶隔紙

炒桑白皮半兩 杏仁去皮尖 鷄腕脰十箇

右為細末同煎三味和勻棗肉為丸如梧桐子大每

服七丸臨卧清茶下

紅椒丸出危氏方 治虛癆喘嗽眩暈

靈砂一兩細研 人參 木香 大香附子淨 大紅椒合

口并子焙出汗各半兩

右為末糕糊丸如麻子大每服二十九空心橘皮湯下

胡椒半夏丸 治虛寒喘嗽冷痰不止

半夏 乾薑 各一兩 胡椒 丁香 各一分

右為細末生薑自然汁煮薄糊為丸如梧桐子大每服三十丸細嚼乾柿湯食後送下

鍾乳方 出危氏方 治喘嗽痰涎稠粘晝夜不止不得坐卧遠

年近日並皆治之

滑石 半兩 鍾乳粉 見成者一兩 南星 炮切片生薑製

右為末煮乾柿去蒂核搗細搜藥為丸如梧桐子大每服四十丸薑棗煎湯下氣弱人更服養正丹

百花膏 出濟生方 治喘嗽不已或痰中有血

款冬花 百合 蒸焙

右等分為細末鍊蜜為丸如龍眼大每服一丸食後臨卧細嚼薑湯嚥下噲化尤佳

杏仁煎 出濟生方 治久患肺喘咳嗽不得已睡卧不得服之

即愈

杏仁去皮尖胡桃肉

右等分為細末研成膏鍊蜜少許丸如彈子大每服一丸或二丸食後臨卧細嚼用薑湯嚥下人參湯亦可生薑煎服亦可

寧神散一名寧肺散方見咳嗽門五臟諸咳嗽類

雌黃丸出聖惠方治咳嗽喘急

雌黃分一雄黃分一杏仁七枚湯浸去皮尖雙仁炒微黃色

右為末以蟾酥為丸如粟米大以燈心煎湯每服三五丸送下

治咳嗽上氣華陀中藏經方

蒲葍葉治一切肺喘劇甚者効如神焙碾為末米飲調服二錢七併服取瘥氣味清香其實酸澁夏紅可食核如棗核類山茱萸棟葉背白者用江西謂之盧都子

七七散余居士選奇方治喘嗽

長皂莢三條去黑皮破開兩邊去子一莢仁巴豆十粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十枚用生薑汁製杏仁麻油製巴豆蜜製半夏右件一處火炙黃色研為細末每服用一字安在手掌中臨睡用生薑汁調舌點喫立有神効

雄黃丸

余居士選奇方

治喘嗽

雄黃

雌黃

信

各一錢

巴豆

五粒

半夏

半兩

湯浸七次

右搗末糊為丸如椒子大每服五丸臨睡茶清下忌

熱物小兒加減與服之

四寶丸

出仁存方

治喘嗽化痰

知母

貝母

款冬花

白礬

枯

右等分為末以稀糊丸如梧桐子大甑上蒸過每服

二十九丸食後薑湯送下

千金丸

出仁存方

治證同前

南星

半夏

各一兩

白礬

一兩半枯

右以生苡萹一箇去子入藥在內濕紙裏煨熟取出

為末再用生白礬一兩將苾蒞穰汁并苾蒞仁研細
同丸如梧桐子大每服十五丸用淡薑湯下臨卧服
之

一方出方存仁治喘嗽

雄黃 雌黃 信石 黃丹

右等分用鯽魚一箇去腸肚洗淨量魚大小入藥在
內令滿以線縛定鹽塗固濟用炭三斤燒紅候冷取
出研細末浸蒸餅為丸菜豆大臨卧沙糖水下三五

丸小兒一二丸每夜只一服

化痰延壽丸海岳居士秘方治痰喘中滿咽喉作聲或中風偏

枯不能行步並宜服之

香附炒四兩 南星炮一兩 半夏四兩漿水浸 枳殼二兩麩炒去穰 白

礬半兩 黑牽牛頭末四兩微黃 商陸一兩

右為細末酒打麩糊為丸如梧桐子大每服五六十
丸生薑湯送下食遠臨卧服之嗽加人參一兩喘加

紫參一兩

甜葶藶丸 出聖惠方 治一切喘嗽不瘥

甜葶藶 一兩隔紙炒 人參 三分去頭 赤茯苓 三分 蛤蚧 一對

頭尾全酥 炙微黃 杏仁 一兩湯浸去皮尖雙仁炒

右為細末以棗肉和丸如梧桐子大每服三十丸日

進三四服以粥飲下

控痰良方 出直指方 治喘嗽通用

虢丹 白礬 各二兩

右以錢王搏刺一大孔先入虢丹以白礬蓋頂用炭

一筋煨至火盡礬枯丹黑出火毒研細煮調麩和丸如麻子大每服十五丸沸湯泡生薑汁送下諸頑痰迷塞關竅不通聲音不出以三十丸研末入全蝎少許用自然薑汁澄取清者調灌須臾吐痰立愈凡喘促胃膈膨湃寸脉急數須從權吐之中滿內實而喘者與解毒雄黃丸

二黃丸 出衛生家寶方 治喘嗽哮呷氣急雌雄

雄黃 三錢 雌黃 三錢 信砒 一錢 馬兜 三錢 杏仁 七粒去皮尖

右件研細將皂角五條不蛀者搥碎按取汁一盞熬成膏子和藥安乳鉢內燒皂角煙薰過丸如蘿蔔子大每服三丸臨卧壅水送下小兒一丸孕婦不可服一夜只一服喘退不可服也

治感風冒寒喘嗽久不瘥或身有煩熱其脉弦緊者澹察

小柴胡湯加桑白皮北五味子薑棗煎服

治喘嗽

右用陳橘皮一兩水浸去穰細切用巴豆十粒去殼同橘皮炒令十分赤色傾在桌子上揀去巴豆須淨盡不用巴頭擣橘皮為末每服二錢米飲調下臨卧時服遠年二三服或瀉一兩行不妨以溫粥補之忌食毒物

哮喘附論

夫治哮喘嗽者一名黧黯涎在咽喉間令人喘嗽不寧甚者搖身滾肚上氣喘急頭汗身冷或時發作多

由小年冷水驚恐所致也

方

青金丹 治喎

天南星一人參二錢半夏一兩款冬花三錢杏仁二兩

去皮螺青半錢百藥煎二兩五味子五錢礞石二錢白礬半錢

訶子五錢皂角一兩

右為細末薑汁糊為丸如梧桐子大每服二十九丸臨卧茶清送下忌生冷膩熱之物日三服

黃明膠散出本方治十六般哮喘

黃明膠炒一兩馬兜鈴仁 甘草各一兩半夏薑汁浸三日重

一兩杏仁去皮尖人參半兩

右為末每服一大錢水一盞隨病湯使煎至七分臨

卧後服 心嗽面赤或汗流加乾葛煎一方白芷

肝嗽眼中淚加烏梅一箇糯米十四粒煎 脾嗽不

思飲食或惡心入薑三片煎 胃嗽吐通吐醜酸水

蚌粉煎 肺嗽上氣喘急入桑白皮煎 膽嗽令人

不唾用茶半錢調 膈嗽咳出痰丸塊薑自然汁調

嚙下 癆嗽入秦艽末同煎 冷嗽天曉時嗽甚加

蔥白同煎 血嗽連頓不住當歸生薑一方棗 產

後嗽背脾疼痛甘草一寸黃蠟少許煎 黎嗽涕唾

稠粘烏梅生薑煎 氣嗽吐痛脹滿青皮去白煎

熱嗽夜甚蜜一匙蔥頭白煎 哮喘聲如拽鋸入半

夏兩箇煎 腎嗽時復三兩聲入黃耆白糖煎 以

上十六件哮喘病依法煎服無不効驗

青金丹 一名定喘 寧肺丸 治齁嗽 方見咳嗽 門久嗽類

內金丸 出仁 存方 治喞喘

鷄內金 二十箇 信石 二錢半 黃丹 兩半

右各研細露星七宿再入白牽牛末半兩葶藶末半

兩半夏二錢半共為末蒸棗肉取膏為丸如麻子大

露星二宿硃砂為衣每服七丸臨卧冷清茶送下

金粟丹 一名雄黃解毒 出經驗良方

鷄冠雄黃 研令極細 鬱金 各二錢半 巴豆 十四粒去殼 膜壓令油盡

右為末醋煮麩糊為丸如粟大津唾嚥下或茶清下
大人十九小兒量其大小與服見効

治遠年近日哮喘妙方出本

砒錢一錢 麩錢一錢 海蝶蛸錢一

右為末水調作餅子慢火炙黃再研令細每服一字
用井花水調一大鍾呷空心服良久吐出為度小兒
加減與之忌食毒物

紫金丹出本治哮喘

信石一錢 半研淡鼓一兩 水潤去

右以鼓丸如菜豆大每服七丸至十九丸冷淡茶清下

臨卧只一服後不可喫一應湯水之類今以信八分

鼓一兩每服二十九丸一法二件成膏搽盥內艾薰入

生硃末丸有一風疾婦人患十年徧求醫者皆不効

忽有一道人貨此藥漫贖一服是夜減半數服頓愈

遂多金丐得此方予屢用以救人特為神異

鬼哭丹一名鼓破丸 出經驗良方治勦胎亦能治瘧

白石石 一錢 白砒霜者 良不用黑者 寒水石 四錢

右各研為細末取端午日三五家粽角極薄切用建
盞盛粽一過用寒水石鋪一過却信石鋪之如後用
粽角用前法鋪之如鋪盡仍將粽子蓋却用淡豉冷
水微浸取濃汁滴於盞內用乳搥搥鍊成丸取劑左
右心盛藥丸如大粟米大每服大人止服五丸五歲
後止三丸周歲以上只一丸瘡痰未發前五更東流
水初下 水盞鹽菟燒灰調沸湯候冷吞下 食艱

茶菟燒灰調沸湯冷下或冷臘茶清下 老艱用半
夏五粒生薑一大塊同搗自然汁吞下永遠不發

古老飲 出仁 存方 治魚哮喘

古老錢 白梅肉 各七 箇

石水一大盞浸二宿每服一茶腳許空心服良久吐

出惡物

鯽魚丸 出家藏 經驗方 治肺經久受邪氣喘嗽急初發則寒從

皆起冷如冰雪漸漸喘促氣不相續痰涎壅塞咯吐不

出坐卧不得莫可支吾兩肩聳豎曲皆弩目困憊欲絕
宜服或未効再服即愈其効如神

右用鯽魚重一斤者不去鱗腸只於肚下近頭處開
一孔入信石一塊重一錢令深入在内却以魚入竹
筒内外用青蒿搗塗固濟候乾火煨竹筒通紅候冷
出塗取魚去燒不過者研細入蚌粉二錢研得所丸
如菘豆大硃砂為衣每服四丸或五六丸沙糖冷水
臨卧服之忌熱物一方喘正急時宜服之不可多過

丸數欲試此藥先用猪肺一枚吹脹入數粒於肺腕
内頃刻漸痿方表其効

千金丸 治哮喘

仙藥千兩金丸奇 神仙留與故人知

一兩雄黃鷄冠色 半兩明信煨如灰

一兩玄精龜背樣 雌黃一兩最相宜

一兩鷲管如雪色 二兩明霜火上飛

二兩蛤蚧巴豆炒 去了殼兒六十枚

同炒去豆只用粉 沙糖和蜜搗須時

荷葉乳為極細末 泥糕調糊莫令稀

丸如菜豆顆兒大 每服七丸用冷蘆

小兒服時歲加減 喫了忌酒三日期

喉如拽鋸聲鳴嚮 審問與藥莫差池

此藥家傳百餘載 且莫輕傳寶秘之

紅散子 治諸呀呷有聲睡卧不得

右土硃不拘多少極為細末米醋調時時進一二服

治一切數動

右用處州磁器不以多少打碎研為細末如數發時

每用二三錢用手指頭點津液蘸藥點上嚮下即効

黑馬蹄香散 治哮喘

右用馬蹄香焙乾研為細末每服二三錢如正發時

用淡醋調下少時刻吐出痰涎為驗

馬屁勃丸

治哮喘

方見咳嗽類門久嗽類

白前方

出肘後方

主久患呀呷咳嗽喉中作聲不得睡卧

右取白前搗為末溫酒調二錢服

治久哮

右用梧桐子一連紙包濕放在火煨取出安地上出火氣為末空心井花水一盞送下痰出即愈

治哮喘嗽

右以大南星切作片香油煎至黑色研末睡覺細嚼
煎茶清漱口不語之

治吼喘咳嗽病脾胃寒不思飲食面色黃羸瘦古人名

為肺脹令人却做胃喉大黃黑白二牽牛等分修合成
就更加檳榔為末名為奪命因由冷漿調下便時休免
得胡針亂灸

治齁喘出朱氏集驗方

右用苦丁香三箇為末水調細呷吐出稠痰即愈

治齁齁出永類

白礬半兩 大南星半兩炒 巴豆半錢去皮油 甘遂二錢半末

右作末和勻每服大人一錢小兒半錢薑片夾嚼燈

心湯臨卧一服尋常華蓋散打和參蘓飲服婦人九
寶湯和清肺湯加芎歸煎服

療動
出本
華方

右取榆白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五合
末二錢煎至如飲服瘥


治動盪及吐風涎

右用石菖與甘草同煮服

治喉中呀呷有聲不絕

右以不蛀皂角燒灰存性研細以生薑自然汁調一

錢許於掌中旋旋舌舐之



普濟方卷一百六十三

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官編修臣朱紱

謄錄監生臣韋洪勳