



生



烈

由與開竅於陰

感此則大便難下而陰

天醫之傷胃不及其物而助

勞世一傷胃不及其物而助

火邪之中耕散真

燥熱之病不一有風時有陽結

陰結又有年一老氣虛也聚不足而結燥者治法

云胃要燥急食平以潤之燥者散之如由陰不

得大便以辛開之如由不壯大便以苦泄之陽

結者散之如由小便利而大便

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

澀者散之如由大便澀而

開燥湯

升麻

生地黃

熟地黃

當歸

甘草

大黃

桃仁

麻仁

紅花

除桃仁

研如泥

外別如麻

豆大都

作

服水

研如泥

煎至

盡去

阻

和

潤

燥

治

燥

秘

乾

閉

大

便

結

血

秘

方

研

如

泥

細

末

煉

心

白

急

加

酒

洗

大

如

血

燥

而

大

如

風

結

燥

大

如

風

結

燥

大

如

風

結

燥

大

如

風

結

燥

大

如

風

結

燥

大

如

風

結

燥

大

○如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之

○如脉澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以滑其燥

○如寒陰之病結閉而大便不通者以肩方中辛熱藥加前附子乾薑湯以溫之

其病雖在共證當服陽藥補之若大便不通者亦宜服藥微通其大便

○若病陰虛或陰寒之證宜於陽藥中少加苦寒之藥以

除其燥止勿加

陰躁欲坐井中者其二腎脉按之必虛或沉細而遲此易為辯且知有客邪之病亦當從權加藥以去之

麻黃白朮湯

治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫面

上及腹充甚其色黃麻木身重如山沉困無

力四肢痿軟不能舉動喘促唾清水吐噦痰

唾白沫如膠時躁熱發欲去衣煩更而過振

寒項額有時如冰額寒尤甚頭旋眼黑目中  
溜火冷淚鼻不聞香臭少腹急痛當臍有動  
氣按之堅硬而痛

青皮

酒黃連已春

酒黃蘗

橘紅

甘草炙

升麻炒

黃芪

人參

桂枝

白朮

厚朴

柴胡

蒼朮

豬苓已春

吳茱萸

白茯苓

澤瀉已春

白豆蔻

炒麴已春

麻黃已春

杏仁燻

右炒明分水二升先煎麻黃令

沸去沫取八分煮取四升去相稍熱食

連服

此藥治其木火乘

於陽道為陰火傷其

氣四折勝之病今正遇

冬寒時來肺金尅火凌

木是火勝必有大誤其證善恐火多嚏鼻中

如有物不聞香臭目視眩暈多悲健忘小腹

急痛通身黃腹大脹面目腫尤甚食不下痰

唾涕有血目昏傷大便不通並宜此藥治之

升陽湯一名升陽益血湯

治膈咽不通逆氣急急大便不行

青皮 槐子 生地黄

熟地黄 黃連 當歸身

甘草梢 黃芩 牛膝

黃芪 茯苓 白朮

右次世... 煎... 流... 二

大... 煎... 服

活血潤...

右... 煉蜜

服... 二兩

久不... 大便日

澀腸湯 令見風

治大腸結燥不通

治大腸結燥不通

生地黃

熟地黃

生草藥 大黃

是感秋  
 味滲泄  
 前子亦  
 資水之  
 上源也  
 如不渴而小便不通者熱在下  
 且藥有氣之薄者乃陽中之陰  
 如雨如  
 化源也  
 水  
 金



焦血分故不渴而大燥小便不通也無閉於下  
焦者腎也膀胱也乃陰中之陰陰受熱閉塞  
其流易上老云寒在胃中則熱不入熱在下焦  
頃塞下便不利則此方寒在胃中則熱不入  
藥以除其熱也寒在胃中則熱不入熱在下焦  
生無陰其陽在胃中則熱不入熱在下焦  
中之陰其陽在胃中則熱不入熱在下焦  
不是也此方寒在胃中則熱不入熱在下焦  
之寒在胃中則熱不入熱在下焦

之牛其山壽... 熱火  
之邪而因其下焦使小便不通也  
之藥治法當先出其所以然也  
其所因其如則知其所以然也  
通關凡小便不通者

治不渴而小便不通者在下焦血分也

黃蘗 知母 肉桂 桑

右為細末熟水為丸如梧桐子大每服一百  
丸空心白湯下頓兩足令藥易下行故也如  
小便利前陰中如刀刺痛當有惡物下為驗

清肺飲子

治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心草

通草

澤瀉

瞿麥

琥珀

馬薔

木通

車前子

茯苓

猪苓

右為麤末每服五錢

熱食速服或為方八

導氣除燥湯

治小便閉塞不通乃

也

茯苓

滑石

知母

澤瀉

黃蘗

右以咀每服五錢水

熱空心服

○如急閉不拘時服

腎疸湯

治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤

羌活

防風

柴胡



角仁除風燥以地榆破之以核實之苦寒補腎  
以下泄胃實以澤瀉之酸滲使氣歸於前陰以  
補清燥又胃之濕脾也白朮之苦甘以苦補燥  
氣之不足其甘味以瀉火而益元氣也故曰首  
寒瀉火乃假核實之酸也古人曰藥為下焦如  
瀆又曰在下者引而竭之多病者便秘澀以大  
黃推去之其津液益不足以當歸和血及油潤  
之劑大散白朮之利其宜作湯以與之是下  
焦有熱以急瀉之之法也以此推之而燥者  
故宿食消盡空公作是則之

秦朮白朮丸

治痔疾并痔漏有膿血大便燥硬而作疼痛  
不可忍

秦朮

桃仁一湯洗去

皂角仁燒存性已上各壹兩

當歸梢酒浸

澤瀉

枳實麩炒黃

白朮二錢

地榆三錢

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麩糊為  
丸如雞頭仁大令藥光滑焙乾每服五七十  
丸白湯下空心服待少時以美饍壓之忌生  
冷硬物冷水冷菜之類并濕麪酒及辣辛熱

大料物之類犯之則藥無驗也

秦朮蒼朮湯

治痔疾若破謂之痔漏大便秘澀必作大痛此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也受病者燥氣也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣而合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也若大便燥結者主病兼受火邪熱結不通也去此四者其西方肺主諸氣其體收下亦助病為邪須當破氣藥蒸之治法全

矣以剉湯與之其効如神

秦朮

桃仁湯浸去

皂角仁

燒存性

蒼朮

防風七合

黃蘗

洗五合

當歸

澤瀉已合

梭身檳榔

另研

大黃

右除檳榔桃仁皂角仁三味外餘藥咬咀如

麻豆大都作一服水三盞煎至一盞二分去

粗入檳榔等三味末再上火煎至一盞空心

熱服待少時以善糖壓之不犯胃氣也服藥

日忌生冷硬物及酒濕麵大料物乾薑之類

犯之則其藥無效

○如有白膿加白葵花頭五及去萼心青皮半錢不去白入正藥中同煎木香三分為細末同檳榔等三味依前煎服餌古入治此疾多以歲月除之此藥一服則愈

七聖丸

治大腸疼痛不可忍叔和云積氣生於脾藏傍大腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦火莫謾多方立紀綱

羌活一兩

附子二兩

芍藥

黃連

木香

枳實

黃芩

厚朴

白朮

陳皮

知母

母散

白朮

取

大便微利

收不愈

不得急

大便其

痛澀其

秦光防風湯

治痔漏每日大便時於疼痛如無效者非痔漏也此藥主之

秦光

防風

當歸身

白朮 以上各壹

炙甘草

澤瀉

黃蘗 五斤

大青燬

橘皮

柴胡

升麻 此名

枳仁

紅花 此名

古制如麻豆大每服一匙或二匙或三匙或四匙或五匙

夫相稱執心服一匙或二匙或三匙或四匙或五匙

大辛能物

秦艽羌活湯

治痔漏成瘻

羌活 此名

不計其數

防風 此名

升麻

炙甘草

麻黃

柴胡 此名

藁本 此名

細辛 少許

紅花 少許

右劉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗空心服之忌風寒麪大小便

當歸郁李仁湯

治痔漏大便硬努出大腸頭下血苦痛不能忍

郁李仁

皂角仁 此名

枳實 此名

秦艽

麻仁

當歸

生地黃

蒼朮配伍

大黃

澤瀉已上各一分

右剉如麻豆大除皂角仁別為末水三盞煎至一盞去粗入皂角仁末調空心食前服之忌如前

紅花桃仁湯

治痔漏經年因而飽食筋脉橫解腸澀為痔治法當補北方瀉中央

黃蘗壹錢五分

生地黃壹錢

澤瀉捌分

蒼朮伍分

當歸梢

漢防已

防風梢

熟艾伍分

麻黃貳分

紅花貳分

桃仁拾箇

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞去粗稍熟食前服之忌如前

秦光當歸湯

治痔漏大便結燥疼痛

大黃煨四錢

秦光

赤實已上各一分

澤瀉

當歸梢

皂角仁

白朮已上各五分

紅花許

桃仁二十不

右都作一服大...



服忌如前

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

一富者前陰臊臭又函連曰飲酒腹中不和求  
先師治之曰夫前陰者是厥陰肝之脈絡循陰  
器出其挺末凡臭者心之所主散入五方為五  
臭入肝為臊此其一也當於肝經中瀉行間是  
治其本後於心經中瀉少衝乃治其標如惡針  
當刺藥除之酒者氣味俱陽能生裏之濕熱是  
風濕熱合於下焦為邪故經云下焦如瀆又云

在下者引而竭之酒是濕熱之水亦宜決前陰  
以去之

龍膽瀉肝湯

治陰部時復熱痒及臊臭

柴胡五分

澤瀉一錢

車前子

木通五分

生地黄

當歸稍

草龍膽三分

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞  
去粗空心稍熱服便以美饌壓之此藥柴胡  
入肝為引用澤瀉車前子木通淡滲之味利

小便亦除膝氣是名在下者引而竭之生地黃草龍膽之苦寒瀉酒濕熱更兼車前子之類以撤肝中邪氣肝主血用當歸以滋肝中血不足也

清震湯

治小便溺黃臊臭淋瀝兩丸加冰陰汗浸多

羌活

酒黃蘗

升麻

柴胡

蒼木

黃芩

澤瀉

麻黃根

猪苓

防風

炙甘草

當歸身

藁本

紅花

古劉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗臨卧服大忌酒濕麪

固真湯一名正元湯

治兩丸冷前陰痿弱陰汗如水小便後有餘滴尻脣并前陰冷惡寒而喜熱膝下亦冷

升麻

羌活

柴胡

炙甘草

草龍膽

澤瀉

黃蘗

知母

右劉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞

去粗空心 稍熱服以早飯壓之

清菟湯 一名柴胡勝濕湯

治兩外腎冷兩髀陰汗前陰痿陰囊濕痒臊氣

柴胡

生甘草

酒黃蘗 已上各貳錢

升麻

澤瀉 已上各壹錢五分

當歸梢

羌活

麻黃根

漢防己

草龍膽

茯苓 已上各壹錢

紅花 以許

五味子 貳拾箇

右剉如麻豆大分作二服水匕盞煎至一盞

去粗食前都煎之

椒粉散

治前陰兩丸濕痒 其方月減

肉桂 以分

當歸梢

猪苓 已上各參分

蛇床子

黑狗脊 已上各五分

麻黃根 以分

野葛 以分

紅花 以許

斑猫 兩枚

右為末乾糝上避風寒冷濕處坐卧

補肝湯

治前陰水冷并陰汗兩脚痿弱無力

黃芪 赤芍

炙甘草 伍分

升麻

猪苓 已上各四分

白茯苓

葛根

人參 已上各四分

柴胡

羌活

陳皮

連翹

當歸身

黃蘗 炒

澤瀉

蒼木

翹末

如母

防風 已上

右剉如麻豆大，散作一服水二大盞，煎至一

盞，去粗空心，新熟，服忌酒、濕麵。

溫腎湯

治面色萎黃，身黃，脚痿，弱無力，盜汗。

柴胡

麻黃根 陸分

白茯苓

白朮

酒黃蘗

猪苓

升麻 陸分

蒼木

防風 已上各壹錢

澤瀉 或錢

右令作二服，每服水一大盞，煎至一盞，去粗

食前，稍熱服，一時辰許方食。

延胡丁香丸 一名丁香氣丸

治臍下撮急，疼痛，并周身皆急，痛小便頻數

及五脉急，獨腎脉按之不急，皆虛無力，名曰

腎虛

羌活參錢

當歸

茴香已去

延胡索

麻黃林

肉桂已去

丁香

木香

甘草

川烏頭已春五分

防己八分

蠅一分

右為細末酒煮麩糊為丸如...大每服五  
十丸空心鹽白湯服

瀉痢門

訶子皮散

癸卯冬白樞判家一老僕...氣特  
弱病脫肛日久服藥未驗復下赤白...作

治曰...大氣

也真...消氣

而除...而除

寒補陽以補氣

御米散 糯米

訶子根去核

若為細末都作一服水二...

和相

空心熱服

麻補胃湯

治宿有陽明血證因五月間大熱喫香腸瀉  
下血如遠家及如節腹沉沉腹中不痛血  
色紫黑而心熱身熱渴陽明少陽經血證  
也

白芍

黃芩

枳實

芍藥

葛根

古方如

一服每服水一盞煎至

升陽去濕和血湯

治腸瀉下血方作一派其血嘔出有力而遠  
射口帶如節脊中血下行腹中大作痛乃陽  
明氣衝熱毒所作也當升陽去濕熱和血脉  
是其治也

橘皮

熟地黃

當歸身

蒼朮

秦艽

肉桂

生地黃

牡丹皮

生甘草五分

升麻七分

熟甘草

黃芪已各壹錢

白芍藥壹分

右咬咀都作一服水煎至一盞去粗空

心稍熱服立効

益智和中湯

治腸澼下血或血色紫黑腹中痛腹反惡寒

石手關脇弦疾之無力而喜熱物屬之內寒

明矣

肉桂壹分

桂枝四分

牡丹皮

柴胡

葛根

芍藥仁

半夏已各五分

當歸身

炙甘草

黃芪

升麻已各壹錢

白芍藥已各壹錢五分

乾薑已各五分

右為麤末都作一服水三盞煎至一盞去粗

食後溫服

芍藥藥皮丸

治濕熱惡痢血痢頻併寤病無問膿血並皆

治之

芍藥

黃芪已各壹錢

當歸

右為米飯為丸如雞頭大每服五七十九食  
前米飲湯下忌油膩酒濕麪等物

和中益胃湯

治太陰陽明腹痛大便常泄若不泄即秘而  
難見在後傳作濕熱毒下痢或口腹中微痛  
脇下急縮腹緩而洪弦中之下得之按之空  
虛

蘇朮 壹分

藁朮

熟地黃

炙甘草

當歸身

四分

米

升麻

右以

服水二盞煎至一盞去粗空

槐花散

治腸澼下血濕毒下血

川芎

槐花

陳皮

荆芥穗

熟地黃

白木 已未分

當歸身

升麻

各錢

右為細末每服二錢米飲湯調下食前忌酒

濕毒生冷硬物



扶苓湯

治因傷冷飯水泄一夜走十行變作白痢次日其痢赤白交中疼痛減食熱躁四肢沉困無力

生黃芩各一分

當歸身四分

肉桂

炙甘草一分

猪苓

茯苓各一分

澤瀉一分

芍藥一分

蒼朮

生薑

升麻

柴胡已春或錢

右以水如麻豆大加作一服每服水二盞煎

至一盞去粗粒食前服之

大便三四次瀉而不多有時作泄腹

便黃

黃芩

柴胡

當歸身

益智

橘皮各一分

升麻一分

及甘草

紅花火酒

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗粒

熱食前服之

升陽除濕湯

自下而上者引而去之

蒼朮去毒

柴胡

羌活

防風

升麻

神麴

澤瀉

猪苓

炙甘草

陳皮

麥蘗

石都作一服水二

一盞去粗空心服

之

如胃寒則...

夏生薑二片

一飲則...

不得用

人

補不喜飲食四肢怠惰

新起之口不知味腹鳴之便微瀉身體昏悶

覺渴不喜冷物

黃芪

白草

當歸梢

羌活已上各五分

人參

黃芩

柴胡

半夏

白朮已上各五分

陳皮

升麻已上各五分

蒼朮去毒五分

紅花之許

右都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食

前服之

升麻補胃湯

治因內傷服牽牛大黃食藥泄瀉過多腹中

火痛

甘草七分

升麻

柴胡

草豆蔻

黃芪五錢

半夏六分

當歸身

乾薑五錢

紅花少許

右都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食

遠服之

瘡瘍門

散腫潰堅湯

治馬刀瘡疔受如石...耳下至缺盆...或

...手足少陽經中及瘰癧遍

出或...破流膿...皆以之

黃芩...草龍膽...小黃根剉碎酒洗

黃連...酒知母...桔梗

白布...柴胡...炙甘草

六一二稜...廣茂...連翹已名大錢

葛根...白芍藥...當歸梢

苦六連或錢...升麻六分

右咬咀每服六錢水二盞零八分先浸多半

日煎至一盞去粗食後熱服於卧處伸足在  
高處頭低垂每含一口作十次嚥服畢依常  
安卧取藥在膈上貯蓄故也另攪半料作細  
末煉蜜為丸如棗豆大每服百餘丸用此藥  
湯啣一口下或加海藻五錢炒亦妙

升陽調經湯

治原經逆  
中來若  
來方成  
堅硬大  
至頻車此皆出是陽明胃經  
之隱曲肉底是足少陰腎經中  
於癸腎是夫傳與其俱作塊子  
等並皆治之或作丸亦可

子兩  
黃  
炙甘草  
桔梗  
為藥  
右  
百餘  
硬可  
一  
作十次  
之留  
一口  
在後  
送下  
丸藥  
服畢  
其



救苦化堅湯

治療瘰癧馬刀缺癭從耳下或耳後下頸至肩  
上或入缺盆中乃手足少陽之經分其瘰癧  
在頰下或至頰車乃是陽明之經分受心脾  
之熱而作也今將二經合而治之

黃芪

護及毛間腫此處生血亦瘡

家聖藥也

人

補中氣

黃芪

能去瘡

邪

黃芪

升麻

此一味俱是陽明本經藥也

連翹

此一味十二經瘡中之藥不可無也  
能散諸血結氣聚此瘡家之神藥也

牡丹皮

卷八

去腸胃中留滯宿血

當歸身

生地黄

熟地黄 已各五分

此三味諸經中和血生血涼血藥也

白芍藥

五分

如夏月病後血虛其氣其能補中益肺之虛病後血虛中痛必用之其則不

可用

肉桂

大辛 氣 味 散 結 散 寒 通 經 活 絡 溫 中 下 氣 除 積 滯 助 陽 消 陰 藥 也

之 功 用 如 此 藥 性 大 辛 氣 味 散 結 散 寒 通 經 活 絡 溫 中 下 氣 除 積 滯 助 陽 消 陰 藥 也

瘡用大辛熱以消滯凍之氣如有知痛者去之

柴胡

捌分

功同連翹如瘡不在少陽經則去之

黍粘子

參分

無腫不用

羌活

壹錢

獨活

防風

已上各五分

此三味必關手足太陽證脊痛項強不可迴視腰似拆項似拔者是也其防風一味辛溫若瘡在膈已上雖無手足太

陽經證亦當用之為能散結去上部風邪病人身拘急者風也

昆布 其分

其味大鹹若瘡堅硬結硬者宜用鹹能

軟堅

京三稜 其分

其分

廣茂 其分

此二味若瘡堅硬甚者用之如不堅硬勿用

益智仁 其分

如泄多者胃不和也或病人吐沫吐食

黃蘗 其分

以法煨悶

如有熱或腿脚無力加如有燥煩欲去  
衣者腎中伏火也更宜加之無此證勿



用

厚朴

壹錢貳分薑製

如腹脹者加之無則勿用

右為細末湯浸餅和丸捻作餅子日乾搗

如米粒大每服二錢白湯下

○如氣不順加補皮者加木香少許量病人

虛實隨時斟酌與之無令藥多妨其飲食此

治之大法

○如止在胃中者加柴胡秦艽各三

味餘

○如白濁者加黃芩芍藥各三

味餘

○如氣虛者加黃芪黃連

味餘

○如氣虛而後病變之權

藥知母防己之類視邪

○如氣在上中下三焦

氣在上焦加黃芩

味餘

○如本人大便不通而滋其邪盛者加酒製大

黃以利

○如血燥而大便燥乾者加桃仁酒製大黃三味

○如風結燥不行者加麻仁大黃

○如風澀而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽

以利之

○如麻濕覺身有氣而大便不通者加麻仁

仁大黃以除濕

○如陰寒之病為寒結閉而大便不通以

中土之藥如乾薑冰冷與之

用藥之法不惟瘡瘍一說諸疾病量入素氣

弱者當去苦寒之藥多加入參黃芪甘草之

類瀉火而先補其元氣然後做此

柴胡連翹湯

治男子婦人馬刀瘡

中桂

當歸補血

秦艽子 貳錢

炙甘草

酒黃蘗

生地黄 貳分

柴胡

黃芩

酒知母

連翹

瞿麥 穗 六錢

右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一

蓋去粗補熱食後服之

黍粘子湯

治耳痛生瘡

昆布

蘇木

生甘草

蒲黃

草龍膽

黍粘子

連翹

生地黄

當歸梢

黃芩

炙甘草

黃連

各五分

柴胡

黃芪

桔梗

各錢

桃仁

紅花

少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞

去粗補熱食後服之

呼酒湯

一名連翹湯

治皮膚痒眼下垂止

桂枝

連翹

生地黄

桔梗

升麻

甘草

當歸梢

麻黃

豆蔻仁

羌活

防風

柴胡

蒼朮

各錢

酒黃芩

紅花

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞

去粗食後熱服

消腫湯

治馬刀瘡

黍粘子炒

黃連上各五分

當歸梢

甘草上各壹錢

瓜蒌根

黃芪上各壹錢五分

生黃芩

些胡上各壹錢

連翹

紅花火許

右咬咀每服五錢水一盞煎至一盞去粗稍

熱食後服忌酒濕麵

內托莖活散

治足太陽經中左右二處腫痛按之無力

腎生癰堅硬

疔大作

肉桂參分

連翹

炙甘草

蒼朮

橘皮上各五分

當歸梢

防風

藁本上各壹錢

黃芪上各壹錢五分

黃蘗酒製

羌活上各壹錢

右咬咀都作一服水二盞酒一盞煎至一盞

去粗稍熱空心服以夾衣蓋攤上使藥力行

罷去蓋之衣

升麻托裏湯

治婦人兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼

子其脉弦洪按之細小

黃蘗五分

肉桂五分

秦粘子伍分

黃芪

炙甘草

當歸身已上各壹錢

連翹

升麻

葛根已上各壹錢五分

右以咀都作一服水一大盞酒半盞同煎至一盞去粗稍熱食後服

肉托黃芪湯

賈德茂小男於左大腿近膝股內出附骨癰不辨肉色漫腫皮澤木硬瘡勢甚大其左脚

緩微有力此藥之

生地黃

羌活

柴胡

右以咀都作一服水一大盞酒半盞同煎至一盞

去粗食一熱服

胡連經湯

治小兒項側有瘡取一而不潰名曰馬刀瘡

柴胡

連翹

當歸梢

生甘草

黃芩

黍粘子

京三稜

桔梗

黃連

紅花

右列如麻豆大都作一服水二大盞煎至一

盞盡去粗熱熱食後服忌苦藥泄大便

白芷

此方出... 苦於手陽明大腸經

... 腫痛在陽明

... 洪緩有力

... 邪氣在表其

... 知不在

... 疑

... 從上

... 寒

... 治

... 其

... 實

... 生

... 地黃

... 黃芩

黃芩

酒黃芩

紅花

生黃芩

連翹

白芷

生地黃

黃芩

桔梗

... 氣使無

... 為瘡

... 故治

... 其寒

... 實

... 疑

... 從上

... 寒

... 治

... 其

... 實

... 疑

... 從上

... 寒

... 治

... 其

... 實

右咬咀各作二服酒水各一大盞半同煎至一盞去粗粉熟地卧服一服而愈

保生救苦散

治火燒或熱油燒及脫乳肉者

生寒水石 大黃 煨 黃藥油等分

右為細末用酒調服或乾用此藥塗之其

痛立止 凡五破傷風之患

上散

治諸般疥癩

蛇牀子散

熟硫黃 寒水石 斑猫

右方研碎黃硫黃寒水石如粉次入斑猫和

蛇牀子黑狗脊等分研勻先洗疥癬令

湯透去油調于中搽以鼻中吹二兩次

搽上可一上即愈

○如痛甚及腫滿尚起者加寒水石一倍

○如不苦癢只加黑狗脊

○如微癢只加蛇牀子

○如癢中有蟲加雄黃

○如喜火炙湯浴者加硫黃

聖愈湯

治諸惡瘡血出多而心煩不安不得睡眠亡血故也以此藥主之

生地黃

熟地黃

川芎

人參已上各

當歸身

黃芪已上各

右咬咀如麻豆大都作一服水二大盞煎至

一盞去粗料無時服

獨聖散

治湯湯破火燒破瘡毒疼痛

生白礬

石為細末是瘡法謂瘡破處不拘時候

黃芪肉桂柴胡胡桐

治附骨癰疽及腫不辨肉色行步作痛按

之火痛

黃芪

當歸梢已上各

柴胡已上各

黍粘子炒

連翹

肉桂已上各

升麻已上各

炙甘草

黃蘗已上各

右咬咀好糯米酒一大盞半水一大盞半同煎

至一大盞去粗空以溫服少時便以早飯壓

之不致大熱上攻中上二焦也



安神丸

治心神煩亂怔忡死凡欲吐胃中氣亂而熱  
 有似與濃之狀皆膈上血中伏火蒸蒸然不  
 安宜用權衡法以鎮陰火之浮行以養上焦  
 之氣經云熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之  
 以黃連之苦寒去心煩除濕熱為君以甘草  
 生地黃之甘寒瀉火補氣發生陰血為臣以  
 當歸補血不足以硃砂納浮溜之火而安神  
 明也

生地黃

酒洗

左付除砂

湯浸合餅為丸如黍米大每服十五丸津唾

無下後

硃砂安神丸

治心煩懊憹怔忡上熱中氣亂心下  
 痞悶食入反出

硃砂

黃連

生甘草

石為末湯浸研餅為丸如黍米大每服十五丸

食後洋蜜煎下

補氣湯

治皮膚間有麻木乃肝氣不舒行故也

白芍藥

橘皮

不去白

黃芪

澤瀉

右咬咀每服一兩水一盞煎至一盞去濕

服

當歸補血湯

治婦人肌熱燥熱目赤面紅煩渴身熱晝夜

不怠其脈洪大者宜投全無之証經曰身熱

得之於心則四肢皆熱也

當歸身

右咬咀每服一服水一盞煎至一盞去粗

服

柴胡升麻湯

治男婦人四肢身熱肌熱筋骨痛熱如

火燎以手捫之烙人夫熱四肢者為肝土也

熱伏連中此病多因血虛而得之又有因血

過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中此藥之

升麻

獨活

獨活

羌活

白芍藥

白芍藥

炙甘草

柴胡

柴胡

生白芍

生白芍五分 煎水二大匙 煎至一匙去粗

熱服之無冷之物

火熱

治五心身熱是火鬱於地中 治者理也

治五心身熱是火鬱於地中 治者理也

治

草

草

草

草

草

草

草

皮

皮

皮

皮

皮

皮

皮



防風

羌活

紅

右為細末

麻黃

治中痛

急


麻黃

黃

歸

川

山



右吹咀每...

Vertical text columns on the left page, including characters like '通', '按', '大', '小', '五', '七', '九', '十', '十一', '十二', '十三', '十四', '十五', '十六', '十七', '十八', '十九', '二十', '二十一', '二十二', '二十三', '二十四', '二十五', '二十六', '二十七', '二十八', '二十九', '三十', '三十一', '三十二', '三十三', '三十四', '三十五', '三十六', '三十七', '三十八', '三十九', '四十', '四十一', '四十二', '四十三', '四十四', '四十五', '四十六', '四十七', '四十八', '四十九', '五十', '五十一', '五十二', '五十三', '五十四', '五十五', '五十六', '五十七', '五十八', '五十九', '六十', '六十一', '六十二', '六十三', '六十四', '六十五', '六十六', '六十七', '六十八', '六十九', '七十', '七十一', '七十二', '七十三', '七十四', '七十五', '七十六', '七十七', '七十八', '七十九', '八十', '八十一', '八十二', '八十三', '八十四', '八十五', '八十六', '八十七', '八十八', '八十九', '九十', '九十一', '九十二', '九十三', '九十四', '九十五', '九十六', '九十七', '九十八', '九十九', '一百'.

均時服

茶經補氣湯

此湯治氣虛血弱，服之能補氣養血，誠為補劑中之極品也。

凡氣虛血弱，面色萎黃，頭暈目眩，心悸怔忡，失眠健忘，食慾不振，消化不良，大便溏薄，婦女經水不調，赤白帶下，產後失血過多，服此湯無不立效。

血氣不足

黃芪

甘草

生地黃

草豆蔻仁

升麻

熟地黃

人參

紅花

此湯治五臟六腑，皆作一服，水二盞煎之。

此湯治五臟六腑，皆作一服。

十陽湯

此湯治太陽經寒，恐則氣下行，此升。

氣

天升黃 伍錢

麻黃 不去節

防風 伍錢

藥

六分 咀 每服五錢水二盞煎至一盞去粗粉

藥

藥

藥

曰西南坤上也

天地之雨也陰也

下行地之氣也

參則十陽濕去其陰時也 為寒中濕勝則音

聲如鼓於中 相法家有說土音

如者濕氣也 其藥也 亦也 以明其濕

審矣 又知此 者亦為陰寒也 附經云氣虛則

外寒雖見於中蒸蒸為汗然使大寒知始為熱

而表虛之陽不任外寒也 傳寒中多成痺塞矣

色以候天脈以候地形者乃候地之陰陽也故

以候氣候之皆有形無形之可見者也

調衛湯

治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任風也

黃芪

麻黃根每斤

羌活七分

生甘草

當歸補

生黃芪

半夏各五分

麥門冬

生地黃已洗

諸苓各分

蘇木

紅花已洗

五味子七粒

右劉如麻子

大附片一

煎至一盞

去粗細無服

中風證之

黃芪斤

清燥湯

治六月...母實...

日濕熱相合...庚大賜寒涼以救之...金

受濕熱之邪...化寒水生...源源絕則腎虧

痿厥之病...作腰已下痿...痺流...注動行

發不正兩足軟側此藥主之

黃芪

橘皮

白朮

澤瀉

人參

白茯苓

升麻

炙甘草

麥門冬

當歸身

生地黃

神麴末

枳殼

柴胡

酒黃蘗

木香

五味子...



去相空心燕服

歸六黃湯

治盜汗之聖藥也

當歸

生地黃

熟地黃

黃藥

黃芩

黃連

黃芪加倍

右為麤末每服五錢水二錢煎至一錢分食前服小兒減半服之

豆散

治身重如石

黃藥

黃芩

黃連

黃芪

黃芩

黃連

治身重如石

忽覺有風氣暴至診脈六脈俱弦其按之

洪實有力其證手舉三日便秘面赤熱此

風氣始至加於身也四肢者脾也以風寒之

邪傷之則痛急而身痺乃風濕末疾而中在

邪傷之則痛急而身痺乃風濕末疾而中在

外也內經曰寒則筋攣正謂此也本人志飲  
酒內有寒熱寒於陽胃之間故大便秘澀而  
面赤熱內則手足陽明受熱外則足太陰脾  
經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而  
緩其急以黃藥之苦寒滑以瀉實而潤  
燥用升陽氣行手足  
陽明之經用  
絕更以桂枝辛熱入  
藥甘草專補脾  
不受風寒之邪而退其邪專益肺金也  
人參以補元氣為之輔佐加當歸身去裏

急而和血潤燥此藥主之

芍藥五分

升麻

葛根

人參

當歸稍

炙甘草已上各五分

酒黃藥

桂枝已上各五分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一  
盞熱服不拘時令煖房中近火摩搓其手

瀉榮湯

治癘風滿面連頸極癢不任眉毛脫落先破  
其處令惡氣消盡然後服此藥

連翹

升麻已上各五分

桔梗五分

生黃芩

生地黄已上各四分

黃芪

蘇木

黃連

地龍

全蠍

當歸已上各三分

白豆蔻

人參已上各五分

甘草壹分半

梧桐淚壹分

麝香少許

桃仁去筒

黃蟲去翅足炒去筒

水蛭去筒炒

右劉如蘇豆大除連翹梧桐淚白豆蔻另為細末麝香黃蟲水蛭三味同為細末熬作一服水一盞酒一盞入連翹煎至一盞去粗再入白豆蔻二味入麝香等再煎至七八沸熱

人參

治兩手

四肢麻痺

黃芪

升麻

白芍

白芍

升麻

甘草

升麻

升麻

石咬咀分作四服每服水一盞煎至一盞去

粗熱食遠服

導氣湯

治兩腿麻木沉重

黃芪 捌錢

甘草 六錢

青皮 四錢

升麻

柴胡

當歸 補

澤瀉 已春 貳錢

酒皮 七錢

紅花 水許

玉味子 壹百貳十箇

三叉咀 分作四服 每服水一大盞 煎至

去相食前執服

補中湯

治高黃汗多 赤白皮 煎至 水一大盞 煎至

黃芩 兩手 水一大盞 煎至 水一大盞 煎至

行也

當歸

大參 補

參 補

右 文 四 分 作 煎 水 一 盞 去 相 食

遠 參 煎 水 一 盞 去 相 食

蘇 黃 各 半 湯

蘇黃各半湯

治秋冬每夜五更嗽連聲不絕乃至天曉日

出方緩口苦兩脇下痛心下痞悶吐而夕驚

筋孳破節疼痲痺延津胃神昏呵欠不  
進飲食

麻黃 別錄 蒼朮 山錢

草口 藥性 紫胡

生何 藥性 當歸 補

炙甘草 藥性 黃芪 藥性

右次咀 作一服水 煎服

卧服

上清湯

清利頭

人 女 少

葛根 壹錢五分

黃芪 壹錢

白朮 壹錢

木桂湯 一錢五分 善本思

治 寒濕 痺痛 色萎黃

蒼朮 壹錢

橘皮 壹錢

枳枝 壹錢

黃芪 壹錢

白朮 壹錢

半夏 壹錢

炒神麩

澤瀉 壹錢

旱且 壹錢

猪苓 壹錢

黃芪 壹錢

炙甘草 壹錢

益去根煎 為效

黃芪 壹錢

白朮 壹錢

半夏 壹錢

炒神麩

澤瀉 壹錢

旱且 壹錢

猪苓 壹錢

枳枝 壹錢

橘皮 壹錢

黃芪 壹錢

白朮 壹錢

杏仁

右部作一服水二盞生薑五片煎至一盞去粗食前熱服

正氣湯

治盜汗

炒黃芩

炒知母

已上各五錢五分

炙甘草

右為麤末作一服水

煎至一盞

服

趁痛丸

治打撲... 不可忍

白薄荷

白芷

白芍

白朮

右為細末煉蜜為丸每服一丸細

膏溫酒吞下

退熱湯

治表口虛執或遇夜則甚

黃芪

柴胡

土甘

黃連

黃芩

芍藥

地骨皮

生甘草

芍藥

當歸身

升麻

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗人參遠

○如身體力困者加麥門冬五味子以上各伍人參

甘草已下各一錢

解表升麻湯

治遍身壯熱筋骨疼痛

升麻

羌活

蒼朮

各壹錢

防風

柴胡

甘草

各伍分

黃歸

藥本

橘皮

各壹分

加黃歸不盡

右

水

煎

去粗

服

天麻

治有風寒因受日熱致成頭痛來右口角

每眼頗有側視及左三指麻痺木疼痛

天麻

芍藥

神麩炒

羌活

茯苓

人參

黃連

當歸

茵陳

甘草

升麻

黃芩

黃藥

蒼朮地味

澤瀉七分

柴胡九分

主治咳嗽作一服水二盞煎去一盞去粗食

健步丸

治膝中無力伸屈不得

腿脚沉重汗後發熱

防己

滑石

澤瀉

白朮除濕湯

治平後發熱

白朮

治平後發熱

以黃色此藥

白朮

澤瀉

八參

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去粗

炙甘草

柴胡已上各伍錢

知母

赤茯苓

生地黃

地骨皮

汗後發熱

小便或大便

湯

丸

每服七十



食速温服

○如小便快利減茯苓澤瀉一半

○如有刺痛一劑藥中加當歸身百

加味四君子湯

治久瘧熱多寒少不止

白朮

白茯苓

甘草

黃芩

右改單每服三錢水煎服

煎至一

血湯

治發熱晝少而夜多太陽經中元甚晝病則

在氣夜病則在血是是太陽膀胱血中浮熱

微有氣也既病人大小便如常知邪氣不在

臟腑是無裏證也外無惡寒知邪氣不在表

也有時而發有時而止知邪氣不在表不在

裏知在經絡也夜發多而晝發少是邪氣下

陷之深也此雜證也熱入血室而治之

生地黃酒洗

熟地黃

蒲黃

丹參酒炒

當歸酒洗

漢防已酒洗

柴胡 去芦

甘草梢炙

羌活 已上各壹分

桃仁 去皮尖

右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗空心溫服

洗面藥

治面有黥點或生瘡或生塵拂及粉刺之類并去皮膚燥癢去垢膩潤澤肌膚

皂角

好升麻

錫實子研

白芨

計松

縮砂

白丁香

秦子

桑豆

糯米 弄成

右為細末用之如常

澄肌如玉成

白丁香

白芨

白牽牛

白斂 已上各壹分

白芷 宋錢

當歸稍

白茯苓

升麻 已上各壹分

白茯苓

楮實子 已上各三錢

麻黃 去節

白附子

連翹 已上各壹分

小椒 壹錢

右為細末用之如常

面油摩風膏

麻黃

升麻 薰衣

防風

已上各藥

羌活 黃

當歸身

白朮

白檀

已上各藥

君用小油半斤以銀器中熬綿包定前藥於  
油中熬之得所澄淨去粗入黃蠟一兩再熬  
之為度

小兒門

論驚風論

外物驚宜鎮心以黃連安神是若氣動所驚宜  
寒水石安神元土之防風并治風平溫之藥必

殺人何也辛散淳滋熱者火也能令母實助風  
之氣感皆殺人也因驚而泄青色先鎮汗以硃  
砂之類勿用寒涼之氣大禁於驚丸風木旺必  
克脾胃當先實其土後瀉其木問孝忠編集錢  
氏方以益黃補土悞矣其藥有丁香辛熱助火  
火旺土愈虛矣青橘皮瀉肺金丁香辛熱大瀉  
肺與大腸脾實當瀉子令脾胃虛反更瀉子而  
助火重虛其土殺人無疑矣其風木旺證右關  
脉洪大掌中熱腹皮熱豈可以助火瀉金如寒  
水來乘脾土其病嘔吐腹痛瀉痢青白益黃散

聖藥也令立一方先瀉火補金大補其土是為神治之法

黃芪湯

黃芪或錢

人參壹錢

炙甘草壹分

右吹咀作一服水一大盞煎至半盞去粗食

遠服加白芍藥尤妙

此三味皆甘溫能補元氣甘能瀉火內經云熱淫于內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉火酸味能瀉肝而大補肺金所補得金土之位火旺火虛風木何由而來尅土然

後瀉風之邪

夫益黃散理中丸養神丸之類皆治脾胃寒濕大盛神血之藥也若得脾胃中伏熱火勞役不足之證及服熱藥已久而類胃虛而成慢驚之證用之必傷人命夫慢驚風者皆由久瀉脾胃虛而生也錢氏以羌活秦艽療慢驚風悟矣脾胃虛者由火邪乘其土位故曰災後來者為虛邪火旺能貫其木亦旺故來尅土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒更於脾土中補金以酸涼收

土中金旺火衰風木自虛矣損食多進逆食  
前藥是也

益黃散

治胃中風熱

黃連或錢

陳皮去白

人參已上各五錢

芍藥七分

生甘草

熟甘草已上各

黃連少許

右為細末每服二錢水一盞煎至五勺食前  
服

升陽益血湯

二月間一小兒不滿一百日氣腹脹二日

大便一度瘦弱身黃宜升陽益血

補血利大便

煨補五分

神麩末

升麻五分

當歸

厚朴已上

枳實已上

右都作一服水一大盞煎至半盞去粗食遠

熱服

厚腸丸

治小兒失乳以食飼之未育食腸不能消化  
或生腹脹四肢瘦弱或刺色無常

厚朴

青皮

橘紅

辛復

蒼朮

人參

初實

麥冬

木

右為極細末水煮麥冬為丸

二十丸溫水送下

補陽湯

時初冬一小兒二歲大

青黑腦後青絲

便微青耳尖冷

不利胃而多驚

黃連

橘皮

葛根

連翹

蠟梅

炙甘草

升麻

黃芪

柴胡

當歸身

蘇黃

吳茱萸

生地黃

地龍

右次吐都作一服水一大盞半煎至六分去

和順乳食旺

大蕪美湯一名梳子梳谷湯

治黃府土色為熱為瀉當小便不利今反利

知黃色為燥胃經中大熱黃肌落知膀胱  
與腎俱受土邪乃大濕熱之證鼻下斷作瘡  
者上逆行榮氣伏火也能乳者胃中有熱也  
寒則食不入喜食土者胃不足也面黑色者  
為寒為痺大便一白寒褐色血黑色熱畜血中  
間黃之腸中有熱治法當滋榮潤燥除寒熱  
致津液

防風

炙甘草

山梔子仁

黃連 各

麻黃 不去根節

柴胡

黃蘗

羌活 已去葉分

茯苓 已去葉分

大群作一 服用水一大盞半煎  
令前稀熱服

小兒面色黃腹脹食不能下

白朮

桂枝

厚朴

白朮

白茯苓

柴胡 已去

麻黃

羌活

蒼朮

白朮

升麻 已去

吳茱萸

草豆蔻

澤瀉

白朮

精紅膠

青皮

黃連

杏仁

右都作一服水二大盞煎至一盞去滓分

服

中法外消丸

枳實

黃連

厚朴

生薑

黃芩

枳殼

橘皮

白朮

破仁

茯苓

半夏

白朮

夫此丸之功用能治一切瘡毒...

凡症

丸

乾生薑

厚朴

枳殼

黃連

黃芩

白朮

橘皮

枳實

厚朴

右為紅木湯浸一餅為丸如黍米大每服三

十丸隨乳

瘡疹論

夫瘡疹始出之證必先見面燥腮赤目胞亦赤





氣下流合於腎中二火交攻致營氣不凝於  
 肉理惡血乃發諸癩疹皆出於陽明故三番癩如顯之證皆足  
 後聚肉理歸於陽明故三番癩如顯之證皆足  
 太陽去勝脫尅病小腸其始出皆在於面頰而  
 於陽明因理熱化為膿者也二火熾甚反熾寒  
 水遍身俱出此皆出於足太陽之變中來也當  
 外發寒邪使令消發內歸一火不令交攻其中  
 令濕氣上騰複其本枝可一二服止仍必以  
 兒以後再無二番癩出之意世內有之惡癩者  
 詳之

不生癩

出希者再

川芎  
 葛根  
 蒼朮  
 白朮

酒芍藥

升麻

防風

羌活

獨活

黃芩

白芍

川芎

葛根

酒芍藥

黃芩

蒼朮

已各  
二分

細辛

生薑

白朮

陳皮

蘇木

紅花一分

吳茱萸半分

右劉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一

盞去粗精熟飲之

○夫癰毒出者必由血熱氣逆故也

大禁牛巴

智仁類

通中

水新

四

知

少加黃本以瀉火而補元氣

如心出小

連脾弦洪少加黃連

如命門

動搖少如生

證瘡以皆因

雖大熱內

辨小兒

呵欠

疔噴

睡中發驚

或下尖冷

眼澀

或辯復食

熱

或口醋氣

如辯不消

腹中痛

○如身熱少具其瘧未發乃與升麻湯二五錢

脈之待身表溫和瘧亦已顯服藥乃止

○身涼其瘧未出辯得是瘧者無問服數

身表溫和及瘧瘡已顯然後乃止

時山 桔梗湯寬胃膈利咽咳

桔梗

已出只時時與之決咽咳者利胃膈

桔梗

甘草

石為麤末每服二錢水一大盞煎至六分去

粗大溫時服之不可口乾數

○如見傷食證又見瘧者先與小犯大以巴豆

藥剋化過再與升麻湯

○如食重傷前藥不能過再與犯大以巴豆藥

過

○如大便行當即便與升麻湯服之恐瘧子內

為已後臨時作非過

○如瘧子已出稠密身表熱急與下項

秦粘子湯

如痲子已出稠密者未絕忌與此藥服之防  
後青乾黑照

秦粘子以酒洗 甘草炙

史明神效 黃芩

黃芩地骨皮 右同差 五六分

去粗溫麻黃柴胡升

治小兒麻黃柴胡升 流清

麻黃柴胡升麻黃柴胡升

滋麻滋麻

麻黃麻黃

厚朴厚朴 益智益智

柴胡柴胡 當歸當歸

升麻升麻 生薑生薑

神翅神翅 蘇合蘇合

紅花紅花

右剉如麻豆大小作二服水一大盞前至七

分食速服忌風寒微有汗則效