





| *Carissimo Lenormand*
m.d.

SYNOPSIS

HYMENOPHYLLACEARUM.

SYNOPSIS
HYMENOPHYLLACEARUM,
MONOGRAPHIAE HUJUS ORDINIS

PRODROMUS.

AUCTORE

R. B. VAN DEN BOSCH M. D.

Excerptum ex Vol. III. Nederl. Kruidk.
Archief., pag. 341—419.
m. Dec. 1858.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

LUGD. BATAVORUM APUD
JACOBUM HAZENBERG CORN[!]. FILIUM.

Janet Janet
Wm. 1863

1558
1859!

QL 1

. A 1

B62

1859

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

S Y N O P S I S

HYMENOPHYLLACEARUM.

AUCTORE

R. B. VAN DEN BOSCH M. D.



Quum anno 1855 Hymenophyllaceas Javanicas ut determinarem et describerem tradidisset am. DE VRIESE, statim intellexi, me in hoc opere boni quid praestitum non esse, nisi totius familiae notitiam simul mihi compararem. Mox autem studium illud adjumentum esse desiit. Imo, absoluta specierum Javanicarum Synopsi (Plantae Junghuhnianae I. p. 545 seq.), universalem illam cognitionem tamquam novum studiorum scopum mihi proposui, cui adtingendo per ultimum biennium horas omnes impendi subsecivas, parcam medici praxin factitantis sor-

JAN. 1 1926
Bamboo delanei

tem. Meque non minus alliciebant plantulae, elegantia nescio an formarum diversitate insigniores, quam incerta et confusa illas tractandi ratio, quae vel in optimorum Pteridographorum libris offendebant. Patuit enim specierum distinctionem saepe fallacibus characteribus inniti, characteres contra optimos saepe negligi, studiumque hoc universe institui secundum methodum, vegetabilibus tam exiguis tamque tenerae structurae omnino non adaequatam.

Microscopio itaque usus, omnes species, quarum specimina habebam, accurate investigare statui idque in primis egi, ut specierum ab auctoribus veteribus descriptarum notitiam mihi compararem. Non enim poteram quin mirarer, auctores recentiores hasce adeo neglexisse, ut, paucis exceptis, illis sint dubiae vel ignotae. Inter omnes autem constat, veterum testimonia in hac scientia non impune negligi neque decere excusationis causa afferre, illorum diagnoses nimia brevitate peccare dignoscendaeque speciei non semper sufficere. Propterea quantum potui eorum specimina aeque religiose ac recentiorum investigavi et characteribus, quos microscopii usus suppeditavit, novis magisque certis denuo in schedulis descripsi et in proprium usum delineavi.

Monographia Hymenophyllacearum hoc modo nata est, quam velim ut iconibus illustratam

publico usui aliquando tradere possim. Interim ut aliquem studiorum fructum percipiam, in primis vero ut amicis et fautoribus, qui varia auxilia obtulerunt, quomodo hisce sim usus, ostendam, Synopsin hanc in lucem edere constitui, quae, si quis Botanicorum eidem agro collendo praeter me operam dederit, quid egerim, quidve agendum reliquerim, ei declareret.

Quod ad Synopseos rationem attinet, pauca monenda habeo. Catalogi aridi taedio lectores ut parcerem, synonyma pauca specierumque patriam adjeci, quorum auxilio quid subintellexerim rei perito facilius patescat. Plurium specierum autopsiam consequi adhuc desidero. Nihilominus in Catalogum eas recipere non dubitavi quotiescumque ex descriptione vel iconе de speciei auctoritate dubitare non licebat; quarum vero sive characteres sive affinitatem ex iisdem eruere non potui, has tamquam ignotas suo quantumpote loco inserui.

Contextum frondis eo majoris habeo momenti, quo altius in hoc studio penetravi, characteresque propterea a cellularum forma, magnitudine, contentis mutuatos in descriptiōnibus semper inserui juxta illos, quos frondium forma, divisio, sororum dispositio et forma suppeditarunt. Cellulae autem, ut prius, dicuntur *minimae*, quibus lumen est usque 0,^{mm} 4, dum idem *parvis* est 0,^{mm} 4—0,7, *mediocribus*

$0,^{\text{mm}} 7$ — $0,8$, *magnis* $0,^{\text{mm}} 8$ — $1,0$, *maximis* ultra $1,^{\text{mm}} 0$: in cellulis *elongatis* diameter longitudinalis transversali duplo est major. Quoad frondis divisionem monere oportet, frondem *pinnatifidam* dico, cuius rhachis utrinque ala foliacea lacinularum simili praedita est, *pinnatam* contra, quando illa sive est teres, sive laciniis decurrentibus tantum marginata; hoc in casu ala rhacheos sensim fit angustior pinnamque sequentem non attingit. Directio porro laciinarum determinatur terminis: *erectus*, *patulus*, *divaricatus*, *horizontalis*, *deflexus* secundum angulum plus minusve acutum, quem respectu rhacheos efformant. Stipitis frondisque dimensiones ad modum decimalem judicantur.

In distinguendis novis speciebus parcus fui. Imo plurimas in schedulis distinctas mihiq[ue] minime dubias nunc reticere consultum videbatur. Magis enim, species ab aliis determinatas et descriptas microscopica methodo comprobatas tradere, cordi est. Si nihilominus justo nimium distinxisse alicui videar, ei in mentem revocare liceat praestantissimi sui temporis viri effatum, in hac familia praesertim neglectum: »praestat enim, inquit, plantas cum non plena certitudine veri discriminis inter censem verarum stirpium conservare, quam inter varietas relegare disperituras“ (HALLER Hist. stirp. Helvet. I p. 194.)

Genera a Cl. PRESL proposita, paucis exceptis, delenda, imo quae conserventur, emendanda esse, persuasum mihi habeo. Venarum decursus et distributio, in silicibus caeteris disponendis egregii, in Hymenophyllaceis vix aliquius est usus. Habitus contra est quaedam similitudo et ratio typica, quae mira constantia in magno saepe specierum numero rediens, genera in posterum statuenda divinare quasi sinit. At vero species antea melius sint cognitae, earum historia plenius sit illustrata, vitae ratio et distributio geographica diligentius sint observatae; nam, ut viri inter nostri aevi Botanicos praestantissimi El. FRIES verba repeatam: »vana sunt nova genera, sine universali specierum cognitione et praecipue morphoseos historia.”

Restat, ut gratum animum significem viris clarissimis, qui augendis et suppeditandis auxiliis studia mea adjuvarunt utque iis, quorum auxiliis, ut pensum hoc absolvere possim, opus mihi est, studia mea commendem.

HYMENOPHYLLACEAE.

A. TRICHOMANOÏDEAE.

Cardiomanes PR.

1. *C. reniforme* (FORST.) PR. Hym. p. 12; *Trichomanes* FORST. Prodr. p. 84.
Hab. Nova-Zeelandia, FORST! FRASER!
MOSMAN! etc.

Feea BORY emend.

1. *F. botryoïdes* (KAULF.) *Trichomanes* KAULF.
Enum. p. 263 (1824); *F. nana* BORY
Dict. d. sc. nat. VI. p. 447 c. icon.
(1846).
Hab. Guyana Gallica, POITEAU!
2. *F. spicata* (HEDW.) in WEB. et MOHR Beitr.
(1805) I. p. 116 (nomen); *F. polypodina* BORY in Dict. d. sc. nat. VI. p.

447 c. icon. (1846); *Trichomanes spicisorum* DESV. in Berl. Mag. V p. 329 et *F. osmundoïdes* DC. in POIR. Encycl. meth. VIII p. 65 — utrumque teste div. KUNZE.

Hab. (Jamaica, St. Vincent), Trinidat! Guadeloupe! Guyana Gallica!

3. *F. Boryi*. *Hymenostachys diversifrons* BORY in Dict. d. sc. nat. VIII p. 462 c. icon. Hab. St. Domingo! Guyana Gallica! (America centralis.)

Obs. Nomen triviale hujus et insequentis speciei, characterem quippe generis ideoque omnibus speciebus communem indicans, commutare ausus sum.

4. *F. Humboldti*. *Trichomanes heterophyllum* H. B. K. Nov. Gen. I p. 25.

Hab. Juxta ripas Rio negro, HUMB; Fl. Essequebo, SCHOMB. (n. v.)

5. *F. Spruceana* (HOOK.) *Trichomanes* HOOK Cent. of ferns tab. 81.

Hab. Rio negro, SPRUCE. (n. v.)
Neuromanes TREVIS. *)

* Venae venulis spuriis transversalibus reticulatim conjunctae.

*) Nomen Preslianum (1843) retinere non licet propter homonymum genus Umbelliferarum a TORREY et GRAY in Flora of North-America anno 1838 propositum.

1. *N. Hedwigii. Trichomanes pinnatum* HDW.
gen. et sp. fil. fasc. I tab. IV fig. 1. *)
Hab. Jamaica! S^t. Domingo, SIEB!
Guadeloupe, L'HERMIN! Trinidad CRÜ-
GER! Guyana Gallica, LE PRIEUR! Su-
rinam, SPLITG! KEGEL, HOSTM! Bra-
silia, MART! CLAUSS! Peruvia, HKE!
Venezuela, FUNK et SCHLIM! (Rio Ne-
gro pr. S. Carlos, HUMB. en BONPL.)

2. *N. Kaulfussii. Trichomanes pennatum* KAULF.

Enum. p. 264.

Hab. (Jamaica, Trinidad. (HOOK.), Gu-
yana Gallica, CHAM.); Surinam, SPLITG!
HOSTM! KEGEL; Guy. anglic., SCHOMB!
Brasilia, LUSCIN., MART! N. Grenada,
(ocana), SCHLIM! (Mexico (S. Pedro
Tepinapa) LIEBM.), Guatemala, KEGEL!
(Peruvia (KZE)).

Obs. Div. KUNZEI sententia de diver-
sitate hujus et antecedentis speciei
(Bot. Zeitg. 1847 p. 352) structura
frondium egregie confirmatur. Perpe-
tuae autem utriusque confusione non
nisi mutandis nominibus mederi posse,
persuasum mihi habeo.

*) Tabulas in opere Hedwigii, ut citari possint, nume-
ravi secundum ordinem quo editae fuerunt.

3. *N. Vittaria* (DC.) PR. Hym. p. 19; *Trichomanes* DC. in POIR. Encl. meth. VIII p 65.

Hab. Surinam, KAPPL! KEGEL!
SPLITG! Guyana gallica (t. KZE)

4. *N. immersum* n. sp. Fronde pinnata, pinnis e basi lata inaequali ovato-oblongis petiolatis, sessilibus vel sursum deorsumve rhachi latius breviusve adnatis ultima elongata oblongo-lineari inciso-lobato, margine irregulariter (saepe lacero-) dentato; venis crebris tenuibus simplicibus furcatisve in marginem excurrentibus venaque marginali continua conjunctis, venulis transversalibus crebris; cellulis (forma et magnitudine ut in *N. Kaulfussii*) interraneis vero diffusis intermixtis globulis paucis; soris valde dispersis immersis, indusio parvo urceolato.

Rhizoma breve horizontale dense radiculosum, stipites fasciculatos debiles emittens; frons tenuis diaphana olivaceo-viridis.

A reliquis differt: statura minore (stipes 0,06—0,1 frons 0,07 longa, 0,02—0,04 lata), consistentia frondis et structura, soris immersis etc.

Hab. S^t. Domingo! de TUSSAC in Herb. FÉE.

** venuis transversalibus nullis.

5. *N. abruptum* FÉE Mém. I p. 14 tab. I fig. 5 (1844); *N. Hostmannianum* Kl. in Linnaea XVIII p. 532 (1845).

Hab. Guyana Gallica Le PRIÈUR! (Surinam, Hostm.; Brasilia? (t. KZE).

Cephalomanes PR. *) emend.

* Rhizoma brevissimum, frondes fasciculati.

1. *C. rhomboïdeum* (J. Sm.) *Trichomanes* J. Sm. in HOOK. Journ. III p. 417; *C. atrovirens* PR. Hymen. p. 18. tab. V. †)

Hab. Ins. Philippinae. Cum! Java, ZOLL!

2. *C. Javanicum* (Bl.) *Trichomanes* Bl. Enum. II p. 224; *C. oblongifolium* PR. Epimel. p. 19 tab. 10.

*) „Nomen genericum dignum alio, licet aptiore, permutare non licet.” Linn. Phil. Bot. 243. Praecepto huicce persapienti, servando et hoc genere et *Leptocionio*, utrumque licet minime aptum sit, obtemperare decet.

†) *Nomina* plantis collectionum venalium antea non descriptis imposita, etiamsi nulla addita sit descriptio, iis quae alias quis iisdem plantis serius imposuit, prioritatis quam dicunt gratia, servanda esse persuasum mihi habeo. Proptere anominas Smithiana Hymenophyllacearum Cumingianarum anno 1841 edita Preslianis in monographia serius (scil. anno 1843) praferenda esse censeo. Rem aliter sese habere simulac de nominibus manuscriptis collectionum privatarum publicarumve agitur, non est quod moncam.

Hab. Java! Bl., ZOLL.; Ins. Philippinae, CUM!

3. *C. curvatum* (J. Sm.) *Trichomanes* J. Sm. in HOOK. Journ. Ill p. 417; *T. asplenioïdes* PR. Hymen. p. 5 et 37.

Hab. Ins. Philippinae, CUMING!

4. *C. Zollingeri* v. d. B. in Pl. Jungh. I p. 552 (seorsim p. 8.)

Hab. Java! Soembawa! ZOLL.

5. *C. Boryanum* (KZE) *Trichomanes* KZE. Farrnkr. p. 237 tab. 97; *T. alatum* BORY in Dup. Voy. Bot. p. 282 tab. 38 fig. 2.

Hab. Ins. Carolinae, MERTENS. (n. v.)

6. *C. Singaporianum*. *Trichomanes Javanicum* HK. et GREV. tab. 240 (non Bl.)

Hab. Singapore, WALLICH (n. v.)

7. *C. Madagascariense* n. sp. Fronde oblongo-lanceolata pinnata, pinnis inferioribus horizontalibus contiguis, superioribus mediisque divaricatis imbricatis cunctis breviter petiolatis e basi lata cordata inaequali oblongis, margine inaequaliter dentato-serratis, apice rotundatis, venulis remotiusculis 1—2 furcatis; cellulis maximis teneris elongatis hexaedris, parietibus rectis hyalinis, interaneis amorphis fuscescens-tibus seriatim radiatimque dispositis; soris subimmersis, mediotenus latius

superne anguste marginatis, indusio cylindrico parum ventricoso, ore dilatato patulo recto.

Stipes triqueter glaber 0,1 et ultra longus, frons tenuis diaphana olivacea 0,15—0,18 longa, 0,03—0,04 lata, pinnae 0,010—0,016 longae, 0,006—8 latae.

Habitu et statura convenit cum *C. Zollingeri* C. et *curvato*, sororum forma cum *C. rhomboïdeo*.

Hab. Madagascar! BOIVIN in Herb. de FRANQUEVILLE.

** Rhizoma scandens, frondes sparsi.

8. *C. dissectum* (J. Sm.) *Trichomanes* J. Sm. in Hook. Journ. Bot. III p. 417; *T. dimidiatum* Pr. Hym. p. 15 et 38.

Hab. Ins. Philippinae! CUMING; Ins. Loo—choo (Oosima)! WRIGHT.

9. *C. auriculatum* (Bl.) *Trichomanes* Bl. Enum. II p. 225; *T. Bélangeri* BORY in BÉL. Voy. Bot. p. 79 tab. 8 fig. 1.

Hab. Java! BÉL.! REINW.! ZOLL!

Species ignota:

T. fuscum Bl. Enum. II, p. 225. Java.

Trichomanes Sm.

* Rhachis s. costa nulla, venae furcato-ramosae.

a. Stipes simplex.

1. *T. parvulum* Poir. Encl. meth. VIII p. 44;
T. Sibthorpioides BORY in WILLD. sp.
 pl. V p. 498 (testibus Hook. et KZE.
 Hab. Madagascar, THOUARS; Ins. Mascarenae, BORY (n. v.)
2. *T. saxifragoides* PR. Hym. p. 16 et 39; *T. parvulum* Bl. Enum. p. 223 (excl. syn.)
 Hab. Ins. Philippinae! CUMING; Java!
 ZOLL.; Rawak! GAUDICH.
3. *T. Thouarsianam* PR. Hym. p. 16 et 40.
 Hab. Ins. Borboniae, THOUARS. (n. v.)
4. *T. digitatum* Sw. Syn. p. 370 et 422; *T. lancatum* WILLD. Sp. pl. V p. 500.
 Hab. Ins. Mascarenae! SIEBER, BORY, etc.
5. *T. flabellatum*. *T. digitatum* BL. (non Sw.)
 Enum. p. 224 (excl. Syn.)
 Hab. Java! BL., ZOLL.
6. *T. palmatifidum* C. MULL. in Bot. Ztg. 1854
 p. 732; *T. digitatum* KZE Bot. Ztg.
 1847 p. 302 (non Sw. nec. BL.)
 Hab. Java! ZOLL., v. GESK.
7. *T. nitidulum* v. n. B. in Pl. Jungh. I p. 547
 (seorsim p. 3.)
 Hab. Java! v. GESK., JUNGH.

8. *T. dichotomum* KZE in Bot. Ztg. 1848 p. 285.

Hab. Java! ZOLL.; Taïti! VIEILL et PLANCH.

β. stipes prolifero-ramosus.

9. *T. proliferum* BL. Enum. p. 224; *T. palmatum*.

PR. Hym. p. 16 et 39.

Hab. Java! BL., ZOLL. TEIJSM.; Ins. Philippinae! CUMING.

10. *T. minutum* BL. Enum. p. 223; *T. parvulum* KZE in ZOLL.! Verz. p. 45.

Species ignota.

T. bifolium BL. Enum. II 224. p. Java.

** Rhachis venas flabellatim vel pinnatim
emittens.

a. Sori primitus terminales.

α. Venulae spuriae,

† secus marginem junctae.

11. *T. cuspidatum* WILLD. Sp. pl. V p. 499;
T. Bojeri HOOK. et GREV. tab. 155.
Hab. Ins Mascarenæ! THOUARS, BÉLANGER, BORY, BOIVIN, alii.

12. *T. Hookeri* PR. Hym. p. 16; *T. muscoïdes* HOOK. et GREV. tab. 179 (non Sw.)
Hab. (Jamaica), Cuba! Guyana Gallica! (Peruvia?)

13. *T. erosum* P. B. Fl. d'Oware et de Benin
II p. 79 tab. 109 fig. 3.

Hab. Africa occidentalis, P. B. (n. v.)

14. *T. membranaceum* L. Sp. pl. Ed. 2^a p. 1560.
Hab. Antillae! Guyana Gallica! Columbia!

†† liberae.

15. *T. Petersii* A. GRAY in SILLIM. Am. Journ.
sc. and arts 2^e Ser. 1853. p. 326
(sec. Hook. Cent of ferns tab. 86.)
Hab. Amer. Sept!, (Alabama) PETERS.

16. *T. sublimbatum* C. MÜLL. in Bot. Ztg. 1854
p. 737; *T. Hookeri* KZE in Bot. Ztg.
1848 p. 285 (non PR.); *T. Muscoïdes*
id. in Bot. Ztg. 1846 p. 476 non Sw.)
Hab. Java! ZIPPELIUS, ZOLLINGER.

Species ignota:

T. adiantinum BORY in Bél. Voy. Bot. p. 78.

β. *Venulae spuriae nullae.*

§ 1. *Pseudachomanes* PR. (*T. sinuosum* etc.)

† Frons pinnatifida.

17. *T. sinuosum* RICH. in WILLD. sp. pl. V p.
502; *T. Quercifolium* DESV. in Berl.
Mag. V p. 328 (non HOOK. et GREV.);
T. Poeppigii PR. Hym. p. 16 et 41
(teste ipso)

Hab. Guadeloupe! Trinidad! N. Grenada! Venezuela! (Peru), Mexico!

18. *T. incisum* KLF. Enum. p. 261; *T. cognatum* PR. Hym. p. 16 et 41 (teste KZE.)
Hab. Brasilia! CHAMISSO, BORY,
MART, BEYRICH, etc.

19. *T. holopterum* KZE Farrnkr. p. 185 tab.
77 fig. 2.

Hab. Guadeloupe! Martinique! St.
Vincent! Guyana Gallica!

20. *T. Bancrofti* Hook. et GREV. tab. 204; *T. coriaceum* KZE Linn. IX p. 105 et
Analect. p. 46 tab. 29 fig. 1.
Hab. Surinam! Guyana Gallica! et
anglica! Brasilia! (Jamaica, St. Vincent.)

Species ignota :

- T. arbuscula* DESV. in Ann. Soc. Linn. Paris VI
p. 326, Guyana.

†† frons bipinnatifida.

21. *T. adscendens* KZE Farrnkr. p. 186; Bot.
Ztg. 1847 p. 320.

Hab. Ins. Martinique! M^{le}. Rivoire.

22. *T. alatum* Sw. Fl. Ind. occid. III p. 1732
[non HOOK.]; PLUM. Foug. p. 73 tab.
50 D.

Hab. (St. Domingo), Jamaica!

23. *T. ptilodes.* *T. alatum* Hook. et Grev. tab. 11 (non Sw.)

Differt a praecedente: fronde duplo altiore et latiore apice lanceolata, la ciniis latioribus magis invicem remotis, lacinulis superioribus linearibus, venulis remotioribus, cellularum magnitudine et forma, indusiis magis elongatis cylindricis orificio bicorni, etc.

Hab. Jamaica! Guadeloupe! Venezuela!

24. *T. attenuatum* Hook. sp. fil. I p. 122 tab. 39 C.

Hab. St. Vincent, Jamaica, Dominica. (n. v.)

Obs. Specimina non vidi; genuinum vero *T. alatum* Sw. sistere, ex habitu frondis sororumque forma etc. verosimile videtur.

††† frons tripinnatifida.

25. *T. Lindeni* PR. Epimel. p. 11 tab. 6 (1849);
T. macroclados KZE Farnkr. II p. 72 tab. 130 (1851); *T. scandens* Hook. sp. fil. I p. 140 (nec L. nec Sw.)

Hab. Jamaica! LINDEM; Cuba! LINDEN, WRIGHT! Porto-ricco! (Mexico?)

Obs. Frons rectius pinnata dicitur

prinnis bipinnatifidis; rhachis enim apice excepto nuda est et teres.

26. *T. Bicorne* Hook. Cent. of ferns tab. 82.

Obs. Affinitas speciei non visae mihi latet.

Hab. Rio negro, R. SPRUCE. (n. v.)

§. 2. *Achomanes* PR. (*T. crispum* L. etc.)

§ frons pinnatifida. *)

27. *T. crispum* (L. Sp. pl. Ed. 2^a p. 1560 (non HEDW. nec Hook); PLUM. Foug. p. 67 tab. 86.

Hab. (Martinique; PLUM.) Porto-ricco! SCHWANECKE.

28 *T. fastigiatum* SIEB. FL. Martin. N.?;

Syn. fil. N. 144; *T. crispum* HEDW. Gen. fil. tab. IV fig. 2 (non L.)

Hab. Jamaica! Sw.; Martinique! SIEB.; St. Vincent!

29. *T. accedens* PR. Epimel. p. 14; *T. crispum* HOOK et GREV. tab. 12. (non L.)

Hab. Guadeloupe! L'HERMINIER;

*) Species plures hujus sectionis, dificiente speciminum bonorum copia, mihi non satis notae sunt. Rhizoma breve adscendens frondesque fasciculati in nonnullis, in aliis rhizoma horizontale frondesque sparsi egregium subdivisionis characterem suppeteret evidentur.

30. *T. pellucens* KZE in Linn. IX p. 104; Farrnkr.
p. 158 tab. 68.
Hab. Brasilia! v. MART., M'RAE; Pe-
ruvia! POEPPIG, LECHLER; (Guyana Ang-
lica, SCHOMB.)
31. *T. cristatum* KAULF. Enum. p. 265.
Hab. Brasilia! GARDN.; Surinam!
WEIGELT, KAPLER, Guyana Anglica!
SCHOMB.
32. *T. pilosum* RADDI Fil. Brasil. p. 63 tab. 79
fig. 1; *T. laxum* Kl. in Linn. XVIII p.
530 (teste KZE.)
Hab. Brasilia! RADDI, DE MART.,
Princ. NEovid, alii; Columbia! MORITZ;
Guyana Gallica! Le PRIEUR.
33. *T. Martiusii* PR. Hymen. p. 15 et 36; *T.*
pilosum MART. Icon. sel. p. 105 (excl.
Syn.) tab. 68 (fig. dextra).
Hab. Brasilia, DE MART., Guyana
Angl., SCHOMB.? Surinam, HOSTM.! KE-
GEL, SPLITG! (vix. v.)
34. *T. Plumula* PR. Hymen. p 15 et 36; *T.*
pilosum MART. l. l. (fig. sinistra).
Hab. Brasilia, DE MART! Guyana
Angl., SCHOMB!
35. *T. plumosum* KZE in Linn. IX p. 104.
Hab. Peruvia! POEPPIG.
36. *T. Haenkeanum* PR. Hymen. p. 15, 36 et
65; *T. crispum* PR. Reliq. Haenk. t

p. 69 (excl. syn. teste ipso.)

Hab. Peruvia! DOMBÉY, HAENKE; Bolivia! WEDDELL.

37. *T. Sellowianum* PR. Hymen. p. 15 et 37,
Hab. (Brasilia, SLOW, GARDNER.

POHL; Surinam, KEGEL); Columbia?
FUNCK et SCHRIM..

38. *T. eriophorum* (PR.) *Ragatelus* PR. Epimel.
p. 18 tab. 9.

Hab. Guyana Anglicā, SCHOMB. (n. v.)

†† frons bipinnatifida v. pinnato-pinnatifida.

39. *T. Kaulfussii* HOOK. et GREV. Icon. App.
p. b; *T. lucens* ibid tab. 10 (non Sw.)
Hab. Ins. Antillarum (Jamaica, St.
Vincent, Trinidad! Dominica, St. Kitts,
St. Thomas, Martinique! Porto-ricco!
Guadeloupe!) (Guyana, PARKER.)

40. *T. lucens* Sw. Syn. p. 143 (non HOOK.);
HEDW. Gen. fil. tab. V.
Hab. Jamaica! Sw., Antilles (s.
loco spec.) de TUSSAC!

41. *T. splendidum*. *T. lucens* HOOK. Sp. fil. I p
138 tab. 41 A. (excl. Syn.)
Hab. S^a. Fé de Bogota! HARTW.;
Peruvia! LECIILER.

42. *T. Lambertianum* HOOK. sp. fil. I p. 139 tab.
41 B.

Hab. Peruvia, RUIZ et PAVON. (n. v.)

43. *T. crinitum* Sw. Fl. Ind. occid. III p. 1730;
Ragatelus Pr. Hymen. p. 16.
 Hab. Jamaica! Sw., MENZ., PURDJE;
 (St. Vincent, GUILD.); St. Domingo!
 DE TUSSAC; Guadeloupe? l'HERMIN.

Species ignotae:

- T. pallidum* Bl. Énum. II p. 225. Java.
T. elatum DELV. in Ann. Soc. Linn. Paris. VI
 p. 327. America tropica.

b. Soris primitus axillares lateralesve.

α. *Craspedoneuron* (*T. album* Bl. etc.)

44. *T. album* Bl. Enum. II p. 226.
 Hab. Java! REINW., Bl., v. GESK.;
 Ins. Philippinae! CUM.
 45. *T. Braunii* v. d. B. in Pl. Jungh. I p. 550
 (seorsim. p. 6); *T. album* KZE Bot. Ztg. 1846 p. 476 (non Bl.)
 Hab. Java! Bl.? in Herb. AL. BR.
 46. *T. glaucescens* v. d. B. in Pl. Jungh. I p. 551
 (seorsim p. 7); *T. album* KZE Bot. Ztg. 1847 p. 350. (non Bl.)
 Hab. Java! v. GESK., ZOLL.
 47. *T. glaucofuscum* Hook. sp. fil. I p. 128; tab.
 40 A; *T. acutum* PR. HYMEN. p. 16 et 42.
 Hab. (Ins. Australes), Philippinae!
 Ceylon! (Penang.)

$\beta.$ *Crepidomanes*. (*T. humile* FORST. etc.)

48. *T. humile* FORST. Prodr. N. 464; *T. Luzonicum* PR. Hymen. p. 16 et 42.
 Hab. Ins. Societatis! Australes! Philippinae! (Otaheite), Taiti! Java!
49. *T. Endlicherianum* PR. Epimel. p. 10 tab. 5 A; *T. humile* $\beta.$ HOOK. sp. fil. I p. 123.
 Hab. (Ins. Norfolk); Nov. Zealandia!
50. *T. intramarginale* HOOK. et GREV. tab. 211.
 Hab. (Ceylon, LINDLEY); Hong Kong! WRIGHT.
51. *T. Colensoi* HOOK. Cent. of ferns tab. 79.
 Hab. Nov. Zealandia, COLENSO (n. v.) Vix hujus loci!
52. *T. Schmidianum* ZENK. in TASCHN. DISS. p. 34 tab. I fig. 1.
 Hab. Malabar (Ottacamund), SCHMID!
53. *T. depauperatum* BORY in DUPERR. Voy. Botan. p. 283.
 Hab. Ins Carolinae! DUPERR.

$\gamma.$ *Eutrichomanes*.

\dagger *T. pyxidiferum* L. etc.

54. *T. pyxidiferum* L. sp. pl. Ed. 2^a p. 1561
 - (excl. Syn.); PLUM. Foug. p. 74 tab. 50 E. (non aliorum.)

Hab. (S^t. Domingo, PLUM.) Guyana
Gallica! LEPRIEB.

55. *T. Brasiliense* D^{ES}V. Mém. Soc. Linn. Par. VI p. 328 tab. VII fig. 4; *T. pyxidiferum* HEDW. gen. fil. tab. III. fig. 2. Hab. Brasilia! v. MART., WEDDELL; Venezuela! FUNCK et SCHLIM.
56. *T. emarginatum* Pr. Epimel. p. 11 tab. B; *T. pyxidiferum* β. HOOK. sp. fil. I p. 124 (p. p.)
Hab. Brasilia! DE MART., BEYRICH.
57. *T. leptophyllum*. *T. pyxidiferum* HOOK. et GREV. tab. 206; HOOK. sp. fil. I p. 121 (fide specim.)
Hab. S^t. Vincent! Martinique! Guadeloupe! Jamaica! S^t. Domingo! Cuba!
58. *T. olivaceum* KZE teste KR. in Linn. XX p. 437. (a neutro descriptum.)
Hab. Columbia! MORITZ; Nov. Grenada! SCHLIM.; Mexico (Huatusco)! SCHAFFNER.
59. *T. cavifolium* C. MÜLL. in Bot. Ztg. 1854 p. 753.
Hab. Mexico, LEIBOED! SCHIEDE!
SCHAFFNER!
60. *T. Lechleri*. *T. pyxidiferum?* KZE in LINN. IX p. 106.
Hab. Peru! LECHL.; Quito! JAMESON.

61. *T. exsectum* KZE Anal. p. 47 tab. 29 fig. 2.
 Hab. Ins. Juan Fernandez! C. GAIJ;
 (Ins. Chiloë, CUMING; Valdivia, BRIDGES.)
62. *T. angustatum* CARM. in Linn. Trans. XII
 p. 513.
 Hab. Ins. Tristan d'Acunha, CARM. (n. v.)
63. *T. tenerum* SPR. Syst. veg. IV p. 129.
 Hab. Brasilia, BRANCHET! DE MART.!
 REGNELL! BEYRICH! etc. Peru, MATTH!
 Quito, JAMESON! SAETTONE!
 Obs. *T. angustato* non viso, *T. tenerum* distinctum ab illo habere debeo, dum utriusque specimina comparare licuerit. Specimina Brasiliensia, praesertim quae a MARTIO et BEYRICHO lecta vidi in Herb. am. SONDER et frondis divisione et indusiorum forma cum iconе *T. angustati* satis bene convenire, non negandum; quae vero a REGNELLIO lecta ibidem vidi, quaeque omnino sistunt *T. fulvum* Kl. (sive Herb. Mus. Par.) characteribus haud levibus recedunt.
64. *T. Schiedeanum* C. MÜLL. in Bot. Ztg. 1854
 p. 716.
 Hab Mexico, SCHIEDE! SCHAFFNER!
 etc.
65. *T. cuueiforme* SCHK. Farrmkr. p. 135 tab.

134 (nomine *T. pyxidifera* per errorem
inscripta).

Hab. S^t. Domingo, (n. v.)

66. *T. trichoideum* Sw. Syn. p 144; *T. tenellum* HEDW. fil. gen. tab. III fig. 1; *T. angustissimum* Pr. Epimel. p. 18 tab. 8 A.

Hab. Jamaica! Sw; Columbia (Venezuela! MORITZ, FRUNCK et SCHLIM, Nov. Grenada! SCHLIM.)

67. *T. cellulosum* KR. in Linn. XVIII. p. 531.
Hab. Guyana Anglicæ, SCHOMB. (n. v.)

68. *T. melanotrichum* SCHLTDL. in Linn. X p. 553.
Hab. Prom. bon. spei! ZEYHER,
DRÈGE, etc.; Ins. Borboniae! BORY,
BOIVIN, RICHARD.

†† *T. radicans* Sw. etc.

69. *T. radicans* Sw. Fl. Ind. occid. III p. 1736;
T. scandens Hedw. Gen. fil. tab. VI.
(non L.)

Hab. Jamaica! specim. ACHAR. in
Herb. SONDER.); Cuba? WRIGHT! Me-
xico? SCHAFFN.

70. *T. eximium* KZE in Bot. Ztg. 1846 p. 478;
1847 p. 350 (nomen); *T. ambiguum*
Kl. in Linn. XVIII p. 531 (nomen).

Hab. Columbia (Venezuela! MORITZ;
N. Grenada! SCHLIM.).

Obs. *T. ambiguum* SIEB. (Syn. fil. N. 143) a PRESLIO sancitum, dubia mihi species quandoquidem specimina modo viderim juvenilia et sterilia; ex habitu vero et contextu *T. eximio* affinius crediderim quam *T. radicanti*, cuius synonymon habent auctores.

71. *T. Luschnatianum* PR. Hymen. p. 16 et 45.

Hab. Brasilia, (Bahia! LUSCHNAT, Sierra de Registro! MART. BEIJL.) alii.

Obs. Specimen quod vidi authenticum in Herb. Cl. MOUGEOT in diagnosin omnino non quadrat; convenit autem illud cum MART. Herb. Fl. Brasil. N. 389. Differunt haec a *T. radicante* praeter notas externas, cellulis majoribus opacis firmis elongatis irregularibus (saepe quasi tetraëdris) interaneis obscure viridibus, cellulis marginalibus duplo minoribus (lacinulas lentis ope visas marginatas efficien-tibus).

72. *T. scandens* L. Sp. pl. Ed. 2^a. p. 1562; Sw. Fl. Ind. or. III p. 1737; *T. Kunzeanum* HOOK. sp. fil. I p. 127 tab. 39 D.

Hab. Columbia LINDEN! MORITZ! FUNCK et SCHLIM! (Peru? POEPP., MATTH.)

73. *T. Moritzii* n. sp. Fronde sessili lanceolata

bipinnatifida, laciniis primariis patulis divaricatisve remotis (imis exceptis) fere *aequidistantibus* e basi inaequaliter cuneato-lanceolatis apice productis pinnatifidis, secundariis *strictiusculis* remotis 2—3 furcatis, lacinulis fastigiatis abbreviatis apice emarginato-bifidis rotundatis; cellulis *mediocribus* vel *parvis* firmis opacis hexaedris vix *elongatis* interaneis obscure viridibus amorphis marginem versus obscure granulosis, soris e cylindrico ventricosis infundibuliformibus ore *integro recto parum dilatato*. Frons 0,5—0,35 longa, 0,06—0,07 lata firma rigida opaca obscure viridis.

Hab. Columbia, (Col. Tovar! MÖRITZ; N. Grenada 9000'! SCHLIM.)

74. *T. abrotanifolium* n. sp. Fronde sessili vel subsessili lanceolata *tripinnatifida*, la- ciniis primariis patulis inferne distan- tibus sursum sensim approximatis su- perne contiguis e basi cuneata lanceo- latis bipinnatifidis, secundariis *stricti- usculis* cuneato-oblongis lanceolatisve inferioribus pinnatifidis superioribus dichotomis, lacinulis cunctis *angustis strictis elongatis*; cellulis *magnis elon- gatis* hexaedris teneris interaneis laete

viridibus amorphis, marginem versus abbreviatis minoribus distincte granulosis; soris cylindricis *elongatis* superne in orificio *undulato-repandum* dilatatis. Frons 0,4 et ultra longa, 0,08—0,10 lata rigida *virgata* opaca obscure viridis.

Hab. Brasilia! DE MART. in Herb.
SOND.

75. *T. collariatum* n. sp. Fronde breviter stipitata lanceolato-lineari *bipinnatifida*, laciiniis primariis divaricatis horizontalibusque *remotis* imis distantibus oblongis pinnatifidis, secundariis *patulis* divaricatisve *contiguis* e basi cuneata oblongis antice latioribus truncatis inciso-dentatis; cellulis parvis vel medio-cribus firmis opacis hexaëdris *non elongatis* interaneis obscure viridibus *granulosis*; soris e cylindrico clavatis ore *subito in limbum amplum undulatum* dilatato. Frons usque 0,3 longa, 0,05 lata rigidula opaca obscure viridis.

Hab. Mexico!(Tabasco) 300' LINDEN.

76. *T. speciosum* WILLD. Sp. pl. V.p. 514; *T. radicans* HOOK. Sp. fil. I p. 125 p. p. (non Sw.); *T. speciosum* var. *Andrewsii* NEWM. Hist. p. 315.

Hab. Ins Canarienses! Madeira! (Ins. Azoricae), Hibernia!

77. *T. brevisetum* R. Br. Hort. Kew. V p. 529; *Hymenophyllum alatum* Engl. Bot. tab. 1417; *T. speciosum* NEWM. Hist. p. 305.

Hab. Madeira! Hibernia!

Obs. Contextu frondis certo a *T. specioso* diversum est. Specimina vero, quibus sum usus, quippe diverso evolutionis stadio collecta, specierum diversitatem non extra omne dubium ponunt. Res denuo notaeque melioris auxiliis indaganda.

78. *T. striatum* DON Prodr. Fl. Nepal. p. 1.

Hab. Nepal! (specimen auctoris ex dono ill. LAMBERT in Herb. SONDER).

79. *T. Davallioïdes* GAUDICH. in Voy. Uranie Bot.

Cryptog. p. 378.

Hab. Ins. Sandwich (Woahoo)! M'RAE in Herb. SOND. (comm. Cl. LINDLEY).

Species ignotae:

T. umbrosum WALL. Cat. N. 165. Nepal.

T. venustum Desv. in Ann. Soc. Linn. Paris. VI p. 328. Brasilia.

T. diaphanum H. B. K. Nov. gen. p. 25. Venezuela.

T. anceps WALL. Cat. N. 166. Nepal.

80. *T. rupestre* RADDI (*Hymenophyllum*) Fil. Brasil. p. 67 tab. 80.

Hab. Brasilia, RADDI, DE MART! POHL!
WEDDELL! alii.

Obs. Species insignis! sterilis modo
hucdum lecta, at e contextu frondis
vix dubie inter Trichomanes enumera-
randa.

81. *T. Ankersii* PARK. in Hook, et GREV, tab.
201.

Hab. Guyana (Batava! HOSTM., AN-
GLICA, PARK., SCHOMB.; Gallica! LE
PRIEUR); Trinidad! (specim. Hook.) in
Herb. de VR.)

82. *T. brachypus* KZE in Linn. IX p. 105; *T. radicans* HOOK. et GREV. tab. 218;
T. subsessile SPLITG. in Tijdschr. v.
nat. gesch. VII p. 437.

Hab. Peru! PÖPP.; Brasilia, BRAN-
CHET! DE MART! Guyana (Batava, SPLITG!
KAPPL.! Gallica, LE PRIEUR, Anglica,
SCHOMB.); (Trinidad, Lockh., St. Vincent,
GUILD.)

Obs. Unam alteramve speciem hic
esse confusam suspicari quidem, at
deficiente speciminum copia affirmare
non licet.

††† *T. rigidum* Sw. etc.

* *Americana.*

83. *T. rigidum* Sw. Fl. Ind. occ. III p. 1738;
HEDW. gen. fil. tab. II.

Hab. Ins. Antillarum (Jamaica, Do-
mingo! Portoricco! Guadeloupe! etc.)
Columbia (Venezuela! N. Grenada!)

84. *T. Mandiocanum* RADDI Fil. Brasil. p. 64
tab. 79 fig. 2; ? *T. firmulum*. PR. Hy-
men. p. 16 et 46.

Hab. Brasilia, RADDI, MART! CLAU-
SEN! WEDDELL! alii.

Obs. Cl. PRESL, speciem suam rha-
chide et stipite nudis (non marginatis)
a *T. rigido* differre perhibens, eo ipso
hoc sibi ignotum esse, testatur.

85. *T. compressum* LESV. in Berl. Mag. 1811
p. 329.

Hab. Domingo! POITEAU.

86. *T. Prieuri* KZE Anal. p. 48; *T. anceps*
HOOK. sp. fil. I p. 135 (p. p. et excl. β)

Hab. Guyana Gallica, RICH., LE
PRIEUR (Anglica, SCHOMB.); Brasilia, DÈ
MART! WEDDELL; Peru! LECHL.

87. *T. anceps* HOOK. sp. fil. I p. 135 (excl. β)
tab. 40 C. 1.

Hab. Jamaica! Guadeloupe! Trini-
dad!

Obs. Plures indubie hic latent species, non vero nisi examinatis speciminiibus completis e variis regionibus probe dignoscendae. Evidem licet viros Cl. HOOKER et KUNZE, quisque nomine a se proposito, idem subintellexisse persuasum mihi habeam, ad designandum speciminum, quae vidi, typum duplicem nominibus illorum mutato sensu uti, quam novum propponere, malui.

88. *T. Daucoïdes* PR. Epimel. p. 12 tab. 7.
Hab. (America centralis, FRIDRICHSTHAL); Martinique! BÉRANGER.

89. *T. tenuifolium* CAV. (Prael. n. 697); Sw. Syn. p. 144.

Hab. Ins. Chiloë! NÉE.

Species ignota:

- T. intermedium* KAULF. PR. Hymen. p. 16. Patria?

** Capensia et Mascarena.

90. *T. Drègei*; *T. rigidum* KZE in Pl. acotyl. Afr. austr. p. 73 (excl. omn. Syn.)
Hab. Cap. bon. spei! DRÈGE; Port Natal! GUEINBIUS.

91. *T. Achilleafolium* WILLD. sp. pl. V p. 512;?
T. stylosum POIR. Encycl. Bot. VIII p. 32.

- Hab. Ins. Mascarenae! SIEB., BORY,
BOIVIN, alii; Madagascar! THOUARS.
92. *T. foeniculaceum* BORY in WILLD. sp. pl. V
p. 511;? *T. parviflorum* POIR. Encycl.
méth VIII p. 83.
Hab. Ins. Mascarenae! COMMERS.,
BORY, BOIVIN, alii; Madagascar! THOUARS.
93. *T. giganteum* BORY in WILLD. sp. pl. V
p. 514.
Hab. Ins. Borboniae, BORY!, BÉL!
BOIVIN! alii.
94. *T. tamarisciforme* JACQ. Coll. III p. 285 tab.
21 fig. 2; *T. tamariscinum* BORY in
BÉL. Voy. Bot. p. 81;? *T. parviflorum* POIR. Encycl. meth. VIII p. 83.
Hab. Ins. Borboniae! COMMERS., BÉL.,
BOIVIN; Madagascar! THOUARS.
95. *T. meisolium* BORY in WILLD. sp. pl. V p.
508.
Hab. Ins. Borboniae! BOIV., BÉL.,
DE HELL, alii.
96. *T. lanceolatum* POIR. Encycl. meth. VIII p. 83.
Hab. Madagascar! THOUARS (in Herb.
Mus. Par.)
97. *T. longisetum* BORY in WILLD. sp. pl. V p.
510.
Hab. Ins. Borboniae! BORY, DE MONTR-
BRISON, alii; Java! ZOLL.
98. *T. Boivini* n. sp. Fronde ovato- vel oblongo-

lanceolata bipinnatisida, laciinis primariis e basi latiore lanceolatis contiguis vel remotiusculis, superioribus patulis, mediis inferioribusque divaricatis imo deflexis pinnatisidis, secundariis e basi angustata oblongis contiguis patulis vel erectiusculis irregulariter incisis (vix lobatis) inaequaliter obtuse dentatis, venis pinnatim ramosis, venulis ultimis furcatis parallelis densissimis, cellulis (aegre distinguendis) opacis mediocribus imo magnis valde inaequalibus irregularibusque elongatis, parietibus flexuosis incrassatis, interaneis amorphis diffusis spissis olivaceis, soris in laciniarum secundariarum incisuris immersis lateralibus, indusio cylindrico parum ventricoso incurvo orificio parum ampliato undulato, receptaculo setaceo indusio duplo et quod excedit longiore. Rhizoma brevissimum adscendens, radiculis ramosis, pariter ac stipes compressus apice pennis insimis decurrentibus anguste marginatus rachisque et venae, paleaceo-hirsutum, stipes 7 centim. longus, frons 10—14 centim. longa, 5—7 centim. lata opaca rigida olivaceo-fusca.

Affinitate proximum *T. elongatum*,
quod differt: glabritie, stipite rhachi-
busque teretibus, structura frondis et
colore, directione pinnarum, pinnulis
lanceolatis profunde lobato-incisis etc.

Hab. Ins. S^{te} Marie (Madagascar)
BOIVIN in Herb. DE FRANQUÈVILLE.

Species ignotae :

T. myriophyllum DESV. in Ann. Soc. Linn. Paris.

VI p. 329. Madagascar.

T. Thuyoides DESV. ibid. p. 328. Bourbon.

T. cypresoïdes DESV. ibid. p. 330. Ins. Se-
chelles.

T. Alchemillaefolium WALL. Cat. N. 159. Mauritius.

* * Indica et Malasica.

99. *T. obscurum* BL. Enum. II p. 227; *T. mil-
lefolium* DESV. Mém. Soc. Linn. Par.
VI p. 329; *Didymoglossum longisetum*
PR. Hym. p. 23 et 49.

Hab. Ceylon! (sp. HOOK. in Herb.
DE VR.); Java! REINW., v. GESK., ZOLL.;
Ins. Philippinae! COMMERSON, CUMING;
(Sincapore, LOBB, WALLICH); M. Nila-
girici! PERROTET; Ins. S^{te} Marie de
Madagascar! BOIVIN.

100. *T. papillatum* C. MÜLL. in Bot. Ztg. 1854
p. 751.

Hab. Ins. Philippinae! CUMING.

101. *T. maximum* BL. Enum. II p. 228 (excl.
var. β .)

Hab. Java! BL., ZOLL.; Ins. Philip-
pinae! CUMING.

102. *T. Millefolium* PR. Hymen. p. 16 et 43;
T. anceps β . HOOK. sp. fil. I p. 135
tab. 40 C. fig. 3.

Hab. Ins. Philippinae! CUMING; Ja-
va! ZOLL.

103. *T. Apiumfolium* PR. Hymen. p. 16 et 44; *T.*
myrioplasium KZE in B. Z. 1846 p. 477.

Hab. Ins. Philippinae! CUMING; Java!
v. GESK., ZOLL., JUNGII.

104. *T. gemmatum* J. SM. in HOOK. Journ. III
p. 416.

Hab. Malacca! CUMING.

105. *T. eminens* PR. Hymen. p. 16 et 44.

Hab. Ins. Philippinae! CUMING.

106. *T. Pluma* HOOK. cent. of ferns tab. 97.

Hab. Borneo, LOBB. (n. v.) Dissertne
revera a *T. longiseto* BORY?

Species ignota :

- T. bifidum* VENT. in WILLD. sp. pl. V p. 511.
India orientalis.

* * * * Australica.

107. *T. Bauerianum* ENDL. Prodr. Fl. Norf. p.
17; *T. meifolium* β . HOOK. sp. fil. Ip. 137.

Hab. Ins. Norfolk, BAUER; Ins. australes, BENN., NICUT.; India, WARD.; teste HOOKER (n. v.)

108. *T. strictum* MENZ. HOOK. et GREV. tab. 122.

Hab. Nov. Zealandia, MENZ., CUNN. (n. v.)

109. *T. elongatum* CUNN. HOOK. sp. fil. I p. 134.

Hab. Nov. Zealandia, J. D. HOOK! SINCL! MOSSM.! F. MÜLL.! alii.

110. *T. polyanthos* HOOK. IC. PL. TAB. 703; sp. fil. I p. 138.

Hab. (Ins. australes, NICHT.); TAÏTI! VIEILL. et PLANCH. (in Herb. MOUG.)

Desciscentes :

111. *T. Smithii* HOOK. ICON. PL. TAB. 704; *Abrodictyon Cumingii* PR. HYMEN. p. 20! TAB. 7 (??)

Hab. Ins. Philippinae! CUMING.

112. *T. venosum* R. BR. PRODR. FL. NOV. HOLL. p. 915; *Phlebodium Brownii* v. d. B. IN SCHED.

Hab. Nova Hollandia! Nova Zelandia!

113. *T. caespitosum* (GAUD.) HOOK. SP. PL. I p. 132 TAB. 40 B; *Hymenophyllum GAUDICH.* IN VOY. URANIE p. 374 TAB. 5 FIG. 2; *Serpyllopsis antarctica* v. d. B. IN SCHED.

Hab. Chili! LECHL., PUCCIO; INS. CHILOE!

GAIJ, PHILIPPI, CUM.; Ins. Falkland, Hermite! etc. J. D. HOOK.; Terra Magellanica! LECHL.

114. *T. Maugeoti* n. sp. Fronde lanceolata pinnatisida, laciniis horizontalibus approximatis contiguisque e basi latiore oblongo-linearibus integris margine undulatis, venulis pinnatis divaricatis, cellulis opacis aegre distinguendis irregularibus inaequalibus magnis, parietibus valde flexuosis hyalinis, marginalibus parietibus rectis opacis, interaneis amorphis diffusis spissis obscure viridibus, soris primitus axillaribus, serius in latere superiore laciniarum seriatis immersis, indusio pyriformi- cylindrico margine dilatato undulato, receptaculo setaceo non exserto. Rhizoma adscendens brevissimum paleaceum, paleis aculeiformibus fuscis, ramosum, ramis glabris parceradiculosis, stipites fasciculati basi inprimis, pariter ac rhachis venaeque, paleacei vix ultra 2 centim. longi tenues teretes, frons circiter 8 centim. longa, 1,5—2 centim. lata plus minus obscure viridis rigidula parum diaphana.

Habitu gaudet frondis sterilis *Féeae spicatae* specierumque e tribu *Achoma-*

nes, a quibus vero pluribus iisque gravissimis notis differt.

Hab. Guyana Gallica! LE PRIEUR.

Species ignotae:

- T. Guineense* Sw. Syn. fil. p. 142. Guinea.
- T. diffusum* Bl. Enum. II. p. 225. Java.
- T. Polypodioïdes* L. Sp. pl. p. 1561. India orientalis.
- T. dichotomum* PHILIPPI in Bot. Ztg. 1856 p. 631 et 650. Ins. Juan Fernandez.
- T. pellucidum* GOLDM. Act. Acad. Leop. XIX Suppl. I p. 466. Brasilia.
- T. Bryoïdes* GOLDM. ibid. p. 466. Brasilia.
- T. Meijenianum* PR. (*Meringium*) Hymen. p. 24 tab. VIII B. Manila.

Didymoglossum DESV.

* Sori primitus terminales.

a. Costa flabellatim ramosa, venulis spuriis continuis.

1. *D. punctatum* (POIR.) DESV. in Ann. Soc. Linn. Paris. VI p. 330; *Trichomanes* POIR. in Encl. meth. VIII. p. 64.
Hab. Antillarum insulae: (Martinique, Guadeloupe, Trinidad, Cuba!), Guyana! Surinam! (America centralis).

2. *D. sphenoïdes* (KZE) PR. Hym. p. 23; *Trichomanes* KZE in Linn. IX p. 102; *T. reptans* HK. et GREV. tab. 32 (excl. Syn.)

Hab. Ins. Antillarum: (Jamaica! St. Vincent! Cuba! Guadeloupe! Barbados), Peruvia?

3. *D. pusillum* (Sw.) DESV. in Ann. l. l. p. 330; *Trichomanes* Sw. Syn. p. 142.

Hab. Ins. Antillarum (Jamaica! Trinidad), Brasilia! Columbia!

- b. Costa pinnatum ramosa, venulis spuriis interrupis.

4. *D. muscoïdes* (Sw.) DESV. in Ann. l. l. p. 330; *Trichomanes* Sw. Syn. p. 141; *T. hymenodes* HEDW. fil. gen. tab. III fig. 3.

Hab. Jamaica! Sw.

5. *D. apodum* (HK. et GREV.) *Trichomanes* HK. et GREV. tab. 117.

Hab. Ins. Antillarum (Barbados, Cuba), Columbia! Mexico!

6. *D. Schaffneri* (SCHLTDL.) *Trichomanes* SCHLTDL. in Linn. XXVI p. 368.

Hab. Mexico, SCHAFFN. (n. v.) Num differt a praecedente?

7. *D. Pabstianum* (C. MÜLL.) *Trichomanes* C. MÜLL. in Bot. Ztg. 1854 p. 738.

Hab. Brasilia (S. Catharina)! PABST.

8. *D. reptans* (Sw.) PR. Hym. p. 23; *Trichomanes* Sw. Syn. p. 142.

Hab. Ins. Antillarum (Jamaica! S.
Domingo, Cuba!)

9. *D. Krausii* (HK. et GREV.) PR. Hym. p.
23; *Trichomanes* HK. et GREV. tab. 149.

Hab. Ins. Antillarum: (Jamaica, Do-
minica, S^t. Vincent, Porto-ricco, Gua-
deloupe, Trinidad!) Guyana! Surinam!
Columbia! Mexico?

10. *D. quercifolium* (HK. ET GREV.) Pr. Hym.
p. 23; *Trichomanes* HK. et GREV. tab.
115; *T. reptans* LIEBM. Mex. Bregn.
p. 142.

Hab. Columbia! Mexico! Ins. S.
Thomas!

* * Sori primitus axillares.

11. *D. filicula* DESV. Ann. Soc. Linn. Par. VI
p. 331; *Trichomanes minutulum* GAU-
DICH. in FREIJC. Voy. Bot. p. 377 tab.
12 fig. 2.

Hab. Ins. Mascarenae! Madagascar!
Java! Timor! Ins. Philippinae! Ins.
Societatis (Borabora)! Ins. Rawack!
(Bonin Sima.)

12. *D. bilabiatum* (N. et BL.) v. d. B. in Pl.

Jungh. I. p. 557 (seorsim p. 13);
Trichomanes N. et Bl. in Act. Acad.
 Leop. XI. p. 123 tab. XIII fig. 2.

Hab. Java! Sumatra? Ceylon! MAC-
 RAE, Timor! GAUDICH.

13. *D. capillatum* (TASCHN.) Pr. Hym. p. 65;
Trichomanes TASCHN. Diss. p. 34 tab.
 I fig. 2.

Hab. Ind. orient. (m. Nilagirici !)
 SCHMIDT; Sumatra! Java!

14. *D. undulatum* PR. Hym. p. 23 et 48.
 Hab. Ins. Philippinae! CUMING.

15. *D. brevipes* PR. Hym. p. 23 et 47 (1843);
T. melanorrhizon HOOK. sp. fil. I p.
 140 (1846.)

Hab. Ins. Philippinae! CUMING.

Obs. *D. decipiens* DESV. in Ann.
 L. L. VI. p. 330 tab. VII fig. 3 quam
 maxime est dubium; in novo enim
 orbe, quantum scio, nulla species ex
 affinitate specierum ultimarum pro-
 venit.

Leptocionium PR. emend.

1. *L. denticulatum* (Sw.) *Hymenophyllum* Sw.
 Syn. p. 148 et 375; *Didymoglossum*
 Pl. Jungh. I p. 560 (seorsim p. 16.)
 Hab. Ins. Java! THUNB., BL., JUNGH.
 alii.

2. *L. Neesii* (BL.) *Trichomanes* BL. Enum. II p. 226; *Hymenophyllum dichotomum* N. et BL. in Act. Acad. Leop. XI p. 127 tab. XIII fig. 4; *H. multifidum* BORY in BÉL. Voy. Bot. p. 82 (non Sw.)
 Hab. Ins. Java! BÉL., REINW., ZOLL;
 Ceylon! THWAITES.
3. *L. aculeatum* (J. SM.) *Trichomanes* J. SM.
 in Hook. Journ. III p. 417.
 Hab. Ins. Philippinae! CUMING.
4. *L. acanthoides* Pl. Jungh. I p. 560 (*Didymoglossum*).
 Hab. Ins. Java! v. GESK.
5. *L. Braunii* Pl. Jungh. I p. 560 (*Didymoglossum*).
 Hab. Ins. Java! REINW., TEYSM.
6. *L. holochilum* Pl. Jungh. I p. 561 (*Didymoglossum*).
 Hab. Ins. Java! Herb. AL. BR.
7. *L. serrulatum* (PR.) *Didymoglossum* PR. Hym.
 p. 23 et 48; *Hymenophyllum Smithii* Hook. sp. fil. I p. 97 (p. p.) tab. 35 B; *H. bivalve* J. SM. in Hook. Journ. III p. 418 (non Sw.).
 Hab. Ins. Philippinae! CUMING.
8. *L. affine* Pl. Jungh. I p. 562 (*Didymoglossum*).
 Hab. Ins. Java! TEYSM.

9. *L. Preslii*; *Hymenophyllum Smithii* HOOK.
 1. l. p. p.; *Sphaerocionium bivalve*
 PR. in Herb. Berol. (Hym. p. 34?)
 Hab. Ins. Philippinae! MEYEN, CU-
 MING.
- 10 *L. dichotomum* (Cav.) *Hymenophyllum* Cav.
 Prael. N. 688; *H. plicatum* KAULF.
 Enum. p. 268.
 Hab. Chili! LECIHL., GAY, alii.
11. *L. Magellanicum* (DÈSV.) *Didymoglossum* DESV.
 in Act. Soc. Linn. Par. VI. p. 331; *Ptycho-
 phyllum* KL. in Linn. XVIII. p. 533.
 Hab. Terra Magellani, Chili! LECIHL.,
 PHILIPPI.
12. *L. dentatum* (Cav.) *Hymenophyllum* CAV. Prael.
 N. 687.
 Hab. Ins. S. Carlos de Chiloe!
 NEÉ.
13. *L. tortuosum* (HK. et GREV.) *Hymenophyllum*
 HK. et GREV. tab. 129; *Mijrmecostylum* PR. Hymen. p. 27 tab. 10 A.
 Hab. America antarctica, MENZ., J.
 D. HOOK. ! LECIHL. ! alii.
14. *L. Seselisolum* PR. Hymen. p. 33 et 52.
 Hab. Chili, CUMING (n. v.)
15. *L. attenuatum* (HOOK.) *Hymenophyllum*
 HOOK. sp. fil. I. p. 99 tab. 36. A.
 Hab. Brasilia, GARDN.; (n. v.)
 Obs. *Didymoglosso* et *Hymenophyllo*

genus intermedium, quod, si ulterior observatio confirmaverit, pluribus Hymenophylli speciebus ditatum iri existimo.

B. HYMENOPHYLLOÏDEAE.

Hymenoglossum PR.

1. *H. cruentum* (CAV.) PR. Hym. p. 35; *Hymenophyllum* CAV. Prael. N. 684.

Hab. Chili! NÉE, LECHL., GAY, alii; (Mexico? HAENKE).

Hymenophyllum SM.

A. Frons glabra,

a. margine integro.

α. Frons plana.

† Venae a basi inde furcato-dichotomae.

1. *H. marginatum* HK. et GREV. tab. 34.

Hab. Nova Hollandia, FRASER (n. v.)

2. *H. brevifrons* KZE. Farrnkr. I p. 236 tab.

96 fig. 2.

Hab. Guyana Gallica! LE PRIEUR.

3. *H. palmatum*; *Trichomanes flabellatum* BORY

in BÈL. Voy. Bot p. 77.

Hab. Ins. Mascarenae! BORY, BÈL., BOIVIN.

†† venae pinnatim ramosae.

4. *H. abruptum* HOOK. sp. fil. I p. 88 tab. 31 B.
Hab. (Jamaica), Cuba! WRIGHT.
5. *H. brevistipes* LIEBM. Mex. Bregn. p. 138.
Hab. (Mexico); Cuba! WRIGHT; Caracas! FUNK et SCHLIM.
6. *H. asplenioïdes* SW. Syn. p. 145.
Hab. Jamaica! Mexico! (Guyana anglica, Brasilia?)
7. *H. capillaceum* ROXB. HOOK. sp. fil. I p. 109 tab. 38 B; *H. infortunatum* BORY in Voy. Uran. Bot. p. 284 tab. 38 fig. 3.
Hab. Ins. St. Helena, MENZ.! J. D. HOOK! M'RAE! alii.
8. *H. Fumarioïdes* BORY in WILLD. Sp. pl. V p. 526.
Hab. Ins. Mascarenæ, BORY!
9. *H. gracile* BORY in Willd. sp. pl. V p. 527.
Hab. Ins. Mascarenæ, BORY! HOMBRON! BOIVIN! alii.
10. *H. Natalense* n. sp. Fronde lanceolata vel linearis basi pinnata caeterum bipinnatifida, lacinias primariis erecto-patulis imbricatis e basi cuneata acuta lanceolato-oblongis pinnatifidis, se-

cundariis contiguis strictiusculis obovatis cuneatisque simplicibus furcatisve, lacinulis strictis latis apice emarginatis, cellulis magnis opacis parumper elongatis acutangulis chlorophyllosis, globulis laete viridibus diffusis, marginalibus duplo fere minoribus non elongatis, parietibus hyalinis incrassatis hic illic leviter undulatis, soris praemagnis rhomboideo-oblongis basi conicis antice bilobis, lobis vix $\frac{1}{2}$ sorum aequantibus integris leviterve erosionis, receptaculo brevi inclusa. Rhizoma ultra setaceum horizontale, stipes teres setaceus usque 7 centim., frons 10—12 centim. longa, $1\frac{1}{2}$ —2 centim. lata fusco-olivacea parum diaphana debilis.

Hab. Port Natal, GUEINZIUS! loco non designato, DRÈGE! Klynrivier, ZEIJHER! Gnadenthal, BREUTEL!

Obs. Vix dubie huc citandum *II. Fumarioïdes* auctorum de filicibus Capensis (SCHILTDL. Adumbr. pl. Cap. p. 56 (excl. pl. Brasil.; tab. 35 citata numquam prodiit); KUNZE Pl. acotyl. Afr. p. 75; etc.), quae vero species omnibus omnino notis a nostra rece-

dit. Specimina ZEIJHERI et BREUTELII in schedulis nomine H. ZEYHERI distinxi, quippe quae habitu et divisione frondis, soris duplo minoribus, in primis vero contextu frondis tanto-pere singulari differunt, ut normalis an sit dubitem. Propterea hic indicasse sufficiat dum ulterior observatio quid pro vero habendum sit, docuerit.

11. *H. rarum* R. BR. Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 159 (seorsim p. 808); *H. semibivalve* HK. et GREV. tab. 83.

Hab. (Tasmania), Nov. Zealandia, J. D. HOOK!

12. *H. flabellatum* LABILL. Nov. Holl. pl. spec. II. p. 101 tab. 250 fig. 1; *H. nitens* R. BR. Prodr. p. 159 (seorsim p. 808.)

Hab. Tasmania! van Diemensland!
Australia felix! etc.

13. *H. Hookeri* BORY in BÈL. Voy. Bot. p. 84; *H. nitens* HK. et GREV. tab. 197 (non R. BR.); *H. flabellatum* β Hook. sp. fil. I p. 111.

Hab. Nova Zealandia! Ins. Auckland!
(Java.)

14. *H. polyanthos* Sw. Syn. p. 149.
Hab. Jamaica! Sw. Columbia! MORITZ.
15. *H. Grevilleanum* Pr. Hymen. p. 32 *H. polyanthos* HK. et GREV. tab. 128 (non Sw.)
Hab. Jamaica! (St. Vincent.)
16. *H. Schomburgkii* Pr. Hymen. p. 32; *Trichomanes clavatum* KAULF. in WEIG. Exsicc. Surin.; *H. polyanthos* KZE in Linn. XXI p. 240; *H. clavatum* SPLITG. in Tijdschr. voor Nat. Gesch. VII p. 437.
Hab. Guyana Batava! Anglica!
17. *H. Martinicense*. *H. decurrens* β. Sieberi
Pr. Hymen. p. 32.
Hab. Martinique! SIEB.; Guyana Gallica! LE PRIEUR.
18. *H. Poeppigianum* Pr. Hymen. p. 32 et 54;
H. clavatum KZE in Linn. IX p. 109;
H. polyanthos METTEN. in Fil. Lechl. p. 26.
Hab. Peruvia! LECHL.; (Guyana Anglica).
19. *H. axillare* Sw. Syn. p. 148.
Hab. Jamaica! Sw.
20. *H. millefolium* SCHLTDL. in Linn. V p. 620;
H. polyanthos PR. Hymen. p. 32.
(non Sw.)
Hab. Mexico. (n. v.)
21. *H. abietinum* HK. et GREV. tab 127.

- Hab. Peruvia, JAMESON, LECHL. !
COUTHOUY !
22. *H. cuneatum* KZE Anal. pterid. p. 50
(1837); *H. Cumingii* PR. Hymen. p.
32 et 56 tab 11 A (1843.)
Hab. Ins. Juan Fernandez. (n. v.)
23. *H. australe* WILLD. Sp. pl. V p. 527; *H. polyanthos* LABILL. (teste spec. auth.)
Hab. van Diemensland! Taïti!
PLANCH, et Vieill.
24. *H. Blumeanum* Spr. S. V. IV p. 131; *H. pectinatum* N. et BL. in Nov. Act.
Leop. XI p. 124 tab. XII fig. 5
(non CAV.)
Hab. Java! Herb. AL. BR.; Su-
matra! TEYSM.
- Obs. Speciminibus incompletis de-
ceptus *H. linearis* ante habui affine.
Meliora nunc edoctus non alienum esse
video a speciebus, seriem *H. poly-
anthi* in regionibus Indo-australibus
repetentibus, imo praecedenti, quo-
cum structura omnino convenit, olim
subjungendum esse facile crediderim.
25. *H. integrum* v. d. B. in Pl. Jungh. I p.
563 (seorsim p. 19.); *H. emarginatum*
N. et BL. l. l. p. 127 tab. XI
fig. 5 (non Sw.)
Hab. Java! BL.

26. *H. pycnocarpum* v. d. B. in Pl. Jungh. I.
p. 564 (seorsim p. 20.)
Hab. Java! Herb. AL. BR., (Gedé) v. GESK
27. *H. coloratum* AL. BR. in Pl. Jungh. I p. 565
(seorsim p. 21.)
Hab. Java! Herb. AL. BR.
28. *H. tenellum* DON. Prodr. Fl. Nepal. p. 12;
HOOK. sp. fil. I p. 112.
Hab. Nepal! WALL. (spec. ex dono
LAMBERT in Herb. SOND.)
29. *H. Wrightii* n. sp. Fronde late oblonga
pinnatifida, laciniis patulis contiguis
1—2 dichotomis dimidiatis (?), laci-
nulis latiusculis abbreviatis, cellulis
opacis firmis rubro-fuscis magnis (imo
maximis) elongato-hexaëdris acutan-
gulis globulosis, globulis inaequalibus
confertissimis diffusis, parietibus hyali-
nis tenuibus rectis, cellularum margi-
nalium minute et obtuse crenulatis, soris
in laciniis axillaribus reflexis lacinulâ
lerioribus e basi conica immersa bi-
lobis, lobis semicircularibus integris,
receptaculo brevi. Rhizoma horizon-
tale ramosum setaceum paleis piliformi-
bus elongatis crispulis parce tomen-
tosum; stipes mediotenus ala rhacheos
descendente anguste marginatus vix
ultra 7 millim. longus, frons 16

millim. longa, 10 millim. lata opaca
firmiuscula rubro-fuscidula.

Hab. Japonia! (Hakodadi), WRIGHT.

30. *H. paniculiflorum* PR. Hymen. p. 32 et 55.

Hab. Ins. Philippinae, CUMING. (n. v.)

31. *H. clavatum* Sw. Syn. p. 149; *H. fraternum?*

PR. Hymen. p. 32 et 54 tab. 12 B.

Hab. Jamaica! Sw.; Porto-ricco!

SGHWANECKE.

32. *H. protrusum* Hook. sp. fil. I p. 104 tab.

37 B; *H. clavatum* Sw. (p. p.) teste
spec. auth.

Hab. Mexico! SINCL.; Jamaica! Sw.

33. *H. ferax.* n. sp. Fronde lanceolata tripin-
natifida, laciiniis primariis oblongo-
lanceolatis mediis contiguis, infimis sum-
misque remotiusculis, patulis apice
arrecto bipinnatifidis, secundariis ob-
longis obovatisve contiguis patulis vel
subdivaricatis pinnatifidis, tertiaris
pinnatifidis apicalibus simplicibus, la-
ciniulis simplicibus dichotomisve bre-
vibus latis apice integro, cellulis ru-
bro-fuscis validis opacis mediocribus
subaequalibus parum elongatis obtus-
angulis, interaneis amorphis spissis
diffusis, parietibus vix conspicuis fla-
vescentibus rectis, marginalium cel-

lularum incrassatis crenulatis, soris magnis numerosis turgidis in lacinulis tertiaris lateralibus e basi conica bilobis, lobis sori $\frac{2}{3}$ aequantibus oblongis margine eroso, receptaculo brevi inclusa. Rhizoma —? stipes teres setaceus debilis 7 centim. et ultra longus, frons 2 decim. longa, 3—4 centim. lata opaca fusco-olivacea firmiuscula pendula(?)

Hab. Venezuela! FUNCK et SCHILIM (N. 1578.)

34. *H. Jalappense* SCHLTDL. in Linn. V p. 619;
H. polyanthos KZE in Linn. XVIII p. 352.

Hab. Mexico, SCHIEDE! SCHAFFNER!
 alii.

35. *H. Kohautianum* PR Hymen. p. 32 et 56.
 Hab. Martinique! SIEB.; Guadeloupe!
 L' HERMIN.

36. *H. recurvum* GAUDICH. in Voy. Uran. Bot. p. 576.
 Hab. Ins. Sandwich! GAUDICH.

37. *H. acrosorum* v. D. B. in Pl. Jungh. I p. 564 (seorsim p. 20.)
 Hab. Java! v. GESK.

38. *H. Aucklandicum*. *H. crispatum* δ *Tasmanicum* HOOK. sp. fil. I p. 105 excl.
 Syn. R. BR. et? COLENSO).

Hab. Tasmania! Ins. Auckland! J.
D. HOOK. in Herb. SOND.

Obs. Synonymon Hookerianum citare
jubent specimina viri clarissimi in
Herb. DE VRIESE. Caeteroquin speciem,
quam equidem ad specimina Aucklan-
dica (in Herb. SONDER) determinavi,
nondum descriptam credidisse, quan-
doquidem *H. flabellatum* R. BR., ab
illustri auctore synonymon citatum,
toto coelo diversum esse e specimine
authentico compertus sim. Plantam,
a COLENSO nomine *H. atrovirentis* des-
criptam identicam esse cum illo *H.*
flabellato suspicor, at specimine non
viso judicium ferre nequeo.

39. *H. caudiculatum* MART. Icon. sel. Brasil.
p. 102 tab. 67.

Hab. Brasilia, MART! BEYR.! alii.

40. *H. caudatum Sphaerocionium productum* PR.
Hymen. p. 35 et 61; *H. fuciforme*
METTEN. in Fil. Lechl. p. 26; *H. cau-
diculatum* β. HOOK. sp. fil. I p. 102.

Hab. Chili, GAY! LECHL.! (Ins. Chiloe).

41. *H. fuciforme* Sw. Syn. p. 148.

Hab. Chili, LECHL.! (Ins Chiloe, Juan
Fernandez).

42. *H. Junghuhni* v. d. B. in Pl. Jungh. I.
p. 570 (seorsim p. 26); *H. dilatatum*
BL. Enum. II p. 221. (non Sw).
Hab. Java, REINW.! JUNGH.! ZOLL.!
43. *H. macrocarpum* (PR.) *Sphaerocionium* PR.
Hymen. p. 35 et 61.
Hab. Ins. Philippinae! CUMING.
44. *H. badium* HK. et GREV. tab. 76.
Hab. (India orientalis), WALL. (n. v.).
45. *H. Cumingii*. *Sphaerocionium badium* PR. Hy-
men. p. 35. (non HK. et GREV.)
Hab. Ins. Philippinae! CUMING.
Obs. *H. badium* secundum descrip-
tionem et iconem) differt: fronde e
basi obtuso elliptica, laciniis primariis
brevibus, soris in hisce axillaribus
solitariis, indusii lobis integerrimis,
colore badio, etc.
46. *H. sororium* (PR.) *Leptocionium* PR. Epimel.
p. 21 tab. 11.
Hab. (Nova Zelandia), Java! v. GESK.,
JUNGH.
47. *H. leptodictyon* C. MÜLL. in Bot. Ztg. 1854
p. 734.
Hab. Java! ZOLL., v. GESK.
48. *H. demissum* (FORST. SW. Syn p. 147 et 374;
Trichomanes FORST. Prodr. p. 85 N.
468.
Hab. (Ins. maris pacifici, FORST.),

Philippinae! CUMING, Nova Zelandia,
SINCLAIR! J. D. HOOK.! alii.

49. *H. eximium* KZE in Bot. Ztg. 1846 p. 478
(descr. ad specimina incompleta); *H. inclinatum* v. D. B. in Pl. Jungh. I
p. 570 (seorsim p. 26.)

Hab. Java, ZOLL! v. GESK.!

Species ignotae:

H. emarginatum Sw. Syn. p. 148 et 377.

Java, THUNB.

H. imbricatum BL. Enum. p. 220. Java.

H. ramosissimum HAMILT. in DON Prodr. Fl.
Nepal. p. 12. Nepal.

β. Frons squarrosa crispa vel undulata.

- 50 *H. sanguinolentum* Sw. Syn. p. 529.

Hab. Nova Zealandia SINCL! CUM!
J. D. HOOK! MOSM! alii.

- 51 *H. pulcherrimum* COL HOOK. sp. fil. I. p.
103 tab. 37 A.

Hab Nova Zealandia, COL. (n. v.)

- 52 *H. imbricatum* COL. (in Tasm. Phil. Journ.)

H. rarum β. HOOK. sp. fil. I p. 101.

Hab. Nova Zealandia, J. D. HOOK.!

Java, TEYSM.! (Chiloe? Terra del fuego?)

Obs. Cum *H. raro* R. BR. ne habi-
tu quidem convenit. Nomen valde
aptum mutandum erit si homonymam

speciem Blumeanam, nunc Botanicis
ignotam, aliquando inter species co-
gnitas recipere licebit.

53. *H. tabulare*. *H. rarum* KZE Farrnkr. I p.
234 tab. 96 fig. 1 (non R. Br.).

Hab. Africa australis (Tafelberg,
Duivelsberg, Hollandsberg) ECKL ! ZEY-
HER ! DRÈGE !

54. *H. apicale* *H. axillare* Hk. et Grev. tab 124.
(non Sw.).

Hab. Jamaica ! (S^t. Vincent.)

Obs. Differt ab *H. axillari* Sw. ha-
bitu frondis et divisione, stipite et
rhachi inferne nuda filiformibus, soris
lacinula duplo angustioribus e basi
cuneata oblongo-trapezoïdeis termina-
libus, cellularum denique forma et mag-
nitudine.

55. *H. nigricans* (Pr.) Kl. in Linn. XVIII p.
536; *H. polyanthos* γ. Hook. sp. fil.
I. p 107 (p. p.)

Hab. Columbia ! MORITZ; Peruvia,
DOMB. MATTH. !

56. *H. myriocarpum* Hook. sp. fil. I p 106.
tab. 37 D.

Hab. (Columbia, HARTW.) Caraccas !
FUNK et SCHLIM, MORITZ ?

- 57 *H. Andinum* n. sp. Differt a praecedentibus:
stipite debili, pariter ac rhachis in-

ferne, non alato, fronde tenui flaccida, ab *H. myriocarpo* insuper: laciniis primariis elongatis apice arrectis, lacinulis latioribus et longioribus, soris oblongis obovatisve, indusii lobis emarginate—crenatis, contextu frondis; ab *H. nigricante*: laciniis secundariis elongatis, lacinulis plus quam duplo latioribus apice integris, soris duplo majoribus, cellularum forma et magnitudine.

Hab. Andes Quitenses! COUTHOUY.

- 58 *H. Ricciaefolium* BORY in WILLD. sp. pl. V p. 531; *Adiantum tenellum* JACQ. collect. III p. 287 tab 21 fig. 3 (ruditis sed bona.)

Hab. Ins. Bourbon! BORY, BOIVIN;
Madagascar! GOUDEOT.

59. *H. crispatum* WALL. Hook. sp. fil. I p. 105?
(excl. saltem ♂); HK. et Grev. tab 77.

Hab. Nepal, WALL. (n. v.)

60. *H. erosum* BL. Enum. II. p. 221.

Hab. Java, BL.!

61. *H. fimbriatum* J. Sm. in Hook. Journ.
III. p. 418.

Hab. Ins. Philippinae, CUM.! Java,
v. GESK!

62. *H. Javanicum* SPR. S. V. IV p. 132; *H. crispum* N. et Bl. in Act. Acad. Leop. XI p. 128 tab. XIV fig. 1.
 Hab. (India orientalis), Ceylon!
 GARDN. Java! Bl., ZOLL., alii.
- 63 *H. micranthum* v. d. B. in Plant. Jungh. I p. 566 (seorsim p. 22).
 Hab. Java, v. GESK.!
- 64 *H. Reinwardti* v. d. B. in Plant. Jungh. I p. 567 (seorsim p. 23.); *H. dichotomum* BL. Enum. II p. 222 (non CAV., nec N. ab Es.)
 Hab. Java, REINW.!
65. *H. productum* KZE in Bot. Ztg. 1848 p. 305.
 Hab. Java, ZOLL! v. GEKS.! alii.
66. *H. flexuosum* CUNN. in HOOK. Bot. Mag. Compan. II. p. 369.
 Hab. Nova Zeelandia, CUNN, F. MULLER! SINCLAIR! alii.
67. *H. Tasmanicum* *H. flabellatum* R. BR. Prodr. p. 159 (seorsim p. 808 (non LABILL.))
H. crispatum ♂ HOOK. sp. fil. I p. 105 (p. p.)
 Hab. van Diemensland! R. BR.

Species ignota:

H. daedaleum BL. Enum. II p. 220. Java.

68. *H. undulatum* Sw. Syn. p. 148; HEDW.
gen. fil. tab. XIX (non XI).
Hab. Jamaica! Sw.; Peruvia! MATTH.
- 69 *H. flaccidum*. *H. undulatum* HEDW. gen. fil.
tab. XI; *H. myriocarpum?* METTEN. in
Fil. Lechl. p. 26. (non HOOK.)
Hab. Jamaica! Cuba WRIGHT; Co-
lumbia! MORITZ; Andes Quitenses!
SAETTONE; Mexico! SCHAFFN; Peruvia!
LECHL.
70. *H. crispum* HBK. Nov. Gen. I. p. 258;
KUNTH Syn. p. 90. *H. undulatum* MET-
TEN. in Fil. Lechl. p. 26 (non Sw.)
Hab. (Columbia, HUMB., BONPL.);
Peruvia, LECHL.
- 71 *H. reniforme* HOOK. Sp. fil. I p. 110 tab.
38 C.
Hab Peruvia, MATTH. (n. v.)
72. *H. convolutum* n. sp. Fronde linearis bipin-
nata, pinnis e basi cuneata oblongis
vel oblongo—linearibus interdum ra-
mulus plus minus elongatos simu-
lantibus aequidistantibus erecto-pa-
tulis in fronde fertili contiguis, in
sterili remotis pinnatis, pinnulis ap-
proximatis patulis obovatis vel subfla-
bellatim cuneatis simplicibus vel 1—3
furcatis, lacinulis linearibus antice
lrioribus emarginatis longitudinaliter

convoluto-undulatis, cellulis teneris hyalino-diaphanis (subtiliter punctulatis) mediocribus, imo magnis, subaequalibus regulariter subelongato-hexaëdris acutangulis, interaneis frustuloso-nebulosiss parietalibus (raro diffusis) e rubro fuscidulis, parietibus hyalinis rectis tenuibus, soris in lacinulis terminalibus parvis turgidis, indusio e basi rotundato-cuneata bilobo, lobis $\frac{3}{4}$ sori partes aequantibus suborbicularibus antice denticulatis, receptaculo brevi. Rhizoma ultra setaceum, stipes setaceus (pariter ac rhachis) teres fusco-ater circiter 5 centim. longus, frons 1— $1\frac{1}{2}$ decim. longa, 15 milim. lata debilis diaphana e pallide badio rubro-fusca.

Hab. Andes Quitenses! COUTHOUY,
JAMESON.

Species ignota:

H. Endiviaefolium DESV. Ann. soc. Linn. Par.

VI p. 334. Peruvia.

b. margine dentato.

α. Indusium integrum.

73. *H. Wilsoni* HOOK. Brit. Fl. I. p. 446; Engl.
Bot. Suppl. I tab. 2686.

Hab. Brittannia! (in primis Hibernia et Scotia); Ins Far! Norvegia austr. et occid! (Saxonia)?

- 74 *H. megachilum* PR. Epimel. p. 22 tab. 8 B.
Hab. Brasilia, GARDN. (n. v.)

- 75 *H. unilaterale* BORY in WILLD. sp. pl. V.
p. 521.

Hab. Ins. Bourbon, BORY!

- 76 *H. Meyeri* PR. Hymen. p. 31 et 50.

Hab. Africa australis, DRÈGE! LEIBOLD! Natal GUEINZIUS!

- 77 *H. cypressiforme* LABILL. Nov. Holl. pl. spec. p. 102. tab. 250 fig. 2; *H. Tunbridgense* β HOOK. sp. fil. I p. 95 (p. p.)

Hab. Nova Zeelandia! LABILL.

78. *H. Menziesii* PR. Hymen. p. 31 et 51; *H. Tunbridgense* METTEN. Fil. Lechl. p. 26.

Hab. America antarctica; Terra Magellani, LECHL! Hermite Isl., Cape Horn, J. D. Hook! (Staatenland, MENZ.)

79. *H. secundum* HK. et GREV. tab. 133.

Hab. America australis et antarctica; Chili! PUCCIO; Terra Magellani! LECHL.; Hermite Isl., Cape Horn, J. D. Hoor! (Staatenland, MENZ.)

80. *H. serra* PR. Hymen. p. 32 et 53 tab. XI B; *H. secundum* METTEN Fil. Lechl: p. 26 (p. p.)

Hab. (Chili, CUMING); Valdivia! PUTTIPI.

81. *H. pectinatum* CAV. Prael N. 685.

Hab. Chili, GAIJ! LECHL.! PUCCIO!
alii.

82. *H. Bridgesii* HOOK. sp. fil. I p. 97 tab. 35 C.

Hab. Chili, BRIDGES, CUMING, PHILIPPI!

83. II. *Bibraianum* STURM in Flora 1853
p. 361.

Hab. Chili, BIBRA. (n. v.)

84. *H. bivalve* (FORST.) Sw. Syn. p. 146 et 372;
Trichomanes FORST. Prodr. p. 460.

Hab. (Nova Zealandia, FORST., COL.);
Ins. Auckland! J. D. HOOK.

β *indusium dentatum*.

85. *H. Tunbridgense* SM. Fl. Britt. III
p. 1141.

Hab. Brittannia! Gallia occidentalis!
(Italia superior), Corsica! Tyrolis australis!
(Saxonia?)

86. *H. Drègeanum* PR. Hymen. p. 32 et 52;
H. Tunbridgense β *pedunculatum* KZE.
in Pl. acotyl. Afr. austr. p. 74.

Hab. Africa australis! DRÉGE, ECKLON,
alii.

87. *H. minimum* RICH. Fl. Nov. Zeel. p. 91
tab. 14 fig. 2; *H. antarcticum* PR.

Hymen. p. 31 et 50 tab. 12 A?

Hab. Nova Zealandia, SIEB.! J. D.
HOOK.! MOSSM.! alii.

88. *H. asperulum* KZE in Linn. IX p. 109; *H. Tunbridgense* METTEN. Fil. Lechl. p. 26 (p. p.)
Hab. Chili, POEPP., PHILIPPI!

Species ignota:

H. Thunbergii (ECKL.) PR. Hymen. p. 32.
Cap. bon. spei.

89. *H. fucoides* Sw. Syn. p. 146; *Trichomanes* HEDW. gen. fil. tab. VIII.
Hab. Jamaica! Columbia (Venezuela!
Nova Grenada!), (Mexico, Peruvia
Brasilia?)
90. *H. pedicellatum* KZE in Linn. XX p. 439.
Hab. Columbia, MORITZ! FUNK et SCHLIM!
91. *H. Peruvianum* HK. et GREV. tab. 208.
Hab. Columbia (Andes Quitenses,
JAMES.! SAETTONE! COUTHOUIJ! Nova
Grenada, SCHLIM?).
92. *H. spinulosum* H. B. K. Nov. gen. I p. 26;
KTH. Syn. pl. orb. nov. p. 90; *Lep-
tocionium fucoides* Kl. in Linn. XVIII
p. 533.

Hab. Columbia, HUMB. et BONPL.,
MORITZ! FUNK et SCHLIM!

Obs. Species hae quatuor licet parvitate non peccent, varie confusae sunt. *H. pedicellati* nomen e schedulis KUNZEANIS edens, describendi curram non prima vice aliis commode relinquens, Cl. KLOTSCHI distinguendum id ab *H. fucoïde* monet: indusii valvulis ovato-lanceolatis, margine inaequaliter serrato-dentatis; quasi hoc a specie SWARTZIANA alienum esset. *H. Peruvianum*, etiamsi pinnatum dicat Cl. HOOKER, rhachi inferne anguste alata gaudere videtur situque et directione sororum omnino cum *H. fucoïde* convenit, cujus quippe sori vetusti demum reflectuntur. Utroque insignius *H. spinulosum*. Quae vidi adque auctorum sententiam determinavi specimina contextu frondis duplicem typum monstrant; alteram cellulis firmis opacis magnis parietibus rectis, teneris hyalinis facile maximis parietibus crenulatis alteram.

93. *H. blepharodes* PR. Hymen. p. 32 et 51.

Hab. Martinique! Guadeloupe!

94. *H. Jamesoni* HOOK. sp. fil. I p. 96 tab
35 A.

Hab. Andes Quitenses! JAMESON.

95. *H. cristatum* HK. et GREV. tab. 148.

Hab. Andes Quitenses, JAMESON.
(n. v.)

96. *H. multifidum* (FORST.) SW. Syn. p. 149
et 378; *Trichomanes* FORST. Prodr.
p. 85 N. 473.

Hab. (Ins. maris pacifici, FORST.);
Nov. Zeelandia, LYALL! J. D. HOO-
KER! alii.

B. Frons vestita,

- a. pendula (stipite plerumque debili).

α. Venae venulaeque alato-cristatae.

97. *H. sericeum* SW. Fl. Ind. occid. III p.
1745; PLUM. Foug. p. 56 tab. 73;
HEDW. gen. fil. tab. VII.

Hab. Ins. Antillarum (Jamaica!
Cuba! Guadeloupe! Martinique, Tri-
nidad!)

98. *H. plumosum* KLF. Enum. p. 267; *Sphae-
rocionium aureum* PR. Hymen. p. 34
et 57.

Hab. Brasilia! Columbia! Peruvia!

99. *H. tomentosum* KZE Linn. IX p. 107;
Farrnkr. I p. 160 tab. 69; *H. seri-*

ceum METTEN. in Fil. Lechl. p. 25
(non Sw.)

Hab. Peruvia, PÖPP. ! LECHL. !

Species ignotae:

H. pyramidatum DESV. in Ann. Soc. Linn.

Paris. VI p. 332. America tropica.

H. lobato-alatum KL. in Linn. XX p. 438.

Peruvia.

β. Venae venulaeque nudae.

100. *H. hirsutum* Sw. Fl. Ind. occid. III p. 1746;

HEDW. gen. fil. tab. X.

Hab. Jamaica! Cuba! Columbia!

Mexico?

101. *H. latifrons* n. sp. Fronde oblonga vel lanceolato-oblonga pinnatifida, laci-niis inferioribus obtuseque 1—3dichoto-mis, reliquis oblongo-linearibus fur-catis simplicibusque patulis subaequidis tantibus, lacinulis margine leviter undu-latis apice retusis, venulis gracilibus pro-pe apicem desinentibus, pilis frondis marginem et laminam, pariter ac rha-chidem, venas venulasque dense ob-tegentibus debilibus elongatis apice in radios 2—4 erectiusculos divisis, cellulis hyalinis maximis elongatis regularibus acutangulis, parietibus

parum diaphanis rectis tenuibus, interaneis parietalibus amorphis fuscidulis, marginalibus magis elongatis subtetraëdris, soris parvis in lacinulis terminalibus hisque angustioribus, indusio e basi conico-rotundata bilo lobis suborbicularibus transversim latioribus undulatis integris dense ciliatis, receptaculo setaceo brevi.

Rhizoma horizontale setaceum repens, pariter ac stipes brevissimus (1—1,5 centim.) teres capillaris, hirsutum, frons 4—5,5 centim. longa, 2—2,5 centim. lata diaphana tenera olivaceo-fuscidula, lacinulae 3 millim. latae.

Hab. Guadeloupe! PERROTT., L'HERMIN.

102. *H. venustum* DESV. in Ann. Soc. Linn. Paris. VI p. 332; *H. hirsutum* RADDI Fil. Brasil. p. 19 tab. 79 fig. 3 (non Sw.); *H. Raddianum* MÜLL. in Bot. Ztg. 1854 p. 722.

Hab. Brasilia, RADDI (n. v.)

103. *H. pulchellum* SCHLTDL. in Linn. V p. 618.

Hab. Mexico! SCHIEDE, SCHAFFN.

104. *H. elegantulum*. *H. pulchellum* HOOK. sp. fil. I pag. 91? tab. 33 A! (non SCHLDL)

Hab. Andes Quitenses! JAMES., SAETTONE.

105. *H. procerum*. *H. pulchellum* METTEN. in
Fil. Lechl.p. 25 (non SCHLTDL., nec
HOOK).
Hab. Peruvia! LECIHL.; Columbia!
JAMES., RÉMIJ.
106. *H. lineare* Sw. Fl. Ind. occid. III p. 1749;
H. elegans SPR. S. V. IV p. 133;
H. trifidum HK. et GREV. tab. 196.
Hab. Brasilia! Peruvia! (Columbia),
Nova Grenada!
107. *H. Crugeri* MÜLL. in Bot. Ztg. 1854
p. 722.
Hab. Trinidad! CRÜGER; Guadeloupe!
L'HERMIN.
108. *H. interruptum* KZE. Anal. p. 48 tab. 30.
Hab. Peruvia, PÖPPIG (n. v.)
109. *H. aequabile* KZE. sec. KL. in Linn. XX
p. 438 (a neutro descriptum!)
Hab. Columbia, (Venezuela, MORITZ!
FUNK et SCHLIM! Nova Grenada,
SCHLIM!)? Peruvia, LECIHL.!
Obs. Speciene differat ab antecedente,
me judice, denuo inquirendum est.
H. interruptum coll. POEPPIGIANAE,
quod vidi, evidenter pertinet ad *H. tomentosum* KZE. Specimina Peruviana
a Lechlero collecta e contextu frondis
huc referenda sunt; sunt autem ste-
rilia ideoque non tute determinanda.

110. *H. pendulum* BORY in BÈL. Voy. Ind. or. Bot. p. 81 tab. 8 fig. 2.

Hab. Ins. Bourbon, BORIJ! BOIVIN! de MONTBRISON! alii.

Species ignotae:

- H. nudum* (POIR.) DESV. Ann. Soc. Linn. Par. VI p. 332. Guadeloupe.

- H. capillare* DESV. ibid. p. 333. Ins. Tristan d'Acunha.

b. *erecta* (stipite firmiore.)

111. *H. Organense* HOOK. sp. fil. I p. 90 tab. 32 B; *H. Beyrichianum* KZE in Linn. IX p. 108 (quo ad pl. Brasil.)

Hab. Brasilia, GARDN., BEYR.! Columbia (Venezuela! MORITZ, N. Grenada! SCHLIM.)

112. *H. Beyrichianum* KZE in Linn. IX p. 108 (quo ad pl. Peruv.)

Hab. Peruvia, POEPP. (n. v.)

113. *H. Ruizianum* KL. (*Sphaerocionium*) Linn. XVIII p. 535.

Hab. Peruvia, RUIZ (n. v.)

114. *H. Lindeni* HOOK. sp. fil. I p. 94 tab. 34 C; *H. spectabile* MORITZ in Coll. Fil. Columb.

Hab. Venezuela, LINDEN, MORITZ!

115. *H. valvatum* HK. et GREV. tab. 219.

Hab. Andes Columbicae, JAMES.!
Peruvia, LECHL.

116. *H. Francailllei* n. sp. Fronde oblongo-lanceolata apice producta bipinnatifida, laciiniis primariis e basi lata triangularibus ovatisve imbricatis contiguisque subhorizontalibus, imis deflexis, pinnatifidis, secundariis obtuse-ovatisve, remotiusculis patulis insimis 2—3 dichotomis, reliquis simplicibus furcatisve, lacinulis elongatis undulatis margine integro dense pilis simplicibus hyalinis obsesso, apice attenuato-rotundato, sinubus cunctis latis obtusis, venis venuisque tenuibus fuscis, pariter ac rhachis, parce pilosis cellulis parum diaphanis magnis maximisque inaequalibus subregularibus elongatis, parietibus subdiaphanis rectis parum incrassatis, interaneis amorphis globulosisve primum diffusis serius parietalibus, globulis minutis flavo-fuscis, marginem versus minoribus latitudine usque $2\frac{1}{2}$ longioribus, soris in lacinulis terminibus, indusio e basi elongato-conica immersa oblongo bilobo, lobis ante eroso-denticulatis ciliatis nudisve.

Rhizoma ultra setaceum dense ramulosum paleaceo-hirsutum, stipes teres, basi excepta, glaber obscure fuscus 5—7 centim. longus, frons 10—14 centim. longa, 4—5 lata olivacea diaphana undulato-squarrosula rigidiuscula.

H. valvatum si non erraverim in determinandis speciminibus Peruvianis, differt: fronde e basi lata ovata, lacinulis latioribus sinubus angustis acutis interstinctis minus undulato-crispis, cellulis majoribus interaneis amoene viridi-chlorophyllosis, marginalibus opacis (lacinulis hinc sub lente marginatis), soris majoribus etc.

Hab. Guadeloupe! PERROTTET; Martinique! BÉLANGER.

117. *H. Plumieri* HOOK. et GREV. tab. 123
(excl. Syn. PLUM.)

Hab. Andes Columbianae, JAMES.,
COUTHOUY!

118. *H. trapezoidale* LIEBM. Mex. Bregn. p. 141.

Hab. Mexico, LIEBM. (n. v.)

119. *H. hirtellum* Sw. Syn. p. 149.

Hab. Jamaica! St. Vincent! Guadeloupe! Mexico!

120. *H. crispatum*. *H. hirtellum* METTEN. in Fil. Lechl. p. 25 (non Sw.)

Hab. Peruvia, LECHL.!

Obs. *H. valvato* magis quam *H. hirtello* affine, quorum hoc quidem differt: fronde lanceolata, laciiniis primariis patulis, secundariis simplicibus furcatisve, lacinulis duplo fere latioribus, rhachi plana, cellulis validis opacis majoribus, interaneis (quatenus globulosis) minutis diffusis aureis; illud vero: fronde subcordato-ovata, laciiniis primariis latioribus imbricatis, lacinulis plus quam duplo latioribus, rhachi plana, stipite terete, cellulis majoribus, parietibus rectis, interaneis distinete et pulchre viridi-globulosis, etc.

121. *H. ciliatum* Sw Fl. Ind occid. III. p. 1753;

Syn. p. 147; PLUM. Foug. p. 73 tab.

50 fig. D.; *Sphaerocionium vestitum*

PR. Hym. p. 34 et 58.

Hab. Jamaica! Guadeloupe! Martinique! Mexico?

122. *H. remotum*. *H. ciliatum* HK. et GREV. tab.

35 (non Sw.); *Sphaerocionium Gre-*

villeanum PR. Hymen. p. 34;? *H.*

Borijanum METTEN in Fil. Lechl. p. 25.

Hab. (Ins. S. Vincent,) Columbia;

MORITZ; Guyana Gallica! LEPRIEUR;

Brasilia! SÉLLOW, LANGSD. ; Peruvia?

LECHL.

123. *H. Surinamense.* *Sphaerocionium ciliatum*
Pr. Hymen. p. 34.
Hab. Surinam! WEIG., HOSTM.;
Guyana Gallica, LE PRIEUR! Brasilia! -
WEDDELL.
124. *H. commutatum* Pr. (*Sphaeroc.*) p. 34; *H.*
Boryanum RADDI Fil. Brasil. p. 66
tab. 79 fig. 4. (non WILLD.)
Hab. Brasilia, RADDI, MART.!
125. *H. Schiedeanum* Pr. (*Sphaeroc.*) p. 34 et 60;
H. ciliatum var *nudipes* KZE in Linn.
XVIII p. 351.
Hab. Mexico, SCHIEDE! LEIB., LIEBM.
alii.
126. *H. Boryanum* WILLD. Sp. pl. V p. 518.
Hab. Ins. Bourbon, BORY! BOIVIN!
Mauritius, SIEBER! Madagascar, BOI-
VIN!

Species ignotae:

- H. trichophyllum* HBK. nov. gen. I p. 22.
Cumana.
- H. diversilobum* Pr. Hymen. p. 34 et 59.
Antillae.
- H. microcarpum* DESV. Ann. Soc. Linn.
Paris. VI p. 333. Hispaniola.
- H. Sieberi* Pr. Hymen. p. 34 et 58. Mar-
tinique.
-

127. *H. elasticum* BORY in WILLD. Sp. pl. V
p. 520.

Hab. Ins. Bourbon! BORY, BOIVIN;
Mauritius! SIEBER, BOIVIN; Madagascar!
BERNIER.

128. *H. flavo-aureum* BORY in BEL Voy. Ind. or.
Bot. p. 84.

Hab. Ins. Bourbon! BOIVIN in Herb.
DE FRANQUEVILLE.)

Obs. Infausto casu specimina ste-
rilia modo vidi; tamen species adeo
videtur insignis, ut, in determinando
erraverim, novo nomine serius descri-
benda sit.

129. *H.aeruginosum* (POIR.) DESV. Ann. Soc.
Linn. Paris. VI p. 332; *Trichomanes*
POIR. Encycl. meth. VIII p. 76.

Hab. Ins. Tristan d'Acunha, BORY,
CARM. (n. v.)

130. *H. subtilissimum* KZE. (1837 Anal. p. 49);
H. Berteroii HOOK. (1846) sp. fil. I
p. 93 tab. 33 C.

Hab. Ins. Juan Fernandez, BERT.;
Chiloe, CUMING (n. v.)

131. *H. Frankliniae* COL. in Tasm. Journ. 1842
p. 376; *H. aeruginosum* β. HOOK. sp.
fil. I p. 94.

Hab. Nova Zealandia, MENZ.! CO-
LENZO.

Obs. Species tres ultimas in unam, nomine *H. aeruginosi*, jungendas esse monuit Cl. J. D. HOOKER (Fl. N. Zee-land. teste STURM Enum. p. 39). Recte forsitan; liceat vero mihi ex mea methodo seorsim illas enumera-re, donec frondium contextu bene cognito, notarum externalium diversitatem distinctioni sufficere docuerit, necne. Cautelam suadet preterea speciei, sin est distributio geographica singularis.

- 132 *H. lanceolatum* HOOK. et ARN. (in BEECHEY Voy.) HOOK. Sp. fil. I p. 94 tab. 34 B.

Hab. Ins. Sandvicense, GAUDICH.! (in Herb. FÉE) LAY et COLLIE, alii.

133. *H. obtusum* HOOK. et ARN. (in BEECHEY Voy.) HOOK. Sp. fil. I p. 93 tab. 33 D.

Hab. Ins. Sandvicense, LAY et COLLIE M'RAE! in Herb. SOND. comm. LINDLEY).

Species ignota:

- H. arbuscula* DESV. Ann. Soc. Linn. Paris. VI. p. 33?. Ins. Mauritius.

Desciscentes:

134. *H. dilatatum* (FORST.) Sw. Syn. p. 147 et 373; *Trichomanes* FORST. Prodr. p. 85 n. 467; *Diplophyllum dilatatum* v. d. B. in sched.
 Hab. (Ins. maris pacifici, FORST.); Nov. Zealandia, MENZ., J. D. HOOK.! F. MÜLL.! MOSSM alii.
135. *H. scabrum* RICH. Fl. Nouv. Zeel. p. 90 tab. 14 fig. 1; *Sphaerocionium glanduliforum* PR. Epimel. p. 22 tab. 12; *Diplophyllum? scabrum* v. d. B. in sched.
 Hab. Nov. Zealandia, d'URVILLE, LYALL! J. D. HOOK.! SINCLAIR! alii.
136. *H. Chiloënsis* HOOK. sp. fil. I p. 90 tab. 32 A; *Leptocionium dicranotrichum* PR. Hymen. p. 26 tab. XI D. (teste STURM Enum. p. 40.)
 Hab. Chili, GAY! LECHL;! alii (Chiloë, CUMING).
137. *H. exsertum* WALL. Cat. n. 171; HOOK. sp. fil. I. p. 109 tab. 38 A.
 Hab. Nepal! WALL.; mont. Nilagirici! PERROT.; Ceylon? THWAITES.
138. *H. Gardneri* n. sp. Fronde ovata acuminate pinnatifida, lacinias (infimis exceptis) contiguis imbricatisque divaricatis patulisque oblongis inciso-loba-

tis, lacinulis brevibus subsimplicibus oblongo-linearibus apice attenuato-roundatis integris, venis venulisque validis pinnatim ramosis divaricatis, pariter ac rhachis et stipes, pilis elongatis articulatis fuscidulis obsessis, cellulis opacis firmis magnis imo maximis inaequalibus regularibus elongatis acutangulis, parietibus s. rectis s. nodulosis incrassatis, interaneis amorphis olivaceis vel flavo-fuscis, soris in laciis axillaribus, indusio turgido e basi rotundato-conica suborbiculari mediotenus bilobo, lobis antice grosse crenatis, receptaculo filiformi brevi inclusu. Rhizoma intricatum capillaceum paleaceo-strigosum, stipes teres setaceus 1-1, 5 centim. longus, frons 3 centim. longa, 2 centim. circiter lata parum diaphana rigida fusco-olivacea:

Hab. Ins Ceylon, GARDN. ! in Herb.
MOUGEOT.

139. *H. Zollingeri* KZE. in Bot. Ztg. 1848 p. 305; *H. elasticum* KZE. et ZOLL. Verz. p. 46. (non BORY)

Hab. Java. ZOLL

140. *H. dipteroneuron* AL. BR. in Herb; v. d B. in Pl. Jungh. I. 571 (seorsim p. 27)

Hab. Java! Herb. AL. BR.

Species ignotae:

- H. decurrens* JACQ. Coll. III p. 103 tab.
2 fig. 12. Martinique.
- H. hygrometricum* (POIR.) DESV. in Ann.
Soc. Par. VI p. 333; *Trichomanes* POIR.
in Encl. méth. VIII p. 79. Madagascar.
- H. floribundum* H. B. K. Nov. gen. I p.
27. Cumana.
- H. nigrescens* LIÈBM. Mex. Bregn. p. 140.
Mexico.
- H. Telfairianum* WALL. Cat. N. 168. Mau-
ritius.





New York Botanical Garden Library

QL 1 .A1 B62 1859
Bosch, R. B. van de/Synopsis Hymenophyll

gen



3 5185 00136 8248

