

卷十一
卷十二



浙江圖書館



浙江圖書館

醫學綱目卷之十一

肝膽部

眩 癩 子癩

大法

肝木

內經論助皆屬肝木

成無已云眩者非玄而見其玄謂厥里眩也眩重者運為運轉之運世謂之頭旋是也



內經論眩皆屬肝木屬上虛丹溪論眩主於補虛

治痰降火仲景治眩亦以痰飲為先也

諸風掉眩皆屬於肝

全文見診法

河間 掉搖也眩昏亂旋運也風主動故也所謂風氣其不

頭目眩運者由風木王則必是金衰不能制木而木生

火木火者皆陽也故風人多為患也風起則搏則頭

目眩運而旋轉也風火皆屬於肝主動兩動相搏則

旋轉也故火本動也燭得風則旋轉也或乘舟車及作
環舞而眩運者其動不正而左右紆曲故經曰曲直動
搖風之用也眩運而嘔吐者風熱甚則故也

狗蒙招左目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚
則入肝 全文見治虛實法

本事治肝厥頭暈清頭目釣藤散

釣藤 陳皮 半夏 麥門冬 茯苓

茯神 人參 甘菊花 防風 各半兩 甘草 一分

石膏 一兩

右為粗末每服四升水一盞半生姜七片煎八分去

查溫服

治肝厥狀如癰疾不惺 嘔吐醒後頭虛運發熱方

麻黃 釣藤 取皮 石膏 干葛 半夏曲

紫胡 甘草 枳壳 甘菊 各等分

右為粗末每服四升水一盞半生姜三片棗一枚同
煎至八分去查溫服

婦人患頭冷者十居其半每法發必掉眩如在棟上蓋
目血虛肝有風邪熱之作素問云狗蒙招搖目眩耳聾
上虛下實過在足少陽厥陰甚則肺肝蓋為此也予嘗
處北方以授人比他藥捷而効速芎藭散

川芎 一兩 當歸 三分 羌活 旋覆花 蔓荊子

細辛 華陰者 石羔 藁本 荆芥穗 半夏曲

防風

熟地黄

甘草各半兩

右為末每服二名水一大盞姜三片同煎至七分去滓溫服不拘時候服

右甘寒瀉冷木

羅風痰治驗○叅政楊公七旬有二宿有風疾於至元戊辰春忽病頭旋眼黑目不見物心神煩亂兀兀欲吐不吐心中如懊懣之狀頭偏痛微腫而赤色腮腴亦赤色足脗冷命予治之予料之此少吐之時喜飲酒久積濕熱於內風痰內作上熱下寒陰陽不得交通否之象也經云治熱以寒雖良工不敢廢其繩墨而更其道也然而病有遠近治有輕重叅政今年高氣弱上熱雖盛豈

而病有遠近治有輕重參政今年高氣弱上熱雖盛豈
敢用寒涼之劑損其脾胃經云熱則疾之又云高顛之
上砭射取之予以三稜針約二十餘處刺之其血紫黑
如露珠之狀少頃頭目便覺清利諸証悉減遂處方云
眼黑頭旋虛冷內作非天麻不能除天麻苗謂之定冷
草此草狹不為風所搖故以為君偏頭痛者乃少陽也非
柴胡黃芩酒制不能治柴胡以治上熱又為目用故以
為臣橘皮炙甘草補中益氣為佐生姜半夏能治風痰
茯苓利小便導濕熱引而下行故以為使服之數服邪
氣平生氣復而安矣

天麻半夏湯治風痰內作胸滿不利頭旋眼黑兀兀欲
吐上熱下寒不得卧

天麻 半夏 各一兩
橘皮 去白 柴胡 各七分

黃芩 酒浸 甘草 炙
白茯苓 去皮 金胡 各五分 黃連 三分

右咬咀作一服水二盞姜三片煎至一盞溫服食後

忌酒麵并生冷物明年春參政除懷孟路揔管以古

風一揆見贈

恒美活湯治風熱壅盛上攻頭目昏眩

美活 一兩 防風 一兩 細黃芩 酒洗 柴胡 七分

酒黃連 一兩 酒黃柏 半兩 瓜蒌根 酒洗 炙甘草 七分

白茯苓 五分 澤瀉 三分

右為粗末每服秤五分外水二盞煎至一盞取清食後

或先臥通口熱服日二服

外感風寒眩

右岑寒瀉風木

靈筋骨血氣之精而與脈并為目系上屬於腦後出於項中故邪中於項目逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣 大感篇

本事治一切頭旋本目體虛風邪乘於陽經上注於頭面遂入於腦亦目痰水在於胸膈之上犯大寒使陽氣不行痰水結聚上冲於頭目令頭旋

羚羊角 茯神各一兩 芎藭 防風 白芷

半夏 湯洗七次各半兩 枳壳 附子 各一分

右為粗末每服四升水一盞半生姜半分煨火煎至

七分去滓不拘時候溫服

百一都梁丸治風吹項背頭目昏眩以及眩痛

香白芷 大塊者用沸湯炮洗四五次焙干

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼用荆芥湯

點茶下

無擇大豆紫湯治中風頭眩惡風自汗吐冷

方見
產門

聖惠治風頭旋用蟬壳二兩微炒為末非時溫酒下一分

針經衛氣篇云上虛則眩又五藏生成篇云狗蒙招

尤目瞑耳聾下實上虛蓋蒙昏胃也招搖掉也冥黑

眩也皆謂昏冒搖掉眼黑眩屬下實上虛也

丹陳容婦人近五十頭痛麻眩運脈甚虛宜補氣益血去

眩目勞役及

上虛

脈虛噉者
為虛

風行濕

天麻

酒一升

人參

半升

白朮

一升

苓

半升

歸身尾

酒半升

川芎

半升

陳皮

半升

炙甘草

二升

芪

三分

半夏

半升

生姜

三片

賈勇曰勞後眼先眩倦息須不爽肚帶溇滑

芪

半升

參

半升

歸

一升

炒柏

三升

白朮

一升酒浸

陳皮

半升

蔓荊子

五粒

炙甘草

一升

煎稍熱飲之午時夕時各一次去枕眠少時已時申

時各一次

男子患目作勞成病沒熱脚痠口苦頭暈

白朮

茯苓

杜仲

陳皮

當歸

一兩

人參 生地黃 黃連 芎 半兩 白芍

甘草 一兩

分十八帖食前熱下柳青丸廿二粒

丈夫患熱頭眩脈大而散此是辛散中來

陳皮 柴胡 三兩 人參 白朮 二兩 黃芪

木通 一兩 甘草 一兩

分三帖

本事治風眩頭暈川芎散

山茱萸 一兩 山藥 甘菊花 人參

茯神 川芎 各半兩

右細末每服二兩酒調下不拘時候日三服不可悞

左細末每服二名酒調下不拘時候日三服不可誤

用野菊花龐先生方

去血多而眩者為血虛

濕痰

丹溪治眩補虛治痰降火

三日芎歸湯治產後去血過多眩運不省及傷胎去血

多崩中去血多金瘡血多拔牙齒去血多不止懸虛

心煩眩運頭重目瘡拳頭欲倒方見婦人大法条

丹頭眩屬氣虛之痰無痰則不能作治痰為主補

氣并除火藥

濕多者二陳湯火多痰曰火動二陳湯加酒苓

眩火動其痰二陳湯加黃芩蒼朮羌活散冷行濕

世水煮金花丸治頭眩方見痰飲

丹眩運不可者大三次炒干為末茶調下每服一

錢至二錢

錢至二錢

眩吐痰涎
口口相續為
虛宜補之墜
之

一男子年七十九歲頭目昏眩而重手足無力吐痰口
口相續左手脈散大而緩右手緩而大脈不及於左
重按昏無力飲食畧減而微湯大便三四日一行衆
人皆與風藥予曰若果與風藥至春深必死矣如皆
大虛証當以補藥作大劑服之衆然而去予教以用
人參黃芪當歸身芍藥白朮陳皮濃煎作湯使下連
柏丸三十粒如此者服二年半而精力如少壯時連
柏丸冬加干姜少作令藥余三時皆依本法連柏皆
姜汁炒為細末又以姜汁熬為糊丸
本事治虛風頭旋吐痰涎不已養正丹

黑鈆

水銀

硫黃

朱砂各一兩

眩而嘔逆為

痰厥宜治

痰

虛者無補

中悸者無

行水

右用建盞一隻火上鎔鉛成汁次下水銀用柳枝子打勻取下故少時下二味末打勻令冷取下研為粉用米飲丸或用棗肉丸如梧子大每服三十九粒湯下此藥升降陰陽補接真氣非止頭旋而已

恒

范天驟之內素有脾胃之病時頭煩燥胸中不利大便不通初冬出外而晚歸為寒氣怫鬱悶亂大作火不得伸故也鑿疑有熱治以疎風丸大便秘行而病不減又疑藥力小復加七八十丸下兩行前証仍不減復添吐逆食不能停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短後上喘無力不欲言心神顛倒兀兀不止目不欲開如在風雲中頭骨痛如裂身重如山四肢厥冷不得安

卧予謂前証乃胃氣已損復下兩次則重損其胃而痰厥頭痛作矣制半夏白朮升麻湯主之食

天麻 半斤 半夏 湯洗七次 一分半 人參 五分 白朮 二斤

蒼朮 半斤 橘皮 一分半 黃芪 半斤 澤瀉 半斤

白茯苓 半斤 炒麵 一分 大麥蘖麵 一分半

乾姜 一斤 黃柏 二斤

右件吹咀每服半兩水二盞煎至一盞去渣帶熱服食前一服而愈此頭痛若甚謂之足太陰痰厥頭疼非半夏不能療眼黑頭旋冷虛內作非天麻不能除其苗為定風草獨不為風所動也亦治內風之神藥也內風者虛風是也黃芪甘濕瀉火補元氣人參甘

溫 瀉 火 補 中 益 氣 二 朮 俱 甘 苦 溫 甘 除 濕 補 中 益 氣
澤 瀉 茯苓 利 小 便 導 濕 橘 皮 苦 溫 益 氣 補 中 升 湯 麴
消 食 蕩 胃 中 滯 氣 大 麥 蘗 麵 寬 中 助 胃 氣 乾 姜 辛 熱
以 條 中 寒 黃 柏 苦 大 寒 酒 洗 以 至 冬 天 以 火 在 泉 散
燥 也

右 氣 虛 挾 痰 眩 予 當 治 一 人 卧 則 稍 輕 但 舉 頭 則
頭 旋 眼 黑 以 天 麻 半 夏 茯苓 陳 皮 白 附 姜 蚕 參 菴
朮 草 歸 生 姜 黃 芩 並 湯 服 之 五 六 日 愈 蓋 做 此 方
加 減 之 也

濟 生 芎 朮 湯 治 胃 兩 中 濕 眩 暈 嘔 逆 頭 昏

川 芎 半 夏 湯 洗 以 次 白 朮 各 一 兩 甘 草 炙 甘 半 兩

右父母每服四升水一盞生姜七片煎服不拘時

嚴氏旋覆花湯治中脘伏痰嘔逆眩暈

旋覆花 半夏 橘紅 乾姜 各一兩 檳榔

人參 甘草 白朮 各半兩 五生薑

右剉碎每服一兩水煎服

仲景云卒嘔吐心下痞滿間有水眩悸者半夏加

茯苓湯主之方見嘔吐

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癡眩此水也五苓

散主之方見傷寒

子和青黛散搗鼻取涎治眩神效方是頭痛

頭眩眩暈可用獨聖吐之吐可用清上散涼之藥

痰閉不出者
宜吐之

頭風眩暈可用獨聖 吐之吐 可用清上 涼之藥

防風通聖散如半夏之味仲景云此痰結胸中而致也

通聖散見癰

獨聖散

瓜蒂 不以多少 加蔚金 等分

右為細末每服一匙或二匙薑汁調下服之用雞翎

探吐

河間搜風丸治邪氣上逆風熱上攻頭目眩暈大小便結滯

大小結滯者 微利之

人參

茯苓

南星 半兩

藿香 二分半

乾生薑

白朮

生各一兩

蛤粉 二兩

寒水石 一兩

大黃

黃芩

牽牛 四兩

薄荷葉 半兩

滑石

四兩

半夏 一兩

体虚有寒者宜术附

右为末滴水丸小豆大每十丸生姜汤下加至二十

丸日三服

仲术附子汤治冷虚头重眩岩极不知食味暖肌补中益

精气

白术二两

附子

一枚半炮去皮

甘草

一两炙

右三味剉每五升七姜五片棗一枚水盞半煎七分

去查温服

本事治体虚有风外受虚湿身如在空中之生散

生附子去皮脚

生南星各等分

右二味吹咀每服四大升水一盞半生姜十片煨火

煎至八分去查服戊午年在新安有此疾張鑿博子

至八分去查服戊午年在新安有此疾張鑿博子

倚息形腫者

宜木瀉

後授此方三服愈

仲心下有支飲其人苦胃眩澤瀉湯主之

短氣倚息形如腫為支飲

澤瀉 五兩

白朮 二兩

二味以二升煮一升分溫再服

運氣眩有二

運氣

風氣助肝眩

治以涼

一曰風助肝盛眩經云厥陰司天之政風行太虛雲

物搖動目轉耳鳴三足氣風乃時舉民病掉眩人

云厥陰司天客勝則耳鳴掉眩又云厥陰之勝耳

鳴頭眩又云厥陰之復筋骨掉眩治以諸涼是也

二曰濕邪傷腎眩經云太陰司天濕淫所勝病腰背

頭項痛而眩治以苦熱是也

河間神妙散搐鼻治頭目昏眩偏正頭痛 方見頭痛門

雜方

濕邪傷腎眩治以熱

針灸上

補百會風府
補申脈

肩背項痛者

取湧泉崑

崑

針灸下

腦為髓之海其輸上在于其蓋下在風府髓海不足

則腦轉耳鳴眩疲眩冒目無所見全文是針灸蓋者百會穴也補百會

風府二穴則眩愈也

上氣不足頭為之苦傾目為之眩補足外踝下留之

全文是針灸

邪在腎肩背項項痛時眩取湧泉崑崑視有血者盡

取之全文是針灸

眩穴頭目眩運

至陰

標幽又法

金門

素君又法 內冷池通玄同

風池 神庭

又法 三官

金門 馮 三里補

心術頭暈怕寒少冷寒則目暗僵仆不分冬夏當用綿

帽包日夜不離一去帽即發

百會 惺惺 一分恐上星 風池 二寸半致令頭大熱即可去帽

豐隆 二寸半立愈

素君頭熱

上顙 會 風門 絲竹空 百會

甲風眩善嘔吐煩滿神庭主之如顏色青 一作清者上星

任脈太陰少陰

主之取上星者先取譙譙後取天牖風池加頭痛額

青者顙會主之

風眩引額痛上星主之先取譙譙後取天牖風池

風眩目瞑惡寒風面赤腫前項主之千金云風眩偏頭疼

風眩目眩顙上痛後項主之

風眩驚手腕痛泄風汗出至腰陽谷主之千金云腕疼作手倦

腦風頭目眩頭痛風眩目痛腦空主之

風逆暴四肢腫濕則希然寒飢則煩心飽則眩大都主之

頭眩目痛數半寒王枕主之千金云頭半寒痛

丹左手脈數熱多

脈澁有死血

右手脈實痰積

脈大必是久病

癩癩

癩癩即頭

眩也痰在兩間則眩微不介痰溢上

兩上則眩甚仆倒於地而不知人名之曰癩癩徐

嗣伯云大人曰癩小兒曰癩其實一疾也然此中

風中寒中暑尸厥等仆倒不同凡癩癩仆時口中

作聲時省時吐涎沫省後又復發時作時止而不

休息中風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲省時

無涎沫省後不復再發間有發者亦非如癩癩之

常法也

丹癩

驚

痰

宜吐

大率行痰為主

南星

黃連

瓜蒌

半夏

大法

尋火尋痰分少多治無有不愈

分痰與熱有熱以涼藥清其心

有痰者必用吐藥吐後用東垣安神丸

吐証必用吐吐後用平肝之藥青黛紫胡以苦之類

海治長洪伏三脈風癩驚癩發狂惡人與火者灸第三推

第九椎服局方妙香丸以針投之眼子透冷水內浸少

時服之如本方善治弦細緩三脈諸癩似狂者李河南

五坐丸 局方妙香丸見虛煩

氣亂于頭則為厥逆頭重眩仆 全文見針灸門

邪搏陽則為癩疾 全文見針法不同。針經九針云邪入於陽轉為癩疾

厥成為癩疾 厥氣上逆也

上實
諸仆皆由厥氣
逆上亂于頭顛

厥成爲癩疾 厥氣上逆也

素

帝曰人生而有病癩疾病名曰何安所得之岐伯曰病

名曰胎病此得之在母腹中時其母有兩大驚氣上而

不下精氣并居欲令子發為癩疾

奇病論

凡癩癩及中冷中寒中暑中濕氣厥尸厥而昏眩倒

仆不省人事者皆由邪氣逆上陽分而亂於頭中也

癩癩者痰邪逆上也中風寒暑濕及氣厥尸厥者亦

風寒濕暑等邪逆上也邪氣逆上則頭中氣亂頭中

氣亂則脉道閉塞孔竅不通故耳不聞声目不識人

而昏眩無知仆倒於地也以其病在頭巔故曰癩疾

治之者或吐痰而就高越之或鎮墜痰而從高抑之

或內消痰邪使氣不逆或隨風寒暑濕之法用輕劑

高者目而越之

散散上焦或針灸頭中脈絡而導其氣皆使頭癩脈道流通孔竅開發而不昏眩也是知癩癩之癩與厥成巔疾眩冒巔疾之巔一疾也五太僕誤分癩巔為二疾獨孫真人始終一之今特冠此氣亂頭巔等經文於癩癩之篇首使人知疾所歸而沒有據也

奇方碧霞丹治五種癩癩疾

方見上下門

世傳暗風天麻南星半夏姜蚕白附子防風各半兩白朮二兩用木瓜一個切去頂取穰納前藥末用原頂覆住麪包蒸熟就搗如泥為丸又用皂角二寸敲細酒半碗浸一宿去渣如散時取前藥四十九丸納口用酒灌下取出痰即愈自省後日服三十粒姜湯下

酒灌下取出痰即愈自省後日服三十粒姜湯下

羅治癰病心風病 皂角 五錠 右槌破瀝汁熬如稀糊攤

帟上曝干取兩葉如小錢大用溫漿浸洗去帟注於

兩鼻孔各一規壳許須更涎下咬筋瀝盡涎後服藥

祛痰丸 代赭石 一兩生白礬 二兩生 右為細末稀麵

為丸如梧子大每服三十丸冷水送下不拘時

仲風引湯治癰疾瘰癧 方見寒熱條

無擇礬丹治五癩百癰無問陰陽冷熱

礬丹 晉丸

右用博鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安丸在

上以白炭五斤煨令炭盡取出細研以不經水猪心

血為丸如菜豆大每服十丸至二十丸橘皮湯下

高者抑之行三

世傳治暗風遠年日久不愈皆可服

蛇黃 廣南道地者不計多少

右火煨醋淬七次為細末每服二錢溫酒調下年深者亦治

羅參朱丸治風癩大有神效

人參

蛤粉

朱砂

右為末雜豬心血為丸桐子大每服三十丸金銀水下食遠

神應丹治諸癩

好辰砂 不以多少

右細末用猪心血和之得所以蒸餅裹蒸熟取出就

熱丸食後臨卧煎人參湯下每服一丸如梧子大有神效

琥珀壽星丸

天南星

一斤撥坑二尺深用木炭五斤煨熟紅取
出炭掃淨用好酒一升泼之將南星趁熱

下坑用盆蓋訖泥壅合過
一宿取出再焙干為末

琥珀

四兩取末

朱砂

二兩一半為末

猪心三个取血另打生姜麩糊攪令熟作稠粘將心

血入就上藥末丸如梧子大每服五十九丸薑人參湯

空心送下日進三服



世蜜陀僧散治暗風取蜜陀僧成塊者以鉄線密纏又用

鉄線懸掛火煨紅用酒醋一升淬尽出火毒研極細每

一錢射香酒調下

治癰疾凌霄花一味為細末每三合空心酒調服每服

藥時以木梳不住手梳其髮又用冷水一碗逐口含之

内消痰涎便
不遂上

水温即换水盡位梳如此四十九日永絕其根按此法使頭巖

氣血升降流通不
寧邪氣搏結也

楊氏家藏五癩丸治癩癧發作不問新久並宜服之

天南星 炮一兩 烏蛇肉 酒浸一宿去皮
骨焙干研一兩 朱砂 二分半
另研

全蝎 二枚去毒炒 半夏 二兩陽洗
七次焙干 雄苗 一名半另研

蜈蚣 半条去頭足炒 白姜蚕 一兩半
炒去綠 射香 三分另研

白朮 一兩 白附子 半兩炮 皂角 四兩搥碎水半升揉汁
將汁与白朮一同熬干研

右為末姜汁煮麴丸如梧子大每服三十丸姜湯下

丹治癩疾

川芎 二兩 防風 猪牙皂角 礬金 明允

黃脚赤脚蜈蚣 各一條

黃脚赤脚蜈蚣 各一條

羅治癩病心風病
右細末蒸餅丸梧子大空心茶清下十五丸一月除根

天南星

右以九蒸九曝天南星為末生姜汁打糊為丸如梧
子大每服二十丸並人參湯下麥門冬菖蒲湯下亦得

春脉者肝也春脉太過為病在外令人善怒忽

眩冒而巔疾

全文見治法。脉来絃實而強為太過

歲木太過甚則忽忽善怒眩冒而癩疾

全文見運氣類註

丹延捨夫人癩通聖散二分半姜三片並下犀角丸三十

粒犀角丸見後條

保防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃

芒硝 連翹 薄荷 麻黃不去節 各半兩 石膏

桔梗 黃芩各兩 白朮 山梔 荆芥穗各二分半

滑石三兩 甘草二兩

右為粗末每服一兩生姜同煎溫服日再服

勞汗當風汗出為鼓鬱乃瘕勞汗出於玄府脂液兩凝

去芒硝倍加芍藥當歸散玄府之風當調其榮衛

俗云風刺或生癭癰或赤或白倍加麻黃鹽豉葱白出

其汗麻黃去節亦去芒硝鹹走血而內凝故不用之發汗

罷依前方中加四物湯黃連解毒三藥而飲連日一服

故內經以苦茂之謂也 在肌表連內也

故內經以苦茂之謂熱在肌表連內也

小便淋瀝去麻黃加滑石連翹並葉湯調木香一各七
麻黃主表不主於裏故去之

腰脇痛走注疼痛者加硝石當歸甘草一服各二各調
車前子末海金沙末各一各內經曰腰者腎之府

破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以下之無散
之汗下後通利氣血祛逐風邪每一兩加荆芥穗大黃

各二各調全蝎末一各羌活末一各

諸風潮搐小兒急慢驚風大便秘結邪熱暴甚腸胃乾
燥寐汗咬牙上竄睡語筋轉驚悸肌肉蠕動每一兩加
大黃二各梔子二各調茯苓末二各

如肌肉蠕動調羌活末一各經曰肌肉蠕動命曰微冷

風傷於肺咳喘急每一兩加半夏桔梗紫苑各二份
如打撲傷損支節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸
大黃各三份半調沒藥乳香末各二份

鮮利四時傷寒內外所傷每各一兩加益原散一兩芫
白十莖鹽豉一合生姜半片水一椀同煮至五七沸或
為一小椀溫冷服一半以筋投之即吐、罷後服一半
稍熱服汗出立解

如飲酒中風身熱頭痛如破者加黃連鬚二份芫白十
莖依法立愈臍旁用桂枝麻黃湯解之

頭旋腦熱鼻塞濁涕時下每一兩加黃連薄荷各二份
半內經曰膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不

半内經曰膽液不... 則辛... 鼻淵者... 下不

已也王註曰膽液不... 澄則為濁涕不已如水泉者故

曰鼻淵也此為足太陽脈與陽明脈俱盛也如氣逆者

木香末一分

素心脈滿大癰瘰筋攣

大奇論。王註云熱氣內薄筋乾血涸故癰瘰筋攣

仲景風引湯除熱癰瘰又治大人風引少小驚癰瘰瘖亦

日數十發醫所不療又治脚氣

大黃

龍骨

乾姜 各四兩

桂枝 三兩

甘草

牡礪 各二兩

寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

紫石英

石膏 各六兩

右十二味杵篩篩以葦囊盛之取三指撮井花水三

升煮三沸溫服一升

海藏云治風熱瘖瘖食後量多少溫呷之不用滓無不効也

寒熱
脈滿大為熱

河間犀角丸治風癩癩發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末半兩

赤石脂

三兩

朴硝二兩

白姜蚕一兩

薄荷葉一兩

右為末麵糊為丸如梧子大每服二十九至三十九
溫水下日三服不拘時候如覺痰多即減丸數忌油膩物也

龍腦安神丸治男子婦人五積癩癩無問遠年近日發

作善時

茯神

去皮取末一兩

人參玄芦

地骨皮

甘草各二兩

麥門冬

去心二兩

龍腦三兩另研

牛黃

半兩另研

朱砂

三兩

麥門冬去心
龍腦另研
牛黃另研
朱砂另研

素白皮 二兩
馬牙硝 二兩 另研
麝香 三兩 另研

烏犀末 二兩
金箔 十五片

右十三味為細末煉蜜為丸彈子大金箔為衣冬月

溫水化下夏月涼水又治虛勞發熱咳嗽語澁舌強

日進三服

素肝脈小急癰瘕筋挛 大奇論。王註云肝養筋內藏血肝氣受寒故癰瘕筋挛脈小急者寒也

二陰急為癰厥 全上

肺脈急甚為癰疾 全文見治虛實法

腎脈急甚為骨巔疾

羅沉香天麻湯治癰瘕筋挛 方見小兒門

珠子辰砂丹治風癰久不愈者

脈小急為寒

薯蓣

人參

遠志

防風

紫石英

茯神

虎骨

虎睛

龍腦

五味子

石菖蒲

丹參

細辛

珠子末

各二
分半

右件為細末水打麵糊為丸如梧子大用朱砂二分

研細為衣每服三十五丸煎金箔湯送下日進三服

忌魚肉濕麵動風之物

烏龍丸治五風癰病

川烏頭

草烏

天仙子

五靈脂

各二
兩

烏豆

右為細末滴水和丸如梧子每服五七丸溫水下如

中風加附子半兩

子和昔項開完顏氏病風搗先右臂并右足約搗六七十

實
子如昔頃開完顏氏病冷搐先右臂并左足約搐六七十

數良久左臂并左足亦搐鼻六七十數不差兩目直
視昏瞶不識人幾月余求治於予先涌其寒痰三四
升次用導水禹功散泄二十余行次服通聖散辛涼
之劑不數日而差

羅法者草麻子治諸癩病不同年深日近

草麻子

去皮取仁二兩

黃連

去須剉如豆大一兩

右件用銀器水一大碗慢火熬水盡即添水熬三日
兩夜為度取出只用草麻子仁封乾不得見日用竹
刀將草麻子每枚切作四段計草麻子五粒二十段
作一服用京芥湯食後溫服

丹一婦人四十五歲生子多觸胎室時有腹痛每夜喜飲

虛

酒三盃即睡其夫性暴而諧謔所以借酒而解怒忽九
月望後癩病大作目上視揚手擲足甚強健拳体大筋
皆動掣喉響如鋸涎沫流口兩角如此一時辰許証皆
靜狀如熟寢全不知人半時許小腹漸痛漸上至心痛
大作汗如雨自頭至乳而止如此半時許痛漸減汗亦
收作時却自言其痛其餘言語皆謬誤問亦不荅亦不
知人痛定又熟寢如前癩其痛間作晝夜不息經兩宿
方召子脈之痛作時脈四至半似弦非弦左弱於右予
未敢與藥候癩作時再看形脈癩作時六脈皆隱但有
大筋轉指下眼白青而面不青手之動三倍於足予問
痛乍時必欲重按此癩作時汗必不出其夫曰果然予

痛多時必欲重按此癰作時汗必不出其夫日果然予

曰也非死証善尚能嚔藥則易治試以調香子附末灌
之適癰勢稍定却嚔得半盞令急燒竹瀝末乾時痛大
作予以肝有怒邪目血少而氣獨行所以脾受刑肺胃
之間舊有酒痰為肝氣所侮鬱而為痛然酒性喜動可
以出入升降之內則痛出外則癰當乘其入內之時急
為點大敦行間中皖三處令少頭同時下火灸之足上
艾火少灸先了腹上之痛漸下至腰而止熱寐少時癰
作似前証減半急以竹瀝入少姜汁灌下大半鍾灌時
適值癰定熱寐如前自是不復省人事一晝二夜衆皆
矣予曉之曰身不發熱目痛則汗出大便不通者五
七日自予之來亦未見其小水非死非寐當以血少無

神而昏耳予為痛檢人中幾斷而呻吟急以人參湯因
竹瀝灌之又昏睡如前予教以作人參白朮膏以竹瀝
調下如此二晝夜凡用人參一斤白朮二斤眼忽能開
手能舉自能胸膈滿悶問仍不荅目開亦未知人又如
前竹瀝下人參膏一晝夜忽自言胸膈滿而舉身皆痛
其目仍未為見忽自溺床甚多予聞之甚喜且得痼疾
痛皆不作但教令煎陳皮芍藥甘草川芎湯調參朮膏
加竹瀝飲之予欲往他處且其脈之聞其作聲予自知
謬拙不教以粥藥間之急令作稀粥與之止嘔得三四
匙禁牙不受予遂以木楔斡開以稀粥搗碎入菜湯與
竹瀝同灌燕一大鍾蓋是粥多而菜居三之一予遂出

竹瀝同蘆燕一大鍾蓋是粥多而菜居三之一予遂出門教令粥菜相間與之子在二十里外未申間天大風作予料此婦癩必作馳往視之癩不作而痛作脈去來無次急為灸然谷太衝巨關灸罷痛定問其要粥否曰我正飢其夫飲之以粥噉兩鍾予又往他處仍教以藥湯調參朮膏竹瀝與粥間與之如前至第二夜半時召予甚急往視之癩病大作奪手不能診脈令人扶定兩肘予捉其中指強而脈之四至半粗大有力左右同而右少緩口妄言而無次又怒罵人眼上視不瞬而欲歐擊又欲起走其狀差有所憑然予捉定兩手為灸兩大指背半甲半肉者三壯怒狀稍殺求覓索粥視之耳目仍未有聞見昏寐至夜半狂怒大作且言鬼恠之事而

師巫至大罵巫者予靜思氣目血虛亦從而虛邪目虛
一理或有之且與補藥血氣差克邪當自退仍與前藥
又恐痰頑佐以荆瀝又以秦丞相灸鬼法灸之哀告我
自去遂昏睡一晝夜忽自起坐索粥甚夫與之方問夫
你面垢如許恠床上有香氣繼又無所知識惟開眼不
睡手足雖能運動却又尋摸態如此又二晝夜但粥食
稍加又溺床多如前予益喜仍守前藥又往他處次日
晚忽來召予急往視之病人自言渾身皆痛脈之皆五
至左右均面和問參朮膏俱盡遂教令就於前藥中參
朮並去荆瀝加香附末與一服覺甚快予且令守此藥
至次夜半時來告急日前痛又作往視之坐桶上叫聲

至次夜半時來告急曰前痛又作往視之坐桶上呻声甚高予怒之此虛病亦多汗腸燥而糞難耳痛當在小腹此腰急姑琥珀膏大者貼小腹仍教以熱手摩腰臂間連得下氣而痛減就睡少時又起如是者五六次一鑿者勸令用通利藥予曰痛甚死孰為輕重且堅忍至夜半後當自通又往它處至四更來告急往視之痛大作予令坐溫湯中當自下換湯痛定覺甚快第二桶湯下結糞二塊就睡天明予又往它處至晚又告急予視痛大作連及兩脇手不可近予忽之此痛無因若結糞未盡痛當在下多痛在上必因食多問之果然鑿者欲用感應丸予教勿與藥病者力索藥遂以香附末令舐之至夜半痛漸減至天明覺飢索粥予曰非飢也乃

濕痰
久癩為痰積

嘈耳勿與而自安其家又自與粥至辰已問予往它處
至晚痛又作而痛者索香附末不已遂以湯調半碗與
之探令吐猶有宿食痛遂止予又往它處至夜半又告
痛復作詢之以醋拌蘿蔔苗吃粥又以香附末探吐之
痛定教令一晝夜勿與食次日少與淡粥覺飢時下陳
皮湯下白朮丸如此調理自安

痰癩癩治法並見上實條

古治風癩病久不能愈者從厚朴丸里春秋加添外又
於每一料中加

人參

菖蒲

茯神

各一两半

右依厚朴丸春秋加添法和劑服餌 厚朴丸方見半

右依厚朴丸春秋加添法利服解厚朴丸方是也

陰陽

晝發屬陽

躄

夜發屬陰躄

恒升陽湯治陽躄疔是太陽下行宜升湯氣

麻黃

八分不去節

羌活

一兩半

防風根八分

炙甘草

半兩

右吹咀每服秤三分水五大盞煮至一盞去查稍熱

服宿食消盡腹中窒服之後避冷一兩時辰乃効

索古晝發治陽躄申脈二穴在足外踝下陷中容爪甲白

肉際是也夜發治陰躄照海二穴在足內踝下陷中是

也先灸兩躄各二七壯然後服前藥

千金治風癩百麻病麻人四升水七升猛火煮令牙生去

滓煎取七合旦空心服或發或不發或多狂語勿恠之

但人摩手足頃定風允進二劑愈

雜方

狐肝一具 烏鴉一隻 鴟集一个 白丸一两

生犀角 末一两 野狸 一个用新瓦罐 一个去腸肚不用皮 毛裝在罐内 泥淨用炭灸 黃色

右為末用酒打麵糊為丸如皂子大朱砂為衣每服

一丸温酒送下不拘時候

湯氏蝎虎治癩法見小兒驚癩妙

針灸上

不樂頭痛目

赤煩心取手太

陽陽明太陰

靈暴寧癩眩足不任身取天柱 寒熱篇○五亂篇云氣亂

仆取之天柱大抒不知取

癩疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚作極已而煩心

候之于顏取手太陽陽明太陰血變而止癩狂篇○痛

視千金作直視甚作千金作甚作

癩疾始作而引口啼呼喘悸者候之手陽明太陽左強

引口啼呼取 手陽明太陽

手陽明太陽

癩疾始作而引口啼呼吸喘者候之手陽明太陽左強

反僵脊痛水

足太陽陽明

太陰手太陽

針灸下

者攻其右右強攻其左血變而止 全上

癩疾始作先反疆目而脊痛候之足太陽陽明太陰手

太陽血變而止 全上

五龍治癩 凡灸癩必先下之乃可灸不然則氣逼不通能殺人針不拘

雄尾 非高手不可多此多則令人健忘

神門

通玄治癩

後谿

集成治癩

雄尾 湧泉 心輸 漸

素君治癩

陽交 三里

又法治癰

後谿 太冲 間使

摘英治風癰熱病心風驚癰

上腕 三里

素君天吊

巨關三寸 百會顙門

東陽治癰

平旦發者足少陽 晨朝發者足厥陰

日中發者足太陽 黃昏發者足太陰

人定後者足陽明 半夜發者足少陰

心癰面赤心下熱短氣喘息

心癆面赤心下熱短氣喘息

巨缺 灸三壯

肝癆面青反視手足搖動

丘墟 三壯 中封 三壯

脾癆面黃腹大喜癩

胃腕并腕旁一寸各三壯

冲陽隱白

肺癆面白口唾沫

肺俞少商商陽各三壯

腎癆面黑正直視身不搖如尸厥

金戶必海至陰湧泉 各灸三壯

萑癆目及四支不舉

風府 二七壯 刺一分 百會人中承漿 各隨年壯

腸痾都無動靜如尸厥狀

承山湧泉勞宮鑿目

各隨年壯刺一分

馬痾張口搖頭馬鳴欲反折

胃府三壯刺一分神關

牛痾目直視腹滿

雄尾尖三壯刺大椎三壯刺

猪痾吐濁沫口動搖

浮白三壯刺一分

羊痾揚目吐舌

大椎三壯刺五分

大痾手屈拳攣

勞宮 一壯刺 一分

絲竹助戶 各一壯

雞癩搖頭反折喜驚月搖

至陰寰陰厲兌 各灸三壯刺一分

手陽明穴

甲癩疾多言耳鳴口僻頰腫實則聲齟啖痺不能言齒痛

鼻鼽衄虛則痺膈偏歷主之

癩疾吐舌鼓頷在言見愚溫晉主之 腕後五寸

癩疾吐舌曲池主之

癩疾互引僵仆申脈主之先取陰蹻後取京骨頭上行

癩疾狂妄行振寒京骨主之

身痛狂善行癩疾束骨主之補諸

癩疾僵仆轉筋僕參主之

足太陽穴

癩疾目瞠數衄崑崙主之

狂癩疾体痛飛揚主之

癩疾反折委中主之

癩疾憎風時振寒不得言得寒益甚身熱狂欲自杀目

反妄見癩癱泣出死不知人肺俞主之

癩狂鬲俞及肝膈主之

癩疾僵仆目妄見恍惚不樂在走癩癱絡都主之

癩狂互引天柱主之

癩狂互引反折戴眼及眩狂不得卧意中煩擗竹主之

癩疾厥寒熱大煩滿悲泣出詳谿主之

癩病互引口喎喘悸者人迎主之及陽明太陰後手足變

足太陰穴
任督脉穴

血而止

癩疾狂多食善咲不為於外煩心渴商丘主之

癩疾嘔沫神庭及兌端承漿主之其不嘔沫本神及百

會後項王枕天冲大抒曲骨尺澤陽谿外立當上脘

傍五分通谷金門承筋合湯主之委中下二寸合湯

癩病互引水溝及斷交主之

癩疾上星主之先取諶諶後取天牖風池

癩疾嘔沫暫起僵仆惡見風寒面赤腫臁會主之

癩疾瘰癧狂走頸直項痛後項主之後項在百會後一

寸五分

癩疾狂走瘰癧搖頭口喎戾頸強間主之

癩疾骨痠眩狂癡口禁羊鳴刺腦戶

狂易多言不休及狂走欲自杀目反妄見刺風府

癩疾怒欲杀人身柱主之

千金云癩癢身熱狂走淡語見鬼

狂走癩疾脊急強目轉上插筋膺主之

癩疾散如狂走者面皮厚敦敦不治虛則頭重洞泄癰

痔大小便難腰尻重難居長強主之

手足陽穴

寒厥癩疾禁听癩癢驚狂陽交主之

癩疾太瘦腦空主之

癩疾僵仆狂瘡完骨及風池主之

癩狂癩癢眩仆癩疾瘡不能言羊鳴沫出聽宮主之

癩疾狂煩滿刺絲竹空

癩疾在煩滿刺絲竹空

足厥陰少陰
穴

癩疾吐舌沫出羊鳴戾項天井主之在肘後

癩疾短氣嘔血胸背痛行間主之

癩厥癩疾洞泄然谷主之

右針灸癩法內經但取手足太陽陽明太陰六經而

已今甲乙經等畜又多取替任手足少陽足少陰厥

陰蓋隨証取之然學者當以內經為主也

靈骨癩疾者頰齒諸分肉皆滿而骨居汗出煩慌嘔多沃

沫氣下泄不治

頰齒咸切。骨居汗出千
金作骨倍強直汗出

筋癩疾者身倦事急大刺項大經之大杼脉嘔多沃沫

氣下泄不治

脉癩疾者暴仆四支之脉皆脹而縱脉滿盡刺之出血

不瀦灸之挾項太陽灸帶脈于腰相去三寸謝分肉
本輸嘔灸沃沫氣下泄不治

癩疾者疾發如狂者死不治

治癩疾者與之居察其所當取之處病至視之有過
者寫之置其血于歛壺之中至其發時血獨動矣不
動灸窮骨二十壯窮骨者骹骨也

來疾去徐上實下虛為厥癩疾 全文見治虛實法

素癩疾脈搏大滑久自已脈小堅急死不治 通評虛實論

癩疾脈虛則可治實則死 全上

脈癩疾脈實堅者生脈沉細小者死 此說以內經相及更

子癩

冷熱

子癰

雲岐葛根湯治妊娘臨月目發冷瘕忽悶憤不識人吐逆

眩倒名曰子癰

葛根

貝母

去心

牡丹皮

防已

防風

當歸

川芎

白茯苓

桂心熱

澤瀉

甘草

各二兩

獨活

石膏

人參

各三兩

右欸咀以水九升煮取三升分溫二升貝母令人易

產未臨升麻代之

丹一婦人懷妊六月發癰手足揚直面紫黑色合眼涎出

昏憤不省人事半時而醒鑿其震靈丹五十餘帖其疾

時作時止無減証直至臨產方自食產一女葶中子母

皆安次年其夫疑丹毒必作求治之診其脈浮取絃重

取瀉按至骨則沉寔滯數時正二月日未見其癩發証

狀未敢照藥意其奮年癩發時乃是五月欲待其時度

此疾必作當審諦施治至五月半後其癩疾果作皆是

午已兩時遂散教以自防風通聖散生用甘草加桃仁

多紅花少或或坐至四五疾發漸疎而輕散

而愈

大全治子癩用確砂末酒調下二升詳見胎

癩 勞風 胎前癩 產後癩

癩病者口禁角弓反張者是也

丹 癩大率與癩病相似此癩為虛宜葶多是氣虛有火

魚 痰參竹瀝之類 不用 魚風藥

升溪海養補虛 大法

無擇此証多由亡血筋無所營故邪得以襲之所以傷寒

汗下過多其夫病瘡人及產後致斯病者槩可見矣

丹 一男子二十餘歲患痘瘡醫謝後忽患口禁不用四支

強直不能屈時遠臍腹痛一陣則冷汗如雨痛定則

汗止時作時止其脈極弦緊而急如直弦狀問知此

極勤苦意其目勞倦傷血山居多風寒乘虛而感同

痘瘡其血愈虛當用溫藥養血辛涼散冷遂以當歸

身芍藥為君以芍青皮鈞藤鈞為臣白朮陳皮甘草

為佐桂枝木香黃連為使加以黃芩服至十二帖而安

海神木加羌活麻黃湯治剛瘧解利無汗 神朮方見 傷寒太陽

白朮加桂心黃芪白朮湯治柔瘧解利有汗 白朮方見 傷寒太陽

太陽陽明加川芎

荆芥穗

正陽陽明加羌活

酒大黃

少陽陽明加防風

柴胡根

熱而在表者加黃芩

寒而在表加桂枝黃芩附子

熱而在裏者加大黃

寒而在裏加干姜良姜附子

已上數經寒熱當以脈別之

防風當歸散

防風 當歸

川芎

地黃各一兩

右剉每服一兩水三盞煮至二盞去渣溫服

仲景活人治瘧法並是後表裏陰陽條

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧

瘧音熾 強

仲景活人祛邪
表瘧發熱惡
寒

寒瘧發熱見

無汗惡寒為剛瘧

有汗惡風為柔瘧

瘧強直也。仲景全文見傷寒

太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘧 全上

仲葛根湯治太陽無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得

語欲作剛瘧葛根湯主之 方見傷寒

海藏善發熱無汗反惡寒者名剛瘧宜

麻黃 去節 桂枝 各一兩 甘草 半兩 杏仁 二十五個 去皮尖

獨活 防風 二味各一兩

右剉細每服一兩水三盞煮至一盞半去渣溫服

仲瓜蒌桂枝湯太陽病其証備身體強兀兀然脈沉遲此

為瘧 海藏云治有汗柔瘧

瓜蒌根 二兩 桂枝 三兩 芍藥 三兩 甘草 二兩

生姜 三两 大枣 十二枚

右古味以水九升煮取三升分温三服取微汗汗不

出食顷啜粥散之

海藏著发热有汗而不恶寒者名柔痉

挂枝加川芎防风汤

挂枝

芍药

生姜

三味各一两半

甘草

防风

川芎

各一两

大枣

方枚

右剉细每服一内水三盏益至一盏半去渣温服

活挂枝加葛根汤治柔痉

方见伤寒

九刚柔二痉并可与小续命汤

方见中风门但去查入生姜汁

小续命汤加减法

通治表症

若柔瘧自汗者去麻黃夏間反病有熱者減桂枝一
半冬及初春去黃芩

千金續命湯治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷

或智或疑或身強直不語或生或死狂言不可名狀

不角弓反張或欲得食或不用食或大小便不利皆

瘵之此方通治剛柔二瘵

人參 桂心 當歸 獨活 黃芩

干姜 炮 甘草 炙各七 石膏 一兩 杏仁 半枚

右九味咬咀以水九升煮取三升分溫三服日二覆

取汗無汗者加麻黃

仲瘵為病胸滿口禁卧不省席脚掣急斷齒可與大承氣

裏瘵胸滿
斷齒

湯方見傷寒

子和呂君玉之妻年三十餘病風搐目眩角弓反張亦數
日不食諸醫皆作驚風暗風風痼治之以天南星雄黃
天麻烏附用之殊無少效藪人曰諸冷掉眩皆屬肝木
曲直動搖風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰
不能平木肝木茂而自病自涌風涎二三升次以寒劑
下十餘行又以排針刺百會穴出血二盈立愈
海藏若汗下後不解乍靜乍躁目直視口噤往來寒熱脈

半表半裏
瘧往來寒

熱

弦者少陽風瘧宜柴胡加防風湯

柴胡 二兩 人參 五錢 半夏 制方各 黃芩 五錢

生姜 甘草 各七錢半 防風 一兩 秦 三個

瘧肢不厥為陽

瘧無肢厥為陰
陰瘧無汗

右剉每服一兩水三盞煮至一盞半去渣溫服

若發汗過多發熱頭面搖卒口禁背反張者太陽無陽

明也宜去冷養血防風當降散主之 方見本門大法條

陽瘧並見表裏条仲景雖曰瘧皆身熱足寒然屬陽

者不厥逆

百一治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之

以酒或水六升煮取二升去滓服

千金倉公當歸治賊風口噤角弓反張瘧者方

當歸 各七 防風 各半 獨活 一兩 附子 一个

細辛 半兩 麻黃 一兩二分半

右六味咬咀以酒五升水三升煮取三升服一升口

不開者格口內湯一服當蘇二服小汗三服大汗
活八味白朮散治陰瘧一二日面腫手足厥冷筋脈急汗
不出恐陰氣內傷

白朮

茯苓

五味子各半兩

桂心三分

麻黃半兩

良姜一分

羌活半兩

附子三分

右為末每服四升水一大盞生姜五片同煮至五分
去渣溫服無時

海藏著發熱脈沉而細者附太陰也必腹痛宜

桂枝加芍藥防風湯 又宜小續命湯

桂枝

一兩半

防風

芍藥

各一兩

三兩

生姜

一兩半

大棗

六枚

陰瘧有汗

右剉每服一兩水三盞煎至一盞半去查溫服

活附子散治陰瘧手足厥逆筋脉拘急汗出不止頭項強

再搖頭口噤

桂心 三分 附子 一兩 白朮 二兩 川芎 三分 獨活 半兩

右為末每服三升水一盞棗一個煎至五分溫服

桂心白朮湯治陰瘧手足厥冷筋脉俱急汗出不止

白朮 附風 甘草 桂心

附子 川芎 各等分

右為末每服五升水二盞生薑五片棗二枚同煎至

七分去查溫服

附子防風散治陰瘧閉目合面手足厥逆筋脉拘急汗

出不止

白朮 一兩

防風

甘草 各三分

桂心 半兩

附子 三分

柴胡 一兩半

茯苓 三分

五味子 一兩

干姜 三分

右為末每服三升水二盞生姜四片同煎去渣溫服

藏府

背反張屬太陽

頭低視下屬陽明

半肢搐搦屬少陽

海盜汗太多目致瘧身熱足寒項強惡寒頭熱面赤目脈

頭搖口噤背反張者太陽瘧也

羞頭低視下手足牽引肘膝相構陽明瘧也

羞一目或左或右邪視并一手一足搐搦者少陽瘧也

汗之止之和之下之各隨其經可使必矣

右太陽瘧屬表無汗宜汗之有汗宜止之陽明瘧屬

裏宜下之少陽室屬半表半裏宜和之也可謂各隨

藁風下之少陽室屬半表半裏宜和之也可謂各隨

其經也

目怒得者寫
肝補脾

丹盧婦人目怒手足強直十指如東左脈弦虛右脈弦大
而強稍堅此風木攻風脾土宜速寫肝氣助肺金補
脾土之陰

黃連 二名 南星 一名 白朮 一名 人參 黃芩

天麻 川芎 木通 陳皮 青皮 半名

甘草 一名

右作一帖並取一盞入姜汁令辣再沸熱服

肺移熱於腎傳為柔瘥 全文見 諸病傳變

運氣瘥有三

一曰風經云厥陰在泉客勝則大關節不利內為瘥

肺移熱於腎
運氣

風

濕

寒包熱

雜方

強拘痠外為不便又云諸暴強直皆屬於風是也

二曰濕經云諸瘧項強皆屬於濕王註謂陽內鬱而

陰行於外是也

三曰寒包熱經云火太過曰赫曦赫曦之紀上羽

正微同其病瘧蓋司天之寒束火於中亦陽內鬱陰

行於外是也之意也

世傳治角弓反張用胞衣瓶內水用鵝毛挑抹患人口唇

即愈

肘後治中風身體強直不得屈伸反覆刮栲樹皮細切一

升以酒二升浸一宿每日溫酒服半升酒盡再作

栲樹即狗摘樹按本草栲壳去風濕

診

千金 治口噤手足不隨而身體強直伏龍肝五升以水八

升和攪取汁飲之

仲病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭

動搖卒口噤背反張者瘧病也

語人書云外証發熱惡寒時傷寒相似但

其脈沉遲弦細而項背反張為異也

太陽病發汗太多目致瘧

夫風病下之則瘧欲汗發必拘急

暴腹脹大者為欲解脈如故反伏弦者瘧

夫瘧脈按之緊如弦直上下行

脈經瘧家其脈伏堅直上下

無擇凡瘧脈皆沉伏弦緊

太陽發汗多病下之皆能致瘧脈皆弦堅伏堅

瘧脈沉細或滑

灸瘡目圓

皆難治

禁忌

針灸上

諸瘧先取太陽

督脈

甚者取少陽

仲太陽病發熱沉脈而細者名曰瘧為難治

瘧病有灸瘡難治 即破傷風之類

其目正圓者瘧不治

瘧病善發其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其

汗已其脈如馳

靈風瘧身反折先取足太陽及膈中及血絡出血中有寒

取三里 熱病篇

素太陽所謂強上引背者陽氣大上而爭故強上也 脈解篇

督脈為病脊強反折 骨空論

足少陰之筋循脊內挾脊上至項其病主痲痺及瘧

在外者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不

在外者不能使在內者不能仰故陽病者腰反折不

能促陰病者不能仰治在燔針剗剗以知為數以痛

為輸在內者熨引飲藥此筋折紐紐設甚者死不治

全文見筋門

足太陽之筋上挾脊上項其病腓率脊反折項筋急

云云治在燔針剗剗以知為數以痛為輸全上

甲 瘕脊強反折瘕癰癩疾頭重五處主之

瘕脊強互引惡寒時振慄喉痺大氣滿喘胸中鬱目

熱眩項強寒熱僵仆不能久立煩滿裏急身不安席大

杼主之

瘕反折互引腹脹掖率背中怏怏引脇滿痛內引心中

脊肉肺膈主之又刺陽明從項而數背椎挾脊脊而痛

針灸下
反折取足太
陽督脈

按之應手者刺之尺澤三痛立已

尺澤之上恐有并字

瘧互引身熱譫譫主之

瘧筋痛急互相引肝膈主之

熱瘧脾膈及腎膈主之

熱瘧互引汗不出反折尻臂內痛似痺瘡狀勝脫主之

脊強互引反折汗不出腰膈主之

瘧善喘頭眩項痛煩喘而振寒通谷主之

瘧驚互引脚如結膈如裂束骨主之

瘧目反白多鼻不通和涕黃更衣

一云便去血

京骨主之

瘧脊強頭眩通脚如結膈如裂崑崙主之

眩通骨作眩運

瘧互引反折飛揚主之

瘧互引反折飛揚主之

摘英脊強反折取瘧門立愈

甲瘧反折心痛形氣短尻瀉小便黃閉長強主之

瘧目不胸刺胛戶

瘧取顛會及百會天柱兩膺上關光明主之

瘧互引唇吻強乞端主之書

瘧頰滿斷交主之圖

瘧身反折口噤喉痺不能言三里主之

瘧口噤大迎主之

瘧口噤互相引口乾赤黃或時不禁承漿主之

瘧反目憎冷刺絲竹空

瘧互引善驚天冲主之

口噤及內有寒取足陽明

隨証雜取

瘥而脊強反折京骨主之

瘥先取太谿後取太倉之原

瘥脊強口不可開多唾大便難石闕主之

瘥腹大堅不得急期門主之

瘥脊強裏急腹中切痛水合主之

瘥互引腕骨主之

瘥上氣急際主之

勞風

勞風即瘥之屬蓋古又名為勞風也強上者似角

弓反張也冥視者目開不見物凡瘥病皆目不識

人或反視邪視直視也治法當與瘥同丹谿所謂

考異

勞風即瘥之

屬

人戒反視邪視直視也治法當與胎前產後丹發而謂
瘡比癰為虛者得其耳

素勞風法在肺下其為病也使人強上冥視唾出若涕惡
風而振寒此為勞風之病帝曰治之奈何岐伯曰以
救僂仰巨陽引精者三日中年者五日不精者七日
款出清黃涕共狀若膿大如彈丸從口中若鼻中出
不出則傷肺傷肺則死矣評熱病論

河間芎藭丸治勞風上冥視肺熱上

川芎 枳殼 等分

右蜜丸桐子大每十九丸溫水下食後日三服嘗治一

人強上冥視用川芎枳殼
各三錢煎湯服之一服愈

胎前瘡

雲岐獨活防風湯治妊娠中風角弓反張口禁語澀謂之

風瘧亦名子痲

麻黃去節

防風

獨活

桂心

羚羊角屑

升麻

甘草

酸棗仁

秦艽

各半

川芎

當歸

杏仁制各七外

右咬咀每服四外姜四片竹瀝一合同煎水

防風葛根湯治妊娠中風腰背強直時復反張

防風

葛根

川芎

生地黃各二兩

杏仁制

麻黃

去節各一兩半

桂心

獨活

甘草

防己各一兩

右咬咀每服四外水煎

產後瘧

虛痰

產後瘧

大產後中風瘧口噤而青手足急強者

以竹瀝二升分五服溫溫頻服大效
按丹溪用參竹瀝治瘧於散在宜也

治產後中風瘧遍身冷直口噤不識人

白朮 四兩細切

右以酒三升煮取一升頓服効

無擇大豆紫陽治產後瘧背強口噤

獨活 一兩半 大豆 半升 酒 三升

右先以酒浸獨活並一二沸別炒大豆極焦烟出急

投酒中寧封候冷去豆每服一二合許得少汗則愈

日數十服此湯能去風消血結如姪娘折傷 胎

死腹中服此羹
此方獨活與四物湯各半用之可也

千金雞屎醴治產後中風口噤拘急困篤腰背強直時時

反折

雞屎 三升

大豆 二升

先炒豆令聲絕次炒雞屎令黃以酒一斗先淋雞屎
取汁淋大豆每服一升重者四五服極妙

子母主產後中風困篤或背強口噤或但煩熱若渴或
身頭皆重或身痒極嘔逆直視此皆虛熱中風大豆三
升熬令極熟候無聲共盛以酒五升沃之熱投可得二
升尽服之温覆令出汗出身即產後得依稍
服之以防冷氣又消結血 衍義云口噤加獨活

右大豆虛人之

丹產後風瘧口禁不閉項強血冷頭痛肚熱運悶用愈冷

散食後臨卧温酒調下口禁不受藥者搗鼻亦效方

見瘦瘵門

衍義

產後血暈身瘧直帶眼口角此目外肢向上牽急不

知人取雞子一枚去壳不請以荆芥末二名調服遂

安甚敏捷

右荆芥倒氣虛人忌服

雲岐經効方治產後中風腰背強直時、反張名曰風瘧

防風

甘草

干葛

浙川芎

地黃

各二兩

麻黃

去節

桂心

獨活

羌活

秦芫

防已各四兩

杏仁五十个去皮尖炒

右改咀每服一兩水若有汗者不可服

大全小續命湯治產後剛柔二瘧

右經効方及小續命湯二方治產後瘧必與補氣血

之劑相傳各半服之可也

治產後中風身加角弓反張口噤不語方

川烏

右取黑豆半身同炒半黑以酒三升瀉於鑊內急攪

以絹漚取酒微溫服一小盞取汗差口不開者拘用

灌之未効加烏雞屎一合炒內酒中服之以瘥為度

郭產後變瘧如汗出兩手找不及者不可治也

破傷風

大法

破傷風先頂

付瘡口及擦

牙尊引

本事治破傷風及打撲傷損項強牙關緊急欲死王真散
此方南星有防風制其毒不麻人

天南星

湯炮七次

防風各等分

右細末先以熱小便洗淨瘡口用綿帛拭干以藥糝

瘡口良久渾身痒瘡口出赤黃水是効又以温酒

調下一名如牙緊急角弓反張用藥二名童子小

便調下或曰閉傷相打內有傷損之人以藥二名

温酒調下打傷至死但心頭微温以童子小便調

下二名併三服可救二人性命累効

治打撲傷損腫痛傷風

天南星

半夏

地龍

各等分

右為末用生姜薄荷
汁調帖痛處

千金治破傷風腫厚付杏仁膏燃燭灸之

絲驗治狗咬破傷風以人參不許多少葉柴火燒令烟絕

用盞子合研為末搽在瘡上立効

無擇治破傷濕口禁強直

牡礪

右末付瘡口仍以末二尔並甘草湯調下

孫右廂太保王霸行次踢破脚爪甲目而發寒熱嘔逆

腹中痛悶亂不勝有作傷寒證治者皆不獲愈召孫至

曰此破傷風也不須服藥但以驅風膏貼之毒當化作

清中一日夜其病皆去

驅風膏未詳蓋
玉真散之類也

竹治破傷風欲死者用蜈蚣碾為細末搽牙吐涎沫立甦

餘同傷寒
分表裏用
藥

河間凡破傷中風宜以早令導引按摩自不能者令人以
屈伸按摩挽之以捷筋脉稍得舒緩而氣得通行及
類以麤斡牙開令口遲噤若緊噤之則常以麤斡
當之及頻斡之勿損牙齒免致口噤不開
而粥藥不能下也

潔論曰夫以者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風
苛毒弗能為害也故破傷風者通於表裏分別陰陽同
傷寒証治間間往往有只知發表者不知攻裏和解者
此汗下和三法也亦同傷寒証治有在表者有在裏者
有半表半在裏者在裏宜下在表宜發汗在表裏之間
宜和解然汗下亦不可過其法也又不可妄意處治各

通其藏脉免汗世之非宜也故破傷風者從外至內者
則病也自此卒暴傷損風襲之間傳播經絡致死寒熱
更作身体反張口噤不開甚者邪氣入藏則分汗下之
治諸瘡不差榮衛虛肌肉不生瘡眼不合者風邪亦能
外入于瘡為破傷風之候故諸瘡不差時舉世皆言着
灸為上是為熱瘡而不知火熱客毒逐經諸變不可勝
數微則發熱甚則生風而搐或角弓反張口噤目邪皆
曰瘡鬱結於榮衛不得宣通而生亦有破傷不灸而病
此者瘡有治痂瘡口閉塞氣難通泄故陽熱易於鬱結
而熱甚則生風也故表脉浮而無力者太陽也脉長而
有力者陽明也脉浮而弦小者少陽也太陽宜汗陽明

有力者陽明也脈浮而弦小者少陽也太陽宜汗陽明

脈浮惡寒

伸欠拘急

宜表

初傳在表宜

防風葷

宜下少陽宜和解若明此三法而治不中病者未之有也

河間破傷風邪在表而裏氣尚平者甚証善伸數欠筋脈

拘急或時惡寒或筋惕而搐脈浮數而弦也宜以辛熱

治風之藥開沖結滯榮衛宣通而愈猶傷寒表拂鬱而

以湯之麻黃治類辛熱散者也

紫羌活防風湯治破傷風初傳在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥

甘草

地榆

花細辛

各一兩

右咬咀每服五升水一盞半益至七分去滓熱服不

拘時候量緊慢加減用之熱則加大黃二兩大便秘

則加大黃一兩緩緩令過

次宜蜈蚣
錫開之

防風湯治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜急服此藥

防風 羌活 獨活 川芎 各等分

右咬咀每服五分水一盞半煎至七分去渣溫服三

二服後宜調蜈蚣散大効

蜈蚣散

蜈蚣 一對 鱧 五分 野鶴糞 五分 炒烟為度

右為細末每服一分用防風湯調下此藥裏和可服

至愈但有裏証不可服如前藥不解表不已覺轉入

裏當服左龍丸漸看大便硬軟加巴豆露服之蜈

蚣酒調亦得

無擇治破傷風口禁強直

無擇治破傷風口禁強直

魚膠 燒七分存性

右研細入射香少許無射亦可每服二分酒調下不飲酒米湯下又方用蘇木煎酒下又針刺瘡口一方

用牛皮膠煎服亦此義也

丹破傷風多死血非全竭不用用十介為末酒調日三服

又破傷風血凝心針入肉起走三証如神鵝翎燒灰存性

研細酒調一錢

右魚鱠蜈蚣葷姜共酒及防風湯同服則能發表也

江子大黃同服則能治裏也

玉真散治破傷風項強牙關緊神効 方見前大法條

紫雄黃散治表藥

項強口禁者 宜星半 烏剗痰解表

天南星 二分 半夏 五分 天麻 同上 雄黃 二分半

右為細末每服一分溫酒調下如有涎于此藥中加

大黃為下藥

茂表雄黃散

雄黃 一分

防風 二分

草烏 一分

右件為細末每服一字溫酒調下裏和至食可服裏

不知不可服

濟生治破傷風將欲死者

川烏頭生

天南星 生

天麻

去芦各等分

右為細末每服一錢豆淋酒調下稍溫服次用酒二

盞長之善牙禁幹開灌之但藥得下無不活者

蓋長之若牙禁幹用灌之但藥得下無不活者

羅天麻丸治破傷風

天麻

三分

川烏

三分半
皮生用

草烏

一分

雄黃

一分半

右為細末酒糊為丸如梧子大每服十九溫酒送下

不拘時候

烏梢散治破傷風及洗頭風神效方

烏梢

好酒浸一宿取肉去骨方好

白附子

草烏

實切揀者大白者佳

黑附子

炮去皮劑

川芎

姜蚕

天麻

蝎梢

二分半

麻黃

去節振一兩

右九味并為細末每服抄一匙熱酒調下一日三服

重者三五日見效

千金從高墜下頭破腦出血中風口噤豆一升熬去腥勿

甚則目瞪不
識人者宜吐

使大熟杵末蒸之氣遍令甌下盆中以酒一升淋
之温服一升覆取汗付膏瘡上

山居用桑條尺許者十數根火上炙取汁熱酒調下

羅朱砂丸治破傷風目瞪口噤不語手足搐搦項筋強直

不能轉側者則不識人

朱砂研

半夏洗

川烏各一兩

雄黃五分

鳳凰臺

三分

射香

一字

右為細末棗肉為丸如梧子大每服一丸或二丸冷

水下以吐為度如不吐加一丸或吐不佳非恠並蒸

白湯止之汗出為効温酒亦得

紫白朮湯治破傷風大汗不止筋挛搐搦

白朮

葛根各一兩

升麻

黃芩各半兩

紫白木湯治破傷風大汗不止筋牽搐搦

白木 葛根 各一兩
升麻 黃芩 各半兩

芍藥 二兩
甘草 二兩半

右咬咀每服一兩水一盞半煮至一盞去渣溫服不拘

時候

白木防風湯若服前藥之過有自汗者宜服此藥

白木 一兩
防風 二兩
黃芩 一兩

右咬咀每服五七錢水一盞半煮至一盞去渣溫服

不拘時候此治破傷風藏府和而有自汗可用此藥

善藏府秘小便赤自汗不止者宜用治裏証芎黃湯

下之

河間破傷風裏勢已甚而舌強口噤項背反張驚惕搐搦

脈洪便赤府

閉腹滿汗出
宜裏

涎唾稠粘胸腹滿塞而或便溺秘結或時汗出脈洪
數而弦也然汗出者由風熱鬱甚于裏而表熱稍罷
則腠理踈泄而心火熱甚故汗出也筋被火燥故筋
勁急而口噤兩風熱加之惕而搐風熱燥并鬱甚于
裏故煩滿而或閉結也法宜除風散結寒藥下之以
使鬱滯流通雨而後以退風熱開結滯之寒藥調之
而熱退結散則風自愈矣猶陽明証熱甚于裏而日
晡潮熱大汗能出熱不退而以大承氣湯下其裏之
熱也

潔
芎黃湯治破傷冷厥府秘小便赤自汗不止者因用熱
藥汗出不休故知無寒也宜速下之先用芎黃湯三二

藥汗出不休故知無寒也宜速下之先用芎黃湯三二

服後用大芎黃湯下之

如無裏証藏府和而自汗者不遲用此可用前表証白朮防風湯類

川芎 一兩

黃芩 方分

甘草 二分

右咬咀每服五匕水一盞半並至七分去渣溫服

不拘時候三服即止再用下藥

大芎黃湯

川芎

五分

羌活

黃芩

大黃

各一兩

右咬咀依前並服宜和為度

左龍丸治直視在裏者

左盤龍

炒五分即野鴿糞也

白姜蚕

炒五分

鰾 炒五分

雄黃 一分

右同為細末燒飲為丸如梧子大每服十五丸溫酒

下如裏証不已當于左龍丸末一半內入巴豆霜半
外燒飯為丸如 梧桐子大每服一丸同左龍丸

一處合服每服藥中加一丸如此漸加至利 為度

利後當服和鮮半表半裏藥

江鰮丸治破傷風驚而後搐藏府秘澁知病在裏可用

江鰮丸下之

江鰮 剉炒
半兩

野鴿糞 炒半兩

雄黃 一分

白姜蚕 半兩

蜈蚣 一對

天麻 一兩

右件為細末又將藥末作三分二分燒飯為丸如桐

子大朱砂為衣後時一分入巴豆霜一分同和亦已

燒飯為丸如桐子大不用朱砂為衣服朱砂為衣丸

二十九 入巴豆霜一分第二服二丸加至利為度再

燒飯為丸如桐子大不用朱砂為衣服朱砂為衣丸

二十九入巴豆霜一丸第二服二丸加至利為度再

服朱砂為衣藥病全止

子和貧家一男子年二十餘病破傷風搐牙關緊急角弓反張矣之室室無人問者時時呻呼予怜其苦以風藥投之口噤不能下乃從兩鼻竅中灌入咽喉約一中腕死中求生其藥皆大黃甘遂牽牛硝石之類良久上涌下泄吐且三四外下一二十行風搐立止支體柔和且已能自起口雖開尚未能言予又以桂枝麻黃湯三兩作一服便啜之汗出周匝如洗不三日而痊

河間破傷風表未已而漸入于裏則病勢漸甚若裏未大甚而脈在肌肉者宜以退風熱開結滯之寒藥調之或

脈弦小頭汗身無汗宜和

發表攻裏
後亦宜和

以微加治風辛熱亦得以意消息不可妄也此猶傷寒

病勢半在表半在裏而以小柴胡湯和解之也

紫地榆防風散治破傷風半風半在表半在裏頭微汗身

無汗不可散汗宜表裏治之
地榆 防風 地丁香 馬齒莧 各等分

右件為細末每服三分溫米飲調下

羌活湯治破傷風發表攻裏後內外風去可常服此湯

緩緩而治不拘時候服之乃治半表半裏也

羌活 菊花 麻黃 川芎 防風

石膏 全胡 黃芩 細辛 甘草

枳殼 白茯苓 蔓荊子 各一兩 薄荷 半兩 吳白芷 半兩

方以阻每服五為水一盞半生薑五片同煎一盞

枳壳 白茯苓 蔓荆子各一兩 薄荷 半兩 吳白芷 半兩

右以咀每服五升水一盞半生姜五片同煎至一盞

去查稍熱服不拘時候日進二服 有汗去麻黃

羌活湯治用利藥大便通利後搐瘥不已者

羌活 獨活 防風 地榆 各一兩

右以咀每服五升水一盞半煎至一盞去查溫服

有熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣

入胃全氣養血為度

養血當歸地黃散

當歸 地黃 芍藥 川芎 藁本

防風 白芷 各一兩 細辛 五升

右以咀依前煎服

虛 日久宜養血

痰

痰心寒熱

丹金瘡中風口噤欲死竹瀝半升煖飲之安 廣利方

破傷風發熱

瓜蒌子 九分 滑石 一分半 南星 蒼朮

赤芍藥 陳皮 炒柏 連 苓

白芷 半分 甘草

右姜一片並服

又二方用竹瀝瓜蒌實輩治破傷風熱痰脈洪者

前方用南星半夏草烏川烏輩則治破傷風寒痰

脈無力者也

脈病瘡腰脊強急瘳癱者皆不可治

羅有四不可治第一頭目青黑色第二額上有汗珠不流

診

第三眼小目睛第四身上有汗如油以四段不可治

第三眼小目睛第四身上有汗如油此四般不可治

瘵瘵

產後瘵瘵

成無已云瘵者筋脉急也瘵者筋脉緩也急者則引而縮緩者則瘵而伸或縮或伸動而不止者名曰瘵瘵俗謂之搐者是也凡癩瘡風瘵破傷風三疾皆能瘵瘵但癩瘡瘵瘵則仆地不省而然風瘵瘵瘵則角弓反張而然破傷風瘵瘵則有瘡口而然故分此三疾為三門然又有不仆倒不角弓反張及無瘡口而瘵瘵者故另立此瘵瘵一門焉

肝脉微濡為瘵瘵筋瘵

全文見診。大奇論云肝脉小急瘵瘵筋瘵是亦肝虛為瘵也

心脉急甚為瘵瘵

全文見治虛實法。經云急者多寒

無血榮灌
筋脉為虛

肝脈溫急而
瘦為肝虛
心脈急而瘦為
心大虛寒

脾脈急而瘦
為脾虛

河間治筋脈相引而急精液少筋脈不榮灌而引急及五

勞七傷小便數腹痛難立如戒建中湯

駱龍吉云腎主精肝主筋心主

脈腎精盛則滋育諸筋榮灌諸脈故筋脈柔和
今腎干精亏筋脈相引而急當滋腎以沃之

人參

炙甘草

官桂

白茯苓

當歸

附子炮

厚朴

姜制各一兩

龍骨

黃芪

麥門冬

去心各三兩

白芍藥

生地黄各四兩

右為末每服三升水一盞半生姜五片棗一枚飭少

許煎至一盞去渣溫服

腎傳之心病筋脈相引而急病名曰癰當此之時可

灸可藥

全生文見

脾脈急甚為癰瘕

全文見虛實法急者多寒

本事原符中一宗人得疾踰年不蓋謁醫于王恩和

脾虛汗乘
瘦

本事原符中一宗人得疾踰年不蓋謁鑿于王恩和繹思
和具脉状云病目驚恐肝藏為邪來乘陽明之經即胃
是也邪盛不畏我者又來乘肺肺緣久病氣弱全無德
受肝凌侮其病時復頭眩瘈瘲搐制心胞伏涎久之則
害脾氣要乎肝氣使歸經則脾不受剋脾為中州土主
四支一体之事脾氣正則土生金金旺則肺安矣今疾
欲作時覺氣上衝者是肺侮肺肺不受侮故有此上衝
肝勝則復受金剋故搐搦也以熱藥治之則愈甚以冷
藥治之則氣以虛肺屬金金為清化便覺藏府不調今
用中和溫藥抑肺補脾漸可安愈今心忪非心忪也胃
之大絡名曰建里絡胸膈及兩乳間虛而有痰則動更

頃時設一陣熱者是其候服下三方一月而愈思和名
鑿寓儀真時人少知者後至都下声名藉甚為鑿官政
和中度黃冠終采築珠侍晨

續斷湯

續斷

杜仲

肉桂

防風

牛膝

白茯苓

細辛

人參

甘草

當歸

白芍藥

各兩

川芎

秦艽

川獨活

熟乾地黄

各三兩

右為細末每服二升水一盞生姜三片棗一枚同煎

至七分空心食前稍熱服

署預丸

署預

人參

沙參

遠志

防風

署預 人參

沙參

遠志

防風

珍珠母

紫石英

研水

茯神

各一兩

虎睛

一對

虎骨

一兩二味 須真者

龍齒

華陰細辛

石菖蒲

五味子

丹參

各一分

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三十九至五十

丸金銀薄苛湯下食後臨卧服

獨活散

川獨活

白朮

白茯苓

葳蕤

秦艽

柏子仁

甘草

各一兩

犀角

川椒

熟干地黄

柏實

白芷

官桂

各半兩

人參

右為細末每服二名水一盞生姜三片棗一枚同煎

至七分不拘時候服

目內翳搗

垣胃風湯治虛風証能食麻木牙關急搗胃中有風獨面

有腫

白芷

二分

升麻

二分

葛根

蒼朮

炙甘草

一分半

柴胡

三分

藜蘆

蔓荊子

羌活

甘柏

三分

當歸身

麻黃

半外不去節者用

草豆蔻

干生姜

二分

素三白散

右剉如麻豆大分二服每服水二盞煎至一盞去滓

熱服食後

汗多亡陽為虛

羅過汗亡陽變証治驗○中山王知府次子薛里年十三

六月十三日暴雨方過池水泛溢目而戲水衣服盡濕

其母責之至晚覺精神昏愊怠惰嗜卧次日頭痛身熱

脚腿沉重一女鑿用和解散散之閉戶塞牖覆以重衾

以致若熱不禁遂散狂言欲去其衾而不能去是夜汗

脚腿沉重一女醫用和解毒散散之開戶塞牖覆以重衾

以致若熱不禁遂發狂言欲去其衾而不能去是夜汗

至四更濕透其衾明日尋衣撮空又以承氣湯下之言

後言語漸不出四支不能收持有時項強手足痠痲搯

急而拿目左視而白睛多口唇肌肉蠕動飲食減形體

羸瘦命予治之具說前由予詳之蓋傷濕而失於過汗

也且人之原氣起於臍下腎間動氣週於身通行百脈

今盛暑之時大發其汗多則亡陽百脈行澁故三焦之

氣不能上榮心肺心火旺而肺氣焦况目驚恐內搖恐

內經云恐則氣下陽主聲陽既亡而聲不出也陽氣者

精則養神柔則養筋又曰奪血無汗奪汗無血今發

汗多血氣俱衰筋無所養其病為痊則項強手足痠痲

搐急而孛目通於肝肝者筋之合筋既燥而無潤故目
左視而白睛多肌肉者脾也脾熱則肌肉蠕動故口唇
動而作經云肉痿者得之濕地也脾熱者肌肉不仁發
為肉痿痿者痿弱無力運動久為不仁陽主於動今氣
欲竭熱音於脾故四肢不用此傷濕過汗而成壞証明
矣當治時之熱益水之原救其逆補上外生發之氣黃
帝針經曰上氣不足推而揚之此之謂也以人參益氣
湯治之內經云熱淫所勝治以甘寒以酸收之人參黃
芪之甘溫補其不足之氣而緩急搐故以為君腎惡燥
急食辛以潤之生甘草甘微寒黃柏苦辛寒以救腎水
而生津液故以為臣當歸辛溫和血脈橘皮苦辛白朮

苦甘炙甘草甘溫益脾胃進飲食肺收急食酸以收

而生津液故以為臣當歸辛溫和血脈補皮苦辛白朮
苦甘炙甘草甘溫益脾胃進飲食肺欬收急食酸以收
之白芍藥之酸微寒以收耗散之氣而補金故以為佐
升麻柴胡苦平上升生發不足之氣故以為使乃從陰
引陽之謂也

人參益氣湯

黃芪 五分

人參

黃柏

白芍

升麻

柴胡 各三分

當歸

炙甘草 二分

白朮 二分

生甘草 二分

陳皮 三分

右剉作一服水二盞半先浸兩時辰並至一盞去渣
熱服果晨食後午食前各一服投之三日後語聲漸
出少能行步四肢柔和食飲漸進至秋而愈

丹獨活湯治風虛昏憤不自覺手足痠癢坐卧不能或散
寒熱血虛不能服散汗葉及中風自汗在宜服之川獨
活羌活人參防風當歸地黃細辛茯神去木半夏桂心
白薇遠志菖蒲去毛川芎各半兩甘草三分咬咀每服
五錢水盞半姜五片煎七分去查無時温服

續命煮散治風氣畜滯心中昏憤四肢無力口眼開動
或時搖擗亡失津液渴欲引飲此能扶榮衛去虛風中
風自汗及產後中風自汗在宜服之

防風 獨活 當歸 人參 細辛

葛根 芍藥 川芎 甘草 熟地黃

半夏 遠志去心 荆芥穗各半兩 桂心七分半

古改咀每服五升水一盞姜三大片煎至七分去查

驚怒激起

風火為實

怒而得者肝

盛宜先救脾

右咬咀每服五升水一盞姜三大片薑至七分去查

溫服不拘時汗多不止者加牡礪一分

海藏愈風散治肝後中風癱瘓

方見產後癱瘓

丹徐道濟子年十七歲五月間同有兩羞愧忿怒而時發

昏兩手搖動如狂狀時作時止發則面紫黑鼻丸能動

左過右右過左有數豎用金箔鎮心丸抱龍丸炒香散

定志丸等藥不効予見其脈微弦六至輕重皆有斷之

曰此內素有溫熱因激起厥陰相火又有時令之火不

合服有麝香之藥况肝病先當救脾土時諸藥多燥血

壞脾土者遂用黃連為君人參為臣酒浸芍藥和自陳

皮為佐生甘草為使生姜一小片煎服八帖而愈

心脉滿大而瘦
為心實熱

河間瘦動也踢跳動瘦火之体也

仲風引湯治風引瘦癡方見癩癩門

經云心脉滿大癩瘦筋挛仲景風引湯治火心熾盛

之瘦癡也

本事治大人小兒驚風退熱取涎中黃散

朱砂一名

射香一字

腦子

喜者三名

水銀

一名依法事治

牛黃一字

狗黃一字

雄黃

半兩

令香

半兩

右為末將前四味末頓一處後四味末攷一處臨時

和勻每服一字或半分薄芎湯入金銀箔同調下如

用取涎入江子二粒去油菜末二錢和勻只可服半

字薄芎茶清調下量大小虛實加減此之用補

脾濕盛瘕

脾病者行善瘕

全文見針灸虛實

丹盛人婦年三十餘歲正月間新產十數日左脚右手發
搐氣喘不得眠面部口鼻黑氣予診其脈浮弦而沉澀
右手為甚予意以為受溫証遂問懷胎時曾大渴思水
否彼云妊娠三個月時嘗喜羹湯茶水遂以黃芩荆芥
木香白朮檳榔滑石陳皮川芎蒼朮甘草芍藥至四服
加桃仁又四服而瀉瀉有声巖府大下視之皆如水晶
塊大者如雞子黃小者如科斗樣十數枚遂搐定喘止
遂於前藥內去荆芥檳榔黃芩滑石加當歸身茯苓共
十餘帖調其血自安

丹酒多風搐

驚氣瘵瘵

白朮 半兩

人參

二名半

甘草

三名

陳皮

蒼朮

天麻

細切 酒浸

白芍

酒浸 一名

防風

川芎

一名半

小便多加五味子為末作丸

子和馬叟年五十九日秋欠稅官杖二十得驚氣成風搐

已三年矣病大微則手足顫掉不能持物食則令人代

哺口目張睽唇舌爵爛抖擻之狀如線牽傀儡每設市

人皆聚觀夜卧發熱衣被盡褰遍身燥痒中熱而反外

寒久欲自盡手不能繩傾產求醫至破其家其病益堅

叟之子邑中旧小吏也以父病訊戴人戴人曰此病甚

易治善隆暑時不過一涌再涌奪則愈矣金以秋寒可

三之如未愈更別刺腧穴必愈以通聖散汗之繼服涌

三之如未愈更別刺胸穴必愈以通聖散汗之繼服通

劑出痰一二升至晚又行五七行其疾小愈待五日再

一涌出痰三四升如雞黃成塊熱如湯然叟以手顫不

能自探妻其代探咽噎腫傷昏憤如醉約一二時許稍

稍省又下數行立覺足輕顫減熱亦不作足亦能步手

能中擲自持匙筋未至三涌病去如濯病後但覺極寒

戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣故宜

以散風導氣之藥和不可以熱劑溫之恐反成化病也

衛氣故當
作衛氣虛

運氣癱瘓有四

一曰風木盛經云木太過曰叢生叢生之紀其動掉

眩巔疾又云歲土不及風乃大行病筋骨繇復肌肉腠

運氣
風木盛

風木虛

火熱

濕土

針灸

酸又云歲水不及濕乃大行木復則病骨併辟肉潤
瘕又云風勝則動是也

二曰風木虛經云木不及曰痿和痿和之紀其病搖
動注恐又云陽明司天燥氣下臨肝氣上從病振掉
鼓慄是也

三曰火熱經云少陽所至為潤瘕又云火平氣曰升
明升明之紀其病潤瘕又云火熱鬱之散瘕瘕骨痛又
云少陽之復驚瘕欬衄目乃潤瘕是也

四曰濕土經云歲土太過濕氣流行甚則病行善瘕
又云太陰之復掉眩瘕尤甚是也

甲
臂瘕引口中惡寒頓腫頰腫引缺盆商陽主之

臂癩引口中惡寒頓腫頰腫引缺盆商陽主之

目不明腕急身熱驚狂蹙癩癩瘕曲池主之

癩瘕口沫出上関主之

風汗出至腰項急不可以左右顧及悅仰肩拖肘瘕目

痛痂亦生在癩瘕頭眩目痛陽谷主之

肺寒熱癩瘕其脉代絶者死

太陽之脉其終也戴眼癩瘕其色白

全文見
診生死

產後癩瘕

海藏愈風湯一名舉卿右拜散治產後惡汗後中風搐搦

荆芥 不以多少

右為細末炒大豆黃卷無以酒沃之去黃卷取汁調

末三五分和滓飲之輕者一服愈重者二服尤重更

加一二服中病即止其効如神氣虛人忌服一方用
薑便調。本事方經云驗產室中皆有之陳選方中
用舉卿古拜二味蓋切脚隱語以秘之也此藥委有
奇効神靈之功大抵產室無風為佳不可衣被帳褥
太煖太煖即汗出汗出則腠理開易於中風便昏冒
記有一婦人產後遮護太密閣內更生火燄久及醒
則昏、如醉不省人事其家驚惶鑿用此藥佐以交
加散祝云服之必睡睡中必以左手搔頭覺必醒
矣良久如其言

大全
交加散治產後中風 方見產後通用門

治產後中風不省人事口吐涎手足瘳瘳

治產後中風不省人事口吐涎手足攣瘳

當歸 荆芥穗 等分

右為細末每服二升水一盞酒少許煎至七分灌之

如牙關緊急用匙斡微灌下但下咽即有生理屢効

保治產後經適斷感異証手足牽搐咬牙昏冒者宜服增

損柴胡湯

柴胡 八錢 黃芩 四兩 人參 半夏 各三升 石膏 四升

知母 二升 黃芪 五升 甘草 炙

右為簾末每服半兩姜五片棗四枚水一盞半煎

至一盞溫服無時

前証已去次與秦芫湯去其風邪

秦芫 八升 人參 三升 防風 四升半 柴胡 八升 黃芩 四升半

其

半夏三分 甘草炙 芍藥半兩

右每服五七分，水一盞，煎至七分，溫服，無時，二三日經水復行，前証退，宜與荆芥散，小柴胡小料中加荆芥五分，炒同小柴胡，煎服，二三日後，宜正脾胃之氣，無除邪風，宜服後藥。

防風湯

蒼朮四兩

防風三兩

川芎一兩

羌活一兩半

右粗末，每一兩，於一盞，煎至一半，無時服之。

凡服前藥，宜勿犯胎氣，產後變化，並同傷風寒，無証，並從加減，四物湯。

顛振

虛實

顛振

顛振與瘳瘳相類但瘳瘳則手足牽引而或屈或伸
顛振則但戰戰勤而不屈伸也

虛振經文見針灸條若用則參朮補虛茯苓半夏行
痰飲及本事青鹽丸是也如有實熱積滯顛振者張
氏子和以汗吐下三法治馬叟及仲景藜芦甘草湯
湯之類是也

本事治腎虛及腰膝無力青鹽丸

茴香 三兩
兔絲子末 四兩
干山藥 二兩
青鹽 一兩

右先將兔絲子洗淨無灰酒浸日中晒七日冬天近
火煨之曝干另為末將餘藥為末和勻酒糊丸如梧
子大每服三五丸溫酒或鹽湯下子須常服數年

腎虛腰僂
彛

痰实臂腫体
表 關

壯力進食有一婦人足躄曳曰服此藥久之履地如故
仲病人常以手指臂腫動此人身体關關者藥芦甘草湯主之
本事治中風能言口不喎斜而手足躄曳脉虛浮而數宜
汗而和解星附散

天南星

半夏

二味薄切片
姜汁浸透

黑附子

白附子

川烏

白姜蚕

沒藥

人參

白茯苓各等分

右為麤末每服二合酒各一盞同煎至八分去滓熱
服三二服汗出差頃在桐蘆有人患此証三投此藥
得汗手足能舉

世治手戰用浮萍搗自然汁調酒空心服立効

愈風湯治顛振

方見產後瘦瘵

肝木
風熱

風寒

三目獨活散治氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪使上氣

不守正位致頭招搖手足顫掉漸成目昏

獨活 地骨皮 細辛 芎藭 菊花

防風 去義 甘草炙

右等分為末每服三升水盞半並至一盞去查取六

分清汁入少竹瀝再並食後溫服日二

河間祛風丸治中風偏枯手足戰掉語言蹇澁筋骨痛

川烏頭炮 草烏頭炮 天南星 半夏 藜蘆粉 各二兩

甘草 川芎 藿香葉 地龍 苓苓香

獨活 各三升 白姜蚕 淘米泔浸去絲 川姜 半兩炮

右為末以一兩用藜蘆粉一兩又一法用藥末一兩

愈風湯治顫振 方見產後 瘧疾

白麴二兩滴水為丸如桐子大量人虛實加減細嚼
茶酒下五丸至七丸食後初服三丸漸加
千金金牙酒療積年八風舉身躄曳不得轉側行步跛躓
不能收攝又暴口禁失音言語不正四肢背脊筋急腫
痛流走不常

金牙

碎如米粒用
小絹袋盛

地膚子

無子用莖一
方用飲麻子

乾地黄

菟藿根

附子

防風

細辛各四兩

蜀椒畧

菴草

四兩木也一名
茵草茵音用

羌活

一斤一方
用羌活

右十味以咀盛以絹袋用酒四斗於瓮中漬密閉
頭勿令氣泄春夏三四宿秋冬六七宿酒成去渣日
服一合此酒無毒可小醉常令酒氣相接不盡一劑

病無不愈此酒勝灸諸風痺曳神驗

世傳治痰核苓丸人常著被人抽牽而手戰掉至於盤物

亦不能舉服此藥立愈又治臂痛如神 方見效

海移刺相公神仙保命金丹治男子丹田衰弱五藏虛損

血氣少微肌瘦面塵手足躄掉目視眈眈迎風出泪耳

鳴旋轉筋骨無力春秋發嗽痰喘滿悶腰膝疼痛脚

上癭疹虫雞坐困夜多盜汗四肢怠惰陽事不強直滑

無子息宜服此丹

草烏頭

四兩秋收黑色者去皮同蛤粉炒
黃存性地內埋一宿去火毒焙干

金鈴子

三兩
去皮

破故布

二兩酒
浸一宿

茴香

三兩

右為細末酒糊丸桐子大每服三二十丸空心温酒

運氣

肝盛則眩胃不

泄不痿

肝虛則恐懼注

泄筋痿

針灸

下婦人醋湯下服數日病即効痼寒久痢左宜服。婦人血冷月事不調赤白絕孕面黑焦于髮退不生瘦惡自汗每服三十九丸熱醋湯下久服補虛益男子無凶中卒病此藥性溫無毒保全天壽

運氣神掉有二

一曰木助肝盛經云木太過曰叢生叢生之絕其動掉眩巔疾是也

二曰木虛金制經云木不及曰委和委和之紀其病搖動注恐又云陽明司天燥氣下臨肝氣上從病根掉筋痿不能久立是也

靈黃帝曰人之躄者何氣使然岐伯曰胃不實則諸脉虛

者氣虛則筋脉懈弛筋脉懈弛則行陰用力氣不能復

靈黃帝曰人之解者何氣使然岐伯曰胃不實則諸脉虛

諸脉虛則筋脉懈墮筋脉懈墮則行陰用力氣不能復
故為解曰其所在補分肉間口問篇少陽根於竅陰結
於窞窞窞者耳中也少陽為樞樞折即骨繇而不安
於地故骨繇者取之少陽視有餘不足骨繇者節緩而
不收也所謂骨繇者搖故也當窮其本也繇者搖動也
足少陽根於竅陰潘于丘墟注于陽輔入于天容光明
也。手少陽根于關冲潘于陽池注于支溝入于天牖
外關也。成絡皆當取之

密語手足顛掉

內關灸

合谷灸

癘風

癘風拾遺

風

重者取積取
汗絕味絕色
丹溪洞虛法
度確解忌
嚴

癘者有榮衛熱附其氣不清故使鼻柱壞而色敗

皮膚癘癘風寒客於脈而不去癘風或名寒熱全

文見諸風

脈風成為癘 全文見診

丹大風是受得天地間杀气之風古人謂之癘風者以其

酷烈暴悍可畏耳人得之者頭分在上在下夫在上者

以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天散取惡

物陳虫於穀道中出取出雖有道路之異然皆不外乎

陽明一經治此病者須知此意看其疔瘡與瘡上先見

者上体多者在上也下先見者下体多者在下也上下

同得者在上復在下也陽明胃經與大腸也無物不受

同得者在上復在下也陽明胃經與大腸也無物不受
此風之入人也氣之受則在上多血受之則在下多血
氣傷受者甚多自非鑿者神手病者鉄心罕有免死夫
從上或從下以漸而未皆是可治之病人見其病勢之
緩多恐之雖按此法施治此証已全然脫体若不絕絕
味絕色皆不免再發再發終不救矣某嘗治五人矣中
間惟一婦人以其貧甚無物可吃也餘四人三四年後
皆再發孫真人云吾嘗治四五百人終無一人免於死
非孫真人不能治也蓋無一人能守禁忌耳此一婦人
去病外又是千餘帖加減四物湯半年之上方得月經
行十分安愈

治法在上起者醉仙散在下起者通天再造散

出三方後

用通聖散可用三稜針委中去血不能忌口絕房勞不治
醉仙散

胡麻仁

牛蒡子

蔓荊子

枸杞子各半兩

已上四味同為籬末以紫色為度

白茯苓

苦參

瓜蒌根

防風各半兩

右八味同為細末每一兩半入乾粉二分拌勻大人

用一分空心日午臨卧各一服淡茶下之喫後六七

日間先於齒縫內出臭涎水渾身覺疼昏悶如醉下

臭惡屎為度量大小虛實加減與之証候重急者先

以再造散下之補養得還復與此藥須斷鹽醬醋諸

般魚鱗料果子燒煨炙燻等物止可淡粥反煮

服魚肝油 料果 子燒煨炙燻等物止可淡粥反者
熟時菜亦須淡食茄亦不可吃惟有烏梢蛇菜花蛇
可以淡酒煮熟食之以助藥力

再造散

川大黃

綿紋鉞者一兩

獨生皂角刺

經年黑大者一兩

真鬱金

生者半兩

白牽牛

半炒半生六兩

右末每服二錢臨夜冷酒調下以淨桶戾泄虫如虫
口黑乃是多年虫口赤色乃是近方三數日又進一
服立候無虫則絕根也

三回方服法每服五名日未出面東以無灰酒下
盡量為度晚利黑頭小虫病稍輕者止利如魚腸
臭穢物忌毒半月但食稠粥軟飯漸生眉毛皮膚

如常甚者不過三兩次須將理不可妄有勞動及
終身不得食牛馬騾驢等肉犯者死不赦本事方
名追命散無牽牛用大風油和無灰酒調下蓋三
日再造散本事方追命散潔古二聖散皆大同小
異之方也

丹若脈大而虛者先以蒼耳牛蒡子酒蒸各三兩黃精

浮萍各一兩若參七分半為末酒煮蛇肉如無蛇肉
用烏鯉魚亦可糊丸服之俟脈實却服再造散

宋洞虛云大風有五種黑色者不治餘皆治虫食汗
眉毛落食肺鼻塔食脾声哑食心足底穿膝腫食腎
耳鳴唧唧耳出生瘡或痒或痛如針刺食身則皮痒

耳鳴脚脚耳冷生瘡或痒或痛如針刺食身則皮痒

如虫行自頭面來者為順風自足起者為逆風多目
感寒感熱此雜穢氣而成治之法先用雷鳴散即再
造散每五名重日未出時面東以無灰酒下之當日
必利下惡物或血或膿或異物或臭穢且以稀粥養
半月切勿妄動作輕者自安重者必與換骨散即醉仙
散胡麻苦參同炒防風白蒺藜同炒蔓荊子牛蒡子
同炒瓜蒌根枸杞子同炒大戟炒各三名重淨者為
則各研各包秤起入好輕粉二名半重和勻分作九
服以茶清下早食後不飢不飽時服午食後又照前
一服半夜又一服第二三日如前中間或吐或泄不
用怕怯但腮喉腫頭面腫吞咽不得旋出惡水或牙

間出血絲臭水或言不得或問如死不可飲食但稀
粥以竹管吸入養或一旬半月一月面漸白平安矣
一方無大戟又一方有地骨皮周先生用効又一法
挑枝槐枝桑枝柳枝楮枝濃作湯大缸盛之坐於中
浸至頸一日俟湯如油即効矣本草治惡疾遍身生
瘡濃煎萍汁漬浴半日治暴乾神方也

又方荆芥穗大黃拖子蔚金當歸生干地黃杜仲防
風羌活獨活白茯苓等分細末以大風油入熱蜜為
丸茶清下四五十九一日三服須戒三年日誦觀音
千聲以自解大緊治此病專以氣清血和為上不斷
房則血不能和不茹淡則氣不能清止可粥飯姜鹽

房則血不能和，不加淡則氣不能清，止可漸飲，若益
醬醋亦不可犯。惟蛇用生姜酒煮食之餘皆忌。
發揮曰：癘風之病，因其感異氣深而且久，遠故為難治。
非不治之謂也。往見粗工苟利務求速效，悉佐以大
風油，殊不知大風油性熱，有燥痰之功，而傷血為害
非細。病未愈而先明矣。予治數人，惟兩貧婦人全安。
後有各以四物湯百餘帖而經行，男子六、七人皆以
不斷房不淡茹愈而復死。內一人雖能淡茹，唯食炒
銀杏十數枚亦死。

無擇大風惡疾瘡癩茶毒膿汁淋漓眉髮墮落手足指
脫頑痺痛痒顏色枯痺鼻塌眼爛齒豁唇揭病証之
惡無越於斯。負此病者百無一生，猶且愛志，妻孥復

有名利不仁之行仍欲更作死而無悔深可悲傷凡
遇此疾切須斷絕及一切口味以私事務悉宜屏置
絕不交俗事絕慶吊幽隱林下依法治療非但愈疾
亦能因是而致神仙目禍致福也

秘傳夫大風有三五証一者風水而生二者傳授而得
三者不能調和太熱當風而臥飲酒入水而浴醉後
席地取涼作勞之後渡水登山或大寒之後日事涉水
踏冰以致寒熱往來流注四肢氣脈不通經絡閉塞
不得汗出生成名曰癩癩証又曰癩証又名冷癩夫
大風者有五等肺冷者先落眉毛肝冷者面生紫疱
腎冷者脚指底先痛重則先穿脾冷者遍身如癩心冷

腎風者脚指底先痛重則先穿脾冷遍身如癱心冷
先損其日用藥治須守戒忌識病君子若能相信然
後可治你依我戒我鑿你生若不相依不可治也
大風有五死証一者皮死麻木不仁二者肉死割切
不痛三者血死潰爛成膿四者筋死手指脫落五者
骨死鼻柱匾塌若不早治必見此五者之証更若声
啞目盲不可救矣餘皆可治

大風有十忌一忌胡蘿蔔等菜二忌五辛葱韭胡荽
菜三忌猪羊驢馬牛騾等肉四忌鴉鴨雞鴈兔肉五
忌鯨鮫魚六忌魚頭鮓醬七忌鱧蟹泥鰍八忌豆腐
荳粉九忌油麵炙燻鹽醋十忌酒色服藥之後病將
退減百日之外炒鹽熟菜以助下飯不宜過多大病

之人忌一年為妙受病之人能守禁忌數日之間便見効驗也初服藥之日須擇開日天月二德為佳

通關丸取五歲六府毒氣順行下而出也

雄黃丸去風邪杀虫毒服五日十日便効

驅風散薰洗三次出汗為佳

遇仙丹生眉毛長指甲除爛肉消紫疔通鼻柱明眼目

逐風丸常服除根永無再病

立効散眉毛不生即出

通關丸方

巴豆

三外去油皮

錦紋大黃 一兩

革麻子仁 少許

鼠糞

一兩揀其黑者

黑丑頭末

一兩

左末糊丸如豆大每三十九加至四五十丸五更淡

右末糊丸如豆大每三十九加至四五十丸五更淡
米飲湯下不動再加

雄黃丸

雄黃 一兩

烏梢蛇肉 一兩

白花蛇

酒浸去去皮骨取肉一兩

杏仁 一兩去皮尖白麩同炒黃色去麩

龍腦 一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十九空心茶清

下日二服須細細嚼下

驅風散熏洗隨服雄黃丸

槐花

零零香

苦參

各半斤

茅香

地骨皮

白芷

海桐皮

薄荷葉

何首烏

細辛

麻黃

黃芩

黃柏

羌活

獨活

槐枝

透骨草

黃連

藁本

荆芥各四兩

雄黃

二兩另研細

川芎

四兩

右對分作三次用水三桶煎至七分去渣入浴缸內
上用木架置病人坐定以席圍之以被覆之取熱湯
氣熏之汗出為效湯溫就浴浴了不可見風須密室中
服藥

遇仙丹

大楓子仁

四兩

防風

二兩

烏梢蛇肉

酒浸一兩

胡麻子

五兩水淘淨
煬火炒

白花蛇肉

酒浸一兩

大風油
真者二兩

右為末煉蜜丸一料分作四十九丸每服一丸用茶清
空腹細嚼送下日進四服十分病服十料五分病服

空腹細嚼送下日進四服十分病服十分病服十分病服

五料

逐風丸

赤芍藥

當歸

陳皮

肉桂

木瓜

乾葛

荆芥

細辛

蘇木節

蔓荊子

黑丑

薄荷

何首烏

骨碎補

去尖細切
清油炒

苦參

葶藶仙

木鱉子

藁本

天麻

川芎

羌活

獨活

全蠲

川山甲

二兩半

生地黄

石菖蒲

胡麻子

炒已上廿七
味各二兩

防風

二兩半

紫金皮

四兩

乳香

半兩

木香

半兩

蚕沙

四兩

甘草

半斤

蒼朮

半斤米
甘浸

草烏

半斤

沒藥

二兩半

破故布

一兩

白芷

一兩

右三十八味

為末用皂角一斤炙去皮弦為末熬膏

海藏法簡捷

和前藥末為丸如梧子大每服五十丸食前茶清

飲送下日三次服之

立効散

煎服皂一刺通聖散用散一斤刺四兩
服三二百帖可眉生真隆也

鹿角燒灰 二兩

羊角燒灰 二兩

半夏 少許一分半

右為末生姜自然汁調付眉毛上即生後服大冷子

一斤常服之不可維已上六方皆攻劑恐亦可用
之於那淺陰不虛者

海藏愈風身治癩病手足麻木眉毛脫落遍身生瘡及癩

風癭疹皮膚燥痒搔以成瘡癬冷疾皆主之

苦參

一斤取頭末
細者四兩

皂角

一斤剉一寸許於無灰
酒浸一宿取出不用酒

却出新水一碗那成濃汁去查以
中文武火熬為稀膏

土挑蛇

一條去腸陰干酒浸三日去頭皮尾骨取
淨肉晒干為細末大風用之小証不用

白花蛇 烏梢蛇 各一條 依前酒

潔古疎泄魯
風熱

白花蛇

烏梢蛇

各一條依前酒浸取肉為細末

右將蛇肉末苦參末入膏內和丸桐子大每服六七
十丸空心通聖散送下乾物壓之三日三服三日後浴
之大汗出為度再三日浴之大病不出三浴即安如
病人大府不堅實通聖散可去大黃芒硝

潔治癩風先擇皮散從少至多服五七日後灸承漿穴七

壯灸瘡輕再灸瘡愈後再灸之服三聖散泄熱祛血之

風邪戒房室三年針灸藥止述類象形此治肺風之熱

法也然非止肺藏有之俗去鼻屬肺而病發於肺端而

言之不然如此者既鼻準腫赤脹但為瘡之類乃謂血

隨氣化既氣不施化則血聚矣血既聚使肉腐爛而生

虫也謂厥陰主生五虫厥陰為風木故木生五虫盖三
焦相火熱甚而制金金衰故木來剋侮經曰侮勝也宣
寫火熱利氣之劑虫自不生也法曰流水不腐戶樞不
蠹此之類也故此疾血熱明矣當以藥緩疎泄之煎局
方內升麻湯下錢氏方內瀉青丸餘各隨經言之故病
風者陽氣先受之也

搗皮散治肺歲風毒遍身瘡疥及癩疹癢痒搗之成瘡
又治面風刺及婦人粉刺

搗皮

四兩
燒灰

荆芥穗 二兩

甘草

半兩

枳殼

四兩 去瓤 用炭火燒 欲灰於温帛上 令冷

杏仁

二兩 去皮尖 用水一盞 炒銀器
內熱 熬去水一半 以來 放令乾

杏仁外餘藥為末將杏仁另研合細次用諸

杏仁二兩去皮尖用半水一盞於銀器內熬熟去水

右件除杏子外餘藥為末將杏仁另研令細次用諸藥令勻磁合內收之每服三匙食後溫酒下

二聖散治大風疔疾

大黃半兩切碎 皂角刺二斤燒灰研細

右將大黃煎湯調下皂角灰二匙服之早服樺皮散中煎升麻湯下瀉青丸晚服二聖散此數等之藥皆為緩疎泄血中之風熱也

東垣護甫法

羅

癘風治驗。○戊寅歲正月段庫病癘風滿目連頸極痒眉毛已脫落頭熱水沃之稍緩每晝夜頭數次或砭刺亦緩先師曰夫脈風者是癘風也榮衛熱腐其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚痒潰風寒客於脈而不去名

曰癰疽附之當刺其腫上已以銳針刺其腫處按出其
惡氣腫盡乃止辛溫散之甘溫升之行陽明經寫心火
補肺氣乃正治之也以補氣瀉榮陽

升麻 七分
連翹 七分
蘇木 三分
當歸 三分

黃連 三分
黃芩 四分
甘草 一兩半
黃芪 二分

人參 二分
生地黃 四分
桃仁 三个
桔梗 五分

麝香 少許
梧桐泪 一分
地龍 三分
全蝎 三分

蜜 去翅足
水 經 炒令烟
白芷 二分

右件剉如麻豆大除連翹另研梧桐泪另研白芷

細為末另放麝香蜜水經三味為細末另放外

作一服水二盞入連翹煎至一盞去查再入梧桐泪

白荳蔻仁二味并射香等三味再上火煎至七分稍
熱服早飯後午飯前忌酒麵生冷硬物

換肌散治大風疾年深久不能愈以至面毛墮落鼻梁

崩壞額顙腫破不至踰月取效如神

白花蛇

浸三兩酒一宿

黑烏蛇

浸三兩酒一宿

地龍

去土三兩

當歸

一兩

細辛

一兩

香白芷

一兩

天麻

二兩

蔓荊子

葳靈仙

荊芥穗

甘菊花

昔參

紫參

沙參

木賊

沙苑蒺藜

不灰木

炙甘草

天門冬

赤芍藥

九節菖蒲

定風草

何首烏

胡麻子

炒黃

川芎

草烏頭

去皮

蒼朮

米泔浸

木鼈子

已上各三四

子和表裏魚

改

輕者疎風和血

右同為極細末每服五分七酒調下食後酒多為妙
 子和陽夏張主簿病癩十餘年眉髮皆落皮膚皴澁如樹
 皮戴人斷之曰足有汗者可治之當大發汗其汗出當
 臭其涎當腥乃置煖室中偏塞風隙以三聖散吐之汗
 出周身如卧水中其汗柔粘臭不可聞痰皆腥如魚涎
 兩足心微有汗次以舟車丸濟心散大下五七行如此
 數次乃瘳

丹黃精丸治大風輕者惡瘡重者

蒼耳 浮萍 香粘子 各兩 蛇肉 一兩半 黃精

右為末阿魏半兩醋浸糊丸

癩方

羊草

烏蛇肉

蒼耳

香粘子

浮萍 烏蛇肉 蒼耳 香粘子

右為末等分以豆淋酒調下

羅凌霄散治癩風

蟬殼 七个

地龍 七个炒焙

白僵蚕 七个

凌霄花 半兩

右為細末每服二分熱酒調下不拘時於浴室中常存湯中浴一時許服神效

四聖保命丹

大黃 半兩

黃柏 半斤

苦參

荆芥穗

四兩

蝦蟆 一斤燒灰

右為細末煉蜜為劑分作一百二十九每服一丸溫

酒嚼下食後日進三服忌肉醬

祛風散

大蚕沙

五升篩簸淨水
淘二遍焙干

東行蠶帛

一个焙干為末用白麵四
斤挫蚕以為絡索焙干

每服一二合柏葉湯調下食前日進三服

栢葉湯

東南枝上摘栢葉一秤水一桶煮三沸濾去查窰

盛起旋熬調蚕沙服初服苦澀三五日後甜服十

日四肢沉困便赤白痢服藥一月後發出瘡疔瘡

四十日瘡破後瘡上付藥

烏龍散

倒懸青皮 二兩
烏雞子皮 三兩

用拍油二兩調擦

天麻湯瀉以服之神效

胡麻子 半升另研
天麻 二兩
乳香 七兩半另研

右為細末每服五兩以臘茶調下日進三服十五日

兩腰眼灸十五壯忌動風物

世治將成風証蓋皮光眉未脫者

蒼朮 一兩
苦參 一兩
黍粘子 一兩
紫萍 一兩半

草烏 一兩切片子与烏豆
雜煮去豆用草烏
生地黄 一兩半已上二味
童便酒共煮爛

皂角刺 一兩細切

右為末酒糊丸淡飲食絕房事一人可三斤立愈

治大風累劫苦參四兩酒浸七日漚起晒干為末用酒
浸打糊為丸每服三十九丸空腹用浸酒吞下日二服
服酒盡良愈

聖惠治大風癩疾骨肉殂敗百節疼痠眉鬢墮落身體
習、痒痛以馬先蒿細剉炒為末空心及晚食前溫酒
調下三錢匕

外臺治癩馬先蒿一名馬矢蒿搗末服方寸匕日三服如
更赤起一年 差本草云一名爛石草葉如芫蔚花紅
白色實八九月熟又名虎麻又名馬新蒿

朝野僉載商人有人患大風家人患之山中為起茅屋有
烏蛇墜酒罌中病人不知飲酒漸差罌底尚有蛇骨方

知其由

聖惠治大風病令眉耳再生用側柏葉九蒸九暴搗羅為末煉蜜為丸如梧子大每日三服夜一服熱水下五丸十九百日引生

外臺治惡風疾松脂煉絞冷水中二十遍蜜丸服三兩飢即服之日三鼻柱斷離者二百日差斷鹽及房勞

本事治風毒瘡如大風疾綠靈散用桑葉洗淨熟蒸晒干為末水調二分服日四五無時出經驗

濟生三和湯以四物湯涼而散當歸人中停水煎服世傳治遍身瘡疥及癩風以滾鹽水浴之極妙宋夏太尉

用此良愈

羅如聖散治大風疾洗瘡藥大有神效

頑荆子 苦參 玄參 厚朴 荆芥穗

紫參 陳皮 沙參 麻黃 去節已上 各一兩

蔓荆子 防風 白芷 葳靈仙 各二兩

右為細末用藥三升桃柳枝各一把水五升同煎臨

卧熱洗之忌五辛物

大風奇病

丹治手指攣四節間痛不可忍漸至漸落方口草麻子一

兩去皮黃連一兩剉如莖以小瓶入水一升同浸春

夏三日秋冬五日後取草麻子一枚擘破面東以浸

藥水平旦時一服漸加至四五枚微利不妨瓶中水

以更添忌動冷食累用得効

以夏添忌動心食累用得効

無擇一僧得病狀如白癩卒不成瘡但每旦起白皮一升許如蛇蛻醫者謂多啖炙燻所致此局方解毒雄黃見三四服而愈

聖惠治大風頭面鬚髮脫以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研取漿水解釋灰味住次用熱水入菘豆麩

濯之取淨不過十度良三日一沐頭一日一洗面

針灸上

素病大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉為故汗出百

日刺骨髓汗出百日凡二百日鬚眉生而止 長刺節論

靈癘以者素刺其腫上已刺以銳針針其處按出其惡氣

腫盡乃止常食方食無食他食 四時氣篇

素大風出灸譙譙譙在背下俠脊停三寸所厭之令

大風目外皆痛身熱非缺盆中痛臨泣主之

大風默、不知而痛嗜卧善驚瘦天井主之

千金云悲傷不樂

癘風捨遺

丹溪云大風子治癘風功甚速殊不知其泣熱有燥痰之功而傷血為害非細今刑一二以俟陰弓邪淺之人間用之

世大風子丸治大風不拘年月遠近只手指頭不落為好

大風子二斤

去壳取肉只有八兩取作油只有四兩淨今和肉用

當歸二兩

防風二兩

右先將當歸防風為末然後以大風子肉碎搗打和春千百下自然成塊丸如梧子大眼乾每服四十丸至五十丸病在上食後病在下食前米飲下日三服如未効再服半料如皮肉上有淤血可用碗屑角去毒血二月斷根好忌口两个月只服淡飯一月以瓦

瓶煮不可犯鉄器好後永斷忌猪肉

此方用於感邪
淺者亦以四物湯兼服

浙江圖書館

醫學綱目卷之十一終

醫學綱目卷之十一

肝膽部

醫學綱目卷之十二

肝膽部

諸痺

行痺即走注冷痛

痛痺即痛冷

著痺即麻木不仁

鶴膝風

痺

一身盡痛

產後身痛

冷痺雜合病

素黃帝問曰痺之安生岐伯對曰冷寒濕三氣雜至合而

為痺也

其冷勝者為行痺

行痺者行而不定世秤為走注疼痛及歷節之類是也

寒氣勝者為痛痺

痛痺者疼痛如鍛世稱為痛風及白角惡尸之類是也

濕氣勝者為著痺

著痺者著而不移世稱為麻木不仁之類是也風麻木不仁必有而

不移河間所謂氣之行道路著而麻者得矣或痛自一處始終不移者亦是也帝曰其有五

風寒濕三氣合而為痺
冷勝者為行痺
其痺注走
寒勝者為痛
痺其痺疼痛
濕勝者為著
痺其痺不仁
初感風寒濕
其痺在骨節

脉肌皮之表

表皆不已再

感風寒温腎

肝心脾肺之

裏

五藏痺狀

者何也岐伯曰以冬遇此者為骨痺以春遇此者為

筋痺以夏遇此者為脉痺以至陰遇此者為肌痺以

秋遇此者為皮痺凡風寒温所為行痺痛痺者痺之病冬遇此者為骨痺春遇此者為

筋痺夏遇此者為脉痺長夏遇此者為肌痺秋遇此者為皮痺皆為所遇之時所客之處命名非裔此行

痺痛痺着痺之外又别有骨痺筋痺脉痺肌痺皮痺也帝曰内舍五藏六府何

氣使然岐伯曰五藏皆有合病久而不去者内舍於其

合也故骨痺不已復感於邪内舍於腎筋痺不已復

感於邪内舍於肝脉痺不已復感於邪内舍於心肌

痺不已復感於邪内舍於脾皮痺不已復感於邪内

舍於肺所謂痺者各以其時重感於風寒湿之氣也

凡痺之客五藏者肺痺者煩滿喘而嘔心痺者脉不

通頭則心下鼓暴上氣而喘溢乾善噦厥氣上則恐

凡痺之客五歲者肺痺者煩滿喘而嘔心痺者脈不

通煩則心下鼓暴上氣而喘溢乾善噫厥氣上則恐

肝痺者夜卧則驚多飲數小便上為引如懷腎痺者

善脹死以代踵脊以代頭脾痺者四支解隨發欬

嘔汁上為大塞腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時

發飧泄治見飧泄門胞痺者少腹膀胱按之內痛羞

沃以湯澀於上為清涕治見淋門滯氣喘息痺聚在

肺滯氣憂思痺聚在心滯氣遺溺痺聚在腎滯氣乏

竭痺聚在肝滯氣肌絕痺聚在脾王註云滯氣謂氣之妄行者各隨歲

之所主而諸痺不已亦益肉也其風氣勝者其人易

已也帝曰痺其時有死者或疼久者或易已者其故

何也岐伯曰其入歲者死其留連筋骨間者疼久其

痺入歲死

番筋骨間難

番皮膚間也

六府痺

刺五藏六府
痺大法

番皮膚同易已帝曰其客於六府者何也岐伯曰此亦其食飲居處為其病本也六府亦各有俞風寒濕氣中其俞而食飲應之循俞而入各舍其府也帝曰以針治之奈何岐伯曰五藏有俞六府有合循脈之分各有所散各隨其過則病瘳也

冬藏風寒濕者為骨痺久不已則內入於腎病腎

張弓攣尻以代腫身蹇脊以代頭

取太谿委中

春感風寒濕者為筋痺久而不已則內入於肝病

則則驚多飲數小便

取太冲陽陵泉

夏感風寒濕者為脈痺久而不已則內入於心

戰者其脈必...
骨蒸...
...

夏感風寒濕者為脈痺久不已則內入於心病心
下滿暴喘盜乾善噫善恐懼

取太陵小海

長夏感風寒濕為肉痺久不已則內入於脾病四

肢解隨發欬嘔汁

取太白三里

秋感風寒濕者為皮痺久不已則內入於肺病煩

滿喘嘔

取太淵合谷

帝曰榮衛之氣亦令人痺乎岐伯曰榮者水穀之精氣

也和調於五藏滲陳於六府乃絡入於脈也故循脈上

榮衛不為痺

江圖書

諸痺為病有

寒多則痛

病久則不痛不

仁

陽少陰多則

寒

陰少陽多則

熱

骨脉筋肉皮

痺皆具則不痛

下貫五藏絡六府也衛者水穀之悍氣也其氣慄疾滑

利不能入於脉也故循皮膚之中分肉之間熏於盲膜

散於胸腹逆其氣則病從其氣則愈不逆以寒濕氣合

故不為痺帝曰善痺或痛或不痛或不仁或寒或熱或

燥或濕其故何也岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也

治見痺其不痛不仁者病久入深榮衛之行瀦經絡時疎

故不痛皮膚不榮故為不仁治見其寒者陽氣久陰氣

多其病相益故寒也治見其熱者陽氣多陰

氣少病氣勝陽遭陰故為痺熱其多汗而濡者此其逢

濕其也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也

帝曰夫痺之為病不痛何也岐伯曰痺在於骨則重在

筋則血凝而不流在於筋則屈而不伸在於肉則不

痺皆具則不痛

帝曰夫痺之為病不痛何也岐伯曰痺在於骨則重在

雜方

診

於脉則血凝而不流在於筋則屈而不伸在於肉則不
仁在皮則寒故具此五者則不痛也凡痺也類逢寒則
危逢熱則縱帝曰善 危一作急痺論

河間升麻湯治熱痺肌肉熱極体上如鼠走唇口反縱皮
色變 諸風皆治

升麻 三升 茯神 去皮 人參 防風 犀牛角

羚羊角 鑄 羌活 各一升 官桂 半兩

右為末每服四升水二盞生姜二塊碎竹瀝少許同
煎至一盞温服不計時候

素少陰有餘病皮痺癢疼不足病肺痺。太陰有餘病肉
痺寒中不足病脾痺。陽明有餘病脉痺身時熱不足

諸脈有餘

痺在表

不足痺在

裏

粗理肉不堅

者善病痛

色薄澤為

風濁黑為痺

病心痺。太陽有餘病骨痺身重不足病腎痺。少陽

有餘病筋痺肝腸痛不足病肝痺

四時刺
逆從論

肺脈微大為肺痺引胸皆起惠日光。心脈微大為

心痺引背善痰出大者多氣血。全文見診

靈帝曰何以候人之善病痺者少俞荅曰粗理而肉不堅

者善病痺黃帝曰痺之高下有處乎少俞荅曰欲知高

下者各視其部五變篇

關中薄澤為風冲濁為痺五色篇

浮絡多青則痛黑則痺 全文見皮

絡脈暴黑者留久痺也 全文見陰陽

素脈瀉曰痺 平人氣象論

行痺即走注痲痛

表裏
表寒

行痺即走注疼痛

仲諸肢節疼痛身體魁癭脚腫如脫頭眩短氣温温欲吐
桂枝芍藥知母湯主之

桂枝 四兩 芍藥 三兩 甘草 二兩 麻黃 二兩

生薑 五兩 白朮 五兩 知母 四兩 防風 四兩

附子 二兩炮

右九味以水七升煮取二升温服七合日三服

病歷節不可屈伸疼痛烏頭湯主之

麻黃 芍藥 黃芪 各三兩 甘草 炙

川烏 五枚 以蜜二升煮取一升即出烏頭

右五味以水三升煮取一升去渣內蜜煎

中更並之服七合不知盡服之
河間防風湯治行痺走注無定

防風

甘草

當歸

赤茯苓去皮

杏仁

炒熟

桂

已上各一兩

黃芩

秦艽

葛根各三兩

麻黃

去節

右為粗末每服五升水酒合二盞棗三枚生姜五片
煎至一盞去渣溫服

本事治濕傷腎腎不養肝肝自生風遂生風濕流注四肢
筋骨或入左肩隅肌肉疼痛漸入左指中

薏苡人散

薏苡人一兩當歸

小川芎

乾姜

茵芋

甘草

官桂

川烏

防風

人參

羌活

白朮

麻黃

獨活

各半兩

未

夫卅 薑活 白木

麻黃

獨活 各半兩

右為細末每服二外空心臨卧酒調下日三服

治白痢歷節諸冷疼痛遊走無定狀如虫齒晝靜夜劇

及一切手足疼痛

麝香丸

川烏 大八角者 三个生用

全蠍 二十一个生用

黑豆 二十一个生用

地龍 半兩生

右為細末入射半字同研勻糯米糊為丸如菉豆大

每服七丸甚者十九夜即令藹室温酒下微出冷汗

一身便差○予得此方凡是歷節及不側痰痛一二

服便差在歙川日有一貴家婦人遍身走注疼痛至

甘草

官桂

川烏

防風

人參

表热

夜則設如蚤啣其肌多作鬼邪治予曰此正歷節病

也三服愈歛尸葉切

丹龍虎丹治走注疼痛或麻木不遂或半身疼痛

草烏 蒼朮 白芷 各一兩

右碾為末水拌散熱盪過再入乳香二兩當歸牛膝

各半兩酒糊丸彈子大酒化下

無擇附子八物湯治風歷節四支疼痛如錐燬不可忍

附子 炮去皮 干姜 炮 芍藥 茯苓 半夏 炙

桂心 各三兩 白朮 四兩 人參 三兩

右剉散每服四升水二盞煎至七分去查食前

表丹痛風走注疼痛

黃柏 酒炒二兩 蒼朮 酒炒二兩

表批
表升痛風走注痰痛

黃柏

酒炒二名

蒼朮

酒炒二名

右作一服煎調酒葳靈仙末為君羊角灰為臣蒼

朮為佐芥子為使用姜一片入藥末一名搗碎以前

藥再溫服

垣和血散痛湯治两手十指一指疼子一指疼又腫骨頭

裏疼發時多則五日少則三日晝輕夜重膝痛左膝痛

了右膝痛多則五日少則三日晝輕夜重痛時覺熱行

則痛輕腫却重解云先血後氣乃先痛後腫形傷氣也

羌活身

一名半

升麻身

一名半

麻黃節身

一名半

桃仁

十名

柴胡身

二名

紅花

一名

當歸身

一名

防風

一名

炙甘草

二名

獨活

半名

猪苓

半名

黃柏一斤 防己一斤 酒知母一斤 酒黃連

右以咀分作四服每服水一大盞至一半去滓空

心熱服

羅真定府張大年二十九素好嗜酒至元辛未五月間病
手指節腫痛屈伸不利膝膕亦然心下痞滿身體沉重
不欲飲食即欲吐面色痿黃精神減少至六月來求予
治之診其脈沉而緩緩者脾也難經云膕主體重節痛
膕者脾之所主四支屬脾蓋其人素飲酒加之時助濕
氣大勝流於四支故為腫痛內經云諸濕腫滿皆屬脾
土仲景云濕流關節支體疼煩此之謂也宜以大羌活
湯主之內經曰濕淫于內治以苦濕以苦散之以淡滲

湯主之內然曰濕淫于內治以苦溫以苦散之以淡滲

之又曰風勝濕羌活獨活苦溫透關節而勝濕故以為
君升麻苦平蕨靈仙蒼朮防風苦辛溫散之者也故以
為臣血壅而不流者則痛當歸辛溫以散之甘草甘溫
益氣澤瀉鹹平茯苓甘平導濕而利小便以淡滲之也
氣相合上下分散其濕也

大羌活湯

羌活 獨活 各五分 蒼朮 防風 各五分

蕨靈仙 甘草 茯苓 當歸 澤瀉 各五分

右作劑一服水二盞煎至一盞溫服食前一服食後
一服忌酒麵生冷硬物

本事 麻黃湯治歷節

麻黃 一兩
羌活 一兩
黃芩 三分
細辛 真華陰者

黃芪 各半兩

右為粗末每服五外水二盞煎至八分去渣溫服接

續四三服有汗慎冷

治風熱成歷節攻手指作赤腫麻木甚則攻肩背兩膝

遇暑熱或大便秘即作牛蒡子散

牛蒡子 新豆豉 炒 羌活 各三兩 生地黃 二兩半

黃芪 一兩半

右為細末湯調二外服空心食前日三服此病多胸

膈生痰久則赤腫肘者肢節久久不退遂成癰冷此

孫真人預戒也宜早治之

河間大黃藥散治周痺注五臟留滯胃中結聚益氣出毒

河間大葶藶散治周痺注五藏滯胃中結聚益氣出毒

潤澤皮毛補腎氣

大葶藶 一斤炒香熟

右為末每服半升温酒調下空心加至一升日三服

本草云大葶消痰血破婦人惡血治熱痺筋
挛膝痛古人多用酒沃豆藥取汗蓋表藥也

葛裏痰涎
注作痛

無擇控涎丹凡人忽患胸背手足頰項腰膝隱痛不可忍

連筋骨牽引釣痛坐卧不寧時時走易不定俗鑿不曉

謂之走注便用風藥及針灸皆無益又疑是風毒結聚

欲為癰疽亂以藥帖亦非也此乃是痰涎伏在心膈上

下变为疾或令人頭痛不可舉或神意昏倦多睡或飲

食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸声多沅唾涎手脚重

臍冷痺氣不通誤認為癰癤亦非也凡有此疾但用是藥不過數服其疾如失

甘遂 去心 紫大戟 去皮 白芥子 真者各等分

右為末煮糊丸如梧子大晒干臨卧淡姜湯或熟水下五七丸至十九丸如疾猛氣實加丸數不妨其效如神

千金犀角湯治熱毒流入四肢歷節腫痛方

犀角 二兩 羚羊角 二兩 全胡 黃芩 拖子仁

射干 各三分 大黃 升麻 各四兩 豉 一升

右九味咬咀每服五升水二盞煎服

本草 苜蓿丸治歷節腫滿疼痛

苜蓿 朱砂 薏苡仁 各一兩 牽牛子 一兩半

苜蓿 朱砂 薏苡人各一兩 牽牛子 一兩

郁李仁 半兩

右細末煉蜜杵丸如梧子大輕粉滾為衣每服十丸
至十五丸至二十九五更溫水下到晚未利可二三
服快利為度白粥將息

表裏無施

子和一稅官風寒濕痺腰脚沉重浮腫夜則痛甚兩足惡
寒經五六月間猶綿脛靴是膝皮膚少有跣露則冷冷
襲之流入經絡其病轉劇走注上下往來無定其痛極
處便孳急而腫起肉色不變腠理開如虫行每遇冷冷
病必轉增飲食減肌體瘦乏須人扶稍能行立而服者
烏附姜桂種種燥熱燔針灸莫知其數前後三年不
獲一愈一日命予脈之其兩手皆沉滑有力先以導水

丸通經散各一服是夜瀉三十余行痛減過半漸服赤
茯苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治痺方是
也日三服煎七八分漿漿然汗出余又作玲瓏竈法熏
蒸血熱必增劇諸汗法古方亦多有之惟以吐散汗者
世罕知之故予嘗曰吐法無汗良以此夫

千金治游風行走無定或如盤大或如甌或著腹背或著
臂或著腳悉主之

海藻

茯苓

防風

獨活

附子

白朮各三兩

大黃五兩

鬼箭

當歸各二兩

右九味咬咀以酒二斗漬五日初服二合漸加以知

為度

血
痰挟死血

丹控涎散治身及脇走痛痰挟死血如桃仁泥丸

走泣疼痛

葳灵仙 一分
川芎 七分
槐子仁 炒 一分
当归 一分

桂 一分
苍术 一分
桃仁 七粒
甘草 半斤

生姜五片水煎半乾入童便半盞竹瀝半盞再沸熱

忌肉汁湿麵雞肉

定痛丸治風湿一切痛

乳香
沒藥
地龍 去土
木鱉子 去皮

金星石 五靈脂

右等分蜜丸彈子大每一丸臨卧酒下

外臺治歷節諸風百節酸痛不可忍松脂三十斤煉五十

血湿

遍亦可二十遍用以煉酥三升温和松脂二升熱攪令
極稠旦空腹以酒服方七日二服數日麵粥為佳慎酒
腥生冷鮓物果子百日瘥

松節酒治歷節風四肢疼痛松節二十斤酒五斗漬三

七日服一合日五六服丹溪云松屬金能
滲血中之濕

千金松葉酒治歷節松葉三十斤酒二石五斗漬三七日

服一合日五六度

寒熱

寒走注疼痛治法及熱走注疼痛治法並見表寒

表熱條

濕熱

垣身體沉重走注疼痛濕熱相傳而風熱鬱不得伸附着

于有形也 蒼朮黃柏之類

本條與節手集方治臂脛疼痛不計深淺皆効用虎胫骨二

雜方

李絳兵部手集方治臂胫痛不計深淺皆効用虎胫骨二
大兩簾椿熬黃麝羊角一大兩屑新芍藥二大兩切細
三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每旦空腹飲
一盃冬中速要服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩
日即可服也

經驗治冷毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨一兩炙為末夾絹
袋盛酒三升漬五日每服三合日三散

聖惠治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙
黃槌碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙
靈黃帝問于岐伯曰周痺之在身也上下移徙隨脈其上
下左右相應間不容空頭聞此痛在血脈之中邪將在

針灸上

衆痺走痛或

左或右刺其

處

周痺走痛不

能左右刺其

脈

分肉之間乎何以致是其痛之移也間不及下針其搖

痛之時不及定治而痛已止矣何道使然願聞其故岐

伯蒼曰此衆痺也非用痺也黃帝曰願聞衆痺岐伯對

曰此各在其處更發更止更居更起以右應左以左應

右非能周也更發更休也黃帝曰善此痛安生何因而

有名岐伯對曰陰寒濕氣客於外分肉之間迫切而為

沫沫得寒則聚聚則排分肉而分裂也分裂則痛、則

神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則它痺益

發則如是帝曰善余已得其意矣帝曰善余已得其意矣八字衍文也

此內不藏在外未發于皮獨居分肉之間真氣不能

周故命曰周痺周痺當作衆痺夫周痺邪在血脈衆邪在分肉今云邪獨居分肉之間而命曰

周痺者是衆痺之類也明矣神歸之則熱也

周痺者 是衆痺之誤 為周痺也 明矣 神澤之則熱 熱則

痛解者 所謂更止更居也 痛解則厥厥則定 痺者 所謂

謂更發更起也 自黃帝曰善此痛安生至此 今移於此 一百十四

黃帝曰善刺之 柰何岐伯對曰刺此者痛雖已止必刺

其處勿令復起 帝曰善 急聞周痺如何 岐伯對曰周痺

者在于血脉 之中隨脈已上隨脈已下不能左右

各當其 而黃帝曰刺之 柰何岐伯對曰痛從上下者先

刺其下 以過之後刺其上 以脫之痛從下上者先刺其

上 以過之後刺其下 以脫之故刺痺者必先切循其下

之六經 視其虛實及大絡之血結而不通 及虛而脈陷

空者 而調之 慰而通之 其瘳堅轉引而行之 周痺篇

不通為實脈 陷空為虛 大絡血結

久而入府者
刺其俞合
針灸上

按繆刺論云凡痺往來往無常處者在分肉之間痛而刺之以月死生為數用針者隨氣盛衰以為痛數針過其日數則脫氣不及日數則氣不瀉左刺右右刺左病已止不已復刺之如法月生一日一痛二日二痛漸多之十五日十五痛十六日十四痛漸少之詳此亦刺衆痺於所痛之處法當與前衆痺法相參用之刺五歲亡府痺法見諸痺

千金治歷節但於痛處多三壯佳

怪穴白虎歷節風痛

兩踝尖 在內外兩踝尖灸

渾身疼痛往來上下無常

渾身疼痛往來上下無常

陽輔

如足跟方得履地風池 寸半

如膝蓋腫起曲池 寸半

陽陵泉 寸半

心術婦人四旬曰小產後成病百節痛無常處卧床不起

八字 五分

環跳 四寸半

五樞 三寸半

曲池腋門 各寸半

絕骨 二寸半

如脊背疼者人中太推節下各五分

委中

七分見血立刻

無擇附骨疽與白布飛尸歷節皆相類歷節則走注不定

白布飛尸痛淺按之則便附骨疽痛探按之無益又一

說白布飛尸亦能作膿着骨而生及其腐潰碎骨出盡

方愈如是則附骨疽與白虎飛尸是一病但淺深不同耳

診

歷節痛風皆附

骨疽相類皆

能作膿

歷節脈弱
而澁

仲寸口脈沉而弱沉即主骨弱即主筋沉即為腎弱即為
肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故曰歷節
少陰脈浮而弱弱則血不足浮則為風風血相搏則疼
痛如掣盛人脈滿小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此
皆飲酒汗出當風所致

痛痺即痛風

圖

大法

痛風目血先
受熱後感寒
而血汚作痛

丹痛風論。氣行脈外血行脈內晝行陽二十五度夜行
陰二十五度此平人之造化也得寒則行遲而不及得
熱則行速而太過內傷於七情外傷於六氣則血氣之
運或遲或速而疾作矣彼痛風者大率因血受熱已自
沸騰其後或涉冷水或立湿地或扇取涼或臥當冷寒

弗騰其後或涉冷水或立濕地或扇邪涼或臥當風寒

涼外搏熱血得寒汚濁凝滯所以作痛夜則痛甚行於

陰也治法以辛濕豎辛涼之劑流散寒濕開散腠理其

血得行其氣相和其病自安然亦有數種治法稍異謹

書一二以証予言一種治東陽傳兩腿痛一治朱宅閩

帖半年而安詳見後或曰此見隣人用草藥研酒飲之

不過數帖亦有安者如子之言類皆經久取効無乃大

迂緩乎予曰此刻病草藥石上採石綠為之君過山龍

等扶之皆性熱而燥者不能養陰却能燥濕病之淺者

濕痰得燥則開熱血得熱則行亦可取効彼病深而血

必愈刻愈虛愈刻愈深若朱之病是也子以我為迂緩

乎朱子病即朱閩辜痛鑿數月不應而丹溪起之也

丹溪治先受
之血熱
主於血熱血
虛血汚

潛行散治痛冷黃柏一味酒浸焙乾為末生姜汁和酒
調服必煎四物等湯相間服之妙

三妙散治筋骨疼痛目熱目濕者如有氣加氣藥如有
血虛加補血藥如痛甚以姜汁熱之

黃柏炒 蒼朮炒制去皮

右為粗末生姜研入湯煎沸服此二物皆有雄壯之
氣如表實氣實者少酒佐之

一法二妙為君加甘草羌活各二分陳皮芍藥各一分
酒炒葳靈仙末半分為末服之佳

一男子年四十六歲家貧農業秋涼忽渾身發熱兩臂
膊及腕兩足及跨皆疼痛如鍛晝夜劇人共風藥則

膊及腕兩足及膝皆疼痛如鍛晝夜劇人其風藥則

愈痛此氣血藥則不効已待斃而已予脈之兩手俱瀉
而數右甚於左問其飲食則如平時形瘦如削蓋大痛
而瘦非病也用蒼朮一錢半重酒黃柏一各半重生附
一片生甘草三分麻黃半各重研桃仁九個作一帖煎
入姜汁些少令辣熱服至四帖後去附子加牛膝一各
重至八帖後未告急云氣上喘促不得痛睡刮微減此
時昏黑不能前去診視予意其血虛曰服麻黃過劑陽
虛被發動而上奔當此補血鎮墜帶味酸之藥以收遂
以四物湯加芍倍芍藥加人參二各重五味十二粒作
一帖與二帖服之喘促隨定是夜遂安三日脈之數減
大半溢脈如舊問其痛則曰不減然呻吟之聲却無察

其起居則疲弱無力病人却自謂不弱遂以四物湯加
牛膝白朮人參桃仁陳皮甘草檳榔入姜三片煎服如
此藥與五十帖而安一月後因負重擔痛復作飲食亦
少再與此藥每帖加黃芪三分又二十帖方全愈

東陽傅大年踰六十性急作勞患兩腿痛動則痛甚予視
之曰此無虛証當補血虛血病當自安遂與四物湯加
桃仁陳皮牛膝生甘草煎入生姜研潛行散熱飲三四
十帖而安

何縣長年四十餘形瘦性急因作勞背疼臂痛骨節疼
是心火熱可與四物湯帶熱下大補丸與點丸保和丸
芎六十立食前服

婦人脚疼脚怕冷夜重日輕

生地 白芍 歸尾 五分 炒柏 黃芩

白朮 陳皮 蒼朮 二分 牛膝 二分 甘梢 一分

分六帖益取食前熱飲之

隣鮑之子年二十餘日患血痢用澁取効後患痛風踰

叫械隣予視之是惡血入經絡証血受濕熱久為凝濁而

下未盡番滯隨道所以作痛經久不治恐成枯細遂與

四物湯加桃仁紅花牛膝黃芩陳皮生甘草益生姜研

潛行散入少酒飲之數十帖又與刺委中出血黑血近

三合而安

痢後風係血入藏府下未盡復還經絡不得行故也用

扶風痰者疎
之導之

明節一兩 乳香一分 焦存性蒼朮一兩 紫葳一

兩半生甘草半兩 黃柏一兩 批仁去皮不去尖一兩 俱

為末每服三錢生薑同搗細水煎起二三沸服

朱宅間內年三十食味甚厚性亦躁急患痛冷攣縮數

月醫得不應予視之曰此扶痰與氣証當和血 疎痰

導氣病自安遂以潛行散入生甘草牛膝炒枳壳通草

陳皮桃仁姜汁煎飲半年而安

即左腿久骨白痛小便赤少此積憂痰沫所為

白朮 枳壳 赤芍 芍 桑參 連翹

通草 半多 甘菊 三分

云六安人脚股骨痛

白朮 枳壳 赤芍 芍 桑參 連翹 通草 三分

蒼朮 白朮 陳皮 芍藥 木通

甘草 半外

分四帖煎下大補丸四十

右丹溪治痛風法主於血熱血虛血汚或挾痰皆不
離四物潛行黃柏牛膝生甘草桃仁陳皮蒼朮生姜
汁而隨証加減哉前人之未發鑿世俗之不鑿其有
功於世也

痛在胃經者
鮮食毒

本事 王檢正希臯昔患鼻額間痛或麻痺不仁如是者數
年忽一日連口唇頰車髮際皆痛不可開口雖言語飲
食亦補妨在額與頰上常如糊 手觸之則痛予作足
陽明經絡受風毒傳入經絡血凝滯而不行故有此証

或者以排風小續命透冰丹之類皆之皆不効製此犀
角升麻湯贈之數日而愈

上等犀角 一兩一分
真川升麻 一兩
防風

羌活 各三分
川芎
白附子
白芷

黃芩 各半兩
甘草 一分

右粗末每服四大分水一盞半煎至八分去渣通口

服食後臨臥日三四服

○是陽明胃也經云腸胃為市又云陽明血多氣胃
之中腥膻五味無所不納如市廛無所不有也六經
之中血氣俱多腐熟飲食故食之毒聚於胃故此方
以犀角為主解飲食之毒也陽明經絡環唇挾口起

以犀角為主鮮飲食之毒也陽明經絡環唇核口起

於鼻合頰中循頰車上耳前過客主人循髮際至額

顛故王公而患皆一經絡也故以外麻佐之餘藥皆

滌除冷熱升麻黃芩專入胃經稍通者自能曉

海 四物蒼朮各半兩 此活血丹相表裏 治四支腫痛不能舉動四

物湯半兩蒼朮半兩同煎

活血丹 此四物蒼朮各半兩相表裏 治遍身骨節疼有神

熟地黃 三兩 當歸 白朮 白芍 續斷

人參 各一兩

右細末酒糊丸梧子大

垣 蒼朮復煎散二月內合蘇伯娘治寒濕相合腦右痛惡

寒項筋脊強肩背胛服痛膝膻痛無力行步能食身沉

先賢治後感 之外寒 微者蒼朮散

重其脈沉緩洪上急

蒼朮 四兩水二碗煎至二大盞去渣入下藥 羌活 一兩 升麻 半兩 柴胡 半兩

藁本 半兩 澤瀉 半兩 蒼朮 半兩 黃柏 三分 紅花 少許

右為粗末用蒼朮湯二盞煎至一大盞去渣溫服空

心微汗為效忌酒麵

暖筋湯治目如火腫痛兩足及伏兔骨筋痛膝少力身

重腰痛夜惡寒痰嗽項頸筋骨皆急痛目多淚泪急食

不下

羌活 二兩 獨活 二兩 藁本 三兩 麻黃 三兩 蘇木 一兩

升麻 三分 甘草 二兩 草豆蔻 三分 生地黄 三分 黃芩 三分

酒黃柏 三分 蒼朮 半兩 當歸身 三分 柴胡 三分 熟地黄 三分

甚者桂附設

生甘草根 二分

右為麤末都作一服水二盞煎至一盞去滓熱服遠食

仲桂枝芍藥知母湯

河間 防風湯

已上一方治痛冷神妙並是行痺表糸

世傳 治痛風草烏四兩去尖木鼈子三兩去壳自然銅一

兩鍛香白芷三兩沒藥二兩另研南星二兩葳靈仙

二兩地龍三兩糊丸每十五粒

羅 活血應痛丸治風濕客於腎經血脉髓滯腿脚腫疼不

能轉側皮膚不仁遍身麻木吐攻頭目虛腫耳內常鳴

下注脚膝重痛少力行履艱難亦治項背拘挛不得舒

暢常服和血脉壯筋骨使氣脈宣流

酒黃柏三分 蒼朮半斤 當歸身三分 柴胡三分 熟地黃二分

狗脊

玄毛

蒼朮

泔浸一宿

香附

炒去毛

陳皮

五兩半

沒藥

一兩二分

草烏

一兩半炮

右為細末酒煮麵糊為丸如桐子大每服十五丸溫

酒或熱湯送下不拘時候久服忌桃李雀鴿諸血物

丹八珍丸治一切痛風脚氣頭冷

乳香

沒藥

代赭石

山甲

生用

川烏

不去皮火生用一兩

草烏

不去皮火生用五兩

羌活

半兩

全蝎

廿一个頭尾全者

右醋糊丸桐子大每服十一丸

羅烏靈丸治久患冷寒麻木痛行步艱難

五靈脂

一兩

川烏

一兩炮去皮臍

又甚者以酒行
桂附

右為細末酒煮麵糊為丸如桐子大每服十九加至

五十九宜心温酒送下忌一切珍物

史承相遇仙方治諸般痛風手足艱難筋骨疼痛口眼喎

斜言語蹇澁

附子

炮去皮臍

川烏

炮去皮臍

當歸

酒浸焙

川芎

羌活

去芦

肉桂

酒洗焙

杜仲

去皮炒去絲姜汁制

黃芪

去芦

白茯苓

妙去刺

白朮

人參

去芦

川牛膝

酒浸焙去芦

防風

天麻

去苗

白茯苓

去皮

草薢

狗脊

燒去毛

川續斷

浙獨活

肉桂

去粗皮

赤芍藥

各了兩

虎脰骨

二兩半酥炙

右十二味切細以生絹袋盛之用無灰酒一斗浸蜜

服藥後不動
者蒸之熨之

封繩口春三日夏二日秋七日冬十日取出藥晒焙
干為末酒糊丸梧子大用浸藥酒一盞送下五十九
空心服忌生冷油膩豆腐麵食發風之物

世五加皮酒治風濕遍身疼痛俗名痛風或腫或癱或脚
氣不能步履者用五加皮不拘多少入白麵內同釀白
酒飲之或入在曲內造好酒服尤妙

丹治環跳穴痛不已防生附骨癰方以蒼朮佐黃柏之辛
行以青皮冬加桂枝夏加桑子黃芩休虛者加杜仲牛
膝以甘草為使大料煎入酒深者恐朮柏桂枝十數帖
後不動以少麻黃一二帖又不動者恐癰將成急搥地
成坑以火煨紅沃以小便赤休坐其上以被席圍抱下

成坑以火煨紅泥以小便赤体坐坑上以被席圍抱下
体使热蒸腠理開血氣暢而愈

時行熱毒攻手足大痛欲死作地坑深三尺可容則止
足却燒令熱以酒沃之乘熱着履坐其上包裹勿泄氣
立安善手痛者煖酒浸之

傷寒類要

衍義三升醇酒伴蚕屎五斗用甑蒸熟於暖室中鋪於油
單紙上令患風冷氣閉及近感癰冷人就而患一边卧
着温熱厚蓋覆汗出為度若虛人須常在左右防大熱
昏冒仍令頭面不得壅覆未全愈間再作

外臺治風痛腫白虎病以三年釀醋五升熱煎三五沸切
葱白二三升煮一沸瀝出布帛熱裹當病上慰之差為度
靈寒痺之為病也番而不去時痛而皮不仁黃帝曰刺寒

痺內熱柰何伯高荅曰刺布衣者以火焯之刺大人者
以藥熨之黃帝曰藥熨柰何伯高荅曰用醇酒二十升
蜀椒一斤干姜一斤桂心一斤凡四種皆咬咀漬酒中
用綿絮一斤細白布四丈并內酒中置酒焉矢焜中蓋
封塗勿使泄五日五夜出布絮曝乾之乾復漬以盡其
汁每漬必晡其日乃出乾乾并用滓與綿絮複布為複
巾長六七尺巾則用之生桑炭炙布以熨寒痺所刺之
處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十遍而止汗
出以巾拭身亦三十遍而止起步內中無見風每刺必
熨如此病已矣此所謂內熱也內音納。壽夭剛柔篇

羅枯痛散治肢節疼痛熨烙藥

羅枯痛散治肢節疼痛熨烙菜

羌活

獨活

細辛

肉桂

防風

白朮

良姜

麻黃

天麻

川烏

吳茱萸

乳香研

小檗去日

全蝎生

當歸各二兩

川芎半兩

右為粗末入乳香研勻每抄藥一十錢痛甚者十五

錢同細鹽一升炒令極熱熟絹袋盛熨烙痛處不拘

時早晚頻用藥冷再炒一次用畢甚妙藥不用

仲婦人六十二種風及腹中血氣刺痛紅藍花酒主之

紅藍花一兩

右一味以酒一大升煎減半頓服一半末之再服

濟生虎骨丸治經絡凝澀骨節疼痛筋脉挛遇陰寒愈痛

無寒熱者
但活汚血

南乳香 另研 浸藥 另研 赤芍藥 熟地黃

虎胫骨 酥炙黃 當歸 各一兩 血竭 五錢

右為末同木瓜一枚切破去子入乳香末在內以麻
縷纏定勿令透氣好酒六升煮至酒盡取木瓜去皮
研如泥更入熟蜜少許杵和為丸如桐子大每服五
十九病在上食後在下食前溫酒下

羅木瓜虎骨丸治風寒濕合而成痺脚重不仁疼痛少力
足下癰痛不能躡地脚膝筋挛不能屈伸項背拘急手
足無力耳內蟬鳴頭眩目運及腿脚行步艱難並皆治之

木瓜 麒麟竭 研 虎胫骨 酒炙 木香

自然銅 醋煅七次 松香脂 敗龜板 醋炙去襴褸 骨碎補 去毛

甜瓜子

桂

當歸

沒藥 各二兩

乳香

研半兩

地龍

去土

安息香

湯酒煮入藥各二兩

右件一十五味除研藥外為細末拌勻酒麵糊為丸

如桐子大每服三十九丸溫酒送下煎木瓜湯送下亦

得漸加至五十九丸空心食前服

濟生麒麟竭散治寒濕傳於經絡疼痛不忍可

血竭

南乳香

沒藥

白芍藥

當歸 各五分

水蛭

并碎炒令烟尽

射香 各三分

虎胫骨

酥炙黃五分

右八味為細末和勻每服三分溫酒下食前

丹 越痛散

乳香

沒藥

桃仁

紅花

當歸

上下

地龍

五靈脂

牛膝酒浸

羌活酒浸

香附便浸

生甘草

如痰熱加酒芍酒柏

痛風大法

蒼朮

南星

川芎

白芷

當歸

酒芍

在上者加羌活 靈仙 桂枝

在下者加牛膝 防己 木通 黃柏

薄桂治痛風無味而薄者獨此能轉橫行 手臂 頷南

星 蒼朮 等至痛處

上中下痛風方

臂痛

南星 二兩
台芎 一兩
白芷 半兩
桃仁 半兩

桂枝 三兩橫 漢防已 半兩下行
草龍膽 半兩下行
蒼朮 米泔浸一宿二兩

黃柏 二兩酒炒 紅花 一兩半酒洗
葳靈仙 二兩去蘆上行 神曲 一兩炒

羌活 三兩通身走骨節

世傳 治痰核丸至臂痛如神 方見效

控涎丹 治肩背臂痛如神 方見行痺

控涎丹 加去油木鱉子一兩 桂半兩 治臂痛每二十九

加至二十九妙

丹治臂痛

半夏 一兩 陳皮 半兩 茯苓 半兩 蒼朮 一兩石

葳靈仙 三兩 酒芩 一兩 白朮 一兩 南星 一兩

香附 一名 甘草 少許

世治臂痛

紅曲 炒

神曲 炒黃

館

為末酒調服之

姜黃散治臂痛非風非痰

姜黃

四兩

甘草

羌活 各一兩

白朮

二兩

腰以下痛者加海桐皮當歸芍藥

恒臂痛有六道經絡究其痛在何經絡之間以行本經藥

行其血氣氣血通則愈矣若表上諸疼痛便下之則不

可當詳細辨之

右東垣云臂痛有六道經絡以行本經藥行其血氣

左東垣云臂痛有六道經絡以行本經某行其血氣

足痛

虛實

痛冷多屬血虛
氣血俱虛

者蓋以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而定之則其臂臑之前廉痛者屬陽明經以升麻白芷葛根行之後廉痛屬太陽經以羌活藁本行之外廉痛者屬少陽以柴胡行之內廉痛者屬厥陰以柴胡青皮行之內前廉痛者屬太陰以升麻白芷蒼白行之內後廉痛者屬少陰以細辛獨活行之并用針灸法視其何經而取之也

足痛新病以痛風 法治之久病非脚氣即鶴膝風治之各自有門痛冷多屬血虛然後寒熱得以侵之治法並見血熱血虛条

丹 張子元氣血虛有痰小便白濁陰火間起痛冷時作

脈沉滑有力
及大便燥結
者宜下之

人參 一兩
白朮 二兩
熟地黃 二兩
川黃柏 二兩炒黑

山藥
海石 一兩 好者
瑣陽 半兩
乾姜 燒灰半兩 取其不走

南星 一兩
敗龜板 二兩炙

右粥丸

痛風痰帶熱先以舟車丸或導水丸神芎丸下之後以
趁痛散調血如痰熱趁痛散加酒冷酒拍

痛風

糯米 一盞

黃躑躅根 一碗

黑豆 半盞

右件用酒水各一椀煎半乾徐徐服之大吐大瀉一
服住純便純行動

子和

一男子六十餘病腰尻脊跨皆痛數歲不愈晝靜夜

子 和 一男子六十餘病腰尻脊跨皆痛數歲不愈晝靜夜
躁大痛往來屢求自盡矣旦則定夕則痛作必令人手
槌擊至五更雞鳴則漸減向曙則痛止戴人診其兩手
脈皆沉滑堅勁力如張絙謂之曰病雖瘦難於食然腰
尻脊跨皆痛者必大便堅燥其左右日有五七日或八
九月見燥屎一兩塊如彈丸結硬不可言曾令人刻取
之強下一兩塊渾身燥痒皮膚皴揭枯澀如麩片戴人
既得病之虛實陰用大承氣以姜棗煎之加牽牛頭末
二名不敢言是瀉劑蓋病者聞暖則悅聞寒則惕說補
則從說瀉則逆此蔽非一日也而况一齊人傳之衆豈
人咻之手是蓋成使稍熱咽之從少至多累至三日天
且晚臍下泄四五行約半盆以灯視之皆燥屎燥硬

塊及淤血雜藏府穢不可近須臾痛減九分昏睡鼻息
調如常人睡至明日將夕始覺飢而索粥溫涼與之又
困睡一二日其痛盡去次令飲食調養日服導飲丸廿
露散滑利便溺之藥四十餘日乃服常仲明之妻每遇
冬寒兩手熱痛戴人曰四肢諸陽之本也當夏時散越
而不痛及乎秋冬收斂則痛以三花神佑丸大下之熱
遂去

運氣痺有二

一曰濕經云太陰司天濕淫所勝病附腫骨痛陰痺
陰痺者按之不得治以苦熱是也

二曰燥經云陽明所至為死陰股膝髀臑胫足病又

二日燥經云陽明所至為尻陰股膝解腓胫足病又

云歲金太過燥氣流行甚則尻陰股膝解腓胫足皆病是也

內經刺灸諸痛法先明經脈次別淺深蓋經脈者謂手足十二經脈也

針灸上
手痛取手經
前廉痛取
陽明

後廉痛太陽

外廉痛取少

陽

手前廉痛屬陽明經云手陽明脈所生病者肩前臑痛大指次指不用全文見針灸門下全

後廉痛屬太陽經云手太陽脈是動則病肩似拔臑似折所生病者肩臑肘臂外後廉痛

外廉痛屬少陽經云手少陽脈所生病者耳後肩臑肘臂背痛小指次指不用又云邪客手少陽之絡令人臂外廉痛手不及頭刺手中指次指爪甲上去端

內廉痛取厥

陰

內後廉痛取

少陰

內前廉取太陰

足痛取足經

前廉痛取陽

明

後廉痛取太

陽

如韭葉各一病左取右右取左

內廉痛厥陰經云手厥陰脈是動則病手心熱肘臂

挛急腋腫

內前廉痛屬太陰經云手太陰脈所生病者臑臂內

前廉厥掌中熱痛

內後廉痛屬少陰經云手少陰所生病者臑臂內後

廉痛厥掌中熱痛

足前廉痛屬陽明經云足陽明脈所生病者膝腫

痛循膺乳氣街股伏兔骭外廉足肘上皆痛中指

不用

後廉痛屬太陽經云足太陽脈是動則病衝頭痛項

後蘆痛屬太陽經云足太陽脈是動則病衝頭痛項

外蘆取少陽

內蘆痛取厥

陰

內前蘆痛取

太陰

似拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結踹如裂是謂

踝厥所生病者項背腰尻膕膈脚背痛小指不用

外蘆痛屬少陽經云足少陽所生病者胸脇肋髀膝

外至脛絕骨外踝及諸節皆痛小指次指不用又云

足髀不可舉側而取之在樞會中以復利針大針不

可刺又云邪客於足少陽之絡令人番於樞中痛髀

不可舉刺樞中以毫針寒則久番針以月死生為數

立已

內蘆痛屬厥陰

內前蘆痛屬太陰經云足太陰脈所生病者股膝內

腫厥足大指不用

內後薦痛取
少陰

病分淺深
痛在皮取皮

病在脉取脉

病在肉取肉

病在筋取筋

內後薦痛屬少陰經云足少陰脉所生病者脊股內

後薦痛足下熱而痛此手足十二經脉痛皆視虛實

寒熱陷下而施補瀉疾留灸之法也已上全文並見針灸門十二經

条盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之也

淺深者謂皮脉肉筋骨之淺深也

病在皮調之皮蓋取血絡也

病在脉調之脉即取前手足十二經之血脉也

病在肉調之分肉經云病在肌膚肌膚蓋痛名曰肌

痺傷於寒濕刺大分小分多散針而深之以熱為故

無傷筋骨傷筋骨瘡發善變諸分盡熱病已止

病在筋調之筋經云病在筋筋挛節痛不可以行名

病在筋者

病在筋調之筋經云病在筋筋者痛不可以行

病在骨取骨

取腎

曰筋痺刺筋上為故刺分肉間不可中骨也

病在骨調之骨經云病在骨骨重不可舉骨髓酸痛

寒氣至名曰骨痺深者刺無傷脉肉為故其道大分

少分骨熱病已止又云邪在腎則病骨痛陰痺陰痺

者按之不得取之湧泉崑崙視有血者盡取之又云

骨痺舉節不用而痛汗注煩心取三陽之經補之作

三陰也皮脉肉筋骨之淺深隨其處取之也

又久痺不去身者視其血絡盡出其血

痛痺久而入藏府為病刺法見諸痺

玉龍 渾身痛疼但於痛處針不拘經穴須避筋骨穴名天

應穴針各決痛針

久而入藏府者
刺其俞
針灸下
臂膊痛

攝要臂膊疼痛

肩顯手三里外關

摘英臂膊疼痛并麻痺

肩顯肩井曲池

集成臂膊麻痺疼痛

肩顯曲池手上廉合谷

不應再取

肩井列缺

玉龍臂痛連腕

液門

以皮向後透陽池寫

中渚

以皮透腕骨寫

攝要臂內痲痛

經渠

一息灸

靈道

一分針向前三分

少海

五分

東陽臂痲攣

針師家會只畢前合後受

臂不舉

肘臂痛

肘窩竅陰尺澤前谷後溪

甲子臂不得上頭尺澤主之

臂不可舉頭項痛咽腫不可咽前谷主之

肘臂腕中痛頰腫不可以顧頭項急痛臨淫滌肩胛小

指痛前谷主之

肘痛不能自帶衣起頭眩頰痛面黑渴風肩頭痛不可

顧關衝主之

肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛臂痿痺不仁

天井主之千金云肩內麻木

肘中濯濯臂內廉痛不可及外關主之

肘痛尺澤主之

手腕痛

撮要腕痛

中陽谿

玉龍腕無力并痛

腕骨

橫針入三分痛則寫無力則補

曲池

補寫同上

手指痛

撮要五指拘攣

三間

一分先寫後補灸之

前谷

一分寫之灸

五指皆痛

陽池外間合谷

腿跨痛

跨痛腿肢

環跳

右腎樞視骨下一指側卧伸下寫八吸

居窕

八寸二分留

委中出血

掃要跨痛壓弓

環跳

懸鍾

摘英作丘壚針五分番三呼灸三壯

集成跨痛腿肢以不能轉側舉動艱難

環跳

三寸半灸七七壯

風市

灸二七七壯

居窈

三寸半灸五七壯

委中崑崙三里陽陵泉

下穴不己取

玉樞陽輔

腰痛

委中崑崙人中

乘君側脚風

絕骨

太冲

東君髀樞痛足脛寒熱足外廡皮骨痛

臨泣

一分三陰交

寸半附陽

五分

髀樞痛

甲髀樞中痛不可舉一毫針寒留之以月死生為疝數

一作息數立已長針亦可腰筋相引痛急痺筋痠胫骨不

可屈伸痺不仁環跳主之

東陽髀筋急胫痛縱緩痠痺膈疼冷膝外薦不可屈伸濕

痺流腫

以市中瀆陽關懸鍾

圖

腿膝外薦痛

腿痛

陽陵泉三里伏兔陰市

腿膝拘攣痛引脇或青或焦或蠶或枯如腐木狀

以市灸 陽陵泉曲泉崑崙

腿膝外薦痛股腫胫酸轉筋痠痺或膝胫熱不能行動

腿膝外薦痛肢腫脚酸轉筋痿痺或膝肢熱不能行動

俠溪

五分

髀關光明

各一寸

髀痺引膝肢外薦急痛脛痠搖動有聲諸節痠不能行

陽陵泉絕骨中封

膝外薦痛

甲膝外薦痛熱病汗不出目外眦赤痛頭眩兩額痛逆寒

泣出耳鳴多汗目痒胸中痛不可反側痛無常處俠

溪主之

膝外薦痛不可屈伸脛痺不仁陽關主之

髀痺引膝腹外薦痛不仁筋急陽陵泉主之

膝內薦痛

膝內薦痛引腹不可屈伸連腹引咽嗑痛膝關主之

東陽腿膝內薦痛引腹不可引伸連腹引咽嗑痛

太冲五分

中封膝關

脛痛

脛酸寒足下熱不能久立濕痺不仁

中都冲陽承山承筋

脛寒四支重少氣難言不得卧

至陽

三陰交

甲痺脛腫足肘不收跟痛巨虛下廉主之

脛痛足緩失履濕痺足下熱不能久立條口主之

脛若^{苦一作}痺膝不能屈伸以不可舉行梁丘主之

玉龍草鞋風

崑崙

橫透太溪
寫畝六吸

太溪

橫透崑崙
寫畝六吸

申脈

五分補少寫多
畝二吸忌灸

掃要草鞋風足腕痛

崑崙

透太溪

丘墟商丘

各半寸寫灸

鞋風

足腕痛草

集成又法

崑崙丘墟商丘照海

不已取後穴

太冲解溪

足腕不收痿癭坐不能起髀脚痛

光明

以皮五分

丘墟 直五分

腕緩不收履足不任胫酸

然谷浮白崑崙

撮要外踝紅腫痛

申脉 半寸寫

摘英繞踝風

曲池 如繞外踝痛無刺絲絡

足少陽小指間三分

足踝痛

脚背腫

如繞肉踝痛兼刺大都 三分 如腕前廉刺行間 二分

玉龍脚背紅腫

太冲丘墟冲陽 彈針出血 臨泣

集成又法

太冲臨泣行間内庭 不已取 崑崙丘墟

足指痛

撮要大姆指本節骨疼

大都 彈針出血

足五指尽疼不得踐地

湧泉 二分 然谷 一寸

甲風寒從足小指起脾痺上下帶胸脇痛無常處至陰主之

足下熱痛不能久立濕痺不能行三陰交主之

足下熱痛

足下熱痛不能久立痺痺不能行三陰交主之

骨痛

骨痺煩滿商丘主之

膚痛痿痺外丘主之

寒氣在分肉間痛上下痺不仁中瀆主之

着痺即麻木不仁

靈衛氣不行則為不仁刺即真邪篇

氣虛不行為麻木

垣神効黃芪湯治渾身麻木不仁或左或右半身麻木或

面或頭或只手臂或只腳腿麻木不仁並皆治之方見目門

倒捷拳毛

芍藥補氣湯治皮膚間有麻木此肺氣不行也藥古老人立方神効

黃芪 一兩 白芍藥 一兩半 橘皮 不去白 澤瀉 半兩

炙甘草 一兩

右吹咀每服一兩水二大盞煎至一盞去渣溫服如
肌肉麻木必時瀉榮氣而愈如濕熱相合肢沉痛當
瀉濕熱

杜彥達患右手右腿麻木左足手大指次指亦常麻木
至腕已三四年矣諸處求醫治之不效久欲令真定李
明之鑿而居許昌蓋未暇一到去秋自衛城艤舡下燕
今夏暫乘馬廻過真定詣明之舍以所病告之明之曰
麻者氣之虛也真氣弱不能流通填實經絡四支俱虛
故生麻痺不仁一藥決三日効遂制人參益氣湯服二
日後覺手心熱手指中間如氣滿脹至三日後又覺兩
手指中間皮肉如不敢觸者似痒痛滿脹之意指上瑟

手指中間皮肉如不敢觸者似痺痛滿脹之意指上

琴不敢用手擦傍觸明之云真氣遍至矣遂於两手指
甲傍各以三稜針一刺之微見血如黍粘許則麻痺自
息矣人為處第二第三藥服之
人參益氣湯治五六月間两手麻木四支困倦怠惰嗜
卧乃濕熱傷元氣也以此藥治之

黃芪 八分 人參 一分 生甘草 各半兩 炙甘草 一分

五味子 一百廿分 升麻 三分 柴胡根 二分半 白芍藥

右咀咀每服秤半兩水五盞益至一盞去渣空心温
服服後令少卧於麻痺處按摩曲伸少時午飯前又
一服日二服

第二次藥並服如前

黃芪 八分
紅花 半分
陳皮 一分
澤瀉 一分
當歸梢 二分

第三次服藥

黃芪 古分
黃柏 一分二分
橘皮 二分
澤瀉 二分
升麻 二分

白芍藥 五分
生甘草 一分
五味子 百个
生黃芪 八分

炙甘草梢 一分

右咬咀分作四服煎服如前法如前稍熱服秋涼去

五味子冬月去黃芪服之大効

人參補氣湯治兩指麻木五月間乃熱傷元氣

黃芪 八分
人參 半兩
生甘草根 半分
熟甘草 二分

五味子 一百四十
白芍藥 三分
升麻 二分
柴胡 二分半

右咬咀如麻豆大分作四服每水二盞煎至一盞去

右吹咀如麻豆大分作四服每水二盞至一盞去

查稍熱服食後

除濕補氣湯治左腿麻木沉重

黃芪 八分 甘草梢 六分 五味子 一百 升麻梢 二分

當歸梢 二分 紫胡梢 二分 澤瀉 二分 紅花 二分半

橘皮 一分 青皮 四分

右吹咀分作四服水三大盞至一盞去查稍熱服

食前

氣虛挾風寒

仲

血痺病從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重因瘦

勞汗出卧不時動搖加被遂冷微遂得之但以脉自微

滿在寸口関上小緊宜針引陽氣令脉和緊去得愈

血痺陰陽俱微寸口関上微尺中小緊外証身體不仁

如風痺狀黃芪桂枝五物湯主之

黃芪 三兩

芍藥 三兩

桂枝 三兩

生姜 六兩

大棗 十二枚

右五味以水六升煮取三升溫服七合日三服

一方有人參

羅

中書左丞張仲讜五十三歲至元戊辰春正月在大都

患冷証半身麻木一鑿欲下之再命予決可否乎予曰

治風當通目通用汗之可也然此地此時雖交春令寒

氣猶存汗之必虛其表必有惡冷惡寒之証仲讜欲速

差遂汗之身體輕快後數日再來邀予治之曰果如君

言官事繁劇不敢出門當如之何予曰仲景云大法夏

宜汗陽氣在外故也今時陽氣尚弱初出於內汗之則

宜汗陽氣在外故也今時陽氣尚弱初出於內汗之則

使衛氣亟奪衛氣失守不能肥實腠理表上無陽冷見
必大惡矣內經曰陽氣者衛外而為固也又云陽氣者
若天與日失其所則折壽而不彰當時之時猶有過汗
之戒况不當汗而汗之者乎遂與黃芪建中湯加白朮
服之滋養脾胃生發榮衛之氣又以溫粉撲其皮膚待
春氣實表氣實即愈矣內經曰代不可伐時不可遺此
之謂也 黃芪湯中湯方見治虛實法

桓
戊申春節使趙君年幾七旬病體熱麻肢膝無可飲食
有汗妄喜笑善飢痰涎不利舌強難言聲啞不鳴身重
如山求治於先師診得左手脈洪大而有力是邪熱客
於經絡中也兩臂外有數瘰遂問其故對以燃香所至

先師曰君之病皆由以也夫人之十二經灌溉周身終而復始蓋手之三陽從手表上行於頭加之以火邪陽并於陽勢甚熾焉故邪熱毒行流散於周身而熱麻

黃帝

針經四卷
口問第一

胃熱則虫動虫動則廉泉開故涎下熱傷元

氣而沉重無力飲食不胃燥悍之氣不循常度故多汗心火盛則妄喜咲脾胃熱則消穀善飢肺金衰則声嘎不鳴仲景曰微數之脉慎不可灸焦骨傷筋血难復也君奉養以膏粱之味無故加以大毒熱傷於經絡而為以病明矣内經云熱淫所勝治以苦寒佐以苦甘以甘瀉之以酸收之當以黃柏知母之苦寒為君以瀉火邪壯筋骨乃腎欲堅急食苦以堅之黃芪生甘草之甘

邪壯筋骨乃腎欲堅急食甘以堅之黃芪生甘草之甘

寒瀉熱補表五味酸止汗補肺氣之不足以為臣炙甘草當歸之甘辛和血潤燥柴胡升麻之甘平行少陽陽明二經自地升天以苦散之者也以為佐改咀同煎取清汁服之更繆刺四支以瀉諸陽之本使十二經絡相接而泄火邪不旬日而良愈遂名其方曰清神補氣湯

蒼木 四名 藁本 二名 升麻 六分 柴胡 三分

五味子 一名半 黃柏 酒制 三名 知母 酒二名 陳皮 二名半

生甘草 二名 當歸 二名 黃芪 三名

右吹咀每服五名水盃半煎至一盃去渣空心服之待少時復以美饌壓之

補氣升陽和中陽丁未年九月間李正臣夫人表告求

閉目則麻木為風熱下陷

治極得六脉中俱得弦洪緩相合按之無力弦在其上是
風熱溫下陷入陰中陽道不行其証閉目則渾身麻木
晝少而夜甚懼閉目則麻木漸退久則絕無常開其目
此証不作懼甚麻木不敢合眼致不得眠身體皆重時
有痰嗽覺胸中常似有痰而不利時有躁作氣短促而
有喘肌膚充盛飲食大小便如常惟畏麻木不敢合眼
為最苦觀其色脉形病相應而不逆內經云陽盛瞑目
而動輕陰病閉目而靜重又云諸脉皆屬於目靈樞云
開目則陽道行陽氣而遍周身閉目則陽道閉而不行
如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木為冷雖三尺
之童皆以為然細按之則區分矣久坐而起則有麻木

之童皆以為然細按之則區分矣久坐而起則有麻木

為如繩繫縛之人釋之覺麻木作而不敢動久則自已
以此驗之非有風邪乃氣不行也以此按之不須治風
補其肺中氣麻自去矣知其經脈陰火秉其陽分火動
於中為麻木當無去陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外
在上而下作也當實其皮毛以溫劑身重脈緩者濕氣
伏匿而作也時見燥作當升陽助氣益血微瀉陰火去
濕通行經脈調其陰陽則已矣非五藏六脈之本有邪
也補氣升陽和中湯主之

黃芪五斤 人參三斤 浙炙甘草一斤 橘皮二斤

當歸身二斤 生甘草梢一斤 佛耳草一斤 白芍藥三斤

草豆蔻仁一斤半 益陽退寒 黃柏一斤 酒洗 除濕瀉火 白朮二斤

眩運無麻木
亦風熱下陷

蒼朮 一名半熱除補中
白茯苓 一名除濕導火

澤瀉 二名用全上
升麻 一名行陽明經

右咬咀每服秤三升水二大盞並至一盞去渣稍熱
服早飯午飯前服之至八服而愈

溫經除濕湯李夫人十月二十日得立冬嚴霜作時病
四肢無力乃癢厥濕熱在下焦也醋心者是濁氣不降
欲為滿也合目麻木者陽道不行也惡風惡寒者上焦
之分皮膚中氣不行也開目不麻木者目閉助陽道故
陰寒之氣少退也頭旋眩運者風氣下陷於血分不得
伸越而作也

羌活 七分
獨活 三分
柴胡 二分
黃芪 二分
人參 一分

甘草 一分

白芍藥 三分

橘皮 二分

白朮 一分

蒼朮 二分

澤瀉 一分

猪苓 一分

黃柏 三分

黃連

木香 二分

草豆蔻仁 二分

麩 二分

麻黃

不去節 三分

升麻 半分

當歸 三分

右剉如麻豆大作二服水二大盞並至一盞去渣稍

熱服食遠治肢節沉重疼痛無力之聖藥也

濕氣風証不退眩暈麻木不已除風濕羌活湯主之

羌活 一兩 防風 去芦一兩

柴胡 五分

藁本 三分

獨活 五分

蒼朮 制一分

浙茯苓 二分

澤瀉 二分

猪苓

去皮 二分

甘草 炙半分

黃芪 一分

橘皮 三分

黃柏 三分

黃連 去鬚 一分

升麻 七分

川芎 三分 去頭痛

濕痰死血

丹手麻是濕痰死血

十指麻是濕痰死血

子和鄆城梁賈人年六十餘忽曉起梳髮覺左手指麻
斯頃半臂麻又一臂麻斯頃頭一半麻比及梳華畢從脇
至足皆麻大便二三日不通往問它醫皆云冷或藥或
針皆不解求治于戴人戴人曰左手三部脈皆伏比右
手小三倍此枯澀痺也不可純歸之風亦有火燥相兼
乃命一瀉一泄一汗其麻立已後以辛涼之劑調之潤
燥之劑濡之惟小指次指尚麻戴人云病根已去此餘

燥之劑需之惟小指次指尚麻驚人云病根已去此餘

烈也方可針溪谷溪谷者骨空也一日晴和往針之用
靈樞中雞足法向上卧針三進三引訖復卓針起向下
卧針送入指間皆然手熱如火其麻全去

濟生茯苓湯治傳畜支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏湯炮七次 赤茯苓去皮 陳皮各一兩 枳實去穢炒

桔梗去芦 甘草炙各半兩

右吹咀每服四分水一盞姜七片煎服不拘時

形數驚恐經絡不通病生於不仁治之以按摩醪

藥全文見省治法

衍義一法五灵脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩

半炮去皮同為末滴水丸如彈丸每服一丸生姜温酒

風寒于衛不
行為不仁

磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻

風論云風氣行諸脉俞散於分肉之間與衛氣相干

其道不利故使肌肉憤臃而有瘍衛氣有所凝而不

行故其肉又不仁也全文見諸風門又氣血論云肉分之間

溪谷之會積寒留舍榮衛不居內為骨痺外為不仁

命曰大寒留於溪谷此亦冷寒相干衛氣致衛氣不

行而不仁也全文見肉門

仲黃芪五物湯方見本門衛虛條

世惡寒而麻木者烏附之類最驗其效全在

本事治風濕寒痺麻木不仁粥法三何益對宜後或向不

川烏生為末

右香熟白米作粥半碗藥末四分同米用慢火熬熟
稀薄不用稠下姜汁一茶脚許蜜三大匙攪勻空心
啜之溫為佳如是中濕更入薏苡仁二分增米作一
碗服。此粥治手足四支不遂痛重不能舉者有此
証預宜防之左氏曰風淫末疾謂四肢為四末也脾
主四肢風邪客于肝則濡脾脾為肝剋故疾在末穀
氣引風濕之藥徑入脾經故四支得安此陽劑極有
力予嘗則此以授人服之良驗

治風濕四肢浮腫肌肉麻痺甚則手足無力筋脈緩急

宜續斷丸 都君子方

川續斷

萆薢

當歸

炒切微

附子

防風

燥

雜方

摩之

天麻 各一兩 乳香

沒藥 各半兩

川芎 三分

右細末煉蜜丸梧子大每服三四十丸酒或飲下空

心食前

丹劉河間作原病式嘗以麻為澁同歸燥門中真知病機者也

河間前胡散治榮虛衛實肌肉不仁致令癢重名曰肉苛

虛其氣

全胡

白芷

細辛

官桂

白朮

川芎 各三兩

川椒 去目并閉口者生用二兩

吳茱萸

湯洗炒

附子 炮

當歸 各二兩

右剉以棗酒三升勻拌同窰一宿以煉成猪脂膏五

針灸

斤入藥微為候白芷黃紫色瀝去查成膏病在處摩之病以熱調以藥櫻桃大瘰癧瘡瘻皆治并去諸風瘡痒痛傷折墜損

內經刺灸着痺分新久其新者湯熨火灸經云風

寒入皮膚或痺不仁腫痛可湯熨及火灸刺而去

之是也

全文見治法次傳系

久者焮針刺之經云着痺不去

久寒不已焮取其三里是也

針經四時氣篇

桓俠帥郭巨濟篇枯二指着足不能伸迎先師於京師治

之則以長針刺委中至深骨而不知痛出血一二升其

色如墨又且醪刺之如是者六七次服藥三月病良愈

甲膝寒痺不仁痿不屈伸髀關主之

久而入藏府
者刺其俞合
診

血
汚血

着痺久而入藏府為病刺法見諸痺

着痺不移肌肉破身熱脈偏絕是逆也

全文見
診生死

素榮氣虛不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用

肉如故也人身此志不相有曰死逆奈論

脈診人被風不仁痿厥其脈虛生堅急疾者死

鶴膝風 歷節之類

羅伊祁丸治鶴膝風腰膝風縮之疾

伊祁

頭尾
全者

桃仁生

白附子

阿魏

桂心

安息香

用研
桃仁

白芷各一兩

乳香

沒藥各三分

已上九味用童子
便酒二升炒熟冷處

地漏蘆

當歸

芍藥

牛膝

羌活

地骨皮

葳靈仙各一兩

牛膝 羌活 地骨皮 女真 仙各一兩

血虛 挾 濕 熱

脾 飲食 痰 積

右蜜為丸 彈子大 空心 煖酒 化下 一丸 胡荽 望博士

病 風 痿 手 足 指 節 皆 如 桃 李 痛 不 可 忍 服 之 悉 愈

丹 丈 人 年 十 七 歲 患 脚 膝 疼 稍 腫

生 地 歸 頭 白 芍 蒼 朮 炒 柏

芎 桂 木 通

分 四 帖 煎 取 小 盞 食 煎 熱 飲

一 男 子 年 近 三 十 滋 味 素 厚 性 多 焦 怒 秋 間 髀 樞 左 右

發 痛 一 點 延 及 膝 盡 靜 夜 劇 痛 惡 寒 口 或 渴 或 不 渴 或

瘡 或 不 瘡 鑿 者 用 風 藥 兼 用 補 血 至 次 年 春 其 膝 漸 腫

其 痛 愈 甚 其 食 漸 減 形 漸 瘦 羸 至 春 末 膝 腫 如 椀 不 可

屈 伸 診 其 脈 左 弦 大 頗 實 寸 澀 甚 大 率 皆 數 知 其 小 便

必數而短遂作飲食痰積在太陽陽明治之炒拍一兩
生甘草梢三錢犀角屑三錢蒼朮鹽炒三錢川芎二錢
陳皮半兩牛膝半兩木通半兩芍藥半兩遇暎熱加桑
苓三錢為細末每三錢重些生姜自然汁同研細多少
通中以水盪起煎令沸帶熱服食前飲之一晝夜四次
與至半月後數脈漸減痛漸輕去犀角加牛膝敗龜板
半兩當歸身尾半兩如前服又與半月多腫漸減食漸
進不惡寒惟脚膝酸軟未終久立久行去蒼朮黃芩時
當夏熱加炒黃柏至一兩半餘依本方內加牛膝春夏
用莖葉冬用根惟葉杵取汁用之効尤速須斷酒肉濕
麵胡椒年絕當中年夏加生地黃半兩冬加桂枝茱萸

雜方

世換骨丹通治風濕治鶴膝風

防風

牛膝

當歸

虎骨

酥炙各一兩

枸杞

二兩半

敗龜板

羌活

獨活

秦艽

草薺

松節

蚕沙

各一兩

茄根

二兩洗

蒼木

四兩

酒浸或酒糊丸皆可

圖

食療脚膝筋急痛煮木瓜令爛研作漿粥樣用裹痛

處冷即易一宿三五度熱裹便差煮木瓜時入一半

酒同煮之

子和嶺北李文卿病兩膝膃屈伸有声剥剥然或以為骨鳴戴人曰非也骨不憂焉能鳴此筋濕也濕則筋急

有緩者不鳴急者鳴也差用予之藥一湧一泄上下去

其水則自無声矣李文卿乃從其言既而果然笑

素蹇膝伸不屈治其捷

骨空論下同○經云輔骨上橫骨下為捷王註云髀輔骨上橫骨下

股外之中側立搖動

取之筋動應手滑壽云捷骨之

坐而膝痛治其機

經云俠髓為機王註云髓骨兩傍相接延骨壽云扶腰而旁腹骨為機後為腎

立而暑解治其骸

經云膝解為骸關王註云暑熱也

骸關一經云起而引解言膝痛起立引膝

骨解之中也滑壽云挾膝解中為腹

膝痛痛及拇指治其脘

經云輔上為脘王註云脘謂之後油脚之中委中穴

坐而膝痛如物隱者治其關

經云脘上為關王註云關

之以動搖筋應手

膝痛不可屈伸治其背內

王註云大杼穴也

膝痛不可屈伸治其骨內行穴也

連肝差折治陽明中俞膠王註云差膝痛不可屈伸連

膠三里穴也

差別治巨陽少陰榮王註云差痛而膝如別高者則治之

淫深脛痠不能久立治少陽之維在外上五寸外上當

上○王註淫深謂似酸痛而無力也外踝上五寸光明穴也

右捷機骸關諸穴更恭訂之

靈膝中痛取犢鼻以真利針一發而間之針大如釐刺膝

無疑雜病篇

玉龍鶴膝風腫及腿痛

寬骨在膝蓋骨上一寸梁丘穴兩旁各五分針入五分留十吸寫之

膝關在膝蓋骨下犢鼻內傍橫針透膝眼在犢鼻外旁禁灸留八呼寫之

撮要又法

陽陵泉

橫透陰陵泉
補生寫成

陰陵泉

橫透陽陵泉
補生寫成

集成又法

膝關

委中

二寸半但紫脈
上出血為妙

三里

石已取
下穴

陽陵泉中脘豐隆

通玄膝腫

行間

世脚拗痛

委中出血

乘君脚膝痛筋急

風池手三間三陰交三里

熱則筋膜
乾而攣

攣

熱攣者經所謂肝氣熱則筋膜乾筋膜乾則筋急而

攣

全文見
痿門

又云因於濕首如裹濕熱不攘大筋綆短

小筋弛長綆短為拘弛長為痿之類是也

全文見陰
陽丹溪大

筋綆短者熱傷血不能養筋故為拘攣小
筋弛長者濕傷筋不能束骨故為痿弱

丹王秀濕熱大作脚痛後手筋拘攣足乏力

生地

當歸

川芎

白朮

各二名

蒼朮

一名半

炙草

三分

木通

煎湯下大補丸三十五大補丸須炒煖

心鏡薏苡人散治筋脉拘攣久冷濕痺

薏苡人一升搗散每服以水二升煮作兩匙末作

寒則筋脈
急而挛

粥空腹食之 行義云筋急拘挛有兩等素問大筋受熱則縮而短故挛急不伸此因熱

而拘挛故可用薏苡人差素問言目寒即筋急不可用也

寒挛者經所謂寒多則筋挛骨痛者是也

本事同官歙丞張德操常言其肉子昔患筋挛脚不得屈伸逾年動則令抱持求鑿於泗水楊吉老云此筋病宜服下三方一年而愈

治筋極養血地黄丸 春夏服之

熟地黄 一分 續荆 一分 山茱萸 五分 黑狗脊 炙

地膚子 白朮 乾棗 鱘鱠 干之 天雄

車前子 革薢 山芋 即山菜 澤瀉 牛膝 各一兩

右細末煉蜜和杵丸如梧子大每服五十丸温酒下

空心服之夜卧亦服

治筋痺支節束痛羚羊角湯 秋服之

羚羊角 肉桂 附子 獨活 各一兩三分

白芍藥 防風 芎藭 各一兩

右為粗末每服三大錢水一盞半生姜三片同煎至

八分取清汁服日可三服

治寒冷濕痺番於筋脈挛縮不能轉側烏頭湯冬服之

大烏頭 細辛 川椒 甘草 秦艽

附子 官桂 白芍藥 干姜 白茯苓

防風 當歸 川獨活 各一兩三分

右為粗末每服三升水一盞半棗二枚同煎至八分

去查空心食前服

千金薏苡人湯治拘挛不可屈伸

白欬

薏苡人

芍藥

桂心

酸棗仁

牛膝

干姜

甘草 各升

附子 三枚

右九味吹咀以醇酒二斗漬一宿微火煎三沸每服

一升日三扶杖起行耐酒服五合

恒和血通經湯靈壽縣長董豎軍癸卯年十二月間大雪

脈輕取弦急
重取洪實為
外寒內熱乎

初霽時目事到真定忽覺有風氣暴至扶伊親眷張芸

夫來請遂與俱往診候得六脈俱弦甚急按之洪實有

力其証手挛急雖明其狀大便閉澀不通及面赤面熱

此風之如如於身也四支者脾也以風寒之邪也傷之

則搖急而事閉乃風淫末疾而寒在外也內經云寒則筋寧正謂此也本人素多飲酒近日為覺風氣不飲內有實熱乘於皮胃之間故大便秘澀而面赤熱內則乃手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草根以解其寒邪而緩其急搖內用黃柏之苦寒滑以瀉實而潤燥急救腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令過絕更以桂枝辛熱手陽明之經為引用潤燥復以芍藥專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺也加人參以補元氣為之輔位加當歸身去裏急而和血名之曰和血通經湯

升麻 一升

葛根 一升

桂枝 二升

當歸身 一升

虛則血脈而
榮於筋而
挛

邪氣惡血住
番閱節而挛

人參 一分 芍藥 半分 炙甘草根 一分 酒洗黃柏 二分

右剉如麻豆大 都作一服 水二盞 益至一盞 去 查

熱服 令煖 房中近火 摩搓其手 乃愈

虛挛者 經所謂 虛邪搏於筋 則為筋挛 又云 脈

弗榮 則筋急 全文見 診生死 又仲景云 血虛則筋急 此

皆血脈弗榮於筋 而筋虛成攣 故丹溪治挛用四

物加減 本事治筋急 極用養血地黃丸者 蓋本乎

此也

靈黃帝曰 人有八虛 各何以候 岐伯曰 以候五藏 黃帝曰

候之 柰何 岐伯曰 肺心有邪 其氣番於兩肘 肝有邪 其

氣留於腋 脾有邪 其氣留於兩髀 腎有邪 其氣留於

氣留於腋兩脾有邪其氣留於兩脾腎有邪其氣留於

兩脘凡此八虛者皆機關之室真氣之所過血絡之所遊邪氣

血固不住番住番則傷筋絡骨節機關不得屈伸故病攣也

丹一村夫背偃倮而足攣已成廢人予診其脈兩手皆沉

弦而瀉遂以張戴人煨腎散共之上吐下瀉過月餘久

吐瀉交作如此凡三次帖然平復煨腎散用甘遂末三錢

少鹽糊透糝菜末在內荷葉畏燒熟溫酒嚼服之



攣皆屬肝

攣皆屬肝者經云肝主身之筋膜故也又云陽明之

復甚則入肝經脈筋攣又云脾移寒於肝癰腫筋攣

心鏡除一切風濕痺四支拘攣蒼耳子三兩搗末水一

升半煎取七分去查呷

食療酒煮木瓜粥畏筋急痛處佳方見鶴膝風門

雜方

針灸上

筋挛取筋

脉挛取脉

針灸下

内經針灸法取挛有筋挛脉挛之異取筋挛者經云

病在筋挛筋節痛不可以行名曰筋痺刺筋上為故

刺分肉間不可中骨也病起筋是病已止者是也全

見痛痺門取脉挛者經云手厥陰脉是動則病手心熱肘

臂挛急腋腫辨虛實寒熱陷下取之是取筋脉之挛

也全文見針灸門十二經條又曰少陽之别名曰外關去腕二寸

實則肘挛取之別也全文見針灸門十五經條又曰邪客於足

太陽之絡令人拘挛背急引脇而痛刺之從項始數

脊推俠脊疾按之應手如痛刺之傍三瘡立已全文見針

灸門經刺絡條是取絡脉之挛也

千金灸筋急不能行内踝筋急灸内踝四十壯外踝筋急

灸外踝三十壯立愈

玉龍 兩肘拘挛

曲池

九分先寫後補
補四呼寫九吸

臂天澤

手如弓者可針
五分先補後寫

標 筋挛骨痛

鬼門補

張仲文 神仙灸法 治脚筋挛急

見腰痛門兩脚
內外曲文尖

撮要 膝曲筋緊不能舒

曲泉 一寸半

怪穴 膝筋拘挛不開

兩脈外曲文尖

灸二七壯 即委陽穴也

甲 兩手挛不伸及掖偏枯不仁手瘳偏小筋急太陵主之

寒熱

手及臂掌神明主之 穴未詳

掖拘攣暴脈急引痛內引心痛譫譫主之

一身盡痛

一身盡痛其病暴似傷寒者屬濕痺並見傷寒太陽証門其者連雞已者於此求之

寒而一身痛者甘草附子湯熱者桂枝湯

甘草附子湯方是傷寒身疼門

恒壯痛湯治濕熱相搏肩背沉重疼痛上熱胸膈不利及遍身疼痛

羌活 半兩

人參 二兩

甘草 五兩

防風 三兩

苦參 一兩酒浸

升麻 二兩去

葛根 二兩

知母 二兩酒炒

黃芩 二兩炒黃

澤瀉 三兩

酒黃芩 五兩

猪苓 三兩

滯氣

苜蓿葉

五升酒浸

白朮

一斤半

當歸身

三升酒浸

蒼朮

右為粗末每服一兩水二盞煎至一盞食遠或空心

日一服

丹婦人患身痛食少脈澀畧沉重取弦實此氣滯也

白朮

古名

青皮

黃芩

芍藥

木通

陳皮

半兩

神曲

炒一兩

桂

二升

甘草

半升

蘇梗

分十帖煎

虛

補中表散

恒麻黃桂枝升麻湯李夫人先患渾身麻木睡覺則少減

開目久則全已閉則麻復至此証用藥已全去又目家

事不和心中煩惱遍身骨節痛身体沉重飽食減少腹

中氣不運轉

虛損

麻黃 不去節 半斤 桂枝 二分 升麻 人參 半斤 白朮 三分

炙甘草 三分 黃芪 半斤 半夏 二分 生薑 一分 陳皮 二分

厚朴 二分 木香 一分 茯苓 三分 澤瀉 三分 黃柏 二分

附子 二分 草豆蔻仁 二分

右吹咀水二大盞煎至一盞去渣稍熱服食遠

本事治遍身皆痛如勞証者善傷寒身體痛者不可服但
但少年虛損冬憊老人諸疾並皆治之

黃芪 人參 甘草 附子炮 羌活

木香 知母 芍藥 川芎 全胡

枳殼 桔梗 白朮 當歸 茯苓

半夏 制已上 各半兩 柴胡 鱉甲 醋炙各 一兩 桂心 酸棗仁 各三分

針灸

杏仁 半兩炒

右為末每服二升水一盞姜三片棗三枚烏梅三個
葱白三寸同煎至七分空心溫服

脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸實則身盡痛

此脈若羅絡之血皆取之脾之大絡脈也 全文見針灸

潔 百節痛實無所知

絕骨 三稜針出血

產後身痛

雲岐 越痛散治產後氣弱血滯遍身疼痛及身熱頭痛

牛膝 當歸 桂心 白朮 黃芪

獨活 生薑 各半兩 甘草 薤白 各三升半

虛 補中有通

表

汚血

右吹咀每服半兩水三盞益至盞半去滓食前

五積散加醋煎治感寒頭痛身疼

方在傷寒恐共四物各半服之穩當

加桃仁煎治腰痛逐敗血去風濕

大全治產後遍身青腫疼痛及衆疾

乾漆

大麥蘗 茅

右各為細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘗一重干漆

如此填滿自鹽泥固濟火煨通赤收冷研為散但是

產後諸疾熱酒調下二錢

風痺雜合病

風病與痺病雜合也蓋風痺痿厥四者多雜合如冷

痺風痿痿痺痿厥風厥之類是也冷痿即冷痺

陰陽

病今集入中風門痿厥痺厥即脚氣病今集入厥門
風厥痿痺散見各門風痺今入痺門焉

靈病在陽者命曰風壽夭剛柔篇

恒此病在陽言十二經各受風邪以高言氣分也故身半
已上風中之也用針當引而去之也又曰散而去之
用藥以辛溫散散通曰通用又熱曰熱用是也

靈病在陰者命曰痺

恒身半已下濕中之也痺論曰欲食自倍腸胃乃傷得之
飲食勞倦脾胃氣虛而下溜運氣榮氣不得外浮經
營心肺也

陰陽俱病命曰風痺

言陰陽氣血俱病也

診

尺膚滿者風痺也 全文見診法

靈風痺淫涼病不可已者足如履冰時如入湯中股胫淫

涼煩心頭痛傷腎脾時嘔時眩眩已汗出傷心久則

目眩傷肝悲以喜恐短氣不樂傷肺不出三年死也一云三日

靈死

困藥山辛

困藥山辛


困藥山辛

困藥山辛

困藥山辛

醫學綱目卷十二終

醫學綱目卷十二終




浙江圖書館

浙江圖書館善本

甲登記號：010760

一九 年 月 日


浙江圖書館



卷十一
卷十二





浙江圖書館





浙江圖書館



Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black