

漢書門
類號函架冊
一七九
二七九
一〇九

內閣文庫
漢
類號冊架
一七九
二七九
一〇九

| | |
|------|----------|
| 內閣文庫 | |
| 番號 | 漢 12971 |
| 冊數 | 100 (41) |
| 函號 | 301 60 |

四十一

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

G Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak



渴

經云病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也夫日服柴胡湯已渴者足陽明也故以渴又陽明

成傷寒邪傳裏則渴邪在表則不渴夫三陽雖或有渴

不如三陰之甚也故太陰腹滿溢乾少陰口燥舌乾而

渴厥陰則消渴消渴者飲水多而小便少謂其熱能消

水也蓋初傳則熱微而渴微傳深則熱甚而渴甚也凡

渴與水勿令極意三陽微渴者五苓散大渴者白虎湯

三陰熱甚而渴者順下之其或渴微而強多飲之則成

悸動支結喘咳餽噦乾嘔腫滿下利小便不利皆由此

也

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者

傷寒論

卷之二十三

五十四

少少與之令胃氣和則愈若肌浮小便不利微熱消渴者五苓散張頌渴用白虎湯宜也其用五苓散滲津液用之今脈尚浮身有微熱而渴乃表證已解邪傳裏而煩渴者枝之辛和肌表白木茯苓之甘淡以潤虛燥也○按此說亦未瑩太陽經也膀胱者津液之府故東垣以渴為膀胱經本病然則治渴者當瀉膀胱之熱瀉瀉膀胱之熱者利小便而已矣發汗已肌浮數煩渴者五苓散本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入即吐名曰水逆五苓散方

猪苓 去皮 拾捌銖 澤瀉 壹兩陸銖 茯苓 拾捌銖

桂 去蘆皮 半兩 白朮 拾捌銖

右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水

汗出愈

苓者令也通行津液尅伐腎邪專為號令者苓之功也五苓之中茯苓為主故曰五苓散內經曰淡味滲泄為陽水飲內蓄須滲泄之必以甘淡為主故以茯苓甘平為君猪苓甘平為臣雖甘也終歸甘淡脾惡濕水飲內蓄則脾氣不洽益脾勝濕必以甘溫為助故以白朮甘溫為佐內經曰鹹味滲泄為陰泄飲導溺必以鹹為助故以澤瀉為使水畜不行則腎氣燥內經曰腎惡燥急食辛以潤之散濕潤燥必以桂枝辛熱為使多飲暖水令汗出而愈者以辛散而水氣外泄故解

服桂枝湯大汗後大煩渴不解肌洪大者白虎加人參

傷寒論

卷之三

五十五

湯 太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病柴胡白虎桂
 枝去桂加人參 傷寒無大熱口渴渴心煩背微惡寒
 白虎加人參湯 傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不
 可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之
 渴欲飲水無表證者太陽陽證罷轉屬陽明也
 傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時惡風
 大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主
 之王注云若純在表則惡風無時
 今表裏無熱故時時惡風也

白虎加人參湯

治渴而脈洪小便利者

石膏

碎肆兩

知母

壹兩半

甘草

壹兩

粳米

壹

人參

伍錢

右以咀每服壹兩水煎溫服

許有人初病嘔吐俄為醫者下之已七八日而內外
 發熱予診之曰當用白虎加人參湯或曰既吐復下
 且重虛矣白虎可用乎予曰仲景云若吐下後七八
 日不解熱結在裏表裏俱熱者白虎加人參湯正相
 當也蓋始吐者熱在胃脘而脈至今虛大三投湯而
 愈仲景既云傷寒若吐若下後七八日不解表裏俱
 熱者白虎加人參湯主之又云傷寒脈浮發熱無汗
 其表不解不可與白虎又云脈浮滑此以表有熱裏

有寒白虎加人參湯主之。國朝林億校正謂張仲
景於此表裏自差矣予謂不然大抵白虎能除傷寒
中渴表裏發熱故前後二證或云表裏俱熱或云表
熱裏寒皆可服之一種脈浮無汗其表不解全是麻
黃與葛根證安可行白虎也林億見所稱表裏不同
便謂之差是亦不思之過也

張用藥有遲速之弊故設法以關防法有關防不盡
者則著方以拯治也假如上一二條前條乃仲景設法
以關防也後條及傷寒病若吐若下後七八日不解
結熱在裏表裏俱熱時時惡風大渴口舌乾燥而煩

欲水數升者以白虎加人參湯主之此二條則著方
以拯治也夫白虎湯專治大煩大渴古人設法之意
惟恐表證未罷而輒用之治有太速之弊若背微惡
寒及時時惡風二證其中煩渴已甚非白虎不能遏
也必俟表邪俱盡未免有太遲之愆也此乃法之關
防不盡者故著方以拯治也苟不著方必然違法此
方法之妙所以不可偏廢也

吳或問白虎湯仲景以表不解者不可與又時時惡
風背上惡寒者此有表也又以白虎主之何也蓋石
膏辛寒解足陽明經本熱蒸蒸發熱潮熱表裏皆熱

舌燥煩渴之聖藥也且時時者時或惡風而不常也
背上惡者但覺微惡而不甚也所有盛熱躁渴而用
則無疑矣若夫表證惡寒常在背上惡寒而不燥渴
者切不可用也又太陽經發熱而渴無汗者不可與
之但汗後脈洪大而渴者則可與也如陰傷寒面赤
煩躁身熱與其胃虛惡心大便不實脈弱食少無大
熱者切不可用也如誤用之則傾危可立而待矣
太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴
日晡小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大
陷胸湯 傷寒發熱惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗

小便便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫痃期門

復利其小便故也 白虎加入參湯小柴胡湯去半夏加瓜蒌竹葉○張其陽明汗多此陽明

病去利而渴胃中津液乾燥若與猪苓湯利其小便是為實實虛虛之弊也 陽明病脈浮

而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加入參湯主之若

脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

少陽傷寒中風往來寒熱胸脇滿默默不欲飲食心煩喜嘔或渴或欬者小柴胡湯若渴者去半夏加入參括
蕒根 傷寒四五日身熱惡風項強脇下滿手足溫而

中字禾可作

傷寒論

卷之三

五十七

渴者小柴胡湯 得病六七日脈遲浮弱惡風手足溫
 醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身頸項強小
 便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者柴胡不
 中與也或云下重渴欲飲水嘔者五苓加茵陳蒿湯
 少陰渴而下利屬少陰其病但蕪欲寐小便白者四逆
 湯蕪咳嘔不得眠小便不利者猪苓湯蕪自利純青色
 水者大承氣湯有熱者白頭翁湯方論見
 厥陰消渴氣上衝心心疼飢不欲食食則吐衄若下之
 則利不止若欲飲水少少與之愈邪傳厥陰則熱已深也邪自太陽傳至太
陰則腹滿而咽乾未成渴也邪至少陰者口燥舌乾而渴未成消也至厥陰而消渴者熱甚能消水故也飲水

兼頭汗

兼咳嗽

暑

多而小便少者謂之消渴木生于火肝氣通心厥陰容
 熱氣上衝心中疼熱傷寒六七日厥陰受病之時為
 傳經盡則當入府胃虛客熱飢不欲食蛇在胃中無食
 則動聞食氣而出得食蛇出此熱在厥陰經也設使下
 之虛其胃氣厥陰木邪相乘必吐下不止按
 成氏為表陽邪傳裏者非也消渴心中疼熱也
 隨病治例渴而頭汗小便不利兼脇滿往來寒熱者柴
 胡桂枝乾薑湯蕪發黃者茵陳蒿湯論見
 表不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽或渴或利或噎或
 小便不利少腹滿或喘小青龍湯 又心下有水氣咳
 而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍
 湯俱宜去半夏加括蕪根
 夏月汗出惡寒身熱足冷而渴者為中暑白虎加人參

傷寒論

卷之三

五十七

表未解

表解

脇滿寒熱

結胸病

欲飲不

參湯及酒黃連主之

方見中暑惡寒身熱者證似表也足冷者不可表

發熱惡寒腹滿汗出小便利而渴者為肝乘脾刺期門

論見腹滿

表解不惡寒而渴者宜白虎湯

渴而脇滿及往來寒熱其證未經汗者小柴胡去半夏

加人參瓜蒌湯若汗下後者柴胡桂枝乾薑湯

詳見脇滿痛者

往來寒熱

渴而心下鞭痛日晡潮熱不大便者為結胸宜大陷胸

湯若但鞭不痛者為痞與瀉心湯不解反渴而小便不

利者宜五苓散

詳見結胸痞氣小二門

病在陽明應汗之反以冷水噀之灌之其熱益煩肉上

粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不瘥與五苓湯

論見結胸

文蛤散方

文蛤

壹兩即海蛤粉也河間丹溪多用之大能治痰

右一味為散沸湯調服方寸匕

渴不能飲

渴欲飲水逆

渴欲飲水者少

渴欲飲水而不能飲者丹田有熱胸中有寒

論見濕痺

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入

則吐者名曰水逆五苓散主之

渴欲飲水若太陽發汗後大汗出煩躁不得眠者及厥

陰病氣起衝心心疼吐衄者少少與之愈

論見前條及氣上衝

傷寒論

卷之三

六十

診

凡得時氣病至五六日而渴欲飲水不能多不當與之
 何者以腹中熱尚少不能消之更與水作病也至七八
 日大渴欲飲水者猶當依證與之與之常令不足勿極
 意也言能飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘
 若噦不可與之忽然大汗出是為自愈也活人云凡病
飲水若小渴咽乾者少少
呷潤之令其胃中和乃佳
 凡得病反能飲水此欲愈也但聞病飲水自愈小渴者
 亦強與之飲因成其禍不可復救活人云強飲水致飲
以五苓散或
陷胃湯主之
 而下利脈弱脈數而渴者自愈論見
論見
論見
 而發熱其脈不弦緊而浮弱者汗出愈論見
論見
論見
 渴

禁忌

要活人云切戒太陽證無汗而渴者不可與白虎湯
 陽明證汗多而渴者不可與猪苓湯然太陽渴終不
 可與白虎耶太陽證得汗後脈洪大而渴者方可與
 之也陽明渴終不可與五苓散耶陽明證小便不利
 汗少脈浮而渴者方可與之也

趙活人切戒太陽證無汗而渴者不可與白虎湯陽
 明證汗多而渴者不可與五苓散愚詳仲景論治渴
 藥有不可與之戒有二傷寒脈浮發熱無汗渴欲飲
 水無表證者白虎加人參湯表不解不可與活人不
 云表不解但云無汗不可與則誤矣經云陽明汗多

而渴不可與猪苓湯活人改作五苓散蓋猪苓專滲
泄五苓兼汗利安得而改之經既云汗多而渴者不
可與猪苓湯而太陽傷寒汗出而渴復用五苓散者
蓋渴雖同汗之多寡則異太陽屬表未至汗多胃躁
故用五苓滲熱和表非若陽明屬裏汗多而胃躁也
經又云陽明發熱汗多急下之均是陽明汗多前證
戒利小便此證不戒利大便何也蓋渴者邪氣散漫
在經未收斂入胃作實此證不渴則內已作實外又
發熱恐熱內竭津液故急下之且猪苓五苓又有可
疑者太陽病脈浮小便不利微熱消渴者五苓散陽

明脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯也證
同何故用藥之不同耶然大陽邪在表發汗不解故
用五苓和表行津液陽明邪已入裏熱客下焦故用
猪苓滲瀉其熱噫白虎猪苓五苓等藥若能證察于
機微治明于權變則可與不可與庶得仲景之妙外
有自利而渴條下註云傷寒熱入于藏流于少陰之
經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲註用猪苓湯白頭
翁湯又後下利問中重出自利而渴條下却云腎虛
故引水自救通用白通四逆猪苓等湯一問以渴為
熱一問以渴為虛水炭不祥何憑分別又且分隸兩

門設使後人臨病檢閱前後兩不相聞疑誤豈小今
詳定少陰病欬而下利嘔渴心煩不得眠及厥陰證
下利欲飲水是皆傳經之邪熱必沉細數仲景故
以滑石黃連等清利之其或少陰自利而渴欲吐不
吐心煩但欲寐是直入本經之陰邪也脈必沉微仲
景故以附子乾薑溫之本問何不如此明示脈證合
為一門而明辨之庶一見而兩得焉清之溫之隨其
攸利又何疑誤之有

吳凡渴當分六經而治太陽經標熱在表則不渴若
熱傳入膀胱之本則煩渴脈浮數小便不利也五苓

散切不可與白虎湯凡陽明病脈長標熱無汗而渴
者葛根解肌湯或六神通解散倍葛根以汗解之若
陽明熱傳于胃中本熱惡熱濺濺汗出而渴脈浮洪
數者人參白虎湯五苓不中與也若陽明本熱或蒸
蒸而熱潮熱煩渴舌燥口乾飲水大便實者大柴胡
湯或調胃承氣湯下之若內未實尚未可下宜小柴
胡增損用之少陽脈弦數口苦咽乾發熱而渴者小
柴胡去半夏加瓜蒌根餘見本條太陰自利則不渴
惟少陰有口苦飲水小便色白者此下有寒也脈沉
者附子湯若身寒厥逆脈滑而口渴者此裏有熱也

人參白虎湯凡陰證煩躁口渴不能用冰厥沉足冷者宜四逆湯冷飲之凡傷寒時氣等證欲飲水者為欲愈蓋得水則能和其胃氣汗出而解不與水則乾燥無由而作汗遂致悶亂而死也凡與水須察病人勇怯邪熱輕重多少與之寧從不及不可太過恐水多不能滲化停畜為害多矣其水須用新汲井中者為良凡熱病熱甚大便實者以玄明粉一二錢加入水中飲之最妙凡中暑煩渴者加辰砂天水散調水中飲之尤良如虛人煩渴不飲水以燈心煎湯浸水中與之凡口渴細茶湯白梅湯棗豆湯皆可飲香水

梨雪梨嫩藕西瓜皆可食凡用冰須以涼水洗去鹽味方可

戴凡渴問其所欲欲冷欲熱欲多欲少若飲多而欲冷者陽渴也更須審其有何證在經也其太陽證小便不利而渴者五苓散其陽明證大便不利而渴者宜於前本經求之已利猶渴宜白虎湯其少陽證寒熱往來而渴者小柴胡湯去半夏加括蕒根如其數陰亦有自利而渴各已見本經但陰有渴古人多用冷劑以其皆挾陽氣且經雖陰而病則陽也然亦有下清穀不係熱利純是陰證而反見渴者此是陰在

下隔陽於上兼因洩瀉津液既去枯燥而渴其人雖引飲所飲自少而常喜溫不可投冷劑宜理中湯或四逆湯加人參一錢渴甚連理湯有陽證不渴陰證反渴者陽明不甚渴太陰乃大渴不可不知治渴一也有堅腎水而渴止者有利小便而渴愈者堅腎水則用天花粉之屬利小便則用茯苓猪苓之類蓋太陰以利小便為先陽明以利小便為戒少陽以膽經半表半裏未可下之其人或大渴不止當以小柴胡湯加天花粉之屬堅其腎水腎水既堅自還滲入大腸大便微通熱去而渴解若病在太陽太陽在膀胱腎經非利小便則熱無從去渴何由愈外有非太陽證煩躁發渴此乃陰盛隔陽不當潤其渴惟當治其陰

○附

羅傷寒食少而渴者當以和胃之藥止之不可用涼藥止之也恐復損胃氣愈不能食白朮茯苓是也

海秦二母病太陰病三日不解後嘔逆惡心而脈不浮與之半硫丸二三服不止復與黃芪建中湯脈中極緊無表裏病胸中大熱發渴引飲皆曰陽證欲飲之水予反與薑附等藥緊脈反沉細陽猶未生以桂附薑烏之

類酒丸與百九接之二日中十餘服病人身熱煩躁不寧欲作汗也又以前九接之覆以厚衣陽脈方出而作大汗翌日大小便始通下瘀血一盆如猪肝然用胃風湯加桂附三服血止其寒甚如此亦世所未見也少陰證口燥舌乾而渴尺寸脈俱沉沉遲則四逆湯沉疾則大承氣湯少陰口燥舌乾而渴身表涼脈沉細而虛者瀉心湯主之此有形無形藥也

人參湯 治傷寒七八日汗後心煩燥渴

人參

黃芩

柴胡

葛根

山梔

甘草

各壹兩

炙各半兩

右為麤末每服五錢薑棗煎溫服

活陽毒倍常燥盛大渴者黑奴丸主之方見風溫加

渴甚者宜瓜蒌湯方見中暑伏熱累治不瘥其人發

渴不已酒蒸黃連丸主之方見

脈熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲水不止

腹大而脹尚不厭飲目無精光者死不治

朝大而翹尚不翹增目無翹頭昏夜不寐

頭熱赤舌質令人噁口並舌赤黃赤黃赤治增木不五

噁不日噁蒸黃與水主之

噁其音宜瓜雙噁風盛中胃火熱累谷不藥其人發

舌則毒對常熱瀉火噁音黑對水主之風盛風盛吐

古為癰末其則正疑傳策煎盛則

乾嘔欲吐

成嘔者聲物兼出也俗謂之哕非也夫哕與噦蓋字異

而音義俱同吐者但吐出其物而無聲故有乾嘔而無

乾吐嘔有責為熱者責為寒者至於吐家則悉言虛冷

也嘔又有停飲者有胃脘有膿者皆當明辨之嘔而發

熱者柴胡湯證具與其嘔不止心下急鬱鬱微煩大柴

胡湯主之者是邪熱為嘔也膈上有寒飲乾嘔者不可

吐也當溫之與其乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

是寒邪為嘔也先嘔後渴者此為欲解先渴後嘔者為

水停心下此屬飲家是停飲嘔者嘔家有癰膿不須治

膿盡自愈是胃脘有膿而嘔也諸如此者雖有殊別大抵傷寒表邪欲傳裏裏氣上逆則為嘔也是以半表半裏證多云嘔也傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪是知邪氣傳裏者必致嘔也至於乾薑附子湯證云不嘔不渴為裏無熱十棗湯證云乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也即此視之其嘔為裏熱明矣嘔家之為病氣逆者必散之痰飲者必下之千金曰嘔家多服生薑此是嘔家聖藥是要散其逆氣也金匱要略曰嘔家用半夏以去其水水去嘔則止是要下其痰飲也嘔多雖有陽明證不

可攻也謂其氣逆而未收斂為實也其嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者已為難治蓋謂其虛寒之甚也醫者必審其邪氣之虛實疾證之逆順為施藥劑治則當矣

太陽病或已發熱未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒麻黃湯 太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈

按仲景雖曰嘔家雖有陽明證不可攻攻之為逆然陽明伏熱熏蒸清道而嘔且煩者非以苦寒直折之不可也故用大柴胡下之 傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下

利者大柴胡 太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而
胃中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下
者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胃中痛微
澹者此非柴胡證以嘔故知極吐下也成心下溫溫欲吐鬱鬱微煩胃中痛當責邪熱容於胸中大便反澹腹微滿則邪熱已下於胃也日數雖多若不經吐下止是傳邪亦未可下當與柴胡湯以除上中二焦之邪若曾吐下傷損胃氣胃虛則邪乘虛入胃為實非柴胡湯所能去調胃承氣湯下胃熱以嘔知胃氣先曾傷動也○按經文溫溫當作嘔嘔又以嘔下當有闕文蓋嘔家正為柴胡證也豈逸微澹和嘔而發熱者小柴胡湯主之 傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之 太陽與陽明合病不利但嘔者

葛根加半夏湯主之活人云頭疼身熱肌熱目疼鼻乾而浮而長是也
葛根半夏湯方

葛根 半夏各貳錢 麻黃 生薑各壹錢半

甘草 芍藥 桂枝各壹錢 大棗貳枚

右咬咀以水一斗先煎麻黃葛根減二升去白沫納諸藥煎取三升溫服一升覆取微汗

陽明傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濇濇然者是

轉屬陽明也大柴胡湯 食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯

主之得湯反劇者屬上焦也葛根半夏湯 傷寒嘔多雖有

陽明證不可攻之黃芩生薑半夏湯小柴胡湯活人用結便湯

傷寒

卷之三

六

陽明病脇下鞅滿不大便而嘔舌上白胎者可與小

柴胡湯陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛或用真武湯去茯苓

少陽嘔而往來寒熱胸脇苦滿者宜小柴胡若兼下利者乃太陽少陽合病宜黃芩加半夏生薑湯論見往來

利○太陽陽明合病自下利為在裏當與葛根湯發汗陽明少陽合病自下利者為在裏可與承氣湯下之此

太陽少陽合病自下利為在半表半裏非汗下所宜故與黃芩湯以和解之嘔者胃氣逆也故加半夏生薑以

散逆傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他

藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯血弱氣盡腠理

開邪氣因入與正氣相搏結于脇下正邪分爭往來寒

熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高

痛下故使嘔也小柴胡湯主之邪氣外甚陽不主裏裏

但下利而不嘔裏氣上逆而下者何嘔而渴而飲

不下利也與小柴胡湯以切脈半表半裏之邪

水嘔者柴胡不中與也活人云宜治脇間水赤

太陰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自

痛若下之必胸下結鞅

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯

主之少陰病下利脈微澀嘔而汗出必數更衣反少

者當溫其上灸之少陰病二三日不已至四五日腹

痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣其

身重

傷寒論

卷之三

七

人或欬或小便便利或下利或嘔者真武湯去附子加生薑

厥陰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便便利色白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胸

脇煩滿者其後必便血黃芩芍藥湯抵當湯嘔而脈

弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯傷寒本

自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾

薑黃連黃芩人參湯傷寒邪自傳表為本自寒下醫反

吐下損傷正氣寒氣內為格拒經

曰格則吐逆食入口即吐謂之寒格更復吐下則重虛

而死是更逆吐下與乾薑黃芩人參湯以通寒格吐證經云

仲景之意以本因寒下醫復吐下因成寒格吐證經云

格則吐逆若更復吐下治之為逆故用乾薑以溫裏黃

連黃芩反佐以取之人參補正氣也今活人却言關脈

遲故用此藥何耶雖然脈遲為胃中虛冷而吐者仲景嘗言之矣病人脈

又有脈數為客熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣

微鬲氣虛脈乃數也數為客熱不能消穀以胃中虛

冷故吐也今以其脈異證同故引此以為診視之別

虵厥者其人當吐虵今病者靜而復時煩此為藏寒虵

上人膈故煩須臾復上得食而嘔又煩者虵聞食臭出

其人當自吐虵烏梅丸詳吐

渴先渴却嘔者為水停心下此屬飲家活人云赤茯苓湯主之

先嘔却渴者此為欲解候也金匱云嘔思水者急與之

下利嘔而下利有寒熱者為陽宜黃芩湯大柴胡湯無

熱者為陰宜猪苓湯真武湯並見吐利門

傷寒論

卷之六

煩嘔而心煩若汗吐下後者梔子生薑豉湯若未曾吐
汗下後兼欬而渴者宜猪苓湯詳見不
得眠
嘔家有瘕膿者不必治膿盡自愈 服桂枝嘔者酒客
病

戴陽明證且雖顯然有可下證者兼之嘔多猶屬上
焦未可遽下宜小柴胡湯若太陽不與少陽陽明合
病而獨見太陽證或吐瀉者恐病人高間素有痰飲
停飲傷滯且以一陳湯定之候嘔吐定徐進解太陽
經藥若先嘔却渴者宜猪苓湯先渴却嘔者宜治高
間之水小半夏茯苓湯渴欲飲水水入即吐吐已復

渴名曰水逆由心經受熱而小腸不利也宜五苓散
若少陰不渴而吐或乾嘔者理中湯去白朮加生薑
嘔而吐涎沫者吳茱萸湯 太陰厥陰間有嘔吐太
陰宜理中湯厥陰宜四逆湯並加生薑煎已上陰證
乃陰中之陰宜用熱劑陽入陰者能為利而不為嘔
嘔屬上而近於外也陽之所入者深故利也 又有
陽證病新瘥後見嘔別無所因此餘熱在胃脘也宜
竹葉石膏湯或橘皮竹茹湯 大凡得之太陽而嘔
者必是合病嘔乃病漸入內非正太陽也曾記有人
初得病太陽證有嘔吐不住藥投暖劑莫能治之知

太陽已汗解固當用冷劑是太陽見嘔非合陽明則
合少陽其嘔為熱用暖劑非矣又記有人初病其
太陽證而嘔一家少長患狀悉類與養胃湯入服無
不立效此時行之氣適然如此是為傷寒雜病又非
可以正經傷寒律之也

吳初得之嘔逆嘔噦清水嘔吐飲食者皆著寒傷胃
也如惡寒拘急未發熱而嘔逆或吐食者宜加減藿
香正氣散或人參養胃湯若已發熱者十味芎蘇散
發散或葛根湯加生薑半夏若自汗者不可發汗宜
正氣散去紫蘇以和之凡發熱口苦脈弦數而嘔心

煩而嘔胸脇滿而嘔往來寒熱而嘔日晡發熱而嘔
皆屬少陽並小柴胡倍加半夏生薑主之熱少減黃
芩口乾加葛根括蕒根心煩加薑汁炒黃連心下痞
滿加枳實若潮熱內實不大便嘔不止心下鬱鬱微
煩者大柴胡下凡嘔吐胃家有熱脈弦數口苦煩渴
胃有寒脈弦遲逆冷不食有冰氣先渴後嘔腹滿怔
忡有膿血痰中腥氣奔逆上衝不煩治之嘔膿盡自
愈此四者不可不辨凡太陰腹滿吐食不下或腹痛
嘔吐脈沉者理中湯加半夏陳皮藿香厚朴生薑之
類寒甚加附子凡少陰飲食入口即吐心下溫溫欲

吐復不能吐手足寒脈沉細者四逆湯加半夏生薑
橘皮之類凡厥陰嘔吐涎沫逆冷脈沉微者吳茱萸
四逆湯加半夏生薑陳皮之類

乾嘔欲吐太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱
者汗自出齋齋惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者
桂枝湯傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或
渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯
張或問小青龍與小柴胡證皆嘔而發汗表裏之證
大槩彷彿何故三方用藥之不同曰夫傷寒表不解
裏熱未甚而渴欲飲水不絕此多不當與之以腹中熱

尚少而不能消水飲停蓄故作諸證然水寒作病非
溫熱之劑不能解故用小青龍湯發汗散水原其理
初無裏證因水寒以致然也夫小柴胡證係傷寒發
執執邪傳裏在于半表半裏之間熱氣內攻故生諸
證緣二證雖曰表裏俱病其中寒熱不同故用藥有
薑桂柴苓之異也

傷寒中風醫反下之其人下利日十數行穀不化腹中
雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂
病不盡復下之其痞益甚此非熱結但以胃中虛客氣
上逆故便鞭也甘草瀉心湯傷寒一日太陽受之脈

傷寒論

卷之二十三

七十四

若靜者為不傳，煩欲吐，若躁煩，脈數急者為傳也。宜與麻黃湯。表罷，小柴胡、白虎湯。傷寒胸中有熱，胃中有邪氣，腹中痛，欲嘔吐者，黃連湯。太陽中風，下利嘔逆，表解者可攻之。其人漿漿汗出，發作有時，頭痛，心下痞，鞭滿，引脇下痛，乾嘔，短氣，汗出不惡寒者，此表解裏未和也。十棗湯。太陽病不解，轉入少陽者，脇下鞭滿，乾嘔，不能食，往來寒熱，尚未吐下，脈沉緊者，與小柴胡湯。

張或云乾嘔脇痛小柴胡十棗湯皆有之一和解一攻伐何也蓋小柴胡病在半表半裏間外有寒熱往來內有乾嘔諸病所以不可攻下宜和解以散表裏之邪夫十棗湯證外無寒熱其人漿漿汗出此表已解也但頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣者邪熱內蓄而有伏飲是裏未和也與十棗湯以下熱逐飲已上二證宜

從表證以夾有裏證而乾嘔脇痛者乃柴胡湯證也無表證而乾嘔脇痛即十棗湯證也上文所言頭痛者而欲吐者屬陽明也吳茱萸湯得湯反劇者屬上焦也小

柴胡湯。梔子豉湯。黃芩湯。食穀欲吐者胃不受也與吳茱萸湯以溫胃得湯反劇者

上焦不納也少陰病，飲食入口即吐，心中噓噓欲吐，不能

吐，始得之，手足寒，脈弦遲者，此胸中實，不可下。當吐之。若膈上有寒飲，乾嘔者，不可吐也。急溫之，宜四逆湯。

少陰病，下利不止，脈逆，無脈，乾嘔，煩者，白通加豬膽汁湯。少陰病，下利，清穀，裏寒外熱，手足厥冷，脈微欲絕，身反不惡寒，其人面赤色，或腹痛，或乾嘔，或咽痛，或利

傷寒論

卷之二十三

七十五

正脈不出者通脈四逆湯 少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也 太陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥者死 病解後虛羸少氣欲吐者竹葉石膏湯

○附

赤茯苓湯 治傷寒嘔噦心下滿胃膈有停水頭眩心

悸

赤茯苓

人參 各壹兩

半夏 薑製

橘紅

芎藭

白朮 各半兩

右咬咀每服四錢薑五片水煎服

葛根湯 治傷寒乾嘔不正

葛根

人參

麥門冬 去心

炙甘草 各壹兩

半夏 薑製

黃芪 各柒錢

白茯苓

白朮 各半兩

右咬咀每服三錢生薑三片棗二枚同煎服

本如里母煎三錢半薑三錢棗二枚同煎服

白茯苓

白朮

各半兩

炙甘草

半夏

薑棗

黃芩

各半兩

葛根

人參

麥門冬

去心

葛根湯 治 傷寒 項背 強 不 屈 水 煎 服

少陽病 口苦咽乾 眩 往來寒熱 胸脇痛

胸滿 胸痛 耳聾

少陽經治法雖悉屬和解然有誤汗譏語屬胃一證宜調胃下之少陽雖無汗解之法然有小柴胡加薑桂者亦溫解微汗之意又此經本證脅痛耳聾寒熱往來乾嘔或嘔苦水宜小柴胡湯和解之倘不解者却宜大柴胡湯下之若胃脇多痰瓜蒂散吐之斯仲景之微旨也

和解 小柴胡湯 小柴胡加桂湯

吐 瓜蒂散

傷寒少陽病 桂之三

下六

調胃承氣湯 大柴胡湯

少陽之病口苦咽乾目眩也

乙經曰膽者中清之府五藏取決於膽咽為之使少

柴胡湯 尺寸俱弦者少陽受病也以其脈循脇絡於

耳故胸脇痛而耳聾或云少陽篇有胸脇滿而無痛

為中風口苦咽乾目眩為傷寒 少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿

而煩者不可吐下吐下則悸而驚 誤吐氣虛者悸

寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則

譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸 成經曰三

受病脈細者邪漸傳裏雖頭痛發熱為表未解以

細知邪客少陽為半在表半在裏則不可發汗發汗亡

胃承氣湯中乾燥少陽之邪因傳入胃必發譫語當與調

故煩而悸凡頭痛俱為在表惟此頭痛為少陽者何

宜重則小承氣湯則大柴胡蓋少陽不可下陽明不可

承氣主之誤矣調胃承氣 傷寒三日少陽脈小者欲

太陽陽明藥也則邪至小則平傷寒三日邪傳

也少陽脈當弦緊今脈小者邪氣微而欲已也

陽病欲解時從寅至辰上 氣寅卯辰少陽木旺之時

海辨表裏中三說假令少陽證頭痛往來寒熱脈浮

此三證但有一即為表也口失滋味腹中不和

小便或閉而不通或泄而不調但有一即為裏也

如無上下表裏證餘皆虛熱也是病在其中矣

張或謂少陽膽經繫紆盤屈皆多于各經及觀少陽篇中治證至簡又不聞何藥為本經之正法何也夫經絡所據太陽在後以為表陽明在前以為裏少陽在側夾于表裏之間故曰半表半裏治法在表者宜汗在裏者宜下既居兩間非汗下所宜故治療無正法也經曰少陽中風兩耳無聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚上條又云不可發汗似此其汗下吐三法皆少陽所忌其劑不過和解而已所以仲景止以小柴胡湯而為用至當也然而經絡支別雖多所行非由正道故為病亦不能多矣

口苦咽乾

口乾

舌乾

咽不利

口爛

成咽乾口燥舌澀俱為熱證但有微甚耳惟太陽中寒桂枝附子湯證由誤汗咽乾作甘草乾薑湯以復其陽者隨其逆治壞病者非治其本寒也然咽乾之由有由汗下後而得者有不因汗下而得者其間治法或和解或微汗或急下或微下當考兼有之證而施輕重之治然其為熱則一也蓋經謂咽喉乾燥亦不可汗以其多有裏證故也實無寒病善治者尤宜互考渴條乃獲

全功

太陽咽喉乾燥者不可發汗津液不足也

傷寒脈浮自汗

傷寒口燥
小便數心煩微惡寒脚攣急本桂枝附子湯證反與桂
枝湯攻表得之便厥咽乾煩躁吐逆者甘草乾薑湯
傷寒吐下後七八日不解表裏俱熱時惡風大渴舌
上乾燥而煩者白虎加人參湯 本下之心下痞與瀉
心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散
太陽病重發汗復下之不大便五六日舌上燥渴日晡
小有潮熱從心下至小腹硬滿而痛者大陷胸湯
陽明病腹滿脈浮緊口苦咽乾而喘若其人發熱惡寒
誤下之則腹滿小便難若其人發熱不惡寒反惡熱誤
下之則胃空虛為懊憹誤下之則譫語誤加燒針則不

得眠

許學士云宜小柴胡湯

陽明病口燥

漱水不欲飲者必

或用黃芩芍藥湯犀角地黄湯

陽明病汗若下後渴

欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯

脈浮發熱口乾

鼻燥能食者必衄或用黃芩湯

陽明中風口苦咽乾

腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊或用麻黃小柴胡湯

少陽口苦咽乾目眩宜小柴胡湯

少陰病自利清水色純青心下痛口乾燥者急下之宜

大承氣湯 少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之

大承氣湯 成傷寒傳經五六日邪傳少陰則口燥舌乾

氣未深入之時便作口燥咽乾者是邪熱已甚腎水乾也急與大承湯下之以全腎也正經自病其深入宜急

傷寒口燥

失之三

下之若躁則死腎水乾燥故也○張或云承氣湯陽明
當下之證宜用今少陰病亦用何也蓋胃為水穀之海
主養四旁四旁有病皆能傳之入胃其胃土燥則腎水
乾以二三日則口燥咽乾是熱之深傳之速也故曰急
下之以全腎水夫土實則水清謂水穀不相混故自利
清水而口乾燥此胃土實熱而致然也下利色青青肝
也乃肝邪傳腎緣腎之經脈從肺出絡心注胸中由是
而心下痛故急下以去實熱逐腎邪其六七日腹脹不
大便以入府之邪壅甚胃土勝則腎涸故急下以逐胃
熱滋腎水蓋陽明與少陰皆有急下之條然而證雖不
同其入府之理則一是以皆用大承氣也○按舌乾輕
咽乾重者蓋咽舌雖皆通于少陰之絡而舌又為心之
苗也傷寒喜陽而惡陰故舌乾為輕也

厥陰傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥冷下部
脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者難治麻黃升麻
湯傷寒一二日至四五日而厥者必發熱應下之反

發其汗必口傷爛赤

吳少陰脈疾可下脈沉附子湯加知母黃檗麥門冬
五味子天花粉若虛熱病後煩熱不解者以竹葉石
膏湯須去半夏加天花粉潤之凡發汗吐下後口燥
咽乾此津液衰少腎水不升虛火上炎也宜生津益
氣湯或竹葉石膏湯若脈沉微足冷舌燥者多難治
其少陰有急下以救腎水之例若虛人水竭火燥不
可下者以補中益氣湯倍加人參五味麥門冬天花
粉黃檗知母以滋水也

狐惑病亦咽乾默默不欲眠目不能閉聲啞咽乾為狐

傷寒口燥

惑但蟲蝕下部者為狐其咽乾下唇有瘡黃連犀角湯
趙活人謂脾藏有熱則津液枯少故令口燥而咽乾
津液枯少固也然非獨脾藏有熱脾主太陰太陰腹
滿而咽乾此可言脾熱特一證耳餘皆非也如白虎
加人參湯證口舌乾燥者表裏俱熱也口苦咽乾者
少陽經熱或陽明中風也口燥咽乾急下之自利清
水色純青心下痛口乾燥者少陰經熱也咽乾煩躁
吐逆者誤汗津液少而欲作陽明內熱者如上數
證豈亦脾藏有熱哉

眩

凡傷寒頭眩者莫不因汗吐下虛其上焦元氣之所致
也眩者目無常主頭眩者俗謂頭旋眼花是也眩冒者
昏冒是也少陽口苦咽乾目眩者少陽居表裏之間以
表邪漸入于裏表中陽虛故目眩也太陽少陽併病或
眩者責其虛也傷寒有起則頭眩與眩冒者皆汗吐下
後所致是知其陽虛也故針經曰上虛則眩下虛則厥
眩雖為虛又陽明中風但頭眩不惡寒者此又風主眩
也凡此皆非逆候及其諸逆發汗劇者言亂目眩者死
噫病勢已成可得半愈及病已劇神醫莫為也

太陽傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩
脈沉緊發汗則動經身為振搖者茯苓桂枝白朮甘
湯主之吐下後裏虛氣上逆心下逆滿氣上衝胸表虛
湯主之陽不足起則頭眩脈浮緊邪在表當發汗脈沉
緊邪在裏不可汗汗則外動經絡損傷陽氣則不能主
持諸脈身為振搖也與此湯以和經益陽○真武湯
主之汗後補不止用傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微
以密腠理未能止汗
八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝咽嗔眩冒經脈動惕
者久而成痿傷寒吐下後發汗則表裏之氣俱虛虛煩
正氣當復邪氣當罷尚心下痞脇下滿氣上衝咽嗔眩
冒者足正氣未復而邪留也經脈動惕者經絡之氣虛
極久則熱氣還經必成痿弱○或
用真武湯桂枝茯苓白朮甘草湯

太陽少陽併病心下鞭頸項強而眩者當刺大椎肺俞

禁下 太陽少陽併病頭項痛眩冒時如結胸心下

痞鞭刺大椎第一間肺俞肝俞禁發汗汗則譫語脈弦

五六日譫語不止刺期門
陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難欲作

穀疸須下之腹滿如故所以然者脈遲故也見前陽明

陽明病但頭眩不惡寒故能食而效其人必咽痛若

不效者咽不痛陽明病身不重但頭眩而不惡寒者陽

食名中風風邪攻胃胃氣上逆則效咽門者胃之系效
甚則咽傷故咽痛若胃氣不逆則不效其咽亦不痛也
○四逆散加桔梗小柴胡乃
本經中風非傷寒小承氣湯

少陽少陽之病口苦咽乾目眩也小柴胡湯加

天麻川芎

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死下利則水穀竭眩冒則陽氣脫

動氣在左誤汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤方論見動氣活人云宜小

建中湯諸逆誤汗而言亂目眩者死論見諸語

吳太陽中風頭眩頭搖者脈浮弦而急也羌活神朮

湯加防風天麻之類若血虛頭眩者以四物湯加人

參天麻之類若痰火上攻者加酒芩竹瀝之類若內

傷勞役陰虛頭眩者宜補中益氣湯加川芎天麻防

風蔓荊子之類若下焦元氣虛脫者宜人參養榮湯

或大建中湯加天麻曾治一婦人服藿香正氣三劑

汗出過多頭眩身搖發熱肌虛數遂用人參養榮湯

倍加人參為主加天麻少佐酒炒黃蘗二服而愈易

老曰頭旋目黑非天麻不能除故加之少加黃蘗以

救腎水也

殊習本也

法曰煎或曰黑非天祿不道創姑也之也吹黃藥以
亂爪入參蒸主味天祿少武臣心黃藥二則而愈
刊出圖之煎如良餅發熱神氣獲後用入參蒸

往來寒熱

成往來寒熱者寒已而熱作熱已而寒起蓋寒為陰熱
為陽裏為陰表為陽邪客于表與陽爭則發寒矣邪入
于裏與陰爭則發熱矣表邪多則寒多而熱少裏邪多
則熱多而寒少邪在半表半裏之間外與陽爭而為寒
內與陰爭而為熱表裏之不拘內外之無定由是寒熱
往來而無常也故以小柴胡立諸加減法以和解之又
寒熱如瘧與夫往來寒熱似是非非也如瘧者止作有
時正氣與邪爭則作分則止矣往來寒熱則止作無時
或往或來日有三五發或者十數發此其與瘧異也雖

傷寒往來寒熱

法之三

八

四

然往來寒熱屬半表半裏當和解之又有病至十餘日
熱結在裏復往來寒熱亦宜大柴胡下而愈 趙傷寒
百問歌第五十九問中以陰陽相勝陽不足則先寒後
熱陰不足則先熱後寒此特論陰陽雜病二氣自相乘
勝然也非可以謂傷寒

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食
心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞
鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或咳者與小
柴胡湯主之此病有在表者有在裏者有在表裏之間
五六日邪氣自表傳裏之時中風者或傷寒至五六日
也王函曰中風五六日傷寒往來寒熱即是或中風或

傷寒非是傷寒有中風中風復傷寒也經曰傷寒中風
有柴胡證但見一證便是不必悉具者正是謂或中風
或傷寒也邪在表則寒邪在裏則熱今邪在半表半裏
之間未有定處是以寒熱往來也邪在表則心腹不滿
邪在裏則心腹脹滿今言胸膈苦滿知邪氣在表裏
之間少陽行身之側胃脇為少陽之部故經曰其脈循
脇絡於耳故胃脇痛而耳聾默默靜也邪在表則呻吟
不安邪在裏則心煩悶亂內經曰陽入之陰則靜默默
者邪方自表之裏在表裏之間也邪在表則能食邪在
裏則不能食不欲飲食者邪在表裏之間未至於必不
不能飲食也邪在表則煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔
心煩喜嘔者邪在表方傳裏也邪初入裏未有定處則
所傳不一故有或為之證有柴胡證 本太陽病不解
轉入少陽者脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐
下脈沉緊者與小柴胡湯此太陽轉入少陽是表邪入
裏脇下鞅滿不能食往來
寒熱邪在半表半裏之間若已經吐下脈沉緊者邪氣
入府為裏實尚未可吐下脈沉緊為傳裏雖深未至入

傷寒卷之九 失之二 六十六

府外猶未解也。若已吐下發汗溫針譫語柴胡湯證罷此為壞病知犯何逆以法治之。成少陽之邪在表裏之間若妄吐下發汗溫鍼損耗津液胃中乾燥木邪干胃必發譫語若柴胡證不罷者則不為逆柴胡證罷者壞病也詳其因何治之逆以法治之○救壞病傷寒五六日已發汗助藥衛生津液桂枝湯求之

而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之。難知曰若用柴胡而移時于早晚氣移于血血移于氣是邪無所容之地故知其欲自解也○傷寒五六日已經汗下之後則邪當解今胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者則邪氣猶在半表半裏之間為未解也胸脇滿微結寒熱心煩者邪在半表半裏之間也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也若熱消津液今小便不利而渴者其人必嘔今渴不嘔知非裏熱也傷寒汗出則和今但頭汗出餘處無汗者

津液不足而陽虛于上也與柴胡桂枝乾薑湯以解表裏之邪復津液以助陽也。血弱氣盡

腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之。按血弱氣盡至結於脇下是釋胃脇苦滿句正邪分爭二句是釋往來寒熱句倒裝法也默默不欲飲食無上文滿痛而言藏府相連四句釋心煩也

小柴胡湯方

- 柴胡 半斤
- 半夏 湯洗 半升
- 人參
- 甘草
- 黃芩
- 生薑 各參兩
- 大棗 十二枚

易經注來歷考

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升

温服一升日三服

成内經曰熱淫于内以苦發之柴胡黃芩之苦以發傳邪之熱裏不足者以甘緩之入參甘草之甘以緩中和之氣邪半入裏則裏氣逆辛以散之半夏以除嘔邪在半表則榮衛爭之辛甘解之薑棗以和榮衛

加減法用此加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加括萋實一枚胸中

不嘔熱聚而氣不逆也甘者令人中滿方熱聚無用人參之補辛散逆氣既不嘔無用半夏之辛温熱宜

寒療聚宜苦括萋苦寒泄胃中温熱若渴者去半夏加人參合前成四

兩半括萋根肆兩而潤括萋根苦而涼徹熱生津二

湯為若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩去黃芩惡寒中加芍藥以

通壅○通壅功若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩少止痛功大入中滿痞者去大棗之甘鹹以奠之痞鞭者加牡蠣之鹹若心下悸小便不利者

去黃芩加茯苓四兩飲而水蓄不行為悸小便不利得苦則水益堅故去黃芩淡味滲泄為陽茯苓甘淡以泄伏水若不渴外有微熱者

去人參加桂三兩温覆取微汗愈不渴者裏和也故表未解也加桂以發汗

若欬者去人參大棗生薑加五味子半

升乾薑二兩發者氣逆也甘則壅氣故去人參大棗之酸以收逆氣肺寒則欬散以辛熱故易生薑以乾薑之熱也

傷寒邪氣在表者必清形以為汗邪氣在裏者必蕩

滌以取利其於不外不内半表半裏是當和解則可

易與主來寒熱 疾之三

也小柴胡和解表裏之劑內經曰熱淫于內以苦發之邪在半表半裏則半成熱矣熱氣內傳變不可測須迎而奪之必先散熱是以苦寒為主故以柴胡為君黃芩為臣以成徹熱發表之劑邪氣傳裏則裏氣不治故用人參甘草為主以扶正氣而復之也邪初入裏氣必逆也是以辛散之物為之助故用半夏為佐以順逆氣而散邪也裏氣平正則邪氣不得深入是以三味佐柴胡以和裏內經曰辛甘發散為陽表邪未已迤邐內傳既未作實宜當兩解其在外者必以辛甘發散故用生薑大棗為使輔柴胡以和表也

七物相合兩解之劑當矣邪氣自表未歛為實乘虛而湊則所傳不一故有增損以禦之胸中煩而不嘔煩者熱也嘔者氣逆也煩而不嘔則熱聚而氣不逆邪氣欲漸成實也人參甘補去之使不助熱也半夏辛散去之以無逆氣也除熱必以寒泄熱必以苦加括萋實以通胸中之鬱熱若渴者津液不足半夏味辛性燥滲津液物也去之則津液易生人參味甘而潤括萋根味苦而堅堅潤相合津液生而渴自已邪氣入裏裏氣不足則壅寒而腹中痛黃芩苦寒而寒中去之則氣易和芍藥酸泄而利中加之則裏氣得

通而痛自己內經曰甘者令人中滿大棗甘溫去之
則鞭滿散鹹以硬壯蠟味酸鹹寒加之則痞者消
而鞭者更若心下悸小便不利水畜而不行也內經
曰腎欲堅急食苦以堅之堅腎則水益堅黃芩苦寒
去之則畜水浸行內經曰淡味滲泄為陽茯苓甘淡
加之則津液通流若不渴外有微熱不渴則津液足
去人參以人參為內之物也外有微熱則表證多
加桂枝以取汗發散表邪也若咳者肺氣逆也甘補
中則氣愈逆故去人參大棗之甘肺欲收急食酸以
收之氣逆不收故加五味子之酸蓋咳本於寒寒氣

內淫則散以乾薑之辛熱生薑乾薑一物也生者溫
乾者熱故以乾易生也

吳或問小柴胡湯近世治傷寒發熱不分陰陽而用
之何也然柴胡之苦平乃足少陽經傷寒發熱之藥
半表半裏之熱除往來寒熱小有日晡潮熱也佐以
黃芩之苦寒以退熱半夏生薑之辛以退寒人參大
棗之甘溫以助正氣解渴生津液則陰陽和而邪氣
解矣但太陽經之表熱陽明經之標熱皆不能解也
如用之豈曰無害若夫令陽寒面赤發熱脈沉足冷
者服之立至危殆可不慎哉及內虛有寒大便不實

傷寒雜病論卷之九

脈息小弱與婦人新產發熱皆不可用也

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯

必蒸蒸而振却發熱汗出而解成邪在半表半裏之間

醫便以藥下之若柴胡證仍在者雖下之不為逆可復

與柴胡湯以和解之得湯邪氣還表者外作蒸蒸而熱

先經下裏虛邪氣欲出內則振振然也傷寒中風有

柴胡證但見一證便是不必悉具柴胡證是邪氣在表

而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利

或為證以法治之不傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但

必待其證候全具也結胸無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出大陷

胸湯主之 詳結胸

大柴胡湯方

柴胡 半斤

半夏 半升

黃芩

芍藥 各三兩

生薑 切 伍兩

大棗 拾貳枚 擘

枳實 炙 肆枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一

升日三服一方有大黃二兩 若不加大黃恐不為

大柴胡湯也

成方有峻緩輕重醫當臨時斟酌如大滿大實堅有

燥屎者非駛劑則不能泄是以有大小承氣湯之峻

傷寒雜病論卷之九

九

利者亦用之何也夫治病節目虛實二者而已裏虛者雖便難而勿攻裏實者雖吐利而可下經曰汗多則便難脈遲尚未可攻以遲為不足即裏氣未實故也此以大柴胡主之凡吐利心腹濡軟為裏虛嘔吐而不利心下痞鞅者是裏實也下之當然况太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先以小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈然嘔不止而微煩裏熱已甚結于胃中故下之則愈二節病證雖有參差其裏實同一機耳皆與大柴胡者宜也

傷寒五六日已發汗而復下之胃腸滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之已發汗而復下之雖不失先發後攻之序及當汗而反下之宜然既汗之邪當自散若不待其全解及內實而復下之是猶傷於早也烏得不結然已發汗則邪勢已衰雖或失之成註欠明故著之

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡 半斤

枳實 兩

桂枝 去蘗皮 兩

牡蠣 煨

乾薑

黃芩 各二兩

甘草 炙 壹兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升

傷寒主來寒熱

温服一升日三服初服微煩再服汗出便愈

成內經曰熱淫於內以苦寒之柴胡黃芩之苦以解
傳表之邪辛甘發散為陽桂枝甘草之辛甘以散在
表之邪鹹以軟之牡蠣之鹹以消胸脇之滿辛以潤
之乾薑之辛以固陽虛之汗津液不足而為渴苦以
堅之括婁之苦以生津液

病人脈微而濇者此為醫所病也大發其汗又數大下
之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱
欲着複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒
陰弱則發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣
弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝
冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰

氣內弱不能勝熱故裸其身又陰脈遲濇故知血亡也

右脈微因大發汗所致故病當惡寒之時雖盛夏亦
欲着複衣服濇因大下所致故病當惡寒後發熱之
時雖盛冬亦欲裸其體是皆亡血陽微陰弱不能勝
冷勝熱非是盛夏卒延至盛冬也

令親痛非甚溫夏為甚至極必死
 却難治冬亦難治其難治者以血弱難治也
 然善醫亦須識因大下而好姑麻當辨寒之辨難溫夏亦
 古麻姑因大發下而好姑麻當辨寒之辨難溫夏亦
 屏內脈不指難辨姑麻其良又創麻善醫姑麻血白也

脇滿痛

邪氣傳裏必先自胸而脇以次經心腹而入胃也是以
 胸滿多帶表證脇滿多帶半表半裏證如下後脈促胸
 滿者桂枝去芍藥湯又太陽與陽明合病喘而胸滿者
 不可下宜麻黃湯一者屬表須汗之蓋胸中至表猶近
 也及脇則更不言發汗但和解而已經曰設胸滿脇痛
 者及胸脇滿不去者與夫本太陽病不解傳入少陽脇
 下硬滿乾嘔往來寒熱脈沉緊者俱宜小柴胡和解之
 也大抵邪初入裏尚未停留為實但鬱積生滿者和解
 斯可矣若留于胸中聚而為實者又非吐下之不可已

傷寒形滿病
如發汗若下之煩熱胸中窒者梔子豉湯若胸中痞硬
氣上衝咽喉不得息者此胸中有寒瓜蒂散二者均是
吐劑又當知梔子吐虛煩客熱瓜蒂吐痰實宿寒也
太陽病十日已去肌浮細而嗜卧者外已解也若胃滿
脇痛者與小柴胡湯肌浮者與麻黃湯 傷寒四五日
身熱惡風頭項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡去半
夏加人參括蕁根主之 傷寒五六日中風往來寒熱
胸脇苦滿不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴
或腹中滿或脇下痞鞭或心中悸小便不利或不渴身
有微熱或欬小柴胡湯主之 傷寒十三日不解胃脇

滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而
不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者
實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之
得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫數下之不
能食脇滿面目及身黃項強小便難者與柴胡湯必
下重 傳經熱邪脇滿乾嘔大柴胡湯 太陽中風下
利嘔逆表解者乃可攻之其人漉漉汗出發作有時頭
痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此
表解裏未和也宜十棗湯
十棗湯方

芫花 炒黑

甘遂

大戟 各等分

右為細末和合之再入日中杵二三百下先以水一升煮肥棗十枚取五六合去香納藥末強人一錢虛人半錢單飲棗湯送下平日服若下少病不除者明日更服加五分利後米粥調養若合下不下令人脹滿遍身浮腫也昔杜壬問孫兆曰十棗湯畢竟治甚病孫曰治太陽中風表解裏未和杜曰何以知裏未和孫曰頭痛心下痞滿脇下痛乾嘔汗出此知裏未和也杜曰公但言病證而所以裏未和之故要緊總未言也孫曰其嘗於此未決願聽開喻杜曰裏未和

者蓋痰與燥氣雍於中焦故頭疼乾嘔短氣汗出是痰膈也非十棗不治但此湯不宜輕用恐損人於條忽用藥者慎之

陽明病潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯主之 陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者小柴胡湯 陽明中風脈弦浮大短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦者小柴胡湯脈但浮無餘證者麻黃湯 本渴而飲水欲嘔者柴胡不可與也食穀者噦不欲飲水而嘔者柴胡證也 若因水而嘔者水停心下也

傷寒論卷之六

失之三

少陽脇滿乾嘔往來寒熱者屬少陽方論見往來寒熱

厥陰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小

便利色白者熱除也欲得食為病愈若厥而嘔胸脇煩

滿者必便血黃芩芍藥湯小柴胡湯抵當湯

吳綬治脇下痛加枳殼青皮桔梗芍藥脇下硬加牡

蠣粉若增寒拘急往來寒熱而胸脇滿者加桂枝白

芍藥俱小柴胡湯內加之

婦人發熱惡寒經水適來熱除肌遲身涼脇滿如結胸

狀謔語者刺期門論見謔語

吐下汗後脈微心下痞脇痛氣上衝咽眩冒肌動惕者

成痿論見下後脈弦者必兩脇拘急脇下素有痞

連在臍傍痛引少腹入陰筋者名藏結死左右者陰陽

部也宿痞在脇則陰陽之道路不通故邪不得傳經而直入于藏是以死也

通

便和色白者熱除也欲得食為病愈不厥而嘔胸膈實
滿者必便血胡湯抵當湯

吳緩治胸下滿加枳殼兩皮枳殼為藥腸下硬加牡
蠣粉若增寒枳殼急行水熱而胸膈滿者加桂枝白

下不特轉惡而直入于熱其又非也
戰栗微汗身熱此少鄭人創首
也寒者不可用也必兩相併發
則不寒者亦不可

胸滿 論見前胸滿痛條 內無胸病者已前見

太陽太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯

陽受氣于胸中喘而胸滿者陽氣不宣發壅而逆也心
下滿腹滿皆為實當下之此以為胸滿非裏實故不可
下雖有陽明然與太陽合病

中室者梔子豉湯 陽受氣于胸中發汗若下使陽氣不
而胸中窒塞與梔子 病如桂枝證頭不痛項不強寸
豉湯以吐胸中之邪

脈微浮胸中痞鞅氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒
也當吐之宜瓜蒂散 病如桂枝證為發熱汗出惡風言

若頭項不痛強則邪不在表也頭痛項強為桂枝證具
在裏今寸脈微浮則邪不在表而傳裏也浮為在表沉為
中與表相應故知邪在胸中者猶如桂枝證而寸脈微
浮也以胸中痞鞅上衝咽喉不得息知寒邪客于胸中
傷寒胸滿

而不在表也千金曰浮上部填塞胸中滿者吐之
則愈與瓜蒂散以吐胸中之邪若氣不上衝則不可用
也

太陽病下之脈促胸滿者桂枝去芍藥湯方論見
若脈促不結胸者欲解也下後胸滿小便不利若

無煩驚譫語身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯
元驚若蕪噦而舌胎者為濕痺

陽明潮熱大便溏小便可胸脇滿屬陽明見脇
少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者若吐下之

則悸而驚救逆小柴胡去黃芩加茯苓湯少陽之脈起
耳中其支者下胸中貫膈風傷氣風則為熱少陽中風

氣壅而熱故耳聾目赤胸滿而煩邪在少陽為半表半
裏以吐除煩吐則傷氣氣虛者悸

以下除滿下則止血血虛者悸

太陰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自

痛若下之必胸下結鞅太陰為病陽邪傳裏也太陰之

不得降者嘔吐而食不下不得升者曰利益甚時腹
自痛陰塞在內而為腹痛者則為常痛此陽邪干裏雖

胸下為結鞅經曰病發于陰而反下之則陰邪留于
湯理中湯元不瀉四逆湯趙活人第十八問中云太

陰者脾之經主胸膈脹愚嘗觀成氏明理論云胸中
至表猶近所以仲景云喘而胸滿者麻黃湯是屬表而

可汗者也又云胸脇滿者小柴胡湯屬半表半裏而可
和解者也至于太陰止云腹滿而吐食不下時腹自痛

或腹滿而咽乾由此觀之可見太陰不主胸上者明矣
少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯少陰之脈從腎

中則循喉嚨其支別者從肺出絡心注胸中邪自陽經
傳于少陰陰虛客熱下利咽痛胸滿心煩也與猪膚湯

調陰散熱咽痛五方大能解

厥陰病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而
煩飢不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散手足厥冷者邪
氣內陷也脉緊牢者為實邪氣入府則脉沉今脉乍緊
知邪結在胸中為實故心下滿而煩胃中無邪則喜飢
以病在胸中雖飢而不能食與瓜蒂散以吐之
胸中之邪手足厥冷非脉緊胸痛別之
熱少厥

微胸脇煩滿一證已前見

吳胸滿多用吐法實者宜瓜蒂散虛者宜人參蘆或
以香蘇散飲下一甌以手探喉中吐之亦可凡傷寒
三四日已傳少陽經脉弦口苦發熱而胸滿宜小柴
胡湯若胸中滿悶者加枳殼桔梗各二錢以利之若
胸脇滿而煩者加瓜萸實二錢黃連一錢半活人

治胸滿氣痞不寬只用枳殼桔梗各二錢生薑五片
名曰枳殼湯凡心之上胸之分宜枳殼心之下胃
之分宜枳實蓋枳殼能泄至高之氣枳實能泄至低
之氣其瓜萸仁能瀉肺洗滌胸中痰垢之要藥也故
胸滿而煩必加之一法治氣痞胸滿用小麥麩一二
升以生枳殼切半同炒令熟去枳殼以帛包熟麩熨
胸中頓易執之則氣易散而愈矣

胸膈痛耳聾尺寸脉俱弦者少陽受病也論見大法活人云柴胡湯
病胸中諸實胃中鬱鬱而痛不能食齊下欲使人按之而反
有涎唾下利十餘行其脉反遲寸口脉微滑此可吐之
利則止各六
吐下後嘔嘔欲吐胃中痛大便澹腹滿而煩者宜調胃
承氣湯詳嘔

胸痛

胸脇痛耳聾尺寸脉俱弦者少陽受病也論見大法活人云柴胡湯

主

病胸中諸實胃中鬱鬱而痛不能食齊下欲使人按之而反

有涎唾下利十餘行其脉反遲寸口脉微滑此可吐之

利則止各六

吐下後嘔嘔欲吐胃中痛大便澹腹滿而煩者宜調胃

承氣湯詳嘔

承氣湯

七下... 胃中藏大便... 胃

休... 止

身... 汗... 其... 又... 口... 吐... 之

中... 實... 胃... 中... 積... 而... 藏... 不... 指... 食... 之... 而... 又

主

耳聾... 耳... 聾... 只... 十... 刺... 其... 聲... 心... 則... 受... 病... 也... 人... 云... 柴... 附... 子... 歸... 身... 大... 黃... 湯

耳聾

耳聾

耳聾有二一由重發汗虛一由少陽中風 胃脇痛耳

聾尺寸脈俱弦者少陽受病也

未持脈時病人又手自冒心試教令欬而不欬者此必

耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此黃耆建中湯

少陽中風兩耳無聞目赤胸滿而煩者不可吐下吐下

則悸而驚或用小柴胡湯

少陽與厥陰俱病耳聾囊縮而厥者此兩感證 厥陰

榮衛不通耳聾囊縮不知人危矣 濕溫證治在太陰

不可汗汗則不能言耳聾不知病處身青面色變名曰

重鳴白虎不語言耳聾不眠或或青面色變各日

藥滿不眠耳聾藥滿不眠人可矣 然此猶在五日之內

少則與氣則其耳聾藥滿而則其耳兩耳皆聾

耳聾而藥滿則其耳聾藥滿而則其耳兩耳皆聾

耳聾而藥滿則其耳聾藥滿而則其耳兩耳皆聾

耳聾而藥滿則其耳聾藥滿而則其耳兩耳皆聾

耳聾而藥滿則其耳聾藥滿而則其耳兩耳皆聾

耳聾而藥滿則其耳聾藥滿而則其耳兩耳皆聾

耳聾而藥滿則其耳聾藥滿而則其耳兩耳皆聾

耳聾而藥滿則其耳聾藥滿而則其耳兩耳皆聾

耳聾而藥滿則其耳聾藥滿而則其耳兩耳皆聾

陽毒

陽毒之證初受病時所加邪毒深重加以當汗失汗當下失下或吐下後邪熱乘虛而入誤服熱藥使毒熱散漫如抱薪抹火無不延燎至於六脉沉實舌卷焦黑鼻中如烟煤身面錦斑狂言直走踰垣上屋登高而歌棄衣而走皆其證也五日可治六七日不可治

升麻龍甲湯 治陽毒為病面赤斑斑如錦紋咽喉痛

垂腹血

升麻 貳兩

當歸

蜀椒 炒去

甘草 各壹兩

龍甲 手指大壹片

雄黃 研半兩

右六味以水四升煮取一升頓服之取汗愈肘後千
金方陽毒升麻湯有桂無鼈甲陰毒甘草湯無雄黃

附

酒陽毒升麻湯治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下
之後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言奔走或
見鬼或下利脈浮大數面赤斑斑如錦紋咽喉痛下
膿血五日可治七日不可治

升麻

犀角

射干

黃芩

人參

甘草

右咬咀水煎服食頃再服溫覆手足出汗解不解重

作

陽毒梔子湯 治陽毒傷寒發熱百節疼痛

升麻

黃芩

杏仁

石膏

梔子

赤芍藥

知母

大青

甘草

柴胡

右咬咀每服半兩薑五片豉百粒同煎

大黃散治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂

大黃

桂心

甘草

芒硝

大腹皮

木通

桃仁

右咬咀水煎服以利為度

海葛根散 治陽毒身熱如火頭痛躁渴咽乾痛

葛根 朱錢半 黃芩 大黃 醋炒

甘草 梔子 枳殼 各半兩

右咬咀水煎服

活黑奴丸 治時行病六七日未得汗脉洪大或數面

赤目痛身體大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五六日

已上不解熱在胸中口噤不能言為壞傷寒醫所不

治或人精氣已竭心下尚煖揆開其口灌藥下咽即

活蕪治陽毒及發斑

麻黃 去節泡 大黃 貳兩 金底煤 研

黃芩 芒硝 竈突墨 研

梁上塵 小麥奴 各壹兩

右為末煉蜜丸如彈子大新汲水研下一丸渴者與

冷水盡飲之須臾當寒寒竟汗出便瘥若無汗再服

一九須微利效小麥奴即小麥未熟時叢中不成麥

捻之成黑勃是也此藥須是病人大渴倍常躁盛者

乃可與之若不渴者服之反為禍耳

脉洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如烟煤以水漬布薄

之疊布數重新水漬之稍接去水搭於胸上須臾蒸熱

又漬冷如前薄之仍換新水數十易熱甚者置病人於

渴者一本陽毒作

水漬法

水中勢纔退則已亦一良法也

丹砂丸 治傷寒陰陽二毒危惡形證

舶上硫黃

水銀

太陰玄精石

太陽石

各壹兩

硝石

半兩

右為末用無油銚子以文武火炒上項藥令勻如灰色研極細生薑自然汁浸炊餅丸如棗豆大每服五丸龍腦生薑蜜水下壓其躁也若陽毒藥湯下陰毒白湯下不許於屋底炒

白虎加人參名化斑湯

斑盛者青黛一物湯

咽痛

玄參升麻湯

青黛一物湯

青黛

如棗大壹塊

用新汲水研服

玄參升麻湯

升麻

玄參

甘草

各半兩

水三盞煎一盞半去滓服

陶陽毒傷寒服藥不效斑爛皮膚手足皮俱脫身如

塗硃眼珠如火躁渴欲死脉洪大而有力昏不知人

宜三黃石膏湯主之或升麻梔子湯吐之若熱甚

時狂時昏口噤咬牙藥不可下者用水漬法候牙寬

狂亂稍定投藥亦良如黑奴丸不可輕用

活陽氣獨勝陰氣暴絕必發躁狂走妄言面赤咽痛
發斑或下利赤黃肌洪實或滑促宜酸苦之藥救
陰陽毒輕者桔梗大黃湯 陽毒升麻湯 梔子
仁湯 又龍膽草一物湯

趙陽根于陰陰根於陽無陽則陰無以化無陰則陽
無以生可見兩者不能相無也又仲景云陽氣先絕
陰氣後絕此人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭此
人死身色必赤則知陰陽二氣在人身中不可偏絕
絕則無復生之理今活人書論陰毒而曰陽氣絕論
陽毒而曰陰氣絕既絕矣是為不治之證又何藥焉

蓋陰陽二證之深重也又挾毒氣是為陰毒陽毒故
其藥皆用升麻犀角雄黃大青輩以解其毒然後陽
毒泄而陰氣復陰毒泄而陽氣復大汗出而解矣活
人書何不曰陽氣極盛陰氣極微為陽毒陰氣極盛
陽氣極微為陰毒庶不為極絕之證

傷寒證治準繩帙之三

陽毒下利

發熱下利不渴者此陽毒也宜以升麻湯治之

陽毒者身大熱反欲得飲者此陰毒也宜以升麻湯治之

陽毒者身大熱反欲得飲者此陰毒也宜以升麻湯治之

陽毒者身大熱反欲得飲者此陰毒也宜以升麻湯治之

陽毒者身大熱反欲得飲者此陰毒也宜以升麻湯治之

陽毒者身大熱反欲得飲者此陰毒也宜以升麻湯治之

陽毒者身大熱反欲得飲者此陰毒也宜以升麻湯治之

陽毒者身大熱反欲得飲者此陰毒也宜以升麻湯治之

陽毒者身大熱反欲得飲者此陰毒也宜以升麻湯治之

