

癲癇

脫肛

瘻

痔

瘡風

臨證指南醫案
卷七

臨證指南醫案目

卷七

痢

便血

脫肛

痿

痺

瘻

驚

癲癇

臨證指南醫案卷七

滸關李太

古吳葉 桂天士先生著 錫山鄭錦曉滋九全較

邵 銘新甫

痢

暑濕熱

沈 暑必挾濕傷在氣分。古稱滯下。此滯字非停滯飲食。言暑濕內侵腑中流行阻遏而爲滯矣。消導升舉溫補。暑邪無有出路。胸痞不飢不食。粘膩未已。而肛門沉墜。裏結三焦。皆受邪蒸。上下渾如兩截。延爲休息痢疾。纏

綿展轉。豈旦晚驟愈之病。

淡乾薑

生薑

小川連

淡黃芩

人參

枳實

徐 夏季痢症。多是濕熱食積。初起宜分消其邪。但肌柔白嫩。乃氣虛之質。且性情畏藥。只宜少與勿過。

枳榔汁

青皮

陳皮

厚朴

川連

黃芩

木香

炒黑山楂

又 濕熱下痢。必用苦辛寒爲治。栗殼濱腸止瀉。久痢成方。當此熱邪未清。宣通斯滯可去。因色白氣弱。未敢峻攻耳。

攻耳。

厚朴

黃芩

川連

木香汁

查肉

炒銀花

麥芽

盧 痘症濕熱。皆是夏令伏邪。但以攻消。大傷胃氣。不能去病。今微嘔不飢。不寐。大便欲解不通。是九竅六腑不和。總是胃病。

人參一錢

吳萸炒川連四分

泡淡生乾薑五分

茯苓三錢

川棟子肉一錢

生白芍一錢

某女舌色灰黃。渴不多飲。不飢。惡心。下利紅白積滯。小溲不利。此暑濕內伏。三焦氣機不主宣達。宜用分理氣血。

不必見積。以攻滌下藥。

飛滑石

川通草

猪苓

茯苓皮

藿香梗

厚朴

白蔻仁

新會皮

陸氏經來暑穢瘀脹心煩自利黑瘀

淡黃芩

枳實

川連

石菖蒲

鬱金

橘紅

陳姪瀉痢兩月肢體浮腫高年自屬虛象但胸脘痞悶納穀惡心每利必先腹痛是夏秋暑熱鬱滯於中虛體挾邪焉有補濇可去邪扶正之理恐交節令變症明是棘手重症矣

人參

茯苓

川連

淡乾薑

大廈浮腫

生白芍 枳實

某臍上青筋突痛。太陰脾受傷。此前症也。近日腹痛白積。兩旬不已。是新受夏秋暑濕。與病異岐。先理新病。導氣分消主之。

藿香

厚朴

廣皮

茯苓皮

川連

木香

木瓜

扁豆

某痰哮宿病。正在初秋而發。又值寒熱下痢血積。腹痛吐逆。脈來右弦左弱。目黃差明。必是暑濕凝滯着裏。以補虛之中。佐以清邪。乃通劑法。

人參

黃芪

白芍

廣皮

石蓮子

濕熱

川連

查肉

草決明

金銀花

王痢疾古稱滯下。乃是濕熱氣薄腸胃。阻閉氣分。故利仍不爽。河間丹溪僉用清熱導氣者爲此。

黃芩

川連

草決明

炒黑查肉

生白芍

石蓮

丹皮

廣木香汁

倪十面垢舌白。心下脘中。淒淒痛窒。至圊復便不爽。此水穀之濕內蒸爲熱。氣道阻閉。上熱下冷。若外受客邪。既過暮原。必有寒熱矣。

淡黃芩

川連

淡竹葉

枳榔汁

白芍

厚朴

廣皮白

某濕溫下痢脫肛五苓散加寒水石

江食物不調腸胃蘊蓄鬱蒸積聚而滯下三月不愈清疎帶補之

人參

川連

炒白芍

炒查肉

廣皮

茯苓

炒當歸

烏梅

陸濕熱內蘊中焦痞結陽氣素虛體質濕注自利不爽。神識昏亂將變柔症。

炒半夏

人參

枳實

川連

乾薑

黃芩

薑汁

顧得湯飲腹中瀘瀉自利稀水平昔酒客留濕濕勝內
非痢疾溫熱病下利耳

例延三月

亦非痢。

蘊腸胃不爽。凝積東垣清暑益氣亦爲濕熱傷氣而設。
但脾胃久病。仍能納食。當苦味堅陰。芳香理脾。

生茅术

四兩

炒黑黃柏

二兩

炒黑地榆

二兩

猪苓

一兩半

澤瀉

一兩半

水法丸

服三錢

葛根酒。客大便久瀉。肠上曾發瘡瘍。春夏肠下有形。腹形
滿脹。此久蘊濕熱。瘡瘍自利。未能泄邪。腸胃氣壅。利頻
不爽。法當分消以去濕熱。若攻劫太過。必傷脾胃。議用
丹溪小溫中丸。早進二錢五分。夜進二錢五分。

某潮熱。自利腹痛。

黃芩

生白芍

枳實

桔梗

梔榔汁 木香汁

徐能食。腹痛下痢。兼和其陰。

人參 生白芍 黃芩 枳實

川連 乾薑

某六濕熱內蒸。下利紅積。

炒黑神麴 炒黑杏肉 茯苓皮 飛滑石
新會皮 厚朴 淡竹葉 扁豆葉

祝入三十年久痢。須推飲食避忌。酒客濕滯腸中。非風藥之辛。佐苦味入腸。何以勝濕逐熱。久病飲食不減。腸中病也。

綿茵陳

香白芷

北秦皮

茯苓皮

黃柏

藿香

某形瘦陰虧。濕熱下痢。悞投消食。反劫津液。邪未盡。津先耗。咽喉痛且嗰欬。所謂濕未罷。已上燥矣。

川連

銀花

通草

黃芩

川貝

茯苓皮

某濕熱內阻氣分。腹痛下痢。目眴黃。舌光不渴。議清裏泄濕熱。

黃芩

寒水石

川連

厚朴

秦皮

鬱金

山五濕鬱腹痛利紅如豆汁

生茅术

錢

炒山楂

半錢

厚朴

一錢

紅麴

牛

廣皮

一錢

猪苓

一錢

某夏秋痢疾。固是濕熱傷氣。脾胃氣滯。後重裏急不爽。

古方香連丸。取其清裏熱。必佐理氣。謂氣行斯濕熱積聚無容留矣。知母生地滋陰除熱。治陰分陽亢之火。與痢門濕熱太異。蓋滋則呆滯氣鈍。窒塞宜乎。欲便不出究竟濕熱邪。仍在桂附熱燥。又致肛墜痛如刀割。補中益氣東垣成法。僅僅升舉下焦清陽。未能直透腸中。再用大黃重藥。兼知母生地等味。更令傷及下焦。書義

謂諸痢久都屬腎傷。小腹痛墜忌冷。顯然是下症。議與升陽亦須下治。

人參 茯苓 濡瀉 炙草 防風根
羌活 獨活 細辛 生薑 大棗

某舌白渴不欲飲心腹熱。每痢必痛。肛墜痢又不爽。微嘔有痰。口味有變。頭中空痛。兩頰皆赤。此水穀氣蒸濕熱鬱於腸胃。清濁交混。忽加煩躁難鳴。苦况法當苦寒泄熱。苦辛香流氣滲泄利濕。蓋積滯有形濕與熱本無形質耳。

川連

黃芩

鬱金

厚朴

厥陰伏
熱

猪苓 槐米 秦皮

包 先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷。

淡黃芩 川連

丹皮 生芍

炮薑 炒銀花

陳氏溫邪經旬不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥

陰恐致變瘻。

白頭翁 川連

黃芩 北秦皮

黃柏 生白芍

又溫邪誤表劫津神昏恐致瘻厥。

炒生地 阿膠 炒麥冬 生白芍

炒丹皮

女貞子

邱姬進潤劑。痛緩積稀。知厥陰下利。宜柔宜通。血虛有風顯然。

生地

阿膠

丹皮

生白芍

銀花

小黑稽豆皮

某熱漸入裏。胸痞便泄。議酸苦泄熱。

黃芩

川連

枳實

白芍

廣皮白

滑石

甘草

穀芽

協熱癆

蔡內虛邪陷。協熱自利。脉左小右大。病九日不減。是爲重症。議用白頭翁湯方。加黃芩白芍。

同前

向

潘時令暑濕都從口鼻而受氣鬱則營衛失於轉運必身熱無汗其邪自上以及中必循募原致腸胃亦鬱腹痛瀉積無非濕熱之化此分消利濕則可若以表藥則傷陽氣矣。

茯苓

陳皮

厚朴

木香

炒扁豆

炒山楂

又協熱下利粘膩血水是腸胃中濕熱之化也。

北秦皮

白頭翁

茯苓

澤瀉

炒銀花

益元散

某春溫內陷下痢最易厥脫。

川連

阿膠

淡黃芩

炒生地

生白芍

炙草

王 热毒逗留不化。潮熱下利。

川連

黃芩

炒白芍

茯苓

澤瀉

木瓜

張三 江南地薄氣弱。夏季食物內蘊。時令熱迫內聚。濕熱赤癥。入冬不愈。皆飲食不忌之累。宜淡薄滋味。

生茅术

厚朴

南山楂

草果仁

樗根皮

槐花

廣皮

銀花

又 痘血三月。晝癰夜止。肛門欲墜。以氣陷門戶不藏。

人參

當歸

白芍

肉桂

炙草

白术

廣皮

煨薑

南棗

某二血痢半載少腹痛。六味地黃加炒查肉炒延胡。

某血積痛癆起於夏令秋半不減明是濕熱滯於腸胃久延面色消奪右脉搏大乃痢症所大忌稍通積聚兼以和血。

○酒炒大黃

川連

黃芩

丹皮

肉桂

歸身

白芍

生甘草

袁二久痢腹疼下血

○生黃芪

三錢

生白术一錢

炒歸身一錢

炒查肉一錢

炒地榆半錢

六痢用苦辛

○痢用寒下
佐以兼

廣皮一錢 厚朴一錢 羌活五分 防風根五分

朱九下痢帶瘀血。肛中氣墜。腹不痛。

炒黑樗根皮一錢

生茅术一錢

生黃柏一錢

炒黑查肉三錢

炒黑地榆半錢

炒焦銀花一錢

赤苓三錢

猪苓一錢

半錢

某痛痢不爽。已有血下。暑濕不獨在氣分。且積勞茹素。

攻奪宜慎。

當歸

白芍

南山楂

厚朴

草果

炮薑

某脉緩。脅上痛。便稀溺短。此乃濕鬱脾胃之陽。致氣滯。

裡急。宗古人導濕分消意。

○陽虛氣滯

利用導溫
涼水消

利用溫柔

次下

生茅术

廣皮

厚朴

官桂

飛滑石

茯苓

猪苓

澤瀉

炒山楂

張七脉沉伏久痢腹痛畏寒少食氣弱腸滯以溫通方法。

熟附子

生茅术

生大黃

茯苓

厚朴

木香

又溫下相投。腸滯不通。皆因腑陽微弱。古賢治痢不離通濤二法。

當歸

肉桂心

茯苓

厚朴

南山楂

生麥芽

王六平昔溫補相投。是陽不足之體。聞患痢兩月。不忌食。

臨證指南醫案 卷一
物。脾胃滯壅。今加嘔惡。夫六腑宜通。治痢之法。非通即瀉。肛腸結閉。陽虛者。以溫藥通之。

熟附子

製大黃 厚朴

木香

茯苓皮

范二痢稱滯下。謂有滯必先痛後下。况病起不慎口腹。陽氣窒塞。積聚留着。得間在此試閱前方。宣通者有効。守補則病劇。

六腑皆以宣通爲用。

附子

大黃

茯苓

厚朴

生草果

廣皮

又 温下已效。腸胃留滯。都因陽不主運。再佐理氣兼之。

附子

製大黃

茯苓

廣皮

厚朴

生益智

木香

猪苓

李 痘將兩月。日微黃。舌白口乾。唇燥赤。腹滿。按之軟。竟日小便不通。病者自述肛門窒塞。努掙不已。僅得迸出粘積點滴。若有稀糞。自必傾腸而多。思夏秋間暑濕內着爲痢。軒岐稱曰滯下。謂滯着氣血。不獨食滯一因。凡六腑屬陽。以通爲用。五臟皆陰。藏蓄爲體。先瀉後痢。脾傳腎則逆。卽土尅水意。然必究其何以傳尅之由。蓋伏邪垢滯。從中不清。因而下注矣。遷延日久。正氣因虛。仲景論列三陰。至太陰篇中。始挈出腹滿字樣。脾爲柔臟。惟剛藥可以宣陽驅濁。但今二腸室痺。氣不流行。理中

等法。決難通腑。考內經二虛一實者治其實。開其一面也。然必溫其陽。佐以導氣逐滯。欲圖扭轉機關。捨此更無他法。

製附子 生厚朴 木香 製大黃 炒黑大茴

又 懶弛半月。脾腎復憊。脾敗不主健運。納食皆變痰沫。腎真失司。納氣水液上泛阻咽。皆病傷閼壅變脹。未傳脉見弦芤。是無胃氣。小愈變病。最屬不宜。入冬爲藏陽之令。今陽漸潰散。而陰液枯槁。渴不多飲。飲不解渴。治陽。必用剛藥。其陰更涸矣。轉展無可借箸。勉與脾胃分調。脾陽動則冀運。腎陽靜可望藏。王道固難速功。揆之

體用不可陰藥。此病未必收功

陽虛

早服炒焦腎氣丸 午服參苓白朮散加益智仁。
許三勞倦咳嗽失血。仍然不避寒暑。食物腹中瀉痢。病上
加病。後感法當先治。以分病有新舊。

厚朴

益智

廣皮

茯苓皮

白芍

炙草

木瓜

炒扁豆

又 咳嗽瀉痢。藥治相背。治肺礙脾。治脾礙肺。方今交冬。
治病爲要。病人說早食相安。晚食脹滿。脾胃陽氣已乏。
勿徒消滯寒。赴矣。

白芍

桂酒拌

益智

廣皮

茯苓

焦白术

炙草

穀芽

砂仁殼

張下痢泄瀉之後。診脉右弦大。胃虛少納。陽弱不司運化。法當通腑之陽。

人參

益智仁

炒菟絲餅

炒砂仁末

茯苓

廣皮白

陸二腹滿自瘳。脉來濡小。病在太陰。况小便清長。非腑病濕熱之比。法當溫之。

生於术

附子

茯苓

厚朴

乾薑

許二四。痢疾一年。已浮腫漏瀉。古稱久痢必傷腎。月前用理陰煎不應。詢及食粥吞酸。色瘁脈濡。中焦之陽日憊。水

穀之濕不運。仍辛溫以甦脾陽。佐以分利用。胃苓湯去。

甘草加益智。

陳 痢積雖然少緩。諸效不減。面色青晦。四肢厥冷。仍在
陰途。擬進益黃散法。

人參

煨益智仁 公丁香

茯苓

廣皮

青皮

木瓜

炒冬米

某 脉微細。肢厥。下痢無度。吳茱萸湯。但能止痛。仍不進
食。此陽敗陰濁。腑氣欲絕。用桃花湯。

赤石脂

乾薑

白梗米

某 痢後大便不實。食不健運。色脈俱是虛象。此清陽失

臘於中陰氣先走泄於下先理中焦再當攝陰。

人參

白术

茯苓

炙草

廣皮

炮薑

益智

某自利不渴者屬太陰。呃忒之來由乎胃少納穀衝氣上逆有土敗之象勢已險篤議金匱附子粳米湯。

人參

附子

乾薑

炙草

粳米

某長齋有年土薄氣餒加以久痢少穀欲嘔脾胃之陽衰矣由夏及今半載不痊倘忽腫脹何法施治。

人參

白术

乾薑

炮薑

丁香

茯苓

袁中下陽微嘔呃下利溫中不應恐延衰脫夫陽宜通
陰宜守此關閘不致潰散春回寒谷生氣有以把握候
王先生主議

人參

附子

炮薑

炒粳米

赤石脂

生白芍

某春痢入冬痢止腹痛食少童年那有淫慾之擾此係
寒熱不和脾胃受傷也六君子湯加肉桂

某脉沉微下痢紅紫黑舌胎粉白並不渴飲此太陰脾
營虛寒也倣理陰煎

寒
脾營虛

當歸頭

白芍

炮薑

炙草

茯苓

益智

唐氏下痢四十餘日形寒腹痛

炒當歸

生白芍

肉桂

炒山楂

青皮

茯苓

陽明不
闔

沈議堵截陽明一法。

人參

炒白梗米 炮薑

赤石脂

脾腎兼
虛

某六高年下痢痰多舌乾脈右空大神困音低乃脾腎兩
虧二氣交虛有年致此恐非所宜。

人參一錢半

菟絲子一錢半

赤石脂三錢

炮薑一錢半

茯苓三錢

木瓜一錢

王十五久痢久瀉爲腎病。下瀉久而陰傷氣墜。四神丸治脾

腎晨泄。辛溫香燥皆剛。佐入五味酸柔。不過稍製其雄烈。此肛墜尻瀉。乃腎液內少而氣陷矣。腥油肉食須忌。

熟地 禹餘糧石 五味子

蔣五久痢用辛甘溫而效。是脾陽久傷。治由東垣法極是。述食血腥滑物必便溏。四肢忽有肉瘳。營衛內應脾胃。氣血未得充復。五旬外下亦怯。用脾腎兩補。

人參 山藥 茯苓 湖蓮 茢實 補骨脂

蓴蓉 莱肉 五味 巴戟 萃絲 覆盆子
某 下痢腹痛舌乾肛墜。瀉傷陰也。

熟地炭

炒歸身

炒白芍

炒查肉

茯苓

炙草

某滯濁下行痛緩議養陰通腑。

生地

阿膠

丹皮

山梔

猪苓

澤瀉

孫脉左數下利腹不甚痛暮夜微熱所伏暑熱乘陰虛下陷是清熱理脾不效當攝陰升陽。

熟地炭

當歸炭

山查炭

炒黑麥芽

炙黑甘草

防風根

炒黑升麻

又照方去山查麥芽加人參焦白芍

又：瀉痢久必陰損液耗。此口渴微咳。非實火客邪。與甘酸化陰。

人參

山藥

炙草

炒烏梅

木瓜

炒湖蓮肉

蔡 脉右數。左細數。面垢舌燥。白苔點點。肌膚甲錯。左脇動氣。伏暑當秋涼而發。初病如瘧。當從苦辛寒法。裏邪熾烈。變爲下痢。胃津被劫。陰液大耗。昔賢於熱病液涸急以救陰爲務。苟胃關得甦。漸以冀安。否則犯喻氏所指。客邪內陷。液枯致危之戒矣。復脉湯去薑桂麻。

又 酸甘化陰法。

人參

生地

烏梅

炙草

麥冬

木瓜

鮑痢久陰液消亡無以上承必唇燥舌乾奈胃鬱不和善噫難飢此由陰膩柔劑所致擇其不膩滯者調之

人參

炙草

炒白芍

炒烏梅肉

炒麥冬

茯神

周十五痢後氣墜都主陰傷但嗔怒不已木犯土致病留連攝陰之中聊佐和肝

熟地

茯苓

炒山楂

炒烏梅

木瓜

某陰液涸則小水不通胃氣逆則厭食欲嘔此皆痢之

欵症也。治以中下二焦爲主。議理陰煎。

熟地

白芍

附子

五味

炮薑

茯苓

吳三痢久陰傷腹痛。肛門墜脹。秋病入冬不愈。已屬休息症。和陰劑中仍有升降。倣東垣法。

炒熟地

炒當歸

炒白芍

炙草

生山楂

生穀芽

久痢傷
腎下焦
不攝

陳三瀉痢久則傷腎。多見下焦沉墜。先傷在陰。剛藥不效。

人參

鹿茸

菟絲子

茯苓

舶茴香

製補骨脂

砂仁

張五晨泄痢血屬腎病無痛墜等因用黑地黃丸。

范瀉痢起於長夏。醫謂時令濕熱。胃苓湯。芩芍法。固非謬訛。因高年腎陽肝陰先虧。使客氣內擾阻遏中流之

砥柱坐鎮。致狂瀉滔天耳。病經兩旬不減。重陰無陽。驗諸神識尚清。其外邪爲少。而內損爲多。八脉無權。下無收攝。漏卮不已。理必生陽泄下焦冷。此皆陰陽二氣微絕。治病則芬。治本爲宜。非置之不理。實究天人而已。

人參

二錢

鹿茸

二錢

炒黑當歸

三錢

生杜仲

三錢

生沙苑

一錢

茯苓

三錢

此必不效

李十五自痢五六

年卽周身痛痺

益腸胃病

致經絡筋骨篩

病

及間新劇

病

病

籬疎撤。陽失衛。藥難效。靈書此代煎。

冬於术

芩苓

熟附子

河水煎

吳九治痢大法。無過通塞二義。夏秋濕熱固多。初痢不痛已。非濕熱色滯者。腸中陳腐也。至今痛而痢。痢後復痛。按之痛減屬虛。小雪不愈。陽不來復。久痢治腎。然非滋膩。先用芩苓术桂湯。

某氏治痢古法。不越通濇。經停有痕。腹浮腫。八脉之病。醫惑於見痢。認爲脾胃症。議用濟生腎氣丸。

朱七痢久肛墜。是下焦腎虛。失於收納。治脾胃藥無功。

熟地炭 炒歸身 赤石脂 五味子 炒查肉

周四六五痢久必傷腎陰。八脉不固。腸膩自滑而下。但執健脾。

無用。病不在中。納穀遲。下焦坎陽亦衰。用三神丸。

五味子 補骨脂 肉果

某 痘久陰陽兩傷。少腹肛墜。連兩腰膀脊髀痠痛。由臟腑絡傷。已及奇經。前議輕劑升陽頗投。仍從下治。

人參 鹿茸 附子 炒當歸

茴香 菟絲子 杜仲

周 轉方柔藥相安。顯然久痢傷及腎陰。當用理陰煎。兼用禹糧石脂丸。以攝固腸中。

熟地炭 歸身炭 人參 炙甘草

五味子

炒杏肉

兼服禹糧赤石脂丸

金脉數動。下痢腹鳴痛。

後墜。卧則氣衝。咳嗽吐粘涎。

產後過月。顯是下損至中。納穀日少。形神日衰。勢已延成

蓐勞。難期速功。

熟地炭

人參

茯神

炒山藥

建蓮

赤石脂

某氏。休息痢。經二年。明是下焦陰陽皆虛。不能收攝。經期不來。小腹撫摩有形上行。似乎癥瘕。其實氣結。若不急進溫補。恐滋擾腫脹之累也。

人參

附子

茯苓

炙草

五味

白芍

氣虛下陷

某 氣虛下陷。門戶不藏。

人參

黃芪

廣皮

炙草

歸身

炒白芍

防風

升麻

妙

某 痘經五十日來，小愈再發，獨見後重下墜，此爲氣陷。則門戶不藏，亦胃弱內風乘襲之議。陷者舉之。

人參

歸身

白芍

炙草

升麻

荷葉

瘧變痢

石 瘧邪熱氣內陷變痢。延已三月。脾胃氣衰。面浮肚膨。仍有裏急欲墜之象。中虛伏邪。進以和解。

黃芩

柴胡

人參

丹皮

炒當歸

白芍

穀芽

炒山楂

蔡 神氣索然。腹中動氣。舌紅隘乾。寒熱日遲。平素積勞致虛。邪伏厥陰。脈促細堅。溫清難用。勉議復脉湯。存陰勿涸。希圖援救。復脉湯。

又 兩投復脉。色脈畧轉。所言平素積虛。不但瘧邪內陷。陽結於上。則胸痞。陰走於下。則頻利。非徒開泄攻邪也。救逆湯去薑。

又 奔豚動氣。皆是陽虛濁泛。當和營理陽。

人參

茯苓

歸身

炙草

桂心

牡蠣

煨薑

大棗

又 衊氣填塞。邪陷下痢。勢非輕小。用瀉心法。

人參

淡乾薑

熟附子

川連

黃芩

枳實

又 人參

淡乾薑

生地

炒桃仁

此症必收功

張 氣衰熱伏。腹痛下痢。脘中痞悶。不欲納食。由瘧變痢。
經邪入腑。斯病勢已重。清理濕熱以開痞。延久必須扶

正。

淡黃芩

川連

人參

生白芍

乾薑

枳實

某邪陷瘧後變癆。傷及厥陰。症見氣上撞心。飢不能食。
乾嘔腹痛。全是肝病。肝爲至陰之臟。相火內寄。仲景治
法不用純剛燥熱之藥。以肝爲剛臟故也。今正交土旺。
土木爲讐。五日內未爲穩當。

腸風

人參

炒當歸

炒白芍

炒烏梅肉

茯苓

淡吳萸

生香附汁

真北秦皮

孫下痢無積。肛墜腸間汨汨有聲。此屬腸風。當用攝固。

熟地炭

萸肉炭

炒歸身

炒杞子

川斷

北味肉

煎藥送赤石脂丸三錢

某當年久痢。用三神丸得效。是脾腎兩因。兼理氣分之。

滯體質陽虛。遇冷病加。今病起長夏。小水不通。必係夏熱阻其宣化。久則氣血凝着而爲腸經先。與桂苓甘露飲分消其濕。

於术

茯苓

猪苓

澤瀉

滑石

桂心

黃芩

白芍

噤口癆

包川連

人參

黃芩

草決明

炒山楂

炒銀花

又 噇口癆乃熱氣自下上衝而犯胃口。腸中傳導皆逆。阻似閉。腹痛在下尤甚。入香連梅芍。僅宣中焦。未能泄下。

熱燔燎。若不急清陰液。同歸於盡。姑明其理。以俟高明。

備採 白頭翁湯

又 脉左細數。右弦。乾嘔不能納穀。腹痛裏急後重。痢積不爽。此暑濕深入。着腑。勢屬噤口痢疾。症非輕渺。議用苦寒清解熱毒。必痛緩胃開方。免昏厥之變。

川連

黃芩

銀花

炒山楂

乾薑

白芍

木香汁

又 下午病劇。乃陰氣消亡之徵。若但陰柔。恐生生不至。
疎補胃藥。正宜進商。

生地

阿膠

人參

生白芍

炒山楂

炒銀花

篇 初起無寒熱卽瀉痢嘔惡不食乃噤口痢重病夫暑

邪之傷由口鼻吸氣而入邪與水穀交混蒸變濕熱釀

爲積滯膿血腸胃氣壅欲解不能通爽遂致裏結後重

香連苦辛理氣導潔清熱初用頗是皆緣勞碌之人非

膏梁溫養之質淡薄積勞中氣易傷四十日來積少痛

緩醫稱病解而食不下咽不知飢飽診得脉弦形衰舌

白不渴飲水日瀉數行全屬胃倒氣奪中宮損極下關

不攝穀不能咽焉能承受湯藥藥味氣劣胃衰必惡久

痢久瀉務在能食古人非醒脾胃卽安腎攝納再詢粉

漿下咽或噙或嚥議以上院宜通其清陽下焦當固攝

其滑脫。倣古方中參苓白朮散末。當以米飲日服二次。
間以不膩滑之物。食些少勿多。以示胃之所喜爲補。必
得胃氣漸醒。方有_無轉危爲安。

人參

二錢

焦朮

一錢半

茯苓

一錢半

炙草

五分

炒扁豆

二錢

苡仁

一錢半

桔梗

一錢

砂仁

七分炒

炮薑炭

一錢

肉豆蔻

一錢

右藥研細秤准分兩

每次

用香粳米

飲湯調服

一錢五分

右藥須日進二次

鮑

舌心黃。

邊白渴。

飲水漿停胃脘。

乾嘔微微冷呃。

自痢

稀水小便不利。

診脈堅勁不和。

八旬又二暑濕熱邪內

着必脾胃氣醒始可磨耐。

以高年不敢過清過消。

用清

醫學卷一
暑益氣方法

川連

黃芩

石蓮子

煨乾葛

青皮

人參

茯苓

厚朴

豬苓

澤瀉

又 口中乾燥。小水全無。泉源已竭。陰液無以上承。痢症。噤口。都是濕熱壅於胃口。下元衰憊。衝脈氣震高突。此攻病保真。理難捉摸矣。

川連

黃芩

草決明

石蓮子

烏梅

白芍

痢症。古名滯下。惟夏秋暑濕。挾積者居多。其次則風溼火迫。寒侵也。推之燥氣獨不爲患。攷前法悉有定

例不必再述。至於暑者。有陰暑。陽暑之源。其邪必兼乎濕。夫陰暑由於人之陽氣先虧。加以貪涼喜冷。鬱折生陽。故主於溫。陽暑由於天之熱伏。阻氣化濁。則重於清。而醫之下手工夫。於此須細心認定。但邪之來也。似水之流。臟腑間一有罅隙。則乘虛而着。故有在氣在血之分。傷臟傷腑之異。若表之邪鬱。而氣機下流不息者。喻氏論人參敗毒散。裡之積壅。而寒熱交粘者。潔古立芍藥湯。在氣分。有苦辛調氣。與辛甘益氣等法。在血分。有酸苦行血。及鹹柔養血諸方。若表症急從乎三陽。有桂枝湯。葛根芩連湯。小柴胡湯。

裏勢實。耑究脾胃。有小承氣湯。溫脾湯。總之治腑以三焦。見症爲憑。治臟以足三陰爲要領。辨得虛實之情形。酌以或通或濇之法。則臨症權宜庶乎不錯矣。但是症不治之條甚多。最難愈者。莫如休息痢。攻補之法非一。予亦不贅。最危險者。莫如噤口痢。却有兩端。若因暑濕邪充。格拒三焦者。氣機皆逆傳而閉。上下之勢渾如兩截。若治不得其要。則邪無出路。正立消亡。此丹溪立法最高。後世都宗其旨。先生又借用半夏瀉心湯。減去守中之品。取補以運之。辛以開之。苦以降之。與病情尤爲允協。所以先生之見長。是集

之奧妙。每每在此。又因脾腎之陽素虛。陰邪從中而下者。先傷太陰。繼傷少陰。關開大開。痛泄無度。戊癸少化火之機。命陽無蒸變之力。此不餓不食爲嘔爲脹。理宜然矣。與邪多積熱之候相比。絕然不同。叅之仲景理中湯。腎氣丸。及景岳理陰煎。胃關煎等法可也。吾鄉姚頤真先生。化出捷徑良法。以大劑旋覆。配八參歸姜附。桂製白芍之類治之。靡不應手而愈。想旋覆之性溫。能達下。醣可利胃。質之柔潤。以補陽中之陰。較地黃阿膠尤勝。與之腸膏竭盡。絡脈結滯。而痛者。堪稱神品。自此推廣。用治甚多。若曰某方某藥。

但治某症。不知活用。反稱杜撰。則禁絕後人靈活之
心。無從施發矣。邵新甫

便血

濕熱

鄭夏至後濕熱內蒸腸風復來議酸苦法。

川連

黃芩

烏梅肉

生白芍

廣皮

厚朴

荆芥炭

菊花炭

又駐車丸二錢

某脉右數形色蒼黑體質多熱復受長夏濕熱內蒸水穀氣壅血從便下法以苦寒佐以辛溫薄味經月可冀病愈

病愈

茅术

川連

黃芩

厚朴

地榆

槐米

程 年前痰飲哮喘。不得安卧。以辛溫通陽劫飲而愈。知脾陽內弱。運動失職。水穀氣蒸。飲邪由濕而成。濕屬陰。久鬱化熱。熱入絡血。必自下。但體質仍屬陽虛。凡腸紅成方。每多苦寒。若臟連之類。於體未合。毋欲速也。

生於术

茯苓

澤瀉

地榆炭

桑葉

丹皮

陽虛寒
濕

俞 腸虛。腸紅洞瀉。議劫胃水。理中換生茅术。生厚朴

附子炭炮薑

程七十脉沉。糞後下血。少年淳朴得此。乃食物不和。腸絡空隙所滲。與升降法。

茅术

厚朴

廣皮

炮薑

炙草

升麻

柴胡

地榆

寒退便血

以有嗔怒而
腹滿瀉血者

用此方得外
不換火候

又脉緩濡弱陽氣不足過飲濕勝大便溏滑似乎不禁
便後血色紅紫兼有成塊而下論理是少陰腎臟失司
固攝而陽明胃脈但開無合閉矣從來治腑以通爲補與
治臟補法迥異先擬煖胃通陽一法

生茅术

人參

茯苓

新會皮

厚朴

炮附子

炮薑炭

地榆炭

濕遏脾
陽

程一失職酒食氣蒸濕聚陽鬱脾陽清陽日陷矣議用東垣
失職酒食氣蒸濕聚陽鬱脾陽清陽日陷矣議用東垣

升陽法。

人參

茅术

廣皮

炙草

生益智

防風

炒升麻

中虛濕
下陷

某陽虛體質食入不化飲酒厚味卽瀉而腸血未止蓋陽微健運失職酒食氣蒸濕聚脾陽清陽日陷矣當從

謙甫先生法。

人參

二錢半

乾薑

二錢半

附子

三錢半

茅术

五錢半

升麻

三錢半

白术

二錢半

厚朴

二錢半

茯神

二錢半

廣皮

二錢半

炙草

二錢半

歸身

一錢半

白芍

一錢半

葛根

二錢半

益智

一錢半

地榆

三錢半

神麴

半錢

右藥各製薑棗湯丸

溫濕勝中虛便紅。

焦术

炒當歸

炒白芍

炙草

防風根

煨葛根

乾荷葉

鬱怒木
火犯土

劉六鬱怒腸紅復來木火乘腑絡腹中微痛議與和陰。

冬桑葉

丹皮

生白芍

黑山梔

廣皮

乾荷葉邊

生穀芽

張二年前衝氣入腕有形痛嘔糞前後有血此屬厥陽擾絡風動內爍頭顛皆眩痛每日用龍薈丸。

葉嘔怒動肝絡血乃下按之痛減爲虛夫肝木上升必犯胃口遂脹欲嘔清陽下陷門戶失藏致裏急便血參

术炮薑辛甘溫暖乃太陰脾藥焉能和及肝胃丹溪云
上升之氣自肝而出自覺冷者非真冷也

駐車丸二錢

程四六少陽絡病必犯太陰脾陽衰微中焦痞結色痿如瘁
便後有血論脾乃柔臟非剛不能胜陽然鬱勃致病溫
燥難投議補土泄木方法

人參

當歸

枳實汁

炒半夏

桑葉

丹皮

某 凡有痔疾最多下血今因嗔怒先腹滿隨瀉血向來

糞前近日便後是風木鬱於土中氣滯爲膨氣走爲瀉。

議理中陽泄木佐之。

人參

附子

炮薑

茅术

厚朴

地榆

升麻

醋炒

柴胡

醋炒

大腸血
熱

某

便紅脈數

生地

三錢

銀花

三錢

黃芩

一錢

白芍

一錢半

槐花

一錢

程二脉數能食腸紅陰自下泄。腸腑熱熾所致。非溫補之

症。

地榆炭

柿餅灰

槐花

金石斛

細生地

丹參

黃柏

黑稽豆皮

某三七內熱。腸紅發痔。當清陰分之熱。

生地

炒丹皮

酒炒黃芩

炒黑槐花

柿餅灰

玄參

銀花

黑山梔

汪。歎血已止。糞中見紅。中焦之熱下移。腸胃屬腑。止血亦屬易事。花甲以外年歲。熱移入下。到底下元衰矣。

細生地

川石斛

柿餅灰

天冬

趙六三勞倦便後血。

炒黑樗根皮

一兩炒黑地榆三錢炒焦丹皮一錢五加皮三錢

炒焦銀花

一錢蒼朮一錢

茯苓二錢

炒澤瀉一錢

炒黑欒根皮

一兩

炒焦銀花

一錢

蒼朮一錢

茯苓二錢

炒澤瀉一錢

一錢

錢十陰虛內熱。腸紅不止。

○與前方同
而生地芽木
不同於便法
便結之不

陽明不
闔

炒黑櫟根皮

一錢炒生地

三錢炒銀花

一錢炒黑地榆

二錢

歸身

半錢

生白芍

一錢半

炒丹皮

一錢

茯苓

一錢半

蔡三

脈濡

小食少氣

衰

春季便血

大便時結時溏

思春夏

便血用酸澀

法

甘酸固澗闔陽明爲法

人參

炒粳米

禹糧石

赤石脂

木瓜

炒烏梅

某能

食腸血

脉細色痿

肛痔下墜

議酸苦

熄風堅陰

萸肉炭

五味炭

黃柏炭

地榆炭

禹糧石

赤石脂

○與前方同
而去參米之
者加柏榆之善
微虛而此並

滿沒食不。而便血。

脾胃氣

吳二中滿過於消。克便血。食入易滯。是脾胃病。血統於脾。

健。自能統攝歸脾。湯嫌其守疎。腑養臟相宜。

九蒸白朮

南山楂

茯苓

廣皮

穀芽

麥芽

薑棗湯法

此方太淡。然論病治一法也。

某三便血如注。面黃。脈小。已經三載。當益胃法。

人參

一錢 焦朮

三錢

茯苓

三錢

炙草

五分

木瓜

一錢

炮薑

五分

心脾營
損

李十五上年夏季。絡傷下血。是操持損營。治在心脾。

歸脾飴糖丸

朱。入暮腹痛。鳴響。累久已偏墜。春正下血。經月顏色

鮮明此痛決非傷瘀積聚乃營損寒乘木來侮土致十四載之纏綿調營培土以甘泄木散鬱宜辛節口戒慾百天可效。

人參

炒當歸

炒白芍

肉桂

炮薑

茯苓

炙草

南棗

又細推病情不但營氣不振而清陽亦傷洞泄不已而辛潤宜減甘溫宜加從桂枝加桂湯立法

人參

桂枝

茯苓

生白芍

炙草

肉桂

煨薑

南棗

又仍議理營。

人參

於术

茯苓

炮薑

脾不統
血

某便後下血此遠血也。

焦术

一錢

炒白芍

一錢

炮薑

一錢

炙草

五分

木瓜

一錢

炒荷葉邊

二錢

血去陰
傷寒陽
上胃

方 脉小左數便實下血乃肝絡熱勝血不自寧。醫投參芪歸桂甘辛溫煖昧於相火寄藏肝胆火焰風翔上蒙清空。鼻塞頭暈喰咳不已一悞再悞遺患中厥夫下虛則上實陰傷陽浮冒乃一定至理。

連翹心

竹葉心

鮮生地

玄參

是鼻塞丸
倉咳治法
治下血也

丹皮

川斛

又下血陰傷走泄虛陽上升頭目清竅參芪术桂辛甘
助上致鼻寒耳聾用清上五六日右脉已小左仍細數
乃陰虧本象下愈虛則上愈實議以滋水制火之方

生地

玄參

天冬

川斛

茯神

炒牛膝

又脉左數耳聾腸痛木失水涵養以致上泛用補陰丸

補陰丸五錢 又虎潛丸 羊肉膠丸

某 腸紅粘滯四年不痊陰氣致傷。肛墜刺痛大便不爽。

藥難驟功當以潤劑通腑

陰虛血滯

生地

稽豆皮

杏肉

麻仁

冬葵子

歸鬚

後寒熱

勞傷營衛

姚

勞傷下血絡脈空乏爲痛

營衛不主循序流行而爲

偏寒偏熱診脉右空大左小促

通補陽明使開闔有序

歸芪建中湯

脾腎虛

唐

內經以陰絡傷則血內溢蓋燒酒氣雄擾動臟絡聚

血之所難得小愈而神采爪甲不榮猶是血脫之色

肛墜便甚治在脾腎以脾爲統血之司腎主攝納之柄故

也晚歸脾去木香早六味去丹澤加五味芡實蓮

肉阿膠丸

便汚血

血後虛寒寒

沈五酒濕污血皆脾胃柔膩主病當與剛藥。

黑地黃丸

凡脾腎爲柔臟可受剛藥。心肝爲剛臟可受柔藥。不可不知。謙甫治此症立法以平胃散作主。加桂附乾薑歸芍重加炒地榆以收下濕用之神效。卽此意也。

吳四二腹痛下血食孽齊豆漿而愈乃泄肺導濕之藥既愈以來復有筋骨痠寒熱夜卧口乾乃濕去氣泄陽明脈乏不主用事營衛失度津液不升之象天眞丸主之。

去人參

支六五痔血久下肌肉瘦黃乃血脫氣餒漸加喘促浮腫再延腹脹便不可爲此症臟陰有寒腑陽有熱詳於金匱

穀疸篇中極難調治

人參

焦术

茯苓

炒菟絲子

廣皮

生益智

木瓜

腎陽虛

楊

八 中年形勞氣餒陰中之陽不足且便血已多以溫養

固下男子有年下先虛也

人參

茯苓

歸身

淡蕘蓉

補骨脂

巴戟

炒遠志

生精羊肉

熬膏丸

服五錢

田 八 久矣晨泄腹痛近日有紅積此屬腎虛

補骨脂

大茴香

五味

茯苓

生菟絲

陳 三 脉左虛濶右緩大尾間痛連脊骨便後有血自覺惶

急

脉左虛濶右緩大尾間痛連脊骨便後有血自覺惶

急

脉左虛濶右緩大尾間痛連脊骨便後有血自覺惶

急

卷一百一十一
一間作

惶欲量兼之納穀最少明是中下交損八脈全虧早進
青囊班龍丸峻補玉堂關元暮服歸脾膏涵養營陰守
之經年形體自固

鹿茸

生切薄另研

鹿角霜

另研

鹿角膠

鹽湯化

柏子仁

去油烘乾

熟地

九蒸

韭子

鹽水浸炒

菟絲子

另磨

赤白茯苓

蒸

補骨脂

胡桃肉

日摃淨炒香

右溶膏煉蜜爲丸每服五錢淡鹽湯送

鹿茸壯督脉之陽鹿霜通督脉之氣鹿膠補督脉之
血骨脂獨入命門以收散越陽氣柏子涼心以益腎
熟地味厚以填腎韭子菟絲就少陰以升氣固精重

皮血足渴

腎陰虛

用茯苓淡滲。本草以陽明本藥。能引諸藥入於至陰之界耳。不用棗味之酸。以酸能柔陰。且不能入脈耳。胡十八。上下失血。先瀉血後便瀉踰月。陰傷液耗。胃納頗安。且無操家之勞。安養閑坐百日。所謂靜則陰充。

熟地

萸肉

茯神

山藥

五味

龍骨

汪 腎虛當春陽升動。咳嗽止聲音未震。冀有血陰難充復。不肯上承。用陰藥固攝。

熟地

白芍

茯神

黑稻豆皮

炒焦烏梅肉

成紅三年久
服補無不效

陳三腎陰虛絡中熱。肝風動。腸紅三載不已。左脇及腹不

清間在此

爽少陽亦逆。多以補中調攝。故未見奏功。姑用疎補。爲

益臟通腑。

熟地炭

炒當歸

炒查肉

炒地榆

炒丹皮

冬桑葉

又益陰泄陽。四劑血止。但腰痠。脘中痺。咽燥喜涼飲。肛熱若火。烙陽不和平。仍是陰精失涵。用虎潛法。

熟地炭

白芍

當歸

地榆炭

龜膠

知母

黃柏

豬脊髓丸

某沫血鮮紅凝塊紫黑。陰絡傷損。治在下焦。况少腹痛

瘕。肝腎見症。前此精濁日久。亦令陰傷於下。

人參

茯神

熟地炭

炒黑杞子

五味

炒地榆

生杜仲

又 左脈小數堅。肛墜脹。

人參

茯神

湖蓮肉

芡實

熟地炭

五味

奇脉傷

陳氏脈小瀉血有二十年。經云。陰絡傷。血內溢。自病起十

六載。不得孕育。述心中痛墜。血下不論糞前糞後。問脊

椎腰尻瘦楚。而經水仍至。跗膝常冷。而骨髓熱灼。由陰

液損傷。傷及陽不固密。閱頻年服藥。歸芪雜入涼肝焉。

血千年受
諸虛寒

是遵古治病議從奇經升固一法。

鹿茸

鹿角霜

枸杞子

歸身

紫石英

沙苑

生杜仲

炒大茴

補骨脂

禹餘糧石

蒸餅漿丸

勞力傷
絡

張九勞力見血。胸背脇肋諸脉絡牽掣不和。治在營絡。

人參

歸身

白芍

茯苓

炙草

肉桂

血瘀在
絡

計五瘀血必結在絡。絡反腸胃而後乃下。此一定之理。平三

昔勞形奔馳。寒暄飢飽致傷。苟能安逸身心。瘀不復聚。

不然年餘再瘀不治。

下瘀血非
凡門治法

旋覆花

新絳

青葱

桃仁

當歸鬚

柏子仁

宋

氏

當年腸紅繼衄血喉痛已見陽氣乘絡絡爲氣乘漸

若懷孕者然氣攻則動如梭與胎動迥異倘加勞怒必
有汚濁暴下推理當如是觀

柏子仁

澤蘭

卷柏

黑大豆皮

茯苓

大腹皮

便血一症古有腸風臟毒脈痔之分其見不外乎風
溼腸胃濕熱傷脾二義不若內經謂陰氣受傷及結
陰之旨爲精切仲景之先便後血先血後便之文尤

防血崩耳非
尾門治法也

簡括也。陰絡卽臟腑隸下之絡。結陰是陰不隨陽之徵。以先後分別其血之遠近。就遠近可決其臟腑之性情。庶不致氣失統攝。血無所歸。如漏卮不已耳。肺病致燥濇。宜潤宜降。如桑麻丸。及天冬地黃銀花柿餅之類是也。心病則火燃。血沸宜清宜化。如竹葉地黃湯。及補心丹之類是也。脾病必濕滑。宜燥宜升。如茅术理中湯。及東垣益氣湯之類是也。肝病有風陽痛迫。宜柔宜泄。如駐車丸。及甘酸和緩之劑是也。腎病見形消腰折。宜補宜填。如虎潛丸。及理陰煎之類是也。至膽經爲樞機。逆則木火煩營。有桑葉山梔柏

人言聞胃
而胃之法不越
數語矣

子丹皮之清養。大腸爲燥腑。每多濕熱風溼。如辛涼苦燥之治。胃爲水穀之海。多氣多血之鄉。臟病腑病無不兼之。宜補宜和。應寒應熱。難以拘執而言。若努力損傷者。通補爲主。膏粱蘊積者。清踈爲宜。痔瘡則滋燥兼投。中毒湏知寒熱。餘如黑地黃丸。以治脾濕。腎燥。天眞丸。以大補真氣。真精平。胃地榆之升降。脾胃歸脾之守。補心脾。璇龍以溫煦。奇督建中之復生。陽枳术之疎補。中土禹糧。赤脂以堵截。陽明用五仁湯。復從前之腸液。養營法善。病後之元虛。此皆先生祖古方而運以匠心。爲後學之津梁也。邵新甫

哉是言非
其所好也

脫肛

濕熱氣
虛下陷

翁六

濕熱皆主傷氣。氣下陷墜肛而痛。洩溺後。陰囊筋牽

五

着於肛。其痛爲甚。夫厥陰肝脉達陰。按脈濡弱。決非疎

泄。主治。議進陷者舉之。從東垣補中益氣湯。

氣虛下陷

孫六

面色痿黃。腹痛下血。都因飲食重傷脾胃。氣下陷爲

脫肛。經月不愈。正氣已虛。宜甘溫益氣。少佐酸苦。務使

中焦生旺。而驅年羸虧之陰自堅。冀有向安之理。

人參

川連

炒歸身

炒白芍

炙草

廣皮

石蓮肉

烏梅

中益氣去
火加葛收

又 肝翻純血。不但脾弱氣陷。下焦之陰亦不攝。固面色三戶。已無華色。此益氣乃一定成法。攝陰亦不可少。然幼稚補藥。須佐宣通。以易虛易實之體也。

人參

焦朮

廣皮

白芍

炙草

歸身

五味

升麻

醋炒 柴胡 醋炒

某 便後少腹痛。肛墻漏則便滑。臂虛不攝。

熟地炭

五味

萸肉炭

茯苓

炒遠志

炒菟絲子

某 肛墻尻痛。利多傷陰。

熟地炭

五味

茯神

炒山藥

○
攝
腎氣不

炒查肉

炒菟絲子

煎送禹糧石脂丸

王六陽氣下陷。腎真不攝。肛墜氣泄如風。向老下元陽愆。

非升柴能舉其陷。

人參

鹿茸

補骨脂

炒大茴香

茯苓

調入陽起石三分

吳五脫肛漏血。遇勞卽發。病經十六載。色萎黃。背脊痛。診脈尺中下垂。法當升陽攝陰。兼理奇脉。

斑龍丸加五味子蜜丸

脫肛一症。其因不一。有因久痢久瀉。脾腎氣陷而脫者。有因中氣虛寒。不能收攝而脫者。有因酒濕傷脾。

色慾傷腎而脫者。有因腎氣本虛。關門不固而脫者。有因濕熱下墜而脫者。又肛門爲大腸之使。大腸受寒受熱。皆能脫肛。老人氣血已衰。小兒氣血未旺。皆易脫肛。經曰。下者舉之。徐之才曰。瀉可去脫。皆治脫肛之法也。觀先生治脫肛之症。亦不越乎升舉固攝益氣三法。如氣虛下陷而脫者。宗東垣補中益氣湯。舉陷爲主。如腎虛不攝而脫者。宗仲景禹糧石脂丸。及熟地五味丸絲輩。固攝下焦陰氣爲主。如肝弱氣陷。脾胃氣虛下陷而脫者。用攝陰益氣兼以酸苦泄熱爲主。如老年陽氣下陷。腎真不攝而脫者。又有鹿

茸陽起石等。提陽固氣一法。汪訥菴云。有氣熱血熱而肛反挺出者。宜用芩連槐柏及四物升柴之類。愚謂卽或間有此症。終非可訓之法。存之以質君子。鄒滋九

臨期更問首血瘀發非直應也。夫瘀之曰氣鬱子
而其人發出者宜用斧頭時補以丹參止痛。
草歸桂石桂共研一匙玉精散服。

痺

肺熱葉
焦

湯六三有年偏痺。日瘦。色蒼脈數。從金匱肺熱葉焦則生痺。

火症非全速

覽論

玉竹

大沙參

地骨皮

麥冬

桑葉

苦百合

甜杏仁

恐未必效

徐歲三面瘦跗。此屬肺熱痺。

連翹

花粉

黑山梔

赤小豆

桑葉

白通草

張 濕中伏熱。沉着下焦。用苦勝濕。辛通氣分。然必循經

濕火

入絡漸次達及陽明。

綿茵陳

三錢

生茅术

五分

黃柏

一錢半

晚蚕沙

一錢

寒水石

三錢

茯苓皮

三分

又色蒼脈實體質強壯雖年踰四旬氣元充旺詢知平日善啖酒醴甘肥此釀成濕火蘊結下焦今少腹微腫硬二便滯濇自覺少腹氣脹上冲兩足沉重艱於步履腿股皮中甚熱卽內經所云濕熱不攘大筋縶短小筋弛長縶短爲拘弛長爲痿也更述曾因熬煉膏藥中有瘧蟲蜈蚣等物吸受穢濁毒氣未始非與濕熱糾蓄沉伏下焦前議苦辛寒燥茲再佐以搜逐絡隧然此病從

日而入必茹素戒飲二二年之久病根可拔當恪守勿
懈爲要

綿茵陳

三錢

黃柏

一錢半

川草薢

一錢

茯苓皮

三錢

金鈴子

半錢

穿山甲

三錢

大楨榔汁

一錢

又綿茵陳

草薢

茯苓皮

黃柏

桑沙

漢防己

龍胆草

山梔

青黛

又病去七八常服二妙丸可也

黃柏

八兩略炒

茅山术

米泔浸切片同烏芝麻拌飯上蒸三五次去芝麻焙乾三兩

二味研末水法丸空心服三錢開水下

吳十二雨濕泛潮外來水穀聚濕內起兩因相奏經脈爲痺

濕熱蒸
爛筋骨

始病繼以瘡瘍。漸致痿緩筋弛。氣隧不用。濕雖阻氣。而熟蒸爍及筋骨。久延廢棄有諸。

大豆黃卷

飛滑石

杏仁

通草

木防已

胃氣室
筋骨不
利

廉三診脉論體。從遺精漏瀉。繼而環跳穴痛。遂不堪行走。臟陰傷及腑陽。陽氣日加窒塞。經脈不司舒展。食入壅脣欲吐。大便旬日不通。痞阻日甚。而爲痿症。內經論治痿獨取陽明。無非流通胃氣。蓋胃脈主乎束筋骨利機關竅也。議用加味溫胆湯。

又 大便旬日不通。用更衣丸。取意小腸火腑。非苦不通。非下不導也。

邪風八
絡

某歲五頭目口鼻喎邪。繼而足痿。此邪風入絡所致。

○陽明虛。營絡熱。內風動。

羚羊角

犀角

玄參

細生地

黃柏

川斛

川草薢

○陽明虛。營絡熱。內風動。

○愈

○五旬又四。陽氣日薄。陽明脈絡空乏。不司束筋骨。以

○流利機關。肩痛肢麻。頭目如蒙。行動痿弱無力。此下虛

○上實。絡熱。內風沸起。當入夏陽升爲甚。燥濕利痰。必不

○應病。議清營熱以熄內風。

犀角

鮮生地

玄參心

連翹心

冬桑葉

丹皮

鈞藤

明天麻

○肝胃虛。內風動。

陳 陽明脉空。厥陰風動。自右肩臂漸及足跗。痿躄長夏。

氣泄。秋半不主收藏。顯然虛症。先用通攝方法。

淡蕊蓉

熟地

杞子

川牛膝

川斛

茯苓

遠志

炒黑

石菖蒲

肝胃虛

夏四

自稱壯失血遺精。

兩交夏月。

四肢痠癱。

不得轉動。

指節亦不能屈曲。

凡天地間。

冬主收藏。

夏主發洩。

內損多

年不復元。陽明脈衰所致。

當歸

羊肉膠

杞子

鎖陽

菊花炭

茯苓

青鹽

胃陽督
腎皆虛

吳九三下焦痿蹙。先有遺泄。濕瘻。頻進滲利。陰陽更傷。雖有參芪术。養脾肺以益氣。未能救下。即如畏冷。陽微。幾日

飯後吐食乃胃陽頓衰。應乎外衛失職。但下焦之病多屬精血受傷。兩投柔劑溫通之補。以腎臟惡燥。久病宜通任督。通攝兼施。亦與古賢四斤金剛健步諸法互參。至於胃藥。必須另用。夫胃腑主乎氣。氣得下行爲順。東垣有升陽益胃之條。似乎相悖。然芩連非苦降之氣味乎。凡吐後一二日。暫停下焦血分藥。卽用扶陽理胃二日。俾中下兩固。經旨謂陽明之脉。束筋骨以利機關。諒本病必有合矣。

鹿茸 淡蕊蓉 當歸 杞子 補骨脂
巴戟天 牛膝 栝子仁 茯苓 川斛

吐後間服大半夏湯加淡乾薑薑汁

濕熱肝
腎虛

沈 長夏濕熱。經脈流行氣鈍。兼以下元絡脈已虛。痿弱不耐。步趨常似酸楚。大便或結或溏。都屬肝腎爲病。然益下必佐宣通脈絡。乃正治之法。倘徒呆補。恐季夏後濕熱還擾。須爲預理。

鹿角霜

當歸

生茅术

熟地

薑汁
製

茯苓

桑椹子

蓆蓉

巴戟

遠志

小茴

金毛狗脊三筋酒

蒸水熬膏和丸。淡鹽湯送下。

李九四 瘰癧在下。肝腎病多。但素飲必有濕熱。熟瘀濕滯。氣血不行。筋縮。肌肉不仁。體質重着難移。無非濕邪之深。

沉也。若論陽虛不該大發瘡痍。但久病非速攻。莫計效
遲。方可愈疾。

細生地

鹹蓴蓉

當歸鬚

牛膝

黃柏

生刺蒺

川斛

草薢

包五寢食如常。脈沉而緩。獨兩腿內外肌肉麻木。五旬又三。陽脈漸衰。蹻維不爲用事。非三氣雜感也。溫通以佐脈絡之流暢。倣古賢四斤金剛之屬。

○淡蕊蓉

枸杞子

牛膝

茯苓

白蒺藜

木瓜

草薢

金毛狗脊膏丸

郭 汝足痿弱。遇冷筋掣。三年久病。藥力焉得速拔。況不

臨證指掌醫案 卷一
明受病何因。徒見病而治。難期速功。據云精滑溺後。通納下焦爲宜。

淡蕊蓉

茯苓

川斛

生茅术

生杜仲

金毛狗脊

脾腎陽虛

沈四眩暈怔忡。行走足肢無力。肌肉麻木。骨骼色變。早晨腹鳴。疲泄。此積勞久傷陽氣。肝風內動。勢欲瘓厥。法當脾腎雙補。中運下攝。固體治病。

○脾腎雙補丸 山藥粉丸

繆仲淳方

肝腎虛

沈三寢食如常。儀容日瘦。語言出聲。舌絡牽強。手足痿弱。不堪動作。是肝腎內損。漸及奇經諸脈。乃痿痺之症。未

能驟期速功。地黃飲子去萸味桂

席 雨水後。診得右脈頗和。左關尺大堅搏不附骨。春陽初萌。裏真漏泄。有風動枯痿之慮。議乙癸同涵意。

熟地

淡蓴蓉

杞子

五味

萸肉

牛膝

川斛

茯神

菊花

山藥粉丸

寒 衝脈虛

李氏 右肢跗足無力如瘓。交子夜痰多喰嗽。帶下且頻。是衝脈虛寒。浮火上升。非治嗽清熱。夫衝爲血海。隸於陽明。女科八脉奇經最要。內經論之。女子五七年歲。陽明日衰。今天癸將絕。年歲脈絡少氣。非見病治病膚淺之見。愚意通陽攝陰以實奇脈。不必縷治。

腎陽奇
脈兼虛

薛氏加減八味丸二兩勻七服鹽湯送下

許金瘡去血。乃經脈營絡之傷。若損及臟腑。倏忽莫救。
後此嗔怒動肝。屬五志中陽氣逆逆。與客邪化火兩途。
苦辛泄氣。頻服既多。陽遂發泄。形雖若豐盈。而收藏固。
攝失職。少腹約束。陽道不舉。背脊喜靠。步履無力。皆是。
痿弱症端。漸至痿廢。議以通納之法。耑事涵養生真。冀。
下元之陽。八脉之氣。收者收。通者通。庶乎近理。

鹿角霜 淡蕊蓉乾 生菟絲粉 生杜仲粉

歸身

五味

大茴香

遠志

家韭子

覆盆子

雲茯苓

蒜汁泛丸

唐三脉左沉小右弦兩足腰膝瘦弱無力舌本腫脹劑頸
轟然蒸熱痰涎湧出味鹹此腎虛收納少權督脈不可
約束陰火上泛內風齊煽久延痿厥沉疴病根在下通
奇脈以收拾散越之陰陽爲法

虎潛去知柏歸加枸杞青鹽羊肉膠丸

下焦陰虛萬脉濡弱右大心熱煩渴兩足膝腰髀伸縮不得自如
此乃下焦陰虛熱爍筋骨而爲痿躄

生虎潛去龜廣鎖加玄參

黃二冬藏精氣既少當春夏發泄失血遺精筋弛骨瘦不
堪行走精血內怯奇脈中少氣三年久損若不絕慾安

問有僂廢難狀之疾。

鹿筋膠

羯羊肉膠

牛骨髓

猪脊髓

線魚膠

蓴蓉乾

紫巴戟

枸杞子

茯苓

沙苑子

牛膝

青鹽

某 痘後陰傷骨癆。

生杜仲

熟地

龜甲

黃柏

虎骨

牛膝

當歸

巴戟

某 痘如歷節。但汗出筋縱而痛。冬月爲甚。腰脊僵僂形彎。據述未病前。夢遺已久。是精血內損。無以營養筋骨。難與攻迫。議香茸丸。溫通太陽督脈。

鹿茸

三兩

生當歸

二兩

麝香

一錢

生川烏

五錢

雄羊腎三對酒煮爛搗丸

經云肺熱葉焦則生痿躄。又云治痿獨取陽明。以及
脉痿筋痿肉痿骨痿之論。內經於痿症一門可謂詳
審精密矣。奈後賢不解病情。以諸痿一症或附錄於
虛勞。或散見於風濕。大失經旨。賴丹溪先生特表而
出之。惜乎其言之未備也。夫痿症之旨。不外乎肝腎
肺胃四經之病。蓋肝主筋。肝傷則四肢不爲人用。而
筋骨拘攣。腎藏精。精血相生。精虛則不能灌溉諸末
血。虛則不能營養筋骨。肺主氣。爲高濶之臟。肺虛則

高源化絕化絕則水涸水涸則不能濡潤筋骨陽明爲宗筋之長陽明虛則宗筋縱宗筋縱則不能束筋骨以流利機關此不能步履痿弱筋縮之症作矣故先生治痿無一定之法用方無獨執之見如衝任虛寒而成痿者通陽攝陰兼實奇脉爲主濕熱沉着下焦而成痿者用苦辛寒燥爲主腎陽奇脉兼虛者用通納八脉收拾散越之陰陽爲主如下焦陰虛及肝腎虛而成痿者用河間飲子虎潛諸法填納下焦和肝熄風爲主陽明脉空厥陰風動而成痿者用通攝爲主肝腎虛而兼濕熱及濕熱蒸灼筋骨而成痿者

益下佐以溫通脈絡。兼清熱利濕爲主。胃虛空塞。筋骨不利而成瘓者。用流通胃氣及通利小腸火腑爲主。胃陽腎督皆虛者。兩固中下爲主。陽明虛。營絡熱。及內風動而成瘓者。以清營熱熄內風爲主。肺熱葉焦而成瘓者。用甘寒清上熱爲主。邪風入絡而成瘓者。以解毒宣行爲主。精血內奪。奇脈少氣而成瘓者。以填補精髓爲主。先生立法精詳。真可垂諸不朽矣。

鄉滋九

痺

周痺

吳風濕相搏。一身盡痛。加以墮水。外寒裏熱。痛極發厥。

此屬周痺。

桂枝木

片薑黃

羚羊角

海桐皮

花粉

白蒺藜

又照前方去薑黃白蒺藜加大豆黃卷木防已

鮑四風濕客邪。留於經絡。上下四肢流走而痛。邪行觸犯。

不拘一處。古稱周痺。且數十年之久。豈區區湯散可效。

凡新邪宜急散。宿邪宜緩攻。

蟻螂蟲

全蝎

地龍

穿山甲

蜂房

川烏

麝香

乳香

右藥製末以無灰酒煮黑大豆汁泛丸

杜三溫暖開泄。驟冷外加風寒濕三氣交傷爲痺。遊走上下爲楚邪入經隧。雖汗不解。貴乎宣通。

桂枝

杏仁

滑石

石膏

川草薢

漢防已

苡仁

通草

又 經脈通而痛痺減。絡中虛則痿弱無力。周身汗出。陽泄已多。豈可再用苦辛以傷陽泄氣乎。內經以筋緩爲陽明脉虛。當宗此旨。

黃芪

防風

白朮

茯苓

炙草

桂枝

當歸

白芍

苡仁

又大凡邪中於經爲痺。邪中於絡爲瘻。今痺痛全止。行走痿弱無力。經脈受傷。陽氣不爲護持。法當溫養通補。經旨春夏養陽。重在扶培生氣耳。

黃芪

四兩

茯苓 三兩

生白朮 二兩

炙草

淡蕊蓉

二兩

當歸 三兩

牛膝 二兩

仙靈脾 二

虎骨膠

金毛狗脊

十二兩無灰酒
浸半日蒸熬膏

膠膏爲丸

劉一瀕海颶風潮濕。着於經脈之中。此爲周痺。痺則氣血不通。陽明之陽不主司事。食腥膩遂不化爲溏瀉。病有

六七年正虛邪實不可急攻宜緩

生白术

生黃芪

海桐皮

川桂枝木

羌活

防風根

行渾

周 痛勢流走而腫後感外邪參藥不可與也從行渾治

羌活

木防已

石膏

生甘草

海桐皮

杏仁

吳 寒入陰分筋骨痛更此爲渾症遺泄內虛忌用表散
劫真

當歸

沙苑

北細辛

桂枝木

生白术

茯苓

又 虎骨

當歸

北細辛

生白朮

茯苓

又 行痺入左足。

生虎骨

防已

草薢

苡仁

半夏

茯苓

某氏風濕化熱萃於經脈。腫痛游走。病名行痺。世俗呼爲歷節風是也。

桂枝

羌活

石膏

甘草

杏仁

防風

又 行痺。腹中痛。便難。不知飢。

瓜蔞皮

紫苑

杏仁

鬱金

肢痺

牛夏

山梔

桑枝

愈肩胛連及臂指走痛而腫。一年乃肢痺也。絡虛留邪。

和正祛邪。

黃芪

防風

海桐皮

生白术

歸身

川羌活

片薑黃

白蒺藜

李脉小弱。當長夏四肢痺痛。一止之後筋骨不甚舒展。
此衛陽單薄。三氣易襲。先用陽明流暢氣血方。

黃芪

生白术

漢防已

川獨活

苡仁

茯苓

朱二肢痺痛頻發

羚羊角

木防已

川桂枝尖

晚蚕沙

川草薢

白通草

生苡仁

茯苓

汪 冬月温暖，真氣未得潛藏。邪乘內虛而伏，因驚蟄節。
春陽內動，伏氣乃發。初受風寒，已從熟化，兼以夜坐不
眠，身中陽氣亦爲泄越。醫者但執風寒濕三邪合成爲
痺，不曉病隨時變之理。羌防葛根再泄其陽，必致增劇
矣。焉望痛緩議用仲景木防已湯法。

木防已

石膏

桂枝

片薑黃

杏仁

桑枝

又 氣中伏邪得宣，右肢痺痛已緩。血分留熱壅着，左肢

卷一
痛勢未衰。足微腫。體質陰虛。仍以宣通輕劑。

羚羊角

桂枝木

片薑黃

花粉

木防已

杏仁

桑皮

顧 濕熱流着四肢痺痛。

川桂枝

木防已

蚕沙

石膏

杏仁

威靈仙

寒濕

某 左脉如刃。右脉緩濶。陰虧本質。暑熱爲瘧。水穀濕氣下墜。肢末遂成攀痺。今已便瀉減食畏冷。陽明氣衰極矣。當緩調。勿使成疾。

生白术

狗脊

獨活

茯苓

木防已

仙靈脾

防風

威靈仙

又濕痺脉絡不通用苦溫滲濕小效。但汙出形寒泄瀉。
陽氣大傷難以濕甚生熱例治通陽宣行以通脈絡。生
氣周流亦却病之義也。

生於术

附子

狗脊

苡仁

茯苓

草薢

徐九長夏濕勝氣阻不飢不食四肢痺痛痛甚於午後子
前乃陽氣被陰濕之遏色痿黃脈小澀以微通其陽忌
投劫汗。

茯苓

萆薢

木防已

晚蚕沙

臯瀉

金毛狗脊

黎肢膝麻痺。足膝爲甚。

當歸

杞子

生虎骨

油松節

各二兩

川芎

狗脊

草薢

淮牛膝

仙靈脾

檀香泥

白芨根

沙苑

各二兩

火酒

醇酒各半浸七日

某三寒濕滯於經絡。身半以下筋骨不舒。二便不爽。若非
迅疾飛走不能效。蠲痛丹。

某勞力感濕。腰痺酸痛。四肢乏力。

生杜仲

生苡仁

沙苑子

茯苓

粗桂枝木

金毛狗脊

晚蚕沙

木防己

某十五年中。痺痛三發。述痛久流及肢節骨骱屈曲之所。皆腫赤。此寒濕變熱爲欲解。病在軀殼筋骨。無害命之理。但病深沉下甚。已屬陰邪。小腹脹。小溲全無。

川獨活

八分

漢防已

八分

川熟附

八分

粗桂枝木

一錢

茯苓

五錢

川草薢

一錢

木猪苓

一錢半

又

生白术

三分錢

茯苓

三錢

川熟附

一錢

川獨活

五分

北細辛

一分

漢防已

五分

猪苓

一錢半

澤瀉

一錢

又

陽虛濕痺。愈下焦無力。用幹旋其陽。

茯苓

四兩

生白术

二兩

泡淡生乾薑

一兩

肉桂

五錢

已上四味生研末。滾水泛丸。每早服三錢。開水下。

何三脉沉。目黃舌腫。周身四肢痙攣。胃痛。肢末皆腫強。遇冷飲涼卽病。此久伏濕邪。陽氣傷損。議溫氣分以通周行之脈。

川烏頭

生白术

桂枝木

茯苓

半夏

薑汁

唐姬右後脇痛連腰膀。發必惡寒逆冷。暖護良久乃溫。此脈絡中氣血不行。遂至凝塞爲痛。乃脈絡之痙症。從陽維陰。維論病。

鹿角霜

小茴香

當歸

川桂枝

沙苑

茯苓

風濕

王 努力。經氣受傷。客邪乘衛陽之疎而入。風濕阻遏。經隧爲腫。爲痛。大汗。連出。痛仍不止。而大便反滑。其濕邪無有不傷陽氣者。固衛陽以却邪。古人正治。以濕家忌汗耳。

生於术

三錢

防風根

五分

生黃芪

三錢

片薑黃

一錢

桂枝木

五分

海桐皮

一分

羌活

五分

獨活

五分

又 人參

一錢

生於术

二錢

黃芪

三錢

炒當歸

一錢

川桂枝

一錢

炙甘草

五分

煨薑

七分

南棗

二枚

又 風濕腫痺。舉世皆以客邪宜散。愈治愈劇。不明先因勞倦內傷也。蓋邪之所奏。其氣必虛。參术益氣。佐以風

藥氣壯托出其邪。痛斯止矣。病人自云手足如墮如無。詎非陽微不及乎。四末乎此皆悞治。致參藥過費耳。
人參一錢 生於术二錢 黃芪二錢 歸身一錢
肉桂三分 炙甘草三分 黃薑一錢 南棗一枚
又 遺泄陰傷。兼以歟攝。

人參一錢 生於术二錢 黃芪三錢 歸身一錢 炙草五分
熟地三錢 茯神三錢 五味五分 白芍一錢

九 方
人參二兩 黃芪四兩 茯神二兩 杞子二兩 鹿角霜二
鹿茸二兩 歸身三兩 炙草一兩 菊花炭二兩 煉蜜丸
王 風濕痺痛。

防已

生於术

川獨活

茯苓

炒黃柏

生苡仁

又 瘰在四肢。

羚羊角

白蒺藜

海桐皮

滑石

大豆黃卷 茄仁

又 照前方去蒺藜苡仁加連翹青菊葉花粉

又 羚羊角 犀角

連翹

海桐皮

大豆黃卷 花粉

薑黃

金銀花

金 風濕熱走痛。二便不通。此瘡症也。

杏仁

木防已

寒水石

鬱金

生石膏 木通

李 風濕肌腫而痛畏熱。

炒黃柏 茅术 製蒺藜 木防已

秦艽 鈎藤

又 黃柏 防已 茯苓 茱仁

草薢 虎骨

楊 四肢流走痺痛風勝移走濕凝爲腫下焦爲甚邪人

陰分 燭痛丹

蔣 氏 便溏食少腰腹已下骨骼肢節沉痛

人參 生於术 製白松香 茯苓

漢防已

北細辛

川獨活

苡仁

王身半已上屬陽風濕雨露從土而受流入經絡與氣血交混遂爲痺痛經月來外邪已變火化攻散諸法不能取效急宜宣通清解毋使布及流注

防已

薑黃

蚕沙

杏仁

石膏

滑石

毛氏風濕相搏一身腫痛周行之氣血爲邪阻蔽倣仲景木防已湯法

木防已

石膏

杏仁

川桂枝

威靈仙

羌活

洪三濕盛生熱生痰漸有痿痺之狀乃陽明經隧爲壅不可拘執左屬血右屬氣也金匱云經熱則痺絡熱則痿今有痛處治在氣分

生於术

三錢

生黃芪

三錢

片薑黃

一錢

川羌活

一錢

半夏

一錢

防風

五分

加桑枝

五錢

又 茂木固衛升陽左肩胛痛未已當治營中以辛甘化

風法

黃芪

當歸

炙草

防風

桂枝

肉桂

張 骨骱走注行痛身體重着不能轉舒此爲濕痺但陽

虛之質。忌辛散苦寒藥。

桂枝木

木防已

苡仁

羚羊角

大豆黃卷

杏仁

橘紅

方 左脈弦大，面赤痰多，大便不爽。此勞怒動肝，令陽氣不交於陰，陽維陽蹻二脈無血營養，內風燬筋，跗蹠痺痛，暮夜爲甚者，厥陰旺時也。病在脈絡。

金斛

晚蚕沙

漢防已

黃柏

牛夏

草薢

大棗榔汁

又 痛右緩，左痛濕熱未盡，液虛風動也。

生地

阿膠

龜版

稽豆皮

茯苓

通草

某九

舌白目彩油光腰痺痛濕邪內蘊尙未外達必分利

濕邪爲主

杏仁

蘇梗

木防已

厚朴

茯苓皮

花粉

晚蚕沙

茵陳

吳氏風濕化熱蒸於經絡周身痺痛

舌乾咽喉燥津液不得升降營衛不肯宣通怕延中癥

生石膏

杏仁

川桂枝

苡仁

木防已

又

石膏

杏仁

木防已

炒牛夏

橘紅

黑山梔

薑汁

竹瀝

石 脈數右大溫漸化熱灼及經絡氣血交阻而爲痺痛。
陽邪主動自爲遊走陽動化風肉腠浮腫俗諺稱爲白虎歷節之謂。

川桂枝

木防已

杏仁

生石膏

花粉

薑金

又 照前方去薑金加寒水石晚蚕沙通草

又 脉大已減右數象未平痛緩什七肌膚甲錯發癢腹微滿大便不通陽明之氣未化熱未盡去陰已先虛不可過劑。

麻仁

鮮生地

川斛

丹皮

寒水石 鈎藤

某久痺釀成歷節舌黃痰多由濕邪阻着經脈

漢防已 嫩滑石 晚蚕沙

寒水石

杏仁 芍仁 茯苓

濕熱入
血絡

宋病者長夏霉天奔走內踝重墜發斑下焦痛起繼而筋掣及於腰窩左臂經云傷於濕者下先受之夫下焦奇脈不流行內踝重着陰維受邪久必化熱爍血風動內舍乎肝胆所謂少陽行身之側也診得右脉緩左脉實濕熱混處血絡之中搜逐甚難此由濕痺之症失治延爲痿廢沉疴矣三年病根非倉猝迅攻姑進宣通營

絡參之奇經爲治。考古聖治瘻瘍。獨取陽明。惟通則留邪可拔耳。

鹿角霜

生白朮

桂枝

茯苓

撫芎

歸鬚

白蒺藜

黃菊花

某初病濕熱在經。久則瘀熱入絡。膿瘍日多未已。漸而筋骨疼痛。金匱云。經熱則痺。絡熱則瘻。數年宿病勿事速攻。夜服蒺藜丸。

午

犀角

玄參

連翹心

野赤豆皮

細生地

丹參

薑黃

桑枝

塞經絡
瘀血壅

張二四肢經隧之中。遇天令陰晦。疼痛拘攣。癰疽瘍瘍潰膿。

防已

桑枝

海桐皮

片薑黃

又 痘已漸安，脈絡有流通意。仲景云：經熱則痺，絡熱則
癆。知風滯於內，治以甘寒。寒可去熱，甘味不傷胃也。

甜杏仁

連翹

玄參

花粉

菉豆皮

梨汁

又 餘熱尙留下午足寒，晨餐頸汗，胃未調和，食不甘美。
因大便微溏，不必過潤。

北沙參

麥冬

川貝

川斛

陳皮

穀芽

肝陰虛
瘡邪入

沈七

用養肝血，熄風方。右指仍麻，行走則屈伸不舒。戊亥

原书缺页

原书缺页

血絡

必心熱煩蒸。想前法不效。杞歸辛溫。陽動風亦動矣。議去辛用酸。若疑慮。途次瘧邪未盡。致脉絡留滯。兼以通逐緩攻亦妙。

熟地

龜膠

阿膠

秋石

天冬

麥冬

五味

茯神

蜜丸晨服

桃仁

穿山甲

乾地龍

撫芎

歸鬚

丹皮

紅花

沙苑

香附汁丸夜服

熟入下
焦血分

某仲景以經熱則痺。絡熱則癆。今痺痛多日。脉中筋急。
熟入陰分血中。致下焦爲甚。所謂上焦屬氣。下焦屬血。

耳

柏子仁

當歸

丹皮

鈎藤

川斛

沙苑

又 痛。右膝甚。

生虎骨

柏子仁

牛膝

草薢

苡仁

茯苓

風寒濕
入下焦
經隧

某 四八 脉弦勁。右足踝腫。痛得煖得摩稍適。此風寒濕三氣混入經隧而爲痺也。當用辛溫宣通經氣爲要。

活絡丹一丸陳酒下

某 痛在外踝筋骨妨於行走。邪留經絡。須以搜剔動

藥。

氣滯熱

鬱

川烏

全蝎

地龍

山甲

大黑豆皮

某 病後過食肥膩，氣滯熱鬱。口膩粘涎，指節常有痺痛。
當從氣分宣通方法。

蘇梗

杏仁

薑皮

鬱金

半夏麵

橘紅

肝胃虛
滯

陳 五 労動太過，陽氣煩蒸。中年液衰風旋，周身痺痛。此非
四 客邪法宜兩調，陽明厥陰。

黃芪

生白朮

製首烏

當歸

白蒺藜

黑穠豆皮

肝膽風
熱

張 三 煩勞鬱勃之陽，變現熱氣內風。內經以熟瀋風消，必

用甘寒。前議謂酒客不喜甘味。且痰多食少。亦忌甘膩。
滋滯。用清少陽胆熱者。酒氣先入肝膽也。酒汁濕着腸
胃受之。理明以通胃。胃腸氣機流行。食加滑泄頗膩。今
者氣熱。當午上冒。經絡痺痛。亦減於平日。主以和陽甘
寒。宣通經脈佐之。

童桑

羚羊角

天門冬

枸杞子

白蒺藜

丹皮

茯苓

霍山石斛

共熬膏

某氏血虛風痺。骨骱腫痛。

羚羊角

細生地

玄參

當歸

桂枝

桑枝

白蒺藜

精血虛

金三痺痛在下重着不移。論理必係寒濕。但左脈搏數。經月遺泄三四。痛處無形。豈是六淫邪聚。然隧道深遠。藥餌未易奏功。佐以艾灸。冀得效靈。

枸杞子 肉蓯蓉 虎骨膠 糜角膠 杜仲

桑椹子 天冬 沙苑 茯苓 滇膠丸

孫 脉右太陽明空氣短閃爍欲痛

人參 生黃芪 熟白朮 灸草 廣皮

當歸 白芍 半夏 防風根 羌活

又 益氣頗安。知身半已上痺痛。乃陽不足也。

人參 黃芪 熟於朮 灸草

桂枝

歸身

白芍

川羌

沈 瘀痛在右氣弱有痰。

生於木

川桂枝

川獨活

片薑黃

白茯苓

陳防已

營虛

王 辛香走竄宣通經體壅結氣分之濕有却病之能無補虛之益大凡藥餌先由中宮以布諸經中焦爲營氣之本營氣失養轉旋自鈍然攻病必藉藥氣之偏朝夕更改豈是去疾務盡之道另於暮夜進養營一貼

人參

茯苓

桂枝木

炙草

當歸

炒白芍

南棗

筋痺

吳三筋縱痛甚邪留正痺當此天暖間用針刺以宣脉絡。

初補氣血之中必佐宣行通絡之治

生黃芪

防風

桂枝

炒黑常山

歸身

青菊葉汁

血中氣滯

某 痒痛偏左入夜尤甚血中之氣不行。

歸鬚

桑枝

苡仁

白蒺藜

薑黃

木防已

血虛熱

劉三周禮採毒藥以供醫事蓋因頑鈍沉痼着於軀殼非

臟腑虛損故必以有毒攻拔使邪不留存凝着氣血乃效既效矣經云大毒治病十去其五當此只宜愛護身

體勿勞情志便是全功道理愚人必曰以藥除根不知
天地之氣有勝有復人身亦然穀食養生可御一生藥
餌偏勝豈可久服不觀方士煉服金石丹藥疽發而死
者比比。

何首烏 黑芝麻 桑枝桂枝湯泛丸

營中熱某 脉沉小數營中留熱骱骨尙有微疼宜通經絡佐清
營熱

鈎藤 細生地 當歸鬚 白蒺藜

丹皮 片薑黃

此症與風病相似但風則陽受之痺則陰受之故多

重着沉痛。其在內經不越乎風寒濕三氣。然四時之令皆能爲邪。五臟之氣各能受病。其實痺者閉而不通之謂也。正氣爲邪所阻。臟腑經絡不能暢達。皆由氣血虧損。腠理踈豁。風寒濕三氣得以乘虛外襲。留滯於內。致濕痰濁血流注凝滯而得之。故經云三氣雜至。合而爲痺。又云風勝爲行痺。寒勝爲痛痺。濕勝爲着痺。以及骨痺筋痺脉痺肌痺皮痺之義可知。痺病一症。非偏受一氣足以致之也。然而病症多端。治法亦異。余亦不能盡述。茲以先生治痺之法爲申明一二。有衛陽踈風邪入絏而成痺者。以宣通經脈。甘

寒去熱爲主。有經脉受傷。陽氣不爲護持而爲痺者。
以溫養通補扶持生氣爲主。有暑傷氣濕熱入絡而
爲痺者。用舒通脈絡之劑。使清陽流行爲主。有風濕
腫痛而爲痺者。用參术益氣。佐以風藥壯氣爲主。有
濕熱傷氣及溫熱入血絡而成痺者。用固衛陽以却
邪。及宣通營絡兼治奇經爲主。有肝陰虛。瘡邪入絡
而爲痺者。以酸苦滋陰。兼以通逐緩攻爲主。有寒濕
入絡而成痺者。以微通其陽。兼以通補爲主。有氣滯
熱鬱而成痺者。從氣分宣通爲主。有肝胃虛滯而成
痺者。以兩補厥陰陽明爲治。有風寒濕入下焦經隧。

而爲痺者。用辛溫以宣通經氣爲主。有肝胆風熱而成痺者。用甘寒和陽。宜通脈絡爲主。有血虛絡濇及營虛而成痺者。以養營養血爲主。又有周痺行痺。筋痺及風寒濕三氣雜合之痺。亦不外乎流暢氣血。祛邪養正。宜通脈絡諸法。故張景岳云。治痺之法。祇宜峻補真陰。宜通脈絡。使氣血得以流行。不得過用風燥等藥。以再傷陰氣。亦見道之言也。鄒滋九

卷

一

瘧厥

瘧火上
閉

李

先因嘔吐腹痛。隨卽昏迷。此氣火痰上蒙清神爲厥。

煎厥

某

陽氣暴張。精絕。令人煎厥。

細生地

一兩

阿膠

三錢

出山鉛

打薄五錢

調珍珠

末一錢

又 煎厥者。下焦陰液枯燥。衝氣上逆爲厥。議用鹹寒降逆。血肉填陰。

細生地

玄參

龜膠

阿膠

淡菜

蚌水

又 液涸消渴。都是臟陰爲病。前議填陰藥汁。膿膩不能
多進。但胃口不醒。生氣何以再振。陽明陽土。非甘涼不
復。况肝病治胃。自來有諸。

人參

麥冬

川斛

新會皮

白粳米

乾佩蘭葉

王一四經云。一經云。煩勞則張。精絕。辟積於夏。令人煎厥。夫勞動陽氣。弛張。則陰精不司。留戀其陽。雖有若無。故曰絕。積之既久。逢夏季。陽正開泄。五志火動。風生。若煎熬者。然斯爲量厥耳。治法以清心益腎。使肝胆相火。內風不爲暴起。然必薄味靜養爲穩。

連翹心

玄參心

竹葉心

知母

腎厥

細生地

生白芍

某二腎厥。由背脊而升。發時手足逆冷。口吐涎沫。喉如刀刺。蓋足少陰經脈上循喉嚨。挾舌本陰濁自下。上犯必循經而至。倣許學士椒附意。通陽以泄濁陰耳。

炮附子

淡乾薑

川椒

胡蘆巴

半夏

茯苓

薑汁泛丸

某 腎厥氣逆至頭 玉貞丸二十粒

膻中熱
鬱心竅

盛四九腑上心下熱熾。咽喉間陳腐氣。遂神昏仆厥。經時汗出而醒。病來口渴血沫。乃膻中熱壅。以致心竅受蒙。若

非芳香清透不能宣通絡中瘀痺

生烏犀角

一兩
兩

丹參

一兩

鬱金

二兩

雲茯神

一兩

石菖蒲

五錢

麝香

一錢

冰片

五分

各生研野赤豆皮煎湯泛丸竹葉湯送下二錢食後

服

謝女熟鬱於內則機竅不靈春令升泄木火化風旋擾痺癰擣據有癲癇之慮不可進通經再劫其陰液

細生地

鬱金

犀角

丹參

石菖蒲

生白芍

竹瀝

又火淫於內治以苦寒佐以鹹寒

黃連

黃芩

黃柏

黑山梔

牡蠣

生地

冲入方諸水

又 脉左堅。經阻半載。戊亥陰時。厥逆肢掣。逾時方甦。卽欲渴飲。龍薈宣竅。鹹苦清火未效。且大便兩旬不解。定是熱結在血。倣古人厥應下之義。用張子和玉燭散。

玉燭散

溫邪劫
液風陽
上逆

羅溫邪內陷。津液被劫。厥陽挾內風上逆。遂致瘡厥。

生牡蠣

阿膠

熟地炭

生白芍

炒遠志

石菖蒲

又 厥陰悞進剛藥。五液劫盡。陽氣與內風鳴。張遂變爲

痘。平昔內損。繼以暴邪。本屬難調。此陰氣竭絕。戊亥當防。

熟地炭

磁石

生白芍

木瓜

遠志

茯神

毛瘦人而病溫熱。神呆舌赤。診脈時。兩手牽掣震動。此津液受劫。肝風內鼓。是發痘之原。議以養胃汁。熄肝風。務在存陰耳。用仲景復脉湯法。去參薑桂。

余脉細促。神迷舌縮言蹇。耳聾四肢牽引。牙關不緊。病已月餘。乃溫邪劫液。陽浮獨行。內風大震。變幻痘厥危。病議以育陰熄風法。必得痘止神清。方有轉機。

阿膠二錢 雞子黃一枚 人參秋石并一錢 天冬一錢

細生地二錢 白芍半錢

又 神氣稍甦。脈來歟靜。五液交涸。風陽尙動。滋液救其
焚燎。清補和陽去熱。用藥全以甘寒。津液來復。可望向
安。

阿膠 人參 淡菜 鮮生地

天冬

川斛

毛 少陰不藏。溫邪深入。喘促汗出。渴不多飲。舌辛似縮。
症非輕小。擬用復脉湯。爲邪少虛多之治。去薑。
又 舌絳汗泄。齒燥痰膩。熱劫津液。最防痘厥。

復脉湯去薑桂

暑邪內
陷胞絡
閉結

唐 積勞伏暑。欲寐時。心中轟然上升。自覺神魂縹渺。此皆陽氣上冒。內風鼓動。所以陡然昏厥。

石膏

知母

甘草

粳米

生地

麥冬

竹葉心

方 热閉神狂。因乎食復。畏人與肢筋牽動。仍屬暑病變

瘡。通三焦以清神明。冀有轉機。紫雪丹二錢。

又 舌欲痿。膚燥筋掣。熱劫脂液殆盡爲瘡。用河間甘露飲。再服紫雪丹一錢。

楊 暑由上受。先入肺絡。日期漸多。氣分熱邪逆傳入營。

遂逼心胞絡中。神昏欲躁。舌音縮手足牽引。乃暑熱深陷。謂之發瘻。熱閉在裏。肢體反不發熱。熱邪內閉則外脫。豈非至急。考古人方法。清絡熱必兼芳香。開裏竅以清神識。若重藥攻邪。直走腸胃。與胞絡結閉無干涉也。

犀角

玄參

鮮生地

連翹

鮮菖蒲

銀花

化至寶丹四丸

金 暑熱結聚於裏。三焦交阻。上則神呆不語。牙關不開。下則少腹衝氣。小溲不利。邪結皆無形之熱閉塞。漸有痙厥之狀。昨大便既下。而現此象。豈是垢滯。議芳香宣竅。通解在裏。蘊熱。紫雪丹一錢。五分開水化勻三服。

醫言

卷之三

六

鮑

舌白渴欲冷飲氣促嗰啞而呃胸悶昏譖

此暑風濕熱穢濁痺塞宿垢尙在小腸旬日間漸變痙厥是爲險

機議逐穢結以冀稍清

大杏仁

連翹心

竹葉心

川貝母

菖蒲根汁

辰砂益元散

煎藥化牛黃丸

一服

蔡

暑濕熱都着氣分乃消食苦降滋血亂治熱熾津涸

舌板成瘻究竟邪閉阻竅勢屬不穩

人參

生甘草

石膏

知母

粳米

潘

二肝陽化風上冒爲厥風陽內燦脂液涸而作痛此非

實症剛燥忌用

肝風

口膩屢貼
氣分極升
一味滋陰之
極

生地

阿膠

牡蠣

天冬

茯神

生白芍

夏_{二五}中年已後陽氣日衰是下焦偏冷陽不及護衛周身

氣分更虛右肢如瘓當春地氣上升身中肝風太震心

嘈噴怒痰湧音啞乃厥象也皆本氣自病最難見效

熟地

熟淡附子

牛膝炭

炒麥冬

遠志炭

茯苓

馬面青胱白入夜顴頰漸赤耳聾舌心乾板而縮並不渴飲間有寒戰後熱此厥陰肝臟液涸風旋勢成瘻厥危症勉從經旨之訓辛苦急當食甘以緩之

甘麥大棗湯加阿膠

陸 面青頭痛動搖手足搐搦牽掣驚嚇惱怒病從肝起如饑求食晝夜無寐都是肝風盤旋鼓舞漸爲癇厥此乃五志之病

阿膠

牡蠣

生地

天冬

小麥

生白芍

某 衡氣鎮脹厥 龍薈丸一錢二分

顧 此瘧厥也。蓋厥陰風旋陽胃神迷則爲厥。陽明絡空四末不用而爲瘧厥。午後黃昏乃厥陰陽明旺時。病機發現矣。凡此皆屬絡病。金匱篇中有之。仲景云諸厥宜

下下之利不止者死。明不下降之藥皆可止厥。但不可
硝黃再傷陰陽耳。但積年沉痼。非旦夕速效可知矣。

活鱉甲

真阿膠

方諸水

鮮生地

玄參

青黛

又 照前方去玄參加天冬

厥從肝起。其病在下。木必得水而生。陰水虧。斯陽風
燥筋。而絡中熱沸。卽厥拙擬血屬介類。味鹹入陰。青
色入肝。潛陽爲法。

又 陰絡空隙。厥陽內風掀然鼓動而爲厥。余用鹹味入
陰和陽。介類有情之潛伏。頗見小效。但病根在下深遠。

湯劑輕浮焉能填隙。改湯爲膏。取藥力味重以填實之。
亦止厥一法。

鮮鱉甲

敗龜版

猪脊髓

羊骨髓

生地

天冬

阿膠

淡菜

黃柏

熬膏早服七錢午服四錢

林 據說六七年前驚駭起病氣從左脇有聲攻及胸膈。

心中脹極氣降脹減必汗出洩濁此屬肝厥凡煩勞動
怒卽刻舉發肝木風火內寄其來必驟且有聲音久恙
非湯藥可投緩調須用丸藥更發作自必輕減。

人參

乾薑

附子

桂枝

川椒

小川連 川棟子 當歸

白芍

烏梅肉丸

顧 平昔腸紅陰絡久傷。左脇下宿瘕。肝家風氣易結。形

瘦面青陰虛。陽氣易冒。血絡不得凝靜。諸陽一并遂爲厥。衝氣自下犯胃爲呃。症似蓄血如狂。奈脉細勁咽喉皆痛。真陰枯槁之象。水液無有。風木大震。此剛劑強鎮不能熄其厥冒耳。此症恐未必收功。

生雞子黃一枚真阿膠二錢淡菜泡洗五錢龜板五錢
冲入熱童便一杯

戴 酒客中虛多濕。陽明素虛。厥陰來乘。當穀雨土旺用事。風木與陽俱升逆。鬱冒而厥。此平昔積勞內因。與外

邪無涉。閱醫多用風藥。是再傷肌表護衛之陽。乃召風以致中耳。

川桂枝

羚羊角

炒半夏

橘紅

明天麻

茯苓

當歸

鈎藤

吳三肝風癇厥。迅發莫制。都因腎真內怯。平素多遺。診脉芤弱。議用固本丸。固本加五味。萸肉龍骨金箔蜜丸。
謝八有年下虛。春木自地而升。陽浮。上蒙清竅。經云。下虛上實爲厥癲疾。肝風內震。倘加惱怒。必致厥仆。寐中大忌攻痰祛風藥。

熟地

天冬

萸肉

五味

牛膝

厥陰

龜甲

磁石

茯神

遠志

菖蒲

夏九少腹氣攻有形。嘔吐頭脹。陰脈不至頭。而厥陰脈上至顱頂。四肢逆冷。卽厥象也。不是瘧母宿冷。肝脉環遶陰器爲遺洩。

炒黑川椒

川棟子

炒橘核

青木香

小茴香

茯苓

王右脉已伏。左小緊。四肢冰冷。乾嘔煩渴。厥陰濁泛胃陽欲絕。此屬痛厥。姑以辛熱泄濁通陽。

泡淡吳萸

製附子

川棟子

延胡

淡乾薑

茯苓

又脉微爲無陽。下利冷汗。嘔逆不食。肢厥不肯回陽。一團濁陰阻蔽。却有閉脫之危。議四逆之屬。護陽驅濁。

人參

淡附子

枳實

茯苓

生淡乾薑

又肢厥惡心。吞酸胸滿。大便不通。有六日。

川連

淡乾薑

人參

枳實

陳皮

半夏

茯苓

厥陰熱
邪

史

溫熱已入厥陰。陰傷致風陽上巔。遂爲瘡厥。厥發丑

寅。陽明少陽之陽震動。昨進鹹苦。清其陰分之熱已效。

今復入鎮陽以止厥。

生地

天冬

阿膠

雞子黃

生龍骨 小麥

蔣 眩暎心痛脹。嘔吐涎沫。周身麻木。此厥陰肝臟中陽過。胃貫膈逆衝不已。有瘡厥之意。

川連 吳萸。乾薑

川棟子

烏梅

牡蠣 白芍

又 開泄和陽入陰已效。當停煎藥。龍薑丸

程 厥邪熱深。生薑性辛溫。大泄肝陰。陽遂上冒。心熱暈厥。但陰虛熱熾。苦寒不可多進。以滋陰却熱爲穩。

生鱉甲 鮮生地 生白芍

知母

山梔 橘紅

張未病先有驚恐先寒戰後發熱心中極熱乾嘔煩躁渴飲冷仍不解渴診脉小弦舌白無胎曾肢冷如冰此熱邪已入厥陰肝經所謂熱深厥深也病全入裏極爲棘手議用紫雪丹開深伏之熱結取其芳香宣竅冀得躁擾勢緩方有轉機紫雪丹二錢

王心中疼熱耳聾目矇熱邪已入厥陰三日不厥方有好音

鬱金

川連

秦皮

黃芩

連翹心

石菖蒲汁

某先發水痘已感冬溫小愈不忌葷腥餘邪復熾熱不

可退入夜昏煩。輒云頭痛邪深走厥陰。所以終厥診脉。兩手俱細。是陽極似陰。鼻燥舌乾。目眞黃。多屬邪閉。壞敗。諒難挽回。用涼膈散。

肝風燦
陰

伍女室女經來衝脈自動動則陽升內風遶旋不風爲薄厥煎厥陽明虛胃失降厥陰熱肝愈橫風陽上冒清空

神迷諸竅似阻皆入夏大地發泄之徵本虛表實先理

其實議用局方龍薈丸純苦直降非湯飲留連腸胃之

比每服三錢不拘二三次分服接用復脉法去參薑桂

施氏諸厥屬肝肝病犯胃爲嘔逆腹痛乃定例也診脉虛

小望色㿠白據述懷妊病竟不發思中流砥柱斯肝木

肝逆胃虛

凝然則知培植胃土乃治病法程矣。

六君子去术皮加芍藥木瓜煨薑南棗

某氏厥屬肝病幾番病發都因經水適來夫血海既聚既下斯衝脈空乏而風陽交動厥之暴至之因由也。厥寒濡潤亦和陽泄內風之義治之未應下焦獨冷候倉胸痺思衝脉乃陽明所屬陽明虛則失閽厥氣上犯莫渴內經治肝不應當取陽明制其侮也暫用通補入肺取乎腑以通爲補小半夏湯加白糯米

龔三諸厥皆隸厥陰。痴瘕心熱脇脹中消便難乃肝陽內風妄動消爍犯及陽明矣經言治肝不應當取陽明肝

胃一臟一腑相對。不耐溫補者。是肝用太過。肝體不及也。

九孔石決明

淮小麥

清阿膠

細生地

天冬

茯神

怒

陳

嗔怒微厥。肝陽升舉。宜益胃陰以制伏。

人參

冷冲

麥冬

茯神

鮮蓮子

竹葉心

生甘草

微溫服

奇正風動

葉

氏

脉右大熱升風動鬱冒爲厥。宗陳無擇羚羊角散方。

風陽動

羚羊角

小生地

玄參

丹參

連翹

黑豆皮

又厥後驚惕汗泄。陽風無制。都緣陰枯不主戀陽。議用六味益陰和陽。炒六味去山藥。加入參秋石。

又渴不欲飲。陰不上乘。况寐醒神識不靜。易驚汗出。法

當歛補。

人參

萸肉炭

熟地

五味

茯神

遠志

又半月經水兩至。痛自下。焦衝突而厥。病由陰維衝任。蓋八脉所司也。此養營僅到中宮。所以無效。

蕤蓉

鹿角霜

當歸

柏子霜

桂枝木

茯苓

又 前法已中病情。須從奇經治義。

照前方去桂枝木加鹿角膠

又 痘去八九。僅以溫補下元爲法。不必窮治。

淡蕊蓉

炒杞子

當歸

柏子仁

茯苓

小茴香

心營熟

陶氏脈數厥止。熟在營中。

犀角

玄參

丹皮

連翹心

胆星

橘紅

吐
蛇厥嘔

王 口鼻觸入異氣。胃傷嘔吐。土衰則木旺。肝風內橫。三
虫擾動爲痛。從蛇厥論治。

陰涸欲絕

川椒

乾薑

桂枝木

川棟子

人參

川連

烏梅

生白芍

黃二十一據述十一年前夏秋間多用井水鹽梅因此昏厥已
後三五日一發病愈雖醒日瘦日減間有語言不自接
續想其至理水鹽梅酸大泄肝腎臟陰厥者陽氣逆亂
胃神憤憤勢成沉痼非癘厥門治痰治火清竅者是臟
陰受病臟主乎藏畜醫偏搜逐劫爍凡陰涸欲絕譬諸
一油盡燈焰忽明忽昏撲然息矣先聖先賢從無成法未
敢奏藥欺人常用人乳一杯

某脉左動如數右小濡弱病起嗔怒卽寒熱汗出心悸

繼而神竈自覺散越。夫肝臟藏竈。因怒則諸陽皆動。所見病源無非陽動變化內風而爲厥。故凡屬厥症多隸厥陰肝病。考內經治肝不外辛以理用。酸以治體。甘以緩急。今精彩散失。鎮固收攝猶慮弗及。而方書泄肝平肝抑肝方法儘多。至於補法多以子母相生爲治。此病全以肝腎下焦主法爲正。所服醫藥竝無師古之方。未識何見。

阿膠一錢半
牛黃一枚
雞子黃一枚
人參一錢
生地三錢
金箔五片

某冷是足上貫於心。初起周身麻木。今則口鼻皆有冷氣。病起驚恐。內傷肝腎爲厥。衝脉隸於肝腎。二臟失藏。

肝腎虛
衝氣逆

衝氣沸亂其脈。由至陰而上。故多冷耳。

淡蕊蓉

熟地炭

五味子

紫石英

痛厥

茯苓

牛膝

汪

胃陽傷殘。濁氣上攻。將爲痛厥。當治陽明之陽。

吳茱萸 薑汁

半夏

茯苓

粳米

又 照前方去吳萸加廣皮

癟厥

某 熱甚而厥。其熱邪必在陰分。古稱熱深厥深。病中遺泄。陰傷邪陷。發表攻裏。斷難施用。和正托邪。是爲正法。

草果

知母

人參

半夏

薑汁

烏梅

厥者從下逆上之病也。瘡者明其風強之狀也。所以二字每每並言。原與傷寒門所載者有間。想是症總由氣血日偏。陰陽一并而成。譬如風雷之猛烈。鬱極而發也。若發而漸復者。猶可轉危爲安。若發而轉逆者。必至直拔根荄乃已。斯存亡之機。在乎命臟之盈虧耳。考方書之名目不一。致病之因由亦繁。大抵可吐者。如痰食填塞於胸中。用瓜蒂散之類。及燒鹽探引方法。可清可折者。如厥陽壯火升逆而莫制。用玉女煎。及宣明龍薈丸法。可開可降者。如氣厥薄厥。而形氣暴絕。有五磨飲子。及蒲黃酒法。穢濁蒙神。而昏

亂無知。有牛黃至寶。及蘇合香丸之兩法。飛尸卒厥。
先宜酒醴以引導。并可按穴而施鍼法及灸法。若從
虛而論者。如內奪而厥。則爲瘡疽。有地黃飲子之通
攝下焦法。煩勞陽張。令人煎厥。有人參固本。加入金
箔方。諸水爲壯水制火法。血厥而陽騰絡沸。叅乎從
陰從陽法。色厥而精脫於下。急與大劑挽元法。腎厥
宗許學士之椒附以通陽。蛇厥有仲景之安蛇法。陽
極用救陰峻劑。陰極有扶陽方法。種種規模已爲全
備。及叅案中。先生於是症獨重在肝。蓋肝者將軍之
官。善于他臟者。也要知肝氣一逆。則諸氣皆逆。氣逆

則痰生。遂火沸風旋。神迷魂蕩。無所不至矣。若犯於上者。不免凌金爍液。有門冬湯。及瓊玉膏之補金柔制法。若犯於中。而爲嘔爲脹者。用六君去木。加木瓜。姜芍之類。及附子。粳米湯。加人參。爲補胃凝肝法。若震及心脾。而爲悸。爲消者。用甘麥大棗湯。合龍蠣之屬。爲緩急重鎮法。若挾少陽之威。而乘顛搖。絡者。用羚羊鈎藤玄參連翹之劑。爲熄風清絡法。若本臟自病。而體用失和者。以椒梅桂芍之類。爲益體宣用法。若因母臟之虛。而擾及子臟之位者。用三才配合龜甲磁硃。及復脉減辛味。複入雞黃之屬。爲安攝其子。

母法。至於瘧厥之治。尤覺神奇。取血肉介類。改湯爲膏。謂其力味重實。填隙止厥最速。此豈非補前人之未備。開後學之法門者乎。叅是案者。幸毋忽諸。邵新

甫

驚

氣逆陽
泄

某

驚則氣逆。陽泄爲汗。用重鎮壓驚。

川桂枝木

五分

黃芪

去心二錢

人參

一錢龍骨

煅一錢半

左顧牡蠣

煅一錢半

痰火阻
竊

某

驚恐傷神。不語。

建蘭根汁

薑汁

金汁

共和一處隔

湯燉徐徐服

臟燥陽
浮

某

因驚外觸見症。神怯欲迷。已經肢厥冷汗。怕動。倣鎮。

性理虛

人參

茯神

棗仁

生龍骨

石菖蒲

炙草

南棗

陳淮小麥

早上服

楊氏

經血期至。驟加驚恐。卽病寒熱。心悸不寐。此驚則動。

肝恐則傷腎。最慮久延臟燥。卽有肝厥之患。

淮小麥

天冬

龍骨

牡蠣

白芍

茯神

東二十九心中若烟霧。噯則氣散。少頃卽聚。易驚恐畏懼。嘔逆。不渴。自述難鳴苦況。瀉後亡陰。熱藥劫陰。前議和胃不應。主以鎮之攝之。

炙甘草

淮小麥

大棗

棗仁

青龍骨

肝腎陰虛陽浮

某驟驚陽逆暴厥爲肝胆病晝則心悸是陽動夜則氣墜屬陰虧用收固腎肝可效。

生地五錢

萸肉一錢

龍骨三錢

牡蠣三錢

五味一錢

真金箔三

張

經云驚則傷膽。恐則傷腎。大凡可畏之事猝然而至者謂之驚。若從容而至可以宛轉思維者謂之恐。是驚急而恐緩也。夫驚症大人亦有之。小兒最多。因其神志未堅。胆氣未充。故每遇稍異之形聲。卽悚然而驚矣。驚之所傷由心猝及乎胆。由胆卽及乎肝。遂致心主君火兼肝胆中相火風木驟然而起。症現搐搦。

癲癇。神昏譖妄。肢冷厥逆。吐乳身熱。目竄口噤。種種所患。無非心肝胆之現症。而實毫無外感之風邪。此因外受之驚。而動內之木火風也。故但當以一驚字立爲病名。斯乃切當。因其內風沸起。遂加一風字。因病來迅速。又加一急字。故遂有急驚風之病名。此已屬牽強附會矣。至於今之混稱爲急驚風者。更屬背謬。總因小兒陰氣未充。外感之風溫風熱風火。以及寒邪化熱。并燥火諸症。最易傷陰。陰傷則血不營筋。液傷則脈絡滯濇。熱盛亦能使內之木火風相繼而起。所現之症。與受驚者類亦相同。然實非因受驚而

起其所治之法大有區別。如果因驚者，治宜安養心神，鎮驚定性。甘涼清內熱，柔潤熄肝風，或少佐芳香，通其竅絡，舒其結閉。至於剛熱燥濶，表散之藥，槩不可用。若無驚而但感外邪者，有宜於涼散，有宜於溫散，有宜於苦寒清火，有宜於甘溫扶陽，或補或瀉。自當按六淫之邪而施治，與驚字毫無關涉。奈今之醫者，每遇非驚之症，因不能辨明六氣中所傷何氣，却定不出病名，遂強將一驚字混入，藉口漫稱爲急驚、風症，掩飾欺人。病家亦酷信之，以爲小兒防範難週，焉有無驚之理。其所訂之方，錯雜游移，不知治驚總

以心肝胆爲主。若治時邪須兼肺胃脾腎三焦營衛。
經絡而論大不相同也。更有一種稱慢驚風之病名
者。尤屬怪誕。不經必當取爲駁正。有論在幼科吐瀉
之後宜合觀之。華岫雲

癲癇

驚恐疾
火升

孫入神呆脈沉。因驚恐以致癲疾。語言不甚明了。此痰火阻其靈竅。深戒酒肉厚味。靜室善調。經年可愈。

黃連

黃芩

山梔

枳實

橘紅

胆星

菖蒲

遠志

陳 動怒驚觸。乃外加擾內。致五志陽越莫制。古人集癲癇狂辨。以陽併於陰。陰併於陽。互異。今以陽逆狂亂。非苦藥之降。未能清爽其神識也。當歸龍薈丸二錢。

倪 驟然驚惕。陽氣上逆。遂神呆不寐。倏爾叫喊。不食不

醫案 卷十七 飢不便。有癇癲之象。龍鬚丸二服。

盧十 痘病已成癰疾難愈

竹節白附子 天竺黃 陳胆星 石菖蒲

川連 鬪金 茯神 橘紅

汪 驚恐陽升風動宿癰遂發。吐痰嘔逆不言。絡脈失利。
竅絡阻陽氣鬪

也。

羚羊角 石菖蒲 胆星 遠志

連翹 鈎藤 天麻 橘紅

曹十 春病及長夏。癇厥屢發。前用龍鬚丸意苦泄肝膽。初服卽瀉。此久病陰分已虛。議理陰和陽。入酸以約束之。

生雞子黃 阿膠 川連 黃柏

生白芍 米醋

金二十
二 潤厥神呆肢強

犀角 羚羊角 玄參 葛蒲

炒牛夏 炒遠志 鬯金 橘紅

木火動
心神虛

吳 驚狂乃木火擾動。雖得平靜。仍心悸怔忡。夜卧不寐。
診脉虛細如絲。已非痰火有餘。議補心丹。以理心之用。

人參 茯神 肉桂 玄參 丹參

天冬 麥冬 生地 川連 柏子仁

菖蒲 桔梗 遠志

木火鬱
血滯

葉氏

每遇經來紫黑癇疾必發暮夜驚呼聲震。晝則神呆。

面青多笑火風由肝而至泄胆熱以清神再商後法。

丹皮

丹參

細生地

黑山梔

茺蔚子

胡黃連

調入琥珀末

肝腎陽
升

張二入冬不寐癇疾遂發此陽不潛藏治在肝腎。

用虎潛法

火鬱心
腎不交

某癲疾脉不鼓指議爻心腎益神志。

生地

龜甲

黃柏

川連

酒炒菖蒲

茯神

遠志

山梔

竹葉

風陽上
亢

葉九五志陽升神識迷惑忽清忽甚者非有形質之邪乃

熱氣化風上巔致於竟夜不寐。攻痰疎利。決不效驗。先以極苦之藥。冀其亢陽潛降。

生地

龍胆草

丹參

木通

山梔

蘆薈

青黛

薄荷

過勞心火

某平昔操持身心皆動。悲憂驚恐。情志內傷。漸漸神志恍惚。有似癲癇。其病不在一臟矣。醫藥中七情致損。二千年來從未有一方包羅者。然約言總以陰陽迭偏爲定評。凡動皆陽。當宗靜以生陰是議。陽乘於絡臟陰不安。歛攝鎮固。久進可效。家務見聞必宜屏絕。百日爲期。

人參

廉珠

茯神

棗仁

炙草

之癲癇

卷

生龍骨

萸肉

五味

金箔

天地一陰陽也。陰陽和則天清地寧。一有偏勝。遂有非常之變。人身亦一陰陽也。陰陽和則神清氣定。一有偏勝。自致不測之病。故內經曰。重陽者狂。重陰者癲。癇與癲其原則同也。古人集癲癇狂辨。以爲陽併於陰。陰併於陽。此誠不刊之論。言乎現症。狂則少卧。不饑。妄言妄笑。甚則上屋踰垣。其候多躁而常醒。癲則或歌或哭。如醉如癡。甚至不知穢潔。其候多靜而常昏。癇則發作無時。卒然昏仆。筋脈痺瘓。口中作聲。後人因其聲似。分馬癇。牛癇。猪癇。羊癇。雞癇。五名。其

候經時而必止。推其病因。狂由大驚大怒。病在肝膽。
胃經三陽併而上升。故火熾則痰湧。心竅爲之閉塞。
癲由積憂積鬱。病在心脾胞絡。三陰蔽而不宣。故氣
鬱則痰迷。神志爲之混淆。痼病或由驚恐。或由飲食
不節。或由母腹中受驚。以致內臟不平。經久失調。一
觸積痰厥氣內風。猝焉暴逆。莫能禁止。待其氣反然
後已。至於主治。察形證。診脈候。以辨虛實。狂之實者。
以承氣白虎。宜折陽明之火。生鐵落飲重制肝膽之
邪。虛者當壯水以制火。二陰煎之類主之。癲之實者。
以滾痰丸開痰壅。閉清心丸洩火鬱。大虎膏當養神。

而通志歸脾枕中之類主之癇之實者。用
攻風控涎丸以劫痰龍鬚丸以瀉火虛者當補助氣
血。調攝陰陽養營湯河車丸之類主之。狂癲癇三症
治法大旨不越乎此。今如肝風痰火者苦辛以開泄。
神虛火炎者則清補並施。肝膽厥陽化風旋逆者以
極苦之藥折之。神志兩虛者用交心腎法。勞神太過
者宗靜以生陰意爲欽補鎮攝方案雖未詳備而零
珠碎玉不悉堪爲世寶哉。醫者惟調理其陰陽不使
有所偏勝則鬱逆自消而神氣得反其常焉矣。龔商

年