

藥用植物圖考

鄒樹文題

茄科

曼陀羅花

曼陀羅花屬栽培於庭園間一年生草本春月下



種抽苗莖高三四尺至六七尺葉互生卵形常有缺刻秋
月葉腋生花為大形合瓣花
冠白色或淡紫呈漏斗形其
裂片有五排列如摺襞狀果
實卵圓形外面有刺甚多成
熟則裂開種子有麻醉性之毒質花葉亦有毒其葉加於烟草
而用之則有鎮咳之效惟其量過多反足傷人云嶺外代答云
盜賊採乾而末之以置人飲食使之醉悶則挈篋而趨

去積及寒濕脚氣

效用 南人或用於小兒食藥去積甚峻李時珍曰八月採花九月結實花子洗諸風寒濕脚氣入麻藥廣西志悶陀羅人食之則顛悶軟弱急用水噴面乃解土人呼為顛茄
烟草 烟草屬南亞美利加原產今則徧布中國一年生草本



漏斗狀呈淡紅紫色雄蕊五枚與花冠裂片同數圓錐花序其葉乾之稱為烟葉供喫烟之原料需用甚廣又供藥用有麻醉性

有毒春月下種夏月移植田園間在暖地則前年初冬下種今之發芽翼年始播種之至夏月莖高四五尺葉互生而大卵形而尖合瓣花冠如

治蛇咬齒
留內

治五內邪
氣熱中渴

效用 莖葉曬乾研末和肥皂水可驅除蚜蟲及葉蚤等採葉

置床下有蠶蚤及臭蟲之效并治蛇咬避風擠去惡血研末搗

爛敷之均可 附烟桿油治蛇咬齒留內者搽之即出

枸杞 枸杞屬生於山野落葉灌木幹纖弱成蔓狀高達四五



尺葉長橢圓形互生或叢生
春月開紫花合瓣花冠分為
五裂雄蕊五枚著生於花冠
上漿果狀如卵而尖成熟則
色赤其嫩葉供食用又可代
茶古時將其果實用作強壯

劑

效用 本草經味苦寒主治五內邪氣熱中消渴周痺風濕久

藥用植物圖考 卷二

治難產黃
病

服堅筋骨、輕身、不老。別錄根大寒、子微寒、無毒、主風濕、下胸
脇氣、客熱、頭痛、補內傷、大勞、噓吸、強陰、利大小腸、耐寒暑。
酸漿一名燈籠草
酸漿屬生於原野、或園圃隙地、多年生草



赤色、在花後生長如囊、累累下垂、頗為美觀、此植物之果實、供
藥用、有解毒之效。
效 用 本 草 經 味 酸 平、主 熱 煩 滿、定 志、益 氣、利 水 道、產 難、吞 其

本、春月自宿根出苗、高至二
三尺、葉互生、卵形而先端尖、
夏月開白花、合瓣花冠、雄蕊
五枚、與花冠裂片同數、呈淡
黃色、雌蕊一枚、花後結成赤
色漿果、包被於萼內、此萼帶

實立產陶隱居云小兒食之能除熱亦主黃病多效
 蜀羊泉 茄屬生於原野或園圃隙地多年生蔓草莖細長卷



絡於他物上葉長卵形基部
 有大缺刻夏月自葉腋伸出
 花梗分極開小白花雄蕊之
 藥近集於雌蕊花柱之周圍
 其構造與茄花相類花後結
 球形小漿果赤色東陽土人
 名曰白毛藤以其莖葉均有
 白毛故名採根同猪肉煮食
 有治女子白帶之效此植物
 與本草綱目植物名實圖考

治惡瘡疥
癩及漆瘡

治諸熱毒
及疔腫

所載名同而圖不同，詠別有一種，故繪二圖以資比較。

效用 本草經味苦寒，主治頭禿、惡瘡、熱氣、疥癩、療癬蟲。別

錄，主療齩齒、女子陰中內傷、皮間實積、搗塗漆瘡。又治黃疸病。

此草一把，搗汁和酒服，不過三五次即愈。

龍珠 蕃茄屬，生於園圃隙地。毒草也。莖高一二尺至三四尺。



葉橢圓形，而先端尖，互生。七

月自葉腋伸出花柄，常二花

叢生，或二花以上者，色白或

淡黃，形狀與茄花類，果實多

漿，而色紅。

效用 苗苦寒，無毒，陳藏器

主能變白髮，令人不睡，又主諸熱毒、石氣、發動調中解煩。又云

其子治疔腫

番椒 番椒屬培植甚廣種類亦多一年生草本高至二三尺



等消化機之衰弱水腫咽喉焮衝痛風等用之

葉互生長卵形而尖夏月開小白花合瓣花冠分裂五片有長花梗果實細長熟呈赤色有辛味其色或有黃與紫黑者其形或有圓形倒卵等者其成分為辛味之樹脂辣分色素及鹽類

治疝氣殺蟲

治寒中下

腹痛及凍瘡

效用 漢藥實驗談辛溫無毒治疝氣殺蟲解西瓜中毒多食發痔枯血損眼 民間治療食西瓜停滯者食之則解截瘡用之小鳥便秘時吞蕃椒之水則治金魚等之病放此於水中則藥用植物圖考 卷二

治寒中、下腹痛、色帶番椒於腹卷中治之、凍瘡未潰者、用番椒

煎汁治之

茄一名落蘇

茄屬品類甚多、栽培於園圃、一年生草本、莖高



二、三尺、葉互生、卵形、或橢圓形、夏月開紫花、合瓣花冠、萼有刺、藥近集於花柱之周圍、花後結大形漿果、暗紫色、間有呈白色者、供食用、其果實之形、以卵圓形為常、但金華等地所產者、殆

長圓柱形為多、

效用 茄子甘寒無毒、大明本草治溫疾、傳尸、勞氣、醋摩傳腫

毒、帶、吳瑞燒灰、米飲服二錢、治腸風下血不止、及血痔、花

治溫疾腫毒及腸風下血及血痔

時主治金瘡牙痛研茄花乾之燒
 根及枯莖葉開寶本草

主治凍瘡皴裂煮湯漬之良

白茄 說明詳茄條下汪連仕方一名王盤茄有大小二種大



者如雞卵小者如指頭初生色
 白老則皮黃能入骨追風治一

切癱瘓根名白風藤合酒蒸服

茄實蘸硫黃擦白癩風康粵

茄國產者良名茄丸 葉治腸

紅大便下血劉羽儀驗方用白茄子葉經霜方採刷淨毛去焦

即止永不復發此方曾
 經那犬咬過之人服
 蒂治發背及一切毒癰初起味水軒

白茄蒂七日生首烏
 等分酒煎服即消

葇荑 一名天仙子 葇荑屬生於山野多年生草本莖高一尺

治腸紅大
 便下血及
 背發毒癰

治齒痛出
蟲



綠色此植物有毒可製鎮痙鎮痛等之藥

效用 本草經子苦寒無毒主治齒痛出蟲肉痺物急之服輕身使人行走及奔馬強志益力通神見鬼多食令人狂走 別錄療癩狂風癩顛倒拘攣

白英 茄屬有毒草本生於山地形態極似蜀羊泉而稍小莖

亦蔓性纏繞他木惟葉通常不分裂亦無缺刻莖葉皆平滑無

餘根莖橫行於地中早春其葉萌出紫黑色後呈淡綠色長橢圓形有尖端互生春日生有梗於葉腋合瓣花冠如鐘狀淡紫色雄蕊五枚與花冠裂片之數同着生於花冠之上花後結實圓形如豆粒大

治八疸瘡
瘡

毛夏秋之際開總狀花紫色雄蕊之藥近集於花柱之周圍開



小花於藥頂而放散花粉花後
結紅色之果

效用 本草經味甘寒主治寒
熱八疸消渴補中益氣久服輕
身延年 本草拾遺主治煩熱
風癩丹毒瘡瘡寒熱小兒結熱

煮汁飲之

別刺敦那

別刺敦那屬歐羅巴及西亞細亞原產多年生草

本葉互生卵形花自葉腋生暗紫色雄蕊五枚雌蕊一枚花後

結漿果黑色此植物之葉稱為別刺敦那葉根稱為別刺敦那

根可由此提取莨菪鹼西名阿脫以供藥用

藥用植物圖考 卷二 六

治眼病及
瘰癧等症

鎮痛



生草本、春月萌生、高至二三尺、葉卵形、全邊或呈波狀、夏日稍

效。用此種藥類、在外用時、則治眼病、在內用時、則治瘰癧、癩等症。
菲沃斯 菲沃斯屬、歐羅巴原產、越年生草本、全部有毛、高三尺許、葉緣邊有缺刻、基部抱於莖上、花無花梗、花冠黃色、生紫色之脈。

效用 此植物為麻醉之毒草、有以之用於鎮痛者。

龍葵 茄屬、生於原野中、一年

瘡打腫金
瘡拔毒

葉之中間抽出花莖開小白花花瓣五裂雄蕊之藥近集於雌



蕊花柱之周圍繖形花序花後結
小漿果球形黑色其大與豌豆之
種子略相等此植物與龍珠異者
龍珠常以二花集生於葉腋果實
紅熟是也其莖與葉煎成液汁塗

頑癬上可以治之

效用 唐本草味苦寒微甘滑無毒食之解勞少睡去虛熱腫

其子療疔腫 救荒本草採葉傅貼腫毒金瘡拔毒

紫草科

紫草 紫草屬生於山野中多年生草本根之皮部深紫色莖

直立高八九寸葉互生為長卵形葉面粗糙莖葉皆有小毛夏

藥用植物圖考 卷二



月開小花帶紫白色生於莖之
上部花後結實形小圓微尖冬
月將其根掘而乾貯之供紫色
之染料野生者尤佳

效用 本草經根味苦寒無毒

主治心腹邪氣五疳補中益氣利九竅通水道并治惡瘡癩癬
班疹痘毒及活血涼血 植物名實圖考今醫者治痘癩破血

多用紫草茸

松陽

松陽屬落葉喬木高三丈周圍達三尺樹皮呈紫黑色

葉互生橢圓形或倒卵形有鋸齒如柿樹之葉其質厚有茸毛
而粗糙七月頃枝梢上抽花梗為圓錐花序花白色果實為小
圓形色黑李時珍曰其材如松其身如楊故名松楊

破惡血養
好血安胎
治水痢

旋花

旋花屬生於山野中或栽培於庭際多年生蔓草莖細



效用 唐本草云味甘鹹平無
毒主治折傷破惡血養好血安
胎止痛生肉 陳藏器曰木皮
苦平無毒主治水痢不問冷熱
濃煎令黑服一升

旋花科

長卷絡於他物上葉互生戟
形或箭形有長葉柄夏月葉
腋出花梗開漏斗狀花冠呈
淡紅白色形狀與牽牛花相
類其地下部供食用

治面疔
色

療脚滿水
腫逐痰消
飲

效用 花甘根辛溫無毒本草經主治面疔黑色媚好益氣根

主腹中寒熱邪氣

牽牛子 牽牛子屬一年生之纏繞草本葉心臟形常有三裂



互生夏月葉腋生花花大呈漏斗狀其色不一朝開而日中即閉果呈球狀三室各室含兩種子有毒質

效用 子甘寒有毒別錄主

治下氣療脚滿水腫除風毒

利小便 時珍云主逐痰消飲通大腸氣秘風秘殺蟲達命門

菟絲子 菟絲子屬蔓草寄生於野薔薇及其他之植物無葉

絲體有吸盤能吸取母樹之滋養料藉以生活莖細長帶黃色

治目赤頭
瘡

主治續絕傷補不足益氣力肥健人苗研汁塗面去面黥聖



即纏絡宿主之周圍葉小如鱗狀夏末開小花帶紅白色或無柄或有粗柄而甚短此植物之種子用為強壯藥

效用 子平甘平無毒本草經

惠方目中赤痛以苗搗汁點之

子母秘錄云小兒頭瘡取苗

者湯頻洗之良

甘藷 牽牛子屬種類頗多中

央亞美利加原產暖地栽培甚廣多年生草本莖細長匍匐於

健胎胃
腎陰

解野葛毒
治難產

地上葉互生，卵形或心臟形，有長葉柄，花紫色，合瓣花冠狀如漏斗，其塊根多肉，味甘，供食用。又以之釀酒作飴，製澱粉。其嫩莖葉可作蔬食之。

效用 味甘平無毒。時珍主治補虛乏，益氣力，健脾胃，強腎陰。功用同薯蕷。

薤菜 牽牛子屬，栽培於園圃。一年生草本，莖中空，高一二尺。



如蔓狀，葉互生，具長柄，基腳矢形。六七月開花，白色，合瓣花冠，狀若漏斗。嫩莖葉供食用。

效用 嘉祐本草味甘平無

毒。主解野葛毒，煮食之亦生搗服之。時珍搗汁和酒服，治難產。

柿樹科

烏木

柿樹屬產於東印度及馬來半島常綠喬木高至二十



尺餘葉互生長橢圓形平滑花單性合瓣花冠淡黃色雌雄同株果實球形赤黃色直徑約一寸五分許其材黑色堅實美麗故器具之料甚賞用之果實供食用或自未熟之果實採取澀

汁供網及船等之塗料

效用 時珍云味甘鹹平無毒主治解毒又主霍亂吐利取屑

研末溫酒服

柿 柿樹屬中國栽培甚廣落葉喬木高至二三十尺春末生

藥用植物圖考 卷二

治霍亂吐利

治反胃咯
血腸痔
瀉
湯火瘡血
刺

枝葉互生橢圓形而先端尖葉柄約三分許帶毛初夏開合



瓣花冠帶黃色雌雄常生於同
株或有生於異株者花後結大
形漿果約二寸許呈黃赤色其
形狀扁圓大小不一供食用

效用 甘寒澀無毒別錄主治
通耳鼻氣治腸胃不足壓胃間

熱止口乾 白柿柿餅甘平澀無毒治反胃乾柿三枚連蒂搗

他藥雜之咯血血淋腸痔痔漏下血 霜時珍云清上焦心肺熱生

津液化痰止渴寧嗽治咽喉口舌瘡痛 木皮時珍主湯火瘡

燒灰油調傅根主治血崩血刺下血

君遷子一名牛爛柿

柿樹屬生於山野之落葉喬木高達二

消渴去煩
熱

器主治消渴去煩熱令人潤澤
令人輕健



齊墩果科

安息香

時珍曰此香辟惡安息諸邪故名按段成式酉陽雜

俎云安息香樹出波斯國呼為辟邪樹長二三丈皮色黃黑葉

長約五分許六月開黃色合
瓣花如壺狀花後結小漿果
球形或橢圓形徑約六七分
果實之嫩者採取澀汁以供
漆料熟可供食用
效用味甘清平無毒陳藏
李珣云鎮心久服悅人顏色

治鬼胎血
邪產後血
暈

有四角、經冬不凋、二月開花、黃色、花心微碧、不結實、刻其樹皮

其膠如飴、名安息香、六七月堅凝、乃取

之、燒之通神、避眾惡

效用 味辛甘平、無毒、唐本草、主治心

腹惡氣、鬼疰、大明本草、邪氣、魍魎、鬼

胎血和辟、蠱毒、霍亂、風痛、男子遺精、暖腎氣、婦人血噤、并產後血暈

紫金牛科



紫金牛 紫金牛屬、生於山林

陰地、常綠小灌木也、莖高五六

寸至一尺餘、葉互生、橢圓形而

尖、緣邊有鋸齒、夏月莖梢葉腋

開花、帶青紫色、花小、有花梗、合

治時疾膈
氣去風痰

瓣花冠著以赤色之小點常二花集聚而生花後結小球形果
熟呈紅色或有白色者其實久不落故可貴重此植物可盆栽
以供賞玩

效用法 味平平無毒蘇頌上治時疾膈氣去風痰 時珍云解

百兩金 紫金牛屬常綠亞灌木產於暖地可作盆景莖高尺



許葉互生廣披針形長者達五
寸許呈深綠色其質厚緣邊有
隆起之黑點如微鋸夏日葉腋
出長寸許之花梗著生繖形數
小花花冠如盞狀五裂頗深呈
綠白色果實生青熟紅如南天

治咽喉腫痛

燭之實，至春尚存，變種甚多，果實有帶黃白者，葉形有變更者，不遑枚舉。

效用：根苦平無毒，蘇頌主治壅熱、咽喉腫痛，含一寸，嚥津，又

治風涎、硃砂根。

紫金牛屬，生於山中陰地，常綠亞灌木，莖高二三尺，

在暖地則至七八尺，葉互生，長

橢圓形，有尖端，革質，厚而有光

澤，緣邊有鈍鋸齒，夏月莖上抽

花梗，開帶白色小花，花冠五裂，

有暗色之小點，雄蕊與花冠裂

片相對，果實球形，赤色，大如豌豆。



豆，終冬不落，或有白色、黃色者。此植物供觀賞之用。李時珍曰：

治咽喉腫
痺

敷灘腫瘡
癩及血痢
腹痛

治男女吐
血牙痛

砒砂根生深山中苗高尺許葉似冬青葉背甚赤夏月長茂根

大如筋赤色此與百兩金彷彿

效用 根苦涼無毒時珍主治咽喉腫痺磨水或醋噉之甚良

小青 紫金牛屬生於沙孺地高不盈尺開小粉紅花夫瓣下

垂冬結紅實俗呼矮茶性寒雲巖農曰此草短而凌冬命曰小

青微之也然粉花丹實彌滿亢谷而移植輒不茂

效用 羅思舉簡易草藥云味溫

無毒搗敷癰腫瘡癤甚效又治血

痢腹痛研汁服解蛇毒中暑發昏

用小青葉并水浸去泥控乾入沙

糖搗汁急灌之王醫皆知用之或



名為雪裏珠或名為矮腳草又名地茶兼治男婦吐血牙痛通

藥用植物圖考 卷二

筋骨和血無知其為小青者瘋氣健脾養血小兒疳積(用酒冲)

鹿蹄草科

鹿蹄草

鹿蹄草屬生於山野之陰地種類甚多多年生常綠



草本葉具長柄自地下部叢生葉身橢圓形質厚深綠色葉脈綠白色花莖自葉叢之中央生出長七八寸上部綴以數花總狀花序花梗長花冠白色常下向花瓣五片

雄蕊十枚雌蕊之花柱甚長此植物供觀賞之用昔時常以為收斂藥用於止血及瘡創按此學名植物書中多作鹿蹄草故從之惟日本植物書所載鹿蹄草圖與本草綱目及植物名實圖考之鹿蹄草圖不同而與植物名實圖考之鹿銜草圖相類

治金瘡出血



故日本理科大學植物標品目錄，以此學名作鹿銜草，存以備考。效用 時珍主治金瘡出血，搗塗即止。又塗一切蛇蟲犬咬傷。

鹿銜草 鹿蹄草屬，九江建昌山中有之。鋪地生綠葉，紫背面，有白縷，略如葺菜而微長。根亦紫。安徽志：鹿銜草性益陽，出婺源。即此。湖南亦有之，俗呼破血丹。滇南尤多。



效用 土人用以浸酒，色如丹，治吐血、通經有效。土醫云：性溫，無毒，入肝腎二經。

石南科

治賊風温
瘡

羊躑躅

石南屬生於山地落葉小灌木幹高三四尺葉倒披針形或倒長卵形長約三四寸春日開黃花長約寸餘排列作



極短之總狀花序花瓣結合雄蕊之藥開孔子房上位果實為乾果有毒植物也

效用 本草經味辛温主治賊風在皮膚疼痛温瘡惡毒諸痺種蔬者漬其花以殺蟲

椴木

椴木屬生於山地常綠灌木莖高五六尺在深山者高

至二十餘尺葉具革質且光澤長卵形而先端尖緣邊有小鋸齒早春新枝之頂上開花總狀花序合瓣花冠上部裂為五片呈壺狀而下垂呈白色木材堅實供細工之料

破產後血
及諸暗咬
泥瘡



效用 葉有劇毒所煎之液
 為殺蟲藥（如家畜之蠅蟲
 用於裸蟲葉蚤綿蟲蚜蟲根
 切蟲亦有效）以驅除園圃
 之害蟲及牛馬之蟲若牛馬
 誤入其葉則如醉而斃蓋此
 毒之作用足以停止呼吸者
 也本草拾遺味苦平破產後血煮汁服之葉搗碎封蛇咬亦洗

石南

石南屬生於深山中或植於墓傍以資壯觀常綠植物

高七八尺乃至丈餘春生新葉葉大革質長橢圓形而厚其下
 面有毛密生淡褐色常集於梢頭夏日自葉之中心開花甚多

藥用植物圖考 卷二

愈頭風
殺
蟲毒破積



本草經味辛苦主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛
積聚逐風痺
服多服思男
別錄平毒療腳弱五臟邪氣除熱女子不可久

緞木 緞木屬生於山林之亞喬木新枝呈赤色葉互生有毒
為卵圓形裡面之脈上多毛茸五六月間新枝稍抽花軸長二
三寸下垂穗狀花白色筒狀儼若懸鐘緣邊有三尖角稍似滿

合瓣花冠上部裂為五片淡
紅色雄蕊十枚其形狀類於
山躑躅之花頗艷美

效用 湘人四月採石南芽
為茶去風暑月尤宜桂陽呼
為風藥充茗浸酒能愈頭風

補腰脚益
陽道

沿猫齧止
吐血



庭園中常綠灌木，高三四尺，多分枝，葉橢圓形，有短柄，革質，深綠色，莖葉俱有黑色之毛，茸，初夏開花，合瓣花冠，五裂，白色，雄蕊十本，雌蕊一枚，有葉狀之萼片，分泌粘質。

天星之花，此木至長成木紋側綫，故曰綫木。

效用 本草拾遺味甘溫無

毒，主風血羸瘦，補腰脚，益陽

道，宜浸酒。

白杜鵑 石南屬，多栽培於

效用 漢藥實驗談被猫齧

止泄強筋
固精

時煎服白杜鵑之花即瘥東陽市醫以止吐血
南燭一名烏飯 名見開寶本草道家以葉染米為青餛飯陶



隱居登真隱訣已載之開花如
米粒歷歷下垂湖南謂之飽飯
花四月八日俚俗寺廟染飯饋
問其風猶古夢溪筆談以為南
天燭誤矣

效用 枝葉苦平無毒陳藏器

主治止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不飢變白却
老子酸甘平無毒時珍主治強筋骨益氣力固精駐顏
木蒸蘆 岩南天屬生於山野中落葉灌木高三四尺葉互生
卵形壺狀合瓣花冠帶白色總狀花序此植物有毒其葉製為

治疥癬殺
蟲

治風熱腫
毒

止心腹痛
及腎痛



來半島常綠木本葉對生長卵形花為兩性花無花瓣萼四裂

粉末以入鼻中能發嚏

效用 陳藏器味苦辛溫有毒主

治疥癬殺蟲

檀香科

檀香 檀香屬產於東印度及馬

木材香氣甚盛有用以為薰物者

或造器物或作緩和劑及清涼劑

效用 白旃檀辛溫無毒弘景主

治清風熱腫毒 大明本草煎服

止心腹痛霍亂腎氣痛水磨塗外

腎并腰腎痛 時珍主噎膈吐食

傅金瘡止

又面生黑子，每夜以漿水洗拭，令赤，磨汁塗之，甚良。紫檀味
鹹，微寒，無毒，別錄主治磨塗惡毒。弘景刮木傅金瘡止血止
痛療淋。

馬兜鈴科

杜衡 細辛屬，生於山地，多年生常綠草本，有根莖，葉心臟形，



無光澤，具長葉柄，花被筒狀，三
裂，暗紫色，有萼而無花冠，此萼
之緣邊，其基脚有橫褶，可供
賞玩，根莖作芳香劑。

此為吐藥，然此根之效力較為緩弱，用半錢不吐，此根能利小
效用。和蘭藥鏡曰：根及葉有
酷烈之氣，內服者吐下，先哲用

治水腫腹水等

便又有發汗通經之效故用於水腫腹水等多稱治驗治間歇熱內臟經久之壅塞下利吹根末於鼻中可為輕嚏藥能蓄池頭中之膠粘汚液治頑固之頭痛等

細辛 細辛屬生於山中之陰地宿根直本葉如杜衡而薄無



光澤又無斑紋春月抽新葉於葉間接近地面之處綴以數花呈紫黑色大二三分其根可供藥用

效用 本草經味辛溫主治

欬逆頭痛腦動百節拘攣風

濕痺痛死肌久服明目利九竅輕身長年別錄無毒主溫中

下氣破痰利水道開胸中滯結除喉痺艷鼻風癩癩疾下乳結

治欬逆頭
痛百節拘
攣

治牙痛舌
硬

清火毒通
滯氣

汗不出、血不行、安五臟、益肝膽、通精氣、又能生口涎、治牙痛、舌硬、

土青木香

馬兜鈴屬、長沙山坡間有之、細莖蔓生、葉及花實

皆與馬兜鈴相似、根黃瘦、亦有香氣、蓋同種而形態畧變者也、

唯開花作筍子狀、本小末


大、彎如牛角、夫梢上翹、紫

黑、頗濃、中露黃蕊、與馬兜

鈴開花如枸杞者迥別、

效用 俚醫以清火毒通

滯氣



馬兜鈴

馬兜鈴屬、生於山野中、多年生纏繞草本、葉鈍頭長

心臟形、全邊畧與薯蕷之葉相類似、夏月葉腋出長柄、著生一

治肺熱效
嗽痰結喘
促



花其萼筒狀不整齊似角上彎又似喇叭上部黑紫色下部綠色或有白色者此植物之地下部乾之用為清血藥及通經藥惟服之過量則刺激消化器與泌尿器頗強烈足以傷人寇宗奭曰蔓生附木

而葉脫時其實尚垂狀如馬項之鈴故得名也


效用 嘉祐本草味苦寒無毒主治肺熱欬嗽痰結喘促血痔

瘰癧 宋圖經云七八月採實暴乾主肺病三月採根治氣下

膈止刺痛

大葉馬兜鈴 馬兜鈴屬生於山地多年生纏繞植物莖之下

部木質葉略類薯蕷花似馬兜鈴而較大帶黃色故有差異



效用 此植物地下部乾燥之可
用為清血及通經藥然服之過量
則刺戟消化器及泌尿器甚強烈
有足致死者

豆科

雲實 雲實屬生於山野落葉灌
木高達十餘尺莖葉均有刺葉為
二回羽狀複葉小葉形小而質薄
夏日莖枝抽出許多花梗每梗又
分出花柄每柄各綴一黃花花瓣
稍不整齊雄蕊數多雌蕊一枚總
狀花序果實為莢

治遺精腸
癖及骨硬
咽喉痛

效用 本草經味辛溫主治洩痢腸癖殺蟲毒去邪惡結氣

止痛除寒熱 花主治見鬼精物多食令人走狂久服輕身通

神明 根治骨硬及咽喉痛研汁蒸之

葛 葛屬生於山野多年生蔓草莖長二三丈常纏繞於他物



上否則臥伏於地葉互生有

長柄自三小葉所成莖與葉

俱生褐色之毛茸秋月葉腋

抽出花軸長五六寸總狀花

序蝶形花冠紫赤色兩體雄

蕊果實為扁莢密生褐毛此

植物之根最大者長三四尺冬月自根中採澱粉供食及糊用

效用 本草經根味甘平主治消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣

藥用植物圖考 卷二

治身大熱
時諸毒并
心熱吐血

治頭痛
症

解諸毒 萬竅主下痢廣利方云心熱吐血用生葛搗汁半升
頓服立瘥并可治衄血不止 別錄葛根無毒療傷寒中風頭
痛解飢發表出汗開腠理療金瘡止痛脇風痛
錦雞兒 錦雞兒屬生於山野落葉小灌木莖高三四尺葉互



生羽狀複葉自四小葉所成
總葉柄之頂端作針狀托葉
亦為針狀春日自葉腋生花
帶黃色果實為莢
效用 植物名實圖考云俗
以為滋陰補陽之藥花蒸雞

蛋治頭痛根去皮煮猪心治勞症

金雀花 金雀花屬歐羅巴原產常綠灌木高至四五尺嫩莖

沿婦人白
帶頭暈耳
鳴腰膝酸
疼

平滑綠色有稜縱行數列掌狀複葉自三小葉所成無卷鬚花



良效頭暈耳鳴腰膝酸疼一切虛損服之甚效此性不熱不寒
煨雞或猪肉食

合崩 合崩屬生於田野中一年生草本高至二三尺葉互生
羽狀複葉自許多小葉而成秋日開黃花總狀花序花數稀少
果實為莢細而長其種子之間有節



效用 東陽俚人採生者潔
 潔以煨猪肝有醫自疾之效
 鹿藿 鹿藿屬生於山野多
 年生草本莖細長常卷絡於
 他物上葉自三小葉所成葉
 柄頗長具毛茸夏背葉腋著以
 數花短總狀花序花冠蝶形
 淡紫色果實為莢長五六分
 潤三分許常含黑色二種子
 效用 本草經味苦平主蠱
 毒女子腰腹痛不藥腸癰瘰
 癧瘍氣

蠶豆

蠶豆屬豆莢如老蠶或以蠶時始熟故名栽培於山野



八月下種冬生嫩苗方莖中空高三四尺葉厚而肥面青背白一柄三小葉二月開白花間有黑斑點總狀花序種子扁平如腎當未熟時採摘以佐蔬菜熟則以養家畜為多亦當開花後即刈之以作

綠肥者

健胃和五臟醒酒

效用

食物本草氣味甘微辛平無毒主治快胃和臟腑苗氣

味苦微甘温

主治酒醉不醒油鹽炒熟煮湯灌之效

豌豆

豌豆屬栽培於田野越年蔓草莖長三四尺為全裂單

藥用

植物圖考卷二

三五

除吐逆止
泄痢



蓋一個雌蕊花後結成莢果種子形圓可供食用其莖與葉嫩時作綠肥或為家畜飼料

效用 氣味甘平無毒陳藏器主治消渴淡煮食之良效 孫

思邈云以治寒熱熱中除吐逆止泄痢澀下利小便腹脹滿

豇豆 豇豆屬栽培頗廣一年生草本通常莖有蔓性攀緣於


他物羽狀複葉自三小葉而成夏月自葉腋抽花軸生數花於其頂為無限花序蝶形花冠淡紫色果實為長莢中含數種子

葉如羽狀奇出複葉托葉甚發達兩片對生而擁莖先端之小葉變卷鬚為攀登之用三四月間自葉腋伸出花軸開數於其上花冠蝶形色白或紫兩體雄

補腎健胃
止吐泄
痢

紫藤

紫藤屬生於山野草本質似灌木卷絡他物之上奇數



供食用

效用 氣味甘平無毒李時珍

主治理中益氣補腎健胃和五臟調營衛生精髓止消渴吐逆

泄痢小便數解鼠奔毒

羽狀複葉夏初開花花軸長而下垂為總狀花序蝶形花冠紫色或白色果實為長莢密生短毛內藏種子甚多栽培於庭園供觀賞用其莖強韌可束縛他物又採其纖維以供織料種子及嫩葉可供

下水瘡病
令酒不敗

食用

效用 氣味甘微溫有小毒陳藏器云作煎如糖服下水瘡病
又曰其子作角角中仁熬香著酒中令酒不敗敗酒中用之亦

槐

槐屬落葉喬木莖高二三丈葉互生為奇數羽狀複葉墨綠



而背淡白初夏梢頭開成穗狀花序蝶形花冠色白而帶微黃十本雄蕊各自離生雌蕊一本果實為莢長二寸餘內藏小扁子其間有繸如連珠狀木質堅實文理美麗供

製器具及建築材料頗佳

治五痔心
痛赤白痢
等

治青盲眼
赤淚出

效用 花芽作染料又治五痔心痛赤白痢等症 槐實苦寒
無毒本草經主治五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人
乳癥子臍急痛
决明 决明屬自生於山野或栽培於田園一年生草本莖高
二三尺為羽狀複葉似藤而
有鋸齒枝端簇生細花有黑
白粉紅等色常供藥用



效 種子鹹平無毒本草
經主治青盲淫膚赤白膜眼
赤淚出久服益精光輕身

日華云助肝氣益精以水調末塗腫毒燻太陽穴治頭痛又貼
胸心止鼻衄作枕治頭風明目甚於黑豆 東坡家藏方云

藥用植物圖考 卷二

五

治癩瘡

瘡蔓延用决明子一兩為末入水銀輕粉少許研不見星患處
擦破上藥立瘥

紫荆

紫荆屬栽培於庭園供觀賞用莖高丈餘落葉喬木單



葉互生心臟形而先端尖淡綠
有光澤春月開花數朵簇生花
冠蝶形紅紫色果實為扁平之
莢長二寸餘闊四五分此植物
花落生葉其木似黃荆而色紫
故名

治宿血下
五淋并毒
解腫

效用

木并皮苦平無毒開寶本草主治宿血下五淋濃煎汁

服

時珍云活血行氣消腫解毒治婦人血氣疼痛經水凝滯

刀豆

刀豆屬栽培於園圃間一年生蔓草常纏繞於他物上

葉卵形而尖自三小葉合成。具長柄。夏月開紫花或白色花。花

祛痰滋養
止嘔益腎



止嘔益腎 民間治療嘔不止。用刀豆粉及白湯服之。甚效。

落花生 落花生屬。常栽於砂質土中。一年生草本。莖蔓延於

地上。葉為偶數羽狀複葉。小葉四片。夏秋間開黃花。蝶形花冠。

花後入於地中。生長而結果實。種子炒之供食用。

效用 甘香可口。甘辛能潤肺。香能舒脾。為果中之佳品。其果

藥用植物圖考 卷二

潤肺舒脾

嗜之且可為蔬供食



實亦可榨油香脆清芬有滋
 養身體之效
 首宿 首宿屬自生於原野
 中或為農作物二年生草本
 平臥於地上長二尺餘葉互
 生羽狀複葉自三小葉所成
 無卷鬚托葉細裂花軸自葉
 腋生出每叢三花至五花花
 小黃色蝶形花冠果實為莢
 呈螺旋狀有刺頗尖銳此植
 物可作綠肥又為牧草馬甚

治熱病煩
滿目黃赤
酒疸

治丹毒風
疥

效用 氣味甘平滑無毒別錄安中利人可久食 孟銑云利

五臟輕身健人洗去脾胃間邪熱氣通小腸諸惡熱毒煮和醬

食亦可作羹 根寒無毒蘇恭主治熱病煩滿目黃赤小便黃

酒疸搗取一升令人吐利即愈

綠豆 綠豆屬一年生陸田之作物莖高一尺餘至生複葉自



三小葉而成柄長至秋開黃色

小花蝶形花冠其龍骨瓣卷作

螺旋狀花柱有毛莢細長無節

種子綠色即所謂綠豆也

效用 氣味甘寒無毒開寶本

草煮食消腫下氣壓熱解毒生

研絞汁服治丹毒煩熱風疹藥石發動熱氣奔豚 日華主厚

藥用植物圖考 卷二

治霍亂轉筋諸藥毒死

腸胃作枕明目治頭風頭痛除吐逆孟詵主補元氣和調五臟安精神行十二經脈去浮風潤皮膚宜常食之煮汁消渴寗原云解一切藥草牛馬金石諸毒時珍主治痘毒利腫脹附綠豆粉甘涼平無毒寗原主治痘瘡濕爛不結痂死者乾撲之良時珍云新水調服治霍亂轉筋解諸藥毒死心頭尚溫者豆皮甘寒無毒時珍主熱毒退目醫解酒毒豆芽開寶本草主治霍亂吐下絞汁和醋少許溫服黃大豆黃大豆屬栽培於陸田一年生作物高達二尺餘莖葉均有毛葉互生有長柄複葉自三小葉所成小葉心臟形全邊無鋸齒夏月開小花蝶形花冠色白或帶紫兩體雄蕊一雌蕊果實為莢有毛種子供食用滋養頗富又為醬及醬油豆腐等之好原料

補五臟益
中下氣



效用 嘉祐本草氣味甘平無

毒補五臟益中助十二經脈調

中煖胃腸 葉利五臟下氣

木黃芪 木黃芪屬自生於山

野多年生宿根草本其莖偃地

作蔓狀葉互生奇數羽狀複葉

小葉緣邊無鋸齒橢圓形或卵

形常有十片以上夏月葉腋抽

梗生花淡黃綠色亦有淡紫

色者排列作總狀花序花後結

莢細長無節採其根乾之供藥

用

治癰疽敗
瘡排膿止
痛

效用 本草經味甘溫主治癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾
五痔鼠瘻補虛小兒百病 別錄無毒主婦人子藏風邪氣逐
五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰

氣
皂莢

皂莢屬落葉喬木高至三四丈有銳針自多數小葉成



為羽狀複葉夏月葉間抽莖開
黃綠色小花成穗狀花後結莢
長約七八寸闊寸許內有小扁
子木材供器具及薪炭之料嫩
葉供食用其莢煮汁用以洗濯
污垢能不害本質

效用 本草經味辛鹹溫主風痺死肌邪氣鼠頭淚出利九竅

治風濕症
喘逆腫消

殺精物 別錄有小毒瘰腹脹滿消穀除熱嗽囊結婦人胞不
落明目益精可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如豬牙
者良 李時珍曰味辛而性燥氣浮而散吹之導之則通上下
諸竅服之則治風濕痰喘腫滿殺蟲塗之則散腫消毒搜風治
瘡

甘草 甘草屬多年生草本春月生新芽高至二三尺葉互生




羽狀複葉往往自十餘片小葉
而成小葉長卵形夏秋之際葉
腋抽花梗集生於其上成穗狀
花序花冠蝶形淡紫色此植物
之地下莖及根採掘而乾貯之
色黃有特殊之甘味用為緩和

治五臟六腑寒熱邪氣

藥有用以加於食品中者

效用 本草經味甘平主治五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡瘻解毒温中久服輕身延年 別錄國老無毒主温中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脈利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種草

百脈根 百脈根屬生於山野中多年生草本高至一尺餘莖



細長而傾斜葉羽狀複葉自五小葉所成其基部二小葉宛如托葉花冠蝶形黃金色果實為莢此植物為牧草供牛馬之食料

唐本草根苦微寒無毒主治下氣止渴去熱除虛勞補不足酒

卜氣止渴

效用 蘇恭曰二八月采根日乾

浸或水煮丸散兼用

苦參 槐屬多年生草本自一根抽數莖高至三四尺葉互生



驅害蟲除
疥癬

治心腹結
氣癥瘕積
聚

以除疥癬及其他之寄生物又自莖皮採取纖維供織物及其
他之用

效用 本草經味苦寒主治心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘
瀝逐水除癰腫補中明目止淚 別錄無毒養肝膽氣安五臟

藥用植物圖考 卷二

治腎冷精
流婦人氣
血墮胎

定志益精利九竅除伏熱腸辟醒酒小便黃赤瘡惡下部隱平

胃氣令人嗜食輕身

補骨脂一名破故紙

補骨脂屬一年生春月下種而生高三



四尺夏秋之間葉腋出寸許之花梗開淡紫色蛾形小花如球狀種子成熟呈黑色採之可供藥用蘇恭曰莖高三四尺葉小似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月

采

效用 子平大溫無毒開寶本草主治五勞七傷風虛冷骨髓

傷敗腎冷精流及婦人氣墮胎甄權云男子腰疼膝冷囊

濕逐諸冷痺頑止小便腹中冷時珍主治腎泄通命門煖丹

治遺精
痛
婦人斷產

田斂精神

附小兒遺尿

膀胱冷也夜屬陰故便不禁破腎虛

腰痛

經方用破故紙一兩炒為末溫酒服三錢神效或加木香一錢

玉莖不萎時時如針

刺控之則脆此名腎瀉用破故紙葑子各一兩為末每用三錢水二盞煎六分服日三次愈則止

零陵香

零陵香屬

蘇恭曰

零陵香今湖廣諸州皆有之多



生下濕地葉如麻兩兩相對莖方七月中旬開花至香古云薰草是也

效用 氣味甘平無毒別錄主

治明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛上氣腰痛附牙齒

疼痛 零陵香種葉煎水含漱之

婦人斷產 零陵香為末酒服二錢每服至一兩即一年絕孕蓋血關香即

也

蘇方 一名蘇木

雲實屬東印度原產喬木高五十尺許莖有

藥用植物圖考 卷二

三

破血排膿
消癰腫

刺葉為二回羽狀複葉，自許多小葉成，小葉畧帶革質，花黃色，頗美麗。此植物之根材，去其皮，煎之煎液，為紅色染料。又自根材可採黃色染料。



血噤赤白痢，并後分急痛。

血運蘇方木三兩，水五升，煎取二升，分服。

胡盧巴一名苦豆

胡盧巴屬，一年生之園養植物，春月下種。

生苗莖高二三尺，夏月自葉腋開小蛾形白色花，花後結細莢。

效用 唐本草味甘鹹平，無毒，主破血，產後血脹，悶欲死者，水煎苦酒煮五兩，取濃汁服之。效。大明本草，婦人血氣心腹痛，月候不調，及羸勞，非膿止痛，消癰腫，撲損淤血，女人失音，附破傷風。蘇方木為散，三錢酒服，立瘥。產後

治冷氣症
瘧疾溫脚
氣

右腎、暖丹田、
附小腸氣痛



長二、三寸、熟而根枯

效用 味苦大溫、無毒、嘉祐本

草、主治元臟虛冷、氣得附子、疏

黃、治腎虛冷、腹脇脹滿、面色青

黑、得藁香子、桃仁、治膀胱氣

時珍治冷氣、疝瘕、寒濕脚氣、益

胡盧巴炒研末、每服二錢、茴香酒下

榿藤子 一名象豆

榿藤子屬陳

藏器曰、按廣州記云、榿藤子生廣

南山林間、作藤着樹、如通草藤、其

實三年方熟、角如弓、袋子若雞卵

其外莖紫黑色、其殼用貯丹藥、經

治五痔瘡
毒

年不壞取其中仁入藥服用 李時珍曰子紫黑色微光大一

二寸圓而扁人多剔去肉作瓢垂於腰間也

效用 仁澀甘平無毒藏器主治五痔蠱毒飛尸喉痺以仁為

粉微熬水服一二匕亦和大豆漂面去野黯

山根豆 山根豆屬自生於山中陰地常綠蔓狀亞灌木莖柔



弱長一二尺易傾倒夏月葉腋出

穗開白色蝶形花後結實熟呈

黑色採根乾用蘇頌曰山根豆生

劍南及宜州果州山谷今廣西亦


有以忠州萬州為佳苗蔓如豆葉

青經冬不凋八月採根

效用 氣味甘寒無毒開寶本草主治解諸藥毒止痛消瘡腫

治腹脹喘
滿蛇狗咬
蛛傷

毒發熱、效嗽、治人及馬急黃、殺小蟲、時珍云、研末湯服五分、
治腹脹、喘滿、酒服三錢、治女人血氣腹脹、又下寸白諸蟲、丸服、
止下痢、磨汁服、止卒患、熱厥、心腹痛、五種痔痛、研汁塗諸熱腫、
禿瘡、蛇狗蜘蛛傷、附方、霍亂吐痢、山根豆末、橋水、蠱腹大、有
而皮色黑者、山根喉中發癢、山根豆末、磨醋嚙之、追涎即愈、勢重
豆末、酒服二錢、能言語、涎出、就



赤小豆 菜豆屬、種類不一、栽
培於陸田中、一年生草本、高至
二尺餘、葉自三小葉所成、小葉
往往三裂而淺、夏秋葉腋開淡
黃色花、蝶形花冠、其色雌雄蕊
之龍骨瓣作螺旋狀、果實為莢

下水腫排
癰腫

治漏胎或
傷胎

細長形往往含赤色種子或呈白色其與綠豆相異者綠豆種子帶綠色是也亦小豆種子可供食用或製餡或作糕

效用 本草經主治下水腫排癰腫膿血 別錄味甘酸平無

毒主治寒熱熱中消渴止洩利小便吐逆卒澀下腹脹滿 葉別

錄主去煩熱止小便小兒遺尿小赤豆葉搗汁服之千金方 葉時珍主治妊娠

數月經水時來名曰漏胎或因房室名曰傷胎用此為末溫酒

服方寸七日三次得效乃

止

黎豆 黎豆屬生於山野

亦有栽培於陸田者一年

生纏繞草本春末下種生

蔓葉如豇豆但葉脈偏斜



温中益氣

去風濕下痢便血
玉莖濕癢

夏秋間開花成簇花如藕豆呈紫色四五英同一處長三四寸

大如拇指種子細長似鼠矢而不尖滇南呼為鼠豆蓋肖形也

效用 氣味甘微温有小毒時珍主治温中益氣

肥皂英屬李時珍曰肥皂英生高山中其樹高大葉如



檀及皂英葉五六月開白花結英長三四寸狀如雲寶之英而肥厚多肉內有黑子數顆大如指頭不正圓其色如漆而甚堅中有白仁如粟煨熟可食

效用 莢辛温微毒時珍主治去風濕下痢便血瘡癬腫毒

附方 玉莖濕癢肥皂一個燒存性香油調搽即愈

相思子 相思子屬東印度原產蔓生木質植物葉為偶數羽

藥用植物圖考 卷二

治風痰瘡
瘡

狀複葉，自數多小葉而成，花小白，或帶紅色，蝶形花冠，果實



為莢，種子大如豌豆，鮮紅色，黑色，或帶白色，此種子供裝飾之用。時珍曰：相思子生嶺南，樹高丈餘，白色，其葉似槐，其花似皂莢，其莢如扁豆，其子大如小豆，半截紅色，半截黑色，彼人以欺

首飾

效用 氣味苦平，有小毒，吐人時珍主治通九竅，去心腹邪氣

止熱悶、頭痛、風痰、瘡癩、殺腹臟及皮膚內一切蟲，除蠱毒，取二

七枚研服，即當吐出。附方：解中蠱毒，用未鑽相思子十四枚，

服，欲吐，押之勿吐，少頃當大吐，非常輕者，但服七枚神效。

許碎為末，溫水半盞和。

雞眼草 胡枝子屬自生於原野路傍之雜草、莖高四五寸乃



至一尺許、多分枝、葉互生、羽狀複葉、自三小葉所成、小葉長卵形、或長橢圓形、托葉闊帶褐色、夏秋間、葉腋開紫花、花梗甚短、每梗着一花、或數花、花冠蝶形、

兩體雄蕊、雌蕊一個、果實為小莢、救荒本草、雞眼草生荒野中、蜀地生葉如雞眼大、似三葉酸漿葉而圓、又似小蟲、兒臥單葉而大、結子如粟粒小、黑、茶褐色、味微苦、氣與槐相類、性溫、採子搗取末、其米青色、按江西田野中有之、(浙江隨處有之)土人呼為公母草、其葉皆斜紋、搗之、輒復相勾連、效、用、或云中暑、搗取汁、涼水飲之、即愈、

治中暑

藥用 植物圖考 卷二

治蠱毒疫
喘

黃環

蘇恭曰黃環惟襄陽大有餘處雖有亦稀巴西人謂之
之就葛今庭園亦種之作藤生大者莖六七寸根亦葛類陶隱



居云似防己者近之取葛根誤
食之吐利不止土漿解之此真
黃環也今太常收劍南來者乃
雞屎葛非黃環也其花紫色其
其子名狼跋子角生似皂莢交

廣送入太常者正是黃環也花實與葛同時

效用 本草經味苦平無毒主治蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在臟中

除痰逆寒熱時珍治痰嗽消水腫利小便

吉納 東印度原產常綠樹高至四十尺餘葉為羽狀複葉小

葉之頂端呈凹形花及果實與 檀相類

收斂藥

治疥癬



效用 此植物自其幹上滲出之汁液，乾之，稱為吉納，為收斂藥。

藥

百露拔爾撒謨 中美洲原產

喬木，高五十尺許，葉為奇出羽

狀複葉，小葉七片至十一片，花

白色，總狀花序。

效用 此植物之樹皮中所採

之樹脂，稱為百露拔爾撒謨，可

治疥癬。

加利拔兒豆

西部亞非利加

原產，莖之下部木質，複葉自三小葉成，與菜豆之葉相類，蝶形

藥用植物圖考 卷二

亞克沙阿仙藥

荊毬花屬前印度及東部阿非利加原產常



花冠暗赤色總狀花序果實為莢
含種子二粒或三粒此種子扁平
形稱為加刺拔兒豆

效用 種子供藥用能令腫孔縮
小又能令瘧癩鎮靜然有猛毒之
性不可不慎也

綠樹本高至四十尺許葉二回羽
狀複葉自數多小葉而成花黃色雄
蕊之數多果實為莢含數種子此
木材所煎之汁乾之成褐色塊稱
為阿仙藥

收斂藥治

下劑

效用 阿仙藥有收斂性故用於嗽藥又有以之加於鉄或銅

中供褐色或黑色之染料

海那 决明屬產於熱帶亞非利加灌木狀之植物也葉偶數

羽狀複葉小葉長卵形而尖花瓣

五片稍不整齊黃色果實為莢扁

平

效用 此植物之葉稱為海那葉用

用於下劑最著於世

骨拜波拔爾撒謨樹 南美洲原產



常綠樹本高至二十尺葉為羽狀複葉小葉卵形約四片至十片花有萼四片無花冠雄蕊十枚雌蕊一個花後果實結成莢略帶橢圓形含一種子此樹幹穿以深穴所流出之樹脂稱為

藥用植物圖考 卷二 三六

複葉小葉卵形其數在二對以上有托葉甚顯著蝶形花冠呈



骨泔波拔爾撒謨

效用 此植物之樹脂用以治尿

道之疾病云

羅望子 羅望子屬喬木葉互生

為偶數羽狀複葉自許多小葉成

花白色有赤色之線條總狀花序

果實為莢

效用 此植物之果肉用於清涼

藥及緩下藥

芒芒決明 山黧豆屬生於山野

中蔓草由卷鬚而上昇葉為羽狀

除痰止渴
調中



而馬蹄決明苗角皆鞣苦不可食也

效用 按苙芒生道旁葉小於決明性平無毒火灸作飲極香
除痰止渴令人不睡調中

薔薇科

玫瑰

薔薇屬多生於北國之海濱沙地上常綠灌木莖高二

三尺有刺密生葉有短毛奇數羽狀複葉小葉橢圓形托葉着

生葉柄上花大美麗花瓣紅色或白色花托壺狀外面有刺內

黃色兩體雄蕊果實細長與豌豆
之莢相類似其葉供殺蟲之原料
李時珍曰決明有二種一種馬蹄
決明一種苙芒決明但苙芒嫩苗
及花與角子皆可瀉茹及點茶食

能為

緣狀、莖葉多刺、葉具長柄、分裂為三小葉、緣邊有鋸齒、其色上



藏有許多雌蕊、果實可食、

效用 根皮供黃、褐色染料、花

可製香水、或供藥用、

苦蘇 產於亞非利加洲、喬木、

葉互生、羽狀複葉、花小、淡紅色、

圓錐花序、雌花與雄花生於異

株、此植物雌花之已乾者、稱為

苦蘇花

效用 其花有以驅除條蟲

者、

治婦人乳
癰



青下白而質粗糙四月開花
花花瓣五片雄蕊多數簇生
雌蕊亦多數五六月果實成
熟呈黃赤色可食

效用 俗以治婦人乳癰法
以此植物之葉芽與蜀羊泉

白毛之嫩芽共搗爛用布絞汁和頂上大泥片一分餘置杯中
放飯鍋上蒸之用鴨毛蘸搽患處頗見功效

蛇莓 蛇莓屬多年生草本莖長二三尺匍匐於地上葉互生

有微毛而不滑葉柄長自三小葉所成邊緣有鋸齒春夏之交
花軸自葉腋伸出頂端綴頭狀花托萼外有總苞花瓣五片黃
色雄蕊二十枚雌蕊甚多果實細小熟時花托膨大呈饅頭狀

治紅線疔
敷蛇蟲咬
井通婦人
月經



之神效

日華子云味甘酸冷有毒通婦人月經

蟲咬

地榆

地榆屬生於山野之宿根草本莖高三四尺葉互生羽

狀複葉小葉長橢圓形有鋸齒秋月梢頭開紫色小花聚集成

長橢圓形其長殆與萼等雌蓋隱於萼筒之內

效用 土人掘其根乾之搗碎以飼猪母有醫治小猪乳痢之效

外着數多紅色果實於其上外形畧與和蘭蛇莓相類有毒不堪食

效用 植物名實圖考云多生

園野中安南人以莖葉搗敷疔

瘡隱其名曰疔瘡藥紅線疔試

止冷熱痢
月經不止
血崩



根微寒無毒別錄止冷熱痢
極效 開寶本草止吐血鼻
衄腸風月經不止血崩產前
後諸血疾并水瀉 李杲曰
搗汁塗犬蛇蟲傷
金櫻子 薔薇屬攀援灌木
其枝蔓延甚長葉互生自三
小葉或五小葉片合成有托
葉著生於葉柄之上夏月開
白色單瓣花大三寸許甚美
觀亦有重瓣及淡紅色者枝
有密生之刺萼作壺狀亦多

刺雌蕊多數隱於萼筒內

效用 嘉祐本草味酸澀平溫無毒療脾洩下痢止小便利澀
精氣久服令人耐寒輕身 本草綱目花止冷熱痢殺三蟲和
鐵粉研勻拔白髮塗之即生黑者亦可染髮 葉治癰腫嫩葉
研爛入鹽少許留頭洩氣

龍茅草 龍茅草屬生於山野或村舍隙地多年草本莖高二



三尺葉互生羽狀複葉自大
小不整齊之小葉合成當萌
芽時常附地而叢生夏月莖
梢開花形小色黃花瓣五片
總狀花序約長一尺許果實
有許多刺毛能附着於他物

治月經前
後及赤白
痢疾

上此植物之莖葉及根用為收斂藥

效用 滇南本草味苦性溫治婦人月經前後紅崩白帶面寒

腹痛赤白痢疾

翻白草 委陵菜屬自生於原野多年生宿根草本地下部有



紡錘狀之塊根早春布地叢生羽狀複葉各小葉之緣邊有齒牙葉背及葉柄作純白色且多白毛故名翻白草三月自葉腋抽花梗高達六七

寸至尺餘梗上分歧綴以數花花冠黃色其萼與瓣數各有五雌一枚雄蕊多數簇生

效用 救荒本草云即雞腿兒根白可食時珍根甘微苦平

藥用植物圖考 卷二

治吐血瘡
癰瘡

安五臟益
精氣

無毒。主治吐血、下血、崩中、瘧疾、癰瘡。

蓬蘽 懸鉤子屬，生於山野，多年生草本。莖呈蔓狀，葉互生，具



長柄，自三小葉而成，邊緣有鋸齒。莖與葉俱生細長之軟毛。夏秋間稍頭開五瓣之白花，花後結實，與蛇莓相似，生則青黃，熟則紫黯，微有黑毛。效用：本草經味酸平，主安

五臟，益精，長陰，令堅，強志，倍力。久服有子，輕身不老。

懸鉤子 懸鉤子屬，生於山野，落葉灌木。葉具長柄，互生，掌狀

單葉，裂片自三至五，葉莖俱生刺。莖高四五尺，葉緣有鋸齒，初

夏葉腋開花，花瓣五片，白色，其大與棠棣花之花冠相近，似果

治子死腹
中不下破
血殺蟲



實為肉果呈紅色由多數之

小核果合成供食用

效用 本草拾遺根皮味苦

平無毒主治子死腹中不下

破血殺蟲毒卒下血婦人赤

帶下久患痢不止赤白膿血

膿痛并煎濃服之 子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾去

酒毒 漢藥實驗談治久痢疾又能作補劑



寒莓 懸鉤子屬生於山地常綠蔓性小灌木莖通常平臥於

地長四五寸至二三尺每節生根葉掌狀淺裂稍呈圓形葉柄

長邊緣有齒牙莖葉粗糙密生毛茸冬月花簇生於莖梢花瓣

五片白色花後果熟可食

治腰背酸痛



效用 東陽俚人採根蒸雞
治婦人產後腰背酸痛有活
血之效

桃 櫻桃屬栽培於園圃落

葉亞喬木莖高二三丈單葉

互生為披針形緣邊有鋸齒

仲春開花有紅白種種花冠

有單瓣重瓣之分單者五瓣

雄蕊多數簇生雌蕊一枚子

房上位重瓣者亦有多種其

雄蕊常變花瓣不能結實第

供觀賞花梗甚短果實夏月

治淤血
閉

成熟亦有成熟於秋者。體圓而頂微尖。外果皮薄。有微毛。中果皮多。肉含漿。內果皮變核而藏仁於其中。故名核果。此植物生長速。其壽鮮有過五十年者。五年後宜以刀剗其皮。出其脂液。則多延數年。實辛酸甘熱微毒。多食令人有毒。如冬桃食之。解熱毒。

效用 仁味苦甘平。本草經主治淤血。血閉癥瘕。驅邪氣。殺小蟲。櫻桃屬栽培甚廣。落葉喬木。莖高二三丈。葉廣橢圓形。緣



邊多鋸齒。先端尖而曲。早春開花。為聚傘冠。花後生葉。花梗甚短。合片萼。下部如筒。上部分裂。為五花冠。五瓣。亦有重瓣者。色多紅。或白。香氣頗濃。雄蕊多數。

明目益氣
治霍亂止
痢

雌蕊一枚果實形圓而味酸可供食用其內部密著於核與杏
之內部易於分離者異果實酸平無毒多食損齒傷筋蝕脾胃
令人發上痰熱

效用 核仁酸平無毒主治明目益氣除煩熱其葉煮湯飲之
可治霍亂止痢

杏 櫻桃屬我國栽培甚廣金屬尤多落葉喬木莖高二三丈



花與葉酷似梅次梅開花色淡
紅或微白亦先花後葉果實形
圓中果皮之內部易與內果皮
所變之核分離味酸可食但性
酸熱生痰及癰疽者不宜多食

小兒尤忌

治效逆上
氣

治大腹水
腫面目
浮腫

效用 將仁加水蒸溜製成杏仁露用為鎮痙藥及咳嗽藥核
之兩仁者殺人并可毒狗 本草經主治效逆上氣雷鳴喉痺
下氣產乳金瘡寒心奔豚
郁李 櫻桃屬生於山野或栽培於庭園間落葉灌木莖高三



主治大腹水腫面目四肢浮腫利小便尿道根主齒斷齧齒堅

齒

藥用植物圖考 卷二

四三

四尺葉為廣披針形有鋸齒先
葉後花花形小而有柄花分五
瓣色淡紅雄蕊甚多雌蕊一柱
果實形小而圓成熟則帶紫赤
色味甘酸帶苦供觀賞用
效用 核仁酸辛無毒本草經

梨

梨屬落葉喬木栽培甚廣莖高三丈餘單葉互生質厚而



光卵形先端尖銳緣邊有鋸齒葉柄長春夏之交開花花色淡白花殘生葉花瓣五片雄蕊多數藥囊黑褐雌蕊五枚果實圓形或橢圓外皮色褐有碎白點食用之部為萼

與花托發育而成中央之軟骨質為子房發育而成稱為假果種子黑褐色成熟在夏秋

效用 梨實甘寒多食成冷劑然卒暗風不語者搗汁頻服胸


中痞塞熱結者宜多食之有潤肺涼心消痰降火解瘡毒酒毒

諸效

潤肺消痰
降火解瘡
毒

林檎

梨屬落葉喬木適於寒地燥壤然過寒亦非所宜我國



所產種類不多尋常僅別其大小呼大者曰蘋果小者曰花紅莖高達丈餘枝稍柔弱展布甚廣初春發葉單葉卵形而尖緣有毛狀之鋸齒春末開花色白或淡紅葉帶紫

色子房着生於萼之筒部結成梨果夏末成熟形圓而畧扁大約寸餘向陽之部色較鮮紅

效用味甘可生食并可製脯及釀酒等又能下氣消痰治霍亂肚痛等病消渴者食之最宜

木瓜 木瓜屬落葉灌木幹高六七尺單葉長橢圓形春月先

治霍亂肚痛

去濕和胃
滋脾益肺



葉開花色有種種或白色或深紅或紅白相雜皆甚美麗子房五室各含胚珠數箇與萼筒部相接合果實橢圓外面平滑長二三寸似榧櫨而小可供食用

效用

果實酸溫無毒功能去濕和胃滋脾益肺 別錄主濕

脾脚氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

枇杷

枇杷屬栽培於園圃常綠喬木莖高一二丈羽狀單葉

互生有鋸齒葉底有毛茸盛冬開白花形小而五瓣雄蕊多於花瓣往往數花集生有佳香花序頗似密束翼年夏月果實成熟正圓如球黃色有毛果柄更甚白者為上黃者次之

利肺氣止
吐逆

解暑毒療脚氣

花時珍主治頭風鼻流清涕辛夷等分研末



效用 味甘而酸生食頗佳

有以之釀酒製醬者能止渴

下氣利肺氣止吐逆主上焦

熱潤五臟 葉苦平無毒別

錄主治卒呃不止下氣煮汁

服 時珍云和胃降氣清熱

酒服二錢日二服

山楮子 山楮子屬自生於山

野落葉灌木莖高四五尺分枝

頗多莖枝均生針葉為楔形有

鋸齒春月隨葉開白花雄蕊二

治肉積痞
滿止水痢
治瘡癩

治金瘡疽
痔鼠瘻惡
瘡

十枚數花簇生狀與林檎相似果實秋熟形圓而畧扁色赤黃而味酸構造亦與林檎相同果頂有萼之殘片亦假果也

效用 果實能化飲食消肉積癥瘕痰飲痞滿吞酸滯血痛脹

唐本草煮汁服止水痢沐頭洗身治瘡癩

蛇含 委陵菜屬生於原野之濕地多年生草本莖長而質軟

常伏臥於地上掌狀複葉濃綠色

葉柄長在莖之下部者有五小葉

至上部則有三小葉春夏間稍上

分歧多數之花梗着以黃色小瓣

花雄蕊及雌蕊甚多

效用 本草經味苦微寒主治驚

癩寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡 別錄無毒療心腹邪



治疥瘡
痔

狼牙

委陵菜屬草本。莖頗長，質硬而直立。上部之葉，每葉有



三小葉，花黃色。花序由數花而成，有萼樣之苞。雌蕊多數，各雌蕊含一胚珠。花後結乾果，有毒植物也。

效用 本草經：根苦寒，有毒。主治邪氣、熱氣、疥癬、惡瘡、瘡痔、去

白蟲。大明本草：殺腹臟一切蟲，止赤白痢，煎服。

覆盆子。懸鉤子屬，名見名醫別錄。又有莖缺盆，西國草畢櫻

伽、大麥莓、插田蕨、烏蘆子等名。昔人多謂覆盆、蓬蘽乃一物異名。李時珍則謂同類異種。蓬蘽子以八九月熟，故謂之割田蕨。

治腎精虛
竭陰痿

醫
治痘後目

覆盆子以四五月熟故謂之插田蕪



效用 別錄甘平無毒主治益氣輕身

令髮不白甄權云男子腎精虛竭陰

痿能令堅長女子食之有子葉微酸

鹹平無毒時珍主明目止淚收濕氣

根時珍主治痘後目醫取根洗搗澄粉

日乾蜜和少許點於醫丁上二三次自散百日内治之久即難療

巴旦杏 櫻桃屬中央亞細亞原

產落葉樹也高至十五尺許葉披

針形與桃葉相似花無梗雄蕊多

於花瓣雌蕊一枚常二花相聚果

實亦與桃相類惟其汁不多成熟



止咳下氣

則果皮乾燥裂開而出核。此植物有變種。種子之甘者稱為甘巴旦杏。其苦者稱為苦巴旦杏。甘巴旦杏之種子供食用。苦巴旦杏之種子供藥用及製油用。

效。用。苦巴旦杏之種子加水蒸溜之製成苦巴旦杏水。可用為鎮痙藥及鎮咳藥。飲膳正要云味甘平溫無毒時珍主治止咳下氣消心腹逆悶。

鹿梨。梨屬為梨之原種。生於山野。落葉喬木。莖高二三丈。樹

Pinn. Calleryana Bge



有針。葉大橢圓形或卵形。緣邊有細鋸齒。葉柄及葉背密生軟毛。春日枝梢葉腋開攢簇白色之花。與梨花略相似。果實呈球狀。徑五六分。味惡。唯下此種子可用其苗為

治痢及瘡
疥

止滑痢治
霍亂

接梨樹之砧木時珍曰山梨野梨也處處有之梨大如杏可食

其木紋細密赤者文急白者文緩

效用 蘇頌曰味酸瀋寒無毒主治煨食治痢 根皮同實并

治瘡疥煎汁洗之

棠梨 棠梨屬李時珍曰棠梨野梨也處處山林有之樹似梨

而小葉似蒼朮葉亦有團者三

叉者葉邊皆有鋸齒色頗黦白

二月開白花結實如小棟子大

霜後可食其樹接梨甚佳有甘

酢赤白二種

效用 時珍云實酸甘瀋寒無



毒主治燒食止滑痢 枝葉主治霍亂吐瀉不止轉筋腹痛取

一握同木瓜二兩煎汁細呷之

附方反胃吐食

棠梨葉油炒去刺為末每

一錢 且酒服

棠梨屬落葉喬木高二三十尺樹皮每年剝脫痕如雲



紋葉互生卵形而尖春末隨葉開

花生於枝之頂端萼之外面平滑

花冠五瓣紅色雄蕊比花瓣多雌

蕊一枚子房五室果實橢圓形尖

頭凸凹不正純黃色有芳香略與

甜瓜相類此植物可備觀賞其木

材供牀柱等用果實滋味甚強不宜生食或燒或蒸或浸砂糖

中供食用亦有以之供藥用者蘇頌曰榲桲木葉花實酷類木

瓜但比木瓜大而黃色瓣之惟着蒂間別有重蒂如乳者為木

藥用植物圖考 卷二

罌

解酒去痰
止痢及霍
亂

瓜無此則榭榼也李時珍曰榭榼乃木瓜之大而黃色無重蒂者也榼子乃木瓜之短小而味酢澇者也榭榼則榼類之生於北土者也三物與木瓜皆是一類各種故其形狀功用不甚相遠

效用 宏景云酸平無毒主治解酒去痰 大明本草煨食止痢浸油梳頭治髮白髮赤 吳瑞云煮汁服治霍亂轉筋 榭榼 棠梨屬南部歐羅巴原產近於榭榼之種類也落葉木



本高七八尺餘枝多而叢生葉互生卵形或橢圓形下面有毛密生花大寸半花瓣白色微帶淡紅萼有毛其形狀畧與林檎之花相類生於枝之頂端果實為圓形漿果黃色外面生

除心間酸
水去胸膈
積食

毛亦密且多凹凸大二寸餘有特殊之芳香供食用味甘酸頗佳此樹適於寒地有栽培於庭園間者

效用 開寶本草酸甘微溫無毒主治溫中下氣消食除心間

酸水去臭辟衣魚 蘇頌云去胸膈積食止渴除煩將臥時噉

一兩枚生熟皆宜

柰 林檎屬李時珍曰柰與林檎一類二種也樹實皆似林檎



而大有赤白青三色白者為素柰赤

者為丹柰亦曰朱柰青者為綠柰皆

夏熟冬熟者為冬柰子帶碧色柰一

名頻婆據採蘭雜志學圃餘疏謂頻

婆即蘋果則柰即蘋果也

效用 別錄實苦寒有小毒多食令人肺壅臃脹有病人尤甚

補中和脾

汁服

山櫻桃

孟銑主治補中焦諸不足氣和脾治卒食飽氣壅不通者搗

櫻桃屬栽培於庭園間落葉灌木高至七八尺時仍



覺纖弱短小其嫩莖及葉之下面生毛甚密葉互生卵形或廣披針形有鋸齒不齊春月隨葉開花花瓣白色五片略與梅花相類果實為小球形核果夏月成熟呈深紅色有光澤大四分許味甘酸多液

供食用又可供觀賞其與桃相異者桃葉披針形有鋸齒果實形大是也

效別錄實味辛平無毒主治止洩腸癖除熱調中益脾氣

精止腸澼瀉

令人好顏色、美志、孟詵云、止洩精、

秩移 秩移屬生於山地、落葉喬木、高至二三十尺、春末生新



葉、葉橢圓形、有鋸齒、嫩時具白色、花呈短穗狀、花瓣五片、白色而細、長、雄蕊多於花瓣、與葉共翻於風、中有奇觀、果實成熟時、赤色如小、豆、為觀賞之用、木材供器具及薪、炭之料、陳藏器曰、秩移木生江南

山谷、樹大十數圍、無風葉動、花反而後合、詩云、唐棣之華、偏其、反而是也、

效用 陳藏器曰、木皮苦平、有小毒、主治去風血、脚氣、疼痺、跪

損、瘀血、痛不可忍、取白皮、火炙、酒浸服之、和五木皮桑槐桃煮

去風血脚
每疾痺

藥用植物圖考 卷二

五

養筋治血
去雀斑

湯將脚氣殺疥蟲風癢燒作灰置酒中令味正經時不敗
紅梅消 懸鈎子屬江西湖南河邊多有之細莖多刺初生似



叢漸引長蔓可五六尺一柄
三葉葉亦似蕁田蕪初發面
青背白漸長背亦淡青三月
間開小粉紅花色似紅梅不
甚開放下有綠蒂就蒂結實
如覆盆子色鮮紅累累滿枝

味酸甜可食

效用 江西俚醫以紅梅消根浸酒為養筋治血消紅退腫之

藥又取花汁入粉可去雀斑

營實牆藤 薔薇屬時珍曰此草蔓延柔靡依牆援而生故名

治癰疽惡
瘡潰疔腹
痛及下疳
瘡

者結子成簇生青熟紅其核有白毛如金櫻子核八月采之根
采無時



效用 本草經實酸溫無毒主治癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱
氣陰蝕不瘳利關節別錄根苦澁冷無毒主治止洩痢腹痛
五臟客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷搥生肉復肌 葉攝
生方主治下疳瘡焙研洗傅之黃花者更良

蔕藤宏景曰營實薔薇子也以
白花者為良時珍曰薔薇野生
林塹間春抽嫩蕨小兒搗去皮
刺食之既長則成叢似蔓而莖
硬多刺小葉尖薄有細齒四五
月開花四出黃心有白色粉紅二

水楊梅

水楊梅屬生於山野中，多年生草本，高至二三尺，春



月敷地叢生，下部之葉羽狀複葉，不整齊，其形狀畧類萊菔葉。夏月葉間抽莖，梢上分歧，每枝頭著一花，花瓣五片，深黃色，雌蕊甚多，雄蕊亦不少，果實為小乾果，先端如鈎形，往往集聚呈

球狀，大三四分，其地下部供藥用，嫩莖葉供食用。

效用 時珍云：辛溫無毒，主治療瘡腫毒。

月季花 薔薇屬，東南亞西亞原產，灌木，高至五六尺，其嫩莖

有刺，葉為全裂葉，自三小葉或五小葉所成，平滑而有光澤，托

葉甚狹，花形大，具壺狀花托，花冠淡紅色，此植物供觀賞，其花

治疔瘡毒
腫

活血消腫
及瘰癧



野薔薇

薔薇屬生於原野或栽培於庭園間落葉灌木有刺



效用 味甘溫無毒時珍主治活

血消腫傳毒 附方瘰癧未破用

季花頭二錢沈香五錢芫花炒三

錢碎剉入大鯽魚腹中就以魚腸

封固酒水各一盞煮熟食之即愈

魚須安糞水內遊死者方效此是

家傳方活

人多矣

莖細高三四尺延引如蔓葉畧有
毛為奇數羽狀全裂葉裂片五乃
至七橢圓形托葉着生於葉柄上
初夏枝梢着花圓錐花序花冠五
瓣色白或帶紅常放芳香果實紅

治瘡肺癰
婦人禿髮

熟如南燭子、供藥用、又將其花蒸溜、可製香水。

效用

花

治瘡伍涵芬讀書志、白野薔薇、婦人鬱結吐血、劉克

香烈大耗真氣、虛人忌服之。

根

治肺癰、吐膿痰、酒煎服、口瘡、煎湯漱口。

子

名石珊瑚、治產後軟癱、婦人禿髮、用薔薇嫩枝、同猴薑煎汁刷之。

胡頹子科

胡頹子

胡頹子屬、自生於山野、或栽培於庭園間、常綠灌木。



莖高十餘尺、有針、葉互生、長橢圓形、底面密生褐色及銀色之鱗、緣邊如波狀、冬月枝梢葉間開花、花有合片、萼帶白色、至翼年初夏、果實成熟、長橢圓形、約五分許、赤色、其上散布雲母色。

治水痢洗
瘡疥并
吐血不止

之小星點味酸澀微甘併食用

效用 子酸甘無毒藏器主治水痢根味同子煎湯洗惡瘡疥并

犬馬癩瘡 時珍主治吐血不止煎水飲之喉痺痛寒煎酒灌

之皆效 葉味亦同子時珍主治肺虛氣短喘欬劇者取葉焙

研米飲服二錢 附此葉喘咳方出中藏經云甚者亦效如神昔有人患喘三十年服之頓愈甚者服葉

後胸上生小癭瘕作癢則瘥也虛甚加人參等分名清肺散大抵皆取其酸澀收斂肺氣耗散之功耳

瑞香科

瑞香 瑞香屬中國原產變種甚多常綠小灌木有毒高至四五

尺葉長橢圓形質厚有光澤冬月葉間攢出花蕾至春分時開

放團繖花序花有合萼四裂大四五分內面白色外面紅紫色

頗美麗芳香亦盛又有白花者香氣更烈此植物供觀賞用其

樹皮之纖維供製紙之原料格古論云瑞香高者三四尺有數

治急喉風



種有枇杷葉者、楊梅葉者、柯葉者、毬子者、欒枝者、惟欒枝者、花紫香烈、枇杷葉結子、其始出於廬山、宋時人家栽之、始著名、欒枝者、其節彎曲、如斷折之狀也、其根綿軟而香、

效用 時珍根甘鹹無毒、主治急喉風、用白花者研灌之、

莨花 雁皮屬、自生於山地、落葉小灌木、幹高三四尺、枝葉俱

對生、形似雁皮而小、葉橢圓形或卵形、葉端尖、全邊、長六七分

至寸許、十月間、枝梢分叉著花、黃色、呈筒狀、長二分許、樹皮供

製紙原料、亦與雁皮同、李時珍曰、莨者饒也、其花繁饒也、

效用 本草經味苦寒、有毒、主治傷寒、溫瘧、下十二水、破積聚、

欬逆上氣
喉鳴咽腫

藥用植物圖考 卷二



大聖瘧疾清血... 寒熱邪氣利水道 甄權治欬
逆上氣喉中腫滿 疰氣蠱毒 瘕
癖氣塊
芫花 瑞香屬 自生於山野 落
葉灌木 高至三四尺 葉小 橢圓
形 全邊 春日先花後葉 花冠筒
狀 上部裂為四片 呈紫色
效用 本草經味辛溫 主欬逆
上氣 喉鳴咽腫 短氣 蠱毒 鬼瘧
疰 痲毒 殺蟲魚 別錄苦微
溫 有小毒 治心腹脹滿 去水氣

寒痰涕唾如膠通利血脈惡風痺濕一切毒風四肢攣急不能
行步

安石榴科

安石榴 俗名石榴

安石榴屬栽培於園圃落葉大灌木高至



八九尺至丈餘葉對生或散生
葉面平滑長橢圓形或倒卵形
花大萼赤色花瓣深紅色子房
下位有橫室果實大球狀上部
存萼熟則裂開不整齊現出種
子其種子有紅肉或白肉味分

甘酸二種可供食用

效用 根皮為去蟲藥此植物全體有收斂性其野樹之果皮

治泄瀉久赤白痢

有重收斂性如泄瀉與久赤白痢等服之能獲效 附石榴果

皮煮水方石榴皮一兩汽水二十兩右入鍋熬至一半濾渣為療治白帶白濁每服半兩乃至一兩

千屈菜科

拘那花 紫薇屬自生於山野落葉灌木葉互生大橢圓形而尖有微毛夏開大紅花一枝數十苞繁如紫薇花瓣有鋸齒至

敗毒散茶



秋深有之花葉莖俱與紫薇畧同惟色淡紅叢生小科高不過二三尺此異點耳山中小兒取其花苞食之味淡微苦有清香故名苞飯花

效用 民間治療用為敗毒

散於之藥

仙人掌科

仙人掌 一名霸王樹

有刺長尺許幅二三寸互相層疊至高丈餘夏月開黃赤複瓣



花實之形色似蜜果外面多毛刺熟則可食此植物本產於氣候乾燥雨露稀少之地欲減少蒸發水分之量故葉變刺而莖肥厚貯蓄多量水分與養料且含

葉綠質能代葉之功用


效用 嶺南雜記仙人掌人家種於田畔以止牛踐種於牆頭亦辟火災無枝葉青嫩而扁厚有刺每層有數枝杈柯而生絕

無可觀其汁入目使人失明

金縷梅科

蘇合香

楓屬生於小亞細亞落葉喬木葉互生掌狀分裂葉



柄長花小單性有許多花集生如頭狀雌花與雄花同株自此植物之樹皮所採之樹脂稱為蘇合香用治疥癬李時珍曰按寰宇志云蘇合香出安南三佛齊諸番國樹生膏可為藥以濃而無滓者為上

治疥癬

治癩瘡去三蟲

效用 別錄甘溫無毒治癩瘡去三蟲除邪令人無夢魘久服

通神明輕身長年

楓 楓屬生於山野落葉喬木幹高二三丈葉掌狀三裂與槭

藥用植物圖考 卷二

樹略相類，緣邊有細鋸齒。秋季變紅色，頗美觀。春月抽新葉而



生雌雄花，呈黃褐色，聚集如頭狀。有總苞，果實圓球形，有軟刺。此樹皮所流出之樹脂，可以代蘇合香之用。

效用 楓果辟瘴，卻瘟明目，除濕。

治水腫脹及癩

舒經絡，拘攣，周身痺痛，手脚及腰痛，焚之，嗅其烟氣，皆愈。熏衣被，可除蚤。趙恕軒云：楓果去外刺皮，肉圓如蜂窠，即路路通。其性大能通十二經穴，故救生苦海。治水腫脹，用之，以其能搜逐伏水也。

桃金娘科

治癩楓種十個，燒存性，白硫五釐共末，香油搽上，即愈。

丁香

產於熱帶地方，常綠木本，高至二十尺餘，葉對生，長橢

治齒痛

圓形而尖全邊花常聚生於枝頂花瓣淡紅色此植物名見開



之調味藥又將花芽蒸餾之製揮發油謂之丁香油用以治齒

痛

有加利一名按樹

有加利屬澳洲東南部原產常綠喬木高至三

百尺許葉有小點卵形或披針形全邊花生於上部之葉腋每
葉腋生一花雄蕊甚多此植物生長頗速其吸收地中之水分

實本草又有丁子香雞舌青等
名陳藏器曰雞舌香與丁香同
種花實叢生其中心最大者為
雞舌擊破有順理而解為兩向
如雞舌故名乃是母丁香是也
效用 此植物之花芽為芳香

治瘧疾

驅蟲藥
奮劑及

為殺菌劑及香水之原料



亦甚多，能使富於病原之濕地乾燥，而變為適於健康之地，故暖國往往廣栽之。


效用 此植物之樹皮及葉，可為瘧疾之解熱劑，或蒸餾其生鮮之葉，採取揮發油，用

加耶布的 產於東印度及馬來地方，常綠樹本，高至十五尺許，葉互生，披針形，花白色，穗狀花序，效用 此植物之新葉及枝蒸餾之，其所得之油，稱為加耶布的油。

行血養血
明目

用於興奮藥及驅蟲藥
桃金娘

桃金娘屬產於暖地常綠灌木葉對生橢圓形有三
大脈下面密生細毛其質厚夏
月枝梢葉腋出小梗開花常自
一花至三花花瓣五淡紅色雄
蕊甚多下生子房萼亦密生毛
此植物供觀賞冬月宜養於溫



室中

效用 花行血 子味甘入脾養血明目