


聖王濟總錄

百卒

庫文閣内			
三	〇		
内閣文庫			
番號	漢	12609	
冊數	200(158)		
函號	300	212	



大學東
校典藉
局之印



大德重校聖濟總錄卷第一百六十

產後門

產後血運

產後語言妄亂

產後惡露不下



總錄一百六十

或於惡露不下

或於血脈

或於諸言安屬

或於門

大醫正對聖術醫經卷第一百六十

產後統論

論曰凡產婦胞胎既辨無問是男是女或有欲男得女
 欲女得男者知之則不足致生佗病其惡血下少者即
 與滑血湯惡血下多者即與和氣湯劑未得飲酒恐引
 惡血流散四肢而發昏冒也又不欲便睡當候氣血調
 定須臾立膝仰臥高枕牀頭厚鋪衲褥密塞四壁無引
 隙風時用醞醋一器就帳內用炭火淬之以壓血運又
 時令人以煖手從心上捍至臍下以逐敗血三日內只
 食白粥間服滑血和氣之劑三日後時飲少醇酒并食
 軟飯旬日以後漸可滋味或以醋煮雞卵為能破血然

食之日久奪人顏色一月之內慎不可出房縱步及女
 工之勞百日之內慎無犯房室及諸飲食忌慎之類又
 戒喜怒憂悲愁恐致疾患凡產婦一月之內寢臥常
 須覆衣被縱值暑月亦不得露身體尤避風冷濕蔭之
 氣若沐浴又須出三月外縱復不能依此亦須六十日
 後方可沐浴揚氏曰凡言滿月者謂滿三月非三十日
 也

論曰產後血運之順不順多寡皆致運悶者血隨氣行血多
 者氣虛血少者氣逆故也其候日旋轉精神昏憤甚者

沉黙不知人治法虛弱者宜調氣而益血氣逆者宜調
 氣而下血則思過半矣

治產後惡血下少氣逆頭目旋運眼花心悶頭重不舉

當歸湯方

當歸

洗切

芎藭

去皮尖

大黃

剉

桂皮

芍藥

牡丹皮

各半

右七味麤搗篩分作三劑每劑用水五盞生薑五片

棗五枚擘同煎取三盞去滓時服一盞放溫服

治產後惡血下多氣虛頭目旋運沉沉黙黙不省人事

調氣益血陳橘皮湯方

陳橘皮去白

白朮切

人參

甘草炙

黃耆剉

酸石榴皮洗切

熟乾地黄各半兩

右七味麤擣篩分作三劑每劑用水五盞生薑五片

棗五枚擘同煎至取三盞去滓時服一盞稍熱服

治產後敗血不盡衝心迷悶旋運不語當歸湯方

當歸切炒

芎藭

芍藥

桂皮去麤皮

生乾地黄微炒各壹分

牛膝去苗酒浸切焙

獨活去蘆頭

劉寄奴各半兩

治產後敗血不盡衝心迷悶旋運不語當歸湯方

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞入生薑五片煎

至七分去滓溫服不拘時候

治產後敗血不下上衝心運腹痛璫瑁散方

璫瑁銚分

蒲黃

琥珀別研如粉

好墨

牡丹去心各半兩

赤龍鱗燒灰即鯉魚皮也

芎藭

延胡索

當歸微炙各壹分

右九味擣羅爲散每服二錢匕用煖生薑酒調下淡

醋湯亦得不拘時服

治產後血運悶絕唇口青色不省覺者宜先用生雞子

清一枚打勻灌入口卽定却服荷葉湯方

荷葉帶染 蘇枋木剉碎 牛膝去苗切焙

芍藥 延胡索各半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水酒共一盞煎至六分去滓溫服如運甚不省拗開口灌之

治產後血運悶絕丹參湯方

丹參去蘆頭 芍藥 甘草炙令赤各半兩

蜜壹兩 生薑汁合參 生地黄汁壹盞

右六味除地黄蜜生薑汁外麤搗篩每五錢匕以水一盞煎至六分去滓入地黄汁一合蜜一匙頭生薑汁半合更煎令沸溫分三服

治產後惡血結聚血氣衝心運悶垂死敗醬湯方

敗醬一升 羌活去蘆頭 當歸微炙切

芍藥 芎藭 瞿麥用穗子各壹兩

枳殼去瓢麩炒黃 桂去麤皮各參分 桃人湯浸去皮尖雙人麩炒黃

色參拾枚

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓下馬牙消末半錢匕更煎數沸溫服空心相次再服利三二行惡血下為効

治產後血上衝心運悶腹脇疔痛不可忍惡血不下或成塊者可服活血冬瓜子湯方

冬瓜子微炒別研桃人湯浸去皮尖麩炒

牡丹去心芒消兩半大黃剉碎炒令

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服早晨日晚各一如口噤拗口灌之必効

治產後血運延胡索湯方

延胡索 芍藥各壹兩 牛膝去

當歸焙切 人參各壹兩半 生乾地黄兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

入白蜜一匕頭更煎令沸溫服相次再服

治產後血運無問冷熱悉主之琥珀煎方

琥珀壹兩別研末 生地黄汁壹盞 生薑汁壹盞

右三味先取地黃生薑汁二味相和緩火煎去一半

別下無灰酒一盞又煎候如稀餈方取琥珀末入煎

中熟攪置於瓷器中每空心取半匙溫酒調服

治產後血運心煩悶亂恍惚如見鬼神生益母草飲方

生益母草汁半盞如無以土瓜根汁代 生地黄汁半盞

生藕汁半盞 雞子白枚 童子小便半盞

右五味先將汁四味相和煎令沸次下雞子白攪勻

分作三服

治產後血下少運悶嘔逆紅藍花湯方

紅藍花

蘇枋木

各半兩到

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓

溫服相次再服

治產後血運煩悶地黃飲方

生地黃汁

童子小便

右二味各半盞相和煎七分溫服相次更煎服之

治產後惡血上掩心如見神鬼欲死生薑飲方

生薑汁

生地黃汁

右二味各取汁半盞相和一處煎取七分後下酒少

許相和溫服之

治產後血運迷悶不省人事脣口冷面青醋雞子方

醖醋

生雞子

右二味先以醋半盞煎數沸打破雞子一枚投於醋

中熟攪令勻頓服之立効

治產後血運心悶不識人言語錯亂少氣芍藥湯方

芍藥

生乾地黃

甘草

炙令赤各壹兩

丹參

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一分切碎

同煎至七分去滓下白蜜少許再煎令沸溫服相次

更服

治產後血運欲絕當歸飲方

當歸微炙壹兩

鬼箭羽兩貳

右二味麤搗篩每服三錢匕酒一盞煎至六分去滓溫服相次再服

治產後血運不識人延胡索散方

延胡索

劉寄奴

當歸微炙各壹兩

右三味搗羅為散以溫酒調三錢匕服之須臾更服

治產後血運絕不識人芍藥散方

芍藥半兩搗末

亂髮壹分燒灰

右二味相和研令勻每服二錢匕以熱酒調溫服之

須臾再服

治產後血運氣乘虛上衝心悶絕紅藍花湯方

紅藍花

生乾地黄

訶梨勒皮

煨黃色伍枚

右三味麤搗篩每服二錢匕以水酒共一盞煎至七分去滓溫服如人行三二里再服

治產後血運煩悶益母草湯方

益母草

乾者壹兩

藕節

乾者

人參各半兩

右三味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服

治產後血塊攻築頭目昏運桂心散方

桂皮去麤皮

薑黃各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕以炒生薑酒調下不

拘時服

治血運心中煩悶兼腹痛羚羊角散方

羚羊角燒灰

枳實去穢炒黃

芍藥壹兩

右三味搗羅為散煎酒令溫調一錢匕空心日晚各

一服童子小便及湯調下亦得

治產後血運天麻湯方

天麻

訶梨勒炮過用皮

木香各壹兩

芸薹子半兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服相次再服

治產後血運及腹痛沒藥酒方

沒藥半兩

右一味用酒三盞將沒藥磨盡每服一盞煎沸溫服

治產後血運心腹鞭乍寒乍熱續斷湯方

續斷兩

右一味麤搗篩每服二錢匕以水一盞煎至七分去

滓溫服

治產後血運心悶氣絕地黃飲方

生地黄肥嫩者

右一味搗取自然汁每服半盞煎令沸服之未効再

治產後血運不識人狂言亂語蓮葉飲方

蓮葉參箇炙

甘草炙貳兩剉生蜜壹匙

生地黄汁合參蒲黃貳兩湯成下

右五味以前二味用水五盞煎取兩盞去滓下蜜并

地黃汁再煎三五沸入蒲黃攪勻分溫五服

又方

右以童子小便磨黃狗膽灌之最妙

治婦人產後血運九竅血出欲死者芸臺散方

芸臺子

當歸剉焙各壹兩

芍藥

桂去麤皮各半兩

右四味擣羅為細散每服三錢匕以酒并童子小便

各半盞調灌下立差

治產後血運煩悶不識人狂亂紅雪湯方

紅雪參分

赤馬通參塊

童子小便伍合

生地黄汁壹合

右四味以小便地黃汁浸馬通絞取汁下紅雪煎令

消分溫二服

治產後下血過多氣虛血運衝心悶亂不知人事地黃

散方

生乾地黃焙切

白芷

延胡索

白膠炙

赤芍藥

桂去麤皮

白朮

劉寄奴

龜甲醋炙

丹參

當歸切焙各壹兩

荷葉貳片

右一十二味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下不拘

時服

治產後敗血衝心運悶及腹痛麝香散方

麝香研半兩

丹砂研壹兩

烏鴉毛臘月者燒灰研半兩

墨研半挺

蘇枋木剉壹兩半

豬胞子燒為灰伍枚

鯉魚鱗燒灰肆兩

油頭髮燒灰貳兩

右八味除前四味外搗羅為散和勻每服二錢匕煖

酒調下

治產後血運悶亂恍惚不語方

生益母草汁壹合

地黃汁貳合

童子小便壹合

紅藍花

紫葛細剉各半兩

右五味同煎五七沸去滓溫分服

又方

童子小便伍 地黄汁貳 當歸切焙搗末半兩

赤馬通柴塊

右四味用小便地黄汁浸馬通絞去滓調下當歸末分三服

治產後血運腹悶氣喘急欲死蘇枋飲方

蘇枋木末貳兩 荷葉炙壹枚 芍藥壹兩半

桂去麤皮壹兩 鱉甲去裙襴醋炙壹兩半

右五味剉如麻豆大以水五盞藕汁一合同煎取二盞去滓入紅雪一兩分溫二服粥食前如人行三五里再服

治產後百病血運劉寄奴湯方

劉寄奴 甘草

右二味等分剉如麻豆大每服五錢匕先以水二盞入藥煎至一盞再入酒一盞再煎至一盞去滓溫服

治產後血運心煩悶紅藍花湯方

紅藍花貳兩 紫葛壹兩 芍藥壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓再入生地黃汁半合更煎六七沸溫服不拘時

治產後血運惡血不行腹脹滿迷悶方

赤馬通伍塊 童子小便 酒各伍合

右三味和攪馬通調絞取汁熱煖分溫服之

治產後惡血不下血運不識人紅藍花散方

紅藍花等分 荷葉蒂等分

右二味擣羅為散每服二錢匕用生藕汁調下

治產後血運悶及惡血不下牛膝散方

牛膝去苗酒浸切焙 當歸切 芎藭各二兩

劉寄奴青兩半 芍藥一兩 桂去麤皮

蒲黃各壹兩 紅藍花各壹兩 琥珀研

生薑切炒乾各半兩

右一十味擣羅為散每服三錢匕溫酒調下或以水

一盞煎七分溫服亦得

治產後血運眼花黑暗不見物黑神散方

赤龍鱗炒 亂髮燒灰 烏賊魚骨燒灰各參分

桂去麤皮 乾薑炮 延胡索

牡丹皮 芍藥 訶梨勒皮

芎藭各半兩 當歸切 生乾地黄焙各壹兩

水蛭炒壹分

右一十三味擣羅為散每服二錢匕炒生薑酒調下

或炒生薑黑豆小便調亦得

治產後血運血塊及傷折內損血瘀大黃散方

羊脛炭燒赤酒淬拾徧伍兩 大黃童子小便浸

日定濕紙裹 巴豆去殼漿水煮熟

半兩錢燒赤醋淬為粉新水淘

右四味搗研為散研令勻每服半錢匕當歸一分童

子小便煎濃稍溫調下產後血運當逐血下口噤者

幹開灌下候識人更一服累經生產有血積堅癖血

塊及敗血風勞寒熱諸疾當下如爛肝片永無他疾

墜擊內損當歸酒下一字

治產後血氣運悶或身體腫滿發狂瀉痢寒熱等疾惟

瀉而喘者難差黑桂散方

黑豆炒熟去皮壹兩 肉桂去麤皮 當歸酒浸切焙

芍藥 乾薑炮 生乾地黄焙

甘草炙 蒲黃紙上炒各壹兩

右八味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三服

治產後血運方

右以童子小便濃磨好墨量多少溫服

又方以童子小便煎黃一兩

又右預浸紅藍花汁一升煎十數沸頻服之

又方以童子小便煎黃一兩

又取極醞醋和所產血一棗大服之并喫面

又方 蘇合香 檀香 沉香 乳香 沒藥 各一兩 大風之疾 服之 亦妙
又右以童子小便磨安息香服亦妙

又方 蘇合香 檀香 沉香 乳香 沒藥 各一兩 大風之疾 服之 亦妙
又右以童子小便磨安息香服亦妙

氣 產後語言妄亂
論曰 愁憂思慮則傷心 心虛故邪從之 新產之人 內亡
津液而血虛 志弱使人精神昏亂 語言錯謬 恍惚不寧
甚者 變狂癲之證 治宜補血益心安神 定志則病自愈
治產後血氣虛精神不安 言語錯謬 茯苓丸方

白茯苓 去黑皮 壹兩半 澤瀉 人參 各壹兩
桂皮 去麤 芎藭 兩各壹兩 麥門冬 去心 焙 兩半
當歸 焙切 熟乾地黄 焙各 兩各壹兩 遠志 去心 壹兩
右九味 搗羅為末 鍊蜜丸 梧桐子大 每服二十九煎
人參湯下 不拘時服

治產後血虛受邪 語言失度 精神恍惚 茯苓神湯方
茯苓 去木 壹兩 人參 龍齒 黃耆 剉
琥珀 赤芍藥

牛膝 酒浸切 焙 生乾地黄 壹兩 桂 去麤皮 兩
右九味 麤搗篩 每服三錢 匕水一盞 煎取七分 去滓

溫服不拘時

治產後血虛狂語臥起不安妄有所見人參丸方

人參

茯神去木各壹兩

枳殼去瓢麩炒壹兩半

羚羊角鎊炒

芎藭各壹兩

檳榔剉參

桃人湯去皮尖雙人炒參拾枚

遠志去心

桂去麤皮

木香

白芷各半兩

訶梨勒皮壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十丸煎人參湯下空心日午夜臥

治產後心虛言語謬誤恍惚不安麥門冬湯方

麥門冬去心焙

貳兩

白茯苓去黑皮

壹兩半

赤芍藥

當歸切

人參

甘草炙剉各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治產後心氣不足血邪狂言眠臥不安茯苓湯方

白茯苓去黑皮

壹兩半

甘草炙剉

壹兩

遠志去心

半兩

白薇

龍齒研各壹兩

熟乾地黄焙壹兩半

人參

防風去叉各壹兩

獨活去蘆頭半兩

右九味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治產後血虛心氣不足言語謬妄眠臥不安羊腎湯方

羊腎壹對去脂細切以水參升煎至貳升澄清 遠志去心半兩

芍藥剉壹兩 黃芩去黑心 防風去叉

白茯苓去黑皮 人參 獨活去蘆頭

甘草炙剉各半兩 熟乾地黄焙壹兩

右一十味除腎外麤擣篩每服三錢匕用腎汁一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治產後血虛或因驚恐神志不寧言語錯謬妄有所見

遠志九方

遠志去心 甘草炙 白茯苓去黑皮

桂去麤皮 山芋 麥門冬去心焙

人參 當歸切焙 白朮

澤瀉 獨活去蘆頭 阿膠炙令燥

菖蒲各壹兩半 乾薑炮壹兩 熟乾地黄焙貳兩

右一十五味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九煎人參湯下空心日午夜臥服

治產後血氣不調言語謬亂當歸湯方

當歸切焙 人參 芍藥

酸棗人皮去 黃芩去黑心 白鮮皮

甘草炙剉各壹兩

右七味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後血虛亂語心志不寧茯神湯方

茯神去木 貳兩

人參

芍藥

剉各壹兩半

甘草炙 剉

當歸切 焙

桂

去麤皮 各壹兩

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑二片棗二枚擘破煎至七分去滓溫服不拘時

治產後血邪語言妄亂麝香散方

麝香

別研 壹分

烏鴉燒 灰

虎糞

燒 灰 各 半兩

右三味搗羅為散研勻每服二錢匕溫酒調下

治產後心虛風邪所搏語言妄亂遠志湯方

遠志

去心

赤芍藥

黃芩

去黑 心

白茯苓

去黑 皮

人參

防風

去

獨活

去蘆 頭

甘草

炙 各 壹兩

熟乾地黃

焙 貳 兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓不拘時溫服

產後惡露不下

論曰產後惡露不下者以藏府宿挾虛冷或臨產受寒氣使經絡凝澁氣道不利故惡血凝積而不下也日久為結癖疝瘕之疾令人心腹脹滿疼痛寒熱之證生焉

治產後惡露不下人參湯方

人參半兩 黃芩壹兩 大黃壹兩 當歸壹兩 牡丹皮壹兩

甘草壹兩 芍藥壹兩 熟乾地黄壹兩

吳茱萸壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服日四五服

治產後惡露不快臍腹連腰疼痛煩躁汗出四物湯方

當歸壹兩 芍藥壹兩 熟乾地黄壹兩

芍藥各半兩

右四味搗為麤末每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服

治產後來往寒熱惡露不下芫胡湯方

芫胡壹兩 桃人壹兩

當歸壹兩 黃耆壹兩 芍藥壹兩

吳茱萸壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎

至六分去滓溫服

治產後惡露不下或下不盡腹痛不除小腹急痛澤蘭

湯方

澤蘭葉壹兩 甘草壹兩 當歸壹兩

芍藥貳兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗二枚擘生地黃一分切同煎至七分去滓溫服早晨日晚各一服

治產後腹中滿痛血露不盡黃芩湯方

黃芩去黑心

芍藥

赤茯苓去黑皮

大黃剉炒

熟乾地黄焙各兩厚朴去麤皮生薑汁炙

乾薑炮裂

桂去麤皮各兩蟲蟲去翅足微炒

甘草炙

桃人湯浸去皮尖雙人炒令黃色各半兩

枳實去麤炒

木各壹兩半

芒消壹兩

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水酒共一盞煎至七分去滓溫服

治產後臍腹疼餘血未盡不進食地黃湯方

芍藥

甘草炙各壹兩

丹參壹兩半

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓人地黃汁一合蜜半合生薑汁一合更煎數沸空腹

溫服

治產後惡血所下不盡心腹疼痛芎藭湯方

芎藭壹兩半

大黃剉炒貳兩

芍藥壹兩半

黃芩去黑心壹兩

桂去麤皮壹兩

甘草炙兩

當歸切焙

熟乾地黄焙壹兩

桃人湯浸去皮尖雙入微炒令黃色半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空腹溫服

治產後惡露不下攻刺心腹疼痛乾漆丸方

乾漆搗碎炒烟出

五靈脂木一

沒藥研

牡丹皮去心

陳麴炒各半兩

菴藺子

延胡索去麤皮

當歸切焙各壹兩

右九味搗研為末醋煮麩糊丸如梧桐子大不計時

候煎生薑醋湯下二十九溫酒亦可

治產後惡血不盡腹內堅痛不可忍當歸湯方

當歸切焙壹兩半

芍藥壹兩半

桂去麤皮壹兩

桃人湯浸去皮尖雙入炒黃肆拾玖枚

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治產後惡露不下腹痛臍下堅鞭沒藥丸方

沒藥研

當歸切焙

劉寄奴

延胡索

桃人去皮尖雙入麩炒令黃色參分

乾漆搗碎炒烟出

騏驎竭

大黃剉炒各壹兩

桂皮去麤皮

烏藥剉

赤芍藥各半兩

右一十一味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二
十九丸溫酒下不拘時候

治產後腹中惡血不除苦身強痛牡丹飲方

牡丹皮壹兩 大黃剉炒 壹兩 桂去麤皮 壹兩

桃人湯浸去皮尖炒 令黃色肆拾枚

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空腹溫服

治產後惡露不下氣攻心腹煩悶刺痛琥珀湯方

琥珀 薑黃 牛膝酒浸 切焙

虎杖 牡丹皮各半 兩 當歸切焙

生乾地黃焙 桂去麤皮 桃人湯浸去皮尖 雙入麩炒各

參 分 大黃剉焙 壹兩 蟲去翅足炒 黃壹分

芒消壹兩

右一十二味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎取七分

去滓溫服

治產後三日外惡露不多下心煩悶麥門冬飲方

生麥門冬汁合 貳 生藕汁合 參 生薑汁合 半

生地黃汁合 參 益母草汁合 參 白蜜半 壹

右六味相和煎沸放溫每服半盞如覺性寒即入清

酒三合溫煖服之

治產後惡露不下腹內疴痛牡丹皮湯方

牡丹皮

去心

桂皮

牛膝

酒浸切焙各參分

桃人去皮尖雙

生乾地黄

焙

蓬莪茂

剉

檳榔

剉

當歸

切焙各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切

煎至七分去滓稍熱服不計時候

治產後惡露不盡除諸痛補不足黃耆湯方

黃耆

剉半兩

熟乾地黄

剉壹兩

芎藭

半兩

桂

去麤皮半兩

人參

參分

防風

去義壹分

當歸

切焙半兩

白茯苓

去黑皮

細辛

去苗葉

芍藥

甘草

炙各壹分

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓溫服不拘時服

治產後惡露不盡當歸湯方

當歸

切焙參兩

桂

去麤皮貳兩

荷葉

帶參葉

右三味麤搗篩每服三錢匕水半盞酒一盞入生薑

三片同煎至七分去滓溫服早晨日晚各一服

治產後惡露不下結塊衝心運悶垂死敗醬飲方

敗醬

羌活

去蘆頭

枳殼

去瓢麩炒黃各壹兩

桂

去麤皮參分

當歸

切焙

芍藥

芎藭

瞿麥穗各壹兩

馬牙消兩半

桃人

湯浸去皮尖雙人麩炒黃色貳拾伍枚

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服

治產後惡露未盡氣血攻心腹痛心胸有熱豉飲方

豉炒乾兩半

羊肉

壹斤去脂水捌盞煮取肉汁伍盞澄清

當歸切焙兩半

桂去麤皮兩半

黃芩去黑心參分

麥門冬

去心微分莎草根兩半

生乾地黄焙壹兩半

右八味除肉外麤搗篩每服三錢匕生薑三片葱白

一莖切肉汁一盞半同煎至七分去滓溫服

治產後月內惡露不下當歸飲方

當歸切焙

牛膝酒浸切焙

蘇枋木剉

桂去麤皮

牡丹皮剉

芍藥

芎藭

艾葉微炒

生乾地黄剉

延胡索

桃人

湯浸去皮尖雙人麩炒黃各半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕生薑一棗大拍破

水半盞酒半盞同煎至七分去滓溫服不拘時

治產後惡血不盡攻心乏力腹痛脹滿頭痛蒲黃飲方

蒲黃微炒壹兩半

芒消研參分

芎藭兩半

桂去麤皮兩半

鬼箭兩半

生乾地黄焙貳兩

桃人湯浸去皮尖雙人麩炒黃色貳拾枚

右七味麤搗篩每服三錢匕入棗二枚擘水一盞同煎至七分去滓溫服

治產後惡露不下或下未盡有熱藕汁飲方

藕汁半盞 生地黄汁壹盞 生薑參分

酒壹盞

右四味先煎地黄汁令沸次下藕汁生薑汁與酒更煎三五沸放溫時時飲之

治產後有熱惡露未盡補虛調氣生地黄飲方

生地黄汁半大盞 桂去麤皮半兩 黃耆剉參分

麥門冬去心微炒參分 當歸切焙半兩 甘草炙半兩

右六味除地黄外麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓入地黄汁一合更煎數沸溫服

治產後惡露未盡有冷氣腹痛兼補虛羸羊肉湯方

羊肉壹斤去脂切碎水捌盞煮取肉汁肆伍盞澄令清 桂去麤皮參分 當歸切焙參分 吳茱萸微炒黃耆剉半兩 芎藭兩

右六味除肉外麤搗篩每服三錢匕肉汁一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服

治產後惡露未盡血氣疔痛四肢蒸熱蜀椒飲方

蜀椒炒去目 芍藥切 當歸切 生薑切 羊肉切 水一斗

煎至七分去滓溫服

治產後惡露未盡血氣疔痛四肢蒸熱蜀椒飲方

蜀椒炒去目 芍藥切 當歸切 生薑切 羊肉切 水一斗

煎至七分去滓溫服

治產後惡露未盡血氣疔痛四肢蒸熱蜀椒飲方

蜀椒炒去目 芍藥切 當歸切 生薑切 羊肉切 水一斗

煎至七分去滓溫服

治產後惡露未盡血氣疔痛四肢蒸熱蜀椒飲方

蜀椒炒去目 芍藥切 當歸切 生薑切 羊肉切 水一斗

煎至七分去滓溫服

蜀椒去目及閉口者炒出汗壹分

羊肉壹斤去脂切碎水參升煮

取肉汁壹升當歸切焙半兩

桂去麤皮半兩

生乾地黄兩豉微炒半兩

右六味除肉外麤搗篩每服三錢匕生薑三片葱白

一莖切取肉汁一盞半煎至七分去滓溫服

治產後大腸秘惡露不下補虛羊肉飲方

羊肉壹升去脂切碎水參升煮肉汁壹升半澄令清白茯苓去黑皮參分

黃耆剉參分當歸切焙半兩桂去麤皮半兩

麥門冬去心微炒參分甘草炙半兩大黃剉炒半兩

右八味除肉外麤搗篩每服三錢匕以肉汁一盞半

煎至七分去滓溫服

治產後餘血不盡逆搶心胸手足逆冷脣乾腹脹短氣

甘草湯方

甘草炙芍藥 桂去麤皮

大黃剉炒阿膠炙燥別搗末各壹兩

右五味除阿膠外麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎

至七分去滓下阿膠末一錢溫服空心日晚各一服

下惡物即差

治產後半月餘惡血不盡腹痛寒熱嘔吐不能食芍藥

湯方

赤芍藥

分參

白茅根

兩半

瞿麥穗

壹分

桃人

湯浸去皮尖
雙人柴枚炒

知母

兩焙半

桂

去麤皮
半兩

朴消

當歸

剉焙各
壹分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓再入生地黄汁半合復煎至一盞溫服日三

治產後惡露不盡七八日腹痛兩脇妨滿兼兒枕痛劉

寄奴湯方

劉寄奴

兩貳

桔梗

炒參
兩

當歸

剉焙
兩貳

生薑

切焙
壹兩

桂

去麤皮
兩貳

陳橘皮

湯去白焙
壹兩半

芍藥

兩參

赤茯苓

去黑皮
參兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓入延胡索末半錢匕攪勻溫服日三

治產後三四日惡露下嘔吐不食身體壯熱芍藥湯方

芍藥

兩參

知母

焙貳
兩

當歸

剉焙
壹兩

紅藍花

兩貳

荷葉蒂

貳枚
炙

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片

煎至八分去滓再入蒲黃一錢匕生地黄汁半合煎

六七沸去滓空腹溫服相次再服之

治產後惡露不盡臍腹疔痛澤蘭湯方

澤蘭

壹兩

當歸

切焙
兩貳

生地黄

切焙
兩貳

甘草炙判

芍藥貳兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水二盞入棗三枚擘破煎至一盞去滓溫服

治產後惡露不盡臍腹疔痛壯熱增寒咽乾煩渴劉寄

奴湯方

劉寄奴兩

知母焙各壹兩

當歸焙切

鬼箭羽各貳兩

桃人去皮尖雙人炒壹兩半

右五味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服空心食前

治產後三日或七日內敗血不散蒲黃當歸散方

蒲黃

當歸焙切

芍藥

澤蘭葉

延胡索

白蕪荑炒

桂去麤皮等分

右七味搗羅為細散每服二錢匕四日外熱酒調下四日內用童子小便調下

