

AUG 15, 1944

434

華北醫藥月報

褚氏謹



肺炎
化學療法劑

Sulfapyridin 劑之白眉

「亞濟普羅」對於各型肺炎 實靈驗無比 開始投與後 皆於24小時以內 得解熱者最多 其理學的所見消失所要日數 比於對照例群 均天得短縮 概於第1星期間得消失者90%

注射	10%, 30%	各3cc	B管	10管	50管
粉劑	25g	100g		500g	
片劑	(0.2)	30片	50片	100片	

亞野製藥株式會社
天津出張所·興亞第一區西宮島街一丁目五·三

亞野牌 亞濟普羅

中華民國三十三年八月發行

八月號

第八卷 第八期

天然維他命D.A製劑

(聖魚肝油精)



海力博濃

本品每克中含...
三種維他命...
二種維他命...

主治

營養不足
精力衰退
心血虧耗
呼吸器病
眼眩乾燥
癆瘵易生
時發夜盲
生齒遲慢

包裝：五〇西
(藥房均售)

HALIBUTOL




贈即索函獻文錄巨細詳

位本

果効

種老品實用師區有另



特效淋葉發明問世
榮獲諾貝爾醫學賞

為醫學界最大成功
願全國醫師多推獎

治淋藥

特效藥

1 高杜馬克博士
發現而受賞者
2 利尿止痛殺菌
3 利尿靈驗無比
4 男淋女濁三五
日內迅速斷根
5 其他化膿性諸
疾患亦最靈驗
全內服藥片最安
全毫無副作用

包裝：一四片
(藥房均售)

G-U-CIDE

天津柳行洋行
天津柳行洋行

NORD-CHINA MEDIZINISCHE MONATSSCHRIFT

BAND 3. NR. 8 (AUGUST) 1944

華北醫藥月報 第三卷第八期目錄

衛生與宣傳.....本 社(一三)

華北之虎列拉及預防法.....大須賀武(四)

老人性關節病.....楊群倫(九)

精神病與神經病講座(二).....楊群倫(一三)

醫藥國播管案.....本 社(一七)

衛生與宣傳

國之行政機關，當然係以民衆為對象，對於民衆之宣傳，應為其行政之對象，中央之宣傳機關，即以民衆為對象之衛生教育，生業及華北之有醫藥衛生委員會，多不願及。

吾國之衛生行政，推行至極，政宜伊始，各省市長以及全體，困於行政，民衆之缺乏衛生常識，職員，均在理與否，精神極其，其最大障礙，故於衛生行政，可謂，據該會表示，今後工作方之光，首重衛生教育之推行，以開導民衆為主，決不，此為不可謂言之不預也。

做執義的會務宣傳，將來以全華，適之吾國衛生行政機關，多，北民衆為對象的廣義衛生宣傳事，忽略此點，所作之，所為終極的業，必有大規模之四週日也。

本社董事

名譽董事長	國民政府 醫學博士
名譽顧問	國民政府外交部長
	朱井清 醫學博士
	北大醫學院名譽教授
董事長	侯鏡汶 醫學博士
	中華民國醫學會會長
	胡適植 華北醫校
	華北防疫委員會常委
	周頌聲 醫學博士
	華北衛生研究所所長
	傅汝勤 醫學博士
	前天津市衛生局局長
	賈向初 醫學博士
	河北省衛生事務局長
	張世庵 醫學博士
	前北京市衛生局局長
	鮑紅清 醫學博士
	北京大學醫學院院長
	劉兆霖 醫學博士
	北大醫學院附屬醫院院長
	馬志道 醫學博士
	北大醫學院教授兼秘書
	姚鴻森 醫學博士
	北京大學醫學院教授
	小川山治 醫學博士
	北大醫學院教授
	沈德 醫學博士
	華北醫藥衛生委員會處長

點心，其氣味，水果，點心即附着「虎烈拉」菌，食此者即染患「虎烈拉」。

（丙）井旁洗滌者「虎烈拉」患者裝便或吐瀉物物件，因洗滌者之手及洗滌之水井中之水，即為「虎烈拉」菌所污染，以該井之水洗手淨面，或洗食器，飲該井之生水，即染患「虎烈拉」。

（丁）「虎烈拉」菌者，因身體健康反較患者更有危險，例如保菌者出廁時，手沾其手，以該物接觸食物，即染患「虎烈拉」菌。食該物者，即可染患「虎烈拉」，故尤以飯館飲食店，或點心舖有「虎烈拉」保菌者時，則更危險，食保菌者出外，即可於電車或公共汽車之扶手，或佈「虎烈拉」菌，而利用該扶手上即附着「虎烈拉」菌，或食手指以共相握食點心，則可染患「虎烈拉」，以上僅陳述主要傳染路徑五項，並藉「虎烈拉」如何傳染，如何延延，充分加以研究。

第四 症狀

（甲）潛伏期 所謂潛伏期者，即指自發菌侵入身體至成爲疾病之期間而言。「虎烈拉」之場合自「虎烈拉」菌由口入內起，連則數小時，遲則二三日即發生病症。

（乙）發熱 在發生病症之前以腹部膨脹時而嘔者居多，此即所謂發熱前，以後即開始下痢及嘔吐。

（丙）下痢 於初之一二次排洩軟便，其後即爲「虎烈拉」特有之米泔汁狀瀉便（適如用米磨成之汁）之下痢，然下痢時，感覺如腸炎或赤痢之腹痛者甚少此雖爲「虎烈拉」之一特徵，然有時亦有如赤痢時之腹痛者，或發便中混有血液者。

（丁）嘔吐 嘔吐時嘔吐，爲「虎烈拉」患者之嘔吐，恰如乳兒飲乳過多時之吐法又不感覺痛苦，此亦「虎烈拉」之一特徵。

（戊）發燒 傳染病以發高熱者居多，然「虎烈拉」患者，則多

在最初稍微發燒，其後反較普通體溫爲低，約在三十四度左右，不過亦有時有發高熱者。

（己）脾部痛之症狀 脾部即俗所謂「硬肚子」處之筋肉，觸之即「轉筋」而感覺其疼。

（庚）其他症狀 因下痢或嘔吐劇烈，身體中水分缺乏，故或口渴，或喉乾，或皮膚失去彈性而多皺紋，或聲音嘶啞，且腹痛小而體弱，口唇或手指成爲紫色即大約三人中死上二人，少可拍的傳染者。

以上述「虎烈拉」之主要症狀，然其中亦有僅下痢，二次即愈之輕微的「虎烈拉」故在「虎烈拉」流行時，應儘爲二次之下痢，決不能不留心，應速請醫師診斷之。

在此處順便一言者，即「虎烈拉」防疫上最應警戒之事有三：一爲在決定爲「虎烈拉」患者時應採取「虎烈拉」菌一事一爲僅下痢二次即愈之輕微患者受醫生診治而動搖「虎烈拉」菌一事一爲「虎烈拉」保菌者散播「虎烈拉」菌一事。

因此在「虎烈拉」防疫上，對於「虎烈拉」患者之早期發現，早顯診斷，及「虎烈拉」保菌者之檢索等事，顯爲必要。

第五 預防方法

茲將預防方法，區別爲一般預防方法與特種預防方法，述之於下：

（甲）一般預防方法，即時常細心注意，勿使「虎烈拉」菌入口，同時而留神勿使胃腸之活動力薄弱，而使其強健之方法也。至於宜如何不使「虎烈拉」菌入口，若充分研變傳染路則幸然可以瞭解，茲願一述之。

（1）勿飲生水冰水。

（2）勿食生肉。 魚類等生物，鍋對勿食

(8) 勿食若蟲落箱之物。
任何熟之菜，倘有若蟲落箱，則極危險，故菜看上須用紗
袋將箱蓋，以免若蟲落箱，且須努力驅除若蟲。

(9) 上廁所及山外歸來時，必洗手，而於飯菜或飲食之前，必仔細洗
手。

次宜如何勿使胃腸之活動力過弱而使其結實。

(1) 切勿狂吃胡吃。

(2) 勿使身體過勞，須有充分睡眠。

(3) 勿飲酒，以免受寒。

(4) 勿食干。

「虎烈拉」流行時，宜長十之說，流傳頗廣，蓋其後食干一
個，即可幫助消化，且「虎烈拉」菌，乃過酸類，即為微菌之菌，

虎標萬金油
虎標頭痛粉
虎標止痛膏
虎標驅風油
虎標止咳露
虎標驅蚊香
虎標驅蟲藥
虎標驅鼠藥
虎標驅蛇藥
虎標驅蠍藥
虎標驅蚊香
虎標驅蟲藥
虎標驅鼠藥
虎標驅蛇藥
虎標驅蠍藥

總發行所 天津法界
電話二局一五五九號
藥房商店 均有代售

故梅干於某種程度上，對於「虎烈拉」菌，有殺菌作用。然現查屬真
梅干，非常困難，故服用強健胃腸之藥，亦為良好之預防方法。

特種預防方法特別預防方法，即「虎烈拉」之預防注射。

「虎烈拉」之預防注射，其注射之處，應於發病者其少，且效果
亦確實，故必須受預防注射。由事北之衛生當局觀之，第一，完全之
飲料水，不易獲得，尤以買水之家庭，若買水者中，雖有一人患病
「虎烈拉」者，或「虎烈拉」保潔者，則極危險，又下層階級之中國人
，亦向上層階級，且與有公共廁所，而無洗手處，便溺後，不洗
手，又竟有將「虎烈拉」之屍體，棄於街上之地方，生活於此種環境
中者，不格外注意，則有患「虎烈拉」之危險，故除時常守一
預防方法，同時受「虎烈拉」之預防注射外，別無他法。「虎烈拉」
之預防注射，雖云效果確實，然注射一次，其效力不維持二年，故於
「虎烈拉」流行期內，注射兩次，即於五六月，注射一次，八九月注射
一次，以注射二次，虎最為完全。

第六，患者發生時之注意。

(1) 「虎烈拉」流行期內，若稍覺胃腸，須立即就醫診治。

(2) 注意患者之便與勿使若蟲落箱吐瀉物上，例如，將石灰水
木炭，煤球兒，白粉，撒撒於便內，以若若蟲落箱，掃子或便器
類之物，則若蟲落箱，以若若蟲落箱而家庭尤須努力驅除若蟲。

(3) 處理患者之便與吐瀉物者須用肥皂，仔細洗手。

(4) 患者使用之食器類，在沸水內泡過後洗淨，最為安全。

(5) 決定為「虎烈拉」患者後，須絕對服醫藥會及衛生機關之
命令，且對於警察官及衛生機關之詢問，切不可虛偽申告，若因病家
之虛偽申告而「虎烈拉」蔓延之例甚多也。

(完)

華康新藥行

(北京西琉璃廠一百五十九號)

各醫藥化學法玻璃調
劑藥名學生航瑞院劑
廠藥成用材新器品方
計械藥品洋藥器品方

興亞製藥廠

本廠教授名藥劑師與名醫
師會同處方配製各種特效良藥
名目繁多不及備載印有出品要
覽函索即寄

廠址：天津特別一區花園路二號
電話八局〇一〇九號
天津法租界華中路三六號
電話三局〇〇五二號

肺癆之救星

一紫河車及脾、肺、
荷爾蒙之製劑 **安肺星** 錠劑

上海天平製藥廠出品

此藥為最新進步之治肺新劑
之荷爾蒙及脾、肺、荷爾蒙之製劑
藥料成此藥以補於肺臟之不足故能專門醫治肺癆
主治：肺癆、肺氣腫、肺萎縮、肺充血、肺出血、肺
包膜：每瓶二百七十片定價洋八元五角小瓶九十片定價
洋三元

華北總經理處 **北方大藥房** 北京西單北大街
各大藥房均有代售 電話西局二三六

北京大華藥房

批發：南洋原料、醫藥器械、化學藥品、地名成藥、玻璃器皿、衛生材料

自製：金治膏、痢疾散、鉅咳散、解毒散、小瀉散、殺虫散

良藥：特製、小瀉散、殺虫散

地址：地安門外南橋頭五十九號
電話北局(4)〇二七二號

北京中華大藥房

運銷各大名廠最新藥品原料
疫苗血清醫療器械衛生材料
附設診療所精理內外各科
樂山馳名各種良藥總發行所

北京店：前門外大街西單北大街
中華大藥房 電話(七)1111
電話(三)20110

老人性關節病

北平衛生行政學院 楊羣倫

一、緒言

以老年關節病為病因的變的而起之關節疾患也。

古羅馬醫家 Malian articularum Senilis 名病之下，因生特別胃
聖骨關節，故 Malian Cases Senile 之疾病在病理學部學上，或他方
臨牀上屬多數之關節，而至一般皆以變形性關節病矣；又，一次慢性
性多發性關節炎亦多發於老年者。

一般皆知關節病發於骨結核同樣為青年期壯年病之疾病，見於高
年者之關節結核在臨牀上常呈異型之經過，此等諸點皆各參考之價值
，故稱曰老人性疾患。

二、變形性關節

從來，亦稱之為特形性變形性關節炎，變形性關節病於關節體
即關節骨端，軟骨端部液膜或關節囊起發後漸行性變，與進
行性變化同時起發者稱之為變形性關節病，因之關節變形，因病變進行
之程度可見高度，特形。

此疾病起於中年，老年者，然亦可見於青年期。本病之經過之經

修正緩慢而長期，對生命無甚大影響，而由病因接近老前起之
點推，故在統計上經例數以中年老年者為多，然於壯年者亦不若小。

男子較女子為多，據 Janicke 之報告則女子以 Kohn 為
治療者為多。

侵犯關節、股、肩、肘、腕、膝、趾關節等之大關節，據 Pavesich 謂以
膝關節為最多，約占四肢關節之九八，肩、肘關節與趾關節同，如
當膝關節之二五，二二，大概多發於右側，尤以肩、肘關節與膝
關節為多。又膝關節症例在年齡雖無大差別，然股、肩、肘關節之
罹患率與年齡共增。

其原因之本報上言之今日尚不一致。Pavesich 區別其原因為一次時
即原發性，其性者為二次者。

由一次性原因發之，於關節全體或一部有先天或後天性損傷或虛
弱之要約，無特別原因老衰現象應關節之生理機能之要求則於關節起
病變，而後起之者也。

二次性原因，即引起先天或後天內關節構造異常者，例如在一側
之關節，或以過重之負荷，其他外傷，連續之疾病，新陳代謝異常
，炎症，血之存在，由於細菌毒素之疾病，此外關節幼年期中過度
之關節炎，慢性關節炎，急性漿液性關節炎，非紅熱性關節炎，後遺

潰症，內分泌作用之不振和，關節之良性腫痛，神經系統之病狀（如神經痛，脊髓神經痛等）。

變性關節症在病理學上其重要所見為關節軟骨端部之破壞。此變化係 *Reiter* 之所謂靜力學說 *Statiche Theorie*，關節中所當，力不均等則其關節的營養而為促進，故可解釋此種各原因的。其病者也，有先天或後天的關節變性時或骨關節損傷後之固定及治癒狀態不滿意之時，則其為其誘因。然亦未必限於此而也。例如四肢切斷術後，在患處關節增加過度之負荷，然亦未必起變性關節症也。

Roemer 氏謂因器械的荷能荷關節軟骨失其彈力性，與軟骨下組織及骨質組織以異常之刺激而增加，因其結果更於軟骨，骨質起反應性變化。

Wolensky 亦主張關節骨端及軟骨端之抵抗力減退，同時難因應關節變性之要請者為原因重要。又 *Wolensky* 以實驗研究之成績與病理學之研究為立脚點以關節軟骨之彈力性減退為主因之學說相平衡，以無菌性軟骨壞疽解釋原因之本原。又 *Wolensky* 指出由於血行障礙而有之營養失調，所謂 *nutritive Therapie* 即是也。而關節軟骨化症為主要原因，在血液循環上言之因供給血液不均衡之結果而引起變性，即所謂變化。

然無論如何關節軟骨之變化，就中起變性之原因由以上可知絕非一元的，由本質之意義上觀之欠明確確之點甚多。又二次誘發變性軟骨之病變之原因亦甚多。

臨床症狀如病理解剖學之所見，自覺及他覺之症狀相差之點甚著。

臨床現狀變性行性，有時突然引起自覺障礙。亦無何等可慮為其誘因者，例如大體有刺痛，漸次進行，可見肌肉縮上合階，樓梯困難而下則則自由，隨時可覺肢體酸痛。或於下時膝部酸痛。患者之自訴大部分為：關節酸痛，關節不快感嚴重或延感。

。如刺似之酸痛則無少。其發現則為因疲勞之後，或久坐久臥以下起之時於注意及之。亦有清晨睡醒時痛者。稍活動後其消失，至晚又起者。且易疲勞。

又臨床痛其他之異常感同時的現則關節之運動障礙，此皆由於疼痛而起者，亦不出於關節變性之範圍。其病者，從其新與他覺的所見各病變之關係。

大多數發生於大關節，然多發性亦不少。然於股關節一經病變時，易於波及他側。亦可以一側而波及兩側。而解之，入各處之病變，故可謂各促進病者，亦各謂老人性變性關節炎多發性者。

他覺的所見為關節之外表呈一特種之外觀。不似結核梅毒 *Charcot* 之呈紡錘狀膨脹。皮肉無異常。

關節常無腫脹一感，然關節之不自由或生埋變而求過重故起二次性炎症，可以顯出程度之局部皮膚熱，多有發熱或貯留成關節水腫者。故可知此症之骨端及緣提。若深顯發時，時現急痛，多於老人性變性關節症。

可知此症出關節變性，各時也者自身亦可感出。可詳明變性為變性者此變性者。此種變性非特各處可常感得之，在變性中各時出現消失，依關節之部位，或紙毛形成，關節由之引致游離化之存在與否各異。從出液多的點證明。

關節運動障礙之程度之甚，常起之。其起因於變性的即利變性的原因至要者，勿謂由於疼痛而起也。因之疼痛與變性，運動障礙亦大減輕。

雖各關節運動障礙不礙關節直，因疼痛而長時間不受治療的，因是之故，運動功能全被障礙。此為高齡患者所常經驗者。

亦各急變性痛者，久之則關節液大量蓄積。而疼痛一時稍減者。疼痛各於關節局部以神經痛變性疼痛為主原因者。而為關節變性之病變之本質，時各變性為變性者。亦為變性者。


之病變不難察，而關節液之蓄積，因肌肉之自荷過利，致肌痛甚著。亦各因關節變性之病變，因肌肉之自荷過利，致肌痛甚著。

如新自覺障礙與他覺之所見各不平行之時，為各一變性。在治療上可按生利變性治療，而以生自覺的症狀之輕重為對照，而加減治療方法。

(未完)

華北醫藥
報社敬啟

新 禱 勝 利



醫科器械一般

村谷洋行

北京內二區旗衛街一號
電話南局三九二六番

娃 娃 寧

小兒良藥娃娃寧，成分名貴，配合精密，藥量小，効力大。無苦味，容易服。主治小兒消化不良，便秘，痢疾，咳嗽，吐乳等症。

定價 每瓶二角 每打二元四角
天津德迪氏製藥廠出品



各科診察 隨時住診

大生醫院

醫學博士 周瑞麟
眼科醫師 張德民
北京西單 報子街
電話四局〇九一四

花柳淋病

確具把握
負責根治

燕中診療院

診所北京西單轉角
路西時間：上午八至十二
時下午一至十時
電話四局四〇八二號

專門割治子宮瘻及痔瘡漏管等症
新建院舍設備完善

鳴聲醫院

院長前中央醫院外科主任陳慶
院址：北京東城弓弦胡同八號

運售各國原料藥材著名成藥醫學器械理化工藝
藥劑衛生材料疫苗血清自製家用良藥承配方劑

中央藥房股份有限公司

天津東北城角
電話二局一五六九號

天津興亞三區二十七號
電話三局一五二一號

東亞醫院

院長醫學博士 八木長作
北京東單中橫街三號
電話東局(五)二〇〇三
二〇〇三
二〇〇三
(夜間用)二〇〇三

內科 小兒科 X光科 肺病科 花柳科 皮膚科 泌尿科

小峰醫院

住診隨時
院址北京前門外六號
電話五〇二五八六

志仁診療院

不分時間 急診接生 分科應診 專門醫師

院長：周志仁

地址：西長安街一〇四號

電話：南(3)局一三三三

精神病與神經病講座 (二)

華北衛生行政學院 楊群倫


二、精神的健全及精神

病，精神薄弱及病態人格

我們在面對強光的時辰，瞳孔就縮小，熱的時辰，便發汗。這是我們對於外界刺激的反應，但不是有意識的反應，並且不是我們因爲聰明才把瞳孔縮起來，或感到熱才發汗，這是所謂反射的附加作用。由於自律神經系統的作用發生的。但是，除了這種作用之外，你在感到熱時會脫掉一件衣服，或走到樹蔭下去，假如你在屋中的話，你會開開窗子，讓涼風吹進來，像這些行是我們的判斷對於刺激的有意識的反應作用。這對於刺

激的有意識的反應我們稱做「精神健全」。我們生活在近世的社會中，會遇到各種複雜的場面，爲了生活在這環境中，我們用合理的方法使我們自己適應的適合環境，凡能適應而合理的適應這種複雜的社會而生活的人，我們可說他是個「精神健全」的人。

我們每人有着不同的素質，環境，生活方式，習慣，所以個人意識的適應環境的方式，也就人各一様了，於是產生了各人的性格和個性。如果我們把意識上精神活動的辦法分析一下，可以知到它是由於「知覺」，「感情」，「意志」，「反應」，構成的：



在我們感到外界的事象的時候感情和理智(即智能)便來決定我們的意志，去作某一種反應感情和理智適宜的說會便產生了單獨的人格。前面所說個人各一様の性格便是由「感情」和「意志」所左右，也就是說「感情」是決定人格變化的重要的因子。因此產來「情性」就超乎一般人以外的，便形成了所謂異常人格。也就是我們所說的「病態人

格中。這種人格「較智」與「勇」者，叫做精神
 薄弱（或弱）。我們可以用「病態人格是情
 性發育不全」，「精神薄弱（低能）是智性
 發育不全」來解釋它！那麼，什麼是精神呢
 ？一個人如果他的本來人格混亂崩壞，即他
 的體行的反應方式發生變化的時候，我們便
 可以斷定，他是地處過渡的一位精神病人。
 病態人格及精神薄弱是生來的人格變異，精
 神病是人格的變化。所以大多數精神病人的
 病症狀，是少帶意識上的變化。
 一 意識是精神狀態的反面。由其明、暗、
 廣、狹來支配。一類人類內精神機能。從這
 個意識，在好幾「百人騎馬」一般亂走亂
 撞，他的精神活動沒有一定軌道。雖然有時
 我們看見有的精神病人，在表面上好像保持
 着正常的樣子，實際上他的意識，和其他的
 精神病人同樣的起變化，正如同我們在
 戲台前，當着燈光的人減掉一切的光，代
 替而來的紅、黃、綠、藍、紫色的光輝直
 射在舞台上。我們的目光，被它迷惑着，辨
 不上的人。物都換了另一付面貌！當
 一個人在意識變化的時候，會產生錯覺、幻
 覺、尤以幻覺、幻覺更為常見，他會失了控
 記憶，發生種種可笑的錯誤。他的思想，判
 斷，不正確，作着種種的妄測，行動也失却
 正軌。其次在他的感情上也發生變化，這時

感情變化的發生與意識變化無關係，這時
 可以看見他時而狂喜、時而暴怒、或號泣、
 整個的人帶去抑鬱制而混亂起來。
 精神病不論直接、間接都是由腦子的
 病變發生的，有一定的經過、漸次進行、或
 成慢性或急性。這也是精神病與別種人格及

低能之不同點。而且，腦子實際是全身一切
 的機關，能影響全身的狀態，所以精神病人
 往往會對感覺，連營養低下等。

——（未完）——

血液性傳染病特效藥

殺 鍊 敵

本品為最新化學治療劑。對於球菌
 菌及葡萄球菌傳染病均有特效。一
 經服用。能使侵入組織中之菌類立
 受限制。血中之微生物即可消除

主治：
 淋病性或淋球菌性敗血症、淋球菌
 性膿膜炎、中耳炎、乳房炎、扁桃
 腺炎、猩紅熱、丹毒、白喉、流行
 性腦膜炎、淋毒性關節炎等

上海五洲藥廠出品
 北京 天津 五洲大藥房發行

Minophagen A L

關於驅梅毒療法。吾人當改從來之陳腐常識。莫過信 **Salvarsan**

之效力。要真摯檢討新式療法 **Minophagen A.L.** 乃確認 **S. Varsan**

對於頑固性血清陽性梅毒之缺點。研究創製之藥劑。由是

Minophagen A.L. 之適應症如次。

頑固之第二期及第三期血清陽性梅毒，先天性梅毒，**Salvarsan** 適量服用者之梅毒及其
他早期梅毒（主訴頭痛，神經痛，複視，口角異常），淋病梅毒，角膜炎，皮膚炎
，發作性血色素尿，腎臟病尤其是痛風性疼痛，單純性視神經萎縮，內科的梅毒症（心筋
肉炎，肝梅毒）。

MINOPHAGEN A.L. 之發明者

京都市國大學醫學部助教授

醫學博士 荻內牧 醫學士 海老瀨浩

醫學士 高橋松雄 醫學士 佐藤繁模

華中北包辨處

高岡商店

日本大阪市東區伏見町三

華中包辨處

重松大藥房

上海昆山路一二八

華北包辨處

渡邊春陽堂

青島市奉天路二三五

製造發賣元

合資
會社

MINOPHAGEN 製藥本舖

東京縣四谷區內藤町一番地

包裝

3 圓筒	5 管
”	10 管
”	50 管
6 圓筒	5 管



本欄
歡迎
投稿

本報廣告費
報紙之一 一月四角五分
報紙之二 一月二角五分
報紙之三 一月二角五分
報紙之四 一月二角五分
特別函 一月一角五分
普通函 一月一角五分
論述(夾釘) 一月一角五分

△中央防疫處擬彙中央派駐醫院醫員李宜禧、懷心職病之疾，於月前由滬返世，並擬辦安葬火葬。

△專衛生當局，為強化防疫工作，特將該市現有之真然路防疫處，白下路衛生試驗所，暨由三三三防疫機關，加以合併，成立南京市衛生試驗所，所長一職由衛生局長潘君擔任，工作重點為一般防疫指導，食品衛生檢查、暨屠宰場、染毒、公共衛生等檢查。

△上海市衛生當局，為預防

夏令虎疫流行起見，除普遍注射預防針外，特擬定患者之早期隔離之獎勵辦法，對於發現患者，予以獎金，賞額分爲一千元、八百元、六百元、四百元、二百元等五級。

△有身染致命藥劑的平，百到母國等，因銷路頗廣，最近上海英商中守中等買牌大量製造，在各埠推銷獲利，惟因事機洩露，被判處徒刑八個月。

△南京衛生署發表：該署現正辦理營業從業人員登記，截至日前，已審合格者，計醫師八一九人，藥師

五九人，牙醫四九人，助產士二二六人，護士三九人，藥劑生九六人，醫士一九九八人。

△東亞醫學會籌備分會，前以第三次東亞醫學會總會開會時，會議決下屆大會在新加坡舉行，於六月下旬，在新加坡舉行第一次連絡會議，結果決定會期在明年六月上旬。

△北平市防疫工作，今年無爲完備，於八月一日起舉行防疫工作，計出動男女警察四百人。

大明眼鏡公司

人人愛戴

出品

索安門大街七十九號

登記證字第五十二號(三十一年五月刊)

民國三十三年八月出版(每月一刊)

第三卷 第八期

定價：每冊五元 全年：拾陸元

北京市西單德勝門外口臥佛寺街七號

發行所 華北醫藥報社

電話四局三九五三

發行人 沈蔚村

(編輯部)北京市石柵馬大街廣源胡同四號

「百浪太平」的「噴」

'FRONTALDIN' WOUND POWDER

本品為最新穎之創傷藥
 口外用新藥。新鮮只必
 甚多之創口。用之無有
 防止化膿特效。本品用
 法簡便。清潔無垢。
 各種外科上之加蓋口
 用之最有藥效。

每罐五十公分

「利龍」油膏

'LIFON' - OINTMENT

凡各種瘡毒。使用本品
 在藥之瘡口。最有特效。
 局部清潔。最有利創傷。
 尤宜於一切汚穢創傷。
 瘡口。腐爛。蜂窩織炎
 乳房炎以及白濁性淋
 菌通性結膜炎等症。

每管長

