

欽定授時通考

欽定授時通考

欽定授時通考

目錄

卷一

總論上

天時門

卷二

總論下

天時門

卷三

天時門

春

卷四

天時門

夏

卷五

秋

卷六

冬

天時門

卷七

土宜門

彙考

卷八

土宜門

方輿圖說

卷九

土宜門

辨方

卷十

土宜門

物土

卷十一

土宜門

田制上

卷十二

土宜門

田制下

卷十三

土宜門

田制圖說上

卷十四

土宜門

田制圖說下

卷十五

土宜門

水利一

卷十六

土宜門

水利二

卷十七

水利三

土宜門

卷十八

水利四

土宜門

卷十九

彙考

嘉禾瑞穀瑞麥

穀種門

卷二十

御稻米

稻一

穀種門

卷二十一

穀種門

稻二

卷二十二

穀種門

稻三

卷二十三

穀種門

粱

稷

卷二十四

穀種門

黍

卷二十五

穀種門

粟

卷二十六

穀種門

麥

卷二十七

穀種門

豆一

卷二十八

穀種門

豆二

卷二十九

穀種門

豆三

卷三十

穀種門

麻

卷三十一

功作門

稟考

卷三十二

功作門

犁耕

卷三十三

功作門

耙勞

卷三十四

功作門

播種

卷三十五

功作門

淤蔭

卷三十六

功作門

耘籽

卷三十七

功作門

灌溉

卷三十八

功作門

泰西水法

卷三十九

功作門

收穫

卷四十

功作門

政治

卷四十一

功作門

牧事附

卷四十二

勸課門

彙考

卷四十三

勸課門

詔令

卷四十四

勸課門

章奏

卷四十五

勸課門

官司

卷四十六

勸課門

祈報

卷四十七

勸課門

敕諭一

卷四十八

勸課門

敕諭二

卷四十九

勸課門

新穀

耕籍

卷五十

御製詩文

卷五十一

勸課門

御製詩文

卷五十二

勸課門

耕織圖上

卷五十三

勸課門

耕織圖下

卷五十四

蓄聚門

彙考

卷五十五

常平倉

蓄聚門

卷五十六

社倉

義倉

蓄聚門

卷五十七

圖式

蓄聚門

卷五十八

彙考

農餘門

卷六十

蔬一

農餘門

金匱要略 卷六十五

二

卷六十五

農餘門

卷六十五

農餘門

蔬三

卷六十五

農餘門

蔬四

卷六十五

農餘門

果一

卷六十五

農餘門

果二

卷六十五

農餘門

果三

卷六十六

農餘門

果四

卷六十七

農餘門

木一

卷六十八

農餘門

木二

卷六十九

農餘門

雜植

卷七十

農餘門

畜牧一

卷七十一

農餘門

畜牧二

卷七十二

彙考 制居

浴種

蠶桑門

卷七十三

飼養

蠶桑門

卷七十四

分箔 入簇

擇繭

蠶桑門

卷七十五

繅絲 織染

蠶桑門

卷七十六

蠶桑門

桑政

卷七十七

蠶桑門

卷七十八

蠶桑門

桑餘

桑餘

欽定四時通考卷六十五

農餘

課三

荔支

錦荔支

龍眼

山龍眼

橘

柑

佛手柑

香櫞

金橘

金豆

柚枳

枸橘

橄欖木威
餘甘子

椰子

無花果

安吉果

葛根



荔支

荔支。一名丹荔。一名離支。樹高數丈。自徑尺。至於合抱。形團圓如帷蓋。葉如冬青。綠色蓬蓬。四時常茂。花青白。開於二三月。狀如橘。又若冠之蕤綏。五六月結實。喜雙狀。如初生松毬。核如熟蓮子。殼有皴紋。如羅生。青熟紅。肉淡白如肪玉。味甘多汁。夏至將中。翕然俱赤。大樹每下子百斛。五六月盛熟時。彼地皆燕會其下。雖多食亦不傷人。覺熱以蜜漿解之。或以殼浸水飲亦佳。初出嶺南及巴中。今閩之泉福漳興。蜀之嘉蜀渝涪。及三廣州郡。皆有之。以閩中爲第一。蜀次之。嶺南爲下。其類有陳紫。出著作郎陳琦家。品爲第一。諸云其樹聳熟其實廣上而圓下。大可徑寸有五分。香氣清遠。色澤鮮紫。

水薄以陳支亦肌之常徑等亦有少員第之亦觀之。
如而可矣。下理皮紫甘精而李。瓢厚之食之。
大黃膜之爲味。雖消形於味。雖附色之。
周家紫。色實種附色之。得拔莫有味之。
州藍出上承都紫。色實種附色之。其味同者。
核類一家官實種附色之。已此過不核者。
朱核類一家官實種附色之。比食中品。
核頗色朱核類一家官實種附色之。其味同者。
而朱核類一家官實種附色之。至核者。
大如紫江品大出方初化味大似核一味百如絳望。
虎皮。而朱核類一家官實種附色之。其味同者。
如紫江品大出方初化味大似核一味百如絳望。
此色生於白。出此及中生。食中品。
有丹在荔核。而福支大法。爲陳方一紫。有實查。
青紅獨而福支大法。爲陳方一紫。有實查。
絳絕綠小州爲次石。荔堂極於院。俱多而龍牙。長可。
類大。虎皮。將軍荔支。大丁香。江綠。軍。以三牙。
果三。三以官五微殼獨類。寸狀種代濃厚香陳。無核寸。小如名。
寸狀種代濃厚香陳。無核寸。小如名。方紅。
餘名之。時出色紫薄而陳。然彎甘陳。味尖凡。
皮之。因有天紫而差。州泉不曲美紫紅。
皮之。因有天紫而差。州泉不曲美紫紅。

溫玳瑁紅。玳瑁有黑點，以色類硫黃，故名。以上出福州。何家紅，出漳州。圓丁香，皆旁蒂大而尖，十八娘紅，細長，閩王有女，行十八好食此，因名。得名或云物之美者，爲十八娘蕙團，每朵數十，並蒂雙垂，釵頭可施頭髻。珍珠荔支，團白如珠，無核，此以色異。丁香荔支，核小如丁香，亦謂之標核。蜜荔支，然過於甘，火山荔支之最小者，粉紅荔支，深紅荔支，本出南越，四月熟，味甘，肉薄，閩中近年僅有。秋元紅，實時最晚，因以得名。蚌殼荔支，深渠如瓦屋，狀如瓦屋，以狀得名。蒲桃荔支，上見蔡襄荔支譜，又有綠色焉。蠟色，皆品之奇者。自蔡襄以後，鄭熊徐燦、鄧慶案諸人，各爲之譜，競立新名，標奇炫異，或言姓氏，或言州郡，皆識其所出。王敬美曰：荔支以狀元香爲最，然不如長樂勝畫，肉厚而味甘，當爲種中第一。第乾之不能如狀元。

香風味。楓高驛荔支甲天下。亡論丹實纍纍。而樹亦婆娑可愛。在漳泉者。四五月熟。然肉薄味酸。能損齒。又云荔支以興化之楓亭驛爲最。長樂次之。性甘微熱。止渴益智。健氣病齒。及火病人最忌。

夢溪筆談閩中荔支核有小如丁香者。多肉而甘。土人亦能爲之。取荔支木去其宗根。仍火燔令焦。復種之。以大石抵其根。但令旁根得生。其核乃小。種之不復芽。

徐燦荔支譜荔核入土種者。氣薄不蕃。雖蕃不結子。間有成樹者。經十餘歲。稍稍結顆。肉酸澀無味。鄉人於清明前後十日內。將枝梢刮去外皮一節。上加膩土。用棕裏之。至秋露枝上生根。以細齒鋸從根處截下。植之他

所勿令動搖。三歲結子纍然矣。接枝之法。取種不佳者。截去元樹枝莖。以利刃微啟小隙。將別枝削鋸。插固隙中。皮肉相向。用樹皮封繫。寬緊得所。斟酌裹之。凡接枝必待時暄。蓋欲藉陽和之氣。一經接搏。二氣交通。則轉惡爲美矣。若近海魚鹽之處。斥鹵土鹹。其味微酸不佳。縱奪接之。終不能以彼易此也。

又荔枝性宜熱。最畏高寒。古樹歷數百年者。枝柯皓屈。根幹盤旋。其陰可蔽數畝。歲久根深。縱霜霞侵壓。不過葉碎。可無損於樹。當春仍發新葉。開花結實。至於新種。不歷十數年者。樹稊根淺。一遇霜霰。隨卽枯萎。明年不復花實。鄉人有愛其樹者。當極寒時。樹下以稻草煨火溫。

之。寒氣不侵。葉無凋損。秋冬之際。壅壓其根。仍伐去枯根。不令礙樹。逢春尤易發生。

鄧慶棠荔支譜 荔子原無用核種者。皆用好枝刮去外皮。以土包裹。待生白根如毛。再用土覆一過。以臘月鋸下。至春隨生新葉。他木栽時。皆去枝葉。獨荔樹要畱宿葉承露。若葉去露槁。則無生機。余嘗六七月鋸荔蘆。新根方生。無不存活。最怕日曬。必求稍陰涼處。時時灌水。方易生葉。

羣芳譜 荔支有間歲生者。謂之歇枝。有仍歲生者。半生半歇也。春花之際。傍生新葉。其色紅白。六七月時。色已變綠。此明年開花者也。今年實者。明年歇枝也。最忌麝

香。或遇之。花實盡落。其熟未更採摘。蟲鳥皆不敢近。或已取之。蝙蝠蜂蟻爭來蠶食。園家破竹五七尺。搖之荅荅然。以逐蝙蝠之屬。

錦荔支 附

錦荔支。一名瀨葡萄。元時名紅姑娘。卽詩所云苦瓜也。出南蕃。今閩廣江南皆有之。蔓生葉如葡萄。有微刺。蔓上有鬚。莖葉皆柔。七八月開小黃花。五瓣如碗形。結瓜有長短二種。色青綠。熟則黃紅。皮上礧砌架作弄。斑斑如錦。紅綠陸離。最爲可玩。瓜味微苦。小熟之。調以薑醋。春時種。秋結實。其子形扁如瓜子。亦有癭瘤可入藥。

龍眼



龍眼

龍眼。一名益智。廣雅云。益智。龍眼也。一名比目。一名圓眼。一名蜜脾。一名燕卵。一名繡水團。一名海珠叢。一名川彈子。一名亞荔支。一名荔支奴。閩廣蜀道出荔支處皆有之。樹似荔支。高一二丈。枝葉微小。葉似林檎。凌冬不凋。春末夏初開細白花。七月實熟。大如彈丸。肉薄於荔支。白而有漿。甘如蜜。質味殊絕。純甜無酸。實極繁。作穗如葡萄。每穗五六十顆。殼青黃色。性畏寒。白露後方可採摘。性平無毒。安志健脾。補虛開胃。除蠭毒去三蟲。久服輕身不老。裨益聰明。故又名益智。非今醫家所用之益智。于食品以荔支爲貴。而資益則龍眼爲良。蓋荔支性熱。

而龍眼平和也。

農政全書白露後採用海滷浸一宿取出曬乾用火焙之。以核乾硬爲度。如荔支法收藏之。城朵乾者名龍眼錦。

山龍眼附

山龍眼出廣中。夏月熟。色青。肉如龍眼。亦龍眼之野生者也。

龍荔附

龍荔狀如小荔支。而肉味似龍眼。木之身葉亦似二果。故名。三月開小白花。與荔支同熟。但可蒸食。不可生啖。令人發癟。見鬼物。出嶺南。

橘



橘

橘。一名木奴。樹高丈許。枝多刺生。莖間葉兩頭尖。綠色光面闊寸餘。長二寸許。四月生小白花。清香可人。結實如柚而小。至冬黃熟。大者如杯。包中有瓣。瓣中有核。實小於柑。味甘微酸。種類不一。有蜜橘。其味最甘。黃橘。扁小多瓣。狀大而扁。已碧。可愛。不待霜後。色味佳。外綠。心紅。隆冬采之。生意如新。朱橘。實小如火。搘橘。外薄內盈。其脈赤如火。沙橘。細小甘美。凍橘。入月開花。早黃橘。秋半已丹。穿心橘。膚理皺密。儼如乳。乳橘。狀似乳。橘堅瓢多。味絕美。芳油橘。外黑似油。飾中堅。自然橘。他橘與柑必以枝接之。種子下種。故味甚美。自名天然。出蘇州。台州。西出荊州。南出閩廣。撫州皆不如。

溫州者爲上也。王敬美曰。閩中柑橘。以漳州爲最。福州次之。樹多接成。惟種成者氣味尤勝。橘肉生痰聚飲。不益人。若煎以蜜。充果食甚佳。或蜜或薰作餅。尤妙。亦可醬淹作菹花。以之蒸茶。向爲龍虎山進御絕品。園中宜多種多收。核葉皆苦平無毒。可入藥。

書禹貢厥包橘柚錫貢。

傳小曰橘。大曰柚。疏橘柚二果。其種本別。以實相比。則柚大橘小。

文昌雜錄。南方柑橘雖多。然亦畏霜。每霜時亦不甚收。惟洞庭霜雖多。仍無所損。詢彼人云。洞庭四面皆水也。水氣上騰。尤能辟霜。所以洞庭柑橘最佳。歲收不耗。正

爲此爾

羣芳譜種植種子及栽皆可以枳樹截接或貼接尤易成宜肥地至冬須以大糞壅培則來年花實俱茂遇旱以米泔灌漑則實不損落根下埋死鼠則結實加倍物類相感志云橘見尸而實繁涅槃經云如橘見鼠其果實多。

避暑錄話凡橘一畝比田一畝利數倍而培治之功亦數倍於田橘下之土幾於用篩未嘗少以瓦甓雜之田自種至刈不過一二耘而橘終歲耘無時不使見纖草地必面南爲屬級次第使受日每歲大寒則於上風焚糞壤以溫之。

多能鄙事茅灰及羊矢壅之。多生實。十一月內。將橘樹根寬作盤。澆大糞三次。至春用水澆二次。花實必茂。
便民圖纂十月後。將金橘安錫器內。或芝麻雜之。經久不壞。若橙橘之類。藏菜豆中極妙。弗近米邊。見米即爛。

柑



柑

柑。古作甘。開寶本草云。柑未經霜時猶酸。霜後甚甜。故名柑子。梅溪詩注云。他果非無甘者。惟柑從甘。言最

甘也。生江南及嶺南。閩廣溫台蘇撫荆爲盛。川蜀次之。

似橘少刺。實亦似橘而圓大。霜後始熟。味甘甜。皮色生

青熟黃比橘差厚。理稍粗而味不苦。惟乳柑山柑皮可

入藥。橘實可以久畱。柑實易腐敗。柑樹畏冰雪。橘樹略

可耐。此柑橘之異也。乳柑。出溫州泥山。爲最。其味似乳

其花香韻。其實圓正。其膚理如澤蠟。其木婆娑。其葉纖長。其皮

薄而味珍。脈不黏瓣。食不留滓。一顆僅一大六七寸。其味似乳

無者。擘之香霧噀人。爲柑中絕品。

海紅柑。樹小而實極大。有二核。亦有全者。

其洞庭柑。出洞庭山。皮細而色紅。可久藏。今獅頭柑。

黃比他柑。加甜。近帶如丹。其熟最美。生枝柑。甜柑。類青皮。微酸。可耐久霜。先

時留之枝間。俟味變甘。平蒂柑。出成都。
帶葉而折。新美可愛。升色蒼黃。大如朱柑。
大色嫣紅。味多酸。以刀木柑。膚理堅頑。瓣大而乏膏。又
破之。潰以鹽始可食。外彊中乾。故名以木。又
有白柑沙柑之類。性大寒。治腸胃熱毒。解丹石。止異渴。
多食令人脾冷生痰。發痼癖。皮調中下氣。

廣羣芳譜橘錄。歲當重陽。色未黃。採之名曰摘青。及經
霜之二三夕。遇天氣晴霽。羣以小翦就枝間平蒂斷之。
輕置筐筥。護之必謹。懼其香霧之裂。則易壞。尤不便酒
香。凡採者。竟日不敢飲。柑橘宜斥鹵之地。種時高者畦
壟。溝以泄水。每株相去七八尺。歲四鋤。冬月以泥壅根。
夏時以糞溉之。

物類相感。志藏柑子。以益盛。用乾潮沙蓋之。

佛手柑

附

佛手柑木似朱欒而葉尖長。枝間有刺。植之近水乃生。其實狀如人手有指。有尺餘者。皮如橙柚而厚。皺而光澤。其色如瓜。生綠熟黃。其核細。味不甚佳。而清香襲人。置衣笥中。雖形乾而香不歇。

本草

南人雕鏤花鳥。作蜜煎食。

欽定受時通考 橙



卷之三
三
橙

橙樹似橘有刺。實似柚而香。晚熟耐久。大者如盈。經霜始熟。葉大有兩刻缺。如兩段。皮厚蹙。瓤如沸。香氣馥郁。可薰衣。可芼鮮。可和菹醢。可爲醬蠶。可蜜煎。可糖製。爲橙丁。可蜜製爲橙膏。可和湯待賓客。可解宿酒。速醒。唐鄧間皆有。江南尤多。栽植與橘同。多食傷肝氣。發虛熱。同豬肉食。發頭旋。恶心。洗去瓢中酸汁。和鹽蜜煎成貯食。止恶心。能去胃中浮氣。惡氣。皮消食下氣。去胃中浮氣。和鹽貯食。止恶心。

香櫞



香櫟

香櫟。一名枸櫟。柑橘之屬。嶺南閩廣江西皆有之。實大如小瓜。皮若橙而光澤可愛。肉甚厚。白如蘿蔔而臍虛。雖味短而香芬大勝。置衣笥中。經旬猶香。古作五和糴。用之。

欽定授時通考

金橘



金橘

金橘。一名金柑。

橘錄云。金柑在他柑特小。大者如錢。小者如龍目。

色似金。大者如龍目。色似金。

一名盧橘。

本草云。此橘生時青盧色。黃熟則如夏橘。故有金橘。盧橘之名。盧黑色也。

一名夏橘。

本草云。此橘冬夏相繼。廣州謂之夏橘。山橘子大如土瓜。

名給客橙。

本草云。香芬如橙可供給客也。

魏王花木志云。蜀有給客橙。似橘而非。若柚而香。亦名盧橘。

一名小木奴。

見元稹詩。生吳越江浙川廣間。出營道者爲

冠。江浙者皮甘肉酸次之。樹似橘不甚高大。五月開白

花結實。秋冬黃熟。大者徑寸。小者如指頭。形長而皮堅。

肌理細潤。生則深綠。熟乃黃如金。味酸甘而芳香可愛。

糖造蜜煎皆佳。廣人連枝藏之入臘醋尤香美。

便民纂要。金橘將枳棘接之。八月移栽肥地。灌以糞水。

金豆附

一名山金柑。一名山金橘。橘錄云。生山徑間。比檳
榔更小。形色頗類。結實繁多。肉瓣不可分。止一核。
羣芳譜。木高尺許。實如櫻桃。生青熟黃。形圓而光溜。皮
甜可食。味清而香美。可蜜漬。

柚



柚與檸同。古作櫟。博雅云條柚。注一名壺

爾雅云條柚。云似橙實酢。

注一名壺

甘本草云狀如齒。故名壺。象形也。古今一

名臭橙。

桂海

志。又謂之壺。爾雅謂之櫟。又曰櫻。

爾雅云櫟櫻。注云

廣雅謂

之鑄柚本草云鑄亦壺也。廣州記云鑄柚實大如斗。

柚實大而粗。三月開花

奇大。香甚馥郁。實亦如橘。有甘有酸。皮厚而臭。樹葉皆

類橙。實有大小二種。小者如柑如橙。俗呼爲蜜筩。大者

如升如瓜。俗呼爲朱欒。有圍及尺餘者。俗呼爲香欒。閩

中嶺外江南皆有之。南人種其核。云長成以接柑橘甚

良。又有名文蛋。名仁崽者。亦柚類也。

橘錄朱欒作花比柑橘絕大而香。就樹採之用箋香細

作片。以錫爲餽。入花一重。則實香一重。使花多於香。仍敷餽旁。以溜汗液。用器盛之。炊畢。去花。以液浸香。再蒸。凡三換花。始暴乾。入甕器密盛之。他時焚之。如在柑林中。凡柑橘並金柑。皆可切瓣。壓去核。漬之以蜜。金柑著蜜。尤勝他品。取朱藥核。洗淨。下土中。一年而長。名曰柑。明年移而疏之。又一年。木大如小兒拳。遇春月。乃接。取諸柑之佳。與橘之美者。經年向陽之枝。以爲貼。去地尺餘。細鋸截之。剔其皮。兩枝對接。掬土實其中。以防水蕩。覆其外。麻束之。過時而不接。則花實復爲朱藥矣。

枳附

樹木如橘而小。高五七尺。葉如橙。多刺。春生白花。至秋

成實。七月採爲實。八月十月採爲穀。於此而鑑以種。
厚而小者爲枳實。完大者爲枳殼。

周禮考工記。橘踰淮而北爲枳。

枸橘

附

橘處處有之。樹葉並與橘同。但幹多刺。三月開花。葉不香。結實大如彈丸。形如枳實而殼薄不香。

欒欒



欒欒
欒欒
欒欒
欒欒

欒欒

欒欒。一名青果。一名諫果。一名忠果。

宋王禹偁欒欒詩。我今何所喻。喻彼

忠臣辭齊東野語黃涪翁云餘
甘欒欒二物可名之爲諫果也。南人謂之格覽見元郝
詩注生嶺南閩廣諸郡及沿海浦嶼間皆有之。樹似木櫟

而高大數圍。端直可愛。枝皆高聳。葉似櫟柳。二月開花。
八月結子。狀如長棗。色青。兩頭皆尖。先生者居下。後生
者漸高。深秋方熟。核亦兩頭尖而有稜。核內有三竅。竅
內中有仁可食。其類有綠欒。色青綠。核內無仁。有亦乾小。
而甘取肉搘碎乾自有霜如白鹽謂之欒烏欒。色青
肥大。有紋層疊如海螺。色白。外有黑皮。最甘嫩。
又江峒中似有一種波斯欒欒似。但核作兩瓣。一種方欒。出廣西兩
即波斯欒欒之類也。野生者樹峻而子繁。蜜漬鹽醃。

皆可藏久。用之致遠。作佳果。生嚼味苦澀。微酸。良久乃甘美。生食煮汁飲。並生津止渴。開胃下氣。治喉痛。消酒毒。住泄瀉。解一切魚鱉毒。及骨鯁。閩中尤重其味。云咀之口香勝雞舌香。

領表錄異 橄欖樹有野生者。樹峻不可梯緣。但刻其根下方寸許。內鹽於其中。一夕子皆自落。

種樹書 橄欖將熟。以竹釘釘之。其實盡落。

鄰幾雜志 橄欖木并花如樗。將採其實。剝其皮。以薑汁塗之。則盡落。

木威

本草拾遺 木威生嶺南山谷。樹高丈餘。葉似棟子。如橄

欖而堅。亦似棗。削去皮。可爲粽食。

餘甘子

附

餘甘子。兩廣諸郡。閩之泉州。及西川戎瀘蠻界山谷。皆有之。

南方草木狀 花黃。實似李。青黃色。核圓。作六七稜。食之


先苦後甘。

異物志 其樹葉如槐葉。其枝如柘。其子圓大如彈丸。有文理。如定陶瓜。

本草 木高一二丈。枝條甚軟。葉青細密。朝開暮歛。如夜合而微小。春生冬彫。三月有花。著條而生。如粟粒。隨節結實作蓬。每條三兩子。至冬而熟。連核作五六瓣。乾卽

並核皆裂。俗作果子噉之。泉州山中亦有。狀如川棟子。
形圓味類橄欖。亦可蜜漬鹽藏。其木可製器物。

椰



椰子

椰子。一名胥餘。嶺南州郡皆有之。樹葉如栟櫚。高六七丈無枝條。其實大如寒瓜。外有粗皮。皮次有殼。圓而且堅。剖之有白膚。厚半寸。味似胡桃而極肥美。有漿飲之得醉。

寰宇記 椰子樹似檳榔而高大。葉長一尺無陰。結實。一房生三十餘子。如瓜。其殼中有白如熊白。內有漿一升。清如水。甜如蜜。飲之愈渴疾。殼堪爲酒壺。皮堪縛船。土人多種之。

寇宗奭曰。椰子開之有汁。白色。如乳如酒。極香。別是一種氣味。強名爲酒。中有白瓠。形圓如桔。上起細壘。亦

白色而微虛。其紋若婦人裙褶。味亦如汁。與着殼一重。白肉皆可糖煎爲果。其殼可爲酒器。如酒中有毒。則酒沸起。或裂破。今人漆其裏。卽失用椰子意。

農政全書。椰用甚多。南中人樹之者。資生之類。大率在焉。

海槎餘錄。椰子樹初栽時。用鹽一二斗。先置根下。則易發。

無花果



無花果

無花果。一名映日果。一名優曇鉢。一名阿駒。一名蜜果。
最易生插條卽活在處有之。三月發葉。樹如胡桃葉如
楮子。生葉間五月內不花而實。狀如木饅。生青熟紫。味
如柿而無核。人家宅園隨地種數百本。收實可備荒。其
利有七。實甘可食。多食不傷人。且有益。尤宜老人小兒。
一也。乾之與乾柿無異。可供邊實二也。六月盡。取次成
熟。至霜降有三月。常供佳實。不比他果一時採擷都盡。
三也。種樹十年取效。桑桃最速。亦四五年。此果截取大
枝。扦插。本年結實。次年成樹。四也。葉爲醫痔勝藥。五也。
霜降後未成熟者。採之可作糖蜜煎果。六也。得土卽活。

隨地可種。廣植之。或鮮或乾。皆可濟饑。以備歉歲。七也。
倦游錄木饅頭。京師亦有之。謂之無花果。狀類小梨。中空。既熟。色微紅。味頗甘酸。嶺南尤多。

羣芳譜扦插。春分前取條長二三尺者插土中。上下相半。常用糞水澆葉。生後純用水。忌糞。恐枝葉大盛易摧折。結實後不宜缺水。當置瓶其側。出以細雷。日夜不絕。果大如甌。

欽定四庫全書

古今考略卷六十六

農餘

果四

甜瓜

西瓜

北瓜

蓮子

蓮藕

甘蔗

菱

芡

荔臍

慈姑
百合

卷八



甜瓜

甜瓜。一名甘瓜。一名果瓜。北土中州種蒔甚多。二三月下種。蔓生葉大數寸。五六月花開黃色。六七月熟。其類甚繁。有圓者長者尖者扁者。大而徑尺者小而一捻者。稜之或有或無。色之或青或綠。或黃斑。繆斑。白路黃路。種種不同。甘肅甜瓜大如枕。皮瓢皆甘勝於蜜。以皮厚乾柔韌甘美而有味。浙中一種陰瓜。種宜陰處。秋熟。色黃如金。皮膚稍厚。藏至春食之如新。凡瓜大曰瓜。小曰瓞。子曰瓢。肉曰瓢。跗曰環。蒂曰寃。其畏麝。諸瓜皆同。凡食瓜過多。但食酒。或水服麝。或食鹽花。卽消化。性寒滑無毒。少食止渴除煩熱。利小便。通三焦壅塞。夏月不

中暑多食動宿冷。病破腹。手足無力。

詩幽風七月食瓜。

爾雅牋牋其紹牋。

注俗呼牋瓜爲牋。紹者。瓜蔓緒亦著子。但小如煦。禮記曲禮爲天子削瓜者副之。巾以絲爲國君者華之。巾以絳爲大夫者累之。士寢之。庶人斂之。

注副析也。旣削。又四析之。乃橫斷之。而巾覆焉。華。中裂之。不四析也。累。保也。謂不巾覆也。寢之。不中裂。橫斷去寢而已。斂之。不橫斷。

玉藻瓜祭上環。

注上環。橫切之圓如環也。

龍魚河圖瓜有兩蒂兩鼻者殺人。

羣芳譜種植。二月上旬爲上時。三月上旬爲中時。四月上旬爲下時。五六月止可種藏瓜耳。預將生數葉便結瓜者爲本母子。候熟蒂自落。取來截去兩頭。其中段子淘淨曝乾收作種。臨種時用鹽水洗之。取熟糞土種之。仍將洗子鹽水澆之。得鹽氣則不籠死。坑深五尺。大如斗。納瓜子大豆各四粒。瓜生數葉。將豆掐去。瓜生至初花鋤三四次。勿令生草。但鋤不可傷根。傷根則瓜苦。候秧拖時。掐去蔓心。再用熟糞培根下。勤澆灌。摘瓜勿令踏蔓。及翻覆之。踏則瓜爛。翻則瓜死。若生蟻。置骨其旁。引而棄之。

西瓜



金匱要略 卷之三
西瓜

西瓜。一名寒瓜。蔓生。花如甜瓜。葉大多橢缺。面深青。背微白。葉與莖皆有毛如刺。微細而硬。其稜或有或無。其色或青或綠或白。其形或長或圓或大或小。其瓢或白或黃或紅。紅者味尤勝。其子或黃或紅或黑或白。白者味更劣。其味或甘或淡或酸。酸者爲下。本草綱目云。味甘淡寒無毒。除煩止渴消暑熱。療喉瘻口瘡。解酒毒。子取仁可薦茶。皮可蜜煎。糖煎。醬醃。食瓜後食其子。卽不噫瓜氣。以瓜劃破。曝日中。少頃食之。頗涼。收藏得法。可至來年春夏。近糯米及酒氣。則易爛。

羣芳譜種植。秋月擇其瓜之嘉者。留子曬乾。收作種。欲


種瓜地。耕熟加牛糞。至清明時。先以燒酒浸瓜子少時。取出瀝淨。拌灰一宿。相離六尺起一淺坑。用糞和土壅之於四周。中留鬆土。種于其中。不得復移。瓜易活而甘美。栽宜稀。澆宜頻。糞宜多。蔓短時作綿兜。每朝取蟲。恐食蔓長弱已。頂蔓長至六七尺。則掐其頂心。令四旁生蔓。欲瓜大者。每科揀其端正旺相者。止留一瓜。餘蔓花皆掐去。則實大而味美。性畏香。尤忌麝。麝觸之。乃至一顆不收。

北瓜

附

形如西瓜而小。皮色白甚。薄。瓢甚紅。子亦如西瓜而微小。狹長。味甚甘美。與西瓜同時。想亦西瓜別種也。

蓮子



蓮子

蓮子。一名藕實。一名澤芝。蓮房成菂菂在房。如蜂子在窠。六七月采嫩者生食。脆美。至秋房枯。收之去黑殼。謂之蓮肉。黑而沉水者。其堅如石。謂之石蓮子。其房大者。謂之百子蓮。味甘平。濶無毒。交心腎。厚腸胃。固筋骨。強精神。補虛損。利耳目。除寒熱。治諸血病。熟食良。切碎可作粥飯。生動氣易脹。宜去心。

爾雅
荷。芙蕖。其實蓮。其中的。的中薏。

疏李巡曰。芙蕖其總名也。的蓮實也。薏中心也。陸機疏云。蓮青皮裹白子爲的。的中有青爲薏。

又的
藪。

註卽蓮實。


埤雅花時卽有實。始而黃。黃而青。青而綠。綠而黑。中肉白。內青心。二三分爲苦薏。

齊民要術八九月取堅黑蓮子瓦上磨尖頭令皮薄。取墐土作熟泥封三指長。令蒂頭泥墮而重。磨頭泥少而尖。種時擲至池中。重頭向下。自能周正。薄皮在上易生。數日卽出。不磨者卒不可生。

食療本草服食不饑。石蓮肉蒸熟去心爲末。煉蜜丸桐子大。日服三十丸。此仙家方也。

陸璣詩疏蓮菂可磨以爲飯。如粟也。輕身益氣。令人強健。又可爲糜。幽州揚豫取備饑年。

蓮



蓮藕

蓮藕湖澤陂池皆有之。以蓮子種者生遲。以藕芽種者最易發。其芽穿泥成白藕。卽蕕也。長者至丈餘。五六月叢汲水取之。可作蔬茹。俗呼藕絲菜。節生二莖。一爲藕荷。其葉貼水。其下旁行生藕。一爲芰荷。其葉出水。其旁莖生花。冬月至春掘藕食之。藕白有孔有絲。大者如肱臂。長六七尺。凡五六節大抵野生及紅花者。蓮多藕劣。種植及白花者。蓮少藕佳。白花藕大而孔扁。生食味甘。平煮則不美。紅花及野藕。生食味澀。蒸煮則佳。氣味甘平。無毒。消食解渴。散血生肌。蒸食開胃。補五臟。實下焦。搗浸澄粉。服食輕身益年。與蜜同食。令人腹臟肥不生蟲。

亦可休糧。

爾雅。藕荷。芙蕖。其本。蕕。其根。藕。

注。蕕。乃莖下白蒻。在泥中者。

埤雅。藕。其生應月。月生一節。遇閏輒益一節。收藏好肥。白嫩。藕埋陰濕地。可經久如新。欲致遠。以泥裹之。則不表。

甘蔗



甘蔗

甘蔗叢生。莖似竹。內實直理。有節無枝。長者六七尺。短者三四尺。根下節密。以漸而疎。葉如蘆而大。聚頂上。扶疎四垂。八九月收莖。可留至來年春夏。王灼糖霜譜云。有數種。曰杜蔗。卽竹蔗。綠嫩薄皮。味極醇厚。專用作霜。曰白蔗。一名荻蔗。一名芳蔗。一名蠟蔗。可作糖。曰西蔗。作霜。色淺。曰紅蔗。亦名紫蔗。卽崑崙蔗也。止可生啖。不堪作糖。江東爲勝。今江浙閩廣蜀川湖南所生。大者圍數寸。高丈許。又扶風蔗。一丈三節。見日卽消。遇風則折。交趾蔗。特醇厚。本末無厚薄。其味至均。圍數寸。長丈餘。取汁曝之。數日成餡。入口卽消。彼人謂之石蜜。多食蔗。

齧血燒其滓烟入目則眼暗。

齊民要術說文曰諸蔗也。按書傳或爲芋蔗或干蔗或耶蔗或都蔗所在不同。

又家法政曰三月可種甘蔗。

羣芳譜種植穀雨內於沃土橫種之節間生苗去其繁冗至七月取土封壅其根加以糞穢候長成收取雖常灌水但俾水勢流滿潤濕則已不宜久蓄。

又蔗有四色紅蔗止堪生啖。芳蔗可作砂糖。西蔗可作霜。色淺不甚貴。杜蔗綠嫩味極厚專用作霜。凡蔗最困地力。今年爲蔗田者。明年改種五穀以滋息之。

薺



荊

菱

爾雅云

菱蘋

今水中菱

禮記疏云

今水

中

菱。一名芰。

芰也。屈到嗜芰。卽菱角也。武陵記云。兩角者。

三

角四角者芰。本草綱目云。其葉枝散。故字從芰。其

月稜。峭故謂之菱。而俗呼爲菱角。楊慎以芰爲雞頭者。

誤也。

一名水栗。

見風俗通。一名沙角。

見本草。一名薢。謂之芰。秦

謂之楚。楚文云。秦

謂之芰。秦

謂之生水澤處處有之。落泥中最易生。種陂塘者爲家

菱。葉實俱大。野生者小皆三月生蔓。延浮水上。葉扁而

有尖光面如鏡。葉下之莖有股如蝦股。一莖一葉兩兩

相差。如蝶翅狀。五六月開花黃白色。實更肥美。有無角

者。其色嫩青老黑。又有皮嫩而紫色者。謂之浮菱。食之

尤美。李時珍曰。其實或三角四角兩角無角。家菱角軟

高脆。亦有兩角彎卷如弓形者。其色有青有紅有紫嫩

也。

謂之生水澤處處有之。落泥中最易生。種陂塘者爲家

菱。葉實俱大。野生者小皆三月生蔓。延浮水上。葉扁而


有尖光面如鏡。葉下之莖有股如蝦股。一莖一葉兩兩

相差。如蝶翅狀。五六月開花黃白色。實更肥美。有無角

時剝食皮脆肉美。老則殼黑而硬。墮入水中。謂之烏鵲。冬月取之。風乾爲果。生熟皆佳。野蕷其角堅直刺人。其色嫩青老黑。嫩時剝食甘美。老則蒸煮食之。野人曝乾。剝米爲餅。爲粥爲糕爲果。皆可代糧。其莖亦可暴收。和米作餉。以救荒歉。蓋澤農有利之物也。

羣芳譜種植。秋間取熟黑者撒池中。來春自生。

芡



芥

一名鷄頭。

古今注云。芥。鷄頭也。一名芟。方言云。北燕謂之芟。青徐淮泗之間謂之芟。南楚江湘

之間謂之鷄頭。或謂之鳥頭。埤雅云。其蓬似鷄首。故曰鷄頭。

一名雁喙。

一名雁頭。

一名

鴻頭。

爾雅翼云。葉有芒刺。兼有一

名鷄頭。

一名

卵蓬子。

見管

子。

一名

蕎子。

本草經註云。芥實。即今蕎子也。

圓

一名

水硫黃。

孫公談圃云。芥甘滑可食。名

水硫黃。

詳見東坡雜記。

生水澤中處。

處有之。

三月生葉貼水。

大於荷葉。

皺文如縠。

蹙劙如沸。

面青背紫。俗名鷄頭盤。莖葉皆有刺。莖長丈餘。有孔有

絲。嫩者剥皮可作蔬茹。

五六月開紫花。結苞外有刺。如

蝶花在苞頂如魚目。莢大味甘平。濱無毒。補中強志。

殼內白米狀如魚目。莢大味甘平。濱無毒。補中強志。

芥。一名鷄頭。古今注云。芥。鷄頭也。一名芟。方言云。北燕謂之芟。青徐淮泗之間謂之芟。南楚江湘之間謂之鷄頭。或謂之鳥頭。埤雅云。其蓬似鷄首。故曰鷄頭。一名雁喙。一名雁頭。一名鴻頭。爾雅翼云。葉有芒刺。兼有一名鷄頭。一名卵蓬子。見管子。一名蕎子。本草經註云。芥實。即今蕎子也。圓

一名水硫黃。孫公談圃云。芥甘滑可食。名

水硫黃。詳見東坡雜記。

生水澤中處。

處有之。

三月生葉貼水。

大於荷葉。

皺文如縠。

蹙劙如沸。

面青背紫。俗名鷄頭盤。

莖葉皆有刺。莖長丈餘。有孔有

絲。嫩者剥皮可作蔬茹。

五六月開紫花。結苞外有刺。如

蝶花在苞頂如魚目。莢大味甘平。濱無毒。補中強志。

殼內白米狀如魚目。莢大味甘平。濱無毒。補中強志。

聰耳明目。開胃助氣。止渴益腎。除溼痺。腰脊膝痛。久服身輕不饑。耐老。莖止煩渴。除虛熱。生熟皆宜。根狀如三稜。煮熟如芋。可食。治心痛氣結病。

羣芳譜種植。秋間熟時。取實之老者。以蒲包包之。浸水中。三月間撒淺水內。待葉浮水面。移栽淺水。每科離二尺許。先以麻餅或豆餅拌勻河泥。種時以蘆記其根。十餘日後。每科用河泥三四碗壅之。

臍 莪



本草綱目 卷之二
荔臍

荔臍。一名芍。一名鳧茈。

爾雅云。芍。鳧茈。爾雅翼云。一名名爲鳧茈。當是鳧好食之。

元茨。本草綱目云。者爲荔臍。音訛也。大者爲荔臍。大者爲地栗。

舊名烏芋。以形似芋而色烏也。今皆名荔臍。又鳧茈。音訛也。

生淺水中。其苗三四月出土。一莖直上。無枝葉。狀如龍鬚。色正青。肥田生者。麤似細葱。高二三尺。其本白蒻。秋後結實。大者如山楂栗子。臍有聚毛。纍纍下生入泥底。野生者黑而小。食之多滓。種出者皮薄。色淡紫。肉白而大。軟脆可食。味甘微寒。滑無毒。治消渴。除胸實熱氣。作粉食。厚腸胃。療膈氣。消宿食。黃疸。治血痢。下血。血崩。辟蠱毒。消誤吞銅鐵。

翠芳譜種宜穀兩種

慈姑



慈姑

茨菰或作

慈姑。歲根生十二子。如慈姑之乳衆子。故名爾。雅
冀云。歲有閏則生十三子。一名藉姑。一名水萍。一名河
鳧。此一名白地栗。苗名翦刀草。一名翦搭草。一名燕尾
草。一名槎丫草。莖榦似嫩蒲。又似三稜。苗甚軟。其色深
青綠。每叢十餘莖內。抽出一兩莖。上分枝。開小白花。四
瓣。蕊深黃色。根大者如杏。小者如栗。色白而瑩滑。五六
七月采葉。正二月采根。煮熟味甘甜。時人以作果。

羣芳譜種植慈姑。豫於臘月間。折取嫩芽。種於水田來。
年四月盡。如種秧法種之。離尺許。田最宜肥。每顆花挺
一枝。上開數十朵。色香俱無。惟根至秋冬取食。甚佳。

百合



百合

百合。一名離。一名強瞿。一名蒜腦譜。一名夜合。根如葫
蒜。數十片相累。或云是蚯蚓相纏結變作之。其葉短而
闊。微似竹葉。白花四垂者百合也。葉長而狹。尖如柳葉。
紅花不四垂者山丹也。莖葉似山丹而高。紅花帶黃而
四垂。上有黑斑點。其子先結在枝葉間者卷丹也。又有
一種色微綠者。開花最遲。俗名真百合。

四時類要二月種百合。此物尤宜雞糞。每坑深五寸。如
種蒜法。又云取根曝乾。搗爲麪。細篩。甚益人。

農政全書宜肥地。加雞糞熟鋤。春取根大者。劈雜於畦
中。如種蒜法。五寸一科。二月半鋤之。滿三遍。則不鋤不

五年大如盞。頻澆則花開爛熳。清香滿庭。秋分亦可分。

欽定授時通考卷六十七

農餘

木一

楮 榆 桑 椴 檉 柏 杉 榧 桃 桑 榆 桤 桐

槐 榆

柳 檉

檉 柳

箕 柳

松



松

松。竦幹虬枝。碨柯多節。歲久皮皴。望若龍鱗。李時珍曰。
百木之長。猶公。故字從公。四時常青。不改柯葉。三針者。
爲括子松。七針者爲果松。千歲之松。下有茯苓。上有兔
絲。又有赤松。白松。鹿尾松。其產深山峭壁。偃蹇離奇者。
其根爲巖石所礙。下有磐石。則上爲偃蓋。非其性也。

事類全書栽松。春社前。帶土栽培。百株百活。舍此時。決
無生理也。斫松木須五更初。便削去皮。後無白蟻。山人
斫老松根。取松脂燃之。以代油燭。亦貧家之利。

農桑通訣插松。用驚蟄前後五日。斬新枝。斸院入枝。下
泥杵緊。相視天陰即插。遇雨十分生。無雨即省分數種。

欽定農桑考
卷六十七 農餘 木一
松柏法。入九月中。擇成熟松子。柏子去臺收頓。至來春
春分時。甜水浸子十日。治畦下水土糞。漫散子於畦內。
如種菜法。或單排點種上。覆土厚二指許。畦上搭短棚
蔽日。旱則頻澆。常須溼潤。至秋後去棚。長高四五寸。十
月中夾葛稽籬以禦北風。畦內亂撒麥糠覆樹。令稍上
厚二三寸止。南方宜微蓋。至穀雨前後。手爬去麥糠澆之。次
冬封蓋亦如此。二年之後。三月中。帶土移栽。先標區用
糞土相合內區中。水調成稀泥植栽於內。擁土令區滿
下水塌實。築脚踏杵無用。次日有裂縫處。以腳躡合。常澆令溼。
至十月祛倒。以土覆藏。毋使露樹。至春去土。次年不須
覆栽。大樹者於三月中移。廣畱根土。謂如一丈樹。畱土方三尺。地遠移者。

二尺五寸。一丈五尺樹。畱土三尺。或三尺五寸。用草繩纏樹根上。樹大者從下
剗去枝三二層。樹記南北。運至區處。栽如前法。

種樹書。栽松須去尖大根。惟畱四邊鬚根。則無不盛。春
分後勿種松。秋分後方宜種。法大槩與竹同。只要根實。
不令動搖。自然活。

齊民要術油松法。將青松研倒去枝。於根上鑿取大孔。
入生桐油數斤。待其滲入。則堅久不蛀。他木同。

本草

松子出遼東雲南者尤大。食之香美。

又松脂。一名松膏。一名松香。一名松膠。一名

瀝青。皆爲物用。

欽定四庫全書
本草綱目

柏



金匱
柏

柏。一名柏。爾雅云柏柕。陰木也。凡木皆向陽。柏獨向陰指西。

雅云柏柕。

故字從白。西方正色也。樹聳直皮薄肌膚。三月開細瑣。

花結實成毬狀如小鈴多瓣。霜後瓣裂中有子大如麥。芬香可愛處處有之。古以生泰山者爲良。今陝州宜州密州皆佳而乾陵尤異。木之文理多爲雲氣人物鳥獸。川柏亦細膩以爲几案光滑悅目。

農政全書種柏。九月中柏子熟時採。俟來年二三月間。用水淘取沉者著濕地二三日淘一次。候芽出將剗熟地調成畦水飲足以子勺撒其中覆細土半寸再以水壓下。二三日澆一次勿太濕勿太乾既生四圍豎矮籬。

護之。恐爲蝦蟆所食。常澆水糞。俟長高數尺分栽。
又秋時剪小枝二三尺。亦可插活。

檜



欽定四庫全書

卷之二十一

農餘

木一

六

檜

檜。柏葉松身。葉尖硬。亦謂之栝。今人名圓柏。以別側柏。
爾雅翼又有二種。別名檜柏。不甚長。其枝乍檜乍柏。一
枝之間屢變。人家庭宇植以爲玩。

老學菴筆記海檜有二種。海檜天矯堅瘦。皆天成。又有
刻削盤屈而成者。名土檜。海檜絕難致。凡人家所有。大
抵土檜也。

農桑通訣檜種如松法。插枝者。二三月檜芽葉動時。先
熟剷黃土地成畦。下水飲畦一遍。滲定再下水。候成泥
漿。研下細如小指檜枝。長一尺五寸許。下削成馬耳狀。
先以杖刺泥成孔。插檜枝於孔中。深五六寸以上。栽宜

稠密。常澆令潤澤。上短矮棚蔽日。至冬換作熒廬。次年二月月去後。候樹高移栽。如松柏法。

便民圖 松杉柏檜。俱三月下種。次年三月分栽。無不活。洞庭陸氏曰。移松杉柏檜。冬至及年盡。雖不帶土根亦活。正月九分活。二月七分活。清明後半活。

欵



楸

楸。梓。楨。爾雅曰。槐小葉曰。楨。大而散楸。小而散楨。椅梓。
鼠梓。又曰如木楸。曰喬。郭璞注曰。槐當爲楸。楸細葉者爲人皮。
粗散者爲梓。謂之虎梓。說文曰。櫟義疏曰。櫟。楨。楸。櫟屬今人謂之苦楸。小而
無角者。與梓子角者。亦木梓。本名爲柳楸。似楸有角者。然則楸梓二木相類者也。生江東者
根屬葉材。末異。世人見其色黃。呼爲角楸。或名子楸。黃白者也。生子江者。謂之櫟。櫟葉
大而不早震。楸木王。植于林。諸木皆內拱。造屋楸有之。良材也。故謂楨。櫟有之。櫟
故謂之櫟。櫟有之。櫟有之。

齊民要術 宜割地一方種之。梓楸各別。無令和雜。
又種梓法。秋耕地令熟。秋末冬初。梓角熟時。摘取曝乾。
打取子。耕地作壘。漫散。卽再勞之。明年春生有草枝。令

去勿使荒沒。後年正月間，勵移之方步，兩步一樹。此樹須大
不得栽，即無子。可於大樹四面掘坑，取裁移之。一方兩步
一根，兩畝一行，一行百二十株。五行合六百株。十年後
一樹千錢。柴在外，車板盤合樂器所在，任用勝於松柏。
農政全書春月斷其根，瘞於土，遂能發條，取以分種。

又花葉飼豬，並能肥大，且易養。

杉



杉

杉。一名櫟。

爾雅云
被粘。

一名沙。一名櫟。

類松而幹端直。大者

數圍。高十餘丈。文理條直。葉麤厚。微扁。附枝生。有刺。至冬不凋。結實如楓。有赤白二種。赤杉實而多油。白杉虛而乾燥。有斑文如雉尾者。謂之野鷄斑。入土不腐。燒灰最發火藥。

種樹書

插杉枝用驚蟄前後五日。斬新枝。鋤開根。入枝

下泥杵緊。

視天陰則插。插了遇雨十分無雨卽省分數。

農政全書

插杉法。江南宣歙池饒等處山廣土肥。先將

地耕過。種芝蔴一年。來歲正二月氣盛之時。截嫩苗頭一尺二三寸。先用镢春穴。插下一半築實。離四五尺成

行密則長。稀則大。勿雜他木。每年耘鋤。至高三四尺。則不必鋤。

椿



椿

椿。集韻作櫟。禹貢作柂。左傳作櫛。今俗名香椿。本草陳藏器云。俗呼爲豬椿。易長而有壽。南北皆有之。木身大而實。其幹端直。紋理細膩。肌包赤皮。有縱紋易起。


農桑輯要木實而葉香。有鳳眼者。謂之椿。木疎而氣臭者。謂之樗。又曰。有花而莢者。謂樗。無花不實。謂椿。

廣羣芳譜椿樗二木。形幹相類。無花木身。大幹端直者爲椿。有花木身小幹多迂矮者爲樗。一類二種也。

農政全書椿宜於春分前後栽之。

又其葉自發芽及嫩時。皆香甘。生熟鹽醃皆可茹。

梧桐



梧桐

梧桐。爾雅曰榮桐木。又曰櫟梧。郭璞注云人以其皮青號曰青桐也。今櫟皮。其木無節直生。理細而性緊。四月開花。五六月結子。莢長三寸許。五片合成。老則開裂如箕。名曰纍。鄂子綴其上。大如黃豆。雲南者更大。可生噉。亦可炒食。遁甲書云。梧桐可知月正閏。歲生十二葉。一邊六葉。從下數一葉爲一月。有閏則十三葉。視葉小處則知閏何月。立秋之日。如某時立秋。至期一葉先墜。又有白桐。一名華桐。一名泡桐。華而不實。蔡邕月令曰。桐始華。桐木之後華者也。岡桐。一名油桐。一名荏桐。一名瞿子桐。一名虎子桐。實大而圓。取子作桐油入漆。及油器物艤船。爲時

所須人多僞爲之。惟以篾圈擣起如鼓面者爲眞海桐。
生南海及雷州白而堅韌可作繩入水不爛。

齊民要術青桐九月收子二三月中作一步圓畦種之。

方大則難裏所以須圓小。治畦下水一如葵法五寸下一子少與熟糞和土覆之生後數澆令潤澤此木宜溼故也。當歲卽高一丈。

至冬豎草於樹間令滿外復以草圍之以葛十道束置

不然則凍死也。明年三月中移植於廳齋之前華淨妍秀極爲

可玩。明年冬不須復裹成樹之後剝下子一石

子於葉上生多者五六少者三四也。炒食甚美多嫩亦無妨也。白桐無子是明年之花房。

亦遶大樹掘坑取栽移之成樹之後任爲樂器青桐則不中用於山石之間生者樂器則鳴青白二桐並堪車板盤合

屨等用作。

農政全書正二月內以黃土拌鉅末少許或益或地上俱可種上覆土末寸半許時時用水澆灌使土長溼待長尺餘移栽冬間不用苦蓋。

又江東江南之地惟桐樹黃栗之利易得乃將旁近山場盡行鋤轉種芝蔴收畢仍以火焚之使地熟而沃首種三年桐其種桐之法要在二人並耦可順而不可逆一人持桐油一瓶持種一籮一人持小鋤一把將地剗起卽以油少許滴土中隨以種置之次年苗出仍要耘耔一遍此桐三年乃生首一年猶未盛第二年則盛矣生五六年亦衰卽以栗殼剝之一二年其栗便生且最

大。但其味略滯耳。首種三年桐爲利近速。圖久遠之利。
仍要樹千年桐。法亦如前種黃栗之法。候秋季落子。多
收擇高厚之處。掘地爲坑。下用礫糠鋪底。將種放下。上
用稻草蓋定。以土覆之。俟來年春氣盛時。治地成畦。約
一尺二寸。成行分種。空地之中。仍要種豆。使之二物爭
長。又可使直而不曲。待長一二尺。卽將山場依前法燒
鋤過。約闊五尺。成行移苗栽之。次年耘耔。

楮



楮

楮。一名穀。一名穀桑。有二種。雄者皮斑而葉無極叉。謂之斑穀。三月開花。成長穗。如柳花狀。不結實。雌者皮白無花。葉有極叉。似葡萄葉。開碎花。結實如楊梅。其實初夏生。大如彈丸。青綠色。六七月成熟。漸深紅。八九月采實名楮桃。一名穀實。

陸璣詩疏構幽州謂之穀桑。或曰楮桑。荆揚交廣謂之穀。中州人謂之楮。食其嫩芽可當菜茹。

酉陽雜俎穀田久廢必生構葉有瓣曰楮。無曰構。本草李時珍曰。楮本作杼。其皮可績爲紵故也。

又凡穀樹雄者不結實。歉歲人采花食之。雌者實如楊

梅半熟時。水澡去子。蜜煎作果食。

齊民要術。宜澗谷間種之地。欲極良。秋上楮子熟時。多收淨淘。曝令燥。耕地令熟。二月。糲構之。和麻子漫散之。卽勞。秋冬仍畱麻勿刈。爲楮作煖。若不和麻子種。卒多凍死。明年正月初。附地芟殺。放火燒之一歲。卽沒人。不燒者瘦。而長亦遲。三年便中斫。皮薄不任用。未滿三年者。斫法。十二月爲上。四月次之。非此而斫者。則然。不燒則不滋茂也。兩月多枯死也。每歲正月。常放火燒。自有乾葉在地。足得火。二月中間。斫去惡根。斸者地熟。楮科亦以留潤澤也。移栽者。二月蒔之。亦三年一斫。三年不斫者。徒其柴足。夫錢無益也。楮地賣者。省功而利少。煮剥賣皮者。雖勞而大。以供然。自能造紙。其利又多。種三十畝者。歲斫十畝。三年一偏。歲收絹百疋。

廣州記蠻夷取穀皮熟搗爲揭裏蜀布以擬氈甚煖也。其木腐後生菌耳味甚佳。

農桑通訣南方鄉人以穀皮作衾甚堅好鬻之實爲貧家之利焉。

槐



槐

槐爾雅曰棖。有青黃白黑數種。白槐似柂而葉差小。其葉細而包青絲者直謂之槐。有守宮槐一名紫槐。幹弱花紫晝合夜開。又色黑者爲豬屎槐。材不堪用。四五月開黃花。未開時狀如米粒。採取曝乾。炒過煎水染黃甚鮮。青槐花無色不堪用。七八月結實。作莢如連珠。中有黑子。以子多者爲好。淮南子曰。槐之生也。季春五日而免目。十日而鼠耳。更旬而始規。二旬而葉成。諸槐功用大略相等。木有極高大者。材實重可作器物。

齊民要術 槐子熟時多收。擘取數曝勿令蟲生。五月夏至前十餘日。以水浸之。如浸麻子法也。六七日當芽生。好雨種

麻時和麻子撒之當年之中卽與麻齊。麻熟刈去獨留槐槐既細長不能自立根別樹木以繩欄之。以茅裹不則傷皮成痕瘢也。雨多風冬天多風繩欄宜三年正月移而植之亭亭條直千百若一。所謂蓬生麻中不扶自直。若隨宜取栽匪直長遲樹亦曲惡。宜於園中割地種之。若園好未移之間妨廢耕墾也。農政全書初生嫩芽焯熟水泡去苦味可薑醋拌食曬乾亦可代茶飲也。

欽定四庫全書
本草綱目

榆



金匱要略

卷之十一

十一

榆

榆爾雅曰榆白粉。又曰蘆莖。註曰。粉榆先生葉。卻著莖皮。色白。蘆莖今之刺榆。廣志曰。有姑榆。有郎榆。案今世有刺榆木甚牢。可以爲車轂及器物。山榆可以爲蕪蕡。凡種者宜種刺楨兩種。利者爲多。其餘軟弱例非佳好之木也。

四民月令三月榆莢成及青收乾以爲旨蓄。

旨美也。蓄積也。司部收青小蒸曝之至冬以釀酒滑香宜養老。詩云我有旨蓄亦以御冬也。

色變白將落可作

醤。酬隨早晏勿失其適。

音頭。榆。醤。

齊民要術榆性扇地其陰下五穀不植。

隨其高下廣狹東西三方所

扇各與樹等。

種者宜於園地北畔秋耕令熟至春榆莢落時。

收取漫散犁細畊勞之榆生共草俱長明年正月初附地芟殺以草覆上放火燒之。

一根上必十數條俱生正強者餘悉掐去之。

一歲之中長八九尺矣。不燒則長遲矣後年正月二月移栽之。

不燒則長遲矣

初生卽移者喜曲故須採叢林長至三年乃移栽。

長而細又多瘢痕不剝則短龐而無

依法燒之則依前茂矣。科茹太長更須裁不用剝沐。剝者長而細又多瘢痕不剝則短龐而無

病謬曰不剝沐十年成軸言

易龐也必欲剝者宜畱二寸於塗坑中種者以陳屋草布塗中散榆莢於草上以土覆之燒亦如法。

陳草還似肥良勝糞

無陳草者用糞糞之亦佳

糞雖

生而瘦旣栽移者燒亦如法也

糞雖

又種榆法其餘地畔種者致雀損穀旣非叢林率多曲

戾不如割地一方種之其田土薄地不宜五穀者唯宜

榆及白楊地須近市。

賣柴夾葉

省功也

挾榆刺榆凡榆三種色

別種之勿令和雜挾榆莢葉味苦凡榆莢味甘

是須別也

先耕地

作壘然後散榆莢壘者看好料理又易得中散訖勞之榆生

甘者春時將煮賣

是須別也

先耕地

芟殺燒斫。一如前法。三年春可將莢葉賣之。五年之後便堪作椽。不棟者即可斫賣。一根桺者鏹作獨樂及盞。一箇。三十文。一根桺者鏹作獨樂及盞。十年之後。魁椀瓶榼器皿無所不任。器皿一百文也。三十文。一十五年後中爲車轂。及蒲桃瓮。瓮一車轂一具。值絹二十口。一百文。則三百四十貫。莢葉三十束。則三十萬束。則三十萬貫。其歲歲科簡剝治之功。指柴顧人。十束雇一人。無業之人。爭來就作賣柴之利。已自無貲。歲出萬束。一束三十萬貫。則三十萬貫。莢葉三十束。則三十萬貫。在外。况諸器物。其利十倍。於柴三十萬貫。歲收三十萬貫。研後復生。不勞更種。所謂一勞永逸。能種一頃。歲收千疋。唯須一人守護。指揮處分。旣無牛耕種子。人功之費。不慮水旱風蟲之災。比之穀田。勞逸萬倍。男女初生。各與小樹二十株。比至嫁娶。悉任車轂。一樹三具。一具值絹三疋。成絹二

百八十疋聘財資遣。龐得充事。

農桑通訣。榆醬能助肺。殺諸蟲下氣。榆葉曝乾。搗羅爲末。鹽水調勻。日中炙曝。天寒於火上熬過。拌菜食之。味頗辛美。榆皮去上皺。瀝乾枯者。將中間嫩處剉乾。礧爲粉。當歉歲亦可代食。昔沛豐歲饑。民以榆皮作屑。煮食之人賴以濟焉。

農政全書。榆根皮作麪。可和香劑。嫩葉爛浸淘淨可食。榆錢可羹。又可蒸糕餌。榆皮溼搗如糊。粘瓦石極有力。汴洛以石爲碓嘴。用此膠之。

柳



柳

柳。易生之木也。性柔脆。北土最多。枝條長軟。葉青而狹長。其長條數尺。或丈餘。媯媯下垂者。名垂柳。木理最細膩。陳藏器曰。江東人通名楊柳。北人都不言楊。楊樹枝葉短。柳樹枝葉長。李時珍曰。楊枝硬而揚起。故謂之楊。柳枝弱而垂流。故謂之柳。蓋一物二種也。柳至春晚。葉長成花。花中結細子。如粟米大。細扁而黑。上帶白絮。如絨。名柳絮。又名柳絨。隨風飛舞。著毛衣。卽生蟲。入池沼。隔宿化爲浮萍。又憑柳可以爲櫛。車輞雜材及梳。

陶朱公書。凡種柳千樹。則足柴。十年以後。髡一樹。得一載。歲髡二百樹。五年一週。

齊民要術種柳。正月二月中。取弱柳枝大如臂。長一尺半。燒下頭二三寸埋之令沒。常足水以澆之。必數條俱生。留一根茂者。餘皆研去。別豎一柱。以爲依生。每一尺以長繩柱欄之。所搘不能自立。必爲風枝葉卽掐去。令直聳上。高下任人取足。便掐去正心。卽四散下垂。婀娜可愛。若不掐心。則枝不四散。或斜或曲。生亦不佳也。六七月中。取春生少枝種。則長倍疾。壯故長。疾也。少枝葉青無葉。下田停水之處。不得五穀者。可以種柳。八九月中。水盡燥溼得所時。急耕則鐫榦之。至明年四月。又耕熟。勿令有塊。卽作場壘。一畝三壘。一壘之中。逆順各一到。場中寬狹。正似葱壘。從五月初盡七月末。每天雨時。卽觸雨折取。春生少枝。

長疾三歲成椽。比於餘木。雖微脆亦足堪事。一畝二千六百六十根。三十畝六萬四千八百根。根直八錢。合收錢五十一萬八千四百文。百樹得柴一載。合柴六百四十八載。直錢一百文。柴合收錢六萬四千八百文。都合收錢五十八萬三千二百文。歲種三十畝。三年種九十畝。歲賣三十畝。終歲無窮。

檉柳附

檉柳。爾雅曰。檉河柳。乃河旁赤莖小楊。植生水旁。皮正赤如絳。枝葉如松。一名雨師。一名赤檉。本草云。天將雨。檉先起氣應之。負霜不凋。乃木之聖。故字從聖。一名河柳。一名人柳。一名三眠柳。一名觀音柳。一名長壽仙人。

金匱要略通考 卷之三
柳幹小枝弱葉細如絲。年三次作花。花如蓼花。穗長二三寸。色微紅。

檉柳

附

檉柳。一名鬼柳。本草云。其樹高舉。其木如柳。故名。爾雅注作柜。卽孟子所謂杞柳也。多生溪澗側。高大者四五丈。合二三人抱。其葉似柳非柳。似槐非槐。鄭樵通志云。檉乃榆類。其實亦如榆錢。鄉人採其葉爲甜茶。

便民圖種杞柳。二月間先將田用糞壅灌。戽水耕平。以柳鬚斷作三寸許。每入一握。隨田廣狹併力一日齊種。頻以濃糞澆之。有草卽用小刀剜出。田勿令乾。八月研起刮去柳皮。曬乾爲器。根旁敗葉掃淨則不蛀。至臘月

間。將重長小條。復斫去長者。亦可爲器。舊根常留。

箕柳

附

種箕柳法。山澗河旁。及下田不得五穀之處。水盡乾時。
熟耕數遍。至春凍釋。於山坡河坎之旁。刈取其柳三寸
絕之。漫散卽勞。勞訖引水停之。至秋任爲簸箕。五條一
錢。歲收萬錢。山柳赤而脆。河柳白而韌。

楊



楊

楊有二種。白楊青楊。白楊一名高飛。一名獨搖。微帶白色。高者十餘丈。性勁直。堪爲屋材。青楊又有二種。一種梧桐青楊。身聳直高大。一種身矮多岐枝。不堪用。楊與柳自是二物。柳枝長脆葉狹長。楊枝短硬葉圓闊。北方材木全用楊槐榆柳四種。是以人多種之。

齊民要術種白楊。秋耕地熟至正月二月中。以犁作壘。一壘之中。以犁逆順各一。到場中寬狹各似作蔥壘。訖。又以鋤掘底一坑作小壘。所取白楊枝大如指。長三尺者屈着壘中。以土壓上。令兩頭出土向上。直豎二尺一株。明年正月中。剝去惡枝。一畝三壘。一壘七百二十

株。一株兩根。一畝四千三百二十株。三年中爲蠶撻。
反五年任爲屋椽。十年堪爲棟梁。以蠶撻爲壅。一根五
錢。一畝歲收二萬一千六百文。柴又作梁埽住在外。歲種三十畝。
三年九十畝。一年賣三十畝。得錢六十四萬八千文。周
而復始。永世無窮。比之農夫。勞逸萬倍。去山遠者。實宜
多種。千根以上。所求必備。

博聞錄

楊柳根下先埋大蒜一枚。不生蟲。

種樹書

種水楊須先用木樁釘穴方入楊庶不損皮易

長。臘月二十四日種楊樹。不生蟲。