



外科正宗目錄

卷一

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陽半陰症歌第五

癰疽五善歌第六

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法并禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆十一

病有三因受病主治不同論十二

外科正義 卷之二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷二

瘡瘍看法十五

腫瘍治法十六

腫瘍主治方十七

潰瘍治法十八

潰瘍主治方十九

卷三

癰疽圖形二十

癰疽諸名歌二十一

腦疽二十二

卷四

發背二十三

疔瘡二十四

脫疽二十五

卷五

瘰癧二十六

鬚疽二十七

卷六

咽喉二十八

時毒二十九

瘻瘤三十

肺癰三十一

卷七

流注三十二

乳癰三十三

附骨疽三十四

卷八

腸癰三十五

臘毒三十六

痔瘡三十七

下疳三十八

魚口便毒三十九

卷九

囊癰四十

懸癰四十一

臀癰四十二

楊梅瘡四十三

結毒四十四

多骨疽四十五

陰瘡四十六

卷十

傷寒發頤四十七

癟發四十八

癰疽四十九

小腹癰五十

鶴口疽五十一

龍泉疽虎鬚毒五十二

石榴疽五十三

穿踝疽五十四

大麻風五十五

翻花瘡五十六

腋癰五十七

脅癰五十八

鼻痔五十九

骨槽風六十

紫白癩風六十一

齒病六十二

腦漏六十三

破傷風六十四

跌撲六十五

金瘡六十六

杖瘡六十七

竹木刺六十八

湯潑火燒六十九

甲疽七十

繭脣七十一

痞癰七十二

天蛇毒七十三

頭痛七十四

合谷毒七十五

鼻出血七十六

牙縫出血七十七

血箭血痣七八八

卷十一

鵝掌風七十九

腎囊風八十

疥瘡八十一

瞼瘡八十二

血風瘡八十三

頑癬八十四

膿窠瘡八十五

火丹八十六

天泡八十七

肺風粉刺酒皶鼻八十八

雀斑八十九

汗斑九十

油風九十一

白屑風九十二

耳病九十三

漆瘡九十四

瘡瘍瘡九十五

痄腮九十六

痰包九十七

癩風九十八

溼腫九十九

女人面生黧黑斑一百

鈎鉗風一百一

枯筋箭一百二

婦人腳丫作癢一百三

手足破裂一百四

眼丹一百五

眼胞菌毒一百六

黑子一百七

體氣一百八

白禿瘡一百九

奶癬一百十

蟾拱頭一百十一

小兒遺毒爛斑一百十二

蠟蛇串一百十三

小兒痘風瘡一百十四

小兒赤遊丹一百十五

走馬疳一百十六

重舌一百十七

胎瘤一百十八

鵝口瘡一百十九

痘癰一百二十

痘疔一百二十一

黃水瘡一百二十二

卷十二

大人口破一百二十三

脣風一百二十四

臭田螺一百二十五

牛程蹠一百二十六

蟻螂蛀一百二十七

田螺泡一百二十八

皴痛一百二十九

凍風一百三十

陰蝨一百三十一

蒲桃疫一百三十二

咬傷一百三十三

風犬傷一百三十四

惡蟲叮咬一百三十五

百蟲入耳一百三十六

誤吞針鐵骨哽咽喉一百三十七

人面瘡一百三十八

陰毒一百三十九

失榮症一百四十

中砒毒一百四十一

落丁領擎法一百四十二

救自刎斷喉法一百四十三

試知百病死生法一百四十四

造孽報病說一百四十五

仙方活命飲今古不同論一百四十六

拾遺症一百四十七 繃縛背瘡法一百四十八

癰疽內肉不合法一百四十九

煉元明粉法一百五十 煉金頂砒法一百五十一

煉硝石法一百五十二 取蟾酥法一百五十三

製附子法一百五十四 昇白靈藥法一百五十五

製寒食麪法一百五十六

製披針喉針法一百五十七

諸藥製法一百五十八 逐日人神歌一百五十九

十二時人神歌一百六十

十干日針忌歌一百六十一

尻神歌圖一百六十二 醫家五戒一百六十三

醫家十要一百六十四

外科正宗卷二

海甯許楣辛本訂

明崇川陳實功著 吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光焻寅昉校

瘡瘍看法第十五

初起頂高根活色赤發熱。掀腫疼痛。日漸高腫者順已成掀痛。皮薄光亮。飲食如常。二便調和。身溫者順。已潰膿稠。色鮮不臭。腐肉自脫。掀腫易消。身輕者順。潰後新肉易生瘡。口易斂。飲食漸進者順。初起頂平根散。色暗。

微腫不熱不疼身體倦怠者逆已成腫堅色紫不作膿。
不腐潰惟口乾多煩躁者逆已潰皮爛肉堅不腐腫仍
不消痛仍不減心煩者逆潰後膿水清稀腐肉雖脫新
肉不生色敗臭穢者死。

楣案此係總論看法各卷分論大略相同徐氏謂
不必重出良然

腫瘍治法第十六

初起知痛或不痛起發或不發母論陰陽表裏日數遠
近但未見膿者俱宜灸之徐曰寒毒方宜灸既灸不知痛癢明

灸之。掀腫發熱。疼痛有時。脈來浮數。無便秘者。宜藥托之。身體拘急。脈緊惡寒。飲熱就暖者。邪在表也。宜汗之。腫硬痛深。口乾便秘。身熱脈實者。邪在裏也。宜下之。掀痛勢甚。煩躁飲冷。舌乾口燥者。火在上也。宜清之。腫痛堅硬。背如負石。惡心乾嘔。邪毒在內。解毒拔之。腫痛日深。內膿不出。瘀肉塗塞瘡口者。急宜開割之。軟慢不作膿。及不腐潰者。陽氣虛也。壯脾胃。助陽氣。身涼自汗。手足並冷。六脈虛細。便泄陽脫也。急溫之。

楣案原本此後接以癰疽治驗各條。余觀之皆發

背也。敘于諸方之前爲失次。故另補發背總論。而移于第四卷腦疽之後。

腫瘍主治方第十七

神授衛生湯

衛生湯用阜歸銀
芷甲羌防翹草節

粉乳紅沈石決明
大黃便秘得之行

治癰疽發背。腦疽對口。丹瘤瘰癧。惡毒疔瘡。溼痰流

注。及一切諸毒。未成者卽消。已成者卽潰。能宣熱散

風。行瘀活血。解毒消腫。疏通臟腑。且藥性平和。功效

甚速。誠外科首用方也。

徐曰外科治法不外宣熱散風十六字

羌活

八分

昉風

白芷

穿山甲

研

土炒

沈香

紅花

連翹

石決明

煅各六分

金銀花

皁角刺

歸尾

甘草節

花粉

各一錢

乳香

五分

大黃

酒拌炒二錢。脈虛便利者不用。

水二碗煎八分。病在上部先服藥。隨後飲酒一杯。病在下部先飲酒一杯。隨後服藥以行藥勢。

徐曰。此外科之主方。加減不外乎此。羌活搜風發

表勝溼。防風解表去風勝溼。白芷發表散風熱。活

血排膿。連翹散結消腫排膿。瘡家聖藥。甘草節生

肌止痛。惟花粉大寒不可用。破後口渴乃可用。其

方之分兩亦宜斟酌得中除大黃外共一兩零五分

又曰外科與內科大不相同內科之病千頭萬緒一病必有一病之主方外科不過托毒清火及生肌長肉等數法耳卽有加減亦惟隨症選擇幾味無多法也集中所載不下數百方細審之不外數十方學者果能將藥性細細參考隨症施治無投不利也

楣案外症陽毒卽不服藥亦能自腫自潰以至收

功。然有藥以治之。則可內消陰毒。非服藥不可。集中首列衛生湯。蓋卽仙方活命飲。而藥味小有出入。本是古法。然余觀他書治陰陽二毒之方。儘有佳者。目擊試驗。今附錄于左。

四妙湯

卽神效托裏散

生黃耆

五錢

大當歸

一兩

金銀花

一兩

甘草節

二錢

右藥水煎。晝夜服盡。自可移深居淺轉。重作輕。如已成氣血素虧。不能穿潰者。加白芷。阜針。山甲各二錢。一伏時。自潰。如已潰後。卽宜刪去阜針。山甲。如初起。

掀痛口渴加天花粉。此方出外科說約。顧世澄瘍醫

大全中采之。謂此乃瘍科首用捷法。數十年來凡治

一切癰疽。皆賴此方。增減活法。臨時酌用。遇大症。金

銀花每加至六兩四兩。生黃耆加至兩許。當歸加至

二兩。甘草節加至三錢。但見瘡色不起。膿水清稀。卽

加肉桂轉陰爲陽。化毒成膿。如乳癰乳吹。卽加蒲公

英一兩立消。百發百中。萬穩萬當。如偏身有溼熱瘡癬者勿用

楣案金銀花須重用。方得力。他書載一園丁發背甚危。取金銀藤五六兩搗爛入熱酒一鍾。絞取汁。

溫服。渣罨患處。四五服而平。後用此藥治瘡。因以養身成家。遂棄園業。蓋金銀花治瘡未成卽散。已成卽潰。藤與花功用相同也。

又案全生集謂大癰潰後。醫多用炙耆炙草。或用半炙半生。殊不知耆草皆炙。適以補毒。而不能托毒。倘毒氣未盡。反得補助。致攻內腑。則如之何。此說甚當。蓋不獨未潰以前不可用炙耆炙草矣。

又案昔有人傳一方。遇赤貧者生大毒。以阜角刺四兩。生甘草二錢。酒水各半煎服。初起一二劑卽

消余試驗數人。然有力者不如用四妙湯爲妥。

陽和湯

熟地黃

一兩

白芥子

二錢炒研

鹿角膠

三錢

肉桂

一錢

薑炭

五分

麻黃

五分

加生甘草

一錢乳岩加

土貝母

五錢

右藥用水加酒一杯同煎。

相案全生集治陰疽專恃犀黃丸及此方。大指謂諸疽白陷乃氣血虛寒凝滯所致。陽和一轉則凝結之毒自能化解。血虛不能化毒者尤宜溫補排膿。膿雖已潰毒氣未盡通其腠理之功仍不可緩。

蓋補而不溫。則血凝氣滯。孰作釀膿之具。猶之造酒不暖。何以成漿。造飯無火。何以得熟。溫補而不開腠裏。則寒凝之毒。何從覓路行消。且毒盛者反受其助。猶車粟以助盜糧矣。余謂徐氏痛詆溫補。蓋爲十全大補等方。略不顧及外症。及專用參附者言也。此方用熟地。薑桂鹿角。以爲溫補之品。用麻黃以開腠理。用白芥子以消皮裏膜外之痰。具有法度。全生集又謂熟地得麻黃。則不膩膈。麻黃得熟地。則不發表。神用在斯。其言良是。余見獲效。

者頗多。昔一親戚患腦疽。色如隔宿豬肝。蔓延無
畔岸。醫投以涼藥。神思昏憊。余令服此方。一劑而
神清毒活。漸次出膿而愈。知全生集之不余欺也。
然半陰半陽之症。卽不可用。

醒消丸

乳香	一兩	沒藥	一兩	麝香	一錢	雄精	五錢
去油		去油					

右乳沒雄三味各研秤準。再合和麝香共研。用爛煮
黃米飯一兩入末搗和爲丸。如萊菔子大。如飯嫌乾。
量加開水可也。晒乾忌烘。每服三錢。熱陳酒送下。醉

蓋取汗酒醒癰消痛息此方專治紅癰

犀黃丸

真犀黃三分

乳香一兩去油

沒藥一兩去油

麝香一錢五分

石藥先將乳沒各研秤準再合和犀麝共研用黃米飯一兩如前法爲丸飯嫌乾酌加開水晒乾忌烘凡乳岩瘰癧痰核橫痃流注肺癰小腸癰等毒每服三錢熱陳酒送下患生上部臨卧服下部空心服此方

紅癰亦可用

楣案外症丸藥以此方爲最妙治白疽與陽和湯

相輔而行。陽和湯有時須斟酌用之。而此方無投
不利。所見獲效者甚多。余仲兄珊林喜食厚味。而
不嗜茶。數十年來。腦背等處屢欲生大瘡。皆乘其
初起。服此丸得消。戊午年夏間生疔尤危險。其疔
甚奇。兩兩相對而生。腦門左右兩額角兩額兩太
陽穴兩耳門共十箇。惟兩眉之間一箇。初以爲暑
癆。不甚在意。俄覺身發寒熱。飲食不進。神思恍惚。
知爲大毒。急服此丸。并另服煎藥。用生黃耆至四
兩。生甘草至五錢。漸覺神清熱退。毒亦高腫潰爛。

甫旬日而九毒已收功。惟餘二毒出膿稍遲。又半月全愈。潰膿後停服犀黃丸。仍服生黃耆及調理脾胃托毒之品。胃口日開。但厭食葷腥。又一月卽如常矣。因係疗毒。首尾用洞天膏及頭二三瓶。參藥。

又案犀乃牛之別種。方用犀黃。實牛黃耳。牛黃以產于陝西者爲最勝。世稱西黃。西犀同音。遂訛爲犀黃。不知藥有犀角無犀黃也。陝產牛黃質輕而細。如千層蚌殼。重疊可揭。用津唾磨指甲上。黃透

指甲洗之不退者真其產于廣中者名廣黃質重而粗無千層蚌殼紋磨指甲黃色亦不甚透醫家取其價賤用代西黃然其力甚薄合此丸斷不可用駱駝亦有黃大而灰黯肆中以充廣黃乃是偽品更有以雞子黃晒乾混充則貨藥者之造孽矣用者審之

三黃丸

熟大黃

三錢

乳香

一兩去油

沒藥

一兩去油

雄精

五錢

麝香

一分一錢

犀黃

三分

石將熟大黃酒浸透。隔湯蒸軟搗爛。再將餘五味研極細和入。再搗干杵爲丸。如梧子大。每服五錢。此丸專治懸癰紅腫熱毒疼痛。大癰楊梅結毒火毒等症。連服十次。雖甚險者全愈。

五通丸

廣木香

五靈脂 麻黃

乳香去油

去油

沒藥去油

去油

右藥等分。各研極細末。再秤準研勻。用黃米飯搗爛。入末再搗爲丸。如梧子大。另以芎歸赤芍連翹生甘草等藥煎湯送丸。每服五錢。凡大癰生於要緊穴道。

將在發威之際。服此甚效。如與三黃丸間服。更妙。

小金丹

白膠香

五靈脂

草烏

地龍

木鼈

各一兩
五錢

乳香

去油

沒藥

去油

歸身

各七錢
五分

墨炭

一分
一錢

麝香

三分

右白膠香以下八味。各研極細末。秤準和勻。再入麝香墨炭同研。用糯米粉一兩二錢爲厚糊。和入諸末。搗干杵爲丸。如芡實大。此一料約爲二百五十九。晒乾忌烘。蓋瓶密藏。勿令泄氣。臨用取一丸布包放平。

石上隔布敲細。取好酒調藥令勻。蓋好浸一二時許。
再用銀物研過。熱陳酒送服。醉蓋取汗。楣案此須斟酌如每日服無每日取汗之理
一丸至服消乃止斷流注初起及一應痰核癰癧

乳岩橫痃初起。服消乃止。如流注初起。及一應痰核癰癧。
潰久者。當以十九作五日早晚服。服則可杜流走。不
至再增。但方內有五靈脂。與人參相反。不可與有參
之藥同日服。

控涎丹

金生集易名子龍丸

製甘遂

紅芽大戟

白芥子

炒

右藥等分各研秤準再合研煉蜜爲丸每服三分淡
薑湯送下日服三次凡實痰流注瘰癧橫痃初起皆
宜服此丹以消之製甘遂之法每斤用甘草四兩煎
湯浸三日湯黑換河水淘洗再用清水日淘日浸每
日換水數次三日後去心再淘浸四五日取一撮入
白瓷盆內隔一宿盆中水無異色乃濺乾以麪裹如
團棗火煨至麪團四面皆黃內藥熟透取出晒乾入
鍋炒透磨粉其苦寒之性經製則不苦而甜不寒而
溫矣如藥肆已經製過但須清水浸一二日並無黑

色便可用。製大戟之法去附枝水煮透去骨取皮切
晒磨粉甘遂與甘草相反不可與有甘草之藥同日
服。

內消沃雪湯

內消沃雪草歸皮
阜甲射干銀貝芍

乳沒青翹歸芷耆
木香花粉大黃宜

治發背併五臟內癰。尻臀諸腫大小腸癰肛門臘毒。
初起但未出膿堅硬疼痛不可忍者。

青皮

陳皮

乳香

沒藥

連翹

黃耆

當歸

甘草節

白芷

射干

天花粉

穿山甲

貝母

白芍

金銀花

草角刺各八分

木香四分

大黃二錢

水酒各一碗煎至八分量病上下食前後服之

徐曰此方以治氣分之症爲宜但藥味太雜宜揀擇熟讀藥性方能知也

內疎黃連湯

內疎黃連湯木香

梔歸芩芍薄荷榔

大黃桔草連翹共

邪毒消除身自強

治癰疽腫硬發熱作嘔大便秘澀煩躁飲冷噦呃心

煩舌乾口苦六脈沈實有力此邪毒在臟也急宜服此以內除之使邪氣不得傳變經絡

木香

黃連

山梔

當歸

黃芩

白芍

薄荷

檳榔

桔梗

連翹

各

錢

甘草

五分

大黃

二錢

水二茶鍾煎八分食前服。臨服加蜜二匙亦可。

徐曰。此爲寒下之劑。

保安萬靈丹

萬靈丹用尤防風川草二烏甘蝎芥

羌活麻黃歸斛芎
雄黃何首北辛同

治癰疽疔毒對口發頤風溼風溫溼痰流注附骨陰疽鵝膝風症左癰右瘍口眼喎斜半身不遂氣血凝滯偏身走痛步履艱辛偏墜疝氣破傷風牙關緊閉截解風寒無不應效。

茅术

八兩

全蝎

石斛

當歸

甘草

炙

明天麻

川芎

羌活

荆芥

防風

麻黃

北細辛

川烏

湯泡去皮

草烏

湯泡去皮尖

何首烏

各一兩

明雄黃

六錢

右爲細末。煉蜜丸。每藥以一兩作四丸。一兩作六丸。
一兩作九丸。三等做下。以備年歲老壯病勢緩急取
用。預用硃砂六錢研細爲衣。瓷罐收貯。治癰疽初起。

二三日之間。或已成至十朝前後。尚未出膿。狀若傷
寒。頭疼煩渴。拘急惡寒。肢體疼痛。惡心嘔吐。四肢沈

重恍惚悶亂坐卧不甯皮膚壯熱者。又治傷寒四時
感冒傳變疫症。但惡寒身熱表症未盡者俱宜服之。
用連鬚大蔥白九枝煎湯一茶鍾。將藥一丸乘熱化
開。通口服盡。被蓋出汗爲效。如服後汗遲。再用葱白
湯催之。後必汗如淋洗。漸漸退下。覆蓋衣物。其汗自
收自斂。患者自然爽快。其病如失。未成者隨卽消去。
已成者隨卽高腫潰膿。如諸疾無表症相兼不必發
散者。只用熱酒化服。此方原載於諸風癱瘓門。予每
用之發散瘡毒。其功甚捷。故移錄於此。詳觀此方治

腫瘍甚效者何也。凡榮衛不調氣血凝滯乃生癰腫。此方性專發散又能順氣搜風通行經絡所謂結者開之。況瘡毒乃日積月累結聚所發苟非甘溫辛熱發泄以汗疏通安能得效所謂發散不遠熱正合此方之意也。服後避風當食稀粥忌冷物房事孕婦勿服。

徐曰此方剛燥膏粱之人不宜用藥亦太雜。

又曰此方治寒溼之毒爲宜餘者當斟酌。

楣案以此方治風溫及傷寒四時感冒傳變疫症。

實開外科妄治內症之弊

雙解復生散

歸
翹滑石銀羌活

麻黃甘草荷山梔

治癰疽發背諸般腫毒初起憎寒發熱四肢拘急內

熱口乾大小便秘宜此藥發表攻裏

荆芥

防風

川芎

白芍

黃耆

麻黃

甘草

五分

薄荷

山梔

當歸

連翹

滑石

金銀花

羌活

人參

白朮

各八分

大黃

芒硝

各二錢

水二碗表症甚者加薑三片葱頭二莖裏症甚者臨

外科古方卷一
服加生蜜三匙爲發表攻裏雙解藥也。

徐曰此方以散風爲主藥味亦雜。毒甚而體強者可用。

內消散

內消散內用銀花知貝天花白芨加半夏乳香併阜甲

此方神效病全瘥

瘡。治癰疽發背對口。疔瘡乳花百種無名腫毒。一切歹雖未全愈。亦可轉重就輕移深居淺。

金銀花

知母

貝母

天花粉

穿山甲

白芨

半夏

阜角

乳香

各

水酒各一碗。煎八分。隨病上下食前後服之。留藥渣搗爛。加秋芙蓉葉細末一兩。白蜜五匙。同渣調敷瘡上。一宿自消。重者再用一服。忌口效。

徐曰。此方能散熱痰。與前諸方近。不必錄。

清熱消風散

清熱消風散芍耆柴芩翹與紅花皀

銀花歸粉草陳皮蒼朮防芎和解宜

治癰疽諸毒。已成未成之間。外不惡寒。內無便秘。紅赤高腫。有頭掀痛。宜服此藥和解之。

防風

川芎

當歸

黃芩

白芍

花粉

金銀花

甘草

五分

連翹

紅花

柴胡

蒼朮

陳皮

黃耆

角刺

各一

錢

水二茶鍾煎八分食遠服婦人加香附童便炒已上七方癰疽七日前瘡勢未成形體壯實表裏之症相合者宜服病退卽已如過七日以後形勢已成便宜用後托裏等藥催毒在外以速其膿禁前表下之藥損傷元氣致生他變

徐曰此卽前諸方之意無他異義

內固清心散

內固清心散 茯苓 人參 菟豆 粉

砂雄 三元明粉 冰片 生甘草 痘自輕

治癰疽發背對口疔瘡熱甚掀痛煩躁飲冷服此可
預防毒氣內攻不致變症。

茯苓

辰砂

人參

甘草

雄黃

元明粉

白豆蔻

乳香

冰片一錢

真豆粉

兩二

右爲細末。每服一錢五分蜜湯調下。不拘時候。

徐曰。此護心之方也。然護心另有效方。此方可不

備。

護心散

護心散用好硃砂

豆粉乳香甘草加

兩錢送下惡心嘔吐頓然瘥

治瘡毒內攻。口乾煩躁。惡心嘔吐。

真豆粉一

兩

乳香

淨末三錢

硃砂

二錢

甘草

末一錢

右共研極細。每服二錢。白滾湯調服。早晚二次。

徐曰。此不必。

琥珀蠟礬丸

琥珀蠟礬丸琥珀

明礬黃蠟與硃砂
雄黃蜂蜜丸成就護心護膜效堪誇

治癰疽發背已成未膿之際。恐毒氣不能外出。必致內攻。預服此丸。護膜護心。亦且散血解毒。

白礬

一兩

黃蠟

一兩

雄黃

一錢二分

琥珀

一錢另研極細

硃砂

一錢二分

蜂蜜

二錢

右將白礬等四味先碾研極細。另將蜜蠟銅杓內溶化。離火片時候蠟四邊稍凝時。方入上藥攪勻。共成一塊。以一人將藥火上微烘。眾手急丸。小篆豆大。用硃砂爲衣。瓷罐收貯。每服二三十丸。白湯食後送下。病甚者早晚日進二次最效。

徐曰。此護心緩治之方不可少。

托裏消毒散

托裏消毒散人參
角針白芷銀花等

芍藥歸朮茯苓
桔梗甘草效如神

治癰疽已成。不得內消者。宜服此藥以托之。未成者。

可消已成者卽潰腐肉易去。新肉易生。此時不可用內消泄氣寒涼等藥。致傷脾胃爲要。

人參

川芎

白芍

黃耆

當歸

白朮

金銀花

茯苓

白芷

甘草

阜角針

桔梗

各五分

水二茶鍾煎八分。食遠服脾弱者去白芷。倍人參。

徐曰法重出無別義。

排膿內托散

排膿內托散
正草桔梗併桂膝

歸

參朮苓陳芍附耆

隨方加減在人爲

治癰疽腦項諸發已潰流膿時宜服此藥

當歸

人參

各二

川芎

白芍

黃耆

陳皮

茯苓

各一

香附

甘草

五分

白芷

項之上加三分

桔梗

胸之上加五分

牛膝

下部加五分

肉桂

八分

薑三片水二茶鍾煎入分食遠服。

徐曰此補托之總方。

又曰此乃溫托之法寒症而無毒者宜。

媚案參朮桂三味徐圈桔梗註胸之上三字牛膝

註下部加五分字亦圈

又案既言補托總方。又言寒症而無毒者。宜蓋陽
毒熱毒無補法。恐人誤會也。

乳香黃耆散

乳香黃耆散乳沒
芎歸白芍與陳皮

粟殼參耆甘草撮
加上熟地疼卽脫

治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍未成者速散已

成者速潰敗腐膿毒不假刀砭其惡肉自然脫下兼

治打撲傷損筋骨疼痛。

乳香

沒藥

各五分

黃耆

鶯粟殼

半兩
蜜炒

人參

甘草

各一錢

川芎

歸身
白芍

陳皮

熟地黃

各一錢

水二茶鍾煎八分量病上下食前後服之

徐曰。乳香沒藥粟殼皆止痛之藥也。熟地黃不人煎藥。其誤起於薛立齋。應換熟大黃。

神功內托散

神功內托散
芎耆
附子
木香
甘草
炙

歸朮
陳皮
白芍
宜
參苓
山甲
起垂
危

治癰疽腦項諸毒至十四日後當腐潰流膿時不作腐潰更兼瘡不高腫脈細身涼者

當歸

一錢

白朮

一錢

黃耆

一錢

人參

各一錢

附子

各一錢

白芍

一錢

茯苓

一錢

陳皮

一錢

木香

一錢

甘草

炙各

五分

川芎

一錢

山甲

炒入

一錢

分

一錢

分

煨薑三片大棗二枚水二茶鍾煎八分食遠服。

徐曰此方治寒溼之毒。

透膿散

透膿散內用黃耆
加上角針頭自破

山甲芎歸總得宜
能令膿毒透紅肌

治癰疽諸毒內膿已成不穿破者服之卽破。

黃耆

四錢

山甲

炒末一錢

川芎

三錢

當歸

二錢

阜角針

一分五錢

水二茶鍾煎一半隨病前後服臨時入酒一杯亦好。

徐曰此方專主透膿以爲諸方加味則可專用大

偏。

竹葉黃耆湯

竹葉黃耆湯草芩
石膏半夏兼冬地
淡竹生津瀉渴心

芎歸白芍共人參

治癰疽發背諸般疔腫表裏熱甚口乾大渴者。

黃耆

甘草

黃芩

川芎

當歸

白芍

人參

半夏

石膏

麥冬

分

淡竹葉

十片

生地黃

一錢

水二茶鍾薑三片燈心二十根煎八分食遠溫服。
徐曰此治熱毒之方然終宜入風藥幾味。

又曰知母蘆根茅根元參連翹皆可選用。

回陽三建湯

回陽三建府參耆
陳朴木紅甘紫草

歸朮芎芩杞獨萸

陰疽危症此堪扶

治陰疽發背初起。不疼不腫。不熱不紅。硬若牛皮。堅如頑石。十日外脈細身涼。肢體倦怠。皮如鱗甲。色似土硃。多生粟頂。孔孔流血。根腳平散。軟陷無膿。又皮不作腐。手熱足涼者。俱急服之。

附子

人參

黃耆

當歸

川芎

茯苓

枸杞

陳皮

萸肉

各一錢

木香

甘草

紫草

厚朴

蒼朮

紅花

獨活

各五分

煨薑三片。皂角樹根上白皮二錢。水二碗煎八分入

酒一杯隨病上下食前後服之用綿帛蓋瘡令暖并不得大開瘡孔走泄元氣爲要愚按凡背疽屬陰者皆由臟腑先壞而內毒不得發越於外也舊有用雞冠翦血滴於疽上者有醋煮雄艾敷用者豬腦熱藥敷圍者神燈火氣灼照者此數法皆陰疽所宜予雖常用未見實效蓋陰疽不起者如樹木之根壞強培枝葉終無發生之理先要疎其土通其脈助其本回其陽此四者缺一不可予常據理用藥得生者十中三四用蒼朮厚朴茯苓陳皮疎其土川芎當歸紫草

紅花通其脈。人參黃耆枸杞山萸助其本。附子木香
甘草獨活回其陽。但根本內有一脈未絕之氣。服之
俱可得生。如手足溫暖。瘡便發熱。漸作掀腫。復生疼
痛。色暗得活。堅硬得腐。胃氣得回。此卽藥之效驗。必
在三服中應之爲吉。外兼照法接助回陽。此通治陰
疽之大法也。

徐曰。此治陰毒。然藥味太雜。不可學。

黍米寸金丹 黍米寸金丹乳香 蟬麝酥 雄狗寶 霜
輕沒蜈蚣 狗鯉膽 黑石硝 砂男乳 良
二名返魂丹。三名再生丸。四名追命丹。五名延壽丹。

六名來甦圓七名知命丸八名得道丸此方昔出異人所傳常有暴中急症忽然卒倒者搘開牙關研灌三丸其人卽活又能治發背腦疽偏身壅腫附骨癰疽等症初起憎寒壯熱四肢倦怠沈重者無分表裏老幼輕重並宜服之

麝香

五分

乳香

沒藥

雄黃

狗寶

輕粉

烏金石

各一錢

蟾酥

二錢

粉霜

水銀煉白色者

黃蠟

各三錢

硇砂

二錢

鯉魚膽

陰乾三條

狗膽

乾用一箇

白丁香

四十粒

金頭蜈蚣

七條金者

酥炙黃色

頭胎男乳

合

右其爲細末。除黃蠟乳汁二味熬成膏。同藥和丸。如
棗荳大。大人三丸。小兒用一丸。病重者五丸。令病用
葱湯熱病用新汲水送下。衣被密蓋勿令透風。汗出
爲度。諸病如失後食白粥調理。

徐曰。此乃護心托毒之藥。險毒之症可用。不可輕
用。疗毒最宜。

董發背奇方發背諸方此獨嘉
并添沒藥將紙裹燃照薰瘡逐漸加
治發背初起七日前後未成者自消已成者自潰不

起發者卽發。不腐潰者卽腐。誠爲良法。

雄黃

硝砂

血竭

沒藥

各二錢

麝香

四分

右五味研爲細末。每用三分。綿紙裹藥爲擦。長約尺許。以真麻油潤透。灼火離瘡半寸許。自外而內。周圍徐徐照之。火頭向上。藥氣入內。瘡毒隨火解散。自不內侵臟腑。初用三條。漸加至四五條。候瘡勢漸消漸減。薰後隨用敷藥。如已潰大膿發泄時。不必用此照敷。只宜用膏藥蓋貼。

徐曰。此卽神燈照法。治寒毒不起。發最妙。

敷藥方

薰後敷方有四般

車前稀薺五龍乾

銀花小粉爲糊貼

膿毒消清身自安

車前草

連根葉

豨薺草

五龍草

金銀花

各等分

右四味鮮草藥一處搗爛。加三年陳小粉。卽常用漿衣者。初起仍加飛鹽末二三分。共打爲稠糊。徧敷瘡上。中留一頂。以膏蓋貼。避風。自然拔出膿毒。若冬月草無鮮者。預採蓄下。陰乾爲末。用陳米醋調敷。亦如

前法並效。但五龍草不能隨地皆有。或致缺少難合。

予常薰後頂以膏蓋。周圍腫上以如意金黃散代敷亦效。

如意金黃散

如意金黃散大黃
南星厚朴甘花粉

薑黃黃柏芷陳蒼
敷上腫消體便康

治癰疽發背諸般疔腫跌撲損傷溼痰流毒大頭時
腫。漆瘡火丹風熱天泡肌膚赤腫乾溼腳氣婦女乳
癰。小兒丹毒。凡外科一切諸般頑惡腫毒隨手用之。
無不應效誠爲瘡家良便方也。

天花粉

上白四兩黃柏色重者

大黃

薑黃

白芷

各五

分

紫厚朴

陳皮

甘草

蒼朮

天南星

各八錢

以上各藥切成薄片。曬極乾燥。各研極細淨末。每樣稱準合和再研。資器收貯。勿令泄氣。凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者。及夏月火令時。俱用茶湯同蜜調敷。
徐曰蜜調祇能清熱不能收口。如微熱微腫。及大瘡已成欲作膿者。俱用葱湯同蜜調敷。如漫腫無頭。皮色不變。溼痰流毒。附骨癰疽。鶴膝風等症。俱用葱酒煎調。如風熱惡毒皮膚亢熱。紅色光亮。形狀游走不定者。俱用蜜水調敷。如天泡火丹。赤遊丹。黃水漆瘡。惡血攻注等症。

俱用大藍根葉搗汁調敷。加蜜亦可。湯潑火燒皮膚。
破爛麻油調敷。具此諸引要在臨用之際。順合天時。
洞窺病勢。察其寒熱溫涼用之爲妥。

徐曰。此卽通行圍藥。

四虎散

四虎散內用南星
再添狼毒并豬腦

草烏半夏效通靈
搗貼癰疽腫即甯

治癰疽腫硬厚如牛領之皮不作膿腐者。

南星

草烏

半夏

狼毒

各等分

右爲細末。用豬腦同搗偏敷瘡上。留正頂出氣。
徐曰。此治寒痰之敷藥。

真君妙貼散

真君妙貼散神通
諸般異症皆堪效
常取收功掌握中

薺薺硫黃白薺同

治癰疽諸毒及異形異類頑硬大惡歹瘡走散不作
膿者宜用此藥不痛者卽痛痛甚者卽止

明淨硫黃

八兩爲末

薺薺

白薺

各四兩

共一處用清水微拌乾溼得宜木廂內罐成薺片單
紙包裹風中陰乾收用臨時再研極細用新汲水調
敷如皮破血流溼爛疼痛等症麻油調搽天泡火丹
肺風酒刺染布青汁調搽並效

回陽玉龍膏

回陽玉龍膏肉桂
草烏赤芍與南星

白芷軍薑同一位
熱酒調敷功更倍

治背疽陰病。不腫高。不掀痛。不發熱。不作膿。及寒溼流注。冷痛痺風。諸溼腳氣。手足頑麻。筋骨疼痛。及一切皮色不變。漫腫無頭鶴膝風等。但無皮紅肌熱者。一概用之。俱有功效。

草烏

三兩
炒
煨各

軍薑

三兩
煨

赤芍

炒

白芷

南星

一兩
煨各

肉桂

五錢
煨

右製畢。其爲細末。熱酒調敷。此藥有軍薑肉桂。熱血生血。旣生旣熱。恐轉致壅而爲害。故有草烏南星。可以破惡氣。祛風毒。活死肌。除骨痛。消結塊。回陽氣。又

有赤芍白芷足以散滯血。住痛苦。加以酒行藥性。攻通氣血。雖十分冷症。未有不愈者。誠爲寒灰之焰。枯木之春。大抵病冷則肌肉陰爛。不知痛癢。其有痛者。又多附骨之痛。設若不除。則寒根透髓。尋常之藥。固莫能及矣。

沖和膏

沖和膏內紫荆皮
白芷配成五行妙

獨活菖蒲赤芍宜
諸般外症總堪醫

治癰疽發背。陰陽不和。冷熱不明者。

紫荆皮

五兩炒

獨活

三兩炒

赤芍

二兩炒

白芷

一兩

石菖蒲

一兩

右爲細末。葱湯熱酒俱可調敷。紫荆皮乃木之精能。
破氣逐血消腫。獨活土之精。動蕩凝滯血脈。散骨中
冷痛。去麻痺溼。石菖蒲水之精。善破堅硬。生血止痛。
破風消腫。白芷金之精。能去風生肌定痛。赤芍火之
精。能生血活血。散瘀除痛。蓋血生則肌肉不死。血動
則經絡流通。故肌活不致爛痛。經通不致壅腫。此爲
散風行氣活血消腫祛冷軟堅之良藥也。其中五行
相配用者再無不效。又流毒骨疽冷症尤效。

徐曰。此風痰之圍藥。

又曰。此方古本皆有之。皆極推重。外科不可少也。

鐵桶膏

鐵桶膏中有麝香
明礬
礬倍并銅綠

調醋
箍瘡法最良

沿發背將潰已潰時。根腳走散不收束者。用此箍之。

銅綠

五錢

明礬

四錢

膽礬

三錢

五倍子

微炒一兩

白芨

五錢

輕粉

鬱金

各二錢

麝香

三分

右爲極細末。用陳米醋一碗。杓內慢火熬至一小杯。

候起金色黃泡爲度。待溫。用藥末一錢。攬入膏內。每

用頓溫。用新筆塗膏瘡根上。以綿紙蓋之。瘡根自生

繩紋。漸收漸緊。再不開大。

徐曰此收束之要藥凡散漫之毒皆可用。

煮拔筒方

煮拔筒方羌紫蘇生甘薑艾石菖蒲鬚葱白芷兼獨活筒拔瘡膜看有無

治發背已成將潰時膿毒不得外發必致內攻乃生煩躁重如負石非此法拔提毒氣難出也。

羌活

獨活

紫蘇

斬艾

鮮菖蒲

甘草

白芷

各五錢

連鬚葱

三兩

預用口徑一寸二三分新鮮嫩竹一段長七寸一頭留節用刀剗去外青留內白一半約厚一分許靠節鑽一小孔以杉木條塞緊將前藥放入筒內筒口用

葱塞之。將筒橫放鍋內。以物壓勿得浮起。用清水十
大碗。溟筒煮數滾。約內藥濃熟爲度。候用。再用披針
於瘡頂上一寸內。品字放開三孔。將藥筒連湯用大
瓷鉢盛貯。至病者榻前。將筒藥倒出。急用筒口乘熱
對瘡合上。以手捺緊。其筒自然吸住。約待片時。藥筒
已溫。拔去塞孔木條。其筒自脫。將器倒出筒中物色。
看是何樣。如有膿血相黏。鮮明紅黃之色一二杯許。
乃是活瘡。治必終愈。如拔出物色純是敗血。氣穢紫
黑稀水而無膿意相黏者。此氣血內敗。肌肉不活。必

是死瘡。強治亦無功矣。此法家傳。屢經有驗。如陽瘡易潰易膿之症。不必用此。以傷氣血。惟陰瘡十五日前後堅硬不潰。不膿者。用之。此法有回天之效。醫家不可缺也。

徐曰。此方亦有用處。

又曰。此吸毒之法。袋膿瘡亦可用。

豬蹏湯

豬蹏湯內羌甘草
加生露蜂房更妙

赤芍黃芩白芷歸
諸瘡一洗換新肌

治癰疽。諸毒已潰流膿時。用此湯洗。消毒氣去惡肉。回死肌。潤瘡口。又能散風消腫。腐盡則已。

羌活

甘草

赤芍

黃芩

白芷

當歸

蜂房

各等分

右爲粗末。看疽瘡大小。用藥多少先將豮豬前蹄一隻。用白水六碗。煮蹄軟爲度。將汁濾清吹去汁上油花。用藥一兩投於汁中。再用微火煎十數沸。密絹濾去藥渣。候湯半熱。將軟絹蘸湯淋於瘡上。輕手浥去。疼膿腐肉。諸惡物隨湯而下。洗訖。以絹帛浥乾。照前總論次第。如式用藥。

徐曰。洗方不可少。

媚案蜂房一味徐圈。獫豬卽今之閹豬。

又洗藥方

洗藥方中歸獨活
癰疽腐盡頻淋洗

水長肉生肌頓失愁

當歸

獨活

白芷

甘草

各二錢

葱頭

五箇

用水三碗煎至藥爛。濾清。以絹帛蘸湯。泥淨瘡上。隨搽貼紅黑二膏蓋之。洗時切忌風寒爲要。治背瘡輕易者。以此代豬蹄湯用亦效。

徐曰。前方好。

加味太乙膏

太乙膏中槐柳枝
大黃木鼈芷輕粉

元丹魏芍血餘宜
乳沒當歸地桂奇

治發背癰疽。及一切惡瘡。跌撲傷損。溼痰流毒。風溼
風溫。徧身筋骨走注作痛。內傷風鬱。心腹胸背攻刺
作疼。腿腳酸軟。腰膝無力。湯潑火燒刀傷棒毒。五損
內癰七傷外症。俱貼患處。又男子遺精。婦人白帶。俱
貼臍下。臟毒腸癰亦可丸服。諸般瘡癰。血氣癩痒。諸
藥不計痛痒者。並效。

肉桂

白芷

當歸

元參

赤芍

生地

大黃

土木鼈

各二兩

眞阿魏

二錢

輕粉

四錢

槐枝

柳枝

各一

血餘

一兩

乳香

淨末
五錢

沒藥

淨末
三錢

右上十味併槐柳枝用眞麻油足秤五斤將藥浸入油內春五夏三秋七冬半候日數已畢入潔淨大鍋內慢火熬至藥枯浮起爲度。住火片時用布袋瀘淨藥渣將油秤準足數將鍋刷淨復用細舊絹將油瀘入鍋內要清淨爲美將血餘投下慢火熬至血餘浮起以柳塊挑看似膏溶化之象方算熬熟淨油一斤將飛過黃丹六兩五錢徐徐投入火加大些夏秋亢熱每油一斤加丹五錢不住手攬候鍋內先發青烟。

後至白烟疊疊旋起氣味香馥者其膏已成卽便住火將膏滴入水內須軟硬得中如老加熟油若嫩加炒丹每各少許漸漸加火務要冬夏老嫩得宜爲佳候烟盡掇下鍋來方下阿魏切成薄片散於膏面上化盡次下乳沒輕粉攬勻傾入水內以柳棍摟成一塊再換冷水浸片時乘溫每膏半斤扯拔百轉成塊又換冷水投浸用時每取小塊銅杓內烊化隨便攤貼至妙

徐曰此通治之要方

又曰此通行之方然更有佳者

楣案諸書膏藥方甚多惟全生集分貼陰毒陽毒
二膏甚佳而陽和膏尤不可缺蓋陰毒多寒凝非
得溫暖之膏不能轉陰爲陽也今並附錄於後

洞天鮮草膏

專貼陽毒夏天熱癤尤妙

壯年頭髮一

牛蒡子

甘菊

蒼耳

以上俱用新鮮根葉

各一斤

金銀藤

馬鞭草

仙人對坐草

以上亦用新鮮

者各一斤

白芷

甘草

五靈脂

當歸

各半斤

先用菜油三斤。將頭髮入鍋熬枯。去渣聽用。再以菜油十斤。同牛蒡等各鮮草熬枯。瀝出。再入白芷等藥熬枯。出渣。用絹濾淨。并入髮油內。共秤準斤兩。每油一斤。用當日炒透桃丹七兩。徐徐投入。隨熬隨攬。熬至滴水成珠。以兩指取膏爲丸。而丸不黏指爲度。掇下鍋來。候稍溫。傾入水中。扯拔數十次。即可攤貼。

陽和解凝膏

專貼陰毒。凡腦疽背疽乳疽瘰癧。及一切爛潰陰疽。俱以此貼。如紅癰勿貼。

新鮮牛蒡子根葉梗三

斤

活白鳳仙梗

兩

川附

桂枝

大黃

當歸

肉桂

官桂

草烏

川烏

地龍

僵蠶

赤芍

白芷

白芨

各二兩

川芎

四兩

續斷

防風

荆芥

五靈脂

木香

香櫟

陳皮各一兩

乳香

研細末

沒藥

研細末

各二兩

麝香

研細
一兩

用菜油十斤先將牛蒡白鳳仙熬枯去渣次日除乳
香沒藥蘇合油麝香外餘藥俱陸續入鍋煎枯去渣

濾淨。秤準斤兩。每油一斤。加炒透桃丹七兩。熬至滴水成珠。不黏指爲度。掇下鍋來。將乳香沒藥蘇合油麝香入膏攪和。半月後攤貼。此膏兼可治瘧疾。貼在背脊第三節骨上。

楣案全生集言膏藥不可以草麻子煎入。倘貼孕婦下身瘡癧。卽小產。產後尚不悟膏藥之故。而再貼。則致命。附記于此。

生肌玉紅膏生肌玉紅膏更奇
血竭白蠟同紫草
麻油熬好貼生肌
此膏專治癰疽發背。諸般潰爛棒毒等瘡。用在已潰

流膿詩。先用甘草湯。甚者用豬蹄藥湯淋洗患處。
絹浥淨。用抿腳挑膏於掌中捺化。徧搽新腐肉上。外
以太一膏蓋之。大瘡早晚洗換二次。兼服大補脾胃
暖藥。腐肉易脫。新肉卽生。瘡口自斂。此乃外科收斂
藥中之神藥也。

白芷五錢 甘草一兩 歸身二兩 血竭一
白蠟二錢 紫草二錢 輕粉各四
錢 斤

先用當歸甘草紫草白芷四味入油內浸三日。大約
內慢火熬煎微枯色。細絹慮清將油復入杓內煎滾。

下整血竭化盡次下白蠟微火化之用茶鍾四枚預
頓水中將膏分傾四茶鍾內候片門方下研極細輕
粉每鍾一錢攬勻候至一伏時取起不得加減致取
不效

徐曰此膏卽藥油也乃去腐生肌之總方其調入
末隨症加減

化腐紫霞膏

化腐紫霞膏甚奇
金砒血竭同樟腦

草仁巴豆與螺螄
銅鐵敷之也化糜

治發背已成瘀肉不腐及不作膿者又諸瘡內有膿
而外不穿潰者俱用此膏不腐爛者自腐不穿潰者

自破其功甚於烏金膏及碧霞錠子

輕粉

草麻仁

研各三錢

血竭二錢

巴豆

研白仁五錢

樟腦

一錢

金頂砒

五分

螺蛳肉

用內晒乾爲末二錢

右各爲末共研一處瓷罐收貯臨用時旋用麻油調搽頑硬肉上以綿紙蓋之或膏貼亦可至頑者不過二次卽軟腐爲膿點諸瘡頂亦破

徐曰此藥易合而可久藏點藥之最便者去頑肉不可少

楣案巴豆金頂砒螺螄肉三味徐圈

又案點藥及去頑肉以白降丹爲最妙呼膿拔毒。
去腐生肌及初起內消亦有靈妙。繆藥此書惟有
玉紅膏及末卷白昇藥殊爲未備今采取各方附
錄於後

白降丹

水銀

一兩
四錢

淨火硝

一兩四錢夏
天加三錢

白礬

一兩
另研

硃砂

五錢三
分另研

雄精

二錢三
分另研

硼砂

四錢
另研

早礬

七錢
一兩

白砒

二錢
另研

食鹽

三
錢

右藥研至不見水銀星爲度盛于陽城罐內用煊炭

微火鎔化。火急則水銀上升走鑪。熬至罐內無白煙起。以竹枝撥之。無藥屑撥起。用木杵槌實。則藥吸于罐底。謂之結胎。胎成。將空罐合上。用綿紙條潤以墨水。置于縫間。鹽泥封固。烤乾。如有裂縫。添鹽泥密固之。再用宜興鉢頭盛水上。放大黃沙盆中。開一孔。將有藥之罐在上。空罐在下。入沙盆孔中。水平罐底。然後盆內鋪以淨灰。輕輕按平。不可動搖。恐傷封口。卽要走鑪。鋪畢。取燒紅栗炭。攢圍藥罐。用扇微扇。煉一炷香。謂之文火。再略重扇。煉一炷香。謂之武火。炭隨

少隨添勿令間斷而見罐底再煉一炷卽退火俟盆

灰冷定去灰及封口土開看下罐內所有白霜卽謂

之丹資瓶收貯聽用

楣案兩罐鹽泥封固須用鐵條四根夾住鐵絲纏縛方不脫

一治腫瘍膿成不穿用津唾調少許點毒頂以膏蓋

之卽穿或用麪糊以竹片拌和爲條切作脂麻大

放膏中對腫頭貼之不用指拌者新降甚烈恐沾

指疼痛起泡也

一治潰瘍毒根堅硬如石用以消化

一用作點藥如病者怕疼可用生半夏對攏再加冰

片少許。能令肉麻不痛。名夏冰對配丹。或用蟾酥少許。攏入。亦可不疼。

一肌薄骨露無肉之處。及經脈交會之所。神氣之所注。氣血之所聚。潰後元氣有傷。不能收斂。須藉溫補。滯斂收功者。此丹不可概施。恐拔傷元氣。初降性烈。尋常之症。只用後開九一丹爲妥。如腐肉厚韌。不化不脫。或三七。或對攏。或一九。斟酌用之。年久烈性已退。方可專用。然四圍好肉。亦須用生肌之藥護之。

九一丹

生石膏

九分

白降丹

一分

右共研極細聽用。年久降丹烈性已退。八二七三攏和均可。

一治腫瘍結核。將丹薄薄勻繆膏上。數箇卽消。不可太多。多則有傷皮膚。

一治潰瘍。繆膏上貼之。提膿拔毒。毒盡生肌。比昇丹功效數倍。惟瞼骨正面及踝骨與凡肌薄無肉之處。不能化膿。但有稠水者。忌用此丹。緣提拔甚猛。

誤用反疼。甚則流血。宜用後開頭二三瓶。繆藥爲妥。

此丹用綿紙撲作藥線。潤以麪糊。將丹拌上。插入膿管。能退管收功。

頭瓶繆

丁香一錢
山柰五錢
甘松五錢
草撥一兩
白芷三錢
兒茶五錢
乳香一錢
草烏五錢
沒藥一錢

油去

右各研極細末。再秤準。共研極勻。瓷瓶收貯。勿令泄。

氣腫瘍初起。繆膏上貼之。未成者消。已成者潰。

二瓶繆

延胡索

五錢

牙皂

一錢

麝香

三分

丁香

一錢

右藥製法同上。繆膏中能呼膿拔毒止痛。凡肌薄無肉之地。必用此藥。切不可用九一丹。

三瓶繆

硃砂

一錢研極
細水飛淨

爐甘石

一錢

以黃連五分煎汁

燬淬研極細冰

水飛淨

川連

一錢

生龍骨

五錢

冰片

一分

右藥製法同上。繆膏貼之。能生肌長肉。或卽薄繆新。

肌上緣有深潭處恐藥不能到也。凡繆藥總以極細爲主。粗則嵌入嫩肉亦能作疼。不可不知。

珍珠散

珍珠

一錢人乳浸三日。夏天須每日換血竭五分。乳珠質最堅。尤宜研極細如飛麪。

分

兒茶

五分

石膏

一錢
煅

爐甘石

一錢
製法與上

赤石脂

一錢
煅

陳年絲吐頭

五分
存性
煅

冰片

一分
二釐

右藥製法同上。諸毒膿腐已盡。用此繆上。卽能生肌長肉。平口收功。神效無比。但珍珠價貴。恐醫者不能備。只用上三瓶繆藥。亦遠勝於昇丹也。

陰毒內消散

麝香

二錢

輕粉

三錢

丁香

一錢

牙阜

二錢

樟冰

四錢

腰黃

三錢

良薑

二錢

肉桂

一錢

川烏

二錢

甲片

三錢

白胡椒

一錢

乳香

二錢

沒藥

二錢

阿魏

三錢

炒

瓦去油

去油

去油

右藥製法同上陰毒初起。繆膏上貼之卽消。已成卽

潰。惟疔毒癬瘡等毒及孕婦忌貼。

以下二方蔣君光
焫得之于其舅家

桐鄉曹氏云秘之
已數世施送極驗

陽毒內消散

麝香

二錢

冰片

二錢

白芨

四錢

薑黃

四錢

南星

四錢

甲片四

樟冰四

輕粉三

膽礬三

銅綠四

錢

漂青黛二

錢

右藥製法同上。陽毒初起。繆膏上貼之。二方皆功專于消已破者勿繆。

以上三十二方。凡腫瘍初起及已成時選用。

新附十
八方

潰瘍治法第十八

膿熱不潰。瘍口散大。不生肌者。裏虛欲變症峻補之。此三字徐

勒批曰也腐肉雖脫。新肉生遲。如棗色者。肉冷肌寒。宜須清毒。

大溫氣血。潰後食少。心煩不睡。發熱作渴者。脾弱陰虛。宜補中益氣。身涼脈細。倦怠懶言。食不知味者。脾弱也。醒脾助胃。風寒襲於瘡口。皮白綻而不收斂者。外照而內溫補。潰後面黃肌瘦。膿水清稀。瘡色淡白者。當香燥助脾。脈大無力。細濇微沈。自汗身涼者。氣血俱虛。峻補之。出血或膿多。五心煩熱。躁甚不眠者。亡陽也。急補之。瘡口已合。經犯房勞。或值急暴。復崩潰者。仍助氣血。

潰瘍主治方第十九

十全大補湯

十全大補參耆芍歸朮茯苓甘草炙

肉桂川芎熟地黃棗薑加之號全方

治潰瘍發熱。或惡寒。或作痛。或膿多。或清。或自汗盜汗。及徧身流注瘰癧。便毒諸瘡。久不作膿。或膿成不潰。潰而不斂。若氣血不足之人。結腫未成膿者。宜加陳皮。香附。半夏。連翹。服之自消。

人參

黃耆

白芍

肉桂

川芎

熟地

當歸

白朮

茯苓

各一錢

甘草

炙五分

分

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食前服。

徐曰。此方必毒火盡除而後可全用。

八珍湯

八珍湯擅理陰陽

芍芍當歸熟地黃

參苓白朮兼甘草

何愁虛弱不康強

治潰瘍諸症。調和榮衛。順理陰陽。滋養氣血。進飲食。
和表裏。退虛熱。爲氣血俱虛之大藥。

川芎

白芍

當歸

熟地

人參

白朮

茯苓

各一錢

甘草

炙五分

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食前服。

補中益氣湯

補中益氣用陳皮

當歸升麻參朮耆

甘草柴胡薑棗引

元虛不足得和宜

治瘡瘍元氣不足。四肢倦怠。口乾發熱。飲食無味。或
飲食失節。或勞倦身熱。脈洪大而無力。或頭痛而惡

寒。或聲高而喘。身熱而煩。

黃耆

一錢五分

甘草炙

人參

當歸

白朮各

錢

升麻

柴胡

陳皮各三分

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎一鍾。空心熱服。

徐曰。此治陽陷之方。然升柴亦當酌用。

楣案補中益氣湯並無麥冬五味二品。而此書刻本或有或無。當是後人所加。徐於前卷屢言此二品不可用。而此但言升柴當酌用。是徐本亦無此二品。故刪去。

人參養榮湯

人參養榮參朮歸
甘草地黃併五味

陳皮白芍桂心耆
茯苓遠志棗薑宜

治潰瘍發熱惡寒。或四肢倦怠。肌肉消瘦。面色萎黃。

吸吸短氣。飲食無味。不能收斂。或氣血原不足。不能收斂。若大瘍愈後多服之。不變他症。

白芍

一錢人參
五分

陳皮

黃耆

桂心

當歸

白朮

甘草

各一錢

熟地黃

五味子

茯苓

各八分

遠志

五分

薑三片。棗二枚。水二茶鍾。煎八分。食遠服。

徐曰。此方陰陽兩虛而不收口者最宜。

人參黃耆湯

人參黃耆湯更奇
黃檗歸身五味子

升麻神薑棗薑隨
麥冬二术草陳皮

治潰瘍虛熱不睡少食。或穢氣所觸作痛者。

黃耆

人參

白朮

麥冬

歸身

蒼朮

甘草

陳皮

升麻

神薑

分

黃檗

酒拌炒

五味子

炒五分

水二茶鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服。

徐曰藥味亦雜。

內補黃耆湯

內補黃耆湯桂芍川芎遠志人參等

歸苓熟地草門冬
棗薑加上有奇功

治癰疽發背諸瘡已破後虛弱無力體倦懶言精神

短少飲食無味。自汗口乾。脈濺不睡。

黃耆

人參

茯苓

川芎

歸身

白芍

熟地

肉桂

麥冬

遠志

錢

甘草

五分

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎一鍾。食遠服。

徐曰。此等方與十全大補等方大同小異。不必復記。

托裏清中湯

托裏清中湯茯苓
棗薑半夏陳皮草

尤冬五味梗人參
專治瘡瘍咳嗽清

治癰疽脾胃虛弱。咳嗽痰氣不清。飲食少思者。

人參

白朮

桔梗

陳皮

半夏

茯苓

各一錢

麥冬

五味子

甘草

各五分

水二茶鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

徐曰不必存

托裏和中湯

托裏和中湯半夏
陳皮甘草木香荳

白朮

參苓功不亞
煨薑效值千金價

治癰疽中氣虛弱飲食少思腫不消潰不斂者

半夏

白朮

人參

茯苓

陳皮

煨薑

各一錢

木香

甘草

各五分

水二茶鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

徐曰此暖胃之方可治痢瀉。

托裏建中湯

托裏建中附子強還兼半夏同甘草

參苓白朮與炮薑補氣回陽此最良

治癰疽元氣素虛或因寒涼傷脾損胃飲食少思凡
浪無味或作嘔泄瀉等症急服以建中氣。

人參

白朮

茯苓

各二錢

半夏

炮薑

各一錢

錢

甘草

五分

熟附子

八分

水二茶鍾煨薑三片棗二枚煎八分不拘時服

徐曰亦重前。

托裏溫中湯

托裏溫中益智良參苓陳朮羌附夏

木香白蔻與乾薑甘草丁香功倍強

治癰疽陽弱陰寒。脈虛身冷。或瘡爲寒變。反致不疼。
或膿水清稀。心下痞滿。腸鳴腹痛。大便微溏。食則氣
短嘔逆。不得安卧。時發昏憤者。

白朮

茯苓

木香

丁香各五分

半夏

陳皮

羌活

益智仁

乾薑炮

人參

白蔻仁

甘草錢

附子二錢

水二茶鍾薑三片。棗一枚。煎八分。不拘時服。方與舊
不同。予製此嘗治癰疽陰症。及雜症陽氣脫陷。與寒
氣逼陽於外。發熱煩躁。口乾作渴。投之津液頓生。煩

熱頓退。其應如響。

徐曰亦前方義。而藥加重。

聖愈湯

聖愈湯憑熟地耆人參一品同煎服

川芎生地與當歸
膿甚心煩此可醫

治潰瘍膿水出多氣血虛極脈細空而無力以致心煩不安。眠睡不甯或五心煩躁等症。

熟地

生地

川芎

人參

各五錢歸身

黃耆

鹽水炒各一錢

作一劑水二茶鍾煎八分食遠服。

徐曰此方無意義。

楣案古方聖愈湯卽四物加參耆此去白芍而兼用生熟地宜徐氏以爲無意義。

保元大成湯

保元大成廣木香耆陳附草砂仁芍

參芩歸朮最爲良五味山萸同棗薑

治潰瘍元氣素虛精神怯弱或膿水出多神無所主以致睡卧皆倦六脈虛細足冷身涼便溏或秘胸膈或寬或不寬舌雖潤而少津口雖食而無味瘡弦不緊肉色微紅總由不足大補堪施

人參

白朮

黃耆

蜜水拌炒各二錢

茯苓

白芍

陳皮

歸身

甘草炙

附子

山萸肉 五味子

各一錢

木香

砂仁

各五分

水二茶鍾。煨薑三片去皮大棗三枚。煎八分食。遠服。
服至精神回。手足煖。脾胃醒。肉色紅爲度。以上數症。
乃元氣虛脫已欲變壞之病。非此不回也。

徐曰。亦重前。

獨參湯

人參一味。獨稱強。濟困扶危立大綱。

氣血兩亡。併自汗。

脈虛寒熱用皆良。

治潰瘍膿水出多。氣血虛極。或惡寒。或發熱。或自汗。
冷汗。或手足指甲青冷。或身涼脈細。

人參

二兩

作一劑水二碗。棗十枚煎一碗。徐徐服之。若煎至稠厚。卽爲膏矣。作三次用。好溫酒化服亦可。

徐曰。此暫用急救之方。千不得一者。

香砂六君子湯

古有香砂六君湯
砂仁半夏陳皮等

參苓白朮與藿香
甘草同煎加棗薑

治潰瘍脾胃虛弱。惡心嘔吐。或飲食不思等症。

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏

錢

甘草

藿香

砂仁

各五分

薑三片。棗二枚。水二茶鍾。煎八分。食遠服。

徐曰。此方穩切。凡脾胃之方皆本此。此乃祖方也。

清震湯

清震湯中益智仁
棗薑附子同香附

參苓柿蒂澤甘陳
半夏加增效似神

治潰瘍脾胃虛弱。或悞傷生冷。或氣惱勞役。或入房夢遺。致火邪乘入中脘。乃生呃逆。

益智仁

陳皮

半夏

茯苓

人參

甘草

香附

各一錢

柿蒂

二十
四箇

澤瀉

三分

熟附子

手足冷者
用一錢

薑三片棗二枚。燈心二十根水二茶鍾。煎八分不拘時服。如身熱口乾便燥火呃者。加黃連五分。

徐曰亦重前

醒脾益胃湯

醒脾湯用朴山查
澤瀉陳皮山藥夏
木香蘇子並堪加

二术二苓參麥芽
二分五分老黃米

治潰瘍脾胃虛弱過傷飲食生冷以致胸膈不寬四肢面目浮腫及小水不利等症

人參

陳皮

茯苓

半夏

山藥

白朮

各一錢

蒼朮

厚朴

澤瀉

麥芽

木香

山查

蘇子

豬苓

各五分

老黃米

炒黃一錢

水二茶鍾薑三片燈心二十根煎入分食前服

徐曰此燥脾而兼利水之方

托裏定痛散

托裏定痛散當歸
粟殼桂皮併熟地

乳沒川芎白芍隨
瘡瘍疼痛此堪醫

治癰疽潰後血虛疼痛不可忍者。服之甚效。

歸身

熟地黃

乳香

沒藥

川芎

白芍

肉桂

各一錢

粟殼

泡去筋膜
蜜炒二錢

水二茶鍾煎八分隨病上下食前後服之。

徐曰此方能止痛。

楣案熟地黃徐改生地黃。

歸脾湯

歸脾湯用赤參耆酸棗木香龍眼肉

煎加薑棗益心脾

白朮

茯神

黃耆

棗仁

龍眼肉

各一

錢

木香

附參

甘草

炙各五分

當歸一錢

遠志

三分

薑一片。棗二枚。水煎食。遠服。

楣案此方失載。治何症。讀內科書自知。

神應異功散

異功散中丁木香
陳皮半夏當歸朴

參芩桂附可回陽
肉蔻還加尤棗薑

治潰瘍陰盛陽虛。發熱作渴。手足並冷。脈虛無力。大便自利。至飲沸湯而不知其熱者。

木香

官桂

當歸

人參

茯苓

陳皮

白朮

各一分

半夏

丁香

肉豆蔻

附子

厚朴

各五分

水二茶鍾。薑五片。棗三枚。煎八分。不拘時服。此方癰疽陰症及雜症。陽氣脫陷。與寒氣逼陽於外。發熱煩躁口乾作渴。投以薑桂附子之類。津液頓生。煩熱頓退。其應如響。

徐曰。此亦溫脾之藥。亦重出。

參朮膏

參朮膏中參朮地
補脾補氣兼補血

分煎合用酌其中
急症虛危可漸充

治癰疽發背等症。大膿後氣血大虛急宜用此。

上好人參半斤

切片用。水五大碗。砂鍋內慢火熬至三碗。將渣再煎汁一碗。共用。密

絅瀘清復熬稠厚
瓷碗內收貯聽用

雲片白朮六兩

懷慶熟地六

人參兩俱熬同

上法

以上三膏各熬完畢各用瓷碗盛之頓入水中待冷取起蓋勿洩氣如患者精神短少懶于言動短氣自汗者以人參膏三匙白朮膏二匙地黃膏一匙用無灰好酒一杯頓熱化服如脾氣虛弱飲食減少或食不知味或已食不化者用白朮膏三匙人參膏二匙地黃膏一匙好熱酒化服如患者腰膝酸軟腿腳無力皮膚手足麪澀枯槁者用地黃膏三匙人參白朮

宵各二匙化服。如氣血脾胃相等無偏勝者。三膏各二匙。熱酒化服。此膏用於清晨併臨睡時。各進一次。自然精神強健。氣血頓生。新肉易生。瘡口易合。任瘡危險。勢大膿多。可保終無變症。夏天炎熱。恐膏易變。分作二次熬用。亦好。愈後能服。鬚髮變黑。返老還童。以上諸方。功難及此。

徐曰。此方純用蠻補氣血。毫無意義。

八仙糕

八仙糕設卻爲何山藥參苓蓮芡實

養胃健脾止瀉多白糖米粉蜜調和

治癰疽。脾胃虛弱。精神短少。飲食無味。食不作飢。及

平常無病久病。但脾虛食少嘔泄者。並妙。

人參

山藥

茯苓

芡實

蓮肉

各六

兩

糯米

三升

粳米

七升

白糖霜

二斤半

白蜜

一斤

右將人參等五味。各爲細末。又將糯米亦爲粉。與上藥末和勻。將白糖和蜜湯中頓化。隨將粉藥乘熱和勻。攤鋪籠內。切成條糕蒸熟。火上烘乾。瓷器密貯。每日清晨。用白湯泡用數條。或乾用亦可。但覺飢時。隨用數條甚便。服至百日。輕身耐老。壯助元陽。培養脾胃。妙難盡述。

徐曰此服食之方不足治病。

胃愛丸

胃愛丸中參术苓建蓮甘草蜜丸就

紫蘇山藥豆蔻陳胃弱脾虛效似神

治潰瘍脾胃虛弱飲食諸味不喜用過開胃進食之

藥不效者此脾崩之象宜服之食進爲吉。

雲片白朮一兩

鮮白者米泔浸去澀水切片晒乾同麥芽拌炒

懷慶山藥一兩

肥大上白者切片用男乳拌溼候潤透晒微焙

上白茯苓一兩

切一分厚用砂仁二錢共茯苓合碗內飯上蒸熟只用茯苓

清河人參一兩

製畢晒乾共爲細末

陳皮

用陳老米先炒黃色方入同炒微燥勿焦六錢

小紫蘇

蜜拌透晒乾微蒸片時連梗葉切片五錢

白豆蔻

三錢

蓮肉

去皮心敲碎五錢

甘草

炙三錢

右共爲細末用老米二合微焙碾粉泡荷葉湯打糊。
丸梧子大每服八十九。清米湯不拘時服。

徐曰此和平養胃之方

二神丸

二神丸用破故紙
薑棗煎水候水乾

肉果去油兩相使
棗丸吞服寒瀉止

治癰疽脾胃虛弱飲食不消大便溏泄。

破故紙

四兩微炒香

肉果

肥大者二兩薑裹煨切片盪去油

用大棗四十九枚老生薑四兩切片水浸棗薑煮至

水乾爲度。取棗肉同二藥淨末爲丸。如梧子大。每服七十丸。清米湯空心送下。並治尋常腎虛脾泄俱效。
徐曰。此治寒滑瀉痢之症。

加減八味丸

八味丸中五味宜
茯苓澤瀉山萸肉

地黃山藥桂丹皮
止渴生津兼治脾

治癰疽已發未發。口乾作渴舌乾黃硬者。

茯苓

山藥

丹皮

各四兩

澤瀉

蒸三兩

山萸肉

五兩

熟地黃

搗膏酒入兩

肉桂

六錢

五味子

炒三兩

右共爲末。煉蜜丸如梧子大。每服二錢。空心服。鹽湯

送下尋常酒服亦可。此又滲溼潤燥藥也。

以上二十五方治癰疽已潰。至於收斂正病雜病變症壞症。俱在其中選用。毋得錯亂。大抵潰後氣血根本無有不虧傷者。補怯扶羸。理勞續損。皆不出於前方。此外無法也。

楣案未有紅鉛造化丹。徐批不入藥。用筆勾去。余故不錄。爲著書者消一罪孽。實存二十四方。

徐曰。以上所錄潰瘍諸方。皆內科溫補之法。乃大症潰後。精血大虧。自宜溫補。但瘡口未全愈。必有

兼外科之症。或膿清不厚。或寒熱未止。或火毒未清。或胃口未和。或新肉未生。或毒痰內積。種種兼症。若一味峻補。與外科不相照顧。則餘毒未清。反能增病。必須審度其虛。是病氣未除。抑全屬虛寒。然後擇取對症之藥。幾味成方。如不問外症之有無。而一概以全方治。則其中必有不對症之藥。反能有害。是不但不知內科。并外科之理亦不知也。

薛立齋之用內科方。盡如此。不值一笑也。

梱案。腫瘍方中如意金黃散。尋常用一次。不過數

分而原書所開各藥至四十斤之多。卽其門如市之場醫亦須一二年方能用完。不知末藥最怕泄氣。卽瓮罐密藏。閤久香氣必大減。用便不靈。醫者當以應付之繁簡爲合藥之多少。甯少無多。勿使閤久而成朽藥。余將此方分兩減至一斤。恐人疑其與原書不符。故附記卷末。至真君妙貼散二十一斤。亦嫌其多。今亦酌減。

又案凡合丸散。須各藥各研。稱準淨末。合和再研。最爲要著。緣末藥總須臘渣藥有粗細。卽渣有多

少有一兩僅得淨末四五錢者亦有得七八錢至九錢外者共研去渣則與原方銖兩配合不符倘內有要藥去渣一半誤事多矣。

外科正宗卷二終