

好
娠



普濟方卷之一百二十四目錄

○ 妊娠諸疾門

論十二道類十二類
方四百方法十二法



類
○ 胤嗣

轉女為男

養胎胎教

子淋

惡阻

子煩
心腹痛

心腹脹滿

身體腫脹

腰痛

論一道方七十四方

○ 胤嗣

秦椒丸

栢子人丸

白薇丸

又方

廣胤丹

白薇丸

紫石門冬丸

七子散

女服紫石芙丸

卷百丸

紫石八丸

養真丸

白微丸

白微丸

續嗣降生丹

秦桂丸

朴硝盪胞湯

白薇丸 助陽丹 九人家園圃有凌霄花婦聞其氣不孕

治婦人久無子息 杜蘅丸 杜衡丸 吉祥丸

秦桂丸 一名蠡斯丸 扶血丸 禹餘糧湯 陽起石丸

紫石英丸 調經散 洗洗丸 坐導藥方 鍾乳丸

慶雲散 治婦人久無子息 地黃湯 治婦人子臟風冷致令無子

熟乾地黃散 治婦人無病觸禁久不生子 八真丹 白芷暖宮丸

又方 治婦人無病觸禁久不生子 承澤丸 栢子人丸

抑氣散 專治婦人下元虛冷定子嗣 陽起石丸

治婦人無子 療無子臟冷宮內炙丸 八黃湯

療婦人子臟偏僻冷結無子 茱萸丸 又方

治婦人無子及冷帶 煖宮丸 驗胎法 一名探胞湯

千金保生丸 參香勝金散 治勞損產後無子 八珍散

歸艾丸 麝香圓 藥茸萬病丸 附子當歸丸 壯陽令人有子

令人有子 令人有子 令婦人有子 令生男兒 療婦人無子

○任辰 論一道方七方

白朮湯 白朮散 木香丸 胎孕九箇月將息胎法

犀角散 治妊娠臍腑常多轉瀉 治妊娠渾身碎痛

男女受胎時日法 推正相日法 推貴宿日法 胎前避忌

妊娠食忌法 食忌起居 胎前藥忌

○養胎胎教 論一道方五十九方

烏雌雞湯 補胎湯 艾葉湯 黃連湯 雄雞湯

茯神湯 菊花湯 一名麻苗雌雞湯 調中湯 阿膠湯 一名蒺藜湯

安中湯 麥門冬湯 一名人參雌雞湯 柴胡湯 葱白湯

杏人湯 芍藥湯 葵子湯 半夏湯 猪腎湯

丹參膏 甘草散 麥門冬散 黃芩散 苧根飲子

竹茹散 柴胡散 赤茯苓散 人參散 乾地黃散

桑寄生散 敗蒲散 桑寄生飲子 柴胡散 茯苓神散

紫苑飲子 葱白雌雞湯 人參丸 當歸散

赤石脂散 甘草散 地黃芎藭丸 人參丸 熟乾地黃湯

蒸大黃丸 黃耆湯 白木湯 乾地黃湯 白木散

白木當歸湯 橘皮湯 熟乾地黃湯 艾葉湯

桑寄生湯 當歸湯 白木散 當歸飲 阿膠湯

枳殼散 地黃丸 治婦人懷胎不長

○轉女為男

論一道方二方 法五法

丹參丸 又方 轉女為男者 九受胎三月逐物變化

紫宮玉女祕法 又法 妊娠纔滿三月要男者

○惡阻

論一道方五十五方

半夏茯苓湯 茯苓丸 陳橘皮丸

治妊娠惡阻嘔吐不止 麥門冬散 安胎飲 枳殼丸

茯苓湯 旋覆半夏湯 桔梗湯 半夏飲

茯苓湯 人參散 白木散 厚朴丸 陳橘皮丸

人參橘皮湯 一名八味竹茹湯 柴胡散 柴胡飲

人參飲 桑寄生飲 保生湯 犀角散 參木飲

人參飲 白木丸 茯苓飲 一名茯苓湯 陳橘皮散 麥門冬丸

治妊娠惡阻胃寒 人參散 療妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

半夏茯苓湯 療婦人妊娠惡阻嘔吐 加味二陳湯

小紫蘇飲 麥門冬湯 人參湯 前胡飲 麥門冬飲

薑橘湯 茯苓丸 白木散 醒脾飲子 四七湯

人參丁香散 人參半夏丸 小地黃丸

治妊娠忽下黃汁如膠 治阻病 參橘散 赤茯苓散

人參調中散 李氏家傳快氣湯 溫真人方

膠艾湯

○子煩

論一道方十八方

升麻湯 酸棗人湯

赤茯苓散

退熱湯

柴胡飲

知母湯 茯苓湯

竹瀝湯

知母飲

犀角散

竹瀝湯 一名竹葉湯

麥門冬湯 一名竹葉湯

治妊娠恒苦煩悶

治孕婦七八箇月傷暑傷熱

治妊娠常苦煩悶此是子煩

治妊娠子煩口乾不得卧一母丸

治妊娠心中煩悶見食即吐

○子淋

論一道方二十四方

地膚大黃湯

療妊娠數月小便淋瀝疼痛

安榮散

木通湯 冬蔡子散

冬蔡子湯

海蛤湯

當歸湯

人參散 蔡子散

又方

白芷散

石蠅散

石韋湯 鯉魚汁

治妊娠淋小便數而少澁痛

檳榔散

滑石湯 治妊娠小便淋澁臍腹妨悶

車前子湯

蔡子飲 甘遂散

猪苓散

地膚湯

心腹痛

論一道方八十四方

保生湯

澤蘭丸

沉香湯

七寶湯

真白湯

妙薑丸 厚朴散

木香散

半夏散

地黃飲

木香和脾飲

枳實湯

如聖散

草薹散

阿膠湯 大復湯 一名雞蘇散

厚朴湯

人參飲

丁香散 當歸散

芎歸湯

人參湯

沉香湯

人參湯 白木湯

療妊娠三四月腹痛時時下血

療妊娠被驚惱胎向下不安

艾葉散

參朮湯

當歸湯 大腹皮飲

金粟湯

荳蔻湯

當歸芍藥散

沉香散 安胎飲

人參湯

白木散

桔梗丸

芍藥散 雞蘇散

治妊娠心下急氣滿切痛

橘皮湯

芎藭湯 鹿角膠散

治妊娠胎動腹痛心煩

治妊娠率心痛

薑茂湯 加減四物湯

芎藭散

地黃湯

草菓散 香木散

當歸湯

白木湯

治妊娠卒心痛

黑神散 枳殼丸

芎藭湯

槐子 一名蒲黃酒

當歸飲 治妊娠三五月忽然心腹絞痛

生雞子酒

雷定

又方

治妊娘卒心痛欲死

玄胡索散

竹茹湯

牛屎方

地黃酒

治妊娘胎動腹痛連腰

車脂方

又方

知母丸

治妊娘忽口苦心腹痛

治妊娘傷胎結血心腹痛

治妊娘四五月忽心腹絞痛

治妊娘胎動腹痛連腰方

治妊娘腹中痛

當歸散

治妊娘心痛

火龍散

治妊娘渾身厥冷氣痛衝心

治妊娘忽然心痛悶絕

治妊娘心痛煩悶

○中惡心腹痛

論一道方十方

當歸散

犀角散

治妊娘中惡心腹疔痛

又方

又方良薑湯

檳榔散

又方

治妊娘中惡心腹痛

又方

治妊娘中盡心腹痛

○心腹脹滿

論一道方十七方

丁香散

阿魏丸

厚朴煎散

白芷寇散

倉公下氣湯

訶梨勒飲

檳榔散

人參湯

白木湯

沉香散

白芷寇丸

木香丸

草豆蔻散

藿香丸

白木散

枳殼湯

治妊娘脹滿有熱証者

○身體腫脹

論一道方二十八方

木通湯

當歸散

八正散

勝金散

桑白皮湯

鯉魚湯

防已湯

赤茯苓湯

茯苓丸

天仙藤散

療妊娘身腫有水氣

葶藶散

又方

澤瀉湯

腎着湯

五皮散

治妊娘體腫

寄生飲

桑白皮飲

猪苓散

蔡子散

商陸赤小豆湯

治妊娘從脚上至腹腫

燒秤錘方

治妊娘毒腫方

又方

治妊娘兩脚浮腫

治婦人身腫九月而瘖瘖

○腰痛

論一道方二十一方

五加皮散

續斷丸

一名五加皮丸

平胃散

一名平安散

杜仲散

防風湯

當歸散

大地黃丸

大腹散

治妊娠腰痛

治妊娠腰痛不止方

治妊娠腰痛

牛屎方

地黃酒

紫酒

通氣散

療妊娠腰背痛

治妊娠卒腰背痛如折

產前軟膝

杜仲丸

阿膠丸

治妊娠腰痛不可勝舉

普濟方卷之一百二十四目錄

終

普濟方卷之一百二十四

。妊娠諸疾門

○胤嗣

附論

夫有夫婦則有父子婚姻之後必求嗣續故聖人謂不孝有三無後為大者言嗣續之至重也凡欲求子當先察夫婦有無勞傷痼害之屢依方調治使內外和平則婦人樂有子矣○素問云天地者萬物之父母也陰陽者血氣之男女也有夫婦則有父子婚姻之後則有生育生育者人倫之本也且男女之合二情交暢陰血先至陽血後衝血開裏精陰外陽內陰含陽胎而男形成矣陽精先至陰血後參精開裏血陽外陰內陽含陰胎而女形成矣若夫受形之易者男女必當其年男子二八精氣溢瀉必三十而娶女子二七天癸至必二十而嫁欲其二氣充實然後交合交而孕孕而育育而壽儻若婚嫁不時真氣早泄未完而

必

傷是以交而不孕孕而不育育而不壽者多矣以此觀之男女婚姻貴乎及時夫婦貴乎益壯則易於受形也且父少母老生女必羸母壯父衰生男必弱誠有斯理或男子真精氣不濃婦人血衰而氣旺是謂夫病婦疹皆使人無子治療之法女子當養血氣抑以減喜怒男子益腎生精以節嗜欲依方調治陰陽和平則婦人樂有子矣○又曰無子者其事有三也一者墳墓不嗣二者夫婦年命相尅三者夫病婦疹皆令無子若是墳墓不嗣年命相尅此二者非藥能益若夫病婦疹須將藥餌故得有效也然婦人挾疾無子皆由勞傷血氣生病或月經閉結或崩漏帶下致陰陽之氣不和經血之行乖候故無子也診其右手關後尺脉浮浮則為陽陽脉絕無子也尺脉微濇中年得此為絕產也少陰脉如浮緊則絕產惡寒脉尺寸俱微弱者則絕產也又有因將攝失且飲食不節乘風取冷或勞傷過度致令風冷之氣乘其經血結於子臟子臟得冷故令無子也○凡婦人年二三十無病而無子經血如常或經血不調者乃陰不升而陽不降此上下不得交通有所滯礙不能為用故也可用獨聖散涌訖寒痰三二升後用導水丸禹攻散世三五行

或十餘行單用無憂散世十餘行處寒熱虛實用之次服葱白粥三五日胃氣宣通腸中得實可服玉燭散更服白朮散茯苓之類降火益水既濟之道當不數月而有孕內經曰婦人有癢痔遺溺嗑乾諸證雖服妙藥針灸亦終不能孕蓋衝脉督脉任脉有此病不能孕故也○婦人所以無子者衝任不足腎氣虛寒也內經謂女子二七天癸至任脉通太衝脉盛陰陽和故能有子若衝任不足腎氣虛寒不能繫胞故令無子亦有本於夫病婦疹者當原其所因而調之○治要之法男服七子散女服紫石門冬丸及坐藥湯胞湯無不有子也

方

秦椒丸出聖惠方治婦人絕產生來未產盪滌腑臟使玉門受子精及子臟風虛冷氣致陰陽二氣不能和合故令久無子

秦椒

天雄各十

玄參

人參

白欬

鼠婦

白芷

黃耆

桔梗

露蜂房

白僵蚕

桃人

蟬蛸

白薇

細辛

蕪荑各一兩

牡蒙

沙參

防風

甘草

牡丹皮 牛膝 卷栢 五味子 芍藥

桂心 大黃 石斛 日本各三 栢子人

茯苓 當歸 乾薑各一 澤蘭 乾地黃

芎藭各一兩 乾漆 白石英 紫石英 附子各二

鍾乳半兩 水蛭銖十 麻布叩復頭燒七尺 蟲蟲百枚

右為末蜜丸如梧桐子大酒服十九日再稍加至二十九若有所去

如豆汁鼻涕此是病出覺有異即停一方無鼠婦

栢子人丸出聖方治婦人子臟虛冷及五勞七傷羸瘦面無顏色不能

飲食產後斷緒無子多時

栢子人 澤蘭 芎藭 防風去芦 紫石英飛細研水

白石英飛細研水 厚朴去麤皮塗生 乾薑炮裂 熟乾地黃

當歸剉碎 杜仲去麤皮炙 甘草炙微赤 桂心 牛膝去苗各

川椒去目及閉口者 人參去芦 石斛去根 白芷 赤石脂細研

燕羨 肉蓯蓉酒浸一宿刮 白芍藥 桔梗去芦 五味子

秦朮去苗 龍骨 防葵 白茯苓 藁本

細辛 獨活各半 黃耆剉 鍾乳粉二兩

右為末入研藥了都研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九空

心及晚温酒下

白薇丸出聖方治婦人子臟風虛積冷經絡不調面無血色肌肉消瘦不

能飲食及帶下久無子

白薇 細辛 防風 人參 秦朮

秦椒 白斂白芷 桂心 牛膝 燕羨

沙參 芍藥 五味子 白殭蚕 牡丹

蟻螬各一 乾漆 栢子人 乾薑 卷栢

附子 芎藭各三 桃人 紫石英各一 鍾乳

乾地黄 白石英各二 鼠婦半兩 水蛭 蟲蟲各十

吳茱萸銖八 麻布叩復頭燒

右為末蜜丸如梧子大酒服十五九日再稍加至三十九當有所去

小覺有異即停服

羅真

又方出千金方 治久無子或斷緒上熱下冷百病皆治之

白薇各白薇丸 乾地黄 乾薑 車前子 蜀椒各十

紫石英 藁本 石膏 菴藺子 卷柏各三

澤蘭 赤石脂 白龍骨 遠志 麥門冬

茯苓 太乙餘糧各二 當歸 芎藭

蛇床子各一 白芷 覆盆子 桃人 人參各一

桂心 蒲黃各二 細辛三兩 橘皮半兩

右為末蜜和凡如梧子大酒服十五丸日再漸增以知為度亦可至

五十九丸慎猪雞生冷酢滑魚蒜驢馬牛肉等覺有娠即停三月正擇

食時可食牛肝及心至四月五月不用

廣胤丹出御藥 治久無子息 川續斷剉碎 澤蘭葉去枝 熟地黄焙

黃耆剉細 人參上黨者 白芍藥 川芎 白薇

牡丹皮淨 延胡索 白茯苓去皮 當歸去苗洗淨 陳皮湯浸去

嫩鹿茸燎去毛酥酒塗 防風去苗 藁本去苗 肉蓯蓉酒浸軟去穢

華田辛 細辛去苗葉土 蓬莪茂 京三稜慢火煨熟和白麵裹

黑附子剉裂去皮 甘草剉炒 覆盆子去萼枝

右為細末鍊蜜和凡如彈子大每服一粒空心食前細嚼溫酒下日

進三服有孕住服昔有人常服此藥而生七男以此常合與人服而

皆應效

白薇丸療婦人百病斷絕緒產

白薇 細辛 厚朴多 椒炒出 桔梗

鼈甲炙各五分 防風 大黃 附子炮 石硫黃研各

牡蒙二分 人參 桑上寄生各四分 紫苑 杜蘅

白殭蚕 續斷 秦艽 水蛭各三 紫石英研 朴硝

牛膝 蟲蟲去翅 當歸各八

桂心 鍾乳

右搗篩蜜丸空腹溫酒服如梧桐子十五丸日二漸加至三十九不

吐不利忌生冷油膩餒生血物人莧生葱生菜猪肉冷水粘食陳臭

紫石門冬丸出聖方治婦人久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脈虛損胞內宿寒疾病經水不時暴下不止月內再行或月前月後及子臍積冷虛羸百病崩漏帶下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛少腹急重小便白濁已上疾証皆令孕育不成以至絕嗣不孕此藥並能主療常服除瘀血温子藏令人有孕臨產易生子及生子充實無病

紫石英 天門冬各三兩 當歸 芎藭 紫葳

卷栢 桂心 烏頭 乾地黄 牡蒙一作牡

禹餘糧 石斛 辛夷各二兩 人參 桑寄生

續斷 細辛 厚朴 乾薑 食茱萸

牡丹 牛膝各三兩 栢子入兩 薯蕷 烏賊骨

甘草各一兩半

右為末蜜和丸如梧桐子大酒服十九日三漸增至三十九丸以腹中熱為度不禁房室丈夫出外不可服藥或温米飲下空心食前日服七子散出大良方治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足兼治婦人無子皆因五勞七傷虛羸百病所致

五味子 鍾乳粉 牡荊子 菟絲子 車前子

菥菀子 石斛 乾地黄 薯蕷 杜仲

鹿茸 遠志各八兩 附子 蛇床子 芎藭各六兩

山茱萸 天雄 人參 茯苓 黃耆

牛膝各五兩 桂心十銖 菝葜銖 巴戟天十二銖

右為末酒服方寸匕日二不知增至二匕以知為度禁如藥法不能酒者蜜和丸服亦得一方加覆盆子八銖

女服紫石英丸

紫石英燒口火煨之以石 禹餘糧火煨 熟地黄湯洗清

辛夷人 厚桂去皮不見火 卷栢醋炙 石斛去皮剉 川續斷酒浸

栢子人研炒別 川烏炮去 川芎 海螵蛸醋炙 牡丹皮去心

川當歸酒洗 粉草各一兩 桑寄生 華陰細辛去土洗

山藥 吳茱萸炒 乾薑炮各半兩 人參七銖 天門冬去心一兩半

梓朴去皮薑汁塗炙

右為細末醋為丸如梧桐子大每服七十九至百丸空心米飲吞下

以腹中熱為度不禁房事夫出不可服盡劑當有娠
卷栢 治婦人子臟冷久無子由風寒邪氣客於經血

卷栢 壯蒙 藁本 當歸剉碎 熟乾地黄

栢子人 乾薑剉裂 禹餘糧燒醋淬 白薇已上各

芎藭 人參去芦 五味子 石斛去根 桂心

附子炮裂去皮臍 防風頭去芦 吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒 甘草炙微

牛膝去苗 桑寄生 川椒去目及閉口者微炒

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒下三十九

紫石英丸 治婦人久無子由子臟久積風冷陰陽不能施化

紫石英細研水飛過二兩 細辛 桔梗去芦

厚朴去麩皮塗生 防風去芦 川大黃剉碎

川椒去目及閉口者微炒去汗 附子炮裂去皮臍 硫黃細石 白薇

當歸剉碎 桂心各一兩 鱉甲一兩半 牡蒙 人參去芦

秦寄生各三分 半夏湯洗七遍去滑用 白殭蠶微炒

續斷 紫苑洗去苗土 杜衡 牛膝去苗各半兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心及晚食前溫酒下

養真丸 治婦人血虛氣憊陰陽不升降久不成妊娠者

鹿茸 當歸 肉蓯蓉 禹餘糧 菟絲子

覆盆子 熟地黄 紫石英 桑螵蛸各二兩 五味子

真琥珀 白芍藥 川芎 桑寄生 卷栢

艾葉 川薑 堅白茯苓 人參 牡蠣

酸棗人各一兩 鍾乳粉四兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大食前溫酒吞下五十九日三服

喫後用粥飯厭之

白薇丸 治補調衝任溫暖子宮治胞絡傷損宿受風寒久無子

或胎不牢多致損墮又服去下藏風冷令人有子

白薇去苗 牡蒙 藁本各五 薑黃 當歸去芦

熟地黄各七 川芎 人參去芦 栢子人微炒 石斛去根

桂心去麩 附子炮裂去皮臍 五味子去梗 防風去苗 甘草

川牛膝去苗 吳茱萸湯浸七次 桑寄生各六分 秦椒六分 禹餘糧八分

右為末鍊蜜丸如梧桐子大空心酒下三十九日二服忌生菜葱熱麵蕎麥蒜猪肉炙博蔡菜蕪蕪菜海葶和食臭物等一方有紫參無牡蒙米飲亦得繞覺妊娠即住服已懷孕者尤不宜服之白薇丸 治婦人無子或斷緒上熱下冷飲食減退肢體黃瘦凡有心腹一切疾病皆主之

白薇

熟乾地黄

川椒

去目及開口者 微炒去汗

白龍骨

車前子

當歸

芎藭

蛇床子

細辛

乾薑

藁本

桂心

卷柏

白芷

覆盆子

菖蒲

人參

桃人湯浸去皮尖雙

白茯苓

遠志

麥門冬

白朮

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心及晚食前溫酒下續嗣降生丹 治婦人稟受氣弱胎臟虛損子宮冷憊血寒痼冷難成子息功效如神

當歸

桂心

龍齒

烏藥

益智

杜仲

石菖蒲

吳茱萸

茯神

川牛膝

秦艽

細辛

苦桔梗

半夏

防風

白芍藥

乾薑

川椒

二兩湯浸 半日焙

附子

附心作一錢重

如皂子大

牡蠣

子小片要取漳泉二州者却用童

一錢重

出用碗黃末一兩米醋塗

乾用炭五斤煨

每通皮紙裏又兩餘

米酸浸全熟濕火

後合藥用

右為細末取附子內硃砂別研為細末糯米糊為丸如梧桐子大每服三十九至百九空心淡醋溫酒鹽湯亦可下一日二服。此藥又療男子精寒不固陽事衰弱白濁夢泄及治婦人血虛帶下肌瘦寒熱但是男女諸虛百損客熱盜汗氣短之力面無顏色飲食少味並皆治之更有奇效難以具述受持君子宜預行善及方却服此藥無不感應

秦桂丸 治婦人無子

秦艽

桂

杜仲

防風

牡丹皮

厚朴

附子

陽起石

白茯苓

白薇

當歸

乾薑

牛膝

沙參

半夏子

人參

卷柏

鹿茸

細辛

高伴

右各為末以蜜丸如梧桐子大每服三四十九丸温酒下食前

朴硝盪胞湯出聖惠方治婦人立身已來全不產及斷緒久不產三十年者

一朴硝 牡丹皮 當歸 犬黃 桃人生用俱各三銖

細辛 厚朴炙 桔梗 人參 赤芍藥

茯苓 桂心 甘草炙 牛膝 橘皮各二銖

附子六銖 蠱蟲去翅足微熬 水蛭各十枚炙

右以咀以清酒五升水五升合煮取三升分四服日三夜一每服相

去三時更服如常覆被取少汗津不出冬日著火籠之必下積及

冷赤膿如赤小豆汁益為婦人子宮內有此惡物使然或天陰臍下

痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更

服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去

惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著坐導藥一方

不用桔便甘草一方無水蛭

白薇丸出千金方治月水不利閉塞絕產十八年服此藥二十八日有子金城太守方

白薇 細辛各三銖 人參 杜蘅一方用牡蠣 牡蒙

厚朴 半夏 白殭蚕 當歸 紫苑各銖

牛膝 沙參 乾薑 秦芫各半 蜀椒

附子 防風各一兩半

右為末蜜和丸如梧子大先食服三丸不知稍增至四五丸此藥不可常服覺有娠即止用之大驗一方有桔梗丹參十八銖一方有紫參助陽丹治婦人無子月經不調蓋因腹脇疼痛血塊血癖所以不能先服當歸六合散空心煎十餘服先去敗露腹肚不疼可服助陽丹十五服必然成胎有一婦人三十七歲無子服此藥半月有子

細辛 防風 茱萸 川椒 白朮

白臉 乾薑 茯苓各一兩半 牛膝 秦芫

附子 陳皮 石菖蒲 厚朴 沙參

人參 桂心各七銖

右為細末鍊蜜為丸如紅豆大每服十九丸温酒下日進三服尅日見效男子服能補益婦人服之有子覺有孕不可服無夫婦人者不可

服用壬子日修合忌雞犬孝服每月經後三五日淨一舉便成亦可
延年益壽

凡人家園圃有凌霄花婦聞其氣不孕男服七子丸出便產

五味子一兩淨二兩菟絲子二兩先蒸去灰却用酒浸非子一兩炒

覆盆子一兩酒洗去酒蛇床子半兩黑附子一兩去皮兩鹿茸一兩酒

白茯苓半兩原蚕蛾一兩酒煮乾先洗遠志半兩湯去心陽起石一兩酒

益志子一兩去皮兩沉香半兩見火兩黃芪半兩蜜炙兩熟地黃一兩湯洗

右為細末酒煮糯米糊為丸如梧桐子大每服六七十空心鹽酒

或鹽湯吞下弱甚者加天雄半兩炮去皮脚腰痠痛者加杜仲一兩

去皮薑汁炒去絲石斛一兩去根

治婦人久無子息大有神效

茯苓 桂 川芎 人參 當歸各三

細辛二兩 沉香 五味子各一 川牛膝 沙參

白薇 琥珀各半 川烏一箇 川椒一兩 蜜一斤

右為細末鍊蜜丸如梧子大每服五十九溫酒下醋湯亦得日進二

服

杜蘅丸 治婦人腹臃久積風冷血氣凝滯不能宣通故令無子

杜蘅 附子炮裂去細辛各一 防風去芦 白茯苓各一

白薇 牛膝去苗 半夏湯洗七遍 沙參去頭

秦艽去苗 桂心 川椒去目及閉口 菖蒲

藁本 蛇床子各三

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心及晚食前溫酒

下有子即住服

杜蘅丸治婦人久無子斷緒

杜蘅三月三日採 桔梗剉炒 附子炮裂去 牛膝切酒浸 石菖蒲

細辛去苗 蜀椒去目炒 半夏湯洗二十遍 厚朴去麩皮 沙參去頭

防風去又 乾薑炮剉 桂去麩皮

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服溫酒下二十九漸加三十九早

晨日午各一服

吉祥丸出千金方治婦人積年不孕

天麻

柳絮

牡丹

茯苓

乾地黄

杜心各一兩

五味子

桃花

白朮

芎藭各二兩

覆盆子一斗 桃人一枚 百

菟絲子

楮實子各一升

右為末蜜和丸如豆大每服空心飲苦酒下五丸日中一服晚一服

秦桂丸出千金方治婦人無子經進有效危氏方

秦芫去芦

桂心不見

杜仲製去皮 防風

厚朴各三分

附子生去皮

白茯苓各一兩

白薇

乾薑炮

沙參

牛膝酒浸

半夏各半兩

人參一兩

細辛二兩

右為細末鍊蜜為丸如赤豆大每服三十丸空心食前醋湯米飲任

下未效加丸數已覺有孕便不可服用温酒下亦得昔金城太守范

羅謹上臣驗此術若服藥四十日無子請戮臣一家以令天下醫人

賜子丸曰張伯高學士傳云無子藥諸士夫服後俱有應驗就藥緘

上書刊二句云修合者用意以誠服餌者存心以仁不惠乎無子也○

服如覺無益稍加丸數為度如服七日後陰陽覺有娠此藥與前大

子中含字文妻李氏年四十無子服此藥十三日有娠此藥冬蟲斯丸

屢用屢驗此方不可不廣傳與人夫不在家不可服

扶血丸出仁存方治婦人無子

紫石英

桑螵蛸半兩

熟艾醋炒

卷栢一兩

覆盆子四兩

阿膠炒

包金土各一兩

栢子人二兩

陽起石半兩

熟地黄一兩

牡礪煨 磁石二兩

右為細末以糯米粥丸如梧桐子大每服三四十九酒吞下食前

禹餘糧湯 治婦人胞胎寒冷絕產無子

禹餘糧煨

白殭蚕去黑 烏賊魚骨去甲皮

龍骨碎研

桂去蘆

竈下黄土無灰者

石韋去毛

乾薑炮

滑石研

赤芍藥

半夏製水浸

石韋去毛 乾薑炮

伐緒丁頭者 各半兩

右擣篩每服三錢匕水一盞入生薑三片煎至六分去滓食前温服

日再

陽起石出危方治丈夫真精氣不濃不能施化是以無子

陽起石煨細

鹿茸煨去毛絲子水淘淨酒浸

天雄炮皮去韭子炒

肉蓯蓉酒浸各覆盆子酒浸

石斛去根桑寄生

沉香別研原蠶蛾酒炙五味子各半

右為末酒煮糯米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯或鹽酒下

紫石英出大良方

紫石英 阿膠

當歸

川芎

赤芍藥

川續斷各一兩鹿茸

白朮

桂心各半

栝子一兩

熟地黄三兩

右為末鍊蜜為丸如梧桐子大空心溫酒下二十九丸兼治虛中有熱

頭目旋暈足如履空嘔吐不食月水不調或多或少皆虛候也久服

能生髮令有子更治虛悸常若憂思皆心血不足血室虛所也

調經散出便產療月候不調或在月前或在月後或多或少或逾月不

至或一月兩來此是病主不孕

吳茱萸一兩半去關目者半夏一兩湯當歸一兩去參

麥門冬二兩半

白芍藥京南川芎如

牡丹皮去骨

厚朴去皮不

阿膠如蚌甘草炙一

右咬咀每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓食前稍熱服

月候既調月月如期而來按時而止則當有娠○欲娠月候調勻顏

色肌膚如常但苦沉重煩悶不欲飲食又不知患之所在脉又平和

是欲妊也如此經兩月後經忽不通則結胎矣○既娠之候多病惡

阻婦人性弱有風氣痰飲則病其狀沉重昏眩惡聞食氣喜啖酸

甚則寒熱心煩嘔痰恍惚不能支持輕者不服藥亦不妨重者須服

藥

洗洗丸 治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墮

澤蘭葉

白朮各一兩

肉桂去麩

乾薑炮多

熟地黄洗焙

當歸洗焙各

川芎

石斛酒浸

白芍藥

牡丹皮去心

延胡索略一

右為細末醋麵糊丸如梧子大每服五十九溫酒空心下一方無乾

薑肉桂白朮有白薇人參

坐導藥方

夫求子者服藥須有次第不得不知其次第謂男服七

子散女服盪胞湯及坐藥并服紫石門冬丸則無不得効矣

皂莢一兩炙去皮子 大黃

戎鹽

礬石燒

當歸各二兩

五味子

乾薑各三兩

細辛三兩

蜀椒炒出汁

葶藶子

苦瓠各三分一方作山菜黃

右搗篩內輕絹袋子如中指許大長三寸盛之令滿內子門中生任

意勿行走急小便時即出之仍易新者一日當下青黃冷汁盡止

即可幸御自有子若未見病出亦可至十日安之本為子宮有惡

物故令無子值天陰冷則發疼痛須候病出尽方已不可中輟每日

早晚用苦益菜煎湯董洗一方無葶藶一方有砒霜三分著藥後

日乃服紫石門冬丸

鍾乳丸 治婦人斷緒無子

鍾乳研一復時 白礬燒令汁盡

阿膠燒令

紫石英研細

蜀椒去目及閉口者炒去汗

生乾地黃焙 五味子炒

蛇床子炒

原蠶炒

石亭脂研極細

右除石藥別研外餘藥為末和勻鍊蜜和搗丸如柘相子大每日空心煖酒下二十丸漸加至三十丸

慶雲散 治丈夫陽氣不足不能施化施化無成

覆盆子 五味子各一升 菟絲子二升 天雄一兩 石斛

白朮各三兩 桑寄生四兩 天門冬九兩 紫石英二兩

右治下篩酒服方寸匕先食服日三素不耐冷者去寄生加細辛四兩陽氣不少而無子者去石斛加檳榔十五枚

治婦人久無子息

吳茱萸湯浸二

白芨去鬚 白斂去皮

白茯苓去皮各

細辛梗葉 牛膝去芦

附子炮去皮臍 人參一錢

桂心一錢

右為細末鍊蜜為丸如桐子大每服十九丸用温酒送下食前

治婦人子臟風冷致令無子

皂莢去黑皮塗酥 川大黃對碎 戎鹽

白礬炮灰

當歸對碎微炒

五味子

川椒去目閉口者

乾薑對裂 細辛各三分

右為末用綿裹藥末如棗大內產門中有惡物下即止未効再用

熟乾地黄散出聖惠方治婦人久無子斷緒者是子臟積冷血氣不調

熟乾地黄 牛膝去苗 當歸炒細微 栝子人 白薇各一兩

芎藭 卷栢 防風去芦頭各三分 桂心半兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓空心温服

地黄湯 療久無子斷緒小腹冷疼氣不調

熟地黄 乾 川牛膝 當歸各八分 卷栢 川芎

防風各六分 牽牛子末 桂心各三分

右吹咀以水六升煮取二升三合去滓分三服服別和一分牽牛子未如人行四五里更進一服以快利止忌生菜葱熱麵蕎麥蒜

猪肉炙博葵菜蕪荑蒜菜海藻粘食臭物等

八真丹 治婦人無子

當歸 芍藥 地黄 川芎 鹿茸

阿膠炒作珠用乾草火燒 艾葉 續斷各等

右八味停分細末醋打麵糊為丸如桐子大每服二十九空心好酒

送下

白芷暖宮丸出永類治暖血海實衝任治子宮虛弱風寒客滯因而斷

緒不成孕育及數常墮胎或帶下赤白漏下五色頭月虛暈嘔吐少氣

胃腹苦滿心下煩悸臍腹刺痛連引腰背下血過多兩脇牽急嘔吐不

食面色青黃肌膚瘦瘁寢當自汗

禹餘糧製一兩 白薑炮 芍藥 白芷 川椒製

阿膠粉炒 艾葉製 川芎各三分

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服四十九米飲下或温酒醋湯亦得

常服温補胞室和養血氣光澤顏色消散風冷退除百病自成孕

育性平不熱

大黃丸出千金治帶下百病無子服藥十天下血二十日下長蟲及青黃

汁三十日病除五十日肥白 柴胡 朴硝 乾薑各一兩

大黃破如米豆熬 芎藭五兩 蜀椒二兩 茯苓如雞子

右為末蜜和丸如梧桐子大先食服七丸米飲下加至十九以知為

度五日微下

治婦人無病觸禁久不生子出附後方

右常候月水絕後一日接為男二日為女三日為男四日為女五日為男六日為女過此女門閉不成勿復交接更待後月徒然無

益浪辛苦也宜用後方

栢子人丸出附後方治婦人無病觸禁久不生子

用栢子人一升茯苓末二升搗合乳和服十九即佳

又方出附後方

大黃七分

半夏

前胡各一分

皂莢

杏仁

吳茱萸各二分

右搗篩鍊蜜為丸每服二十九不過半年有子依前法即定男女也

治婦人不生者

胡椒二兩為末

艾一兩為末

熟鹽半兩

花椒半兩為末

砂仁

茴香各半兩

官桂

右為末裝入猪肚內縫合煮熟每日清早晨割二兩好酒三五盞服之肚腹熱子懷為孕

承澤丸出千金方治婦人下焦三十六疾不孕絕產

梅核人

辛夷各一分

葛上亭長七枚

溲疏三兩

葉本一兩

澤蘭子五合

右為末蜜和丸如大豆先食服二丸日三不知稍增若腹中無堅癖積聚者去亭長加通草一兩惡甘者和藥先以苦酒搜散乃內少蜜和為丸或軟飯為丸温酒送下亦可

陽起石出續命方治婦人子臟虛冷勞傷過度風寒結搏久不受胎遂致絕子不產此藥服之大益子宮消除積冷

陽起石酒浸半日

吳茱萸湯七次微炒

熟地黄各一兩

牛膝去酒

乾薑炮

白朮各三

右為細末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服二十九至三十九温酒或温米飲下空心食前日二服若覺有妊即止抑氣散出危氏方治婦人氣盛於血所以無子尋常頭暈膈滿體痛怔忡

皆可服之香附子乃婦人仙藥也不可謂其耗氣而勿服

香附子炒研淨

茯神去木

橘紅二兩

甘草炙一兩

右為細末每服二錢入鹽少許食前沸湯調服仍兼進紫石英丸後

專治婦人下元虛冷定子嗣

血竭一錢

大黃半兩

頭紅花半兩

臘脚醋

一大碗

右為細末一處同煎熬成膏子如大豆大每服一九服至七日再加

大黃湯

後方

治婦人月水不利結積無子

大黃剉炒

桃人

湯浸去皮尖雙

蟲蟲法翅是微

水蛭

糯米內炒候米黃即去米三枚

右剉如麻豆每服一錢酒一盞煎至七分去滓空腹溫服如無結積

不可服一方無水蛭

治婦人無子

以二三月選丁亥日採取桃花陰乾為末入麝香硃砂人參角井花

水下取戊子日下同為細末當信用行溫酒下二服並絕妙

療無子臍冷宮內炙丸出聖

麝香二分

皂莢

十分塗酥炙

蜀椒

六分炒

右搗篩蜜丸酸棗人大以綿裹內產宮中留少綿線出覺憎寒不

不淨下多即抽綿線出却丸藥一日一度換之無問晝夜皆內無所

忌也

又方出聖

蛇床子

石鹽

細辛

乾薑

土瓜根四兩

右搗散取如棗核大以綿裹內子宮中以指進之依準前法中間

病未可必不得近丈夫餘無所忌並效

療婦人子臍偏僻冷結無子坐藥方出聖

蛇床子三兩

芫花三兩

右搗篩取棗大紗袋盛內產門中令沒指袋少長作須去任意卧

著慎風冷

菜萸丸出聖

治婦人陰寒十年無子

吳茱萸一升蜀椒一升去目并末

右蜜丸如彈子綿裹導子腸中日再易無所下但開子臍令陰溫即有子也

驗胎法一名採胞湯婦人經脈不行已經三月者欲驗有胎

用川芎生不見火為細末空心濃煎艾湯調下方寸已覺腹內微動則有胎也如胎不轉動腰重如石可用酒調下

治婦人無子及冷帶

雞子殼細研兩燒灰

綿子二兩瓦器內煨令烟

右酒糊丸每服二十丸空心酒下此藥盡見効

煖宮丸 治衝任虛損下焦久冷臍腹疼痛月事不調或來多不斷或過

期不至或崩中漏血赤白帶下或月再行淋瀝不止帶下五色經脈將

至腰腿沉重痛連臍腹小便白濁面色萎黃肢體倦怠飲食不進漸

至羸弱及治子宮久寒不成胎孕

附子炮裂去皮

杜仲炒斷

桂梗

沙參

厚朴去麩皮姜汁

黃耆

白薇去土

川牛膝去苗 川白芷

北細辛去葉 乾薑

蜀椒各二分

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九粒酒下服之一月自然有

孕多服四物湯羊肉丸亦效或棗湯吞下

辛葶丸出孟氏治婦人子宮宿受風冷多致胎氣不固常有損墮宜去

子宮風當服之

嫩鹿茸炮去毛酥塗

北細辛

黃芪蜜炙

當歸各二

藁本頭

京芍藥

川白芷

牡丹皮

川芎

乾薑炮

肉桂去皮

小黑豆炒

沒藥剉研

防風

川椒鹽炒出汗去

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服四五十丸用溫酒或淡醋湯送

下空心食前

八珍散出孟氏治婦人虛深閉內閣常以無子為憂思慮過多傷損

脾氣脾虛則不能制水漏五色之證或只常下黃白水宜服此藥

人參

白朮

粟米微炒

白茯苓

厚朴姜製各

益智一兩

黃芪二兩

甘草半兩

右為散每服三錢薑三片棗子四箇煎至八分空心服
千金保生丸出孟氏若服調氣血覺得氣調血逆但未受娠則屏去他
藥再服此藥以實子宮須經候過三日復再構自然成娠無疾而不娠
者由宜多服此藥自然成娠矣

防風 石膏煨 糯米 川椒去月炒 北黃芩

秦艽去土 厚桂去皮 貝母 北細辛 石斛酒浸蒸

大豆黃卷淨如無以小黑 白薑炮 火麻仁炒去殼

甘草炙 熟地黄洗酒蒸 當歸各二 沒藥真者

右末煉蜜丸如彈子大每服空心用北棗四枚煎湯嚼下日二服

不可用酒下恐發洩了真氣不能護血

參香勝金散出孟氏治婦人血不和須先調其榮衛使之順度則服十

金保生丸乃服有娠

當歸二兩 白薇一兩 沒藥一分 玄胡索去皮 藁本頭

綿黃芪蜜炙各 京芍藥 甘草 肉桂

紫石英煨 白朮 白石脂醋煨 川芎 白茯苓

人參 川白芷 白牡丹皮 沉香已上各

右為末每服二錢溫酒調下空心服又水一大盞薑二片北棗二枚

同煎若虛煩作熱每服之時入生地黄汁一合同煎一服

治勞損產後無子陰中冷溢出子門閉積年不產身體寒冷方千金

防風半兩 桔梗三十 人參一兩 菖蒲 半夏

丹參 厚朴 乾薑 紫苑 杜蘅各謝

秦艽 白斂 牛膝 沙參各半

右十四味為末白蜜和丸如小豆食後十五丸日三服不知增至二

十丸有娠止夫不在勿服之服藥後七日方合陰陽

歸艾丸出朱氏治婦人平生無子服之屢驗

生地黄淨洗各用破盆研爛如 白芍藥

白茯苓 延胡索 當歸去芦浸 熟艾三兩 白芍藥

右除艾葉外各焙乾為末入前件地黄生薑作一處煉蜜丸如梧桐

子大每服五十九丸空心酒下一日三服

麝香圓出梅藥治婦人陰中又冷或成白帶淋瀝不斷又無子冷

零陵香

藿香各二錢

蛇床子半兩

吳茱萸

枯白礬

木香各三錢

麝香半錢

丁香

麝香各一錢

不灰木

白芷各二錢

龍骨半兩

右為細末煉蜜和丸每兩作四十九丸每用一丸綿裹內陰中

麋茸萬病丸出十便良方補養氣血久服令人有子方

熟乾地黄

當歸

麋茸勿使鹿茸

右件各等分為細末煉蜜丸如梧桐子大空心食前米飲或溫酒下

五十丸

附子當歸丸出十便良方治血臟虛冷方

當歸三兩

芍藥二兩

附子

白朮各一兩

右為細末醋煮麵糊和丸如梧桐子大米飲下三十九丸未效加至五

十九丸空心服

壯陽令人有子出本以鹿項骨髓蜜煮服之

令人有子出本

以正月十五日燈盡夫婦共於富家局會所益之勿令人知之安卧

床下當月有娠

令人有子出本

以正月雨水夫妻各飲一盃還房當雙有子神效也

令人有子出本以狗骨煎汁煮粥飲食之熱補

令生男兒出本以虎鼻懸戶上

療婦人無子

二月丁亥日收桃杏花陰乾為末戊子日和井花水服方寸匕日

二三服

○ 姙 娠

附論

夫何以知婦人姙娠脉平而虛者乳子法也經云陰搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脉動甚者姙子也少陰心脉也心主血脉又腎名胞門子戶尺中腎脉也尺中之脉按之不絕法姙娠也三部脉沈浮正等按之無絕者有娠也姙娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也姙娠四月欲知男女者左疾為男右疾為女左右俱

疾為產二子又法左手沈實為男右手浮大為女左右手俱沈實猥生
二男俱浮大猥生二女尺脉若左偏大為男右偏大為女左右俱大產
二子大者如實狀又法左手尺中浮大者男右手尺中沈細者女若來
而斷絕者月水不利又法左右尺俱浮為產二男不然女作男生俱沈
為產二女不爾男作女生又法得太陽脉為男得太陽脉為女太陰脉
沈大陽脉浮又遣妊娠人面南行還復呼之左迴首者是男右迴首者
是女又看上圍時夫從後急呼之左迴首是男右迴首是女又婦人妊
娠其夫左乳房有核是男右乳房有核是女妊娠欲知將產者懷妊離
經其脉浮設腹痛引腰脊為今出也但離經者不病也又法欲生其脉離
經夜半覺痛日則生也○孕原立本章有泰初有泰始渾淪一判既見
氣矣故曰泰初既立形矣故曰泰始氣初形始天地相因生生化化
品物彰矣故曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生有生之初雖
陽為之主育而克之必陰為之主因形移易日改月化無非坤道之代
終也謂之妊陽既受始陰壬之也謂之胞已為正陽陰包之也謂之胚
未成為器猶之坯也謂之胎也既食於母為口呂也若娠則以時動也

若懷則以身依之也天之德地之氣陰陽之至和相與流薄於一體唯
能順時數謹人事勿動而則生育之道得矣觀四序之運生長收藏貸
出萬物有儀則咸備而天地之氣未始或虧者蓋陰陽相養以相濟
也昧者曾不知此乃欲拂自然之理謬為求息之術方且推生死於五
行斷補養於藥石以偽勝真以人助天雖或有子孕而不育育而不壽
者衆矣昔人論年老者有子者男不過盡八八女不過盡七七則知氣血
在人固自有量夫豈能逃陰陽之至數哉○大全良方云肝為血之肺
為氣血為榮氣衰應有體偶者血為榮屬陰肺主氣為衛屬陽陰陽配
定無孕血旺氣衰應有體偶者血為榮屬陰肺主氣為衛屬陽陰陽配
血氣盛則無娠孕若尺微閉滑尺帶數流利往來并雀啄小兒之脉已
見形數月懷胎猶未覺脉微閉滑尺帶數流利往來并雀啄小兒之脉已
脉已見形證也左疾為男右為女流利相通速來去兩手關脉大相應
已形亦在前通語利相通疾疾連來去是或兩手關脉洪大相應是
胎已亦有左手帶縱兩箇兒脉者夫行乘妻水行乘火金行乘木即鬼賊
右形狀也左手帶縱一雙女脉者妻乘夫也名曰橫見於右手則懷一雙女兒也
李辰

逆生三男逆者子乘母也是水生行乘金火行乘木即巳
 女順者母乘子也是金行乘水木行乘火即巳
 男一女分形證寸關尺部脈大小遲疾相應者是懷一男一
 女有時子死母身存或即母亡存子命此二句之文無辨
 流利滑數相參皆替替陽實陰虛脈得明遍滿胃堂皆逆氣若寸關尺若寸關尺
 通陰虛之脈皆替替有力而滑數皆陽是也左手太陽浮大男左手寸口為
 大則見懷右手太陰沉細女右手太陰沉細女右手寸口為諸陽為男諸陰女指
 下分明長記取懷諸陽脈皆為男寸關尺沉微弱之類是也當懷女子當三部沉
 正等無絕尺內不止真胎婦寸關尺內三部脈按之沉浮正者真胎也無絕
 夫乘妻兮縱氣霧也縱氣霧者夫乘妻也又水行乘火夫之陽氣乘妻之
 陰氣二氣上下相逐如妻乘夫兮橫氣助謂橫者妻乘夫也見前注
 母兮逆氣參逆者子乘母也謂子氣與母氣相參合也
 氣順四氣以榮養方乃成胎也謂胎氣與母氣相參合也
 婦人懷小兒五箇月是謂五月胎已成受火精以成謂胎氣與母氣相參合也
 脈息濼亂非病苦之證謂五月胎已成受火精以成謂胎氣與母氣相參合也
 無病汗出不食吐逆時精神結備其中住謂三經胎以榮其母懷娠至五

月其胎雖成阻其未備故胎氣動上衝心以謂胎汗出不食滑疾不散胎
 吐逆名曰難產三月滑利為胎氣散者弦緊牢強滑者安沉細而微歸泉路
 五月母其胎五箇月但疾懷胎之不散者弦緊牢強滑者安沉細而微歸泉路
 之脈宜強緊牢強滑利為胎氣散者謂胎氣與母氣相參合也
 微故不沉細也又云孕育備論經云少陰脈動甚者有子厥旨何哉曰
 手少陰之經屬心足少陰之經屬腎心之所主者血腎之所主者精精
 血合氣而成之也然而胞門子戶又所以為精血之會其於尺部二脈
 尤有可驗者焉且婦人尺部之脈滑是為血實必主月事不行若其來
 斷絕或中絕而不至者此皆無孕惟滑而不絕畧無間斷於其間此則
 真胎孕之脈也婦人懷胎臟氣擁閉不可多睡不可憂懼勞役不可啖
 食粘滯辛辣強硬之物又不可妄施針灸所貴時行數步調暢自適使
 氣得其平若酒麵炙博執毒重遠若感觸風邪傳染熱氣若誤服藥餌
 破血動胎若七情內傷快意跳慾則易致漏胎若腹痛方來用力太早
 若覺則驚動胎轉未得若抱持不正奔突後若近產多淫觸犯禁忌
 則易產難既產之後或過用心力或素有痰阻或血虛氣逆或虛極乘

寒則血運眩悶之證生矣然而安胎之法有二因母病以致動胎者但
療母其胎自安或胎氣不堅因觸動以致母病者則安胎而母自產以
膠艾湯芎歸湯各半縮砂佐之為良難產之劑前所謂四物湯加吳茱
萸入醋夾煎黑神散用乳香煎湯調下皆其要藥產後血運先以舊漆
器燒煙微向其鼻次則五靈脂末半生半炒入蘇合香丸百沸湯調與
之或黑神散入麝少許調以紫蘇湯或花蕊石散用童子小便溫調
劑可也損孕驗法婦人面色青手足冷指甲黑而且遍體不仁腰腹痛
割其或面青唇青以至古間黯黑口角沫出則不容以人力勝之入要
將產腹痛萬勿驚動且須凭物而行直至腰疼子逼育門方可用力蓋
腎繫於腰而胎繫於腎故也俗於產下用理中丸然蜜其而滯不若但用
理中湯俗於小兒初誕多用黃連然差苦傷胃不若但用甘草炙煎綿
蘸入口良久迭用惡物自出俗於胎孕已成多服滑胎和殼散然和殼
微寒須以縮砂烏藥為佐產後飲食米飯勿用產後盥洗沸湯是常調
血以四物逐瘀以黑神人所共知也若夫順氣等劑胎前產後尤當兼
施而並用之血運昏迷切勿用降真香熏之以塞其氣

方

白木湯明出論治妊娠血液虛衰委弱難以運通動氣滯痺麻榮衛不能
宣通常服養液潤燥開通結滯令血昌盛

白木 三兩

寒水石

當歸

黃芩

芍藥

人參

石膏

乾葛

防風

縮砂

藿香 各半

甘草

茯苓 各一

木香 一錢

右為細末每服三錢水一盞生薑三片同煎至六分去滓溫服日三
次又宜服人參半夏加一服為妙崔宣武方用白木一兩

白木散出危氏方治妊娠氣不調和飲食易傷

白木 炒

乾紫蘇 各一

人參

白芷 各三

川芎

訶子皮

青皮 各半

甘草 一分

右為末每服二錢水一盞薑三片煎至七分溫服。經云飲食自倍
腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五宮傷於五味若妊子飲
食不節生冷毒物恣性食取致傷脾胃故妊娠傷食最難得藥唯
此木香丸白木散二方最為穩捷

木香丸出危方治婦人有孕傷食

木香二錢 三稜炮

人參

白茯苓各三錢

右為細末麪糊丸如菜豆大熟水吞三四十九

胎孕九箇月將息胎法出天全良方

用猪肚一全具依法用葱五味煮熟食食如不盡更食以盡為度不得與別人食無効

犀角散出唐寶鑑治妊娠婦人產前諸風熱因倦時發昏眩

揀參

山梔子

黃連

青黛

川芎

川羌活

吳白芷

甘草炙

茯苓去皮已上各半兩

右為麤末每服五錢水一盞半生薑三片竹葉五七葉同煎至一盞去滓溫服食前

治妊娠臟腑常多轉瀉身上肌肉常冷心中寒慄方出楊子建萬全護命方

白朮

續斷

吳茱萸

防風

當歸

人參

芎

五味子各半兩

甘草炙一分 細辛三錢

右為細杵羅為末每服三錢水一盞二分生薑三片棗二枚同煎取一

盡空心喫

治妊娠渾身碎痛并腹內疼痛不可勝忍悶亂欲死方出楊子建萬全護命方

白朮

當歸

芍藥

芎

黃芩各一分

右細杵羅為末每服三錢水一盞二分煎取一盞一分空心去滓喫

法便產須知

凡欲要兒子生吉良者交會之日常避丙丁及弦望朔晦大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏冥日月無光虹蜺地動日月薄蝕此時受胎非止百倍損於父母生子或瘡痲聾瞶頑愚癩狂癲跛育眇多病短壽不孝不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中并竈圍廁之側塚墓屍柩之傍皆悉不可夫交會如法則有福德大智善人降托胎中仍令父母性行謂順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中則令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之驗有如影響此乃必然之理何不再思之

男女受胎時日法出便產須知

凡男女受胎皆以婦人經絕一日三日五日為男仍遇月宿在貴宿日又以夜半後生氣時寫精者有子皆男必壽而賢明高爵也若以經絕後二日四日六日寫精者有子皆女過六日皆不成子又遇王相日尤吉

推王相日法 出便產須知

春甲乙 夏丙丁 秋庚辛 冬壬癸

推貴宿日法

正月一日六日九日十日十一日十二日十四日二十一日二十四日二十九日
二月四日七日八日九日十日十二日十四日十九日二十二日二十七日
三月一日六日七日八日十日十七日二十日二十五日
四月三日四日五日六日八日十日十五日十八日二十二日二十八日
五月一日二日三日四日五日六日十二日十三日十五日十六日

二十日二十五日二十八日二十九日三十日
六月一日三日十日十三日十八日二十三日二十六日二十七日
二十八日二十九日
七月一日十一日十六日二十一日二十四日二十五日二十六日
二十七日二十九日
八月五日八日十三日十八日二十一日二十二日二十三二十四
四日二十五日二十六日
九月三日六日十一日十六日十九日二十日二十一日二十二日
二十四日
十月一日四日九日十四日十七日十八日十九日二十日二十二日二十九日
十一月一日六日十一日十四日十五日十六日十七日十九日二十二日二十九日
十二月四日九日十二日十三日十四日十五日十七日二十四日二十七日

若春合甲寅乙卯夏合丙午丁巳秋合庚申辛酉冬合壬子癸亥與上
件月宿日合者尤佳

胎前避忌出產後救急方

初受胎後凡妨胎藥物並不宜服或房勞不戒能令胎孕不成。抵娠
六七箇月後醉飽過度房事不節產母多有腰疼腹痛之疾甚則傷
胎不宜登高舉重或至跌撲挫閃損胎。古人入月則異寢比特邏於
色慾則生子頭戴穢惡而出俗謂戴白生其子必患胎癆

妊娠食忌法出便產須知

食鷄子鮮乾鯉魚鱸令子多瘡。食豆醬合藿令墮胎。食兔肉令
子缺唇。食犬肉令子無聲。食酒多食雀肉令子無恥。食樵子
及鴨子令子倒懸。食驢馬肉令延月。食魚鱉子傷兒。食山羊
肉令子多病。食驪肉令產難。食鷄肉及糯米令子腹中多蟲。○
食水將令絕胎。食雀肉地醬令子淫無恥。食螺螄令子鋪腹產
妊娠六七月多食五辛炙燂酒麪令子胎熱。多食水冷淘菜蓴生
冷菜菓令子患胎寒。大小便向非常之地令半產殺兒此大忌之

食忌起居

羊肝多食生子多厄難。蛙蟾子啞啞。食螭鼈橫生。子薑多食
子生瘡多指。乾薑蒜雞毒胎無益。粘膩難化傷胎。無鱗魚不
可食。鯀魚過多致有產難。菰子名菌有大毒。有食菌多誕子
風而夭。勿亂服湯藥。酒勿過飲以產尤忌。勿亂妄針灸。勿
向非常地便旋半產殺人。勿舉重登高涉險。必有大驚子必顛
疾宜自釋。勿多腫須特行步。体虛賢氣不足子必解顛腦破不
合宜溫補。脾胃不和榮衛虛怯子必羸瘦。自家及鄰家興修犯
其胎氣令兒破形損命。刀犯者形必傷。泥犯者竅必寒。打擊
者色青黯。擊縛者相拘攣

右此等驗如反掌切宜避之

胎前藥忌出胎產救急方

雄黃 雌黃 與硫黃 代赭 硃砂 巴豆 霜 水銀 鉛粉 生金 屑
消分 三品 牙 扑 芒 虎掌 鬼 印 鬼 箭 羽 牽牛 牛 膝 川 白 薑
天雄 附子 川草 烏 南星 半夏 及 藜 蘆 紅花 芫花 并 大 戟

躑躅野葛與蘭茹 白薇杜蘅牡丹葶 槐子皂角蕪渡疏

挑仁三棱乾筒漆 茵草通草瞿麥俱 攬根茅根蘇方木

牛黃蝟皮生鼠徒 坑青斑猫并地膽 蜚虫水蛭及蜈蚣

殭蚕蚕布蟹爪甲 蜈蚣蜥蜴衣白魚 驢馬兔肉雞鴨子

菜中莫食大小葫 麝香肉桂蛇蟬蛻 催生以前切忌諸

○養胎胎教 附論

夫至精纔化一氣方凝始受胞胎漸成形質子在腹中隨母聽聞自妊娠之後則須行坐端嚴性情和悅常處淨室多聽美言令人讀誦詩書陳禮說樂耳不聞非言目不視惡事如此則生男女福壽敦厚忠孝賢明不然則男女既生則多鄙賤不壽而過此所謂因外象而內感也昔太姪娠文王目不視惡色耳不聽惡聲口不談惡言世傳胎教之道是謂此也前論亦畧叙之矣然則婦人有終身無子者何也按巢氏病源云婦人無子者蓋有三焉一者墳墓不嗣二者夫婦年命相尅三者夫疹婦病皆令無子若夫疹婦病可以服藥而後能有子餘皆不可致也令觀

是說亦未盡善有人以婦人無子問西京常器之者乃曰女人自少多病服燥藥無節使天癸耗動且早故終身無子又有問襄陽宋大亭者亦然然則婦人妊娠有兩胎者何也按古今方書並無論及此者惟巢氏論云陽施陰化精氣有餘故生二胎且謂成一胎之理其精有幾耶今觀婦人有兩胎者其精神氣宇畧無小異至於數有兩胎或間成兩胎者有俱男俱女者有一男一女者道藏經云有求子法云婦人月信初止後一日三日五日值男女相日陽日陽特交合有子多男若男女稟受皆壯則多子一有怯弱則少子以此推之理可槩見焉又婦人妊娠男女之別何也按顛顛經云陽盛發陰當孕成男六腑諸經皆舉其陽陰盛發陽當孕成女六腑諸經皆舉其陰巢氏病源云三陽所會則生男三陽所會則生女葛洪肘後方云男從父氣女從母氣聖濟經云天之德地之氣陰陽之至和相為流薄於一體因氣而左動則屬陽陽資之則成男因氣而右動則屬陰陰資而成女易稱乾道成男坤道成女此男女之別也凡妊娠有疾投以湯藥有傷胎破血者之忌何也內經云婦人重身毒之奈何岐伯答曰有故殞衰其大半而已也

蓋妊娠有疾不可不投藥也必在醫者審度疾勢經重量度藥性高下處以中痛不必多品視其疾勢已衰藥宜便止則病去母安子亦無損復何懼於攻治哉○凡婦人妊娠十月其說見於古書有不同者多矣按巢氏病源論婦人妊娠一月名始胎足厥陰脉養之二月名始膏足少陽脉養之三月名始胎當此之時血不流形形象始化未有定儀見物而變欲子端正莊嚴常令可見貴不可見狀貌醜惡人也欲生男宜操弓矢乘牡馬欲生女宜著珥璫施環珮欲子美好玩白璧觀孔雀欲子賢能宜看詩書務和雅手心脉養之四月始受水精以成血脉手少陽脉養之五月始受火精以成其氣足太陰脉養之六月始受金精以成其筋足陽明脉養之七月始受木精以成其骨手太陽脉養之八月始受土精以成膏革手陽明脉養之九月始受石精以成毛髮足少陰脉養之十月五臟六腑關節人神皆備此其大畧也又五臟論有稱香婆者論一月如珠露二月如桃花三月男女分四月形象具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒能動手九月三轉身十月受氣足更有稱張仲景者亦然又顛顛經云一月為胎胞

精血疑也二月為胎形成胚也三月陽神為三魂四月陰靈為七魄五月五行分五臟也六月六律定六腑也七月精闕竅通光明也八月元神具降真靈也九月宮室羅布以定生人也十月受氣足萬象成也今推究教說之理如五臟論者類皆淺陋不經往往妄托其名至於三藏佛書且語涉怪誕漫不可考今按顛顛經三卷云中古巫方所撰隋人巢氏亦嘗序之今巢氏論婦人妊娠乃不見言之聖濟經源化篇亦獨取顛顛經更不言巢氏論者何哉嬰童寶鑑集云小兒方論起自巫方黃帝云吾不能察幼小賴國有巫能方知小兒之壽夭耳及觀巢氏論小兒候亦云中古有巫方立小兒顛顛經以占壽夭世所相傳者有少小方焉是巢氏論小兒則取於顛顛經則是未盡其理故不言之若聖濟經者但取其文句不若巢氏之論其間有胎教之法為可取所以巢氏論妊娠至三月始胎之時欲令見貴人莊嚴若操弓矢施環珮觀孔雀讀詩書之類豈非胎教之理乎嘗讀推巢氏所論妊娠脉養之理若足厥陰肝脉也足少陽膽脉也為一臟腑之經餘皆如此且四時之令必始於春木故十二經之養胎於肝也所以一月二月手心主心胞

絡脉也手少陽三焦脉也屬火而夏旺所以胎養在三月四月也屬手少陰心手太陽小腸者以君王之官無為而尊也足太陰脾脉也足陽明胃脉也屬土而旺長夏所以胎養而五月六月手太陰肺脉也手陽明大腸脉也屬金而旺秋所以養胎在七月八月足少陰腎脉也屬水而旺冬所以養胎在九月又况母之腎臟繫於胎是母之真氣子之所賴也至十月兒於母腹之中受足諸臟氣脉所養然後待時而生此論奧微而有至理餘書所論皆不能及也觀此則知巢氏之論世更有明之者亦未有過於巢氏之論矣余因述其說○又曰王氏脉經云產育人倫莫不受重今世希見論者且謂夫婦配合陰陽奇耦乾道成男坤道成女天元一氣既已妊娠自可將護胎息無犯禁忌生子必賢明壽考今人嗜慾為樂輕弃性命反又房勞如鳥獸御之亦有特蓋房勞絡脉滿而經脉虛運動之間胎氣亦隨經絡所損難產傷胎墮子皆從此得然間有一降生悖惡壽夭則患胎驚變生諸病難救療豈不痛哉○又曰妊娠臟腑筋脉濡滯關節壅塞切忌晝寢不可等閒服藥針灸思慮悲憂驚恐胎孕須要頻頻行步寬綬日行三千步用溫水濯足深

浴不可益防水氣衝胎可保無危八九箇月食葵菜臨產宜軟粥飯或爛煮雞雞取汁煮溫飽食則氣順下必易分娩日然無病飢渴氣乏大冷熱物損○又云孫真人大率妊娠唯在抑陰助陽素問陰搏陽則謂之子蓋閉前為陽閉後為陰尺中之脉按之搏手而不絕也妊子也婦人平居陽氣微盛無害及其妊子則方閉經遂養胎氣若陽盛搏之則經血妄行胎乃不固素問陰虛陽搏謂之崩其抑陽助陰之方甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交雜別生他病唯是內補九佐之使陽不至強陰不至弱陰陽調勻有益胎嗣此前人未嘗論及以二味熟乾地黄四兩酒浸當歸二兩酒浸將息以全人命更得明醫喻於人幸莫大焉○氣質生成章具天地之性集萬物之靈陰陽平均氣質完備或其自爾然而奇耦異數有衍有耗剛柔異用或強或羸血榮氣衛不能逃於消息盈虛之理則稟賦之初詎可一槩論是以附贅垂疣駢拇枝指侏儒跛躄斃形氣所賦有如此者瘡瘍癰腫龍耳瘡啞瘦瘠疲瘵氣形之病有如此者然則胚胎造化之始精氣變之後保衛輔翼固有道矣天有五氣各有所湊地有五味各有所入湊有節適所入有

度量凡所畏忌悉知戒慎資物為養者理固然也寢興以時出處以節
可以高明可以周密使霧露風邪不得間而入因時為養者理宜然
也以至調喜怒寡嗜有慾作勞不忘而氣血從之皆所以保攝妊娠使諸
邪不得干焉苟不然方授受之時一失調養則內不足以為中之守外
不足以為身之強氣形弗充而疾疢因之若食充脣缺食犬無聲食雜
魚而瘡癩之屬皆以食物不戒之過也心氣大驚而癩疾腎氣不足而
解顛脾胃不和而羸瘦心氣虛乏而神不足之屬皆以氣血不調之過
也或能食飲知所戒推而達之五味無所傷誠能於氣血知所調推而
達之邪氣無所乘茲乃生育相待而成者故曰天下人不困○妊娠之
人有宿挾痼疾而後有娠或有娠時節適幸理致生疾病並令腑臟衰
損氣力虛羸令胎不長故須服藥去其疾病蓋其氣血以扶養胎者也
○妊娠將理無方脾胃不足飲食減退不能行榮衛化精微養衝任故
令胎藏內弱子氣不足生化稍虧巢元方謂母病藥母則胎安是也若
使脾胃和而能飲食水穀化而運氣血則何慮胎氣不長也○又云人
由受氣至於有生十二經脈迭相滋養猶之物世得寒溫之正土地之宜

無物不長凡胎胞中或有萎燥者蓋由妊婦所稟怯弱不足自周陽
陽血氣偏係非冷即熱胞胎失於滋利所以萎燥而不長也日月雖過
不能生育亦有後時致失者惟宜資母血氣俾陰陽調通本末相應則
胎從而有養矣○又云妊娠一月謂之始形二月謂之始膏三月謂之
始胎當是之時血脈不流形象始化男女於此儀則未分緣感而應所
以孕婦欲令見榮貴端正之人不欲見偃僂侏儒之輩及猿猴犬馬怪
禽異獸仍夜卧宜息心靜慎物亂思恐形異夢而感不祥也妊婦所以
擇食者蓋假五氣五味生成五藏氣味各隨所喜而歸之陰陽應象論
曰酸生肝若生心耳生脾辛生肺鹹生腎此五藏假五味以生也六節
藏象傳曰臊氣湊肝焦氣湊心香氣湊脾腥氣湊肺腐氣湊腎此五藏
假五氣以成也若形藏未備則隨其不足而孕婦必欲其氣味食之蓋
陽為氣陰為味氣化則精生味化則形長誠以人之生也氣本於天形
本於地內經為天食人以五氣地食人以五味正此之謂若夫天合既
分形質不完者皆孕婦擇食之時不得其氣味故視斜覷短偏瞽雙盲
手纏足跛腰偃背僂此肝形之不備也言遲語吃或啞或瞶神氣昏塞

此心形之不備也。胃背凸凹，舌短唇缺，此脾形之不備也。毫毛疎薄，髮鬢禿落，或毫毛通白，皮膚偏赤，此肺形之不備也。由是孕婦擇食，假其氣味，生五鞭五鞭數歲，不能行此腎形之不備也。由是孕婦擇食，假其氣味，生或五藏一有不備，病輒隨之。譬由陶冶成器，一或苦窳，是水火之劑不謹，豈曰工之良哉。

方

烏雌雞湯 治妊娠一月名始胎，飲食精熟，酸美受御，宜食大麥，母食腥辛，是謂纒正。○妊娠一月足厥陰脉，養不可針灸，其經足厥陰內屬於肝，肝主筋及血，一月之時，血行否澁，不為力事，寢必安靜，無令恐畏。○妊娠一月陰陽新合，為胎寒，多為痛熱，多卒驚，舉重腰痛，腹滿胞急，卒有所下，當預安之，宜服。

烏雌雞一隻治食法

茯苓

阿膠各二兩

甘草

生薑各一兩

吳茱萸一升

麥門冬五合 人參

芍藥

白朮各三兩

右咬咀以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煎取三升內酒三升

并膠烱盡取三升放溫每服一升日三

補胎湯大全良方 若曾傷一月胎者當預服此方

細辛兩

防風兩

乾地黄

白朮各三兩

生薑兩

吳茱萸

大麥各五合

烏梅升

右咬咀以水七升煮取二升半分三服先食服寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去之加稻萹根二兩若有所思去大麥加栝子人三合一。方有人參一兩忌生菜蕪荑桃李雀肉等物。

艾葉湯一名雞艾湯 治妊娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百節皆痛是為胎始結。○妊娠二月足少陽脉養不可針灸其經足少陽內屬於膽主精二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動也。妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背痠痛卒有所下熱艾湯

艾葉 丹參 當歸 麻黃各二兩 人參

阿膠各三兩

甘草加

生薑兩

大棗十二枚

右咬咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠煎取三升分三服一方

用烏雌雞一隻宿肥者治如食法割頭取血內三升酒中相和次以水一斗二升先煮取汁去雞肉內藥煎取三升內血酒并膠煎取三分溫三服忌海藥菘菜

黃連湯出千金方若曾傷二月胎者當預服此

黃連

人參各一兩

吳茱萸五

生地黄五兩一兩用阿膠

右咬咀以酢漿七升生薑三兩煮取三升分四服日三夜一每十日一修合若頻覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿且用水一方用當歸半兩忌猪肉冷水燕羹

雄雞湯出千金方妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢嫫者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清靈

為外象而內感者也○妊娠三月手心主脈養不可針灸其經手心主內屬於心無悲哀思慮驚動○妊娠三月為定形寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁嗔怒喜煩什動於經脈腹滿統臍苦痛或腰背卒有所下

雄雞一隻治如食法

黃芩

白朮

生薑各一兩

麥門冬合

五

芍藥四兩

大棗十二枚

甘草

人參

茯苓

阿膠各二兩

右咬咀以水一斗五升煮雞減半出雞內藥煮取半內清酒三升并膠煎取三升分三服一日令盡當溫卧一方用當歸芍藥各二兩不用黃芩生薑忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等

茯神湯出千金方若曾傷三月胎者當預服此

茯神

丹參

龍骨各一兩

阿膠

當歸

甘草

人參各二兩

大棗二十枚

赤小豆二升

右咬咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食服七日後服一劑腰痛者加桑寄生二兩一方有薤白二兩麻子一升忌同前一方用水煎服

菊花湯一名麻黃雌雞湯出聖德方治妊娠四月受水精以成血脉食宜稻粳羹魚

鴈是謂盛血氣通耳目而行經絡妊娠四月壬子少陽脈養不可

針灸其經手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和

心志節飲堆娠四月有寒心下愠愠欲嘔胸膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒中風寒顛項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胃心煩不得安卒有所下

菊花雞子大一枚

麥門冬一升

大棗十二枚

人參一兩半

甘草

當歸各二兩

麻黃去節

阿膠各三兩

半夏四兩

生薑五兩

右以咀以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服温卧當汗以粉撲之護風寒四五日一方用烏雌雞一隻煮水煎藥忌羊肉海藻菘菜餒等

調申湯出千金方若曾傷四月胎者當預服此

白芍藥

生薑各四兩

後朴

生李根白皮

枳實

白朮

柴胡各三兩

續斷

芎藭

甘草各一兩

當歸一兩半

烏梅一升

右以咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一八日之後復服一劑一方有半夏二兩忌海藻菘菜桃李雀肉

阿膠湯一名施復花湯出千金方治妊娠五月始受火精以成其氣卧必晏起沐浴浣衣深

其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以菜菹調以五味是為養氣以定五臟○妊娠五月足太陰脉養不可針灸其經足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆成無大飢無甚飽無食乾燥無自灸熱無大勞倦○妊娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶煩欲卧卒有所下

旋復花二合

人參一兩

生薑六兩

當歸

芍藥

甘草

黃芩各二兩

吳茱萸七合

阿膠四兩

麥門冬一升

右以咀以水九升煮藥減半內清酒三升并膠微火煎取三升半分四服日三夜一先食服便愈不瘥再服一方用烏雌雞一隻割取咽血內酒中以水煮雞以前藥減半內酒并膠煎取三升半分四服忌海藻菘菜

安中湯出千金方曾傷五月胎者當預服此

黃芩一兩

當歸

芎藭

乾地黃

人參各二兩

甘草

芍藥各三兩

生薑六兩

麥門冬一升

五味子

大麻人各五 大棗三十枚

右咬咀以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日復服一劑忌如前

麥門冬湯一名人參雞治妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞

無得靜處出遊於野數觀走犬及視走馬食且驚鳥猛獸之內是謂變

腠理紐筋以養其力以堅背脊○妊娠六月足陽明脈養不可針灸其

經足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食其美

無太飽○妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖

忽有所下腹痛如欲產手足煩疼

麥門冬一升 人參 甘草 黃芩各二兩 乾地黄三兩

阿膠四兩 生薑六兩 大棗十五枚

右以水也升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分三服每如人行

三四里中間進糜粥一方用烏雌雞一隻煮水以煎藥忌海藻菘菜

蕪荑

柴胡湯出千金方若曾傷六月胎者當預服此

柴胡四兩 茯苓一兩 白朮 芍藥一作紫葳 甘草

麥門冬 芎藭各二兩 生薑六兩 乾地黄五兩 大棗三十枚

右咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一中間進糜粥勿食生

冷及堅硬之物七日更服一劑大千方用黃芩二兩忌海藻菘菜蕪

荑桃李雀肉等

葱白湯出千金方治妊娠七月始受木精以成其骨勞身搥肢無使定止動

作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒當食稻粳以密腠理是為養

骨而堅齒○妊娠七月手太陰脈養不可針灸其經手太陰內屬於肺

主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

○妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脈若傷寒煩熱腹

滿短氣常苦頸項及腰背強宜服

葱白長三四寸 十四莖 半夏 麥門冬各一升 旋復花二合

黃芩一兩 人參一兩半 甘草 當歸 黃香各二兩

阿膠四兩 生薑八兩

右咬咀以水八升煮減半內清酒三升及膠煎取四升每服一升日三

夜一温卧當汗出若不出者加麻黃二兩煮服如前法若秋後勿強
責汗一方以黃雌雞一隻割咽取血内酒中煮雞取汁以煎藥大全
方忌羊肉餒海藻菘菜等

杏人湯出千金方若曾傷七月胎者當預服此

杏人 甘草 各二兩 紫苑 二兩 鍾乳 乾薑 各三兩

麥門冬 去心 吳茱萸 一升 粳米 五合 五味子 三合

右咬咀以水八升煮取三升半分四服日三夜一中間進食七日服
一劑一方用白雞一隻煮汁黃雌雞亦可用酒二升煎藥大全方忌

海藻菘菜

芍藥湯出文全良方治妊娠八月胎受土精以成雷胃革和心靜息無使氣極

是謂密腠理而光澤顏色○妊娠八月手陽明九竅皆成無食燥物無輒失食

陽明内屬於大腸主九竅八月手陽明九竅皆成無食燥物無輒失食

無忍大起○妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛下寒下熱胎動不

安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或清或黃或使寒燥腰

背苦冷而痛目眦眦

芍藥 生薑 各四兩 厚朴 二兩 甘草 當歸

白朮 人參 各三兩 薤白 切一升

右咬咀以水五升清酒四升合煮取三升分三服日再夜二方用

烏雌雞煮汁煎藥大全方忌海藻菘菜桃李雀肉等

葵子湯出千金方若曾傷八月胎者當預服此

葵子 二升 甘草 厚朴 各二兩 白朮 柴胡 各三兩

芍藥 四兩 生薑 六兩 大棗 二十枚

右咬咀以水九升煮取三升分三服日三凡十日一劑一方用烏雌

雞一隻煮水以煎藥大全方忌海藻菘菜桃李雀肉等物

半夏湯出千金方治妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備

欲體食甘緩帶自持而是之是謂養毛髮致才力妊娠九月足少陰脉

養食不可針灸其經足少陰肉屬於腎腎主續縷九月之時兒脉續縷皆

成無處濕冷無著灸未○妊娠九月若卒得下痢腸滿懸急胎上衝

心腰背痛不可轉側短氣

半夏 麥門冬 吳茱萸 當歸 阿膠 各三兩

乾薑 一两 大棗 十二枚

右吹咀以水九升煮取三升去滓内白八合微火上温分四服痢即止一方用雌雞一隻煮汁煎藥大千方忌生血飭物等猪腎湯出子若曾傷九月胎者當預服此

猪腎 一具 茯苓 桑寄生 乾薑 乾地黄

芎藭 各三 白朮 附子 中者 大豆 三合 麥門冬 一升

右吹咀以水一斗煮腎令熟去腎内藥煎取三升半分四服日三夜一凡十日更一劑大千方忌猪肉蕪菜桃李雀肉酢等物一方有人參無附子大豆

丹參膏 出金方一名治養胎臨月腹令滑而易產○妊娠十月五臟具備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神皆備但候時而生姓

娠一月始胎二月始膏三月始胞四月形體成五月能動六月筋骨立

七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣八胃十月諸神備日滿即產矣宜服滑胎藥八月即服此藥

丹參 半斤 芎藭 當歸 各二兩 蜀椒 五合 有熱以大

右吹咀以清酒漉濕停一宿以成煎猪膏四升微火煎膏色赤如立膏成新布絞去滓每日取如棗許納酒中服之不可逆服至臨月乃可服舊有常驗

其草散 出金方令易生母無疾未生一月日預服過三十日行步動

作如故兒生墮地皆不自覺

甘草 一两 黃芩 一兩 乾薑 吳茱萸 大豆黃卷

麻子人 桂心 大麥蘖 各三兩 方用糲米

右治下節酒服方寸匕日三服水服亦得

麥門冬散 出聖惠方治妊娠一兩箇月惡食手足煩悶

麥門冬 去心 大腹皮 剉各 知母 人參 去芦頭 黃芩

枳殼 麩炒微黃去

右為散每服四錢以水一大盞入葱一兩莖煎至分去滓食前温服黃芩散 出聖惠方治若曾傷二月胎當預服

黃芩 人參 去芦頭 阿膠 鵝卵 碎炒令黃 當歸 半兩 剉

吳茱萸 一分 湯浸 焙乾微炒

右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓食前溫服如覺大便不安加烏梅一兩

芎根飲子出聖惠方治妊娠二三月胎動

生芎根二兩 甘草炙微 黃芩 白芍藥 當歸生微炒 各一兩

阿膠炒令黃燥 黃芩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞入棗三枚煎至五分去滓食前

溫服

竹茹散出聖惠方治妊娠三四月胎動不安手足煩熱面色萎黃

竹茹 麥門冬去心 白茯苓 梔子人 黃芩各一兩

甘草微赤 石膏二兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前溫服

柴胡散治妊娠三四月氣壅惡食嘔歲肢節煩疼或脚膝虛腫

柴胡去苗 人參去芦頭 甘草炙微 紫蘇莖葉 大腹皮

陳橘皮湯浸去白穢 木通三分剉

右為散每服四錢以水一大盞煎至五分去滓食前溫服

赤茯苓散出聖惠方治妊娠四五月頭重耳鳴時時腹痛

赤茯苓 桑寄生 蔓荊子各一兩 人參半兩去芦頭 防風去芦頭

刺薊各三分

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前溫服

人參散出聖惠方治妊娠四五月胎不安或有所下

人參去芦頭 當歸生微 芍藥 黃芩 艾葉微炒

桑寄生 熟乾地黄已上各二兩 阿膠炒令黃燥

甘草炙微赤 吳茱萸湯浸七遍

右為散每三錢以水一中盞煎至五分去滓食前溫服

乾地黄散出聖惠方治曾傷五月胎預服

熟乾地黄 甘草炙微赤 麥門冬去心 五味子 黃芩

桑寄生各一兩 右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至三分去滓每

於食前溫服

桑寄生散出聖惠方治妊娠五箇月胎不安腹內疝刺痛日夜不止不欲

言語四肢昏沉宜服安胎

桑寄生 木通 剉

甘草 炙微赤 白芷

熟乾地黄 二兩

赤茯苓

遠志 去心

當歸 剉微

陳橘皮 湯浸去白穢 各半兩

知母 各一兩

右為散每服四錢以水一大盞煎至五分去滓不拘時溫服

敗蒲散 出聖方 治妊娠五六月忽患腹內疔刺痛兼有惡血下日夜不止

敗蒲 白木

厚朴 去粗皮塗生薑汁 炙令黃熟各一兩

赤芍藥 艾葉 微炒各半兩

訶梨勒皮 煨用 枳殼 麩炒微黃去穢 當歸 生微炒

白芷

右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時

候溫服

桑寄生 飲子 出聖方 治妊娠五六月患心腹脹滿口乾腹中疔刺疼痛

不土

桑寄生

木通

生乾地黄

訶梨勒皮

白木

赤茯苓

當歸 剉微炒

芎藭 各三分

右細剉和勻每服半兩以水一大盞入葱白七寸豉五十粒煎至五

分去滓不拘時候溫服

柴胡散 治曾傷六月胎預服

柴胡 去苗

紫葳

白木

麥門冬 去心

熟乾地黄

芎藭

肉蓯蓉

酒浸一宿剉去粗皮炙令乾各一兩

甘草 半兩炙

右為散每服四錢以水一大盞入棗三枚煎至五分去滓每於食前服

茯神散 治妊娠六七月忽覺四肢煩疼心悶口乾頭痛

茯神

黃芩

麥門冬 去心

石膏 各一兩 梔子 人

甘草 炙微赤 剉

秦艽 去苗各半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓入竹瀝半合更煎三

兩沸不拘時候放溫服之

紫苑 飲子 出聖方 治妊娠六七月傷寒欬嗽氣急

紫苑 洗去苗去

桑根白皮 各半兩

乾棗 七枚

灯心 二十莖

生薑 一分

陳

一兩焙湯浸去白穢

右細剉和勻以水三大盞煎至一盞半去滓食後分為四服日三夜

一服

葱白雌雞湯出聖方治妊娠七月忽驚恐動搖腹痛卒有所下足厥冷若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強悉主之

葱白十四莖半夏湯浸七黃耆編去滑

黃芩人參去芦頭

生薑阿膠搗碎各二兩

甘草炙微赤旋復花各半兩

右細剉先取黃雌雞一隻理如食法先以水一斗煮雞取汁五升去

雞下藥煎至三升入酒二升更煎至四升去滓每於食前溫服一小盞

半夏飲子出聖方治妊娠七八月或因驚恐或是復寒煩熱腹肚滿脹氣促腰重

半夏湯浸七編去滑黃耆人參去芦頭麥門冬去心各

黃芩各半兩甘草炙微赤

右細剉和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分葱白七寸煎至五分去滓不拘時候溫服

當歸散出聖方治妊娠八九月因悞損胎或胎不安腹內疼痛下血不止

胎死活未知但妊娠腹內疼痛或漏胞

當歸剉微芎藭桑寄生艾葉微炒各一兩

阿膠二兩搗碎

右為散每服四錢以水一大盞煎至五分去滓入酒一合更煎三兩沸不拘時候放溫服之

赤石脂散出聖方治妊娠八九月胎動時有所下腹內疴刺疼痛頭面壯熱口乾手足逆冷兼氣上妨悶

赤石脂白朮當歸剉微炒乾薑炮裂剉蘆根

桑寄生各半兩地龍一分艾葉三分鍾乳粉芎藭

鹿茸去毛塗熟地黃厚子朴去麋皮塗生薑汁

右為散每服三錢以水酒各半中盞煎至六分去滓不拘時候溫服

甘草散出聖方治妊娠十月滿足入月預服

甘草微赤黑豆炒熟糯米大麻子各一兩乾薑炮裂

白茯苓吳茱萸湯浸七編焙乾

右為散每服食前以煖酒調下二錢若未入月不得輒服

地黃芩出聖 治妊娠氣血虛弱令胎不長和氣養胎

熟乾地黃焙 厚朴去粗皮生薑 芎藭 當歸切焙

龍骨 阿膠炒燥 白石脂已上各三分 白茯苓去黑皮 柴胡去苗

刺薊 桑寄生焙乾 黃耆對各半兩 甘草對各一分 人參三分

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸不拘時候粥飲下

日三

人參出聖 治妊娠胎不長宜服養胎

人參 白茯苓去黑皮 當歸切焙 柴胡去苗各一分 枳殼三分

厚朴 刺薊 桑寄生各一分 甘草半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前溫水吞下方加阿膠一兩

孰乾地黃湯 治妊娠胎萎燥羸瘦不長

孰乾地黃焙 甘草對 白木 白茯苓去黑皮

阿膠炙燥 木香各一兩 細辛去苗葉 人參 防風去皮

白芷 各半兩

右咬咀每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三

蒸大黃丸出千 治妊娠養胎令易產

大黃銖三十 枳實 芎藭 白木 杏仁各十

芍藥 乾薑 厚朴各銖 吳茱萸一兩

右為末蜜丸如梧桐子大空腹酒下二丸日三不知稍加之

黃耆湯出聖 治妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢

黃耆對 白木 人參 麥門冬去心焙

芎藭 甘草對各半兩 陳橘皮湯去白焙 前胡去芦頭

右咬咀每服三錢匕以水一盞入生薑三片棗三枚煎至六分去滓

食前溫服

白木湯 治妊娠胎萎燥漸覺羸瘦面色黃黑腹臍虛冷

白木對 芎藭 芍藥 厚朴去粗皮生

當歸切焙 人參 甘草對 訶梨勒炮去核

具福

右咬咀每服三錢已以水一盞入生薑一分煎至七分去滓温服
日三

乾地黄湯治妊娠氣血不足胎瘦不長

熟乾地黄焙 阿膠炒 芎藭炒 當歸切米炒 赤芍藥各二兩

甘草炙剉 人參各半

右咬咀每服三錢已水一盞入粳米少許同煎至七分去滓温服
日三

白朮散治妊娠胎不長養

白朮二兩 芎藭 芍藥 人參

甘草炙剉

阿膠炙令燥

右為末每服三錢已以葱粥飲調下日三一方如苦痛加芍藥心下
毒痛倍加芎藭吐唾不能食飲加細辛一兩半大錢二十枚煎服
之復更以醋漿水服之若嘔亦以醋漿水服

白朮當歸湯治妊娠胎萎燥胎漏腹痛不可忍

白朮 當歸切焙 芎藭 人參 阿膠炙燥各

艾葉焙乾

右咬咀每服五錢已以水一盞酒半盞入棗三枚拍碎同煎至一盞
去滓分温二服空心一服午食前一服

橘皮湯治妊娠虛冷胎萎燥不長

陳橘皮湯浸去 厚朴去粗皮生薑 當歸切焙

人參 阿膠炙燥各 白朮二兩

右咬咀每服三錢已以水一盞入生薑一分切棗三枚擘破同煎
至七分去滓温服日三

熟乾地黄湯治妊娠胎萎燥過時未產滋氣血益胞藏

熟乾地黄炒 當歸切焙 熟艾炒乾 芎藭各一兩 阿膠炙燥

甘草炙剉

右咬咀每服三錢已以水一盞煎至七分去滓温服日三

艾葉湯治妊娠胎中虛冷致胎萎燥不長

艾葉炒 芎藭 當歸炙剉 乾薑炮 白朮各一兩

右咬咀每服三錢已以水一盞煎至七分去滓温服日三一方有耳

草無乾薑

桑寄生湯

治妊娠胎萎燥不能轉動心中急痛

桑寄生剉

白茯苓各一兩 黑參

姜糖各一兩

白木二兩

右咬咀每服三錢匕以水一盞入粳米半合生薑一分切同煎至七

分去滓溫服日三

當歸湯

治妊娠胞中虛胎不榮長致令萎燥

當歸切焙

甘草炙剉

乾薑炮

芍藥各一兩

白木二兩

右咬咀每服三錢匕以水一盞入大棗三枚擘破同煎至七分去滓

空心溫服

白朮散

調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風冷胎痿不長或失於

將理動傷胎氣多致損墮懷孕常服壯氣益血保護胎藏

白朮

川芎各四兩

川椒炒出汗

牡蠣煨二兩

右為細末酒調一錢日三夜一但苦痛加芍藥心下毒痛倍加川芎

吐唾不能飲食加細辛一兩半夏大者二十枚服之後有漿水服之

若嘔亦以醋漿水服之復不解者小麥汁服之已後其人若渴者大

麥粥服之病雖愈盡服之勿置忌雀肉桃李

當歸飲

治妊娠胎萎燥

當歸切焙

芍藥

阿膠炙燥各一分

白木二兩

右為粗末每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服日三

阿膠湯

治妊娠胎萎燥全不轉動

阿膠炙燥

當歸切焙

甘草炙剉

白木二兩

右麓搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服日三

枳殼散

常服養胎益氣安和子臟治胎中一切惡疾胎類見滑

地黃丸

治婦人血衰不足經候愜澁至子宮不榮妊娠多病胎不長

成用熟地黃不拘多少切焙為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸空

心煎當歸酒爵下溫酒亦得

治婦人懷胎不長

用鯉魚長一尺者去腸肚鱗以水漬沒內鹽及棗煮令熟取汁稍

稍飲之當胎所腹上當汗出如牛鼻狀雖有所見胎雖不安者十餘

日輒一作此令胎長大甚平安

○轉女為男

附論

夫疑形殊稟章天地形之大也陰陽者氣之大也惟形與氣相資而立未始偏廢男女構精萬物化生天地陰陽之形氣寓焉語七八之數七少陽也八少陰也相感而流通故女子二七天癸至男子二八天癸至則以陰陽交合而兆始故也語九十一之數九老陽也十老陰也相包而賊形故陰窮於十男能圍之陽窮於九女能方之則以陰陽相生而成終故也元氣孕毓皆始於子自子推之男左旋積歲三十而至巳女右旋積歲二十而至巳巳為正陽陰實從之自己懷妊男左旋十月而生於寅女右旋十月而生於申申為三陰寅為三陽而生育之時著矣其稟賦也體有剛柔脈有強弱氣有多寡血有盛衰皆一定而不易也以至分野異域則所產有多寡之宜吉事有祥則所夢各應其類是故荆揚薄壤多女雍冀厚壤多男熊羆為男子之祥蛇虺為女子之祥是皆理之可推也胎化之法有所謂轉女為男者亦皆理之自然如食壯雞取陽精之全於天產者帶雄黃取陽精之全於地產者操弓矢藉斧

斤取剛物之見於人事者氣類潛通造化密移必於三月兆形之先蓋方儀則未具陽可以勝陰變女為男理固然也○又云張華博物志曰妊娠必謹所感感於善者生子必善感於惡者生子必惡故不欲令見惡物異禽毒獸切忌馬犬兔龜鰲鴉鴨無鱗魚粘膩難消化物薑薑乳餅子屬用醬醋和藿食損胎難產惟務簡靜動止有節三箇月之後聽誦經典詩書諷脈靜處諷心目不視惡色耳不聽惡聲如此生子必賢明端正忠孝壽考也

方

丹參丸出千金方治婦人始覺有娠養胎并轉女為男

丹參

續斷

芍藥

白膠

白朮

栝子人

甘草各二兩人參

芍藥

乾薑各三兩

吳茱萸

橘皮

當歸各一兩白芷

冠纓燒一兩各

乾地黄半一兩

燕薹十八錢

犬卵一具乾東門上雄雞頭一枚

右為末蜜和丸如梧子大酒服十九日再稍加至二十九

又方出千金方

用原蠶屎一枚以井花水服之日三服

轉女為男者蓋陽施陰化所以有娠遇三陰所會多生女子但懷娠二

月名曰始藏精成為胞至於三月謂之始胎血脉不流象形而變是時

男女未定故令於未滿三月間服藥方術轉令生男也鉅軒

以芥置妊娠床下繫刃向下勿令人知恐不信者令侍雞抱印時

依此置窠下一窠盡出雄雞神効此雖未試亦不可不知者一法覺三

月尿雄雞浴處

九受胎三月逐物变化故古人立胎教能令生子良善長壽忠孝仁義

聰明無疾蓋須十月之內常見好景象母近邪僻真良教也如有觸

忤傷胎治各有法又自初覺有娠鉅軒

取弓絮弦縛婦人腰下滿百日去之一法絳囊成帶左臂

紫宮玉女秘法妊娠三月已前

取雄雞尾尖上長毛三莖潛安婦人卧蓆下勿令知之驗

又法 取夫髮及手足甲潛安卧蓆下勿令知之

妊娠纔滿三月要男者出子 鉅方

以雄黃半兩衣中帶之要女者以雌黃帶之一方絳囊盛帶之

惡阻

附論

夫妊娠阻病者謂之子病巢氏病源謂之惡阻若婦人稟受怯弱或有

風氣或有痰飲既妊娠便有是病其狀顏色如故脉息和順但覺肢體

沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食酸醎甚者或作寒熱心中憤悶嘔

吐痰水胃膈煩滿恍惚不能支持不拘初娠但疾若有輕重耳輕者不

服藥亦不妨重者須以藥療之宜服半夏茯苓湯茯苓丸二方專治阻

病然此二藥比來少有服者以半夏有胎之性蓋胎初結慮其易散

比不可不謹也張仲景傷寒論云婦人傷風續得寒熱發作有時此為

熱入血室有用黃龍湯者小柴胡湯去半夏此蓋為妊婦而設焉且以

白朮散或人參丁香散人參橘皮湯醒脾飲子試之亦効皆不用半夏

動胎等藥服者知之○水飲停積結聚為痰人皆有之少者不能為害

多則成病妨害飲食乃至嘔逆妊娠之病若嘔逆甚者傷胎也原疾之

由皆胃氣不調或風冷乘之冷搏於胃故成斯病也亦惡阻之一時○

又曰婦人所食穀味化為血氣下為月水凡妊娠之初月水乍聚一月為胎二月為胚三月為胎胎成則男女分方食於母而口舌焉在胎之時血氣未用五味不化中氣壅實所以脾胃不思穀味聞見於物故惡心有所阻也其病心中憤悶頭重目眩四肢怠惰惡聞食氣是矣○妊娠之初經隧內閉以氣養血當是之時腸胃沮如散入焦膈若素有痰飲則飲與血博食飲輒吐頭目旋暈憎聞食氣喜啖酸醢四肢倦怠不自勝持多卧少起厭厭困憊名曰惡阻已產之後胞外餘血敗瘀流利名曰惡露蓋惡者不善不爭之義阻者阻滯之阻血博痰飲伏於胞絡難除也當漸消之露者露水之露裹於胞臟隨胎而至不可遲也當急逐之由是之胎前曰惡阻後曰惡露古人名深有意也惡阻病者心中憤悶頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲噉酸醢多睡少起世云惡食是也乃至滿三月四月日已上大劇者不能自勝舉也此由婦人本虛羸血氣不足氣力又弱兼當風取冷太過心下有痰水挾之而有娠血既已閉水漬於藏氣不宜故心煩憤氣逆則嘔吐血既不通經絡不溢則四肢沉重挾風則頭眩故有胎而病惡阻所謂欲

有胎者其人月水尚來而顏色肌肉如常但如沉重憤悶不欲食飲不知患所在脈理順續四時平和即是欲有胎也如此已經二月日也

方

半夏茯苓湯出千金治妊娠阻病心中憤悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩體重四肢百節疼煩沉重多臥少起惡寒汗出瘦極黃瘦

半夏

生薑各銖

乾地黄

茯苓各銖

橘皮

旋復花

細辛

人參

芍藥

芎藭

桔梗

右咬咀以水一斗煮取三升分三服若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知母各十二銖若變冷下痢者去乾地黄入桂心十二銖若食少胃中虛生熱大便閉塞小便赤少者加大黃十八銖去地黄加黃芩六銖餘依方服一劑得下後消息看氣力冷熱增損方調定更服一劑湯便急服茯苓丸令能食便強健也忌生冷醋滑油膩菘菜海藻一方加棗二枚名半夏湯衛生寶鑑無辛冬因方無旋覆花有紫蘇葉

扶苓丸出千金治妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢垂弱不自勝持服之即効要
先服半夏茯苓湯兩劑後可服此常服此藥消痰水令能食強力養胎

扶苓去皮

人參去芦

桂心熬

乾薑炮

半夏一方炮洗

橘皮略一

白朮

葛根

甘草炙

枳實略二

右為末蜜和為丸如梧桐子大米飲服二十九漸加至三十九日三肘後不用乾薑半夏橘皮白朮葛根只五味又云妊娠忌桂一方有麥門冬忌海藻菘菜羊肉錫糖桃李雀肉酥

陳橘皮丸治妊娠阻病心中煩悶頭眩惡聞食氣聞便嘔吐悶亂顛倒四肢怠墮不自勝舉先服半夏茯苓湯兩劑後次服此

陳橘皮湯浸

白茯苓去黑皮

白朮

甘草炙

乾薑

半夏溫水洗

枳實去氣

右為末鍊蜜為丸和塗酥為劑搗令勻熟丸如梧桐子大每服二十九生薑湯下食前服

治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無効者用此藥理血歸

原則愈出大全

人參

甘草

川芎

當歸

京芍藥

丁香略半

白茯苓

白朮

陳皮略半

苦梗炒

枳殼去穢

半夏洗七次切

右以咀每服三錢重生薑五片棗一枚煎

麥門冬散出聖惠方治妊娠心煩憤悶虛燥吐逆惡聞食氣頭眩四肢沉重百節疼痛多臥少起

麥門冬

子芩

赤茯苓略一

柴胡

赤芍藥

陳皮

人參

苦梗

桑寄生

甘草

旋復花各半

生地黄兩

右為粗末每服四錢水一盞薑半分煎至六分去滓無時溫服

安胎飲出永類治懷胎三月四月至九月惡阻病者心中憤悶頭重目眩四肢沉重懈怠不欲執作惡聞食氣酸嘔酸多臥少起嘔逆不食

或胎動不安非時轉動腰腹疼痛或時下血及妊娠一切病疾並皆治之

甘草炙

扶苓去皮

當歸去芦

熟地黄酒蒸

芍藥

白木 黃耆去苗 白芍藥 半夏炮洗七次 阿膠炒粉

地榆各等分

右吹咀每服三錢水一盞半生薑四片煎至八分去滓溫服無時候如或惡食但以所思之物任意與之必愈按妊娠禁忌勿食鷄子鯉魚膽兔犬野驢山羊肉魚鱉如難產桑椹又按胎教論云令母常居靜室多聽美言聽人講論詩書陳說禮樂耳不聽非言目不視惡事心不起邪念能令生子尾厚福壽忠孝仁義聰明無疾斯乃聖人所留教論故隨方狀以書○一方無半夏地榆有人參桑寄生一方無白木黃耆半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白茯苓

枳殼丸 治妊娠阻病心中煩悶頭眩聞食氣即嘔逆四肢無力不自勝舉

枳殼麩炒微黃去穢 人參去蘆頭 肉桂皮去粗 半夏湯洗七遍去滑 白木

葛根剉 白茯苓各二 麥門冬二兩研 乾薑炮裂剉

甘草炙微赤剉 陳橘皮湯浸去白

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不拘時候以生薑粥飲下二十九

茯苓湯 治妊娠惡阻嘔逆惡心四肢痛疼惡聞食氣怔忡煩悶多

損墜宜安胎調勻血脉

白茯苓皮去 旋復花各二 陳橘皮一兩 生薑炮黃二兩

芎藭 人參 桔梗頭去 甘草炒

芍藥略半 細辛去醋

右粗搗篩每服三錢匕水一盞同煎至六分去滓溫服不拘時候

旋覆半夏湯 治妊娠阻病心下憤悶吐逆不食惡聞食氣頭暈四

肢百節煩痛多卧少起

旋覆花去枝 芎藭 細辛洗去 人參 甘草炙

半夏湯洗七次 赤茯苓皮去 當歸酒浸 乾生薑 陳皮去白已上

右吹咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候

桔梗湯 治妊娠阻病心中憤悶虛煩吐逆惡聞食氣頭眩體重四肢

疼痛煩熱多臥少起惡寒汗出羸瘦

桔梗 半夏湯洗七遍去骨 白茯苓皮去黑 細辛去苗葉 芎藭

人參 甘草炙剉各 芍藥一兩 熟乾地黄微炒

右咬咀每服五錢匕水一盞半生薑五片同煎至六分去滓溫服食後日二服

半夏飲 治妊娠惡阻心中憤悶聞食氣即吐逆肢節痠疼多黃瘦

半夏湯洗去滑生薑汁製過

白茯苓去黑皮

細辛去苗

旋覆花

桔梗

赤芍藥

陳橘皮燍白

甘草炙

熟乾地黄焙

右咬咀每服三錢水一盞入生薑五片同煎至七分去滓溫服空心食前

茯苓湯

治憂怒并氣攻血溢停留胃脘噎聞血腥嘔吐食飲及妊

娠中院宿冷冷血侵脾惡聞食氣病名惡阻

半夏洗七次

茯苓

熟地黄略

橘皮

細辛

人參

芍藥

川芎各二錢

右剉散每服四大錢水二盞薑七片煎七分去滓空腹服有容熱

煩渴口瘡者去橘皮細辛加前胡知母腹冷下痢者去地黄入桂心炒

胃中虛熱大便秘小便澀去地黄加大黃一兩八錢黃芩六錢

人參散

治妊娠一兩月惡聞食氣手足煩悶

人參去芦

知母

枳殼麩炒微黃去

陳橘皮一兩湯浸

甘草炙

麥門冬心

黃芩

大復皮剉已上

大復皮剉已上

右為散每服三錢以水一中盞入薑半分煎至六分去滓不拘時

溫服

白朮散

治妊娠阻病心中憤憤悶頭目眩四肢沉重惡聞食氣好

樂酸醎菓實多臥少起三月四月皆多嘔逆百節痠痛不得自舉

白朮

原朮去粗皮塗生薑

葛根

麥門冬去心

人參去芦

陳橘皮湯浸去白

白茯苓半

白茯苓半

甘草炙

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時

候溫服

厚朴丸

治妊娠阻病頭疼肩背煩悶往往氣脹不思飲食

厚朴

厚朴去粗皮塗生薑

白朮

陳橘皮

前胡去芦頭

赤茯苓兩

麥門冬心

人參去芦

半夏湯洗七

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不拘時候生薑

粥飲下二十九

陳橘皮丸 治妊娠阻病心胃氣滿復脇疔痛腰重

陳橘皮湯浸去白

當歸對微炒

赤芍藥

乾薑炮裂

艾葉炒微過

芍藥三分

甘草炙微

吳茱萸湯浸去焙乾

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不拘時以粥飲下二十九

人參橘皮湯 治阻病嘔吐痰水妊娠三月以來惡阻吐逆或

初姓擇食頭痛寒熱間作四肢不和心虛煩悶者服之各八

味竹茹湯

人參去芦

陳橘紅

白朮

麥門冬去心各

甘草三分

厚朴製

白茯苓去皮各半兩用

右為粗末每服四錢水一盞半淡竹茹一塊如彈子大生薑三片

前至七分去滓登清溫服空心食前一寸無茯苓麥門冬

甘草名橘皮湯 治妊娠心悶頭目昏重心胃煩悶不思飲食或嘔吐

柴胡一兩半

赤茯苓

麥門冬略

枇杷葉去毛

人參

橘紅

甘草各半兩

右吹咀每服四錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服

柴胡散出聖惠方治妊娠阻病頭疼四肢羸弱不思飲食唯思眠睡

柴胡去苗

赤芍藥

麥門冬略

人參

黃耆微炒

甘草炙各

生地黄一兩半研

右為粗末每服三錢以水一盞入地黃汁一分同煎至六分去滓溫

服日再一方無生地黄用生薑煎服

人參多飲出大金治妊娠阻病心中煩悶嘔噦吐逆惡聞食氣頭眩

人參

麥門冬志

白茯苓略

生薑各三分陳橘皮湯浸去

甘草炙各

大棗五枚

右對如麻豆大分為二劑每劑以水五盞煎取二錢去滓食前分

三服如人行三五里再服一方凡妊娠惡食者以所思食任意食

之必愈忌菘菜醋等物

桑寄生飲出聖治妊娠惡阻頭眩嘔吐腰腹痛胎動不安

桑寄生惠方 阿膠炒燂 芫胡去苗 麥門冬燂 人參

刺薊各一兩 郁李仁去皮炒

右咬咀每服三錢水一盞前至七分去滓溫服不拘時候一才治妊

娠阻病氣攻肩背兩脇肋腰臍下痛胎動不安無芫胡兩生薑煎服

保生湯良方治婦人經候不行身無病而似病脉滑大而六部俱勻

乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食臭或但嗜一物或大吐或時吐

清水此名惡阻切勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁

香生薑煎服

人參 甘草各一分 白朮 香附子 烏藥

橘紅各半兩

右咬咀每服三大錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服無特

或為末調服亦可

犀角散治聖治妊娠心煩憤悶虛燥吐逆惡聞食氣頭眩四肢沉重

百節疼痛多臥少起

麥門冬 芋根各二 黃芩 茯神各一 甘草各一

犀角屑 羊兩

右咬咀每服四錢水一盞生地黃一分淡竹葉二七片煎至六分去

滓溫服

參朮飲出便產專治阻病

橘紅四錢 藿香葉三錢 浙朮一兩 粉草各半 人參半兩

丁香二錢半 去花

右為末每服二錢水一小盞生薑五片煎至七分去滓溫服惡心加

乾薑胃膈悶加枳實又云千金半夏茯苓湯內有半夏孕婦不可服

宜服此藥甚妙

人參飲治妊娠阻病心中憤悶頭目眩四肢沉重懈怠惡聞食氣

好喫酸醜果實多臥少起三月四月皆多嘔逆百節不能自舉者

人參二兩 白茯苓焙 厚朴去粗皮塗生 白朮各一

陳橘皮湯浸去 葛根各一

右咬咀每服三錢以水一盞入生薑五片同煎至六分法滓溫服

日再

白朮丸 治妊娠阻病頭疼有背煩悶氣脹不思飲食

白朮

原朴

去粗皮生薑汁炙七遍

當歸

微炒

陳橘皮

湯浸去白

白茯苓

去黑皮

熟乾地黄

微炒各一兩半

右為末鍊蜜搗和塗酥為劑搗令勻熟丸如梧桐子大每日空心米飲下二十九丸早晨日晚各一服

茯苓飲

一名茯苓湯

治妊娠阻病心中煩悶頭眩重憎聞食氣聞便嘔逆

四肢重不持子煩

陳橘皮散

出聖方

治妊娠二三月惡阻病吐嘔不能食

陳橘皮

湯浸去白

白茯苓

半夏

湯洗七遍去滑

麥門冬

去心各一兩

甘草

半兩炙

人參

三分生

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分淡竹茹一分煎至五分去滓不拘時候溫服

麥門冬丸

出聖方

治妊娠阻病頭重不思飲食四肢羸弱多臥少起

麥門冬

一兩半

柴胡

去苗

枳殼

麩炒微黃去核

又桑寄生

刺薊

各一兩

甘草

炙微赤

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不拘時候煎淡竹茹湯下二十九丸

治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及心腹刺痛

人參

丁香

柿蒂

各一兩

甘草

良薑

右為細末每服二錢熱湯點下無時

人參散

出大全良方

療初妊惡食嘔逆

人參

原朴

生薑

枳殼

甘草

各二兩

右切以水六升煮取三升分三服不拘時療妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹

麥門冬

各三兩

前胡

橘皮

一兩

蘆根

右為切以水一大升煮取半升分為二服去滓食前一服一才無麥門冬用小麥三合體熱四肢煩熱者加地骨皮

半夏茯苓湯

出大全良方

治妊娠惡阻嘔吐不食

半夏

泡洗七次炒黃

陳皮

各二兩

白茯苓

二兩

縮砂人

一兩

甘草

四兩

右咬咀每服四錢水二盞薑十片棗一枚烏梅半箇煎至七分食
前溫服如嘔逆甚者加青竹茹一彈子大同熬空心進

療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食出大良方

青竹茹 橘皮各三兩 生薑 茯苓略四 半夏五兩

右細切以水六升煮取二升半去滓分三服不瘥頻服惡羊肉
酥餲等物

加味二陳湯出危氏方治受胎一月或兩月嘔吐擇食緣中脫宿有痰
飲經水止腹氣滯所作名曰惡阻

陳皮 白茯苓各兩半 半夏一兩 白朮七錢 粉草三錢

右劉散每服四錢生薑三片烏梅一箇煎食前服未効加生薑汁

小紫蘇飲出危氏方

紫蘇 厚朴 白茯苓各兩半 半夏一兩 甘草各三錢

右劉散每服三錢水一盞生薑五片棗二枚煎溫服客熱煩渴口
生瘡者加知母前胡腹冷下痢加桂心炒冒中虛熱大小便秘加
黃芩頭疼加細辛川芎

麥門冬湯治妊娠惡阻病心中憤悶見食嘔吐惡聞食氣肢節
煩疼身體沉重多臥黃瘦

麥門冬略三 人參略三 白茯苓略黑 陳橘皮湯浸去白

甘草一分

右粗搗篩每服三錢以水一盞入生薑一分拍破棗二枚煎至六
分去滓溫服食前

人參湯治妊娠一兩月惡食手足煩悶

人參 知母焙 枳殼炒去 黃芩去黑皮

大復一枚并皮

右咬咀每服三錢以水一盞生薑半分切前至七分去滓溫服食
後日二

前胡飲治初妊娠惡阻食即吐逆頭痛顛倒寒熱

前胡去芦頭 細辛去苗葉 白茯苓略黑 甘草炙

厚朴去粗皮生薑汁

右為粗末每服二錢水一盞生薑一分切同前至六分去滓溫服

不拘時日二服一才加人參名前胡湯

麥門冬飲出聖心治妊娠阻病胎不安寒熱嘔逆氣滿不思飲食

麥門冬焙去心 人參 白茯苓去黑皮 阿膠各一兩

甘草炙

右為鹿末每服三錢匕以水一盞入生薑一分拍碎棗二枚同煎至

六分去滓食後溫服日二一才加陳橘皮

薑橘湯治妊娠惡阻嘔吐涎痰不能食

生薑母 陳橘皮白 青竹茹略半 前胡去苗三分 檳榔剉二枚

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

茯苓丸出肘後方 療妊娠惡阻嘔吐顛倒垂死不自勝持服之即効

茯苓 人參各一兩 肉桂炙 甘草炙 枳殼半

右搗篩蜜和丸每服二十九加至三十九日三服○古今療胎

病方有類十首不問虛實冷熱胎死者活此方緣妊娠忌桂所以煎

白木散出十便良方 治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者

白木一兩 人參半兩 丁香二錢半 甘草一分

右為末每服二錢水一盞薑五片煎至七分溫服

醒脾飲子出永類 治妊婦阻病嘔逆不食甚者中滿口中無味或作寒熱

草豆蔻以濕紙裹灰火中煨令紙乾取出皮用 厚朴制各半兩 乾薑三分

甘草一兩二分

右為細末每服二大錢水一大盞棗二枚生薑三片煎至八分去滓

呷服病輕者只一二便能食舊有橘紅二兩治寒熱瘡痢不食

後人去橘皮以乾生薑代乾薑治老人氣虛大便秘少津液引飲

有奇効一方用乾薑去橘皮亦名醒脾飲子治阻病極為神驗

四七湯出如聖心 治妊娠三月惡阻為病氣鬱生痰

半夏洗 白茯苓四兩 厚朴三兩姜汁製 紫蘇二兩

右咬咀每服四錢用水一盞半薑五片棗一枚煎至七分法滓不

拘特候

人參丁香散出大全良方 治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及心腹刺痛

人參半兩 丁香 藿香葉各一分

右為散每服三錢水一盞煎至七分法滓溫服無時

人參半夏丸出聖治妊娠惡阻病醋心胃中冷腹痛吐逆不喜飲食

半夏湯炮 人參 乾生薑略半

右為細末以生地黄汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服四十九米飲送下不拘時候

小地黄丸出保慶治妊娠酸心吐清水腹痛不能食

人參 乾薑炮

右為末用生地黄汁丸如梧子大每服五十九米湯下食前服之齊生方加製半夏等分

治妊娠忽下黃汁如膠或如出豆汁出大

芋根切二分 銀一斤

右以水九升煎取四升每服入酒二升或一升煎藥取一升分作二服

治阻病出在用香附子末熱湯調服

參橘散出醫方治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

赤茯苓 橘皮去白 麥門冬志心 白木 厚朴薑製

甘草炙

右以咀每服四錢水一盞薑七片竹茹少許煎七分去滓溫服

赤茯苓散出楊氏治妊娠惡阻心胃煩悶頭暈惡心四肢昏倦嘔吐痰水惡聞食氣

赤茯苓去皮 半夏湯洗 陳橘皮去白 桔梗去芦頭 乾地黄炮

各一兩 白木 川芎 人參去芦頭 赤芍藥略

旋復花 甘草炙 右件以咀每服三錢水一盞半生薑三片煎至一觔去滓熱服

不拘時候

人參調中散出楊氏調脾肺氣治胃腸滿悶四肢煩熱及妊娠

阻病心胃注悶嘔逆可思飲食

人參去芦頭 甘草炙 枳殼炒 厚朴姜汁製 白木

白茯苓去皮 紫胡去苗 細辛去葉土 藿香葉 去土

陳橘皮去白 右件為咀每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫

服

服

服食前

李氏家傳快氣湯

繼產

自初妊娠惡阻便可服此寬中快氣

抑陽輔陰八月滑胎易產

枳殼五兩

縮砂

香附

甘草

右各淨秤同炒為末湯調服

溫真人方繼產

枳殼五兩

川當歸

木香各二兩

甘草一兩

右為末湯調服

膠艾湯

出指

治妊娠胞阻

阿膠

川芎

甘草各二兩

艾葉

當歸各三兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓服覺冷痛加乾薑二兩

子煩

附論

夫妊娠苦煩悶者四月受少陰君火氣以養精六月受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多有煩悶名曰子煩也產實云夫妊娠而子煩者

是肺臟虛而熱乘於心則令心煩也若熱而煩者但熱而已若有痰飲而煩者嘔吐涎沫纒聞食氣煩燥不安也大抵妊娠之人既停痰積飲又虛熱相搏氣鬱不舒或煩燥或嘔吐涎沫劇則胎動不安均謂之子煩也

方

升麻湯

一名麥門冬散出聖惠方

治妊娠壅熱心神煩燥口乾渴逆此證與子煩大同

小異通用知母丸亦可

川升麻

黃芩

人參

麥門冬

梔子人

柴胡

茯苓

瓜蒌根

犀角屑

各一兩知母

甘草

各半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服

酸棗人湯 治妊娠煩懊虛悶四肢疼痛不睡

酸棗人

炒二兩芍藥

防風

去義 羌活

去苗 赤茯苓

犀角鎊

五味子

甘草

人參

檳榔

右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓不拘時溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治妊娠心煩頭項疼痛不思飲食手足多熱

赤茯苓

桑寄生

知母

百合

麥門冬去心

川升麻

人參去芦頭

柴胡去苗已上

甘草半兩炙

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入甜竹茹一分生薑半分蘆白
七寸煎至六分去滓不拘時候溫服

退熱湯治妊虛煩懊熱夫妊虛煩懊熱者以陽氣偏勝熱氣獨
作心下懊悶頭痛面赤小便黃澁甚則淋痛是也病源又謂之子煩

人參

甘草炙

黃芩去黑心

當歸切焙

芍藥

梔子人

防風去叉

柴胡去苗各

右搗篩每服三錢水一盞煎取七分去滓溫服食後

柴胡飲治妊虛煩懊熱胎氣不寧手足煩倦

柴胡去苗

桑寄生

知母切焙

百合洗

麥門冬切焙

升麻各一

甜竹茹新竹茹

右搗篩每服五錢水一盞半生薑三片同煎至一盞去滓食後溫服

知母湯治妊虛煩懊熱

知母切焙

防風去叉

黃芩去黑心

甘草炙

麥門冬去心

赤茯苓

升麻各一兩

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分入竹瀝少許攪勻
去滓溫服不拘時

茯苓湯治妊虛煩懊熱中
悶乳頭運重嘔逆四肢倦怠

赤茯苓去黑皮一

赤茯苓

防風去叉

人參

白朮剉炒

枳殼去穰

甘草炙各

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時候

竹瀝湯治妊心下煩熱燥

防風去叉

麥門冬去心

黃芩去黑心

升麻

梔子人

右搗篩每服三錢水一盞竹瀝半合煎至七分去滓食後溫服日

知母飲出大治妊心脾壅熱口乾渴苦煩悶

赤茯苓

黃芩

黃耆各三兩

知母

甘草各二兩

右粗末桑白皮煎湯成入竹瀝一合服不拘時候胎臍受熱最宜服

之一方去黃耆知母加地骨皮犀角屑嫩葛各三分吹咀煎如前法

犀角散出聖惠方治妊娠心煩熱悶

犀角屑 地骨皮 黃芩 麥門冬去心 赤茯苓已各二兩

甘草半兩炙

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸不拘時候溫服

竹瀝湯一名竹葉湯治妊娠常苦煩悶此是子煩以四月受少陰燥氣

以養精六月受少陽相火氣以養氣若母心驚驚膽寒多煩悶

竹瀝一升一作竹葉 麥門冬 防風 黃芩各三兩 茯苓各四兩

右以水四升合竹瀝煮取二升分三服不瘥再作一方用知母無黃芩一方加人參半兩

麥門冬湯一名竹葉湯治妊娠四月六月多苦煩悶心驚驚膽怯名曰子煩

白茯苓去皮 人參 麥門冬去心 防風各一兩

右吹咀每服四錢水一盞半薑五片入淡竹葉十片煎至八分去滓溫服不拘時候

治妊娠恒苦煩悶此名子煩

茯苓二兩 竹瀝一升

右以水四升合竹瀝煎取二升分三服不差重竹亦可特特竹瀝煎之

治孕婦七八箇月傷暑傷熱以致子煩胎氣迫近於上咽喉窒礙心腹脹滿下墜似前痢每登廁時坐一炊久忽爾氣下方得大便一通世浴率用痢藥不知病在胎熱子煩

用小片胡湯下黃連阿膠丸或用炒阿膠淨黃連各一分和殼柴黃半之分作兩劑烏梅薑蜜煎服後其大便調導却以川芎茯苓縮砂甘草繼之若五苓散感應丸香連駐車非其治也

治妊娠常苦煩悶此是子煩出大金良方

用竹瀝隨多少時時服止取瘥

治妊娠子煩口乾不得臥出大金良方

黃連去鬚為細末每服一錢粥飲調下酒蒸黃連丸亦妙

一母丸出大金良方治妊娠因服藥致胎不安有似虛煩不得臥者

用知母一两洗焙為細末以棗肉為丸如彈子大每服一丸細嚼煎人參湯送下○次見醫者不識此證作虛煩治之損動胎氣宜矣有識者亦見有藥也產科鄭宗文得於陳藏器本草拾遺中也用之良驗一方用養花糯米湯化下名萬安丸

治妊娘心中煩悶見食即吐非時惡心飲食不進非時悶絕脉氣洪滿

大小腑實執出楊子建萬全護命方

麥門東去心

防風

茯苓

山施

前胡去毛

升麻

黃苓

石膏各等分

右細杵羅為末每服三錢水一盞半葱三枝煎六七沸食後臨臥喫

○子淋附論

夫淋者由腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則小便數也膀胱熱則小便行澀而數不宣妊娘之人胞繫於腎腎間虛熱而成淋疾甚者心煩悶亂故謂之子淋也轉胞證候孕婦多有之患在忍縮小便或喜食煎炒或胞後為熱所迫遂便小腸之氣逆而不通大腸之氣與之俱滯外水

不能入膀胱內水不能出膀胱淋瀝急每欲尿時痛不可言大便亦裏急似痢非痢必以手從胸悶按至臍下庶可立出小便否則逆上出為不禁甚者因此腹脹浮腫治法用涼藥疎利小腸中熱仍與通泄大腸治其腸中攪痛大便入下則溺胞隨即歸正於是小便順流宜服葵子散

方

地膚子湯出聖惠方療妊娘患子淋由腎虛膀胱熱則小便行澀而數不

宣心中煩臍腹悶

川大黃

地膚草兩各三

知母

黃苓

猪苓

赤芍藥

通草

川升麻

枳實

甘草各二兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分溫服此不瘥還飲地膚

葵根汁忌海藻松酢物

療妊娘數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思飲食出聖惠方

瞿麥穗

赤茯苓

桑白皮

木通

葵子各一兩

黃苓

芍藥

枳殼

車前子各半兩

右為鹿末每服四錢水一盞煎至六分温服

安樂散出旋治妊娠小便淋瀝蓋小便淋瀝者何答曰本因調攝失宜子臟氣虛蓋綠酒色過度傷其血氣致水臟澹遂成淋瀝名曰子淋宜服安樂散通利小便

麥門冬去心 通草 滑石錢各一 當歸去芦酒浸 燈心

甘草半兩 人參細辛洗錢

右搗羅為細末每服用三錢煎麥門冬湯調服不拘時候服之尤妙

一方止用檳榔赤芍藥各等分水煎空心服妻效或葱白煎亦可

木通湯 治妊娠子淋澀痛

木通剉 石常去毛各兩 赤茯苓去黑皮 芍藥 桑根剉

陳橘皮湯浸去白炒 人參各三分

右搗節每服三錢水一盞半入生薑一棗大煎至八分出滓温服

冬葵子散出爭治妊娠胎不安小便淋澀小腹疼痛

冬葵子炒 苧胡去白 桑根白皮剉 赤茯苓已上各一兩

赤芍藥一兩 當歸三兩剉成散

右搗為散每服四錢水一中盞入生薑半分葱白七寸煎至六分去

滓不計時候温服

冬葵子湯出全治妊娠患淋小便澀不利小腸水道熱痛

冬葵子一升 芍藥二兩 黃苓 赤茯苓 車前子各三兩

右吹咀以水七升煎至二升温分三服

海蛤湯治妊娠子淋

海蛤 木通剉 豬苓去黑皮各半兩 冬葵子微炒 滑石餅一分

右搗篩每服三錢水一盞入燈心十莖同煎至六分去滓食前温服

當歸湯治妊娠子淋澀痛煩

當歸切焙 芍藥 赤茯苓去黑皮 甘草炙剉 梔子人兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓温服

人參散治妊娠子淋

人參 木通剉 青塩細研以湯一盞化浸 海金沙別研

莎草根去毛二兩

右將人參木通莎草根搗羅為細散同海金沙青塩一處再研勻每

服二錢空心酒或米飲調下

葵子散出聖方治妊娠小便澁痛謂之子淋

葵子 滑石 木通 榆皮各等

右為末每服三錢以水一盞半葱白七寸煎至七分食前服一方無

榆皮

又方出仁方

葵子 滑石 杏仁 寒水石各等

右為末或煎或調服神效

白芷散治妊娠子淋小便頻澁痛

白芷 三分 鬱金 阿膠炙燥 滑石各一兩

右搗羅為散每服二錢煎葱白湯調下

石蠟散治妊娠子淋日夜頻數澁痛夫婦人懷子而淋者謂之子淋因

腎虛膀胱經客邪熱令澁少而數水道澁痛引於臍者是其候也

石蠟 一枚碎 乳香 一分 滑石 半兩

右研細末為散每服一錢煎燈心湯調下

石韋湯治妊娠小便頻數澁少疼痛

石韋去毛 榆白皮剉各兩 滑石 二兩

右搗篩每服三錢水一盞入葱白二寸生薑二片煎至六分去滓

食前溫服

鯉魚汁出聖方治妊娠小便淋澁胎不安

鯉魚一枚重一斤者理如食法 葵菜 一斤 葱白四兩

右以水五升者熟者少許鹽和魚菜并汁同食之效

治妊娠淋小便數而少澁痛手足煩痛出聖方

地膚草 茅根剉 大麻子各一兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入葱白七寸煎至六分去滓不

計時候溫服

檳榔散出產經治胎前諸般淋瀝小便不通醫作轉脬用他藥不愈此

檳榔煨散 赤芍藥各等

右為麩末每用五錢水一盞半煎七分去滓溫服空心食前尋

常男子婦人血淋及小便淋瀝滯水道疼痛用之甚效一方治妊
娠中惡心腹疼痛温酒調下一錢
滑石湯治妊娘子淋

滑石研

赤柳根剉半

右搗篩每服五錢半煎至八分食前去滓温服

治妊娘小便淋瀝臍腹妨悶出聖惠方

猪苓黑皮 蘧麥一兩

右搗細羅為散每服二錢不計時候煎葱白湯調下

車前子湯治妊娘患淋水道熱不通

車前子五兩 葵根切

右以水五升煎取一升半分二服

葵子飲大治妊娘患子淋

以葵子一升水五升煮取二升分再服一方無葵子用葵根亦可亦

治小便不通

甘遂散大治妊娘子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不產者

宜服此藥下之

用大山赤皮甘遂二兩為末以白蜜二合和合如大豆粒多覺心下
煩得微下者日一服之後還將猪苓散不得下日三服漸加至半錢
以微利為度

猪苓散既於療妊娘小便澁痛兼療胎水亦治子淋

用猪苓五兩去皮為末白湯調方寸匕加至二匕日三夜二不瘥宜
轉下之服前藥

地膚湯大療妊娘患子淋小便數出少或熱疼痛酸索手足疼煩及
子煩

用地膚草三兩細切水四升煮取二升半去滓分三服日三一方作
地膚子十二兩

○心腹痛

附論

夫妊娘心腹痛者或由宿有冷痰或新觸風寒皆由臟虛而致發動也
邪正相擊而并於氣隨氣上下衝於心則心痛下攻於腹則腹痛

故令心腹痛也。妊娠而痛者，邪正二氣交攻於內，若不時差者，其痛衝擊胞絡，必致動胎。甚則傷墮也。又云：妊娠心腹疼痛，多是風寒濕冷痰飲與臟氣相擊，故令腹痛。攻傷不已，則致胎動也。○妊娠心痛者，多是風邪痰飲乘於心之經絡，邪氣搏於正氣，交結而痛也。若傷心正經而痛者，為真心痛，心為帝主之官，統領諸臟，不可受邪。邪若傷之，朝發夕死，夕發朝死。若傷心支別絡而痛者，則乍安乍甚，休作有時也。妊娠之人，或有病而痛不已者，氣乘胞絡，傷損子臟也。則令胎動，凡胎轉移，則多不安。不安而動於血者，則血下也。雷公云：心痛欲死，急覓延胡。○妊娠臟腑虛弱，胃寒濕之氣，邪氣與正氣相擊，故令腹痛。病不已，則傷胞絡，令胎不安。治法宜祛散寒濕，安和胎氣，則痛自愈。

方

保生湯治妊娠心腹痛祛散寒濕安和胎氣

- 紫苑去苗 龍骨 赤石脂各一兩 艾葉炒
- 白木各三 黃連去鬚 厚朴去分鹿皮生 阿膠炒
- 芫胡去苗 龍骨 赤石脂各一兩 艾葉炒

枳殼各一兩 旋復花炒 地榆一兩 肉苳蔻去穢 益智去皮

乾薑炮 右鹿搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

澤蘭治妊娠羸瘦腰冷腹痛不欲食安胎 當歸切焙 桂去分鹿皮 乾薑炮 芎藭

阿膠炒 蕪荑 葶藶本 石膏研 白芎

栝子仁炒 人參 白木 細辛去苗 甘草炙

右搗羅為末，鍊蜜和丸如梧桐子大，每服十五丸，溫酒下，日再服。

沉香湯治妊娠心痛痰逆不思飲食

- 人參 白苳蔻去皮 草苳蔻去皮 厚朴去麤皮生薑 白木剉
- 半夏半兩 陳橘皮湯浸 木香半兩
- 乾薑炮 甘草炙

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至七分去滓稍熱食前服

七寶湯治妊娠心痛胸腕不利嘔吐冷痰

半夏

半兩生薑汁浸切炒

大腹皮

剉

甘草

訶梨勒

剉去

白木

各一兩

郁李仁

人參

白茯苓

各一兩

芎藭

剉

右麝搗篩每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至七分去滓溫服

服

真白湯治妊娠腹痛不思飲食

木香

沉香

丁香

蓬莪茂

芎藭

當歸

芍藥

棟實

懷香子

甘草

益智

陳橘皮

湯浸去白

右麝搗篩每服二錢水一盞棗一枚煎六分去滓食前溫服

妙薑丸治妊娠兩脇脹悶腹中疼痛嘔逆不思食

乾薑

桂皮

木香

沉香

當歸

甘草

白芷

白茯苓

青橘皮

芍藥

乾木瓜

薑黃

右搗羅為末湯浸蒸餅為丸如小彈子大每服一丸細嚼溫酒下食

前服

厚朴散治妊娠冷氣攻心腹疼痛或不納飲食

厚朴

二兩去麝皮塗生薑汁炙令香熟

陳橘皮

一兩湯浸

吳茱萸

浸七遍曝乾微炒

阿膠

三分搗碎炒令黃燥

乾薑

半兩炮

草薢

去皮各一兩

白木

芎藭

人參

甘草

一分炙微赤坐

右為散每服三錢以水一中盞半入生薑三片大棗三枚同煎至一盞去滓不計時候稍熱服之日三服一方加當歸無生薑煎服

木香散治妊娠心腹疼痛

木香

枳殼

白芷

蓬莪茂

白木

益智

甘草

桂

青橘皮

人參

京三稜

右為散每服二錢不拘時候沸湯調服

半夏散治妊娠傷冷心腹痛或痰逆不納飲食

半夏湯浸七遍去滑人參去芦草薹蔻去皮白木身高良薑剉厚朴去麁皮

艾葉微炒各阿膠搗碎炒陳橘皮湯浸去白穢焙

熟各一兩芎藭身甘草一分炙芍藥

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

地黃飲治妊娠心腹痛面赤汗息悶喘無力

生乾地黃焙人參身當歸切焙桑寄生身芍藥

赤茯苓去黑皮桔梗剉炒各桂皮去穢鈞藤剉甘草炙剉各

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服

日三

木香和脾飲治妊娠心腹冷痛霍亂吐瀉

木香身丁香身白木身甘草炙芎藭身

人參身草薹蔻去皮沉香身大腹皮剉訶梨勒煨去核

右搗篩每服一錢水一盞入生薑五片同煎至七分去滓溫服空心

食前

枳實湯一名積柳散治妊娠心腹痛脇滿不思飲食

枳實去穢炒人參身赤茯苓去皮苾胡去苗木香炮

桂皮去穢草薹蔻去皮各白木三分檳榔生剉

右入麁搗篩每服二錢水一盞煎取七分去滓溫服不拘時一方用生薑煎服

薑煎服

如聖散治妊娠心痛胸膈不利不思飲食

人參身白木各一兩乾薑炮丁香炒各縮沙仁炒

檀香剉桔梗炒各胡椒炒甘草炙

右搗羅為散每服二錢鹽湯點服

草薹蔻散出聖方治妊娠心腹常痛喫食減少四肢不和全不入食

草薹蔻身陳橘皮身乾地黃身白木各一兩川芎三分

當歸炒桂心身乾薑身木香各半

右為細末每服四錢水一盞棗二枚煎至六分熱服無時

阿膠湯出聖方治妊娠心腹痛胎動不安四肢皆不和

阿膠炙燥芎藭身桑寄生身陳橘皮湯浸去白穢各一兩

艾葉炒半兩

枳實去穢麩炒半兩

當歸切焙三分

高良薑

甘草炙一分

右搗篩每服三錢以水一盞入棗三枚煎至七分去滓不拘時稍熱服

大腹湯一名雞蘇散治妊娠心痛張滿胎不安穩

大腹皮剉

芎藭

赤茯苓去黑皮

陳橘皮湯浸去白焙

人參各三

當歸切焙

苧麻根剉半兩

紫蘇莖葉作雞蘇

右搗篩每服五錢水盞半煎一盞去滓無時溫服一方加生薑

厚朴湯治妊娠心脾痛嘔逆不下食

厚朴去麩皮剉生薑汁浸一宿炒熟

白朮各四

白芷二兩

乾薑炙

甘草炙

益知炒去皮

陳橘皮切焙

沙炒去皮

右分鹿搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時候

人參飲治妊娠心痛腹脹脹滿不思飲食嘔逆不止

人參

桑寄生

阿膠炒燥

陳橘皮焙

白茯苓去黑皮

白朮

甘草炙

厚朴去麩皮剉各三分

右分鹿搗篩每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時

丁香散治妊娠腹中冷痛

丁香三分

當歸切焙

蓬莪茂煨

益智去皮

甘草炙

芎藭

木香炒

青橘皮湯浸去白

右為細末每服二錢沸湯調下食前服

當歸散出聖方治妊娠胎動不安腹內疼痛

當歸三兩

阿膠切焙

熟乾地黄

艾葉微炒各

甘草炙

乾薑各半兩

白芍藥

芎藭各一兩

右搗篩為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

芎歸湯出聖方治妊娠先患冷氣忽中心腹痛如刀刺

川芎

人參

茯苓

吳茱萸

苦梗樹

當歸各三

厚朴製

芍藥各二

右吹咀以水九升煎取三升分三服氣下即安一方有甘草二兩炙

○上證枳殼散亦可

人參湯出聖方治妊娠心腹俱痛引脇肋妨悶不思食

人參

厚朴

去麋皮生

訶梨勒

煨去

阿膠

赤茯苓

去黑皮

白朮

陳橘皮

湯浸去白

甘草

右搗篩每服三錢水一盞入生薑五片棗二枚煎取七分去滓溫服

不拘時候

沉香湯 治妊娠心痛不可禁

沉香

剉

厚朴

去麋皮生薑

附子

炮裂去

陳橘皮

湯浸去

甘草

白朮

芍藥

各二

右剉如麻豆每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至六分去滓

溫服

人參湯 治妊娠腹內疝痛如刀所刺

人參

大腹

檳榔

三枚

枳殼

去穢

芍藥

各四

芫胡

附子

炮裂去皮

右剉如麻豆每服三錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓空心食

前溫服

白朮湯 治妊娠腹痛疝刺安胎

白朮

桂

陳橘皮

湯浸山白

甘草

剉

厚朴

芍藥

芍藥

各一

右分鹿搗篩每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至六分去滓食前

熱服

療妊娠三四月腹痛時時下血

方見本門漏胎類續斷飲

當歸

川芎

阿膠

人參

各六

艾葉

四分

大棗

茯苓

右細切以水四升煮取二升溫分三服

艾葉散 治聖治妊娠胎動不安腹內疝痛

艾葉

芍藥

乾薑

炮裂

桑寄生

各三

阿膠

搗碎

當歸

甘草

剉

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分

去滓不計時候稍熱服

參朮湯治妊娠心腹疼痛脇肋脹滿燥煩

人參 白朮 枳殼麩炒 赤茯苓去黑皮

檳榔煨 肉苳蔻去殼 芫胡去苗

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分去滓食前

温服

當歸湯治妊娠心腹氣攻疼痛

當歸切焙 麥門冬去心 芎藭切 赤茯苓去黑皮 甘草炙

大劑去根 芫胡三分

右為麩末每服三錢水一盞入生薑五片棗三枚煎至八分去滓不

計時候稍熱服

大腹皮飲治妊娠心腹疼痛及兩脇肋內妨悶嘔逆惡心不止飲食不

下體倦四肢小力或時發氣脹喘息麩大胎不安穩宜服

大腹皮生 人參 赤茯苓去黑皮 當歸切焙

枳殼去穢 芫胡去苗 白朮各一兩半

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分去滓温服日三

金粟湯治妊娠心痛温中調氣

粟米 半夏生薑汁浸 甘草炙 人參羊兩

白朮 桂去粗皮 檳榔剉

右搗篩每服二錢水一盞生薑三片煎六分去滓温服

芫蔻湯治妊娠心痛時多痰逆食飲無味腹脇脹滿

肉苳蔻仁 附子湯浸 縮沙炒 木香一分

白朮 芎藭各一兩

右剉如麻豆每服二錢水一盞生薑三片煎七分去滓温服不拘時

當歸芍藥散治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產後血暈虛氣之

崩中久痢常服通暢血脉不生癰瘡消痰養胃明目益津宜服○安期

先生賜李少君父鉅之藥後仲景增減為婦人懷妊痛方

白芍藥羊兩 當歸 茯苓 白朮各二兩 澤瀉

川芎各四兩 芍藥各四兩 澤瀉各二兩

右為末每服二錢食前温酒調服又補勞養真陽退邪熱安和神志

潤澤容色散邪寒瀘瘡時氣一方用芍藥四兩澤瀉茯苓川芎各一

兩當歸白朮各二兩亦可以蜜丸服

沉香散治妊娠內積冷氣腹中切痛

沉香剉半兩

蜀椒去開口反目炒出汗一分

甘草炙

烏藥剉

當歸焙切

芎藭各一兩

右為末每服一錢溫酒調下熱湯亦得不拘時

安胎飲出便產須知治胎寒腹痛胎熱多驚舉重腰痛腹滿胞急或頭昏明

當歸去芦

枳殼去穢剉炒

粉草炙

糯米二合

熱地黃熱湯淨洗蒸用二兩

川芎一兩半

右剉每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚金銀少許同煎至七分

去滓食前服虛弱者加黃耆下血者加阿膠炒下血未止者加熟艾

腹痛者加白芷白芍藥減食者加人參白朮

人參湯治妊娠疼痛

人參去芦

茯苓去粗皮

赤芍藥

桔梗去芦各半兩

製朴一兩

甘草二錢半

右吹咀每服三錢水一盞煎至七分熱服之

白朮散出聖治妊娠胎動腹痛及腰疼不止

白朮

白茯苓格三

熟乾地黃

阿膠持神炒

當歸剉微炒

甘草炙微赤

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分

去滓不計候稍條服

桔梗丸治妊娠心疼痛思旧飲食夫妊娠心腹痛者由妊娠失於將

護外受風冷

心脾之經手少陰是也脾之經從胃

別上膈注心中是也二經為風冷宿寒所攻邪正交擊手故令

心腹俱痛久不差則妨害飲食耗弱氣血傷動胞絡

桔梗一兩

訶梨勒剉去

木香各半兩

厚朴去蘆皮生

白朮各二兩

細辛去苗半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫米飲下食前服

芍藥一兩

白朮一兩

黃芩去黑心

陳橘子

湯去白焙

木香 三分 丁香 半兩

右為細散每服二錢空心炒生薑湯調下

雞蘇飲 妊娠心腹氣脹疔刺疼痛不安

雞蘇 人參 赤茯苓 大腹皮 芎藭

芎藭 各半

右割如麻豆大每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服之

治妊娠心下急氣滿切痛 出大金

赤茯苓 六分 桑白皮 五分 前胡 四分 郁李仁 檳榔 各三

右為細末以水二升煮取一半去滓夜臥服

橘皮湯 治妊娠復痛不思飲食

陳橘皮 湯洗去白焙五錢 甘草 剉炒 厚朴 去蘆皮生薑汁炙

白朮 各四 草薹 各二兩

右將葱一握細切拌藥卷一宿炒令黃色搗為分鹿末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

芎藭湯 治妊娠心痛嘔逆不思飲食

芎藭 甘草 芍藥 草薹 檳榔

右搗篩每服二錢水一盞棗一枚生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

拘時

鹿角膠散 治妊娠胎動腹痛悶絕

鹿角膠 人參 甘草

芎藭 當歸

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入葱白七寸煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠胎動腹痛心煩

芎藭 當歸 阿膠 曲頭棘 鐵

大麥葉

右為細剉和勻以水一大盞半煎至一盞去滓食前分溫三服

治妊娠卒心痛氣欲絕

川芎 當歸 茯苓 厚朴

右水六升煎取三升分為二服立愈

薑朮湯 治妊娠腹痛和氣思食治中滿

薑黃

蓬莪朮 煨

藿香 各一兩

甘草

各半兩

右麩搗篩每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服不拘時

加減四物湯 出入治 治妊婦產前腹痛及治月事或多或少或前或後胎

氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不下

當歸 二兩

川芎 一兩

白芍藥 二兩

熟乾地黄 二兩

方用生

右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分取六分清汁熱服 日四服以

知為度妊孕下血即入艾六七葉阿膠末一錢同煎疾勢甚大散藥

不及以四味各半兩細剉以水四盞煎至二盞半去滓分四服 食前

熱服一日之中令盡以知為度平常產乳服至三膈止如虛弱血臟

不調至一月止○因虛致熱熱與血搏口舌乾渴欲飲水者加栝蒌根

一兩麥門冬三分○腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥各一分○血

崩加地黃蒲黃各二兩○因熱生風加川芎一分柴胡半兩○身熱

脈躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩○大便秘結加大黃半兩桃仁

一分炒○大便滑洩加桂心熟附子各一分○發寒熱加乾薑牧丹

皮芍藥各一分○嘔者加白朮人參各半兩○腹脹加厚朴枳實各

一分○虛煩不得眠加竹葉人參各一分○煩燥大渴加知母石膏

各半兩○水停心下微吐逆加猪苓茯苓防己各一分○虛寒吐類

傷寒加人參柴胡防風各三分○此法大治產前產後衆疾如神加

防風熟地黃各一兩○治男子婦人諸般風氣毒瘡加地骨皮二兩

白茯苓一兩○治男子婦人骨蒸氣此方乃善養守元氣得之巢先

生大有神効○高道貴云惠風疾及渾身燥痒以四物湯清汁調消

風散甚妙○產前漏胎加艾阿膠糯米煎性熱加荊芥煎服即愈○

治婦人欲念不遂心膈迷悶刺痛每服一貼加攝紅香附玄胡索

各半兩煎○治經候不通腹中疼痛或脚氣衝心加琥珀煎見効并

醋一合煎立効○治婦人血旺脚痛加五加皮煎服○治婦人血熱

生瘡加地骨皮香附子煎服○治婦人經候不通口乾頭暈是肝血

熱加菊花煎服立効○治婦人百病吳興周端仁加云吳茱萸若陽

歲少使陰藏多使有驗○治婦人臂疼又如癱瘓是血証加紅花煎

服効

芎藭散治妊娠腹痛脹悶

芎藭

當歸切焙

乾薑炮半

陳橘皮湯浸去白

右為散每服二錢用糯米飲調下不拘時

地黃湯

出聖方治妊娠心痛煩悶不食

生乾地黄焙

淡竹茹剉

桂去麩皮

右搗篩為散每服三錢水一盞半煎取一盞去滓溫服不拘時服

草菓散

出大全良方

治妊娠臟氣本虛宿挾風冷脾胃久弱臟腑虛滑腹臍

疔痛日夜無度

厚朴去麩皮薑汁

肉苳冠一箇

草苳冠一箇

右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓熱服

香木散

出大全良方

治妊娠五月已後常胸腹間氣刺滿痛或腸鳴以至嘔

逆減食此由喜怒憂慮過度飲食失節之所致

廣中義茂煨一兩

丁香半兩

粉草一分

右為細末空心鹽湯點服一大盞覺胸中如物按下之狀口蔡元度

寵人有子夫人怒欲逐之病醫官王師復處此方三服而愈後用果驗

當歸湯治妊娠心腹疔痛

當歸切焙

甘草炙剉

乾薑炮半

右分鹿搗篩每服三錢水一盞入棗二枚煎七分去滓溫服

白朮湯

出千金方

治妊娠心腹疼痛不能食及偏身痛或衝心痛欲死綠胎

有水致痛

白朮

黃芩去黑心

芍藥

右分鹿搗篩以水八盞煎至五盞去滓分溫五服服之令易生月飲一

劑為善忌桃李雀肉

治妊娠卒心痛欲死不可忍者

橘皮三兩

豆豉二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大溫水下二七丸無時候

黑神散治妊娠內挾寒冷腹中疔痛安和胎氣

杉木節半斤燒

乾薑二兩燒

右搗羅為散溫酒調下一大錢不拘時

枳殼丸治妊娠腹痛一切氣疾

枳殼二兩棗水浸一日去木香炒一兩
右將木香搗羅為末入枳殼糊內和丸梧桐子大每服二十九溫酒
下不拘時

芎藭湯治妊娠腹痛不可忍安胎止痛方見安胎類

槐子凡一名蕭黃酒治妊娠月數未足而似欲產腹痛者宜服初見墮胎後

當歸飲出便產須知治妊娠腹痛或是冷痛或是胎動方見諸血類

治妊娠三五月忽心腹絞痛

木棗四箇燒鹽一錢燒

右為末取一撮許酒調服之即愈

生雞子酒出方治妊娠心痛或八九月隨樹或牛馬驚傷得心痛者

用破生雞子一枚酒和服之

又方鉶并用蜜一升和井底泥泥心下

治妊娠卒心痛欲死不可忍者麝香

用火麻子三升研水八升煮取五升分為五服

玄胡索散出方治雙身心腹痛可忍及腰腿痛

用玄胡索二兩肥者為末每服三錢以溫酒調下食前又加地黃末

一兩急服五錢効雷公炮炙論云心痛欲死急覓延胡

竹茹湯出方治妊娠心痛因落牀倒地胎有所傷宜服

用青竹茹剉碎三兩麈尾節每服三錢水一大盞煎七分去滓溫服

不拘時一方或八九箇月墮樹或牛馬驚傷得心痛者以青竹皮不

拘多少酒煮三兩沸服之不瘥再服

牛屎方 治妊娠心痛 方見腰痛類

地黃酒出方治妊娠腹中痛 方見諸血類

治妊娠胎動服痛連腰出方

用好豉一合以水一大盞煎至六分去滓食前分溫二服

車脂方出方治妊娠腹痛咳嗽并產難三日不出方見咳嗽類

又方出方取蜜一升頓服良

知母丸治妊娠月未似欲產腹中痛 方見安胎類

治妊娠忽口苦心腹痛不可忍出方
用燒鹽令赤熱三指撮許酒服之立瘥一方用鹽一斤

治妊娠傷胎結血心腹痛出千金方

取小兒屎二升頓服之立瘥

治妊娠四五月忽心腹絞痛及冷氣攻注心脾出良方

用大紅棗十四枚燒存性為末以童子小便調下一方止用溫酒調服

治妊娠胎動腹痛連腰方出聖惠方

右取大麥麩一兩以水一大盞煎五七沸食前分溫三服

治妊娠腹中痛出本草

燒車釭脂末肉酒中服一作車轄中脂

當歸散出聖惠方治妊娠胎動不安腹痛不止

當歸 三兩 續斷 芎藭 陳橘皮湯浸去白穢

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治妊娠心痛或八九月隋樹或牛馬驚傷得心痛及煩悶出聖惠方

白蜜 三兩 羊脂 八兩 青竹茹 一升

右合煎食頃服如棗核大三枚日三一方水煎服

火龍散出齊生按治妊娠心氣痛

艾葉末一盞炒 川棟子各半炒

右為末水煎服之

治妊娠渾身厥冷氣痛衝心欲死方出揚子建萬全護命方

吳茱萸 白朮 當歸 防風 芎藭

續斷 炙艾葉各半 藿香一分

右細杵羅為末每服三錢水一盞一分前取一盞空心服連進兩三盞以効為度

治妊娠忽然心痛悶絕欲死不可勝忍出揚子建萬全護命方

桑寄生半兩 當歸 茯苓 防風 芎藭

吳茱萸各一分

右細杵羅為末每服二錢匕水一盞煎取九分空心喫

治妊娠心痛煩悶

用麻子一合研細水一盞煎取六分去滓非時溫服麻子乃今人續布麻種子也

○中惡心腹痛

附論

夫妊娠人忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡言邪惡之氣中胎傷於人也所以然者血氣自養而為精神之主若氣血不和精神虛弱故邪毒之氣得以中之妊娠之病亦致損胎也

方

當歸散出聖方治妊娠中惡心腹痛

當歸剉微

丁香一作雞舌香

川芎各三兩

青橘皮二兩

吳茱萸半兩

湯泡三

右為細末無時溫酒調一錢

犀角散出聖方

治妊娠中惡腹痛心悶

犀角屑一兩

川升麻

木香各三分

右擣篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠中惡心腹痛出聖方

生乾地黄一兩

枳殼麩炒令去穰木香各三分

右為細末每服一錢酒調下不計時候

又方出聖方

苦梗一兩細剉

生薑半兩

右咬咀以水煎服無時

又方良薑湯出聖方

高良薑

蓬莪茂各一兩

右為細末不計時候以溫酒調下一錢

檳榔散治妊娠中惡心腹痛方見本門

又方出聖方

吳茱萸半兩湯浸

編焙乾微炒

當歸一兩剉

右為末不計時候以醋湯調下一錢

治妊娠中惡心腹痛出聖方

用新生雞子二枚破著杯中以糯米粉和如粥頓服亦治妊娠

卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止

又方出聖方

用水三升洗夫靴剔汁温服

治妊娠中盡心腹痛鉅斤

用燒賤鼓皮酒服方寸匕須臾自呼盡主姓名

心腹脹滿

附論

夫妊娠心腹脹滿者由腹內夙有寒氣致令停飲妊娠重因觸冷飲發動與氣相干故令心腹脹滿也○妊娠脾氣不和痰飲留滯則中焦生寒寒則胃受水穀不能消化令人胃脹胃脹者腹滿也

方

丁香散 治妊娠腹滿脹急可進飲食利心胸止乾嘔

丁香一分 白朮

蒼朮各一兩

前胡各一兩

胡椒

高良薑 乾薑炮

葛根

厚朴去麩皮生薑

藿香

訶梨勒去核

旋復花各一兩 甘草炙

右搗羅為散每二錢匕沸湯點服不計時候

阿魏丸 治妊娠腹滿喘逆脹悶

阿魏麩細 丁香

木香

藁香子微炒 白芷

陳橘皮湯浸去

檳榔剉

香附子炒 甘草炙

生薑去皮薄切暴

右搗羅為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸爛嚼煎蘿蔔湯下温酒或鹽湯生薑湯下亦得此藥下氣療心腹虛脹

厚朴煮散 治妊娠腹脹不欲飲食

厚朴去麩皮生薑

白朮

芎藭

乾薑炮

當歸切焙

訶梨勒去核

陳橘皮湯浸去

人參

芍藥各半 甘草炙

右搗師每服三錢水一盞入大棗二枚煎取七分去滓不計時候稍熱服

白芷薤散出聖方 治妊娠心腹脹滿氣攻胸膈咽喉不利飲食減少

白芷薤

甘草炙

枳殼剉 蘇合各半

人參剉

白朮

大腹皮剉

前胡剉

赤茯苓

訶梨勒剉

陳橘皮

湯浸去白穢

右擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

倉公下氣湯出大全良方治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食四肢無力

姜活 赤芍藥 甘草 擣柳 青皮

大復皮 陳皮 赤茯苓 半夏 桑白皮

桂心各半 紫蘇莖二兩

右吹咀每服三錢一盞薑五片棗一枚煎至七分去滓溫服無時候一方加燈心煎

訶梨勒飲出聖方治妊娠腹滿氣衝胸膈煩悶四肢少力不思飲食

訶梨勒煨去核 赤茯苓去黑 前胡去芦頭 大復皮對三 陳橘皮湯浸去

桑根白皮對各三分 枳殼麩炒微 白朮 芎藭各半

右麈擣篩每服三錢以水一盞入生薑半分切棗三枚同煎取七分去滓溫服不計時候

擣柳散出聖方治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食四肢少力

擣柳 前胡去芦頭 赤茯苓各一人 參去芦頭 白朮

芎藭各半 陳橘皮湯浸去 枳殼麩炒微 黃去

甘草對一分

右擣篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每於食前溫服

人參湯治妊娠腹滿助妨悶不思飲食方見心腹痛類

白朮湯治妊娠腹滿少食多脹

白朮 三兩 陳橘皮湯浸去白 木香半兩 丁香半兩

甘草灸一兩半 厚朴去麩皮生薑 半夏一兩庄薑汁浸

乾薑炮二兩

右為末每服三錢水二盞入生薑五片同煎至一盞去滓溫服不拘時沉香散治婦妊娠腹滿可食勻氣利膈

沉香對 陳橘皮湯浸去 人參各半 木香

茯苓去黑 甘草灸略 白朮二兩

右為細散每服二錢入鹽少許以沸湯點食前服

白芫薹丸治妊娠腹滿飲食遲化寬中勻氣健脾和胃

白芷去皮枳殼用水漿煮令軟木香二兩當歸切焙

訶梨勒去核陳橘皮二兩白細對炒令黃色

右為末將棗用漿水煮去皮核爛研和藥丸如梧桐子大每服二十

丸至三十丸切生薑入鹽炒焦黑色煎湯下不拘時

木香丸治妊娠腹滿可思飲食嘔逆不止

木香 蓬義茂炮制 青橘皮 湯浸去白焙

甘草炙 甘草炙

右為末水浸炊餅和丸如彈子大每服一丸濕紙煨生薑一塊如皂

子大與藥同嚼溫湯下食前服

草薹散出聖方治妊娠心腹脹滿脾胃氣虛不下食飲

草薹去皮人參去芦白木各一兩柴胡去苗陳橘皮湯浸

焙各一兩 甘草炙 甘草炙

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六

分去滓不計時候稍服

藿香丸治妊娠腹滿溫胃氣化冷痰利膈思飲食

藿香葉 木香各一兩 肉苳蔻去殼 丁香各半兩 半夏一兩 薑汁

三宿透切焙乾

右為末生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九食前生薑湯

下

白朮散出聖方治妊娠心腹脹滿不欲飲食

白朮 黃芩略一兩 陳橘皮去白 穰湯浸

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分

去滓不計時候溫服

枳殼湯出保命方治婦人懷胎腹脹

枳殼炒 黃芩一兩

右為末每服半兩水一盞半煎一盞去滓溫服治產前脹滿身體

沉重枳殼湯中加白朮一兩

治妊娠脹滿有熱証者出門難救類方枳殼湯見

○身體腫脹

附論

夫妊娠腫滿由臟氣本弱因產重虛土不尅水血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀陳無擇云九婦人宿有風寒冷濕妊娠喜脚腫俗呼為皺脚亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水○九妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣安穩若中風寒邪氣及有所觸犯則隨邪而生病也九妊娠經血壅閉以養胎若忽然虛腫乃胎中挾水水血相搏脾胃惡濕主身之肌肉濕漬氣弱則肌肉虛水氣流溢故令身腫滿也然其由有自或因世瀉下痢臟腑虛滑耗損脾胃或因寒熱瘧疾煩渴引飲太過濕漬脾胃皆能使頭目或手足浮腫也然水漬於胞兒未成形則胎多損壞及其胎產日脚微腫乃胞臟水少血多水出於外故現微腫則易生也宿有寒氣因寒冷所觸故令腹腫滿也○妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫腿膝以來行步艱辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於脚脂間有黃水出者謂之子氣直至分娩方消此由婦人素有風氣或衛任經有血風未可妄投湯藥亦恐大段其者慮將產之際費力有不測之憂故不可不治於未產之前也○脾合土候肌肉土氣和平則能制水水自傳化無有停積若妊娠脾胃氣虛無

血壅閉則水飲下化濕氣淫溢外攻形體內注胞胎懷妊之始腫滿或必傷胎氣如臨月而脚微腫者利其小便則病可愈

方

木通湯出聖方治妊娠身體浮腫心腹脹滿小便不通

木通對 香薷 桑根白皮對各一兩 木香

訶梨勒皮 黃芩各三兩 枳殼去穢炒 檳榔各半兩 紫蘇葉葉

右麤擣篩每服四錢水一盞入生薑半分相碎煎至六分去滓溫服

食前日再

當歸散出大全方 治胎前諸疾或因怒中氣充子藏或克脾脈腹急肚脹腰腹時疼可思飲食四肢浮腫氣急時喘大便忽難小便忽澀玉門忽腫

當歸一兩 赤茯苓 枳殼 白芍藥 川芎各二兩

川白薑炮 木香煨 粉草各半兩

右咬咀每服三大錢水一盞半薑三片煎至八分去滓無時溫服如稟受氣弱及南人枳殼減半如氣實及北人於內加分二服服之或

連日大便秘澀加蜜同煎

八正散出危氏方治妊娠心氣壅胎氣八箇月散墜手足浮腫急痛不安難產

瞿麥劉

木通劉

滑石

大黃劉車前子

篇蓄一名地

山拖人

甘草劉

右對散每服三錢水一盞茴香撮同煎熟服

勝金散

出濟生方

小腹虛脹者何蓋因食硬物傷胎胎既受病傳於脾胃氣

虛冷逼小腹狀若奔豚或腰重大便秘澀兩脇虛鳴宜服勝金散温中下氣疾即安矣

吳茱萸劉

陳皮去

乾生薑

乾薑炮

川芎

各一錢半

厚朴去皮

縮砂仁炒

甘草劉

右為細末每服二錢薑湯調服不拘時候一方有木香無縮砂仁

桑白皮湯出聖方治妊娠四肢腫滿小便不利喘促

桑根白皮劉

枳殼去

商陸各半

澤瀉三分

冬葵根

赤茯苓去

木通劉

右麓擣篩每服四錢已水一盞半入生薑半分拍碎煎至八分去滓食前温服以利為度

鯉魚湯

出大生良方

治妊娠腹大胎間有水氣脚腫通身腫滿胸肚不分

鯉魚一頭

斤二

生薑用五

白朮五兩

芍藥

當歸各三

茯苓

四兩

右咬咀以水一斗二升先煮魚熟澄清取八升內藥煎取三升分五

服忌桃李雀肉酢物等一方用陳皮少許同煎昔有妊娠腹脹小便

不利吐逆諸醫雜進温脾胃寬氣去脹等劑服之反以藥物不納轉

加脹滿揆心驗之胎死腹中又服諸下胎藥不能通解舉家憂惶因

得鯉魚湯論曰脚腫俗呼為鄒脚亦有通身腫滿心胸急脹名曰

胎水証遂去娠心前衣服看之胸肚不分急以鯉魚湯三五服大小

便皆下惡水腫消脹去方得分娩死胎可謂更生之人矣此證蓋

緣懷身腹大娠婦不自知覺人人皆以謂身娠如此終不以為胎水病

醫人何以得知故書此諭病家自當覺察

防已湯

出聖方

治妊娠通身浮腫喘息促小便澀

防已

大腹皮剖各三分桑根白皮剖

紫蘇莖葉

赤茯苓去黑皮

木香一分

右分鹿藿節每服四錢水一盞入生薑半分拍碎煎至六分去滓食前溫服一方無大腹皮

赤茯苓湯出聖惠方

治妊娠身體浮腫心腹急滿小便赤澀及水腫

赤茯苓去黑皮

白朮

旋復花各半

木通剖

杏人湯浸去皮

黃芩各三

右分鹿藿節每服三錢已水一盞入生薑一分拍碎煎至六分去滓食前溫服一方無木通用防已二兩不用薑煎

茯苓丸出聖惠方

治妊娠身體腫有水氣心腹脹滿小便澀喘息促

赤茯苓去黑皮

郁李仁湯浸去皮

檳榔剖半

葶藶子炒令黃

枳殼去穢

白朮各三

右擣羅四味為末入末味同研令細鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

煎桑白皮湯下一方加桑白皮名檳榔丸粥飲下

天仙藤散出十便良方

治妊婦足腫似水氣狀

天仙藤洗畧

香附子炒

陳皮

甘草

烏藥不能要天台者

但得較白香而棘者良

右等分淨秤為細末每服三錢水一盞薑三片木瓜三片紫蘇三葉

同煎至七分放溫澄清空心食前服日三服小便利氣脈通體輕腫

漸消更不須多服

療妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少出大金

茯苓四兩

杏人

檳榔各三

旋復花

郁李仁各一

右為粗末以水六升煮取三升去滓分溫三服小便利通即止

葶藶散出大金

療妊娠遍身洪腫

葶藶子十分

茯苓二兩

桑白皮二兩

郁李仁八分

右為粗末以水六升煮取二升分溫三服小便利即瘥

又方出大金

治妊娠煩渴引飲致腹脹身腫不能食

澤瀉

葶藶各三

茯苓

枳殼

白朮各六

右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即瘥

澤瀉湯出大金

治妊娠經氣壅滯身體浮腫喘促大便難小便澀

澤瀉

桑根白皮剉木通

枳殼去穢炒

赤茯苓去黑皮

檳榔剉各一兩

右麤擣竹師每服四錢匕水一盞半入生薑半分拍碎煎至八分去滓食前溫服稍利為度日再服

腎着湯出三方治妊娠腰脚腫痛

茯苓

白朮各四兩

乾薑

甘草各二兩

杏仁三兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分食前服

五皮散出大方治胎水亦治尋常脾虛腫滿

大腹皮

桑白皮

生薑皮

茯苓皮

橘皮絡等

右咬咀每服半兩水二盞濃磨木香一呷同煎至八分去滓空心溫服亦治男子脾虛腫滿一方無桑白皮有白朮倍之名白朮散

治妊娠體腫有水氣心腹急滿出千方

茯苓

白朮各四兩一方無白朮

黃芩

杏仁各三兩

旋復花二兩

右咬咀以水六升煮取二升半分三服忌桃李雀肉鮓物

寄生飲 治妊娠遍身虛腫

桑寄生一兩

桑根白皮剉炒三分

木香半兩

大腹皮二分

紫蘇莖葉一兩

右細判如麻豆大拌勻每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

桑白皮飲出聖方治妊娠四服腫皮肉拘急小便不利

桑根白皮剉炒一兩

商陸根一兩

赤小豆三合

羌活去芦頭半兩

右咬咀如小豆大拌勻用水五盞入生薑七片同煮候豆熟瀘去滓

渴即節汁并食豆小便利差一方無生薑名商陸湯

猪苓散出聖方治妊娠身躄浮腫腹脹小便不利微渴引飲氣急

猪苓二兩去黑皮

紫蘇莖葉

木通剉各一兩

右擣細羅為散每於食前以溫水調下二錢

葵子散出聖方治妊娠身躄浮腫小便不利洒浙惡寒

葵子

赤茯苓

漢防己各二兩

右擣細羅為散每於食前以粥飲調下一錢

商陸赤小豆湯

一名赤小豆湯出危氏方

治妊娠手足腫滿攣急

赤小豆 商陸各等

右咬咀每服一兩用水一碗煎至七分澄清汁服一方有澤漆一方無澤漆有桑白皮

治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴引飲出方

取猪苓五兩為末以熱水服方寸匕日三服

燒秤錘方出方治妊娠脹滿及妊娠卒下血方見諸血類

治妊娠毒腫方出方

用蕪菁根淨洗去皮搗酢如薄泥勿令有汁猛火煮二三沸適性薄腫以帛急裹之日再易寒時溫覆非根時用子若腫在咽中取汁含咽之

又方出方

用燒捷牛屎酢和傳之乾則易亦可服方寸匕日三

治妊婦兩脚浮腫名曰脆脚因脾衰不能制水血化為水所致

用生料平胃散每服三錢薑煎服為末蘇湯調服亦可

治婦人身腫九月而瘖瘖不能言者

煎玉燭散二兩水半碗煎至七分去滓入蜜放溫時時呷之

腰痛附論

夫腎主腰足因勞傷動其經虛則風冷乘之則腰痛冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其不止多動胎氣婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚者則胎墮也

方

五加皮散出方療妊娠腰疼痛不可忍或連膝痛先服此散

杜仲四兩 五加皮三兩 阿膠炙 防風 金毛狗脊

川芎 北細辛 白芍藥各二兩 草薢三兩 杏仁八十枚去

右咬咀以水九升煮取二升去滓下膠作三服一方無芍藥生薑煎服

煎服

續斷丸一名五加皮丸療妊娠三二月腰痛不可忍者次服此丸

續斷 杜仲各十 芎藭 獨活各三 狗脊

五加皮 草薢 芍藥 薯蕷 訶子肉各八

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心酒下四十九日三服

平胃散一名平治產前氣築刺兩脇疼痛見咳

杜仲散出聖療觸動胎不安以致腰痛背及臍腹內痛

杜仲 五加皮 當歸 芍藥 川芎

單薤各三 人參一兩

右細剉以水七升煮取二升半分温三服無時

防風湯 治妊娠身痛

防風去芦 藁本去芦 獨活去芦 細辛去葉 甘草

阿膠炒令

右咬咀每服三錢水一盞煎熱服之

當歸散出大 療妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛二三月娠

當歸三兩 阿膠 甘草各二 葱白一升

右細剉以水七升煮取三升去滓分温五服無時

大地苗丸 治產前後腰腹疼一切血疼及治氣血虛四肢不舉骨

體熱疼

熟地黄二兩 烏梅肉 當歸各一

右為細末鍊蜜丸如彈子大每服一丸白湯嚥下空心

大腹散 治妊娠氣壅攻腰疼痛不可忍

大腹皮剉 郁李人湯浸去皮 澤瀉各一

右擣篩為散每服四錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

温服

治妊娠腰痛

豉二兩 榆白皮三

右孰擣蜜丸如梧桐子大服二七丸亦治心痛温酒下亦可

治妊娠腰痛不止方

鹿角屑二兩 生乾地黄一兩

右擣細羅為散每於食前以温酒調下二錢

治妊娠腰痛

用麻子三升以水五升煮取汁三升分五服亦心痛

牛屎方 治妊娠腰痛亦治心痛煩悶

用燒牛屎焦末水服方寸匕日三服

地黃酒 治妊娠腰痛 方見諸血類

紫酒 治妊娠腰痛如折亦治常入腰痛一名聖酒方

用大黑豆二合炒令香熟以酒一大盞煮取七分去豆空心頓服

通氣散 治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

用破故紙不以多少瓦上炒令香熟為末罇核桃肉半箇空心温

酒調下二錢

療妊娠腰背痛反覆不得

用鹿角長六寸燒令赤酒中淬再燒再淬以角碎為度取酒飯之

為末服亦可

治妊娠卒腰痛如折

以銀一兩水三升煎取二升飲之

產前軟勝

甘草

生薑

烏梅等分

右用水一大盞同煎至分去滓服便令勝骨軟產宮受氣痛不攻作

杜仲丸 治衝任脉虛血海虛弱寒濕邪氣客搏胞絡妊娠腰痛小

腹牽連行步力弱艱於俯仰小便白濁晝夜頻併

五加皮

萆薢

山茱萸二味各

杜仲四兩炒

阿膠蛤粉炒

金毛狗脊灸去毛

防風去芦

川芎

細辛去葉

鹿角屑二味各

當歸洗焙

生乾地黃各一

右件為細末蜜糊和丸如梧桐子大每服三十九温酒送下或煎艾

湯下空心食前服

阿膠丸 治妊娠胎臑受寒腰腹疼痛或因損動惡露頓下腹痛作

陣

香附子去毛 天仙子炒令黑 當歸洗焙各 五味子

吳茱萸湯洗七遍

阿膠蛤粉

川芎


乾薑炮各

蒼朮三兩米泔水

右件為細末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服三十九煎艾湯下或

木香醋湯下空心食前

治妊娠腰痛不可勝舉兩足沉重行步無力臍腹痛不可勝忍



缺卷 125-卷131

杜仲去麩皮

續斷

茯苓

芎

防風

芍藥

草薢

當歸

枳殼

細辛

右細杆羅為末每服三錢水一盞二分同煎取一盞空心去滓喫
蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下三十九丸亦得

普濟方卷之一百二十四 畢



