

朱

彌

日

本草綱目菜部目錄第二十六卷

李時珍曰凡草木之可茹者謂之菜韭薤葵葱藿五
菜也素問云五穀爲養五菜爲充所以輔佐穀氣疏
通壅滯也古者三農生九穀場圃裁草木以備饑饉
菜固不止于五而已我國初周憲王圖草木之可濟
生者四百餘種爲救荒本草厥有旨哉夫陰之所生
本在五味陰之五宮傷在五味謹和五味臟腑以通
氣血以流骨正筋柔腠理以密可以長久是以內則
有訓食醫有方菜之于人補非小也但五氣之良毒

各不同五味之所入有偏勝民生日用而不知乃搜

可茹之草凡一百五種爲菜部分爲五類曰薰辛曰

柔滑曰蓏曰水曰芝杮

舊本菜部三品共六十五種今併入五種移十三種入草部六種入果部自草部移入及併二十三種自穀部

移入一種果部移入一種外類有名未用移入三種

神農本草經一十三種

梁陶弘景註

名醫別錄一十七種

梁陶弘景註

唐本草七種

唐蘇恭

千金食治二種

唐孫思邈

本草拾遺一十三種

唐陳藏器

食療本草三種

唐孟説張鼎

食性本草一種

南唐陳士良

蜀本草二種

蜀韓保昇

日華本草二種

宋人
大明

開寶本草六種

宋馬志

嘉祐本草十種

宋掌禹錫

圖經本草四種

宋蘇頌

證類本草一種

宋唐慎微

日用本草三種

元吳瑞

食物本草二種

明穎汪

食鑑本草一種

明甯原

救荒本草一種

明周憲王

本草綱目一十七種

明李時珍

附註

魏李當之齊徐之才藥錄

吳普本草

宋雷斬炮炙

唐李珣海藥

唐甄權藥性

蕭炳四聲

金張元素珍珠囊

楊損之刪繁

朱寇宗奭衍義

元朱震亨補遺

李杲法象

王好古湯液

明陳嘉謨蒙筌

明汪機會編

菜之一

葷辛類三十二種

韭
別錄

山韭

千金
孝文韭附

葱

別錄

薑葱
千金
別錄

胡葱

開寶

薤

別錄

子
即
藠

五辛菜
拾遺

芸薹

唐本
即油菜

菘

別錄

大
蒜

芥
別錄

白芥

開寶

蕪菁

別錄

白
菜

萊菔
唐本

生薑

別錄

乾薑

本經

竺
乾
薑
附

天
地

茼蒿
嘉祐

邪蒿

嘉祐

胡荽

嘉祐

胡蘿蔔
綱目

水蘄

本經
即芹菜

董

唐本
即旱芹

紫堇
圖經

馬蘄

唐本

禳香

唐本
即茴香

蔔蘿

開寶
池得勒

蜀胡爛

吉附

數低

羅勒

嘉祐
卽蘭香

白花菜

食物


蔊菜

綱目

草豉

拾遺

右附方舊一百五十新二百九十二



本草綱目菜部第二十六卷

菜之一 葱菜類三十二種

韭
中品

釋名草鍾乳

拾遺

起陽草

侯氏

藥譜

○頌曰

案許慎

葉出地上形

其根不傷至

一歲三四割

其根

不傷至

一種而久生

故謂之韭

冬壅培之

先生春復生

信乎久生者也

藏器曰俗謂

韭是草鍾乳

言其溫補也

時珍曰

韭之莖名韭白

根名韭黃

花名韭菁

禮記謂韭爲

豐本

言其美在

白韭之

根也蘿之美在白韭之

美在黃黃乃未出土者

集解

時珍曰

韭叢生

豐本長葉青翠

可以根分可

以子種其性內生

不得外長葉高三寸便翦

翦忌日中一歲不過五翦收子者只可一翦八月

開花成叢收取醃藏供饌謂之長生韭

言翦而復

翦忌日中一歲不過五翦收子者只可一翦八月

開花成叢收取醃藏供饌謂之長生韭

言翦而復

生久而不乏也九月收子其子黑色而扁須風處
陰乾勿令浥鬱北人至冬移根于土窖中培以馬
屎暖則卽長高可尺許不見風日其葉黃嫩謂之
韭黃豪貴皆珍之韭之爲菜可生可熟可菹可久
乃菜中最有益者也羅願爾雅翼云物久必變故
老韭爲莧頌曰鄭玄言政道得利陰物變爲陽故
葱冷而韭溫

葱冷

爲韭

可驗

氣味辛微酸溫濁無毒

時珍曰生辛濁熟甘酸大明曰熱宗奭曰春食則香忌說曰熱

夏食則臭多食則能昏神暗目酒後尤忌說曰熱
病後十日食之卽發困五月多食乏氣力冬月多
食動宿飲吐水不可與蜜及牛肉同食

主治

歸心安五臟除胃中熱

利病人可久食

別錄時珍曰案千金方作可久食不利病人

葉煮鯽魚

鮮食斷卒下痢根入生髮膏用

弘景根葉煮食溫中

下氣補虛益陽調和臟腑令人能食止洩血膿腹

中冷痛生擣汁服主胸痹骨痛不可觸者又解藥

毒療狂狗咬人數發者亦塗諸蛇虺蠍蠻惡蟲毒

藏器煮食充肺氣除心腹痼冷痃癖擣汁服治肥白

人中風失音

日華煮食歸腎壯陽止洩精暖腰膝

甯原

燥熟以鹽醋空心喫十頓治胸膈噎氣擣汁服治

胸痹刺痛如錐卽吐出胸中惡血甚驗又灌初生

小兒吐去惡水惡血永無諸病

訛

主吐血唾血衄

血尿血婦人經脈逆行打撲傷損及膈噎病擣汁

澄清和童尿飲之能消散胃脘瘀血甚效

震亨

飲生

汁主上氣喘息欲絕解肉脯毒煮汁飲止消渴盜

汗熏產婦血運洗腸痔脫肛

時珍

發明

弘景曰此菜殊辛臭雖煮食之便出猶熏灼不如葱薤熟卽無氣最是養生所忌頌曰菜

中此物最溫而益人宜常食之昔人正月節食五辛以辟痼氣謂韭薤葱蒜薑也

宗奭曰韭黃未出薹土最不益人食之滯氣蓋含抑鬱未申之氣故也孔子曰不時不食正謂此類花食之亦動風思

邈曰韭味酸肝病宜食之大益人心

時珍曰時珍曰韭葉熱根功用相同生則辛而散血熟則甘而補中入足厥陰經乃肝之菜也素問言心病宜食韭葉

食鑑本草言歸腎文雖異而理則相貫蓋心乃肝

之子腎乃肝之母母能令子實虛則補其母也道家目爲五葷之一謂其能昏人神而動虛陽也有

一貧叟病噎膈食入卽吐胸中刺痛或令取韭汁
入鹽梅鹵汁少許細呷得入漸加忽吐稠涎數升
而愈此亦仲景治胸痹用薤白皆取其辛溫能散
胃脘痰飲惡血之義也震亨曰心痛有食熱物及
怒鬱致死血留于胃口作痛者宜用韭汁桔梗加
入藥中開提氣血有腎氣上攻以致心痛者宜用
韭汁和五苓散爲丸空心茴香湯下蓋韭性急能
散胃口血滯也又反胃宜用韭汁二盃入薑汁牛
乳各一盃細細溫服蓋韭汁消血薑汁下氣消痰
和胃牛乳能解熱潤燥補虛也一人臘月飲刮剥
酒三盃自后食必屈曲下膈硬澁微痛右脈甚濤
關脈沉此污血在胃脘之口氣因鬱而成痰隘塞
食道也遂以韭汁半盞細細冷呷盡半斤而愈

附方

舊二十一

新

胸痹急痛

說曰

胸痹痛如錐刺

得俛仰自汗出或徹背

上不治或至死可取生韭或根

食療本草

陰陽易病

男子陰

腫小腹

洗搗汁服之

食療本草

陰陽易病

絞痛頭重眼花宜獮鼠屎湯煮之用獮鼠屎十四枚韭根一大把水二錢煮七分去滓再煎二沸溫

灌

服得汗愈未汗再

方同卒然中惡

擣韭汁灌

鼻中便甦○

臥忽不寤勿以火照之但痛齧拇指

甲際而唾其面則活取韭

擣汁吹入鼻中冬月

則用韭根肘後方風忤邪惡

韭根一把烏梅十

升水一斗煮之仍以病人櫛內入煮三沸櫛浮

者生沉者死煮至三升分三服

金匱要略吳茱萸炒半

息欲絕韭汁飲

一升效夜出盜汗

韭根四十九根水二升

消渴引飲韭苗日用三五兩或炒或作羹勿入鹽

入醬無妨喫至十斤卽佳極效過清明

勿喫有人病此引飲无度

秦憲副方喉腫難食傳之冷卽易

此方而愈生韭葉作羹粥燂炒任脫肛不收

金方水穀病疾韭食之良

食醫心鏡

千水穀病疾食之良

一斤切以酥拌炒熟綿裏作二
包更互熨之以入爲度 聖惠 痔瘡作痛 用盆盛

器蓋之畱一孔用洗淨韭菜一把泡湯中乘熱坐孔上先熏後洗數次自然脫體也 袖珍方 小

兒胎毒 初生時以韭汁少許灌之卽吐出 惡水惡血永無諸疾 四聲本草 小兒腹

脹 韭根搣汁和豬肋煎服一 合閒日一服取愈 祕錄 小兒患黃 韭根搣汁

取黃水取痘瘡不發 韭根煎湯服一 效同上 海上方 產後嘔水 產後

哭傷肝嘔青綠水用韭葉一斤取汁 入薑汁少許和飲遂愈 摘玄方 產後血運 韭

切安瓶中沃以熱醋令氣入鼻中卽省 丹溪心法 赤白帶下 韭根搣汁和童尿露一夜

空心溫服取效 鼻衄不止 韭根葱根同搣棗大塞海上方 入鼻中頻易兩三度卽

止金方 千五般瘡癬 韭根炒存性搣末和塗之數度愈 經驗方 金瘡

出血

韭菜汁和風化石灰日乾每用
爲末傳之效瀕湖集簡方

刺傷中水腫

煮韭痛

熱

搘

之

千金

漆瘡作癢

韭菜

葉

杵

傳

斗門

方

猢猻

狗咬傷

七日

當一

不發乃脫也急于無風處以冷水洗淨卽服韭菜汁

一盃隔七日又一盃四十九日共服七盃須百日

忌食酸鹹一年忌食魚腥終身忌食狗肉方得保

全否則十有九死徐本齋云此法出肘後方有風

犬一日咬三人止一人用

簡便

百蟲入耳

韭菜

連根

洗搗

聾耳出汗

韭菜

汁日滴三

聖惠方

牙齒蟲匿

韭菜

連根

洗搗

泥和傅痛處腮上以紙蓋住一時取下有細蟲在

泥上可除根○又方韭菜根十箇川椒二十粒香油

少許以水桶上泥同搗傅病牙解肉脯毒器蓋過密

賴上良久有蟲出數次卽愈也

有夜者爲鬱肉屋漏沾著者爲漏脯皆

張文仲備急方

食物中毒

韭生

良汁服數升

千金

韭子脩治

大明日入藥揀淨蒸熟

氣味辛甘溫無

毒石

時珍曰陽也伏鍾乳乳香

主治夢中洩精溺血

別錄暖腰膝

治鬼交甚效

日華

補肝及命門治小便頻數遺尿女

人白淫白帶

時珍

發明

頌曰韭子得龍骨桑螵蛸主漏精補中葛洪

孫思邈諸方多用之弘景曰韭子入棘刺諸

丸主

漏精時珍曰棘刺丸方見外臺祕要治諸勞

丸主漏精多不錄案梅師方治遺精用韭子五

合白

龍骨一兩爲末空心酒服方寸七千金方治

夢遺小便數用韭子二兩桑螵蛸一兩微炒研末

每旦

酒服二錢三因方治下元虛冷小便不禁或

成白濁有家韭子丸蓋韭乃肝之菜入足厥陰經

腎主閉藏肝主疏洩素問曰足厥陰病則遺尿思想無窮入房太甚發爲筋痿及爲白淫男隨洩而下女子綿綿而下韭子之治遺精漏泄小便頻數女人帶下者能入厥陰補下焦肝及命門之不足命門者藏精之府故同治云

附方

舊三

夢遺溺白

藏器曰

韭子每日空心生吞

一二十粒鹽湯下○聖惠治

虛勞

傷腎

夢中洩精用韭子二

兩

虛勞溺精

用新

韭子

一升稻米二斗水一

斗七

千

微炒爲末食前溫酒服二錢匕

升十月霜後采之好酒八合漬一宿以晴明日

童子向南擣一萬杵平旦溫酒服方寸匕日再服

之外

夢洩遺尿

韭子一升煮粥取汁六升分三服

升煮粥取汁六升分三服

千

金臺祕要

玉莖強中

玉莖強硬

不痿精流

不住時時如針

刺捏之則痛

其病名強中乃腎滯漏

疾也用韭子破故紙各一兩爲末

每服一錢水一盞煎服日三卽住

經驗方腰腳無力

韭 子一升揀淨蒸兩炊久暴乾簸去黑皮炒黃搗
粉安息香二大兩水煮一二百沸慢火炒赤色和

搗 爲丸梧子大如乾入少蜜每日空腹酒下三十丸以飯三匙壓之大佳

崔元亮海上方女

人帶下 及男子腎虛冷夢遺用韭子七升醋煮干

沸 煎研末煉蜜丸梧子大每服三十九空

心 溫酒下 **千金方** 煙熏蟲牙

用瓦片煅紅安韭子數粒清油數點待煙起以筒吸引至

痛處良久以溫水漱吐有小蟲出爲効未盡再熏 救急易方

山韭

金

釋名

藿 音鐵

未詳

集解

頌曰藿山韭也山中往往有之而人多不識形性亦與家韭相類但根白葉如燈心苗耳

韓詩云六月食鬱及薁謂此也時珍曰案爾雅云藿山韭也許慎說文云鐵山韭也金幼孜北征錄

云北邊雲臺戎地多野韭沙葱人皆采而食之卽此也蘇氏以詩之鬱卽此未知是否又呂忱字林觀此則知野韭又有山水二種氣味或不相遠也

氣味鹹寒濇無毒主治宜腎主大小便數去煩熱

治毛髮

金千

發明

時珍曰薤腎之菜也腎病宜食之諸家本草不載而孫思邈千金方收之他書薤字多訛

作薤字薤乃豆葉也

陳直奉親養老書有薤菜羹卽此也其方治老人脾胃氣弱飲食不強用薤菜

四兩鯽魚肉五兩煮羹下

少并少
麴食每三五日一作之云極補益

附錄

孝文韭

拾遺藏器曰辛溫無毒主腹內冷脹滿洩痢腸澼溫中補虛令人能食生

塞北山谷狀如韭人多食之云是後魏孝文帝所

種又有諸葛韭孔明所種此韭更長被人食之時

珍曰此亦山韭也

但因人命名耳

葱

中品
別錄

釋名

綱

菜伯

同

和事草

同

鹿胎

時珍曰葱從忽

外直中空有忽

通之象也

孔

孔

孔

葱初生曰葱針葉曰葱青衣曰葱袍莖曰葱白葉

中涕曰葱苒諸物皆

宜故云菜伯和事

集解

恭曰葱有數種山葱曰薑葱療病以胡葱其

人閒食葱有二種一種凍葱經冬不死分莖

栽蔴而無子一種漢葱冬卽葉枯食用入藥凍葱

最善氣味亦佳也保昇曰葱凡四種冬葱卽凍葱

也夏衰冬盛莖葉俱軟美山南江左有之漢葱莖

實硬而味薄冬卽葉枯胡葱莖葉粗硬根若金燈

人呼爲龍角葱荆楚閒多種之其皮赤每莖上出
歧如八角故云瑞曰龍角卽龍爪葱又名羊角葱
莖上生根移下蒔之時珍曰冬葱卽慈葱或名太
官葱謂其莖柔細而香可以經冬太官上供宜之
故有數名漢葱一名木葱其莖粗硬故有木名冬
葱無子漢葱春末開花成叢青白色其子味辛色
黑有皺文作三瓣狀收取
陰乾勿令浥鬱可種可栽

葱莖白氣味辛平葉溫根鬚汁並無毒

弘景曰葱

冷青熱傷寒湯中不得用青也宗奭曰葱主發散
多食昏人神說曰葱宜冬月食不可過多損鬚髮
發人虛氣上沖五臟閉絕爲其開骨節出汗之故
也思邈曰正月食生葱令人面上起遊風生葱同
蜜食作下利燒葱同蜜食壅氣殺人張仲景曰生
葱合棗食令人病合犬雞肉食多令人病血時珍
山人服地黃常

主治作湯治傷寒寒熱中風面目浮腫能出汗

經本

傷寒骨肉碎痛喉痹不通安胎歸目益目睛除肝

中邪氣安中利五臟殺百藥毒根治傷寒頭痛

別錄

主天行時疾頭痛熱狂霍亂轉筋及奔豚氣腳氣

心腹痛目眩止心迷悶

大

通關節止衄血利大小

便孟詭治陽明下痢下血

李

達表和裏止血

甯原

除風

溼身痛麻痺蟲積心痛止大人陽脫陰毒腹痛小

兒盤腸內釣婦人妊娠溺血通乳汁散乳癰利耳

鳴塗猘犬傷制蚯蚓毒

時珍

殺一切魚肉毒

良

發明

元素曰葱莖白味辛而甘平氣厚味薄升也陽也入手太陰足陽明經專主發散以通上

下陽氣故活人書治傷寒頭痛如破用連鬚葱白

湯主之張仲景治少陰病下利清穀裏寒外熱厥逆湯加葱白腹中痛者去葱白成無己解之云腎

惡燥急食辛以潤之葱白辛溫以通陽氣也時珍

曰葱乃釋家五葷之一生辛散熟甘溫外實中空肺之菜也肺病宜食之肺主氣外應皮毛其合陽

明故所治之症多屬太陰陽明皆取其發散通氣之功通氣故能解毒及理血病氣者血之帥也氣

通則血活矣金瘡磕損折傷血出疼痛不止者王璆百一方用葱白砂糖等分研封之云痛立止更無痕癩也葱葉亦可用又葱管吹鹽入玉莖內治小便不通及轉脬危急者極有捷效余常用治數人得驗

附方

舊三十二

感冒風寒

初起卽用葱白一握淡豆豉半合泡湯服之取

汗瀕集簡方

傷寒頭痛

如破者連鬚葱白半斤生薑二兩水煮溫服

時疾頭痛

發熱者以連根葱白二十根和米煮粥

活人書

時疾頭痛

入醋少許熱食取汗卽解

濟生祕覽

數種傷寒

初起一二日不能分別者用上法取汗

傷寒勞復

因交接者腹痛卵腫用葱白搗爛苦

酒一盞和服

千金方

風溼身痛生葱搗爛入香油數點水

丹溪心法

妊娠傷寒赤斑變爲黑斑

尿血者以葱白一把水三升煮熱服汁食

葱令盡取汗

傷寒類要

六月孕動困篤難救者葱白一大握水三升煎一升去滓頓服

楊氏胎動下血病痛搶心用葱白煮濃汁飲之

未死卽安已死卽出未效再服

一方加川芎一方用銀器同深師方

卒中惡死或先病或平居寢臥

產乳

一方加川芎一方用銀器同深師方

米煮粥及羹食

奄忽而死皆是中惡急取葱心黃刺入鼻孔中男
左女右入七八寸鼻中血出卽甦○又法用葱刺
入耳中五寸以鼻中血出卽活也如無血出
卽不可治矣相傳此扁鵲祕方也崔氏纂要

小兒

卒死

無故者取葱白納

入下部及兩鼻孔

陳氏經驗方

小兒盤

腸

內釣腹痛用葱湯洗

兒腹仍以炒葱搗貼

陰毒

湯氏嬰孩寶鑑

腹痛

厥逆唇青卵繻六脈欲絕者用葱一束去根

及青留白二寸烘熱安臍上以熨斗火熨之

葱壞則易良久熱氣透入手足溫有汗卽瘥乃服

四逆湯若熨而手足不溫不可治

朱肱南陽活

人脫陽危症

凡人大吐大泄之後四肢厥冷不省

人事或與女子交後小腹腎痛外腎

人病方也

擂縮冷汗出

厥逆須臾不救先以葱白炒熟熨臍

後以葱白三七莖擂爛用酒煮灌之陽氣卽回此

華陀救卒

病方也

卒心急痛

牙關緊閉欲絕以老葱白五

莖去皮鬚搗膏以匙送入喉

中灌以麻油四兩但得下咽卽甦少頃蟲積皆化黃水而下永不再發累得救人瑞竹堂方霍

亂煩躁

坐臥不安葱白二十莖大棗二十枚水三升煎二升分服

深師方

蠍蟲心

痛

用葱莖白二寸鉛粉二錢搗丸服之卽止葱能通氣粉能殺蟲也

楊氏經驗方

腹皮

麻痺

不仁者多煮葱白食之卽自愈

危氏方

小便閉脹

不治殺人葱白三斤剉炒

帕盛

二箇更互熨小腹氣透

許學士本事方

大小便閉

搗葱白和醋封小腹

上仍灸七壯

外臺祕要

大腸虛閉

勻氣散用連鬚葱一根薑一塊鹽一捻淡豉三七粒

搗作餅烘掩臍中

紮定良久氣通

楊氏直指方

小兒虛閉

葱白三根泥

卽通不通再作

煎湯調生蜜阿膠末服仍以葱頭染

蜜插入肛門少頃卽通

全幼心鑑急淋陰腫泥

半斤煨熱杵爛

外臺近根截一寸許安臍中

貼臍上

或有白者以赤根樓葱

本草綱目卷之二十一

霍亂

以艾灸七壯

經驗方

小兒不尿

乃胎熱也用大葱白切四片用乳汁半盞同煎片時

分作四服卽通不飲乳者服之卽飲乳若臍四旁有青黑色及口撮者不可救也

全幼心鑑

腫

毒尿閉

因腫毒未潰小便不通用葱切入麻油煎至黑色去葱取油時塗腫處卽通

普濟

水癰病腫

葱根白皮煮汁服一盞當下水出病已困者取根搗爛坐之取氣水自下

聖

陰囊腫痛

又方用煨葱入鹽杵如泥塗之

小便

溺血

葱白一握鬱金一兩水一升煎

濟方

腸痔有血

葱白一握細切和米煮

三斤煮湯熏洗

二合溫服一日三次

普濟方

赤白下痢

粥日日食之

食醫心

鏡便毒初起

葱白炒熟布包熨數次乃用傅藥卽消。

永類方用葱根和蜜搗傅以紙

密護之外服通氣藥卽愈

癰疽腫硬烏金散治癰疽腫硬無頭

不變色者米粉四兩葱白

一兩同炒黑研末醋調貼一伏時又換以消爲度

外科精義

一切腫毒

葱汁漬之日四

五度乳癰初起

葱汁一升

頓服

並千金

疗瘡惡腫

刺破以老

貼兩時疔出以醋湯

洗之神效

聖濟錄

小兒禿瘡

冷汗洗淨以羊角葱搗泥入蜜和塗

之神效

楊氏刺瘡金瘡

濃汁潰之甚良

金瘡瘀血

者大

葱白二十枚蘇子三升杵碎水九升煮一升半

頓服當吐出膿血而瘻未盡再服

並千金方

血

壅怪病

人偏身忽然肉出如錐

既癰且痛不能飲

食名血壅不速治必潰膿血以赤皮葱燒

灰淋洗飲豉湯數盞自安

夏子益怪病奇方

解金銀毒

葱白煮汁飲之

腦破骨折

蜜和葱白

擣勻厚封立效

肘後方

自縊垂死

葱心刺耳鼻中有血

甦出卽

葉主治煨研傅金瘡水入皺腫鹽研傅蛇蟲傷及

中射工溪毒

日華

主水病足腫

蘇頌

利五臟益目精發

黃疸

邈思

發明

頌曰 煙葱治打撲損見劉禹錫傳信方云得于崔給事取葱新折者燒火煨熱剝皮其閒

有涕便將罨損處仍多煨續續易熱者崔云頭在澤潞與李抱真作判官李相方以毬杖按毬子其

軍將以杖相格因傷李相拇指并爪甲劈裂遽索

金創藥裹之強索酒飲而面色愈青忍痛不止有

軍吏言此方遂用之三易面色卻赤斯須云已不

痛凡十數度用熱葱并涕纏裹其指遂畢席笑語

時珍曰按張氏經驗方云金創折傷血出用葱白

連葉煨熱或鍋烙炒熱擣爛傅之冷卽再易石城

尉戴堯臣試馬損大指血出淋漓余用此方再易

而痛止翌日洗面不見痕跡宋推官鮑縣尹皆得

此方每有殺傷氣未絕者亟令用此活人甚眾又凡人頭目重悶疼痛時珍每用葱葉插入鼻內二三寸並耳內氣通卽便清爽也

附方

舊三

水病足腫

葱莖葉煮湯漬之日三小便

新二

五次妙

韋宙獨行方

腫毒取

不通

葱白

連葉擣爛入蜜合外

瘡傷風水

腫毒取

腫毒取

青葉

青葉

和乾薑黃藥等分煮

湯浸洗立愈

食療

蜘蛛咬瘍

偏身生瘍

青葉

青葉

青葉

一條在內待化

成水取點咬

處卽愈

李絳兵部手集

代指毒痛

取萎黃葱

葉煮汁熱

千金方

汁氣味辛溫滑無毒

主治湯血飲之解藜蘆及桂毒

別錄散瘀血止衄止

吉

痛治頭痛耳聾消痔漏解眾藥毒

時珍能消玉爲水

化五石仙方所用

弘景

發明

時珍曰葱汁卽葱涕功同葱白古方多用葱涎丸藥亦取其通散上焦風氣也勝金方取

汁入酒少許滴鼻中治衄血不止云卽覺血從腦

散下也又唐瑤經驗方以葱汁和蜜少許服之亦

佳云隣媼用此甚效老僕試之亦驗二物同食害人何以能治此疾恐人脾胃不同非甚急不可輕試也慎微曰三洞要錄云葱者菜之伯也能消金

錫玉石

神仙消金玉漿法于冬至日以壺盧盛葱

汁及根埋廷中次年夏至發出盡化爲水以法潰

金玉銀石各三分自消矣暴乾如餡食之可休

糧亦曰金漿也

附方

舊四新一衄血不止

方見金瘡出血

不正取葱炙熱挾汁塗之

卽止

梅師方

火 焰 丹 毒

從頭起者生

痔瘻作痛

葱涎白蜜和塗

之先以木鱉子煎湯熏洗其冷如冰

卽效一

人苦此早閒用之午刻卽安也

唐仲舉方

解鉤

吻毒

面青口噤欲死

涕啖之卽解

以葱千金

鬚

主 治 通 氣

孟

療飽食房勞血滲入大腸便血腸

澼成痔

口乾研末每服二錢溫酒下

時

附 方

舊

喉 中 腫 塞

氣不通者葱鬚陰乾爲末每用

二錢入蒲州膽礬末一錢和勻

每用一字吹

之 杜王方

花

主 治 心 脾 痛 如 錐 刀 刺 腹 脹 用 一 升 同 吳 茄 莴

一 升 水 八 合 煎 七 合 去 淬 分 三 服 立 效

頌○出崔元亮方

實氣味辛大溫無毒主治明目補中氣不足

本經溫

中益精華宜肺歸頭

日華

思邈

附方

舊

眼暗補中

葱子半斤爲末

每取一匙煎湯

一升半去滓入米煮粥食之亦

可爲末蜜丸梧子大食後米湯服

一二十九日三服

食醫心鏡

荳葱

音格千金○

釋名山葱

集解

保昇曰荳葱生山谷不入藥用

頌曰爾雅云

荳山葱也說文云荳葱生山中細莖大葉食

之美於常葱宜入藥用時珍曰

時珍曰荳葱野葱也山

原平地皆有之生沙地者名沙葱生水澤者名水

葱野人皆食之開白花結子如小葱頭世俗不察

胡葱卽蒜

荳葱誤指此爲胡葱詳見胡葱下保昇言

野人皆食之開白花結子如小葱頭世俗不察

胡葱卽蒜荳葱誤指此爲胡葱詳見胡葱下保昇言

野人皆食之開白花結子如小葱頭世俗不察

胡葱卽蒜荳葱誤指此爲胡葱詳見胡葱下保昇言

野人皆食之開白花結子如小葱頭世俗不察

胡葱卽蒜荳葱誤指此爲胡葱詳見胡葱下保昇言

不入藥用蘇頌言入藥宜用山葱胡葱今攷思邈
千金食性自有荳葱功用而諸本失收今採補之

氣味辛微溫無毒

時珍曰佛家以荳葱爲五葷之一見蒜下

主治除瘴

氣惡毒久食強志益膽氣

思邈

主諸惡戴狐尿刺毒

山溪中沙蠱射工等毒煮汁浸或搗傅大效亦兼

小蒜茱萸輩不獨用也

蘇恭

子氣味

同葱

主治洩精

思邈

胡葱

宋開寶

釋名

蒜葱

綱目

回回葱

時珍曰

按孫真人食忌作葫

葱因其根似葫

蒜故也俗稱

回葱似

言其來自胡地

故曰胡葱耳

蒜葱

正合此義

元人飲膳

正要作回

葱

因其根似葫

蒜故也俗稱

回葱似

言其來自胡地

故曰胡葱耳

集解

詵曰胡葱生蜀郡山谷狀似大蒜而小形圓皮赤稍長而銳五月六月採保昇曰葱凡四

種冬葱夏枯漢葱冬枯

胡葱莖葉粗短根若金燈

荳葱生于山谷

頌曰胡葱類荳葱而根莖皆細白

或云根莖微短如金燈或云似大蒜而小皮赤而

銳時珍曰胡葱卽蒜葱也孟詵韓保昇所說是矣

非野葱也野葱名荳葱似葱

而小胡葱乃人種蔥八月下種五月收取葉似葱而小胡葱乃人種蔥

不甚臭江西有水晶葱蒜根葱葉蓋其類也李廷

飛延壽書言胡葱卽藠子蓋因相似而誤爾今俗

皆以野葱爲胡葱因不識

蒜葱故指荳葱爲之謬矣

脩治

數日凡採得依紋擘碎用綠梅子相對拌蒸

伏時去梅子砂盆中研如膏瓦器曬乾用

氣味辛溫無毒

時珍曰生則辛平熟則甘溫詵曰亦是薰物久食傷神損性令人多

忘損目明絕血脈發痼疾患胡臭齶齒人食之

轉甚思邈曰四月勿食葫蘆令人氣喘多驚

治溫中下氣消穀能食殺蟲利五臟不足氣孟詵療

腫毒保昇

發明

時珍曰方術煮溪澗白石爲糧及煮牛馬驢骨令軟皆用胡葱則亦軟堅之物也陶弘景

言葱能化五石消桂爲水則是諸葱皆能軟石故今人採荳葱煮石謂之胡葱也

附方

新

身面浮腫

小便不利喘急用胡葱十莖赤豆三合消石一兩以水五升

煮葱豆至熟同搗成膏每空心溫酒服半匙

聖惠方

子主治中諸肉毒吐血不止萎黃悴者以一升水煮冷服半升日一夜一血定乃止孟詵

薤

音械○別錄中品

釋名

菴子
音叫或作

薤子

音火葱

綱目

菜芝

別錄

鴻薈

音會時珍曰薤本文作虧韭類也故字從韭從虧音槧諧聲也今人因其根白呼爲菴子江南人訛爲莜子其葉類葱而根如蒜收種宜火熏故俗人稱爲火葱羅願云物莫美于芝故薤爲菜芝蘇頌

復附箇子於

蒜條誤矣

集解

別錄曰

薤生魯山平澤

恭曰薤是韭類葉似

美赤者苦而無味

頌曰薤處處有之春秋分時至

冬葉枯爾雅云

山薤也生山中莖葉與家薤相

類而根差長葉差大僅若鹿葱體性亦與家薤同

今人少用宗奭曰

薤葉如金燈葉差狹而更光故

古人言薤露者以其光滑難拭之義

時珍曰薤八

月栽根正月分

莖宜肥壤數枝一本則茂而根大

葱葉狀似韭韭菜中實而扁有劍脊薤葉中空似細

氣亦如葱二月開細花紫白色根如

小蒜一本數顆相依而生五月葉青則掘之否則
內不滿也其根煮食芼酒糟藏醋浸皆宜故內則
云切葱薤實諸醤以柔之白樂天詩云酥暖薤白
酒謂以酥炒薤白投酒中也一種水晶葱葱葉蒜
根與薤相似不臭亦其類也按王禎農書云野薤
俗名天薤生麥原中葉似薤而小味益辛亦可供
食但不多有卽爾雅山薤是也

薤白氣味辛苦溫滑無毒

好古曰入手陽明經頌曰薤宜去青取白白冷

而青熱也說曰發熱病不宜多食三四月勿食生者大明日生食引涕唾不可與牛肉同食令人作痕癥

主治金瘡瘍敗輕身不饑耐老

本經歸骨除寒熱

去水氣腫痛擣塗之錄煮食耐寒調中補不足止久

痢冷瀉肥健人日治洩痢下重能泄下焦陽明氣

華

治洩痢下重者氣滯

滯

李杲好古曰下重者氣滯也四逆散加此以泄氣滯

治少陰病厥逆洩痢

及胸痹刺痛下氣散血安胎

時

心病宜食之利產

婦

邈思

治女人帶下赤白作羹食之骨哽在咽不去

者食之卽下

孟詵

補虛解毒

蘇頌

白者補益赤者療金

瘡及風生臍肉

蘇恭

與蜜同擣塗湯火傷甚速

宗奭溫

補助陽道

時珍

發明

弘景曰薤性溫補仙方及服食家皆須之偏入諸膏用不可生啖葷辛爲忌

詵曰薤白色

者最好雖有辛不葷五臟學道人長服之可通神

安魂魄益氣續筋力頌曰白薤之白性冷而補又

曰葛子煮與蓐婦飲易產亦主腳氣

時珍曰 蕤味辛氣溫諸家言其溫補而蘇頌圖經獨謂其冷補

按杜甫薤詩云 束比青芻色圓齊玉筋頭衰年關膈冷味暖併無憂亦言其溫補與經文相合則冷

補之說蓋不然也又按王禎云薤生則氣辛熟則甘美種之不蠹食之有益故學道人資之老人宜

之然道家以薤爲五葷之一而諸氏言其不葷何耶薛用弱齊諧志云安陸郭坦兄得天行病後遂

能大餐每日食至一斛五年家貧行乞一日大饑至一圍食薤一畦

如龍漸漸縮小有人撮飯於上卽消成水而病尋瘳也按此亦薤散結蒜消癥之驗也

宗奭曰薤葉光滑露亦難竚千金治肺氣喘急方中用之亦取其滑泄之義

附 方

舊十五

胸 痹 刺 痛

張仲景栝樓薤白湯治胸

氣喉中燥癢寸脈沉遲關脈弦數不治殺人用栝樓實一枚薤白半升白酒七升煮二升分二服

千金治胸痹半夏薤白湯用薤白四兩半夏一合枳實半兩生薑一兩桔梗半枚㕮咀以白芍漿

三升煮一升溫服日三○肘後治胸痛瘥而復發薤根五升擣汁飲之立瘥○載音在醉漿也

中惡死卒死或先病或平居寢臥奄忽而死皆霍

亂乾嘔不止者以薤一虎口以水三升煮取一

半頓服不過三作卽已韋宙獨行方奔豚氣痛

薤白擣汁飲

肘後方赤痢不止

薤同黃蘖煮汁

赤

白痢下薤白一握同米煮粥日食之食醫心鏡小兒疳痢薤白生擣

米粉和蜜作餅炙熟與食不過三兩服楊氏產乳

產後諸痢多煮薤白食

仍以羊腎脂

同炒食之范汪方妊娠胎動腹內冷痛薤白一升當歸四

兩水五升煮二升分二服

古今錄驗鬱肉脯毒杵薤汁服之三升良葛洪方瘡犯惡露甚者殺人薤白

擣爛以帛裹煨熟去帛傅之冷卽易換亦可擣作

餅以艾灸之熱氣入瘡水出卽瘥也 梅師方

手指赤色

隨月生死以生薤一把熟擣爛塗之愈乃止

肘後方

疥瘡痛

癩

煮薤葉擣爛塗之

同上

灸瘡腫痛

薤白一升

豬脂一斤切

以苦酒浸一宿

微火煎

塗三上三下

去滓梅師方

上去滓

手足癰瘡

生薤一把

以熱醋投

入

千金

毒蛇蟹傷

薤白擣傅

徐玉方虎犬咬傷

薤白擣汁

飲之并

止洪方

葛諸魚骨哽

薤白嚼柔

以繩繫中到

咽處引之卽

出同上

誤吞

釵鑲

取薤白曝萎煮熟

切食一

哽處引之卽出

葛洪方

目中風翳

作痛取

薤根醋擣傅

腫處

斷安膜復爲之

范汪方咽喉腫痛

冷卽易之

咽喉腫痛

冷卽易之

聖惠

附錄

蓼蕎拾遺藏器

曰味辛溫無毒

主霍亂腹冷

腹氣攻擊腹滿

不調產後血攻胸

冷氣攻擊腹滿

不調產後血攻胸

冷氣攻擊腹滿

膈刺痛煮服之生平澤其苗如葱韭時珍曰此亦山薤之類方名不同耳

蒜

別錄下品

釋名

小蒜

別錄

茆蒜

音卯

葷菜

時珍曰

蒜字從蒜音蒜

諧聲也又象蒜根之形

謂之葷菜

謂之大蒜

中國初惟有此後因漢人得葫蒜於西域遂呼此爲小蒜以別之故伏侯古今注云蒜茆蒜也俗謂之小蒜胡國有蒜十子一株名曰胡蒜俗謂之葷葷卽五辛謂其辛臭昏神伐性也鍊形家以小蒜大蔥韭芸薹胡荽爲五葷佛家以大蒜小蒜興渠阿魏也雖各不同然皆辛熏之物生食增恚熟食發姪有損性霧故絕之也

集解

別錄

蒜生葉時可煮和食

五月五月採之

宏景曰小

蒜也五月五日採之

蒜葉枯取根名薑

子正爾噉之亦甚熏臭保昇曰小蒜野生處處有
葫而細數倍也爾雅云葫山蒜也說文云蒜
也菜之美者雲夢之葷生山中者名葫頤曰本草
謂大蒜爲葫小蒜爲蒜而說文所謂葷菜者乃大
蒜也葷卽小蒜也書傳載物之別名不同如此用
藥不可不審宗奭曰小蒜卽葫也苗如葱鍼根白
莖俱大而瓣多辛而帶甘者葫也大蒜也按孫炎
大者如烏芋子兼根煮食謂之宅蒜時珍曰家蒜
有二種根莖俱小而瓣少粹甚者蒜也小蒜也根
爾雅正義云帝登葷山遭蕷芋毒將死得蒜鬻食
乃解遂收植之能殺腥羶蟲魚之毒又孫愐唐韻
云張騫使西域始得大蒜種歸據此則小蒜之種
自葷移栽從古已有故爾雅以葷爲山蒜所以別
家蒜也大蒜之種自胡地移來至漢始有故別錄
云一吳人調鼎多用此根作薑更勝葱韭也按此
以葫爲大蒜所以見中國之蒜小也又王禎農書
種之澤蒜最易滋蔓隨處隨熟時採子漫散

正別錄所謂小蒜是也其始自野澤移來故有澤
名而寇氏誤作宅字矣諸家皆以野生山蒜澤蒜
解家蒔之小蒜皆失於詳攷小蒜雖出於薦既
經人力栽培則性氣不能不移故不得不辨

蒜

小蒜根也

氣味辛溫有小毒

弘景曰味辛性熱損人

不可長食思邈曰無毒

三月勿久食傷人志性黃帝書云同生魚食令人
奪氣陰核疼瑞曰腳氣風病人及時病後忌食之

主治

歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃溫中除

邪痹毒氣

別錄

主溪毒

弘景

下氣治蠱毒傅蛇蟲沙虱

瘡

日華恭曰此蒜與胡葱相得主惡載毒山

溪中沙虱水毒大效山人狸獵時用之

弘景

塗疗

腫甚良

孟詭

葉主治心煩痛解諸毒小兒丹疹

思邈

發明

頌曰古方多用小蒜治中冷霍亂者汁飲之
南齊褚澄治李道念雞瘕便瘻宗奭曰華陀

用蒜蠶卽此蒜也時珍曰按李延壽南史云李道
念病已五年丞相褚澄診之曰非冷非熱當是食
白鯉雞子過多也取蒜一升煮食吐出一物涎裏
視之乃雞鱉翅足俱全澄曰未盡也更吐之凡十
二枚而愈或以蒜字作蘇字者誤矣范曄後漢書
云華陀見一人病噎食不得下令取餅店家蒜蠶
大可二升飲之立吐一蛇病者縣蛇于車造陀家
見壁北縣蛇數十乃知其奇又夏子益奇疾方云
人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠶也
用蒜汁半兩和酒服之當吐出如蛇狀觀三書所
載則蒜乃吐蠶要藥而後人鮮有知者

附方

舊七

時氣溫病

初得頭痛壯熱脈大卽以小蒜一升杵汁三合頓服不過

再作便瘻

霍亂脹滿

不得吐下名乾霍亂小蒜一升水三升煮一升頓服

肘後方

升

肘一

後方霍亂轉筋

入腹殺人以小蒜鹽各一兩擣傅臍中灸七壯立止

聖濟錄積年

心痛

不可忍不拘十年五年者隨手見效濃汁煮小蒜食飽勿着鹽曾用之有效再不發也

兵部手集

水毒中人

一名中溪一名中溼一名水病似

日則生蟲食下不癢不痛

大熱即無力以浴身若身發赤斑

旦醒暮劇

手足逆冷三日則生蟲食下不癢不痛

過六七日蟲食五臟注下不禁以小蒜三升煮微

熱大熱卽無力以浴身若身發赤斑

文者毋以他病治之也

肘後方

射工中人

瘡成

者取蒜切片貼瘡

千金

止截瘻疾

小蒜不拘多少研泥入黃丹少許丸如芡

汗出者小蒜一升韭根一升楊

子大每服一丸

面東新唐慎微

陰腫如刺

汗出者小蒜一升韭根一升楊

升韭根一升楊

汲水下至妙

永類方

惡核腫結

小蒜吳茱萸等分擣傅卽散

葛氏

柳根二斤酒

乘熱熏之

水三升煎沸

汗出者小蒜一升韭根一升楊

升韭根一升楊

附後五色丹毒

無常及發足踝者杵

葛氏

小兒白禿

頭上團團

附後

五色丹毒

蒜厚傳頻易

葛氏

小兒白禿

頭上團團

白色以蒜切日揩子母祕錄蛇蠍蟬人小蒜搗汁服以

之良方

之良方

小蒜傳之

肘後

蜈蚣

咬瘡

嚼小

蒜塗之

肘後方

小蒜洗淨

搗汁滴之

未出再滴李絳兵

山

蒜

拾

部集手

釋名

蒼

音歷澤蒜

集解

頌曰

江南一
種山蒜似大
蒜而臭

藏器曰澤

蒜根如小蒜

葉如韭又生石閒者名石蒜與

蒜無異時珍曰山蒜澤蒜石蒜同一物也但分生

于山澤石閒不同耳人閒栽時小蒜始自三種移

成故猶有澤蒜之稱爾雅云蒼山蒜也今京口有

蒜山產蒜是也處處有之不獨江南又呂忱字林

蒜

山產蒜

是也處處有之

不獨江南又呂忱字林

蒜山產蒜是也處處有之不獨江南又呂忱字林

蒜山產蒜是也處處有之不獨江南又呂忱字林

蒜山產蒜是也處處有之不獨江南又呂忱字林

蒜山產蒜是也處處有之不獨江南又呂忱字林

蒜山產蒜是也處處有之不獨江南又呂忱字林

蒜山產蒜是也處處有之不獨江南又呂忱字林

蒜

山中蒜也則蒜不但產于山而又產于水也

別有山慈姑水仙花老鴉蒜石蒜之類根葉皆似

蒜而不可食其花
亦異並見草部下

氣味辛溫無毒

主治山蒜治積塊及婦人血痕用苦醋磨傅多效

蘇頌

澤蒜石蒜並溫補下氣滑水源

藏器

葫

別錄下品

釋名大蒜

弘景

葷菜

弘景曰

今人謂葫爲

大蒜蒜爲

小蒜以其氣類相似也

時珍曰

其氣類相似也

時珍曰

其氣類相似也

時珍曰

其氣類相似也

時珍曰

其氣類相似也

時珍曰

其氣類相似也

按孫愐

唐韻云

張騫使

西域始得

大蒜葫蘆則小

蒜乃中土舊有

而大蒜出

胡地故有

胡名二蒜皆

屬五葷故通可

稱葷詳見

蒜下

集解

別錄曰

蒜大蒜也

五月五日採獨子者入藥

尤佳保昇曰

葫出梁州者

大徑二寸最羨少

辛涇陽者皮亦甚粹頌曰今處處園圃種之每顆
六七瓣初種一瓣當年便成獨子葫至明年則復
其本矣其花中有實亦作葫瓣狀而極小亦可種
之時珍曰大小二蒜皆八月種春食苗夏初食薹
五月食根秋月收種北人不可一日無者也

氣味辛溫有毒久食損人目

弘景曰性最熏臭不可食俗人作薹以噉

鱠肉損性伐命莫此之甚惟可生食不中煮也恭
曰此物煮羹臘爲饌中之俊而陶云不中煮當是
未經試耳藏器曰初食不利目多食卻明久食令
人血清使毛髮白時珍曰久食傷肝損眼故稽康
養生論云葷辛害目此爲甚耳今北人嗜蒜宿炕
故盲瞽最多陳氏乃云多食明日與別錄相左何
耶震亨曰大蒜屬火性熱喜散快膈善化內暑月
人多食之傷氣之禍積久自見養生者忌之化肉
之功不足論也頌曰多食傷肺傷脾傷肝膽生痰
助火昏神思邈曰四月八月食葫傷神令人喘悸

口味多爽多食生葫行房傷肝氣令人面無色生
葫合青魚鮓食令人腹內生瘡腸中腫又成痴瘕

發黃疾合蜜食殺人凡

服一切補藥不可食之主治歸五臟散癰腫瘡瘍

除風邪殺毒氣錄別下氣消穀化肉

恭去水惡瘴氣蘇

除風溼破冷氣爛痃癖伏邪惡宣通溫補療瘡癬

殺鬼去痛

藏器

健脾胃治腎氣止霍亂轉筋腹痛除

邪祟解溫疫療勞瘧冷風傳風損冷痛惡瘡蛇蟲

蠱毒溪毒沙蟲並擣貼之熟醋浸經年者良

日華溫

水擣爛服治中暑不醒擣貼足心止鼻衄不止和

豆豉丸服治暴下血通水道

宗

擣汁飲治吐血心

痛煮汁飲治角弓反張同鯽魚丸治膈氣同蛤粉丸治水腫同黃丹丸治痢瘧孕痢同乳香丸治腹痛擣膏敷臍能達下焦消水利大小便貼足心能引熱下行治泄瀉暴痢及乾溼霍亂止衄血納肛中能通幽門治關格不通

時珍曰

發明

宗奭曰 葫蘆氣極葷置臭肉中反能掩臭 凡中暑毒人 爛嚼三兩瓣溫水送之下咽卽知但

禁飲冷水又鼻衄不止者擣貼足心衄止卽拭去

時珍曰 葫蘆入太陰陽明其氣薰烈能通五臟達

諸竅去寒溼辟邪惡消癰腫化癥積肉食此其功

也故王禎稱之云味久不變可以資生可以致遠

化臭腐爲神奇調鼎俎代醯醬攜之旅塗則炎風

瘴雨不能加食餌腊毒不能害夏月食之解暑氣

北方食肉麪尤不可無乃食經之上品日用之多助者也蓋不知其辛能散氣熱能助火傷肺損目血一晝夜不止諸治不効時珍令以蒜傅足心卽時血止真奇方也又葉石林避暑錄云一僕暑月馳馬忽仆地欲絕同舍王相教用大蒜及道上熱土各一握研爛以新汲水一瓊和取汁抉齒灌之少頃卽甦相傳徐州市門忽有版書此方咸以爲神仙救人云藏器曰昔有患瘻癬者夢人教每日食大蒜三顆初服遂至暝眩吐逆下部如火後有人教取數片合皮截卻兩頭吞之名曰內灸果獲大效也頌曰經言葫散癰腫按李絳兵部手集方人云毒瘡腫毒號叫臥眠不得人不能別者取獨頭蒜兩顆搗爛麻油和厚傅瘡上乾卽易之屢用救人無不神效盧坦侍郎肩上瘡作連心痛悶用此便瘥又李僕射患腦癰久不瘥盧與此方亦瘥又葛洪肘後方云凡背腫取獨顆蒜橫截一分安腫頭上炷艾梧子大灸蒜百壯不覺漸消多灸爲

善勿令大熱若覺痛卽掀起蒜蒜焦更換新者勿
令損皮肉洪嘗苦小腹下患一大腫灸之亦瘥每
用灸人無不應效又江寧府紫極官刻石記其事
但云是發背及癰疽惡瘡腫核初起有異皆可灸
之不計壯數惟要痛者灸至不痛不痛者灸至痛
極而止疣贅之類灸之亦便成痂自脫其効如神
乃知方書無空言者但人不能以意詳審則不得
盡應耳時珍曰按李迅論蒜錢灸法云癰疽之發
着灸勝于用藥緣熱毒中鬲上下不通必得毒氣
發洩然後解散凡初發一日之內便用大獨頭蒜
切如小錢厚貼項上灸之三壯一易大槧以百壯
爲率一使瘡不開大二使內肉不壞三瘡口易合
一舉而三得之但頭及項以上切不可用此恐引
氣上更生大禍也又史源記蒜灸之功云母氏背
脾作癢有赤暉半寸白粒如黍灸二七壯其赤隨
消信宿有赤流下長二寸舉家歸咎于灸外醫用
膏護之日增一暉二十二日橫斜約六七寸痛楚
不勝或言一尼病此得灸而愈予奔問之尼云劇

時昏不知人但聞范奉議坐守灸八百餘壯方甦
乃灸四旁赤處皆痛每一壯燼則赤隨縮入三十
餘壯赤暉收退蓋灸遲則初發處肉已壞故不痛
直待灸到好肉方痛也至夜則火熾滿背瘡高阜
而熱夜得安寢矣至曉如覆一甌高三寸上有
百數小竅色正黑調理而安蓋高阜者毒外出也
小竅多毒不聚也色正黑皮肉壞也非艾火出其
毒於壞肉之裏則內逼五臟而危矣

附 方

舊十六新

背瘡灸法

凡覺背上腫硬疼痛用溼紙貼尋瘡頭用大蒜

片作圈圍定填藥于內二分厚着艾灸之痛灸至
十顆淡豉半合乳香一錢細研隨瘡頭大小用竹
片瘻瘻灸至痛以百壯爲率與
蒜錢灸法同功 外科精要 痘瘍惡毒 用門臼灰
汁再擦少頃卽消散也雖發背癰腫亦可擦之
以獨蒜頭或新蒜染灰擦瘡口候瘡自然出少
汗

色丹毒

無常色及發足踝者搗蒜厚傳乾卽易之

關格脹滿

大便不通

獨頭蒜燒熟去皮綿裏納下部氣立通也

乾溼霍亂

蒜搗塗足

心立愈

水氣腫滿

大蒜田螺車前子等分熬膏攤貼臍中水從便漩而下數

永類鈴方

山嵐瘴氣

蒜各熟一大片共食之少頃腹鳴或吐血或

日卽愈象山民人患水腫一卜者傳此用之有效

瘧疾寒熱

仇遠碑史山嵐瘴氣生熟大便泄卽愈攝生妙用方

炭上燒之酒服方寸七

瘧疾寒熱

獨頭蒜研末用桃仁半片放內關穴上將獨蒜搗爛罨之縛住男左女右卽止隣

嫗用此治人屢效○普濟方端午日取獨頭蒜

寒瘞冷痢

熟入礬紅等分搗丸芡子大每白湯嚼下一丸梧子大每服九丸長流水下甚妙

端午日以獨頭蒜十箇黃丹二錢搗丸

方泄瀉暴痢

大蒜搗貼兩足心亦及小兒泄

濟方可貼臍中

下痢禁口

大蒜搗貼兩足心亦及小兒泄

痢方並腸毒下血

蒜連丸用獨蒜煨搗和黃連末同上

爲丸日日米湯服之濟生方

暴下血病

用葫蒜五七枚去皮研膏入豆豉搗丸梧子大每米飲下五六十九無不愈者

鼻血不止

草衍義本
左鼻血出貼左足心右鼻血出貼右足心如泥作錢大餅子厚一豆許藥不應用蒜一枚去皮研兩鼻俱出俱貼之立瘥簡要濟眾方

痛

生蒜搣汁服二升卽愈

肘後

鬼疰腹痛

法醋浸至二三年

一枚香墨如棗大搗和

醬汁

一合頓服

永類鈴方

心腹冷痛

至數顆其效如神

李

時珍瀕湖

夜啼腹痛

面青冷證也

用大蒜一枚煨

研日乾乳香五分搗丸芥子

李

大下

每服七丸乳汁

危氏得效方

寒溼氣痛

粉搗塗之

唐瑤經

驗方

鬼毒風氣

獨頭蒜一枚和雄黃杏仁研爲丸空腹飲下三丸

靜坐少時當下毛出即

安

食療

本草

狗咽氣塞

喘息不通須臾欲絕用獨頭

蒜二枚削去兩頭塞鼻中左

患塞右右患塞左候口

中膿血出立效

聖惠

喉痹腫痛

大蒜塞耳鼻中

日二易之時

後方

魚骨哽咽

獨頭蒜塞鼻中自

處轉易之亦主

蟲痛外臺祕要

十便良方

眉毛動搖

目不能交睫喚之

不應但能飲食用

獨頭蒜

煨熟切

足貼

心摘

腦瀉鼻淵

大蒜切片貼

足

心取效止

摘

方玄

頭風苦痛

易簡方

用大蒜研汁

噙鼻中○

聖濟

逐箇于地上磨成膏子

以殭蠶一兩去頭足安

蒜上碗覆一夜勿令透氣

只取蠶研末

入鼻中

以蒜

獨頭蒜切片

噙鼻中

以艾

安臍上

以艾

安臍上

水甚效

小兒驚風

總錄方

同上

小兒臍風

獨頭蒜切片

安臍上

以艾

安臍上

以艾

安臍上

以艾

安臍上

以艾

安臍上

以艾

安臍上

以艾

止炎之口

中又有蒜氣卽

黎居士簡易方

小兒氣淋

宋憲宗爲郡王時

病淋日夜凡三百

日中含

中含

起國醫罔措或舉孫琳治之琳用大蒜淡豆豉蒸餅三物搗丸令以溫水下三十丸曰今日進三服病當減三之一明日亦然三日病除已而果然賜以千緡或問其說琳曰小兒何緣有淋只是水道

不利三物皆能通利故也

愛竹翁談數

產後中風角弓反張不語用

大蒜三十瓣以水

三升煮一升灌之卽甦

張傑子母祕錄

金瘡中風角弓反張取蒜一

升去心無灰酒四

升煮極爛并滓服之須臾得汗卽瘥

外臺祕要

婦人陰腫作瘡蒜湯洗

升去心無灰酒四

永類鈐方陰汗作癢

大蒜淡豉搗丸梧子大硃砂爲

衣每空腹燈心湯下三十丸

爲

便淋瀝或有或無用大蒜一箇紙包煙熟露

一夜空心新水送下

朱氏集驗方

小兒

白秃團圓切蒜日

閉口椒毒食之

氣閉欲絕者煮蒜

張仲景方

射工溪毒獨頭蒜切三分厚貼上灸之

梅師方

蜈蠍蟹傷

射工溪毒獨頭蒜切三分厚貼上灸之

梅師方

獨頭蒜摩之蛇虺蟄傷孟說曰卽時嚼蒜封之六卽止

梅師七易仍以蒜一升去皮以

升搗細小便一升煮三四沸浸損處○梅師用獨

頭蒜酸草搗以冷水食一瓣攝生方

絞傅咬處

腳肚轉筋大蒜擦足心令熱卽安仍

食蟹中毒乾蒜煮汁飲

之集驗方蛇瘕面光發熟如火炙人

安如蛇狀卽危氏方

五辛菜

拾遺

集解

時珍曰五辛菜乃元旦立春以葱蒜韭蓼蒿

芥辛嫩之菜雜和食之取迎新之義謂之五

辛盤杜甫詩所謂春日春盤細生菜是矣

氣味

辛溫無毒

時珍曰熱病後食多損目

主治歲朝食之助發

五臟氣常食溫中去惡氣消食下氣

藏器

蕷薹

唐本草

釋名寒菜

胡居士方

胡菜

同上

薹菜

埤雅

薹芥

沛志

油菜

綱目

珍曰此菜易起薹須採其薹食則分枝必多故名

蕷薹而淮人謂之薹芥卽今油菜爲其子可榨油

也羌隴氏胡其地苦寒冬月多種此菜能歷霜雪

種自胡來故服虔通俗文謂之胡菜而胡洽居士

百病方謂之寒菜皆取此義也或云塞

外有地名雲臺始種此菜故名亦通

恭曰別錄云薹乃人間所噉菜也

宗炳曰

薹乃人間所噉菜也

宗炳曰

薹乃人間所噉菜也

宗炳曰

薹乃人間所噉菜也

宗炳曰

薹乃人間所噉菜也

集解

恭曰

薹不甚香

經冬根不死

辟蠹於諸

菜中亦

多用諸家註

亦不明令

人不甚佳時珍曰

薹方藥多用

諸家註

亦不明令

則老不可食

生葉形色

微似白菜

冬春採薹心爲茹

三月收子亦

則老不可食

開小黃花四瓣

如芥花結莢

收子亦

則老不可食

生葉形色

微似白菜

冬春採薹心爲茹

三月收子亦

如芥子灰赤色炒過榨油黃色燃燈甚明食之不及麻油近人因有油利種者亦廣云

莖葉氣味辛溫無毒

大明日涼別錄曰春月食之能發膝痼疾說曰先患腰腳

者不可多食食之加劇又損陽氣發瘡及口齒病胡臭人不可食又能生腹中諸蟲道家特忌以爲五葷之一主治風遊丹腫乳癰唐本草開治

產後血風及瘀血

日華

煮食治腰腳痺搗葉傅女人

吹嫋器治療疽豌豆瘡散血消腫伏蓬砂

時珍

發明

藏器曰薑薹破血故產婦宜食之馬志曰今俗方言病人得喫薑薹是宜血病也思邈曰

貞觀七年三月予在內江縣飲多至夜覺四體骨肉疼痛至曉頭痛額角有丹如彈丸腫痛至午通

腫目不能開經日幾斃予思本草薑薹治風遊丹腫遂取葉搗傅隨手卽消其驗如神也亦可搗汁

服

附方

新八

赤火丹毒

方見上

天火熱瘡

初起似癰漸如水泡似火燒瘡

赤色急速能殺人

雲薹葉搗汁調大

黃芒消生鐵衣等分塗之

近效方

風熱腫毒

薹葉搗汁調大

苗葉根蔓菁根各三兩爲末

以雞子清

消無蔓菁卽以商陸根代之

甚効也

近効方

手足癰疽

此疽喜着手足肩背纍纍如赤豆剝之

汁出用薹葉煮汁服一升并食乾熟

千金方

異疽似癰

而小有異膿如小豆汁今日去

菜數頓少與鹽醬

冬月

千金方

異疽似癰

而小有異膿如小豆汁今日去

千金方

異疽似癰

而小有異膿如小豆汁今日去

明日滿用薹葉搗熟布袋盛於熱灰中

更互熨之不過三二度

無葉用乾者

千金方

異疽似癰

而小有異膿如小豆汁今日去

斑瘡

薹葉煎湯洗

外臺祕要

血痢腹痛

日夜不止以薹葉搗汁二合入蜜

水泡似火燒瘡

日夜不止以薹葉搗汁二合入蜜

水泡似火燒瘡

日夜不止以薹葉搗汁二合入蜜

一合溫服

聖惠方

腸風下血

同

子氣味辛溫無毒主治夢中洩精與鬼交思取油

傅頭令髮長黑

藏器

行滯血破冷氣消腫散結治產

難產後心腹諸疾赤丹熱腫金瘡血痔

時珍

發明時珍曰薺薹菜子葉同功其味辛氣溫能溫散結治產後一切心腹氣血痛諸遊風丹毒熱腫瘡痔諸藥咸用之經水行後加入四物湯服之云能斷產又治小兒驚風貼其項頸則引氣上出也婦人方治產難歌云黃金花結粟米實細研酒下十五粒靈丹功效妙如神難產之時能救急

附方

新十

薺薹散

治產後惡露不下

血結衝心刺

痛將來纔遇冒寒踏冷其血必

往來心腹閒刺痛不可忍謂之血母并治產後心腹諸疾產後三日不可無此用薺薹子炒當歸桂

心赤芍藥等分每酒服二

錢趕下惡物

楊氏產乳

黃等分爲末

每服三錢薑七片酒水各半

蓋童便半溫隱居海上方

補血破氣

蓋煎七分溫服卽甦

溫隱居海上方

追氣丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可常服

血虛破氣塊甚効用薑

薑子微炒桂心各一兩高

良薑半兩爲末醋糊丸梧子大每

淡醋湯下五丸

沈存中靈苑方

腸風臘毒

下血

子生用甘草炙爲末每服

二錢水煎服之

普濟方頭風作痛

大黃三分爲

鼻末

喑風熱牙痛

薑

薑臺子白芥子角茴香等分爲

小

兒天鈞

薑臺子

生烏頭去皮尖各二錢爲

末每用

風瘡不愈

陳菜子油同穿山甲末熬成

膏塗之卽愈

攝生眾妙方

熱癰腫毒

薑臺子狗頭骨等分爲

未金方傷損接骨

黃米炒二合龍

末醋和傅之

骨少許爲末醋調成膏攤紙上貼之

乾坤祕韞

湯火傷灼

菜子油調蚯蚓屎搽之

楊起簡

蜈蚣蟹傷

菜子油傾地上擦地上油摻之卽好勿令四眼人見

德堂方

螃蟹

陸氏積

菘別錄

上品

釋名白菜

時珍曰按陸佃埤雅云菘性凌冬晚凋四時常見有松之操故曰菘今俗謂之

白菜其色白其味也

集解

弘景曰菘有數種猶是一類止論其美與不美菜中最爲常食

種猶是一類止論其美與不美

美菜中最爲常食

宗奭曰菘葉如蕪菁綠色

差淡其味微苦葉嫩稍闊

頌曰揚州一種菘葉圓

而大或若筭啖之無渣絕勝他土者疑卽牛肚菘

也時珍曰菘卽今人呼爲白菜者有二種一種莖

圓厚微青一種莖扁薄而白其葉皆淡青白色

燕

趙遼陽揚州所種者最肥大而厚一本有重十餘斤者南方之菘畦內過冬北方者多入窖內燕京圃人又以馬糞入窖壅培不見風日長出苗葉皆嫩黃色脆美無滓謂之黃芽菜豪貴以爲嘉品蓋亦倣韭黃之法也菘子如蕷薹子而色灰黑八月以後種之二月開黃花如芥花四瓣三月結角亦如芥其菜作菹食尤良不宜蒸曬

正誤

恭曰

菘有三種牛肚菘葉最大厚味甘紫菘葉薄細味少苦白菘似蔓菁也菘菜不生北

土有人將子北種初一年卽半爲蕷薹二年菘種都絕將蕷薹子南種亦二年都變土地所宜如此頌曰菘南北皆有之與蔓菁相類梗長葉不光者爲蕷薹梗短葉闊厚而肥腴者爲菘舊說北土無菘今京洛種菘都類南種但肥厚差不及爾機曰蔓菁菘菜恐是一種但在南土葉高而大者爲菘秋冬有之在北土葉短而小者爲蔓菁春夏有之時珍曰白菘卽白菜也牛肚菘卽最肥大者紫

菘卽蘆菔也開紫花故曰紫菘蘇恭謂白菘似蔓
菁者誤矣根葉俱不同而白菘根堅小不可食又
言南北變種者蓋指蔓菁紫菘而言紫菘根似蔓
菁而葉不同種類亦別又言北土無菘者自唐以
前或然近則白菘紫菘南北通有惟南土不種蔓
菁種之亦易生也蘇頌漫爲兩可之言汪機妄起
臆斷之辨俱屬謬誤今悉正之

莖葉氣味甘溫無毒

大明日涼微毒多食發皮膚風癩癩

說曰發風冷內虛人

不可食有熱人食亦不發病性冷可知本草言性
溫未解其意弘景曰性和利人多食似小冷張仲
景言藥中有甘草食菘卽令病不除也頌曰有小
毒不可食多多則以生薑解之瑞曰夏至前食發
氣動疾有足疾者忌之時珍曰氣虛胃冷人多食惡
心吐沫氣壯人則相宜

主治通利

腸胃除胸中煩解酒渴

別錄消食下氣治癰氣止熱

氣嗽冬汁尤佳

蕭炳

和中利大小便

甯源

附方

舊一
新二

小兒赤遊

行於上下至心卽死
菘菜搗傳之卽止

張傑子母祕錄

漆毒生瘡

白菘菜搗爛塗之

飛絲入目

白菜揉爛帕包滴汁三二點入目卽

出濟方

普子

氣味秀音弘景

甘平無毒主治作油塗頭長髮塗

刀劍不鎬

音秀弘景

附方

舊一

酒醉不醒

菘菜子二合細研井華水
一盞調爲二服

聖惠方

芥

別錄上品

釋名

時珍曰按王安石字說云芥者界也發汗散氣界我者也王禎農書云其氣味辛烈菜中

之介然者食之有剛象故字從介

集解

弘景曰芥似菘而有毛味辛辣可生食及作菹其子可以藏冬瓜又有茛音卽作菹甚辛辣

芥有三種葉大子麤者葉可食子入藥用葉小子細者葉不堪食子但作薹又有白芥子粗大白色如白粱米甚辛美從西戎來頌曰芥處處有之有青芥似菘有毛味極粹紫芥莖葉純紫可愛作薹最美有白芥見本條其餘南芥旋芥花芥石芥之類皆菜茹之美者不能悉錄大抵南土多芥相傳嶺南無蕪菁有人攜種至彼種之皆變作芥地氣使然耳時珍曰芥有數種青芥又名刺芥似白菘有柔毛有大芥亦名皺葉芥大葉皺紋色尤深綠味更辛粹二芥宜入藥用有馬芥葉如青芥有蘇花芥葉多缺刻如蘿蔔英有紫芥莖葉皆紫如蘇有石芥低小皆以八九月下種冬月食者俗呼臘嫩薹春月食者俗呼春菜四月食者謂之夏芥芥心嫩薹謂之芥藍淪食脆美其花三月開黃色四出結莢一二寸子大如蘇子而色紫味辛研末泡過爲芥醬以侑肉食辛香可愛劉恂嶺南異物志云

南土芥高五六尺子大如雞子此又芥之異者也

莖葉氣味辛溫無毒

說曰煮食動氣與風生食發丹石不可多食大葉者良細

葉有毛者害人

甯源曰有瘡瘍痔疾便血者忌之

思邈曰同兔肉食成惡邪病同鯽魚食發水腫

主治歸鼻除腎經邪氣利九竅明耳目安中久食

溫中

別錄

止欬嗽上氣除冷氣

華日

主欬逆下氣去頭

面風

孟洗

通肺豁痰利膈開胃

時珍

發明

時珍曰

芥性辛熱而散故能通肺開胃利氣

華日

人眼目發人瘡痔而別錄謂其能明

肝木受病目者蓋知暫時之快而不

知積久之害也素問

云辛走氣病無多食辛多則肉胝而唇揭此類

是矣陸佃云望梅生津食芥墮淚五液之自外至

云辛走氣病無多食辛多則肉胝而唇揭此類

是矣陸佃云望梅生津食芥墮淚五液之自外至

也慕而涎垂媿而汗
出五液之自內生也

附方

新

牙齦腫爛

出臭水者

芥菜稈燒

研末

頻傅之

卽愈

飛絲入

目

青菜

汁點之

摘玄方

如

漆瘡搔癢

芥菜煎湯洗

千金方

痔瘡腫

痛

芥葉搗餅

頻坐之

談

埶翁

經效方

子氣味

辛熱無毒

時珍曰

多食昏目

動火泄氣傷精

弘景

症氣發無常處

及射工毒

主治

歸鼻去

一切邪惡症氣喉痹

蘇恭

治風毒腫

丸服之

及麻痺醋研傅之

撲損瘀血腰痛腎冷和生薑研

塗貼之

又治心痛酒調服之

華研末作醬食香美

塗貼之

日華

研末作醬食香美

通利五臟

孟說

研末水調塗項顙止衄血

吳瑞

溫中散

寒豁痰利竅治胃寒吐食肺寒欬嗽風冷氣痛口

噤唇緊消散癰腫瘀血

時珍

血癰腫痛癆之邪其性熱而溫中故又能利九竅通經絡治口噤耳聾鼻衄之證消瘀痰治嗽止吐主心腹諸痛白芥子辛烈更甚治病尤良見

後本條

附方

舊五新十八

感寒無汗

水調芥子末填臍內以熱物隔衣熨之取汗出妙。

楊起箭便單方

身體麻木

芥菜子末

濟生秘覽

中風口噤

縮者用芥菜子一升研入醋

煎一升傅領頰下效

聖惠方

升

小兒唇緊

用馬

搗汁

濃搗破頻塗

喉痹腫痛

芥子末水和傅喉下乾卽易之○又

之

崔氏纂要方

喉內待喉內

鳴卻用陳麻骨燒烟吸人立愈

並聖惠方

耳卒

用

幹芥子研末

醋調取汁點入喉

乾卽易之○又

用

幹芥子研末

醋調取汁點入喉

乾卽易之○又

聾閉

芥子末裹塞之

人乳汁外臺祕要

和以綿

真紫芥菜子炒黑爲

末用

羊肝一具

分作八服每用芥末三錢

捻肝目

上筍籜裏

定煮熟冷食

以汁送下

聖濟總錄

目

中翳膜

芥子一粒輕手捲入眼中少頃

孫氏集效方

總錄

以井華水雞子清洗之

中生薑自然

眉毛不生

芥

菜子半夏等分

爲末生薑自然

研末絹袋盛入三斗酒中七

升

汁

調搽數次卽生

孫氏集效方

鬼疰勞氣

芥子

研末

絹袋盛入三

斗酒中七升

廣濟方

方見霍亂

日溫服

一日三次

廣濟方

熱痰煩運

白芥子

吐瀉

芥子搗細水和傅

聖濟總錄

反胃吐食

芥子末酒服方寸匕日三服

干金

上氣嘔吐

芥子末蜜丸梧子大井華水寅時下七丸申時再服

千金方

臍

方

崔氏纂要方

鳴卻用陳麻骨燒烟吸人立愈

並聖惠方

耳卒

下絞痛

方同上

腰脊脹痛

芥子末調酒貼之立效

走注風

毒

作痛用小芥子末和

雞子白塗之

聖惠

一切癰腫

豬膽汁和芥子

末貼之日三上

豬脂

亦可干金翼

癰腫熱毒

家芥子末同柏葉搗塗愈者大驗得山芥更妙

千金翼

無不干

金翼

熱毒瘰癧

小芥子末醋和貼之看消

即止恐損肉

厚塗之半日痛即止

五腫瘻疾

芥子

末以水蜜

和傅乾

射工中人

有瘡用芥子末和酒

廣濟方射工中人

厚塗之半日痛即止

即止

○千金方

婦人經閉

不行至一年者

臍腹痛腰腿沉重

寒熱往來用芥子二兩爲末每服

水調貼臍上

即止

二錢熟酒

食前仁存方

陰證傷寒

腹痛厥逆

芥菜子研末

水調貼臍上

即止

白芥

宋開寶附

釋名

胡芥

蜀本草

蜀芥

時珍曰

其種來自胡戎而盛於蜀故名

胡

集解

恭曰白芥子

粗大白色如白染米甚辛美

從

子

白爲茹食之甚美保昇曰胡芥近道亦有之葉大而

子白且粗入藥及啖最佳而人閒未多用之時珍曰

白芥處處可種但人知蒔之者少爾以八九月

下種冬生可食至春深莖高二三尺其葉花而有

風大雪須謹護之乃免折損三月開黃花香郁結

角如芥角其子大如粱米黃白色又有一種莖大

而中實者尤高其子亦大此菜雖是芥類迥然別

種也然入藥勝於芥子

莖葉氣味

辛溫無毒

時珍曰肘後方言熱病人不可食

主

寒病

人

主

冷氣器

安五臟功與芥同

華

子氣味

辛溫無毒

主治發汗主胸膈痰冷上氣面

目黃赤又醋研傅射工毒

別錄

禦惡氣遁尸飛尸及

暴風毒腫流四肢疼痛

弘景

燒烟及服辟邪魅

日華

藏器

曰入鎮宅方用欬嗽胸脇支滿上氣多唾者每用溫酒吞

下七粒

思邈

利氣豁痰除寒暖中散腫止痛治喘嗽

反胃癆木腳氣筋骨腰節諸痛

時珍

發明

震亨曰疾在腸下及皮裏膜外非白芥子莫能達古方控涎丹用白芥子正此義也時珍

曰白芥子辛能入肺溫能發散故有利氣豁痰溫中開胃散痛消腫辟惡之功按韓懋醫通云凡老

人苦於痰氣喘嗽胸滿懶食不可妄投燥利之藥反耗真氣懋因人求治其親靜中處三子養親湯治之隨試隨效蓋白芥子白色主痰下氣寬中紫

蘇子紫色主氣定喘止嗽蘿蔔子白種者主食開

瘡降氣各微微炒研破看所主爲君每劑不過三四錢用生絹袋盛入煮湯飲之勿煎太過則味苦辛若大便素實者入蜜一匙冬月加薑一片尤良南陵末齋子有辭贊之

附方

舊一新入

反胃上氣

白芥子末酒服二錢普濟方

熱痰煩運

白芥子黑芥子大戟甘遂芒消硃砂等分爲末糊

丸梧子大每服二十丸

薑湯下名白芥丸普濟

冷痰痞滿

黑芥子白芥子大戟甘遂胡椒桂心等分爲末糊

丸梧子大每服十九丸

薑湯下

名黑芥丸

普濟方

腹冷氣起

白芥子一升微炒研末湯浸

蒸餅丸小豆大每薑湯吞十

丸甚妙○傳信方

腳氣作痛

方見白芷小兒乳癬

白芥子研末水調攤膏貼

之以平爲期本草權度

防痘入目

白芥子末水調塗足心引

毒歸下令瘡疹不入目

全効心鑑

腫毒初起

白芥子末醋調塗

瀕湖集簡方

胸脇痰飲

白芥子五

錢自朮一兩爲末棗肉和搗丸梧子大每白湯服五十九 摘玄方

蕪菁

別錄上品

釋名蔓菁

唐本

九英菘

食療諸葛菜

藏器曰

蕪菁北人

朔閒燒食其根呼爲蕪根猶是蕪菁之號蕪菁今并汾河

北之通稱也塞北河西種者名九英蔓菁亦曰九

英菘根葉長大而味不美人以爲軍糧禹錫曰爾

雅云須蕷蕷詩谷風云采葑采菲毛茛註云葑須

也孫炎云葑一名葑菘禮坊記云葑蔓菁也陳宋

之閒謂之葑陸機云葑蕷也幽州人謂之芥郭

璞云蕷蕷似羊蹄葉細味酢可食揚雄方言云豐

蕷蔓菁也陳楚謂之豐齊魯謂之蕷關西謂之蕷

蕷趙魏謂之大芥然則葑也須也蕷菁也蔓菁也

豐蔓菁也芥也七者一物也時珍曰按孫愐云

藏器謂蕷蕷苗也其說甚通掌禹錫以蕷蕷釋蔓菁陳

豐蔓菁也其說甚通掌禹錫以蕷蕷釋蔓菁陳

模

下劉禹錫嘉話錄云諸葛亮所止令兵士獨種

蔓菁者取其纔出甲可生啖一也葉舒可煮食二

尋而採五也冬有根可食六也比諸蔬其利甚博

至今蜀人呼爲諸葛菜江陵亦然又朱輔山溪蠻

叢話云猫獺猺地方產馬王菜味澀多刺卽諸葛菜也相傳馬殷所遺故名又蒙古人呼其根爲沙吉木兒

集解

弘景曰別錄蕪菁蘆菔同條蘆菔是今溫菘

似菘好食西川惟種此其子與溫菘甚相似而俗方無用惟服食家鍊餌之而不言蘆菔子恐不用也俗人蒸其根及作菹食但小薰臭爾恭曰蕪菁北人名蔓菁根葉及子皆是菘類與蘆菔全別體用亦殊陶言蕪菁似蘆菔蘆菔葉不堪食是江表不產二物理喪其真也菘子黑色蔓菁子紫赤色大小相似蘆菔子黃赤色而大數倍且不圓也大明曰蔓菁比蘆菔根短而細葉大連地上生厚闊

短肥而腴其色紅頌曰蕪菁南北皆有北土尤多
四時常有春食苗夏食心亦謂之薹子秋食莖冬
爾其子夏秋熟時採之宗奭曰蔓菁夏月則枯當
此之時蔬圃復種謂之雞毛菜食心正在春時諸
菜之中有益無損於世有功采擷之餘收子爲油
燃燈甚明西人食之河東太原所出其根極大他
處不及也又出西番吐谷渾地機曰葉是蔓菁根
是蘆菔時珍曰別錄以蕪菁蘆菔同條遂致諸說
猜度或以二物爲一種或謂二物全別或謂在南
爲萊菔在北爲蔓菁殊無定見今按二物根葉花
子都別非一類也蔓菁是芥屬根長而白其味辛
苦而短莖粗葉大而厚闊夏初起薹開黃花四出
如芥結角亦如芥其子均圓似芥子而紫赤色蘆
菔是菘屬根圓亦有長者有紅白二色其味辛甘
圓紫黃花結角如蟲狀腹大尾尖子似胡盧巴不均
而永葉不甚大而慥亦有花葉者夏初起薹開淡甘
此分之自明白矣其蔓菁六月種者

根大而葉蠹八月種者葉美而根小惟七月初種者根葉俱良擬賣者純種九莢九英根大而味短削淨爲菹甚佳今燕京人以瓶醃藏謂之閉甕菜

根葉氣味苦溫無毒

時珍曰辛甘苦
奭曰多食動氣

主治利五臟輕身益氣可長食之

別錄常食通中令人肥健
蘇頌

消食下氣治嗽止消渴去心腹冷痛及熱毒風腫

乳癰妬乳寒熱

孟詵

發明

詵曰九莢菘出河西葉大根亦粗長和羊肉食甚美常食都不見發病冬日作菹煮羹食

消宿食下氣治嗽諸家商畧其性冷而本草云溫恐誤也

附方

舊八新四預禳時疾立春後遇庚子日溫蔓菁汁合家大小並服之不限多少

一年可免時疾

神仙教子法

鼻中衄血

諸葛菜生搗汁飲十便良方

大醉不

堪

連日病困者熟去滓冷飲之良

肘後方

飲酒辟氣

乾蔓菁根

二七枚蒸三遍碾末

酒後水

一切腫毒

生蔓菁根一握入鹽

花少許同搗封之日

三易之○肘後方用

大鍼大染鐵生衣刺

疔瘻有

根

用大鍼刺作孔削蔓菁根如鍼大染鐵生衣刺

蔓菁根鐵生衣等分搗塗于上有

疔瘻有

膿出卽易須臾

根出立瘥忌油

肘後方

蔓菁根并葉去

膿生冷五辛黏滑陳臭

卽瘥冬月只用根此方已救十數人須避風

卽換不過三五次

李

絳兵部

女子妬乳生蔓菁根搗和鹽醋漿水煮

洗之五六度良又方和雞子白

汁

封之亦妙

陰腫如斗生蔓菁根搗封之治人豌豆

所不能治者集療方

人豌豆

食療

亦妙

陰腫如斗

生蔓菁根搗封之治人豌豆

人豌豆

斑瘡

蔓菁根搗汁挑瘡研塗之三食頃根出矣

肘後方

犬咬傷瘡

重發者用蔓菁

根搗汁服之

肘後方

小兒頭禿

蕪菁葉燒灰和脂傅之

千金

飛絲入眼

蔓菁菜揉爛帕包滴汁兩點即出也

普濟方

子氣味苦辛平無毒

主治目

別錄明目

療黃疸利小便

水煮汁服

主癥瘕積聚

少少飲汁治霍亂心腹脹

末服之主目暗

爲油入面膏去黑點

皺文恭和油

傅蜘蛛咬

藏器

壓油塗頭能變蒜髮

孟說

入丸藥服令

人肥健尤宜婦人

蕭炳

發明

藏器曰仙經言蔓菁子九蒸九曝搗末長服可斷穀長生蜘蛛咬者恐毒入內搗末酒服

蔓菁子九蒸九曝搗末長服

內搗末酒服

亦以油和傅之蔓菁園中無蜘蛛是其相畏也(時)
珍曰蔓菁子可升可降能汗能吐能下能利小便
初采子炒過榨油同麻油鍊熟一色無異西人多
食之點燈甚明但烟亦損目北魏祖珽

附方

舊四新十八

明目益氣

蕪菁子一升水九升煮汁盡日乾如此三度研細水

服方

寸七日三亦可研水和米煮粥食外臺祕要

常服明目

使人洞視腸腑用蕪菁子

三方升以苦酒三升煮熟

寸七日三無所忌抱朴子云服盡一斗能夜視

日乾研篩末以井華水服

有所見物

千金方但瞳子不壞者十得九愈用

蔓菁子六升蒸之氣遍合飴

取下以釜中熱湯淋之乃曝乾還淋如是三遍卽

收杵爲末食上清酒服方寸七日再服崔元亮

海上方同上法補肝明目

蕪菁子淘過

一斤黃精二

方虛勞目暗

普濟方法

補肝明目

蕪菁子淘過

斤同和丸蒸九曬爲末每空心米飲服二錢日再服○又方蔓菁子二升決明子一升和勻以酒五升水煮乾曝爲末每服二錢

風邪攻目

視物不明肝氣虛者用蔓菁子兩

溫水調下日二並聖惠濟總錄又燒成灰爲末每服半錢食後酒下日三服

服食辟穀

味盡曝搗爲末每服二錢溫水下蛇蛻二日三服

黃汗染衣

涕唾皆黃用蔓菁子搗末平日以帛浸水

○蘇頌圖經本草外臺祕要黃疸如金晴黃小便赤用生蔓菁子末熟食忌水。浸水方寸七日三服

服一匙日再服加至兩匙以知爲度每夜以帛裹肚結不通用蔓菁子搗末水絞服少末愈

急黃黃疸

及內黃腹結不得嚏鼻中出黃水及下利則愈

以子壓油每服一盞更佳

陳藏器本草拾遺熱黃便結水和絞汁服少末愈

本草綱目卷之二十一

水和絞汁服少末愈

頃當瀉

一切惡物

沙石草

二便關格

脹悶欲絕

蔓

髮並出

孟詭食療本草

二便關格

蔓菁子油一合

揀

空腹服之

卽通通後

心腹作脹

蔓菁子一大合

搗爛水一升和

研瀘汁一盞

頓服少頃

自利或利或

霍亂脹痛

蔓菁子淨搗爛水一升和

飲之瀝

集簡方

妊娠溺澀

蔓菁子末水服方寸匕

外臺祕要

入腹身

體強舌乾硬

用蔓菁子三兩

聖惠方

瘍疽發熱

疽

手足肩背

累累如米

起色白刮之

汁出復發熱用

肘後方

骨疽不愈

愈而復發

骨從孔中出者

蔓菁子搗

一日一易之

小

兒頭禿

蔓菁子末和

酢傅之

眉毛脫落

蔓菁子四兩炒研醋

和塗之

聖惠面

麩點

蔓菁子研末入

面脂中夜夜

聖惠

面

麩點

蔓菁子研末去

面皺

花氣味辛平無毒主治虛勞眼暗久服長生可夜

讀書三月三日采花陰乾爲末每服二錢空心井

華水下

慎微

菜菔

音來匍唐本草

釋名蘆葩

郭璞云蘆音羅葩蒲北切同菔

蘿葡

音羅葛孫炎註云紫花

花菘

同上俗呼溫菘

土酥

同上俗呼溫菘似蕪菁大根

雹葵

音爾雅孫炎註云紫花

菘也

俗呼溫菘似蕪菁大根

是也

頌曰紫花菘溫菘皆南人所呼吳人呼楚菘

廣南人呼

秦菘時珍曰按孫愐廣韻言魯人名莊

薳

音拉答秦人名蘿蔔王禎農書言北人蘿蔔一

種

四名蕃曰破地錐夏曰夏生秋曰蘿蔔冬曰土

酥

謂其潔白如酥也珍按菘乃菜名因其耐冬如

松柏也萊菔乃根名上古謂之蘆菔中古轉爲萊
菔後世訛爲蘿蔔南人呼爲蘿菔與雹同見晉
灼漢書註中陸佃乃言萊菔能制麴毒是來麴之
所服以菔音服蓋亦就文起義耳王氏溥濟方稱
乾蘿蔔爲仙人骨

亦方土謬名也

集解

弘景曰蘆菔是今溫菘其根可食俗人蒸其

根及作菹食但小薰臭爾葉不中啖又有赤
爲生菜食大葉可熟啖陶氏言不中食理喪其真
根細而過辛不宜服之恭曰萊菔卽蘆菔也嫩葉
通有北土尤多有大小二種大者肉堅宜蒸食小
也江北河北秦晉最多登萊亦好頌曰萊菔南北
者白而脆宜生啖河朔極有大者而江南安州洪
州信陽者甚大重至五六斤或近一秤亦一時種
蒔之力也瑞曰夏月復種者名夏蘿蔔形小而長
者名蔓菁蘿蔔時珍曰萊菔今天下通有之昔人
以蕪菁萊菔二物混註已見蔓菁條下圃人種萊
菔六月下種秋采苗冬掘根春末抽高薹開小花

紫碧色夏初結角其子大如大麻子圓長不等黃
赤色五月亦可再種其葉有大者如蕪菁細者如
花芥皆有細柔毛其根有紅白二色其狀有長圓
二類大抵生沙壤者脆而甘生瘠地者堅而粹根
葉皆可生可熟可菹可醬可豉可醋可餽可腊可
飯乃蔬中之最利益者而古人不深詳之豈因
其賤而忽之耶抑未諳其利耶

氣味根辛甘葉辛苦溫無毒

說曰性冷思邈曰平不可與地黃同食令

人髮白爲其潤營衛也時珍曰多食菜菔動氣惟生薑能制其毒又伏硇砂

主治散服

及炮煮服食大下氣消穀和中去痰癖肥健人生

搗汁服止消渴試大有驗

唐本

利關節理顏色練五

臟惡氣制麴毒行風氣去邪熱氣

蕭炳利五臟輕身

令人白淨肌細孟詭消痰止欬治肺癆吐血溫中補

不足同羊肉銀魚煮食治勞瘦欬嗽華日同豬肉食

益人生搗服治禁口痢汪穎搗汁服治吐血衄血吳瑞

寬胸膈利大小便生食止渴寬中煮食化痰消導

甯源殺魚鯉氣治豆腐積汪機主吞酸化積滯解酒毒

散瘀血甚效末服治五淋丸服治白濁煎湯洗腳

氣飲汁治下痢及失音并烟熏欲死生搗塗打撲

湯火傷

時珍

發明

頌曰萊菔功同蕪菁然力猛更出其右斷下
方亦用其根燒熟入藥尤能制麴毒昔有婆

傳又羅見門僧東來見食麥麴者驚云此大熱
見食中蘆菔乃云賴有此以解其熱何以食
飽食麴必不啖蘆菔炳曰搗爛制麴作餽飪
見食嚼嚥之便消慎微曰按楊億談苑云江東居
種芋三十斛計省米三十斛種蘿蔔三十
黃益言生佳傳見食中蘆菔乃云賴有此以解其熱何以食
已物味何首烏三十斛則知蘿蔔果能消食也宗奭曰人飲食過之此大熱
散氣用蘆菔則令人鬚髮白世皆以爲服歟居
功成金與散氣用蘆菔芥子更辛何止能散緩而下氣速也
以散氣用蘆菔震亨曰蘆菔根屬土也散爲服歟居
人主升氣用蘆菔則知蘿蔔則令人生薑而又能散緩而下氣速也
人血皆降言久氣熟甘多而辛少乎時珍曰蘆菔根屬土也散爲服歟居
故所生飲食豈非氏言其下氣用蘆菔震亨曰蘆菔根屬土也散爲服歟居
人皆肺脾腸胃三焦之病李九華云少陽明因蘆菔氣熟氣葉停土也散爲服歟居
食滯所生人皆以爲服歟居
人皆以爲服歟居

氣溫營衛也。據洞微志云齊州有人病狂云夢中見紅裳女子引入宮殿中小姑令歌每日遂歌云五靈樓閣曉玲瓏天府由來是此中惆悵悶懷言不盡一丸蘿蔔火。吾宮有一道士云此犯大麥毒火。吾宮火者毀也。遂以藥并蘿蔔治之果愈。又按張杲醫說云饒民七病鼻衄甚危。醫以蘿蔔自然汁和無灰酒飲之卽止。蓋血隨氣運氣滯故血妄行蘿蔔下氣而酒導之故也。又云有好食豆腐中。中毒醫治不效。忽見賣豆腐人言其妻誤以蘿蔔湯入鍋中。遂致不成其人心悟乃以蘿蔔湯飲之而瘳。物理之妙如此。又延壽書載李師逃難入石窟中。賊以烟熏之垂死。摸得蘿蔔菜一束嚼汁嚥下甦此法備急不可不知。

附方

舊二十二新

食物作酸

蘿蔔生嚼數片或生菜嚼

之亦佳絕妙乾者熟者鹽

醃者及人胃冷者皆

瀕湖集簡方

反胃噎疾

蘿蔔蜜煎浸細

方普濟良方

消渴飲水

獨勝散用出丫子蘿蔔三枚淨洗切片
自乾爲末每服二錢煎豬肉湯澄清調

下日三服漸增至三錢生者搗汁亦

可或以汁煮粥食之

圖經本草

肺痿欬血

蘿蔔

和羊內或鯽魚煮熟頻食

普濟方

鼻衄不止

蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注

鼻中皆良或以酒煎沸入蘿

葡再煎飲之

衛生易簡方

下痢噤口

蘿蔔搗汁十小盞蜜

一盞水一盞同煎早一服午一服日晡米飲吞阿

膠丸百粒如無蘿蔔以子搗汁亦可一方加枯礬

七分同煎一方只用蘿蔔菜煎湯日日飲之

濟方用蘿蔔片不拘新舊染蜜噙之嚥汁味淡再

換覺食以肉煮

粥與食不可過多

痢後腸痛

方同

大腸便血大蘿

粥有性荷葉燒存性

蒲黃生用等分爲末

每服一錢米飲下

普濟方

腸風下血蘿蔔皮

任意食之

昔婦人服酒疾下血

連旬不止用大

蘿蔔二十枚留

此有效

百十選方

酒疾下血

連旬不止用大

蘿蔔二十枚留

青葉寸餘以井水入罐中煮十分爛

大腸脫肛

生

入淡醋空心任食

壽親養者方

菔搗實臍中束之覺有瘡即除

摘玄方

小便白濁

生蘿蔔

剜空留蓋入吳茱萸填滿蓋

沙石諸淋

疼不可忍用蘿蔔切片蜜浸少時炙乾

數次不可過焦細嚼鹽湯下日三服名

普濟名

眼眩膏普濟遍身浮腫

出子蘿蔔浮麥等分

浸湯飲之聖濟總錄

偏正頭痛

生蘿蔔汁一蚬

痛

蘿蔔煎湯洗之仍以蘿蔔曬

乾爲末穢內

聖濟總錄

偏正頭痛

生蘿蔔汁一蚬

殼

仰臥隨左右注鼻中神效王荊公病頭痛有道

人傳此方移時遂愈也以此治人不可勝數

如

宜失音不語

蘿蔔生搗汁入薑

喉痹腫痛蘿蔔

和阜莢

汁同服普濟方

和阜莢

漿服

取吐

滿口爛瘡

蘿蔔自然汁

頻漱去涎妙

瀨湖集簡方

烟熏欲

同上

死

方見發明下

湯火傷灼

生蘿蔔搗塗之子亦可

聖濟總錄花火傷肌

方同上

打撲血聚

皮不破者用葉搗封之

邵氏方

子

氣味辛甘平無毒

主治研汁服吐風痰同醋研

消腫毒

華下氣定喘治痰消食除脹利大小便止

氣痛下痢後重發瘡疹

時珍

發明

震亨曰

萊菔子治痰有推牆倒壁之功長于利氣生能升熟能降升

則吐風痰散風寒發瘡疹降

則止內痛皆是利氣之效予曾用果有殊績

附方

舊二新十四

上氣痰嗽

喘促唾膿血合研細煎湯食上服之。

食醫

肺痰欬嗽

以糖和丸萊菔子半升淘淨焙乾炒黃爲末

心鏡

大便不通

大便不通

本草綱目卷四

卷四

卷四

卷四

卷四

卷四

卷四

卷四

卷四

甚妙。鷄喘痰促

遇厚味卽發者蘿蔔子淘淨蒸

勝金方

熟曬研薑汁浸蒸餅丸綠豆大

每服三十丸以日津嚥下

醫學集成

痰氣喘息

蘿蔔子炒

性等分爲末薑汁和煉蜜丸

梧子大蒸餅丸麻子大

久嗽痰喘

蘿蔔子炒

子炒杏仁去皮尖炒等分

時津嚥下

簡便單方

蘿蔔子炒研末蜜丸梧子大

蘿蔔子炒研末蜜丸梧子大

時津嚥下

濟生祕覽

宣吐風痰

勝金方

子末溫水調服三錢良久吐出涎沫如是癱緩風

香油及蜜各半升擂細以水一盃濾取汁入

香油及蜜些須溫服後以桐油浸過曬乾鴛鴦翎探

溪吐法用蘿蔔子半升擂細以水一盃濾取汁入

吐中風口禁

蘿蔔子牙阜瘻各二錢以丹溪方

小兒風寒

水煎服取吐

丹溪方

之取微汗

蘿蔔子生研末

一錢溫葱酒服

易簡方

風祕氣祕

蘿蔔子炒一合

擂水和臯莢末二錢氣脹氣蠱萊菔子研以水濾服立通

米炒乾又浸又炒凡七次爲末每兩一錢壽域神方

氣脹氣蠱汁浸縮砂一兩一錢如神朱氏集驗方

小兒盤腸氣痛用蘿蔔子炒黃研末乳香湯服

朱氏集驗方

半錢楊仁齋直指方年久頭風萊菔子生薑入麝香少許搐入鼻普濟方等分搗取汁

研以人乳和之左

中立止普濟方牙齒疼痛蘿蔔子十四粒生薑點左右鼻右瘡疹不出蘿蔔子生研末米飲服

研以人乳和之左

疼點左鼻右瘡疹不出蘿蔔子生研末米飲服

研以人乳和之左

花主治用糟下酒藏食之甚美明目良士

生薑

別錄
中品

校正

原附乾薑下今分出
今自草部移入此

釋名

時珍曰

按許慎說文

薑作疆

云薑能疆禦百邪故謂之薑

初

王安石字說云薑能疆禦百邪故謂之薑

名紫薑或

其尖微紫名紫薑或

初

生薑嫩者其尖微紫名紫薑或

作子薑宿根謂之母薑也

集解

九月采之

良苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對

根黃無花實秋時采根時珍曰薑宜原隰沙地四

月取母薑種之五月生苗如初生嫩蘆而葉稍闊

似竹葉對生葉亦辛香秋社前後新芽頓長如列

指狀采食無筋謂之子薑秋分後者次之霜後則

老矣性惡溼洳而畏日故秋熱則無薑呂氏春秋

云和之美者有楊樸之薑楊樸地名在

西蜀春秋運斗樞云璇星散而爲薑

藥乾薑生健爲山谷及荊州揚州

氣味辛微溫無毒

藏器曰生薑湯要熱則去皮要

冷則畱皮元素曰辛而甘溫氣

才曰秦椒爲之使殺半

夏脯醍毒惡黃芩黃連天鼠糞弘景曰久服少志

少智傷心氣今人噉辛 辣物惟此最常故論語云

每食不撤薑言可常食但不可多爾有病者是所

宜矣恭曰本經言薑久服通神明主痰氣即可常

檢陶氏謬爲此說檢無所據思邈曰八九月多食

半

志

薑

至春多患眼損壽減筋力孕婦食之令兒盈指

寒

散之故食薑不禁辛走氣瀉肺故秋月則禁之

晦菴語錄亦有秋薑夭人天年之語時珍曰食薑

久積熱患目珍屢試有準凡病痔人多食兼酒立

發甚速癰瘍人多食則生惡肉此皆昔人所未言

者也相感志云糟薑瓶內入蟬蛻

雖老薑無筋亦物性有所伏耶

主治久服去臭

氣通神明

本經

歸五臟除風邪寒熱傷寒頭痛鼻塞

欬逆上氣止嘔吐去痰下氣

別錄

去水氣滿療欬嗽

時疾和半夏主心下急痛和杏仁作煎下急痛氣

實心胸擁隔冷熱氣神效搗汁和蜜服治中熱嘔

逆不能下食

甄權散

煩悶開胃氣汁作煎服下一切

逆不能下食

甄

散

煩悶開胃氣汁作煎服下一切

結實衝胸膈惡氣神驗孟詵破血調中去冷氣汁解

藥毒

藏器

除壯熱治痰喘脹滿冷痢腹痛轉筋心滿

去胸中臭氣狐臭殺腹內長蟲

張鼎

益脾胃散風寒

元素解菌蕈諸物毒

吳瑞

生用發散熟用和中解食野

禽中毒成喉癆浸汁點赤眼搗汁和黃明膠熬貼

風溼痛甚妙

時珍

乾生薑主治

治嗽溫中治脹滿霍亂不止腹痛冷

痢血閉病人虛而冷宜加之

甄權

薑屑和酒服治偏

風

孟詵

肺經氣分之藥能益肺

好古

發明

成無己曰薑棗味辛甘專行脾之津液而和營衛藥中用之不獨專於發散也吳曰生薑

之用有四制半夏厚朴之毒一也發散風寒二也與棗同用辛溫益脾胃元氣溫中去溼三也與芍藥同用溫經散寒四也孫真人云薑爲嘔家聖藥蓋辛以散之嘔乃氣逆不散此藥行陽而散氣也或問生薑辛溫入肺何以云入胃口曰俗以心下便爲胃口者非矣咽門之下受有形之物及胃之系人云夜間勿食生薑令人閉氣何也曰生薑辛溫主開發夜則氣本收斂反開發之則違天道矣若人有病人則不然也生薑屑比之乾薑則不熱比之俗言上牀蘿蔔下牀薑薑能開胃蘿蔔消食也時珍曰薑則不溫以乾生薑代乾薑者以其不僭故也蜜煎調和無不宜之可蔬可和可果可藥其利博矣凡早行山行宜含一塊不犯霧露清溼之中風暑及山嵐不正之邪案方廣心法附餘云凡中風中暑及

中氣中毒中惡乾霍亂一切卒暴之病用薑汁與童尿服立可解散蓋薑能開痰下氣童尿降火也
頌曰崔元亮集驗方載敕賜薑茶治痢方以生薑切細和好茶一兩益任意呷之便瘥若是熱痢留薑皮冷痢去皮大妙楊士瀛曰薑能助陽茶能助陰二物皆消散惡氣調和陰陽且解溼熱及酒食暑氣之毒不問赤白通宜用之蘇東坡治文潞公有效

附方

舊二十

新三十

生薑

二兩附子一兩水五

升煮取二升分再服忌豬

肉冷水

千金

少許蜜

一匙水二合和服之○

內冷

水

胃虛風熱

不能食

升煮

用薑汁半盃生地黃汁

脾胃聚痰發爲寒熱生薑四兩搗

千金

自然汁一酒盃露一夜于發日五

本草

瘧疾寒熱

脾胃聚痰發爲寒熱生薑四兩搗

本草衍義

初虞世必効方久

更面北立飲卽止

未止再服

易簡

寒熱痰嗽

咽之

本草衍義

初虞世必効方久

生薑五兩錫半升火煎熟食盡瘡段

久

欬嗽不止

侍御用之有效

生薑五兩錫半升火煎熟食盡瘡段

久

患欬噫

生薑汁半合蜜一匙煎溫
呻三服

小兒欬嗽
生薑四兩

煎

湯浴之

暴逆氣上

嚼薑兩三片

外臺祕要方

小兒欬嗽

生薑

千金方

家

効

寇氏衍義

乾嘔厥逆

嚼

生

薑

心鏡

心痞嘔噦

心下痞堅

兵部手集用母薑

頻

長蟲

醫也

嘔吐不止

生薑二兩醋漿二合銀器煎

升

心鏡

心痞嘔噦

心下痞堅

生薑八兩水三升

取四合連滓呷之又殺腹內

煮

一升取汁同煮一升

半分再服

反胃羸弱

兵部手集用母薑

分再服卽止

頻

油

傳信適用方用生薑

煎過爲末軟棉蘸末嚼嚥

霍亂轉筋

兵部手集用母薑

入腹欲死生薑

屎

一升水四升煎二升

霍亂欲死

生薑五

分

再服卽止

梅師方

霍亂轉筋

兵部手集用母薑

入腹欲死生薑

煮

三兩沸服仍以薑搗

霍亂腹脹

不得吐下用生

貼

痛處外臺祕要

霍亂腹脹

不得吐下用生

煮

二升分三腹中

腹滿

綿裹煨薑內下部

冷卽易之

梅師胸脇滿

服

肘后方

霍亂腹脹

綿裹煨薑內下部

冷卽易之

梅師胸脇滿

痛

凡心胸脇下有邪氣結實硬痛脹滿者生薑斤搗渣留汁慢炒待潤以絹包于患處款款熨一

之冷再以汁炒再熨良久豁然寬快也

陶華傷寒搗法

生薑削長寸塗鹽

內下部通外臺立

冷痢不止

生薑煨研爲末共乾薑末等分以醋和麵作餽餽先以水

枚以粥送下日一度食療

消渴飲水

乾生薑末一兩

以鯽魚膽汁和丸梧子大

溼熱發黃

生薑時時周

每服七丸米飲下

身擦之其黃

自退也

一方加茵陳

刮薑取汁于錢唇

蒿尤妙

傷寒搗法

宗奭曰用古銅錢

點之淚出今日點明日愈勿疑。一治暴風客熱

目赤睛痛腫者臘月取生薑搗絞汁陰乾取粉入熱

銅青末等分每以少許沸湯泡澄清溫洗

時時擦滿口爛瘡

生薑自然汁頻漱

之後用薑片時時擦

吐亦可爲末擦之甚

効

牙齒疼痛

老生薑瓦焙入枯礬末同擦之有
人日夜呻吟用之卽愈普濟方喉

癆毒氣

生薑二斤搗汁蜜五合煎勻每服一
合日五服

食鷓鴣毒

方並見禽

雞毒

食鷓鴣毒

部本條

中蒿苣毒

中諸藥

毒

猢猻犬傷人

並飲生薑汁

虎傷人瘡

內服生薑

洗之用白礬末

傅上祕覽

蝮蛇螯人

薑末傳之乾

子金蜘蛛咬人

炮薑切片貼之良

千金

刀斧金瘡

生薑嚼傳勿動次日

扶壽方卽閃

拗手足

生薑葱白搗爛

跌撲傷損

薑汁和酒調

百

蟲入耳

生薑汁少許滴之

下狐臭

塗絕根

赤白癩風

之艮並易簡

兩耳凍瘡

膏塗暇日記

發背初起

生薑塊

以炭火炙一層刮一層爲末
以豬膽汁調塗海上方

疔瘡腫毒

方見白芷下

諸瘡

痔漏

久不結痂用生薑連皮切大片塗白礬末

疔瘡腫毒

方見白芷下

產後血

滯

沖心不下生薑五

產後肉線

婦產後用力垂

觸之痛引心腹欲絕

一道人令買老薑連皮三斤

搗爛入麻油二斤拌勻炒乾先以熟絹五尺折作

方結令人輕輕盛起肉線使之屈曲作三團納入

產戶乃以絹袋盛薑就近熏之冷則更換熏一日

夜縮入大半二日盡入也云此乃魏夫人祕傳脈

怪病方也但不可使線斷斷則不可治之矣

怪病方也但不可使線斷斷則不可治之矣

脈

溢怪症

有人毛竅節次血出不止皮脹如鼓須臾

目鼻口被氣脹合此名脈溢生薑自然汁

和水各半盞服卽安

○並夏子益奇疾方

薑皮氣味辛涼無毒主治消浮腫腹脹痞滿和脾

方見白芷下

胃去醫

時

附方

舊

拔白換黑

刮老生薑皮一大升于久用油
肥鍋內不須洗刷固濟勿令通

氣令精細人守之文武火煎之不得火急自旦至
夕卽成矣研爲末拔白後先以小物點麻子大入
孔中或先點鬚下然後拔之以指撲入三日後當

生黑者神效李卿用之有驗

蘇頌圖經本草

葉氣味辛溫無毒

主治食鱠成癥搗汁飲卽消

機張

附方

新

打傷瘀血

薑葉一升當歸三兩爲末溫酒

服方寸匕日三范汪東陽方

乾薑

本經
中品

校正

自草部
移至此

釋名白薑

見下

集解

弘景曰

乾薑今惟出臨海章安數村作之蜀
漢薑舊美荊州有好薑而不能作乾者凡作

乾薑法水淹三日去皮置流水中六日更刮去皮

然後曬

乾置瓮缸中釀三日乃成

頌曰造法采根

子長流水洗過日曬爲乾薑以漢溫池州者爲良

陶說乃漢州乾薑法也

時珍曰乾薑以母薑造之

今江西襄均皆造以白淨結實者爲良故人呼爲白薑又曰均薑凡入藥並宜炮用

氣味辛溫無毒

褚曰苦辛

好古曰大熱保昇曰久

服令人目暗餘同生薑時珍曰大

胎內消蓋其性熱而辛散故也

主治胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風溼痹腸

澼下痢生者尤良

本經

寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風

邪諸毒皮膚閒結氣止唾血

別錄

治腰腎閒疼冷

氣破血去風通四肢關節開五臟六腑宣諸絡脈

去風毒冷痹夜多小便

甄

消痰下氣治轉筋吐瀉

腹臟反胃乾嘔瘀血撲損止鼻紅解冷熱毒開胃

消宿食

大明

主心下寒痞目睛久赤

好舌

發明

元素曰乾薑氣薄味厚半沉半浮可升可降陽中之陰也又曰大辛太熱陽中之陽其用

有四通心助陽一也去臟腑沉寒痼冷二也發諸經之寒氣三也治感寒腹痛四也腎中無陽脈氣欲絕黑附子爲引水煎服之名薑附湯亦治中焦寒邪寒淫所勝以辛散之也又能補下焦故四逆湯用之乾薑本辛炮之稍苦故止而不移所以能治裏寒非若附子行而不止也理中湯用之者以其回陽也李杲曰乾薑生辛炮苦陽也生則逐寒邪而發表炮則除胃冷而守中多用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣故也須以生甘草緩之辛熱以散裏寒同五味子用以溫肺同人參用以溫

胃也。好古曰：乾薑心脾二經氣分藥也。故補心氣不足，或言乾薑辛熱而言補脾今理中湯用之，言泄不言補何也？蓋辛熱燥溼泄脾中寒溼邪氣非泄正氣也。又云服乾薑以治中者必僭上不可不
知。震亨曰：乾薑入肺中利肺氣入腎中燥下溼入肝經引血藥生血同補陰藥亦能引血藥入氣分，須炒黑用之。有血脫色白而天不澤脈濡者此大寒也。宜乾薑之辛溫以益血大熱以溫經時珍曰：乾薑能引血藥入血分氣藥入氣分又能去惡養新。有陽生陰長之意故血虛者用之。凡人吐血衄血下血有陰無陽者亦宜用之。乃熱因熱用從治之法也。

附方

舊十六

脾胃虛冷

不下食，傾久羸弱成療者

用溫州白乾薑漿水煮透

取出

焙乾

末陳廩米

煮粥飲丸

梧子大每

蘇頌圖經

脾胃

服三五丸

白湯下其効如神

虛弱

飲食減少易傷難化無力肌瘦用乾薑頻研

梧子大

每空心米飲

十便方

頭運吐逆

胃冷生痰也用川乾薑炮二錢半甘

草炒一錢二分

水一鍾半煎減

傳信適用方

心脾冷痛

暖胃消痰二薑

丸用乾薑高良薑等分

炮研末糊丸梧子

和劑局方

心氣卒

痛乾薑末米飲服

外臺祕要一

陰陽易病

傷寒後婦人得病雖瘥未滿百日不可治也

可與男合爲病拘急手足拳腹痛欲死丈夫名陰

易婦人名陽易速宜汗之卽愈滿四日不可治也

用乾薑四兩爲末每用半兩白湯調服覆

衣被出汗後手足伸卽愈傷寒類要方

衣被出

汗後手足伸卽愈

中寒水

瀉乾薑炮研末粥飲服

千金方

寒痢青色

乾薑切大豆大

枚日三夜一累用

血痢不止

乾薑燒黑存性放冷

米飲服一錢米飲

下神妙○脾寒瘡疾

外臺用乾薑高良薑等分爲末每服一錢水一盞煎至七

分服○又乾薑炒黑爲末

臨發時以溫酒服三錢七

冷氣欬嗽

結脹者乾薑末熱酒調服

半錢或楊糖丸

噙姚僧坦方欬嗽上氣

用合州乾薑炮阜莢炮

去皮子及蛀者桂心紫

色者去皮並搗篩等分鍊白蜜和搗三千杵丸梧

子大每飲服三丸漱發卽服日三五服禁食葱麵

油腥其效如神禹錫在淮南與李亞同幕府李每

治人而不出方或謂其吝

藥若見此方用藥熱燥必不肯服故但出

藥卽多效也試之信然劉禹錫傳信方

眠乾薑爲末湯服三錢吐血不止

小便調服一錢

千金方

良鼻衄不止

乾薑削尖煨塞鼻中卽止

聖濟錄赤眼澀痛

白薑末水調貼

利冷淚目昏

乾薑粉點洗之

一字炮湯廣

方

冷淚目昏

聖濟錄赤眼澀痛

足心甚妙

目忽不見

令人嚼母薑以舌日舐六目

中卒痛

乾薑削圓滑內皆

出拭之未盡更易

千金

牙痛不止

川薑炮川

椒等分

爲末

御藥院

方

斑豆厥逆

斑豆服涼藥多手足厥

冷脈微用乾薑炮二錢

半粉

甘草炙一錢半水二錢

煎一鍾

傅四圍

留頭自愈此乃東

癰疽初起

乾薑一兩炒紫研末

昌申醋

打糊和作劑

以黃丹爲衣

每日隨瘡大小入藥

在內追膿盡生

兩口合爲度如不合

以葱白汁調大

黃末

擦之卽

救急方

虎狼傷人

乾薑末傅

之

肘后

猢犬傷人

乾薑末水

良并

以薑炙

熱熨之

蛇蠍蟻人

乾薑末袋盛佩之遇蟻

卽以傅之便

定廣利方

服三七生薑

汁服亦

以傅之便

卽以傅之便

廣利方

附錄天竺乾薑

拾遺藏器曰味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腰背痛

痃癖氣塊

惡血積聚

生婆羅門國

一名胡乾

薑狀似薑

小黃色也

茼蒿

宋嘉祐

釋名蓬蒿

時珍曰形氣同乎蓬蒿故名

集解

機曰本草不著

形狀後人莫識

時珍曰

茼蒿

八九月下種

冬春采食

肥莖花葉微似白蒿

其味辛甘作蒿氣

四月起薹高二尺餘

開深黃色

花狀如單瓣菊花一花結子近百成毬如地菘及苦蕡子最易繁茂此菜自古已有孫思邈載在千金方菜類至宋嘉祐中始補入本草今人常食者而汪機乃不能識輒敢

擅自脩纂誠可笑慨

氣味

甘辛平無毒

禹錫曰多食動風氣

薰人心令人氣滿

主治安心

氣養脾胃消痰飲利腸胃

思

邪蒿

宋嘉祐

釋名

時珍曰此蒿葉

集解

藏器曰邪蒿根莖似青蒿而細軟時珍曰三四月生苗葉似青蒿色淺不臭根葉皆可茹

氣味辛溫平無毒

說曰生食微動風作羹食良不與胡荽同食令人汗臭氣

治胸膈中臭爛惡邪氣利腸胃通血脈續不足氣

孟說煮熟和醬醋食治五臟惡邪氣厭穀者治脾胃

腸澼大渴熱中暴疾惡瘡

食醫心鏡

胡荽

宋嘉祐

葫蘆

外臺

蕷

時珍曰 蕷許氏說文作
葫蘆云 葫蘆屬可以香口也

葉細而根多鬚綏綏然也

張騫使西域始

胡荽今俗呼爲

蕷

蕷乃莖葉布散

之貌俗作

芫花之芫

非矣

藏器曰石

勒諱胡故并汾人呼

胡荽爲香

荽

集解

時珍曰

胡荽處處種之

八月下種晦日尤良

初生柔莖圓葉葉有花

歧根軟而白冬春采

之香可食亦可作菹

道家五葷之一立夏後開

細花成簇如芹菜花

淡紫色五月收子

子如大麻

予亦辛香按賈思勰

齊民要術云六七月布種者

可竟冬食春月接子

沃水生芽種者小小供食

而已王禎農書云胡荽於蔬菜中子葉皆可用

生熟俱可食甚有益於世者宜肥地種之

李廷飛曰胡荽

蒜子也吳瑞曰胡荽俗呼

蒜

時王上蒜子卽藠子乃薤也

李

正誤

李廷飛曰

胡荽蒜子也

吳瑞曰胡荽俗呼

藠

時王上藠子卽藠子乃薤也

李

作吳二氏云並

胡荽誤矣

根葉氣味辛溫微毒

說曰平微寒無毒可和生菜食此是葷菜損人精神華陀

云胡臭口臭齶齒及腳氣金瘡人皆不可食病更

加甚藏器曰久食令人多忘根發痼疾不可同邪

蒿食令人汗臭難產時珍曰凡服一

及藥中有白朮牡丹者不可食此伏石鍾乳

主治

消穀治五臟補不足利大小腸通小腹氣拔四肢

熱止頭痛療沙癬豌豆瘡不出作酒飲之立出通

心竅

嘉祐補筋脈令人能食治腸風用熱餅裹食甚

良

孟詵合諸菜食氣香令人口爽辟飛尸鬼疰蠱毒

甚

瑞辟魚肉毒

原

發明

時珍曰胡荽辛溫香竄內通心脾外達四肢能辟一切不正之氣故痘瘡出不爽快者能

辟

發之諸瘡皆屬心火營血內攝于脾心脾之氣得芳香則運行得臭惡則壅滯故爾按楊士瀛直指方云痘疹不快宜用胡荽酒飲之以辟惡氣牀上下左右皆宜掛之以禦汗氣胡臭天癸淫佚之氣一應穢惡所不可無若兒虛弱及天時陰寒用此故妙如兒壯實及春夏晴暖陽氣發越之時加以酒麴助虐以火益火胃中熱熾毒血聚畜則變成黑陷矣不可不慎

附方

舊五

癰痘不快

用胡荽二兩切以酒二大盞

煎沸沃之以物蓋定勿令洩

從項背至

熱氣結滯

經年數發

新四氣候冷去滓微微含嚥頭面經驗後方足令遍勿嚥頭面經驗後方背至者胡荽半斤五月五日采陰乾水七升煮取一半去滓分服未瘥更服春夏葉秋冬根莖並可用必孩子赤丹胡荽汁塗之面上黑子蘋荽煎湯日日洗之

效方

必

孩子赤丹

胡荽

譚氏方

之

面上黑子

蘋荽煎湯

日日洗之

兩葵根

說小產後無乳

乾胡荽煎湯飲

經驗方

小便不通

胡荽二

根

一握水二升煎一升入滑石末

肛門脫出

胡荽切一升燒

煙熏之卽入

子母祕錄解中蠱毒

胡荽根搗汁半升和酒

服立下神驗

必効方

蛇

虺蟹傷

胡荽苗合口椒等分搗塗之

千金方

子氣味辛酸平無毒

炒用主治消穀能食

思邈蠱毒五

痔及食肉中毒吐下血煮汁冷服又以油煎塗小

兒禿瘡發痘癰殺魚腥

時珍

附方

舊三

食諸肉毒

吐下血不止瘻黃者

胡荽子一升煮令發裂取汁冷服半

升日夜各

新四一服卽

食療本草

腸風下血

胡荽子和生菜以熱

餅裹食之

普濟方

痢及瀉血

胡荽子一合炒搗末每服二錢赤痢砂糖水下白痢

薑湯下瀉血

白湯下日

二砂

濟方

普五痔作痛

胡荽子炒爲末每服二錢空心

溫酒下數服見効

海上仙方

痔

漏脫肛

胡荽子一升粟糠一升乳香少許

以小口瓶燒烟熏之

儒門事親

腸頭挺

出

秋冬搗胡荽子醋煮熨之

孟說食療本草

胡荽子五

牙齒疼痛

胡荽子卽

升以水五升煮取一

外臺祕要

胡蘿蔔

綱目

釋名

時珍曰元時始自胡地

集解

時珍曰胡蘿蔔今北土山東多蒔之淮楚亦有種者

辛臭如蒿不可食

冬月掘根生熟皆可啖兼果蔬菜

之用根有黃赤二種微帶蒿氣長五六寸大者盈

握狀似鮮掘地黃及羊蹄根三四月莖高二三尺

開辟白花攢簇如傘狀似蛇牀花子亦如蛇牀子

周憲王救荒本草云野胡蘿蔔苗葉花實皆同家
於蛇牀又金幼孜北征錄云交河北有沙蘿蔔根
長二尺許大者徑寸下支生小者如筋其色黃白
氣味辛而微苦亦似蘿蔔氣此皆胡蘿蔔之類也

根氣味甘辛微溫無毒主治下氣補中利胸膈腸

胃安五臟令人健食有益無損

時珍

子主治久痢

時珍

水蘿蔔

音芹。本經下品。

釋名芹菜

別錄水英本經楚葵

弘景曰蘿蔔字俗作芹字

論其主治合在上品未

解何意乃在下品二月三月作英時可作蘿蔔

淪食故名水英時珍曰蘿蔔當作蘿蔔从艹蘿蔔諧聲也

也

謂之楚葵呂氏春秋菜之美者有雲夢之芹雲夢楚地也楚有蘄州蘄縣俱音淇羅願爾雅多產芹故字从芹蘄亦音芹徐鍇注說文蘄字从承誤出也據此則蘄字亦當从蘄作蘪字音銀疑相

集解

別錄

曰水蘄生南海池澤

恭曰水蘄卽芹菜

有兩種荻芹白色取根赤芹取莖葉並堪

色而無實根亦白色

詵曰芹生水中葉似芎藭其花白

如高田者宜人置酒醬中香美高田者名白芹餘

田者皆有蟲子在葉閒視之不見食之令人爲患

時珍曰芹

弘景曰又有渣芹可爲生菜亦可生啖

時珍曰芹

又有水芹旱芹生江湖陂澤之涯旱芹生平地

有赤白二種二月生苗其葉對節而生似芎藭其

莖有節棱而中空其氣芬芳五月開細白花如蛇

采其芹杜甫詩云濟饑其利不小詩云虧沸檻泉言

碧

潤羹皆美芹之功而列子言鄉豪嘗
芹蟄口慘腹蓋未得食芹之法耳

莖氣味甘平無毒

思邈曰苦酸冷濁無毒

詵曰和醋食損齒齶痕不可食

李廷飛

赤芹害人不可食

主治女子

赤沃止血養精保血脈益氣

令人肥健嗜食

本經去伏熱殺石藥毒搗汁服

孟詵飲

汁去小兒暴熱大人酒後熱鼻塞身熱去頭中風

熱利口齒利大小腸

藏器

治煩渴崩中帶下五種黃

病大

發明

張仲景曰春秋三時龍帶精入芹菜中人誤食之爲病面青手青腹滿如妊娠痛不可忍作

蛟龍病俱服硬錫三升日三度吐出蜥蜴便瘥時珍曰芹菜生水蛭蛟龍雖云變化莫測其精那

得入此大抵是蜥蜴虺蛇之類春夏之交遺精於此故爾且蛇喜嗜芹尤爲可證別有馬芹見後

附方

舊一

小兒吐瀉

拘多少

子母祕錄

水芹搗汁

切細煮汁飲之

不

小便

淋痛

水芹菜白根者去葉搗

汁井水和服

聖惠方

水芹搗汁

日服六七

小便出血

水芹搗汁

日服六七

合

聖

花氣味苦寒無毒

主治脈溢

水芹搗汁

日服六七

小便

水芹搗汁

日服六七

董

音勤○

釋名苦董

爾雅

董葵

唐

阜芹

綱目

禹錫曰

爾雅云

韞

也

郭璞云

卽董葵

本草言味甘而

此云苦董

古人語倒猶

甘草

謂之大苦也

時珍曰

其性滑如葵故得葵名

人所種葉似

蕺菜花紫色

葉如細柳子如米

董根如薺葉如細柳子如米

非人所種葉似

集解

恭曰

董菜野生非人所種葉似

蕺菜花紫色

葉如細柳子如米

禹錫曰

說文云

董根如薺葉如細柳子如米

非人所種葉似

蕺菜花紫色

葉如細柳子如米

非人所種葉似

蒸汋食之甘滑內則云董萱柏榆是矣時珍曰此
旱芹也其性滑利故洪舜俞賦云烈有椒桂滑有
堇榆一種黃花者有毒殺人卽毛芹也見草部毛
莧又烏苗亦名堇有毒各見本條下

菜氣味甘寒無毒主治搗汁洗馬毒瘡并服之又

塗蛇蠍毒及癰腫

唐本

久食除心下煩熱主寒熱鼠

瘻瘰癧生瘡結核聚氣下瘀血止霍亂及生搗汁
半升服能殺鬼毒卽吐出

孟詭

發明

詭曰董葉止霍亂與香荳同功香荳卽香薷也

附方

舊二新一

結核氣

董菜日乾爲末油煎成膏摩之三五度便瘥孟詭食療

溼熱氣

旱芹菜日乾爲末糊丸梧子大每服四十丸空心溫酒下大殺百蟲毒壽域神方

蛇咬瘡生杵葷汁塗

之萬畢術

紫董

音芹
宋圖經

釋名赤芹

綱目

蜀芹

圖經

楚葵

同上

苔菜

同上

水薺菜

時珍

董

蘄芹蒜四字
一義也詳下

集解

頌曰紫董生江南吳興郡淮南名楚葵宜春郡名蜀芹豫章郡名苔菜晉陵郡名水薺菜

也時珍曰蘇頌之說出於唐玄宗天寶單方中不具紫董形狀今按軒轅述寶藏論云赤芹卽紫芹

也生水濱葉形如赤芍藥青色長三寸許葉上黃斑味苦澀其汁可以煮雌制汞伏硫砂擒三黃號

爲起貧草又土宿真君本草云赤芹生陰厓陂澤近水石閒狀類赤芍藥其葉深綠而背甚赤莖葉

似蕎麥花紅可愛結實亦如猢猻麥其根似蜘蛛嚼之極酸苦澀江淮人三四月采苗當蔬食之南

方頗少太行王
屋諸山最多也

苗氣味酸平微毒

花氣味酸微溫無毒主治大人小兒脫肛

蘇頌

附方

舊

一 脫 肛

凡大人小兒脫肛

每天冷及喫冷食

即暴痢不止

則下脫久療不瘥者

春閒收紫堇花二斤曝乾爲散加磁毛末七兩相

和研細塗肛上納入即使人嚦冷水於面上即吸

入腸中每日一塗藥嚦面不過六七度即瘥矣又

以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日再服漸

漸加至二方寸匕以瘥爲度若五歲以下小兒即以

半杏子許和酒服之忌生冷陳倉米等物天寶單

方

馬蘄

音芹唐本草

釋名牛蘄

爾胡芹通

野茴香

綱目時珍曰凡物大者多以馬名此草似

芹而大故也俗稱野茴香以其氣味子形微

似也金光明經三十二品香藥謂之葉婆你

用之香似橘皮而無苦味保昇曰花若芹花子如

防風子而扁大爾雅云菱牛蘄也孫炎釋云似芹

集解

恭曰馬蘄生水澤旁苗似鬼鍼恭菜等嫩時

而葉細銳可食菜也一名茭一名馬蘄子入藥用

時珍曰馬蘄與芹同類而異種處處卑溼地有之

三四月生苗一本叢生如蒿白毛蒙茸嫩時可茹

葉似水芹而微小似芎藭葉而色深五六月開碎

花攢簇如蛇牀及蒔蘿花青白色結實亦似蒔蘿

子但色黑而重爾其根白色長者尺許氣亦香而

莖極葉子似叔腳着人衣如鍼與此稍異方

苗氣味甘辛溫無毒主治益脾胃利胸膈去冷氣

作茹食

珍時

子氣味甘辛溫無毒主治心腹脹滿開胃下氣消

食調味用之

唐本

炒研醋服治卒心痛令人得睡

孟說

溫中暖脾治反胃

時珍

附方

新

慢脾驚風

馬

芹子丁香白殭蠶等分爲末每服一錢炙橘皮煎湯下名醒

脾散

普濟方

懷香

唐本

校正

自草部移入此

釋名 苗香八角珠

頌曰

懷香北人呼爲茴香聲相

無臭

氣臭醬入末亦香故

近也

弘景曰

煮臭肉下少許卽

俗多懷之

氣臭莊咀嚼恐懷香之名或以此也

時珍曰俚

俚

俚

俚

集解

頌曰今交廣諸番及近郡皆有之入藥多用番舶者或云不及近處者有力三月生葉似

老胡荽極疎細作叢至五月莖粗高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼爲土茴香八九月采實陰乾今近道人家園圃種之甚多川人多煮食其莖葉宗奭曰云似老胡荽者誤矣胡荽葉如蛇牀雖有葉之名但散如絲髮特異諸草也時珍曰茴香宿根深冬生苗作叢肥莖絲葉五六月開花如蛇牀花而色黃結子大如麥粒輕而有細棱俗呼爲大茴香今惟以甯夏出者第一其他處小者謂之小茴香自番舶來者實大如柏實裂成八瓣一瓣一核大如豆黃褐色有仁味更甜俗呼舶茴香又曰八角茴香廣西左右江峒中亦有之形色與中國茴香迥別但氣味同爾北人得之咀嚼薦酒

子氣味辛平無毒

思邈曰苦辛微寒濤權曰苦辛得酒良炒黃用好古曰陽也浮

也入手足少陰太陽經

主治諸瘻霍亂及蛇傷

唐

膀胱胃閒

冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐

馬志

治乾溼腳氣腎

勞癩疝陰疼開胃下氣

大明

補命門不足

李杲

暖丹田

吳綏

發明

詵曰茴香國人重之云有助陽道未得其方

法也好古曰茴香本治膀胱藥以其先丙故曰小腸也能潤丙燥以其先戊故從丙至壬又手足少陰二藥以開上下經之通道所以壬與丙交也時珍曰小茴香性平理氣開胃夏月祛蠅辟臭食料宜之大茴香性熱多食傷目發瘡食料不宜過用古方有去鈴丸用茴香二兩連皮生薑四兩同入坩器內淹一伏時慢火炒之入鹽一兩爲末糊丸梧子大每服三五十丸空心鹽酒下此方本治脾胃虛弱病茴香得鹽則引入腎經發出邪氣

腎不受邪病自不生也
亦治小腸疝氣有効

附方

舊四新十六

開胃進食

茴香二兩生薑四兩同搗勻入淨器內溼紙蓋一宿

次以銀石器中文武火炒黃焦爲末酒糊丸梧子大每服十九丸至二十五丸溫酒下

經驗方

瘧發熱

連背項者茴香子搗服之

孫真人方大小便閉

鼓脹氣促八角茴香

研煎湯調五苓散末服之日一服

曹濟方大小便閉

少許鹽少許

數

茴香不拘多少淘淨入鹽少許

傷寒脫陽小便不通

炒研爲末炙糯米糕蘸食之

摘傅腹上外腎消飲水

用

茴香末以生薑自然汁調傅腹上外腎消飲水

摘玄方

小便如膏油用

茴香炒苦棟子炒等

力保命集

分爲末每食前酒服二錢

腎邪冷氣弱

分作用大茴香六兩分作三分用生附子一個去皮

一分茴香一分同炒黃

分作用三分为末每食前酒服二錢

一分茴香一分同炒黃

出火毒一夜去附子研茴香爲末空心鹽酒下一錢第二度用二味各一分同炒存性出火毒以附子去一半留一半同茴香爲末如前服第三度各一分同炒存性出火毒全研爲末如前服之朱氏集驗方

腎虛腰痛 茴香炒研以豬腰子批開摻末入米散用八角茴香杜仲各炒研三錢木香一錢水一鍾酒半煎服

腰重刺脹 八角茴香炒爲末食前鹽湯下外以糯米散用八角茴香杜仲各炒研三錢木香一錢水一鍾酒半煎服

小腸氣墜 直指用八角茴香炒作二包更換熨之簡便方

小茴香少許水服取汗 孫氏集効方治小腸疝氣痛不可忍用大茴香荔枝核炒黑各等分研末每服一錢溫酒調下○瀕湖集簡方用大茴香炒研每酒服一錢

膀胱疝痛

本事方用舶茴香杏仁各一兩葱白焙乾五錢爲末每酒服二錢嚼胡桃送下○集要治疝氣膀胱小腸痛用茴香鹽炒晚蠶沙鹽炒等分爲疝氣偏末煉蜜丸彈子大每服一丸溫酒嚼下

墜

個連尿入二末於內繫定罐內以酒煮爛連胞一
搗丸如梧子大每服五十丸白腸下刺痛小茴香湯下仙方也鄧才筆峯雜興

枳殼

五錢炒爲末每服二錢鹽酒調服神効袖珍方辟除口臭茴香煮羹及生食並

得

醫心鏡蛇咬久潰小茴香搗末干金

莖葉氣味

同子主治煮食治卒惡心腹中不安權甄

治小腸氣卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得生搗

汁一合投熱酒一合和服

孟謨

發明

頌曰范汪方療惡毒癰腫或連陰卵髀間疼痛攀急牽入小腹不可忍一宿卽殺人者用

茴香

苗葉搗汁一升服之日三四服其滓以貼腫上冬月用根此是外國神方永嘉以來用之起死回生

神驗

蒔蘿

宋開寶

校正

自移入草部

釋名

慈謀勒

寶開

小茴香

時珍曰蒔蘿慈謀勒皆番言也

集解

藏器曰蒔蘿生佛誓國實如馬芹子辛香珣

曰按廣州記云生波斯國馬芹子色黑而重

蒔蘿子色褐而輕以此爲別善滋食味多食無損

卽不可與阿魏同食奪其味也

頌曰今嶺南及近

道皆有之三月四月生苗花實大類蛇牀而簇生

辛香六七月采實今人多用和五味不聞入藥用

時珍曰其子簇生狀如蛇牀子而短微黑氣辛臭

不及茴香嘉謨曰俗呼蒔蘿椒內有黑子但皮薄

色褐不
紅耳

苗氣味辛溫無毒主治下氣利膈

時珍

子氣味辛溫無毒主治小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷

不下食兩肋痞滿

藏器

健脾開胃氣溫腸殺魚肉毒

補水臟治腎氣壯筋骨

日華

主膈氣消食滋食味

李珣

附方新二門挫腰痛

蕷蘿作

末酒服

二

牙齒疼痛

舶上

蕷蘿葉子白芥子等分研末口

中

含水隨左右噏鼻神効

聖惠方

附錄蜀胡爛

拾遺藏器

日子味辛平無毒

主冷氣

心腹脹滿補腎除婦人血氣

下痢殺

蟲生安南似

似

數低

拾遺藏器

日子味甘溫無毒

主冷風冷氣

下宿食又

牙齒蟲生安南似

可和食

似

數低

拾遺藏器

日子味甘溫無毒

主冷風冷氣

下宿食又

消脹滿生西番北土兼似

池得勒

拾遺藏器曰根

氣無毒破冷

懷香胡人以作羹食之

馬思荅吉

時珍曰味苦溫

無毒

根也胡人食之

去邪惡氣

溫中利膈

順氣止痛生津解渴令人口香

元時飲

膳用之云極香料也不知何狀故附之

羅勒

宋嘉附

釋名

蘭香

嘉祐

香菜

綱目

醫子草

禹錫曰

北人避石勒

諱呼羅勒爲

蘭香

時

勒爲

集解

禹錫曰

羅勒處處有之

有三種

一種似紫蘇

葉一種

葉大二十步內卽聞香

一種堪作生

物者

子可安入目中去醫少頃溼脹與

一種堪作生

葉生時種之乃

菜冬月用乾

葉者

子可

安入目中去

醫少頃溼脹與

一種堪作生

物俱出也

時珍曰

香菜須

三月叢葉生時

種之乃

生否則不生常以魚腥水米泔水澆之則

香而茂不宜糞水

耀仙神隱書言

園邊水側宜廣

廣

水澆之則

廣

水澆之則

廣

水澆之則

廣

種之饑年亦可濟用其子大如蚤褐色而不光七月收之○弘景曰術家取羊角馬蹄燒作灰撒溼地遍踏之卽生羅勒俗呼爲西王母菜食之益人

氣味辛溫微毒

禹錫曰不可多食壅關節澀營衛令人血脈不行又動風發腳氣

主治調中消食去惡氣消水氣宜生食療齒根爛瘡爲灰用之甚良患嘔嘔者取汁服半合冬月用

乾者煮汁其根燒灰傅小兒黃爛瘡

禹錫主辟飛尸

鬼疰蠱毒

吳瑞

發明

時珍曰按羅天益云蘭香味辛氣溫能和血潤燥而掌禹錫言多食澀營衛血脈不行何

耶又東垣李氏治牙疼口臭神功丸中用蘭香云無則以蘭香代之此但取其去惡氣而已故飲膳

正要云與諸藥同食味辛
香能辟腥氣皆此意也

附方

新

鼻疳赤爛

蘭香葉燒灰二錢銅青五分輕
粉二字爲末日傳三次錢乙

小兒方

反胃欬噫

生薑四兩搗爛入蘭香葉一兩椒
末一錢鹽和麵四兩裏作燒餅煨

熟空心喫

不過兩三度効反
胃入甘蔗汁和之

普濟方

**子主治目翳及塵物入目以三五顆安目中少頃
當溼脹與物俱出又主風赤眵淚祐**

發明

時珍曰

按普濟方云昔廬州知錄彭大辨在

每納一粒入背內閉目少頃連膜而出也

一方爲末點之時珍常取子試之水中亦脹大蓋此子得

溼卽脹故能染惹眵淚浮膜爾然目中不可着

一塵而此子可納三五顆亦不妨碍蓋一異也

附方

新

目昏浮腫

蘭香子每用七個睡時水煎服之久久有効也海上名方

走馬牙疳

小兒食肥甘腎受虛熱口作臭息

次第齒黑名曰崩砂漸至齦爛名曰潰槽又

或血出名曰宣露重則齒落

名曰腐根用蘭香子末輕粉各一錢蜜陀僧醋淬研末半兩和勻每以

少許傅齒及齦上立効內

服甘露飲活幼口議

白花菜

食物

釋名羊角菜

集解

時珍曰白花菜三月種之柔莖延蔓一枝五葉葉大如拇指秋閒開小白花長蕊結小角

長二三寸其子黑色而細狀如初眠蠶沙不光澤

菜氣臭惟宜鹽菹食之穎曰一種黃花者名黃

花菜形狀相同但花黃也

氣味

苦辛微毒

穎曰多食動風氣滯臟腑令人胃中悶滿傷脾主治下氣時

穎煎水洗痔搗爛敷風溼痺痛擂酒飲止瘡

時

汪穎煎水洗痔搗爛敷風溼痺痛擂酒飲止瘡

蔊菜

音罕綱目

校正

併入草部拾遺蔊菜

釋名

蔊菜

音罩

芥米菜

時珍曰

蔊味辛

芥如火

燄人

辛味

芥如火

燄人

蔊菜

云辛菜也

篇並無

蔊字止有

蔊字云辛

菜也著形狀

今攷唐韻玉

爾訛

集解

時珍曰

蔊菜生南地

田園閒小草也

冬月布

地叢生長

二三寸柔梗

細葉二月開細花

黃

色結細角長一

二分角內有細子

野人連根葉拔

而食之味極辛

芥呼爲芥米

菜沙地生者尤伶仃

故洪舜俞老圃賦云

蔊有拂士之風

林洪山家清

供云朱文公飲後輒以

蔊莖供蔬品

蓋盱江建陽

供云

朱文公飲後

輒以蔊莖供

蔬品蓋盱江

建陽

嚴陵人皆喜食之也

氣味辛溫無毒

李廷飛曰：蔊菜細切以生蜜洗拌或略汋食之，爽口消食多食發痼疾。

藏器曰：生熱病。

主治去冷氣腹內久寒飲食不消令人能食

藏器曰：利胸膈害冷。

生小兒有疎。

草豉

拾遺

校正

自草部移入此

集解

藏器曰：生巴蜀諸國草似韭狀，或出花中，被人食之。

氣味辛平無毒

主治惡氣調中益五臟開胃令人

能食

藏器

本草綱目菜部第二十六卷終