


1997
• 95
sect. 5
c. 2



SYNOPSIS

PLANTARUM

SEC

ENUMERATIO SYSTEMATICA

**PLANTARUM PLERUMQUE ADHUC COGNITARUM CUM
DIFFERENTIIS SPECIFICIS ET SYNONYMIS
SELECTIS**

AD MODUM PERSOONII ELABORATA

AUCTORE

DR. DAVID DIETRICH,

SOCC. PLUR. LITT. SODAL.

*LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN*

SECTIO QUINTA.

CLASSIS XX—XXIII.

VIMARIAE, 1852.

SUMTIBUS ET TYPIS BERNH. FRIEDER. VOIGTL.

QK97

D5

ALM 5

c.2

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

MURATA, KIYOKO

SOIL MICROBES AND PLANT GROWTH

AND THEIR USE IN SOIL FERTILITY MANAGEMENT
BY KIYOKO MURATA, WITH A FOREWORD BY
TOMOJIRO KOBAYASHI

TRANSLATED FROM THE JAPANESE BY

YOSHIO TSUJIKI

THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

V o r r e d e.

LAMMERS
VON VOR
WILHELM
MANNS

Obgleich dieses Werk ursprünglich im Ganzen nur auf 100 Druckbogen berechnet war, so sah der Herausgeber doch schon bei Erscheinen der Sect. I ein, dass diese Bogenzahl bei weitem nicht zureiche; dass aber dieselbe bei weitem mehr als das Doppelte übersteigen würde, lag doch ausser seiner Berechnung. Doch war es nun einmal nicht zu vermeiden, indem, um dem zu Grunde liegenden Plane treu zu bleiben, alle zu Gebote stehenden botanischen Hilfsmittel benutzt werden mussten, und namentlich in dem vergangenen Jahrzehend eine so ungeheure Zahl neuer Pflanzen beschrieben wurde, dass die folgenden Classen fast ums Doppelte stärker geworden sind.

Von der Verlagshandlung wiederholt angewiesen, das Werk so viel wie möglich abzukürzen, konnte dieses nicht mit willkürlicher Weglassung von Gattungen und Arten geschehen, allein um doch obiger Nothwendigkeit zu genügen und endlich den Schluss zu erreichen, wurde bei den Gattungen und Arten nur der abgekürzte Name des Autors, von welchem sie benannt wurden, hinzugefügt, und da erst dessen Werk selbst angeführt, wo eine Abbildung zu citiren war. Ebenso wurden zu ausführliche Diagnosen, so viel wie möglich abgekürzt, doch ohne dem Ganzen zu schaden.

Zwar wurde bei'm Erscheinen der Sect. IV versprochen, am Schlusse der Sect. V noch ein Generalregister zu liefern, allein es musste dieses, da schon die Beschreibung der Gattungen und Arten der 20—23. Classe bei weitem die festgestellte Bogenzahl überstieg, leider weggelassen werden.

Zwar standen dem Autor bei Ausarbeitung der Sect. V bei weitem mehr Hilfsmittel zu Gebote, als bei den früheren Sectionen, aber dennoch musste er einzelne Werke unberücksichtigt lassen, die ihm bei sehr schwieriger Anschaffung unzugänglich waren. Die Orchideen wurden nach Lindleys Werken aufgezählt, die Urticeen theilweise nach Miquel, bei den Mimoseen wurden Bentham's Arbeiten benutzt. Die Palmen wurden, um die neuesten Arbeiten von Martius nicht unberücksichtigt zu lassen, in dieser Section nochmals abgehandelt.

Da es sich aber, wenn dieses nun endlich vollendete Werk nicht schnell wieder veralten soll, nöthig macht, die während der Ausarbeitung der 5 Sectionen, neuen Gattungen und Arten, welche nicht mit aufgenommen werden konnten, in einem Supplementbande zu liefern, dem dann auch ein Generalregister beigefügt werden soll, so wird Unterzeichneter sehr gern dazu bereit sein, wenn die Verlagshandlung hierzu durch einen kostendeckenden Absatz des nun completen Werkes nur einigermassen in den Stand gesetzt wird, denn da viele Subscribers während der Dauer von 13 Jahren, welche diese 5 Bände zu ihrer Vollendung bedurften, durch den Tod oder sonst wie abgesprungen sind, so konnte dieselbe nur mit grossen Opfern des Verlegers ermöglicht werden. Viele zweifelten auch, dass das Werk jemals vollständig werden würde. Jetzt sind diese Zweifel gehoben und sollte hieraus dem Verleger mehr Unterstützung und grösserer Absatz resultiren, so wird er gewiss gern zu einem Supplementband mit den inzwischen nöthig gewordenen Ergänzungen, Nachträgen und dem Generalregister die Hand bieten.

CLASSES XXX.

GYNANDRIA.

MONANDRIA.

Orchidaceae.

ORDO I. *Malaxideae.* Pollen massis ceravis definitis cohaerens, stigmenti immediate applicatum, tela cellulosa accessoria nulla. Anthera terminalis v. opercularis.

1. *Pleurothallaeae.* Lindl. orchid.
3. *Columna erecta orario continua*
v. basi parum producta.

4396. Pleurothallis. Sepala conniventia, lateralia v. omnia connata. Petala minora. Labellum liberum columnae parallelum disforme integerrimum. Columna elongata aptera. Pollinia 2 saepius caudicula pulvrea apice juncta.

4397. Cadetia. Sepala patentia lateralia obovata. Petala minora subulata. Labellum concavum calcaratum 3-lobum calcare retusodidymo. Clinandrium bidentatum. Anthera 1-locularis.

4398. Seelochilus. Sepala conniventia carinata basi coalita calcarata. Petala aequalia. Label- lum integrum inferne attenuatum basi fidum margine infra medium bicorne disco calloso puberulo, antice biden- dato. Columna apice emarginata.

4399. Speclinia. Sepala conniventia lateralia basi connata. Petala nana. Labellum liberum basi saccatum petalis conforme. Columna membranaceo-alata. Anthera bilocularis. Pollinia 2 caudiculae insiden- tia.

4400. Physosiphon. Sepala in tubum ventricosum apice tri-
V.

fidum connata. Petala nana carnosa. Labellum nanum. Columna ovario continua nana mutica. Pollinia 2 sphaerica.

4401. Acianthera. Sepala conniventia, lateralia connata supremum galeatnm. Petala minora cuneiformia. Labellum cum columna articulatum trilobum lobis lateralibus acutis intermedio obtuso. Columna alata apice lacerata.

4402. Aspegrenia. Sepala conniventia. Petala aequalia. Label- lum cum columnae basi continuum, breve unguiculatum erectum 3-fidum, lacinis lateralibus filiformibus intermedia 3-loba. Columna nana. Anthera 4-locularis nuda. Pollinia 8 collateralia.

4403. Octomeria. Sepala patentia basi subconnata. Petala se- palis conformia. Labellum basi sac- catum subtrilobum cum pede columnae articulatum. Columna elongata. Anthera 4-locularis crista callosa. Pollinia 8 cohaerentia.

4404. Lepanthes. Sepala patentia lateralia altius connata. Petala nana. Labellum bilobum. Columna elongata teres. Anthera ?

4405. Stelis. Sepala glo- bose-conniventia subconnata. Petala nana. Labellum conforme. Columna nana. Anthera 1-locularis. Pollinia 2 ceracea ovata viscosa.

4406. Osyricea. Sepala subringentia basi subconnata. Petala minuta. Labellum ungue calloso articulatum ventricosum indivisum limbo glanduloso. Anthera semibilocularis

apice in laminam glaudulosam expansa. Pollinia pulposo - ceracea.

4407. Chrysoglossum.

Sepala ringentia basi subconnata. Petala subaequalia. Labellum basi auriculatum intus lineis prominentibus cristatum. Pollinia 2 subgloboso-anugula libera.

4408. Gastroglossis. Sepala patentia lateralia connata. Petala conformia. Labellum semitrifidum. Anthera denticulo dorsali affixa 2-locularis. Pollinia 4 obovata per paria pilis glutinosis cohaerentia.

4409. Restrepia. Sepala lateralia omnino connata. Petala filiformia basi subconnata. Labellum conforme basi biauriculatum. Columna apice in alam producta. Pollinia 2 ceracea oblonga.

4410. Oberonia. Sepala subreflexa libera. Petala linearia saepe erosa. Labellum adscendens saepius 4-lobum elongatum. Pollinia 2 solida filiformia.

4411. Titania. Sepala lateralia reflexa, supremum angustius patens. Labellum adscendens trilobum. Columna libera apice utrinque 1-dentata. Pollinia 4 incumbentia.

4412. Carteretia. Sepala lateralia basi obliqua acuta supremum obtusum. Petala minor obtusa. Labellum concavum calcaratum, 3-lobum, lacinia intermedia 3-fida. Anthera antice apiculata.

4413. Empusa. Sepala lateralia basi inaequalia. Petala linearia patula. Labellum cucullatum bituberculatum limbo indiviso. Columna elongata apice alata. Pollinia 4 collateralia.

4414. Platystylis. Sepala patula, lateralia angustiora. Petala filiformia. Labellum integrum medio sulcatum. Columna compresso - dilata stigmate emarginata. Pollinia 4 collateralia.

4415. Microstylis. Sepala patentia libera. Petala filiformia patula. Labellum patentissimum sagittatum integerrimum v. denticulatum. Columna apice bidentata. Pollinia 4 apice per paria cohaerentia.

4416. Dienia. Sepala patentia libera. Petala filiformia. Labellum erectum acute trilobum margine callosum. Columna clavata elongata

gata v. cum labello minutissima. Pollinia 4 apice per paria cohaerentia.

4417. Malaxis. Sepala patula libera. Petala minora. Labello concavum integerrimum. Columna minima apice utrinque dentata. Pollinia 4 incumbentia.

4418. Nephelaphyllum. Sepala linearia subreflexa. Petala conformia. Labellum calcaratum linea media elevata integerrimum. Anthera 3-angulatis. Pollinia 8 subquadrata quaternaria incumbentia.

4419. Corallorrhiza. Sepala conniventia oblongo-linearia. Petala conformia. Labellum patens ecalcaratum 3-lobum lobis lateralibus minimis. Anthera terminalis. Pollinia 4 subglobosa incumbentia.

4420. Liparis. Sepala patula libera lateralia saepius breviora. Petala filiformia. Labellum bituberculatum integrum. Columna elongata incurva apice marginata. Pollinia 4 collateralia.

4421. Dendrochilum. Sepala patentia petalis conformia. Labellum integerrimum concavum subcristatum. Columna antice bicornis apice dentata v. rostrata. Anthera insra biciliaris bilocularis. Pollinia 4 libera incumbentia.

4422. Otochilus. Sepala patentia petalis conformia. Labellum trilobum lobis lateralibus columnam amplectentibus intermedio elongato. Anthera bilocularis. Pollinia 4 basi granuloso - cohaerentia.

4423. Coelia. Sepala libera patentia. Petala minora. Labellum integerrimum. Columna nana. Anthera bilocularis connectivo cohaerentes. Pollinia 4 per paria cohaerentia.

4424. Pholidota. Sepala globoso - conniventia. Labellum 3-lobum v. integrum. Columna teres v. alata. Anthera bilocularis 2-4-valvis. Pollinia 4 globosa.

4425. Dilochia. Sepala conniventia. Labellum 3-lobum basi subsaccatum. Columna clavata alata apice dentata. Anthera 4-locularis cristata. Pollinia 4.

4426. Earina. Sepala acuta. Petala miuora carnosa obtusa. Labellum carnosum cucullatum trilobum. Columna nana. Pollinia 4 per paria cohaerentia.

4427. Coelogyne. Sepala et petala conformia. Labellum cucullatum 3 - lobum lineis disci elevatis v. cristatis v. integerrimum ecristatum. Columna alata. Stigma bilabiatum. Pollinia 4 libera v. granuloso - cohaerentia.

4428. Myoxanthus. Sepala basi in cyathum connata elongato - filiformia. Petala conformia. Labellum nanum cum columnae pede articulatum. Columna aptera apice marginata. Anthera 1 - locularis. Pollinia 2 caudicula nulla.

4429. Hexisea. Sepala clausa angusta. Petala subaequalia. Labellum postice cum columna connatum refractum' integerrimum. Columna apice biaurita. Anthera bilocularis. Pollinia 4 granuloso - cohaerentia.

4430. Paxtonia. Sepala et petala labello conformia. Columna subclavata rima stigmatis subrostellata. Anthera opercularis decidua. Pollinia 8 angusta clavata apice cohaerentia.

4431. Mesosclastes. Sepala libera petalis aequalia. Labellum integrum concavum subcochleatum medio interruptum. Columna nana aptera. Pollinia 2 medio foveolata.

4432. Diploconchium. Sepala reflexa ovata. Petala linearia. Labellum carnosum medio constrictum 3 - lobum. Columna superne cucullata - excavata. Anthera bilocularis 4 - locellata. Pollinia 4 basi cohaerentia.

4433. Evelynia. Sepala erecta libera. Labellum cum pede columnae continuum obcordatum basi bicallosum disco nudum. Antherae loculis 4 incomplete locellatae. Pollinia 8 basi quadratim cohaerentia.

2. *Dendrobieae. Lindl. orch. p. 45. Columna ovario incumbens, basi longius producta.*

4434. Cochlinia. Sepala erecta lateralia connata. Petala minora. Labellum cum pede columnae articulatum, superne in limbum semilunatum margine revolutum et verrucosum dilatum. Columna apice bicornis. Pollinia 2 libera ovata.

4435. Lyracea Lindl. Sepala conniventia inaequalia lateralia inter se cum pede columnae connata. Petala nana spathulata. Labellum bilo-

bum. Columna nana. Pollinia 2 in unum connata.

4436. Megaelinium. Sepala erecta inaequalia lateralia minora cum columna connata. Petala nana. Labellum cum basi columnae elastice articulatum integrum numanum. Columna nana marginata. Pollinia 4 per paria cohaerentia.

4437. Bulbophyllum. Sepala erecta acuminata cum pede columnae connata. Labellum cum pede columnae articulatum unguiculatum saepius integrum v. posticum. Columna bidentata v. bicornis. Pollinia 4 per paria cohaerentia.

4438. Cirrhopetalum. Sepala ringentia lateralia multo longiora acuminatissima valde obliqua. Petala minora. Labellum integrum cum basi columnae articulatum. Columna minima basi longe producta apice cornibus 2 petaloideis. Pollinia 4, duo interiora multo minora lamelliformia.

4439. Bryobium. Perianthium villosum connivens. Labellum ovatum indivisum inappendiculatum basi constrictum. Pollinia 8 incumbentia.

4440. Trias. Sepala patentia ovata. Petala minora erecta. Labellum minimum indivisum margine subdentatum. Anthera in membranam petaloideam connatam producta.

4441. Macrostomium. Sepala reflexa, lateralia in calcar connata. Labellum ecalcaratum unguiculatum concavum, limbo elongato supra columnam fornicato. Columna nana canaliculata. Pollinia 2 bipartibilia stigmatis margini ligulato adhaerentia.

4442. Microcoelia. Sepala libera aequalia. Petala conformia paucis minora. Labellum cum columnae articulatum calcaratum, calcare ventricoso, limbo indiviso nano. Columna minima. Pollinia 2 libera medio foveolata.

4443. Epierianthes. Sepala integra patula. Petala multifida lacinii clavatis. Labellum breve cum columnae pede incurvo articulatum integrum margine revolutum glandulosum. Pollinia 2 ovata.

4444. Monomeria. Sepala ringentia, interstitio denticulato intus barbata. Petala nana. Labellum ovatum 3 - lobum, disco lamellis 4 paral-

lelis lobis laterale antrorsum falcatis apice bidentatis. Columna longe producta apice minute bicornis. Pollinia cohaerentia.

4445. Stenoglossum. Sepala conniventia. Petala conformia minora. Labellum posticum cum columna in urceolum connatum, limbo longe unguiculato. Pollinia 4 libera.

4446. Diglyphis. Sepala ringentia. Petala latiora. Labellum pedi columnae elastice adhaerens ascendens concavum intus membranaceo - cristatum. Columna apice incurva. Anthera antice bifida. Pollinia 2 compressa.

4447. Mycaridantes. Sepala conniventia extus lanata. Petala minora. Labellum articulatum trilobum cucullatum disco cristato v. appendiculatum. Columna marginibus alatis introflexis. Pollinia 8 ovata parva.

4448. Phreatia. Sepala conniventia. Petala minora. Labellum integrum carnosum cum pede columnae articulatum. Columna margine membranaceo. Anthera bilocularis. Pollinia 8 sphaerica viscosa cohaerentia.

4449. Eria. Sepala clausa exlus lanata v. glabra basi calcar simulantia. Labellum 3-lobum cucullatum disco calloso v. cristato. Pollinia 8 libera, v. materia elastica cohaerentia.

4450. Porpax. Sepala subaequalia in tubum connata lateralia basi obliqua columna adnata. Labellum carnosum cum pede columnae articulatum basi tuberculo auctum. Columna nana aptera. Pollinia 8 per paria inaequalia.

4451. Aporum. Sepala carnosa obliqua. Petala minora. Labellum articulatum integrum v. trilobum limbo cristato calloso v. nudo. Columna basi longe producta. Anthera bilocularis. Pollinia 4 per paria collateralia.

4452. Oxytophyllum. Sepala et petala erecta aequalia. Labellum cum pede columnae articulatum indivisum limbo carnosu subtus tuberculato. Columna basi longe producta. Anthera columnae denti dorsali insidens. Pollinia 2 non partibilia.

4453. Polystachya. Sepala acuta cum pede columnae connata. Petala minora. Labellum sessile trilobum. Pollinia 4 per paria cohaerentia.

4454. Metachilum. Sepala conniventia. Petala nana. Labellum ventricosum integrum cum margine pedis columnae connatum intus appendiculatum. Stigma prominens apice membranaceo - bilobum. Anthera 2 - locularis dorsalis.

4455. Macrolepis. Sepala erecta acuminata. Petala nana conformia. Labellum erectum oblongo-lineare carnosum anceps utrinque lobulis 2 auctum. Columna elongata apice antrorsum bicornis.

4456. Dendrobium. Sepala membranacea erecta v. patula lateralia majora obliqua. Petala conformia minora. Labellum sessile indivisum v. 3-lobum saepius appendiculatum. Pollinia 4 per paria collateralia.

4457. Hexameria. Sepala in saccum maximum producta. Labellum e basi calcaris ortum unguiculatum, lamina superne indivisa basi biseta. Columna brevissima. Pollinia 6 in loculis 2.

4458. Hexadenia. Sepala triangulare basi in calcar spurium connata. Petala oblonga. Labellum cum pede columnae articulatum sub-integrum plicatum. Clinandrium auriculis lateralibus et dente postico acuminato marginatum. Anthera carnosia 6-locularis.

3. *Epidendreae Lindl.* Pollen massis ceraceis definitis cohaerens, tela cellulosa caudiculis elasticis pulvereis saepe replicatis cohaerente; glandula propria nulla.

4459. Collabium. Sepala reflexa in calcar connata. Labellum ecalcaratum, limbo semilunato basi intus bicalloso columnam amplectente. Pollinia 2 ovato-globosa caudiculus affixa.

4460. Epidendrum. Sepala patula. Petala subangustiora. Labellum ungue columnae omnino v. parum concreatum disco costato v. tuberculato interdum in calcar ovario adnatum productum. Columna elongata, clinandrio saepius marginata. Anthera affixa.

carnosa 4 - locularis. Pollinia 4 caudiculis 4 replicatis.

4461. Schomburgkia. Sepala et petala patentia conformia. Labellum dissimile membranaceum trilobum cucullatum basi cum margine columnae connatum supra basin tumidum venis lamellatis. Pollinia 8.

4462. Dinema. Sepala herbacea patula. Petala conformia. Labellum majus membranaceum indivisum unguiculatum cum basi columnae connatum. Columna nana bicornis. Pollinia 4, per paria caudiculis 2 replicatis adnata.

4463. Hartwegia. Sepala patula colorata. Petala paulo minora. Labellum cum columna connatum basi gibbosum limbo ovato basi calloso. Pollinia 4 olivaceo - purpurea.

4464. Diothonea. Sepala conniventia distincta supremo convexo. Labellum cum cyatho e columnae lateribus formato articulatum obsolete lobatum, foliolis lateralibus longe dependens. Columna erecta clinandrio cucullato. Pollinia 4 solida pyriformia.

4465. Encelia. Sepala patula subaequalia. Labellum posticum cucullatum columnam involvens apice trilobum basi callosum. Columna libera clavata. Pollinia 4 collateralia caudiculis totidem revolutis.

4466. Isochilus. Sepala conniventia, lateral. subdilatata et basi connata. Labellum cum columna articulatum indivisum perigonii foliolis conforme. Columna clavata bitricornis. Pollinia 4 caudiculis ligulatis replicatis.

4467. Arophyllum. Sepala patula lateralia basi in gibbas connata. Petala angustiora. Labellum cum columnae basi producta articulatum indivisum concavum calcaratum. Pollinia 8 pyriformia.

4468. Ponera. Sepala membranacea conniventia basi in saccum conuata. Petala multo angustiora. Labellum posticum, ungue concavo adscendente lamina refracta linearis subsagittata truncata subemarginata. Pollinia 4, caudiculis totidem reflexis.

4469. Brassavola. Sepala et petala conformia acuminata. Labellum cucullatum integrum columnam involvens. Columna clavata mar-

ginata, stigmate infundibulari, clinandrio postice tridentato. Pollinia 8, minoribus intermixtis.

4470. Laelia. Sepala explanata. Petala majora disformia carnosa. Labellum tripartitum lamellatum circa columnam convolutum. Columna carnosa aptera antice canaliculata. Pollinia 8, caudiculis 4 elasticis.

4471. Cattleya. Sepala carnosa patula. Labellum cum columna articulatum cucullatum integrum v. trilobum columnam involvens. Columna clavata elongata marginata. Pollinia 4 caudiculis totidem replicatis.

4472. Broughtonia. Sepala patula angusta cum labelli basi connata et decurrentia. Petala latiora. Labellum indivisum ascendens in calcar lineare decurrens. Columna crassa brevis. Pollinia 4, caudiculis totidem.

4473. Barkeria. Sepala et petala membranacea patentissima. Labellum columnae adpressum planum integerrimum nudum cuneatum c. appendiculo. Columna petaloidea. Pollinia 4 caudiculis totidem erectis.

4474. Trichosma. Sepala patula. Petala erecta. Labellum 3-lobum cristatum cum pede columnae articulatum. Columna carnosa marginata. Anthera fornicata bilocularis. Pollinia 8.

4475. Leptotes. Sepala patula linearis. Labellum posticum columnae parallelum trilobum laciinis lateralibus minoribus circa columnam convolutis intermedia oblonga marginibus reflexis. Columna brevis crassa. Pollinia 6 inaequalia 2 pyriformia.

4476. Tetramicra. Sepala linearis - oblonga patula. Labellum columnae parallelum explanatum tripartitum, lacinia intermedia subunguiculata disco lineata, basi in calcar ovario adnatum decurrens. Columna elata in labellum procurrentis. Pollinia 8 alterna minima.

4477. Spathoglottis. Sepala libera. Petala paulo latiora. Labellum cum basi columnae articulatum saepius saccatum tripartitum lacinia intermedia unguiculata basi tuberculata v. cristata utrinque 1 - dentata. Columna alata petaloidea. Pollinia 8.

4478. Bletia. Sepala patula aequalia. Labellum cum columnae basi articulatum cucullatum saepius

saccatum trilobum disco lamellato v. tuberculato. Columna elongata semi-teres. Anthera 8-locularis. Pollinia 8, caudiculis 4 pulvereis.

4479. Ipsea. Sepala pubescentia explanata cum pede columnae connata saccum mentientia. Labellum ungue brevi saccato cum pede columnae articulatum concavum trilobum lamellatum. Columna elongata semi-teres. Anthera bilocularis. Pollinia 8, caudiculis 4 pulvereis.

4480. Pesomeria. Sepala et petala libera caduca. Labellum posticum cum basi columnae connatum basi gibbosum, limbo indiviso convoluto. Columna clavata clinandrio dentato.

4481. Arundina. Sepala patula linearis-lanceolata basi subconnata. Labellum columnae continuum circa eandem convolutum 3-lobum v. integrum disco cristatum v. elevato-lineatum, lobis plicatis. Anthera 4-locularis. Pollinia 8.

4482. Phajus. Sepala subaequalia patula. Petala conformia. Labellum cucullatum basi columnae adnatum calcaratum integrum v. 3-lobum disco lamellosa v. cristata. Columna elongata marginata. Anthera 8-locularis. Pollinia 8 subaequalia.

4483. Cytheris. Sepala patula subaequalia supremum recurvum. Labellum posticum planum calcaratum disco cristatum. Columna brevis alata. Pollinia 8 aequalia.

4484. Tylostylis. Sepala erecta patula lateralia subtus connata. Petala paullo angustiora. Labellum elastice articulatum parvum integrum disco callosum. Columna incurva clavata. Pollinia 8 subcompressa caudiculis connata.

4485. Ania. Sepala linearis-lanceolata conniventia. Labellum cum basi columnae interdum producta in calcar v. saccum connatum 3-lobum planum medio lamellatum. Columna elongata alata. Anthera 6—8-locularis. Pollinia 8.

4486. Cylindrolobus. Sepala subringentia. Petala breviora subconniventia. Labellum cum pede columnae articulatum adscendens concavum intus cristatum, limbo semitri-lobo undulato fornicato. Anthera 4-locularis. Pollinia 8.

4487. Apaturia. Sepala pubescentia patula lateralia majora. Petala angustiora patula. Labellum unguiculatum articulatum basi ventricosum carnosum apice trilobum disco cristatum. Columna clavata clinandrio alato. Anthera 4—8-locularis. Pollinia 8.

4488. Trichotosia. Sepala pubescentia erecta. Petala glabra. Labellum unguiculatum limbo integer-rimo v. sublobato. Columna basi longe producta. Pollinia 8 aequalia cohaerentia.

4489. Mitopetalum. Sepala ringentia acuminatissima petalis conformia. Labellum indivisum acuminatum intus lineatum sepalis brevius. Columna recta basi producta. Anthera carnosa bilocularis. Pollinia 8 materia pulverea cohaerentia.

4490. Drymoda. Sepala lateralia cum pede columnae longissime connata acuminata sessilia. Petala nana. Labellum cum pede columnae articulatum trilobum convexum lobo medio deflexo. Columna nana auri-cula longa, basi in pedem longissimam elongata.

4491. Plocoglottis. Sepala ringentia labello supposita basi connata. Petala minor a pice incurva. Labellum basi utrinque plicis membranaceis inflexis columnae connatum limbo indiviso. Anthera 4-locularis. Pollinia 4 subglobosa, caudiculis 2 longis cohaerentia.

4492. Physinga. Sepala membranacea basi connata. Petala minora. Labellum carnosum tuberculatum indivisum columnae inferne connatum sacco vesicaeformi basi auctum. Columna carnosa nana biloba ima basi antherifera.

4493. Sophronitis. Sepala patula petalis latiora. Labellum integrum cucullatum linguaeforme medio crista transversa simplici. Columna apice alata. Anthera 8-locularis. Pollinia 8 caudicula duplice pulverea.

**4. Vandae Lindl. orch. p. 135. Pol-
len massis ceraceis definitis co-
haerens, sub anthesi lamellae elasti-
cae et stigmatis glandulae affixum.
Anthera terminatis raro dorsalis
opercularis.**

4494. Melicin. Sepala et petala coriacea conformia patula. La-

bellum patulum membranaceum planum medio constrictum utrinque appendice carnosa truncata medio foveata basi pilosum. Clinandrium undique fimbriatum. Pollinia 2 glandula parva ovali.

4495. Nanodes. Sepala ringentia posticum fornicatum. Labellum cum columna connatum carnosum indivisum. Columna clinandrio alato. Anthera bilocularis rostrata. Pollinia 4 compressa in glandula ovata sessilia.

4496. Aspasia. Sepala patula aequalia posticum cum petalis connatum. Labellum oblongum concavum ecalcaratum obsolete 4-lobum. Columna marginata. Pollinia 2 pyriformia postice sulcata, caudicula plana glandula parva.

4497. Ornithidium. Sepala clausa aequalia petalis conformia. Labellum cum basi columnae connatum cucullatum disco callosum. Columna rostello brevissimo. Anthera bilocularis. Pollinia 2 in glandula parva triangulare sessilia.

4498. Dactylostylis. Sepala demum reflexa ovata. Petala transverse fimbriata. Labellum cum basi columnae connatum naviculiforme fimbriatum adscendens basi glandula lata bilobata cinctum. Columna elongata rostello longissimo adscendente.

4499. Aeropsis. Sepala patula basi in unum connata. Labellum cum basi columnae in tubum connatum, limbo patente cordato cristato. Columna erecta utrinque cornibus 2 porrectis apice glandulosis. Anthera in clinandrium cucullatum abscondita. Pollinia 2 fusiformia caudicula filiformi.

4500. Seraphyta. Sepala petalis latiora. Labellum porrectum basi cum columna connatum ecallosum planum ecalcaratum. Columna apice oblique truncata. Pollinia 4 clavata caudicula elongata, glandulae hyalinae.

4501. Trizeuxis. Sepala globosa conniventia. Labellum basi columnae brevissime adnatum integrum concavum acutum. Anthera 1-locularis carnea. Pollinia 4 basi discreta.

4502. Ornithocephalus. Sepala patula obtusa lateralia reflexa supremum fornicatum. Labellum posticum ecalcaratum acuminatissimum. Columna aptera rostello elongato sub-

alato. Pollinia 4 solida, caudiculae longissimae.

4503. Cirrhaea. Sepala libera petalis multo latiora. Petala linearia flexuosa. Labellum continuum longe unguiculatum tripartitum, lacinias angustis intermedia minore. Columna teres clavata. Anthera incomplete bilocularis. Pollinia 2 oblonga compressa.

4504. Aganisia. Sepala et petala aequalia haud producta. Labellum liberum mobile indivisum concavum. Columna emarginata apice utrinque brachio acuto patulo aucta.

4505. Sarcochilus. Sepala lateralia cum ungue labelli subtus connata interiora libera conformia. Labellum posticum continuum ecalcaratum calceiforme lobo intermedio carnosus solidus. Pollinia 2 in glandula deltoidea sessilia.

4506. Pilumna. Sepala et petala oblique inserta aequalia patula. Labellum basi columnae adnatum sub-integrum unguiculatum convolutum. Columna teres clinandrio cucullo dentato circumdato buccis duabus carnosis semiclausis. Pollinia 2 fissa glandulae ovatae adnata.

4507. Trigonidium. Sepala semiherbacea in cyathum trigonum conniventia apice patula. Petala duplo minora ventosa. Labellum nanum trilobum medio carnosum. Columna nana semiteres. Anthera 1-locularis. Pollinia 4 glandula triangulare insidentia.

4508. Stenia. Sepala lateralia basi obliqua. Labellum cum basi columnae continuum indivisum concavum. Columna mutica. Pollinia 4 geminata linearia.

4509. Huntleya. Sepala explanata, lateralia basi antice involuta. Labellum planum indivisum rhomboideum unguiculatum patens basi longe fimbriatum. Columna clavata apice cucullata margine alata.

4510. Warrea. Flores subglobosi subregulares. Labellum continuum indivisum lineis elevatis carnosis in medio. Columna semiteres clavata. Pollinia 4 glandula triangulare.

4511. Maxillaria. Sepala patula v. conniventia basi producta columba in saccum connata petalis conformia. Labellum cucullatum cum basi

producta articulatum sessile 3-lobum. Columna semiteres aptera. Anthera incomplete 2-locularis. Pollinia 2 bipartibilia v. integra caudiculis glandulae transversae affixa.

4512. Epiphora. Sepala libera acuta. Petala obovata. Labellum posticum cum columnae basi articulatum carinatum 3-lobum. Columna inversa, stigmate margine trituberculato. Anthera 1-locularis. Pollinia 4, caudiculae linearis affixa.

4513. Siagnanthus. Sepala ringentia. Labellum cum pede columnae articulatum adscendens medio infractum integrum. Columna basi producta arcuata clavata. Anthera bilocularis carnosa. Pollinia 2 postice biloba.

4514. Trichocentrum. Sepala patentia. Labellum cum marginibus columnae connatum elongato-calcaratum erectum integrum disco callosum. Columna nana apice fimbriato-ciliata. Anthera pilosa. Pollinia 2 integra caudicula bifida.

4515. Bifrenaria. Sepala patula, lateralia basi producta. Petala duplo minora. Labellum cum pede columnae mucronato-articulatum cucullatum 3-lobum medio callosum. Anthera subcristata mutica. Pollinia 4 per paria incumbentia caudiculis 2 distinctis.

4516. Batemania. Sepala patula. Petala latiora obliqua. Labellum 3-lobum cucullatum. Columna elongata semiteres clinandrio marginato. Anthera bilocularis parva. Pollinia 2 postice biloba glandula 3-angulari caudicula nulla.

4517. Scaphyglottis. Sepala conniventia supremo linearis convexo. Labellum columnae pedi parum producto eique parallelum oblongum canaliculatum margine subrepandum. Columna marginata. Pollinia 4 teretia in glandula cuneata sessilia.

4518. Dicrypta. Sepala erecta. Labellum cum columnae articulatum oblongum obsolete trilobum carnosum, callo disci interrupto. Columna clinandrio convexo. Anthera incomplete bilocularis. Pollinia 4 complanata, caudicula brevi linearis glandulae lunate affixa.

4519. Govenia. Sepala lateralia falcata labello supposita supremo paulo majora. Petala conni-

ventia breviora. Labellum integerimum ecalcaratum concavum sessile. Columna subfusiformis apice utrinque marginata. Anthera calypriformis 1-locularis. Pollinia 4 solida.

4520. Alemania. Perianthium patens. Sepala lateralia calcar referentia. Labellum petalis conforme basi glandulosum s. tuberculatum. Columna carnosa 3-cuspidata basi in calcar tubulosum producta. Anthera 4-locularis. Pollinia 4 pedicellata.

4521. Psittacoglossum. Perianthium patens. Sepala elongata lanceolata. Petala conformia angustiora incurva. Labellum crassum scabrum obscurae auriculatum ad unguem tuberculo concavo instructum. Columna subtriquetra. Anthera bilocularis. Pollinia 4.

4522. Cyanoches. Perianthium explanatum. Sepala lateralia lanceolata. Petala latiora falcata decurva. Labellum liberum ecalcaratum columnae continuum lanceolatum integrum ungue abrupto calloso. Columna elongata auriculis 2 ad latera clinandrii. Pollinia 2 postice subpedicellata.

4523. Zygostates. Sepala reflexa. Petala majora dilatata fimbriata. Labellum cum columnae articulatum cymbiforme patens basi intus cornutum et dentatum. Columna antice excavata, basi utrinque brachio linearis patentissimo apice globoso, rostello longissimo. Anthera rostrata.

4524. Catasetum. Sepala et petala globoso-conniventa subaequalia. Labellum crassum carnosum nudum ventricosum v. explanatum fimbriatum sub apice saccatum obsolete trilobum. Columna apice v. basi utrinque cirrhosa v. mutica. Pollinia 2 postice biloba v. sulcata.

4525. Stanhopea. Perianthium patentissimum. Sepala undulata. Petala conformia angustiora. Labellum liberum anticum ecalcaratum carnosum utrinque cornutum epichilio convexo hypochilio excavato. Columna elongata petaloideo-emarginata. Pollinia 2 elongata fissa.

4526. Cyclosia. Sepala conniventa inter se connata labello supposita. Labellum cum columnae basi continuum ecalcaratum planum nudum trifidum. Columna elongata tortuosa

longe apiculata antice concava. Pollinia 2 ovata biloba.

4527. Houlettia. Sepala concava. Petala angustata apice rotundata. Labellum cum columnae basi incurvata articulatum carnosum medio constrictum. Columna arcuata antice plana. Pollinia 2 basi connata.

4528. Gongora. Sepala patula divaricata. Petala minora columnae medio connata. Labellum cum basi columnae continuum unguiculatum hypochilio explanato utrinque cornuto, epichilio ancipiiti. Columna elongata emarginata. Pollinia 2 linearia.

4529. Coryanthes. Perianthium patentissimum. Sepala dilatata flexuosa conduplicata, lateralia maxima. Petala multo minora erecta. Labellum unguiculatum maximum galeatum tridentalum in medio unguis appendice poculiformi circumdatum. Columna bialata. Pollinia 2 compressa.

4530. Anguloa. Perianthium globoso - connivens. Sepala basi inter se connata. Petala minora. Labellum cum columnae basi continuum longe unguiculatum lamina adscendente calceiforme apice inaequaliter 3-loba. Pollinia 2 solida hinc sulcata pendula sessilia.

4531. Peristera. Perianthium globosum. Labellum columnae continuum erectum medio articulatum epichilio pulvinato obovato truncato, hypochilio bicorni. Columna basi magna dilatata. Pollinia 2 postice fissa.

4532. Eucnemis. Perianthium bilabiatum galeatum. Labellum indivisum. Columna alato - marginata. Pollinia 4 collateralia per paria connata.

4533. Cymbidium. Sepala et petala explanata aequalia. Labellum sessile liberum cum columnae basi articulatum v. subconnatum, indivisum v. trilobum. Columna erecta semiteres. Pollinia 2 postice biloba, in glandula subsessilia.

4534. Grobya. Sepala lateralia basi connata sigmoidea supremo erecto breviora. Petala dilatata majora conniventia. Labellum liberum nanum lobatum medium adscendens. Columna arcuata basi incrassata. Pollinia 2 postice lobata.

4535. Scleropteris. Sepala membranacea. Petala spathulata angustiora carnosa. Labellum unguicu-

latum cum basi columnae continuum saccatum utrinque connatum. Columna arcuata compressa apice truncata rostelllo longissimo. Pollinia 2 elongata compressa.

4536. Acropera. Sepala patula lateralia divaricata. Petala nana apice truncata subpatula. Labellum cum columnae basi elastice articulatum trilobum, lobo intermedio minore saccato. Columna saccato - concava. Pollinia 2 caudicula linearis - subulata, glandula minuta.

4537. Cremastra. Sepala libera, basi tubuloso - conniventia apice patula. Labellum columnae parallellum longe unguiculatum apice dilatum trifidum appendice ad basin limbi carnosa, naviculari adscendente. Columna elongata. Pollinia 4.

4538. Grammatophyllum. Sepala et petala aequalia. Labellum cum columnae articulatum nanum 3-lobum cucullatum. Columna basi callosa. Pollinia 2 globosa basi sulcata in apicibus glandulae lunatae sessilia.

4539. Trichoceras. Sepala et petala explanata. Columna nana villosa utrinque processu petaloideo piloso, rostelllo acuminato. Pollinia 2 solida obovata caudicula simplici elongata.

4540. Geodora. Sepala et petala subaequalia libera subsecunda. Labellum columnae continuum sessile cucullato - ventricosum basi saccatum. Anthera bilabiata. Pollinia 2 postice biloba.

4541. Acanthaphyllum. Sepala ventricosa conglutinata lateralia ungui columnae adnata, supremum cum petalis spathulatis forniciatum. Labellum cum pede columnae longe productum elastice articulatum limbo trilobo complicato disco lamelato. Pollinia 8 inaequalia.

4542. Doritis. Sepala lateralia basi valde obliqua, superius petalis obtusis conforme. Labellum cum columnae pede elastice articulatum flexum, lamina hastato - triloba, linea media clavata. Columna alato - marginata.

4543. Chelonanthera. Perianthium patens. Labellum cum basi columnae articulatum emarginatum utrinque inflexo - 1 - dentatum. Columna erecta petaloidea infra apicem antherifera. Pollinia 4 hemisphaerica.

4544. Acanthoglossum. Sepala et petala cuneiformia. Labellum basi ventricosum limbo reflexo patente bilobo interne bicalloso. Columna membranaceo-mARGINata. Anthera rostellum emarginato incumbens. Pollinia 4 glandula hamata.

4545. Sunipia. Perianthium ringens. Petala nana. Labellum integrum erectum. Columna nana. Anthera dorso affixa bilocularis. Pollinia 4 per paria glandulae communis affixa.

4546. Calypso. Sepala et petala secunda. Labellum concavum sub apice saccatum trilobum, lobis lateralibus connatis intermedio dilatato barbato suppositis. Pollinia 4, bipartita.

4547. Eulophia. Perianthium explanatum. Labellum sessile cornutum v. subcallosum trilobum v. indivisum, venis cristatis, barbatis v. omnino laevibus. Columna semiteres marginata. Pollinia 2 postice biloba.

4548. Dipodium. Perianthium patens. Labellum basi saccatum cum columna connatum utrinque infra medium auriculatum disco barbatum. Anthera bilocularis membranacea. Pollinia 2 oblique biloba.

4549. Galeandra. Perianthium subpatens. Labellum sessile infundibuliforme calcaratum indivisum margine fimbriato. Anthera galeaeformis crista recurva dorso clinandrii affixa. Pollinia 2 postice excavata cum glandula elongata.

4550. Zygopetalum. Sepala et petala adscendentia cum columnae pede connata. Labellum anticum indivisum patens ungue adscendente, crista magna transversa carnosa. Anthera incomplete bilocularis. Pollinia in glandula transversa subsessilia.

4551. Cyrtopodium. Sepala et petala aequalia. Labellum pedi columnae productum continuum unguiculatum 3-partitum explanatum calcaratum. Columna semiteres. Pollinia 2 postice biloba, glandula ovata.

4552. Chysis. Sepala et petala connata calcar simulantia. Labellum patulum trilobum venis basi callosis. Columna marginata mutica rostellum laminato. Anthera opercularis subrotunda glabra. Pollinia 8 in laminam luteam confusa.

4553. Cytopera. Sepala et petala adscendentia. Labellum ecalcaratum concavum ventricosum trilobum venis longitudinalibus callosis cristatis v. tuberculatis. Pollinia 2 postice biloba caudicula brevi subtriangularia.

4554. Lissochilus. Sepala parva reflexa. Petala maxima alaeformia. Labellum liberum v. pede columnae connatum saccatum concavum integrum v. trilobum. Anthera cristata. Pollinia 2 glandula triangulare.

4555. Chaenanthe. Sepala ringentia, lateralia connata columnae basi productae adnata saccata. Petala revoluta. Labellum cum columna connatum basi in calcar productum trilobum. Pollinia 2 pyriformia.

4556. Notylia. Sepala et petala aequalia. Labellum ecalcaratum patentissimum integrum. Columna teres acuminata. Anthera dorsalis. Pollinia 2 integra caudicula elongato-cuneata 1 glandula minuta.

4557. Masdevallia. Sepala in tubum connata apice libero longe ligulata. Petala nana. Labellum articulatum sessile oblongum concavum nanum. Columna incana. Pollinia 2 in caudiculis 2 filiformibus.

4558. Cryptochilus. Perianthium tubulosum fauce contractum basi antice gibbosum. Labellum basi columnae productae continuum liberum indivisum. Columna semiteres clinandrio 4-dentato. Pollinia 8 per paria columnae cohaerentia.

4559. Trichopilia. Sepala et petala patentia linearis - crispa. Labellum magnum convolutum trilobum, lobo intermedio subbilobo. Columna teres clinandrio villoso-fimbriato. Pollinia 2 postice sulcata glandula minima.

4560. Jonopsis. Sepala cum basi columnae connata. Labellum multo major basi saccatum ungue calloso, lamina explanata biloba. Columna aptera rostellata. Pollinia 2 postice sulcata, glandula obovata.

4561. Diadenium. Sepala angusta basi cohaerentia in calcar longum producta. Petala latiora. Labellum panduraeformi-oblongum disco subtus incrassatum. Columna clavata basi biaurita clinandrio marginato.

Pollinia 2 caudiculae apice dilatatae affixa.

4562. Quenettia. Sepala linearia basi gibbosa. Petala conformatia. Labellum oblongum integrum muticum basi excavatum bicallosum. Columna apice utrinque auriculata. Pollinia 2 glandula minuta.

4563. Comparettia. Sepala angusta calcarata. Petala latiora libera. Labellum posticum cum columna unguiculatum ungue basi subtus in cornua 2 producta, lamina reniformi integra v. bidentata. Columna marginato-membranacea medio inflata. Pollinia 2 in caudiculis 2 filiformibus.

4564. Rodriguezia. Sepala et petala subaequalia. Labellum unguiculatum integrum basi cornutum medio callosum. Columna teres apice barbata. Anthera 1-locularis, clinandrio nudo retrorsum declivi.

4565. Bourlintonia. Sepala et petala convoluta inter se connata. Labellum unguiculatum, apice dilatatum bilobum basi calcaratum, ungue canaliculato lamellato. Columna teres longe clavata, apice appendicibus 2 coloratis aucta, clinandrio stigmate utrinque cornuto. Pollinia 2 apice dilatata-bifida.

4566. Macradenia. Sepala et petala aequalia. Labellum sessile cucullatum concavum integrum acuminatum. Columna clavata lobis lateribus in cucullam antheram amplectantem conniventibus. Pollinia 2 caudicula basi longe angustata glandula ovali.

4567. Cryptarrhena. Sepala et petala obovata explanata. Labellum unguiculatum dependens ecalcaratum limbo truncato utrinque bicorni. Columna nana tumida aptera. Anthera columnae apice cucullato inclusa.

4568. Cuitlauzinia. Sepala et petala subrotunda carnosa. Labellum unguiculatum limbo bilobo undulato rugoso. Columna apice auriculis 3 petaloideis. Anthera 1-locularis cucullata. Pollinia 2 pyriformia cava.

4569. Oncidium. Sepala et petala conformia. Labellum maximum ecalcaratum lobatum basi tuberculatum v. cristatum. Columna apice utrinque bialata. Anthera incomplete

bilocularis rostellum elongato. Pollinia 2 sulcata glandula oblonga.

4570. Pteroceras. Sepala et petala obovata. Labellum vix perianthio longius unguiculatum ecalcaratum limbo connivente basi alis binis erectis linearibus.

4571. Fernandezia. Sepala et petala conformatia patentia. Labellum anticum v. posticum liberum ecalcaratum 3-lobum disco tuberculatum. Columna utrinque aurita. Pollinia 2 obovata.

4572. Lochilus. Sepala et petala aequalia. Labellum ecalcaratum indivisum basi tuberculatum aut laminatum et foveola mellifera auctum. Columna sub stigmate utrinque brachio aucto.

4573. Pachyphyllum. Sepala et petala libera. Labellum liberum indivisum sessile basi uno apice bituberculatum. Columna petaloidea. Pollinia 8.

4574. Dichaea. Sepala et petala conniventia acuta aequalia. Labellum cum columna articulatum unguiculatum nudum ecalcaratum deltoideum. Columna erecta aptera. Pollinia 4 geminata glandula minuta.

4575. Phymatidium. Sepala et petala patentia libera. Labellum subunguiculatum indivisum basi callosum. Culmen libera alata marginata basi tumida.

4576 Miltonia. Sepala et petala sessilia revoluta basi connata. Labellum maximum dilatatum indivisum sessile, basi lamellatum. Columna nana apice aurita. Pollinia 2 caudiculae oblongae adnata.

4577. Cyrtochilum. Sepala et petala explanata, petala miuora. Labellum ungue tuberculato ecalcaratum indivisum. Columna brevis alata. Pollinia 2 caudicula filiformi, glandula minuta.

4578. Odontoglossum. Sepala et petala explanata aequalia. Labellum unguiculatum ecalcaratum indivisum lamina patente basi cristata. Columna marginata apice utrinque alata. Pollinia 2 solida caudicula linearis glandula hamata.

4579. Brassia. Sepala et petala angusta. Labellum columnae continuum ecalcaratum planum indivisum basi bicristatum. Columna na-

na aptera. Pollinia 2 sulcata, caudicula brevi, glandula crassa.

4580. Tetrapeltis. Sepala patula. Petala angustissima aequilonga. Labellum liberum saccatum sessile geniculatum trilobum, lobis lateralibus abbreviatis. Columna clavata. Pollinia 4 globosa glandula communi adhaerentia.

4581. Phalaenopsis. Sepala patentia, libera. Petala multo majora. Labellum liberum basi callosum trilobum lobis lateralibus recurvato-adscendentibus, intermedio bicirrhoso. Columna semiteres rostello gladiato. Pollinia 2 glandula maxima cordata.

4582. Trichoglossis. Sepala et petala aequalia. Labellum cum marginibus columnae connatum saccatum utroque margine cornutum limbo carnoso indiviso, basi callo saccum claudente. Pollinia 2 globosa glandula parva hamata v. peltata.

4583. Ansellia. Sepala oblonga carnosa patentia libera. Petala patula duplo latiora. Labellum sessile trilobum bilamellatum lobo medio minore verrucoso. Columna basi utrinque auriculata. Pollinia 4 sessilia, glandula utrinque acuminata.

4584. Sutrinia. Sepala lateralia ad apicem usque connata basi subsaccata membranacea. Labellum liberum ungniculatum medio elevatum oblongum concavum indivisum. Columna apice utrinque alis sulcatis.

4585. Telipogon. Sepala angusta acuta. Petala late ovata. Labellum sepalis conforme. Columna teres pilosa clinandrio postice processu subulato uncinato instructo. Anthera stipito elongato fistuloso uncinato affixa.

4586. Nanda. Sepala et petala aequalia. Labellum cum basi columnae continuum saccatum v. calcaratum, subtrilobum lobo medio carnoso. Columna abbreviata crassa libera. Pollinia 2 obliqua biloba glandula subrotunda.

4587. Rhenanthera. Sepala et petala subaequalia. Labellum cum columna elasticè articulatum, liberum nanum medio saccato-concavum trilobum. Pollinia 2 biloba, glandula subtriangulari.

4588. Diplocentrum. Perianthium subclausum. Labellum cum columna articulatum indivisum bical-

caratum. Columna minuta. Pollinia 2 glandula maxima concava.

4589. Microsaceus. Sepala linearia. Labellum columnae antice adnatum basi saccatum, limbo abbreviato fornicate. Columna nana aptera obtusa. Pollinia 4 obovata basi foveolata caudicula communis juncta.

4590. Camarotis. Sepala connata. Petala paulo minoria. Labellum obovatum canaliculatum apice sub appendicula calcaratum. Columna apice longissime sigmoideo-rostrata. Pollinia 2 elongata subalata glandula forcata.

4591. Chiloschista. Sepala patentia petalis multo longiora. Labellum cum columnae basi articulatum bipartitum medio cristatum. Columna minima. Pollinia 2 appendicula brevi glandula minuta.

4592. Gunnia. Perianthium ringens. Labellum carnosum, ungue longe producto lineari erecto bilobum antice cornutum mucrone inflexo disco tuberculato. Pollinia 4 caudicula linearis.

4593. Microporas. Sepala et petala aequalia. Labellum cum basi columnae continuum calceiforme subtrilobum lobo intermedio minimo lateralibus majoribus. Columna rostello maximo inflexo. Pollinia 2 caudicula subalata.

4594. Saccolabium. Perianthium explanatum. Labellum basi columnae adnatum indivisum calcaram. Columna erecta rostello subulata. Pollinia 2 subglobosa caudicula elongata glandula minuta.

4595. Taeniophyllum. Sepala basi connata petala aequalia. Labellum calcaratum basi columnae adnatum limbo integro calcare inappendiculato. Columna nana rostello ovato. Pollinia 4, glandula minutissima.

4596. Cleisostoma. Sepala linearia. Labellum calcaratum basi columnae adnatum limbo tridentato, calcaris ore dente clauso. Anthera incompleta bilocularis. Pollinia 2 subglobosa caudicula filiformi glandula minuta hamata.

4597. Appendicula. Sepala supremum subfornicatum. Petala minora. Labellum pede columnae longe producto affixum concavum in-

divisum. Columna nana. Pollinia 8 v. pauciora, glandula oblonga.

4598. Cryptoglottis. Sepala clausa cum pede columnae in calcar longum didymum producta, supra medium inter se cohaerentia. Labellum inclusum articulatum unguiculatum integerrimum. Pollinia 4 clavata sterilibus totidem intermixtis, glandula hamata.

4599. Ceratostylis. Sepala basi producta calcar aemulanta. Labellum subiclusum ungue longo in curvo, indivisum concavum crassum. Columna basi longe producta. Pollinia 8 in glandula sessilia.

4600. Ephippium. Perianthium ringens. Labellum cum columnae pede elastice articulatum parvum integrum scabellaeforme. Columna nana antice biconnata.

4601. Ceratochilus. Perianthium patens. Labellum parvum cum columna connatum sacco v. calcare compresso, fauce biglandulosum limbo trifido v. integro. Columna nana. Pollinia 2 glandula hamata.

4602. Echioglossum. Sepala et petala aequalia. Labellum cornutum trilobum lobo intermedio disformi utrinque calloso in ligulam bifidum producto cornu dente clauso. Pollinia 2 bipartibilia glandula arcuata dilatata.

4603. Sarcanthus. Sepala et petala aequalia. Labellum breve calcaratum, cum columna articulatum, trilobum; calcare intus semi - biloculare. Pollinia 2 postice lobata.

4604. Podochilus. Perianthium clausum. Sepala lateralia latiora. Petala angustiora. Labellum cum columnae pede elastice articulatum integrum unguiculatum. Columna in ovario recumbens, clinandrio membranaceo bicorni. Pollinia 4 caudiculis convolutis.

4605. Adenoncos. Sepala et petala aequalia. Labellum concavum carnosum intus glanduloso - tumidum erectum limbo indiviso. Columna brevis obtusa. Pollinia 4, glandula pettata.

4606. Birchea. Sepala linearia, petalis subbreviora. Labellum sessile carnosum ecalcaratum oblongum apice bifidum. Columna brevis aptera. Pollinia 2 integra lamina pellicula lata.

4607. Oeceoclades. Perianthium ringens. Sepala et petala aequalia. Labellum liberum sessile cum columna articulatum, calcaratum, calcare curvo saepe obconico, lamina lobata cucullata complicata. Pollinia 2, glandula minuta.

4608. Aerides. Perianthium patens v. clausum. Sepala cum pede columnae connata. Labellum articulatum saccatum v. calcaratum trilobum lobis lateralibus nanis, limbo cucullato v. subulato. Pollinia 2 postice sulcata, glandula peltata subrotunda.

4609. Stauroglottis. Sepala et petala conformia cum basi columnae connata. Labellum tripartitum, lacinia intermedia ovato - acuminata, lateralibus linearis - spathulatis, disco cristato. Clinandrium bilabiatum. Pollinia 2 bisectilia.

4610. Schoenorchis. Sepala et petala aequalia labello multo minor. Labellum basi columnae adnatum calcaratum v. saccatum obsolete trilobum. Columna basi bicornis. Pollinia 2 globosa caudicula filiformi glandula parva hamata.

4611. Aeranthus. Sepala et petala minora conniventia. Labellum cum pede columnae articulatum calcaratum petalis conforme. Columna apice alata. Pollinia 2 globosa hinc perforata glandulis duabus.

4612. Cryptopus. Sepala spathulata aequalia. Petala majora unguiculata lobata. Labellum cum basi columnae connatum calcaratum 4-partitum. Pollinia 2 obovata postice sulcata glandulis 2 dimidiatis villosis.

4613. Oenia. Sepala et petala explanata aequalia. Labellum sessile horizontale cucullatum trilobum calcaratum. Columna erecta nana. Pollinia 2 postice biloba glandulis 2.

4614. Angraecum. Sepala et petala patentia. Labellum basi columnae continuum sessile carnosum indivisum, sepala multo latiore, calcare recto connato. Columna nana varius elongata. Pollinia 2 glandula triangulare.

4615. Mystacidium. Sepala et petala aequalia. Labellum cum columna articulatum calcaratum indivisum. Columna brevis recta carnosa apice utrinque processu longo linearis,

rostello elongato. Pollinia 2 dorso excavata, caudicula bicorni, glandulis subpeltatis.

4616. Agrostophyllum. Sepala patula lata, petala linearia. Labellum cum pede columnae connatum saccatum medio constrictum limbo indiviso truncato. Pollinia 8 cuneata sessilia.

4617. Calanthe. Sepala libera v. subconnata. Labellum cum columna connatum lobatum v. integrum calcaratum v. muticum, disco lamellatum v. tuberculatum. Pollinia 8, glandulæ bipartibili adhaerentia.

4618. Melachdenia. Perianthii resupinati sepala lateralia apice reflexa galeam formantia posticum cordatum. Petala minima squamaeformia rotundata. Labellum carnosum margine revolutum cum columnae pede articulatum. Columna antice bicirrhosa basi longe producta.

4619. Centropetalum. Perianthii sepalæ et petala labello duplo minora. Labellum obovatum indivisum nudum basi appendice parva excavata auctum. Columna petaloidea convoluta. Pollinia 4 geminatim affixa.

4620. Anthericlis. Sepala obovata. Labellum liberum nanum trilobum longe calcaratum. Columna marginata. Pollinia 2 bipartita, caudicula linearis glandula parva transversa.

4621. Limatodes. Sepala et petala erecto-patentia. Labellum liberum indivisum calcaratum, limbo intus tumido. Pollinia 8 obovata glandula minuta.

4622. Glomera. Sepala clausa lateralia latiora. Petala angustiora. Labellum liberum indivisum saccatum columnam amplectens. Columna brevis carnosa apice tumida. Pollinia 8 ovata compressa in glandula sessilia.

4623. Oxyanthera. Sepala ovato-triangularia. Petala ovato-lanceolata. Labellum conforme erectum integrum concavum. Columna subquadangularis. Pollinia apice materia granulosa cohaerentia.

4624. Thelasis. Sepala basi connata. Petala minora. Labellum liberum ecalcaratum indivisum concavum columnæ parallelum. Pollinia 8

subglobosa, caudicula filiformi, glandula hamata.

4625. Ptychochilus. Sepala basi connata. Petala minora. Labellum liberum ecalcaratum indivisum concavum columnæ parallelum. Pollinia 8 subglobosa, caudicula filiformi glandula hamata.

5. *Ophrydeae Lindl.* Pollen e massulis ceracis innumeris cohaerentibus, glandulae stigmatis agglutinatae, in massas binas colligatae. Anthera terminalis erecta v. resupinata persistens, locutis completis.

4526. Orchis. Perianthium galeatum. Sepalum supremum cum petalis in fornicem connivens. Labellum anticum, cum basi columnæ connatum integrum v. 3—4-lobum basi calcaratum. Pollinia stigmatis plicatum inclusa.

4627. Anacaptis. Perianthium erecto - connivens. Labellum anticum cum basi columnæ connatum trilobum basi calcaratum et lamellis parallelis instructum. Pollinia glandulae communi bursulae simplici inclusæ affixa.

4528. Gymnadenia. Perianthium galeatum. Sepala lateralia patentia. Petala minora fornicato - conniventia. Labellum trilobum calcaram. Pollinia glandulæ 2 distinctis lateralibus ebursiculatis.

4629. Perularia. Perianthium carnosum. Sepala lateralia reflexa, supremum rotundatum crenulatum cum petalis retusis erectum. Labellum anticum calcaratum carnosissimum indivisum medio tuberculatum. Pollinia glandulæ 2 parvulis.

4630. Nigritella. Sepala et petala patentia. Labellum posticum ovato-acuminatum concavum basi scrotiformi-calcaratum. Pollinia glandulæ distinctis bursulae integrae loculos antrorum includentibus.

4631. Aceras. Perianthium connivens. Labellum brevissime saccato-calcaratum v. gibbosum tripartitum, patens v. pendulum. Pollinia caudiculis distinctis glandulae communi affixa.

4632. Helothrix. Perianthium connivens. Petala libera patula. Labellum cum columna connatum calcaratum lobatum concavum. Pollinia 2

glandulis distinctis in bursulis 2 segregatis inclusis.

4633. Centrochilus. Sepala lateralia majora posticum cum petalis angustis in alam connivens. Labellum tripartitum, lobo intermedio porrecto linearis-canaliculato lateralibus 4-plo brevioribus, calcare longissimo filiformi. Pollinia longe caudiculata.

4634. Glossapsis. Sepala et petala conformia. Labellum tripartitum, laciinis lateralibus elongatis calcare brevi inflato. Rostellum maximum plicatum. Pollinia glandulis distinctis cucullis duobus discretis inclusis.

4635. Platianthera. Sepala et petala galeata. Labellum elongatum indivisum v. tripartitum calcare filiformi. Pollinia glandulis 2 sublateralibus nudis.

4636. Hemipilia. Sepala patentia. Petala paulo minora. Labellum cum basi columnae connatum elongato-calcaratum oblongum trilobatum. Pollinia glandulis distinctis apicibus canalium cucullis dimidiatis exceptis.

4637. Peristylus. Perianthium campanulatum. Labellum integrum v. tripartitum calcare brevissimo scrotiformi. Pollinia glandulis 2 sublateralibus nudis.

4638. Saccidium. Sepala conniventia, lateralia saccata. Petala carnosa spathulata duplo longiora. Labellum posticum magnum convolutum calcaratum apice carnosum divisum. Pollinia parva.

5639. Pachites. Sepala patentia supremum submajus. Petala angustiora. Labellum posticum ecalcaratum, petalis conforme. Anthera stipitata resupinata, rostello subquadrato crassissimo.

4640. Coeloglossum. Perianthium connivens. Labellum carnosum unguiculatum calcaratum tripartitum disco saepius tuberculatum ungue crassissimo concavo adscendente margine eroso et glanduloso processibus 2 carnosis clavatis ex ora calcaris ortis. Pollinia glandulis nudis.

4641. Monotris. Sepala membranacea postice connata. Petala carnosa acuminata duplo minora. Label-

lum petalis aequilongum liberum basi cornutum apice carnosum trifidum cucullatum.

4642. Scopularia. Sepala membranacea conniventia lateralia minoria. Petala lacerato-multifida circa labellum convoluta. Labellum membranaceum multifidum. Antherarum loculis cucullum magnum pollinium glandulas tegentem formantibus.

4643. Aopla. Perianthium bilabiatum. Sepala lateralia deflexa superium erectum cum petalis galeam formans. Labellum lineare ecalcaratum. Anthera rostello decurvo elongato. Pollinium glandulac nudae.

4644. Dissorhynchium. Sepala lateralia latiora reflexa superius fornicate cum petalis angustis concavum. Labellum cum basi columnae connatum, in laciinis linearibus usque ad basin tripartitum, calcare longissimo. Anthera ampla erecta. Pollinia in caudiculis longis filiformibus.

4645. Herminium. Perianthium campanulatum. Sepala membranacea. Petala angustiora medio bidentata subcarnosa. Labellum basi saccatum hastato-trifidum. Pollinium glandula maxima cucullato-concavae nudae.

4646. Habenaria. Petala integra v. 2—3-fida conniventia. Labellum elongatum pendulum integrum v. trifidum elongato-calcaratum. Pollinium glandulac nudae.

4647. Ate. Perianthium galeatum. Sepala bifida pubescentia. Labellum pubescens pendulum trifidum calcare filiformi. Pollinium glandulac nudae.

4648. Bonatea. Perianthium galeatum. Sepala patula. Petala integra v. bifida glabra v. pubescentia conniventia. Labellum pendulum tripartitum, calcare filiformi. Anthera erecta, processibus stigmatis carnis longissimis v. abbreviatis.

4649. Diplomeris. Perianthium campanulatum. Petala breviora. Labellum petalis aquale indivisum calcaratum. Anthera horizontalis rostello maximo membranaceo dilatato. Pollinium glandulac nudae.

4650. Cynorkis. Sepala conniventia, petala cum supremo conglutinata. Labellum columnae connatum calcaratum saepius 4-partitum

perianthii foliolis diversissimum. Anthera horizontali v. resupinata rostelllo plano dilatato tripartito.

4651. Tryphia. Sepala herbacea conniventia aequalia. Petala linearia sepalis longiora. Labellum membranaceum cum columna connatum calcaratum tripartitum. Anthera erecta nana rostelllo ovato.

4652. Bucculina. Sepala galeata lateralia basi labelli oblique aduata supremum minus. Petala duo majora carnosa erecta dentata. Labellum concavum 5-partitum, lacinias linearibus calcaratum disco barbatum.

4653. Arnottia. Sepala inaequalia lateralia majora alaeformia patula. Petala angustiora patentia. Labellum posticum ecalcaratum petalis coalitum et conforme. Pollinium glandulae nudae.

4654. Stenoglottis. Sepala conniventia aequalia libera. Petala tenuiora fimbriato-serrulata concava. Labellum lineare canaliculatum ecalcaratum basi tuberculo instructum apice trifidum. Pollinium glandulae retro in rostelli sacculis absconditae.

4655. Bartholina. Sepala basi in tubum antice connata lacinias secundis. Petala falcata labello subconnata. Labellum calcaratum explanatum patens trilobum lobo medio multifido, lacinias filiformibus.

4656. Bicornella. Sepala inaequalia. Petala cum sepalo supremo in galeam convexam conglutinata. Labellum columnae nanae ad natum calcaratum indivisum angustum canaliculatum. Pollinia minima caudiculis longis linearibus.

4657. Satyrium. Sepala basi connata petalis paulo minora. Labellum posticum sessile erectum fornicate-concavum basi bisaccatum v. bicalcaratum. Columna elongata. Pollinia biloba glandulis peltatis nudis.

4658. Disa. Sepala patentia supremum galeatum. Labellum basi columnae insertum porrectum sessile lamina indivisa v. triloba. Columna bialata alis petaloideis; clinandrio dilatato. Pollinia sulcata caudiculis distinctis.

4659. Serapias. Sepala in galeam cucullatam connata. Petala basi dilatata longe cuspidata. Labellum sessile basi columnae insertum

bilamellatum disco pilosum subtrilobum lobo terminali elongato deflexo. Columna elongata, clinandrio in acumen petaloideum producto. Pollinia glandula communi intra bursulam recondita.

4660. Satyridium. Perianthii sepala et petala secunda. Labellum patens planum basi bicalcaratum. Columna gracilis libera. Pollinia caudiculis 2 connatis glandulae unicae.

4661. Aviceps. Perianthii riugentis sepala in labium. inferius tridentatum coalita, petala nana. Labellum galeatum basi bisaccatum. Columna elongata sub galea recondita. Stigmatis bilabiati labium posticum maximum.

4662. Monadenia. Sepalum supremum galeatum basi in calcar productum interiora carnosa subconformia. Labellum oblongum carnosum. Columna nana bipartita clinandrio carnosus truncato.

4663. Schizodium. Sepala canaliculata supremum basi calcatum, interiora nana. Labellum liberum lineare acuminatum supra basin constrictum. Columna bipartita clinandrio elevato. Pollinium glandulae 2 nudae.

4664. Pterigodium. Sepala lateralia patula concava supremum galeatum. Labellum columnae adnatum bilabiatum. Columna brevis aptera, clinandrio antice supra stigma prominente in bursulas duas distinctas excavato. Pollinia 2, caudiculis glandulisque distinctis.

4665. Coryciun. Sepala lateralia in unum connata supremum galeatum adscendens. Petala latiora basi ventricosa patula. Columna apice bialata. Labellum apice columnae insertum unguiculatum, lamina replicata patente. Pollinia 2, bursulis remotis ala utraque tectis.

4666. Chamaerepes. Sepala conniventia. Petala paulo minora. Labellum columnae basi insertum sessile planum obsolete trilobum deflexum. Columna antice incrassata. Pollinia glandulis distinctis inter bursulas reconditis.

4667. Ophrys. Sepala lateralia patula supremum galeatum. Petala minora. Labellum sessile cartilagineo-rigidum carinatum v. lobatum.

Columnae clinandrio antice fisso bibrasiculato. Pollinia in caudiculis rectis glandulisque intra bursulas recessit.

4668. Disperis. Sepala patentia basi saccata v. calcarata, supremum cum petalis galeatum. Labellum erectum unguiculatum. Pollinia 2 caudiculis glandulisque distinctis bursulis remotis.

6. Gastroideae Lindl. Pollen e massulis majusculis elastice massis cohaerentibus axi distincta nulla. Anthera terminalis opercularis.

4669. Penthia. Sepala membranacea libera ecalcarata, interiora diversiformia. Labellum lineare simplex liberum petalis multo angustius a columnae clinandrio saepius trilobatum sejunctum. Pollinia glandulis 2 nudis.

4670. Forficaria. Perianthium ringens. Sepala concava. Petala subulata. Labellum carnosum truncatum liberum nanum. Anthera reclinata.

4671. Herschelia. Sepalum supremum galeatum inflatum dorso calcaratum. Petala sub galea obscondita carnosa basi auriculata apice dolabriiformia. Labellum oblongum carnosum integerrimum. Columna nana bipartita. Pollinia glandulis 2 maximis cornis dentatis.

4672. Brachycorthis. Sepalum supremum convexum muticum. Petala ovata obtusa basi obliqua medio carnosa. Labellum coriaceum basi cavum apice dilatato-tridentatum. Pollinia glandulis 2 nudis.

4673. Ceratandra. Sepalum externis cum petalis in galeam saepius antice pendulam conglutinata. Labellum unguiculatum luanatum nudum v. appendice carnosa. Stigma parvum 3-lobum. Pollinia glandulis nullis.

4674. Ommatodium. Sepalum supremum cum petalis lobatis apice fornicatis in galeam conglutinata. Labellum sessile hastatum appendice membranacea tubulosa auctum. Stigma brachii incurvis. Pollinia glandulis nullis.

4675. Ceratopsis. Sepala et petala tenera. Labellum ovatum nudum basi calcaratum indivisum sub apice tuberculatum. Columna minima

truncata apice in fronte bicirrhosa. Pollinia granulata.

4676. Gastrodia. Perianthium tubulosum basi ventricosum limbo breviter 5-lobo lobis subsecundis. Labellum inclusum liberum unguiculatum marginibus undulatum columnae incumbens.

4677. Epipogium. Sepala linearia patentia. Petala conformia paulo latiora. Labellum sessile erectum trilobatum lobis lateralibus parvis intermedio maximo integerrimo concavo intus glanduloso, basi in calcar inflatum producto.

4678. Mysteria. Sepala canaliculata. Petala unguiculata. Labellum unguiculatum indivisum reflexum. Columna teres, stigma sagittatum bifidum. Pollen bipartitum granulare botryoideum.

7. Neottieae Lindl. Pollen pulvereum e granulis taxe coherentibus, stigmatis glandulae affixum. Anthera stigmati parallela persistens loculis approximatis.

4679. Spirantha. Sepala conniventia, posticum fornicatum cum petalis connivens. Labellum inclusum trifidum columnae adnatum, calcare brevissimo refracto subulato. Pollinia in granula angulata delabentia.

4680. Spiranthes. Sepala lateralia labello supposita basi in sacrum brevem decurrentia, supremum cum petalis connivens v. plus minus connatum. Labellum canaliculatum columnam inferne amplectens, lamina integerrima v. fimbriata. Columna brevis. Pollinia 2 linearis-clavata glandulae communi affixa.

4681. Adenostylis. Sepala lateralia labello supposita supremum cum petalis connivens. Labellum cum columnae connatum basi ventricosum intus pubescens. Columna apice emarginata utroque latere glanduloso-tumida.

4682. Stenorrhynchus. Perianthii cylindrici sepala lateralia basi in sacrum connata. Labellum anticum apice angustatum basi dilatatum columnam amplectens. Columna teres elongata. Pollinia 2 pulveracea.

4683. Ulantha. Sepala erecta lateralia ovata crispata papillosa supremum ovatum planum. Petala sub-

conformia. Labellum breviter unguiculatum late oblongum crispatum papillosum disco lamellatum.

4684. Plexaure. Sepala lateralia labello supposita basi obliqua patula supremum fornicatum. Petala breviora falcata adscendentia. Labellum ungue pede columnae connatum, lamina porrecta saccata, limbo reflexo. Pollinia 8 caudiculae communi affixa.

4685. Neottia. Sepala et petala aequalia. Labellum pendulum basi saccatum trilobum, lobis lateribus minimis intermedio bifido. Pollinia 2 glandula communi juncta.

4686. Listera. Sepala petalis conformia paulo latiora. Labellum pendulum basi aequale bifidum. Columna brevissima. Pollinia 2 glandula communi juncta.

4687. Epipactis. Sepala et petala aequalia. Labellum patens interruptum, hypochilio concavo nectarifero, epichilio latiore basi bicalloso. Pollinia 2 glandulae communi affixa.

4688. Pelexia. Sepala exterritoria lateralia dependentia supremum cum interiore connivens. Labellum sessile porrectum indivisum, basi in calcar ovario connatum productum. Pollinia 2 glandulae communi affixa.

4689. Sauroglossum. Sepala conniventia lateralia linearia arcuatim patentia basi valde obliqua, supremum cum petalis conforme. Labellum lineare canaliculatum ecallosum basi dilatatum. Columna elongata apice subspathulata.

4690. Eucosia. Sepala petalis latiora. Labellum sepalis conforme intus villosum columnam amplectens. Columna brevis obtusa indivisa. Pollinia 2 biloba.

4691. Georchis. Sepala et petala aequalia conniventia. Labellum anticum sessile basi intus pilosum cucullatum apice convolutum. Columna brevissima, clinandrio elongato acutissimo.

4692. Macodes. Sepala conniventia. Petala filiformia patula. Labellum liberum saccatum in herbe patulum trilobum, lobo medio elongato linguaeformi. Columna obliqua torta appendice biloba.

4693. Aetheria. Sepala et petala conniventia, lateralia latiora,

supremum cum petalis fornicatum. Labellum basi ventricoso - productum intus biglandulosum, limbi indivisi fornicati incrassati marginibus involutis glandulosis.

4694. Goodyera. Sepala subringentia. Petala angustiora. Labellum sessile basi excavatum in ligulam brevem canaliculatum acuminatum. Columna semibifida, rostello recto bicorni.

4695. Haemaria. Sepala lateralia reflexa supremum et petala conniventia. Labellum anticum liberum basi bicallosum testiculato - saccatum subsagittatum planum. Columna clavata, clinandrio cucullato rostello acuminato.

4696. Cordylestylis. Sepala et petala in globulum conniventia. Labellum sessile concavo - ventricosum indivisum apice incrassato - bituberculatum revolutum sacco intus fibrilliger. Columna incrassata. Pollinia pulvrea cavata.

4697. Myrophila. Perianthium connivens. Sepala oblique recurva subuncinata supremum arcuatum. Labellum anticum nanum liberum saccatum dependens apiculatum. Columna brevissima.

4698. Microchilus. Sepala lateralia linearis - lanceolata patula, supremum cum petalis in fornicem apice tridentatum connatum. Labellum subpendulum in calcar scrotiforme productum limbo brevi rotundato reflexo.

4699. Erythrodes. Sepala lateralia labellum amplectentia. Petala unguiculata angustiora. Labellum basi in calcar subdidymum productum limbo rotundato - emarginato reflexo. Columna brevis setaceo-acuminata.

4700. Synassa. Sepala labello supposita in calcar cum ovario connatum producta, superius cum petalis conglutinatum. Labellum cum columna omnino connatum apice crismum dilatatum callis 2 infra apicem acuminatum. Pollinia 2 bisulca.

4701. Tropidia. Sepala lateralia majora. Labellum liberum sessile ventricosum compressum, lateribus reflexis lamellatis apice constrictum cucullatum. Pollinia 4 massis bilobis cohaerentia.

4702. Cnemidia. Sepala lateralia semiconnata basi in calcar spuriū producta. Labellum biberum calcaratum canaliculatum acuminatum.

4703. Physurus est Microchilus n. 4698.

4704. Baskervillea. Sepala patentia libera. Petala angustiora. Labellum liberum ovatum nudum basi in saccum pendulum productum. Columna appendiculata pyramidalis, fo-vea bilabiata.

4705. Galera. Sepala conniventia petalis angustiora. Labellum obtuse calcaratum concavum limbo indiviso undulato. Columna brevis crassa fornicate. Pollinia 2 subbiloba.

4706. Herpysma. Sepala conniventia cum petalis antrorsum arcuata. Labellum anticum calcaram cum columnā semitereti connatum apice abrupte rotundatum sub apice bicallosum.

4707. Aneectochilus. Perianthium ringens. Sepala lateralia basi subconnata, supremum cum petalis minoribus in galeam connivens. Labellum basi ventricoso - productum apice canaliculato - unguiculatum, limbo dilatato semibilobo. Columna superne incurva utroque latere callosa.

4708. Myoda. Sepala reflexa superius cum petalis conglutinatum. Labellum anticum cum columnā connatum, apice unguiculatum hastato-tripartitum. Columna brevis stigmatis parvo punctiformi.

4709. Cheirostylis. Sepala basi in tubum ventricosum superne bilabiatum connata. Petala libera. Labellum multo majus unguiculatum intus bicallosum, limbo dilatato profunde bilobo patente.

4710. Tripleura. Perianthium cruciatum quasi 4-phylum, sepa- la exteriora linearia patentissima. Labellum liberum concavum. Columna brevissima processibus 2 membranaceis corniformibus.

4711. Chlorosa. Sepala et petala patentia aequalia. Labellum columnam amplectens. Columna nana crassa. Pollinia farinosa.

4712. Ponthieva. Sepala patula. Labellum basi columnae insertum concavum indivisum. Columna brevissima subulata. Pollinia 4 glandula communi juncta.

4713. Cranichis. Perianthium ringens. Labellum erectum fornicateum concavum. Columna medio dilata- tata apice emarginata. Pollinia 4 glandula communi conjuncta.

4714. Pterichis. Perianthium ringens. Sepala herbacea ovata dor- sale pendulum. Petala unguiculata dilatata. Labellum posticum coria- ceum galeatum acuminatum columnam abscondens. Columna nana, stig- mate bilabiata.

4715. Prescottia. Sepala re- flexa. Petala minora. Labellum po- sticum erectum cucullatum integeri- um carnosum. Columna nana cla- vata. Pollinia 4 geminata.

4716. Altensteinia. Sepala basi connata. Petala angustiora omnia revoluta. Labellum sepalis ma- jus sessile erectum indivisum. Co- lumnā apice emarginata denticulata. Pollinia 2 pedicellata.

4717. Zeuxine. Sepala con- niventia supremum basi saccatum. La- bellum anticum basi membranaceum bicallosum apice unguiculatum carno- sum dilatatum concavum. Columna brevissima. Pollinia 4 glandula unci- nata.

4718. Zosterostylis. Sepala acuminata patula. Petala minora. La- bellum sessile inappendiculatum, co- lumnā brevissimam crassam intra basin excavata fovea. Pollinia 2 biloba.

4719. Rophostemon. Sepala conniventia. Petala minora. La- bellum ecalcaratum concavum erectum limbo sublobato. Columna clavata apice profunde excavata. Pollinia 2 margini stigmatis incidentia.

4720. Cryptostylis. Sepala patula cum petalis lineari-subulata. Labellum magnum posticum carina- tum basi ventricosa columnam occul- tans. Pollinia 2 biloba.

4721. Calochilus. Sepala labello supposita. Petala erecta mi- nora. Labellum sessile acuminatum disco intus marginibusque barbatum. Columna nuda bituberculata. Pollinia 2 biloba.

4722. Gomphichis. Sepala et petala patula aequalia. Labellum concavum carnosum ecallosum co- lumnæ incumbens. Columna clavata villosa, clinandrio utrinque membrana lacera marginato.

4723. Stenoptera. Perianthii ringentis foliola omnia in tubum connata. Labellum dorsale fornicateum unguiculatum indivisum columnam abscondens. Columna teres tomentosa crenata.

4724. Prasophyllum. Perianthium ringens. Labellum unguiculatum adscendens indivisum ecalcaratum. Columna trifida. Pollinia 2 biloba.

4725. Haplochilus. Sepala conniventia labello supposita dorsale petalis adglutinatum. Labellum ventricosum intus callosum, limbo membranaceo explanato fisso. Columna brevis utroque latere glanduloso tumida.

4726. Genoplesium. Perianthium ringens. Sepala lateralia longiora, interiora basi columnae connata. Labellum posticum indivisum ecalcaratum basi cucullatum. Columna semibifida.

4727. Orthoceras. Sepala lateralia linearia erecta. Petala sessilia nana sub sepalo supremo conniventia galeata. Labellum sessile trifidum ecalcaratum. Columna utrinque lobo petaloideo erecta.

4728. Burnetia. Sepala conniventia linearia cum petalis aequanlia. Labellum multo minus cuneatum indivisum subunguiculatum inappendiculatum. Columna petaloideo-marginalia basi utrinque in lobulum producta.

4729. Diuris. Sepala lateralia elongata linearia labello trifido supposita supremum multo latius fornicateum. Columna brevis utrinque lobo petaloideo aucta.

4730. Epiblema. Sepala et petala plana patula. Labellum unguiculatum ecalcaratum ungue canaliculato marginibus callosis, lamina integra basi processibus filiformibus fasciculatis.

4731. Thelymitra. Perianthium patens. Labellum sessile ecalcaratum sepalis conforme. Columna bifida clinandrio petaloideo cucullata apice trifido, lobis lateralibus penicillatis, rarius nudis.

4732. Maedonaldia. Sepala cum petalis angustioribus patentissima. Labellum petalis conforme omnino calvum. Columna brevis clinandrio

trilobo. Anthera tomentosa antice intrusa.

S. Arethuseae Lindl. *Pollinis massae pulvri* v. *e corpusculis angulatis* basi aut infra apicem affixa. *Anthera terminalis* opercularis.

4733. Decaisnea. Sepala lateralia basi connata gibbosa labello adhaerentia. Labellum conforme limbo indiviso concavo. Columna compressa clinandrio biaurito.

4734. Microtis Sepalum supernum galeatum. Petala adscendentia. Labellum cum columnae basi producta subunguiculatum oblongum indivisum v. bilobum basi callosum. Columna infundibuliformis apice biaurita.

4735. Acianthus. Sepala cristata labello supposita. Petala minoria subreflexa. Labellum dissimile indivisum basi bicallosum disco inappendiculato. Columna arcuata aptera. Pollinia 4 distincta per paria cohaerentia.

4736. Cyrtostylis. Sepala patula, supernum erectum. Labellum indivisum basi bicallosum disco inappendiculato. Columna apice dilatata auriculata. Pollinia 4 compressa distincta.

4737. Chiloglottis. Sepala lateralia labello supposita canaliculata apice tereta, supernum apice dilatatum in acumen desinens. Labellum unguiculatum basi bicallosum disco laminae glanduloso, basi appendicula lingulata. Columna apice auriculato-bifida.

4738. Eriochilus. Sepala lateralia deflexa supremum cum petalis erectum. Labellum disco pubescente eglanduloso. Columna semi-teres apice simplici. Pollinia 8 antica minora.

4739. Caladenia. Perianthium sublabiatum. Labellum unguiculatum cucullatum subtrilobum apice angustum disco glandulis seriatis ornatum. Columna membranaceo-dilatata. Pollinia 2 a latere compressa semibifida lobo antico minore.

4740. Glossodia. Sepala et petala patentia aequalia. Labellum dissimile brevius sessile indivisum eglandulosum. Appendix ligularis in-

ter labellum et columnam. Columna membranaceo-dilatata.

4741. Pterostylis. Perianthium ringens. Labellum unguiculatum subinclusum lamina indivisa basi appendiculata v. gibbosa. Columna basi cum galea connata, apice lata auriculata-alata.

4742. Lyparanthus. Sepalum supremum latius fornicatum. Labellum sepalis et petalis brevius semicucullatum disco glandulosu v. papuloso margine integro v. fimbriato. Columna linearis arcuata.

4743. Corysanthes. Sepala linearia cum petalis deflexis ringentia, supremum maximum cucullatum v. tubulosum basi muticum v. bicalcaratum.

4744. Caleyia. Sepala et petala linearia. Labellum unguiculatum lamina peltata cava extorsum aperta. Columna petaloideo-dilatata.

4745. Calcearia. Perianthium ringens. Sepala et petala basi connata linearia, sepalum supremum spatulatum fornicatum. Labellum sessile maximum basi scrotiformi columnam amplectens, lamina subbiloba intus bicallosa.

4746. Calopogon. Sepala et petala conniventia. Labellum posticum unguiculatum subpatens lamina disco barbata. Columna incurva apice alata. Pollinia 2 angulata.

4747. Pogonia. Perianthium erecto-connivens. Labellum sessile v. unguiculatum cucullatum lamina disco papilloso cristata. Pollinia 2 sulcata.

4748. Arethusa. Sepala exteriora basi in gibber brevissimum producta cum supremo et petalis in galeam conniventia. Labellum superne cucullatum disco intus cristatum. Columna linearis apice dilatata.

4749. Spiculaea. Sepala et petala linearia. Labellum unguiculatum ungue elongato-tereti inarticulato, lamina peltata linearis. Columna elongata marginata superne alata, alis falcatis apice circa antheram 4 lobam confluentibus.

4750. Codonorchis. Perianthium campanulatum. Labellum unguiculatum ovatum medio seriatim glandulosum. Columna elongata alata. Anthera membranaceo-marginata. Pollinia 2 compressa farinosa.

4751. Cleistes. Perianthium connivens. Labellum oblongum membranaceum liberum circa columnam convolutum integrum v. trilobum medio lamellatum. Columna elongata clavata clinandrio dentato. Anthera pedicellata inflexa.

4752. Anthogonium. Perianthium tubulosum apice ringens. Sepala in tubum longum connata. Petala spathulata. Labellum integerimum apice truncatum. Pollinia 4 apicibus per paria connata.

4753. Erythrorchis. Sepala et petala conniventia. aequalia. Labellum carnosum concavum, limbo erecto sublobato. Columna brevissima unguiculata. Pollinia 2 libera. Caps. siliquaeformis.

4754. Drakea. Sepala linearia cum petalis reflexa. Labellum unguiculatum, ungue longissimo medio articulato lamina peltata convexa. Columna elongata utrinque basi auri culata. Pollinia 4.

4755. Maplostellis. Sepala anguste linearia. Labellum sessile dilatato-truncatum. Columna teres aptera. Pollinia 4 subglobosa.

4756. Chloraea. Sepala lateralia apice incrassata deflexa, supremum cum petalis in galeam connivens. Columna elongata marginata. Labellum cucullatum integrum v. trifidum disco cristatum.

4757. Asarea. Sepala deflexa. Petala paulo minora patula. Labellum trilobum basi bicallosum, lobo medio cristato. Columna apice dilatata.

4758. Bipinnula. Sepala lateralia labello supposita elongata fimbriata supremum cum petalis connivens. Labellum sessile cucullatum cristatum appendicibus filiformibus fimbriatum.

4759. Limodorum. Sepala conniventia. Petala angustiora. Labellum unguiculatum erectum basi longe calcaratum, lamina articulata indivisa columnam amplectens.

4760. Cephalanthera. Sepala et petala semipatentia aequalia. Labellum sessile interruptum, hypochilio saccato-concavo cum epichilio apice recurvo articulato. Pollinia 2 biloba.

4761. Crybe. Sepala conniventia, lateralia basi obliqua. Label-

lum majus basi cum columna connatum membranaceum cucullatum erectum. Columna clavata medio bidentata.

4762. Cyathoglottis. Sepala et petala clausa aequalia. Labellum minus marginibus columnam amplectens, lamina indivisa plana. Columna membranaceo-marginata.

4763. Sobralia Labellum sessile liberum iudicatur circa columnam in tubum convolutum disco pliato - barbatum. Columna angusta alata apice trifida, lobo medio antherifero.

4764. Epistephium. Perianthium basi calyculo ureolato. Labellum sessile indivisum circa columnam in tubum convolutum disco barbatum cristatumve. Columna anguste alata apice trifida lobo medio cullato antherifero.

4765. Cyrtosia. Sepala et petala aequalia. Labellum carnosum concavum intus discoideum limbo rotundato v. emarginato. Columna superne dilatata aut subalata. Pollina 2 riniformia.

4766. Vanilla. Sepala erecto-patentia. Labellum columnae adnatum planum apice convolutum. Columna aptera. Capsula siliquaeformis carnosa. Semina globosa testa solida.

DIANDRIA.

4767. Cypripedium. Labellum inflatum. Columna trifida. Pollen granulosum.

4768. Stylidium. Cal. bilabiatus. Cor. 5-fida. Caps. bilocularis.

HEXANDRIA.

4769. Aristolochia. Perianthium ventricosum. Anthera bilocularis. Caps. 6-locularis.

GYNANDRIA. MONANDRIA.

4396. PLEUROTHALLIS L. (1740)

Sect. I. *Elongatae* Lindl. in Bot. Reg. 1842, misc. p. 68—84. *Spicae v. racemi foliis longiores v. subaequales.*

* *Racemosae. Pedicelli bractea longiores.*

a. *Disepalae. Sepala lateralia fero ad apicem connata. Labellum indivisum.*

1. *P. Matthewsii* Lindl. folio oblongo acuminato basi rotundato; sepalis petalisque setaceo-acuminatis; labello transverse obtusissimo medio cernoso cordato. Acronia planigera Prest. symb. t. 57. In Peruvia. 2.

2. *P. restrepoides* Lindl. fol. oblongo coriaceo subsessili spicis geminis strictis duplo breviore; floribus ringentibus disepalis glabris longe pedunculatis; sepalo inferiore cymbiformi bidentato; petalis duplo minoribus; labello linearis-oblongo canaliculato. In Peruvia. 2. Flores viridi-purpurei.

3. *P. hians* Lindl. folio oblongo obtuso racemo 6-9-floro duplo breviore; bracteis minutis ochreatis; pedicellis elongatis; floribus bilabiatis; labio postico bidentato; labello pubescente obovato-lanceolato acuminato; clinandrio ciliato. In Brasilia. 2. Flores viridi-purpurei.

4. *P. oblongifolia* Lindl. folio oblongo obtuso carnosum racemo laxo duplo breviore; sepalis acuminatis connatis; petalis truncatis 3-nerviis; labello angusto. In Jamaica. 2. Flores rubri.

5. *P. macrorhiza* Lindl. folio linearis-acuto carnosum cum petiolo articulatis; pedunc. 2-3-floro capillari; sepalis ovato-oblongis; petalis cuneatis; labello ovato obtuso basi cullato petalis duplo longiore. In Brasilia. 2. Flores viridi-purpurei.

6. *P. fusca* Lindl. folio obovato-lanceolato caule longiore; racemo solitario paucifloro; sepalis 2 oblongis acutis; labello obovato lanceolato acuto plano; clinandrio denticulato. In Brasilia. 2. Flores fusco-purpurei.

7. *P. flexuosa* (Specinia Poepp. t. 90.) caule brevissimo 1-phyllo; folio lato-lanceolato acuto; racemo capillari flexuoso; sepalis intus villosis; petalis semilunatis; labello oblongo superne angulato; columna apice dentata. In Peruvia. 2.

8. *P. picta* Lindl. folio spatulato marginato retuso; bracteis minimis; sepalis acuminatis, lateralibus apice

tantum sejunctis; petalis linear-lanceolatis acutis; labello linear obtuso supra 1-sulcato. *In Demerara.* 2.

9. *P. Grobyi* Lindl. B. R. t. 1397. folio obovato emarginato caule triplo longiore; bracteis minimis membranaceis; sepals costatis oblongis acutis; petalis lanceolatis acutis; labello linear-obtuso carnoso, superne 1-sulcato. *In Brasilia.* 2.

b. **Disepalae. Labellum trilobum v. repandum.**

10. *P. pachyglossa* Lindl. folio obovato-lanceolato apice tridentato caule longiore; scapo eretto 4-floro filiformi; sepals linear-lanceolatis acuminatis, inferiore bicarinato bidentato; petalis carnosus obovatis 3-nerviis dorso sub apice verrucosis; labello petalis duplo longiore crassissimo linguiformi auriculato medio villosa. *In Mexico.* 2. Sepala purpurea.

11. *P. pandurifera* Lindl. caespitosa; folio oblongo marginato 3-dentato; pedunculo setaceo folio triplo longiore 5-6-floro; sepals diaphanis infimo bidentato; petalis obovatis obtusissimis; labello pandurato; clinandrio late membranaceo. *In Brasilia.* 2.

12. *P. quadrifida* Lindl. caule elongato; folio cuneato-oblongo carnoso lucido vaginante; racemis fasciculatis longissimis; perianthio 4-partito; sepals apice reflexis; labello trilobo carinato cum columna elastice articulato. *In Mexico.* 2. Flores lutescentes.

c. **Trisepalae** Lindl. Sepala lateralia ultra medium libera.

13. *P. acuminata* Lindl. folio oblongo acuto; spicis subgeminis; sepals lanceolato-linearibus acuminatis. *Dendrobium H. et K.* *In Peruvia.* 2.

14. *P. elegans* Lindl. folio oblongo obtuso; spicis 4-5-nis; sepals oblongis obtusiusculis. *Dendrobium H. et K.* *In Nov. Granata.* 2. Flores fusco-violacei.

15. *P. marginata* Lindl. folio oblongo biconvexo caule longiore apice subtridentato; sepals subfalcatis; petalis linearibus obtusis; apice callous; labello linear-canaliculato. *In Guatimala.*

16. *P. scariosa* Lindl. caule bre-

vissimo; folio elliptico carnoso supra hyalino margine scarioso; peduncul. 3-4 filiformibus flexuosis secundifloris; labello 3-partito. *In Mexico.* 2.

17. *P. aristata* Lindl. in ann. nat. hist. 4. 2. t. 15. caespitosa, folio ovali acuto caule longiore; racemo capillari flexuoso eretto 4-6-floro; pedicellis elongatis; sepals subciliatis semiconnatis; petalis semipinnatifidis; labello linear glanduloso-hispido utrinque auriculato. *In Demerara.* 2. Flores purpurei.

18. *P. laxa* Lindl. folio oblongo acuminato; racemis laxis; caps. nulla. *In Jamaica.* 2. Flores secundi atropurpurei.

19. *P. alpestris* Lindl. folio ovato-lanceolato; racemis laxis; carinis capsularum muricatis. *In Jamaica.* 2. Flores parvi secundi luteo-virides.

* *Spicatae* Lindl.

a. **Disepalae.**

20. *P. racemiflora* Lindl. folio oblongo emarginato; racemo secundo multifloro duplo breviore; bracteis vaginatis adpressis; sepals ovato-lanceolatis; petalis ovatis subaequalibus; labello subunguiculato linguiformi obtuso; clinandrio dentato. *In Jamaica.* 2.

21. *P. glumacea* Lindl. folio lanceolato petiolato petiolo longiore; spica nutante multiflora foliis triplo longiore; sepals linearibus acuminatis, inferiore bicarinato; petalis obtongis; labello ovato obtuso. *In Brasilia.* 2. Flores flavi.

22. *P. lanceolata* Lindl. caule ascendente tereti, folio ovato lanceolato eretto basi angustiore triplo longiore; racemo solitario apice nutante, e spatha maxima coriacea. *In Peruvia.* 2.

23. *P. caulinflora* Hook. ic. t. 50. folio subrotundo-ovato petiolato, racemis secundis fasciculatis duplo breviore; spatha oblonga obtusa; sepalo inferiore oblongo emarginato; petalis linearibus; labello subrotundo membranaceo concavo retuso cum ungue columnae articulato. *In Peruvia.* 2.

24. *P. truncata* Hook. ic. t. 55 folio lanceolato-ovato acuminato racemis geminis aequali caule plures longiore; sepals lateralibus in unum ovatum connatis superioriore cucul-

lato; petalis linearis oblongis; labello truncato revoluto. *In Peruvia.* 2. Flores aurantiaci.

25. *P. diffusa* Poepp. et Endl. nov. t. 86 caule anguloso folium ovato-oblongum acutum excedente; racemis longissimis diffusis; spatha compressa acuminata brevi; floribus secundis; sepalis late ovatis; labello unguiculato emarginato cucullato. *In Peruvia.* 2.

26. *P. longicaulis* Lindl. folio coriaceo angusto oblongo obtuso caule apice alato 4-plo breviore; spicis numerosis multifloris cernuis; labello bilamellato oblongo acuto acute trilobo. *In Brasilia.* 2. Flores flavi.

27. *P. plumosa* Lindl. folio coriaceo ovali spica paulo breviore; floribus pubescentibus; sepalo dorsali linearis sub apice intus convexo, lateribus obtusis connatis; petalis nanis argute inciso-serratis; labello concavo serrulato-papilloso. *In ins. Trinitatis.* 2. Flores virides.

28. *P. spiralis* Lindl. caule tereti laxe vaginato folio oblongo aequali; racemo erecto spirali folio longiore; bracteis acuminatis; sepalis ovatis obtusiusculis, lateralibus cymbiformi - connatis; petalis truncatis nanis. *In Peruvia.* 2.

29. *P. tricarinata* Poepp. et Endl. t. 87 caule compresso folium linearis oblongum obtusum aquante; spica solitaria pedunculata; floribus distichis resupinatis; sepalis connatis margine revolutis; labello unguiculato oblongo. *In Peruvia.* 2.

b. Trisepalae.

30. *P. stenopetala* Lindl. folio oblongo apice rotundato caule longiore; bracteis cucullatis; sepalis linearibus acuminatissimis intus pubescentibus liberis; petalis nanis obtusis labelloque conduplicato pubescentibus. *In Brasilia.* 2.

31. *P. sclerophylla* L. fol. oblongo petiolato obtuso carnosus; bracteis ovatis cucullatis; sepalis acuminatissimis liberis; petalis nanis obtusis; labello apice piloso-glandulosus. *In Brasilia.* 2.

32. *P. arbuscula* Lindl. caule erecto racemoso vaginis striatis vestito; fol. ovalibus mucronatis; spicis solitariis secundis folio duplo lon-

gioribus; sepalis linearis elongatis obtusis; petalis rotundatis nanis; labello linearis. *In Peruvia.* 2.

33. *P. gelida* Lindl. folio oblongo carnoso concavo; spicis geminiis secundis; floribus cylindraceis; sepalis carnosus intus pilosis; petalis minimis apice denticulatis. *In Jamaica.* 2.

34. *P. rubens* Lindl. folio oblongo lanceolato obtuso; racemis longissimis; sepalis lanceolatis acuminatis; petalis obtusis; labello obovato repando lineis 2 elevatis. *In Brasilia.* 2.

35. *P. Jamesoni* Lindl. folio linearis - oblongo; racemo secundo; bracteis densis cucullatis; sepalis oblongis; petalis multo minoribus rotundis; labello rhombeo 3-lobo. *In Peruvia.* 2.

37. *P. saurocephala* Lodd. B. Cab. t. 1571. folio coriaceo sessili; sepalis coriaceis pubescentibus oblongis; petalis nanis acutis; labello oblongo utrinque bilamellato, lamellis incurvis. B. M. d. 3030. B. R. t. 1968. *In Brasilia.* 2.

38. *P. Lanceana* Lodd. B. Cab. t. 1767. fol. carnosus ovalibus acutis; spicis solitariis pendulis; sepalis coniventibus acutis lateral. usque ad apicem connatis; petalis subulatis ciliatis; labello ovato. *In Surinamo.* 2. Flores flavi.

39. *P. capillaris* Lindl. folio linearis-lanceolato; racemis capillaris fasciculatis; sepalis acuminatis basi connatis; petalis fere aequilongis serratis acuminatis; labello lanceolato trivenio. *In Brasilia.* 2.

40. *P. floribunda* Lindl. caule apiciti; spicis flexuosis multifloris; sepalis ovatis; petalis serrulatis; labello trilobo bitamellato lacinias acutis. *In Martinica.* 2.

41. *P. caulescens* Lindl. caulis adscendentibus; fol. gracillimus linearis-lanceolatis costatis; racemis subsecundis; bracteis ochreatis ovatis acutis; sepalis lanceolatis; petalis ovatis acutis; labello ovato obsolete trilobo. *In Peruvia.* 2.

42. *P. teres* Lindl. folio tereti racemo gracili breviore; bracteis ochreatis; floribus pendulis; petalis minimis oblongis acutis; labello linearis marginibus incrassatis. *In Brasilia.* 2. Flores cinnamomei.

43. *P. rupestris* Lindl. folio tere-

ti mucronato antice sulcato; racemo stricto; sepalis acutis; petalis lanceolatis ciliatis; labello subtrilobo appendice magno bifurco carnoso. *In Brasilia.* 2. Flores purpurei.

Sect. 2. *Effusa* Lindl. t. c. *spicata*
v. racemi folio multo breviores.

a. Laeves. Flores omnes pubescentes.

44. *P. macrophylla* Lindl. caule folium oblongo-lanceolatum duplo excedente; racemis fasciculatis numerosissimis spatha saccata basi inclusis; labello subrotundo utrinque acuminato. *P. floribunda* Poepp. et Endl. nov. g. t. 84. *In Peruvia.* 2.

45. *P. decurrentis* Poepp. et Endl. t. 83. caule anguloso folium subrotundum utrinque acutum triplo excedente; spicis abbreviatis oliganthis; sepalo inferiore bimucronulato. *In Peruvia.* 2.

46. *P. secunda* Poepp. et Endl. caule folio oblongo triplo longiore; racemis capillaribus paucifloris; floribus secundis; sepalis late ovatis; labello cordato-rotundo longe unguiculato. *In Peruvia.* 2.

47. *P. prolifera* Lindl. caulis anciptibus; folio oblongo cochleato proliferis; sepalis conniventibus; petalis labelloque conformibus. *In Brasilia.* 2.

48. *P. luteola* Lindl. folio ovato canaliculato acuto 3-dentato; pedunc. 3-floro; floribus glabris; sepalis laterali connatis omnibus carnatis; petalis spathulatis emarginatis. *In Brasilia.* 2.

49. *P. bicarinata* Lindl. folio oblongo coriaceo; sepalis linearibus aequalibus, lateralibus carinatis ad apicem fere connatis; sepalis linearis-obovatis minute serratis glabris; labello obovato denticulato. *In Brasilia.* 2. Flores flavescentes.

50. *P. ochreata* Lindl. folio crasso lanceolato complicato; racemo denso flexuoso nutante; bracteis cucullatis acutis; sepalis acuminatis; petalis linearis-oblongis nanis. *In Brasilia.* 2. Sepala rubra. Petala flava.

51. *P. obovata* Lindl. folio coriaceo obovato canaliculato caule longiore; spicis fasciculatis; floribus gla-

berrimis; sepalis petalisque linearibus acuminatis; columna cucullata alata dentata. *In Brasilia.* 2.

52. *P. hypnicola* Lindl. fol. ovato-lanceolato apice tridentato; racemo capillari; pedicellis elongatis; petalis obovatis rhombis nanis; labello ovato unguiculato acuminato. *In Brasilia.* 2.

53. *P. auriculata* Lindl. folio oblongo-lanceolato decurrente; spica cernua 4—5-flora; sepalis laevibus ovatis acutis concavis; petalis oblongis obtusis; labelli 3-partiti lobis laterali. angustissimis falcatis acuminatis, apice glandulosis. *In Brasilia.* 2. Flores fusi.

54. *P. barbata* Westc. fol. lanceolatis ovatis apiculatis; sepalis subaequalibus patulis lateral. reflexis; petalis multo minoribus ciliatis acutis; labello integerrimo linguaeformi subtus barbato. *In Para.* 2.

55. *P. pruinosa* Lindl. folio linearis-lanceolato obtuso arcuato; racemis laxis capillaribus; sepalis ovatis concavis extus pruinosis inferiore e-marginato; petalis linearibus; labello nano rhombo-ovato. *In Surinamo.* 2. Flores minimi flavi.

b. Pubescentes Lindl. Flores pubescentes.

56. *P. strupifolia* Lindl. fol. longissimo coriaceo obtuso lorato; racemis fasciculatis pendulis; floribus hirsutis pubescentibus; sepalo intermedio apice carnoso revoluto lateribus intus maculis pilosis. *In Brasilia.* 2. Flores purpurei.

57. *P. bicolor* Lindl. folio oblongo coriaceo; spatha diphylla; sepalis reflexis inferiore 3-lineato extus basi villosa, 2 superioribus maculatis; labello velutino maculato. *P. picta* Hook. B. M. t. 3897. *In Mexico.* 2. Flores purpurei.

58. *P. pectinata* Lindl. fol. oblongo acuto cochleato glauco; caule ancipti; spica simplici disticha; bracteis cucullatis; sepalis pubescentibus elongatis basi ventricosis; labello oblongo basi pectinato. *In Brasilia.* 2. Flores virides.

59. *P. pubescens* Lindl. folio lanceolato; racemis nutantibus fasciculatis; sepalis pubescentibus; petalis lanceolatis serratis; labelli oblongi lobis lateral. inflexis; clinandrio serrulato. *In Mexico.* 2.

60. *P. inaequalis* Lindl. spica densa folio oblongo breviore, ovario pubescente; sepalis ovatis dorsali duplo majore; petalis nanis; labello oblongo-rotundato fimbriato. *In Brasilia.* 2.

61. *P. casapensis* Lindl. fol. cordato-oblongo decurrente; bracteis cucullatis cuspidatis; sepalis acutis connatis glabris; petalis serratis diaphanis; labello leviter serrulato. *In Peruvia.* 2. Flores flavi.

62. *P. ciliata* Knowl. et Westc. n. Cab. t. 19. racemis nutantibus multifloris; sepalis linear-lanceolatis acutissimis ciliolatis lateral. connatis; petalis serratis; labello linguaeformi serrulato, verrucoso. *In Demerara.* 2. Flores villosi aurei.

63. *P. recurva* Lindl. folio obovato coriaceo; spica brevi recurva; floribus pubescentibus; sepalis lateralibus connatis; petalis rhombeis acutis; labello membranaceo sinuato obtuso. *In Brasilia.* 2. Flores pallide purpurei.

64. *P. villosa* Knowl. et Westc. folio coriaceo ovali 3-nervi; spicis fasciculatis densifloris; sepalis carinatis longe ciliatis basi saccatis; petalis oblongis nanis apice ciliatis; labello obtuso ciliato. *In Mexico.* 2.

65. *P. Smithiana* Lindl. fol. oblongo; sepalis oblongis lateral. ad apicem cohaerentibus; petalis obovatis clinandrio denticulatis; labello obvato utrinque dentato callis 2 elevatis. *In Brasilia.* 2.

Sect. 3. *Aggregatae* Lindl. l. c. p. 77. *Pedunculi aggregati 2-flori.*

a. *Pubescentes.*

66. *P. scabripes* Lindl. folio linear-lanceolato apice tridentato caule longiore; vagina pilosa; flore solitario pubescente; ovario tomentoso; sepalis acutis connatis; labello spatulato rotundato. *In Brasilia.* 2.

67. *P. vittata* Lindl. folio ovali crassissimo; caule tereti; spica disticha; floribus tomentosis; sepalis lateral. acutissimis falcatis; petalis obvatis acutis serratis; labello biauriculato margine scabro. *In Mexico.* 2.

68. *P. breviflora* Lindl. folio carnoso obovato subtus purpurascens; floribus sessilibus pilosis; sepalis ovatis lateral. connatis; petalis ovatis

apiculatis; labello carnoso apice denticulato angulato. *In Mexico.* 2.

69. *P. aphthosa* Lindl. misc. 1843. no. 7. folio coriaceo cauli triquetro aequali; spatha 2-valvi coriacea; floribus tomentosis carnosis sepalis oblongis intus papillosis lateralibus connatis; petalis denticulatis subdianphanis; labello lineari oblongo. *In Mexico.* 2.

70. *P. ophiocephala* Lindl. folio oblongo concavo carnoso; flore solitario e spatha duplice erumpente; sepalis oblongis obtusis intus papillosis extus pubescentibus; petalis intus villosis; labello obtuso marginibus elevatis truncatis. *In Mexico.* 2.

b. *Laeves.*

* ***Labelium lineare v. oblongum.***

71. *P. grandiflora* Lindl. fol. perfoliato oblongo caudato apice tridentato; sepalo supremo ventricoso acuminato lateralibus recurvis triplo latiore; petalis hispido-ciliatis; labello carnoso ciliato. *In Peruvia.* 2.

72. *P. octomerioides* Lindl. folio oblongo subemarginato caule pedali duplo breviore; sepalis liberis carnosus obtusis; petalis linear-lanceolatis carnosis; labello minimo ovato integerrimo glabro. *In Mexico.* 2.

73. *P. fragilis* Lindl. folio ovato-oblongo; caule compresso; pedunculis bifloris folio adpressis; floribus carnosis fragilibus glaberrimis; sepalis connatis; petalis cuneatis apiculatis; columna apice denticulata; labello linear-lanceolato. *In Brasilia.* 2.

74. *P. circumplexa* Lindl. fol. coriaceo emarginato ovato; caule subnullo; floribus capitatis ovariisque pubescentibus; capitulo disticho 6-floro; sepalis inferior. in unum connatis supremo panduraeformi; labello crasso calceiformi serrulato. *In Mexico.* 2.

75. *P. affinis* Lindl. folio lanceolato 3-dentato; sepalis setacis acuminatis liberis; labello ovato-oblongo obtuso medio producto columnae adnato; ovario pubescente. *In Peruvia.* 2.

76. *P. ruscifolia* Hook. exot. fl. t. 197. folio ovali-lanceolato longitudine caulis; floribus fasciculatis; spatha bivalvi; pedicellis filiformibus; sepalis ovato-lanceolatis; petalis li-

nearl-lanceolatis minoribus; labello oblongo undulato obtuso. In Jamaica. 2.

77. *P. muscifera* Lindl. caulis vaginis maculatis; sepalio supremo acuminatissimo, lateralibus lanceolatis connatis; petalis linearibus clavatis patentissimis labello linearis repando apice carnosus. In Guatimala. 2.

78. *P. bidentata* Lindl. rhizome repeute filiformi; caulis adscendentibus; folio apice 2—3-dentato; sepalis ecarinatis; labello linearis obtuso apice ciliato. In Brasilia. 2.

79. *P. angustifolia* Lindl. rhizome repente filiformi; caulis adscendentibus folio lanceolato longioribus; sepalis carinatis; petalis lanceolatis denticulatis; labello linearis basi marginibus incrassatis. In Mexico. 2.

80. *P. discoidea* Lindl. caulis strictis; folio ovato-lanceolato brevioribus; pedunc. solitariis 1-floris; sepalis oblongis acutis lateral. omnino connatis; petalis linearibus acuminatis decurvis; labello cordato-ovato undulato. In ins. Trinitatis. 2. Flores flavi.

81. *P. glandulifera* Lindl. folio ovali carnosus 3-dentato; racemis 2—3-floris; sepalis bilabiatis basi connatis; petalis lanceolatis serratis; labello ovato obtuso piloso auriculis minimis triglandulosis. In Riojaneiro. 2. Flores pallide flavi.

82. *P. orbicularis* Lindl. fol. subrotundo ovato emarginato; floribus fasciculatis; sepalis linearis oblongis glabris inferiore bipartito; petalis ellipticis acutis serratis; labello ciliato obtuso. In Demerara. 2.

83. *P. Lingua* Lindl. caespitosa; folio spathulato acuto emarginato carnosus caule multo longiore; sepalis linearibus acuminatis, petalis multo brevioribus obovatis obtusis apiculatis; labello linearis apice convexo. In Brasilia. 2.

84. *P. tribuloides* Lindl. caule brevissimo 1-phyllo; folio lanceolato obtuso; pedunculo brevissimo 1-floro; capsula globosa echinata. In Jamaica. 2.

c. Laeves. Labellum cor- datum.

85. *P. tentaculata* Lindl. folio obtuso oblongo plano coriaceo; floribus

3—4 longe pedunculatis disepalis; sepalis linearis-lanceolatis acuminate insinu emarginato; petalis filiformibus; clinandrio alte dentato. Restrepia Poepp. et Endl. t. 59. In Peruvia. 2. Flores purpurei.

86. *P. Hartwegii* Lindl. fol. lanceolato; floribus dense aggregatis disepalis, sepalio inferiore cymbiformi superiore multo latiore; labello nano hastato-cordato utrinque lobato-crispato apice serrato. In Loxa. 2.

87. *P. taurifolia* Lindl. caule 1-phyllo; folio oblongo acuminato basi angustato; floribus fasciculato-congestis; sepalis lateralibus apice liberi. In Popaya. 2.

88. *P. succosa* Lindl. fol. ovato-lanceolato succoso; floribus fasciculatis subsessilibus; sepalis lanceolatis lateral. connatis; petalis subulatis linearibus; labello minimo cordato recurvo. P. multicaulis Poepp. et Endl. t. 82. In Peruvia. 2.

89. *P. tridentata* Klotsch; caule 1-phyllo; folio oblongo lanceolato apice tridentato; spatha 1-valvi con-duplicato-carinata; floribus minutis aggregatis flavis bracteis obsolete tridentatis; labello parvo orbiculari. In Caracas. 2.

90. *P. scabringuis* Lindl. fol. cordato-lanceolato apice tridentato; floribus subsolitariis; sepalis ovatis convexis connatis; petalis linearis-subulatis serrulatis; labello unguiculato oblongo sagittato piloso, vena intermedia apice varicosa. In Peruvia. 2.

91. *P. cordata* Lindl. caule tereti sulcato; folio subrotundo coriaceo horizontali alte cordato acuminato; floribus e spatha brevi exsertis. In Peruvia. 2.

92. *P. undulata* Poepp. et Endl. folio cordato-ovato acuminato undulato; spatha membranacea truncata longitudine florum; sepalis oblongis acuminatis connatis; labello oblongo obtuso bidentato. In Peruvia. 2.

93. *P. atropurpurea* Lindl. vaginis caulis 2—3 ventricosis; folio oblongo plano 7—9-venio; flore solitario subsessili; petalis 3-cuspidatis; labelli lamina sagittata. In Jamaica. 2.

94. *P. papillosa* Lindl. caulis strictis folio lanceolato apice tridentato paulo longioribus; pedunc. subaggregatis 1-floris; sepalis campa-

nulatis; labello hastato obtusissimo apice vittis 2 elevatis carnosis papillosis. *In Brasilia.* 2.

d. Labellum trilobum.

95. *P. sicaria* Lindl. folio oblongo angusto; pedunc. brevibus 2—3-floris cernuis aggregatis; sepalis linear-i-lanceolatis patulis chartaceis cohaerentibus; petalis ovalibus acutissimis serratis; labello lanceolato acutissimo. *In ins. Trinitatis.* 2.

96. *P. retusa* Lindl. caule elongato folio lanceolato carnoso retuso sulcato margine revoluto; pedunc. filiformibus fasciculatis. *In Mexico.* 2. Flores fuscocallide purpurei.

Sect. 4. Muscosa e Lindl. l. c. p.

82. *Pedunculi filiformes simplices v. bifidi rarius multifidi.*

97. *P. ephemera* Lindl. folio oblongo emarginato; pedunc. capillari; ovario trialato; sepalis linearibus acutis basi connatis; petalis nanis lanceolatis; labello linearis recurvo. *In Brasilia.*

98. *P. linearis* Lindl. caule ancipiti folio linearis-oblongo subtriplo longiore; spicis capillaribus bifloris altera folio duplo breviore. *In Mexico.* 2.

99. *P. parvifolia* Lindl. folio minus ovari emarginato subsessili; pedunc. solitario folio longiore; sepalis oblongis acutis; petalis nanis obovatis; labello oblongo obtuso maculato. *In Brasilia.* 2.

100. *P. muscoidea* Lindl. caespitosa acaulis; folio ovali biconvexo; pedunc. setaceo bifloro; perianthio explanato; sepalis linearis-lanceolatis; petalis multo minoribus conformibus; labello ovato obtuso canaliculato. *In Brasilia.* 2.

101. *P. Lanceola* Spr. caulis brevissimis caespitosis; folio lanceolato subpetiolato; pedunc. capillari bifloro; sepalis obtusis patulis; petalis apice subciliatis; labello obtuso ovato recurvo. *In Jamaica.* 2.

102. *P. trifida* Lindl. caespitosa; folio linearis-lanceolato apice tridentato; pedunc. apice plurifloro; sepalis obtusis antico bidentato concavo; petalis spathulatis rhomboidis; labello obtuso a latere repando. *In Brasilia.* 2.

103. *P. plantaginea* Lindl. caespitosa; caule brevissimo; fol. petiolatis spathulato-linearibus; pedunc. capillaribus 1-floris; sepalis ovato-oblongis connatis; labello lanceolato obtuso. *Specinia Poepp. et Endl.* t. 89. a. *In Peruvia.* 2.

104. *P. pusilla* Lindl. caule 1-phyllo; folio elliptico subacuto; pedunc. solitariis 1—2-floris; sepalis oblongo-lanceolatis acuminato-filiformibus. *In Loxa.* 2. Flores flavescentes.

105. *P. hymenantha* Lindl. folio linearis-lanceolato obsolete tridentato; pedunc. flexuosis capillaribus; bracteis minimis; sepalis acutis; petalis acuminatis; labello oblongo subundulato complicato. *In Brasilia.* 2.

106. *P. uniflora* Lindl. folio linearis-lanceolato subsessili; pedunc. 1-floro; sepalis oblongo-lanceolatis acutis subaequalibus; labello linearis-lanceolato obtuso basi concavo. *In Brasilia.* 2.

107. *P. sertularioides* Spr. rhizome repente articulato; caulis brevissimis; pedunc. 1-floris folio brevioribus; sepalis liberis linearis-lanceolatis patulis; labello lanceolato; clinandrio integerrimo. *In Jamaica.* 2. Flores albidii.

108. *P. Gardneri* Lindl. rhizoma te repente intricato; fol. ovalibus marginato; pedunc. capillaribus folio multo longioribus; sepalis petalisque linearis-lanceolatis apice serrulatis; labello rhomboe acuto lamellis 2. *In Brasilia.* 2.

109. *P. punctata* Lindl. caulis strictis folio crasso ovato longioribus; pedunc. capillaribus paucifloris; petalis lanceolatis apice pubescentibus; labello unguiculato cordato-sagittato columna elongata. *In Brasilia.* 2.

110. *P. corniculata* Lindl. caulis folio oblongo emarginato subaequalibus; pedunc. bifloris folio brevioribus; sepalis lanceolatis petalis duplo brevioribus; labello linearis-lanceolato basi gibboso. *Hook. ext. fl. t. 109. In Jamaica.* 2.

111. *P. seriata* Lindl. folio carnosus plano ovali emarginato; pedunc. filiformi plurifloro; sepalos dorsali margine reflexo antice latiore acute emarginato; petalis spathulatis carnosis; labello oblongo obtusissimo, pubescente. *In Brasilia.* 2.

mate repente articulato polyphyllo; fol. ovalibus mucronatis; caulinis brevissimis; pedunc. longissimis bifloris; petalis linearibus acuminatis; labello parvo pubescente trilobo. *In Brasilia.* 2.

113. *P. Miersii* Lindl. rhizomate filiformi intricato; fol. ovalibus mucronatis trinerviis; pedunc. setaceis multifloris; sepalum dorsali ovato acuminato lateralibus ovalis semiconnatis; petalis lanceolatis serrulatis; labello oblongo acuto. *In Brasilia.* 2.

4397. CADETIA Freyc. (1830).

1. *C. umbellata* Freyc. voy. t. 33. In ins. Moluccanis. 2. Herba pusilla caulinis simplicibus vaginatis; folio carnoso enervi floribus fasciculatis albis.

4398. SCELOCHILUS Klotsch. (1841.)

1. *S. Klotsch.* In Caracas. 2. Herba epiphyta rhizomate caespitosa pseudobulbis nullis; fol. solitaria coriacea carinata. Racemus radicalis. Flores compressi flavi.

4399. SPECLINIA Lindl. (1830).

1. *S. ciliaris* Lindl. fol. angusto lanceolato obtuso; spicis secundis; sepalis carinatis ciliatis inferiore bifido; petalis ciliatis. In Mexico. 2. Flores viridi-purpurascentes.

1. *S. orbicularis* Lindl. folio subrotundo ovato emarginato; floribus fasciculatis; sepalis linearib. oblongis glabris, inferiore bipartito; petalis serratis. In Demerara. 2.

3. *S. oborata* Lindl. fol. coriaceo obovato caule longiore; spicis fasciculatis; floribus glaberrimis; sepalis linearibus acutis; labello linearis acutus; columna cucullata alata dentata. In Brasilia. 2. Flores parvi lutei.

4. *S. floribunda* Lindl. caule angusti; fol. oblongo lanceolato; spica flexuosa multiflora; labello bicristato. In Martinica. 2.

5. *S. pusilla* Lindl. folio elliptico acuto; pedunc. 1—2-floris; sepalis oblongo-lanceolatis acuminato-filiformibus. Dendrobium H. et K. In Peruvia. 2.

6. *S. elegans* Lindl. folio obtuso; spicis 4—5-nis; sepalis obtusis. Dendrobium H. et K. In Nov. Granata. 2.

4400. PHYSOSIPHON Lindl. (1837).

1. *P. Loddigesii* Lindl. P. tubata Lodd. b. Cab. t. 1601. In Hispania. 2. Herba habitu Pleurothallidis.

2. *P. carinatus* Lindl. In Amer. austr. 2.

4401. ACIANTHERA Scheidw. (1842).

1. *A. punctata* Scheidw. In Brasilia. 2. Folia ovata obtusa glauca utrinque purpureo-punctata. Sepala extus villosa intus purpureo punctata v. ocellata. Labellum purpureum.

4402. ASPEGRENIA Poepp. et Endl. (1835).

1. *A. scirpoidea* Poepp. et Endl. t. 116. In Peruria. 2. Caules tereti vaginati scirpoidei. Flores laterales fasciculati paleaceo-bracteati.

4403. OCTOMERIA R. Br. (1821).

1. *O. graminifolia* R. Br. fol. lanceolatis; labello ovato lobo intermedio bicostato tridentato; sepalis ovatis. Plum. ic. 176. f. 1. B. M. 2764. In Caribaeis. 2. Fl. flavi.

2. *O. Baueri* Lindl. n. g. p. 20. fol. lanceolatis; labello oblongo; lobo intermedio elongato flexuoso dilatato; sepalis ovatis. In Ind. occ. 2.

3. *O. serratifolia* Hook. B. M. t. 2823. fol. distichis serrulatis; racemo paucifloro; labello oblongo-lineari crenulato; lobo intermedio obtuso abbreviato; sepalis lanceolatis. In Brasilia. 2.

4. *O. gracilis* Lodd. folio linearicarinato apiculato recurvo; floribus fasciculatis; labelli emarginati lobis, lateralibus erectis rotundatis. In Brasilia. 2.

5. *O. tridentata* Lindl. fol. ovali crassissimo acuto; floribus fasciculatis; labello oblongo apice tridentato

112. *P. articulata* Lindl. rhizo-

auricula utrinque reflexa; lamellis obsoletis. In Demerara. 2. Fl. flavi.

6. *O. discolor* Lodd. fol. latis papraceis subtus discoloribus; labello linguaeformi linea media elevata villosa, autherae margine angulisque papillosis. In Demerara. 2. Flores aurantiaci.

7. *O. grandiflora* Lindl. misc. 1842, no. 80. folio longo lanceolato arcuato; vaginis caulis arcte adpressis; labelli trilobi laciniis lateral. subfalcatis acutis media denticulata fissa, lamellis 2 carnosis. In Brasilia. 2.

4404. LEPANPHES Sw. (1806).

1. *L. tridentata* Sw. folio ovato acuto apice tridentato; floribus basi 3-queritis; sepalis acuminate. B. R. t. 1762. In Ind. occ. 2.

2. *L. pulchella* Sw. folio subrotundo acuto; sepalis acuminate ciliatis interioribus postice cruciantibus. In Ind. occ. 2.

3. *L. concinna* Sw. folio ovato acuminate; sepals subrotundis acutis interioribus postice obtusis. In Ind. occ. 2.

4. *L. cochlearifolia* Sw. folio orbiculari convexo concavo. In Ind. occ. 2. Fl. sanguinei.

4405. STELIS Sw. (1799).

1. *S. ophioglossoides* Sw. fol. lanceolato incurvo; floribus cernuis sub-6-gonis; sepalis truncatis; labello cordato. B. R. t. 935. In Ind. occ. 2.

2. *S. micrantha* Sw. fol. coriaceo lanceolato obtuso; floribus nutantibus secundis trigonis; sepalis apiculatis labello conformibus. Hook. exot. fl. t. 158. In Ind. occ. 2.

3. *S. pusilla* H. et K. folio lanceolato acuto; floribus nutantibus; sepalis exteriorib. rotundis 3-nerviis. In Amer. austr. 2.

4. *S. carnosa* H. et K. folio longo obtuso subcarnoso; spica cylindrica; floribus erectis; sepalis ener- viis ovatis. In Amer. austr. 2.

5. *S. floribunda* H. et K. folio longo obtuso coriaceo; spicis 4-nis; floribus nutantibus; sepalis ovatis tri-nerviis intus pubescentibus. In Amer. austr. 2.

6. *S. angustifolia* H. et K. folio lanceolato obtuso; spicis geminis; floribus nutantibus; sepalis exterioribus ovatis 3-nerviis pubescentibus. In Nova Granata. 2.

7. *S. elongata* H. et K. folio lanceolato obtuso spica solitaria 4-plo breviore; floribus nutantibus; sepalis exterioribus 3-nerviis obtusis. In Popaya. 2.

8. *S. alba* H. et K. folio oblongo ovato coriaceo; floribus nutantibus; sepalis exterioribus ovato-oblongis acutis. In Popaya. 2.

9. *S. macrocarpa* H. et K. folio oblongo obtuso spicis geminis duplo breviore; floribus nutantibus; sepalis exterioribus rotundo-ovatis 5-nerviis. In Nova Granata. 2.

10. *S. argentea* Lindl. folio linearis oblongo in petiolum canaliculatum angustato; racemo elongato; sepalis ovatis subdiaphanis pubescentibus; petalis labelloque truncatis apice particulis argenteis micantibus. In Guiana. 2.

11. *S. crassifolia* Lindl. l. c. fol. angusto semiteriti; bracteis membranaceis cucullatis truncatis; floribus cernuis; sepalis subrotundo-ovatis liberis 3-nerviis; petalis obovatis membranaceis; labello trilobo carnosus la- cinia intermedia elongata. In Ind. occ. 2.

12. *S. tristyla* Lindl. fol. oblongo concavo subundulato; spica erecta subtertiili; bracteis cucullatis; calyce triangulare; petalis truncatis carnosis; labello truncato medio sulcato; co-lumna superne viscosa stigmatica. In Brasilia. 2.

13. *S. intermedia* Poepp. et Endl.

14. *S. atropurpurea* Hook. B. M. t. 3975. In Peruvia.

15. *S. spathulata* Poepp. et Endl.

4406. OSIRYCERA Blume (1826).

1. *O. crassifolia* Blum. tabell. t. 58. In Java. 2. Folio lanceolata. Spicae radicales. Flores purpurascentes.

4407. CHRYSOGLOSSUM Blume (1826).

1. *C. ornatum* Blum.; fol. lanceolatis pedunculisque glabris; labelli lobis subrotundis, medio fornicato. *In Java.* 2.

2. *C. villosum* Blum. tab. t. 7. fol. ovato-oblongis pedunculisque villosis; labelli lobis lateralibus acutis. *In Java.* 2.

4408. GASTROGLOTTIS Blume (1826).

1. *G. montana* Blume. *In Java.* 2. Planta terrestris. Radix fibrosa. Fol. oblongo-lanceolata plicata. Flores longe pedunculati puri flavi.

4409. RESTREPIA H. et K. (1817).

1. *R. artennifera* H. et K. nov. g. t. 94. *In Popaya.* 2. Caulis squamis magnis vaginato. Fol. plicata. Flores axillares.

4410. OBERONIA Lindl. (1831).

1. *O. iridifolia* Lindl. fol. latis ensiformibus; racemo longo; floribus verticillatis; bracteis fimbriatis; sepalis interior. erosus; labello 4-lobo fimbriato. *In Ceylonia.* 2.

2. *O. longibracteata* Lindl. fol. ensiformibus; racemo nutante; scapo ancipiti; labello truncato lobato. *In Ceylonia.* 2. Flores virides.

3. *O. caulescens* Lindl. fol. subfalcatis angustis; racemo flexuoso; labello elongato bilobo basi carnosus obtuse bidentato. *In Nepalia.* 2.

4. *O. antropophora* Lindl. fol. ensiformibus subfalcatis; spica nutante; floribus verticillatis; sepalis linearibus; lobo medio labelli trilobi elongato bilobo. *In Ind. or.* 2. Flores minutissimi.

5. *O. bicornis* Lindl. fol. ovatis undulatis; recemis numerosis nutantibus; sepalis ovatis; labello sublunato bicorni. *In Silhet.* 2.

6. *O. brevifolia* Lindl. fol. ovatis brevibus; racemo stricto; labello ciliato apice crenulato. Thouars orch. t. 8. *In ins. Borboniae.* 2.

7. *O. Myosurus* Lindl. fol. linearibus carnosis rectis longitudine racemi; caps. sphaericis 6-angulatis. *In ins. Societat.* 2.

8. *O. spathulata* Lindl. fol. ensiformibus vaginatis subrecurvis; labello spathulato emarginato. *Malaxis Blume.* *In Java.* 2.

10. *O. lunata* Lindl. fol. pancis ensiformibus vaginatis incurvis, limbo labelli semilunato denticulato. *Malaxis Blume.* *In Java.* 2.

11. *O. monstrosa* Lindl. caule simplici late folioso; fol. remotis ensiformibus subincurvis; spica elongata densiflora. *Malaxis Blume.* *In Java.* 2.

12. *O. cylindrica* Lindl. misc. spica densa cylindrica; bracteis canaliculatis ciliatis; sepalis petalisque reflexis intus labelloque cordato-truncato fimbriato pubescentibus. *In Marnilla.* 2.

13. *O. imbricata* Lindl. caule folioso; fol. compressis vaginatis imbricatis; labello lingulato denticulato. *Malaxis Blume.* *In Java.* 2.

14. *O. microphylla* Lindl. fol. angusto-eusiformibus vaginatis; sepalis interioribus erosus; labello producto rotundo crenato. *Malaxis Blume.* *In Java.* 2.

15. *O. similis* Lindl. fol. ensiformibus vaginatis suberectis; labello semitrifido erosu, lobo medio elongato bifido. *Malaxis Blume.* *In Java.* 2.

16. *O. recurva* Lindl. acaulis; fol. brevibus acutis racemo recurvo multifloro; bracteis ovatis integris; petalis obovatis subdentalis; labello subrotundo 4-lobo denticulato. *In Madras.* 2.

17. *O. Wightiana* Lindl. acaulis; fol. ensiformibus racemo erecto multifloro; petalis linearibus; labelli 4-lobo lobis lateralibus rotundatis integris intermedio elongato apice denticulatis. *In Ind. or.* 2.

18. *O. miniata* Lindl. caulescens; fol. equitantibus subfalcatis acutis; spica longissima pendula laxiflora; bracteis linearibus convolutis laceris; pedicellis glanduloso-pilosus; sepalis petalisque ovatis acutis. *In Singapore.* 2.

4411. TITANIA Endl. (1833).

1. *T. miniata* Endl. In *Ins. Norfolk.* 2. Herba pusilla habitu Oberoniae. Folia disticha. Scapi angulati. Flores racemosi coccinei minimi.

4412. CARTERETIA Rich. (1837).

1. *C. paniculata* Rich. sert. astrol. In *Nov. Holl.* 2. Herba parasitica fol. pedalibus; scapo ramoso bracteato; floribus racemosis parvulis virulentibus.

4413. EMPUSA Lindl. (1828).

1. *A. paradoxa* Lindl. B. R. t. 825. In *Nepalia.* 2. Fol. membranacea plicata. Racemus terminalis multiflorus. Flores ochroleuci.

4414. PLATYSTYLIS Lindl. (1831).

1. *P. decurrens* Lindl. bulbis compressis; fol. lanceolatis; pedunculo nutante; bracteis ovatis decurrentibus; labello utrinque 1-dentato. Malaxis Blume. In *Java.* 2.

2. *P. atropurpurea* Lindl. bulbis subcompressis; fol. binis ovatis; pedunculo 5-gono; labello emarginato mucronato. Malaxis Blume. In *Java.* 2.

4415. MICROSTYLLIS Nutt.

1. *M. monophyllum* Lindl. caule 1-folio; racemo paucifloro; labello acuminato integerrimo. Malaxis Sw. Hall. helv. t. 36. In *Europa.* 2.

2. *M. ophioglossoides* Nutt. caule 1-folio; racemo obtuso capitato; labello tridentato. Malaxis B. Cab. t. 1116. In *Aur. bor.* 2.

3. *M. diphyllum* Lindl. fol. 2 ovato-lanceolatis acutis; scapo 3-quetro; labello rotundo acuminato. Malaxis Cham. In *Unalaschka.*

4. *M. umbellulata* Lindl. caule diphylo; fol. ovato-lanceolatis acuminatis undulatis longissime vaginantiibus; floribus umbellatis. Malaxis Sw. In *Jamaica.* 2.

5. *M. spicata* Lindl. caule diphylio; fol. cordatis; scapo 4-gono; labello trilobo lobo medio elongato. Malaxis Sw. fl. ind. t. 28. In *Jamaica.*

6. *M. Wallichii* Lindl. fol. oblongis acuminatis; racemo elongato; sepalis interior filiformibus; labello ovali bifido. In *Nepalia.* 2.

7. *M. biaurita* Lindl. fol. ovato-oblongis acuminatis; racemo denso multifloro; labello basi bicristato; sepalis secundis. In *Ind. or.* 2. Flores lividi.

8. *M. bitoba* Lindl. fol. oblongis acuminatis; racemo elongato paucifloro; sepalis interior linearibus truncatis; labello ovato apice bilobo. Malaxis Don. In *Nepalia.* 2.

9. *M. discolor* Lindl. fol. ovato-oblongis undulatis plicatis; labello ovato integerrimo cucullato; sepalis secundis. In *Ceylon.* 2. Flores flavo-purpurei.

10. *M. purpurea* Lindl. fol. ovato-oblongis plicatis; labello bifido acuminato longe equitante; sepalis truncatis. In *Ceylon.* 2. Cor. purpurea.

11. *M. flavesens* Lindl. fol. ovato-lanceolatis; labello integerrimo. Cypripedium Blume. In *Java.*

12. *M. versicolor* Lindl. fol. cordato-oblongis plicatis undulatis; labello antice dentato; columna apice bicorni; sepalis secundis. In *Ind. or.* 2. Flores purpureo-lutei.

13. *M. Rheedii* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis plicatis; labello longe equitante plicato dentato. Malaxis Rheedii Willd. In *Ind. or.* 2.

14. *M. macrostachya* Lindl. Ophrys Llave. In *Mexico.* 2. Flores spicati conferti. Scaps 4-gonus longissimus.

15. *M. rupestris* Poepp.

16. *M. ventricosa* Poepp.

17. *M. excavata* Lindl. floribus corymbosis; scapo 6-gono; petalis filiformibus reflexis; labello acutissime sagittato alte excavato, apice tridentato. In *Mexico.* 2.

18. *M. hystionantha* Lk. et Otto Berol. t. 5. pseudobulbis elongato-ovatis diphyllis; fol. membranaceis late ovatis acutis undulatis; scapo 6—8 angulato; floribus aeneo-olivaceis; sepalis reflexis; petalis filiformibus circinatis; labello oblongo-orbiculari. In *Brasilia.* 2.

4416. DIENIA Lindl.

(1831).

(Flores fusci.)

1. D. congesta Lindl. fol. oblongo-lanceolatis plicatis; spica densa cylindrica; sepalis secundis; labello calloso tridentato. *In Nepalia.* 4.

2. D. fusca Lindl. fol. oblongo-lanceolatis acuminatis plicatis; spica densa cylindrica; sepalis secundis; labelli trifidi dentibus obtusis medio conico. *In Ceylona.* 4. Flores fuscopurpurei.

3. D. cylindrostachya Lindl. folio ovato obtuso; spica densa cylindrica; labello apice calloso subintegro; columna brevissima. *In Nepalia.* 4.

4. D. muscifera Lindl. caule diphylo; fol. latis oblongis, obtusis; racemo sparsifloro; labello trilobo lobis acuminatis. *In Nepalia.* 4.

5. D. Gmelini Lindl. caule diphylo; fol. oblongis obtusis; racemo paucifloro; laciuiis labelli acutis. *Orchis Gmel. sib.* t. 4. f. 1. *In Sibiria.* 4.

6. D. calycina Lindl. fol. oblongo obtuso; spica elongata tereti; sepalis linearibus; labello nano trilobo, lobis incurvis. *In Mexico.* 4.

7. D. Myurus Lindl. fol. oblongo ovatis binis; spica densa cylindrica; sepalis filiformibus reflexis. *In Mexico.* 4.

4417. MALAXIS Sw. (1800).

1. M. paludosa Sw. act. holm. t. 6. f. 2. *In Europa.* 4. Folia pauca carnosa. Flores racemosi luteo-virides.

4418. NEPHAPHYLLUM Blume
(1826).

1. N. tenuiflorum Blume; floribus laxe spicatis cernuis; labelli limbo intus rugoso-muricato. *In Java.* 4.

2. N. pulchrum Blume; floribus dense spicatis; labelli limbo intus lineis 3 muricatis. Blume tabell. t. 22. *In Java.*

4419. CORALLORHIZA Hall.
(1747).

1. C. innata R. Br. spica pauciflora; sepalis inferioribus deflexis; pe-

V. talis acutis; labio oblongo. *Ophrys L. Fl. Dan.* t. 451. *In Europa.* 4. Spithamea, scapus squamosus. Flores flavi.

2. C. multiflora Nutt. spica multiflora; sepalis obtusis omnibus erectis; labello subrotundo undulato crenato; calcare manifesto. *In Canada.* 4.

3. C. odontorrhiza Spr. racemo spicato multifloro; sepalis acutis; labello oblongo obtuso. *Ophrys Corallorrhiza Michx.* *In Am. bor.* 4.

4. C. hyemalis Nutt. floribus demum pendulis; labello trilobo undulato crenato; disco plicato; sepalis conniventibus. *Cymbidium hyemale Willd.* *In Am. bor.* 4.

5. C. Mertensiana Bong. *In ins. Sitcha.* 4.

4420. LIPARIS Rich. (1817).

1. L. Rheedii Blume tab. t. 54. bulbis cylindricis; fol. ovato-lanceolatis; pedunc. 4-quetro; limbo labelli rotundo crenato. *In Java.* 4. Flores purpurascentes.

2. L. nervosa Lindl. fol. ovato-oblongis undulatis; scapo angulato; floribus longe pedunculatis cernuis; labello retuso bicalloso. *Epidendron Thunb. jap.* t. 10. *In Japonia.* 4. Flores purplei.

3. L. odorata Lindl. fol. oblongo-lanceolatis plicatis; racemo multifloro; scapo 3-gono; labello ovato concavo; floribus flavo-viridibus. *Rheede* 12. t. 28. *In Ind. or.* 4.

4. L. elata Lindl. fol. oblongis acutis plicatis; racemo multifloro; labello obovato bicalloso purpureo; sepalis oblique recurvis. *B. R. t. 1175.* *In Ind. or.* 4.

5. L. oliracea Lindl. fol. cordato-oblongis acuminatis plicatis; scapo basi tereti; labello retuso cum mucrone basi bicalloso; sepalis obtusis. *In Nepalia.* 4.

6. L. barbata Lindl. fol. binis oblongis acuminatis plicatis; racemo paucifloro; labello curvato barbato basi sulcato. *In Ceylona.* 4. Flores virides.

7. L. purparascens Lindl. fol. cordato-ovatis acutis undulatis plicatis; floribus racemoso-corymbosis; labello subrotundo emarginato. Thouars orch. afr. t. 26, 27. *In ins. Bourboniae.* 4.

S. L. atropurpurea Lindl. fol. 2—3-plicatis cucullatis; labello recurvo crenulato; sepalis interior longissimis filiformibus. *In Ceylona.* 2. Flores pulcherrimi atropurpurei.

9. L. nepalensis Lindl. fol. 2 cordatis acuminate plicatis; scapo angulato; labello maximo cucullato; sepalis linearibus. *In Nepalia.* 2. Flores virides.

10. L. tiliifolia Rich. fol. oblongis acutis; scapo angulato; labello maximo recurvo discoloro; sepalis patentissimis. Malaxis B. M. t. 2004. *In Am. bor.* 2. Flores purpurascentes.

11. L. Loeselii Rich. fol. 2 ovato-oblongis obtusis plicatis racemo paucifloro brevioribus; labello ovato integerrimo; sepalis linearibus. Ophrys E. Bot. t. 47. *In Europa.* 2. Cor. flavescentia.

12. L. flavescens Lindl. fol. oblongis plicatis racemo 2—4-floro brevioribus; scapo flexuoso; labello integerrimo; sepalis filiformibus. Malaxis Thouars Orch. t. 25. *In Borbonia.* 2. Flores flavi.

13. L. montana Blume; bulbis compressis 1—2-phyllo; pedunculo erecto sulcato; limbo labelli obtuso mucronato. *In Java.* 2. Flores purpurascentes.

14. L. plantaginea Lindl. bulbis ovatis vaginatis; fol. oblongis acuminate plicatis; scapo marginato; labello undulato obtuso. *In Ind. or.* 2. Flores virides.

15. L. tradescantifolia Lindl. bulbis subcompressis vaginatis 1-phyllo; fol. ovatis discoloribus; bracteis minutis; labelli limbo integerrimo. Malaxis Blume. *In Jara.* 2.

16. L. Cypeolum Lindl. folio solitario orbiculari cucullato apice reflexo; labello maximo orbiculato. Cymbidium Willd. *In ins. Otaheite.* 2.

17. L. foliosa Lindl. fol. oblongo-lanceolatis acutis; racemis paucifloris; scapo subancipiti; labello oblongo sepalisque reflexis. B. R. t. 882. B. M. t. 2709. B. Cab. t. 1097. *In Nov. Holl.* 2.

18. L. longipes Lindl. in Wall. pl. as. rar. t. 35. pseudobulbis longissimis diphyllo; fol. ensiformibus; racemo stricto; labello sepalisque acutis. *In Ind. or.* 2.

19. L. elegans Lindl. bulbis elongatis diphyllo fol. lanceolatis acuminate; scapo tereti; labello cuneato truncato crenulato basi bicalloso; sepalis oblongis obtusis. *In Ind. or.* 2. Flores aurantiaci.

20. L. crenulata Lindl. bulbo compresso; fol. geminis linearis-lanceolatis acuminate; labello emarginato crenulato. Malaxis Blume. *In Java.* 2. Flores aurantiaci.

21. L. latifolia Lindl. bulbis oblongis subcompressis; folio lato-lanceolato; bracteis ovatis adpressis parvis; limbo bilobo crenulato. Malaxis Blume. *In Java.* 2. Flores aurantiaci.

22. L. angustifolia Lindl. fol. anguste lanceolatis; pedunc. paucifloro; bracteis linearis subulatis; labello obtuso. Malaxis Blume. *In Java.* 2. Flores flavi.

23. L. viridiflora Lindl. bulbis ovatis; fol. geminis ovatis-lanceolatis; racemo multifloro nutante; scapo ancipiti; labello undulato obtuso. Malaxis Blume. *In Java.* 2. Flores virides.

24. L. affinis Lindl. fol. in bulbo ovato-oblongo solitariis lanceolato-linearibus; pedunculo nutante; labelli limbo rotundato. Malaxis Blume tab. 54. *In Jara.* 2.

25. L. parviflora Lindl. bulbo ovo subcompresso; fol. geminatis lanceolatis; pedunc. nutantibus; labello angusto emarginato. Malaxis Blume. *In Jara.* 2. Flores lutei labello coccineo.

26. L. pallida Lindl. bulbo oblongo subcompresso; fol. lanceolato; bracteis remotis; labello rotundato retuso crenulato. Malaxis Blume. *In Jara.* 2. Flores olivacei.

27. L. minima Lindl. folio linearis-lanceolato; pedunc. compresso folium aequante; floribus distichis; caps. triquetris. Malaxis Blume. *In Jara.* 2.

28. L. caespitosa Lindl. folio lanceolato longitudine racemi pauciflori; scapo tereti; labello lanceolato reflexo; sepalis acutis. Malaxis Thouars. *In Ins. Borboniae.* 2.

29. L. tuteola Lindl. bulbis minimis vaginatis; fol. linearis-lanceolatis; scapo flexuoso paucifloro; labello obovato retuso; pedicellis capillaribus. *In Ind. or.* 2.

30. *L. compressa* Lindl. bulbo ovato subcompresso; fol. lanceolato-linearibus; pedunc. compresso; bracteis bifariam imbricatis; labello orbiculato. Malaxis Blume. *In Java.* 2.

31. *L. mucronata* Lindl. bulbo subcompresso; folio lanceolato-lineari acuminato; bracteis bifariam imbricatis; labello angusto semibifido. Malaxis Blume. *In Java.* 2. Flores flavo-virentes.

32. *L. gregaria* Lindl. fol. ensiformibus acutis; scapo aincipi; rachi atata; bracteis distichis pectinatis; labello truncato, sepalis reflexis. Malaxis Thouars t. 89. *In Ceylona et Borbonia.* 2. Flores luteo-virides.

33. *L. guineensis* Lindl. B. R. t. 1671. Fol. oblongis acutis plicatis; racemo paucifloro; labello postico cuneato bilobo basi bituberculato; sepalis lateralibus rotundis ovatis. *In Sierra Leone.* 2. Flores virides parvi.

34. *L. pendula* Lindl. pseudobulbis elongatis compressis diphyllis; racemo terminali longissimo pendulo; sepalis petalisque reflexis obtusis; labello postico ovato concavo basi bicalloso. *In Ind. or.* 2. Flores parvi virides.

35. *L. spathulata* Lindl. misc. 1840. fol. ensiformibus basi angustatis scapo aincipi longioribus; racemo denso erecto cylindrico; petalis filiformibus; sepalis linearis oblongis; labello ovato-lanceolato canaliculato recurvo basi ecalloso. *In Ind. or.* 2. Flores virides.

36. *L. alata* Scheidw. fol. 6 oblongo-ovatis acutis plicatis petiolatis; spica erecta multiflora; scapo alato squamoso purpureo alis 6 membranaceis; sepalis petalisque linearibus; labello revoluto atropurpureo. *In Mexico.* 2. Flores purpurei.

37. *L. serraformis* Lindl. *In Ind. or.* 2.

Bulbophyllum Thouars orch. afr. t. 93, 94. *In Borbonia.* 2. Flores fusi.

3. *D. pallideflavens* Blume; bulbis ovalibus; labello carinato edentulo; gynostegii laciniis lateralibus sebris. Blume tab. t. 52. *In Java.* 2. Flores pallide flavi.

4. *D. edentulum* Blume; bulbis oblongo-subulatis; labello integerrimo interne 1-calloso; laciniis gynostegii lateralibus medio aequalibus. *In Java.* 2. Flores flavo-virentes.

5. *D. cornutum* Blume; bulbis fusinis; labello basi denticulo interne bicalloso; gynostegii laciniis lateralibus elongatis. *In Java.* 2. Flores virentes.

6. *D. simile* Blume; labello inferne denticulato interne bilineato; gynostegii laciniis lateralibus medio aequalibus. *In Java.* 2. Flores flavo-virentes.

7. *D. abbreviatum* Blume; bulbis ovali-oblongis; labello basi utrinque dente reflexo instructo interne bicalloso; gynostegii laciniis lateralibus abbreviatis. *In Java.* 2. Flores virentes.

8. *D. filiforme* Lindl. misc. 1840. scapo filiformi elongato; racemi multiflori rachi angulata subflexuosa; petalis obovalis; labello rotundato basi auriculato intus bilineato. *In Guatimala.* 2.

9. *D. latifolium* Lindl. misc. 1843. no. 74. fol. oblongo-lanceolatis coriaceis 3-nerviis; pedunc. elongatis apice longe spicatis; labelli lobis lateral. linearis-lanceolatis ciliatis. *In Manilla.* 2.

10. *D. glumaceum* Lindl. spica conica elongata apice nutante; bracteis distichis glumaceis; sepalis petalisque acuminatis; columna apice pectinata; labelli 3-lohi lobis lateralibus inflexis acutis, intermedio orbiculari. *In ins. Philippin.* 2.

4421. BENDROCHILUM Blume (1826).

1. *D. aurantiacum* Blume; bulbis oblongis; labello carinato edentulo. *In Java.* 2. Flores aurantiaci suaveolentes.

2. *D. occultum* Lindl. bulbis quadratis; bracteis maximis 4-fariam imbricatis; labello linearis fimbriato.

4422. OTOCHILUS Lindl. (1831).

1. *O. alba* Lindl. bulbis ovalibus imbricatis; fol. lanceolatis subuplicatis; bracteis oblongis sepalis acutis. *In Nepatia.* 2. Flores albi.

2. *O. fusca* Lindl. bulbis elongatis fusiformibus; fol. linearis-lanceolatis; bracteis linearibus; sepalis obtusis. *In Ind. or.* 2. Labellum roseum.

3. *O. porrecta* Lindl. bulbis elongatis fusiformibus; fol. oblongo-lanceolatis plicatis; bracteis linearibus; sepalis acutis. *In Ind. or.* 2.

4423. COELIA Lindl. (1831).

1. *C. Bauerana* Lindl. *Epidendron tripterum* Sm. ic. t. 44. *In Jamaicā.* 2. Acaulis. Folia et scapus radicallis e squamis coriaceis erumpentia.

4424. PHOLIDOTA Lindl. (1825).

1. *P. imbricata* Lindl. B. R. t. 1213 et 1777. Hook. exot. fl. t. 138. folio solitario oblongo-lanceolato acuto; spicis pendulis; labello subgloboso cucullato; lobis lateralibus paucis intermedio bilobo. *In Ind. or.* 2.

2. *P. undulata* Wall. fol. binis lanceolatis erectis; spicis elongatis pendulis; sepalis ovatis concavis; labello ventricoso obsolete trilobo. *In Ind. or.* 2.

3. *P. rubra* Lindl. bulbis ovatis corrugatis; fol. binis lanceolatis; spicis laxis erectis, fructiferis nutantibus; sepalis concavis ovatis acutis; labello trilobo, lobo medio acuto. *In Ind. or.* 2. Flores lateritii.

4. *P. carnea* Lindl. bulbis subremotis ovato-oblongis 1—3-phyllis; fol. linear-lanceolatis; labello rotundato intus bicalloso. *Crinonia Blume* tab. t. 41. *In Jara.* 2.

5. *P. globosa* Lindl. bulbis approximatis globosis 2—3-phyllis; fol. linear-lanceolatis; labelli limbo obtuso. *Crinonia Blume.* *In Java.* 2.

6. *P. recurva* Lindl. rhizomate carnoso adscendentem; folio solitario lanceolato plicato; spicis secundis recurvis; labello ventricoso obtuso. *In Nepalia.* 2.

7. *P. articulata* Lindl. rhizomate carnoso adscendentem; fol. plicatis apice subintegris; spicis cernuis; labello cucullato integro apice rotundato. *In Ind. or.* 2. Flores albi.

8. *P. conchoidea* Lindl. misc. 1840. spica pendula disticha imbricata; bracteis oblongis concavis apiculatis; epichilio trilobo, laciinis lateralibus rotundatis intermedio obsolete, hypo-

chilio utrinque in lobum adscendentem producto. *In Manilla.* 2.

4425. DILOCHIA Lindl. (1831).

1. *D. Waltichii* Lindl. *In Singapore Ind. or.* 2. Folia coriacea disticha. Racemus terminalis. Flores speciosi.

4426. EARINA Lindl. (1836).

1. *E. autumnalis* Lindl. B. R. t. 1699. *In Nov. Zealandia.* 2. Herba rhizomate repente; fol. linearibus distichis, floribus parvis articulatis.

4427. COELOGYNE Lindl. (1822).

1. *C. flaccida* Lindl. bulbis oblongis angulatis ustulato-squamosis; fol. lanceolatis longe petiolatis; racemo nutante; labello trilobo, lobo medio basi auriculato. *In Ind. or.* 2. Flores albi.

2. *C. cristata* Lindl. bulbis angulatis; racemo radicali nutante; labelli trilobi crista dupli interrupta inferiore pectinata. *In Nepalia.* 2. Flores maximi albi.

3. *C. speciosa* Lindl. B. R. 1847. t. 23. bulbis 4-gonis 1-phyllis; fol. oblongo-lanceolatus; scapo nutante retroflexo; labello intus cristis 2 munitus. *Chelonanthera Blume.* Rumph amb. 6. t. 48. *In Java.* 2. Labellum fulvum.

4. *C. incrassata* Lindl. bulbis oblongis sub-4-gonis; fol. lanceolatis nervosis; pedunc. nutante; labello intus bicristato; lobo medio incrassato. *Chelonanthera Blume.* *In Java.* 2. Flores sordide albi.

5. *C. elata* Lindl. bulbis angulatis; fol. longe petiolatis oblongis; scapo stricto, squamis distichis vaginato; labelli bicristati lobo medio crenulato. *In Nepalia.* 2. Flores albi.

6. *C. prolifera* Lindl. bulbis angulatis in rhizomate squamoso; fol. lanceolatis longe petiolatis; scapo gracili erecto prolifico; labelli lobo medio obtuso crenulato undulato. *In Nepalia.* 2. Flores viridi-flavi.

7. *C. nitida* Lindl. bulbis ovatis caespitosis nitidō-squamosis; fol. lanceolatis acuminatis; racemis nutanti-

bus; labelli lobo medio cordato disco lineis 2 elevatis. In *Nepalia*. 2. Flores candidi.

8. *C. ocellata* Lindl. bulbis ovatis caespitosis; fol. lanceolatis acuminatis in petiolum attenuatis; racemis strictis; labelli lobo medio lineis 3 lamellatis; columna subtriloba. In *Sihet*. 2.

9. *C. Gardneriana* Lindl. bulbis ampullaceis teretibus; fol. lanceolatis 5-costatis longe petiolatis; racemis densifloris nutantibus; labelli denticulati basi saccati lobo medio bilobo. In *Ind. or.* 2. Flores candidi.

10. *C. fuscescens* Lindl. bulbis oblongis teretibus; fol. oblongis plicatis coriaceis; racemo mutante; labello 3-lobo 3-lineato, lobo medio amplio undulato. In *Nepalia*. 2. Flores vires - fuscescentes.

11. *C. trinervis* Lindl. bulbis ovatis in rhizomate crasso; fol. lanceolatis plicatis longe petiolatis; racemo stricto; labelli lobo medio lineis 3 flexuosis elevatis. In *Ind. or.* 2.

12. *C. odoratissima* Lindl. bulbis caespitosis ovatis; fol. petiolatis lanceolatis; racemo 3-floro; bracteis cymbiformibus; labello 3-lobo 3-costato. In *Ceylona*. 2. 4-uncialis. Flores candidi.

13. *C. fimbriata* Lindl. B. R. t. 868. bulbis oblongis; fol. lanceolatis pedunc. bifloro duplo longioribus; sepalis reflexis; labello undulato fimbriato. In *China*. 2. Flores slavescentes.

14. *C. uniflora* Lindl. bulbis ampullaceis aggregatis; fol. linearis-lanceolatis acuminatis; scapis 1-floris; labelli oblongi lobis lateralibus fallacatis. In *Ind. or.* 2. Flores carnei.

15. *C. longifolia* Lindl. bulbis oblongis 4-gonis diphyllis; fol. longe lanceolatis; racemo elongato flexuoso; labello intus bicristato. *Chelonanthera* Blume. In *Java*. 2. Flores helvoli.

16. *C. miniata* Lindl. bulbis oblongis 4-gonis diphyllis; fol. linearis-lanceolatis; labello intus lineis 2 elevatis, limbo acuto. *Chelonanthera* Blume. In *Java*. 2. Flores miniatai.

17. *C. humilis* Lindl. labello integro fimbriato, disco cristis pluribus fimbriatis. *Epidendron* Sm. exot. fl. t. 98. In *Nepalia*. 2. Flores candidi.

18. *C. Wallichiana* Lindl. B. R. 1810. t. 24. labelli lobo medio ovato denticulato apice bilobo, disco cristis 5 incompletis denticulatis; columna apice dentata. In *Ind. or.* 2. Flores purpurei.

19. *C. maculata* Lindl. fol. lanceolatis plicatis; lobo labelli medio oblongo emarginato fimbriato, disco cristis 5 serratis. *Epidendron* Sm. exot. fl. t. 97. In *Ind. or.* 2. Flores candidi.

20. *C. praecox* Lindl. fol. oblongis plicatis; labelli lobo medio oblongo emarginato fimbriato, disco cristis 5 serratis. *Epidendron* Sm. exot. fl. t. 97. In *Ind. or.* 2. Flores purpurei limbo labelli albo.

21. *C. parviflora* Lindl. bulbis caespitosis elongatis; fol. linearis-lanceolatis obtusis; racemo stricto; sepalis conniventibus; labello integerimo. In *Nepalia*. 2.

22. *C. ovalis* Lindl. pseudobulbis fusiformi-ovalibus striolatis; fol. ovali-lanceolatis acutis; pedunc. sub-4-floro; bracteis concavis cartilagineis; petalis linearibus reflexis; labelli lobis lateralibus in fronte pectinatis. In *Ind. or.* 2.

4428. MYOXANTHUS Poepp. et Endl. (1836).

1. *M. monophyllum* Poepp. et Endl. nov. gen. t. 88. In *Peruvia*. 2.

4429. HEXISEA Lindl. (1844).

1. *H.* Lindl. In *Peruvia*. 2. Herba epiphyta caulibus adscendentibus, racemis paucifloris.

4430. PAXTONIA Cunningham. (1841)

1. *P. rosea* Cunningham. B. R. 1838. t. 60. In *Manilla*. 2. Herba caespitosa pseudo-bulbosa, fol. plicatis; floribus racemosis roseis.

4431. MESOCLASTES Lindl. (1830).

1. *M. uniflora* Lindl. p. 45. floribus solitariis; labelli dimidio superiore medio calloso. In *Ind. or.* 2.

2. M. brachystachys Lindl. spicis brevibus densis paucifloris; labelli dimidio suporiore ecalloso.

4432. DIPLOCONCHIUM Schauer (1840).

1. D. . . . Schauer pl. Meyen. t. 12. f. 2. *In Manilla.* Herba ebulbosa, fol. costatis, floribus capitatis.

4433. EVELYNA Poepp. et Endl. (1836).

1. E. aurea Poepp. et Endl. *In Peruvia.* 2.

2. E. capitata Poepp. et Endl. *In Peruvia.* 2.

3. E. graminifolia Poepp. et Endl. *In Peruvia.* 2.

4. E. oligantha Poepp. et Endl. *In Peruvia.* 2.

5. E. strobilifera Poepp. et Endl. *In Peruvia.* 2.

4434. COCHLIA Blume (1836).

1. C. violacea Blume. *In Jara.* 2. Herba caulescens. Folia coriacea ovato-elliptica. Flores capitati violacei.

4435. LYRAEA Lindl. (1830).

1. L. prismatica Lindl. Bulbophyllum Thouars orch. afr. t. 109. *In Ins. Manritii.* 2. Folia coriacea lanceolata. Scapus gracilis palmaris. Flores lutescentes.

4436. MEGACLINUM Lindl. (1830).

1. M. falcatum Lindl. B. R. t. 989. fol. binis ovalibus biplicatis; rachi compressa falcata crenata; sepalis interior minimis. *In Sierra Leone.* 2.

2. M. maximum Lindl. B. R. t. 1959. rachi complanata crenata; bulbo oblongo angulato. *In Sierra Leone.* 2.

3. M. Bufo Lindl. misc. 1831. n. 82. rachi maxima lanceolata; floribus nigro-pilosis; sepalis acutissimis suprae laevi lateralibus intus pubes-

centibus; petalis minimis acutis glabris; labello ovato carnoso rugoso. *In Sierra Leone.* 2.

4. M. oxypterum Lindl. B. R. 1839. no. 10.

4437. BOLBOPHYLLUM Thouars (1822).

a. Flores fasciculati v. solitarii.

1. B. leopardinum Lindl. g. p. 48. bulbis caespitosis; fol. radic. globoso-fasciculatis; sepalis ovatis guttatis; labello carnoso obtuso integerrimo. Dendrobium Wall. tent. t. 28. *In Ind. or.* 2.

2. B. affine Lindl. rhizome re-pente; fol. coriaceis oblongis petiolatis emarginatis; pedunc. radicalibus 1-floris. *In Nepal.* 2.

3. B. mutabile Lindl. fol. coriaceis lanceolatis retusis; pedunc. folio brevioribus bifloris; labelli limbo crenulato. Diphyes Blume. *In Java.* 2. Flores crocei.

4. B. ciliatum Lindl. bulbis remotis; fol. linear-lanceolatis; pedunc. fol. brevioribus. Diphyes Blume. *In Java.* 2. Flores violacei.

5. B. cernuum Lindl. bulbis approximatis; fol. lanceolatis; pedunc. fol. longioribus cernuis. Diphyes Blume. *In Java.* 2. Flores purpurascentes.

6. B. parvulum Lindl. bulbis depresso; fol. ovalibus obtusis; pedunc. fol. longioribus; labelli limbo obtuso glanduloso tamido. Diphyes Blume. *In Java.* 2. Flores aurantiaci.

7. B. hirsutum Lindl. bulbis approximatis; fol. lanceolatis; sepalis exterior apice hirsutis; labello intus glanduloso. Diphyes Blume. *In Java.* 2. Flores aurantiaci.

8. B. oratifolium Lindl. bulbis approximatis; fol. ovalibus; sepalis exterior. lanceolatis in aequalibus; labelli limbo obtuso. Diphyes Blume. *In Java.* 2. Flores flavo-virentes.

9. B. inaequale Lindl. bulbis approximatis; folio linear-lanceolatis obtusis; labelli limbo obtuso. Diphyes Blume. *In Java.* 2. Flores aurantiaci nervis atropurpureis.

10. B. bicolor Lindl. bulbis ovalibus; fol. solitariis oblongis coriaceis emarginatis; corymbo 3-floro; sepa-

llis cuspidatis; labello obtuso. In China. 24. Flores speciosi crocei.

11. *B. tenellum* Lindl. bulbis approximatis; fol. lanceolatis obtusis; sepalis inaequalibus ovalibus, dorsali lanceolato; labelli limbo tumido verrucoso. Diphyses Blume. *In Java.* 24. Flores auranciaci.

12. *B. gracile* Lindl. bulbis approximatis; fol. linearis - spathulatis; sepalis exterioribus acuminatis. Diphyses Blume. *In Java.* 24. Flores flavescentes.

13. *B. mucronatum* Lindl. bulbis remotis; fol. ovalibus planis mucronatis; labello carinato. Diphyses Blume. *In Java.* 24. Flores pallide flavi.

14. *B. tenuifolium* Lindl. bulbis remotis; fol. ovalibus margine recurvis; labello interne carinato. Diphyses Blume. *In Java.* 24. Flores pallide flavi.

15. *B. violaceum* Lindl. bulbis remotis; fol. lanceolatis obtusis; sepalis interior. oblique marginatis. Diphyses Blume. *In Java.* 24. Flores violacei.

16. *B. tortuosum* Lindl. fol. linearis - lanceolatis; labello utrinque hirsuto; gynostegii appendicibus tortuosis. Diphyses Blume. *In Java.* 24. Flores atropurpurei.

17. *B. Cheiri* Lindl. misc. 1844. fol. oblongis coriaceis floribus magnis solitariis; sepalis lanceolatis lateralis basi ventricosis petalisque linearibus acuminatis conniventibus; labello mobili apice longe rostrato. *In Manilla.* 24. Flores olivacei fuscostriati.

18. *B. plicatum* Lindl. l.c. no. 73. floribus solitariis glabris; sepalis oblongis obtusis; labello linguiformi obtuso prope basin bijugato inter juga subaspera nectare lucido obducto; pollinibus 4 inaequalibus. *In Singapore.* 24. Flores luteo - ochracei.

19. *B. macranthum* Lindl. B. R. 1844. t. 13. fol. petiolatis oblongis planis coriaceis; floribus solitariis; flore plano resupinato; sepalis dorsali piano ovato acuminato lateralibus petalisque hinc tortis; labello minimo subtrilobato acuminato. *In Singapore.* 24. Flores nigro - violacei.

b. *Flores spicati v. racemosi.*

20. *B. auricomum* Lindl. bulbis ovatis teretibus; spica cernua; sepalis interior. ciliatis; labello minimo ovato carnoso. *In Ind. or.* 24.

21. *B. culamarium* Lindl. pseudobulbis 4 - gonis; scapo stricto longissimo apice florido; sepalis anguste triangularibus margine pubescens; petalis cornuformibus glabris teretibus; labello linearis margine tomentoso supra medium longissime villoso. *In Sierra Leone.* 24. Flores ochracei.

22. *B. hirsutum* Lindl. bulbis caespitosis ovatis; scapis pubescentibus; spicis recurvis villosis; labello linearis retuso. Stelis Sm. *In Nepalia.* 24. Flores virescentes.

23. *B. Careyanum* Spr. rhizome repente; bulbis ovatis angulatis; spicis cylindricis densifloris; sepalis lateralis maximis; labello trilobo. Anisopetalum Hook. exot. fl. t. 149. *In Nepalia.* 24. Flores aurantiaci.

24. *B. reptans* Lindl. rhizome repente; fol. linearibus apice bidentatis; racemo laxo; sepalis interior. minutis obtusis; labello ovato integerimo. Tribachia Lindl. coll. t. 4. *In Nepalia.* 24. Sepala crocea.

25. *B. imbricatum* Lindl. misc. 1844. spica fusiformi - sub 4-gona vix compressa; sepalo supremo linearis, lateralis ovalibus brevioribus; petalis filiformibus hirsutis; labello ovato basi pectinato. *In Sierra Leone.* 24. Scapus 1-pedalis. Flores purpurei.

26. *B. variegatum* Thouars orch afr. t. 105 et 106. fol. linearis - loratis spicis cernuis; sepalis exter. acuminatis; labello canaliculato; bracteis maximis. *In ins. Borboniae.* 24.

27. *B. nutans* Thouars t. 107. bulbis rotundis subquadratis; fol. binis obtusis oblongis; scapo nutante; labello subcordato canaliculato. *In ins. Borboniae.* 24.

28. *B. densum* Thouars t. 108. bulbis ovalibus; fol. linearis - loratis; spicis erectis; sepalis ovalis; labello cordato ovato integerimo. *In ins. Mauritii.* 24.

29. *B. pendulum* Thouars t. 104. rhizomate filiformi; bulbis rotundis quadratis; fol. linearis - oblongis emar-

ginatis; scapis recurvis; labello carnoso obtuso. *In ins. Mauritii.* 2.

30. *B. incurvum* Thouars t. 95. bulbis quadratis; fol. ovato-oblongis emarginatis; spicis nutantibus; sepalis linearibus; labello oblongo ciliato. *In ins. Mauritii.* 2.

31. *B. cupreum* Lindl. fol. angusto solitario scapo longiore; racemo brevi oblongo nutante; petalis setaceo-acuminatis serrulatis; labello ovato dente utrinque setaceo; columnae angulis cristatis. *In Manilla.* 2. Flores cuprei.

32. *B. adenopetalum* Lindl. misc. 1842. fol. obtusis petiolatis; spica secunda multiflora; sepalis acuminatis; petalis spathulatis acutis intus glandulosis; labello ovato ciliato. *In Ind. or.* 2.

33. *B. gracile* Thouars t. 101. bulbis ovalibus compressis; fol. gemini linear-loratis; spica filiformi gracili; vaginis scapi inflatis. *In ins. Mauritii.* 2. Flores minimi.

34. *B. minutum* Thouars t. 110. bulbis subrotundis; fol. binis oblongis emarginatis; scapo elongato; sepalis ovatis acutis; labello convexo integrerrimo. *In Madagascar.* 2.

35. *B. cocoinum* Lindl. B. R. t. 1964. bulbis ovatis 4-gonis; fol. lanceolatis; spica stricta multiflora; bracteis linearibus acutis; sepalis aristatis, petalis linearibus denticulatis, columna bicorni longioribus; labello ciliato. *In Sierra Leone.* 2. Flores albo-rosci.

36. *B. bracteolatum* Lindl. B. R. n. 5. 11. t. 57. pseudobulbis ovatis tetrapteris diphyllis; fol. scapo pendulo rachi fusiformi pluries brevioribus; floribus carnosis; sepalis ovatis acutis basi connatis; labello triquetro acuto dorso serrato. *In Demerara.* 2.

37. *B. Commersonii* Thouars t. 97. bulbis oblongis subangulatis; fol. solitariis oblique emarginatis; scapo multifloro. *In Borbonia.* 2.

38. *B. erectum* Thouars t. 96. bulbis subrotundis angulatis; fol. solitario oblongo emarginato; spica laxa nutante; labello oblongo ciliato. *In Madagascar.* 2.

39. *B. recurrum* Lindl. bulbis compressis caespitosis; fol. oblongis emarginatis subtus purpureo-maculatis; scapis pendulis folio duplo longiori-

bus; sepalis obovatis ciliatis. *Tribachia* Lindl. B. R. t. 963. *In Sierra Leone.* 2. Cor. virescens.

40. *B. tetraxonum* Lindl. bulbis ovatis acute 4-gonis; rachi 4-gona pubescente; bracteis dorso pubescens; labello ovato serrato. *In Sierra Leone.* 2.

41. *B. setigerum* Lindl. bulbis ovatis 1-phyllis; fol. ovalibus acutis; spica pendula; rachi filiformi; sepalis ovatis acutis; petalis setaceis patensissimis extus tuberculatis; labello apice tridentato. *In Demerara.* 2.

42. *B. fuscum* Lindl. pseudobulbis 4-gonis 2-phyllis; fol. lineari-oblongis emarginatis; spica disticha antecipi glabra pendula; bracteis cuculatis coloratis; labelli lobis laterali bus serrulatis acutis. *In Sierra Leone.* 2. Flores fusi.

43. *B. polyrhizum* Lindl. bulbis ovatis caespitosis; spicis laxis 5—6-floris; sepalis interior. minimis; labello sessili integerrimo. *In Ind. or.* 2. Flores viridi-lutei.

44. *B. cylindraceum* Lindl. bulbis nullis; fol. solitariae oblongo-lanceolatis; spica densissima cylindrica; sepalis interior. minimis; labello ovato obtuso. *In Ind. or.* 2. Flores albi.

45. *B. gibbosum* Lindl. fol. petiolatis lanceolatis obtusiusculis coriacidis; labelli limbo obtuso lineato, ungue gynostegii gibboso. Diphyes Blume. *In Jara.* 2. Flores pallide flavi.

46. *B. odoratum* Lindl. fol. petiolatis lanceolatis nervosis; labello interne glanduloso. Diphyes Blume. *In Jara.* 2. Flores flavi odoratissimi.

47. *B. flarescens* Lindl. fol. breviter petiolatis lineari-lanceolatis; pedunc. basi vaginato; labelli limbo obtuso ciliato. Diphyes Blume. *In Jara.* 2. Flores flavi.

48. *B. pumilum* Lindl. caule radicante filiformi bulbifero; bulbis 1-phyllis; fol. oblongo; scapis tenuissimis elongatis flexuosis. Dendrobium Sw. *In Sierra Leone.* 2.

49. *B. claratum* Thouars t. 100. bulbis ovatis diphyllis; fol. oblongo-loratis emarginatis; rachi clavata; floribus semiimmersis. *In ins. Mauritii.* 2. Flores purpurascentes.

50. *B. limbatum* Lindl. misc. 1840. pseudobulbis ampullaceis depresso; fol. ? racemo cylindrico multifloro

longe pedunculato; bracteis minimis; sepalis ovatis obtusis ciliatis; petalo superiore villoso; labello ovato crasso obtuso basi bidentato; disco nitido subscabrido. In Ind. or. 4. Flores purpurei.

51. *B. flavidum* Lindl. misc. 1840. pseudobulbis oblongis compressis vaginis 2 membranaceis vestitis; spicis laxis folio angusto brevioribus; sepalis acuminatis, petalis oblongis obcordatis acutis; labello bicarinato recurvo, lobis lateralibus undulatis obsoletis; columna bicorni. In Sierra Leone. 4. Flores lutei.

52. *B. sordidum* Lindl. misc. 1840. spica carnosa acuminata conica; floribus sessilibus carnosissimis; sepalis ovatis acutissimis; petalis linearibus apice rotundatis; labello basi auriculato; columna utrinque biseta. In Guatemala. 4. Flores fusco-purpurei.

53. *B. barbigerum* Lindl. B. R. t. 1942. pseudobulbis lenticularibus; bracteis ovatis amplexicaulibus; sepalis linearis-lanceolatis acuminatis; petalis subulatis; labello linearis-lanceolato acuminato villoso apice stupposo barbato. In Sierra Leone. 4. Flores viridi-purpurascens.

54. *B. saltatorium* Lindl. B. R. t. 1970. bulbis ancipitibus; fol. solitariis acutis racemis brevioribus; bracteis ovatis adpressis; sepalis ovato-oblongis pubescentibus; petalis subulatis columna longioribus; labello villoso apice stuppo. In Sierra Leone. 4. Flores violacei.

55. *B. pusillum* Thouars t. 102. bulbis subquadratis; fol. solitariis oblongis obtusis; rachi clavata; sepalis ovatis linearibusque; labello cordato. In ins. Mauritii. 4.

56. *B. caespitosum* Thouars t. 103. rhizomate intricato; bulbis oblongis quadratis; fol. geminis retusis; rachi clavata; labello sagittato ovato. In Borbonia. 4.

c. Flores capitati.

57. *B. radiatum* Lindl. rhizomate crasso; bulbis elongatis teretibus; fol. oblongis apice integerrimo; scapis filiformibus; floribus capitatis radiatis; sepalis acutissimis. In Ind. or. 4.

58. *B. odoratissimum* Lindl. rhizomate filiformi; bulbis cylindricis;

fol. oblongis striatis retusis; floribus non radiatis; sepalis carnosus acuminate obtusis. Stellis Sm. In Ind. or. 4.

59. *B. umbellatum* Lindl. rhizomate repente; bulbis ovatis subangulatis; fol. linearis-loratis retusis; floribus corymbosis; sepalis lateralibus falcatis; labello complicato cordato. In Nepal. 4.

60. *B. caudatum* Lindl. rhizomate filiforme intricato; bulbis ovatis subquadratis; fol. ovatis solitariis; sepalis lateralibus longissime acuminatis interior minutis; labello trilobo. In Nepal. 4.

61. *B. clandestinum* Lindl. misc. 1841. n. 166. rhizomate repente squamis cucullatis vestito; pseudobulbis minimis 1—2-phylis; fol. oblongis carnosis; floribus minimis; sepalis clausis ovatis in setam productis; petalis ovalibus obtusis; labello anguste ovato obtuso. In Singapore. 4. Flores straminei.

62. *B. capitatum* Lindl. bulbis remotis compressis; fol. lanceolatis acutis; pedunc. brevi; floribus 5—7 laxe capitatis bracteis cinctis. Diphyes Blume. In Java. 4. Flores pallide flavi.

63. *B. obtusum* Lindl. bulbis subremotis; fol. linearis-lanceolatis obtusis; pedunc. brevi apice 2—3-floro. Diphyes Blume. In Java. 4. Pusilla. Flores flavescens.

64. *B. sulcatum* Lindl. bulbis ovatis sulcatis; fol. linearis-lanceolatis obtusis; pedunc. filiformibus 3-floris; sepalis acuminatis. Diphyes Blume. In Java. 4. Flores pallide flavi.

65. *B. augustifolium* Lindl. bulbis fusinis remotis; fol. linearis-lanceolatis acutis; pedunc. folio brevioribus laxe capitatis. Diphyes Blume. In Java. 4.

66. *B. croceum* Lindl. bulbis remotis; fol. late lanceolatis; pedunc. nutantibus; floribus dense capitatis. Diphyes Blume. In Java. 4. Flores crocei.

67. *B. laxiflorum* Lindl. bulbis remotis; fol. lanceolatis; pedunc. cernuis. Diphyes Blume. In Java. 4. Flores pallide flavi.

Species non satis notae.

68. *B. Lobii* Lindl. B. R. 1847. n. 29. in text. folio petiolato obovato-

oblongo coriaceo; pedunc. 1-floro basi subglandulo e bracteis squamiformibus cucullatis falcatis erumpente; sepalis oblongis exterioribus falcatis; petalis reflexis; labello cordato apice recurvo. In Java. 2. Flores lutei fusco maculati.

69. *B. serpens* Lindl. caule radicante bulbifero; bulbis diphyllis; fol. ovatis; scapis radicalibus. *Cymbidium reptans* Sw. In Ins. Mauritii. 2.

70. *B. galeatum* Lindl. caule radicante, partialibus 1-phyllis; folio lato-lanceolato obtuso; racemo multifloro; floribus conicis incurvo-galeaeformibus. *Dendrobium* Sw. In Sierra Leone. 2.

71. *B. pygmaeum* Lindl. rhizomate repente filiformi; fol. solitariis subsessilibus ellipticis pubescentibus coriaceis. *Dendrobium* Sw. In Nov. Zealandia. 2.

4438. CIRRHOPETALUM Lindl. (1827).

✓ 1. *C. Thouarsii* Lindl. p. 58. sepalis interior. ciliatis aristatis; fol. oblongis obtusis emarginatis scapo brevioribus. *Bulbophyllum longiflorum* Thouars t. 98. B. R. n. 5. 11. t. 11. In Otaheite, Java etc. 2.

2. *C. Roxburghii* Lindl. sepalis interior. ciliatis acutis; fol. lanceolatis; umbella radiata multiflora. In Ind. or. 2. Flores lutei.

3. *C. vaginatum* Lindl. sepalo suprmo obtuso mutico, inferioribus longissime acuminatis; vaginis scapi ventricosis; racemo recurvo. In Ind. or. 2.

4. *C. Blumei* Lindl. sepalis interior. pubescentibus; fol. linear-lanceolatis; pedunc. 1-floris. *Ephippium ciliatum* Blume. In Java. 2.

5. *C. Wallichii* Lindl. sepalis oblongis retusis muticis; fol. oblongo-lanceolatis obtusis scapi longitudine. In Nepatia. 2. Flores fulvi.

6. *C. Macraei* Lindl. sepalis acuminatis, interior. nudis; fol. oblongo-lanceolatis obtusis emarginatis scapo aequalibus. In Zeylona. 2. Flores pallide virides rubro-venosi.

7. *C. caespitosum* Wall. fol. ovalibus obtusis; scapo filiformi; sepalo supremo obovato fornicate acuto lateralibus convolutis; labello minimo

solido triquetro apice recurvo. In Ind. or. 2.

8. *C. cornutum* Lindl. pseudobulbis angulatis scapo paulo brevioribus; sepalis lateralibus in cornu connatis petalisque ciliatis; labello angusto 3-angulari supra sulcato. In Ind. or. 2. Flores purpurei.

9. *C. maculosum* Lindl. misc. 1841. floribus geminis solitariis; sepalo supremo oblongo acuto lateralibus obtusis margine anteriore pone basin 1-plicato; petalis sepalo supremo brevioribus obtusis, labello ovato obtuso apice recurvo. In Ind. or. 2. Flores pallide virides.

10. *C. chinense* Lindl. B. R. 1842. t. 49. fol. lanceolatis; umbella multiflora; sepalo supremo galeato, petalisque oblongis obtusis serrulatis apiculatis; labello linguiformi obtuso carnoso laevi tremulo. In China. 2. Flores pallidi.

11. *C. picturatum* G. Lodd. pseudobulbis angulatis; folio oblongo emarginato; floribus umbellatis; sepalo supremo ciliato setaceo acuminato; lateralibus obtusis, petalis acuminatissimis ciliatis villosis; labello linearrecurvo. In Ind. or. 2. Flores purei.

12. *C. auratum* Lindl. B. R. 1845. t. 61. pseudobulbis angulatis; fol. oblongo convexo; floribus umbellatis; sepalo supremo petalisque setaceo-acuminatis fulvo-ciliatis; labello linear recurvo. In Manilla. 2.

13. *C. Cumingii* Lindl. B. R. 1845. pseudobulbis 4-gonis; fol. oblongo obtuso; umbella dimidiata multiflora; sepalo dorsali petalisque ovatis acuminatis fimbriatis; labello ovato basi tuberculato. In ins. Philippinis. 2. Flores intense purei.

14. *C. nutans* Lindl. misc. 1839. n. 118. pseudobulbis ovato-rotundis rugosis; fol. ovato-subrotundis emarginatis coriaceis humi profusis; scapo erecto elongato; umbella nutante; sepalis glaberrimis; petalis ovatis acutis serrulatis; labello obtuso bicristato. In Manilla. 2.

15. *C. fimbriatum* Lindl. misc. 1839. n. 120. pseudobulbis ovatis 4-gonis; fol. ovalibus; umbella multiflora; sepalis lateralibus ligulatis cohaerentibus supremo petalisque ovatis acuminatis fimbriatis; labello crasso linguiformi; anthera papillosa.

In Bombay. 4. *Sepala viridia*; ci-
liis purpureis.

16. *C. elongatum* (Ephippium Blume). fol. ebulbosis oblongis lanceolatis basi carinatis; floribus in pedunculo elongato superne dense spicatis; sepalis acuminatis. *In Java.* 4.

17. *C. capitatum* (Ephippium Blume). bulbis oblongis subcompressis; fol. oblongo-lanceolatis; floribus capitatis; sepalis elongatis acuminatis margine revolutis. *In Java.* 4.

18. *C. antenniferum* Lindl. B. R. 1843. sub t. 49. scapo 1-floro; sepalo dorsali lineari-lanceolato abrupte acuto lateralibus cohaerentibus canaliculatis falcatis; petalis in setam tenuissimam apice clavatam productis. *In ins. Philippinis.* 4.

19. *C. maxillare* Lindl. ic. fol. oblongo scapi 1-flori longitudine; sepalo dorsali setaceo acuminato, lateralibus obtuse acuminatis petalis acutissimis. *In ins. Philippinis.*

20. *C. compressum* (Ephippium uniflorum Blume). bulbis oblongis compressis; fol. lato-lanceolatis; pedunc. 1-floro; sepalis ovatis acuminatis. *In Java.* 4.

4439. *BRYOBIA* Lindl. (1838).

1. *B. pubescens* Lindl. B. R. 1838. misc. p. 79. *In Antillis.* 4. Herba pusilla caule carnoso. Fol. bina carnosia. Flores minuti capitati.

4440. *TRIAS* Lindl. (1831).

1. *T. oblonga* Lindl. fol. oblongis. *In Ind. or.* 4. Flores fusco-virides, labello purpurascente.

2. *T. ovata* Lindl. fol. ovatis. *In Ind. or.* 4. Sepala interiora alba rubro striata.

4441. *MACROSTOMIUM* Blume (1826).

1. *M. aloifolium* Blume tab. 37. *In Java.* 4.

4442. *MICROCOELIA* Lindl. (1831).

1. *M. exilis* Lindl. *In Madagascar.* 4. Radices numerosissimae, Spicae filiformes. Flores minutissimi.

4443. *EPICRANTHES* Blume (1826).

1. *E. javanica* Blume. *In Java.* 4. Herba epiphyta scandens. Folia ovalia. Pedunc. 1-flori.

4444. *MONOMERIA* Lindl.

1. *M. barbata* Lindl. *In Ind. or.* 4. Bulbi ovati. Folia longissime petiolata pedalia. Flores pallide purpurei.

4445. *STENOGLOSSUM* H. et K. (1820).

1. *S. coryophorum* H. et K. nov. gen. t. 87. *In Nor. Granata.* 4. Caulis foliosus simplex. Flores terminales spicati.

4446. *DIGLYPHOSA* Blume (1826).

1. *D. latifolia* Blume tab. 60. *In Java.* 4. Caulis subcarnosus apice 1-phyllus. Foliolum membranaceum ellipticum. Flores spicati.

4447. *MYCARANTHES* Blume (1826).

1. *M. oblitterata* Blume; labelli lobo medio oblitterato; fol. subcoriaceis. *In Java.* 4.

2. *M. tatifolia* Blume; labelli lobo medio abbreviato; sepalis exterior. versus apicem incrassatis; fol. lato-linearibus. Blume tab. 57. *In Java.* 4.

3. *M. lobata* Blume; labelli lobo medio dilatato undulato subbilobo; fol. rigidis. *In Java.* 4.

4. *M. stricta* Lindl. spica secunda densa; labello scrotiformi per medium calloso. Eria Lindl. coll. tab. 41. f. B. *In Nepalia.* 4. Flores glauci.

5. *M. obliqua* Lindl. 1840. misc. n. 184. fol. lato-linearibus carnosis

canaliculatis apice oblique emarginatis scapo brevioribus; sepalis lateribus carinatis; labelli cuneati 5-lobi callo apiculi pube densa decidua farinam referente vestito. *In Singapore.* 4. Flores albi rufo-puberuli.

4448. PHREATIA Lindl. (1831).

1. *P. elegans* Lindl. fol. linearibus coriaceis emarginatis; scapis gracilis nutantibus; spicis multifloris; labello ovato intus piloso. *In Zeylona.* 4. Flores albi.

2. *P. retusa* Lindl. bulbis ovato-globosis 2—3-phylis; fol. linear-lanceolatis retusis; spicis brevibus densifloris. *Dendrobium Blume.* *In Java.*

3. *P. taxiflora* Lindl. fol. membranaceis linearibus; spicis folio longioribus strictis; labelli limbo dilatato concavo. *Dendrolirium Blume.* *In Java.* 4.

4. *P. densiflora* Lindl. fol. membranaceis lato-linearibus; spicis elongatis flexuosis densifloris; labelli limbo ovato concavo. *Dendrolirium Blume.* *In Java.* 4.

5. *P. pusilla* Lindl. fol. membranaceis anguste linearibus; spicis suberectis longitudine foliorum; labelli limbo rotundato patente. *Dendrolirium Blume.* *In Java.* 4.

6. *P. secunda* Lindl. fol. carnosis anguste linearibus; spicis nutantibus secundis; labelli limbo rotundato patente. *Dendrolirium Blume.* *In Java.* 4.

7. *P. coriacea* Lindl. fol. cariaceis linearibus oblique retusis; spicis erectis folio longioribus; labelli limbo intus pubescente dilatato concavo. *Dendrolirium Blume.* *In Java.* 4.

4449. ERIA Lindl. (1829).

1. *E. paniculata* Lindl. in Wall. pl. as. rar. t. 36. fol. linear-lanceolatis acuminatis; caulibus pendulis elongatis; racemis cylindricis; sepalis lanatis. *In Ind. or.* 4.

2. *E. flava* Lindl. fol. lanceolatis distichis; caulibus ovalibus; sepalis dense lanatis ovatis; labelli lobo medio recurvo crenulato. *Dendrobium*

Hook. exot. Bot. 124. *In Nepalia.* 4. Flores flavescentes.

3. *E. bicolor* Lindl. caulibus elongatis; fol. lanceolatis; sepalis ovatis glabris; labelli lobo nudio acuto; racemo stricto; rachi pubescente. *In Zeylona.* 4. Rachis rosea. Flores candidi.

4. *E. flavescentis* Lindl. bulbis cylindricis 3—4-phylis; fol. lanceolatis nervosis; spicis intrafoliaceis stellato-pubescentibus; bracteis coriaceis margine revolutis. *Dendrolirium Blume* tab. 69. *In Java.* 4. Flores speciosi.

5. *E. rugosa* Lindl. bulbis 3-questris; fol. oblongo-lanceolatis nervosis; spicis fusco-tomentosis; labello intus crispato-membranaceo. *Dendrolirium Blume.* *In Jara.* 4.

6. *E. ornata* Lindl. bulbis sub-compressis ovalibus 3-phylis; spica radicali vaginata sepalisque fusco-tomentosis; labello intus crispato-cristato. *Dendrolirium Blume.* *In Jara.* 4.

7. *E. albo-tomentosa* Lindl. bulbis ovalibus compressis 3-phylis; fol. lanceolatis rigidis; spica radicali sepalisque albo-tomentosis; labello intus crispato. *Dendrolirium Blume.* *In Jara.* 4.

8. *E. hyacinthoides* Lindl. bulbis ovatis subcompressis diphyllis; fol. lanceolatis coriaceis; spicis lateralibus sepalisque nudis; labello intus callosa-verrucoso. *Dendrolirium Blume.* *In Jara.* 4. Flores candidi.

9. *E. bicristata* Lindl. bulbis cylindricis vaginatis diphyllis; fol. lanceolatis coriaceis; spica lateralisi sepalisque extus sericeo-tomentosis. *Dendrolirium Blume.* *In Jara.* 4. Flores albidi.

10. *E. rosea* Lindl. fol. solitariae cariaceis lanceolatis; bulbis ovatis costatis; sepalis glabris; labelli 3-lobi ungue bicostato, lamina tricostata. *Ochomeria Spr.* *In China.* 4.

11. *E. stellata* Lindl. t. 904. fol. lanceolatis carnosis 5-costatis; sepalis pubescentibus acuminatis; scapo ovariiisque ferrugineo-lanatis. *In hort. Angliae.* 4.

12. *E. alba* Lindl. fol. distichis plicatis; bulbis multicostatis; sepalis oblongis; labello tricalloso; racemis geminis. *In Ind. or.* 4.

13. *E. excarata* Lindl. fol. binis lanceolatis plicatis; caulibus sulcatis; sepalis basi pilosis; racemis lateralibus erectis; bracteis obovatis recurvis. *In Nepal.* 4. Tota planta viridi-caerulea.
14. *E. pumita* Lindl. fol. linearilanceolatis plicatis; spicis capitatis; sepalis subpilosus obtusis; labelli lobis lateralibus subulatis. *In Ind. or.* 4.
15. *E. obesa* Lindl. caulibus crassis teretibus; sepalis obtusis; labelli lobis lateralibus rotundatis; capsulis longissimis. *In Ind. or.* 4.
16. *E. erecta* Lindl. bulbis cauliniformibus subcompressis; fol. lanceolatis acutis; spicis erecto-patentibus oppositifoliis. *Dendrolirium Blume.* *In Java.* 4.
17. *E. abbreviata* Lindl. bulbis cauliniformibus teretibus; fol. lanceolatis acutis lucidis; spicis oppositifoliis brevissimis. *Dendrolirion Blume.* *In Java.* 4.
18. *E. multiflora* Lindl. bulbis cauliniformibus teretibus; fol. linearilanceolatis acutis; spicis densifloris oppositifoliis nutantibus folio dimidio brevioribus. *Dendrolirium Blume.* *In Java.* 4.
19. *E. micrantha* Lindl. bulbis cauliniformibus teretibus; fol. lanceolatis obtusiusculis; spicis densifloris oppositifoliis cernuis aequalibus. *Dendrolirium Blume.* *In Jara.* 4.
20. *E. robusta* Lindl. bulbis compressis vaginatis diphyllyis; fol. latolinearibus rigidissimis; spica inferne vaginata tomentosa. *Dendrolirium Blume.* *In Java.* 4. Flores flavescentes.
21. *E. ebulbis* Lindl. fol. geminatis linearibus obtusis rigidis; spicis tomentosis folio dimidio brevioribus. *Dendrolirium Blume.* *In Jara.* 4.
22. *E. acuminata* Lindl. bulbis oblongis compressis 5—7—phyllis; fol. linearilanceolatis acuminatissimis rigidis; spica subtomentosa longitudine foliorum. *Dendrolirium Blume.* *In Jara.* 4.
23. *E. sulcata* Lindl. bulbis ovatis sulcatis subdiphyllyis; fol. linearilanceolatis coriaceis; spicis erectis superne sulcatis nudis. *Dendrolirium Blume.* *In Jara.* 4.
24. *E. appendiculata* Lindl. bulbis ovato-oblongis vaginatis 3—4—phyllis; fol. lanceolatis coriaceis obtusis; spica arachnoideo-tomentosa longitudine foliorum. *Dendrolirium Blume.* *In Java.* 4.
25. *E. ferruginea* Lindl. B. R. n. ser. 12. t. 35 caulibus teretibus articulatis vaginatis; fol. oblongis obtusis; racemo erecto multifloro; ovario villosissimo; labelli lobis lateralibus truncatis intermedio serrato subuplicato; disci cristis 4-dentatis. *In Cuttutta.* 4. Sepala fusco-viridia. Pet. albo-rosea.
26. *E. planicaulis* Wall. caule compresso folioso erecto; fol. coriaceis aveniis obtusis; floribus glabris subsessilibus bracteatis; labello reniformi supra unguem bicalloso; petalis linearis sepalis ovatis acutis multo angustioribus. *In Ind. or.* 4. Flores rosei.
27. *E. nutans* Lindl. misc. 1840. caule tereti folioso; fol. oblongis undulatis striatis; flore campanulato solitario nutante, bractea plana patente carnosa; sepalis petalisque obtusis; labelli trilobi lobis lateralibus erectis intermedio transverse carnosus apiculato. *In Singapore.* 4. Flores albi.
28. *E. velutina* G. Lodd. ex Lindl. misc. 1840. caule tereti velutino; foli distichis carnis ovato-lanceolatis margine revolutis utrinque velutinis; flore solitario oppositifolio inter squamas villosas obtusas sessili; sepalis petalisque apice recurvis extus hirsutis; labello elongato. *In Singapore.* 4. Flores pallide lutei.
29. *E. clivicaulis* Lindl. misc. (1840) caulibus clavatis; fol. lanceolatis acutissimis; bracteis concavis recurvis; sepalo dorsali petalisque ovalibus undulatis; labelli trilobi lobis lateral adscendentibus, intermedio oblongo tomentoso infra sinus bituberculato. *In Ind. or.* 4. Flores albi.
30. *E. bipunctata* Lindl. B. R. 1841 misc. no. 179. caulibus ovalibus compressis; fol. lanceolatis acuminatis 4-nerviis; racemis axillaribus cylindricis; bracteis ovatis reflexis; sepalis petalisque ovatis obtusis; labello trilobo carnosus, laciniis lateralibus minoribus. *In Ind. or.* 4.
31. *E. bractescens* Lindl. B. R. 1844. t. 29. pseudobulbis brevibus ovatis subdiphyllyis; fol. oblongis undulatis; racemis erectis; bracteis marginé

revolutis linearibus reflexis; labelli trilobi lobo medio truncato rugoso obtuse apiculato. *In Singapore.* 2.

32. *E. longitabris* Lindl. I. c. no. 69. Eriæ bractescens facie sed sepalis petalisque magis acuminatis; labelli trilobi lobulis 3 ad apicem fere productis aequalibus lateralibus abbreviatis lobo medio ovato acuminato. *In ins. Philippinis.* 2.

33. *E. armeniaca* Lindl. B. R. 1841. t. 42. pseudobulbis ovalibus compressis triphyllis; fol. oblongo-lanceolatis coriaceis; racemo tomentoso radicali stricto; labelli lobis lateralibus dentiformibus, intermedio rhomboe crispo trilamellato, lamella media versus apicem labelli producta. *In ins. Philippinis.* 2. Scapus 1-ped. Flores fusci.

34. *E. pulchella* Lindl. in Wall. cat. pseudobulbis ovatis stipitatis diphyllis; fol. oblongo-lanceolatis obtusis; racemo lanato erecto; perianthio explanato incano; labello subrotundo basi trilineato. *In Ind. or.* 2. Perianthium luteum lanatum. Labelum fuscum.

35. *E. polyura* Lindl. B. R. 1842. t. 32. caule elongato folioso; fol. lanceolatis acutis patulis striatis; spicis oppositifoliis multifloris nutantibus; sepalis petalisque ovatis acutis; labello cordato ovato basi bicarinato. *In Manilla.* 2. Flores albi labello kermesino.

36. *E. floribunda* Lindl. B. R. 1844. t. 20. caulinis carnosis subflexuosis; fol. lanceolatis acuminatis; racemis oppositifoliis patulis multifloris pubescentibus; bracteis defloratis ovatis retrorsis; sepalis petalis triplo latioribus; labello angusto saccato lacinia intermedia cuneata tridentata. *In Ind. or.* 2.

37. *E. cochleata* Lindl. B. R. 1844. misc. n. 23. fol. lanceolatis coriaceis 5-costatis; sepalis glabriusculis petalique linear-lanceolatis; labello basi costis 5 apice 3 undulatis linea-to; scapo elongato multifloro ovariisque alte costato. *In Manilla.* 2. Sepala pallide viridia, petala et labelum alba.

38. *E. vestita* Lindl. B. R. 1845. t. 2. dense fusco-villosa; caulinis pendulis; fol. lanceolatis coriaceis subtus dense villosis; racemis elongatis flexuosis; sepalis lanceolatis in

cornu obtusum connatis; petalis obtusis glabris; labelli trilobi lobo medio subrotundo crispo piloso, linea elevata velutina. *In Ind. or.* 2. Flores extus armeniaci intus albi.

39. *E. convallarioides* Lindl. B. R. 1841. t. 62. fol. distichis oblongo-lanceolatis plicatis; sepalis extus villoso spicis axillaribus densissimis. *Piralia* Lindl. Orch. Scel. p. 23. c. ic. *In Nepalia.* 2. Flores albi.

4451. APORUM Blume (1826).

1. *A. indirizum* Blume tab. 39. labello oblongo cristato indiviso carnoso. *In Java.* 2. Flores flavescentes.

2. *A. incrassatum* Blume; labelli limbo rotundato incrassato revoluto. *In Java.* 2.

3. *A. lobatum* Blume; labelli limbo semitrifido, lobo medio rotundato crenulato. *In Java.* 2.

4. *A. anceps* Lindl. labello unguiculato ecalloso inappendiculato cuneato emarginato crenulato; caulinis pendulis. *Dendrobium* Sw. B. R. t. 1239. *In Ind. or.* 2.

5. *A. Serra* Lindl. fol. scapelliformibus acutis carnosis; caulinis subramosis apice foliosis; floribus? *In Ind. or.* 2.

6. *A. Leonis* Lindl. misc. 1840. n. 126. fol. coriaceis ovatis v. cultratis obtusis; floribus solitariis terminalibus; labello linear-longo emarginato ecristato apice ciliato-dentato et minutissime pubescente. *In Singapore.* 2.

7. *A. sinuatum* Lindl. misc. 1841. n. 3. fol. lanceolatis aequilateris approximatis acutis; floribus solitariis axillaribus; labello cuneato elongato intra apicem linea hippocrepica crassa sinuata circumdata. *In Singapore.* 2.

8. *A. cuspidatum* Wall. fol. lanceolatis; floribus solitariis axillaribus; labello emarginato apice crispo per medium obsolete bilineato. *In Ind. or.* 2.

4452. OXYSTOPHYLLUM Blume (1826).

1. *O. carnosum* Blume; fol. linear-lanceolatis strictis acuminatis sub-

falcatis; labello cuneato supra tomentoso; tuberculo apicis minuto; petalis crassis. Rumph 6. t. 50. f. 2. In Java et Amboina. 2.

2. *O. rigidum* Blume; fol. strictis coriaceis; labelli tuberculo obtuso. In Java. 2.

3. *O. excavatum* Blume; fol. erectis subcoriaceis; labelli limbo intus excavato extus convexo. In Java. 2.

4453. POLYSTACHYA Hook. (1824).

1. *P. luteola* Hook. exot. fl. t. 103. spica paniculata; fol. oblongis multi-nerviis scapo brevioribus; floribus ovariisque glabris. In Mexico. 2. Flores luteo-purpurei.

2. *P. puberula* Lindl. t. 851. spica paniculata thyrsiformi; fol. lanceolatis 7-nerviis scapo longioribus; floribus ovariisque pubescentibus. In Sierra Leone. 2.

3. *P. affinis* Lindl. spica simplici cylindracea; fol. ovalibus 9-nerviis scapi longitudine; floribus ovariisque pilosis; bulbis depressis. In Sierra Leone. 2.

4. *P. fusiformis* Lindl. caulis articulatis fusiformibus carnosis; fol. linearie-oblengis oblique emarginatis; floribus paniculatis glabris. Dendrobium Thouars orch. afr. t. 68. In Bononia. 2.

5. *P. cultrata* Lindl. spica composita pauciflora; fol. solitario basi auriculato oblongo cultriformi; floribus ovariisque glabris. Dendrobium Thouars t. 87. In ins. Mauritii. 2.

6. *P. bracteosa* Lindl. misc. 1840. fol. obovato-oblengis acutis; racemo tomentoso elongato cernuo basi ramoso; bracteis foliaceis acuminatissimis squamosis; sepalis villosis; labelli ciliati trilobi per medium villosi lobo medio ovato acuto. In Sierra Leone. 2.

7. *P. cerea* Lindl. misc. 1840. pseudobulbis ovatis; fol. oblongo-lineari-bus undulatis racemo simplici obtuso brevioribus; floribus cernuis; labelli trilobi pone basin callosi per axin pubescentis lobis lateralibus nanis intermedio obtuso undulato. In Mexico. 2.

8. *P. ramulosa* Lindl. scapo paniculato; floribus glaberrimis; sepala basi conica elongata; labello cu-

neato trifido margine involuto. In Sierra Leone. 2.

9. *P. zeylanica* Lindl. canescens; fol. oblongo-lanceolatis; paniculae ramis elongatis; labelli lobo medio elongato disco furfuraceo; capsula inter costas reticulata. Dendrobium Thouars t. 85. In Sierra Leone. 2.

10. *P. reflexa* Lindl. B. R. 1841. misc. n. 43. pseudobulbis compressis conicis annulatis; scapo subclavato apice racemoso; sepalis expansis sub apice mucronatis lateralibus maximis; labello pandurato medio crenulato genusflexo pulvinato apice dilatato membranaceo. In Sierra Leone. 2. Flores albi kermesini.

11. *P. clavata* Lindl. misc. 1842. no. 71. fol. lineari-oblengis obtusis recurvis canaliculatis; panicula brevi stricta spicata ramis clavatis; labelli cariosi lobo medio crenato lateralibus brevibus acutis; disco farinoso basi convexo. In Beliza. 2. Flores pallide lutei.

4454. METACHILUM Lindl. (1831).

1. *M. cyathiferum* Lindl. In Ind. or. 2. Appendix disci labelli cyathiformis.

4455. MACROLEPIS Rich. (1842).

1. *M. Rich.* sert. astr. t. 19. In ins. Vanicoro. 2.

4456. DENDROBIUM Sw. (1799).

Sect. I. *Eudendrobium* Lindl. Caules graciles. Folia tenuia plana. Flores gemini v. terni foliis oppositi.

a. *Labellum indivisum.*

1. *D. macrophyllum* Lindl. sert. t. 35. caulis pendulus; fol. ovato-oblengis obtusis nervosis; sepalis lanceolatis lateral. subproductis; petalis oblongis acutis; labello pubescenti convoluto denticulato. B. M. t. 3970. In Manilla. 2. Sepala et petala rosea. Labellum sanguineo striatum.

2. *D. maniliforme* L. caulis erectis carnosis, intermediis tumidis; fol.

oblongis obtusis; floribus geminatis fol. longioribus; sepalis petalisque oblongis obtusis; labello cucullato serrulato acuto intus pubescente. B. R. t. 1314. In Japonia. 2.

3. *D. caerulescens* Lindl. sert. t.

17. facie omnino *D. nobilis* floribus nunc ternatis; petalis angustioribus margine reflexis valde undulatis; labello ovali acuminato intus viloso. In Ind. or. 2.

4. *D. nobilis* Lindl. sert. t. 3. caulinibus teretibus erectis; fol. oblongis oblique emarginatis obtusis; floribus geminis; sepalis ovalibus petalis duplo majoribus undulatis; labello ovato subrotundo cucullato viloso. In China. 2. Flores violacei.

5. *D. pulchellum* Roxb. caulinibus teretibus pendulis; fol. oblongo-lanceolatis subuplicatis; racemis lateraliibus strictis multifloris; bracteis ovatis obtusis; labello unguiculato cochleariformi obtusissimo ciliato. Lodd. B. Cab. t. 1935. In Sylhet. 2. Sepala albida. Pet. et labellum rosea.

6. *D. Devonianum* Paxt. Mag 7. 169. caulinibus pendulis; fol. ovato-lanceolatis acutis; pedunc. 2—3-floris; sepalis oblongis acutis integris, petalis duplo latioribus fimbriatis; labello maximo cochleariformi margine plumoso. In Ind. or. 2. Sepala rosea. Petala et labellum aurantiaca.

7. *D. Pierandi* Roxb. caulinibus pendulis glabris; fol. ovato-lanceolatis acutis; floribus geminis; sepalis acuminatis membranaceis; petalis acuminatis; labello cucullato dilatato subrotundo pubescenti ciliato. Hook. exot. fl. t. 9. B. R. t. 1756. In Ind. or. 2. Flores rosei. Labello luteo.

8. *D. cucullatum* R. Br. B. R. t. 548. facie omnino *D. Pierandi* sed labello subrotundo-ovato basi in ungumen brevem convoluto. B. R. t. 1756. In Ind. or. 2.

9. *D. transparens* Wall. caulinibus pendulis teretibus; fol. ovato-lanceolatis acuminatis apice obliquis; floribus geminis; sepalis acuminatis; petalis obtusis sepalo supremo majoribus; labello oblongo undulato ciliato. In Nepalia. 2. Flores rosei.

10. *D. amoenum* Wall. caulinibus pendulis gracilibus nebulosis, floriferis aphyllis; fol. lanceolatis acutis; floribus geminis racemum spurium for-

mantibus longe pedunculatis divaricatis; sepalis oblongis obtusis labello crenulato disco villoso. Roxb. cor. t. 41. In Nepalia. 2. Flores albi.

11. *D. heterocarpum* Wall. caulinibus teretibus pendulis; fol. oblongis acutis planis; floribus geminis adonatis racemosis; sepalis oblongis petalique acutis; labello unguiculato subpanduraeformi holosericeo piano. In Nepalia. 2. Flores pallide flavi.

12. *D. macrostachyum* Lindl. B. R. t. 1865. caulinibus flagelliformibus; fol. ovato-lanceolatis; floribus ternatis racemosis; sepalis ovatis acutis; petalis lanceolatis; labello cucullato venoso limbo ciliato intus pubescente. In Ceylona. 2. Flores flavi.

13. *D. gemellum* L. fol. membranaceis lanceolatis acuminatis; pedunc. bifloris; labello ovali acuto apice crispato; lamellis tribus serrulatis inconspicuis. Sedilonum Blume. In Java. 2. Flores pallide lutei.

14. *D. rugosum* Lindl. fol. subco-riaceis lanceolatis apice emarginatis; sepalis et labelli limbo acuminatis; labello intus membranaceo-rugoso. Grastidium Blume. In Java. 2. Flores pallide lutei.

15. *D. sataccense* Lindl. fol. membranaceis linearis-lanceolatis oblique retusis; sepalis acutis; labello obtuso intus 1-lineato. Grastidium Blume. In Java. 2. Flores intense lutei.

16. *D. acuminatissima* Lindl. fol. membranaceis linearibus sepalisque acuminatissimis. Grastidium Blume. In Java. 2. Flores virides.

17. *D. chrysanthum* Wall. caulinibus pendulis; fol. ovato-lanceolatis acuminatis; floribus inter folia nascentibus; sepalis carnosus oblongis obtusis venis extus tuberculatis; petalis obovatis retusis; labello cucullato denticulato retuso obsolete trilobo. In Nepalia. 2. Flores lutei.

18. *D. Paxtonii* Lindl. B. R. 1839. caulinibus sulcatis; fol. ovato-lanceolatis acuminatis obsolete emarginatis; pedunc. bifloris; petalis serrulatis obovatis; labello concavo indiviso margine multifido fimbriato. In Ind. or. 2. Flores aurei.

19. *D. ochreatum* Lindl. caulinibus incrassatis; fol. latis ovalibus acuminatissimis; petalis lanceolatis; labello cucullato rotundato indiviso supra piloso. In Ind. or. 2. Flores lutei.

20. D. aureum Lindl. caulibus erectis clavatis; fol. linearis-oblongis emarginatis; pedunc. subbifloris aggregatis; sepalis linearis-ovatis acuminate obtusis; petalis ovatis acutis undulatis; labello undulato indiviso medio serrulato. *In Ceylona.* 4. Flores pallide lutei.

21. D. sulcatum Lindl. B. R. 1838. t. 65. caule clavato sulcato subflexuoso compresso; fol. oblongis acutis 3-nervis; pedunc. 3-floris; petalis oblongis obtusis glabris; labello obcordato hirsuto sulcato. *In Ind. or.* 4.

22. D. nutans Lindl. caulibus subclavatis hispidis apice foliosis; fol. ovato-lanceolatis uncinato-bilobis; pedunc. bifloris; bracteis minimis; petalis sepalisque linearis-lanceolatis acuminate; labello conformi carnoso crenulato indiviso; capsulis nutantibus. *In Ceylona.* 4. Flores albi virentes labello flavo.

23. D. candidum Wall. caulibus flexuosis; fol. ovato-lanceolatis apice obliquis obtusis; pedunc. bifloris; sepalis patulis subproductis petalis conformibus; labello obovato-lanceolato obtuso medio barbato supra basin calloso lateribus erectis cucullatis. *In Ind. or.* 4. Flores parvi albi suaveolentes.

24. D. foliosum Brogn. in Duperr. voy. t. 41. *In?*

25. D. stuppeum Lindl. caule erecto tereti; fol. linearis-oblongis oblique emarginatis; pedunculis bifloris; bracteis cucullatis; sepalis petalique carinatis; labello oblongo cucullato obtuso sub apice calloso stupposo. *In Ind. or.* 4. Flores parvi albi.

26. D. anomum Lindl. facie omnino macrophylli et colore; sepalis ovato-lanceolatis; petalis oblongis planis undulatis; labello subrotundo acuto. *In ins. Philippinis.* 4.

b. Labellum tritobum.

27. D. Ruckeri Lindl. B. R. 1843. t. 60. fol. ovato-lanceolatis acuminate planis; floribus geminis; sepalis patulis margine reflexis; labelli 3-lobi lobis rotundatis intermedio undulato axi elevata villosa. *In ins. Philippinis.* 4. Flores magni lutei.

28. D. sanguinolentum Lindl. B. R. 1842. t. 6. caulis pendulus; fol. ovato-lanceolatis; sepalis petalique

ovatis patulis obtusis; labello glabro, lacinia intermedia retusa nunc utrinque plicata; appendice cornuformi pubescente retrorsa aucta. *In Ceylona.* 4. Flores violacei.

29. D. revolutum Lindl. caulis obtuse ancipitibus; fol. ovato-oblongis obtusis apice obliquis emarginatis floribus solitariis oppositifoliis; sepalis petalique acutissimis revolutis; labello rhomboideo per medium exarato, lineis 3 discoloribus. *In Singapore.* 4. Flores straminei.

30. D. excisum Lindl. fol. linearis-oblongis oblique retusis; floribus basi squamatis; sepalis petalique acuminate; labello oblongo basi utrinque excisus disco late glanduloso. *In Singapore.* 4. Flores albi inconspicui.

31. D. longicornu Lindl. B. R. t. 1315. caulis hispidis flexuosis; fol. ovato-lanceolatis obliquis; bracteis ovatis hispidis; sepalis lateralibus in calcar longum acuminatum connatis; labello infundibuliforme cucullato integro dentato. *In Nepal.* 4.

32. D. tridentiferum Lindl. fol. oblongo-lanceolatis oblique emarginatis; geminis paleaceis; sepalis lateralibus ovatis carnosus obliquis; petalis lanceolatis acutis membranaceis; labello carnosus trifido basi tuberculo carnosus linea utrinque elevata aucto, lobis lateralibus antrorsum curvis. *In Nova Guinea.* 4.

33. D. luzonense Lindl. fol. distichis anguste lanceolatis apice emarginatis; labello spathulato obtusissimo lacinias lateralibus obsolete denticulatis. *In Lazonia.* 4.

34. D. Cunninghamii Lindl. caulis pendulus ramosis vaginis foliorum cornis transversim corrugatis squamatis; fol. ovato-linearibus obtusis; sepalis ovatis acutis; labelli lobo medio undulato basi 5-lamellato lateralibus nanis acutis. *D. biflorum* Rich. astrol. t. 26. *In Nov. Zeelandia.* 4. Flores albi.

35. D. biflorum Sw. caule pendulo gracili; fol. linearis-lanceolatis acuminate planis; pedunc. bifloris; sepalis petalique acuminatissimis; labello rhomboideo, lobo medio deltoideo acuminato margine fimbriato. *In ins. Societatis.* 4. Flores minimi apicibus setaceis.

36. D. calcaratum Lindl. caulis nigro-pubescentibus; fol. linearibus

oblique bilobis; floribus resupinatis; sepalis ovatis lateral. revolutis basi in cornu conicum productis; labelli linearis lobis marginibus incurvis; ungue cum columna in calcar connato. In Singapore. 2.

37. *D. bitlobum* Lindl. fol. linearibus obtusis bilobis; floribus membranaceis minutis, sepalis obtusis; labello libero elongato obovato apice carnoso trilobo, lacinia media verrucosa, cornu elongato obtuso. In Nov. Guinea. 2.

38. *D. pugioniforme* A. Cunningham. caulis repente nodoso-articulatis setoso-stipulatis; fol. lanceolatis acutis carnosus; floribus resupinatis axillaribus; perianthii foliolis patulis acutis; labello longitudinaliter tricarinato, lobo intermedio undulato-crispato. In Nov. Holl. 2.

*Sect. II. Stachyobium Lindt. l.
c. Caules gracilis. Folia tenuia
plana. Flores racemosi.*

a. *Labellum indivisum.*

39. *D. aduncum* Lindl. B. R. 1846. t. 15. caulis pendulis; fol. linear-lanceolatis acutis integris; floribus ternis patulis; sepalis petalisque ovatis obtusis cornu rotundato; labello unguiculato ovato concavo intus villosa; columna apice bialata sub stigmate villosa; anthera glandulosa. In Ind. or. 2.

40. *D. formosum* Roxb. caulis pendulis pilosis; fol. distichis ovatis apice oblique emarginatis obtusis; racemo 4—5-floro; floribus maximis; sepalis oblongis acutis lateralibus longe productis; labello dilatato obtuso in calcar obtusum connato. Wall. pl. as. rar. t. 39. B. R. 1839. t. 64. In Ind. or. 2. Flores albi.

41. *D. rhombeum* Lindl. B. R. 1843. t. 17. caulis teretibus foliosis; fol. lanceolatis acutis; racemis 4-floris; sepalis ovalibus obtusis; labello rhombeo un'ulato acuto, medio pubescente; columna utrinque tuberculata; anthera pubescente. In Manna. 2.

42. *D. fimbriatum* Hook. exot. fl. t. 71. caulis teretibus pendulis; fol. ovato-lanceolatis; racemis lateralibus multifloris; sepalis oblongis undulatis patentissimis; petalis majori-

bus ciliatis undulatis; labello indiviso fimbriato. In Nepalia. 2. Flores lutei.

43. *D. polyanthum* Wall. caulis teretibus pendulis; fol. oblongo-lanceolatis apice integris; racemis 3—4-floris; sepalis lanceolatis; petalis majoribus oblongis undulatis obtusis; labello obovato cucullato ciliato; caps. fusiformibus apteris. In Ind. or. 2. Labellum luteum.

44. *D. Dathousianum* Paxt. mag. 1845. t. 145. caulis teretibus subfusiformibus strictis; fol. ovato-lanceolatis obtusis; racemis 5—7-floris; sepalis et petalis ovatis; labello indiviso medio constricto supra glanduloso-villoso lateribus erosis. B. R. 1846. t. 10. In Ind. or. 2. Flores albo-rosei. Labellum maculis 2 sanguineis.

45. *D. moschatum* Wall. caulis pendulis; fol. linear-lanceolatis oblongis; racemis lateral. laxis 5—6-floris; sepalis patentissimis petalique oblongis obtusis venosis; labello unguiculato calceolari ohtusissimo. B. M. t. 3837. D. Calceolus Hook. exot. fl. t. 184. B. R. t. 1779. In Ind. or. 2. Fores albi.

46. *D. calcaratum* A. Rich. sert. Astrol. t. 7. caule ramoso articulato aphylo; fol. linear-lanceolatis acutis; floribus spicato-corymbosis; sepalis lateralibus in cornu clavatum fissum productis; labello linearis-patulato. In Vanicoro. 2.

47. *D. flavescens* Lindl. (Onychium Blume) ebulle; fol. paucis linear-lanceolatis obtusis; floribus subspicatis terminalibus pubentibus; labello intus pubescentibus; limbo emarginato plicato. In Java. 2. Flores parvi lutei.

48. *D. nudum* Lindl. fol. linear-lanceolatis inaequali-acuminatis membranaceis; racemis paucifloris; sepalis lanceolatis dorso angustioribus. In Java. 2. Flores pallide purpurei.

49. *D. ramosum* Lindl. caulis pendulis gracilibus ramosis, fol. lanceolatis acuminatis apice integerrimis; floribus subracemosis; sepalis lateralibus magnis in cornu longum connatis; labello acuto crispato. In Ind. or. 2.

50. *D. herbaceum* Lindl. caulis ramosis teretibus; fol. linear-lanceolatis acuminatis apice bilobis; racemo

terminali; sepalis lateralibus basi subproductis petalisque linearibus; labello lanceolato integerrimo nudo. In Ind. or. 2. Flores virides.

51. *D. mutabile* Lindl. fol. linearilanceolatis obtusis oblique retusis membranaceis. *Onychium* Blume. In Java. 2. Flores pallide rosei.

52. *D. sclerophyllum* Lindl. fol. lato-lanceolatis oblique retusis rigidis. *Onychium* Blume. In Java. 2. Flores albi glandulis 3 luteis.

53. *D. auriferum* Lindl. caulinibus teretibus pendulis; fol. oblongis obtusis integris; racemis horizontalibus clavatis foliorum longitudine; bracteis dense imbricatis; sepalis petalis labelloque linearilanceolatis acuminatissimis. In China. 2. Flores lutei.

b. Labellum trilobum.

54. *D. barbatulum* Lindl. caulinibus teretibus; floribus laxe corymbosis; pedicellis filiformibus glaucescentibus; petalis obovatis; labelli lobo medio basi viloso. In Bombay. 2. Flores pallide flavi.

55. *D. lancifolium* Rich. sert. Astrol. t. 8. caule erecto ramoso folioso; fol. anguste lanceolato-linearibus acutis; floribus purpurascensibus subspicatis; labelli lobo medio ovato margine criso. In Moluccis. 2.

56. *D. bicameratum* Lindl. caulinibus fusiformibus; fol. linearilanceolatis apice oblique bidentatis; pedunc. lateralibus squamatis 4-floris; sepalis subrotundis acutis; labelli trilobi lacinia media rotundata. In Ind. or. 2. Flores latei purpureo-maculati.

57. *D. elongatum* Cuningham. caulinibus teretibus sulcatis elongatis erectis 4—5-phyllis; racemo terminali multifloro; foliolis perianthii ovatis obtusis; labello 3-carinato lobo medio lato cordiformi. In Nov. Holl. 2. Flores flavi rubro-maculati.

58. *D. bicolor* Lindl. caulinibus erectis elongatis subclavatis apice foliosis; fol. lanceolatis acutis; racemo 3—4-floro; bracteis petaloideis venosis; petalis sepalisque oblongis obtusis; labello trilobo obtuso. In Ceylona. 2. Flores albi.

59. *D. catenatum* Lindl. caulinibus teretibus erectis; internodiis tumidis; fol. linearilanceolatis acutis; racemis 4—5-floris; sepalis petalisque

lanceolatis acuminatis; labello oblongo apice trilobo. *Epidendron monile* Thunb. In China et Japonia. 2. Sepala viridia; petala alba.

60. *D. denudans* Don. caulinibus caespitosis vaginatis; fol. oblongilanceolatis apice oblique emarginatis; racemis lateralibus nutantibus; sepalis acuminatis lateralibus basi incurvis; labelli lobo medio criso, lateralibus serratis. In Nepal. 2. Flores albo-virides.

62. *D. alpestre* Royle ill. t. 88. f. 2. caulinibus brevissimis ovatis triphyllis; fol. lineariloblongis; racemis 3—5-floris; sepalis acuminatis; labelli lobis lateralibus laceris. In Himalaya. 2. Flores albi labello purpureo.

62. *D. cuspidatum* Lindl. caulinibus brevibus erectis 3—5-phyllo; fol. lineariloblongis apice oblique emarginatis; racemis 3—4-floris; sepalis petalisque linearilanceolatis; labelli trilobi lobis lateral. maximis integerim. In Tovoy. 2. Flores albi.

63. *D. microbulbon* A. Rich. ann. sc. nat. 15. t. 8. caulinibus parvis ovatis aggregatis diphyllo; fol. oblongolinearibus acutis; scapo gracili trifloro; petalis linearibus obtusis; labelli crassi lobis lateral. minimis medio crenulato. In Ind. or. 2. Sepala pallide carnea.

64. *D. pygmaeum* Lindl. caulinibus caespitosis vaginatis; fol. linearilanceolatis; racemis terminal. multifloris; rachi angulata; sepalis petalisque linearispathulatis; labello unguiculato integro longitudinaliter bicalloso. In Martaban. 2.

Sect. III. Ceratobium Lindl. l.c. p. 62. Caules erecti graciles. Folia coriacea disticha. Racemi laterales multiflori. Petala sepalis multo longiora.

65. *D. taurinum* Lindl. B. R. 1843. t. 28. fol. oblongis emarginatis; racemo oblongo; sepalis ovatis; petalis linearibus; labello oblongo apice criso lineis 3 elevatis, apice flexuosis. aucto. In Manilla. 2. Sepala viridia petala et labellum purpurea.

66. *Mirbelianum* Gandich in Freyc. voy. t. 38. fol. ovato-oblongis obtusis; racemis ovatis longe pedunculatis; sepalis ovato-lanceolatis acutis;

petalis spathulatis obtusis, labelli tri-lobi lobo medio ovato undulato, lineis 3 elevatis. In Nov. Guinea. 4.

X 67. *D. veratrifolium* Lindl. fol. oblongis obtusis amplexicaulibus 9—11—nerviis; racemo elongato multifloro; sepalis undulatis acutis; petalis spathulatis obtusis; labello oblongo venis 3 elevatis, lobo medio undulato. In Nov. Guinea. 4. Racemi 1 ped. longi.

68. *D. macranthum* A. Rich. sert. Astrol. t. 6. fol. ellipticis apice subbilobis; racemo longe pedunculato apice 1-phyllo; sepalis ovato-lanceolatis; labello lanceolato trilobo tricarinato, lacinia intermedia acuminate. In Vanicoro.

X 69. *D. attenuatum* Lindl. fol. lanceolatis carnosis oblique emarginatis; sepalis acuminate; petalis linearibus reflexis; labello 3-lobo venis 5 elevatis, lobo medio acuto 3-costato. In Nov. Guinea. 4. Petala biuncialia.

70. *D. undulatum* R. Br. fol. ova-to-oblongis emarginatis; racemis longissimis; sepalis petalique undulatis; labelli trilobi lobo intermedio lanceolato, lineis 5 elevatis. *D. discolor* Lindl. B. R. 1841. t. 52. In Java. 4.

71. *D. affine* Lindl. fol. linearior-oblongis acutis coriaceis; floribus spicatis; sepalis linear-lanceolatis; petalis obovatis; labelli trilobi lobo medio linear-lanceolato, lateralibus rotundis. In Timor. 4.

Sect. IV. Pedilonium Blume.
Caules erecti. Racemi laterales.
Sepala lateralia basi in succum
connata cum labello integro cohae-
rentia. Flores purpurei.

72. *D. secundum* Wall. (Pedilonium Blume) fol. oblongis apice oblique retusis; racemis secundis; sepalis ova-tis, lateralibus in cornu longum in-curvum connatis; labello integrerrimo, acuto apice tumido. B. R. t. 1291. In Java et Malaccis. 4.

73. *D. erosum* Lindl. (Pedilonium Blume) fol. subcoriaceis lanceolatis obtusis; sepalis obtusis dorsali peta-lis latiore; labelli limbo rotundato con-cavo eroso. In Java. 4.

74. *D. hymenophyllum* Lindl. fol. membranaceis inaequali-acuminatis; pedicellis brevibus; sepalo dorsali in-terioribus obtusis aequali, sacco cal-

cariformi longissimo; limbo labelli undulato. Pedilonium undulatum Blume. In Java. 4. Labellum flavum.

X 75. *D. Kuhlii* Blume sub Podilonio. fol. submembranaceis lanceolatis apice inaequali-obtusis; sepalo dorsali in-terioribus lato-lanceolatis latio; la-belli limbo spathulato acuto. In Ja-va. 4. Flores pallide purpurei.

76. *D. Hasseltii* Blume sub Pedilo-nio. fol. rigidis lanceolatis profunde oblique emarginatis; sepalo dorsali in-terioribus lato-lanceolatis aequali; labelli limbo linear acuto. In Java. 4. Flores intense purpurei.

Sect. V. Desmotrichum Blume.
*Pseudobulbi e rhizomate articulato-
nati. Labellum per axin lamella-
tum.*

77. *D. Kingianum* Bidw. pseudo-bulbis bifoliis; fol. ovalibus emarginatis; pedunc. terminali 1—3-floro; sepalis ovatis; petalis obovatis apicu-latis duplo brevioribus; labelli cuneati pubescentis laciniis lateral. acutis, in-termedia subrotundata, axi trilineata apice tridentata. In Nov. Holl. 4.

* * *

78. *D. chrysotoxum* (Dendrocory-ne) Lindl. B. R. 1847. t. 19. pseudo-bulbis clavalis angustis multicosta-tis 2—4-phyllis; fol. oblongis coria-ceis; racemis arcuatim decurvis; se-palis petalique explanatis oblongis obtusissimis his duplo latioribus; la-bello indiviso margine minutissime pectinato et fimbriato. In Ind. or. 4. Flores aurantiaci.

79. *D. Egertoniae* Lindl. B. R. 1847. t. 19 in textu. caule tereti erec-to basi ebulbi; fol.? floribus 2—4-nis; sepalis linearibus obtusis petalis angustioribus; labello ovato obtuso intus villosi; columna basi bicame-rita; anthera pubescente. In Ind. or. 4. Flores rosei purpureo-striati.

80. *D. mesochlorum* Lindl. I. c. caule tereti basi ebulbi; fol. lanceo-latis acuminatis; floribus 4-nis; se-palis ovali-linearibus obtusis; petalis angustioribus; labello ovato obtuso intus villoso undulato-fimbriato; co-lumna basi bicamerata foveata; an-thera pubescente. In Ind. or. 4. Flores albi apicibus violacei.

81. *D. triadenium* Lindl. B. R. 1847. t. 1. radicibus villosis; caulinus

elongatis ramosis basi fusiformibus; fol. ovato-oblongis obtusis; panicula racemosa terminali; sepalis ovatis acutis; petalis labelloque oblongis undulatis emarginatis hoc glabro utrinque 1-dentato; stigmate villoso. *In Ind. or.* 4. Flores ex albo pallide lilacini.

82. *D. Veitchianum* (Dendrocoryne) Lindl. B. R. 1847. t. 25 in textu. caulis clavatis anguste costatis 2—3-phylis; fol. sessilibus oblongis apice acutis; racemo erecto multifloro; pedicellis sepalisque villosissimis; petalis unguiculatis spathulatis glabris; labello maximo alte trilobo, lacinia lateralibus flabellatim venosis. *In Java.* 4. Sepala lutea. Petala alba. Labellum viride purpureo-venosum.

4457. HEXAMERIA R. Br. (1840).

1. *H. In Jara.* 4. Herba nana caule ramoso. Folia disticha mucronata basi in petiolum attenuata. Racemi terminales pauciflori.

4458. HEXADESMIA Brogn. (1840).

1. *H. Brogn. ann. sc. nat.* 17. 44. ex Endl. *In Mexico.* 4. Herba epiphyta pseudobulbis stipitatis compressis diphyllis. Folia oblonga coriacea. Flores 2—4 fasciculati.

4459. COLLABIUM Blume (1826).

1. *C. nebulosum* Blume bydr. *In Java.* 4. Herba terrestris radicibus repentibus. Fol. radicalia remota oblonga petiolata nebulosa. Pedunculi elongati. Flores spicati.

4460. EPIDENDRUM L. (1747).

1. *Encyclium* Lindl. in Hook. *journ.* 3. pag. 81. Caules pseudobulbosi. Flores racemosi v. paniculati. Labellum liberum.

a. Labellum integerrimum.

1. *E. vitellinum* Lindl. fol. binis oblongis obtusis apice recurvis; racemo secundo terminali; sepalis petalisque ovato-lanceolatis acutis; la-

bello cuneato oblongo basi callosa. B. R. 1840. t. 35. Sert. orch. t. 45. *In Mexico.* 4. Flores aurantiaci.

2. *E. ligulatum* Llave; fol. lanceolatis coriaceis striatis; scapo filiformi; sepalis petalisque ligulatis reflexis; labello obovato limbo subcrenato; caps. trigona. *In Mexico.* 4. Flores purpurei, labello fuscoluteo.

3. *E. lividum* Lindl. pseudobulbis ovalibus compressis diphyllis; fol. linearis lanceolatis subundulatis; scapo paucifloro; sepalis linearibus acutis; petalis spathulatis obtusis; labello linearis oblongo crispo medio tomentoso, serie triplici dentium elevatorum. *In Columbia.* 4. Flores parvi purpurei.

4. *E. articulatum* Klotsch gartz. 1838. caule repente radicante; pseudobulbis gracilibus compressis; fol. linearibus acutis; floribus articulatum racemosis; petalis spathulatis extus ochreaceis intus purpureo-variegatis; labello linguaformi albido longitudinaliter cristato-gibboso rubro-venoso basi villoso barbato. *In Guayra.* 4.

5. *E. tripunctatum* Lindl. pseudobulbis ovalibus compressis diphyllis; fol. ligulatis recurvis; scapo bifloro; sepalis patentissimis linearibus; labello obovato rugoso; columna atropurpurea apice triloba. *In Mexico.* 4. Flores viridi-flavi.

6. *E. asperum* Lindl. pseudobulbis ovatis subangulatis diphyllis; fol. coriaceis ligulatis carinatis acutis; scapo ramoso pedunculisque asperis; petalis sepalisque obovatis; labello cucullato flabellatim crispo apice tridentato. *In Mexico.* 4. Flores lutei rubro-venosi.

7. *E. auritum* Lindl. pseudobulbis elongatis compressis; folio augusto obtuso; racemo debili trifloro; ovario nigro furfuraceo; sepalis linearis lanceolatis acutis patentibus; petalis erectis; labello linearis medio carnoso subrugoso; columna apice tridentata; anthera utrinque auricula simplici bifida acuta. *In Guatimala.* 4. Flores pallide virides. (affinis *E. tripunctatum*.)

8. *E. cubense* Llidl. pseudobulbis teretibus elongatis; fol. rigidis horizontalibus anguste ovalibus; scapo paucifloro; bracteis minimis; sepalis petalisque conniventibus linearis-lan-

ceolatis; labello obovato apiculato lineis 3 ramentaceis. In Cuba. 4. Flores albi, labello medio flavo.

b. *Labellum trilobum, laciiniis lateralibus nanis.*

9. *E. Candollei* Lindl. scapo paniculato; sepalis petalisque obovato-oblongis; labelli cucullati lobo medio criso acuminato disco sulcato pubescente. *E. cepiforme* Hook. B. M. t. 3765. In Mexico. 4. Flores fuscii labello luteo.

10. *E. primulinum* Batem. scapo paniculato; sepalis petalisque oblongis acutis; labelli laciiniis lateralibus acutis intermedia obovata apiculata, callo dupli elevato calloso. In Mexico. 4.

11. *E. Linkianum* Klotsch I. c. *pseudobulbis fusiformibus 2—3-phyllois*; fol. ensiformibus recurvis; racemo paucifloro; sepalis patentissimis linear-lanceolatis; labelli lobo medio criso venis elevatis sub columua pubescente. *E. pastoris* Link et Otto Abb. t. 12. In Mexico. 4. Flores lutei purpureo striati.

12. *E. hastatum* Lindl. racemo striato 6—7-floro; sepalis petalisque discoloribus lanceolatis acutissimis; labello subrotundato emarginato subangulato, basi utrinque lobulo aucto. In Mexico. 4. Flores purpureo-striati labello albo.

13. *E. rufum* Lindl. pseudobulbis pyriformibus; fol. lanceolato-ligulatis patentibus; scapo paniculato; sepalis petalisque ovalibus acutis; labelli trilobi laciiniis lateral brevibus semiovatis intermedia margine revoluta secus axin elevata. In Brasilia. 4. Flores fuscio-lutei.

14. *E. Boothianum* Lindl. pseudobulbis compressis ovatis diphyllois, fol. oblongis undulatis; racemo 7-floro; sepalis petalisque ovali-linearibus acutis fusco-variegatis; labello rhomboideo utrinque deflexo. In Cuba. 4. Flores viridi-flavi, labello albente.

15. *E. pterocarpum* Lindl. racemo angusto; sepalis petalisque linearibus acuminatis; lobo labelli intermedio multo longiore acuto pubescente, callo tridentato aucto; caps. 3-alata. In Mexico. 4. Flores lutei.

16. *E. tesellatum* Batem. fol. linear-lanceolatis scapo flexuoso mul-

tifloro brevioribus; sepalis lanceolatis acutis petalisque minoribus subspatulatis; labelli lacinia media cucullata callis 3 cristigeris muricata sub columna pubescente. B. M. t. 3638. In Mexico. 4. Flores fuscio-olivacei labello tesellato.

17. *E. viridiflorum* Lindl. fol. ensiformibus recurvis acutis panicula brevioribus; sepalis lateralibus falcatis petalisque linearibus erectis; labelli lacinia intermedia crispa callo basi oblongo dupli. *Encyclia* B. M. t. 2831. In Brasilia. 4. Flores virides albo-purpurei.

18. *E. glaucum* Lindl. undique glaucescens; pseudobulbis ovalibus 1-phyllois; fol. ensiformibus acutis pergameneis; scapo pendulo paniculato; sepalis petalisque ovalibus obtusis; labello linearis; columnae cardine appendice ovata obtusa recurva aucto. *Epithecium* Westc. fl. cab. t. 87. In Mexico. 4. Flores parvi virides purpuro striati.

19. *E. limbatum* Lindl. omnino facie *E. glauci* sed sepalis petalisque subrotundo-ovatis; columnae appendice truncata dentata tenui; floribus duplo majoribus. In Guatimala. 4.

20. *E. squalidum* Llave; floribus racemosis; sepalis petalisque oblongis acutis patulis; labello rotundo trilobo; laciiniis lateralibus trilobis intermedia subreniformi undulata medio crassissima tricostata. In Mexico. 4. Flores fuscio-lutei.

c. *Labellum tripartitum, laciiniis lateralibus elongatis intermediae aquatibus.*

Labelli lobo medio acuto.

21. *E. Pastoris* Lindl. caule repente radicante; fol. linearibus acutis; floribus racemosis; perianthii foliolis margine recurvis extus sordide flavis intus purpureo-fusco-lineatis spatulatis; labello albido dein luteo, lobis lateral. basi semilunatis medio cordato deflexo minore. In Mexico. 4. Flores odorem Vanillac fragran tes.

22. *E. concolor* Lindl. pseudobulbis lenticularibus confertis; fol. latolanceolatis acutis; scapo filiformi 5-floro; sepalis ligulatis; petalis linearibus; labelli lacinia intermedia ma-

jore. In Mexico. 4. Flores pallide flavi.

28. *E. fucatum* Lindl. pseudobulbis caespitosis 1 - phyllis; fol. ligulatis coriaceis obtusis; panicula nutante multiflora; sepalis petalisque linearioribus oblongis tessellatis obtusis; labelli lobo intermedio acuto ovali callo sulcato piano elevato basi lobi intermedii. In Cuba. 4. Flores parvi lutei.

24. *E. pictum* Lindl. fol. ligulatis coriaceis obtusis dorso rotundatis; racemo paniculato; sepalis petalisque obovato-linearibus; labelli trilobi lobis lateral linearibus subfalcatis columnam amplectentibus, intermedio ovali acuto criso. In Demerara. 4.

25. *E. crispatum* Knowl. et Weste. fl. cab. 2. t. 79. fol. linear-lanceolatis carnosus obtusis mucronatis; scapo multifloro; sepalis petalisque linearibus striatis; labelli lacinia intermedia elongata crispata; ovario varicoso. In Mexico. 4.

26. *E. chloroleucum* Hook. B. M. t. 3557. fol. coriaceis lignatis apice rotundatis; racemo paniculato; sepalis petalisque linear-lanceolatis; labelli trilobi lobis lateralibus linearibus obtusis intermedio acuminato crisculo, disco venis elevatis calloso. In Demerara. 4. Flores virides, labello albo.

27. *E. Ceratistes* Lindl. pseudobulbis conicis 2—3-phyllis; fol. ensiformibus strictis; panicula longa cernua; sepalis petalisque obovatis acutissimis herbaceis; labelli lobis lateralibus obtusis recurvis intermedio acuminato criso basi 4-costato; columna bicornuta. In Peruvia. 4.

28. *E. odoratissimum* L. fol. binis ensiformibus; racemo subsimplici; sepalis oblongis petalisque euncatis patulis; labelli lobis lateralibus linearibus, intermedio ovali multo latiore. In Brasilia. 4. Flores luteo-olivacei.

29. *E. selligerum* Batem. pseudobulbis 2—3-pollicaribus; scapo subramoso; sepalis patentissimis obovatis concavis obtusis; petalis unguiculatis acutis; labelli lacinias recurvis, intermedia ovata acuta crispula; disco carnoso medio depresso. In Mexico. 4. Flores parvi violacei.

30. *E. graniticum* Lindl. pseudobulbis attenuatis diphyllis; fol. ensiformibus panicula multiflora breviori-

bus; sepalis petalisque lanceolatis patulis; labelli lacinia intermedia obovata apice inflexo acuto; columna sub apice auriculata. In Guyana. 4. Flores virides purpuro punctati, labello albo purpureo-striato.

31. *E. Ovulum* Lindl. pseudobulbis oviformibus diphyllis; fol. linearibus canaliculatis acutis; scapo filiformi 3-floro; sepalis linearibus 3-veniis; petalis angustioribus spatulatis; labello medio venis radiantibus glandulosis trilobo; columnae tridentatae dentibus denticulatis. In Bataanor. 4. Sepala olivacea labellum album.

32. *E. diotum* Lindl. pseudobulbis ovatis corrugatis 1-phyllis; fol. coriaceis ensatis; floribus racemosis distantibus; sepalis petalisque obovatis unguiculatis undulatis acutis; labello rhombeo carnosus in medio soveato, lacinia intermedia undulata cuspidata. In Guatimala. 4. Racemus 2-pedalis. Flores cinnamomeoi-luteoli.

33. *E. pachyanthum* Lindl. fol. lato-ligulatis subundulatis apice obliquis; perianthio carnosus herbaceus; sepalis lanceolatis; petalis obovatis apice complicatis; labelli lacinias lateral truncatis, intermedia spatulata acuta basi trilineata. In Guyana. 4. Labellum stramineum.

34. *E. nemorale* Lindl. scapo racemoso 10-floro pedunculisque scabris; sepalis petalisque acuminatis linear-lanceolatis; labelli trilobi lacinias cucullatis intermedia maxima obovata. In Mexico. 4. Flores magni purpurascentes.

Labelli lobo medio rotundato.

35. *E. bractescens* Lindl. pseudobulbis caespitosis 3—4-phyllis; fol. linearibus; scapo debili 3—4-floro; bracteis infimis foliaceis; floribus u tantibus longe pedunculatis; sepalis petalisque linear-lanceolatis acuminatis; labelli lobis lateralibus apice recurvis subdentatis, intermedio elevato sulcato pubescente. In Mexico. 4. Flores purpurei, labello albo.

36. *E. aciculare* Batem. fol. binis linearibus canaliculatis acutis; racemo simplici; sepalis petalisque linear-lanceolatis acutis; labelli lacinias adscendentibus linearibus obtusis apice recurvis, intermedia subundulata picta

acuta. In Bahama. 4. Sepala et petala purpurea, labello albo.

37. *E. dichromum* Lindl. pseudobulbis ovato-fusiformibus diphyllis; fol. ligulatis planis apice rotundatis; racemo laxo paucifloro; sepalis linear-lanceolatis; petalis obovato-lanceola'tis latioribus; labelli trilobi lobo medio obcordato; columna apice biaurita. In Pernambuco. 4. Sepala et petala alba, labellum roseum.

38. *E. glutinosum* Scheidw. pseudobulbis pyriformibus; fol. binis linearibus coriaceis; racemo subsimplici glutinoso; sepalis oblongis acuminatis petalisque patulis; labelli trilobi lobis oblongis obtusis integris intermedio ovato criso; columna bidentata. In Brasilia. 4. Sepala et petala viridi-purpurea. Labellum albolutescens lineis purpureis.

39. *E. gracile* Lindl. B. R. t. 1765. fol. ensiformibus; racemo simplici longissimo; sepalis oblongis petalisque cuneatis patentibus; labelli lobis semiovatis, intermedio oblongo criso obtusissimo disco bicostato. In Bahama. 4. Flores virides, labello luteo purpureo lineato.

40. *E. venosum* Lindl. fol. ensiformibus obtusis; racemo stricto simplici; sepalis linear-lanceolatis petalisque angustioribus patentissimis; labelli tripartiti lobo medio lineis 3 subramosis elevatis. In Mexiso. 4. Scapus 1-pedalis; labellum album violaceo-venosum.

41. *E. ionosmum* Lindl. scapo racemoso; sepalis petalisque coriaceis obovatis concavis obtusis aequalibus; labelli lobis lateralibus columnam amplexentibus apice rotundatis undulatis coloratis striatis, intermedio emarginato criso; columna antice bicorni. In Essequebo. 4. Flores rubro-vrides.

42. *E. flavum* Lindl. pseudobulbis attenuatis triphyllis; fol. ensiformibus paniculae subaequalibus; sepalis petalisque patulis obtusis, labelli laci-niis lateralibus truncatis intermedia obovata nuda; columna sub apice auriculata. In Brasilia. 4. Flores flavescentes.

43. *E. tripterum* Lindl. pseudobulbis ovalibus compressis diphyllis; fol. linear-oblongis obtusis; racemo 4-6-floro; sepalis petalisque linear-lanceolatis patulis; labelli trilobi lobis

lateralibus linearibus obtusis interme-dio undulato venis rugosis; capsula triptera. In Mexico. 4. Flores purpurei, labello pallidiore.

44. *E. virgatum* Hook. pseudobulbis subcompressis rugosis; fol. subun-dulatis acutis glaucis; panicula vir-gata ramis longis gracilibus; labelli hastati lobis lateralibus acutis inter-medio obovato acuto callo maximo pone basin. In Mexico. 4. Flores parvi viridi-fusci.

45. *E. aromaticum* Batem. orch. mex. t. . . floribus dense paniculatis; sepalis linearibus patentissimis; labelli lobis lateralibus triangularibus acu-minatis intermedio rotundo apiculato venis elevatis cristato. In Guatimala. 4. Flores fragrantissimi lutei.

46. *E. oncidoides* Lindl. B. R. t. 1623. pseudobulbis ancipitibus; fol. 2-3 ensiformibus panicula laxa bre-vioribus; sepalis petalisque obovatis unguiculatis; labelli lobo intermedio cuspido 5-costato. Patria? 4. Flores fusco-lutei.

47. *E. alatum* Batem. I. c. t. 18. fol. ensiformibus obtusis coriaceis ob-solete striatis panicula alata multi-flora brevioribus; sepalis petalisque lineari-oblongis patentissimis; labello suborbiculari profunde trilobo, lobo intermedio latissimo lineato mar-gine undulato-crupo. In Guatimala. 4. Flores viridi-flavi, labello rubro-venoso.

48. *E. altissimum* Batem. pseudo-bulbis elongatis 2-3-phylis; scapo ramosis longissimis; sepalis linearibus acutis; labelli lobis lateralibus dimidiatis tortis obtusis interme-dio elongato recurvo. In Bahama. 4.

Labelli lobo medio bilobo.

49. *E. polystachyon* H. et K. fol. oblongis obtusis striatis; scapo poly-stachyo; sepalis reflexis oblongis acutis; petalis lanecolato-spathulatis; labelli trilobi lobis lateral. crenulatis intermedio profunde emarginato. In Peruvia. 4. Flores Intei.

50. *E. phoeniceum* Lindl. sert. t. 46. fol. binis oblongis acutis; scapo paniculaque scabris; sepalis petalisque subaequalibus coriaceis; labelli laci-niis lateral. oblongis obtusis apice recurvis, intermedia maxima undula-ta; columna utrinque 1-dentata. In Cuba. 4.

51. *E. adenocarpum* Llave; fol. strictis linearibus acutis ternis; scapo simplici multifloro; sepalis ovato-lanceolatis acutis; petalis angustioribus obtusis; labelli lobo intermedio obscure 4-lobo, venis 5 elevatis radian-tibus. *E. papillosum* B. M. t. 3631. In Guatimala. 2. Flores viridi-flavescentes.

52. *E. adenocaulon* Llave; fol. ensiformibus coriaceis; scapo simplici glanduloso; sepalis petalisque linear-lanceolatis patentissimis; labello tri-partito, lobis lateralibus acutis iuvolutis; intermedio cordato emarginato obtuso. In Mexico. 2. Flores pale-lide violacei.

53. *E. macrochitum* Hook. B. M. t. 3534. pseudobulbis ovatis rugosis diphyllis; fol. linearis - oblongis coriaceis; sepalis petalisque obovato-lanceolatis patulis apicibus incurvis; labelli lobo intermedio maximo obcordato, disco calloso cristato sellae-formi. Batem orch. t. 17. In Guatimala. 2. Flores viridi-purpurei labello luteo.

54. *E. europurpureum* Lindl. fol. ternis lanceolatis margine revolutis; scapo erecto multifloro; sepalis petalique patulis oblongis bicoloribus; labelli tripartiti laciniis parvis ovatis integris, intermedia maxima alte bi-loba. In Hispaniola. 2. Flores lu-tei, labello purpureo.

55. *E. bifidum* Aubl. fol. ternis lanceolatis; scapo ramoso foliis multo longiore; sepalis oblongis acutis petalique linearis-lanceolatis patulis; labelli lobo medio maximo subreniformi sulcato basi biappendiculato. B. R. t. 1879. In Ind. or. 2. Sepala et petala viridia, labellum roseum.

56. *E. varicosum* Batem. fol. 2 coriaceis ligulatis acutis; sepalis petalique cuneato-lanceolatis carnosis vernicosis; labello cucullato trilobo basi pubescente, lacinia intermedia reniformi venis tuberculatis picta, callo pulvinato pubescente. Hook. journ. 3. t. 10. In Guatimala. 2.

57. *E. Michauxianum* Llave; fol. in pseudobulbos pyriformes 3—4-nis ensiformi-lanceolatis; scapo ramo-sissimo; sepalis petalique cuneato-lanceolatis; labello tripartito lacinia intermedia reniformi biloba. In Mexico. 2. Flores pallide flavi, labello albo.

58. *E. ochraceum* Lindl. B. R. 1838. t. 26. pseudobulbis obverse pyriformibus caespitosis 1—3-phylis; fol. linearibus acutis recurvis; spica terminali laxiflora; sepalis petalique linearis-obtusis; labelli laciniis lateralibus inflexis denticulatis, intermedia emarginata callo plano apice tridentato; columna apice 3-corni denticulata. In Mexico. 2. Folia crassa. Flores aurantiaci inconspicui.

59. *E. Hanburii* Lindl. fol. ensiformibus coriaceis recurvis; floribus racemosis distantibus; sepalis petalique spathulatis patentibus; labelli lobis lateralibus falcatis obtusis nanis intermedio oblongo bilobo venis elevatis dichotomis. In Mexico. 2. Flores purpurei.

2. *Osmophytum* Lindl. in Hook. journ. 3. S1. Caulis pseudobulbo-sus v. fusiformis apice foliosus. Flores racemosi. Labellum adnatum saepius indivisum cochleatum.

60. *E. cochleatum* L. pseudobulbis ovalibus; fol. oblongis acuminatis subundulatis; sepalis petalique linear-lanceolatis reflexis; labello cordato cochleato subrotundo; columna brevissima. Jacq. ic. t. 605. B. M. t. 572. In Ind. or. 2. Sepala et petala viridia, labello purpureo.

61. *E. bracteolatum* Presl; pseudobulbis sulcatis; fol. oblongo-lanceolatis patulis; labello obcordato obtuso crenulato basi cristato. In Guayaquil. 2.

62. *E. lancifolium* Pav. pseudobulbis elongatis teretibus; fol. oblongo-lanceolatis acutiusculis; racemo stricto terminali; sepalis petalique lanceolatis acuminatis reflexis; labello cordato cochleato. B. M. 1842. t. 50. In Mexico. 2.

63. *E. radiatum* Lindl. pseudobulbis utrinque costatis 3-phylis; fol. elongatis acutis; racemo denso multifloro; ovarii 3-alatis; sepalis linearibus petalique patentissimis; labello cochleato crenato criso. In Mexico. 2. Flores pallide virides labello purpureo striato.

64. *E. venosum* Lindl. pseudobulbis angustis fusiformibus; fol. ensiformibus scapi longitudine; racemo 4—5-floro; sepalis linearis-lanceolatis petalique patentissimis; labelli

Iaciniis ovatis acutis intermedia callo baseos lineisque 3 elevatis subramosis. In Mexico. 2. Labellum album venis violaceis.

65. *E. fragrans* Sw. fol. solitariis lanceolatis apice recurvis; sepalis linearis-lanceolatis petalisque acuminatis patentibus; labello subrotundo cuspidato lineato integerrimo. In Am. tropica. 2.

66. *E. aemulum* Lindl. B. R. t. 1898. rhizomate repente; pseudobulbis ovalibus compressis; fol. solitariis oblongo-lanceolatis coriaceis; sepalis petalisque linearis-lanceolatis aequalibus patentibus; labello subrotundo coeruleo lineato integerrimo. In Para. 2.

67. *E. glumaceum* Lindl. B. R. t. 6. pseudobulbis angustatis diphylis; fol. anguste oblongis patulis; racemo cylindrico e squamis glumaceis acutissimis pedunculo longioribus erumpente; sepalis petalisque linearibus acuminatissimis. In Brasilia. 2.

68. *E. inversum* Lindl. pseudobulbis elongatis compressis; fol. lorate canaliculatis obtusis; spica subbiflora; sepalis petalisque patulis linearis-lanceolatis convexis; columna obtuse 3-dentata. In Brasilia. 2. Flores straminei.

69. *E. variegatum* Hook. B. M. t. 3151. fol. oblongo-lanceolatis obtusis; racemo multifloro; sepalis petalisque obovatis coriaceis obtusis; labello subrotundo brevissimo intus sub columna pubescente; dente columnae postico obtuso. *E. coriacium* B. M. t. 3595. *E. crassilabium* Poepp. et Endl. t. 162. In Peruvia et Brasilia. 2.

70. *E. lividum* Lindl. fol. linearis-lanceolatis subundulatis obtusiusculis; scapo terminali paucifloro; ovario triquetro; sepalis erectis herbaceis linearibus mucronatis; petalis spatulatis obtusis; labello lineari-oblongo crispo medio tomentoso; columna triquetra apice 3-callosa. In Columbia. 2. Flores purpurei subtesellati.

71. *E. calamarium* Lindl. pseudobulbis calamiformibus diphylis; fol. linearibus acutis; racemo simplici erecto; sepalis patentissimis linearibus acutis apice recurvis; petalis subspatulatis; labello subrotundo acuto. In Brasilia. 2. Flores viridi-flavi.

3. *Hormidium* Lindl. Caulis pseudobulbosus. Flores sessiles. Labelatum adnatum.

72. *E. pygmaeum* Hook. journ. 1. t. 118. rhizomate moniliformi; fol. brevibus lanceolatis subundulatis acutis; floribus solitariis; sepalis petalisque linearibus acutis; labelli lacinii lateribus incurvis; sepalis lateralibus labello suppositis eique adnatis. In Brasilia. 2.

73. *E. miserum* Lindl. pseudobulbis compressis aggregatis; scapo brevissimo subbifloro; sepalis ovatis acutis; petalis linearibus; labelli 3-lobi lobis lateral. rotundatis inconspicuis, intermedio truncato emarginato. In Mexico. 2. Flores viridi-fusci.

74. *E. caespitosum* Poepp. et Endl. nov. g. t. 101. caule repente, pseudobulbis cylindricis diphylis; fol. ovato-lanceolatis acutis; floribus spicatis; labello integro transverso reniformi antice retuso apiculato nudo. In Peruvia. 2.

75. *E. serpens* Lindl. pseudobulbis oblongis 2-3-phylis; fol. ovato-lanceolatis acutissimis; labello coeruleo serrulato Calvi; caps. ovali 3-quatra. In Peruvia. 2. Flor. magni violacei.

4. *Diacrium* Lindl. Caulis fusiformis apice foliosus. Flores racemosi. Labelum liberum.

76. *E. bidentatum* Lindl. fol. obvato-lanceolatis apice recurvis; racemo terminali eretto paucifloro; sepalis lanceolatis petalisque angustioribus patentibus; labello rhomboideo angulis utrinque 1-dentato. In Mexico. 2.

77. *E. bicornutum* Hook. B. M. t. 3332. fol. linearis-oblongis obtusis coriaceis; caule corniformi; sepalis ovato-lanceolatis, petalis conformibus latioribus; labelli 3-lobi lobo medio elongato alte bilamellato. In Demerara et Ins. Trinitatis. 2. Flores magni albi roseo-tincti labello basi flavo rubro maculato.

5. *Epictadium* Lindl. Caulis pseudobulbosus. Flores racemosi e spatha erumpentes. Labelum liberum.

78. *E. aurantiacum* Retz. Orch. t. 12. fol. oblongis planiusculis coriaceis caule clavato diphyllo duplo bre-

vieribus; spatha maxima cucullata; racemo brevi subcerno densifloro; sepalis petalisque lanceolatis acutis; labello cucullato basi columnam involvente. In Mexico. Flores numerosi aurantiaci.

6. *Lanium Lindt. l. c. Caulis repens squamatus, ramulos pseudobulbosos v. breves foliosos promens. Pedunculus racemosus v. paniculatus. Flores tomentosi. Labellum adnatum.*

79. *E. microphyllum Lindl. caule repente squamato; ramulis foliosis; fol. distichis oblongis carnosis acutis serrulatis; racemo tomentoso; ovario tomentoso; sepalis apice aristatis; petalis linearibus; labello oblongo acuto bilamellato venis 3-obsoletis. In Démérara. 4. Flores lanati purei.*

80. *E. Avicula Lindl. caule repente squamato; ramulis pseudobulbosis diphyllis; fol. ovatis panicula tomentosa multo brevioribus; sepalis lanceolatis acutis tomentosis; labello rhomboe basi bicalloso. In Brasilia. 4.*

7. *Aulizenium Lindl. l. c. Caulis fusiformis apice foliosus. Flores racemosi. Labellum adnatum in lobos fissum.*

81. *E. ciliare L. fol. geminis; sepalis petalisque acuminatissimis linearibus; labelli trilobi lobis lateribus setaceo-peccinatis; spica 6-flora. Jacq. am. t. 179. t. 89. B. R. t. 784. In Ind. occ. 4. Flores pallide virentes labello albo.*

82. *E. viscidum Lindl. caule tereti 1-phyllo; folio canaliculato mucronulato; racemo paucifloro; bracteis herbaceis; labelli tripartiti laciniis setaceo-fimbriatis; clinandrio cucullato dentato. In Mexico. 4.*

83. *E. cuspidatum Lindl. B. cab. t. 10; fol. in pseudobulbis ternatin insidentibus; sepalis lineari-lanceolatis acuminatis; spica subtriflora. In Ind. occ. et Mexico. 4. Flores magnistraminei.*

84. *E. viviparum Lindl. caule fusiformi diphylio; fol. oblongis subundulatis obtusis; racemo denso paucifloro; sepalis petalisque linearibus acutis patentissimis; labelli trilobi laciniis lateral. rhombeis intermedia*

lineari acuminata; cucullo columnae fimbriato. In Démérara. 4. Flores albi.

85. *E. stenopetalum Know. et Westk. 2. t. 175. fol. lanceolatis; floribus solitariis; sepalis lanceolatis; petalis anguste linearibus, labello 3-lobo, lobo medio cuspidato purpureo, lobis lateralibus albidis columnam involventibus. In Mexico. 4.*

86. *E. clavatum Lindt. B. R. t. 1870. caule clavato in pseudobulbum ovatum desinente diphylio; fol. lanceolatis patulis; racemo simplici; sepalis petalisque lanceolato-linearibus aequalibus; columua clavata; labelli 3-partiti bicallosi laciniis lateralibus ovatis subfalcatis. In Cumana. 4. Flores virides labello albo.*

87. *E. falcatum Lindl. caule ramoso carnoso membranis laxis imbricatis vaginato; fol. solitariis falcatis acutis; pedunculis elongatis; sepalis petalisque lineari lanceolatis patentissimis, labelli laciniis lateralibus dimidiatis. E. parkinsonianum Hook. B. M. t. 3778. In Mexico. 4. Flores pallide lutei.*

88. *E. aloisolum Batem orch. t. 25. rhizome repente folioso, caulis brevibus 1-phylis; floribus longe pedicellatis ex axillis folii crassissimi prodeuntibus; sepalis petalisque lanceolatis acuminatis; labelli lobis lateralibus acinaciformibus intermedio setaceo. In Mexico. 4.*

89. *E. collare Lindl. caulis fusiformibus elongatis apice 3-phylis; fol. coriaceis patulis; racemo laxo paucifloro; sepalis petalisque conformatibus; labello ovato obtuso undulato apice recurvo clinandrio margine elevato denticulato cincto. In Guatimala. 4. Flores albo-lutei.*

90. *E. saxatile Lindl. caulis fusiformibus apice diphyllis; fol. lineari-lanceolatis racemo paucifloro brevioribus; sepalis oblongis petalisque filiformibus; labello laciniis subrepandis intermedium bilobam reniformem serratam imbricantibus. In Brasilia. 4. Flores membranacei rubropurpurei.*

91. *E. rupestre Lindl. caulis filiformibus diphyllis; fol. lanceolatis acutis; pedunc. aincipiti; racemo ceruno; sepalis oblongis petalisque linearibus obtusis; labelli laciniis lateral. acutis margine postico serratis, inter-*

media integra lineis 3 elevatis rugosis.
In Peruvia. 2.

92. *E. Hartwegii* Lindl. fol. oblongis obtusis coriaceis; spica multi-flora basi spathacea; floribus coriaceis; sepalō supremo oblongo obtuso lateralibus acutissimis; labello 3-lobo basi callo pubescente concavo aucto ungue et columna brevissimis. *In Peruvia.* 2.

93. *E. parvilabre* Lindl. fol. oblongo emarginato caule longiore; racemo multifloro cernuo; sepalis oblongis obtusis; petalis duplo latioribus 5-nerviis; labelli 3-partiti lacinias lateral. falcatis acutissimis, intermedia angustissima. *In Peruvia.* 2.

8. *Psilanthemum* Klotsch.

94. *E. Stamfordianum* Batem. orch. t. 11. pseudobulbis fusiformibus; fol. oblongis obtusis coriaceis; racemo paniculato; sepalis lanceolatis patentibus; labelli tripartiti lacinia intermedia transverse biloba s. emarginata fimbriata. *In Guatimala.* 2. Flores fragrantes pallide flavi.

9. *Euepidendron* Lindl. *Caulis foliosus. Pedunculus brevis esquamatus. Labellum adnatum.*

a. *Flores solitarii v. fasciculati.*

95. *E. equitans* Lindl. caule folioso ancipiti; fol. equitantibus ancipitibus; flore solitario terminali pendulo; pedunc. ancipiti; sepalis petalisque linearibus acuminatis; labello complicato; medio trilamellato lobo medio carnoso. *In Mexico.* 2. Flores fusi.

96. *E. vesicatum* Lindl. caule elongato; fol. inflatis equitantibus glau-cis acutis; floribus fasciculatis carnosis; labello subrotundo cordato linea media tuberculisque 2 basilaribus elevatis; collo ovarii medio vesicato. *In Brasilia.* 2.

97. *E. tolimense* Lindl. caulis ramosis scaberrimis; fol. ovato-lanceolatis; floribus 2-3 sessilibus terminalibus coriaceis; petalis setaceis; labello subcordato apice carnoso intus pubescente avenio. *In Nov. Granata.* 2. Flores lutei.

98. *E. piperinum* Lindl. fol. distichis succulentis oblongis obtusis; pedunc. brevissimis subbifloris; sepalo

dorsali petalisque filiformibus erectis, lateralib. ovato-lanceolatis; labello ovato cochleato venis radiantibus. *In Quito.* 2.

99. *E. lamellatum* Lindl. caule erecto flexuoso; fol. lanceolatis emarginatis glabris subcarnosis; corymbo sessili paucifloro; sepalis lanceolatis acutis; petalis obovato-lanceolatis; columna apice utrinque alata; labello obovato integerrimo basi transversim lamellato. *In Columbia.* 2.

100. *E. latilabre* Lindl. fol. ovatis obtusis subvaginantibus; sepalis petalisque angustioribus linear-i-oblongis obtusis patulis; labello repando sublobato emarginato basi bicalloso; clinandrio laci-niato; pedunculis 2-4 floris sessilibus. *In Am. trop.* 2.

101. *E. umbellatum* Sw. fol. distichis oblongis undulatis obtusis; sepalis linear-i-oblongis obtusis petaliske linearibus patentibus; labello indiviso rotundato repando basi bicalloso; clinandrio laci-niato. B. M. t. 2030. *E. difforme* Jacq. am. t. 136. *In Ind. occ. et Mexico.* 2.

102. *E. ensatum* Rich. et Galeott. caule compresso ancipiti; fol. oblongo-lanceolatis acutis; floribus parvulis albo-brunneis; labello adnato trilobo; lobis obtusis margine sinuosis. *In Mexico.* 2.

103. *E. discolor* Rich. et Galeott. orch. mex. ined. t. 18. caule compresso; fol. oblongo-lanceolatis obtusis bilobis; floribus maximis solitariis v. binis externe rabellis interne luteolis; labello albo trilobo medio linear-i-longissimo. *In Mexico.* 2.

104. *E. nocturnum* L. fol. distichis oblongis acutis; floribus subgeminis terminalibus; sepalis petaliske linearibus acuminatis patulis; labelli 3-lobi lobis lateralibus ovatis integerrimis intermedio setaceo. Jacq. am. t. 225. f. 139. B. R. t. 1961. *E. tridens* Poepp. et Endl. nov. g. t. 103. *In Peruria et Ind. occ.* 2. Flores albi viride et purpuro tincti.

105. *E. longicolle* Lindl. caule compresso folioso; fol. linearibus apice angustatis; floribus aggregatis nutantibus; sepalis petaliske linearibus acutis; labelli 3-lobi lobis lateralibus acutis integrerius, lamellis 2-callosis; collo ovarii elongato. B. M. t. 4165. *In Demerara.* 2. Flores pallide lutei labello albo basi maculis luteis.

106. *E. lactiflorum* Rich. et Galeott. caule tereti dependente apice 1-phyllo; folio oblongo lanceolato conduplicato; floribus albis 2-3 axillaribus; labello 3-lobo lobo medio lanceolato-lineari. *In Mexico.* 2.

b. Flores racemosi v. spicati.

* *Labellum indirisum.*

107. *E. ferrugineum* Pav. fol. oblongo-lanceolatis emarginatis; racemo simplici erecto; labello acuminato integro. *In Peruvia.* 2.

108. *E. cucullatum* Lindl. caule compresso folioso; fol. linearis-lanceolatis acutis; pedunc. squamato paucifloro; rachi brevi flexuosa; sepalis petalisque ovato-lanceolatis acutis; labello obovato acuto adnato linea media tuberculisque 2 callosis. *In Para.* 2. Flores albi.

109. *E. ramosum* Jacq. am. t. 132. fol. linearibus obtusis emarginatis; racemis terminalibus paucifloris; sepalis ovato-lanceolatis; petalis linearibus acutis; labello subcordato ovato concavo rigido; caule ramoso. *E. rigidum* B. Cab. t. 1600. *In Jamaica.* 2. Flores parvi viridi-flavi.

110. *E. rigidum* Jacq. am. t. 134. fol. distichis ovato-oblongis obtusis; spicae flexuosae rachi ancipti; sepalis coriaceis ovatis obtusis; petalis linearibus membranaceis; labelli palato obtuso calloso cuniculo inflato; bracteis foliaceis. *In Ind. occ.* 2. Flores parvi virides.

111. *E. dichotomum* Lindl. caule fructicoso decumbente filiformi dichotomo; fol. anguste lanceolatis acutissimis; sepalis linearis-lanceolatis petalis conformibus angustioribus; labello cuniculato basi bicalloso. *In Demerara.* 2. Flores virides.

112. *E. aggregatum* Lindl. fol. distichis, lanceolatis acuminatissimis; racemis oppositifoliis subsessilibus brevissimis; floribus corymbosis; labello cordato basi bilamellato. *In Peruvia.* 2.

113. *E. macrostachyum* Lindl. caule scabriusculo; fol. oblongis mucronulatis; racemo longissimo cernuo angulato; bracteis magnis duris, ovato-cordatis reflexis; floribus coriaceis; petalis filiformibus; labello cordato concavo. *In Nov. Granata.* 2. Flores virides.

114. *E. xylostachyum* Lindl. caule scabro; fol. oblongis obtusis coriaceis; spica stricta flexuosa dura; bracteis herbaceis cucullatis; floribus carnosis; labello cordato obtuso margine recurvo. *In Nov. Granata.* 2.

115. *E. costatum* Rich. et Galeott. caule compresso; fol. elliptico-oblongis obtusis; floribus purpureis; racemo terminali; labello adnato orbiculari cordato crasso costis divergentibus notato. *In Mexico.* 2.

** *Labellum indirisum serratum v. dentatum.*

116. *E. propinquum* Rich. caule tereti; fol. oblongo-lanceolatis obtusiusculis; racemis 4-floris; floribus brunneis; labello adnato cordato margine denticulato. *In Mexico.* 2.

117. *E. ledifolium* Rich. caule tereti; fol. lanceolato-linearibus obtusiusculis; floribus parvulis luteis in racemo simplici laterali; labello orbiculato denticulato-sinuoso. *In Mexico.* 2.

118. *E. subulatifolium* Rich. fol. teretibus subulatis acutis; scapo 4-5-floro; floribus intense luteis parvulis; labello suborbiculari integro sinuoso. *In Mexico.* 2.

119. *E. orgyale* Lindl. caule orgyali disticho folioso; fol. ovato-oblongis vaginis margineque scabris; racemo sessili cylindrico; floribus carnosis; sepalis ovalibus; petalis spatulato-linearibus serrulatis; labello cordato serrulato. *In Bogota.* 2. Flores lutei.

120. *E. imbricatum* Lindl. fol. distichis lineari-oblongis obtusis; caule ramoso; spicis ovato-oblongis imbricatis; sepalis petalisque ovatis acutis; labello ovato-acuto obsolete crenulato. *In Brasilia.* 2.

121. *E. fimbriatum* H. et K. fol. distichis oblongo-linearibus retusis margine vaginisque scabris; racemo angusto terminali; sepalis linearibus retusis; petalis serratis; labello serato bilamellato. *In Peruvia.* 2.

*** *Labium sublobatum.*

122. *E. tenue* Lindl. fol. distichis linearibus acuminatis; racemis angustis simplicissimis; bracteis ovatis cucullatis; sepalis linearibus obtusis;

petalis filiformibus; labello sessili ovato utrinque 1-dentato, venis basos elevatis. *In Brasilia.* 2.

123. *E. filicaule* Lindl. caule gracili ramosissimo; fol. linearibus acutis petalisque filiformibus patentibus; labello cordato retuso repando; spicis 3-floris. *In Brasilia.* 2. Flores parvi.

124. *E. scriptum* Rich. et Galeott. orch. mex. ined. t. 17. caule compresso diphyllo; fol. approximatis lato-ellipticis subacutis; floribus pallide roseis; racemis scapum pedalem terminantibus; labello cordato obsolete 3-lobo. *In Mexico.* 2.

125. *E. smaragdinum* Lindl. caule gracili valde folioso; fol. lineari-lanceolatis acuminatis distichis; spica pauciflora rigida nutante; bracteis acuminatis squarrosis; sepalis acutissimis; petalis angustissimis acuminatis; labello cordato carnoso apice 3-dentato. *In Demerara.* 2. Flores vires.

**** *Labellum exacte 3-lobum.*

126. *E. acuminatum* Pav. fol. lanceolato-linearibus; racemo terminali; labello subhastato acuminato basi utrinque auriculato. *In Peruria.* 2.

127. *E. conopseum* R. Br. fol. binis radicalibus rigidis coriaceis; racemo laxo multifloro; sepalis linearibus obtusis petalisque angustioribus patentibus; labello obcordato obtuso 3-lobo. *In Carolina et Georgia.* 2. Flores parvi viridi-lutei.

128. *E. lignosum* Llave. caulis ramosissimis lignosis; fol. distichis lineari-lanceolatis emarginatis fasciculatis; sepalis petalisque patentibus; labelli 3-partiti laciniis lateralibus obtusis; florum fasciculis sparsis. *In Mexico.* 2. Flores virides punctati. *Labellum purpureum.*

129. *E. scabrum* Pav. fol. ovato-lanceolatis marginibus vaginisque scabris; racemo terminali; labello cruciformi. *In Peruria.* 2.

130. *E. chionoeum* Lindl. caule laevi ramoso; fol. ovato-lanceolatis marginibus vaginisque scabris; racemo capitato cernuo; sepalis subrotundis; petalis obovatis serrulatis; labelli laciniis cuneatis callis 2-cornutis. *In Nov. Granata.* 2. Flores albi.

131. *E. cernuum* H. et K. fol. oblongis obtusis coriaceis; spica cernua;

sepalis lanceolatis margine revolutis cuspidatis; labello margine reflexo, lobis lateralibus rotundis intermedio obtuso. *In Popaya.* 2. 3-ped. Flores viridi-flavi.

132. *E. arbuscula* Lindl. caule tereti fructicoso ramoso; ramulis 2-3-phyllis; fol. oblongis coriaceis patulis; racemis oblongis densis cernuis; bracteis lanceolatis patentissimis; sepalis oblongis acutis carnosis; petalis linearibus apice latioribus; labello cordato basi tricalloso, lacinia intermedia undulata. *In Mexico.* 2. Flores brunnei.

133. *E. lacertinum* Lindl. floribus racemosis; ovaris subsecundis longissimis pendulis; bracteis setaceis; sepalis lanceolatis acuminatis; petalis lineari-lanceolatis; labelli basi bilamellati laciniis lateralibus triangularibus intermedia lineari elongata. *In Guatimala.* 2.

***** *Labellum 4-lobum, lobo intermedio emarginato v. 3-dentato.*

134. *E. bifarium* Sw. fol. distichis cordato-lanceolatis; spica terminali flexuosa; rachi ancipiti; sepalis ovato-lanceolatis convexis; petalis setaceis; labelli lobo medio bilobato. *In Jamaica.* 2. Flores albo-vires.

135. *E. cauliflorum* Lindl. caule tereti; fol. ovato-oblongis planis acuminatissimis; corymbis axillaris; sepalis angustis patentissimis concavis; petalis linearibus reflexis; labelli lobo intermedio truncato tridentato. *In Brasilia.* 2.

136. *E. patens* Sw. fol. distichis oblongis lanceolatis; racemo terminali; sepalis petalisque oblongis acutis concavis patulis; labello 4-lobi lobis lateralibus rotundis, anterioribus linearibus conniventibus. B. Cab. t. 1587. *In Jamaica.* 2. Flores pallidi. Sepala extus ferruginea.

137. *E. parviflorum* Pav. fol. lanceolato-linearibus; racemo brevi; labelli 3-lobi laciniis subrotundis; intermedia bipartita acuta. *In Peruia.* 2.

138. *E. viride* Pav. fol. lanceolatis acutis; racemo terminali; labii 3-lobi laciniis lateralibus obcordatis intermedia bifida. *In Peruria.* 2.

139. *E. torquatum* Lindl. caule leongato aspero; fol. oblongis coria-

ceis obtusis distichis; spica sessili cernua; floribus coriaceis; labelli basi bidentati lobis lateral. subtruncatis intermedio cuneato tridentato. In Peruvia. 2.

***** *Labellum multisidum.*

140. *E. cristatum* Pav. fol. lanceolatis; racemo dependente; labello 3-partito, lacinia media bifida lateribus 3-partitis. In Peruvia. 2.

141. *E. coronatum* Pav. fol. ova-to-lanceolatis; racemis dependentibus; labello 3-lobo, laciniis bifidis, intermedia minore. In Peruvia. 2.

c. Flores paniculati.

* *Labellum indivisum margine integrerrimum.*

142. *E. frigidum* Linden. caule erecto indiviso folioso; fol. rigidis ovato-lanceolatis margine recurvis acutis; racemis paniculatis pendulis; bracteis squarrosis; floribus carnosis; petalis linearibus; labello complicato basi bicalloso. In Columbia. 2.

143. *E. Funkianum* Rich. et Galeott. orch. mex. ined. t. 16. caule articulato; fol. ovalibus obtusissimis apice bilobis; floribus parvulis brunueis paniculatis; labello adnato cordato acuto. In Mexico. 2.

144. *E. gramineum* Lindl. fol. distichis lineari-lanceolatis acutis striatis; racemo terminali paniculato; sepalis oblongis acutis; petalis linearibus; labello cordato ovato medio pliato basi calloso. In Peruvia. 2.

145. *E. aquaticum* Lindl. caule ancipi ramoso; fol. lineari-oblongis acutis; panicula simplici; sepalis oblongis petalisque linearibus obtusis; labello carnosus alte cordato cucullato clinandrio utrinque bidentato. In Brasilia. 2.

146. *E. diffusum* Sw. caule ancipi; fol. oblongis; panicula terminali ramosissima; sepalis lineari-lanceolatis petalisque setaceis erecto-patulis strictis; labello cordato bicalloso. In Jamaica. 2. Flores parvi rubri.

147. *E. vincentinum* Lindl. caule ancipi; fol. distichis anguste lanceolatis acutissimis; panicula laxa filiformi; sepalis lineari-lanceolatis; pe-

talis filiformibus; labello subrotundo criso. In ins. Vincenti. 2.

148. *E. recurratum* Lindl. fol. ensiformibus mucronatis strictis scapis longis recurvis aequalibus; bracteis apice setaceis; sepalis ovato-oblongis; petalis linearis spathalatis; labello alte cordato subquadrato ecalloso. In Columbia. 2.

149. *E. micranthum* Lindl. fol. distichis lineari-lanceolatis acuminate; panicula virgata; bracteis setaceo-acuminatis; sepalis oblongis carnosis obtusis; petalis linearibus; labello quadrato indiviso nudo. In Peruvia. 2.

** *Labellum dentatum v. bilobum.*

150. *E. lineare* Pav. fol. linearibus; racemo terminali subpaniculato; labello obcordato cuneiformi basi utrinque dentato. In Peruvia. 2.

151. *E. volubile* Pav. fol. oblongo-ovatis; ramis volubilibus; labelli bifidi laciniis lanceolatis. In Peruvia. 2.

152. *E. cordatum* Pav. fol. cordatis amplexicaulibus; panicula flexuosa; labelli bifidi laciniis acuminatis recurvis. In Peruvia. 2.

*** *Labellum 3-fidum.*

153. *E. carnosum* Lindl. fol. distichis ovato-lanceolatis acutis; vaginis rugulosis; panicula rigida striata multiflora bracteis duris ovatis cucullatis; sepalis carnosis oblongis obtusis hinc gibbosis; labelli 3-lohi lobis lateralibus rotundis erectis intermedio conico solido. In Brasilia. 2. Flores flavescentes.

154. *E. durum* Lindl. fol. distichis ovato-lanceolatis acutis; vaginis rugosis; panicula simplici pauciflora; sepalis oblongis acutis duris striatis petalis angustioribus; labelli transverse rhombi lobis lateral. erectis truncatis, intermedio triangulari acuto. In Guiana. 2. Flores lutei.

155. *E. purum* Lindl. caule elongato tereti; fol. ensiformibus obtusis; floribus paniculato-racemosis; sepalis anguste lanceolatis; petalis linearibus; labelli 3-partiti basi 5-costati laciniis ovatis acutis. In Caracas. 2. Flores pallide virides.

156. *E. tridactylon* Lindl. caule fusiformi gracili apice distiche folioso;

fol. anguste oblongis obtusis; spica terminali 3-partita; sepalis subrotundato-ovatis patentibus incurvis; petalis spatulatis linearibus apice incurvis labello adscendente basi bicallosi laciniis linearibus lateralibus margine involvintis. *In Brasilia.* 2.

157. *E. erubescens* Lindl. fol. oblongi lanceolatis acutis; panicula amplissima flexuosa; petalis sepaliasque obtusis; labelli 3-lobi lacinia intermedia subrotunda venis 3 elevatis. *In Mexico.* 2. Flores rosei.

**** *Labellum 4-lobum.*

158. *E. floribundum* H. et K. n. g. t. 86. fol. lanceolato oblongis acuminate submembranaceis; panicula terminali; sepalis reflexis lanceolatis; petalis filiformibus linearibus divaricatis. B. M. t. 3637. *In Mexico.* 2.

159. *E. verrucosum* Sw. fol. distichis lanceolatis vaginis verrucosis; floribus paniculatis; sepalis oblongis concavis acutis petaliasque linear-i-lanceolatis patulis; labelli 4-lobi laciniis linearibus obtusis divaricatis. B. Cab. t. 1084. *In Jamaica.* 2. Sepala et petala pallide viridia labellum flavum.

10. *Amphiglottium Salisb. ex Lindl. t. c. Caulis longe foliosus folia disticha. Pseudobulbi angusti. Pedunculi terminales riginati. | Labellum integrum v. sublobatum cum columna connatum.*

a. Flores spicati v. racemosi.

* *Labellum sublobatum.*

160. *E. Skinneri* Batem. fol. distichis lanceolatis acuminatis; caule apice longe aphylo squamoso; racemo cylindrico multifloro; floribus cernuis; sepalis linear-i-lanceolatis; petalis ovalibus acutis; labello ovato acuminato integerimo basi callo sulcato cristato. *In Guatimala.* 2. Flores magni profunde rosei.

161. *E. biforatum* Lindl. fol. elongato-lanceolatis pedunculo squamato longioribus; racemo paucifloro cernuo; bracteis carinatis rigidis; labello subrotundo ovato per medium elevato basi biforato. *In Brasilia.* 2.

162. *E. setiferum* Lindl. fol. distichis lanceolatis acutis; caule simplici squamis foliacis vaginato; racemo cernuo; bracteis longissimis se-

taceis; labello cordato integerrimo basi trituberculato. *In Brasilia.* 2.

** *Labellum plus minus lobatum sed non fimbriatum.*

163. *E. cornutum* Lindl. fol. gramineis linear-i-lanceolatis acutissimis; racemo elongato cylindrico cernuo; petalis filiformibus; labelli laciniis lateral. nanis, intermedia cornuta, basi 3-collosa. *In Peruvia.* 2. Flores albi fragrantissimi.

164. *E. ovalifolium* Lindl. fol. distichis ovali-lanceolatis acutis; sepalis oblongo-lanceolatis; petalis linearibus; labelli cordati lobo intermedio linear-i bilobo disco 3-carinato. *In Mexico.* 2.

165. *E. Clowesii* Batem. fol. lanceolatis racemo longioribus; bracteis minimis mucronatis; petalis filiformibus reflexis; labelli 3-carinati lobo medio bilobo. *In Guatimala.* 2. Flores albo-flavescentes.

166. *E. fuscatum* Sw. fol. oblongis undulatis apice recurvis; sepalis oblongis; petalis linearibus; labello carnosus cordato 3-lobo; laciniis rotundatis intermedia emarginata; spica globosa recurva. Jacq. am t. 138. B. M. t. 2844. B. Cab. t. 887. *E. virescens* B. Cab t. 1867. *E. viridi-purpureum* Hook. B. M. t. 3666. *In Am. austr.* 2. Flores fusco-virescentes.

167. *E. orchidiiflorum* L. fol. distichis linear-i-oblongis obtusis; floribus carnosis in racemo brevi; sepalos supremo obovato; petalis linearibus cuneatis; labello apice 3-dentato. *In Bahia.* 2. Caules floriferi 1-pedales.

168. *E. fruticosum* Lindl. fol. distichis ovato-oblongis acutis; caule ramoso fruticoso; racemo terminali nutante; sepalis petaliasque ovato-lanceolatis acutis; labello cordato undulato obtuso callis 5 magnis. *In Mexico.* 2.

169. *E. campestre* Lindl. fol. distichis linear-i-lanceolatis; pedunculi elongati squamis adpressis; racemo cylindrico; sepalis lateralibus falcatis; labello subrotundo obsolete 4-lobo; laciniis clinandrii 4-lobi quadratis. *In Brasilia.* 2.

*** *Labellum fimbriato-serratum profunde lobatum.*

170. *E. xanthinum* Lindl. fol. distichis oblongis carnosis; caule longe

aphyllo; sepalis petalisque patentibus linearibus; labelli 3-lobi lobis truncatis grosse serratis callo serrato. In Brasilia. 2.

171. *E. elongatum* Jacq. fol. distichis oblongo-lanceolatis acutis; caule apice longe aphylllo ramoso; sepalis petalisque linearibus patentibus; labelli 3-lobi lobis lateral. truncatis denticulatis, intermedio callo carnoso crenato. B. M. t. 611. In Ind. occ. 2.

172. *E. ellipticum* Grah. in Hook. exot. fl. t. 207. fol. distichis ellipticis obtusis concavis succulentis; caule apice longe aphylllo; labelli 3-lobi lobis lateral. rotundatis laciniatis intermedio truncato apice denticulato basi callo concavo plicato. In Brasilia. 2. Flores rosei.

173. *E. ibagense* H. et K. fol. distichis oblongis obtusis carnosis; caule simplici apice aphylllo; sepalis oblongis acutis petalis minoribus; labello obcordato crenulato fimbriato, callo concavo 3-lobo. In Peruvia. 2. Flores aurantiaci.

174. *E. cochlidium* Lindl. fol. distichis ovato-oblongis obtusis emarginatis coriaceis; sepalis petalisque linear-lanceolatis; labelli laciniis laceris, callo carnoso maximo. In Peruvia. 2. Flores lutei.

175. *E. dichotomum* Presl. fol. distichis lanceolato-oblongis obtusis; caule apice aphylllo squamoso ramoso; sepalis petalisque lanceolatis acutis reflexis; labelli laciniis fimbriatis lateral. patentissimis, callo intermedii concavo crenulato. In Peruvia. 2. Flores flavi.

176. *E. lacerum* Lindl. fol. distichis linear-oblongis obtusis; caule simplici aphylllo laxe squamato; sepalis petalisque lanceolatis acutis; labelli 3-lobi lobis pectinato-laceris. In Cuba. 2. Flores pallide rosei.

177. *E. blepharistes* Barker; sepalis ovatibus; petalis acuminatis; labelli 4-lobi laciniis aequalibus linearibus apice multifidis linea media elevata. In Guayra. 2.

178. *E. imatophyllum* Lindl. fol. distichis ligulatis obtusis; caule simplice apice aphylllo vaginato; petalis serratis; labelli basi bicornis laciniis lateralib. nanis laciniatis. In Demerara. 2. Flores pallide rosei.

179. *E. rapicans* Pav. fol. disti-

bhis cordato-ovatis obtusis; caule simplici aphylllo; sepalis petalisque lanceolatis acutis; labelli basi bicallosi lobis lateral. denticulatis intermedio apice fimbriato. In Mexico et Guatimata. 2.

180. *E. cinnabarinum* Lindl. fol. distichis oblongis apice subrecurvis; sepalis petalisque lanceolatis; labello 3-lobo carinato basi bituberculato, laciniis lateralibus incisi-laceris intermedio angulis simplicibus fissisque. In Brasilia. 2. Flores cinnabarin.

181. *E. Schomburgkii* Lindl. B. R. 1838. t. 53. fol. distichis oblongis obtusis margine sanguineo-punctatis; sepalis petalisque linear-lanceolatis patentissimis; columna clavata elongata; labelli lobis lateral. laceris, intermedio criso. In Demerara. 2. Flores coccinei.

182. *E. flexuosum* Mey. ess. fol. distichis carnosis lanceolatis emarginatis; caule flexuoso; sepalis lanceolatis; petalis rhomboideis, labello acuminato quadrato, margine lacero. In Essquebo. 2.

183. *E. Lindenii* Lindl. caulis simplicibus strictis; fol. ovalibus obtusis coriaceis distichis; racemo oblongo obtuso; sepalis petalisque aequalibus; labelli 3-partiti laciniis lateral. rotundis laceris, intermedia cuneata dentata basi bituberculata crista comosa ante tuberculosa. Prope Meridano. 2.

b. Flores paniculati.

184. *E. Martianum* Lindl. fol. distichis angustis lanceolatis; caule ramoso squamis concavis vaginato; petalis linearibus obovatis obtusis; labello cordato subrepando basi bituberculato axi elevata. In Brasilia. 2.

185. *E. taxum* Poepp. et Endl. caulis repentibus adscendentibus angustis; fol. lanceolato-oblongis acutis; panicula elongata multiflora; sepalis erectis lanceolatis acutis; labelli ovalis subcordati nudi laciniis integerrimis. In Peruvia. 2. Flores pallide virides.

186. *E. rubrocinctum* Lindl. fol. oblongo-ligulatis acuminatis carinatis; panicula ampla cernua subsessili; sepalis oblongis concavis coriaceis petalis anguste linearibus; labello transverse cordato. In Brasilia. 2. Flores flavo-virentes.

187. *E. pallidiflorum* Hook. B. M. t. 2980. fol. distichis oblongis linearibus obtusis; sepalis petalisque lanceolatis obtusis; labelli trilobi lobis lateral. rotundatis marginibus involutis. *In ins. Vincentii.* 4. Flores flavescentes.

188. *E. gladiatum* Lindl. fol. distichis gladiiformibus; racemis sessilibus fasciculatis corymbosis recurvis; sepalis oblongis obtusis margine reflexis petalisque spathulatis patulis; labelli 3-lobi lobis lateral. quadratis intermedio emarginato. *In Mexico.* 4.

189. *E. anisatum* Llave; fol. distichis elliptico-lanceolatis; sepalis petalisque patentibus linearibus obtusis; labelli laciniis lateralibus obtusis intermedia profunde acute biloba. *In Mexico.* 4.

190. *E. polyanthum* Lindl. fol. distichis ovali-lanceolatis acuminatis; caule ramoso; racemis multifloris cernuis; sepalis ovato-lanceolatis striatis acutis petalis linearibus reflexis; labelli 3-costati lobis lateralibus retusis, intermedio linearis. Batem. orch. mex. t. 34. ***E. bisetum*** Lindl. *In Mexico.* 4. Flores amoene aurantiaci.

191. *E. Haenkeanum* Presl.; fol. distichis ovato-lanceolatis nervosis acutis; spica paniculata; sepalis oblongo-lanceolatis acutis; petalis spathulatis; labelli 3-lobi lobis lateralibus rotundatis medio minore obcordato. *In Peruvia.* 4.

192. *E. porphyreum* Lindl. fol. distichis oblongis acutissimis; squamis spathaceis dense imbricatis; panicula simplici multiflora; sepalis oblongis acutis falcatis; labelli laciniis lateral. rotundatis intermedia quadrata bidentata basi bicornuta. *In Peruvia.* 4. Flores purpureo-aurantiaci.

193. *E. laeve* Lindl. fol. distichis lanceolatis apiculatis; panicula simplici multiflora; sepalis oblongis laevibus; petalis filiformibus; labelli 4-lobi laciniis posticis cuneato-rotundatis acutis linearibus divaricatis disco 3-cauloso. *In Popaya.* 4.

194. *E. paniculatum* Fl. peruv. fol. distichis oblongis acuminatis; caule apice vaginis acuminatissimis; vestito; panicula conferta composita; petalis filiformibus, labelli 4-lobilaciniis oblongis obtusis. *In Guyquil.* 4.

11. *Spathium* Lindl. l. c. ***Caulis erectus foliosus.*** Flores in pedunculo longo bracteis equitantibus spathaceo. Labellum perianthio totum adnatum.

a. Labellum indivisum.

195. *E. grandiflorum* Lindl. fol. distichis ensiformibus obtusis; racemo denso e spatha dupliciti; sepalo dorsali ovali lateralibus duplo latioribus dimidiatis; petalis linearibus; labello cordato margine postico crispato, venis 2 elevatis. *In Peruvia.* 4.

196. *E. Scutella* Lindl. fol. coriaceis ovato-lanceolatis distichis; spatha brevi lata acinaciformi pedunc. aequali; racemo umbellato paucifloro; sepalis petalisque linearis-lanceolatis; labello oblongo cordato ecalloso. *In Peruvia.* 4. Flores flavescentes.

197. *E. mancum* Lindl. fol. 3-4 oblongis obtusis carnosis oblique emarginatis; racemo stricto multifloro foliis multo longiore; floribus carnosis; sepalis rotundis obtusissimis petalis spathulatis apice concavis; labello minimo concavo obtusissimo. *Prope Loxam.* 4. Flores aurantiaci.

198. *E. adenoglossum* Lindl. fol. carnosis linearis-oblongis obtusis; racemo elongato simplici e spatha ancipiti; sepalis ovatis reticulatis; petalis 3-veniis acutis; labello linearis tricalloso. *In Peruvia.* 4.

199. *E. ventricosum* Lindl. fol. linearis-lanceolatis acutis; racemis angustis multifloris e spatha linearis ortis; floribus membranaceis; sepalis oblongis acutis, petalis filiformibus; labello ovato cordato acutissimo. *In Peruvia.* 4.

b. Labellum 3-lobum.

200. *E. brachyglossum* Lindl. fol. linearis-lanceolatis apice rotundatis obliquis; racemo elongato simplici nutante e spatha ancipiti; floribus carnosis; sepalis obovatis concavis; petalis linearibus 3-veniis; labelli laciniis laterali. nanis callis 2 lamellaeformibus. *In Peruvia.* 4.

201. *E. leucochitum* Klotsch. fol. distichis coriaceis patulo-recurvis obtusis emarginatis; racemo simplici 6-floro e spatha ancipiti; floribus magnis odoratis; sepalis deflexis petalis patulis; labelli 3-lobi lobis lateral. orbic.

culatis; columna elongata candida biloba. In Caracas. 2.

202. *E. armeniacum* Lindl. B. R. t. 1867. caulibus teretibus indivisis; fol. lanceolatis coriaceis acutis; racemis cylindricis nutantibus; petalis setaceis; labello disco callo magno instructo. *Encyclia polystachia* Poepp. et Endl. nov. g. t. 114. In Brasilia et Peruria. 2. Flores parvi aurantiaci.

203. *E. nutans* Sw. fol. oblongis distichis undulatis obtusis; panicula nutante multiflora; sepalis petalisque obtusis patails; labelli lobis lateral. cordatis intermedio truncato apiculato, venis 3 elevatis. In Ind. occ. et Brasilia. 2.

204. *E. refractum* Lindl. folio carnoso ovato oblongo obtuso, pedunculo elongato; spathis plurimis falcatis obtusis; racemo brevi 4 – 5-floro cernuo; floribus carnosis; sepalis oblongis dorsali refracto; petalis ovalibus; labello subrotundo cordato 3-lobo basi biverrucoso. In Caracas. 2.

205. *E. geminiflorum* H. et K. caule repente ramoso; fol. oblongis obtusis coriaceis; pedunc. subbifloris; sepalis lanceolatis acuminatis margine revolutis; labello ovato-cordato subcincinnato 3-lobo. In Popaya. 2.

206. *E. leucochylum* Lindl. fol. distichis coriaceis patenti-recurvis subtus costato-carinatis; racemo simpliciterminali 6-floro e spatha ancipiiti; floribus magnis odoratis; perigonii foliis linearibus flavo-viridibus margine incurvis; labello 3-lobo lobis laterallibus orbicularibus intermedio elongato acuminato; columna elongata candida apice biloba. In Caracas. 2.

207. *E. dipus* Lindl. B. R. 1845. d. 4. (*Spathium*) fol. longis flaccidis distichis acuminatis; panicula nutante densa e spathis 2 herbaceis; sepalis petaliske lanceolato-linearibus semi-circularibus intermedio bilobo laciniis linearibus recurvis dente minuto interjecto. In Brasilia. 2. Flores viridi-fusci. Labellum album.

208. *E. rubrocinctum* Lindl. panicula ampla cernua; sepalis oblongis concavis acutis coriaceis; petalis angusto-linearibus; labello transverse cordato 3-lobo, lobii medii trilobi dente intermedio minuto; columna inappendiculata. In Guatimala. 2. Flores viridi-flavi.

c. Labellum 3-partitum.

209. *E. aeridiforme* Booth in B. R. caule folioso tereti; fol. oblongis obtusis; pedunc. elongato; racemo 7–8-floro nutante; sepalis petalisque oblongis coriaceis obtusis; labello carnosus 3-partito-cordato, laciniis lateribus oblongis obliquis intermedia cuneata auriculata. In Brasilia. 2. Flores virides apicibus fuscis.

210. *E. longiflorum* H. et K. fol. oblongis obtusis striatis coriaceis; racemi nutantis pedunculo spatha maxima breviora; sepalis petalisque lanceolato-linearibus margine revolutis; labelli lacinia intermedia lanceolata acuminata margine revoluta. In Nov. Granata. 2.

211. *E. spathaceum* Lindl. racemis alternis densissimis pendulis; spathis foliaceis falcatis conduplicatis; sepalis rigidis striatis acutis; petalis filiformibus; labelli lacinia intermedia ovata obtusa. In Peruria. 2.

212. *E. excisum* Lindl. fol. latis oblongis apice rotundatis excisis spatha lata coriacea pedunculo longiore; floribus paniculatis; petalis filiformibus; labello hastato laciniis lateral. crenulatis, intermedia linearis divergenti-biloba. In Popaya. 2.

213. *E. cylindraceum* Lindl. caule ramoso; fol. cuique ramulo 2 ovato-oblongis; pedunculo spathis 2–3 equitantibus elongatis herbaceis vestito; racemo elongato cylindrico; labelli basi tricallosi laciniis lateralibus antrosum falcatis postice serrulatis intermedia biloba serrulata. In Popaya. 2.

214. *E. Trinitatis* Lindl. caulibus foliosis ancipitibus; fol. linearis-lanceolatis glaucescentibus oblique emarginatis; racemo terminali nutante basi vaginis herbaceis; sepalis linearis-lanceolatis petalis piliformibus; labelli laciniis lateral. concavis denticulatis intermedio acuminato. In ins. Trinitatis. 2. Flores aurantiaci.

d. Labellum 6-partitum.

215. *E. raniferum* Lindl. B. R. 1842. t. 42. fol. distichis lanceolatis; racemis terminalibus lateribusque divaricatis multifloris; sepalis ligulatis convexis obtusis petalisque patentissimis; labelli laciniis integerrimis den-

tatisque posticis rotundatis intermediis linearibus. In Mexico. 4.

4461. SCHOMBURGKIA Lindl. (1839).

1. *S. tibicinis* Lindl. B. R. 1845. t. 30. v. *grandiflora*; pseudobulbis conicis corniformibus annulatis sulcatis 3 - phyllis fol. oblongis coriaceis; scapo longissimo apice paniculato; sepalis petalisque undulatis crispis; labello cucullato. Batem. orch. t. 30. In Guatimala. 4. Flores violaceo-lutei.

2. *S. crispa* Lindl. sert. orch. t. 10. pseudobulbis fusiformibus, floribus racemosis; bracteis ovario aequalibus; labello ovato - oblongo obtuso vix cucullato obsolete trilobo; sepalis petalisque oblongis crispis subaequali, lamellis 5 undulatis. B. R. 1844. t. 23. *S. marginata* Hook. Bot. M. t. 3729. In Demerara. 4.

3. *S. marginata* Lindl. sert. t. 13. pseudobulbis clavato - fusiformibus; floribus racemosis; labello ovali acuto trilobo subcucullato sepalis petalisque oblongis undulatis aequali, lamellis crispis 5 continuis. In Surinamo et Demerara. 4.

4. *S. undulata* Lindl. pseudobulbis fusiformibus; floribus dense racemosis; bracteis longissimis spathaceis; sepalis petalisque linearibus undulato - crispis labello longioribus; labelli cucullati lobis lateralibus rotundatis, intermedio lamellis 5 undulatis 2 lateralibus rectis tenuibus. In Guayra. 4. Flores fusco - purpurei.

4462. DINEMA Lindl. (1831).

1. *D. paleaceum* Lindl. fol. ensiformibus obtusis planis spica pauciflora longioribus; ovario leptiginoso; floribus secundis; sepalis petalisque stramineis. In Guatimala. 4.

2. *D. polybulbum* Lindl. fol. oblongis obtusis; sepalis petalisque viridiibus venis sanguineis; labello albo; columna sanguinea. Epidendrum Hook. exot. flor. t. 112. f. 1. In Jamaica et Mexico. 4.

4463. HARTWEGIA Lindl. (1840).

1. *H. purpurea* Lindl. In Guatimala. 4. Folia oblongo - lanceolata acuta crassissima fusco-viridia. Flores in scapo erecto terminales rosei.

4464. DIOTHONEA Lindl. (1841).

1. *D.* Lindl. in Hook. journ. 2. p. 12. In Peruvia. 4. Herba ramosa ebulbis. Folia linearis-lanceolata striata. Racemi multiflori.

4465. ENCYCLIA Hook. (1844).

1. *E. viridiflora* Hook. vid. Epidendron viridiflorum no. 17.

4466. ISOCHILUS R. Br. (1821).

1. *I. lineare* R. Br. caule tereti; fol. distichis linearibus emarginatis; racemo cernuo; labello lanceolato obtuso. B. R. t. 745. In Martinica. 4.

2. *I. globosum* Lindl. caule simplici sub-1-floro; fol. teretibus canaliculatis; labello ovato acuto canaliculato, patalis quam sepala minoribus. Epidendron Jacq. am. t. 133. f. 1. In Jamaica. 4.

3. *I. teretifolium* Sw. caule folioso; fol. tereti-3-quertris obtusis carnosis; flore solitario; labello striato 3 - quertrō incrassato. Epidendrum Sw. In Ind. occ. 4. Flos luteo-viridis.

4. *I. graminifolium* H. et K. nov. g. t. 78. caule ramoso; fol. linearibus acuminatis membranaceis; labello obovato oblongo obtuso basi angustato. In Popaya. 4.

5. *I. proliferum* R. Br. caule carnoso proliferō diphyllo; fol. linearibus emarginatis; floribus fasciculatis; labello linearē obcordato. B. R. t. 825. In Jamaica. 4. Flores albi.

6. *I. fusiforme* Lindl. caule carnoso basi proliferō; fol. linearibus emarginatis mucronatis; floribus solitariis nudis; labello triangulari. In Trinidad. 4.

7. *I. linifolium* Lindl. caule simplici folioso; fol. distichis linearibus apice 3-dentatis; spica disticha terminali; floribus bracteis inclusis. Elleanthus Presl. In Peruvia. 4.

8. *L. lancifolium* Presl. caule antcipiti vaginato apice 3-phyllo; fol. lanceolatis serrulatis apice 3-dentatis; spica disticha reflexa; floribus inclusis. *Elleanthus* Presl. In *Guajaguit*. 2.

9. *J. tividum* Lindl. pseudobulbis filiformibus arcte squamosis; fol. solitariis linearibus 2—3-dentatis; racemo capillari secundo nutante sub-3-floro; labello cordato revoluto apice toveolato basi mellifero. In *Mexico*. 2. Flores lividi.

4467. AROPHYLLUM Endl. (1840).

1. *A. spicatum* Lexarz (sub *Arpophyllum*). In *Mexico*. 2. Caules cylindrico-depressi membranulis scariosis involuti. Folia crassa longissima. Flores parvi dilute purpurei.

4468. PONERA Lindl. (1831).

1. *P. juncifolia* Lindl. fol. subulatis canaliculatis secundis; spica subbiflora terminali in caule folioso; labello retuso; clinandrio mutico. In *Mexico*. 2.

2. *B. graminifolia* Lindl. fol. linearis-lanceolatis oblique emarginatis; spica subbiflora terminali in caule folioso; labello acuto apice recurvo crenulato; clinandrio mutico. In *Mexico*. 2.

3. *P. striata* Lindl. fol. linearis-lanceolatis oblique emarginatis; spica subbiflora axillari in caule defoliato; labello bilobo integro; clinandrii dente dorsali in antheram incurvo. In *Guatimala*. 2.

4469. BRASSAVOLA R. Br. (1829).

1. *B. cucullata* R. Br. labello cullato fimbriato apice integro; sepalis petalisque acuminatissimis. *Epidendron* B. M. t. 543. In *Ind. occ.* 2. Flores ochroleuci.

2. *B. tuberculata* Hook. B. M. t. 2878. labello oblongo cuspidato integerrimo; sepalis pedunculo ovarioque tuberculatis; dentibus clinandrii fimbriatis. In *Brasilia*. 2. Flores albi.

3. *B. nodosa* Lindl. labello cor-

dato acuminato integerrimo; dentibus lateralibus clinandril integris postico bifido. *Epidendron* L. Jacq. am. t. 140. In *Jamaica*. 2. Flores magni odore Lilii candidi.

4. *B. subulifolia* Lindl. labello integro; sepalis petalique acuminatissimis; fol. longissimis subuliformibus. In *ins. Neris*. 2.

5. *B. Perrini* Lindl. B. R. t. 1561. labello ovato acuminato integerrimo ungue convoluto columnae longitudine; clinandrio postico serrato. In *Brasilia*. 2. Flores flavescentes.

6. *B. cordata* Lindl. B. R. t. 1914. labello cordato acuminato (albo); sepalis petalique linearibus acuminatis, clinandrio integerrimo postice in dentem subulatum producto. In *Brasilia*. 2.

7. *B. grandiflora* Lindl. folio plano angusto lanceolato rigido; labello maximo subrotundo-quadrato acuminato ungue longiore; sepalis petalique acuminatissimis linearibus. In *Honduras*. 2.

8. *B. glauca* Lindl. B. R. 1840. t. 44. fol. coriaceis oblongis obtusis glaucis; spatha 1-flora; sepalis petalique linearis-lanceolatis obtusis; labello subsessili rotundo margine lobato; clinandrio dentato. In *Vera Cruz*. 2.

9. *B. angustata* Lindl. sepalis petalique linearibus acuminatissimis collo ovarii longioribus; labello ovato acuminato serrulato basi haud cucullato; clinandrii 3-lobi lobis lateralibus flabellatim incisis. In *Demerara*. 2.

10. *B. venosa* Lindl. B. R. 1840. t. 39. folio lanceolato semicylindrico; sepalis petalique linearibus; labelli ungue longe complicato lamina subrotundo-ovata subtriloba acuminata basi serrata, venis elevatis. In *Honduras*. 2. Flores virides labello albo.

4470. LAELIA Lindl. (1831).

a. *Grandiflorae*. Petala sepalis longiora.

1. *L. grandiflora* Lindl. fol. lanceolatis; sepalis lanceolatis petalis ovatis carnosis venosis; labello purpureo-violaceo ad basin et medium albicante, lacinia intermedia maxima subcrenata limbo undulato purpur-

cente, prominentiis petaloideis luteis.
In Mexico. 4.

2. *L. majalis* Lindl. fol. angusto scapo bifloro aequali; sepalis lanceolatis petalis oblongo-lanceolatis duplo latioribus; labelli lobo medio emarginato, lateralibus parvis obtusis. Batem. orch. t. 18. B. R. t. . . *In Mexico.* 4.

3. *L. autumnalis* Lindl. B. R. 1839. t. 27 fol. oblongo-linearibus patentissimis scapo sub-6-floro brevioribus; sepalis lanceolatis acuminatis patentissimis; petalis undulatis; labelli lobis lateral. truncatis, intermedio apice reflexo. Batem. orch. t. 9. *In Mexico.* 4. Flores rosei.

4. *L. anceps* Lindl. B. B. t. 1751. pseudobulbis 4-questris; fol. lanceolatis; scapo ancipiti bifloro; ovario viscoso; labelli disco linearis elevato apice 3-lobo. *In Mexico.* 4. Flores splendidi rosei.

5. *L. superbiens* Lindl. scapo longissimo multifloro; bracteis maculatis; sepalis petalisque linearis-oblongis obtusis; labelli lobo medio obtusissimo, disco lamellis 5 maximis subserratis. *In Guatimala.* 4.

6. *E. furfuracea* Lindl. B. R. 1839. t. 26. pseudobulbis ovatis strictis; folio anguste oblongo acuto; scapo paucifloro; sepalis lanceolatis acuminatis patentissimis, petalis undulatis sublobatis; labelli bilamellati lobo medio revoluto; ovario glandulis nigris furfuraceo. *In Mexico.* 4.

7. *L. Perrini* (Cattleya B. R. 1838. t. 2.) fol. oblongis coriaceis; sepalis oblongis linearibus obtusis; labello 3-lobo basi in cuniculum ventricosum producto; lacinia intermedia undulata elongata. *In Brasilia.* 4. Flores pallide lilacini.

8. *L. peduncularis* Lindl. pseudobulbis subrotundis compressis linea utrinque elevata; fol. oblongis obtusis; corymbo 4-floro; sepalis linearibus petalisque oblongis obtusis; labello trilobo lineis 2 elevatis. *In Mexico.* 4. Flores violacei.

9. *L. rubescens* Lindl. B. B. 1841. t. 41. pseudobulbis subrotundis compressis; fol. oblongis obtusis; racemo multifloro; sepalis linearibus; petalis lanceolatis subundulatis; labello conformi auriculato medio pubescente. *In Mexico.* 4. Flores albi rubro tincti.

10. *L. acuminata* Lindl. B. R. 1841. t. 24. pseudobulbis ovatis compressis rugosis; folio emarginato; floribus corymbosis; sepalis linearibus petalisque lanceolatis undulatis acuminatis; labelli lobo intermedio lanceolato undulato acuminato. *In Guatimala.* 4. Flores rosei.

11. *L. albida* Lindl. B. B. 1839. t. 54. pseudobulbis ovalibus diphyllis; fol. linearibus acutis; spica multiflora; sepalis petalisque acutis apicibus reflexis; labello alte 3-lobo 3-costato. *In Mexico.* 4. Flores albi roseotincti.

b. / *Parviflorae. Petala separatis aequalia.*

12. *L. virens* Lindl. sepalis suberectis ovatis petalisque lanceolatis subaequalibus; labello oblongo obsolete trilobo cucullato apice ovato criso linea obsoleta elevata versus basin; columnae cardine 1-dentato. *In Brasilia.* 4. Flores viridi-lutei.

13. *L. cinnabarinia* Batem. orch. t. 28. Paxt. mag. 1840. pseudobulbis ampullaceis elongatis; fol. oblongis undulatis; scapo 4—5-floro; sepalis petalisque oblongo-linearibus obtusis aequalibus; labelli lobo medio ovali criso lineis 3 elevatis. *In Brasilia.* 4. Flores aurei.

14. *L. rupestris* Lindl. pseudobulbo elongato 1-phyllo; scapo multifloro; sepalis petalisque oblongis acutis; labelli lobo intermedio obtuso margine criso lineis 2 elevatis. *In Brasilia.* 4. Flores violacei.

15. *L. flava* Lindl. B. R. 1842. t. 62. fol. oblongis carnosis coriaceis planis; scapo erecto brevioribus; racemo laxo; bracteis minimis acutis; floribus luteis; labelli 3-lohi lobo medio oblongo criso recurvo, venis 4 elevatis. *L. caulescens* Lindl. *In Brasilia.* 4.

4471. CATTLEYA Lindl. (1823).

a. *Labellum columnam involvens.*

1. *C. superba* Lindl. sert. t. 22. caulis clavatis sulcatis; fol. oblongis marginatis; sepalis oblongis acutis; petalis lanceolatis duplo latioribus; labelli lobo intermedio emarginato den-

ticulato basi venis elevatis rugoso.
In Demerara. 2. Flores intense rosei.

2. *C. Skinneri* Batem. orch. t. 13. caulinibus clavatis; fol. ovalibus obtusis; sepalis angustis oblongo-lanceolatis rectis; petalis 3-plo latioribus oblongis; labello integerrimo convoluto plano emarginato; columna nana. *In Guatimala.* 2. Flores rosei.

3. *C. Walkeriana* Gardu. fol. oblongo-ellipticis coriaceis caule cylindrico longioribus; sepalis petalisque calloso-apiculatis, labelli 3-partiti cucullati lobis lateral. valde oblique truncatis intermedio lato rotundo basi venis elevatis rugosis. *In Brasilia.* 2.

4. *C. maxima* Lindl. B. R. 1846. t. 1. caulinibus obovato-clavatis angustatis; spatha pedunculo multo breviore; sepalis oblongis obtusis; petalis undulatis ovalibus; labelli maximis crisi trilobi lobo medio undulato alte emarginato. *In Guayaquit.* 2.

5. *C. labiata* Lindl. coll. t. 33. caulinibus clavato-fusiformibus sulcatis; fol. solitariis oblongis; sepalis lineari lanceolatis acutis; petalis membranaceis undulatis multo latioribus; labello obovato criso undulato. Hook. exot. fl. t. 157. B. Cab. t. 1856. B. M. t. 3998. *C. Mossiae* B. M. t. 3669. B. R. 1840. t. 56. *C. Lemoniana* Lindl. B. R. 1846. t. 35. *In Brasilia.* 2.

6. *C. crispa* Lindl. B. R. t. 1172. Hook. B. M. t. 3910. caulinibus crassis oblongis clavatis; spatha magna herbacea; sepalis lineari-lanceolatis acutis; petalis undulatis crispis; labelli indivisi limbo ovato acuminato quam maxime undulato-crispo. *In Brasilia.* 2. Flores maximi albi.

7. *C. citrina* Lindl. caulinibus ovatis squamis albis vestitis; fol. lanceolatis glaucis; pedunc. longissimis solitariis; floribus carnosis pendulis citrinis; labello undulato linea media lata elevata. B. M. t. 3742. *In Mexico.* 2.

8. *C. pumila* Hook. B. M. t. 3656. caulinibus brevibus sulcatis; fol. solitariis acutis; pedunc. 1-floro; sepalis rectis; petalis ovalibus 3-plo latioribus; labello indiviso lineis 3 elevatis. B. R. 1844. t. 5. *In Brasilia.* 2. Flores violaceo-rosei.

9. *C. Pinellii* Hort. facie *C. pumi-*

lae sed sepalis acutis albidis; petalis ovatis roseis; labello majis criso; columna apice dentibus 2 crenatis aucta.

In Brasilia. 2.

10. *C. Loddigesii* Lindl. coll. t. 37. caulinibus elongatis teretibus; fol. 2 ovato-oblongis lateral. falcatis; labelli lobis lateral. rotundis; medio dilatato criso lineis pluribus elevatis. B. misc. t. 186. *Epidendron violaceum* B. Cab. t. 337. *C. ovata* Lindl. B. R. t. 1919. *C. intermedia* Hook. B. M. t. 2851. *In Brasilia.* 2. Flores lilacini.

11. *C. Harrisoniana* Batem. fol. anguste lanceolatis; sepalis oblongis apiculatis; petalis ovalibus; labelli lobis lateral. rotundatis, intermedio criso angusto, lineis pluribus elevatis. *In Brasilia.* 2. Flores lilacini.

12. *C. Forbesii* Lindl. coll. t. 37. caulinibus elongatis teretibus; fol. 2 oblongis; sepalis petalique linearis-oblongis obtusis; labelli 3-lohi lobo medio cordato argute dentato undulato apiculato, lineis 5 elevatis. B. R. t. 953. B. Cab. t. 1152. *In Brasilia.* 2. Flores lilacini.

13. *C. maritima* Lindl. pedunc. 1-floro caule subclavato; fol. 2 ovalibus obtusis; sepalis oblongis acutis; petalis lanceolatis falcatis obtusis; labelli lacinia intermedia denticulata emarginata. *In Buenos Ayres.* 2.

14. *C. Arebergii* Scheidw. sepalis lateral. falcatis obtusiusculis; petalis latioribus undulatis; labelli 3-lohi lobis undulato-crispis intermedio lilacino lamina lutea; fol. ovatis carnosis. *In Brasilia.* 2.

15. *C. guttata* Lindl. B. R. t. 1406. caulinibus elongatis teretibus; floribus carnosis; sepalis lineari-lanceolatis acuminatis; petalis undulatis; labelli 3-lohi lobis lateral. ovatis intermedio bilobo. *In Brasilia.* 2.

16. *C. granulosa* Lindl. B. R. 1842. t. 1. caulinibus gracilibus 2-phyllois; fol. oblongo-lancicolatis obtusis; petalis spathulatis undulatis obtusissimis; labello cucullato 3-partito, lacinia intermedia lamina dilatata rotunda plicata granulosa denticulata. *In Guatimala.* 2.

b. *Labellum planum columnam non involvens.*

17. *C. Acalandiae* Lindl. B. R. 1840. t. 48. caulinibus cylindraceis stria-

tis decumbentibus floribus subsolitariis; sepalis petalisque lanceolatis herbaeis incurvis maculatis; labelli plani hypochilio dilatato repando epichilio orbiculari reniformi emarginato. In Brasilia. 4.

18. *C. bicolor* Lindl. fol. ovato-oblongis angustis caule elato 3-plo brevioribus; sepalis lanceolatis falcatis acutis; petalis subundulatis obtusis; labello indiviso erenato. In Brasilia. 4. Caulis 3-ped. Labellum purpureum.

19. *C. domingensis* Lindl. caule brevi oblongo annulato; folio ovalioblongo coriaceo; scapo longissimo terminali 7-8-floro; sepalis linearilanceolatis acutis petalis oblongis obtusiusculis triplo angustioribus; labello indiviso plicato - criso. In Domingo. 4.

4472. BROUGHTONIA R. Br. (1821).

1. *B. sanguinea* B. Cab. t. 739. Labello subrotundo cordato truncato margine eroso basi luteo venis purpureis picto. Epidendrum sanguineum Sw. In Jamaica. 4.

2. *B. aurea* Lindl. labello ovato convoluto acuminato. In Mexico. 4. Flores amoene lutei.

4473. BARKERIA Knowl. et Westk. (1840).

1. *B. elegans* Knowl. et Westc. fl. cab. t. 49. fol. angustis membranaceis nervosis; pedunc. longis gracilibus squamosis ramosis; floribus magnis nutantibus. Columna petaloidea. In Mexico. 4.

2. *B. Lindleyana* Batem. fol. ovalibus acutis; columna clavata alata apice tridentata immaculata. In Mexico. 4. Flores purpurei.

3. *B. spectabilis* Batem. racemo multifloro laxo; labello ovato lanceolato tricarinato; sepalis linearilanceolatis; petalis ovatis acuminatis. In Guatemala. 4. Flores lilacini.

4474. TRICHOSMA Lindl. (1842).

1. *T. suavis* Lindl. B. R. 1842. t. 21. In Ind. or. 4. Herba cibulosa. Caulis squamis verrucosis vestitus 3-phyllus. Spica terminalis basi spathacea. Flores albo-virentes labello flavo violaceo-venoso.

4475. LEPTOTES Lindl.

1. *L. bicolor* Lindl. B. R. t. 1625. In Brasilia. 4. Caules breves teretes squamis vagiatis vestiti. Folia teretiuscula; scapus 3-florus.

4476. TETRAMICRA Lindl. (1831).

1. *T. rigida* Lindl. Cymbidium Willd. Plum. ed. Burm. ic. 181. f. 1. In Hispaniola. 4. Scapus longus teres squamosus racemosus. Folia brevia linearia carnosa recurva.

4477. SPATHOGLOTTIS Blume. (1826).

1. *S. plicata* Blume; bracteis petaloideis coloratis; petalis obtusis coninvolutis; labelli lacinia intermedia cuneata retusa utrinque 1-dentata. Bletia angustata Gaudich. in Freyc. voy. t. 32. In Ind. or. 4. Flores lutescentes.

2. *S. pubescens* Lindl. racemo secundo; bracteis minutis acutis; petalis oblongis obtusis; labelli basi saccati lobo intermedio tricarinato hituberculato. In Ind. or. 4.

3. *S. ixoides* Lindl. bracteis vaginatis obtusis; petalis undulatis patentibus; labelli ventricosi saccati lacinia intermedia basi bidentata ungue bilamellato. Cymbidium Don. In Ind. or. 4.

4. *S. Fortuni* Lindl. B. R. 1845. t. 19. fol. lanceolato-linearibus scapo pubescente brevioribus; floribus laxeracemosis; sepalis ovalis obtusis; petalis oblongis latioribus; labelli lacinias lateral. oblongis obtusis; intermedia cuneata emarginata ungue utrinque dente aucto, lacinellis 3 basi villosis carnosis subdentatis; columna apice denticulata. In Manilla. 4. Flores lutei.

5. *S. parvifolia* Lindl. fol. solitarius gramineis scapo pubescente multo brevioribus; racemo 3-floro pubescente; sepalis ovatis acutis; petalis oblongis unguiculatis; labelli lacinia intermedia cuneata iudivisa, lamellis 3 glabris, intermedia filiformi; columna elongata. In Ind. or. 2.

6. *S. tomentosa* Lindl. fol. 2 latolanceolatis scapo tomentoso longioribus; racemo tomentoso multifloro; bracteis obtusissimis concavis; sepalis petalisque obtusissimis; labelli lacinia intermedia apice reniformi ungue elongata angustissima basi hastata lamellis 2 semiconnatis. In Mindanao. 2.

4478. BLETIA R. et P. (1800).

1. *B. catenulata* R. Br. sepalis petalisque patentibus; labelli cucullati lobis lateralibus rotundatis abbreviatis, intermedio subrotundo convexo. In Peruvia. 2.

2. *B. florida* R. Br. petalis obtusis supra columnam fornicatis; labelli 5-costati lobo intermedio cuneato criso lamellis 3 undulatis. B. R. t. 1401. *B. pallida* B. Cab. t. 629. In Trinidad. 2. Flores carnei.

3. *B. verecunda* R. Br. petalis oblongis obtusis fornicatis; labelli costis crassis subramosis, lobo medio latiore quam longo undulato; scapo ramoso. Limodorum altum Jacq. ic. t. 62. *B. Shepherdii* Hook. B. M. t. 3319. In Ind. occ. 2. Petala purpurea.

4. *B. hyacinthina* R. Br. petalis linearibus patulis; labello cucullato medio lamellato lacinias crassis; bracteis subpetaloideis. Cymbidium Smith. exot. 6. t. 60. B. M. t. 1492. In China. 2. Flores rosei.

5. *B. speciosa* H. et K. scapo radicali 1-floro; petalis oblongis obtusis crenulatis, labelli 3-lobo lobo medio crenulato. In Mexico. 2.

6. *B. campanulata* Llave; sepalis petalique campanulatis; labelli laci- niis lateralibus convolutis. intermedia undulata longitudinaliter sulcata. In Mexico. 2. Flores purpurei.

7. *B. coccinea* Llave; labelli tripartiti laci- niis lateralibus convolutis intermedia pendula profunde emarginata. In Mexico. 2. Flores coccinei.

8. *B. punctata* Llave; sepalis pe-

talique cuneiformibus; labelli 3-lobi lacinia intermedia latiore undulata. In Mexico. 2. Sepala et petala ferruginea punctis purpureis.

9. *B. capitata* R. Br. labello prope basin intus callo adnato; caule folioso; floribus capitatis. In Ind. or. 2.

10. *B. obcordata* Lindl. sepalis linearibus obtusis; labelli lobo intermedio obcordato; scapo racemoso; fol. oblongis acuminatis. In Sibet. 2. Flores ochracei.

11. *B. tuberculosa* Spr. sepalis petalique patentibus; labelli cucullati ventricosi 3-lobi laci- niis crassis intermedia transverse emarginata. Limodorum Thouar. t. 31. In Madagascar. 2. Flores lutei.

12. *B. villosa* Rich. sepalis petalique ovato-lanceolatis acutis patentibus; labello integrerrimo obcordato undulato medio villoso. In Mauritio. 2. Flores purpurei.

13. *B. aphylla* Nutt. aphylla; labello 3-lobo costato; scapo racemoso squamoso. In Carolina. 2.

14. *B. latifolia* Gaudich. fol. linear-lanceolatis striatis multinerviis; scapo elongato simplici multifloro. In ins. Moluccis. 2.

15. *B. gracilis* Lodd. B. Cab. t. 1661. sepalis petalique lanceolatis acuminatis; labelli 3-lobo lobo intermedio transverse emarginato undulato; fol. plicatis oblongis acutis. B. R. t. 1681. In Mexico. 2. Flores sordide roseo-lutei.

16. *B. reflexa* Lindl. B. R. t. 1760. sepalis linear-lanceolatis lateralibus reflexis; petalis conniventibus; labelli 3-lobo lobo intermedio angusto undulato lamellis 5 altis parallelis. In Mexico. 2. Labellum violaceum.

17. *B. havanensis* Lindl. sepalis patulis ovatis acutis elamellatis, petalis supra columnam conniventibus ovatis undulatis; labello ovato cucullato 3-lobo, laci- niis lateralibus intermedium retusam crassam imbricantibus cristis 3 lamellatis. In Havannah. 2.

18. *B. secunda* Lindl. fol. oblongo-acuminatis 7-nerviis; floribus racemosis; sepalis petalique cuneatis oblongis secundis collateralibus; labelli laci- niis intermedia membranacea obovata emarginata medio bicallosa. In Mexico. 2.

4479. IPSEA Lindl. (1831).

1. *I. speciosa* Lindl. In Zeylona.
2. Herba terrestris radice carnosa biloba. Folia ensiformia plicata. Flos solitarius speciosus.

4480. PESOMERIA Lindl. (1838).

1. *P. tetragona* Lindl. Epidendron Thouars orch. t. 33., 34. Herba terrestris caule 4-gono. Fol. membranacea plicata. Racemus simplex lateralis. In ins. Mauritii. 2.

4481. ARUNDINA Blume (1828).

1. *A. bambusifolia* Lindl. labello intus lamellis 2 carnosis undulatis cristatis; fol. acuminatis. In Nepal. 2. Flores speciosi.

2. *A. minor* Lindl. labello intus lineis 3—5 elevatis integris obtuso undulato; fol. acutis. In Zeylona. 2. Petala rosea.

3. *A. chinensis* Blume; labello intus lineis 5 nudis cristato, limbi lobo medio rotundato. In Java. 2.

4. *A. speciosa* Blume; labello intus lineis 3 barbatis cristato, lobis integris subundulatis, intermedio multo longiore. In Java. 2.

5. *A. densa* Lindl. B. R. 1842. t. 26. labello obovato-subrotundo 4-lobo apiculato laciniis rotundatis lamellis 3 crispatis rectis; petalis oblongis; fol. subaequalibus. In Singapore. 2. Flores rosei.

4482. PLAJUS Lour. (1790).

1. *P. grandifolius* Lour. acaulis; fol. oblongo-lanceolatis acutis; labello oblongo cucullato integro crispo apice emarginato arcuato-calcarato. Bletia Tankervilleae B. M. t. 1924. In China. 2. Flores albi intus fusci.

2. *P. Wallachii* Lindl. acaulis; fol. oblongo-lanceolatis acutis; labello cucullato crispo integro acuminatisimo calcare arcuato. Wall. pl. as. rar. t. 158. In Ind. or. 2. Flores fusci; labellum album flavo et rubro-suffusum.

3. *P. Blumei* Lindl. sepalis acuminatissimis; labello intus bicristato; limbi lobo medio maximo undulato. In Java. 2.

4. *P. veratrifolius* Lindl. caulescens; fol. oblongo-lanceolatis acuminate; labello obovato crispo integro repando; calcare recto. In Silhet. 2. Flores flavi.

5. *P. maculatus* Lindl. caulescens; fol. ovato-lanceolatis maculatis; labelli trilobi lobis apice plicato-crenatis, intermedio ovato obtuso calcare recto. Bletia Woodfordii B. M. t. 2719. In Ind. or. Flores flavi.

6. *P. bicolor* Lindl. acaulis; fol. lanceolatis acuminatis; labello cucullato ventricoso integro obtuso undulato; calcare cylindrico coarctato. In Zeylona. 2. Flores lutei labello roseo.

7. *P. albus* Lindl. in Wall. pl. as. t. 198. caulescens; fol. oblongo-lanceolatis acutis; labello oblongo cucullato denticulato apice rotundato disco 5-cristato. B. R. n. s. 11. t. 33. In Nepal. 2. Flores albi speciosi.

8. *P. callosus* Lindl. sepalis petalique undulatis; labello cucullato trilobo margine crispo; calcare recurvo Limodorum Blume. In Java. 2.

9. *P. flavus* Blume; subcaulescens; sepalis obtusis; labello semitrichi- lobo intus tricristato, lobo medio cristato. Limodorum Blume. In Java. 2.

4483. CYTHERIS Lindl. (1831).

1. *C. cordifolia* Lindl. In Ind. or. 2. Herba terrestris spithamea; Folia petiolata cordata. Flores parvi.

4484. TYLOSTYLIS Blume (1836).

1. *T. rigida* Blume. 2. Caulescens. Folia lanceolata oblique retusa rigida. Scapi spicati multiflori.

4485. ANIA Lindl. (1831).

1. *A. angustifolia* Lindl. fol. angustis plicatis; scapo multifloro. In Ind. or. 2.

2. *A. latifolia* Lindl. fol. late oblongis plicatis; scapo paucifloro. In Ind. or. 2.

3. *A. bicornis* B. R. 1844. t. 8. folio oblongo lanceolato carnososo scapo breviore; labelli lobo medio emarginato apiculato ecalcarato bilamellato, lamella altera versus apicem interjecta; anthera bicorni. In Zeylonia. 2.

4486. CYLINDROLOBUS Blume (1836).

1. *C. compressus* Blume. In Java.
2. *Folia lanceolata*. Spicae oppositifoliae.

4487. APATURIA Lindl. (1831).

1. *A. chinensis* Lindl. In Ind. or. 2.

4488. TRICHOTOSIA Blume. (1826).

1. *T. annulata* Blume. In Java. 2.
2. *T. ferox* Blume et *T. microphylla* Blume. In Java. 2.

4489. MITOPETALUM Blume (1836).

1. *T. speciosum* Blume. In Jara.
2. Herba terrestris caule radicante. Folia plicata longe petiolata. Petioli basi bulboso - tumidi.

4490. DRYMODA Lindl. (1841).

1. *D.* Lindl. sert. orch. t. 8. f. c. ex Endl. gen. In Ind. or.
2. Herba minuta pseudobulbosa ut videtur aphylla; scapis radicalibus vaginatis 1 - floris.

4491. PLOCOGLOTTIS Blume (1826).

1. *P. javanica* Blume. In Java.
2. Herba epigaea. Folia in petiolo tumido solitaria oblongo-lanceolata plicata. Scapus multiflorus.

4492. PHYSINGA Lindl. (1839).

1. *P. prostrata* Lindl. In Am. tropica. 2. Caulis prostratus anceps dense distiche foliosus. Folia ovato-lanceolata purpurascens. Scapus filiformis ramosus.

4493. SOPHRONITIS Lindl. (1827).

1. *S. grandiflora* Lindl. B. R. t. 1129. In Brasilia. 2. Herba pusilla 1 - phylla ebulbis; racemis axillaribus effusis.

2. *S. violacea* Lindl. folio solitario linearis scapo terminali 1 - floro; columnam alis maximis. In Brasilia. 2.

4494. HELICIA Lindl. (1845).

1. *H. sanguinolenta* Lindl. In Guayaquil. 2. Herba pseudobulbosa. Folia

coriacea undulata. Pedunculus 1-florus. Flores olivacei sanguineo-maculati. Labellum album striis sanguinolentis.

4495. NANODES Lindl. (1828).

1. *N. discolor* Lindl. B. R. t. 1541. In Brasilia. 2. Caules dense foliosi. Folia ovato-oblonga viridi-purpurea. Flores solitarii obscure purpurei.

4496. ASPASIA Lindl. (1830).

1. *A. epidendroides* Lindl. B. R. t. 1907. In Panama. 2. Pseudobulbi 1-2 - phylli compresso-dipteri. Folia pedalia subcoriacea. Spicae breves.

2. *A. variegata* Lindl. B. R. t. 1907. pseudobulbis oblongis ancipitibus; sepalis linearis - oblongis petalisque subrhamboideis acutis; labelli lobis lateralibus recurvis intermedioque serratis. In Guatimala. 2. Flores virides sanguineo-fasciati, labelum albo-violaceum.

3. *A. lunata*. Lindl. l. c. pseudobulbis oblongis, compressis laevibus; sepalis petalisque linearibus obtusis patentissimis; labelli lobis lateralibus novis intermedio plano subradato undulato; floribus solitariis. In Brasilia. 2. Sepala et petala luteo-viridia sanguineo-maculata. Labellum album macula lineata.

4497. ORNITHIDIUM Salisb. (1803).

1. *O. coccineum* Salisb. caulinibus ramosis. fol. coriaceis; racemis axillaribus effusis. Epidendrou Jacq. am. 8. 135. *Cymbidium* B. M. 2. 1437. In ins. Martinica.

2. *O. album*. Hook. B. M. t. 3306.

3. *O. minutum*. Lindl. fol. oblongo-ovatis margine serrulatis; floribus axillaribus laxe exsertis; labelli 3-lobi laciniia intermedia late ovato-truncata undulata. In Columbia. 2.

4. *O. aureum* Poepp. et Endl. n. g. t. . In Peruvia. 2.

4498. DACTYLOSTYLIS Scheidw. (1839).

1. *D.* Scheidw. In Brasilia. 2. Herba epiphyta fol. lanceolatis acutis, margine revolutis; floribus pedicellatis reflexis viridi-flavis labello albo.

4499. ACRIOPSIS Blume. (1826).

1. *A. javanica* Blume. In Java. 2. Folia linear-lanceolata obtusa. Pedunculi paniculati. Flores pedicellati.

4500. SERAPHYTA Fisch. et Mey. (1842).

1. *S. diffusa* Fisch. et Mey. Epidendron B. M. 2. 3565. In Am. austr. 2. Herba epiphyta caulescens fol. distichis, panicula terminali.

4501. TRIZEUXIS Lindl. (1823).

1. *T. falcata* Lindl. In Ind. occ. 2. Herba epiphyta perva acaulis. Folia falcata disticha. Flores aggregati minimi.

4502. ORNITHOCEPHALUS Hook. (1828).

1. *O. gladiatus* Hook. exot. fl. 2. 127. Penins. Trinitat. 2. Herba epiphyta acaulis. Folia equitantia carnosa. Spica axillaris. Flores inconspicui.

4503. CIRRHAEA Lindl. (1828).

1. *C. Loddigesii* Lindl. B. R. t. 1538. fol. oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis; petalis linearibus flexuosis; labelli lobo medio linearis. In Brasilia. 2.

2. *C. viridipurpurea* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis; petalis linearibus arcuatis; labelli lobo medio acuminato lateralibus aequali. Gongora Hook. B. M. A. 2978. In Brasilia. 2.

3. *C. fuscolutea* Lindl. fol. lanceolatis acuminatis; petalis linear-lanceolatis; labelli lobo medio ovato lateralibus obtusis. In Brasilia. 2.

4. *C. tristis* Lindl. B. R. t. 1889. fol. oblongo-lanceolatis; petalis linear-spathulatis; labelli sagittati lobo intermedio linearis lateralibus acuminatis. In Mexico. 2. Flores sordide viridi-fuscis. Labellum violaceum.

5. *C. obtusata* Lindl. B. R. t. 2005. fol. oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis; petalis sepalisque linearis oblongis obtusiusculis planis; labelli lobo

medio obovato acuto inflexo late unguiculato lateralibus acuminatis. In Brasilia. 2. Flores flavi.

6. *C. saccata* Lindl. pseudobulbis ovatis tetrapteris; fol. oblongis plicatis 7-costatis; saeo pendulo 3-gono; racemo multifloro; sepalis lateralibus margine revolutis; petalis linearibus obtusis basi compresso teretibus; labello galeato saccato. In ? 2.

7. *C. Warreana* Lindl. B. R. t. 1999. In Brasilia. 2.

4504. AGANISIA Lindl. (1840).

1. *A. pulchella* Lindl. B. M. 1840. t. 32. In Demerara. 2. Rhizoma repens; pseudobulbi aphylli. Racemus radicalis 3-4-florus. Flores albi.

4505. SARCOCHILUS R. Br. (1810).

1. *S. falcatus* R. Br. B. R. t. 1832. In Nov. Holl. 2. Fol. linear-lanceolata falcata. Racemi axillares secundi, bracteis latis. Flores speciosi.

2. *S. parviflorus* Lindl. fol. oblongis undulatis bidentatis; racemis nutantibus 4-floris; petalis falcatis obtusis. In Nov. Holl. 2. Flores virides purpureo maculati.

3. *S. unguiculatus* Lindl. misc. 1840 racemo 3-4-floro; labelli unguiculati 3-lobi ungue convexo linearis, linea media exserta, lamina cava, lobis lateralibus semiovatis obtusis intermedio supra 3-nervi subtus globoso apice papillaeformi. In Manilla. 2. Flores straminei.

4506. PILUMNA Lindl. (1846).

1. *P. laxa* Lindl. B. R. 1846. t. 57. In Popaya. 2. Pseudobulbi ancipites. Fol. oblongum subtus maculatum. Racemus laxus multiflorus. Perianthium viridi-roseum. Labellum album.

4507. TRICHONIDIUM Lindl. (1840).

1. *T. Egertonianum* Lindl. pseudobulbis ovalibus compressis diphyllo-

aggregatis; fol. ensiformibus; petalis linearis-lanceolatis apice callosis; labello 3-lobo medio calloso. *In Honduras.* 4. Flores pallide lividi.

2. *T. obtusum* Lindl. B. R. t. 1923. Fol. linearis-lanceolatis vaginis acutis; sepalis obovatis; petalis obtusis; labello dorso tuberculato; anthera glanduloso-pilosa. *In Demerara.* 4. Flores lutei.

3. *T. latifolium* Lindl. fol. obovato-oblongis; vaginis acuminate; sepalis lanceolatis acutis anthera glabra. *In Brasilia.* 4.

4. *T. acuminatum* Batem. pseudobulbis ovatis sulcatis 1-phyllo; fol. linearibus pedunc. longioribus apicibus recurvis; petalis ovalis-lanceolatis; labello 3-lobo petalis duplo longiore. *In Demerara.* 4. Flores straminei.

5. *T. tenue* Lodd. pseudobulbis fusiformibus; fol. linearibus obtusis emarginatis; sepalis linearibus secundis; labello cuneato trilobo, lobis lateralibus rotundatis intermedio acutiusculo. *In Demerara.* 4.

6. *T. ringens* Lindl. misc. 1840. pseudobulbis compressis subrotundis; fol. oblongis recurvis coriaceis nitidis; scapo filiforme stricto; perianthio trilobato; sepalis petalisque margine revolutis; labelli trilobi nani ciliati pubescentis lobis lateralibus dentiformibus, intermedio revoluto lucido basi callo reniformi. *In Mexico.* 4. Flores flavo-virides.

4510. WARREA Lind. (1844).

1. *W. cyanea* Lindl. B. R. 1845. t. 28. spica brevi; labello subrotundocuneato apiculato undulato lineis 5 elevatis. *In Columbia.* 4. Labellum caeruleum.

2. *W. bidentata* Lindl. bracteis pedicello 4-plo brevioribus; labelli apice bidentati venis valde convexis flabellatis, lamellis altis intermedia duplo majore.

4511. MAXILLARIA R. et P. (1801).

a. Pedunculi axillares.

1. *M. platypetala* R. et P. caule folioso; fol. oblongis obtusis coriaceis; sepalis oblongis rotundatis basi cuneatis; labello oblongo medio tuberculo truncato. *In Peruvia.* 4. Sepala guttata.

2. *M. ochroleuca* Lodd. fol. ensiformibus strictis; sepalis linearis-lanceolatis acuminatissimis; labello cucullato medio calloso, lobis subundulatis. *In Brasilia.* 4. Flores albidi.

3. *M. longipetala* R. et P. fol. ligulatis apice tridentatis; pedunc. 1-floris; sepalis conniventibus; labello lobo intermedio criso. *In Peruvia.* 4.

4. *M. alba* Lindl. 1-3 ligulatis acutis coriaceis aveniis; sepalis patulis ovato-lanceolatis obtusis lateralibus basi connutis; labello tuberculo oblongo in medio. *Dendrobium Hook. exot. fl. 142.* *In Jamaica.* 4. Flores candidi.

5. *M. undulata* R. et P. bulbis ovato-oblongis striatis; fol. lanceolatis 5-7-nerviis; scapo racemoso. *In Peruvia.* 4.

6. *M. variegata* R. et P. bulbis ovatis; fol. lanceolatis plicatis; scapo variegato racemoso. *In Peruvia.* 4.

7. *M. ligulata* R. et P. bulbis ovatis; fol. ensiformibus; scapo volubili; floribus paniculatis; nectarii labio ligulato. *In Pillao.* 4.

8. *M. hastata* R. et P. bulbis oblongis; fol. ensiformibus; scapo volubili; pedunc. distantibus racemosis; nectarii labio hastato. *In Peruvia.* 4.

9. *M. paniculata* R. et P. bulbis oblongo-ovatis; fol. ensiformibus plicatis; floribus paniculatis. *In Peruvia.* 4.

4508. STENIA Lindl. (1838).

1. *S. pallida* Lindl. B. R. 1838. t. 20. *In Demerara.* 4. Herba epiphyta acaulis ebullis. Fol. oblonga apice recurva. Flores radicales solitarii.

4509. HUNTLEYA Lindl. (1837).

1. *H. sessiliflora* Lindl. floribus sessilibus. *In Guyana.* 4.

2. *H. Meteagris* Lindl. B. R. 1838. t. 14. floribus longe pedunculatis. Descourt. orch. Bras. t. 8. *In Brasilia.* 4. Flores aurantiaco-coccinei.

10. *M. cuneiformis* R. et P. bulbis ovatis fol. ensiformibus canaliculatis; floribus racemosis; petalis cuneiformibus; nectario cordiformi. *In Peruvia.* 2.

11. *M. bicolor* R. et P. bulbis ovatis ancipitibus; fol. ensiformibus margine scabris; floribus ramosis; pedicellis subdichotomis. *In Peruvia.* 2.

12. *M. tricolor* R. et P. bulbis ovatis compressis; fol. ensiformibus striato-nervosis; floribus racemosis erectis tricoloribus. *In Peruvia.* 2.

13. *M. triphylla* R. et P. bulbis ovatis triphyllis; fol. ensiformibus carinatis; floribus racemosis; petalis labelloque acutis. *In Peruvia.* 2.

14. *M. triangularis* Lindl. caulescens; pseudobulbis ovalibus utrinque corrugato-sulcatis; fol. ligulatis; floribus solitariis axillaribus; sepalis patentissimis triangulare-curvis; labello oblongo ociliato concavo medio verruca solitaria polita aucto anthera conica scabra. *In Guatimala* 2. Flores cinnamomei rubro maculati.

15. *M. Meleagris* Lindl. caulescens; pseudobulbis ovalibus ancipitibus; fol. solitariis obtusis undulatis; sepalis petalisque acuminatis; labelli oblongi lobo medio subemarginato tuberculo transverso subcrenato basi 3-costato. *In Oxaca.* 2. Flores purpurei.

16. *M. undatilora* R. et P. bulbis ovatis; fol. lanceolatis 5-nerviis; floribus paniculatis. *In Peruvia.* 2.

17. *M. prolifera* R. et P. bulbis oblongis sulcatis; fol. lanceolatis; scapo bulbifero foliiferoque; floribus nutantibus. *In Peruvia.* 2.

18. *M. racemosa* R. et P. bulbis fibrosis; caule radicante vaginato; floribus axillaribus solitariis. *In Peruvia.* 2.

19. *M. densa* Lindl. B. R. t. 1804. pseudobulbis axillaribus compressis emarginatis; recurvis densissime aggregatis; perianthio bilabiato; sepalis acuminatis carinatis; labello indiviso recurvo medio linea elevata. *In Mexico.* 2. Flores albi.

20. *M. variabilis* Batem. caulescens; bulbis ovalibus compressis; fol. linearilineatis obtusis; sepalis petalisque linearicus; labello oblongo retuso calloso medio utrinque contracto; anthera pubescente. *In Mexico.* 2. Flores intense purpurei.

21. *M. tenuifolia* Lindl. B. R. 12. t. 8. pseudobulbis ovato-oblongis compressis; fol. linearis-lanceolatis acutis recurvis; pedunc. axillaribus solitariis; floribus cernuis; sepalis ovato-lanceolatis margine revolutis; labello indiviso apice reflexo, callo integerrimo oblongo. *In Mexico.* 2. Flores purpurei.

22. *M. Maclaei* Lindl. misc. 1840. subcaulescens; pseudobulbis 1-phylis compressis; apiculatis; pedunc. axillaribus solitariis squamatis; floribus rectis; sepalis ovato-lanceolatis acutis conniventibus; labello oblongo indiviso non reflexo. *In Guatimala.* 2. Flores fusco rubri labello albo.

23. *M. purpurascens* Lindl. pseudobulbis ovatis v. conicis sulcatis; fol. 2 linearis-lanceolatis apiculatis; floribus solitariis glabris; sepalis lanceolatis apiculatis supremo connivente; petalis conniventibus linearibus; labello 3-lobo margine purpureo-maculato glabro disco carnoso; anthera subpubescente. *In Brasilia.* 2. Flores lutei.

24. *M. acutipetala* Hook. B. R. t. 3966. pseudobulbis diphylis; fol. lato-linearibus acutis; scapis radicali 1-2-floris; sepalis petalisque oblongis acutis; labello 3-lobo, centro striato lineis elevatis 5; lobis lateral. columnam involventibus, intermedio acuto reflexo. *In Am. med.* 2. Flores aurantiaci sanguineo-maculati.

25. *M. rugosa* Scheidw. pseudobulbis oblongis compressis sulcatis 1-phylis; fol. coriaceis rugosis; scapo 1-floro; scapi vaginis 6-8 ventricosis; sepalis lateral. lanceolatis supremo fornicato; petalis conniventibus; labelli carnosus trilobi lobo intermedio apice sulcato in axi obcordato. *In Brasilia.* 2. Flores purpurei.

b. Pedunculi radicales.

26. *M. tetragona* Lindl. B. R. a. scapi 1-flori t. 1428. pseudobulbis 4 gonis; fol. oblongo-lanceolatis platicatis; labello oblongo ventricose 3-lobo erecto lobi intermedii disco appendice carnoso. B. M. t. 3146. *In Brasilia.* 2. Flores virides.

27. *M. viridis* Lindl. B. R. t. 1510. fol. lanceolatis acuminatis undulatis plicatis; sepalis petalisque oblongis obtusis; labelli breve 3-lobi

lobo medio transverse unguiculato. *M. placanthera* Hook. B. M. t. 3173. *In Brasilia*. 2.

28. *M. Parkeri* Hook. B. M. t. 2729. bulbis ovalibus 1-phylis; folio lanceolato coriaceo; vaginis ventricosis coloratis; labello 3-lobo cucullato linea longitudinali clavata. *In Demerara*. 2. Flores albi purpureo-maculati. *Labellum* lilacinum.

29. *M. Lyonii* Lindl. acaulis; pseudobulbis ovatis compressis; fol. linear-lanceolatis emarginatis; floribus solitariis; sepalis petalisque obtusis striatis; labello obtuso intra apicem scabro tuberculo oblongo in medio. *In Mexico*. 2. Flores fusco-purpurei.

30. *M. aromatica* Grah. in Hook. exot. fl. t. 219. bulbis ovatis compressis; sepalis acutis; labelli semicylindrici laciniis lateralibus serrulatis, intermedia bilabiata. B. R. t. 1839. *In Mexico*. 2. Flores aurantiaci.

31. *M. stapelioides* Lindl. B. R. n. ser. 12. t. 17. bulbis obtusangulis ovatis 1-2-phylis; fol. glaucis 1-costatis; pedunculis brevissimis; labello ovato ventricoso 3-lobo, lobis lateralibus linearibus. *Cymbidium* Link et Ott. abb. t. 52. *In Brasilia*. 2. Flores flavi.

32. *M. Rollisoni* Lindl. B. R. 5. n. t. 40. acaulis; fol. oblongo-lanceolatis acutis apice recurvis; scapis 1-floris diffusis; sepalis carinatis acutissimis; labelli lobo medio margine deflexo, callo truncato-tridentato denticulis reflexis. *In Brasilia*. 2.

33. *M. acicularis* Herb. pseudobulbis subfusiformibus sulcatis; fol. linearibus acuminatis canaliculatis; pedunc. arctissime squamosis 1-floris; perianthio connivente; labello indiviso oblongo disco illinito. *In Brasilia*. 2. Flor. purpureo-chocolati.

34. *M. uncata* Lindl. caulescens; pseudobulbis in axillis squamarum sulcatis; folio linear-obtuso; labello oblongo obtuso carnoso margine crispato; columna apice utrinque uncata. *In Demerara*. 2.

35. *M. chlorantha* Lindl. acaulis; pseudobulbis ovalibus compressis; fol. ligulatis obtusis lucidis; sepalis petalisque linearibus connivent.; labelli trilobi lobo intermedio ovato granulato criso, callo ovato. *In Demerara*. 2.

36. *M. aculifolia* Lindl. pseudo-bulbis ovalibus compressis 1-phylis; fol. oblongo acuminato; pedunc. 1-floris radicalib. vaginatis; sepalis petalisque oblongis; labello retuso emarginato pubescente apice glabro versus basin lacinia brevi aucto. *In Demerara*. 2. Flores fusi.

37. *M. tentiginosa* Lindl. B. R. bracteis late ovatis acuminatis; labelli lobo medio ovato-oblongo obtuso; crista transversa medio processu quadrato tridentato aucta; antherae apice incurvo. *In Brasilia*. 2. Flores purpurei et purpureo maculati.

38. *M. aureo-fulva* Knowl. et Westsk. fl. cab. t. 83. pseudobulbis angulatis rugosis; fol. oblongo-lanceolatis costatis scapo radicali multifloro multo brevioribus; floribus longe pedicellatis apice reflexis; sepalis lateralibus calcaratis; labello 3-lobo, medio lanceolato B. M. t. 3629. *In Brasilia*. 2. Flores aurantiaci.

39. *M. porrecta* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis 3-nerviis; pedunc. 1-floro vaginato; sepalis linearibus apice concavis lateralibus incurvis; labello angusto apice 3-lobo medio calloso pubescente lobo medio criso revoluto. *In Brasilia*. 2. Color Maxillariae pictae.

40. *M. macrophylla* Poepp. et Endl. n. g. t. 64. fol. lanceolatis scapo 1-floro adscendente duplo longioribus; bractea cincinnata acuta ovarii longitudine; sepalis oblongis undulatis basi intus pilosis; labello oblongo concavo, lacinia intermedia subrotunda serrata appendice linguaeformi; anthera villosa. *In Peruvia*. 2. Sepala purpureo-fusca petala straminea.

41. *M. costata* Lindl. fol. lanceolatis plicatis scapo 1-floro adscendente longioribus sepalis petalisque macrophyllae similibus; labello trilobo concavo lacinia intermedia rotundata serrata, appendice carnosu 5-costato; anthera glabra. *In Peruvia* ?.

42. *M. foveata* Lindl. fol. lanceolatis undulatis plicatis racemo triplo longioribus; bracteis linearibus sphacelatis; sepalis petalisque linear-oblongis; labello postice oblongo apice 3-lobo, lacinia media rotundata carnosa excavata disco 2-5-sulcato. *In Demerara*. 2.

43. *M. picta* B. et M. t. 3154. bulbis sulcatis 1-2-phylis; sepalis

petalisque globoso-conniventibus; lobello 3-lobo disco rubescente. B. R. t. 1802. In Brasilia. 4. Flores magni purpureo-maculati.

44. *M. Barringtoniae* Lodd. B. Cab. t. 1821. bulbis compressis costatis; fol. 3-nis oblongo-lanceolatis plicatis; sepalis petalisque obtusis; labelli lobo medio fimbriato. Epidendron Sm. ic. t. 25. In Jamaica. 4. Flores magni olivacei.

45. *M. vitellina* Lindl. B. R. n. ser. 12. t. 12. pseudobulbis ovatis obtuse angulatis monophyllis; fol. lanceolato in petiolum angustato; racemo cernuo; labelli lobi crenulatis, tuberculo disci trilobo obtusissimo, ungue pubescente. In Brasilia. 4.

46. *M. Deppei* Lodd. B. Cab. t. 1612. bulbis ovatis obtusangulis; vaginis ventricosis acuminatis; sepalis patentissimis; labello cucullato 3-lobo apice recurvo. In Mexico. 4. Petala nivea. Labellum vitellinum.

47. *M. subulata* Lindl. pseudobulbis aggregatis angustissimis diphylis; fol. semiteretibus subulatis; pedunc. densissime vaginatis; labelli callo magno in axi. In Brasilia. 4. Flores fusco-rubri.

48. *M. grandiflora* Lindl. bulbis ovatis compressis; fol. lanceolatis acutis sepalis apic revolutis; labello complicato subundulato basi transverse plicato. Dendrobium H. et K. nov. g. t. 88. In Peruvia. 4. Flores albi carnosii.

49. *M. parvula* Hook. exot. fl. t. 217. pseudobulbis oblongis incurvis; sepalis lateralibus basi valde productis; labello obovato cucullato repando. In Brasilia. 4. Sepala fulvo-aurantiaca.

50. *M. setigera* Lindl. scapis radicali. 1-floris, squamis acuminatis striatis supra ovario adpressa; sepalis lanceolatis obtusis; petalis linearibus apice abrupte setigeris; labello oblongo-trilobo piloso, lacinia media crispa; clinandrio fimbriato. In Peruvia. 4. Flores pallide flava.

51. *M. jugosa* Lindl. flore subgloboso; sepalis oblongis incurvis obtusis; petalis conformibus concavis; labelli oblongi sigmoidei pilosi jugosii lobis lateralibus nanis intermedio semicirculari; columna apice lobata villosissima. In Brasilia. 4.

52. *M. candida* Lodd. pedunc. radicali. 1-floris; sepalis petalisque

linearibus acuminatis; labello oblongo obsolete 3-lobo medio furfuraceo ad incisuram callosa lobo medio ovato obtuso denticulato. In Brasilia. 4. Flores albi.

53. *M. placanthera* Hook. B. M. t. 3173. sepalis linearis-oblongis obtusis intus secus medium seriatim maculatis; petalis maculatis; labelli angusti trilobi minute pubescentis lacinia intermedia dilatata columna apice lobata. In Brasilia. 4.

54. *M. barbata* Lindl. Phyto log. t. p. 7. pseudobulbis inaequaliter 4-angularibus corrugatis vaginatis; fol. ovatis costatis acutis; floribus racemosis; sepalis inaequalibus, petalis majoribus lateral. apice subinvolutis; labello cucullato 3-lobo barbato margine criso disco carnoso. In Brasilia? 4. Flores lutei.

55. *M. madida* Lindl. pseudobulbis ovatis elongatis sulcatis diphylis; fol. lanceolato linearibus acutis plicatis; floribus solitariis; sepalis petalisque acutis; labelli 3-lobi medio callosi lobis lateralibus inconspicuis intermedio recurvo disco madido. In Brasilia. 4. Flores lutei fusco maculati.

Scapi multiflori.

56. *M. Harrisoniae* B. R. t. 897. fol. lanceolatis plicatis; sepalis lateralibus calcar longum referentibus; labelli lobis margine crispis disco piloso. B. M. t. 2927. Hook. act. fl. t. 120. In Brasilia. 4. Flores magni albi.

57. *M. palmifolia* Lindl. pseudobulbis conicis striatis; fol. lato-lanceolatis plicatis; floribus secundis; sepalis lateralibus in calcar spurium connatis; labello lamina crassiuscula reflexa. Colax Lindl. B. R. t. 897. In Jamaica. 4. Flores magni albi.

58. *M. Warreana* Lodd. scapo multifloro; fol. lanceolatis acuminatis; sepalis ovatis concavis; labello unguiculato indiviso, jugis elevatis lamina seriatim corrugata. In Brasilia. 4. Sepala fulvo-lutea.

59. *M. racemosa* Hook. B. M. t. 2789. pseudobulbis compressis 4-gonis; fol. oblongo-lanceolatis 3-costatis; sepalis lateralibus valde elongatis; labello indiviso undulato columna pubescente. B. R. t. 1566. B. Cab. t. 1318. In Brasilia. 4. Flores sordide flavi-

60. *M. pallidiflora* Hook. B. M. t. 2806. pseudobulbis aggregatis 1-phyllis; folio lato-lanceolato; sepalis lateralibus saccum rotundatum reficientibus; labello oblongo bituberculato margine undulato. *In ins. Vincent.* 2. Flores lividi-flavi.

61. *M. maculata* H. et K. bulbifera; fol. lanceolatis acutis; sepalis lanceolato-oblongis margine undulatis; labello oblongo acuto undulato albo violaceo-striato. *In Mexico.* 2. Flores virides.

62. *M. latifolia* Lindl. terrestris; fol. obovato-oblongis acutis basi angustatis 3-nerviis membranaceis; sepalis lanceolatis; labello oblongo cucullato apice reflexo punctato. *Dendrobium* H. et K. *In Mexico.* 2. Flores flavo-rosei.

63. *M. longifolia* Lindl. terrestris; fol. lineari-lanceolatis acutis 9-nerviis membranaceis; sepalis acutis lanceolatis; labello ovato undulato crenato. *Dendrobium* H. et K.

64. *M. corrugata* Lindl. pseudobulbis ovatis subimbricatis; fol. lanceolatis solitariis; racemis paucifloris petiolo multo longioribus; bracteis minimis; sepalis petalisque obtusiusculis; labello oblongo utrinque emarginato, venis elevatis flexuosis corrugato, tuberculo mediano obtuse tricarinato. *In Bogota.* 2. Flores fusco-purpurei.

65. *M. scabrlinguis* Lindl. pseudobulbis ovatis elongatis sulcatis; fol. scapo erecto multifloro longioribus; bracteis acutissimis; sepalis petalisque lineari-oblongis acutis lateral. falcatis; labelli 3-lobi lobo medio carnosissimo utraque facie papillis densissimis; anthera pubescente. *Ad Loxam.* 2. Flores luteo-purpurei.

66. *M. Brocklehurstiana* Lindl. fol. solitariis oblongo-lanceolatis scapo multifloro multo brevioribus; sepalis oblongis interioribus paulo conuatis, petalis angustioribus; labello membranaceo 3-partito, laciniis lateral. linearibus acuminatis reflexis, intermedia subhastata; columna basi infundibulari depressa. *In Rio Janeiro.* 2. Flores fusco-cinnamomei.

67. *M. concava* Lindl. acaulis racemosa; pseudobulbis oblongis alte sulcatis; fol. geminis tricostatis nitidis; bracteis setaceis; sepalis lateral. falcatis; petalis obtusis; labello oblongo obsolete 3-lobo apice carnosoo

concavo tuberculo lineari apice obtuse 3-dentato. *In Guatimala.* 2.

68. *M. decolor* B. R. t. 1819. pseudobulbis oblongis compressis; fol. solitariis oblongo-lanceolatis acuminate; scapo multifloro; sepalis ovato-oblongis obtusis; petalis conniventibus; labello obsolete trilobo obtuso cucullato 5-callosa callis elevatis. *In Jamaica.* 2. Flores ochroleuci.

69. *M. squatens* Hook. B. M. t. 2955. pseudobulbis ovatis diphylis; fol. lanceolatis plicatis; scapo multifloro; sepalis petalisque ovato-lanceolatis subundulatis acutis; labelli trilobi lobo medio ovato subundulato. *Dendrobium* B. R. t. 732. B. Cab. t. 1059. *In Brasilia.* 2. Flores sordide lutei.

70. *M. cristata* Lindl. B. R. t. 1811. bulbis ovatis sulcatis 1-phyllis; fol. oblongo-lanceolatis plicatis; floribus explanatis; sepalis petalisque lanceolatis acutis; labello 3-partito carnoso, laciniis lateralibus falcatis, intermedia cristato-fimbriata. *In ins. Trinitatis.* 2. Sepala albo-sanguinea.

71. *M. crocea* Lindl. B. R. t. 1799. bulbis oblongis compressis; fol. oblongis undulatis obtusis emarginatis; scapis 1-floris vaginatis; sepalis petalisque auguste triangularibus elongatis acutis; labello subtrilobo apice carnoso criso. *In Brasilia.* 2. Flores flavi.

72. *M. Bothii* Lindl. rhizomate repente; pseudobulbis ovalibus compressis diphylis; fol. angustis obtusis; sepalis petalisque erectis angustatis acutis; labello obtuso margine membranaceo. *In Guatimala.* 2. Flores viridi-lutei.

73. *M. cucullata* Lindl. B. R. 1840. t. 12. pseudobulbis ovalibus compressis 1-phyllis; folio lato scapis longiore; vaginis imbricatis inflatis; bractea cucullata ovario longiore, sepalis acuminatis; labello 3-lobo, lobis lateral. nanis medio elongato apice incrassato, callo basi spathulato. *In Am. austr.* 2. Labellum violaceum.

74. *M. rhombea* Lindl. acaulis; pseudobulbis ovalibus ancipitibus; bractea ovario aequali; sepalis petalisque acutis labello subrhombico trilobo, lacinia intermedia oblonga apiculata lateralibus rotundis nanis appendice plana retusa longioribus. *In Mexico.* 2.

75. *M. Scinneri* Lindl. misc. 1840. pedunc. radical.; bractea ovata cucullata acuminata; sepalis oblongis acutis glabris intus villosis; petalis subrhombis velutinis; labelli lobis lateralibus truncatis, intermedio ovato pubescente, lamina venisque sparse villosis; columna elongata tomentosa. In ? 4.

76. *M. Steelii* Lindl. B. R. t. 1986. caule pendulo squamato; fol. longissimis flagelliformibus canaliculatis; labello subquadrato 4-lobo B. M. t. 3573. In Demerara. 4. Flos tigrinus.

4512. EPIPHORA Lindl. (1840).

1. *E. pubescens* Lindl. In P. b. Spei. 4. Herba epiphyta subbulbosa, fol. binis oblongo-linearibus; racemo terminali.

4513. SIAGNANTHUS Poepp. et Endl. (1837).

1. *S. multicaulis* Poepp. et Endl. n. g. t. 96. In Peruvia. 4. Herba epiphyta pseudobulbosa, pedicellis axillaribus fasciculatis 1-floris.

4514. TRICHOCENTRUM Poepp. et Endl. (1837).

1. *T. pulchrum* Poepp. et Endl. n. g. t. 115. fol. radical. basi incrassatis cavis 1-nerviis; pedunc. radical. brevissimis 1-floris; floribus magnis speciosis. In Peruvia. 4.

2. *T. recurvum* Lindl. bracteis distichis cucullatis ovatis acutis; sepalis petalisque ovatis acutis; labello basi purpureo bidentato, calcare recurvo ovarii longitudine. In Guiana. 4.

3. *T. candidum* Lindl. bracteis ovatis acutis; sepalis petalique ovatis acutis; labello oblongo emarginato basi obsolete bidentato ecalcarato gibboso; columnae alis ovatis acutis; anthera villosa. In Guatimala. 4.

4. *T. fuscum* Lindl. B. R. t. 1951. fol. oblongis acutis oblique tortis; labello glabro bilobo basi bilanceolato venis callosis, alis columnae serratis. In Peruvia. 4. Perianth. viride labellum albo-roseum.

5. *T. iridifolium* Lindl. fol. distichis linear-lanceolatis carnosis;

labello ovali obtuso indiviso basi bilamellato; columnae alis parvis obtusis integris. In Demerara. 4. Flores pallide lutei.

4515. BIFRENARIA Lindl. (1832).

1. *B. atropurpurea* Lindl. pseudobulbis 4-gonis; folio solitario oblongo lanceolato; labelli lobo medio transverse subtrilobo suberoso. Maxillaria B. Cab. t. 1877. In Brasilia. 4. Flores atropurpurei odoratissimi.

2. *B. aurantiaca* Lindl. B. R. t. 1875. bulbis compressis diphyllis; fol. oblongis plicatis; floribus racemosis; labelli lobis lateralibus semicordatis intermedio transverse ovali subundulato basi bicalloso. In Demerara. 4.

3. *B. ? tongicornis* Lindl. pseudobulbis elongatis 4-gonis; racemo multifloro; labello longe unguiculato spathulato apice trilobo, lacinias rotundatis medio pubescente, disco elevato calloso. In Demerara. 4. Flores aurantiaci brunneo maculati.

4. *B. inodora* Lindl. pseudobulbis 4-gonis; folio oblongo acuto criso; pedunc. 1-floris; sepalis oblongo-obtusis, cornu elongato clavato; petalis undulatis; labelli lobis undulatis subdentatis intermedio piloso. In Brasilia. 4. Flores virides labello amoe- ne violaceo.

4516. BATEMANIA Lindl. (1837).

1. *B. Colleyi* Lindl. B. R. t. 1714. In Demerara. 4. Pseudobulbi ovati 4-goni. Fol. obovata plicata. Racemus radical. pendulus. Flores fusco-purpurei.

4517. SCAPHIGLOTTIS.

1. *S. reflexa* Lindl. fol. semiterribus supra planis sulcatis apice integerrimis; sepalis lateralibus ovato-triangularibus reflexis; petalis linearibus obtusis; labello emarginato obtusissimo undulato medio refracto. In Demerara. 4. Flores lutei.

2. *S. violacea* Lindl. B. R. t. 1901. In Demerara. 4.

3. *S. striata* Lindl. In Demerara. 4.

4. *S. pallidiflora* Lindl. In ins. Trinitatis. 4.

5. *S. affinis* Poepp. et Endl. nov.
g. t. 97. In Peruvia.
6. *S. graminifolia* Poepp. et Endl.
In Peruvia. 2.

4518. DICRYPTA Lindl. (1831).

1. *D. Baueri* Lindl. fol. coriaceis ligulatis cum basi nunc bulbosa articulatis; peduno. vaginatis; floribus solitariis axillaribus. Heterotaxis crassifolia Lindl. B. R. t. 1028. B. Cab. t. 1651. In Jamaica. 2.
2. *D. densifolia* Poepp. et Endl. nov. g. t. 68. In Pernvta. 2.
3. *D. discolor* Lindl. In ?
4. *D. bicolor* Batem. In Demerara. 2.
5. *D. iridifolia* Batem. In Demerara. 2.

4519. GOVENIA Lindl. (1830).

1. *G. superba* Lindl. fol. plicatis; spicis radicalibus multifloris; petalis cuneatis cuspidatis obliquis. B. R. t. 1795. Flores aurantiaci sanguineo-maculati.
2. *G. liliacea* Lindl. B. R. n. s. 11. t. 13. labello ovato basi ima cucullato; spica oblonga; scapo 1-vaginato; bracteis oblongis cucullatis; fol. lauceolatis, plicatis; radice tuberosa. In Mexico. 2. Flores albo-flavescentes.

3. *G. Gardneri* Hook. B. M. t. 3660. scapo obtuso 4-gono; racemo elongato; floribus post anthesin refractis; sepalis petalisque ovatis obtusis; labello acuto apice maculis 5 notato lineis 2 convexis. In Brasilia. 2. Flores albi violaceo-maculati.

4. *G. lugenophora* Lindl. pseudobulbo ovato vagina laegenaeformi utriculata inclusa; petiolis 4-gonis; racemo longissimo multifloro; labello ovato glabro. In Mexico. 2.

4520. ALEMANNIA Llave. (1825).

1. *A. punicea* Llave. In Mexico. 2. Herba pumila pseudobulbosa. Scapi simplices multiflori. Flores speciosi punicei.

4521. PSITTAGLOSSUM Llave. (1825).

1. *P. atratum* Llave. In Mexico.
2. *Pseudobulbi* anicipites 1-phyllic. Folia oblongo-lanceolata laevigata conduplicata. Scapus radicalis squamis distichis tectus. Flos magnus atropurpureus.

4522. CYCNOCHES Lindl. (1831).

1. *C. Loddigesii* Lindl. B. R. t. 1742. floribus maximis viridifuscis; labello albo sanguineo-guttato apice virescente. In Surinamo. 2.
2. *C. maculatum* Lindl. racemo longissimo; floribus fusco-luteis; labello linear-lanceolato, glandulis pinnatifide marginato, Patria ? 2.
3. *C. ventricosum* Batem. orch. mex. t. 5. In Guatimala. 2.
4. *C. chlorochiton* Lindl. sert. t. 16. In Demerara. 2.

4523. ZYGOSTATES Lindl. (1839).

1. *Z. cornuta* Lindl. cornu unico incurvo ad basin labelli; petalis rhomboideis. In Brasilia. 2. Flores ut in sequenti viridi-lutei.
2. *Z. lunata* Lindl. dente duplice ad basin labelli; petalis lunatis. In Brasilia. 2.

4524. CATASETUM Richards. (1822).

a. *Labellum galeatum.*

1. *C. tridentatum* Hook. exot. fl. t. 90, 91. fol. oblongo-lanceolatis acuminatis; perianthiis compressis conniventibus acuminatis; labello galeato 3-dentato margine laevi. *C. macrocarpum* H. et K. n. g. t. 631. *C. Claveringii* B. Cab. t. 1344. B. R. t. 840. *C. Wailesii* Hook. B. M. t. 3937. In Am. austr. 2.

2. *C. maculatum* H. et K. t. 630. foliolis calycinis duobus interioribus maculatis; labello ciliato. In Nov. Granata. 2.

3. *C. integrerrimum* Hook. B. M. t. 3829. sepalis petalisque conniventibus; labello carnoso galeato basi inflexo lateribus suis invicem imbricanti-

bus margine laevi v. serrato. *C. maculatum* B. R. 1841. t. 62. Batem. orch. t. 11. *In Guatimala*. 2.

4. *C. planiceps* Lindl. B. R. 1843. t. 9. sepalis petalisque ovatis conniventibus; labello carnoso galeato rotundato compresso apiculato indiviso margine serrato. *In Am. austr.* 2. Flores viridi-flavi.

5. *C. fuliginosum* Lindl. sepalis petalisque oblongis acutis reflexis; labello cucullato integrerrimo v. minute serrulato patente; columna brevi ecirrhosa apice in setam producta. Patria? 2. Flores virides purpureo maculati.

6. *C. luridum* Lindl. B. R. t. 1667. caulis defoliatis angustis sulcatis; perianthio subgloboso parum maculato; sepalis petalisque oblongis apice rotundatis; labello cucullato carnoso mutico apice subtruncato; racemo nubante. *C. abruptum* B. M. t. 3939. *In Brasilia*. 2. Flores virides globosi fusco-maculati basi lutea.

7. *C. semiapertum* Hook. exot. fl. t. 213. fol. oblongo-lanceolatis multiplicatis racemo compacto longioribus; perianthii subpatentibus; labello galeato apice incurvo, laterib. denticulatis. B. R. t. 1769. *In Brasilia*. 2. Flores parvi virides.

8. *C. purum* Nees ic. pl. h. bonn. t. 1. fol. linear-lanceolatis; perianthio patente obsolete punctato; labello ventricoso apice incurvo concolore ciliato integrerrimo. *In Brasilia*. 2.

9. *C. Hookeri* Lindl. coll. t. 40. fol. lanceolatis 3-plicatis; perianthii globosis; labello apice incurvo, lateribus denticulatis. *In Brasilia*. 2. Flores parvi flavo-fusci.

10. *C. globiflorum* Hook. B. M. t. 3942. spica elongata multiflora; perianthio globoso; sepalis petalisque subconformibus ovatis acutis concavis arctissime imbricatis; labello hemisphaeric-globoso basi columnae longitudinaline denticulato. *In Brasilia*. 2. Flores olivacei.

11. *C. longifolium* Lindl. sert. orch. t. 31. fol. longissimis gramineis; racemo cylindraceo pendulo multifloro; sepalis ovatis subrotundis petalorum conformium dorso applicatis; labello urceolari intus cernico margine fimbriato. *In Demerara*. 2. Folia longissima. Flores amoene aurantiaci.

12. *C. discolor* Lindl. racemo multifloro laxo; labello hemisphaeric

marginibus planis medio fimbriatis. *Monachanthus* B. R. t. 1735. *M. Bushnanii* Hook. B. M. t. 3832. *M. roseo-albus* Hook. t. 3736. *In Brasilia*. 2. Flores pallide purpurei, labello intus flavo.

13. *C. atratum* Lindl. B. R. 1838. t. 63. racemo decurvo; sepalis petalisque patentibus ovatis acutis; labello carnoso cucullato margine tenui pectinato, apice rotundato reflexo crasso denticulato. *In Brasilia*. 2. Flores extus virides sepala intus purpurea labello viridi-flavo.

14. *C. Russetianum* Hook. B. M. t. 3777. pseudobulbo elliptico magno; fol. lato-lanceolatis; racemo ampio labello membranaceo antice inflato margine undulato fimbriato disco membrana cristato. *In Guatimala*. 2. Flores virides.

b. *Labellum planum*, saepius foveatum v. *saccatum*.

Myanthus.

15. *C. laminatum* Lindl. labello lanceolato basi saccato apice marginibusque incurvo basin versus fimbriato per axin lamella unica carnosa alta integra v. denticulata basi biloba instructo; columna cirrhata. Sert. orch. t. 38. *In Mexico*. 2. Flores magni purpurei viridi-maculati.

16. *C. tabulare* Lindl. sepalis petalisque omnino *C. laminati*; labello oblongo antico concavo basi cornuto fimbriato extus sub apice lineis serrulatis elevatis striato. *In Nor. Grana-ta*. 2.

17. *C. saccatum* Lindl. sepalis lanceolatis patentibus dorsali petalisque fornicate; labello subrotundo acuminato fimbriato medio saccato; ostio contracto reniformi postice dentato; columna cirrhata. *In Demerara*. 2.

18. *C. Naso* Lindl. spica brevi erecta; sepalis oblongo-lanceolatis adscendentibus aequalibus; labello hemisphaeric in appendicem carnosam ovatam producto, marginibus basi tenuibus laceris. *In Caracus*. 2. Flores virides purpureo maculati.

19. *C. Trulla* Lindl. B. R. 1841. t. 34. sepalis petalisque patentibus ovalibus planis; labello late ovato acuminato subcordato concavo fimbriato apice laevi; columna brevi. *In Peru trop.* 2.

20. *C. callosum* Lindl. B. R. 1841.
t. 5. f. 1. petalis concoloribus linearilanceolatis sepalo dorsali conformi suboppositis; labello ovato-oblongo obtuso basi saccato supra saccum callo magno margine obsolete crenato. *In Guayra.* 2. Flores rubro-fusci, labello viridi et flavo tuberculato.

21. *C. porifolium* Lindl. labello piano cordato-ovato truncato crenato lobo apicis elevato carnosus ovato medio nectarifero dente baseos ovato incurvo; columna cirrhosa. *In Demerara.* 2.

22. *C. dettoideum* Lindl. labello imberbi sagittato triangulari, angulis posticis rotundatis, dente apice dilatato calloso margine incurvo basi tuberculato. *In Demerara.* 2. Flores virides purpureo-maculati, labello purpureo.

23. *C. trifidum* Hook. B. M. t. 3262. racemis elongatis cernuis multifloris, sepalis petalisque lanceolatis convergentibus; labello transverse piano alte 3-fido lacinia intermedia minore. *Myanthus cernuus* Lindl. B. R. t. 1721. *In Brasilia.* 2.

24. *C. cornutum* Lindl. B. R. 1841. t. 5. f. 2. petalis maculatis linearilanceolatis sepalo dorsali conformi suppositis; labello subcordato-ovato basin versus saccato sub sacco cornu valido inflexo instructo processibus teretibus rigidis fimbriato basi dentato. *In Demerara.* 2. Flores virides atro-purpureo-maculati.

25. *C. lancifolium* Lindl. B. R. 1841. t. 5. f. 5. petalis maculatis linearilanceolatis sepalo dorsali conformi suppositis labello subcordato-ovato fimbriato basin versus saccato sub sacco cornu 3-partito instructo. *In Brasilia.* 2.

26. *C. barbatum* Lindl. petalis versus apicem serratis; labello infra medium saccato margine pilis tenuibus succulentis albis longe fimbriato apice anguste attenuato recurvo supra ad basin spina tripartita infra apicem spina magna dentata porrecta. *Myanthus* Lindl. B. R. t. 1778. *M. spinosus* Hook. B. M. t. 3802. *In Brasilia et Demerara.* 2. Flores virides.

27. *C. cristatum* Lindl. B. R. t. 966. foliis oblongo-lanceolatis; perianthii explanatis; sepalo supremo petalique conniventibus; labello fimbriato cristatoque expanso cristae pilis crassis lucidis compressis. *In Brasilia.* 2.

4525. STANHOPEA Hook. (18.).

1. *S. insignis* Hook. B. M. t. 2948 et 2949. hypochilio globoso antice intruso basi et apice fisco mutico intus radiatim verrucoso extus ecarinato epichilio aequali, cornubus subtriangularibus falcatis incurvis; columna latissime alata. B. Cab. t. 1985. B. R. t. 1837. *In Brasilia.* 2.

2. *S. devoniensis* Lindl. sert. orch. t. 1. hypochilio subgloboso antice gibbosus basi mutico epichilio aequali; epichilio ovato integro v. obsolete 3-dentato cornubus falcatis incurvis aequalibus; columna marginata. *S. maculosa* B. Cab. t. 121. *In Mexico.* 2. Flores lutei fusco-maculati.

3. *S. oculata* Lindl. B. R. t. 1800. bracteis ovatis longe acuminatis; hypochilio unguiculato elongato cymbiformi antice intruso apice carnosus aperte sulcato mutico basi ecorni intus laevi extus bicarinato; epichilio ovato integro, cornubus semiteretibus adscendentibus acutis; columna late alata. *Ceratochilus* B. Cab. t. 1764. *In Mexico.* 2. Flores aurantiaci lila-cino-maculati.

4. *S. Bucephalus* Lindl. bracteis ovario subaequalibus; hypochilio unguiculato cymbiformi antice intruso apice carnosus aperte sulcato mutico basi longe angustato ecorni intus laevi extus bicarinato epichilio subrotundo-ovato cuspidato integro brevirore; cornubus gracilibus teretibus brevioribus; columna basi angustissima sursum alata. *Epidendrum grandiflorum* H. et B. pl. aeq. t. 27. *Anguloa* H. et K. *In Quito.* 2. Flores pallide flavi rubro maculati.

5. *S. Wardii* Lindl. sert. orchid. t. 20. bracteis longe acuminatis ovariis duplo brevioribus; hypochilio exacte oblongo depresso sessili antice intruso apice carnosus fisso, vix dentato basi utrinque angulato; cornubus semiteretibus foliatis incurvis subcircrosis; columna late alata. *In Am. austr.* 2. *Labellum* pallide flavum maculo intense luteo.

6. *S. Ruckeri* Lindl. hypochilio obovato sessili antice intruso basi mutico apice carnosus aperte sulcato et dente valido inflexo aucto, cornubus semiteretibus incurvis; columna late alata. *In Mexico.* 2. Flores pallide flavi.

7. *S. graveolens* Lindl. hypochilio subcompresso saccato intus glaberrimo antice bidentato et inter dentes profunde sulcato; epichilio integerrimo; cornubus acuminatissimis incurvis columnae alis latissimis subquadratis. *In Peruvia.* 2. Flores straminei labello aurantiaco-maculato.

8. *S. quadricornis* Lindl. B. R. 1838. t. 5. hypochilio oblongo basi bicorni antice saccato apice carnosus excavato mutico, epichilio ovato integro aequali; cornubus incurvis tetetibus brevioribus columna late alata. *In Am. austr.* 2. Color St. oculatae sed basi rubra et maculis 2 fuscis.

9. *S. eburnea* Lindl. B. R. t. 1529. labello oblongo vix medio constricto; hypochilio pone basin bicorni; epichilio ovato oblongo obtuso metachilio duplo longiore solido plano-convexo antice truncato bidentato; columna longissima apice tantum late alata. B. M. t. 3359. *In ins. Trinitat. et Brasilia.* 2.

10. *S. tigrina* Batem. orch. mex. t. 7. hypochilio subrotundo intus lamellis glandulosis radiato basi mutico apice sulco brevi aperto dente valido inflexo; epichilio ovali aequaliter tridentato cornubus falcatis aequali. *In Mexico.* 2. Flores aurantiaci brunnei maculati.

11. *S. Martiana* Batem. orch. mex. t. 27. labello medio parum constricto; hypochilio brevi sessili scrotiliformi, cornubus apice cirrhosis rectiusculis; epichilio obscure 3-dentato. B. R. 1843. t. 44. *In Mexico.* 2. Flores albi rubro maculati.

12. *S. saccata* Batem. orch. mex. t. 15. labello medio paulo constricto; hypochilio scrotiliformi antice omnino aperto subtus gibboso ecarinato intus radiatim glandulosum lamellato; epichilio ovati 3-lobi lacinia intermedia nana; cornubus latis. *In Guatimala.* 2. Flores viridi-flavo-maculati maculisque brunneis basi lutei.

4526. CYCLOSIA Klotsch. (1838).

1. *C. maculata* Klotsch *In Mexico.* 2. Rami densissimi carnosos incrassati. Folia disticha. Flores ramosi.

4527. HOULETTIA Lindl. (1841).

1. *H. vittata* Lindl. B. R. 1841. t. 69. sert. orch. t. 43. *In Brasilia.* 2. Pseudobulbi 1-phyllici conici. Fol. longissima petiolata plicata. Scapus radicalis adscendens. Flores racemosi neutrales.

4528. GONGORA Pav. (1801).

1. *G. atropurpurea* Hook. exot. fl. t. 178. fol. multiplicatis; sepalis lata basi acuminatis; hypochilio sub-4-cornuto denticulis interjectis. *In ins. Trinitatis.* 2. Flores atropurpurei immaculati.

2. *G. quinquenervis*. Fl. per. prodr. t. 25. fol. 5-plicatis lanceolatis; sepalis concavas basi angustatis; hypochilio bicorni dorso calloso. *In Peruvia.* 2. Flores luteo-purpurascentes.

3. *G. fulva* Lindl. B. R. 1844. t. 51. hypochili convexit cornubus lateral. elongatis capitatis aristatis setaceis; epichilio acuminato aequilongo; pedicellis column tripl longioribus. *In Peruvia.* 2. Flores lutei purpureo maculati.

4. *G. nigrita* Lindl. hypochili convexit cornubus lateral. adscendentibus abbreviatis aristis setaceis; epichilio acuminato apice uncinato breviro. *In Demerara.* 2.

5. *G. buxonia* Lindl. B. R. 1841. t. 2. et var. leucocilia 1847. t. 17. hypochili convexit cornubus lateralibus obsoletis; aristis setaceis; epichilio acuminato paulo breviro; pedicellis column tripl longioribus. *In Brasilia.* 2. Flores viridi-violacei et violacei punctati.

6. *G. truncata* Lindl. sepalis lateralibus rotundato-oblongis supremo obovato apiculato carinato; petalis minimis ovatis acutis decurrentibus 5-nerviis; labelli vernicati hypochilio medio compresso nude bicamerato margine laevi apice bicorni; epichilio ovato canaliculato. *In Mexico.* 2.

7. *G. Galeottiana* Lindl. *In Mexico.* 2.

4529. CORYANTHUS Hook. (1830).

1. *C. speciosa* Hook. B. M. t. 3102. fol. anguste lanceolatis; scapis erectis bifloris; labello 1 - colore. Gongora

B. M. t. 2755. *C. speciosa* alba Lindl. In Brasilia. 2. Flores maximi odore ingrato.

2. *C. maculata* Hook. fol. lanceolatis; scapis nutantibus multifloris; labello intus purpureo-maculato. B. R. t. 1793. In Demerara. 2.

3. *C. macrantha* Hook. fol. ? scapis ? labello basi utrinque quater plicato, plicis deflexis. Gongora B. Misc. t. 80. In Caraccas. 2. Flores maximi generis.

4530. ANGULOA Fl. per. (1801).

1. *A. uniflora* Fl. per. pedunc. 1-floro radicali squamis 2 imbricatis inflatis vaginato; flore bractea spathacea herbacea sublongiore; labelli glabri lobo medio angustissimo reflexo; lamina appendiculari retusa. B. R. 1844. t. 60. In Columbia. 2. Flores albi luteo tincti.

2. *A. Clowesii* Lindl. B. R. 1844. t. 63. pedunc. 1-floro radicali laxe squamato; flore carnosu resupinato; labelli 3-lobi lobo medio piloso infundibulari bilabiato labio altero 3-dentato; columna integra. In Columbia. 2. Flores straminei labello albo.

3. *A. Ruckeri* Lindl. B. R. 1846. t. 41. pedunc. 1-floro radicali squamis inflatis imbricatis vaginato, perianthio globoso; labelli 3-lobi antici lobis lateralibus aequalibus medio piloso infundibulari bilabiato labio altero 3-dentato; columna integra. In Columbia. 2. Flores lutei intus rubescentes.

4. *A? squalida* Poepp. et Endl. nov. g.t. 74. scapo spicato multifloro; floribus secundis; sepalis reflexo-patulis; fol. 6—8-nerviis. In Peruvia. 2. Flores carnei.

4531. PERISTERA Hook. (1830).

1. *P. elata* Hook. B. M. t. 3116. labello erecto medio articulato, dimidio superiore obovato truncato medio pulvinato inferiore bilobo columna continua; fol. plicatis scapis vaginatis multifloris. In Am. austr. 2.

2. *P. guttata* Lindl. (Knowl. et Westc.) B. Cab. t. 70. labelli crassi concavi lobis lateral. vix conspicuis superiore ovato margine denticulato

intus tuberculis minimis obsito; columna aptera; scapo pendulo multifloro; racemo denso secundo. In ? 2.

3. *P. Humboldti* Lindl. B. R. 1843. t. 18. labelli inflexi hypochilio carnoso oblongo concavo, metachilio bilobo laciinis erectis cuneatis carnosus, margine inferiore valde incrassato medio appendice biloba carnosa divaricata utrinque bidentata aucto, columna alata; racemo elongato multifloro pendulo. Anguloa superba H. et K. nov. g. t. 93. In Venezuela. 2. Flores fusco-purpurei multipunctati.

4. *P. cerina* Lindl. B. R. t. 1953. scapo brevi pendulo, racemo denso; labelli lobo medio margine crispato; columna aptera, Patria ? 2. Flores lutei.

4532. EUCNEMIS Lindl. (1833).

1. *E. brevitabris* Lindl. In Mexico. 2. Folia oblongo-lanceolata plicata. Scapus fol. longior. Flores bilabiati.

4533. CYMBIDIUM Sw. (1806).

a. *Acaulia ebubia*, fol. saepe ensiformibus; floribus galeatis; labello lamella dupliqui. Eucymbidium Lindl.

1. *C. sinense* Willd. fol. lanceolato-ensiformibus subcarnosis striatis; scapis erectis multifloris; bracteis ovario aequalibus; sepalis petalisque oblongo-lanceolatis; labello oblongo obtuso indiviso revoluto; lamellis arcuatis apice dilatatis conniventibus. Epidendron Andr. rep. t. 216. B. M. t. 888. In China. 2. Flores numerosissimi. Labellum sanguineum medio luteum.

2. *C. ensifolium* Sw. fol. ensiformibus striatis acutis sapis erectis multifloris; bracteis ovario duplo brevioribus; sepalis petalisque linearioribus acutis; labello indiviso planiusculo oblongo obtuso revoluto; lamellis continuis. B. R. t. 1976. B. M. t. 1751. In China. 2. Flores viridi-lutei, venis purpureis.

3. *C. xiphifolium* Lindl. B. R. t. 529. fol. linearis-ensiformibus cartilagineo-serrulatis striatis acutis; scapis erectis 4—5-floris; bracteis acuminatis; sepalis petalisque linearioribus

acutis; labello indiviso cucullato revoluto obtuso intus bicalcarato. In China. 4. Flores pallide virides.

4. *C. haematodes* Lindl. fol. lineariformibus tricostatis; scapo erecto multifloro; sepalis lineariformibus longis acutis; petalis lanceolatis undulatis; labelli lobis lateral. rotundatis obsoletis, intermedio ovato undulato; lamellis arcuatis integris. In Zeylona. 4. Flores albi venis roseis.

5. *C. macrorhizon* Lindl. rhizome repente subterraneo orbiculato; scapo adscendente laxe vaginato; racemo stricto laxifloro; sepalis lineariformibus longis, petalis latioribus; labelli 3-lobi concavi lobis lateral. rotundatis intermedio elongato obtuso convexo revoluto. In Cachemir. 4.

6. *C. cyperifolium* Wall. fol. lineariformibus acutis striatis 3-costatis scapis strictis longioribus; bracteis foliaceis; sepalis petalisque lineariformibus longis acutis intermedio ovato refracto. In Ind. or. 4. Flores virides.

7. *C. longifolium* D. Don. fol. lineariformibus striatis acutis scapo erecto nutante multifloro; bracteis minutis; petalis falcatis acutis; labelli 3-lobi lobis lateral. brevibus acutis intermedio ovato acuto subcordato; lamellis integerrimis. In Nepalia. 4. Flores virides sanguineo-striati.

8. *C. giganteum* Wall. fol. ensiformibus; racemo cernuo; bracteis minutis; sepalis oblongis petalisque lineariformibus striatis acutis; labelli 3-lobi lobis lateral. parvis acutis basi pubescentibus, intermedio undulato medio barbato; lamellis pilosis. In Nepalia. 4. Flores fusco-purpurei ochro-leuco marginati.

9. *C. elegans* Lindl. racemo densissimo nutante fol. ensiformibus breviore; floribus cylindraceis; sepalis petalisque lineariformibus longis obtusiusculis; labelli cuneati apice trilobi lobis lateral. acutis intermedio recto lamellis connatis. In Nepalia. 4. Flores viridi-lutei.

10. *C. lancifolium* Hook. exot. fl. t. 51. fol. radicalibus oblongo-lanceolatis scapis erectis paucifloris longioribus; labello 3-lobo apice recurvo linea media elevata sulcata; caulinibus fusiformibus carnosus. In Nepalia. 4. Sepala candida petala medio rosea, labellum candidum sanguineo-maculatum.

11. *C. suave* R. Br. fol. elongato-linearibus carinatis; scapis axillaribus basi bracteis imbricatis; racemis multifloris; perianthii patentis foliolis obtusis; labello ecarinato indiviso. In Nov. Holl. 4.

12. *C. canaliculatum* R. Br. fol. elongatis linearibus et carinatis rigidis; scapis axillaribus basi bracteis imbricatis; racemis multifloris; perianthii patentis foliolis acutis; labello infus bicarinato apice 3-lobo. In Nov. Holl. 4.

13. *C. Finleysonianum* Lindl. scapo gracillimo flexuoso multifloro; bracteis brevissimis; sepalis petalisque lineariformibus longis obtusis; labelli 3-lobi lobis lateral. acutis intermedio undulato recurvo; lamellis callosis. In Cochinchina. 4.

14. *C. bicolor* Lindl. fol. ensiformibus carnosus obtusis; racemis pendulis multifloris; sepalis petalisque lineariformibus longis acutiusculis; labelli 3-lobi saccati lobis acutis; lamellis basi callosis. In Ceylona. 4. Flores purpurei.

15. *C. aloifolium* Sw. fol. ensiformis coriaceis obtusis; racemis pendulis multifloris; petalis sepalisque lanceolatis obtusiusculis; labelli revoluti lobis lateral. acutis intermedio oblongo obtuso; lamellis interruptis elavatis. Rheede mal. 12. t. 8. In Ind. or. 4.

16. *C. Wattichii* Lindl. fol. latis ensiformibus oblique retusis, racemis longissimis pendulis multifloris; sepalis petalisque lineariformibus longis acutis, lamellis continuis. *C. aloifolium* Wall. In Ind. or. 4.

17. *C. pendulum* Sw. fol. ensiformis coriaceis obtusis; racemis pendulis multifloris; sepalis petalisque lineariformibus longis obtusis; labelli 3-lobi lobis lateral. acutis lamellis continuis apice confluentibus. B. R. 1840. t. 25. Epidendron Roxb. corom. t. 44. In Ind. or. 4. Flores straminei.

18. *C. limbatum* Hook. fol. oblongis coriaceis planis; racemis multifloris; bracteis minutis; sepalis petalisque linearibus obtusis, labelli 3-lobi lobis lateral. acutis intermedio lineariformibus obtuso. In ins. Trinitat. 4.

19. *C. riotaceum* H. et K. fol. distichis oblongis obtusis canaliculatis interne maculatis; pedunc. paucifloro; petalis subcrenulatis; labelli 3-lobo intermedio subrotundo emarginato

crenulato interne ruguloso-villoso. In sylevis *Orinocensis*. 2. Flores violacei patentissimi.

20. *C. flabelliforme* Sw. acaule compressum; fol. basi attenuatis carinatis superne planis ovato-lanceolatis nervosis; scapis abbreviatis 1-floris. In *Jamaica*. 2.

21. *C. acuteatum* Sw. fol. linearibus patentibus scapo flexuoso brevioribus; racemo denso paucifloro; sepalis petalisque conniventibus obtusis; labelli ovati 3-lobi lobis lateral. acutis intermedio recto rotundato. *Satyrion* L. In *Prom. b. s.* 2. Flores parvi flavi.

22. *C. tabulare* Sw. folio linearis solitario; scapo flexuoso striato; floribus 5 cernuis; sepalis ovatis-obtusis concavis erectis, petalis patentibus; labello breviore convoluto concavo obtusissimo 3-partito. *Satyrion* L. In *Prom. b. S.* 2. Flores virescentes. *Labellum* flavum

23. *C. flabellatum* Lindl. fol. linearis-loratis distichis flabellatis scapo longioribus; racemo paucifloro sepalis ovatis acutis petalis erectis brevioribus; labelli lobis lateralibus acutis intermedio criso trilobo. *Limodorum* Thouars orch. afr. t. 39. 40. In *Madagascar*. 2. Flores purpureo-lutei.

24. *C. subulatum* Sw. acaule; fol. subulatis sulcatis; racemis radicalibus. In *Jamaica*. 2.

25. *C. virescens* Lindl. fol. gramineis recurvis serrulatis 3-nerviis; scapo 1-floro; sepalis linearibus obtusis concavis patulis; labello oblongo indiviso apice revoluto, fovea utrinque irregulare truncata infra apicem plicarum. In *Japonia*. 2. Flores viridi-lutei.

26. *C. iridifolium* Lindl. fol. elongato-linearibus; racemis multifloris bracteatis; perianthii foliolis patulis obtusis; labello 3-lobo, lobo intermedio linguiformi, disco glanduloso-punctato nitido. In *Nov. Holl.* 2.

27. *C. madidum* Lindl. fol. ensiformibus; racemis pendulis; sepalis ovalibus obtusis patulis, petalis conform. erectis; labello permedium madescente oblongo, lobis lateral. minimis intermedio oblongo obtuso. In *Ind. or.* 2. Flores viridi-flavi.

28. *C. pubescens* Lindl. fol. ensiformibus; striatis bidentatis; racemo brevi pendulo; bracteis minimis; se-

palis petalisque linearibus patulis; labelli 3-lobi basi saccati intus pubescentis laciniis lateralibus acutis intermedia oblonga obtusa subundulata. In ? 2.

29. *C. Mastersii* Griffits; fol. distichis anguste ensiformibus obtusis; squamis pedunculi herbaceis equitantibus acutissimis; racemo brevi cernuo; sepalis petalisque lineari-oblongis acutis; labello obovato 3-lobo intus pubescente, lobo medio undulato. B. R. 1845. t. 50. In *Ind. or.* 2. Flores albi labello rubro maculato et macula lutea.

b. Caulescentia ebulbia. Pseudo-Vanda Lindl.

30. *C. tenuifolium* Willd. fol. teretibus; umbellis subsessilibus; sepalis linearibus obtusis patentibus petalis longioribus; labello oblongo concavo, disco 3-callosa basi auriculato apice membranaceo bilobo. Rheede 12. t. 5. In *Malabarica*. 2. Sepala et petala luteo-viridia labellum pallide viride.

31. *C. triste* Willd. fol. teretibus; umbellis subsessilibus; sepalis petalisque conniventibus carnosus oblongis cymbiformibus; labello oblongo sepalis duplo latiore. Luisia teretifolia Gaudich. voy. t. 37. In *Nova Caledonia*. 2.

c. Caulescentia axillaris pseudobulbiferis. Camaridium Lindl.

32. *C. restitum* Sw. caule dichotomo vaginis undique imbricato apice axillisque bulbifero; bulbis 1-phyllis; floribus consertis e vaginis caulis. *Camaridium* purpureum Spr. In *Jamaica*. 2. Flores minutti purpurei.

33. *C. ochroleucum* Lindl. fol. ligulatis carinatis oblique emarginatis; floribus solitariis axillaribus; sepalis petalisque aequaliter patentibus linearis-oblongis subacutis; labello cucullato trilobo disco barbato. *Camaridium* B. R. t. 844. In *ins. Trinitatis*. 2.

34. *C. glandulosum* H. et K. bulbo oblongo; fol. late linearibus acutis; pedunculo paucifloro pedicellisque glandulosis; sepalis spathulatis; labello 3-lobo, lobo intermedio emarginato. In *Caracus*. 2. Flores aurantiaci.

35. *C. candidum* H. et K. bulbo oblongo; fol. linearis-lanceolatis obtu-

sis; pedunculo paucifloro; calycis foliolis lanceolato-oblongis crenulatis; labello 3-lobo, lobo intermedio subrotundo emarginato crenulato. *In Popaya.* 2. Flores candidi; labelli lobo intermedio violaceo.

36. *C. cordigerum* H. et K. bulbo oblongo; fol. linear-lanceolatis obtusis; pedunculo paucifloro; calycis foliolis spatulatis; labello 3-lobo, lobo intermedio obcordato subcrenulato. *In Venezuela.* 2. Flores purpurei.

d. Rhizoma repe's pseudo-bulbos 1—2-phyllos gerens. *Bulbidium* Lindl.

37. *C. diurnum* Sw. fol. coriaceis linear-longis rectis obtusis; scapo terminali paniculato multifloro; sepalis petalisque patentibus; labelli 3-lobi lobis lateralibus abbreviatis acutis dentatis intermedio unguiculato obovato bilobo marginibus revolutis. *Limodorum* Jacq. ic. t. 603. *In Caracas.* 2.

38. *C. trinerve* Mey. fol. radical. linear-lanceolatis trinerviis; scapo paniculato; bracteis petalisque margine crispato-undulatis; labelli lobo medio latiore emarginato. *In Essequibo.* 2. Flores fusco-lutei. *Labellum sulphureum.*

39. *C. marginatum* L. fol. linear-lanceolatis coriaceis erecto-recurvis; scapis 1-floris gracilibus vaginatis; sepalis petalisque minoribus oblongo-lanceolatis; labello oblongo lanceolato obtuso cucullato subrepando indiviso. *Maxillaria* gracilis B. Cab. t. 1837. *In Brasilia.* 2. Flores lutei.

40. *C. javanicum* Blume; bulbis caulinormibus teretibus 3-foliatis; fol. linear-lanceolatis acuminatissimis membranaceis; spica laterali pauciflora; labello intus carinato. *In Java.* 2.

41. *C. cuspidatum* Blume; bulbis ovato-oblongis compressiusculis sub-4-phylis; fol. linear-lanceolatis cuspidatis coriaceis; spica radicali 3—5-flora; labello intus carinato medio bicarilloso. *In Java.* 2. Flores flavi lineis purpureis.

e. *Acaulia tuberosa*. Columna alata. *Angidium* Lindl.

42. *C. utriculatum* Sw. radice difformi succulenta; fol. lato-lanceolatis-plicatis; scapo e vagina inflata foliis duplo longiore; floribus albis

succulentis. *Limodorum* Jacq. fragm. t. 32. f. 4. *In Jamaica.* 2.
f. Species dubiae.

43. *C. vexilliferum* Llave. *In Mexico.* 2.

44. *C. montanum* Sw. *In Jamaica.* 2.

4534. *GROBYA* Lindl. (1840).

1. *G. galeata* Lindl. *In Brasilia.* 2.

4535. *SCLEROPTERIS* Scheidw. (1839).

1. *S.* Scheidw. in Otto et Dietr. gart. 7. *In Brasilia.* 2. Pseudobulbi 4-goni 1-phyllo. Folium ovato-oblongum acuminatum coriaceum 5-nerve. Racemi filiformes penduli. Flores flavi.

4536. *ACROPERA* Lindl. (1833).

1. *Loddigesii* Lindl. B. M. t. 3563. *Maxillaria* galeata B. Cab. t. 1645. *In Mexico.* 2. Flores fusco-crocei.

4537. *CREMASTRA* Lindl. (1834).

1. *C. Wallichiana* Lindl. *Cymbidium appendiculatum* Don. *In Nepal.* 2. Bulbi magni globosi. Folia oblongo-lanceolata. Scapus 1—2 ped. Flores penduli rosei.

4538. *GRAMATOPHYLLUM* Blume (1826).

1. *G. speciosum* Blume caule carnosus; fol. ensiformibus plicatis; scapis radicalibus. Rumph 6. t. 42. *Gabertia scripta* Gaudich. *In Java et Moluccis.* 2. Flores luteo-virides.

2. *G. Finleysonianum* Lindl. caule cylindraceo stricto; fol. distichis emarginatis; racemis terminalibus longe pedunculatis; bracteis distichis concaavis rigidis. *In Singapore.* 2.

3. *G. multiflorum* Lindl. racemo erecto longissimo; labelli pubescentis medio hirsuti lobis lateral. subfalcatis B. R. 1842. t. 65. *In Manilla.* 2. Flores fusco-virides.

4539. TRICHOCEROS H. et K. (1815).

1. *T. parviflorus* H. et K. nov. g. t. 76. processibus columnae linea-ribus adscendentibus exannulatis sepalis paulo brevioribus. *In Nov. Granata.* 2. Flores flavescentes.

2. *T. antennifer* H. et K. processibus columnae annulatis arcuatis antennaeformibus. *Epidendron H. et Bonpl. pl. aeq. t. 28. In Quito.* 2. Flores violaceo-punctati.

3. *T. muralis* Lindl. processibus columnae oblongis obtusis planis sepalis duplo brevioribus. *In Peruvia.* 2.

4540. GEODORUM Jacks. (1810).

1. *G. purpureum* R. Br. scapo fol. longiore; racemo pendulo; floribus alternis; labello ovato acuto picto. *Limodorum nutans Roxb. cor. t. 40. In Ind. or.* 2.

2. *G. pictum* Lindl. racemo pendulo multifloro; labello ovato retuso picto; callo disci ovato apice soluto dentato; fol. lanceolato-oblongis. *Cymbidium R. Br.*

3. *G. dilatatum* R. Br. scapo fol. breviore; spica pendula; floribus congestis; labello subcalcarato apice dilatato crenulato. *Rheede 11. t. 25. Limodorum recurvum Roxb. corom. t.*

39. *Cistella cernua* Blume. *In Ind. or.* 2. Flores carnei venis roseis.

4. *G. pallidum* Don; scapo fol. breviore; spica congesta nutante; labello basi saccato ovato integerrimo cucullato. *Limodorum candidum Roxb. In Ind. or.* 2.

5. *G. citrinum* Jacks. scapo fol. breviore; spica pendula; floribus congestis; labello basi subcalcarato apice obtuso integerrimo. *In Ind. or.* 2. Flores citrini.

6. *G. saccatum* Lindl. B. R. t. 1687. scapo florifero fol. duplo breviore; spica pendula congesta; labello gibbosum ovato emarginato integerrimo lineis 2 callosis elevatis. *In Zeylona.* 2. Flores rosei.

4541. ACANTHOPHIIPPUM

Blume. (1826).

1. *A. javanicum* Blume; petalis 3-angularibus; labelli lobis lateral. truncatis; perianthio ovato. *In Java.* 2.

2. *A. Sylhetense* Lindl. petalis oblongo-lanceolatis acutiusculis; labelli lobis lateralibus acutis; perianthio obovato. *In Sylhet.* 2. Flores 2-poll. albi.

3. *A. bicolor* Lindl. B. R. t. 1730. petalis oblongo-lanceolatis acutis; labelli lobis lateral. rotundatis; perianthio ovato. *[In Zeylona.* 2. Flores lutei apice purpureo-violacei.

4. *A. striatum* Lindl. petalis oblongis acutis sepalisque apice revolutis; labelli lobis lateral. rotundis intermedio acuto carnoso utrinque plicato elevato longitudinali. *In Nepalia.* 2

4542. DORITIS Lindl. (1834).

1. *D. pulcherrima* Lindl. *In Cochinchina.* 2. Herba caulescens radices undique promens. Folia oblonga carnosa. Spica stricta multiflora.

4543. CHELONANTHERA Blume (1826).

1. *C. gibbosa* Blume; bulbis oblongis 4-angularibus diphyllis; fol. lanceolatis; racemis elongatis nutantibus flexuosis; labello medio bidentato. *In Java.* 2.

2. *C. ventricosa* Blume tab. 51. bulbis oblongis compressiusculis sulcatis diphyllis; fol. lanceolatis nervosis; scapo erecto; labello medio bidentato. *In Java.* 2.

3. *C. sulphurea* Blume; bulbis oblongis 3-gonis 1-phyllis, fol. lanceolatis coriaceis; labello margine inferne utrinque carinato. *In Java.* 2.

4544. ACANTHOGLOSSUM Blume (1826).

1. *A. nervosum* Blume. *In Java.* 2. Herba epiphyta bulbifera habitu Chelonantherae.

4545. SURPIA Lindl. (1834).

1. *S. scariosa* Lindl. spicis fol. duplo longioribus; floribus bracteis brevioribus; labello ovato basi concavo. *In Nepalia.* 2. Flores albi roseo suffusi.

2. S. bicolor Lindl. racemis foliis subaequalibus; floribus bracteis longioribus; labello obovato apiculato serulato-ciliato. In Nepalia. 4. Petala alba. Labellum atropurpureum.

4546. CALYPSO Salisb. (1805).

1. C. borealis Salisb. parad. lond. t. 89. Hook. exot. fl. t. 12. B. M. t. 2763. Orchidium boreale Sv. bot. t. 518. In regionibus septentrionalibus Europ. Amer. et Asiæ. 4. Herba terrestris bulbosa. Folia solitaria plicata. Flos terminalis speciosus.

4547. EULOPHIA R. Br. (1823).

a. Folia plicata cotemporanea.

1. E. explanata Lindl. racemo stricto multifloro; sepalis patentissimis; petalis oblongis angustioribus; labello ovato obtuso subundulato concavo lammato. In Zeylona. 4.

2. E. nuda Lindl. fol. lanceolatis acuminatis; racemo paucifloro secundo fol. longiore; sepalis petalisque linear-oblongis obtusis; labello obtuso oblongo subundulato nudo. In Ind. or. 4.

3. E. bracteosa Lindl. fol. oblongo-lanceolatis scapo terminali longioribus; bracteis foliaceis; sepalis petalisque carnosis oblongis acutis; labello oblongo apice retuso undulato elevato venoso versus apicem glanduloso-barbato. In Ind. or. 4.

4. E. grandiflora Lindl. fol. lanceolatis; scapi vaginis longissimis; sepalis carnosis oblongis undulatis acutis; petalis retusis; labello oblongo subrepando sub apice glanduloso. In Zeylona. 4.

5. E. guineensis Lindl. B. R. t. 686. scapo laxo multifloro; sepalis petalique linear-lanceolatis acutis; labelli cucullati lobis lateral. abbreviatis intermedio subundulato obtuso lineis verruculatis inscripto. In Sierra Leone. 4. Sepala et petala viridia purpureo venosa. Labellum album.

6. E. promensis Lindl. folio unico longo petiolato linear-lanceolato; sepalis concavis oblongis acutis; petalis obtusis; labello oblongo medio constricto basi ventricoso utrinque tumido sub apice rotundato, processibus aggregatis carnosis truncatis. In Ind. or. 4.

7. E. articulata Lindl. pseudobulbis articulatim connatis; racemo elongato; sepalis reflexis petalique contortis; labelli 3-lobi lobo medio ovato obtuso deflexo margine crispato, disco lineis callosis crispis rugosissimo. In Guinea. 4. Flores incarnati labello violaceo.

8. E. concolor Lindl. fol. oblongis acutis concavis brevibus; racemo terminali flexuoso subcorymboso; sepalis petalique oblongis acutis; labelli 3-lobi lobis lateralibus adscendentibus acutis intermedio convexo crispato crenato. Limodorum Thouars orch. afr. t. 45. In Borbonia. 4. Flores lutescentes.

9. E. herbacea Lindl. fol. oblongo-lanceolatis acutis; racemo secundo; sepalis herbaceis ovato-lanceolatis acutis; petalis brevioribus obtusiusculis; labelli 3-lobi lobis lateralibus abbreviatis intermedio oblongo subundulato venis pubescentibus. In Zeylona. 4. Sepala viridia petala et labellum candida.

10. E. turida Lindl. B. R. t. 1821. fol. lineari-lanceolatis scapo ramoso multo brevioribus; bracteis minimis subulatis; sepalis linear-spathulatis obtusis petalis paulo latioribus; labelli 3-partiti basi callosi lobis lateral. obtusis recurvis intermedio obcordato. In Sierra Leone. 4.

11. E. scripta Lindl. caulis carnosis oblongis; fol. linear-loratis subdistichis; scapis radical. ramosis; sepalis petalique linear-oblongis obtusiusculis; labelli 3-lobi lobo intermedio cuneato rotundato tuberculato bicristato; calcare brevissimo. Limodorum Thonars. orch. t. 46. 47. In Madagascaria et Borbonia. Flores speciosi purpureo-lutei.

12. E. graminea Lindl. fol. gramineis; scapo ramoso; floribus erectis in fructu pendulis; sepalis petalique linearibus acutissimis; labello 3-lobo basi angustato, lobo intermedio oblongo crispato venis 3 fimbriato-appendiculatis. In Ind. or. 4.

13. E. pulchra Lindl. fol. oblongo-lanceolatis; racemis strictis multifloris; sepalis petalique oblongo-linearibus acutis; labello oblongo basi ventricoso obtuso subundulato; calcare subdidymo. Limodorum Thouars t. 43. In Borbonia. 4. Flores speciosi purpureo-maculati.

14. E. virens R. Br. fol. gramineis linear-i-lanceolatis scapo ramoso brevioribus; sepalis petalisque oblongis obtusis tesellatis; labelli 3-lobi barbati lobis lateral. abbreviatis intermedio ovato obtuso. *Limodorum virens* Roxb. corom. t. 38. *In Ind. or.* 2.

15. E. carinata Lindl. fol. linearibus complicatis carnosis fractu facilibus; scapo simplici; labello concavo spathulato apice repando; calcare ecarinato. *Rheede* 12. t. 26. *In Malabarica.* 2.

16. E. macrostachya Lindl. B. R. t. 1972. fol. oblongis utrinque acuminateis plicatis subtricostatis; scapo simplici foliis longiore; sepalis linear-i-lanceolatis acuminatis; petalis latioribus undulatis; labelli suborbicularis 3-lobi lobis lateral. intermedio alte bilobo subaequalibus, lamellis 2 nanis. *In Zeylona.* 2.

17. E. hians Spr. fol. ensiformibus integerimis; scapo radicali squamis cucullatis vaginato; sepalis petalisque obtusis; labelli 3-lobi lobis lateral. parvis ovatis intermedio ovato-obcordato striato venoso. *Satyrium* L. *In Prom. b. Spec.* 2.

18. L. ensata Lindl. B. R. t. 1147. fol. linear-i-lanceolatis plicatis; scapo simplici; racemo capitato; sepalis petalisque oblongis acutis; labelli 3-lobi lobo intermedio linguaeformi, disco barbato; bracteis venosis. *In Prom. b. S.* 2. Flores flavi.

19. E. atrovirens Lindl. fol. oblongo - lanceolatis acutis patentibus scapo erecto simplici multifloro subaequalibus; sepalis petalisque ovatis acutis; labello cucullato 3-lobo, lobis rotundis intermedio transverso; calcare subinfundibulari obtusissimo. *In Ind. or.* 2. Flores ochroleuci sepalis extus purpureo-maculatis.

20. E. squalida Lindl. fol. latensiformibus 5-nerviis; spica multiflora; bracteis ovatis acuminatis ovario acutangulo brevioribus; labelli 3-lobi laciinis rotundatis intermedia crispa emarginata calva venis elevatis. *In Chili.* 2.

b. Desciscentes. Folia equitantia.

21. E. tristis Spr. fol. ensiformibus equitantibus serrulatis; scapo subramoso; sepalis petalisque conniventis

bus oblongis acutis; labelli 3-lobi lobis lateralibus abbreviatis, intermedio oblongo obtuso criso, venis. 7 subparallelis. *Satyrium* Thunb. *In Prom. b. S.* 2. Flores fuscæ.

22. E. tamettata Lindl. fol. ensiformibus integerrimis scapo terminali duplo brevioribus; bracteis acuminateis; sepalis petalisque conniventibus oblongis acutis; labelli 3-lobi lobo intermedio oblongo obtuso criso venis omnibus laceris cristatis. *In Prom. b. Spec.* 2.

23. E. micrantha Lindl. fol. ensiformibus recurvis margine serrulatis; scapo ramoso squamis longis membranaceis vaginato; spicis elongatis; perianthio connivente; sepalis angustovatis obtusis carnosis; labelli concavi 3-lobi lobis lateralibus divergentibus acutis; intermedio 3-lamellato rotundato. *In Prom. b. Spei.* 2.

24. E. barbata Spr. fol. linearis-ensiformibus recurvis integerrimis; scapo compresso flexuoso fol. duplo longiore; sepalis petalisque ovato-lanceolatis acutis; labelli 3-lobi lobis lateral. minutis intermedio oblongo criso disco barbato. *Serapias capensis* L. *In Prom. b. S.* 2. Flores albi.

c. Aphyllae. Folia serotina. Flores penduli secundi.

25. E. rupestris Lindl. floribus pendulis subsecundis; sepalis petalisque linearibus acutis; labello 3-lobo basi angustato, lobis lateral. abbreviatis intermedio oblongo dentato. *Bletia dubia* Don. *In Ind. or.* 2. Flores carnei labello sanguineo-maculato.

26. E. campestris Wall. sepalis petalisque linear-i-spathulatis obtusiusculis; labello oblongo 3-lobo venoso, lobo intermedio transverse crenulato lineis 3 barbatis ad basin. *In Ind. or.* 2. Flores fusco-purpurei.

27. E. ramentacea Lindl. bracteis subulatis ovario brevioribus; floribus erectis; sepalis petalisque linear-i-spathulatis acutis; labelli 3-lobi lobo intermedio undulato obtuso, lamellis 3 interruptis apice laceris. *In Ind. or.* 2.

4548. DIPODIUM R. Br. (1810).

1. D. punctatum R. Br. squamis radic. distantibus; labello recto disco

pubescente. B. R. t. 1980. *Dendrobium Sm. exot. fl. t. 12. In Nov. Holl.* 2.

2. *D. squamatum* R. Br. squamis radic. oblongis carinatis imbricatis; labello barbato deflexo. *In Nov. Caledonia.* 2.

4549. GALEANDRA Lindl. (1834).

1. *G. Baueri* Lindl. ill. of orch. pl. t. 8. fol. oblongis acutis racemo terminali paucifloro folium superante; sepalis petalisque linearis - oblongis acutiusculis; labello maximo antice repando emarginato. B. R. 1840. t. 49. *In Guiana.* 2.

2. *G. gracilis* Lindl. fol. linearis lanceolatis acuminatis scapo vaginato radicali brevioribus; sepalis petalisque explanatis ovatis acutis; labello antice infundibuliformi obtuso margine fimbriato. *Eulophia* B. R. t. 742. *In Sierra Leone.* 2. Flores virides apicibus sanguineo-maculatis.

3. *G. extinctoria* Lindl. racemo erecto simplici subsecundo paucifloro; sepalis conniventibus obovatis serratis; petalis brevioribus integerrimis obtusis; labello postico extictoriiformi obtuso margine fimbriato. *In Sierra Leone.* 2.

4. *G. cristata* Lindl. sepalis petalisque linearis-lanceolatis reflexis; labello convoluto margine criso; calcare acuminate; antherae crista rhombea unguiculata. *In Guiana.* 2.

4550. ZYGOPETALUM Hook. (1828).

1. *Z. Makaii* Hook. B. R. t. 2748. fol. lorato-lanceolatis strictis apice recurvis racemo brevioribus; sepalis petalisque oblongo-lanceolatis acutis; labello obcordato glaberrimo, callo crassissimo bilobo. B. Cab. t. 1664. *Eulophia* B. R. t. 1436. *In Brasilia.* 2.

2. *Z. intermedium* Lodd. fol. ensiformibus racemo brevioribus; sepalis petalisque oblongis acutissimis; labello subrotundo undulato alte bilobo pubescente. *In Brasilia.* 2.

3. *Z. brachypetalum* Lindl. fol. ensiformis-lanceolatis scapo elato multifloro brevioribus; sepalis petalisque oblongis obtusis; labello transverse subrotundo emarginato pubescente, callo integerrimo. *In Brasilia.* 2.

4. *Z. crinitum* Lodd. B. Cab. t. 1687. fol. late lanceolatis bracteis cucullatis; sepalis petalisque linearis-lanceolatis acutissimis; labello obovato emarginato basi longo angustato venis villosissimis, callo incurvo. *In Brasilia.* 2.

5. *Z. stenochilum* Lodd. B. Cab. t. 1923. fol. latioribus racemo subaequalibus; sepalis oblongis acuminatis petalis brevioribus duplo angustioribus; labello angustato oblongo obtuso villosi, callo emarginato. *In Brasilia.* 2. Flores fusco-rubri labello albo medio violaceo-venoso.

6. *Z. maxillare* Lodd. B. Cab. t. 1776. B. M. t. 3686. fol. linearis-lanceolatis undulatis acuminatis racemo flexuoso longioribus; sepalis petalisque ovato-oblongis acutis; labello glabro obovato, crista unguiformi maxima crenata. *In Brasilia.* 2. Sepala et petala viridia fusco maculata labello violaceo margine coeruleo.

7. *Z. Murreyanum* Hook. B. M. t. 3676. pseudobulbis profunde sulcatis; racemis fol. brevioribus; sepalis petalisque ovato-lanceolatis; labelli 3-lobi lobis lateral. ovatis, intermedio ovato-lanceolato reflexo glabro; callo integro sulcato. *In Brasilia.* 2. Sepala et petala pallide viridia, labello albo.

8. *Z. gramineum* Lindl. fol. linearis-lanceolatis; scapo 1-floro capillari brevi adscendente; labello subrotundo fimbriato tenui supra basin appendicibus 2 ovato-lanceolatis acutis aucto. *In Popaya.* 2.

9. *Z. cochleare* Lindl. B. R. t. 1857. fol. obovato-lanceolatis pedunculis 1-floris multo longioribus; sepalis petalisque ovato-lanceolatis conniventibus; labello cochleato subrotundo bilobo velutino; crista arcuata crenata anthera ecristata. *In ins. Trinitatis.* 2. Flores albi labello azureo fragrantissimi.

10. *Z. rostratum* Hook. B. M. t. 2918. fol. lato-lanceolatis patulis scapo paucifloro longioribus; sepalis petalisque linearis-lanceolatis undulatis acuminatis; labello subrotundo-ovato, callo bascos crenato lunato; columna apice cucullata dentata. *In Demerara.* 2. Sepala et petala viridia striis purpureis, labello albo crista violacea.

11. *Z. africanum* Hook. B. M. t. 3812.

4551. CYRTOPODIUM R. Br. (1821).

1. *C. Andersoni* R. Br. sepalis petalisque undulatis ovatis; labelli lobis lateral. oblongis obtusis intermedio ovato rotundato concavo; disco convexo. B. M. t. 1800. R. B. 1841. t. 8. *Cymbidium Andersoni* B. rep. t. 651. *In Ind. or.* 4. Flores flavi.

2. *C. punctatum* Lindl. fol. lanceolatis plicatis; scapo paniculato; vaginis maximis; sepalis petalisque undulatis acutis maculatis; labelli lobo intermedio papilloso. *Plum. sp. t. 187.* *In Hispaniola.* 4.

3. *C. cristatum* Lindl. racemo simplici; bracteis patulis concavis setaceo-acuminatis; labelli lobis subaequalibus lateralibus erectis ietermedio concavo; crista oblonga carnosa inter lobos laterales. *In Demerara.* 4.

4. *C. glutiniferum* Raddi. *In Brasilia.* 4.

5. *C. Wilmorei* Floral cab.

4552. CHYSIS Lindt. (1837).

1. *C. aurea* Lindl. B. R. t. 1937. caulinibus pendulis; fol. nervosis basi vaginalibus; racemis lateral. multifloris. *In Am. trop.* 4.

2. *C. bractescens* Lindl. B. R. 1841. t. 23. bracteis cucullatis venosis foliaceis ovario longioribus; labelli lobis lateral. obtusis intermedio carnosus bilobo plicato, lamellis 5 carnosis basi pubescentibus. *In Mexico.* 4. Flores albi labello luteo.

3. *C. laevis* Lindl. bracteis brevibus ovatis; sepalo dorsali oblongo; petalis falcatis; labelli lobo intermedio membranaceo crispato, lamellis 5 carnosis glaberrimis. *In Mexico.* 4. Flores magui lutei.

4553. CYRTOPEIRA Lindt. (1833).

1. *C. plantaginea* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis 5-costatis racemo radicali brevioribus; sepalis linearilanceolatis petalis latioribus brevioribus; labelli lobis lateral. incurvis, intermedio ovato undulato. *Limodorum Thouars orch. afr.* t. 41. 42. *In Madagascar.* 4. Flores purpurascentes.

2. *C. Woodfordii* Lindl. caulinibus fusiformibus carnosis; fol. lanceolatis

plicatis patentibus; scapo radicali multifloro; bracteis subulato-lanceolatis; sepalis lineari-lanceolatis acutis; petalis oblongis conniventibus; labelli gibbosi lobis lateralibus rotundatis. *Cyrtopodium B. M. t. 1814.* B. R. t. 1508. *In ins. Trinitat.* 4. Flores virides labello purpureo.

3. *C. flava* Lindl. fol. longis lanceolatis plicatis; scapo striato multifloro; sepalis petalisque ovatis acutis; labelli 3-lobi lobo intermedio angustiore obtuso crispato, venis 3 ramentaceis. *In Ind. or.* 4. Flores lutei.

4. *C. obtusa* Lindl. fol. longis lanceolatis plicatis; scapo stricto multifloro; sepalis petalisque obtusissimis; labelli 3-lobi lobis obtusis, axi elevata carnoso basi bituberculato.

5. *C. bicarinata* Lindl. aphylla; scapo gracili distanter vaginato; racemo compacto oblongo; sepalis petalisque linear-lanceolatis undulatis acutis; labelli 3-lobi lobo intermedio undulato bilobo; pede columnae elongato. *In Ind. or.* 4. Flores virentes labello lilacino striato medio flavo.

7. *C. plicata* Lindl. fol. acuminate scapo laxe vaginato 6-8-floro; sepalis lineari-lanceolatis petalisque latioribus acutis; labelli 3-lobi basi bicallosi lobis lateralibus rotundatis erectis intermedio retuso. *In Ind. or.* 4.

8. *C. pedicellata* Lindl. fol. subsolitarii ensiformibus plicatis; floribus racemosis cernuis; sepalis ovato-lanceolatis acutiusculis patent-erectis lateralibus angulatis; labelli lobo intermedio oblongo concavo supra sulcato ramentis brevissimis obsito. *Satyrium capense L.* *In Prom. b. Spec.* 4.

9. *C. gigantea* Lindl. fol. carnosis equitantibus ensiformibus recurvatis; scapo multifloro; sepalis petalisque ovatis acutis patentibus; labelli hastati lobis lateral. deltoideis utrinque productis, intermedio integrō disco longitudinaliter plicato limbō undulato. *Satyrium L.* *In Prom. b. Spec.* 4. Flores flavescentes.

4554. LISSOCHILUS R. Br. (1821).

1. *L. speciosus* R. Br. fol. carnis; scapo multifloro; sepalis ovatis reflexis; petalis oblongis; labello cum

basi columnae connato basi auriculato; epichilio convexo sulcato emarginato, gibbo brevi. B. R. t. 573. In Prom. b. Spec. 2.

2. *L. streptopetalus* Lindl. scapo radicali multifloro; sepalis oblongis obtusis; petalis duplo latioribus basi tortis; labelli trilobi lobis lateral. ascendentibus obtusis, intermedio convexo rotundato 3-costato. *Eulophia* B. R. t. 1002. B. M. t. 2931. In Brasilia. 2. Sepala viridia purpureo-maculata. Petala labellumque vitellina.

3. *L. parviflorus* Lindl. scapo 6-8-floro; sepalo supremo ovato concavo reflexo; petalis oblongis unguiculatis; labello basi auriculato, epichilio oblongo obtuso 3-carinato, gibbo antice sulcato. In Prom. b. Spei. 2.

4. *L. macranthus* Lindl. bracteis maximis convolutis cuspidatis; sepalis linear-oblengis obtusis reflexis late oblongis obtusissimis; labello basi infundibulari acuminato lobo intermedio crenato. In Africa. 2.

5. *L. arabicus* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis plicatis; racemo multifloro; sepalis oblongis obtusis patentissimis; petalis oblongis obtusis; labelli lobis lateralibus acutis, intermedio cenvexo venis 5 elevatis lamellatis, gibbo conico obtuso. In Arabia. 2.

4555. CHAENANTHE Lindl. (1838).

1. *C. Barkeri* Lindl. In Brasilia. 2.

4556. NOTYLIA Lindl. (1825).

1. *N. punctata* Lindl. labello unguiculato cordato-ovato obtuso basi calloso margine reflexo; sepalis petalisque obtusis; rachi flexuosa. In ins. Trinitatis. 2.

2. *N. incurva* Lindl. labello unguiculato cordato-ovato acuminato sub apice carinato basi ecallosa margine reflexo; sepalis lateralibus apice rectis petalisque lanceolatis acutis; columna recurva. In ins. Trinitatis. 2. Flores pallide straminei.

3. *N. Barkeri* Lindl. labello unguiculato cordato-ovato basi calloso margine subreflexo; sepalis lateralibus apice reflexis petalisque acutis; columna recurva. In Mexico. 2. Flores lutei.

4. *N. tenuis* Lindl. labello unguiculato cordato-ovato setaceo-acuminato

basi ecalloso margine reflexo; sepalo supremo falcato lateralibus apice revolutis acuminatis; columna recta. In Demerara. 2. Flores flavi.

5. *N. micrantha* Lindl. labello subsessili plano ovato acuto basi calloso; sepalis petalisque linearibus acutis; columna recta. In Demerara. 2. Flores pallide virides.

4557. MADESVALLIA Ruiz. (1800)

1. *M. uniflora* Ruiz. fol. oblongo-spathulatis, pedunc. 1-floris longissimis; sepalis aristatis. H. et K. nov. g. t. 89. In Peruvia. 2.

2. *M. caudata* Lindl. fol. obovato-oblongis scapo paulo brevioribus; sepalis longissime aristato-caudatis. In Nov. Granata. 2.

3. *M. infracta* Lindl. fol. obovato-oblongis breve petiolatis scapi longitudine; floribus ventricosis sub sepalis lateralibus infractis; sepalis longe aristatis. In Brasilia. 2. Flores violacei aristis luteis.

4558. CRYPTOCHILUS Wall. (1824).

1. *C. sanguineus* Wall. tant. t. 26. B. R. 1838. t. 23. In Nepalia. 2. Herba terrestris pseudobulbis aggregatis; spica secunda multiflora. Flores sanguinei pubescentes.

4559. TRICHOPILIA Lindl. (1836).

1. *T. tortilis* Lindl. B. R. t. 1863. B. M. t. 3739. In Mexico. 2. Pseudobulbi carnosii vaginis maculatis tecti 1-phyllo. Folia coriacea complicata. Flores axillares solitarii.

4560. JONOPSIS H. et K. (18.).

1. *J. testiculata* Lindl. fol. teretisubulatis; sepalis acutis antice didymoventricosis; labello ovato acuminato. *Dendrobium* Sw. In Jamaica et Hispaniola. 2. Flores fragrantes albi labello purpureo-venoso.

2. *J. utricularioides* Lindl. coll. t. 39. f. A. fol. lineari-oblengis; sepalis petalisque obtusis non ventricosis; labello obovato emarginato basi bituberculato. *Jantha pallidiflora* Hook. exot. fl. t. 113. In ins. Trinitatis. 2.

3. *J. pulchella* H. et K. nov. g. t.
83. floribus violaceis caetera ut in *J. utricularioide*. In *Nor. Granata*. 2.
4. *J. teres* Lindl. fol. teretibus; scapo simplici paucifloro; sepalis acutis semiconnatis; labello obovato-lanceolato apice undulato basi bilamellato. In *Demerara*. 2. Flores lilacino-striati.

4561. DIADENIUM Poepp. et Endl. (1839).

1. *D. micrauthum* Poepp. et Endl. nov. g. t. 71. In *Peruvia*. 2. Herba ebulbis rhizomate repente tortuoso. Fol. oblongo-lanceolata. Flores panicula-to-racemosi.

4562. QUENETTIA Lindl. (1839).

1. *Q. microscopica* Lindl. In? 2. Herba pusilla Pleurothallidis facie. Folia teretia maculosa. Flores paniculati flavi.

4563. COMPARETTIA Poepp. et Endl. (1831).

1. *C. coccinea* Lindl. B. R. 1838. t. 68. fol. angustis coriaceis acutis; sepalo antico acuto calcare falcato duplo breviore; labello obcordato subrepando basi bilamellato, calcaribus subulatis ciliatis. In *Brasilia*. 2. Flores coccinei.

2. *C. rosea* Lindl. Bot. Reg. t. In *Brasilia*. 2.

3. *C. falcata* Poepp. et Endl. nov. g. t. 70. racemis simplicibus. In *Peruvia*. 2.

4. *C. saccata* Poepp. et Endl. t. 93. racemis ramosis. In *Peruvia*. 2.

4564. RODRIGUEZIA Ruiz. (1800).

1. *R. secunda* H. et K. nov. g. t. 92. pseudobulbis compressis ovalibus; fol. lanceolatis apice emarginatis; spica cylindrica foliis longiore recurva; sepalo supremo fornicato; labello deflexo. In *Popaya*. 2. Flores atro-rosei.

2. *R. lanceolata* R. et P. fl. per. prodr. t. 25. bulbis obovatis; fol. lanceolatis striatis; scapis racemosis dependentibus. In *Peruvia*. 2.

3. *R. ensiformis* Ruiz; bulbis oblongis; fol. ensiformibus lineatis; scapis racemosis erectis. In *Peruvia*. 2.

4. *R. recurva* Lindl. fol. lanceolatis plicatis; racemo recurvo; petalis sepalisque undulatis; labello revoluto emarginato. Gomeza B. M. t. 1748. In *Brasilia*. 2. Flores lutei.

5. *R. planifolia* Lindl. fol. binis planis linear-lanceolatis utrinque angustatis subveniis; racemis recurvis. Gomeza B. Cab. t. 660. In *Brasilia*. 2.

6. *R. suaveolens* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis striatis; scapo erecto multifloro; sepalis petalisque acuminate; labello obovato reflexo membranis 2 erectis. Pleurothallis B. M. t. 2746. In *Brasilia*. 2. Flores lutescentes odore Primulæ veris.

7. *R. taxiflora* Lindl. pseudobulbis ancipitibus ovalibus; fol. linear-lanceolatis acutissimis; racemo laxo cernuo; labelli recurvi obsolete bicristati appendice unguis aqua; sepalis antice bifidis. In *Brasilia*. 2. Flores pallide virides.

8. *R. crispa* Lindl. B. R. 1840. t. 54. sepalis omnibus liberis petalisque undulato-crispis; labelli bicristati appendice ungue multo breviore. In *Brasilia*. 2. Flores virides fragrantes.

9. *R. maculata* Lindl. misc. 1840. racemis nutantibus basi laxe vaginatis; sepalo supremo cum petalis acuto; labello oblongo retuso infra medium crista pubescente utrinque elongata aucto basi 4-dentato. In *Guatimala*. 2. Flores rubri.

4565. BURLINGTONIA Lindl. (1837).

1. *B. candida* Lindl. B. R. t. 1927. racemis pendulis; sepalo anteriore apice bilobo supremo petalisque obtusis; labello seriebus duabus lamellarum carnosarum in disco. In *Demerara*. 2. Flores candidi.

2. *B. venusta* Lindl. racemis pendulis; sepalo anteriore integerrimo supremo acuto, labello infra medium transverse plicato. In *Brasilia*. 2.

3. *B. fragrans* Lindl. racemis erectis; sepalo anteriore integerrimo supremo acuto; labello postico cucullato supra unguem bilamellato disco

pubescente elevato apice 3-dentato.
In Brasilia. 4.

4. *B. rubescens* Lindl. racemis erectis; sepalo interiore integerrimo linear-lanceolato patente supremoque acuminato; labello basi auriculato bilamellato. *Rodriguezia Poepp.* et Endl. n. g. t. 70. *In Peruria.* 4.

5. *B. rigida* Lindl. caulis rigidis densissimis per longa intervalla prolieris; scapo longo racemoso; labello mutico sublamellato. *In Brasilia.* 4.

6. *B. maculata* Lindl. B. R. 1839. t. 44. racemis pendulis; sepalo anteriore emarginato, supremo sepalisque ovato-oblongis undulatis acutis; lamellis labelli cristatis dentatis; labello bilobo undulato denticulato versus unguem lacero. *In Brasilia.* 4. Flores odorati lutei.

4566. MACRADENIA R. Br. (1822).

1. *M. lutescens* R. Br. B. R. t. 612. scapo erecto foliis coriaceis breviore multifloro. *In ins. Trinitatis.* 4. Flores luteo-virides intus purpureo-marmoratis.

2. *M. triandra* Lindl. B. R. t. 1815. fol. coriaceis linear-oblengis acuminate; racemo prostrato; labello in medio trilabellato; clinandrio serrato antheris duabus sterilibus. *In Surinam.* 4. Sepala et petala intus sanguinea. Labellum album.

3. *M. mutica* Lindl. fol. coriaceis linear-lanceolatis; racemo prostrato 3-floro; bracteis oblongis obtusis cucullatis; labello cordato-ovato basi cucullato medio transverse calloso; clinandrio serrato, rostello mutico. *In ins. Trinitat.* 4. Flores sordide albi.

4567. CRYPTARRHENA R. Br. (1816).

1. *C. lunata* R. Br. B. R. t. 153. *In Jamaica.* 4. Herba acaulis. Folia caespitosa coriacea. Scapus terminalis multiflorus. Flores parvi lutei.

4568. CUITLAUZINA Llave. (1825)

1. *C. pendula* Llave. *In Mexico* 4. Herba epiphyta pseudobulbis de-

pressis rugatis. Folia coriacea. Scapus nudus pendulus multiflorus radicalis. Flores speciosi.

4569. ONCIDIUM Sw. (1800).

a. *Folia plana v. complicata.*

1. *O. crispum* Lodd. B. Cab. t. 1854. pseudobulbis oblongis sulcatis rugosis diphyllis; fol. lanceolatis acutis; scapo simplici multifloro; sepalis undulatis recurvis obtusis; petalis unguiculatis undulatis; labelli lobis lateralibus cornuformibus recurvis nanis, intermedio maximo. B. M. t. 3499. B. R. t. 1920. *In Brasilia.* 4. Scapus 30—60-florus.

2. *O. nubigenum* Lindl. pseudobulbis 1—2-phyllis; fol. lanceolatis acutis; scapo simplici paucifloro (3-10); sepalis petalisque oblongis acutis undulatis; labelli lobis lateralibus nullis intermedio 6-lobo; columnae alis rotundatis carnosus. *In Peruria.* 4.

3. *O. riperinum* Lindl. fol. linear-lanceolatis acutis planis; scapo simplici cernuo flexuoso; racemo denso multifloro; sepalis petalisque lanceolatis acutis reflexis; labelli lobis lateralibus obsoletis denticulatis semisagittatis intermedio reniformi, crista basi et apice bicorni. *In Uruguay.* 4.

4. *O. bifolium* Sims. Bot. M. t. 1491. pseudobulbis oblongis diphyllis; fol. lanceolatis patentibus planis, scapo simplici cernuo racemoso laxo multifloro; sepalis petalisque obtusis concavis undulatis; labelli lobis lateralibus nanis obtusis recurvis intermedio maximo reniformi plano bilobo repando; crista tuberculata; columnae alis integris. B. Cab. t. 1845. *In Montevideo.* 4. Labellum rubro-maculatum.

5. *O. pauciflorum* Lindl. fol. linear-lanceolatis complicatis acuminatis subfalcatis integris; scapo simplici apice 2—3-floro; sepalis lateralibus connatis cochleatis; labelli lobis lateral. rotundatis runcinatis, intermedio reniformi bilobo, crista 5-loba; columnae alis acinaciformibus. *In Mexico.* 4. Flores parvi maculati.

6. *O. tetrapetalum* Willd. fol. lanceolatis acutis falcatis complicatis integris; scapo multifloro; sepalis petalisque lanceolatis acuminatis; inferioribus in unum connatis cymbiforme

labelli longitudine; crista 5-tuberculata; alis columnae acinaciformibus denticulatis. Epidendron Jacq. am. t. 142. In Jamaica. 2.

7. *O. variegatum* Sw. fol. oblongis acutis complicatis falcatis margine cartilagineo-serrulatis; sepalis obtusis, lateralibus in unum cucullatum integrum connatis; petalis obtusis sublobatis; labelli lobis lateralibus ovatis obtusis recurvis intermedio reniformi undulato bilobo minoribus, crista trilamellata. Sloane jam. t. 148. f. 2. In Jamaica. 2.

8. *O. cornigerum* Lindl. B. R. t. 1542. pseudobulbis sulcatis 1-phylis; fol. ovalibus acutis sessilibus striatis; scapo simplici decumbente paucifloro brevioribus; sepalo supremo petalisque undulatis obtusis, labelli lobis lateralibus linearibus cornutis, intermedio repando undulato, crista antice verrucosa truncata postice crenata. In Brasilia. 2.

9. *O. pubes* Lindl. Bot. R. t. 1007. pseudobulbis cylindricis 1-phylis; fol. lanceolatis subcostatis; panicula multiflora subsecunda; sepalis obovatis obtusissimis fasciatis, anteriore bidentato; labello pandurato cuneato utrinque bicornuto, crista dupli rugosa bicornuta v. cordato; stigmate rostellum pubescentibus. *O. bicornutum* Hook. B. M. t. 3109. In Brasilia. 2. Flores virentes rubro-fasciati; labellum pallidum sanguineo-marginatum.

10. *O. flexuosum* Sims. B. M. t. 2203. pseudobulbis ovalibus compressis 2-phylis; fol. oblongo-lanceolatis striatis; panicula ramosissima; sepalis oblongis obtusis; petalis obovatis undulatis; labelli lacinia media sub-4-loba, lateralibus auriculaeformibus crista postice pulvinata antice in lobos 3 laceros divisa; columnae alis rotundis. In Brasilia. 2. Flores lutei nitidissimi.

11. *O. fimbriatum* Lindl. sepallo supremo obovato-fornicato inferiore bipartito acuminato labello subaequali; petalis obovatis sinuatis undulatis; labelli lacinia apiculata lateralibus linearibus adscendentibus crista tuberculata fimbriata; clinaudrio fimbriato. In Brasilia. 2. Flores lutei maculati. Crista antice sanguinea postice ochracea.

12. *O. citiatum* Lindl. B. R. t. 1660. pseudobulbis compressis 1-phylis; fol. complicatis linearis-oblongis obtusis scapo flexuoso paucifloro multo brevioribus; sepalis undulatis linearis-oblongis obtusis; petalis obovatis crispis; labelli lacinii obovatis sinus suis latissimis fimbriatis; crista 5-corni. In Brasilia. 2. Flores lutei sanguineo-maculati.

13. *O. barbatum* Lindl. coll. t. 27. fol. linearis-oblongis coriaceis emarginatis; scapo flexuoso paniculato; sepalis undulatis acutis; labelli lobo medio minimo bilobo disco barbato, crista compressa triloba lobo medio 3-crenato. In Brasilia. 2.

14. *O. attissimum* Sw. fol. ensiformibus rigidis carnosis scapo 6-pedali multo brevioribus; sepalis petalisque linearis-lanceolatis undulatis; labello cordato subreniformi emarginato; crista emarginata. B. R. t. 1651. Epidendron Jacq. am. t. 141. B. M. t. 2990. *O. Baueri* illustr. of Orch. plant. t. 7. In Ind. occ. 2. Flores flavi fusco-marginati.

15. *O. pictum* H. et K. n. gen. t. 81. fol. lato-linearibus coriaceis; scapo paniculato multifloro; sepalis linearis-lanceolatis unguiculatis petalisque obtusis undulatis; labelli lobis lateralibus nanis intermedio transverso retuso undulato; crista 7-8-tuberculata. In Popaya. 2. Flores lutei rubro-punctati.

16. *O. funereum* Elave; fol. ensiformibus acutis; scapo stricto paniculato multifloro; sepalis petalisque lanceolatis undulatis inferioribus subfalcatis; labelli lobis lateralibus nanis integrermis, intermedio rotundato basi utrinque emarginato; columnae alis semisagittatis. In Mexico. 2.

17. *O. carthagense* Sw. fol. oblongis acutis rigidis carnosis; sepalis undulatis supremo unguiculato obtuso cochleato reflexo; petalis obtusis undulatis lobatis; labelli lobis acutis recurvis intermedio reniformi; crista triloba carnosa, lobis tuberculatis intermedio acuto elongato; columnae, alis repandis. Jacq. am. t. 133. f. 4. In Carthagena. 2.

18. *O. turidum* Lindl. fol. oblongis acutis rigidis carnosis; scapo paniculato multifloro; sepalis petalisque, undulatis obovatis, superioribus obtusis inferioribus acutis; labelli lobo inter-

medio undulato transverso emarginato; crista tuberculis 2 ad basin 2 majoribus intermediis callisque cruciatis 3 a fronte. In Jamaica. 4.

19. *O. olivaceum* H. et K. fol. oblongo-lanceolatis; pedunculo simplici multifloro; foliolis calycis ramosis reflexis; labello 3-fido; lacinia intermedia subreniformi emarginata; gynostegio apice cucullato. In Popaya. 4. *Labellum roseum.*

20. *O. ampliatum* Lindl. B. R. t. 1699. sepalis omnibus liberis; labello bilobo subrotundo transverso, lobis lateralibus brevissimis, callo baseos 3-lobo intermedio compresso; alis columnae 2 cuneatis dentatis lateralibus reflexis. In Panama. 4.

21. *O. Harrisonianum* Lindl. B. R. 1569. pseudobulbis 1-phyllis; fol. carnosus linearis-oblongis acutis recurvis; panicula ramosa multiflora; sepalis petalisque linearibus obtusissimis; labelli lacinias lateralibus minutis auriculaeformibus, crista 5-loba centro pubescente; columnae alis deltoideis. In Brasilia. 4.

22. *O. globuliferum* H. et K. fol. oblongis brevissime mucronatis; scapis simplicibus sub 1-floris; foliolis calycis subaequalibus crenulato-undulatis apice emarginato bilobo; gynostegio apice ala crenulata cincto? In Popaya. 4. Flores rubro-maculati.

23. *O. iridifolium* H. et K. fol. ensiformibus brevibus equitantibus; scapo simplici sub-1-floro; sepalo sub-premo obtuso, lateralibus acutis; petalis obtusis undulatis; labelli lobis lateralibus parvis subrotundis unguiculatis, intermedio multo majore bilobo utrinque versus apicem emarginato. In Am. austr. 4.

24. *O. Papilio* Lindl. B. R. t. 910. pseudobulbis rugosis 1-phyllis; fol. oblongis coriaceis obtusis maculatis; scapo ancipti; sepalo supremo petalisque linearibus longissimis; sepalis lateralibus oblongis revolutis undulatis; labelli lacinia intermedia emarginata subrotunda crispa; cristae glandulis formam ranae cubantis referentibus; columnae alis serratis. B. M. t. 2795. B. Cab. t. 1086. In ins. Trinitatis. 4.

25. *O. tigrinum* Llave. bulbis ovatis anciptibus; fol. lanceolatis bulbo innatis; scapo tereti simplici; floribus lamina labelli reniformi longe ungu-

culata. In Mexico. 4. Flores odore violae suavissimo, magni speciosi pellem tigrinam referentes.

26. *O. onustum* Lindl. sepalis omnibus laceris; labello bilobo transverso, lobis lateralibus apice dilatatis; callo cochleato antice appendicula tuberculiformi instructo; alis columnae 2 integerrimis; fol. linearibus complicatis falcatis. In Panama. 4.

27. *O. panduriferum* H. et K. n. gen. t. 82. fol. lanceolatis; pedunculo paniculato multifloro; calycis foliolis subaequalibus undulatis unguiculatis; labello panduraeformi apice emarginato; gynostegio apice ala 5-loba cincto. In Nova Granata. 4. Flores aurantiaci.

28. *O. echinatum* H. et K. t. 79. bulbo oblongo; fol. oblongo-lanceolatis; pedunculo paniculato multifloro; labello 3-fido basi bialato; gynostegio alato rostrato, rostro elongato ascendentis; capsula glandulosa echinata. In Mexico. 4.

29. *O. ornithorhynchum* H. et K. t. 80. bulbo oblongo; fol. lanceolatis; pedunculo paniculato multifloro; labello panduraeformi apice marginato; gynostegio alis 2 cuneatis erectis coronato longe rostrato. B. R. 1840. t. 10. In Mexico. 4.

30. *O. hyalinobulbum* Llave; bulbis lenticularibus subhyalinis; fol. linearis-lanceolatis; scapo filiformi flexuoso; fol. insectiformibus resupinatis; lamina labelli lanceolata; gynostegio longe rostrato. In Mexico. 4.

31. *O. serpens* Lindl. caule repente tortuoso filiformi ad nodos radicante; fol. oblongo-lanceolatis acutis pedunculis bifloris brevioribus; sepalis petalisque obovatis obtusis planis aequalibus; columna marginata apice membranacea cucullata. Ad Patacocha. 4. Flores lutei castaneo-maculati.

32. *O. macranthum* Lindl. sepalis cordatis oblongis obtusis undulatis; labelli hastati lacinias lateralibus subfalcatis intermedia acuminatissima; crista basi hastata apice dentibus 2 runcinatis; columnae alis rotundatis. In Guyaguay. 4.

33. *O. diraricatum* Lindl. B. R. t. 1050. fol. oblongis obtusis apiculatis concavis coriaceis margine saepe fisis, scapo divaricatissimo; sepalis petalisque obovatis obtusis; labelli crenulati cordati lobis lateralibus ro-

tundatis, intermedio subcordato; crista pulvinata pubescente 4-loba. *In Brasilia.* 2.

34. *O. maculosum* Lindl. pseudobulbis ovatis compressis; fol. lanceolatis acutis; scapo maculoso paniculato; sepalis ovalibus reflexis; labello maximo basi pubescente subreniformi 4-lobo; columnae alis superior. falcatis. *In Brasilia.* 2.

35. *O. varicosum* Lindl. pseudobulbis sub-4-gonis; fol. spathulato-lanceolatis; scapo gracili pyramidali; sepalis petalisque reflexis acutis; labello maximo sub-4-lobo, crista postice 3-dentato fornicata antice cuneata; alis columnae denticulatis. *In Brasilia.* 2.

36. *O. isopterum* Lindl. pseudobulbis ovalibus compressis; fol. anguste canaliculatis recurvis; sepalis acutis supremo fornicato; petalis obovatis reflexis; labelli lacinia media transverse angulata biloba, crista tuberculosa. *In Brasilia.* 2.

37. *O. pumilum* Lindl. B. R. t. 920. B. Cab. t. 1732. pseudobulbis nullis; fol. rigidis ovalibus obliquis; panicula thyrsoidae; sepalis petalisque obovatis incurvis; labelli 3-lobi lobis ova-tis obtusis, intermedio minore; alis columnae integerimis. *In Brasilia.* 2.

38. *O. Barkeri* Lindl. misc. 1841. pseudobulbis ovalibus compressis angulatis diphylis; fol. angustis petiolo vaginante articulatis racemi cernui simplicis pedunculo brevioribus; sepalis liberis petalisque lanceolatis undulatis; labelli lobis lateral. parvis subquadratis, intermedio transverso apice inflexo tuberculo oblongo basi bidentato apice obsolete 3-lobo; columnae alis brevibus. *In Mexico.* 2.

39. *O. nebulosum* Lindl. misc. 1841. pseudobulbis ovalibus ancipitibus nebulosis diphylis utrinque 3-costatis; fol. angustis chasctsaeis panicula angusta brevioribus; sepalis liberis petalisque lanceolatis undulatis patentibus; labelli lobo intermedio bilobo tuberculo sulcato 3-dentato utrinque 1dentato; columnae elongatae alis denticulatis. *In Guatimala.* 2. Flores magni pallide lutei fusco-maculati.

40. *O. Wrayae* Lindl. B. R. misc. 1841. pseudobulbis ovatis compressis sulcatis; fol. 2 linearis-lanceolatis; scapo radicali elongato ramoso; floribus paniculatis; sepalis petalisque

ovato-acuminatis patentibus ferrugineo-maculatis; labello late cuneato obovato 3-lobo cristato, crista elevata acute 3-loba. B. M. t. 3854. *In Mexico.* 2.

41. *O. nanum* Lindl. misc. 1842. pseudobulbis nullis; fol. rigidis ovalibus concavis; racemo stricto foliorum longitudine; sepalis petalisque obovatis obtusis incurvis; labello lucido auriculato apice cuneatim dilatato; alis columnae angustissimis decurvis apice glandulosis. *In Guiana.* 2.

42. *O. galloparinum* Morren ann. soc. hort. Gant. 1. 13. pseudobulbis ovatis; fol. binis planis lanceolatis; spica simplici 7—10-flora in scapo elongato; sepalis liberis ovatis undulato-concavis petalisque ovato-lanceolatis roseo-purpureis; labelli lobo medio maximo elongato emarginato citrino, crista minima, tuberculis maximis rugoso-carunculatis purpureis; columnae alis latis. *In Mexico.* 2.

43. *O. sphacelatum* Lindl. B. R. 1845. t. 30. pseudobulbis elongato-ovatis ancipitibus; fol. longis ensiformibus apice recurvis; racemo compo-sito multifloro; sepalis petalisque lineari-lanceolatis undulatis; labello medio constricto basi auriculato apice dilatato bilobo, crista deppressa pubescente apice 3-loba; columnae alis elongatis erosis. *In Guatimala.* 2. Flores lutei fusco-maculati.

44. *O. urophyllum* Lodd. fol. equitantibus margine plano apice acutissimis; scapo longo pendulo paniculato; sepalis linearibus acuminatis lateribus ad apicem fere connatis; petalis obovato-rotundis; labelli lobis lateribus brevibus concavis obtusis intermedio unguiculato reniformi emarginato; columnae alis maximis acinaciformibus. *In Brasilia.* 2. Flores lutei fusco-maculati.

45. *O. Suttoni* Lindl. B. R. 1842. misc. 8. pseudobulbis ovatis compressis sulcatis diphylis; fol. linearibus gramineis scapo aequalibus; sepalis petalisque lineari-lanceolatis planis labello oblongo basi auriculato angustiore; tuberculo cristae 7—9-dentato; columnae alis 3-angularibus. *In Mexico.* 2. Flores lutei olivaceo-fusco-maculati.

46. *O. ensatum* Lindl. B. R. 1842. misc. 15. pseudobulbis subrotundis compressis; fol. ensiformibus strictis;

panicula longissima multiflora; sepalis petalisque lanceolatis acutis subundulatis olivaceis luteo-marginatis; labello luteo reniformi disco olivaceo; crista pubescente 7-tuberculata, tuberculis elongatis. *In Guatimala.* 2.

47. *O. citrinum* Lindl. B. R. t. 1758. (*O. altissimo* affine) pseudobulbis oblongis compressis; sepalis petalisque labelli longitudine linearis-oblongis undulatis; labello cordato utrinque introrsum arcuato apice dilatato subreniformi; crista 8-tuberculata pubescente; stigmate orbiculari.

48. *O. microchilum* Batem. pseudobulbis lenticularibus 1-phyllo; folio ensiformi crassissimo; sepalis longe unguiculatis petalique undulatis retusis; labello cordato tridentatum; crista subrotunda 5-crenata; columnae nanae alis oblique truncatis. *In Guatimala* 2.

49. *O. Wentworthianum* Batem. pseudobulbis nebulosis oblongis compressis ancipitibus diphyllo; paniculae elongatae ramis 3-floris; sepalis petalique acutis; labelli cordati laciniis grosse crenatis, intermedia lamina reniformi denticulata, crista 5-dentata; columnae alis erosionis. *In Guatimala.* 2. Flores lutei rubro-maculati.

50. *O. Justeagi* Bark. in litt. pseudobulbis ovatis compressis; fol. erectis coriaceis oblongo-ensiformibus subundulatis; sepalis petalique oblongis undulatis; labello obovato retuso basi sagittato disco tuberculo apice depresso dilatato bilobo aucto. *In Mexico.* 2.

51. *O. carinatum* Knowl. et Westc. fl. cab. 2. p. 30. pseudobulbis ovatis; fol. lanceolatis; scapo erecto; floribus secundis racemosis; petalis conniventibus maculatis; pedicellis flexuosis; labello cristato integrerrimo bracteis scariosis. *In Xalapa.* 2.

52. *O. intermedium* Knowl. et Westc. fl. Cab. t. 60. fol. oblongis acutis rigidis carnosis; scapo paniculato flexuoso; sepalis undulatis integris, supremo coeruleo; petalis crenulato-crispis; labelli lobis lateralibus nanis revolutis intermedio reniformi undulato; columnae repanda sinuata. *In Cuba.* 2. Flores lutei.

53. *O. unicornutum* Knowl. et Westc. I.c. pseudobulbis ovatis compressis costatis diphyllo; fol. linearis-lanceolatis; scapo simplici glauco multifloro; sepalis petalique linearispathulatis inferior, in unum connatis;

labelli lobis lateralibus denticulatis; crista elevata transversa; columnae alis abbreviatis. *In Brasilia.* 2.

54. *O. raniferum* Lindl. B. R. n. s. 11. t. 48. pseudobulbis sulcatis diphyllo; fol. lato-linearibus; scapo paniculato; sepalis petalique acutis patulis; labelli crista depressa medio constricta dimidia posteriore quadrata basi utrinque callosa; alis columnae integris. *In Brasilia.* 2.

55. *O. deltoideum* Lindl. B. R. t. 2006. pseudobulbis angustis oblongis; fol. lanceolatis canaliculatis; sepalum supremo obovato unguiculato; petalis obovatis crispis; columnae alis maximis acinaciformibus dentatis. *In Peruia.* 2.

56. *O. trulliferum* Lindl. B. R. n. ser. 12. t. 57. pseudobulbis elongatis compressis 1—2 phyllis; fol. oblongo-ovalibus; sepalis obtusis non connatis; labelli lobis lateralibus nanis rotundatis, intermedio trulliformi serrato crista verrucosa medio depresso; columnae alis integrerrimis. *In Brasilia.* 2. Flores lutei purpureo-maculati.

57. *O. sanguineum* Lindl. ebulbe; fol. oblongis coriaceis; scapo longissimo paniculato; sepalis petalique crispis sublobatis; labelli 3-lobi subcrispi vernicati crista ovata convexa corrugata; columnae alis sublobatis. O. Huntianum Hook. B. M. t. 3806. ex Lindl. *In Guyana.* 2. Flores straminei.

58. *O. unicornis* Lindl. pseudobulbis ovalibus compressis diphyllo; fol. oblongo-linearibus recurvis; racemo composito ramis divaricatis; sepalis lateralibus in unum concavum connatis; petalis obovatis undulatis; labello disco basi transverse elevato antice cornuadscendente compresso subfalcato acuto. *In Brasilia.* 2. Flores flavi.

59. *O. Martianum* Lindl. sepalis supremo petalique obovatis obtusis concavis lateralibus linearibus brevioribus; labello reniformi; crista falcata compressa utrinque bituberculata; alis columnae denticulatis subquadratis. *In Brasilia* (Mart.). 2.

60. *O. lunatum* Lindl. B. R. t. 1929. pseudobulbis oblongis compressis; scapo racemoso; perianthii spatulatis retusis; labello pubescente lunato basi piloso, laciniis lateralibus minimis inflexis crista linearis apice depresso bidentata. *In Brasilia.* 2.

61. *O. retusum* Lindl. fol. linearilanceolatis; scapo paniculato divaricato; perianth. spathulatis carnosis; labelli crista 5-lamellata tuberculis 6 elongatis circumdata; columnae alis maximis. *In Peruria.* 2.

62. *O. gracile* Lindl. bulbis ovatis compressis; fol. lanceolatis acutis; scapo 3-6-floro; sepalis linearilanceolatis; labello cuneato emarginato basi auriculato lamellis 2 linearibus cristato. *In Brasilia (Mart.).* 2.

63. *O. ramosum* Lindl. panicula stricta dense ramosa; sapalis angustis supremo fornicato lateralibus unguiculatis; petalis subundulatis; labelli crista digitato-tuberculata; columnae alis integerrimis. *In Brasilia.* 2.

64. *O. leucocitum* Batem. scapo elato paniculato; sepalis petalisque oblongis obtusis patentissimis; labello alte bilobo, lacinias retusis unanis, crista tricorni utrinque bidentata. *In Mexico.* 2.

65. *O. reflexum* Lindl. pseudobulbis ovatis 1-phylis; fol. anguste lanceolatis acutis recurvis longissimis pendulis; sepalis petalisque linearibus undulatis; labelli crista depressa tridentata bicorni; columnae alis dentatis foliatis. *In Mexico.* 2.

66. *O. stramineum* Lindl. B. R. 1840. t. 14. fol. crassis carnosis ovato-lanceolatis acutis dorso rotundatis; scapo paniculato rigido; sepalis rotundis unguiculatis integerrimis; petalis emarginatis crispis; labelli lobis margine revolutis intermedio reniformi tuberculis 4 geminatis. *In Mexico.* 2. Flores straminei.

67. *O. confragosum* Lindl. pseudobulbosum; scapo simplici glaucescente nutante; sepalis ovatis acuminatis petalisque undulatis; labelli lobis lateralibus recurvis intermedio alte bilobo reniformi, disco maximo digitato; columnae alis denticulatis. *In Mexico.* 2.

68. *O. putrinatum* Lindl. B. R. n. ser. 12. t. 42. panicula ramosissima divaricata; sepalis petalisque obovatis acutis; labelli lobo intermedio bilobo undulato lateralibus crispis, disco pulvinato villosissimo. *In Brasilia.* 2.

69. *O. hians* Lindl. sepalis petalisque aequalibus ovalibus obtusis concavis; labello auriculato medio contracto apice bilobo utrinque dentato

carnoso papilloso eretto; alis eolumnae subfalcatis. *In Brasilia.* 2.

70. *O. brachiphyllum* Lindl. B. R. 1845. sub. t. 4. fol. crassissimis brevibus erectis acutis; panicula laxa pauciflora; sepalis petalisque obovatis acuminatis longe unguiculatis; labelli lobis lateral. ovalibus patentibus acutis, intermedio reniformi emarginato, tuberculo tricorni subverrucoso; columnae alis sublunatis. *In Mexico.* 2.

b. Folia teretia v. triquetra.

71. *O. triquetrum* R. Br. petalis acutis anticis connatis; labelli lobo medio subrotundo indiviso; scapo racemoso; fol. 3-quetris. *Epidendron Sw.* *In Jamaica.* 2.

72. *O. pulchellum* Lindl. fol. acute 3-quetris subfalcatis integris; racemo simplici cernuo; sepalis cymbiformibus acuminatis; petalis obovatis planis; labelli lobo intermedio retuso; crista 3-loba antice 1-callosa; alis columnae denticulatis. *In Jamaica et Demerara.* 2.

73. *O. Celobetta* Sw. fol. radicalibus teretibus subulatis; scapo stricto paucifloro; sepalis petalisque lanceolatis unguiculatis; labelli lacinias abbreviatas intermedia unguiculata reniformi emarginata; alis retrorsum falcatis integris. *Plum. ic. t. 184. f. 2. Jacq. am. t. 131. f. 2.* *In Jamaica.* 2.

74. *O. emarginatum* Meyer; fol. lanceolato-linearibus obtusis emarginatis; floribus terminalibus; labello obovato integerrimo; columnae alis ovato-subrotundis. *In Essequebo.* 2.

75. *O. adscendens* Lindl. l. c. fol. erectis juncis scapo stricto paniculato aequalibus; sepalis petalisque obovatis obtusis concavis; labelli lobis lateral. nanis intermedio reniformi emarginato tuberculo ovato 7-dentato; columnae alis integerrimis incurvis. *In Guatimala.* 2.

76. *O. Lomonianum* Lindl. B. Reg. t. 1789. fol. compressis acuminatis supra sulcatis; scapo stricto paucifloro; sepalis parvis apiculatis liberis; petalis undulatis; labelli lobis lateralibus linearibus intermedio maximo reniformi bilobo lobis dentatis. *In Havannah.* 2. Flores lutei.

77. *O. longifolium* Lindl. B. R. 1845. t. 4. fol teretibus longissimis

diffusis; scapo dense paniculato; sepalis petalisque apiculatis obtusis concavis; labelli lobis lateral. patentibus quadratis, intermedio obovato bifido, tuberculo basi depresso antice tricorni glabro; columnae alis sublunatis. In Mexico. 4. Fol. 3-ped. Flores lutei labello sanguineo-maculato.

78. *O. lacerum* Lindl. B. R. 1846. t. 27. fol. longis teretibus carinatis; panicula contracta multiflora; sepalis petalisque conformibus obovatis concavis, labelli elongati laciniis lateribus linearibus refractis, intermedia longe unguiculata biloba margine laceria; columnae brevis pubescentis alis semiovatis. In Caracas. 4. Flores pallide lutei fusco-maculati et punctati.

79. *O. pallidum* Lindl. misc. 1840. pseudobulbis obcordatis compressis marginatis; fol. acute carinatis; scapo erecto paniculato; sepalis petalisque oblongis liberis; labelli auriculis rotundatis, lobo intermedio cuneato obovato, disci basi glandulosi appendice 5-partita, laciniis cornutis pubescensibus. In Brasilia. 4.

4570. PTEROSERAS Hass. (1842).

1. *P.* Hass. In Java. 4. Radices aëreac maxime. Folia ovato-oblonga apice inaequalia. Inflorescentia elongato-racemosa.

4571. FERNANDEZIA R. et P. (1800).

1. *F. elegans* Lindl. B. Cab. t. 1214. fol. obtusis ovatis carinatis; bracteis obtusis membranaceis; labelli hastati lobis lateralibus acutis intermedio oblongo obtuso; disci tuberculis anticis minimis, posticis maximis coloratis. Lockhartia B. M. t. 2715
In ins. Trinitatis.

2. *F. denticulata* Fl. per. fol. oblongis acuminatis carinatis denticulatis; caule nutante; pedunc. 3—5-floris. In Pittao. 4.

3. *F. subbillora* Fl. per. fol. ensiformibus carinatis; caulinibus virgatis; pedunculis subbilloris. In Peruvia. 4.

4. *F. acuta* Lindl. B. R. t. 1806. fol. acuminatis carinatis; corymbo laxo multifloro; bracteis obtusis membranaceis; labello linearis-3-lobo lacinia

intermedia emarginata obtusa, disco pulvinato tuberculo minimo pone basin. In ins. Trinitatis. 4.

5. *F. lunifera* Lindl. fol. obtusis; petalis incurvis falcatis reduplicatis; labelli 5-lobi disco tuberculato, laciniis infimis falcatis intermedia dilatata bifida; columna dentata. In Brasilia. 4.

6. *F. punctata* Fl. per. fol. linearibus inaequaliter emarginatis; ramis dichotomis; floribus axillaribus; nectarii labio prominentia notato. In Munna. 4.

7. *F. laxa* Fl. per. fol. lanceolatis acuminatis contortis; caule laxo; nectarii labio utrinque denticulo recurvo. In Peruvia. 4.

8. *F. haematodes* Fl. per. fol. ovato-lanceolatis margine scabris; caulis erectis; floribus ternis; petalis interioribus brevioribus. In Peruvia. 4.

9. *F. graminifolia* Fl. per. fol. linearibus emarginatis; caule radicante; ramis furcatis; floribus e furcatura sessilibus. In Pittao. 4.

10. *F. conferta* Fl. per. fol. linearibus integerrimis reflexis; caule radicante; ramis confertis; floribus axillaribus solitariis. In Pittao. 4.

4572. LEOCHILUS Lindl. (1842).

1. *L. herbaceus* Lindl. labello obvato emarginato apice denticulato medio凸形 laevi basi excavato villosa. In Guayra. 4.

2. *L. sanguinolentus* Lindl. labello pandurato sepalis multo majore apice bilobo, laciniis subrotundis imbricatis superficie plana laevi supra basin trituberculata basi ipsa villosa; columnae alis abbreviatis; clinandrii dorso elevato; anthera parva. In Guayra. 4.

3. *L. carinatus* Lindl. Bot. R. 1841. misc. 22. In Mexico. 4.

4. *L. oncidoides* Lindl. In Mexico. 4.

5. *L. coctlearis* Lindl. In Mexico. 4.

4573. PACHYPHYLLUM H. et K. (1817).

1. *P. distichum* H. et K. nov. g. t. 77. In Peruvia. 4. Herba cau-

lescens fol. distichis; spicis axillari-
bus recurvis bifarium imbricatis. Flo-
res inconspicui.

4574. DICHAEA Lindl. (1840).

1. *D. echinocarpa* Lindl. caule pen-
dulo; fol. ovatis acutis; labello
pubescente sagittato; capsula subrotun-
da echinata. *Limodorum pendulum*
Aubl. t. 322. *In Guiana*. 2.

2. *D. latifolia* Lindl. caule pen-
dulo; fol. oblongis obtusis apiculatis;
capsulis longe pedunculatis angustis
oblongis echinato-villosis. *In ins.
Vincentii*. 2.

3. *D. muricata* Lindl. fol. ovato-
oblongis acuminatis; labello?; capsula
muricata. *Cymbidium Sw.* *In Ja-
maica*. 2.

4. *D. trichocarpa* Lindl. fol. li-
nearibus subreflexis labello; subrotun-
do concavo; capsula subrotunda
albo-hirsuta. *Epidendron Sw.* *In Ja-
maica*. 2.

5. *D. graminoides* Lindl. caulinibus
erectis; fol. linearibus acutis; peta-
lis sepalisque acutis; labello cuneato-
sagittato; capsula glabra. *Isochilus*
Hook. exot. fl. t. 196. *In Jamaica*. 2.

6. *D. panamensis* Lindl. caule
erecto; fol. glaucis linearibus acutis
rectis; pedunculis capillaribus; labello
ovato subsagittato; fructu glabro. *In
Panama et Columbia*. 2.

7. *D. glauca* Lindl. caule com-
presso erectiusculo; fol. linearis ob-
longis acutis subtus glancis; capsulis
glabris. *Epidendron Sw.* *In Ja-
maica*. 2.

8. *D. ochracea* Lindl. *In Am.
austr.* 2.

**4575. PHYMATIDIUM Lindl.
(1833).**

1. *P. delicatulum* Lindl. fol. bre-
vibus linearis subulatis; bracteis di-
stichis acerosis; petalis sepalisque
acutis; labello rhomboideo acuto. *In
ins. St. Catharinæ*. 2.

2. *P. calrifolium* Lindl. fol. longis
subulatis falciformibus; bracteis mem-
branaceis; petalis obtusissimis; la-
bello suborbiculari basi undulato. *In
Brasilia*. 2.

4576. MILTONIA Lindl. (1837).

1. *M. spectabilis* Lindl. B. R. t.
1976 et 1992. pseudobulbis ovalibus
ancipitibus laevibus; fol. ligulatis pa-
tentissimis; pedunculis 1-floris; squa-
mis magnis fuscis striatis imbricatis
carinatis; sepalis ovalibus planis; pe-
talum revolutum; labello maximo cuneato
rotundato basi 3-lamellato; columnæ
alis angustis acutissimis. B. M. t. 4201.
In Brasilia. 2. Flores pallide stra-
minei, labellum purpureum.

2. *M. cuneata* Lindl. Bot. R. 1844.
t. 8. pseudobulbis ovato-oblongis; fol.
oblongis striatis subundulatis; racemo
plurifloro; sepalis petalisque lanceo-
lati undulatis; labello cuneato ro-
tundato basi bilamellato utrinque sub-
repando; columnæ medio bidentata;
clinandrio integerrimo. *In Brasilia*.
2. Flores violacei labellum album.

3. *M. flarescens* Lindl. sert. t. 48.
Cyrtochilum B. R. t. 1627. pseudobul-
bis angustissimis ancipitibus laevi-
bus; fol. binis linearis ensiformibus;
scapo compresso arctissime vaginato;
bracteis glumaceis flavescentibus; se-
palis petalisque linearibus acuminatis;
labello repando criso basi pubescente.
In Brasilia. 2. Flores lutei roseo-
maculati.

4. *M. stellata* Lindl. sert. t. 48.
pseudobulbis diphyllos ovalibus anci-
pitibus; fol. ligulatis obtusis scapo
multo brevioribus; racemo disticho;
bracteis convolutis glumaceis ovario
longioribus; sepalis petalisque linearis-
bus acutis stellatis; labello oblongo
undulato acuto. *In Brasilia*. 2. Flo-
res pallide flavi.

5. *M. candida* Lindl. sert. t. 21.
pseudobulbis ovatis apice angustatis
diphyllos; fol. angustis; bracteis con-
cavis squamaeformibus; sepalis petali-
isque oblongis aequalibus; labello
subrotundo criso basi 5-lamellato;
columnæ pubescente basi biauri. *In
Brasilia*. 2. Flores maximi fusco-
maculati, labello albo.

6. *M. Russeliana* Lindl. *Oncid-
ium* B. R. t. 1830. pseudobulbis ova-
tis costatis diphyllos; fol. ligulato-
lanceolatis patentibus; sepalis petali-
isque conformibus ovato-oblongis sub-
undulatis; labello retuso apiculato sub-
sinuato; columnæ bidentatae alis

magnis falcatis. In Brasilia. 4.
Flores viridi-purpurei, labello violaceo.

4577. CYRTOCHILUM H. et K. (1817).

1. *C. undulatum* H. et K. nov. g.
t. 84. fol. calycinis ovatis undulatis
patentibus. In Nova Granata. 4.
Flores fuscentes.

2. *C. flexosum* H. et K. foliolis
calycinis undulatis reflexis, exterioribus
spathulatis, interioribus obovatis.
In Nov. Granata. 4. Scapus ramosissimus.

3. *C. pardinum* Lindl. fol. linearior-
oblongis basi angustatis; petalis undu-
latis sepalisque angustioribus lanceo-
latis; labello unguiculato ovato lan-
ceolato; unguis axi cum columna
connato utrinque lamellato, callis ele-
vatis linearibus. In Peruvia. 4.

4. *C. ixoides* Lindl. fol. membranaceis linear-lanceolatis striatis; scapo
simplici apice racemoso; labello ob-
longo obtuso basi bilamellato medio
5-tuberculato. In Nov. Granata. 4.
Flores lutei.

5. *C. mystacinum* Lindl. pseudobulbis ovalibus compressis corrugatis
1-phyllis; fol. ligulatis acutis; scapo
ramoso; labello cordato obovato-lan-
ceolato subrepando piano apice re-
flexo medio pubescente; columnae alis
multifidis. B. R. 1839. t. 62. In Pe-
ruvia. 4.

6. *C. maculatum* Lindl. B. R. 1838.
t. 44. pseudobulbis ovatis compressis
subangulatis basi foliosis; fol. late
ligulatis striatis; perianthiis acutissi-
mis; labello membranaceo dentato;
alis columnae falcatis integerrimis.
In Mexico. 4.

7. *C. stellatum* Lindl. sert. orch.
t. 7. pseudobulbis diphylis ovalibus
compressis striatis; fol. ligulatis ob-
tusis; racemo disticho multifloro; se-
palis petalique linear-ovatis acutis
stellatis; labello oblongo undulato
striato. In Brasilia. 4.

8. *C. Karwinskii* Lindl. scapo pa-
niculato; sepalis petalique oblongo-
lanceolatis apiculatis labello obovato
rigido ecristato venis incurvis lamel-
latis; margine columnae serrato. In
Mexico. 4.

9. *C. graminifolium* Lindl. In
Mexico. 4.

10. C. filipes Lindl. In Bra-
silia. 4.

4578. ODONTOGLOSSUM H. et K. (1817).

a. *Frymenium* Lindl.

1. *O. brevifolium* Lindl. in Benth.
pl. Hartw. fol. ovato-oblongis paten-
tibus scapo simplici multifloro duplo
brevioribus; bracteis oblongis membra-
naceis pedicellorum longitudine; se-
palis subrotundis unguiculatis undula-
tis; labello unguiculato basi columnae
adnato auriculato cuneato emarginato
basi tuberculis callosis 5 et appendice
parva 3-dentata aucto; clinandrio ser-
rato in marginem alaeformem decurrens.
In Loxa. 4.

2. *C. citrosum* Lindl. B. R. 1843.
t. 3. pseudobulbis subrotundis compres-
sis laevibus 1-phyllis; folio oblongo-
ligulato obtuso racemo panillo breviore;
sepalis oblongis obtusis petalique con-
formibus subaequalibus; labello un-
guiculato reniformi basi bituberculato;
columnae alis lateralibus subtruncatis
dorsalique rotundata denticulatis. In
Mexico. 4. Flores maximi albi la-
bello violaceo.

3. *O. pulchellum* Batem. in B. R.
1841. t. 48. pseudobulbis oblongis com-
pressis anciptibus diphylis; fol. li-
nearibus apice oblique emarginatis;
scapo fol. aequali ancipti debili 6-7-
floro; sepalis ovatis acutis; petalis
obovatis acutis subundulatis; labelli
3-lobi laciniis lateralibus triangulari-
bus, intermedia oblonga subquadrata
apice recurva; columnae alis et cli-
nandrio laceris. In Guatimala. 4.
Labellum album.

4. *O. Egertoni* Lindl. facie *O. pul-*
chelli sed floribus duplo minoribus;
labello acuto basi excavato dentibus
duobus supra excavationem inflexis
postice rotundato cordato. In Gu-
atimala. 4.

5. *O. crispum* Lindl. fol. lanceo-
latis seapo multifloro paniculato bre-
vioribus; sepalis ovato-lanceolatis; pe-
talos ovatis acutissimis crispis mem-
branaceis; labello conformi dentibus
duobus validis in fronte paucisque mi-
noribus utrinque versus laminae basin;
clinandrii alis lateralibus rotundatis
laceris; postica nulla. In Bogota. 4.

6. *O. roseum* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis racemo gracili duplo brevioribus; sepalis petalisque lanceolatis; labello 3-lobo basi bilamellato; lobis lateralibus nanis rotundatis intermedio obtuse acuto; columna elongata apice alis 3 membranaceis integris aucta. *In Peruvia.* 4.

b. *Euodontoglossum* Lindl.

+ *Leucochilum Labellum album.*

7. *O. Cervantesii* Llave; pseudobulbis ovatis angulatis; fol. solitariis oblongis in petiolum canaliculatum angustatis; scapo paucifloro; bracteis vaginisque membranaceis acutissimis equitantibus elongatis; sepalis membranaceis oblongo-lanceolatis acutis; petalis latioribus subunguiculatis acutis; labello subcordato-ovato acuto unguiculato; ungue carnoso cyathiformi pubescente antice bidentato medio tuberculato processibus 2 pilosis ante cyathum; columnae pubescentis auriculis rotundatis. B. R. 1845. t. 36. *In Oaxaca.* 4.

8. *O. apterum* Llave; bulbis ovatis depresso-ovalis; fol. lato-lanceolatis nervosis conduplicatis; scapo tereti paucifloro; gynostemio aptero crasso. *In Mexico.* 4.

9. *O. caerulescens* A. Rich. pseudobulbis ovoideo-oblongis compressis 1-phylis; fol. oblongo-lanceolato acutissimo; scapo 1-2-floro; floribus albido-caerulecentibus; labello cordato membranaceo acuto margine sinuoso eroso; gynostemio clavato pubente. *In Mexico.* 4.

10. *O. membranaceum* Lindl. sert. orch. t. 25. pseudobulbis foliisque *O. Cervantesii*; scapo 2-4-floro; bracteis vaginisque membranaceis acutissimis equitantibus; sepalis membranaceis unguiculatis lanceolatis; petalis latioribus oblongis obtusis; labello cordato obtusissimo unguiculato ungue carnoso cyathiformi pubescente antice bidentato medio tuberculato processibus 2 ante cyathum elongatis pubescentibus. *In Oaxaca.* 4.

11. *O. Galeottianum* A. Rich. pseudobulbis aggregatis 1-phylis; fol. elliptico-lanceolato acuto; scapo foliis duplo longiore 3-floro; floribus albis magnis; labelli alis erectis obtusis truncatis; lamina subcordato-

acuminata; gynostemio margine alato; alis angustis longis. *In Mexico.* 4.

12. *O. nebulosum* Lindl. sert. orch. t. 25. pseudobulbis diphyllis; fol. oblongis erectis pedunculo terminali sub-4-floro brevioribus; bracteis scariosis; sepalis membranaceis oblongis undulatis apiculatis; petalis conformibus latioribus basi angustatis; labello sessili basi cucullato carnosus limbo ovato-acuto dentato; lamellis maximi rotundatis; columna aptera pubescente. *In Mexico.* 4.

13. *O. Rossii* Lindl. B. R. 1839. t. 48. pseudobulbis ovatis caespitosis ancipitibus 1-phylis; fol. oblongo-lanceolatis scapo radicali subbifloro longioribus; bracteis membranaceis carinatis acuminatis; sepalis linear-lanceolatis carinatis acuminatis; petalis oblongis obtusis revolutis; labello subrotundo-ovato emarginato undulato, lamellis unguis confluentibus rotundatis denticulis 2 obtusis. *O. Ehrenbergii* Klotsch et Otto ic. t. 16. *In Mexico.* 4. Sepala lutea fusco-maculata, petala alba basi purpurea, labellum album.

14. *O. stellatum* Lindl. pseudobulbo ovali compresso; folio solitario lanceolato recurvo; scapo subbifloro; bracteis ovarii triquetri medium haud attingentibus; sepalis petalisque aequalibus linearibus acuminatis herbariaeis; labello rhomboideo grosse dentato appendice baseos truncata 4-dentata libera. *In Mexico.* 4.

15. *O. pygmaeum* Lindl. pseudobulbis ovalibus vaginis membranaceis acuminatis vestitis; fol. anguste ovalibus in petiolum angustatis racemo paucifloro flexuoso duplo longioribus; sepalis petalisque subaequalibus; labelli pubescentis rhombei dentali appendice maxima bivalvi in medio tumida, laciniis rotundatis. *In Mexico.* 4.

16. *O. constrictum* Lindl. panicula laxa basi foliosa; sepalis petalisque expansis linear-lanceolatis acuminatis; labello medio constricto; hypochilio oblongo epichilio subpandurato cuspidato serrato basi lamellis 2 serratis aucto; columna bicirrhosa. *Ad Guayra.* 4.

17. *O. hastatum* Batem. orch. mex. t. 20. pseudobulbis, oblongis ancipitibus diphyllis; fol. ligulatis basi conduplicatis; racemo elongato paniculato; sepalis petalisque conformibus herba-

ceis lanceolatis acuminatis; labelli hastati lobis lateralibus truncatis intermedio ovato acuminato cristae lamellis 4 parallelis; columnae auriculis lunatis. In Mexico. 4. Flores virides rubro-maculati.

† Xanthochilum Lindl. Labellum maculatum.

a. Columnae auriculis rotundatis latioribus quam longis v. nullis.

18. *O. grande* Lindl. sepalis lanceolatis lateralibus convexis falcatis petalisque oblongis obtusis latioribus subundulatis; labello subrotundo basi auriculato sepalis plus duplo breviore; tuberculis basi 3 corrugatis aliisque lateralibus dentiformibus minoribus; columnae tomentosae marginibus rotundatis convexis incurvis. Batein. orch. mex. t. 46. In Guatimala. 4.

19. *O. Warneri* Lindl. pseudobulbis ovatis ancipitibus subangulatis apice elongatis diphylis; fol. patulis linearis-lanceolatis racemo paucifloro brevioribus; bracteis minimis; sepalis ovalibus patentissimis, petalis paulo angustioribus obtusis adscendentibus; labelli 3-lobi plani lacinia intermedia cuneata, biloba, lateralibus quadratis, tuberculo disci simplici; columnae elongata aptera. In Columbia. 4.

20. *O. gracile* Lindl. fol. oblongis papyraceis basi canaliculatis angustatis scapo gracili subpaniculato brevioribus; bracteis minutis; sepalis petalisque oblongis obtusis longe unguiculatis illis dorso carinatis; labello bilamellato oblongo obtuso medio geniculato; columnae alis falcatis acutis. In Peruria. 4. Flores parvi fusi.

21. *O. longifolium* Lindl. fol. lanceolatis papyraceis basi longe canaliculatis scapo subpaniculato gracili brevioribus; bracteis minutis; sepalis petalisque lanceolatis acutis longe unguiculatis; labello bilamellato oblongo acuto medio geniculato apicibus lamellarum auriciformibus divergentibus; columnae alis falcatis minimis. In Peruria. 4.

22. *O. ixoides* Lindl. caespitosum sere culbe; fol. linearis-lanceolatis acutis striatis; scapo simplici apice racemoso; bracteis brevibus ovatis cucullatis; sepalis petalisque unguiculatis obtusiusculis; labello oblongo

obtuso basi bilamellato medio 5-tuberculato; columna aptera. In Nov. Granata. 4. Flores parvi flavi.

23. *O. laeve* Lindl. B. R. 1844. t. 39. pseudobulbis compressis sulcatis; fol. oblongo-ensiformibus obtusis apice obliquis; floribus paniculatis; bracteis laxis membranaceis; sepalis petalisque oblongo-linearibus acutis planis; labelli lamina panduraeformi apiculata ungue laevi obtusissime bidentata; columnae alis apice rotundatis crispis basi planis. In Guatimala. 4. Flores fragrantes fusco-lutei.

24. *O. retusum* Lindl. fol. linearis-lanceolatis papyraceis scapo paniculato brevioribus; bracteis ovatis; sepalis petalisque subsessilibus lanceolatis acutis supremo canaliculato; labello oblongo retuso basi bilamellato; columnae nanae alis maximis oblongis. In Peruria. 4. Flores parvi lutei.

25. *O. Bicotoniense* Lindl. B. R. 1840. t. 66. pseudobulbis compressis oblongis 2-3-phyllis; fol. ensiformibus undulatis scapo racemoso duplo brevioribus; sepalis petalisque linearis-lanceolatis maculatis; labelli ungue bilamellato, lamina cordata acuminata undulata; columnae alis integris. Cyrtochilum Batem. orch. mex. t. 6. Zygopetalum africanum Hook. B. M. t. 3812. In Guatimala. 4. Flores virides fusco-maculati labellum lila-cinum.

26. *O. myanthum* Lindl. fol. lanceolatis basi canaliculatis erectis scapo paniculato elongato flexuoso duplo brevioribus; bracteis minutis; sepalis petalisque linearis-lancelatis unguiculatis acutis; labello geniculato lanceolato acuto basi bilineato; columnae brevis alis obsoletis subulatis. In Peruria. 4. Flores minimi.

27. *O. tacerum* Lindl. sert. orch. t. 25. pseudobulbis ovalibus ancipitibus; fol. linearis-oblongis; racemo subpaniculato terminali; bracteis ovatis squamaeformibus; sepalis petalisque rhombeo-lanceolatis acuminatis; labello lacero ovato concavo cuspidato, lamellis fimbriatis denticulis 2 anteriores subulatis glabris; columnae glabrae auriculis subtruncatis. In Peruria. 4. Flores amoene aurantiaci.

28. *O. pardinum* Lindl. fol. linearis-oblongis basi angustatis striatis; petalis undulatis sepalisque angustioribus lanceolatis; labello unguiculato

ovato-lanceolato, unguis axi cum columna connato utrinque lamellato, callos quibusdum elevatis inaequalibus linearibus productioribus e medio. In Peruria et Popaya. 2. Flores magni lutei fusco-maculati.

29. *O. epidendroides* H. et K. nov. gen. t. 85. pseudobulbis ovato-oblongis compressis; fol. lanceolatis subcordatis; scapo erecto multifloro; sepalis petalisque acuminatis undulatis; labello unguiculato oblongo obtuso undulato-crenato, basi trituberculato. In Nor. Granata. 2. Flores magni lutei fusco-maculati.

30. *O. angustatum* Lindl. B. R. t. 1992. pseudobulbis compressis; fol. longis lato-lanceolatis erectis scapo brevioribus; scapo paniculato; sepalis linear-lanceolatis acuminatis; petalis ovato-lanceolatis unguiculatis undulatis; labello ovato-lanceolato acuminato; crista baseos lamellata multifida; columua mutica. In Peruvia. 2.

31. *O. revolutum* Lindl. fol. ensiformibus rigidis margine revolutis scapo rigido dense paniculato brevioribus; bracteis cucullatis; sepalis petalisque lanceolatis unguiculatis acutis; labello conformi sessili cordato; lamellis 5 carnosis integris, quarum 3 superiores multo breviores, columna aptera. In Popaya. 2.

32. *O. maculatum* Llave; (B. R. 1840. t. 30.) pseudobulbis oblongis compressis 1-phylis; fol. oblongis nervosis acutiusculis racemis pendulis brevioribus; sepalis linear-lanceolatis acuminatis discoloribus; petalis oblongis acuminatis undulatis; labello cordato acuminato subcrenato; appendice unguis bivalvi concava cochleari apice producta emarginata per medium argute serrulata; columna pubescente subaptera. In Mexico. 2. Petala et bellum lutea fusco-maculata.

33. *O. cordatum* Lindl. (Knowl. fl. cab. t. 100.) pseudobulbis oblongis compressis diphyllis; fol. lato-oblongis planis acutis scapo squamoso brevioribus; racemo stricte disticho; bracteis navicularibus acuminatis membranaceis; sepalis petalisque linear-lanceolatis acuminatissimis; labello cordato acuminatissimo integerrimo appendice carnosa apice biloba basi utrinque dente unico aucta; columna pubescente clavata subaptera. In Mexico. 2.

b. Columnae auriculis linea-ribus longioribus quam latis
v. cirrhosis.

34. *O. cristatum* Lindl. fol. linear-lanceolatis acutissimis; scapo multifloro simplici paulo brevioribus; sepalis petalisque lanceolatis acuminatis; labello lanceolato acuminato geniculato basi lamina multifida cristato; columna elongata basi membranaceo-marginata apice alis duabus uncinatis; anthera cristata. In Peruvia. 2. Flores fusco-maculati.

35. *O. cirrhosum* Lindl. sepalis lanceolatis petalisque latioribus undulatis acuminatissimis maculatis labello longioribus; labelli lamina cordata acuminatissima; columna apice aptera bicirrhosa. In Guayaquil. 2.

36. *O. Hattii* Lindl. pseudobulbis ovatis acuminatis ancipitibus; fol. ensiformibus in basin angustatis; scapo paniculato; sepalis petalisque ovato-lanceolatis acuminatis unguiculatis; labello oblongo acuminato pectinato; crista baseos lamellata multifida; columua alis bidentatis dente superiore aristato. In Peruvia. 2. Flores lutei fusco-maculati.

37. *O. rigidum* Lindl. fol. oblongis basi angustatis scapo rigido paniculato brevioribus; sepalis lateribus lineari-lanceolatis dorsali petalisque lanceolatis; labello unguiculato obovato cordato apiculato lineis 2 elevatis in ungue; columnae brevis semiteretis alis angustis decurvis serrulatis. In Peruvia. 2. Flores lutei.

38. *O. bicolor* Lindl. fol. lanceolatis scapo simplici paucifloro flexuoso subaequalibus; sepalis petalisque ovatis acutis subundulatis aequalibus; labello unguiculato obovato apiculato basi obtuso, denticulis quibusdam in ungue; columnae brevis alis decurvis serratis. In Peruvia. 2.

39. *O. erosum* A. Rich. pseudobulbo ovoideo oblongo 1-phyllo; fol. lanceolatis acutis; scapo 1-floro; sepalis luteis; labello lilacino late ovali margine eroso-denticulato. In Mexico. 2.

40. *O. Ghiesbreghtianum* A. Rich. pseudobulbis ovoideis compressis 3-phylis; scapo pedali 3-6-floro; floribus luteis bruneo-maculatis; labello luteo longe unguiculato transverse orbiculari emarginato, sepalis duplo longiori ungue linearis basi hinc et illinc

obtuse auriculato superne bicristato.
In Mexico. 4.

4579. BRASSIA R. Br. (1821).

1. B. lanceana Lindl. B. R. t. 1754. sepalis lateralibus elongatis labello oblongo undulato acuminato subrepando vix duplo longioribus; callo baseos simplici canaliculato truncato pubescente dentibus 2 liberis membranaceis in fronte. *In Surinamo.* 4. Flores lutei brunneo-maculati.

2. B. Lawrenceana Lindl. B. R. 1841. t. 18. sepalis lateralibus elongatis labello oblongo apice lanceolato subundulato plus duplo longioribus; callo baseos simplici canaliculato truncato pubescente. *In Brasilia.* 4.

3. B. angusta Lindl. pseudobulbis oblongis ancipitibus; fol. binis oblongis sessilibus subundulatis racemi longitudine; sepalis linearibus acuminatis lateralibus candatis; petalis linearibus acuminatis; labello linear-lanceolato acuminato; lamellis baseos connatis pubescentibus antice denticulo auctis. *In Brasilia.* 4.

4. B. macrostachya Lindl. sert. t. 6. pseudobulbis compressis margine obtusis 2-3-phyllis; scapo nutante multifloro; sepalis linearibus acuminatis lateralibus longissimis; labello oblongo-lanceolato acuminato petalis longiore; lamellis baseos liberis villosis dentibus 3 liberis in fronte. *In Demerara.* 4.

5. B. caudata Lindl. B. R. t. 832. pseudobulbis compressis margine acutis; scapo erecto; sepalis ovato-linearibus acuminatis lateralibus longissimis; labello ovato acuminato petalorum longitudine; lamellis baseos liberis villosis denticulis 2 liberis in fronte. *In Ind. occ.* 4.

6. B. bidens Lindl. pseudobulbis angustis ancipitibus; fol. oblongo-lanceolatis scapo stricto multifloro aequalibus; sepalis acuminatis lateralibus labello duplo longioribus; labello rhomboe undulato petalis breviore; lamellis baseos laevibus rectis appendice membranacea biloba in fronte. *Patria?* 4.

7. B. cochleata Knowl. et Westc. n. Cab. t. 53. sepalis petalisque subaequalibus linearibus acuminatis; la-

bello elongato cochleato acuminato. *In Demerara.* 4.

8. B. verrucosa Lindl. fol. scapis gracilibus duplo brevioribus; sepalis lateralibus acuminatis labello unguiculato obovato apiculato verrucoso plus duplo longioribus; lamellis baseos liberis villosis apice recurvis. *In Guatimala.* 4. Flores labello excepto pallide virides.

9. B. guttata Lindl. pseudobulbis oblongis ancipitibus, diphylis; fol. oblongis obtusis racemo multifloro brevioribus; bracteis membranaceis patentibus squamaeformibus; sepalis linearibus acuminatis petalis conformibus brevioribus; labello supra basin cordato ovato criso; lamellis baseos connatis pubescentibus edentulis apice divergentibus. *In Guatimala.* 4.

10. B. brachiata Lindl. pseudobulbis oblongis angustis compressis diphylis; fol. obtusis racemo multifloro brevioribus; bracteis patentibus squamaeformibus; sepalis petalisque brevioribus acuminatis longissimis; labello supra basin cordato subrhombideo acuminato criso; lamellis baseos bidentatis obtusis. *In Guatimala.* 4.

11. B. aristata Lindl. racemo secundo nutante multifloro; sepalis linearibus strictis acuminatis lateralibus lamello 4-plo longioribus; petalis ex ovata basi acuminatis aristatis; labello obovato basi angustato sub apice aristato secus medium verrucoso; lamellis baseos glabris apice liberis divergentibus rotundatis. *In Guatimala.* 4.

12. B. peruviana Poepp. et Endl. n. g. t. 117. fol. elongatis acutissimis; sepalis anguste linearidus acuminatissimis aequalibus; floribus resupinatis; labello oblongo lanceolato acuto undulato crenulato sepalis subaequali. *In Peruvia.* 4.

13. B. maculata R. Br. B. M. t. 1691. sepalis petalisque linearibus acuminatis aequalibus; labello postico subrotundo. *In Jamaica.* 4. Sepala et petala olivaceo-brunnea cum labello purpureo-maculata.

14. B. Clowesii Lindl. pseudobulbis ovalibus 3-phyllis; fol. ensiformibus angustis erectis scapo longioribus; racemo paucifloro laxo; bracteis minimis setaceis; sepalis petalisque lan-

ceolatis aequalibus; labelli cordati in medio constricti apice subrotundo acuto basi lamellis 5 inaequalibus abruptis 5 uncialibus aucta. *Miltonia Lindl. sert. orch. t. 34. In Brasilia.* 4.

15. *B. pumila* Lindl. fol. binis patulis elongato-lanceolatis caudiculatis; sepalis linearis-lanceolatis acuminateis inferioribus labello longioribus; labello pandurato acuminate subundulato basi bicarinato dentibus ante carinas 2 acutis elevatis aucto. *In Chili.* 4. Flores flavi basi purpurei.

4580. TETRAPELTIS Wall. (1836).

1. *T. fragrans* Wall. *In Ind. or.* 2. Caulis adscendens. Fol. oblonga lanceolata plicata. Racemus terminalis 6-unc. longus. Flores albi.

4581. PHALAEENOPSIS Blume. (1826).

1. *P. amabilis* Blume Paxt. mag. of Bot. 7. p. 49. c. ic. B. R. 1838. t. 34. Rumph 6. t. 43. *In Java.* 4. Folia bina coriacea. Scapus 1-ped. 3-4-florus. Flores magni albi.

4582. TRICHOGLOTTIS Blume. (1826).

1. *T. retusa* Blume bijdr. et in tabell. t. 8. fol. linearibus retusis rigidis; floribus lateralibus subsolitariis; labelli limbo piloso. *In Java.* 4.

2. *T. lanceolaria* Blume; fol. linearis-lanceolatis coriaceis pedunc. paucifloris oppositifoliis; labelli limbo imberbi. *In Java.* 4.

3. *T. rigida* Blume; fol. linearis-lanceolatis carnosis; floribus oppositifoliis subsolitariis; labelli limbo dentibusque lateralibus callosis. *In Java.* 4.

4583. ANSELLIA Lindl. (1846).

1. *A. africana* Lindl. Paxt. mag. of Bot. 1846. p. 241. c. ic. *In Africa.* 2. Herba epiphyta. Caules elongati foliosi. Panicula terminalis.

4584. SUTRINIA Lindl. (1841).

1. *S. pendula* Lindl. *In Peruvia.* 2. Herba epiphyta pseudobulbosa glabra. Folia solitaria coriacea. Spica multiflora pendula.

4585. TELIPOGON H. et K. (1817).

1. *T. angustifolius* H. et K. nov. g. t. 75. fol. linearis-lanceolatis acuminatis; labello imberbi. *In Nov. Granata.* 4. Flores flavescentes.

2. *T. latifolius* H. et K. fol. lanceolato-oblongis acutis; labello basi barbato. *In Jain de Bracomoros.* 4.

4586. VANDA R. Br. (1820).

1. *R. Roxburghii* R. Br. fol. apice oblique tridentatis; racemis erectis fol. longioribus; sepalis petalisque oblongo-ovatis undulatis obtusis; labelli lobo medio ovato emarginato. Paxt. Mag. of Bot. 7. p. 265. c. ic. *In Ind. or.* 4.

2. *V. furra* Lindl. Angraecum Rumph 6. t. 46. f. 1. Cyrtochilum furfum Willd. *V. Roxburghii* Hook. B. M. 3416. *In Amboina* 4. Species dubia.

3. *V. longifolia* Lindl. fol. longis loris apice obliquis obtusissimis; racemis horizontalibus fol. triplo brevioribus; sepalis oblongis obtusis; petalis angustioribus; labelli hypochilio concavco pubescente apice rotundato; crista carnosa per axin, epichilio subrotundo-ovato obtuso. *In Trop. Wall.*

4. *V. gigantea* Wall. fol. late loris apice obtusissimis emarginatis subaequalibus; racemis folio duplo brevioribus; sepalis petalique oblongo-ovatis obtusis; labello incurvo canaliculato basi cordato apice dolabriiformi obtuso; callo conico in medio. *In Ind. or.* 4.

5. *V. spathulata* Spr. fol. ovato-oblongis obtusis oblique emarginatis; recurvis erectis multifloris; sepalis petalique oblongis obtusis planis; labelli hypochilio antice bicalloso, epichilio rhomboideo apice incurvo medio cristato; ovario hexaptero. Rheede 12. t. 3. *Epidendron L.* *In Ind. or.* 4. Species pulcherrima floribus aureis.

6. *V. peduncularis* Lindl. fol. loratis apice alte oblique bilobis; pedunculo longissimo filiforme corymboso; sepalis oblongis obtusis; petalis duplo minoribus; labello oblongo retuso villosa basi bilamellato. *In Zeylona.* 2. Flores magnitudine et facie Ophrydis apiferae.

7. *V. multiflora* Lindl. coll. t. 38. fol. loratis apice obliquis emarginatis; pedunculis subcorymboso-ramosis; sepalis petalisque oblongis obtusis maculatis subaequalibus; labello cristato; lobo medio ovato acutiusculo. *In Chine.* 2. Flores lutei sanguineopunctati.

8. *V. lissochiloides* Lindl. fol. ensiformibus emarginatis racemo multifloro terminali brevioribus; sepalis petalisque oblongis obtusis; labello oblongo canaliculato apice uncinato. *Fieldia Freyc. voy. t. 36. In ins. Moluccanis.* 2. Flores speciosi lutei.

9. *V. cristata* Lindl. fol. canaliculatis recurvis apice truncatis oblique excisis tridentatis; racemo erecto trifloro fol. breviore; sepalis obtusis oblongis fornicate; petalis angustioribus; labelli lobis lateralibus brevibus acutis intermedio vittato oblongo apice saccato, inaequaliter 3-corni. *In Neopatia.* 2. Flores albi viridi-tincti.

10. *V. teres* Lindl. fol. teretibus; racemis adscendentibus subbifloris; sepalis oblongis obtusis; lateralibus semitortis labello suppositis; petalis majoribus suborbiculatis undulatis; labello basi conico laciniis lateral. subtruncatis intermedia subpubescente. *In Sylhet.* 2.

11. *V. lamellata* Lindl. fol. distichis coriaceis acute bidentatis; spica multiflora; sepalis petalisque obovatis obtusis undulatis subincurvis; labello basi mammoso, limbo retuso auriculato bilamellato bituberculato. *In Manilla.* 2.

12. *V. congesta* Lindl. fol. oblongis coriaceis apice obliquis mucronulatis; spicis capitatis subsessilibus, perianthio carnoso fragili; sepalis petalisque obtusissimis; labello deltoideo crenato papilloso pubescente. *In Zeylona.* 2.

13. *V. parviflora* Lindl. racemo simplici; sepalis oblongis, petalis linearibus spathulatis; labelli trilobi lobis lateralibus adscendentibus acutis intermedio oblongo canaliculato spon-

gioso bilamellato apice circulari-denticulato; calcare angusto obtuso. *In Boubay.* 2.

4587. RHENANTHERA Lour. (1796).

1. *R. coccinea* Lour. caule disticho folioso; fol. apice oblique emarginatis; paniculis lateralibus multifloris; sepalis undulatis lanceolatis obtusis superiore petalisque spathulato-linearibus longioribus; labelli lobis lateralibus truncatis, intermedio linguaeformi reflexo. *In Cochinchina.* 2. Flores sanguinei.

2. *R. arachnites* Lindl. caule altissime adscendente; fol. lanceolatis; sepalis petalisque arcuatis linearibus apice latioribus; labelli hirsuti lobis ovalibus subaequalibus; intermedio intus cristato apice bidentato. *Kaempf. ic. 868. In Japonia.* 2.

3. *R. Sulingi* Lindl. caulis subramosis; fol. linearibus retusis; spicis simplicibus paucifloris; sepalis subaequalibus obtusiusculis; limbo ovato incrassato tuberculis lineato. *In Java.* 2.

4. *R. elongata* Lindl. caule ramoso; fol. lato-linearibus oblique emarginatis; paniculis elongatis nutantibus; sepalis exterioribus lateralibus internis latioribus spathulatis; labelli limbo ovato bicalloso. *In Java.* 2.

5. *R. matutina* Lindl. caule ramoso; fol. linearibus oblique retusis; pedunculis paniculatis nutantibus; sepalis lateralibus exterioribus connexis; labelli limbo ovato abbreviato. *Aerides Blume tab. 24. In Java.* 2.

4588. DIPLOCENTRUM Lindl. (1832).

1. *D. recurvum* Lindl. *In Ind. or.* 2. Epiphyta caulescens. Folia complicata carnosa recurva. Racemi paniculati recurvi. Flores minimi. Calcaria brevia obconica incurva.

4589. MICROSACCUS Blume. (1826).

1. *M. jaranensis* Blume. *In Java.* 2. Herba epiphyta pusilla. Caules

compressi. Folia scapelliformia equitantia rigida. Pedunculi intrafoliacel pauciflori.

4590. CAMAROTIS Lindl. (1833).

1. *C. purpurea* Lindl. fol. emarginatis oblongo-linearibus; labello apice appendiculo subulato inflexo foramine instructo. Paxt. mag. v. 7. p. 25. c. ic. In *Sylhet*. 2.

2. *C. obtusa* Lindl. labello calciformi lobulo terminali truncato obsolete 3-dentato inflexo intus appendice biloba canaliculata aucto; columnaria torta; rostello ungue labelli vix longiore. In *Ind. or.* 2.

4591. CHILOCHISTA. Lindl. (1833).

1. *C. usnoides* Lindl. *Epidendron* Don. In *Nepalia*. N. Herba humilis epiphyta hirsuta aphylla; radicibus complanatis viridibus. Flores albi odorati.

4592. GUNUIA Lindl. (1838).

1. *G. picta* Lindl. In *ins. Van Diemen*. 2. Herba epiphyta rhizomate repente. Folia disticha lanceolata falcata basi articulata, racemo stricto foliorum longitudine.

4593. MICROPERA Lindl. (1833).

1. *M. pallida* Lindl. In *Sylhet*. 2. Epiphyta caulescens. Folia disticha linearia arcuata apice aequaliter emarginata. Spicae laterales horizontales foliis breviores. Flores citrini.

4594. SACCOLABIUM Blume. (1826).

e. Labelli calcar perianthio patenti aequale v. brevius.

1. *S. pusillum* Blume; caulescens; fol. linearibus rigidis distichis; floribus axillaribus subpedicellatis solitariis. In *Java*. 2.

2. *S. micranthum* Lindl. fol. oblongo-loratis apice obliquis obtusis alte bilobis; racemis cernuis densifloris foliis brevioribus; sepalis subrotundato-ovatis; petalis linearibus obtusis, labelli calcare subrotundo; lamina obovata obtusa v. acuta basi callo reflexo instructa. In *Nepalia*. 2.

3. *S. densiflorum* Lindl. fol. lorato-oblongis apice obliquis emarginatis; racemis densis cylindricis; floribus extus scabris; sepalō supremo fornicate; labello infundibulari; apice calcariis ventricoso quater gibboso. In *Sylhet*. 2.

4. *S. guttatum* Lindl. fol. longis canaliculatis inaequaliter truncatis arcuatis; racemis cylindricis ~~densifloris~~; sepalis ovatis, petalis duplo angustioribus; labelli calcare compresso truncato-conico, intus pubescente; capsulis oblongis 6-gonis. Rhee. 12. t. 1. *Sarcanthus* Lindl. B. R. t. 1443. In *Ind. or.* 2. Flores albi roseo-violaceo-guttati.

5. *S. spicatum* Lindl. fol. lineariligulatis recurvis apice truncatis cum mucronulo; spicis basilaribus multifloris elongatis; labello indiviso ovali margine undulato demum inferne cornuto; fol. perianthii anticus maximis alaeformibus; calcare saccato descendente. In *Nepalia*. 2.

6. *S. praemorsum* Lindl. fol. radicalibus linearibus canaliculatis apice praemorsis cuspidatis; racemis longissimis; labelli calcare infundibulari obtuso recurvo; lamina ovata acuta. *Rhyncostylis* Blume. *Aerides* Willd. In *Ind. or.* 2.

7. *S. ringens* Lindl. racemo subramoso stricto crassiusculo multifloro; perianthio ringente; sepalis ovatis acutis petalis paulo minoribus; labelli calcare infundibulari obtuso incurvo; lamina triloba basi callosa, lobis lateribus nanis. In *Ind. or.* 2.

8. *S. giganteum* Lindl. fol. latis loratis carnosis uncinato-bilobis; racemis cylindricis multifloris; sepalis oblongis obtusis petalis longioribus obovatis; calcare conico lamina breviore obovata carnosa apice 3-loba, lobo medio inflexo minore. In *Ind. or.* 2.

9. *S. Wightianum* Lindl. fol. canaliculatis angustis obtusis carnosis apice subaequalibus; racemis ramosis; sepalis petalisque obovatis obtusis;

calcare cylindraceo arcuato; lamina lanceolata basi callo bilobo carnosus instructa; capsulis tripteris 3-costatis. *In Ind. or.* 2.

10. *S. curvifolium* Lindl. fol. linearibus canaliculatis arcuatis apice praemorsis; racemis densis multifloris, sepalis ovatis, petalis obovatis; labelli calcare cylindraceo obtuso lamina linearis truncata. *In Nepalia.* 2. Flores ruberrimi.

11. *S. rubrum* Lindl. fol. canaliculatis arcuatis apice bidentatis; racemis multifloris; sepalis petalisque ovatis; labelli calcare cylindraceo obtuso incurvo, lamina ovali acuminate apice subcarnosa basi bicorniculata. Paxt. Mag. 7. p. 145. c. ic. *In Nepalia.* 2.

12. *S. papillosum* Lindl. B. R. t. 1552. fol. ligulatis apice obliquis cuspidatis; racemis brevissimis capitatis; sepalis carnosis linearis-ovatis obtusis; labelli calcare obconico obtuso intus villoso; lamina ovata carnosa papillosa recurva. Epidendron prae-morsum Roxb. cor. t. 43. *In Malabarica.* 2. Flores albi lutei purpureo-picti.

13. *S. dasypogon* Lindl. acaule fol. ovato-oblongis acutis apice oblique bidentatis; corymbis subumbellatis densifloris foliis aequalibus; sepalis petalisque linearis-oblongis incurvis, labelli lamina dilatata subcordata denticulata. *In Nepalia.* 2.

14. *S. undulatum* Lindl. acaule; fol. angustis undulatis acuminatis apice obliquis obtusis; racemis multifloris; sepalis ovato-oblongis acutis; labelli calcare oblongo apice subinflato; lamina oblonga obtusa levissime triloba. *In Sihet.* 2.

15. *S. acutifolium* Lindl. fol. oblongo-loratis carnosis acutis apice integerrimis; corymbis multifloris; sepalis petalisque obovato-oblongis acutis; labelli calcare brevi ventricoso; lamina dilatata triloba denticulata *Acerides* Wall. *In Ind. or.* 2. Flores lutei labello albo medio rubescente.

16. *S. calceotare* Lindl. subacaule; fol. loratis acuminatis apice oblique bidentatis; corymbis multifloris; sepalis petalisque obovato-oblongis obtusis; labelli calcare inflato orbiculato; lamina lunata rotundata ciliata. *In Nepalia.* 2. Flores lutei purpureo-

maculati. Labellum album lamina basi coccineo punctata.

17. *S. claratum* Lindl. caulescens pendulum; fol. linearis-clavatis apice bidentatis; spicis oppositifoliis; labello inflato barbato. *Limodorum* Willd. *In Ind. or.* 2.

18. *S. obliquum* Lindl. acaule fol. late loratis hilobis obliquis; corymbis axillaris multifloris; sepalis petalisque linearis-ovatis obtusis; labelli calcare inflato orbiculato, lamina deltoidea fimbriata. *In Ind. or.* 2. Flores lutei labello albo.

19. *S. adscendens* Lindl. caule ramoso repente; fol. coriaceis vaginantis; racemis elongatis; sepalis petalisque conniventibus subaequalibus; labelli calcare clavatus; lamina 3-loba parva, laciniis lateral. inflexis. *Robiquetia* Gaudich. voy. t. 34. *In ins. Moluccis.* 2.

20. *S. aphyllum* Lindl. caulinibus tortuosis squamosis scandentibus; radicibus longissimis tortuosis; sepalis petalisque ovalibus; labelli calcare infundibulari apice inflato obtuso; lamina ovata acuta. *Angraecum Thouars* orch. afr. t. 33. *Gussonea Rich.* t. 11. *In Madagasc. et Maurit.* 2.

21. *S. striatum* Lindl. fol. loratis apice oblique bilobis; racemis erectis rarifloris; sepalis petalisque ovatis acutis; labelli calcare conico in laminam ovatam acutam producto. *Angraecum Thouars* orch. t. 72. *In Borbonia.* 2. Flores albi.

22. *S. dumosum* Lindl. fol. arcuatis apice oblique erosis; racemis ramosissimis, ramis divaricatis; sepalis obovato-oblongis obtusis; labelli calcare conico obstuo margine dentato, lamina oblonga lobis 2 lateribus obsoletis. *In Ind. or.* 2. Flores intescentes, labellum roseum.

23. *S. racemiferum* Lindl. fol. loratis planis oblique emarginatis obtusis; racemis ramosis; sepalis ovatis; petalis linearibus; labelli calcare conico subcompresso margine utrinque denticulo instructo. *In Ind. or.* 2. Flores parvi intus fusco-rubri. Labellum album.

24. *S. nireum* Lindl. fol. distichis linearis-loratis obtusis emarginatis; pendulis ancipitibus ramosis; floribus spicatis; sepalis conniventibus; labelli lamina spatulata carnosa. *In Zeytona.* 2.

25. *S. reflexum* Lindl. fol. brevibus anguste oblongis apice bilobis; racemis erectis ramosis; sepalō supremo petalisque reflexis linearibus undulatis; labelli calcare scrotiformi ventricoso; lamina ovata acuta. *In Singapore.* 2.

26. *S. bifidum* Lindl. racemo pendulo gracili; petalis basi obscure hastatis; labello recurvo hastato apice setaceo fisso; laciniis basi linearibus obtusis erectis. *In Manilla.* 2. Flores parvi ochroleuci.

27. *S. gemmatum* Lindl. fol. distichis canaliculatis subtortis apice tridentatis; spica ramosa; floribus minutis carnosis; petalis subrotundis; labello carnoso ovato cristallino, marginibus calcaris conici penduli dilatatis rotundatis; columna brevissima. *Patria?* 2.

28. *S. compressum* Lindl. caule juniore ancipiū; fol. distichis amplexicaulibus undulatis oblique 3-dentatis; racemis cylindricis pendulis; labelli calcare falcato obtuso lamina carnosa minima dentiformi. *In Manilla.* 2. Flores sanguineo-carnosis.

b. Labelli calcar perianthio clauso triplo longius lamina obsoleta.

29. *S. brerifolium* Lindl. fol. linear-oblóngis brevibus obtusis apice subaequalibus emarginatis; racemis horizontalibus foliorum longitudine; sepalis petalisque conniventibus; labelli calcare recto subcylindrico apice conico obtuso sepalis triplo longiore; lamina minima acuta. *In Zeylona.* 2.

30. *S. roseum* Lindl. fol. linearibus apice obliquis obtusis emarginatis; racemis paucifloris foliis brevioribus; sepalis petalisque inaequalibus conniventibus acutis; labelli postici calcare longissimo obtuso cylindrico incurvo; lamina minima acuta. *In Zeylona.* 2. Flores parvi rosei.

31. *S. gracile* Lindl. fol. ensiformibus valde obliquis subfalcatis; racemis strictis gracilibus multifloris fol. aequalibus; sepalis petalisque ovatis acutis aequalibus reflexis; labelli calcare conico sepalis duplo longiore lamina minima acuta. *In Zeylona.* 2.

4595. TAENIOPHYLLUM Blume. (1825).

1. *T. glandulosum* Blume tabell. 70. spica elongata retroflexa glandulis adspersa laxiflora; labelli limbo acuminato intus ad apicem denticulo instructo. *In Jara.* 2.

2. *T. hirtum* Blume; spica elongata leviter flexuosa laxiflora hirta; labelli limbo acuminato intus edentulo; rostellum antice valde producto. *In Java.* 2.

3. *T. acuminatissimum* Blume; spica abbreviata retroflexa glabra pauciflora; bracteis approximatis; sepalis et labello acuminatissimis margine inflexis. *In Java.* 2.

4. *T. obtusum* Blume; spicis abbreviatis strictis scabris; bracteis bifariam imbricatis; labelli limbo obtuso. *In Java.* 2.

4596. CLEISOSTOMA Blume. (1825).

1. *C. suareolens* Blume; fol. latolinearibus oblique retusis; labelli limbo fornicate cum mucrone fimbriato. *In Java.* 2.

2. *C. subulata* Blume; fol. linear-lanceolatis apice contracto-subulatis; labelli limbo ovato acuto margine utrinque tumido. *In Java.* 2.

3. *C. sagittata* Blume tabell. 27. fol. linearibus retusis; labelli limbo recto sagittato. *In Java.* 2.

4. *C. spathulata* Blume; fol. latolinearibus oblique retusis; spicis simplicibus labelli dentibus lateralibus rotundatis interne callosis; limbo ovato brevissimo. *In Java.* 2.

5. *C. acaulis* Lindl. fol. loratis apice acute bilobis obliquis; corymbis paucifloris; sepalis petalisque subrotundo-oblóngis carnosissims; labello saccato cymbiformi acuto carnosissimo. *In Zeylona.* 2.

6. *C. cautescens* Lindl. fol. loratis distichis apice obtuse bilobis; spicis erectis subramosis; sepalis petalisque obovato-oblóngis patentibus aequalibus; labelli calcare poculiformi; dente dorsali ovato; lamina brevissima rotundata. *In Zeylona.* 2. Flores rosaceous, labellum album.

7. *C. rosea* Lindl. caule folioso; fol. anguste lanceolatis coriaceis acu-

tis; sepalis lateralibus oblique ovatis acutis petalisque linearibus obtusissimis; labelli lobis lateralibus crassissimis transverse truncatis. In Manilla.

2. Flores straminei.

8. *C. latifolium* Lindl. misc. 1840. fol. oblongis obtusis apice subaequalibus bilobis; floribus paniculatis; ramis simplicibus rigidis, petalis sepalsque linearibus obtusis; labelli calcare ventricoso lamina reniformi dente membranaceo bilobo. In Ind. or. 24. Flores lutei rubro marginati.

9. *C. discolor* Lindl. 1845. fol. oblongis canaliculatis oblique truncatis; racemo paniculato; labello 3-fido utrinque plicato lobo medio carnosus obtuso intus bituberculato dente dorsali indiviso carinato; calcare oblongo obtuso. In Ind. or. 24.

10. *C. decipiens* Lindl. fol. distichis loratis oblique emarginatis leviter undulatis; spicis recurvis compositis; sepalis petalisque oblongis rotundatis; labelli lamina rotundata transversa, sacco subventricoso pubescente. In Zeylona. 24.

4597. APPENDICULA Blume.
(1825).

a. Spicae elongatae. Labelum integrum.

1. *A. pendula* Blume; caulis simplicibus superne subcompressis; fol. linear-lanceolatis 3-cuspidatis; spicis axillaribus terminalibusve solitariis pendulis folio longioribus; labelli limbo ovato-obtuso cum mucrone. In Java. 24.

2. *A. cristata* Blume; caulis ramosis compressis; fol. linear-lanceolatis apice tricuspidatis; spicis axillaribus solitariis longissimis inferne nudis compressis; labelli limbo rotundato emarginato interne utrinque cristato. In Java. 24.

3. *A. anceps* Blume; caulis simplicibus foliaceis; fol. lanceolatis apice 3-cuspidatis; spicis oppositifoliis terminalibusve solitariis v. geminis folio brevioribus; labelli limbo obtusiusculo reflexo. In Java. 24.

4. *A. alba* Blume; caulis simplicibus subcompressis; fol. linear-lanceolatis retuso-mucronatis; spicis axillaribus simplicibus terminalibusve

saepe geminatis; labelli limbo obtuso. In Java. 24.

5. *A. ramosa* Blume; caulis ramosis teretiisculis; fol. ovali-oblongis parvis retuso-mucronatis; spicis paucifloris oppositifoliis solitariis folio subaequalibus; labelli limbo obtuso interne bicalloso. In Java. 24.

6. *A. pauciflora* Blume; caulis simplicibus teretibus; fol. ovalibus retuso-mucronulatis; pedunculis oppositifoliis brevissimis sub-1-floris; labelli limbo obtuso cum mucrone. In Java. 24.

7. *A. taxifolia* Blume; caulis ramosis teretibus; fol. linearibus oblique mucronulato-retusis rigidis lucidis; spicis axillaribus terminalibusque solitariis folio brevioribus paucifloris; labelli limbo rotundato crenulato intus ad marginem tumido. In Java. 24.

8. *A. carnosa* Blume; caulis simplicibus teretibus; fol. linearibus apice inaequali-obtusis carnosis; pedunc. axillaribus v. intrafoliaceis brevissimis 1—2-floris; labelli limbo rotundato emarginato recto. In Java. 24. Flores parvi albo-virentes.

9. *A. angustifolia* Blume; caulis simplicibus teretibus; fol. linearibus oblique retusis canaliculatis rigidiscutulis; spicis axillaribus solitariis folio-brevioribus, limbi acuti marginibus incurvis. In Java. 24.

10. *A. reflexa* Blume; caulis simplicibus teretibus; fol. ovalibus retuso-mucronulatis; spicis supraaxillaribus solitariis folio brevioribus densifloris; labelli limbo patente obtuso cum mucrone. In Java. 24.

11. *A. undulata* Blume; caulis compressis fol. ovalibus retuso-mucronulatis; spicis oppositifoliis solitariis folio aequalibus; labelli limbo ovato undulato. In Java.

12. *A. purpurascens* Blume; caulis simplicibus compressis; fol. ovalibus retuso-mucronatis; spicis filiformibus subramosis oppositifoliis terminalibusve folio multo longioribus; labelli limbo ovato acutiusculo. In Java. 24.

13. *A. cornuta* Blume; caulis simplicibus teretibus; fol. ovalibus retuso-mucronulatis; spicis terminalibus oppositifoliisque solitariis folio brevioribus paucifloris; labelli limbo obtuso intus calloso; gynostemio utroque

latere dente recurvo instructo. In Java. 4.

14. *A. congenera* Blume; caulis foliis et spicis praecedentis, sed labello reflexo rotundato concavo intus nudo; gynostemio edentulo. In Java. 4.

15. *A. torta* Blume; caulis simplicibus compressis; fol. ovalibus retuso-mucronulatis; spicis terminalibus solitariis bracteis coloratis roseis bifariam imbricatis; labello torto. In Java. 4.

b. Flores terminales capitati bracteis paucis cincti. Labelum sublobatum.

16. *A. callosa* Blume; caulis simplicibus teretiusculis; fol. linearioribus retuso-mucronulatis; vaginis foliorum bidentatis; labelli limbo lato ovato interne calloso patente. In Java. 4.

17. *A. Hasseltii* Blume; caulis simplicibus teretibus; fol. lato-linearibus retuso-mucronulatis; vaginis foliorum edentulis labelli limbo erectiusculo crenulato. In Java. 4.

18. *A. longifolia* Blume; caulis simplicibus compressis; fol. linearilanceolatis retusis; floribus dense spicatis. In Java.

4598. CRYPTOGLOTTIS Blume. (1825).

1. *C. serpyllifolia* Blume tabell. 42. In Java. 4. Herba pusilla subramosa. Folia linearia cuspidata. Pedunculi solitarii pauciflori. Flores parvi albidi.

4599. CERATOSTYLIS Blume. (1825).

1. *C. graminea* Blume; caulescens; fol. linear-lanceolatis acuminatissimis; pedunculis solitariis geminise subtomentosis; labello apice incrassato margine ciliato. In Jaca. 4.

2. *C. latifolia* Blume; caulescens; fol. lanceolatis obtusis; pedunculis solitariis geminise villosiusculis; labello intus lineis 2 pubescentibus notato. In Java. 4.

3. *C. simplex* Blume; caulis simplicibus teretibus 1-phyllis; fol. lanceolatis retusis; pedunculis soli-

tariis sepalisque glabris; labello superne cucullato. In Java. 4.

4. *C. anceps* Blume; caulis simplicibus subfoliaceis 1-phyllis; fol. lanceolatis retensis; pedunculis 1-3 sepalisque exterioribus arachnoideo-pubescentibus. In Java. 4.

5. *C. gracilis* Blume; caulis simplicibus teretibus 1-phyllis; fol. linearis-subulatis semiteretibus; pedunculis 1-4 ovarisque villosiusculis. In Java. 4.

6. *C. subulata* Blume; caulis simplicibus teretibus 1-phyllis; fol. subulatis teretibus leviter canaliculatis; floribus confertis arachnoideo-pubescentibus. In Java. 4.

4600. EPHIPPIUM Blume. (1825).

1. *E. lepidum* Blume; bulbis pentagonis; fol. lanceolatis obtusis emarginatis in pedunculo elongato ad apicem capitatis; sepalo dorsali interioribus ciliolatis acuminatissimis. In Java. 4.

2. *E. cornutum* Blume tabell. 65. bulbis ovato-oblongis sub 4-gonis; fol. lanceolatis acutis; pedunculo brevi 1-floro; sepalis acutis, lateralibus exterioribus reliquis valde latioribus; labello ad marginem inferne ciliato. In Java. 4.

4601. CERATOCHILUS Blume. (1825).

1. *C. biglandulosus* Blume tabell. 25. labelli calcare ventricoso lamina subulata; caulis simplicibus. In Java. 4.

2. *C. micranthus* Blume; labelli calcare compresso emarginato; lamina medio erecta incrassata; caulis subramosis flexuosis. In Java. 4.

3. *C. orchideus* Lindl. caulescens simplex articulatus pendulus flexuosus; fol. distichis lanceolatis acutis; floribus axillaribus subsolitariis; labello bifido cornu germine duplo breviore. In Java. 4.

4602. ECHIOGLOSSUM Blume. (1825).

1. *E. javanicum* Blume tabell. 28. In Java. 4. Herba epiphyta cau-

lescens. Folia disticha linearis-lanceolata cuspidata rigida. Spica oppositifolia pubescens.

4603. SARCANTHUS Lindl. (1826).

1. *S. paniculatus* Lindl. Bauer ill. t. 9. fol. longis loratis apice oblique bilobis obtusis; spicis paniculatis; sepalis petalisque linearis-oblongis undulatis obtusiusculis; labelli calcare recto obtuso emarginato in laminam bicornem medio callosam producto. Aerides B. R. t. 220. In China. 2. Flores lutescentes.

2. *S. rostratus* Lindl. coll. t. 39. f. 13. fol. lanceolatis acutis planis subrecurvis; spica simplici horizontali foliis subaequali; sepalis petalisque obovato-oblongis obtusis patentibus; labelli calcare recto obtuso in laminam incurvam rostratam producto. In China. 2. Flores luteo-virides sanguineo-marginati.

3. *S. succisus* Lindl. B. Reg. t. 1014. fol. oblongis subundulatis praemorsis; spica simplici horizontali v. deflexa foliis longiore; rachi ancipite; sepalis petalisque oblongis obtusis; labelli calcare apice didymo inflato in laminam ovatam acutam carnosam producto. In China. 2. Flores viridi-lutei medio purpurei. Labellum luteum apice sanguineum.

4. *S. teretifolius* Lindl. fol. teretibus; spica simplici horizontali foliis aequali; sepalis petalisque oblongis obtusis reflexis; labelli calcare recto obtuso intus pubescente in laminam ovatam acutam carnosam producto; facie columnae villosa. Vanda Lindl. coll. t. 6. In China. 2. Sepala et petala luteo-viridia venis 3 sanguineis notata.

5. *S. pallidus* Lindl. fol. distichis coriaceis ligulatis apice oblique retusis panicula multiflora ramosa multo brevioribus; labelli lobo medio solido tereti incurvo. In Ind. or. 2. Flores pallidi.

4604. PODOCIILUS Blume. (1825).

1. *P. lutescens* Blume tabell. 12. fol. ovalibus emarginatis rigidis lucidis; petalis obtusis; labello sagittato

basi bicalloso; rostello subulato; glandula sagittata. In Java. 2.

2. *P. microphyllus* Lindl. fol. anguste ovatis acutis oblique tortis; petalis obtusis; labello sagittato emarginato; rostello obtuso glandula subrotunda. In Ind. or. 2. Flores minutissimi.

3. *P. cultratus* Lindl. fol. equitantibus imbricatis acutis cultratis; spicis brevissimis paucifloris. In Neptalia. 2.

4. *P. falcatus* Lindl. fol. equitantibus imbricatis obtusis falcatis; spicis laxis terminalibus nutantibus; petalis subulatis; labello lanceolato integerrimo in unguem sigmoideum angustato. In Zeylona. 2.

5. *P. saxatilis* Lindl. fol. equitantibus retrorsum cultratis obtusis; spicis brevibus cernuis; petalis obtusiusculis; labello lanceolato integerrimo in unguem sigmoideum angustato. In Zeylona. 2. Flores parvi flavi.

6. *C. gracilis* Lindl. fol. linearibus distichis cuspidatis; caulis repentibus; floribus solitariis sessilibus; petalis obtusiusculis; labello sagittato obovato mucronato; capsula glandulosa. Platysma Blume. In Java. 2.

7. *P. tenuis* Lindl. fol. distichis linearibus acuminatis; caule ramoso; spicis terminalibus paucifloris; floribus minutissimis bracteolatis.

4605. ADENONCOS Blume. (1825).

1. *A. virens* Blume. In Java. 2. Herba epiphyta. Caules simplices. Folia disticha linearia acuta carnosa supra canaliculata. Pedunculi oppositifolii solitarii pauciflori. Flores sessiles virentes.

4606. BIRCHEA Rich. (1841).

1. *B. nilgherrensis*. In Ind. or. 2. Herba epiphyta caule folioso. Fol. teretia. Flores albi spicati.

4607. OECEOADES Lindl. (1832).

1. *O. tenera* Lindl. caulescens; fol. oblongis carnosis emarginatis; spicis 3-4-floris horizontalibus; sepalum supremo galeato, lateralibus

labello subaequali; labello sepalis breviore 2-lobo cucullato, laciniis lateralibus emarginatis truncatis, intermedia carnosa basi bicallosa. *In Zeyttona.* 2. Flores fulvi.

2. *O. paniculata* Lindl. fol. oblongis apice bilobis erosis; paniculatis lateralibus folio duplo longioribus; floribus minutis; sepalos supremo acuto galeato; petalis minoribus acutis; labello sinuato cordato apice longe acuminato; calcare brevi ventricoso. *In Ind. or.* 2. Flores fulvo-lutei.

3. *O. flexuosa* Lindl. subacaulis; fol. linearis-loratis apice oblique bilobis erosis; paniculis flexuosis divaricatis; floribus minutis; sepalis petalisque obovato-oblongis; labello oblongo repando intus piloso. *In Ind. or.* 2. Flores intus flavo rosei. Labellum albo-roseum.

4. *O. parviflora* Lindl. caule brevissimo; fol. linearis-lanceolatis acutis sessilibus; scapo gracili simplici; floribus parvulis; laciniis calycis brevibus basi coaliatis; labello 3-fido; calcare adscendente. *Angraecum Thouars orch. afr. t. 60.* *In Mauritio.* 2.

5. *O. gracilis* Lindl. caule brevissimo; fol. linearibus longissimis; striatis apice bilobis basi subcarinatis striatis; floribus minimis in spica gracili longissima; calcare recurvo ovarii longitudine. *Angraecum Thouars orch. afr. t. 77.* *In Mauritio.* 2.

6. *O. pusilla* Lindl. subacaulis; fol. obovato-oblongis apice aequalibus acutis bilobis racemis adscendentibus gracilibus brevioribus; floribus minutis; sepalis obovatis obtusis petalis conformibus minoribus; labello hastato triangulari; calcare infundibuliformi incurvo labello longiore. *In Ind. or.* 2.

7. *O. Retzii* Lindl. aphylla subarticulata fasciculata cortici adpressa; racemis simplicibus. *Limodorum Willd.* *In Ind. or.* 2.

8. *O. funalis* Lindl. aphylla, radicans; pedunculo biforo; limbo labelli bilobo; cornu longissimo subulato. *Limodorum Willd.* *In Jamaica.* 2. Flores magni albidi.

9. *O. falcata* Lindl. caule simplici; fol. distichis linearibus canaliculariatis acutis; floribus axillaribus solitariis longe pedunculatis; sepalis petalique patentibus linearibus acutis; labello 3-lobo lobo medio emarginato; calcare

longissimo filiformi incurvo. *Limodorum B. R.* 2097. *In China.* 2.

10. *O. maculata* Lindl. fol. solitariis lanceolatis maculatis coriaceis; scapis radicalibus foliis longioribus; flor. ringentibus; labelli 3-lobo intermedio emarginato; calcare recto obtuso. *Angraecum B. R. t. 618.* Lindl. coll. t. 15. *Geodorum Link et Otto abb. t. 14.* *A. monophyllum* Rich. orch. t. 9. *In Brasilia.* 2.

460S. AERIDES Lour. (1790).

a. Spicae bracteis carinatis saepius carnosis instructae; Labelli limbus cucullatus rarius expansus.

1. *A. Arachnites* Lindl. fol. latelinearibus retusis; sepalis longe acuminatis; labello intus appendice linearie instructo. *Dendrocolla Blume.* *In Java.* 2.

2. *A. testaceum* Lindl. fol. acutis bilobis inter lobos cuspidatis; racemis strictis simplicibus; sepalis petalique obovato-oblongis obtusis; labelli laciniis obtusis, intermedia apice dilatata reniformi biloba dentata lineis 2 elevatis. *In Zeyttona.* 2.

3. *A. Wightianum* Lindl. fol. loratis apice obliquis bilobis inter lobos cuspidatis; racemis strictis simplicibus; sepalis petalique ovalibus anticis majoribus; labelli laciniis lateralibus pediculae adnatis obtusis intermedia subcuneata apice 3-loba. *In Ind. or.* 2.

4. *A. odoratum* Lour. fol. flaccidis apice obtusis obliquis; racemis pendulis multifloris foliis longioribus; labelli cucullati laciniis lateralibus erectis intermedia ovata acuta inflexa; calcare conico incurvo. *A. cornutum* Bot. R. t. 1485. *In Ind. or.* 2.

5. *A. affine* Wall. fol. subrecurvis retusis mucronatis; racemis cylindricis multifloris; sepalis oblongis obtusis; labello ovato membranaceo obsolete 3-lobo ungue saccato geniculato; calcare parvo cornuto laminae supposito. *In Ind. or.* 2.

6. *A. crispum* Lindl. fol. planis obtusis obliquis; sepalis petalique subaequalibus obtusis; labello membranaceo margine criso basi bicalloso ungue recto; calcare parvo cornuto obtuso. *In Ind. or.* 2.

7. A. taeniale Lindl. subacaule; radicibus compressis repentibus foliacēs; fol. ovalibus acutis membranaceis; racemis 5—6-floris; sepalis petalisque ovalibus acutis anticis duplo latoribus basi labelli adnatis, labelli laciniis lateralibus apice obtusis denticulis, intermedia integerrima. *In Nepalia.* 2. Labellum violaceum.

8. A. obtusum Lindl. (Dendrocolla Blume;) caule compresso; fol. linearilanceolatis emarginatis cum mucrone intermedio sepalis obtusiusculis; labello interne villoso. *In Java.* 2.

9. A. amplexicaule (Dendrocolla Blume;) fol. cordatis amplexicaulibus; sepalis oblongis acutis; labello interne muricato. *In Java.* 2.

10. A. purpurascens Lindl. caulis compressiusculis; fol. lanceolatis emarginatis purpurascensibus; sepalis acutis. Dendrocolla Blume. *In Java.* 2.

11. A. acuminatissimum Blume (sub Dendrocolla). caulis subramosis; fol. linearilanceolatis emarginato-mucronatis carnosus; sepalis et labelli limbo longiter acuminatis. *In Java.* 2.

12. A. vires Lindl. B. R. 1844. t. 44. fol. latis oblique retusis; racemis pendulis multifloris; sepalis petalisque obovatis obtusis; labelli cornu acuminato ascendentē, lobis lateralibus apice denticulatis intermedio lanceolato medio canaliculato versus apicem denticulato. *In Java.* 2.

13. A. maculosum Lindl. B. R. 1845. t. 58. fol. coriaceis planis apice obliquis obtusis; racemis densis nubantibus subpaniculatis; sepalis subrotundo-oblongis petalis conformibus duplo latoribus, labello ovato subundulato integerrimo basi utrinque 1-dentato, tuberculo indiviso interjecto; columna brevissima. *In Java.* 2. Flores roseo-purpurei maculati.

b. Spicae bracteis coalitis et scrobiculatis munitae. Labelli limbus callosus abbreviatus.

14. A. compressum Lindl. fol. linearilanceolatis apice cuspidatis carnosus; pedunc. compresso bracteis nempe basi ad apicem carnosis carinatis connatis tecto. Dendrocolla Blume. *In Java.* 2.

15. A. tessellatum Wight; fol. trancatis; racemis paucifloris; foliis bre-

vioribus; sepalis petalisque patentibus unguiculatis obovatis obtusis crispis tessellatis; labelli calcare recto conico; lamina ovata dentibus lateralibus erectis acuminatis columnae longitudine. Epidendrum Roxb. cor. t. 42. *In Ind. or.* 2.

16. A. cylindricum Lindl. fol. terribus; racemis brevibus subbifloris; sepalis ovatis obtusis petalis oblongis latoribus; labelli cucullati infundibularis laciniis lateral. oblongis obtusis intermediae carnosae ovatae obtusae adnatis; calcare recto conico. *In Ind. or.* 2.

17. A. teres Lindl. fol. lato-linearis basi angustioribus apice obtuse emarginatis; pedunculo elongato tereti bracteis scrobiculatis tecto. Dendrocolla Blume. *In Java.* 2.

18. A. pusillum Lindl. fol. lato-lanceolatis; pedunculo versus apicem bracteis paucis obsesso, sepalis acutiusculis; labelli auriculis profunde bifidis. Dendrocolla Blume. *In Java.* 2. Flores miniati.

19. A. emarginatum Lindl. fol. linearilanceolatis oblique emarginatis; pedunc. confertis hirsutis paucifloris; sepalis acutis; labelli auriculis emarginatis. Dendrocolla Blume. *In Java.* 2. Flores flavi.

20. A. pallidum Lindl. fol. linearilanceolatis oblique retusis; pedunculo superne bracteis paucis instructo; sepalis obtusis; labello extus cum tuberculo. Dendrocolla Blume. *In Java.* 2.

21. A. spurium Lindl. caulis elongato-clavatis superne 4-gonis diphyllis; fol. lanceolatis; floribus e scrobiculis lateralibus caulis erumpentibus. Dendrocolla Blume. *In Java.* 2.

22. A. minimum Lindl. caulis simplicibus; fol. paucis lanceolatis acutiusculis; spicis brevibus ad apicem paucifloris; sepalis carinatis obtusiusculis; labelli limbo obliterateo. Dendrocolla Blume. *In Java.* 2.

c. Spicae superne bracteis subulatis congestis praeditae; labelli limbo abbreviato formicato.

23. A. angustifolium Lindl. fol. carnosus linearilanceolatis canaliculatis obtusis emarginatis; pedunc. brevibus paucifloris. Dendrocolla Blume. *In Java.* 2.

25. *A. subulatum* Lindl. fol. carnosis linearis lanceolatis canaliculatis apice contractis subulatis; pedunc. brevibus paucifloris. Dendrocolla Blume. In Java. 2.

26. *A. hystrix* Lindl. fol. linearibus basi angustioribus apice retusis; pedunculis elongatis apice congesto-multifloris. Dendrocolla Blume. In Java. 2.

27. *A. anceps* Lindl. caulibus antcipitibus; fol. lanceolatis mucronatis; pedunc. filiformibus apice paucifloris. Dendrocolla Blume. In Java. 2. Flores albo-flavescens.

d. *Labellum pileiforme*, appendicula tabulari carnosa intus a dorso projiciente.

28. *A. appendiculatum* Wall. fol. teretibus; sepalis petalisque linearis oblongis obtusis reflexis; columna elongata basi pubescente; labelli lobo medio complicato basi 1-corni pubescente. In Ind. or. 2.

c. *Labelli lamina biloba* dilatata unguiculata.

29. *A. difforme* Wall. acaule; fol. oblongis carnosis acutis oblique bilobis; racemis strictis; sepalis oblongis obtusis lateralibus majoribus; petalis linearibus obtusis; labelli cucullati lamina maxima biloba. In Ind. or. 2.

4609. STAUROGLOTTIS Schauer. (1842).

1. *S.* Schauer pl. Mey. p. 432. In Manilla. 2. Herba epiphyta pseudobulbis diphyllos. Folia carnosa nervosa. Scapi spicigeri. Flores majusculi.

4610. SCHOENORCHIS Blume. (1825).

a. *Labellum basi calcaratum.*

1. *S. juncifolia* Blume; fol. subulatis basi canaliculatis; spicis intrafoliaceis simplicibus; labelli calcare incurvo. In Java. 2.

b. *Labellum basi saccatum.*

2. *S. micrantha* Blume; fol. subulatis basi canaliculatis; spicis simplicibus axillaribus. In Java. 2.

3. *S. paniculata* Blume; fol. linearibus canaliculatis; spicis paniculatis axillaribus. In Java. 2.

4611. AERANTHUS Lindl. (1824).

1. *A. grandiflora* Lindl. B. R. t. 817. pedunculis debilibus 1-floris; columnae pede longius producto; calcare abbreviato. Dendrobium Thouars orch. afr. t. 88. In Madagascar. 2. Flores virides labellum album apice virescens.

2. *A. sesquipedalis* Lindl. pedunc. rigidis bifloris; calcare longissimo filiformi. Angraecum Thouars orch. afr. t. 66 et 67. In Madagascar. 2. Flores maximi albi.

4612. CRYPTOPUS Lindl. (1824).

1. *C. elata* Lindl. Hook. B. misc. 1. t. 115. Angraecum Thouars orch. afr. t. 79, 80. In Madagascar. 2. Herba epiphyta caulescens. Folia disticha coriacea. Paniculae multiflorae laterales. Flores speciosi.

4613. OENIA Lindl. (1824).

1. *O. Auberli* Lindl. longe caulescens; fol. ovalibus acutis; labello cucullato cuneato bilobo cuspide intermedia obsoleto; calcare brevi conico. Epidendron Thouars t. 81. In Mauritio. 2.

2. *O. macrostachya* Lindl. fol. loratis canaliculatis obtusis oblique bilobis; labello cucullato cuneato sublacero bilobo cuspide intermedio obsoleto; calcare conico medio constricto. Epidendron Thouars t. 83. In Bourbonia et Mauritio. 2.

3. *O. brachystachya* Lindl. subacaulis; fol. loratis apice obtusis leviter oblique emarginatis; racemo simplici paucifloro. Epidendron Thouars t. 84. In Mauritio. 2.

4614. ANGRAECUM Thouars. (1816).

1. *A. eburneum* Thouars orch. afr. t. 65. caule simplici; fol. coriaceis

lucidis apice obliquis 7-striatis; spicis multifloris secundis, labello cordato subrotundo cuspidato basi jugo elevato cristato, calcare sepalum supremo parallelo dimidio longiore; ovario scabro B. R. t. 1522. In Borbonia. 4.

2. *A. superbum* Thouars orch. afr. t. 62, 63, 64. In Madagascar. videotur ex Lindl. v. praecedentis; labello magis quadrato.

3. *A. crassum* Thouars orch. afr. t. 70 et 71. fol. loratis apice obtusis oblique bilobis; racemis secundis horizontalibus, sepalis petalisque minorebus acutis; labello ovato; calcare pendulo ovario breviore. In Madagascar. 4.

4. *A. palmiforme* Thouars orch. afr. t. 68, 69. caule erecto tereti basi nudo; fol. caulem coronantibus elliptico-oblongis bilobis obtusis; floribus magnis; laciniis patulis; labello concavo lanceolato; calcare adscendente brevissimo. A. Rich. orch. t. 10. In Borbonia. 4. Flores albi.

5. *A. gladiifolium* Thouars orch. t. 53. fol. lanceolatis acutis distantibus; labello lanceolato acuto plano; calcare pedunculo subtriunciali paulo longiore. B. R. 1840. t. 68. In Borbonia. 4.

6. *A. fragrans* Thouars orch. afr. t. 54. fol. loratis angustis obtusis oblique bilobis; petalis angustissimis decurvatis; labello ovali-lanceolato; calcare filiformi pendulo pedunculo dimidio breviore. Acrobium Spr. In Borbonia. 4.

7. *A. filicornu* Thouars t. 52. fol. linearibus obtusis emarginatis; sepalis petalisque ovato-lanceolatis patentibus; labello ovato-lanceolato; calcare longissimo filiformi. In Borbonia. 4.

8. *A. expansum* Thouars orch. t. 57. fol. linear-loratis oblique bilobis; sepalis petalisque patentissimis linear-lanceolatis acuminatis; labello ovato acuminato calcare filiformi adscendente triplo longiore. In Mauritia et Borbonia. 4.

9. *A. implicatum* Thouars orch. t. 58. fol. brevibus oblongis obtusis oblique bilobis; sepalum supremo labelloque ovatis acuminatis caeteris partibus paulo majoribus; calcare longissimo filiformi. In Madagascar. 4.

10. *A. carpophorum* Thouars t. 76. subacaule; fol. loratis obtusis oblique

bilobis; racemis paucifloris; floribus parvis; calcare filiformi; fructu 3-angulari 3-costato. In Mauritia. 4.

11. *A. triquetrum* Thouars t. 49. subacaule; fol. linear-loratis apice obtusis bilobis; pedunc. subradicalibus 1-floris sepalis petalisque angustis acuminatis; labello concavo acuto calcare dependente longiore; fructu obovato 3-quetro. In Mauritia. 4.

12. *A. inapertum* Thouars t. 50. subacaule; fol. linear-lanceolatis acuminatis; sepalis petalisque labelloque acutis; calcare incurvo obtuso. In Borbonia. 4.

13. *A. cucullatum* Thouars orch. t. 48. pnsillum; fol. approximatis elliptico-angustis obtusis emarginatis laciniis exterioribus calycis aequalibus patulis; labello cucullato subintegro orbiculato obtuso. In Mauritia et Borbonia. 4.

14. *A. pectinatum* Thouars orch. t. 51. caule repeute ramis adscendentibus foliosis; fol. numerosis linearis oblongis distichis approximatis carnosis obtusis; floribus axillaribus solitariis subsessilibus; sepalis labelloque patentibus oblongis obtusis subaequalibus; cornu rectiusculo ovario breviore. Hook. B. misc. 1. t. 116. In Mauritia et Borbonia. 4.

15. *A. caulescens* Thouars orch. afr. t. 75. caule brevi; fol. paucis latilinearibus distichis coriaceis; pedunculis elongatis paucifloris; sepalis oblongo-ovatis patentibus subaequalibus; labello cochleato acuminatissimo; cornu incurvato ovarium contortum subaequante. Hook. misc. B. 1. t. 117. In Mauritia. 4.

16. *A. multiflorum* Thouars t. 74. caulescens ramulosum; fol. brevibus loratis obtusis oblique bilobis; racemis subcorymbosis axillaribus foliis brevioribus; sepalis ovatis acutis; petalis conformibus minoribus; labello ovato acuto calcare horizontati incurvo obtuso aequali. In Borbonia. 4.

17. *A. Calceolus* Thouars orch. afr. t. 78. subacaule; fol. loratis obtusis bilobis valde obliquis; floribus paniculatis; sepalis petalisque acuminatissimis; labello concavo acuminato calcare recto clavato horizontali duplo breviore. In Borbonia. 4.

18. *C. capense* Lindl. fol. radicalis quitantibus subensiformibus obtusisculis digitalibus spithameisive; flo-

ribus secundis spicatis; sepalis lanceo-latis apice recurvis lateralibus hoc obtuse unidentatis, petalis angustioribus; labello lanceolato acuto basi bicaruso; calcare filiformi obtuso pollicari. *In Prom. b. Spec. 4.*

19. *A. filiforme* Lindl. aphyllum radicans; pedunc. subtrifloris; labello ovato; cornu brevissimo apice capitato. *Epidendron Sw. In Hispaniola.* 4. Flores minuti sordide lutei.

20. *A. Ashantense* Lindl. B. R. 1845. n. 75. caulis repens; fol. distichis coriaceis ovatis apice oblique erosis; spicis foliis subaequalibus; floribus resupinatis; sepalis petalisque galeatis denticulatis ovato-lanceolatis obtusiusculis; labello pandurato obtuso denticulato basi 1-dentato; calcare arcuato compresso basi constricto labelli longitudine; pollinium caudicula acuminata bipartibili. *In Ashante.* 4.

21. *A. resicatum* Lindl. ic. no. 9. acaule; fol. canaliculatis recurvis spicac pendulae aequilibus; floribus distantibus divaricatis; sepalis ovatis; petalis linearibus acutis; labello ovato acuto; calcare arcuato ovario longiore apice inflato diaphano. *In Ashante.* 4.

22. *A. pellucidum* Lindl. B. R. 1844. t. 2. acaule; fol. distichis oblongis subundulatis recurvis apice obliquis basi equitantibus; racemis densis nutantibus axillaribus foliis brevioribus; sepalis petalisque linearilanceolatis; labello fimbriato cordato-ovato truncato; calcare brevi porrecto; glandula communi didyma. *In Sierra Leone.* 4. Flores albi.

23. *A. micranthum* Lindl. B. R. t. 1772. caule brevi; fol. oblongis 3-nerviis; spicis secundis multifloris horizontalibus; sepalis petalisque minimis angustis; labello conformi bidentato medio pubescente recurvo-calcarato. *In Sierra Leone.* 4. Flores albi.

24. *A. distichum* Lindl. B. R. t. 1781. caule imbricato; fol. distichis compressis recurvis obtusis; floribus solitariis secundis; sepalis petalisque ovatis rotundis; labello oblongo concavo tridentato; calcare horizontali. Flores lactei. *In Sierra Leone.* 4.

25. *A. candatum* Lindl. B. R. t. 1844. fol. loratis canaliculatis emarginatis; spica radicali pendula flexuosa 4-flora; labello obovato rostrato serrulato; calcare longissimo apice bilobo,

In Sierra Leone. 4. Perianthium viride. *Labellum album.*

26. *A. armeniacum* Lindl. caulescens; fol. distichis apice oblique et acute bidentatis; spicis lateralib. horizontalibus secundis; petalis linearibus; labelli lobii lacinias acuminatis; calcare pendulo clavato compresso calyce 2-plo longiore. *In Sierra Leone.* 4.

27. *A. bitubum* Lindl. misc. 1840. caule brevissimo; fol. cuneato-obovatis oblique bilobis reticulatis, racemo verrucoso pendulo multifloro multo brevioribus; sepalis petalisque lanceolatis patentibus; labello conformi paulo majore calcare filiformi emarginato breviore. *In Cap. Cast Castle.* 4.

4615. MYSTACIDIUM Lindl. (1845).

1. *M.* Lindl. in B. M. comp. p. 205 ex Endl. *In P. b. S.* 4. Herba epiphyta brevissime caulescens; fol. distichis obtusis oblique emarginatis; racemo multifloro subsecundo.

4616. AGROSTOPHYLLUM Blume. (1825).

1. *A. javanicum* Blume. *In Java.* 2. Herba epiphyta caulescens. Folia linearia acuminata. Flores capitati terminales, bracteis paleaceis cincti.

4617. CALANTHE R. Br. (1821).

1. *C. veratrifolia* R. Br. B. R. t. 720. scapo stricto fol. oblongis acutis longiore; bracteis oblongis concavis; racemis densis multifloris; labello 4-lobo basi sulcato et glanduloso, calcare filiformi pendulo paulo longiore. Rumph 6. t. 52. f. 2. *In Ind. or.* 4. Flores nivei.

2. *C. purpurea* Lindl. scapo erecto fol. latis oblongis petiolatis acuminatis longiore; racemis laxis multifloris; labelli 3-lobi lobis lateral. nanis rotundatis patentibus, intermedio angusto cuneato divergente bilobo; calcare ovario vix breviore. *In Zeylona.* 4. Flores pallide purpurei.

3. *C. masuca* Lindl. scapo erecto fol. latis oblongis petiolatis acuminatis longiore; racemis laxis multifloris;

labello bilobo basi bicristato; lobis lateralibus intermedio retuso transverso appressis; calcare pendulo clavato ovario pubescente duplo longiore. *Bletia* Don. *In Nepalia.* 4. Flores pallide purpureo-coerulescentes.

4. *C. emarginata* Lindl. fol. lato-lanceolatis; spica erecta pubescente; labello basi calloso limbo 3-lobo lobo medio emarginato-spathulato lateralibus minutis; calcare linearis subcompresso ovarium aequante. *In Java.* 4. Flores magni violacei.

5. *C. vestita* Wall. molliter villosa; scapis laxis multifloris; pedicellis filiformibus flexuosis; labelli lamina 3-loba; lobis lateralibus oblongis obtusis intermedio cuneato divergenti-bilobo inappendiculato; calcare filiformi inflexo labello breviore. *In Trop. Java.* 4. Flores maximi.

6. *C. sylvatica* Lindl. scapo stricto fol. duplo longiore; racemo laxo multifloro; labello basi cordato auriculato 3-lobo ore glanduloso, lobo medio cuneato dilatato emarginato apiculato plano subconcavo; calcare arcuato ovario breviore. *Centrosis Thouars orch. Afr. t. 35 et 36. In Mauritius et Borbonia.* 4. Flores magni purpurascentes.

7. *C. plantaginea* Lindl. scapo recto basi alte vaginato foliis subaequali; fol. petiolatis ovali-oblongis acutis; labello 3-lobo lobis obovatis subaequalibus; intermedio basi sulcato; calcare filiformi horizontali apice bidentato ovario pubescente. *In Nepalia.* 4. Flores pallide lilacini.

8. *C. speciosa* Lindl. fol. lato-lanceolatis; spica erecta sepalis anterioribus rhomboideis; labello intus bicristato; limbo subtrilobo; lobo medio ovato emarginato cum mucrone; calcare clavato recto ovario breviore. *In Java.* 4.

9. *C. pulchra* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis; spica erecta; labello basi bituberculato limbo semitrilobo, lobo medio ovato acuto; calcare subulato arcuato ovarium aequante. *Amblyglottis Blume. In Java.* 4. Flores pallide aurantiaci.

10. *C. densiflora* Lindl. B. R. t. 1646. scapo laxe vaginato multo breviore; racemis densis multifloris subcorymbosis; labello obovato obtuso bilobo? cum columna elongata parum connata; calcare longo recto pendulo

apice clavato. *In Silhet.* 4. Flores lutei.

11. *C. clarata* Lindl. scapo fol. breviore; racemo congesto cernuo longe bracteato; labello suborbiculato mucronulato integerrimo basi bicallosa; calcare clavato sulcato recto. *In Sylhet.* 4. Folia angusta bipedalia.

12. *C. angustifolia* Lindl. fol. linearis-lanceolatis cuspidatis; spica radicali limbo emarginato undulato; calcare obtuso ovarium aequante. *Amblyglottis Blume. In Java.* 4.

13. *C. curculigoides* Wall. scapo crasso fol. duplo breviore; racemo denso multifloro; labello ovato acuminate indiviso basi undulato; calcare gracili acuto apice incurvo. *In Penang.* 4.

14. *C. striata* R. Br. labello 3-lobo subbicostato basi angustato; lobis lateralibus falcatis truncatis intermedio linearis cuneato emarginato; calcare brevi conico. *In Japonia.* 4.

15. *C. abbreviata* Lindl. fol. lanceolatis; spica erecta; labello basi cum tuberculo hirsuto limbi 3-fidi lobo medio semibifido; calcare obtuso minus. *Amblyglottis Blume. In Java.* 4.

16. *C. brevicornu* Lindl. racemis secundis; labelli lamina triloba; lobis lateralibus ovatis acutis intermedio cuneato bilobo lamellis 2 petaloideis in disco; calcare brevissimo; ovario pubescente. *In Sylhet.* 4.

17. *C. gracilis* Lindl. scapis gracilibus multifloris alte vaginatis; labelli basi saccati lobis lateralibus abbreviatis intermedio crispo. *In Ind. or.* 4.

18. *C. tricarinata* Lindl. fol. oblongis scapo stricto laxe racemoso multo brevioribus; labello ecalcarato trilobo; lobis lateralibus oblongis obtusis nanis intermedio obovato crispo lamellis 3 petaloideis crenulatis in disco. *In Nepalia.* 4.

19. *C. puberula* Lindl. scapo fol. aequali laxe racemoso; bracteis linearis-lanceolatis ovario longioribus; sepalis ovatis lateralibus obliquis; petalis linearibus; labelli hastati inappendiculati ecalcarati lobis lateralibus subfalcatis intermedio lanceolato. *In Sylhet.* 4.

20. *C. discolor* Lindl. sert. t. 6. B. R. 1840. t. 55. sepalis petalisque acutis; labelli 3-lobi columnae omnino accreti basi pubescentis bilamellati lobo

intermedio bilobo 3-carinato; calcare pubescente acuto.

21. *C. bicolor* Lindl. t. 6. racemo laxo pubescente; sepalis petalisque acutis; labelli trilobi columnae omnino accreti lobis aequalibus, intermedio cuneato trilamellato pubescente bicorni; calcare acuto limbo duplo breviore glabro. *In Jara.* 4.

22. *C. furcata* Batem. fol. ovato-lanceolatis profunde plicatis; scapo dense capitato subaequalibus; labello columnae omnino adnato tripartito basi glanduloso - cristato, lobis serratis; calcare pubescente apice furcato. *In ins. Luzoniae.* 4.

4618. *MALACHADENIA* Lindl. (1839).

1. *M.* Lindl. ex Endl. *In Brasilia.* 4. Herba brasiliensis repens pseudobulbis 1-phyllo, scapo radicali, floribus carnosis.

4619. *CENTROPETALUM* Lindl. (1840).

1. *C.* Lindl. ex Endl. *In Peruvia.* 4. Folia disticha carnosa linearia falcata. Flores solitarii lutei.

4620. *ANTHERICOLIS* Rafin. (1840).

1. *A. discolor* Rafin. Tipularia Nutt. *In Am. Bor.* 4. Scapus pendulis nudus. Folium unicum ovatum. Flores laxe spicati nutantes viridi-purpurascentes.

4621. *LIMATODES* Blume. (1825).

1. *L. pauciiflora* Blume. *In Java.* 4. Herba terrestris. Scapi basi tumidi. Folia lato-lanceolata. Pedunculi solitarii pauciflori. Flores albi.

4622. *GLOMERA* Blume. (1825).

1. *G. erythrosma* Blume. *In Java.* 4. Herba epiphyta caulescens. Folia carnosa. Flores in scapo radicali spicati sessiles.

4623. *OXYANTHERA* Brongn. (1836).

1. *O.* Brongn. in Duperrey voy. t. 73. *In ins. Moluccanis.* 2. Radices fasciculati filiformes. Caulis brevissimus. Folia disticha linearioriblonga. Scapi axillares. Flores spicati.

4624. *THELASIS* Blume. (1825).

1. *T. obtusa* Blume; fol. e bulbis solitariis lato-linearibus oblique retusis; spica elongata. *In Jara.* 4.

2. *T. carinata* Blume; fol. distichis elongato-linearibus oblique retusis inferne carinatis; spica elongata. *In Java.* 4.

3. *T. capitata* Blume; fol. in bulbis difformibus linearis lanceolatis oblique retusis; floribus capitato-confertis demum laxe spicatis. *In Java.* 4.

4625. *PTYCHOCHILUS*. (1843).

1. *P.* Schauer pl. Mey. ex Endl. *In Manilla.* 4. Herba epigaea glabra. Caules flexuosi. Folia oblonga cuspidata. Spica terminalis.

4626. *ORCHIS* L.

a. *Masculae* Lindl. Sepala lateralia reflexa v. patentia.

* *Labellum* indivisum v. laccerum v. obsoletissime trilobum.

1. *O. salina* Turcz. fol. linearis lanceolatis erectis; spica laxiflora; sepalis angustis obtusis; labello rhomboideo erenato subtrilobo acuminate pubescente calcare pendulo acuminato breviore; bracteis linearis lanceolatis herbaceis; tuberculis palmatis. *In Siberia.* 4.

2. *O. iberica* Bieb. fol. ensiformibus; spica laxa multiflora; sepalis angustis ovatis obtusis; labello subquadrato pubescente emarginato longitudine calcaris penduli; tuberculis elongatis 2-3-partitis. *In Caucaso.* 4.

3. *O. latifolia* L. labello 3-lobo; calcare conico-cylindrico descendente ovario breviore; sepalis sursum reflexis; bracteis flore longioribus 3-nerviis venosisque; caule fistuloso 4-6-folio; fol. patulis inferior. ovaibus oblongis obtusis superioribus mi-

noribus lanceolatis acuminatis tuberibus palmatis. *O. majalis* Rchb. ic. 770. Sturm 7. E. B. t. 2308. Fl. dan. t. 266. *O. Hatagirea* Don. nep. *O. cruenta* Mill. Fl. dan. t. 876. *O. haematoches* Rchb. In Europa. 4. Flores purpurei.

4. *O. incarnata* L. caule fistuloso 4—6-phyllo; fol. elongato-lanceolatis attenuatis apice cucullato contractis; tuberibus palmatis; fabello 3-lobo calcare conico cylindrico descendente ovario breviore; sepalis patulis postea sursum reflexis. *O. angustifolia* Wimm. In Europa. 4. Flores incarnati.

5. *Traunsteineri* Saut. ex Koch syn. caule fistuloso 4—5-folio; fol. inferioribus lanceolato-linearibus erecto-patulis superior. linearibus apice planis; tuberibus palmatis; calcare conico-cylindrico ovario breviore; sepalis sursum reflexis; bracteis inferioribus florem aequantibus superioribus flore brevioribus. *O. incarnata* Rchb. ic. 1140. In Europae turfosis, (e. g. in Thuringia).

6. *O. sesquipedalis* Willd. labello obovato lateribus reflexo emarginato dentato; petalis superioribus acutis conniventibus; cornu cylindraceo germe subaequante; bracteis lanceolatis flore longioribus. In Lusitania. 4. Radix palmata.

7. *O. saccata* Tenore; fol. radicalibus ovato-oblongis acutis patentibus canaliculis minoribus vaginatis; spica laxiflora; sepalis obtusis; labello oblongo obtuso crenato calcare crasso pallido pendulo longiore; bracteis herbaceis florum longitudine. In Europa austr. 4. Folia maculata.

** Labellum 3—4-fidum v. distincte 3-lobum.

8. *O. aristata* Fisch. fol. ovato-lanceolatis acutis; caule subdiphylo longioribus; spica ovata densiflora; sepalis acutissimis; labello ovato acuto 3-lobo lateribus deflexo; calcare crasso pendulo; bracteis herbaceis acuminatis; tuberculis palmatis. In Uralaschka. 4.

9. *O. sambucina* L. fol. obovato-oblongis obtusissimis in caulem adscendentibus; spica densa oblonga; sepalis obtusiusculis; labelli obsoleti 3-lobi rotundi lobo medio angustiore; calcare pendulo inflato labello duplo

longiore; bracteis foliaceis oblongis acutis floribus longioribus; tuberculis palmatis. Jacq. austr. t. 108. Rchb. ic. In Europa. 4. Flores ochro-leuci labio late flavo rubro-punctato; v. purpurei bracteisque purpurascensibus. Odor. sambucinus.

10. *O. pallens* L. fol. obovato-oblongis obtusissimis in caulem adscendentibus; spica densa oblonga; sepalis ovatis obtusis; labelli rotundi 3-lobi lobis aequalibus integris; calcare horizontali recurvo inflato labello duplo longiore; bracteis membranaceis linearis-lanceolatis floribus brevioribus; tuberculis indivisis. Jacq. austr. t. 45. *O. sulphurea* B. M. t. 2869. In Europa. 4.

11. *O. Spitzelli* Saut. labello 3-lobo subvelutino dependente, lobis lati crenatis intermedio emarginato; calcare conico cylindrico verticaliter descendente ovario paulo breviore; sepalis obtusis; petalis apice truncatis emarginatisque; bracteis 1-nerviis ovarium aequantibus; tuberculis indivisis; fol. obovato-oblongis obtusis. In alp. tyrolens. 4. Flores purpurei.

12. *O. pseudosambucina* Ten. fl. neap. t. 86. fol. linearibus spatulatis obtusis subundulatis in caulem adscendentibus; spica cylindracea laxiuscula; sepalis ovatis obtusis; labelli 3-lobi lobis subaequalibus integris; calcare gracili horizontali, labello duplo longiore; bracteis foliaceis lanceolatis acutis; tuberculis palmatis. *O. romana* Sebast. *O. bracteata* Tenore. In Italia. 4.

13. *O. provincialis* Balb. misc. t. 9. fol lanceolatis omnibus radicalibus; spica laxa; sepalis ovato-oblongis trilobi latioris quam longi pubescentis, trilobi crenulati lobis lateralibus acutis intermedio truncato subemarginato; calcare gracili adscendente apice inflato labello triplo longiore; bracteis membranaceis apice subulatis floribus brevioribus; tuberculis indivisis. *O. Cyrylli* Ten. neap. t. 87. *O. pauciflora* Ten. t. 88. In regno neapolitano. 4. Flores pallide flavi, labio in medio rubro-punctato.

14. *O. canariensis* Lindl. fol. oblongis acutis acuminatis; spica laxiuscula; sepalis petalisque ovato-oblongis acutis; labelli oblongi medio truncato crispulo lateralibus multo majore; calcare crasso obtuso labello breviore; bracteis apice subulatis flo-

ribus brevioribus; tuberculis indivisis.
In ins. Canaria. 2.

15. *O. foliosa* Soland. fol. oblongo-lanceolatis acuminate laxe vaginantis; spica oblonga multiflora; sepalis ovatis acutis; labello latiore quam longo obsoleto 3-lobo plano, laciinis lateralibus emarginatis intermedia acuta multo majoribus; calcare pendulo cornuto labello duplo breviore; bracteis herbaceis acuminatis; tuberibus palmatis. B. R. t. 1701. *In Madera.* 2.

16. *O. mascula* L. fol. oblongis obtusis omnibus radicalibus basi multipunctatis; spica laxa multiflora; sepalis oblongis obtusis; labelli 3-lobi lobis lateralibus divergentibus subintegris intermedio emarginato subaequalibus; calcare horizontali obtuso labello longiore; bracteis apice subulatis floribus brevioribus; tuberculis indivisis. E. B. t. 1631. *O. speciosa* Hort. sepalis petalisque longe acuminatis. Jacq. ic. t. 180. *In Europa.* 2. Flores purpurei var. floribus albis.

17. *O. parvifolia* Chaubard in Amans Fl. Agen. t. 7. fol. linearilanceolatis canaliculatis; spica densa; calcare conico obtuso ovario duplo breviore; labelli 3-lobi lobis crenulatis rotundatis intermedio paulo longiore et angustiore; sepalis divaricatis. *In Gall. austr.* 2. Flores purpurei.

18. *O. brevicornu* Viv. fl. ital. fragm. t. 12. f. 2. labello trilobo denticulato; calcare conico obtuso ovario triplo breviore; sepalis acutiusculis exterioribus reflexis; fol. linearilanceolatis. *In Italia.* 2. *O. masculae proxima.*

19. *O. stabiana* Teu. fol. lanceolatis omnibus radicalibus; spica laxa multiflora; sepalis acuminatis; labelli 3-lobi lobis lateralibus divergentibus subdentatis intermedio truncato emarginato duplo brevioribus; calcare horizontali obtuso labello longiore; bracteis apice subulatis floribus brevioribus. *In Italiae Stabiarum nemoribus?* Flores odori.

20. *O. patens* Desf. atl. t. 248. fol. omnibus radicalibus angustis spatulatis acutis; spica laxiflora; sepalis ovatis obtusis; labelli 3-lobi oblongi plani laciinis lateral. divergentibus crenatis truncatis abbreviatis intermedia cuneata tridentata; calcare crasso

obtuso pendulo labello breviore; bracteis linearibus apice subulatis membranaceis ovario brevioribus. *In Attante.* 2.

21. *O. taxiflora* Lam. fol. linearilanceolatis acutis in caule adscendentibus; floribus distantibus; sepalis obtusissimis; labelli subcrenati trilobi, lobis lateralibus rotundatis cum intermedio emarginato confluentibus calcare horizontali labello subaequali; bracteis lanceolatis floribus subaequalibus tuberculis indivisis. *O. palustris* Jacq. ic. t. 181. Rchb. ic. t. 831. *In Europa.* 2. Flores purpurei.

22. *O. maculata* L. caule gracili; fol. linearilobis obtusis remotis; spica densa conica v. cylindrica; sepalis ovatis acutis; labelli plani subcuneati apice 3-lobi lobis omnibus acutis lateralibus subcrenulatis intermedio acuto latioribus subcrenulatis calcare gracili pendulo labelli longitudine; bracteis linearilanceolatis acuminatis herbaceis floribus aequalibus; tuberculis palmatis. Fl. don. t. 933. E. B. t. 632. Rchb. ic. t. 566. *In Europa.* 2. Flores dilute lilacini masculis lineisque purpureis.

b. Militares Lindl. Sepala conniventia galeam referentia.

• * *Labellum indivisum.*

23. *O. rubra* Jacq. ic. t. 183. scapo folioso; fol. linearilanceolatis acutis arcte vaginatis; sepalis obliquis acutis; labello crenulato unguiculato calcari conico incurvo pendulo aequali. *O. papilionacea* B. R. t. 1155. Fl. graec. t. 928. *In Europ. austr.* 2. Flores sanguinei venosi magni.

24. *O. papilionacea* L. scapo undique folioso; fol. laxe vaginatis; sepalis oblongis acutis; labello maximo venis labelliformibus denticulato calcare gracili recto pendulo longiore. *In Hispan. Lusitan. Algeria etc.* 2. *O. rubrae proxima.*

25. *O. spectabilis* L. fol. binis oblongis obtusis scapi longitudine; bracteis foliaceis floribus longioribus; labello lanceolato calcari clavato pendulo aequali. *In Am. septentr.* 2. Sepala viridi-purpurea. Labellum albidum.

** Labelum 3-lobum.

26. *O. coriophora* L. fol. linearilanceolatis acutis sursum evanescenibus; spica elongata; sepalis galeae agglutinatis linearilanceolatis acuminatis; labello 3-lobo calcari conico aequali; laciniis lateralibus deflexis intermedia lanceolata multo brevioribus. *O. cimicina* Crantz Jacq. austr. t. 122. *In Europa.* 4. Galea sordide fusco-purpurea, labellum medio dilute rubellum punctis purpureis.

27. *O. sancta* L. fol.?: caule vaginato aphylo; spica elongata; sepalis galeae agglutinatis linearilanceolatis acuminatis; labello 3-lobo calcare conico infexo longiore; laciniis lateralibus acute bilobis intermedia acuta paulo brevioribus. *In Palestina.* 4.

28. *O. acuminata* Desf. atl. t. 217. fol. ovalibus acutis cuspidatis; sepalis acuminatissimis; labello 3-partito glaberrimo calcari pendulo incurvo aequali, laciniis lateralibus truncatis abbreviatis intermedia subrotunda crenulata; bracteis acuminatis floribus subaequalibus. B. M. t. 1932. *In Algeria.* 4.

29. *O. corsica* Viv. bulbis 2. fol. ovato-ellipticis; spica contracta globosa; petalis omnibus conniventibus ovato-acuminatis, 2 interioribus lateralibus paulo minoribus; labello 3-fido, lobis lateralibus falcatis dentatis medio apicem versus rotundato expanso dentato; calcare incurvo obtuso germen duplo superante. *In Corsica.* 4.

30. *O. Morio* L. fol. oblongo-linearibus obtusis; sepalis oblongis obtusis lineatis; labello trilobo latiore quam longo sepalis majore calcari horizontali obtuso subaequali; laciniis lateralibus dentatis intermedia submarginata majoribus. Schk. t. 271. *In pratis Europae.* 4. Flores purpurei, venis galeae viridibus validis. Var. floribus roseis v. albis.

31. *O. longicornis* Desf. atl. t. 246. fol. oblongis linearibus obtusis; sepalis oblongis obtusis; labello 3-lobo sepalis aequali; calcare horizontali apice inflato breviore; laciniis lateralibus subintegris intermediae aequalibus v. minoribus. B. M. t. 1944. B. B. t. 202. *O. picta* Lois. gall. t. 26. *In Europa austr. et Algeria.* 4.

*** Labelum 4-fidum v.
4-partitum.

32. *O. sphaerica* Bieb. fol. omnibus lanceolatis acutis; spica subglobosa; sepalis aristatis; labelli 3-lobi lobis lateralibus acutiusculis incurvis intermedio quadrato retuso apiculato subaequalibus; calcare labello breviore; bracteis linearisubulatis floribus brevioribus. *In Iberia.* 4.

33. *O. globosa* L. folio inferiore obtuso superioribus lanceolatis acutis; spica subglobosa; sepalis aristatis apice saepe appendiculatis; labelli 3-lobi angusti lobis lateralibus truncatis divergentibus intermedio rhomboideo emarginato cuspidato brevioribus; calcare labello breviore; bracteis linearilanceolatis herbaceis floribus brevioribus. Jacq. austr. t. 265. Rchb. ic. 767. *Nigritella* Rchb. exc. *In Europa.* 4. Spica densissima. Flores albido-rosei labellum purpureo-punctatum.

34. *O. conica* Willd. labello 3-partito lacinia media elongata apice dilatata emarginata; petalis conniventibus aristatis; cornu germine breviore; spica densa conica; fol. ovatis. *In Lusitania.* 4. Affinis *O. globosae*.

35. *O. variegata* Jacq. ic. t. 599. fol. oblongo-lanceolatis acutis; spica corymbosa, sepalis acuminatissimis; labello calcari rectiusculo pendulo aequali laciniis denticulatis lateralibus oblique truncatis intermediae cuneatae bilobae subaequalibus; bracteis aristatis ovario longioribus. Hall. helv. t. 30. B. R. t. 367. *O. Simia* Vill. *In Europa.* 4. Flores ex albido-lilacini striati labio purpureo-punctato.

36. *O. taurica* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis laxe vaginantibus in caulem adscendentibus; spica pyramidalis; sepalis oblongis acutis; labello calcari rectiusculo subhorizontali aequali, laciniis integris lateralibus acutis apice incurvis intermedia cuneata apice dilatata tridentata multo brevioribus; bracteis linearilanceolatis acuminatis ovario brevioribus. *O. pyramidalis* Bieb. *In Caucaso.* 4. *O. variegata* affinis.

37. *O. militaris* L. fol. oblongo-lanceolatis acutis; spicae cylindrica; sepalis acutis obtusis; labello medio pubescente calcare pendulo incurvo v. rectiusculo duplo longiore;

Iaciniis lateralibus linearibus intermediae cruribus divergentibus truncatis plurinerviis; bracteis brevissimis. Jacq. ic. t. 598. Rchb. ic. t. 701. O. Rivini Sweet. fl. gard. t. 162. O. galeata Lam. In Europa. 2. Galea cinerea v. pallide purpurea. Labellum dilute purpureum medio albidum punctis purpureis pictum.

38. *O. fusca* Jacq. austr. t. 176. fol. oblongis basi angustatis; spica longa cylindracea multiflora siccatione fuliginosa; sepalis ovatis obtusis; labello medio pubescente calcare brevi pendulo incurvo duplo longiore; laciniis lateralibus linearibus intermedia obcordata; bracteis obsoletis. *O. moravica* Jacq. ic. t. 182. *O. militaris* DC. E. B. t. 16. In Europa. 2. Galea atropurpurea punctis saturatioribus v. virescens et punctis atro-purpureis; labellum album dilute roseum punctis purpureis hirsutis pictum.

39. *O. Simia* Lam. fol. oblongo-lanceolatis acutiusculis; spica cylindracea crassa; sepalis acuminatis; labello medio hispido calcare pendulo incurvo duplo longiore; laciniis linearibus, cruribus intermediae univeniis; bracteis brevibus obtusis. *O. tephrosanthos* Vill. B. M. t. 3426. In Europa. 2. Galea purpurascens - cinerea, labellum dilute purpureum v. albidum saturatus purpureo-punctatum.

40. *O. undulatifolia* Biv. fol. oblongo-lanceolatis undulatis obtusis; spica crassa subcorymbosa; sepalis acuminatis; labello calcare pendulo incurvo triplo longiore; laciniis omnibus linearibus acuminatis; bracteis brevissimis. Fl. graec. t. 927. *O. tephrosanthos* B. R. t. 375. In Europa austr. et Algeria. 2.

41. *O. longicruris* Schrad. ab. *O. undulatifolia* differt fol. planis ovatis, floribus purpureis duplo minoribus, labelli laciniis angustioribus spica pyramidata non globosa. In Lusitania. 2.

42. *O. macra* Lindl. fol. linearis oblongis; spica angusta pauciflora; sepalis acuminatissimis; labello calvo crystallino-verrucoso calcare pendulo rectiusculo duplo longiore; lacinus linearibus acutis cruribus intermediae univeniis; bracteis brevibus acuminatis. Hook. fl. lond. c. ic. In Anglia. 2.

43. *O. punctulata* Stev. hb. fol. oblongis superioribus angustioribus; spica cylindracea; sepalis acuminatis;

labello medio pubescente carnoso calcare incurvo apice dilatato triplo longiore; laciniis lateraribus linearibus incurvis, intermedia cuneata retusa cum apiculo; bracteis brevissimis. In Tauria. 2.

44. *O. intacta* Lk. spica densiuscula; sepalis conniventibus acutis; labello 3-partito, laciniis subaequalibus intermedia linearis apice tridentata; calcare brevissimo; bracteis ovario duplo brevioribus. In Lusitania. 2.

45. *O. ustulata* L. fol. ovato-oblongis acutis; spica angusta cylindracea densa obtusa; sepalis ovatis obtusis; labello calcare brevi uncinato triplo longiore; laciniis punctato-scabris linearibus, intermediae bilobae cruribus truncatis; bracteis acuminatis ovario longioribus. E. B. t. 18. Rchb. ic. t. 569. Sturm 12. In Europa. 2. Galea obscure atropurpurea. Labelium album guttulis intense purpureis.

4627. ANACAPTIS Rich. (1817).

1. *A. pyramidalis* Rich. spica densa pyramidali; labelli lobis subaequalibus intermedio truncato; lamellis distinctis apice divergentibus. *Orchis* L. Jacq. austr. t. 266. Rchb. ic. 766. Sv. Bot. t. 584. In Europa. 2. 1-2-ped. Flores saturate persicini e pulvicio purpurascentes. Calcar ovario longius.

2. *A. quadripunctata* Ten. fl. neap. t. 89. labio trilobo plano lobis aequalibus, medio subemarginato subquadripunctato; petalis patentibus ovalibus obtusis; cornu recto filiformi germe longiore spica multiflora oblonga; floribus minutis bracteisque concoloribus rubris violaceisque. In Neptalia. 2.

3. *A. Brancifortii* Lindl. *Orchis* Biv. pl. sic. t. 1. f. 2. spica laxa elongata; labelli lobis omnibus acutis; lamellis in unam hippocrepicam coaliatis. In Sicilia. 2. Planta palmaris. Bracteae purpureae.

4628. GYMNADENIA R. Br. (1821).

1. *G. conopsea* R. Br. fol. angustis; spica densa cylindracea; sepalis lateribus patentibus; labelli 3-lobi lobis obtusis integerrimis aequalibus;

calcare arcuato filiformi ovario duplo longiore. *Orchis L.* Fl. dan. t. 224. O. *Ornithis* Jacq. austr. t. 138. In Europa. 2. Flores purpurei rarius albi.

2. *G. odoratissima* Rich. labello 3-fido lobis ovatis obtusis; calcare filiformi ovarium subaequante; perigonii laciniis exterior patentissimis; bracteis trinerviis; spica cylindrica elongata; fol. linear-lanceolatis; tuberibus palmatis. Rchb. ic. t. 814. *Orchis L.* Jacq. austr. t. 264. In *pratis turfosis Europae*. 2. Flores purpurei fragrantissimi.

3. *G. albida* Rich. labello profunde 3-fido, laciniis integerrimis, lateralibus acutis, intermedio duplo latiore oblongo obtuso; calcare ovario triplo breviore; perigonii laciniis in galeam subrotundam conniventibus; spica elongata subsecunda; tuberibus fasciculatis. *Satyrium L.* E. B. t. 505. *Orchis Sw.* Fl. dan. t. 115. In Europa. 2. Flores parvi albidi.

4. *G. humilis* Lindl. fol. linear-oblongis acutis; spica laxa pauciflora; perigonii laciniis obtusis; labello subrotundo 3-lobo sepalis aequali; lobis rotundis medio emarginato; calcare subulato ovario elongato vix aequali; tuberibus indivisis. *Orchis Nicodemii* Ten. fl. neap. t. 90. In *pascuis Apuliae et Dalmatiae*. 2. Habitus O. masculae sed minor.

5. *G. elata* Lindl. labello obcordato crenato; cornu subulato dependente. O. *elata* Poir. In *Barbaria*. 2. 2-ped. Spica 8-pollicaris. Flores violacei.

6. *G. sibirica* Turczk. fol. angustis obtusis in caule acuminatis; spica densa cylindracea; sepalis lateralibus patentibus; labelli trilobi lobis subaequalibus lateralibus rotundis crispis intermedio integerrimo; calcare arcuato filiformi ovario longiore. In *Sibiria*. 2.

7. *G. tridentata* Lindl. folio solitario radicali oblongo obtuso, caulinis 2-3 multo angustioribus et minorebus; spica brevi laxiuscula; sepalis campanulatis; labello plano truncato obsolete tridentato sepolorum longitudine; calcare filiformi arcuato ovario paulo longiore. *Habenaria Hook. exot. fl.* t. 81. In *Am. bor.* 2.

8. *G. cylindrostachya* Lindl. caule folioso; fol. oblongo-lanceolatis basi angustatis; spica densa cylindracea; sepalis lateralibus pendulis; petalis

rhomboideis hinc in angulum acutum productis; labello oblongo 3-lobo; lobis lateralibus acutis intermedio truncato medio 1-callosso; calcare filiformi ovario longiore. In *Ind. or.* 2.

9. *G. violacea* Lindl. caule folioso; fol oblongis acutis parum decrescentibus; spica densa oblonga; bracteis foliaceis floribus longioribus; sepalis patulis lateralibus acutis; petalis oblongis obtusis; labello subrotundo tridentato; calcare filiformi pendulo ovario longiore. In *Ind. or.* 2. Folia atroviridia. Flores plumbeo-violacei.

10. *G. Orchidis* Lindl. caule folioso; fol. oblongis erectis acutis; spica densa cylindracea; bracteis foliaceis floribus longioribus; sepalis obtusis patulis; petalis oblongis obtusis; labello subcuneato 3-lobo lobis truncatis denticulatis; calcare filiformi pendulo ovario longiore. In *Ind. or.* 2.

11. *G. flexuosa* A. Rich. fol. binis radicali erectis secundis; caule flexuoso bisquamato; spica brevi ovata; labelli 3-lobi lobis obtusis; calcare filiformi labelli longitudine. *Satyrium Thouars t. 7.* In *Mauritio*. 2.

12. *G. rostellata* A. Rich. fol. pluribus ovato-oblongis acutis rosulatis; caule vaginato; spica angusta; labelli trilobi lobis obtusis; calcare filiformi labelli longitudine. *Satyrium Thouars t. 8.* In *Mauritio*. 2. Flores minimi.

13. *G. cucullata* Rich. fol. radicibus 2 oblongis v. orbiculato-ovatis submembranaceis; caule vagina solitaria acuminatissima; spica secunda; sepalis petalisque erectis galeam referentibus; labello 3-partito lobis filiformibus intermedio longiore; calcare adscendente labello breviore. Rchb. ic. t. 816. *Gmel. sib. 1. t. 3. f. 2.* In *muscosis Europae*. 2.

14. *G. flava* Lindl. folio inferiore ensiformi stricto fere caulis longitudine, caulinis multo minoribus canaliculatis acuminatis, supremis minimis; spica densissima conico-cylindracea; labello oblongo acuto margine denticulato; calcare pendulo infundibulari apice incurvo. *Orchis Nutt.* In *Am. bor.* 2.

15. *G. macrantha* Lindl. caule folioso; fol. oblongis acutis patentibus; spica taxa; bracteis foliaceis floribus aequalibus; sepalis angustis pa-

tentibus acutis; petalis subfalcatis; labello obcordato convexo calcari crasso pendulo acuto subaequali. *In Sierra Leone.* 2. Flores maximi lilacini.

16. *G. Chusua* Lindl. caule 1—2-phyllo; fol. ovato-lanceolatis acutis; spica secunda 3—5-flora; bracteis foliaceis acuminate floribus longioribus; sepalis lateralibus denticulatis; calcare recto apice incrassato paulo breviore. *Orchis Don.* *In Nepalia.* 2.

17. *G. pauciflora* Lindl. caule 2-phyllo bifloro; fol. linearis-lanceolatis distantibus internodiis brevioribus; bracteis ovato-lanceolatis foliaceis floribus subremotis longioribus; sepalis acutis lateralibus reflexis; petalis conniventibus obtusis; labello cuneato 4-dentato pubescente calcare subhorizontali rectiusculo breviore. *In Dauria.* 2. Flores violacei.

18. *G. spatulata* Lindl. caule nudo folii solitarii spatulati obtusi longitudine; spica densa secunda 3—4-flora; bracteis foliaceis obtusis floribus longioribus; sepalis petalique obtusis; labello oblongo concavo crenulato calcare recto duplo longiore. *In Ind. or.* 2.

Labellum posticum.

19. *G. conica* Lindl. fol. linearibus acuminate sensim in squamis acuminatis angustatis; racemo conico; sepalis lateralibus contortis petalique obtusissimis; labello postico linearis; calcare adscendente filiformi; ovario recto. *In Florida.* 2.

* 20. *G. nivea* Lindl. fol. linearibus acuminate sensim in squamas acuminatas angustatis; racemo denso cylindraceo; sepalis lateralibus contortis supremo petalique obtusissimis patentibus paulo majoribus; labello postico ovato; calcare adscendente filiformi; ovario recto. *Orchis Nutt.* *In Am. bor.* 2. Flores parvi nivei.

4629. PERULARIA Lindl. (1833).

1. *P. fuscescens* Lindl. *Orchis L. Gmel.* sib 1, t. 4. f. 2. *In Siberia.* 2. Planta facie Plantatherae bifoliae.

4630. NIGRITELLA Rich. (1817).

1. *N. angustifolia* Rich. fol. linearibus calcare brevissimo. Rehb. ic.

1009. B. Cab. t. 1643. *Satyrium nigrum* L. Jacq. austr. t. 368. *In alpibus Europae.* 2. Flores atropurpurei v. rosei.

2. *N. fragrans* Rehb. ic. 1010. fol. linearis-lanceolatis; calcare arcuato ovario fusiformi subaequali. *Orchis suaveolens* Vill. Delph. t. 1. *In alpibus Europae.* 2.

4631. ACERAS R. Br. (1821).

1. *A. hircina* Lindl. fol. oblongis acutis; racemo multifloro; labello longissimo flexuoso spiralique partito, laciniis lateralibus abbreviatis intermedia bifida; calcare brevissimo obtuso. *Satyrium L. E. B.* t. 34. *In Europa.* 2.

2. *A. caprina* Lindl. labello 3-partito; linea baseos media subpubescente; laciniis lateralibus falcato-lanceolatis; media linearis longissima apice bifida; petalis obtusis conniventibus; nectario scrotiformi. *Orchis Bieb.* *In Tauria.* 2.

3. *A. formosa* Lindl. radicibus testiculatis; labello 3-lobo; lateralibus brevibus repando-undulatis medio elongato linearis-spathulato emarginato; petalis conniventibus; interioribus erosionis; cornu germine paulo breviore. *Orchis Stev.* in act. Linu. 11. t. 39. *In Caucaso.* 2.

4. *A. anthropophora* R. Br. fol. oblongis obtusis plerisque radicalibus; labello 4-partito plano, laciniis linearibus lateralibus paulo brevioribus. *Ophrys L. E. B.* t. 39. *In Europa.* 2. Flores e viridi-purpurascentes foetidi.

5. *A. angustifolia* Lindl. fol. linearis-lanceolatis acuminatis; spica rara elongata secunda parviflora; petalis subulatis; labello pendulo linearis sepalis duplo longiore apice 3-fido lacinia intermedia breviore. *In Ind. or.* 2.

6. *A. secundiflora* Lindl. B. R. t. 1525. fol. maculatis; spica densa secunda parviflora; petalis subulatis; labello patente oblongo sepalis aequali basi gibboso trilobo; lobo intermedio obovato mucronulato. *Ophrys densiflora* Desf. Ann. Mus. t. 16. *Zimantoglossum* Rehb. *In Europa.* 2. Flores parvi carneo-virides.

4632. HELOTHRIX Rich. ex Lindl. (1835).

1. *H. parvifolia* Lindl. caule floribusque hirsutissimis. *Orchis hispidula* L. In Afr. austr. 2. 4-pollucaris lanuginosa. Folia subrotunda. Flores Herminii Monorchidis.

2. *H. exitis* Lindl. caule apice floribusque glaberrimo. *Orchidea exilis* Burch. In Afr. austr. 2. 4-unc. Fol. 1 radicale minimum. Caulis filiformis striatus. Spica subspiralis. Flores minimi.

4633. CENTROCHILUS Schauer. (1842).

1. *C. . .* Schauer pl. Meyen t. 13. f. 6. In China austr. 2. Herba glabra. Spica terminalis.

4634. GLOSSAPSIS Spr. (1827).

1. *G. tentaculata* Lindl. B. R. t. 862. sub *Glossula*. In China. 2. Herba fol. Orchidis. Flores parvi virides, laciniis lateralibus labelli longissimis.

4635. PLATANTHERA Rich. (1817).

a. Labellum indivisum.

a. Labellum integrum, basi bidentatum aut repandum.

1. *P. obtusata* Lindl. folio solitario obovato; caule saepius aphylo; spica laxiuscula; sepalo supremo latissimo; petalis acuminatis obtusis; labello acuminato apice recurvo calcaris arcuati longitudine. *Orchis Pursh.* In Am. austr. 2.

2. *P. tipuloides* Lindl. folio radicali solitario obtuso basi angustato caulinò oblongo acutato superioribus minoribus; spica brevi laxa; bracteis foliaceis linearibus acuminatis floribus duplo longioribus; petalis labelloque carnosis ovatis obtusis subaequalibus; calcare arcuato filiformi ovario longiore. *Orchis L.* In Kamtschatka. 2.

3. *P. elegans* Lindl. fol. binis oblongo-lanceolatis; caule squamis parvis ramentaceis; spica longa densa cylindracea; bracteis linearisubulatis

florum longitudine; sepalis campanulatis acuminatis obtusis subaequalibus; calcare filiformi arcuato ovario longiore. In Am. bor. 2. Flores parvi. Glandulae pollinum maxima.

4. *P. bifolia* Rchb. ic. 1143. fol. radicalibus binis obovatis caulinis paucissimis depauperatis; spica laxa multiflora; sepalis lateralibus reflexis; labello linearis obtuso petalis duplo breviore; antherae lobis approximatis parallelis. *Orchis L.* *Habenaria R. Br.* Pl. brachyglossa Rchb. ic. 1144. In Europa. 2. Flores albi labellum flavescens.

5. *P. chlorantha* Rchb. ic. 1145. fol. radicalibus 2 oblongis acutiusculis caulinis squamaeformibus; spica densa multiflora; sepalis lateralibus reflexis; labello angusto ovato-lanceolato petalis duplo longiore, calcare filiformi apice incrassato duplo breviore; antherae lobis divaricatis distantibus. *Orchis bifolia Fl. dan. t. 235.* E. B. t. 22. B. Cab. t. 1653. In Europa. 2. In Anglia ex Lindl. communis.

6. *P. Hookeri* Lindl. fol. radicalibus binis orbiculatis planis; caule nudo; spica stricta multiflora; sepalis lateralibus reflexis; labello linearilanceolato acuminato glabro sepalis parum longiore; calcare filiformi arcuato ovarii longitudine, lobis basi adnatis. *Habenaria Hookeri Torrey.* H. orbiculata Hook. exot. fl. t. 145. B. Cab. t. 1523. In Am. bor. 2.

7. *P. orbiculata* Lindl. fol. radicalibus 2 orbiculatis planis, caule subaphylio; racemo laxo multifloro; sepalis lateralibus reflexis; labello linearispathulato basi pubescente sepalis fere triplo longiore; calcare compresso arcuato ovario duplo longiore; antherae lobis basi elongatis liberis. *Orchis Pursh.* *Habenaria macrophylla* Hook. In Canada. 2.

8. *P. Menziesii* Lindl. fol. radicalibus 2 subrotundo-oblongis erectis; caule subbisquamato; racemo laxo paucifloro; sepalis obtusissimis; petalis truncatis labello linearis obtuso brevioribus; calcare pendulo apice inflexo ovario subaequali. In Am. bor. 2.

9. *P. Schischmareffiana* Lindl. fol. radicalibus binis obovato-lanceolatis canaliculatis; spica subsecunda multiflora; bracteis oblongis obtusis ovario longitudine; sepalis oblongis obtusis;

petalis labelloque carnosis ovatis obtusis; calcare arcuato gracili labelli longitudine. *Habenaria Cham.* In *Unalaschka*. 4. Planta facie Hermanni Monorchidis.

10. *P. Koenigii* Lindl. caule folioso; fol. inferioribus oblongo-lanceolatis obtusis emarginatisque superioribus linearibus spicae fere aequalibus; spica densa cylindracea; bracteis herbaceis floribus aequalibus; labello sub-rhomboideo-linearis obtuso calcare inflexo obtuso longiore. *Orchis Retz. O. dolichorhiza* Fisch. In *circulo arctico*. 4.

11. *P. herbiota* Lindl. caule folioso; fol. inferioribus oblongis acutis; superioribus lanceolatis acuminatis; spica densa cylindracea; bracteis herbaceis acuminatis floribus longioribus; labello linearis-lanceolato basi bidentato medio unituberculato calcare clavato duplo brevirore. *Habenaria R. Br.* *Orchis Pursh.* In *Am. bor.* 4.

12. *P. hyperborea* Lindl. caule folioso; fol. lanceolatis strictissimis acutis; spica laxiuscula subsecunda; bracteis linearis-lanceolatis acutis flore longioribus; sepalis deflexis; petalis labelloque linearibus obtusis subaequalibus calcaris obtusi penduli longitudine; radicibus longissimis carnosis. *Orchis L. Retz obs.* 4. t. 3. In *circulo arctico*. 4.

13. *P. convallariaefolia* Lindl. caule folioso; fol. oblongo-lanceolatis sensim decrementibus; spica laxiuscula elongata; bracteis linearis-lanceolatis herbaceis floribus longioribus; petalis falcatis truncatis; labello linearis obtuso calcaris longitudine. *Orchis Fisch.* In *Kamtschatka*. 4.

14. *P. dilatata* Lindl. caule folioso; fol. lanceolatis gramineis; spica elongata cylindracea densa laxaque; fol. linearis-lanceolatis acuminatis floribus aequalibus longioribusque; sepalis ovatis obtusis; petalis minoribus conformibus membranaceis; labello rhomboideo linearis-lanceolato obtuso calcaris obtusi longitudine. *Orchis Pursh.* *Habenaria dilatata* Hook. exot. fl. t. 95. In *Am. bor.* 4.

15. *P. huronensis* Lindl. caule folioso; fol. inferioribus oblongis superioribus gramineis; spica laxa tenui; bracteis acuminatis florum longitudine v. longioribus; labello ovato-lanceolato calcaris incurvi compressi lon-

gitudine. *Orchis Nutt.* *Habenaria Spr.* In *Am. bor.* 4.

16. *P. tencostachys* Lindl. caule folioso; fol. oblongo-lanceolatis obtusis; spica longissima densa; bracteis florum longitudine; sepalis ovatis obtusis; petalis membranaceis linearibus emarginatis; labello rhomboideo linearis-lanceolato calcare filiforme arcuato duplo brevirore; antherae lobis parallelis rostellum maximo plicato. In *Am. bor.* 4.

17. *P. gracilis* Lindl. caule folioso; fol. oblongo-lanceolatis obtusis; debilibus patentibus; spica laxa elongata, floribus inferioribus remotis; bracteis angustis acuminatis floribus longioribus; petalis obliquis acuminatis obtusis; labello linearis obtuso calcaris apice inflati obtusissimi longitudine. In *Am. bor.* 4. 1—2-ped. Fol. 3 poll. longa.

18. *P. stricta* Lindl. caule folioso stricto; fol. ovato-lanceolatis internodiis duplo longioribus; spica laxa elongata; bracteis linearis-lanceolatis floribus longioribus; sepalum dorsali latiore; petalis ovatis acuminatis obtusis; labello linearis obtuso calcaris apice inflato obtusissimo duplo longiore. In *Am. bor.* 4.

19. *P. graminea* Lindl. caule folioso; fol. strictis inferioribus linearis-lanceolatis obtusiusculis; superioribus acuminatis; spica laxiuscula; bracteis acuminatis floribus brevioribus; petalis obliquis apice truncatis tridentatis labello rhomboideo lanceolato undulato venoso aequalibus calcare arcuato clavato duplo brevioribus. In *Am. bor.* 4. Glandulae maximae.

20. *P. arcuata* Lindl. caule folioso; fol. oblongis acutis; racemo laxo multifloro; bracteis foliaceis acuminatis floribus longioribus; sepalis secundis; labello linearis sepalis longiore; petalis linearibus liberis; calcare clavato labello duplo longiore; ovario rostrato. In *Ind. or.* 4.

21. *P. latilabris* Lindl. caule folioso; fol. ovato-oblongis acutissimis; spica longa laxiuscula; bracteis ovatis acutis ciliatis; petalis conformibus glabris carnosus labello carnosus lanceolato brevioribus; calcare clavato labello duplo longiore; ovario rostrato. In *Ind. or.* 4.

22. *P. acuminata* Lindl. caule folioso; fol. ovato-oblongis acutissimis;

spica longa latiuscula; bracteis ovatis floribus brevioribus; sepalis obtusis obtusis ciliatis; petalis ovatis acuminatis carnosis glabris labello linearis carnoso aequilongis et duplo latioribus; calcare arcuato labello multo longiore; ovario rostrato. *In Nepalia.* 2.

23. *P. clarigera* Lindl. caule folioso; fol. ovato-oblongis acuminatis; spica elongata laxiuscula; bracteis acuminatis florum longitudine; sepalis petalisque ovatis obtusis glabris; labello linearis acuto basi bidentato tuberculo uno in medio; calcare clavato obtusissimo labello longiore. *In Ind. or.* 2.

24. *P. japonica* Lindl. labello linearis subulato integerrimo; petalis obtusis; cornu germe triplo longiore; caule folioso; fol. lanceolatis patentibus. Thunb. *jap.* t. 3. *In Japonia.* 2.

25. *P. angustata* Lindl. labelli limbo linearis; calcare attenuato. Mecosa Blume tab. 1. *In Java.* 2.

26. *P. Blumei* Lindl. labelli limbo oblongo-ovato; calcare clavato. Mecosa Blume. *In Java.* 2.

27. *P. aphylla* Lindl. racemo secundo; floribus campanulatis albis; nectario filiformi; fol. nullis. Orchis Forsk. Habenaria R. Br. *In Arabia.* 2.

28. *P. obcordata* Lindl. caule humili dense folioso; fol. ovato-oblongis acutis, spica densa foliosa; sepalis petalisque galeatis lateralibus patentibus; labello obcordato apiculato calcare longiore. Orchis Don. *In Nepalia.* 2.

29. *P. decipiens* Lindl. caule folioso; fol. oblongis vix vaginantibus inferioribus obtusis supremis acutis; spica multiflora laxiuscula; bracteis foliaceis inferioribus flore duplo longioribus sepalis petalisque anguste ovatis acutiusculis; labello cuneato tridentato calcare curvo conico duplo longiore. *In Sibiria.* 2.

b. Labellum incisum, nunc tantum crenulatum.

30. *P. cristata* Lindl. caule folioso; folio inferiore longo lanceolato caeteris minoribus acuminatis; spica oblonga densa multiflora; bracteis acuminatissimis florum longitudine; sepalis supremo ovato lateralibus de-

flexis rotundatis; petalis rotundatis crenatis; labello ovato margine lacero calcari clavato oblique truncato subaequali. Orchis Mich. ex. Habenaria R. Br. B. Cab. t. 1651. *In Am. bor.* 2. Flores lutei.

31. *P. holopetala* Lindl. caule folioso; fol. ovato-lanceolatis acutis; spica laxa multiflora; bracteis linearilanceolatis ovarii longitudine; sepalis suborbiculatis obtusis supremo galeato; petalis linearibus acuminatis obtusis integerrimis; labello lanceolato margine lacero calcare filiformi duplo breviore; ovario rostrato. Habenaria blephariglottis Hook. exot. Fl. t. 87. *In Canada.* 2. Flores albidi.

32. *P. blephariglottis* Lindl. caule folioso; fol. inferioribus lanceolatis canaliculatis sensim decrescentibus; spica oblonga multiflora densa; bracteis foliaceis linearibus acuminatis floribus brevioribus; sepalis rotundato-oblongis lateralibus reflexis; petalis spatulatis dentatis; labello oblongo piano fimbriato medio papilloso calcare recto pendulo triplo breviore; ovario longissime rostrato. Orchis Willd. *In Am. bor.* 2. Flores albidi.

33. *P. citaris* Lindl. caule folioso; fol. inferioribus ovato-lanceolatis supremis minimis; spica oblonga densa multiflora; bracteis acuminatis ovario brevioribus; sepalis reflexis ovato-rotundatis obtusis; petalis linearibus reflexis apice incisis; labello oblongo margine capillaceo multifido calcare arcuato duplo breviore; ovario colorato longissime rostrato. Orchis L. Andr. rep. t. 42. B. M. t. 1668. *In Am. bor.* 2. Flores aurei v. nivei.

2. Labellum 3-partitum.

a. Labellum laciniæ indivisæ.

34. *P. rotundifolia* Lindl. folio solitario radicali subrotundo-ovato plano; caule nudo; spica pauciflora laxiuscula; bracteis obtusis ovario brevioribus; sepalis petalisque obtusis; labello 3-lobo lobis lateralibus subfalcatis intermedio obcordato apiculato; calcare acuto labelli longitudine. Orchis Pursh. *In Am. bor.* 2.

35. *P? graminea* Lindl. caule folioso; fol. gramineis; spica brevi pauciflora; bracteis ovatis, ovario brevioribus; labello 3-lobo lobo medio

elongato calcare longiore. Satyrium Thouars. orch. afr. t. 6. In Madagascar. 2.

36. *P. cubitalis* Lindl. caule folioso; fol. linear-lanceolatis acutissimis; spica laxa foliosa; bracteis cucullatis cuspidatis acuminatissimis floribus longioribus; sepalis ovatis obtusis; petalis subulatis; labello 3-partito laciniis lateralibus retrorsum falcatis, calcare clavato pendulo triplo breviore. Orchis L. Habenaria R. Br. In Zeylona. 2. Sepala viridia. Labellum purpureum.

37. *P. longibracteata* Lindl. caule folioso; fol. ovato-lanceolatis; bracteis longissimis foliaceis acuminatissimis; labelli 3-partiti laciniis linearibus lateralibus abbreviatis; calcare obtuso abbreviato. In regno Burmanorum ad fl. Irawaddi. 2.

38. *P. brachyphylla* Lindl. fol. duobus radicalibus carnosus reniform-orbiculatis; scapo squamis acumina-tissimis vestito; bracteis ovatis cuneolatis acuminatissimis florum longitudine; sepalis ovato-subrotundis superno obtuso lateralibus acutis pen-dulis; petalis minoribus ovatis; labello alte tridentato sepalis breviore; calcar clavato triplo breviore; ovario rostrato. In Ind. or. 2.

39. *P. flava* Lindl. labello 3-fido integerrimo, lacinia media majore; cornu filiformi longitudine germinis; spica elongata congesta; bracteis flore longioribus. Orchis L. In Virginia. 2.

b. Labelli lacinia incisae aequales.

40. *P. incisa* Lindl. caule folioso; fol. obovato-oblongis sursum decre-scentibus; racemo oblongo multifloro; bracteis linearibus acuminatis floribus longioribus; sepalis oblongis lateralibus deflexis; petalis erectis oblongis denticulatis; labelli unguiculati subrotundi laciniis cuneatis inciso-denticulatis intermedia majore calcare duplo breviore. Orchis Willd. In Am. bor. 2.

41. *P. fimbriata* Lindl. caule folioso; fol. obovato-oblongis sursum de-crecentibus; racemo oblongo multi-floro; bracteis linearibus acuminatis supremis floribus subaequalibus; sepalis oblongis obtusis incisis; labelli unguiculati subrotundi laciniis cuneatis inciso-dentatis, intermedia majore

calcare duplo breviore. Orchis h. Kew. In Am. bor. 2.

42. *P. crispa* Lindl. caule folioso; fol. anguste lanceolatis acuminatis sursum decrescentibus; racemo cylindra-ceo denso multifloro; bracteis linearibus acuminatis floribus brevioribus; sepalis subrotundis patentissimis; petalis conformibus inciso-crispis; labelli unguiculati subrotundi laciniis cuneatis inciso-crispis, intermedia majore, calcare triplo breviore; angulis ovarii crispis. In Am. bor. 2.

43. *P. fissa* Lindl. caule folioso; fol. ovato-lanceolatis acuminatis; spica oblonga multiflora; bracteis acuminatis ovario brevioribus; sepalis subrotundo-ovatis obtusis; petalis obovatis denticulatis, labello 3-partito, laciniis truncatis apice denticulatis lateralibus brevioribus, intermedio bilobo calcare filiformi duplo longiore. Orchis Plukn. t. 434. f. 6. In Am. bor. 2. Flores magni purpurei.

44. *P. grandiflora* Lindl. affinis P. fimbriatae sed floribus duplo ma-joribus; labelli laciniis lateralibus altius incisis intermedia latiore; bra-cteis inferioribus haud flore longioribus. Habenaria Torr. In Am. bor. 2.

45. *P. leucophaea* Lindl. fol. an-gustis ovato-lanceolatis sensim an-gustatis; spica laxa multiflora; bra-cteis ovato-lanceolatis acuminatis flo-ribus aequalibus; petalis obovatis inciso-crenatis; labello 3-partito unguiculato; laciniis multifidis acuminatis; ungue bilamellato; calcare filiformi longissimo apice clavato compreso-acuto. Orchis Nutt. In Am. bor. 2.

46. *P. physodes* Lindl. caule folioso; fol. inferioribus oblongis obtusis supremis angustissimis acuminatis; racemo laxo multifloro; bracteis foliaceis flore longioribus; sepalis retusis, lateralibus deflexis; petalis emarginatis; labello unguiculato 3-partito, laciniis cuneatis capillaceo-multifidis subaequalibus; calcare ova-rio duplo breviore. Orchis L. O. lacera Sweet fl. Gard. t. 73. Habenaria R. Br. In Am. bor. 2. Flores albo-virescentes.

c. Labelli lacinia incisae; lateralibus multo majoribus.

47. *P. candida* Lindl. caule folioso subbifloro; fol. ovato-oblongis acutis

supremis cucullatis; sepalis ovatis acutis; petalis linearibus nanis; labello cuneato-rhomboideo tripartito; lacinis lateralibus latis integris intermedia lineari; calcare clavato labello duplo longiore. *Habenaria* Don. In *Nepalia*. 4.

48. *P. uniflora* Lindl. labello maximo suborbiculato; perianthii foliolis ovalibus obtusis; calcaribus ovario fere duplo longioribus. *Habenaria* Don. In *Nepalia*. 4.

49. *P. Susannae* Lindl. caule folioso subtrifloro; fol. ovato-oblongis acutis supremis cucullatis acuminatis; sepalis ovatis obtusis lateralibus obliquis dorsali rhomboideo; petalis linearibus acutis; labelli 3-partiti lacinis lateralibus truncatis multifidolaceris intermedia lineari, calcare duplo longiore. Rumph. 5. t. 99. f. 2. *Orchis gigantea* Sm. exot. bot. t. 100. In *Ind. or.* 4.

50. *P. robusta* Lindl. caule folioso 4—5-floro; fol. oblongis acutis supremis lanceolatis cucullatis; sepalis ovatis acutis; petalis linear-ovatis nanis; labelli 3-partiti lacinis lateralibus cuneatis truncatis incisis intermedia lineari longiore; calcare longissimo. In *regno Burmanno*. 4.

51. *P. dentata* Lindl. labello tripartito; lacinis lateralibus oblongis dentatis intermedia lineari obtusa integra; cornu germine duplo longiore. *Orchis* Sw. In *China*. 4.

52. *P. radiata* Lindl. fol. ensiformibus suberectis caule subbifloro; bracteis acuminatis ovario duplo breviribus; labello 3-partito plano; lacinis lateralibus dilatatis ciliato-dentatis, intermedia lanceolata; calcare filiformi acuto ovario aequali. *Orchis Susannae* Thunb. O. radiata Thunb. ic. pl. Jap. t. 2. In *Japonia*. 4.

laxiuscula; bracteis ovatis acuminatis floribus longioribus; sepalis ovatis acutis membranaceis patentibus; petalis carnosis subrotundo-ovatis coniventibus; labello ovato canaliculato obtuso apice cucullato; calcare brevissimo subteret. *Habenaria* L. In *Unalaschka*. 4.

2. *P. islandicus* Lindl. caule diphylo; bracteis foliaceis; inferioribus spica 4—5-flora longioribus; sepalis ovato-lanceolatis petalis 3-plo angustioribus; labello lanceolato indiviso; calcare scrotiliformi subdidymo. In *Islandia*. 4.

3. *P. oboletus* Lindl. labello oblongo lanceolato indiviso; petalis erectis; cornu obtuso scrotiliformi; germinibus pedicellatis; scapo nudo; bracteis brevissimis squamaeformibus. *Orchis* Willd. In *Am. bor.* 4.

4. *P. latifolius* Lindl. caule basi folioso; fol. 2—3, ovali-oblongis acutis amplexicaulibus; spica longissima cylindracea; labello concavo obsolete 3-lobo acuminato petalis conformi; calcare apice inflato. *Satyrium* Thouars orch. afr. t. 10. *Herminium* Lindl. B. R. t. 1499. In *Borbonia et Mauritio*. 4.

5. *P. Commersonianus* Lindl. fol. tribus ad basin caulis rosellatis ovali-acutis nervosis; caule gracili; spica longa; floribus minutis; labello subtriangulari basi subcanaliculato; calcare brevissimo recurvo. *Gymnadenia* Rich. orch. maurit. t. 4. In *Borbonia*. 4.

6. *P. citrinus* Lindl. fol. 2. caulinis ovato-lanceolatis acuminatis superioribus multo minoribus subulato-acuminatis subtus glandulosis; floribus glandulosis; labello cuneato angulis rotundatis; calcare minimo tereti. *Habenaria* Thouars orch. afr. t. 18. In *Borbonia*. 4.

7. *P. densiflorus* Lindl. bulbis ovalibus indivisis; fol. radicalibus lanceolatis petiolatis superioribus caulinis spathaeformibus; spica densa; calcare scrotiliformi. *Satyrium* Brot. Lus. t. 22. In *Lusitania*. 4.

8. *P. cordatus* Lindl. caule diphylo; fol. cordatis acutis; spica secunda; sepalis petalique ovato-lanceolatis acutis subaequalibus; labello 3-lobo basi saccato; squamis antherae lateralibus elongatis clavatis. *Haben-*

4636. HEMIPILIA Lindl. (1835).

1. *H. cordifolia* Lindl. In *Ind. or.* 4. Caulis 1-ped. Folium cordatum amplexicaule. Racemus secundus. Flores magnitudine *Orchis* masculae.

4637. PERISTYLUS Blume. (1825).

1. *P. Chorisianus* Blume; fol. binis lato-ovatis acutis; spica pauciflora

naria cordata Hook. B. misc. I. t. 55.
B. M. t. 1499. In Africa. 4.

9. *P. fallax* Lindl. folio subsolitario caulinus erecto linearis-lanceolatus nunc caule longior; spica subsecunda; sepalis ovatis acutis; petalis subulato-linearibus; labello hastato-3-lobo; laciniis subaequalibus acutis; calcare brevi conico. *Herminium* Lindl. In *Nepalia*. 4.

10. *P. virescens* Lindl. labello lanceolato crenato; petalis conniventibus; cornu obtuso scrotiforme; bracteis flore longioribus. *Orchis* L. In *Am. bor.* 4.

11. *P. bracteatus* Lindl. caule folioso; fol. oblongis obtusis v. retusis sursum angustatis et acutioribus; spica laxa; bracteis foliaceis acuminatis floribus duplo triplo longioribus; petalis linearibus erectis; labello linearis-truncato subcuneato angulis apice nunc productioribus calcare inflato brevi. Salish. parad. t. 110. *Habenaria* Hook. exot. fl. t. 175. In *Am. bor.* 4.

12. *P. viridis* Lindl. caule folioso; fol. oblongis inferioribus obtusissimis; spica densa obtusa; bracteis foliaceis floribus longioribus; petalis linearibus erectis; labello linearis-abrupte tridentato dente intermedio minore calcare brevi inflato. *Satyrium* L. E. B. t. 94. *Habenaria* Hook. fl. Lond. c. ic. *Himantoglossum viride*. In *Europa*. 4.

13. *P. Hamiltonianus* Lindl. fol. pluribus lanceolatis acuminatis spica densa cylindracea longioribus; bracteis setaceo-acuminatis floribus multo longioribus sepalis petalisque obtusis conformibus aequalibus; labello rotundato 3-dentato; calcare orbiculari. *Herminium* Lindl. In *Ind. or.* 4.

14. *P. godyeroides* Lindl. caule basi laxe vaginato medio folioso; fol. ovato-oblongis acutis abrupte in squamas acuminatissimas transeuntibus; spica longa cylindracea; sepalis petalisque ovatis acutis subaequalibus; labello 3-partito laciniis ovatis acutis; calcare rotundo inflato. *Habenaria* Don. *Herminium* Lindl. In *Nepalia*. 4. Flores ochroleuci.

15. *P. plantaginea* Lindl. fol. 3 erectis oblongo-lanceolatis acutis spicace fere aequalibus; sepalis ovatis; petalis subrotundis obtusis; labello rotundato obtuso tridentato; calcare sphaeroideo. *Herminium* Lindl. B. R. t. 1499. In *Zeylona*. 4.

16. *P. constricta* Lindl. caule basi laxe vaginato medio folioso; fol. pluribus oblongo-lanceolatis scapo brevioribus abrupte in squamas acuminatas transeuntibus; sepalis linearis-lanceolatis acuminatis; petalis conformibus duplo angustioribus; labello 3-fido; laciniis acuminatis lateralibus angustioribus et longioribus; calcare vesicato. *Platanthera* Lindl. In *Nepalia*. 4.

17. *P. gracilis* Blume; fol. linearis-lanceolatis acuminatis; labelli limbo tripartito, laciniis lateralibus angustissimis, media lanceolata; calcare subclavata. In *Java*. 4.

18. *P. grandis* Blume fol. latoblongis acuminatis; labelli limbo semitrifido; calcare obtuso. In *Java*. 4.

19. *P. aristatus* Lindl. caule gracili basi nudo vaginato medio folioso; fol. ovato-lanceolatis petiolatis membranaceis abrupte in squamulas quasdam 2 distantes transeuntibus; spica rara pauciflora; sepalis ovatis acutis; petalis subulatis majoribus; labello 3-partito, laciniis lateralibus setaceis flexuosis intermedia recta carnosa subulata longioribus; calcare ovali inflato antice costato. In *Zeylona*. 4.

20. *P. atlanticus* Lindl. fol. lanceolatis maculatis; spica densa brevi obtusa; sepalis acutis; labello 3-lobo lobis linearibus angustissimis intermedio longiore et latiore; calcare abbreviato obtuso. *Satyrium* Desf. In *Attante*. 4.

4638. SACCIDIUM Lindl. (1835).

1. *S. pilosum* Lindl. Orchidea pilosa Burch. In *P. b. S.* 4. Caulis 1-ped. Spica 8-poll. densissima. Flores parvi.

4639. PACHITES Lindl. (1835).

1. *P. appressa* Lindl. Orchidea Burch. In *P. b. S.* 4. Herba rigida crassa $\frac{1}{2}$ -ped. ferruginea. Fol. 4 unc. longa. Spica pedalis densissima.

4640. COELOGLOSSUM Lindl. (1834).

1. *C. lacertiferum* Lindl. fol. radicalibus 2-3 oblongo-lanceolatis

caeteris squamaeformibus acutis adpresso; spica gracili rara; bracteis acuminate ovarii longitudine; labello linearie medio callo magno elevato apice 3-lobo lobis linearibus acuminate, intermedio longiore; calcare ovato inflato apiculato. In *Nepalia*. 4.

2. *C. acuminatum* Lindl. fol. pluribus radicalibus oblongo-lanceolatis caeteris acuminatis squamaeformibus; spica rara multiflora; bracteis acuminatis florum longitudine; labello 3-partito basi bicalloso laciniis setaceis divaricatis intermedia breviore; ungue marginato crispo; calcare ovato inflato apiculato. In *Nepalia*. 4.

3. *C. brerifolium* Lindl. fol. radicalibus parvis ovato-lanceolatis caeteris minutis acuminatis ovarii longitudine; labello 3-partito, laciniis lateralibus linearibus obtusis intermedia ovata breviore; calcare clavato pendulo labello longiore. In *Nepalia*. 4.

4. *C. densum* Lindl. caule folioso; fol. lanceolatis acuminatis sensim decrescentibus; spica oblonga densa; bracteis oblongis acuminatis floribus aequalibus; labello 3-partito; laciniis lateralibus setaceis intermedio linearie breviore; unguis margine incrassato undulato; calcare pendulo labello duplo longiore. In *Ind. or.* 4.

5. *C. secundum* Lindl. caule folioso; fol. oblongo-lanceolatis acuminatis planis; spica densa secunda; bracteis ovato-lanceolatis setaceo-acuminatis foliaceis floribus longioribus; labello 3-partito laciniis lateralibus filiformibus intermedio linearie triplo breviore, ungue linearie margine eroso; calcare scrotiformi apiculato. In *Ind. or.* 4.

4641. MONOTRIS Lindl. (1834).

1. *M. secunda* Lindl. In *P. b. S.* 2. Radices testiculatae. Foliolum minimum radicale. Caulis retrorsum hispidus. Flores parvi secundi. Bracteae et sepalorum margines hispidae.

4642. SCOPULARIA Lindl. (1834).

1. *S. Burchellii* Lindl. In *P. b. S.* 2. Radices testiculatae. Folia radicalia membranacea. Caulis aphyllus. Spica elongata subsecunda. Flores parvi.

4643. AOPLA Lindl. (1834).

1. *A. reniformis* Lindl. In *Nepalia*. 2. Herba radicibus testiculatis. Foliolum solitarium radicale. Spica laxa secunda. Flores herbacei.

4644. DISSORHYNCHIUM Schauer. (1842).

1. *D. . . .* Schauer ex Endl. In *Manilla*. 2. Herba Gymnadeniae facie. Folia lanceolata. Spica laxa.

4645. HERMINIUM R. Br. (1821).

1. *H. Monorchis* R. Br. fol. radicalibus binis ovato-oblongis; labello petalisque tridentatis; spica longa cylindracea pedunculata. *Ophrys L. Engl.* hot. t. 71. In *Europa*. 4.

2. *H. atpinum* Lindl. B. R. t. 1499. fol. linearibus gramineis; labello ovato repando petalis acutis duplo majore. *Spica pauciflora* fol. breviore. *Ophrys Jacq. vind. t. 9. In Atp. Europ.* 4.

3. *H. gramineum* Lindl. folio radicali lanceolato canaliculato; labello integerrimo concavo acuminato petalis duplo breviore; spica secunda elongata. *Neottia monophylla* Don. In *Nepalia*. 4.

4. *H. congestum* Lindl. fol. erectis oblongis apice latioribus spicae densae subaequalibus; bracteis squamaeformibus ovario brevioribus; sepalis ovatis obtusis; petalis ovalibus subaequalibus; labello ovato integro convexo basi gibboso et marginato. In *Nepalia*. 4.

4646. HABENARIA Willd. (1803).

A. Erostres.

1. Petala 2—3-fida.

a. Sepalum supremum petalis angustius.

1. *H. rotundifolia* Lindl. folio solitario radicali subrotundo-cordato piano obtuso; racemo 3-floro, floribus longe pedunculatis; petalis latissimis ovatis acutis lacinia anteriore subulata; labelli 3-partiti laciniis subaequalibus intermedia latiore; calcare incurvo

clavato obtuso labello paulo longiore.
In Ind. or. 4.

b. *Sepalum supremum petalis majus.*

a. *Petalorum laciniae latitudine subaequales.*

2. *H. abortiens* Lindl. fol. lanceolatis erectis; racemo elongato multifloro; bracteis foliosis florum fere longitudine; sepalum supremo nano; petalis minimis lacinia anteriore latoe bifida; labelli 3-partiti lacinia intermedia linearis obtusa lateralibus dimidio brevioribus subulatis calcare clavato acuminato labello longiore; basibus antherae elongatis. *In Peruvia.*
4. Sepala maxima reflexa falcata.

3. *H. digitata* Lindl. fol. ovato-oblongis undulatis acutis; racemo laxo elongato multifloro; bracteis lanceolatis ovarii longitudine; petalis bipartitis; lacinias linearibus anticis cum basi labelli connatis; labelli 3-partiti lacinias subaequalibus linearibus acutis calcare clavato acuto brevioribus. *Bonatea Punduana* Lindl. B. herbacea Wall. *In Ind. or. 4.* 1—2-ped. Flores parvi albi.

4. *H. secunda* Lindl. racemo denso subsecundo multifloro; bracteis lanceolatis acuminatis florum fere longitudine; petalis bipartitis; lacinias anterioribus falcatis paulo angustioribus et longioribus; labelli 3-partiti lacinias linearibus obtusis subaequalibus; calcare pendulo crasso clavato. *In Brazilia.* 4.

5. *H. pentadactyla* Lindl. fol. anguste lanceolatis carinatis; racemo laxo multifloro; bracteis foliaceis acuminatis ovatis subaequalibus; petalis bipartitis, a galea plana liberis, lacinias posterioribus membranaceis convenientibus; anterioribus linearibus carnosis patentissimis longioribus; labelli 3-partiti carnosii sepals brevioris lacinias linearibus aequalibus calcare clavato apice ventricoso ovarii longitudine. *In paludosis Bonariae.* 4.

6. *H. macrostachya* Lindl. fol. obovato-lanceolatis; racemo laxo multifloro; bracteis linearis-lanceolatis acuminatis ovario subaequalibus; petalis bipartitis, lacinias setaceis longissimis; labelli lacinias setaceis calcare cylindrico pendulo. *In Zeylona.* 4. Petala et labellum rubro maculata.

7. *H. salaccensis* Blume; labello 3-partito, lacinias linearibus media longiore; calcare filiformi ovarium aequante; sepals interioribus perianthii basi bipartitis. *In Java.* 4.

8. *H. arachnoides* Thouars orch afr. t. 18. racemo laxo multifloro; petalis bipartitis, lacinias linearibus; labelli 3-partiti lacinias lateralibus intermedia duplo brevioribus; calcare filiformi apice inflato obtuso; sepals lateralibus supremo majoribus. *In Madagascar.* 4. Flores flavescentes.

9. *H. bractescens* Lindl. fol. densis lanceolatis; petalis bipartitis lacinias carnosis filiformi-lanceolatis, lateralibus adscendentibus; sepalum supremo galeato; calcare pendulo apice compresso ovario breviore. *In Bonaria.* 4.

b. *Petalorum lacinia anterior angustior et elongata.*

10. *H. macroceras* Spr. B. M. t. 2947. racemo laxo paucifloro; petalis bipartitis, lacinia anteriore filiformi recurva duplo longiore; labelli 3-partiti lacinias lateralibus filiformibus recurvis; calcare arcuato subclavato; sepals lateralibus reflexis. *Orchis Habenaria* L. Sw. obs. t. 9. *In Jamaica.* 4.

11. *H. longicauda* Hook. B. M. t. 2957. fol. ovato-lanceolatis acuminatis; racemo paucifloro; petalis bipartitis, lacinia anteriore filiformi sublongiore; labelli 3-partiti lacinias lateralibus filiformibus recurvis intermedia breviore acuta; calcare pendulo filiformi longissimo; sepals lateralibus reflexis. *In Demerara.* 4.

12. *H. Gourlieana* Gillies; petalis bipartitis, lacinia anteriore filiformi longissima; labelli 3-partiti lacinias lateralibus filiformibus recurvis; calcare recto pendulo filiformi ovario duplo longiore; processibus lateralibus carnosis. *In Mendoza.* 4.

13. *H. bicornis* Lindl. racemo denso stricto subcorymboso; petalis bipartitis a galea plana liberis lacinia anteriore subaequali falcatim cornuta; labelli 3-partiti carnosii lacinias spatulatis; calcare longissimo inflexo apice compresso. *In Cuba.* 4.

14. *H. maculosa* Lindl. fol. undulatis coriaceis; racemo denso multifloro; petalis bipartitis, lacinia ante-

riore setacea; labelli 3-partiti laci-niis linearibus; calcare filiformi com-presso adscendente ovario longiore; sepalis lateralibus pendulis. *In Ind. occ. et Peruvia.* 2. Caulis 1—2-ped. fuscumaculatus.

15. *H. Michauxii* Nutt. fol. ovali-lanceolatis; racemo longo multifloro; petalis bipartitis, laci-niis anterioribus setaceis; labelli 3-partiti laci-niis lateralibus setaceis intermedia longioribus; calcare ovario duplo longiore. *Orchis quinqueseta* Michx. *In Carolina.* 2. 2-ped. Flores albi.

16. *H. repens* Nutt. caule basi radicante folioso; racemo longo densifloro; petalis bipartitis, laci-niis anterioribus setaceis galea aequalibus; calcare ovario aequali. *In Carolina.* 2.

17. *H. maxillaris* Lindl. fol. linear-oblongis acutis; racemo denso multifloro; petalis bipartitis, laci-niis aequalibus; labelli 3-partiti laci-niis lateralibus paulo angustioribus et brevioribus; calcare filiformi subclavato; sepalis explanatis aequilongis. *Platanthera foliosa* voy. de la Coquille t. 38. f. B. *In Peruvia.* 2.

18. *H. paucifolia* Lindl. fol. ensiformibus; caule superne squamato; petalis bipartitis; laci-niis aequilongis anterioribus filiformibus reflexis; labello 3-partito; sepalis lateralibus pendulis; lacinia intermedia latiore; calcare pendulo curvato ovario breviore. *In Chili.* 2.

19. *H. lancifolia* Rich. orch. Maurit. t. 1. fol. linear-lanceolatis; racemo paucifloro laxo; bracteis setaceis petalis bipartitis; lacinia anteriore setacea duplo longiore; labelli linearis 3-fidi laci-niis lateral. divergentibus angustioribus; calcare recto obtusissimo. *In Mauritio.* 2.

20. *H. vesiculosus* Rich. Ic. t. 2. fol. oblongo-lanceolatis; bracteis apice setaceis; petalis bipartitis, lacinia anteriore filiformi paulo longiore; labelli linearis 3-fidi laci-niis lateralibus divergentibus; calcare apice inflato ovarii longitudine. *In Mauritio.* 2. Flores virentes.

21. *H. truncata* Lindl. fol. ovato-lanceolatis acuminatis; racemo denso cylindrico; petalis bipartitis, laci-niis anterioribus setaceis deflexis cum basi labelli connatis; labelli 3-partiti laci-niis linearibus acutis intermedia la-

tiore; calcare clavato pendulo. *In Madagascaria.* 2.

22. *H. crassicornis* Lindl. fol. ovato-oblengis; racemo multifloro; bracteis foliaceis; petalis bipartitis, laci-niis anterioribus setaceis adscendentibus; labelli 3-partiti laci-niis linearibus acutis; sepalis latioribus explanatis acutissimis; calcare recurvo compresso. *In Mexico.* 2.

23. *H. flexuosa* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis acutis; floribus distantibus; bracteis foliaceis eucullatis; petalis bipartitis laci-niis anterioribus filiformibus rectis reflexis; labelli 3-partiti laci-niis aequalibus filiformibus; sepalis lateralibus pendulis; calcare filiformi compresso ovario duplo longiore. *In Mexico.* 2.

24. *H. clypeata* Lindl. fol. parvis ovatis cuspidatis; racemo multifloro; petalis bipartitis, laci-niis anterioribus linearibus posticis cum sepalō supremo rotundato galeam orbiculatam planam efficientibus; labelli penduli lacinia intermedia linear-lanceolato; calcare compresso ovarii longitudine. *In Mexico.* 2.

25. *H. entomantha* Lindl. fol. parvis ovatis acutis; racemo multifloro; bracteis ovatis acuminatissimis; petalis bipartitis, laci-niis longissimis setaceis; labelli 3-partiti lacinia intermedia linear-lanceolatis longissimis setaceis; calcare pendulo compresso ovario longiore. *Orchis Llave.* *In Mexico.* 2. Flores lutei.

26. *H. mystacina* Lindl. fol. linearibus setaceo-acuminatis; bracteis foliaceis; petalis bipartitis, laci-niis linear-lanceolatis erectis galea longioribus barbatis posticis glabris; labelli 3-partiti lacinia intermedia linear-obtusa basi lateralibusque barbata; calcare pendulo compresso ovarii longitudine. *In Brasilia.* 2.

27. *H. nuda* Lindl. fol. linearibus vaginantibus; racemo laxo multifloro; petalis semiovatis laci-niis setaceis adscendentibus; sepalō supremo subrotundo cuspidato; labelli 3-partiti laci-niis lateralibus setaceo-filiformibus intermedia linear-truncata calcaris longitudine. *In Brasilia.* 2.

28. *H. setacea* Lindl. fol. linearibus apice setaceis; racemo 5—7-floro; bracteis setaceo-acuminatis; ovario arenato; petalis bipartitis; laci-niis anterioribus setaceis adscendentibus galea

acuminata longioribus; labelli lacinis setaceis; sepalis lateralibus acuminatis. *In Brasilia.* 2.

29. *H. gracilis* Lindl. fol. radicibus subbinis; caule vaginato; racemo stricto; bracteis lanceolatis ovario longiore; petalis bipartitis, lacinis anterioribus filiformibus subaequalibus; calcare arcuato adscendente compresso ovario longiore; sepalis ovatis obtusis. *In Brasilia.* 2.

30. *H. aranifera* Lindl. fol. paucis lanceolatis; racemo elongato denso; bracteis ovarii hexagoni longitudine; petalis bipartitis; lacinis a galea liberis, lateralibus e lata basi setaceis; labelli tripartiti lacinis linearibus sepalorum ovarorum longitudine; calcare filiformi ovarii longitudine. *In Bonariae paludosis.* 2.

31. *H. imbricata* Lindl. fol. lineari-oblongis obtusis; racemo denso multifloro; petalis bipartitis, lacinis lateralibus setaceis; labelli 3-partiti lacinia intermedia lineari-lanceolata obtusa, lateralibus setaceis arcuatis; sepalis margine serrulatis; calcare inter bracteas latente. *In Brasilia.* 2.

32. *H. ichneumonea* Lindl. labello tripartito; lacinis linearibus; calcare lineari incurvo apice ovato; calyce 7-phyllo, foliolis lateralibus exterioribus majoribus reflexis. *Orchis Sw. In Sierra Leone.* 2.

33. *H. membranacea* Lindl. labello 3-partito, lacinis lateralibus lanceolato-linearibus, apice longissimo capillaceo, media lineari; calcare subulate germine breviore incurvo; calyce 7-phyllo. *Orchis Sw. In Sierra Leone.* 2.

34. *H. trifida* H. et K. caule paucifolio; fol. lanceolato-oblongis; foliolis calycinis 3 interioribus 3-fidis. *In Nov. Granata.* 2. Petala alba.

c. Petalorum lacinia anterior nana.

35. *H. monteridensis* Lindl. fol. lanceolatis acuminatis; racemo oblongo densissimo; petalis earnosis bipartitis, lacinis nanis acutis; labelli carnosus tripartiti lacinis aequalibus, intermedia lineari-ensiformi lateralibus subfalcatis duplo longiore; calcare clavato pendulo ovarii longitudine. *In Brasilia.* 2.

36. *H. breridens* Lindl. fol. ovalibus; racemo denso stricto multifloro; petalis carnosis antice 1-dentatis; labelli curnosi tripartiti lacinia intermedia lineari-ensiformi lateralibus subfalcatis duplo longiore; calcare clavato pendulo ovarii longitudine. *In Brasilia.* 2.

37. *H. parviflora* Lindl. fol. lineari-lanceolatis; racemo cylindrico multifloro; petalorum lacinia anteriore falcata posteriore duplo breviore; labelli tripartiti lacinis deflexis; calcare filiformi pendulo ovario breviore. *In Brasilia.* 2. Flores albo-virides.

38. *H. angustifolia* H. et K. caule paucifloro; fol. lanceolatis; foliolis calycinis interioribus bifidis; labello 3-fido, lacinis linearibus. *In Guiana.* 2.

39. *H. latifolia* H. et K. fol. ovato-oblongis; floribus spicatis; petalis lateralibus bifidis; labello 3-fido lacinis linearibus divergentibus. *In Nova Granata.* 2.

40. *H. leptoceras* Hook. Bot. M. t. 2726. fol. lanceolatis undulatis; racemo longo laxiusculo; petalorum lacinia anteriore acuto adscendente posteriore duplo breviore; labelli 3-partiti lacinia intermedia lineari-acuminata apice dilatata, lateralibus falcatis; calcare filiformi compresso; sepalum supremo compresso cuspidato cucullato; basibus antherae longissimis. *In Brasilia.* 2.

2. Petala indirisa.

a. Labellum simplex v. lacinis lateralibus minimis.

41. *H. brachyceras* Spr. fol. angusto-lanceolatis; racemo laxo multifloro; petalis ovatis acuminatis infra galeam obtusam invicem trajicientibus; labello filiformi subclavato integerrimo; calcare apice compresso ovario triptero breviore. *Orchis monorhiza Sw. In Jamaica.* 2.

42. *H. obtusa* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis; racemo laxo; bracteis foliaceis latis cucullatis floribus longioribus; sepalum supremo rotundato, lateralibus obtusis reflexis; labello lineari obtuso adscendente; calcare pendulo clavato compresso. *In Brasilia.* 2. Petala alba.

43. *H. floribunda* Lindl. racemo laxo longissimo; bracteis obtusis mem-

branaceis; petalis dimidiato-oblongis truncatis antice carnosis; labello linearis acutiusculo; calcare pendulo ovarii longitudine. *In Peruria.* 4.

44. *H. quadrata* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis mollibus; racemo longissimo laxo; petalis quadratis cuspidatis antice carnosis medio venosis; labello linearis; calcare pendulo filiformi compresso ovario longiore. *In Brasilia.* 4.

45. *H. hexaptera* Lindl. fol. ovato-lanceolatis; racemo longo laxo; petalis linearis-oblongis obtusissimis; labello linearis acuto sepalis lateralibus acutis aequali; calcare falcato compresso; sepalum supremo serrulatum; ovario hexaptero alis crispis. *In Brasilia.* 4.

46. *H. petaloides* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis acutis; racemo longo; bracteis foliaceis acuminatis ovario brevioribus; petalis cuneatis; sepalum supremo rotundato cuspidato longioribus; labello linearis apice dilatato basi bidentato; calcare compresso clavato acuminato pendulo ovario longiore. *In Brasilia.* 4.

47. *H. parridens* Lindl. fol. ovato-lanceolatis; racemo laxo multifloro; sepalum dorsali ovato obtuso cum apiculo, lateralibus reflexis acuminatis; petalis subfalcatis sepolorum longitudine; labello filiformi; calcare filiformi arcuato labello paulo longiore. *In Peruria.* 4.

48. *H. purpurea* Thouars orch. afr. t. 17. fol. angustis ensiformibus acutis radicalibus; caule squamato; bracteis squamaeformibus; labello cuneato cuspidato, calcare incurvo obtuso labello breviore. *In Madagascaria.* 4. Flores purpurei.

49. *H. linifolia* Presl. scapo paucifloro; fol. linearis-lanceolatis; sepalis integris; labello linearis oblongo integerrimo basi angulato; bracteis ovario brevioribus. *In Peruria.* 4.

b. **Labellum 3-fidum, laciniis filiformibus indivisis.**

50. *H. elongata* R. Br. fol. oblongis acutis; racemo laxo multifloro; bracteis acuminatissimis; labello 3-partito, laciniis filiformibus lateralibus divaricatis intermedia duplo brevioribus; calcare filiformi adscendente ovarii longitudine. *In Nov. Holl.* 4.

51. *H. reflexa* Blume; labello 3-partito; laciniis linearibus, media elongata recurva; sepalis exterioribus latioribus reflexis; calcare clavato arcuato ovario breviore. *In Java.* 4.

52. *H. arenaria* Lindl. fol. binis oblongis acutis; scapo vaginato; bracteis membranaceis acuminatis; labelli 3-partiti laciniis filiformibus lateralibus recurvis; calcare pendulo filiformi ovario longiore. *In P. b. S.* 4. 1½-ped. Sepala lateralia pendula.

53. *H. fiticornis* Lindl. caule gracillimo bifolio; fol. strictissimis oblongo-linearibus obtusis; bracteis subulatis; labelli tripartiti laciniis filiformibus obtusis intermedia adscendente lateralibus deflexis; calcare filiformi compresso ovarii longitudine. *Orchis Thouars.* *In Guinea.* 4. Flores minuti.

54. *H. procera* Lindl. B. R. t. 1858. labello 3-partito; laciniis adscendentibus lateralibus linearibus divaricatis media subulata porrecta canaliculata; calcare linearis obtuso germe longiore; sepalis lateralibus deltoideis. *Orchis Sw.* *In Sierra Leone.* 4.

55. *H. tridactylites* Lindl. fol. 2 radicalibus oblongo-lanceolatis petiolaris; racemo laxo; bracteis membranaceis acuminatis; labelli 3-partiti laciniis filiformibus intermedia paulo longioribus; calcare filiformi clavato pendulo ovarii longitudine. *Orchis Webb.* *In Cunar.* 4.

56. *H. graminea* Lindl. fol. radicalibus linearibus scapo filiformi stricto multo brevioribus; bracteis squamaeformibus acutis; labelli 3-partiti sepalorum longitudine laciniis filiformibus aequalibus; calcare compresso clavato ovarii longitudine. *Platanthera linifolia* Wall. *In Sikkim.* 4.

57. *H. viridiflora* R. Br. fol. angustis recurvis; petalis ovatis sepalis majoribus conformibus; labelli 3-partiti sepalis paulo longioris horizontalis laciniis filiformibus intermedia longiore; calcare filiformi pendulo ovarii longitudine. *Orchis Sw.* *In Ind. or.* 4.

58. *H. lucida* Lindl. fol. obovato-lanceolatis acutis planis racemo elongato; labelli 3-partiti laciniis lateralibus linearibus obtusis divaricatis adscendentibus sepalis longioribus in-

termedia ovata setaceo-acuminata; calcare filiformi apice compresso ovario longiore. *Platanthera* Lindl. In Ind. or. 2.

59. *H. furcifera* Lindl. fol. oblongis planis acutis; racemo elongato angusto; bracteis ciliatis; labello 3-fido laciniis linearibus furcatis lateralibus intermedio breviori suppositis; petalis retusis galea brevioribus; calcare compresso ovario longiore apice involuto. In Mysore. 2.

60. *H. stenopetala* Lindl. fol. obovato-lanceolatis acuminatis planis; racemo denso; labelli linearis 3-fidi laciniis acuminatis lateralibus nanis; petalis setaceo-linearibus a galea liberi; sepalis setaceo-acuminatis; calcare recto filiformi ovarii longitudine. In Ind. or. 2.

61. *H. Heyneana* Lindl. fol. angustis ovalibus; racemo secundo; bracteis foliaceis cucullatis; labelli 3-partiti laciniis subaequalibus. intermedia anguste ovali lateralibus filiformibus incurvis; calcare pendulo filiformi. *Platanthera* Lindl. In Ind. or. 2.

62. *H. Rumphii* Lindl. fol. angustis canaliculatis; racemo oblongo denso; bracteis squamisque caulis setaceo-acuminatis; labelli 3-partiti laciniis filiformibus lateralibus brevissimis; calcare clavato labelli longitudine. Urville voy. de la Coquille t. 38. Rumph. amb. 1. t. 54. f. 2. In Amboina. 2.

63. *H. promensis* Lindl. fol. anguste oblongis patentissimis in squamas acuminatissimas mutatis; racemo oblongo denso; bracteis acuminatissimis; labelli 3-partiti laciniis filiformibus subaequalibus; sepalo supremo petalisque falcatis fornicatis. In Ind. or. 2.

64. *H. marginata* Colebr. in Hook. exot. fl. t. 136. fol. patentissimis cordatis albo-marginatis; racemo oblongo denso; labelli 3-partiti penduli laciniis sepalis longioribus; sepalo supremo petalisque semiovatis fornicatis; calcare pendulo apice ventricoso ovarii longitudine. In Ind. or. 2. Sepala viridia. Petala et labelum lutea.

65. *H. latifolia* Lindl. fol. radicalibus ovato-oblongis acutis caule distanter vaginato; racemo laxo multifloro; bracteis linearibus acuminatis-

simis; labelli lacinia media sepalis longiore obtusa, lateralibus setaceis nanis, sepalo supremo petalisque falcatis fornicatis; calcare filiformi pendulo sursum dilatato. In Zeylona. 2. Flores magni speciosi.

66. *H. praealta* Lindl. fol. ensiformibus strictis; racemo longissimo cylindrico; bracteis cucullatis ovarii longitudine; labello 3-partito laciniis linearibus aequalibus; calcare clavato ovarii longitudine. *Satyrium* Thouars orch. afr. t. 11. In Borbonia. 2.

c. *Labellum trifidum*, laciniis lateralibus dilatatis v. fissis.

67. *H. pectinata* Don; fol. oblongis lanceolatis acuminatis; racemo elongato; bracteis foliaceis; labelli 3-partiti laciniis sursum capillaceo-3-partitis, segmentis setaceis, intermedia linearis acuminata; sepalis lateralibus deflexis petalisque antice repandis pubescentibus. *Orchis pectinata* Sm. exot. Bot. t. 99. In Ind. or. 2.

68. *H. ensifolia* Lindl. fol. ensiformibus; racemo laxo brevi; labelli 3-partiti laciniis lateralibus capillaceo-multifidis, segmentis filiformibus obtusis; sepalis petalisque lanceolatis secundis glabris; calcare pendulo clavato. In Ind. or. 2.

69. *H. intermedia* Don; caule 1-5-floro; fol. ovato-oblongis acuminatis distantibus; labelli 3-partiti laciniis lateralibus capillaceo-multifidis, segmentis longissimis setaceis indivisis, sepalo supremo petalisque glabris galeatis lateralibus falcatis; calcare ascendente infracto filiformi. In Nepalia. 2.

70. *H. pubescens* Lindl. fol. radicalibus oblongis acutis; racemo elongato cylindrico axi pubescente; bracteis acuminatis pubescentibus; labelli 3-partiti lacinia intermedia linearis carnosa lateralibus apice dilatatis fissis calcare arcuato compresso. In Ind. or. 2.

71. *H. cephalotes* Lindl. fol. oblongis acuminatis; racemo oblongo denso; bracteis cucullatis acuminatis; labelli trilobi pubescentis lacinia intermedia linearis acuta lateralibus multifido-ciliatis longiore; sepalo supremo petalisque conniventibus galeatis pubescentibus, sepalis lateralibus intus tomentosis. In Ind. or. 2.

72. *H. longicornis* Lindl. fol. lanceolatis recurvis; bracteis acuminatis-simis; labelli 3-partiti lacinia intermedia linearis, lateralibus falcatis cre-natis obtusis; calcare clavato com-presso. *In Ind. or.* 2.

73. *H. ochroleuca* R. Br. fol. bre-vissimis adpressis ovato-lanceolatis acutis; racemo raro paucifloro; labelli 3-fidi lacinia intermedia compressa filiformi lateralibus lanceolatis divari-catis; sepalo supremo petalisque duplo minoribus subquadratis; calcare pen-dulo ovarium aequante. *In Nov. Holl.* 2.

B. Rostratae.

74. *H. plantaginea* Lindl. fol. ob-longis acutis v. obtusis; spica laxa secunda; labelli 3-fidi lacinia intermedia linearis-acuta, lateralibus latissimis denticulatis; calcare arcuato ovario rostrato longiore. *Orchis Roxb.* *Gymnadenia Lindl.* *In Ind. or.* 2.

75. *H. platyphylla* Spr. fol. radi-calibus orbiculatis acutis; spica densa multiflora; bracteis setaceo-acuminatis; labelli 3-dentati lacinia intermedia linearis acuta lateralibus denticulatis nanis; calcare longissimo filiformi apice incrassato. *Orchis plantaginea* Roxb. corom. t. 37. *O. Roxburghii* Pers. *In Ind. or.* 2. Flores albi fragrantes.

76. *H. crinifera* Lindl. fol. ob-longo-lanceolatis; spica densa; labello unguiculato 3-partito laciniis acumi-natissimis sepalis 4-plo longioribus; sepalo supremo petalisque galeatis; calcare adscendente clavato compresso labelli longitudine. *In Zeylona.* 2. *Labellum album.*

77. *H. trichosantha* Wall. fol. ovatis oblongis; spica brevi densa; bracteis ciliatis acuminatis; labelli 3-partiti laciniis lateralibus dentatis planis, intermedia linearis acuta; sepalis lateralibus reflexis; calcare compresso ovario longiore. *In Ind. or.* 2.

78. *H. geniculata* Don; fol. ob-longo-lanceolatis; spica cylindracea; bracteis setaceo-acuminatis; labelli 3-lobi lobis lateralibus dentatis planis intermedio linearis acuto; calcare basi infundibulari sursum cylindraceo clavato obtuso. *Platanthera geniculata* Lindl. *In Nepalia.* 2. Statura et facies O. masculae.

79. *H. longifolia* Hamilt. fol. an-gustis acuminatis; spica laxa multi-flora; labello subrotundo plano trilobo, lobis lateralibus semioblongis integris intermedio linearis acuto; sepalo supremo cum petalis in galeam agglutina-tis; calcare filiformi ovario longiore. *Gymnadenia Lindl.* *In Ind. or.* 2.

80. *H. stenopetala* Lindl. fol. ob-longo-lanceolatis acuminatis; vaginis caulis laxis acuminatissimis floribus longioribus; labello basi appendicu-lato linearis-oblongo carnoso 3-lobo, lobis acuminatis lateralibus nanis; pe-talis setaceo-linearibus; calcare fili-formi obtuso ovarii longitudine. *In Zeylona.* 2.

81. *H. commelinifolia* Wall. fol. oblongo-lanceolatis planis; spica laxa multiflora; bracteis foliaceis ciliatis; labello 3-fido, laciniis lateralibus se-taceis divaricatis intermedia linearis acuminata; sepalis lateralibus reflexis 3-angularibus; calcare filiformi ovato. *Orchis Roxb.* *In Ind. or.* 2.

82. *H. rostrata* Wall. fol. radi-calibus oblongo-lanceolatis; spica ob-longa densa; bracteis acuminatissimis ciliatis; labello 3-partito sepalis duplo longiore; laciniis filiformibus acumi-natis; sepalo supremo galeato, late-ralibus falcatis. *In Ind. or.* 2.

83. *H. linguella* Lindl. fol. ob-longo-lanceolatis erectis; spica sub-rotunda multiflora; bracteis acumi-natissimis ciliatis; labelli 3-partiti la-ciniis filiformibus intermedia deflexa lateralibus brevissimis; sepalis late-ralibus pendulis contiguis; calcare filiformi compresso-clavato ovario lon-giore. *In China.* 2. Flores aurei.

84. *H. acuifera* Wall. fol. omni-bus radicalibus anguste lanceolatis erectis; squamis caulis setaceo-acumi-natis; spica subrotunda densa; la-bello linearis 3-partito, laciniis late-ralibus subulatis sepalos supremo piano; calcare cylindrico apice obtuso in-flexo. *Platanthera Lindl.* *In Ind. or.* 2.

85. *H. densa* Wall. fol. oblongis acuminatis; spica longissima cylindracea densa; bracteis acuminatis ovarii longitudine; labello linearis ob-tuso indiviso; petalis sepalisque con-formibus ovatis acutis conniventibus; calcare clavato ventricoso. *Platanthera Lindl.* *In Nepalia.* 2.

86. II. *Sigillum* Thouars orch. afr. t. 20. fol. oblongis nervosis; bracteis brevissimis; sepalis ovatis patulis; petalis postice emarginatis; labello 5-fido laciniis linearibus nanis intermedio latioribus subfalcatis. *In Borbonia.* 2.

4647. ATE Lindl. (1835).

1. *A. virens* Lindl. *Habenaria barbata* Wight. *In Ind. or.* 2. Pedalis. Folia ovata acuminata. Racemus secundus. Flores virides galeati.

4648. BONATEA Willd. (1808).

a. Petala bipartita.

1. *B. spiciosa* Willd. fol. oblongis subundulatis; racemo paucifloro compacto; petalis bipartitis linearilanceolatis, laciniis anterioribus labello adnatis; labello 3-partito laciniis linearibus convexis undulatis apice revolutis, rostello ciliato; calcare filiformi pendulo. B. M. t. 2926. *Orchis L.* *In P. b. S.* 2.

2. *B. cirrhata* Lindl. fol. oblongilanceolatis subundulatis; racemo paucifloro; ovario longo pedunculato; laciniis petalorum setaceis anteriore longissima flexuosa; labello 3-partito laciniis setaceis; processibus carnosus capitatis galeae longitudine; calcare longissimo compresso convoluto. *In Madagascar.* 2.

3. *B. incarnata* Lindl. fol ensiformibus canaliculatis; racemo denso cylindrico; sepalis omnibus reflexis; petalorum lacinia posteriore membranacea subulata reflexa; labelli laciniis linearibus acutis; rostello subulato anthera breviore; processibus carnosus capitatis anthera brevioribus; calcare falcato. *Habenaria Lyall.* *In Madagascar.* 2.

4. *B. Bilabrella* Lindl. caule gracili; fol. linear-lanceolatis; racemo laxe oblongo; sepalis reflexis apice valde obliquis; petalis carnosis pubescentibus bipartitis, laciniis anterioribus ovatis obtusis recurvis; labelli laciniis angustissime lanceolatis intermedia filiformi; calcare falcato basi infundibulari. *Bilabrella falcicornis* Lindl. *In P. b. S.* 2.

5. *B. pratensis* Lindl. fol. angustis ensiformibus; racemo subcorymboso; floribus galeatis; petalis bipartitis, laciniis anterioribus linearibus falcatis; labelli 3-partiti laciniis aequilongis linearibus subfalcatis obtusis; processibus carnosis crassis truncatis nanis. *Orchis Salzm.* *In P. b. S.* 2. Flores lutescentes.

6. *B. flexuosa* Lindl. caule flexuoso; fol. coriaceis lanceolatis; racemo laxe paucifloro; bracteis foliaceis cucullatis ovario longipedunculato longioribus; floribus galeatis; petalis carnosis bipartitis, laciniis anterioribus linearibus reflexis; labello carnosus 3-partito, laciniis convexis linearibus obtusis; processibus rotundatis inflexis; calcare pendulo longitudine bractearum. *In Brasilia.* 2.

7. *B. pauciflora* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis acutis canaliculatis; floribus galeatis longe pedunculatis; petalis carnosis bipartitis; laciniis lateralibus reflexis linearibus acutis; labelli carnosus laciniis deflexis linearibus acutis; processibus crassis truncatis. *Orchis longicornis* Salzm. *In Brasilia.* 2.

b. Petala indivisa.

8. *B. foliosa* Lindl. caule dense folioso; racemo denso; bracteis foliaceis cucullatis; floribus galeatis; petalis oblongis obtusis sepalis duplo majoribus; labello linearis obtuso basi bidentato; processibus carnosis brevibus obovatis canaliculatis; calcare clavato ovario breviore. *Orchis Sw.* *In P. b. S.* 2.

9. *B. gracilis* Lindl. caule gracili subbifloro; fol. oblongis acutis; floribus longe pedunculatis galeatis; labello obovato tripartito laciniis indivisis intermedia linearis lateralibus dilatatis falcatis breviore; calcare longissimo compresso. *In Ind. or.* 2. Calcar 5 pol. longum.

10. *B. micrantha* Lindl. fol. oblongis succulentis; caule gracili superne aphylo; racemo laxe elongato; floribus galeatis longe pedunculatis; labello carnosus, laciniis linearibus acutis; processibus carnosis reniformibus; calcare compresso apice ucinato. *In P. b. S.* 2. Flores minimi.

4649. DIPLOMERIS Don. (1822).

1. *D. pulchella* Don nep. caule 2–3-phyllo subtrifloro; fol. ensiformibus glabris; calcare recto. Paragnathis pulchella Spr. *Diplochilus* Lindl. In Ind. or. 2. Flores nivei.

2. *D. hirsuta* Lindl. caule monophyllo 1-floro; folio oblongo hirsuto; calcare incurvo. *Diplochilus* Lindl. In Ind. or. 2. 3-poll. Bracteae magnae ciliatae.

4650. CYNORCHIS Thouars. (1822).

1. *C. uniflora* Lindl. fol. binis ensiformibus acuminatis caulis 1-flori longitudine; sepalis obtusissimis; labelli 4-lobi lobis oblongis rotundato-truncatis; calcare clavato ovarii longitudine. In Madagascar. 2.

2. *C. purpurascens* Thouars t. 15. fol. radicalibus longis lanceolatis acuminatis; caule medio 1-squamato; labelli 4-lobi lobis subaequalibus rotundato-truncatis; calcare filiformi ovarii longitudine. *Gymnadenia* A. Rich. orch. t. 6 f. 1. In Mauritio et Borbonia. 2. Flores purpurascentes.

3. *C. Boryana* Lindl. caule 1-phyllo squama unica acuminata laxevaginante; folio ovato-lanceolato acuminato; labelli 3-lobi lobis truncatis aequalibus; calcare inflato brevissimo incurvo. *Gymnadenia* Rich. orch. t. 5. In Mauritio. 2.

4. *C. flexuosa* Lindl. folio solitario oblongo 5-sulcato; caule flexuoso; labelli 3-lobi lobo medio cuneato emarginato lateralibus abbreviatis truncatis; calcare filiformi labelli longitudine. In Madagascar. 2. Caulis spithameus. Rostellum maximum 3-fidum.

5. *C. fastigiata* Lindl. B. R.t. 1996. fol. binis radicalibus oblongo-lanceolatis; racemo corymboso; labello 4-fido; laciniis aequalibus truncatis; calcare longissimo filiforme Thouars t. 13. In ins. Mauritii. 2. Flores lutei.

6. *C. triphylla* Lindl. fol. linearilanceolatis 3-costatis horizontalibus; caule corymboso; labello 4-fido laciniis aequalibus truncatis; calcare longissimo filiformi. *Cynosorchis* Thouars orch. t. 14. In Mauritio. 2.

7. *C. squamosa* Lindl. fol. 1—2 radicalibus oblongo-lanceolatis acutis racemo brevi oblongo; labello postico cuneato truncato basi bidentato; calcare gracili tereti labelli longitudine. *Amphorchis* Thouar. orch. t. 4. *Gymnadenia* Rich. t. 6. f. 2. In Mauritio et Borbonia. 2. Flores purpurascentes.

4651. TYPHIA Lindl. (1831).

1. *T. secunda* Lindl. *Orchis* Thunb. In P. b. S. 2. *Tubercula sphaerica*. Folia bina ovalia. Caulis palmaris nudus. Racemi secundi 2 poll. longi.

4652. BUCCULINA Lindl. (1839).

1. *B. . . .* Lindl. In P. b. S. 2. Herba acaulis radicibus testiculatis; fol. orbiculatis horizontalibus; scapo evaginato glabriusculo.

4653. ARNOTTIA Rich. (1817).

1. *A. mauritiana* A. Rich. orch. t. 7. f. 1. In Borbonia. 2. Herba terrestris radice tuberculata; caule 1-phyllo, floribus spicatis densis purpurascentibus.

4654. STENOGLOTTIS Lindl. (1839).

1. *S. . . .* Lindl. In P. b. S. 2. Herba radicibus fasciculatis; fol. rosulatis; scapo vaginato.

4655. BARTHOLINA R. Br. (1822).

1. *B. pectinata* R. Br. *B. Burmanniana* Ker in Brandes journ. 4. t. 5. f. 2. *Orchis* Sw. in Web. et Mohr Arch. t. 3. In P. b. S. 2. Folium reniforme pilosum, caulis palmaris 1-florus fuscus. Petala albo-violacea. Labellum 1 unc. latum medio viride, lacinia multifida.

4656. BICORNELLA Lindl. (1831).

1. *B. gracilis* Lindl. fol. brevibus ensiformibus; petalis sepalis aequali-

bus; ovario scabro; appendicibus rostellii spathulatis obtusis. In Madagascar. 4.

2. *B. longifolia* Lindl. fol. lineariformibus; petalis sepalo minoribus; ovario glabro; appendicibus ova-tis obtusis. In Madagascar. 4.

4657. SATYRIUM Sw. (1800).

a. Longicalcarata; bracteis sub anthesi erectis v. patulis.

1. *S. membranaceum* Sw. fol. magnis orbiculatis; spica subdensa; bracteis membranaceis demum reflexis; sepalis lateralibus linear-oblongis 3-nerviis, medio infra medium 3-venio; petalis undulatis margine laceris; labello galeato apice serrato; calcaribus longissimis. In P. b. S. 4.

2. *S. longicollis* Lindl. fol. ovato-subrotundis; vaginis caulis imbricatis; spica elongata conica; perianthio arcte connato; sepalis linear-oblongis petalisque linearibus carinatis; labello oblongo. In P. b. S.

3. *S. carneum* R. Br. fol. binis orbiculatis carnosis; vaginis caulis coriaceis; spica densa oblonga; bracteis maximis ciliatis; sepalis obtusis; petalis obovatis acuminatis obtusis; labello galeato reflexo; calcaribus deflexis ovario aequalibus. B. M. t. 1512. In P. b. S. 4. Flores maximi albi carneo suffusi.

4. *S. parviflorum* Sw. fol. ovato-lanceolatis, caulinis inflatis acumina-tis; spica cylindrica; sepalis ovatis patentibus intermedio petalisque linear-lanceolatis apice canaliculatis; labello galeato acumine reflexo; calcaribus subulatis ovario longioribus. Orchis bicornis Jacq. h. Schoenbr. t. 179. In P. b. S. 4.

5. *S. stenopetalum* Lindl. fol. ?; vaginis caulis oblongis concavis erectis; spica laxa multiflora; sepalis latera-libus linearibus obtusis concavis car-nosis intermedio linearis patente; petalis linearibus carnosis revolutis; labello apice reflexo marginibus carno-sis; calcaribus longissimis. In P. b. S. 4.

6. *S. foliosum* Sw. fol. oblongo-lanceolatis cincinnatis caulis fere lon-gitudine; spica densa obtusa; bracteis ovalibus; sepalis intermedio decurvo; petalis linearibus obtusis; calcaribus

filiformibus pendulis ovario longioribus. In P. b. S. 4. Flores parvi pallide purpurascentes.

7. *S. sphaerocarpum* Lindl. fol. ovato-oblongis; spica elongata; sepalis labello longe adnatis intermedio linearis; petalis linearibus supra pubescentibus; calcaribus subulatis ova-rio aequalibus. In P. b. S. 4.

8. *S. amoenum* A. Rich. fol. binis oblongis acutis; spica oblonga; bracteis acutis floribus deflexis longioribus; sepalis ovalibus; petalis conformibus minoribus; labello galeato; calcaribus crassis cylindricis ovario longioribus. Diplectrum Thouars orch. afr. t. 22. In Borbonia. 4.

b. Longicalcarata; bracteae subanthesi reflexae.

9. *S. longicauda* Lindl. fol. lanceolatis acuminatis cauli adpressis; spica oblonga densa; bracteis ciliatis reflexis, sepalis petalisque linearibus ciliatis pubescens recurvis; labello criso tomentoso; calcaribus filiformi-bus longissimis. In P. b. S. 4.

10. *S. macrophyllum* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis; spica oblonga angusta; bracteis acutissimis reflexis; perianthio infundibulari; sepalis petalisque linearibus cum labello fornicato dorso carinato ultra medium connatis; calcaribus ovario aptero longioribus. In P. b. S. 4. 2-ped. Fol. 9—10 poll. longa.

11. *S. rostratum* Lindl. fol. ovato-lanceolatis; spica laxa oblonga; bracteis ovatis ciliato-scabris reflexis; sepalis intermedio petalisque linearibus adscendentibus lateralibus deflexis; labello rostrato cum sepalis alte connato; calcaribus longissimis. In Ma-dagascar. 4.

12. *S. gracile* Lindl. fol. radica-libus ovalibus acutis; caule gracili; spica gracili; bracteis linear-lanceo-latis reflexis; sepalis linearibus basi angustatis, petalis adscendentibus angustioribus; labello acuminato apice crispulo intus pubescente; calcaribus filiformibus ovario multo longioribus. In Madagascar. 4.

13. *S. tupulinum* Lindl. fol. oblon-gis acutis; spica elongata densa bra-cteis ovatis herbaceis reflexis foliata; sepalis revolutis obtusis; petalis se-mirhomboideis apice reflexis crispis;

labello galeato apice reflexo; calcaribus filiformibus pendulis. In P. b. S. 4.

14. *S. cucullatum* Thunb. fol. orbiculatis ciliato-scabris; vaginis inflatis furfuraceo-ciliatis; bracteis concavis reflexis; sepalio intermedio linearis obtuso, petalis carnosus conformibus longiore, lateralibus basi alte connatis; labello carnosus cristato; calcaribus pendulis ovario longioribus. B. R. t. 416. *Orchis bicornis* Andr. rep. t. 315. In P. b. S. 4. Flores virides.

15. *S. candidum* Lindl. fol. binis subrotundo-ovatis glabris; vaginis caulis utriculatis inflatis margine pellucidis; bracteis acutis reflexis; sepalis linearibus obtusis; petalis minoribus apice recurvis; labello inflato apice reflexo; calcaribus pendulis ovario longioribus. In P. b. S. 4. Flores albi.

16. *S. acuminatum* Lindl. fol. binis cordato-ovatis undulatis; spica tenui; bracteis ovatis reflexis; sepalis petalisque ovalibus obtusis; labello apice obtuso carnosus crispus; calcaribus pendulis ovario longioribus. In P. b. S. 4. Flores candidi.

17. *S. humile* Lindl. fol. ovato-oblongis; vaginis caulis cucullatis; spica laxa (6-flora) bracteis deflexis; sepalis cum labello alte connatis oblongis; petalis linearibus obtusis apice recurvis; labello recurvo carnosus obtuso; calcaribus filiformibus ovario longioribus. In P. b. S. 4.

18. *S. densiflorum* Lindl. fol. oblongis; spica ovata elongata densissima; bracteis acutissimis reflexis flore longioribus; sepalis lateralibus oblongis obtusis recurvis intermedio multo minore linearis; petalis retusis; labello carnosus apice rotundato crenato reflexo dorso costato; calcaribus filiformibus pendulis ovarii longitudine. In P. b. S. 4.

19. *S. nepalense* Don. fol. oblongo-lanceolatis acutis; spica laxa multiflora; bracteis ovatis reflexis longitudine florum; sepalis lateralibus oblongis petalisque linearibus glabris; labello galeato dorso cristato; calcaribus filiformibus ovario longioribus. In Ind. or. 4. Flores rosei.

c. *Brevicalcarata*; bracteae sub anthesi erectae, v. reflexae v. patulae.

20. *S. Wightianum* Lindl. fol. oblongis coriaceis acutis; spica oblonga densa; bracteis ovalibus reflexis florum longitudine; sepalis lateralibus oblongis intermedio linearis obtuso petalis linearibus breviore omnibus glabriusculis; labello galeato apiculato acuto cristato; calcaribus filiformibus ovario multo brevioribus. In Ind. or. 4.

21. *S. erectum* Thunb. fol. oblongis obtusis coriaceis margine cartilagineis scabris sensim in vaginas convolutis imbricatis mutatis; spica multiflora; bracteis concavis reflexis floribus longioribus; sepalis oblongis petalisque linearibus acutis; labello oblongo galeato; calcaribus filiformibus ovario brevioribus. In P. b. S. 4. 1—2-ped. Flores aurantiaci.

22. *S. papillosum* Lindl. in Bauer ill. t. 14. fol. binis radicalibus cordato-orbicularis papillosis; spica oblonga obtusa; sepalis recurvis obtusis petalisque conformibus minoribus patulis; labello acuto margine revoluto dorso cristato apice subcrispo recurvo omnibus alte connatis; calcaribus ovario paulo longioribus. In P. b. S. 4. Flores carnei.

23. *S. cassideum* Lindl. fol. binis radicalibus ovato-subrotundis; spica laxa multiflora; bracteis acuminatis reflexis; sepalis concavis obtusis, petalis minoribus obovatis erectis, omnibus labello carnosus galeato rotundato margine revoluto brevioribus. In P. b. S. 4.

24. *S. coniosolium* Sw. fol. oblongo-lanceolatis acutis coriaceis margine scabriusculis; vaginis 2—3 coriaceis; bracteis ovatis acutis reflexis florum longitudine; sepalis petalisque linearibus obtusis glabris labello maximo orbiculari brevioribus; calcaribus cylindricis intus barbatis. *S. cucullatum* Lodd. B. Cab. t. 104. In P. b. S. 4. Flores vitellini.

25. *S. ciliatum* Lindl. fol. ovato-lanceolatis; spica ovali imbricata; bracteis demum reflexis floribus duplo longioribus; sepalis linearibus obtusis petalisque angustioribus ciliatis; calcaribus conicis ovario parum longioribus. In *Nepalia*. 4.

26. *S. tigulatum* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis undulatis erectis; spica angusta multiflora; bracteis reflexis floribus paulo longioribus; sepalis petalisque adscendentibus in acumen longum lineare obtusum membranaceum angustatis; labello linguaformi; calcaribus decurvis. In P. b. S. 4.

27. *S. militare* Lindl. fol. ovalibus carnosis; spica longa dense cylindrica; bracteis reflexis floribus longioribus; sepalis oblongis petalisque linearibus obtusis cum labello alte connatis deflexis; labello obtuso dorso vena alata cristato; calcaribus ovario brevioribus. In P. b. S. 4.

28. *S. eriostomum* Lindl. fol. oblongis acutis; spica elongata laxa; bracteis ovato-lanceolatis reflexis floribus longioribus; sepalis lateralibus semiorbiculatis glabris petalisque linearibus tomentosis; labello carnosus cristato inflato; calcaribus carnosis deflexis ovario sublongioribus. In P. b. S. 4.

d. *Saccata*; *bracteae patulae*
v. *reflexae*.

29. *S. bracteatum* Thunb. fol. ovatis amplexicaulibus 3-nerviis caulem rectum pubescentem vestientibus; spica densa; bracteis rotundato-ovatis acuminatissimis; sepalis carnosis concavis patentissimis intermedio pendulo membranaceo petalisque anguste linearibus acutissimis; labello pubescente; columna sessili. In P. b. S. 4.

30. *S. retusum* Lindl. fol. ovato-oblongis cordatis superioribus ovatis; spica densa elongata; sepalis lateralibus erectis oblongis obtusis, petalis linearibus multo minoribus; labello ventricoso apice depresso retuso; calcaribus 2 retrorsis cylindricis ovario multo brevioribus. In P. b. S. 4.

31. *S. bicallousum* Thunb. fol. ovatis amplexicaulibus obtusis longitudine caulis spica densa; bracteis setaceo-acuminatis floribus multo longioribus; sepalis lateralibus oblongis; petalis acutis; labello ventricoso acuto apice depresso inflexo glabro basi bisaccato. In P. b. S. 4.

32. *S. lineatum* Lindl. fol. ovatis amplexicaulibus; caule flexuoso; spica densa elongata; sepalis petalisque secundis linearibus obtusissimis latera-

libus falcatis; galea ovata acuta glandulosa carinata basi bisaccata margine pubescente venis 3 elevatis scabris aliisque immersis abbreviatis striata; stigmate villoso. *S. bracteatum* Ker in Brandes jour. 8. t. 3. f. 1. In P. b. S. 4.

33. *S. pictum* Lindl. folio infimo oblongo-subrotundo, superioribus ovalibus basi caulem vaginantibus; spica angusta; bracteis ovatis patentissimis floribus longioribus; sepalis petalisque linearibus obtusis 1-veniis galea glabra striata acuminata ecarinata apice ciliata; calcaribus gibbis brevissimis. In P. b. S. 4.

34. *S. cordifolium* Lindl. folio subrotundo-cordato acuto caulis longitudo; spica oblonga nutante; bracteis cordatis acuminatissimis densissimis reflexis ciliatis floribus multo longioribus; sepalis lateralibus falcatis; labello glabro basi bisaccato; stigmatis labio galeae proximo bidentato. In P. b. S. 4.

35. *S. nuticum* Lindl. fol. cordato-orbiculatis; spica oblonga; bracteis oblongis concavis reflexis floribus longioribus sepalis integerrimis papillosum longioribus lateralibus falcatis; petalis spatulatis pubescentibus crispis lacerisque cum sepalis alte connatis; labello oblongo ecalcarato criso. In P. b. S. 4.

36. *S. trinerve* Lindl. fol. caulinis anguste lanceolatis carinatis trinerviis obtusis; spica densa ovata angulis omnibus scabris; sepalis lateralibus linearibus petalis et intermedio duplo majoribus; labello apice obtuso basi bisaccato; ovario tomentoso. In Madagascar. 4.

37. *S. striatum* Thunb. fol. ovatis cucullatis; floribus spicatis; bracteis rhombeis erectis galea excisa; calcaribus brevibus ovatis. In P. b. S. 4. Galea latissima.

4658. DISA L. (1767).

a. *Antherae erectae*.

1. *Macranthae*.

1. *D. grandiflora* L. caule folioso subbifloro; fol. lanceolatis acutis; sepalis oblongis acuminatis; galea cucullata obtusa v. acuta; calcare co-

nico pendulo; petalis semilanceolatis denticulatis; labello linear-lanceolato. B. R. t. 926. In P. b. S. 4. Flores 4 - 5 unc. in diametro rubri.

2. *D. secunda* Sw. fol. radicalibus ensiformibus; caule nudo distanter vaginato; floribus distantibus secundis; sepalis oblongis mucronatis; galea conformi infra medium dorsi saccato; petalis oblongis acutis; labello filiformi sepalis duplo breviore. In P. b. S. 4. Flores magui purpurei.

3. *D. crassicornis* Lindl. fol. ovato-oblongis acutis; spica rara pauciflora; sepalis lateralibus oblongis sub apice mucronatis; galea minore longe infundibulari; petalis reflexis labelloque lanceolatis. In P. b. S. 4. Galea cum calcare bipollucaris.

2. Micranthae.

4. *D. incarnata* Lindl. caule folioso; fol. linearibus caulinis latioribus adpressis acutis; spica ovata; sepalis oblongis obtusis; galea convexa obtusa medio calcare pendulo clavato ipsa longiore aucta; petalis orbiculatis dimidiatis; labello filiformi sepalis breviore. In Madagascar. 4. Spica pyramidalis 2-poll. in cauli pedali.

5. *D. gracilis* Lindl. fol. ensiformibus erectis; vaginis laxis acutis; spica gracili multiflora; bracteis oblongis acutis; sepalis oblongis obtusis coriaceis; galea infra medium in calcar carnosum inflatum pendulum producta; petalis obovatis emarginatis. In P. b. S. 4.

6. *D. chrysostachya* Sw. caule folioso; fol. erectis lanceolatis; spica longissima densissima cylindrica; bracteis oblongis acutis; sepalis oblongis obtusis coriaceis; galea infra medium in calcar carnosum inflatum pendulum producta; petalis obovatis apiculatis; labello linear. In P. b. S. 4.

7. *D. polygonoides* Lindl. caule basi folioso apice vaginato; fol. linear-lanceolatis caule parum brevioribus; spica densa ovato-cylindrica; sepalis petalisque oblongis obtusis; galea obtusa infra medium dorsi in calcar tenui clavatum ipsa paulo longius producta; labello linear. In P. b. S. 4. Flores parvi rosei.

b. *Anthera supina*.

1. *Galea incumbens postica calcarata*. *Petala falcata*. *Flores spicati*.

8. *D. cornuta* Sw. fol. lanceolatis erectis basi cucullatis; sepalis oblongis apiculatis; galea orbiculata; petalis basi auriculatis; labello nano oblongo obtuso velutino. In P. b. S. 4. *Labellum atropurpureum*.

9. *D. macrantha* Thunb. galea acuta erecta; calcare conico porrecto; petalis interioribus retusis; labello oblongo acuto crenato. In P. b. S. 4.

10. *D. longifolia* Lindl. fol. linearibus erectis caule longioribus; spica oblonga foliosa; bracteis longissimis; sepalis linearibus obtusis intus pubescentibus; galea fornicata acuta pubescente; petalis auriculatis emarginatis; labello linearis pubescente. In P. b. S. 4.

2. *Galea infundibularis recurva*. *Petala supina 1-dentata*.

11. *D. longicornis* Lindl. fol. oblongis; caule 1-floro apice folioso; petalis sublinearibus apice attenuatis obtusis a latere exteriore dente obtuso magno decurrente auctis. In P. b. S. 4. *Flos caeruleus*.

3. *Galea antica horizontalis*. *Petala lobata auriculaeformia*.

12. *D. fasciata* Lindl. caule fol. squamaeformibus cuspidatis vaginato; floribus solitariis geminise; sepalis oblongis obtusis; labello oblongo concavo. In P. b. S. 4. Flores pallidi bracteis semiimmersi.

4. *Galea antica saccata*. *Petala falcata apice callosa*.

13. *D. rosea* Lindl. fol. radicalibus ovato-oblongis obtusis; caule subflexuoso; floribus corymbosis; petalis contortis subdentatis subemarginatis labello utrinque angulato. In P. b. S. 4.

5. *Galea erecta basi infundibularis v. saccata*. *Labellum filiforme v. acuminatam*. *Petala erecta*. *Flores saepe corymbosi*.

14. *D. sagittalis* Sw. fol. obtusis margine revolutis, racemo corymboso; sepalis anguste oblongis acutis; galea

sagittata pubescente basi acuta conica; petalis a lata basi abrupte acuminate pubescentibus. *Orchis L.* In P. b. S. 4.

15. *D. attenuata* Lindi. fol. oblongis basi angustis obtusis; galea apice hastata pubescente basi conica pendula; petalis villosis; labello linearie obtuso basi angustato. In P. b. S. 4.

16. *D. triloba* Lindl. fol. caulinis 4 acutis appressis; corymbo denso; bracteis oblongis acutis ovarii longitidine; sepalis lanceolatis acutis; galea obovata apice subtriloba; petalis linearibus obtusis basi hinc dilatatis. In P. b. S. 4.

17. *D. glandulosa* Burch. glanduloso-pubescentis; fol. radicalibus parvis subrotundo-ovatis; floribus 5—6 dense corymbosis; sepalis concavis ovatis galea basi in calcar late conicum ipsius longitidine producta; petalis subfalcatis labelloque apiculatis. In P. b. S. 4.

18. *D. venosa* Sw. fol. lanceolatis glaucis; racemo laxo; bracteis ovatis acutis ovario duplo brevioribus; sepalis oblongis obtusis venosis; galea patula dorso obtuse conica; petalis oblongis obtusis labello linearie sepalis breviore. In P. b. S. 4.

19. *D. caulescens* Lindl. caule gracili folioso adscendente; fol. linearibus; racemo laxo flexuoso; sepalis oblongis angustis sub apice mucronulatis; galea pendula basi conica acuta; petalis subrotundo-cuneatis apice denticulatis; lamello filiformi. In P. b. S. 4.

20. *D. nerrosa* Lindl. caule rigido stricto; fol. ensiformibus acutatis; racemo denso ovato; sepalis oblongis erectis obtusis sub apice acute et late carinatis; galea basi in calcar filiforme producta; petalis linearibus subfalcatis apice truncatis denticulatis; labello linearie. In P. b. S. 4.

21. *D. Draconis* Sw. fol. radicibus angustis recurvis; racemo oblongo laxo; sepalis elongatis acutis; galea apice obtusa calcare longissimo subulato; petalis acuminate retusis sepalis paulo brevioribus. *Orchis L.* In P. b. S. 4. *Galea alba.* Sepala flavo-alba. Petala purpureo-marginata et striata. *Labellum album.*

6. *Galea erecta v. infundibularis.* *Labellum apice dilatatum lobatum,* *Petala supina falcata basibus productis.*

22. *D. gladioliflora* Burch. fol. ?; caule gracili; vaginis angustis distantibus herbaceis setaceis; racemo 9—10-floro; ovario gracillimo; sepalis linearibus apice latioribus; galea subdentata basi in cornu arcuatam producta; labello apice 3-dentato. In P. b. S. 4.

7. *Galea incumbens infundibularis.* *Labellum oblongum.* *Petala supina falcata libera.* *Folia setacea.*

23. *D. porrecta* Sw. fol. radicali basi lanatis; caule stricto; spica ovato-oblonga; sepalis infra apicem cirrhosis. Ker in Brandes Journ. 8. t. f. 1. In P. b. S. 4.

8. *Galea incumbens calcarata.* *Labellum tacerum sessile v. unguiculatum.* *Folia angustissima.*

24. *D. spathulata* Sw. caule stricto bifloro fol. angustissimis rigidis subfalcatis; sepalis ovatis apice inflexis acuminate tortis; galea ovata incumbente crenulata; calcare intus villoso; labello subrotundo-cordato trilobo crenato longe unguiculato; petalis supinis falcatis bipartitis serratis basi auriculatis. In P. b. S. 4.

25. *D. tripartita* Lindl. fol. angustissimis striatis falcatis apice latioribus; sepalis ovatis apice inflexis; galea ovata incumbente obsolete crenata calcare brevissimo recto obtuso supra basi aucta laciniis linearibus, intermedia longissima; petalis supinis bidentatis. In P. b. S. 4.

26. *D. multifida* Lindl. fol. filiformibus rigidis striatis; caule gracili calamiformi; floribus paucis secundis; sepalis ovatis patulis rectis apice mucronatis; galea acuta basi conica ovario duplo longiore; labello multifido. In P. b. S. 4.

27. *D. barbata* Sw. fol. angustissimis rigidis; caule calamiformi; floribus secundis racemosis; sepalis acutis ovatis patulis; galea subrotunda ovata acuta postice breve calcarata; petalis geniculatis apice oblique dilatatis 4—5-dentatis; labello multipartito. *Orchis L.* In P. b. S. 4.

28. *D. lacera* Sw. fol. filiformibus rigidis contortis striatis; caulis vaginis adpressis acutissimis; floribus subsecundis racemosis; sepalis oblongis cum acumine; galea in calcar conicum ovario duplo brevius producta; petalis falcatis obtusis; labello sessili apice fimbriato. *Satyrium hians* L. In P. b. S. 2.

29. *D. bracteata* Sw. caule folioso; fol. lanceolatis; spica multi-flora laxa; bracteis acuminatis foliaceis ovarii longitndine; sepalis reflexis ovato-lanceolatis acutis; galea ovali obtusa in calcar breve producta; petalis linear-lanceolatis obtusis basi obliquis cordatis; labello linear obtuso. In P. b. S. 2. Flores parvi virides galea fusca.

30. *D. tenuis* Lindl. fol. setaceis caule distanter vaginato multo brevioribus; spica laxa angulata flexuosa; bracteis setaceo-acuminatis; sepalis ovatis mucronatis; galea erecta conica adscendente; petalis linearibus subfalcatis obtusis basi auriculatis; labello filiformi. In P. b. S. 2.

31. *D. tenella* Thunb. fol. filiformibus flexuosis; spica densa; bracteis apice foliaceis; calcare sepolorum longitudine; labello spathulato; petalis acutis. *Orchis* L. In P. b. S. 2. Flores rubri.

32. *D. brachyceras* Lindl. fol. elata basi filiformibus flexuosis; spica densa; bracteis apice foliaceis calcare brevi conico acuto; labello linear; petalis acuminatis. In P. b. S. 2. Petala rhomboidea.

33. *D. obtusa* Lindl. fol. linear-lanceolatis; spica densa; bracteis concavis florum longitudine; calcare brevissimo obtuso; labello linear membranaceo sepalsique lateralibus supremo multo brevioribus; petalis minimis linearibus subfalcatis basi in dentem obtusum productis. In P. b. S. 2.

34. *D. bifida* Thunb. floribus secundis; calcare unguiculari apice bifido; sepalis oblongis obtusis. In P. b. S. 2.

35. *D. ferruginea* Thunb. vaginis cuspidatis; floribus in spica pollicari resupinatis; galea fornicata calcare saccato basi ampliore; sepalis setaceo-cuspidatis. In P. b. S. 2.

36. *D. cernua* Thunb. fol. carinatis rigidis subcoriacis; spica pedali

apice cernua densa; calcare inflato venoso; petalis falcatis venosis; labello linear obtuso. In P. b. S. 2.

37. *D. physodes* Thunb. fol. equitantibus; spica pedalii apice cernua; calcare gibbo subdidymo dependent; sepalis ovatis obtusis reflexis; petalis linearibus apice emarginatis saturate purpureis; labello linear. In P. b. S. 2.

38. *D. cylindrica* Thunb. fol. virginantibus; spica cylindrica; floribus minutis numerosissimis; sepalis ovato-lanceolatis acutis; petalis lanceolatis; labello linear-oblongo apice obovato. In P. b. S. 2.

39. *D. excelsa* Sw. fol. lanceolatis acutis erectis; scapo filiformi 2-pedali; spica 20—30-flora; calcare brevissimo obtuso; petalis minimis falcatis; labello integro emarginato. In P. b. S. 2.

4659. SERAPIAS Sw. (1800).

1. *S. cordigera* L. labello cordato-ovato glandulos-pilos; floribus congestis bractearum longitudine. Fl. graec. t. 1932. B. Rep. t. 475 In Europ. austr. 2. Cor. atrorubens.

2. *S. lingua* L. labello ovato-lanceolato basi pubescente; bracteis floribus brevioribus. Hook. exot. fl. t. 11. B. Cab. t. 655. Fl. graec. t. 931. In Europ. austr. 2. Flores brunneo-purpurascens, labellum incarnatum.

3. *S. longipetala* Rchb. labello ovato-lanceolato acuminato basi glandulos-pilos; bracteis floribus longioribus. *S. cordigera* B. R. t. 1189. In Europa austr. 2. Flores rubro-violacei, labellum pilosum.

4. *S. epiglottis* Willd. labello linear-lanceolato acuminato glabriuscule; sepalis acuminatissimis; bracteis acuminatis floribus longioribus. In Algeria. 2.

5. *S. triloba* Viv. fragm. t. 12. f. 1. labelli lobis subaequalibus omnibus exsertis rotundatis undulato-crenatis. Prope Genuam. 2. Petala rubra. Labellum atropurpureum.

4660. SATYRIDIUM Lindt. (1838).

1. *S. rostratum* Lindl. In P. b. S. 2. Planta spithamea habitu Orchidis, glaberrima. Folia anguste lanceolata. Flores spicati albi purpureo suffusi.

4661. AVICEPS Lindl. (1839).

1. *A. pumila* Lindl. Satyrium Sw. In Pr. b. Sp. 2. Herba foliosa radicibus testiculatis. Flores ringentes, axillares inter folia abditi.

4662. MONADENIA Lindl. (1839).

1. *M. rufescens* Lindl. fol. radicibus 2 oblongis; caule vaginato; bracteis oblongis acutis floribus multo brevioribus; calcare linearis pendulo sepalis multo longiore. Satyrium Thunb. Disa Sw. In P. b. S. 2.

2. *M. brevicornis* Lindl. fol. ensiformibus acuminatis caulem vestientibus; bracteis oblongis acuminatis; floribus longioribus; calcare inflato compresso sepalis vix longiore. In P. b. S. 2.

3. *M. micrantha* Lindl. fol. ensiformibus acuminatis caulem vestientibus; bracteis apice foliosis longe acuminatis; sepalis petalisque acutis; calcare filiformi obtuso sepalis longiore. In P. b. S. 2.

4. *M. densiflora* Lindl. fol. erectis lanceolatis canaliculatis acutis caulis longitudine; spica densa cylindrica; sepalis lateralibus oblongis; calcare pendulo filiformi antice alato; petalis subtortis apice carnosus; labello linearis - spathulato carnosus. In P. b. S. 2.

5. *M. macrostachya* Lindl. fol. lanceolatis longitudine caulis; spica elongata; sepalis lanceolatis acutis; calcare inflato pendulo semicylindraceo; petalis oblongis obtusis; labello linearis obtuso sepalorum longitudine. In P. b. S. 2.

6. *M. macrocera* Lindl. fol. paucis ensiformibus canaliculatis; spica strictissima; bracteis ovario brevissimo brevioribus; sepalis ovatis acutis; calcare longissimo filiformi pendulo; petalis labelloque pendulo ovatis acutis. In P. b. S. 2.

7. *M. ophrydea* Lindl. caule flexuoso; fol. linearibus patulis; spica 4-flora; floribus longe distantibus; sepalis oblongis supremo obtusissimo; calcare filiformi ovarii longitudine; petalis oblongis obtusissimis. In P. b. S. 2. Flores maximi generis.

8. *S. prasinata* Lindl. fol. ensiformibus imbricatis; spica ovata densa; sepalis lateralibus linearis-oblongis ob-

tus supremo cuneato fornicate; petalis lanceolatis apice obliquis obtusis supra basin punctulatis. Disa B. R. t. 210. In P. b. S. 2.

4663. SCHIZODIUM Lindl. (1839).

1. *S. flexuosum* Lindl. sepalis subrotundo-oblongis obtusis venosis superiore apiculato; calcare brevi inflexo; petalis integris basi dilatatis apice linearibus carnosus galeae longitudine; labello acuminato criso. Orchis L. In P. b. S. 2. Flores crocei.

2. *S. arcuatum* Lindl. sepalis acuminatissimis arcuatis; calcare adscendente filiformi; petalis duplo brevioribus lobo altero linearis auricula baseos linearis rotundata integerrima; labello glabro epichilio filiformi basi rhomboe concavo marginibus inflexis. In P. b. S. 2.

3. *S. longipetatum* Lindl. sepalis acutissimis canaliculatis arcuatis lateralibus longioribus; calcare adscendente filiformi; petalis sepalis supremo aequalibus lobo altero linearis basi exauriculatis; labello glabro filiformi basi dilatato. In P. b. S. 2.

4. *S. obtusatum* Lindl. sepalis linearibus obtusis, calcare adscendente apice retuso; petalis brevissimis pubescentibus oblique truncatis auricula baseos adnata rotundata glabra; labello pubescente. In P. b. S. 2. Flores pallidi maculati.

5. *S. obliquum* Lindl. sepalis linearibus acutis lateralibus longioribus; calcare horizontali filiformi obtuso; petalis brevissimis bidentatis auricula baseos semilibera rotunda subserrata. In P. b. S. 2.

6. *S. clavigerum* Lindl. sepalis petalique ovato-lanceolatis acutis planis calcare clavato adscendente; petalis bidentatis sepalis duplo brevioribus dente altero rotundata basi oblique tortis auricula semilibera integerrima; labello filiformi recto carnosus basi linearis membranaceo sepalis longiore. In P. b. S. 2. Flores omnium minimi.

7. *S. rigidum* Lindl. caule basi tantum flexuoso; petalis linearibus acutis, bidentatis sepalis brevioribus; epichilio dimidia inferiore oblonga membranacea adscendente superiore car-

nosa tereti reflexa. In P. b. S. 4.
Flores maximi.

8. *S. inflexum* Lindl. fol. obovatis longe petiolatis; caule unifloro vaginis acutis arte adpressis; sepalis oblongo-linearibus obtusis calcare conico elongato; petalis oblique tortis apice rostratis emarginatis carnosis basi obsolete auriculatis; epichilio concavo apice carnosus abrupte rostrato. Disa Mundt. In P. b. S. 4.

9. *S. maculatum* Lindl. caule unifloro vaginis caulis obtusis laxis; sepalis lateralibus oblongo-linearibus, intermedio dorso conico; petalis linearibus; labello lanceolato obtuso. Disa L. In P. b. S. 4. Flos caeruleus.

4664. PTERIGODIUM Sw. (1800).

1. *P. platypetalum* Lindl. caule tenui 1—2-phyllo; fol. linearibus; floribus subsolitariis; petalis latissimis truncatis; labello minimo trilobo, lobis lateralibus integerrimis intermedio acuto appendice triloba margine integrata. In P. b. S. 4.

2. *P. catholicum* Sw. caule subdiphylo; fol. oblongis obtusis; floribus geminis v. racemosis petalis cordatis rotundatis; labello minimo ovato acuto crispo appendice acuminata supradentes sulcata et serrata. Brandes journ. 6. t. 1. f. 3. Ophrys L. In P. b. S. 4.

3. *P. acutifolium* Lindl. caule subdiphylo; fol. oblongis acutissimis; floribus racemosis; petalis hinc rectiusculis inde rotundatis cordatis; labello minimo ovato acuto undulato appendice acuminata integerrima apice sulcata. In P. b. S. 4.

4. *P. alatum* Sw. caule folioso; fol. canaliculatis acutis; floribus dense racemosis; petalis hinc rectiusculis inde rotundatis; labello dilatato 3-lobo lacinii lateralibus crenatis intermedia minima acuta, appendice carnosa obtusa repanda infra apicem bifoveata. Brandes l. c. t. 3. f. 2. In P. b. S. 4.

5. *P. caffrum* Sw. caule folioso; fol. inferioribus ovato-oblongis cuneatis; floribus racemosis; petalis cuneatis hinc rectis inde rotundatis; labello dilatato bilobo, lacinii rotundatis integerrimis mucronulo interjecto, appendice oblonga sub apice excavata. Ophrys Thunb. In P. b. S. 4.

6. *P. carnosum* Lindl. caule folioso; fol. canaliculatis subdistichis eusiformibus acuminatissimis; floribus dense spicatis carnosis; petalis obovatis pubescentibus concavis cum sepalō intermedio galeam formantibus; sepalis lateralibus late ovatis obtusis; labello transverse emarginato appendice uncinata. In P. b. S. 4.

7. *P. renosum* Lindl. fol. linearilanceolatis convolutis caulem vestientibus; spica densa cylindrica; sepalis ovatis concavis aequalibus; petalis cuneatis serratis; labello subrotundo-cordato serrato, appendice minimo labello adnato, rostello bialato alis reflexis. In P. b. S. 4.

8. *P. inversum* Sw. fol. subdistichis lanceolato-ensiformibus; floribus dense spicatis; petalis inversis oblongis hinc rectiusculis; labello parvo unguiculato rotundato postico, appendice linguaformi erecta emarginata antice bilamellata. Brandes journ. 6. t. 4. f. 1. In P. b. S. 4. 2-pedalis.

4665. CORYCIUM Sw. (1800).

1. *C. crispum* Sw. fol. undulatis margine crispis; spica laxiuscula; petalis truncatis saccatis cum sepalō agglutinati; labello obovato retuso basi nudo. Arethusa Thunb. Buxb. cent. 3. t. 11. In P. b. S. 4.

2. *C. excisum* Lindl. fol. linearibus convolutis basi dilatatis; spica densa elongata; petalis truncatis concavis inflexis; labello longo unguiculato bilobo basi carnoso appendice cordata subrotunda emarginata. In P. b. S. 4.

3. *C. bicolor* Sw. fol. margine crispatis; spica densissima cylindrica; petalis ovatis concavis versus sepaliū supremum tortis; labello bilobo sessili appendice cordato-ovata subitus carinata. Ophrys Thunb. In P. b. S. 4.

4. *C. microglossum* Lindl. fol. e basi latissima vaginante in acumen productis; spica oblonga; petalis liberis cuneato-subrotundis concavis pubescentibus; labello linearilanceolato integerrimo appendice ovata emarginata. In P. b. S. 4.

5. *C. orobanchoides* Sw. fol. ensiformibus carinatis; spica cylindrica v. ovali densiflora; petalis saccatis cum

sepalo intermedio agglutinatis; labello deflexo biloba, appendice reflexo bipartito laciniis acuminatis. Brandes journ. 8. t. 3. f. 3. *Satyrium L.* In P. b. S. 4.

6. *C. vestitum* Sw. fol. oblongis venoso-reticulatis; spica cylindrica densa; sepalo supremo angusto concavo apice latiore exciso cum petalis ovatis ventricoso saccatis cohaerente, appendice reflexa bipartita, laciniis deflexis. *Ophrys volucris* Thunb. In P. b. S. 4.

4666. CHAMAEREPES Spr. (1827).

1. *C. alpina* Spr. est *Herminium alpinum* p. 138.

4667. OPHRYS Sw. (1800).

a. *Muticae. Labello basi mutico.*

1. *O. vespifera* Willd. labello mutico glaberrimo trilobo; lobis rotundatis medio emarginato; caule paucifloro. *O. insectifera* d. glaberrima Desf. In *Barbaria*. 4.

2. *O. lutea* Cav. ic. t. 160. labello mutico oblongo trilobo apice dilatato limbo glaberrimo luteo disco sanguineo velutino; lobo intermedio rotundato; petalis glabris. Hook. exot. fl. t. 10. Rchb. ic. t. 857. *O. vespifera* Pers. In *Europ. austr.* 4.

3. *O. funerea* Vivian. labello mutico basin versus sensim coarctato conico tenuissime sericeo lateribus deflexis antice 3-lobo; lobis omnibus rotundatis medio paulo majore subintegerrimo. In *Corsica et prope Genuam*. 4.

4. *O. fusca* Link; labello mutico velutino oblongo trilobo; laciniis lateralibus nanis intermedio emarginato; petalis glabris. Rchb. ic. t. 855. *O. lutea* Bivona Cent. t. 5. β . iricolor; labello coeruleo fasciato. *O. iricolor* Desf. choix t. 3. Rchb. ic. t. 856. *O. fusca* B. R. t. 1071. In *Europa austr.* 4.

5. *O. Myodes* Jacq. ic. t. 184. labello mutico emarginato trilobo pubescente; lobis lateralibus acutis intermedio multo majore oblongo; peta-

lis subulatis obtusis ciliatis columna mutica. *O. muscifera* Sm. Engl. B. t. 64. In *Europa*. 4. Cor. atrovioletacea macula labii ex albido-rubella; stamen roseum.

6. *O. Speculum* Link.; labello mutico oblongo trilobo limbo barbato atropurpureo disco glabro caeruleo luteo circumdato: lobis lateralibus pone basin nanis intermedio oblongo emarginato; petalis minimis glabris. B. R. t. 370. Rchb. ic. t. 859. *O. ciliata* Biv. *O. vernixia* Brot. *O. Scopulax* Brot. Ius. t. 3. f. 2. In *Europa austr.* 4.

7. *O. canaliculata* Viv. labello basi cuneiformi convexo trifido; lobis lateralibus ovato-acuminatis hispidis brevioribus intermedio in duos lobos antice expanso; petalis minimis ciliato-hispidis. In *Corsica*. 4.

8. *O. Pectus* Mutel in ann. sc. nat. 3. t. 8. B. f. 3. labello mutico trilobo velutino; lobis lateralibus deflexis nanis et intermedio rotundato reflexis; petalis linearibus obtusis glabris. In *Algeria*. 4. *Labellum* fuscopurpureum basi albidum.

9. *O. sphegifera* Willd. labello pubescente tripartito angusto elongato; lacinia media integerrima appendiculata. *O. insectifera* c. apiformis Desf. In *Barbaria*. 4.

10. *O. umbilicata* Desf. ann. mus. t. 5. labello testaceo obovato 3-partito, laciniis lateralibus ovatis acutis intermedia convexa rotundata albozonata maculis 3 luteis supra zonam; sepalis petalisque herbaceis. In *Oriente*. 4.

11. *O. Bertolonii* Moretti; labello mutico velutino obovato apice obsolete trilobo retuso sepalis multo longiore macula disci obcordata glabra nitente; petalis glabriusculis Rchb. ic. t. 865. *O. Speculum* Biv. cent. 1. t. 3. In *Sicilia et Dalmatia*. 4.

12. *O. araeolea* Rchb. labello subrotundo subacuto pubescente basi mutico sulcis e basi binis nigris; petalis glabris. In *Tallesia*. 4.

13. *O. aranifera* Sm. E. B. t. 65. labello velutino oblongo emarginato panduraeformi basi mutico; petalis linearis oblongis glabriusculis columna longioribus *O. fucifera* Curt. lond. t. 67. Sm. E. B. t. 32. In *Europa media*. 4.

b. *Cornutae*; labello basi utrinque cornuto.

14. O. Scolopax Cav. ic. t. 161. in ann. sc. nat. s. 3. t. 8. B. f. 1. labello basi bigibbo obovato velutino; lobis lateralibus deflexis barbatis intermedio oblongo apice inflexo emarginato; petalis velutinis apice angustatis. *O. bombylifera* Lk. Rehb. ic. t. 867. *In Lusitania*. 4.

15. O. apifera Huds. labello 3-lobo basi bigibboso; lobis lateralibus deflexis acutis villosis intermedio glabriuscule apiculato apice reflexo; petalis villosis columna brevioribus Rehb. ic. t. 866. E. B. t. 383. *In Europa*. 4.

16. O. brachyotus Rehb. ic. europ. t. 871. labello velutino obovato-triangulari utrinque dentato basi bigibboso appendiculo inflexo; petalis subrotundovalvis velutinis columnae obtusae vix aequalibus. Prope Genuanum Rehb. 4.

17. O. cornuta Stev. 2. t. 10. labello villoso obovato-triangulari trilobo; lobis lateralibus brevibus cornua duo longissima gerentibus intermedio obtuso cum appendiculo brevi inflexo; petalis brevissimis villosis. Rehb. ic. t. 870. *O. bicornis* Sadi. *In Tauria*. 4.

18. O. picta Lk. labelli 3-lobi lacinii lateralibus bipartitis altera parte sursum altera deorsum versis media emarginata appendiculata fusco flavoque varia; petalis linearibus acutis purpureis; bracteis floribus multo longioribus. *In Lusitania*. 4.

19. O. tabanifera Willd. labello bigibboso ovato acuto 3-partito villoso; lobis lateralibus deflexis acutis intermedio ovato; petalis ciliatis acutis. *O. picta* Salzm. *O. vestrifera* Stev. in Mem. Mosc. 2. t. 11. f. 4, 5. *O. pulla* Ten. Fl. neap. t. 97. *In Europa Sicilia et Barbaria*. 4.

20. O. bremifera Stev. Mem. Mosc. 2. t. 11. caule folioso; labello villoso basi bicorni trilobo, lobo medio emarginato cum appendiculo brevi; perianthii foliolis interioribus villosis brevissimis. *In Tauria*. 4.

21. Pseudospeculum DC. labello oblongo indiviso basi bicalloso apice obsolete 3-dentato limbo villoso disco glabro; petalis pubescentibus columnae brevirostri aequalibus. Rehb. ic. 860. *In Gallia austr.* 4.

22. O. fucifera Hall. ic. helv. t. 24. f. 2, 3. labello obovato-triangu-

lari velutino indiviso basi bigibboso apice appendice rhomboe inflexo; petalis convolutis columnam brevirostrem subaequantibus velutinis. *O. Arachnites* E. B. t. 2596. *O. exaltata* Ten. *In Europa*. 4.

23. O. utrata Lindl. labello emarginato integerrimo convexo villoso bivittato versus basin bicorni; petalis ovatis pubescentibus. *In Italia*. 4.

24. O. arachnites Hort. labello indiviso latissimo trapezoideo vix velutino appendice incurva basi bigibbosa; petalis glaberrimis columnam obtusam aequantibus. B. M. t. 2516. Rehb. ic. t. 872. *In Europa*. 4. Calyx roseus viridi-vittatus. Petala superiore rosea; labellum atro-violaceum.

25. O. tenthredinifera Willd. labello integerrimo subquadrato cuneato villoso appendiculato basi auriculato cornuto sub apice barbato disco glabro, appendice inflexa, petalis ovatis acutis tomentosis, bracteis florum longitidine. B. R. t. 205. B. M. t. 1093. Rehb. ic. 874. Sibth. graec. t. 929. *O. villosa* Desf. ann. Mus. X. t. 14. Rehb. ic. t. 875. *O. grandiflora* Ten. Neap. t. 94. *In Europa austr. et Barbaria*. 4.

26. O. Tenoreana Lindl. labello integerrimo trapezoideo angulato velutino appendiculato basi bicalloso disco fusco linea flexuosa lutea; petalis ovatis acutis tomentosis; bracteis floribus longioribus. Rehb. ic. 876. *O. tenthredinifera* Ten. neap. t. 93. *O. fusca* Fl. graec. t. 930. *In Calabria et Graecia*. 4.

27. O. ferrum equinum Desf. ann. Mus. t. 93. labello oblongo subquadrato apiculato violaceo maculo albo hippocrepico in medio; sepalis roseis. *In Oriente*. 4.

28. O. mammosa Desf. I. c. t. 12. labello fusco basi bimammoso oblongo apice viridi obsolete trilobo disco bivittato mammisque violaceis. *In Oriente*. 4.

4668. DISPERIS Sw. (1800).

a. Labellum appendice auctum.

1. D. capensis Sw. caule basi patentibus piloso; fol. linearibus acuminate apice setaceis; floribus solitariis; sepalis acuminatissimis; labello

lineari-lanceolato utrinque 1-dentato.
In P. b. S. 2.

2. *D. secunda* Sw. fol. linearibus; racemo folioso secundo; sepalis lateralibus divaricatissimis saccatis; labello cordato-ovato acuminato apice cucullato, appendice lineari apice villosa. Ker in Brandes l. c. t. 1. f. 3. *Orchis L.* *In P. b. S. 2.* Flores ochroleuci.

3. *D. micrantha* Lindl. caule 1—3-floro diphylo, fol. cordatis amplexicaulis glabris; sepalis aristatis medio saccatis; labello sagittato appendice lineari apice dilatato rotundato villosa. *In P. b. S. 2.*

4. *D. tripetaloides* Lindl. fol. cordato-oblongis acutis; sepalis glabris lateralibus pendulis basi connatis foveolatis; labello filiformi pubescente apice dilatato-rotundato appendice minima concava. Thouars t. 3. *In Borbonia.* 2.

5. *D. cordata* Sw. caule erecto bifloro; fol. cordatis acutis; sepalis lateralibus semiconnatis; labello bilobo appendice recurvo clavato. Dryopeya Thouars. t. 2. *In Mauritia.* 2.

b. Labellum muticum.

6. *D. villosa* Sw. undique pubescentis; caule multifloro basi diphylo; folio inferiore ovato oblongo superiore acuminato complicato; sepalis divaricatis sub apice gibboso-saccatis; labello linearis apice latiore. Ker l. c. t. 1. f. 5. *Arethusa L.* *In P. b. S. 2.*

7. *D. cucullata* Sw. caule diphylo 1-floro foliisque oblongis pubescentibus; floribus glabris; sepalis lateralibus divaricatis acutis medio saccatis. Ker l. c. t. 1. f. 4. *In P. b. S. 2.*

8. *D. oppositifolia* Sm. glabra; caule diphylo 1-floro; fol. ovatis sessilibus; sepalis lateralibus foveatis unguiculatis ultra sacculus connatis; labello unguiculato bilobo pubescente, laciniis linearibus divaricatis. Dryopeya Thouars t. 1. *In Borbonia et Mauritia.* 2.

4669. PENTHEA Lindl. (1838).

1. *P. metaleuca* Lindl. fol. linearibus v. lanceolatis; corymbo denso multifloro; sepalis oblongis obtusis petalis basi et apice denticulatis; la-

bello lineari-oblongo pone basin obsolete dentato. *Disa Thunb.* *In P. b. S. 2.*

2. *P. obtusa* Lindl. vaginis inflatis erectis acutis; corymbo denso contracto; sepalis obovatis obtusissimis concavis; petalis labelloque emarginato cuneatis membranaceis. *Disa Lehmanni.* *In P. b. S. 2.*

3. *P. filicornis* Lindl. fol. setaceis; vaginis foliaceis acuminatis patulis; spica ovata multiflora; sepalo supremo oblongo galeo; petalis linearibus falcatis obtusis; labello setaceo. *Orchis L.* *In P. b. S. 2.* Flores purpurascentes.

4. *P. reflexa* Lindl. fol. linearis-setaceis carnosis; spica ovata multiflora; sepalo supremo unguiculato cordato subrotundo reflexo; petalis falcatis linearibus obtusis labello setaceo-filiformi pendulo. *In P. b. S. 2.*

5. *P. patens* Lindl. fol. setaceis superioribus latioribus acuminatis; floribus corymbosis; sepalo supremo subrotundo cordato acuto lateralibus acuminatis; petalis ovatis acutis obtusisque antherae subsequalibus. *Ophrys L.* *In P. b. S. 2.*

4670. FORFICARIA Lindl. (1839).

1. *F. graminifolia* Lindl. *In P. b. S. 2.* *Disa lacera* affinis. Fol. linearia acutissima. Flores racemosi. Petala setacea hirsuta genuflexa.

4671. HERSCHELIA Lindl. (1839).

1. *H. coelestis* Lindl. *Disa graminifolia* Ker in Brandes Journ. 8. t. 1. f. 2. *In P. b. S. 2.* Folia setacea. Racemus 4—6-florus. Flores magni intense caerulei.

4672. BRACHYCORITHIS Lindl. (1839).

1. *B. ovata* Lindl. *In P. b. S. 2.* 1-ped. Fol. magna ovata acuta. Flores inter folia superiora axillares.

4673. CERATANDRA Lindl. (1839).

1. *C. ochroleuca* Lindl. fol. ciliatis; spica cylindracea; sepalis latera-

libus basi aequalibus; labello longe unguiculato lunato acuto; appendice dentata subquadrata. *Ophrys atrata* L. In P. b. S. 4. Sepala viridia purpureo-striata. Petala et labellum lutea.

2. *C. auriculata* Lindl. fol. ciliatis; spica cylindrica; sepalis laterilibus basi auriculatis; labello longe unguiculato lunato obtuso; appendice integerrima subrotunda. In P. b. S. 4.

3. *C. globosa* Lindl. fol. scabriusculis superioribus minoribus; spica subglobosa; petalis cordato-ovatis acutis; labello nudo subrotundo breviter unguiculato. In P. b. S. 4.

4. *C. parviflora* Lindl. fol. margine scabriusculis; spica subglobosa; petalis margine anteriore in angulum obtusum productis; labello nudo transverso rhomboideo angulis acutis. In P. b. S. 4.

5. *C. grandiflora* Lindl. fol. margine pilosis; spica densissima oblonga; petalis semicordatis basi cucullatis, labello nudo subrotundo cordato subsessili. In P. b. S. 4.

6. *C. Harveyana* Lindl. fol. linearibus involutis; spica laxiuscula; bracteis ovatis acutis; petalis margine crispis; labello sagittato appendice rhomboidea. In P. b. S. 4.

4674. OMMATODIUM Lindl. (1839.)

1. *O. Volucris* Lindl. *Pterygodium* Sw. Ker in Brandes journ. 6. t. 4. f. 1. *Ophrys* L. In P. b. S. 4. Folia cordata amplexicaulia. Spica elongata multiflora.

4675. CERATOPSIS Lindl. (1839.)

1. *C. rosea* Lindl. *Limodorum* Don. In *Nepalia*. 4. Herba palmaris aphylla squamis scariosis vestita. Columna minima.

4676. GASTRODIA R. Br. (1810.)

1. *G. sesamoides* R. Br. In *Nov. Holl.* 4. Rad. tuberosa oblonga. Racemus ante anthesin nutans. Flores ochroleuci.

2. *G? javanica* Lindl. *Epiphanes* Blume. In *Java*. 4.

4677. EPIPOGIUM Gmel. (17..)

1. *E. Gmelini* L. *Satyrium* L. Jacq. austr. t. 84. *E. aphyllum* Rehb. In *Europa et Siberia*. 4. Herba aphylla radice ramosa corallina carnosae. Seapus membranaceo-vaginatus pauciflorus. Labellum albidum colore dilute purpureo suffusum.

4678. HYSTERIA Reinw. (1825.)

1. *H. veratrifolia* Reinw. In *Java*. 4. Caulescens terrestris. Spica terminalis.

4679. SPIRANTHERA est CHAE-RADOPLECTRON Schauer. (1842.)

1. *C.* Schauer. In *China*. 4. Herba *Spiranthis nostratis* facie Flores parvi.

4680. SPIRANTHES Rich. (1817.)

a. *Euspiranthes* Lindl. Sepala subparallela. Labelli porrecti lamina recta v. rectiuscula, sepalis basi parum productis subaequalis. Flores horizontales.

1. *S. aestivalis* Rich. fol. radicalibus caulinisque linear-lanceolatis; floribus spiralibus; bracteis glabris ovalibus ovario longioribus; labello oblongo glabro (tuberibus fusiformibus). Rehb. ic. t. 337. *Neottia Lam.* In *pratis Europae*. 4. Flores albi.

2. *S. Romanzoffiana* Cham. fol. radicalibus caulinisque lanceolatis scapo folioso aequalibus; spica oblonga densa; bracteis foliaceis; labello oblongo-lanceolato obtuso basi latiore apice crispato. In *Unalaschka*. 4.

3. *S. gemmifera* Lindl. E. B. t. 2786. In *Hibernia*. 4. Planta ex Lindl. non satis nota.

4. *S. australis* Lindl. fol. linear-lanceolatis subhensiformibus; floribus spiralibus glabris v. pubescentibus; bracteis ovatis ovario longioribus labello apice dilatato criso supra piloso. *Neottia crispata* Blume. var. a) spica pubescente mediocri. Gmel. sib. 1. t. 3. f. 1. Sp. *amoena* Ledeb. — b. spica elongata pluries spirali.

- Neottia flexuosa* Sm. N. *australis* γ. *spica valde elongata pubescente, floribus minoribus.* S. *parviflora* Lindl. δ. *spica breviore pubescente fol. omnibus radicalibus.* S. *Wightiana* Wall. ε. *spica glabra.* S. *pudica* Lindl. Coll. t. 30. *Neottia sinensis* Pers. *In Asia China et Nov. Holl.* 2.
5. *S. congesta* Lindl. fol. lanceolatis; spica pauciflora conica puberula; bracteis ovatis setaceo-acuminatis; labello oblongo basi contracto subauriculato apice concavo, callis obsoletis. *In Siberia.* 2.
6. *S. tenuis* Lindl. fol. linearilanceolatis coriaceis patulis; scapo gracili; spica tenui multiflora ovariisque pubescentibus; sepalis petalisque linearibus acutis cristallino-papulosis; labello criso pubescente; callis clavatis liberis. *In Guiana.* 2.
7. *S. ovalis* Lindl. glaberrima; fol. lineariformibus acutis; spica ovali densa; sepalis petalisque linearibus obtusis; labello oblongo apice recurvo criso callis elongatis falcatis sagittam referentibus. *In Texas.* 2.
8. *S. graminea* Lindl. fol. latolinaribus acutis; scapo vaginato apice tomentoso; spica ovali-lanceolata densa; sepalis pubescentibus petalisque linearibus obtusis; labello apice criso; callis subrotundis adnatis. *In Mexico.* 2.
9. *S. cernua* Rich. fol. linearilanceolatis scapi longitudine; spica densa tortili pubescente; bracteis acuminatis incurvis pilosis floribus aequalibus; labello criso membranaceo; callis minutis conicis. B. M. t. 1568. *In Am. bor.* 2. Flores magni albi.
10. *S. longitabris** Lindl. spica laxa secunda pilosa; bracteis acuminatis glabris floribus brevioribus; labello ovato-lanceolato apice retrorsum lacero carnosus callis conicis. *In Louisiana.* 2.
11. *S. porrifolia* Lindl. glaberrima; fol. strictis ensiformibus acuminatis; spica densa tortili; bracteis acuminatis floribus aequalibus; labello ovato-lanceolato acuminato recurvo obtuso, callis elongatis rectis. *In Am. bor.* 2.
12. *S. odorata* Lindl. fol. ensiformibus acutis; spica densa tortili pilosa multiflora; bracteis lanceolatis acutis florum longitudine; sepalis glabris apice latioribus patentissimis; labello recurvo minutissimo ciliato dorso scabro, callis elongatis circinatis. *Noettia* Nutt. *In Carolina.* 2.
13. *S. latifolia* Torr. fol. oblongis elongatis; spica densa brevi tortili puberula; bracteis apice incurvis floribus longioribus; sepalis petalisque obtusissimis glabris; labello subquadrato apice subcrispo; callis obsoletis. *In Am. bor.* 2.
14. *S. diuretica* Lindl. fol. ensiformibus; scapo glabriuscule; vaginis acutis; spica densa elongata conica tomentosa; sepalis acuminatis glabris; labello pubescente oblongo basi cucullato apice rotundo papilloso undulato. Feuill. per. 2. t 17. *In Chili.* 2.
15. *S. tortilis* Rich. fol. linearibus 1-pedalibus; scapo bipedali; spica spirali; floribus secundis cernuis glabris; lamina labelli reflexa concava 3-loba, lobis margine crenulatis. *Neottia* Sw. fl. ind. t. 28. f. c. *In Jamaica.* 2.
16. *S. bicolor* Lindl. fol. lanceolatis petiolatis; spica elongata secunda tomentosa spirali; sepalis petalisque basi gibbis; labello linearis oblongo basi cordato obsolete trifido v. crenulato papilloso. *Neottia* Ker B. R. t. 794. *In Jamaica.* 2.
17. *S. plantaginea* Lindl. fol. lanceolatis nervosis petiolatis; vaginis appressis; spica elongata simplici subsecunda tomentosa; sepalis petalisque linearibus acutis; labello linearis oblongo carnosus elongato obsolete 3-lobo, callis sphaericis adnatis. *In Peruvia.* 2.
18. *S. peruviana* Presl; spica subtortili; bracteis flore aequilongis; labello ovato crenato concavo carinato; fol. lanceolatis acutis; tuberibus oblongis. *In Peruvia.* 2.
19. *S. macrostachya* Poepp. et Endl. fl. per. 2 t. 110. a-k. fol. lanceolatis linearibus; spica elongata floribusque dense pubescentibus; labello ovato acuto denticulato integro nudo; sepalis interioribus angustissimis. *In Peruvia.* 2. Flores albi.
20. *S. autumnalis* Rich. fol. omnibus radicalibus ovato-oblongis; floribus spiralibus secundis; bracteis pubescentibus ovatis ovario longioribus; labello apice rotundo glabro. *Neottia* Sw. *Ophrys* L. E. B. t. 541. *In Europa.* 2.
21. *S. aprica* Lindl. fol. ovato-oblongis concavis; scapo pubescente

in medio vagina aucto; spica secunda 4—5-flora; sepalis glabris dorsali valde acuminato; labello ovato carnosus sessili apice abrupte in laminam crispam dilatato; callis minimis dentiformibus.

In Brasilia. 4.

22. *S. truncata* Lindl. fol. ovato-oblongis acutis; scapo gracili; spica pauciflora pilosa; sepalis linearibus omnibus basi ventricosis pilosis; labello carnosus apice dilatato trilobo, lobo medio abrupte truncato *In Brasilia.* 4.

23. *S. Prestii* Lindl. fol. ovato-oblongis acutis; spica tenui; bracteis linearibus flore longioribus; labello ovato concavo sub apice spathulato rotundato constricto. *Cyclopogon ovalifolium* Presl. t. 13. f. 1. *In Peruvia.* 4.

24. *S. elongata* Rich. fol. oblongis petiolatis; spica elongata spirali pubescente; bracteis linearibus acutis; sepalis linearibus obtusis glabris; labello carnosus sessili linearis basi ventricoso apice truncato; columna pubescente. *Neottia B. M.* t. 1475. *N. minor* Jacq. ic. 601. *B. Rep.* t. 376. *In Ind. occ.* 4.

25. *S. inaequilatera* Poepp. et Endl. t. 110. fol. ovatis longe petiolatis; spica pubescente; bracteis linearibus ovario longioribus; sepalis inferioribus falcatis; labelli spathulati lobo terminali obcordato integerrimo nudo. *In Peruvia.* 4.

26. *S. lineata* Lindl. glaberrima; fol. ovatis acuminatis petiolatis; vaginis adpressis; spica elongata simpliciter torta; sepalis linearibus obtusis medio lineatis acutissimis; labelli lamina angulata lineis 3 notata. *In Brasilia.* 4.

27. *S. cuspidata* Lindl. fol. late oblongis acutis; spica spirali laxe tomentosa; sepalis lateralibus acuminatis et ovario tomentosis; labello obovato crenulato, basi canaliculato ob callos duos elongatos liberos sagittato. *In Brasilia.* 4.

28. *S. bracteosa* Lindl. B. R. t. 1934. fol. rosulatis oblongis acutis; scapo pubescente; bracteis squamisque scapi linear-lanceolatis foliaceis floribus longioribus; sepalis ovatis acutis pubescensibus; spica rara recta; labello pubescente 3-lobo papilloso. *In Brasilia.* 4.

29. *S. brevilabris* Lindl. fol. ob-

longis basi obtusis; spica tortili hispida; labello brevi oblongo apice crispo medio pubescente, callis rectis obtusis barbatis. *In Texas.* 4.

30. *S. gracilis* Hook. fl. bor. Am. t. 203. glaberrima; fol. ovatis; scapo tenui gracili; spica plures spirali; labello oblongo lanceolato crispo supra pubescente; callis elongatis curvis intramarginalibus. *Neottia tortilis* Pursh. *In Am. bor.* 4.

31. *S. Beckii* Lindl. glaberrima; fol. anguste ovalibus; scapo stricto filiformi; spica tenui spirali; bracteis apice setaceis ovario puberulo longioribus labelli lacinis erosis intermedia truncata glandulosa. *Neottia tortilis* Eell. *In Am. bor.* 4.

Aphyllae Lindl.

32. *S. ramentacea* Lindl. glaberrima; vaginis caulis longissimis; spica densa cylindrica; sepalis lateralibus linearibus obtusis petalis acutis multo longioribus; labello et columna medio pubescensibus, callis minutis conicis. *In Mexico.* 4.

33. *S. pyramidalis* Lindl. glaberrima; vaginis oblongis imbricatis; spica elongata pyramidalis; bracteis obovatis floribus longioribus; sepalis basi glandulos-pilosus; labelli limbo ovato concavo, carnosus basi bicalloso. *In Guatimala.* 4.

34. *S. hemichrea* Lindl. glaberrima; vaginis oblongis imbricatis; spica elongata pyramidalis; sepalis dorsali rhomboideo et petalis obtusis membranaceis lateralibus angustioribus carnosus ad ovarii medium usque productus; labelli basi pubescentis lamina ovata obtusa. *In Guatimala.* 4.

35. *S. camporum* Lindl. vaginis scapi cucullatis; spica attenuata multiflora; bracteis ovatis acuminatis venosis florum longitudine; sepalis ovatis acutis labelli lobo medio tomentoso; columna basi barbata. *In Montevideo.* 4.

36. *S. dilatata* Lindl. vaginis acuminatis imbricatis; spica cylindrica densissima; bracteis ovatis aristatis; sepalis acutis basi villosis; labelli ungue linearis glabro lamina transverse oblonga plana media villosa appendice parva ovato concava acuta carnosa apiculata. *In Montevideo.* 4.

Sectionis dubiae, ob folia ignota.

37. *S. apiculata* Lindl. scapi squamis acuminatis; spica rara elongata; sepalis petalisque acutis; labello oblongo membranaceo apice ovato rotundato carnoso; callis liberis truncatis villosus. *In ins. Trinitatis.* 2.

38. *S. rupestris* Lindl. vaginis scapi oblongis acutis coriaceis inferioribus foliaceis; spica densa thyrsoidae pubescente; sepalis ovatis obtusis tomentosis; labelli ungue extus tomentoso; columna glabra; rostellum setaceo corneo. *In Montevideo.* 2.

39. *S. Ilareana* Lindl. scapi squamis membranaceis arce adpressis; spica rara elongata spirali; bracteis acuminatis flore multo brevioribus; sepalis petalisque acuminatis; labello linearis apice pubescente. *In Mexico.* 2.

b. *Sarcoglossa* Lindl. Sepala lateralia decurva. Labelli adscendentis lamina carnosa deflexa, sepalis basi valde productis multo brevior. Flores erecti.

40. *S. picta* Lindl. B. R. t. 823. fol. obovato-lanceolatis undulatis; scapo piloso; spica laxa elongata; sepalis pilosis lateralibus infra medium ovarii decurrentibus; labello oblongo glabro basi sagittato apice deltoideo venoso. Neottia B. M. t. 1562. N. acaulis Sm. exot. bot. t. 105. v. fol. immaculatis. Spir. grandiflora B. R. t. 1043. Neottia grandiflora B. M. t. 2730. *In ins. Trinitatis.* 2.

41. *S. speciosa* Lindl. fol. obovato-lanceolatis; spica laxa angusta elongata; sepalis subpilosis, lateralibus infra medium ovarii decurrentibus; labello linearis sagittato medio piloso apice ovato. *Sarcoglossa* Presl rel. Haen. t. 15. *In Peruvia.* 2.

42. *S. bonariensis* Lindl. vaginis imbricatis acuminatis; spica elongata tomentosa; bracteis linearis-lanceolatis acuminatis floribus aequalibus; sepalis petalisque villosis lateralibus in cornu gibbosum breve productis; labello spatulato concavo sub apice rotundato. *In Bonaria.* 2.

43. *S. hirta* Lindl. fol. linearis-lanceolatis longe petiolatis; spica densa elongata villosa; bracteis li-

nearibus acuminatis floribus longioribus; sepalis villosis lateralibus in cornu breve gibbosum productis; labello oblongo plano obtuso basi sagittato pubescente. *In Peruvia.* 2.

44. *S. villosa* Poepp. et Endl. fol. longe petiolatis oblongo-lanceolatis acutis; bracteis ovarium villosum aequalibus linearibus; sepalis inferioribus falcatis; labello spatulato intus papilloso apice reniformi dentato. *In Peruvia.* 2.

45. *S. longifolia* Blume; fol. linearis-lanceolatis longissimis trinerviis; pedunculo floribusque externe pubescens; labelli limbo acuminato reflexo; gynostemio ad apicem utrinque repando; stigmate lanceolato. *In Java.* 2.

46. *S. vaginata* H. et K. Planta habitu Serapiadis Linguae, floribus spicatis. *In Peruvia.* 2.

**4681. ADENOSTYLIS Blume.
(1825).**

1. *A. emarginata* Blume. Cionisaccus Kuhl et Hasselt Orch. edid. Breda t. 8. *Zeuxine emarginata* Lindl. *In Java.* 2. Caulis basi radicans. Folia linearia acuminata. Spica spiralis. Flores albi.

**4682. STENORHYNCHUS Rich.
(1817).**

1. Sepala lateralia basi valde producta.

1. *S. speciosus* Rich. glaberrimus; fol. oblongo-lanceolatis apicem versus undulatis; squamis scapi imbricatis acuminatis; bracteis floribus multo longioribus; labello oblongo subulato canaliculato. *Neottia speciosa* Jacq. ic. t. 600. B. M. t. 1374. Hook. exot. fl. t. 3 et 4. *In America tropica.* 2.

2. *S. papulosus* Lindl. caule villosi; fol. lanceolatis lineatis; spicis laxis; perigonio urceolato papuloso, labello calcarato. *Neottia Llave.* *In Mexico.* 2.

3. *S. australis* Lindl. scapo basi glabro apice tomentoso; squamis remotis apice foliaceis; spica tomentosa pyramidali densa; labello lanceolato acuminato medio utrinque piloso; sepalis tomentosis. *In Brasilia.* 2.

4. *S. orchidioides* Rich. fol. oblongo-lanceolatis luridis subuplicatis planis; scapo pubescente; spica oblonga multiflora; bracteis acuminate ovarii tomentosi longitudine; sepalis glanduloso-pubescentibus. Plum. ic. t. 181. f. 2. Neottia B. M. t. 1036. N. squamulosa H. et K. nov. g. t. 71. In Am. tropica. 4.

5. *S. aphyllus* Lindl. scapo bracteatō superne floribusque pubescenti-glandulosis; perigonii laciiniis 3 exterioribus linearī-acuminatis rectiusculis basi in calcar breve obtusissimum productis. Neottia Hook. B. M. t. 2797. In ins. Trinitatis. 4.

b. *Sepala lateralia basiparum producta.*

6. *S. sulphureus* Lindl. fol. lanceolatis glaucis nervosis; caule articulato; spicis secundis; floribus confertis; perigonis hiantibus tomentosis; labello acuto intus lanuginoso.. In Mexico. 4. Planta tristis adspicu.

7. *S. lupulinus* Lindl. scapo basi glabro apice pubescente; squamis cullatis obtusis; spica oblonga lupulina; bracteis basi villosis; ovario obovato villosissimo sepalis villosis breviore; petalis pilosis; labello obtuso intus pubescente. In Mexico. 4.

8. *S. aurantiacus* Lindl. caule folioso glabro; fol. oblongis; spica oblonga multiflora; bracteis oblongis concavis dorso villosis; ovario obovato sepalis villosissimis multo breviore; labello extus tomentoso apice undulato. Neottia Llave. In Mexico. 4.

9. *S. cinnabarinus* Lindl. fol. omnibus lanceolatis; spicis conico-thyrsoideis compactis; perigonis urceolatis subtomentosis; labello erecto apice reflexo. Neottia Llave. In Mexico. 4. Flores crocei.

10. *S. Michuacanus* Lindl. fol. ensiformibus nervosis; spicis secundis lanatis; perigonis ringentibus subtomentosis; labello subhastato venoso. Neottia Llave. In Mexico. 4. Planta bipedalis odoratissima. Flores lutei.

oblonga acuminata glauca fusco maculata. Flores maximi viridi-albi.

4684. *PLEXAURE* Endl. (1832).

1. *P. limenophitax* Endl. fl. norf. In ins. Norfolk. 4. Herba digitalis caespitosa. Folia carnosula linearilanceolata. Flores inconspicui minimi dense spicati.

4685. *NEOTTIA* L. (1740).

1. *N. Nidus avis* L. glabra; sepalis petalisque ovatis erectis; labelli laciiniis recurvis rotundatis. E. B. t. 48. Fl. dan. t. 181. Neottidium Nidus avis Nees gen. c. ic. In Europa. 4.?

2. *N. listeroides* Lindl. pubescens sepalis petalisque linearibus obtusis reflexis; labelli elongati cuneati laciiniis ciliatis acutis rectis; mucrone interjecto; columna incurva. In Ind. or. 4.

3. *N. kamtschatica* Lindl. subpubescens; sepalis ovatis patentibus, petalis minoribus linearibus obtusis; labello linearī bilobo, clinandrio cuculato. Ophrys L. Neottia etc. amoen. acad. 2. t. 4. f. 24. In Sibiria. 4.

4. *N. micrantha* Lindl. glaberrima; sepalis lanceolatis acuminatissimis patentibus; petalis minoribus conformibus; labello breviore ovato acuminato basi excavato, clinandrio nudo. In Sibiria. 4.

4686. *LISTERA* R. Br. (1821).

1. *L. ovata* R. Br. fol. subrotundo-ovalibus; scapo pubescente squamula una alterave ovata appressa instructo; labello bipartito basi rotundato sepalis erectis plus duplo longiore. Ophrys L. Fl. dan. t. 137. E. B. t. 1548. In Europa. 4.

2. *L. Banksiana* Lindl. fol. oblongis acutis; scapo filiformi squamula una alterave foliacea patula instructo; labello elongato cuneato emarginato sepalis lanceolatis patulis duplo longiore. Ophrys Menz.

3. *L. Escholtziana* Cham. fol. orbiculato-ovatis scapi longitudine; racemo pubescente; sepalis acutis mox reflexis; labello obcordato patente;

4683. *ULANTHA* Hook. (1830).

1. *U. grandiflora* Hook. B. M. t. 2990. Neottia ibid. t. 2956. In ins. Vincentia. 4. 1-ped. Folia linearis-

columna elongata recta. *In Unalascha*. 2.

4. *L. convallariooides* Nutt. fol. oblongis obtusis scapo nudo aequalibus; racemo glabro; sepalis lanceolatis demum reflexis; labello obcordato basi utrinque dentato; columna elongata arcuata. *Epipactis Sw.* *In Am. bor.* 2.

5. *L. cordata* R. Br. fol. cordatis subrotundo-ovatis scapo brevioribus; racemo glabro; bracteis minimis obtusis; sepalis ovatis patentibus; labello linearis bipartito basi utrinque lobato; ovario pedicelli longitudine. *Ophrys L. Engl. Bot. t. 358.* *In Europa.* 2.

6. *L. australis* Lindl. fol. ovatis acutis scapo nudo brevioribus; racemo minutissime glanduloso-scabro; sepalis ovatis reflexis; petalis revolutis; labello linearis basi bisagittato sepalis quater longiore laciniis setaceis. *Listera convallariooides Ell.* *In Carolina.* 2.

4687. EPIPACTIS Cam.

1. *E. palustris* Sw. fol. lanceolatis erectis 5-nerviis; racemo paucifloro; bracteis ovarii longitudine; hypochilio cuneato truncato margine laevi; epichilio membranaceo subrotundo obtusissimo undulato sepalis longiore. *Hook. fl. lond. t. 89.* *Sturm 13.* *B. Cab. t. 156.* *Fl. dan. t. 267.* *In Europa.* 2. Flores albo-rubelli.

2. *E. microphylla* Sw. fol. ovato-lanceolatis enerviis intermediis et superioribus internodio brevioribus; racemo elongato multifloro; hypochilio oblongo margine tenui criso epichilio ovato acuto criso basi confuse verrucoso sepalis aequali. *Waldst. Kit. t. 270.* *In Europa.* 2.

3. *E. latifolia* Sw. fol. oblongis ovatisque multinerviis intermedio longioribus; racemo elongato multifloro; hypochilio subrotundo intus tuberculatim calloso; epichilio breviore cordato acuminato basi bituberculato sepalis paulo breviore. *Serapias L. Engl. B. t. 269.* *Hall. helv. t. 44.* *E. purpurea Engl. B. suppl. t. 2775.* *In Europa.* 2. Flores e viridi rubentes.

4. *E. atrorubens* Schult. fol. ovato-oblongis multinerviis internodio longioribus; racemo longissimo multifloro; hypochilio ovali laevi; epichilio subrotundo piano acuto basi bitubercu-

lato sepalis paulo breviore. *E. viridiflora Rchb.* ic. f. 1142. *In Europa.* 2. Flores atropurpurei.

5. *E. macrostachya* Lindl. fol. oblongis acuminatis amplexicaulibus multinerviis; racemo raro paucifloro; bracteis inferioribus foliaceis; hypochilio cuneato subrotundo; epichilio parvo ovato acuto; sepalis breviore. *In Ind. or.* 2.

6. *E. Royleana* Lindl. fol. ovato-oblongis acentis amplexicaulibus; racemo raro paucifloro; bracteis inferioribus foliaceis; hypochilio cuneato truncato; epichilio ovato obtuso parvo metachilio rhombeo carnoso interposito. *In Ind. or.* 2.

7. *E. herbacea* Lindl. fol. ovalibus acuminatis multinerviis basi angustatis; spica brevi sessili; bracteis linearis-lanceolatis acuminatis floribus duplo longioriaus; hypochilio subrotundo; epichilio ovato acuminato plano. *In Ind. or.* 2.

8. *E. americana* Lindl. fol. 5-nerviis ovalibus superioribus ensiformi-lanceolatis; bracteis foliaceis floribus multo longioribus; racemo laxo sursum pubescente; hypochilio oblato ventricoso medio muricato epichilio multo minore ovato late acuminato. *E. gigantea Hook. fl. Am. t. 202.* *In Am. bor.* 2.

4688. PELEXIA Rich. (1817).

1. *P. spiranthoides* Lindl. *B R. t. 985.* fol. ovato-lanceolatis undulatis; spica elongata multiflora; bracteis membranaceis acuminatis flore longioribus; sepalis acutis lateralibus dependentibus; labello apice rotundato apiculato emarginato 2-lamellato. *Satyrium Sw.* *In Ind. occ.* 2. Flores virides labello albo.

2. *P. taxa* Lindl. fol. longe petiolatis ellipticis acutis; spica secunda laxa; sepalis inferioribus basi saccata coalitis, superioribus puberulis; bracteis flore brevioribus. *Stenorhynchus Poep. et Endl. n. g. t. 109.* *In Peruaria.* 2. Flores rubri.

3. *P. setacea* Lindl. fol. ovalibus petiolis duplo brevioribus; spica multiflora; bracteis linearis-lanceolatis; setaceo-acuminatis; sepalis linearis-lanceolatis in apicem setaceum elongatum productis; labello lanceolato

fimbriato; cornu filiformi sepalis breviore. *Neottia calcarata* B. M. t. 3403.
In Brasilia. 2.

4. *P. domingensis* Lindl. fol. ellipticis petiolis brevioribus; spica pauciflora; bracteis linearibus lanceolatis florum longitudine; sepalis petalisque linearis-lanceolatis lateralibus apice patulis; labello lanceolato acuminate integerrimo, cornu acuminato inflexo. *Neottia* Sw. fl. ind. t. 28. f. i. *In Hispaniola.* 2.

5. *P. triloba* Lindl. fol. oblongis acutis petiolo brevioribus; spica elongata laxa multiflora; bracteis adpressis flore brevioribus; sepalis acutis lateralibus recurvis; labello apice trilobo lacinia intermedia lanceolata acuta reflexa; cornu sepalis sere duplo longiore. *In Am. bor.* 2. 1—4-ped. Flores virides.

4689. SAUROGLOSSUM Lindl. (1832).

1. *S. elatum* Lindl. B. R. t. 1618. *In Brasilia.* 2. Radices fasciculatae. Folia radicalia membranacea. Flores spicati herbacei densissimi. Sepala viridia. Labellum album.

4690. EUCOSIA Blume. (1825).

1. *E. carnea* Blume. *In Java.* 2. Folia ovata petiolata nervosa. Spica terminalis villosa pauciflora. Flores bracteati carnei.

4691. GEORCHIS Lindl. (1832).

1. *G. biflora* Lindl. fol. subrotundovalvis pictis scapo bifloro aequalibus; vaginis 2 obtusis; floribus puberulis; labelli ovati acumine linearis undulato obtuso basi pilosa. *In Nepalia.* 2.

2. *G. cordata* Lindl. glabra; fol. cordatis acutis 3-nervis (scapo multifloro brevioribus; vagina solitaria acuminata; floribus glaberrimis labelli acumine apice recurvo medio villosa. *In Zeylona.* 2.

3. *G. foliosa* Lindl. caule adscidente glabro; fol. ovalibus utrinque acutis longe petiolatis; scapi tomentosi apice aphylli vaginis foliaceis imbricatis; spica oblonga; sepalis ovatis acutis tomentosis; labello ovato

concavo marginibus inflexis. *In Ind. or.* 2.

4692. MACODES Blume. (1825).

1. *M. Petola* Blume tab. 2. Rumph. 6. t. 51. f. 3. *In Jara.* 2. Herba *Spiranthis* habitu, fol. ovalibus acutis eleganter venosis; spicis glandulosopubescentibus.

4693. ANTERIA Blume. (1825).

1. *A. albida* Blume; glabra; fol. ovato-oblongis; floribus dense spicatis; labelli limbo ovato intus muricato. *In Java.* 2.

2. *A. javanica* Blume; fol. ovalibus acutis undulatis discoloribus floribus laxe spicatis externe glandulosopubescentibus; labelli limbo angustato. *In Java.* 2. Folia purpurea.

3. *A. oblongifolia* Blume tab. 11. fol. ovato-oblongis; floribus laxe spicatis externe glanduloso-puberulis; labelli limbo ovato fornicato. *In Java.* 2.

4. *A. oculata* B. R. fol. ovalibus in petiolum latum angustatis; spica densa elongata; bracteis magnis glanduloso-pubescentibus; labello oblongo basi saccato apice acuminato extus tuberculato. *Platylepis goodyeroides* Rich. t. 6. f. 4. *In Borbonia.* 2.

5. *A. abbreriata* Lindl. caule basi folioso adscendente; fol. ovali-lanceolatis in petiolum angustissimum attenuatis; spica pauciflora stricta; labello basi ventricoso apice angustato et dilatato. *In Nepalia.* 2. Flores minimi.

6. *A. fusca* Lindl. acaulis; fol. rotundatis ovalibus acutis sessilibus; scapo piloso; spica densissima oblonga; sepalis ovatis obtusis; labello saccato apice ovato obtuso. *Goodyera* Lindl. in Wall. cat. *In Ind. or.* 2.

4694. GOODYERA R. Br. (1813).

a. *Labellum anticum, liberum.*

1. *G. repens* R. Br. subacaulis; fol. ovatis subacutis 1-coloribus; spica elongata secunda; sepalis ovatis acutis pubescentibus; labello ventricoso

apice acuminate deflexo. *Satyrium*
L. E. B. t. 289. *In Europa*. 2.

2. *G. pubescens* R. Br. subcaulis; fol. ovatis oblongis acutis pictis; spica densa pubescente; sepalis ovatis obtusis pubescentibus; labello ventricoso apice ovato recto; stigmate rotundo. Lindl. coll. t. 25. Sweet. fl. gard. t. 47. *Satyrium* Michx. *In Am. bor.* 2.

3. *G. Menziesii* Lindl. subcaulis; fol. oblongis venosis 1-coloribus; spica laxa secunda multiflora; sepalis linearis-oblongis puberulis; petalis margine dilatatis; labello concavo apice lineari recurvo obtuso stigmate antheraque acuminatis. *Spiranthes decipiens* Hook. fl. bor. Am. t. 204. *In Am. bor.* 2.

4. *G. marginata* Lindl. subcaulescens; fol. ovato-lanceolatis unicoloribus; spica elongata secunda; bracteis in acumen lineare productis floribus longioribus; labello apice concavo acuto. *In Ind. or.* 2.

5. *G. macrophylla* Lowe prim. fl. Mad. c. ic. subcaulescens; fol. oblongis acutis in vaginis suis sessilibus; scapo apice tomentoso; spica pyramidata densa; sepalis pubescentibus oblongo-linearibus obtusis; labello ovato concavo obtuso margine utrinque sub-1-dentato. *In Madera*. 2.

6. *G. procera* Hook. exot. fl. t. 39. caulescens glaber; fol. lanceolatis acuminatis; spica densa elongata cylindrica; floribus subglobosis; sepalis petalisque subrotundis obtusis; labello intus villosso. *Neottia* Ker B. R. t. 639. *In Asia tropica*. 2.

7. *G. rubicunda* Lindl. caulescens; fol. oblongis acutis in basin cuneatam angustatis; spica elongata multiflora laxa ferrugineo-tomentosa; sepalis pubescentibus; labello concavo acuto apice reflexo intus villoso. *In Manna*. 2.

8. *G. nuda* Thouars orch. afr. t. 29. caulescens glaber; fol. ovali-lanceolatis acutis membranaceis; spica oblonga multiflora; bracteis acuminatis; sepalis glabris; labello concavo acuminato apice ovali acuto. *In ins. Mauritio*. 2.

9. *G. guyanensis* Lindl. scapo glabro squamis membranaceis acuminatis vaginato; spica densa cylindrica puberula; bracteis glabris ovatis ventricosis apice setaceis; sepalo dor-

sali galeato acuminato apice dilatato. *In Guyana*. 2.

b. *Labellum posticum* c. columna conutum.

10. *G. elongata* Lindl. caulescens; fol. ovali-lanceolatis petiolis angustissimis; scapo gracili et spica rara multiflora elongata pubescentibus; sepalis obtusis pubescentibus; labello concavo acuminato intus villoso; columna articulata. *In Ind. or.* 2.

11. *G. grandis* Lindl. (*Neottia* Blume) fol. ovali-oblongis; spica densa et floribus externe villosiusculis; bracteis ovarium fere duplo superantibus; labelli limbo patente. *In Jara*. 2.

12. *G. viridiflora* Lindl. (*Neottia* Blume) fol. ovato-oblongis; spica paniculata floribusque glabris; bracteis longitudine ovarii pubentis; labello acuto patente. *In Java*. 2.

13. *G. colorata* Lindl. (*Neottia* Blume) fol. ovato-lanceolatis discoloribus; spica rara floribusque externe puberulis; bracteis ovario aequalibus; labelli limbo patente. *In Java*. 2.

14. *G. reticulata* Lindl. (*Neottia* Blume) fol. lanceolatis reticulato-nervosis; spica laxiflora; bracteis ovarium superantibus. *In Java*. 2.

15. *G. parviflora* Lindl. (*Neottia* Blume) fol. oblongo-lanceolatis; pedunculis floribusque externe puberulis; bracteis longitudine ovarii; labelli limbo obtuso patente interne bicalloso. *In Java*. 2.

16. *G. valliseta* Lindl. (*Satyrium* Llave) bulbis fasciculatis; fol. 7-nerviis; floribus pellucidis; labello subindiviso erecto, lacinia media reflexa. *In Mexico*. 2. Flores spicati ferrugineo-pubescentes.

4695. HAEMARIA Lindl. (1840).

1. *H. discolor* Lindl. *Goodyera* Ker. *In China*. 2. Herba decumbens; fol. coriaceis marginatis glabris. Scapus erectus squamatus. Spica multiflora. Flores albi.

4696. CORDYLESTYLIS Falconer. (1842).

1. *C. himalayensis* Falc. *In Himalaya*. 2. Radices fibroso-fasci-

culatae. Caulis strictus. Folia ovali-lanceolata coriacea glabra. Spica cylindrica confertim multiflora. Flores albi.

4697. HYLOPHILA Lindl. (1840).

1. *H. mollis* Lindl. In Singapore.
2. Herba caulescens basi radicans. Folia petiolata laxe vaginantia. Scapus terminalis. Spica herbacea multiflora. Flores parvi tomentosi.

4698. MICROCHILUS Presl. (1830).

a. Labellum apice lunatum.

1. *M. hirtellus* (Physurus Lindl.) caule adscendente medio folioso; fol. ovatis acutissimis petiolatis; scapo pubescente; petalis integerrimis; labello apice lunato ciliato; calcare filiformi. Orchis et Satyrium Sw. In Jamaica. 2.

2. *M. major* Presl. Rel. Haenk. caule basi folioso; fol. ovato-lanceolatis acuminatis multinerviis; spica elongata angusta; labello linearis apice reflexo sagittato tomentoso; calcare oblongo ventricoso. Physurus Lindl. In Peruria. 2.

3. *M. roseus* (Physurus Lindl.) caule crasso erecto denso folioso; fol. ovalibus acuminatis multinerviis scapo et inflorescentia villosis; spica cylindrica elongata; labello apice lunato laciniis falcatis revolutis; calcare filiformi. In Brasilia. 2.

4. *M. densiflorus* (Physurus Lindl.) caule adscendente; fol. ovali-lanceolatis acuminatis trinerviis; spica densa cylindrica intra folia subsessili; labello apice crasso unguiculato sagittato; calcare falcato ovario longiore. In Brasilia. 2.

5. *M. bifalcis* (Physurus Lindl.) caule erecto; fol. multinerviis ovali-lanceolatis scapo aequalibus; spica laxa elongata; labello apice lunato biconvexo laciniis elongatis falcatis; calcare filiformi incurvo. In Peruria. 2.

6. *M. oratus* (Physurus Lindl.) caule erecto; fol. ovato-lanceolatis acuminatis 3-nerviis; spica conica densissime imbricata pubescente; labello apice lunato apiculato; calcare vesicato. In Peruria. 2.

7. *M. repens* (Pelexia Poepp. et Lindl. n. sp. t. 124. f. a—e) pubescens labello elliptico utrinque emarginato lobo terminali reniformi apiculato dentato; spica elongata; scapo medio folioso; fol. petiolatis lanceolatis acutis. In Peruria. 2.

b. Labellum apice dilatatum angulatum aut rotundatum.

8. *M. minor* Presl; scapo tenui erecto basi folioso; fol. ellipticis acuminatis; spica linearis laxa; floribus minutis; labello linearis apice dilatato emarginato; calcare scrotiformi ovario duplo breviore. In Peruria. 2.

9. *M. foliosus* (Pelexia Poepp. et Endl.) labello obovato utrinque transversim inciso, lobo terminali curvato acuto integerrimo papilloso; calcare ovario longiore pendulo; spica ovali densiflora; scapo folioso; fol. petiolatis oblongis acuminatis. In Peruria. 2.

10. *M. plantagineus*; caule adscendente; fol. ovato-lanceolatis acutis petiolatis cuneatis dentatis; labello linearis acuminato, apice ovato crenulato recurvo; calcare inflato. Sloane hist. t. 147. f. 2. Physurus et Pelexia Lindl. Satyrium L. In Ind. occ. 2.

11. *M. debilis* (Physurus Lindl.) caule debili filiformi prostrato; fol. ovatis obtusiusculis 3-nerviis; racemo ovato paucifloro obtuso; labello apice dilatato angulato medio bilamellato; calcare inflato obtuso ovarii longitudine. In Brasilia. 2.

12. *M. pictus* (Physurus Lindl.) caule brevissimo; fol. ovatis acutis pictis; petiolo tenui; scapo villoso 2—3-vaginato; racemo conico; sepals glabris; labelli concavi lobo medio truncato apiculato; calcare compresso medio latiore. In Brasilia. 2.

13. *M. Blumei* (Physurus Lindl.) caule adscendente fol. ovato-lanceolatis 3-nerviis; scapo et inflorescentia rufo-pilosus; petalis linearibus integerrimis; labello oblongo concavo apice cordato-ovato reflexo; calcare didymo inflato. Erythrodes Blume. In Java. 2.

c. Labellum lanceolatum.

14. *M. pauciflorus* (Physurus Lindl.) pubescens; labello oblongo integro

denticulato; calcare ovarium adaequante; scapo paucifloro nudo; floribus alternis dissitis; fol. ellipticis obtusis. Pelexia Poepp. et Endl. t. 124. In Brasilia. 2.

d. Labellum apice tridentatum.

15. *M. quercetica* (Physurus Lindl.) caulescens glaberrimus; fol. ovatis acutis membranaceis; spica pauciflora; labello sub apice tripartito constricto; calcare oblongo sepalis paulo breviore. In Am. bor. 2.

4699. *ERYTHRODES* Blume est
MICROCHILUS Blumei.

4700. *SYNASSA* Lindl. (1830).

1. *S. corymbosa* Lindl. Pelexia Lindl. orch. In Peruvia. 2. Scapus pubescens vaginatus. Corymbus capitatus.

4701. *TROPIDIA* Lindl. (1830).

1. *T. curcuitigoides* Lindl. In Ind. or. 2. Glabra. Caulis strictus. Folia linear-lanceolata, in vagina longa striata sessilia. Spica conica. Flores virides.

4702. *CNEMIDIA* Lindl. (1830).

1. *C. angulosa* Lindl. fol. ovato-oblongis acuminatis; sepalis ovatis acutis carinatis lateralibus ultra medium connatis. In Ind. or. 2.

2. *C. semilibera* Lindl. fol. ovalibus utrinque acutis; sepalis linearibus obtusis lateralibus infra medium liberis. In Ind. or. 2.

4703. *PHYSURUS* est *MICROCHILUS* no. 4698.

4704. *BASKERVILLA* Lindl. (1840).

1. *B. assurgens* Lindl. In Peruvia. 2. Planta glaberrima palma-

ris. Folia omnia radicalia obovata acuminata. Spica cylindracea. Flores Gymnadeniae conopseae magnitudine.

4705. *GALERA* Blume (1825).

1. *G. nutans* Blume tab. 3. In Jara. 2. Herba terrestris caulescens. Radix tuberosa. Caulis aphyllus apice spicatus multiflorus. Flores pedicellati nutantes.

4706. *HERPYSMA* Lindl. (1840).

1. *H. longicaulis* Lindl. In Ind. or. 2. Caulis longus adscendens dense foliosus. Folia lanceolata. Spica sessilis oblonga luponina.

4707. *ANOECTOCHILUS* Blume. (1825).

1. *A. setaceus* Blume fl. jav. t. 15. fol. pictis ovatis v. ovalibus acutis discoloribus; spica stricta pauciflora sepalisque pubescentibus; labelli margine setaceo-multifido basi rotundato; sacco conico emarginato. Rumph. 6. t. 41. f. 3. B. R. t. 2010. In Java. 2. Flores albi.

2. *A. Roxburghii* Lindl. fol. pictis ovatis acutis discoloribus; spica laxa multiflora sepalisque pubescentibus; labelli margine setaceo - multifido basi sagittato; sacco conico emarginato. Chrysophaphus Wall. tent. fl. nep. t. 27. In Ind. or. 2. Flores albi.

3. *A. brevitabris* Lindl. fol. pictis subrotundo ovatis discoloribus; spica laxa multiflora glanduloso-pilosa; bracteis ovatis setaceo-acutis; sepalis pubescentibus; labelli margine pinnatifido dentato lamina breviore basi sagittato; sacco emarginato. In Assam. 2.

4. *A. lanceolatus* Lindl. fol. ovato-lanceolatis 1 - coloribus; spica densa multiflora glanduloso-pilosa; sepalis glabris; labelli margine interrupte dentato-fimbriato laminae longitudine; sacco didymo. In Assam. 2.

5. *A. flarescens* Blume; fol. ovato-oblongis; spica pubente multiflora;

sepalis nudis; labello inferne ad margines denticulato. In Java. 2. Flores flavi.

6. *A. pubescens* Blume; fol. ovatis, spica subbiflora sepalisque exterioribus pubescentibus; labello inferne ad margines denticulato. In Java. 2. Flores albi.

7. *A. sandvicensis* Lindl. fol. ovatis; spica subsessili angusta multiflora; bracteis lanceolatis acuminatis appressis ovario linearri brevioribus; labelli marginie integro apice transverse cordato apiculato; sepalis glabris; sacco didymo. In ins. Sandwich. 2.

8. *A. gracilis* Blume; fol. ovatis; spica pauciflora pubente; sepalis glabris; labello edentulo; callis gynostemii erosionis. In Java. 2.

4708. MEJODA Lindl. (1830).

1. *M. rufescens* Lindl. In Penang. 2. Herba spithamea adscendens. Folia pube tenui mollia ovalia. Scapus vaginatus. Spica multiflora. Flores albi.

4709. CHEIROSTYLLIS Blume. (1825).

1. *C. montana* Blume; caule 3-foliato superne pubescente; fol. lanceolatis nervosis membranaceis; labelli laciniis cuneatis apice crispis. In Java. 2. Flores parvi albi.

2. *C. parrifolia* Lindl. fol. petiolatis ovalis acutis undulatis; floribus pilosis; labelli apice subrotundo 4-dentato callis baseos bipartitis; columnae minima brachiis rectis liberis ipsi aequalibus. In Zeylona. 2. Flores minutti albi.

3. *C. pusilla* Lindl. fol. ovatis aristato-acuminatis; floribus glaberrimis; labelli laciniis oblongis apice dentatis; petalis apice rhomboidis; columnae brachiis adscendentibus adnatis. In Sythet. 2.

4710. TRIPLEURA Lin L. (1830).

1. *T. pallida* Lindl. In Ind. or. 2. Herba terrestris glabra caulescens. Folia linearia summa fasciculata vi-

rentia. Spica densa parviflora. Flores albi.

4711. CHLOROSA Blume. (1825).

1. *C. latifolia* Blume; fol. solitariis ovatis v. ovato-oblongis; scapo paucifloro laxe spicato. In Java. 2.

2. *C. gracilis* Blume; fol. binis ovato-oblongis undulatis; scapo ad apicem dense spicato. In Java. 2.

4712. PONTHIEVA R. Br. (1813)

1. *P. glandulosa* R. Br. fol. cuñeato-oblongis in petiolum attenuatis. sepalis lateralibus planis dorsali cum petalis in laminam rhomboideam tridentatam laxe agglutinatis. Neottia B. M. t. 842. Ophrys pubera Michx. In Ind. or. 2. Flores amoene virides.

2. *P. petiolata* Lindl. B. R. t. 760. fol. ovato-oblongis margine crispis petiolis brevioribus; sepalis lateralibus margine revolutis dorsali cum petalis in laminam oblongam indivisam agglutinatis. In ins. Vincentii. 2. Flores rubro-lutei.

4713. CRANICHIS Sw. (1800).

1. *C. aphylla* Sw. Fl. ind. t. 29. f. 1. scapo filiformi pubescente; spica densa; bracteis minutis ovatis; sepalis conniventibus; labello fornicate sepalis majore et coloratore. In Jamaica. 2. Flores albidi.

2. *C. diphylla* Sw. fol. petiolatis acuminatis cordatis nitidis; scapo filiformi; spica parva; sepalis persistentibus; petalis tenerioribus deciduis; labello postice carinato sepalis minore. In Jamaica. 2.

3. *C. pauciflora* Sw. fol. rosulatis oblongis sessilibus scapo apice pubescente; spica laxa; bracteis cucullatis ovarioque pubescentibus; sepalis patulis oblongis acutis; petalis linearibus obtusis; labello ventricoso acuminato membranaceo. In Jamaica. 2.

4. *C. muscosa* Sw. fl. ind. t. 29. f. 3. fol. petiolatis ovato-oblongis nervosis; vaginarum lamina subrotundo-oblonga foliacea; ovariis elongatis acuminatis; sepalis petaliske

patentibus; labello oblongo concavo
venis intus tuberculatis. *In Jamaica.* 2.

5. *C. ovata* Wickstr. caule paniculifolio; fol. radicalibus petiolatis ova-tis acutis obsolete nervosis, caulinis sessilibus; spica pauciflora; bracteis ovato-lanceolatis; capsulis subellipticis. *In Guadelupe.* 2.

6. *C. tubulosa* Lindl. caule glabro distanter vaginato; spica elongata imbricata; bracteis lanceolatis ovario longioribus; sepalis petalisque patentibus basi in tubum brevem connatis; labello ovato medio carnoso, stigmate emarginato. *In Mexico.* 2.

7. *C. ciliata* Humb. Kunth nov. gen. t. 74. fol. petiolatis ovato-ellipticis; scapo pubescente spica ovata glabra laxiuscula; ovarii linearibus; floribus patulis; petalis ciliatis; labello obovato subrotundo trinervi venis validis rectangulis picto. *In Caracas.* 2.

8. *C. foliosa* Lindl. fol. radicalibus obovato-lanceolatis petiolis et scapo diphylo longioribus; spica laxa multiflora glabra; sepalis petalisque aequalibus patulis; labello cymbiformi basi angustato intus verrucoso. *Ponthieva multiflora* Poepp. et Endl. t. 123. *In Peruvia.* 2. Flores parvi albi.

4714. PTERICHIS Lindl. (1840).

1. *P. galeata* Lindl. *In Peruvia.* 2. Herba terrestris Sarcoglossidis minoris habitu. Scapus tomentosus. Spica flexuosa. Bracteae glanduloso-tomentosae. Sepala dense glanduloso-tomentosa.

4715. PRESCOTTIA Lindl. (1823).

1. *P. plantaginea* Lindl. fol. erectis lanceolato-oblongis in petiolum lamina breviorem sensim angustatis; spica stricta dense cylindracea; bracteis ovarii longitudine; labello oblongo emarginato. *In Brasilia.* 2.

2. *P. phleoides* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis erectis in petiolum lamina breviorem sensim angustatis; spica stricta densissima ovali; bracteis florum longitudine; labello ovato acuto. *In Brasilia.* 2.

3. *P. lancifolia* Lindl. fol. erectis lanceolatis acutissimis in petiolum angustatis scapo aequalibus vaginis bracteisque setaceo-acuminatis; spica cernua imbricata; labello hemisphaericō. *In Brasilla.* 2. Flores albi.

4. *P. colorans* Lindl. B. R. t. 1915. folio solitario ovato oblongo acuminato basi cucullato petioli longitudine; spica densa longissima erecta; petalis subulatis adscendentibus. *In Brasilia.* 2.

5. *P. petiolaris* Lindl. fol. latis ovali-lanceolatis acuminatis petiolo longissimo brevioribus; spica densissima elongata multiflora; petalis sepalisque revolutis. *In Peruvia.* 2. Spica pedalis.

6. *P. stachyodes* Lindl. fol. oblongis angustis basi cucullatis petiolo aequalibus; spica imbricata basi rari-flora; petalis sepalisque revolutis; labello conico auriculis elongatis; bracteis ovarii longitudine. *Cranichis Sw. fl. ind. t. 29. f. 4. In Ind.or.* 2.

7. *P. oligantha* Lindl. fol. petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis luidis; scapo filiformi; vaginulis minutis acutis; spica filiformi; floribus numerosis omnium minutissimis; sepalis conniventibus; labelli galeati obtusissimi auriculis elongatis. *Cranichis Sw. l. c. t. 29. f. 2. In Jamaica.* 2. Flores albo-rubri.

8. *P. leptostachya* Lindl. fol. oblongis acutis petiolis suis duplo longioribus; spica tenui rariflora; petalis sepalisque revolutis; labello oblongo emarginato basi valde gibbo; bracteis ovario multo brevioribus. *In Brasilia.* 2.

9. *P. tenuis* Lindl. fol. rosulatis adscendentibus ovalibus acutis; spica imbricata basi rariflora; sepalis lateribus erectis; petalis sepaloque dorsali ovalo-triangularibus subaequalibus reflexis labello subrotundo mucronato; bracteis ovarii longitudine. *In Peruvia.* 2.

10. *P. micrantha* Lindl. fol. rosulatis ovalibus 3-nerviis acutis; spica gracili imbricata; sepalis revolutis; petalis linearibus obtusis; labello subrotundo mucronato cum sepalis lateribus in gibbum connato. *In Brasilia.* 2.

4716. ALTENSTEINIA H. et B. (1821).

1. *A. fimbriata* H. et K. nov. gen. t. 72. spica elongata cylindracea; labello subrotundo-ovato fimbriato; gynostemio apice denticulato. *In Quito.* 2.

2. *A. pilifera* H. et K. t. 73. spica ovato-oblonga; labello oblongo acuminato; gynostemio apice pilifero. *In Quito.* 2.

3. *A. paleacea* H. et K. vaginis caulis bracteisque ramentaceis membranaceis; spica cylindracea densissima; sepalis petalisque loratis obtusis recurvis; labello oblique inflexo calceiformi fimbriato. *In Quito.* 2.

4717. ZEUXINE Lindl. (1836).

1. *Z. sulcata* Lindl. fol. linearilanceolatis acuminatis aggregatis cauli aequalibus; spica densa subsessili; labello apice reniformi. *In Bengal.* 2. 4-8-poll. Flores albi.

2. *Z. membranacea* Lindl. canle elongato; fol. linearibus distantibus apiculatis reticulatis; spica pedunculata cylindracea imbricata; labello membranaceo apice oblato apiculato. *In Ind. or.* 2.

3. *Z. goodyeroides* Lindl. fol. ovato-lanceolatis petiolulatis medio pallidis; scapi vaginis 2 distantibus petaloideis acuminatis; spica rara pubescente; sepalis lateralibus patentissimis; labelli lamina membranacea subrotunda. *In Ind. or.* 2. Flores albi.

4. *Z. integerrima* Blume (sub *Adenostyli*). labelli limbo integerrimo. *In Java.* 2.

4718. ZOSTEROSTYLLIS Blume. (1825).

1. *Z. Arachnites* Blume; labello linear-oblongo glabro; sepalis petalique setaceis. *In Java.* 2.

2. *Z. zeylanica* Lindl. labello ova-to acuminato intus tomentoso; sepalis linearilanceolatis. *In Zeylona.* 2. Flores herbacei.

4719. ROPHOSTEMON Blume. (1825).

1. *R. concolor* Blume; fol. concor-tibus glabris; scapo multifloro. *In Java.* 2.

2. *R. discolor* Blume; fol. discoloribus supra in nervis infra muricatis; scapo subbifloro. *In Java.* 2.

4720. CRYPTOSTYLIS R. Br. (1810).

1. *C. longifolia* R. Br. floribus porrectis; labello convexo marginibus recurvis: axi a basi striis 2 elevatis desinentibus in collum ovatum apice approximatum; fol. oblongis; spica elongata. *Bauer ill. t. 17 et 18.* *Mallaxis subulata* Labill. nov. t. 212. *In Nor. Holl.* 2.

2. *C. ovata* R. Br. floribus porrectis; labello convexo marginibus re-curvis axi intus infra medium laevi; juxta apicem processu didymo elongato obtuso pubescente calloso; fol. oblongo-ovatis petiolo suo longioribus; spica coarctata. *In Nor. Holl.* 2.

3. *C. erecta* R. Br. floribus erectis; labello supra concavo axeos carina supra membranacea elevatiore. *In Australia.* 2.

4721. CALOCHILUS R. Br. (1810).

1. *C. campestris* R. Br. labello sepalis acuminatis parum longiore semilanceolato lamina 5-plo breviore; columna basi biglandulosa bracteis apice setaceis ovario aequalibus; spica rara 4-8-flora; fol. radicalibus nulis caulinis 3 distantibus acuminatis; anthera mucronata. *In Australia.* 2.

2. *C. herbaceus* Lindl. labello sepalis ovatis acutis parum longiore; acumine brevi recto semilanceolato; columna basi biglandulosa bracteis apice setaceis ovario aequalibus; spica brevi 2-4-flora; fol. radicalibus nulis caulinis 3 distantibus acuminatis; anthera mucronata. *In Tasmania.* 2.

3. *C. paludosus* R. Br. labello perianthio duplo longiore; acumine ligulato flexuoso dimidium laminae aequante; columna basi eglandulosa; bracteis ovario brevioribus; spica 2-4-flora; anthera obtusa. *In Australia.* 2.

4722. GOMPHICHIS Lindl. (1840).

1. *G. goodyeroides* Lindl. *In Peru-*
viria. 2. Herba robusta bipedalis. Folia coriacea lanceolata. Scapus apice

tomentosus. Spica densissima oblonga tomentosa.

4723. STENOPTERA Presl. (1831).

1. *S. peruriana* Presl. Rel. Haen. t. 14. fol. oblongo-lanceolatis acutis glabris; scapo pubescente; spica tenui elongata tomentosa; sepalis herbaceis tomentosis apice recurvis; petalis linearibus revolutis; labelli lamina coriacea oblonga emarginata. In Peruvia. 2.

2. *S. acuta* Lindl. fol. lanceolatis acutissimis vaginis scapi acuminate foliaceis; spica densa elongata multiflora; collo floris pubescens abbreviato; sepalis lateralibus acutissimis falcatis antico ovato breviore; petalis linear-lanceolatis acutis ciliatis; labelli lamina oblonga acuta serata crispa; columna pubescente. In Brasilia. 2.

3. *S. cardinalis* Lindl. fol. hysteranthiis glaberrimis; spica oblonga multiflora; collo floris elongato; sepalis lateralibus lanceolatis ovario aequalibus antico petalisque patentissimis spiralibus linearis; labelli lamina lanceolata; columna tomentosa. In Peruvia. 2.

4724. PRASOPHYLLUM R. Br. (1810).

1. Sepala lateralia basi connexa.

1. *P. brachystachyum* Lindl. sepalis acutissimis nudis lateralibus carnosis dorsali membranaceo duplo longioribus basi cohaerentibus, petalis dorsali brevioribus acutissimis; labelli lamina lanceolata basi obscure bicarinata imberbi; lacinias columnae bifidis. In Tasmania. 2.

2. *P. rufum* R. Br. sepalis lateralibus distinctis dorsali petalisque nudis; labelli lamina elongato-cuneata apice denticulata marginibus brevissime ciliatis; columnae lacinias bifidis; antherae mucrone setaceo. In Australia. 2.

3. *P. nigricans* R. Br. sepalis lateralibus basi cohaerentibus dorsali petalisque nudis; labelli lamina oblongo-ovata bicarinata imberbi; lacinias lateralibus columnae triangulari-

bus bidentatis; antherae mucrone brevissimo. In Australia. 2.

4. *P. truncatum* Lindl. fol. spica multiflora longiore; ovariis subrotundis obovatisque; bracteis minimis squamaeformibus; sepalis linearibus acuminatis lateralibus liberis; petalis linearibus obtusis; labelli lamina petalis aequali bilamellata, dimidio superiore ovato undulato; columnae lacihiis inaequalibus bidentatis. In Tasmania. 2.

b. Columnae lacihiæ laterales apice integrae.

5. *P. patens* R. Br. ovariis obovatis bractea subrotunda ter longioribus; sepalis acutis lateralibus distinctis patentibus; labello longitudine sepalorum, dimidio superiore ovato oblongo undulato; columnae lacihiis obtusissimis leviter emarginatis. In Australia. 2.

6. *P. lutescens* Lindl. ovariis cylindricis; bracteis ovatis basi longioribus; sepalis carnosis, lateralibus obtusis labello undulato sepalis breviore; columnae lacihiis obtusis integrerimis. In Tasmania. 2.

7. *P. strictum* R. Br. ovariis cylindraceo-oblongis bractea ovata acuminata duplo longioribus; spica pauciflora; sepalis lateralibus longitudinatiter cohaerentibus; labello oblongo obtuso sepalis aequali, marginibus undulatis. In Australia. 2.

8. *P. australe* R. Br. ovariis cylindricis subpedicellatis bractea subacuminata vix duplo longioribus; sepalis apice attenuatis obtusis lateralibus infra cohaerentibus supra distinctis; labello ovato apice undulato ultra laminam longe producto. In Tasmania. 2.

9. *P. macrostachyum* R. Br. ovariis cylindraceo-oblongis; bracteis lanceolatis pedicellos subaequantibus; spica elongata; sepalis acutissimis lateralibus approximatis; columnae lacihiis anthera brevioribus. In Australia. 2.

10. *P. flavum* R. Br. ovariis cylindraceis subsessilibus bractea acutissima vix duplo longioribus; spica multiflora; sepalis acutiusculis lateralibus extra medium distinctis; columnae lacihiis antheram aequantibus. In Australia. 2.

11. *P. elatum* R. Br. ovariis cylindraceis sessilibus bractea acutiuscula duplo longioribus; sepalis acutis lateralibus infra distinctis; labello undulato acuminate; columnae alis linearibus obtusis hinc emarginatis antherae longitudine. *In Australia.* 2.

12. *P. macrotys* Lindl. ovariis cylindraceis subsessilibus bractea acutissima plus duplo longioribus; spica multiflora; sepalis lateralibus superne distinctis basi cohaerentibus; labello oblongo-lanceolato undulato obtuso; columnae laciniis linearibus anthera duplo longioribus. *In Australia.* 2.

13. *P. giganteum* Lindl. ovariis cylindraceis subsessilibus bracteis acutis plus duplo longioribus; sepalis acutis lateralibus superne distinctis basi cohaerentibus; labello oblongo-lanceolato undulato obtuso; columnae laciniis linearibus obtusis anthera paulo longioribus. *In Australia.* 2.

14. *P. alpinum* R. Br. ovariis obovatis; bracteis subrotundis pedicellos subaequantibus; sepalis acutis lateralibus approximatis; labelli dimidio superiore lineari-lanceolato undulato; columnae laciniis obtusissimis hinc emarginatis. *In Tasmania.* 2.

15. *P. affine* Lindl. ovariis obovatis; bracteis subrotundis pedicellos superantibus; sepalis acutis lateralibus approximatis; labelli dimidio superiore lineari-lanceolato undulato; lamina completa; columnae laciniis hinc emarginatis. *In Australia.* 2.

16. *P. rostratum* Lindl. ovariis subrotundo-obovatis sessilibus; bracteis acuminatissimis; spica rara multiflora; sepalis linearibus setaceis lateralibus liberis; labelli plani dimidio inferiore orbiculari superiore lineari obtuso bicarinato; columnae laciniis hinc emarginatis. *In Tasmania.* 2.

17. *P. fuscum* R. Br. ovariis obovatis bractea late ovata acuta ter longioribus; spica densa cylindracea; sepalis acuminatis lateralibus basi cohaerentibus labelli dimidio superiore duplo angustiore lineari-lanceolato marginibus simplicibus. *In Australia.* 2.

18. *P. orale* Lindl. ovariis clavatis bractea ovali pluries longioribus; sepalis obtusis posticis distinctis labelli longitudine; labelli ovalis supra medium callosi apice obtuso undulato;

columnae laciniis semiovatis integris. *In Australia.* 2.

19. *P. gracile* Lindl. folio caule multo longiore; spica rara multiflora; ovariis pedicellatis bractea ter longioribus; sepalis acuminatis lateralibus basi cohaerentibus; labello cordato ovato acuto nudo medio semel undulato. *In Australia.* 2.

c. Sepala lateralia basi saccata.

20. *P. gibbosum* R. Br. ovariis cylindraceis; spica multiflora imbricata; sepalis lateralibus papilloso cohaerentibus basique saccatis; petalis spatulatis labelli lamina oblonga obtusa papillosa; columnae laciniis membranaceis hinc dentatis. *In Australia.* 2.

21. *P. parvifolium* Lindl. ovariis clavatis; spica pauciflora obtusa; sepalis acuminatis basi saccatis; petalis conformibus; labelli lamina lanceolata undulata obtusa basi bilamellata; columnae laciniis linearibus obtusis; anthera apiculata rostellate longissimo petaloideo. *In Australia.* 2.

22. *P. fimbriatum* R. Br. sepalis lateralibus infra approximatis et juxta basin gibbosis dorsali petalique ciliatis; labelli lamina longissime fimbriata; laciniis columnae bipartitis; antherae rostro elongato. *In Australia.* 2.

4725. HAPLOCHILUS Endl. (1840).

1. *H. regius*; caule glabro; fol. ovato-lanceolatis acuminatis margine atroviridis; scapo piloso bisquamoso; spica laxa pauciflora secunda; bracteis acuminatis ovarii longitudine; sepalis basi villosis dorsali apice recurvo petaloideo; petalis crispis. Monochilus Lindl. *In Zeylona.* 2.

2. *H. flurus*; caule erecto glabro; fol. lineari-lanceolatis acuminatis sessilibus enerviis; scapo pubescente; spica secunda multiflora; sepalis petalique ovatis obtusis; labelli laciniis oblongis integris; callis 2. Monochilus Wall. Etaeria Lindl. *In Ind. or.* 2. Flores flavi.

3. *H. nervosus*; caule erecto glabro; fol. ovatis nervosis; scapo elongato piloso 1—2 squamoso; spica laxa pauciflora; sepalis ovatis herbaceis acutis basi pilosis; petalis apice rotundis; callis labelli utrinque tribus. Mono-

chilus Wall. *Etaeria* Lindl. *In Ind. or.* 2.

4. *H. longilabris*; caule glandulosopilosum; fol. subbinis ovatis acutis undulatis; scapi vaginis 3 acuminatis; spica pauciflora; bracteis ovatis acutis ovario hirsuto brevioribus; sepalis hirsutis acutis; petalis obtusis; labelli laciniis elongatis, utrinque 4-dentatis. *Monochilus* Lindl. *In Zeylona.* 2. Flores albi.

5. *H. affinis* caule piloso; fol. ovatis 3-nervis; scapo medio vaginato; spica secunda pauciflora; bracteis subrotundis cucullatis acuminatis pilosis ovarii arachnoidei longitudine; sepalis ovatis acutis; petalis apice rotundatis; labelli laciniis oblongis grosse crenatis. *Monochilus* et *Etaeria* Lindl. *In Ind. or.* 2.

4726. CHENOPLESIUM R. Br. (1810).

1. *C. Baueri* R. Br. *In Australia.*
2. Herba habitu *Prasophylli.*

4727. ORTHOCERAS R. Br. (1810).

1. *O. strictum* R. Br. bracteis ultra sepalam dorsale longe productis. *In Australia.* 2.

2. *O. Solandri* R. Br. bracteis ultra sepalam dorsale vix productis. *Diuris Novae Zeelandiae* Rich. nov. zeel. t. 25. f. 1. *Ophrys cornuta* Solaund. *In Nov. Zeelandia.* 2.

4728. BURNETTIA Lindl. (1840).

1. *B. cuneata* Lindl. *In Tasmania.* 2. Folia nulla. Flores duo pedicellati. Sepala exsiccata linearia acuta.

4729. DIURIS Sm. (1804).

a. Labellum basi bicarinatum.

1. *D. maculata* Sm. exot. bot. t. 30. fol. angustissimis; floribus maculatis; sepalis lateralibus petalis brevioribus; petalis rhomboides acutis; labelli laciniis oblongis subdenticulatis, intermedia subrotunda; columnae laciniis linearibus acute incisis. *In Australia.* 2.

2. *D. pardina* Lindl. fol. ensiformibus canaliculatis scapi longitudine; floribus maculatis; sepalis lateralibus linearis-lanceolatis petalis aequalibus; petalis subrotundis; labelli laciniis oblongis obtusis lateralibus integerrimis; columnae laciniis acutis sinuato-serratis. *In Australia.* 2.

3. *D. currifolia* Lindl. fol. linearibus canaliculatis scapo subtrifloro brevioribus; floribus maculatis; sepalis lateralibus linearibus petalis oblongis obtusis aequalibus; labelli laciniis lateralibus linearibus apice denticulatis intermedia cuneata integerima; columnae laciniis acutis serratis. *D. maculata* B. M. t. 3156. *In Tasmania.* 2.

4. *D. palustris* Lindl. fol. filiformibus scapo corymboso aequalibus; floribus maculatis; sepalis lateralibus petalis nonnihil longioribus; petalis ovalibus obtusis; labelli laciniis subaequilongis integerrimis rotundatis intermedio oblata plicata; columnae laciniis apice falcatis subserratis. *In Tasmania.* 2.

5. *D. emarginata* R. Br. labelli lacinia intermedia basi intus bicarinata lateralibus duplo longiore; petalis emarginatis; fol. subulatis canaliculatis scapo ter brevioribus; spica pauciflora. *In Australia.* 2.

6. *D. setacea* R. Br. labelli lacinia intermedia basi intus bicarinata lateralibus duplo longiore; fol. setaceis scapo 1—2-floro 4—5-ies brevioribus. *In Australia.* 2.

7. *D. pedunculata* R. Br. labelli lacinia intermedia basi intus carina duplice pubescente lateralibus triplo longiore; sepalis lateralibus labello parum longioribus; petalis lanceolatis acutissimis; fol. scapo 2—3-floro longioribus. *In Australia.* 2.

8. *D. lanceolata* Lindl. fol. linearibus scapi longitudine; vaginis 2—3 herbaceis acuminatis; petalis lanceolatis acutis; labelli bicarinati basi pubescentis laciniis lateralibus nanis serratis intermedia ovata acuta. *In Tasmania.* 2.

9. *D. aurea* Sm. exot. bot. t. 9. fol. linearis-eusiformibus scapo 2—3-floro brevioribus; sepalis lanceolato-linearibus petalis aequalibus dorsali rotundato obtuso; petalis ellipticis acutis; labelli bicarinati laciniis lateralibus linearibus nanis intermedia

ovata acuta. *D. spathulata* Sw. In Australia. 2.

10. *D. longifolia* R. Br. fol. racemo 3—4-floro aequalibus; sepalis lateralibus petalis subdupo longioribus dorsali ovato rotundato; petalis oblongis obtusis; labelli bicarinati laciniis laciniis lateralibus nanis rotundatis intermedia reniformi. In Australia. 2.

11. *D. elongata* Sw. fol. linearibus scapo elato 2—4-floro dimidio brevioribus; sepalis lateralibus petalis fere triplo longioribus; petalis oblongis; labelli bicarinati laciniis lateralibus nanis linearibus oblique emarginatis intermedia ovata undulata. In Australia. 2.

12. *D. alba* R. Br. fol. scapum subaequantibus; sepalis lateralibus petalis duplo longioribus; petalis ovalibus acutis; labelli bicarinati laciniis lateralibus linearibus obtusis, intermedia subcordato-ovata acuta carinis apice crenatis. In Australia. 2.

b. **Labellum basi ecarinatum**
v. **1-carinatum**.

13. *D. sulphurea* R. Br. fol. linearibus scapo 3—5-floro duplo brevioribus; floribus maculatis; sepalis lateralibus petalis nonnihil longioribus; dorsali ovato bimaculato; petalis ovalibus acutis; columnae laciniis falcatis integerrimis. In Australia. 2.

14. *D. pauciflora* R. Br. fol. subulatis scapo 1—2-floro 3—4-plo brevioribus; floribus immaculatis; sepalis lateralibus petalis aequalibus; petalis lato-ellipticis subacutis; columnae laciniis linearibus undulatis. In Australia. 2.

15. *D. filifolia* Lindl. Swan Riv. t. VIII, B. fol. setaceis scapo multifloro univaginato multo brevioribus immaculatis; sepalis lateralibus petalis aequalibus; petalis ovalibus acutis; labelli lobo medio ovato acuto complicato lateralibus rotundatis dentatis. In Australia. 2. Flores flavi.

16. *D. carinata* Lindl. fol. filiformibus scapo multifloro bivaginato multo brevioribus; floribus subsecundis maculatis; sepalis lateralibus petalis aequalibus; petalis oblongis obtusis; columnae laciniis semiovatis falcatis integerrimis. In Australia. 2.

17. *D. taxiflora* Lindl. caule multifloro; floribus flavis internodiis bre-

vieribus; pedunculis longissimis capillaribus; labelli lobo medio subtundo basi ima plicato lateralibus multo minoribus margine postico denticulatis. In Australia. 2.

18. *D. Drummondii* Lindl. fol. ensiformibus erectis scapo multifloro duplo brevioribus; floribus flavis secundis; sepalis petalis aequalibus; petalis ovalibus acutis labelli lobo medio unicarinato rhombeo lateralibus rotundatis integerrimis duplo longiore. In Australia. 2.

19. *D. corymbosa* Lindl. fol. ensiformibus erectis scapo 1—3-floro brevioribus; floribus purpureis subcorymbosis; sepalis lateralibus petalis aequalibus; petalis obovatis emarginatis; labelli lobis rotundatis subaequalibus integerrimis intermedio subemarginato basi ima elevato; columnae laciniis acutis crenatis. In Tasmania. 2.

20. *D. porrifolia* Lindl. fol. lanceolatis linearibusque acuminatis scapo 4—6-floro 1-phyllo brevioribus; pedicellis bracteis foliaceis brevioribus; floribus maculatis; sepalis petalorum longitudine; petalis ovalibus acutis; labelli lobis oblongis rotundatis intermedio minore medio elevato. In Australia. 2.

4730. EPIBLEMA R. Br. (1810).

1. *E. grandiflorum* R. Br. In Australia. 2. Caulis $\frac{1}{2}$ -ped. glaberrimus. Folium solitarium filiforme recurvum. Racemus 2—5-florus. Flores caerulei speciosi.

4731. THELYMITRA Forst. (1776).

a. **Columuae lobis lateralibns lata basi sessilibus.**

1. *T. fusco-lutea* R. Br. perianthio patulo; cuculli laciniis lateralibus conniventibus connatis lacero-fimbriatis margine postico villosis, intermedia extrusa erecta nuda; fol. lanceolatis glabris. In Australia. 2. Flores flavi.

2. *T. stellata* Lindl. folio radicali oblongo glabro; racemo cylindraceo; floribus fuscisstellato-patentibus; laciniis acuminatis; cuculli laciniis lateralibus fimbriatis margine postico pul-

vinatis villosis; intermedia carnosa galeata breviore dorso tuberculata.

In Australasia. 4.

3. *T. carnea* R. Br. perianthio connivente; cuculli laciniis extimis denticulatis imberibus intermedia transversa glabra; folio linearis brevis; scapo flexuoso 1—3-floro. *In Australasia. 4.*

4. *T. jarauica* Blume; perianthio patulo; cuculli laciniis lateralibus brevissimis penicillatis lobo medio nudo emarginato edentulo; spica 3—5-flora. *In Java. 4.*

b. *Columnae lobis lateralibus pedunculatis stuposis.*

5. *T. macrophylla* Lindl. folio radicali erecto lanceolato; racemo elongato cylindrico; floribus purpureis; cuculli laciniis lateralibus parvis sessilibus stuposis, intermedia majore fornicata glabra indivisa. *In Australasia. 4.*

6. *T. arenaria* Lindl. folio linearis, racemo 2—6-floro; cuculli emarginati glabri laciniis lateralibus petiolatis stuposis; floribus purpureis patulis. *In Tasmania. 4.*

7. *T. nuda* R. Br. folio angusto ensiformi canaliculato; spica multiflora; cuculli laciniis extimis penicellatis petiolatis intermedia emarginata lobulis rotundatis integris. *In Tasmania. 4.*

S. *T. Forsteri* Sw. folio ensiformi canaliculato; racemo 4—6-floro; perianthio erectiusculo patulo; cuculli laciniis extimis pedicellatis stuposis, intermedia cuneata rotundata emarginata. Rich. fl. zeel. t. 25. f. 2. *Serapias regularis* Forst. *In Nov. Zeland. 4.*

9. *T. versicolor* Lindl. folio linearis; racemo paucifloro; floribus patulis; cuculli laciniis lateralibus pedicellatis stuposis, intermedia biloba margine inflexa. *In Tasmania. 4.*

10. *T. angustifolia* R. Br. perianthio patulo; cuculli laciniis extimis penicillatis intermedia dorso nuda emarginata lobulis dentalis; spica pauciflora; folio scapum aequante. *In Australasia. 4.*

11. *T. graminea* Lindl. folio radicali linearis; racemo secundo multifloro; floribus purpureis; cuculli laciniis lateralibus stuposis unguiculatis

intermedia fornicata integerrima glaberrima. *In Australasia. 4.*

12. *T. villosa* Lindl. Swan R. t. VIII, c. folio radicali oblongo apiculato subtus villosi, caulinis linearibus acuminatis glabris; racemo cylindrico; floribus luteis; cuculli laciniis lateralibus glandulosis recurvis intermedia denticulata emarginata. *In Australasia. 4.*

13. *T. crinita* L. folio radicali apiculato glabro; racemo cylindrico; floribus purpureis; cuculli laciniis lateralibus barbatis unguiculatis intermedia fornicata emarginata dorso glanduloso-villoso. *In Australasia. 4.*

14. *T. aristata* Lindl. folio ensiformi canaliculato vaginisque acutissimis; spica multiflora; bracteis aristatis; cuculli laciniis lateralibus pedicellatis villosis; intermedia emarginata glanduloso-serrata. *In Tasmania. 4.*

15. *T. tigrinus* R. Br. perianthio patulo maculato; cuculli laciniis lateralibus distinctis stuposo-barbatis, intermedia breviore crisfata; fol. linearibus canaliculatis. *In Australasia. 4.*

17. *T. campanulata* Lindl. folio radicali linearis; racemo secundo multifloro; floribus purpureis campanulatis; cuculli laciniis lateralibus subnatis apice barbatis intermedia tripartita dorso glandulosa. *In Australasia. 4.*

18. *T. ixoides* Sm. exot. bot. t. 29. perianthio patulo; cuculli laciniis lateralibus penicillatis, intermedia trifida, lobulis lateralibus apice erosis medio breviore multo latiore dorso glanduloso; spica multiflora. *In Australasia. 4.*

19. *T. canaliculata* R. Br. perianthio patulo; cuculli laciniis extimis penicillatis intermedio dorso nudo multifida lobulis corngatis; exteriore longiore remotiore; spica multiflora. *In Australasia. 4.*

20. *T. iridioides* R. Br. folio angusto ensiformi plano; spica elongata multiflora; cuculli laciniis lateralibus unguiculatis stuposis intermedia trifolia; lobis lateralibus erosis intermedio verrucoso. *In Australasia. 4.*

21. *T. juncifolia* Lindl. folio linearis; spica 1—5-flora; floribus parvis purpureis variegatis; cuculli membranacei laciniis lateralibus petiolatis fibratibus intermedia 3-loba; lobis late-

ralibus cuneatis erosionis; centrali granuloso. *In Tasmania*. 2.

22. *T. media* R. Br. perianthio patulo; cuculli laciniis extimis penicillatis intermedia dorso nuda 3-fida, lobulo medio dimidia breviore emarginato spica multiflora. *In Australia*. 2.

**4732. MACDONALDIA Gunn.
(1838).**

Clinandrii lobis lateralibus obsoletis.

1. *M. Smithiana* Gunn. caule unifloro 3-phyllo; floribus luteis; sepalis petalisque obtusis; cuculli 3-lobi glabri laciniis lateralibus nanis intermedia mutica; anthera tomentosa. Lindl. Swan R. t. IX. B. *In Tasmania*. 2.

2. *M. concolor* Lindl. caule 3-phyllo subbifloro; floribus luteis; sepalis petalisque obtusis; cuculli 3-lobi glabri laciniis lateralibus majoribus rotundatis, intermedia minima glabra. *Thelymitra flexuosa* Endl. *In Tasmania*. 2.

3. *M. antennifera* Lindl. Ic. t. IX. C. caule subtriphylo paucifloro; floribus luteis; sepalis petalisque obtusis; clinandrio a tergo appendicibus 2 carnosis clavatis emarginatis aucto. *In Nov. Holl.* 2.

4. *M. variegata* Lindl. floribus purpureis; sepalis petalisque linearibus acuminatis; clinandrii laciniis lateralibus lanceolatis subcarinatis intermedia obsoleta papillosa; anthera carnosa obtusa elongata, loculis semi-circularibus. *In Nov. Holl.* 2.

5. *M. spiralis* Lindl. folio radicali spirali caulinio soiitario ovato; caule 1-floro; floribus purpureis; clinandrii laciniis lateralibus carnosis dolabri-formibus; intermedia obsoleta papillosa; anthera obtusa apice pubescente. *In Nov. Holl.* 2.

6. *M. cyanea* Lindl. caule stricto subbifloro; floribus cyaneis; clinandrii laciniis lateralibus apice dentatis intermedia obsoleta papillosa; anthera apice 3-loba. *In Tasmania*. 2.

7. *M. venosa* Lindl. caule stricto bifloro; floribus caeruleis campanulatis; labello sepalis petalisque serrulatis; clinandrii lobis lateralibus spiraliter involutis intermedio papilloso;

anthera basi verrucosa. *Thelymitra* R. Br. *In Nov. Holl.* 2.

4733. DECAISNEA Brogn. (1832).

1. *D. densiflora* Brongn. in Dup. voy. t. 39. *In Brasilia*. 2. Folia rosulata oblonga obtusa. Spica densissima cylindracea. Perianthium revolutum.

4734. MICROTIS R. Br. (1810).

1. *M. parviflora* R. Br. sepalis lateribus revolutis petalisque linearibus obtusis; labello ovato acuto margine nudo apice tenui basi utrinque callis verrucosis aucto; spicae floribus omnibus approximatis. *In Nov. Holl.* 2.

2. *M. atrata* Lindl. folio basi cullato caule longiore; spica densa cylindracea; sepalis lateralibus oblongis revolutis supremo subrotundo; petalis ovatis acutis; labello oblongo obtuso nudo. *In Nov. Holl.* 2.

3. *M. porrifolia* Spr. sepalis acutis patulis; petalis obovato-linearibus; labello obovato-oblongo retuso basi bicalloso margine tuberculato-incrassato; spicae floribus inferioribus distantibus. M. Banksii M. M. t. 3377. *In Nov. Zeet.* 2.

4. *M. pulchella* R. Br. sepalis lateribus petalisque ovali-oblongis patentibus obtusiusculis; galea planiuscula; labello oblongo obtuso crispato emarginato nudo, callis baseos confluentibus convexis. *In Nov. Holl.* 2.

5. *M. arenaria* Lindl. sepalis lateribus linearibus revolutis obtusis dorsali orbiculata acuminata galeata; petalis filiformibus obtusis; labello oblongo truncato apiculato plano medio carnoso, callis baseos confluentibus concavis. *In Tasmania*. 2.

6. *M. media* R. Br. sepalis lateribus revolutis oblongis acutis; petalis linearibus obtusis; labello oblongo-cuneato truncato verrucis globosis granulosis marginato basi utrinque incrassato disco bicalloso. *In Nov. Holl.* 2.

7. *M. alba* R. Br. sepalis lateribus revolutis linearibus acutis; petalis obovato-linearibus obtusis; labelli dimidia inferiore lineari superiore dilatata bifida; disco incrassata marginibus undulatis calloso-tuberculatis. *In Nov. Holl.* 2.

8. M. rara R. Br. sepalis laterilibus revolutis petalisque linearibus acutis; labello oblongo cuneato retuso infra apicem calloso margine subundulato nudo; baseos callis confluentibus; spicae floribus inferioribus distantibus.
In Nov. Holl. 2.

4735. ACIANTHUS R. Br. (1810).

1. A. exsertus R. Br. floribus racemosis aristatis brevissimis; galea basi attenuata; petalis horizontaliter reflexis; labello apice papuloso; columna exserta.
In Nov. Holl. 2.

2. A. fornicateus R. Br. floribus racemosis; aristatis perianthio quadruplo brevioribus; petalis erectiusculis; labello longitudinaliter papuloso; columna inclusa.
In Nov. Holl. 2.

3. A. caudatus R. Br. scapo 1—2-floro; floribus aristatis longissimis; folii marginibus undulatis.
In Nov. Holl. 2.

4. A. rivularis Cunnigh. caule unifloro folio breviore; sepalis laterilibus petalisque longissime et tenuissime aristatis; galea acuminate; labello cordato acuminato venoso, disco papilloso margine tenuissime erose crenulato.
In Nov. Zel. 2.

4736. CYRTOSTYLIS R. Br. (1810).

1. C. reniformis R. Br. *In Nov. Holl.* 2. Tubercula sphaerica. Caulis unifolius. Folium membranaceum amplexicaule reticulatum. Racemus secundus pauciflorus.

4737. CHIOGLOTTIS.

1. diphyllea R. Br. sepalo dorsali spathulato petalis reflexis integris angustiore; labelli obovati disco toto tuberculato. Epipactis reflexa Labill. l. c. t. 211. f. 1. *In Nov. Holl.* 2.

1. C. Gunnii Lindl. sepalo dorsali obtusiusculo, petalis erectis hinc serrulatis latiore et longiore; labelli subrotundi disco nudo axis seriebus 3 tuberculato.
In Nov. Holl. 2.

4738. ERIOCHEILUS R. Br. (1810).

1. E. autumnalis R. Br. folio epigaeo ovato basi cucullato; caule 1-

plurifloro puberulo; bracteis subrotundis membranaceis ovariiisque pubescentibus; petalis apice dilatatis denticulatis; labello obovato revoluto; antherae rima glabra. Epipactis cucullata Labill. nov. Holl. t. 211. f. 2.
In Nov. Holl. 2.

2. E. tenuis Lindl. folio epigaeo membranaceo ovato-oblongo elongato obtuso; caule tenui unifloro bracteaque ovata glabro; ovario tomentoso.
In Nov. Holl.

3. E. scaber Lindl. folio epigaeo coriaceo subrotundo-ovato acutissimo; caule nano unifloro ovario bracteisque scabris.
In Nov. Holl. 2.

4. E. dilatatus Lindl. folio medio caulis inserto linearis-lanceolato coriaceo basi dilatato; caule paucifloro ovariiisque glabris.
In Nov. Holl. 2.

5. E. latifolius Lindl. folio medio caulis inserto linearis-oblongo; caule multifloro apice pubescente; bracteis oblongis ciliatis rachi ovariiisque tomentosis; labello subrotundo; sepalo dorsali columna multo longiore; antherae rima tomentosa.
In Nov. Holl. 2.

6. E. multiflorus Lindl. folio medio caulis inserto ovali acuminato; bracteis oblongis ciliatis rachi ovariiisque tomentosis; labello ovali obtuso sepalo dorsali columna paulo longiore; antherae rima glabriuscula.
In Nov. Holl. 2.

4739. CALADENIA R. Br. (1810)

a. Sepala et petala subaequalia ringentia non acuminata. Labellum seriatim glandulosum saepissime trilobum.

1. C. alba R. Br. perianthii foliolis acutiusculis; columna labelloque evittatis; glandulis biseriatis; lobo labelli intermedio longitudinaliter fimbriato; disco eglanduloso.
In Nov. Holl. 2.

2. C. carnea Lindl. perianthii foliolis acutis; columna labelloque saepius vittatis, glandulis subbiseriatis, inferioribus strictis capitulo luteo, lobo intermedio inciso vel serrato, disco nudo.
In Nov. Holl. 2.

3. C. caerulea R. Br. perianthii foliolis acutis; labello vittato, glandulis bistrati, lobi intermedii marginibus integerrimis; disco glanduloso;

bractea scapo adpressa; folio brevi patulo piloso. In Nov. Holl. 4.

4. *C. sericea* Lindl. folio oblongo-ovato molliter sericeo caule 1—2-floro pluries brevior; sepalis petalisque obtusiusculis; labelli cuneati glandulis minutis 4-seriatis basi maximis carnosis, lobis aequalibus integerimis intermedio disco glanduloso. In Nov. Holl. 4.

5. *C. barbata* Lindl. perianthii foliolis obtusiusculis subaequalibus labelli subcuneati lobis lateralibus antice pectinatis intermedio inciso-serrato; glandulis dense 4-seriatis ad medium lobi currentibus inferioribus truncatis; vagina scapi foliacea. In Nov. Holl. 4.

6. *C. unguiculata* Lindl. folio linearis caule 1-floro brevior; sepalis petalisque obtusiusculis; labelli cuneati longe unguiculati glandulis 4-seriatis ramentaceis infimis majoribus, lobis dentatis lateralibus truncatis intermedio oblongo. In Nov. Holl. 4.

7. *C. alata* R. Br. perianthii foliolis acutissimis: interiorum lateralibus divaricatis; columna labelloque vittatis glandulis biseriatis, lobo intermedio basi utrinque 1-dentato; disco eglanduloso; folio linearis. In Nov. Holl. 4.

8. *C. flava* R. Br. perianthii foliolis acutis; labelli lamina basi cordata glandulis biseriatis infimis longioribus supremis fasciculatis, lobo intermedio basi utrinque bidentato dentibus lobum aequantibus disco eglanduloso; folio lanceolato. In Nov. Holl. 4.

9. *C. latifolia* R. Br. perianthii foliolis obtusiusculis labelli cordati glandulis biseriatis approximatis, lobo intermedio utrinque 2—3-dentato dentibus lobo ter brevioribus; disco eglanduloso; folio lanceolato oblongo pubescente; scapo hirsuto. In Tasmania. 4.

10. *C. reptans* Lindl. folio oblongo caule 1-floro duplo longiore; sepalis petalisque obtusiusculis; labelli glandulis biseriatis approximatis, lobis lateralibus oblongis infra apicem dente subsolitario instructis, disco nudo utrinque basi pluridentato; anthera longe mucronata. In Nov. Holl. 4.

11. *C. mollis* Lindl. folio oblongo caule elongato 4-plo brevior; sepalis petalisque acutiusculis; labelli glandulis biseriatis approximatis; lobis lateralibus rotundatis intermedio lauceo-

lato utrinque basi 3-dentato, disco nudo. In Nov. Holl. 4.

12. *C. elongata* Lindl. fol. linearis oblongo caule elongato 4-plo brevior; sepalis petalisque acutiusculis; labelli glandulis biseriatis approximatis: lobis lateralibus oblongis infra apicem dente subsolitario instructis intermedio lanceolato disco nudo utrinque basi pluridentato; anthera longe mucronata. In Nov. Holl. 4.

13. *C. marginata* Lindl. folio radicali oblongo cauli subaequali; sepalis petalisque obtusiusculis; labelli glandulis biseriatis filiformibus conformibus; lobis lateralibus rotundatis intermedio triangulare basi fimbriato apice glandulis marginato, disco nudo. In Nov. Holl. 4.

14. *C. ochreata* Lindl. folio oblongo acuto basi ochrea laxa truncata vaginato caule subramoso brevior; sepalis petalisque obtusiusculis; labelli glandulis biseriatis filiformibus conformibus: lobis lateralibus rotundatis intermedio triangulare acuminato subcrispo margine calloso. In Nov. Holl. 4.

15. *C. testacea* R. Br. perianthii foliolis acutis; labelli glandulis depresso quadrilateriatis lobis lateralibus apice pectinatis intermedio glanduloso-crenato; glandulis disci paucis congestis. In Nov. Holl. 4.

16. *C. congesta* R. Br. perianthii foliolis acutis labelli glandulis 4-seriatis depressis 4 infimis stipitatis dissimilibus: lobis lateralibus longioribus quam latis intermedioque nudis disco glanduloso. In Nov. Holl. 4.

17. *C. angusta* Lindl. perianthii laciniis acutis; labelli ovalis undulati sub apice serrulati glandulis erectis 4-seriatis conformibus; disco obsolete papilloso; folio linearis-glabro; scapi pilosiusculi vagina appressa. In Tasmania. 4.

b. Sepala et petala subaequalia patula haud producta labello indiviso undique glanduloso.

18. *C. gemmata* Lindl. folio ovato undulato coriaceo caule villosi unifloro aphylio pluries brevior; labello subrotundo-ovato acuto glandulis depresso undique tecto. In Nov. Holl. 4.

19. *C. ixioides* Lindl. folio ovato obtuso scapo bibracteato unifloro ter breviore; labello oblongo medio constricto apice serrulato glandulis munitis ramentaceo. *In Nov. Holl.* 4.

c. Sepala et petala ringentia longissime acuminata; labello integro saepius margine fimbriato.

20. *C. filifera* Lindl. folio linearis caule duplo breviore; sepalis petalisque apice filiformibus plumoso-glandulosis; labello ovato-lanceolato obtuso dentato basi integro medio constricto; glandulis biseriatis. *In Nov. Holl.* 4.

21. *C. denticulata* Lindl. folio linearis caule villosi breviore; sepalis petalisque apice filiformibus plumoso-glandulosis; labello ovato-lanceolato obtuso supra medium denticulato: glandulis biseriatis. *In Nov. Holl.* 4.

22. *C. hirta* Lindl. folio oblongo caule furcato elato multo breviore; sepalis petalisque acuminatis; labello oblongo serrato obtuso; glandulis 4-seriatis infimis capitatis. *In Nov. Holl.* 4.

23. *C. pallida* Lindl. folio linearis glabro basi piloso; sepalis acuminatissimis clavatis apice scabriuscula; petalis apice setaceis glabris; labelli ovati acuminati basi incisi apice integri glandulis aequalibus filiformibus quadrilateriatis. *In Tasmania.* 4.

24. *C. filamentosa* R. Br. folio linearis pilosiusculo caule 1—2-floro multo breviore; sepalis petalisque filiformi-acuminatis scabris; labelli ovati obtuse acuminati medio serrati apice integri glandulis aequalibus filiformibus 4-seriatis. *In Tasmania.* 4.

25. *C. clavigera* Cunningham. folio linearis lanceolato villosissimo caule 1-floro multo breviore; vagina subfoliacea patula; sepalis petalisque acuminatissimis glabris apice saepius clavatis; labelli subrotundo-ovati integri medio subserrati glandulis 4-seriatis infimis subdissimilibus. *In Nov. Holl.* 4.

26. *C. dilatata* Lindl. folio linearis oblongo villosi caule 1-floro multo breviore; vagina scapi subfoliacea apice setacea patula; sepalis petalisque acuminatissimis; labelli 3-lobi lobis lateralibus falcatis margine ante-

riore fimbriatis, glandulis disci 4-seriatis. *In Nov. Holl.* 4.

27. *C. Patersoni* R. Br. folio linearis pilosiusculo caule 1-floro multo breviore; vagina scapi subfoliacea basi setacea; sepalis petalisque acuminatissimis glanduloso-scabris; labelli ovato-lanceolati basi pectinati apice serrati glandulis 4-serialibus falcatis, disco apicis subverrucoso. *In Tasmania.* 4.

28. *C. longicauda* Lindl. Swan Riv. t. 8. folio oblongo angusto canaliculato villosissimo caule furcato elato multo breviore; sepalis petalisque filiformi-acuminatissimis glandulosis; labello ovato-oblongo obtuso basi cordato fimbriato ultra medium serrato, glandulis conformibus 4-6-seriatis. *In Nov. Holl.* 4.

29. *C. discoidea* Lindl. folio oblongo-lineari obtuso villosi caule subbifloro breviore; sepalis petalisque acutissimis aristatis; labelli ovali pectinati disco glandulis depresso sine ordine onusto. *In Nov. Holl.* 4. Flores luteo-purpurei.

30. *C. gracilis* R. Br. perianthii foliolis acutis; labelli glandulis 4-seriatis lobis lateralibus latioribus quam longis intermedio breviter fimbriato, disco basi glanduloso. *In Tasmania.* 4.

4740. GLOSSODIA R. Br. (1810).

1. *G. major* R. Br. labello ovato acuto apice glabro basi pubescente; appendice unguiculata labello multo breviore apice biloba laciniis patentibus acutis. *In Nov. Holl.* 4.

2. *G. minor* R. Br. labello ovato acuto apice glabro basi pubescente, appendicis bipartitae laciniis obtusis parallelis labello multo brevioribus. *In Nov. Holl.* 4.

3. *G. emarginata* Lindl. labello oblongo-lineari retuso glabro medio geniculato, appendicibus 2 linearibus truncatis parallelis labelli longitudine; caule 1-floro. *In Nov. Holl.* 4.

4. *G. Brunonis* Endl. labello linearis obtuso glabro geniculato appendicibus 2 oblongis acuminatis obtusis labello subaequalibus; caule apice furcato. *In Nov. Holl.* 4.

4741. PTEROSTYLIS R. Br.
(1810).

a. *Caulis foliosus 1-florus;*
foliis omnibus conformibus.

1. *P. reflexa* R. Br. fol. linearilanceolatis setaceo-acuminatis; sepalis lateralibus setaceo-acuminatis reflexis dorsali acuminato inflexo longioribus; labelli lamina sensim acuminata appendice penicillata. Disperis alata Labill. nov. Holl. t. 210. In Nov. Holl. 2.

2. *P. grandiflora* R. Br. fol. linearilanceolatis acutis internodiis longioribus; sepalis lateralibus setaceo-acuminatissimis sursum elliptico-dilatatis dorsali acuminato multo longioribus; labelli lamina apice filiformi obtusa appendice penicillata. Bauer ic. n. Holl. Guille. lith. t. 6. In Nov. Holl. 2.

3. *P. Banksii* Cunningh. in B. M. t. 3172; caule folioso 1-floro; fol. lato-lanceolatis infime carinatis basi vaginantibus; labello oblongo ovato subuncinato obtusiusculo columnam aequante appendice penicillata. In Nov. Zeeland. 2.

4. *P. scabra* Lindl. caule scabro; fol. ovato-lanceolatis acuminatis; labelli lamina apice filiformi clavata appendice penicillata; sepolorum laterarium acumine filiformi ipsis breviore. In Nov. Holl. 2.

5. *P. praecox* Lindl. caule scabriuscule; fol. ovato-lanceolatis acuminatis margine glabris; sepalis lateralibus filiformi-acuminatis dorsali acuto parum longioribus; labelli lamina linearilanceolata appendice penicillata. In Tasmania. 2.

6. *P. pyramidalis* Lindl. fol. inferioribus ovatis in petiolum angustatis superioribus minoribus sessilibus; labelli lamina linearis apice paulo latiore, appendice penicillata; sepalis lateralibus filiformibus supremi longitudine. In Tasmania. 2.

7. *P. barbata* Lindl. fol. ovatis acuminatis imbricatis supremis vaginantibus inflatis; labelli lamina subulata clavata barbata sub apice nuda appendice glabra apice denticulata; sepalis acuminatissimis. In Nov. Holl. 2.

8. *P. squamata* R. Br. fol. radicalibus erectis imbricatis acuminatis in caulem adscendentibus; caulinis nunc squamaeformibus; sepalis lateralibus

linearibus pendulis dorsali multo minoribus, labelli lamina filiformi luteobarbata apice dilatata lunata glabra. In Nov. Holl. 2.

b. *Caulis foliosus multiflorus;*
fol. omnibus conformibus.

9. *P. longifolia* R. Br. fol. linearibus acutis subtus glaucis; sepalis acutis dorsali galeato, lateralibus pendulis semiconnatis; labello linearis oblongo 4-dentato basi glanduloso, appendice brevissima obtusa indivisa; columnae alis barbatis. In Nov. Holl. 2.

10. *P. vittata* Lindl. fol. radicalibus nullis, caulinis ovato-lanceolatis; labello bifido fimbriato appendice indivisa; columnae alis deorsum acuminatis barbatis. In Nov. Holl. 2.

11. *P. parviflora* R. Br. caule 2-5-floro; labio inferiore breviore; appendice apice trifurca. In Nov. Holl. 2.

c. *Caulis foliosus 1-florus;*
fol. radicalibus stellatis vel
saltem a caulinis valde di-
versis.

12. *P. obtusa* R. Br. fol. radicis ovalibus, caulinis linearis-oblongis sessilis; sepalis lateralibus erectis filiformi-acuminatis dorsali longioribus; labelli lamina lanceolata obtusa, appendice penicillata; columnae alis glabris. In Nov. Holl. 2.

13. *P. revoluta* R. Br. caule unifloro; labelli lamina apice sensim angustata acuta appendice penicillata; foliorum laterarium margine interiore medio dilatato crenato inciso. In Nov. Holl. 2.

14. *P. scabrida* Lindl. fol. infimis tantum stellato-pubentibus ovato oblongis acutis; bractea foliacea cucullata; sepalis minutissime pubescentibus; labelli lamina linearis-lanceolata obtusa; appendice apice fimbriata. In Tasmania. 2.

15. *P. furcata* Lindl. fol. infimis ovato-lanceolatis acutis; bractea foliacea cucullata; sepalis glaberrimis laterarium acumine ipsis longiore; labelli lamina linearis obtusa appendice apice fimbriata. In Tasmania. 2.

16. *P. cucullata* R. Br. fol. ovalibus acutis; bractea foliacea cucullata; sepalis extus tomentosis latera-

libus acentis galeae aequalibus; labelli lamina linearis obtusa glabra; appendice apice fimbriata. In Tasmania. 4.

17. *P. dubia* R. Br. fol. caulinis 2, florale pedunculo breviore; perianthio pubescente; labelli lamina integra appendice penicillata. In Nov. Holl. 4.

d. Folia omnia radicalia stellata. Caulis multiflorus vaginatus.

18. *P. mutica* R. Br. fol. radicalibus stellatis; racemo spirali; labii calycis obtusiusculis; labelli lamina oblonga membranacea unguiculata. In Nov. Holl. 4.

19. *P. gibbosa* R. Br. fol. radicalibus stellatis; vaginis scapi remotis; labii calycis acuminatis; labelli lamina crassiuscula basi utrinque 1-seta supra nuda. In Nov. Holl. 4.

20. *P. rufa* R. Br. fol. radicalibus stellatis; vaginis scapi remotis; labii calycis acuminatis; labelli lamina crassiuscula obtusa indivisa ciliata. In Nov. Holl. 4.

e. Folia omnia radicalia stellata. Caulis 1-florus vaginatus.

21. *P. curta* R. Br. fol. radicalibus stellatis; bracteis scapi praeter floralem 2-3; flore erectiusculo; labio calycis inferiore galea acutiuscula breviore; labelli lamina linearis-oblonga obtusa supra carinata appendice bifida fimbriata. B. M. t. 3086. In Nov. Holl. 4.

22. *P. nutans* R. Br. flore nutante; labii longitudine subaequalibus; galea acuminata; labello apice attenuato truncato. In Nov. Holl. 4.

23. *P. concinna* R. Br. scapo medio unibracteato; labelli lamina emarginata inclusa columnam aequante. B. M. t. 3400. In Nov. Holl. 4.

24. *P. acuminata* R. Br. bractea scapi praeter floralem unica; flore erectiusculo; labio inferiore parum longiore, galea acuminata; labelli lamina integra apice attenuata exserta columnam superante. B. M. t. 3401. In Nov. Holl. 4.

25. *P. pedunculata* R. Br. bractea scapi praeter floralem pedunculo sub-breviore unica; flore erectiusculo gla-

bro; labio inferiore multo longiore galea acutiuscula; labello integro inclusum obtusiusculo columnam breviore. In Tasmania. 4.

26. *P. nana* R. Br. fol. ovatis acutis petiolo parum longioribus; scapo pubescente; flore erecto; labio inferiore longiore galea acutiuscula; labello lanceolato integro. In Nov. Holl. 4.

27. *P. ophioglossa* R. Br. scapo medio ebracteato; labelli lamina emarginata columnam superante apice exserta. In Nov. Holl. 4.

f. Folia omnino nulla.

28. *P. aphylla* Lindl. scapo 1-2-floro; calycis labio inferiore cuneato acute bifido, superiore acuto petalis apice incurvis obtusis breviore; labello linearis obtuso; appendice bifida fimbriata; columnae alis ciliatis apice setiferis. In Tasmania. 4.

4742. LYPERANTHUS R. Br. (1810).

1. *L. nigricans* R. Br. fol. cordato ovato; sepalis petalisque linearibus in labium 4-phylum deflexis; labello crispo inciso obtuso apice revoluto disco papilloso. In Nov. Holl. 4.

2. *L. ellipticus* R. Br. folio lanceolato elliptico; labelli disco papuloso marginibus nudis. In Nov. Holl. 4.

3. *L. suareolens* R. Br. folio linearis elongato labio calycis inferiore diphyllo; petalis adscendentibus; labelli disco glandulis seriatis sessilibus; marginibus nudis. In Nov. Holl. 4.

4. *L. serratus* Lindl. folio linearis elongato; labio calycis inferiore diphyllo; petalis adscendentibus; labello apice serrato disci glandulis seriatis conicis sessilibus marginibus muricatis et papillosis. In Nov. Holl. 4.

4743. CORYANTHES R. Br. (1810).

1. *C. fimbriata* R. Br. flore sessili folio multe minore; labello ecalcarato infra cucullato supra dilatato; disco glabro marginibus inflexis fimbriatis, galea curvata apice obtusa. In Nov. Holl. 4.

2. *C. pruinosa* Cunningham. labello ecalcarato infra cucullato supra dilatato; disco hirsuto marginibus inflexis fimbriatis; galea basi attenuata erecta apice mucronata. *In Nov. Holl.* 2.

3. *C. diemenica* Lindl. flore penduculato saepius flore majore; labello ecalcarato cucullato dentato basi convoluto; galea obtusa rotundata inflexa. *In Tasmania.* 2.

4. *C. unguiculata* R. Br. labello ecalcarato convoluto medio glandulis cristato apice aperto obliquo; galea unguiculata; flore pendulo. *In Nov. Holl.* 2.

5. *C. bicalcarata* R. Br. labello tubuloso apicis dilatati marginibus reflexis basi bicalcarata. *In Nov. Holl.* 2.

labelli ungue alato, lamina cuneata truncata apiculata medio pilis filiformibus barbata. *In Florida.* 2.

4747. POGONIA R. Br. (1813).

1. *P. ophioglossoides* Nutt. folio solitario ovali lanceolato; sepalis petalisque coloratis obtusis; labello oblongo obtuso serrato basi angustato apice integrum: axeos glandulis inferioribus minoribus pubescentibus superioribus elongatis glabris cristatis B. R. t. 149. Hook. exot. p. t. 70. Arethusa Lam. ill. t. 729. f. 1. *In Am. bor.* 2.

2. *P. pendula* Lindl. B. R. t. 908. fol. ovatis squamaeformibus amplexicaulibus; floribus axillaribus nutantibus; sepalis petalisque linearibus obtusis; labello apice trilobo medio granuloso, lobo intermedio crispato. Plukn. t. 348. f. 6. *In Am. bor.* 2. Flores albi.

3. *P. gentianoides* Lindl. caule corymboso; fol. squamaeformibus cucullatis apice rotundatis bracteis acuminatis 3-nerviis; labelli apice 3-lobo lacinia media subrotunda plicata lateralibus ovatis integris lineis 3 elevatis exasperatis per axin productis. Arethusa Sw. *In Jamaica.* 2. Flores fusco-purpurei.

4. *P. verticillata* Nutt. fol. verticillatis oblongis acutis; sepalis linearibus erectis petalis oblongis acutis duplo longioribus labello anguste oblongo apice 3-lobo per axin lamellato, lobo intermedio rotundato deflexo. Arethusa Willd. Plukn. t. 348. f. 1. *In Am. bor.* 2.

5. *P. divaricata* R. Br. folio solitario lanceolato; bractea foliacea; sepalis linear-lanceolatis patentissimis; petalis oblongo-lanceolatis coloratis conniventibus; labello bilamellato oblongo-lanceolato cucullato 3-lobo: lobo intermedio elongato acuminato serrulato medio cristato lacero. Arethusa. Lam. t. 729. f. 3. *In Am. bor.* 2.

6. *P. Julianae* Wall. folio cordato septemnervi scapo unifloro; labelli lobis lateralibus nanis rotundatis intermedio subrhombico acuto basi piloso. Epipactis Roxb. *In Bengal.* 2.

7. *P. carinata* Lindl. folo cordato 5-nervi; scapo multiifloro; labelli rhomboidei subtrilobi venosi intus lunati

4744. CALEYA Endl. (1838).

1. *C. major* R. Br. Endl. ic. t. 1598. labelli lamina laevi. *In Nov. Holl.* 2.

2. *C. minor* R. Br. labelli lamina tuberculata. *In Nov. Holl.* 2.

4745. CALCEARIA Blume. (1825).

1. *C. picta* Blume tab. 33. ic. dextr. labello cucullato bicalcarato apice rotundato denticulato intus bicalloso; sepalo supremo cuneato-subbilobo, lateralibus petalisque longissimus. *In Java.* 2.

2. *C. fornicate* Blume. labello bicalcarato acuto denticulato intus bicalloso; sepalo supremo linear-ovalato apice rotundato fornicate lateralibus petalisque labelli longitudine. *In Java.* 2.

4746. CALOPOGON R. Br. (1813).

1. *C. pulchellus* R. Br. folio ensiformi acuminato; scapo 2—4-floro; labelli ungue basi utrinque auriculato, lamina cuneata infra apicem villosa medio glandulosa. Sweet fl. gard. 2. t. 115. Limodorum tuberosum B. M. t. 116. *In Am. bor.* 2.

2. *C. parvifolius* Lindl. folio filiformi stricto; labelli ungue oblongo margine revoluto, lamina rotundata cuneata apiculata infra apicem pubescente. *In Am. bor.* 2.

3. *C. parviflorus* Lindl. fol. rigida; spica multiflora quaque versa;

lobo intermedio crenato. *Epipactis Roxb.* In *Bengalia*. 2. Flores virides labello purpureo venoso.

8. *P. plicata* Lindl. folio subrotundo cordato plicato piloso discolori multinervi; scapo 2—3-floro; labello convoluto bilobo. *Epipactis Roxb.* In *Bengalia*. 2.

9. *P. flabelliformis* Lindl. folio cordato - subrotundo repando; scapo multifloro racemoso; labelli 3-lobi lobo intermedio criso piloso. *Nervilia Aragoana* Gaudich. in Freyc. voy. t. 135. In *Nepalia*. 2.

10. *P. ovata* Lindl. fibrosa; caulinibus simplicibus articulatis foliatis erectis bracteisque pubescentibus; fol. ovato-oblongis acutis membranaceis; floribus coactaneis. *Nervilia Gaudich.* In *ins. Marianis*. 2.

4748. ARETHUSA Gron. (1743).

1. *A. bulbosa* L. Lam. ill. t. 729. f. 1. B. M. t. 2204. B. Cab. t. 1170. In *Am. bor.* 2. Herba aphylla, scapo unifloro squamato. Flores purpurei.

4749. SPICULAEA Lindl. (1839).

1. *S. ciliata* Lindl. Swan Riv. f. 4. In *Nov. Holl.* 2. Herba spithamea. Folium radicale cordatum acumiuatum. Racemus 2—3 poll. longus.

4750. CODONORCHIS Lindl. (1839).

1. *C. Poeppigti* Lindl. fol. 3—4 oblongis; labelli lamina rhombeo-ovata acuminata per axin glandulis clavatis cristata. *Pogonia Poepp. et Endl. nov. gen.* t. 122. In *Chili*. 2. Flos vidi-purpureus.

2. *C. Lessonii* Lindl. fol. 2—4 ovatis acutis; labelli lamina ovato-rotundata acuminata obtusiuscula glandulis basi aggregatis elongatis versus apicem papillaeformibus. *Calopogon Brongn.* in Duperrey voy. t. 37. f. 1.

4751. CLEISTES Rich. (1836).

1. *C. lutea* Lindl. labelli 3-lobi abbreviati lobis lateralibus rotundatis

intermedio criso emarginato. *Aubl. guj.* t. 321. In *Gujana*. 2.

2. *C. rosea* Lindl. labello convoluto acuminato integerrimo sepalorum longitudine, lamellis laceris per medium. In *Gujana*. 2.

4752. ANTHOGONIUM Wall. (1836).

1. *A. gracile* Wall. In *Nepalia*. 2. Folia sesquipedalia 4—8 poll. lata graminea. Scapus 7—8-florus. Flores sanguinei.

4753. ERYTHRORCHIS Blume. (1825).

1. *E. altissima* Blume. *Rumphia t. 70.* *Vanilla pterosperma* Lindl. In *Singapore et Java*. 2. Herba aphylla. Caules sarmentosi nodoso-articulati 50—150 ped. longi. Flores albo-lutei.

4754. DRAKAEA Lindl. (1839).

1. *D. elastica* Lindl. Swan Riv. f. 3. In *Nov. Holl.* 2. Radices lanatae apice bulbosae. Folium subrotundum cordatum. Scapus pedalis 1-florus.

4755. HAPLOSTELLIS Thouars. (1821).

1. *H. truncata* Thouars orch. afr. t. 24. In *Mauritio*. 2. Herba tuberosa aphylla humilis 1-flora.

4756. CHLORAEA Lindl. (1827).

a. Labellum integrum v. obsolete trilobum.

1. *C. speciosa* Poepp. et Endl. nov. g. t. 46. labello integro rhombeo; cristis ancipitibus setoso-ciliatis; sepalis lanceolatis spiralibus revolutis; petalis oblongis obtusis; spica pauciflora. In *Chili*. 2. Flores albi.

2. *C. barbata* Lindl. labello ovato indiviso, marginibus laceris per faciem totam setis creberrimis cristato tuberculato; sepalis lateralibus obtusis; petalis obliquis margine anteriore venisque papilloso. In *Chili*. 2.

3. *C. campestris* Poepp. l. c. labello integro elliptico lanceolato rarer cartilagineo-dentato setis pinnatis seriatis tecto; sepalis lateralibus apice incrassatis; petalis falcatis; spica elongata multiflora. *In Chili.* 4. Flores albi.

4. *C. cuneata* Lindl. labello cu-neato apice grosse dentato ad latera integro lamellis 6 percurso quarum centrali interrupta et papillis 2—3 in septimae loco: sepalis petalisque membranaceis nudis. *In Chili.* 4.

5. *C. longipetala* Lindl. labello membranaceo obovato obtusissimo integro basi multilamellato venis 5 appendicibus falcatis interrupte cristatis; sepalis lateralibus lanceolatis acuminate callosis; petalis lanceolatis obtusis falcatis. *In Chili.* 4.

6. *C. Piquichen* Lindl. labello oblongo inciso-dentato: venis 7 centralibus appendicibus falcatis cristatis; sepalis lateralibus apice rotundatis discoloribus; petalorum venis basi varicosis. Feuill. per. t. 19. *In Chili.* 4.

7. *C. lamellata* Lindl. labello oblongo obtuso crenato juxta marginem verrucoso venis 7 centralibus appendicibus falcatis cristatis; sepalis lateralibus apice concavis incrassatis petalis nudis brevioribus. *In Chili.* 4.

8. *C. multiflora* Lindl. labello sub-rhombeo obtuso basi integerrimo ultra medium crenulato juxta margines papilloso venarum centralium appendicibus distantibus falcatis in tuberculosis apicem mutatis, sepalis lateralibus apice incrassatis; petalis nudis. *C. decipiens* Poepp. t. 55. *In Chili.* 4.

9. *C. cristata* Hook. labelli sub-rhomboidei lateribus inferioribus rotundatis verrucosis integerrimis superioribus laceris venis centralibus ad apicem usque creberrime glandulosis sepalis lateralibus apice concavis incrassatis; petalis acutis nudis. *In Chili.* 4.

10. *C. crispa* Lindl. labello subrotundo-oblongo apice criso nudo basi integro et pone margines papilloso venis centralibus 7—9-setosis; sepalis lateralibus apice vix incrassatis; petalis acutis parum brevioribus basi granulosis. Feuill. 2. t. 20. *In Chili.* 4.

11. *C. membranacea* Lindl. labelli oblongi obsolete 3-lobi longe unguiculati subglandulosi lobo intermedio

obtuso lateralibus productiore et angustiore axi glandulis clavatis atris cristato; sepalis petalique omnino nudis valde membranaceis. *In Bo-naria.* 4.

12. *C. viridiflora* Poepp. t. 47. labello integro rhombeo obtuse apiculato cristis ancipitibus nudis ad medium usque tecto apice verrucoso; sepalis oblongis infimis deflexis planis, petalis oblique ovalis postico latioribus; spica pauciflora. *In Chili.* 4.

13. *C. cylindrostachya* Poepp. t. 50. labello integro obovato-oblongo sepalis longiore revoluto postice setoso apice granuloso; sepalo postico ovali acuto infimis spiralibus; petalis angustatis falcatis; spica multiflora. *In Chili.* 4.

14. *C. incisa* Poepp. t. 54. labello 3-fido subrotundo grosse inciso-serrato postice integerrimo disco sulcato lamellato; sepalis linearibus infimis apice incrassatis; petalis verrucosis; spica pauciflora; floribus distantibus. *In Chili.* 4.

15. *C. nudilabia* Poepp. t. 52. labello integro oblongo lateribus angustato cristato laevi nervoso membranaceo sepalis aequalibus aeniis conformi. *In Chili.* 4.

16. *C. grandiflora* Poepp. t. 48. labello integro ovato deltoideo apice bidentato crassissimo ecristato dense granuloso; sepalis inaequalibus postico ovali infimis lanceolato-oblongis deflexis; petalis late ovatis obliquis; spica pauciflora. *In Chili.* 4.

b. Labellum manifeste 3-lobum.

17. *C. aurantiaca* Lindl. labelli 3-lobi basi angustati lobis ovalis rotundatis venis omnibus pariter tuberculatis; sepalis lateralibus retusis spicae elongatae floribus distantibus; bracteis acuminatissimis. Asarca Hook. *In Chili.* 4.

18. *C. alpina* Poepp. t. 53. labelli 3-lobi integerrimi lobo intermedio ovo-to; cristis disci ancipitibus ad apicem continuis, lobis lateralibus nudis; sepalis lanceolatis acutis petalis spatulato-oblongis; columna latissima; spica pauciflora; scapo humili folioso. *In Chili.* 4.

19. *C. chrysantha* Poepp. labelli rhombeo-oblongi subtrilobi lobo ter-

minali ovato late et aequaliter dentato, lobis lateralibus integerrimis nudis; setis disci lamellosis falcatis serratis; floribus croceis. In Chili. 2.

20. *C. semibarbata* Lindl. labelli oblongi utrinque rotundati lobis lateralibus intra marginem crenulatum papillosis, intermedio serrato nudo: venarum 5 appendicibus falcatis conformibus; sepalis lateralibus obtusis concavis incrassatis; petalis nudis obsolete varicosis. In Chili. 2.

21. *C. Paronii* Lindl. labelli triboli venis 5 centralibus glandulis clavatis uniformibus cristatis; lobis lateralibus apice rotundatis undulatis intermedio angustiore oblongo obtuso criso. *Serapias Gavilu* Pav. In Chili. 2.

22. *C. virescens* Lindl. labelli 3-lobi lobis ovatis obtusis intermedio duplo majore venis 9 basi lamellis totidem parallelis aequalibus acutis deinde appendicibus quibusdam elongatis v. falcatis; sepalis apice obtusis concavis incrassatis; petalorum venis varicosis. In Chili. 2.

23. *C. discoidea* Lindl. fol. acutis scapis longitudine; labelli 3-lobi lobis lateralibus rotundatis apice incrassatis crenatis, intermedio ovalo obtuso carnoso disco verrucoso, venis 7 lamellis serratis; sepalis lateralibus apice obtusis incrassatis; petalis nudis. In Chili. 2.

24. *C. ulanthoides* Lindl. labelli cnneati oblongi lobis lateralibus apice serratis, intermedio brevi transverse serrato medio incrassato; venis 5 basi pariter obscure lanceolatis deinde appendicibus paucis latis falcatis munitis; petalorum venis incrassatis. In Chili. 2.

25. *C. affinis* Lindl. labelli ungue lato concavo: limbo rotundato oblongo trilobo, lobis lateralibus integerrimis intermedio rotundato dentato, venis omnibus basi calloso-cristatis deinde tuberculatis; sepalis oblongis apice obtusissimis obliquis crenatis; petalis obtusis varicoso-venosis. In Chili. 2.

26. *C. Gaudichaudii* Lindl. floribus spicatis; bracteis magnis margine scariosis involutis; sepalis petalisque subaequalibus obtusis; labello petalis breviore sub-3-lobo: lobis lateralibus margine fimbriatis laciniis incrassatis, lobo medio linguaeformi partie media disci carunculis cuneiformibus elon-

gatis dense tecto. *Arethusa lutea* Gaudich. In ins. Magellanicas. 2.

27. *C. Commersonii* Lindl. floribus dense spicatis; bracteis angustatis ovarium subaequantibus; sepalis lanceolatis acutis apice subulatis carnosis; petalis obtusis; labello petalis duplo breviore trilobo; lobis lateralibus rotundatis integris, medio ovato carunculis densissime tecto. *Serapias lutea* Pers. In syris frēti Magellani. 2.

4757. ASARCA Poepp. (1836).

a. Labellum omnino nudum.

1. *A. bidentata* Poepp. nov. gen. t. 121. labello subsessili rhombeo-ovoato nudo coriaceo medio utrinque unindentato postice integerrimo antice obtuso et denticulato; sepalis lateralibus obtusis; petalis nudis; spica pauciflora. In Chili. 2.

b. Labellum medio cristatum.

2. *A. glandulifera* Poepp. t. 120. B. labello unguiculato cordato acuminate convexo utrinque bicristato: disco appendicibus clavatis creberrimis barbato; sepalis lateralibus ovatis apice obtusis concavis; petalis obovatis venis tuberculatis; floribus dissitis. *Chloraea Volucris* Lindl. In Chili. 2.

3. *A. auctiflora* Poepp. t. 120. A. labelli lobis lateralibus subquadratis nudis terminali linearie integerrimo verrucoso lamellato; perianthii foliolis lanceolatis angustis acuminatis; spica thyrsoides. In Chili. 2.

4. *A. odoratissima* Poepp. t. 118. labelli postice transversim ovalis disco glanduloso cristato: lobis subaequalibus lateralibus rotundatis nudis terminali ovato repando obtusato. In Chili. 2. Flores aurei.

5. *A. sinuata* Lindl. labelli 3-lobi pubescentis venis inferioribus lamellatis; lobis lateralibus rotundatis, intermedio elongato linearie calloso-sinuato; sepalis lateralibus acuminatis apice incrassatis; bracteis acuminatis simis. *Chloraea longe bracteata* Benth. in Botanist t. 94. In Chili. 2. Flores albi labellum luteum.

6. *A. leucantha* Poepp. t. 119. labelli postice transversim ovalis disco setoso-cristato; lobis inaequalibus la-

teralibus rotundatis nudis terminali linearis serrato revoluto supra verrucoso. Feuill. t. 18. In Chili. 2. Flores albi.

c. Labellum medio nudum v. obsolete lamellatum pone marginem papillosum.

7. *A. maculosa* Poepp. t. 121. f. A. a-d. labelli unguiculati obsolete trilobi lobis lateralibus rotundatis infra marginem suum lamellatis et tuberculatis intermedio incrassato rotundato integerrimo nudo; sepalis lateralibus obtusissimis; petalorum venis et margine tuberculatis. *Chloraea galeata* Lindl. In Chili. 2. Flores albovirides tuberculis luteis.

8. *A. alaris* Lindl. labelli subsessilis cucullati trilobi denticulati lobis lateralibus rotundatis obsolete tuberculatis intermedio creberrimo verrucoso; sepalo dorsali reflexo acuminato lateralibus linearibus patulis obtusissimis apice incrassatis aratisque; petalis rhombis acutis maculatis. *Chloraea alaris* Lindl. In Chili. 2.

9. *A. parviflora* Poepp. t. 121. B. labelli unguiculati rhomboe-ovalis subtrilobi lobis lateralibus rotundatis intra marginem papillosis intermedio linearis elongato emarginato; sepalo dorsali fornicato cum columna semiconnatis viridi-punctatis. In Chili. 2. Sepala viridia. Labellum flavum.

4758. BIPINNULA Juss. (1800).

1. *B. Commorsonii* Lindl. caule unifloro; sepalis lateralibus pinnatis, laciniis brevibus clavatis. *Arethusa biplumata* Sm. ic. t. 23. In Bonaria. 2.

2. *B. plumosa* Lindl. spica multiflora; sepalis lateralibus acuminatissimis pinnatis, laciniis filiformibus elongatis; labelli margine multipartito inciso. In Chili. 2.

3. *B. mystacina* Lindl. spica multiflora; sepalis lateralibus apice dilatatis pinnatis, laciniis filiformibus ramosis; labelli dimidio superiore seiatim tuberculato inferiore lamellato. *Chloraea fimbriata* Poepp. t. 57. In Chili. 2.

4759. LIMODORUM Tournef. (1790).

1. *L. abortivum* Sw. *Orchis* L. Jacq. austr. t. 193. Hall. helv. t. 36. In Europa. 2. Herba aphylla radice fibrosa. Scapus vaginatus. Spica elongata laxiuscula. Flores purpurei.

4760. CEPHALANTHERA Rich. (1820).

1. *C. pallens* Rich. bracteis foliacis ovario glabro longioribus; epichilio cordato-ovato latiore quam longo obtuso vena media cristata; ovario glabro. *Epipactis* Hook. Lond. t. 76. E. B. t. 271. Hall. helv. t. 41. In Europa. 2.

2. *C. acuminata* Lindl. bracteis setaceis acuminatis superioribus ovario brevioribus; epichilio cordato-ovato sub apice barbato lineis baseos quinque elevatis ovario glabro. In Nepal. 2.

3. *C. ensifolia* Rich. bracteis minimis squamaeformibus; epichilio obtusissimo latiore quam longo vena media lamellata; ovario glabro. *Epipactis* Hook. lond. t. 77. E. B. t. 494. Fl. dan. t. 506. In Europa. 2. Flores pallidi.

4. *C. rubra* Rich. bracteis linearibus acutissimis foliaceis; epichilio ovato acuminato lineis elevatis undulatis cristato; ovario rachique tomentosus. *Serapias* L. Fl. dan. t. 345. E. B. t. 437. In Europa. 2. Flores rubri.

4761. CRYBE Lindl. (1836).

1. *C. rosea* Lindl. B. R. t. 1872. In Mexico. 2. Herba tuberosa foliis plicatis. Flores penduli racemosi rosei.

4762. CYATHOGLOTTIS Poepp. et Endl. (1836).

1. *C. crocea* Poepp. caule apice 2-3-floro; floribus sessilibus; labello columnam triplo superante. In Peruvia. 2. 1-2-ped. Flores lutei.

2. *C. candida* Poepp. t. 94. floribus terminalibus longe pedunculatis;

pedunculis bracteatis labello columnam dimidio superante. In Peruvia. 2.

4763. SOBRALLIA R. et P. (1800).

1. *S. dichotoma* R. et P. caule laevi; fol. ovatis longe acuminatis; racemis axillaribus solitariis bifidis multifloris; labelli crenati laceri disco carinato crispo filisque uncinatis barbato. In Peruvia. 2. 12—20-ped. Flores albo-violacei.

2. *S. fimbriata* Poepp. caule scabrido; fol. late ovalibus breviter acuminatis; flore terminali solitario; labelli fimbriati disco setis carnosus barbato; petalis lacero-ciliatis. In Peruvia. 2. 2-ped. Flores biunciales nivei.

3. *S. setigera* Poepp. fol. ovato-oblongis longe acuminatis chartaceis vaginis terminalibus bracteisque in strobilum bi-triflorum imbricatis setoso-scabris; labelli fimbriati margine cristis multifloris ancipitibus. In Peruvia. 2. 4—5-ped. Flores nivei.

4. *S. rosea* Poepp. t. 93. fol. oblongis acuminatis basi angustatis; racemo flexuoso paucifloro; bracteis alternis distichis distantibus cymbiformibus glabris; labello obcordato inciso undulato subplicato setis carnosus secus venam medianam parce barbato. In Peruvia.

5. *S. macrantha* Lindl. Sert. orch. t. 29. fol. ovalibus acuminatis basi planis; bracteis strobili 1-flori imbricatis glabris; petalis oblongis; labello emarginato plano glabro. In Mexico. 2. Flores 4-unc. rosei.

6. *S. Liliastrum* Lindl. sert. orch. t. 29. fol. lanceolatis acuminatissimis vaginis striatis glaberrimis; racemo multifloro disticho; bracteis ovatis spatheis; sepalis lanceolatis acuminatis; petalis conformibus undulatis labello undulato-crispo; columnae alis maximis falcatis. In Bahia. 2. 10—12-ped. Flores penduli magui rosei.

7. *S. biflora* R. et P. bulbis fasciculatis; fol. oblongo-lanceolatis acutissimis; culmis bifloris. In Peruvia. 2.

4764. EPISTEPHIUM H. et K. (1817).

1. *E. etatum* H. et K. nov. g. t. 632. fol. amplexicaulibus oblongis; flo-

ribus spicatis; labello obsolete trilobo interne barbato; lobis lateralibus columnam involventibus intermedio crenato undulato; columnae auriculis rotundatis. In Nov. Granata. 2.

2. *E. asterophyllum* Lindl. fol. amplexicaulibus subrotundo-ovatis coriaceis marginatis; spica elongata multiflora; labello obovato undulato crispo indiviso convoluto secus medium retrorsum ramentaceo. In Brasilia. 2.

3. *E. amplexicaule* Poepp. nov. g. t. 91. caule ramoso; fol. cordato-amplexicaulibus acuminatis nitidis; spica elongata; bracteis foliaceis; petalis revolutis; labello subrotundo obcordato cucullato margine lacero secus medium barbato. In Peruvia. 2. 3—4-ped.

4. *E. monanthum* Poepp. t. 92. caule simplici; fol. ovato-oblongis basi cucullatis flaccidis glaucis; flore terminali solitario; bractea spathacea ovario longiore; petalis erectis; labello obovato integerimo convoluto plano secus medium bilamellato ecrivato. In Peruvia. 2. Flores violaceo-lilacini.

5. *E. parviflorum* Lindl. fol. petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis; bracteis minimis acutis; spicis terminalibus et axillaribus multifloris; floribus cernuis; labello crinito. In Guiana. 2.

4765. CYRTOSIA Blume. (1825).

1. *C. javanica* Blume Rumphia t. 69. In Java. 2. Herba caulescens aphylla. Caules ramosi erecti squamati. Flores fusci carnosii laxe spicati.

4766. VANILLA L. (1747).

1. *V. aromatica* Sw. fol. ovato-oblongis acuminatis sessilibus; perianthii campanulati laciniis 5 undulatis acuminatis apice revolutis; labello acuminato basi cucullato linea media elevata nuda; capsulis cylindricis longissimis. Plum. ic. t. 188. In Am. austr. 2.

2. *V. clavigulata* Sw. in Schrad. jour. 2. f. 1. fol. lanceolatis acutis concavis rigidis; floribus aggregatis; sepalis carnosis obtusis concavis pe-

talis obtusis postice carinatis; labello deflexo undulato crispato ungue sulco hirsuto-ciliato exarato, ciliis ramentaceis multifidis; fructu oblongo. Sloane hist. t. 224. f. 3, 4. *In Antillis.* 4. Flores magni albi.

2. *V. planifolia* Andr. bot. Rep. t. 538. fol. oblongo-lanceolatis obsolete striatis; sepalis petalisque oblongis erectis obtusiusculis; labelli lamina emarginata crenata crispa utrinque recurva medio lamellis transversis cuneatis dentatis retrorsum imbricatis cristata sub apice verrucosa; columna antice pilosa; fructu longissimo odoratissimo. Salish. parad. t. 82. *In Ind. occ.* 4.

4. *V. albida* Blume Rumphia. t. 67. fol. petiolatis lanceolatis crassis planis; spicis 3—9-floris; labelli limbo ovato rotundato antice et in fauce disco barbato instructo: columna glabra; fructibus 3-quetris falcatis inodoris. *In Java.* 4.

5. *V. grandiflora* Lindl. spica brevi multiflora bracteis latis rotundatis striatis; sepalis petalique elongatis rectis planis oblongis basi angustatis; labelli retusi apiculati crispi limbo basi lamellis brevibus transversis cuneatis dentatis retrorsum imbricatis cristato sub apice glabro; columna antice pilosa. *In Guiana.* 4.

6. *V. bicolor* Lindl. fol. ovato-oblongis subsessilibus acutis striatis margine rubentibus; sepalis linearilanceolatis acutis patentibus dorso rotundatis; labello membranaceo semi-libero convoluto apiculato undulato venis ramentaceis in medio dense stupsis; columna barbata. *In Demerara.* 4. Flores pallidi fragrantissimi.

7. *V. Palmarum* Lindl. fol. ovatis subcordatis brevi petiolatis succulentis; floribus geminis; sepalis petalique angustis oblongis erectis planis; labello membranaceo. Epidendron Vanilla fl. flum. c. ic. *In Brasilia.* 4.

8. *V. aphylla* Blume Rumphia t. 68. aphylla pedunc. sub 3-floris; labelli limbo undulato obtuso medio barbato; anthera biloba; fructu cylindraceo (insipido?) *In Java.* 4.

9. *V. satira* Lindl. fol. oblongis succulentis, floralibus minimis; fructibus esulcatis. *In Mexico.* 4.

10. *V. sylvestris* Lindl. fol. oblongo-lanceolatis succulentis; florali-

bus minimis; fructibus bisulcatis. *In Mexico.* 4.

11. *V. Pompana* Lindl. maxima; fol. oblongis succulentis subinde latissimis et basi subcordatis; floralibus minimis; fructibus bisulcatis. *In Mexico.* 4.

12. *V. inodora* Lindl. fol. ovalivel ovato-lanceolatis membranaceis; floralibus maximis; fructibus bisulcatis inodoris. *In Mexico.* 4.

DIANDRIA.

4767. CYPRIPEDIUM L. (1817).

1. *Foliosa. Caulis polyphyllos. Sepala antica omnino connata.*

1. *C. parviflorum* Salish. in act. Linn, 1. t. 2. f. 2. caule 1—2-floro; fol. ovalibus acuminate; stamine sterili triangulari; labello depresso petalis spiralibus linear-lanceolatis breviore; sepallo dorsali ovato acuminato antico integro latiore. Bot. M. t. 3024. *In Am. bor.* 4. Flores fragrantissimi fusi, labellum luteum.

2. *C. pubescens* Willd. h. ber. t. 13. fol. ovalibus acutis; stamine sterili triangulari; labello compresso petalis linearibus spiralibus breviore; sepalis aequalibus integris dorsali lanceolato acuminato. *C. pauciflorum* B. M. t. 911. Red. lil. t. 90. *In Am. bor.* 4.

3. *C. candidum* Willd. caule 1-floro; fol. basi angustatis apice acutis; bractea cucullata; stamine sterili lanceolato; sepalis integris petalique spiralibus linear-lanceolatis subaequalibus labello compresso longioribus. *In Am. bor.* 4.

4. *C. spectabile* Sw. stamine sterili cordato-ovato obtuso; sepalis subaequalibus oblongis obtusis indivisis; petalis lanceolatis planis latioribus et longioribus; labello petalis longiore ventricoso subsulcato. *C. album* B. M. t. 216. B. R. 1566. *In Am. bor.* 4.

5. *C. molle* Lindl. caule multifloro pedunculis ovariisque villosis; stamine sterili oblongo cuspidato; sepalis subaequalibus acutis indivisis, petalis minoribus conformibus basi intus barbatis; labello petalis aequali oblongiore truncato piano. *In Mexico.* 4.

6. C. palmifolium Lindl. caule angulato villoso multifloro; fol. lanceolatis acuminatis supra glabris subtus pilosis; racemo simplici; stamine sterili ovato acuto; sepalis glabriusculis ovalibus integris subaequalibus labello brevioribus; petalis linearibus acuminatis basi ciliatis; labello elliptico depresso. *In Guiana.* 2. 5—6-ped. Flores straminei; labellum luteum.

b. Foliosa. Caulis polyphyllus. Sepala lateralia apice libera.

7. C. Calceolus L. fol. ovalibus acutis; stamine sterili ovato obtuso; sepalis ovatis acuminatis subaequalibus labello longioribus antico bidentato; petalis linearibus acuminatis rectis; labelli ore constricto venis centralibus pilosis. Fl. dan. t. 999. *In Europa.* 2. Sepala et petala fusca. Labellum luteum.

8. C. cordigerum Don. fol. ovalibus acutis stamine sterili oblongo obtuso subcordato; sepalis ovatis acuminatis subaequalibus labello longioribus antico apice fisso; petalis linearilanceolatis acuminatis rectis; labelli ore constricto. *In Ind. or.* 2.

9. C. montanum Dougl. fol. ovalibus acutis; stamine sterili ovato acuto; sepalis lanceolatis acuminatis labello longioribus antico bidentato; petalis linearibus acuminatis spiraliibus; labello subgloboso. *In Am. bor.* 2.

10. C. passerianum Richards. caule 1-floro; fol. ovalibus acutis; stamine sterili elliptico cordato obtuso; sepalis oblongis obtusissimis antico minore bidentato; petalis angustioribus obtusissimis labello obovato ore rotundato contracto subaequalibus. Hook. fl. bor. Am. t. 206. *In Am. bor.* 2.

11. C. Irapeanum Llave; caule piloso multifloro; fol. ovatis acuminatis amplexicaulibus; stamine sterili ovato acuminato basi fimbriato; sepalis petalique aequalibus oblongis basi barbatis antico apice bipartito; labello obovato ore constricto brevioribus. *In Mexico.* 2.

12. C. macranthum Sw. caule 1-floro; fol. oblongis acutis; stamine sterili cordato acuminato; sepalis in-

aequalibus dorsali oblongo acuto antico minore bidentato; petalis ovato-lanceolatis labello ore contracto crenato brevioribus. B. M. t. 2938. B. R. t. 1534. Amm. ruth. t. 21. *In Siberia et Am. bor.* 2. Flores intense purpurei.

13. C. ventricosum Sw. caule bifloro; fol. oblongis acutis; stamine sterili sagittato cordato concavo; sepalis inaequalibus dorsali oblongo acuminato antico minore bifido; petalis linearilanceolatis acuminatis labello longioribus. Gmel. sib. t. 1. f. σ. Sweet fl. gart. 1. 1. *In Siberia.* 2.

c. Arietinum Lindl. Caulis polyphyllus. Sepala omnia libera.

14. C. arietinum R. Br. caule folioso pubescente 1-floro; fol. lanceolatis glabris; sepalis omnibus liberis lateralibus petalique linearibus subaequalibus dorsali ovato acuto; labello unguiculato obconico; stamine sterili orbiculari. B. M. t. 1969. B. Cab. t. 1240. *In Am. bor.* 2.

d. Caulis diphyllo.

15. C. japonicum Thunb. jap. t. 1. caule villoso; fol. suboppositis subrotundis acutis sinuato-undulatis; bractea oblonga acuta ovario multo breviore; sepalis petalique labello subgloboso brevioribus. *In Japonia.* 2.

16. C. guttatum Sw. caule diphylo; fol. alternis ovato-ellipticis acutis ciliatis; stamine sterili ovato emarginato; bractea oblonga acuminata ovario longiore; sepalis labello brevioribus dorsali maximo apiculato antice bifido petalis acutis; labelli subrotundi ore patulo plano. Falk Beitr. t. 17. Amm. ruth. t. 22. *In Asia et Amer.* 2.

e. Acaulia. Folia omnia radicalia.

17. C. humile Salisb. act. linn. 1. t. 3. f. 4. fol. binis membranaceis oblongis plicatis; scapo pubescente; bractea foliosa acuminata ovario multo longiore; stamine sterili rhomboe acuminato; labelli maximi ventricosi ore

contracto. B. M. t. 192. C. acaule Michx. In Am. bor. 2. Flores magni purpurei striati.

18. *C. venustum* Wall. fol. coriaceis ligulatis canaliculatis; scapo pubescente; bractea ovario plus duplo breviore; stamine sterili cuneato; sepallo antico cuneato labello breviore dorsali subrotundo-ovato acuminato; petalis oblongis obtusis barbatis; labelli oblongi ore lobo aucto. B. M. t. 2129. Hook. exot. fl. t. 35. In Ind. or. 2.

19. *C. purpuratum* Lindl. B. R. t. 1991. fol. coriaceis oblongis acutis striatis maculatis canaliculatis; scapo pubescente; sepallo dorsali acuminato ciliato margine revoluto; petalis oblongis subundulatis pubescentibus; stamine sterili lunato. In Ind. or. 2.

20. *C. insigne* Wall. fol. coriaceis linear-ligulatis debilibus; scapo tomentoso; bractea ovario subaequali; stamine sterili obcordato pubescente; sepallo antico obtuso dorsali fornicato oblongo undulato emarginato; petalis linear-ovatis subundulatis basi barbatis extus pubescentibus labello oblongo lobo obtusato aucto. In Ind. or. 2.

21. *C. Lindleyanum* Schomb. fol. radicalibus lanceolatis rigidis coriaceis acutis plicatis glabris scapo rufo villosi paniculato vaginato; vaginis bracteisque fuscis acutis cucullatis rigidis; stamine sterili hirsuto tridentato fornicato; sepalis villosis concavis obtusis; villosis; labello oblongo calceiformi glabro. In Guiana. 2.

22. *C. caudatum* Lindl. sepalis oblongo-lanceolatis acuminatis extus pubescentibus; petalis pubescentibus in acumen longissimum cardiforme productis; labelli ore hirsuto. In Peruia. 2.

23. *C. barbatum* Lindl. B. R. 1842. t. 17. acaule fol. coriaceis acutis canaliculatis maculatis; scapo pubescente; sepallo dorsali cuspidato; obtuso ciliato margine revoluto; petalis subundulatis fimbriatis margine superiore verrucoso; stamine sterili lunato; pubescente. B. M. t. 4234. C. javanicum Blume. In Java. 2. Labelium violaceum.

4768. STYLEDIUM Sw. (1807)

a. *Tolypangium* Endl. Capsulae ventricosae subovatae sphaericae aut oblongae nec lineares.

* Herbae scaposae. Folia radicalia.

1. *S. carnosum* Benth. scapo elato glabro v. apice glandulosu pubescente; fol. petiolatis suborbiculatis carnosis glabris squamis scariosis interstinctis; racemo subsimplici; calycis glandulosu-pubescentis labii partitis. In Nov. Holl. 2. Cor. lilacinae.

2. *S. pilosum* Labill. nov. Holl. t. 213. scapo glandulosu-pubescente subramoso; fol. planis elongatis lanceolato-ensiformibus. In Nov. Holl. 2. Flores paniculato-racemosi rubescentes.

3. *S. reduplicatum* R. Br. scapo villis eglandulosis acutis hirto; racemo subramoso; fol. angusto-ensiformibus reduplicatis extus squamis latioribus. In Nov. Holl. 2. Flores rubri.

4. *S. taxiflorum* DC. scapo vix foliis longiore paleis patulis apice glandulosis hispido; fol. linearibus margine arcte revolutis pube minima velutinis; racemo simplici laxo; pedicellis elongatis; bracteis linear-subulatis; calycis tubo pilis apice glandulosis hispidissimo. In Nov. Holl. 2. Flores carnei.

5. *S. hebegynum* DC. scapo pilis apice glandulosis patentim hirto; fol. linearibus margine revolutis pubescenti-hirtellis; racemo subramoso. In Nov. Holl. 2. Fol. 4-5 poll. longa.

6. *S. squamellatum* DC. scapo erecto foliis multo longiore pilosiusculo; fol. linearibus glandulosu-ciliatis; squamis subfoliaceis; racemo simplici; capsula glandulosu-pilosa. In Nov. Holl. 2. Cor. violaceae.

7. *S. schoenoides* DC. scapo erecto foliis fere duplo longiore pilis patulis eglandulosis hispido pedicellis calycibusque glandulosu-velutinis; fol. linearibus glabris; squamis scariosis utrinque basi folii adnatis; racemo 3-5-floro subumbellato. In Nov. Holl. 2. Cor. purpurascens.

8. *S. hirsutum* R. Br. scapo villosi acutis eglandulosis hirsuto; racemo subsimplici; fol. linearibus margine parum recurvis; squamis folia distin-

gentibus interioribus acuminatis. B. M. t. 3194. In Nov. Holl. 4. Corolla roseo-purpurea.

** Herbae scaposae. Fol. radicalia conferta, squamis multis interstinctis.

9. *S. umbellatum* Labill. t. 217. scapo supra piloso-glanduloso; racemis subspicatis in umbellam basi involucratam dispositis; fol. linearibus. In ins. Van Diemen. 4.

10. *S. Armeria* Labill. t. 216. scapo basi glabro apice inter flores glanduloso-piloso; racemo subspicato simplici; fol. linear-ensiformibus margine subrecurvis integerrimis glabris. In ins. Van Diemen. 4.

11. *S. melastachys* R. Br. scapo pilosiusculo; spica simplici glandulosopilosissima; floribus imbricatis subsessilibus; fol. linearibus margine subrecurvis brevibus. In ins. Van Diemen. 4.

12. *S. graminifolium* Sw. l. c. t. 1. f. 1. scapo inter flores glandulosopiloso; racemo simplici subspicato; fol. linearibus rigidis plus minus margine denticulatis glabris. Labill. t. 215. B. M. t. 1918. Caudolæa serulata ann. Mus. 6. t. 64. f. 2. In ins. Van Diemen. 4. Cor. violaceo purpurea.

13. *S. lineare* Sw. t. 1. f. 2. scapo glabro filiformi; racemo simplici; pedicellis ovaria aequantibus; fol. comppresso-filiformibus margine denticulatis scapo multo brevioribus. Ventenatia minor Sm. exot. 60. t. 67. In Nov. Holl. 4.

14. *S. setaceum* Labill. scapo glaberrimo; racemo simplici subspicato; fol. setaceis mucronulatis; capsulis clavato-oblongis. In Nov. Holl. 4.

*** Herbae scaposae. Fol. scapis nullis v. minoribus sparsis nec verticillatis, radicalibus confertis esquamatis.

15. *S. spinulosum* R. Br. fol. linearibus mucronatis basi attenuatis margine spinosis; scapo glandulosopubescente; racemo simplici raro subcorymboso; fauce coronata; labello inappendiculato. In Nov. Holl. 4.

16. *S. caespitosum* R. Br. fol. linearibus mucronatis margine integer-

rimis; racemo saepe diviso; rachi scapoque glabris fauce nuda; labello inappendiculato. In Nov. Holl. 4.

17. *S. pitiferum* R. Br. fol. linear-lanceolatis piliferis margine integerrimis; racemo simplici; rachi pubescente; scapo glabro; fauce nuda; labello inappendiculato. In Nov. Holl. 4.

18. *S. setigerum* DC. fol. linearibus conferte caespitosis ciliatis utriusque glabris seta longa terminatis; scapo elongato setis flavidis in racemo glandulosis hispido; racemo subpaniculato; calyx bilabiato 5-partito corollaque piloso-glandulosis. In Nov. Holl. 4.

19. *S. assimile* R. Br. fol. angusto-spathulatis glabris crassiusculis margine integerrimis; racemo parum diviso; rachi scapoque pubescens; fauce nuda; labello appendiculato. In Nov. Holl. 4.

20. *S. spathulatum* R. Br. fol. spathulatis utrinque glandulosopubescentibus margine integerrimis; racemo multifloro scapoque glabris fauce coronato; labello appendiculato. In Nov. Holl. 4.

21. *S. glaucum* Labill. t. 214. fol. radic. lanceolato-spathulatis integerimis subacuminatis subtus pallidis; scapis glabris; racemi pauciflori pedicellis elongatis; fauce nuda; labello exappendiculato. In Nov. Holl. 4.

22. *S. eriorhizon* R. Br. fol. spathulatis setaceo-acuminatis utrinque glabris, marginibus tomentosis, collo lanato incrassato; racemo subpaniculato scapoque glandulosopubescente; fauce nuda; labello appendiculato. In Nov. Holl. 4.

23. *S. floribundum* R. Br. fol. oblongis undique glabris ad margines integerrimis; scapis numerosis paniculatis lanatis villis acutis eglandulosis; fauce nuda labello appendiculato. In Nov. Holl. 4.

24. *S. junceum* R. Br. fol. radicalibus linearibus, scapi glabri minutis distantibus bracteisque medio adnatis; calycis lobis subulatis; fauce glandulatis stipitatis coronata; labello inappendiculato. In Nov. Holl. 4.

24. *S. violaceum* R. Br. fol. radicalibus angusto-lanceolatis, scapi glaberrimis parvis adpressis bracteisque sessilibus; racemo simplici; calycis tubo parce glandulosopilos-

lobis basi gibbis; fauce coronata; labello inappendiculato. In Nov. Holl. 2.

**** Folia scapi vel. caulis verticillati.

26. *S. luteum* R. Br. scapo inarticulato glabro; fol. radicalibus linearibus, caulinis inferioribus in verticillis 1—2 dispositis cacteris sparsis remotis; calycis lobis basi subgibbosis; fauce coronata, labello inappendiculato. In Nov. Holl. 2.

27. *S. amoenum* R. Br. scapo inarticulato glabro; fol. radicalibus spatulatis acuminatis; caulinis supra medium in verticillum unicum dispositis; superioribus nullis fauce coronata; labello inappendiculato. In Nov. Holl. 2.

28. *S. articulatum* R. Br. scapo articulis 2 verticillato-foliatis; fol. radicalibus lanceolatis coriaceis; labello appendiculato. In Nov. Holl. 2.

29. *S. Brunonianum* Benth. scapo articulis 2 verticillato-foliatis; fol. radicalibus linear-lanceolatis basi attenuatis; racemo laxo; calyce aequaliter 5-partito lobis obtusis; corollae fauce coronata; labello appendiculato. B. R. new. ser. 15. t. 15. In Nov. Holl. 2.

30. *S. diversifolium* R. Br. scapo stricto inarticulato; verticillis 3—5-foliosis filiformibus; fol. radicalibus lanceolatis; fauce coronata iabello appendiculato. In Nov. Holl. 2.

31. *S. scandens* R. Br. caule scandente glabro; fol. fasciculato-linearibus apice spiraliter cirrhosis; racemi pedicelli nlongatis, fauce coronata; labello appendiculato; corollae lobis serratis; columna superne pubescente. In Nov. Holl. 2.

***** Caulis suffruticosus.
Folia sparsa crebra.

32. *S. fruticosum* R. Br. caule suffruticoso glabro; fol. angustato linearibus subdecurrentibus mucrone acutis glabris confertis; racemo piloso glandulosu subpaniculato; fauce semicoronata; labello appendiculato. Rehb. mag. t. 39. Herb. amat. t. 250. In Nov. Holl. 2.

33. *S. taricifolium* Rich. caule suffruticoso puberulo; fol. angusto-linearibus sessilibus confertis acutiuscu-

lis glabriusculis; racemo puberulo-glandulosu subpaniculato; fauce nuda; labello appendiculato. B. M. t. 2249. Link et Otto Abb. t. 32. In ann. unus. 18. t. 3. Bot. R. t. 550. In Nov. Holl. 2.

34. *S. leptostachyum* Lindl. Swan Riv. bot. n. 121. scapo simplici glaberrimo discolori; fol. obovatis acutis longe petiolatis; racemo simplici elongato; rachide ovarii pedicellisque glandulosis. In Nov. Holl. 2.

35. *S. scabridum* Lindl. strictum scapo glandulosu-piloso, fol. linearibus reduplicatis pubescenti-scabris aequalibus racemo lato corymboso glandulosu hirsuto. In Nov. Holl. 2.

36. *S. Cygnorum*. scapo stricto glandulosu-piloso; fol. linear-ensiformibus reduplicatis pubescenti-scabris longiore; racemo suhramoso; rachide ovarii pedunculisque glandulosis. *S. laricifolium* Lindl. In Nov. Holl. 2.

37. *S. saxifragoides* Lindl. fol. linear-lanceolatis apice piliferis margine scabriusculis scapo glabro; racemo suhramoso; rachide ovario corollaque glandulosu-pilosis. In Nov. Holl. 2.

38. *S. striatum* Lindl. fol. obovato-lanceolatis acutissimis flabellatim venosis glabris; scapo glaberrimo glauco; fol. quibusdam linearibus prope medium approximatis subverticillatis; racemo simplici; floribus eglandulosis. In Nov. Holl. 2.

39. *S. bicolor* Lindl. fol. linearibus mucronatis margine scabris; scapo glaberrimo aphylo; racemo laxo subramoso ovato rachide corollaque glandulosis. In Nov. Holl. 2.

40. *S. ciliatum* Lindl. fol. linearibus ciliatis; apice piliferis; scapo floribusque pilis luteis glandulosis vestitis; rachide villosissima; panicula pyramidata. In Nov. Holl. 2.

41. *S. hispidum* Lindl. fol. linearibus hispidis incurvis, apice piliferis scapo glaberrimo; racemo subramoso corymboso rachide floribusque glandulosu-tomentosis; sepalis ovatis obtusis. In Nov. Holl. 2.

42. *S. compressum* Lindl. scapo compresso; articulis 3 verticillato-foliatis; fol. radicalib. linearibus obtusis; racemo cylindraceo glauco simplici;

rachide subglandulosa; floribus glaberrimis. In Nov. Holl. 4.

43. *S. diuroides* Lindl. scapo 1-articulato glabro; fol. verticillatis superioribusque sparsis; radicalibus filiformibus obtusis; racemo simplici pyramidato subglanduloso; calycis foliolis basi planis. In Nov. Holl. 4.

44. *S. nudum* Lindl. caule elongato imbricato; fol. spathulatis acutis margine denticulatis; scapo aphylo; racemo cylindraceo simplici; fol. spathulatis acutis margine denticulatis; scapo aphylo; racemo cylindraceo simplici glandulis nigris vestito. In Nov. Holl. 4.

45. *S. caulescens* Lindl. caule elongato imbricato; scapo extra medium verticillo uno; fol. caulinis spathulatis acuminatis margine denticulatis scapi linearibus; racemo cylindraceo simplici glandulis lutescentibus dense pubescente. In Nov. Holl. 4.

b. *Nitrangium* Endl. Capsulae graciles lineares v. linearilanceolatae.

* Herbae scapiformes; fol. radicalibus rosulatis; caulinis nullis v. paucis.

46. *S. capitellare* R. Br. scapo capillari 1—2-floro; fol. radicalibus ovalibus; calyce glabro acutissimo, limbo 3-partito, facinia media bifida fauce coronata; labello inappendiculato. In Nov. Holl. 4.

47. *S. tenerum* Spr. scapo capillari; spica pauciiflora; fol. radicalibus subrotundis; calycis labiis partitis glandulosis; limbi laciniis duabus majoribus semibifidis; fauce nuda; labello inappendiculato. *S. tenellum* R. Br. In Nov. Holl. 4.

48. *S. rotundifolium* R. Br. scapo capillari 1—4-floro; fol. radicalibus subrotundis; calycis labiis indivisis; laciniis 4 limbi subaequalibus; fauce nuda. In Nov. Holl. 4.

49. *S. crassifolium* R. Br. scapo tereti; spica racemosa elongata; foli-radicalibus elongato-lanceolatis. In Nov. Holl. 4.

50. *S. corymbosum* R. Br. scapo tereti corymbose; fol. radicalibus linearibus mucrone setaceo; calycis labiis partitis. In Nov. Holl. 4.

51. *S. Kunthii* Wall. scapis plurimis subnudis cymoso-corymbosis;

floribus sessilibus paucis spicatis; fol. paulo supra medium rosulatis subrotundis petiolatis; calycis labio subtridentato altero bifido. In Silhet. 4.

52. *S. tenellum* Sw. in ber. Mag. 1807. t. 2. f. 3. scapo simplici compressiusculo; fol. radicalibus ovato-lanceolatis obtusis basi attenuatis sessilibus, caulinis paucis vix acuminatis; floribus paucis spicatis remotis sessilibus; calycis labio altero 3-fido altero 2-partito. In Ind. or. ④.

53. *S. utiginosum* Sw. l. c. t. 24. f. 4. scapo filiformi superne paniculato; fol. radicalibus rotundis subsessilibus, caulinis remotis elongatis obtusis; floribus remotis sessilibus bibracteatis; calycis labio altero trifido altero bipartito. In Zeylona. 4.

54. *S. urticaefolium* Benth. caule erecto filiformi basi subancipiti apice laxo subcorymboso; fol. alternis paucis inferioribus ovatis superioribus oblongis; fauce coronata; labello appendiculato. In Nov. Holl. 4?

55. *S. longitubum* Benth. caule erecto filiformi apice laxe paniculato; fol. ad basin caulis confertis linearibus planis acuminatis superioribus minoribus sparsis; calycis laciniis in labia duo subconnatis; cor. limbi laciniis 2 obovatis 2 minoribus oblongis; fauce coronata, labello appendiculato. In Nov. Holl. 4?

56. *S. thyrsiforme* DC. fol. petiolatis obovato-spathulatis basi longe cuneatis scapo adscendent-erecto pilis glandulosis v. eglandulosis hirsuto; racemo composito conferto glandulosobirsuto; corolla subhirsuta. In Nov. Holl. 4.

57. *S. leptobotrys* DC. fol. anguste linear-lanceolatis utrinque attenuatis glabris; scapo foliis 4-plo longiore nudo tereti glabro; rachi sparse pedicellis calycibusque conferte piloso-glandulosis; racemo elongato dissitifloro composito; calycis lobis apice setaceis. In Nov. Holl. 4.

58. *S. leptophyllum* DC. fol. radicalibus confertis erectis anguste linearibus glabris; scapo teretifol. duplo triploque longiore hispido pilis inferne eglandulosis superne in racemo bracteis et calyce glandulosis; racemo laxo thyrsiformi; bracteis acutissimis. In Nov. Holl. 4.

59. *S. thesioides* DC. fol. radicibus erectis linearibus glabris; scapis 2—4 erectis folia triplo 4-ploque superantibus glabris; racemo composito laxo; pedicellis calycibusque glanduloso-pilosis, calycis lobis subaequalibus acutis; corollae tubo brevissimo; capsula linearis pedicello suo paulo longiore. In Nov. Holl. 4.

60. *S. androsaceum* DC. fol. linearis-setaceis glabris; scapo fol. 2—4-plo longiore nudo ad apicem subglandulosus; floribus conferte capitatis; bracteis oblongis obtusiusculis concavis basi solutis; calycis tubo linearis apice parce piloso glanduloso. In Nov. Holl. 4?

61. *S. scariosum* DC. fol. conferte caespitosis linearibus rigidulis acutiusculis supra et margine scabris; scapis 1—3 erectis folia multo superantibus glabris omnino nudis; racemo subspicato; calycis lobis valde inaequalibus margine scariosis; corollae tubo brevissimo. In Nov. Holl. 4. Cor. roseae.

** Herbae caulescentes floribus alternis v. solitariis.

62. *S. inundatum* R. Br. caule ramoso infra divisuram folioso; fol. linearibus; corollae limbo laciniis majoribus obovatis minoribus linearibus; fauce nuda; labello inappendiculato basi tubo adnato. In Nov. Holl. 4.

63. *S. despctum* R. Br. caule partito; ramis paucifloris; fol. linearibus; limbi corollae laciniis linearibus oblongis parum inaequalibus; fauce nuda; labello inappendiculato basi tubo adnato. In Nov. Holl. 4.

64. *S. diffusum* R. Br. caule ramoso diffuso filiformi; fol. linearibus caulinis distantibus; corollae limbi laciniis 2 majoribus bifidis; fauce coronata; labello inappendiculato basi tubo adnato. In Nov. Holl. trop. 4.

65. *S. pygmaeum* R. Br. caule simplici erecto 2—3-floro; fol. linearibus; calycis lobis paritis; corollae limbi laciniis integris; fauce nuda; labello inappendiculato. In Nov. Holl. 4.

66. *S. bulbiferum* Benth. caulis erectis basi bulbiferis; fol. ad apicem caulis fasciculatis linearibus; pedunc. apice 1—3-floro umbellato; involuci fol. linearibus. In Nov. Holl. 4.

*** Pedunculi 1-flori ex alis foliorum in summitate scapi vel rami confertorum.

67. *S. repens* R. Br. caule repente; ramis adscendentibus; fol. subulatis adnatis terminalibus confertissimis; fauce coronata; labello inappendiculato. In Nov. Holl. 4.

68. *S. guttatum* R. Br. scapo simplici; fol. radicalibus linearibus; floribus fasciculatis sessilibus; bracteis foliaceis fauce coronata; labello appendiculato. In Nov. Holl. 4.

69. *S. pedunculatum* R. Br. scapo simplici; fol. radicalibus lanceolatis; floribus umbellatis; pedicellis capillaris; involuci foliolis linearibus; limbi corollae laciniis inaequalibus; fauce nuda; labello inappendiculato. In Nov. Holl. 4.

**** Racemi caulem foliosum terminantes. Capsula compressa.

70. *S. breviscapum* R. Br. caule simplici; fol. compresso-filiformibus summis confertissimis; racemo pedunculato subpaniculato; rachi villosa; capsula lanceolata aequivalvi pubescente. In Nov. Holl. 4.

71. *S. fasciculatum* R. Br. caulis pluribus adscendentibus glabermiss; fol. linearibus acutis; florae in spicam subracemosam bracteatum ad rachim glabram digestis, capsula lanceolata utroque loco seminifero, superiore postico demum acuto. B. R. t. 1459. In Nov. Holl. 4.

72. *S. falcatum* R. Br. caule subsimplici rachique pubescens; fol. linearibus; spica pedunculata subracemosa; capsulis divaricatis lanceolatis, loco utroque seminifero, superiore dimidio angustiore clauso. In Nov. Holl. 4.

73. *S. Lessoni* DC. caule fruticoso subsimplici erecto dense et breviter rachique hirtello; fol. linearibus acutis in petiolum fere attenuatis glabris; racemo terminali simplici; calycis tubo elongato ad apicem corollisque parce piloso-glandulosis; labello elongato inappendiculato. In Nov. Holl. 2.

74. *S. imbricatum* Benth. caule fruticoso tenuiter lanato; fol. imbricatis adpressis ovatis aristatis; racemis subsimplicibus; corollae tubo longe

exerto fauce coronata; labello appendiculato. In Nov. Holl. 4.

75. *S. adnatum* R. Br. caulinibus a collo plurimis simplicibus glabris; fol. linearibus; spica sessili divisa, partialibus paucifloris; capsulis basi adnatis linearibus; collo calyce breviore, loculo superiore vacuo angustissimo. B. R. t. 914. B. M. t. 2598. B. Cab. t. 1132. In Nov. Holl. 4.

76. *S. propinquum* R. Br. caule multiplici, partialibus umbellatim divisus; fol. linearibus; spica sessili subsimplici; capsulis basi adnatis linearibus; collo calycem aquante, loculo superiore vacuo angustissimo. In Nov. Holl. 4. Flores carnei.

77. *S. dichotomum* DC. caule erecto dichotomo ad ramificationes folia fasciculata gerente et radicem validam agente; fol. subnatis mucronatis basi ad margines anguste membranaceis glabris; pedunculis scapiformibus hispidis; pilis in racemo glandulosis; racemo composito; bracteis bracteolisque acutissimis; calycis lobis subobtusis. In Nov. Holl. 4. Flores flavi.

78. *S. proliferum* DC. caule gracili glabro ramoso sub fasciculis radicante; ramis e fasciculis foliorum 3—6 ortis; pedunculo terminali hispido; racemo subsocomposito paucifloro; calycis lobis obtusis. In Nov. Holl. 4.

79. *S. eriopodum* DC. caule abbreviato di-trichotome ramoso glabro e nodis radicante; fol. fasciculatis lineariteretiusculis acutis glabris; pedunculis pilis lanatis hirsutissimis; racemo spiciformi conferto; calycis tubo sparse glanduloso-piloso, lobis obtusissimis adpressis. In Nov. Holl. 4.

***** Corollae limbus bipartitus, lobis bifidis.

80. *S. alsinoides* R. Br. caule erecto; fol. ovatis, floralibus oppositis; floribus axillaribus sessilibus solitariis ebracteatis. In Nov. Holl. 4.

81. *S. pycnostachyum* Lindl. scapo villis acutis piloso; fol. radicalibus spathulatis apiculatis ciliatis panicula densa cylindracea glanduloso-tomentosa; rhachide villosa; calycibus obtusis. In Nov. Holl. 4.

82. *S. canaliculatum* Lindl. utrinque glaberrimum; scapo folioso; fol. linearibus acutis subcauliculatis; pa-

nicula pyramidata; pedicellis glandulosis. In Nov. Holl. 4.

83. *S. androsaceum* Lindl. fol. radicalibus membranaceis ovato-subrotundis petiolatis subglandulosis; scapo glabro subglanduloso; cyma simplici bracteata basi diphylla; pedunc. pubescenti-glandulosis; ovario glanduloso scabro; corollae calcaratae tubo brevissimo, laciniis posticis bidentatis anticis majoribus inaequaliter bilobis. In Nov. Holl. 4.

84. *S. Drummondii* Grab. fol. omnibus radicalibus caspitosis lanceolato-linearibus acuminatis undulatis marginibus reflexis coriaceis utrinque nudis nitidis basi squamis elongatis vaginatis; scapo glanduloso-pubescente paniculato; calyce bilabiato $\frac{1}{2}$ fido; corollae fauce coronata. In Nov. Holl. 4.

4769. ARISTOLOCHIA L. (1747).

a. FRUTICOSAE VOLUBILES V. SCANDENTES.

1. *A. gigantea* Mart. nov. gen. t. 48. glabra volubilis; fol. ovato-subrotundis acutis; stipulis reniformibus; floribus solitariis, tubo ventriculiformi, limbo pedali plano cordato obtuso intus velutino-scabro macula glabra glandulosa ad fauem. In Brasilia. \ddag . 6-ped. Flos glauco-viridi-violaceus.

2. *A. cordiflora* Mutis. perianthii inflati glabri ore contracto, limbo amplissimo cordato unicolore; fol. cordatis acuminatis. Ad fl. Magdalen. 4.

3. *A. Sipho* Herit. Stirp. t. 7. fol. cordatis acutis glabris; pedunculis 1-floris bractea ovata instructis; perianthii incurvis, limbo fusco-nigro. In Am. bor. \ddag .

4. *A. tomentosa* Sims. B. M. t. 1369. fol. cordatis acutis subtus villosis; pedunc. 1-floris ebracteatis; perianthiis incurvatis. A. hirsuta Muell. In Louisiana. \ddag .

5. *A. baetica* L. perianthio infundibuliformi incurvo glabro labio ovato-obtusiusculo mucronato; pedunc. solitariis; fol. cordato-oblongis acutis. Moris hist. 12. t. 17. f. 6. In Hispania, Creta. 4.

6. *A. glauca* Desf. atlant. t. 252. perianthio infundibuliformi glabro, labio ovato acuto; pedunc. solitariis elon-

gatis; fol. cordato-ovatis obtusis subtus glaucis. In Afr. bor. ♂.

7. *A. altissima* Desf. atl. t. 249. perianthii incurvis, labio ovato ciliato retuso; fol. cordatis oblongis undulatis. In Algeria et Creta. ♂.

8. *A. mexicana* L. fol. oblongis acuminatis 3-nerviis; pedunc. multifloris; perianthii incurvi labio ovato mucronato. Jacq. am. t. 146. Pict. t. 223. In Mexico. ♂.

9. *A. Kaempferi* Willd. perianthii incurvi limbo ovato-oblongo; pedunc. 1-floris nudis; fol. cordatis hastato-subtrilobis. Banks. ic. Kaempf. t. 49. In Japonia. ♂.

10. *A. hastata* H. et K. nov. g. t. 116. caule volubili sulcato-angulato; petiolis foliisque subtus in venis pubescentibus trilobo-hastatis; perianthio pubescente recto labio ovato-oblongo acuto concavo; appendice nulla. In Havanna. ♂.

11. *A. pentandra* Jacq. am. t. 147. pict. t. 224. perianthii refracti limbo lanceolato; pedunculis bractea cordata cinctis; fol. cordatis hastato-3-lobis. In Cuba. ♂.

12. *A. nummularifolia* H. et K. I. c. t. 110. caule prostrato scandente; fol. reniformibus emarginatis glabris; perianthii labio lanceolato, appendice nulla; capsulis subglobosis. Ad Orinocum. ♂.

13. *A. Raja* Mart. I. c. t. 52. volubilis glabra; stipulis reniformibus; fol. transverse oblongis obsolete 3-lobis, lobo medio brevissimo; floribus solitariis; perianthii tubo obovato, limbo infundibuliformi in labium lanceolatum acutum concavum extenso. In Brasilia. ♀.

14. *A. Augricida* D. fol. cordatis oblongis acuminatis; stipulis cordatis solitariis amplexicaulibus; perianthii erecti limbo dilatato labio lanceolato. Jacq. am. t. 144. pict. t. 220. In Mexico. ♂.

15. *A. timorensis* Decaisn. hb. tim. caule volubili; ramis sulcatis; fol. elliptico-ovatis cordatis acuminatis glabris; seminibus marginatis hinc laevibus planis inde superficie obcordata rugosa nigra. In ins. Timor. ♂.

16. *A. caudata* Booth. in B. R. t. 1453. volubilis; fol. inferioribus trianguli-reniformibus v. 3-lobis, superior. 3-partitis; perianthii cylindrici

infracti labio cordato cuspidato. In Brasilia. ♂. Flores fusco-lutei.

17. *A. foetens* Lindl. B. R. t. 1824. volubilis fol. lato-cordatis acutis; pedunc. solitariis; bractea perfoliata; limbo perianthii maximo integro cordato labio longissime caudato extus glabro. In Ind. occ. ♂. Flores maximi luteo- et purpureo-variegati.

18. *A. indica* L. perianthii erecti labio lanceolato elongato; pedunculis multifloris; fol. subcordato-ellipticis emarginatis. Rheede mal. 3. t. 25. In Ind. or. ♂.

19. *A. acuminata* Lam. fol. cordatis acuminatis; floribus racemosis; caule volubili. In ins. Mauritii. ♂.

20. *A. fragrantissima* Ruiz h. Madrit. 1805. c. ic. perianthii tubulosi labio lanceolato reflexo; pedunculis subaggregatis; fol. cordatis acuminatis. In Peruvia. ♀.

21. *A. bilabiata* L. perianthii tubulosi labio lanceolato divaricato; pedunc. 1-floris; fol. semilunato-bilobis; lobis divergentibus obtusis subemarginatis. Plum. ic. 32. f. 1. In Hispaniola. ♀.

22. *A. peltata* L. perianthii medio contracti punctati labio lingulato emarginato punctato ciliato intus muricato; fol. subpeltatis reniformibus. Jacq. am. pict. t. 222. Plum. ic. 32. f. 2. In Hispaniola. ♂.

23. *A. reniformis* Willd. perianthii erecti punctati labio spatulato retuso incurvo laevi; fol. reniformibus emarginatis. A. peltata Sw. In Hispaniola. ♂.

24. *A. ramicifolia* Mart. I. c. t. 54. volubilis glabra; fol. elongato-deltoides profunde cordatis sinu lobisque rotundatis; stipulis subnullis; pedunculis 1-floris solitariis; perianthii tubo elliptico limbo erecto e basi cylindrica ligulato oboconico apice rotundato. In Brasilia. ♂. Flores fusco-violacei.

25. *A. punctata* Lam. perianthii tubulosi labio spatulato elongato punctato 3-striato; pedunc. 1-floris; fol. profunde cordatis obtusis. Plum. spec. 5. ic. 34. In Hispaniola. ♂.

26. *A. pilosa* H. et K. I. c. t. 113. caule volubili sulcato hirti; fol. ovatis obtusis profunde cordatis supra glabris subtus hirti-pubescentibus; petiolis hirtis; perianthio recto pubescen-

te, labio ovato oblongo obtuso; appendice nulla. *In Quito.* 2.

27. *A. barbata* Jacq. ic. rar. t. 608. fol. cordatis oblongis; perianthii recti limbo dilatato, labio spathulato apice barbato. *In Caracas.* 2.

28. *A. foetida* H. et K. nov. gen. t. 114. caule volubili angulato pilosiusculo; fol. subrotundis acuminatis cordatis 3-nerviis adpresso-pilosus; perianthio hirtello incurvato limbo linearis indiviso. *In Mexico.* 2.

29. *A. odoratissima* L. caule volubili fruticoso; fol. cordatis; pedunculis 1-floris elongatis; labio perianthii cordato-lanceolato. Sloane hist. t. 104. *In Jamaica.* F. Flores ampli.

30. *A. cynanchifolia* Märt. t. 51. volubilis glabra; fol. ovato-triangularibus cordatis sinu subquadrato, lobis glaucis; perianthii tubo obovato, limbo 1-labiato cordato deltoides acumina-tissimo serrulato. *In Brasilia.* 2.

31. *A. Surinamensis* W. fol. 3-lobis; perianthii incurvi labio cordato plano. Jacq. obs. t. 3. *In Jamaica et Surinamo.* 2.

32. *A. trilobata* L. fol. 3-lobis obtusis; pedunc. 1-floris; perianthii inflati infracti labio basi cordato acuminate caudato integerrimo stigmate apice in lacinias producto. *In Ind. occ.* 2.

33. *A. macrura* Gomez. fol. cordatis 3-lobis; pedunc. 1-floris; perianthii infundibuliformis labio latiore cedato apice longissime caudato crenulato; stipulis reniformibus. *In Brasilia.* 2.

34. *A. caudata* L. fol. profunde cordatis oblongis emarginatis, sinibus baseos incumbentibus; perianthii tubulosi labio dilatato reniformi integerrimo in caudam filiformen apice incrassatum aheunte. Jacq. am. t. 145. pict. t. 221. *In Domingo.* 2.

35. *A. grandiflora* Sw. fol. latocordatis acutiusculis; calycis ore amplissimo, labio maximo subcordato longissime caudato integerrimo. B. M. t. 4368—4369. *In Jamaica.* 2.

36. *A. glaucescens* H. et K. I. c. t. 115. caule volubili foliisque glabris ovalis acutis subcordatis coriaceis 5-nerviis subtus glaucescentibus; perianthii tubo incurvato, labio ovato cordato concavo cuspidato, appendice biloba. *In Nov. Granata.* 2.

37. *A. caracasana* Spr. caule volubili sulcato foliisque glabris trilobis; perianthii glabri cylindrici incurvati labio cordato longissime cuspidato appendice 6-partita reflexa. *A. trifida* Lam. *In Caracas.* 2.

38. *A. obtusata* Sw. fol. cordatis obtusis subtus reticulato-venosis tomentosis; pedunc. 1-floris; perianthii limbo bilabiato obtuso integerrimo. *A. rugosa* Lam. *In Caribaeis.* 2.

39. *A. deltoidea* H. et K. I. c. t. 112. caule volubili sulcato glabro; fol. 3-angulari-ovatis acutis basi subtruncatis trinerviis, nervis petiolisque pubescens; stipulis reniformibus; perianthio recto bilabiato, appendice in-divisa. *In Ad flum. Amaz.* 2.

40. *A. geminiflora* H. et K. I. c. t. 117. caule volubili sulcato foliisque subtus molliter pubescens supra nitidis coriaceis obovato-oblongis acutiusculis subcordatis; pedunc. bifloris; perianthii incurvati pubescens labio ovato acuto, appendice nulla. *Prope Honda.* 2.

41. *A. bilabiata* L. fol. ovato-oblongis obtusiusculis trinerviis; perianthii recti infundibuliformis ore bilabiato, labio altero breviore bilobo, altero longiore integerrimo. Plum. sp. t. 32. f. 1. *In Hispaniola.* 2.

42. *A. ringens* Vahl Symb. t. 47. stipulis foliisque cordato-subrotundis; perianthii ventricoso-inflati reticulati maculati ore bipartito, labio altero spathulato altero lanceolato. *In Brasilia.* 2.

43. *A. brasiliensis* Mart. volubilis glabra; fol. cordiformibus; perianthii tubo obovato limbo basi cylindrico bilabiato, labio superiore elongato lanceolato canaliculato inferiore subbre-viore e basi canaliculata in laminam transverse oblongam subbilobam ex-tenso. *A. ringens* Link et Otto 1. t. 13. *In Brasilia.* 2.

44. *A. tabiosa* Ker B. R. t. 689. volubilis glabra; fol. stipulisque reniformibus obtusis; perianthii tubo obovato limbo basi cylindrico bilabiato, labio superiore lanceolato recto abbreviato inferiore 4-plo longiore e basi inflata cymbiforme in laminam transverse ellipticam emarginatam extenso. *In Brasilia.* 2.

45. *A. galeata* Mart. nov. g. t. 50. volubilis glabra; fol. stipulisque reniformibus; floribus solitariis tubo pe-

rianthii obovato globoso, limbo cylindrico deflexo tandem bilabiato, labio superiore lanceolato acuto galeato recurvo inferiore e basi linearis canaliculata in laminam obcordato-emarginatam extenso. *In Brasilia.* 4.

46. *A. cymbifera* Mart. t. 49. volubilis glabra; fol. cordato-reniformibus; floribus solitariis; perianthii tubo cylindrico deflexo bilabito; labio superiore lanceolato acuto canaliculato inferiore plus quam duplo longiore e basi inflato-cymbiformi in laminam ovatam emarginatam undulatam extenso. *In Brasilia.* 4.

47. *A. eriantha* Mart. t. 53. ramis hirsutis; fol. reniformibus mucronulatis pubescentibus; perianthii ventricosi sursum tubulosi hirti ore aperto hinc in labia duo horizontalia spathulata glanduloso-barbata abeunte. *In Brasilia.* 4.

48. *A. Taliscana* Hook. et Arn. volubilis glabra; fol. petiolatis cordato-rotundis obtusissimis basi sinu profunde lateque bilobis subtus pallidioribus; pedunculo axillari 1-floro; perianthii tubo breviusculo labium recurvum late ovatum intus filamentosopapillosum aequante. *In Talisco Peruviae.* 5.

49. *A. saccata* Wall. pl. as. rar. t. 103. volubilis; fol. oblongis v. ovato-oblongis acuminatis integerrimis subtus ramisque villosis; floribus lateralibus racemosis; perianthio villoso incurvo medio ventricoso, limbo orbiculari angustissimo subrepando patentissimo, fauce brevissima. B. M. t. 3640. *In Ind. or.* 5. Flores violacei.

50. *A. chilensis* Bridg. in B. R. t. 1680. herbacea volubilis; fol. reniformibus emarginatis undulatis subtus pubescentibus; pedunc. 1-floris cbracteatis; perianthio basi infracta ventricoso, limbo obliquo emarginato intus villoso. *In Chili.* 4.

b. Caulis erectus herbaceus.

51. *A. ciliata* Hook. Bot. Mag. t. 3756 caule erecto geniculato subsimplici; fol. longe petiolatis reniformicordatis obtusissimis subtus glaucescentibus; pedunc. axillaribus 1-floris; perianthii tubo curvato basi inflato, limbo obliquo obtuso pilis longis carnosis glandulosis ciliato. *In Buenos Ayres.* 4.

52. *A. sempervirens* L. caule prostrato flexuoso subscandente; fol. cordatis oblongis acuminatis; perianthio incurvo labio ovato retuso. Sabb. hort. t. 82. *In Creta.* 4.

53. *A. longa* L. caule ramoso laxe prostrato subscandente; fol. cordatis ovatis retusis; perianthii labio ovato-acuminato striato. Mill. ic. t. 51. f. 2. Hayne 9. t. 20. *In Europ. austr.* 4.

54. *A. pallida* W. et K. pl. Hung. t. 42. caule simplici adscendente; fol. cordato - triangularibus emarginatis; floribus solitariis rectis; perianthii labio lanceolato emarginato. Hayne 9. t. 23. *In Europ. austr.* 4.

55. *A. rotunda* L. caule erectiusculo subramoso; fol. cordatis ovatis obtusis subsessilibus; pedunculis solitariis; perianthii labio oblongo retuso. Blackw. t. 256. Hayne 9. t. 22. *In Europ. austr.* 4.

56. *A. Pistolochia* L. radice fibrosa; caule erecto subramoso; fol. cordatis acutis scabris subdenticulatis; pedunc. 1-floris; perianthii tubulosi labio altero brevissimo reflexo altero elongato oblongo obtuso recto. Clus. hist. LXXII. *In Gallia austr.* 4.

57. *A. Clematitis* L. erecta; fol. cordato-subrotundis obtusiusculis; pedunc. aggregatis; perianthii erecti labio oblongo. E. B. t. 398. Fl. dan. t. 1235. Hayne 9. t. 24. *In Europa.* 4.

58. *A. Serpentaria* L. adscendens geniculis nodosis; fol. cordatis oblongis acuminatis; pedunculis radicabilis; calycis labio lanceolato. Catesb. car. t. 29. *In Am. bor.* 4.

59. *A. hastata* Nutt. erecta flexuosa; fol. subcordato-hastatis acuminatis; pedunc. radical. perianthii labio ovato. *A. sagittata* Mühlb. Plukn. t. 78. f. 1. *In Am. bor.* 4.

60. *A. pubens* R. Br. procumbens; fol. cordato-oblongis obtusis pubescentibus; floribus solitariis; perianthii labio lanceolato. *In Nov. Holl.* 4.

61. *A. inflata* H. et K. t. 111. caule prostrato scandente; fol. reniformibus emarginatis glabris; perianthii labio oblongo-ovato mucronato, appendice indivisa; caps. cylindraceis. *Ad fl. Magdal.* 4.

62. *A. cretica* L. flexuosa erecta; fol. petiolatis cordatis obtusis hirsutisculis; pedunculis 1-floris; perian-

thii incurvi deflexi ventricoso-tubulosi
intus hirti labio obtuso abbreviato. In
Creta. 2.

63. *A. Maurorum* L. flexuosa
erectiuscula; fol. hastatis lanceolatis
lobis rotundatis; perianthii curvati la-
bio ovato acuto.

64. *A. bracteata* Retz. flexuosa
erectiuscula; fol. cordatis obtusis; pe-
dunc. solitariis; bracteis cordatis peti-
olatis; calycis labio elongato in-
curvo. *A. microphylla* Willd. In *Ind.*
or. 2.

65. *A. bracteolata* Lam. erectius-
cula glabra; fol. petiolatis cordatis
denticulatis; pedunc. solitariis; bracteis
sessilibus subrotundis; perianthii labio

angusto elongato. *A. mauritiana* Pers.
In *ins. Mascar.* 2.

66. *A. lutea* Desf. erecta subra-
mosa; fol. cordatis obtusis emarginata-
tis; pedunc. brevissimis 1-floris; pe-
rianthii erecti tubulosi labio altero ab-
breviato reflexo, altero lanceolato
acuto inflexo. In *Asia minore*. 2.

67. *A. pontica* Lam. flexuosa glabra;
fol. cordato-subrotundis; pedunc. so-
litariis; perianthii incurvi labio altero
ovato acuto, altero bilobo obtuso. In
Asia minore.

68. *A. hirta* L. erecta hirta; fol.
petiolatis cordatis oblongis obtusis pu-
bescensibus; pedunc. solitariis 1-floris;
perianthii incurvi limbo dilatato ovato.
In *ins. Chios.* 2.

C L A S S I S X X I .

M O N O E C I A .

M O N A N D R I A .

4770. *Cynomorium*. Amen-tum imbricatum. Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. O. Fem. Cal. 4-phyllus. Cor. O. *Balanophoreae*.

4771. *Lophophytum*. Flores capitati. Masc. Perigonum squa-mula carnosa canaliculata. Filamen-tum flaccidum antherae longitudinaliter dehiscentes. Fem. Perig. O. Ovaria plurima. Styli 2. stigmatibus capita-tis. *Balanophoreae*.

4772. *Balanophora*. Spadix capitatus. Perig. masc. 9-partitum pedicellatum. Anthera 4-locula-ris. Fem. Perig. nullum. Stylus ca-pillaris. *Balanophoreae*.

4773. *Helosis*. Spadix capita-tus. Receptaculum setis glandulosis et squamis peltatis deciduis obstitutum. Flor. masc. Perig. pedicellatum 3-par-titum. Fem. Perig. O. Caryopsis el-liptica membranula denticulata coro-nata. *Balanophoreae*.

4774. *Casuarina*. Flores mase. Perig. diphyllum bibracteolatum. Filamentum filiforme. Antherae 2-lo-culares. Fem. Perig. O. Bracteolae 2. Coryopsis lenticularis. Sem. inversum. *Casuarineae*.

4775. *Najas*. Masc. Tunica duplex, exterior calyptraeformis apice bicuspidata hinc fissa, interior in la-cinias 4 rupta. Anthera 4-gona. Fem. Tunica nulla. Nucula 1-sperma. *Najadeae*.

4776. *Caulinia*. Flores in axillis foliorum glomerati. Anthera el-liptica, intra tunicam cellulosam apice denticulatum inclusa. Styli 2-3.

Nucula 1-sperma tunica cellulosa tecta. *Najadeae*.

4777. *Zannichellia*. Flores axillares; solitarii. Perig. O. Filamen-tum filiforme, anthera bilocularis, loculis basi sagittatim divergentibus. Stylus brevis, stigma peltatum. Nu-culae 4 coriaceae dorso subcrenatae. Sem. pendulum. *Najadeae*.

4778. *Zostera*. Spatha lon-gitudinaliter dehiscens. Spadix com-presso-planus dorso nudus antice sta-minibus ovariiisque alternatim biseria-tis onustus. Antherae filamento bre-vissimo peltatum affixa. Stylus sub-tilatus, stigmata 2 capillaria. Utri-culi membranacei 1-spermi. *Najadeae*.

4779. *Althenia*. Flores axil-lares. Masc. Cupula calycina tri-dentata. Anthera sessilis 1-locularis linearis. Fem. Perig. O. Ovaria fu-siformia 1-locularia. Stylus filiformis, stigma peltatum. Caps. compressa alata. Sem. oblongum pendulum.

4780. *Lilaea*. Flores. Masc. spicati. Perig. O. Anthera sessilis extensa. Fem. spicati. Perig. O. Ovaria spicata 1-locularia. Caryopsis membranacea Sem. erectum.

4781. *Artocarpus*. Flores masc. amentacei. Perig. bipartitum. Filamentum planum. Anthera bilocularis. Fem. in spadice e spatha bi-valvi. Perig. tubulosum. Baccæ compositæ. *Artocarpeae*.

4782. *Ceratocarpus*. Flores masc. aggregati. Perigon. hya-linum bilobum. Stam. receptaculo in-sertum. Perigonii fem. lobis setaceis. Styli 2 setacei. Utriculus perigonii

clausus bicornutus. Sem. compressum.
Chenopodeae.

4783. Anthostema. Involucrum commune profunde bilobum. Masc. involucrum sub-8-lobum. Calyculus florum minimus 3—4-fidus. Fem. involucrum O. Cal. campanulatus 3—4-dentatus. Caps. carnosata. *Euphorbiaceae*.

4784. Maprounea. Flores masc. in capitula amentiformia involucro bipartito cincta. Flos fem. ad basin capit. masc. unicus bibracteatus. Cal. 3-lobus. Caps. 3-cocca 3-sperma. *Euphorbiaceae*.

DIANDRIA.

4785. Hippomane. Flores masc. glomerati. Cal. turbinatus bifidus. Filamentum bifidum antheris adnatis. Fem. Perigon. tripartitum. Stylus crassus stigmata plura radiata. Fructus carnosus pomiformis. *Euphorbiaceae*.

4786. Stillingia. Masc. Cal. tubulosus crenulatus. Stam. 2 libera, antheris extrorsis adnatis. Fem. Cal. trifidus. Stylus cylindricus. Stigmata 3 revoluta glandulosa. Fructus 3-coccus. *Euphorbiaceae*.

4787. Seepasma. Masc. Cal. 4-partitus, lacinias conniventibus intus 4-glandulosis. Filamentum crassum antheris 2. Fem. Cal. 5-partitus persistens. Stigmata 5—8 sessilia. Caps. sulcata 5—8-loocularis. *Euphorbiaceae*.

4788. Epistylum. Masc. Cal. 4-partitus, intus 4-glandulosus. Filamentum crassum antheris 2. Fem. Cal. 5-partitus intus glandulis 5. Ovarium carnosum. Stigmata 3 biloba. Caps. obtuse 3-gona 3-loocularis 3-valvis 3-sperma. *Euphorbiaceae*.

4789. Adenopeltis. Flores amentiformes, fem. 1-2 ad basin amenti, reliqui masculi sessiles, solitarii ad axillam squamae introrsum biglandulosae. Cal. nullus. Antherae bilobae. Styli 3 reflexi. Caps. 3-cocca 3-sperma. *Euphorbiaceae*.

TRIANDRIA.

4790. Carex. Spicae monoicae rarius dioicae. Masc. squamae simplices. Filamenta capillaria exserta. Fem. Praeter squamas perianthium

1-phylum persistens achenio connatum. *Cyperoideae*.

4791. Uncinia. Masc. Spiculae 1-florae. Palea l. Fem. Spiculae abortu 1-florae flore feminino pedicellato, masculorum abortivorum pedicello setiformi. Glumae 2. Stylus 3-fidus. Caryopsis 3-gona chartacea. *Cyperoideae*.

4792. Schoenoxphium. Spiculae multiflorae, flore inferiore feminino masculis anticis pedicellatis. Ovarium sessile stylo 3-fido. Caryopsis 3-gona chartacea stylo coronata. *Cyperoideae*.

TYPHACEAE.

4793. Typha. Spica cylindrica mascula culmum terminans. Filamenta filiformia, simplicia v. 2—3-furca, antherae basi fixae 4-locellatae. Spica feminea infra masculam culmum obvestiens. Stylus simplex, stigma linguaeformis. Fructus subdrapaceus minimus.

4794. Sparganium. Flores in capitula dense congesti. Stamina in receptaculo hemisphaerico plurima; Stylus simplex stigmate linguaeformis. Fructus drupaceus.

4795. Tragia. Flores masc. Cal. 3-partitus. Fem. Cal. 6-partitus rarius 5—8-partitus. Stylus 3-fidus. Caps. hispida 3-cocca. *Euphorbiaceae*.

4796. Excoecaria. Masc. Cal. O. ejus loco sqama saepe extus glandula depressa stipata. Stam. basi coalita. Fem. squama 3-partita v. squamae 3. Stylus 3-partitus, stigmatibus reflexis. Caps. 3-cocca. *Euphorbiaceae*.

4797. Microstachys. Cal. 3-partitus. Filamenta brevia. Stylus 3-partitus reflexus stigmata simplicia. Caps. laevis v. echinata prismatico 3-cocca, semina teretia. *Euphorbiaceae*.

4798. Cnesmone. Flores masc. Cal. 3-fidus urceolatus. Anthaerae infra apicem adnatae. Fem. Cal. 3-phillus persistens. Stigmata 3 sessilia persistentia. Caps. hispida 3-cocca. *Euphorbiaceae*.

4799. Trichostemon. Cal. 5-partitus. Pet. 5. Filamenta apice libera. Styli 3 bifidi. Caps. 3-cocca. *Euphorbiaceae*.

4800. Micranthea. Flores masc. Cal. coloratus 6-phyllo. Cor. O. Stamina disco glandulosō 3-lobo inserta. Fem. Cal. 3-partitus. Styli 3 revoluti. Caps. acuminata 3-cocca 6-sperma. *Euphorbiaceae.*

4801. Acharia. Cal. uterque disepalns. Cor. masc. 3-loba fem. 3-petala. Caps. 1-sperma 3-valvis. *Euphorbiaceae.*

4802. Axyris. Masc. Cal. 3-partitus. Cor. nulla Fem. Cal. 3-sepalus persistens. Cor. O. Stylus bifidus persistens. Utriculus 1-spermus. *Chenopodeae.*

4803. Hernandia. Involucrum 4-phylum 3-florum. Masc. Perianthium 6-partitum. Glandulae 6-stipatae. Antherae glandes oblongae. Fem. Cal. campanulatus integer. Cor. 8-partita. Glandulae 4. Stigma infundibuliforme. Drupa 8-costata.

4804. Sarothrostachys. Spica longissime filiformis. Masc. Cal. membranaceus cupulaeformis 3—4-dentatus. Stam. 3, filamentis brevissimis, antheris globoso-didymis. Fem. Germen 3-angulatum. Stigmata subulata reflexa. Caps. 3-cocca coccis 1-spermis. *Euphorbiaceae.*

4805. Antidaphne. Spicae strobiliformes. Masc. geminati. Perig. tubo filiformi limbo trilobo. Stam. 3 perigonii fauci inserta. Filamenta apice dilatata. Fem. Perig. urceolatum. Stigma sessile capitato-globosum. Bacca 1-sperma. *Loranthae.*

4806. Philodice. Masc. Perigonium exter. 3-phylum, interius tubulosum limbo 3-fido. Fem. Perig. utrumque 3-phylum. Stigmata 3, bipartita. Caps. 3-locularis.

TETRANDRIA.

4807. Litorella. Masc. Cal. longe pedunculatus 4-partitus. Cor. tubulosa 4-fida. Filamenta elongata. Fem. Perianthium sessile 2—4-dentatum. Stylus longissimus. Caryopsis rugosa. *Plantagineae.*

4808. Argothamnia. Masc. Cal. 4-sepalus. Cor. 4-petala. Glandulae 4. Antherae dorso incumbentes. Fem. Cal. 5-partitus. Cor. O. Styli 3 bipartiti, laciniis bifidis. Caps. 3-cocca. *Euphorbiaceae.*

4809. Tricaryum. Masc. Cal. 4-sepalus coloratus. Cor. O. Glandulae 4. Fem. Cal. 4-partitus. Cor. O. Styli O. Stigma lacinatum. Drapa 3-locularis. Nūces 3. *Euphorbiaceae.*

4810. Buxus. Cal. 4-sepalus, bractea colorata accessoria. Filamenta filiformis. Fem. Cal. 3-bracteatus 4-sepalus, sepalis apice bifidis. Glandulae 3. Stigmata revoluta. Caps. 3-rostris 3-cocca. *Euphorbiaceae.*

4811. Tricerca. Masc. Cal. 4-partitus, laciniis acutis aequalibus. Cor. O. Filamenta crassa. Antherae post anthesin recurvæ. Fem. Cal. 5-sepalus. Cor. O. Styli 3 stigmatibus recurvis. Caps. 3-gona 3-cornis. *Euphorbiaceae.*

4812. Sarcocolla. Masc. Cal. 4-sepalus aequalis. Cor. O. Filamenta latiuscula; antherae dorso affixæ. Fem. Flos gemmaeformis, squamis imbricatis. Styli 2 revoluti. Drupa 1-sperma. *Euphorbiaceae.*

4813. Serpicula. Masc. Cal. 4-partitus. Pet. 4. Filamenta capillaria. Antherae grandes 4-gonae. Stylorum 4 rudimenta. Fem. Cal. limbus minimus 4-fidus. Stylus truncatus brevissimus. Nux globosa angulata 1-sperma. *Haloragaceae.*

4814. Diotis. Masc. Cal. 4-sepalus persistens sepalis obtusis. Filamenta capillaria, antherae didymæ. Fem. Cal. urceolatus bicornis, corniculis obtusis divergentibus. Sem. compressum basi villosissimum. *Chenopodeae.*

4815. Eriocaulon. Capitulum androgynum; squamis 1-floris. Perig. dupli serie 4—6-phylum. Fem. Foliola perianthii infra connata. Stam. 4—6. Antherae biloculares. Fem. Foliola perig. distincta. Stigmata 2-3. Caps. 2—3-locularis. *Restiaceae.*

URTICEAE.

4816. Urtica. Masc. Cal. 4-sepalus. Cor. O. Urceolus nectarifer. Filamenta filiformia elastica. Antheræ didymæ. Fem. Cal. 2—3—4-valvis. Stigma penicillato-barbatum. Sera. unicum.

4817. Dubrucilia. Flores sessiles in panicula. Masc. Cal. 4-

partitus. Pistilli rudimentum clavatum. Fem. Cal. 3-lobus, lobo extiore maximo incrassato. Stam. sterilia. 3.

4818. Urena. Masc. Cal. 4-5-partitus. Stam. 4-5. Fem. Cal. 4-5-partitus irregularis. Stigma globosum villosum. Achénium oblique ovatum.

4819. Fleurya. Masc. Cal. 4-partitus. Stam. 4. Fem. Cal. 4-partitus irregularis. Stigma elongatum filiforme villosum. Achenium ala angustissima cinctum.

4820. Gerardinia. Masc. Cal. 4-partitus. Fem. Cal. 4-partitus, laciinis inaequalibus 3 inferne connatis. Stigma longissimum filiforme villosum. Achenium lenticulare compresum.

4821. Parietaria. Flores mase. et fem. in eodem involucro, involucrum multipartitum. Masc. Cal. 4-partitus intus lanatus. Fem. Cal. tubulosus 4-lobus. Stigma capitato-vilosum in stylo filiformi.

4822. Gesnouina. Flores 1-2 masc. unus femineus in eodem involucro. Involucrum campanulatum 6-fidum. Masc. Cal. 4 partitus villosus. Fem. Cal. ovalis 4-lobus. Stigma elongatum ad unum latus villosum.

4823. Freirea. Flores capiti. Masc. Cal 4-partitus, fructifer chartaceus rufus tuberoso-vilosus. Stigma capitato-vilosum.

4824. Thaumuria. Flores in capitulo involucrato. Involucrum 5-fidum 3-florum, laciinis majoribus alaeformibus. Masc. Cal. 4-partitus. Fem. Cal. 4-dentatus villosus intus lanatus. Stigma capitato-vilosum.

4825. Pouzolzia. Flores in involucro polyphylo. Masc. Cal. 4-5-partitus. Stam. 4-5. Fem. Cal. fructifer sulcateo-angulatus v. complanato - blalatus inferne lato cristatus, limbo parvo bilobo. Stigma sessile elongatum villosum.

4826. Rousseliea. Flores ráccemosi. Involucrum polyphyllum. Masc. Cal 4 - partitus. Rudimentum pistilli lanatum. Fem. Cal. fructifer 1-phyllo complanato-4-alatus. Stigma capitato-vilosum.

4827. Bochmeria. Masc. Cal. 4-partitus. Filamenta subulata. Antherae didymae. Fem. Cal. O. Squamæ confertæ oblongæ. Stylus

elongatus filiformis plumosus. Achénium stylo coronatum.

4828. Dorstenia. Receptaculum carnosum concavum androgynum. Perig. O. Stam. pistillis mixta. Antherae biloculares. Stylus lateralis bifidus. Semina in cavis receptaculi nitulantia.

4829. Splitgerbera. Flores fasciculati, involucro 4-phyllo. Masc. Perig. 4-partitum. Filamenta petaloidea; antherae biloculares dorso affixæ. Fem. Perig. ovatum ovarium cingens. Stylus cylindricus. Stigma elongatum villosum. *Urticeae.*

4830. Procris. Masc. Cal. 4-5-partitus. Cor. O. Filamenta elastica; anthera loculis divaricatis. Fem. Cal. 4-dentatus. Styli 2-3-bifidi. Caps. 1-spermae in receptaculo baccato. *Urticeae.*

4831. Morus. Flores masculi amentacei. Cal. 4-partitus. Antherae biloculares. Fem. Stigmata 2 sessilia. Baccae cum calyce concretae aggregatae.

4832. Albradiea. Flores masculi et feminei in distinctis receptaculis integris. Cal. frnetifer exsuccus vel basi tantum modo succulentus.

4833. Fatoua. Flores masculi et fem. in eodem receptaculo orbiculari margine ramoso - laciniato. Cal. fructifer membranaceus. Ovarium obliquum. Stigma bifidum lobo altero minuto.

4834. Alnus. Flores amentacei. Masc. Squamae 3-florae. Perianthium 4-lobum. Antherae didymae in filamentis tenuibus.. Fem. squamae biflorae. Perianthium O. Styli 2. Nux angulata bilocularis disperma. *Amentaceae.*

4835. Carya. Flores amentacei. Masc. squamae 3-partitae. Cor. O. Stam. 4-6. Fem. Cal. superis 4-fidus. Stigma 4-lobum. Fructus 4-valvis. Nux 4-angula. *Amentaceae.*

4836. Traganthus. Flores axillares aggregati. Masc. Cal. 4-partitus. Stam. 4-6, filamentis subulatis antheris globosis. Fem. Cal. parvus 4-partitus squamis magnis 4-fariam imbricatis cinctus. Styli distincti recurvi. Caps. depresso 3-an-

gularis 3-locularis 3-cocca. *Euphorbiaceae.*

4837. Pothos. Spatha reflexa persistens. Spadix stipitatus globosus floribus hermaphroditis obsitus. Perigonum 4-phylum. Stam. 4, filamentis linearibus complanatis. Stigma sessile umbilicatum. Baccia 1—2-sperma. *Aroideae.*

4838. Iasia. Spatha elongata demum reclusa. Spadix sessilis cylindricus. Perigon. 4-phylum. Stigma sessile subtruncatum. Baccacae muriatae 1-loculares 1-spermae. Fol. pinnatifida. *Aroideae.*

4839. Anthurium. Spatha abbreviata reflexa persistens. Spadix subsessilis cylindricus. Perigonum 4-phylum. Stam. 4, filamenta linearia, antherae biloculares. Stigma sessile oblongum. Baccia bilocularis 2—4-sperma. Fol. palmata. *Aroideae.*

4840. Spathiphyllum. Spatha foliaris persistens. Spadix pedicellatus abbreviatus. Perigonum 4—8-phylum. Stam. 4—8, filamenta linearis-lanceolata. Stigma 3-lobum. Baccia 3-locularis. *Aroideae.*

PENTANDRIA.

4841. Friesia Spr. Masc. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Filamenta apice dilatata, antherae introrsum dehiscentes. Fem. Cal. 5-partitus, intus squamulis instructus. Stigmata 3 biloba. Fructus 1-spermus dehiscens. *Euphorbiaceae.*

4842. Crozophora. Masc. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Stamina receptaculo glanduloso imposita. Fem. Cal. 10-partitus, laciniis linearibus. Pet. O. Styli 3 bifidi. Fructus 3-coccus. *Euphorbiaceae.*

4843. Hexadica. Masc. Cal. 5-sepalus. Pet. 5. Fem. Cal. 6-sepalus. Cor. O. Stigmata 6, conniventia. Caps. 6-locularis 6-sperma. *Euphorbiaceae.*

4844. Sacellium. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Fem. Cal. ventricosus 5-dentatus. Cor. O. Stigma bifidum. Drupa 4-gona 4-locularis 4-sperma.

4845. Ambrosia. Masc. Involucrum 1-phylum multiflorum. Cor. 5-dentata. Antherae sessiles biloculares. Fem. Cal. 5-fidus 1-florus.

Cor. O. Styli 2 simplices. Nucula 1-sperma. *Ambrosiaceae.*

4846. Franseria. Masc. Involucrum 1-phylum multiflorum. Cor. tubulosae 5-dentatae. Filamenta brevissima. Antherae biloculares. Fem. Cal. 3—5-sepalus. Cor. O. Styli 4 bifidi squamis stipitati. Drupa setis uncinatis tecta 4-locularis 4-sperma. *Ambrosiaceae.*

4847. Xanthium. Masc. Involucrum subdiphyllum multiflorum. Recept. setosum. Perianthium 5-dentatum. Antherae 4—5 mucronatae. Fem. Involucrum diphyllum biflorum. Perianthium cum drupis 2 coalescens hamato-echinatum. *Ambrosiaceae.*

4848. Chiropetalum. Cal. 5-partitus. Masc. Pet. 5, lamina palmatis 3—7-fida, laciniis acutis. Filamenta superne distincta. Fem. Cor. O. Glandulae 5. Styli 3 distincti bifidi. Caps. globosa 3-cocca. *Euphorbiaceae.*

4849. Loxostylis. Cal. parvus coloratus. Pet. 5, disco 5-lobo inserta. Filamenta subulata, antherae introrsae biloculares. Styli 3—4, stigmata capitata. Drupa exsucca. Sem. oblongum. *Terebinthaceae.*

HEXANDRIA.

4850. Comptonia. Masc. Amentum cylindricum imbricatum, squamis 1-floris. Perianthium 2-phylum. Cor. O. Filamenta 3 bifurca. Antherae 6 bivalves. Fem. Amentum ovatum dense imbricatum. Perianthium 6-phylum. Styli 2 capillares. Nux 1-sperma. *Myriceae.*

Palmae.

4851. Hyospathe. Masc. Cal. cupularis 3-fidus. Cor. 3-petala. Filamenta filiformia, antherae linearis-oblongae. Fem. Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala, petalis ovatis. Stigmata 3. Baccia 1-sperma.

4852. Kunthia. Masc. Cal. membranaceus 3-fidus. Cor. tripetala subcarnosa. Filamenta subulata. Antherae lineares. Fem. Cal. campanulatus 3-dentatus. Cor. 3-petala. Stigmata 3 revoluta. Baccia 1-sperma subcarnosa.

4853. Leopoldinia. Masc. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala, petalis

ovatis. Filamenta complanata antherae ovatae biloculares. Fem. Cal. 3-phyllo. Cor. 3-petala. Stigmata 3 patentia. Bacca drupaeformis orbicularis 1-sperma.

4854. Euterpe. Masc. Cal. 3-phyllo, foliolis ovatis. Cor. 3-petala. Filamenta subulata. Antherae sagittatae. Masc. Cal. 3-phyllo. Cor. 3-petala. Ovarium 3-loculare loculis 2 minimis. Stigmata 3 sessilia. Bacca 1-locularis 1-sperma.

4855. Oenocarpus. Masc. Cal. 3-partitus carinatus. Cor. 3-petala, petalis ovatis. Filamenta subulata; antherae lineares sagittatae. Fem. Cal. 3-phyllo, foliolis orbicularibus. Cor. 3-petala. Stigmata 3 sessilia. Bacca 1-locularis 1-sperma.

4856. Oreodoxa. Masc. Cal. 3-phyllo, foliolis late ovatis imbricatis. Cor. 3-petala, petalis oblongo-ovatis. Stam. 6, 9—12. Antherae dorso affixae. Fem. Cal. et Cor. ut in mare. Stigmata 3 conniventia. Drupa baccata, sarcocarpio fibroso.

4857. Areca. Cal. 3-partitus carinatus. Cor. 3-petala, petalis lanceolatis. Stam. 3, 6—12. Antherae ovatae sagittatae. Fem. Cal. 3-phyllo. Cor. 3-petala. Stigmata sessilia patentia. Drupa baccaeformis 1-sperma sarcocarpio fibroso.

4858. Dypsis. Cal. 3-phyllo, foliolis suborbiculatis. Cor. 3-petala, petalis ovatis acutis. Filamenta subulata basi subcohaerentia. Antherae subrotundae. Fem. Cal. 3-phyllo. Cor. 3-petala. Stigmata 2—3 sessilia. Bacca 1-sperma fibrosa.

4859. Seafertia. Masc. Cal. 3-phyllo, foliolis ovatis. Cor. 3-fida, laciniis oblongis. Stam. 6 v. plurima, filamenta filiformia libera, antherae lineares subsagittatae. Fem. Cal. et cor. maris imbricato-convoluta. Stylos brevissimus, stigmata 3 patentia. Bacca 1-sperma fibrosa.

4860. Marina. Masc. Cal. in-crassatus subcylindricus tridenticulatus. Cor. 3-petala. Antherae lineares. Fem. Cal. urceolatus 3-fidus. Cor. 3-petala. Stigmata 2—3 connata. Bacca 2—3-sperma. Sem. convexa.

4861. Calamus. Masc. Cal. 3-dentatus Cor. 3-partita v. 3-petala. Filamenta basi connata, antherae lineares. Fem. Cal. et Cor. maris.

Stigmata 3 sessilia. Bacca 1-sperma; squamis retrorsis loricata.

4862. Daemonorops. Flores paniculati. Masc. Cal. campanulatus 3-dentatus. Cor. 3-partita. Antherae lineares basi fixa. Fem. Cal. et Cor. maris. Stigmata 3 recurva. Bacca 1-sperma squamis retrorsum imbricatis.

4863. Sagus. Spadix ramosus. Masc. Cal. 3-dentieulatus. Cor. 3-petala. Filamenta basi dilatata, antherae lineares. Fem. Cor. campanulata 3-fida. Staminum urceolus 6-dentatus. Stigmata 3 connata. Bacca squamis retrorsis loricata.

4864. Metroxylon. Spadix ramosus. Cal. 3-fidus. Cor. 3-partita. Filamenta subulata, antherae dorso afflue. Fem. Cal. et cor. maris. Staminum urceolus 6-dentatus. Stigmata 3 in pyramidem connata. Bacca squamis retrorsis loricata.

4865. Bentineckia. Masc. Cal. 3-dentatus. Cor. 3 petala. Fem. Cal. 3-dentatus bibracteolatus. Cor. 3-petala. Bacca 1-sperma sphaerica succulenta.

4866. Geonomia. Masc. Cal. 3 phyllo, foliolis carinato-concavis. Cor. tripetala plana. Filamenta in cylindrum connata, antherae loculis divaricatis. Fem. Cal. 3-phyllo. Cor. gamopetala 3-fida. Urceolus 6-dentatus ovarium ambiens. Stigmata revoluta. Bacca 1-sperma.

4867. Corypha. Flores hermaphroditi v. monoici. Cal. cupularis 3-denticulatus. Cor. 3-petala. Styli subulati coalescentes stigmate simplici. Bacca 1—3-sperma.

4868. Livistona. Cal. 3-fidus. Cor. 3-partita. Filamenta in discum coalita, antherae cordato-oblongae. Styli connati. Bacca plerumque unica 1-sperma.

4869. Desmoncus. Masc. Cal. membranaceus 3-angularis v. 3-fidus. Cor. 3-petala, petalis ovatis. Antherae lineares erecta. Fem. Cal. cupularis ore 3-denticulato. Cor. gamopetala urceolo tridentato, basi pervia. Stigmata 3 revoluta acuta. Drupa ovata subglobosa 1-sperma.

4870. Bactris. Masc. Cal. tener 3-partitus v. 3-fidus. Cor. 3-petala, petalis apice crassioribus longitudinaliter striatis. Stamina 6, 9—12,

antherae sagittatae. Fem. Cal. et cor. maris sed firmiores. Stigmata 3 pyramidatim connata mox revoluta. Drupa ovata.

4871. Guilielma. Masc. Cal. 3-angularis, angulis membranaceis. Cor. gamopetala subglobosa profunde 3-partita. Antherae lineari-oblongae incubentes. Fem. Cal. membranaceus annularis. Cor. coriacea campanulata. Stigmata 3 sessilia. Drupa 1-sperma fibroso-carnosa.

4872. Martinezia. Masc. Cal. 3 phyllus Cor. 3-petala. Fem. Cal. et Cor. maris. Staminum urceolus membranaceus. Stigmata 3 sessilia. Drupa 1-sperma.

4873. Acrocomia. Flores masc. in superiore parte ramorum spadicis densissimi in foveolis sessiles. Cal. parvus 3-phyllus. Cor. 3-petala prismatica - cylindrica. Stamina inclusa. Fem. Cal. 3 - phyllus. Cor. 3-petala. Cupula annularis 6-dentata. Stigmata 3 revoluta. Drupa globosa 1-sperma.

4874. Astrocaryon. Flores masc. in superiore ramorum parte densi. Cal. 3-partitus v. 3-fidus laciniis acutis. Cor. 3 partita subcarnosa. Stam. 6, petalis per paria opposita. Fem. Cal. urceolatus tridentatus. Cor. urceolata carnosa ore tridentato. Stigmata 3 in corpus floccoso-gelatinosum confluentia. Drupa ovata 1-sperma.

4875. Elais. Flores in diversis spadicibus corymboso-ramosis. Masc. Cal. papyraceo-aridus 3-phyllus. Cor. membranacea 3-petala petalis erecto-coniventibus. Filamenta in urceolum apice 6-fidum connata. Fem. Cal. membranaceus 3-phyllus foliolis imbricato-convolutis. Cor. 3-6-petala. Stigmata 3 magna. Drupa angulata 1-sperma.

4876. Cocos. Masc. Cal. 3-phyllus, foliolis lanceolatis acutis. Cor. 3-petala. Antherae lineares subsagittatae. Fem. Cal. 3-phyllus, foliolis suborbiculatis convolutis. Cor. 3-petala convoluta. Stigmata 3 pyramidato-3-quatra. Bacca ovata mesocarpio crasso fibroso, putamine osseo.

4877. Syagrus. Masc. Cal. 3-phyllus, foliolis 3-angularibus. Cor. 3-petala petalis carnosulis. Filamenta subulata, antherae subsagittatae lineares. Fem. Cal. 3-phyllus foliolis ovatis. Cor. 3-petala, petalis

imbricatis. Stigmata 3 sessilia pyramidato-3-gona. Drupa oblonga 1-sperma.

4878. Diplothemium. Flores masc. subcarnosi coriacei. Cal. 3-phyllus, foliolis anguste lanceolatis basi connatis. Cor. 3-petala, petalis ovatis. Stam. 6-12 v. indefinita, antherae sagittatae v. sublineares. Flores fem. coriacei striati. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala, petalis integerimis v. repando-dentatis. Stigmata 3 triquetra.

4879. Maximiliana. Masc. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala, petalis lanceolatis. Antherae lineares dorso adnatae. Fem. Cal. 3-phyllus foliolis imbricato-convolutis. Cupula membranacea ovarium cingens. Stigmata 3 revoluto - patentia. Drupa ovata 1-sperma.

4880. Pinanga. Masc. Cal. 3-partitus, laciniis subcarinatis. Cor. 3-petala. Stam. 6-15, antherae lineares basifixae. Fem. Cal. 3-phyllus et cor. 3-petala conformis. Stigmata 3 vix distincta. Bacca fibrosa 1-sperma.

4881. Kentia. Masc. Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala. Filamenta brevissima antherae basifixae. Fem. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Stigmata 3 distincta. Bacca parce fibrosa 1-sperma.

4882. Oncosperma. Masc. Cal. 3-partitus laciniis cariatis. Cor. 3-petala. Filamenta crassiuscula libera antherae sagittatae. Fem. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Stigmata 3 sessilia conniventia. Bacca grumoşa 1-sperma.

4883. Cyrtostachys. Spadix corymboso-ramosus. Masc. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Filamenta complanata basi unita. Fem. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Stigmata 3 sessilia divergentia.

4884. Pseudanthus. Masc. Cal. urceolatus 6-partitus, laciniis linearibus. Stam. 6 inaequilonga. Fem. Cal. nudus 5-6-partitus. Styli 3 revoluti intus stigmatosi. Caps. 1-loicularis 1-sperma. Euphorbiaceae.

OCTANDRIA.

4885. Myriophyllum. Masc. Cal. 4-fidus. Cor. 4-petala. Stam.

4—8. *Antherae* lineares 4-loculares. Fem. Cal. 4-lobus. Cor. O. Stigma-ta sessilia 4 plumosa. Nucula 1-sperma. *Hatorageae.*

4886. Corylus. Masc. Flores amentacei. Squamae 3-partitae v. 3-dentatae. Stamina biseriata imbricata. Antherae subsessiles apice subbarbatae. Flos fem. gemmaceus squamis imbricatis. Styli 2 simplicissimi filiformes. Nux ovata. *Amen-taceae.*

DECANDRIA - POLYANDRIA.

Amentaceae.

4887. Betula. Flores amentacei. Masc. Squamulae 5 sub quavis squama. Filamenta 5—6 bifida 2 antherifera. Fem. Squamae 3-lobae terna germina tegunt. Styli 2. Sem. alatum.

4888. Carpinus. Flores amentacei. Masc. Squamae ciliatae. Stam. 12—16 antheris apice barbatis. Fem. Squamae laxae 3-lobae. Styli 2. Nux.

4889. Ostrya. Flores amentacei. Masc. Squamae ciliatae. Stam. 12—16 ramosa. Fem. Amentum nudum. Caps. inflata 1-sperma.

4890. Fagus. Amenta subrotunda. Masc. Cal. 5-fidus bracteatus. Stam. 15—20. Fem. Cal. exterior 4-fidus 2-florus interior denticulatus germini adnatus. Stigmata 3. Nuces 2—3.

4891. Castanea. Masc. Amenta cylindrica, Cal. 5-fidus. Fem. Cal. 5—6-sepalus echinatus terna fovente germina stigmatibus penicillatis.

4892. Quercus. Flores masc. amentacei. Cal. 5-partitus, lacinii lanceolati ciliatis. Antherae ovales. Flores fem. gemmacei. Cal. imbricatus. Stigmata 3 plana. Nux ovalis calyx persistente cincta.

4893. Lithocarpus. Flores amentacei. Masc. Cal. 6-partitus, lacinii ovatis. Discus clavatus villosus. Filamenta elongata. Fem. Cal. brevissimus 5—6-partitus. Stylus incrassatus 3-gonus. Nux obovata rugosissima.

4894. Platanus. Amenta globosa squamata. Masc. Perianthium O. Stam. numerosa. Filamenta apice incrassata super antheris in corpuscula glandulosa terminatae. Fem. Squa-

mulae planea clavatae. Caryopsis clavata basi pilosa.

4895. Juglans. Flores masculi amentacei. Amenta cylindrica squamis imbricatis. Antherae biloculares. Fem. Cal. solitarius 4-deutatus germini accrescens. Cor. 4-fida laci-nii acutis. Stigmata crassa glandu-losa - squamulata. Drupa putamine bivalvi.

4896. Pterocarya. Flores masc. amentacei. Cal. 5—6-paritus. Stam. 10—20. Antherae crassae bi-loculares. Flores fem. laxe spicati. Cal. 3—5-partitus. Stigmata 2 elon-gata. Drupa parva bialata. *Juglan-deae.*

4897. Engelhardtia. Flores masc. amentacei, amenta e squa-mis 3-multipartitis composita. Antherae magnae pubescentes didymae. Fem. involucrum cupulatum 4-fidum, laci-nii 3 elongatis. Cal. 4—5-fidus. Stylus bi-vel multipartitus. Drupa 1-sperma.

4898. Hedyosmon. Amenta mascula oblonga sine squamis et pe-rianthio. Filamenta O. Antherae arcte imbricatae mucronatae. Fem. Cal. 1-phyllus 3-dentatus. Stylus 3-querter. Drupa 3-gona 1-sperma ca-lyce baccato vestita.

4899. Thelygonum. Masc. Cal. corollinus bivalvis revolutus. Stam. 11. Filamenta capillaria. Antherae lineares elongatae. Fem. Ger-men subglobosum nudum. Cor. late-ralis tubulosa apice bifida denticulata. Stylus simplicissimus. Drupa subglo-bosa. *Chenopodaeae.*

4900. Ceratophyllum. Masc. Involutum axillare multipartitum la-ciniis apice denticulatis v. integeri-mis. Antherae ventricosae. Fem. In-volutum multipartitum. Stylus filiformis incurvus. Nux 1-sperma. *Cera-tophyllae.*

4901. Sagittaria. Masc. Pe-rigon. 6-phyllo, foliolis 3 interioribus petaloideis, filamenta filiformia. Fem. Perigon. maris. Stylus centra-lis brevissimus, stigma terminale obtusum. Carpida plurima capitato-congesta. *Helobiae.*

4902. Mithridatea. Masc. Invol. ovatum connivens 4-partitum antheris numerosissimis totum vestitum.

Fem. Invol. concavum superne pervium germinibus 1-stylis obtectum. Achenia cortice pulposo. *Urticeae.*

4903. Garcia. Cal. utriusque sexus bipartitus. Masc. Petala 12 sericea reflexa. Recept. hemisphaericum carnosum villosum multiglandulosum. Filamenta subulata ultra antheras producta. Fem. Pet. 8. Margo glandulosus germen cingens. Stigma 3-lobum. *Euphorbiaceae.*

4904. Euphorbia. Involucrum androgynum 4—5-partitum extus appendiculis glandulosis rotundatis v. bicornibus. Flosculi apetali masculi. Pedicelli incerti numeri singuli cum singulis staminibus articulati. Antherae 2 loculares. Germ. pedicellatum centrale. Styli 3, bifidi. Caps. 3-cocca. *Euphorbiaceae.*

4905. Cleidion. Masc. Cal. 3-partitus patens. Stam. plurima receptaculo inserta. Fem. Cal. parvus 5-partitus persistens. Ovarium didymum biloculare loculis 1-ovulatis. Stylus longus 2—3-partitus. Caps. dicocca 2-sperma. *Euphorbiaceae.*

4906. Mabea. Masc. Cal. 5-dentatus. Cor. O. Stam. 9—12 receptaculo obconico inserta. Fem. Cal. 5-fidus v. 6-fidus. Stylus 3-fidus lobis filiformibus contortis. Caps. 3-cocca 2-sperma. *Euphorbiaceae.*

4907. Elateriospermum. Masc. Cal. 4-phyllo, foliolis imbricatis. Cor. O. disco interdum viloso glanduloso. Fem. Cal. 4—6-phyllo foliolis imbricatis deciduis. Ovarium annulo viloso setigero cinctum. Stigmata 3 sessilia. Drupa subglobosa 3—4-sulca. *Euphorbiaceae.*

4908. Manihot. Cal. corollinus campanulatus 5-fidus. Cor. O. Stam. disco carnoso inserta alterna breviora. Stylus brevior. Stigmata 3, pluriloba, lobis in massam conicam sinuatum compactis. Caps. tricocca. *Euphorbiaceae.*

4909. Cephalocroton. Flores capitato-spicati v. axillares. Masc. Cal. 4-partitus. Cor. O. Stam. 8, antheris bilocularibus. Fem. Cal. 5-partitus laciniis bipinnatifidis. Cor. O. Styli lobis trifido-ramosus. Caps. calyx squarroso cincta 3-sperma.

4910. Podostachys. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Stam. 8—10, filamentis inflexis, antheris introrsis bilocularibus. Fem. Cal. campanula-

tus. Petala 6 parva linearia. Germen villosum gemmulis intra loculos pendulis. Stigmata sessilia profunde bipartita lobis filiformibus involutis. Caps. tricocca 1-sperma.

4911. Astraea. Masc. Cal. globosus profunde 5-fidus. Pet. 5. Stam. 12—15 filamentis inflexis, antheris reniformibus. Fem. Cal. campanulatus 5-partitus. Cor. O. Glandulae squamaeformes 5. Styli elongati sulcati apice in 7—8 lobos filiformes divisi. Caps. 3-cocca 3-sperma.

4912. Ocalia. Masc. Cal. globosus profunde 5-fidus. Pet. 5. Glandulae 5. Stam. 10. receptaculo viloso inserta, antheris ovalis bilocularibus. Fem. Cal. campanulatus 5-partitus, laciniis acutis. Cor. O. Germen pilis stellatis vestitum. Stigmata bipartita lobis filiformibus. Caps. setosa.

4913. Eutropia. Masc. Cal. profunde 5-fidus. Pet. 5. Glandulae 5 intense coalitae. Stam. 10. Antherae emarginatae. Fem. Cal. 5—6-partitus. Cor. O. Stigmata bifida divaricatim adscendentia, lobis complanatis. Caps. 3-cocca 3-sperma.

4914. Cleodora. Masc. Cal. pubescens 5-partitus, Pet. 5. Stam. 10 receptaculo viloso inserta, antheris adnatis. Fem. Cal. cupularis 5-fidus persistens, laciniis latis obtusis. Stigmata 3-tripartita, lobis teretibus profunde bifidis. Caps. globosa 3-sperma.

4915. Timandra. Flores masc. racemosi. Cal. urceolato-campanulatus profunde 4-fidus. Pet. 4. Stam. 8 filamentis inflexis. Fem. Flores squalares solitarii. Cal. 5-partitus. Cor. O. Stigmata 3, 3—4-partita. Caps. globosa 3-sperma.

4916. Medea. Flores sparsi. Masc. Cal. 5-partitus. Pet. 5. Stam. 10, receptaculo hirto inserta, filamentis pilosis. Fem. Cal. profunde 5-partitus persistens. Stigmata 3, profunda trifida. Caps. globosa 3-sperma.

4917. Sajoria. Masc. Cal. 4-partitus. Stam. 8, glandulis 4 cincta. Fem. Cal. 4-partitus. Germen 4-lokulare. Stylus brevissimus. Stigma 4-radiatum. Caps. depressa 4-cocca, coccis alato-corniculatis.

4918. Ctenomeria. Masc. Cal 4-partitus laciniis integerrimis. Stam. plurima 50—60 receptaculo inserta, filamenta capillaria, antherae

elongato-lineares longitudinaliter dehiscentes. Fem. Cal. 6-partitus lacinis pectinato-pinnatifidis. Styli 3 longi. Stigmata dense papillosa.

4919. *Tiglum.* Masc. Cal. 5-partitus. Petala 5 disco lanato 5-anguloso inserta cum glandulis 5 patellaformibus alterna intus villosa. Filamenta 15 libera. Fem. Cal. 5-fidus. Pet. 5. Stylus ad basin 3-partitus, lacinis profunde 5-fidis filiformibus reflexis. Caps. glabra 3-cocca. Sem. pendula.

4920. *Geiseleria.* Masc. Cal. 4-partitus. Pet. 4. Discus 4-radiatus. Stam. 8 receptaculo villoso inserta. Fem. Cal. 5-partitus. Pet. 5 minntissima. Discus 5-radiatus. Styli 3 filiformes profunde bifidi, Caps. 3-cocca 3-sperma.

4921. *Brachystachys.* Cal. 5-partitus. Pet. 5 ovali-lanceolata. Discus 5-partitus lobis cum petalis alternantibus. Stam. 10 disco villoso inserta. Fem. Cal. 5-partitus irregulare. Pet. 5 inaequalia. Stylus 6-partitus, lobis filiformibus apice in-crassatis. Caps. 3-cocca.

4922. *Lasiogyme.* Masc. Cal. 5-partitus patens. Pet. 5 utrinque villosa. Discus 5-lobus, lobis patellaformibus. Stam. 15—20 disco lanato inserta filamentis villosis. Fem. Cal. 5-fidus campanulatus. Cor. O. Discus 5-lobus. Stylus 3-partitus lacinis involutis bifidis. Caps. villosa 3-gona.

4923. *Baliospermum.* Cal. 5-partitus. Cor. O. Masc. Stam. 16-20 disco glanduloso inserta antherarum loculis apici filamentorum adnatis. Fem. Ovarium basi margine membranaceo cinctum. Stigmata 3 sessilia basi cohaerentia. Sem. variegata.

4924. *Croton.* Masc. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Glandulae 5 petalis alternae. Stam. 10—12 receptaculo nudo v. villoso inserta, antheris filamenti apici adnatis. Fem. Cal. 5-partitus. Cor. O. Glandulae v. appendiculae 5. Styli 3, 2-multiplici, lacinis intus stigmatosis. Euphorbiaceae.

4925. *Codiaeum.* Masc. Cal. 5-partitus reflexus. Pet. 5. squamae-formia glandulis 5 alterna. Fem. Cal. 5-fidus. Pet. O. nisi squamulae 5 germe cingentes. Styli 3 reflexi. Fructus subbaccatus 3-coccus. Euphorbiaceae.

4926. *Caperonia.* Masc. Cal. 5-fidus. Pet. 5 cum staminibus 10 inserta. Fem. Cal. 5-partitus. Pet. O. Stylus 3-fidus stigmatibus flabellato-multipartitis. Caps. 3-cocca. Euphorbiaceae.

4927. *Rottlera.* Masc. Cal. 5-partitus reflexus. Pet. O. Stam. plurima; filamenta filiformia; antherae oblongae biloculares. Cal. 3—5-partitus. Stylus 2—3—5-partitus. Stigmata elongata plumosa. Euphorbiaceae.

4928. *Antherosperma.* Masc. Cal. diphyllus caducus campanulatus 8-lobus. Cor. O. Filamenta capillaria. Fem. Cal. diphyllus multifidus lacinis acutis. Styli capillares plumbosi. Caryopses plurimae. Urticeae.

4929. *Dactylostemon.* Flores masc. pedicellati. Cal. 2—3-phyl-lus. Stam. 6—16, filamentis calyce multo longioribus v. brevissimis, antheris bilocularibus. Fem. Cal. 3-phyl-lus. Stigma tripartitum lacinis revolutis. Caps. 3-locularis 3-cocca.

4930. *Actinostemon.* Spica basi foliosa, perulis magnis aridis. Masc. Cal. O. Stam. 4—12 filamentis brevibus, antheris extrorsis bilocularibus. Fem. Cal. O. Stylus cylindricus, stigmata 3 recurvata. Caps. 3-locularis 3-cocca, coccis 1-spermis.

4931. *Leptorhachis.* Flores racemosi. Masc. Cal. cyathiformis 4-partitus eglandulosus. Stam. 15 subexserta filamentis clavaformibus antheris globosis. Fem. Cal. 5-partitus. Germen hirtum. Stylus elongatus, stigmata 3 patentia. Caps. hirta 3-locularis 3-sperma.

4932. *Caryota.* Spadix ramosissimus. Spathae plures. Cal. 3-sepalus. Cor. 3-petala. Stigmata 3 sessilia conniventia. Bacca disperma. Palmae.

4933. *Begonia.* Cal. O. Masc. Pet. 4, 2 minora. Stamina plurima persistentia supera. Filamenta libera v. basi juncta. Antherae oblongae extrorsum dehiscentes. Fem. Styli 3. Stigmata brevissima. Caps. 3-querata alata. Begoniaceae.

Aroideae.

4934. *Pistia.* Spatha basi tubulosa spadice connata. Spadix

basi feminens, apice masculus, antherae 2—8. Stylus terminalis crassus, stigma subcyathiforme. Bacca 1-loocularis. Sem. plurima.

4935. Ambrosinia. Spatha basi convoluta superne cucullata. Spadix complanatus in appendicem liberae desinens. Antherae 10 longitudinaliter bivalves. Stylus terminalis longiusculus, stigma discoideum. Bacca 1-loocularis. Sem. plurima.

4936. Cryptocoryne. Spatha breviter tubulosa limbo elongato plica tubum claudente cum spadicis vertice connata. Spadix medio nudus, apice antheriferus. Antherae vertice biporosae. Carpida verticillata. Styli radiatim divergentes. Bacca plurilocularis.

4937. Stylochaeton. Spatha basi longe tubulosa limbo subfornicato. Spadix exsertus. Filamenta brevia. Antherae 4-gonae biloculares. Carpida 6 verticillata. Stigma capitata. Bacca plurilocularis.

4938. Arisarum. Spatha basi tubulosa limbo fornicate. Spadix superne nudus. Staminum filamenta conoidea antheris hemisphaericis. Stylus distinctus, stigma capitato-peltatum. Baccae 2—8-spermae.

4939. Arisaema. Spatha basi convoluta, limbo fornicate. Antherae in filamentis distinctis verticillatae. Stylus brevis stigma capitato-peltatum v. depresso-hemisphaericum. Bacca 1-oligosperma. Sem. globosa umbilico lato.

4940. Biarum. Spatha basi tubulosa limbo plano patente. Spadix apice nudus longe exsertus. Antherae sessiles confertae rima v. poro dehiscentes. Stigma subcapitatum. Bacca 1-sperma. Sem. globosum.

4941. Arum. Spatha basi convoluta. Spadix apice nudus clavatus. Antherae distinctae v. connatae rima brevi dehiscentes. Ovaria plurima libera. Stigma sessile depresso-hemisphaericum. Bacca 1-v. oligosperma. Sem. subglobosa.

4942. Typhonium. Spatha basi convoluta. Spadix inferne interruptus androgynus apice subulatus. Antherae distinctae, longitudinaliter dehiscentes. Ovaria plurina. Stigma terminale sessile. Baccae 1-spermae; sem. subglobosum. Fol. cordata v. hastata.

4943. Sauromatum. Spatha basi tubulosa limbo patente. Spadix apice nudus subclavatus. Antherae distinctae rima brevi dehiscentes. Ovaria plurima. Stigma terminale hemisphaericum. Bacca 1-sperma. Folium pedatum.

4944. Dracunculus. Spatha convoluta, limbo patente. Spadix inferne androgynus apice clavatus nudus. Antherae in phalanges connatae apice rima brevi obliqua dehiscentes. Ovaria plurima. Stigma sessile depresso-hemisphaericum. Baccae 1-v. oligospermae. Sem. globosa v. angulata. Fol. pedata.

4945. Pythonium. Spatha basi convoluta limbo fornicate. Spadix apice obtuso nudo corrugato-tuberculato. Antherae distinctae, filamento brevissimo, poris 4 dehiscentes. Stylus subulatus; stigma clavato-trilobum. Fol. bipinnatifida.

4945. Amorphophallus. Spatha basi convoluta, limbo patente. Spadix inferne androgynus appendice sterili elongata granuloso-verrucosa. Antherae distinctae filamento brevissimo. Ovaria 2—3—4-loocularia. Stigma capitatum v. emarginatum. Fol. bipinnatifido-composita.

4946. Remusatia. Spatha basi convoluta limbo refracto expanso. Spadix abbreviatus appendice sterili nulla. Antherae plurime connectivis clavatis truncatis verticillatim adnatae. Stylus brevissimus attenuatus; stigma capitatum siccum.

4947. Colocasia. Spatha recta v. cucullata. Spadix interrupte androgynus, appendice sterili clavata v. acuminata. Antherae biloculares connectivis conoideis truncatis sessilibus v. stipitatis verticillatim adnatae. Ovaria conferta. Stylus brevissimus Stigma capitatum. Fol. peltata.

4948. Caladium. Spatha convoluta recta. Spadix appendice sterili nulla. Antherae poro apice dehiscentes. Ovaria plurima conferta. Stigma terminale sessile discoideum. Baccae 1—2-loocularis. Sem. angulata. Fol. peltata hastata.

4949. Peltandra. Spatha elongata undulata apice recurva. Spadix appendice sterili brevissima nuda. Antherae abbreviatae connectivis clavatis truncatis verticillatim adnatae

poro dehiscentes. Stylus brevissimus stigma subcapitatum. Fol. sagittata.

4950. Xanthosma. Spatha convoluta recta. Spadix appendice sterili nulla. Antherae biloculares connectivis conoideis verticillatim adnatae. Ovaria plurima stylis crassissimis placentaeformibus cohaerentia 4-locularia. Stigma latum flavo-glutinosum. Fol. sagittata.

4951. Acontias. Spatha basi convoluta recta. Spadix interrupte androgynus appendice sterili nulla. Ovaria plurima stylis crassissimis placentaeformibus interse cohaerentia subtrilocularia. Stigma minutum orbiculare flavo-glutinosum. Fol. lobato-pedata.

4952. Syngonium. Spatha convoluta recta. Spadix appendice nulla. Antherae 4—5, biloculares connectivo truncato angulato adnatae. Ovaria connata. Stigmata distincta albo-glutinosa. Baccae concretae 1-spermae. Fol. pedata.

4953. Culeasia. Spatha recta hians abbreviata. Spadix interrupte androgynus. Antherae sessiles 2 ex eodem punto. Ovaria plurima conferta. Stigma capitatum. Fol. ovato-lanceolata acuminata.

4954. Philodendron. Spatha post florescentiam reclusa. Spadix continuo-androgynus, appendice sterili nulla. Antherae distinctae 2-7 dorso per areolas dispositae. Ovaria conferta 5—15-locularia. Stigma subsessile truneatum v. radiato-sublobatum. Baccae discretae polyspermae. Fol. maxima lobato-lacera.

4955. Spathicarpa. Spatha involuta. Spadix totus spathae adnatus, floribus 3-seriatis serie intermedia mascula. Antherae plurimae connectivo peltato longe stipitato adnatae. Stylus elongatus stigma capitatum. Baccae 1-spermae. Fol. hastato-trilobum.

4956. Dieffenbachia. Spatha convoluta. Spadix spathae adnatus inferne pseudohermaphroditus superne masculus, appendice nulla. Antherae connectivo truncato verticillatim adnatae. Ovaria singula staminodiis 3 clavatis cincta. Stigma discoideum sessile. Baccina 1-locularis; sem. globosum. Fol. oblongo-ovata.

4957. Atherurus. Spatha basi hians superne convoluta. Spadix

interrupte androgynus appendice filiformi sterili longe exserta. Antherae plurimae confertae biloculares. Stylus filiformis. Stigma depresso-hemisphaericum. Baccina 1-sperma. Sem. oblongum.

4958. Aglaonema. Spatha hians tandem clausa. Spadix continuo androgynus appendice sterili nulla. Antherae plurimae sessiles 4-loculares. Stigma late discoideum sessile. Baccinae 1-spermae. Fol. oblonga.

4959. Homalomena. Spatha hians tandem reclusa. Spadix androgynus cum appendice sterili nulla. Antherae plurimae sessiles. Stigma sessile 3-fidum concavum. Fol. cordata v. sagittata.

4960. Richardia. Spatha convoluta limbo expanso marcescente. Spadix androgynus appendice sterili nulla. Antherae liberae sessiles biloculares, loculis poro dehiscentibus. Ovaria plurima conferta. Stylus brevis; stigma subconvexum glandulosum. Baccinae 1-loculares oligospermae. Sem. obovata. Fol. hastato-cordata.

4961. Calla. Spatha expluata persistens. Spadix stipitatus apice masculus. Stamina plurima in spadicis parte inferiore circumposita; filamenta filiformia apice compresso-dilatata. Antherae didymae longitudinaliter dehiscentes. Stigma sessile disciforme. Baccinae distinctae 1-loculares. Fol. cordata.

4962. Monstera. Spatha hians tandem decidua. Spadix sessilis basi femineus superne hermaphroditus. Stamina in spadicis parte superiore ovarii indefinite circumposita, filamenta complanata, antherae biloculares. Stigma capitatum, baccinae inter se connatae. Fol. ovato-oblonga integra v. perforata.

4963. Scindapsus. Spatha hians demum expansa decidua. Spadix sessilis inferne femineus superne hermaphroditus. Stamina plurima, filamentis cuneatis. Stigma sessile oblongum. Baccinae 1-spermae. Sem. uncinatum. Fol. perforata v. laciniato-pinnatifida.

4964. Gonathanthus. Spatha basi convoluta limbo refracto, longe acuminato. Spadix brevis inferne pistilla superne genitalia gerens. Antherae 6-loculares, loculi connectivo

crasso peltato 6-lobo verticillatim adnatae. Stigma sessile depresso. Fol. peltata cordata.

MONADELPHIA.

Cucurbitaceae.

4965. Cucurbita. Masc. Cal. campanulatus 5-fidus. Cor. calyci adnata campanulata 5-fida. Stam. 5 triadelpha. Fem. Cal. 5-partita. Cor. maris. Stylus 3-fidus stigmata incrassata biloba. Bacca clavata v. sphaerica 3-locularis.

4966. Cucumis. Masc. Cal. campanulatus 5-dentatus. Pet. 5 acuta calycis basi inserta. Stam. 5 triadelpha. Fem. Cal. tubo cum ovario connato limbo 5-dentato. Cor. maris. Stigmata 3 bipartita. Pepo caruosa sulcata verrucosa v. laevis. Sem. margine acuto v. aequalia.

4967. Coniandra. Masc. Cal. campanulatus 5-fidus. Cor. limbo 5-fido patentissimo. Stam. 5 saepe 3-adelpha. Fem. Cal. campanulatus 5-fidus. Cor. 5-fida. Stigma depresso-capitatum sub-3-lobum. Bacca ovata rostrata 3-locularis.

4968. Cyrtonema. Masc. Cal. campanulatus 5-fidus. Cor. 5-partita patens. Stam. 5 triadelpha. Fem. Cal. tubo fusiformi cum ovario conuato, limbo campanulato 5-fido. Stigmata 3 obtusa. Bacca fusiformis rostrata 3-locularis.

4969. Melotria. Masc. Cal. campanulatus 5-dentatus. Cor. subrotata 5-fida, lobis ciliatis v. denticulatis. Stam. 3. Fem. Cal. campanulatus 5-dentatus. Cor. maris. Stylus brevis. Stigma 3-partitum fimbriatum. Bacca ovata v. globosa.

4970. Zehneria. Masc. Cal. campanulatus 5-dentatus. Cor. 5-partita patens intus pilosa. Stam. 3, antherae loculis apice demum confluentibus. Cal. campanulatus 5-dentatus. Cor. maris. Stylus cylindricus, stigma 3—4-fidum, lobis capitatis coninventibus v. labelliformibus peltatis. Glandula stylis basin ringens 3-fida. Bacca coriacea exsueca.

4971. Rhynchosarpa. Masc. Cal. tubo urceolato subgloboso, limbo 5-dentato. Cor. campanulata limbo 5-partito denticulato. Stam. 3. Antherae loculis linearibus marginibus connectivi infra apicem adnatis. Fem.

Cal. 5-dentatus limbo 5-dentato campanulato. Cor. maris. Stylus brevis stigma bipartitum. Bacca ovata sulcata longe rostrata.

4972. Bryonia. Masc. Cal. campanulatus 5-partitus. Cor. 5-partita. Stam. 5 triadelpha. Antherae 1-loculares, loculo lineari secus connectivi inciso-dentati-marginem gyrose adnatae. Glandula basilaris 3-loba. Fem. Cal. campanulatus 5-fidus. Cor. maris. Stylus 3-fidus, stigmata capitata v. reniformi-biloba. Bacca globosa v. ovata.

4973. Citrullus. Masc. Cal. profunde 5-fidus. Cor. 5-partita subrotata. Stamina 5 triadelpha; antherae 1-loculares loculo lineari secus connectivi incisi trilobi marginem dorsalem gyrose adnatae. Fem. Cal. profunde 5-fidus. Stylus cylindricus 3-fidus, stigmata reniformi-cordata. Bacca globosa polysperma.

4974. Ecbalium. Masc. Cal. campanulatus 2—5-partitus. Cor. 5-partita. Stam. 5 triadelpha. Antherarum loculo lineari, connectivi crassi sigmadoidei dorso intra marginem adnato. Fem. Cal. campanulatus 5-partitus. Stylus cylindricus 3-fidus; stigmata hippocrepica. Bacca ovalis mucicata.

4975. Momordica. Masc. Cal. campanulatus 5-partitus patens. Cor. 5-partita lacinis obtusis. Stam. 5 triadelpha filamenta crassa; antherae 1-loculares, loculo lineari connectivi crassi undulati margini extus adnato. Fem. Cal. 5-partitus patens. Cor. maris. Stylus cylindricus 3-fidus. Bacca pulposa tuberculata v. muricata.

4976. Luffa. Masc. Cal. campanulatus 5-dentatus. Cor. profunde 5-partita patens. Stam. 5 triadelpha. Antherarum loculo lineari-connectivi crassi margini sinuato extus adnato. Fem. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. Stigmata crassa reniformia biloba. Bacca demum exsucca intus fibrosa.

4977. Benincasa. Masc. Cal. 5-fidus, lacinis latis undulato-dentatis. Cor. 5-fida lobis obovatis undulatis. Stam. 5 triadelpha antherae loculo lineari connectivi dilatati infractuoso-sinuati margini dorsali adnato. Fem. Cal. cylindricus 5-partitus. Cor. maris. Stigma crassissimum irregulariter trilobum. Bacca

obovato cylindrica lanata glauco-pruinosa.

4978. Lagenaria. Masc. Cal. campanulatus 5-partitus. Cor. 5-petala. Stam. 5 triadelpha, antherae 1-loculares, loculo linearis connectivi crassi anfractuoso-sinuati papillosi margini dorsali adnato. Fem. Cal. 5-partitus. Cor. maris. Stylus subnullus. Stigmata 3 crassa biloba granulosa. Bacca carnosa demum lignescens polysperma.

4979. Coccinia. Masc. Cal. 5-fidus laciniis subulatis. Cor. campanulata limbi 5-fidi lobis acuminatis integrerimis. Stam. triadelpha, antherarum loculis longitudinalibus anfractuosis. Fem. Cal. 5-fidus. Cor. maris. Stylus sterilia triadelpha. Stylus brevior 3-fidus, stigmata bifida. Bacca oblonga irregulariter erupta.

4980. Trichosanthes. Masc. Cal. subclavato-campanulatus 5-fidus. Cor. 5-partita, laciniis integris v. bifidis fimbriato-ciliatis. Stam. triadelpha, antherarum loculis longitudinalibus gyroso-flexuosis. Fem. Cal. 5-dentatus. Cor. maris. Stylus trifidus, stigmata oblonga subulata. Bacca oblonga pulposa polysperma.

4981. Elaterium. Masc. Cal. longe tubulosus cylindricus 5-dentatus Cor. 5-petala, petalis linearibus v. lanceolatis patentibus. Stam. 5 monadelpha. Fem. Cal. tubulosus ventricosus 5-dentatus. Cor. maris. Stylus sterilia glandulaeformia. Stylus cylindricus. Stigma capitatum. Bacca muricato-echinata elastice 2-3-valvis.

4982. Cephalandra. Masc. Cal. breve campanulatus 5-dentatus. Cor. 5-partita. Stam. 5 triadelpha apice in capitulum subglobosum coailita, antherae 1-loculares longitudinaliter flexuosae. Fem. Cal. 5-dentatus. Cor. maris. Stigma lobatum. Bacca trilocularis polysperma. Sem. compressa oblique rostellata.

4983. Cyclanthera. Masc. Cal. brevissimus planus laciniis 5 subulatis. Cor. hemisphaerica 5-fida lobis 3-angularibus acutis. Staminum columna in discum peltatum margine antheriferum desinens. Fem. Cal. 5-partitus. Cor. maris. Stigma convexum. Fructus carnosus.

4984. Schizocarpum. Masc. Cal. 5-dentatus. Cor. infundibuliformis,

limbo 5-fido patente. Stam. 3 anthers cohaerentibus. Fem. Glandula stylis basin cingens. Bacca basi 6-locularis polysperma.

4985. Sicyos. Masc. Cal. campanulatus subulato-5-dentatus. Cor. 5-fida. Stamina 5 in columnam apice capitato-antheriferam connata; antherae 1-loculares demum confluentes. Cal. campanulatus 5-dentatus. Stylus apice 2-3-fidus stigmata indivisa. Nucula coriacea echinata 1-sperma.

4986. Sechium. Masc. Cal. clavato campanulatus, 5-fidus. Cor. 2-partita. Stamina 5 in columnam apice 3-partitam coalita. Antherae cohaerentes, loculis flexuosis adnatis. Fem. Cal. 5-fidus. Cor. maris. Stylus apice 3-fidus. Stigmata incrassato-biloba. Bacca globosa 1-locularis, 3-valvis.

4987. Erythropetalum. Cal. obsolete 5-dentatus. Petala 5 ovata. Stam. 5 ad marginem disci epigyni inserta, antherae erectae latere dehiscentes. Fructus clavatus 1-locularis, 3-valves.

4988. Zucca. Flores masc. axillares bractea ampla concava involuti. Cal. maximus campanulatus 5-fidus extus 5-appendiculatus. Stam. 5.

4989. Thladiantha. Masc. Cal. campanulatus, laciniis lanceolatis elongatis. Cor. campanulata-bilabiata fauce ventricosa. Stam. 5, filamenta libera, antherae intus dehiscentes. Neutr. Cal. rotato-5-partitus. Cor. retusa 5-fida. Antherae 5 effetae corneae lunatae. Ovarii vestigium nullum.

Passifloreae.

4990. Modecca. Masc. Squamulae 5 petaloideae. Stam. 4-5 basi in annulum connata; antherae introrsae biloculares. Fem. Stam. sterilia 4-5. Ovarium 1-loculare stipitatum. Stigmata 3 dilatata in stylo brevissimo. Caps. globosa subcrustacea.

4991. Paschanthus. Perigonium persistens tubulosum 10-fidum. Stam. 5 inter se libera, antherae lineares basi insertae. Stigmata 3 brevissima. Caps. subbaccata 3-valvis 3-sperma. Semina axillo carnosu munita.

4992. Ceratosicyos. Masc. Involucellum 4—5-phylum foliolis linearibus. Perigonium inflato-campanulatum. Stam. 4—5 perigonio inserta, filamenta ima basi connata; antherae intorsae longitudinaliter dehiscentes. Squamulae 4—5 subulatae. Fem. Involucellum O. Perig. anguste campanulatum 5-fidum. Stigmata 4 bifida. Caps. siliquaeformis 4-gona 4-valvis.

Euphorbiaceae.

4993. Delechampia. Flores unisexuales in involucro communi. Masc. Involucellum pedunculatum 2—5-phylum. Cal. 4-partitus. Filamenta inferne in stipitem connata, squamae nonnullae interdum filamentis interjectae apice pluripartitae. Fem. involucellum subsessile diphyllum 3-florum. Cal. 5, 6, 10—11-partitus, laciniis integris dentatis et ciliatis saepissime spinulosis v. papposis. Caps. 3-cocca calyce cincta.

4994. Colliguaja. Flores amentaeformes. Cal. O. Masc. Stam. 10—12 squamae patentis nervo medio utrinque inserta. Fem. bractea lanceolata bracteolis 2 stipitata. Styli 2—3 patentissimi intus stigmatosi. Caps. 2—3-cocca, 2—3-sperma.

4995. Synaspisma. Masc. Amentum squamis peltatis. Cal. 5-phillus convolutus. Stam. 10—15 basi in tubum 5-angulosum connata. Flores fem. racemosi. Cal. minimus 5-dentatus. Stylus brevissimus 3-fidus, lobulis stigmatosis. Caps. 3-cocca, coccis elastice bivalvibus.

4996. Pluknetia. Masc. Cal. 4-partitus. Stam. 8—16, filamentis coalitis basi glandulis 4 cinctis. Fem. Cal. 4-partitus. Stylus elongatus, stigma peltatum 4-lobum lobis medio supra punctatis. Caps. depressa 4-cocca coccis anguloso-carinatis 1-spermis.

4997. Anabaena. Masc. Cal. campanulatus 5-partitus. Stam. 10 squamis 4 cincta filamentis ima basi coalitis, antheris globoso-4-lobis. Fem. Cal. 4-partitus. Ovarium echinatum. Stigma 3-lobum. Caps. 3-cocca.

4998. Acalyphe. Masc. Cal. 4-partitus. Stam. 8—16 filamentis basi connatis, antherae loculis di-

stinctis flexuosis. Fem. Cal. 3-partitus. Styli 3 laciniati. Caps. 3-cocca, coccis globosis 1-spermis.

4999. Mappa. Masc. Cal. 2—3-partitus. Stam. 2—12. Filamenta libera v. basi coalita, antherae loculis globosis. Fem. Cal. irregulariter 2—3-fidus. Styli 2—4 distincti v. subcoaliti. Caps. echinis longis armata.

5000. Siphonia. Masc. Cal. campanulatus 5-fidus v. 5-dentatus. Cor. O. Stam. connata in columnam infra apicem antheriferam; antheris 5—10 adnatis verticillatis. Fem. Ovarium basi calycis impositum, 6-costatum 3-loculare. Stigmata 3 sessilia subbiloba. Caps. magna fibroso-corticata, 1—3-sperma.

5001. Elateriospermum. Masc. Cal. 4-phillus, foliolis imbricatis. Cor. O. Stam. 10—15 disco interdum villosa in ambitu glanduloso inserta. Fem. Cal. 4—6-phillus, foliolis deciduis. Ovarium annulo setigerum cinctum. Stigmata 3 emarginata. Drupa subglobosa 3—4-sulca putamine 3-cocco.

5002. Anda. Masc. Cal. campanulatus 5-dentatus. Cor. 5-petala petalis glandulis 5 alterna. Stamina 8, filamentis basi coalitis filiformibus 3 longioribus antheris incumbentibus. Fem. Stylus brevis 2—3-fidus, stigma integra v. denticulata. Drupa carnosa pulverulenta putamine osseum bi-triangulata.

5003. Aleurites. Cal. tubulosus 2—3-fidus. Cor. 5-petala, petalis cum squamis v. glandulis 5 alterna. Masc. Filamenta brevia in receptaculum conicum columnae connata. Styli 2—3 bipartiti laciniis acutis. Fructus carnosus apice dehiscens 2—3-coccus, coccis chartaceis.

5004. Elaeococca. Cal. 2—3-partitus. Cor. 5-petala calyce longior. Stam. 10—12 filamenta inferne connata 5 breviora. Fem. Ovarium 3—5-loculare. Stigmata 3—5. Fructus carnosus-fibrosus. 3—5-coccus.

5005. Jatropha. Cal. 5-partitus deciduis. Cor. 5-petala. Stam. basi coalita longitudine inaequalia basi glandulis 5 subconfluentibus stipata. Styli 3 bifidi. Fructus 3-coccus.

5006. Cnidoscolus. Masc. Cal. corollinus subcampanulatus 5-

fidus. Cor. O. Stam. 10—15 exteriora breviora basi glandulis 5 minutis stipata interiora longius connata. Fem. Cal. erollinus 5-partitus. Cor. O. Ovarium glandulis 5 stipatum. Styli 3 multifidi. Caps. setoso-hispida 3-cocca.

5007. Ricinus. Masc. Cal. 3—5-partitus. Cor. O. Stamina plurima, filamentis multifariam ramosissimis antherarum loculis distinctis ex apice filamenti pendulis. Fem. Ovarium 3-loculare. Stigmata 5 in stylo brevi profunde bipartita colorata. Caps. plerumque echinata.

5008. Spathiostemon. Masc. Cal. 3-partitus patens. Cor. O. Filamenta plurima inferne in columnam connata verticillatim ramosa, antheris didymis. Fem. Cal. 5-partitus. Styli 3 longi intus plumoso-stigmatis. Caps. muricata 3-cocca.

5009. Baloghia. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala, petalis disco annulari 5-lobo inserta. Stam. plurima, filamentis basi in columnam crassam connatis. Stigmata 3 linearia bipartita, lobis contortis. Caps. 3-cocca 3-sperma.

5010. Ricinocarpus. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala calyce longior. Masc. Filamenta in columnam basi 5-glandulosam a basi ad apicem antheriferam connata. Fem. Stylus brevis stigmata 3 linearia bipartita. Caps. globosa echinata 3-sulca 3-cocca.

5011. Amperea. Cal. campanulatus 5-fidus. Cor. O. Stam. 8, filamentis filiformibus ima basi coaliatis. Fem. Cal. 5-partitus, laciniis acutis rigidis. Stylus brevis. Stigmata 3 bifida, laciniis acutis. Caps. membranacea 3-cocca.

5012. Baliospermum. Cal. 5-partitus. Cor. O. Masc. Stam. 16—20 disco plano ad ambitum glanduloso imposita; antherarum loculis apici filamentorum adnatis. Fem. stigmata 3 sessilia apice emarginata. Caps. 3-cocca, coccis chartaceis.

5013. Juloeroton. Masc. Cal. rotato-campanulatus 5-fidus. Cor. 5-petala, petalis spathulatis. Glandulae 5, petalis alternae. Stam. 10 filamentis filiformibus basi barbatis lana densa cohaerentibus superne pubescentibus. Fem. Cal. 5-partitus.

Cor. O. Stylus 3-fidus laciniis intus stigmatosis. Caps. coccis 1-spermis.

5014. Ditaxis. Cal. 5-partitus. Pet. 3. Columella staminifera; staminibus verticillatis quinis superioribus totidemque inferioribus. Fem. Cal. 5-partitus. Pet. 5 erecta. Glandulae 5 laciniis oppositae. Stylus 3-fidus, laciniis bifidis. Stigmata plana lobata. Fructus 3-coccens.

5015. Monotaxis. Cal. 4—5-partitus. Pet. 4—5 hastato-3-loba conchiformia. Glandulae 4—5 clavatae. Stam. 8—10 filamentis capillaris basi connatis, antheris bilocularibus. Stigmata 3 bipartita fimbriatopapillosa. Caps. 3-cocca coccis 1-spermis.

5016. Enchidium. Cal. 5-partitus. Pet. 5. basi biglandulosa. Filamenta 10 in columnam connata. Styli 3. Stigmata 6. Fructus?

5017. Bridelia. Cal. 5-fidus. Pet. 5. Stam. 5. filamentis inferne connatis antheris introrsis. Ovarium disco connivente apice 5-fido immersum. Styli 2—3 apice bifidi. Fructus bacciformis 2—3-locularis.

5018. Andrachne. Masc. Cal. 5-partitus. Pet. 5. emarginata. Columna antherifera basi setulis 5 bifidis stipata. Stam. 5 ex apice columnae. Fem. Cal. 5-sepalus. Cor. O. Styli 3. bifidis. Fructus 3-coccus, coccis 2-spermis.

5019. Sauropus. Masc. Cal. depresso-orbiculatus coriaceus coloratus limbo 6-dentato. Cor. et glandulae O. Stam. 3. filamentis in columnam apice 3-fidam connatis, columnae lobis reflexis. Fem. Cal. 6-partitus. Stigmata 3 reflexa bifida. Caps. carnosae semina cochleata.

5020. Agyneia. Cal. 6-partitus Cor. O. Masc. Filamenta 3 in columnam apice 3-lobam coalita, lobis extus antheriferis. Fem. Styli bifidi ovarii foveolae immersi. Caps. 3-locularis bivalvis. Sem. arillata.

5021. Phyllanthus. Cal. 5—6-partitus laciniis biseriatis. Stam. 3—5, filamenta in columnam glandulis 5—6 aut disco 5—6-lobo cinctam coalita. Styli 3 bifidi stigmatibus 6. Caps. 3-cocca coccis 2-spermis.

5022. Melanthesa. Masc. Cal. coriaceus turbinatus 6-dentatus. Cor. O. Stam. 3. Filamenta in columnam coalita antherae infra co-

lumnae apicem tricuspidatum adnatae. Fem. Cal. brevis urceolatus 6-lobus. Stigmata 3 brevia sessilia interdum semibifida. Caps. baccata intus 3-cocca.

5023. Kirganelia. Masc. Cal. 5-partitus. Cor. O. Stam. 5. in columnam medio diantheriferam apice 3-lobo triantheriferam basi 5-glandulosam coalita. Antherae didymae. Fem. Styli 3 bipartiti laciniis acutis. Baccia succulenta 3-locularis.

5024. Embelica. Cal. 6-partitus. Cor. O. Masc. Stam. 3. Filamenta in columnam apice trifidam basi eglandulosam v. 6-glandulosam coalita. Antherae extrorsae connectivo excurrente apiculatae. Fem. Ovarium disco glanduloso 5-fido inclusum. Fructus drupaeformis intus 3-coccus.

5025. Anisonema. Masc. Cal. 5-partitus intus glandulis 5 alternis. Cor. O. Stam. 5, filamenta crassa omnino coalita, inaequalia; antherae globoso-didymae. Fem. Cal. 4-6-partitus. Ovarium 6-10-loculare. Caps. globoso-depressa 6-10-sulca.

5026. Glochidionopsis. Masc. Cal. 6-partitus laciinis biserratis. Cor. O. Stam. 3, filamenta coalita, antheris extrorsis sub apice adnatis. Fem. Cal. 3-rarius bipartitus. Styli 3 subulati. Ovarium 3-loculare. Caps. 3-cocca, coccis 3-spermis.

5027. Gynoon. Masc. Cal. 5-partitus. Cor. O. Stam. 3-6; filamentis brevissimis inferne coalitis, antheris extrorsis. Fem. Cal. 6-partitus. Cor. O. Stigmata 3 hinc convexa inde angulata in massam ovoidem ovario duplo majorem tripartibilem coalita.

5028. Lithoxylon. Masc. Cal. 5-fidus laciinis venosis. Cor. O. Stam. 5, filamentis calyci sub ovarii rudimento glandulaeformi indiviso disci glandulosi orbiculati centro insertis, antheris transversim dehiscentibus. Fem. Ovarium disco glanduloso orbiculari impositum. Stigmata 3 patentia apice bifida.

5029. Gymnanthes. Flores amentaceo-spicati, bractea stipati. Masc. Cal. 1-phylus squamaeformis. Stam. 1-3, filamentis basi connatis, antheris globoso-didymis. Fem. Cal. minimus 2-partitus. Stylus brevissimus crassus. Stigmata 3 revoluta.

Caps. 3-locularis, coccis 1-spermis bivalvibus.

5030. Sebastiania. Flores spicati. Masc. Stam. 3-7, squamulis angustis acutis stipata, filamentis brevissime coalitis. Fem. Germen 3-loculare. Stylus brevis crassus. Stigmata 3 revoluta. Caps. 3-locularis 3-cocca 3-sperma.

5031. Gussonia. Flores spicati, singuli bractea extus glandulosa stipati. Masc. squama intus glandulosa. Stam. 3, filamentis basi coalitis. Fem. Cal. 3-fidus bracteolatus. Stigmata 3 revoluta. Caps. 3-locularis 3-cocca 3-sperma.

5032. Adenogyne. Flores spicati. Masc. Squamae eglandulosae 3-florae. Cal. diphyllus. Stam. 4-8 filamentis subnullis. Fem. Cal. 3-fidus persistens. Stigmata 3 revoluta. Caps. globosa 3-locularis 3-cocca 3-sperma.

5033. Sennefeldera. Flores paniculati. Masc. Cal. cupulaeformis obsolete 4-fidus. Stam. 8, synemate brevissime columnari, antheris globoso-didymis. Fem. Cal. urceolatus 4-dentatus. Stylus cylindricus. Stigmata 3 teretia sulcata.

5034. Leucandra. Flores racemosi. Masc. Cal. 4-partitus. Stam. 4, filamentis crassis basi coronatis longitudinaliter per paria coalitis, antheris albidis. Fem. Cal. 6-partitus. Germen hirtum 3-loculare. Stigmata simplicia apice recurva. Caps. hirta 3-locularis 3-cocca.

5035. Bia. Flores spicati. Masc. Cal. campanulatus 4-partitus. Stam. 12 glandulis squamaeformibus cincta, filamentis basi coalitis antheris basi emarginatis. Fem. Cal. 5-partitus. Stylus brevis. Stigmata 3 apice recurva intus fimbriata. Caps. 3-cocca 3-sperma.

5036. Botryanthe. Flores racemoso-spicati. Masc. Cal. globosus profunde 4-partitus. Stam. 10-20 filamentis brevibus monadelphis. Fem. Cal. 4-fidus lobis apice recurvis. Germen 4-angulare 4-loculare. Stylus crassus clavatus obtuse 4-angulus. Stigmata 4 divaricata. Baccia globosa carnososo-suberosa.

5037. Cladogynos. Masc. Cal. 2-3-partitus coloratus tomentosus. Stam. 4 exserta filamentis basi connatis. Fem. Cal. 6-fidus foliaceus

amplus. Stylus bifidus ramosus glandulos-plumosus. Fructus tomentosus 3-coccus 3-spermus.

5038. Asterandra. Flores axillares. Cal. 5—6-partitus. Stam. 5—6, filamentis in columnam disco integro subgyroso cinctam coalitis, antheris stellatim radiatis. Fem. Germen disco magno integro cinctum. Stigmata 3 patentia petaloidea bifida margine crenata.

5039. Discocarpus. Flores axillares aggregati. Masc. Cal. cyathiformis 5-fidus laciniis intus squama instructis. Cor. O. Stam. 5 inferne coalita longe exserta. Fem. Cal. profunde 5-fidus. Cor. 5-petala. Germen sessile disco carnoso crenato-marginato cinctum. Stylus brevissimus crassus. Stigmata petaloidea crenato-laciniata. Caps. globoso-depressa pubescens 6-angularis, 3-sperma.

Lardilazabaleae.

5040. Akebia. Cal. 3-phylloides. Cor. O. Stam. 6, filamenta cylindrica, antherae biloculares adnatae. Fem. Cal. 3-phylloides, foliolis rotundis. Cor. O. Ovaria 3—9. Stigma peltatum.

5041. Holboellia. Masc. Cal. 6-phylloides, foliolis crassiusculis. Pet. 6, scutiformia v. lanceolata. Stam. 6, filamenta in tubum conniventia. Fem. Cal. et cor. ut in mare. Stam. 6 antheris abortivis. Ovaria 3 conoidea. Stigma sessile conicum. Bacca polysperma.

5042. Stauntonia. Masc. Cal. 6-phylloides, foliolis carnosus. Cor. O. Stam. 6, filamentis in tubum connatis, Fem. Cal. et cor. maris. Stam. 6 nana abortiva. Styli breves stigmate capitato-peltata.

5043. Parvatia. Masc. Cal. 6-phylloides, foliolis carnosus. Pet. 6. Stam. 6, filamentis in tubum connatis, antherae extorsae biloculares. Fem. Cal. et cor. maris. Stam. 6 minima abortiva. Ovaria 3. Stigma sessile conoideum.

5044. Burasaja. Masc. Cal. 6-phylloides. Pet. 6 conniventia. Stam. 6, filamentis connatis. Fem. Cal. et cor. maris. Stigmata sessilia. Drupae 3 nucleo falcato.

5045. Biassolettia. Cal. 5-phylloides. Cor. O. Masc. Tubus sta-

mineus 3-queter tridentatus. Antherae 3. Fem. Tubus stamineus 4-angulus sterilis. Stylus 4-gonus velutinus, stigmata 2 colorata.

5046. Cytinus. Masc. Perigonium tubulos-campannulatum limbo 3—4—6-lobo. Filamenta in tubum connata, antherae lineares. Fem. Perig. maris. Stylus cylindricus stigma globosum octo sulcis exaratum. Caps. baccata 8-locularis polysperma.

Pandaneae.

5047. Nipa. Flores in spadice ramoso, ramis spatha cinctis. Masc. Perigonium 6-phylum, foliotis reflexis. Filamenta 3 in columnam connata antherae 6. Fem. Perig. O. Stigmata 3 sessilia. Drupae irregulares fibrosae.

CONIFERAE. A. Cupressineae Endl.

a. *Actinostrobeae* Endl. *Strobili squamae valvatae*. Folia alterna opposita v. ternata.

5048. Frenula. Strobilus 6-valvis, valvis alternis minoribus polyspermis. Semina diptera. Folia ternata.

5049. Actinostrobus. Strobilus sexvalvis, valvis aequalibus 1-spermis. Semina triptera. Folia ternata.

5050. Callitris. Strobilus 4-valvis, valvis alternis minoribus dimonospermis. Semina diptera. Folia opposita.

5051. Libocedrus. Strobilus 4-valvis, valvis alternis minoribus monospermis. Semina inaequaliter diptera. Folia opposita.

b. *Thujopsideae* Endl. *Strobili squamae imbricatae*. Folia opposita.

5052. Biota. Strobili squamae coriaceae dispermae. Semina aptera.

5053. Thuja. Strobili squamae coriaceae dispermae. Semina diptera.

5054. Thujopsis. Strobili squamae lignosae 5-spermae. Semina diptera.

c. *Cupressineae rerae* Endl. *Strobili squamae peltatae*. Folia opposita.

5055. Cupressus. Strobili squamae polyspermae. Semina diptera.

5056. Chamaecyparis. Strobili squamae dispermae. Semina diptera.

d. Taxodineae Endl. Strobili squamae peltatae v. imbricatae. Folia alterna.

5057. TAXODIUM. Strobili squamae peltatae dispermae. Semina aptera.

5058. Glyptostrobus. Strobili squamae imbricatae dispermae. Semina basi monoplera.

5059. Cryptomeria. Strobili squamae cum bractea connatae 4—6-spermae. Semina angulata.

B. Abietinae Nees.

a. Abietinae verae Endl. Squamae strobili dispermae. Semina squamae adnatae.

5060. Pinus. Antherae bilocularis. Semina tandem a squama soluta. Squama apophysi destituta (*Sapinus* sect. Endl.) v. squama apophysa incrassata (*Pini* sect. Endl.)

b. Cunninghamiae Endl. Squamae 1-pleiospermae. Semina libera.

5061. Cunninghamia. Antherae 3-loculares. Squamae ebracteatae 3-spermae.

5062. Arthrotaxis. Antherae bilocularis. Squamae ebracteatae tri-pentaspermae.

5063. Sequoja. Antherae bilocularis. Squamae ebracteatae peltatae penta-heptaspermae.

C. Gnetaceae Endl.

5064. Gnetum. Amenta interrupte verticillata. Gemmulae integumento triplici. Folia lata.

5065. Ephedra. Amenta imbricata. Gemmulae integumento duplo. Vaginae aphyllae.

Monococcia. MONANDRIA.

4770. CYNOMORIUM Sw. (1791).

1. C. coccineum Sw. Lam. ill. t.

742. In Mauritiana et Sicilia. ♀.

Stipes squamosus. Amentum cylindricum. Squamae amenti retusae.

4771. LOPHOPHYTUM Endl. (1837).

1. L. Schott et Endl.
Melet. t. 1. *In Brasilia.* 2.

4772. BALANOPHORA Forst. (1776).

✓ 1. B. fungosa Forst. gen. t. 50.
In ins. Tanna. 2. Stipes squamosus. Amentum oblongum. Squamae amenti patulae.

2. B. capensis Eckl. et Zeyh. ex Steud. nom. *In P. b. S.* 2.

4773. HELOSIS Rich. (1823).

1. H. cajennensis Rich. stipite nudo; amento subgloboso; squamis subrotundis peltatis. *Cynomorium Pers.* *In Cajenna.* 2.

2. H. jamaicensis Rich. stipite squamoso; amento elongato; squamis imbricatis dimidiatis rhomboideis. *Balanophora Sw.* *In Jamaica.* 2.

4774. CASUARINA L. (1740).

1. C. nodiflora Forst. ramulis filiformibus breviusculis simplicibus v. divisis subtriquetris glabris 2—3 mm. longis, vaginalium dentibus 4 triangulatis acutis raro obtusiusculis carinatis pallido-marginatis appressis; amentis masculis plerumque compositis, femineis globosis; bracteolis alte exsertis. *Gaertn.* t. 91. *Miq. rev.* *Cas.* t. 1. f. A. B. *In Nov. Caledonia.* ♀.

2. C. sumatrana Jungh. fronde rotundata explanata umbraculiformi; ramis teretibus ad nodos annulatis; ramulis tenuissimis acute 4-gonis profunde sulcatis; vaginalis ramulorum apicibus 4-dentatis, dentibus squamosis scariosis; strobilis terminalibus maximis subglobosis; fructibus multiseriatis horizontalibus. *Pl. nov. ind. or. bata v. t. 2.* *In Sumatra.* ♀. *Arbor 40-ped.*

3. C. Brunonianum Miq. t. 1. f. C. ramulis filiformibus strictiusculis subflexuosis simplicibus v. plerumque ra-

mificatis glaucis v. saturate viridibus 5—6 raro 4-angulato-sulcatis angulis prominentibus, sulcis glabris; internodiis 4—5 mm. longis; vaginarum dentibus 5—6 raro 4 angusto-lanceolatis dorso convexis, marginibus apiceque subincurvo appressissimis glabris v. junioribus ciliolatis; strobilis? In Java. ♂.

4. *C. excelsa* (Dehnh.) Miq. t. 1. f. F. ramulis elongatis rectis pallide viridibus, octo-sulcate-teretibus angulis rotundatis; faciebus in sulcos angustos demissis internodiis circiter 1 cent. longis; vaginarum dentibus 8 raro 7 lanceolato-linearibus angustatis glabris hyalino-pallidis, serius fuscescentibus appressis. In Nov. Holl. ♂.

5. *C. microstachya* Miq. t. 1. f. E. ramis ramulisque subconformibus glaucescentibus his oppositis alternisque abbreviatis rigidis obtuse 4-gonis, angulis obtusis faciebus planis v. concavo-demissis glabris; internodiis 3—7 m. longis; vaginarum dentibus plerumque 4 lanceolato-acuminatis mox marcescentibus; amentis masculinis terminalibus et lateralibus abbreviatis subconicis densifloris; vaginis 4-dentatis. In Nov. Holl. ♂.

6. *C. Drummondiana* Miq. t. 1. f. D. ramis ramulisque subconformibus, his oppositis v. verticillatis horizontaliter patentibus rigidis abbreviatis ramisque 6-angulato-teretibus, angulis prominentibus, faciebus concavo demissis, sulco medio glabro v. puberulo; internodiis 2—3 m. longis; vaginarum dentibus 6 appressis lanceolatis subglabris parte superiore mox marcescente fuscescente et truncata basi viridi convexo-tumida persistente; amentis masc. abbreviatis cylindricis densifloris; vaginis brevissimis 6-dentatis. In Nov. Holl. ♂.

7. *C. thuyoides* Miq. t. 2. f. A. ramulis alternis, oppositis v. verticillatis brevibus patentibus strictis simplicibus 5—4-gono teretibus glabermissimis pallide viridibus, internodiis 2'' longis; vaginarum dentibus 4-plerumque 5 sublanceolato-triangularibus acutis glabris appressis; amentis masculis ramulos terminantibus brevissimis; vaginis 4—5-dentatis glabris; strobilis maturis breviter pedunculatis subglobosis; bracteolis exsertis

longe uncinato-spinosis. In Nov. Holl. ♂.

8. *C. nana* Sieb. ramulis sparsis subconfertis erectiusculis brevibus strictis simplicibus teretiusculis 4, vulgo 5-sulcatis, juniorum sulcis puberulis; internodiis 3—6 lin. longis; vaginarum dentibus 5 rarius 4 triangularibus acutiusculis fuscescenti pallidis, junioribus ad margines tenere puberulis, amentis masculinis ramulos terminantibus v. secus ramos sessilibus abbreviatis; vaginis approximatis in dentes 5 raro 4 pallidos ciliolatos partitis amentis fem. secus ramos pedunculatis. In Nov. Holl. ♂.

9. *C. tephrosperma* H. Hamburg. ex Miq. I. c. ramulis densiusculis subpatulis v. unilateralibus rectiusculis strictis, simplicibus 5-angulatis, angulis latis obtusis sulcis profundiusculis angustis direntis glabris nitidis saturate viridibus; internodiis 2—3 lineas longis, dentibus 5 appressissimis brevibus triangularibus acutis, dorso convexis fuscescentibus marginibus hyalinis glabris; amentis? In Nov. Holl. ♂.

10. *C. Preissiana* Miq. t. 2. f. C. ramulis erectis strictis breviusculis glaucescentibus subglabris 4—5. v. 6. angulatis angulis acutiusculis faciebus demissis; internodiis 3—6'' longis; vaginarum dentibus 4—6 ovato-triangularibus v. sublanceolatis dorso viridulo v. fuscescenti-pallidis marginibus hyalinis subciliatis; amentis masc. subconico-cylindricis densifloris; vaginarum dentibus 4, 5 v. 6 latis ciliolatis, fem. subsessilibus oblongis utrinque obtusis bracteolis maturis verruculosis margine superiore puberulis. In Nov. Holl. ♂.

11. *C. Lehmanniana* Miq. t. 3. f. A. ramulis densis subpatulis aut unilateralibus strictis glaucescentibus simplicibus 5—6-angulatis angulis obtusis, faciebus demissis glabris; internodiis 4—5 lin. longis; vaginarum dentibus brevibus 5—6 v. 7 appressis triangulari-sublanceolatis pallide viridulis junioribus subciliolatis; amentis fem. lateralibus confertis obovato-oblongis; strobilis maturis obtusis; bracteis e basi late ovata ciliolata rostrato-acuminatis; bracteolis vertice triangulari vel semilunari glabratim fuscescentibus, basi in protuberantium

continuatis. In Nov. Holl. ♂. Frut. 8—10-ped.

12. *C. selaginoides* Miq. t. 3. f. B. ramulis densis patentibus 1-lateribus strictis rectis v. curvatis teret-6-gonis; internodiis 4—6 lineas longis dentibus 6 raro 5—7 appressis triangularibus acutis viridulis marginibus hyalino-pallidis tenerime ciliatis dein glabris; amentis masculis cylindricis strictis densifloris; vaginis in dentes 6 partitis. In Nov. Holl. ♂.

13. *C. Baxteriana* Miq. t. 3. f. C. ramulis densis strictiusculis 7—8 angulato-teretibus angulis prominentibus; internodiis 3—6 lin. longis marginibus ciliolatis hyalinis demum glabris dorso convexis; amentis fem. lateribus breviter pedunculatis cylindricis obtusis v. sterili-attenuatis 10—15-stichis, junioribus puberulis; bracteis ovatis acuminatis ima basi puberulis bracteolis lato-ellipticis dorso infra apicem et basi calloso-incrassatis. In Nov. Holl. ♂.

14. *C. ramuliflora* Otto et Dietr. Miq. t. 4. A. ramulis horizontalibus quandoque unilateralibus strictiusculis laete viridibus 6—8 angulato-teretibus; faciebus demissis glabris v. in sulco puberulis internodiis 2—4 lin. longis vaginarum pallidarum dentibus 6—8 v. 7 triangulari-lanceolatis subconniventibus albido-pellucidis v. basi fuscis tenere ciliolatis; amentis feminineis ramulos filiformes normales terminantibus. In Nov. Holl. ♂.

15. *C. tenuissima* Sieb. Miq. t. 4. f. B. ramulis simplicibus capillari-filiformibus erectis teretiusculis v. junioribus obsolete 4-gono-teretibus nascentibus tenere puberulis adultis glabris pallide viridibus; internodiis 6—8 lin. longis; vaginarum dentibus 4 brevissimis triangularibus ciliolatis v. glabris adpressis; amentis masculis tenuibus strictis; vaginis obverse prismato-conicis fuscis puberulis 4-dentatis; amentis fem. breviter pedunculatis ellipsoideis, pube brevi albicante appressa inspersis 10-stichis. In Nov. Holl. ♂.

16. *C. leptoclada* Miq. t. 4. f. C. ramulis confertis filiformibus subflaccidis inferne teretiusculis superne 6 rarius 7-angulato-teretibus striatis seiatim puberulis; internodiis 7—10 lin. longis; vaginarum dentibus 6—7 breve lanceolatis basi subcarinatis,

pallidis vel fuscescentibus subpatulis; amentis masc. ramulos terminantibus vel secus ramos sessilibus filiformibus; vaginis 6-angulatis dentatis; amentis fem. breviter pedunculatis; juniorum bracteis ovatis acuminatis imbricatis intus et extus fusco-tomentellis. In Nov. Holl. ♂.

17. *C. equisetifolia* Forst. ramulis filiformibus cinereo-viridulis 6—8 vulgo 7-angulato-teretibus angulis acutiusculis, faciebus subdemissis medio sulco puberulo v. glabro notatis; vaginarum dentibus 6—8 appressis lanceolatis ciliolatis dorso carinatis; internodiis 5—8 lin. longis; amentis masc. sursum subclavatim incrassatis; vaginis imbricatis in dentes 6—7—8 lanceolatos partitis pubescentibus; amentis fem. breviter pedunculatis maturis ellipticis acutis exsertis. Miq. t. 5. f. A. C. In Nov. Holl. Ind. or. Africa orient. etc. ♂.

18. *C. stricta* Ait. Miq. t. 6. f. C. ramulis densis simplicibus elongatis filiformibus erectis saturate viridibus polygono-teretibus sulcatis; angulis striaeformibus pallidioribus; internodiis singulis versus apicem incrassatis 4—6 lin. longis; vaginarum dentibus 8—10 vulgo 8 erecto-subappressis basi pallidis caeterum fuscescentibus serius albo-decoloribus et truncatis subulatolinearibus; amentis masc. ramulos terminantibus vaginis multifidis glabris. In Nov. Holl. ♂.

19. *C. suberosa* Otto et Dietr. ramulis gracilibus erectis verticillatis v. solitariis teretibus 6—8-sulcato-striatis faciebus subplanis v. concaviusculis in sulco medio puberulis v. glabris internodiis 6—8 lin. longis; vaginarum dentibus 6—7 rarius 8 erectis sublanceolatis pallido-hyalinis dorse apiceque saepe fuscis, nascentibus subciliolatis; amentis masc. ramulos terminantibus; vaginis vulgo 6—7-dentatis; strobilis breviter pedunculatis, maturis oblongis utrinque obtusis 15-stichis; bracteis latis abrupte acuminatis basi villosis; bracteolis basi protuberantia auctis. In Nov. Holl. ♂.

20. *C. Cunninghamiana* Miq. t. 6. f. A. ramulis densis filiformibus simplicibus strictis pallidis vel subglauciscentibus 8—10 angulato-striatis, faciebus planiusculis sulco vulgo glabro; internodiis 4—7 lineis longis;

vaginarum dentibus 8—10 erecto-adpressis anguste lanceolatis carneopallidis mox albidio-exaratis et basi fusca relicta truncatis strobilis lateribus breviter pedunculatis maturis depresso-globosis utrinque truncatis 12-pluristichis; bracteis in acumen pallidum breve constrictis; bracteolis prominentibus. In Nov. Holl. ♂.

21. *C. distyla* Vent. (Miq. t. 7. f. A—C. ramulis strictis haud elongatis simplicibus 6—7-angulato-teretibus, angulis obtusis faciebus demissis in sulco medio glabris v. puberulis; internodiis 5—8 lin. longis; vaginarum dentibus 6—7 ovato-lanceolatis acutis ciliolatis lutescenti-viridibus apice subrubellis; amentis masc. strictiusculis 10—14-articulatis, vaginis 6—7-angulatis dentatis; strobilis maturis oblongis 14-stichis. In Nov. Holl. ♂.

22. *C. Fraseriana* Miq. t. 6. f. D. ramulis verticillatis breviusculis v. elongatis 7—8-angulato-teretibus angulis prominentibus; internodiis 8—12 lin. longis; vaginarum dentibus 7—8 lanceolatis marginibus hyalinis medio subbinervi-fuscis ciliolatis subpatulis fusescentibus; strobilis pedunculatis ovato-subglobosis; bracteolis obtusatis crassis tuberculatis puberulis sensim glabratris. In Nov. Holl. ♂.

23. *C. rigida* Miq. t. 7. f. D. ramulis rigidis crassis glabris 8—9-angulato-teretibus; angulis prominentibus; internodiis 8—10 lin. longis; vaginarum arctarum dentibus 8—9 ovato-lanceolatis dorso fusescentibus marginibus pallidis; strobilis maturis oblongis apice conice attenuatis 14-stichis bracteis ovatis acuminatis ciliolatis; bracteolis basi protuberantibus auctis. In Nov. Holl. ♂.

24. *C. trichodon* Miq. t. 8. f. A. ramulis plerumque verticillatis rigidis simplicibus 8—9-angulato-teretibus; angulis prominentibus laevibus faciebus sulco profundo puberulo v. glabro instructis internodiis 1—unc. longis; vaginarum dentibus 8—9 lanceolato-linearibus elongatis patulis v. flexuosis basi carinatis fusescentibus ciliolatis; amentis masculis rectis strictis; vaginis cyathiformibus dentibus angusto linearibus patulo-recurvis. In Nov. Holl. ♂.

25. *C. paludosa* Sieb. (Miq. t. 8. f. B. ramulis plerumque verticillatis strictis simplicibus teretibus sulcis

7—6 puberulis; internodiis 5—6 lin. longis haud constrictis; vaginarum dentibus 7 rarius 6 subappressis lanceolatis medio fusescentibus; amentis masculis sessilibus verticillatis; vaginis floriferis remotiusculis in dentes 6—7-partitis puberulis glabrescentibus; strobilis sessilibus raro pedunculatis verticillatis v. oppositis. In Nov. Holl. ♂.

26. *C. pumila* Otto et Dietr. Miq. t. 8. f. B. ramulis longiusculis plerumque leviter curvatis teretiusculis elevato-striatis, sulcis inter strias decurrentibus, internodiis 4—8 lin. longis; vaginarum dentibus 6—8 lanceolatis adpressis pallidis versus apicem fusescentibus ciliolatis; strobilis breviter pedunculatis 10—15-stichis; bracteis ovatis acuminatis extus glabris; bracteolis, ellipticis obtusis. In Nov. Holl. ♂.

27. *C. Hügeliana* Miq. t. 11. f. A. ramulis elongatis subflaccidis teretibus angulis striaeformibus verruculosis sensim dilatatis 8—9 striisque totidem puberulis glabrescentibus; internodiis 1—2 vaginarum dentibus 8—9 triangulari-lanceolatis fuscis marginibus pallidis subciliatis erecto-patulis serius truncatis; amentis masculis filiformibus 30-articulatis; vaginis obconico-campanulatis angulato-sulcatis puberulis, strobilorum ovatorum bracteolis semiglobosis. In Nov. Holl. ♂.

28. *C. cristata* Miq. t. 10. f. A. ramulis longiusculis laevigatis adultis glaberrimis teretibus sulcis 9—11 angulis haud distinctis internodiis 1—1½ unc. longis; vaginarum dentibus 9—11 lanceolatis fusescentibus margine hyalinis subciliolatis serius truncatis; strobilis ellipticis utrinque obtusis obtusis 18-stichis fere glabris inter bracteas tenere puberulis; bracteolis alte exsertis lanceolato-oblongis subobtusis dorso subcarinatis. In Nov. Holl. ♂. Arbor 20—25-ped.

29. *C. quadrivalvis* Labill. nov. Holl. t. 218. Miq. t. 9. f. A, B, C. trunco perspicue annulato laevi, ramulis patulis simplicibus teretibus 9—12-striatis sulcatisque, striis elevatis pallidis verruculosis glabris v. glabriusculis sulcis pubescentibus; vaginarum dentibus 9—12 lanceolatis ciliolatis fusescentibus erecto-patulis amentis masculis elongatis flaccidis subcroceolutescentibus 20—30-articulatis; vaginis

campanulatis striato-sulcatis 9—12-dentatis; *strobilis breviter pedunculatis ellipsoideis* 17—18-stichis; *bracteolis acentis pungentibus*. *In Nov. Holl.* Ȑ.

30. *C. torulosa* Ait. Miq. t. 11. f. *B. ramulis elongatis subnudolosis teretibus* 12—15-sulcato-striatis; *striis sensim deplanatis*, *sulcis angustis glabris*; *vaginarum dentibus plerumque* 15 subulato-lanceolatis adpressis *basi lutescenti-fuscis apice albidis hyalinis sursum fuscis ciliotatis*; *strobilis breviter pedunculatis utrinque truncatis* 17-stichis, *bracteolis ellipticis acutis extus puberulis prominentibus*; *protuberantiis lateribus nullis*. *In Nov. Holl.* Ȑ.

31. *C. glauca* Sieb. Miq. t. 11. f. *C. ramulis glaucescentibus teretibus nodulosis striis sulcisque* 15—16 glabris fere obsoletis; *internodiis* 1—1½ unc. longis, *vaginarum basi tumidularum dentibus* 15—16 linearis-lanceolatis appressis fuscescentibus marginibus pallidis dein sphacelatis et truncatis; *amentis masculis cylindraceis densifloris*; *vaginis brevibus subpatellaeformibus dentibus circiter* 15 elliptico-lanceolatis; *strobilis subglobosis utrinque truncatis polystichis*; *bracteolis prominentibus cristatis*. *In Nov. Holl.* Ȑ. *Arbor.* 36—40-ped.

32. *C. sparsa* Tausch; monoica; *ramulis nutantibus laxis remotis* 6-sulcatis glabris; *denticulis vaginarum erectis patulis*; *ramulis spicigeris sparsis*, *femineis ovatis masc. linearibus abbreviatis* 7—9-articulatis. *In hort. Sam. Dyk.* Ȑ.

33. *C. prisca* Miq. t. 12. *ramulis 5-angulatis*, *angulis prominentibus*, *faciebus demissis*; *vaginarum dentibus 5 triangularibus*; *amentis masculis subteretibus*; *vaginis 5-floris*; *strobilis fem. oblongis obtusis* 10-stichis; *bracteolis incrassatis subsemiglobosis apice acutiusculo prominulis*; *acheniis tumidulis*. *In Nov. Holl.*? Ȑ.

4475. NAJAS L. (1747).

1. *N. arguta* H. et K. fol. ternis linearibus argute dentato-spinulosis. *N. marina* var. Kunth. *In Nov. Granata.* 4.

2. *N. marina* L. dichotoma; fol. oppositis ternisque linearis-oblongis sinuato-denticulato-spinulosis; caule

femineo muricato. *Sturm* 41. Gmel. bad. t. 3. *N. monosperma* et *tetrasperma* Mich. gen. t. 8. f. 1, 2. *In Europa.* ⊖

3. *N. muricata* Delile. fl. d'Aeg. t. 50. f. 1.

4. *N. canadensis* Michx. *In Am. bor.* ⊖

4476. CAULINIA Willd. (1805).

1. *C. atagnensis* Poll. fol. verticillato-fasciculatis linearibus rectis molliebus mucronato-denticulatis. Ic. fl. tic. t. 15. Brug. ann. 1816. t. 9. *Najas* Rehb. *In Europa.* 4.

2. *C. fragilis* Willd. ber. Schr. 1798. t. 1. f. 2. fol. ternis oppositis que linearis-subulatis recurvatis aculeo-dentatis rigidis. Mich. gen. t. 8. f. 3. *N. minor* Roth. Schk. t. 296. *In Europa.* ⊖

3. *C. flexilis* Willd. t. 1. f. 1. fol. ternis pluribusque apice denticulatis patentibus. *In Europa et Pensylvania.* 4.

4. *C. guadelupensis* Spr. fol. oppositis subulato-linearibus spinuloso-dentatis; stipulis ciliatis. *In Guadelupa.* ⊖

5. *C. indica* Willd. l. c. t. 1. f. 3. fol. ternis oppositis que linearis-subulatis repandis junioribus setaceo-dentatis. *Fluvialis* Pers. *In Ind. or.* ⊖

6. *C. microphylla* Balb. et Nocca fl. tic. t. 16. fol. omnibus verticillatis, inferioribus simplicibus remotis superioribus approximatis dichotomis. *Ad Paviam.* ⊖

7. *C. composita* Hamilt. in Wall. cat. *In Ind. or.* ⊖

4477. ZANNICHELLIA Mich. (1729).

1. *Z. palustris* Mich. gen. t. 34. f. 1. *spatha campanulata*; filamento demum longissimo. Lam. ill. t. 441. Schk. t. 280. Rehb. ic. 1005. *In Ital. sup.*

2. *Z. repens* Benningh. radicans; filamento germina vix superante; multicrenulatis. Rehb. ic. 1003. *In Germania.* 4.

3. *Z. pedicellata* Fries. fol. tenuissimis; fructibus utrinque cristatis repando-spinuloso-dentatis. *Z. pe-*

dunculata Rehb. ic. 1007. *Z. gibberosa* Rehb. ic. 1006. *In aqua marina Europae.* 2.

4. *Z. polycarpa* Nolte; fructibus sessilibus v. brevissime pedicellatis; stylo quartam fructus partem aequante. Rehb. ic. 1004. *In Europa.* 2.

5. *Z. contorta* Schlecht. caule filiformi; fol. alternis subulato-filiformibus contortis. *Potamogeton Desf.* *In Afr. bor.* 2.

6. *Z. tuberosa* Lour. fol. ensiformibus radicalibus; floribus spicatis radice tuberosa. *In Cochinchina.* 2.

7. *Z. dentata* Willd. anthera biloculari; stigmatibus dentatis; seminibus asperis. *Mich. gen.* t. 34. f. 2. *In Italia.* 2.

8. *Z. Rosenii* Wallm. in flor. 1841. *In Gothlandia.* 2.

9. *Z. pedicellata* Wall. cat. *In Ind. or.* 2.

4478. ZOSTERA L. (1747).

1. *Z. marina* L. caule teretiusculo; fol. gramineis longissimis linearibus. Lam. ill. t. 733. *Dict. sc. nat. cah.* 14. E. B. t. 467. *Sv. bot.* t. 168. *In Europa.* 2.

2. *Z. uninervis* Vahl. caule compresso repente; fol. 1-nerviis; geniculis incrassatis. Caul. t. 2. Fl. dan. t. 1501. *Ad ins. Norderney et ad mare rubrum?* 2.

3. *Z. Noltii* Hornem. fl. d. t. 2041. fol. linearibus 1-nerviis; vaginis paucifloris; retinaculis seminum alternis; seminibus oblongis apice attenuatis. *In Daniae ins.* 2.

4. *Z. bullata* Delile. *In Aegypto.* 2.

4779. ALTHENIA Petit. (1814).

1. *A. filiformis* Petit. *Bellevalia australis* Delil. *In Gallia austr.* 2.

4780. LILAEA Humb. et Bonpl. (1817).

1. *L. subulata* H. et Bonpl. pl. aeq. t. 63. *In Nov. Granata.* 2. Herba paludosâ acaulis radice fibrosa. Fol. teretia basi vaginantia.

4781. ARTOCARPUS L. (1747).

1. *A. incisa* L. fol. oblongis sinuato-pinnatifidis sebris subtus pubescentibus; amentis cernuis nudis. Gaertn. t. 71. Rumph. 1. t. 33. *In Ins. Motucc.* 2.

2. *A. integrifolia* L. fol. oblongis indivisis basi crenatis subtus scabris. Rheede 3. t. 26—28. *In Ind. or.* 2.

3. *A. Champedon* Lour. fol. oblongis integerrimis pilosis rugosis sparsis. *A. Polyphema* Pers. Rumph. 1. t. 31. *In Ind. or.* 2.

4. *A. philippensis* Pers. fol. obovatis retusis integris glabris; amentis masc. erectis. *In ins. Philipp.* 2.

5. *A. pubescens* Willd. fol. ellipticis utrinque rotundatis subtus pubescentibus; amentis masc. pendulis. Rheede 3. t. 32. *In Malabar.* 2.

6. *A. elastica* Blume; fol. pinnatifido-sinuatis utrinque hispidis; lacinias sinuato-incisis acuminatis; amentis masculis cylindricis. *In Java.* 2.

7. *A. rigida* Blume; fol. ovalioblongis apice mucronatis basi rotundatis integerrimis rigidis infra strigosasperis; amentis globosis. *In Java.* 2.

8. *A. glauca* Blume; fol. ovalibus utrinque acutis integerrimis subtus glaucis; amentis globosis. *In Java.* 2.

9. *A. parvifolia* Voigt Syll. 2.

10. *A. echinata* Roxb. *In Ind. or.* 2.

11. *A. Finteysoniana* Wall. cat. *In Ind. or.* 2.

12. *A. Gomeziana* Wall. cat. *In Ind. or.* 2.

13. *A. mollis* Wall. cat. *In Ind. or.* 2.

4482. CERATOCARPUS L. (1747).

1. *C. arenarius* L. Lam. ill. t. 741. *In Siberia.* ♂. Caulis ramosissimus.

4483. ANTHOSTEMA Adr. Jus. (1825).

1. *A.* Juss. tent. t. 18. f. 60. *In Senegambia.* 2. Arbor lactescens fol. alternis integerrimis; pedunculis articulato-racemosis multifloris.

4484. MAPROUNEA Aubl. (1775).

1. *M. gujanensis* Aubl. t. 342. Aegophrion betulinum L. Sm. ic. in ed. t. 42. Lam. ill. t. 743. Gaertn. t. 138. In Guiana. ♂. Arbor lactescens fol. integerrimis, floribus capitatis.

2. *M.* Hil. pl. us. bres. t. 65. In Brasilia. ♂.

DIANDRIA.**4485. HIPPOMANE L.**

1. *H. Mancinella* L. fol. ovatis serratis. Lam. ill. t. 793. Jacq. pict. t. 238. In Am. austr. ♂. Arbor vasta habitu Pyri.

2. *H. spinosa* L. fol. ovatis utrinque spinoso-3-dentatis. Sapium ilicifolium Willd. Plum. ic. 171. f. 1. In Am. austr. ♂.

4488. EPISTYLIUM Sw. (1806).

1. *E. caulinorum* Sw. racemis caulinis basi squamosis; fol. oblongis acutis; caule arborescente. In Jamaica. 2. *A. axillare* Sw. racemis axillaribus; fol. ovatis acuminatis; caule fruticoso. In Jamaica. ♂. Frut. 2-4-ped.

4489. ADENOCREPIS Blume. (1825).

1. *A. javanica* Blume. In Java. ♂. Arbor 40-ped. fol. alternis oblongis crenulatis; racemis axillaribus.

4490. CAREX L. (1747).*A. Species Europaea.*

a. *Spicula in apice culmi solitaria.*

* *Spiculae dioicae. Stigmata 2.*

1. *C. dioica* L. spicula terminali solitaria dioica; fol. culmisque glabris; radice stolonifera. Sturm 69. Host. t. 77. Schk. t. 1. f. 1. In pratis spongiosis. 2.

2. *C. Daralliana* Sm. spicula terminali solitaria dioica; fol. margine culmisque scabris; radice fibrosa. Sturm 50. Host. t. 41. Schk. t. A. q. w. f. 1. *Cum priore.* 2.

3. *C. parallela* Laestad. spica linearis; stigmatibus 2; fructibus ovato-lanceolatis patulis glabris; culmo sulcato; fol. canaliculatis. In Lapponia. 2.

* *Spiculae androgynae.*

4. *C. pulicaris* L. spicula terminali solitaria androgyna superne mascula; fructibus remotis oblongis utrinque attenuatis; glumis deciduis. Schk. t. A. f. 3. Sturm 53. In pratis. 2.

5. *C. capitata* L. spicula terminali solitaria superne mascula; fructibus dense confertis plano-compressis gluma longioribus. Schk. t. Y. Sturm 50. In pratis alpinis. 2.

6. *C. obtusata* Liljebl. spicula solitaria superne mascula; stigmatibus 3; fructibus gluma longioribus ovatis

4486. STILLINGIA L. (1747).

1. *S. syratica* L. fol. sessilibus oblongis obtusis basi attenuatis serrulatis; caule herbaceo. In Am. bor. 2.

2. *S. ligustrina* Michx. fol. petiolatis lanceolatis utrinque attenuatis integrerrimis; caule fruticoso. In Am. bor. 2.

3. *S. sebifera* Michx. fol. petiolatis rhomboides acuminatis integrerrimis; caule arboreo. Croton L. Sapium Mirbel. In Am. bor. et China. ♂.

4. *S. nutans* Vahl; arboreascens; fol. rhombo-ovatis acuminatis undulatis glabris; glandulis marginalibus. Croton Forst. In ins. Societ. 2.

5. *S. populnea* Vahl; arboreascens; fol. cordato-ovatis acuminatis integrerrimis glabris basi glanduliferis. In Ceylona. ♂.

4487. SYNASPISMA Endl. (1839).

1. *S. peltata* Endl. Crozophora peltata Labill. cal. t. 75. In Nov. Caled. ♂. Frut. fol. integerrimis alternis; amentis deum cylindricis pendulis.

ellipticisve in rostrum bifidum acuminate. Schk. t. D. 15. Sturm 61. In arenosis. 2.

7. *C. rupestris* All. ped. t. 93. f. 2. spicula terminali superne mascula; fructibus obovatis rostro truncato brevissime rostratis gluma brevioribus. *C. petraea* Schk. Kkk. f. 193. et t. Nnn f. 200. In alpibus altissimis. 2.

8. *C. pauciflora* Lightf. fl. sc. t. 6. f. 2. spicula terminali solitaria androgyna subquadridiflora; fructibus lanceolato-subulatis teretibus reflexis. Sturm 61. In turfos. 2.

9. *C. microglochin* Wahlenb. spicula terminali solitaria androgyna subduodecimflora; fructibus lanceolato-subulatis teretibus reflexis; crista basi recta utriculum superante. Sturm 61. In paludosis alp. 2.

10. *C. pyrenaica* Wahlenb. fructibus oblongis breviter rostratis horizontalibus; culmo 3-quetro; fol. carinato-setaceis. In Pyrenaeis. 2.

11. *C. macrostyla* Lapeyr. stigmatibus 2 elongatis; fructibus erectis ampullaceis acuminatis nitidis squama margine scariosa longioribus. In Pyrenaeis. 2.

12. *C. Marchandiana* Lapeyr. stigmatibus 3; fructibus ampullaceis acuminatis nitidis squamam acutam aequantibus; culmo nudo. In Pyrenaeis. 2.

13. *C. ambigua* Lk. stigmatibus 3; fructibus obovatis apiculatis glabris squama obtusa majoribus; fol. culmos superantibus. *C. dimorpha* Brot. In Lusitania. 2.

14. *depressa* Lk. spica oblonga multiflora; stigmatibus 3; fructibus oblongis pubescentibus; squamis cuspidiatis; fol. culmos superantibus. In Lusitania. 2.

b. Spiculae aggregatae capitatae.

15. *C. cyperoides* L. spiculis in capitulum globosum involucro triphyllum elongato cinctum conglobatis; fructibus lanceolatis longissime rostratis. Sturm 55. *C. bohemica* Schreb. t. 28. In Germ. 2.

16. *C. baldensis* L. spiculis masculis plerumque 3 aggregatis in capitulum lobatum basi involucro diphyllo horizontaliter patente cinctum. Sturm 47. In Germ. 2.

17. *C. foetida* Hall. spiculis in capitulum subrotundo-ovatum aggregatis; stigmatibus 2; fructibus erectis ovatis in rostrum elongatum apice bifidum margine serrulatum acuminatis; culmo a basi angulis scabro. St. 47. In Helvetia. 2.

18. *C. incurva* Lightf. scot. t. 24. f. 1. spiculis superne masculis in capitulum subrotundum aggregatis; fructibus inflatis, rostro laevi apice oblique truncato; culmo laevi incurvo folia aequante; radice stolonifera. Sturm 47. *C. juncifolia* All. ped. t. 92. f. 4. In alpinis. 2.

19. *C. stenophylla* Wahlenb. spiculis in capitulum ovatum aggregatis; fructibus 9—11-nerviis in rostrum apice albido-membranaceum dorso emarginatum acuminatis; stolonibus elongatis. Sturm 47. Schk. t. G. f. 32. *C. glomerata* Host. In collibus herbitis. 2.

20. *C. chondorrhiza* Ehrh. spiculis in capitulum ovatum aggregatis; fructibus ovatis in rostrum margine laeve apice scariosum breviter bilobum acuminatis; culmo laevi basi ramoso fol. multo longiore; stolonibus elongatis. Sturm 45. In Germ. et Suecia. 2.

c. Spiculae sessiles aggregatae. Stigmata 2.

21. *C. gynomane* Bertol. spiculis 2—4 superne masculis remotis laxifloris; bracteis foliaceis; stigmatibus 3; fructibus ellipticis binerviis. *C. Linkii* Schk. t. Bbh. f. 118. Sturm 61. In Istria. 2.

22. *C. divisa* Hudson. spica composita; stigmatibus 2; fructibus latovatis dorso 3—11-nerviis; glumis fructum aequantibus; radice stolonibus elongatis repente. Sturm 55. Schk. t. R. et K. f. 61. *C. schoenoides* Host. gr. t. 4. *C. austriaca* Schk. t. Qqq. f. 157. In humidis. 2.

23. *C. disticha* Huds. spica decomposita oblonga densa; spiculis supremis et inferioribus feminis, intermediis masculis; fructibus 9—11-nerviis a margine angusto serrulato-scabro cinctis; radice stolonifera. Sturm 55. In pratis. 2.

24. *C. arenaria* L. spica decomposita; spiculis superioribus masculis, intermediis apice masculis; stigmatibus 2; fructibus ovatis 7—9-nerviis a

medio ala dilatata serrulato - scabra cinctis; stolonibus repentibus. Sturm 2 et 69. *In arenosis.* 4.

25. *C. microstyla* Gay; spiculis numerosis plerumque dense congestis; stigmatibus 2; fructibus erectis ovatis a medio sensim in rostrum attenuatis; rostro apice latere interiore integro dorso fisso; radice caespitosa. *In alp. Helv.* 4.

26. *C. vulpina* L. spica decomposita ovato-oblonga densa, vel elongata interrupta; fructibus squarroso-patentibus ovatis plano-convexis; glaucis mucronatis fructu brevioribus; culmo scaberrimo; radice fibrosa. Sturm 57. *In paludosis.* 4.

27. *C. muricata* L. spica composita oblonga; stigmatibus 2; fructibus squarrosis plano-convexis enerviis in rostrum serrulatum acuminatis; culmo superne scabro; radice caespitosa. *C. contigua.* Sturm 61. — Var. β . *rirens* Koch. *C. loliacea* Schreb. *C. muricata* Hoppe. Sturm 61. fructibus viridibus. *Ad vias.* 4.

28. *C. dirulsa* Good. spica composita elongata, infima remota longius pedicellata; stigmatibus 2; fructibus erecto-patulis ovatis; glaucis mucronatis; culmo gracili subunitante; rhizomate caespitosa. Sturm 57. *In sytris.* 4.

29. *C. guestphalica* Bonningh. spica composita elongata, spicula infima remota; stigmatibus 2; fructibus erecto-patulis subrotundo-ovatis; culmo gracillimo tenui denique arcuatim ad terram deflexo. *In Guestphalia.* 4.

30. *C. teretiuscula* Good. trans. of Linn. soc. 2 t. 19. f. 3. spica composita v. decomposita valde aggregata; stigmatibus 2; fructibus ovatis gibboso-convexis nitidis enerviis laevibus; culmo 3-quetro faciebus convexiusculus; rhizomate oblique subrepente. *In pratis.* 4.

31. *C. paniculata* L. spicis paniculatis; stigmatibus 2; fructibus ovatis gibboso-convexis enerviis laevibus in rostrum bidentatum acuminatis; culmo 3-quetro faciebus planis; radice fibrosa dense caespitosa. Sturm 50. *In paludosis.* 4.

32. *C. paradoxa* Willd. act. acad. ber. 1791. t. 1. f. 1. spicis paniculatis; stigmatibus 2; fructibus ovatis gibboso-convexis dorso anticeque nervoso-striatis in rostrum bidentatum

acuminatis; culmo superne scaberrimo; radice fibrosa. Sturm 50. *In turfosis.* 4.

33. *C. Schreberi* Schrank. spica composita; spiculis 5 confertis rectis ovato-oblongis; fructibus erectis glumam aequantibus oblongo-ovatis plano-convexis a basi fere margine serrulato-ciliatis in rostrum bifidum acuminatis; radice stolonibus elongatis repente. Sturm 61. *In arenosis.* 4.

34. *C. brizoides* L. spica composita subdisticha; spiculis approximatis curvatis omnibus androgynis; fructibus erectis glumam aequantibus lanceolatis margine a basi serrulato-ciliatis; rostro bifido; radice stolonibus elongatis repente. Sturm 50. *In nemorosis.* 4.

35. *C. Ohmulleriana* O. F. Lang. spica composita; spiculis 8—10, superioribus 4—6 masculis lanceolatis; inferioribus remotis basi masculis; fructibus marginatis margine fere a basi serrulato-ciliatis; radice stolonibus elongatis repente. *In pratis humidis.* 4.

36. *C. Boenninghausiana* Wall. spica composita; spiculis 8—12; superioribus lanceolatis basi apiceque vel totis masculis denique curvatis inferioribus remotis compositis; fructibus glumam aequantibus margine fere a basi serrulato-scabris. Sturm 55. *In paludosis.* 4.

37. *C. remota* L. spica composita; spiculis alternis inferioribus 3—4 remotis infima bractea culmum superante fulta; culmo gracili debili arcuatim nutante. Sturm 50. *In humidis.* 4.

38. *C. axillaris* Good. l. c. t. 19. f. 1. spica composita; spiculis alternis, inferioribus remotis compositis, infima bractea stricta culmum superante fulta; culmo stricte erecto. Sturm 55. *In paludosis.* 4.

39. *C. stellulata* Good. spica composita; spiculis 4 remotiusculis; fructibus squarroso-patentibus in rostrum bidentatum serrulato-scabrum acuminatis; radice fibrosa caespitosa. Sturm 50. *In pratis humidis.* 4. Var. β . *grypus* Koch; spiculis 3 brunneis; fructu rostro incurvato. *C. grypus* Sturm 57.

40. *C. leporina* L. fructibus erectis nervoso-striatis margineque alato serrulato-scabro in rostri apicem excur-

rente cinctis; radice caespitosa. Leers. herb. t. 14. f. b. — β . — glumis atbidis stria dorsali virente Fl. dan. t. 1710. Sturm 55. In Germ. 4.

41. *C. elongata* L. spica composita spiculis cylindricis inferne masculis; fructibus patentibus lanceolatis compressis antice posticeque nervoso-multistriatis in rostrum subintegrum attenuatis; radice dense caespitosa. Sturm 50. Schk. Hhhh. f. 192. In paludosis. 4.

42. *C. lagopina* Wahlenb. spicula composita spiculis 3 subrotundo-ellipticis alternis confertis; fructibus erectis ovatis plano-convexis laevis in rostrum integrum acuminatis; culmo laevi; radice stolonifera. Sturm 47. *C. Lachenalii* Schk. t. Y. f. 79. In alp. granit. 4.

43. *C. Heleonaster* L. spica composita; spiculis 5—6 remotiusculis; fructibus ovatis subtiliter striatis in rostrum breve emarginatum postice non fissum acuminatis; radice caespitosa. Sturm 50. *C. elongata* Leers herb. t. 14. f. 7. Ad stagna. 4.

44. *C. Personii* Sieb. spica composita; superioribus plerumque dense approximatis; fructibus ovatis subtiliter striatis in rostrum breve postice per totam longitudinem fissum margine serrulato-scabrum acuminatis; radice caespitosa. *C. Gebhardi* Sturm 50. In humid. alp. 4.

45. *C. toliacea* L. spica composita spiculis sub 4 subrotundis; fructibus ellipticis obtusis erostratis ore integerimis nervosis; culmo apice scabro; radice stolonifera. Sturm 69. In turfosis Guestphaliae. 4.

46. *C. tenuiflora* Wahlenb. spiculis 3-nis subglobosis; fructibus oblongis obtusis glumas aequantibus; culmo scabro teretiusculo; fol. angustissimis. Schk. t. E eee f. 187. In Lapponia. 4.

47. *C. glareosa* Wahlenb. spiculis ternis oblongis confertis; fructibus squamas aequantibus oblongis; culmo flaccido; fol. angustissimis. Schk. t. A aa. f. 97. Sv. bot. t. 645. In Scandinavia. 4.

48. *C. norvegica* Wahlenb. spiculis 4-nis oblongis approximatis; fructibus lenticularibus apiculatis squama lata obtusa brevioribus; bracteis cuspidatis; culmo 3-quetro. Schk. t. S. f. 66. In Scandinavia. 4.

49. *C. repens* Bellard. spiculis alternis oblongis superioribus confertis

inferioribus remotis; fructibus oblongis acuminatis bifidis compressis clavato-serratis. In agro Taurinensi. 4.

50. *C. tusitanica* Willd. spica ramosa; spiculis lanceolatis basi bracteatis; fructibus oblongis acuminatis ore oblique ciliata serratis. Schk. t. Ccc. f. 119. In Lusitania. 4.

51. *C. alopecurus* Lapeyr. spiculis sub-5-nis incluse pedunculatis inferne femineis terminalibus cernuis media sessili; stigmatibus 3; squamis lanceolatis obtusis; fol. culmum teretem superantibus. In Pyrenueis. 4.

52. *C. longiseta* Brot. spiculis subternis superne masc. infima sessili; bractea basilaris setacea longissima; fructibus 3-quertris squamas ovatas aequantibus. In Lusitania. 4.

53. *C. glareosa* Wahlenb. spicis subternis approximatis oblongis sub-sessilibus supra terminalibus mascula; stigmatibus 2 fructibus squamas aequantibus oblongis attenuatis nervosis; culmo flaccido; fol. angustissimis. Schk. t. Aaa. f. 97. Sv. Bot. 645. In Scandinavia. 4.

Spica terminalis mascula, laterales femineae, rarius terminalis apice feminea, vel masculorum plures.

a. Stigmata 2.

54. *C. Gaudiniana* Guthnick. spica terminali linearis lateribus 2—3 brevioribus sessilibus; fructibus glabris e basi ovata in rostrum apice bidentatum sensim attenuatis; fol. apice plano-compressis scabriusculis. Sturm 69. In Germania. 4.

55. *C. microstachya* Ehrh. spicis lateribus 2—3 femineis, conspicue brevioribus approximatis sessilibus; fructibus glabris ovatis in rostrum glabrum vel obsolete denticulatum apice breviter dentatum acuminatis; fol. apice argute 3-quertris scabris. Sturm t. 55. In Germania. 4.

56. *C. stricta* Gooden. linn. trans. 2. t. 21. f. 9. spicis masculis 1—2 cylindricis; bracteis basi utrinque auriculatis; fructibus ellipticis planis nervosis; foliorum vaginis omnibus margine reticulato-fassis; radice dense

caespitosa stolonibus destituta. Sturm
50. *In Europa.* 4.

57. *C. Drejeri* Lang. spicis masc. 1—3 oblongo-cylindricis, superne sessili; bracteis vaginaeformibus infima foliacea; fructibus ellipticis antice et postice convexiusculis minutissime punctulatis; vaginis foliorum inferioribus reticulato-fassis. *In Germania.* 4.

58. *C. vulgaris* Fries. (*C. caespitosa* auct.) spicis fem. 2, 3—4 cylindricis; bracteis auriculatis vaginae destitutis, infima foliacea culmo breviore, fructibus glabris antice planis dorso convexiusculis multinerviisque; vaginis non reticulato-fassis; radice stolonifera. Linn. trans 2. t. 21. f. 8. *In Europa.* 4.

59. *C. acuta* L. spicis masc. 1—3, fem. 3—4 elongato-cylindricis, florigeris nutantibus; bracteis foliaceis auriculatis, infima culmum superante; fructibus glabris compressis subinflatis antice posticeque convexiusculis obsolete nervosis; vaginis foliorum non reticulato-fassis Sturm 57. *In Europa.* 4.

60. *C. rigida* Gooden. Linn. trans. 2. t. 22. f. 10. spica mascula solitaria; fem. cylindricis sessilibus; fructibus glabris subtrigonis laevibus brevissime rostratis; rostelllo tereti indiviso; fol. recurvis. Sturm 69. *In Europa.* 4.

61. *C. bicolor* All. spicis pedunculatis 3 in apice culmi confertis saepeiusque quarta remota longius pedunculata bracteaque foliacea vaginata fulta; fructibus glabris erostratis integerrimis; glumis ovatis obtusis. Sturm 47. *In Europa.* 4.

b. Stigmata 3.

62. *C. Buxbaumii* Wahlenb. spica terminali androgyna obovata inferne mascula; fem. 3 infima pedunculata; fructibus ellipticis triquetris obtusis brevissime rostratis; glumis cuspidatis; foliorum vaginis reticulato-fassis. Sturm 61. Schk. t. Gg. f. 76. *In Europa.* 4.

63. *C. Vahlii* Schk. t. Gg. f. 44 et Ppp. f. 151. spicis 3 dense congestis breviter pedunculatis subrotundis, terminali androgyna basi mascula caeteris feminis; fructibus glabris trigonis, breve rostellatis, rostelllo bidentato. *In alp. Germaniae et Sueciae.* 4.

64. *C. nigra* All. spicis 3—4 dense aggregatis sessilibus v. breve pedunculatis ovatis terminali androgyna basi mascula; fructibus glabris compressis dorso obtuse carinatis; culmo scabro. Sturm 47. *In alp. altissimis.* 4.

65. *C. aterrima* Hoppe; spicis 3—5 confertis omnibus oblongo-cylindricis erectis terminali androgyna basi mascula; fructibus glabris subrotundo-ovatis compressis dorso obtuse carinatis rostelllo brevi minute bidentato. Sturm 47. *In alp. editissimis.* 4.

66. *C. atrata* L. spicis 3—5 confertis terminali ovata androgyna basi mascula, feminis oblongis denique pendulis; fructibus glabris subrotundo-ovatis compressis dorso obtuse carinatis, rostelllo bidentato. Sturm 47. *In Europa.* 4.

67. *C. irrigua* Sm. spica masc. solitaria, feminis 2—3 cernuis longe tenuiterque pedunculatis; fructibus subrotundo-ovalibus obtusis lenticulari-compressis glabris enerviis; fol. linearibus planis laevibus. Sturm 53. *C. irrigua* Wahlenb. lapp. t. 15. f. 2. *In Europa.* 4.

68. *C. limosa* L. spica masc. solitaria; fem. 1—2 pendulis longe pedunculatis ovatis densifloris; bracteis foliaceis biauriculatis; fructibus subrotundo-ovalibus obtusis lenticulari-compressis glabris multierviis apiculatis; fol. complicato-canaliculatis. Sturm 53. *In Europa.* 4.

69. *C. supina* Wahlenb. spica masc. solitaria linear-lanceolata; feminis 1—2 approximatis subrotundis sessilibus; fructibus globoso-ellipticis triquetris nitidis glaberrimis apice scarioso-rostratis; radice stolonifera. Sturm 48. *C. campestris* Host. 4. t. 88. *In Europa.* 4.

70. *C. pilulifera* L. spicis fem. 3 subrotundis sessilibus; bractea inferiore linear-subulata non vaginante tota foliacea; fructibus subgloboso-ovatis pubescentibus. Sturm 50. *In Europa.* 4.

71. *C. tomentosa* L. spicis feminis 1—2 subsessilibus cylindricis; bractea inferiore foliacea horizontaliter patente; fructibus trigonis hirtotomentosis. Sturm 53. *In Europa.* 4.

72. *C. montana* L. spicis feminis 1—2 approximatis; bracteis totis membranaceis; fructibus oblongo-ovatis trigonis hirti-pubescentibus; radice

fibrosa dense caespitosa. Sturm 2 et 69. *In Europa.* 4.

73. *C. ericetorum* Poll. spicis fem. 1—2 ovatis; bracteis membranaceis amplexicaulibus aristatis; fructibus obovatis 3-gonis pubescentibus glabris breviter ciliatis obtusissimis nervo ante apicem evanescente. Sturm 57. *C. montana* Leers herb. t. 16. f. 6. var. β glumis magis oblongis. *C. membranacea* Sturm 61. *In Europa.* 4.

74. *C. praecox* Jacq. austr. t. 446. spicis fem. 1—2 approximatis ovato-oblongis; bracteis amplexicaulibus; fructibus obovatis rostratis pubescentibus, glumis nervo excurrente mucronatis; radice stolonifera. Sturm 69. *C. filiformis* Leers herb. t. 16. f. 5. *C. umbrosa* Host. gr. 1. t. 69. *C. mollis* Host. 4. t. 184. *In Europa.* 4.

75. *C. polyrrhiza* Wallr. spicis oblongo-ovatis 2—4, sessilibus; bracteis margine membranaceis infima vaginante; fructibus obovatis trigonis rostratis pubescentibus; radice fibrosa dense caespitosa. *C. umbrosa* Sturm 57. *C. longifolia* Host. 4. t. 85. *In Europa.* 4.

76. *C. humilis* Leyss. spicis feminis 2—3 remotis subtrifloris; pedunculis bractea membranacea vaginante aphylla inclusis; fructibus obovatis 3-gonis apice pubescentibus; fol. canaliculatis culmum superantibus; radice fibrosa. Sturm 2 et 69. *In Europa.* 4.

77. *C. gynobasis* Vill. spicis feminis 2—3 sub-5-floris, infima subradicali longissime pedunculata; fructibus obovatis 3-queritis emarginatis subtiliter pubescentibus; radice fibrosa. Sturm 47. *C. diversiflora* Host. gr. 1 t. 70. *In Europa.* 4.

78. *C. digitata* L. spicis feminis linearibus pedunculatis remotis; pedunculis bractea membranacea vaginante oblique truncata; fructibus obovatis 3-gonis brevissime rostratis pubescentibus glumam aequantibus; radice fibrosa. Sturm 61. *In Europa.* 4.

79. *C. ornithopoda* Willd. spicis feminis ternis linearibus confertis pedunculatis; pedunculis bractea membranacea vaginante oblique truncata inclusis; fructibus obovatis 3-gonis pubescentibus gluma longioribus; radice fibrosa. Sturm 61. *In Europa.* 4.

80. *C. alba* Scop. spicis fem. 2 sub-5-floris; bracteis vaginantibus

membranaceis aphyllis dorso stria herbacea notatis; fructibus globose-ovatis striatis glabris rostro oblique truncato; radice stolonifera. Sturm 53. *In Europa.* 4.

81. *C. pilosa* Scop. spicis pedunculatis laxifloris, bracteis vaginantibus foliaceis; fructibus globose-ovatis trigonis glaberrimis; culmis laevissimis striatis subaphyllis; fol. fasciculorum sterilem lato-linearibus pilosociliatis. Sturm 55. *In Europa.* 4.

82. *C. nitida* Host. gr. 1. t. 71. spicis oblongis densiloris; inferiore exserte pedunculata sub-12-flora, superiore subsessili; fructibus globose-ovatis rostratis glabris, rostro apice albidio-membranaceo bilobato; radice stolonifera. Sturm 47. *C. verna* Schk. t. L. f. 46 et Ppp. f. 156. *In Europa.* 4.

83. *C. panicea* L. spica mascula pedunculata semper erecta; fem. 2 laxifloris infima exserte pedunculata; bracteis foliaceis vaginantibus; fructibus globose-ovatis rostratis glabris, rostro tereti-truncato; radice stolonifera. Sturm 50. *In Europa.* 4.

84. *C. vaginata* Tausch; spica mascula sub anthesi rectangule refracta; fem. 2—3 laxifloris; fructibus subglobose-ovatis trigonis glaberrimis rostro tereti oblique truncato; culmis laevissimis basi foliosis; fol. lato-linearibus; radice stolonifera. Sturm 61. *C. tetanica* Rchb. C. subspatacea Fl. dan. t. 1530. *In Europa.* 4.

85. *C. glauca* Scop. spicis masculis subbinis; feminis 2—3 cylindricis densiloris longe pedunculatis denique pendulis; fructibus ellipticis obtusis rostelloque brevissimo subemarginato apiculatis compresso-convexis scabriusculis enerviis. Sturm 53. *C. flaccia* et pendula Schreb. *In Europa.* 4.

86. *C. claraeformis* Hoppe in Sturm 61. spicis masculis subbinis clavatis apice latioribus elongato-pedunculatis pendulis; bracteis foliaceis; fructibus elliptico-oblongis obtusis, rostello brevissimo subemarginato apiculatis compresso-convexis scabriusculis enerviis. *In atp. Europ.* 4.

87. *C. maxima* Scop. spica masc. solitaria feminine arcuatis denique pendulis, cylindraceis elongatis; fructibus ellipticis triquetris breviter rostratis glabris; rostro 3-gono. Sturm 55. *C. pendula* Good. *In Europa.* 4.

88. *C. strigosa* Huds. spica masc. solitaria; fem. 4 distantibus cernuis gracilibus laxifloris; fructibus oblongo-lanceolatis nervosis 3-gonis attenuatis; radice stolonifera. Sturm 55. In Europa. 4.

89. *C. pallescens* L. spica masc. solitaria; fem. 2—3 approximatis cernuis oblongo-ovatis pedunculatis; fructibus ellipticis erostratis subcompres sis obsolete nervosis glabris; fol. vaginisque inferioribus pilosis. Sturm 53. In Europa. 4.

90. *C. capillaris* L. spicis fem. 2—3 longe pedunculatis cernuis laxe 5—10-floris, superioribus masculam superantibus; bracteis foliaceis, fructibus ellipticis turgidis 3-gonis basi apice que attenuatis glabris; radice fibro sa. Sturm 53. *C. atrofusca* Schk. t. Y. no. 82. *C. limosa* Scop. In Europa. 4.

91. *C. fuliginosa* Schk. t. Cc. no. 47. spicis omnibus pedunculatis subapproximatis; terminali androgyna, inferioribus denique pendulis; fructibus lanceolatis glabris in rostrum serrulato-ciliatum bidentatum attenuatis. Sturm 47. *C. frigida* Host. gr. 4. t. 90. In Europa. 4.

92. *C. frigida* All. spica masc. lanceolata rarius apice feminea; femaleis 4 oblongis densifloris suprema sessili, infima remota longissime pedunculata pendula; fructibus lanceolatis glabris in rostrum marginatum serrulato-ciliatum bidentatum attenuatis. Sturm 93. *C. geniculata* Host. gr. 4. t. 94. *C. fuliginosa* Host. t. 93. In alp. Europae. 4.

93. *C. sempervirens* Vill. spicis oblongo-lanceolatis, masc. solitaria, fem. 3, sublaxifloris, inferioribus exserte pedunculatis erectis; fructibus ovato-lanceolatis in rostrum serrulato-ciliatum apice scarioso-bilobum attenuatis dorso hispidulis. *C. ferruginea* Schk. t. M. f. 48. Sturm 53. In Europa. 4.

94. *C. hispidula* Gaud. spicis oblongo-lanceolatis masc. solitaria, fem. 2, infima incluse rarius exserte pedunculata; fructibus ovalis marginatis serrulato-ciliatis in rostrum breviusculum cuspidibus 2 terminatum acuminatis dorso pubescentibus; fol. linearibus culmeis et fasciculorum sterilium aequilongis. *C. fimbriata* Schk. t. Uuu f. 165. In Europa. 4.

95. *C. firma* Host. spica masc. solitaria; fem. plerumque 2 erectis densifloris ellipticis, inferiore exserte pedunculata; fructibus oblongo-lanceolatis glabris in rostrum serrulato-ciliatum apice truncato-bilobum acuminatis; fol. lanceolato-linearibus trifariam patentibus rigidis. Sturm 57. In Europa. 4.

96. *C. ferruginea* Scop. spica masc. solitaria; fem. 2 linearibus laxifloris omnibus exserte pedunculatis, fructiferis nutantibus; fructibus elliptico-oblongis 3-gonis in rostrum serrulato-scabrum antice planum apice bidentatum acuminatis. *C. Mielichhoferi* Schk. Sturm 53. *C. spadicea* DC. *C. Scopoliana* Willd. In Europa. 4.

97. *C. tenuis* Host. gr. 4. t. 92. spica masc. solitaria, fem. 2—3 linearibus laxifloris omnibus exserte pedunculatis, fructiferis nutantibus; fructibus lanceolato-oblongis apice attenuatis 3-gonis superficie margineque glabris; fol. setaceo-linearibus; radice stolonifera. *C. brachystachys* Schk. t. P. f. 58. Sturm 53. In alp. Europae. 4.

98. *C. depauperata* Good. spica masc. solitaria; fem. 3 remotis exserte pedunculatis erectis 3—6-floris; fructibus elliptico-ovatis 3-gonis in rostrum lineari-elongatum serrulato-scabrum apice bilobum contractis multinerviis, nervis circiter triginta prominulis. *C. ventricosa* Curt. Lond. 6. t. 68. *C. triflora* Schk. t. M. f. 50. In Germ. et Anglia. 4.

99. *C. Michelii* Host. spica mas. solitaria; fem. 1—2 remotis ellipticis exserte pedunculatis 6—12-floris; bracteis spicam aequantibus culmo multo brevioribus; fructibus obovatis ventricoso-trigonis glabris in rostrum lineare elongatum apice acute bifidum subito acuminatis. Sturm 55. spica pallida. In mont. Europ. 4.

100. *C. hordeistichos* Vill. spicis masc. 2, fem. 3 erectis ovatis densifloris, infima exserte pedunculata; bracteis vaginantibus erectis foliaceis foliisque radicalibus culmo multo longioribus; fructibus 3-gonis acute rostrato-bifidis serrulato-scabris. Schk. t. Ddd. f. 12. et t. S. f. 65. In Europa. 4.

101. *C. flava* L. spica masc. solitaria; fem. 2—3 vel 5—6 subapproximatis subrotundo-ovalis, infima incluse

pedunculata; bracteis foliaceis breviter vaginantibus denique patentissimis v. refractis; fructibus ovatis inflatis in rostrum recurvatum serrulato-scabrum bidentatum acuminatis. Sturm 57. In Europa. 4.

102. *C. fulva* Good. spica masc. solitaria; fem. 2, infima remota exserte pedunculata v. 3 superioribus 2 approximatis omnibus ovato-oblongis; bracteis longe vaginantibus, infima foliacea spicam masculam attingente v. superante; fructibus ovatis in rostrum bifidum serrulato-scabrum acuminatis patentibus, infimis saepe horizontaliter expansis; glumis acutis. Sturm 57. In humidis Europ. 4.

103. *C. Oederi* Ehrb. spicis fem. 2—3 subrotundo-ovatis subsessilibus infima pedunculata; bracteis foliaceis denique patentissimis vel refractis breviter vaginantibus vel infima remota et elongato-vaginata; fructibus rotundis in rostrum rectum serrulato-scabrum acuminatis. Sturm 57. In Europa. 4.

104. *C. Hornschuchiana* Hoppe; spicis fem. 3 oblongo-ovatis densifloris, infima anguste foliacea spicam superante; fructibus ovatis inflatis in rostrum bifidum margine serrulato-scabrum adscendentibus. *C. distans* fl. dan. t. 1049. Host. t. 77. In Europa. 4.

105. *C. distans* L. spicis fem. ovato-oblongis densifloris omnibus longe remotis; bracteis infimis foliaceis spicam superantibus; fructibus ovatis 3-gonis, subinflatis nervosis, nervis lateralibus paulo magis prominentibus; glumis ovatis obtusis mucrone scabro terminatis. Sturm 53. In Germania. 4.

106. *C. binerris* Sm. spicis fem. 3 remotis densifloris infima exserte pedunculata; bracteis infimis foliaceis spicam superantibus; fructibus 3-gonis nervis 2 validis prominentibus caeterum obsolete nervosis in rostrum bifidum serrulato-scabrum obtusum acuminatis; glumis ovatis obtusis mucrone scabro terminatis. Sturm 55. In Germania et Anglia. 4.

107. *C. extensa* Good. linn. trans. 2. t. 21. f. 7. spicis fem. 2—4 oblongo-ovalibus densifloris superioribus sessilibus subcongestis infima remotiuscula inclose pedunculata, bracteis longissimis culmo longioribus denique recurvato-patentissimis; fructibus ovatis

in rostrum bidentatum margine glabrum acuminatis. Sturm 57. In maritimis Europ. 4.

108. *C. punctata* Gaud. spicis fem. 3 remotis densifloris infima exserte pedunculata; bracteis elongatis; fructibus ovatis obsolete nervosis in rostrum breve bidentatum margine glabrum acuminatis; fol. anguste linearibus planis, ligula oppositifolia oblonga. Sturm 61. In Helvetia. 4.

109. *C. laevigata* Sm. spicis masc. 1—2, fem. 3—4 remotis cylindricis densifloris pedunculatis infima subpendula; fructibus ovatis in rostrum margine scabriuscum cuspidato-bifidum acuminatis; glumis attenuato-acuminatis; culmo laevi; fol. lato-linearibus; ligula oppositifolia oblonga. *C. patula* Schk. t. Bbb. f. 116. In Europa. 4.

110. *C. Pseudocyperus* L. spicis feminis 6—8 longe pedunculatis pendulis cylindricis densifloris; bracteis foliaceis; fructibus ovato-lanceolatis bicuspido-rostratis; glumis linearibus scabris; culmo acutangulo angulis scabro. Sturm 57. In Europa. 4.

111. *C. ampullacea* Gond. spicis masc. 1—3, fem. 2—3 remotis cylindricis breviter pedunculatis densifloris; fructibus patentissimis subglobose inflatis glabris dorso subseptem-nerviis, rostro linearis-bicuspidato; culmo obtusangulo laevi. Sturm 57. *C. vesicaria* Huds. In paludosis Europae. 4.

112. *C. vesicaria* L. spicis masculis 1—3, fem. 2—3 oblongo-cylindricis subsessilibus erectis densifloris; fructibus oblique patentibus ovato-conicis inflatis in rostrum compressum bicuspidiatum attenuatis glabris dorso sub-7-nerviis; culmo acutangulo, angulis scabro. *C. inflata* Huds. In Europa. 4.

113. *C. paludosa* Good. spicis masc. 2—3, glumis inferioribus obtusis; spicis fem. 2—3 cylindricis densifloris; glumis acuminatis cuspidatis; fructibus ovato-oblongis compressis subtriangularis nervosis bidentato-rostratis acuminatis glabris; culmo acutangulo angulis scabro. Sturm 53. *C. Kochiana* Sturm 69. In Europa. 4.

114. *C. riparia* Curt. Lond. 4. t. 60. spicis masc. 3—5 glumis cuspidatis; fem. 3—4 cylindricis densifloris sessilibus, glumis cuspidatis; fructibus ovato-conicis margine rotundatis

utrinque convexis tenuiter breve birostratis glabris; culmo acutangulo angulis scabro. Sturm 69. *C. crassa* Ehrh. *Ad fossas, ripas fluv. Europae.* 2. Species maxima.

115. *C. nutans* Host. t. 83. spicis masc. 1—2, fem. 3—4 cylindricis densifloris; glumis cuspidatis; fructibus ovato-conicis subtiliter impresso-striatis bidentato-rostratis glabris; culmo laevi. Sturm 61. *In umbrosis Europae.* 2.

116. *C. evoluta* Hartm. spicis masc. 2—3 fem. remotis cylindricis erectis densifloris sessilibus; fructibus ovatis turgidis hirto-pubescentibus; culmo acutangulo scabro; fol. planis culmo latioribus. Sturm 69. *Ad ripas fluv. Europae.* 2.

117. *C. filiformis* L. spicis masc. 1—2, fem. 2—3 remotis oblongis densifloris sessilibus v. infima pedunculata; fructibus oblongo-ovatis turgidis hirto-pubescentibus; culmo obtusangulo laevi v. scabriuscule; fol. canaliculatis culmo vix latioribus. Sturm 53. *C. splendida* Willd. prodr. t. 1. f. 3. *In Europa.* 2.

118. *C. hirta* L. spicis masc. 2, fem. 2—3 erectis oblongo-cylindricis, inferiore pedunculata; glumis subaristatis; bracteis foliaceis; fructibus ovatis in rostrum bicuspitatum acuminatis hirtis; fol. vaginisque pilosis. Sturm 55. *In Europa.* 2.

119. *C. sphaerica* Lapeyr. spicis superioribus subsessilibus approximatis, inferioribus pedunculatis remotis; fructibus acuminatis bilobis laevibus squamas lanceolatas aristatas superantibus. *In Pyrenaeis.* 2.

120. *C. Grioletti* Schk. t. . . f. . . spicis fem. 4-nis ovato-oblongis erectis, infima longissime pedunculata; fructibus obovatis costatis subhidendatis hirtis squamas ovatas acutas superantibus culmo foliisque glabris. *In Liguria.* 2.

121. *C. demissa* Hornem. spicis fem. 2. remotiusculis subpedunculatis subrotundis; fructibus oblongis acuminatis squamas oblongas acutas aequantibus; fol. elongatis patentibus. *In Norvegia.* 2.

122. *C. rotundata* Wahlenb. spicis fem. 2. ellipticis remotis pedunculatis; fructibus globoso-inflatis rostratis squama obtusa majoribus; culmo

tereti. *C. globularis* Schk. t. . . f. . . *In Lapponia.* 2.

123. *C. lirida* Willd. spicis fem. subbinis paucifloris subremotis erectis bracteas vaginantes superantibus; fructibus oblongis obtusiusculis squamas obtusas excedentibus. *In Lapponia.* 2.

124. *C. laxa* Wahl. spicis fem. 2 oblongis nutantibus; fructibus ellipticis compressis apiculatas squamas oblongas obtusis aequantibus; bracteis vaginantibus. *In Lapponia.* 2.

125. *C. rariflora* Sm. spicis fem. 2 linearibus nutantibus paucifloris; bracteis obsoletis; fructibus obovatis apiculatis glabris squamas oblongas obtusiusculas superantibus. *In Scotia.* 2.

126. *C. serrulata* Biv. spicis masc. 3, fem. 2. subsessilibus erectis cylindricis; fructibus subrotundis compressis pubescentibus apiculatis squamis mucronatis serrulatis; culmo 3-gono. *In Sicilia.* 2.

127. *C. longiaristata* Bivon. spicis masc. aggregatis, fem. sub 3-nis remotis cylindricis erectis subsessilibus; fructibus obovatis compressis apiculatis squama nervosa aristata brevioribus; culmo 3-gono. *In Sicilia.* 2.

128. *C. aquatilis* Wahl. spicis masc. sub 2-nis, fem. 2 sessilibus clavato-linearibus; fructibus ellipticis compressis apiculatis squamas oblongas obtusiusculas superantibus. *In Lapponia.* 2.

B. Species Asiaticae Africanae Americanae et Novae Hollandiae.

1. *Stylus bifidus.*

a. *Spicae solitariae apice masculae.*

129. *C. anthoxanthea* Presl. spicula androgynna apice mascula solitaria; stigmatibus 3; nectario ovato-lanceolato gluma ovata mucronata longiore; culmo scabro. *In Neotka Sund.* 2.

130. *C. micropoda* C. A. Mey. t. 6. spica oblonga superne mascula; stigmatibus 2; perigyniis stipitatis laevissimis patentibus ovato-oblongis latrostratis; gluma obtusiuscula; culmo scabro. *In Unalaschka.* 2.

131. *C. Redowskiana* C. A. Mey. Cyp. t. 4. spica dioica; fructibus linearie-oblongis utrinque attenuatis lae-

vibus ore bilobo hyalinis glumam obtusam superantibus; fol. scabris 3-gono-setaceis. In Camtschatka. 4.

132. *C. leiocarpa* C. A. M. t. 5. spica dioica; fructibus erectis anguste oblongis laevissimis, glumam acutam superantibus; fol. 3-questris scabris. In Unalaschka. 4.

133. *C. oreophila* C. A. M. spica cylindrica superne mascula stigmatibus 2; perigyniis sessilibus laevibus glabris ore bidentatis gluma ovata acuta brevioribus; radice repente. In Caucaso. 4.

b. Spicae conplures apice masculae.

134. *C. enervis* C. A. M. in Ledeb. ill. t. 349. spicis 6 oblongis apice masculis; fructibus erectis enervibus compressis ellipticis rostratis immarginatis serrulatis ore hyalino bidentatis gluma acutiuscula longioribus; bracteis aphyllo. In Altaica. 4.

135. *C. ammophila* Willd. spica composita, spiculis oblongis alternis confertis inferioribus superne masculis; fructibus ovato-oblongis bidentatis squamis lanceolatis mucronatis. In Hispania. 4.

136. *C. duriuscula* C. A. M. cyp. t. 8. spicis capitatis apice masculis; stigmatibus 2; perigyniis ovatis subcompressis subnerviis glabris margine serrulatis breviter rostratis ore integro; fol. angustis complicatis culmo rectis. In Camtschatka. 4.

137. *C. consanguinea* Kunth; spicis 7-9 approximatis oblongis obtusis; squamis feminis ovatis acute mucronatis; utriculis floriferis ovatis apice attenuata bidentatis ad angulos scabris; fol. angustis. In P. b. S. 4.

138. *C. curaica* Kunth; spicis apice masculis capitatis; stigmatibus 2; perigyniis ovatis acuminatis serrulatis ore hyalino oblique truncatis gluma ovata acuta longioribus. C. ova-ta Ledeb. ill. t. 323. In ins. Curacic.

139. *C. physodes* Willd. spica composita, spiculis 4-nis alternis confertis superne masculis; fructibus ellipticis inflatis striatis bidentatis. In desertis Kirgisorum. 4.

140. *siccata* Dewey in Sillim. journ. 10. t. F. f. 18 et 14. spica composita; spiculis ovatis acutiusculis approximatis; fructibus ovato-lanceolatis acuminatis compressis margine

scabris bifidis squamam ovatam subaequantibus. In Am. bor. 4.

141. *C. bromoides* Schk. t. 8. XXX. f. 176. spica masc. linearis sessili; fem. 3, inolute subpedunculatis oblongis compressis; fructibus oblongo-ovatis acuminatis rostratis bicuspidiatis; squamis oblongis mucronatis. In Am. bor. 4.

c. Spica composita androgyna. Spiculae apice masculae plerumque abbreviatae.

142. *C. bonariensis* Desf. scapo triquetro laevi nudo; spica composita, spiculis androgynis confertis; involucro communis 1-phyllo spica longiore. In Buenos Ayres. 4.

143. *C. bracteosa* Kunze; fol. gramineis scabris; spica ovata obtusa involucrata; spiculis abbreviatis; stigmatibus 2; utriculis ovatis rostratis plano-convexis nervosis basi spongioso-subcoriaceis; rostro bidentato; stylo basi aequali. In Chili. 4.

144. *C. Sororia* Kunth; caespitosa; fol. gramineis margine scabris; spica ovata obtusa densa; spiculis crebris apice masculis; stigmatibus 2; utriculis ovatis rostratis superne hispido-scabris squamam ovatam acutam superantibus; rostro bidentato. In Montevideo. 4.

145. *C. xalapensis* Kunth; caespitosa; spica elliptico-oblonga obtusa folio subulate suffulta densa; stigmatibus 2; utriculis ovatis rostratis superne hispidulis obsolete 3-4-nerviis, squamam ovatam ellipticam mucronatam superantibus, rostro bidentato. In Xalapa. 4.

146. *C. Brongniartii* Kunth; fol. anguste gramineis margine scabris; spica cylindracea densa; spiculis crebris; stigmatibus 2; utriculis ellipticis rostratis nervosis ad angulos superne marginatis subcoriaceis basi spongiosis; squama ovata acuminata; rostro subdentato antice profunde fissa; stylo basi bulboso. In Chili. 4.

147. *C. Bonplandii* Kunth; spica ovata foliolo longissimo fulta; spiculis subrotundo-ovatis; stigmatibus 2; utriculis ovato-oblongis rostratis nervosis hispidulo-scabris; squama ovata acuminata, rostro bidentato; stylo basi aequali. In Am. bor. 4.

148. *C. sparganioides* Muehlenb. Schk. t. Lll. f. 142. spiculis multiflo-

ris suboctonis ovatis approximatis superne masculis; fructibus ovatis compressis marginatis bifidis margine ciliato-serratis horizontalibus. In Am. bor. 4.

149. *C. stipata* Muehlenb. Schk. t. Hhh. f. 132. spiculis 5—10 oblongis superne masculis aggregatis; fructibus patentibus ovatis acuminatis bicuspidiatis convexo-planis nervosis; culmo 3-quetro asperrimo. In Am. bor. 4.

150. *C. setacea* Dewey l. c. t. B. f. 5. spicis approximatis sessilibus; spiculis apice masculis ovatis obtusis conglomeratis; fructibus ovato-lanceolatis acuminatis compressis bifidis divergentibus squamae aristatae subaequalibus. In Am. bor. 4.

151. *C. vulpinaris* Nees in Wight; spica ovata obtusa compacta, spiculis compositis ovatis imbricatis; fructibus ovatis bidentatis compressis subgibbosis erectis squamis ovatis membranaceo-acutis pallide fuscis. In Nepatia. 4.

152. *C. foliosa* Don nep. spiculis compositis ovato-oblongis adpressis approximatis, bracteis bracteolisque e basi membranacea setaceis elongatis; fructu ovali rostrato primum scabro dein glabro; squamis ovatis aristato-mucronatis testaceis carina angulisque culmi scaberrimis. In Nepatia. 4.

153. *C. nubigena* Don; spiculis confertis ovatis; bracteis cuspidatis; fructibus erectis ovatis plano-convexis glabris dorso striatis margine denticulato rostro bidentato; squamis cuspidatis ovatis albo-membranaceis. In Nepatia. 4.

154. *C. retroflexa* Muehlenb. Schk. t. Kkk. f. 140. spiculis subquaternis remotiusculis superne masculis; fructibus ovatis bidentatis glabris reflexo-patentibus; squamis oblongo-lanceolatis. In Am. bor. 4.

155. *C. multiflora* Muehlenb. Schk. t. Lll. f. 144. spicis anguste paniculatis superne masculis oblongis obtusis; fructibus ovatis acuminatis bicuspidiatis; squamis ovatis mucronatis; bracteis foliaceis filiformibus. In Am. bor. 4.

156. *C. cephalophora* Muehlenb. Schk. t. Hhh. f. 133. spicis superne masculis in formam ellipticam aggregatis; fructibus ovatis compressis bifidis marginatis superne ciliato-serratis. In Am. bor. 4.

157. *C. leiorrhyncha* C. A. Mey. cyp. t. 9. spiculis approximatis superne masculis; stigmatibus 2; perigyniis oblongo-ovatis rostratis laevissimis ore bidentatis; bractea infima foliacea spicam excedente. In Daruria. 4.

158. *C. notoleca* Nees in Wight; spica basi interrupta; ramulis adpressis dense spiculiferis oblongis v. cylindricis; bracteis membranaceo-setaceis; fructibus ovatis dorso laevissimo serrulato-scabris; squamis flavo-virentibus. In Nepatia. 4.

159. *C. adpressa* R. Br. prodr. spica decomposita elongata partialibus adpressis; spiculis ovatis apice masculis; squamis acutis; fructibus ovatis utrinque nervosis marginibus extrorsum denticulatis. In Nov. Holl. 4.

160. *C. decomposita* Muehlenb. Dewey l. c. t. S. f. 58. spica decomposita; spiculis alternis confertis permultis; fructibus ovatis 3-quertris rostratis parvis nigris glabris squamam albam subaequautibus. In Am. bor. 4.

161. *C. Commersoniana* Sieb. fol. anguste gramineis sulcatis rigidis; spicis cylindricis paniculatis; squamis femineis ovatis obtusis muticis; utriculis ovato-oblongis rostratis membranaceis nervosis ad angulos hispidis rostro bidentato; stylo bifido basi bulboso. In ins. Mauritii etc.

162. *C. nepalensis* Spr. fol. anguste gramineis; spicis 4 pedunculatis gracilibus apice masculis; fructibus ellipticis longe rostratis hispidulo-scabris, rostro bifido lobulis subulatis. In Nepatia. 4.

163. *C. pichinchensis* H. et. K. spicis paniculatis cylindricis apice masculis; squamis ovato-oblongis acutis glabris; fructibus ovato-oblongis compressis apice bidentatis glabris. In Quito. 4.

164. *C. pallida* C. A. Mey. cyp. t. 8. spiculis approximatis intermediis masculis; stigmatibus 2; perigyniis ovatis glabris marginatis serrulatis rostratis ore bifidis gluma acuta longioribus. In Kamtschatka.

165. *C. propinqua* Nees; spica ovata densa; spiculis 5—6-nis contiguis; fructibus ovatis marginatis bidentatis ciliato-serratis; squamis ovatis acutis. In Chili. 4.

166. *C. muskingumensis* Schweinitz; spiculis androgynis; ovali-oblongis acutis suboctonis; fructibus lan-

ceolatis compressis alatis nervosis
glabris acuminatis bidentatis, squama
ovata lanceolata plus duplo longiori-
bus. Dewey journ. 10. t. L. f. 35.
In Am. bor.

167. *C. foena* Willd. Dewey journ.
10. t. S. f. 60. spiculis 4-nis inferne
masculis approximatis; fructibus ova-
tis acuminatis marginatis bidentatis
squamatam oblongam lanceolatam sub-
aequantibus. *In Am. bor.* 4.

168. *C. straminea* Willd. spiculis
sub-5-nis subrotundis inferne masculis
approximatis; fructibus subrotundo-
ovatis rostratis bidentatis margine ci-
liato-serratis squama lanceolata ma-
joribus. Schk. t. G. f. 34. et tab. N.
f. 45. *In Am. bor.* 4.

169. *C. inversa* R. Br. spica com-
posita; spiculis ovatis 2-3, involu-
cratis basi masculis; squamis acumi-
natis; fructibus plano-convexis acu-
mine bidentata. *In Nor. Holl.* 4.

170. *C. scirpoidea* Schk. t. Zzz.
f. 180. spiculis 4-nis ellipticis inferne
masculis; fructibus ovatis bidentatis
compressis margine ciliato - serratis
erectis; squamis ellipticis obtusis. *In*
Am. bor. 4.

171. *C. sterilis* Schk. t. Mmm. f.
146. spicis sub-6-nis alternis oblon-
gis contiguis; fructibus ovatis com-
presso-triquetris acuminatis apice re-
curvis bicuspidatis margine ciliato-
serratis. *In Am. bor.* 4.

172. *C. festucacea* Schk. t. Wwww.
f. 173. spica composita; spiculis 8-nis
inferne masculis cylindricis; fructibus
subrotundo-ovatis marginatis rostra-
tis bidentatis. *In Am. bor.* 4.

173. *C. tenera* Dewey journ. 10.
t. C. f. 3. spicis subquinis obovatis
alternis sessilibus infima bracteata;
fructibus ovatis compressis rostratis
subalatis nervosis ciliato - serratis
squama oblonga lanceolata longiori-
bus. *In Am. bor.* 4.

174. *C. similis* Urville; fol. linea-
ribus apice subulatis culmo longiori-
bus; spiculis inferne masculis subsenis
sessilibus ellipticis, squamis ovatis
acutiusculis squarrosis, nervo viridi.
In ins. Maclovianis. 4.

175. *C. tenuiflora* Wahlenb. Schk.
t. Eeee. f. 187. spiculis 3 subrotundo-
ellipticis inferne masculis; fructibus
ellipticis obtusis compressis, bractea
ovata cuspidata ad basin spiculae in-
terioris. *In Lapponia.*

176. *C. disperma* Dewey journ. t.
A. f. 3. (Spr. 3. 808) spicis 5 subre-
motis plerumque bifloris infima bra-
cteata; fructu ovato subobtuso nervoso
glabro margine scabro gluma ovata
duplo longiore. *In Am. bor.* 4.

177. *C. trisperma* Dewey journ.
t. C. f. 12. spiculis ternis remotis ses-
silibus ovatis apice femineis; fructi-
bus oblongis acutis vel rostratis plano-
convexis ore integerrimis multinerviis
apice subscabris squama hyalina lon-
gioribus. *In Am. bor.* 4.

178. *C. sibirica* Willd. spica com-
posita spiculis 4-nis approximatis in-
ferne masculis; fructibus ellipticis com-
pressis obtusissimis. *In Siberia.* 4.

179. *C. eteusinoides* Turcz. spicis
linearibus approximatis; perigyniis el-
lipticis glabris rostellatis ore subin-
tegro gluma obtusa longioribus. *In*
Baical. 4.

180. *C. lenticularis* Michx. spica
inferne mascula; fem. 2. pedunculatis
erectis; fructibus ovato-ellipticis ro-
stellatis ore integro membranaceis
nervosis glabris squamatam ellipticam
obtusam $\frac{1}{2}$ superantibus. *In Am. bor.* 4.

181. *C. Nora-Angliae* Schwein.
Dewey journ. 10. t. B. f. 7. spicis
distinctis; spica staminifera brevi,
fructiferis 3-4 subremotis sessilibus
ovatis brachiatis; fructibus ovato-3-
quetris subventricosis rostratis pu-
bescensibus squama ovata mucronata
paulo longioribus. *In Am. bor.* 4.

182. *C. floridana* Schwein. Dewey
jour. 10. t. 22, 23. spica masc. ses-
sili parva; fem. 4-nis aggregatis ova-
tis infima saepe remota; fructibus ova-
libus basi attenuatis compressis rostra-
tis breve bifidis squamae scabro-eu-
spidatae aequalibus. *In Florida.* 4.

183. *C. aurea* Nutt. spicis fem. 3-
nis oblongis laxifloris subpendulis;
fructibus obovatis v. pyriformibus ob-
tusis nervosis gluma oblonga ovata
acuta longioribus. *In Am. bor.* 4.

184. *C. acaulis* Urville. spica ma-
scula unica terminali ovata, squamis
lanceolatis acutis; staminibus mona-
delphis; femineis 3-nis ovato-globosis
subpedunculatis inter folia linearia
subimmersis; squamis ovato-oblongis
1-nerviis. Brongn. in Dup. voy. t. 28.
f. a. *In ins. Maclovianis.* 4.

185. *C. antucensis* Kunze; fol.
sulcato - nervosis complicatis; spica
mascula solitaria, femineis 3 cylin-

dricis obtusis, iufima longe pedunculata; utriculis ellipticis brevissime rostellatis compressis obsolete nervosis glabris, rostello truncato. In Chili. 2.

186. *C. caespititia* Nees in Wight; spicis fem. 3 appressis cylindricis; bracteis foliaceis; culmi 3-quetri angulis foliisque margine scaberrimo-serrulatis; fructu glabro obtuso ore integro; squamis masculis utrinque vitta ferruginea notatis. In Sibet. 2.

187. *C. aquatilis* Wahleb. spicis subsessilibus sublinearibus incrassato-clavatis; fructibus ellipticis brevissime rostratis ore integerrimis squamam rotundam aequantibus. In Am. bor. 2.

188. *C. hispida* Schk. t. S. f. 64. spicis masc. sub-5-nis fem. 4-nis cylindricis remotis; fructibus ellipticis compressis hispidis rostratis ore hidentatis squama aristata brevioribus. In Barbaria. 2.

189. *C. crinita* Lam. Schk. t. Eee. f. 125 et Ttt. f. 164. spicis masc. 2, fem. 4, pedunculatis pendulis cylindricis; fructibus subrotundo-ellipticis ventricosis rostellatis ore integris squama oblonga aristata brevioribus. In Am. bor. 2.

190. *C. cryptocarpa* C. A. Mey. cyp. t. 14. spicis masculis subternis; feminis subternis pedunculatis nutantibus; perigyniis glabris granulatis ellipticis compressis rostellatis gluma oblonga obtusa duplo brevioribus. In Kamtschatka.

191. *C. Gaudichaudiana* Kunth; spica mascula solitaria longe pedunculata, feminis sessilibus cylindricis; utriculis ellipticis brevissime rostellatis compressis nervosis punctulatis glumam ovato-oblongam mucronatam superantibus. In Nov. Holl. 2.

192. *C. longicurvis* Nees in Wight; spiculis compositis laxis apice masculis; stigmatibus capillaribus praelongis; fructibus ovalibus biconvexis rostratis glabris junioribus margine ciliato serratis; squamis fem. ovato-oblongis luteo-rufis culmo gracilli; fol. superne scaberrimis. In Nepalia. 2.

193. *C. longipes* Don nep. spicis pluribus alternis anguste cylindricis laxis apice masculis basi quandoque compositis pedunculo longe exerto; fructibus late ovalibus glabris nervoso-striatis longe rostratis rostro serrato-scabro apice bifido; squamis oblongis aristatis flavis. In Nepalia. 2.

194. *C. lenta* Don; digyna; vaginis elongatis pedunculo brevioribus; spicis filiformibus cernuis apice masculis glumis ellipticis acutis; arillis ovatis striatis rostratis. In Nepalia. 2.

195. *C. anthericoides* Presl. spiculis apice masculis densis plurimis oblongo-lanceolatis; glumis ovatis acuminatis nervosis; fructu ovato plano-convexo marginato serrato bifido rostrato; fol. latiusculis margine scabris. In Nootkasund. 2.

196. *C. densiflora* Presl. spiculis apice masculis densis in spicam ramosam dispositis; glumis aristatis, fem. subrotundis; masculis ovato-lanceolatis; arista scabra; ovario oblongo compresso striato bidentato; fol. latiusculis scabris. In ins. Mariae Annae. 2.

197. *C. geminata* Schk. t. W. P. p. f. 75. spicis masc. 3 pedunculatis, androgynis sub-8-nis pedunculatis pendulis remotis apice masc.; caps. subglobosis brevissime rostratis ore in divisis; squama lanceolata mucronata. In Nov. Seelandia. 2.

198. *C. chlorantha* R. Br. spicis 5-6 indivisis bracteam scariosam subaequantibus apice masculis; squamis acutis; culmo foliisque scabro. In Nov. Holl. 2.

199. *C. parva* Nees in Wight; spicula androgyna obconica; fructibus conico-subulatis ore oblique truncato; squamis fem. inferis paucis ovatis obtusis acuminine longo setaceo; culmo striato. In Nepalia. 2.

200. *C. exitis* Dewey. journ. t. Q. f. 53 et 54. unispicata androgyna et dioica gracilis setaceo-foliosa; fructibus ovato-lanceolatis utrinque convexis divergentibus serrulato marginatis squama ovata acuta paulo longioribus. In Am. bor. 2.

201. *C. remotiuscula* Wahlenb. spica androgyna composita, spiculis alternis sub-6-nis; fructibus ovato-oblongis acuminatis bifidis compressis ancipitibus; bractea spiculae inferiores foliacea longissima. In Siberia. 2.

202. *C. Deweyana* Schwein. spiculis subternis sessilibus ovatis alternis apice feminis; fructibus oblongo-lanceolatis rostratis acuminatis bifurcatis margine subscabris, squama oblongo-lanceolata aristata hyalina paulo longioribus. Dewey journ. 10. t. C. f. 11. In Am. bor.

203. *C. gibba* Wahlenb. spica composita, spiculis alternis remotis bracteis foliaceis longissimis suffultis; fructibus compressis bifidis squama longioribus. *C. remota* Thunb. In *Japonia*. 4.

204. *C. mutica* R. Br. spica mascula solitaria, squamis obtusis, femineis 3 distantibus pedunculis erectis; capsulis ovalibus muticis squama ovata mucronata longioribus. In *Am. arct.* 4.

205. *C. physocarpa* Presl. (rel.) spiculis masc. terminalibus 2—3, fem. 3-nis cylindricis; glumis oblongis acutis; fructu ovoideo inflato rostrato bidentato nervoso; culmo 3-quetro scabro fol. breviore. In *Nootkasund*. 4.

206. *C. chilensis* Brongn. 3-pedalis; fol. linearibus longissimis; spicis fem. quaternis oblongis sessilibus, mascula cylindrica; squamis fem. lanceolato-subulatis urceolum fusiformem acutum bidentatum superantibus, masculis acutissimis. In *Chili*. 4.

207. *C. phacota* Spr. spicis cylindricis sub-5-nis nutantibus inferioribus fem. terminalibus masculis; fructibus obovatis cuneatis rostellatis papilloso-micantibus depresso, squamis obcordatis setaceo-aristatis; culmo angustissimo 3-quetro. In *Nepalia*. 4.

208. *C. notha* Kunth (*C. punctata* Nees) spica masc. solitaria, fem. 3 cylindricis fastigiatis; bracteis setaceis auriculatis; fructibus ovalibus convexis 5-nervibus glabris sanguineopunctatis, squamis ovatis obtusis; fol. margine scaberrimis. In *Nepalia*. 4.

2. *Stylus trifidus.*

a. *Spicae solitariae divisae.*

209. *C. aphylla* Kunth; culmis caespitosis teretibus aphyllis; spica oblique inserta bractea spathiformi suffulta; utriculis oblongis compressis acute bidentatis ciliolatis; stigmatibus longissimis; squamis 3-nerviis hyalino-albidis. In *Chili*. 4.

210. *C. Michauxii* Schwein. Dewey 14. t. R. f. 56. (*C. scirpoidea* Michx.) dioeca; culmis caespitosis scabris; spica fem. solitaria erecta cylindrica nuda; fructibus oblongis rostratis triangularibus membranaceis hirsutis squamam ellipticam ciliatam aequantibus. In *Am. bor.* 4.

b. *Spica mascula solitaria.*

211. *C. setifolia* Kunze; culmis caespitosis filiformibus; spica ovata superne mascula; utriculis obovato-pyriformibus obtusangulis binerviis ore bilobo minutissimo pilosis hirtellisque. In *Chili*. 4.

212. *C. Fraseriana* Bot. Mag. t. 1391. spica simplici androgyna superne mascula; fructibus ovatis ventricosis divaricatis; culmo vaginato, vagina suprema cucullata foliacea. *C. Fraseri* Andr. rep. t. 639. In *Am. bor.* 4.

213. *C. polytrichoides* Mühlb. Schk. t. III. f. 138. spica superne attenuata; fructibus oblongo-lanceolatis compresso-triquetris obtusis emarginatis; squamis oblongis obtusis mucronatis. *C. microstachya* Michx. In *Am. bor.* 4.

214. *C. affinis* R. Br. spica androgyna simplici superne mascula; squamis lanceolatis acutis muticis, infima aristata. In *Am. arctica*. 4.

215. *C. nigricans* C. A. Mey. cyp. t. 7. spica oblonga superne mascula; perigyniis stipitalis patulis laevissimis ovatis rostratis ore scarioso bilobis glumam obtusam aequantibus. In *Unalaschka*. 4.

216. *C. obtusata* Liljeblad (*C. microcephala* Ledeb. ill. t. 319.) spica androgyna simplici pauciflora, superne mascula; fructibus subquaternis ellipticis nitidis striatis emarginatis squama lanceolata majoribus. In *Oelandia et Siberia*. 4.

217. *C. circinata* C. A. Mey. cyp. t. 6. spica superne mascula; perigyniis erectis oblongo-lanceolatis ore truncatis margine hispidis glumam obtusam superantibus; fol. rigidis circinatis. In *Unalaschka*. 4.

218. *C. attenuata* R. Br. spica androgyna simplici superne mascula densa; fem. paucioribus alternis; squamis omnibus obtusis. In *Am. arct.* 4.

219. *C. filifolia* Nutt. spica superne staminifera subcylindrica acuta; fructibus subglobosis ore integris cum squama retusa; fol. filiformibus involutis subulatis. Dewey journ. 10. t. P. f. 50.

220. *C. Sellowiana* Schlecht. fol. flaccidis; spica cylindrica superne mascula; bracteis oblongo-ellipticis cuspidato-acuminatis fructus e basi cuneata ovali-triquetri acuminati mar-

gine sursum subalati angustioribus.
In Brasilia.

c. Spicae plures aggregatae
v. distantes androgynae superne masculae.

221. *C. squarrosa* L. spica androgyna crassissima oblongo-cylindrica; fructibus imbricatis horizontalibus glabris subsquarrosis apice bidentatis glumis lanceolatis longioribus. Schwein. monogr. t. 27. f. 2. *In Am. bor.* 4.

222. *C. microcephala* Willd. spicis androgynis inferne masculis aggregatis ovato-capitatis; fructibus ovatis acuminatis bicuspidatis margine cartilagineo-serratis. *In Asia bor.* 4.

223. *C. virescens* Muehlenb. spica androgyna linearis pedunculata inferne mascula, fem. approximatis 2 subpedunculatis linearibus; fructibus globo-so-triquetris. Schk. t. Mmm. f. 147. *In Am. bor.* 4.

224. *C. dasycarpa* Muehlenb. Dewey journ. 11. t. M. f. 38. spicis distinctis, staminifera subsessili parva, fem. 3 approximatis oblongis; fructibus ovato-3-quetratis v. oblongis villosis nervosis, squama ovata acuminata longioribus. *In Carolina.* 4.

225. *C. triceps* Michx. spicis 3 ellipticis sessilibus, terminali androgyna inferne mascula, reliquis mere feminineis; fructibus pyriformibus trigonis apice perforatis glabris squamam oblongam acuminato-mucronatam aequantibus. *In Am. bor.* 4.

226. *C. hirsuta* Willd. spica oblonga pedunculata inferne mascula, fem. subternis subsessilibus oblongis; fructibus obovalis obtusissimis obtuse 2-quetratis; fol. vaginisque hirsutis. *In Am. bor.* 4.

227. *C. formosa* Dewey. journ. t. B. f. 6. spicis oblongis crassis secundis quaternis distantibus pedunculatis nutantibus; fructibus oblongis 3-quetratis subinflatis ore subintegro v. bilobo squama ovata acuta subduplo majoribus. *In Am. bor.* 4.

228. *C. infuscata* Nees; spicis 4-5 approximatis ovalibus sessilibus supra mascula; fructibus ovalibus gibboso-trigonis glabris mucrone brevi truncato squamas ovatas acutas fuligineo-nigras superantibus. *In Nepatia.* 4.

229. *C. Vahlii* Schk. t. Gg. f. 44. et Ppp. f. 154. spica androgyna pedunculata oblonga inferne mascula, fem. oblongis obtusis; fructibus subrotundo-ellipticis triquetris squama oblonga obtusa majoribus. Fl. dan. t. 403. *In Lapponia.* 4.

230. *C. melanantha* Ledeb. ic. t. 317. spicis subsenis confertis ovatis sessilibus; fructibus 3-gonis ellipticis rostellatis, ore hyalino integerrimo terminatis granulatis, glumam muticam aequantibus. *In reg. altaica.* 4.

231. *C. sabulosa* Turcz. spicis 4-nis sessilibus oblongis; utriculis anguste pyriformibus rostratis punctulatis glabris, squama elliptica acuta brevioribus, rostro bidentato angulis scabro. *In atp. Baical.* 4.

232. *C. caucasica* Stev. spica terminali basi mascula; fem. 4 pedunculatis infima remota; fructibus ellipticis compressis rostro bifido, squamam lanceolatam acuminatam longitudine aequantibus. *In Caucaso.* 4.

233. *C. parvibracteata* Wight; spicis 3-nis inferiore remota pedunculata; reliquis sessilibus; bracteis brevissimis subulatis; fructibus oblongis apice bidentatis, squamis ovatis aculis apice denticulatis fuscis carina viridi; culmo gracili fol. elongatis. *In Nepatia.* 4.

234. *C. asperula* Nees; spicis sub-5-nis pedunculatis cylindricis; bracteis foliaceis; fructibus ovalibus depresso-5-costatis subtilissime punctato-exasperatis, rostro anguste bidentato; squamis feminineis oblongis acutis, masculis lanceolatis. *In Nepatia.* 4.

235. *C. Gmelini* Hook. in Beech. voy. t. 27. spicis 4. pedunculatis, oblongis; squamis ovatis longe cuspidiatis capsulis ellipticis compressis striatis glaberrimis stipitatis, rostro brevi integro; bracteis foliaceis; culmo ad angulos scabro. Gmel. sib. 1. t. 30. f. 1. *In Kamtschatka.* 4.

236. *C. misandra* R. Br. spiculis 4-6 pedunculatis ovalibus pendulis terminali basi mascula; fructibus lanceolatis acuminatis bidentatis margine denticulatis squama ovali longioribus. *In ins. Melville.* 4.

237. *C. magellanica* Lam. Schk. t. N. f. 51. spicis androgynis 3-4 pedunculatis confertis inferne masculis nutantibus; fructibus subrotundo-ovatis obtusis; squamis ovatis acuminatis

mucronatis. *Ad fretum magellanicum.* 2.

238. *C. Washingtoniana* Dewey journ. 10. t. D. f. 14. spica staminifera solitaria erecta, fructiferis oblongo-cylindricis subsparsifloris; fructibus ovatis utrinque acutis compressis breve rostratis squamam ovatam acutam aequalibus. *In Am. bor.* 2.

239. *C. parviflora* C. A. Mey. spicis subternis ellipticis confertis sessiliibus terminali basi mascula; utriculis rostratis punctulatis glabris squamam ovatam acutam paulo superantibus rostro bidentato. *In Caucaso et alp. Baical.* 2.

c. Spica mascula solitaria, femineae 1—3 plerumque sessiles. Utriculi membranacei pubescentes v. villosi.

240. *C. Meyeriana* Kunth. spicis femineis subbinis ovato-subrotundis approximatis sessilibus infima brevissime pedunculata; perigyniis ellipticis erostriatis puberulis gluma oblonga obtusiuscula paulo longioribus. *C. asperula* Turezn. *In Alp. Baical.* 2.

241. *C. sabynensis* Lessing. spica mascula cylindrica, femineis 1—2 ellipticis, inferiore pedunculata; squamis masculis obtusis glabris; utriculo pyriformi breviter rostrato 3-gono pubescente viridi ore bidentato fuscescente. *In Mongolia chinens.* 2.

242. *C. Royleana* Nees; spica masc. solitaria, fem. sub-3-nis cylindricis, inferiore incluse et breve pedunculata; bracteis foliaceis; fructibus ovatis subrostratis bidentatis pubescentibus squamam ovalem subulato-cuspidatam aequalibus; culmo gracili. *In Nepalia.* 2.

243. *C. varia* Muehlenb. Schk. t. Uuu. f. 167. spicis fem. subternis approximatis sessilibus subglobosis; fructibus globoso-3-quertris rostratis bidentatis pubescentibus squama oblonga brevioribus. *In Pennsylania.* 2.

244. *C. collecta* Dewey journ. 10. t. N. f. 44. spica mascula erecta laxe imbricata gracili, femineis subternis ovatis paucifloris; fructibus ovatis rostratis subbidentatis subpubescentibus, squama ovata acuta paulo longioribus. *In Am. bor.* 2.

245. *C. nimbellata* Schk. t. Wvv. f. 171. spica masc. solitaria, fem. 3,

8-floris ovatis verticillatis; fructibus ovatis pubescentibus rostratis ore integris squamam ovato-lanceolatum aequalibus. *C. β vicinia* Dewey t. D. f. 13. *In Am. bor.* 2.

246. *C. tucorum* Willd. spicis fem. 2—3 bractea foliari fultis ellipticis sessilibus; fructibus subtomentosis rostro elongato bifido squamam acutam aequalibus. *In Am. bor.* 2.

247. *C. marginata* Muehlenb. Schk. t. Lll. f. 143. spicis fem. subgeminis approximatis subglobosis; fructibus globosis tomentosis bidentatis squama oblonga-ovata majoribus; fol. radicalibus annotinis. *In Am. bor.* 2.

248. *C. concinna* R. Br. spica mascula sessili cylindrica; femineis 3-nis subsessilibus; capsulis trigono-ovatis rostellatis pubescentibus squamis obovatis duplo brevioribus. *In Am. arct.* 2.

249. *C. peruriana* Presl. spicis subsessilibus cylindricis multifloris; glumis ovatis aristatis trinerviis fructu subancipiti rostrato striato glaberrimo brevioribus; culmo foliisque 3-quertris. *In Peruvia.* 2.

250. *C. indecora* Kunth; spicis femineis 1-nis incluse pedunculatis cylindrico-oblongis; utriculis ovatis oblongis rostellatis enerviis ferrugineis glabris angulis scabris squamam subrotundam aristato-mucronatam paulo superantibus; rostro fisso. *In ins. Maclov.* 2.

251. *C. diluta* Bieb. spicis fem. 4-nis oblongis superioribus incluse pedunculatis; fructibus 3-quertrō-ovalis rostellatis bidentatis, squamis ovatis acutis sublongioribus. *In Iberia.* 2.

252. *C. distenta* Kunze; spica mascula cylindrica femineis 3 distantibus cylindrico-oblongis superiore sessili; utriculis membranaceis subnervosis glabris, superne ad angulos scabriusculis attenuato-rostratis, rostro truncato. *In Chilli.* 2.

253. *C. plantaginea* Lam. Schk. t. Kkkk. f. 195. spicis fem. 4 pedunculatis distantibus; fructibus ellipticis 3-quertris pedicellatis glabris squama ovata cuspidata brevioribus; fol. 3-nerviis. *C. latifolia* Schk. t. U. f. 60. *In Am. bor.* 2.

254. *C. conoidea* Schk. t. Vvv. f. 168. spicis fem. 2. remotis supra sessilibus infima longe pedunculata; fructibus oblongo-conicis obtusis squa-

mam aequantibus. *C. tetanica* Schk. t. Ggg. f. 100 et Oooo. f. 127. In Am. bor. 4.

255. *C. granularioides* Schwein. spica mascula oblonga pedunculata; feminineis 2—3 oblongis densifloris suprema sessili; fructibus oblongis glabris ore integro squama ovato-subulatis paulo longioribus. Dewey journ. 10. t. A. f. 4. In Am. bor. 4.

256. *C. blanda* Dewey t. K. f. 33. spica mascula erecta 3-quetra; feminineis oblongis cylindricis paucifloris, suprema sessili, pedunculo auncipiti; fructibus ovalibus sub-3-quetris. In Am. bor. 4.

257. *C. digitalis* Willd. spicis fem. subternis remotis filiformibus pedunculatis cernuis; fructibus ellipticis obtusis squama oblongo-lanceolata longioribus. Schwein. monogr. t. 36. f. 1. In Am. bor. 4.

258. *C. gracillima* Schwein. Dewey journ. 10. t. J. f. 28. spicis longis gracilibus 4-nis pedunculatis suprema inferne mascula; fructibus oblongis 3-quetris obtusis ore oblique subbilobo; squama oblonga obtusa aristata majoribus. In Am. bor. 4.

259. *C. pubescens* Muehlenb. Schk. t. Eee. f. 126. spicis fem. 4 sessilibus, infima exserte pedunculata; fructibus ovato-3-quetris pubescentibus rostratis bidentatis squama oblongo-mucronata longioribus; fol. pubescentibus. In Am. bor. 4.

260. *C. scabrata* Schwein. Dewey. journ. 10. t. K. f. 32. spica masc. 3-quetra, fem. sub-5-nis subremotis exserte pedunculatis cylindricis alternis suberectis cum longis foliaceis bracteis instructis; fructibus ovato-oblongis subventricosis bifidis, squama ovato-lanceolata ciliata longioribus. In Am. bor. 4.

261. *C. anceps* Muehlenb. spica masc. solitaria, fem. 3 remotis, inferioribus pedunculatis; fructibus ovatis nervosis ore membranaceis squama oblonga mucronata longioribus. Dewey journ. 10. t. N. f. 47. *C. plantaginea* Muehlenb. In Am. bor. 4.

262. *C. oligocarpa* Schr. t. Vvv. f. 170. spicis fem. 3—5-floris cylindricis; fructibus subrotundo-triquetris obovatis rostellatis ore integris squama oblonga mucronata longioribus. In Am. bor. 4.

263. *C. chersokensis* Schwein. Dewey journ. 10. t. L. f. 34. spicis masc. ternis feminineisque 4-nis cylindricis; fructibus ovatis glabris subtriquetratis subcompressis nervosis longe rostratis bifidis squama ovata paulo majoribus. In Am. bor. 4.

264. *taxiflora* Lam. spicis fem. 3, 6—8-floris distantibus, infima remota pedunculata; fructibus oblongis ventricosis obtusis, squama ovata mucronata majoribus. *C. pauperata* Michx. In Am. bor. 4.

265. *C. Hitchcockiana* Dewey journ. 10. t. E. f. 17. spica mascula erecta pedunculata; feminineis 3-quetro-ovalibus inflatis striatis squamam oblongam v. ovatam mucronatam subaequantibus. In Am. bor. 4.

266. *C. granularis* Muehlenb. Schk. t. Vvv. f. 169. spicis fem. 3 remotis 2 inferieribus pedunculatis; fructibus globoso-ovatis nervosis ventricosis rostellatis ore obsolete emarginato. In Am. bor. 4.

267. *C. striata* R. Br. spicis fem. 2—3 cylindricis erectis tertiae pedunculo vaginam longam superante, squamis acuminato-aristatis; fructibus globosis multinerviis; rostro brevisimo. In Nov. Holl. 4.

268. *C. psychrophila* Nees; spicis fem. 3-nis, inferiore longe pedunculata cernua; bracteis foliaceis; fructibus ovalibus 3-gonis rostratis glabris squamam oblongam ovatam nigram superantibus; culmo acuto 3-quetro scabro. In Nepalia. 4.

269. *C. cruenta* Nees; spicis cylindricis nutantibus; bracteis foliaceis decrescentibus; fructibus oblongo-lanceolatis acuminatis bidentatis atro-sanguineis glabris; culmo gracili compresso-triquetro. In Kamaon. 4.

270. *C. coriophora* Fisch. et Mey. spica mascula cylindracea oblonga; fem. 2—6 longe pedunculatis pendulis ellipticis; utriculis ellipticis acuminato-rostratis compressis hyalino-albidis margine viridibus superne hispidulis, rostro acute bidentato; ovario longo stipitato. In Dahnria. 4.

271. *C. tristis* Bieb. bracteis foliaceis; spicis masculis 2, fem. 3 distantibus cylindricis longe pedunculatis; fructibus glabris margine hispidis oblongis acutis ore hyalino subbilobo, glabris obtusa sub longioribus. In Caucaso. 4.

272. *C. chlorostachys* Stev. spicis fem. 3-nis exserte pedunculatis; fructibus lanceolato-3-quetris apice membranaceo subhilobo squama ovata obtusissima membranaceo-marginata longioribus. *In Caucaso.* 2.

273. *C. juncea* Willd. caule 3-quetro laevi sol. angustis margine scabris; spicis fem. 2—4 infima longe pedunculata filiformibus; valvis oblongis obtusis carina saepe ciliato-scabris, fructibus oblongis rostro longo dentato margine et nervis ciliato-scabris. *In Caucaso.* 2.

274. *C. refracta* Schk. t. III. f. 136. spica feminea solitaria pedunculata nutante filiformi; stigmatibus 3; fructibus ovatis acuminatis ore obliquis squamam ovatam mucronatam subaequantibus. *In Pennsylvania.* 2.

275. *C. Torreyana* Dewey. (Spr. cur. 312.) spicis femaleis ternis oblongis sparsifloris remotis pedunculatis subpendulis; fructibus oblongis basi subattenuatis subinflatis subtriquetris nervosis acutis ore bilobo; squamis oblongis scabro aristatis. *C. aristata* Dewey t. A. f. 1. *In Am. bor.* 2.

276. *C. Grayana* Dewey journ. 10. t. S. f. 59. spica masc. oblonga; femaleis subbinis oblongo-cylindricis pedunculatis; fructibus ovato-oblongis subinflatis subtriquetris ore integris squama oblonga obtusa longioribus. *In Am. bor.* 2.

277. *C. miliacea* Muehlenb. Schk. t. Ooo. f. 151. spicis fem. 3 filiformibus summa subsessili reliquis pedunculatis; fructibus ovatis 3-quetris breve rostratis ore integris squama oblonga emarginata aristata longioribus. *In Am. bor.* 2.

278. *C. fusiformis* Nees; spicis masc. subbinis, fem. 4-nis remotis filiformibus laxis; bracteis foliaceis; fructibus fusiformibus attenuato-rostratis squama ovali mucronulata duplo longioribus ore membranaceo bidentato; culmo elongato gracili. *In Nepalia.* 2.

279. *C. hebecarpa* C. A. Mey. cyp. t. 12. spicis fem. 5-nis filiformibus inferioribus exserte pedunculatis; perigyniis pubescentibus oblongis 3-quetris rostratis bidentatis glumam mucronatum superantibus. *In Nepalia.* 2.

280. *C. flexuosa* Muehlenb. Schk. t. Ddd. et Aaaa. f. 124. spica masc. solitaria; fem. 4-nis remotis filiformi-

bus pedunculatis cernuis; fructibus distantibus alternis oblongis rostratis bifidis squama ovata mucronata duplo longioribus. *In Am. bor.* 2.

281. *C. longifolia* R. Br. spicis cylindricis pendulis indivisis; pedunculis capillaribus inferioribus 4—5 nis superioribus 3—2-nis solitariis; fructibus nervosis. *In Nov. Holl.* 2.

282. *C. tristachya* Thunb. spica masc. solitaria linearis incluse pedunculata; fem. binis linearibus approximatis incluse pedunculatis; fructibus oblongis emarginatis. *In Japonia.* 2.

283. *C. albicans* Willd. spica mascula solitaria, fem. 3, lanceolatis approximatis; fructibus lanceolatis squamam nitide albam subaequantibus. *In Carolina.* 2.

284. *C. pediformis* C. A. Mey. cyp. t. 10. spicis fem. 3-nis linearibus; fructibus 3-gono-ovovalis oblique rostratis pubescentibus glumam acutam mucronatam aequantibus; bracteis cupidatis. *In Kamtschatka.* 2.

d. Spica terminalis mascula reliquae feminiae.

285. *C. camtschaticense* Kunth. spica mascula oblonga, fem. subbinis remotis pedunculatis; perigyniis subglobosis hispidulis rostro longissimo cuspidato margine hispido glumam cuspidatam aequantibus. *C. longirostrata* C. A. Mey. cyp. t. 12. *In Kamtschatka.* 2.

286. *C. phyllostachys* Mey. spica solitaria interrupta apice mascula; fem. 2—3 1-floris; perigyniis glaberrimis ovato-trigonis acutis ore membranaceo truncato; glumis inferioribus foliaceis longissimis. *In Talysh.* 2.

287. *C. Steudelii* Kunth. caespitosa; culmis abbreviatis; fol. longissimis; spicis 2 longissime pedunculatis, floribus 2—3 infimis femaleis; utricle pyriformibus longerostratis subtrigonis binerviis, squamam aristatam superantibus. *C. disperma* Steud. *In Miami (Ohio).* 2.

288. *C. Willdenovii* Schk. t. Mmm. f. 145. spica androgyna simplici superne mascula; fructibus alternis oblongis tereti-3-quetris scabris acuminatis; squamis ovatis acuminatis, infima foliacea. *In Am. bor.* 2.

289. *C. pedunculata* Muehlenb. Schk. t. Ggg. f. 131. spicis androgynis sub-4-nis pedunculatis remotissimis superne masculis erectis; fructibus obovatis 3-questris obtusis; squamis oblongis obtusis mucronatis. *In Am. bor.* 4.

290. *C. nigromarginata* Schwein. Dewey journ. t. H. f. 27. spica masc. solitaria sessili; fem. 2 ovatis sessilibus masculae arcte approximatis; pedunculis longis radicalibus 3-nis e radice ortis; fructibus ovatis subtri-questris rostratis bidentatis pubescen-tibus. *In Pennsylvania.* 4.

291. *C. macella* Kunth; culmis caespitosis filiformibus; spicis 3—5 longe pedunculatis infima subradicali cylindricis superne masculis; utriculis oblongis obtusis 3-gonis binerviis nervis pubescentibus. *In Montevideo.* 4.

292. *C. moesta* Kunth; repens; culmis glabris fol. anguste gramineis; spicis 3—4 una terminali folio subulato suffulta, infima radicali cylindrica; utriculis oblongis obtusis ore obtuse bidentato puberulis. *In Montevideo.* 4.

293. *C. phalaroides* Kunth; re-pens, culmis adscendentibus; fol. glau-cis apice denticulato-scabris; spicis 6 longe pedunculatis cylindrico-ob-longis; utriculis immaturis pyriformi-bus obtusis ore integro puberulis. *In Brasilia.* 4.

e. *Spiae masculae* 2—3 femi-neae totidem.

Squamae feminineae aristatae. Utriculi rostrati, rostro bi-cuspidato. Utriculi hirto-pilosii.

294. *C. pellita* Muehlenb. spicis masc. 3, fem. 2 cylindricis erectis remotis superiore sessili; fructibus ovatis bifidis pilosis squama oblonga cri-stata brevioribus. *In Am. bor.* 4.

295. *C. Wallichiana* Wight; spicis masc. 3-nis, fem. 2 remotis sub-sessilibus erectis cylindricis; bracteis foliaceis longis; fructu bidentato hirto; squamis oblongo-lanceolatis acumina-tis subaristatis; masculis repandis. *In Ind. or.* 4.

296. *C. Fedia* Nees; spicis masc. feminineisque 3-nis his cylindricis di-stantibus, inferiore exserte peduncu-

lata; fructibus ovato-ventricosis brevi-rostribus hirtis apice obliquis 2—3-lobis squamam ovalem cuspidatam ae-quantibus sed duplo latioribus. *In Nepalia.* 4.

297. *C. trichocarpa* Muehlenb. spicis masc. 3; fem. 2 pedunculatis erectis cylindricis remotis, fructibus ovatis acuminatis bicupidatis pilosis squama ovata lanceolata aristata lon-gioribus. *In Am. bor.*

f. *Spiae masculae* 2 fem. 3
subsessiles.

298. *C. lutensis* Kunth; culmo su-perne foliisque serrulato-scabris glau-cescentibus; spica mascula cylindrica longe pedunculata feminine distantibus; utriculis patent-recurvis obovatis 15-nerviis, rostro bicupidato. *In P. b. S.* 4.

299. *C. Hookeri* Kunth; bracteis foliaceis elongatis inferiore vaginata; spicis sterilibus 2—3 sessilibus, squa-mis oblongo-lanceolatis, fertilibus cy-lindricis acutis, infima pedunculata; fructu lanceolato striato hispido rostro bifido. *In Conception.* 4.

300. *C. incrassata* Schlecht. spicis cylindricis crassis superioribus 4—10 masculis; rhizome repente; fol. la-tis longissimis margine serrulato-scabro; culmo polystachyo; fructibus ovato-elongatis apice furcato bidentatis glabris. *In Brasilia.* 4.

301. *C. orthostachys* C. A. M. in Ledeb. ic. t. 324. bracteis foliaceis longissimis; spicis masc. 3-nis fem. 3-nis distantibus cylindricis erectis; fructibus glaberrimis erectis ovato-ob-longis subtrigonis nervosis rostratis bicupidatis; vaginis villosis. *In Altai.* 4.

302. *C. procera* Kunth; culmis triquetris; vaginis fissis; spica masc. solitaria, feminine 6 cylindricis ses-silibus; utriculis oblongis bicouvezis ore bidentatis membranaceis squamam aristatam subacquantibus. *In Brasilia.* 4.

303. *C. iridifolia* Kunth; caespi-tosa culmo folioso glabro; spicis ma-sculis 3, feminine totidem cylindricis, infima longe pedunculata pendula; squamis masculis emarginato-bilobis. *In P. b. S.* 4.

304. *C. glaucescens* Ell. Dewey journ. 10. t. M. f. 39. spicis feminine

3—4 cylindricis pedunculatis demum pendulis; fructibus ovatis compressis enervibus glaucis squamam emarginatam mucronatam subaequantibus; fol. glaucescentibus. In Am. bor. 2.

g. Spicae masculae 1-3, fem. 1-4, Urticuli ventricosi birostrati nervosi glabri.

305. *C. clavata* Thunb. spicis masculis solitariis geminis 3-nive, femineis totidem pedunculatis cylindricis densis; fructibus lato-ovatis depresso-inflatis rostratis bidentatis squamam ovalem setaceo-mucronatam subaequantibus. In P. b. S. 2.

306. *C. bullata* Schk. t. Uuu. f. 166. spicis masc. 3 femineis 2 cylindricis pedunculatis suberectis; fructibus ovato-globosis rostratis bifurcatis, rostro hispidis squama lanceolata majoribus. In Am. bor. 2.

307. *C. rostrata* Muehlenb. spica mascula solitaria; squamis oblongis longissime aristatis, fem. 2 cylindricis, infima exserte pedunculata; fructibus ovatis inflatis 5-nerviis rostratis ore bidentatis. *C. tentaculata* Schk. t. Ggg. f. 130.

308. *C. hystericina* Muehlenb. Schk. t. Fff. f. 127. squamis spicae masculae ovato-oblongis mucronatis, femineis 2 cylindricis infima pedunculata; fructibus ovatis multinerviis rostratis ore bifidis squama oblonga aristata longioribus. In Am. bor. 2.

309. *C. lupulina* Muehlenb. Schk. t. Ddd. f. 123 et t. Iii. f. 194. spica masc. solitaria; femineis 3 incluse pedunculatis oblongis approximatis; bracteis longissimis foliaceis; fructibus ovatis ventricosis nervosis longissime conico-rostratis, squama ovata multoties longioribus. In Am. bor. 2.

310. *C. Frankii* Kunth; repens stolonifera; spica mascula solitaria; femineis 5 cylindricis squarrosis, infima remota longe pedunculata; utriculis patentissimis pyriformibus 3-gonis inflatis squama aristaeformi brevioribus. In Baltimore. 2.

311. *folliculata* L. Schk. t. N. f. 52. spica masc. solitaria, feminea sub-6-flora subsolitaria exserte pedunculata; fructibus ovatis ventricosis nervosis rostratis ore bipartitis squama ovata longioribus. In Am. bor. 2.

312. *C. Elliotti* Dewey journ. t. M. f. 50. spica mascula solitaria praelonge bracteata; spicis femineis 3 subrotundis suprema apice mascula, infima longissime pedunculata cernua; fructibus ovatis glabris punctulatis nervosis longe rostratis bifurcatis, squama ovata obtusa longioribus. In Am. bor. 2.

313. *C. oligosperma* Michx. fol. involuto-junceis; spicula feminea unica globulari sessili, bractea setacea spicam masculam linearem quandoque duplcem aequante; fructibus paucisimis turgido-ovatis. In Am. bor. 2.

314. *C. Quesiana* Dewey journ. 14. t. Q. f. 55. spica mascula solitaria oblonga gracili; femineis subbinis ovatis; fructibus ovatis 3-quertris subinflatis glabris ore integris squama ovata longioribus. In Am. bor. 2.

315. *C. xantsophysa* Wahlenb. Dewey journ. 7. t. D. f. 15. R. f. 57 et 58. spica mascula solitaria, femineis crassis subternis distantibus laxifloris ovatis pedunculatis; fructibus oblongo-conicis inflatis magnis rostratis bifurcatis squama subaristata longioribus. In Am. bor. 2.

316. *C. subulata* Michx. spica mascula solitaria, femineis 3 remotis sub-6-floris, supremis sessilibus infima exserte pedunculata; fructibus tereti-subulatis squama multo longioribus patentibus apice bicuspidiatis, cuspidiibus reflexis. *C. Michauxii* Dewey t. G. f. 21. In Am. bor. 2.

317. *C. trifida* Cav. ic. t. 465. spicis masc. 3; femineis 3 remotiusculis cylindrico-ventricosis superioribus sessilibus; fructibus ovato-lanceolatis bidentatis squama oblonga 3-dentata aristata brevioribus. *C. aristata* Urvill. In ins. Maclovianis. 2.

h. Spica masc. solitaria; femineae 3—5 interdum apice masculae. Utriculi patentes longe rostrati bicuspidiati. Squamae femineae longe aristatae.

318. *C. Haenkeana* Presl. spica mascula terminali, femineis 4-nis remotis longe pedunculatis pendulis cylindricis; glumis ovatis longe aristatis; fructu lanceolato ancipi longe rostrato bidentato. In ins. Philippis. 2.

319. *C. cognata* Kunth.; spicis masc. geminis; fem. 4-nis cylindricis subsessilibus; bracteis longis, fructibus ovato-3-gonis rostratis bifurcatis striatis squamam serrulato-scabram aequantibus. *In P. b. S.* 4.

320. *C. excelsa* Poepp. spicis masculis solitariis v. gemini; fem. 4-nis remotis longe pedunculatis pendulis cylindricis; utriculis bicuspidatis nervosis patentibus; squamis feminineis obovatis. *In Chili.* 4.

321. *C. Forsteri* Wahlenb. spicis masculis 2 sessilibus; androgynis cylindricis 4-nis remotis pedunculatis cernuis basi masc.; fructibus ovatis 3-quertris rostratis bifidis recurvatis. Schk. t. Z et NN f. 84. *In Nova Zeelandia.* 4.

322. *C. Doniana* Spr. spicis fem. 3-4 cylindricis, masc. solitaria; fructu patulo ovato-lanceolato margine acuto in rostrum planum bidentatum attenuato; squamis angustis nervo carinali viridi fructo brevioribus. *C. chlorostachys* Don. *In Nepalia.* 4.

323. *C. gigantea* Rudge Linn. trans. 7. t. 10. f. 2. spicis fem. 3-4 remotis cylindricis erectis inolute pedunculatis; bracteis foliaceis longissimis glaberrimis; fructibus ovatis conico-rostratis bifidis nervosis squama ovato-lanceolata longioribus. *In Am. bor.* 4.

324. *C. retrorsa* Schwein. Dewey journ. 9. t. L. f. 36. spicis masculis subternis suprema longe pedunculata, feminineis quinis oblongo-cylindricis subfasciculatis longe inolute pedunculatis; fructibus ovatis inflatis rostratis bifurcatis reflexis squama lanceolata duplo longioribus. *In Am. bor.* 4.

325. *C. multispicata* Kunze; fol. elongatis; spicis masculis 4, fem. 5, cylindricis erectis breviter pedunculatis geminis; squamis masculis apice rotundato-truncatis ciliatis; utriculis stipitatis ovatis rostro bicuspidato. *In Chili.* 4.

i. *Spicae androgynae apice masculae. Utriculi rostrati membranacei nervosi glabri, pubescentes v. hispiduli.*

326. *C. tachnosperma* Wall. spicis filiformibus cernuis apice masculis longe pedunculatis, radicis fasciculatis; bracteis elongatis foliaceis; fructibus ovatis nervoso-striatis pubescenti-scabris

patulis; squamis ovalibus. *C. flexilis* Don. *In Nepalia.* 4.

327. *C. speciosa* Kunth; spiculis subternis maxime distantibus linearibus una radicali; fructibus grossis ventricoso-trigonis rostratis dense striatis carinis scabris; squamis rhombeo-ovatis obtusis striatis; culmo foliis acutissimis breviore. *C. concolor* Nees. *In Ind or.* 4.

328. *C. hymenolepis* Nees; spicis cylindricis incluse pedunculatis superioribus masculis; fructibus rostratis bidentatis scabris; squamis albo-membranaceis albo-cuspidatis; fol. linearibus longissimis. *In Nepalia.* 4.

329. *C. viridis* Schlecht. culmis caespitosis superne scabris; spicis 5-8 gracilibus apice masculis; utriculis oblongo-lanceolatis rostratis trigonis glabris squamam ovato-oblongam acutatam superantibus rostro bidentato. *In Mexico.* 4.

330. *C. Boryana* Schk. t. Gggg. f. 121. spica mascula solitaria, androgynis cylindricis remotis supra sessili reliquis cernuis; capsulis ovatis acuminatis bipartitis squama aristata longioribus. *C. subulata* Wahlenb. *In ins. Borboniae.* 4.

331. *C. typhoides* Bory. spicis androgynis subquinis cylindrico-oblongis; fructibus ovato-oblongis acuminatis bicuspidatis compressis squama ovata cuspidata brevioribus. *In ins. Borboniae.* 4.

332. *C. eminens* Nees; spicis compositis axillaribus exserte pedunculatis nutantibus; spiculis 3-4 multifloris; fructu ovato-lanceolato hispido-ciliato bifido, lacinias obtuse 3-dentatis; squamis brunneis margine membranaceis subbifariis. *In Goosaingtan.* 4.

333. *C. Myosurus* Nees; spicis compositis exserte pedunculatis; spiculis elongatis curvis multifloris; fructu trigono gibbo basi attenuato, rostro brevi bifido margine serrulato-scabro; squamis imbricatis ovatis glabris. *In Ind. or.* 4.

334. *C. polystachya* Wahlenb. corymbis ramosis confertis androgynis pedunculatis remotis; spicis laxis attenuatis superne masc.; fructibus lanceolatis subulato-rostratis recurvatis; squamis lanceolatis. *In Jamaica.* 4.

335. *C. ramosa* Schk. t. Pppp. f. 204. corymbis supradecompositis di-

varicatis pedunculatis remotis; spicis filiformibus gracilibus superne masculis; fructibus lanceolato-triquetris rostratis bipartitis pubescentibus squama lanceolata mucronata majoribus. *C. cruciata* Willd. *In Ind. or.* 4.

336. *C. meiogyna* Nees; spicis compositis axillaribus; rachi angulata scabra; spiculis approximatis teretibus acutis laxe squamosis; squamis masculis imbricatis ovatis obtusis brunneis. *In Nepalia.* 4.

337. *C. fuirenoides* Gandich. triandra, trigyna; paniculis spicaeformibus cylindricis erectis; spiculis oblongo-cylindricis; squamis multinerviis subaristatis glabris, fructo striato; fol. longissimis margine scabris. *In ins. Mariae Anne.* 4.

338. *C. indica* L. spicis decompositis subpinnatis, inferioribus pedunculatis; rachi angulata scaberrima; fructu trigono-ovato rostrato nervoso striato scabro; squamis imbricatis ovatis mucronatis scabris. *In Ind. or.* 4.

339. *C. condensata* Nees; spicis decompositis densis ovatis axillaribus; rachi angulata sulphureo-hispidissima; spiculis lanceolatis teretibus; fructu ovato-lanceolato rostrato basi 3-gono; squamis aequalibus imbricatis ovatis mucronatis griseis. *In Nepalia.* 4.

340. *C. cladostachya* Wahlenb. corymbis ramosis vagis androgynis pedunculatis remotis; spicis laxis sparisoris; fructibus oblongis subulato-rostratis, squamis lanceolatis. *In Jamaica.* 4.

341. *C. filicina* Nees; spicis pinnato-decompositis supra decompositis que pedunculatis densis; spiculis superne masculis inferne androgynis: fructibus lanceolatis subulato-rostratis squamis ovatis obtusiusculis longioribus. *In Ind. or.* 4.

342. *C. mexicana* Presl. spicis apice masculis 4-nis linearis-lanceolatis in spicam ramosam foliosam digestis, inferioribus reflexis; glumis subrotundo-ovatis; fructu lanceolato 3-quetro striato. *In Mexico.* 4.

343. *C. spartea* Wahlenb. rhizome repente; culmis filiformibus; fol. elongatis angustis; pedunculis subcapillaribus 3-5-stachyis, spicis paucifloris apice masculis; fructibus cu-neatis attenuatis membranaceis striato-nervosis glabris, squamam late ovatam superantibus. *Uncinia Spr.*

C. indica Schk. t. Bb. f. 86. *In P. b. S.* 4.

344. *C. Dregeana* Kunth; caespitosa; fol. anguste gramineis scabris culmo multo brevioribus; pedunculis polystachyis; spicis sessilibus oblongis dense spicato-congestis apice masculis; utriculis oblique ellipticis obtusis ore bidentato. *In P. b. S.* 4.

Species quoad sectiones dubiae.

345. *C. spicigera* Nees; spiculis ovalibus 4-nis superne masculis axillaribus pedunculatis; stigmatibus 3; fructibus ovatis trigonis nervosis margine scabris bidentatis squamam ovatam mucronatam superantibus; fol. angustis culmo longioribus. *In Ind. or.* 4.

346. *C. Lindleyana* Nees; spicis decomposito-glomeratis ovalibus, inferioribus longe pedunculatis supremis confluentibus; rachi strigosa; spiculis ovatis ferrugineis; fructu 3-gono ovato nervoso glabro rostrato squama ovata aristata longiore. *In Ind. or.* 4.

347. *C. Wightiana* Nees; spicis decomposito-glomeratis oblongis, inferioribus longe pedunculatis; spiculis oblongis imbricatis apice masculis; fructu erecto 3-gono squama ovali acuta striata pallida duplo longiore; fol. latolinearibus scabrimis. *In Ind. or.* 4.

348. *C. rhaphidocarpa* Nees; spicis compositis, infima longe pedunculata; rachi hirsuta; spiculis alternis ovatis apice masculis; fructu patente oblongo trigono longe rostrato glabro margine subciliato squama ovali subulato-acuminata duplo longiore fol. linearibus subtus vaginisque hirtis. *In Ind. or.* 4.

349. *C. buccans* Nees; spicis compositis pedunculatis, inferioribus remotis; rachi 3-quatra scabra rigida; spiculis cylindricis; fructu ovato inflato dorso gibbo angulatoque in nervis scabro squamam ovatam setaceo-cuspidatam subaequante. *In Ind. or.* 4.

350. *C. valida* Nees; spicis fasciculato-decompositis androgynis pedunculatis solitariis remotis, terminibus corymbosis, spiculis subglomeratis superne masculis; fructibus ovatis 3-gonis rostratis patulis glabris squama ovata acuminata membranacea fusco-

purpurascente paulo longioribus; culmo crasso valido. In China. 4.

351. *C. scabrella* Wahlenb. corymbis ramosis glabris androgynis remotis; spicis superne masculis; fructibus ellipticis acutis scabris. In Jamaica. 4.

352. *C. cryptostachys* Brongn. in Dup. voy. t. 25. racemo composito axillari subradicali fol. quintuplo breviore; spicis apice masculis deflexis linearibus; squamis ovatis acutiusculis multinerviis scariosis; fructibus ovato-fusiformibus apice bifidis striatis duplo brevioribus; fol. subulatis longissimis. In Nov. Guinea. 4.

353. *C. gracilis* R. Br. spicis numerosis pedunculatis apice masculis; inferioribus 3—5-nis remotiusculis parum divisis; fructibus striatis. In Nov. Holl. 4.

354. *C. media* R. Br. spicis 3-nis androgynis subsessilibus approximatis apice masculis; stigmatibus 3; capsulis ovatis rostellatis glaberrimis squamae ovatae longioribus. In Am. arct. 4.

355. *C. ovata* Rudge linn. trans. 7 t. 3. f. 1. spicis apice masculis 4—5-nis ovatis densifloris pedunculatis pendulis bracteatis; fructibus ovatis compressis acuminatis bifidis squamae ovatae acutae aequalibus. In Canada. 4.

356. *C. setigera* Don; spicis cylindricis erectis inferioribus androgynis, superioribus 2—3 masculis; squamis membranaceis late ovalibus mucronatis testaceis; fructu late ovato brevirostri pubescenti-scabro. In Nepalia. 4.

357. *C. Wahuensis* C. A. Mey. t. 10. spica mascula solitaria, androgynis 2 incluse pedunculatis apie masculis; stigmatibus 3; fructibus oblongis ventricosis nervosis glabris rostro bifido terminatis glumam mucronatam aequantibus. In ins. Wahu. 4.

358. *C. myosuroides* Lowe; spicis 7-nis remotissimis solitariis cylindricis densifloris demum pendulis elongatis gracilibus; pedunculo vaginam duplo excedente; fructibus minimis triquetro-oblongis squamas lanceolatas acuminatas aequantibus. In Madera. 4.

359. *C. etata* Lowe; spicis subensis apice masculis remotissimis linearibus pendulis elongatis basi compitis ramosis; fructibus costatis obovato-triquetris rostratis squamas ob-

longo-ovatas aristatas subaequantibus, rostro bifido tenui. In Madera. 4.

360. *C. microcarpa* Bertol. spicis tereti-linearibus, terminali mascula subsolitaria, androgynis superne masculis subquinis, inferioribus remotis; fructibus ovato-triquetris apiculatis truncatis subemarginatis squama ova-to-acuminata paulo longioribus. In Sardinia. 4.

361. *C. obscura* Nees; spicis feminis pluribus imbricatis lanceolatis, inferiore pedunculata reliquis sessilibus terminali mascula; fructibus oblongis emarginato-bidentatis margine scabris, squamis ovatis obtusis fuscis; culmi triquetri angulis foliisque margine scaberrimis. In Nepalia. 4.

362. *C. Victorialis* Nees; spicula mascula 1; feminis subternis incluse pedunculatis erectis cylindricis angustis; fructibus lanceolatis rostratis ore integro glabris; squamis feminis late ovalibus emarginatis, subrepandis; culmo humili; bracteis margine scaberimis; rhizome crasso. In Nepalia. 4.

363. *C. ligulata* Nees; spica mascula solitaria; feminis sub-5-nis approximatis exserte pedunculatis anguste cylindricis; fructibus oblongis 3-gono-gibbis asperis binervibus; squamis ovatis pallidis; culmo 3-gono apice folioso. In Nepalia. 4.

364. *C. cardiolepis* Nees; spica mascula solitaria basi bibracteata, feminis 2 distantibus cylindricis; vagina ore membranacea brachiphylla; stylo e perigynio prominente; stigmatibus 3; fructu ovali pubescenti-scabro, squamis ovalibus emarginatis, feminis margine candidis, masculis totum fuscis; fol. scaberrimis. In Nepalia. 4.

365. *C. Emendorum* Spr. spicis feminis erectis cylindricis subsessilibus masc. solitariis; glumis ellipticis acuminatis superne scabris; arillis lanceolatis compressis apice truncatis emarginatis. In Nepalia. 4.

366. *C. tenuis* Nees; spicis masculis 3-nis sessilibus; infera bractea membranacea setigera suffulta; femina solitaria lanceolata, bractea setacea subinclusa; stigmatibus 3; fructibus lanceolatis compressis margine scabris; squamis ovatis acutis rufoferrugineis albo-marginatis. In Nepalia. 4.

367. *C. chinensis* Reetz; spica mascula solitaria; feminis 4 cylindricis

remotis 3 inferioribus exserte pedunculatis; stigmatibus 3; capsulis ovato-acuminatis ventricosis rostratis squama subsetacea longioribus. In China. 2.

368. *C. japonica* Thunb. Schk. t. Yw. f. 110. spica mascula solitaria, fem. 3 ovatis, supra sessili; reliquis pedunculatis; capsulis oblongis rostratis ore bidentatis patentibus squama oblonga majoribus. In Japonia. 2.

369. *C. pumila* Thunb. Schk. t. Yy. f. 112. spicis masculis 2, feminis 2 oblongis remotis inferiore subradicali pedunculata; fructibus ovatis bidentatis glabris, squamam ovatam acutam aequantibus. In Japonia. 2.

370. *C. lacistema* R. Br. 3-gyna; vaginis nullis spicis fem. 3 cylindricis erectis infima breve pedunculata; squamis obtusis mucronulatis; fructibus ovalibus ventricosis rostratis nervosis erectis, squamam ovatam acutam aequantibus. In P. b. S. 2.

371. *C. Urvillei* Brongn. caule humili fol. linearis-subulatis breviore; spicis masculis 3; squamis ovato-oblongis scariosis; spicis fem. 3 subsessilibus erectis approximatis, inferioribus foliis longissimis stipatis; squamis fuscis ovato-acuminatis fructu ovato laevissimo bidentato longioribus. In Chili. 2.

372. *C. vestita* Schk. t. Bbbb. f. 182. spica mascula solitaria lanceolata, feminis 2 ovatis sessilibus approximatis; stigmatibus 3; fructibus ovatis rostratis ore obliquis pubescens squamam ovatam acutam subaequantibus. In Am. bor. 2.

373. *C. Halseyanoides* Dewey tab. N. f. 43. spicis masculis 2 oblongis sessilibus a fructifera remotis spica feminina exserte pedunculata oblonga; fructibus ovali-ovatis brevi-rostratis subtriquetris inflatis glabris nervosis squama ovata acutiuscula paulo longioribus. In Am. bor. 2.

374. *C. Schweinitzii* Dew. in Sill. journ. 9. t. B. f. 8. spicis masculis 2, supra longa gracili pedunculata; feminis 4 longis cylindricis subpendulis; bracteis foliaceis; fructibus ovato-oblongis supra attenuatis rostratis inflatis bifurcatis nervosis glabris squama lanceolata subulata longioribus. In Am. bor. 2.

375. *C. Barrattii* Torr. Dew. in Sill. journ. 11. t. P. f. 51. spicis masculis subbinis; feminis subternis ob-

longo-cylindricis cernuis; fructibus oblongis subtriquetris subscabris squama ovato-lanceolata subhusta paulo brevioribus. In Am. bor. 2.

376. *C. longirostris* Torr. Dew. journ. 9. t. C. f. 20. spicis masculis 3-nis brevibus media sessili fem. 2-3 cylindricis pendulis subsparsifloris exserte pedunculatis; fructibus ovatis subglobosis inflatis glabris longirostratis bifidisque squama lanceolata cuspidata paulo longioribus. In Am. bor. 2.

377. *C. Richardsoni* R. Br. spica mascula solitaria pedunculata; feminis 2 alternis subsessilibus exsertis multifloris; fructibus obtusis pubescensibus. In Am. arct. 2.

378. *C. aristata* R. Br. spicis feminis 3-4, cylindricis distantibus breve pedunculatis; fructibus glaberrimis nervosis, rostro longissimo alte bifido; squamis omnibus aristatis; fol. subtus villosis. In Am. bor. 2.

379. *C. podocarpa* R. Br. spica mascula solitaria; fem. 2 pendulis oblongis; fructibus ellipticis rostellatis integris pedicellatis. In Am. bor. 2.

380. *C. stylosa* C. A. Mey. cyp. t. 12. spica mascula solitaria, feminis 2 distantibus pedunculatis, fructiferis nutantibus; fructibus laevibus compressis oblongo-lanceolatis acutis ore integerrimis gluma aristata brevioribus. In Unalaschka. 2.

381. *C. macrochaeta* C. A. Mey. t. 13. spica mascula solitaria, feminis 2 distantibus pedunculatis, fructiferis subnutantibus; fructibus laevibus compressis oblongo-lanceolatis acutis ore integerrimis gluma aristata brevioribus; bracteis foliaceis. In Unalaschka. 2.

382. *C. bispicata* Hook. in Beech. voy. t. 28. spica feminea solitaria pedunculata erecta ovata pauciflora; squamis amplis ovatis longe acuminatis, capsula ovata longe rostrata bifida sublongioribus; spica mascula longe pedunculata cylindrica, squamis ovalibus cuspidatis. In Kamtschatka. 2.

383. *C. Neesiana* Endl. spicis masculis terminalibus pluribus, feminis sub-6-nis cylindricis strictis basi compositis; squamis ovato-lanceolatis setaceo-acuminatis fructus ovatos strigosos rostratos nervosos aequantibus, rostro argute bifido. In ins. Norfolk. 2.

384. *C. Soleirolii* DC. spicis masculis 3—4, femineis 3—4 cylindricis oblongis sessilibus; fructibus ovato-rotundis compressis margine ciliatis rostellatis ore bidentato squama linearie-lanceolata brevioribus; fol. glaucescentibus. In Corsica. 2.

385. *C. breviculmis* R. Br. spicis femineis 2—3 approximatis oblongis, mascula cylindrica gracili; squamis cuspidiatis; fructibus ovalibus acuminatis attenuatis pubescentibus; fol. culmo longioribus. In Nov. Holl. 2.

386. *C. cataractae* R. Br. spicis femineis ovatis superioribus 2—3 confertis subsessilibus; vaginis abbreviatis infima remota; squamis obtusis; fructibus ovatis rostratis nervosis; culmis laevis. In Nov. Holl. 2.

387. *C. borbonica* Lam. spicis femineis erectis sessilibus superioribus confertis mascula crassiore terminali; fol. gladiatis. In ins. Borbonia. 2.

388. *C. miliaris* Michx. spica feminea plerumque solitaria sessili ova-ta; bractea setacea; fructibus globosis glabris. In Canada. 2.

389. *C. membranacea* Hook. spica mascula solitaria, femineis majus minusve pedunculatis oblongo-cylindricis erectis obtusis atrofuscis nitidis; fructu laevi rotundo inflato breviter acuminato bifido pedicellato; vaginis perbrevibus. In Kotzebousund. 2.

390. *C. Esenbeckii* Kunth; spicula mascula cylindracea, culmi altitudine; squamis ovalibus obtusis membranaceis fructibus 2; fol. planis linearibus 3-nervibus, culmo teretiusculo. *C. trinervis* Nees. In Nepal. 2.

391. *C. Lyngbyei* Hornem. fl. dan. t. 1888. spicis linearibus masculis pluribus, fem. 3 pedunculatis flaccidis, stigmatibus 2; fructibus obovatis obtusis squamis acuminatis. In ins. Færoensi. 2.

392. *C. tenuiflora* Poir. spicis femineis erectis paucifloris inferioribus distantibus longe pedunculatis superioribus subsessilibus fol. angustissimis. In Barbaria. 2.

393. *C. binata* Poir. culmo triquetro; spiculis subbinatis sessilibus approximatis terminali androgyna, feminea sessili laxe imbricata; squamis margine rufescens. *C. distachya* Desf. In Barbaria. 2.

4791. UNCI^{NIA} Pers. (1805).

1. *U. tenuis* Poepp. culmo inferne foliato; fol. culmo brevioribus angustissime linearibus margine scabris; spica gracili laxiflora folio suffulta, squamis deciduis, basi persistente saccata; utriculis lanceolatis hinc planis inde convexo-obtusangulis glabris; arista apice uncinata. In Chili austr. 2.

2. *U. jamaicensis* Pers. culmo glabro inferne foliato; fol. culmum superantibus anguste linearibus carinatis margine scabris; spica tenui subdensiflora; utriculis ovato-oblongis ore truncatis basi attenuatis membranaceis hinc planis inde convexis ad angulos hispidulis; arista uncinata utriculum duplo superante. Schk. t. G. f. 30. In Jamaica. 2.

3. *U. trichocarpa* C. A. Mey. cyp. t. 4. culmo glabro basi foliato, fol. longitudine culmi linearibus margine scabris; spica tenui densiflora ad basin folio brevi setiformi instructa; utriculis oblongo-lanceolatis 1-nerviis ad angulos ciliatis superneque fasciculato-pilosus, arista uncinata apice hispidula. In Chili. 2.

4. *U. macloviana* Gaudich. culmo glabro basi foliato; fol. erectis rigidis linearibus margine scabris; spica gracili densiflora; utriculis lanceolato-oblongis truncatis 1-nerviis membranaceis ad angulos ciliato-hispidulis, arista apice uncinata glabra utriculum vix duplo superante. In ins. Maclovianis.

5. *U. Lindleyana* Kunth; culmo glabro inferne foliato; fol. culmum aequantibus anguste linearibus interne margineque scabris; spica solitaria gracili densiflora ad basin folio spicam superante suffulta; utriculis stipitatis lagenaeformibus membranaceis glabris apice truncato-subbidentatis dorso irregulariter nervosis; arista apice uncinata glabra utriculum duplo superante. In ins. Owhyhee. 2.

6. *U. longifolia* Kunth; culmo foliato apice scabriuscule; fol. culmum duplo superantibus planis glaucescenti-viridibus margine supraque in nervibus 3 primariis scabris; spica cylindrica densiflora basi nuda; utriculis obovatis longe rostratis convexo-angulatis 1-nerviis ad angulos ciliato-hispidulis, arista uncinata. In Chile. 2.

7. *U. australis* Pers. spica androgyna simplici superne incrassata mascula; fructibus oblongis teretiusculis breve rostratis; arista setiformi uncinata. *In Zealandia.* 4.

8. *U. phleoides* Pers. fructibus oblongis triquetris margine laevibus. *C. phleoides* Cav. ic. t. 464. f. 1. *In Am. austr.* 4.

9. *U. erinacea* Pers. spica androgyna simplici superne mascula obtusa; fructibus subrotundo-ovatis triquetris; arista filiformi uncinata squama subrotunda quintuplo longiore. *Carex* Cav. ic. t. 464. f. 2. Schk. t. Nunn. f. 201. *In Am. austr.* 4.

10. *U. compacta* R. Br. spica oblonga densa multiflora; squama infima aristata; fructibus dense imbricatis undique glaberrimis; culmo laevi; fol. planis strictis. *In Nor. Holl.* 4.

11. *U. riparia* R. Br. spica filiformi laxiuscula pauciflora, squama infima conformi; fructibus alternis semi-imbricatis lanceolatis nervosis undique glaberrimis, culmi angulis scabris; fol. planis laxis. *In Nor. Holl.* 4.

12. *U. gracilis* Thouar. Fl. Trist. da Cunha. t. 5. spica unica superne mascula; arista uncinata; culmo gracili fol. longiore. *In ins. Tristan da Cunha.* 4.

13. *U. brevicaulis* Thouar. l. c. t. 6. spica unica superne mascula crassiore; aristis uncinatis culmo foliis breviore. *In ins. Tristan da Cunha.* 4.

14. *C. tenella* R. Br. spica filiformi pauciflora; squamis deciduis conformibus; fructibus subimbricatis lanceolatis laevibus; culmo angulato filiformi laevi; fol. subsetaceis flaccidis. *In Nor. Holl.* 4.

15. *U. nepalensis* R. Br. spica solitaria stricta multiflora superne mascula; fructibus lanceolatis compres- sis obtusis bidentatis; arista subcylindrica scabra inclusa; fol. filiformibus. *In Nepalia.* 4.

16. *U. Lehmanni* Nees; corymbul- lis pleiochachyis apice attenuatis pure masculis alternis distantibus incluse pedunculatis, spiculis linearibus superne masculis; squamis ovatis setaceo-cuspidatis; fructibus ovato-3-gonis striatis longioribus, rostro biden- tato; seta hypogyna parumper exserta. *In P. b. S.* 4.

4791b. SCLERIA L. (1747).

Spicae masculae femineis v. andro- gynis paucioribus intermixtae multi- florae. Squamae undique imbricatae exteriores vacue. Stam. 3 rarius 2 r. 1. Spicae femineae 1-florae. Spicae androgynae flore inferiore fe- mineo. Achenium lapideum crusta- ceum v. fragile disco majus minusve trilobo suffultum.

1. **Paniculae axillares et ter- minales.** Achenium lapideum.

a. **Discus trilobus lobis in- tegris.**

1. *S. Flagellum* Sw. culmis scan- dentibus; vaginis 3-angularibus ore rotundato-villoso-ciliatis; fol. linearibus trinerviis pilosiusculis subtus re- trorsum spinuloso-scabris; paniculae ramis patentissimis rachique triquetris spinoso-hispidis. Berg. act. holm. 1765. t. 4. Gartn. t. 2. *In Am. austr.* 4.

2. *S. reflexa* H. et K. culmis scan- dentibus; vaginis triquetris angulis re- trorsum serrulato-scabris, ligula fusca rotundata; paniculae ramis patentibus triquetris, ramis inferioribus reflexis; floribus masculis 3-andris; achenio ro- tundato lacteo nitido; disco suborbiculari integro margine reflexo. *In Non. Andalusia.* 4.

3. *S. scabra* Willd. culmo 3-que- tro margine retrorsum scabro; vagini- nis triquetris anguste alatis in ligulam ovatam fuscum productis; panicula terminali contracta; spicis masculis femineis intermixtis staminibus 3. *In Cumana.* 4.

4. *S. communis* Kunth; culmis 3- que- triis angulis retrorsum scabris, va- ginis triquetris membranaceo-alatis in ligulam ovatam rigidam ciliolatam pro- ductis; paniculis pyramidatis, bracteis setiformibus; floribus masculis 1-andris; achenio rotundato umbonato albo, v. fuscescens nitido. *S. pratensis* Nees. *In Brasilia.* 4.

5. *S. metaleuca* Rchb. culmis 3- que- triis angulis scabris; vaginis 3-alati- scabris in ligulam obtusam rigidam productis; paniculis depauperatis; flo- ribus masc. monandris; achenio sub- globoso mucronato castaneo basi al- bido. *In Nor. Granata.* 4.

6. *S. testacea* Nees culmis 3-que- triis angulis scabris; vaginis 3-alati

in ligulam oblongam obtusam productis; paniculis axillaribus simplicissimis; floribus masculis 3-andris; achenio globoso apice punctato urceolato laevi lacteo-candido nitido. In ins. Sandwicensibus. 4.

✓ 7. *S. margaritifera* Willd. fol. linearibus; vaginis 3-quetris vix alatis ligula abbreviata; rotundata; paniculis ramosis pyramidalibus; floribus masculis 3-andris; achenio subgloboso fuscescenti-umbonato laevi albido nitido; discis haud ciliatis lobis ovatis. In ins. Tanna. 4.

8. *S. microcarpa* Nees; fol. rigidulis margine nervisque scabris; vaginis trialatis antice in ligulam ovatam obtusam rigidam productis; spicis interrupte spicato-dispositis; floribus masculis 3-andris; achenio ovato mucronato lacteo nitido. In Surinamo et Martinica. 4.

9. *S. riparia* Poepp. et Kunth; culmis acute triangularibus glabris; fol. late linearibus margine scabermissimis; vaginis bialatis ligulatis; paniculis geminis altera minore, ramis rachique triquetris scabris; achenio ovato lacteo-albido nitido; disco cupuliformi sinuato-3-lobo densissime ciliato. In Peruria. 4.

10. *S. scrobiculata* Nees culmis vaginisque acute triangularibus angulis retrorsum serrulato-scabris; fol. elongatis, margine carinaque retrorsum serrulato-scabris; bracteis elongatis subulatis inferne ciliatis; achenio ovato scrobiculato albido nitido marginibus hirtello, lobis obtusis subcrenulatis. *S. timorensis* Nees. In Manila, Timor etc. 4.

11. *S. laevis* Sw. culmis vaginisque acute triangularibus glabris; fol. linearibus rigidis; paniculis ramosis ramis rachique glabris; floribus masculis 3-andris; achenio globoso cicatrice notato laevi fuscescente nitido, disco trilobo lobis non ciliatis. In Ceylona. 4.

12. *S. tesellata* Willd. culmis 3-quetris glabris; fol. serrulato-scaberrimis; vaginis triquetris puberulis, ligula abbreviata rotundata; bracteis paniculae simplici elongatis subulatis, achenio subgloboso tesellato-cancellato albido. In Ind. or. 4.

13. *S. mitis* Berg. l. c. t. 5. culmis 3-quetris scabriusculis; vaginis acute 3-angularibus glabris; ligula

ovata obtusa rigida; paniculae simplicis ramis rachique triquetris serrulato-scabris; achenio subgloboso apice depresso albido nitido; disco cupuliformi densissime setuloso-ciliato. In Jamaica. 4.

14. *S. sororia* Kunth; culmis triquetris scabriusculis; vaginis glabris angulis membranaceo-alatis retrorsum scabris, ligula ovato-oblonga obtusa rigida; fol. late linearibus 3-nerviis margine spinuloso-scabris; paniculis ramosis confluentibus; achenio ovato-subgloboso apice subumbonato laevi lacteo-albido; disco 3-lobo, lobis densissime setuloso-ciliatis. In Brasilia. 4.

15. *S. scindens* Nees; culmis triangularibus angulis scabris; fol. linearibus 3-nerviis nitidis; vaginis triangularibus subpilosus; ligula brevissima rotundata; panicula ramosissima; achenio ovato-globoso, apice cicatrizzato laevi lacteo-albo nitido; disco trilobo lobis latis rotundatis glabris subrecurvatis. In Antillis. 4.

16. *S. verrucosa* Willd. culmis acute triangularibus; fol. lanceolatis margine serrulato-scaberrimis; vaginis trialatis, alis margine serrulato-scabris, ligula rotundata rigida; achenio subgloboso verrucoso, verrucis compressis subretrorsis, disco obsolete sinuato 3-lobo, subsetoso. In Guinea. 4.

17. *S. racemosa* Poir. culmis 3-angularibus glabris; fol. late linearibus 3-nerviis scabris; vaginis 3-alatis glabris, ligula ovata brevi obtusa; paniculis simplicibus longe pedunculatis; achenio ovato obtuso albo laevi nitido; disco magno obsoletissimo trilobo ciliato fimbriato. *S. macrospurma* Nees. In Madagascaria. 4.

18. *S. paludosa* Poepp. et Kunth; culmis acute triangularibus scabermissimis; fol. linear-lanceolatis scabris 5-7-nerviis; vaginis trialatis margine retrorsum serrulato-scaberrimis; ligula abbreviata obtusa; bracteis longissimis setaceis; achenio subgloboso laevi albido nitido, disco magno margine undulato-3-lobo ciliato adnato. In Peruia. 4.

19. *S. melanomphala* Kunth; culmis vaginisque 3-quetris angulis retrorsum scabris; fol. elongatis linearibus 3-nerviis, ligula abbreviata rotundata rigida; paniculis geminis

contractis; achenio ovali laevi lacteo-albo apice rotundato nigro nitido, disco obsolete 3-lobo ciliato. *In P. b. S.* 4.

20. *S. bracteata* Cav. ic. t. 457. culmis trigonis foliosis glabris; fol. villoso-hirtis margine retrorsum serrulato-scaberrimis; vaginis trigonis purpurascenscentibus villosis; paniculis terminalibus ramosissimis masculis, inferioribus feminineis; achenio depresso-globoso reticulato tuberculato violaceo, disci trilobi lobis margine atro-sanguineis. *In Brasilia.* 4.

21. *S. cyperina* Willd. culmis triquetris angulis scabris; fol. margine carinaque serrulato-scaberrimis; vaginis trialatis alis scabris, ligula ovata obtusa rigida; panicula terminali sessili densa; spicis masculis longe pedicellatis; achenio subrotundo ovato cicatrica fusca terminato, tuberculato-rugoso hirtello albido. *In Cumana.* 4.

b. *Discus trilobus lobis inciso-serratis.*

22. *S. trialata* Poir. fol. late linearibus scabris; ligula rotundata; paniculis pyramidalibus; achenio subrotundo subumbonato subcompresso albo laevi nitido; disci laciniis flabelato-incisis. *In Madagascar.* 4.

23. *S. Sieberi* Nees; fol. elongatis margine scabris; vaginis glabriusculis triangularibus; ligula rotundata rigida; achenio elliptico umbonato laevi glabro albido nitido, disco trilobo, lobis serrato-incisis. *In Mauritio.* 4.

24. *S. abortiva* Nees; culmis vaginisque triquetris glabris; fol. late linearibus 5-nerviis; ligula rotundata rigida; paniculis pyramidalibus; achenio ovato-subrotundo apice cicatrizado-punctato laevi cinerascente nitido. *In Madagascar.* 4.

25. *S. angusta* Nees; culmis vaginisque glabriusculis; fol. rigidis margine scabris ligula brevi ovata obtusa; achenio ovato obtuso violaceo nitido, disci lobis multifidis. *In Madagascar.* 4.

26. *S. sylvestris* Poepp. et Kunth; culmis punctulato-pilosus, angulis retrorsum scabris; fol. latis elongatis margine scabris; paniculis pyramidatis androgynis, ramis scabris purpurascenscentibus; bracteis elongatis capil-

laceis; achenio globoso spadiceo-nigro nitido, disci lobis irregulariter multifidis. *In Peruria.* 4.

27. *S. arundinacea* Kunth; culmis vaginisque angulis scaberrimis; fol. latis longis scabris; ligula ovata obtusa; paniculis ramosissimis androgynis; bracteis elongatis setaceis; achenio subglobose, umbonato laevi pallido, disco multifido. *In Nov. Holl.* 4.

28. *S. miriocarpa* Kunth; fol. apice angustatis margine serrulato-scabris rigido-membranaceis; vaginis 3-alatis, alis retrorsum serrulatis; ligula rotundata rigida; paniculis ramosissimis pyramidatis, ramis patentissimis; achenio globoso umbonato reticulato-rugoso rugis hirtellis atro-violaceo. *In Brasilia.* 4.

29. *S. cyanocarpa* Kunth; culmis pilosis; vaginis foliorum trialatis margine scabris; ligula ovata obtusa; panicula terminali ramosissima ampla foliata; ramis triquetris purpurascenscentibus; bracteis elongatis; achenio depresso-globoso violaceo, lobis disci serrato-incisis. *In Brasilia.* 4.

30. *S. pantcooides* Kunth; culmis subpilosis angulis retrorsum spiculoso-scabris; vaginis trialatis pubescentibus; panicula ramosa foliata, ramis rachique pubescentibus purpurascenscentibus; achenio depresso-globoso tuberculato, tuberculis hirtellis stramineo-albido, disci lobis irregulariter multifidis. *In Brasilia.* 4.

31. *S. olyroides* Kunth; culmis scabriusculis; fol. oblongis scabris; ligula ovata obtusa rigida; paniculis pyramidatis ramis patentibus; achenio ovato-globoso subumbonato glabro albo nitido, disci lobis serrato-incisis. *In Brasilia.* 4.

2. *Pedunculi axillares et terminales oligostachyi*. Achenium lapideum v. crustaceum fragile. *Discus stipitiformis.*

* 32. *S. filiformis* Sw. culmis glabris; vaginis angulis scabris purpurascenscentibus; ligula ovata obtusa rigida; spicis subgeminis altera mascula altera feminea; stamine solitario; achenio ovato-subgloboso subacuminato tuberculato nitido basi annulo angustissimo ferrugineo cincta, disco orbiculari undulato. *Hypoporum purpurascens* Nees. *In Am. austr.* 4.

33. *S. reticularis* Michx. culmis gracilibus angulis scabris; vaginis anguste 3-alatis retrorsum scabris; pedunculis elongatis superne anguste 3-alatis; achenio fragile globoso scrobiculato hirtello lacteo-albo fusco apiculato, disci lobis rotundatis. *In Mexico.* 4.

34. *S. pauciflora* Muell. culmis foliisque hirtellis; achenio mucronato transverse tuberculato-rugoso basi 8-spinoso, spinis apice incrassatis lacteo-albido nitido; stipite basi tumido faciebus biglandulosis. *In Carolina.* 4.

35. *S. Brownei* Kunth; culmis angulis retrorsum scaberrimis; fol. anguste linearibus longissimis; ligula abbreviata villosula; spicis plurifloris; flore inferiore femineo caeteris masculis; achenio lapideo ovato fusco-mucronato trigono tuberculato albo nitido, disci lobis rotundatis. ? distans R. Br. *In Nov. Holl.* 4.

36. *S. capillaris* R. Br. culmo vaginisque acute triangularibus inferioribus pubescentibus; ligula obtusa villosula; panicula simplici pauciflora nutante; floribus masculis monandris; achenio fragili ovato candido nitido annulo angustissimo basi cincto, disco obsolete trilobo. *S. Hypoporum* Nees. *In Nov. Holl.* 4.

37. *S. lithosperma* Willd. glauca culmis gracilibus triquetris glabris; fol. angustis elongatis; vaginis pilosiusculis angulis glabris; ligula rotundata; spicis interrupte spicatis; achenio lapideo ovato-elliptico umbonato trigono laevi albo nitido basi margine angusto ferrugineo cincto. Rheede 12. t. 48. *In Ind. or.* 4.

38. *S. nitida* Willd. culmis 3-questris glabris, vaginis angulis membranaceis; fol. rigidis scabris; ligula rotundata rigida; pedunculis longissimis; achenio ovato subgloboso laevi lacteo candido nitido ad basin margine celluloso-papilloso cincto. *In Carolina.* 4.

39. *S. ciliata* Michx. culmis vaginisque acute triangularibus pubescens marginibus carinaque ciliatis; ligula brevissima truncata; bracteis elongatis ciliatis; spicis multifloris; flore inferiore femineo caeteris masculis; achenio fragili globoso verrucoso albidu nitido. *In Carolina.* 4.

40. *S. Sellowiana* Kunth; culmis vaginisque acute triangularibus pu-

hescenibus, angulis retrorsum hispidis; ligula rotundata pilosa; bracteis elongatis foliaceis; achenio osseo subgloboso umbilicato sessili albo nitido; disco punctulato scabro, lobis emarginatis. *In Brasilia.* 4.

41. *S. capitata* Willd. culmo 3-quetro glabro; fol. rigidis 3-nerviis; vaginis purpurascensibus; glomerulo terminali solitario pauperato fol. 2 suffulto; achenio lapideo globoso mucronulato albido nitido, lineis 3 notato, disco obsolete trilobo. *In Guyana.* 4.

42. *S. pygmaea* R. Br. pusilla glabria; fol. linearibus acutis; fasciculis subcapitatis; spicis femineis sub-1-floris, squamis 2 exterioribus multinerviis; achenio lapideo ovato umbonato, rugoso subcancellato cinerascente, disci lobis rotundatis. *In Nov. Holl.* 4.

3. *Spicae interrupte glomeratae solitariae terminales v. paniculatae*. Achenium lapideo-crustaceum. Discus stiptiformis v. cupularis. Ligula nulla.

43. *S. nutans* Willd. culmo vaginisque glabriusculis linearibus; spica composita; floribus diandris; squamis exterioribus aristatis hirsutis; achenio fragili subgloboso albo nitido, basi trigona, margine fusco tridentato adnato, disco patelliformi 3-lobo. *In Brasilia.* 4.

44. *S. cenchroides* Kunth; culmis vaginisque glabris; fol. anguste linearibus margine scabris; spica composita interrupte glomerata; squamis subaristatis hispidis; achenio lapideo subgloboso cicatricula notato obsolete trigono faciebus subsulcatis, disco trigono persistente. *In P. b. S.* 4.

45. *S. mollis* Kunth; culmo foliisque hirtis; spica composita, spicis propriis fasciculato-congestis flor. masculis diandris; squamis dorso hirsutis; achenio globoso obsolete trigono lacteo-candido nitido basi trigona subtriloba fusca cincto, faciebus superne 5-sulcatis. *In Brasilia.* 4.

46. *S. interrupta* Willd. culmis foliis vaginisque hirsutis; spica composita interrupte glomerata; squamis aristatis carina hirsutis; achenio la-

pideo subgloboso mucronato rugis transversis scabro candido, disco 3-gono integro. In *Gujana et Antillæ*. 2.

47. *S. hirtella* Sw. hirsuta; spica composita; floribus masculis diandris; squamis subaristatis hirsutis; achenio lapideo ovato-globoso mucronato lacteo-albo nitido margine trilobo fusco cincta, faciebus superne 4-porosis. Hypoporum Nees. In *Jamaica*. 2.

48. *S. distans* Poir. glabra; spica composita; propriis ternis; flore inferiore femineo reliquis masculis diandris; squamis exterioribus aristatis glabris, arista pilosiuscula; achenio lapideo subgloboso umbonato-mucronato candido nitido, faciebus 4-porosis, disco trigono integro. In *Porto-rico*. 2.

49. *S. verticillata* Muehl. puberula; fol. angustissimis; vaginis retrorsum pilosiusculis; spiculis fasciculato-congestis bifloris; flore inferiore femineo, superiore masculo diandro; squamis glabris aristatis; achenio lapideo globoso rugis transversis subundulatis obsito albido nitido, basi attenuata 3-angulata; faciebus 5-sulcato-porosis. In *Am. bor.* 2.

50. *S. tenella* Kunth; glabra; spica interrupte glomerata, spiculis pauci-floris androgynis, floribus masculis monandris; achenio subgloboso obsoletissime trigono rugis reticulatis subscrobiculato candido nitido, faciebus 5-porosis. In *Gujana*. 2.

51. *S. pergracilis* Kunth; glabra; fol. angustis margine scabris; spica gracili; spiculis 5-floris; floribus masculis monandris; achenio lapideo depresso-globoso mucronato trigono eehinato tuberculato albo nitido, faciebus integris, disco patelliformi integro. Hypoporum Nees. In *Ind. or.* 2.

52. *S. Dregeana* Kunth; culmo elongato gracili foliisque glabro; spica interrupta composita, spiculis fasciculatis androgynis, flore inferiore femineo caeteris masculis diandris; squamis exterioribus mucronatis atro-sanguineis carina virescente; achenio stipitato osseo ovato-globoso trigono mucronato, lacteo-albo laevi nitido. In *P. b. S.* 2.

53. *S. Meyeriana* Kunth; glabra gracilis; spica composita, spiculis fasciculatis androgynis; flore inferiore femineo reliquis masculis diandris, squamis carina glabris mucronatis; achenio

obovato trigono albido. In *P. b. S.* 2.

54. *S. holcoides* Kunth; glabriuscua-la; panicula terminali simplici patula; spiculis glomeratis; flore inferiore femineo, caeteris masculis diandris; achenio articulato osseo obovato trigono albo laevi vel tuberculis spine-scente. In *P. b. S.* 2.

55. *S. rigida* Kunth; robusta glabra, fol. margine carinaque serrulato-scaberrimis; ligula abbreviata ovata ciliata; panicula elongata foliata, spiculis inferioribus masculis intermediis androgynis superioribus femineis sessilibus; floribus masculis monandris; achenio obovato trisulco flavescente nitido. Fuirena Spr. In *Brasilia*. 2.

56. *S. pleostachya* Kunth; glabra; fol. rigidis margine ciliatis; ligula obtusa rigida; panicula terminali simplici, ramis remotis elongatis; spicis subternis sessilibus masculis androgynis submixtis; floribus masc. diandris; achenio obovato apiculato laevi albido nitido, stipite cupuliformi-dilatato. Rhynchospora Spr. In *Brasilia*. 2.

57. *S. stricta* Kunth; caespitosa glabra; ligula obtusa; panicula elongata ramosa foliata, ramis diffusis filiformibus; spicis longe pedicellatis masculis paucifloris, fem. 1-floris; floribus masculis diandris; achenio obovato trigono umbonato punctulato-scabriuscule ferrugineo nitido. In *Brasilia*. 2.

58. *S. leptoclada* Poepp. et Kunth; caespitosa glabra; ligula ovata obtusa; panicula elongata ramosa foliata androgyna apice feminea, ramis diffusis capillaris; spicis longe pedicellatis masculis plurifloris, fem. 1-floris; achenio obovato trigono pustulato-scabro ferrugineo nitido, disco integro. Ad *flum. Amazonum*. 2.

59. *S. junciformis* Kunth; culmis strictis filiformibus; vaginis in folium breve linear-setaceum productis; panicula terminali simplici; ramis sub-4-nis 1—3-stachyis; floribus masc. diandris; achenio oblique obovato subtrigono tuberculato-scabro ferrugineo. In *Brasilia*. 2.

Species subdubiae.

60. *S. oryzoides* Presl. vaginis alato triquetris; panicula terminali fastigiata; spiculis solitariis sessilibus,

squamis ovatis acutis glabris; achenio globoso laevissimo apiculato. *In Ceylona et Ind. or. 4.*

61. *S. macrophylla* Presl. scabra; panicula terminali erecta; bracteis setaceis; spiculis sessilibus inferioribus femineis; glumis masculis ovatis acutis, femineis ovato-subrotundis mucronatis; fructu globoso, laevissimo apiculato. *In Luzonia. 4.*

62. *S. sumatrensis* Retz. fol. elongatis subtus puberulis; vaginis puberulis per ternas approximatis purpurascens ore fimbriato-ciliato; paniculis ramosis pyramidatis androgynis; floribus masculis 3-andris; achenio globoso reticulato cinereo-nigro lobis undatis crenatisque. *In Ind. or. 4.*

63. *S. androgyna* Nees; vaginis triquetris angulis scabris; lobulo oppositifolio rotundato; fol. glabris; panicula elongata; spiculis masculis v. androgynis squama tertia feminea, quarta spiculam masculam bifloram amplectente; fructibus ovatis acutis. *In Ind. or. 4.*

64. *S. chilensis* Kunth; culmo 3-quetro; fol. linearibus obtusiusculis vaginisque trialatis margine scabermiss, lobulo oppositifolio elongato; paniculis spicato-decompositis ovatis; bracteis hirto-ciliatis; achenio globoso undulato-rugoso. *S. ciliaris* Nees. *In China. 4.*

65. *S. hebecarpa* Nees; culmo triquetro foliisque linearibus acuminateis vaginisque 3-alatis margine scabris; panicula terminali brevi foliacea; achenio obsolete trigono laevi nitido hirto. *In Ceylona. 4.*

66. *S. poaeformis* Retz. culmo aphylo; paniculae contractae ramis flexuosis; spiculis sessilibus, femineis axillaribus, masculis bifloris. *In Ind. or. 2.*

67. *S. ceylanica* Poir. culmo debili subaspero; fol. linearibus acutis glabris; paniculis coarctatis alternis axillaribus longe bracteatis; achenio globoso apice tuberculato. *In Ceylona. 4.*

68. *S. mucronata* Poir. caule triquetro aspero; fol. ensiformibus subglabris; vaginis asperis; paniculis axillaribus elongatis; achenio glandiformi mucronato. *In Ind. or. 4.*

69. *S. Neesii* Kunth; culmo erecto simplici; spiculis capitatis foliisque hirsutis; nuce rugosa tuberculata basi

trifariam biporosa; squamis masculis apice fimbriato-laceris. *In Ceylona. 4.*

70. *S. rugosa* R. Br. pubescens diffusa; spicis axillaribus terminalibusque paucifloris androgynis; spiculis sexu distinctis; fol. culmo longioribus. *In Nov. Holl. 4.*

71. *S. laxa* R. Br. glabra; spicis axillaribus pedunculatis paucifloris subnutantibus androgynis; spiculis sexu distinctis sub-1-floris; fructibus rugosis culmis foliisque laevibus. *In Nov. Holl. 4.*

72. *S. nigrescens* Presl. pubescens; fol. linearis-lanceolatis margine scabris; panicula terminali erecta; spiculis subsessilibus solitariis; glumis nervo scabris, masculis ovatis acutis, femineis subrotundis mucronatis; achenio globoso laevissimo. *In Guayaquil. 4.*

73. *S. elongata* Presl. culmo 3-quetro scabriuscule; fol. angustis linearibus margine scabris; pubescens; panicula foliata simplici, ramis scabris; spiculis sessilibus bractea setacea brevioribus; achenio globoso laevissimo apiculato. *In Mexico. 4.*

74. *S. foveolata* Cav. caule 3-quetro striato; fol. inermibus; achenio foveolato; floribus paniculis pedunculatis. *In Panama. 4.*

75. *S. latifolia* Sw. culmo triquetro foliisque late lanceolatis laevibus; paniculis elongatis; fructibus laevibus apice puncto elevato albo notatis. *In Jamaica. 4.*

76. *S. nervosa* Wickstr. culmo inferne subcompresso superne 3-quetro glabro; fol. longe lanceolatis acuminateis nervosis scabris; paniculis elongatis; pedunculis angulatis scabriusculis; nucibus laevibus. *In Guadelupa. 4.*

77. *S. setacea* Poir. culmo foliisque setaceis glaberrimis; spicis axillaribus minimis longe pedunculatis; spiculis angustis pedicellatis v. subsessilibus. *In Portorico. 4.*

78. *S. micrantha* Poir. culmo foliisque filiformibus glabris; paniculis brevibus laxis axillaribus terminalibusque; bracteis minimis subulatis; achenio minimo mucronato. *In Portorico. 4.*

79. *S. curoliniana* Willd. culmo foliisque pubescentibus; fasciculo terminali paucifloro hirsuto. *S. hirtella* Michx. *In Am. bor. 4.*

80. *S. gracilis* Ell. culmo filiformis 3-quetro foliisque glabris; spiculis

paucis paucifloris fasciculatis subterminalibus; glumis glabris nuce laevi nitida. In *Georgia*. 4.

4792. SCHOENOXIPHIUM Nees. (1837).

1. *S. Dregeum* Kunth; glabriuscum; spicis decompositis; squama feminea marginibus a basi ad apicem connata utriculum referente oblongum triangularem attenuato-rostratum; achenio oblongo punctulato. In *P. b. S.* 4. 2—3-ped.

2. *S. Meyerianum* Kunth; spicis decompositis oblongo-lanceolatis; squama feminea achenium oblongo-lineare triangulare basi styli conico rostratum laevi involvente marginibus liberis. *S. capense* Nees. In *P. b. S.* 4.

3. *S. Sickmanianum* Kunth; fol. margine carinaque spinuloso-scabris; spicis decompositis oblongo-lanceolatis acutis; squama feminea marginibus a basi ad apicem connata utriculum referente. In *P. b. S.* 4.

4. *S. Ecklonii* Nees; spica composita densa; spiculis plerisque androgynis demum patenti-recurvis; squama fertili clausa striata. In *P. b. S.* 4.

5. *S. Thunbergii* Nees; spica decomposita densa, partialibus aggregatis subpedunculatis; spiculis imbricatis androgynis supremis masculis; squama fertili clausa striata recta. *Carex capensis* Thunb. In *P. b. S.* 4.

6. *S. rufum* Nees; spicis axillariibus ovatis longe pedunculatis terminali composita; spiculis confertis; squama feminea una libera truncata terminalibus pluribus masculis setaceo-cuspidatis. In *P. b. S.* 4.

4793. TYPHA L. (1737).

1. *T. latifolia* L. fol. linearibus planis caulem florigerum suprantibus; spadice masculo femineo contiguo utroque cylindraceo. Fl. dan. t. 645. Schk. t. 271. Nees gen. t. 1. In *Europa*. 4.

2. *T. angustifolia* L. fol. linearibus inferne canaliculatis caulem florigerum superantibus; spadice masculo a femineo remoto utroque cylindraceo.

E. B. t. 1456. Fl. dan. t. 815. In *Europa*. 4.

3. *T. minima* Funk; fol. caule florigerorum lanceolatis caule multoties brevioribus, fasciculorum sterium anguste linearibus; spadicibus remotis cylindricis, femineo denique ellip. Poll. ver. t. 1. In *Europa*. 4.

4. *T. nana* Calem. diss. f. 23. spica feminea ovali oblonga mascula contigua; filamentis indivisis; fol. anguste linearibus semicylindricis leviter canaliculatis. *Prope Nizzam*. 4.

5. *T. domingensis* Pers. fol. subensiformibus; spica mascula feminea que remotis. In *Domingo*. 4.

6. *T. Brownii* Kunth; fol. semi-cylindricis extrorsum planis; spica mascula a feminea remota. *T. angustifolia* R. Br. In *Nor. Holl.* 4.

7. *T. tenuifolia* H. et K. fol. planisculis; squamis spadicis masculi a femineo remoti apice bi-aut trifidis. In *Venezuela*. 4.

8. *T. elephantina* Roxb. fol. ensiformibus obtusis interne planis longitudine caulis; amento masculo a femineo distincto interstitio 2—3-polllicari; filamentis apice 2—3 antheriferis. In *Ind. or.* 4.

9. *T. truxillensis* H. et K. fol. subtus convexiusculis; squamis spadicis masculi femineo insidentibus apice 3—4-fidis laciniis subhamiformibus. In *Truxillo*. 4.

4794. SPARGANIUM L. (1747).

1. *S. ramosum* L. caule erecto ramoso; fol. basi triquetris lateribus concavis; stigmate lineari. E. B. t. 745. Fl. dan. t. 1282. Nees g. 2. t. 2. f. 1. In *Europa*. 4.

2. *S. simplex* Huds. caule erecto simplici; fol. basi 3-quebris lateribus planis; stigmate lineari. E. B. t. 745. Fl. dan. t. 932. Nees g. 2. f. 2—14. In *Europa*. 4.

3. *S. americanum* Nutt. caule subsimplici; fol. inferioribus caulem aequantibus v. superantibus floralibus basi concavis erectis; stigmate simplici ovoideo-oblongo obliquo vix dimidiam longitudinem styli aequante. In *Carolina*. 4.

4. *S. nutans* L. caule simplici foliisque decumbentibus v. nutantibus, his planis; spadice masculo subsoli-

tario; stigmate oblongo. E. B. t. 273. Fl. dan. t. 260. In Europa. 4.

5. *S. angustifolium* R. Br. fol. planis laxis caule longioribus; amentis masculis numerosis; stigmatibus ovalibus; drupis obovatis laevibus apice depressis. In Nov. Holl. 4.

4795. TRAGIA L. (1747).

a. Caulis scandens.

1. *T. volubilis* L. fol. cordatis ovatis acuminatis serratis glabriusculis; petiolis ciliatis; foliolis calycinis femineis indivisis hirtis; caule scandente. Sloane hist. t. 82. f. 1. In Ind. occ. ♂.

2. *T. pedunculata* Beauv. fl. Oware t. 54. fol. oblongis dentatis subpilosis; spicis pedunculatis; caule scandente. In Benin. ♂.

3. *T. cordata* Vahl; fol. cordatis acuminatis serratis subtus hispidis; foliolis calycinis femineis hirsutis pinnatifidis; caule scandente. In Arabia fel. ♂.

4. *T. hispida* Willd. fol. cordatis lanceolatis acuminatis subintegerrimis hispidis; foliolis calycinis femineis pinnatifidis setoso-hispida. In Ind. or. ♂.

5. *T. macrocarpa* Willd. fol. profunde cordatis ovatis acute dentatis hispidis; caule scandente. In Kentucky. ♂.

6. *T. hirsuta* Blume; fol. cordato-ovalibus acuminatis denticulatis hirsutis; calycibus femineis 6-partitis indivisis; caule scaudente. In Java. ♂.

7. *T. villosa* Thunb. fol. cordatis villosis subtus hirsutis. In P. b. S. ♂.

8. *T. capensis* Thunb. fol. cordato-ovatis dentatis hispidis; involucro pectinato; caule volubili. In Ind. or. ♂.

9. *T. involucrata* Willd. fol. hispidis ovatis acuminatis serratis; foliolis calycinis famineis pinnatifidis setoso-hispida. Jacq. ic. t. 100. Rheede 2. t. 39. In Ind. or. Ⓢ.

b. Caulis erectus.

10. *T. virgata* Poir. fol. oblongo-lanceolatis acutiusculis serratis glabris; spicis axillaribus filiformibus solitariis terminalibus fasciculatis. T. plumosa Desf. Lam. ill. t. 764. f. 2. In ? ♂.

11. *T. reticulata* Poir. fol. ovatis obtusis crenatis glabris subtus reticu-

latis; spicis axillaribus filiformibus. In ins. Mascar. ♂.

12. *T. interrupta* Spr. fol. longissime petiolatis ovatis acutis serratis subhirsutis; glomerulis in racemo longe pedunculato. Burm. Zeyl. t. 63. f. 1. In Ceylona. ♂.

13. *T. urticaefolia* Michx. fol. coriatis ovatis serratis hirsutissimis; spicis axillaribus. T. Mercurialis Walt. In Am. bor. ♂.

14. *T. nepetaefolia* Cav. ic. t. 557. f. 1. fol. ovatis cordatis serratis hispidis; caule erecto ramosissimo. In Nov. Hispan. ♂.

15. *T. Mercurialis* L. fol. ovatis cordatis serratis acuminatis; spicis paniculatis; caule erecto. Rheede 10. t. 2. In Ind. or. ♂.

16. *T. urens* L. fol. lanceolatis sessilibus obtusis subdentatis caueque erecto ramoso pubescentibus. In Am. bor. ♂.

17. *T. cannabina* L. fil. fol. tripartitis dentato-serratis hispidis; spicis axillaribus pedunculatis. In Ind. or. ♂.

18. *T. pinnata* Andr. Juss. tent. t. ... fol. subhippinnatifidis glabris; laciiniis linearibus obtusiusculis abbreviatis; racemis axillaribus. In Montevideo. ♂.

19. *T. infesta* Mart. fol. ovatis acuminatis argute serratis cauleque hirsutis; fructibus hispidis. In Brasilia. ♂.

4796. EXCOECARIA Willd. (1791).

a. Monoicae.

1. *E. lucida* Sw. floribus pedicellatis; staminibus trichotomis, femineis pedunculatis; fol. ellipticis subserratis. In Jamaica. ♂.

2. *E. glandulosa* Sw. floribus pedicellatis; staminibus conglomeratis; squama glandulifera, femineis sessilibus solitariis. Sloane t. 158. f. 1. In Jamaica. ♂.

3. *E. discolor* Spr. fol. oblongis ntrinque attenuatis integerimis supra lucidis subtus glaucescentibus; amentis filiformibus; floribus geminis; germine stipitato. In Brasilia. ♂.

4. *concolor* Spr. fol. oblongo-lanceolatis integerrimis concoloribus glaberrimis; amentis filiformibus; germine stipitato. Gersonia Spr. In Brasilia. 4.

b. Dioeciae.

5. *E. Agallocha* L. fol. ovatis subacutis crenatis; floribus fem. racemosis. Rumph 2. t. 79. In Ceylona. ♂.

6. *E. tinifolia* Sw. fol. ovato-oblongis obtusis subintegerrimis; floribus feminis racemosis; staminibus 3-partitis. In Jamuica. ♂.

7. *E. Camellia* Willd. fol. ovato-oblongis acutiusculis integerrimis; floribus sessilibus, feminis spicatis. In Ind. or. ♂.

8. *E. cochinchinensis* Lour. fol. lanceolatis subserratis supra nitidis subtus ruberrimis; amenti squamis multifloris. In Cochinchina. ♂.

9. *E. brasiliensis* Spr. fol. oblongo-lanceolatis integerrimis supra nitidis; amentis feminis terminalibus erectis hirsutis. In Brasilia. ♂.

10. *E. ilicifolia* Spr. fol. oblongis utrinque attenuatis subcoriaceis nitidis spinuloso-dentatis; amentis masculis geminis erectis pube stellata incanis. In Brasilia. ♂.

4797. *MICROSTACHYS* Mart. (1823).

a. Fruticosae.

1. *M. myrtilloides* Mart. fol. ovalibus glanduloso-crenulatis subtus fructibusque pubescentibus. In Brasilia. ♂.

2. *M. marginata* Mart. fol. subcordato-ovalibus mucronatis coriaceis cartilagineo-crenulatis glaucis utrinque fructibusque glabris. In Brasilia. ♂.

3. *M. serrulata* Mart. fol. oblongo-lanceolatis acutiusculis serrulatis utrinque fructibusque pubescentibus. In Brasilia. ♂.

4. *M. daphnoides* Mart. fol. oblongo-ovatis crenulato-serrulatis glandulosis subtus incano-tomentosis; fructibus glabris. In Brasilia. ♂.

5. *M. coriacea* Mart. fol. ellipticis coriaceis integerrimis utrinque fructibusque glabris. In Brasilia. ♂.

6. *M. glandulosa* Mart. fol. subcordato-ovatis mucronatis tenuissime serrulatis glandulosis utrinque pubescentibus; fructibus glabris. In Brasilia. ♂.

7. *M. acalyphoides* Mart. fol. cordato-ovalis serrulatis subtus pilosis

basi glandulosis; fructibus glabriusculis. In Brasilia. ♀.

8. *M. crotonoides* Mart. fol. lanceolatis utrinque attenuatis glandulososerrulatis; fructibus glabris. In Brasilia. ♂.

9. *M. hispida* Mart. fol. ovato-lanceolatis glanduloso-serrulatis; utrinque pubescentibus; fructibus hispidis. In Brasilia. ♂.

10. *M. oleoides* Mart. fol. linearilanceolatis utrinque attenuatis tenuissime serrulatis basi glandulosis utrinque fructibusque pubescentibus. In Brasilia. ♂.

11. *M. salicifolia* Mart. fol. linearilanceolatis acuminatis crenatoserratis fructibusque glabris. In Brasilia. ♂.

12. *M. longifolia* Mart. fol. linearilanceolatis acutiusculis serrulatis subtus pubescentibus supra fructibusque glabris. In Brasilia. ♂.

13. *M. scoparia* Mart. fol. angusto-linearibus obtusiusculis calloso-crenulatis coriaceis utrinque fructibusque glabris. In Brasilia. ♂.

14. *M. bidentata* Mart. fol. linearibus acutiusculis argute serratis basi biglanduloso-dentatis utrinque fructibusque glabris. In Brasilia. ♀.

b. Herbaceae.

15. *M. Vahlii* Spr. fol. ovatis acuminatis subintegerrimis fructibusque pubescentibus. *Tragia corniculata* Vahl. *Microstachys* Andr. tent. t. 15. f. 50. In ins. Trinitat. ♂.

16. *M. glabrata* Mart. fol. cordato-ovatis acutiusculis crenatis utrinque fructibusque glabris. In Brasilia. ♂.

17. *M. tragoides* Mart. fol. ovatis acuminatis serratis canaque hirsutis; fructibus hispidis. In Brasilia. ♂.

18. *M. prostrata* Mart. fol. ovato-lanceolatis acutis glanduloso-crenulatis cauleque diffuso-pubescentibus; fructibus glabriusculis. In Brasilia. ♂.

19. *M. Chamaelia* Spr. fol. linearibus obtusiusculis integerrimis glabris; fructibus muricatis. *Tragia* L. Rheed 2. t. 34. In Ind. or. ♂.

4798. *CNESMONE* Blume. (1832).

1. *C. javanica* Blume. In Jara. ♂. *Suffruticosa scandens*. Fol. ovato-ob-

longa inaequaliter dentata. Spicae oppositifoliae. Planta valde stimulans.

4799. TRICHOSTEMON Blume. (1825).

1. *T. serratum* Blume. In *Jara*. ♀. Frutex fol. petiolatis oblongis acuminatis serratis subtus puberulis. Flores conferti racemosi.

4800. MICRANTHEA Desf. (1800).

1. *M. ericoides* Desf. In *Nov. Holl.* ♀. Frutex ramosissimus; fol. subternis linearibus; pedunculis axillaribus 1-floris

4801. ACHARIA Thunb. (1794).

1. *A. tragioides* Thunb. In *Afr. austr.* ♂. Herba ramosa. Fol. alterna petiolata trilobata-incisa pubescens. Flores axillares solitarii.

4802. AXYRIS L. (1747).

1. *A. amaranthoides* L. fol. ovatis; caule erecto; spicis simplicibus. Lam. ill. t. 753. Gmel. sib. 2. t. 2 et 3. In *Sibiria*. ♂.

2. *A. hybrida* L. fol. ovatis; caule erecto; spicis paniculatis. Gmel. l. c. t. 4. f. 1. In *Sibiria*. ♀.

3. *A. prostrata* L. fol. obovatis; caule subdiviso; floribus capitatis. Gmel. l. c. t. 4. f. 2. In *Sibiria*. ♂.

4803. HERNANDIA L. (1747).

1. *H. sonora* L. fol. peltatis. Lam. ill. t. 755. Rumph. 2. t. 85. In *Ind. or.* ♀. Arbor procera.

2. *H. origera* L. fol. ovatis basi petiolatis acuminatis cordatis. Rumph. 2. t. 85. *H. gujanensis* Willd. Aubl. guj. t. 309. In *Ind. or. et Guiana*. ♀.

4804. SAROTROSTACHYS.

1. *S. . . .* Klotsch. In *Brasilia*. ♀. Frutex ramis alternis teretibus. Fol. alterna subcoriacea oblonga spicae longissimae filiformes.

4805. ANTIDAPHNE Poepp. (1839).

1. *A. viscooides* Poepp. et Endl. nov. gen. t. 199. In *Peruvia*. ♀. Frutex parasiticus.

4806. PHILODICE Mart. (1825).

1. *P. Hoffmannseggii* Mart. nov. act. 17. t. 3. In *Para Brasilie*. 2. Fol. crassiuscula pellucida 5-nervia. Pedunc. 4-goni. Flores capitati.

4807. LITORELLA L. (1747).

1. *L. lacustris* L. Schk. t. 287. Sturm 41. In *Europa*. 2. Planta palmaris. Fol. subulata. Scapi 1-flori.

4808. ARGOTHAMNIA R. Br. (1756).

1. *A. candicans* Sw. fruticosa; fol. ovato-lanceolatis serratis subtus ramisque albo-pubescentibus; floribus racemosis axillaribus. Sloane jam. t. 86. f. 3. In *Jamaica*. ♀.

2. *A. herbacea* Spr. fol. subcordatis obtusis integrimis tomentosis; spicis paucifloris. In *Am. bor.* 2.

3. *A. pauciflora* Mirb. In *Am. austr.* 2.

4809. TRICARYUM Lour. (1790).

1. *T. cochinchinense* Lour. In *Cochinchina*. ♀. Arbor mediocris, fol. ovatis spicis congestis subterminalibus.

4810. BUXUS L. (1747).

1. *B. sempervirens* L. fol. ovatis; petiolis margine pilosiusculis; antheris ovato-sagittatis. Schk. t. 287. Guimp. t. 137. In *Europa*. 2.

2. *B. suffruticosa* Lam. fol. ovato-oblongis submembranaceis utroque latere concavis utrinque lucentibus; petiolis ciliatis antheris ovato-sagittatis. In *Europa*. 2.

3. *B. chinensis* Lk. fol. oppositis oblongis obtusis coriaceis junioribus pubescentibus; floribus solitariis brevissime pedunculatis. In *China*. ♀.

4. *B. balearica* Lam. fol. oblongis emarginatis coriaceis glaberrimis luisidis; floribus subsessiculatis; antheris linearibus. In *ins. Balearicis*. ♀.

4811. TRICERA Willd. (1791).

1. *T. cordifolia* Willd. fol. subcordato-ellipticis integerrimis coriaceis nitidis; floribus fasciculatis. *Buxus Spr.* In Ind. occ. ♂.

2. *T. laevigata* Willd. fol. distichis ovato-lanceolatis acutis glaberrimis subcoriaceis subitus aveniis; corymbis axillaribus sub-10-floris; antheris demum incurvis. *Buxus Spr.* Crantzia Vahl. In Jamaica. ♂.

3. *T. citrifolia* Willd. fol. lanceolatis acuminatis coriaceis glaberrimis nervis marginalibus; corymbis supra-axillaribus sub-10-floris; antheris demum incurvis. *Buxus Spr.* In Martinica. ♂.

4812. SARCOCCOCCA Lindl. (1826).

1. *S. pruniformis* Lindl. B. R. t. 1012. *Pachysandra coriacea* Hook. exot. fl. t. 148. *B. saligna* Don. In Ind. or. ♂. Folia lanceolata acuminata glabra. Racemi pauciflori cernui.

4813. SERPICULA L. (1747).

1. *S. repens* L. Lam. ill. t. 758. *Laurembergia* Berg. cap. t. 5. f. 1. In Afr. et ins. Mascar. ♂. Planta repens hispida. Fol. ovata v. linearia subintegerrima v. tridentata.

4814. DIOTIS Schreb. (1791).

1. *D. lanata* Pursh; suffruticosa lanuginosa; glomerulis florum axillaris lanato-tomentosis. Ad fl. Missouri. ♂.

2. *D. triplicina* Spr. caule herbaceo flexuoso ramoso; fol. integerimis obtusis; perigonis fructigeris longe pedunculatis emarginato-bilobis denticulo interjecto. Atriplex L. Fl. dan. t. 304. *D. pedunculata* Sturm 80.

3. *D. ceratooides* Willd. fol. lanceolatis incano-tomentosis; floribus femineis lanatis. *Eurotia* C. A. Mey. *Axyris* L. Jac. ic. t. 189. *Ceratospermum papposum* Pers. In Europa Caucaso et Sibiria. ♂.

4815. ERIOCaulon Gron. (1745).

1. *Paepalanthus* Mart. Stam. 3. *I. Capitula villosa* v. tomentosa.

A. Stigmata bifida.

Pedunculi 1-cephali.

* *Acaulia.*

1. *E. blepharophoron* Bongn. in act. Petrop. 6. t. 16. fol. rigidis linearibus subpungentibus glabris ciliatis basi hirsutis; pedunc. filiformibus sulcatis; capitulis hemisphaericis albo-lanatis. In Brasilia. ♀.

2. *E. Vauthurianum* Guill. in Deless. ic. 3. t. 25. pilosum; fol. caespitosis pedunculos aequantibus linearilanceolatis ensiformibus glabris margine ciliatis; pedunc. caespitosis; capitulis vix pilosis. In Brasilia. ♀.

3. *E. ensifolium* H. et K. nov. gen. t. 70. fol. rigidis linearis ensiformibus pilosis basi lanuginosis; pedunculis folia 2—3-plo superantibus compressis sulcatis; vaginis apice truncato-ciliatis. *Paepalanthus* Kunth. In Bogota. ♀.

* *Subcaulescentia.*

4. *E. paludosum* Bong. I. c. t. 9. fol. confertis linearibus basi lanatis faciebus glabris; pedunculis caespitosis filiformibus elongatis vaginis villosis. In Brasilia. ♀.

5. *E. iridifolium*; (*Paepalanthus* Kunth.) fol. rigidis subensiformibus glabris; pedunculis compressis folia superantibus vaginisque glabris; stigmatibus longissimis. In Brasilia. ♀.

6. *E. nigronireum* Hilar. fol. membranaceis linearibus acutis glabris; pedunculis fasciculatis filiformibus trisulcatis foliis longioribus; vaginis glabris acutis. In Brasilia. ♀.

7. *E. perpusillum*; (*Paepalanthus* Kunth.) a basi ramosum; fol. anguste linearibus acutis membranaceis glabris; pedunc. sulcato-trigonis vaginis glabris his acutis. Ad flum. Amazonum. ♀.

8. *E. zosteraeifolium*; (*Paepalanthus* Kunth.) caule simplici inferne repente dense folioso; fol. linearibus acutis glabris basi sublanuginosis tenuiter membranaceis trimervis; pedunculis vaginisque glabris. Eriocau-

E. plantagineum Bong. t. 17. In *Brasilia*. 4.

9. *E. polytrichoides*; (Paepalanthus Kunth.) caulinis adscendentibus simplicibus foliosis; fol. rigidis linearisubulatis basi pilosis; pedunculis fasciculatis filiformibus molliter pilosis; vaginis acuminatis ore pilosis. Eriocaulon tenue Poepp.. In *Para*. 4.

10. *E. congestum* H. et K. simplex adscendens; fol. linearis - ensiformibus longe pilosis; pedunculis filiformibus trisulcatis molliter pilosis; vaginis acutis. Ad *Orinocum*. 4.

11. *E. fasciculatum* Rottb. act. Havn. I. t. 2. f. 1. simplex erectum; fol. linearibus acutis membranaceis; vaginis pedunculisque pilosis his tenuissime filiformibus; capitulis sordide albo-pilosis; bracteis stellato-patentibus viridibus. In *Surinamo Bahia* etc. 4.

12. *E. Lamarckii* Kunth (sub Paepalantho) simplex erectum foliosum; fol. ensiformi-linearibus mucronatis glabris recurvis; pedunc. filiformibus sub-6-gonis villosulis; capitulis subglobosis albido-villosis. *E. fasciculatum* Lam. ill. t. 50. f. 3. In *Gujana*. 4.

13. *E. dendroides* H. et K. l.c. t. 69. f. 2. erectum simplex foliosum; fol. linearibus acutis pedunculisque trisulcatis filiformibus glabris; vaginis apice hyalino-ciliatis; capitulis sordide villosis. In *Bogota*. 4.

14. *E. molle* Kunth (sub Paepalantho) caespitosum dense foliosum; fol. rigidis linearis - ensiformibus molliter pilosis; pedunculis filiformibus compresso-ancipitibus, angulis pilosis; sepalis apice albo-hirsutis. In *Brasilia*. 4.

b. Pedunculi subcorymbosi.

15. *E. monticola* Mart. (sub Paepalantho.) acaule caespitosum glabrum; fol. lanceolatis acutis erizomate villoso, vaginis truncatis; capitulis numerosis vaginis plumbeo-fuscis. In *Brasilia*. 4.

16. *E. tuberosum* Bong. t. 22. acaule rhizomate tuberoso; fol. caespitosis linearis - lanceolatis acuminatis; vaginis bifidis; pedunculis complanatis; ramis 5-cephalis. In *Brasilia*. 4.

17. *E. corymbosum* Bong. t. 18. acaule fol. caespitosis linearis-lanceo-

latis acuminatis ciliatis pilosis; pedunculis complanatis vaginisque subtruncatis glabris. In *Brasilia*. 4.

18. *E. Spixianum* Mart. nov. act. 17. t. 14. f. 1. sub Paepalantho; caule brevi simplici lanuginoso; fol. caespitosis ovato-linearibus acuminatis ciliatis; scapis compresso-planis 3-8-fidis; bracteis castaneis nitidis. In *Brasilia*. 4.

19. *E. rigidulum* Mart. l. c. t. 2. f. 1-7. sub Paepalantho; caule brevi simplici lanuginoso; fol. caespitosis erectis linearis-lanceolatis acuminatis vaginas truncatas 4-pla superantibus; scapis compressis 8-20-fidis. In *Brasilia*. 4.

20. *E. metaleucum* Bong. l. c. t. 23. caulescens; fol. amplexicaulibus longe acuminatis sparse pilosis basi ciliatis; pedunculis complanatis; vaginis glabris subbifidis. In *Brasilia*. 4.

2. Stamina 2.

21. *E. flaccidum* Bong. l. c. t. 4. adscendens ramosum; fol. subulatis mucronatis rigidis margine pilosis; pedunculis fasciculatis elongatis trisulcatis; vaginis glabris. In *Brasilia*. 4.

22. *E. bifidum* Schrad. caule bifido folioso; fol. linearis-subulatis recurvatis pilosis; pedunculis angulatis hirtis; involuci foliolis calycibusque pilosis. In *Brasilia*. 4.

23. *E. juniperinum*; (Paepalanthus Kunth.) erectum v. adscendens foliosum simplex; fol. subulatis mucronatis rigidis interne pilosis recurvatis; pedunc. 2-8 fasciculatis longissimis filiformibus trisulcatis; vaginis molliter pilosis. In *Brasilia*. 4.

24. *E. helichrysoides*; (Paepalanthus Kunth.) acaule; fol. angustis ensiformibus ciliatis basi lanuginosis; pedunculis retrorsum sericeo-pubescentibus; capitulis depresso-hemisphaericis albido-vilosis. In *Brasilia*. 4.

B. Stigmata indivisa.

1. Pedunculi umbellati.

25. *E. Maximiliani* Schrad. ramosum dense foliosum; fol. caulinis basi vaginantibus patentibus lanceolatolatis; pedunculis pubescentibus; vaginis glabris. Bong. l. c. t. 1. In *Brasilia*. 4.

26. *E. ramosum* Bong. ramosum dense foliosum fol. semiamplexicaulinibus patentibus lanceolato-acuminatis canaliculatis ciliatis; vaginis bifidis peduncularis pilosis. Wickstr. in K. v. A. Handb. 1820. t. 3. *In Brasilia*. 2.

27. *E. affine* Bong. l. c. t. 32. caespitosum foliosum; fol. caulinis amplexicaulinibus patentibus lanceolatis acuminatis ciliatis; vaginis glabris bifidis. *In Brasilia*. 2.

28. *E. divaricatum* Bong. l. c. t. 3. ramosum foliosum inferne denudatum; ramis divaricatis; fol. amplexicaulinibus lanceolatis acuminatis canaliculatis recurvis; pedunculus pilosis vaginis apice pilosiusculis. *In Brasilia*. 2.

29. *E. rigidum* Brong. l. c. t. 31. ramosum foliosum inferne denudatum oblique striatum; ramis brevibus erectis; fol. amplexicaulinibus erectis lanceolatis acuminatis planiusculis vaginis glabris. *In Brasilia*. 2.

30. *E. polyanthum* Bongn. t. 2. caespitosum; fol. radicalibus e basi perlata longe lanceolatis obtusis, caulinis minoribus amplexicaulinibus adpressis planis; pedunc. pilosis; vaginis bifidis glabris. *In Brasilia*. 2.

31. *E. brachypus* Bong. t. 6. caulinibus caespitosis simplicibus; fol. radicalibus linearibus pilosis; pedunculus pubescentibus; vaginis glabriusculis. *In Brasilia*. 2.

32. *E. ciliatum* Bong. l. c. t. 5. simplex; fol. radicalibus e basi lata acuminatis ciliatis; pedunculus facile deciduis subpubescentibus; vaginis bifidis. *In Brasilia*. 2.

33. *E. bahiense* Bong. l. c. t. 20. caespitosum; fol. radicalibus lanceolatis obtusiusculis pilosis ciliatis; pedunculus persistentibus pilosis; vaginis bifidis glabriusculis. *In Bahia*. 2.

2. Species anomalae.

a. Caulescentia v. subcaulescentia.

34. *E. pilosum* H. et K. caespitosum, foliosum; fol. rigidis anguste ensiformibus mucronatis margine pilosis; pedunc. solitariis folia subaequantibus bracteis calycibusque albido-hirsutis. *In Bogotá*. 2.

35. *E. distichophyllum* Mart. in nov. Act. 17. t. 23, sub Paepalantho;

caulinibus strictis ramisque dense bifarium imbricatis; fol. lanceolatis obtusiusculis concavis ciliatis; pedunc. solitariis; squamis fuscis glabris. *In Brasilia*. 2.

36. *E. Bongardi* Kunth, sub Paepalantho; decumbens ramosum; fol. amplexicaulinibus sublinearibus canaliculatis basi pilosis recurvis; pedunculus fasciculatus vaginique pubescentibus. *E. repens* Bongn. l. c. t. 7. *In Brasilia*. 2.

37. *E. microphyllum* Guillemin. in Deless. ic. t. 96. caule gracili ramoso; ramis verticillatis; fol. amplexicaulinibus lineari-lanceolatis recurvis ciliatis; pedunculus tortilis subumbellatus. *In Brasilia*. 2.

38. *E. bryoides* Bong. l. c. t. 10. f. 1. exiguum; caulinibus confertis ramosis dense foliosis; fol. linearibus acuminatis subpilosus; pedunculus fasciculatus pubescentibus; vaginis bifidis. *In Brasilia*. 2.

39. *E. cyabense* Bong. l. l. c. t. 10. f. 2. pusillum caulescens; caulinis subcaespitosis foliosis; fol. caulinis linearibus glabris; pedunculus fasciculatus, fol. involucrantibus brevioribus; vaginis nullis. *In Brasilia*.

40. *E. glareosum* Bong. l. c. t. 25. subacaule; fol. radicalibus caespitosis patentissimis brevissimis linearibus obtusis villosis; pedunculus retrorsum pubescentibus; vaginis foliorum bifidis pilosis. *In Brasilia*. 2.

41. *E. geniculatum* Bong. l. c. t. 31. subacaule; fol. radicalibus linearibus obtusiusculis pilosis ciliatis; pedunculus adpressis pilosis; vaginis bifidis. *In Brasilia*. 2.

b. Acaulia.

42. *E. ligulatum* Bong. t. 12. pusillum; fol. confertis pedunculos subaequantibus lingulatis obtusis subciliatis; vagina glabra albida. *In Brasilia*. 2.

43. *E. currifolium* Bong. l. c. t. 24. acaule; fol. dense confertis linearibus mucronatis curvatis longe pilosis; pedunculus fasciculatus pubescentibus; vaginis brevibus pilosis. *In Brasilia*. 2.

44. *E. mucronatum* Bong. l. c. t. 19. acaule; fol. brevibus dense confertis linearibus mucronatis apice subincurvis parce pilosis; pedunculo sub-

solitario piloso; vagina pilosa. In Brasilia. 2.

45. *E. gramineum* Bong. l. c. t. 26. acaule; fol. caespitosis linearibus acutis apice subincurvis subpilosus; pedunculis caespitosis tenuibus pilosis; vaginis brevibus glabris. *In Brasilia.* 2.

46. *E. macrorhizon* Bong. l. c. t. 11. acaule; rhizomate crasso; fol. linearibus pilosis subtus canescensibus; pedunculis piloso-canis; vaginis pilosis. *In Brasilia.* 2.

47. *E. pitiferum* Bogn. l. c. t. 12. acaule rhizomate crasso; fol. linearibus pubescentibus margine pilosis; pedunculis pubescentibus; vaginis pilosis apice obtusis et piloso-lanceolatis. *In Brasilia.* 2.

48. *E. stellare*. Guillemin. in Deless. ic. 3. t. 97. acanthe, fol. caespitosis erecto-patulus linear-i-lanceolatis obtusiusculis nervo prominente marginatis ciliolatis; pedunc. pubescentibus; vaginis adpressis. *In Brasilia.* 2.

49. *E. flagellare* Guillemin. in Del. ic. 3. t. 98. fol. radicalibus densissime caespitosis linearibus glabris mucronulatis; vaginis pedunculisque glabris nitidis tortilibus. *In Brasilia.* 2.

II. Capitula glabriuscula.

a. Sepala mascula interiora libera.

† Involucra radiato-patentia.

50. *E. elegans* Bong. t. 13. acaule; fol. caespitosis vaginis vix superantibus basi fusco-lanatis setaceis pubescentibus; pedunculis caespitosis tenuibus glabris; vaginis pubescentibus *In Brasilia.* Ⓛ.

51. *E. nireum* Bong. t. 37. acaule; fol. caespitosis vaginas subaequantibus setaceis pilosis glaucescentibus; pedunculis caespitosis tenuibus subglabris vaginis subpilosus. *In Brasilia.* 2.

52. *E. nitidum* Bong. t. 14. acaule fol. caespitosis vaginis brevioribus patent-diffusis linearibus obtusis glabris; pedunculis caespitosis vaginisque adpresso-pilosulis. *In Brasilia.* Ⓛ.

†† Involucra turbinata.

53. *E. vernonioides* Kunth. sub Paepalantho; acaule; fol. caespitosis

rigidis ensiformi-linearibus obtusis glabris; pedunculis filiformibus sex-sulcatis puberulis folia triplo superantibus; vaginis glabris acutis; floribus bracteas superantibus. *In Brasilia.* 2.

b. Sepala mascula subconnata.

† Acaulia.

54. *E. rufulum* Hilar. caespitosum; fol. rigido-membranaceis ensiformibus vaginisque pilosis; pedunculis 6-sulcatis inferne hirsutis; bracteis obovatis aridis fusco-stramineis glabris. *In Brasilia.* 2.

55. *E. hirsutum* Wikstr. l. c. t. 4. fol. distichis linearibus erectis membranaceis vaginis pedunculisque moliter pilosis; bracteis oblongis acutis stramineo-fuscis pilosis; sepalis femineis obtusis. *In Brasilia.* 2.

56. *E. nitens* Bong. t. 55. caespitosum; fol. rigidis ensiformi-linearibus acutis; vaginis folia 4—5-plo superantibus hirsutis; pedunculis longissimis filiformibus trisulcatis; bracteis obtusis stramineis glabris. *In Brasilia.* 2.

57. *E. flavidulum* Michx. caespitosum; fol. angustissimis linearibus vaginisque glabris; pedunculis filiformibus 5-sulcatis; bracteis spathulato oblongis aridis stramineo-pallidis; sepalis masculis obtusis ciliatis. *In Am. bor.* Ⓛ.

58. *E. nardifolium* Kunth (sub Paepalantho) caespitosum; fol. setaceo-linearibus vaginisque glabris; pedunculis filiformibus 7-sulcatis puberulis; bracteis aridis albidis spathulatis; sepalis acutis glabris. *In Brasilia.* 2.

59. *E. morulum* Kunth (sub Paepalantho.) caespitosum; fol. angustissimis ensiformibus vaginisque nigrescentibus glabris; pedunculis filiformibus profunde 5—6-sulcatis pubescentibus; bracteis oblongis acutis aridis. *In Brasilia.* 2.

60. *E. brizoides* Kunth (sub Paepalantho); caespitosum; fol. setaceo-linearibus glabris recurvatis; vaginis glandulosi-pilosus; pedunculis capillaceis trisulcatis; bracteis ellipticis obtusis stramineo-albidis. *In Brasilia.* 2.

61. *E. tenue* H. et K. fol. setaceo-linearibus obtusiusculis membranaceis vaginisque glabris; pedunculis capillaribus trisulcatis puberulis; bracteis

obovatis obtusis aridis albis; sepalis masculis obtusis, feminineis acutis. *Ad flum. Tuamini.* 2.

† *Caulescentia.*

62. *E. anthemidiflorum* Bong. t. 15. caule brevi simplici nudo; fol. radicalibus confertis brevissimis linearibus obtusiusculis; pedunculo terminali subsotitario vaginaque pubescente. *In Brasilia.* 2.

63. *E. Humboldtii* Kunth sub Paepalantho; proliferum caulescens; caule simplici nudo glabro; fol. angustissime linearibus obtusiusculis 5-nerviis fenestratis; pedunculis umbellato-congestis filiformibus 3-sulcatis hirtellis; bracteis spathulatis acutis hyalinis albidis. *E. umbellatum* H. et K. *Ad Orinocum.* 2.

64. *E. verticillatum* Bong. t. 8. caule erecto simplici folioso; fol. radicalibus confertis linearibus acutis pubescentibus; caulinis dense verticillatis; vaginis pubescentibus. *In Brasilia.* 2.

65. *E. umbellatum* Lam. ill. t. 50. f. 4. caule simplici erecto nudo, fol. linearibus acuto-mucronatis, mucrone recurvo 7-nerviis pilosis; pedunculis umbellatis filiformibus 6-sulcatis vaginisque pilosis; bracteis hyalinis albidis pilosis. *In Guiana et Brasilia.* 2.

66. *E. caulescens* Poir. caule simplici folioso albido-lanato; fol. lanceolato-linearibus recurvo-mucronulatis multinerviis pilosiusculis; pedunculis fasciculato-umbellatis filiformibus 3-sulcatis vaginisque pilosis; bracteis oblongis acutis hyalinis albo-stramineis. *In Brasilia.* 2.

67. *E. nubigenum* Kunth sub Paepalantho; caespitosum; fol. linearibus ensiformibus mucronatis rigidis glabris; bracteis stramineis; sepalis subulatis glabris. *In Brasilia.*

2. *Eriocaulia vera* Kunth.
Stamina 6.

a. *American a tetrandra.*

68. *E. septangulare* With. Hook. f. lond. nov. ser. t. 52. acaule; fol. ensiformi-linearibus 5-nerviis pellucidis pedunculis vaginisque glabris; bracteis rotundatis. *E. decangulare*

Hope phil. Trans. 59. t. 12. *In Scotia et Am. bor.* 2.

69. *E. guaphatodes* Michx. acaule fol. ensiformi-lineari bus fenestrato-multinerviis pellucidis rigidis pedunculis vaginisque glabris illis decem-striatis compressis. *Sphaerochloa compressa.* Beauv. ann. sc. nat. 18.8. t. 5. f. 1. *In Am. bor.* 2.

70. *E. decangulare* L. acaule; fol. ensiformi-lineari bus fenestrato-multinerviis rigidis involutis pedunculis vaginisque glabris; bracteis, his obtusis illis 10-12-sulcatis; lobis calycis ciliatis. *Randalia Beauv.* I. c. t. 6. f. 2. *In Am. bor.* 2.

b. *Hexandra.*

71. *E. Gujanense*; (*E. Humboldtii* Kunth) acaule; fol. elongatis linearibus acutis rigidis pedunculisque glabris, his 10-striatis teretiusculis; calyce masculo externe hirsuto bilabiato-trilobo. *In Guiana.* 2.

72. *E. Benthami* Kunth; rachi subglobosa glabra; squamis floriferis spathulatis apice ciliatis; floribus feminineis exterioribus numerosis; sepalis petalisque apice ciliatis; staminibus 6, triabus longioribus. *In Mexico.* 2.

73. *E. Sellowianum* Kunth; acaule, fol. brevibus lanceolato-linearibus ensiformibus obtusis planis obsolete multinerviis non pellucidis, pedunculis vaginisque glabris illis 8-10-sulcatis; bracteis rotundatis; calyce masculo irregulariter bilabiato-3-lobo lobis hirsutis. *In Brasilia.* 2.

74. *E. Pardinum*; *E. elichrysoides* Bong. t. 27. acaule fol. caespitosis e basi lata lanceolatis obtusis pedunculis vaginisque glabris; bracteis obtusis calyce masculo 3-lobo, lobis hirsutis. *Ad Rio Pardo et Rio Pedras.* 2.

75. *E. modestum* Kunth; acaule; fol. subensiformi-linearibus planis multinerviis pellucidis vaginis pedunculisque glabris, illis 10-striatis; calycis masculi limbo irregulariter bilabiato-3-lobo, lobis interne hirsutis. *In Brasilia.* 2.

76. *E. microcephalum* H. et K. acaule; fol. lanceolato-ensiformibus fenestrato-7-9-nerviis pedunculis vaginisque glabris illis 5-sulcatis; bracteis ellipticis rotundatis acutis; se-

palis masculis exterioribus postice connatis. In Quito. 2.

77. *E. gomphrenoides* Kunth; acaule; fol. e basi lata linearibus fenestato-mul inerviis basi pellucidis; pedunculis 8—9-sulcatis; bracteis acutis; sepalis masculis interioribus tubulosos connatis. In Brasilia. 2.

78. *E. leptophyllum* Kunth; acaule fol. angustissime linearibus sulcatangustatis 5-nerviis; pedunculis vaginisque glabris illis sulcatis; bracteis obtusis; sepalis apice pilosis. In Brasilia.

79. *E. metanocephalum* Kunth; caule simplici emerso densissime folioso; fol. angustissime linearibus 1-nerviis pellucidis; pedunculis vaginisque glabris illis umbellato-congestis sulcatis; calyce masculo interiore limbo trilobo, sepalis femineis interioribus glanduliferis. In Brasilia. 2.

2. Asiatica.

80. *E. setaceum* L. (Rheede t. 12. t. 68.) caule simplici elongato densissime foliaceo; fol. setaceis tubulosis bifistulosis; pedunculis umbellato-congestis 6-sulcatis; capitulis glabris. Petiv. gaz. t. 33. f. 10. In Ind. or. 2.

81. *E. sexangulare* L. Burm. Ind. t. 9. f. 4. acaule; fol. angustissime linearibus 3-nerviis; pellucidis pedunculis vaginisque glabris illis 5-sulcatis; bracteis elongatis obtusis; calyce masculo interiore inaequaliter 3-lobo tubo glabro. Leucocephala spathacea Roxb. In Ind. or. 2.

82. *E. Hamiltonianum* Mart. glabrum; rhizome simplici perenni; scapis striatis, folia linear-lanceolata acuminata plus duplo superantibus; capitulis globosis nitidis testaceis glabris. In Gualpara. 2.

83. *E. oryzetorum* Mart. rhizomate brevi apice folioso; fol. linearibus apice incrassatis pellucidis; pedunculis 6-sulcatis; capitulis subvilloso; bracteis obovatis longe acuminatis. In Nepalia. 2.

84. *E. tuzulaefolium* Mart. rhizomate simplici apice folioso, fol. ensiformi-linearibus acutis 9—11-nerviis pellucidis glabris; pedunculis umbellato-congestis 5-sulcatis glabris; capitulis albidovilloso; bracteis obovatis rotundatis, calycis masculi dentibus glabris glanduliferis. In Silhet. 2.

85. *E. nepalense* Prescott. caule brevi simplici radiculoso superne folioso; fol. gramineis fenestrato-multinerviis pellucidis glabris; pedunculis fasciculato-congestis; capitulis albidovilloso; calyce masculo irregulariter trilobo; lobis eglandulosis. In Nepalia. 2.

86. *E. truncatum* Hamilt. acaule; fol. e basi lato-lanceolatis multinerviis non pellucidis pedunculis capitulisque glabris; bracteis obovatis obtusis; calycis masculi 3-lobi lobis glanduliferis, femineis subciliatis. In Monghir. 2.

87. *E. Xeranthemum* Mart. et Wall. rhizome simplici brevi apice folioso; fol. linearibus fenestrato-9—11-nerviis pellucidis; pedunculisque sulcatis glabris; bracteis scariosis oblongis inciso-serrulatis capitulum villosum duplo superantibus; sepalis masculis postice cohaerentibus. In Ind. or. 2.

88. *E. quinquangulare* L. pusillum acaule; fol. gramineis linearibus fenestrato-7-11-nerviis pellucidis purpurascens vaginis pedunculisque glabris his 5-sulcatis; capitulis albidovilloso; bracteis longo acuminatis; calycis masculi lobis apice ciliatis glanduliferis. Leucocephala gratiunifolia Roxb. In Ind. or. 2.

89. *E. argenteum* Mart. et Wall. acaule; fol. linearibus fenestrato-11-nerviis non pellucidis supra pilis punctiformibus adpressis densissime obsitis; pedunculis 6-sulcatis; capitulis niveo-villoso; calycis masculi lobis villoso-fimbriatis glanduliferis. E. Martianaum Wall. cat. In Ind. or. 2.

90. *E. gracile* Mart. et Wall. acaule; fol. linear-ensiformibus, fenestrato-5—7-nerviis pellucidis supra subtilissime strigulosis; pedunculis 6-sulcatis; capitulis albo-villoso; calycis masculis lobis superne pilosis eglandulosis; seminibus hirtellis. In Ind. or. 2.

91. *E. cristatum* Mart. et Wall. acaule caespitosum; fol. angustissime linearibus subensiformibus crassiusculis 9-nerviis pedunculisque 5-sulcatis glabris; capitulis niveo-villoso; bracteis obovatis obtusis; floribus dioicis; calycis masculi lobis albo-villoso antico maximo. In Ind. or. 2.

92. *E. borbonicum* Willd. acaule fol. ensiformi-linearibus acutis fenestrato-9—10-nerviis pedunculisque glabris;

capitulis subglobosis albo - villosis; calycis masculi laciniis 1-glandulosis apice pilosis. In ins. Borboniae. 4.

93. *E. striatum* Lam. ill. t. 50. f. 1. acaule; fol. ensiforme-linearibus acutis fenestrato-multinerviis pedunculisque glabris; capitulis hemisphaericis albo-villosis; calycis masculi interioris lobis elongatis apice ciliatis interne glanduliferis. In ins. Borboniae. 4.

94. *E. Brownianum* Wall. acaule; fol. elongatis gramineis multinerviis non pellucidis utrinque pubescentibus vaginas molliter pubescentes superantibus; pedunculus sulcato-7-angularibus puberulis; capitulis albo-villosis; calyce masculo interiore piloso trilobato. In Ind. or. 4.

95. *E. Wightianum* Mart. et Wall. acaule fol. late linearibus obtusis multinerviis; pedunculus 7-sulcatis pilosus; capitulis subglobosis albido - villosis; calyce masculo interiore irregulariter 3-lobo glabro, lobis parvis 1-glandulosis. In Ind. or. 4.

96. *E. Wallichianus* Mart. et Wall. acaule; fol. gramineo-linearibus fenestrato - multinerviis subpellucidis pedunculis vaginisque glabris; pedunculus sulcato-5-angularibus folia duplo superantibus; capitulis subcylindricis albo-pulveraceis; calycis masculi interioris lobis parvis 1-glandulosis apice ciliatis; seminibus striato-hirtellis. In Ind. or. 4.

97. *E. consanguineum* Kunth; acanthe, fol. anguste linearibus multinerviis pellucidis pedunculis vaginisque glabris; pedunculus 5-sulcatis; capitulis depresso - globosis albo - pulveraceis; calyce masculo interiore irregulariter 3-lobo, lobis parvis 1-glandulosis apice ciliatis; seminibus lineatis. In Ind. or. 4.

98. *E. longifolium* Nees; acanthe fol. anguste linearibus multinerviis vaginas longe superantibus pedunculisque glabris capitulis globosis albo-pulveraceis; sepalis exterioribus navicularibus carina alatis. *E. sexangulare* Willd. In Madagascar. 4.

* Species hexandrae.

99. *E. sericans* Mart. et Wall. scapis 6-angulis pilosis folia linearia acuminata glabra vaginasque ad medium pilosulas 4-plo superantibus; ca-

pitulis hemisphaericis; bracteis testaceis ellipticis interioribus superne dense albo-barbatis. In Torey. 4.

100. *E. nigrescens*; rhizome ceruno; scapo 4-pollicari striato folia anguste linearia acuta fenestrata vaginasque transverse truncatas duplo superante; capitulis globosis; bracteis perianthiiisque nigricantibus superne pilis eburneis barbatis. *E. melaleucum* Mart. *E. quinquangulare* Heyne. In Ind. or. 4.

101. *E. echinulatum* Mart. et Endl. digitale glabrum; scapis 4-angulis folia anguste linearia acuminata 3-4-plo superantibus; capitulis echinulatis pallidis. In Torey. 4.

102. *E. quinquangulare* Lour. culmo 5-angulari; fol. ensiformibus; capitulo globoso basi truncato albicante. In Cochinchina. 4.

103. *E. pubescens* Lam. scapo subviloso; fol. ensiformibus pubescentibus maximis; capitulo plano tomentoso. In Madagascar. 4.

104. *E. repens* Lam. ill. t. 50. f. 2. surculis foliosis repentibus; scapis nudis; fol. confertis ensiformibus recurvis. In Borbonia. 4.

Species nova-hollandicae.

Flores 6-fidi 6-vel 3-andri

105. *E. australe* R. Br. scapo septangulo fol. planis pilosiusculis duplo longiore; capituli squamis involucrantibus imbricatis glabris; paleis dorso pulvereo-dealbatis; perianthii foliolis exterioribus lateralibus carina atata erosa, interioribus barbatis nigromaculatis. In Nov. Holl. 4.

106. *E. Smithii* R. Br. scapo angulato striato fol. glabris planis multoties longiore; capitulo florido globoso; squamis involucrantibus paleisque imberibus; perianthii obsolete barbatis. In Nov. Holl. 4.

107. *E. pallidum* R. Br. scapo angulato fol. planis latiusculis parum longiore; capitulo convexo; paleis imberibus; perianthio femineo 5-partito; foliolis 2 exterioribus angustissimis, 3 interioribus ciliatis, masculo 3-andro exteriore 3-phyllo interioris laciniis obsoletis. In Nov. Holl. 4.

108. *E. nigricans* R. Br. scapo striato setaceo fol. planis glabris longiore; capitulo nigricante; florido

globoso, fructifero obovato squamis paleisque imberibus subovatis; perianthio femineo sub-3-phyllo, masculo interiore obsoleto; receptaculo lanato. *In Nov. Holl.* 4.

109. *E. nanum* R. Br. scapo striato fol. glabris vix longiore; capitulo convexo nigricante; squamis paleisque nudis subovatis; perianthio femineo 6-phyllo immaculato masculo exteriore spathaceo. *In Nov. Holl.* 4.

110. *E. cinereum* R. Br. scapis capillaribus striatis vagina 3-4-plo longioribus; capitulo convexo cinereo; squamis paleisque imberibus hyalinis lanceolatis; perianthio masculo interiore ciliato maculato; antheris albicantibus. *In Nov. Holl.* 4.

111. *E. pusillum* R. Br. scapis setaceis striatis vagina laxa vix duplo longioribus; squamis involucrantibus oblongis scariosis albis capitulum turbinatum pauciflorum superantibus; antheris nigris. *In Nov. Holl.* 4.

** Flores 4-fidi 4-andri.

112. *E. scariosum* R. Br. scapo multistriato fol. planiusculis longiore; capitulo subgloboso scarioso pallido; squamis exterioribus vacuis obtusis, paleis mucronatis imberibus; perianthii feminei exterioris foliolis lateribus falcatis, carina alata. *In Nov. Holl.* 4.

113. *E. fistulosum* R. Br. scapo multistriato fol. fistulosis compressis longiore; capitulo florido convexo nigricante; squamis exterioribus vacuis obtusis paleisque conformibus imberibus; perianthii feminei exterioris foliolis lateralibus carina dilatato-alata. *Randalia R. Br.* *In Nov. Holl.* 4.

114. *E. depressum* R. Br. scapo multistriato fol. fistulosis compressis longiore; capitulo florido depresso; squamis omnibus floriferis imberibus extimis rotundatis; perianthii feminei exterioribus foliolis lateralibus carina dilatato-alata. *Randalia Beauv.* *In Nov. Holl.* 4.

115. *E. deustum* R. Br. scapo angulato-striato fol. compresso-fistulosis vix longiore; capitulo depresso; squamis fere omnibus floriferis extimis rotundatis reliquis mucronulatis utrinque imberibus; perianthii feminei exterioris foliolis lateralibus; carina di-

latato-alata. *Randalia Beauv.* *In Nov. Holl.* 4.

116. *E. triangulare* L. culmo 3-angulari; fol. ensiformibus; capitulo ovato. *Moris. 3. s. 8. t. 16. f. 17. In Brasilia.* 4.

117. *E. Freurisii* Billb. culmo 3-gono; fol. setaceo-linearibus; capitulo hemisphaericus. *In Brasilia.* ④.

118. *E. plantaginoides* Hamilt. surculo brevi erecto folioso; fol. patentibus linearis-lanceolatis margine ciliatis; scapis fasciculato-patulis; calyce communi argenteo scarioso. *In Guiana.* ④.

Eriocaulia brasiliensis a Bongardio edita et ex Kunth affinitatis dubiae.

A. *Stamina 3-6. Capitula piloso-lanata.*

a. *Pedunculi fasciculati.*

119. *E. incanum* Bongn. act. Petrop. 6. t. 61. caule adscendente ramoso folioso; fol. amplexicaulibus adpressis lanceolatis villosis; pedunculis fasciculatis longissimis sericeo-incanis; vaginis villosis bifidis. *In Brasilia.* 4.

120. *E. canescens* Bong. t. 50. caule erecto subramoso folioso; fol. caulinis amplexicaulibus adpressis lanceolatis acuminatis mucronulatis canescensibus; pedunculis fasciculatis lanuginosis; vaginis pubescentibus. *In Brasilia.* 4.

121. *E. fastigiatum* Bong. t. 60. caule brevi simplici folioso; fol. caulinis lanceolatis longissime acuminatis basi subciliatis pubescentibus; pedunculis fastigiatis longissimis vaginisque pubescentibus. *In Brasilia.* 4.

122. *E. tortile* Bong. t. 49. caule brevi subramoso folioso; fol. caulinis linearis-lanceolatis pilosis; pedunculis fasciculatis elongatis gracilibus spiraller tortis glabris; vaginis pilosis. *In Bahia.* 4.

123. *E. saxatile* Bong. t. 30. subacaule fol. linearibus acuminatis pilosis tenuiter ciliatis; pedunculis filiformibus parce pilosis; vaginis pilosis. *In Brasilia.* 4.

124. *E. capitare* Bong. t. 48. subacaule fol. linearibus acuminatis mucronatis pubescentibus glaucis; pedunculis capillaribus subpubescentibus;

vaginis glabris subintegris apice piloso-barbatis. In Brasilia. 4.

125. *E. heteromallum* Bong. t. 39. acaule; fol. caespitosis linearibus obtusiusculis piloso-incanis subhomomallis; pedunculo solitario incano; vagina apice barbata. In Brasilia. 4.

126. *E. lanuginosum* Bong. t. 19. acaule; fol. dense caespitosis brevibus linearibus incurvis piloso-lanuginosis; pedunculis fasciculatis piloso-canescensibus; vaginis brevibus apice laciniatis. In Brasilia. 4.

127. *E. exiguum* Bong. t. 59. acaule; fol. linearibus acutis glabris; pedunculis fasciculatis pubescentibus; vaginis folia adaequantibus glabris. In Bahia. ①.

128. *E. calocephalum* Bong. t. 47. acaule fol. caespitosis vaginas subaequantibus, linearibus submucronatis superne pilosis; pedunculis caespitosis rigidis elongatis pilosiusculis; vaginis pilosis bifidis. In Brasilia. ②.

129. *E. Fischerianum* Bong. t. 29. acaule; fol. caespitosis vagina brevioribus linearibus acutis glabris; pedunculo solitario pubescente; vagina apice trifida. In Minas Geraes. ②.

130. *E. caespitosum* Wickstr. I. c. t. 4. acaule; fol. caespitosis linear-i-lanceolatis obtusiusculis ciliatis; pedunculis caespitosis pubescentibus apice lacinulatis. In Brasilia. 4.

131. *E. crassiscapum* Bong. acaule; fol. vagina brevioribus linearibus acuminatis reticulatis glabris; pedunculo crassiusculo fistuloso glabro; vagina laxa bifida. In Brasilia. 4.

132. *E. chrysanthum* Bong. t. 43. acaule; fol. vagina brevioribus linearibus acuminatis subpubescentibus; pedunculo solitario pubescente; vagina oblique fissa apice lacinulata. In Brasilia. ②.

133. *E. pubigerum* Bong. t. 42. acaule fol. linear-i-lanceolatis acutis pubescentibus pedunculis gracilibus pubescentibus; vaginis apice piloso-barbatis. In Brasilia. ②.

134. *E. flavescentis* Bong. t. t. 35. acaule pubescens fol. linear-i-lanceolatis subfalcatis nitentibus; pedunculis caespitosis; vaginis insignibus apice lacinulatis. In Brasilia.

135. *E. planifolium* Bong. t. 58. acaule fol. pedunculos subaequantibus late linear-i-lanceolatis acuminatis glabris glaucescenti-nitentibus; peduncu-

lis compressis striatis glabris; vaginis truncatis. In Brasilia. 4.

b. Pedunculi corymbosi compressi divisi.

136. *E. Riedelianum* Bong. t. 34. acaule pilosum; fol. caespitosis pedunculos subaequantibus erectis linear-i-lanceolatis acuminatis canescensibus ciliatis; pedunculis caespitosis incanis. In Bahia. 4.

137. *E. elongatum* Bong. t. 41. acaule pubescens; fol. erectis linearibus obtusiusculis; pedunculis longissimis; vaginis demum glabriusculis. In Brasilia. 4.

138. *E. macrocephalum* Bong. t. 33. acaule pubescens; fol. caespitosis; vaginis brevioribus erectis lanceolatis obtusis; pedunculis caespitosis longissimis subincanis; vaginis bifidis, lacinias obtusiusculis. In Brasilia. 4.

139. *E. falcatum* Bong. t. 57. acaule; fol. caespitosis vaginis brevioribus linear-i-lanceolatis falcatis pubescentibus; pedunculis caespitosis vaginisque pubescentibus. In Brasilia. 4.

c. Squamosa. Squamae capitulum insigne.

140. *E. latifolium* Bong. t. 64. acaule pubescens; fol. erectis pedunculos subaequantibus late lanceolatis acuminatis; pedunculis caespitosis; vaginis bifidis. In Brasilia. 4.

141. *E. argenteum* Bong. t. 52. acaule; fol. erectis e basi lata lanceolatis acuminatis acutis pedunculisque sericeo-argenteis; vaginis oblique fissis obtusis. In Brasilia. ②.

142. *E. elatum* Bong. t. 63. acaule; fol. erectis longissimis lanceolatis longe acuminatis pilosis basique ciliatis subtus argenteis; pedunculis caespitosis pubescentibus; vaginis pilosis. In Brasilia. 4.

143. *E. plumosum* Bong. t. 62. acaule; fol. vaginis brevioribus erectis lanceolatis acuminatis obtusis subglabris; pedunculis vaginisque pilosis. In Brasilia. 4.

144. *E. Langsdorffii* Bong. t. 51. caulescens; caule simplici folioso; fol. vaginantibus lanceolatis acuminatis ciliatis; pedunculo axillari solitario pilosiusculo; vagina pilosa. In Brasilia. 4.

145. *E. viviparum* Bong. t. 28. acaule; fol. radicalibus caespitosis acutis supra sparse pilosis subtus glabris; pedunculis vaginisque pilosis. *In Brasilia.* 2.

146. *E. proliferum* Bong. t. 28? acaule; fol. radicalibus caespitosis vaginas subaequantibus linearibus mucronatis pilosis; pedunc. albo-lanatis; vaginis pilosis bifidis. *In Brasilia.* 2.

B. Capitula glabriuscula.

147. *E. splendens* Bong. t. 66. caulescens caule erecto simplici folioso; fol. caulinis lanceolatis pubescentibus; pedunculis fasciculatis vaginisque pubescentibus. *In Brasilia.* 2.

148. *E. circinatum* Bong. t. 39. acaule pusillum; fol. radicalibus pedunculum aequantibus linearibus pubescentibus circinatis; pedunculis sub-solitarii pubescentibus; vagina oblique fissa. *In Brasilia.* 2.

149. *E. crassifolium* Bong. t. 29. acaule pusillum; fol. radicalibus pedunculos subaequantibus linearibus obtusis mucronulatis crassis margine sparse pilosis; pedunculis glabris; vaginis trifidis. *In Brasilia.*

150. *E. pusillum* Bong. t. 29. acaule fol. caespitosis vaginis brevioribus linearibus subcanaliculatis curvatis; pedunculis caespitosis pubescentibus; vaginis laxiusculis. *In Brasilia.* 2.

151. *E. filiforme* Bong. t. 53. acaule fol. vaginis brevioribus confertis patenti-diffusis lanceolatis acutis pubescentibus; pedunculis longissimis filiformibus spiraliter tortis glabris; vaginis pilosis. *In Brasilia.* 2.

152. *E. spirale* Bong. t. 45. acaule fol. vaginas subaequantibus confertis patenti-diffusis linearibus obtusis sparse pilosis; pedunculis caespitosis filiformibus spiraliter tortis glabris; vaginis pilosis 3-fidis. *In Brasilia.* 2.

153. *E. gracile* Bong. t. 46. acaule; fol. vaginas sequantibus confertis linearibus acutis pilosiusculis; pedunculis caespitosis filiformibus pubescentibus; vaginis pilosiusculis. *In Brasilia.* 2.

154. *E. xeranthemooides* Bong. t. 40. acaule; fol. elongatis linearibus canaliculatis mucronatis supra glabris subtus pubescentibus; pedunculo so-

litario elongato subpubescente; vaginis pubescentibus bifidis. *In Brasilia.* 2.

155. *E. centaureoides* Bong. t. 45. acaule; fol. elongatis basi dilatatis ciliatisque linearibus obtusiusculis; pedunculo solitario pubernlo vagina oblique fissa. *In Brasilia.* 2.

156. *E. Prescottianum* Bong. t. 36. acaule fol. lanceolatis acuminatis glabriusculis; pedunculo solitario vaginaque pubescente. *In Brasilia.*

157. *E. aciphyllum* Bong. t. 38. caulescens; caule brevissimo ramuloso; fol. caespitosis vaginis brevioribus lanceolato-linearibus acutis canaliculatis; pedunculis caespitosis vaginisque pubescentibus. *In Brasilia.* 2.

C. Stamina duo.

158. *E. speciosum* Bong. t. 67. caulescens; caule simplici folioso; fol. lanceolatis acuminatis ciliatis planis; pedunculis fasciculatis subpubescentibus vaginis laxis trifidis. *In Brasilia.*

159. *E. trichophyllum* Bong. t. 54. caulescens; caule subramoso folioso; fol. caulinis amplexicaulibus lanceolatis acuminatis mucronatis subcarinatis piloso-canescens; pedunculis terminalibus vaginisque pilosis. *In Brasilia.*

160. *E. amoenum* Bong. t. 56. caulescens caule erecto simplici folioso; fol. amplexicaulibus late lanceolatis acuminatis adpressis glabris pedunculis fasciculatis glabris; vaginis bifidis. *In Brasilia.* 2.

161. *E. sparganioides* Bong. t. 68. acaule; fol. erectis linear-lanceolatis obtusiusculis reticulatis glabris; pedunculis ad apicem pubescentibus; vaginis elongatis glabris. *In Brasilia.* 2.

4816. URTICA L. (1747).

a. Folia opposita.

1. *U. laurifolia* Poir. fol. petiolatis oblongis acuminatis coriaceis utrinque glabris; racemis terminalibus divaricatis. *Ad fret. Magell.* 2.

2. *U. Parietaria* L. setoso-urens; fol. petiolatis ovato-lanceolatis; stipulis ternis lanceolatis membranaceis; cymis axillaribus longe pedunculatis exsertis dioecis. *Sloane hist.* 1. t. 39. f. 1. *In Jamaica.* 2.

3. *U. inermis* Spr. fol. cordato-oblongis grosse dentatis glabris venis petiolisque pubescentibus; spicis axillaribus flexuosis. *In ins. ocean. pacifici.* ♂.

4. *U. crassifolia* Willd. fol. ovato-oblongis 3-nerviis serrulatis crassiusculis subtus reticulatis albidis; corymbis axillaribus dichotomis; floribus glomeratis. *In Am. austr.* ♂.

5. *U. longifolia* Willd. fol. obovato-oblongis acutis triplinerviis apice serrulatis utrinque glabris; corymbis coaretatis axillaribus folio brevioribus. *U. verbascifolia* Poir. *In ins. Mascalen.* ♂.

6. *U. cuspidata* Willd. fol. ovatis acuminatis serratis 3-nerviis utrinque glabris nitidis; corymbis axillaribus divaricatis folio brevioribus. *U. lucens* Poir. *In ins. Mascal.* ♀.

7. *U. involucrata* Sabin. fol. ellipticis 3-nerviis crenatis lucidis ad apicem ramorum congestis; paniculis sessilibus; caule suffruticoso ramoso hirsuto. *In Caribaeis.* ♂.

8. *U. reticulata* Sw. fol. oblongis acuminatis serratis glabris subtus reticulatis; stipulis oblongis; racemis paniculatis axillaribus folio brevioribus; caule suffruticoso glabro. *U. multiflora* Poir. *In Jamaica et Peru.* ♂.

9. *U. ferox* Forst. fol. subcordato-oblongis grosse dentatis supra petiolisque sparse setosis subtus pubescentibus; spicis axillaribus paniculatis geminis folia subaequantibus. *In Nor. Zeeland.* ♂.

10. *U. rufa* Sw. hirsuta; fol. ovato-oblongis acuminatis serratis; stipulis subrotundis albidis; racemis terminibus erectis. *In Jamaica.* ♂.

11. *U. serrulata* Sw. fol. subsessilibus lanceolatis serrulatis utrinque glabris; capitulis florum pedunculatis folio brevioribus. *In Jamaica.* ♂.

12. *U. rupestris* Guss. caule suffruticoso foliisque ovatis acuminatis sub-5-nerviis grosse serratis glabriusculis; stipulis 4-nis; spicis axillaribus androgynis subgeminiis. *In Sicilia.* ♂.

13. *U. rugosissima* Blume hydr. 490. fol. subrotundo-ovatis acuminatis oblique subcordatis trinerviis serratis rugosissimis supra hispidis subtus pilosis; spicis subumbellatis. *In Java.* ♂.

14. *U. pilosiuscula* Blume; fol. subrotundo-ovatis altero minore acu-

minatis subcordatis 3-nerviis dentatis rugosis supra hispidis subtus pubescentibus; spicis glomeratatis interruptis axillaribus. *In Jara.* ♂.

15. *U. moluccana* Blume; fol. oblongo-ovatis altero minore acuminatissimis argute serratis rugosis discoloribus supra hispidis subtus molliter pubescentibus subcordatis; floribus glomeratis; caule arborescente. *In Motuccis.* ♂.

16. *U. caudata* Blume; fol. subrotundo-ovatis acuminatis grosse serratis basi rotundatis trinerviis utrinque mollibus; spicis dense glomeratis cylindricis solitariis folio brevioribus. *In Java.* ♂.

17. *U. spicata* Blume; fol. ovatis longe acuminatis grosse serratis scabriusculis; spicis glomeratis interruptis. *In Japonia.* ♂.

18. *U. celebica* Blume; fol. ovato-oblongis acuminatis obtuse serratis rugosis basi rotundatis trinerviis supra hispidis subtus pubescentibus; spicis paniculatis glomeratis interruptis. *In Celebes.* ♂.

19. *U. leucophaea* Blume; fol. ovato-oblongis altero minore acuminatis grosse exserte serratis basi acutis 3-nerviis utrinque pubescentibus subtus cinerascentibus; paniculis axillaribus folia subaequantibus; floribus secundis. *In Jara.* ♂.

20. *U. glaberrima* Blume; fol. ovato-aut-ovali-oblongis altero minore, acuminatis trinerviis remote exserte serratis glaberrimus; paniculis subgeminis axillaribus folio duplo brevioribus. *In Jara.* ♂.

21. *U. elongata* Blume; fol. ovalioblongis acuminatis basi obtusis trinerviis crenato-serratis glabriusculis; paniculis elongatis virgatis axillaribus. *In Java.* ♂.

22. *U. angulata* Blume; fol. ovalioblongis acuminatis basi rotundatis 3-nerviis obtuse serratis; stipulis foliacies ovalibus; racemulis axillaribus brevissimis; caule angulato. ♂.

23. *U. tutescens* Blume; fol. oblongo-lanceolatis acuminatis basi acutiusculis 3-nerviis rugosis supra nitidis subtus in venis pubescentibus; floribus dioecis conglomeratis. *In Java.* ♂.

24. *U. caerulea* Blume; fol. oblongis acuminatis denticulatis basi acutiusculis trinerviis in venis subtus pubescentibus; floribus glomeratis axil-

laribus; ramulis caerulecentibus. In Java. 2.

25. *U. grandis* Hook. et Arn. fol. cordato-ovatis grosse serratis rugosis supra pubescenti-scabris subtus glabris petiolis venisque foliorum puberulis; stipulis oblongo-lanceolatis magnis caducis; paniculis axillaribus. In ins. Sandwicens.

b. Caulis herbaceus.

26. *U. strigosa* Blume; fol. ovato-oblongis utrinque acutis integerrimis 3-nerviis subtus molli-pubescentibus; floribus verticillatis; caule repente herbaceo strigoso hirto. In Java. 2.

27. *U. hirta* Blume; fol. subsessilibus ovato-oblongis acuminatissimis basi subcordatis 3-5-nerviis integerrimis utrinque pubescentibus; floribus verticillatis axillaribus; caule scandente. In Java. 2.

28. *U. triandra* Blume; fol. subsessilibus ovatis obtusis basi subcordatis integerrimis 3-nerviis glabriusculis; floribus verticillatis axillaribus; caule inferne repente lineis 2 alternantibus puberulis. In Java. 2.

29. *U. corymbosa* Poir. fol. oblique ovatis acutis integerrimis asperis; corymbis axillaribus longe pedunculatis. In Guadelupa. 2.

30. *U. cellulosa* Spr. fol. ovatis utrinque attenuatis 3-nerviis supra glabris subtus cellulosis calloso-punctatis; stipulis ovatis membranaceis; floribus glomerato-paniculatis dioecis. In Cuba. 2.

31. *U. nudicaulis* Sw. fol. subterminalibus ovato-oblongis acuminatis 3-nerviis glabris nitidis; stipulis nullis; floribus racemosis dioecis. In Jamaica. 2.

32. *U. portulacina* Spr. fol. subrotundis crassiusculis integerrimis glaberrimis, alternis majoribus; floribus terminalibus dioecis; caule adscendente basi radicante. In Hispaniola. 2.

33. *U. herniariaefolia* Willd. fol. obovato-subrotundis integerrimis glabris minoribus sparsis terminalibus quaternis; floribus terminalibus caule diffuse ramoso. *U. herniarioides* Sw. In Ind. occ. 2.

34. *U. trianthemoidea* Sw. caule erecto; fol. oblongis obtusis glabris, minoribus sparsis; floribus axillaribus aggregatis monoicis. In Hispaniola. 2.

35. *U. serpyllacea* H. et K. fol. orbiculato-obovatis obtusis subintegerimis subcarnosis supra transverse strigosis subpellucido-punctatis; umbellis geminis; floribus dioecis. In Nov. Granata. 2.

36. *U. Dodartii* L. fol. ovato-oblongis acutis subintegerimis supra petiolisque sparse pilosis; capitulis masc. pedunculatis flore brevioribus. Patria? 2. (Hollandia).

37. *U. thymifolia* H. et K. fol. subobovato-orbiculatis obtusis obsolete crenulatis subcarnosis diaphanis supra transverse strigosis; umbellis geminis; floribus monoicis. In Nov. Granata. 2.

3. Folia dentata, serrata.

38. *U. leptophylla* H. et K. erecta; fol. longe petiolatis 3-angulari-ovato-oblongis acutis cordatis grosse crenato-serratis 5-nerviis scabriusculis; spicis geminis simplicibus androgynis; floribus subconglomeratis. In Nov. Granata. 2.

39. *U. verticillata* Vahl; fol. ovatis obtuse serratis subtus incanis; floribus subverticillatis axillaribus-subsessilibus pilosis. *U. iners* Forsk. In Arabia. 2.

40. *U. laxa* Sw. fol. ovatis acuminatis serratis 3-nerviis subtus pubescentibus; stipulis ovatis; floribus dioecis, capitulis v. racemosis, ramis divaricatis. In Hispaniola. 2.

41. *U. betulaefolia* Sw. fol. cordato-subrotundis serratis 3-nerviis glabris; stipulis oblongis; racemis terminalibus paniculatis; caule adscendente. In Hispaniola. 2.

42. *U. scripta* Hamilt. fol. oblongis acuminatis subserratis venis subtus nigrescentibus; spicis compositis; floribus dioecis. In Ind. or. 2.

43. *U. virgata* Forst. fol. ovato-oblongis crenatis trinerviis utrinque glabris; spicis interruptis axillaribus filiformibus longissimis dioecis. In ins. Societ. 2.

44. *U. repens* Sw. fol. subrotundo-ovatis obtuse serratis; racematis axillaribus monoicis; caule simplici repente. In Ind. occ. 2.

45. *U. ciliata* Sw. fol. ovatis serratis 3-nerviis ciliatis; floribus terminalibus aggregatis androgynis. In Jamaica. 2.

46. *U. radicans* Sw. caule ramis-que radicantibus; fol. obovatis obtusis crenatis laevissimis nitidis; floribus axillaribus subsessilibus monoecis. *In Jamaica.* 2.
47. *U. pendula* Willd. fol. subquaternis ovatis dentatis 3-nerviis subtus pubescentibus; racemis terminalibus. *U. ruppendia* Poir. *In ins. Mascaren.* 2.
48. *U. pungifolia* Poir. fol. ovatis obtusis subtus pilosiusculis crenato-dentatis; glomerulis florum axillaribus, pedunculatis. *In Peruria.* 2.
49. *U. convexa* Hornem. fol. ovatis acutis profunde serratis 5-nerviis utrinque glabris; spicis verticillatis pedunculatis axillaribus. *Patria?*
50. *U. collina* Bert. caule radicante; fol. rhomboideis grosse dentatis basi integerrimis utrinque glabris; corymbis pedunculatis axillaribus diffusis folio brevioribus. *In Portorico.* 2.
51. *U. variegata* Spr. caule diffuso radicante; fol. rhomboideis apice serratis 3-plinerviis maculatis laevis; fasciculis pedunculatis axillaribus petiolo brevioribus. *In Jamaica.* 2.
52. *U. depressa* Sw. caule repente; fol. subrotundis crenatis nervosis succulentis glabris; floribus terminalibus confertis dioecis. *In Jamaica.* 2.
53. *U. dioeca* L. fol. cordatis serratis; paniculis geminis folio longioribus; floribus dioecis polygamis. Fl. dan. t. 446. Blackw. t. 12. *In Europa.* 2.
54. *U. magellanica* Poir. fol. ovato-lanceolatis acuminatis grosse dentatis; glomerulis florum pedunculatis. *Ad fret. Magellan.* 2.
55. *U. urens* L. fol. subrhomboidis inciso-serratis sub-5-nerviis cauleque setosis; floribus fasciculatis monoecis; pedunculis petiolo brevioribus. Fl. dan. t. 739. E. B. t. 1236. *In Europa Asia et Amer.* 2.
56. *U. membranacea* Poir. fol. longe petiolatis subcordato-ovatis grosse serratis sub-5-nerviis cauleque sparse setosis; spicis masc. elongatis filiformibus fem. abbreviatis. *In Gall. Ital. et Afr.* 2.
57. *U. pitulifera* L. fol. subcordato-ovatis serratis; glomerulis fructiferis globosis cauleque setosis. Schk.
- t. 289. E. B. t. 148. *U. balearica* L. *In Europ. Asia et Ind. or.*
58. *U. ardens* Link. fol. ovatis acuminatis duplicato-serratis cauleque setosis; spicis compositis verticillatis; floribus monoecis. *In Nepalia.* 2.
59. *U. distachya* Spr. fol. oblongis acuminatis grosse dentatis 3-nerviis cauleque hirsutis; spicis geminis interruptis filiformibus androgynis erectis folia subaequantibus. *In Montevideo.* 2.
60. *U. Mutisiana* Spr. fol. ovato-oblongis acuminatis dentatis strigosis 3-nerviis; paniculis axillaribus dichotomis folia superantibus; floribus glomeratis monoecis. *U. melastomoides* Kunth. *In Nor. Granat.* 2.
61. *U. floribunda* H. et K. fol. longe petiolatis oblongis acuminatis subcoriaceis 3-nerviis utrinque strigoso-pilosus subtus punctatis; paniculis geminis longe pepunculatis ramosissimis; floribus conglomeratis. *In Popaya.* 2.
62. *U. punctata* H. et K. erecta, fol. longe petiolatis ellipticis valde acuminatis crenatis 3-plinerviis utrinque praesertim supra strigosis subtus glanduloso-punctatis; paniculis 3-4-nis dichotomis; floribus dioecis. *In Jean de Bracamoros.* 2.
63. *U. arguta* H. et K. procumbens; fol. longe petiolatis oblongis acuminatis basi angustatis argute dentatis 3-plinerviis utrinque praesertim subtus strigoso-pilosus; racemis geminis conglomeratis. *In Nor. Valencia.* 2.
64. *U. macrophylla* Thunb. fol. subrotundis duplicato-serratis 3-plinerviis pilosus; paniculis axillaribus. *In Japonia.* 2.
65. *U. procera* Muehlenb. fol. cordato-oblongis acutis serratis cauleque setosis; petiolis ciliatis; spicis geminis petiolo aequantibus; floribus glomeratis dioecis. *U. gracilis* Ait.? *In Am. bor.* 2.
66. *U. rugosa* Sw. fol. oblongis serratis rugosis subtus hirsutis; stipulis ovatis; racemulis terminalibus. *In Hispaniola.* 2.
67. *U. stolonifera* Sw. fol. ovato-oblongis acuminatis dentatis nervosis villosis; stolonibus repentibus; stipulis oblongis; floribus glomeratis racemosis. *In Hispaniola.* 2.

68. *U. chamaedryoides* Pursh, fol. subsessilibus ovatis serratis subtus strigosis; caule setoso; glomerulis axillaribus sessilibus reflexis. In Georgia. 4.

Folia divisa.

69. *U. flabellata* Kunth; fol. flabellato - multifidis cuneatis 3-nerviis subtus petiolisque setosis, lacinia 3-5-lobis; floribus glomeratis. In Quito. 4.

70. *U. lucida* Sw. fol. sessilibus semipinnatis obtusis glabris nitidis; floribus capitatis longe pedunculatis androgynis. In Jamaica. 4.

b. Folia alterna.

* Fruticosae.

71. *U. glomerata* Willd. fol. subsessilibus ovato-lanceolatis subtus hirsutis; floribus glomeratis axillaribus sessilibus. In Ind. or. Ȑ.

72. *U. stimulans* L. fol. amplis oblongis basi attenuatis integerrimis ramisque setosis; paniculis axillariibus. In Java. Ȑ.

73. *U. acuminata* Poir. fol. ovatis mucronatis 6-nerviis glabris; racemis lateralibus compositis; floribus glomeratis; fructibus baccatis. In ins. Mascaren. Ȑ.

74. *U. ardens* Blume; fol. alternis ovalibus acutis basi rotundato-subcordatis integerrimis venosis; paniculis axillaribus folio brevioribus. In Java. Ȑ.

75. *U. ovalifolia* Blume; fol. ovalibus majusculis apice rotundatis cum acumine basi acutis integerrimis penninerviis; corymbis dichotomis axillaribus; caule fruticoso. In Java. Ȑ.

76. *U. contracta* Blume; fol. alternis ovali-acuminatis basi rotundatis integerrimis penninerviis; paniculis axillaribus contractis; caule arborescente. In Jura. Ȑ.

77. *U. parasitica* Blume; fol. alternis elliptico-oblongis acuminatis basi obtusis integerrimis setis minimis adspersis junioribus in venis subtus purpurascens; corymbis axillaribus minimis; caule suffruticoso radicante. In Java. Ȑ.

78. *U. arborescens* Link; fol. longe petiolatis ovato-lanceolatis acu-

minatis subcrenatis sapra scabris subtus villosiusculis 3-nerviis; glomerulis axillaribus. In Manila. Ȑ.

79. *U. caracasana* Jacq. Schoenbr. t. 386. fol. cordatis obtuse serratis villosis floribus dioicis; caule ramisque nudis florescens; caule arboreo. In Caracas. Ȑ.

80. *U. elata* Sw. fol. ovato-oblongis acutis serratis 3-nerviis sparse setosis; ramis nudiusculis racemiferis; floribus dioecis; caule arboreo. In Jamaica. Ȑ.

81. *U. sessiliflora* Sw. fol. longe petiolatis ovato-lanceolatis acutis crenatis 3-nerviis scabriuscculis; glomerulis sessilibus axillaribus; floribus monoecis; caule frutescente. In Jamaica. Ȑ.

82. *U. tiliaefolia*, H. et K. arborescens aculeata; fol. longe petiolatis cordato-ovatis acutis crenato-serratis sub-triplinerviis supra scabris subtus hispidulis subaculeatis; paniculis divaricatis; floribus dioecis. Ad fl. Magdal. Ȑ.

83. *U. ulmifolia* H. et K. arborescens inermis; fol. ovatis acutis serratis pubescentibus; paniculis divaricatis dichotomis; floribus dioecis. Ad fl. Magdal. Ȑ.

84. *U. capitellata* Poir. fruticosa; fol. lanceolatis acuminatis subserrulatis 3-nerviis supra rugosis asperis subtus albidis; floribus dioecis spicatis capitatisque. In Java. Ȑ.

85. *U. peltata* Blume; fol. peltatis subrotundis ovatis acutis denticulatis subtus villosis; paniculis axillaribus divaricatis; caule arboreo. In Java. Ȑ.

86. *U. incana* Blume; fol. subrotundo-ovatis acuminatis denticulatis basi subcordatis 3-nerviis subserratis infra albo-tomentosis; spicis paniculatis glomeratis interruptis axillaribus. In Java. Ȑ.

87. *U. cinerascens* Blume; fol. ovato-oblongis acuminatis exserte serulatis basi rotundatis subcordatis 3-nerviis supra albido-punctatis subtus cinerascentibus subtomentosis; spicis subramosis glomeratis interruptis axillaribus. In Java. Ȑ.

88. *U. candidissima* Blume; fol. majusculis ovato-ellipticis acuminatis argute serratis basi obtusiusculis supra hirtis subtus niveo-tomentosis;

capitulis pedunculatis axillaribus geminis. In Java. Ȑ. 10—18-ped.

89. *U. diversifolia* Blume; fol. acuminatis serratis trinerviis rugosis supra scabris subtus reticulatonoiveo-tomentosis; majoribus ovali-oblongis basi rotundatis minoribus ovato-oblongis basi subcordatis; paniculis folio brevioribus; caule fruticoso. In Java. Ȑ.

90. *U. alba* Blume; fol. oblongis acuminatis medio ad apicem argute serrulatis basi acutis trinerviis subtus reticulatis albido-tomentosis; capitulis pedunculatis geminis axillaribus. In Celebes. Ȑ.

91. *U. dichotoma* Blume; fol. elliptico-oblongis acuminatis serratis basi obtusis v. rotundatis trinerviis subtus reticulatis albido-tomentosis; capitulis in corymbis dichotomis brevissimis axillaribus. In Java. Ȑ.

92. *U. angustata* Blume; fol. anguste lanceolatis acuminatis argute serratis rugosis basi 3-nerviis supra pubescentibus subtus cinerascentibus ramulisque pilosis; capitulis in pedunculis axillaribus brevissimis bifidis. In Java. Ȑ.

93. *U. conglobata* Blume; fol. ovato-oblongis grosse obtuse serratis basi rotundatis 3-nerviis discoloribus rugosis supra hirtis subtus cauleque suffruticoso mollissimis; glomerulis axillaribus sessilibus. In Java. Ȑ.

94. *U. sanguinea* Blume; hispida; fol. alternis ovato-oblongis acuminatis dentatis rugosis basi rotundatis parum attenuatis 3-nerviis subtus pubescentibus et in nervis petiolisque sanguineis; floribus glomeratis axillaribus. In Java. Ȑ.

95. *U. scabra* Blume; fol. ovato-oblongis acuminatis basi subcordatis inaequaliter crenulatis setis asperis adspersis; capitulis pedunculatis axillaribus subgeminis; caule suffruticoso ramoso. In Java. Ȑ.

96. *U. sinuata* Blume; fol. cuneatis obtusis versus apicem repandis; paniculis axillaribus folio brevioribus. In Java. Ȑ.

97. *U. rubescens* Blume; fol. ovali-oblongis acuminatis basi obtusiusculis v. rotundatis superne repandis glabriusculis; capitulis majusculis in pedunculis axillaribus geminatis; caule ramosissimo. In Java. Ȑ.

98. *U. sylvatica* Blume; fol. ovali-oblongis acuminatis basi rotundatis medio ad apicem obtuse serrulatis in costa subtus petiolisque pubescentibus; capitulis subfasciculatis confertis axillaribus lateralibusque. In Java. Ȑ. Arbor 15—20-ped.

99. *U. spinosa* Blume; fol. breviter petiolatis oblongis obtuse acuminatis cum mucrone basi obtusis superne remotis serratis glabris; spicis axillaribus lateralibusque dioecis; caule fruticoso spinoso. In Java. Ȑ.

** Herbaceae.

100. *U. argentea* Forst. fol. longe petiolatis oblongis acutis supra albo-punctatis subtus albo-glaucis 3-nerviis; spicis axillaribus interruptis filiformibus. In ins. Societ. 2.

101. *U. aestuans* L. fol. cordatis serratis 3-nerviis hirtis; racemis dichotomis horizontalibus. In Surinamo. 2.

102. *U. dirergens* Mey. fol. ovatis dentatis 3-nerviis setoso-pilosus; racemis divergentibus strictis. In Surinamo. 2.

103. *U. canadensis* L. fol. cordato-ovatis acuminatis serratis utrinque hispidis; paniculis fem. axillaribus subgeminis superantibus masculis; caule ramosissimo setoso. In Am. aust. 2.

104. *U. ruderalis* Forst. fol. subcordato-ovatis obtuse serratis glabris glaucis; paniculis divaricato-corymbosis. In ins. Societ. 2.

105. *U. capitata* L. fol. cordatis acuminatis aequaliter serratis glabriusculis 5-nerviis; glomerulis spicato-racemosis. In Am. austr. 2.

106. *U. villosa* Thunb. fol. cordatis obtusis crenatis hirtis; ramis divaricatis; glomerulis sessilibus. In Japonia. 2.

107. *U. hirsuta* Vahl; fol. cordato-ovatis serratis hirsutis; racemis compositis folie longioribus; caule petiolisque hirtis. In Arabia. 2.

108. *U. capensis* L. fol. cordato-ovatis crenatis serratis subtus pubescentibus; floribus axillaribus subspicatis. In P. b. S. 2.

109. *U. caffra* Thunb. fol. subcordato-ovatis acutis serratis pubescentibus; floribus axillaribus sessilibus; caule decumbente villoso. In Afr. austr. 2.

✓ 110. *U. affinis* Hook. et Arn. debilis flexuosa; fol. cordato-acuminatis membranaceis longe petiolatis grosse serratis triplinerviis piloso - hispidis subtus pallidioribus; spicis axillaribus glomerato - interruptis. *In ins. Societ.* 2.

111. *U. muralis* Vahl; fol. ovatis acuminatis aequaliter serratis villosis 3-nerviis; capitulis axillaribus sessilibus. *U. parasitica* Forsk. *In Arabia.* 2.

112. *U. nemorosa* H. et K. fol. subcordato - ovatis acuminatis grosse serratis 3-nerviis cauleque setosis; racemis axillaribus compositis androgynis. *Ad fl. Magdalen.* 2.

113. *U. parva* Blume; fol. ovato-lanceolatis integerrimis ciliatis utrinque pubescentibus; floribus axillaribus glomeratis; caule herbaceo repente tereti. *In Jara.* ♂.

114. *U. candicans* Blume; fol. majusculis subrotundo - ovatis acuminatis grosse dentatis pilosiusculis, junioribus subtus cinereo - maculatis; spicis paniculatis glomeratis interruptis axillaribus folio brevioribus; caule fistuloso. *In Java.* ♂.

115. *U. jaranica* Blume; fol. ovatis acuminatis grosse serratis utrinque cauleque erecto herbaceo striato subpubescentibus; spicis glomeratis interruptis axillaribus folia aequantibus. *In Java.* ♂.

Folia divisa.

116. *U. heterophylla* Wall. fol. 3-5-fidis subtus petiolisque aculeatis; laciiniis oblongis acuminatis inciso-serratis; racemis diffusis paniculatis. *U. diversifolia* Link. *In Ind. or.* 2.

117. *U. Millettii* Hook. et Arn. dioeca? fol. alternis longe petiolatis subcordato-ovatis acuminatis dentato-serratis supra piloso-scabriusculis subtus pubescenti-scabris; capitulis floribus masculorum axillaribus pedunculatis; pedunculis petiolo duplo brevioribus. *In China.* ♂.

4817. DUBRUEILIA Gaudich. (1826).

1. *D. inaequalis* Gaudich. fol. ovatis obtusis crenatis strigosis altero minore; corymbis axillaribus longe

pedunculatis. *Urtica Poir.* *In Portorico.* 2.

2. *D. hederacea* Gaudich. fol. parvis orbiculatis crenatis nervosis hirsutis; floribus terminalibus confertis monoicis; caule filiformi repente. *U. hederacea* Poir. *U. nummulariaefolia* Sw. *In Guadelupa et Portorico.* 2.

3. *D. lanceolata* Gaudich. (*Urtica Poir.*) fol. subsessilibus linearis - lanceolatis 3-nerviis subtus albidis; glomerulis axillaribus solitariis. *In Hispaniola.* 2.

4. *D. serpyllifolia* Gaudich. fol. obovato - orbiculatis supra adpresso strigilosis; floribus axillaribus corymbosis; calyce fem. 3-partito. *Urtica Poir.* *U. serpyllacea* H. et K. *Pilea muscicola* Link. *In ins. Carib.* et *Nov. Granat.* 2.

5. *D. callitrichoides* Gaudich. fol. ovato-oblongis obtusis subcarnosis subcrenatis supra strigosis; floribus glomerato-umbellatis. *Urtica Willd.* *In Cumaná.* 2.

6. *D. microphylla* Gaudich. fol. ovatis acutiusculis integerrimis glabris minoribus sparsis; floribus aggregatis dioecis; calyce masc. trivalvi; caule adscendente subcarnoso. *Parietaria microphylla* L. *In Ind. occ.* 2.

7. *D. cuneiformis* Sw. fol. brevissime petiolatis obovatis crenatis glaberrimis; racemulis terminalibus; caule sussruticoso. *Urtica* Sw. *In Jamaica.* ♀.

8. *D. sessilifolia* Gaudich. fol. longe petiolatis ovato-lanceolatis acutis crenatis 3-nerviis scabriusculis; glomerulis sessilibus axillaribus; floribus monoicis; caule sussrutesente. *Urtica Poir.* *In Jamaica.* ♀.

9. *D. trilobata* Gaudich. fol. trilobis. *Urtica Poir.* *In ins. Mauritius.* ♀.

10. *D. pumila* Gaudich. fol. longe petiolatis ovatis acutis serratis sub-3-nerviis; corymbis axillaribus glomeratis breve pedunculatis. *Urtica* L. *U. fasciculata* Poir. *U. palustris* Juss. *In Am. bor.* 2.

11. *D. grandifolia* L. fol. elliptico-oblongis utrinque attenuatis 3-plinerviis inaequaliter denticulatis supra appresso strigilosis; stipulis oblongis obtusis; corymbis paniculatis diffusis folia superantibus. *Urtica* L. *In Ind. occ.*

12. *D. ciliaris* Gaudich. fol. ovato-oblongis trinerviis glabris integerimis ciliatis; corymbis axillaribus divaricatis. *Urtica L.* In *Ind. occ.* 2.

13. *D. semidentata* Gaudich. fol. lanceolatis utrinque attenuatis paucidentatis glabriusculis sub-3-nerviis; stipulis lanceolatis scariosis; floribus subterminalibus paniculatis dioecis. In *Ind. occ.* 2.

14. *D. metastomoides* Gaudich. fol. suboblique ovato-lanceolatis serratis 3-nerviis glabris; floribus paniculatis. *Urtica Poir.* In *Java*. 2.

15. *D. rotundifolia* Gaudich. fol. subrotundis acuminatis subintegerrimis trinerviis coriaceis pellucido-punctatis; spicis interruptis bracteatis; floribus glomeratis. *Urtica Poir.* In *ins. M ascari*. 2.

16. *D. membranacea* Gaudich. fol. longe petiolatis subcordato-ovatis grosse serratis sub-5-nerviis caule que sparse setosis; spicis masc. terminalibus filiformibus; fem. fasciculatis abbreviatis. *Urtica Poir.* In *Italia et Afr.* 2.

17. *D. rhombea* Gaudich. fol. rhombo-ovatis 3-nerviis integerrimis obtusiusculis glabriusculis; corymbis axillaribus flore brevioribus. *Urtica L.* In *Nov. Granat.* 2.

4818. *URENA* Gaudich. (1826).

1. *U. baccifera* Gaudich. arborescens aculeata; fol. obovatis acuminatis serrato-sinuatis sub-5-nerviis subtus petiolisque setoso-aculeatis; paniculis geminis dichotomis; floribus dioecis 5-andris. *Urtica L.* In *Nov. Granat.* 2.

2. *U. acuminata* Gaudich. fol. ovatis mucronatis 5-nerviis glabris; racemis lateralibus compositis; floribus glomeratis; fructibus baccatis. *Urtica Poir.* In *ins. Masc.* 2.

3. *U. gigantea* Gaudich. fol. ovatis integerrimis utrinque glabris subtus reticulatis; paniculis axillaribus; caule elato. *Urtica Poir.* Ad *fret. Magell.* 2.

4. *U. palmata* Gaudich. (*Urtica Forsk.*) fol. cordatis 3-lobis serratis subvillosis hispido-setosis; spicis androgynis ramosis. *U. heterophylla Vahl.* In *Arabia*. 2.

5. *U. horrida* Gaudich. arborescens aculeata; fol. cordato-ovatis acutis dentato-sinuatis supra setosis subtus

aculeatis tomentosis; paniculis dichotomis. *Urtica H. et K.* Ad *fl. Magdal.* 2.

6. *U. lamiifolia* Gaudich. *Urtica Juss.* In *Java*.

7. *U. parietariaefolia* Deless. hb.
8. *U. frutescens* Deless. hb.

4819. *FLEURYA* Gaudich. (1826).

1. *F. divaricata* Gaudich. fol. longe petiolatis ovatis acuminatis dentatis sparse pilosis; ramis setosis; paniculis axillaribus solitariis divaricato-ramosissimis petiolos superantibus. *Urtica L.* In *Am. aust.* 2.

2. *F. paniculata* Gaudich. fol. ovato-lanceolatis subacuminatis basi rotundatis subcordatis obtuse et grosse serratis utrinque glabris; paniculis terminalibus divaricato-corymbosis. In *ins. Rota*. 2.

3. *F. spicata* Gaudich. fol. ovato-cordatis acuminatis basi subcuneatis grosse serratis utrinque ramisque aculeato-pilosis; racemis axillaribus late ramosis; spiculis subglomeratis. In *Ins. Pisang*. 2.

4. *F. glomerata* Gaudich. fol. ovatis acuminatis basi subcuneatis serratis utrinque pilosiusculis; racemis axillaribus brevibus; spiculis glomeratis. In *ins. Pisang*. 2.

5. *F. cordata* Gaudich. fol. cordatis ovatis serrato-crenatis subtus venosis utrinque pilosis; paniculis axillaribus et terminalibus divaricatis. In *Brasilia*. 2.

6. *F. petiolata* Decaisn. hb. tim. herbacea; fol. subrotund-ovatis acutiusculis basi subrotundata acuminatis dentatis membranaceis undique pilosis; petiolis semipedalibus; floribus 5-partitis (Stam. 5) 2.

4820. *GIRARDINIA* Gaudich. (1826).

1. *G. palmata* Gaudich. In *Ind. or.* 2. *Urtica Lech.* Folia alterna.

4821. *PARIETARIA* L. (1747).

1. *P. officinalis* L. erecta sub-simplex; fol. oblongo-ovatis utrinque acuminatis; glomerulis repetito-dicho-

tom.s; bracteis solitariis, geminis ter-nisque. E. B. t. 879. Fl. dan. t. 521. Schk. t. 344. *In Europa.*

2. *P. diffusa* M. K. caule pro-cumbente diffuso; fol. ovalibus; glo-me-rorum ramis 3-floris; involucris 7—9-fidis 3—5-floris; flore medio semineo. U. judaica Schk. t. 346. *In Europa.* 4.

3. *P. judaica* L. fol. ovatis; cau-libus erectis; calycibus trifloris; cor-ollis masculis elongato - cylindricis Lam. ill. t. 853. f. 2. *In Europa et Oriente.* 4.

4. *P. pensylvanica* Mühl. fol. lanceolatis obtusiusculis 3-plinerviis cau-leque pubescentibus; floribus fascicu-latis; involucris 1-floris subtriphyllis florem superantibus; foliolis linearibus. *In Pennsylvania.* 4.

5. *P. floridana* Nutt. fol. ovatis obtusis petiolos aequantibus; floribus glomeratis; involucris sub-3-phylis flores aequantibus. *In Florida.* 4.

4822. GESNOUINA Gaudich. (1826).

1. *G. arborea* Gaudich. *In Te-neriffa.* Ȑ. Boehmeria Pers. B. ru-bescens Jacq. fragm. t. 5. f. 1. Urtica Herit. stirp. t. 20. Fol. alterna oblonga integerrima; rami pilosi. Flores spicato-glomerati.

moso diffuso. Parietaria L. *In Cre-ta.* 4.

4825. POUZOLZIA Gaudich. (1826).

1. *P. taerigata* Poir. fol. alternis ovato-lanceolatis glaberrimis integris; floribus sessilibus aggregatis axillari-bus. Parietaria Poir. *In Gallia.* 4.

2. *P. Sonuerati* Gaudich. fol. lanceolatis alternis dentatis; floribus ses-silibus capitatis. Parietaria L. *In Ind. or.* 4.

3. *P. indica* Gaudich. fol. lanceo-latis; caule erecto. Parietaria L. *In Ind. or.* 4.

4. *P. verbascifolia* Gaudich. fol. in-ferioribus alternis superioribus oppo-sitis lanceolatis pubescentibus. Pa-rietaria Poir. *In Borbonia.* 4.

5. *P. parietarioides* Decaisn. hb. tim. ramis erectis; fol. infimis raro oppositis; supremis alternis ovato-lan-ceolatis subobtusis trinerviis integerri-mis subpilosis utrinque viridibus; flo-ribus paucis axillaribus sessilibus. *In ins. Timor.* 4.

4826. ROUSSELIA Gaudich. (1826).

1. *R. lappulacea* Gaudich. *In Do-minio.* 4. Urtica Sw. Folia alterna ovata scabriuscula integerrima. Se-mina 3-gona. Caulis diffusus.

4827. BOEHMERIA Jacq. (1778).

a. *Folia opposita.*

* *Fruticosae.*

1. *B. cundata* Sw. fol. longe pe-tiolatis ovato-oblongis acuminatis ser-ratis hirsutis; spicis longissimis pen-dulis; floribus glomeratis dioecis. *In Jamaica.* Ȑ.

2. *B. alienata* Willd. fol. brevi-ter petiolatis ovatis acutis integerrimis subtus sericeo-villosis; floribus axilla-ribus glomeratis. Parietaria L. *In Ceylona.* Ȑ.

3. *B. macrophylla* Don. arborescens; fol. amplis lanceolatis acuminatis su-pra rugosis subtus ramulisque pube-

4823. FREIREA Gaudich. (1826).

1. *F. lusitanica* Gaudich. fol. sub-rotundo-ovatis obtusis longitudine petioli; caulis filiformibus. *In Lu-sitania.* Ȑ.

2. *F. alsinaefolia* Gaudich. fol. longe petiolatis ovatis obtusiusculis cau-leque pubescentibus; floribus aggre-gatis spicatisque; involucro 3-phyllo florem superante. Parietaria Delil. *In Aegypto.* Ȑ.

3. *F. filiformis* Gaudich. Parieta-ria Ten. *In ins. Cuprae.* Ȑ.

4824. THAUMURIA Gaudich. (1826).

1. *T. cretica* Gaudich. fol. rhom-beo-ovatis obtusiusculis petiolo lon-gioribus; involucris 5-fidis compres-sis laciniis inaequalibus; caule ra-

scentibus; spicis longissimis interruptis. *In Nepalia.* ♂.

4. *B. platyphylla* Don; fol. cordato-ovatis acuminatis grosse serratis ultrinque ramulisque scaberrimis; spicis simplicibus compositisque. *In Nepalia.* ♂.

5. *B. amputacea* H. et K. fol. oblongis acuminatis crenato-serratis 3-nerviis supra rugosis subtus pilosiusculis; spicis axillaribus verticillatis dioecis folia aequantibus. *In Quito.* ♂.

6. *B. petiolaris* H. et K. fol. longe petiolatis oblongis acuminatis serratis 3-nerviis rigidis subtus incano-pubescentibus; spicis axillaribus solitariis dioecis. *In Quito.* ♂.

7. *B. propinqua* Decaisn. hb. tim. fol. ovatis acuminatis dentatis rotundatis 3-nerviis supra punctulatis subtus niveo-tomentosis; spicis interruptis folio brevioribus; floribus fem. glomeratis; acheniis incano-tomentosis. *In ins. Timor.* ♂.

8. *B. velutina* Decaisn. fol. cordatis longe acuminatis 3-nerviis dentatis supra tenuissime puberulis subtus niveo-velutinis; stipulis late cordato-lanceolatis acutis incano-velutinis; floribus masculis racemosis glomeratis interruptis. *In ins. Timor.* ♂.

** Herbaceae.

9. *B. spicata* Thunb. fol. subrotundo-ovatis acuminatis serratis glabris; spicis verticillatis glomeratis interruptis. *Urtica L.* *In Japonia.* ♀.

10. *B. rotundifolia* Don; fol. subrotundo-ovatis acuminatis serratis hirsutis; spicis masculis capillaribus, fem. verticillatis ramosis. *In Nepalia.* ♂.

11. *B. littoralis* Sw. fol. ovato-lanceolatis serratis 3-nerviis glabris; glomerulis axillaribus sessilibus androgynis. *In Hispaniola.* ♀.

12. *B. capensis* Spr. fol. ovatis acutis obtuse serratis villosis; floribus sessilibus axillaribus. *Parietaria Thunb.* *In P. b. S.* ♀.

13. *B. cylindrica* Willd. fol. ovato-oblongis acuminatis dentatis glabris; floribus dioecis; spicis masculis glomeratis interruptis; fem. cylindricis. *Urtica L.* *In Am. bor.* ♀.

14. *B. urticaefolia* Spr. fol. petiolatis ovatis serratis venosis pu-

bescentibus; floribus axillaribus. *Parietaria L.* fil. *In ins. Mascar.* ♀.

15. *B. cochinchinensis* Spr. diffuse ramosa; fol. ovatis acutis integerimis 3-nerviis pilosis; glomerulis axillaribus verticillatis. *Parietaria Lour.* *In China.* ♀.

16. *B. nana* Don; fol. ovatis obtusis integerimis pilosis; glomerulis axillaribus solitariis sessilibus. *In Nepalia.* ♀.

b. Folia alterna.

* Fruticosae.

17. *B. frutescens* Thunb. fol. elliptico-oblongis acuminatis grosse serratis subtus niveo-tomentosis; ramulis villosis; pedunc. axillaribus divaricato-ramosis. *In Japonia.* ♂.

18. *B. ramiflora* Jacq. fol. latolanceolatis acuminatis grosse aerratis basi attenuatis pellucido-punctatis pubescentibus; floribus axillaribus glomeratis. *Lam. ill. t. 763. Caturus L.* *In Ind. occ.*

19. *B. hirta* Sw. fol. ovatis acutis serratis rugosis hirsutis; glomerulis axillaribus androgynis. *In Jamaica.* ♂.

20. *B. celtidifolia* H. et K. fol. basi inaequalibus ovato-oblongis acuminatis argute serratis 3-nerviis strigosis; glomerulis axillaribus dioecis. *In Quito.* ♂.

21. *B. balottaefolia* H. et K. fol. subcordato-ovatis acuminatis grosse serratis 3-nerviis supra rugosis; glomerulis axillaribus androgynis. *In Quito.* ♂.

22. *B. bullata* H. et K. fol. oblongis acuminatis argute serrulatis 3-nerviis supra bullatis glabris subtus reticulatis hispidis; spicis axillaribus verticillatis dioecis. *In Quito.* ♂.

23. *B. frondosa* Don; fol. ovatis cuspidatis argute serratis subtus niveo-tomentosis; glomerulis fem. sessilibus lateralibus. *Parietaria verbasco-folia Poir.* *In Nepal. et ins. Mascar.* ♂.

24. *B. ternifolia* Don; fol. ternis subrotundis acuminatis grosse serratis tomentosis; spicis interruptis verticillatis axillaribus. *In Nepalia.* ♂.

25. *B. salicifolia* Don; fol. ovato-lanceolatis acuminatis serratis subtus niveo-tomentosis; glomerulis globosis lateralibus sessilibus. *Urtica Roxb.* *In Nepalia.* ♂.

26. *B. angustifolia* Bonpl. fol. lanceolatis acuminatis 3-nerviis obsolete serratis venis subtus strigoso-pilosis; glomerulis axillaribus dioecis. *In Quito.* 2.

27. *B. spicigera* Spr. fol. oblongo-lanceolatis acuminatis serratis subtus pubescentibus 3-nerviis; spicis axillaribus solitariis filiformibus superne masc. inferne feminis. *Ad flum. Magdal.* 2.

28. *B. nudiflora* Willd. fol. oblongis acuminatis integerrimis 3-plinerviis scabriusculis; glomerulis spicatis terminalibus androgynis. *In Caracas.* 2.

29. *B. rubescens* Jacq. arborescens; fol. oblongis utrinque attenuatis integerrimis subtus pubescentibus; spicis axillaribus glomeratis interruptis ramosis. *In Teneriffa.*

** Herbaceae.

30. *B. lateriflora* Mühl. fol. longe petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis obtuse serratis scabris; glomerulis lateralibus sessilibus paucifloris. *In Am. bor.* 2.

31. *B. interrupta* Willd. fol. subrotundo-ovatis acuminatis dentatis glabris; spicis axillaribus glomerato-interruptis. *In Ind. or.* 2.

4828. DORSTENIA L. (1747).

a. Scapigerae.

1. *D. peltata* Spr. fol. orbiculatis integerrimis peltatis pubescentibus; receptaculo oblongo. *In Hispaniola.* 2.

2. *D. Faria* Poir. fol. cordatis angulato-dentatis; scapo 4-angulo; receptaculo subquadrato. *In Brasilia.* 2.

3. *D. opifera* Mart. fol. profunde cordatis ovato-oblongis dentatis; receptaculo orbiculoto supra plano subtus convexo denticulato. *In Brasilia.* 2.

4. *D. brasiliensis* Lam. fol. cordato-ovalibus obtusis crenulatis; receptaculo suborbiculari integerrimo. Düsseld. Pfl. 16. t. 9. *In Brasilia.* 2.

5. *D. cordifolia* Lam. fol. cordato-ovatis acutis sinuato-dentatis subtus glabris; receptaculo orbiculato. *In Am. austr.* 2.

6. *D. tubicina* R. et P. per t. 102. fol. cordato-lanceolatis denticulatis; receptaculo ovali denticulato basi subcompresso aspero. B. M. t. 2304. *In Peruria.* 2.

7. *D. Houstonii* L. fol. cordatis angulatis acutis rugosis asperis; receptaculo 4-angulo. Plenk t. 103. Blackw. t. 578. *In Ind. occ. et Am. austr.* 2.

8. *D. arifolia* Lam. fol. amplis cordato-sagittatis acuminatis subdentatis undulatis; receptaculo ovali. *In Brasilia.* 2.

9. *D. Contrayerva* L. fol. cordatis pinnaefidis asperis; lacinias oblongo-lanceolatis subdentatis; receptaculo 4-angulo lacero. Plum. am. t. 119. Jacq. ic. t. 614. *In Am. austr.* 2.

10. *D. Drakenia* L. fol. palmato-pinnatifidis integerrimis; receptaculo ovali. *In Hispaniola.* 2.

b. Caulescens.

11. *D. radiata* Lam. caule crasso tuberculato; fol. petiolatis cordato-lanceolatis subdentatis; receptaculo piano 10—12-fido. Kosaria Forsk. t. 20. *In Arabia.* 2.

4829. SPLITGERBERA Miquel. (1840).

1. *S. japonica* Miq. comm. phyt. 3. t. 14. *In Japonia.* 2.

4830. PROCRIS Commers. (1770).

a. Capitula pedunculata.

1. *P. trinerrata* Poir. fol. ovato-oblongis subcoriaceis scabris 3-nerviis subcrenatis; stipulis membranaceis erectis; capitulis globosis. *In Hispaniola.* 2.

2. *P. quinquenervia* Spr. fol. elipticas acutiusculis 5-nerviis denticulatis; capitulis globosis; receptaculis demum angulatis. Dorstenia caulescens L. Plum. ic. t. 120. *In Hispaniola.* 2.

3. *P. punctata* Hamilt. fol. semi-cordato-oblongis cuspidatis grosse serratis asperis; stipulis linearibus elongatis; capitulis glomeratis. *In Neptalia.* 2.

4. *P. lucida* Spr. fol. oblongis lanceolatis integerrimis laevibus nitidis;

capitulis cymosis; floribus 5-andris. Dorstenia lucida Forst. In ins. Societ. 2.

5. *P. chinensis* Spr. fol. ternatis quinatisque lanceolatis integerrimis glabris. Dorstenia chinensis Lour. In China. 2.

6. *P. cantonensis* Spr. fruticosa; fol. fasciculatis lanceolatis integerimis glabris; capitulo globose dioeco; floribus 5-andris. Vanieria Lour. In China. 2.

7. *P. cochinchinensis* Spr. fruticosa aculeata; fol. ovato-lanceolatis integerrimis glabris; capitulis androgynis geminis; floribus 5-andris. Vanieria Lour. In Cochinchina. 2.

8. *P. laerigata* Blume; caulescens; fol. oblongo-lanceolatis acuminatis basi oblique attenuatis superne denticulatis pergamentaceis glaberrimis; floribus monoecis; masculis in ramis parvifloris brevissimis. In Jara. 2.

9. *P. longifolia* Blume; suffruticosa; fol. oblongis acuminatis basi oblique attenuatis apice obsolete denticulatis glabris; floribus monoecis, masculis coryboso-3-fidis. In Jara. 2.

10. *P. cuneata* Blume; suffruticosa; fol. cuneato-oblongis acumine brevi inflexo apice denticulatis laevibus; floribus masculis coryboso-3-fidis. In Jara. 2.

11. *P. frutescens* Blume; fol. membranaceis elliptico-oblongis acutis v. acuminatis basi oblique attenuatis superne repando-serratis glabris; floribus masculis incorymbis dichotomis, femineis axillaribus glomeratis. In Jara. 2.

12. *P. patudosa* Blume; herbacea; fol. brevissime petiolatis dimidiato-ovato-oblongis longiter acuminatis supra basin profunde acute serratis; stipulis membranaceis petiolo triplo longioribus. In Java. 2.

b. Capitula sessilia.

13. *P. latifolia* Blume; suffruticosa; fol. longiter petiolatis elliptico-oblongis obtuse acuminatis basi obtusiusculis integerimis glabris; capitulis subsessilibus. In Jara. 2.

14. *P. hirsuta* Blume; suffruticosa; fol. oblongo-lanceolatis longissime rostratis basi oblique attenuatis glabris; capitulis dimidiato-verticillatis hirsutissimis. In Java. 2.

15. *P. rostrata* Blume; suffruticosa; caule superne bisulco; fol. oblongis longe rostratis basi oblique attenuatis versus apicem serratis glabris in venis subtus puberulis. In Jara. 2.

16. *P. sesquifolia* Blume; suffruticosa; fol. lanceolatis acuminatissimis basi oblique attenuatis apice exigue crenulatis ad costam subtus pubescentibus; floribus glomeratis dimidiato-verticillatis. In Jara. 2.

17. *P. sinuata* Blume; herbacea; fol. membranaceis elliptico-oblongis acuminatis basi oblique attenuatis sinuato-exserte serratis glabris in costa infra puberulis; floribus confertis axillaribus. In Jara. 2.

18. *P. strigosa* Blume; herbacea; fol. elliptico-oblongis rostratis basi oblique attenuatis membranaceis supra medium grosse inaequaliter serratis glabris in venis subtus ramulisque strigosis; glomerulis dimidiato-verticillatis pubescentibus. In Jara. 2.

19. *P. parva* Blume; herbacea; fol. dimidiato-ovato-oblongis obtusiusculis supra basin acute serratis in venis subtus glomerulisque dimidiato-verticillatis hirsutis. In Java. 2.

20. *P. membranacea* Blume; herbacea; fol. tenuissime membranaceis oblongo-lanceolatis longiter acuminatis basi oblique attenuatis medio ad apicem grosse obtuse serratis glabris; glomerulis dimidiato-verticillatis. In Jara. 2.

21. *P. gracilis* Blume; herbacea; fol. subsessilibus lanceolatis acutis basi angustatis supra basin serratis glabris; stipulis membranaceis carinatis; capitulis subsessilibus involucratis. In Jara. 2.

22. *P. urticaefolia* Poir. fol. subcordato-oblongis acuminatis crenatis; stipulis linearibus. In Hispaniola. 2.

23. *P. rugosa* Poir. fol. cordato-ovatis crenatis supra rugosis subtus villosis; stipulis membranaceis cuspidatis. In Peruria. 2.

24. *P. maculata* Poir. fol. latolanceolatis subdentatis reticulatis maculatis; stipulis lanceolatis cuspidatis. In Jara. 2.

25. *P. acuminata* Poir. fol. subsessilibus lanceolatis cuspidatis apice crenatis glabris; capitulis minimis. In Java. 2.

26. *P. australis* Spr. fol. subsessilibus oblique oblongis acutis serratis

pubescentibus; stipulis nullis; capitulis subsessilibus exiguis. Dorstenia pubescens Forst. In ins. Societ. 2.

27. *P. rupestris* Hamilt. fol. sessilibus oblique oblongis acuminatis serratis pubescentibus; stipulis lanceolatis acuminatis; capitulis subsessilibus. In Nepalia. 2.

28. *P. fugifolia* Poir. fol. longe petiolatis oblique lanceolatis acuminatis dentatis supra scaberrimis subtus incanis; stipulis linearibus subulatis petiolos superantibus. In ins Masc. 2.

29. *P. monandra* Hamilt. fol. superioribus lanceolatis dentatis utrinque attenuatis pilosis inferioribus minimis ovatis; stipulis ovatis acutis; capitulis paucifloris; flosculis 1-andris. In Nepalia. 2.

30. *P. integrifolia* Don; fol. petiolatis lanceolatis acuminatis integerrimis laevibus coriaceis; stipulis lanceolatis acutis; capitulis glomeratis. In Nepalia. 2.

31. *P. cephalida* Commers. fol. petiolatis lanceolatis acutis integerrimis subtus asperis; stipulis cordatis petiolos subaequantibus. In ins. Masc. 2.

32. *P. melastomoides* Spr. fol. sessilibus lanceolatis integerrimis glabris 3-nerviis; stipulis subnullis; capitulis sessilibus. In Hispaniola. 2.

33. *P. Candolleana* Gaudich. dioeca arborea; fol. alternis subrotundo-ovatis acutis basi rotundatis 3-nerviis crenatis supra pilosiusculis subtus tenuissime albido-tomentosis; receptaculis carnosis baccaeformibus albis. In ins. Marian. 2.

34. *P. nirea* Gaudich. dioeca; fol. alternis ovatis acuminatis basi acutis 3-nerviis argute et grosse serratis reticulato-venosis supra scabris subtus niveo-tomentosis. Rumph. amb. 5. t. 79. f. 1. In ins Marian. 2.

4831. MORUS L. (1747).

De speciebus Mori vide Synops. tom. I. p. 550—551.

4832. ALBRADIA Gaudich. (1826).

1. *A. Gandichaudi*; receptaculis masculis et femineis distinctis integris;

calyce fructifero basi tantum succulento. Epicarpurus Spr. In?

2. *A. orientalis*; arborea ramosissima lactescens; floribus masculis dense spicatis, femineis pedunculatis solitariis. Epicarpurus Blume. Rheede mal. I. t. 48. In Java. 2.

3. *A. spinosa*; fol. ellipticis cuspidiatis integerrimis; drupa baccata 1-sperma. Trophis Blume. In Java.

4. *A. timorensis*; Epicarpurus Decaisn. In ins. Timor. 2.

4833. FATUOA Gaudich. (1826).

1. *F. pilosa* Gaudich. caule ramoso; fol. ovatis acuminatis grosse crenatis basi cuneato-subcordatis utrinque pilosiusculis. Urtica japonica Thunb. In Japonia. 2.

2. *F. aspera* Gaudich. caule simplici fol. ovatis subacuminatis grosse serratis, basi rotundato - subcordatis asperis; subtus pallidis pubescentibus. Urtica Thunb. In Japonia. 2.

3. *F. cordata* Gaudich. fol. ovato-cordatis acutis serratis utrinque ramisque villosis. Parietaria aspera. Lechen. In ins. Motuccis. 2.

4. *F. lanceolata* Decaisn. ramis gracilibus erectis superne puberulis; fol. lanceolatis saepius acuminatis basi rotundatis dentatis supra scabris subtus pubescentibus; capitulis subrugosis. In ins. Timor. 2.

4834. ALNUS Tournef. (1700).

1. *A. glutinosa* Gaertn. fol. obovato-rotundis inaequaliter serratis subretus glutinosis; axillis venarum subtus villosis. Sturm 19. Kern t. 14. Betula Alnus L. In Europa Asia Am. bor. et Afr. bor. 2.

2. *A. viridis* DC. fol. ovatis duplicito-serrulatis glabris demum subtus ad venarum axillas pilosis; squamis femineis 1-floris. Betula ovata Guimp. t. 147. In alp. Europ. 2.

3. *A. incana* Willd. fol. oblongis acutis subtus incano-pubescentibus; axillis venarum nudis; stipulis lanceolatis. Guimp. t. 136. Betula Reit.

et Abb. t. 16. In Europa, Asia, Japonia et Am. bor. ♂.

4. *A. oblongata* Willd. fol. ellipticis obtusiusculis glutinosis serratis axillis venarum subtus nudis. *Betula* Alt. *In Europ. austr.* ♂.

5. *A. glauca* Michx. fol. oblongis acutis duplicito-serratis subtus glaucis axillis venarum subtus nudis; stipulis lanceolatis. *In Am. bor.* ♂.

6. *A. undulata* Willd. fol. ovato-oblongis acutis inaequaliter serratis undulatis, venis subtus petiolisque pilosis stipulis ovato-oblongis. *Betula crispa* Ait. *In Canada.* ♂.

7. *A. nepalensis* Dou; fol. ovalibus acutis crenulatis subtus glaucis pilosiusculis; amentis fem. terminalibus paniculatis, masc. axillaris racemosis. *In Nepalia.* ♂.

8. *A. serrulata* Willd. fol. elliptico-oblongis utrinque attenuatis dentato-serrulatis; venis axillisque subtus pilosiusculis; stipulis ellipticis obtusis. *Abbot ins.* t. 92. *Betula rugosa* Ehrh. *In Am. bor.* ♂.

9. *A. cordifolia* Ten. fol. cordato-ovatis acuminatis subserratis nitidis; axillis venarum subtus villosis. *Betula cordata* Lois. *In Neapoli et Corsica.* ♂.

10. *A. ferruginea* H. et K. fol. subrotundo-ovatis acutis irregulariter denticulatis supra nitidis subtus sericeis ferrugineis. *In Nor. Granata.* ♂.

11. *A. jorullensis* H. et K. fol. ovato-oblongis acutis apice irregulariter denticulatis supra glabris subtus tenuissime fuso-pubescentibus. *In Mexico.* ♂.

12. *A. barbata* C. A. Meyer; arborea; fol. ovato-oblongis acutis biserratis subtus ad venas cum petiolis puberulis in axillis barbatis; stipulis ellipticis acutis. *In Talysh.* ♂.

13. *A. denticulata* C. A. Meyer; arborea; fol. obovatis obtusiusculis petiolisque glabris inaequaliter serratis axillis venarum subtus villosis; stipulis subovatis obtusis. *In Caucaso.* ♂.

14. *A. subcordata* C. A. Meyer; arborea; fol. ovatis cordatis acutis inaequaliter serrulatis subglutinosis glabris axillis venarum subtus petiolisque villosis; stipulis lanceolatis. *In mont. Talysh.* ♂.

4835. CARYA Nutt. (1816).

1. *C. olivaeformis* Nutt. fol. sub-4-gonis lanceolatis subfalcatis serratis glabris impari petiolato; fructibus oblongis 4-gonis; nuce laevi. *Juglans* Michx. *Gaertn.* t. 89. *In Am. bor.* ♂.

2. *C. sulcata* Nutt. fol. subtrijugis oblongis acutis serrulatis subtus petiolaque communi pubescentibus; fructibus subrotundis 4-carinatis; nuce laevi longe mucronata. *Juglans mucronata.* Michx. 192. *In Am. bor.* ♀.

3. *C. alba* Nutt. fol. subtrijugis oblongo-lanceolatis acuminatis argute serratis subtus villosis; fructibus depresso-globosis; nuce compressa obliqua. *Juglans* Michx. Wangenb. t. 10. f. 22. *In Am. bor.* ♂.

4. *C. tomentosa* Nutt. fol. sub-4-jugis oblongo-lanceolatis acuminatis subserratis subtus petiolisque villosis; amentis filiformibus longissimis tomentosis; fructibus subglobosis laevibus; pericarpio crassissimo; nuce sub-6-angulari durissima. *Juglans* Michx. *In Am. bor.* ♂.

5. *C. microcarpa* Nutt. fol. subtrijugis oblongo-lanceolatis acuminatis serratis utrinque glabris subtus glanduloso-punctulatis, axillis venarum barbulatis; fructibus subglobosis; nuce 4-angula truncata. *In Pennsylvania.* ♂.

6. *C. amara* Nutt. fol. sub-4-jugis ovato-oblongis acuminatis argute serratis utrinque glabris; fructibus subglobosis; putamine fragili, nuce subglobosa mucronata laevi. *Juglans* Michx. *In Am. bor.* ♂.

7. *C. porcina* Nutt. fol. sub-4-jugis basi inaequaliter rotundata oblongis acuminatis serratis utrinque glabris; fructibus subgloboso-terbinatis, nuce durissima laevi. *Juglans* Michx. *In Am. bor.* ♂.

8. *C. myristiciformis* Nutt. fol. subtrijugis ovato-lanceolatis acuminatis serratis glabris; fructibus ovalibus rugoso-scabris, nuce ovali acuminata sulcate-lineata durissima. *Juglans* Michx. *In Carolina.* ♂.

9. *C. aquatica* Nutt. fol. sub-5-jugis anguste lanceolatis acuminatis subserratis; fructibus ovatis surtis prominulis; nuce subdepressa rubiginosa tenera. *Juglans* Michx. *In Am. bor.* ♂.

10. *C. integrifolia* Spr. fol. sub-5-jugis lanceolatis acuminatis integer-

rimis ramulis petiolisque tomentosis; floribus 6-8-andris; nuce 4-gona. In Louisiana. ♂.

4836. TRAGANTHUS Klotsch (1840).

Herbae americanae tropicae annuae. Radix fusiformis alba. Caulis erectus ramosus. Folia integerim v. grosse serrata. Spicae axillares. Klotsch in Erichs. Arch. 7. t. 1. p. 188. t. 9. f. A. ex Endl.

4837. POTROS L. (1747).

1. *P. scandens* L. radicans; fol. longe petiolatis lanceolatis v. oblongo-lanceolatis acuminatis basi cum petiolo alato-articulatis; spadicibus axillaribus solitariis pedunculatis recurvatis subglobosis. Rheed. 7. t. 40. B. R. t. 1337. Hook. ic. t. 175. In Ind. or. 2.

2. *P. gracilis* Roxb. scandens; fol. lanceolatis integerrimis in petiolis brevibus teretibus supra vaginas; spadice pedunculato cylindrico vix spatham linguiformem aequante. Rumph. 5. t. 181. f. 2. In Ind. or. 2.

3. *P. remotiflorus* Hook. ic. t. 133. caule scandente gracili flexuoso ramoso; fol. lato-lanceolatis acuminatis trinerviis; petioli vagina elongata canaliculata; spadice gracili elongato flexuoso pedunculato; perianthio 6-lobo 6-andro. In Ceylona. 2.

4. *P. Rumphii* Schott. radicans; fol. longe petiolatis ellipticis acuminatis subtus viridi-flavescentibus; petiolis vaginalis; spadicibus axillaribus pedunculatis cylindricis pendulis. Rumph. 5. t. 182. f. 2. In Moluccis. ♂.

5. *P. Cussuaria* Gmel. caule scandente; fol. longe petiolatis oblongis acuminatis basi rotundatis integerimis; spadicibus ovato-oblongis axillaribus erectis. Rumph. 5. t. 183. f. 1. In Amboina. 2.

4838. LASIA Lour. (1790).

1. *L. Loureiri* Schott. 6-pedalis; fol. longe petiolatis pinnatifidis petiolis scapisque curvato-aculeatis; spatha longissima subulata contorta. Pothos Lasia Roxb. In Ind. or. et Cochinchina. 2.

2. *L. heterophylla* Schott. caule ramisque repentibus; petiolis scapisque aculeatis; fol. sagittatis pinnatifidis; spatha cylindrica superne spiraliter torta clansa. Pothos Roxb. In Ind. or. 2.

4839. ANTHURIUM Schott. (1829).

a. *Folia penninervia.*

1. *A. violaceum* Schott. Meleten. I. p. 22. caule repente fibris reticulatis tecto; fol. oblongis utrinque attenuatis parallele venosis punctatis; pedunculus axillaribus; spadice cylindrico spatham ovatam superante. Pothos violaceus Sw. H. et K. nov. g. t. 19. Hook. exot. fl. t. 55. Bot. Cab. t. 632. In Jamaica Nov. Granat. et Brasilia. 2.

2. *A. gracile* Lindl. B. R. t. 1635. subacaule; fol. cuneato-lanceolatis acuminatis basi valde angustatis; petiolis gracilibus; pedunculus filiformibus; spadicibus gracillimis paucifloris. Rudge guj. t. 32. In Guiana. ♂.

3. *A. coriaceum* Endl. acaule; fol. oblongo-lanceolatis undulatis coriaceis basi obliquis venosis nervo marginali; petiolo apice nodoso; pedunculo foliis dimidio breviore. Hook. exot. fl. t. 210. In Rio Janeiro. ♂.

4. *A. longifolium* Kunth; subacaule; fol. lineari-lanceolatis acuminatis basi rotundatis nitidis; petiolis compresso-teretibus apice tumidis; pedunculis elongatis; spatha patentissima reflexa. Pothos Hoffmannsegg. In Brasil. 2.

5. *A. scolopendrium* Kunth; caule scandente parasitico; fol. lanceolatis acutis basi attenuatis subparallelovenosis, venis subobscurus, margine lineatim parallelis; scapis folia subaequantibus. Pothos Hamilt. In Neptalia. 2.

6. *A. Poiteanum* Kunth; fol. petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis basi angustatis nervis lateralibus divaricatis; spadicibus longissime pedunculatis gracilibus; spatha spadici approximata. In Guiana. 2.

7. *A. Beyrichianum* Kunth; caulescens radicans; fol. petiolatis lanceolatis acutatis mucronatis basi angustatis, nervis lateralibus divaricatis; spadicibus longistime peduncula-

tis rectis gracilibus; spatha reflexo-patentissima acuminata. *In Brasilia*. 2.

8. *A. rubricaulis* Kunth; caulescens; fol. petiolatis lanceolatis acuminatis basi angustatis apice recurvatis nervis lateralibus divergentibus; petiolis semiteretibus apice geniculato-tumidis; spadicibus longe pedunculatis rectiusculis; spatha spadice dimidio breviore. Pothos h. ber. *In Brasilia*. 2.

9. *A. Harrisii* Kunth; caulescens; fol. longe petiolatis lanceolatis acutis coriaceis nitidis, nervis lateralibus divaricatis; petiolis angustissime marginatis folio dimidio brevioribus; spatha approximata reflexa spadice dimidio breviore. Pothos Grah. Hook. exot. fl. t. 211. B. Cab. t. 1301. *In Brasilia*. 2.

10. *A. lanceolatum* Kunth; acaule; fol. brevissime petiolatis lanceolatis acutis basi angustatis ob venas lateralibus trinerviis crassis laevissime complicatis costa crassa; spadicibus pedunculatis erectis folium subaequantibus; spatha subremota lanceolata spadice dimidio breviore. Pothos L. Plum. am. t. 62. *In Am. austr.* 2.

11. *A. Settowianum* Kunth; subacaule; fol. petiolatis lanceolatis acutis mucronatis basi cuneatis; petiolis 4-angularibus apice subgeniculato-nodosis; spadicibus longe pedunculatis rectis gracilibus; spatha erecta acuminata spadice breviore. *In Brasilia*. 2.

12. *A. intermedium* Kunth; caulescens radicans; fol. longe petiolatis lanceolatis acuminatis basi cuneato-angustatis subcoriaceis; petiolis semiteretibus folio dimidio brevioribus; spadicibus longe pedunculatis rectis spatha approximata reflexa linear-lanceolata acuminata. *Patria?* 2.

13. *A. Wittdenowii* Kunth; acaule fol. longe petiolatis oblongo-lanceolatis acutis basi obtusis coriaceis glabris; nervis foliorum lateralibus patulis; spadicibus longe pedunculatis rectis; spatha approximata linear-lanceolata acuminata cuspidata spadicem acquante. Pothos lanceolata Willd. *Patria?* 2.

14. *A. microstachyum* Kunth; caulescens radicans; fol. ovato-oblongis cordatis acuminatis trinerviis; spatha remota linear-lanceolata acuta plana spadicem subaequante; pedunculo

tereti. *Pothos microstachyus* H. et K. *In Nov. Granata*. 2.

15. *A. myosuroides* Endl. caulescens radicans; fol. cordatis ovato-ellipticis acuminatis submembranaceis; spatha remota lanceolata plana spadice parum breviore; pedunculo tereti. *Pothos* H. et K. nov. gen. t. 18. *In Nov. Granata*. 2.

16. *A. Olfersianum* Kunth; caulescens; fol. longe petiolatis oblongis breve acuminatis, venis lateralibus divaricatis, ante marginem et ipso margine confluentibus; petiolis apice geniculato-tumidis; spadicibus longe pedunculatis rectis, spatha approximata reflexa lanceolata acuminata spadice duplo breviore. *Pothos* parasitica Fl. flum. 9. t. 121? *In Brasilia*. 2.

17. *A. microphyllum* Endl. subcaulescens; fol. longe petiolatis ovatis acutis basi rotundatis, venis lateralibus patulis; petiolis folio paulo brevioribus apice geniculato-tumidis; spadicibus longe pedunculatis, erectis folium superantibus; spatha remota oblonga reflexa spadice cylindrico paulo breviore. *Pothos microphylla* Hook. B. M. t. 2953. B. Cab. t. 1673. *In Brasilia*. 2.

18. *A. lucidum* Kunth; caulescens; fol. longissime petiolatis ovatis cordatis mucronatis coriaceis supra nitidissimis, nervis lateralibus obsoletissimis lobis basi laevibus rotundatis; petiolis teretibus folio duplo longioribus; spadicibus longissime pedunculatis rectis; spatha reflexa acuminata. Pothos h. angl. *In Brasilia*. 2.

19. *A. Luschnathianum* Kunth; caulescens fol. longissime petiolatis ovato-oblongis mucronatis basi cordatis utrinque nitidis; petiolis longitudo folii apice tumidis; spadicibus longe pedunculatis rectis; spatha approximata reflexa lanceolata acuminata spadice breviore. *In Brasilia*. 2.

20. *A. glaucescens* Kunth; acaule; fol. longe petiolatis lanceolatis acutatis inaequali supra glaucescentibus subtus laete viridibus, nervis lateralibus patulis; petiolis teretibus; spadicibus longissime pedunculatis rectis crasse cylindraceis; spatha patula coriacea. Pothos Schott. *Patria?* 2.

21. *A. Gaudichaudianum* Kunth; acaule?; fol. longe petiolatis lanceolatis acutis basi cuneato-angustatis

obsoletissime penninerviis; petiolis folio dimidio brevioribus apice geniculato-nodosis; pedunculis longissimis erectis; spatha a spadice remota acuminata. *In Brasilia.* 4.

22. *A. Hookeri* Kunth; acaule; fol. breve petiolatis obovato-spathulatis acutiusculis basi angustatis 30 poll. longis; petiolis canaliculatis angulis rotundatis; spadicibus longe pedunculatis violaceis rectis; spatha approximata acuminata viridi. *P. crassinervia* B. M. t. 2987. *P. solitaria* Fl. flum. 9. t. 123. *In Brasilia et Demerara.* 4.

23. *A. crassinervium* Schott; acaule, fol. breve petiolatis obovato-oblongis basi angustatis laete viridibus 1—2-pedal. subtus albido-punctatis; petiolis dorso tricarinatis; pedunculus sulcato-angulatis; spadicibus crassis rectis, rosellis e spatha viridi reflexa. *Pothos Jacq. ic. t. 609. ejusd. fragm. t. 1. In Cumana.* 4.

24. *A. Schlechtendahlii* Schott; ab *A. crassinervio* differt spadice acutiore, folio angustiore et acutiore venis crebrioribus, superioribus rectis paulo intra marginem anastomosantibus. *In Mexico.* 4.

25. *A. acaule* Schott; fol. breve petiolatis lanceolatis acutis basi angustatis 3—4-pedalibus, costa crassa acutangula; spadicibus rectis viridis fructiferis pendulis, spatha reflexa acuminata spadice longissimo triplo breviore. *Pothos Jacq. am. t. 153. Hook. exot. fl. t. 122. In Am. austr.* 4.

26. *A. crenatum* Kunth; acaule; fol. lanceolatis acutis crenatis inferne angustatis; spadicibus cylindricis mutantibus spatham lanceolatam duplo superantibus. *Pothos L. Plum. ic. t. 39. In ins. Thomae.* 4.

27. *A. trinervium* Kunth; caulescens fol. longe petiolatis oblongis acutis v. obtusis 10—12-poll. basi sub 5-nerviis, costa crassa supra prominula semi-terti-rotunda; spadicibus rectis tenuibus, spatha lanceolata acuminata spadicem superante. *In Brasilia.* 4.

28. *A. quinquenerium* Kunth; fol. ovato-oblongis acutis laevissime cordatis digitato-5-nerviis coriaceis; spatha subremota oblonga acuminata plana 5-nervia. *Pothos H. et K. In and. Peruv.* 4.

29. *A. cordifolium* Kunth; acaule; fol. longe petiolatis deltoideo-ovatis

repando-cordatis acutis pedatinerviis undulatis, lobis rotundatis; spadicibus longissime pedunculatis erectis subcurvatis; spatha subremota linearilanceolata patentissima. *Pothos cordata* Willd. *P. macrophylla* B. M. t. 2801. *In Am. austr.* 4.

30. *A. grandifolium* Kunth; acaule; fol. longe petiolatis elongato-cordatis acutis undulatis 7-nerviis firmis nitidis; petiolis antice sulcatis; pedunculus teretibus petiolo longioribus; spatha lanceolata acuta coriacea spiraliter torta spadice fusco-viridi duplo triplo breviore. *Pothos Jacq. ic. t. 610. In Caracas.* 4.

31. *A. macrophyllum* Endl. subacaule; fol. longe petiolatis maximis cordatis digitato-nerviis membranaceis nitidis; petiolis teretibus canaliculatis; spatha approximata lanceolata acuminata spadice violaceo pedali crasso nutante dimidio breviore. *Pothos Sw. Plum. am. t. 51. f. 1. In Jamaica.* 4.

32. *A. amplum* Kunth; subcaulescens; fol. longe petiolatis ovatis basi sinuato-cordatis acumine obsoleto brevissimo coriaceis undulatis pellucido-punctatis; petiolis compresso-teretibus apice incrassato-tumidis. *Pothos macrophylla* h. Bertol. *Patria?* 4.

33. *A. Humboldtianum* Kunth; acaule; fol. longe petiolatis profundiissime cordato-ovatis acuminate deflexis; petiolis apice tumidis; pedunculus elongatis; spatha remota oblonga acuminata plana spadicem rectum superante. *Pothos cordata* H. et K. *In Caracas.* 4.

34. *A. rubrinervium* Kunth; caulescens; fol. longissime petiolatis lamina deflexis profundiissime cordato-ovatis acutis opacis, lobis patulis; petiolis angulatis rubentibus apice tumidis; spatha remota acuminata spadice odorato breviore. *Pothos Link. In Guiana.* 4.

35. *A. breviscapum* Kunth; acaule?; fol. longe petiolatis repando-hastato-cordatis subdeltoideis acuminate membranaceis lobis magnis divaricatis; spatha remota acuta subcariacea spadicem cylindraceum coronatum obtusum fere duplo superante. *Pothos Poepp. In Peruria.* 4.

36. *A. sagittatum* Kunth; acaule; fol. longe petiolatis profunde cordatis acutis, lobis basilaribus divaricatis; spadicibus longe pedunculatis erectis;

spatha remota reflexa spadicem violaceum erectum superante. Pothos Sims. B. M. t. 1584. *In Ind. occ.* 2.

37. *A. subsagittatum* Kunth; acaule; fol. longe petiolatis lanceolato-oblongis cordatis longe acuminatis 5—7-nerviis; lobis basilaribus rotundatis divergentibus; petiolis longitudine folii. Pothos H. et K. *In Andalusia.* 2.

38. *A. angustum* Kunth; acaule; fol. ovato-lanceolatis profunde cordatis acuminatis 5 - nerviis subcoriaceis lobis rotundatis; spatha oblongo-elliptica obtusa plana subcoriacea multi-nervia spadice breviore; pedunculo tereti. Pothos H. et K. *Ad Orinocum.* 2.

39. *A. cartilagineum* Kunth; fol. longe petiolatis late cordatis acutis rigidis, lobis posticis rotundatis superpositis nervis obliquis distantibus. Pothos Desf. *Patria?* 2.

b. Folia pedatiloba v. pedatisecta.

40. *A. pedatum* Endl. fol. longissime petiolatis pedato-undecim-lobis coriaceis; lobis oblongis acutis intermedio longissimo basi sinuato; spadicibus longe pedunculatis petiolum superantibus, spatha oblonga obtusa concava striata spadicem subaequante. Pothos H. et K. nov. g. t. 20. *In Poppaya.* 2.

41. *A. podophyllum* Kunth; folio pedato, lacinias irregulariter pinnatifidis, lacinulis lobato-repandis; spadice cylindrico spatha laeviuscula longiore. *In Mexico.* 2.

c. Folia digitato-partita.

42. *A. palmatum* Kunth; caulescens radicans; fol. longissime petiolatis, palmatis, lacinias 9—10 lanceolatis peramentaceis; spadicibus longe pedunculatis folio brevioribus nutantibus spatha sulcata albo-viridi longioribus. Pothos L. Plum. am. t. 64, 65. *In Am. austr.* 2.

43. *A. caudatum* Kunth; caulescens scandens; fol. longe petiolatis 3—5-lobis, oblongis acuminatis lobis extimus dimidiato-rotundis membranaceis; petiolis teretibus folio longioribus; spadicibus? *In Hort. ber. sub Pothos.* 2.

44. *A. digitatum* Kunth; caulescens scandens; fol. longe petiolatis digitatis, foliolis 7—11 subpetiolatis lanceolatis oblongisve recurvato-acuminatis subcoriaceis nitidis; spadicibus cylindricis crassiusculis; spatha undulata reflexa spadicem subaequante. Pothos Jacq. ic. t. 611. *In Am. austr.* 2.

45. *A. pentaphyllum* Endl. caulescens scandens; fol. longe petiolatis; foliolis 5—7 obovato-oblongis acuminatis subcoriaceis opacis; spadicibus breve pedunculatis cylindricis violaceis, spathae ovatae viridis longitudine. Pothos B. M. t. 1375. Bot. Cab. t. 567. *In Guiana.* 2.

46. *A. Aubletii* Kunth; caulescens scandens; fol. longe petiolatis digitatis; foliolis 5 oblongis acuminatis; spadicibus cylindricis spatha approximata lanceolata convexa acuta longioribus. Dracontium Aubl. Guj. t. 326. Pothos pentaphylla Willd. *In Guiana.* 2.

47. *A. variabile* Kunth; caulescens scandens; fol. longe petiolatis foliolis 3—9 breve petiolatis elongato-lanceolatis longe acuminatis subundulatis nitidis; spadicibus breve pedunculatis obconicis violaceis spatha ovato-oblonga acuta reflexa interne violascente longioribus. Pothos enneaphylla et heptaphylla Fl. flum. 9. t. 125 et 126. *In Brasilia.* 2.

48. *A. undulatum* Schott. caulescens scandens; fol. longe petiolatis digitato-7-partitis, lobis oblongo-lanceolatis acuminatis subcoriaceis undulatis nitidis; spadicibus pedunculatis conico-cylindricis violaceis spatha ovato-oblonga subcoriacea reflexa violascente longioribus. *In Brasilia.* 2.

49. *A. Ottonis* Kunth; caulescens scandens; fol. longe petiolatis digitatis; foliolis 9 longissimis linearibus acuminatis glabris nitidis; spadicibus conico-cylindricis violaceis spatham reflexam laete viridem subaequantibus. *In Brasilia.* 2.

50. *A.?* reflexum H. et K. scandens, flexuosum; fol. oblongis leviter acuminatis basi obtusis reticulato-venosis coriaceis?. Pothos H. et K. *Ad Orinocum.* 2.

4840. SPATHIPHYLLUM Schott et Endl. (1842).

1. *S. lanceaeifolium* Schott; fol. oblongis acuminatis; spatha oblonga acuminata in scapum decurrente. *Dracontium* Jacq. ic. t. 612. *In Caracas.* 4.

2. *S. sagittaeifolium* Schott. fol. sagittatis; spatha lanceolata acuminata; calycibus 6-partitis. *Dracontium* Mey. *Arum* Rodsch. *Pothos* Rudge guj. t. 34. *In Guiana.* 4.

PENTANDRIA.

4841. FRIESIA Spr. (1828).

1. *F. argentea* Spr. *Crotonopsis linearis* Michx. *In Louisiana.* ⊖ Herba tenera dichotoma; fol. linearibus stellato-pubescentibus; floribus spicatis.

4842. CROZOPHORA Neck. (1790).

a. *Fruticosae.*

1. *C. senegalensis* Spr. fol. rhomboides obtusis subrepandis subtus incanato-tomentosis basi glandulosis; racemis axillaribus; capsulis lepidotis. *Croton* Lam. *In Senegambia.* 4.

2. *C. Rottleri* Spr. fol. rhomboeovatis plicato-rugosis stellato-pubescentibus subtus incanis basi biglandulosis; capsulis villosis. *Croton* Geisel. *In Ind. or.* 4.

3. *C. oblongifolia* Adr. Juss. fol. longe petiolatis subpellatis oblongis acutis eroso-dentatis stellato-hirsutis basi biglandulosis; capsulis squamosis. *Croton* Delil. fl. aeg. t. 51. *In Aegypto.* ♀.

b. *Herbaceae.*

4. *C. plicata* Adr. Juss. fol. ovatis obtusis lobato-crenatis rugoso-pli-catis hirsutis; capsulis stellato-tomentosis. *Croton* Vahl. *In Arabia.* ⊖

5. *C. hierosolimitana* Spr. fol. subrotundis obtusis subintegerrimis utrinque stellato-villosissimis candidis; capsulis splendido-argenteo-lepidotis. *In Palaestina.* ⊖

6. *C. tinctoria* Adr. Juss. fol. ova-to-rhombeis repandis basi biglandulo-

sis pulverulento-tomentosis; capsulis pendulis squamuloso-tuberculatis. Nees gen. 3. t. 12. *Croton tinctorium* L. *In Europ. anstr.* 4.

7. *C. obliqua* Juss. fol. oblique ovato-lanceolatis integerrimis tomentosis eglandulosis; capsulis pendulis squamulosis. *Croton* Forsk. *In Aegypto.* 4.

8. *C. verbascifolia* Adr. Juss. fol. ovato-oblongis repandis utrinque dense stellato-tomentosis; capsulis pendulis squamato-pubescentibus. *Croton* Willd. *C. villosum* Sibth. *In Graecia.* ⊖.

9. *C. mollissima* Adr. Juss. fol. peltatis cordato-ovatis acuminatis denticulatis mollissime tomentosis; racemis compositis; capsulis furfuraceis. *Croton* Geis. *In China.* ⊖.

10. *C. Burmanni* Spr. fol. trilobis obtusis villoso-tomentosis; racemis axillaribus. *Croton hastatum* Burm. *In Ind. or.* ⊖.

11. *C. peltata* Labill. fol. spathulatis glabris integerrimis subglandulosis; floribus racemosis; bracteis fem. peltatis. *In Nov. Caledonia.* 4.

12. *C. Brocchina* Vis. pl. Aeg. et Nub. t. S. f. 2. *In Aegypto.* ♀.

4843. HEXADICA Lour. (1790).

1. *H. cochinchinensis* Lour. *In Cochinchina.* ♀. Arbor fol. alternis ovato-oblongis obtusis integerrimis glabris, floribus terminalibus fasciculatis albis parvis.

4844. SACCELLIUM Humb. et Kunth. (1817).

1. *S. lanceolatum* Humb. *In Peruvia.* ♀. Arbor fol. alternis lanceolatis subdentatis subtus tomentosis; floribus racemosis.

4845. AMBROSIA L. (1747).

1. *A. integrifolia* Muehlenb. fol. sessilibus ovatis acuminatis serratis hispidis; racemis terminalibus ternis. *In Am. bor.* ⊖.

2. *A. bidentata* Michx. fol. sessilibus lanceolatis basi utrinque 1-2-dentatis hirsutis; caule simplici hirto; racemo solitario involucro mucronato. *In Am. bor.* 4.

3. *A. trifida* L. fol. petiolatis 3-fidis acuminatis serratis sebris; caule aspero superne hispido; racemis paniculatis. *In Am. bor.* ♂.

4. *A. heterophylla* Mühl. fol. obtusis subtus incanis, caulinis pinnatifidis subdentatis petiolatis, ramis lanceolatis sessilibus, ramis dupliciter pilosis; racemis solitariis. *A. peruviana* W. *In Am. bor.* 4.

5. *A. cumanensis* Kunth; fol. tripartito-bipinnatifidis pubescentibus subtus incanis, laciinis oblongis acutis dentatis; racemis simplicibus. *In Cumania.* 4.

6. *A. artemisiaefolia* L. fol. bipinnatifidis subtus incano-tomentosis, laciiniis sinuato-dentatis obtusiusculis; racemis terminalibus aggregatis; caule hirsuto. *In Am. bor.* 4.

7. *A. tenuifolia* Spr. fol. bipinnatifidis subtus incano-tomentosis, laciiniis remotis linearibus acutis subdentatis; racemis solitariis; caule hispido. *In Montevideo.* 4.

8. *A. hispida* Pursh; fol. bipinnatifidis incanis laciiniis incisis; racemis subpaniculatis; caule hispido. *In Crotina.* 4.

9. *A. paniculata* Michx. fol. bipinnatifidis glabris; laciiniis lanceolatis; racemis paniculatis cauleque hispidulis. *In Am. bor.* 4.

10. *A. elatior* L. fol. bipinnatifidis glabriusculis, laciiniis lanceolatis acutis ramis petiolisque hirsutis; racemis paniculatis. *In Am. bor.* 4.

11. *A. maritima* L. fol. bipinnatifidis incano-sericeis laciiniis obtusis subdentatis; racemis solitariis; caule villosissimo. Schlk. t. 292. *In Europa et Asia minore.* ♂. Flores lutei.

4846. FRANSERIA Cav. (1790).

1. *F. ambrosioides* Cav. ic. t. 200. fol. petiolatis cordatis lanceolatis elongatis inaequaliter dentatis sebris subglutinosis; petiolis appendiculatis. *In Mexico.* 4.

2. *F. artemisioides* W. fol. petiolatis bipinnatifidis subtus lanatis laciiniis lanceolatis incisis; petiolis alatis. *In Peruvia.* ♀.

3. *F. Chamissonii* Less. *In California.* 4.

4847. XANTHIUM L. (1747).

1. *X. strumarium* L. fol. cordatis angulato-dentatis trinerviis cauleque hirsutiusculis; fructibus racemosis, rostris rectis, aculeis uncinatis. Fl. dan. t. 970. Lam. ill. t. 765. *In Europa.* ♂.

2. *X. canadense* Will. fol. profunde cordatis basi cuneatis angulatis subdenticulatis sebris; caule maculato superne aspero; fructibus geminis hispidissimis. *X. orientale* Gaertn. Linn. dec. 33. t. 17. *In Am. bor.* ♂.

3. *X. macrocarpum* DC. fol. oblongis basi cuneatis subangulatis grosse dentatis sebris; fructibus geminis oblongis hispidis, rostris 2 aculeisque uncinatis. *X. echinatum* Musc. *In Montevideo.* ♂.

4. *X. spinosum* L. spinis stipularibus trifurcatis; fol. 3-partitis subtus incanis laciiniis lanceolatis subdentatis; rostro subulato recto; aculeis uncinatis. Moris Sect. 15. t. 2. f. 3. *In Europ.* ♂.

5. *X. catharticum* Kunth; spinis stipularibus ternatis; fol. pinnatifido-laciiniatis supra strigosis subtus incano-tomentosis laciiniis acutis; fructibus geminis; aculeis uncinatis. *In Quito.* ♂.

4848. CHIROPETALUM Adr. Juss. (1823).

1. *C. dioicum* Adr. Juss. tent. t. 8. f. 26. *C. Croton* Cav. ic. t. 6. *In Mexico.* ♀. Folia lanceolata basi angustata obtusa integerrima tomentosa subsessilia.

4849. LOXOSTYLLIS Spr. (1827).

1. *L. alata* Spr. *In P. b. S.* ♀. Folia impari-pinnata 2—6-juga. Flores paniculati.

HEXANDRIA.

4850. COMPTONIA Gaertn. (1791).

1. *C. asplenifolia* Ait. Liquidambar L. *In Am. bor.* ♀. Frutex cubitalis, fol. lineari-lanceolatis alternantim pinnatifidis laciiniis obtusis; floribus axillaribus.

4851. HYOSPATHE Mart. (1827).

1. *H. elegans* Mart. Palm. t. 1, 2.
 2. *In sylvis ad flum. Amazonum.* ♂. Caudex 5—6-ped. annulatus. Frondes terminales pinnatifidae. Spadices simpliciter ramosi infra frondium vaginas ovati.
-

4852. KUNTHIA H. et B. (1816).

1. *K. montana* H. et B. pl. aeq. t. 122. Mart. Palm. t. 101. f. 6, 7. et t. 142. *In Nov. Granata.* ♂. Caudex 20—24-ped. Frondes 3—4-pedales pinnatae. Baccæ globosæ virides.
-

4853. LEOPOLDINIA Mart. (1824).

1. *L. putchra* Mart. Palm. t. 51, 52. pinnis linearibus acuminatis subtus concoloribus; baccarum fibris exterioribus discretis filiformibus. *In Brasilia.* ♂. 8—10-ped. Frond. 6-ped.

2. *L. insignis* Mart. pinnis lanceolatis aristatis subtus glaucis; baccarum fibris densissime compactis. *In Brasilia.* ♂.
-

4854. EUTERPE Mart. (1824).

1. *E. oleracea* Mart. Palm. t. 29, 30. frondibus pinnatis concinnis pectinatis; floribus densis; foliolis calycinis late ovatis margine denticulatis; baccis globosis. *In Am. austr.* ♂. Caud. 80—100-ped. Frondes 8—12-pedales.

2. *E. ensiformis* Mart. Palm. t. 31. frondibus pinnatis concinnis pectinatis, pinnis longissime acuminatis subensiformibus; floribus laxis; foliolis calycinis masculis lato triangulatibus petalis 4-plo brevioribus. *In Brasilia.* ♂. Caudex 6-orgyalis.

3. *E. edulis* Mart. Palm. t. 32. frondibus pinnatis concinnis pectinatis rachi nervo que pinnarum lepidotis; floribus laxe dispositis; foliolis calycinis orbicularibus. *In Brasilia.* ♂. Caudex 40—100-ped.

4. *E. Praga* Mart. frondibus pinnatis foliolis multijugis. *In Am. austr.* ♂.
-

4855. OENOCARPUS Mart. (1824).

1. *O. distichus* Mart. Palm. t. 22, 23. caudice nudo; frondibus distichis, pinnis linear-lanceolatis; calycibus masculis quam petala oblonga obtusa 4-plo brevioribus; baccis ovatis obtusis. *In Brasilia.* ♂. Caudex 20—40-ped. Frondes 15-pedales.

2. *O. Batana* Mart. caudice nudo; frondibus sparsis, pinnis linear-lanceolatis; calycibus masculis quam petala oblonga acutiuscula 4-plo brevioribus. *In Brasilia.* ♂. Caudex 70—80-ded. Frondes 15-pedales.

3. *O. Bacaba* Mart. Palm. t. 26. f. 1, 2. frondibus sparsis; pinnis linear-lanceolatis; calycibus corolla triplo brevioribus, petalis oblongis acutis; baccis subglobosis vertice acutis. *In Brasilia.* ♂. 50—60-ped. Frondes 12-pedales.

4. *O. minor* Mart. Palm. t. 27. caudice nudo tenui; frondibus sparsis; calycibus masculis corolla 4-plo brevioribus; baccis ovato-ellipticis acutis. *In Brasilia.* ♂. Caudex 10—25-ped. Frondes 6—8-pedales.

5. *O. circumtextus* Mart. Palm. tab. 26. f. 3, 4. caudice opere fibroso supertexto; pinnis oblongo-lanceolatis longe acuminatis; calyce masculo petalis ovato-oblongis obtusiusculis 4-plo breviore; baccis cylindricis. *In Brasilia.* ♂. 20-ped. Frondes 8—10-pedales.
-

4856. OREDOXA Willd. (1805).

1. *O. oleracea* Mart. t. 156. f. 1, 2 et t. 163. caudice elato aequali; pinnis linearibus longe acuminatis apice bifidis; spadice paleis siccis laciniatis albis scrobiformibus deciduis dense tomentoso; baccis ovato-oblongis subcurvatis; areola vasorum in semine oblonga. Jacq. edit. pict. am. t. 235. Euterpe caribaea Spr. *In Antillis.* ♂. Caudex 130-ped.

2. *O. regia* H. et K. caudice mediocre medio tandem tumido; pinnis angusto-lanceolatis acuminatis; drupis ellipticis; areola vasorum in semine orbiculari. Mart. Palm. t. 156. f. 3, 4, 5. Cerocarpus Spr. *In ins. Cuba.* ♂. Caud. 7—9-orgyalis.

3. *O. acuminata* Willd. frondibus pinnatis; pinnis ensiformibus acuminatis. *In Caracas.* ♀.

4. *O. praemorsa* Willd. frondibus pinnatis, pinnis cuneatis apice praemorsis. *In Caracas.* ♀. 40—50-pedalis. Frondes longissimae.

5. *O. Sancona* H. et K. frondibus pinnatis; pinnis crispis. *Oenocarpus Spr. Ad Cartagenam.* ♀. 25—30 ped.

6. *O. frigida* H. et K. frondibus pinnatis; foliolis subflexuosis. *Oenocarpus Spr. In Omiudia.* 4.

154 et 155. f. 1. *In ins. Mauritii.* ♀. 30—40-ped.

6. *A. alba* Bory; inermis; caudice elato; vaginis petiolorum nervisque rubentibus; pinnis angusto-lanceolatis longe acuminatis demum inaequaliter bifidis; spadice fastigiato; stigmate verticali. Mart. Palm. t. 154 et 155. f. 2. *In ins. Madagascar, Bourbonia.* ♀.

7. *A. rubra* Bory; caudice elato; petiolis rachique passim aculeatis; pinnis linear-lanceolatis acuminatis subtus glaucis margine subsetulosis; spadice spatulaque basi aculeatis; petalis oblongis calyce triplo brevioribus; stigmate verticali. Mart. Palm. t. 154 et 155. f. 3. *Euterpe pisifera* Gaertn. t. 139. f. 4. *In ins. Mascarenis.* ♀.

8. *A. pumila* Blume in Mart. Palm. t. 153. f. 1—3. inermis; caudice arundinaceo; pinnis linearibus acuminatis saepe fissis praemorsis; calycibus subulatis petala duplo superantibus. *In Java.* ♀. 8—10-ped.

9. *A. monostachya* Mart. Palm. t. 155. f. 4. inermis caudice gracili humili; pinnis linearibus inaequaliter bifidis praemorso-dentatis; petiolo rachique subtus spadiceque fusco-lepidotis; spadice simplicissimo filiformi. *In Nov. Wallisia.* ♀. Palma 8-ped.

10. *A. Wallichiana* Mart. inermis caudice bunili; pinnis connexis inferioribus falcatis extus repandis et denticulatis subtus paleaceo-villosulis; calycis foliolis late orbicularibus. *In ins. Pinang.* ♀. Frondes 4—5-ped.

11. *A. Nenga* Blume; frondibus pinnatis; pinnis linearibus acuminatissimis supremis truncatis fissis; spadicibus nutantibus; fructibus distichis ellipticis. *In Java.* ♀.

12. *A. coronata* Blume; frondibus pinnatis pinnis anguste linearibus acuminatis supremis praemorsis; spadicis ramis numerosis rectis; fructibus ellipticis stigmate obtuse umbonatis. *In Java.* ♀.

13. *A. spicata* Lam. caudice elato crassiusculo; pinnis linearibus acuminatis; spadice indiviso; fructibus globosis aurantiacis. Rumph. I. t. 5. f. 1 et A. *In Amboina et Java.* ♀.

14. *A. glandiformis* Lam. caudice elato gracili; petiolis hirsutis; pinnis linearibus acuminatis findendis; spadice breviter racemoso; fructibus glanduliformibus luteo-rubentibus. Mart.

Palm. t. 158. f. 4. Rumph. 1. t. 6.
In Amboina Rawack etc. ȏ.

15. *A. vestiaria* Gieseke; caudice mediocri, radicibus aculeatis extra terraneis sulto; pinnis connexis plurinerviis acutis; fructibus ellipticis glanduliformibus rubentibus. *In ins. Bourb.* ȏ.

16. *A. madagascariensis* Mart. drupis oblongo-obovatis stigmatum residuis hinc ad basin notatis; sarcocarpii fibris rigidulis complanatis inde a basi liberis; nucleo obovato; embryo hinc supra basin locato. *In Madagascaria.* ȏ.

Species dubia.

17. *A. tigillaria* W. Jack; frondibus pinnatis, foliolis acutis spadicebus ramosis; flore unico femineo inter 2 masculos; fructibus globosis. *In Sumatra.* ȏ.

4858. DYPYSIS Noronh. (1817).

E. pinnatifrons Mart. Palm. t. 156. f. 1. caudice arundinaceo mediocri; pinnis connexis plicatis linearibus apice fissis denticulato-praeomorsis; rachi inferne fusco-lepidota; spatha basilari unica; spadice duplikato-ramoso; calycis foliolis late ovatis; stigmate subbasilari. *In Madagascaria.* ȏ.

2. *D. forficifolia* Mart. Palm. t. 143. f. 2. caudice arundinaceo humili; fronde subsessili subtiliter lapidopubente pinnatipartita, laciniis oblongis v. lanceolatis terminalibus bilobis; rachi subtus castaneo-furfuracea; spatha dupli. *In Madagascaria.* ȏ.

3. *D. hirsuta* Mart. caudice arundinaceo humili; fronde glabra indivisa cuneato-obovata apice breviter bifida; spatha dupli; spadice squamulis laciniatis hirto decomposito ramoso; floribus minimis. *In Madagascaria.* ȏ.

4859. SEAFORTIA R. Br. (1812).

1. *S. elegans* R. Br. caudice procero; pinnis anguste lanceolatis apice oblique truncatis bifidis erosio-dentatis subfus squamoso-paleaceis; petalis florum masculorum obtusis; stamini-

bus 24; baccis ovalibus. *In Nov. Holl.* ȏ. 30-ped.

2. *S. ptychosperma* Mar. Palm. t. 128 et 129. caudice procero; pinnis linearibus apice oblique truncatis bifidis lacinia antica angustata, erosio-denticiuatis subtus tenuissime griseo-lepidotis; staminibus 20—30; baccis ovalibus; nucleo profunde 5-sulcato. *Ptychosperma gracilis* Labill. *In ins. Nov. Hiberniae.* ȏ.

3. *S. Reinwardtiana* Mart. Palm. t. 158. f. 2. inermis caudice mediocri; pinnis linearibus acuminatis summis confluentibus praemorsis; spadicebus ramosis, ramis numerosis; petalis florum masculorum ovato-acuminatis; stigmate magno disciformi. *In ins. Java.* ȏ.

4. *S. malacana* Mart. Palm. t. 158. f. 3. caudice tenui; frondibus?; spadicebus spithameis; ramis 3—4-nis flexuosis; floribus femineis alternatim distichis; stigmate magno capitato in stylo brevi. *In ins. Pulo-Penang.* ȏ.

5. *S. Dicksoni* Mart. caudice mediocri gracili; pinnis linear-lanceolatis plicatis truncatis praemorsis; spadice refracto simpliciter ramoso; floribus distichis, masculorum calycibus subulatis; staminibus 30, femineorum abortivis apice penicillatis. *Areca Dicksoni* Roxb. *In Malabar.* ȏ.

6. *S. disticha* Mart. caudice humili arundinaceo; frondibus simplicibus obovato-cuneatis bifurcis, laciniis 3-angularibus praemorsis; spadice simplici hirto; staminibus quindecim; baccata ovata acuminata. *Areca Roxb.* *In Pulo-Penang.* ȏ.

7. *S. gracilis* Mart. caudice caespitoso; pinnis plicatis inferioribus linearibus longe falcato-acuminatis terminalibus truncatis confluentibus fissis; rachi nervisque subtus minute lepidotis; spadice simplici retrofracto; floribus masculis polyandris; petalis cordatis acutis. *Areca Roxb.* *In Ind. or.* ȏ. 8—10-ped.

8. *S. oryzaeformis* Mart. caudice mediocri; frondium rachi superne lepidoto-hirsuta; pinnis lanceolatis acutis saepe connexis; spatha lato-marginalia; petalis acuminatis; baccis minutis ovalibus. *Areca Giesecke.* Gaertn. t. 7. f. 2. 6. Rumph 1. t. 5. f. 2. B. C. D. *In ins. Moluccis et Java.* ȏ.

9. *S. sylvestris* Blume; caudice mediocri arundinaceo; pinnis linear-lanceolatis apice attenuatis v. praemorsis; spadice ramoso; florum masculorum petalis ovatis acutis concavis; staminibus 24; baccis oblongis acutis. Areca Lour. In Cochinchina. 2.

10. *S. montana* Blume; caudice 15-pedali; frondibus?; petalis florum masculorum ovatis acuminatis planiusculis. In Jara. 2.

11. *S. saxatilis* Blume in Mart. Palm. t. 158. f. 6. caudice humili arundinaceo; frondium basi scabra; pinnis flabelliformibus apice truncatis erosis; spadice ramoso; baccis obovatis nitidis. Areca oryzaeformis β. Giesecke. Rumph. amb. 1. t. 7. In Amboina. 2.

12. *S. Ramphiana* Mart. caudice elato gracili; frondium pinnis linearibus acuminatis; spadice longiusculo ramoso; baccis olivaeformibus; nucleo longitudinaliter striato. In Amboina. 2. 20—30-ped.

13. *S. Blumei* Kunth; pinnis cuneatis apice acutis et serratis terminali duplo latiore rhomboe; spadicibus simpliciter ramosis; staminibus 16?; baccis ovatis umbonatis; semine longitudinaliter rugoso. Ptychosperma Blume. Rumphia t. 83. In Jara. 2.

14. *S. appendiculata* Blume t. 84. sub Ptychosperma; pinnis flabellato-cuneatis apice eroso-lobatis ibique serratis; spadicibus simpliciter ramosis; baccis obovato-ellipticis umbonatis. In Moluccis. 2.

15. *S. jaculatoria* Mart. Palm. sine descript. In ins. Moluccis. 2.

4860. HARINA Hamilt. (1817).

1. *H. caryotoides* Hamilt. Mart. Palm t. 136. Wallichia Roxb. corom. t. 295. In Ind. or. 2. Caudex subterraneus. Frondes pinnatae, pinnis cuneatis praemorsis; spadicis ramis pendulis.

4861. CALAMUS L. (1767).

1. *C. equestris* Willd. caudice scandente; frondibus cirrhiferis pinnis aggregatis lato-lanceolatis extimis con-natis; vaginarum aculeis patulis rachium recurvis; spadicibus gracilibus ramosis nutantibus; sterilibus retrorsum aculeatis elongatis; baccis glo-

bosis magnitudine Pisi. Mart. Palm. t. 113 et 128. Rumph. 5. t. 55 et 56. In Amboina. 2. Caudex 30-orygalis.

2. *C. ornatus* Blume; scandens; frondibus amplis; pinnis sesquipedalibus lanceolatis subtus glaucis vaginarum rachiumque aculeis sparsis aut verticillatis deflexis; spadicibus paniculatis; amentis elongatis; baccis ovato-globosis vertice acutis. Mart. Palm. t. 116. f. 2. In Java. 2.

3. *C. viminalis* Willd. scandens; frondibus cirrhosis; pinnis sparsis concinnis linear-lanceolatis acuminatis subtrinerviis; aculeis vaginarum crebris subflexuosis flavescentibus, rachium e basi incrassata rectis deflexis; spadicibus repetito-paniculatis in lorum aculeatum mutatis; baccis flavescentibus. Nees off. Pl. t. A. B. Mart. Palm. t. 112. (sub *C. Reinwardtii*) et t. U. f. 3. In Java. 2. 30—40 ped. longus.

4. *C. platyacanthos* Mart. Palm. t. 160. f. 1—3. scandens; frondibus subcirrhati, pinnis sparsis subconcinnis linear-lanceolatis acuminatis; aculeis vaginarum magnis complanatis subverticillatis reduncis; spadicibus decompositis; baccis ovalibus. Rumph 5. t. 54. f. 2. In ins. sundaicis et Motucc. 2. Caud. 50—60-orygalis. Frond. 6—8-ped.

5. *C. oblongus* Reinw. Mart. Palm. t. 160. f. 4. scandens; frondibus plerumque cirrhosis; pinnis sparsis subconcinnis linear-lanceolatis acuminatis; aculeis vaginarum subulatis rectis, rachium rectis v. refractis; spadicibus paniculatis; baccis 1 pollicem longis. In Java. 2.

6. *C. melanotoma* Mart. Palm. t. 116. f. 3 scandens; frondibus cirrhiferis; pinnis angusto-lanceolatis acuminatis aggregatis concinnis; aculeis vaginarum crebris sparsis rectis rachium reduncis; spathis parce aculeolatis; baccis oblongis; squamis flavescentibus. In ins. Sundaicis. 2.

7. *C. scipionum* Lour. caudice robusto articulis tripodalibus subulatis rutilis nitidis; frondibus breviusculis; vaginis rachibusque aculeolatis; spadice crasso decomposito. In Malacca. 2. Scipiones suppediat omnium elegansissimos.

8. *C. petraeus* Lour. caudice scandente inferne crassissimo; articulis

circiter pedalibus cylindricis longitudinaliter sulcatis; frondibus?; aculeis vaginalium rachiumque rectis densis; spadice longissimo; baccis acuminatis. In *Cochinchina*. ♂.

9. *C. latifolius* Roxb. candice scandente elegantissimo; frondibus cirrhiferis; pinnis lato-lanceolatis multinerviis 10—12 poll. longis et 3—6 latis erectis laevigatis convexis; aculeis vaginalium latissimis; spadice masculo supradecomposito. In *Chittagong*. ♂.

10. *C. aureus* Reinw. scandens, articulis basi contractis; frondibus amplis; pinnis subaequidistantibus concisis linear-lanceolatis sesquipedalibus sub-5-nerviis; aculeis petiolorum elongatorum rachiumque subulatis rectis. In *Cebes*. ♂.

11. *C. concinnus* Mart. Palm. t. 116. f. X, 1, 2. frondium rachi ferrugineo-tomentosa subtus aculeis rectis reversis; pinnis linear-lanceolatis; spathis aculeis rectis ramosis; squamis baccarum flavidis margine inferiore fuscidulo. In *Torey*. ♂.

12. *C. Rotang* L. scandens; frondium pinnis linear-lanceolatis acuminatis; aculeis vaginalium crebris compressis rectis, rachium rectis et recurvis spatharum lororumque recurvis; calycibus masculis 3-fidis campanulatis; baccis globosis magnitudine cerasi minoris. Mart. Palm. t. 116. f. 8. Pluckn. t. 106. f. 1, 2. *C. scipionum* Lam. ill. t. 770. f. 1. In *Bengalia* et *Ceylona*. ♂.

13. *C. Pseudo-Rotang* Mart. Palm. t. 116. f. 6. scandens; frondium pinnis linear-lanceolatis fasciculato-aggregatis, aculeis vaginalium rachiumque albido-tomentosarum subulatis rectis spatharum lororumque redundis; spadicibus composito-ramos; baccis globosis. In *Ind. or.* ♂.

14. *C. monoecus* Roxb. scandens; frondium pinnis numerosis linear-lanceolatis aternis vitudis laevigatis; aculeis vaginalium compressis; spadicibus decompositis monoecis; filamentis in tubum alte connatis; baccis ovato-globosis. In *Ind. or.* ♂.

15. *C. vernus* Lour. scandens; articulis longissimis flexillimis; frondibus cirrhiferis longissimis, pinnis lato-lanceolatis acuminatis trinervibus; spadice contracto; spathis inermibus. Rumph. amb. 5. t. 154. f. 1?. In *Co-*

chinchina. ♂. Caudex 100-ped. valde flexilis digitum crassus.

16. *C. ruber* Reinw. in Mart. Palm. t. 116. f. 5. frondibus ecirrhosis longe petiolatis, pinnis confertis linear-lanceolatis acutis; petiolorum aculeis sparsis subulatis rectis; squamis baccarum rufis. In *ins. Sunduicis*. ♂.

17. *C. catapparius* Mart. caudice scandente basi crasso; vaginalis frondium spathisque dense longeque setosis; pinnis linear-lanceolatis trinervibus; rachium aculeis sparsis redundis; spadice decomposito; baccis subglobosis acutis. Rumph amb. 5. t. 51. *Calamus Rotang* Gaertn. t. 139. Lam. ill. 770. f. 2. In *Amboina*. ♂.

18. *C. fasciculatus* Roxb. scandens elongatus; frondium pinnis in fasciculos plures distantes aggregatis ensiformibus; spadice decomposito; baccis ovatis magnitudine cerasi. Rumph amb. 5. t. 55. f. 2. In *Bengalia*. ♂.

19. *C. polygamus* Roxb. scandens; frondibus ecirrhosis; pinnis linearibus, posticis in fasciculos 3—4 distantes aggregatis, anticus solitariis alternis vel oppositis; spadice supradecomposito polygamo. In *Chittagong*. ♂.

20. *C. extensus* Roxb. Mart. Palm. t. 116. f. 4. scandens elongatus; frondibus cirrhiferis; pinnis alternis remotis anguste lanceolatis aculeis gracilibus verticillatis; baccis acutis pallidis. In *Sithet*. ♂.

21. *C. gracilis* Roxb. scandens; frondibus ecirrhosis reflexis; pinnis anguste lanceolatis lucidis; 6—12 fasciculatis; aculeis vaginalium rectis, racheos primum ferrugineo-tomentosae lororum spatharumque redundis; spadicibus globosis. Rheede 12. t. 64. In *Chittagong*. ♂.

22. *C. quinquenerrius* Roxb. scandens; elongatus; frondibus cirrhiferis; pinnis paucis remotis aequidistantibus lanceolatis 5-nerviis, aculeis parvis discretis brevibus robustis; spadice decomposito. In *Sithet*. ♂.

23. *C. penicillatus* Roxb. scandens; frondibus cirrhosis?; pinnis numerosis alternis concinis lanceolatis 7—9 nerviis margine laevigatis apice setis penicillatus extimus connatis. In *Ins. Puto-Penang*. ♂.

24. *C. platyspathus* Mart. scandens tenuis; frondibus ecirrhosis; pinnis sparsis terminalibus distinctis linear-lanceolatis plurinerviis plicatis;

subtus ferrugineo-tomentosis; aculeis vaginalium crebris subulatis rectis caeteris aduncis; spathis subinermibus; loris aculeatis. In Torey. ♂.

25. *C. Draco* L. scandens; frondibus ecirrhosis; pinnis concinnis linearis-lanceolatis acutis; aculeis subulatis atro-spadiceis rectis in vaginalis spathaque ima seriatis; spadice decomposito; baccis globoso-acutis; loris nullis. Pleun t. 276. Hayne Arzn. 10. t. 3. Nees pl. off. 17. t. 3, 4. Mart. Palm. t. 116. f. IX. Rumph. 5. t. 58. f. 1. In Sumatra, Java et Borneo. ♂.

26. *C. Heliotropium* Hamilt. scandens; frondium pinnis concinnis linearis-lanceolatis acuminatis; aculeis rachium spatharumque recurvis; spadicibus masculis decompositis; calycibus urceolatis breviter dentatis. In Gualparu Ind. or. ♂.

27. *C. Guruba* Hamilt. scandens; frondium pinnis linearibus acutis; rachibus ferrugineo-villosis; aculeis rachium spadicumque masc. reduncis; calycibus campanulatis 3-fidis petalis duplo brevioribus. In Ind. or. ♂.

28. *C. rudentum* Lour. scandens longissimus albo-ciuerascens; frondibus cirrhiferis; pinnis concinnis numerosis linearibus acuminatis; aculeis vaginalium gracilibus rectis subverticillatis; spatharum aculeis parvis; baccis ovali-globosis. Rumph amb. 5. t. 53. In Ind. or. et Cochinchina. ♂.

29. *C. melanacanthus* Mart. Palm. t. 116. f. XIII. scandens; frondibus ecirrhosis; pinnis concinnis linearis-lanceolatis acuminatis margine nervis que nigro-setosis; aculeis antice nigris, vaginalium verticillatis rectis; baccis oblongis 8-linearibus, squamis pallido-fuscis spadiceo-marginatis. In Ind. or. ♂.

30. *C. nitidus* Mart. frondibus ecirrhosis glabris nitidis; pinnis approximatis linearis-lanceolatis marginatis; aculeis racheos recurvis; spadicibus feminis compositis julis flexis; squamis baccarum fuscis. In Tenasserim prope Torey. ♂.

31. *C. tenuis* Roxb. polygama; scandens; pinnis numerosis alternis linearibus trinerviis nitidis aculeatis; calyce et corolla urceolatis; spadice abortivo loriformi. In Chittagong. ♂.

32. *C. Haenkeanus* Mart scandens; frondibus 2-pedalibus; pinnis sparsis v. subaggregatis linearis-lanceolatis acuminatis; vaginalis inferne aculeatis superne fusto-setosis orificio ciliatis; aculeis petiolorum rachiumque redundis; julis pollicariibus recurvis; spathae orificio setoso-aculeato. In ins. Luzon. ♂.

33. *C. ciliaris* Blume; scandens brevis tenuis; pinnis concinnis tenuibus linearibus acutis; margine et nervis longe albido-pilosus; vaginalis petiolis rachibusque dense hirsutis; baccis subglobosis. In ins. Nusa Kambangam. ♂.

34. *C. discolor* Mart. frondibus cirrhosis 1-2-pedalibus; pinnis approximatis concinnis aequidistantibus linearibus acutis subtus candidantibus, rachi petioloque castaneo-pulverulento-tomentosis aculeis crebris rectis apice nigris. In ins. Philipp. ♂.

35. *C. asperrimus* Blume; scandens; pinnis linearis-lanceolatis; aculeis vaginalium creberrimis abbreviatis rectis patentibus rachium geminatis uncinatis; spadicibus elongatis decompositis. In Java. ♂.

36. *C. rhomboideus* Blume; pinnis rhomboideo-oblongis multinerviis, nervis a medio ad apicem ciliatis; aculeis rachium sparsis subuncinatis. In Java. ♂.

37. *C. caryotoides* All. Cunningham. scandens tenuis; pinnis parcis sparsis cuneiformibus erosis; vaginalis petiolis rachibus spathisque aculeatis; aculeis rectis v. recurvis; baccis globosis magnitudine pisi; squamis viridibus rufo marginatis. In Nor. Holl. ♂.

38. *C. australis* Mart. fronde cirrosa; pinnis linearis-lanceolatis acuminatis pedalibus margine setulosis plurinerviis; racheos aculeis sparsis reversis. In Nor. Holl. ♂.

39. *C. secundiflorus* Beauv. fl. Ow. t. 9, 10. caudice brevi; frondibus cirriferis; pinnis subconcinnis ensiformibus acutis 3-nerviis, aculeis rachium subulatis recurvis cirrhoem oppositis hamato-reversis; ramis floriferis elongatis cernuo-secundis; baccis ovatis acutis. In Benin Africæ. ♂.

40. *C. mirabilis* Mart. Palm. t. 115. caudice robusto; frondium vaginalis longis cylindricis; zonis transversis aculeorum subelatiorum ante atrorum basi connatorum, qui per intersti-

tia majora sursum et deorsum convenient atque decussantur; spathis longis pendulis. In ins. Sundaicis. ♂.

41. *C. humilis* Roxb. caespitoso-frutescens, caudice et cirrhis destitutus; frondium pinnis lanceolatis laevigatis multinerviis; aculeis parcis longis robustis. In Ind. or. ♂.

42. *C. erectus* Roxb. caudice erecto 15-pedali non scandente; frondium ecirrhosarum pinnis lanceolatis concinnes; aculeis subverticillatis; spadice composito; baccis oblongis. In Silhet. ♂.

43. *C. amarus* Lour. spinis confertis brevibus; foliolis linearibus; spadicibus remotis; spathis partialibus. In Cochinchina. ♂. Caudex 60-pedalis.

44. *C. dioecus* Lour. caule tenuissimo; frondibus et spinis brevioribus; floribus dioecis. In Cochinchina. ♂.

45. *C. barbatus* Mackl. In ins. Nov. Guinea. ♂.

46. *C. heteracanthus* Mackl. In ins Nov. Guinea. ♂.

4862. DAEMONOROPS Blume. (1830).

1. *D. melanochaetes* Blume. Mart. Palm. t. 117, 125. f. 1. t. 126. Rumph. t. 52. In Java Amboina etc. ♂. Caudices plures e radice 150-pedales longe lateque super arbores vicinas vagantes crassitie brachii infantis setis longis tecti. Rachis fusco-tomentosa.

4862. SAGUS Gaertn. (1705).

1. *S. taedigera* Mart. Palm. t. 45, 48. caudice mediocri; baccis linear-ellipticis obtusis 9-sulcis, squamis subvirescenti-olivaceis margine inferiore fimbriatis fuscis; nucleo linear-elliptico obtuso. Raphia Mart. Metroxylon Spr. In Brasilia. ♂. 6-10-pedalis.

2. *S. rinifera* Poir. caudice mediocri; baccis linear-oblengis acutiusculis 9-sulcis sulco latiusculo, squamis pallide castaneis margine inferiore fimbriatis late fuscis; nucleo oblongo utrinque acuto. Beauv. fl. Ow. t. 44. f. 1. et t. 45, 46. Gaertn. t. 10. f. 1. Lam. ill. t. 771. f. 1. In Guinea. ♂.

3. *S. Russia* Jacq. fragm. t. 4. f. 2. candice proceriore; baccis obovatis v. pyriformibus vertice mucronatis 12-15-sulcis, squamis valde convexis profunde sulcatis nitidissimis spadiceis margine ciliatis; nucleo lato-ovato hinc acuto. Raphia Russia Mart. R. pedunculata Beauv. fl. Ow. t. 44. f. 2 et 46. f. 2. Gaertn. t. 120. f. 3. In ins. Mascarenis. ♂. Palma altissima 50-60-pedalis.

4864. METROXYLON Koenig. (1760.)

1. *M. Rumphii* Mart. Palm. t. 102 et 159. candice crasso mediocri; frondibus erectiusculis; petiolis rachibusque aculeatis; spadice erecto, spathis aculeatis; baccis subglobosis utrinque depressis. Rumph amb. t. 17, 18. In Borneo et Celebes. ♂. Palma 20-30-pedalis.

2. *M. laeve* Mart. caudice mediocri immo elato; frondibus erectiusculis; petiolis inermibus; pinnis longe et subulato-cuspidatis; spadice primum erecto inermi. Sagus laevis Jack. Koenig ann. of. bot. 1. t. 4. In Malacca, Java et Amboina. ♂.

3. *M. longispinum* Mart. candice mediocri graciliore; petiolorum aculeis remotis longissimis; baccis magnitudine et forma ovi gallinacei basi depressis. In Amboina. ♂.

4. *M. micranthum* Mart. caudice mediocri crasso; petiolorum aculeis brevibus densis crassis; baccis parvis subglobosis dilute fuscis. In Amboina. ♂.

5. *M. filare* Mart. caudice elato laevigato annulato; frondibus erecto-patulis: petiolorum aculeis subremotis tenuibus; pinnis longe aristatis trinerviis margine nervisque crebre setosis; baccis ovalibus. Rumph. amb. 1. t. 19. In Celebes. ♂.

6. *M. elatum* Mart. Palm. t. 102. (sub *Sagus*) caudice elato; frondibus cernuis; petiolis crebre setosis setis longis spinescentibus; spadicibus ramosis pendulis; baccis globosis albulamine durissimo. In Borneo et Celebes. ♂.

7. *M. microcarpum* Mackl. In Nov. Guinea. ♂.

* 8. *M. microspermum* Mackl. In Nov. Guinea. ♂.

4865. BENTINCKIA Berry (1832).

1. *B. condapanna* Berry in Roxb. fl. Ind. Mart. Palm. t. 132. In Travancore. ♂. Caudex arundinaceus 20-ped. Frondes pinnatae reduplicatae. Spadix ramosus coloratus. Baccæ purpurascentes.

4866. GEONOMA Mart. (1823).

1. *G. multiflora* Mart. Palm. t. 4—6. frondibus pinnatifidis; spadicibus paniculatis pubescentibus; calycibus masculis corolla brevioribus; urceoli feminei dentibus stellato-emersis; baccis globosis. In Brasilia. ♂.

2. *G. maxima* (Gynestum) Poit. in Mem. Mus. 9. t. 1. fol. pinnatis; foliolis numerosis lanceolatis; spadice cernuo, ramis ramosis composito. In Guiana gallica. ♂. Palma 10—12-pedalis.

3. *G. interrupta* Mart. Palm. t. 7. frondibus terminalibus pinnatifidis, pinnae falcato-acuminatis; spadicibus paniculato-multifidis; floribus 5-fariam imbricatis; baccis ellipticis. Martinez Reetz. In Peruvia. 2. Palma 6-orgyalis. Frondes 8—9-pedales.

4. *G. pinnatifrons* Willd. Mart. Palm. t. 8. f. 2. 3. frondibus terminalibus pinnatifissis; pinnae praemorsis; spadicibus ramosis pubescentibus; floribus 4—5-fariam imbricatis; baccis globosis. In Caracas. ♂.

5. *G. acutiflora* Mart. Palm. t. 9. frondibus pinnatifidis; spadicibus ramosis pubescentibus; floribus 3—5-fariam imbricatis acutis; calycibus masculis corollas subaequantibus. Ad flum. Amazonum. 2.

6. *G. paniculigera* Mart. Palm. t. 10. frondibus pinnatifissis; spadicibus paniculato-ramosissimis hirtis; floribus approximatis verticillato-ternis quaternisque; calycibus masculis, corolla brevioribus; baccis globosis. In Brasilia. ♂. Caudex 10-ped. Spadices 1—2-ped.

7. *G. taxiflora* Mart. Palm. t. 11. frondibus ovatis basi cuneatis antice furcato-bifidis tandem pinnatifissis; spadicibus simpliciter ramosis, foveis

masculis sub-t-floris; calycibus masculis corollas subaequantibus. In Brasilia. ♂.

8. *G. pauciflora* Mart. Palm. t. 12. frondibus pinnatifidis; pinnis lanceolatis acuminatis; spadicibus parce ramosis subpubescentibus; calycibus masculis corollas aequantibus apice barbatis. In Brasilia. ♂. Caudex 8-ped.

9. *G. deversa* (Gynestum Poit. l. c. t. 3.) dioica; fol. partitis; foliolis 6 oblongo-lanceolatis acuminatis recurvis; spadice cernuo ramis simplicibus composito. In Guiana gallica. ♂. Palmula 2—3-pedalis.

10. *G. synanthera* Mart. Palm. t. 13. pinnis lanceolatis acuminatis subfalcatis; spadicibus ramosis; floribus margine integerrimis 5—6-fariam imbricatis; corollis masculis calyces parum superantibus; antheris 6. In Peruvia. ♂.

11. *G. simplicifrons* Willd. Mart. Palm. t. 8. f. 1. et t. 11. frondibus lanceolatis basi attenuatis apice bifidis tandem irregulariter pinnatifissis; spadicibus ramosis; floribus 4—5-fariam imbricatis; calycibus masculis corollas aequantibus; baccis subglobosis. In Brasilia. ♂. Caudex 6—12-pedalis.

12. *G. Spixiana* Mart. Palm. t. 15, 16. frondibus lanceolatis basi cuneatis apice bifissis; spadicibus paniculatis pubescentibus; calycis cylindrici feminei dentibus stellato-emersis; baccis ovato-globosis. In Brasilia. ♂. Caudex 6—8-pedalis.

13. *G. pycnostachys* Mart. Palm. t. 17. caudice arundinaceo; frondibus lateralibus terminalibusque linearis-oblongis breviter bifidis; spadicibus simplicibus androgynis villosis; floribus densissimis; calycibus masculis barbatis. In Brasilia. ♂.

14. *G. stricta* (Gynestum Poit. l. c. t. 4.) dioeca; fol. oblongis apice furcatis; spadice simplicispicato erecto. In Guiana gallica. ♂. Palmula 2—3-pedalis.

15. *G. arundinacea* Mart. Palm. t. 18. caudice arundinaceo; frondibus ovatis bifurcis tandem pinnatifidis; spadicibus subsimplicibus; floribus remote verticillatis; calycibus masculis corollas subaequantibus; baccis ovato-globosis. In Brasilia. ♂.

16. *G. acaulis* Mart. Palm. t. 4 et 19. frondibus pinnatifisis, pinnis lanceolatis; spadicibus radicalibus simplicibus cylindricis; calycibus masculis corolla duplo brevioribus. *In Brasilia.* ♀. Frondes 3—4-pedales.

17. *G. macrostachys* Mart. Palm. t. 20. acaulis frondibus lanceolatis basi cunealis apice bifidis; spadicibus radicalibus simplicibus cylindricis; corollis masculis calyces excedentibus; baccis ovatis. *In Brasilia.* ♀. Frondes 4—6-pedales.

18. *G. Poiteana* Kunth; acaulis; fol. apice furcatis simplicibus partitisque; spadice simplici spicato erecto. *Gynestum acaule* Poit. I. c. t. 9. *In Guiana gallica.* ♀.

19. *G. Pohliana* Mart. Palm. t. 6. f. A. frondibus inaequaliter pinnatifisis; pinnis lato-lanceolatis subfalcatis; spadicibus paniculatis; ramis obtusis; floribus 4—5-fariam imbricatis; baccis ovatis. *In Brasilia.* ♀.

20. *G. Schottiana* Mart. Palm. t. 11. A. frondibus regulariter fissis, pinnis linearibus approximatis; spadicibus paniculatis, ramis elongatis torulosis; floribus subdecussatis; baccis ovatis. *In Brasilia.* ♀. Caudex 4—6-pedalis.

21. *G. baculifera* Kunth; dioeca; fol. cuneato-furcatis raro partitis; spadice cernuo, ramis simplicibus composito. Poit. I. c. t. 2. *In Guiana gall.* ♀. Palma 4—6-ped.

22. *G. elegans* Mart. Palm. t. 18. A. caudice tenui frondibus inaequaliter pinnatifisis; pinnis lato-lanceolatis falcati; spadicibus simplicibus; floribus 4—5-fariam imbricatis, calycibus corolla triplo brevioribus; baccis globosis. *In Brasilia.* ♀. Caudex 4—6-pedalis.

4867. CORYPHA L. (1747).

1. *C. taliera* Roxb. corom. t. 255 et 256. Mart. Palm. t. 127. f. 1. frondibus orbiculatis palmato-pinnatifidis, laciniis 40—50 parium; spadice ovato-pyramidalis erecto caudicis duas tertias longitudine aequante. *Taliera bengalensis* Spr. *In Bengalia.* ♀. Caudex 30 pedalis. Frondes 12-pedales.

2. *C. umbraculifera* L. frondibus sublunato-orbiculatis palmato-pinnatifidis, laciniis parium 40; spadice py-

ramidalis erecto caudicis dimidiam longitudinem aequante. Gaertn. t. 17. Lam. ill. t. 899. Mart. Palm. t. 108 et 127. f. 2. Rheede 3. t. 1—2. *In Malabarum et Ceylona.* ♀. Caudex 60—70-pedalis. Frondes in ambitu 30-pedales.

3. *C. elata* Roxb. frondibus suborbiculari-lunatis basi cordatis palmato-fissis, laciniis ensiformibus 40—50 parium; spadice globo-candidis quartam quintamque partem altitudine aequante. *In Bengalia.* ♀. Palma 70-pedalis. Baccace olivaceae.

4. *C. Gebang* Mart. frondibus suborbicularibus palmato-mutifidis; laciniis lanceolatis obtusis emarginato-bifidis; spadice ramosissimo oblongo; ramis nutantibus altitudine quarum quintamque partem caudicis aequante. *In Jara et Celebes.* ♀.

5. *C. sylvestris* Mart. frondibus basi truncata suborbicularibus palmato-mutifidis in laciniis lanceolatas acuminas aequaliter fissis; spadice hirsuto ramosissimo oblongo; ramis coriaceo-coarctatis. Rumph. amb. I. t. 11. *In Java Timor Celebes et Madura.* ♀.

6. *C.?* *nana* H. et K. candice externe daedaleo-venoso; frondibus digitato-mutifidis subtus albis; stipite inermi; spatha externe tomentosa. *In Merico.* ♀. Caudex 1—2-orgyalis gracilis.

7. *G.?* *africana* Lour. frondibus in orbem multifidis plicatis; spadice coarctato suberecto; floribus monoecis. *In Afr. orient.* ♀. Palma 12-pedalis. Petioli spinosi.

4868. LIVISTONA R. Br. (1812).

1. *L. humilis* R. Br. caudice 4—6-pedali; petiolis ex toto aculeatis, aculeis minores inter majores; frondis laciniis filis interjectis; baccis ovatis v. obovatis maturis violaceis. Mart. Palm. t. 109—111. *In Nov. Holl.* ♀.

2. *L. inermis* B. Br. caudice mediocris v. elato 14—30 pedes alto; petiolis inermibus, frondis laciniis filis interjectis; baccis ovatis maturis violaceis. Mart. Palm. t. 145 et 146. f. 4—6. *In Nov. Holl.* ♀.

3. *L. chinensis* R. Br. caudice mediocris; petiolis laminae diametrum subaequantibus a basi ad medium usque

acuteatis; laminae lacinis longe bifidis interdum filis interjectis; baccis olivaeformibus olivaceo-viridibus. Mart. Palm. t. 146. f. 1—3. *Latania chilensis* Jacq. fragm. t. 11. f. 1. *In China, Borbonia et Mauritio.* ♀.

4. *L. rotundifolia* Mart. Palm. t. 102 et t. 135. f. 5. caudice elato; frondum subpeltatum petiolis basi acuteatis aculeis sursum curvis parte laciniarum orbiculari, lacinis longe bifidis basin filis interjectis; baccis globosis nigro-caerulecentibus. Bumph. t. 8. Hayne term. t. 11. f. 1. *In Jura et Cetebea.* ♀.

5. *C. australis* Mart. caudice elato, petiolis ultra medium usque acuteatis laminae diametro longioribus, lacinis lineariformibus breviter bifidis, filis nullis interjectis; baccis globosis. *Corypha R. Br.* *In Nov. Holl.* ♀.

4869. DESMONCUS Mart. (1823).

1. *D. polyacanthus* Mart. Palm. t. 68. vaginis petiolaribus rachibusque adunco-acuteatis cirrhis uncinatis; pinnis oblongis utrinque attenuatis spatha interiori acuteatissima aculeis e basi nodosa; drupis globosis. *In Brasilia.* ♀. Frondes 3—4-pedales.

2. *D. macracanthus* Mart. vaginis petiolaribus rachibusque acuteatis rectis cirrhis uncinatis; pinnis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis; spatha interiori setosa; drupis obovato-globosis. *In Brasilia.* ♀.

3. *D. orthacanthus* Mart. Palm. t. 69 et 98. vaginis petiolaribus rachibusque postice aculeis rectis compressis, his antice inermibus; cirrhis uncinatis; pinnis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis; spatha interiori inermi, drupis pisiformibus. *In Brasilia.* ♀.

4. *D. oxyacanthus* Mart. vaginam petiolorum aculeis e basi incrassata rectiusculis, rachium aduncis; cirrhis uncinatis; pinnis lato v. oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis; spatha interiori inermi; drupis pisiformibus. *In Brasilia.* ♀.

5. *D. pycnacanthus* Mart. vaginis petiolaribus spathisque densissime setoso-acuteatis; aculeolis e basi incrassata rectis, racheos aculeis erectiusculis, cirrhis uncinatis; pinnis ob-

longo-lanceolatis acuminatis in costa postice acuteatis. *In Brasilia.* ♀.

6. *D. setosus* Mart. vaginis dense setosis setis e basi incrassata rectis; rachibus parce setosis, setis rectis v. spinulosis aduncis; cirrhis subinermibus; pinnis linearibus acuminatis. *In Brasilia.* ♀.

7. *D. mitis* Mart. vaginis subinermibus; rachi parce acuteata aculeis aduncis; cirrhis uncinatis, pinnis lanceolatis acuminatis basi setoso-barbatis; spathis inermibus; drupis globoso-obovatis. *In Brasilia.* ♀.

8. *D. prunifer* Poepp. aculeis vaginalium petioli spathae spadicisque setosis e basi conica rectis, racheos aduncis; foliis oblongo-lanceolatis acuminatis inermibus; cirrhis uncinatis; drupis ovalibus pollicaribus. *In Brasilia.* ♀.

4870. BACTRIS Jacq. (1763).

1. *B. minor* Jacq. am. t. 171. f. 1. caudice mediocri aculeatissimo; pinnis lineariformibus acuminatis margine serrulato-aculeolatis inermibus v. utrinque aculeis raris ohsitis; rachibus et spathae dorso acuteatis; spadice romoso; baccis inermibus. Gaertn. t. 139. f. 5. *Prope Carthagenum.* ♀.

2. *B. acanthocarpa* Mart. Palm. t. 70, 71. f. 2. caudice mediocri rachibus spathaque acuteatis, pinnis laxiusculis lineariformibus ciliatis; spadice ramoso; drupis globosis aculeolatis. *In Brasilia.* ♀.

3. *B. Maraja* Mart. Palm. t. 71. f. 1. caudice elato rachibusque glabris acuteatis; aculeis magnis compressis tandem expallidis; pinnis subaggregatis falcato-lanceolatis v. oblongis longe cuspidatis acuteato-ciliatis; spatha acuteatissima; spadice ramoso; drupis globosis glabris inermibus. *In Brasilia.* ♀.

4. *B. setosa* Mart. Palm. t. 72. f. 1—3. caudice mediocri rachibusque hirtis acuteatis; pinnis aggregatis longe setoso-ciliatis; spatha dense acuteata; spadice ramoso; drupis subturbinaloglobosis glabris inermibus. *In Brasilia.* ♀.

5. *B. ciliata* Mart. Palm. t. 71. f. 3. caudice elato rachibusque hirtis acuteatis; pinnis pectinatis linearis-

lanceolatis acutis setoso-ciliatis; spadice ramoso; drupis ovato-globosis.

Martinezia R. et P. In Peruria. ♂.

6. B. macracantha Mart. Palm. t. 73. caudice submediocri rachibusque glabris longe tereti-aculeatis; pinnis suboppositis sparsive lanceolato-subfalcatis ciliatis; spatha aculeis compressis nitidis dense imbricata; spadice ramoso. *In Brasilia. ♂.*

7. B. aristata Mart. Palm. t. 73. a. f. 5. caudice mediocri rachibusque glabris spathaque aculeatis; pinnis lanceolatis v. saepe connexo-oblongis in setam cuspidatis aculeolato-ciliatis; spadice subbipartito; drupis ovatis acutis glabris. *In Brasilia. ♂.* Caudex 10—12-pedalis nigro-aculeatus.

8. B. riparia Mart. Palm. t. 71. f. 4. caudice elato gracili rachibus spathaque aculeatis; pinnis pectinatis linearibus acutis remote ciliatis in costa hirtutis; spadice ramoso hirta. *In Brasilia. ♂.*

9. B. pectinata Mart. Palm. t. 60, 73. a. f. 1, 2. caudice humili arundinaceo inermi, petiolorum vaginis basibusque parce aculeatis; rachibus subinermibus; pinnis pectinatis linearibus subfalcato-acuminatis piloso-ciliatis; spatha aculeata; drupis globosis glabris. *In Brasilia. ♂.* Frondes 3—5-pedales.

10. B. concinna Mart. Palm. t. 72. f. 4, 5, 6. caudice tenui aculeato; rachi postice aculeata pilis destituta; pinnis pectinatis concinnis linear-lanceolatis acuminatis ciliatis; spadice simplici. *In Brasilia. ♂.*

11. B. tomentosa Mart. Palm. t. 73. a. f. 3, 4. caudice humili rachibusque aculeatis tomentosis; aculeis compressis; pinnis sparsis subtus pubescentibus oblongis falcato-cuspidatis; spatha densissime setoso-aculeata; floribus feminineis ferrugineo-hirtis. *In Brasilia. ♂.*

12. B. cuspidata Mart. Palm. t. 73. b. f. 1, 2. caudice arundinaceo humili tomentoso; petiolis in basi vaginante infra pinnas aculeatis; pinnis sparsis oblongo-lanceolatis falcatis longe cuspidatis; spatha longe setosa. *In Brasilia. ♂.* 4—6-ped. Frons 3-pedalis.

13. B. mitis Mart. inermis; caudice arundinaceo humili; pinnis sparsis oblongo-lanceolatis cuspidato-falcatis glabris ciliatis; spatha antice

adpresso-setosa; spadice 2—3-fido.

In Brasilia. ♂.

13. B. fissifrons Mart. Palm. t. 73. b. f. 3, 4. caudice humili; petiolis basi aculeatis; pinnis irregularibus lanceolatis vel oblongo-connexis cuspidatis spinuloso-ciliatis; spathae aculeis compressis; spadice bifido. *In Brasilia. ♂.*

14. B. simplicifrons Mart. Palm. t. 73. c. f. 1, 2. inermis; caudice humili arundinaceo; frondibus indivisis forcate-bipartitis laciis divergentibus linearis-oblongis subfalcatis acutis costatis subciliatis; spatha nuda; spadice simplici. *In Brasilia. ♂.*

15. B. hirta Mart. Palm. t. 60.

74. f. 1, 2. caudice arundinaceo humili inermi; frondibus basi longe vaginante aculeata subsessilibus indivisis hirtis ciliatis obovatis apice bifidis; spadice subbifido; corollis feminineis drupisque hirtis. *In Brasilia. ♂.* Caudex 4—5-pedalis.

16. B. bifida Mart. Palm. t. 73. c. f. 3. caudice submediocri; petiolis basi longe amplexicauli aculeatissimis; frondibus ciliatis lato-ensiformibus; spadice simplici; drupis ovatis. *In Brasilia. ♂.* Caudex 6—10-pedalis.

17. B. caryotefolia Mart. Palm. t. 74. f. 3, 4. caudice humili aculeato; petiolis basi vaginante aculeatis; pinnis sparsis subdeltoideis deorsum cuaneatis praemorsis dente marginali utrinque productiore subtus argenteo-tomentosis; spadice setuloso-ramoso. *In Brasilia. ♂.* Caudex 4—8-ped.

18. B. longifrons Mart. caudice elato; pinnis pectinatis elongatis angustis longe acuminatis crassiusculis subinermibus; spatha aculeata; spadice ramoso tomentoso; pedunculo setoso. *In Brasilia. ♂.* Caudex 12—20-pedalis.

19. B. tongipes Poepp. in Mart. Palm. t. 73. D. f. 1, 2. caudice humili arundinaceo aculeato; petiolis basi vaginante aculeatis setosisque antice inermibus lepidotis; laminae ultra dimidium bifidae utrinque hirtae laciis lanceolatis; spadice bifido; calyce female drupaque globosa setosis. *In Brasilia. ♂.* Caudex 2—3-pedalis.

20. B. chloracantha Poepp. in Mart. Palm. caudice humili petiolisque lepidoto-tomentosis aculeatis; aculeis teretiusculis stramineis; pinnis aggregatis crispis linearibus subfalcatis spi-

nuloso-ciliatis, lacinia longiore cuspida; spadice ramoso. *In Brasilia.* Ȑ.

21. B. campestris Poepp. t. c. caudice humili petiolis rachibusque tomentosis; aculeis planis albidis; frondibus planis rigidulis; pinnis aggregatis lanceolatis apice inaequaliter bifidis coriaceis glaberrimis; spadice ramoso tomentoso; drupis depresso-globosis. *In Brasilia.* Ȑ.

22. B. chaetospatha Mart. caudice humili; petiolis ad vaginae orificium aculeatis antice inermibus rachibusque tomentoso-fuscis; lamina obovata irregulariter pinnatifida margine setulosa; corolla urceolata aculeolata. *In Brasilia.* Ȑ.

23. B? major Jacq. am. t. 171. f.
2. In Carthagena. Ȑ.

4871. GUILIELMA Mart. (1823).

1. G. speciosa Mart. Palm. t. 66.
67. caudice elata; petiolis pinnisque linearis-lanceolatis crispis aculeatis; corollis masculis subglobosis, feminis calyces 4-plo superantibus. **B. Gasipae** H. et K. nov. gen. pl. t. 700. *Ad fl. Amazonum, Orinoci et in Guiana gallica.* Ȑ. Caudices caespitoso-conferti 80—90-pedales.

4872. MARTINEZIA Mart. (1834).

1. M. caryotaeifolia H. et K. nov. gen. t. 699. Mart. Palm. t. 161. f. 1. *Ad Orinocum.* Ȑ. Caudex 5—9-orygalis. Frondes pinnatae spatha 10-pollicaris ovata aculeata.

4873. ACROMIA Mart. (1823).

1. A. sclerocarpa Mart. Palm. t. 100. f. 5. *Cocos aculeata* Jacq. am. t. 169. pict. t. 154. Gaertn. t. 9. f. 1. Grew. Mus. t. 16. *In Brasilia et Caribaeis.* Ȑ. Caud. 20—30—pedalis. Frondes 10—15-pedales pinnatae subcrispatae. Spadices 1—2-pedales penduli.

4874. ASTROCARYON Mey. (1817).

1. A. Murumura Mart. Palm. t. 58, 59. elatum aculeatissimum; pinnis lanceolatis subfalcatis subtus argen-

teis; corolla hirta; drupis spinulosis. *In Brasilia.* Ȑ. 10—20-ped. Frondes 10—12-pedales.

2. A. Airi Mart. Palm. t. 53. a. elatum aculeatissimum; pinnis angusto-lanceolatis longe acuminatis subtus argenteis; bracteis florum masculorum dense hirtis; calycibus ciliato-multifidis; corollis drupisque dense setosis. *In Brasilia.* Ȑ. Caud. 20—30-pedalis.

3. A. gynacanthum Mart. Palm. t. 60 et 61. humilis; pinnis lanceolatis subtus pallidis; florum masculorum bracteis pubescenti-tomentosis; calycibus integerrimis; calycibus corollisque feminis dense subtorto-aculeatis. *In Brasilia.* Ȑ. 19—12-pedalis.

4. A. Munbaca Mart. humilis; pinnis linearis-lanceolatis acutis extimis connatis suboblongis subtus albidis pubescenti-hirtis; floribus feminis sessilibus dense aculeatis; drupis inermibus. *In Brasilia.*

5. A. vulgare Mart. Palm. t. 62, 63. procerum; pinnis lanceolato-longe acuminatis subtus albis; florum masculorum bracteis dorso ciliato-villosis; calycibus subintegerrimis; feminorum calycibus pedunculisque glabris; drupis inermibus. *In Brasilia.* Ȑ.

6. A. Janari Mart. Palm. t. 52 et 65. f. 1. procerum; frondibus erectiusculis; pinnis linearibus longe acuminatis subtus albis; florum masculorum bracteis rufo-barbatis, calycibus irregulariter serrato-ciliatis; drupis inermibus. *In Brasilia.* Ȑ. Caudex 40-ped.

7. A. Tucuma Mart. Palm. t. 65. f. 2. elatum; pinnis lanceolatis longe acuminatis subtus argenteis; florum masculorum bracteis ciliatis; calycibus subintegerrimis; calycibus feminis urceolato-cylindricis hirtulis; drupis globosis inermibus. *In sytris Brasiliæ.* Ȑ.

8. A. acaule Mart. Palm. t. 21, t. 63. f. 5. acaule; pinnis angusto-lanceolatis longe acuminatis subtus pallidioribus; florum masculorum bracteis dorso penicillatis; calycibus integerimis; calycibus corollisque feminis glabriusculis. *In Brasilia.* Ȑ. Caudex subnullus.

9. A. campestre Mart. Palm. t. 63. f. 4 et t. 64. acaule; pinnis linearibus subfalcatis subtus albis; florum masculorum bracteis ciliatis; calycibus

corollisque femineis glabris; drupis obovatis rostratis. In Brasilia. ♂.

10. *A. acuteatum* Mey. Esseq. procerum; pinnis linearibus praemorsis subtus pallidioribus extimis connotatis; calycibus corollaque femineis densissime acuteatis drupa subglobosa inermi. In Brasilia. ♂.

4875. ELAIS Jacq. (1763).

1. *E. guineensis* Jacq. am. t. 172. pict. t. 257. caudice erecto, petiolis spinoso-serratis; pinnis linearis-lanceolatis acutis subtus concoloribus; antheris linearibus; drupis ovatis subangulatis. Mart. Palm. t. 54, 56. Prope Sepastianopolim culta. ♂.

2. *E. melanococca* Gaertn. t. 6. f. 2. Mart. Palm. t. 33, 55. caudice ascendente; petiolis spinoso-serratis, pinnis linearibus acuminatis subtus concoloribus; antheris ovatis; drupis ovatis acutis. In Am. austr. ♂.

3. *E. occidentalis* Sw. frondibus pinnatis; foliolis vaginatis; stipitibus caudiceaque inermibus. Sw. In Jamaica. ♂. Caud. 50–60-pedalis.

4876. COCONUT L. (1747).

1. *C. capitata* Mart. caudice crasso mediocri obsolete et irregulariter annulato basibus petiolorum persistentibus grosse capitato; petiolis postice spinoso-dentatis; frondibus patentibus; pinnis stricte suberectis subtus glaucis. In Brasilia. ♂.

2. *C. coronata* Mart. Palm. t. 80, 81 et t. T. f. 3. caudice elato grosse annulato basibus petiolorum postice spinoso-serratorum sub 5-fariam imbricatorum persistentibus crasse-capitato; frondibus erectis; pinnis linearibus subcrispis, subtus albidis. In Brasilia. ♂.

3. *C. ateracea* Mart. Palm. t. 82. caudice procerrimo subregulariter leviterque annulato; frondibus erecto-patentibus; pinnis linearibus suberispis; floribus femineis subconicis; drupis ovatis. In Brasilia. 60–80-pedalis. Frondes 6–8-pedales.

4. *C. botryophora* Mart. Palm. t. 83, 84 et t. 73. D. f. 3. caudice procerrimo subregulariter annulato; frondibus erecto-patentibus; pinnis linearis-

acuminatis densis suberispis; petalis masculis crassis; drupis ellipticis confertis. In Bahia. ♂. 50–60-pedalis.

5. *C. schizophylla* Mart. Palm. t. 84, 85 et t. T. f. 4. caudice humili annulato; basi petiolorum spinoso-serratis; frondibus laeviter arcuatibus patentibus; pinnis linearibus obtusis; floribus femineis subglobosis. In Brasilia. ♂.

6. *C. flexuosa* Mart. Palm. t. 64 et 86. caudice mediocri subflexuoso, basibus petiolorum squamato et antioe fusiformi-incrassato; frondibus patentibus; pinnis laxis crispis distanter aggregatis linearibus angustis; floribus femineis oblongis angulatis; drupis oblongis rostratis. In Brasilia. ♂.

7. *C. campestris* Mart. caudice submediocri subsquamato-incrassato; frondibus patent-i-recurvatis; pinnis angustis linearis-lanceolatis strictis distanter aggregatis subglaucescentibus; petalis masculis ovatis acutis; floribus femineis oblongis angulatis. In Brasilia. ♂.

8. *C. comosa* Mart. Palm. t. 88. f. 1, 2. subhumilis inferne annulata superne basibus petiolorum squamosa; frondibus abbreviatis patentibus; pinnis erectis approximatis lanceolatis; petalis masculis crassis obovatis. In Brasilia. ♂.

9. *C. mucifera* L. caudice procerimo flexuoso inaequaliter annulato bal-incrassato; frondibus patentibus; pinnis linearis-lanceolatis acuminatis subcencimis; drupis maximis ovato-trigonis. Jacq. am. t. 169 et pict. t. 253. Gaertn. t. 4, 5. Roxb. corom. t. 73. Descourt. fl. des Antill. t. 21, 22. Mart. Palm. t. 62, 65. t. 88. f. 3–6. In Ind. or. et occident. ♂. Caud. 60–80-ped.

10. *C. Romanzoffiana* Cham. in Choris. it. t. 7. Mart. Palm. t. 88. f. 7. caudice subprocero basi et apice incrassato; frondibus arcuatibus; pinnis densis subcrispis ensiformibus; floribus femineis globosis; drupis ellipticis. In Brasilia. ♂. Candex 30–40-ped.

11. *C. Mikianiana* Mart. caudice subprocero irregulariter annulato; frondibus densis suberispis; pinnis linearis-lanceolatis acuminatis; petalis masculis crassis oblongis obtusis; drupis ovato-globosis. In Brasilia. ♂. Candex 40–50-ped.

12. *C. butyracea* L. inermis frondibus pinnatis; foliolis simplicibus. *Pindora Piso bras.* 62. c. fig. *Attalea compta* Mart. *In Am. austr.* ♀.

13. *C? crista* H. et K. candice ventricoso inermi; frondibus pinnatis; foliolis lanceolato-linearibus approximatis apice crispis. *In Cuba.* ♀. Caud. 6-8-pedata.

14. *C. amara* Jacq. nucleo amaro. *In Martinica.* ♀. Coccii nuciferae similis.

15. *C. lapidea* Gaertn. t. 6. f. 1. drupa ovata magnitudine ovi anserini apice mummillari-mucronata. *In Brasilia?* ♀.

4877. SYAGRUS Mart. (1823).

1. *S. cocoides* Mart. Palm. t. 89, 90. caudice inferne annulato, petiolorum basibus capitato; pinnis linearibus angustis suberispis; drupis obovato-ellipticis. *In Brasilia.* ♀.

4878. DIPLOTHEMIUM Mart. (1823).

1. *D. maritimum* Mart. Palm. t. 75, 77. f. 3. et tab. 77. A. acaule frondibus laxis crispis; pinnis linearibus subtus glaucis; drupis obovato-5-gonis. *In Brasilia.* ♀. Frondes 6-7-pedales.

2. *D. campestre* Mart. Palm. t. 76. f. 1, 2 et tab. 78. acaule; frondibus spissis rectiusculis; pinnis rigidis linearibus subtus glaucescentibus; floribus masculis 6-andris; antheris obtusis. *In Brasilia.* ♀.

3. *D. littorale* Mart. Palm. t. 76. f. 5. acaule; frondibus spissis rectiusculis; pinnis rigidis subtus glaucescentibus; floribus masculis 10-12-andris; drupis obovatis angulatis. *In Brasilia.* ♀.

5. *D. caudescens* Mart. Palm. 70, 77. f. 1, 2. caudice mediocri annulato; frondibus suberispis; pinnis linearibus longe acuminatis subtus argenteis; floribus polyandris. *In Brasilia.* ♀.

4879. MAXIMILIANA Mart. (1823).

1. *M. regia* Mart. Palm. t. 91-93. caudicis mediocris vertice vestigiis pe-

tiolorum coronato; antheris exsertis petala lanceolata duplo superantibus; floribus femineis nonnullis in quovis ramo. *In Brasilia.* ♀.

2. *D. insignis* Mart. Palm. t. 91. caudice protero vertice nudiusculo; antheris inclusis petalis fusiformi-triquetris brevioribus; floribus femineis in rachi sessilibus. *In Brasilia.* ♀.

4880. PINANGA Rumph. (1741).

1. *P. oryzaeformis* Rumph est *Seafortiae* species p. 290. descripta.

4881. KENTIA Blume. (1840).

1. *K.* Blume. *Rumphia* t. 106. *In Jara.* ♀. *Palma saxatilis* elata; caudice gracili annulato laevigato apice incrassato. *Frondes pectinato-pinnatifissae.*

4882. ONCOSPERMA Blume. (1840).

1. *O.* Blume. *Rumphia* t. 82 et t. 103. *In archipelago indic.* ♀. *Palma elegans*, caudice elato gracili annulato aculeato. *Frondes terminales pectinato-pinnatisectae.*

4883. CYRTOSTACHYS Blume. (1840).

1. *C.* Blume. *Rumphia* t. 120. *In Moluccis.* *Palma gregaria paludosa* caudice elato gracili annulato. *Frondes pinnatisectae, pinis reclinatis.*

4884. PSEUDANTHUS Sieb. (1827).

1. *P. pimelioides* Sieb. *In Nor. Holl.* ♀. *Fruticulus* fol. imbricatis lanceolato-linearibus mucronatis glabris; floribus albis.

4885. MYRIOPHYLLUM L. (1737).

1. *M. spicatum* L. fol. capillaceis pectinato-pinnatis; spicis verticillatis bracteatis flore brevioribus integerimis infimis subserratis. Fl. dan. t.

681. E. B. t. 83. Schk. t. 296. In Europa. 2.

2. *M. alternifolium* DC. fol. capillaceo-peclinatis aequaliter decrescentibus; spica terminali nudiuscula; floribus alternis inferioribus verticillatis femineis. In Europa. 2.

3. *M. pectinatum* DC. fol. capillaceo pectinato-pinnatis floralibus brevioribus inciso-peclinatis; summis comosis. *M. verticillatum* Fl. dan. t. 1046. In Europa. 2.

4. *M. verticillatum* L. fol. subaequilongis submersis capillaceo-emersis bracteantibus linearis-pectinatis; stigmatibus solidis uncinatis. E. B. t. 218. Dict. hist. nat. cah. 44. In Europa. 2.

5. *M. quitense* H. et K. fol. verticillatis pectinato-pinnatis sectis, lobis filiformi-capillaceis utrinque circiter 15. In Quito. 2.

6. *M. indicum* W. fol. verticillatis, inferioribus in lobos capillaceos pinnatipartitis, superioribus lanceolatis cuneatis apice subincisis; floribus axillaribus verticillatis. In Ind. or. 2.

7. *M. elatinoides* Gaud. fol. quaternam verticillatis, inferioribus in lobos capillaceos pinnatipartitis, superioribus pinnatifidis dentatis v. integris oblongo-lanceolatis; floribus dioecis, femineis axillaribus. In ins. Macklovianis. 2.

8. *M. ternatum* Gaud. fol. ternatim verticillatis inferioribus capillaceo-pinnatifidis, superioribus oblongis integerrimis; floribus axillaribus superioribus 8-andris, inferioribus femineis. In ins. Mactorianis. 2.

9. *M. amphibium* Labill. nov. Holl. t. 220. fol. oppositis obovatis integris; floribus axillaribus solitariis. In ins. Van Diemen. 2.

10. *M. heterophyllum* Michx. fol. verticillatis in lobos capillaceos pinnatifidis; spica terminali nudiuscula; fol. floralibus oppositis ovatis acutis argute serratis flores superantibus. In Am. bor. 2.

11. *M. tuberculatum* Roxb. fol. verticillatis inferioribus pinnatifidis; spica nudiuscula; bracteis oblongis apice subdentatis; carpellis tuberculatis dorso acutis. Ad Calcuttam. 2.

12. *M. intermedium* DC. fol. verticillatis inferioribus in lobos filiformes

pinnatifidis; floribus oblongis linearibus serratis utrinque acuminatis; carpellis subtuberculosis dorso obtusis. In Ind. or. 2.

13. *M. tetrandrurum* Roxb. fol. verticillatis omnibus in lobos capillaceos pinnatifidis; spica nudiuscula bracteis pinnatifidis; carpellis sublaevibus dorso obtusis. In Ind. or. 2.

14. *M. scabratum* Michx. fol. verticillatis omnibus pinnatifidis, lobis linearibus distantibus; floribus axillaribus verticillatis; bracteis foliis omnino conformibus; fructibus 8-angulatis in angulis scabro-tuberculatis. In Am. bor. 2.

15. *M. tenellum* Big. caule simplici subaphyllo basi radicante erecto; fol. squamaeformibus alternis integris summis in axillis floriferis; spica terminali interrupta alterniflora. In Am. bor. 2.

16. *M. hippuroides* Torr. et Gray. fol. quaternis verticillatis inferioribus pinnatum partitis segmentis cappillaris, fol. floralibus linearibus remotis denticulato-serratis; petalis obovatis; carpellis dorso birostratis. *M. scabratum* Cham. In California. 2.

17. *M. proserpinoides* Gill. floribus axillaribus sessiliis subdioecis masculis 8-andris; fol. omnibus subconformibus pectinato-pinnatifidis; lobis linearibus erectis. In Chili. 2.

18. *M. brasiliense* Cambess. fol. verticillatis subaequalibus scabriusculis pinnatisectis, segmentis suboppositis teretiunculis subulatis; lobis calycinis pectinatim 5-lobis; petalis hirsutissimis. In Brasilia. 2.

19. *M. variifolium* Hook. ic. t. 289. simplex v. ramosum; fol. verticillatis nunc omnibus linearibus simplicibus dentato-peclinatis nunc superioribus linearibus integerrimis intermediis pectinato-infimis capillaceo-pinnatifidis; fructibus pubescentibus. In Nor. Holl. 2.

20. *M. propinquum* All. Cunn. fol. quaternis verticillatis pinnatifidis, lobis linearibus oppositis, inferioribus quandoque linearibus integris v. dentatis; floribus axillaribus solitariis geminis. In Nor. Zeelandia. 2.

21. *M. ambiguum* DC. fol. alternis petiolatis pinnati-partitis, inferioribus lobis capillaceis superioribus linearibus

summis subintegris serratis. In Am. bor. 2.

4886. CORYLUS L. (1747).

1. *C. Aretana* L. nuce ovoidea; calycibus fructus campanulatis patulis lacero-dentatis; fol. subrotundis cordatis acuminatis. E. B. t. 723. Schk. t. 305. Guimp. t. 151. In Europa. ♂.

2. *C. tubulosa* L. nuce cylindrica; calycibus fructus tubuloso-cylindricis acuminatis inciso-dentatis; fol. subrotundis cordatis acuminatis. Guimp. t. 152. In Europa. ♂.

3. *C. Colurna* L. nuce abbreviata; calyce fructus patentissimo dupli exteriori multipartito interiore tripartito, laciinis palmatis; fol. subrotundo-ovatis cordatis inciso-angulatis. Schk. t. 305. In Hungaria. ♂.

4. *C. humilis* W. calycibus fructus campanulatis bipartitis nuce majoribus; laciinis inciso-dentatis; fol. cordato-subrotundis acuminatis; stipulis lanceolatis acutis, caule repente. In Nov. Caesarea. ♂.

5. *C. americana* Michx. fol. ovato-oblongis acuminatis; stipulis linear-lanceolatis; calycibus fructus campanulato-tubulosis nuce majoribus bipartitis; laciinis undulatis inciso-dentatis. Wangenh. am. t. 29. f. 61. In Am. bor. ♂.

6. *C. rostrata* Ait. calycibus fructus cornutis muricatis hirsutis nuce duplo longioribus limbo inciso-dentatis; fol. ovato-oblongis acuminatis; stipulis lanceolatis. Willd. arb. t. 1. f. 2. In Am. bor. ♂.

7. *C. ferox* Wall. pl. as. t. 87. In Ind. or. ♂.

8. *C. heterophylla* Fisch. In Siberia. ♂.

9. *C. Turtchaninorii* Bess. In Russia. ♂.

DECANDRIA-POLYGYNIA.

4887. BETULA L. (1747).

1. *B. alba* L. fol. deltoideis acutis duplicato-serratis glabris; squamarum lobis lateralibus rotundatis, medio ovato acuminato longiore; petiolis glabris pedunculo longioribus. Schk. t.

288. *Blackw.* t. 240. Guimp. t. 145. In Europa, Asia. ♂.

2. *B. pubescens* Ehrh. fol. cordato-ovatis plerumque simpliciter serratis; ramulis petiolisque tomentosis; squamarum lobo medio oblongo attenuato lateralibus duplo longiore. Guimp. t. 146. *B. odorata* Bechst. *B. torfacea* Schl. In Europa. ♂.

3. *B. populifolia* Ait. fol. triangularibus longe acuminatis inaequaliter serratis petiolisque elongatis glabris; strobilis erectis breve pedunculatis solitariis, lobis fructus lateralibus rotundatis. *B. acuminata* Ehrh. Wangenh. am. t. 29. f. 38. In Am. bor. ♂.

4. *B. excelsa* Ait. fol. ovatis acutis serratis axillis venarum subtus barbatis; petiolis pubescentibus pedunculo brevioribus; lobis fructus lateralibus rotundatis. Willd. arb. t. 2. f. 2. *dendr. brit.* t. 95. In Am. bor. ♂.

5. *B. davurica* Pall. ross. t. 39. fol. rhombis apice inaequaliter serratis subtus glabris; petiolis pubescentibus; lobis fructus rotundatis ciliatis. In Sibiria. ♂.

6. *B. nitida* Don; fol. ovato-oblongis acuminatis argute duplicato-serratis utrinque glabris nitidis, ramulisque pubescentibus. In Nepatia. ♂.

7. *B. alnoides* Hamilt. fol. ovatis acuminatis inaequaliter serratis glabris; amentis dioecis, masc. axillaribus ternis densis folia superantibus; lobis fructus rotundatis. In Nepatia. ♂.

8. *B. nigra* L. fol. subrhomboidalis acutis angulatis duplicato-serratis subtus petiolisque pubescentibus; squamis fructus villosis, laciinis linearibus aequalibus. *B. lacunosa* et *rubra* Michx. In Am. bor. ♂.

9. *B. papyracea* Ait. fol. basi truncata ovato-oblongis acutis duplicato-serratis, venis subtus hirsutis; petiolis glabris; amentis feminis pedunculatis nutantibus; lobis fructus lateralibus orbiculatis abbreviatis. Willd. arb. t. 2. f. 1. *B. papyrifera* Michx. In Canada. ♂.

10. *B. lenta* L. fol. cordato-oblongis acutis argute serrulatis venis subtus petiolisque pubescentibus; lobis fructus obtusis aequalibus elevato-venosis ciliatis. Dendr. brit. t. 144. *B. nigra* du Roi. In Am. bor. ♂.

11. *B. carpinifolia* Ehrh. fol. cordato-oblongis acutis argute serrulatis

subtus petiolisque glabris, lobis fructus obtusis aequalibus aeniis glabris. *In Am. bor.* Ȑ.

12. *B. utilis* Don; fol. ovatis acuminatis inaequaliter serratis utrinque ramulisque villosis. *In Nepalia.* Ȑ.

13. *B. occidentalis* Hook. ramis rufo-fuscis copiose resinoso-verrucosis; fol. late rhombo-ovatis sublobatis grosse inciso-serratis sublente adpresso-hirsutis subtus epunctatis; amentis lem. lato-cylindricis; squamis lobis lateralibus decurvo-falcatis intermedio longiore. *In Am. bor.* Ȑ.

14. *B. viridis* Vill. fol. ovatis duplicato-serrulatis glabris demum subtus ad venarum axillis pilosis; squamis fem. sub-1-floris. *B. ovata* Schk. Guimp. t. 147. *B. alpina* Borkh. *Alnus viridis* DC. *In Europa.* Ȑ.

15. *B. glandulosa* Michx. fol. subsessilibus obovatis serratis basi integerrimis glabris, ramis glanduloso-punctatis glabris; amentis fem. oblongis; squamis semitrifidis; seminibus anguste marginatis. *In Am. bor.* Ȑ.

16. *B. pumila* L. fol. orbiculato-obovatis serratis subtus ramulisque pubescentibus; amentis feminis cylindricis. Jacq. hort. t. 122. *In Am. bor.* Ȑ.

17. *B. fruticosa* Pall. ross. t. 40. fol. subrotundo-ovatis subaequaliter serratis glabris; amentis fem. oblongis. Guimp. t. 149. Dendr. brit. t. 97. *In Germania et Siberia.* Ȑ.

18. *B. nana* L. fol. orbiculatis crenatis glabris subtus reticulato-venosis. Linn. lap. t. 6. f. 3. Fl. dan. t. 91. Guimp. t. 148. E. B. t. 2326. *In Europa Siber. et Amer. bor.* Ȑ.

19. *B. antarctica* Forst. fol. subrotundo-ellipticis crenatis rigidis nitidis glabris aeniis. *In Terra ignis.* Ȑ.

20. *B. acuminata* Wall. *In Ind. or.* Ȑ.

21. *B. Bhajapaltra* Wall. *In Ind. or.* Ȑ.

22. *B. ciliata* Wall. *In Ind. or.* Ȑ.

23. *B. cylindrastachya* Wall. *In Ind. or.* Ȑ.

24. *B. arguta* Schlecht. *In Mexico.* Ȑ.

4888. CARPINUS L. (1767).

1. *C. Betulus* L. amentorum squamis 3-partitis; fol. ovatis acuminatis duplicato-serratis. Schk. t. 304. Kern. t. 11. Guimp. t. 150. *In Europa.* Ȑ.

2. *C. americana* Michx. strobilorum squamis tripartitis, lacinia intermedia obliqua ovato-lanceolata hinc 1-dentata. Wats. dendr. t. 157. *In Am. bor.* Ȑ.

3. *C. orientalis* L. strobilorum squamis ovatis basi inaequalibus in divisis subangulatis inaequaliter serratis. Wats. t. 98. *C. duinenis* Scop. carn. t. 60. *In Europ. et Asia min.* Ȑ.

4. *C. saginea* Lindl. *In Ind. or.* Ȑ.

5. *C. viminea* Wall. cat. *In Ind. or.* Ȑ.

4889. OSTRY A Mich. (1729).

1. *O. carpinifolia* Scop. amentis ovatis pendulis; fol. ovatis acutis; geminis obtusis. *O. italicica* Mich. gen. t. 104. f. 2. *O. vulgaris* dendr. brit. t. 143. *In Europa.* Ȑ.

2. *O. virginica* W. strobilis oblongis ovatis erectis; fol. oblongo-ovatis acuminatis; geminis acutis. *Carpinus* Lam. ill. t. 708. Abb. ins. 2. t. 98. *In Am. bor.* Ȑ.

4890. FAGUS L. (1767).

1. *F. systratica* L. fol. ovatis glabris subrepandis subundulatis ciliatis. Schk. t. 304. Kern. t. 10. Guimp. t. 143. *In Europ.* Ȑ. Var. fol. sanguineis et fol. laciniatis.

2. *F. ferruginea* Ait. fol. oblongis acuminatis grosse serratis subtus pubescentibus. Michx. arb. 2. t. 9. *In Am. bor.* Ȑ.

3. *F. antarctica* Forst. fol. basi obliquis oblongis inaequaliter crenulato-serratis utrinque glabris subtus discoloribus. *In terra ignis (ins. Chiloe).* Ȑ.

4. *F. obliqua* Mirb. mem. mus. 14. t. 23—26. *In Chiti.* Ȑ.

(De speciebus nov. vide Poepp. et Endl. nov. gen. 194—197. et Hook. Journ. of Bot. 2. p. 146. t. 6—8.)

4891. CASTANEA Tournes. (1700).

1. *C. vesca* Gaertn. t. 37. f. 1. fol. oblongo-lanceolatis acuminatis mucronato-serratis subtus nudis. Guimp. t. 144. E. B. 886. In Europ. austr. et Asia. ♀.

2. *C. chrysophylla* Dougl. in Hook. journ. 1843. p. 496. t. 16. fol. semipervirentibus lato-lanceolatis coriaceis acuminatis integerrimis glabris subtus aureo-farinosis. In Columbia. ♀. Arbor 20-30-ped.

3. *C. pumila* Mill. fol. oblongis acutis mucronato-serratis subtus albo-tomentosis. In China.

4. *C. argentea* Blume; fol. oblongo-lanceolatis longe cuspidiatis basi angustatis glabris subtus argenteis; amentis sericeis. In Jara. ♀.

5. *C. Tungurru* Blume; fol. elliptico-oblongis acutis basi subrotundis subtus sericeis et in costis amentis que tomentosis. In Jara. ♀.

6. *C. javanica* Blume; fol. subfalcatis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis glabris subtus fuscescentibus; amentis foliisque junioribus fulvo-tomentosis. In Jara. ♀. Arbor egregia.

7. *C. ? montana* Blume; fol. elliptico-oblongis acuminatis basi acutis supra glabris subtus griseis et ramulis tenuiter fusco-tomentosis. In Jara. ♀. 80-ped.

8. *C. ? latifolia* Blume; fol. ova-ibus acuminatis subtus albido-glaucis in costis infra ramulisque tomentosis. In Java. ♀. Arbor 50-ped.

9. *C. chinensis* Spr. fol. lanceolatis mucronato-serratis basi integerimis subtus glabris; fructibus 1-spermis. *Fagus Castanea* Lour. In China. ♀.

10. *C. pumila* Michx. fol. oblongis utrinque attenuatis mucronato-serratis subtus tomentosis. *Fagus* Wangerh. am. t. 19. f. 44. Catesb. car. t. 9. In Am. bor. ♀.

11. *C. americana* G. Don; fol. lato-ribus ut in *C. pumila*; nucibus parte superiore villosis. In Am. bor. ♀.

12. *C. sphaerocarpa* Lindl. fol. lanceolatis acuminatis glabris subtus glaucis; fructibus spicatis; spinis culpulae tomentosae ternatis divergentibus; glande ovata mucronulata. *Quercus* Roxb. *O. lanceaefolia* Hamilt. In Ind. or. ♀.

13. *C. microcarpa* Lindl. (*Quercus* acuta Hamilt.) In Ind. or. ♀.

14. *C. martabanica* Wall. pl. as. rar. t. ? 197. In Ind. or. ♀.

15. *C. inermis* Lindl. ex Steud. In Ind. or. ♀.

16. *C. indica* Roxb. et Steud. In Ind. or. ♀.

17. *C. tribuloides* Lindl. in Wall. cat. (*Quercus ferox* Roxb.) ex Steud. In Ind. or. ♀.

4892. QUERCUS.

a. Folia integrifolia.

1. *Q. obtecta* Poir. fol. oblongis coriaceis subtus integerrimis lucidis glabris; squamis calycis lanceolatis rigidis. In Mauritiana. ♀.

2. *Q. castanicarpa* Roxb. fol. oblongo-lanceolatis glabris; fructibus ovatis muricatis; aculeis 3-fidis. In Ind. or. ♀.

3. *Q. grandifolia* Don; fol. sessilibus obovato-oblongis utrinque glabris nitidis basi auriculatis; fructibus terminalibus glomeratis; cupulis sessilibus rugosis; glande mucronulata. In Nepal. ♀.

4. *Q. obtusifolia* Don; fol. cordato-oblongis obtusis subtus tomentosis; cupulis sessilibus tomentosis; glande obtusa. In Nepal. ♀.

5. *Q. Arcuata* Hamilt. fol. lanceolatis acuminatis coriaceis glabris nitidis; fructibus ternis globosis in spicam longissimam digestis. *Q. spicata* Sm. In Nepal. ♀.

6. *Q. motucca* Rumph. amb. t. 56. fol. breviter petiolatis oblongis utrinque attenuatis venosis subundulatis glaberrimis; fructibus solitariis sessilibus; cupulis verrucocis; glande sulcata umbilicata. In Ind. or. ♀.

7. *Q. elegans* Blume; fol. obovato-oblongis obtuse acuminatis in petiolum angustatis glabris; fructibus conseratis; cupulis urceolatis e crenulis concentricis tuberculatis; glandulis hemisphaericis, disco in ambitu foveolato. In Java. ♀.

8. *Q. placentaria* Blume; fol. falcatis ovato-oblongis acuminatis basi rotundatis coriaceis glaberrimis; fructibus conseratis; cupulis planiusculis basi attenuatis concentrica tuberculatis; glandulis orbiculatis depresso-

sulcatis. *Act. Batav.* t. 9. f. 1. In Java. ♂.

9. *Q. glaberrima* Blume; fol. subfalcato-oblongis obtuse acuminatis basi obtusiusculis glaberrimis; fructibus confertis; cupulis planiusculis squamo-so-tuberculatis; glandibus subrotundis. In Java. ♂.

10. *Q. pseudo-molucca* Blume; fol. elliptico-oblongis acuminatis basi acutis glabris supra lucidis glaucis; amentis confertis terminalibus; cupulis abbreviatis planis imbricato-squamosis; glandibus hemisphaericis. In Java. ♂.

11. *Q. angustata* Blume; fol. oblongo-lanceolatis acuminatis supra lucidis subtus glaucis; amentis axillaribus terminalibusque elongatis; cupulis planiusculis imbricato-squamosis basi convexis; glandibus ovato-globosis. In Java. ♂.

12. *Q. sundaica* Blume; fol. ellipticis acuminatis brevi attenuatis supra glabris subtus cinereo-glaucis; costisque tomento laevi obsessis; cupulis squarroso-imbricatis. In Java. ♂.

13. *Q. pruinosa* Blume; fol. ovato-oblongis acuminatis basi subrotundatis subtus amentisque cordatis fulvo-leprosis; cupulis planiusculis squamoso-echinatis; glandulis ovato-orbiculatis. In Java. ♂.

14. *Q. rotundata* Blume; fol. oblongis acuminatis basi attenuatis glabris subtus glaucescentibus; cupulis hemisphaericis margine squamulis adpresso cinctis basi attenuatis edentulis glandibus superne plano-convexis inferne rotundatis. In Java. ♂.

15. *Q. induta* Blume; fol. elliptico-oblongis longe acuminatis basi acutis glabris subtus cinerascentibus; cupulis hemisphaericis basi attenuatis rugosis edentulis; glandulis hemisphaericis subdepressis, disco subdepresso in ambitu alveolato. In Java. ♂.

16. *Q. costata* Blume; fol. oblongis acuminatis basi acutis glaberrimis subtus glaucis; amentis ramosis; fructibus pedicellis clavatim - incrassatis insidentibus; cupulis edentulis circinatiter costatis immersis. In Java. ♂.

Americanae.

17. *Q. magnoliaefolia* Nee. fol. subcordato-oblongis coriaceis supra nitidis subtus tomentosis; fructibus ra-

cemosis exiguis; cupula breviuscula. In Mexico. ♂.

18. *Q. laurifolia* Michx. querc. t. 17 et 18. fol. oblongis basi attenuatis integerrimis glabris; glandula subrotunda laevi. In Am. bor. ♂.

19. *Q. imbricaria* Michx. querc. t. 15, 16. fol. oblongis acutis mucronatis integerrimis subtus pubescentibus; glandula subrotunda. In Am. bor. ♂.

20. *Q. flava* Nee; fol. obovato-subrotundis integerrimis nitidis subtus flavo-tomentosis; fructibus racemosis. In Mexico. ♂.

21. *Q. cinerea* Michx. querc. t. 14. fol. perennantibus coriaceis oblongo-lanceolatis integerrimis basi attenuatis apice obtusiusculis mucronatis subtus stellatum tomentosis; nuce subrotunda. In Am. bor. ♂.

22. *Q. maritima* W. fol. perennantibus coriaceis lanceolatis integerrimis basi attenuatis apice acutis mucronatis glabris, nuce subrotunda. *Q. Phellos maritima* Michx. querc. t. 13. f. 3. In Am. bor. ♂.

23. *Q. Phellos* L. fol. deciduis linearie-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis glabris mucronatis; nuce subrotunda. Catesb. car. t. 16. In Am. bor. ♂.

24. *Q. lanceolata* H. et Bonpl. pl. aeq. t. 81. ramulis tuberculatis; fol. oblongo-lanceolatis utrinque acutis undulato-repandis coriaceis supra nitidis subtus stellato-pubescentibus; fructibus subternis. In Mexico. ♂.

25. *Q. crassipes* H. et Bonpl. t. 83. ramulis tuberculosis; fol. lanceolato-oblongis mucronatis basi rotundatis integerrimis coriaceis subtus cinereo-tomentosis; fructibus pedunculatis subgeminatis; cupulis subturbinate. In Mexico. ♂.

26. *Q. confertifolia* Bonpl. t. 94. ramulis abbrevialis; fol. brevissime petiolatis confertis lanceolatis acuminatis mucronato-aristatis integerrimis coriaceis margine subreflexis subtus pubescentibus; fructibus subgeminis sessilibus. In Mexico. ♂.

27. *Q. microphylla* Nee; fruticosa; fol. confertis lanceolatis mucronatis repandis villosis subtus tomentosis; fructibus geminis sessilibus; cupulis villosis. *Q. repanda* H. et Bonpl. pl. aeq. t. 79. In Nor. Hispania. ♂.

28. *Q. mexicana* H. et Bonpl. pl. aeq. t. 82. ramulis foliisque subtus

stellulato-pubescentibus supra nitidis linear-i-oblongis, acutis; submucronatis subcordatis undulato - subsinuatibus subcoriaceis; fructibus solitariis; cupulis cyathiformibus. *In Mexico.* ♀.

29. *Q. sericea* Willd. fruticosa pumila repens; fol. ovato - oblongis acutis subundulatis subtus sericeis; glande subglobosa. *Q. pumila* Michx. *Querc.* t. 13. f. 1, 2. *In Chili.* ♀.

30. *Q. rirens* Ait. fol. elliptico-oblongis latiusculis integerrimis subtus stellato - pubescentibus; fructibus pedunculatis; cupula turbinata. Michx. t. 10 et 11. *Catesby.* t. 16. *Q. Phellos* β. L. *Q. sempervirens* Walt. *In Am. bor.* ♀.

31. *Q. salicifolia* Nee; fol. oblongo-lanceolatis mucronatis coriaceis undulatis subtus discoloribus axillis venarum subtus barbatis; fructibus geminis villosis. *In Mexico.* ♀.

32. *Q. concentrica* Lour. fol. ellipticis utrinque acutis falcatis integerrimis; calyce fructus concentrica sulcato. *In Cochinchina.* ♀.

33. *Q. glabra* Thunb. fol. oblongo-lanceolatis cuspidatis integerrimis parallelis venosis utrinque glabris subtus flavescensibus; spicis tomentosis. *In Japonia.* ♀.

34. *Q. acuta* Thunb. fol. oblongo-lanceolatis cuspidatis junioribus subtus spicisque ferrugineo - tomentosis. *In Japonia.* ♀.

35. *Q. elliptica* Nee; fol. oblongis utrinque rotundatis coriaceis integerrimis supra glabris subtus seabiunculis; petiolis brevissimis incrassatis. *In Mexico.* ♀.

36. *Q. ambigua* H. et Bonpl. t. 93. fol. obovato-oblongis obtusis basi rotundatis subrepandis membranaceis subtus tenuissime pubescentibus; fructibus 5-7-nis pedunculatis; pedunculis geminis elongatis. *In Mexico.* ♀.

37. *Q. Humboldtii* Bonpl. t. 130. ramis verrucosis; fol. lanceolatis utrinque acutis integerrimis margine undulatis coriaceis glaberrimis. *In Bogota.* ♀.

38. *Q. totimensis* H. et Bonpl. t. 129. ramis verrucosis; fol. confertis sessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis undulato - subrepandis subcoriaceis glabris. *In Nov. Granata.* ♀.

39. *Q. myrtifolia* Willd. fol. oblongis utrinque attenuatis coriaceis

glabris margine revolutis. *In Carolina.* ♀.

b. *Folia dentata.* Glandes oblongae v. ovatae.

40. *Q. Ilex* L. fol. ovato-oblongis dentato-serratis subtus incanis; squamis cupulae arcte imbricatis. Duham. t. 43, 44. *Ilex coccigera* Blackw. t. 186. *Q. heterophylla*, crenata et lusitanica Lam. *In Europa austr.* ♀.

41. *Q. Suber* L. fol. subcordato-oblongis mucronato-dentatis subtus tomentosis; cortice suberoso-fungoso. Duham. II. t. 80. ed. nov. 7. t. 81. Blackw. 193. *In Europa austr.* ♀.

42. *Q. Pseudo-Suber* L. fol. ovato-oblongis mucronato-dentatis subsinuatibus subtus tomentosis; cupulae squamis patulis laxis; cortice rimoso suberoso. *In Etruria Hispania et Afr. bor.* ♀.

43. *Q. coccifera* L. fol. subcordato-oblongis mucronato-dentatis utrinque glabris nitidis; squamis cupulae patulis. Weise Forstb. 1. t. 4. f. 3. Duham. nov. edit. 7. t. 46. *In Hispania Lusitan. et Afr. bor.* ♀.

44. *Q. gramuntia* L. fol. subrotundo - ovalibus spinoso - dentatis sinuatis subtus tomentosis; glande elongata. *Q. rotundifolia* et *hispanica* β. Lam. *In Europa austr.* ♀.

45. *Q. rigida* Willd. fol. subcordato-oblongis spinoso - serratis utrinque glabris subtus glaucis; petiolis apice barbatis; squamis cupulae lanceolatis lignosis patentibus. *In Asia minore.* ♀.

46. *Q. infectoria* Oliv. fol. subcordato-ovatis oblongis grosse dentatis utrinque glabris glaucescentibus; squamis cupulae adpressis; glande oblongo - cylindrica. *Q. canariensis* Willd. *In Asia minore et Teneriffa.* ♀.

47. *Q. humilis* Lam. fruticosa; fol. subcordato - oblongis spinoso - serratis subtus incano-pubescentibus; squamis cupulae planiusculis adpressis; glande oblonga. *In Lusitania.* ♀.

48. *Q. glauca* Thunb. arborea; fol. obovatis mucronato-serratis supra glabris subtus albo - farinosis parallele venosis. *In Japonia.* ♀.

49. *Q. cuspidata* Thunb. fol. ovatis cuspidatis serratis utrinque glaberrimis parallele venosis; cupula echinata. *In Japonia.* ♀.

50. *Q. Prinos* L. fol. oblongis basi attenuatis grosse aequaliter dentatis subtus pubescentibus, dentibus apice callosis; squamis cupulae basi attenuatae appressis; glande maxima. Du Roi t. 6. f. 3. *Q. palustris* Michx. t. 6. In Am. bor. ♂.

51. *Q. agrifolia* Nee; fol. subcordato-ovatis remote spinoso-dentatis utrinque glabris; squamis cupulae hemisphaericae laxis; glande ovato-oblonga-acuta. In Am. bor. ♂.

52. *Q. laurina* H. et Bonpl. aeq. t. 80. ramulis glabris; fol. oblongis v. lanceolato-oblongis acuminatis basi rotundatis apice subdentatis coriaceis glabris nitidis; cupulis cyathiformibus. In Nov. Hispan. ♂.

53. *Q. stipularis* H. et Bonpl. aeq. t. 90. ramulis ferrugineo-tomentosis; fol. obovato-oblongis subcordatis argute et grosse dentatis crasse coriaceis subtus flavo-tomentosis; stipulis persistentibus; fructibus solitariis v. geminis sessilibus. In Mexico. ♂.

54. *Q. obtusata* H. et Bonpl. aeq. t. 76 ramulis tuberculatis tenuiter pubescentibus; fol. oblongis obtusis basi inaequalibus repandis coriaceis subtus pulveruleto-pubescentibus; fructibus sub 5; cupulis campanulato-globosis. In Nov. Hispan. ♂.

55. *Q. crassifolia* H. et Bonpl. t. 91. ramulis sulcatis foliisque subtus flavo-tomentosis breve petiolatis obovatis cordatis remote dentatis crasse coriaceis; fructibus subternis pedunculatis; cupulis subsphaericis. In Nov. Hispania. ♂.

56. *Q. pulchella* H. et Bonpl. aeq. t. 88. ramis tuberculatis; fol. obovato-oblongis subcordatis argute dentatis coriaceis subtus tenuissime incano-tomentosis; fructibus geminis breviter pedunculatis; cupulis depresso-sphaericis. In Hispania. ♂.

57. *Q. Xalapensis* H. et Bonpl. t. 75. ramulis tuberculatis; fol. longe petiolatis ovato-oblongis acuminatis remote cuspidato-dentatis subcoriaceis glabris; cupulis cyathiformibus. In Mexico. ♂.

58. *Q. Sideroxylla* H. et Bonpl. t. 85. ramulis pubescentibus; fol. obovato-oblongis basi rotundatis apicem versus argute sinuato-dentatis coriaceis supra nitidis subtus cano-tomentosis; cupulis cyathiformibus. In Nov. Hispan. ♂.

59. *Q. reticulata* H. et Bonpl. t. 86 ramulis pubescentibus; fol. sub-sessilibus obovatis cordatis remote dentatis coriaceis rugosis subtus tenuissime tomentosis; fructibus geminis longe pedunculatis. In Nov. Hispania. ♂.

60. *Q. spicata* H. et Bonpl. ramulis tomentosis; fol. ellipticis obtusis cordatis remote obtuse dentatis membranaceis subtus tomentosis; fructibus longe pedunculatis subspicatis. In Mexico. ♂.

61. *Q. circinata* Nee; fol. ovato-oblongis utrinque attenuatis undulato-crenatis subtus pubescentibus; fructibus subsessilibus. In Nov. Hispania. ♂.

62. *Q. pandurata* H. et Bonpl. t. 77. ramulis laevibus hirtis; fol. obovato-oblongis subpanduratis subcordatis sinuato-dentatis coriaceis subtus pubescentibus; fructibus subquinis; squamis cupulae sessilis arce imbricatis; glande ovata. In Nov. Hispania. ♂.

63. *Q. Castanea* Willd. fol. longe petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis grosse dentatis subtus tomentosis dentibus subaequalibus apice callosis; glande subglobosa. *Q. Prinos* acuminata Michx. t. 8. In Pensylvania. ♂.

64. *Q. montana* Willd. fol. obovatis acutis grosse dentatis subtus albo-tomentosis dentibus subaequalibus dilatatis apice callosis; glande ovato-oblonga. *Q. Prinos* Monticola Michx. t. 7. In Virginia. ♂.

65. *Q. bicolor* Willd. fol. obovato-oblongis basi integerrimis subtus albo-tomentosis grosse dentatis, dentibus dilatatis inaequalibus apice callosis; fructibus geminis longe pedunculatis; glande ovato-oblonga. *Q. Prinos* tomentosa Michx. t. 2. In Am. bor. ♂.

66. *Q. Michauxii* Nutt. fol. oblongis utrinque rotundatis sinuato-dentatis reticulatis subtus tomentosis; fructibus geminis. *Q. Prinos* discolor Michx. t. . . In Am. bor. ♂.

67. *Q. australis* Link. fol. ovato-ellipticis obtusiusculis sinuato-dentatis coriaceis supra nitidis subtus pubescentibus; fructibus subsessilibus; squamis cupulae arce adressis. In Lusitania. ♂.

68. *Q. imbricata* Hamilt. fol. ellipticis acuminatis dentato-serratis glabris subtus glaucis; fructibus solitariis cernuis; lamellis cupulae depressae imbricatis; glande umbilicata. In *Nepalia*. ♂.

69. *Q. lanuginosa* Don; fol. ovalioblongis acute dentato-serratis utriusque ramulisque lanatis; fructibus sessilibus; squamis cupulae imbricatis; glande ovata umbonata. In *Nepalia*. ♂.

70. *Q. Phallata* Hamilt. fol. ovato-lanceolatis cuspidatis medio dentato-serratis glabris subtus glaucis; fructibus globosis subquaternis sessilibus; lamellis cupulae plicato-imbricatis sericeis. In *Nepalia*. ♂.

71. *Q. Guaricana* Dougl. fol. latissime obovatis utrinque obtusis siuato-pinnatifidis siccitate nigricantibus subtus ramulisque dense fusco-pubescentibus; lobis latis obtusissimis; cupula dense squamosa squamis pubescentibus. In *Am. bor.* ♂.

72. *Q. ithaburnensis* Decaisn. fol. oblongis subcordatis breviter acuminatis grosse dentatis, dentibus setaceo-apiculatis supra nitidis subtus incano-puberulis; cupulae squamulis linearibus acutis reflexis. In *Palaestina*. ♂.

73. *Q. castaneaeifolia* C. A. Mey. fol. petiolatis oblongo-lanceolatis grosse serratis subtus villosis serraturis submucronatis; cupulae sessilis squamis linear-lanceolatis; glande oblongo-cylindrica. Eichw. pl. casp. t. 1. In *Caucaso*. ♂.

74. *Q. mannifera* Lindl. misc. 1840. ramulis glabris; fol. petiolatis oblongis subcordatis incisis, lobis obtusis supra glabris subtus pubescentibus; gemmis feminis ovalibus sessilibus aggregatis imbricatis glabris. In *Kurdistan*. ♂.

75. *Q. regia* Lindl. ramalis glabris; fol. petiolatis ovato-lanceolatis cordatis grosse inciso-dentatis undulatis utrinque nitidis viridibus glaberrimis; dentibus lobisque aristatis. In *Kurdistan*. ♂.

76. *Q. Brandtii* Lindl. ramis petiolis foliisque subtus dense et mollier tomentosis; fol. cordatis ovatis aristato-dentatis acutis super stellato-pubescentibus cinereisque. In *Kurdistan*. ♂.

77. *Q. diversifolia* Nee; fruticosa; fol. ovatis dentatis integerrimisque subtus flavo-tomentosis; fructibus globosis aggregatis. In *Nov. Hispania*. ♂.

78. *Q. prinoides* Willd. fruticosa; fol. obovatis obtusis glabris subtus glaucis grosse dentatis dentibus dilatatis apice callosis; glande ovata. Michx. t. 2. f. 1. In *Am. bor.* ♂.

79. *Q. depressa* H. et Bonpl. pl. aeq. t. 92. fruticosa procumbens; ramulis pubescentibus; fol. sempervirentibus oblongis acutis basi rotundatis argute et remote dentatis rigidis glabris nitidis; fructibus gemini v. ternis. In *Nov. Hispania*. ♂.

80. *Q. gemelliflora* Blume; fol. oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis superne remote serratis supra nitidis subtus glaucis; pedunculis femineis subgemellifloris; cupulis hemimisphaericis imbricato-squamosis. In *Java*. ♂.

81. *Q. turbinata* Blume; fol. oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis supra basin argute calloso-serratis glabris; amentis feminis paucifloris; glandibus globosis; cupulis turbinatis calyculato-squamosis. In *Java*. ♂.

82. *Q. lineata* Blume; fol. oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis serratis subtus fusco-villosis approximato-parallelo-venosis; cupulis squamo-calyculatis. In *Java*. ♂.

Fructus ignoti.

83. *Q. chrysophylla* H. et Bonpl. t. 87. ramulis sulcatis pubescentibus; fol. oblongis basi rotundatis apice cuspidato-dentatis membranaceis supra nitidis subtus tenuissime aureo-tomentosis. In *Hispania*. ♂.

84. *Q. almaguerensis* H. et Bonpl. t. 131. ramulis tuberculatis; fol. confertis subsessilibus obovato-lanceolatis acutis superne grosse dentatis membranaceis glabris subtus glaucescentibus. In *Nov. Granata*. ♂.

85. *Q. glaucescens* H. et Bonpl. t. 78. ramulis angulatis; fol. brevissime petiolatis obovato-oblongis obtusiusculis basi cuneatis dentato-sinuatis membranaceis glabris glaucescentibus. In *Nov. Hispania*. ♂.

86. *Q. Kamropii* Don; fol. ovato-lanceolatis longe cuspidatis spinuloso-serratis utrinque glabris. In *Nepalia*. ♂.

87. *Q. serrata* Thunb. fol. oblongis acuminatis aequaliter serratis parallele nervosis villoso-tomentosis. *In Japonia.* ♀.

88. *Q. dentata* Thunb. fol. obovato-oblongis obtusis inciso-dentatis supra villosis subtus tomentosis. *In Japonia.* ♀.

89. *Q. Cassura* Hamilt. fol. cordato-oblongis obtusis spinuloso-serratis undulatis subtus tomentosis. *In Nepalia.* ♀.

90. *Q. mucronata* Willd. fol. subcordato-oblongis acuminatis aristato-serratis subtus flavo-villosis. *Q. Castanea* Nee. *In Nov. Hispania.* ♀.

91. *Q. splendens* Nee; fol. ovato-oblongis obtuse inaequaliter dentatis subtus nitide sericeo-tomentosis. *In Nov. Hispania.* ♀.

92. *Q. macrophylla* Nee; fol. amplis subcordato-ovatulis undulato-crenatis supra nitidis subtus tomentosis. *In Nov. Hispania.* ♀.

c. Folia apice lobata.

93. *Q. tridens* H. et Bonpl. t. 96. ramulis laevibus; fol. rotundato-oblongis apice cuspidato-tridentatis membranaceis supra pubescentibus subtus tenuiter cinereo-tomentosis; fructibus 3-4. *In Mexico.* ♀.

94. *Q. aquatica* Walt. fol. cuneiformibus glabris apice obsolete trilobis lobo intermedio majore; cupula hemisphaerica; glande subrotunda. Michx. t. 19. *In Am. bor.* ♀.

95. *Q. nigra* L. fol. cuneiformibus glabris basi subcordatis apice subtrilobis, lobis divaricatis retusis subtus rubiginoso-pulverulentis; cupulae squamis scariosis. *Q. ferruginea* Michx. t. 22, 23. *In Am. bor.* ♀.

96. *Q. triloba* Michx. t. 26. fol. obovato-oblongis basi attenuatis subtus albo-tomentosis apice dilatatis 3-lobis lobis mucronulatis; cupula planiuscula; glande subrotunda. *In Am. bor.* ♀.

97. *Q. nana* Willd. fol. cuneiformibus glabris apice trilobis basi subsinuatis, lobis divaricatis mucronatis intermedio majore; axillis venarum subtus pubescentibus. *Q. aquatica* β. *elongata* Ait. Abb. ins. t. 59. *In Am. bor.* ♀.

d. Folia sinuata.

98. *Q. Aegilops* L. fol. ovato-oblongis laevissime sinuatis subtus canepubescentibus; lobis brevissimis mucronatis; cupulae hemisphaericae squamis lanceolatis patentibus. Oliv. it. t. 12. Mill. dict. t. 2153. *In Europa austr. et Oriente.* ♀.

99. *Q. acutifolia* Nee; fol. oblongo-lanceolatis acuminatis sinuatis subtus ferrugineo-tomentosis dentibus cuspidatis; fructibus aggregatis; glande subglobosa H. et Bonpl. pl. aeq. t. 95. *In Nov. Hispan.* ♀.

100. *Q. candicans* Nee; fol. ovatis utrinque attenuatis sinuatis subtus albo-tomentosis dentibus mucronato-setaceis. *In Nov. Hispan.* ♀.

101. *Q. tinctoria* Willd. fol. obovato-oblongis sinuatis subtus stellatopubescentibus; lobis oblongis obtusis obsolete denticulatis mucronato-setaceis; cupula scutellata; glande globosa. Mich. t. 24. *In Am. bor.* ♀.

102. *Q. elongata* Willd. fol. longe petiolatis ovato-oblongis subtus tomentosis sinuatis trilobis lobis subfalcatis setaceo-mucronatis terminali elongato; cupula crateriformi; glande globosa. *Q. falcata* Michx. t. 28. *In Am. bor.* ♀.

103. *Q. discolor* Ait. fol. oblongis pinnatifido-sinuatis subtus stellatopubescentibus; lobis oblongis dentatis mucronato-setaceis; cupula turbinata; glande ovata. *Q. tinctoria* sinuosa Michx. t. 25. *In Virginia.* ♀.

104. *Q. rubra* L. fol. longe petiolatis oblongis glabris obtuse sinuatis lobis acutiusculis dentatis mucronato-setaceis; cupula scutellata laeviuscula; glande ovata turgida. Michx. t. 35, 36. *Q. ambigua* Michx. *In Am. bor.* ♀.

105. *Q. coccinea* Wangenh. am. t. 4. f. 9. fol. longe petiolatis oblongis profunde sinuatis glabris, lobis acutis divaricatis dentatis mucronato-setaceis; cupulae ampliae turbinatae squamosissimae glande ovata abbreviata. Michx. t. 31, 32. *In Am. bor.* ♀.

106. *Q. Catesbeiana* Michx. t. 29, 30. fol. subsessilibus oblongis basi cuneatis profunde sinuatis glabris lobis acutis divaricatis dentatis mucronato-setaceis; cupulae ampliae turbinatae squamis obtusis marginibus introflexis. Catesb. car. t. 23. *In Am. bor.* ♀.

107. *Q. palustris* du Roi. fol. oblongis profunde sinuatis glabris axillaris venarum subtus villosis, lobis acutis dentatis mucronato - aristatis; cupula scutellata laevi. Michx. t. 33, 34. *In Am. bor.* Ȑ.

108. *Q. ilicifolia* Wangenh. fol. obovato-cuneiformibus 3 - 5-lobis subtus cinereo-tomentosis, lobis mucronato-setaceis; cupula subturbinate glande subglobosa. Q. Banisteri Michx. t. 27. *In Am. bor.* Ȑ.

109. *Q. Esculus* L. fol. ovato-oblongis sinuatis glabris; lobis oblongis obtusis subangulatis subdentalis; junioribus utrinque hirtis; fructibus ellipticis sessilibus. *In Asia minore.* Ȑ.

110. *Q. austriaca* Jacq. fol. oblongis laevissime sinuatis subtus pubescentibus basi angustatis lobis brevissimis ovatis acutis integrerrimis; cupulis hemisphaericis echinatis. Q. Cerris Borkh. du Roi t. 5. f. 1. *In Europa austr.* Ȑ.

111. *Q. Cerris* L. fol. oblongis utrinque attenuatis pinnatifido-sinuatis subtus pubescentibus laciniis lanceolatis subdentatis; stipulis filiformibus elongatis ramentaceis linearis-subulatis. Du Roi t. 5. f. 1. Plenk. ic. t. 669. Duham. nov. ed. 7. t. 57. Q. Tournefortii Willd. *In Europ. austr. et Asia min.* Ȑ.

112. *Q. macrocarpa* Michx. t. 2, 3. fol. oblongis profunde sinuatis subtus ad venas pilosis, lobis oblongis superioribus elongatis apice subhilibis; cupulae squamis patulis; glande ovata turgida. *In Am. bor.* Ȑ.

113. *Q. olivaeformis* Michx. fol. oblongis glabris subtus glaucis profunde inaequaliter sinuato-pinnatifidis; cupula superne crinita, glande ovali. *In Am. bor.* Ȑ.

114. *Q. lyrata* Willd. fol. oblongis glabris sinuato-lyratis apice dilatatis, lobis oblongis acutis superioribus angulato-truncatis; cupula depresso-globosa tuberculata-muricata. Michx. t. 4. Q. lobata Nee. *In Am. bor.* Ȑ.

115. *Q. stellata* Wangenh. am. t. 16. fol. oblongis sinuatis subtus pubescentibus; lobis obtusis, superioribus dilatatis bilobis; cupula hemisphaerica, glande ovali. Q. obtusifolia Michx. t. 1. *In Am. bor.* Ȑ.

116. *Q. alba* L. fol. oblongis pinnatifido-sinuatis subtus pubescentibus,

lobis linearis-lanceolatis obtusis integrerrimis basi attenuatis; fructibus pedunculatis; cupula tuberculata planiuscula. Du Roi t. 5. f. 1. Michx. t. 5. *In Am. bor.* Ȑ.

117. *Q. Robur* Willd. fol. petiolatis oblongis glabris sinuatis, lobis rotundatis; fructibus oblongis sessilibus. E. B. t. 1312. Schk. t. 301. Hayne VI. t. 35. Guimp. t. 139. Duham. VII. t. 52. *In Europa.* Ȑ.

118. *Q. pedunculata* W. fol. sessilibus oblongis glabris sinuatis, lobis rotundatis; fructibus oblongis pedunculatis. Schk. t. 301. f. a. Kern. t. 9. Hayne VI. t. 36. Guimp. t. 140. Q. feminea Roth. Q. Robur β. L. *In Europa.* Ȑ.

119. *Q. apennina* Lam. fol. petiolatis oblongis sinuatis subtus villosis lobis abbreviatis rotundatis; fructibus pedunculatis spicatis. *In Gallia Italia et Alsacia.* Ȑ.

120. *Q. saginae* Lam. fol. petiolatis inaequaliter subcordatis obovato-oblongis sinuatis subtus villosis, lobis obtusis angulatis; fructibus subsessilibus tomentosis asperis. Q. pubescens W. Guimp. t. 141. *In Europa.* Ȑ.

121. *Q. iberica* Stev. fol. petiolatis obovato-oblongis subtus pubescentibus sinuatis; lobis brevibus obtusis subemarginatis; fructibus subsessilibus; cupulae villosae squamis mucronatis incumbentibus. *In Caucaso.* Ȑ.

122. *Q. Toza* Bosc. fol. petiolatis subcordato-oblongis sinuato-pinnatifidis subtus villosa-tomentosis; fructibus pedunculatis; squamis cupulae obtusis incumbentibus. Q. Tauzin Pers. Q. pyrenaica Willd. *In Europa austr.* Ȑ.

123. *Q. Douglassii* Hook. et Arn. fol. membranaceis oblongo-ovalibus basi acutis petiolatis sinuato-pinnatifidis subtus puberulis, lobis acutiscutulis, petiolis fulvo-pubescentibus; fructibus sessilibus; cupula dense squamosa; glande ovata cupula 3-plo longiore. *In California.* Ȑ.

4893. LITHOCARPA Blume. (1825).

1. *L. javensis* Blume fl. jav. t. 20. *In Java.* Ȑ. Arbor. valida, fol. alternis oblongis utrinque acuminatis integrerrimis glaberrimis.

2. *L. cantoniensis* D. (Synaedrys Lindl. introd. 1836.) *In China.* ♂.
Nux in foro cantoniensi venalis ossea maxima cupula subimmersa medio sub-tomentosa.

4894. PLATANUS Tournef. (1700).

1. *P. orientalis* L. fol. trilobopalmatis basi cuneatis, lacinii lanceolatis sinuatis; stipulis subintegerimis. Wats. dendr. t. 101. *In Oriente.* ♂.

2. *P. occidentalis* L. fol. basi cuneatis 5-angularibus obsolete lobatis dentatis subtus pubescentibus, stipulis denticulatis. Wats. dendr. t. 100. Catesb. t. 56. Schk. t. 306. *In Am. bor.* ♂.

3. *P. cuneata* Willd. fol. 3—5-lobis basi cuneatis glabris; stipulis bilobis. *In Oriente.* ♂.

4. *P. acerifolia* Willd. fol. cordatis 5-lobis remote dentatis basi truncatis. *In Oriente.* ♂.

5. *P. mexicana* Moricand. pl. am. t. 13. *In Mexico.* ♂.

4895. JUGLANS L. (1747).

1. *J. Regia* L. fol. sub-4-jugis oblongis aequalibus subserratis glabris; fructibus globosis. Schk. t. 302. Kern. t. 10. *In Asia min. Oriente et Europa austr.* ♂.

2. *J. nigra* L. fol. sub-7-jugis basi inaequalibus lanceolatis serratis subtus petiolisque subpubescentibus; fructibus globosis punctato-scabris. Wats. dendr. t. 56. Jacq. ic. t. 191. *In Am. bor.* ♂.

3. *J. cinerea* L. fol. sub-6-jugis ovato-lanceolatis serratis subtus petiolisque viscosis villosis; fructibus ovato-oblongis. Jacq. ic. t. 192. *J. cathartica* Michx. *In Am. bor.* ♂.

4. *J. fraxinifolia* Lam. fol. sub-6-jugis oblique ovato-oblongis acuminate subsessilibus argute serratis glabris. *In Louisiana.* ♂.

5. *J. baccata* L. fol. longe petiolatis oblongis obtusis basi attenuatis integrerrimis supra glabris subtus subpubescentibus; fructibus baccatis. Sloane hist. t. 157. f. 1. *In Jamaica.* ♂.

4896. PTEROCARYA C. A. Mey. (1830).

1. *P. caucasica* C. A. Mey. P. fraxinifolia Spach. Juglans pterocarpa Michx. *In Caucaso.* ♂. Arbor fol. alternis impari-pinnatis epunctatis, spicis simplicibus, masculis densis, feminine elongatis pendulis, floribus parvis.

4897. ENGELHARDTIA Lechen. (1822).

1. *E. rigida* Blume fl. jav. t. 3. fol. abrupte pinnatis sub-4-jugis; foliolis rigidis ellipticis obtusis margine recurvis basi oblique attenuatis; amentis dioecis ramosis brevibus. *In Java.* ♂.

2. *E. spicata* Lechen. fol. abrupte pinnatis sub-5-jugis; foliolis submembranaceis oblongis obtuse acuminatis basi oblique attenuatis; amentis monoecis paniculatis longissimis; squamis masc. 8—13-andris. Blume fl. jav. t. 1 et 5. *In Ind. or.*

3. *E. serrata* Blume fl. jav. t. 4 et 5. *In Java.* ♂.

4. *E. acerifolia* Blume fl. jav. t. 2 et 5 b. Rumph. 2. t. 169. *In Java.* ♂.

5. *E. Wallichiana* Lindl. in Wall. cat. *In Ind. or.* ♂.

6. *E. Roxburghiana* Lindl. in Wall. *In Ind. or.* ♂.

7. *E. Colebrockiana* Lindl. in Wall. *In Ind. or.* ♂.

8. *E. selanica* Blume fl. jav. t. *In Java.* ♂.

4898. HEDYOSMON Sw. (1800).

1. *H. nutans* Sw. frutescens; ramis laxis; fol. lanceolatis acuminatis; petiolis brevibus basi, stipulis retusis ciliatis connatis. *In Jamaica.* ♂.

2. *H. racemosum* G. Don; fol. oblongis serratis breve acuminatis; pedunculus feminine geminis racemosis flexuosis. Tafalla Ruiz et Pav. *In Peruvia.* ♂.

3. *H. arborescens* Sw. ramis strictis erectis; fol. ovato-lanceolatis; vaginis petiolis cucullatis bidentatis; amentis masculis oblongis geminis, feminine racemosis 3-partitis. *In Ind. occ.* ♂.

4. *H. hirsutum* H. et Kunth; vaginis foliisque oblongis serratis subtus hirsutis. *In Nor. Granata.* ♂.

5. *H. glabratum* H. et Kunth nov. gen. t. 635. fol. oblongis lanceolatis serratis asperis; amentis strobilisque ternis. *In Peruria.* ♂.

6. *H. Bonplandianum* H. et Kunth l. c. t. 634—635. fol. oblongis acuminate glabris serratis; pedunc. masc. geminis 3-spicatis. Tafalla glauca R. et P. *In Peruria.* ♂.

4899. THELYGONUM L. (1747).

1. *T. Cynocrambe* L. Lam. ill. t. 777. Gaertn. 75. Schk. t. 299. *In Europa et Ind. or.* ♂. Herba spithamea decumbens. Folia petiolata ova-to-rhombea argute denticulata crassiuscula. Flores axillares parvi albi.

4900. CERATOPHYLLUM L. (1747).

1. *C. demersum* L. fol. dense 2—3-dichotomis rigentibus; fructus stylo longissimo demum uncinato, spinis teretiusculis subulatis deflexis. E. B. t. 947. Gaertn. t. 44. Cham. in Linnaea 2. t. 5. f. 6. b. *In Europa.* ♂.

2. *C. submersum* L. fol. 2—3-dichotomis; fructibus omnino inermibus stylo breve apiculatis. E. B. t. 679. *C. muticum* Cham. l. c. t. 4. f. A. B. *In stagnis Europae.* ♀.

3. *C. apiculatum* Cham. l. c. t. 5. f. 6. c. fol. quater dichotomis; fructu elliptico compresso mucrone debili apiculato basi utrinque gibboso. *C. demersum* Schk. t. 297. *In stagnis Europae.* ♂.

4. *C. platyacanthum* Cham. l. c. t. 5. f. 6. a. fructu ovoideo alato, ala in stylum subulatum demum longissimum uncinatum spinasque complanatas decurrente auriculata faciebus convexis gibbis subcarinatis. *In stagnis Europae.* ♂.

5. *C. muricatum* Cham. l. c. t. 5. f. 6. e. fructu elliptico subcompresso 3—4-spinoso, alato non gibbo; ala regulari multidentato, faciebus convexis submuricatis. *In Aegypto et Ind. or.* ♂.

6. *C. tuberculatum* Cham. l. c. t. 5. f. 6. d. fructu elliptico subcompresso

non gibboso trispinoso non alato, spinis strictis; faciebus fructus convexis tenuiter tuberculatis. *C. indicum* Willd. *In Ind. or.* ♂.

7. *C. Missionis* Wall. fructu ellip-tico subcompresso non gibboso 3-spino-so alato, spinis elongatis, ala superne latiore ad basin spinae decur-rante dentibus paucis irregularibus; faciebus fructus convexis tenuiter tu-berculatis. *C. demersum* hb. Klein. *In Ind. or.* ♂.

8. *C. cristatum* Guill. et Perrott. fol. laevibus aut apice obsolete et ra-rissime denticulatis; nuce basi bispi-nosa compressa margine alata longe mucronata. *C. muricatum* Cham?. *In Prom. viridi.* ♂.

4901. SAGITTARIA L. (1747).

a. *Folia sagittata v. hastata.*

1. *S. sagittifolia* L. fol. profunde sagittatis acutis lobis basilaribus acumi-natis rectis; scapo simplici. E. B. t. 84. Fl. dan. t. 172. Redoute t. 279, 280. *In Europa Siberia et Am. bor.* ♀.

2. *S. obtusa* Mühlb. fol. dilatato-ovatis rotundato-obtusis mucronatis sagittatis, lobis approximatis oblongis oblique acuminatis rectis; scapo simplici; floribus dioecis; bracteis ovatis acutis. *In Am. bor.* ♀.

3. *S. monteridensis* Cham. et Schl. fol. sagittatis margine nervis venisque subtus asperis; antheris linearibus flaviis; filamentis longioribus subulatis hirtis. *In Monterideo.* ♀. Flores lutei?

4. *S. chilensis* Cham. et Schlecht. fol. hastatis margine asperis; antheris linearibus flaviis; filamentis brevibus latis glabris. *In Chili.* ♀. Flores flavi.

5. *S. hastata* Don; fol. lanceola-tis acuminatis hastatis lobis divaricatis patulis; scapo dichotomo multifloro fol. breviore; pedunculis 3-nis. *In Nepatia.* ♀.

6. *S. chinensis* Sims B. M. t. 1631. fol. profunde sagittatis acutis, lobis basilaribus terminali aequalibus ovatis acutis divaricatis; scapo ramoso polygono. *S. sagittifolia* Lour. *In Co-chinchina.* ♀. Flores albi.

7. *S. obtusifolia* L. fol. rotundato-obtusis sagittatis, lobis ovatis acumi-

natis patentibus; scapo paniculato. Rheede mal. 11. t. 45. Pluku. t. 200. f. 7. In Ind. or. 2.

8. *S. heterophylla* Pursh; fol. simplicibus linearibus lanceolatis utrinque acutis seu ellipticis acutis basi obtusis sagittatis, lobis divaricatis linearibus; scapo simplici paucifloro; floribus monoecis, femineis sessilibus; bracteis ovatis acuminatis. In Am. bor. 2.

9. *S. hirundinacea* Blume; fol. saggittato-ovatis v. acuminatis glabris Iaciniis baseos elongatis acuminatissimis distantibus; scapo inferne subramoso. In Java. 2.

10. *S. Blumei* Kunth; fol. radicibus linearibus reliquis sagittato-ovatis obtusissimis glabris Iaciniis baseos rectis obtusiusculis; scapo simplici subumbellato-trifloro. *S. pusilla* Blume. In Java. 2.

b. Folia basi acuta v. angustata.

11. *S. angustifolia* Lindl. B. R. t. 1141. fol. lanceolatis vix costive- niis; scapo gracili subramoso; pedunculis filiformibus subaequalibus petalis multo longioribus; bracteis ovatis acuminatis. In Essequibo. 2.

12. *S. lancifolia* L. fol. longissime petiolatis oblongis acutis basi angustatis penninerviis; scapo erecto inferne ramoso; floribus ternis longe pedicellatis speciosis. Plum. ic. t. 116. f. 1. In Antillis. 2. Radix crassissima.

13. *S. falcata* Pursh; fol. late lanceolatis inferne angustatis; scapo subramoso; seminibus planis falcatis rostratis. *S. lancifolia* Michx. In Am. bor. 2.

14. *S. Sellowiana* Kunth; fol. longissime petiolatis oblongo-lanceolatis acutis basi angustatis penninerviis glabris exterioribus minoribus anguste lanceolatis; scapis erectis ramosis; floribus ternis pedicellatis. *S. acutifolia* Willd. In Brasilia. 2.

15. *S. rhombifolia* Cham. et Schlecht. fol. multinerviis nervoso-marginatis exterioribus submersis linearibus obtusis acuminulatis, emersis rhombo-ellipticis acuminatis; scapo simplici multifloro; pedunculis masculis filiformibus; antheris linearibus flavis. In Brasilia. 2.

16. *S. alpina* Willd. fol. natantibus oblongis v. linearis-oblongis basi rotundatis v. subcordatis; scapo simplici. *S. natans* Pall. it. 3. t. 5. f. 3. In Daruria. 2.

17. *S. rigida* Pursh. fol. anguste lanceolatis inferne carinatis rigidis utrinque acuminatissimis; scapo ramoso; floribus monoecis. *S. bulbosa* Donn. In Am. bor. 2.

18. *S. graminea* Michx. fol. linearibus longissimis trinervibus; scapo simplici paucifloro; floribus monoecis; bracteis oblongis obtusis. In Am. bor. 2.

19. *S. simplex* Pursh; fol. linearilanceolatis acutis inferne angustatis; scapo simplici multifloro; floribus dioecis; bracteis calycibusque rotundatis obtusis. In Am. bor. 2.

20. *S. Purshii* Kunth; fol. subulatis basi vaginantibus convexis; scapo simplici paucifloro; floribus monoecis; bracteis dilatatis acuminatis. *S. acutifolia* Pursh. In Am. bor. 2.

21. *S. acutifolia* L. fol. subulatis basi vaginantibus margine acutis compresso-cuspidatis. In Surinamo. 2.

22. *S. pusilla* Nutt. fol. linearibus obtusis brevibus summitatibus foliacels; scapo simplici foliis breviore; floribus monoecis paucis, fertili deflexo; staminibus plerumque 7. In Am. bor. 2.

23. *S. natans* Michx. fol. natantibus elliptico-lanceolatis obtusis trinervibus basi attenuatis infimis subcordatis; scapo simplici paucifloro; pedunculis inferioribus elongatis. In Carolina. 2.

c. Folia profunde cordata.

24. *S. cordifolia* Roxb. fol. longissime petiolatis ovatis profunde cordatis, lobis basilaribus acutiusculis patolis; scapo simplici longissimo; floribus terno-verticillatis 9—12-andris; carpidiis margine arguto dentato cinctis, utroque latere linea prominente notatis. Prope Calcuttam. 2.

25. *S. gujanensis* H. et K. fol. nuntantibus longissime petiolatis ovato-subrotundis profunde cordatis obtusis lobis acutis; floribus verticillatis hermaproditis 9—11-andris; carpidiis margine dentato cinctis utroque latere muricato-echinatis. In Guiana. 2.

26. *S. echinocarpa* Mart. amoena. 6. t. 3. fol. ovato-sagittatis, lobis

ovatis obtusis dente terminatis; scapo simplici; floribus hermaphroditis racemosis; carpellis muricatis. *In Brasilia.* 2.

27. S. tapputa Dou; fol. cordato-ovalis obtusis, lobis acutis rectis pagina brevioribus; scapo fol. breviore. *In Nepalia.* 2.

4902. MITHRIDATEA Commers. (1788).

1. M. quadrifida Willd. Ambora Tambourissa Lam. ill. t. 784. *In Madagascar.* 2. Arbor fol. oppositis oblongis obtusis integerrimis; racemis axillaribus.

4903. GARCIA Vahl. (1794).

1. G. nutans Vahl. *In ins. Marthae, ad fl. Magdal. Guadelupa.* 2. Arbor fol. alternis petiolatis elliptico-oblongis acutis integerrimis glabris pedunculis nutantibus racemosis villosis.

4904. EUPHORIA L. (1747).

1. Fruticosae.

A. Aculeatae.

a. Aphyllae.

1. E. Antiquorum L. 3—4-angulatis ramosa; ramis patentibus; marginibus angulorum sinuato-aculeatis. Rheede 2. t. 42. Commel. h. t. 12. Blackw. t. 330. *In Aegypt. et Ind. or.* 2. 6—12-ped.

2. E. canariensis L. ramosa 4-angularis; aculeis geminis uncinatis; floribus subsessilibus. Commel. h. t. 104. DC. pl. grass. t. 140. Blackw. t. 340. Düss. 8. t. 19, 20. *In ins. Canariis.* 2. 6—8-ped.

3. E. officinarum L. multangularis; aculeis gemini arcuatis; floribus solitariis subsessilibus. Commel. h. t. 11. Sabb. t. 50. DC. pl. gr. t. 77. Desc. 6. t. 420. Blackw. t. 340. Plenk. t. 365. Düss. 2. t. 15. *In Africa.* 2. Frut. 3—4-ped.

4. E. trigona Haw. triangularis ramosa; ramis erectis subcanaliculatis. E. Antiquorum β. L. *In Ind. or.* 2.

5. E. uncinata DC. pl. gr. ic. aculeata nuda apice incurvo-uncinata subcompressa hinc concava inde convexa; aculeis geminis divergentibus. *In Madera.* 2.

6. E. heptagona L. 7- angularis ramosa; angulis rotundatis; spinis solitariis patentibus elongatis apice floriferis. Boerh. Lugdb. t. 258. Bradl. succ. 4. t. 13. *In Afr. austr.* 2.

7. E. enneagona Haw. sub-9-angularis, angulis repandis erosio-dentatis; ramulis pendulis; aculeis solitariis patulis floriferis. E. erosa W. suppl. *In P. b. S.* 2.

8. E. odontophylla W. suppl. 7—10-angularis; angulis dentatis; dentibus apice foliatis; aculeis rectis solitariis in sinus dentium. *In P. b. S.* 2.

9. E. mammillaris L. aculeata subnuda; angulis tuberculatis spinis interstinctis; tuberculis junioribus fol. instructis. Commel. prael. t. 9. *In Aethiopia.* 2.

10. E. virosa Willd. aculeata nuda multangularis; aculeis geminis subulatis; flore pedunculato. Paters. it. t. 9, 10. *In P. b. S.* 2.

11. E. polygona Haw. sub-10-gona simplex; aculeis solitariis patulis floriferis. *In Afr. austr.* 2.

12. E. triaculeata Forsk. caule tereti sulcato; aculeis ternis; floribus sessilibus. *In Arabia.* 2.

13. E. stellata Willd. teres flexuosa duplice serie tuberculata, tuberculis biaculeatis. Vaill. it. t. 11. *In Afr. aust.* 2.

14. E. cucumerina W. elliptica obtusa sulcata; aculeis subsolitariis; pedunc. sub-3-floris. Vall. it. t. 5. *In P. b. S.* 2.

15. E. cereiformis L. multangularis; spinis solitariis nudis; floribus terminalibus congestis. Burm. afr. t. 9. f. 3. Plukn. t. 231. f. 1. *In P. b. S.* 2.

b. Superne foliatae.

16. E. nereifolia L. sub-5-angularis; angulis subspiratim tortis; aculeis stipularibus geminis; fol. terminalibus oblongis planis. DC. pl. gr. 46. E. Ligularia Roxb. Seb. thes. t. 9. f. 1. *In Ind. or.* 2.

17. E. Niculia Hamilt. ramis teretibus seminudis; spinis stipularibus geminis spiralibus; fol. terminalibus

lingulatis mucronatis carinatis. Rheede
l. c. t. 43. E. nereifolia Roxb. In
Ind. or. ♂.

18. E. varians Haw. teretiuscula
subangustata; angulis oblique tuber-
culatis; aculeis geminis; fol. oblongis.
In Ind. or. ♂.

19. E. grandifolia Haw. teres
simplex; aculeis geminis horizontali-
bus basi late confluentibus; fol. maxi-
mis obovato-oblongis carinatis. *In Afr.* ♂.

20. E. Hystrix Jacq. h. Schoenb.
t. 207. caule squamoso basi spinis sol-
itariis muricato; pedunculus demum
spinescentibus; fol. lanceolato-lineari-
bus. E. loricata Lam. Plukn. t.
230. f. 5. *In Africa.* ♂.

21. E. tribuloides Lam. humilla-
ma basi diphylla aculeata 4-angula-
ris; aculeis geminis patentibus. *In ins.* *Canarii.* ♂.

22. E. pentagona Royle ill. t. 82.
f. 1. ramosa; ramis 5-angularibus ad-
scendentibus angulis acutis prominenti-
bus marginibus undulatis aculeatis;
aculeis geminis subulatis. *In Ind.*
or. ♂.

B. Inermes.

a. Aphyllae.

23. E. aphylla Brouss. nuda ra-
mosa; ramis 4-gonis; floribus terminali-
bus. *In Teneriffa.* ♂.

24. E. Caput medusae L. crassi-
sima; ramis depressis v. adscen-
denteribus tuberculatis, tuberculis sub-
4-gonis junioribus folio linearis instructis;
appendiculis involuci palmatis.
Commel. h. t. 17. *In Africa.* ♂.

25. E. globosa Sims. B. M. t. 2624.
erecta articulata, articulis obovatis
tuberculatis; flore solitario terminali;
appendiculis involuci palmatis. *In Afr.* ♂.

26. E. Commelynii DC. crassa;
ramis erectis tuberculatis; tuberculis
junioribus folio linearis instructis; ap-
pendiculis involuci digitatis ciliatis.
In Afr. austr. ♂.

27. E. tuberculata Jacq. h. Schoenbr.
t. 208. imbricata; tuberculis patentissi-
mis compressis acutis, junioribus foli-
olo linearis instructis; floribus longe-
pedunculatis; appendiculis involuci
palmatis. *In P. b. S.* ♂.

28. E. Anacantha L. imbricata;
tuberculis foliolo subrotundo instructis;
floribus terminalibus solitariis sessili-
bus; petalis palmatis Burm. afr. t.
7. f. 2. DC. pl. gr. ic. 17. *In P. b. S.* ♂.

29. E. Ornithopus Jacq. imbricata;
tuberculis folio oblongo instructis; flo-
ribus terminalibus pedunculatis; ap-
pendiculis involuci 3-partitis. *In P.*
b. S. ♂.

30. E. clandestina Jacq. imbricata;
tuberculis folio cuneiformi in-
structis; flore sessili foliolis imbricatis
occulto; appendiculis involuci sub-
rotundis integerrimis. *In P. b. S.* ♂.

31. E. Clara Jacq. ic. t. 85. im-
bricata; ramis clavatis; tuberculis
adpressis folio spatulato-lineari in-
structis; floribus pedunculatis; appen-
dicalis involuci integerrimis. *In P.*
b. S. ♂.

32. E. bupleurifolia Jacq. h.
Schoenbr. t. 106. capitata imbricata;
tuberculis subrhomboidis; fol. lanceolatis
petiolatis; pedunculus 1-floris; petalis
integerrimis; bracteis flore longioribus.
B. Mag. t. 3476. *In P. b. S.* ♂.

33. E. meloniformis Ait. subglo-
bosa multangularis; cymis peduncu-
latis bracteatis; appendiculis involuci
integerrimis. *In P. b. S.* ♂.

34. E. linearifolia W. ramosa;
foliosa; fol. sparsis lanceolatis mu-
cronatis; floribus terminalibus sessili-
bus; appendiculis involuci subrotundi-
s integerrimis; capsulis muricatis.
E. linifolia Jacq. ic. t. 86. *In P.*
b. S. ♂.

35. E. Latazi H. et K. arborea;
fol. sparsis confertis obovato-lanceo-
latis acutiusculis basi angustatis inte-
gerrimis pubescentibus subtus canes-
centibus; pedunc. axillaris 1-floris.
Prope Popaya. ♂.

36. E. trichotoma H. et K. fru-
ticulosa inermis inferne 2—3-chotoma
glabra; fol. sparsis approximatis ses-
silibus obovato-lanceolatis apice crenu-
latis glauco-viridibus; floribus axil-
laribus solitariis sessilibus. *In ins.*
Cuba. ♂.

37. E. furcellata H. et K. fruti-
culosa caespitosa glabra; caulinis
apice umbellato-3—4-fidis, ramis flo-
ralibus dichotomis; fol. sparsis sessili-
bus lanceolatis apice obsolete crenu-
latis glabris, dentibus involuci ma-
joribus lunate-furcellatis. *In Nov.*
Hispania. ♂.

38. *E. petiolaris* Sims. B. M. ramis nodosis; petiolis verticillatis elongatis; fol. orbiculatis. *In Ind. occ.* ♀.

39. *E. articulata* Lam. ramis dichotomis articulatis; fol. oppositis linearibus subcarnosis; floribus terminalibus pedunculatis subsolitariis nutantibus. *In ins. Caribaeis.* ♀.

40. *E. myrtifolia* L. ramis dichotomis; fol. subrotundis emarginatis integrerrimis subtus incurvis; floribus solitariis. *In Jamaica.* ♀.

41. *E. topogona* Lam. simplicissima superne pentagona; angulis spiratim tortis membranaceis laciniatis; fol. terminalibus spatulatis; pedunculis aggregatis bracteatis. *In Madagascar.* ♀.

42. *E. bracteata* Jacq. ramis teretibus; fol. terminalibus distichis oblongis obtusis; pedunculis subumbellatis bracteatis. *Patria?* ♀.

43. *E. mauritanica* L. ramulis teretibus; fol. alternis lanceolatis acutis glaucis; pedunculis terminalibus aggregatis; involucro crenulato. Dill. elth. f. 373. *In Mauritania.* ♀.

44. *E. obtusifolia* Poir. ramis teretibus cinereis; fol. sparsis linearibus obtusis; pedunculis terminalibus aggregatis elongatis; involucro truncato-obcordato. *E. mauritanica* Lam. *E. virgata* Pers. *In Mauritania.* ♀.

45. *E. piscatoria* Ait. ramis teretibus; fol. linear-lanceolatis; pedunculis terminalibus aggregatis; involucris integrerrimis bracteatis. *In ins. Can.* ♀.

46. *E. batsamifera* Ait. ramis teretibus strictis; fol. lanceolatis glaucis; floribus fasciculato-capitatis. *In ins. Canariis.* ♀.

47. *E. Tirucalli* L. ramis filiformibus divaricatis; fol. linear-lanceolatis; pedunculis terminalibus aggregatis. Rheede 2. t. 44. Rumph 7. t. 29. Comm. hort. 1. t. 14. *In Ind. or.* ♀.

48. *E. laurifolia* Lam. ramis teretibus; fol. oblongis breve petiolatis; pedunculi axillaris 3-floris; involucro obtuso bracteato. *In Peruvia.* ♀.

49. *E. pyrifolia* Lam. ramis teretibus; fol. oblongis apice setaceo-mucronatis laevibus; pedunculis aggregatis sub-1-floris bracteatis. *In ins. Mascar.* ♀.

50. *E. cotinifolia* L. petiolis oppositis elongatis; fol. subcordato-or-

biculatis emarginatis; pedunc. aggregatis bracteatis; involucro integerrimo. Comm. h. t. 15. *In Surinamo.* ♀.

51. *E. verticillata* Desf. petiolis verticillatis elongatis; fol. reniformibus bilobis; pedunc. aggregatis; involucris denticulatis. *In ins. Caribaeis.* ♀.

52. *E. nudiflora* Jacq. ic. t. 479. ramis strictis subdichotomis; fol. petiolatis ovatis oppositis integrerrimis; pedunc. aggregatis axillaris; involucro crenulato; germine longe stipitato deflexo. *In Jamaica.* ♀.

53. *E. mellifera* Ait. fol. sessilibus sparsis lanceolatis acutis laevibus; pedunc. corymbosis; involucris integrerrimis; caps. verrucosis. *In Madera.* ♀.

54. *E. biglandulosa* W. ramis oppositis teretibus; fol. exiguis sessilibus orbiculatis basi biglandulosis; pedunc. aggregatis. *Patria?* ♀.

55. *E. glabrata* Vahl; ramis dichotomis teretibus; fol. parvis oppositis subsessilibus cordato-oblongis acutis glaucis laevibus; stipulis persistentibus; pedunc. terminalibus aggregatis. *E. buxifolia* Lam. *E. littoralis* H. et K. Plun. cat. t. 4. f. 2. Plun. t. 279. f. 7. *In Jamaica et Cuba.* ♀.

56. *E. cestrifolia* H. et K. fruticosa; fol. alternis lanceolato-oblongis acutis basi angustatis integrerrimis glabris; pedunc. axillaris 3—6-floris. *In Peruvia.* ♀.

57. *E. calyculata* H. et K. arborescens; fol. sparsis confertis lanceolatis obtusis basi angustatis integrerrimis glabris; pedunc. terminalibus solitariis v. geminis dichotomis. *In Nov. Hispania.* ♀.

58. *E. cuneata* Vahl; fol. obovatis integrerrimis glabris; pedunc. lateribus 3-floris; capsula villosa subsessili. *In Arabia.* ♀.

59. *E. spinosa* L. ramis spinescentibus; fol. confertis lanceolatis; floribus aggregatis bracteatis. Fl. graec. t. 463. *E. linifolia* Jacq. ic. t. 86. *In Carniolia, Graecia.* ♀.

60. *E. linifolia* Vahl; suffruticosa; fol. infimis oppositis ovalibus superioribus alternis linearibus; pedunc. terminalibus aggregatis; capsula laevissima. *In Hispaniola.* ♀.

61. *E. gotiana* Lam. ramosissima; ramis articulatis fragilibus; fol. ter-

minalibus oppositis semiovalibus obsolete crenulatis glabris; floribus fasciculatis monoecis. In ins. Mascar. ♂.

62. *E. rotundifolia* H. et Ar. suffruticosa diffusa; fol. oppositis rotundatis emarginatis basi breviter cordatis integerrimis carnosulis glabris subtus pallidis; stipulis interpetiolaribus; floribus paucis terminalibus umbellatis. In *Conception*. ♂.

63. *E. myrtifolia* H. et Ar. caule suffruticoso ramoso; fol. late ovatis oppositis acutis obsolete serratis membranaceis glabris; pedicellis axillaris brevibus divisis paucifloris; involuci glandulis rotundatis integerrimis. In ins. *Sandwicens*. ♂.

64. *E. clusiaeifolia* H. et Ar. caule inermi suffruticoso ramoso; fol. oppositis oblongo-ellipticis obtusis integerrimis coriaceis glabris subtus aeniis; pedunc. axillaris bifidis. In ins. *Sandwicens*. ♂.

65. *E. multiflora* Gaudich.; suffruticosa ramosa; fol. oppositis ellipticis obtusis integerrimis membranaceis glabris subtus pallidis purpureo-venosis; floribus axillaris terminalibus que solitariis sessilibus; involuci glandulis rotundatis integerrimis. In ins. *Sandwicens*. ♂.

66. *E. semiperfoliata* Viv. suffruticosa; fol. ovato-oblongis integerrimis subtus villosis; involucris conformibus; umbella sub-4-fida bifida; involucellis orbiculato-reniformibus semiperfoliatis; petalis corniculatis; caps. laevibus. In *Corsica*. ♂.

67. *E. nana* Royle ill. t. 82. f. 2. caule ex rhizomate assurgente brevissimo dichotomo paucifloro; ramis simplicibus 1-floris basi bisquamosis; floribus solitariis terminalibus; fol. post florescentiam apice rhizomatis aggregatis magnis ovato-oblongis crassis. In *Ind. or.* ♂.

68. *E. humilis* Royle t. 82. f. 3. ramis 3—4 tenuiis dichotomis rhizomatis apice assurgentibus aphyllis sed ex dichotomia squamis 2 membranaceis acutis munitis; floribus solitariis terminalibus; involucro 5-fido, segmentis glandulosis squamis fimbriatis alternantibus; fol. rosulatis oblongis acutis basi attenuatis sessilibus. In *Himalaya*. ♂.

69. *E. laeta* Ait. pedunculis umbellatis his dichotomis, bracteis subrotundis; appendiculis involuci emar-

ginatis; fol. sparsis linearis lanceolatis subemarginatis. E. *divaricata* Jacq. ic. t. 84. Patria? ♂.

70. *E. genistoides* L. umbella 5-fida radiis bifidis; bracteis ovato-rhombeis; appendiculis involuci lunato-truncatis; fol. linearibus erectis; superioribus latioribus cartilagineo-crenulatis. E. *spartioides* Jacq.

71. *E. imbricata* Vahl; umbellis lateralibus terminalibusque 2—3-fidis radiis bifidis; fol. bracteisque ovatis mucronatis serrulatis; ramis diffusis. E. *pulchella* Brouss. E. *avenia* Pers. In *Lusitania et Mauritania*. ♂.

72. *E. portlandica* L. umbella 5-radiata dichotoma; fol. patentibus ob-ovatis acutis glabris glaucis; involucellis subcordato-rotundis concavis; capsula angulis scabra. E. B. t. 441. E. *cougesta* W. en. In *Europa*. ♂.

73. *E. glauca* Forst. umbella sub-5-fida radiis 3-fidis; bracteis ovatis; fol. sparsis oblongo-lanceolatis integerrimis. In *Nov. Zeelandia*. ♂.

74. *E. punicea* Sw. umbella sub-5-fida, radiis 3-fidis; bracteis splendide puniceis oblongis acutis; appendiculis involuci cotoxyloides. Sm. ic. B. Reg. t. 190. In *Jamaica*. ♂.

75. *E. dendroides* L. umbella multifida dichotoma; bracteis subcordatis; involuco apice lanato; capsulis laevibus; fol. confertis, linear-lanceolatis mucronatis. Fl. graec. t. 470. E. *divaricata* Jacq. ic. t. 87. In *Italia Creta Sicilia*. ♂.

76. *E. atropurpurea* Brouss. umbella multifida radiis 4-fidis; bracteis linearibus subquaternis; involucris obtusis integerrimis basi connatis sanguineis; fol. congestis lanceolatis obtusiusculis. B. Mag. t. 3321. In *Teneriffa*. ♂.

77. *E. Characias* L. umbella multifida, radiis bifidis; bracteis subrotundis perfoliatis; appendiculis involuci emarginatis; fol. lanceolatis glaucis glabris v. pubescentibus. Jacq. vind. t. 188. E. *paralia* E. B. t. 195. In *Europa*. ♂.

2. Herbaceae

a. Flores solitarii.

78. *E. ocymoides* L. fol. subcordatis obtusis involucrisque integerrimi-

mis; floribus solitariis. *Anisophyllum* Haw. *In Nov. Hispania.* 2.

79. *E. taerigata* Vahl; ramis dichotomis; fol. oppositis ovato-oblongis obtusis mucronatis integerrimis; pedunc. axillaribus 1-floris; germinibus glabris longe stipitatis. *In Ind. or.* 2.

80. *E. tannensis* Spr. ramosa; fol. spatulato-lanceolatis obtusis mucronatis subrepandis; pedunc. axillaribus 1-floris; caps. glabris. *In ins. Tanna.* 2.

81. *E. fimbriata* Rehb. ramis dichotomis pilosis; fol. oppositis subcordato-ovatis obtusis argute serratis pellucido-punctatis subvilloso; involucro laciniato-fimbriato; capsulis villosis. *In Ind. or.* 2.

82. *E. maculata* L. ramis dichotomis glabris; fol. oppositis oblique cordato-oblongis obtusis apice serratis maculatis; floribus axillaribus; capsulis laevibus. *Pluken. t. 63. f. 8.* Jacq. vind. t. 186. *E. androsaemifolia* Presl. *In Italia Sicilia Am. bor.* 2.

83. *E. scordifolia* Jacq. ic. t. 476. ramis dichotomis superne pubescentibus; fol. oppositis obliquis oblongis obtusis crenulatis subvilloso; floribus axillaribus solitariis terminalibus aggregatis. *E. nutans* Lag. *In Hispaniola et Portorico.* 2.

84. *E. malachophylla* Clark. ramis dichotomis; fol. ovatis apice denticulatis mucronatis pilosis; pedunc. solitariis 1-floris; involucris laciniatis. *In Cypro.* 2.

85. *E. picta* Jacq. ic. t. 477. ramis dichotomis; fol. ovatis acutis petiolatis integerrimis glabriusculis; pedunc. axillaribus 1-floris; involucris subrotundis; capsulis glabris. *E. Humboldtii* Willd. *In Nov. Granata.* 2.

86. *E. hexagona* Nutt. ramis diffusis angulatis superne scabris; fol. oppositis linearibus petiolatis patentissimis; floribus axillaribus monoicis; bracteis linearibus flexuosis; capsulis glabris. *In Am. bor.* 2.

87. *E. Heyniana* Spr. ramis dichotomis; fol. oppositis oblique cordatis obtusis serratis glaberrimis; stipulis linearibus; floribus axillaribus subsolitariis; caps. laevibus. *E. microphylla* Roth. *In Ind. or.* 2.

88. *E. lanceolata* Hottl. dichotoma glabra; fol. lineari-lanceolatis subtrinerviis sessilibus glaucescentibus;

floribus subsessilibus; capsulis subverrucosis. *In Ind. or.* 2.

89. *E. angustifolia* Hamilt. caule erecto ramoso proliferu subvilloso; fol. sparsis linearibus obtusis glabris; floribus axillaribus subsessilibus; appendiculis involuci bicornibus. *In Nepal.* 2.

90. *E. parviflora* L. fol. oblongis obtusis glabris obsolete serratis submaculatis; pedunc. axillaribus 1-floris; involucris coloratis. *Burm. zeyl. t. 105. f. 2.* *In Ceylon.* 2.

91. *E. variegata* Sims. B. M. t. 1747. ramis dichotomis pilosis; fol. ovalibus integerrimis undulatis glabris superioribus marginatis; appendiculis involuci orbiculatis; caps. glabris. *In Louisiana.* 2.

92. *E. umbrosa* Bert. fol. longe petiolatis ternis oppositisque ovalis obtususculis integerrimis; floribus axillaribus pedunculatis exiguis monoecis; capsulis glabris. *In Hispaniola.* 2.

93. *E. adiantoides* Lam. ramis dichotomis; fol. longe petiolatis oppositis alternisque rhomboe-subrotundis setaceo-mucronatis; pedunc. capillaris 1-floris; capsulis pubescentibus. *In Peruria.* 2.

94. *E. sphaerorhiza* Benth. in Hook. ic. t. 346. glabra radice tuberosa sphærica; caule herbaceo erecto dichotomo; fol. linearibus integerrimis utrinque angustatis; involucris solitariis breviter pedicellatis; laciniis interioribus brevissimis fimbriatis; glandulis truncatis dorso in appendiculas ovatas fimbriatas coloratas productis. *In Mexico.* 2.

95. *E. portulacoides* L. fol. sessilibus, inferioribus ternis spatulatis obtusis glaucis; pedunculis axillaribus 1-floris; appendiculis involuci subrotundis. *In Chili.* 2.

96. *E. Ipecacuanha* L. ramis dichotomis; fol. oppositis lanceolatis; pedunculis elongatis 1-floris. *In Am. bor.* 2.

97. *E. linearis* Retz; ramis dichotomis; fol. brevissime petiolatis subcordato-linearibus elongatis mucronatis glabris integerrimis subtus albidis; pedunc. axillaribus 1-floris abbreviatis. *In Caribaeis.* 2.

98. *E. arenaria* H. et K. erecta; ramis 4-nis; floriferis dichotomis; fol. 4-nis oblongis utrinque obtusis integerrimis pubescentibus subtus canos-

centibus; floribus alaribus et terminalibus; bracteis elongatis albidis; involucri dentibus majoribus 4. *In Peruia.* 2.

99. *E. ariensis* H. et K. erecta ramis 4-nis, floriferis dichotomis; fol. 4-nis breve petiolatis elliptico-oblongis acutis basi rotundatis piloso-pubescentibus; floribus alaribus et terminalibus bracteatis, involucri dentibus majoribus 5. *In Nov. Hispania.* 2.

100. *E. pubentissima* Michx. fol. oppositis sessilibus subcordato-ovalibus obtusis; pedunc. capillaribus 1-floris; appendiculis involucri pubescentis coloratis petaloideis. *In Carolina.* 2.

101. *E. syriaca* Spr. ramis villosis; fol. petiolatis ovatis subcoriaceis nervosis mucronatis spinuloso-dentatis; floribus axillaribus solitariis; caps. lanatis. *Croton denticulatum* Geis. *In Syria.* 2.

102. *E. lanata* Sieb. ramis dichotomis lanatis; fol. petiolatis oppositis ovatis obtusiusculis mucronato-serrulatis villosis; capsulis sublunatis. *Ad Hierosolymam.* 2.

103. *E. Chamaesyce* L. floribus axillaribus solitariis; glandulis integris; seminibus transverse rugosis; fol. stipulatis oppositis petiolatis subrotundis leviter crenatis crenis muticis; caulinis prostratis ramosis. *In Europa austr.* ⊖.

104. *E. Peplis* L. caulinis prostratis ramosis foliisque glabris; fol. stipulatis oppositis petiolatis oblongis obtusis emarginatis; floribus axillaribus solitariis; appendiculis integris. *In Europa austr.* ⊖.

105. *E. polygonifolia* L. ramis dichotomis fol. petiolatis oppositis lanceolatis obtusis; floribus axillaribus solitariis. *In Am. bor.* ⊖.

106. *E. granulata* Forsk. ramis dichotomis; fol. oppositis obliquis oblongis obtusis pubescentibus integerimis; capsulis villosis. *In Arabia.* ⊖.

107. *E. coccinea* Roth; ramis dichotomis pilosis; fol. obliquis obovatis obtusis integerrimis coloratis subtus albidis; capsulis villosis. *In Ind. or.* 2.

108. *E. centunculoides* H. et K. diffusa procumbens; fol. oppositis suborbiculatis oblique subcordatis integerrimis junioribus obsolete crenulatis glabris; floribus axillaribus solita-

riis; involucri dentibus majoribus integris. *In Cuba.* 2.

109. *E. serpyllifolia* Pers. diffusa repens; fol. oppositis subrotundo ellipticis emarginatis basi rotundatis integerrimis glabris; floribus axillaribus solitariis; involucri dentibus majoribus obsolete trilobis. *E. serpens* H. et K. *In Cumana.* 2. |

110. *E. orbiculata* H. et K. diffusa subserpens; fol. oppositis suborbiculatis oblique cordatis obsolete mucronatis integerrimis glabris; floribus axillaribus solitariis; involucri dentibus majoribus subcrenatis. *Prope Santa Fe de Bogota.* 2.

111. *E. calitrichoides* H. et K. caulinis diffusus procumbentibus linea pubescente notatis; fol. oppositis subrotundo-ellipticis utrinque rotundatis basi obliquis argute serrulatis glabris. *In Nov. Hispania.* 2.

112. *E. tenella* H. et K. caespitosa diffusa prostrata; fol. oppositis ellipticis basi obliquis apicem versus denticulatis glabris; ramulis abbreviatis; floribus axillaribus. *Ad Orinocum.* 2.

113. *E. flexuosa* H. et K. procumbens ramis flexuosis; ramulis dichotomis; fol. oppositis oblongo-ellipticis obtusis submucronatis oblique cordatis apice denticulatis glabris glaucescentibus; floribus axillaribus et alaris. *In Cumana.* 2.

114. *E. ammannioides* H. et K. diffusa procumbens; fol. oppositis oblongis obtusis submucronatis basi oblique rotundatis subpeltoideis integerrimis glabris; floribus alaribus solitariis pedunculatis. *In Cumana.* 2.

115. *E. reniformis* Blume; fol. oppositis oxatis obtusis basi subcordatis oblique serrulatis caulinusque procombentibus dichotomis villosis; cymis dichotomis axillaribus. *In Jara.* 2.

b. Flores aggregati.

116. *E. heterophylla* L. fol. alternis petiolatis hirsutiussculis inferioribus ovatis repando-crenatis superioribus panduraeformibus, floralibus lanceolatis; floribus terminalibus fasciculatis. *In Am. austr.* 2.

117. *E. cyathophora* Jacq. ic. t. 480. fol. alternis petiolatis glabris, infimis ovatis, superioribus panduraeformibus; floralibus coloratis;

appendiculis involuci cotyloideis. In Ind. occ. 2.

118. *E. geniculata* Orteg. ramis dichotomis; fol. alternis ovato-oblongis acutis glabriusculis medio subserratis; floribus terminalibus aggregatis. *E. prunifolia* Jacq. ic. t. *E. frangulaefolia* H. et K. In Ind. occ. et Am. austr. 2.

119. *E. origanoides* L. simplex articulata; fol. subrotundo-ovatis obtusis trinerviis serrulatis glabris; floribus terminalibus paniculatis. In ins. Adscension. 2.

120. *E. scandens* H. et K. scandens ramis foliisque ternis longe petiolatis ellipticis obtusis basi rotundatis integerrimis glabris; paniculis terminalibus patentibus. In Nov. Hispan. 2.

121. *E. hirta* L. ramis villosis; fol. oppositis ovato-oblongis acutis serrulatis hirsutis; glomerulis florum axillaribus pedunculatis. Jacq. coll. suppl. t. 11. f. 1. Rumph 6. t. 23. f. 2. *E. tomentosa* Pers. In Ind. or. 2.

122. *E. graminea* L. ramis dichotomis; fol. oppositis lanceolatis integerrimis; pedunculis dichotomis; involucris dilatatis coloratis. In Nov. Granata. 2.

123. *E. hyssopifolia* L. ramis virgatis glabris; fol. oppositis petiolatis subcordato-linearibus elongatis obsolete serratis; pedunculis fasciculatis; capsulis laevibus. In Ind. occ. 2.

124. *E. dentata* Michx. pumila hirsuta; fol. oppositis ovalibus dentatis; floribus terminalibus congestis. In Am. bor. 2.

125. *E. graminifolia* Michx. ramosa pubescens; fol. sparsis linearibus integerrimis, supremis basi discoloribus. In Am. bor. 2.

126. *E. elegans* Spr. ramis dichotomis villosis; fol. oblique cordatis subrotundis obtusissimis serrulatis; spicis pedunculatis terminalibus; bracteis imbricatis ovatis villosis versicoloribus; appendiculis involuci roseis crenulatis. *E. variegata* Roth. In Ind. or. 2.

127. *E. cristata* Roth; ramis dichotomis villosis; fol. oblique cordatis subrotundis obtusissimis serrulatis; spicis pedunculatis terminalibus; bracteis densissimis imbricatis reticulatis villosis albidis; appendiculis involuci palmato-multiplidis. Ind. Ind. or. 2.

128. *E. Atoto* Forst. simpliciuscula glabra; fol. oppositis petiolatis ovatis obtusis integerrimis; floribus fasciculatis terminalibus. In ins. Societas. 2.

129. *E. hypericifolia* L. ramis patentibus foliisque oppositis obliquis oblongis obtusis subserratis glabris; floribus terminalibus paniculatis. *E. pulchellae* var. Kunth. In Am. austr. 2.

130. *E. pilulifera* L. ramis hirsutis; fol. obliquis oblongis acutis nervosis serrulatis; glomerulis florum axillaribus pedunculatis. Jacq. ic. t. 478. *E. capitata* Lam. *E. procumbens* DC. *globulifera* Kunth. In Ind. or. et occ. ♂.

131. *E. glaucocephala* Pers. ramis virgatis foliisque ellipticis obtusis mucronatis integerrimis glaucis glabermissis; floribus fasciculatis. *E. laevis* Poir. In Molucc. ♂.

132. *E. Berteriana* Balb. ramis pubescentibus strictis; fol. oblique cordatis ellipticis obtusis subserratis; floribus fasciculatis terminalibus. In Hispaniola et Guadelupa. ♂.

Procumbentes.

133. *E. prostrata* Ait. ramosissima prostrata glabra; fol. oppositis petiolatis ellipticis obtusis apice sub-serrulatis subitus glaucis; pedunculis axillaribus paucifloris. In Ind. or. ♂.

134. *E. depressa* Torr. ramis hirsutis; fol. oppositis petiolatis oblongis linearibus acutiusculis obsolete serratis; floribus axillaribus fasciculatis. In Nov. Caesarea. ♂.

135. *E. rosea* Retz; fruticulosa; ramis pubescentibus; fol. oppositis petiolatis obliquis oblongis obtusis apice denticulatis; pedunc. axillaribus cymiferis; involucris appendiculisque roseis. In Ind. or. ♂.

136. *E. microphylla* L. ramis filiformibus pubescentibus; fol. oppositis exignis ovatis acutiusculis integerrimis subitus villosiusculis; floribus axillaribus sessilibus aggregatis. In Ind. or. ♂.

137. *E. satureioides* Lam. ramis diffusis filiformibus glabriusculis; fol. oppositis spatulato-linearibus obtusiusculis; floribus terminalibus fasciculatis. In Ind. or. ♂.

138. *E. dioeca* H. et K. fruticulosa ramis villosis; fol. oppositis obli-

que cordatis oblongis acutis apice denticulatis utrinque pilosis; pedunc. axillaribus 3-floris; floribus dioecis. *In Nov. Granata.* ♀.

139. *E. brasiliensis* Lam. ramis pubescentibus; fol. obliquis oblongis denticulatis glabriusculis; racemis compositis terminalibus. *E. ophthalmica* Pers. *In Brasilia.* ♂.

140. *E. thymifolia* L. ramis pubescentibus; fol. obliquis oblongis serratis; glomerulis florum pedunculatis axillaribus. *In Ind. or.* ♀.

141. *E. pubera* Blume; caule subsimplici herbaceo; fol. oppositis brevissime petiolatis linear-lanceolatis serrulatis pubescentibus; cymis dichotomis axillaribus. *In Java.*

Flores umbellati.

* Umbella bifida.

142. *E. elliptica* L. umbella subbifida simplici, radiis brevissimis; bracteis maculatis; fol. alternis ovato-ellipticis subdentatis pubescentibus; caule ramoso. *In Peguvia.* ♀.

143. *E. tenuis* Hamilt. umbellis axillaribus bifidis; bracteis lanceolatis acutis; fol. oppositis petiolatis ovali-oblongis obtusis serratis subtus cauleque ramosissimo decumbente pubescentibus. *In Nepalia.* ♀.

144. *E. congenera* Blume; ramis alternis dichotomis; fol. oppositis oblongis acutiusculis basi oblique semi-cordatis 3-nerviis serrulatis infra ramulisque puberalis; umbellis subbifidis axillaribus terminalibusque. *In Java.* ♀.

** Umbella 3-fida.

145. *E. mercurialina* Michx. umbella simplicissima 3-fida, radiis 1-floris; fol. oppositis ternisve subsessilibus ovalibus integerrimis. *In Am. bor.* ♀.

146. *E. fusiformis* Hamilt. umbella simplicissima 3-fida, radiis 1-floris basi squamatis; involucro lacero multifido; caule aphylo erecto capsulisque glabris. *In Nepalia.* ♀.

147. *E. Peptus* L. umbellae 3-fidae radiis dichotomis; bracteis ovatis; appendiculis involuci bicornibus; fol. obovatis obtusis integrerrimis emarginatis; capsulae angulis carinatis. Fl.

dan. t. 1100. *Gaertn.* t. 107. f. 2. Bull. t. 79. *E. peploides* Hamilt. *E. punctata* Delil. *In Europa et Aegypto.* ♂.

148. *E. obtusata* Pursh. umbellae 5-fidae radiis dichotomis; bracteis subcordato-ovatis foliisque spathulatis sessilibus serrulatis glabris; caps. mucratis. *In Virginia.* ♂.

149. *E. marginata* Pursh; umbellae 3-fidae radiis dichotomis; bracteis cordato-oblongis margine membranaceis coloratis; appendiculis involuci petaloideis subrotundis capsulis pilosis; fol. amplexicanibus cordato-lanceolatis acutis glaucescentibus. *In Am. bor. et Nov. Hispan.* ♂.

150. *E. prolifera* Hamilt. umbella 3-fida prolifera; bracteis ovalibus obtusis; appendiculis involuci bicornibus; fol. linearibus obtusis alternis glabris. *In Nepalia.* ♂.

151. *E. falcata* L. umbellae 3-fidae radiis subdichotomis; bracteis foliisque lanceolatis mucronatis margine scabris; appendiculis involucris semi-lunatis; capsulis glabris. Jacq. austr. t. 121. *E. mucronata* et *acuminata* Lam. *E. arvensis* Schleich. *In Europa.* ♂.

152. *E. condensata* Fisch. umbella 3-fida glomerata; bracteis cordato-ovatis mucronatis crenulatis; fol. linear-subulatis sursum imbricatis. *In Iberia.* ♂.

153. *E. exigua* L. umbella 3-radiata dichotoma; fol. involucrisque linearibus acutis, involucellis lanceolatis; capsulis laevibus glabris; semine obovato nigro albo-verrucoso. *E. B.* t. 1336. Fl. dan. t. 592. *E. tricuspidata* Lep. *In Europa.* ♂.

154. *E. retusa* Cav. ic. t. 34. f. 3. umbella 3-5-radiata dichotoma; fol. inferioribus cuneiformibus retusis, superioribus involucrisque linear-lanceolatis acutiusculis, involucellis cordatis; capsulis dorso verrucosis glabris. *E. diffusa* Jacq. ic. t. 88. *In Europa austr.* ♂.

155. *E. temnifolia* Lam. umbellae sub-3-fidae radiis bifidis; involucris late cordatis acutis; fol. linearibus acutis patulis; appendiculis involuci semi-lunatis; capsulis punctato-scabris. *E. gracilis* Lois. *In Europa austr.* ♂.

156. *E. dracunculoides* Lam. umbellae 8-fidae radiis dichotomis; floribus subsessilibus; bracteis foliisque

conformibus linearibus obtusis elongatis integerrimis. In ins. Masc. ♂.

157. *E. alexandrina* Delil. fl. d. Aeg. t. 30. f. 2. umbellae 3-fidae radiis dichotomis; bracteis oblique subcordato-ovatis cuspidatis; appendiculis involuci bicornibus; fol. caneatolinearibus retusis; caps. glabris. In Aegypto. ♂.

158. *E. spathulata* Lam. umbellae 3-fidae ramis dichotomis; bracteis ovalibus obtusis; spathulato-oblongis subserratis; capsulis glabris. In Monterideo. ♂.

159. *E. Rothiana* Spr. umbellae 3-fidae radiis dichotomis; bracteis triangularibus mucronatis; fol. linearibus acutis integerrimis; capsulis laevibus. *E. lacta* Roth. In Ind. or. ♂.

160. *E. undulata* Bieb. umbellae sub-3-fidae radiis bifidis; bracteis reniformibus foliisque ovato-oblongis obtusis undulatis; appendiculis involuci semilunatis; caps. laevibus. Ad Volgam. ♂.

161. *E. cornuta* Pers. umbella 3-fida glomerata; bracteis e lata basi lanceolatis acutis argute serrulatis; appendiculis involuci bicornibus; capsulis glabris; fol. linearibus apice denticulatis mucronulatis. *E. retusa* Forsk. descr. t. 13. In Aegypto. ♂.

162. *E. Lagascae* Spr. umbellae 3-fidae radiis dichotomis; bracteis foliisque cordato-oblongis mucronatis; appendiculis involuci integerrimis; capsulis glabris. *E. terracina* Lag. In Hispania. ♂.

163. *E. oblitterata* Jacq. umbella trifida glomerata cbracteata; caps. pilosis; fol. oppositis trapezoideo-oblongis acutis serratis pubescentibus altera baseos parte oblitteratis. In Jamaica et Hispaniola. ♂.

164. *E. calendulaefolia* Delil. fl. aeg. t. 30. f. 1. umbellae 3—5-fidae radiis dichotomis; bracteis cordatis serratis; capsulis glabris; fol. oblongis basi attenuatis amplexicaulibus inaequaliter serratis; caule piloso. In Aegypto. ♂.

165. *E. tuberosa* L. umbellae 3—4-fidae radiis bifidis; bracteis cordato-ovatis oppositis; caule subaphyllum; fol. radicalibus petiolatis oblongis obtusis emarginatis; radice tuberosa. Buxb. cent. 2. t. 23. Burm. afr. t. 4. In Aegypto et Aethiopia. ♂.

*** Umbella 4-fida.

166. *E. Lathyris* L. umbellae 4-fidae ramis dichotomis; bracteis foliisque cordato lanceolatis glancescentibus integerrimis glaberrimis; capsulis fungosis laevibus. Blackw. t. 123. Bull. t. 103. In Europ. 4.

167. *E. echinocarpa* Sieb. umbellae 4-fidae radiis bifidis; bracteis oblique ovatis mucronatis; capsulis setoso-muricatis; fol. alternis oblongis acutis serrulatis; caule simplici. In Creta. 4.

168. *E. terracina* L. umbellae 4-fidae radiis dichotomis; bracteis 3-angulari-ovatis; appendiculis involuci 2—3-dentatis; capsulae angulis verrucosis; fol. spathulato-lanceolatis retusis. Barr. ic. 833. *E. taurinensis* All. ped. t. 88. f. 3. In Europ. austr. ♂.

169. *E. xalapensis* H. et K. umbellae sub-4-fidae radiis bifidis; floribus subspicatis; bracteis linearibus; fol. alternis petiolatis ovato-oblongis acutis integerrimis pellucido-punctatis pubescentibus; caule simplici. In Mexico. ♂.

170. *E. Cashmeriana* Royle ill. t. 82. f. 4. caule erecto folioso; fol. alternis sessilibus ovato-lanceolatis; ramis gracilis; fol. floralibus cordato-rotundis coloratis involucrum mentientibus; umbellae 4-fidae radiis simplicibus, centrali maximo. In Cashmeria. 4.

171. *E. Apios* L. umbellae 4-fidae radiis bifidis; bracteis obcordato-reniformibus; fol. spathulatis obtusis; radice tuberosa pyriformi. In Graecia. ♂.

172. *E. ericoides* Lam. umbellae sub-4-fidae radiis bifidis; bracteis reniformibus obcordatis linearibus obtusis revolutis. In P. b. S. ♂.

**** Umbella 5-fida.

173. *E. androsaemifolia* Schousb. umbellae 5-fidae radiis dichotomis; bracteis reniformibus; fol. oblongis glabris inferioribus obtusis superioribus acutis. *E. isatidifolia* Lam. In Hispan. et Insit. ♂.

174. *E. diversifolia* Pers. umbellae 5-fidae radiis bifidis; bracteis cordato-ovatis mucronatis; appendiculis involuci bicornibus; fol. inferioribus spathulatis retusis, superioribus lineari-lanceolatis acutis. *E. heterophylla*

Desf. In Hispania Numidia et Aegypto. ♂.

175. *E. achanocarpa* Gussone; umbellae 5-fidae radiis dichotomis; bracteis ovatis mucronatis serrulatis; appendiculis involuci integerrimis; fol. spathulatis apice serrulatis pubescens. In Sicilia. ♂.

176. *E. Pityusa* L. umbella 5-radiata dichotoma; involucellis ovatis mucronatis; fol. lanceolatis glaucis infimis imbricato-reflexis superioribus cuspidatis; glandulis subintegris; capsulis laevibus. *E. nummulariaefolia* W. In Europa austr. 4.

177. *E. Paralias* L. umbella 5-radiata dichotoma; involucellis cordato-reniformibus; fol. crassis lanceolato-cuspidatis sursum imbricatis; glandulis lunatis suberosis; capsulis profunde 3-coccis verrucosis. Jacq. h. vind. t. 188. *E. paralia* E. B. t. 195. In Europa. 4.

178. *E. saxatilis* Jacq. austr. t. 345. umbella 5-radiata dichotoma; involucris cordatis, involucellis reniformibus mucronatis; fol. spathulato-linearibus emarginatis aeniis; capsulae angulis scabris. In Europa. 4.

179. *E. Erythrina* Lk. umbellae 5-fidae radiis dichotomis; bracteis rhomboides mucronatis foliisque lanceolatis obtusis glaberrimis margine rubris; appendiculis involuci bicornibus. In P. b. S. 4.

180. *E. corifolia* Lam. umbellae 5-fidae radiis bifidis; bracteis ovatis mucronatis; appendiculis involuci bicornibus; fol. linearibus subrevolutis pubescentibus. In P. b. S. 4.

181. *E. juncea* Ait. umbellae 5-fidae radiis dichotomis; bracteis ovato-oblongis acuminatis; appendiculis involuci subrotundis; fol. linear-lanceolatis acutis. *E. pinifolia* W. In Madera. 4.

182. *E. aleppica* L. umbellae 4-5-fidae radiis bifidis; bracteis ovatis mucronatis; appendiculis involuci semi-lunatis; fol. dense imbricatis setaceis glabris. Alp. exot. t. 64. Sibth. fl. graec. t. 462. In Graecia, Asia minor. 4.

183. *E. itatica* L. stricta, involucellis cordato-triangulis serrato-dentatis glandulis aristato-bicornibus; capsulis dorso convexis glabris; fol. coriaceis lanceolatis margine serrulatis obtusis. Barr. ic. 831. *E. pro-*

vincialis W. In Italia Graecia et Africa bor. 4.

184. *E. atlantica* Pers. umbellae 5-fidae radiis dichotomis; bracteis ovato-oblongis acuminatis; appendiculis involuci rotundatis; fol. sparsis lanceolatis serrulatis. *E. bupleuroides* Desf. In Numidia. 4.

185. *E. helioscopia* L. umbellae 5-radiatae 3-fidae dichotomae involucellis obovatis; fol. cuneiformibus serrulatis glabris; capsulis laevibus; seminibus reticulato-foveolatis. Fl. dan. t. 725. Schk. t. 129. Hayne 2, t. 2. Roep. t. 2. In Europa. ♂.

186. *E. arguta* Soland. umbellae 5-fidae radiis dichotomis; bracteis cordatis; fol. obovatis inciso-serratis; caule piloso. Fl. graec. t. 468. In Cypro. ♂.

187. *E. serrata* L. umbellae 5-fidae radiis 2-3-fidis; bracteis cordatis ovatis foliisque amplexicanibus lanceolatis nervosis serratis. In Hispania et Gallia austr. ♂.

188. *E. obscura* Lois. umbella 3-5-radiata repetito-dichotoma; fol. obovato-lanceolatis infimis retusis reliquis acutis mucronatis; involucris oblique ovalibus cuspidatis. Lois. nov. pl. t. 2. Fl. gall. t. 29. f. 1. In Gallia. ♂.

189. *E. micrantha* Steph. caule tenue gracili; umbella 3-radiata dichotoma; fol. obovato-lanceolatis serrulatis; involucris cordatis; capsula profunda trisulca verrucosa. *E. serrulata* Thui. In Europa austr. ♂.

190. *E. deflexa* Sm. umbellae 5-fidae radiis dichotomis; bracteis trapezoideis; fol. panduraeformi-oblongis deflexis glaucis; appendiculis involuci biformibus. In Euboëa. ♂.

191. *E. tristis* Bess. umbellae 5-fidae radiis dichotomis; fol. elliptico-oblongis glabris; bracteis late cordatis; appendiculis involuci semilunatis. In Volthynia. ♂.

192. *E. corollata* L. umbellae 5-fidae radiis 2-3-fidis; appendiculis involuci petaloideis obovatis; bracteis foliisque oblongo-lanceolatis obtusis integerrimis glabris. In Am. bor. 4.

193. *E. denticulata* Lam. umbellae 5-fidae contractae ramis bifidis; bracteis cordato-ovatis concavis; appendiculis iuvoluci petaloideis denticulatis; fol. spathulato-lanceolatis nervosis integerrimis. *E. cristata*

Dietr. *B. curtifolia* Chaub. In Asia minore. 4.

194. *E. ruterianaefolia* Lam. umbellae 5-fidae radiis 2—3-fidis; bracteis cordatis foliisque lanceolatis glabris serrulatis; appendiculis involucri subrotundis integerrimis. E. Valerianae Pers. In ins. Maris Aegaei. 4.

195. *E. peterococca* Brot. umbellae 5-fidae radiis 3-fidis patentibus demum bifidis; bracteis ovatis foliisque oblongis serrulatis glabris; appendiculis involucri rotundatis; angulis capsulae senis atatis. E. bialata Lk. E. stellata Salzm. In Lusitania. 4.

196. *E. orientalis* L. umbellae 5-fidae radiis 4-fidis; bracteis subrotundis acutis; appendiculis involucri subrotundis integerrimis; capsulis matutinis laevibus; fol. lanceolatis acutis integerrimis. Buxb. cent. 2. t. 26. Galarhoeus Haw. In Oriente. 4.

197. *E. procera* Bieb. umbellae 5-fidae radiis 3-fidis; bracteis ellipticis; fol. lanceolatis obtusis apice serrulatis subtus pubescentibus; appendiculis involucri rotundatis; capsulis glabris. Gmel. sib. t. 93. In Caucaso, Sibiria. 4.

198. *E. gracilis* Bess. umbellae sub-5-fidae radiis 2-fidis; bracteis cordatis acutis; fol. linearis-ellipticis mucronatis; capsulis punctato-scabris. In Ucrania. 4.

199. *E. segetalis* L. umbellae 5-fidae radiis elongatis dichotomis; bracteis late cordatis acutis; appendiculis semilunatis; fol. linearis-lanceolatis superioribus latioribus; capsulae angulis scabris. Jacq. austr. t. 450. E. caespitosa Ten. In Europa. ⊖.

200. *E. pinea* L. umbellae 5-fidae radiis dichotomis; bracteis reniformi-cordatis obtusis mucronatis appendiculis involucri bicornibus; fol. inferioribus deflexis imbricatis angustissimis superioribus latioribus, capsulae angulis scabris. Biv. Bern. sic. 4. t. 5. In Italia. ⊖.

201. *E. angulata* Jacq. ic. t. 481. caule membranaceo angulato; umbella 5-radiata dichotoma; involucris rhombo-ovatis denticulatis; fol. lanceolatis obtusis denticulatis; caps. verrucosis. Rehb. ic. 268. In Europa. 4.

202. *E. dulcis* L. basi lignosa; fol. lato-lanceolatis sessilibus obtusiusculis acutis mucronatis; um-

bella 4—5-radiata; ovariis undique verrucosis. Fl. graec. t. 464. Moris. 12. t. 3. f. 3. Barr. ic. 834. In Europa. 4.

203. *E. fotisequa* Biv. t. 116. umbella 5-radiata, radiis dichotomis strictis; involucellis ovato-oblongis denticulatis; fol. lanceolatis obtusis apice denticulatis; capsulis verrucosis pilosis. E. dulcis Jacq. austr. t. 213. Rehb. ic. 266. In Europa. 4.

204. *E. carniolica* Jacq. a. app. t. 14. umbella 5-radiata, radiis nutantibus laxis; involucellis ovato-lanceolatis integerrimis pilosiusculis; capsulis verrucosis. E. ambigua W. et Kit. t. 135. In Europa. 4.

205. *E. viridiflora* W. Kit. t. 280. umbellae 5-radiatae radiis dichotomis; fol. elliptico-lanceolatis; involucris cordatis obtusis serratis; capsulis verrucosis glabris. E. nodiflora Host. In Hungaria. 4.

206. *E. micrantha* Willd. caule tenui gracili; umbella triradiata dichotoma; fol. obovato-lanceolatis serrulatis; involucris cordatis; capsula trisulca verrucosa; semine ovato acute punctato, linea dorsi carinali nulla. E. serrulata Thuii. In Helvetia. 4.

207. *E. stricta* Sm. E. B. t. 333. caule stricto firmo; umbella 5-radiata dichotoma; fol. lanceolato-oblongis vix dilatatis serrulatis; involucris cordato-deltoides; capsula globosa trisulca verrucosa; semine ovato. E. verrucosa Huds. In Europa. ⊖.

208. *E. longifolia* Hamilt. umbellae 5-fidae radiis 3-fidis; bracteis ovatis mucronulatis; appendiculis involucri semilunatis; fol. lanceolatis acutis integerrimis glabris; capsulis verrucosis. In Nepalia. ⊖.

209. *E. coralloides* L. fol. late lanceolatis obtusiusculis vix serrulatis pubescentibus; umbella 5-radiata; ovariis laevibus lanatis demum pilosis; seminibus laevibus fuscis. In Europa austr. 4.

210. *E. hiberna* L. fol. lato-lanceolatis serratis obtusiusculis integerrimis glabrescentibus; umbella 5-radiata; ovariis dorso convexis muricatis glabris; seminibus nitidis nigrofuscis. Dill. elth. t. 290. f. 374. E. B. t. 1337. In Hibernia. 4.

211. *E. coudylocarpa* Bieb. umbellae 5-fidae radiis bifidis; bracteis reniformi-cordatis foliisque cordato-

lanceolatis obtusiusculis denticulatis glabris; appendiculis involucri rotundatis; capsulis rubro-verruculosis glabris; radice tuberosa. In *Caucaso.* 2.

212. *E. blepharophylla* C. A. Mey. in *Ledeb. fl. alt. t. 387.* *glauca*, *umbellis 5-radiatis radiis sub-3-fidis dichotomis; fol. caulinis ovatis acutis cordatis integerrimis subcoriaceis villosociliatis; appendiculis rotundatis; seminibus laevibus.* In *Sibiria.* 2.

213. *E. buchtormensis* C. A. Mey. l. c. t. 189. *subglabra; umbella 5-radiata, radiis dichotomis; fol. membranaceis obtusiusculis subserrulatis, caulinis spathulato-oblongis cordatis; appendiculis subrotundatis; germinibus glabris verrucosis.* *Prope Buchtorminsk.* 2.

214. *E. rupestris* C. A. M. l. c. t. 190. *glabra laevis; umbella 5-radiata, radiis simplicibus; fol. integrerimis subcoriaceis, caulinis obovato-spathulatis retusis obtusis v. acutis, radiorum rhombis; appendiculis rotundatis; caps. laevibus glabris.* In *Sibiria altaica.* 2.

215. *E. altaica* C. A. Mey. l. c. t. 191. *glabra laevis; umbella 5-radiata, radiis bifidis; fol. membranaceis acutiusculis mulcicis subintegerimis, caulinis mediis ellipticis superioribus obovatis; appendicibus rotundatis; capsulis subdistinctis glabris dorso verrucosis.* In *Sibiria altaica.* 2.

216. *E. macrorhiza* C. A. Mey. l. c. t. 192. *glaucescens; caule tenuissime pubescente; umbella 5-radiata simplicissima oblitterata; fol. submembranaceis glabris serrulatis radiorum ellipticis mucronatis; appendicibus rotundatis; capsulis subglobosis glabris fibrillis elongatis tectis; seminibus laevibus.* In *Sibiria altaica.* 2.

217. *E. ceratocarpa* Tenor. *umbellae 5-fidae radiis dichotomis 4-fidis; bracteis ovatis mucronatis; fol. lanceolatis obtusis integerrimis glancis; appendiculis involucri orbiculatis; capsulae glabrae verrucis coadunatis ramosis incurvis.* In *Neapoli.* 2.

218. *E. epithymoides* L. *umbella 5-radiata dichotoma; involucellis ovatis denticulatis; fol. integrerimis lanceolatis obtusis retusis subtus villosis; anthodio intus glabro; capsulis papilloso-muricatis; seminibus opacis griseo-fuscis.* Jacq. austr. t. 344. *E.*

B. t. 2258. E. verrucosa Gaud. In *Europa.* 2.

219. *E. fragifera* Jan. *inermis pilosa; umbella 5-radiata dichotoma; fol. lanceolatis, turionum sterilium angustioribus; anthodio intus lanato; capsula profunde 3-sulca basi latiore dense carunculata.* Rchb. ic. 870—872. *E. spinosa* Wulf. Ad *Tergestum.* 2.

220. *E. platyphylla* L. *umbellae 5-fidae radiis 3-fidis; bracteis cordatis foliisque lanceolatis serrulatis subtilis pubescentibus; appendiculis involucri rotundatis; capsulis verruculosis glabriusculis.* Jacq. austr. t. 376. *E. laevingiosa* Thuill. *E. subciliata* Pers. Roch. ban. t. 7. f. 17. In *Europa.* 2.

221. *E. papillosa* Hilar. *umbella papilloso-pubescente; appendiculis involucri rotundatis; fol. oblongo-linearis mucronulatis integerrimis laevis glaucis.* In *Brasilia.* 2.

222. *E. pilosa* L. *umbellae 5-fidae radiis 3-fido-bifidis; bracteis ovatis, appendiculis involucri rotundatis; fol. lanceolatis subintegerimis margine scabris pilosiusculis; capsulis pilosis verruculosis.* Rchb. ic. 269. Roch. hann. t. 6. f. 15. *E. villosa* Kit. *E. procera* Bieb. Rchb. ic. 270. In *Europa et Sibiria.* 2.

223. *E. pubescens* Vahl; *tota villosa; umbellae 5-fidae radiis 2-fidis; bracteis ovatis acuminatis; appendiculis involucri rotundatis; capsulis muricatis; fol. ovato-oblongis serrulatis.* In *Afr. bor.* 2.

224. *E. squamosa* Willd. *umbellae 5-fidae radiis divaricatis sub-3-fidis; bracteis subrotundatis mucronatis; appendiculis involucri semilunatis; fol. oblongis acutis subrepandis subtus pubescentibus; capsulis squamosis.* In *Asia minore.* 2.

Umbella multifida.

225. *E. Esula* L. *umbellae radiis bifidis; bracteis subcordatis; appendiculis involucri semilunatis; capsulis glabriusculis; fol. lanceolatis obtusiusculis glaberrimis.* Fl. dan. t. 1270. Spr. hal. t. 3. f. 2. In *Europa.* 2.

226. *E. salicifolia* Hort. *umbellae multifidae radiis dichotomis; bracteis reniformi-cordatis; appendiculis involucri bicornibus; capsulis scabris; fol. lanceolatis integerrimis revolutis pu-*

bescientibus. In Hungaria et Galia. 2.

227. *E. virgata* W. Klt. hung. t. 162. umbella multiradiata dichotoma, pedunculis axillaribus; fol. subcoriaceis linear-lanceolatis attenuatis cuspidatis planis glabris; capsula angulis convexa punctato-scabra, seminibus obovatis griseo-fuscis. *E. Esula* Hayne II. t. 20. *E. uralensis* Fisch. In Europa et Sibiria. 2.

228. *E. niceensis* All. ped. t. 96. f. 1. fol. glaucis coriaceis ovato-lanceolatis sessilibus glabris margine scabris; umbella submultiradiata dichotoma; involucellis cordato-subrotundis; glandulis subbicornibus; capsulis scabris pilosis; semine obovato-cylindrico. *E. oleaeifolia* Gouan. *E. Myrsinites* Wulf. *E. Seguieri* Scop. t. 20. In Europa austr. 2.

229. *E. rigida* Bieb. umbellae multifidae radiis bifidis; bracteis reniformicordatis; appendiculis involuci bicornibus corniculis clavatis; capsulis glabris; fol. imbricatis lanceolatis mucronato-pungentibus coriaceis glaucis. *E. biglandulosa* Desf. In Tauria et Creta. 2.

230. *E. latifolia* C. A. Mey. I. c. t. 185. glabra laevis glaucescens; umbellae multifidae radiis dichotomis; fol. membranaceis mucronulatis subserrulatis, caulinis ovatis v. ovato-oblongis obtusiusculis, radiorum reniformis; appendicibus lunatis; coccis distinctis glabris dorso tuberculatis; seminibus laevibus. In Sibiria altaica. 2.

231. *E. subcordata* C. A. Mey. I. c. t. 186. glabra laevis glanca; umbella multiradiata, radiis dichotomis; fol. subcoriaceis acutis muticis integrermis; caulinis lanceolatis subcordatis, radiorum late cordatis; appendicibus lunatis; coccis distinctis subpilosis dorso rotundatis tuberculatis; seminibus laevibus. In Sibiria altaica. 2.

232. *E. lutescens* C. A. Mey. I. c. t. 12. pilosa; umbella multiradiata, radiis 3-fidis bifidis; fol. membranaceis serrulatis obtusis acutis muticis; radiorum subellipticis; appendicibus rotundatis; capsulis subglobosis glabris tuberculatis conicis elongatis obtectis; seminibus laevibus. In Sibiria altaica. 2.

233. *E. Myrsinites* L. umbella multiradiata dichotoma; fol. spathulato-ovalibus oblique mucronatis coriaceis serrulatis confertis; involucellis reniformibus; glandulis crenulatis; capsula globosa glabra, semine obovato cylindrico ruguloso exsculpto cinerascente. In Europa. 2.

234. *E. lucida* W. Kit. t. 54. fol. demum subcoriaceis lanceolatis obtusis integrermis glabris; ramis florigeris sub umbella radiata dichotomis; glandulis lunato-bicornibus; capsula glabra dorso punctato-scabra; semine laevo cinereo-fusco. *E. pallida* W. In Silesia et Hungaria. 2.

235. *E. agraria* Bieb. umbellae multifidae radiis bifidis; bracteis foliisque cordato-rotundis acutis glabris margine scabris subserrulatis; appendicibus involuci semilunatis; capsulis punctato-scabris. *E. nitens* Trev. In Tauria. 2.

236. *E. amygdaloidea* L. umbella 5-10-radiata punctulisque axillaribus dichotomis; involucellis perfoliatis orbiculatis; fol. lanceolatis obovato-spathulatis obtusis; glandulis lunato-bicornibus; capsula sebriuscula glabra; semine obovato-subgloboso laevo opaco fusco. Spr. fl. Hal. t. 4. E. B. t. 256. *E. sylvatica* L. Jacq. austr. t. 375. Bull. 95. In Europa. 2.

237. *E. Gerardiana* Jacq. austr. t. 436. umbella multiradiata dichotoma pedunculisque axillaribus; involucellis subrotundis; glandulis triangularibus integris; fol. lineari-lanceolatis rigidulis mucronatis glaucis superioribus latioribus; capsula dorso convexa scabra; seminibus obovato-cylindricis laevibus opacis. Spr. hal. t. 3. f. 1. *E. Cajogula* Ehrh. In Europa. 2.

238. *E. Cyparissias* L. umbellae multifidae radiis dichotomis; bracteis subcordatis, appendiculis involuci rotundatis integrermis; capsulis glabris; fol. lineari-lanceolatis acutis sub-3-nerviis glaucis glaberrimis. E. B. t. 480. Bull. t. 97. Jacq. austr. t. 435. Hayne Arzu. 2. t. 22. In Europa. 2.

239. *E. palustris* L. fol. lanceolatis sessilibus subserrulatis glabris; ramis lateralibus sterilibus; umbella 5-radiata; capsula globosa-subconica verrucosa; seminibus obovatis laevibus fusco-nitidis. Fl. dan. t. 816. Hayne 2. t. 23. Rebb. ic. 272, 273. In Europa. 2.

240. E. longiradiata Lapeyr. umbellae multifidae radiis dichotomis elongatis; bracteis ellipticis; appendiculis involuci-truncatis; caps. villosis; fol. spatulatis mucronatis marginatis integrerrimis reflexis. *In Pyrenaeis.* 2.

4905. CLEIDION Blume. (1825).

1. C. javanicum Blume bijdr. p. 613. *In Jara.* 2. Arbor 40-ped. fol. longe petiolatis oblongis serratis; floribus masculis glomeratis.

4906. MAEBA Aubl. (1775).

1. M. Piriri Aubl. guj. t. 334. f. 1. fol. ovato-oblongis acuminatis. *In Guiana.* 2.

2. M. Tayuari Aubl. f. 2. fol. ovatis obtusis subtus venis rubris notatis. *In Guiana.* 2.

3. M. fistulifera Mart. Reis. *In Brasilia.* 2.

4907. ELATERIOSPERMUM Blume. (1825).

1. E. Tapos Blume; fol. sparsis oblongis acuminatis transverse venosis; floribus corymbosis. *In Jara.* 2. Arbor 60-ped.

2. E. Tokbrai Blume; fol. subverticillatis oblongis obtuse acuminatis subparallelo-venosis; fructibus racemosis. *In Java.* 2. Arbor 60—80-ped.

4908 MANIHOT Pohl. (1827).

a. Racemi minute bracteati non comosi.

1. M. salicifolia Pohl ic. t. 10. fol. subsessilibus oblongis subacutis mucronatis integrerrimis. *In Brasilia.* 2. Frut. 2-ped.

2. M. purpureo-costata Pohl. t. 11. fol. subsessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis mucronatis integrerrimis venis roseis. *In Brasilia.* 2.

3. M. orbicularis Pohl. t. 12. fol. brevissime petiolatis subrotundis apice mucronato-dentatis. *In Brasilia.* 2. 3-ped.

4. M. peltata Pohl t. 13. fol. longe petiolatis peltatis difformibus fere qua-

dratis sexlobato-repandis. *In Brasilia.* 2.

5. M. quinqueloba Pohl t. 14. fol. longe petiolatis subpeltatis quinquelobis, lobis retuso-truncatis denticulo mucronato terminatis. *In Brasilia.* 2.

6. M. sagittato-partita Pohl t. 15. fol. petiolatis sagittato-tripartitis, lobis dependente-nutantibus. *In Brasilia.* 2.

7. M. gracilis Pohl t. 16. fol. petiolatis usque ad basin tripartitis, lacinii anguste lanceolato-acuminatis, inferioribus divergente-divaricatis. *In Brasilia.* 2.

8. M. pronifolia Pohl ic. t. 17. fol. longe petiolatis usque ad basin tripartitis, lacinii inaequalibus intermedia lanceolata basi subattenuata, inferiorum lateralibus duabus inaequali-lanceolatis pronis. *In Brasilia.* 2.

9. M. crotalariformis Pohl t. 18. fol. petiolatis usque ad basin tripartitis lacinii oblongis apice acutis mucronatis inferioribus inaequalibus patenti-divergentibus. *In Brasilia.* 2.

10. M. longepetiolata Pohl t. 19. fol. longissime petiolatis usque ad basin tripartitis, lacinia intermedia lanceolato-aenta, lateralibus oblongis acutis mucronatis patent-pronis ad basin cordatis. *In Brasilia.* 2.

11. M. sparsifolia Pohl t. 20. fol. longissime petiolatis tripartitis basi cordato-emarginatis lacinii latis, intermedia elliptica acuta longe mucronata, lateralibus inaequalibus ellipticis intus parum angustioribus extus ad basin semirotundatis divergentibus; bracteis subulatis deciduis. *In Brasilia.* 2.

12. M. anomala Pohl ic. t. 21. fol. petiolatis 3-partitis summis integris cordatis acuminatis, lacina intermedia elliptico-acuminata, lateralibus inaequalibus pronis, lateralibus exterioribus latioribus oblongis, interioribus ad basin angustioribus, bracteis minimis subulatis tomentosis. *In Brasilia.* 2.

13. M. pruinosa Pohl t. 22. fol. petiolatis caulinis 5-partitis, lacinia intermedia oblongis breve acuto-mucronatis ad basin subcuneatis retusis extinis patenti-divergentibus minoribus rameis tripartitis summis simplicibus ovalibus mucronatis subtus pruinoso-caeruleis; bracteis minimis lanccolatis. *In Brasilia.* 2.

14. *M. Aipi* Pohl t. 23. fol. longe petiolatis palmatis profunde 5-partitis lacinis lanceolatis acuminatis ad basin attenuatis integerrimis extimis inaequalibus divergentibus; radice rubescente. *Jatropha Manihot L. partim. Colitur in tota Brasilia* ♀. Caulis orgyalis.

15. *M. utilissima* Pohl ic. t. 24. fol. longissime petiolatis palmatis profunde 7-partitis palmatis lacinis lanceolatis acuminatis integerrimis divaricatis; radice flavescens - albicans. *Janipha Manihot H. et K. Jatropha Manihot L. et auct. Tuss. fl. ant. III. t. 1. Desc fl. ant. 3. t. 176. Colitur in Brasilia et Am. meridionali.* ♂. Radix tuberosa succosa exculenta. Caul. 6-8-ped.

16. *M. flabellifolia* Pohl t. 25. fol. palmatis 8-partitis, lacinis lanceolato-acuminatis basi retusis, nervis subtus ad lentem pilosiusculis. *In Brasilia.* ♀. Caul. rubro-brunneus 3-pedalis.

17. *M. pusilla* Pohl ic. t. 26. fol. longissime petiolatis palmatis profunde 7-partitis lacinis lanceolato-acutis; stipulis disformibus plerumque subulatis aut valide partitis longissimis. *In Brasilia.* ♀. Caulis biuncialis.

18. *M. digitiformis* Pohl ic. t. 27. fol. longe petiolatis palmatis inferioribus 7-partitis superioribus 5-partitis, lacinis angustis lanceolato-subulatis divaricatis. *In Brasilia.* ♀.

19. *M. triphylla* Pohl ic. t. 28. fol. petiolatis caulinis 5-phylis, rameis 3-phylis; foliolis angustis linearis-lanceolatis acuminatis mucronatis dependentibus exterioribus minoribus pronis. *In Brasilia.* ♀. Caulis 3-pedalis.

20. *M. tenuifolia* Pohl ic. t. 29. fol. petiolatis digitatis; foliolis 5-nis linearibus divergentibus margine subrevolutis exterioribus minoribus divaricato-reflexis; bracteis oblongo-lanceolatis grosse et acute dentatis. *In Brasilia.* ♀.

21. *M. tenerrima* Pohl ic. t. 30. fol. petiolatis digitatis; foliolis quinis angustissimis linearibus acutis mucronatis subfiliformibus margine involutis; bracteis setaceo-dentatis. *In Brasilia.* ♀.

22. *M. heterophylla* Pohl ic. t. 31. fol. petiolatis heterophyllis, caulinis palmatis 5-partitis lacinis inciso-sinuatis panduraeformibus apice trape-

ziformibus acumiatis, rameis 3-partitis; rachi racemi bracteisque tomentellis. *In Brasilia.* ♀. Caulis orgyalis.

23. *M. caricaefolia* Pohl ic. t. 32. fol. petiolatis palmatis sub-5-partitis lacinis ample sinuato-panduraeformibus attenuatis; rachi racemi bracteisque glabris. *Janipha Juquilla H. et K. In Brasilia et Am. meridionali.* ♀. Caulis brunneus orgyalis.

24. *M. divergens* Pohl t. 33. fol. petiolatis profunde 3-partitis purpureo-marginatis lacinis oblongis acutis mucronatis; bracteis ovato-acutis ruhundis pruinosis. *In Brasilia.* ♀. Caulis cano-nigrescens 2-pedalis.

25. *M. arcuata* Pohl ic. t. 34. fol. caulinis longissime petiolatis simplicibus v. 3-partitis, rameis simplicibus oblongis acute mucronatis basi cordatis rubro-marginatis lacinis oblongis; bracteis magnis ovato-acuminatis pruinosis. *In Brasilia.* ♀. Caulis bipodus.

26. *M. riotacea* Pohl ic. t. 35. fol. petiolatis tripartitis, lacinis obovato-mucronatis apice latiusculis arcuatim pronis subtus violaceis pruinosis; bracteis magnis brunneo-rubris pruinosis. *In Brasilia.* ♀.

27. *M. datechampiaeformis* Pohl ic. t. 36. fol. petiolatis usque ad basin tripartitis, lacinia intermedia obovata breve mucronata margine repanda, lacinis exterioribus inaequalibus divergentibus subtus velutinis; bracteis hirtis. *In Brasilia.* ♀.

28. *M. tomentella* Pohl ic. t. 37. fol. petiolatis sub-3-phylis, foliolis intermedio ovali mucronato integerimo, foliolis lateralibus inaequalibus supra pilosiusculis subtus bracteisque tomentellis. *In Brasilia.* ♀. 3-pedalis.

29. *M. cajaniformis* Pohl ic. t. 38. fol. breve petiolatis profunde 3-partitis; lacinia intermedia majore oblongo-acuminata mucronata exterioribus inaequalibus glabris; bracteis magnis obovato-acuminatis grosse dentatis glabris. *In Brasilia.* ♀.

30. *M. porrecta* Pohl ic. t. 39. fol. petiolatis profunde 3-partitis, lacinia intermedia oblonga acuta mucronata exterioribus inaequalibus porrectis extus latissimis subovalibus subtus velutino-villosis; bracteis latis ovato-acumi-

natis grosse dentatis pubescentibus.
In Brasilia. ♂.

31. *M. pubescens* Pohl ic. t. 40. fol. petiolatis palmato-3-partitis summis simplicibus pubescentibus laciiniis intermediis oblongo-acuminatis exterioribus inaequalibus subporrectis latere exteriore latiore; bracteis oblongis acutis integerrimis magnis flavotomentosis. *In Brasilia.* ♂.

32. *M. sinuata* Pohl ic. t. 41. fol. petiolatis profunde 3-partitis ad basin emarginatis, laciiniis oblongis intermediis inaequaliter sinuatis plus minus irregulariter panduraeformibus subtus pubescenti-icanis; bracteis magnis ovatis acuminato-dentatis velutino-pilosis. *In Brasilia.* ♂.

33. *M. cecropiaefolia* Pohl ic. t. 42. fol. petiolatis caulinis palmatis 5-lobis rameis trilobis laciiniis late ovalibus apice rotundato-obtusis dente setaceo terminatis ad basin confluentibus plicas formantibus lateralibus se invicem tegentibus; bracteis magnis ovatis integris acute setaceis. *In Brasilia.* ♂.

34. *M. tomentosa* Pohl. ic. t. 43. fol. petiolatis caulinis lato-palmatis 5-partitis rameis 3-partitis laciiniis ovato-oblongis apice acute mucronato-dentatis exterioribus inaequalibus minoribus extus latissimis lato-rotundatis supra pilosis subtus longissime villosa-tomentosis; bracteis oblongis villosa-tomentosis. *In Brasilia.* ♂.

35. *M. cleomifolia* Pohl ic. t. 44. fol. petiolatis caulinis usque ad basin tripartitis; rameis 3-partitis, laciiniis intermediis oblongis acutis, exterioribus dimidiata minoribus deflexis supra pilosis subtus villosis; bracteis acuminato-dentatis villosi. *In Brasilia.* ♂.

36. *M. pariaefolia* Pohl ic. t. 45. fol. petiolatis digitatis glabris; foliolis quinis lanceolatis acuminato-setaceis ad basin angustatis exterioribus brevioribus divergentibus; bracteis ovato-oblongis acuminatis integerrimis. *In Brasilia.* ♂. Caulis brunneus oryzalis.

37. *M. pentaphylla* Pohl ic. t. 46. fol. petiolatis usque ad basin 5-digitato-partitis, laciiniis angustis lanceolato-acuminatis, exterioribus glaberrimis; bracteis oblongo-acutis integris. *In Brasilia.* ♂.

38. *M. varians* Pohl ic. t. 47. fol. petiolatis usque ad basin 3-5-partitis, laciiniis angustis lanceolatis acuminate-mucronatis quinquepartitis extimus longissimis; bracteis ovato-acutis grosse acuminato-dentatis glabris. *In Brasilia.* ♂.

39. *M. laciniosa* Pohl ic. t. 48. fol. petiolatis usque ad basin 5-digitato-partitis, laciiniis angustis inaequale magno-laciinato-sinuatis acute dentatis ciliatis pilosiusculis mucronatis; bracteis ovato-acutis acute dentatis pilosis. *In Brasilia.* ♂.

b. Racemi minute bracteati non comosi.

40. *M. foetida* Pohl; fol. 3-fidis cordatis, laciiniis acuminatis integerrimis. *Janipha H. et K.* *In Mexico.* ♂.

41. *M. diffusa* Pohl; fol. petiolatis palmato-3-5-partitis, laciiniis elliptico-oblongis acutiusculis ad basin attenuatis confluentibus exterioribus minoribus divergenti-divaricatis. *In Brasilia.* ♂.

42. *M. pilosa* Pohl; fol. petiolatis digitato-subquinatis, laciiniis lanceolatis acuminatis ad basin attenuatis pubescentibus subtus ad nervos pilosis exterioribus minoribus divergentibus. *In Brasilia.* ♂.

43. *M. Janiphia* Pohl; fol. 5-partitis cordatis laciiniis acuminatis integerrimis intermedio-panduraeformi. *Jatropha Janiphia L. J. Loeflingii H. et K.* *In Nor. Anulatusia.* ♂.

44. *M. aesculifolia* Pohl; fol. 7-partitis, laciiniis obovato-oblongis acuminatis integerrimis 2 exterioribus minimis. *Janipha H. et K. nov. gen. t. 109.* *In Am. austr.* ♂.

45. *M. Loureiri* Pohl; fol. subnovenlobis, lobis lanceolatis in aequalibus interdum sinuatis. *Jatropha Janiphia Lour.* *In Cochinchina.* ♂.

46. *M. reniformis* Pohl; fol. petiolatis rotundato-reniformibus; lobis approximatis glabris; bracteis oblongis acutis integerrimis, rubicundo-violetaceis pruinosis. *In Brasilia.* ♂.

47. *M. caeruleocensis* Pohl; fol. petiolatis ternatis, foliolis intermediis subrotundo-ellipticis cuspidatis exterioribus obovatis minoribus divergentibus; bracteis oblongo-acuminatis integris. *In Brasilia.* ♂.

48. *M. quinquefolia* Pohl; fol. longissime petiolatis quinatis; foliolis oblongis acutiusculis cuspidatis ad basin attenuatis vix confluentibus exterioribus haud minoribus divergentibus; bracteis ovato-acutis. *In Brasilia.* ♀.

4909. *CEPHALOCROTON* Hochst. (1841).

1. *C. humile* Hochst. *In Africa trop.* ♀. Frutex humilis ramosus stellato-hirtus. Fol. alterna petiolata ovato-cordata crenato-dentata. Flores capitati.

4910. *PODOSTACHYS* Klotsch. (1840).

1. *P.* Klotsch; *In Brasilia.* ♀.

4911. *ASTRAEA* Klotsch; (1841).

1. *A. lobata* Klotsch. fol. alternis 3—5-lobis serratis hirsutis; spicis longissimis hirtis. *Croton lobatum* L. *In Brasilia.* ♀.

4912. *OCALIA* Klotsch. (1841).

1. *O.* Klotsch in Erichs. jour. 7. p. 195 ex Endl. *In Am. tropica.* ♀.

4913. *EUTROPIA* Klotsch. (1841).

1. *E. polyandra* Klotsch; fruticosa; ramis sublepidotis; fol. oblongis obtusis coriaceis glaberrimis crenato-serratis; floribus verticillato-spicatis. *Rottlera brasiliensis* Spr. *In Brasilia.* ♀.

4914. *CLEODORA* Klotsch. (1841).

1. *C. brasiliensis* Klotsch. *In Brasilia.* ♀. Arbor ramis foliisque oblongis subserratis pilosis; spicis terminalibus.

4915. *TIMANDRA* Klotsch. (1842).

1. *T.* Klotsch. *In Brasilia.* ♀. Frutex ramosissimus; fol. alternis bi-

stipulatis stellato-pilosus pellucido-punctatis.

4916. *MEDEA* Klotsch. (1841).

1. *M. erecta*. *In Brasilia.* ♀. Klotsch. in Erich. arch. 7. p. 198. Frutex tristis; fol. consertis ovatis cano-villosis petalique pellucido-punctatis; floribus axillaribus.

4917. *SAJORIUM* Endl. (1842).

1. *S. corniculatum* D. Sajor Rumph. t. 79. f. 2. *Pterococcus* Hask. *In Jara.* ♀. Frutex volubilis; fol. ovato-oblongis rostratis, basi biglandulosus dentato-serratis glaberrimis; floribus racemosis.

4918. *CTENOMERIA* Harw. (1841).

1. *Ct. volubilis* Harw. in Hook. jour. 1. p. 29. *Suffrutex natalensis* caule volubili; fol. longe petiolatis cordatis crenatis subpuberulis; racemis gracillimis.

4919. *TIGLIUM* Klotsch. (1841).

1. *T. officinale?* Klotsch. *Croton Tiglium* L. *Rheede* 2. t. 33. *Burm. zeyl.* t. 90. *Dusseld.* Pl. 11. t. 21. *In Ind. or.* ♀. *Arborescens*; fol. ovato-oblongis acuminatis serratis 5-nervis glabris, racemis terminalibus.

4920. *GEISELERIA* Klotsch.

(1841).

1. *G. glandulosa* Klotsch. *Croton* L. *Jacq. ic.* t. 41. *In Am. trop.* ♀. Fol. oblongis obtusis serratis utrinque stellato-pilosus, glandulis baseos 2-urceolatis; ramis hirtis.

4921. *BRACHYSTACHYS* Klotsch. (1841).

1. *B. hirta* Klotsch. *Croton hirtus* Herit. *In Am. austr.* ♀. Fol. subcordato-ovata 5-nervia rugosa inaequaliter denticulata subtus ramisque hirsuta; racemis axillaribus.

4922. LASIOGYNE Klotsch. (1841).

1. *L. brasiliensis* Klotsch. Croton Mart. In Brasilia. ♂. Folia alterna integerrima stellatim dense tomentosa. Flores racemosi.

4923. BALIOSPERMUM Blume. (1825).

1. *B. axillare* Blume. In Jara. ♂. Frutex fol. alternis grosse repando-serratis subtus strigosis; floribus fasciculatis.

4924. CROTON L. (1747).**1. Fruticosa.****a. Folia glandulosa.***** integerrima.**

1. *C. lineare* Jacq. am. t. 281. fol. linearibus obtusis mucronatis supra viridibus subtus albo-tomentosis basi biglandulosis; floribus dioecis. *C. Cascarilla* Mill. In Ind. occ. ♂.

2. *C. Cascarilla* L. fol. linear-lanceolatis obtusis supra viridibus subtus tomentoso-lanatis basi 3-glandulosis. floribus monoecis. Catesb. 2. t. 46. Plum. am. t. 241, 1. Blackw. t. 578. Plenk. t. 686. Desc. 1. t. 3. In Ind. occ. ♂. Frut. 6—10-ped.

3. *C. compressum* Lam. fol. lanceolatis subtus albo-tomentosis, petiolis decurrentibus basi biglandulosis; ramulis compressis. In Brasilia. ♂.

4. *C. balsamiferum* L. fol. oblongo-lanceolatis integerrimis, utrinque ramisque stellato-tomentosis basi biglandulosis. Jacq. am. t. 162. f. 3. In Ind. occ. ♂.

5. *C. Richardi* Willd. fol. oblongo-lanceolatis obtusis mucronatis supra sebris subtus albo-tomentosis basi biglandulosis. In ins. Martinica. ♂.

6. *C. pubescens* Vahl; fol. elliptico-oblongis utrinque viridibus stellato-pubescentibus basi biglandulosis. In? ♂.

7. *C. flocculosum* Vahl; fol. ovato-lanceolatis obtusiusculis supra subhispidis subtus tomentosis glaucis basi subtus biglandulosis. In Hispaniola. ♂.

8. *C. relutinum* Bert. fol. spathulato-oblongis mucronatis basi subglandulosis supra stellato-pubescentibus

incanis subtus flavidо-lepidoto-tomentosis; ramis dichotomis. In Hispaniola. ♂.

9. *C. alnifolium* Lam. fol. ellipticis utrinque stellato-pubescentibus basi 1-glandulosis; ramis 4-gonis incanis. In Peruvia. ♂.

10. *C. lanatum* Lam. fol. ellipticis utrinque lanatis basi biglandulosis. In Monterideo. ♂.

11. *C. sericeum* Lam. fol. elliptico-oblongis acuminatis supra glaberrimis subtus sericeo-tomentosis basi biglandulosis; calycibus fem. ciliatis. *C. martournense* Aubl. guj. t. In Guiana. ♂.

12. *C. ferrugineum* H. et K. ramis subdichotomis foliisque junioribus ferrugineo-tomentosis; fol. oblongis subacuminatis integerrimis subcoriaceis basi glandulis 2 sessilibus instructis supra tenuissime cano-subtus densissime albo-tomentosis, nervo venisque ferrugineis. In Nov. Granata. ♂.

13. *C. elegans* H. et K. ramulis subternis ferrugineo-tomentosis; fol. elliptico-ovatis acutis integerrimis basi glandulis 2 sessilibus instructis supra pilis stellatis punctiformibus densissime obsitis subtus albo-tomentosis junioribus ferrugineis. In Peruvia. ♂.

14. *C. leptostachyum* H. et K. fol. oblongis acuminatis basi asutiusculis glandulis 2 sessilibus instructis integerrimis parallelo-venosis supra pubescentibus subtus albido-tomentosis spicis elongatis gracilibus. Ad fl. Magdalena. ♂.

15. *C. rivinaefolium* H. et K. ramis dichotomis; fol. oblongis acuminatis basi rotundatis glandulis 2 sessilibus instructis integerrimis supra glabriusculis subtus cano-pubescentibus. In Quito. ♂.

16. *C. polystachym* Willd. fol. oblongis obtusiusculis supra laevibus subtus lepidotis glandulis baseos urcholis insculptis; racemis aggregatis multifloris fulvo-lepidotis. In Brasilia. ♂.

17. *C. adipatum* H. et K. fol. subrhombeo-ovatis acuminatis integerrimis trinerviis coriaceo rigidis basi biglandulosis utrinque densissime lepidotis subtus argenteis adipato-nitidis. At fl. Amazonum. ♂.

18. *C. thuriferum* H. et K. fol. ovatis obtusis integerrimis subtrineriis coriaceis basi biglandulosis utrin-

que cano-pubescentibus. *Ad fl. Amazonum.* ♀.

19. *C. bracteatum* Lam. fol. ovatis acuminatis basi biglandulosis supra stellato-pubescentibus subtus tomentosis; racemis elongatis bracteatis. *In Madagascar.* ♀.

20. *C. callicarpaefolium* Vahl; fol. ovatis acuminatis aveniis supra scabriusculis subtus tomentosis; glandulis baseos 4 pedicellatis. *In Peruvia.* ♀.

21. *C. oratum* Spr. fol. ovatis acutiusculis venosis basi subtus biglandulosis utrinque ramisque stellato-pubescentibus incanis; petiolis crassis abbreviatis. *In Monterideo.* ♀.

22. *C. padifolium* Vahl; fol. cordato-lanceolatis acutis subrepandis supra stellato-scabris subtus incanotomentosis; glandulis petioli pluribus. *C. astroites.* W. *In ins. Caribaeis.* ♀.

23. *C. costatum* H. et K. fol. ovato-ellipticis cordatis acuminatis subintegerrimis costato-venosis basi biglandulosis glabris; junioribus subtus argenteo-lepidotis. *In Nov. Granata.* ♀.

24. *C. xalapense* H. et K. fol. alternis superioribus ternis v. quaternis ovatis acuminatis cordatis integerrimis basi biglandulosis supra scabriusculis subtus cano-tomentosis. *In Mexico.* ♀.

25. *C. penicillatum* Vent. choix. t. 12. fol. ovalis cordatis acuminatis integerrimis margine ciliato-glandulosis supra cano-pubescentibus subtus cano-tomentosis; petiolo basi apice que fasciculo glandularum pedicellatarum instructo. *C. ciliato-glandulosum* Orteg. *In Mexico.* ♀.

26. *C. flaves L.* fol. subpeltatis cordato-oblongis acutiusculis utrinque dense flavo-tomentosis; glandulis baseos pedicellatis. *In Jamaica.* ♀.

27. *C. humile* L. fol. cordato-ovatis acutis basi biglandulosis ciliatis supra scabris subtus tomentosis. *In Jamaica.* ♀.

** Fol. denticulata

28. *C. organifolium* Lam. fol. ovatis obtusis obsolete denticulatis supra scabris subtus tomentosis; glandulis baseos 2 parvis setaceis. Sloane t. 86. f. 3. Desc. t. 471. *In Hispaniola.* ♀.

29. *C. prungens* Jacq. ic. t. 622. fol. cordato-ovatis longissime acuminate obsolete serrulatis supra stellato-scabris subtus tomentosis, glandulis baseos 4 stipitatis. *C. 4-setum* Lam. *In Nov. Granata.* ♀.

30. *C. collinum* H. et K. ramis dichotomis; fol. ovatis acutis margine undulatis subintegerrimis coriaceis basi glandulis 4 sessilibus instructis supra pubescentibus subtus tomentosis fuscescenti-incanis. *In Quito.* ♀.

31. *C. fulvum* Mart. fol. ellipticis integerrimis dense stellato-tomentosis fusco-rubris; floribus subsolitariis axillaribus. *In Brasilia.* ♀.

32. *C. fragrans* H. et K. fol. ovato-oblongis acuminatis supra stellato-hispidis subtus sericeo-tomentosis glandulis baseos 4 sessilibus. *In Quito* ♀.

33. *C. discolor* Rich. fol. ovato-ellipticis obsolete serrulatis supra glaberrimis lineatis subtus tomentosis glauca, glandulis baseos pluribus; floribus dioecis. *In ins. Caribaeis.* ♀.

34. *C. farinosum* Lam. fol. oppositis ovato-lanceolatis subintegerrimis supra viridibus subtus farinoso-incanis glandulis 2 baseos scutellatis; spicis gracilibus ferrugineo-tomentosis. *In Madagascar.* ♀.

35. *C. laevigatum* Vahl; fol. ellipticis obsolete serratis utrinque glabris, glandulis 2 parvis ad apicem petioli; racemis elongatis; fructibus villosis. *In ins. Hainan ad Chin. oram.* ♀.

36. *C. coccineum* Vahl; fol. ovatis acuminatis subintegerrimis utrinque glabris subtus coccineo-punctatis 3-nerviis glandulis baseos fuscis sessilibus. *In Ceylona.* ♀.

37. *C. Adenophyllum* Bert. fol. cordatis acuminatis utrinque glabris subdenticulatis glanduloso-ciliatis; glandulis baseos parvis sessilibus. *In Jamaica.* ♀.

*** *Folia crenata, dentata, serrata.*

38. *C. aromaticum* L. fol. cordato-ovatis acutis denticulatis subtus subtomentosis glandulis baseos pluribus stipitatis; floribus racemosis. *In Mottuccis.* ♀.

39. *C. corchorifolium* Vahl; fol. oblongis acutis serratis supra glabriusculis subtus ramisque dichotomis stel-

lato-hirsutis glandulis baseos 2 stipitatis scutellatis. In *Brasilia.* ȏ.

40. *C. corylifolium* Lam. fol. cordatis ovatis acutiusculis inaequaliter obtuse serratis utrinque stellato-punctatis glandulis baseos 2 sessilibus; racemis elongatis. In *Hispaniola.* ȏ.

41. *C. populifolium* Lam. fol. sub-peltatis cordato-ellipticis scrrulatis utrinque stellato-pubescentibus subtus albido-tomentosis glandulis baseos sessilibus; ramis fulvis. *C. peltoidium* Kunth. In *Hispaniola et Peruvia.* ȏ.

42. *C. argyratum* Blume; fol. ovato-oblongis basi subcordatis biglandulosis margine subdenticulato-erosis supra glabris subtus argenteo-nitentibus; stipulis subulatis; racemis elongatis terminalibus. In *Java.* ȏ.

43. *C. tiglioides* Blume; fol. oblongis acuminatis basi acutis subdenticulatis glabris; racemis simplicibus terminalibus; fructibus globoso-4-gonis depressis. In *Java.* ȏ.

44. *C. laevifolium* Blume; fol. ovali-oblongis acutis v. acuminatis basi glandulis 2 substipitatis exigue distanter serrulatis glabris; spicis interruptis axillaribus terminalibusque. In *Jara.* ȏ. Arbor 40-50-ped.

45. *C. denticulatum* Blume fol. subrotundo-ovatis acutis inaequaliter dentatis basi subcordatis glandulis 2 pedicellatis subtus dense stellato-tomentosis; racemis alaribus terminalibusque. In *Java.* ȏ.

46. *C. betulinum* Vahl; fol. subcordato-ovatis obtusis crenato-dentatis supra viridibus stellato-punctulatis, subtus incano-hispidulis, glandulis baseos substipitatis. In *ins. Caribaeis.* ȏ.

47. *subluteum* Lam. fol. elliptico-oblongis acutis serratis trinerviis basi biglandulosis subtus flavo-tomentosis; fructibus glabris. *C. gujanense* Aubl. guj. t. 339. In *Gujana.* ȏ.

48. *C. muricatum* Vahl. fol. ovatis acutis crenatis supra sebris subtus stellato-canescensibus basi biglandulosis; ramis muricato-asperis. In *Madagascar.* ȏ.

49. *C. diraricatum* Sw. fol. ovato-oblongis obtusis serratis supra glabris subtus hirsutis, glandulis baseos 2 substipitatis; ramis divaricatis glabris. In *Ind. occ.* ȏ.

50. *C. affine* Vahl; fol. superioribus oppositis oblongis acutis serratis

stellato-pilosus, glandulis baseos 2 peltatis stipitatis. In *Portorico.* ȏ.

51. *C. mauritianum* Lam. fol. cordato-oblongis acutis crenatis utrinque stellato-pubescentibus glandulis 2 marginalibus stipitatis 2 ad apicem petioli sessilibus; racemis fructibusque villosis. In *ins. Mascurensis.* ȏ.

52. *C. coriaceum* Bonpl. fol. ovatis acuminatis profunde cordatis denticulatis coriaceis basi glandulis 2 pedicellatis instructis supra hispido-pilosus subtus albidis lanato-tomentosis. In *Quito.* ȏ.

53. *C. Mutisanum* Bonpl. fol. ovatis acuminatis profunde cordatis obsolete duplikato-dentatis basi glandulis 2 pedicellatis instructis supra adpresso-pilosusculis subtus stellato-cano-pulverulentis. In *Bogota.* ȏ.

54. *C. abutiloides* Kunth; fol. cordato-ovatis longe cuspidatis denticulatis supra stellato-incanis subtus lanato-tomentosis lobis baseos incumbentibus; glandulis 2 pedicellatis. In *Peru.* ȏ.

55. *C. suavis* H. et K. fol. ovato-lanceolatis acutis coriaceis crenatis supra stellato-punctatis incano-tomentosis glandulis baseos 4 stipitatis, In *Nov. Granata.* ȏ.

56. *C. Pavana* Hamilt. arborescens fol. ovatis acuminatis serratis subtrinerviis glabris biglandulosis; racemis subterminalibus; fructibus hispidis; seminibus coccorum exiguis. In *Motuccis.* ȏ.

57. *C. ellipticum* Vahl; fol. oblongis utrinque attenuatis subserratis glabriusculis, biglandulosis; fructibus incanis. In *Java.* ȏ.

58. *C. montanum* Vahl; fol. cordato-ovatis acutis glanduloso-serratis utrinque viridibus glabriusculis, glandulis baseos 2 concavis. In *Guadalupe.* ȏ.

59. *C. quadripartitum* Labill. nov. holl. t. 223. fol. oppositis oblongis utrinque attenuatis serratis triplineriis glabris, glandulis baseos 2 stipitatis; floribus dioecis, calycibus 4-partitis. In *terra Diemen.* ȏ.

60. *C. gossypifolium* Vahl; arborescens fol. amplis cordatis 3-lobis utrinque stellato-tomentosis; lobis ovatis acutis subintegerrimis; glandulis baseos 2 sessilibus. In *ins. Trinatitatis.* ȏ.

61. *C. sanguifluum* H. et K. arboreum; fol. ovatis 3-lobis glabriusculis supra incano-tomentosis, lobis acuminatis denticulatis medio maximo; glandulis 2 sessilibus. *In Nov. Granata.* ♀.

62. *C. trilobatum* Willd. fruticum; fol. 3—5-lobis serratis subtus petiolisque pubescentibus. Beauv. fl. d'Owar. t. 36. *In Guinea.* ♀.

b. *Folia eglandulosa.*

* *integerrima.*

63. *C. reticulatum* W. fol. subpeltatis ovato-oblongis acutis integerrimis triplinerviis venoso-reticulatis glabris subtus resinoso-punctatis; spicis interruptis. *In Ind. or.* ♀.

64. *C. glabellum* L. fol. ovatis obtusiusculis integerrimis laevibus; fructibus pedunculatis. Sloane hist. t. 174. f. 3. 4. *In Jamaica.* ♀.

65. *C. evenium* Vahl; fol. ovatis acutiusculis eveniis glabris integerrimis; spicis erectis; fructibus inferne villosis. *In Am. trop.* ♀.

66. *C. glanduliferum* Vahl; fol. elliptico-lanceolatis acutis venosis integerrimis glabris; calycibus masc. 4-glandulosis. *In?* ♀.

67. *C. umbellatum* W. fol. ovato-oblongis acuminatis integerrimis glabris; floribus umbellatis terminalibus. *In Ind. or.* ♀.

68. *C. bixoides* Vahl; fol. cordato-ovatis integerrimis glabris subtus argenteo-punctulatis; ramis scabris. *In Am. austr.* ♀.

69. *C. laurinum* Sw. fol. oblongis acutis rigidiusculis integerrimis glabris subtus punctatis petiolis verruculosis; racemis axillaribus longissimis. *In Jamaica.* ♀.

70. *C. Pluknetii* Vahl; fol. ellipticas integerrimis subtus incanus; ramis punctatis; racemis lateralibus. *In Curassuo.* ♀.

71. *C. domingense* Vahl; fol. subcordato-ovatis obtusissimis integerrimis supra scabris subtus ramisque stellato-incanis; racemis terminalibus. *In Caracas.* ♀.

72. *C. elaeagnifolium* Vahl; fol. subsessilibus lanceolato-oblongis obtusissimis basi attenuatis subtus incanis; racemis terminalibus. *In?* ♀.

73. *C. dioecum* Cav. ic. t. 6. fol. subsessilibus spathulatis obtusis integrerrimis subtus argenteo-incanis; floribus dioecis. *In Mexico.* ♀.

74. *C. citrifolium* Lam. fol. ovato-lanceolatis integris pulvereo-nitidis; spicis axillaribus; coccis rotundis argenteis verrucosis. Burm. ann. t. 240. f. 2. *In Domingo.* ♀.

75. *C. umbratile* H. et K. fol. subcordato-oblongis acuminatis integrerrimis parallele venosis supra stellatoscabris, subtus incanis; fructibus villosis. *Ad Orinocum.* ♀.

76. *C. viscosum* Labill. nov. Holl. t. 221. fol. lanceolatis integrerrimis supra nitidis; floribus subsolitariis axillaribus pedunculatis. *In Nov. Holl.* ♀.

77. *C. argothamnooides* Bert. fol. oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis subsessilibus integerrimis subtus subsericeo-pubescentibus; floribus subfasciculatis; calyce masc. duplo. *Ad fl. Magd.* ♀.

78. *C. heliotropifolium* H. et K. fol. subcordatis mucronatis integrerrimis subtus incano-pubescentibus. *In Quito.* ♀.

79. *C. quitense* Spr. fol. spatulatis obtusis integerrimis parallele venosis subtus stellato-pubescentibus. *C. alnifolium* H. et K. *In Quito.* ♀.

80. *C. turidum* Vahl; fol. ovato-lanceolatis acutis integerrimis utrinque pubescentibus luridis; racemis terminalibus. *Patria?* ♀.

81. *C. Vahtii* Geis. fol. ovatis acutis integerrimis nervoso-venosis subtus stellato-pubescentibus; racemis axillaribus ferrugineo-tomentosis. *Patria?* ♀.

82. *C. titiaefolium* Lam. fol. cordatis acuminatis serratis subtus villosotomentosis; spica terminali. *C. populifolium* Lamb. *Plum.* ic. t. 123. *In ins. St. Vincent.* ♀.

83. *C. prunifolium* Vahl; fol. ovatis obtusis integerrimis venosis utrinque argenteo-lepidotis; floribus paniculatis axillaribus; fructibus nitido-squamosis. *In Hispaniola.* ♀.

84. *C. nitens* Sw. fol. cordato-ovatis acutis integerrimis subtus lepidotis argenteo-micantibus; racemis axillaribus erectis. *C. syringaefolium* et *argyrophyllum* H. et K. *In Jamaica et Nov. Granata.* ♀.

85. *C. Argyranthemum* Michx. fol. obovatis obtusis integerrimis subtus argenteo-micantibus; racemis terminalibus fusco-lepidotis. *C. reflexifolium* H. et K. *In Am. bor. et austr.* ♀.

86. *C. Elateria* L. fol. ovato-elipticis acutiusculis integerrimis supra sparse subtus intenue stellato-lepidotis micantibus; ramis compressis fuscouscentibus; racemis spicatis axillaribus. Sloane t. 174. f. 2. Dusseld. off. Pf. 18. t. 24. Wagn. t. 243. *In Ind. occ.* ♀.

87. *C. squamulosum* Vahl; fol. ovato-oblongis acuminateis integerrimis utrinque argenteo-lepidotis; racemis axillaribus foliatis. *In Hispaniola.* ♀.

88. *C. punctatum* Jacq. fol. oppositis ovato-lanceolatis acutis supra glabris subtus ramisque dense argenteo-lepidotis fuscouscentibus; ramis ternis dichotomis; racemis axillaribus spicatis abbreviatis. *C. trichotomum* Geis. *In Brasilia.* ♀.

89. *C. gracile* H. et K. fol. linear-lanceolatis obtusis submucronatis utrinque densissime argenteo-lepidotis; racemis spicatis axillaribus. *In Mexico.* ♀.

90. *C. cascarilloides* Vahl; fol. lanceolatis elongatis acuminatis undulatis venosis subtus dense lepidotis micantibus. *C. Cascarilla* Lam. *In Hispaniola.* ♀.

91. *C. floribundum* Spr. fol. eliptico-oblongis acutiusculis integerrimis supra scabris subtus dense stellato-argenteis; racemis terminalibus elongatis compositis. *In Brasilia.* ♀.

92. *C. montevidense* Spr. fol. oblongo-lanceolatis utrinque sparse stellato-lepidotis; spicis axillaribus. *In Montevideo.* ♀.

93. *salicifolium* Vahl; fol. linear-lanceolatis acutis integerrimis supra glabris subtus incano-lepidotis; floribus dioecis. *In Jara.* ♀.

94. *C. macrophyllum* Sw. fol. subpeltatis cordato-subrotundis acuminatis coriaceis tomentosis subtus ferrugineo-venosis; racemis axillaribus. *C. venosum* Geis. *In Jamaica.* ♀.

95. *C. sidaefolium* Lam. fol. cordato-oblongis acuminatis subintegerrimis supra sparse lepidotis subtus dense stellato-tomentosis; racemis terminalibus. *In Hispaniola.* ♀.

96. *C. teprorum* W. fol. subcordato-lanceolatis acuminatis integerrimis supra sparse lepidotis subtus dense stellato-tomentosis; racemis terminalibus. *In ins. Caribaeis.* ♀.

mis supra stellato-scabris subtus ramisque dense tomentosis; racemis spicaeformibus axillaribus elongatis; floribus fasciculatis. *C. Cortesianum* H. et K. *In Mexico.* ♀.

97. *C. Vaillantii* Vahl; fol. subovato-lanceolatis integerrimis supra laevibus lineatis subtus tomentosis; spicis sessilibus. *Patria?* ♀.

98. *C. martimum* Walt. fol. elipticis subcoriaceis supra rugosis stellato-hirtis subtus lepidoto-tomentosis. *C. disjunctiflorum* Michx. *In Carolina et Mexico.* ♀.

99. *C. pellitum* H. et K. fol. elipticis integerrimis utrinque stellato-tomentosis fuscouscentibus; floribus axillaribus subsolitariis. *C. fulvum* Mart. *In Peruria et Brasilia.* ♀.

100. *C. incanum* H. et K. fol. eliptico-oblongis submucronatis integerrimis supra pubescentibus subtus lana-to-tomentosis. *In Mexico.* ♀.

101. *C. fragile* H. et K. fol. ovato-oblongis acuminatis mucronatis subtrinerviis supra sparse stellato-pubescentibus subtus ramisque tomentosis. *In Nov. Granata.* ♀.

102. *C. pedicellatum* H. et K. nov. gen. t. 104. fol. ovatis cordatis acuminatis integerrimis supra pubescentibus subtus tomentosis; flore femineo solitario pedicellato spicam superante. *Ad flum. Amazonum.* ♀.

103. *C. stipulaceum* H. et K. fol. longe petiolatis ovatis subacuminatis cordatis integerrimis supra tenuissime pubescentibus subtus albido-tomentosis; stipulis longissimis. *In Nov. Hispan.* ♀.

104. *C. suberosum* H. et K. ramis suberosis fol. ovato-subrotundis acutis cordatis integerrimis crassiusculis supra canescenti-pubescentibus subtus incanus villosa-tomentosis eglandulosis; floribus dioecis. *Prope Acapulco.* ♀.

105. *C. mucronatum* W. fol. cordato-subrotundis obtusis mucronatis utrinque dense tomentosis; ramis ferrugineis. *In Am. trop.* ♀.

** *Folia denticulata, dentata et serrata.*

106. *C. Astroites* Ait. fol. cordato-oblongis acuminatis subdenticulatis utrinque stellato-tomentosis subtus incanus. *C. venosum* Nees. Düss. 3. t. 24. *In ins. Caribaeis.* ♀.

107. *C. rhamnifolium* H. et K. fol. ovato-oblongis acutis membranaceis subdenticulatis supra glabris subtus stellato subcanescens. *In Nov. Granata.* ♂.

108. *C. niveum* Jacq. fol. cordato-ovatis subserratis supra scabris subtus argenteo-tomentosis. *In Ind. occ. et Columbia.* ♂.

109. *C. salviaefolium* H. et K. fol. ovato-oblongis acutiusculis obsolete mucronatis minutissime denticulatis supra hispidulis subtus mollissime villosa - tomentosis incanis. *Ad fl. Magdalenea.* ♂.

110. *C. conduplicatum* Bonpl. fol. ovato-oblongis angustatis submucronatis denticulatis complicatis supra glabris subtus tenuiter cano-tomentosis; spicis gracilibus. *In Cumana.* ♂.

111. *C. fuscescens* Spr. fol. lanceolatis acuminatis subserrulatis supra dense minuteque stellatis subtus tomentosis; ramis fusco-villosis villis apice stellulatis. *In Brasilia.* ♂.

112. *C. rhombifolium* Willd. fol. rhomboe-ovatis acuminatis repandis glabris subtus resinoso-punctatis; racemis paniculatis pubescentibus. *In Ceylona.* ♂.

113. *C. barbatum* H. et K. fol. ovato-ellipticis acutiusculis subcrenatis utrinque mollissime tomentosis basi intense rufo-barbatis. *In Cumana.* ♂.

114. *C. marginatum* H. et K. fol. ovato-oblongis obtusis apice crenulato-serratis supra glabris subtus sparse stellato-scabris rubro-marginatis; calyce fem. glanduloso-hispido. *In Cumana.* ♂.

115. *C. sphaerocarpum* H. et K. fol. cordato-ovatis acuminatis membranaceis subdenticulatis subtus incano-tomentosis; fructibus globosis stellato-incanis. *In Mexico.* ♂.

116. *C. lucidum* Sw. fol. ovato-oblongis acutiusculis remote dentatis utrinque glabris pellucido-punctatis; racemis terminalibus; calycibus fructu glabro majoribus. *C. spicatum* Berg. *C. portoricense* Vahl. *In Cuba.* ♂.

117. *C. diffusum* Rich. fol. oblongo-lanceolatis mucronatis apice serrulatis subtrinerviis supra glabris subtus ramisque hirsutis; floribus fem. corymbosis; calycibus hispidis. *C. ovalifolium* West. *In Caribaeis.* ♂.

118. *C. vestitum* Spr. fol. linearilanceolatis apice obsolete serrulatis

utrinque stellato-hirtis; stipulis gracilibus pectinatis. *In Brasilia.* ♂.

119. *C. campestre* Hil. pl. bras. t. 60. ramis apice compressis; fol. dense tomentosis obovatis denticulatis; spicis axillaribus folio longioribus. *In Brasilia.* ♂.

120. *C. antisiphiliticum* Mart. fol obovato-oblongis inaequaliter duplicito-serratis pilis stellatis rigidis subpulveraceis; fructibus rigido-pilosis. *In Brasilia.* ♂.

121. *C. oppositifolium* Vahl; fol. superioribus oppositis cordato-ovatis acutis dentato-serratis supra sparse stellato-pilosis subtus villosis 3-nerviis; calycibus hirsutis. *In Guinea.* ♂.

122. *C. Iserti* Vahl; fol. subcordato-oblongis acuminatis inaequaliter crenatis glanduloso-dentatis utrinque dense stellato-hirsutis incanis; spicis axillaribus abbreviatis. *In Martinica et Jamaica.* ♂.

123. *C. hispidum* H. et K. fol. cordato-ovatis acuminatis serratis sub-5-nerviis utrinque sparse stellatis; racemis terminalibus aggregatis; calycibus fem. glanduloso-ciliatis. *In Carracas et Brasilia.* ♂.

124. *C. hircinum* Vent. malm. t. 52. glanduloso-viscosum; fol. subcordato-ovatis acuminatis serratis stipulis linearibus; petiolis ramisque hirtis. *In Ind. or.* ♂.

125. *C. althaeafolium* Vahl; fol. cordato-oblongis obtusiusculis serratis utrinque demum glabris; spicis elongatis laxis; calyce femineo solitario basilari. *In Brasilia.* ♂.

126. *C. cassinoides* Lam. fol. oppositis ovatis obtusiusculis apice serratis utrinque laevibus; petiolis ramisque villosiusculis. *In Madagascar.* ♂.

127. *C. congestum* Lour. fol. ovatis inciso-serratis venosis glabris; floribus congestis axillaribus; fructibus pendulis. *In China.* ♂.

128. *C. tabacifolium* Vahl; fol. ellipticis serratis venosis supra pubescentibus subtus villosa-tomentosis; floribus dioecis. *In Ind. or.* ♂.

129. *C. Colliguay* Molin. fol. oppositis subsessilibus lanceolatis denticulatis carnosus scabris; spicis axillaribus; calycibus masc. 4-fidis. *In Chilli.* ♂.

130. *C. dichotomum* W. fol. lanceolatis inaequaliter grosse serratis supra stellato-scabris subtus tomen-

tosis; spicis axillaribus, ramis dichotomis divaricatis. *In Hispaniola.* ♀.

*** Folia subdivisa.

131. *C. capense* L. fol. lanceolatis glabris integris triloboche hastatis; fructibus lignosis. *In Afr. austr.* ♀.

132. *C. heterophyllum* H. et K. fol. ovatis acuminatis serrulato-denticulatis integris 3-loboche hastatis supra pubescentibus subtus stellato-tomentosis; floribus dioecis. *In Nov. Granata.* ♀.

133. *C. hibiscifolium* H. et K. fol. 5-lobis profunde cordatis grosse sinuato-dentatis supra molliter pubescentibus subtus tenuissime cano-tomentosis eglandulosis lobis acuminatis exterioribus minimis. *In Nov. Granata* ♀.

B' Herbacea.

134. *C. urticaefolium* Lam. fol. subcordato-ovatis acutis subserratis utrinque stellato-hirsutis, glandulis baseos sessilibus; racemis terminalibus. *In Ind. occ. et Brasilia.* ○.

135. *C. chamaedryfolium* Lam. fol. subcordato-ovatis venosis obtuse serratis utrinque ramisque pilosis glandulis baseos histipulatis; floribus spicatis terminalibus. *In Jamaica et Hispaniola.* ○.

136. *C. acutum* Thunb. fol. ovatis acuminatis serratis glabris glandulis baseos 2 sessilibus; racemis axillaribus. *In Japonia.* ♀.

137. *C. triquetrum* Lam. fol. cordato-ovatis acuminatis serrulatis subtus stellato-tomentosis, glandulis baseos 2 sessilibus; caule 3-quetro angulis lanatis. *In Brasilia.* ○.

138. *C. caudatum* Vahl; fol. cordatis ovatis serratis stellato-scabris; glandulis petioli stipitatis; racemis longissimis; caule angulato. *In Ind. or.* ○.

139. *C. solanifolium* Vahl; fol. oblongis acutis repando-serratis glaberrinis, glandulis baseos 2 marginalibus; spinulis minutis ad basin petioli; racemulis axillaribus; flore femineo solitario reflexo. ○.

140. *C. capitatum* Michx. fol. ovato-lanceolatis integerrimis tomentosis; spicis capitatis axillaribus. *In Carolina.* ○.

141. *C. strigosum* Spr. fol. ovalioblongis integerrimis subtus stellato-strigilosis; racemis axillaribus; fructibus hirsutis. *In Hispaniola.* ○.

142. *C. pilosum* Spr. fol. oblongo-lanceolatis integerrimis supra glabris subtus ramisque substellato-pilosus; calycibus fem. ciliatis. *In Ind. or.* ○.

143. *C. argenteum* L. fol. subcordato-ovatis acutiosculis apice dentatis 5-nerviisstellulato-scabris subtus argenteis; floribus axillaribus globigeratis; calycibus fem. laciiniatis. *Ad fl. Magdaleneae.* ○.

144. *C. lanceolatum* Cav. ic. t. 575. f. a. fol. lanceolatis glabris integerrimis petiolatis junioribus ciliatis; racemis axillaribus pedunculatis; petalis apice dentatis. *C. tricuspidatum* Lam. *In Chili.* ○.

145. *C. castaneaefolium* L. fol. oblongo-lanceolatis subserratis glabris; spicis axillaribus. *In Jamaica et Am. austr.* ○.

146. *C. morifolium* Willd. fol. subrotundo-ovatis acutis serrulatis subtus pubescentibus; spicis axillaribus. *In Am. austr.* ○.

147. *C. palustre* L. fol. ovato-lanceolatis mucronato-serratis venosis glabrescens; caule hirsuto; fructibus glandulos-hispidis calycibus fem. 6-partitis. *In Mexico.* ○.

148. *C. setigerum* Hook. parvum dichotome ramosum pilis stellatis ubique incano-tomentosum; caule petiolisque setis patentibus hispidissimis; fol. late ovatis obtusis petiolo brevioribus. *In Am. bor.* ○.

** Folia lobata.

149. *C. spinosum* L. fol. palmato-5-lobis spinuloso-serratis; floribus lateribus subsessilis. *In Ind. or.* ○.

150. *C. riparium* H. et K. fol. longe petiolatis trilobis crenatis subtus stellato-tomentosis; fructibus stellato-pilosus. *Ad flum. Amazonum.* ○.

1927. ROTTLERA Roxb. (1832).

1. *R. philippicensis* Ad. Juss. fruticosa; ramis subtomentosis; fol. ovatis acutis subintegerrimis, supra laevibus subtus reticulatis tomentosis; petiolis apice biglandulosis. *C. philippicense* Lam. *In ins. Philippinis.* ♀.

2. R. punctata Adr. Juss. fruticosa; fol. oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis obtusis integerrimis venosis supra laevibus subtus fusco-punctatis argenteo-lepidotis; glandulis baseos obsoletis. *Croton punctatum* Lour. In China. ♂.

3. R. acuminata Adr. Juss. fruticosa; fol. cordato-ovatis acuminate remote dentatis 3-nerviis subtus pumicato-inecanis eglandulosis basi utrinque maevulatis. *Croton Lam.* C. maculatum Vahl. In Java. ♂.

4. R. paniculata Adr. Juss. fruticosa; fol. ovatis acuminate subdentatis supra glabris subtus tomentosis basi biglandulosis; floribus paniculatis. *Croton Lam.* In Java et Zeylona. ♂.

5. R. rusciflora Spr. fruticosa; ramis sub-4-gonis; fol. inaequaliter cordatis acuminate integerrimis 5-nerviis glabris; floribus solitariis dioecis. *Trewia Roth.* In Ind. or. ♂.

6. R. chinensis Adr. Juss. fruticosa; fol. ovatis acutis subdentatis supra glabris subtus tomentosis basi biglandulosis. In China. ♂.

7. R. cantoniensis Spr. fol. ovatis integerrimis glabris albicanibus; fructibus villosissimis. *Ricinus apelta* Lour. In China. Ⓢ.

8. R. tinctoria Roxb. arborescens; fol. elliptico-oblongis utrinque attenuatis integerrimis basi biglandulosis subtus pubescentibus; floribus racemosis dioecis. In Ind. or. ♂.

9. R. japonica Spr. herbacea; fol. ovatis acuminate integris 3-lobisque glabris; floribus spicatis. *Croton Thunb.* In Japonia. Ⓢ.

10. R. tiliaefolia Blume; fol. oppositis subrotundo-ovatis acuminate subdenticulatis basi interdum cordatis subtus glaucis junioribus spicisque stellato-pubescentibus; caule arborescente. In Java. ♂.

11. R. oppositifolia Blume; fol. oppositis altero minore ovato-v. ovalioblongis acuminate basi obtusis biglandulosis repandis subtus et spicis axillaribus pilis stellatis puberis; capsulis inermibus. In Java. ♂. Arbor 50-ped.

12. R. dispar Blume; fol. oppositis altero duplo minore oblongis acuminate basi obtusis denticulatis subtus et spicis axillaribus pubescentibus;

capsulis molliter echinatis. In Java. ♂. Frut. 8-pedalis.

13. R. viscida Blume; fol. ovatis v. subrhomboido-ovatis acuminate subintegerrimis supra viscidis subtus racemisque subsimplicibus axillaribus terminalibusque tomentosis; capsulis inermibus. In Java. ♂.

14. R. multiplandulosa Blume; fol. subrotundo-ovatis indivisis aut semi-trilobis grosse sinnato-dentatis basi glandulosis supra glabris subtus et panicula terminali fastigata stellato-tomentosis; capsulis inermibus. In Java. ♂.

4928. ANTHEROSPERMA R. Br. (1810).

1. A. moschata Labill. nov. Holl. t. 224. In Nov. Holl. ♂. Arbor fol. elliptico-lanceolatis supra nitidis; floribus axillaribus solitariis reclinatis.

4929. DACTYLOSTEMON Klotsch. (1841.)

1. D. Klotsch. in Erichs. Arch. 7. t. 8. f. a. In Am. trop. ♂.

4930. ACTINOSTEMON Mart. ex Klotsch. (1841.)

1. A. Klotsch. l. c. t. 8. f. d. In Brasilia. ♂.

4931. LEPTORACHIS Klotsch. (1841.)

1. L. Klotsch. In Brasil. ♂. Suffrutex volubilis fol. longe petiolatis hastatis denticulatis, floribus racemosis.

4932. CARYOTA L. (1747).

1. C. urens L. pinnulis membranaceo-coriaceis oblique triangularibus aut dimidiato-rhombeis deorsum cuneatis latere exteriore productiore antice inaequaliter dentalis; florum masculorum staminibus 18-32; baccis depresso-globosis dispermis. *Mart. palm.* t. 107, 108, 162. t. V. f. 1. et t. Y. f. 1. 2. *Gaertn.* t. 7. f. 3. Ann. du

Mus. 13. t. 3. f. 29. Rheede 1. t. 11.
In Ind. or. 2.

2. *C. sobolifera* Wall. in Mart. palm. t. 107. f. 2. junior vel acaulis jam sobolifera; pinnis membranaceo-coriaceis oblique triangularibus aut dimidiato - rhomboides deorsum cuneatis, antice inaequaliter profunde et laciniate - dentatis; staminibus 12 - 18; baccis depresso - globosis 1 - spermis. *C. urens* Jacq. fragm. t. 12. f. 1. In ins. Maurili. 2.

3. *C. mitis* Lour. caudice mediocri; frondibus reclinati; rachibus partitibus longis tenuibus nutantibus; pinnis cuneiformibus oblique praemorsis; antheris subsessilibus; baccis 1-spermis magnitudine globi sclopetarii. In Cochinchina. 2.

4. *C. propinqua* Blume; caudice elato; pinnulis coriaceis sessilibus dimidiato - rhomboides antice praemorsis; spadicibus glabris; staminibus 24 - 27; baccis 1-spermis. In Java. 2.

5. *C. maxima* Blume; caudice prae-alto; pinnulis coriaceis subpetiolatis elongatis dimidiato-lanceolatis acuminatissimis, infimis labelliformibus; spadicibus glabris. In Java. 2.

6. *C. furfuracea* Blume; caudice elato; pinnulis membranaceo-coriaceis sessilibus labelliformibus cuspidatis antice praemorso - dentatis; spadicibus furfuraceis; florum masculorum calycibus margine sphacelatis; staminibus plerumque 22; baccis 1-spermis. In Java. 2.

7. *C. Rumphiana* Mart. caudice elato; pinnulis cuiusve racheos partitatis infimis sessilibus rhomboides antice dentatis; rachi adpressis superioribus dimidiato-rhomboideis antice dentatis basi longe cuneatis subpedicellatis; baccis dispermis. Rumph amb. 1. t. 14. In Ind. or. 2.

4933. BEGONIA L. (1747).

a. Perennies.

* Tuberoseae.

1. *B. octopetala* Herit. st. 101. fol. longe petiolatis cordatis lobatis serratis; pedunculo longissimo; floribus masc. 8- fem. 6-petalis; ala capsulae oblonga elongata. B. M. t. 3559. *B. grandiflora* fl. Cab. t. 25. In Peruia. 2.

2. *B. discolor* R. Br. fol. inaequaliter cordatis acuminatis angulato-serrulatis subtus sanguineis; pedunc. dichotomis bisporis; capsulae alis obtusangulis inaequalibus. *B. Evansiana* B. Rep. t. 607. B. M. t. 1743. In China. 2.

3. *B. picta* Sm. exot. Bot. t. 101. caule brevi herbaceo fol. profunde cordatis serratis acutis rugosis hirsutis subtus maculatis; pedunculis 3-fidis; capsulae tomentosae alis abbreviatis; Hook. exot. fl. t. 89. B. Cab. t. 571. B. M. t. 2962. In Nepalia. 2.

4. *B. tenera* Dryand. lin. Trans. 1. t. 16. acaulis; fol. inaequali-cordatis; floribus umbellatis. In Ceylona. 2.

5. *B. tuberosa* Dryand. repens; fol. inaequaliter cordatis angulatis dentatis; capsulae alis parallelis. Rumph. 5. t. 169. In Amboina et Celebes. 2.

6. *B. pedunculosa* Wall. pl. as. t. 97. carnosia villosa; fol. semicordatis falcato-oblongis grosse duplicato-dentatis; floribus paniculatis longissime pedunculatis; capsulae alis acutangulis, tertia elongata. In Ind. or. 2.

7. *B. echinata* Wall. in Royle ill. t. 81. f. 1. fol. subaequaliter cordatis acuminatis inaequaliter duplicato-serratis supra reticulato-venosis subtus rubentibus utrinque pilosis; capsulae densestellato-tomentosae alis acutis una maxima. In Himalaya. 2.

8. *B. tenella* Don; fol. subaequaliter cordatis acuminatis duplicato-serratis glabris; scapo filiformi subbifloro; capsulae alis obtusangulis. In Nepalia. 2.

9. *B. monoptera* Lk. et Otto ic. t. 14. fol. subrotundo - spathulatis oblique truncatis sinuato-crenatis papillosis subtus sanguineis; floribus thyrsoides; capsulae ala unica. B. M. t. 3564. In Peruia. 2.

10. *B. bulbillifera* Lk. et Otto I. c. t. 45. caule simplici bulbillifero; fol. oblique cordatis acuminatis subangulato-crenatis parum ciliatis; pedunc. axillaris 1-floris; germinibus apteris. In Mexico. 2.

11. *B. gracilis* H. et K. caule herbaceo simplici fol. semicordatis duplicato-serratis acuminatis subseptentrivibus; pedunc. 1-floris. In Mexico. 2.

12. *B. Barkeri* Knowl. et Westc. B. Cab. t. 135. acaulis; fol. inaequaliter cordatis obsolete lobatis acutis

supra glabris nitidis subtus hirsutis; scapo longissimo piloso; floribus masc. dipetalis cymosis, cyma ramosissima; petalis obovatis subtus pilosis. In Mexico. 4.

13. *B. nana* Herit. stirp. t. 48. acaulis; fol. lanceolatis acuminatis serrulato - ciliatis; scapo subbifloro; capsula submonoptera. In Madagascaria. 4.

14. *B. Martiana* Lk. et Otto l. c. t. 29. caule ramoso bulbillifero; fol. dimidiato-cordatis acuminatis angulo-serratis glaberrimis; pedunc. axillaris paucifloris; capsula elongata inaequaliter alata. Paxt. 11. p. 51. c. ic. In Brasilia. 4.

15. *B. diptera* Dryand. acaulis; fol. inaequaliter cordatis denticulatis; pedunculis dichotomis; capsulae alis 2 inaequalibus. *B. obliqua* L. In Brasilia. 4.

16. *B. scandens* Sm. caule scandente radicante; fol. subrotundo-ovatis obsolete dentatis glaberrimis nitidis; capsulae ala maxima obtusangula, caeteris minimis. *B. glabra* Aubl. guj. t. 349. *B. populifolia* Schott. *B. denticulata* H. et K. In Guiana et Jamaica. 4.

17. *B. peltifolia* Schott; acaulis; fol. peltatis oblique ovatis acutis integerrimis supra glabris subtus ferrugineo-tomentosis; fructus alis binis rotundatis tertia maxima obtusa. In Brasilia. 4.

18. *B. concinna* Schott. acaulis; fol. peltatis oblique ellipticis acuminatis integerrimis utrinque pilosis; florum masculorum petalis exterioribus orbicularibus; capsula ala tertia maxima. In Brasilia. 4.

19. *B. depauperata* Schott; acaulis subbifolia; fol. subcordato-oblongis acuminatis inaequaliter serratis glabris supra alto-macuiatis subtus purpurascens; filamentis in columnam elongatam concretis. In Brasilia. 4.

20. *B. diversifolia* Grah. B. M. t. 2966. herbacea glaberrima; fol. radi calibus reniformibus late crenatis, caulinis sublobatis inaequaliter argute serratis inferioribus reniformibus; floribus axillaribus congestis; capsulae ala maxima acutangula. In Peruvia. 4.

** Repentes.

21. *B. orbiculata* Jak; subacaulis; fol. orbiculatis crenatis glabris; pedunc.

subdichotomis; capsulae alis subae qualibus obtusangulis. In Bengal. 4.

22. *B. rotundifolia* Dryand. fol. reniformi-subrotundis crenulatis. Plum. ic. t. 45. In Ind. occ. 4.

23. *B. caespitosa* Jack; subacaulis; fol. inaequilateris cordatis angulatis acuminatis glabris; pedunculis dichotome cymosis; capsulae alis ae qualibus obtusangulis v. rotundatis. In Bengal. 4.

24. *B. sublobata* Jack; fol. cordatis sub-5-lobis v. angulatis dentato-serratis margine reflexis glabris: capsulae alis aequalibus obtusangulis. In Puto-Penang. 4.

25. *B. repens* Blume; herbacea; fol. subrotundo-ovatis inaequaliter cordatis acutis v. obtusis repandis cilia tis supra glabris subtus petiolisque pilosiusculis; cymis longe pedunculatis; capsulae alis deltoideis. In Jara. 4.

26. *B. saxatilis* Blume; herba cea; fol. subrotundo-ovatis subinaequaliter cordato - angulatis obsolete denticulatis glabris; pedunculis erectis paucifloris; capsulae alis obtusis. In Java. 4.

27. *B. muricata* Blume; fol. ovato-acutis inaequaliter cordatis supra mu ricatis subtus papilloso-pubescentibus in venis petiolisque tomentosis; capsulae alis parallelis. In Jara. 4.

28. *B. lepida* Blume; caule her baceo inferne repente; fol. subcuneato-oblongis semicordatis acutis exigue serrulatis versus apicem grosse et inaequaliter dentatis subtus in venis strigulosis; racemis compositis oppo sititioliis. In Java. 4.

29. *B. rubra* Blume; herbacea; fol. subrotundo-ovatis inaequaliter cordatis acutis remote denticulatis cilia tis discoloribus supra glabris in venis subtus petiolis cauleque dense tomen tosis; pedunculis filiformibus bifidis. In Java. 4.

30. *B. reptans* Benth. caule radicante; fol. longe petiolatis oblique ovato-lanceolatis acuminatis inaequa liter dentatis, supra rigidio-pilosis subtus glabris furfuraceo-punctatis; capsulae alis latissimis falcato-ovatis. In Mexico. 4.

31. *B. Urticae* Spr. radicans her bacea; fol. oblique ovatis, dupli catoserratis utrinque hispidis; capsulis basi tricornibus. Sm. ic. t. 45. In Nova Granata. 4.

32. *B. geranifolia* Hook. B. M. t. 3387. glaucescens glaberrima; fol. aequaliter cordatis acutis, acute lobatis inciso-serratis subuplicatis nitidissimis fusco-marginatis subtus concoloribus; petalis 2 exterioribus extus rubris intus albis. *In Peruvia.* 2.

33. *B. crassicaulis* Lindl. B. R. XV. t. 44. fol. palmatis profunde partitis, laciniis subpinnatifidis inciso-dentatis subtus petiolisque ferrugineo-pilosus; caule carnoso articulato crasso; paniculis densis ferrugineo-pubescentibus; sepalis rotundis. *In Guatemala.* 2.

34. *B. hydrocotylifolia* Hook. B. M. t. 3968. pubescens, caule crasso brevi squamoso; fol. petiolatis cordatis rotundatis; pedunc. axillaris folio duplo longioribus; floribus racemoso-paniculatis dipetalis; capsulae alis aequalibus. *Patria?* 2.

35. *B. punctata* Klotzsch. ic. pl. h. Berol. t. 7. fol. cordatis 7-lobatis margine inaequaliter sinuato-dentatis setoso-ciliatis utrinque sparse pilosis; petiolis longitudinaliter sulcato-striatis patentim pilosis apice annulatim purpureo-harbatis; sepalis extus coccineo-punctatis. *In Mexico.* 2.

36. *B. heracleifolia* Cham. et Schl. acaulis; fol. cordato-orbiculatis profunde 7-lobatis lobis lanceolatis sinuatibus denticulatis ciliatis utrinque sparse pilosis subtus pallidis nervis rubescensibus hirtellis, petiolo pedunculoque patentim hirsutis. B. M. t. 3444. *In Mexico.* 2.

37. *B. netumbiifolia* Cham. et Schlecht. acaulis; fol. peltatis oblique orbiculatis acuminatis obsolete denticulatis subintegerrimis ciliatis utrinque glabris subtus pallidioribus 9-nerviis nervis subtus fuscescentibus retrorsum hirtellis rete elegantissimo. *In Mexico.* 2.

38. *B. macrophylla* Dryand. caulescens; fol. inaequaliter cordatis crenato-dentatis inferioribus angulatis; capsulae alis obtusangulis una maxima. *B. grandifolia* Jacq. Plum. ic. t. 45. f. 2. *In Jamaica.* 2.

39. *B. stigmosa* Lindl. B. R. n. ser. XVIII. caule brevissimo repente; fol. oblique cordatis acutis indivisis ciliatis subintegris supra maculis discoloribus compressis; petiolis ramificatis; panicula subcymosa; capsulae alis obtusis altera maxima. *Patria?* 2.

40. *B. albo-coccinea* Hook. B. M. t. 4172. fol. oblique ovatis obtusissimis peltatis coriaceo-carnosis sublobato-sinuatis glaberrimis, petiolis adpresso-hirsutis; sepalis 2 exterioribus rotundatis extus coccineis, reliquis albis obovatis; capsula late trialata. *In Ind. or.* 2.

41. *B. rubricaulis* Hook. B. M. t. 4131. acaulis pubescenti-pilosa; fol. petiolatis oblique cordatis sinuato-lobatis serratis rugosis basi profunde bilobis; scapis crassis superne paniculato-ramosis; floribus speciosis 5-petalis; capsulae ala tertia maxima. *Patria ignota* 2.

42. *B. peltata* Hask. fol. coriaceis peltatis subrotundo-ovatis acutis glanduloso-crenatis subtus cum petiolo ramis pedunculisque atro-sanguineis; floribus roseis corymbosis. *In Java.* 2.

*** Erectae.

1. Folia lobata.

43. *B. acerifolia* H. et K. nov. g. t. 644. herbacea dichotome ramosa; fol. longe petiolatis semicordatis 5-6-fidis acutis argute serrulatis subhirsutis; pedunc. terminalibus elongatis. *In Mexico.* 2.

44. *B. longipes* Hook. B. M. t. 3001. caule arborescente superne glanduloso-aspero; fol. inaequaliter cordato-reniformibus angulatis serratis supra glaberrimis subtus pubescentibus; cymis dichotomis; capsulae ala maxima solitaria. *In Mexico.* 2.

45. *B. micrantha* Steud. fruticosa erecta; fol. longe petiolatis cordatis aequilateris 5-lobis; lobis acutis incisis duplicato-serratis ciliatis subtus in nervis venisque ferrugineo-tomentosis; corymbis dichotomis; capsulae alis aequalibus angustis. *B. parviflora* Poepp. et Endl. nov. g. t. 12. *In Chili.* 2.

46. *B. platanifolia* Schott; caule arborescente; fol. 5-lobis scabriusculis, lobis ovatis acutis sinuato-dentatis; cymis dichotomis. *In Brasilia.* 2.

47. *B. lobata* Schott; suffruticosa incano-tomentosa; fol. inaequaliter reniformibus obtuse lobatis denticulatis; capsulae ala tertia maxima linearielliptica horizontali. *In Brasilia.* 2.

48. *B. vitifolia* Schott; caule arborescente; fol. inaequaliter reniformi-

bus angulato-sublobatis serratis utrinque hirtis; cymis dichotomis; perigonio pubescente; capsulae alis 2 angustissimis maxima acutangula. *B. reniformis* Hook. *B. M. t. 3225.* *B. truncata* fl. flum. 10. t. 47. In Brasilia. 2.

49. *B. parrifolia* Schott; suffruticosa glabra; fol. inaequaliter cordatis lobatis, lobis acutis undulatis sparse serratis subglaucous; capsulae alis subaequalibus deltoideis. *B. M. t. 3720.* In Brasilia. 2.

50. *B. sinuata* Grah. caulescens ramosissima ubique glaberrima; fol. inaequali-cordatis lobatis acutis obtuse dentatis nitidis subtus in venis coloratis; pedunculis bifidis ramis bifloris; capsulae alis acutis. *B. M. t. 3731.* In Brasilia. 2.

51. *B. pentaphylla* Walp. caule simplici nodoso muricato; fol. 5-7-digitatis; foliolis lanceolatis acuminate inaequaliter argute serratis lucidis glanduloso-muricatis; cymis longe penduculatis dichotomis; floribus dioecis, masculis albis; filamentis apice in crassatis. *B. muricata* Scheidw. In Brasilia. 2.

52. *B. digitata* Raddi; fol. digitatis subundenis; foliolis lanceolatis inaequaliter serratis glabris; capsulae alis rotundatis aequalibus. *B. verticillata* Velloz. fl. flum. 10. t. 45. In Brasilia. 2.

53. *B. Lindleyana* Walp. fruticosa; caulis carnosus ferrugineo-pubescentibus; fol. longe petiolatis concavis oblique ovatis inciso-dentatis subtus pubescentibus; paniculis ferrugineo-tomentosis; floribus dipetalis. *B. vitifolia* Lindl. In Guatimala. 2.

54. *B. hirsuta* Aubl. guj. t. 348. caulescens; fol. semicordatis angulato-incisis serrulatis hispidis; capsulae ala maxima obtusangula, reliquis minimis. In Guiana. 2.

55. *B. suffruticosa* Mssn. glaberrima; caule flexuoso basi lignoso; fol. obliquis palmatim 3-4-lobis, lobis lanceolatis pinnato-incisis; cymis paucifloris; capsulis venoso-reticulatis, alis 3aequalibus obtusangulis. In P. b. S. 2.

56. *B. caffra* Mssn. caule carnosus nodoso; fol. inaequali-reniformi-cordatis angulato-lobatis serrulatis glaberrimis nitidis; pedunculis axillaris dichotomis; capsulae alis maximis. *B. sinuata* Mey. In P. b. S. 2.

57. *B. multangula* Blume; suffruticosa erecta; fol. inaequali-cordatis ovatis acuminatis profunde angulodentatis utrinque hirsutis; capsulae 3-gonae lateribus subinaequalibus. In Jara. 2.

58. *B. palmata* Don; herbacea fusco-hirsuta; fol. inaequaliter cordatis palmato-lobatis; scapo 3-floro; capsulae villosae alis obtusangulis, altera productiore. In Nepalia. 4.

2. *Folia integrerima, integra, denticulata serrata vel subsinuato-serrata lobata.*

* *Asiatica.*

59. *B. robusta* Blume; herbacea caulescens hirta; fol. maximis subrotundo-ovatis inaequaliter cordatis acuminatis angulatis sinuato-dentatis; cymis axillaribus bifidis. In Jara. 4.

60. *B. dioeca* Hamilt. caule gracili; fol. aequaliter cordato-oblongis acuminatis inaequaliter dentatis glabris; capsulae alis acutis. In Nepalia. 4.

61. *B. rubella* Hamilt. fol. subaequaliter cordatis acuminatis erosodentatis glabris nitidis; petiolis filiformibus; pedunculis multifloris paniculatis; capsulae alis acutangulis. In Nepalia. 4.

62. *B. racemosa* W. Jack; fol. obovato-oblongis irregulariter dentatis acuminatis glabris; racemis masculis erectis; flore femineo axillari; perianthii masculis diphyllis; capsulae alis parallelo-rotundatis. In Bengal. 2.

63. *B. geniculata* W. Jack; caule geniculato; fol. ovato-oblongis denticulatis acuminatis glabris; pedunculis divaricato-dichotomis; floribus masculis dipetalis; capsulae alis obtusangulis. In Sumatra. 2.

64. *B. fasciculata* W. Jack; fol. inferioribus alternis superioribus oppositis oblongo-ovatis basi semicordatis duplikato-serratis pilosis; perianthii masculis diphyllis; capsulae alis obtusangulis. In Sumatra. 4.

65. *B. aptera* Blume; herbacea caulescens glabra; fol. ovato-oblongis inaequaliter cordatis acuminatisimis denticulatis basi extus subangulatis; cymis extraaxillaribus; capsulis 4-gonis. In Java. 4.

66. *B. bombycina* Blume; herbacea caulescens glabra; fol. semicordatis ovato-oblongis acuminatis denticulatis laevibus supra nitidis, subtus in venis purpurascens; capsulae alis obtusis. *In Jara.* 4.

67. *B. angustifolia* Blume; herbacea caulescens glabra; fol. semicordatis oblongis acuminatis repandis denticulatis venis subtus sanguineis; floribus corymbosis; capsulae alis obtusis. *In Java.* 4.

68. *B. repanda* Blume; herbacea caulescens glabra; fol. semicordatis oblongis acuminatis repandis denticulatis laevibus supra nitidis; capsulae alis rotundis. *In Java.* 4.

69. *B. pilosa* W. Jack; fol. subsessilibus irregulariter serratis acuminatis pilosis subtus rubris; bracteis ad basin pedicellorum subrotundis ciliatis; capsulae alis parallelo-rotundatis. *In Bengalia.* 4.

70. *B. bracteata* W. Jack; fol. duplicito-serratis acuminatis pilosis; pedunculo 1-3-floro; bracteis numerosis adpressis; capsulis basi bibracteatis, alis aequalibus rotundatis. *In Benghalia.* 4.

71. *B. erosa* Blume; herbacea subhirsuta; caule erecto; fol. ovatis inaequaliter cordatis acutis erosis; cymis breve pedunculatis; capsulae ala maxima obtusa reliquis oblitteratis. *In Java.* 4.

72. *B. grandis* Dryand. fol. acutis semicordatis duplicito-serratis asperis; floribus dioecis; capsulae alis subaequalibus. Kaempf. ic. t. 20. *In Japonia.* 4.

73. *B. tenuifolia* Dryand. l. c. t. 14. f. 2. caulescens fol. inaequaliter cordatis ovatis acutis angulatis obsolete dentatis; capsulis bicornibus. *In Ind. or.* 4.

74. *B. crenata* Dryand. l. c. t. 14. f. 3. caulescens; fol. inaequaliter cordatis subrotundis obtusis crenato-dentatis; capsulis bilocularibus. *In Ind. or.* 4.

75. *B. longifolia* Blume fol. ovato-oblongis acuminatis denticulatis supra albo-punctatis. *In Java.* 4.

76. *B. hatacou* Hamilt. fol. amplis semiovatis denticulatis subtus hirsutis. *In Nepalia.* 4.

77. *B. isoptera* Dryand. fruticosa; fol. obsolete dentatis semicordatis glabris; capsulae alis subaequalibus parallelis. *In Java.* 4.

** Africanae.

78. *B. Dregei* Otto et Dietr. caule carnoso nodoso; fol. inaequaliter reniformi-cordatis angulato-serratis glaberrimis nitidis; pedunculis axillariis dichotomis paucifloris; capsulae alis subaequalibus 2 rotundatis tercia subacutangula. 4.

79. *B. erinea* Herit. st. t. 47. fol. subaequaliter cordatis acuminatis serratis supra papillis acuminatis natis; caule simplici radice tuberosa; capsulae ala maxima falcata, reliquis oblitteratis. *In Madagascaria.* 4.

*** Americanae.

80. *B. tomentosa* Schott; suffruticosa; fol. inaequaliter reniformibus subtus ferrugineo-tomentosis denticulatis; fructuum alis binis obtusis tercia maxima acuta. *In Brasilia.* 4.

81. *B. reniformis* Dryand. l. c. t. 14. f. 2. fruticosa; fol. subreniformibus angulatis crenato-dentatis; panicula dichotoma; capsulae alis dichotomis duabus minutissimis. B. M. t. 3225. Fl. flum. t. 40. *In Brasilia.* 4.

82. *B. angularis* Raddi; fruticosa; ramis angulatis; fol. subreniformibus crenulatis glabris subtus ad venas hirsutiusculis; stipulis ovatis integerimis; capsulae ala undulatis una maxima obtusangula. B. stipulacea Willd. *In Brasilia.* 4.

83. *B. cucullata* Willd. fol. oblongis cucullatis denticulatis glabris; stipulis oblongis dentatis; capsulae ala maxima acutangula reliquis parallelis. *In Brasilia.* 4.

84. *B. arborescens* Raddi; ramosissima; fol. oblongis acuminatis dentato-serratis utrinque glaberrimis. *In Brasilia.* 4.

85. *B. integerrima* Spr. fruticosa; fol. ovatis integerrimis glabris; capsulae ala obtusangula, reliquis parallelis minimis. *In Brasilia.* 4.

86. *B. undulata* Schott; fruticosa erecta; fol. subsessilibus inaequaliter cordatis oblongis undulato-repandis integerrimis glaberrimis nitidis; cymis dichotomis; capsulae alis rotundatis aequalibus. B. M. t. 2723. *In Brasilia.* 4.

87. *B. bidentata* Raddi; caulescens suberecta; fol. subobliquis oblongo-lanceolatis acuminatis denticulatis glabris; capsulae alis aequalibus, angulis

bidentatis. B. gauduensis H. et K. In Brasilia. ♂.

88. B. castaneaefolia Otto et Dietr. fruticosa erecta; fol. lanceolatis inaequaliter acuminatis basi cordatis crenatis utrinque glaberrimis nitidis. In Brasilia. ♂.

89. B. sanguinea Raddi; ramosa; fol. inaequaliter cordatis acuminatis coriaceo-carnosis glaberrimis subtus sanguineis margine crenulatis revolutis; capsulae alis subaequalibus rotundatis. B. M. t. 3520. Hort. Berol. t. 13. In Brasilia. ♂.

90. B. Fischeri Otto et Dietr. caulescens; fol. oblongis acutis inaequaliter cordatis dentato-serratis utrinque glabris nitidis; stipulis ovatis-integerrimis; floribus masculis 4-petalis petalis marginibus plano-revolutis, feminis 6-petalis. B. M. t. 3532. In Brasilia. ♀.

91. B. maculata Raddi; fruticosa; fol. elongatis semicordatis acuminatis repandis supra albo-maculatis subtus rubris; capsulae alis rotundatis subaequalibus. B. argyrostigma Lk. et Otto h. Berol. t. 10. In Brasilia. ♀.

92. B. hispida Schott; sustruticosa hispida; fol. semicordatis hinc acuminatis inaequaliter dentatis; panicula multiflora; fructuum ala tertia maxima rotunda. In Brasilia. ♂.

93. B. pulchella Raddi; subherbacea; fol. semicordatis acuminatis inaequaliter dentato-serratis glabris; stipulis venoso-reticulatis; capsulae alis rotundatis subaequalibus. In Brasilia. ♀.

94. B. incarnata Lk. et Otto ic. t. 19. fruticosa erecta; fol. semicordatis acuminatis subangulatis duplicato-serratis ciliolatis; cymis nutantibus 2—3-chotomis; capsulae ala tertia maxima obtusa. Floral Cab. t. 48. The Botanist. t. 103. B. insignis Grah. B. M. t. 2900. B. R. t. 1996. In Brasilia. ♂.

95. B. brasiliensis Alph. DC. caule petiolisque longe pilosis; fol. inaequaliter cordato-ovatis superne pilosis; pedunculis retrorsum subpilosis; floribus masculis disepalis 4-petalis, fem. 4—5-petalis; alis capsularum inaequalibus. In Brasilia. ♀.

96. B. villosa Lindl. B. R. t. 1252. fol. semicordatis duplicato-dentatis obtusis; petiolis ramisque villosis; cap-

sulae ala majori rotundata. In Brasilia. ♀.

97. B. disticha Lk. caule fruticoso erecta; fol. inaequaliter cordatis acutis crenulatis glabris subtus in nervis strigoso-hirtis; cymis distichis capsulae alis 2 obtusatis tertia maxima acuta. In Brasilia. ♂.

98. B. coccinea Hook. B. M. t. 3990. fol. obliquis oblongo-ovatis acuminatis carnosus sinuatis serratis rubromarginatis; stipulis amplis obovatis concavis coloratis; paniculis nutantibus; floribus masculis petalis 4 quorum 2 minimis, feminis 5—6-petalis. In Brasilia. ♀.

99. B. aculeata Walp. caule succulento aculeis hamatis axillaribus; fol. breve petiolatis semisagittatis obtusis subtus sanguineis utrinque glaberrimis capsulae alis rotundato-cordatis. In Brasilia. ♀.

100. B. confertiflora Gardn. sustruticosa erecta ramosa; ramis pendunculis petiolisque hirsutis; fol. oblongis acuminatis basi subcordatis minute serrato-dentatis subtus nervo hirsutis; stipulis magnis oblongis; floribus cymosis roseis, petalis ovatis; capsulae ala tertia rotundata. In Brasilia. ♂.

101. B. reticulata Gardn. herbacea ramosa glaberrima; fol. valde obliquis cordatis oblongis acuminatis angulatis irregulariter serrato-dentatis 3—5-nerviis; panicula dichotoma; floribus roseis; petalis 5 ovatis obtusis; capsulae ala tertia rotundata. In Brasilia. ♂.

102. B. Hookeriana Gardn. fruticosa erecta ramosa rufo-lepidoto-tomentosa; fol. pedalibus acutis cordatis duplicato-dentato-serratis; stipulis coriaceis; cymis axillaribus dichotomis; floribus parvis; petalis 5 oblongis obtusis; capsulae globosae alis rotundatis. In Brasilia. ♂.

103. B. peltata Otto et Dietr. caule simplici tomentoso; fol. semipeltatis oblique ovatis repando-crenatis carnosis tomentosis; cymis longissime pendulatis dichotomis; floribus masculis 4-feminis 3-petalis, petalo unico minimo; capsulae ala tertia 1-vel paucicrenata. In Mexico. ♀.

104. B. incana Lindl. caulescens erecta tomentoso-incana; fol. coriaceis peltatis oblongis acutis subangulatis subtus albidis; pedunculo longis-

simo; floribus 4-petalis pubescentibus.
In Mexico. 4.

105. *B. cyathophora* Poepp. et Endl. nov. gen. t. 11. herbacea laevis; fol. cordato-reniformibus inaequalibus angulato-dentatis; pedunculis elongatis basi bractea cyathiformi; pedicellis cymosis 1-floris; capsulae alis inaequalibus. *In Chili.* 4.

106. *B. populifolia* H. et K. caule herbaceo pilosiusculo; fol. semicordato - reniformibus serratis obsolete lobatis 3-nerviis subtus ferrugineis; pedunculis 1-floris. *In Mexico.* 4.

107. *B. acutifolia* Jacq. fol. oblongis acuminatis angulatis serratis glabris; petiolis incrassatis; capsulae ala maxima obtusangula reliquis acutangulis. *B. purpurea* Sw. Sloane jam. t. 127. f. 1. 2. *In Ind. occ.* 4.

108. *B. ulmifolia* H. et K. suffruticosa; fol. semicordatis oblongis aequaliter serratis rugosis pilosis; stipulis lanceolatis acutis; capsulae ala maxima acutangula reliquis obtusangulis. Lk. et Otto ic. t. 38. *B. Cab.* t. 638. *In Am. austr.* 5.

109. *B. elliptica* H. et K. nov. gen. t. 641. herbacea glabra; fol. inaequilatero-ellipticis acuminatis subintegerimis quinque nerviis venosis; corymbis dichotomis longe pedunculatis; capsulae ala exteriore ovato-deltoidea acuta adscendente. *In Nov. Granata.* 4.

110. *B. Ottonis* Walp. suffruticosa ramosa; fol. petiolatis basi oblique subaequaliter elliptico-lanceolatis serrato-dentatis serraturis apice setosis utrinque glaberrimis nitidis; cymis paucifloris axillaribus; floribus albis; capsulae ala dorsali maxima acuta reliquis subnullis. *In Caracas.* 5.

111. *B. dichotoma* Jacq. ic. t. 619. fruticosa erecta; fol. inaequaliter cordatis subangulatis denticulatis glabris subtus ad venas subhirsutis; panicula dichotoma; capsulae ala maxima acutangula. *In Caracas.* 5.

112. *B. acuminata* Dryand. l. c. t. 14. f. 5. 6. fol. semicordatis acuminatis hispidis inaequaliter inciso-dentalis; capsulae ala maxima obtusangula, reliquis acutangulis. *B. R.* t. 764. *In Jamaica.* 5.

113. *B. setulosa* Bertol. eaulescens; fol. oblique cordatis acuminatis subangulatis inaequaliter argute denticulatis ciliatis nervis venisque utrinque

setulosis; pedunculis basi incrassatis. *In Guatimala.* 4.

114. *B. ferruginea* Dryand. caulescens; fol. inaequaliter cordatis dentatis; floris masculi petalis oblongis subaequalibus. Sm. ic. t. 44. *In Nov. Granata.* 4.

115. *B. ciliata* H. et K. herbacea pilosiuscula; fol. longe petiolatis semicordatis acutis grosse duplicato-serratis ciliatis; pedunculis axillaribus 6-floris; capsulae alis inaequalibus rotundatis. *In Nov. Granata.* 4.

116. *B. papillosa* Lindl. caulescens erecta molliter pilosa; fol. semicordatis pilosis supra papillosis subtus de-albatis, oblongis acuminatis denticulatis; lobo baseos maximo rotundato; panicula ter dichotoma; capsulae pilosae alis obtusis altera paulo majore. *In Am. austr.* 5.

117. *B. nitida* Ait. fruticosa erecta; fol. glaberrimis inaequaliter cordatis obsolete dentatis; capsulae ala maxima subrotundata; stipulis carinatis. Sal. parad. t. 72. *B. minor* Jacq. ic. t. 618. *In Jamaica.* 5.

118. *B. suaveolens* Haw. in Lodd. *B. Cab.* t. 69. fruticosa erecta; fol. inaequaliter cordatis acuminatis nitidis hirtis scabriusculis; cymis dichotomis; alis capsularum subaequalibus. *B. odorata* Willd. *B. humilis.* B. M. t. 284. *In Antillis.* 5.

119. *B. elegans* H. et K. suffruticosa glabra; fol. subsessilibus inaequaliter oblongis acuminatis setaceo-serratis reticulato-venosis; capsulae alis inaequalibus coloratis. *In Nov. Granata.* 5.

120. *B. umbellata* H. et K. fruticosa glabra; fol. inaequaliter ovatis acutis ciliato-serratis nervis subtus pubescentibus; floribus superioribus masculis umbellatis inferioribus feminis solitariis; capsulae alis aequalibus cornutis. *In Nov. Granata.* 5.

121. *B. columnaris* Benth. herbaria ramosa; caule ferrugineo-puberulo; fol. oblique ovatis semicordatis serratis hispidulis; floribus umbellatis masc. bi-fem. 3-sepalis; calyce hirto; capsulae laevi trialata acute 3-costata apice in columnam producta. *In Columbia.* 4.

122. *B. palustris* Benth. herbaria pilosa; fol. petiolatis orbiculato-reniformibus subangulatis denticulatis; pedunculis dichotomis paucifloris; cap-

sula anisoptera glabra. Prope Popaya. 4.

123. *B. trachyptera* Benth. herbacea scabro-hirtella; fol. oblique ovato-oblongis semicordatis serratis hispidulis; floribus masculis umbellatis dipetalis femineo unico 2-3-petalo; sepalis hirsutis; capsula scabro-hirtella. *In Popaya.* 4.

124. *B. longirostris* Benth. herbacea scabro-hirtella; fol. oblique ovato-oblongis semicordatis acuminatis serratis hispidulis; sepalis glaberrimis; capsula glabra aequaliter 3-alata longe trirostrata. *In Quito.* 4.

125. *B. multiflora* Benth. fruticosa glabra; fol. subsessilibus inaequaliter oblongis basi dimidiatis superne serrato-crenatis; pedunculis elongatis dichotomis multifloris; stylis apice bifidis; capsulae ala altera obtusa maxima. *In Bogota.* 5.

*** Scandentes.

126. *B. fagifolia* Fisch. caule fruticoso scandente; fol. ovalibus inaequilateris subangulatis serrulatis platicatis utriusque hirtis; cymis dichotomis; capsulae alis 2 angustissimis tertia maxima acutangula. *In Brasilia.* 4.

127. *B. foliosa* H. et K. nov. gen. t. 642. suffruticosa scandens ramosissima glabra; ramis foliosis; fol. subsessilibus semicordatis argute serratis obsolete venosis subtus papillosis; capsulae ala exteriore acuta. *In Brasilia.* 5.

128. *B. bessleriaefolia* Schott; fruticosa scandens ramosissima; fol. semicordato-oblongis acuminatis integerim supra glabris subtus hirsutis; fructuum alis 2 obsolete, tertia maxima rotundata. *In Brasilia.* 5.

b. Annuae.

129. *B. patula* Haw. caule subcarnoso; fol. oblique cordatis acutiusculis subangulato-serratis pubescentibus; cymis dichotomis paucifloris; capsulae alis 2 angustis, tertia maxima acutangula. *B. pauciflora* Endl. B. R. t. 471. *In Ind. occ.* 5.

130. *B. semperflorens* Lk. et Otto ic. t. 5. caule suffruticoso; fol. oblique cordatis ovatis acutis crenatis intus venis ciliolatis glaberrimis; stipulis oblongis; cymis dichotomis; alis

capsularum rotundatis tertia majori. B. Cab. t. 1439. B. M. t. 2920. *In Brasilia.* 5.

131. *B. spathulata* Haw. caule suffruticoso; fol. oblique cordatis obtusissimis ciliolato-crenulatis glabris; stipulis maximis spathulatis; pedunc. axillaribus dichotomis paucifloris; capsulae alis 2 angustioribus rotundatis, tertia majori acutangula. *In Ind. occ.* 5.

132. *B. humilis* Dryand. annua caule pubescente; fol. semicordatis acuminatis duplicato-serratis hispidis; pedunc. axillaribus dichotomis; alis capsularum rotundatis tertia majori. Bonpl. malm. t. 62. B. Cab. t. 69. *In ins. Trinitat.* 5.

133. *B. portoriana* Fisch. et Mey. erecta; caule glabro; petiolis subvillosis; stipulis acuminatis parce ciliatis; fol. ovatis oblique et inaequaliter cordatis subangulatis duplicato-et mucronato-dentatis hirtis; capsularum alis rotundatis unica majori. *In Brasilia.* 5.

134. *B. hirtella* Lk. erecta; caule villoso; petiolis villosissimis; stipulis denticulato-ciliatis; fol. ovato-subrotundis oblique cordatis subangulatis obsolete crenatis; capsularum alis obtusiusculis unica multo majori. *In Brasilia.* 5.

135. *B. Meyeriana* Walp. humilis tenella herbacea; fol. petiolatis oblique cordatis angulato-serratis; floribus axillaribus; pedunculis petiolos aequantibus; capsulae alis subaequilibus rotundatis. *In Brasilia.* 5.

136. *B. filipes* Benth. annua caule gracili glabro; fol. longiuscule petiolatis oblique semicordatis ovato-oblongis triplicatim ciliato-serratis; pedunculis sub-3-floris; floribus minimis; capsulae ala tertia multo latiore. *In ins. Tabaco.* 5.

137. *B. petalodes* Lindl. B. R. t. 1757. caulescens; fol. orbiculatis 5-9-lobis incisis serratis cucullatis; floribus masculis disepalis, femineis 4-sepalis 4-petalis; capsulae alis acuminatis. *In Brasilia.* 4.

Species non satis notae.

138. *B. dimidiata* Velloz fl. flum. X. t. 46. caule erecto crasso annuo; fol. petiolatis obliquis ovatis setoso-mucronatis venosis integerrimis magnis;

paniculis terminalibus dichotomis. *In Brasilia.* 2.

139. *B. acida* Vell. t. 49. crassa carnosa ramosa; caule humili setoso-squamoso; fol. petiolatis aequaliter profunde cordatis rotundatis 7-nerviis obsoletissime repandis integerrimis 7—9-nerviis; petiolis retrorsum setosis; corymbis nutantibus. *In Brasilia.* 2.

140. *B. rotunda* Vell. t. 38. acaulis radice fusiformi descendente; fol. petiolatis oblique profundissime cordatis orbiculatis 5—7-nerviis integerimis; stipulis ovatis concretis subamplectentibus. *In Brasilia.* 2.

141. *B. erecta* Vell. t. 43. caule erecto ramoso; fol. petiolatis subaequaliter ovato-lanceolatis acuminatis argute-serratis; paniculis terminalibus dichotomis multifloris; floribus 4-petalis. *In Brasilia.* 2.

142. *B. declinata* Vell. t. 44. caule nutante virgato paniculato ramoso; fol. breve petiolatis; basi oblique cordatis ovatis acuminatis subrepandis ceterum integerimis penninerviis; paniculis axillaribus dichotomis folio multo longioribus. *In Brasilia.* 2.

143. *B. radicans* Vell. t. 39. scandens; ex axillis ramorum foliorumque radicans; fol. petiolatis aequaliter ovatis acuminatis penninerviis integerimis; cymis terminalibus paucifloris; floribus 4-petalis; petalis 2 obtusissimis 2 subacuminatis. *B. dubia* Vell. t. 42. *In Brasilia.*

144. *B. lanceolata* Vell. t. 33. acaulis; fol. lanceolatis maximis in petiolum basi vaginantem attenuatis integerimis; scapis apice cymosis folio brevioribus paucifloris; floribus dipetalis; capsulae alis aequalibus. *In Brasilia.* 2.

145. *B. cordata* Vell. t. 34. acaulis tuberosa; fol. maximis aequaliter cordatis integerimis sub-7-nerviis; stipulis ovatis acuminatis; scapo foliis parum longiore cymoso-pauciflora; floribus dipetalis; capsulae alis inaequalibus ovatis obtusissimis. *In Brasilia.* 2.

146. *B. procumbens* Vell. t. 36. caule repente radicante demum erecto simplici; fol. petiolatis aequaliter ovatis acuminatis subrepandis; cymis terminalibus paucifloris dichotomis; floribus 4-sepalis. *In Brasilia.* 2.

147. *B. Velloziana* Walp. rhizome crasso repente; fol. ovatis acuminatis repandis penninerviis verrucosis ciliatis in petiolum longissime attenuatis; scapis 1-floris cordato-bibracteatis; petalis exterioribus orbicularibus interioribus ovatis. *B. repens* Vell. t. 35. *In Brasilia.* 2.

148. *B. herbacea* Vell. t. 53. rhizome repente; fol. spathulatis in petiolum longissime attenuatis $\frac{1}{2}$ -pedalibus acuminatis repandis e medio apicem versus serrulatis penninerviis; scapis subumbellato-cymosis; floribus dipetalis. *In Brasilia.* 2.

149. *B. acetosa* Vell. t. 50. caule crasso humillimo simplici; fol. longissime petiolatis basi profunde et oblique cordatis orbiculato-reniformibus maximis integerimis 7—9-nerviis subtus caule petiolisque setulosis; scapis axillaribus apice paniculato dichotomis; capsulae ala tertia deltoidea, reliquis multo minoribus. *In Brasilia.* 2.

150. *B. hastata* Vell. t. 54. fruticosa erecta ramosa; fol. breve petiolatis hastatis peltatisque summis lanceolatis acuminatis argute serratis subrepandis; stipulis lanceolatis acuminatis; pedunculo dichotomo cymoso; petalis cucullatis; capsulae ala dorsali acuta deltoidea. *In Brasilia.* 2.

151. *B. ruginans* Vell. t. 37. caulescens carnosa; fol. longe petiolatis oblique profunde cordatis maximis acuminatis 7-nerviis integerimis subtus pilosis; cymis geniculatis dichotomis paucifloris; floribus dipetalis. *In Brasilia.* 2.

152. *B. geniculata* Vell. t. 51. caule crasso geniculato ramoso; fol. petiolatis aequaliter cordatis 5—7-angulatis argute serrulatis; paniculis axillaribus longe pedunculatis multifloris folia multo excedentibus; floribus tetrapetalis; capsulae ala acute deltoidea reliquis nullis. *In Brasilia.* 2.

4934. PISTIA L. (1747).

1. *P. Stratiotes* L. fol. subrotundo-obcordatis margine undulatis nervis lamelliformibus in aream basilarem truncatam confluentibus. Roxb. cor. t. 268. Rumph 6. t. 74. *P. Stratiotes* et *crispata* Blume in *Rumphia* t. 78 et 79. *In Ind. or.* 2.

2. *P. aegyptiaca* Schleiden; fol. cuneato-obcordatis nervis prominulis in aream minutam basitarem confluentibus. *Stratiotes aegyptica* Vessl. Moris. hist. 4. f. inf. *In Aegypto et Creta.* 2.

3. *P. crispata* Blume; fol. obcordatis angustato-cuneiformibus nervis simplicibus ad basin usque liberis. *In Pondichery.* 2.

4. *P. minor* Blume; fol. cuneato-triangularibus minimis nervis simplicibus ad basin usque liberis. *Pluken.* t. 207. f. 6. *Rumph* 6. t. 177. *In Java.* 2.

5. *P. occidentalis* Blume; fol. oblongo-obovatis apice retusis nervis lamelliformibus in aream magnam lanceolatam confluentibus. *P. Stratiotes* Jacq. *Mart. am.* t. 148. *Decourt. fl. Aut.* t. 7. *Turp. Dict. d. sc. nat.* t. 7. *In Ind. occident.* 2.

6. *P. linguaeformis* Blume; fol. oblongis linguaeformibus abruptius in petiolum attenuatis, area obovata lanceolata. *In Jara.* 2.

7. *P. spathulata* Michx. fol. obovato-orbicularibus abrupte in petiolum coarctatis nervis lamelliformibus in aream petiolarem confluentibus. *P. Stratiotes* Schlecht.

8. *P. commutata* Schleid. fol. ovali-lanceolatis in petiolum longiorum attenuatis simpliciter nervosis; spatha laete viridi. *Sloane hist.* t. 2. *In Jamaica.* 2.

9. *P. obcordata* Schleid. fol. cuneato-obcordatis nervis lamelliformibus in aream petiolarem truncatam confluentibus. *P. Stratiotes* Nee. *Ad flum. Magdaleneae.*

4935. AMBROSINIA Bass. (1747).

1. *A. Bassii* L. fol. radicalibus circiter ovato-cordatis; spatha naviculari horizontali cauda recta terminata. *Blume Rumphia* t. 38. f. B. Moris. s. 13. t. 6. f. 19. *A. nervosa* Lam. ill. t. 737. *In Sicilia, Sardinia et Barbaria.* 2.

4936. CRYPTOCORYNE Fisch. (1883).

1. *C. spiralis* Fisch. fol. linearilanceolatis; spatha sessili spiraliter torta. *Blume in Rumphia* t. 36. f.

C. B. M. 2220. B. Cab. t. 525. In Ind. or. 2.

2. *C. retrospiralis* Kunth; fol. linearilanceolatis; spatha primo ad dextrum spiraliter torta, ibi clausa deinde ad sinistrum ibique aperta; capsula 5-loculari 5-valvi. *Ambrosinia retrospiralis* Roxb. *In Bengaliam.* 2.

3. *C. ciliata* Fisch. fol. oblongolanceolatis; spatha pedunculata longe tubulosa apice fimbriata. *Blume Rumph.* t. 85. *Ambrosinia Roxb. corom.* t. 262. *In Bengaliam, Java et Amboina.* 2.

4. *C. ovata* Schott; fol. oblongis aut ovato-oblongis; spatha pedunculata subspiraliter torta verrucoso-rugosiuscula. *Arum L. Rheede* 11. t. 23. *Caladium ovatum* Cels. *In Ind. or. 2.*

5. *C. unitocularis* Kunth; fol. linearilanceolatis; spatha breve pedunculata longitudine foliorum spiraliter torta; capsula uniloculari. *Ambrosinia Roxb.* *In Coromandetia.* 2.

4937. STYLOCHAETON Leprieur. (1834).

1. *S. hypogaeum* Leprieur in nov. ann. sc. nat. 1834. II. t. 5. *Blume Rumph.* t. 88. *In Senegambia.* 2?

4938. ARISARUM Tournef. (1710).

1. *A. vulgare* Targ. fol. cordato-sagittatis sive cordato-hastatis; spathae limbo apice acuminato incurvato. *Arum Arisarum* Jacq. hort. Schoenbr. t. 192. *Barr. ic.* 573. *In Europ. austri.* 2.

2. *A. proboscideum* Schott; fol. cordato-hastatis; spathae limbo apice filiformi-subulato declinato. *Blume Rumphia* 91. *Bosc. Mus.* t. 50. *Barr. ic.* 1150. *In Appenninis et Etruria.* 2.

4939. ARISAEMA Mart. (1831).

a. *Folia peltatisecta.*

1. *A. erubescens* Schott; segmentis foliorum sessilibus linearilanceolatis longe acuminatis integerrimis remote venosis; spadice clavato obtuso spatha subfornicata abbreviata breviore. *In Ind. or. 2.*

2. *A. Leschenaultii* Blume; segmentis foliorum 10—12 sessilibus oblongis acuminatis erosis parallele venosis; spadice clavato obtuso spatha subfornicata abbreviata breviore. *In Ind. or. 2.*

3. *A. echinatum* Schott; segmentis foliorum 7—8-sessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis; spadice clavato obtuso apice planiusculo, spatha subfornicata subulato-acuminatissima breviore. Arum Wall. pl. as. rar. t. 136. *In Bengal. 2.*

4. *A. nepenthoides* Mart. segmentis foliorum 5-sessilibus lanceolatis longe acuminatis; spadice clavato obtuso spatha auriculato-fornicata breviore. Arum Wall. tent. t. 18. *In Nepalia. 2.*

5. *A. Jacquemontii* Blume; segmentis foliorum 4—5 sessilibus oblongis longe acuminatis; spadice filiformi spatha subfornicata subulato-acuminatissima breviore. *In Ind. or. 2.*

b. Folia subtripartita.

6. *A. hastatum* Blume; fol. cordato-hastatis denticulatis; spadice clavato obtuso spatha ovata acuminata breviore. *A. virginicum* Beauv. *In Am. bor. 2.*

c. Folia trisepta v. pedatisepta.

7. *A. brasiliandum* Blume; fol. triseptis segmentis sessilibus ovato-ellipticis acuminatis, lateralibus extrorsum lobatis; spadice clavato obtuso spatha ovata breviore. Arum triphyllum L. Dod. mem. 81. f. 273. *In Brasilia. 2.*

8. *A. atrorubens* Blume; fol. 3-sectis, segmentis sessilibus ovato-ellipticis lanceolatis acuminatis subintegerrimis; spadice clavato obtuso spatha ovata acuminata breviore. Arum Ait. *A. triphyllum* L. Mart. amoen. Monac. 16. f. 11. B. M. t. 950. B. Cab. t. 320. *In Am. bor. 2.*

9. *A. ringens* Schott; fol. 3-sectis segmentis sessilibus elliptico-ovatis acuminatis integerrimis; spadice clavato-obtuso spatha auriculato-galeata retusa breviore. Arum Thunb. *In Japonia. 2.*

10. *A. laminatum* Blume in Rumphia t. 27 et 37. E. fol. triseptis segmentis

lateralibus sessilibus intermedio ansato ellipticis acuminatis integerrimis; spadice subulato spatha erecta ovata acuminatissima breviore. *In Java. 2.*

11. *A. costatum* Mart. fol. 3-sectis segmentis sessilibus intermedio ovato-elliptico lateralibus semicordato-ovatis cuspidatis arctissime parallelo-penninervigeris; spadice elongato-subulato spatha subfornicata acuminatissima multo longiore. Arum Wall. tent. t. 19. *In Nepalia. 2.*

12. *A. speciosum* Mart. fol. 3-sectis segmentis ansatis intermedio ovato-cordato lateralibus semicordatis acuminatis remote penninerviis; spadice elongato-subulato spatha subfornicata acuminatissima multo longiore. Arum Wall. tent. t. 20. *In Nepalia. 2.*

13. *A. intermedium* Blume; fol. 3-sectis segmentis sessilibus intermedio ovato-elliptico lateralibus semicordato-ovatis acuminatis remote penninerviis; spadice elongato-subuliformi spatha subfornicata acuminata multo longiore. *In Ind. or. 2.*

14. *A. filiforme* Blume in Rumphia t. 28 fol. 3-sectis vel quinato-pedatisectis segmentis ansatis oblongis acuminatis lateralibus obliquis; spadice subulato spatha subfornicata acuminata longiore. Arum Reinw. *In Java. 2.*

15. *A. Roxburghii* Kunth. acaule; fol. ternatis foliolis aequalibus lanceolatis cuspidatis; scapis longitudine petiolorum; spatha spadicem subulato-acuminatum superante; antheris 4—5 in apice filamenti per coronam peltatum circularem congestis. Arum Roxb. *In Ind. or. 2.*

d. Folia pedatisepta.

16. *A. Dracontium* Schott; segmentis foliorum 9—14 lateralibus sessilibus intermedio ansato lanceolato-oblongis acuminatis integerrimis; spadice subuliformi spatha erecta acuminata duplo longiore. Arum L. B. R. t. 668. B. Cab. t. 1165. *In Am. bor. 2.*

17. *A. Bosci* Blume; segmentis foliorum 7—11 vel pluribus omnibus sessilibus linear-lanceolatis acuminatis integerrimis; spadice subuliformi spatha erecta acuminata dimidio longiore. Arum Dracontium Bosc. *In Am. bor. 2.*

18. *A. Thunbergii* Blume; segmentis foliorum 10—15 sessilibus lanceolatis integerrimis spadice subuliformi tortuoso-descendente spatham superne acuminatam subfornicatam longe superante. Arum Dracontium Thunb. *In Japonia.* 2.

19. *A. tortuosum* Schott. segmentis foliorum 7—19, lateralibus sessilibus intermediis subansatis lanceolato-ellipticis acutis subrepandis; spadice subuliformi tortuoso-adscendente spatham superne fornicatam acutam superante. Arum Wall. pl. as. rar. t. 114. *In Nepal.* 2.

20. *A. japonicum* Blume; segmentis foliorum 7—15 lateralibus sessilibus intermedio ansato oblongis acuminatissimis subrepandis; spadice clavato obtuso spatha superne fornicato-incurva acuminata breviore. Arum Dracunculus Thunb. *In Japonia.* 2.

21. *A. serratum* Blume; segmentis foliorum 6—13 lateralibus sessilibus intermedio ansato lanceolatis acuminatis inaequaliter serratis; spadice clavato, spatha superne erecta fornicata acuminata breviore. Arum Thunb. ic. pl. jap. 11. *In Japonia.* 2.

22. *A. cochinchinense* Blume; segmentis foliorum sessilibus lato-lanceolatis integerrimis; spadice subulato spatham superante. Arum Dracontium Lour. *In Cochinchina.* 2.

23. *A. curvatum* Kunth; acaule; fol. pedatis; foliolis 10—12 lanceolatis; spatha fornicata spadice curvato dinidio breviore; filamentis nectarinis nullis; antheris 3-lobis. Arum Roxb. *In Nepal.* 2.

Species dubiae.

24. *A. pumilum* Blume; fol. 3-sectis segmentis sessilibus ovatis obtusiucculis, lateralibus extrorsum gibberis; spadice clavato obtuso spatha superne ovata acuminatissima patula breviore. Arum Lam. Plukn. t. 148. f. 6. *In China.* 2.

25. *A. Loureiri* Blume; fol. triseptis segmentis lanceolatis; spadice subulato spatham superante. Arum Lour. *In China.* 2.

26. *A. pythenium* Blume; fol. pedato-5-raro 3-partitis segmentis ovatis acutis; spadice cylindrico acuto, spatha superne acuminata multo breviore. Arum Mart. *In Brasilia.* 2.

27. *A. pentaphyllum* Schott; fol. quinatisectis segmentis sessilibus oblongis obtusis; spadice erecto subuliformi, spatha superne erecto-patula elongato-acuminata breviore. Arum L. Moris hist. 5. f. 27. *In Ind. or.* 2.

28. *A. heptaphyllum* Blume; fol. pedatisectis; segmentis 6—7 sessilibus oblongis obtusis; spadice erecto fusiformi-attenuato spatham superne erecto-patulam ovatam acutam subaequante. *In Ind. or.* 2.

29. *A. heterophyllum* Blume; fol. pedatis segmentis 3—11 omnibus sessilibus oblongis brevicuspidatis integerrimis simpliciter penninerviis intermedio miore. *In Japonia.* 2.

30. *A. latisectum* Blume; fol. pedatis; segmentis 6 ellipticis longe cuspidatis integerrimis intermedio ansato lateralibus sessilibus. *In Japonia.* 2.

31. *A. amplissimum* Blume; fol. amplis pedatis, segmentis 11—15 oblongis longe cuspidatis arce parallelo penninerviis repandis intermedio ansato, lateralibus sessilibus. *In Japonia.* 2.

32. *A. Plukenetii* Blume; fol. pedatis segmentis 7 subansatis oblongis utrinque acuminatis; spadice subulato spatha erecta acuta multo longiore. Plukn. t. 271. f. 2. *In Virginia.* 2.

33. *A. gracile* Kunth; acaule fol. profunde 3-partitis, laciniis acutis, media oblonga, lateralibus semihastatis; spatha flagelliformi longitudine spadicis flagelliformis; filamentis nectarialibus simplicibus revolutis. Arum Roxb. Rheede 11. t. 21. *In Sylhet.* 2.

4940. BIARUM Schott. (1841).

1. *B. tenuifolium* Schott; fol. linear-lanceolatis; spatha superne reflexa nutante; spadice longissimo subuliformi attenuato declinato. Arum L. B. R. t. 512. B. M. t. 2282. Moris. 13. t. 6. f. 21. *In Europa austr.* 2.

2. *B. gramineum* Schott; fol. linear-lanceolatis; spatha superne erecto-incurva; spadice elongato filiformi obtuso nutante. Arum Lam. Bocc. sic. t. 42. *In Europa merid.* 2.

3. *B. Bovei* Blume Rumphia t. 29. fol. ovatis vel lanceolato-oblongis obtusiusculis; spatha superne patente

spadicem subuliformem aequante. In Syria. 4.

4. *B. Homeid* Blume; fol. lanceo-lato-spathulatis obtusis. Arum acaule etc. Gronv. In Haleppi montosis. 4.

5. *B. Olirieri* Blume; fol. lanceo-lato-linearibus acuminatis; spatha erecto-fornicata acuminatissima. In Oriente.

4941. ARUM L. (1747).

1. *A. maculatum* L. fol. cordato-sagittatis aut hastatis, lobis baseos acutis v. obtusis; spatha superne ovato-oblonga acuminata; spadicis apice clavato obtuso. Blackw. t. 228. Fl. dan. t. 506. E. B. t. 1298. Hayne 13. t. 32. *A. vulgare* Lam. In Europa. 4.

2. *A. italicum* Mill. fol. cordato-hastatis lobis baseos acutis v. obtusis; spatha superne oblonga acuminata; spadicis apice clavato obtuso. B. M. t. 2432. In Europa. 4.

3. *A. Diocoridis* Sibth. fl. graec. t. 947. acaule fol. hastatis integerimis lobis acutis divaricatis; spatha obliqua acuminata. In ins. Cypri. 4.

4. *A. Jacquemontii* Blume; fol. cordato-hastatis, lobis baseos obtusis; spatha superne lanceolata acuminatissima; spadicis apice cylindrico obtuso. In Ind. or. 4.

5. *A. syriacum* Blume; spatha superne oblonga acuminata; spadice elongato cylindraceo obtusiusculo. In Syria. 4.

6. *A. pictum* L. fol. cordatis vel hastato-cordatis; spatha subradicali superne ovato acuminata; spadicis apice clavato obtuso. *A. corsicum* Lois. In Corsica et Balearicis. 4.

7. *A. heterophyllum* Blume; fol. oblongis obtusiusculis ad basim subcordatam passim biauriculatis; auriculis semilanceolatis inflexis; spatha superne ovata subacuta; spadicis apice brevi cylindraceo obtuso. In Mesopotamia. 4.

8. *A. spiculatum* Blume; fol. hastatis; lobis baseos productis linearibus; spatha superne ovata acuta; spadicis apice brevi cylindraceo obtuso. In Persia et Syria. 4.

9. *A. Rauwolfii* Blume; fol. ova-tis hastato-3-lobis, lobis lateralibus linear-i-lanceolatis arrectis; spatha superne ovata lanceolata acuminata;

spadicis apice brevi cylindraceo obtuso. *A. intortum* Bess. In Aleppo. 4.

10. *A. Carsamii* Rauwolf. fol. ovatis. In Aleppo. 4.

11. *A. orientale* Bieb. fol. hastato-sagittatis acuminatis. lobis deflexis; spadice clavato spatha dimidio breviore. In Caucaso et Persia. 4.

12. *A. byzantinum* Clus. rhizoma-te horizontali crasso repente tuberis globulosis basi 1-phyllo obsoito; fol. longe petiolatis sagittato-deltoides acutatis splendentibus, lobis basilari-bus acutis divergentibus. In Asia minore. 4.

4942. TYPHONIUM Schott. (1832).

1. *T. divaricatum* Decaisn. fol. cordato-hastatis integris vel 3-fidis, lobis baseos extrorsum rotundatis; spatha superne ovato-oblonga reflexa spadicem subuliformem subaequante; organis rudimentariis glomeratis setiformibus. Blume in Rumphia t. 36. *A. diversifolium* Blume cat. *A. orixense* R. Br. B. Cab. t. 422. *A. trilobatum* Thunb. B. M. t. 339 et 2324. In Ind. or. China et Nov. Holl. 4.

2. *T. trilobatum* Schott; fol. cor-dato-sagittatis integris aut 3-partitis lobis baseos extrorsum angulo promi-nulis; spatha superne ovato-lanceo-lata reflexa spadicem subuliformem aequante; organis rudimentariis setiformibus glomeratis. Arum L. B. M. t. 339. B. Cab. t. 516. *A. orixense* Andr. Rep. t. 356. B. R. t. 450. In Ind. or. 4.

C. *T. cuspidatum* Decaisn. fol. hastatis integris spatha superne li-neari-lanceolata reflexa spadicem subuliformem subaequante; organis rudimen-tariis laxis partim seti-partim squa-maeformibus. Blume in Rumphia t. 30. f. 1, 2. Rheede 11. t. 20. In Java, Malabaria et Timor. 4.

4. *T. flagelliforme* Blume; fol. ovatis indivisis aut 3-partitis; spatha superne angulato-lanceolata reflexa spadicem aequante. Arum Lodd. B. Cab. t. 396. In Bengal. 4.

5. *T. minutum* Schott; fol. hasta-to-sagittatis indivisis obtusis mucronatis; spatha superne ovata obtusa cu-cullata; spadice recto clavato longiore. Arum mucronatum Spr. Rheede 11. t. 17. In Ind. or. 4.

6. *T. cochinchinense* Blume; fol. cordato-oblongis subacutis; spatha superne cucullata spadicem curvatum superante. Arum Lour. In *Cochinchina*. 2.

7. *T. crenatum* Schott; fol. longissime hastatis cordato-sagittatis; spatha subcylindrica convoluta margine undulato-crenata striata margine rubicunda. *T. eriophorum* Blume. In *Ind. or.* 2.

**4943. SAUROMATUM Schott.
(1832).**

1. *S. pedatum* Schott; acaule; fol. simplicibus ternatis pedatisque, segmentis 5—9 oblongis acuminatis integerimis; spatha basi ventricosa lamina planiuscula longe acutata spadicem superante. Arum Willd. Lk. et Otto ic. t. 8. In *Caracas*. 2.

2. *S. venosum* Blume; fol. pedatisectis, segmentis ovalibus; spadice spatha lanceolata breviore. B. R. t. 1017. *Arisaema* Blume. In *Brasilia*. 2.

3. *S. guttatum* Schott; fol. pedatismultipartitis, lobis oblongis acuminatissimis; spatha ad os tubi irregulariter undulato-repanda. Arum Wall. pl. as. rar. t. 115. In *Nepalia*. 2.

4. *S. sessiliflorum* Kunth; acaule; fol. pedatis segmentis 9 late lanceolatis integris; spathis sessilibus revolutis, spadicem longum conicum erectum acutum duplo superantibus; filamentis nectarinis clavatis; antheris bilocularibus. Arum Roxb. In *Ind. or.* 2.

**4944. DRACUNCULUS Tournef.
(1700).**

1. *D. vulgaris* Schott; fol. pedatis, segmentis lanceolatis intermediis majoribus; spatha intus sulcato-verrucosa; spadicis apice laevigato. *D. polyphyllus* Blume Rumphia t. 37. G. Arum *Dracunculus* L. Bull. herb. t. 73. Lam. ill. t. 740. In *Europa austr. et ins. canariensis*. 2.

2. *D. canariensis* Kunth; fol. pedatis segmentis lanceolatis, intermediis majoribus; spatha angusta intus laevigata glabra; spadicis apice laevigato. In *Teneriffa*. 2.

3. *D. crinitus* Schott; fol. pedatis segmentis bilobatis lateralibus lanceolatis intermedio hastato; spatha intus spadiceaque pilosis. Arum crinitum B. R. t. 831. In *Sardinia et Syria*. 2.

4945. PYTHONIUM Endl. (1836).

1. *P. Wallichianum* Schott; Tomsonia nepalensis Wall. pl. as. rar. t. 99. In *Nepalia*. 2. Folium magnum solitarium umbraculiforme pinuato-triseptum, segmenta acuminata atroviridia. Spatha coriacea cucullata.

2. *P.? Hookeri* Kunth; folio ternatim composito longissime petiolato; fol. pinnatifidis laciniis lanceolatis acutis; spatha oblonga acuminata spadicem longe superante; germinibus reflexis. Caladium petiolatum Hook. B. M. t. 3728. In *Guinea*. 2.

**4945. AMORPHOPHALLUS Blume.
(1836).**

1. *A. campanulatus* Blume in Rumphia t. 32, 33. petiolis verrucoso-asperis; spatha ovata acuta superne patula spadicem ad apicem conoideo-inflatum subaequante. Arum Rumphii Freyc. voy. t. 39. *A. campanulatum* Roxb. corom. t. 272. Rumph 5. t. 113. f. 2. In *Asia tropica*. 2.

2. *A. dubius* Blume; petiolis glabris; spatha spadice superne rotundato-obtuso longiore. Dracontium polyphyllum Denst. Rheede mal. 11. t. 18. In *Malabarica*. 2.

3. *A. Müllerii* Blume; petiolis laevis; spatha ovata acuta superne patente spadice clavato obtuso breviore; antheris 4—5-fariam aggregatis. Arum Müllerii Zipp. In *Jara*. 2.

4. *A. giganteus* Blume in Rumphia t. 34. petiolis verrucoso-asperis; spatha ovata obtusiuscula superne patente spadicem cylindraceo-fusiformem parum superante; antheris absque ordine congestis. Dracontium paeoniifolium Denst. Rheede 11. t. 19. In *Malabarica*, *Ceylona et Jara*. 2.

5. *A. variabilis* Blume in Rumphia t. 35 et 37. petiolis laevis; spatha oblongo-ovata acuminata superne erecto-patente. In *Jara*. 2.

6. *A. zeylanicus* Blume; petiolis laevisibus; spatha ovata acuta superne erecto - patente spadice pedunculato cylindraceo-fusiformi acutiusculo multo breviore. *In Ceylona.* 4.

7. *A. punctulatus* Blume; petiolis laevisibus; spatha oblongo-lanceolata obtusiuscula spadice cylindraceo-fusiformi obtusiusculo paulo breviore. *Arum punctulatum* Zipp. *In Java.* 4.

8. *A. bulbifer* Blume; petiolis laevisibus; rachide foliorum bulbifera, spatha ovata obtusa cucullata spadicem clavatam obtusum aequante. *Arum bulbiferum* Roxb. *in B. M. t. 2072 et 2508.* *In Ind. or.* 4.

9. *A. difformis* Blume; petiolis parum tuberculoso-asperis; segmentis foliorum partim ovatis partim difformibus trapezoideis, apice saepe incisobicuspidatis. *In Oware.* 4.

10. *A. consimilis* Blume; petiolis dense verrucoso-asperis; spatha ovato-acuminata spadice multo breviore. *In Prom. viridi.* 4.

11. *A. tyratus* Kunth; acaulis radice napiformi; fol. compositis, divisionibus primariis subternatis; foliolis lyratis glabris. *Arum Roxb.* *In mont. Circars.* 4.

12. *A. sylvaticus* Kunth; fol. supra decompositis; foliolis lanceolatis; spadice stricto spatha 2-3-plo breviore hac gibba campanulata; antheris bilocularibus. *Arum Roxb.* *In mont. Circars.* 4.

13. *A. margaritifer* Kunth; herbaceus acaulis; fol. 3-fidis segmentis integris anguste lanceolatis pinnatifidis; spatha campanulata spadicem obtusum aequante; nectariis Margaritae magnae similibus. *Arum Roxb.* *In Hindostan.* 4.

14. *A. Fontanesii* Kunth; acaulis petiolo tereti apice 3-partito; foliolis pluribus lanceolatis obovatisque apice acuminatis inaequalibus decurrentibus. *Arum trifidum* Desf. *In Senegal.* 4.

15. *A. sativus* Blume. *In Java.* 4.

4947. COLOCASIA Raj. (1686).

a. Spatha recta undulata.

1. *C. antiquorum* Schott; acaulis; fol. peltatis ovatis repandis basi semibifidis; scapo petiolis breviore; spatha spadice multo longiore cylindrica erecta; clava subcylindrica; antheris plurilocularibus. *Arum Colocasia* L. Catesb. car. t. 45. *Rumph.* t. 109. *In Graecia Aegypto Asia minore et Ind. or.* 4.

2. *C. nymphaeifolia* Kunth; acaulis; fol. peltatis ovatis repaudis basi semibifidis; spatha spadice plerumque longiore cylindrica, clava graciliore acuta; antheris plurilocularibus. *Caladium* Vent. *Rheede* 11. t. 22. *Arum Roxb.* *In Ind. or.* 4.

3.? *C. esculenta* Schott; acaulis; fol. peltatis cordatis; spadice spatha ovata lanceolata breviore. *Caladium* Vent. *Arum* L. *Sloane hist.* t. 106. f. 1. *In Am. austr. et Nova Zeelandia.* 4.

4.? *C. acris* Schott; acaulis; fol. peltatis cordatis; spadice usque ad apicem obtusiusculum antherifero mucronulovo brevissimo nudo spatha lanceolata dimidio breviore. *Caladium acre* R. Br. *In Nov. Holl.* 4.

b. Spatha cucullata incurva.

5. *C. macrorhiza* Schott; acaule; fol. peltatis cordatis repandis basi bipartitis. *Arum* L. *Herm. parad.* t. 73. *In Ceylona.* 4.

6. *C. cucullata* Schott; glaucescens ramosa; fol. subpeltatis exakte cordatis, lobis rotundatis; spadice cylindrico fere longitudine spathae cymbaeformis. *Arum* Lour. *Caladium Pers.* *In China et Bengal.* 4.

7. *C. odora* Brongn. *in nouv. ann. Mus.* 3. t. 7. caulescens; fol. cordatis basi bifidis, lobis rotundatis; pedunculis axillaris geminis; spadice spatham cymbaeformem aequante cum apice staminifero unam-fertiam partem longitudinis sua occupante; baccis 1-4-spermis. *Caladium odorum* B. R. t. 611. *In Pegu.* 4.

8. *C. indica* Kunth; caulescens erecta; fol. cordatis basi bifidis, lobis rotundatis; spadice cylindrico spatham linearem cymbaeformem aequante; clava cylindrica longiore quam reliqua spa-

4946. REMUSATIA Endt. (1836).

1. *R. vivipara* Schott; *Caladium* Nees. Lodd. B. Cab. t. 281. *Arum Roxb.* *Rheede* 12. t. 9. *In Nepalia et Matabaria.* 4. Acaulis. Folia peltata cordata acuminate. Pedunculus bracteatus brevis.

dieis pars. *Arum indicum* Lour. Roxb.
Rumph. amb. 5. t. 106. *In Ind. or.*
et Cochinchina. 4.

Species ex Kunth *dubiae.*

9. *C. pumila* Kunth; fol. orbiculato-peltatis basi emarginata; spatha linearis-oblonga spadice obtuso 4-plo longiore. *Caladium* Don. *In Nepalia.* 4.

10. *C. mucronata* Kunth; acaulis; fol. cordatis obtusis mucronatis lobis rotundatis, nervis lateralibus oppositis. *Arum* Lam. *In Am. austr.* 4.

11. *C. montana* Kunth; acaulis; fol. cordatis acuminatis repandis nitidis; spadice longitudine fere spathae cucullatae coloratae; antheris plurilocularibus; radice tuberosa cylindrica. *Arum* Roxb. *In mont. Circars.* 4.

12. *C. heterophylla* Kunth; acaulis fol. subpeltatis cordato-sagittatis acuminatis repandis lobis baseos rectis rotundatis discretis connatisque; spatha linearis-elongata mucronata spadicem sessilem excedente. *Caladium* Presl. *In ins. Luzonie.* 4.

13. *C. rapiformis* Kunth; herbaea acaulis; radicibus tuberosis rapiformibus; fol. cordatis subrepandis; spadice longitudine fere spathae; antheris plurilocularibus. *Arum* Roxb. *In Pegu.* 4.

14. *C. fornicata* Kunth; caulescens; fol. peltatis anguste cordatis, lobis rotundatis angulatis; spadice clavato; spathae parte dimidia superiore fornicata spadicem aequante; baccis 1—3-spermis. *Arum* Roxb. *In Bengal.* 4.

15. *C. virosa* Kunth; caulescens; fol. peltatis ovatis leviter undulatis basi indivisis; spadice spatha 4-plo breviore basi femineo; antheris plurilocularibus. *Calla* Roxb. *In Ind. or.* 4.

16. *C. obtusitoba* Kunth; caulescens; fol. peltato-cordatis acutis basi excisis sinu lato. *Arum* Lk. *Patria?* 4.

17. *C. Boryi* Kunth; caulescens recta; fol. ovato-cordatis subundulatis basi emarginatis. *Arum* cordifolium Bory. *In ins. Borboniae.* 4.

lipticis breviter acuminatis disco purpureo-sanguineis, lobis basilaribus patulis obtusangulis. *Hook. exot. fl.* t. 26. *B. M. t.* 2543. *B. Cab. t.* 255. *Arum* Jacq. *Schoenbr.* t. 186. *B. M. t.* 820. *In Brasilia.* 4.

2. *C. poecile* Schott; fol. peltatis profunde cordatis ovatis breve acuminatis concoloribus juxta nervos primarios albis, lobis basilaribus rotundatis patulis. *Patria?* 4.

3. *C. colocasioides* Brongn. petiolis violaceis; fol. peltatis lobis posticis productioribus nervis violaceis, venulis paginae inferioris paucioribus nec arcuatim reticulatis. *Arum* Desf. *In ins. Timor.* 4.

4. *C. violaceum* Desf. fol. peltatis ovatis cordato-ellipticis acutis disco violaceis, lobis basilaribus brevibus rotundatis patulis. *In Antillis.* 4.

5. *C. zamiiefolium* Lodd. *B. Cab. t.* 1408. acaule; fol. impari-pinnatis 1—2-pedalibus; foliolis alternis subsessilibus oblongis acutis reflexis; spadice breve pedunculato cylindrico obtuso; spatha spadicem superante elliptica acuta reflexa viridi. *In Brasil.* 4.

4949. *PELTANDRA* Raf. (1817).

1. *P. virginica* Raf. acaulis; fol. hastato-cordatis acutis lobis obtusis; spatha elongata incurva spadice superne masculiflora. *Arum virginicum* L. *Caladium* Hook. exot. fl. t. 182. *In Virginia.* 4.

2. *P. undulata* Raf. fol. radicalibus sagittatis oblongis obtusis; scapo striato punctulato longitudine spathae; spatha inflata undulata mucronata medio fissa spadice obtuso longiore. *In New-York.* 4.

4950. *XANTHOSMA* Schott. (1832).

1. *X. Jacquinii* Schott; caulescens erectum; fol. cordato-sagittatis; spadice spatha cucullata medio contracta breviore. *Arum xanthorrhizon* Jacq. h. *Schoenbr.* t. 188. *Caladium* W. *In Antillis.* 4.

2. *X. sagittifolium* Schott; acaule; fol. sagittatis acuminatis, lobis baseos divaricatis obtusis; spadice spatha ovata cucullata breviore. *Arum* Jacq. h.

4948. *CALADIUM* Vent. (1800).

1. *C. bicolor* Vent. cels. t. 30. fol. peltatis subhastato-cordatis ovato-el-

vind. t. 157. Plum. ic. t. 35. *In Brasilia Canada Jamaica*. $\ddot{\text{h}}$.

3. *X. betophyllum* Kunth; acaule; fol. sagittatis acuminatis; lobis baseos approximatis. *Caladium Willd.* L. *Patria?* $\ddot{\text{h}}$.

4. *X. edule* Schott; acaule; fol. sagittatis breve acuminatis; scapo compresso; spadice spathe lanceolata breviore. *Caladium Mey.* *In Essequebo.* $\ddot{\text{h}}$.

4951. ACONTIAS Schott. (1832).

1. *A. hastifolius* Schott; acaulis; fol. sagittatis acutis basi rotundatis. *Arum sagittifolium* Lk. *Patria ign.* 2.

2. *A. helleborifolius* Schott; acaulis; fol. pedatis *integerrimus*; spadice spathe aequante. *Willd. Arum Jacq.* ic. t. 613. *Caladium Vent. Arum pentaphyllum* Fl. flum. 9. t. 104. *In Martinica et Caracas.* 2.

3. *A. variegatus* Kunth; acaulis; fol. pedatis, foliolis lanceolatis arcuatim horizontalibus; spathe subtereti inflata apice lanceolata acuta; spadice acuminato. *Patria ign.* 2.

4952. SYNGONIUM Schott. (1832).

1. *S. auritum* Schott; *Caladium Vent. Arum L.* *Jacq. h. Schoenb.* t. 191. *Plum. ic. t. 58. Fl. flum. 9. t. 113. In Ind. occ. et Brasilia.* 2. *Caulis elongatus scandens. Folia peditata. Spatha sordide flavo-virens.*

4953. CULCASIA Beauv. (1805).

1. *C. scandens* Beauv. fl. t. 3. *Denhamia Schott. Caladium Willd. In Africa trop.* $\ddot{\text{h}}$. *Caulis suffrutescens volubilis. Folia ovato-oblonga acuta integra petiolata. Spadix spathe superans.*

4954. PHILODENDRON Schott. (1832).

a. *Spatha alba. Stigma sessile capitatum.*

1. *P. crassifolium* Lindl. B. R. t. 1953. fol. lanceolatis acuminatis costa crassissima inflata; spathe obtusa cu-

cullata apiculata. *Rchb. hort. t. 160. Arum lanceolatum Fl. flum. 9. t. 114. In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

2. *P. Linnaei* Kunth; acaule; fol. lanceolatis aveniis. *Arum cannaefolium L.* *In Surinamo.* 2.

3. *P. cannaefolium* Mart. acaule; fol. longe petiolatis ovato-lanceolatis coriaceis viridibus nitidis; petiolis inflatis conicis late canaliculatis; spathe basi convoluta. *Caladium crassipes Hortul.* *In Brasilia.* 2.

4. *P. grandifolium* Schott; caulescens radicans; fol. opacis cordato-sagittatis acutis; petiolis teretibus; spadice obtuso spathe cucullatam medio constrictam aequante. *Caladium Hook. B. M. t. 3345. Arum Jacq. h. Schoenbr. t. 189. In Caracas et Demerara.* 2.

5. *P. Simsii* Kunth; caulescens radicans fol. lucidis cordato - sagittatis acutis; petiolis teretibus spadice obtuso spathe cucullatam medio constrictam basi ventricosam subaequante. *Caladium grandifolium Sims. B. M. t. 2643. C. Simsii Hook.* *In Demerara.* 2.

6. *P. Fontanesii* Kunth; acaule; fol. hastatis scapo longioribus; spathe basi ventricosa superne in cucullum acuminatum spadicem excedente elongata. *Caladium Desf.* *In Brasilia.* 2.

7. *P. punctatum* Kunth; arborescens; fol. amplissimis cordatis transversim oblique nervosis; petiolis teretibus maculatis. *Arum Desf. Patria?* $\ddot{\text{h}}$.

8. *P. arborescens* Kunth; caudice simplici erecto; fol. longe petiolatis profunde sagittatis acutis 5-nerviis membranaceis; spathe oblonga acuta coriacea spadicem paulo superante. *Arum L. Plum. ic. t. 41. f. g. et t. 90. In Ind. occ. et Essequebo.* $\ddot{\text{h}}$.

9. *P. arboreum* Kunth; caudice arboreo; fol. profunde sagittato - cordatis. *Caladium H. et K.* *In Cumana.* $\ddot{\text{h}}$.

10. *P. acuteatum* Kunth; caule arboreo erecto aculeato; fol. sagittatis; spadice spathe cucullato - ovata breviore. *Caladium Mey.* *In Essequebo.* $\ddot{\text{h}}$.

11. *P. hederaceum* Schott; caulescens radicans; fol. cordatis oblongis acuminatis; petiolis teretibus. *Arum L. Jacq. am. t. 152. Plum. ic. t. 51*

et 55. ejusd. Fil. t. 195. In *Carthagenae et Martinica*. 2.

12. *P. inciso-crenatum* Kunth; caulescens radicans; fol. longe petiolatis profunde subhastato-cordatis apice rotundatis margine integerrimis vel grosse inciso-crenatis penni-basi 5-nerviis herbaceis; petalis basi incrassatis. *P. laciniosum* Schott. *Patricia ign.* 2.

13. *P. fragrantissimum* Kunth; caulescens radicans; fol. cordato-oblongis sagittatis; petiolo semitereti marginato; spadice acuto spatham cucullato-cylindraceam medio constrictam basi ventricosam subaequante. *Caladium Hook. B. M. t. 3314.* In *Demerara*. 2.

14. *P. corcovadense* Kunth; caulescens radicans; fol. longe petiolatis profunde subhastato-cordatis acuminatis 5-nerviis nitidis; spadicibus axillaribus pedunculatis; spathis basi convolutis acutis spadicem aequantibus. *Arum Fl. flum. 9. t. 115.* In *Brasilia*. 2.

15. *P. pedatum* Kunth; caulescens; fol. longe petiolatis cordatis profunde tripartitis, lacinia superiore maxima pinnatifida, inferioribus auriculatis incisis; spatha cucullata involuta. *Caladium Hook. exot. fl. t. 206.* In *Brasilia*. 2.

16. *P. turidum* Kunth; acaule; fol. pedatifidis longe petiolatis; spadice praecoce spatham convolutam erectam subaequante. *Caladium liridum* B. Cab. t. 1590. In *Brasilia*. 2.

17. *P. tacerum* Schott; caulescens radicans; fol. cordatis sinuato-pinnatifidis. *Caladium Willd.* *Arum Jacq. h. Schoenbr. t. 468.* *Colocasia hederaea* Desc. fl. ant. t. 53. In *Caracas et Venezuela*. 2.

18. *P. pinnatifidum* Kunth; acaule; fol. pedatifidis. *Arum Jacq. h. Schoenbr. t. 187.* *Caladium Willd.* In *Caracas*. 2.

19. *P. tripartitum* Schott; caulescens radicans; fol. 3-partitis petiolis nudis; spadice spatham cucullato-ovatam aequante. *Arum Jacq. h. Schoenbr. t. 190.* *Caladium Willd.* In *Caracas*. 2.

b. *Spatha flava.* Stigma sessile truncatum.

20. *P. Imbe* Schott; caulescens; fol. longe petiolatis profunde cordatis

ovato-oblongis acuminatis subpedatinerviis; petiolis folio longioribus. *Caladium h.* Berol. *Calostigma* Schott. In *Brasilia*. 2.

21. *P. Sellowianum* Kunth; caulescens radicans; fol. petiolatis profunde cordatis ovato-oblongis acuminatis subpedatinerviis; petiolis folio brevioribus; spadicibus breve pedunculatis; spatha inferne convoluta acuta spadicem paulo superante. In *Brasilia*. 2.

22. *P. oblongum* Kunth; caulescens scandens radicans; fol. longe petiolatis ovato-oblongis acuminatis leviter cordatis; spadicibus axillaribus erectis; spatha acuta basi cucullato-convoluta et ventricosa spadicem subaequante. *Arum oblongum* Fl. flum. t. 113. In *Rio Janeiro*.

c. *Spatha purpurea.* Stigma radiato-lobatum.

23. *P. speciosum* Schott; Meconostigma Schott. Meletm absque descript.

d. *Spatha extus fusco-purpurea intus alba.* Stigma sessile sphinctiforme radiato-lobatum.

24. *P. bipinnatifidum* Schott; fol. bipinnatifidis. *Sphinctero stigma* Schott. Meletm. *Arum Fl. flum. 9. t. 110.* In *Brasilia*. 2.

25. *P. nerrosum* Kunth; fol. oblongis acutis venosis; petiolo lanato. *Pothos Willd.* In *Nova Andalusia*. 2.

26. *P. panduraeforme* Kunth; fol. panduraeformibus acuminatis subcordatis costatis et simpliciter venosis coriaceis. *Pothos H. et K.* Ad *Ori-nocum*. 2.

27. *P. peregrinum* Kunth; acaule; fol. cordatis obtusis mucronatis angulis rotundatis. *Arum L.* In *Am. austr.* 2.

28. *P. ? guttiferum* Kunth; ramis scandentibus; fol. obovato-oblongis acuminatis basi obtusis penninerviis et eleganter striato-costatis petiolis membranaceo-alatis; spadicibus cylindricis axillaribus. *Caladium Poepp.* In *Peruvia*. 2.

29. *P. cordatum* (*Arum*) Fl. flum. 9. t. 111.

30. *P. amphibium* (Arum) Fl. flum.
9. t. 112.
31. *P. nigrum* (Arum) Fl. flum.
9. t. 107.
-

4955. *SPATHICARPA* Hook.
(1832).

1. *S. hastifolia* Hook. misc. 2.
t. 77. In Chili. 2. Folium radicale
solitarium longe petiolatum hastato-
3-lobum petiolo basi vaginante. Sca-
pus gracilis folium superans. Spatha
late linearis.

4956. *DIEFFENBACHIA* Schott.
(1832).

1. *D. Seguine* Schott. Arum Jacq.
am. t. 151. Plum. ic. t. 51. h. et 61.
Mill. ic. t. 295. Caladium Vent. Hook.
exot. fl. t. V. B. M. t. 2606. B. Cab.
t. 608. In Caribaeis Essequebo. 2.
Truncus crassus erectus vel procum-
bens. Folia oblongo-ovata cuspidata.
Pedunculus brevis fructifer reflexus.
Spatha viridis.

4957. *AETHERURUS* Blume.
(1838).

1. *A. ternatus* Blume; fol. trise-
ctis; scapo petiolo bulbifero longiore.
Arum bulbosum Pers. A. atrorubens
Spr. A. forniciatum Roth. In Ind.
or. et Japonia. 2.

2. *A. tripartitus* Blume in Rumph.
t. 31 et 37. F. fol. tripartitis;
scapo petiolo ebulbi breviore. In China
et Japonia. 2.

4958. *AGLAONEEMA* Schott. (1832).

1. *A. simplex* Blume in Rumph.
t. 65 et 36. D. fol. oblongis protu-
beranti-venosis. A. integrifolium Schott.
A. oblongifolium Schott. In Java. 2.

2. *A. murantaeifolium* Blume l. c.
. 66. fol. oblongis obsolete paralle-
venosus. Caladium Zipp. Rumph. 5.
t. 182. f. 2. In Amboina. 2.

3. *A. obtongifolium* Kunth; cau-
lescens; fol. oblongis; spatha cymbo-
formi acuminata; spadice basi depau-
perate femineo. Calla Roxb. In Ind.
or. 2.

4. *A. pictum* Kunth; caulescens
fol. breve petiolatis ovato-oblongis;
floribus axillaribus; spatha gibba acu-
minata spadice obtuso breviore. Calla
Roxb. In Sumatra. 2.

5. *A. princeps* Kunth; fol. oblon-
gis acuminatis; penninerviis petiolis
vaginantibus; spadicibus basi mere
femineis. Caladium h. Berol. Pa-
tria? 2.

6. *A. nitidum* Kunth; fol. ovato-
lanceolatis acuminatis; scapis compres-
sis fol. brevioribus; baccis 1-spermis.
Calla W. Jack. In Puto Penang. 2.

7. *A. maculatum* Blume; fol. albo-
maculatis late expansis basi circum-
volutis. Dracunculus Luzonis Garay.
In ins. Luzoniae. 2.

4959. *HOMALONEMA* Schott.
(1832).

1. *H. occultum* Schott; subacaule;
fol. cordato-ovatis; spatha in helicem
voluta spadice oblongum basi mixti-
florum apice masculum occludente.
Calla Lour. Zantedeschia Spr. In
Cochinchina. 2.

2. *H. aromaticum* Schott; fol. sub-
sagittatis cordatis acuminatis; spadice
cylindrico obtuso spatham aequante;
antheris plurilocularibus. Calla Roxb.
in Sims. B. M. t. 2279. C. occulta
B. Cab. t. 12. In Ind. or. 2.

3. *H. cordatum* Schott; fol. pe-
tiolatis profunde cordatis subrotundo-
ovatis acuminato-cuspidatis; lobis ba-
silaribus rotundatis patulis. Dracon-
tium Houtt. Pflanzsyst. 10. t. 71. f. 2.
In Java. 2.

4. *H. calyptatum* Kunth; acaule;
fol. oblongis cordatis; spatha circum-
scissa parte superiore conica sub anthesi
decidua; spadicis parte dimidia supe-
riore staminibus tecta, inferiore femi-
nea. Calla Roxb. Rumph. 5. t. 111.
f. 1. In Amboina. 2.

5. *H. rubescens* Kunth; caulescens;
fol. cordatis basi bifidis; spatha con-
tracta acuta spadice aequante tertia
parte inferiore spadicis germinibus cor-
pusculisque clavatis obiecta, inferiore
cylindrica feminea. Calla Roxb. Rumph.
t. 111. f. 2. In Chittagong. 2.

4960. RICHARDIA Kunth. (1817).

1. *R. africana* Kunth in ann. Mus. 4. t. 20. *Calla aethiopica* L. Commel. hort. t. 50. B. M. t. 832. *Colocasia Spr.* In P. b. S. 2. *Folia radicalia erecta longe petiolata cordato-hastata. Scapus centralis subtrigonous. Spatha maxima candida.*

4961. CALLA L. (1747).

1. *C. palustris* L. rhizome re-pente geniculato; fol. cordatis cuspidiatis petiolatis; spadice luteo; spatha alba. Fl. dan. t. 422. B. M. t. 1831. Schk. t. 278. Hayne Arzn. 4. t. 5. *In Europa et Am. bor.* 2.

2. *C. humilis* W. Jack; acaulis; fol. ellipticis supra glabris; pedunc. 4—5 ex axillis foliorum petiolo brevioribus. *In Puto-Penang.* 2.

3. *C. angustifolia* W. Jack; acaulis; fol. lanceolatis utrinque glabris acutis; pedunculus 4—5 ex axillis foliorum petiolo brevioribus. *In Puto-Penang.* 2.

4962. MONSTERA Schott. (1832).

1. *M. Adansonii* Schott; fol. oblique ovatis cordatis pertusis; spathis cymbiformibus. *Dracontium pertusum.* L. Jacq. h. Schoenbr. t. 184, 185. Fl. flum. 9. t. 117. *Calla pertusa* Kunth. *C. Dracontium* Mey. Ess. *In Am. austr.* 2.

2. *M. lingulata* Schott; caulescens repens; fol. cordato-lanceolatis; petiolis marginato-membranaceis. *Arum* L. Plum. ic. t. 37. Sloane hist. t. 27. f. 1, 2. *In Jamaica.* 2.

3. *M. cannaefolia* Schott; fol. obovato-lanceolatis utrinque acuminatis costatis; spatha oblonga acuminata plana striata spadicem subaequante; pedunculo tereti. *Pothos* B. M. t. 603. Rudge guj. t. 33. B. Cab. t. 471. *In Guiana, Cumana et ins. Vincentii.* 2.

4963. SCINDAPSUS Schott. (1822).

1. *S. glaucus* Schott; frutescens; fol. longe petiolatis cordato-ovatis acuminatis irregulariter pinnatifidis, laciniis oblongo-falcatis; spadicibus longe pedunculatis; spatha ovata cu-

cillata crassa coriacea; floribus subhexandris. *Pothos* Wall. pl. as rar. t. 156. *In Nepal.* 2.

2. *S. decursivus* Schott; caulescens in arboribus radicans; fol. longe petiolatis elliptico-oblongis acentis cordatis pinnatifidis laciniis linearis-falcatis cuspidatis; spadicibus breve pedunculatis; spatha subcylindrica spadicem superante; floribus sub 4-andris. *Pothos Roxb.* Wall. pl. as. rar. t. 192. (sub *P. caudata*). *In Sylhet.* 2.

3. *S. Peepula* Schott; caule radicante; fol. longe petiolatis oblongis acuminatis integris; spadicibus sub-terminalibus pedunculatis; spatha cylindracea acuta longitudine spadicis; floribus 4-andris. *Pothos Roxb.* *In Sylhet.* 2.

4. *S. pertusus* Schott; caule scandente in arboribus radicante; fol. longe petiolatis cordatis ad unum latus perforatis ad alterum pinnatifidis; spatha gibba acutata; floribus tetrandris. *Pothos Roxb.* Rheede 12. t. 20, 21. *In Coromandetia.* 2.

5. *S. pinnatus* Schott; fol. ovatis pinnatis basi fibroso-filamentotosis junioribus integris; spatha ovato-oblonga acuminata erecta; spadice obtuso-cylindraceo obtuso. *Pothos L. Rumph.* 5. t. 183. f. 2. *In Ind. or. et in ins. Timor.* 2.

6. *S. pinnatifidus* Schott; caule perenni in arboribus radicante; fol. pinnatifidis; segmentis falcatis uniovulis. *Pothos Roxb.* *In Sumatra.* 2.

7. *S. caudatus* Schott; perennis radicans; ramulis extremis aphyllis flagelliformibus pendulis; fol. ovato-cordatis integris v. pinnatifidis segmentis subensiformibus 1-nerviis. *Pothos Roxb.* *In ins. Wales.* 2.

8. *S. officinalis* Schott; caulescens, in arboribus radicans; fol. petiolatis oblongis cordatis; filiformi-cuspidatis; spadicibus terminalibus solitariis; spatha subcylindrica spadicem aequante subclauca; floribus sub-8-andris. *Pothos Roxb.* *In Bengal.* 2.

9. *S. giganteus* Schott; perennis; caulinis radicantibus; fol. longe petiolatis oblongis cordatis integris; spatha cylindrica cuspidata; floribus sub-7-andris. *In ins. Wales.* 2.

10. *S. sylvestris* Kunth; caulescens; fol. lanceolato subensiformibus; spatha cucullata convoluta; spadice cy-

lindrico obtuso. Calla Blume. In Java. ♂.

11. *S. montana* Kunth; caulescens; fol. elliptico-oblongis acutis; spatha cucullata convoluta; spadice elongato-conico. Calla Blume. In Java. ♂.

4964. GONATANTHUS Klotsch. (1843).

1. *G. sarmentosus* Kl. Caladium h. Berol. In Brasilia. 2. Herba acaulis sarmentosa. Folia longe petiolata peltata cordata acuminata; spadix scapum terminans. Spatha flava.

MONOECIA MONADELPHIA.

4965. CUCURBITA L. (1737).

1. *C. maxima* Duch. fol. cordatis rugosissimis petiolatis hispidis; tubo calycis obovato in collum brevem desinente; fructibus globosis subdepressis luteis rubris vel viridibus. Tournef. inst. t. 34. Wight. ic. t. 507. Sering. diss. t. 1. *Patria ign.* ♂.

2. *C. Melopepo* L. fol. cordato-obtusis sub-5-lobis denticulatis; cirrhis in foliis valde imperfectis saepe transformatis; calyce hemisphaerico-campanulato fauce valde dilatato; fructibus depresso-depressis, carne sicca spongiosa alba. Moris. hist. 1. t. 8. *In?* ♂.

3. *C. moschata* Duch. corollis campanulatis basi angustissimis; fol. molibus tomentosis; fructibus ovalibus sphaericis depressis; carne flava v. aurantiaca moschata. In Martinica. ♂.

4. *C. villosa* Blume; fol. subrotundo-cordatis 5-lobis scabris; lobis acutis sinuato-denticulatis; pedunculis 1-floris masculis femineis longioribus; pinnis oblongis villosis. In Ind. or. ♂.

5. *C. Pepo* L. fol. cordato-obtusis sub-5-lobis denticulatis; calycibus in collum infra limbum desinentibus; fructibus subrotundis oblongis laevibus. In Oriente. ♂.

6. *C. farinosa* Blume; fol. subrotundo-cordatis subangulato-7-lobis parum strigosis, lobis acuminatis dentatis; pedunculis 1-floris; pomis obtongis maximis glauco-farinosis. Ad segetes Ind. or. ♂.

7. *C. verrucosa* L. fol. cordatis profunde 5-lobis denticulatis, lobo

medio basi angustato; fructibus subrotundo-ellipticis verrucosis. *Patria ign.* ♂.

8. *C. subverrucosa* Willd. fol. cordatis profunde 5-lobis denticulatis; lobo medio basi angustato; fructibus clavato-ellipticis subverrucosis. *Patria ign.* ♂.

9. *C. aurantia* Willd. scaberrima; fol. subcordatis 3-lobis cuspidatis argute denticulatis; fructibus globosis laevibus facie et colore Citri Auranti. *Patria ign.* ♂.

10. *C. orifera* L. fol. cordatis angulato-5-lobis denticulatis pubescensibus; calycibus obovatis in collum breve desinentibus et post anthesin collo circumscissis. Ad Astrachan. ♂.

11. *C. foetidissima* H. et K. fol. laeviter cordatis ovatis sinuato-angulatis superne angustatis dentalis supra strigoso-hirtis subtus albidis et villosohirtis; floribus femineis axillariis solitariis; calyce campanulato laciniis acutis. In Mexico. ♂.

12. *C. campanulata* Klein; caule sulcate glabro; fol. cordatis angusto-5-lobis denticulatis scabris; floribus masculis umbellatis, femineis solitariis pedunculatis; fructibus ellipticis tomentosis. In Ind. or. ♂.

13. *C. asperata* Gill. ex Hook. b. Misc. dioica; caulinis glabris; fol. palmato-5-partitis punctis callosis utrinque subtus crebrioribus exasperatis, segmentis sinuato-pinnatifidis; floribus masculis capitato-racemosis; femineis pedunculatis solitariis; fructibus subglobosis. Chizostigma asperatum Hook. et Arn. In Chil. ♂.

14. *C. urnigera* Schrad. fol. latocordatis obtuse 5-lobis pubescenti-hirtis; fructu ventricoso-urceolari costato. *Patria ign.* ♂.

15. *C. littoralis* Hasskr. fol. subrotundo-cordatis angulato-5-7-lobis hirtis, lobis repando-dentatis acuminatis; pedunculis 1-floris petiolis ramisque urenti-hirtis; pomis globosis urenti-hispidis densissime glauco-pruinosis. In Java col. ♂.

4966. CUCUMIS L. (1737).

1. *C. Meto* L. caule humifuso scabro cirrhifero; fol. rotundatis angulatis petiolatis; floribus masculis; tubo calycis basi ventricoso apice dilatato;

staminibus inclusis antheris connectivo brevioribus; fructu ovato 8—10-sulcato carne sacharata flava v. alba. In Asia. ◎.

2. *C. deliciosus* *Roth; foliorum angulis obtusis; fructibus ovato-subrotundis pubescentibus, carne alba fragrantissima, cortice tenui. In Hispania colitur. ◎.

3. *C. sativus* L. caule herbaceo cirrhifero; fol. cordatis 5-lobis petiolatis; floribus breve pedunculatis subternis majusculis; florum masculorum tubo calycis tubuloso-campanulato limbo deflexo acuto; fructibus oblongis. Blackw. t. 4. In Patria et Oriente. ◎.

4. *C. flexuosus* L. caule humifuso scabro flexuoso cirrhifero; fol. cordato-ovatis sublobatis denticulatis petiolatis; floribus fasciculatis; calyce valde piloso; fructibus elongatis cylindrico-clavatis. In Ind. or. 4.

5. *C. jamaicensis* Bert. fol. cordatis 3-lobis quintuplinerviis glabris integrerrimis subtus punctato-scabris, laciniiis acuminatis; fructibus subglobosis. In Jamaica. ◎.

6. *C. Chate* L. villosissimus; caulis humifusus obtuse 5-gonis flexuosis; fol. petiolatis breve rotundatis obtuse angulatis denticulatis; floribus parvis; fructibus ellipticis basi apiceque attenuatis pilosis. Alp. pl. aeg. t. 40. In Aegypto. ◎.

7. *C. Dudaim* L. hispidus; fol. inferioribus rotundatis superioribus 5-lobis basi cordatis denticulatis cirrhis simplicibus; petalis ovato-rotundatis; florum masc. calyce rotundato fauce dilatata; connectivo antheris longiore; tubo calycis piloso; stigmatibus 4—6; fructibus globosis carne alba odoratissima. Dill elth. f. 218. In Asia. ◎.

8. *C. Conomon* Thunb. pilosiusculus; caule humifuso striato; fol. cordatis sublobatis petiolatis pilosiusculis; floribus parvis; fructibus oblongis glabris 6—10-sulcis; carne firma.

9. *C. sepium* Mey. fol. cordato-ovatis sub-5-lobis; fructibus ovalibus utrinque acuminatis muricatis. In Essequebo. ◎.

10. *C. lineatus* Bosc. journ. h. nat. 2. t. 37. caule scandente 5-gono; cirrhis 3-fidis folio longioribus; fol. cordato-palmatis acutiusculis serrulatis; floribus subgeminis subsessilibus; petalis ovatis retusis; fructibus ovato-

oblongis lineato-10-costatis. In Cayena. ◎.

11. *C. prophetarum* L. caule humifuso striato; fol. cordatis 5-lobis denticulatis, lobis obtusis; floribus axillaribus 2—5-pedunculatis; calyce masc. campanulato; petalis obovatis; fem. calyce globose 12-striato hispido, limbo campanulato dentibus coronato; fructibus globosis echinatis variegatis. Jacq. hort. t. 9. In Arabia. ◎.

12. *C. africanus* L. caule humifuso angulato; fol. cordatis 5-lobis, lobis acutiusculis; fructibus ovato-oblongis valde echinatis. Herm. parad. t. 36. In P. b. S. ◎.

13. *C. Anguria* Ser. valde pilosus; caule humifuso cirrhifero; fol. palmato-sinuatis basi cordatis scabris; floribus subsolitariis magnitudine Begoniae albae; fructibus globosis echinatis albis. Mill ic. t. 33. Pluckn. t. 170. f. 3. In Jamaica. ◎.

14. *C. muricatus* Willd. fol. cordato-angulatis, angulis rotundatis subcanis; pomis cylindricis muricatis; floribus masculis aggregatis subsessilibus, fem. solitariis. In Tranquebaria. ◎.

15. *C. pubescens* Willd. fol. cordatis subangulatis acutiusculis argute dentatis scabris; fructibus ellipticis obtusis pubescentibus viridibus striis obscurioribus longitudinalibus pictis adultis albis absque striis. C. madraspatanus Roxb. Royle ill. t. 47. f. 1. In Ind. or. ◎.

16. *C. maculatus* Willd. fol. cordatis obsolete angulatis rotundato-obtusis denticulatis scabris; fructibus ellipticis basi angustatis glabris junioribus striis latis viridibus. Ser. diss. t. 3. Patria ign. ◎.

17. *C. Colocynthis* L. caule humifuso subhispido; fol. cordato-ovatis multifido-lobatis subtus albo-pilosis, lobis obtusis; floribus pedunculatis; fem. calycis tubo globose hispido, laciniiis angustatis; petalis parvis; fructibus globosis luteis, carne amarissima. Blackw. t. 411. Citrullus Colocynthis Wight et Arn. ic. t. 498. In Japonia. ◎.

18. *C. campechianus* H. et K. caule cirrhifero; fol. cordatis subrotundis sinnato-5-lobis dentatis, lobis rotundatis intermedio maximo; floribus masculis racemosis paucis; tubo calycis viloso. In littore Campechiano. ◎.

19. *C. perennis* E. James; fol. 3-angulari-cordatis margine undulatis; cirrhis trichotomis lobis calycis undulatis; fructibus orbicularibus laevibus sub-4-locularibus; seminibus ovatis gibbosis margine acuto. *In Am. bor. cultus.* ♂.

20. *C. Hardwickii* Royle ill. t. 47. f. 3. caule volubili scandente scaberrimo pilis glandulosis albidis obsoito; fol. cordato-acuminatis 5-lobis, angulis acutis margine undulato-crenatis; floribus masculis solitariis v. binis. *In Himalaya.* ♂.

21. *C. pseudocolocynthis* Royle ill. t. 47. f. 2. caule gracili prostrato radicante scaberrimo; fol. scabris tuberoso-glandulosis 5-lobis angulis rotundis, lobo terminali latiore cuneato; floribus masculis solitariis penduculatis. *In Himalaya.* ♂.

22. *C. utilissimus* Roxb. caulibus scabris; fol. late cordatis sub 5-lobis, lobis rotundatis dentatis; floribus masculis aggregatis, femineis solitariis; fructibus ovalibus junioribus pubescens tibus demum glabris variegatis 4-6 poll. longis. *In Ind. or.* ♂.

23. *C. turbinatus* Roxb. caulibus scabris; fol. palmato-lobatis obovatis repandis argute dentatis sinibus obtusis; floribus femineis solitariis; fructibus pyriformibus obsolete 3-gonis obtuseque 3-angularis variegatis glabris. *In Ind. or.* ♂.

24. *C. trigonus* Roxb. caulibus scabris; fol. 5-lobis lobis rotundatis repando-argute dentatis; floribus masculis aggregatis, fem. solitariis; fructibus ovalibus utrinque rotundatis 10-striatis. Wight ic. t. 497. *C. maderaspatanus* Wall. *In Ind. or.* ♂.

25. *C. arenarius* Schum. et Thonn. hirtus; fol. cordatis argute lobatis acutiusculis denticulatis; caule petiolisque hispidis; pomis ovalibus tomentosis. *In Guinea.* ♂.

26. *C. chrysocomus* Schum. et Thonn. fol. cordatis subsinuato-repandis, denticulis mucronulatis acutis utrinque scabris; pomis subsphaericis pilis aureis obsitis. *In Guinea.* ♂.

27. *C. dissectus* Decaisn. caule piloso; fol. profunde pinnatifidis rectis supra glabriusculis subtus asperis petiolatis, cirrhis petiolo aequalibus apice 2-3-fidis; floribus masculis solitariis; calyce campanulato laciniis subulatis; ovario oblongo glabro. *In ins. Timor.* ♂.

28. *C. bicirrha* Forst. caulis herbaceis procumbentibus flexuosis hirsutis obsolete 5-angularis sulcatis; fol. cordatis subrotundis 5-gonis acuminate serrato-dentatis subhirsutis; cirrhis bifidis; pedunculis axillaribus hirsutis teretibus; pomo ovato. *In ins. Societat.* ♂.

4967. CORIANDRA Schrad. (1836).

1. *C. glauca* Schrad. in Eckl. et Zeyl. afr. p. 275. fol. glauco-viridibus, caulinis 5-partitis, segmentis cuneato-lanceolatis dentatis superiorum pinnatifidis; laciniis acuminatis terminali cuspidata. *In Afr. austr.* ♂.

2. *C. Zeyheri* Schrad. fol. caulinis 5-partitis segmentis pinnatifidis, laciniis ovato-oblongis obtusis superioribus 3-partitis, segmentis profundius divisis, laciniis acutiusculis. *In Afr. austr.* ♂.

3. *C. pinnatisecta* Schrad. fol. caulinis profunde 3-partitis, segmentis pinnatisectis, laciniis lanceolato-linearibus integris v. subdentatis; terminali elongata. *In Afr. austr.* 2.

4. *C. dissecta* Schrad. fol. 5-partito-palmatis, laciniis pinnatifidis linearibus margine revolutis scabris; floribus umbellatis; fructibus solitariis subrotundis mucronatis obtuse angularis flavis. *In P. b. S.* 2.

4968. CYRTONEMA Schrad. (1836).

1. *C. triloba* Schrad. fol. subcarnosis reniformi-cordatis integris angularis 3-lobis supra glabriusculis subtus margineque scabris; fructu fufiformi acuminato. *Bryonia* Thunb. *In Afr. austr.* 2.

2. *C. sphenotoba* Schrad. fol. firmis utrinque scabris, caulinis trifoliatis, segmentis lateralibus bipartitis intermedio cuneiformi apice 3-lobo, summorum laciniis laciniulisque linearis-oblongis obtusis; fructu rostrato. *In Afr. austr.* 2.

3. *C. digitata* Schrad. fol. firmis utrinque scabris, caulinis trifoliatis segmentis lateralibus 2-3-partitis, intermedio sub-3-fido, summorum segmentis bipartitis simplicibusque laciniis linearibus acutis; fructu rostrato. *Bryonia* Thunb. *In Afr. austr.* 2.

4. *C. latiloba* Schrad. fol. membranaceis utrinque scabris palmato-5-lobis; lobis rotundato-obtusis mucronatis; intermedio majore cuneiformi-ovato; fructu rostrato. In Afr. austr. 4.

4969. *MELOTRIA* L. (1737).

1. *M. pendula* L. fol. cordatis 5-lobis dentatis; cirrhis simplicibus; floribus feminis solitariis longe pedunculatis; corolla subpilosa denticulata; fructibus ovato-subglobosis pendulis. Lam. ill. t. 28. f. 3. Plackn. t. 85. f. 5. In America. 4.

2. *M. grandifolia* Torr. et Gray. 1. p. 541. fol. membranaceis cordatis 3-lobis denticulatis lobo medio maximo acuminato-cuspidato; floribus in axillulis foliorum aggregatis; calycis dentibus linearis-subulatis; stylo basi disco trilobo cincto; fructibus oblongis aurantiacis. In Mississippi. 4.

3. *M. prunifera* Poepp. et Endl. n. gen. t. 174. ramis sulcatis velutino-pubescentibus; fol. sinuato-cordatis 5-angularibus sublobatis denticulatis subtus puberulis; cirrhis bifidis; floribus masculis geminis v. ternis feminis solitariis longissime pedunculatis; corolla intus villosa; peponibus subglobosis laevissimis. In Maynas. 4.

4. *M. fluminensis* Gardn. fol. profunde cordatis 5-angularibus mucronato-denticulatis subciliatis superne albo-punctatis; floribus longe pedunculatis, masculis racemosis, feminis solitariis; fructibus oblongis glabris. In Brasilia. 4.

4970. *ZEHNERIA* Endl. (1840).

1. *Z. suavis* Endl. fol. cordatis dentatis supra scabris subtus pubescentibus, caulinis 5-lobis superioribus 3-lobis, lobis acutis intermedio longiore cuspidato. Pilogyne Schrad. In P. b. S. 4.

2. *Z. Ecktonis* Endl. fol. triangulare-ovatis acuminatis cordatis 3-lobis supra scabris subtus dense piloso-hirtis. Pilogyne Schrad. In P. b. S. 4.

3. *Z. cuspidata* Endl. fol. majora quam in praecedente magis cuspidata, ramealia subintegra nec subtriloba. Pilogyne Schrad. In P. b. S. 4.

4. *Z. membranacea* Endl. foliorum forma Z. dilatatae similis, sed reliquum distinctissimum. Pilogyne Schrad. In P. b. S. 4.

5. *Z. velutina* Endl. fol. caulinis cordatis 5-lobis inaequaliter serrato-dentatis supra scaberrimis subtus dense pubescenti-hirtis. Pilogyne Schrad. In P. b. S. 4.

6. *Z. dilatata* Endl. fol. supra scabris subtus ad venas pubescenti-hirtis, caulinis lato-obtuseque triangulari-cordatis dentatis, superioribus 3-lobis acutiusculis denticulatis. Pilogyne Schrad. In P. b. S. 4.

7. *Z. affinis* Endl. fol. cordatis denticulatis supra scabris subtus ad venas pubescenti-hirtis; caulinis 3-lobis, lobis lateralibus acutiusculis intermedio majori acuto. Pilogyne Schrad. In P. b. S. 4.

8. *Z. Bauerina* Endl. In ins. Norfolk. 4.?

4971. *RHYNCHOCARPA* Schrad. (1837).

1. *R. foetidissima* Schrad. Trichosanthes Jacq. ic. t. 624. Melothria foetida Desr. In Guinea. 4. Radix carnosa napiformis. Folia cordata subdentata pilosa sessilia. Cirri simplices. Flores masculi racemosi. Fructus ovati longe mucronati flavescentes.

4972. *BRYONIA* L. (1737).

a. *Folia angulata*.

1. *B. prostrata* Rottb. caule filiforme sulcato; fol. cordatis obtusis subdentatis scabris; pedunculis axillaribus solitariis; fructibus ovatis angulatis acuminatis. In Tranquebaria. ♂.

2. *B. Perrottetiana* Ser. cirrhis simplicibus capillaribus; fol. late cordatis angulatis sessilibus margine undulatis villosis scabris v. longissime pilosis; pedunculis pilosis; seminibus badiis pilis adpressis granuloso-marginatis. In Senegal. ♂.

3. *B. mucronata* Blume; fol. cordato-ovatis mucronatis subangulatis et repando-denticulatis supra punctato-scabris infra laevibus; floribus

fasciculatis dioecis; baccis ovalibus.
In Ind. or. 2.

4. *B. scabra* Thunb. fol. cordatis angulatis dentatis supra calloso-punctatis pilis utrinque scabris; floribus umbellatis; fructibus globosis; seminibus laevibus. In P. b. S. 2.

5. *B. verrucosa* Ait. fol. cordatis angulatis supra venisque subtus calloso-scabris; cirrhis subsimplicibus; fructibus globosis subsessilibus. In ins. Canariis. 2.

6. *B. scabrata* Blume; fol. cordatis cuspidatis indivisis subangulatisque denticulatis supra scabris in venis subtus asperis; umbellis breve pedunculatis monoecis; fructibus globosis. In Ind. or. 2.

7. *B. punctata* Thunb. fol. cordatis subangulatis supra callosis subtus pilosis; pedunculis 1-floris. In P. b. S. 2.

8. *B. repanda* Blume; fol. cordatis cuspidatis repando-denticulatis supra scabris subtus puberulis; umbellis pedunculatis dioecis; baccis globosis. In Java. 2.

9. *B. leucocarpa* Blume; fol. ova-to-oblongis acuminatis basi exciso-cordatis subrepando-denticulatis supra punctato-scabris subtus pallidioribus; pedunculis subgeminis paucifloris; floribus monoicis; baccis globosis. In Java. 2.

10. *B. geminata* Blume; fol. ova-to-cordatis subhastatisque obtusiusculis obsolete denticulatis punctato-scabris; floribus pedunculatis geminatis monoicis; baccis ovalibus. In Jara. 2.

11. *B. sagittata* Blume; fol. breviter petiolatis sagittatis acuminatis integerrimis supra scabris infra glaucescentibus; pedunculis maculis subumbellatis; femineis 1-floris. In Java. 2.

12. *B. marginata* Blume; fol. cordato-ovatis acuminatis basi subangulatis obsolete denticulatis marginatis asperis; umbellis longe pedunculatis; baccis oblongis. In Jura. 2.

13. *B. Rheebei* Blume; fol. breve petiolatis oblongo-cordatis basi subangulos remote denticulatis glabrinusculis supra punctatis infra glaucis, summis hastato-trilobis; pedicellis masculis dense racemosis medio 1-bracteatis. *B. umbellata* Wight et Arn. part. Rheebe 8. t. 26. In Java. 2.

14. *B. cordata* Hoffm. fol. cordatis scabris denticulatis; floribus axillaribus geminis. *Patria ign.* 2.

15. *B. angulata* Thunb. fol. 5-angulatis utrinque scabris; floribus subumbellatis. In P. b. S. 2.

16. *B. acutangula* Thunb. fol. angulatis integris laevibus glabris. In P. b. S. 2.

17. *B. Moimoi* Ser. fol. cordatis 5-angulatis acute denticulatis, angulo terminali elongato acuto; cirrhis simplicibus; fructibus rubris basi aculeatis, aculeis paucis reflexis. Burm. zeyl. t. 19. f. 1. In Zeylona et Bengal. 2.

18. *B. cochinchinensis* Lour. fol. 5-angulatis asperis; floribus monoicis magnis axillaribus solitariis longe pedunculatis; fructibus ovatis utrinque subacutis 10-angulatis rubris laevibus; seminibus oblongo-ovatis compressis laevibus. In Cochinchina. 2.

19. *B. japonica* Thunb. fol. cordatis indivisis angulatisque dentatis supra viridibus pilis minutissimis inermis hispidis subtus pallidis punctato-squamosis. In Japonia. 2.

20. *B. Blumei* Ser. fol. ovato-cordatis v. cordato-sagittatis acuminatis repando-denticulatis scabris; floribus monoecis, masculis umbellatis, femineis solitariis; baccis oblongis. *B. heterophylla* Blume. In Java. 2.

21. *B. umbellata* Klein; fol. oblongo-cordatis utrinque glabris supra punctatis remote denticulatis basi subangulatis summis hastato-hilobis; pedunculis axillaribus umbellatis. *B. hastata* Lour. In Ind. or.

22. *B. amplexicaulis* Lam. caule angulato glabro; fol. laevibus cordatis subangulos amplexicaulibus subtus punctatis glaucis superioribus saepe anguste 3-lohis; floribus solitariis axillaribus pedunculatis parvis; fructibus acuminatis laevibus. In Ind. 2.

23. *B. heterophylla* Steud. fol. cordatis denticulatis; cirrhis solitariis; floribus solitariis pedunculatis hermafroditis; fructibus coccineis; seminibus nigricantibus. *Solea* Lour. In Cochinchina. 2.

24. *B. pubescens* Poir. caule pilose; fol. cordatis sub 5-lohis, lobis acutis dentato-spinosis; petiolis villosis; cirrhis longissimis ramosissimis; floribus parvis albis pubescentibus umbellatis. In Oriente. 2.

25. *B. hederaeifolia* Jacq. fragm.
t. 113. dioica radice crassa carnosa; caule tereti glabro internodiis distan-
tibus; cirrhis longissimis simplicibus;
fol. cordatis sub-5-lobis supra rugu-
losis subtus hispidulo-scabris; race-
mis simplicibus multifloris; lobis co-
rollae ovatis flavescentibus. *In Te-
neriffa.* 4.

26. *B. althaeoides* Ser. caule fili-
formi sulcato aspero; internodiis folio
longioribus; cirrhis simplicibus anguste
spiraliter contortis; fol. cordato-lan-
ceolatis breve petiolatis 5-angulis ob-
tuse dentatis subtus scabro-subtomen-
tosis, lobo terminali elongato; fructi-
bus zona tenui cinctis valde punctato-
scabris. *B. scarella* Wight et Ser.
part. *In Timor.* 4.

27. *B. pedunculosa* Ser. pilosa;
caule filiformi striato, internodiis di-
stantibus; cirrhis bifidis; fol. longe
petiolatis cordatis longe acuminatis
dentato-crenatis, pilis longis distanti-
bus; floribus magnis laxe racemosis;
pedicellis longis pilosis. *In Nepatia.*

28. *B. deltoidea* Arn. caulinibus gra-
cilibus glabris striatis; cirrhis sim-
plicibus; fol. deltoideis petiolatis supra
calloso-scabris subtus laevibus; floribus
masculis axillaribus subbinis in
racemum brevem digestis; femineis
ignotis. *Aechmandra Arn.* in Hook.
Journ. *In Ceylona.* 4.

29. *B. mysorensis* Wight; caulinibus
glabris nitidis; cirrhis simplicibus;
fol. cordatis repando-dentatis
plerumque 5-angularibus scabriusculis;
floribus masculis umbellatis; umbella
longe graciliter pedunculata; calycis
tubo ovali; fructibus longe ovalibus
glabris; seminibus laevibus zona gla-
bris. *In Ind. or.* 4.

30. *B. foetidissima* Schum. et
Thonn. fol. ovato-cordatis subrepandis
denticulatis utrinque pilosis; racemis
axillaribus; baccis subrotundis acumi-
natis 10-striatis. *In Guinea.* 4.

31. *B. capillacea* Schum. et Thonn.
fol. deltoideo-cordatis denticulatis su-
pra scabris subtus glaucis; racemis
axillaribus elongatis; baccis globosis
glabris, geniculis caulis pilosis. *In
Guinea.* 4.

32. *B. glandulosa* Poepp. et Endl.
nov. g. t. 175. dioeca; fol. superioribus
punctato-hispidis subtus glabris
laevibus basi cuneatis, inferioribus
glandulosis acuminatis serratis integris

late ovalibus v. obtuse trilobis; race-
mis femineis multifloris; baccis ova-
libus. *In Chili.* 4.

33. *B. tenuifolia* Gill. fol. 3-par-
tita, segmentis bipinnatipartitis, la-
ciniis linearibus paucis, inferioribus
1-lateralibus superioribus oppositis;
pedunculus femineis solitariis petiolum
aequantibus; fructu ovali laevi sub-
disperma. *In Chili.* 4.

b. Folia lobata.

34. *B. epigaea* Rottl. caule sul-
cato glabro; fol. coriaceis subcordati-
s trilobis obsolete denticulatis asperis,
lobis lateralibus subbifloribus inter-
medio elongato acuminato; floribus
monoecis, masculis umbellatis, femi-
neis solitariis; baccis globosis. *B. glabra* Roxb. *Aechmandra H. et Arn.*
In Ind. or. 4.

35. *B. scarella* DC. caule mu-
ricato hispido; fol. trilobis dentatis
utrinque calloso-hispidis, lobis late-
ralibus dilatatis angulatis, interme-
dio elongato; petiolis hispidis; floribus
axillaribus subsessilibus plurimis;
fructibus globosis sub-3-gonis; semi-
nibus muricatis. *Wight ic. t. 501.*
Mukia scarella Arn. *B. Maderaspata*
Berg. Cucumis L. *In Ind. or.* 4.

36. *B. attenuata* Arn. in Beech-
voy. 424. monoica; caule profunde
striato glabro; fol. late ovatis oblongis
se profunde 3-lobis integris basi
cuneatis utrinque scabris subtus pu-
bescens, lobis obtuse serratis mu-
cronatis; floribus racemosis; pedicel-
lis inferioribus fasciculatis. *In Aca-
pulco.* 4.

37. *B. latebrosa* Ait. fol. subtri-
lobis pilosis basi attenuatis vix cor-
dati secundum petiolos decurrentibus.
In ins. Canariis. 4.

38. *B. stipulacea* Willd. caule
sulcato; cirrhis 3-fidis; fol. cordatis
3-lobis dentatis glabris utrinque lae-
vibus; stipulis subrotundis concavis ser-
ratis; fructibus ovatis subacutis glabris
luteis 5-locularibus polyspermis. *In
Cochinchina.* 4.

39. *B. americana* Lam. radice
crassa; caule angulato; fol. cordatis
3-lobis angulatis rugosis, dentibus
spinuliformibus; lobis corollae angustis
intus albidis; fructibus ovatis rubris
paucispermis; seminibus compressis.
Plum. ic. 66. *In Antillis.* 4.

40. *B. cordifolia* L. fol. cordatis oblongis 5-lobis dentatis scabris; apice petioli bidentato. *In Ceylona.* 4.

41. *B. alba* L. caule scandente; fol. cordatis 5-lobis dentatis callosopunctatis scabris, lobo terminali vix majore; floribus racemosis monoicis; calycibus feminis corollam aequantibus; stigmatibus glabris; baccis nigris. Schk. t. 316. *In Europa.* 4.

42. *B. dioica* L. fol. cordatis 5-lobis dentatis calloso-asperis; calycibus feminis corolla dimidio brevioribus; stigmatibus hirsutis. E. B. t. 439. Blackw. t. 37. Mill. t. 71. *In sepibus Europae.* 4.

43. *B. nitida* Lk. fol. cordatis 5-lobis apiculatis piloso-scabris; pedunc. umbelliferis. *Patria ign.* 4.

44. *B. cretica* L. radice carnosa; caule scandente; fol. cordatis 5-lobis integerrimis ciliatis utrinque callosomuricatis, lobo terminali majore; cirrhis simplicibus spiralibus; floribus dioecis; feminis axillaribus solitariis; fructibus globosis rubris; seminibus obovatis laevibus. Desf. cor. t. 70. *In Creta.* 4.

45. *B. quinqueloba* Thunb. fol. 5-lobis supra scabris, lobis obtusissimis dentato-mucronatis postice auriculatis, cirrhis simplicibus; florum masculorum pedunculis geminis 1-floris; calyx late campanulato acuteque dentato; corollis campanulatis. B. M. t. 1820. *In P. b. S.* 4.

46. *B. nepalensis* Ser. multiceps; fol. palmato-5-lobis supra scabris subtus laevibus, lobis angustis acutissimis integrisculis, terminali longissimo, lateralibus divaricatis; petiolis brevibus; floribus masculis fasciculatis numerosis minimis; pedunc. inaequalibus. *In Nepalia.* 4.

47. *B. ficifolia* Lam. fol. 5-lobis subdenticulatis, lobis profunde obtusis; petiolis cauleque hispidis. *B. bona-nriensis* Mill. Dill. elth. f. 58. *In Bonaria.* 4.

48. *B. acuta* Desf. caule gracili; fol. subseptemlobis, lobis lanceolatis acutissimis integris v. dentatis; cirrhis simplicibus; florum masculorum pedunculis multifloris; laciniis calycis angustis acutis. *Ad sepes regni Tunetani.* 4.

49. *B. variegata* Mill. fol. palmatis laciniis lanceolatis supra punctatis

infra laevibus; fructu ovato sparso. *In America.* 4.

50. *B. macrophylla* Ser. caule crasso striato; fol. cordatis lobatis angulis excisis, lobis dentatis; petiolis longis; floribus masculis racemosis; fem. solitariis; fructibus oblongis pilosis. *Patria ign.* 4.

51. *B. leiosperma* Wight et Arn. caulinibus pedunculisque hispidis scabris; cirrhis simplicibus; fol. cordatis 5-angularibus v. 5-lobis, segmento medio triangulare repando-dentato supra callosa-scabris subtus dense pilosis; floribus fasciculatis; fructibus globosis magnitudine pisi; seminibus numerosis tumide lateque zonatis glabris. *In Ind. or.* 4.

52. *B. Hookeriana* Wight et Arn. fol. cordatis argute repando-dentatis 5-angularibus angulis acutis lobatisque, lobo medio acuminato, supra scabris subtus pilosis, floribus umbellatis, umbellis compositis longe pedunculatis; fructibus globosis glabris. *In Ind. or.* 2.

53. *B. tubiflora* Wight et Arn. caulinibus gracilibus scabris; fol. longe petiolatis cordatis 5-lobis, lobo intermedio longissimo lanceolato, reliquis ovatis sinuatis dentatisque scabro-hispidis; floribus masculis racemosis; calyx elongato tuberoso; antheris omnibus coalitis; floribus fem. axillaribus solitariis; fructibus ovatis rostratis; seminibus cylindricis reticulatis foveolatis. *Gymnopetalum* Hook. *In Ceylona.* 4.

54. *B. Boykinii* Torr. et Gray; scabro-pubescentes; fol. cordatis 3-lobis denticulatis, lobo medio longissimo acuminato, lateralibus angulatis bilobisque; floribus in axilla 3-5 aggregatis; baccis kermesinis ovalibus; stylis versus apicem coalitis basi disco cupulaeformi circumdati; baccis ovatis trispermis; seminibus magnis compressis. *In Am. bor.* 4.

55. *B. affinis* Endl. fol. cordato-5-partito-lobatis scabris, laciniis oblongo-lanceolatis acuminatis mucronato-serratis, petiolis muricatis; pedunculis 1-floris filiformibus; floribus intus hirtis; fructibus globosis sanguineo-striatis. *In ins. Norfolk.* 4.

56. *B. Tajuja* Velloza fl. flum. X. t. 89. radice tuberosa napiformi spongiosa flavescente; epidermide sordide

fusca. *B. cordifolia* Godoy. *In Brasilia*. 2. *Arbores altissimas scandit*.

c. *Folia palmata*.

57. *B. racemosa* Mill. fol. inferioribus subpalmatis, superioribus indivisis; laciiniis ovatis; floribus racemosis. *Plum. am. t. 97. In Am. austr.* 2.

58. *B. pinnatifida* Burch. fol. ternato-pedatis, lobis pinnatifidis; laciiniis linearibus oblongisque obtusis aveniis. *In P. b. S. 2.*

59. *B. laevis* Thunb. fol. cordatis palmatis serratis laevibus; floribus axillaribus subumbellatis. *In P. b. S. 2.*

60. *B. palmata* L. fol. cordatis palmatis laevibus 5-partitis; laciiniis lanceolatis repando-serratis lateralibus brevioribus; fructibus globosis magnis. *In Ceylona*. 2.

61. *B. Garcinia* Willd. fol. 5-partito-palmatis, lobis subrotundo-ovovatis dentatis supra scabris; stipulis reniformibus ciliatis. *Burm. ind. t. 57. f. 3. In Ceylona*. 2.

62. *B. acerifolia* Willd. fol. 5-partito-palmatis lobis lineari-lanceolatis tripartitis margine scabris; cirrhis simplicibus; pedunculis axillaribus 1-floris. *In Ind. or.* 2.

63. *B. laciniosa* L. fol. scabris palmato-5-lobis, segmentis oblongis lanceolatis acuminatis serratis; petiolis muricatis; floribus masculis fasciculatis; femineis solitariis axillaribus; baccis sphaericis; seminibus pulpo arillari tuberoso-marginatis, lateribus gibbis suberosis. *In Ind or.* 2.

64. *B. cucumeroides* Ser. seminibus ferrugineis transverse oblongis longitudinaliter zona crassissima punctata circumvallatis. *Patria ign.* 2.

65. *B. alceaefolia* Willd. fol. 5-partito-palmatis, lobis lineari-lanceolatis tripartitis margine scabris; cirrhis simplicibus; pedunculis axillaribus 1-floris. *In Ind. or.* 2.

66. *B. africana* Thunb. radice tuberosa; fol. superioribus 5-partito-palmatis, lobis oblongis inciso-dentatis, inferioribus cordatis, angulis dentatis. *Herm. parad. t. 108. In P. b. S. 2.*

67. *B. nana* Lam. caule tenui; fol. inferioribus cordato-subrotundis

integerimis, superioribus profunde 3-lobis, lobis obtusis. *In Africa*. 2.

68. *B. Wallichiana* Ser. caule filiformi striato; fol. subsessilibus sagittatis verrucoso-rugosis; lobo terminali lanceolato-lineari longissimo subdenticulato, lateralibus obtongis reflexis remote denticulatis; floribus numerosis fasciculatis. *In Nepalia*. 2.

4973. CITRULLUS Neck. (1790).

1. *C. vulgaris* L. valde pilosus; caule humifuso; fol. obtusis pinnatifidis subglaucescentibus; floribus solitariis 1-bracteatis; fructibus subglobosis glabris stellato-maculatis. *Cucumis* Ser. *C. Curbita* L. Blackw. t. 157. *In Africa*. ♂.

2. *C. amarus* Schrad. fol. superioribus tripartitis, segmento intermedio productiore sinuato-pinnatifido, lateralibus bifidis, lobis obovatis reliquisque rotundato-obtusis; fructu subgloboso. *In P. b. S. 2.*

3. *C. caffer* Schrad. *Cucurbita* Eckl. et Zeyb. *In Africa*. ♂.

4974. ECBALIUM Rich.

1. *E. agreste* Rehb. *Cucurbita* agrestis Blackw. t. 108. *Momordica* Elaterium L. Schk. t. 313. Hayne t.

45. *In Europa*. ♂. Pedale erectum hispidum. Folia petiolata obtusa crenata. Cirrhi nulli. Flores axillares cymosi. Fructus magnitudine pruni hispidus viriis.

4975. MOMORDICA L. (1737).

1. *M. Balsamina* L. fol. 5-lobo-palmatis dentatis glabris nitidis; fructibus subrotundo-ovatis utrinque attenuatis angulatis tuberculatis aurantiacis irregulariter lateraliterque rompentibus; bractea cordata dentata infra medium pedunculi; arillo rubro. *Lam. ill. t. 794. f. 1. Blackw. t. 539. a. b. In Ind. or.* ♂.

2. *M. Charantia* L. caulinus villosus; fol. palmato-5-lobis sinuato-dentatis, junioribus subtus villosus; pedunculis gracilibus reniformi-bracteatis; calycis segmentis oblongis; fructu oblongo vel ovato utrinque acuminato tuberculato-muricato croceo; semini-

bus oblongis tuberculatis rubro-arillatis. B. M. t. 2455. Rheede 8. t. 9. Rumph. 5. t. 51. Wight ic. t. 504. *M. muricata* DC. Rheede 8. t. 10. *In Ind. or.* ②.

3. *M. senegalensis* Lam. fol. profunde palmatis subserratis subtus pallidis villosis; fructibus ovato-mucronatis tuberculatis aurantiacis v. rubris. *In Senegalia.* ②.

4. *M. cylindrica* L. caule 4-angulari; fol. cordato-sublobatis angulatis dentatis; floribus luteis; fructu cylindrico longissimo subvilloso reticulato; bractea integerrima ad basin pedunculi; seminibus nigris. *In Ceylona et China.* ②.

5. *M. subangulata* Blume; fol. profunde cordatis acuminatis subangulatis mucronulato-denticulatis supra scabris; floribus dioecis bractea cordata integerrima ad apicem pedunculi. *In humidis Javae.* ②.

6. *M. operculata* L. fol. 5-lobis dentatis; fructibus ellipticis angulato-tuberculatis rostratis rostro deciduo operculatis. Comm. rar. t. 22. ex Linn. *In Am.* ②.

7. *M. Lambertiana* Ser. hispida; caule prostrato flexuoso; cirrhis sub-simplicibus; fol. cordato-rotundato-5-lobis denticulatis scabris; petiolis brevibus; pedunculis hispidis. *In Ind. or.* ②.

8. *M. echinata* Mühl. fol. cordatis 5-lobo-angulatis, lobis acuminatis integerrimis glabris; cirrhis multifidis; fructibus subrotundis setaceo-echinatis 4-spermis. *Sicyos lobata* Michx. *In Pensylmania.* ②.

9. *M. bicolor* Blume fol. profunde cordatis 5-lobo-angularibus obtusinsculpis glabris mucronulato-denticulatis margine substrigosis inferne glandulosis; floribus dioecis pedunculatis axillaribus subternis; pomis oblongis glabris rubro-variegatis. *In Ind. or.* ②.

10. *M. aculeata* Poir. caule tenuiscandente; fol. palmato-pedatis lacinii 5—7 dentato-sublobatis supra punctatis albis conspersis subtus nervis petiolisque breviter aculeatis; petiolis nervisque mediis pilis asperis reflexis vestitis; floribus masculis racemosis longe pedunculatis, femineis solitariis subsessilibus; fructibus globosis magnitudine pisi. *Patria ign.* ②.

11. *M. dioeca* Roxb. radice tuberosa perenni; caulinis subpilosis; fol.

longe petiolatis basi cordatis integris v. 3—4-lobis dentatis supra scabris; petiolis eglandulosis; bractea floris cucullata; calycis segmentis subulatis, petalis lanceolatis; fructu ovato mucricato seminibus ovalibus arillo magno. Decaisn. in Jacquem. voy. t. 71. Wight ic. t. 505 et 506. Rheede 8. t. 12. *M. Missionis* Wall. Rheede 8. t. 18. *In Ind. or.* ④.

12. *M. mixta* Roxb. radice tuberosa perenni; caulinis glabris; fol. 3—5-dentatis v. palmatis glabris, lobis oblongis subintegris v. dentatis, petiolis marginibus foliorum umbilicato-glandulosis; pedunculis cucullato-bracteolatis, bracteolis emarginatis scabriusculis, basi glanduloso-pilosis; calyx campanulato; fructu ovali scabro-mucricato. *M. cochinchinensis* Spr. *In Ind. or. et China.* ④.

13. *M. anthelmintica* Schum. et Thonn. pomo ovali utrinque acuto tuberoso; bracteis cordatis supra medium pedunculi; fol. palmato-pedatis, lobis sinuatis obtuse dentatis, dentibus mucronatis cauleque 5-angulari pilosis. *In Guinea.* ②.

14. *M. foetida* Schum. et Thonn. pomis echinatis; fol. cordatis cuspidiatis dentato-repandis, denticulis obtusis mucronulatis pilosiusculis; calycibus echinatis. *In Guinea.* ④.

15. *M. Hystrix* Gill. fol. 5-lobis glabris laevibus cuneatis, lobis denticulatis mucronulatis, inferioribus binis recurvo-patentibus medio productiori; cirrhis simplicibus; floribus ex eadem axilla masculis racemosis, femineis solitariis pedunculatis; fructibus oblique ovatis setis validis echinatis. *In Bonaria.* ④.

16. *M. macropoda* Poepp. et Endl. t. 173. glabra laevis, caulinis 4-gonis; fol. 5-lobis sinuato-cordatis integerrimis; racemis masculis longe pedunculatis; peponibus obliquis ovatis acutis glaberrimis; seminibus rhombis apice retusis glabris. *In Peruria.* ④.

17. *M. pedata* Feuill. per. t. 41. caule acutangulo; fol. pedato-7—9-lobis, lacinii lanceolatis grosse duplikato-serratis; racemis masculis compositis longe pedunculatis folia exce-dentibus; floribus fem. solitariis axillaribus subsessilibus; peponibus cylindricis glabris striatis; seminibus tuberculato-asperis. *In Peruvia.* ④.

18. *M. brachybotrys* Poepp. et Endl. caulis angulosus; fol. sinuato-cordatis 5-lobo-angulatis grosse serratis secus nervos puberulis; racemis masculis ramosis brevissimis; floribus femineis solitariis breve pedunculatis; peponibus ovatis acutis setis carnosis echinatis, 5-8-spermis; seminibus glabris. In Peruvia. ♂.

4976. LUCCA Tournef. (1790).

1. *L. pentandra* Roxb. caule 4-gono; fol. cordatis rotundatis sub-5-lobis angulatis; sepalis late ovato-acuminatis; fructu oblongo-elliptico lineato-verrucoso mucronato lacinis calycinis coronato; seminibus ovatis. Rheede 8. t. 8. L. Cattupicina DC. L. Petola Ser. Rumph. 5. t. 147. In Ind. or. ♂.

2. *L. acutangula* Roxb. caule glabro; fol. 5-angulatis palmatis, lacinis lanceolatis; racemis masculis longe pedunculatis; staminibus distinctis; calycis masculi segmentis glandulosis; fructu 1-pedali clavato obtuso 10-angulo; seminibus atris basi bilobis. Cucumis L. Rheede 8. t. 7. Rumph. 5. t. 149. In Ind. or. ♂.

3. *L. amara* Roxb. fol. scabriusculis cordato-rotundis 5-7-lobis; racemis masculis longe pedunculatis; staminibus adelphis; fructibus 3-4-uncialibus oblongis utrinque acutis acute 10-angulis; seminibus atropunctatis margine tumidis basi bilobis. L. Plucknetiana Ser. Pluckn. t. 172. f. 1. In Ind. or. ♂.

4. *L. echinata* Roxb. caulis pilosissimus; fol. subpilosis 5-lobis repando-dentatis; cirrhis bifidis; floribus parvis dioecis; racemis masculis folio longioribus; staminibus 3-adelphis; fructu ovali setis strictis echinato; operculo deciduo. In Ind. or. ♂.

5. *L. tuberosa* Roxb. radice tuberosa perenni; caulis glabris; fol. reniformi-cordatis 5-7-lobis dentatis glaberrimis; cirrhis simplicibus; fol. parvis albis; racemis masculis paucifloris brevissimis; staminibus diaadelphis; rac. femineis solitariis longe pedunculatis; fructu oblongo $1\frac{1}{2}$ poll. longo utrinque attenuato acute 5-costato. L. amara Wall. In Ind. or. ♂.

6. *L. Kleinii* W. et Arn. caulis sulcatis glabris; fol. longe petiolatis cordatis 3-5-angulatis v. sublobatis scabriusculis argute dentatis, lobo medio longiore triangulari-acuminato; cirrhis longis bifidis; racemis masculis longe pedunculatis, femineis breve pedunculatis; staminibus distinctis; fructu ovali tomentoso. Cucurbita umbellata Klein. In Ind. or. ♂.

7. *L. scabra* Schum. et Thonn. fol. subhastato-cordatis angulatis 5-lobisque scaberrimis; fructu ovato-oblongo laeviusculo pubescente. In Guinea. ♀.

8. *L. striata* Schrad. fol. cordatis sub-5-lobis acuminatis inaequaliter dentatis scabris; petalis oblongo-ovatis rotundatis obtusis; fructu clavato laevi striis obscurioribus notato. Patria? ♂.

9. *L. foetida* Cav. ic. t. 9. caule sulcato; fol. cordatis 5-angulis scabris, angulis acutis serratis; cirrhis umbellatis, fructu mucronato limbo calycinis non coronato. In Ind. or. et ins. Borboniae. ♂.

10. *L. cordifolia* Blume; fol. cordatis acuminatis argute dentatis scabris; floribus dioecis, masculis subumbellatis, femineis solitariis; fructu sulcato rugoso. In Java. ♂.

11. *L. aegyptiaca* Mill. fol. cordato-subrotundis lobatis, lobis angulatis basi excisis marginibus incumbeantibus, cirris simplicibus; fructu obovato-clavato decem angulato, lacinis calycinis coronato. Momordica Luffa L. Alp. aeg. t. 58. Mor. 1. t. 7. f. 1-2. In Aegypto. ♂.

4977. BENINCASA Sari. (1818).

1. *B. cerifera* Sav. Rheede 8. t. 3. In Ind. or. ♂. Herba moschata pilosissima. Fol. cordata sub-5-loba, lobis acutusculis crenatis. Cirri simplices. Fructus ovato-cylindrici lati penduli virides.

4978. LAGENARIA Ser. (1825).

1. *L. vulgaris* Ser. molliter pubescens moschata; caule scandente; cirrhis 3-5-fidis; fol. cordatis integriusculis piloso-subglaucouscentibus basi biglandulosis; floribus monoicis stellatis patentissimis; connectivo papillis

oblongo-ovatis acutis obsito, fructibus pubescentibus maturitate glabratissimis; carne albida eduli. *Cucurbita Lagenaria* L. Moris. sect. 1. t. 5. f. 1—3. Rumph. 5. t. 144. Rheeede 8. t. 4. 5. *Intra tropicos*. Ⓣ.

2. *L. vittata* Ser. fol. rotundato-cordatis subrepandis obsolete denticulatis asperis; pedunculis confertis 1-floris; pomis pyriformibus longitudinaliter vittatis puberulis. *In Ind. or.* Ⓣ.

3. *L. hispida* Ser. piloso-cinerea; fol. cordatis 5-angularibus acuminate-denticulatis subtus glandulis pedicellatis obsitis; caule petiolisque dense hispidis, floribus densissime ferrugineo-pilosus. *Cucurbita* Thunb. *In Japania*. Ⓣ.

4. *L. idololatrica* Ser. fol. cordatis cuspidatis obsolete trilobis pubescentibus basi biglandulosis, lobis lateralibus brevissimis cuspidatis; fructibus pyriformibus. *Cucurbita* Willd. *In Guinea*. Ⓣ.

4979. COCCINIA Wight et Arn. (1824).

1. *C. indica* Wight. et Arn. Decasn. in Jacquem. voy. t. 72. Wight ill. t. 125. *Bryonia grandis* L. *Momordica monadelphia* Roxb. Rheeede 8. t. 14. Rumph. 5. t. 166. Burm. thes. t. 19. f. 1, 2. *In Ind. or.* 4. Folia cordata lobata supra calloso-punctata basi subtus glandulosa lobo terminali obtuso. Fructus oblongi aculeati, aculeis paucis reflexis.

4980. TRICHOSANTHES L. (1747).

1. *T. anguina* L. caule 5-gono, fol. cordatis 3-lobis repando-dentatis puberulis; cirrhis bifidis longissimis; floribus masculis racemosis; lobis corollae laciniioso-ciliatis; fructibus tereti-oblongis piloso-hispidis rumpentibus. Lam. ill. 794. Mill. ic. t. 32. Mich. g. t. 9. 1c. chin. t. 12. Rumph. 5. t. 148. *In China et Ind. or.* Ⓣ.

2. *T. costata* Blume; fol. cordatis 3-lobis denticulatis scabris, lobis lateralibus subbilobis; floribus masculis racemosis, femineis solitariis; pomis parvis ovato-oblongis costatis. *In Java*. Ⓣ.

3. *T. colubrina* Jacq. eclog. t. 128. caule sulcato crassiusculo; cirrhis bi-

fidis; fol. cordato-subrotundis 3—5-lobis lobis brevibus latis dentatis; floribus masculis paniculatis; pedunculo communi longissimo; femineis solitariis; calyce longissimo reflexo; fructu lineato longissimo. *Palria ignota*. Ⓣ.

4. *T. nervifolia* L. caule tenui; fol. cordatis 3-nerviis dentatis; petiolo brevi; cirrhis bifidis; floribus masculis racemosis; racemo longe pendunculato; lobis corollae oblongis laciniato-ciliatis; flor. femineis solitariis; fructibus ovatis acutis albo-lineatis. Rheeede 8. t. 17. *In Ind. or.* 4.

5. *T. scabra* Lour. ramis lignosis subrotundis rugosis scabris; cirrhis bifidis; floribus monoecis; corolla breve ciliata; fructibus subrotundis rubris 10-angularis 5-loclaribus. *In Cochinchina*. ♂.

6. *T. cuspidata* Lam. caule volubili; fol. cordato-oblongis acutis dentatis; cirrhis simplicibus; floribus femineis subsessilibus; calyce longe tubuloso, laciniis acutis fimbriato-ciliatis; fructu ovato longe cuspidato. Rheeede 8. t. 16. *In Ind. or.* ♂.

7. *T. angulata* Lam. caule angulato tenuissimo villosi; fol. cordato-subrotundis angulatis parvis, cirrhis surcatis; floribus masculis paniculatis; pedunculo communi foliis multo longiore; femineis solitariis; petalis fimbriatis. *In Ind. or.* 4.

8. *T. villosa* Blume; fol. cordatis 3-cuspidatis obsolete denticulatis villosis; pedunculis 1-floris; pomis subglobosis albido-striatis. *In Java*. 4.

9. *T. erigera* Blume; fol. profunde cordatis mucronatis mucronato-denticulatis supra nitidis infra asperis; pedunc. fem. 1-floris; pomis ovatis vittatis. *In Java*. 4.

10. *T. grandiflora* Blume; fol. quintuplinerviis ovatis 3-cuspidatis integrerrinis coriaceis glaberrinis; floribus dense spicatis bracteatis. *In Java*. 4.

11. *T. coriacea* Blume; fol. quintuplinerviis cordatis acuminatis integrerrinis coriaceis supra reticulatis glabris infra pallidioribus scabris; floribus masculis laxe racemosis; pedunculo elongato bracteato. *In Java*. 4.

12. *T. cucumerina* L. foetida; caule 4-gono pilosiusculo; fol. cordatis angulatis villosulis petiolatis, nervis albidis; petiolis muricatis, cirrhis bifurcatis; floribus masculis subumbel-

latif., feminis solitariis, lobis calycis ovatis; petalis apice fimbriatis; fructibus viridibus albo-lineatis dein aurantiacis, seminibus margine sinnatis. Bheede 8. t. 15. F. laciniosa DC. In Ind. or. 4.

13. *T. amara* L. caule tereti glabro; cirrhis simplicibus; fol. cordato-subangustatis sinnatis punctato-scabris petiolatis; floribus feminis solitariis; calycibus longe tubulosis, lacinii acutis; petalis ovato-subrotundis fimbriatis; fructibus obovato-oblongis 9-loocularibus viridibus albo-lineatis, carne alba amara. Plum. am. t. 100. In Domingo. ♂.

14. *T. hexasperma* Blume; fol. trinerviis ovatis 3-cuspidatis integerimis coriaceis glabris; floribus masculis racemosis bracteatis, feminis solitariis; pomis globosis 6-spermis. In Java. ♂.

15. *T. macrocarpa* Blume; fol. orbiculato-cordatis 5-lobis v. 3-lobis coriaceis glabris; lobis ovatis acuminate integerrimis lateralibus subbifidis; pomis maximis globosis; caule suffruticoso. In Jura. 4.

16. *T. tricuspidata* Lour. caule fruticoso, cirrhis 3-fidis; fol. cordatis 3-cuspidatis denticulatis glabris multierviis; stipulis subrotundis crassis crenatis; floribus spicatis; bracteis magnis dentatis; fructibus luteis parvis ovatis bilocularibus dispermis. In Cochinchina. 4.

17. *T. pilosa* Lour. caule suffruticoso longissimo sulcato; cirrhis bifidis; fol. cordatis denticulatis pilosovenosis, inferioribus palmatis superioribus 3-lobis; floribus masculis spicatis; bracteis magnis lanceolatis ciliatis; fructibus ovatis acutis coccineis 1-loocularibus; seminibus compressis. In Cochinchina. ♂.

18. *T. chinensis* Ser. fol. cordato-triangularibus obtusiusculis subangustatis; petiolis brevibus; cirrhis simplicibus; floribus masculis solitariis; calyce longe tereti-clavato pilosulo; petalis obovatis margine fimbriatis; tubo calycis feminei piloso, petalis non fimbriatis. ic. braam. t. 33. In China. ♂.

19. *T. tamnifolia* Poir. caulis glabris striatis; cirrhis simplicibus; fol. ovato-subrotundis sublobatis integris supra scabris floribus masculis laxe racemosis parvis; petalis vil-

losis reflexis; fructibus ovatis mucronatis glabris. In Portorico. 4.

20. *T. pubera* Blume; fol. excisocordatis 3-cuspidatis denticulatis infra subtomentosis; floribus feminis subsolitariis; pomis ovatis acutis. In Ind. or. 4.

21. *T. globosa* Blume; fol. palmato-3—5-lobis glabris, lobis linearibus acutis; floribus masculis dense spicatis in pedunculo incrassato bracteatis; feminis solitariis; fructibus globosis. In Jura. ♀.

22. *T. trifoliata* Blume; fol. ternatis; foliolis denticulatis scabris lateribus basi extus gibbis; floribus masculis subracemosis bracteatis; feminis solitariis; fructibus ovatis muricatis; seminibus complanatis denticulatis. Rumph. 5. t. 152. f. 3. In Java. 4.

23. *T. palmata* Roxb. perennis scandens; fol. palmato-lobatis dentatis subtus plerumque pauci-depresso-glandulosis; cirrhis 3-fidis; floribus masculis racemosis bracteola magna apice truncata dentata; floribus feminis solitariis; calycis segmentis ovatis profunde dentatis v. serratis; fructibus globosis; seminibus numerosis oblongis compressis. Wight ic. t. 104. 105. *T. laciniosa* Wight. *T. anguina* Wall. Modecca bracteata Lam. In Ind. or. 4.

4981. ELATERIUM L. (1737).

1. *E. gemellum* DC. fol. cordato-sub-sagittatis 5-angulis, angulo medio acuminato; cirrhis bifidis; floribus masculis longe racemosis; collo calycis longo apice campanulato; petalis ovatis acutiusculis; fructibus curvatis trilocularibus aculeis distantibus. In Mexico. 4.

2. *E. carthagense* L. fol. cordatis angulosis denticulatis supra scabriusculis petiolatis; floribus albis odoratis masculis paniculatis, feminis solitariis; tubo calycis supra ovarium tereti apice non dilatato; petiolis linear-lanceolatis acutis; fructibus reniformibus molliter hispidis; seminibus alatis apice tridentatis. Jacq. am. t. 154. ic. pict. t. 232. In Am. austr. 4.

3. *E. tamnooides* Willd. fol. cordatis acuminatis remote serratis supra glabris subtus hirtis; floribus flavescent-

tibus, femineorum tubo calycis supra ovarium campanulato; stylo brevissimo; stigmate magno plano. In Mexico. Ⓛ.

4. *E. hastatum* H. et K. fol. cordato-sinuatis hastato-triangulatis acuminiatis denticulatis supra scabriusculis subtus glabris; cirrhis simplicibus v. bifidis; floribus masculis racemosis. In Mexico. Ⓛ.

5. *E. quadrifidum* DC. caule pendunculis petiolis cirrhisque pubescens-tibus; fol. cordato-suborbiculatis 7-angulis; cirrhis bifidis pilosis; floribus masculis umbellatis; calyx longe tubuloso apice dilatato; petalis 4 linear-lanceolatis; fructibus valde pilosis. In Mexico. Ⓛ.

6. *E. brachystachyum* DC. fol. trilobis integrum ciliatis, lobo medio oblongo acuminato; floribus ochroleucis, masculis spicatis; tubo calycis apice campanulato, femineorum calyx valde gibboso hispido; capsula oblonga echinata. In Mexico. Ⓛ.

7. *E. trifoliatum* Spr. fol. ternatis incisis. In Virginia. 2.

8. *E. biflorum* Schlecht. fol. cordatis pedato-5-lobis lobis mucronatis argute serratis utrinque scabriusculis rete scabro-pubescente sinibus rotundatis; cirrhis bifidis; floribus masculis racemosis; femineo solitario parce aculeato. In Mexico. Ⓛ.

9. *E. pubescens* Benth. fol. late orbiculatis longe acuminatis 5-7-angulis denticulatis basi profunde cordatis utrinque ramisque scabro-pubescentibus; floribus masculis racemosis; petalis oblongis acutis punctatis, femineis solitariis, tubo calycis filiformi; stylo brevissimo stigmate maximo; fructu rigide aculeato. In Mexico. 2.

4982. CEPHALANDRA Endl. (1840).

1. *C. quinqueloba* Schrad. est *Bryonia quinqueloba* Thunb. vide p. 366.

4983. CYCLANTHERA Schrad. (1833).

1. *C. pedata* Schrad. In Mexico. 2.

4984. SCHIZOCARPUM Schrad. (1839).

1. *S. filiforme* Schrad. In Mexico. Ⓛ.

4985. SICYOS L. (1737).

1. *S. angulatus* L. fol. cordatis angulatis denticulatis scabris; lobis acuminatis; cirrhis 3-5-fidis; floribus masculis corymboso-capitatis; pedunculo communi longo; femineis glomeratis; fructibus ovatis spinescentibus tomentosisque; spinis obscuris. Lam. ill. t. 796. Dill. elth. t. 57. f. 59. In Am. bor. Ⓛ.

2. *S. parviflorus* Willd. ramis glabris; fol. cordatis subangulatis denticulatis scabriusculis; cirrhis 3-fidis; floribus masculis racemosis longe pedicellatis; femineis subcapitato-umbellatis sessilibus; fructibus calyx coronatis. In Quito. Ⓛ.

3. *S. acutus* Rafin. scandens; fol. lobatis; fructibus glomeratis ovatis acutis setosis, setis echinatis intertextis. In Louisiana. Ⓛ.

4. *S. microphyllus* H. et K. ramis scabriusculis; fol. sinuato-cordatis 7-lobis denticulatis scabriusculis; cirrhis 3-fidis; floribus masculis longe pedunculatis; femineis capitato-congestis sessilibus; fructibus echinato-setosis. In Mexico. Ⓛ.

5. *S. vitifolius* Willd. tota planta pube tenuissima viscosa obsita; fol. sinu subrotundo cordatis 5-lobis dentatis. *Patria ignota*. Ⓛ.

6. *S. laciniatus* L. caule glabro; fol. cordato-palmatis supra glabris subtus pilis echinatis rigidis, lobis lobulatis; petiole brevi; cirrhis 3-fidis; floribus masculis subpaniculatis, femineis glomeratis sessilibus; fructibus spinescentibus. In Am. merid. Ⓛ.

7. *S. triquetus* Moc. caule obtuse sulcato; fol. cordatis 5-lobis, lobis latis obtusis subdenticulatis; cirrhis ramosissimis; floribus masculis racemosis pedunculatis aggregato-subverticillatis, femineis subumbellatis; fructibus inermibus elongatis. In Chiappa. Ⓛ.

8. *S. oreganus* Torr. et Gray; puberulus; fol. rotundato-cordatis 7-9-angulatis v. sublobatis denticulatis angulis acuminatis; cirrhis 3-fidis; ♂-

ribus m. asculis racemosis longissime pedunc. platis, vel glomeratis; stylo brevis istmo. S. angulatus Hook. In Am. bor. ♂.

9. *S. montanus* Poepp. et Endl. no. 7. g. t. 172. caulis pubescentibus acutatis; fol. sinuato-cordatis 5-angustatis acuminatis spinuloso-dentatis subtus dense cinereo-pubescentibus; cirrhis 3-fidis; racemis masculis elongatis compositis; feminis capitatis; capitulis 5-floris; bracteis sericeis. In Chili. ♂.

10. *S. bryoniaefolius* Moris mem. di Torino v. 37. t. 6. caule ad nodos subpiloso; fol. cordatis angulatis denticulatis scabridis; floribus masculis pedicellatis subracemosis; feminis sessilibus capitato-umbellatis; calycis dentibus obsoletis; capsulis setoso-mucronatis. S. Badecoa Hook. et Arn. In Chil. ♂.

✓ 11. *S. pachycarpus* Hook. ramis glabris; fol. cordatis 5—7-lobis denticulatis supra glabris subtus papilloso-scabris; cirrhis glabris 3-fidis; floribus masculis paniculatis; feminis capitato-cougestis; fructibus ovatis rostratis. In ins. Oahu. ♂.

12. *S. federaefolius* Decaisn. ramis sulcatis hispidis; fol. cordatis angulosis, angulis mucronatis glabris nervis petiolatis supra hispidis; floribus masculis 3—5-andris racemosis; calyce patulo, laciinis linearibus lanceolatis corolla dimidio brevioribus rotundato-ovatis mucronatis introrsum grandioso-papillosum. In ins. Timor. ♂.

4986. SECHIUM Br. (1756).

1. *S. edule* Sw. caule subteretis striato laevi; fol. cordato-angulatis subtus rugosiusculis, lobis basi coniventibus dentatis terminali longiori acuminato cirrhis 4—5-fidis; floribus masculis racemosis; fructibus magnis obovatis 5-sulcatis apice piloso-echinatis. Jacq. am. t. 163. Chayota edulis Jacq. am. t. 245. In Ind. occ. cultur. ♂.

2. *S. americanum* Lam. fol. cordato-angulosis; floribus racemosis; peponida glabra compressiuscula magnitudine ovi columbae, semine ovali-elliptico. In Jamaica. ♂.

3. *S. palmatum* Ser. caule tereti obtuse sulcato; cirrhis umbellatis; fol.

palmato-lobatis scabris; stipula cordata profunde 3-loba; floribus masculis racemosis; filamentis basi monadelphis; floribus feminis geminis subsessilibus; fructibus aculeatis viridibus magnitudine avellanae. In Mexico. ♂.

4. *S. peruvianum* Poepp. et Endl. nov. g. t. 176. caule sulcato pubescente; fol. cordatis palmato-5-lobis supra punctato-scabridis, lobis acuminatis serratis oblongis, lateralibus falcatis; pedunculis masculis elongatis 1—3-floris, feminis 1-floris; ealyxibus tomentosis, masculis clavatis; fructibus globosis glaberrimis laevigatis. In Peruvia. ♂.

5. *S. amazonicum* Poepp. et Endl. caule angulato sulcato glaberrimo; fol. ad basin usque tripartitis supra punctatis laevibus, lobis acutis subdentatis oblongis; pedunculis utriusque sexus axillaribus 1-floris; calycibus pubescente-hispidis masculis oblongo-obovatis; peponibus obovatis 10-costatis villosis. Ad flum. Amazonum. ♂.

4987. ERYTHROPETALUM Blume. (1826).

1. *E. scandens* Blume. In Java. ♀. Frutex scandens; fol. petiolatis subpeltatis acuminatis integerrmis glabris; pedunculis ramosis axillaribus; pedicellis subumbellatis.

4988. ZUCCA Comm. (1810).

1. *Z. Commersoniana* Ser. *Patria ignot.* ♂. Flores solitarii axillares. Bractea ampla concava calycem magnum coloratum 5-sepalum involvens et squamis 5 basi cincta.

4989. THLADIANTHA Bunge. (1830).

1. *T. dubia* Bunge. In China ad Peking. ♂.

4990. MODECCA L. (1737).

1. *M. palmata* Lam. fol. glabris vario-palmatis subtus glandulosis; stipulis spinescentibus; pedicellis ebra-

cteatis. *Rheede* 8. t. 20—23. *Wight* ic. t. 201. *M. integrifolia* Linn. *In Malabarica*. $\ddot{\text{h}}$.

2. *M. Wightiana* Wall. fol. cordatis 3-angulari-ovatis integris; cirrhis simplicibus; capsulis ampullaceis; seminibus scrobiculatis. *Wight* ic. t. 179. *In Ind. or.* $\ddot{\text{h}}$.

3. *M. aliena* Wall. fol. profunde cordatis oblongis acuminatis, lobis rotundatis; pedicellis umbellatis; cirrhis simplicibus. *In Sylhet.* $\ddot{\text{h}}$.

4. *M. acuminata* Blume; fol. ovato-oblongis acuminatis subcordatis biauriculatis; floribus racemosis; cirrhis elongatis axillaribus; fructibus ovatis acuminatis. *In Java.* $\ddot{\text{h}}$.

5. *M. heterophylla* Blume; fol. indivisis v. 3-lobis acuminatis subcordatis subbiauriculatis; fructibus oblongis utrinque acuminatis. *In Java.* $\ddot{\text{h}}$.

6. *M. cordifolia* Blume in Rumphia t. 49. fol. membranaceis breve petiolatis cordatis mucronulatis biauriculatis; floribus corymbosis dichotomis; cirrhis elongatis. *In Java.* $\ddot{\text{h}}$.

7. *M. obtusa* Blume in Rumphia t. 48. fol. coriaceis oblongo-cordatis obtusis biauriculatis; floribus corymbo-dichotomis ex axillis cirrhorum. *In Java.* $\ddot{\text{h}}$.

8. *M. parriflora* G. Don; fol. oblongo-lanceolatis integris acuminatis glabris; cirrhis simplicibus; pedunculis axillaribus dichotomis. *In Sierra Leone.* $\ddot{\text{h}}$.

9. *M. macrophylla* Blume; fol. coriaceis ovalibus utrinque obtusis basi subbiauriculatis; floribus corymbosis dichotomis ex axillis cirrhorum. *In Java.* $\ddot{\text{h}}$.

10. *M. populifolia* Blume; fol. membranaceis longe petiolatis ovatis acuminatis; fructibus clavato-ellipticis obtusis. *In Java.* $\ddot{\text{h}}$.

11. *M. australis* R. Br. fol. glabris subpeltatis cordatis basi biauriculatis acutis eglandulosis. *In Nov. Holl.* $\ddot{\text{h}}$.

12. *M. bracteata* DC. fol. utrinque tuberculis scabris palmatis basi emarginatis; pedicellis bracteatis racemosis; calycibus subserratis. *In Ind. or.* $\ddot{\text{h}}$.

4991. PASCHANTHUS DC. (1825).

1. *P. repandus* Burch. *In P. b. S.* $\ddot{\text{h}}$. Fol. glabra glauca oblonga

repanda 1-nervia. Pedunculi bicolori.

4992. CERATOSICYOS Nees. (1836).

1. *C. Eckloni* Nees. *In P. b. S.*
2. *Caulis* procumbens subscandens; fol. glabris 3—7-fidis serratis glandulosis; floribus racemosis cernuis.

4993. DALECHAMPIA Plum. (1760).

a. Folia indivisa.

1. *D. convolvuloides* Lam. fol. cordatis acutis subintegerrimis pilosiusculis; involucro cordato colorato; integerrimo. *In Brasilia.* 4.

2. *D. canescens* H. et K. fol. ovatis v. subrotundo-ovatis acuminatis integerrimis profunde cordatis supra glabris subtus cano-tomentosis, lobis incumbentibus; bracteis 3-fidis dentato-laciatiatis. *In Nov. Granata.* $\ddot{\text{h}}$.

3. *D. smilacina* H. et K. fol. ovatis profunde cordatis acuminatis denticulatis supra glabris subtus cano-pubescentibus; lobis approximatis; bracteis involucrantibus 3-fidis dentato-laciatiatis. *Ad Orinocum.* $\ddot{\text{h}}$.

4. *D. tiliacefolia* Lam. fol. cordatis acuminatis integerrimis subtus tomentosis, involuci foliolis cordatis tomentosis apice 3-dentatis. *In Peruvia.* $\ddot{\text{h}}$.

5. *D. tamnifolia* Lam. fol. cordatis acuminatis serratis pilosiusculis; involuci foliolis binis ovatis glabriusculis denticulatis. *In Ind. or.* $\ddot{\text{h}}$.

6. *D. aristolochiaefolia* H. et K. fol. subcordatis acutis obsolete denticulatis subtus cano-pubescentibus; involucris coloratis laciniato-dentatis. *In Quito.* $\ddot{\text{h}}$.

b. Folia lobata.

7. *D. lobata* Spr. fol. 3-lobis integerrimis; involuci foliolis oblongis coloratis. *In Nov. Granata.* $\ddot{\text{h}}$.

8. *D. scandens* Spr. fol. cordatis 3-lobis serratis pubescentibus; involuci foliolis 3-lobis serratis membranaceis; calycibus 10-partitis. *D. villosa* et *latifolia* Lam. *In Ind. occ. et Am. austr.* $\ddot{\text{h}}$.

9. *D. peruviana* Lam. fol. cordatis profunde 3-lobis integerrimis subtus villosiusculis; involucri foliolis ovalibus apice 3-dentatis tomentosis. In Peruvia. ♀.

10. *D. sidaefolia* Kunth; fol. cordatis 2-3-fidis denticulatis subtus incano-villosis; stipulis integerrimis; involucri foliolis apice 3-fidis fimbriatis glanduloso-ciliatis. In Peruvia. ♂.

11. *D. fimbriata* H. et K. fol. 3-partitis minute denticulatis supra adpresso-pubescentibus subtus molliter cano-pubescentibus; stipulis basilaribus subtripartitis; bracteis involucrantibus 3-fidis sericeo-pubescentibus subaequalibus. In Mexico. ♂.

12. *D. mollis* H. et K. fol. 3-partitis minute denticulatis pubescentibus subtus mollibus canescensibus; stipulis basilaribus 4-partitis; bracteis involucrantibus 3-fidis pubescentibus dentato-ciliatis; lobis angustato-acutis intermedio longiore. In Nor. Grana-
nata. ♂.

13. *D. rubiformis* Spr. fol. 3-partitis argute denticulatis supra pilosiusculis subtus cano-pubescentibus stipulis basilaribus bipartitis; bracteis involucrantibus 3-fidis pubescentibus dentato-ciliatis lobis angustato-acutis intermedio longiore. *D. rubioides* H. et K. Ad Orinocum. ♂.

14. *D. hibisciformis* Spr. fol. 3-partitis argute denticulatis ntrinque hirto-pubescentibus; stipulis basilaribus bipartitis; bracteis involucrantibus 3-fidis hirto-puberulis glandulosociliatis viridibus. *D. hibiscoidea* H. et K. In Peruvia. ♂.

15. *ficifolia* Lam. fol. 3-fidis integerrimis supra nitidis subtus tomentosis; stipulis integerrimis; involucri foliolis 3-fidis; capsulis lanatis. In Brasilia. ♂.

16. *D. brasiliensis* Lam. fol. 3-partitis serrulatis supra incano-subtus albedo-villoso-tomentosis; involucri foliolis coloratis apice 3-fidis; calycibus 10-partitis; capsulis glabris. In Bra-
silie. ♂.

17. *D. parvifolia* Lam. fol. 3-partitis inaequaliter dentatis subtus tomentosis; involucri foliolis ovatis 3-dentatis; capsulis asperis. In China. ♂.

c. Folia composita.

18. *D. triphylla* Lam. fol. ternatis utrinque glabris; foliolis lanceolatis

subdentatis; floribus fasciculatis; in-
voluci foliolis 3-fidis. In Brasilia. ♂.

19. *D. pentaphylla* Lam. fol. qui-
natis supra nitidis subtus pilosiusculis;
foliolis ovato-oblongis subdentatis;
floribus fasciculatis; involuci foliolis 5-fidis villosis. In Brasilia. ♂.

4994. COLLAGUAJA Molin. (1810).

1. *C. integriflora* Gill. et Hook. Bot. Misc. 1. t. 39. fol. linearis-lan-
ceolatis integerrimis mucronatis eglandulosis; capsula dioeca; coccis glo-
bosae-subcompressis. In Chilie. ♂.

2. *C. salicifolia* Gill. et Hook. fol.
lanceolatis obscure glanduloso-serra-
tis acutissimis; capsulis 3-angularibus
3-coccis angulis acutis. In Chilie. ♂.

3. *C. odorifera* Gill. et Hook. 1.
c. tab. 40. fol. elliptico-lanceolatis
obtusis mucronatis pulcherrime glanduloso-serratis; capsula 3-angulari
3-coccis; angulis obtusis. In Chilie. ♂.

4. *C. triquetra* Gill. et Hook. fol.
ellipticis mucronatis serratis subglandu-
losis; capsula acute 3-quatra. In Chilie. ♂.

4995. SYNASPISMA Endl. (1837).

1. *S. peltata* Endl. Crozophora
Labill. cal. t. 75. In Nor. Caled. ♂.
Fruct. fol. alternis integerrimis; amen-
tis masculis cylindricis demum elongatis;
racemis feminineis elongatis laxe
pendulis.

4996. PLUKEINETIA Plum. (1703).

1. *P. volubilis* L. capsularum an-
gulis compressis carinatis. Plum. ic.
t. 226. In Ind. occ. ♂.

2. *P. verrucosa* Sm. capsularum
angulis bituberculatis. *P. volubilis* L.
In Surinamo. ♂.

3. *P. corniculata* Sm. capsularum
angulis compressis acuminatis. In
Amboina. ♂.

4997. ANABAENA Adr. Juss. (1821).

1. *A. bracteata* Juss. tent. t. 15.
f. 48. In Brasilia. ♂. Frut. volu-
bilis, floribus masculis cum peduncu-

lis brevibus articulatis bracteatis, fem. longe pedunculatis.

4998. ACALYPHA L. (1737).

a. Monoicae.

g. Spicae androgynae.

* Fruticosa e.

1. *A. betulina* Retz. fol. ovatis acutis serratis; involucris fem. cordatis crenatis. *A. fruticosa* Forsk. Rumph. 4. t. 37. *In Ind. or. et Arabiu.* ♂.

2. *A. cuspidata* Jacq. h. Schönb. t. 243. fol. subcordato-ovatis acuminate serratis glabris ramis canescens-tibus; spicis axillaribus cylindricis solitariis. *In Ind. occ.* ♂.

3. *A. marginata* Spr. fol. ovato-lanceolatis subcoriaceis serratis albo-marginatis pubescentibus; spicis axillaribus cylindricis folio brevioribus. *Tragia* Poir.

4. *A. coiorata* Spr. fol. ovato-lanceolatis obtusis subintegerrimis coriaceis glabris rubro-marginatis. *Tragia* Poir. *In Ind. or.* ♂.

5. *A. biseptosa* Bart. fol. longe petiolatis ovato-oblongis acutis crenato-serratis utrinque glabris; ramis petiolisque pubescentibus; spicis axillaribus sessilibus petiolo brevioribus. *In Portorico.* ♂.

6. *A. australis* L. fol. oblongis obtusiusculis apice serratis supra nitidis; spicis axillaribus solitariis; involucris orbiculatis integerrimis. *A. prunifolia* Nees et Mart. *In Brasilia.* ♂.

** Herbaceae.

7. *A. Poireti* Spr. fol. oblongis acutis serratis pubescentibus; spicis axillaribus cylindricis elongatis; involucris cucullatis crenatis. *A. macrostachya* Poir. Jacq. h. Schoenbr. t. 245. *In Am. trop.* ♂.

8. *A. virginica* L. fol. ovato-lanceolatis petiolo longioribus obtuse serratis; spicis axillaribus abbreviatis; involucris ovatis inciso-dentatis. *In Am. bor.* Ⓛ.

9. *A. caroliniana* Walt. fol. longe petiolatis subrhomboideo-ovalibus serratis; involucris axillaribus ampliatis

incisis. Lam. ill. t. 780. f. 2. *In Am. bor.* Ⓛ.

10. *A. ciliata* Forsk. fol. longe petiolatis ovatis serratis; spicis axillaribus abbreviatis confertis; involucris cordatis imbricato-serratis ciliatis. Vahl symb. t. 20. *In Arabia.* ♂.

11. *A. rubra* Willd. fol. subcordatis oblongis serratis cauleque hirtis; spicis axillaribus solitariis cylindricis elongatis; stylis elongatis multifidis. *Patria ign.* ♂.

12. *A. brachystachya* Hornem. fol. subcordato-ovatis serratis; spicis axillaribus abbreviatis; involucro fem. nullo. *In China.* ♂.

13. *A. prunifolia* H. et K. pilosa; fol. elliptico-ovatis acutis basi rotundatis crenato-serratis; spicis androgynis; bracteis fructiferis 5-dentatis pilosusculis ciliatis. *In Mexico.* ♂.

14. *A. domingensis* Spr. fol. breviter petiolatis lanceolatis serratis glaberrimis; spicis axillaribus solitariis filiformibus; involucro 5-fido. *Traigia filiformis* Poir. *In Hispaniola* ♂.

15. *A. hispida* Willd. fol. longe petiolatis ovatis acutis serratis hirsutis caule petiolisque longe pilosis; spicis axillaribus solitariis; involucris cucullatis argute serratis hispidis. *Urtica pilosa* Lour. *In China et Cochinchina.* 2.

16. *A. indica* L. fol. longe petiolatis rhomboeo-ovatis serratis; spicis axillaribus laxis; involucris glabriusculis subdentatis. *Rheede* X. t. 81. *In Ind. or.* Ⓛ.

17. *A. phleoides* Cav. ic. t. 569. f. 2 et 3. fol. sessilibus ovatis serratis; involucris cucullatis 3—5-dentatis; spica solitaria terminali. *Nov. Hisp.* Ⓛ.

18. *A. reptans* Sm. caule repente; fol. ovatis serratis; spica solitaria terminali filiformi; involucris cordatis 6-partitis villosis. *In Hispaniola et Jamaica.* 2.

19. *A. cordata* Thunb. fol. longe petiolatis cordato-ovatis crenatis sub-setoso-ciliatis; racemis axillaribus paucifloris; involucris 3—4-partitis inaequalibus; stylis longissimis. *In P. b. S.* 2.

20. *A. gemina* Spr. fol. ovato-lanceolatis crenatis glabris; floribus axillaribus solitariis androgynis; involucro cordato. *Urtica gemina* Lour. *In Cochinchina.* 2.

*B. Spicae sexu distinctae.*** Superiores masculae.**+ Fruticosae.*

21. *A. caudata* H. et K. arborea; ramulis foliisque subtus sericeo-pilosis ovatis acuminatis basi rotundatis serratis; spicis longissimis pendulis; bracteis femineis argute inciso-serratis piloso-hispidis. *In Nov. Granata.* ♀.

22. *A. macrophylla* H. et K. arborea; ramulis villoso-hirsutissimis; fol. subrotundo-ovatis acuminatis leviter cordatis grosse serratis supra pilosis subtus glabriusculis; bracteis fructiferis inciso-serratis. *In Nov. An. latusia.* ♀.

23. *A. leptostachya* H. et K. arborea; ramulis foliisque glabris oblongis acuminatis basi rotundatis remote et leviter crenato-serratis; spicis masculis tenuissimis; bracteis fructiferis inciso-serratis. *Prope Turbaco* ♀.

24. *A. sidaefolia* H. et K. arborea; ramulis villoso-pubescentibus; fol. ovatis acuminatis cordatis serratis subtus molliter pilosis; spicis superioribus masculis; bracteis fructiferis inciso-serratis piloso-hirtis. *In Mexico.* ♀.

25. *A. agrimonoides* H. et K. fruticulosa; fol. subrotundo-obovatis basi cuneatis apice lobato-crenatis undulatis; spicis terminalibus masculis; bracteis fructiferis crenato-lobatis piloso-puberulis. *Cav. ic. t. 568. f. 3. In Mexico.* ♀.

26. *A. diversifolia* Jacq. arborescens; fol. subellipticis acutis serrulatis glabriusculis; stipulis setaceis; floribus fem. subgeminis axillaribus; involucris diphyllos integerrimis. *In Caracas.* ♀.

27. *A. hernandifolia* Sw. arborescens; fol. longissime petiolatis subcordato-ovatis acuminatis serratis glabris; spicis longissime filiformibus; involucris cordatis denticulatis. *In Jamaica.* ♀.

28. *A. villosa* L. fol. subcordato-oblongis acuminatis crenatis ramisque villosis; spicis filiformibus; fructibus longe pedicellatis. *In Nov. Granata.* ♀.

29. *A. sessilis* Poir. fol. sessilibus oblongo-linearibus obtusis integerrimis

glabris; spicis abbreviatis; involucris fem. dentatis pubescentibus. *Patria?* ♀.

30. *A. pruriens* Nees; fol. rhomboeovatis obtuse serratis ciliatis hirsutis; spica mascula terminali solitaria; involucris bifloris orbiculatis dentatis. *In Brasilia.* ♀.

++ Herbaceae.

31. *A. monostachya* Cav. ic. fol. orbiculatis crenatis; spica mascula terminali solitaria; floribus femineis axillaribus sessilibus; involucro dentato. *In Mexico.* ♀.

32. *A. corchorifolia* Willd. fol. cordato-ovatis, crenatis pubescentibus; spicis femineis axillaribus sessilibus; involucro cordato dentato hispido; ramis diffusis villosis. *In Martinica et Guadelupa.* ♀.

33. *A. lanceolata* L. fol. oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis serratis; spicis femineis axillaribus; involucris cordatis dentatis. *In Ind. or.* ♀.

*y. Spicae omnes axillares.**+ Fruticosae.*

34. *A. elliptica* Sw. fol. ovato-ellipticis acuminatis crenato-serratis glabris; spicis filiformibus laxis folia superantibus; involucris ovatis dentatis hirtis. *In Jamaica.* ♀.

35. *A. virgata* L. fol. ovato-lanceolatis serratis glabris; spicis axillaribus erectis; involucris fem. cordatis dentatis maximis. *Brown. Jam. t. 36. f. 2. In Jamaica.* ♀.

36. *A. vagans* Cav. ic. t. 569. f. 1. fol. ovato-acutis ciliato-serratis; spicis femineis folio multoties longioribus; involucris cordatis acuminatis ciliato-dentatis. *In Acapulco.* ♀.

37. *A. macrostachya* Jacq. h. Schoenbr. t. 243. fol. subcordato-ovatis acuminatis serratis glabris; petioli longissimis; spicis fem. folia longe superantibus; involucris cucullatis dentato-setaceis. *In Caracas.* ♀.

38. *A. hirsutissima* Willd. fol. ovatis acuminatis serratis cauleque hirsutissimis; spicis fem. folium superantibus; involucris dentatis cuneiformibus hirsutis. *In Caracas.* ♀.

39. *A. glabrata* Thunb. fol. ovatis acutis serratis glabriusculis; spicis cylindricis axillaribus. *In P. b. S.* ♀.

†† Herbaceae.

40. *A. pilosa* Cav. ic. t. 568. f. 2. fol. ovatis acutis serratis cauleque pilosis; spicis geminis axillaribus petiolos subaequantibus; involucris dentatis. In Nov. Hispan. et ins. Philipp. ♂.

41. *A. glandulosa* Cav. ic. t. 570. fol. cordatis ovatis serratis subtus tomentosis cauleque glanduloso-pilosus; spicis axillaribus petiolos subaequantibus; involucris nullis. A. urticaefolia Poir. In Nov. Hispan. ♂.

42. *A. decumbens* Thunb. fol. cordato-ovatis serratis subtus tomentosis; spicis axillaribus; caule decumbente. In Afr. austr. ♂.

d. Spicae feminineae terminales.

* Fruticosae.

43. *A. capensis* Jacq. am. ed. pict. t. 240. fol. oblongo-ohovatis serratis glabris; spicis gracilibus abbreviatis; involucris fem. 3-phyllis. In Ind. occ. ♀.

44. *A. laerigata* Sw. fol. obovato-oblongis serrulatis utrinque glabris nitidis; spicis filiformibus, masc. longissimis; involucris fem. cordatis 6-partitis. In Jamaica. ♀.

45. *A. carthagensis* Jacq. am. t. 180. f. 57. fol. ovato-lanceolatis serratis; involucris fem. cordatis ovatis serratis; caule sarmentoso. Ad fl. Magdal. ♀.

46. *A. capitata* Willd. fol. ovatis obtusis serratis subtus ramisque incano-villosiusculis; involucris dentatis; fructibus tomentosis; spicis masculis filiformibus. In Ind. or. ♀.

47. *A. tomentosa* Sw. fol. ovato-lanceolatis obtusis crenatis rugosis subhirsutis; involucro fem. multipartito; stylis longissimis capillaribus multifidis. In Hispaniola. ♀.

48. *A. carpinifolia* Poir. fol. oblongis acutis serratis glabris; spicis masculis filiformibus pedunculatis, fem. solitaria elongata; involucro 10-partito patulo. In Hispaniola. ♀.

49. *A. angustifolia* Sw. fol. linear-lanceolatis grosse serratis pubescentibus; spicae fem. involucris subrotundis serratis. In Hispaniola. ♀.

* Herbaceae.

50. *A. alopecuroides* Jacq. ic. t. 620 fol. longe petiolatis subrotundo-

ovatis acutis crenato-dentatis utrinque pilosiusculis, ramis petiolisque villoso-sis; spica feminea cylindrica densiflora; involucris 3-partitis aristatis hirtis. In Caracas. ♂.

51. *A. aristata* H. et K. fol. ovatis acuminatis crenato-serratis pilosiusculis; spicis feminis terminalibus cylindricis; involucris 5-partitis aristatis glanduloso-pilosus. A. Histrix Balb. Ad flum. Magd. ♂.

52. *A. polystachya* Jacq. h. Schönbr. t. 246. fol. ovatis acuminatis serrulatis glabris sub-5-nerviis; spicis fem. terminalibus aggregatis; involucris multipartitis laciniis subulatis. In Hispaniola. ♂.

53. *A. ocymoides* H. et K. fol. cordato-ovatis crenato-serratis pubescentibus; spicis fem. terminalibus aggregatis; involucris 5-partitis glanduloso-ciliatis. In Nov. Hispan. ♂.

54. *A. mollis* H. et K. fol. ovato-oblongis acuminatis crenato-serratis utrinque villosis; spicis fem. geminis terminalibus involucro. In Mexico. ♂.

55. *A. hirta* Spr. fol. ovato-oblongis aequaliter serratis hirsutiusculis; petiolis cauleque simplici hirtis; spicis masc. filiformibus; feminea terminali solitaria; involucro nullo. Ad Rio grande. ♂.

b. Dioicae.

c. Fruticosae.

56. *A. alnifolia* Willd. fol. ovatis obtusiusculis crenatis pubescentibus; ramis villosis; spicis masc. filiformibus, fem. interruptis; involucris dentato-villosis. In Ind. or. ♀.

57. *A. scabrosa* Sw. fol. oblongo-lanceolatis crenato-serratis masc. nitidis subtus scabris fem. villosis; spicis masc. cylindricis sessilibus aggregatis, floribus fem. solitariis; involucro crenato glabro. In Jamaica. ♀.

58. *A. betulaefolia* Sw. fol. subrotundis crenatis utrinque glabris; spicis masculis solitariis axillaribus; involucro crenato glabro. In Jamaica. ♀.

59. *A. padifolia* H. et K. fol. ovato-oblongis acuminatis crenato-serratis pubescentibus; spicis masculis gracilibus longissimis; involucro fem. cucullato dentato glanduloso-ciliato purpurascente. In Am. austr. ♀.

60. *A. integrifolia* Willd. fol. subcordato-lanceolatis obtusis integerimis glabris; floribus fem. pedunculatis axillaribus; involucro subrotundo integerimo. In ins. Mascaren. ♂.

61. *A. filiformis* Poir. fol. ovatis acutis argute dentatis ciliatis; petiolis elongatis ramisque pubescentibus; spicis masc. pedunculatis filiformibus elongatis. In Ind. or. ♂.

62. *A. gracilis* Spr. fol. ovato-lanceolatis acuminatis arcuato-serratis nervoso-venosis glabris; caule subsimplici; spicis masc. filiformibus; fem. aggregatis; involucro nullo. Ad Rio grande. ♂.

4999. MAPPA Adr. Juss. (1824).

1. *M. moluccana* Spr. arborescens; fol. maximis peltatis ovatis acuminatis integerimis nervosis subtus petiolisque tomentosis; floribus racemosis bracteatis. Ricinus Mappa L. Trewia huanandifolia Roth. In ins. Molucc. ♂.

2. *M. tanaria* Spr. arborea; fol. peltatis repando-dentatis subtus ramisque farinosis; racemis compositis axillaribus. Ricinus tanarius L. Rumph. 3. t. 22. In ins. Molucc. ♂.

3. *M. cochinchinensis* Spr. arborea; fol. ovatis acuminatis integerimis sub-3-cuspidatis subtus tomentosis; floribus dioecis. Adr. Juss. tent. t. 14. f. 44.

44. *Echinus trisulcus* Lour. In Cochinchina. ♂.

4. *M. tannensis* Spr. fruticosa; fol. cordatis acuminatis subintegerimis glabris; floribus racemosis bracteatis dioecis. Ricinus dioecus Forst. In ins. Tannae. ♂.

5. *M. jamaicensis* Spr. fruticosa; fol. ovatis obtusis coriaceis integerimis utrinque glabris; floribus racemosis dioecis. Croton globosum Sw. In Jamaica. ♂.

6. *M. denticulata* Blume. In Java. ♂.

7. *M. hispida* Blume. In Jara. ♂.

8. *M. javanica* Blume. In Jara. ♂.

8. *M. tomentosa* Blume. In Jara. ♂.

lia. ♂. Arbor procera ramis laevibus; fol. ternatis glabris subtus glaucis; foliolis oblongis obtusis mucronatis; floribus paniculatis.

5001. ELATERIOSPERMUM Blume. (1826).

1. *E. Tapos* Blume; fol. sparsis oblongis acuminatis transverse venosis; floribus corymbosis. In Java. ♂. Arbor 80-ped.

2. *E. Tokbrai* Blume; fol. subverticillatis oblongis obtuse acuminatis subparallelō-venosis; fructibus racemosis. In Java. ♂. Arbor 60—80-ped.

5002. ANDA Piso. (1658).

1. *A. Comesii* Juss. tent. t. 12. f.

37. *A. brasiliensis* Radd. A. Pisonis Mart. am. mon. t. 1. Hilar. tab. 54, 55. In Brasilia. ♂. Arbor lactescens fol. alternis digitato-3—5-foliolatis; petiolis biglandulosis; racemis terminalibus paniculatis.

5003. ALEURITES Forst. (1776).

✓ 1. *A. triloba* Forst. gen. t. 56. fol. cordato-ovatis subtus subfarinaceis basi biglanduliferis junioribus 3-cuspidatis; corymbis masc. dichotomis. *A. moluccana* Willd. *Jatropha L.* In ins. Molucc. et Societ. ♂.

2. *A. taccifera* Willd. fol. ovatis serrulatis scabris triplinerviis junioribus angulatis lanatis; racemis axillaribus. *Croton L.* In ins. Molucc. ♂.

5004. ELAEOCOCCA Commers. (1790).

1. *E. verrucosa* Juss. fol. subcordato-ovatis acuminatis glabris integerimis; floribus paniculatis; fructu verrucoso. *Dryandra fl. jap.* t. 27. In Japonia. ♂.

2. *E. Vernicia* Adr. Juss. tent. t. 11. f. 35. fol. subcordatis acuminatis undulatis glabris biglandulosis; floribus racemosis; fructu varicoso. *Vernicia montana* Lour. *Dryandra Vernicia* Corr. in ann. mus. 8. t. 32.

5000. SIPHONIA Rich. (1790).

1. *S. elastica* Pers. Lam. ill. t. 790. Adr. Juss. tent. t. 12. f. 38. *Jatropha L.* *Hevea gujanensis* Aubl. *S. Cahuchu* Rich. In Guiana et Brasi-

5005. JATROPHA L. (1737).

(Adenoropium Pohl).

1. *J. Berterii* Spr. fol. basi subtruncata subrotundis acuminatis integerrimis venosis mollissimis villosiusculis; floribus racemosis. *Ad flum. Magdalena.* $\ddot{\text{h}}$.

2. *J. divaricata* Sw. fol. ovatis acuminatis integerrimis 3-nerviis venosis glaberrimis nitidis; racemis divaricatis. *In Jamaica.*

3. *J. variegata* Vahl; symb. t. 26. fol. oblongo-lanceolatis mucronatis glaberrimis; stipulis spinescentibus; floribus corymbosis. *Croton* Forsk. *In Arabia.* $\ddot{\text{h}}$.

4. *J. integerrima* Jacq. am. t. 183. f. 47. fol. cordato-ovatis acuminatis integerrimis glaberrimis inferioribus trilobis; floribus corymbosis. *In Cuba.* $\ddot{\text{h}}$.

5. *J. panduraefolia* Andr. rep. t. 267. fol. oblongis subpanduraeformibus basi angulatis utrinque bidentatis acuminatis integerrimis inferioribus 3-lobis; floribus corymbosis. *Vent. malm.* t. 52. *J. hastata* Jacq. *In Cuba.* $\ddot{\text{h}}$.

6. *J. hernandiaefolia* Vent. calyculata; fol. peltatis ovatis integerrimis glabris. *In Portorico.* $\ddot{\text{h}}$.

7. *J. mutabilis* Pohl; fol. integris rotundatis aut 3-lobis cordatis, lobo intermedio majore rotundato, lateralibus cuspidatis ad venas subtus pubescentibus; stipulis filiformibus apice glandulosis. *In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

8. *J. divergens* Pohl; fol. cordatis 3-lobis laciniis acutis cuspidatis, rarius auriculatis margine argute dentatis ciliatis subtus sericeo-pilosis; stipulis filiformibus ramosis glandulosis. *In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

9. *J. ribifolia* Pohl; fol. cordatis trilobis lobo intermedio majore cuspidato, lateralibus semirotundatis margine dense dentato-glandulosis. *In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

10. *J. gossypifolia* Jacq. fol. 3-lobis villosiusculis; lobis ovatis acutis ad basin lato-confluentibus serrato-ciliato-glandulosis; stipulis ramosis apice glandulosis. *Adenoropium* Pohl. *Comm. hort. t. 9.* *In Am. austr.* $\ddot{\text{h}}$.

11. *J. tripartita* Spr. fol. 3-partitis subtus villosis, laciniis lanceolatis acutis integerrimis; floribus spicatis bracteatis. *Adenoropium* Pohl. *In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

12. *J. spinosa* Vahl; fol. 3-partitis glaberrimis, lobis obtusissimis sursum angulatis integerrimis; floribus corymbobis; caule fruticoso aculeato. *Croton* Forsk. *In Arabia.* $\ddot{\text{h}}$.

13. *J. glauca* Vahl; fol. 5-fidis 3-fidisque serrato-dentatis; petiolis nudis; stipulis palmatis. *Pluk. t. 220.* *In Arabia et Ind. or.* $\ddot{\text{h}}$.

14. *J. elegans* Pohl; fol. 3-5-lobis ad basin cuneatis inferioribus divergentibus cum intermediis confluentibus margine dentato-glandulosis glaberrimis nitidis; stipulis filiformibus ramosis apice glandulosis. *In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

15. *J. elliptica* Pohl ic. t. 9. sub Adenorpio; fol. sessilibus ellipticis acutis margine dentato-glandulosis; stipulis ramosis apice filiformibus glandulosis; floribus aggregatis cymosis. *In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

16. *J. Forskalii* Pohl; fol. 5-lobis divaricatis glandulosis; caule fruticoso exstipulato. *J. glandulosa* Vahl. *In Arabia.* $\ddot{\text{h}}$.

17. *J. mollissima* Pohl; fol. 3-5-lobis, lobis latis acutis cuspidatis, infimis brevioribus oblique descendentibus margine cuspidato-dentatis subtus mollissime tomentosis; stipulis filiformibus ramosis glandulosis. *In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

18. *J. villosa* Pohl; fol. 3-5-lobis cordatis lobis late apice cuspidatis intermedio majore, inferioribus brevioribus distantibus dentatis ciliatis subtus albo-tomentosis villosis; stipulis simplicibus filiformibus glandulosis. *In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

19. *J. luxurians* Pohl; fol. cordatis 5-lobis lobo intermedio oblongo acuminato cuspidato, omnibus ciliatis emarginato-dentato-glandulosis subtus tomentellis; stipulis filiformibus ramosis apice glandulosis. *In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

20. *J. peltata* H. et K. fol. peltato-6-7-lobis glanduloso-ciliatis stipulis multifido-setaceis glanduliferis; floribus corymbosis calyculatis; calycibus coccineis. *Ad flum. Amazonum.* $\ddot{\text{h}}$.

21. *J. Martiusii* Pohl; fol. cordatis 5-partitis laciniis lanceolatis acuminatis infimis minoribus integris, supra glabris subtus dense villosis; stipulis basi dilatatis connatis dein ramosis filiformibus apice glandulosis. *In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

22. *J. multifida* L. fol. multipartitae glabris, laciinis superne pinnatifidis; stipulis multifidis setaceis; floribus corymbosis calyculatis; calycibus phoeniceis. *Salist. Parad.* t. 91. *In Nov. Andalusia.* ♂.

23. *J. tomentosa* Sp.; fol. quinodigitatis subtus tomentosis; foliolis oblongis obtusiusculis integerrimis; ramis exstipulatis; floribus corymbosis. *Ad fl. Magdalene.* ♂.

5006. *CNIDOSCOLUS* Pohl. (1831).

1. *C. hamosus* Pohl ic. t. 49. fol. breve petiolatis oblongo-ovatae subacutis basi rotundatis supra glabris subtus pilosiusculis; petiolis acutostimulosis; caule hamoso aculeato-stimulosus. *In Brasilia.* ♂.

2. *C. Marcgravii* Pohl t. 50. fl. trilobo-palmatis lobis acutis ad basin auriculato-cordatis inaequali-magnarepandis prominentiis subovatis apice setaceis utraque pagina pubescentibus, nervis hirtis stimulosisque. *Jatropha herbacea* Spr. *In Brasilia.* ♂.

3. *C. neglectus* Pohl ic. t. 51. fol. palmato-trilobis, lobis oblongis acuminatis basi subemarginatis exterioribus subaequalibus patentibus margine ciliatis subrepandis prominentiis apice brevissima setaceis supra pubescentibus subtus glabris. *In Brasilia.* ♂.

4. *C. vitifolius* Pohl t. 52. fol. 3-5-lobis, lobis dentatis, intermedio lato rotundato acuto margine acute grosse-repando, lateralibus extrorsum et ad basin latioribus, subtus ad nervos stimuloso-urentibus. *Jatropha Mill.* *In Brasilia.* ♂.

5. *C. obtusifolius* Pohl; fol. ovalibus obtusis crenatis glabris margine nervisque subtus stimulosis. *Janipha Mart.* hb. *In Brasilia.* ♂.

6. *C. rubescens* Pohl; fol. ovalibus repando-crenulatis superficie margine nervisque subtus stimulosis. *Janipha Mart.* hb. *In Brasilia.* ♂.

7. *C. repandus* Pohl; fol. ovato-oblongis repando-angulatis ad basin subtruncatis apice denticulatis glabris nervis inermibus. *Janipha phyllacantha* Mart. *In Brasilia.* ♂.

8. *C. quercifolius* Pohl; fol. sinuato-angulatis ad basin angustioribus sinubus subaequalibus, laciinis acutis dente prominente terminatis glabris

subtus costis intermediis stimuloso-urentibus. *Janipha Mart.* *In Brasilia.* ♂.

9. *C. lobatus* Pohl; fol. lobato-sinuatis basi truncatis, lobis acuminateis inaequalibus glabris, subtus nervis intermediis stimuloso-urentibus. *Janipha Mart.* *In Brasilia.* ♂.

10. *C. Michauxii* Pohl; fol. subpalmato-lobatis, lobis obtusiusculis subsinuato-incisis; stimulis patulis horridissimis; cymis breve pedunculatis. *Jatropha stimulosa* Michx. *Bivonea Rafin.* *In Am. bor.* ♂.

11. *C. quinquetobus* Pohl; fol. 3-5-lobis basi cordatis sinuatis dentatis acutis molliter pilosis stimulosis; floribus cymosis longe pedunculatis. *Jatropha L.* *Janipha urens* Poir. *In Am. austr.* ♂.

12. *C. ostiocarpus* Pohl; fol. palmatis 3-5-lobis lobis latis oblongis acuminatis glabris, margine nervis que utraque pagina stimuloso-urentibus. *Jatropha Schott.* *In Brasilia.* ♂.

13. *C. napaefolius* Pohl; caule arborecente spinuloso; fol. palmatis 7-lobis subtus hispidis lobis pinnatifidis; petiolis apice 1-glandulosis; floribus cymbosis. *Jatropha Descourt.* *In Ima occ.* ♂.

14. *C. palmatus* Willd. fol. palmatis 7-lobis laevibus, lobis cuneatis apice 3-lobis dentatis, petiolo apice 1-glanduloso. *Patr. ign.* ♂.

15. *C. fragrans* H. et K. arborea; fol. obsolete 5-lobis sinuato-dentatis glabris; floribus corymbosis. *Jatropha W.* *In Cuba.* ♂.

5007. *RICINUS* L. (1737).

1. *R. communis* L. fol. peltatis palmatis, lobis lanceolatis serratis; caule herbaceo pruinoso. *Lam.* ill. t. 792. *Nees* get. 3. t. 13. *Blakw.* t. 148. *Hayne Arzn.* X. t. 48. *In Afr. bor. et Ind. or. O.*

2. *R. viridis* W. h. *Berol.* t. 49. fol. peltatis palmatis, lobis oblongis dentatis, intermedio obsolete trilobo; caule herbaceo pruinoso; stigmatibus simplicibus. *Rumph.* 4. t. 41. *In Ind. or. O.*

3. *R. africanus* Mill. fol. peltatis palmatis, lobis oblongis serratis; caule fruicoso laevi. *In Afr. bor. O.*

4. *R. lividus* Jacq. ic. t. 196. fol. peltatis palmatis coloratis, lobis oblongis serrato-dentatis; caule fruticoso laevi colorato. *R. communis* Thunb. In P. S. ♀.

5. *R. inermis* Jacq. ic. t. 195. fol. peltatis palmatis, lobis oblongis serratis; caule fruticoso pruinoso; capsulis inermibus. In Ind. or. ♀.

6. *R. speciosus* Burm. Ind. t. 63. f. 2. fol. peltatis digitato-palmatis; foliolis lanceolatis petiolatis serratis, petiolis basi circulo folioso junctis. In Java. ♂.

7. *R. laevis* DC. In hort. Genev. col. ♀.

8. *R. megalosperma* Caill. In Aegypto. ♂.

5008. SPATHIOSTEMON Blume. (1825).

1. *S. javanense* Blume. In Java. ♀. Frutex fol. alternis ellipticis integerrimis; spicis axill. vel lateral. solitariis v. geminis puberis; floribus 3-bracteatis.

5009. BALOGHIA Endl. (1833).

1. *B. lucida* Endl. flor. Norf. In ins. Norfolk. ♀. Arbuscula fol oppositis ellipticis integerrimis stolidis; stipulis membranaceis; floribus terminalibus corymboso-racemosis.

5010. RICINOCARPI Desf. (1817).

1. *R. pinifolius* Desf. in ann. Mus. 3. t. 22. fol. linearibus integerrimis; floribus terminalibus solitariis. In Nov. Holl. ♀.

2. *R. glaucus* Endl. fol. linearibus glaucis; floribus corymbosis. In Nov. Holl. ♀.

5011. AMPEREA Juss. (1823).

1. *A. spartoides* Brongn. in Dup. voy. t. 49. Rich. sert. Astr. t. 20. In Nov. Holl. ♀. Suffrutex ramis compressis virgatis; fol. raris linearibus; floribus axillaribus.

5012. BALIOSPERMUM Blume. (1825).

1. *B. axillare* Blume. In Jara. ♀. Frutex fol. alternis grosse repando-serratis basi biglandulosis; floribus axillaribus.

5013. JILOCROTON Mart. (1837).

1. *J. phagadaenicus* Mart. Croton aduncum fl. flum. 10. t. 66. In Brasil. ♀.

5014. DITAXIS Vahl. (1798).

1. *D. dioeca* H. et K. nov. gen. t. 63. arborea; fol. alternis oblongis argute serrulatis 3-nerviis subtus ramsque tomentosis. In Am. austr. ♀.

2. *D. chiropetala* Bert. vide Croton lanceolatum Cav.

3. *D. heterantha* Zucc. In Mexico. ♀.

5015. MONOTAXIS Brongn. (1836).

1. *M. simplex* Brongn. in Duper. voy. In Nov. Holl. ♀.

2. *M. linifolia* Brongn. l. c. t. 49. In Nov. Holl. ♀.

3. *M. grandiflora* Endl. in Hüg. en. ex Steud. In Nov. Holl. ♀.

4. *M. occidentalis* Endl. In Nov. Holl. ♀.

5. *M. tridentata* Endl. In Nov. Holl. ♀.

5016. EUCHIDIUM Jack. (1833).

1. *E. verticillatum* Jack. ex Hook. In Ind. or. ♀. Frut. fol. verticillatim confertis lanceolatis integerrimis; flor. spicatis.

5017. BRIEDELIA Willd. (1805).

1. *B. montana* Willd. inermis arborea; fol. obovato-ellipticis glabris. Cluytia Roxb. corom. t. 171. In Ind. or. ♀.

2. *B. spinosa* Willd. erecta spinosa; fol. ovatis acutis glabris. Cluytia Roxb. cor. t. 172. In Ind. or. ♀.

3. *B. scandens* Willd. fol. oblongo-ovatis acutiusculis subtus tomentosis; floribus glomerato-spicatis

bracteatis. *Cluytia* Roxb. cor. t. 173. *In Java.* ♀.

4. *B. orata* Decaisn. hb. tim. glaberrima; fol. ovato-rotundatis subacuminatis; ramis tuberculatis. *In ins. Timor.* ♀.

5. *B. Loureiri* Hook. et Arn. in Beech. voy. ramulis pubescentibus virgatis; fol. oblongis acutinsculis glabris; floribus plurimis axillaribus glomeratis sessilibus stylo 3-fido. *Cluytia* Lour. *In China.* ♀.

6. *B. stipularis* H. et Arn. fol. ovalibus subtus tomentosis; stipulis ovatis acutis. *Cluytia* L. *In Ind. or.* ♀.

7. *B. diversifolia* Hook. et Arn. fol. glabris obovatis obtusis v. lanceolatis acutis; stipulis ensiformibus; floribus sessilibus. *Cluytia* Roxb. *In Ind. or.* ♀.

8. *B. collina* Hook. et Arn. fol. ovalibus glabris; floribus paucis glomeratis breve pedicellatis; processibus petaloideis minutis lanceolatis integerrimis. *Cluytia* Roxb. cor. t. 169. *In Ind. or.* ♀.

9. *B. patula* Hook. et Arn. fol. ovali-oblongis apice attenuatis glabris; floribus subsessilibus glomerato-spicatis; processibus petaloideis rotundatis unguiculatis crenulatis perianthio plures brevioribus. *Cluytia* Roxb. t. 176. *In Ind. or.* ♀.

10. *B. oblongifolia* Hook. et Arn. fol. ovali-oblongis acutis glabris subtus glaucis; floribus numerosis glomeratis v. glomerato-spicatis; processibus petaloideis obcordatis 3-dentatis perianthio brevioribus. *Cluytia* Roxb. *In Ind. or.* ♀.

11. *C. glauca* Blume. *In Java.* ♀.

5018. ANDRACHNE L. (1747).

1. *A. fruticosa* L. arborescens; fol. elliptico-oblongis integerrimis laevibus; floribus axillaribus binis pedunculatis. *In Ind. or.* ♀.

2. *A. elliptica* Roth; fruticosa; fol. elliptico-oblongis coriaceis integerrimis basi attenuatis; floribus axillaribus sessilibus congestis. *In Ind. or.* ♀.

3. *A. orbiculata* Roth; fruticosa; fol. orbiculatis subemarginatis basi ciliatis subcoriaceis subtus incanis;

floribus geminis axillaribus breve pedunculatis. *In Ind. or.* ♀.

4. *A. telephiooides* L. herbacea procumbens; fol. subrotundo-ovatis mucronatis glaucis laevibus; floribus axillaribus solitariis pedunculatis. *Nees* gen. fl. germ. 3. t. 11. Juss. tent. t. 6. f. 20. *In Europa et Arabia.* ♂.

5. *A. aspera* Spr. herbacea erectissima; fol. reniformi-orbiculatis subemarginatis utrinque asperis; floribus pedunculatis solitariis; fructibus hispidis. *In Aegypto.* ♂.

6. *A. chinensis* Bunge en. *In China.*

7. *A. rotundifolia* Eichw. pl. Cauc. t. 20. *In Caucaso.* ♂.

5019. SAUROPOUS Blume. (1825).

1. *S. albicans* Blume. *In Java.* ♀.

2. *S. rhamnooides* Blume. *In Java.* ♀.

5020. AGYNEIA L. (1747).

1. *A. pubera* L. fruticosa; fol. ovato-oblongis obtusis integerrimis subtus tomentosis; pedunculis terminalibus paucifloris. *In China.* ♀.

2. *A. Berterii* Spr. arborea fol. oblongis acutis integerrimis glaberrimis; pedunc. supra-axillaribus 1-floris. *Ad fl. Magdal.* ♀.

3. *A. phyllanthoides* Spr. herbacea diffusa; ramulis pinnaeformibus acipitibus; fol. oblongis mucronatis; pedunculatis axillaribus subsolitariis. *Phyllanthus bacciformis* L. *In Coromandelia.* ♀.

4. *A. impubes* L. herbacea diffusa; fol. ellipticis obtusis glabris; pedunculis paucifloris terminalibus. *In China.* ♀.

5. *A. tetrandra* Hamilt. *In Nepalia.* ♀.

5021. PHYLLANTHUS L. (1747).

a. Rami foliacei margine floriferi.

1. *P. montanus* Sw. ramis florigeris subdistichis elliptico-lanceolatis coriaceis inciso-crenatis; floribus subsessilibus; ramulis apice acipitibus cinereis. *In Jamaica.* ♀.

2. *P. latifolius* Sw. ramis florigeris distichis rhomboe-lanceolatis

acutis; floribus polygamis; stylo 3-fido; ramis tereti-compressis. In Jamaica. ♂.

3. *P. speciosus* Jacq. ic. t. 616. ramis floriferis distichis lato-lanceolatis conferte crenulatis; floribus monoecis; stylis bifidis; ramis tereti-sulcatis. *Xylophilla Arbuscula* W. In Ind. occ. ♂.

4. *P. falcatus* Sw. ramis floriferis sparsis linearis-lanceolatis subfalcatis crenatis; floribus androgynis glomeratis, ramulis strictis teretibus. *Commel.* h. t. 102. *Phyllanthus Epiphyllanthus* L. *Xylophilla falcata* Ait. In Am. ♂.

5. *P. angustifolius* Sw. ramis floriferis distichis linearis-lanceolatis lineatis rectiusculis crenatis; floribus polygamis; ramulis compressis canaliculatis. In Jamaica. ♂.

6. *P. ceramicus* Pers. ramis floriferis linearibus longissimis remotissime dentatis rigidis; floribus androgynis; ramulis 4-gonis. *Xylophilla longifolia* Willd. Rumph. 7. t. 12. In Ind. or. ♂.

7. *P. linearis* Sw. ramis florigeris distichis linearibus utrinque attenuatis crenulato-serrulatis submembranaceis; floribus monoicis; ramulis compressis marginatis. In Ind. occ. ♂.

b. Folia vere pinnata, inter pinnas florifera.

8. *P. mimosoides* Sw. ramis virgatis; fol. 20-jugis pinnatis; foliolis oblongo-linearibus basi attenuatis glabris; floribus minutissimis aggregatis. In ins. Caribaeis. ♂.

9. *P. polyphyllus* Willd. ramis teretibus; fol. multijugis glabris; fol. linearibus obtusis mucronatis; floribus axillaribus terminalibusque solitariis. In Ind. or. ♂.

c. Folia subpinnata, rami saltem pinnae formes.

* Arbores v. frutices.

a. Flores solitarii.

11. *P. rhamnoides* Retz; ramis teretibus fol. ovato-oblongis obtusiusculis subtus pallidis; pedunc. sub-solitariis abbreviatis capillaris. In Ind. or. ♂.

12. *P. discolor* Poepp. ramis teretibus flexuosis; fol. ovalibus subtus discoloribus; pedunculis elongatis. In Cuba. ♂.

13. *P. verrucosus* Thunb. ramis incurvis verrucoso-scabris; fol. obovatis coriaceis subtus pallidis; pedunc. capillaris cernuis. In Afr. austr. ♂.

14. *P. turbinatus* Ker. B. R. fol. orbiculato-ovatis lucidis; floribus femineis turbinatis nutantibus. In China. ♂.

15. *P. cernuus* Poir. ramis angulatis fol. ovato-ellipticis subtus pallidis; pedunculis cernuis abbreviatis apice incrassatis. *Breynia disticha* Forst. In Moluccis. ♂.

16. *P. maderaspatensis* L. ramis compressis virgatis; fol. spatulatis subretusis; floribus brevissime pedunculatis. *P. javanensis* Blume. In Ind. or. et Java. ♂.

17. *P. acutifolius* Poir. ramis angulatis subfiliformibus; fol. ovato-lanceolatis acuminato-cuspidatis subtus pallidis; pedunculis abbreviatis. In Brasilia. ♂.

18. *P. orbicularis* H. et K. nov. g. t. 106. ramis teretibus; fol. levissime-cordatis orbiculatis subcoriaceis; floribus solitariis masc. 4-10-andris. In Cuba et Am. austr. ♂.

19. *P. myrsinoides* H. et K. ramis teretibus; fol. obovalis subtus glaucis subcoriaceis; pedunc. fructiferis elongatis. Ad Orinocum. ♂.

20. *P. rupestris* Bonpl. arboreus; ramis teretibus; ramulis 4-5-phylis; fol. subrotundo-ellipticis utrinque rotundatis; floribus axillaribus solitariis longe pedunculatis. Ad Orinocum. ♂.

21. *P. purpurascens* H. et K. ramis teretibus; fol. pinnatim dispositis ellipticis acutis basi rotundatis glabris purpurascens subtus glaucescentibus; floribus axillaribus solitariis. In Cumana. ♂.

22. *P. lathyroides* H. et K. fruticosus; ramis teretibus; fol. pinnatim dispositis elliptico-oblongis obtusiusculis subcordatis glabris; floribus axillaribus solitariis. In Nov. Andal. ♂.

23. *P. microphyllus* H. et K. fruticosus; ramis teretibus; fol. minutis pinnatim dispositis ellipticis utrinque rotundatis glabris; floribus axillaribus solitariis. Ad Orinocum. ♂.

24. *P. cochinchinensis* Spr. fol. fasciculatis minutis glabris; floribus

sparsis dioecis. *Cathetus fasciculata* Lour. In *Cochinchina*. ♂.

25. *P. squamifolius* Spr. arborea; fol. imbricatis minulis subsessilibus subrotundis; floribus sparsis. *Nymphanthus* Lour. In *Cochinchina*. ♂.

✓ 26. *P. distichus* Hook. et Arn. caule fruticoso ramoso; ramulis an- cipitibus pinnaeformibus; fol. oblongis acutiusculis subtus pallidioribus; pedunc. subsolitariis capillaribus cer- nuis folio quater brevioribus. In ins. *Sandwicensis*. ♂.

27. *P. longifolius* Lam. ramis angulato-compressis; fol. lanceolato-linearibus basi attenuatis; floribus sub- sessilibus. In ins. *Mascarenis*. ♂.

β. Flores aggregati.

28. *P. ruscoides* H. et K. arbo- reus; ramis angulatis apice flexuosis puberulis; fol. subpinnatim dispositis ovatis acuminatis mucronatis basi obtusis glabris; floribus axillaribus 4-nis v. 5-nis, unico femineo; pedunc. femineis glabris. In *Peruvia*. ♂.

29. *P. mucronatus* H. et K. ramis angulatis glabriusculis; fol. oblongis utrinque attenuatis mucronatis mem- branaceis glabris; pedunc. aggregatis; fem. unico elongato. In Am. austr. ♂.

30. *P. graveolens* H. et K. ramis angulatis pubescentibus; fol. subro- tundis utrinque obtusis subpubescen- tibus; pedunc. aggregatis elongatis. Ad flum. *Amazonum*. ♂.

31. *P. lycioides* H. et K. ramulis angulatis pubescentibus; fol. oblongis utrinque attenuatis mucronatis mem- branaceis glaberrimis; pedunc. aggregatis, fem. unico piloso. Ad flum. *Maydal*. ♂.

32. *P. piscatorum* H. et K. ar- borescens; ramulis angulatis hirtello- pubescentibus; fol. subpinnatim dispo- sitis subrotundo-ovatis acutis, basi rotundatis margine subundulatis cilia- tis nervo venisque pubescentibus; floribus axillaribus fasciculatis; pedunc. fem. piloso. Ad *Orinocum*. ♂.

33. *P. villosus* Poir. ramis villo- sissimis; fol. oblongis acuminatis tomentosis; floribus subternis inferioribus masculis. *Nymphanthus chinensis* Lour. *Ph. obscurus* Roxb. In *China* et *Ind. or.* ♂.

34. *P. grandifolius* L. ramulis triquetro-compressis; fol. ovato-ob- longis obtusis mucronatis coriaceis glabris; floribus ternis brevissime pedunculatis. *P. ovatus* Poir. In *Porto- rico*. ♂.

35. *P. lucens* Poir. ramis suban- gulatis; fol. ovatis acutiusculis sub- coriaceis supra nitidis submarginatis; floribus subternis pedunculatis. In *China*. ♂.

36. *P. ruber* Spr. ramis rubris; fol. ovatis glabris; floribus congestis androgynis. *Nymphanthus* Lour. In *China*. ♂.

37. *P. multiflorus* Willd. ramulis subcompressis pubescentibus; fol. ob- longis glabris; floribus subaggregatis terminalibus corymbosis. In *Ind. or.* ♂.

38. *P. grandiflorus* Spr. ramulis filiformibus; fol. ovatis acuminatis glabris; pedunc. congestis setaceis. *P. multiflorus* Poir. In *Madagascar*. ♂.

39. *P. acuminatus* Vahl; ramis an- cipitibus superne flexuosis; fol. ova- tis acuminatis glabris; pedunc. con- gestis capillaribus. *P. subglomeratum* Poir. In *Cayenna*. ♂.

40. *P. Conami* Sw. ramulis com- pressis; fol. laevissime cordato-oblon- gis acutiusculis glabris; pedunc. con- gestis capillaribus; floribus masc. mi- nutissimis. *P. brasiliensis* Poir. *Co- nami brasiliensis* Aubl. t. 354. In *Jamaica*. ♂.

41. *P. rotundatus* Poir. ramis te- retibus virgatis; fol. obovato-subro- tundis subtus glaucescentibus venoso- reticulatis; floribus subsessilibus con- gestis. *P. reticulatus* Poir. In *Ind. or.* ♂.

42. *P. virosus* Roxb. ramulis 4- goно-compressis; fol. obovato-oblon- gis obtusissimis; floribus axillaribus aggregatis dioecis. In *Ind. or.* ♂.

43. *P. phillyreaefolius* Poir. ramulis an- cipitibus flexuosis; fol. lanceolatis acuminatis glabris; floribus axillaribus fasciculatis. In ins. *Mas- car.* ♂.

44. *P. lanceolatus* Poir. ramis an- cipitibus rubris; fol. lanceolatis obtu- sis emarginatis; floribus axillaribus fasciculatis. In ins. *Mascar.* ♂.

45. *P. stellatus* Retz; fol. lanceo- latis subcoriaceis glaucis; umbellis ses- silibus axillaribus. In *Ceylona*. ♂.

46. *P. cinerascens* Hook. et Arn. frut. glaber; ramis striatis cortice ci-

nereo; fol. parvis obovatis v. ovalibus obtusissimis v. retusis coriaceis glabris fasciculatis; floribus 3—4-nis 6-fidis. In China. ♀.

47. *P. juglandifolius* Willd. ramis compressis; fol. ovato-oblongis acuminate glabris; floribus ternis androgynis. In Hispaniola. ♀.

** *Humiles herbacei; floribus subsolitariis.*

48. *P. simplex* Retz; ramis angulatis; fol. lanceolatis decurrentibus; floribus axillaribus masc. sessilibus; fem. pedunculatis. In Coromandelia. ♀.

49. *P. anceps* Vahl; ramulis anciptibus; fol. linearis-ellipticis breve petiolatis; pedunculis capillaribus subelongatis. In Ind. or. ♀.

50. *P. polygonoides* Nutt. ramulis filiformibus; fol. subspathulato-lanceolatis mucronatis breve petiolatis; pedunc. subgeminis axillaribus abbreviatis. *P. pinduosa* Poepp. In Peruvia. ♀.

51. *P. obovatus* W. ramulis filiformibus flexuosis; fol. obovatis obtusisculis; pedunc. geminis axillaribus. *P. caroliniensis* Walt. In Am. bor. ♀.

52. *P. cognatus* Spr. ramis compressis alatis; fol. obovato-subrotundis submucronatis; subtus pallidis; floribus solitariis. In Jamaica. ♀.

53. *P. Niruri* L. ramis filiformibus teretibus; fol. oblongo-ellipticis submucronatis; floribus masc. inferioribus geminis, feminineis solitariis superioribus; seminibus laevibus. In Ind. or. ♀.

54. *P. debilis* Willd. ramis ancipti-alatis; fol. subellipticis utrinque attenuatis; floribus sparsis longiuscule pedunculatis. In Ind. or. ♀.

55. *P. cantoniensis* Hornem. ramis compresso-angulatis; fol. oblongo-ellipticis mucronatis subtus glaucis; floribus brevissime pedunculatis; seminibus transverse striatis. In China. ♂.

56. *P. Urinaria* L. ramis teretiusculis; fol. subrotundo-ovatis acutiusculis; floribus masculis inferioribus subaggregatis; feminineis superioribus solitariis pedunculatis. In Ind. or. ♀.

57. *P. debilis* Willd. ramis ancipti-alatis; fol. subellipticis utrinque

attenuatis; floribus sparsis longiuscule pedunculatis. In Ind. or. ♀.

✓ 58. *P. virgatus* Forst. ramis compressis virgatis; fol. linearis-lanceolatis mucronatis; floribus sparsis brevissime pedunculatis. In ins. Societas. ♀.

59. *P. incertus* Thunb. ramis teretibus incurvis; fol. subsessilibus oblongis basi glandulosis; pedunculus sparsis. In P. b. S. ♀.

60. *P. andrachnoides* W. ramis compressis; fol. obovato-cuneatis submucronatis; pedunc. subgeminis axillaribus. In Ind. or. ♀.

61. *P. compressus* H. et K. ramis ancipti-compressis; fol. oblongis utrinque rotundatis; pedunc. solitariis; seminibus asperis. In Nov. Hispan. ♂.

62. *P. hyssopifolius* H. et K. ramis teretibus; fol. elliptico-oblongis acutiusculis pedunc. solitariis; seminibus laevibus. Ad Orinocum. ♀.

63. *P. cuneatus* W. ramis teretibus fol. obovato-lanceolatis recurvato-mucronatis glaucescentibus; floribus subtenuis pedunculatis. *Patria ign.* ♂.

64. *P. rotundifolius* Willd. ramis teretibus; fol. obovato-rotundis acutiusculis; floribus masc. inferioribus ternis, fem. solitariis. In Ind. or. ♀.

65. *P. nummularifolius* Poir. ramis teretibus; fol. subcordato-orbiculatis mucronatis glabris; pedunc. solitariis elongatis. In Ind. or. ♀.

d. *Folia simplicia. Pedunculi compositi.*

66. *P. nutans* Sw. fol. ovato-ellipticis subtus glaucis; racemis terminalibus nutantibus. In Jamaica. ♀.

67. *P. calycinus* Labill. n. Holl. pl. t. 225. fol. spathulatis acutiusculis; racemis terminalibus foliatis, calycibus maximis. In Nov. Holl. ♀.

68. *P. glaucescens* H. et K. ramis 4-gonis; fol. subrotundo-ellipticis acutis subtus glaucis; racemis axillaribus compositis submasculis, terminalibus simplicibus feminineis. In Nov. Hispania. ♀.

69. *P. cornifolius* H. et K. ramis 4-gonis pubescentibus; fol. oblongis elongatis acuminatis reticulato-venosis subtus pilosiusculis; racemis axillaribus multifidis androgynis. In Quito. ♀.

70. *P. symphonicarpoides* H. et K. ramulis pubescentibus; fol. ellipti-

cis parallele venosis glabris; racemis axillaribus bifidis androgynis. *In Quito.* ♀.

5022. MELANTHESA Bl. (1825).

1. *M. chinensis* Blume. *Phyllanthus introductus.* *In Java et China.* ♀.

2. *M. racemosa* Blume. *In Java.* ♀.

3. *M. rhamnoides* Blume. *In Java.* ♀.

4. *M. rubra* Blume. *Phyll. Blumei Steud.* *In Java.* ♀.

5. *M. virgata* Blume. *P. sylvaticus* Steud. *In Java.* ♀.

5023. KIRGANELIA Juss. (1823).

1. *K. elegans* Juss. fruticosa; ramis pinnaeformibus; fol. linear-lanceolatis basi attenuatis subfasciculatis; floribus aggregatis pedunculatis. *Phyllanthus fasciculatus* Poir. *P. Kirganelia* W. *In ins. Mascaren.* ♀.

2. *K. dumetosa* Spr. fruticosa; ramis pinnaeformibus; fol. linear-lanceolatis subsessilibus; floribus solitariis pedunculatis. *Phyllanthus* Poir. *In ins. Mascaren.* ♀.

3. *K. elliptica* Spr. arborea; ramis pinnaeformibus 4-gonis; fol. ellipticis glaberrimis; floribus aggregatis. *Phyllanthus* H. et K. *In Quito.* ♀.

4. *K. floribunda* Spr. arborea; ramis 4-gonis; fol. oblongo-lanceolatis glabris; floribus fasciculato-corymbosis. *Phyllanthus* H. et K. *In Quito.* ♀.

5. *K. satriaefolia* Spr. arborea; ramis 4-angulis; fol. oblongis acuminate subtus fusco-villosis; floribus fasciculato-corymbosis. *Phyllanthus* H. et K. *In Quito.* ♀.

6. *K. timorensis* Decaisn. fol. ovato-oblongis obtusis integerrimis; stipulis setaceis valde deciduis; laciinis calycis ovato-oblongis ovario adpressis. *In ins. Timor.* ♀.

5024. EMBLICA Gaertn. (1791).

1. *E. officinalis* Gaertn. fr. t. 108. fol. pinnatis; foliolis linearibus acutiusculis; floribus aggregatis parvis ochroleucis. *Phyllanthus Emblica* L. Rumph. 7. t. 1 Rheede 1. t. 38. *In Ind. or.* ♀.

2. *E. racemosa* Spr. fol. pinnatis; foliolis oblongo-linearibus obtusis mu-

cronatis; pedunc. axillaribus 1—3-flo-
ris. *Phyllanthus* L. *In Ind. or.* ♀.

3. *E. pilosa* Spr. fol. pinnatis; foliolis ovatis acutis utrinque pilosis; floribus geminis androgynis. *Nymphaanthus* Lour. *In Cochinchina.* ♀.

5025. ANISONEMA Juss. (1823).

1. *A. dubium* Blume; fol. ovalibus obtusiusculis ramulisque tomentosis; pedunculis feminine petiolo longioribus; calyce fem. 3—4-partito. Juss. tent. t. 4. f. 11. *In Java.* ♀.

2. *A. eglandulosum* Decaisn. hb. timor. fol. ovalibus utrinque rotundatis glaberrimis subtus glaucescentibus; calyce masculo 4-phyllo. *In ins. Ti-
mor.* ♀.

3. *A. intermedium* Decaisn. fol. lanceolatis supra subnitidis subtus pal-
lidioribus opacis; floribus axillaribus ternatis; calyce masculo 4—6-partito lobis obovato-rotundatis glandulosis. *In Ins. Timor.* ♀.

5026. GLOCHIDIONOPSIS Blume. (1825).

1. *G. sericea* Blume. *In Java.* ♀.
Arbor ramis pinnaeformibus fol. subcordato-oblongis subtus sericeis; fructibus tomentosis.

5026b. GLOCHIDION Blume. (1825).

Cal. 6-partitus biseriatus eglan-
dulosus. Stam. 3—6. Germen 6—12
loculare. Stylus crassus. Caps. glo-
bosa 6—12-cocca.

1. *G. obliquum* Decaisn. glaberri-
mum; fol. ovatis v. oblongis acuminate
basi obliquis coriaceis; floribus axillaribus fasciculatis pedicellatis;
calyce masc. 6-phyllo, foliolis ovali-
bus. *In ins. Timor.* ♀.

2. *G. arborescens* Blume; fol. el-
liptico-oblongis mucronulatis coriaceis
lucidis ad costam subtus pubescen-
tibus; fructibus subglobosis ramulische
pinnaeformibus subtomentosis;
caule arboreo. *In Java.* ♀.

3. *G. macrocarpum* Blume; fol.
elliptico-falcatis acuminatis inaequi-
lateris coriaceis pinnaeformibus gla-
bris; fructibus subglobosis glabris;
caule arboreo. *In Java.* ♀.

5. *G. lucidum* Blume; fol. ovali-oblongis utrinque acutis inaequilateris lucidis ramulisque pinnaeformibus et fructibus subglobosis glabris; caule arboreo. In Java. ♀.

6. *G. obscurum* Blume; fol. ovalibus obtusis inaequilateris subtus pubescentibus; ramulis pinnaeformibus fructibusque ovato-globosis tomentosis; caule arboreo. In Java. ♀.

7. *G. lutescens* Blume; fol. elliptico-oblongis mucronulatae-acuminatis coriaceis et ramulis fructibusque subglobosis glabris; caule fruticoso. In Java. ♀.

8. *G. littorale* Blume; fol. subrotundo-ovalibus coriaceis ramulisque glabris; fructibus globoso-depressis 12-loocularibus; caule fruticoso. In Java. ♀.

9. *G. dubium* Blume; fol. ovato-v. elliptico-oblongis obtuse acuminatis basi rotundatis glabris lucidis; fructibus globoso-depressis ramulisque pinnaeformibus tetragonis subtomentosis; caule fruticoso. In Java. ♀.

10. *G. molle* Blume; fol. ovatis v. ovato-oblongis mucronatis basi subcordatis oblique utrinque ramulisque pinnaeformibus molliter tomentosis; fructibus depresso-globosis tomentosis; caule arborescente. In Java. ♀.

11. *G. glaucum* Blume; fol. oblongis acutiusculis inaequilateris glabris subtus glaucis; ramulis pinnaeformibus pubescentibus; fructibus ovato-oblongis subtomentosis; caule arboreo. In Java. ♀.

12. *G. moluccanum* Blume; fol. ovali-oblongis acutis inaequilateris coriaceis subtus tenuiter tomentosis; ramulis fructibusque fasciculatis fulvo-tomentosis; caule arborescente. In Java. ♀.

5027. *GYNOON* Adr. Juss. (1824).

1. *G. Heyneanum* Wight et Arn. fol. alternis bistipulatis coriaceis integerrimis glabris. In Ind. or. ♀.

2. *G. tetrandrump* Wight et Arn. In Ind. or. ♀.

5028. *LITHOXYLON* Endl. (1840).

1. *L. Lindleyi* Endl. In Taiti. ♀. Stipulis parvis subrotundis; pedunc. axillaris 1-floris solitariis v. paucis

nutantibus ebracteatis masc. et fem. mixtis.

5029. *GYMNANTHES* Sw. (1794).

1. *G. elliptica* et *lucida* Sw. vid. Syn. p. 257. sub *Excoecaria tinifolia* Spr.

5030. *SEBASTIANIA* Nees. (1833).

1. *S. brasiliensis* Nees est *Excoecaria glandulosa* Sw. vide syn. p. 256.

5031. *GUSSONIA* Nees. (1833).

1. *G. concolor* Nees et *discolor* Nees vide syn. p. 256. sub *Excoecaria*

5032. *ADENOGYNE* Klotsch. (1841).

1. *A. . . .* Klotsch in Erichs. Arch. VII. 1. p. 183. t. 8. f. a. ex Endl. gen.

5033. *SENNEFELDERA* Klotsch. (1841).

1. *A. . . .* Klotsch l. c. t. 8. f. b. In Brasilia. ♀.

5034. *LEUCANDRA* Klotsch (1841).

1. *L. . . .* Klotsch l. c. p. 188. Herba brasiliensis rhizomate repente. Caules erecti spithamei. Fol. petiolata ovata obtusa crenato-dentata. Racemi axillares et terminales.

5035. *BIA* Klotsch. (1841).

1. *B. . . .* Klotsch in Erichs. p. 190. Suffrutex brasiliensis volubilis. Fol. longe petiolata alterna dentata. Flores spicati.

5036. *BOTRYANTHE* Klotsch. (1841).

1. *B. . . .* Klotsch l. c. t. 9. f. B. In Brasilia. ♀. Folia oblonga remote serrata basi biglandulosa. Spicae longissimae.

5037. CLADOGYNOS Zipp. (1841).

1. *C. tomentosum* Zipp. In ins. Molucc. ♂. Frutex erectus ramosus ramis albo-tomentosis. Folia subpellata longe petiolata acuminata 3-loba repando-grosse dentata subtus tomentosa.

5038. ASTERANDRA Klotsch. (1841).

1. *C. cornifolia*; Phyllanthus H. et K. In Am. trop. ♂. Arborea, ramis 4-gonis puberulis, fol. elongato-oblongis acuminatis reticulato-venosis; racemis axillaribus.

5039. DISCOCARPUS Klotsch. (1841).

1. *D.* Klotsch I. c. t. 9. f. 1. In Am. trop. ♂. Arborea ramis spinoscentibus; fol. coriaceis rigidis integerrimis; floribus axillaribus.

5040. AKEBIA Decaisn. (1838).

1. *A. quinata* Decaisn. Arch. du Mus. 1. t. 13. f. A. Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 77. Fol. ternis v. quinis ovatis integris v. emarginatis mucronato-setosis. In Japonia. ♂.

2. *A. lobata* Decaisn. fol. 3-foliolatis; foliolis ovatis repando-lobatis obtusis v. emarginatis mucronatis setaceis. Arch. du Mus. 1. t. 13. f. B. Siebold fl. jap. t. 78. In Japonia. ♂.

3. *A. clematifolia* Siebold; fol. ternatis e basi cordata v. rotundata late acutis obtusis emarginatis coriaceis integerrimis. In Japonia. ♂.

4. *A. quercifolia* Siebold; caule volubili tenui; fol. ternatis foliolis e basi rotundata ovatis obtusis inciso-lobatis, lobis rotundatis glabris membranaceis. In Japonia. ♂.

5041. HOLBOELLIA Decaisn. (1838).

1. *H. latifolia* Wall. tent. 16. foliolis 4-5-nis ovatis; floribus racemosis; baccis ovatis. Decaisn. Arch. Mus. t. 12. f. B. In Nepalia. ♂.

2. *H. angustifolia* Wall. t. 17. foliolis 7-9-nis linearis-lanceolatis;

pedunc. 2-3-floris subfasciculatis; baccis oblongis. In Nepalia. ♂.

5042. STAUNTONIA DC. (1825).

1. *S. hexaphylla* Decaisn. I. c. t. 11. f. C. Siebold jap. t. 76. In Japonia. ♂.

5043. PARVATIA Decaisn. (1838).

1. *P. brunonianana* Decaisn. Arch. du Mus. 1. t. 12. f. A. In Ind. or. ♂.

5044. BURASAJA Thouar. (1838).

1. *B. Madagascariensis* Thouar. fol. petiolatis 3-foliolatis, foliolis brevissime petiolulatis oblongo-ovobatis coriaceis nitidis. Arch. du Mus. 1. t. 13. f. C. In Madagascaria. ♂.

2. *B. gracilis* Decaisn. fol. petiolatis ternatis; foliolis lanceolatis acuminatis basi in petiolum attenuatis subaveniis; pedunc. pedicellisque elongatis gracilibus folia superantibus. In Madagascar. ♂.

3. *B. congesta* Decaisn. fol. petiolatis trifoliolatis, foliolis ovali-lanceolatis acuminatis basi in petiolum attenuatis; pedicellis axillaribus congestis petiolos subaequantibus. In Madagascar. ♂.

5045. BIASOLE TTIA Presl. (1835)

✓ 1. *B. nympheafolia* Presl. rel. Haenk. 2. p. 142. In ins. Marianis. ♂.

5046. CYTINUS Adans. (1763)

1. *C. Hypocistis* L. Cav. ic. t. 171. Duham. arb. t. 68. Lam. ill. t. 137. Hook. exot. fl. t. 153. In Europa. austr. ♂. Planta carnosa palmaris e radicibus Cistorum erumpens squamis loricata in vivo cum floribus lutea siccitate rubens.

5047. NIPA Thunb. (1774).

1. *N. fruticans* Thunb. Lam. ill. t. 897. Rumph. 1. t. 16. In Java. ♂. Frons pinuata. Flores fem. terminales pedunc. dichotomis.

5048. FRENULA Mirb. (1823).

1. Strobili valvae dorso infra apicem mucronatae.

1. F. fruticosa Endl. syn. p. 36. strobilis ovatis infra apicem dorso mucronatis intus laevibus columna de- pressa tricruri; seminum ala angusta. Callitris oblonga Rich. conif. t. 8. n. 2. *In Nov. Holl.* Ȑ.

2. F. rhomboidea Endl. strobilis globosis; valvis dorso infra apicem gibbere conico intus laevibus; columna de- pressa tricruri; seminum ala lata. Callitris Rich. t. 8. n. 1. *In Nov. Holl.* Ȑ.

3. F. Roei Endl. strobilis globo- sis; valvis infra apicem gibbere conico intus laevibus; columna elongata triquetra; seminibus anguste alatis. *In Nov. Holl.* Ȑ.

4. F. triquetra Spach; strobilis aggregatis; valvis valde inaequalibus dorso infra apicem gibbere conico intus tuberculatis, columna de- pressa 3-cruri; seminibus anguste alatis. Cupressus australis Desf. *In Nov. Holl.* Ȑ.

b. Strobili valvae muticae.

5. F. australis Mirb. strobilis sub- globosis, valvis muticis laevibus v. longitudinaliter rugosis intus tubercu- latis; columna obsoleta; seminibus anguste alatis. Thuja Desf. Cupres- sus Pers. *In Nov. Holl.* Ȑ.

6. F. verrucosa Cunningham. strobili- lis subglobosis; valvis muticis extus verrucosis intus tuberculatis; columna elongata 3-queta; seminibus late alatis. *In Nov. Holl.* Ȑ.

7. F. robusta Cunningham. strobilis depresso-globosis; valvis muticis extus tuberculatis rugosis intus tuberculatis; columna triquetra; seminibus anguste alatis. *In Nov. Holl.* Ȑ.

8. F. Gunii Endl. strobilis ovato- globosis, valvis muticis extus laevi- bus v. rugosis intus vix tuberculatis; columna tricruri v. obsoleta, semini- bus anguste alatis. *In Nov. Holl.* Ȑ.

Species indescriptae, dubiae.

9. F. glauca Mirb. Callitris R. Br. *In Nov. Holl.* Ȑ.

10. F. calcarea Cunningham. Cal- litris R. Br. *In Nov. Holl.* Ȑ.

11. F. propinqua Cunningham. Cal- litris R. Br. *In Nov. Holl.* Ȑ.

12. F. tuberculata Mirb. Callitris R. Br. *In Nov. Holl.* Ȑ.

13. F. arenosa Hort. Callitris R. Br. *In Nov. Holl.* Ȑ.

14. F. pyramidalis Hort. Callitris Sweet. *In Nov. Holl.* Ȑ.

15. F. Fotergilli Hort. Callitris Loud. *In Nov. Holl.* Ȑ.

16. F. macrostachya Hort. *In Nov. Holl.* Ȑ.

17. F. rigida Hort. Juniperus ri- gida Nois. *In Nov. Holl.* Ȑ.

18. F. ericoides Hort. Juniperus Nois. *In Nov. Holl.* Ȑ.

5049. ACTINOSTROBOS Miq. (1842).

1. A. pyramidalis Miq. en. *In Nov. Holl.* Ȑ. Frut. orgyalis, ramis spinescentibus. Fol. squamaeformia imbricata. Strobili laeves grisei.

5050. CALLITRIS Vent. (1808).

1. C. quadrivalvis Vent. Thuja articulata Vahl symb. t. 48. Desf. fl. atl. t. 252. Rich. conif. t. 8. f. 1. *In Barbaria et in Atlante.* Ȑ. Frutex dumosus v. arbor gigantea Cupressi facie diffuse ramosa, ramulis patulis complanatis.

5051. LIBOCEDRUS Endl. (1847).

1. L. Doniana Endl. ramulis com- pressis; fol. 4-fariam imbricatis late ovatis acuminatis; strobilis erectis ovatis valvis lignosis spina terminali subulata. Dacrydium plumosum Don. Thuja Doniana Hook. journ. I. t. 18. *In Nov. Zealand.* Ȑ. Arbor 30—70-ped.

2. L. tetragona Endl. ramis 4- gonis; fol. 4-fariam imbricatis, omnibus ovatis obtusis subcymbaeformibus; strobilis ovatis erectis. Juniperus uvi- fera Don. Thuja tetragona Hook. journ. III. t. 4. *In China.* Ȑ.

3. L. chilensis Endl. ramulis an- cipiti-compressis; fol. 4-fariam imbricatis lateralibus complicato-carinatis longe decurrentibus utrinque sulco sto- matifero exaratis; strobilis nutantibus ovato-oblongis. Thuja Don. Hook. I. c. II. t. 4. Thuja andina Poepp. nov. g. t. 220. *In Chili.* Ȑ.

5052. BIOTA Don. (1823).

1. *B. orientalis* Endl. ramis ramulisque strictis v. patentibus compressis; fol. adpressis, facialibus dorso glandula linearis. *Thuja orientalis* L. Schk. t. 309. f. 1. Rich. conif. t. 7. f. 2. In China et Japonia. ♂. Arbor magna ligno duro.

2. *B. pendula* Endl. ramis ramulisque elongato - filiformibus pendulis; fol. basi adpressis apice patulis eglaudosis. *Thuja pendula* Lamb. Pin. 2. t. 67. Siebold fl. jap. t. 117. In China et Japonia. ♂. Arbor 6—12-ped.

5053. THUJA L. (1737).

1. *T. plicata* Donn. ramulis complanatis patentibus; fol. 4-fariam imbricatis in superiore facie lucidis, marginalibus late ovatis acutis, facialibus rhomboides dorso glandula tuberculiformi orbiculari; strobilis nutantibus. Loud. arb. f. 2108. In Am. bor. ♂.

2. *T. occidentalis* L. ramis ancipitibus strictis; fol. 4-fariam imbricatis late ovatis obtusis utrinque luridis, facialibus carinatis dorso glandula tuberculiformi ovali; strobilis nutantibus.

3. *T. gigantea* Nutt. ramulis compressis erectis; fol. 4-fariam imbricatis ovatis acutis, marginalibus navicularibus, facialibus convexis dorso glandula impressa; strobilis arte reflexis. In Am. bor. ♂.

5054. THUJOPSIS Siebold. (1842).

1. *T. dolabrata* Siebold. fl. jap. tab. 119 et 120. Lamb. Pin. t. 68. In ins. Nipon. ♂. Arbor excelsa ramis verticillatis pendulis. Fol. decussatim dense 4-fariam imbricata. Strobili terminales subglobosi.

5055. CUPRESSUS L. (1747).

1. *C. horizontalis* Mill. coma effusa ramis patentibus; ramulis cylindricis; fol. arte adpressis acutiusculis dorso convexis ecarinatis; strobili globosi squamis umbonatis. In Creta Persia et Bithynia. ♂.

2. *C. fastigiata* DC. coma conica ramis strictis; ramulis 4-gonis; fol. adpressis oblongis obtusis dorso con-

exo carinatis; strobili globoso-ovali squamis vix umbonatis. *C. semper-virens* L. Duham. arb. 3. t. 1. Rich. conif. t. 9. In Graecia et Asia minor. ♂.

3. *C. torulosa* Don; coma stricta ramis adscendentibus; ramulis patulis cylindricis torulosis, fol. arte adpressis acutiusculis carinatis; strobili globosi squamis umbonatis. Loud. arb. f. 2329—2331. In Nepal. ♂. Arbor pyramidata ramosissima.

4. *C. glauca* Lam. coma effusa ramis flexuosis patentibus infimis subpendentibus, ramulis 4-gonis; fol. acutis adpressis apice patulis glaucescentibus; strobili globosi squamis mucronatis. *C. lusitanica* Mill. Lois. nouv. Dub. 3. t. 3. Lamb. Pin. t. 42. ed. 2. t. 65. Loud. arb. 2328. In Ind. circa Goam in Lusitania colit. ♂.

5. *C. funebris* Endl. coma effusa ramis nutantibus; ramulis ancipitibus elongatis pendulis, secundariis bifarium patulis; fol. acuminato-acutis carinatis; strobili globosi squamis mucronatis. *Lignum vitae* Staunt. Emb. chin. t. 41. *C. pendula* Lamb. 1. t. 43. 2. t. 66. Loud. arb. f. 2332 et 2333. In China. ♂.

6. *C. Benthamii* Endl. ramulis teretiusculis patentibus; fol. laxe imbricatis ovatis acutis ecarinatis dorso glandula impressa; strobili globosi squamis rugosis subresinosis longe mucronatis. In Mexico. ♂.

7. *C. Lindleyi* Klotsch; ramulis strictis 4-gonis; fol. arte imbricatis ovatis acutis carinatis dorso glandula impressa; strobili globosi squamis glaucescentibus laevibus breviter mucronatis. *C. thurifera* Lindl. In Mexico. ♂.

8. *C. sabinoides* H. et K. ramulis 4-gonis; fol. triangularibus ovatis obtusis crassis arctissime adpressis. *Juniperus mexicana* Spreng. In Mexico. ♂.

9. *C.?* *Coulterii* Pinet Woburn. ramis teretibus; fol. ternatis ovatis acutis imbricatis dorso convexis glaucis. In Mexico. ♂.

5056. CHAMAECPARIS Spach. (1846).

1. *C. sphaeroidea* Spach, ramis patentibus 4-gonis; fol. acuminatis

dorso convexo glanduliferis. Cupressus thyoides L. Wangenh. Beitr. t. 2. f. 4. Duham. t. 2. Michx. arb. t. 2. Loud. arb. f. 2327. Th. sphaeroïdes Richard conif. t. 8. In Am. bor. Ȑ.

2. *C. nutkaensis* Spach; ramis suberectis 4-gonis fol. acuminatis dorso carinato eglandulosis. Cupressus Lamb. Cupressus americana Trautv. imag. pl. t. 7. In Am. bor. Ȑ.

3. *C. thurifera* Endl. ramis patentibus, inferioribus apice reflexis, ramulis teretibus; fol. acuminato-pungentibus ecarinatis eglandulosis. Cupressus H. et K. Juniperus Bonpl. In Mexico. Ȑ.

4. *C. obtusa* (Retinispora) Sieb. et Zucc. jap. t. 121. fol. omnibus squamaeformibus adnatis ovato-rhombeis obtusis v. acutiusculis; seminum alis grano vix latioribus. In ins. Nippon. Ȑ. Arbor 60—80-ped.

5. *C. pisifera* (Retinispera) Sieb. et Zucc. jap. t. 122. fol. omnibus squamaeformibus adnatis ovato-lanceolatis acuminatis v. cuspidatis; seminum alis granum laevigatum superantibus. In ins. Nippon. Ȑ

6. *C. squarrosa* (tinispora) Sieb. et Zucc. t. 123. fol. decussatim oppositis ternis quaternis squarroso-patentibus acrosis linearibus acutis lanceolatis squamaeformibus decurrentibus, alis seminum grano latioribus. In Japonia. Ȑ. 5—6-ped.

5057. TAXODIUM Rich. (1813).

1. *T. distichum* Rich. conif. t. 10. ramis ramulisque patentibus fol. linearibus distichis. Comm. hort. t. 59. Plukn. t. 85. f. 6. Catesb. t. 11. Michx. arb. III. t. 1. Lamb. t. 63. Pinet. woburn. t. 60. In Mexico. Ȑ.

2. *T. microphyllum* Brongn. ramis ramulisque patentibus; fol. ovato-lanceolatis distichis. In Am. bor. Ȑ.

3. *T. adscendens* Brongn. ramis horizontalibus; ramulis adscendentibus gracilis; fol. linearibus ramulis undique adpresso. In Florida. Ȑ.

5058. GLYPTOSTROBOS Endl. (1847).

1. *G. heterophyllum* Endl. ramulis strictis fastigiatis. Taxus nucifera hort.

Taxodium japonicum Brongn. T. heterophyllum Brongn. Schubertia Spach. In China. Ȑ.

2. *G. pendulus* Endl. ramulis gracilis pendulis. Taxodium sinense pendulum Pinet. Woburn. In China. Ȑ.

5059. CRYPTOMERIA Don. (1822).

1. *C. japonica* Don. Kaempf. ic. t. 48. Cupressus L. Gärtn. 2. t. 91. Lam. ill. t. 787. f. 2. Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 124. Hook. ic. t. 668. In Japonia. Ȑ. Arbor excelsa 80—100-ped. et 4—5-ped. in diametro coma pyramidali. Fol. 4-fariam posita linearis-subulata.

5060. PINUS L. (1737).

a. *Tsuja* Endl. Strobili squamae persistentes, bracteis inclusis rarissime exsertis. Folia plana breve petiolata. Petoli basi semiteretes, pulvinis ramo adnatis decurrentibus sursum incrassatis, cicatricibus semiorbicularibus v. sublunatis.

* *Micropeuce* Spach. Bracteae inclusae.

1. *P. Tsuja* Sieb. et Zucc. jap. t. 106. fol. subdistichis planis apice obtuse emarginatis margine integerrimis subtus albo-lineatis; amentis masc. subcylindricis; strobili elliptici bracteis inclusis brevissimis truncatis bifidis; squamis late orbicularibus truncatis v. emarginatis. In Japonia bor. Ȑ. Arbor 20—25-pedalis.

2. *P. Brunonianae* Wall. pl. as. t. 247. Antoine. con. t. 32. f. 1. fol. subdistichis planis obtusiusculis margine superne serrulatis subtus utrinque lacteo-furfuraceis; strobili ovato-obtusi bracteis inclusis cuneatis truncatis; squamis exacte orbiculatis basi haud angustatis. *P. dumosa* Lamb. ed. 2. t. 46. Loud. arb. f. 2233 et 2234. In Butan et Nepalia. Ȑ. Arbor 70—80-ped.

3. *P. canadensis* L. fol. subdistichis planis acutiusculis margine minutissime serrulatis subtus glaucis; amentis stamigeris longe stipitatis globosis; strobili ovati acutii bracteis inclusis latis truncatis crenulatis; squamis e basi late cuneatae obovatis ro-

tundatis. Wangenh. Btr. t. 15. f. 36. Lamb. t. 32. edit 2. t. 45. Antoine conif. t. 32. f. 3. In Am. bor. Ȑ.

** Bracteae exsertae.

4. P. Douglasii Sal. fol. subdistichis planis obtusis integerrimis subtus argenteis; strobili cylindrici ovati bracteis squamas aequantibus v. superantibus linearibus bilobis, lobis acutis crosis; squamis obovatis integerrimis. Lamb. Pin. t. 90. Antoin. conif. t. 33. f. 3. Hook. fl. Am. bor. t. 183. P. taxifolia Lamb. Pin. t. 33. edit. II. t. 47. In Am. bor. Ȑ.

b. Abies Endl. Strobili squamae a rachi persistente solutae bracteis exsertis v. inclusis. Folia petiolata petiolis cylindricis basi incrassatis, pulvinis decurrentibus et superne ultra cicatricem orbicularem productis, saepe obsoletis et parum conspicuis.

* Bracteae exsertae.

5. P. bracteata Don; fol. subdistichis linearibus planis mucronatis subtus argentsis; strobili ovati erecti bracteis exsertis cuneato-linearibus bilobis, lobis acutis divaricatis erosodenticulatis nervo producto; squamis e basi cuneata reniformi-orbicularibus. Lamb. Pin. t. 91. Antoin. conif. t. 30. Loud. arb. f. 2256. P. venusta Dougl. In California et ad fl. Columbia. Ȑ. Arbor 120-ped.

6. P. religiosa H. et K. fol. linearibus subdistichis acutis calloso-mucronatis subtus argenteis v. concoloribus; strobili ovati bracteis exsertis linearibus spathulatis apice rotundato eroso-denticulato abrupte cuspidatis reflexis; squamis unguiculatis reniformibus. Lamb. t. 52. Antoin. t. 28. f. 2. In Mexico. Ȑ.

7. P. nobilis Dougl. fol. secundis abbreviato-linearibus subfalcatis obtusis mucronatis planis subtus argenteis; strobili cylindrici erecti bracteis exsertis late spathulatis eroso-laceris, lacinia intermedia longiore acuta retrorsum imbricatis; squamis late cuneatis stipitatis pubescentibus margine incurvato integerrimo. Antoin. t. 29. f. 2. Abies Pinet. Woburn. t. 40. Ad cataractas Columbiae. Ȑ. Arbor magna.

8. P. Fraseri Pursh; fol. undique patentibus abbreviato-linearibus planis retusis subtus argenteis; strobili ovato-oblongi erecti bracteis lanceaformibus argute serrulatis reflexis; squamis stipulatis cuneato-orbicularibus. Lamb. t. 42. Antoin. t. 29. f. 1. Abies Pin. Woburn. t. 38. In Carolina et Pennsylvania. Ȑ. Arbor 10-ped.

9. P. hirtella H. et K. ramulis hirtellis; fol. pectinato-distichis planis acutis subtus pruinoso-glaucescensibus; strobilis? In Mexico. Ȑ. Arbor 3-4-orgyalis.

10. P. Nordmanniana Stev. Bull. Mosc. 1838. t. 2. fol. subsecundis linearibus planis retusis subtus argenteis; strobili ovati bracteis exsertis linearis-spathulatis apice rotundato nervo excurrente abrupte cuspidato serrulatis reflexis; squamis unguiculatis late reniformibus. Antoin. t. 28. f. 2. Prope Guriel. Ȑ. Truncus rectissimus 80-ped.

11. P. Abies du Roi; fol. subsecundis linearibus retusis v. obtusis aut interdum breve mucronatis subtus argenteis; strobili cylindrici bracteis exsertis linearis-spathulatis cuspidatis reflexis demum evanidis; squamis e basi cuneata rotundato-dilatatis. Lamb. P. t. 30 et ed. 2. t. 50. Abies pectinata DC. P. picea L. In Europa et Asia minor. Ȑ. Arbor 160-ped.

12. P. cephalonica Endl. fol. distichis linearibus planis acuminate-pungentibus subtus argenteis; strobili subfusciformis bracteis exsertis linearis-spathulatis cuspidatis reflexis; squamis e basi cuneata rotundato-dilatatis. Loud. arb. f. 2235 et 2236. Pin. woburn. t. 42. Antoin. con. t. 27. f. 1. In mont. Enos Cephaloniae. Ȑ.

13. P. firma Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 107. fol. distichis linearibus planis obtusis v. emarginato-bicuspidatis subtus pallidioribus; strobili deflexi cylindrici obtusi bracteis exsertis lanceaformibus acutis crenulatis; squamis e basi late cuneata rotundatis margine attenuato-crenulatis. In Japonia. Ȑ. Arbor excelsa habitu A. pectinatae.

14. P. bifida Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 109. fol. distichis divaricato-pectinatis planis acute bifidis subtus albidis; strobilis? Antoin. con. t. 31. f. 2. In Japonia. Ȑ.

15. *P. homolepis* Sieb. et Zucc. jap. t. 108. fol. subdistichis linearibus planis acutis v. obtusis saepe breviter bicuspidiatis subtus albidis; amentis gemmiferis nutantibus; bracteis squamisque breve stipitatis orbicularibus crenatis exacte se invicem aequantibus. Antoin. t. 31. f. 1. *In Japonia*. Ȑ. Arbor 20—30-ped.

16. *P. balsamea* L. fol. subsecundis linearibus planis obtusis saepe breviter bicuspidiatis subtus albidis; strobili erectis ovato-cylindricis; bracteis breviter exsertis suborbiculari abrupte cuspidatis erectis; squamis e basi anguste cuneata abrupte dilatatis transverse ellipticis. Pluckn. t. 121. f. 2. Lamb. t. 48. et ed. 2. t. 41. Antoin. t. 26. f. 3. Rich. conif. t. 16. Pin. woburn. t. 37. *Abies balsamifera* Michx. arb. t. 14. *In Am. bor.* Ȑ. Arbor 40—50-ped.

** Bracteae inclusae.

17. *P. amabilis* Dougl. fol. pectinato-distichis planis acutis subtus argenteis; strobili cylindrici bracteis inclusis e basi stipitata ovalibus obtusis; squamis late cuneatis. Antoin. con. t. 25. f. 2. *In Am. bor.* Ȑ.

18. *P. grandis* Dougl. fol. pectinato-distichis planis obtusis emarginatis subtus argenteis; strobili ovati bracteis inclusis cuneatis truncatis apice abruptim breve cuspidatis; squamis e basi anguste cuneata abruptius dilatatis. Lamb. t. 94. Antoin. con. t. 25. f. 1. *In California*. Ȑ. 170—200-pedalis.

19. *P. lasiocarpa* Hook. fol. linearibus obtusis utrinque concoloribus; strobili bracteis late obovatis vix denticulatis mucronato-acuminatis squama late subrotunda extus dense fusco-pubescente subduplo brevioribus. *In Am. bor.* Ȑ.

20. *P. Pindrow* Royle ill. t. 86. fol. distichis longe linearibus planis apice bidentatis supra cinereis subtus argenteis; strobili erecti ovato-subglobosi bracteis inclusis obcordatis; squamis e basi late cuneata dilatato-reniformibus. Lamb. t. 92. Antoin. t. 24. f. 1. *In Himalaya*. Ȑ. 80—100-pedalis.

21. *P. Webbiana* Wall. fol. subsecundis linearibus planis apice bidentatis supra viridibus subtus niveis;

strobili erecti cylindrici bracteis inclusis ovalibus; squamis e basi late cuneata dilatato-reniformibus. Lamb. ed. 2. t. 44. Antoin. t. 24. f. 1. *P. spectabilis* Lamb. t. 2. *Picea* Loud. f. 2251—2253. *In Himalaya*. Ȑ. Arbor 80—100-ped.

22. *P. Pichta* Fisch. fol. undique erecto-patentibus linearibus obtusis acutisque planis; strobili ovato-conici bracteis inclusis trapezoideis mucronatis; squamis late cuneatis margine rotundatis. *P. Picea* Pall. *Abies sibirica* Ledeb. ill. t. 500. Antoin. t. 26. f. 1. *In Sibiria altaica*. Ȑ. Arbor excelsa.

23. *P. Pinsapo* Boiss. voy. t. 167—169. fol. ramorum sterilium linearibus planis acutis fertilium undique laxe imbricatis subtereti-sediformibus; strobili erecti ovato-cylindrici bracteis inclusis obovatis emarginatis mucronatis; squamis stipitatis late cuneatis margine rotundatis. Antoin. con. t. 26. f. 2. *In Hispania*. Ȑ. Arbor 60—70-ped.

24. *P. Mertensiana* Bong. fol. linearibus obtusiusculis basi in petiolum attenuatis integerrimis; strobili squamis reniformibus integris. *In ins. Sitcha*. Ȑ.

c. *Picea* Endl. Strobili squamae persistentes bracteis inclusi. Folia 4-gona.

25. *P. Menziesii* Dougl. fol. compresso-4-gonis acutis strictis; strobili cylindrici nutantis squamis scariosis rhombis margine erosis. Lamb. t. 89. Antoin. t. 33. f. 1. *In Am. bor.* Ȑ.

26. *P. alba* Ait. fol. 4-gonis incurvis; strobili subcylindrici laxi-nutantis squamis late obovatis indivisis integerrimis. Lamb. ed. 1. t. 26. ed. 2. t. 36. Antoin. con. t. 34. f. 1. *P. canadensis* Wangenh. Reitr. 5. t. 1. f. 2. *Abies alba* Michx. arb. t. 12. Pin. Woburn. t. 33. *In Am. bor.* Ȑ.

27. *P. rubra* Lamb. ed. 1. t. 28. ed. 2. t. 38. fol. 4-gono-subulatis acuminitis; strobili ovato-oblongi obtusi squamis lato-obovatis bilobo-laceris margine integerrimis. Antoin. con. t. 34. f. 2. *P. americana* Wangenh. t. 16. f. 80. Gaertn. t. 91. *Abies* Pin. Woburn. t. 35. *In Nova Scotia et Nova Fundlandia*. Ȑ. Arbor 30-ped.

28. *P. nigra* Ait. fol. 4-gonis strictis acutis; strobili ovati acutinuantis squamis late obovatis indivisis eroso-denticulatis. Mill. ic. t. 1. Lamb. ed. 1. t. 27. ed. 2. t. 37. Antoin. t. 34. f. 3. Abies Michx. arb. t. 11. In Am. bor. ♂. Arbor 80-ped.

29. *P. orientalis* L. fol. sub 4-gonis aoutis; strobili subcylindrici acuti nutantis squamis rhombeo-ovatis apice rotundatis subintegerrimis. Lamb. ed. 1. t. 29. f. a. ed. 2. t. 39. f. a. Antoin. t. 35. f. 1. Abies Joubert et Spach. pl. or. t. 14. Circa Trapezunt, in *Migrelia et montibus Adschariensibus*. ♂.

30. *P. Picea* du Roi; fol. compresso-4-gonis; strobili cylindrici nutantis squamis planis rhombeis apice truncato-excisis. Pinus abies L. Lam. ed. 1. t. 25. ed. 2. t. 35. Antoin. t. 35. f. 2. In Europa. ♂. Arbor 150-pedalis.

31. *P. oborata* Ledeb. ill. t. 499. fol. 4-gonis acuminatis; strobili ovali obtusi squamis late cuneato-obovatis margine rotundato-integerrimis. Ant. t. 37. f. 2. In *Sibiria altaica* ♂. Arbor excelsa.

32. *P. Schrenkiana* Fisch. et Mey. fol. 4-gonis acutis seriatim albo-punctatis; strobili cylindricis erectis; squamis cuneato-obovatis apice rotundatis integerrimis planiusculis; ramentis scariosis dilatatis. In *Sibiria*. ♂.

33. *P. jezoensis* Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 110. fol. compresso-4-gonis spinescenti-mucronatis; amenti gemmiferi oblongi squamis oblongis ellipticis bractea spathulato-rhombea acuta multoties longioribus. Antoin. con. t. 37. f. 1. In *Japonia*. ♂. Arbor magna ligno molli.

34. *P. polita* Sieb. et Zucc. jap. t. 111. fol. 4-gonis abrupte mucronatis; strobili erecti (?) ovati obtusi squamis e basi cuneata obovatis margine integerrimis. Antoin. con. t. 36. f. 1. In *Japonia*. ♂. Arbor insignis habitu Abietis excelsae.

35. *P. Khutron* Royle ill. t. 84. f. 1. fol. 4-gonis mucronato-acuminatis; strobili cylindrici penduli squamis late obovatis inaequaliter fissis margine integerrimis. *P. Smithiana* Lamb. t. 88. Wall. pl. as. rar. t. 216. Antoin. t. 36. Pin. Woburn. t. 30. In *Himalaya*. ♂. Arbor 50-ped.

36. *P. sitchensis* Bong. fol. linearibus sub-4-gonis acuminatis mucronatis; strobili squamis oblongis obtusis tenuissime denticulatis. In ins. Sitcha. ♂.

d. *Larix* Endl. Strobili squamae persistentes bracteis inclusis. Folia sessilia annua fasciculata.

37. *P. dahurica* Fisch. fol. subclavato-4-gonis obtusis, lineis 2 glaucescentibus; strobilis nutantibus; bracteis inclusis e basi ovata cuspidatis; squamis laxis ovatis apice truncato-emarginatis; seminum ala lacera. *P. Larix americana* Pall. Ross. t. 1. f. 2. *Larix Daur.* Trautv. imag. t. 32. In *Sibiria arctica*. ♂. Fruticulus humilis trunco prostrato.

38. *P. leptolepis* Sieb. et Zucc. jap. t. 103. fol. linearibus obtusis; strobili ovati rotundi bracteis inclusis; squamis e basi attenuata orbicularibus emarginatis v. rotundatis teneris striatis margine reflexis et undulato-laceris. In *Japonia*. ♂.

39. *P. Ledebourii* Endl. fol. linear-4-gonis obtusiusculis; strobilis adscendentibus bracteis ellipticis mucronatis; squamis ovatis margine integerrimo recurvato convexis. *Pinus Larix* Pall. ross. t. 1. In *Sibiria*. ♂.

40. *P. pendula* Soland. fol. linear-4-gonis obtusiusculis; strobilis adscendentibus bracteis panduraeformibus mucronatis; squamis ovatis integerrimis margine reflexis. Lamb. ed. 1. t. 36. ed. 2. t. 49. Wangenh. t. 16. f. 37. In Am. bor. ♂.

41. *P. microcarpa* Lamb. fol. linear-4-gonis obtusiusculis; strobilis adscendentibus bracteis ellipticis obtuse acuminatis subexsertis; squamis ovatis integerrimis margine indexis. Lamb. ed. 1. t. 37. ed. 2. t. 50. Antoin. con. t. 21. f. 1. *Larix Pin. woburn.* t. 47. In Am. bor. ♂. Arbor 100-pedalis.

42. *P. Larix* L. fol. linearibus obtusiusculis; strobilis adscendentibus; bracteis inclusis v. exsertis panduraeformibus cuspidatis; squamis ovatis retusis; seminum ala integerrima rotundata. Lamb. t. 35. ed. 2. t. 48. Antoin. t. 21. f. 2. In *Europa*. ♂. Arbor 100-ped.

e. *Cedrus* Endl. Strobili squamae apice verruca deplanata persistentes; bracteis inclusis. Folia perennia fasciculata.

44. *P. Deodara* Roxb. ramis pendulis; fol. patulis laxiusculis; strobili squamis haud inflexis. Lamb. t. 8. ed. 2. t. 52. Antoin. t. 22. f. 2. *In Nepalia*. ♂. Arbor 150-ped.

45. *P. Cedrus* L. ramis erectis; fol. arrectis densis; strobili squamis basi sub angulo recto inflexis. Lamb. t. 37. ed. 2. t. 51. Antoin. t. 22. f. 1. *In Libano*. ♂.

f. *Cembra* Endl. Squamarum apophysis dimidiato-pyramidata umbone terminali. Semina aptera. Folia quina, sena v. terna.

46. *P. parriflora* Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 115. fol. 5-nis; strobilis ellipticis; squamis obovatis rotundatis cochleari-concavis; apophysi dimidiato-pyramidata obtusissima; umbone obsoleto; antherarum crista subnulla. *In Japonia*. ♂.

47. *P. Koraiensis* Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 116. fol. 5-nis; vaginarum elongatarum squamis interioribus linearibus flaccide patentibus integerimis; strobilis cylindricis; squamis cuneatis; apophysi dimidiata late rhombaea obtusissima margine undulata incurva; umbone obsoleto. *In Koraia*. ♂. Arbor 10—12-ped.

48. *P. Cembra* L. fol. 5—6-nis; vaginarum elongatarum squamis interioribus spathulato-linearibus integerimis flaccide patentibus; strobilis ovatis obtusis basi umbilicatis; squamis cuneatis; apophysi dimidiata late rhombaea obtusa, umbone terminali late lanceolato; antherarum crista reniformi crenata, Duham. arb. t. 32. ed. 2. t. 77. Lamb. t. 23. ed. 2. t. 30, 31. Antoin. t. 20. f. 2. Pall. Ross. t. 2. *In Europa et Sibiria*. ♂. Arbor 50-pedalis.

49. *P. Peuce* Griseb. fol. 5—6-nis; vaginarum squamis oblongo-linearibus albo-scariosis; strobilis cylindricis utrinque attenuatis; squamis late ovatis apophysi dimidiata late rotundata-margine attenuata longitudinaliter sulcata umbone terminali transverse lanceolato subtruncato. *In Scardo austr.* ♂. Arbor 30—40-ped.

g. *Strobus* Endl. Squamarum apophysis dimidiato-pyramidata umbone terminali. Semina alata. Strobili cylindrici penduli.

50. *P. excelsa* Wall. fol. carinato-4-gonis elongato-filiformibus tenuibus; strobilis elongato-conicis obtusis; squamarum apophysi dimidiato-pyramidata obtusa convexiuscula adpressa, umbone terminali acuto; antherarum crista ovali truncata lacera. Lamb. ed. 2. t. 33. Pin. Woburn. t. 29. Antoin. con. t. 20. f. 1. *In Himalaya*. ♂. Arbor excelsa pyramidata.

51. *P. Strobus* L. fol. carinato-4-gonis elongato-filiformibus gracilibus tenuissimis; squamarum apophysi dimidiato-pyramidata obtusa; antherarum crista minima pyramidata, lobis subulato-setaceis. Wangenh. t. 1. f. 1. Michx. arb. t. 10. Lamb. t. 22. ed. 2. t. 32. Antoin. con. t. 20. f. 3. *In Am. bor.*

52. *P. monticola* Dougl. fol. carinato-3-gonis abbreviato-filiformibus rigidis; strobilis conico-cylindricis acutis; squamarum apophysi dimidiato-pyramidata obtusa planiuscula; umbone terminali acuto. Lamb. t. 87. ed. 2. t. 132. Antoin. con. t. 18. f. 3. *In Am. bor.* ♂.

53. *P. Ayacahuite* C. Ehrenb. fol. carinato-3-gonis filiformibus rigidis; strobilis cylindrico-pyramidalis praelongis; squamarum apophysi dimidiato-pyramidata acuminata apice recurva; umbone terminali obtuso. Loud. arb. f. 1919—1921. *In Mexico*. ♂. Arbor. 100-ped.

54. *P. Lambertiana* Dougl. fol. carinato-3-gonis filiformibus rigidis; strobilis crasso-cylindricis utrinque obtusis; squamis laxis; apophysi lata dimidiato-pyramidata, umbone terminali dilatato-obtusissimo. Lamb. t. 34. Loud. arb. f. 2203—2207. Pin. woburn. t. 30. Antoin. t. 19. *In Am. bor.* ♂. Arbor gigantea 150-ped.

h. *Pseudostrobus* Endl. Squamarum apophysis pyramidata, umbone centrali. Semina alata. Folia quina.

55. *P. Ehrenbergii* Endl. fol. abbreviatis rigidis 3-uncialibus; strobilis ovatis 2-uncialibus; squamarum apophysi rhombaea transversim acute ca-

rinata, umbone excentrico orbiculari in mucronem acutum recurvum producto. *In Mexico.* ♂.

56. *P. rufa* Endl. fol. 5-unc. rigidis; vaginis squamosis abbreviatis; strobilis oblongis obtusis 3-unc.; squamarum apophysi rhombea, angulo superiore obtuso inferiore acuto, carina transverse elevata; umbone late depresso mucrone tuberculiformi. *In Mexico.* ♂.

57. *P. Hartwegii* Lindl. fol. 4—5-nis 6—unc. rigidis; vaginis scariosis elongatis; strobilis oblongis 4—5-unc. pendulis aggregatis; apophysi depresso pyramidata margine incrassata rugosa, carina transverse parum elevata; umbone rhombeo depresso mutico. Loud. arb. f. 1875 et 1876. *In Mexico.* ♂.

58. *P. oocarpa* Schiede; fol. 5-nis tenuibus elongatis 6—12-unc.; strobilis ovatis acutis 3—5-unc.; apophysi pyramidato-4—5-gona angulo superiore acuto carina transverse parum elevata superiore obsoleta inferiore acuta, umbone suborbiculari depresso mutico. Loud. arb. f. 1894—1896. Antoin. t. 17. f. 2. *In Mexico.* ♂.

59. *P. Russeliana* Lindl. fol. 5-nis 6—8-unc. vaginis squamosis elongatis; strobilis oblongis 6-unc. horizontalibus verticillatis sessilibus; squamarum apophysi depresso-pyramidata, carina transversa acuta, latere superiore angustiore; umbone lato plano conico umbonulato. *In Mexico.* ♂.

60. *P. Deroniana* Lindl. fol. 5-nis elongatis 8—9-unc. vaginis squamosis longis; strobilis solitarii pendulis oblongo-corniformibus obtusis 6-unc.; squamarum apophysi linea parum elevata; umbone lato obtuse umbonulato. Loud. arb. f. 1877 et 1878. *In Mexico.* ♂.

61. *P. macrophylla* Lindl. fol. 5-nis longissimis sesquipedalibus vaginis squamosis; strobilis elongato-ovatis 6-unc.; squamarum apophysi uncinata; umbone continuo discolorre obtuso. Loud. arb. 1835 et 1836. *In Mexico.* ♂.

62. *P. apulcensis* Lindl. fol. quinis tenuibus 6-unc. glaucis; vaginis squamosis longis; strobilis pendulis verticillatis ovatis acutis; squamarum apophysi rhombea, umbone continuo recto v. recurvo. Loud. arb. f. 1899, 1900. *In Mexico.* ♂.

63. *P. Montezumae* Lamb. t. 22. fol. 5-nis longis sesquipedalibus rigidis glaucescentibus; vaginis squamosis; strobilis oblongis spithameis; squamarum apophysi elevato-pyramidata obtuse 4-gona, carina transversa acuta; umbone depresso mutico. Lamb. t. 22. Antoin. t. 17. f. 1. Loud. arb. 1881—1884. *In Mexico.* ♂.

64. *P. occidentalis* Sw. fol. 5-nis elongatis (8—10") tenuibus nitidis; vaginis squamosis abbreviatis; strobilis pedunculatis cernuis conicis (2—3"); apophysi plano-depressa; umbone foliaceo mucronato. Plum. ic. t. 121. Duham. arb. t. 72. Lamb. t. 23. Antoin. t. 18. f. 1. Loud. arb. f. 2183. *In Hispaniola.* ♂.

65. *P. tenuifolia* Benth. fol. 5-nis elongatis (8—10") tenuibus nitidis; vaginis squamosis; strobilis ovoides (1 $\frac{1}{2}$ "); apophysi oblique rhombea plano-depressa margine incrassata; umbone mutico. *Prope Guatimala.* ♂.

66. *P. leiophylla* Schiede et Deppe; fol. 5-nis elongatis (3—5") tenuissimis glaucescentibus vaginis squamosis caducis; strobilis ovatis (1—2") horizontalibus geminis pedunculatis; squamarum apophysi rhomboidea plano-depressa, umbone mucrone deciduo centro excavata. Lamb. ed. 2. t. 21. Loud. arb. f. 2186 et 2187. *In Mexico.* ♂.

67. *P. filifolia* Lindl. fol. 5-nis longissimis 1 $\frac{1}{2}$ -ped.; vaginis squamosis; strobilis conicis elongatis (7—8") obtusis; squamarum apophysi rhombea depresso-pyramidata; carina transversa acuta; umbone calloso obtuso. Loud. arb. 1889 et 1890. *In Guatimala.* ♂.

68. *P. Pseudostrobus* Lindl. fol. 5-nis elongatis 10-poll. tenuissimis glaucescentibus; vaginis squamosis; strobilis horizontalibus verticillatis ovalibus 4-poll.; apophysi rhombea pyramidata recta carina acuta, umbone obtuso. Loud. arb. f. 1888. *In Mexico.* ♂.

69. *P. Orizabae* Gord. in Journ. Hort. cult. soc. t. 237. c. fig. fol. 5-nis elongatis 8—9-poll. filiformi-3-quadratis angulis asperimis; vaginis squamosis; strobilis aggregatis deflexis ovatis obtusis 4—5-poll.; squamarum apophysi e basi transversim rhombea abruptim deflexo-pyramidata nitida;

umbone obtuse uncinato. *In monte Orizaba Mexici.* ♀.

i. *Taeda* Endl. *Squamaram apophysis pyramidata umbone centrali. Folia terna.*

70. *P. Teocote* Cham. et Schlecht. fol. tenuibus flexuosis; vaginis persistentibus fimbriatis; strobilis deflexis ovatis acutis 2—3-poll. umbone rhomboe plano medio tuberculo conico. Lamb. ed. 2. t. 20. Loud. arb. f. 2173 et 2174. *In Mexico.* ♀.

71. *P. patula* Schied. et Deppe; fol. 3-nis tenuissimis flaccidis 8—9-poll.; vaginis persistentibus ciliatis; strobilis ovato-oblongis obtusis; squamarum apophysi angulata, umbone conico recto medio tuberculato. Lamb. ed. 2. t. 19. Loud. arb. f. 2175 et 2176. Antoin. t. 16. f. 2. *In Mexico.* ♀.

72. *P. insularis* Endl. fol. tenuissimis flaccidis 6—9-poll.; vaginis persistentibus; strobilis ovatis acutis; squamarum apophysi angulata; umbone minimo tuberculiformi conico. *In ins. Philippinis.* ♀.

73. *P. persica* Strangw. fol. 3—4-nis, rigidis squarrosis 2—3-poll.; vaginis persistentibus laxis; strobilis subcylindricis obtusis; squamarum apophysi late rhombea nitidissima; carina transversa acutissima, umbone plano, tubculo minimo supra carinam percurrentem sito. *In Persia austr.* ♀.

74. *P. sinensis* Lamb. ed. 2. t. 29. fol. 2-3-nis tenuibus squarrosis 5-poll.; vaginis persistentibus; strobilis ovatis acutis; squamarum apophysi trigono-pyramidata; umbone rhomboe plano medio minutissime tuberculato. Loud. arb. f. 2167—2169. Antoin. con. t. 1. f. 1. *In China.* ♀.

75. *P. longifolia* Roxb. fol. elongatis ultrapedalibus tenuissimis demum pendulis; vaginis laxis laceris; strobilis ovato-conicis; squamarum apophysi trigono-pyramidata crassa recurva; umbone brevi acuto; antherarum crista crenulata. Lamb. ed. 1. t. 21. ed. 2. t. 26, 27. Royle ill. t. 85. f. 1. Loud. arb. f. 2148—2152. Antoin. con. t. 9. *In Nepalia.* ♀.

76. *P. Gerardiana* Wall. fol. brevibus glauco-virentibus; vaginis laxis deciduis; strobilis ovato-oblongis; squamarum apophysi elongato-pyramidata convexo-plano recurva, umbone

continuo valido obtuso; antherarum crista fimbriato-lacera. Lamb. ed. 2. t. 79. Royle ill. t. 85. f. 2. Loud. arb. f. 2153—2155. *In Himalaya.* ♀.

77. *P. Sabiniana* Dougl. fol. 3—4-nis elongatis tenuibus 5—15-poll; vaginis laceris; strobilis ovatis 9—12-poll.; squamaris connatis apophysi ancipiiti; umbone valido elongato subulato uncinato recurvo acuto; seminibus alae longitudine. Lamb. ed. 2. t. 80. Loud. arb. f. 2138—2143. Antoin. t. 11. *In Am. bor.* ♀. Arbor 40—120-ped.

78. *P. Coulteri* Don; fol. elongatis tenuibus 4—15-unc.; vaginis laceris; strobilis oblongo-conicis 1-ped.; squamaris connatis, apophysi ancipiiti in umbonem longissimum 1—3-pedalem (?) subulatum validum uncinato-incurvum continuo; seminibus ala 4-plo brevioribus. Lamb. t. 83. Loud. arb. f. 2144—2147. Antoin. t. 12, 13. *In California.* ♀. Arbor magna 80—100-ped.

79. *P. muricata* Don; strobilis aggregatis inaequaliter ovatis 3-unc.; squamarum apophysi elongata ancipiiti compressa; umbone acuminato-lanceolato continuo. Lam. t. 84. Loud. arb. f. 2180. Antoin. t. 14. f. 1. *In California.* ♀. Arbor 40-ped.

80. *P. radiata* Don; strobilis aggregatis inaequilatero-ovatis 6-unc.; squamarum apophysi ancipiiti conica subdeflexa superne radiatim rimosae; umbone minimo excavato. Lamb. t. 68. Loud. arb. f. 2182. Antoin. con. t. 14. f. 3. *In California.* ♀. Arbor rectissima 100-ped.

81. *P. tuberculata* Don; strobilis aggregatis inaequilatero-oblongis; squamarum apophysi elevata-pyramidata quadrangula; umbone depresso. Lamb. t. 85. Loud. arb. t. 2181. Antoin. t. 14. f. 2. *In California.* ♀. Arbor 100-ped.

82. *P. californica* Loisl. fol. elongatis gracilibus; strobilis pedalibus oblongis obliquis; apophysi elevata-pyramidata tetragona, umbone brevi uncinato. *P. Sinclairii* Hook. et Arn. in Beech. voy. t. 93. *In California.* ♀.

83. *P. insignis* Dougl. fol. 3—4-nis elongatis rigidis; strobilis ovatis 3-unc.; squamarum apophysi elevata-pyramidata tetraquatra, umbone lato plano mucronulato demum mutico.

Loud. arb. f. 2132—2137. Antoin. t. 8. f. 1. *In California*. ♂.

84. *P. ponderosa* Dougl. fol. crassis elongatis subtortis; strobilis ovatis v. subclavatis; squamarum apophysi depresso-pyramidalata carina transversa acuta, umbone valido recurvo. Loud. arb. f. 2132—2137. Pinet. woburn. t. 15. Antoin. t. 8. f. 1. *In Am. bor.* ♂.

85. *P. serotina* Michx. arb. t. 7. fol. 3-nis elongatis tenuibus rigidis; strobilis solitarius geminis patentibus subrotundo-ovatis; squamarum apophysi depresso-4-gona, umbone uncinato; seminumala acinaciformi acuta. Lamb. pin. t. 19. ed. 2. t. 18. Loud. arb. f. 2127—2130. Pinet. woburn. t. 16. *In Am. bor.* ♂.

86. *P. rigida* Mill. fol. ternis abbreviatis rigidis; vaginis elongatis apice circinatis; strobilis longe cylindricis 6—8-unc.; squamarum apophysi elevato-pyramidalata, umbone conico inflexo. Lamb. t. 20. ed. 2. t. 24, 25. Pinet. woburn. t. 22. Loud. arb. f. 2155—2160. *In Virginia et Florida*. ♂.

87. *P. canariensis* Chr. Sm. fol. ternis longissimis tenuibus; vaginis apice laceris; conis longe cylindricis ovatisve; squamarum apophysi compresso-pyramidalata, umbone uncinato; semina, ala dolabritiforme. Lamb. pin. t. 18, 19. ed. 2. t. 16, 17. Loud. f. 2123—2126. Pin. woburn. t. 13. Antoin. con. t. 7. f. 2. *P. Fraseri* Lodd. *In Am. bor.* ♂.

88. *P. Taeda* L. fol. ternis elongatis tenuibus; vaginis longis; strobilis geminis patentibus ovato-oblongis; squamarum apophysi compresso-pyramidalata recta, umbone uncinato; seminumala utrinque aequali. Lamb. t. 16, 17. ed. 2. t. 15. Loud. arb. f. 2118—2122. Pin. woburn. t. 14. Ant. pin. t. 7. f. 1. *In Florida et Virginia*. ♂.

89. *P. australis* Michx. arb. t. 6. fol. ternis longissimis tenuibus (pedalis); vaginis elongatis apice circinatis; strobilis longis cylindricis; squamarum apophysi elevato-pyramidalata, umbone conico inflexo. Lamb. t. 20. ed. 2. t. 24, 25. Pinet. woburn. t. 22. Loud. arb. f. 2156—2160. *In Virginia et Florida*. ♂.

90. *P. canariensis* Ch. Sm. fol. ternis longissimis tenuibus; vaginis apice laceris; conis longe cylindricis

ovatisve; squamarum apophysi pyramidata tetrandra; umbone lato complanato. DC. h. gen. t. 1, 2. Lamb. ed. 2. t. 28. Loud. arb. f. 2162—2166. Pin. woburn. t. 21. Antoin. con. t. 15. *In Teneriffa*. ♂.

91. *P. Bungeana* Zucc. fol. ternis rigidis fasciculis ad innovationes verticillatim approximatim; amentis staminigeris intra gemmam terminalem conicam squamosam; squamis membranaceo-scariosis spadiceis acutis. *In China boreali*. ♂.

k. *Pinaster* Endl. Squamarum apophysis pyramidata, umbone centrali. Semina alata. Folia gemina rarissime tereta.

92. *P. pungens* Michx. arb. t. 5. fol. geminis brevibus; strobilis ovato-conicus; squamarum apophysi compresso-pyramidalata recta patente v. ad basin strobili recurva; umbone conico acuto uncinato. Lamb. Pin. ed. 2. t. 17. Loud. arb. f. 2077—2080. Pinet. woburn. t. 5. Antoin. con. t. 5. f. 4. *In Carolina*. ♂.

93. *P. inops* Soland. fol. geminis brevibus rigidis; strobilis oblongo-conicus recurvis; apophysi elevato-pyramidalata tetraquetra; umbone subulato recto. Lamb. t. 3. ed. 2. t. 12. Loud. arb. f. 2068—2071. *In Am. bor.* ♂.

94. *P. mitis* Michx. fol. geminis praelongis tenuibus; strobilis parvis saepe solitariis conoideo-ovatis; apophysi depresso-pyramidalata; umbone mucronato. Loud. arb. f. 2072—2076. Antoin. con. t. 5. f. 1. *In Am. bor.* ♂.

95. *P. variabilis* Lamb. pin. t. 15. ed. 2. t. 14. fol. geminis v. ternis; strobilis ovato-conicus subsolitariis; apophysi pyramidalata; umbone conico incurvo. Pin. woburn. t. 11. Antoin. con. t. 5. f. 2. *In Am. bor.* ♂.

96. *P. contorta* Dougl. fol. geminis; strobilis ovatis parvis; squamarum apophysi depressa pyramidato-4-gona; umbone mucronato. Loud. enc. of trees f. 1814, 1815. *In Am. bor.* ♂.

97. *P. Pinaster* Soland. fol. geminis elongatis; strobilis verticillatis confertis ovatis sessilibus; squamarum apophysi elevato-pyramidalata; umbone acuto. Duh. arb. t. 29. Lamb. t. 4, 5. ed. 2. t. 9. Loud. arb. f. 2100,

2101. Antoin. t. 6. f. 1. *In Europa.* ♀.

98. *P. pumilio* Haenke; trunco humifuso a basi ramosissimo torto; fol. geminis abbreviatis rigidis; strobilis parvis ovatis obtusis geminis v. ternis, junioribus subsessilibus erectis demum horizontalibus; squamarum apophysi planiuscula rhombea v. elevato-pyramidata subincurva; umbone plano excentrica mucronulata. Waldst. Kit. hung. t. 148. P. Mughos Scop. *In alpibus Europae.* ♀.

99. *P. uncinata* Ram. trunco stricto v. a basi adscendente verticillatim ramosissimo; fol. geminis abbreviatis rigidis; strobilis parvis ovatis sessilibus primum erectis demum horizontalibus v. deflexis; squamarum apophysi elongata inaequilatera pyramidata deflexa; umbone lato plano mutico v. mucronato. Ant. con. t. 3. f. 3. P. Mugho Poir. woburn. t. 2. Loud. arb. f. 2059, 2060. P. Mughus et uliginosa Koch. P. rotundata Lk. P. Pumilio Lamb. t. 2. ed. 2. t. 2. Pinet. woburn. t. 1. P. uliginosa Wimm. *In Europa.* ♀.

100. *P. sylvestris* L. trunco erecto stricto fol. geminis abbreviatis rigidis glaucescentibus; strobilis in pedunculo uncinato nutantibus parvis ovatis; squamarum apophysi pyramidata recta opaca rugosa, umbone truncato lato mutico. Lamb. t. 1. ed. 2. t. 1. Rich. con. t. 11. Loud. arb. f. 2043, 2044. Antoin. con. t. 4. f. 3. *In Europa.* ♀.

101. *P. densiflora* Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 112. fol. geminis tenuibus strictis subglaucescentibus; strobilis in pedunculo uncinato nutantibus parvis conicis; squamarum apophysi pyramidato-rhombea laevi; umbone argute cuspidato deciduo. *In Japonia.* ♀. Arbor 40-ped.

102. *P. Massoniana* Lamb. Pin. t. 12. ed. 2. t. 8. fol. geminis elongatis rigidis strictis glaucescentibus; strobilis in pedunculo patente deflexis parvis ovato-conicis; squamarum apophysi depressa pyramidata laevi umb. margini approximatorrhombico minutissime tuberculata. Sieb. et Zucc. jap. t. 113, 114. *In China et Japonia.* ♀. Arbor magna coma latissima.

103. *P. Merkusii* Jungh. et de Vriese in pl. nov. Jnd. Batav. t. 2. fol. geminis longissimis flexuosis; strobilis ovatis erecto-patentibus; squama-

rum apophysi elevato-pyramidata radiatim striata nitida demum recurva; umbone depresso. *In Sumatra.* ♀. Arbor gigantea 100-ped.

104. *P. Banksiana* Lamb. t. 3. fol. geminis abbreviatis rigidis divaricato-patentibus; strobilis erectis cylindricis acutis incurvis; squamarum apophysi nitida convexa carina transversa elevata, latere superiore convexiore; umbone rhombeo, deflexo. P. rupestris Michx. arb. t. 2. *In Am. bor. trop.* ♀. Arbor 40-ped.

105. *P. resinosa* Soland. fol. geminis elongatis tenuibus rigidulis patentiusculis; strobilis ovato-conicis demum nutantibus; squamarum apophysi nitida rhombeo-pyramidata recta carina transversa elevatiore recta; umbone elevato obtusissimo. Lamb. t. 14. ed. 2. t. 13. Pinet. woburn. t. 6. Loud. arb. f. 2094—2097. Antoin. con. t. 4. f. 1. P. rubra Michx. arb. t. 1. *In Am. bor.* ♀.

106. *P. Laricio* Poir. fol. geminis longis erectis v. patentibus; strobilis solitarii geminis v. pluribus sessilibus ovoideo-conicis rectis v. incurvis; squamarum apophysi nitida convexa carina transversa elevata latere superiore convexiore; umbone rhombeo mutico v. carina productiore subspinoso recurvo. Duh. t. 67 et t. 71. f. 2. Lamb. t. 9. ed. 2. t. 4. P. nigricans Host. P. austriaca Host. P. Pinaster Bess. Roch. bar. t. 38. f. 1. P. halepensis Bieb. P. Pallasiana Lamb. t. 1. ed. 2. t. 5. *In Europa austr. et Tauria.* ♀.

107. *P. pyrenaica* Lapeyr. fol. geminis v. rarius 3-nis rigidis strictis ad apices ramorum penicillatim confertis; strobilis pedunculatis conicis patentibus; squamarum apophysi conica nitida carina transversa acuta, latere superiore convexiore nitido, inferiore longitudinaliter sulcato. Loud. arb. f. 2090—2093. Antoin. con. t. 1. f. 4. P. penicilllus Lap. *In Hispania.* ♀.

108. *P. halepensis* Mill. dict. t. 216. fol. geminis strictis tenuibus glaucescentibus strobilum aequantibus; strobilo pedunculato reflexo ovato-oblongo; squamarum apophysi planiuscula transversim argute carinata laevi; umbone elevato; seminum ala nucleus superante. Lamb. t. 11. ed. 2. t. 7. excl. fig. 5. P. genuensis Cook. *In Hispania et Syria.* ♀.

109. *P. maritima* Lamb. t. 10. ed. 2. t. 6. fol. geminis strictis elongatis tenuibus strobilum duplo superantibus; strobilo pedunculato reflexo ovato; squamarum apophysi depressiuscula ecarinata nitida versus umphonem planum radiatim striata; seminum ala nucleus ter superante. *In Graecia.* ♀.

110. *P. Brullii* Ten. fol. geminis longissimis tenuibus strobilo multo longioribus; strobilis glomeratis subnubantibus ovatis; squamarum umbone convexiusculo, carina transverse arguta latere inferiore longitudinaliter rugoso, umbone angustissimo. Loud. arb. f. 2114—2116. Pin. woburn. t. 9. *In Calabria.* ♀.

1. *Pinea* Endl. Squamarum apophysis pyramidata umbone centrali. Semina aptera. Folia gemina aut rarissima terna.

111. *P. Pinea* L. ramis fastigiatis; fol. geminis strictis elongatis strobilum aequantibus; strobilo pedunculato reflexo ovato-rotundato, apophysi late depresso-pyramidata nitida; umbone lato plano; seminum ala rudimentaria. Lamb. t. 6—8. ed. 2. t. 10—11. Loud. arb. f. 2106—2109. Antoin. t. 3. f. 2. Per regionem mediterraneam sata et hinc inde esera. ♀.

112. *P. cembroides* Zucc. fol. geminis saepiusque ternis abbreviatis plerumque incurvis; strobilis parvis subglobosis; squamarum ungue excavato; apophysi rhombea convexiuscula carina transversa acuta longitudinali parum elevata; umbone depresso; seminibus apteris. *P. Slaveana* Schied. et Depp. Loud. Enc. of trees f. 1858—1860. *In Mexico.* ♀.

113. *P. Fremontiana* Endl. fol. geminis saepissime conglutinatis abbreviatis rigidis pungentibus; strobilis ovatis; squamarum ungue lato excavato; apophysi pyramidata recurva; umbone truncato; seminibus apteris. *In California.* ♀.

ponia. ♀. Fol. alterna distiche patentia adnato-decurrentia longe linearis-falcata rigida margine serrulata subtus fascia albida.

5062. ANTHIROTAXIS Don. (1833.)

1. *A. selaginoides* Don. in Linn. trans. 18. t. 14. Hook. ic. t. 574. ramis crassis; fol. undique imbricatis laxiusculis erecto-incurvatis lanceolato-acuminatis dorso convexo carinatis facie canaliculatis; antherarum connectivo elliptico acuto. *In Tasmania.* ♀.

2. *A. cupressoides* Don; in Linn. trans. 18. t. 13. f. 2. fol. 4-fariam imbricatis late rhomboe-ovatis obtusis adpressis obtuse carinatis; antherarum connectivo elliptico obtuso. *Cunninghamia* Zucc. *In Tasmania.* ♀.

3. *A. taxifolia* Hook. ic. t. 573. ramis tenellis; fol. 4-fariam imbricatis laxis erecto-incurvatis ovato-lanceolatis acutis dorso convexo carinatis facie concavis. *In Tasmania.* ♀.

5063. SEQUOJA Endl. (1847.)

1. *S. sempervirens* Endl. fol. linearibus $\frac{1}{2}$ —1-pollicaribns obtusiusculis subtus albidis. *Taxodium* Lamb. pin. t. 64. *In Am. bor.* ♀.

2. *S. gigantea* Endl. fol. linearibus $1\frac{1}{2}$ —2-pollicaribus acutis subtus glauco-pulverulentis. *Abies religiosa* Hook. *Taxodium sempervirens* Hook. ic. t. 379. *In California.* ♀.

5064. GNETUM L. (1738).

1. *G. Gnemon* L. fol. elliptico-oblongis utrinque angustatis; amentis monoicis solitariis v. subumbellatis; drupis sessilibus ellipsoideis acutiusculis. Rumph. 1. t. 71, 72, 73. Duperrey voy. t. 1. *In Java et Moluccis.* ♀.

2. *G. latifolium* Blume; fol. ovalibus acutis v. obtusis basi rotundatis; amentis dioecis subracemosis; drupis breviter pedicellatis ellipsoideis obtusis. *In Java.* ♀.

3. *G. edule* Blume; fol. oblongo-ellipticis subcuspidatis basi rotundatis v. acutiusculis; amentis dioecis solitariis aut fasciculato-éconfertis; drupis

5061. CUNNINGHAMIA R. Br. (1830).

1. *C. sinensis* R. Br. B. M. t. 2743. Sieb. et Zucc. jap. t. 103 et 104. Plukn. t. 341. f. 1. *Pinus lanceolata* Lamb. pin. t. 34. *In China et Ja-*

breviter pedicellatis ellipsoideis obtusis. Thoa Willd. G. gnemonoides Brongn. Rheede mal. 7. t. 22. Rumph. 5. t. 7. In Malabarica et Java. ♂.

4. *G. funiculare* Blume; fol. oblongis utrinque subattenuatis; amentis dioecis subracemosis; drupis pedicellatis ellipsoideis acutis. Rumph. 5. t. 8. In Java, Moluccis et Cochinchina. ♂.

5. *G. urens* Blume; caule subscandente; fol. ovato-oblongis acutis integerrimis; ramis florentibus dichotomis; floribus staminigeris amentaceis; verticillis approximatis gemmiferis solitariis sessilibus; seminum integumento fragili sicco, pilis pruriens mixto. Aubl. guj. t. 336. Lam. ill. t. 484. In Guiana. ♂.

6. *G. nodiflorum* Brongn. fol. ovato-oblongis acutis integerrimis; amentis staminigeris 4-5-pollicaribus; verticillis globosis pollice distantibus. In Guiana. ♂.

7. *G. Brunnonianum* Griffith in Lindl. veg. Kingdom f. 164. In Ind. or. ♂.

nis fere ad basin bifidis, intima nuculos aequante. In Quito. ♂.

b. Amenta gemmulifera biflora v. uniflora e vaginis 2-4 composita drupacea. Microptyles tubulus apice oblique abscissus, limbo ligulato.

4. *E. andina* Poepp. ramis rectis ramulisque tuberculatis; amentis staminigeris ad ramorum articulos in apice pedunculi continui congestis; antheris subsemis sessilibus gemmuliferis; vaginis bifidis margine albido cinctis, intimae nuculas ovato-oblongas aequantis tubo inclusa; microptyles tubulo brevi recto. E. peruviana Bert. E. americana Bert. E. bracteata Miers. In Chili. ♂.

5. *E. stenosperma* Schrenk et C. A. Mey. Ephedr. t. 3. f. 5. ramulis tuberculatis: amenti gemmuliferi vaginis bifidis scarioso-marginatis, intimae semibifidae nuculas lineares aequantis tubo inclusa; microptyles tubulo brevi recto limbum ligulatum superante. In desertis Songoriae. ♂.

6. *E. vulgaris* Rich. con. t. 4. ramis rectis tuberculatis; amentis ad ramorum articulos subsessilibus v. pedunculatis; pedunculo continuo sive articulato recto; antheris suboctonis mediis stipitatis; amenti gemmuliferi subglobosi vaginis tribus immarginatis bifidis; microptyles limbo ligulato. v. a. *E. subtristachya* Mey. amenta ad apicem pedunculorum saepe terna. *E. distachya* L. — b. *media* Mey. amenta saepius solitaria in pedunculo plerumque inarticulato. *E. monostachya* Bieb. — *E. submonostachya* Mey. c. amenta saepius solitaria. *E. minima* Amm. ruth. t. 26. *Gmel. sib.* t. 37. f. a. *E. distachya* Schk. t. 339. *E. polygonoides* Pall. ross. t. 83. In Europa et Asia. ♂.

7. *E. botryoides* Fisch. et C. A. Mey. Ephedr. t. 8. f. 12. ramis patentissimis v. deflexis tuberculato-scabris; vaginis tubulosis bidentatis; amentis staminigeris in pedunculo laterali articulato recurvato racemosis oblongis; antheris sub-4-nis sessilibus. *Patria ignota*. ♂.

8. *E. heterotica* C. A. Mey. Eph. t. 8. f. 10. fruticosa; ramis rectis amentis ad ramorum articulos pedunculatis; pedunculo plerumque continuo;

5065. EPHEDRA Tournef. (1700).

a. Amenta gemmulifera biflora e vaginis 5-6 composita, fructifera sicca.

1. *E. Tweediana* C. A. Mey. Ephedr. t. 7. f. 9. dioeca; ramis laxis flexuosis subtuberculatis, amentis ad ramorum articulos sessilibus aggregatis; antheris subquinis mediis substitutatis; vaginis subsenis profunde bifidis intima nuculis breviore; microptyles tubulo brevi recto limbo discoideo. In Buenos-Ayres. ♂. Frutex subscandens.

2. *E. americana* Willd. monoica; ramis strictis scabris; amentis ad ramorum articulos breve pedunculatis; antheris subquinis sessilibus gemmiferis ovalis bifloris; vaginis subquinis marginatis bifidis, intima nuculas aequante; microptyles tubulo brevi recto limbo discoideo. Rich. con. t. 29. In Quito. ♂. Frutex ramosissimus.

3. *E. rupestris* Benth. dioica procumbens; ramis flexuosis; amentis gemmiferis bifloris; vaginis subqui-

antheris sub-8-nis mediis stipitatis; amenti subglobosi vaginis 3 emarginatis bifidis, intimae nuculas obovatas aequantis tubo inclusa; micropyles tubo elongato torto limbum ligulatum duplo superante. *E. distachya* Gaud. In *Helvetia*. ♂.

9. *E. intermedia* C. A. Mey. suffrutescens; ramis erectis tuberculatis; amentis ad ramorum articulos pendiculatis, pedunculo brevi continuo; amenti vaginis 3 submarginatis, intimae nuculas subovatas superantibus profunde bifidæ tubo inclusa; micropyles tubo elongato torto, limbum ligulatum multoties superante. In *cotibus Songariae*. ♂.

10. *E. alata* Decaisn. frutescens; ramis tenuissime pubescentibus, amentis staminigeris sessilibus v. ad ramulorum apicem glomeratis; antheris subquaternis; amentis ovoideis; vaginis subbipartitis membranaceo-marginatis nuculas ovato-acuminatas acute 3-gonas aequantibus. *E. altissima* Bove. In *Aegypto*. ♂.

11. *E. tomatolepis* Schrenk; frutescens; ramis rectis tuberculatis; floribus dioecis; amentis in apice pendiculi aggregatis sessilibus subglossosis; vaginis 4 subbipartitis late membranaceo-marginatis nuculas ovatas obtusiusculas aequantibus; micropyles tubulo longe exerto flexuoso limbum ligulatum multoties excedente. C. A. Mey. Eph. t. 6. f. 8. In *Songaria*. ♂.

12. *E. campylopoda* C. A. Mey. scandens; amentis ad articulos sessilibus aggregatis, floribus 2 abortientibus terminatis; antheris subsexis sessilibus; amentis historis pedunculo internodis intercepto fultis reflexis; vaginis glabris, intima abbreviata cupulaeformi, intima apice biloba nuculas ovatas aequante. *E. fragilis* Sieb. *E. altissima* Thomass. *E. distachya* d'Urvill. In *ins. Creta*. ♂.

13. *E. Alte* C. A. Mey. Eph. t. 3. f. 4. arborescens; ramulis hispidulis strictis; pedunculis ad ramorum articulos verticillatis continua v. Internodio interceptis; amentis in apice pendiculi aggregatis; antheris 4-nis sessilibus; vaginis submarginatis ci-

liatis intima cupulaeformi obsoleta biloba, intima apice semibifida nuculas ovatas aequante. *C. foliata* Boiss. In *Arabia*. ♂.

14. *E. fragilis* Desf. fruticosa procumbens; ramis erectis; amentis gemmuliferis 1-floris; antheris 4—5; vaginis breviter bilobis intimae tubo longo exerto; micropyles limbo elongato. *E. distachya* Brot. *E. vulgaris* Rich. conif. t. 4. f. 2. *E. major* Hort. In *Europa austr.* ♂.

15. *E. altissima* Desf. atl. t. 253. scandens; amentis staminigeris in ramulo articulato paniculato-ramosus 1-floris; antheris 2—3, gemmuliferis pendiculatis nutantibus; vaginis inferioribus truncatis, intimae tubo exerto. Rich. conif. t. 4. Mey. Eph. t. 1. In *regione mediterranea*. ♂.

16. *E. procera* C. A. Mey. Eph. t. 4. f. 6. ramis rectis impresso-punctatis; amentis ad ramorum articulos, staminigeris sessilibus antheris sub 8-nis subsessilibus gemmuliferis pendiculo brevi continuo fultis; involuci vaginis bifidis submarginatis, intima inclusa nucula oblonga breviori v. aequali. In *Caucaso, Armenia et Persia*. ♂.

17. *E. monosperma* C. A. Mey. Eph. t. 8. f. 11. ramis rectis impresso-tuberculatis; amentis ad ramorum articulos staminigeris sessilibus; antheris sub 6-nis; gemmuliferis 1-floris pedicello brevi continuo fultis defloratis secundis; vaginis immarginatis bifidis, intima tubo inclusa nuculam subovatam subdupo excedente. In *Sibiria et Mongolia*. ♂.

18. *E. ciliata* C. A. Mey. ramis ramulisque distortis scandentibus angulatis impresso-punctatis, floriferis recurvatis arcuatis; vaginis foliis filiformibus terminatis; amentis gemmuliferis ad ramulorum apicem aggregatis subsessilibus; vaginis ciliatis; antheris subternis sessilibus. In *Gilan*. ♂.

19. *E. antisphyilitica* Berland. pl. exsicc. no. 1590. In *Mexico*. ♂.

20. *E. aphylla* Forsk. Ad *Rosettam*. ♂.

21. *E. Gerardiana* Wall. cat. n. 6048. In *Himalaya*. ♂.

C L A S S I S X X I I .

DIOECIA.

MONANDRIA.

5066. Pandanus. Masc. Spadix compositus undique tectus; masc. filaments monantheris anthera biloculari; fem. germinibus stigmatibusque adnatis. Drupae fibrosae saepe in phalanges connatae parietales manospermae. *Pandaneae.*

5067. Freycinetia. Masc. Spadix simplex undique staminibus tectus typhoideus. Antherae biloculares longitudinaliter dehiscentes. Fem. Spadix simplex. Ovaria 1-locularia; ovula crebelliformia. Fructus baccati molles polyspermia. *Pandaneae.*

5068. Commia. Masc. Amentum squamis imbricatis 1-floris. Filamentum breve. Antherae pluriloculares. Fem. Racemus. Calyx 3-partitus brevis persistens. Styli 3 reflexi. Stigmata crassiuscula. Caps. 3-loba 3-locularis, 3-sperma. *Rutaceae?*

5069. Stephania. Masc. Cal. 6-sepalus; sepala alterna minora. Cor. 3-petala. Anthera annularis coronans apicem filamenti. Fem. Cal. 6-sepalus. Cor. nulla. Stigma filiforme. Bacca supera 1-sperma. *Menispermeae.*

5070. Brosimum. Masc. Amentum globosum squamis peltatis undique tectum. Cal. et cor. nulla. Anthera orbicularis peltata bilamellata, polline globose. Fem. Styli capillares basi cohaerentes. Bacca globosa 1-sperma, nucleo bilobo.

DIANDRIA.

5071. Salix. Flores amen-
tacei. Squamae ut plurimum diandrae.
Masc. Antherae erecta bilocularis.
Fem. Stylus simplex v. nullus. Stigma-
ta 2 simplicia v. divisa. Glandula
nectarifera basilaris. Caps. bivalvis.
Semina basi pilosa. *Salicineae.*

5072. Ceeropia. Flores
dense spicato-fasciculati. Masc. Cal.
turbinatus angulatus, apice foraminibus
2 pervius. Stam. exserta, antheris
4-gonis. Fem. Cal. campanulatus
bidentatus. Stigma capitatum. Ache-
num calyce tectum. *Urticeae.*

5073. Didymela. Masc.
spica composita. Squamulae 2. An-
therae sessiles basi junctae. Fem.
Racemus simplex. Perianthium nul-
lum. Stigmata gemina. Drupae ge-
minae 1-sperma.

5074. Clarisia. Masc. Amentum
filiforme spiratim sulcatum. Squa-
mae diandrae. Fem. Squamae 5-6
peltatae. Styli 2. Drupa 1-sperma.
Amentaceae.

5075. Borya. Masc. Cal. 4-
sepalus. Stam. 2-3. Fem. Cal. 4-
sepalus inaequalis. Stigma capitatum.
Bacca 1-sperma.

5076. Triadica. Flores amen-
tacei. Masc. Amenta filiformia dis-
tincta tuberculis multifloris. Perigo-
nium minimum campanulatum trifidum.
Fem. Stylus brevis crassus, stigmati-

bus 3. Bacca triloba 3-locularis 1-sperma.

5077. Ceratiola. Flores geminalis imbricati. Squamae appressae. Cal. et cor. nulla. Antherae biloculares. Stigma multipartitum radiatum. Bacca nuculis 2, 1-spermis. *Empetreae.*

5078. Falconeria. Flores axillares amentiformes dispositi. Cal. 2-partitus. Cor. nulla. Antherae bilobae, lobis reflexis. Germen biloculare. Stigmata brevissima. *Antidesmeae.*

TRIANDRIA.

1. *Fructus capsularis de-*
hiscens. Restiaceae.

a. *Antherae didymae bifidae.*

5079. Anthochortus. Perigonium infundibuliforme 6-partitum. Culmi filiformes tortuosi.

5080. Ananthria. Perigonium 6-phylum aequale. Stamina 3 libera. Culmi compressi simplices. Flores spicati.

5081. Lynginia. Perigonium 6-phylum aequale. Stam. 3, filamenta in tubum connata. Culmi simplices vaginati.

b. *Antherae simplices 1-lo-*
cales.

5082. Dovea. Perigonium 6-phylum bibracteatum. Stigmata 3—2 sessilia revoluta intus villosa. Caps. 3-locularis.

5083. Lepyrodia. Perigonium 6-phylum persistens. Styli 3 brevissimi distincti, stigmata elongata plumosa. Caps. 3-locularis.

5084. Rhodocoma. Perigonium subcartilagineum 6-phylum. Stylus 3-partitus hirtus retortus. Germen superne pilis roseis comatum. Caps. 3-locularis.

5085. Loxocarya. Fem. Flores solitarii bibracteati. Perigonium 4-sepalum muticum. Stam. rudimento nulla. Caps. 1-locularis.

5086. Restio. Flores spicati imbricati, singuli compressi et bracteola muniti. Sepala 6. Caps. 1-locularis.

2. *Fructus follicularis v.*
utricularis 1-spermus inde-
hiscens.

5087. Schoenodium. Sepala 6 per paria opposita. Germen 1-loculare in stylum attenuatum ovulo pendulo. Stigmata 3 elongata. Flores spicati.

5088. Staberoha. Sepala 6, 2 exteriorum lateralium carina alata. Germen 1—2-loculare. Styli 2—3 distincti. Stigmata elongata subplumosa.

5089. Calopsis. Sepala 6, exteriora aptera. Germen 1-loculare 3-gonum. Stigmata 3 subsessilia distincta plumosa. Spicae compositae.

3. *Fructus nucamentaceus du-*
rus indehiscens.

a. *Germen 1-loculare.*

5090. Thamnochortus. Sepala 6. Stylus 1 persistens stigmate indiviso longo villosa. Nux calyce arcte tecta stylo rostrata lenticulari-compressa.

5091. Leptocarpus. Sepala 6. Stylus 1. Stigmata 2—3. Nux crustacea stylis basi rostrata. Flores fasciculato-spicati.

5092. Elegia. Sepala 6, lateralia saepe naviculari-carinata. Styli brevissimi distincti interdum subnulli stigmatibus plumosis. Flores fasciculato-spicati.

5093. Chaetanthus. Sepala 6, nana interiora 3 minutissima setacea. Stylus 1, stigmate indiviso. Nux calyce parum aucto cincta.

b. *Germen biloculare.*

5094. Wildenowia. Sepala 6 subhyalina in mare 4—5 anguste linearia. Stigmata 2 sessilia. Nux subossea 1-sperma. Culmi ramosi.

† *Styli 2—3 distincti v. styli*
bipartiti v. semibifidi.

5095. Cannomois. Sepala 6 hyalina. Flores fem. spicati imbricati 2—3, unicus maturescens. Styli elongati intus toti v. superne tantum villosi.

5096. Ceratocaryon. Flores fem. in apice spiculae magnae squamis submembranaceis undique imbricatae solitarii. Sepala 6 persistentia interiora minora.

5097. Mesanthus. Flores fem. in media spica squamis coriaceis trifariam imbricalis pauci fertiles. Spicae rachis flexuosa articulata. Cal. 6-fidus v. 6-partitus, laciniis tenuissimis.

5098. Cucullifera. Flores fem. unicus in axilla squamae penultimae spicae compressae subdistichae subtrifariam imbricatae. Sepala 6 truncata.

5099. Hypolaena. Cal. 6-sepalus glaucescens aequalis basi nudus. Stam. 3, antherae peltatae. Stylus 2-3-partitus deciduus.

5100. Hypodiscus. Spiculae masc. et fem. conformes arte imbricatae. Cal. subchartaceus 6-partitus, lobis lanceolatis. Discus hypogynus latus planus.

5101. Leucoplooeus. Spiculae masc. et fem. dissimiles squamis chartaceis, paniculatae. Sepala 6 membranacea v. chartacea lanceolata. Discus hypogynus sessilis v. pateriformis extus rugosus v. laevis apice plicatus.

5102. Boeckhia. Sepala 6 biseriata squamaeformia. Stylus brevis deciduus, stigmata 2 elongata introrsum plumoso-villosa. Discus hypogynus nullus.

5103. Anthobolus. Cal. 3-sepalus deciduus. Stamina basi sepalorum inserta. Stigma sessile 3-lobum. Drupa 1-sperma. Santalaceae?

5104. Vallisneria. Masc. Scapus radicalis spadice brevi terminatus. Flores dense congesti spatha denique trifida involucrati. Cal. 3-partitus. Fem. Flores solitarii in scapo filiformi spiraliter torto longissimo. Spatha tubulosa bifida. Corollae loco squamae 3. Ovarium multiovulatum. Hydrocharideae.

5105. Empetrum. Flores saepe polygami. Involucrum 5-6-partitum. Cal. 3-partitus. Pet. 3 obovata. Antherae didymae. Fem. involucrum 3-4-partitum. Cal. 3-partitus. Pet. 3. Stigmata radiata sim-

briato-lacera. Bacca 3-6-sperma. Empetreae.

5106. Conceveibum. Masc. Cal. 3-partitus. Stam. in columnam connata. Antherae dorso adnatae bilocularis. Fem. Cal. 5-fidus. Styli 3. Stigmata crassiuscula plumosa. Fructus tricoccus.

5107. Tricerastes. Masc. Cal. oblongo-3-gonus 3-dentatus. Filamenta brevissima; antherae extrorsae lineares 2-loculares longitudinaliter dehiscentes. Fem. Germen 1-loculare, parietalibus 3. Styli 3 calycis dentibus oppositi bipartiti lobis filiformi-setaceis. Caps. 1-locularis 3-valvis. Datisceae.

5108. Putranjiva. Masc. Flores capitati. Cal. 4-5-sepalus. inaequalis. Stam. filiformia exserta 2 connata, antherae extrorsae magnae. Fem. Flores axillares solitarii. Cal. 5-sepalus, sepalis incisis. Stigmata filiformina. Putranjiveae.

TETRANDRIA.

5109. Drypetes. Masc. Cal. 4-6-partitus inaequalis. Stam. sub disco centrali sinuato inserta. Fem. Cal. 4-partitus. Styl. 1-2 laterales. Stigma capitatum. Fructus drupaceus 1-spermus.

5110. Olmedia. Flores congesti capitati. Masc. Cal. 2-4-partitus. Stam. elastica. Fem. Cal. bracteis suffultus lagenaeformis. Stigma longissima filiformia. Achenium calyce carnosum tectum. Urticeae.

5111. Broussonetia. Masc. Spicae cylindricae. Cal. 4-partitus. Fem. Spadix compositus clavatus. Cal. urceolatus 4-5-dentatus. Stigma simplex in stylo elongato. Achenia pedicellata calyce piloso inclusa. Urticeae.

5112. Trophis. Masc. Cal. 4-sepalus. Filamenta capillaria. Fem. Cal. minimus. Stylus filiformis bipartitus. Bacca rugosa 1-sperma. Urticeae.

5113. Batis. Masc. Amentum pyramidatum, squamis 1-floris. Antherae sagittatae. Fem. Amentum carnosum involucro diphyllo. Germina 4-gona. Bacca 4-sperma.

5114. Hippophae. Masc. Cal. diphyllo. Antherae angulatae in fundo calycis. Fem. Cal. tubulosus

apice bidentatus germini adnatus. Bacca 1-sperma.

PENTANDRIA.

5115. Pistacia. Masc. Racemi amentacei. Cal. 5-fidus. Antherae 5. Fem. Cal. 3-4-fidus. Drupa sub-1-sperma. Cotyledones crassae carnosoleosae. *Terebinthaceae*.

5116. Savia. Masc. Cal. 5-partitus. Pet. 3-5 circa discum glandulosum inserta. Fem. Cal. 5-partitus. Fructus tricoccus. *Euphorbiaceae*.

5117. Leptonema. Masc. Cal. 5-partitus. Filamenta capillaria elongata. Antherae biloculares. Fem. Cal. 5-fidus. Styli 3-5 ad basin bipartiti filiformes revoluti. Fructus 5-coccus. *Euphorbiaceae*.

5118. Amarora. Masc. Cal. 5-partitus. Discus glandulosus 5-lobus. Antherae grandes filamentis dilatatis brevissimis adnatae. *Euphorbiaceae*.

5119. Spinacia. Masc. cal. 4 sepalus. Antherae subdidymae. Fem. Cal. ventricosus bidentatus. Stigmata 4 filiformia. Achenium calyce turgido tectum inerme v. aculeolatum. *Chenopodiaceae*.

5120. Acnida. Cal. 5-sepalus lus. Filamenta brevissima antherae versatiles. Fem. Cal. tripartitus persistens. Achenium interdum 5-gonum. *Chenopodiaceae*.

5121. Cannabis. Masc. Flores paniculati. Cal. 5-sepalus. Antherae 4-sulcae biloculares. Fem. Flores aggregati. Squama eava germinem ambiens. Styli 2 apice incrassati. Caryopsis. *Urticeae*.

5122. Humulus. Masc. Flores paniculati. Cal. 5-partitus. Fem. Flores in amento ovato strobiliformi. Squamae 5-nae 1-florae. Styli filiformes pubescentes. Achenium subrotundum. *Urticeae*.

HEXANDRIA.

5123. Hyophorbe. Masc. Cal. trigono-campanulatus 3-lobus. Cor. 3-fida. Filamenta basi subcohaerentia. Fem. Cal. et Cor. ut in mare. Staminum rudimentum cupulare 6-fidum. *Palmae*.

5124. Orania. Cal. 3-sepalus. Cor. tripetala. Stam. plurima filamenta filiformia. Fem. Cal. 3-sepalus. Cor. urceolata trifida. Stigmata 2 sessilia acuta. Bacca disperma.

5125. Zalacea. Spadix ramosus. Masc. Flores per paria dispositi intra bracteas spathaceo-connatas bracteolati, bracteolis barbatis. Filamenta basi connata. Fem. Cal. et cor. tripartita. Filamenta sterilia in culum connata. Bacca squamis retortis loricata. *Palmae*.

5126. Borassus. Masc. Amenta cylindrica. Flores biseriatis in foveas aggregati. Cal. trifidus. Cor. 3-partita. Antherae sagittatae. Cal. 3-sepalus. Cor. 6-9-petala. Filamenta sterilia 6-9 connata. Drupa 3-raro 2-4-pyrena. *Palmae*.

5127. Tamus. Masc. Cal. 6-partitus patulus. Filamenta subulata antherae oblongae. Fem. Cal. corollinus 6-partitus, laciiniis basi glandula oblonga notatis. Stigmata bifida. *Sarmentaceae*.

5128. Testudinaria. Masc. Flores racemosi. Cal. campanulatus 6-parlitus, laciiniis linearibus acutis. Fem. Flores solitarii. Cal. 6-partitus. Styli 3 coaliti. Sem. alata. *Sarmentaceae*.

5129. Braunia. Masc. Cal. 3-sepalus. Cor. 3-petala calyce major. Squamae nectarifera 5 stamina stipantes. Fem. Cal. 3-sepalus. Cor. 3-petala. Stigmata obtusa. Bacca 3-sperma. *Menispermeae*.

5130. Pselium. Masc. Flores racemosi. Cal. 6-sepalus. Cor. 6-petala, antherae didymae. Fem. Flores umbellati. Cal. 3-sepalus minimus. Stigma 4-fidum. Drupa 1-sperma. *Menispermeae*.

OCTANDRIA.

5131. Commiphora. Cal. 4-dentatus. Cor. 4-petala erecta. Stamina alterna majora. Fem. ignota.

5132. Diospyros. Cal. 4-partitus. Cor. urceolata 4-fida laciiniis revolutis. Antherae basi affixae subulatae. Stylos 4-fidus. Bacca globosa 8-locularis calyce persistente suffulta. *Myrsinaceae*.

5133. Lagetta. Cal. corollinus tubulosus limbo 4-fido. Squamuiae 8 setaceae in fundo calycis. Fi-

lamenta brevissima; antherae ovatae biloculares. Drupa sicca calyce cineta 1-pyrena.

5134. Shephardia. Cal. 4-fidus tubulosus exstis lepidotus. Stam. cum totidem glandulis alternantia. Stylus incurvus. *Eteagineae.*

5135. Populus. Flores amen-tacei. Bractea multifido-laciniata fimbriata. Cor. campanulata limbo in-tegerrimo. Antherae erectae bilocu-lares. Stigmata sessilia. Caps. 2—3-valvis; semina globosa.

ENNEANDRIA.

5136. Thalassia. Masc. Spatha 1-flora monophylla 2-fida laci-niis oblongis obtusis. Cal. 3-sepalus ob-tusus. Cor. nulla. Antherae con-niventes linear-i-lanceolatae. Flores fem. ignoti.

5137. Mercurialis. Flores masc. racemosi. Cal. 3-partitus pa-tens. Cor. nulla. Filamenta capil-laria. Antherae didymae globosae. Fem. Styli 2 reflexi. Coccii 2 bival-ves 1-spermi. *Euphorbiaceae.*

5138. Hydrocharis. Masc. Cal. trisepalus coloratus. Pet. 3 ob-ovata. Stigmata 3 filiformia. Anthe-rae subrotundae. Fem. Styli 6 bi-partiti cum totidem filamentis. Caps. 6-locularis polysperma. *Hydrocha-rideae.*

DECANDRIA.

5139. Carica. Cal. 4-dentatus minimus. Masc. Cor. infundibuliformis limbo 5-fido. Antherae alternae ses-siles oblongae biloculares. Fem. Cor. pre-funde 5-partita. Stigmata 5 ra-diata. Fructus grandis peponiformis.

5140. Kigellaria. Cal. 5-sepalus. Petala 5, unguibus glandu-lifera. Filamenta brevissima. Anthe-rae apice biporosae. Stigmata obtusa. Caps. baccata 1-locularis, valvis 4 de-hiscens. Semina angulata.

POLYANDRIA.

5141. Juniperus. Masc. Amentum subglobosum. Stam. 4—6-fariam imbricata, subglobosa, rima de-hiscentia. Fem. Squama lateralis se-paloidea, squama interior obtusa pe-taloidea. Stigmata 3. Semina testa-

ossea nucamentacea praedita in in-volucro ancto carnosu baccam spuriam exhibente abscondita.

5142. Widdringtonia. Masc. Amenta terminalia solitaria oblongo-cylindrica minuta. Stam. 4-fariam imbricata, longitudinaliter dehiscentia. Fem. Amenta lateralia. Squamae 4 aquales mucronatae primum paten-tissimae demum connatae. Strobilus subglobosus 4-valvis.

5143. Araucaria. Masc. Amen-ta terminalia solitaria cylindrica. Fi-lamenta horizontalia; antherae loculi 12—20, lineares elongatae cohaeren-tes. Fem. Amentum ovato-oblongum squamis lanceolatis acuminatis. Stro-bilus globosus e squamis incrassatis densissimis imbricatis.

5144. Dammara. Masc. Amenta axillaria cylindrica basi peltata. Stam. imbricata. Filamenta brevissima an-theiae 5—6 loculares longitudinaliter dehiscentes. Fem. Amenta terminalia solitaria v. gemina. Squamae pluri-mae imbricatae. Strobilus ovato-glo-bosus e squamis coriaceo-lignosis dense imbricatis demum ab axi solutis. Sem. ovata compressa.

5145. Sciadopitys. Amenta terminalia subglobosa capitato-aggre-gata. Stamina dense imbricata; fila-menta brevissima in squamam ovatam pro ducta. Fem. solitaria. Squamae pluri-mae semiorbicularis ovaria sub-quavis squama 7—8. Strobilus sub-globosus, squamis coriaceo-lignosis marginie reflexis. Sem. pendula.

5146. Podocarpus. Masc. Amenta crassa cylindrica v. filiformi-gracilia; antherae biloculares, locu-lis extrorsum dehiscentibus. Fem. Spica abbreviata 1—2-flora bracteis cum rachi carnosa coalitis apice solo liberis v. rachi carnosu-incrassata bracteata semini receptaculum suc-cosum praebentibus.

5147. Baerydium. Masc. Amenta terminalia solitaria minuta; antherae biloculares loculis extrorsum dehiscentibus. Fem. Flores solitarii v. rarissime in spicam terminalem col-lecti. Squama subcymbaeformis. Se-men erectum squamae haud accrescenti insidens.

5148. Phyllocladus. Masc. Amenta terminalia conferta cylindrica. Filamenta in processum lacerum pro-ducta. Fem. Amenta pauciflora ra-

cemoso-aggregata. Squamæ alternæ naviculares. Fructus in quovis amento unicus e bracteis in urceolum carnosum basi connatis semen basi cingentibus.

5149. Salisburia. Masc. Amenta axillaria filiformia. Filamenta in squamulam laceram producta; antherae biloculares, loculis e connectivo pendulis longitudinaliter dehiscentibus. Fem. Discus cupulaeformis e pedunculi apice incrassato gemmulae basin cingens. Semen basi cupula carnosa cinctum.

5150. Cephalotaxus. Masc. Amenta axillaria e geminis propriis decussatim perulatis composita. Stam. 4, 6 vel plura. Filamenta teretia; antherae triloculares. Fem. Amenta in stipe nudo 4-gono capitata. Squamæ plerumque 8 decussatae coriaceæ. Fructus in quovis capitulo 2 v. 3, urceolo adnato clauso crasse carnoso drupaceus.

5151. Torreya. Masc. Amenta axillaria solitaria. Filamenta linearia; antherae 4-loculares longitudinaliter dehiscentes. Fem. Flores axillares solitarii gemini v. terni perulis decussatis tecti. Fructus urceolo denum clauso crasso carnoso fibroso drupaceus. Semen erectam.

5152. Taxus. Masc. Amenta axillaria simplicia subglobosa. Filamenta brevissima, antherae loculis 8 connectivo peltato sublobato subtus adnatis. Fructus drupaceus disco carnoso v. membranaceo arido semen laxe involvente apice aperto. Semen nuciforme erectum integumento osco.

5153. Cyens. Masc. Amentum crassissimum squamis imbricatis acuminatis. Antherae innumerae ovales 1-loculares. Fem. Spadix elongatus campanulatus marginibus sinuato-dentatus. Drupa albuminosa. *Cycadeæ*.

5154. Zamea. Masc. Spadix squamis peltatis quas subtus antherae univalves obsident. Fem. Spadix squamis peltatis subtus bifloris. Nux monosperma albuminosa. *Cycadeæ*.

5155. Encephalartus. Squamæ antheriferae oblongo-cuneatae apice incrassato obtusæ v. acuminatae. Fem. in conos pedunculatos dense congestæ attenuato-stipitatae apice peltato-dilatatae.

5156. Datisca. Masc. Cal. 5-sepalus. Antheræ 5—10 oblongæ. Fem. Cal. bidentatus superus persistens. Styli 3 bipartiti. Caps. calyce stylisque coronata 3-gona 1-locularis evalvis. *Resedaceæ*.

5157. Claoxylon. Masc. Cal. 3—4-partitus. Stam. plurima, receptaculo semisphaerico inserta. Filamenta subulata. Antheræ biloculares antrosum dehiscentes. Fem. Cal. 3-fidus, lacinii acutis coloratis. Stigmata hirsuta. *Euphorbiaceæ*.

5158. Hisingera. Masc. Cal. 4-sepalus. Glandulae minutæ difformes. Fem. Cal. 6-sepalus. Styli 2 crassi; stigmata capitato-depressa ante bidentata. Bacca didyma 2-sperma. *Euphorbiaceæ*.

5159. Styloceras. Masc. Cal. et cor. nulla. Squama concava antheræ oblongas biloculares promitens. Fem. Cal. 3—4-partitus basi bracteis suffultus. Styli intus canaliculati obtusi flexuosi. Capsula drupacea bicornis, 4-sperma. *Euphorbiaceæ*.

5160. Hyamenanche. Masc. Cal. 4—5-sepalus. Antheræ oblongæ. Fem. Cal. polysepalus imbricatus. Styli 4 stigmatibus glandulosis fimbriatis reflexis. Fructus 8-sulcus 4-coccus. *Euphorbiaceæ*.

5161. Adriania. Masc. Cal. 5-dentatus, bracteis 2—5 suffultus. Antheræ apice appendiculatae. Fem. Cal. duplex 5-dentatus. Styli 3, bipartiti. *Euphorbiaceæ*.

5162. Acidoton. Masc. Cal. 5-sepalus, sepalis reflexis. Stam. receptaculo globoso inserta interiora longiora. Antheræ sagittatae. Fem. Cal. 6-sepalus. Stylus 3-fidus. Stigmata reflexa. Caps. 3-loba. *Euphorbiaceæ*.

5163. Trewia. Masc. Cal. 3-sepalus coloratus persistens. Stam. numerosa. Filamenta capillaria basi coalita, antheræ biloculares. Cal. 3—4-partitus. Stylus 3—4-partitus lacinii plumosis. Fructus 3—4-coccus. *Euphorbiaceæ*.

5164. Monimia. Masc. Receptaculum cernivens subglobosum dein patens 4-partitum staminibus numerosis obsitum. Antheræ 2-loculares latere dehiscentes. Fem. Receptaculum globosum apice hians germina 5—6. Fructus baccatus 5-pyrenus. *Urticaceæ*.

5165. Phytelephas. Spatha 1-phylla. Spadices simplices clavati floribus dense obsiti. Cal. urceolatus multidentatus. Stylus 5—6-fidus. Drupae aggregatae muricato-angulatae. *Pandaneae.*

5166. Cyrtosma. Cal. hemisphaericus. v. urceolatus 4—8-fidus. Stam. calyci inserta. Styli plures exserti subulati. Caryopses plurimae baccatae calyci carnoso immersae. *Urticeae.*

5167. Hedycania. Cal. planus 8—10-fidus. Antherae sessiles 4-sulcae apice barbatae. Germina subglobosa stigmatibus papillosum terminata.

5168. Flacourtia. Cal. 5-7-partitus deciduus. Cor. o. Stam. receptaculo dense superposita; antherae subrotundatae. Stylus subnillus, stigma latum 5—9-radiatum. Bacca globosa multilocularis.

5169. Cliffortia. Cal. urceolatus limbo 3-fido. Cor. nulla. Filamenta capillaria, antherae oblongae didymae. Stigmata elongata plumosa. Calycis tubus induratus sistit capsulam bilocularem dispermam. *Rosaceae.*

5170. Poterium. Cal. germini accretus basi 2—3-squamatus, limbo 4-partito. Cor. nulla. Filamenta filiformi calycis fauci inserta; antherae subrotundae biloculares. Drupa exsucca 1—2-sperma. *Rosaceae.*

5171. Pera. Cal. disepalus minimus deciduus. Cor. 1-pelata globosa dependens. Stam. receptaculo inserta. Filamenta crassiuscula membranulis multifidis plicatis mixta. Antherae 4-gonae. Stigmata 4 laciniis peltatis. Caps. obovata 4-gona.

5172. Marialva. Cal. disepalus, sepalis concavis demum reflexis. Cor. 4-petala patens. Stamina disco inserta, filamenta filiformia antherae biloculares. Stigmata 4 obtusa. Bacca 4-locularis 4-sperma. *Guttiferae.*

5173. Gyrostemon. Cal. inferus patens sub-6-lobus. Pet. nulla. Stam. gyris concentricis receptaculo imposta. Filamenta nulla. Antherae cuneiformes 4-lobae. Styli crassiusculi acuti. Caps. plures in orbem dispositae membranaceae 1-spermae. *Melastomaceae.*

MONADELPHIA.

5174. Feuillaea. Cal. campanulatus 5-fidus. Cor. rotata 5-partita. Corona staminifera 10-partita. Filamenta alterna sterilia. Styli 3. Bacca drupacea trilocularis compressa. *Cucurbitaceae.*

5175. Cluytia. Cal. 5-partitus. Pet. 5. Glandulae 5 hypogynae cum appendiculis 2—3-fidis alternantes. Antherae dorso affixae. Styli 3 bipartiti reflexi. Fructus tricoccus. *Euphorbiaceae.*

5176. Gynostemma. Cal. 5-partitus. Cor. 5-partita. Antherae in annulnum fere coalitae biloculares. Stigmata 3 persistentia. Drupa baccata globosa 3-locularis. *Menispermeae.*

5177. Myristica. Cal. corollinus urceolatus inferus 3-fidus v. tridentatus. Antherae lineares biloculares coalitae. Stylus pyramidalis stigma bilobum. Drupa 1-sperma nuce arilata. Arillus carnosus. *Myristiceae.*

5178. Alchornea. Cal. 4—5-fidus coloratus deciduus. Cor. nulla. Filamenta brevissima. Antherae erectae oblongae. Stylus bipartitus. Fructus baccatus bicoccus. *Euphorbiaceae.*

5179. Nepenthes. Cal. inferus 1-phyllo 4-partitus subcoriaceus. Columna antherifera colorata capitulum terminale antheris sessilibus aggregatis tectum. Stylus nullus. Stigma peltatum 4-lobum. Caps. oblonga 4-angula sulcata 4-locularis 4-valvis. *Cylineae.*

5180. Sphaerostemma. Cal. bibracteatus 3-sepalus. Petala subnovena triplici serie imbricata. Stamina disco globoso imposita. Baccace plures aggregatae-spicatae in receptaculo elongato dispermae. *Anoneae.*

Dioecia. MONANDRIA.

5066. PANDANUS L. fit. (1762).

a. *Fructus solitarii.*

† *Drupae nux polysperma.*

1. *P. odoratissimus* L. ramis simplicibus; fol. linearibus costa marginibusque ciliato-spinosis; spinis viridibus; spadicibus masculis spicatis

bracteis albis, feminis solitariis; fructibus subglobosis; drupis turbinatis putamine pluriloculari faretis; stigmatibus ovalibus. Roxb. corom. t. 94—96. P. verus Rumph. 4. t. 74. In Ind. or. Arabia, Persia. ♂. Frut. 10—12-pedalis.

2. *P. utilis* Bory. ramis ternatis diebotomis; fol. costa margineque spinoso-dentatis; spinis rubris; capitulis solitariis globosis cernuis; nucibus polyspermis apice pyramidatis; stigmatibus glabris. *P. odoratissimus* Jacq. fragm. t. 13 et 14. f. 4. Mirb. ann. Mus. XVI. t. 17. In Borbonia et Madagascaria. ♂. Arbor pyramidalis 50—60-pedalis.

3. *P. nudus* Thouar; capitulis solitariis dependentibus; nucibus polyspermis apice obtuse pyramidatis; stigmatibus suberosis. Cum praecedente. ♂.

4. *P. drupaceus* Thouar; capitulis solitariis reflexis; nucibus polyspermis externe carnosis apice obtuse pyramidatis; stigmatibus suberosis. In ins. Franciae. ♂.

5. *P. maritimus* Thouar; capitulis solitariis cernuis; nucibus polyspermis; stigmatibus discretis subdigitatis. In ins. Franciae et Borboniae. ♂.

6. *P. elegans* Thouar; capitulis solitariis cernuis; nucibus paucis polyspermis apice pyramidatis. In ins. Borb. ad ripas fluminum. ♂. Arbor 20-ped.

7. *P. palustris* Thouar; capitulis solitariis; nucibus polyspermis digitatis. In paludosis ins. Franciae. ♂. Truncus 10—12-ped.

8. *P. dubius* Spr. ramis simplicibus; fol. longissimis linearibus costa marginique spinosis glaucis; fructibus solitariis pedunculatis pendulis subglobosis; drupis conicis. Rumph. 4. t. 80. In Amboina. ♂.

9. *P. candelabrum* Beav. fl. ow. t. 21, 22. trunco inferne radicibus aereis fullo superne ramoso; ramis erectis; fol. linearis-subulatis margine carinaque serrato-spinosis glaucis; spadicibus subspicatis cylindricis; fructibus subsessilibus globoso-ellipticis; drupis 3-locularibus. In Afr. trop. ♂.

†† Drupa nux disperma.

10. *P. purpurascens* Thouar; capitulis solitariis dependentibus; nuci-

bus dispermis apice obtuse pyramidatis; stigmatibus glabris. In ins. Franciae. ♂.

11. *P. ensifolius* Thouar; capitulis solitariis erectis sessilibus; nucibus paucis dispermis acute pyramidatis. In Madagascaria. ♂.

†† Drupa nux monosperma.

12. *P. erigens* Thouar; capitulis solitariis pedunculatis; nucibus 1-spermis apice pyramidatis. In ins. Borboniae. ♂.

13. *P. sphaeroideus* Thouar; capitulis solitariis sessilibus; nucibus 1-spermis apice planis. In paludosis ins. Franciae. ♂.

14. *P. conoideus* Thouar; capitulis solitariis cernuis nucibus 1-spermis apice pyramidatis. In ins. Franciae. ♂.

15. *P. globuliferus* Thouar. capitulis solitariis globosis sessilibus; nucibus 1-spermis apice planis. In ins. Franciae. ♂.

16. *P. muricatus* Thouar; capitulis solitariis conicis cernuis; nucibus 1-spermis apice planis spinis armatis. In Madagascaria. ♂. Arbor 30-ped.

17. *P. fascicularis* Lam. fol. carina margineque spinoso-dentatis; spinis distanibus; fructu oblongo solitario; drupis fasciculatis. Rheedea 13. t. 6. In Ind. or. ♂.

18. *P. foetidus* Roxb. racemis parcialibus v. thyrsis masculis simplicibus; ovarii distinctis; drupis cuspidato-spinosis; nucibus 1-locularibus. In Bengal. ♂.

19. *P. furcatus* Roxb. drupis fructus compositi oblongi cuneatis coronatis spina incurva laevi acuminata furcata; nucibus 1-locularibus. Rheedea 2. t. 8. In Ind. or. ♂.

20. *P. ceramicus* Rumph. 4. t. 79. fol. linearibus margine costaque dense spinosis; fructu terminali solitario sessili conico obtuse trigono drupis 1-pyrenis. *P. conoideus* Lam. In ins. Ceram Motucc. ♂. Fol. 4-pedalia.

21. *P. caricosus* Rumph.; acaulis; fol. erectis longissimis margine dorsoque subtilissime et densissime spinulosis viridibus; fructu radicali pedunculato; drupis 6—8-angularibus. In Motuccis. ♂. Fol. 10—15-pedalia.

b. Fructus racemosi.

22. *P. humilis* Rumph. 4. t. 76. fruticosus diffusus procumbens; fol. linearibus costa margineque rubro-spinosis; spadicibus masculis spicatis, bracteis albis brevibus distinctis, feminis membranaceo-aggregatis; fructibus ovalibus rubris; drupis 1-spermis. *P. polyccephalus* Lam. *P. montanus* Bory. *In Moluccis Mauritio et Cochinchina.* ♂.

23. *P. pygmaeus* Thouar; capitulis racemosis erectis; nucibus 1-spermis apice pyramidatis. *In Madagascar.* ♂. Arbor 10-ped.

24. *P. edulis* Thouar; capitulis oblongis racemosis erectis; nucibus 1-spermis apice planis. *In Madagascar.* ♂. Truncus 10-ped.

Species dubiae.

25. *P. pedunculatus* R. Br. caudice stolonizante; phalangibus druparum 8—12-loclaribus, apice conicolobato basi subangustato. *In Nov. Holl.* ♂.

26. *P. spiralis* R. Br. caudice stolonibus carente; phalangibus druparum 9—12-loclaribus, apice depresso desellato, basi obtusissima. *In Nov. Holl.* ♂.

27. *P. amaryllifolius* Roxb. diffusus; fol. linearibus trinerviis apicibus valde latis, leviter spinoso-serrulatis. *In Amboina.* ♂.

28. *P. inermis* Roxb. diffusus fol. ensiformibus canaliculatis inermibus nitidis. *In Amboina.* ♂.

29. *P. laevis* Rumph; trunco spinoso ramis 2—3-fidis; fol. longissimis glaucis juxta oras glaberrimis nec ad dorsum ulla gerentibus spinas; spadicibus masc. spicatis, bracteis distinctis. *In Java et Amboina.* ♂.

30. *P. obeliscus* Thouar; fructificatione ignota; fol. terminalibus maximis lateralibus minimis. *In Madagascar.* ♂.

31. *P. Blanco* Kunth; caudice ramisque furcatis; fol. spiraliter imbricatis linguaeformibus costa subtus margineque spinosis; floribus masc. paniculatis; bracteis 2 longissimis tortis superne latis dentalis; feminis in receptaculo communi magno squamoso congestis. *P. spiralis* Blanco. *In ins. Philippinis.* ♂.

32. *P. gracilis* Blanco; caudice simplici; fol. imbricatis orgyalibus ensiformibus subtus margineque spinosis; floribus fem. in pedunculo trianguli intra spatiam imbricatam compositam e foliolis ovalibus et spinulosis, siugulis obtectentibus amentum globosum; strobilos 1—2-poll. *In ins. Philippinis.* ♂.

33. *P. exaltatus* Blanco; caudice 3—4-orgyali; ramis furcatis; fol. longissimis 2-orgyaliibus 4 digitis latis ensiformibus margine fusco subtus in costa deorsum spinosis; strobilo composito. *In ins. Philippinis.* ♂.

34. *P. Sabotan* Blanco; caudice recto; fol. ensiformibus subtus plicis 3 instructis, margine spinis sursum directis subtus in costa deorsum spectantibus armatis ergo inferne spinarum seriebus 3 superne seriebus 4 instructis. *In ins. Philippinis.* ♂.

35. *P. radicans* Blanco. *In ins. Leite.* ♂. Caudex radicans ut in Rhizomorphis.

5067. FREYCINETIA Gaudich. (1830).

1. *F. Gaudichaudii* Bennet pl. jav. 9. pericarpis omnibus acqualiter coarctatis; stigmate 2—3-lobo; spadicibus fem. ovali-oblongis. *In Java.* ♂. Fru-tex scandens, fol. linear-lanceolatis cartilagineo-spinosis.

2. *F. scandens* Gaudich. in Freyc. voy. t. 42. fol. linear-lanceolatis acutis striatis margine nervoque aculeolatis; spadicibus feminis ovato-oblongis pollicariibus; stigmate 3-lobo. *In ins. Motucc.* ♂.

3. *F. strobilacea* Blume Rumphia 1. t. 39. scandens; fol. elongatis linearibus acuminatis apice spinuloso-denticulatis; spadicibus lateralibus, squamis in strobilum ovoideum congestis involucratis, masculis elongato-cylindricis. *Pandanus funicularis* Rumph 4. t. 82. *In Amboina.* ♂.

4. *F. imbricata* Blume Rumph. t. 40. scandens; fol. elongatis linearibus acuminatis basi apiceque spinuloso-denticulatis; spadicibus terminalibus breve pedunculatis, feminis globosis; ovarii 3—5-gynis. *In Java.* ♂.

5. *F. javanica* Blume Rumph. t. 41. scandens; fol. linear-lanceolatis apice spinuloso-denticulatis; spadici-

bus terminalibus breve pedunculatis, femineis 4—5 cylindricis; ovariis 3—4-gynis. In Java. ♂.

6. *F. insignis* Blume Rumph. t. 42. scandens; fol. longissimis linearibus acuminatissimis ima basi apiceque spinuloso-denticulatis; spadicibus breve pedunculatis, femineis 4—5 cylindricis; ovariis 2—3-gynis. In sylvis Javae. ♂.

7. *F. Baueriana* Endl. ill. pl. Norfolk. t. 190, 193—199. scandens radicans annulatus; fol. linear-lanceolatis elongatis bracteisque late ovatis acuminatis dorso margineque spinulosis; ovariis 9—12; stigmatibus sessilibus emarginato-hippocrateiformibus. In ins. Norfolk. ♂.

✓ 8. *F. arborea* Gaudich. l. c. t. 41. caudice arboreo; fol. elongatis linearibus superne angustato-subulatis coriaceis; spadicibus femineis cylindricis; stigmate 6—7-lobo. In ins. Sandwicens. ♂.

9. *F. radicans* Gaudich. l. c. t. 43. radicans; fol. elongatis linearibus carnoso-membranaceis; spadiceibus elongato-cylindricis; stigmate bilobo. In ins. Rawak. ♂.

✗ 10. *F. marginata* Blume; scandens radicans; fol. longissimis linearibus acuminatissimis rigidis supra medium apiceque spinuloso-denticulatis. In Nov. Guinea. ♂.

11. *F. angustifolia* Blume t. 43. scandens; fol. elongatis anguste linearibus acuminatissimis, apice spinuloso-denticutatis; spadicibus terminibus breve pedunculatis masculis femineisque cylindricis; ovariis 4-gynis. In Java. ♂.

12. *F. graminea* Blume; scandens radicans; fol. anguste-linearibus acuminatissimis margine tota longitudine spinuloso-denticulatis; spadicibus longe pedunculatis; femineis elongato-cylindricis. *Carex arborea* Rumph. t. 8. f. 2. In Java. ♂.

13. *F. demissa* Brown et Bennett. In Ottahete. ♂.

14. *F. inclinans* Br. et Bennet. In Java et Nov. Zealandia. ♂.

lanceolatis integerrimis glabris; floribus masc. axillaribus; fem. terminibus.

5069. STEPHANIA Lour. (1790).

1. *S. rotunda* Lour. radice tuberosa caule volubili simpliciunculo; fol. peltatis subrotundis acutis repandis; floribus umbellatis. In Cochinchina. 2.

2. *S. longa* Lour. radice filiformi repente; caule volubili ramoso; fol. peltatis oblongis; floribus capitatis. In Cochinchina. 2.

5070. BROSIMUM Sw. (1788).

1. *B. Alicastrum* Sw. fl. ind. t. 1. In Jamaica. ♂. Arbor utilissima. Folia ovato-lanceolata. Amenta breve pedunculata axillaria. Fructus edulis.

DIANDRIA.

5071. SALIX L. (1747).

A. Salices europeae.

a. *Fragiles* Koch. Squamae amenti concolores luteo-virides ante fructus maturitatem caduae.

1. *S. pentandra* L. 5—10-andra; fol. ovato-ellipticis v. ovato-lanceolatis acuminatis dense serrulatis glaberrimis; stipulis ovato-oblongis aequilateris rectis. Fries nov. suec. t. 1. In paludosis. ♂.

2. *S. cuspidata* Schulz; 4—5-andra; squamis concoloribus deciduis; fol. oblongo-lanceolatis longe acuminatis dense serrulatis glaberrimis; stipulis semicordatis obliquis; petiolo superne mutiglanduloso. In pratis paludosis Europ. ♂.

3. *S. fragilis* L. diandra; squamis concoloribus deciduis; pedicello nectarium 2—3-plo superante; fol. lanceolatis acuminatis glaberrimis v. junioribus subsericeis inflexo-serratis; stipulis semicordatis. Ad ripas et in paludosis. ♂. a. decipiens Koch cor-

5068. COMMIA Lour. (1790).

1. *C. cochinchinensis* Lour. In Cochinchina. ♂. Arbor fol. alternis

tice ramulorum testaceo; gemmis atrofuscis; fol. ramulorum infimis latoboialis obtusissimis. S. decipiens Hoffm. sal. t. 31. E. B. t. 1937. S. vitellina L. — β . *vulgaris* Koch; ramulis rufescensibus; fol. infimis ramulorum oblongo-boialis. S. fragilis Sm. E. B. t. 1996. S. Wargiana Lej. S. excelsa Tausch. — γ . *Russeliana* Koch fol. junioribus ramulisque versus autumnum sericeo-pilosus, serraturis minoribus; stipulis magis acuminatis. S. Russeliana Sm. S. fragilis Sturm 25. S. gracilenta Tausch.

4. *S. alba* L. diandra; amentis pendunculatis; fol. lanceolatis acuminatis serrulatis utrinque sericeis; pedicello nectarium brevissimum vix aequante; stigmatibus crassiusculis emarginatis. Sturm 25. S. coerulea Sm. E. B. t. 2431. S. vitellina L. *Ad ripas et in pratis.* $\ddot{\text{h}}$.

b. *Squamae amenti concolorae luteo-virides persistentes.*

5. *S. amygdalina* L. triandra; squamis persistentibus concoloribus apice glabris; pedicello nectarium 2—3-plo superante; stylo brevissimo, stigmatibus horizontalibus emarginatis; fol. lanceolatis oblongisve acuminatis serratis glaberrimis; stipulis semicordatis. *In paludosis et ad ripas.* $\ddot{\text{h}}$. Var. α . *discolor* Koch; fol. subtus glaucis. S. amygdalina L. S. triandra Sturm 25. S. Villarsiana Willd. S. Hoppeana Willd. — β . *concolor* Koch; fol. subtus viridibus v. subglaucis. S. triandra L.

6. *S. undulata* Ehrh. triandra; squamis amenti persistentibus concoloribus tomentosis apice barbatis; capsulis ovato-conicis pubescentibus glabrisve pedicellatis; pedicello nectarium superante; stylo elongato; fol. lanceolatis longe acuminatis pubescentibus denique glabris. S. lanceolata Sm. E. B. t. 1436. *Ad ripas.* $\ddot{\text{h}}$.

7. *S. hippophaefolia* Thuill. diandra; squamis amenti persistentibus concoloribus tomentosis apice barbatis; capsulis ovato-conicis tomentosis glabrisve; pedicello nectarium aequante; stylo elongato; stigmatibus bifidis longe acuminatis minute glanduloso-denticulatis pubescentibus denique glabris. *Ad ripas.* $\ddot{\text{h}}$.

c. *Pruinosae* Koch. *Squamae amenti apice discolorae. Amenta lateralia etiam fructifera sessilia. Antherae defloratae luteae. Cortex interior aestate citrinus.*

8. *S. acutifolia* Willd. amentis minute bracteatis, nectario ovarii basin superante; stylo elongato, stigmatibus linearis-oblongis; fol. linearis-lanceolatis longe acuminatis soratatis ramulisque junioribus glabris; stipulis lanceolatis acuminatis. S. viscosa Sm. *Ad ripas.* $\ddot{\text{h}}$.

9. *S. daphnoides* Vill. amentis minute bracteatis; capsulis ovato-conicis glabris sessilibus; nectario ovarii basin superante; stylo elongato; stigmatibus oblongis; fol. oblongo-lanceolatis acuminatis glanduloso-serratis glabris junioribus ramulisque tenuis villosis; stipulis semicordatis. S. praecox Sturm 25. *In palud. Europ. bor.* $\ddot{\text{h}}$.

d. *Purpureae* Koch. *Squamae amenti discolorae. Amenta lateralia sessilia ante folia evoluta. Antherae purpureae defloratae nigrae.*

10. *S. Pontederana* Schleich. monadelpha; amentis sessilibus basi bracteatis; capsulis pedicellatis tomentosis; pedicello nectarium aequante; stigmatibus ovatis emarginatis; fol. obovato-lanceolatis serrulatis glabris junioribus pubescentibus. S. discolor et austriaca Host. *In sylvis montanis Europ. austr.* $\ddot{\text{h}}$.

11. *S. purpurea* L. monandra; filamentis connatis; capsulis ovatis sessilibus tomentosis; nectario ovarii basin superante; stylis brevi stigmatibus ovalis; fol. lanceolatis argute serrulatis glabris planis. Sturm 25. S. monandra Hoffm. sal. t. 1. f. 2. S. Lambertiana Sm. S. Helix L. S. mirabilis Host. *Ad ripas et in humidis.* $\ddot{\text{h}}$.

12. *S. rubra* Huds. monadelpha; amentis sessilibus basi bracteatis; capsulis ovatis sessilibus tomentosis; nectario ovarii basin superante; stylo elongato, stigmatibus subfiliformibus; fol. elongato-lanceolatis acuminatis repando-denticulatis margine subrevolutis pubescentibus adultis glabratris; stipulis linearibus. S. fissa Ehrh.

Hoffm. sal. t. 13, 14. S. membranacea Thuill. S. virescens Vill. S. concolor Hort. *g. eleagnifolia* Tausch. *Ad ripas et in dumetis humidis.* ♂.

e. *Viminales* Koch. *Squamae amenti apice discolores. Amenta lateralia sessilia. Antherae defloratae luteae. Capsulae sessiles v. brevissime pedicellatae. Cort. interior virescens.*

13. *S. mollissima* Ehrh. amentis sessilibus v. breviter pedunculatis basi bracteatis; capsulis ovatis conicis tomentosis sessilibus; nectario ovarii basin superante; stigmatibus linearibus bifidis; fol. elongato-lanceolatis acuminatis remote repando-denticulatis junioribus subtus tenuiter tomentosis. S. mollissima Willd. S. pubera Koch. *Ad ripas Europ. sept.* ♂.

14. *S. riminialis* L. amentis sessilibus basi bracteatis caps. ovato-lanceolatis tomentosis; nectario basin ovarii superante; stylo elongato; stigmatibus filiformibus indivisis; fol. elongato-lanceolatis subtus nitido-sericeis; stipulis lanceolatis petiolo brevioribus. St. 25. *Ad ripas Europ.* ♂.

15. *S. stipularis* Sm. amentis sessilibus, basi bracteatis; caps. ovato-lanceolatis tomentosis brevissime pedicellatis; nectario ovarii basin superante; stylo elongato, stigmatibus filiformibus; fol. elongato-lanceolatis acuminatis integerrimis subrepandis subtus tomentosis subnudis; stipulis lanceolato-attenuatis petiolum aequantibus. S. longifolia Hort. *Ad ripas.* ♂.

16. *S. Smithiana* Willd. amentis sessilibus; capsulis ovato-lanceolatis tomentosis pedicellatis; pedicello nectarium aequante; stylo stigmatibus breviore; fol. oblongo-lanceolatis acuminatis subundulato-crenatis denticulatis subtus tomentosis; tomento subsericeo; stipulis reniformi-semicordatis acuminatis. S. mollissima Sm. *Ad ripas et in sepiibus.* ♂.

17. *S. acuminata* Sm. amentis sessilibus bracteatis; capsulis ovato-lanceolatis tomentosis pedicellatis; stylo longitudine stigmatum; stigmatibus filiformibus indivisis; fol. oblongo-lanceolatis acuminatis margine undulatis subglanduloso-denticulatis subtus glaucis tomentosis, tomento opaco; stipulis

reniformi-semicordatis acutis. *Ad ripas.* ♂.

f. *Capreae* Koch. *Squamae amenti apice discolores. Amenta lateralia florifera sessili basi fol. parvis fulta. Antherae defloratae luteae. Capsulae pedicellatae.*

18. *S. Seringiana* Gaud. amentis sessilibus arcuatis; capsulis ovato-lanceolatis tomentosis; pedicello nectarium bis superante; stylo elongato; fol. lanceolato-oblongis acuminatis crenulatis subtus albo-tomentosis rugoso-venosis; stipulis ovatis acutis. S. lanceolata Ser. S. Kanderiana Ser. S. intermedia Host. *Ad rivulos Helvetiae.* ♂.

19. *S. salviaefolia* Lk. amentis sessilibus arcuatis; capsulis ex ovata basi lanceolatis tomentosis; pedicello nectarium bis superante; stylo brevi; fol. oblongo-lanceolatis acutis basi attenuatis denticulatis subtus incano-tomentosis ruguloso-venosis; stipulis semicordatis acutis. S. patula Ser. S. Fluggeana Willd. *In paludosis.* 2.

20. *S. incana* Schrank; amentis subsessilibus arcuatis basi bracteatis; capsulis ovato-lanceolatis glabris pedicellatis; pedicello nectarium bis superante stylo elongato, stigmatibus subbifidis; squamis subglabris breviter ciliatis; fol. lanceolato-linearibus acuminatis denticulatis subtus canato-tomentosis. S. riparia Willd. Sturm 25. S. angustifolia Poir. in Duh. ed. 3. t. 29. S. rosmarinifolia Host. *In convallibus subalpinis.* ♂.

21. *S. holosericea* Willd. amentis sessilibus basi bracteatis; caps. tomentosis pedicellatis; pedicello nectarium 2—3-plo superante; stylo brevissimo, stigmatibus ovatis emarginatis; denticulatis subtus tomentosis. *Ad ripas et in pratis.* ♂.

22. *S. cinerea* L. amentis sessilibus basi bracteatis; capsulis elongato-lanceolatis tomentosis pedicellatis; pedicello nectarium quater superante; fol. ellipticis, v. obovatis planis undulato-serratis ciuereo-viridibus supra pubescentibus, subtus tomentoso-hirtis; stipulis reniformibus; gemmis incanis. S. acuminata Hoffm. S. polymorpha Host. *In dumetis humidis.* ♂.

23. *S. nigricans* Fries; amentis sessilibus; fructiferis breve pedunculatis; pedicello nectarium bis terve superante; stylo elongato; fol. ovatis lanceolatisque undulato-serratis subtus cinereis apice viridibus junioribus ramulisque hirto-pubescentibus. *S. Wulfeniana* Willd. *S. hastata* Schk. t. 317. *S. Amaniana* St. 25. — *eriocarpa* ovarii tomentosis v. hirtis macula glabra notatis. *S. rupestris* E. B. t. 2343. *S. hirta* Sm. t. 1404. *In humidis Europae.* ♀.

24. *S. silesiacu* Willd. amentis sessilibus; capsulis lanceolatis glabris v. sericeis; pedicello nectarium ter quaterve superante; stigmatibus ovatis bifidis; fol. obovatis undulato-serratis subtus concoloribus, adultis glaberrimis. Var. β. *eriocarpa* Koch. *S. fagifolia* Willd. *In montanis Europae.* ♀.

25. *S. grandifolia* Sering. amentis sessilibus; pedicello nectarium sexies superante; fol. oblongo-obovatis acuminatis planis obsolete undulato-serratis glabris subtus cinereo-glaucis pubescentibus; gemmis glabris. *In Subalpinis.* ♀.

26. *S. Capraea* L. amentis sessilibus ovatis; pedicello nectarium 4—6-plo superante; fol. ovatis ellipticis planis recurvato-acuminatis obsolete undulato-crenatis supra glabris subtus glaucis tomentosis gemmis glabris. *S. tomentosa* Ser. *In sylvis Europ.* ♀.

27. *S. aurita* L. amentis sessilibus; capsulis elongatis-lanceolatis tomentosis; pedicello nectarium 3—4-plo superante; fol. obovatis recurvo-apiculatis undulato-serratis rugosis superne pubescentibus subtus glaucis tomentoso-hirtis; stipulis reniformibus gemmis glabris. *In pascuis udis Europae.* ♀.

28. *S. depressa* L. amentis fructiferis pedunculatis; pedunculo foliato; capsulis tomentosis pedicellatis; pedicello nectarium quinques superante; fol. obovatis ellipticisque integerrimis serratis subtus glaucescentibus velutinis pubescentibusque vel adultis glaberrimis; stipulis reniformibus. *S. Starkiana* et *livida* Wahlenb. *In paludosis Europae.* ♀.

29. *S. phyticifolia* L. amentis sessilibus; capsulis ovato-lanceolatis tomentosis; pedicello nectarium 2—3-plo superante; stylo elongato; fol. ovatis

ellipticisve remote repando-serrulatis integerrimisve subtus glaucis adultis glaberrimis. *S. bicolor* Ehrh. *S. arbuscula* Wahlenb. *S. laurina* Sm. *In subalpinis Europ.* ♀.

30. *S. glabra* Scop. amentis pedunculatis; pedunculo foliato; pedicello nectario subduplo longiore; stylo elongato; fol. ellipticis obovatisve serratis glabris lucidis subtus glaucis; stipulis nullis v. glanduliformibus; squamis pilosis denique glabris; staminibus a basi ultra medium villosis. *S. Wulfeniana* Host. *In subalpinis Europae.* ♀.

30. *S. Hegelschweiteri* Heer. amentis denique pedunculatis, pedunculo foliato; capsulis ex ovata basi subulatis pedicello tomentoso vel totis tenuiter tomentosis; pedicello nectarium bis superante; fol. ovalibus serrulatis. *In Helvetia.* ♀.

32. *S. hastata* L. amentis pedunculatis; capsulis ovato-subulatis glabris; pedicello nectario sesqui longiori; stylo elongato; fol. ovatis ellipticis lanceolatisque glabris serrulatis, squamis villosissimis, villo elongato mox crispato-contracto. *S. Ludwigii* Schk. t. 316. *In alp. Europ.* ♀.

33. *S. myrtilloides* L. amentis fructiferis longe pedunculatis; capsulis ovato-lanceolatis longe pedicellatis; pedicello nectarium plures superante; fol. ovatis basi subcordatis integerrimis opacis glaberrimis; stipulis semiovatis. *S. elegans* Bess. *In ericetis Europae.* ♀.

34. *S. ambigua* Ehrh. amentis sessilibus; capsulis ovato-lanceolatis tomentosis longe pedicellatis, pedicello nectarium ter quaterve superante; fol. ellipticis obovatis lanceolatisve recurvato-apiculatis integerrimis vel remote denticulatis subtus rugoso-venosis adpresso villosis stipulis semiovatis rectis. *S. plicata* Fries. *S. incubacea* L. *S. prostrata* Sm. *In paludosis Europae.* ♀.

35. *S. repens* L. amentis sessilibus, fructiferis ovali-cylindricis breve pedunculatis; capsulis ovato-lanceolatis tomentosis glabrisve longe pedicellatis; pedicello nectarium 2—3-plo superante; stigmatibus ovatis bifidis; fol. ovalibus v. ovato-lanceolatis apice recurvatis margine subdeflexis integerrimis v. remote glanduloso-denticulatis nitidis subtus sericeis;

stipulis lanceolatis acutis. S. fusca Willd. S. depressa Hoffm. S. finmarchica Willd. S. argentea Sm. S. arenaria L. S. fusca Mey. *In pratibus Europae.* ♀.

36. *S. angustifolia* Wulf. amentis sessilibus, fructiferis cylindricis breve pedunculatis; capsulis ovato-lanceolatis tomentosis v. glabriusculis longe pedicellatis; pedicello nectarium bis terve superante; fol. elongato-lanceolatis strictis apice recto margine subrevolutis remote glanduloso-denticulatis subtus sericeis; stipulis lanceolatis. S. pratensis Host. S. incubacea Willd. *In paludosis Europae.* ♀.

37. *S. rosmarinifolia* L. amentis sessilibus fructiferis subrotundis breve pedunculatis; capsulis ovato-lanceolatis tomentosis longe pedicellatis; pedicello nectarium bis terve superante; fol. linearibus v. linear-lanceolatis acuminatis, margine planis apice rectis integerimis vel remote glanduloso-denticulatis subtus sericeis; stipulis lanceolatis. S. littoralis Hort. *In Europa.* ♀.

38. *S. Doniana* Sm. monadelpha; amentis sessilibus minute foliosis; caps. ovato-conicis tomentosis pedicellatis; pedicellis nectarium bis superantibus; stylo brevissimo; fol. saepe oppositis lanceolatis vel obovato-lanceolatis acutis strictis apice rectis remote serrulatis supra nitidis subtus sericeis, pilis in adultis sparsis. *Ad margines pratorum Europae.* ♀.

g. *Frigidae.* Squamae amenti apice discolor. Amenta lateralia et fructifera breve pedunculata, pedunculo foliato. Antherae defloratae luteae v. fuscae. Pedicellus nectarium non superans.

39. *S. arbuscula* L. pedunculo foliato; capsulis ovato-conicis tomentosis sessilibus denique breviter pedicellatis; nectario basin capsulae superante; stylo elongato; fol. glabris lanceolatis acutis v. ovatis breviter acuminatis remote serratis supra nitidis subtus glaucis opacis. Jacq. austr. t. 108. S. Waldsteiniana Willd. S. coruscans Sturm 25. S. ovata Sering. S. foetida Schleich. S. alpina Sut. S. prunifolia Ser. S. vaccinifolia E. B. t. 2341. S. prunifolia Sm. S. ve-

nulosa Sm. S. carinata Sm. *In Helvetia et Anglia.* ♀.

40. *S. Lapponum* L. amentis sessilibus, fructiferis subpedunculatis; capsulis ovato-lanceolatis tomentosis glabrisque; nectario pedicellum superante v. aequante; stylo elongato; fol. lanceolatis ellipticis acuminatis integerrimis serrulatisque subtus tomentosis opacis. S. limosa Wahlenb. S. helvetica Vill. S. nivea Ser. S. lactea Bray. S. arenaria Willd. E. B. t. 1809. Sturm 25. S. glauco-philla Willd. S. Stuartiana Sm. *In alpium humidis.* ♀.

41. *S. glauca* L. amentis longe pedunculatis; pedunculo foliato; caps. tomentosis pedicellatis; pedicello nectarium aequante; fol. lanceolatis ellipticis integerrimis subtus cinereis utrinque sericeo-villosis acutis infimis obtusissimis. S. appendiculata Fl. dan. t. 1056. S. sericea Vill. *In alpibus attissimis Europae.* ♀.

42. *S. caesia* Vill. amentis breviter pedunculatis, pedunculo foliato; caps. ovato-conicis tomentosis sessilibus denique brevissime pedicellatis; nectario basin capsulae superante; stigmatibus ovato-oblongis integris bifidisque; fol. acuminatis glaberrimis utrinque glaucis opacis margine revolutis integerrimis. S. prostrata Ehrl. S. myrtilloides Willd. *In summis alp. Europae.* ♀.

43. *S. myrsinites* L. amentis longe pedunculatis; pedunculo amentum subaequante; capsulis ovato-acuminatis lanuginosis denique glabratibus; nectario basin capsulae superante; fol. ellipticis utrinque reticulato-venosis lucidis concoloribus margine dense glanduloso-serrulatis. S. myrsinites et arantifolia Willd. S. Jacquiniana Sturm 25. S. fusca Jacq. austr. t. 409. *In Europa.* ♀.

h. *Gluciales* Koch. Amenta terminalia. Fruticulitrunco subterraneo repente pygmaei.

44. *S. reticulata* L. amentis pedunculatis terminalibus; capsulis ovatis tomentosis subsessilibus; fol. longe petiolatis elliptico-orbiculatis obtusis margine revolutis integerrimis supra rugosis subtus glaucis reticulatis denique glabris. Sturm 25. *In alp. Europae.* ♀.

45. *S. retusa* L. amentis pedunculatis; pedunculo foliato gemmifero; capsulis ovato-conicis glabris breviter pedicellatis; nectario pedicellum subaequante; fol. brevissime petiolatis obovatis vel oblongo-cuneatis integerimis vel basi glanduloso-serrulatis parallelo-venosis glaberrimis. Sturm 25. *S. serpyllifolia* Willd. Jacq. austr. t. 298. *In alpinis Europae.* §.

46. *S. herbacea* L. amentis terminalibus pedunculatis; capsulis ovato-conicis glabris subsessilibus; nectario pedicellum brevem superante; fol. orbicularis ovalibusque obtusis retusis serratis glabris reticulato-venosis utrinque nitidis. *In alpibus Europae.* §.

b. Species asiaticae.

47. *S. acutifolia* Willd. ramis fuscis pruinosis; fol. lanceolatis acuminatis inaequaliter obtuse serratis subtus glaucescentibus; stipulis lanceolatis serratis. *Ad mare Caspium.* §.

48. *S. babylonica* L. ramis pendulis; fol. angusto-lanceolatis acuminatis serratis glabris subtus glaucescentibus; stipulis semiovalatis acuminatis serratis; germinibus ovatis sessilibus. *S. propendens* Ser. *In Asia minore.* §.

49. *S. tetrasperma* Roxb. fol. oblongis lanceolatis acuminatis serratis glabris subtus glaucis; amentis sub-6-andris; caps. ovatis pedicellatis 4-spermis; stylo abbreviato. *In Oriente.* §.

50. *S. berberifolia* Pall. ross. t. 82. ramis glaberrimis; fol. ellipticis acutis utrinque attenuatis argute glanduloso-serratis lucidis glaberrimis; stipulis serratis; bracteis atris; stigmatibus emarginatis. *S. Brayi* Ledeb. ill. t. 449. *In Siberia.* §.

51. *S. pyrolaeifolia* Ledeb. ill. t. 476. ramis glaberrimis; fol. orbicularis v. ovato-ellipticis serratis glaberrimis subtus glaucis; stipulis cordato-orbicularis; bracteis fuscis; ovariis longe pedicellatis; stylo elongato. *Prope Buchtorminsk.* §.

52. *S. pallida* Ledeb. ill. t. 454. ramulis glaberrimis; fol. linearibus acuminatis integerrimis concoloribus glauco-viridibus glaberrimis; amentis lateralibus sessilibus; bracteis fuscis; ovariis subsessilibus sericeis; stylo nullo. *S. caspica* Pall. *In ins. Tschuja.* §.

53. *S. tenuijulis* Ledeb. ill. t. 453. ramulis pubescentibus demum glabris;

fol. oblongis v. oblongo-linearibus utrinque attenuatis acuminatis apice serratis utrinque tenuissime pilosis; amentis pedunculatis; bracteis latis apice fuscis; ovariis sericeis sessilibus; stylo nullo. *In Siberia.* §.

54. *S. arctica* Pall. ramulis glabriusculis; fol. obovatis v. elliptico-obovatis apice rotundatis basi in petiolum longissime attenuatis integerimis subtus glaucis ciliatis; stipulis lanceolatis; bracteis fuscis apice atris; ovariis tomentosis sessilibus. Ledeb. ill. t. 460. *In Siberia.* §.

55. *S. sibirica* Pall. ross. t. 81. f. 3. ramulis pubescentibus v. glaberrimis; fol. oblongis oblongo-ellipticis acutis v. acuminatis integerrimis margine revolutis subtus glaucis sericeis demum glaberrimis; stipulis ovatis; bracteis fuscis; ovariis sessilibus sericeis; stylo integro brevi. *In Siberia.* §.

56. *S. disperma* Roxb. fol. ellipticis mucronatis integerrimis utrinque ramulisque sericeo-villosis; squamis masc. 8-andris ovalibus obtusis; germinibus ventricosis sericeis stylo coronatis. *In Ind. or.* §.

c. Species americanae.

a. Ovaria glabra.

57. *S. angustata* Pursh. fol. lanceolatis elongatis acutis basi attenuatis serrulatis glaberrimis subconcoloribus; stipulis semicordatis; amentis glabriusculis. *In Pennsylvania.* §.

58. *S. pedicellaris* Pursh. fol. obovato-lanceolatis acutis integerrimis utrinque glabris concoloribus; stigmatibus sessilibus; stipulis nullis; amentis pedicellatis; squamis glabriusculis; germinibus longissime pedicellatis oblongo-oblongis. *In Nov. Caesareu.* §.

59. *S. myricoides* Mühl. ramulis rubris glabris; fol. oblongo-lanceolatis acutis basi biglandulosis obtuse serratis glabris subtus glaucis; stipulis ovatis acute glanduloso-serratis; amenti squamis villosis; germinibus longe pedicellatis lanceolatis. *In Am. bor.* §.

60. *S. lucida* Mühl. fol. ovato-oblongis acuminatis-cuspidatis argute serratis utrinque nitidis; stipulis oblongis glanduloso-serratis; amentis subtriandris; squamis lanceolatis latatis; germinibus longe pedicellatis

glabris; stylo brevissimo. *S. cordata* Michx. *In Am. bor.* ♂.

61. *S. cordata* Mühl. fol. cordato-lanceolatis acuminatis argute serratis glabris subtus pallidis; stipulis amplis ovato-subrotundis cartilagineo-serratis; amentis subtriandris squamis lanceolatis lanatis; stylo brevissimo. *In Virginia et Pensylv.* ♂.

62. *S. nigra* Marsh. fol. lanceolatis utrinque acutis serrulatis glabris concoloribus petiolis et nervo medio supra tomentosis; stipulis exiguis dentatis; squamis oblongis villosissimis sub-4-andris; stylo brevissimo. *S. caroliniana* Michx. *In Am. bor.* ♂.

63. *S. Humboldtiana* Willd. fol. linearibus elongatis acuminatis argute-denticulato-serrulatis glabris; amenti masculi squamis 3-dentatis villosis polyandris; germinibus stipitatis. *In Am. austr.* ♂.

64. *S. falcata* H. et K. fol. linear-lanceolatis acuminatis falcatis remote denticulatis glabris; squamis masculis suhrotundis dentatis villosis sub-7-andris; germinibus stipitatis. *In Peruaria.* ♂.

65. *S. oxyphylla* H. et K. fol. lanceolatis acuminatis denticulatis glabris; squamis masculis subrotundis acutis villosis polyandris; germinibus stipitatis. *In Nor. Hispan.* ♂.

66. *S. Bonplandiana* H. et K. fol. lanceolatis acuminatis elongatis serrulatis glabris subtus glaucescentibus; squamis subrotundis villosissimis brevissimis sub-6-andris; germinibus stipitatis. *In Mexico.* ♂.

67. *S. Uva ursi* Pursh. ramis procumbentibus; fol. obovatis integerrimis basi margine glandulosis supra nitidis; stipulis nullis; amentis serotinis laxis; squamis oblongis ciliatis. *In Labrador.* ♂.

68. *S. Hookeriana* Barrat, in Hook. fl. bor. am. ramis valde robustis pubescentibus junioribus dense tomentoso-lanatis; fol. late obovatis serratis margine planis subtus tomentoso-lanatis; amentis cylindricis crassis; squamis longe densissime lanatis; ovarii longe lanceolatis glaberrimis. *In Am. bor.* ♂.

69. *S. adenophylla* Hook. ramis robustis lanatis; fol. ovatis basi cordatis acutis subcoriaceis reticulatum venosis argute serratis, serraturis elon-

gatis glanduliferis lana sericea densa obsitis; stipulis glanduloso-serratis; amentis feminineis elongatis; caps. glaberrimis. *In Labrador.* ♂.

70. *S. Richardsoni* Hook. fl. bor. am. t. 182. ramis glabriusculis; fol. ovato-lanceolatis glaberrimis subtus glaucis; junioribus ciliatis; stipulis glanduloso-dentatis; amentis feminineis terminalibus subcylindricis; squamis oblongis fuscis longe pilosis; stylo longissimo; stigmatibus recurvis bipartitis. *In Am. bor.* ♂.

β. Ovaria pubescentia.

71. *S. conifera* Wangenh. fol. oblongo-lanceolatis remote serratis acutis supra glabris subtus tomentosis; stipulis lanatis subdentatis; amentis sericeo-villosis; germinibus lanceolatis. *In Am. bor.* ♂.

72. *S. prinoides* Pursh. fol. ovalioblongis acutis remote undulato-serratis glabris subtus glaucis; stipulis semicordatis inciso-serratis; amentis villosis; stylo elongato. *In Am. bor.* ♂.

73. *S. fuscata* Pursh; ramis annotonitis fusco-tomentosis; fol. obovato-lanceolatis acutis subserratis glabris subtus glaucis junioribus pubescensibus; amentis nutantibus; germinibus ovatis sericeis; stigmatibus sessilibus. *In Am. bor.* ♂.

74. *S. recurvata* Pursh; fol. obovato-lanceolatis acutis integerrimis margine glandulosis glabris subtus glaucis, junioribus sericeis; stipulis nullis; amentis recurvatis; squamis germinibusque villosis; stylo brevissimo. *In Am. bor.* ♂.

75. *S. Mühlenbergiana* Willd. ramis maculatis; fol. lanceolatis subintegerrimis revolutis subtus rugosovenosus; stipulis lanceolatis; squamis oblongis margine villosis spicis discoloribus; germinibus longe pedicellatis. *S. tristis* Mühlb. *S. alpina* Walt. *In Am. bor.* ♂.

76. *S. grisea* Willd. fol. lanceolatis acuminatis serrulatis supra glabris nervo medio tomentoso subtus subsericeis; stipulis linearibus deflexis; squamis pilosis apice atris; stigmatibus sessilibus. *S. sericea* Mühl. *In Am. bor.* ♂.

77. *S. discolor* Mühl. fol. oblongis obtusiusculis glabris remote serratis apice integerrimis subtus glaucis; stipulis lanceolatis serratis; germini-

bus lanceolatis subsessilibus. *In Am. bor.* ♀.

78. *S. candida* Willd. fol. linearilanceolatis longissimis apice obsolete denticulatis supra pubescensibus subtus niveo-tomentosis revolutis; stipulis lanceolatis; squamis longissime villosis. *In Am. bor.* ♀.

79. *S. obovata* Pursh. fol. obovatis obtusis integerrimis supra glabris subtus sericeo-villosis; stipulis nullis; amentis sessilibus oblongis. *In Am. bor.* ♀.

80. *S. paradoxa* H. et K. ramulis angulatis pubescentibus; fol. ovato-oblongis acutis integerrimis supra glabris subtus glaucis pubescentibus; germinibus stipitatis rostratis. *In Mexico.* ♀.

81. *S. longifolia* Mühl. fol. linearibus acuminatis elongatis remotissime denticulatis glabris concoloribus; stipulis exiguis lanceolatis; amentis penduculatis. *In Pennsylvania.* ♀.

82. *S. vestita* Pursh. repens; fol. suborbiculatis integerrimis supra glabris reticulato-venosis, subtus sericeo-villosis; amentis pedunculatis linearibus; germinibus ovatis sessilibus villosis; stylo profunde bipartito. *In Labrador.* ♀.

83. *S. Drummondiana* Hook. ramis elongatis strictis glabris; fol. obovato-oblongis rigidiusculis integerrimis v. obsolete serrulatis margine sucrevolutis; amentis cylindricis compactis; squamis ovato-lanceolatis fuscis longe sericeis; ovariis dense sericeo-nitido-pilosis. *In Am. bor.* ♀.

84. *S. villosa* Don; ramis foliisque junioribus lana arachnoidea villosis; fol. lato-lanceolatis acutis integerrimis margine revolutis subtus glaucis albo-lanatis; stipulis semicordatis; amentis 2—3-uncialibus ellipticis; squamis oblongo-ovatis fuscis, capsula lanceolata acuminata tomentosa 4-plo brevioribus. *In Am. bor.* ♀.

85. *S. Scouleriana* Barrat. ramis fuscis subrobustis demum glabris; fol. obovato-oblongis integerrimis subtus argenteo-sericeis; amentis oblongo-cylindricis demum recurvatis densifloris; squamis obovatis nigro-fuscescentibus sericeo-villosis; ovariis ovato-lanceolatis acuminatis sericeis. *In Am. bor.* ♀.

86. *S. speciosa* Hook. et Arn. ramis densissime flavo-sericeis; fol.

oblongo-lanceolatis obovatise acutis v. acuminatis integerimis subtus petiolisque niveo-sericeis; stipulis linearilanceolatis fuscis petiolo longioribus; amentis elongatis crassis densissime sericeis; squamis nigrescentibus pilis longis molissimis sericeis; ovariis sericeis. *In Am. bor.* ♀.

87. *S. Barrattiana* Hook. fl. bor. Am. t. 181. ramis flexniosis cicatratis; fol. obovato-oblongis acutis basi cordatis mollibus glanduloso-serrulatis utrinque pubescenti-sericeis; stipulis semiovatis glanduloso-serratis; amentis cylindricis femineis elongatis densifloris pulcherrime sericeis; squamis nigrescentibus longe sericeis stigmati lobis fissis. *In Am. bor.* ♀.

88. *S. rostrata* Richard. fol. oblongis acutis integerrimis pubescentibus subtus glaucis; germinibus longe pedicellatis ovato-subulatis tomentosis; stigmate sessili 4-fido. *In Am. arct.* ♀.

89. *S. japonica* Thunb. arborescens; ramis erectis; fol. lanceolatis acuminatis serratis subtus glaucis junioribus villosis. *In Japonia.* ♀.

90. *S. integra* Thunb. fruticosa; fol. spatulato-linearibus integerrimis glabris. *In Japonia.* ♀.

91. *S. mucronata* Thunb. fol. oblongis mucronatis integerrimis glabris subtus glaucis. *In P. b. S.* ♀.

92. *S. hirsuta* Thunb. fol. ovatis mucronatis integerrimis utrinque hirsutis exstipulatis. *In P. b. S.* ♀.

93. *S. cordifolia* Pursh; fruticosa humilis; fol. subcordato-ovatis acutisculis integerrimis reticulato-venosis ciliatis; stipulis semicordatis. *In Labrador.* ♀.

94. *S. planifolia* Pursh; fruticosa humilis; ramulis laevigatis; fol. oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis medio serrulatis glaberrimis patulis discoloribus; stipulis nullis. *In Labrador.* ♀.

95. *S. Houstoniana* Pursh; fruticosa elatior; fol. elongato-lanceolatis serrulatis utrinque glabris concoloribus; stipulis nullis; staminibus ternis v. quinisis. *In Virginia et Carolina.* ♀.

96. *S. falcata* Pursh; fruticosa humilior; fol. linearilanceolatis longissimis subfalcatis serrulatis utrin-

que glabris; stipulis semilunatis. *In Virginia et Pensylvania.* ♂.

97. *S. taxifolia* H. et K. arborea; ramis sericeis pendulis; fol. confertis subdistichis patenti-reflexis linear-lanceolatis acutis obsolete denticulatis utrinque sericeis; amentis serotinis diandris. *In Mexico.* ♂.

98. *S. magellanica* Poir. fruticosa humilis; ramis glabris; fol. linearibus serratibus glabriusculis; amentis masc. coetaueis villosis. *In Patagonia.*

99. *S. pedicellata* Desf. atl. fol. obovato-oblongis superne rugosis subtus cinereo-tomentosis; capsulis pedicellatis glabris. *In Algeria.* ♂.

100. *S. polaris* Wahlenb. caule filiformi; fol. obovatis obtusissimis subintegerrimis glabris; amentis paucifloris; germinibus sessilibus tomentosis. *In Spitzbergen.* ♂.

5072. CECROPIA Adans. (1700).

1. *C. peltata* L. fol. novemlobis, lobis oblongis obtusiusculis, supra hispido-sebris, subtus albo-tomentosis. Lam. ill. t. 800. *In Jamaica.* ♂.

2. *C. palmata* Willd. fol. palmatolobatis lobis novenis obtusissimis supra glabris subtus albo-tomentosis. *In Brasilia.* ♂.

3. *C. concolor* Willd. fol. palmatolobatis; lobis novenis - obovatis acuminatis utrinque glabris. *In Brasilia.* ♂.

4. *C. digitata* Ten. ♂.

5073. DIDYMELES Thouar. (1810).

1. *D. madagascariensis* Thouar. hist. ins. afr. t. 3. *In Madagascaria.* ♂. Arbor elata, fol. alternis oblongis.

5074. CLARISIA R. et P. (1798).

1. *C. racemosa* B. et P. fol. oblongis acuminatis venoso-lineatis; floribus femineis racemosis. *In Peruvia.* ♂. Arbor 15-ulnaris.

2. *C. biflora* R. et P. fol. obovatis venosis cum acumine longo; floribus femineis geminis. *In Peruvia.* ♂.

5075. BORYA Willd. (1805).

1. *B. cassinoides* Willd. foliolis oblongis obtusis petiolatis coriaceis margine revolutis subtus reticulato-venosis glabris. Brown jam. t. 36. f. 3. *In Antillis.* ♂.

2. *B. porulosa* Willd. fol. oblongo-lanceolatis obtusis sessilibus coriaceis margine revolutis subtus punctatis. Adelia Michx. *In Florida.* ♂.

3. *B. lingustrina* Willd. fol. ovato-lanceolatis utrinque attenuatis sub-sessilibus submembranaceis. Adelia Michx. *In Illinois.* ♂.

4. *B. acuminata* Willd. fol. ovato-lanceolatis utrinque attenuatis petiolatis membranaceis serrulatis. Adelia Michx. fl. bor. Am. t. 48. *In Am. bor.* ♂.

5. *B. retusa* Willd. ramis stipulisque spinescentibus; fol. obovato-oblongis retusis integerrimis subcoriaceis. *In Am. bor.* ♂.

6. *B. distichophylla* Nutt. gemmis pungentibus; fol. distichis submembranaceis subsessilibus lanceolatis acutis margine scabris. *In Tennessee.* ♂.

5076. TRIADICA Lour. (1790).

1. *T. cochinchinensis* Lour. fol. ovatis integerrimis obtusis; perianthiis 3-fidis. *In Cochinchina.* 2.

2. *T. chinensis* Lour. fol. ovatis acuminatis integerrimis; perianthiis 4-fidis. *In China austr.* ♂.

5077. CERATIOLA Michx. (1801).

1. *C. ericoides* Michx. ♂. Folia linearia. Gemmulorum floridarum squamae lacunoso-fimbriatae.

5078. FALKONERIA Royle. (1840).

1. *F. insignis* Royle ill. t. 98. f. 3. sepalis denticulatis; filamentis longioribus. *In Himalaya.* ♂.

2. *F. Wallichiana* Royle ill. t. 98. f. 3. sepalis integerrimis; filamentis brevioribus. *In Nepalia.* ♂.

TRIANDRIA.

5079. ANTHOCHORTUS Nees. (1840).

1. *A. Ecklonii* Nees. In P. b. S. 2. Culmi filiformes tortuosi graciles fasciculatim ramosi.

5080. ANARTHRIA R. Br. (1810).

1. *A. scabra* R. Br. culmis simplicisimis planis foliisque margine scabris; perianthii masculi foliolis linearibus femininei interioribus minoribus. In Nov. Holl. 2.

2. *A. laevis* R. Br. culmis simplicissimis planiusculis foliisque margine laevibus; perianthii masculi foliolis ovali-lanceolatis, femininei subaequalibus. In Nov. Holl. 2.

3. *A. gracilis* R. Br. culmis simplicissimis compresso-filiformibus foliisque conformibus margine laevibus; spica racemosa divisa; perianthii foliolis subaequalibus lanceolatis carinatis. In Nov. Holl. 2.

4. *A. pauciflora* R. Br. culmis simplicibus ancipiti-filiformibus foliisque subconformi-laevibus; racemo paucifloro raro; pedunc. geminatis inaequalibus bractea spathacea brevioribus. In Nov. Holl. 2.

5. *A. prolifera* R. Br. culmis prolifer-ramosis ancipitibus foliosis; floribus subspicatis subsolitariisve. In Nov. Holl. 2.

5081. LYGINIA R. Br. (1810).

1. *L. imberbis* R. Br. vaginis spathisque imberbibus; fasciculis masculis feminineisque multifloris. Schoenodum tenax mas. Labill. t. 229. In Nov. Holl. 2.

2. *L. barbata* R. Br. vaginis spathisque ore barbatis; fasciculis masculis paucifloris; feminine unifloris subsolitariis. In Nov. Holl. 2.

3. *L. monterividensis* Spr. floribus androgynis; vaginis bracteisque imberbibus; fasciculis multifloris; fructibus longe pedicellatis. In Montevideo. 2.

5082. DOVEA Kunth. (1841).

1. *D. macrocarpa* Kunth; culmis simplicibus; calycibus 6-bracteatis sepalis obtusis. In P. b. Spei. 2.

2. *D. ebracteata* Kunth; culmis simplicibus; calycibus ebracteatis; sepalis acutato-pungentibus. Restio equisetaceus Rchb. In P. b. Spei. 2.

3. *D. microcarpa* Kunth; culmo virgato ramosissimo; calycibus 2-3-bracteatis. In P. b. Spei. 2.

5083. LEPYRODIA R. Br. (1810).

1. *L. gracilis* R. Br. culmis subramosis; vaginis strictis; spicae compositae ramis inferioribus remotiusculis; perianthii foliolis exterioribus brevioribus. In Nov. Holl. 2.

2. *L. stricta* R. Br. culmis simplissimis; vaginis strictis; spicae compositae ramis subapproximatis; perianthii subaequalibus. In Nov. Holl. 2.

3. *L. scariosa* R. Br. culmis simplicibus; vaginis laxis; spicae compositae ramis imbricatis divisis; perianthii foliolis interioribus minoribus. L. hermaphrodita Sieb. In Nov. Holl. 2.

4. *L. hermaphrodita* R. Br. culmis simplicibus; vaginis laxis; spicas subsimplicibus; floribus hermaphroditis. Beauv. et Desv. ann. sc. nat. 1828. t. 3. f. 3. In Nov. Holl. 2.

5084. RHODOCOMA Nees. (1840).

1. *R.* Nees. In P. b. S. 2.

5085. LOXOCARYA R. Br. (1810).

1. *L. cinerea* R. Br. In Nov. Holl. 2. Culmi aphylli, paniculati, ramulis flexuosis filiformibus; floribus solitariis.

5086. RESTIO L. (1737).

A. Species capenses.

a. *Styli duo connati rarissime distincti.*

1. *Spicae feminineae pluriflorae.*

1. *R. aristatus* Thunb. diss. t. 3. f. 4. vaginis margine membranaceis aristatis; spicas terminalibus solitariis; squamis ovato-oblongis aristatis nigrocastaneis aristis rectis; antheris mucronatis. R. squarrosis Lam. ill. t. 804. f. 1. In P. b. Spei. 2.

2. *R. echinatus* Kunth; culmis simplicibus 3-spicatis; spicis aperte vaginatis cylindricis; squamis lanceo-lato-subulatis recurvo-squarrosis florem paulo superantibus; sepalis exterioribus longioribus; antheris mucronatis. *In P. b. Spei.* 2.

3. *R. ocreatus* Kunth; culmis ramosis; vaginis laxis acuminatis; spicis solitariis vel geminis cylindricis; squamis ovatis acuminatis aristatis ferrugineis; sepalis subaequilongis subulatis; stylo elongato. *In P. b. S.* 2.

4. *R. setiger* Kunth; culmis ramosis, ramis simplicibus; vaginis arctis hyalinis albo-aridis aristatis; spicis solitariis v. geminis lanceolatis; squamis ovatis ferrugineis margine albidis aristatis; ovario biloculari; stigmatibus elongatis. *In P. b. Spei.* 2.

5. *Iuccaeanus* Kunth; culmis ramosis ramis erectis; vaginis laxis albo-aridis bifido-aristatis; spicis sessilibus cylindricis; squamis ovatis albo-aridis subaristatis florem aequinutibus; sepalis exterioribus acuminatis. *R. dichotomus* Willd. *R. incurvatus* Eckl. *In P. b. Spei.* 2.

6. *S. fraternus* Kunth; culmis ramosis; ramis patulis; spicis masculis in apice ramorum paucis, cylindricis sessilibus; squamis lato-ovatis castaneis aristatis florem vix superantibus apice subrecurvis. *In P. b. Spei.* 2.

7. *R. fiurenoides* Kunth; culmis subramosis, ramis erectis; vaginis arctis bifido-aristatis; spicis spicato-glomeratis; squamis lato-ovatis acuminatis ferrugineis apice recurvis; sepalis lateralibus obtusiusculis. *In P. b. Spei.* 2.

8. *R. taniger* Kunth; culmis ramosis; ramis erectis; vaginis arctis apice lanatis; spicis geminis acutis; squamis ovato-oblongis pallide castaneis; sepalis exterioribus acutis. *In P. b. Spei.* 2.

9. *R. Sieberi* Kunth; culmis ramosis; vaginis arctis mucronatis; spicis ad ramos 2—3 cylindricis acutis; squamis ovatis ferrugineis mucronatis; sepalis lateralibus obtusiusculis. *R. triflorus* Sieb. *In P. b. Spei.* 2.

10. *R. Gaudichaudianus* Kunth; culmis ramosis ramisque subtilissime punctulatis; vaginis laxis patulo-recurvis apice aridis laceris; spicis cylindricis acutis arcuatis; squamis late

ovatis castaneis acutis; sepalis exterioribus acutiusculis. *In P. b. Spei.* 2.

11. *R. venustulus* Kunth; culmis ramosis, ramis elongatis erectis, vaginis subaristatis apice lanam emitentibus; spicis paniculatis; squamis late ovatis castaneo-fuscis; sepalis exterioribus obtusis. *In P. b. S.* 2.

12. *R. intermedius* Kunth; culmis ramosis ramisque obsolete tuberculatis fastigiatis; vaginis arctis mucronatis; spicis cylindricis acutis subcurvatis paniculatis; squamis ellipticis acutis castaneo-fuscis mucronatis; sepalis exterioribus obtusiusculis. *In P. b. Spei.* 2.

13. *R. ritis* Kunth; culmis ramosis tuberculosis; vaginis arctis aridis laceris; spicis masc. cylindricis acutis paniculatis; squamis ovatis subulatis; sepalis exterioribus acutatis. *In P. b. Spei.* 2.

14. *R. macer* Kunth; culmis ramosis, ramis subfastigiatis; vaginis arctis bilobo-aristatis; spicis remotis cylindricis ad apices ramorum subternis; sepalis exterioribus sebro-carinatis acutis. *In P. b. Spei.* 2.

15. *R. scoparius* Kunth; culmis virgato-ramosissimis; ramis subfastigiatis; spicis solitariis cylindricis; squamis ovatis mucronatis ferrugineis; ovario complanato biloculari; stylo elongato. *In P. b. Spei.* 2.

16. *R. schoenoides* Kunth; culmis basi repente dense squamosis; ramis elongatis; vaginis acutis subaristatis; spicis oblongis; squamis ovato-acuminatis castaneis margine hyalino; sepalis exterioribus acute subulatis; stylis elongatis. *In P. b. Spei.* 2.

17. *R. triflorus* Rottb. ic. t. 2. f. 2. culmis subramosis tuberculosis, sterilibus ramosissimis; vaginis arctis hyalinis laceris aridis; spicis paucis remotis ovato-oblongis; squamis ovatis obtusis fuscis; sepalis lateralibus subulatis. *In P. b. S.* 2.

18. *R. Gurnolianus* Kunth; vaginis arctis mucronatis; spicis 3 v. plurimis subclavatis acutis; squamis late ovatis mucronatis castaneis; sepalis exterioribus acutis; antheris mucronatis. *In P. b. S.* 2.

19. *R. miser* Kunth I. c. culmis simplicibus subcompressis; vaginis arctis mucronatis; spicis 3 sessilibus ellipticis; squamis ellipticis obtusis fuscis;

sepalis exterioribus obtusiusculis. In P. b. S. 2.

20. *R. ferrugineus* Lk. hb. Berl. culmis ramosissimis virgatis; ramis fasciculatis; vaginis laxis apice hyalinis aristatis; spicis masc. 3—9 cylindricis, fructiferis clavatis; squamis late ovatis acutis fuscis hyalino-marginatis obtusis v. acutis; antheris acutis. In P. b. S. 2.

b. Spicae semineae 1—2-florae.

21. *R. tenuissimus* Kunth l. c. culmis filiformibus ramosissimis; vaginis arctis sub apice hyalinis; staminibus 2; stylis 2 elongatis inferne connatis; stigmatibus plumosis. In P. b. S. 2.

22. *R. rottboellioides* Kunth l. c. culmis erecto-ramosis; vaginis rotundato-emarginatis; spicis masculis 4—7, sessilibus adpressis bifloris, femineis 1-floris remotis; stylo elongato, stigmatibus plumosis revolutis. In P. b. S. 2.

23. *R. curviramis* Kunth l. c. culmis dichotomo-ramosissimis; vaginis laxis apice albo-arido bifido mucronatis; spicis masculis cylindricis; squamis ferrugineis mucronatis; sepalis lateralibus carina superne villosiusculis. In P. b. S. 2.

B. Species anomatae.

Stigmata 3 sessilia distincta villosa-plumosa. Ovarium biloculare.

24. *R. xyridioides* Kunth l. c. culmis in ramos paucos fastigiatis divisis; vaginis apice in folium erectum desinentibus; spicis 2—10, elliptico-oblongis acutis; squamis ovatis acutis olivaceis; sepalis rigidis acutis; stylis 3. In P. b. S. 2.

25. *R. strobilifer* Kunth l. c. culmis ramosis fastigiatis; vaginis arctis apice arido bifido-lacero mucronatis; squamis late ovatis castaneis femaleis rotundatis hyalino-marginatis; sepalis carina ferrugineo-villosis; capsulis complanatis subrotundis. In P. b. S. 2.

26. *R. pachystachys* Kunth l. c. culmis ramosis; vaginis arctis apice arido mucronatis; spicis ellipticis multifloris; squamis obovatis cuspidiatis castaneo-fuscis; sepalis lateralibus

ferrugineo-villosis; stigmatibus longissimis villosulis. In P. b. S. 2.

27. *R. oligostachys* Kunth l. c. culmis ramosis; vaginis arctis obtusis mucronatis; spicis oblongis plurifloris; squamis ovato-oblongis castaneis mucronatis; sepalis rigidis acutis; stigmatibus 3 sessilibus; caps. complanata. In P. b. S. 2.

28. *R. Pseudo-leptocarpus* Kunth l. c. culmis simplicibus; spicis solitariis v. geminis oblongis sessilibus; squamis laxis ovatis mucronatis fuscis; antheris obtusis muticis; stigmatibus 3 distinctis. In P. b. S. 2.

29. *R. callistachys* Kunth l. c. culmis virgato-ramosis; vaginis arctis apice rotundato-subulatis; spicis sessilibus oblongis; squamis ovalis mucronatis fuscis; sepalis exterioribus acutatis; stigmatibus 3 subsessilibus. In P. b. S. 2.

30. *R. tetragonus* Thunb. culmis ramosis 4-angularibus, ramo sterili ramosissimo folioso; vaginis aristatis subulatis; squamis ovatis acutis fuscis margine hyalinis. In P. b. S. 2.

31. *R. polystachys* Kunth l. c. culmis tenuiter ramosis ramis fastigiatis; vaginis arctis mucronulatis; spicis 6—9 remotis sessilibus oblongis; squamis ovato-oblongis mucronatis ferrugineis florem superantibus; sepalis obtusis, carina superne villosis; antheris acutis. In P. b. S. 2.

32. *R. spinulosus* Kunth l. c. culmis trigonis ramosis punctulatis; vaginis arctis obtusis; spicis sessilibus oblongis vagina acuminata spicam superante instructis; sepalis obtusis carina albido-villosis. In P. b. S. 2.

33. *R. compressus* Rottb. gr. t. 2. f. 4. culmis ramosis, ramis fastigiatis subcompressis; vaginis arctis longe mucronatis; spicis sessilibus oblongo-lanceolatis; squamis laxe imbricatis oblongis acutis florem duplo superantibus ferrugineis; sepalis rigidis carina ferrugineo-villosis. In P. b. S. 2.

34. *R. impolitus* Kunth l. c. culmis dichotomo-ramosis, ramosis densissime punctulato-verruculosis; vaginis laxis verruculosis sub apice bifido-mucronatis ferrugineis florem duplo superantibus; sepalis carina superne subtilissime alatis. In P. b. S. 2.

35. *R. sulcatus* Kunth l. c. culmis simplicibus compressis sulcato-angulatis; spica mascula terminali solita-

ria oblonga; squamis ellipticis mucronatis fuscis; sepalis lateralibus obtusis carina glabris. In P. b. S. 2.

* Microstachya e.

36. *R. capillaris* Kunth l. c. culmis ramosis, ramis filiformibus verruculo-punctulatis; vaginis arctis mucronatis squamam dorso glabram amplectentibus; spicis masc. paniculatis, feminis 1-floris solitariis; squamis oblongis fuscis, feminis lanceolatis; capsula oblique ovata papyracea. In P. b. S. 2.

37. *R. depauperatus* Kunth l. c. culmis dichotome ramosissimis, ramis compressis fusco-punctulatis; squamis dorso villosis; stylis 2 distinctis, stigmatibus elongatis intus plumosis. In P. b. S. 2.

38. *R. deplexus* Kunth; culmis ramosissimis filiformibus verruculosopunctulatis subcurvatis; spicis subspicatis rotundatis; squamis late ovalis mucronatis castaneis albo-marginatis; antheris obtusis muticis. In P. b. S. 2.

39. *R. graminifolius* Kunth; culmis ramosissimis; ramis compresso-incipitibus ferrugineo-punctulatis elongatis; vaginis foliiferis; spicis masculis cylindricis altera sessili spicatis; squamis dorso ferrugineis; antheris obtusis muticis. In P. b. S. 2.

40. *R. leptostachys* Kunth l. c. culmis ramosissimis; ramis filiformibus elongatis; vaginis sub apice bifido arido longe mucronatis; squamis lanceolatis acutis fuscis; sepalis carina glabris; antheris mucronulatis. In P. b. S. 2.

C. Species dubiae.

41. *R. alboaristatus* Nees; culmo simplici aphylo enodi compresso; spicis terminalibus ternis; squamis alboaristatis. In P. b. S. 2.

42. *R. vaginatus* Thunb. culmo sub-simplici stricto; vaginis arctis mucronatis; spicis alternis solitariis; squamis ovato-ellipticis acuminatis; calycibus in carina villosis. *R. squarrosum* Steud. In P. b. S. 2.

43. *R. elongatus* Thunb. culmo simplici aphylo laevi; spicis alternis ovatis erectis ramosis; squamis laceris obtusis. In P. b. S. 2.

44. *R. dubius* Thunb. culmo filiformi bifido dichotomove laxo; vaginis arctis mucronato-foliaceis; spicis alternis rarius solitariis; squamis orbiculato-ovatis mucronatis; sepalis carina fulvo-hirsutis. *R. monostachyus* Steud. In P. b. S. 2.

45. *R. distichus* Rottl. ic. 6. t. 7. f. 5. culmis adscendentibus dichotomoramosis teretibus; ramis strictissimis apice monostachyis; spicis oblongis distichis; squamis lanceolatis convoluto-subulatis basi truncatis; sepalis 2 exterioribus navicularibus, carina unius hirsutissima alterius pubescente. In P. b. S. 2.

46. *R. digitatus* Thunb. culmo simplici dichotomove tereti punctulato; ramulis sterilibus fastigiatis rectis; vaginis spathisque subulato-cuspidatis; spicis terminalibus ternis ovalibus squamisque obtusis laevibus. *Willdenowia tristachya* Spr. In P. b. S. 2.

47. *R. quinquefarius* Nees; culmo decumbente dichotomo laevi; vaginis herbaceo-cuspidatis; spiculis paucis solitariisve approximatis appressis oblongis; squamis ovatis obtusiusculis submucronatis inflatis 5-fariis. In P. b. S. 2.

48. *R. dichotomus* L. culmo basi folioso simplici dichotomove; vaginis apice membranaceis infra apicem mucronatis; spicis 1—6 oblongis acutis appressis; squamis imbricatis obtusis cum mucronulo infra apicem. *R. vimineus* Rottl. ic. t. 2. f. 1. In P. b. S. 2.

49. *R. pauciflorus* Poir. culmis ramosis foliosis floriferis; spiculis subglomeratis rarischis terminalibus; squamis imbricatis ovalibus obtusis. In P. b. S. 2.

50. *R. debilis* Nees; culmo filiformi dichotomo tereti punctulato; vaginis convolutis setaceo-acuminatis; spiculis ternis sessilibus paucifloris sub anthesi cuneiformibus; squamis ovatis obtusiusculis. *Thamnochortus debilis* Spr. In P. b. S. 2.

51. *R. multiflorus* Spr. culmo ramosissimo; ramis fasciculatis omnibus spicigeris; vaginis apice membranaceis bifidis lacerisve spicis singulis 4-nis ovato-oblongis appressis; squamis ovatis subulato-acuminatis. In P. b. S. 2.

52. *R. acuminatus* Thunb. culmo simplici aphylo; panicula erecta;

squamis aristatis; sepalis concavis ovatis obtusis minimis. In P. b. S. 2.

53. *R. nutans* Thunb. culmo simplici aphylo; spicis oblongis cylindricis cernuis; squamis laceris acuminatis. In P. b. S. 2.

54. *R. fruticosus* Thunb. culmo simplici folioso; panicula composita; squamis scariosis laceris. In P. b. S. 2.

55. *R. cuspidatus* Thunb. culmo ramoso folioso tereti; stipulis scariosis; squamis aristatis. In P. b. S. 2.

56. *R. squamosus* Thunb. culmo ramoso tereti; ramis alternis squamosis; spicis globosis erectis; sepalis 3-gonis acutis glabris. In P. b. S. 2.

57. *R. glomeratus* Thunb. culmo dichotomo aphylo laevi; panicula glomerata; squamis ovatis acutis flavescentibus fusco-irroratis glabris. In P. b. S. 2.

58. *R. simplex* Thunb. culmis simplicibus filiformibus tenuissime striatis; spicis alternis solitariis et aggregatis breve pedunculatis; squamis ovatis concavis sub apice carinatis acuminatis. In P. b. S. 2.

59. *R. lucens* Poir. culmis compressis; ramis angulatis; panicula diffusa; spiculis oblongis lutescentibus; squamis marginibus scariosis. In P. b. S. 2.

II. Species novaehollandiae.
Flores dioici. Stam. 2—3. Stylos 2—3-partitus. Caps. 2—3-locularis 2—3-loba angulitis dehiscens.

a. Culmus simplex.

60. *R. monocephalus* R. Br. culmis teretibus hinc sulcatis monostachyis; medio vagina subsolitaria laxa; amento ovato; squamis obtusis; perianthii 6-glumis; stylo bipartito. In Nov. Holl. 2.

61. *R. deformis* R. Br. culmis teretibus striatis paucifloris; vaginis strictis acuminatis; amentis alternis subpedunculatis ovatis; squamis aristato-acuminatis; calyce 5-sepalo. In Nov. Holl. 2.

62. *R. taxus* R. Br. culmis teretibus striatis paucifloris; vaginis laxis obtusis; amentis alternis ovatis; squamis aristato-acuminatis; calyce 6-sepalo; stylo 3-partito. In Nov. Holl. 2.

63. *R. australis* R. Br. culmis teretibus laevissimis; vaginis obtusis; spica multiflora; bracteis amento ovato longioribus; squamis acuminato-aristatis margine lanatis; calyce fem. 4-sepalo; stylo bipartito. In Nov. Holl. 2.

64. *R. patens* R. Br. culmis teretibus laevibus; vaginis strictis obtusis; spica multiflora ramosa; bracteis amento subgloboso brevioribus; squamis aristatis nudis; calyce 6-sepalo. In Nov. Holl. 2.

65. *R. gracilis* R. Br. culmis teretibus laevibus; vaginis strictis obtusis; spica multiflora subcomposita; amentis cylindricis acutis bracteas superantibus; squamis aristatis; sepalis 4; stylo bipartito. In Nov. Holl. 2.

66. *R. complanatus* R. Br. culmis compressis; vaginis strictis; racemo simplici v. ramoso; amentis erectis masculis ovatis feminis oblongis utriusque squamis lanceolatis aristatis; calyce 4-sepalo; stylo bipartito. In Nov. Holl. 2.

67. *R. tremulus* R. Br. culmis compressis; paniculae ramis umbellatis capillaribus simplicissimis; amentis pendulis globosis; squamis acuminatis; sepalis 6 nudis; stylo bipartito. In Nov. Holl. 2.

68. *R. applatus* R. Br. culmis compressis; paniculae ramis divisis; mascula laxa pendula; feminea congesta; amentis subglobosis; squamis acutiusculis; calyce 6-sepalo; stylo tripartito. In Nov. Holl. 2.

69. *R. Brownei* R. Br. culmis teretibus laevibus; panicula simplici; pedicellis subumbellatis capillaribus indivisis; amentis nutantibus ovalioblongis; squamis acutissimis; sepalis 5 inaequalibus, 3 interioribus obtusis spathulatis. In Nov. Holl. 2.

70. *R. cinerascens* R. Br. culmis teretibus cinerascentibus; panicula simplici pauciflora; pedicellis tomentosis; amentis pendulis ovalibus; squamis ellipticis mucronatis; sepalis 6 acutiusculis. In Nov. Holl. 2.

71. *R. diffusus* Spr. culmis teretibus glabris; panicula effusa, ramis divisis; amentis pendulis ovalibus acutis; squamis inferioribus ovatis submuticis acuminatis; sepalis 6 acutis. R. Iaxus R. Br. no. 12. In Nov. Holl. 2.

72. *R. tropicus* R. Br. culmis teretibus; panicula effusa; ramis ramulisque alternis; amentis subsessilibus ovalibus; squamis omnibus acuminateis nitentibus; sepalis 5 acutis. *In Nov. Holl.* 2.

73. *R. microstachys* R. Br. culmis teretibus cinerascentibus; panicula effusa laxa; ramis divisus; amentis paucifloris; squamis acuminatis; perianthii masculis 5 glaucis acutis. *In Nov. Holl.* 2.

2. Culmus ramosus.

74. *R. claratus* R. Br. culmis ramosis filiformibus; paniculis effusis tremulis; ramis parum divisus simplicibus; amentis pendulis oblongo-clavatis; squamis ovatis acutis; sepalis 6. *In Nov. Holl.* 2.

75. *R. fastigiatus* R. Br. culmis supra paniculatis fastigiatis; ramulis compressis spiciferis; amentis ovalibus, lateralibus sessilibus; bracteis cucullatis; squamis ovatis obtusis; sepalis 5 subaequalibus. *In Nov. Holl.* 2.

76. *R. dimorphus* R. Br. culmis supra paniculatis; vaginis laxis mucronulatis; ramulis spicatis; amentis distantibus subsessilibus ovatis; squamis acuminatis margine pubescentibus; sepalis 6; capsulis 3-locularibus. *In Nov. Holl.* 2.

77. *R. crispatus* R. Br. culmis supra paniculatis; ramulis flexuosis; amentis alternis subpedunculatis; squamis ovatis mucronulatis nudis; sepalis 6-glumis. *In Nov. Holl.* 2.

78. *R. sphacelatus* R. Br. culmis paniculatis glabris; ramis compressis flexuosis uncinatisque; vaginis sphacelatis obtusissimis mucronulatis margine ciliatis; amentis terminalibus solitariis ovatis; squamis ovalibus mucronulatis; sepalis 6. *In Nov. Holl.* 2.

79. *R. pubescens* R. Br. culmis ramosis; ramis alternis paniculatis pubescentibus curvatis; amentis terminalibus subaggregatis squamisque ovatis obtusiusculis nudis, sepalis 6 aequalibus. *In Nov. Holl.* 2.

80. *R. fascicularis* R. Br. culmis teretibus; vaginis ore barbatis; ramis alternatim fasciculatis simplicissimis strictis, sterilibus subulatis; fertilibus monostachyis; amentis ovalibus paucifloris. *In Nov. Holl.* 2.

81. *R. lateriflorus* R. Br. culmis ramosis vaginis ore sublanatis incurvatis; amentis sessilibus distantibus paucifloris; squamis mucronatis; sepalis 6. *Calorophus elongata* Labill. nov. *Holl.* t. 228. *Lepyrodia* Spr. *In Nov. Holl.* 2.

82. *R. flexuosus* R. Br. culmis ramosissimis; ramis flexuosis; vaginis mucronatis ore lanatis nunc ramis sterilibus fasciculatis brevissimis; amentis paucifloris terminalibus; squamis mucronatis; sepalis 6. *In Nov. Holl.* 2.

83. *R. tetraphyllum* Labill. I. c. t. 226 et 227. culmis semiteretibus; vaginis obtusis; ramulis sterilibus alternatim fasciculatis dichotomis sub-setaceis; panicula terminali composita; amentis pedunculatis globoso-ovatis; squamis acuminatis; sepalis 4—6. *In Nov. Holl.* 2.

5087. SCHOENODUM Labill. (1806).

1. *S. tenax* Labill. t. 229. excl. planta masc. spicis femineis 5—8 approximatis in ramo geminis altera sessili altera pedunculata; squamis ovatis acuminato-subulatis subsquarrosis; sepalis lateralibus alatis. *Leptocarpus* R. Br. *Restio gracilis* Sieb. *In Nov. Holl.* 2.

2. *S. simplex* Kunth; spicis fem. crebris in spicam compositam dispositis oblongis plurifloris; ramis sub-3-stachyis appressis basi vaginatis; squamis ovato-ellipticis apice rotundatis mucronatis arctis; sepalis lateralibus apteris. *Restio Forst.* *Leptocarpus* R. Br. *In Nov. Holl.* 2.

3. *S. scariosum* Kunth; panicula coaretata simplici; amentis spicatis imbricatis ovatis; squamis acuminatis axillis barbatis; perianthii glumis interioribus margine lanatis; culmo simplicissimo. *Leptocarpus* R. Br. *In Nov. Holl.* 2.

5088. STABEROHA Kunth. (1841).

1. *S. imbricata* Kunth syn. III. p. 442. spicis solitariis squamis ovatis superne angustatis obtusis subsquarrosis; sepalis exterioribus lateralibus acutis carina late alatis ala inferne retrorsum inciso-lobata. *Restio*

imbricatus Thunb. diss. f. 1. *Leptocarpus* R. Br. *In P. b. S. 2.*

2. *S. stenoptera* Kunth l. c. spicis geminis; squamis ovatis apicem versus acuminatis squarrosis; sepalis exterioribus lateralibus apice emarginatis dorso anguste alatis, ala integra. *In P. b. S. 2.*

3. *S.? distachya* Kunth; spicis geminis; squamis oblongo-lanceolatis acutis mucronatis; sepalis exterioribus lateralibus apice libero subulato, carina latissime alata, ala integra. *Restio Rottb. ic. t. 3. f. 5. Leptocarpus* R. Br. *In P. b. S. 2.*

5089. CALOPSIS Desv. (1828).

1. *C. paniculata* Desv. ann. sc. nat. 1828. t. 3. f. 2. culmis paniculato - ramosissimis; ramis teretibus erecto-patulis, nonnullis sterilibus ramosissimis et foliosis; vaginis aridis bifidis lamellato-laceratis; spicis paniculatis; squamis mucronatis ferrugineis apice margineque arido-albidis; fructibus 3-costatis. *Restio Rottb. ic. t. 2. f. 3. In P. b. S. 2.*

2. *C. tritcea* Kunth l. c. culmis subdichotomo - ramosis, his elongatis; vaginis apice arido bifido et lacerato-mucronatis; spicis 2—7 approximatis oblongis; squamis ovato - oblongis acutis ferrugineis florem superantibus; sepalis obtusis lateralibus carina villosis; stigmatibus 3 distinctis sessilibus. *Restio Rottb. ic. t. 3. f. 1. In P. b. S. 2.*

3. *C. festucacea* Kunth. l. c. culmis ramosis; ramis solitariis; vaginis laxis curvato-patulis eroso-truncatis; spicis paniculatis sessilibus obovatis; squamis ovato-oblongis subulatis patulis castaneis; sepalis lateralibus carina piloso-hirsutis; fructibus 3-angularibus, angulis tumidis. *In P. b. S. 2.*

4. *C. hirtella* Kunth l. c. culmis ramosis ramisque hirtellis; vaginis laxis apertis patulis oblongis aristatis; paniculis simplicissimis strictis; spicis oblongo - cylindricis acutis; squamis late ovatis ferrugineis; sepalis exterioribus carina hirsuto - pilosis. *In P. b. S. 2.*

5. *C. peronata* Kunth; culmis ramosis; vaginis laxis patulis mucronatis; paniculis simplicissimis strictis;

spicis lanceolato - cylindricis acutis; squamis apice hyalino-marginatis mucronatis; sepalis exterioribus in carina pilosis; antheris subaristatis. *In P. b. S. 2.*

6. *C. oxylepis* Kunth l. c. culmis ramosis; vaginis laxis apertis obtusis mucronatis; spicis spicatis inferioribus geminatis altera sessili; squamis caustaneo-fuscis hyalino-marginatis mucronatis; sepalis obtusis, carina extus hirsuto-pilosus. *In P. b. S. 2.*

7. *C. incurvata* Kunth; culmis diffusis teretibus fertilibus elongatis, sterilibus ramosissimis foliosis; vaginis laxis recurvo - patulis aristatis; spiculis spicatum approximatis cylindricis; squamis late ovatis apice rotundato-acutis stramineo-fuscescentibus florem duplo superantibus; sepalis obtusis carina externe villosulis; antheris acutiusculis. *Restio Thunb. R. vimineus Rottb. ic. t. 2. f. 1. In P. b. S. 2.*

5090. THAMNOCHORTUS R. Br. (1810).

1. *T. platypterus* Kunth syn. III. p. 429. culmis simplicibus; vaginis arctis acutis; spicis 2—3 sessilibus obovatis; squamis ovato - lanceolatis acutis pallide ferrugineis margine hyalinis; sepalis lateralibus latissime alatis; fructibus lenticulari - conpressis rostratis. *In P. b. S. 2.*

2. *T. Ecklonianus* Kunth l. c. rhizome repente; culmis caespitosis teretibus lepidoto-punctulatis; simplicibus v. inferne ramosissimis; vaginis apice laceratis fuscis; squamis ovato-lanceolatis subulatis ferrugineis; sepalis exterioribus carina late alatis. *In P. b. S. 2.*

3. *T. scariosus* R. Br. culmis ramosis dense albo - tomentosis; ramis sterilibus ramosissimus foliosis hirsutis; squamis ovato - lanceolatis acutis ferrugineis; sepalis exterioribus lateralibus late alatis; fructibus oblique oblongis obsoletissime punctulatis. *Restio Thunb. T. capensis Berg. cap. t. 5. f. 8. In P. b. S. 2.*

4. *T. argenteus* Kunth; culmis simplicibus v. ramosis dense molliter sericeo - tomentosis; ramis sterilibus ramosissimis villo destitutis; vaginis arctis mucronatis; spicis pendulis;

squamis ovato-lanceolatis subulatis ferrugineis; sepalis exterioribus carina angustissime alatis. Restio Thunb. In P. b. S. 2.

5. *T. consanguineus* Kunth; culmis simplicibus; vaginis arctis apice laceratis; panicula ramosa cymosa; ramis flaccidis; squamis lanceolatis acutis fuscis; sepalis exterioribus anguste alatis. In P. b. S. 2.

6. *T. bromoideus* Kunth; culmis ramosis; ramis elongatis erectis; vaginis acutis apice laceratis; spicis cylindricis multifloris; squamis ovato-lanceolatis acutis ferrugineis; sepalis exterioribus carina angustissime alatis reliquis brevioribus. In P. b. S. 2.

7. *T. dichotomus* R. Br. culmis fertilibus simplicibus, sterilibus ramosissimis; vaginis arctis mucronatis, floralibus apice lamellato-laceratis; panicula cymosa; spicis oblongis plurifloris; squamis ovato-oblongis acutis subulatis castaneis margine albido; sepalis exterioribus subulatis; antheris mucronatis. Restio Rottb. ic. t. 1. f. 1. *R. viminens* L. *R. nutans* Thunb. In P. b. S. 2.

8. *T. modestus* Kunth; culmis simplicibus vaginis arctis lamellato-laceris hyalino-aridis; panicula terminali cymosa, ramis flaccidis; squamis ellipticis sub apice obtuso obsoletissime mucronatis castaneo-fuscis margine albidis; sepalis exterioribus apteris; antheris mucronulatis. In P. b. S. 2.

9. *T. floribundus* Kunth; culmis simplicibus; vaginis arctis mucronatis, lamellato-laceris; panicula terminali composita; spicis oblongis plurifloris; squamis ovato-oblongis acutis castaneis margine albidis; sepalis exterioribus mucronatis angustissime alatis. In P. b. S. 2.

10. *T. giganteus* Kunth; culmis simplicibus inferne sterilibus fasciculatis capillaceo-ramosissimis foliosis instructis; vaginis arctis apice irregulariter laceris; panicula terminali composita; squamis ovato-ellipticis obtusis castaneis; sepalis exterioribus lateribus apteris. In P. b. S. 2.

11. *T. robustus* Kunth; culmis virgato-ramosissimis ramis subfastigiatis omnibus sterilibus; vaginis arctis subulatis; panicula oblonga conferta; spicis subsessilibus ovato-ellipticis; squamis late ovatis acuminatis castaneis margine albidis; sepalis exterio-

ribus apteris glabris; antheris muticis. In P. b. S. 2.

12. *T. virgatus* Kunth; culmis virgato-ramosissimis ramis omnibus sterilibus fastigiatis; vaginis arctis subulatis; panicula solitaria conferta, ramis fasciculatis; squamis late ovatis obtusis muticis ferrugineis apice margineque hyalino-albidis; sepalis apice rotundatis apteris; antheris muticis. Restio Rottb. ic. t. 1. f. 2. *Elegia paniculata* Pers. In P. b. S. 2.

13. *T. strictus* Kunth; culmis simplicibus strictis; vaginis arctis mucronatis; panicula terminali simplici oblonga; ramis subfasciculatis; spicis ovato-ellipticis multifloris; squamis late ovatis acuminatis castaneis margine albidis; sepalis exterioribus acutis apteris; antheris apice attenuatis muticis. In P. b. S. 2.

14. *T. scirpooides* Kunth; culmis simplicibus strictis; vaginis arctis acute mucronatis; panicula-ramosa conferta; ramis fasciculatis; spicis subrotundo-ellipticis; squamis ovatis acutis fuscescentibus apice margineque albidis; sepalis lateralibus obtusis apteris; antheris acutis. In P. b. S. 2.

15. *T. aemulus* Kunth; culmis simplicibus; vaginis arctis mucronatis; pedunculis tribus e summa vagina pendulis; spicis obovato-turbinatis apice rotundatis multifloris; squamis oblongis acutis flore duplo longioribus; antheris acutis aristulatis. In P. b. S. 2.

16. *T. cernuus* Kunth; culmis simplicibus; vaginis arctis acuminatis; pedunculis 1-2 e summa vagina pendulis uno 2-altero 1-stachyo; spicis obovatis; squamis ferrugineis oblongis obtusis subcucullatis; sepalis exterioribus acutis apteris; antheris mucronulatis. Restio Thunb. diss. f. 2. In P. b. S. 2.

17. *T. umbellatus* Kunth; culmo simplici aphylo; spicis umbellatis ovatis; squamis oblongis obtusis. Thunb. diss. no. 5. f. 3. In P. b. S. 2.

18. *T. spicigerus* R. Br. culmis simplicibus; spicis subcylindricis 6-gonis masculis effusis, femineis racemosis majoribus; squamis apice patulis concavis acuminatis, femineis late lanceolatis acutis; sepalis exterioribus apteris. Thunb. diss. f. 5, 6. In P. b. S. 2.

19. *T. micans* Kunth; culmo ramoso monophyllo punctulato-micante; vaginis arctis herbaceo-cuspidatis; spiculis lanceolatis spicatis in ramis paniculae nutantibus; squamis ovatis mucronatis. Restio Nees. In P. b. S. 4.

5091. *LEPTOCARPUS* R. Br.
(1810).

1. *L. aristatus* R. Br. fasciculis alternis superioribus aggregatis; squamis subbifloris; sepalis 3 exterioribus subulatis cartilagineis interioribus brevioribus muticis linearis-oblongis; culmo simplicissimo. In Nov. Holl. 4.

2. *L. elatior* R. Br. paniculae ramis divisis; fasciculis capitato-spicatis; bracteis ovatis; calycibus feminis subaequalibus margine tenuissime pubescens; culmo tereti simplici. In Nov. Holl. 4.

3. *L. ramosus* R. Br. paniculae ramis divisis; fasciculis capitatis; calycis sepalis interioribus margine dense lanatis; culmo ramoso. In Nov. Holl. 4.

4. *L. spathaceus* R. Br. spicis parum divisis paniculatis; sepalis mucronatis nudis; pericarpiis nucamentaceis; culmis subramosis teretiusculis; vaginis subulato-mucronatis. In Nov. Holl. 4.

5092. *ELEGIA* Thunb. (1799).

1. *E. deusta* Endl. culmis simplicibus; panicula simplicissima conferta subsecunda; sepalis interioribus, oblongo-lanceolatis subfalcato-curvatis exterioribus ovatis mucronatis carina villosulis. Chondropetalum Rottb. ic. t. 3. f. 2. Restio tectorum L. R. Chondropetalum Zeyh. In P. b. S. 4.

2. *E. nuda* Endl. culmis simplicibus; panicula glomerata spicaeformi denudata, ramis adpressis; bracteis late obovatis; sepalis interioribus ovatis acutis, exterioribus apice uncinato-inflexis; ovario 3-loculari; stylis 3 brevissimis. Chondropetalum Rottb. ic. t. 3. f. 3. Restio Zeyh. In P. b. S. 4.

3. *E. racemosa* Pers. culmis simplicibus teretibus farctis; vaginis deciduis; panicula ramosa spicaeformi, ramis erecto-adpressis; bracteis ovato-

orbicularibus; sepalis fem. ovato-oblongis obtusis, lateralibus carina subtilissime serrulato-scabris. Restio Lam. ill. t. 804. f. 1. In P. b. S. 4.

4. *E. juncea* L. culmis simplicibus teretibus farctis; vaginis deciduis; panicula ramosa spicaeformi; sepalis masc. interioribus obovato-oblongis exteriora rotundato-ovata acuta 4-plo superantibus. Restio Zeyh. In P. b. S. 4.

5. *E. thyrsifera* Pers. culmis simplicibus teretibus farctis; panicula ramosa spicaeformi; bractea suborbiculari apice rotundata; sepalis masculis obtusis navicularibus, interior. oblongis exterior. ovatis, feminine obtusis glabris; stigmatibus plumosis, recurvatis. Restio erectus Thunb. R. thyrsifera Rottb. ic. t. 3. f. 4. Lam. ill. t. 804. f. 3. In P. b. S. 4.

6. *E. fistulosa* Kunth syn. 3. p. 467. culmis simplicibus fistulosis; panicula strobiliformi; vaginis spathaeformibus ovato-oblongis acutis; sepalis elliptico-oblongis obtusis naviculari-carinatis; ovarii pyriformibus triquetris; stigmatibus intus villosis recurvatis. In P. b. S. 4.

7. *E. parriiflora* Kunth; culmis simplicibus filiformibus farctis; vaginis apertis deciduis; paniculis strobiliformibus; vaginis oblongis papyraceo-membranaceis pallide ferrugineis; sepalis obtusis masculis exterioribus brevioribus; fructu pyriformi stigmate triplici recurvato villoso coronato. Restio Thunb. In P. b. S. 4.

8. *E. Dregeana* Kunth; culmis simplicibus teretibus farctis; vaginis remotissimis convolutis; paniculis confertis; sepalis acuminato-subulatis masculis hispido-scabris, fem. punctato-asperis. In P. b. S. 4.

9. *E. panicoides* Kunth; culmis verticillato-ramosis; vaginis culmeis late lanceolatis acuminatis; panicula valde ramosa verticillata; sepalis glabris externis fere 3-plo brevioribus subrotundo-ovatis mucronatis interioribus elliptico-oblongis acutis; antheris longiusele mucronatis. In P. b. S. 4.

10. *E. verticillaris* Kunth; culmis ramosis; ramis verticillatis; vaginis late ovato-lanceolatis acuminatis deciduis; panicula valde ramosa verticillata conferta nuda; bracteis masc. rotundatis fem. acutis; stigmatibus revolutis plumosis. Restio Thunb. diss.

f. 7. *R. equisetaceus* Steud. In P. b. S. 2.

11. *E. propinqua* Kunth; culmo subsimplici; floribus spicatis secundis; spathis ovatis acutis flore brevioribus subcartilagineis; sepalis masculis exterioribus dimidio minoribus. Restio. In P. b. S. 2.

12. *E. asperiflora* Kunth; culmo subramoso; floribus spicatis, spicis glomeratis; spathis ovato-cuspidatis flores superantibus perianthiisque punctis rubris exasperatis margine membranaceis fusco-variis. Restio Zeyh. In P. b. S. 2.

13. *E. mucronata* Rehb. culmo simplici; spicis glomeratis; spathis propriis subulatis flore multo minoribus, communibus amplis cuspidatis convolutis; sepalis exterioribus brevissimis orbiculatis. Restio Zeyh. In P. b. S. 2.

14. *E. grandis* Zeyh. culmo subramoso; spathis propriis ovato-lanceolatis subulatis, communibus oblongis mucronatis convolutis; sepalis exterioribus lanceolatis minimis, feminis interioribus spathulatis. In P. b. S. 2.

5093. CHAETANTHUS R. Br.

1. *C. leptocarpoides* R. Br. In Nov. Holl. 2. Culmi aphylli vaginati, vaginis fisis. Fasciculi spicati.

5094. WILLDENOWIA Thunb. (1799).

1. *W. teres* Thunb. act. Holm. 1790. t. 2. f. 2. dichotome ramosa; vaginis arctis hyalinis mucronatis; spicis fem. nudis solitariis; squamis ovato-ellipticis acuminatis; nuce ovata laevi nigra; stipite cupulari 6-partito. In P. b. S. 2.

2. *W. striata* Thunb. l. c. t. 2. f. 1. dichotome ramosa; ramis striatis; vaginis laxis mucronato-aristatis aridis; spicis fem. solitariis nudis; squamis lanceolatis nudis; stigmatibus brevibus tomentosis; stipite cupulari 6-partito. In P. b. S. 2.

3. *W. arescens* Kunth l. c. p. 454. dichotome ramosa, ramis laevibus; vaginis laxis apice aridis hyalinis aristatis; vagina florali dupli; squamis oblongis subulatis; fructu disco sti-

pitiformi crasso profunde sulcato sulto. In P. b. S. 2.

4. *W. Lucaeana* Kunth; dichotome ramosa; ramis laevibus; vaginis laxis subulatis; spicis fem. 3 in apice ramorum; squamis oblongis acuminatis; fructu fusco-olivaceo apice bituberculato viride disco cupulari 6-partito sulto. In P. b. S. 2.

5. *W. fimbriata* Kunth; vaginis margine laciniato-fimbriatis; spicis feminis 3 sessilibus, vaginis floralibus laciniato-fimbriatis triplo longioribus involutis; stigmatibus 2 densissime et longe villosis; fructu apice ruguloso disco trilobo. In P. b. S. 2.

6. *W. compressa* Thunb. act. 1790. t. 2. f. 3. culmis dichotomis, ramis virgatis; vaginis ovatis acuminatis margine membranaceo; stylo elongato; stigmatibus 3 plumosis; nuce compresso-ancipiiti cinerea. In P. b. S. 2.

7. *W. Ecklonii* Endl. culmo dichotomo, ramis fastigiatis; vaginis oblongis coriaceis fuscis aristatis albo-marginatis; inflorescentia mascula alba racemosa densa; sopalis lineariformibus. In P. b. S. 2.

5095. CANNOMOIS Beauv. (1828).

1. *C. cephalotes* Beauv. ann. sc. nat. 1828. t. 1. f. 1. culmis virgato-racemosis; spicis feminis in ramis solitariis nudis; squamis ovatis acuto-subulatis margine hyalino-membranaceis; stylis 2 elongatis intus stigmatiferis. In P. b. S. 2.

2. *C. simplex* Kunth; culmis simplicibus; spicis feminis in apice culmi 3—4 sessilibus remotis, singulis vagina florali spathiformi sultis; stylis apice villosis. In P. b. S. 2.

5096. CERATOCARYON Nees. (1832).

1. *C. argenteum* Nees. Restio W. In P. b. S. 2. Panícula ramosissima conferta. Bracteae stramineae. Sepala 6 basi connata 1-nervia graminea.

5097. MESANTHUS. (1840).

1. *M. macrocarpus* Nees; Restio elegans Poir. Willdenowia compressa Thunb. In P. b. S. 2. Culmi aphylli

ramosis ramis tereti-compressis. Inflorescentia paniculata bracteis magnis tecta.

5098. CUCULLIFERA Nees. (1840).

1. *C. dura* Nees; Restio acuminate Thunb. In P. b. S. 2. Inflorescentia masc. paniculata. Spiculae femineae alternae in apice culmi sessiles.

5099. HYPOLAENA R. Br. (1810).

1. *H. fastigiata* R. Br. culmis ramosis teretibus striatis cinerascentibus; ramis subfastigiatis; perianthii fructiferi glumis ovalibus. In Nov. Holl. 4.

2. *H. excelsa* R. Br. culmis ramosis teretibus laevibus ramis alternis simplicissimis; perianthii fructiferi glumis subrotundis. In Nov. Holl. 4.

3. *H. taxiflora* Nees; culmis ramosis teretibus punctato-exasperatis; ramis serpentibus fastigiatis; perianthii fructiferi valvulis minutis linearibus; spiculis masculis sub-4-floris. In P. b. S. 2.

5100. HYPODISCUS Nees. (1836).

1. *H. aristatus* Nees. In Nov. Holl. 4. Vaginae rigidae coloratae muticae. Spiculae squamis rigidis acutis aristatis.

5101. LEUCOPLOEUS Nees. (1836).

1. *L. argenteus* Nees. In P. b. S. 2. Spiculae masculae paniculatae, femineae paucae spicatae.

5102. BOECKHIA Kunth. (1844).

1. *B. striata* Kunth; culmis sultato-striatis; spicis solitariis v. geminis; ovariis fructibusquis laevibus. In P. b. S. 2.

2. *B. laevigata* Kunth; culmis laevibus; spicis femineis 6-7 in apice culmi approximatis; ovariis tuberculatis. In P. b. S. 2.

5103. ANTHOBOLUS R. Br. (1810).

1. *A. filifolius* R. Br. fol. filiformibus ramisque laxis. In Nov. Holl. 5.
2. *A. triquetus* R. Br. fol. subulatis semiteretibus undique patentibus; ramulis angulatis strictis. In Nov. Holl. 4.

5104. VALLISNERIA L. (1747).

1. *V. spiralis* L. scapo femineo spirali; fol. nutantibus linearibus obtusis apice serrulatis. Mich. gen. t. 10. Hook. Bot. Misc. III. t. 23, 24. Jacq. Ecl. t. 1. *V. Jacquiniana* Spr. In Europ. Asia et Am. 4.

2. *V. nana* R. Br. fol. linearibus acutis integerrimis; scapo fem. spirali. In Nov. Holl. 4.

3. *V. Physidum* Juss. fol. ensiformibus glabris; scapo recto crasso brevi; floribus masc. 6-andris. In Cochinchina. 4.

4. *V. alternifolia* Roxb. caulescens fol. lineari-lanceolatis alternis denticulato-serratis; floribus sessilibus. Hook. misc. II. t. 11. In Ind. or. 4.

5105. EMPETRUM L. (1747).

1. *E. nigrum* L. procumbens; fol. ovali-oblongis laevibus margine ramisque glandulosis; baccis nigris. E. B. t. 526. Schk. t. 318. In Europa et Asia. 5.

2. *E. rubrum* Vahl; procumbens; ramulis pubescentibus; fol. oblongis margine revolutis supra scabriusculis. Ad fretum Magell. 5.

3. *E. album* L. erectum; ramulis pubescentibus; fol. linearibus margine revolutis supra scabriusculis. Corema Don. In Lusitania. 5.

5106. CONCEVEIBUM Rich. (1824).

1. *C. oratum* Rich. Arbor. fol. alternis petiolatis ovato-oblongis denticulatis subtus incanis; floribus spicatis, axi trigono carnos. Aubl. guj. f. . In Guiana. 5.

2. *C. javanense* Blume. In Java. 5.

**5107. TRICERASTES Presl.
(1835).**

1. *T. glomerata* Presl. In California. ♀. Herba fol. alternis triseptis serratis; floribus axillaribus glomeratis viridibus.

5108. PUTRANJIVA Wall. (1824).

1. *P. Roxburghii* Wall. Royle ill. t. 38. Rheede 7. t. 59. In Ind. or. ♀. Arbor ligno duro albido; fol. alternis petiolatis oblongo-lanceolatis serratis glabris; stipulis minutis villosis.

TETRANDRIA.

5109. DRYPETES Vahl.

1. *D. alba* Poit. fol. oblongo-lanceolatis acutis remote denticulatis. In ins. Testudinum. 2.

2. *D. glauca* Vahl; fol. obovato-oblongis integerrimis coriaceis. In Portorico. ♀.

3. *D. bengalensis* Spr. fol. obovatis obtusiusculis integerrimis membranaceis. Bessera inermis Spr. pug. In Bengalia. ♀.

5110. OLMEDIA R. et P. (1800).

1. *O. aspera* R. et P. fol. oblongis obliquis acuminatis dentatis crenatisque. In Peruvia. ♀.

2. *O. laevis* R. et P. fol. oblongis acuminatis integerrimis. In Peruvia. ♀. Arbor 3-ulnaris.

5111. BROUSSONETIA Vent.

1. *B. papyrifera* Vent. inermis fol. subcordatis lobatis et indivisis. Duham. arb. 16. t. 5. Morus papyrifera L. Papyrios Lam. ill. 760. In Japonia. ♀.

2. *B. tinctoria* Kunth; spinis axillaribus; fol. glabris integerrimis sinuato-lobatis indivisisque ovato-lanceolatis acuminatis. Morus tinctoria L. Macluria aurantiaca Nott. In Ind. occ. Nov. Granata et Brasilia. ♀.

3. *B. Plumerii* Spr. spinis axillaribus; fol. omnibus ovato-lanceolatis acuminatis dentato-serratis scabris

subtus pubescentibus. Morus Plum. ic. t. 204. In Ind. occ. ♀.

4. *B. integrifolia* Hamilt. Arto-carpus Ponga Dennst. Rheede 4. t. 35. In Ind. or. ♀.

5112. TROPHIS L. (1747).

1. *T. americana* L. inermis; fol. oblongis acuminatis integerrimis glabris; floribus spicatis. Brown. jam. t. 37. f. 1. In Ind. occ. ♀.

2. *T. aspera* Retz; inermis; fol. obovato-oblongis acuminatis inaequaliter serratis utrinque scaberrimis; floribus masc. capitatis. fem. solitariis. Streblus Lour. In Ind. or. ♀.

3. *T. cordata* Poir. inermis, fol. cordatis acutis serratis nervosis; floribus masc. racemosis. Streblus Lour. In Cochinchina. ♀.

4. *T. spinosa* Roxb. spinis axillaribus rectis; fol. ellipticis coriaceis integerrimis laevibus; fructibus sub-solitariis. In Moluccis. ♀.

5. *T. aculeata* Roxb. aculeis angularis obtusis; fol. obovatis obtusis integerrimis glabris. In Ind. or. ♀.

6. *T. taxiformis* Spr. spinis terminalibus; fol. oblongo-lanceolatis acuminatis apice serratis glabris; stipulis linear-lanceolatis. In Ind. or. ♀.

7. *T. Ramon* Cham. In Mexico. ♀.

5113. BATIS R. Br.

1. *B. maritima* L. Lam. ill. t. 806. ramis 4-gonis; fol. oppositis carnosis. Jacq. am. t. 40. f. 4. In Jamaica. ♀.

2. *B. vermiculata* Hook. fruticosa ramosissima; fol. alternis elongatis linearibus teretibus carnosis; squamis cuspidatis. Ad fl. Columbiae. ♀.

5114. HIPPOPHAE L. (1737).

1. *H. rhamnoides* L. fol. linearilanceolatis supra glabris subtus albidis lepidotis. Fl. dan. t. 265. E. B. t. 425. Schk. t. 321. Guimp. t. 199. In Europa. ♀.

2. *H. fasciculata* Wall. In Ind. or. ♀.

3. *H. salicifolia* G. Don. H. conferta Wall. In Ind. or. ♀.

PENTANDRIA.

5115. PISTACIA L. (1737).

1. *P. trifolia* L. fol. subternatis simplicibusque *P. macrophylla* Ait. *P. vera* β . *trifolia* DC. *In Syria*. \ddag .

2. *P. vera* L. fol. impari-pinnatis; foliolis ovatis basi subattenuatis mucronatis 3—5-nis. Blackw. t. 461. Duh. 4. t. 17. *In Syria*. \ddag .

3. *P. Terebinthus* L. fol. impari-pinnatis; foliolis septenis ovato-lanceolatis basi rotundatis acutis mucronatis. Blackw. t. 478. Duham. 1. t. 87. *In Europa*. \ddag .

4. *P. atlantica* Desf. fol. impari-pinnatis; foliolis subnovenis lanceolatis basi subattenuatis, petiolo inter paria terminalia subalata. *In Attante, Asia minore et Graecia*. \ddag .

5. *P. mexicana* H. et K. t. 608. fol. impari-pinnatis foliolis 16—20 alternis et oppositis inaequilatero-oblongis utrinque acutis mucronatis membranaceis nervo medio rachique pubescentibus; fructibus turgide lenticularibus. *In Mexico*. \ddag .

6. *P. fagaroides* Willd. fol. impari-pinnatis; foliolis ovatis obtusis; petiolis alatis. *Patria ign.* \ddag .

7. *P. oleosa* Lour. fol. impari-pinnatis aut abrupte pinnatis; foliolis 4—7 ovato-lanceolatis; fructibus junioribus echinatis. Rumph. 1. t. 57. *In Cochinchina et Moluccis*. \ddag .

8. *P. Lentiscus* L. fol. abrupte pinnatis; foliolis 8-nis lanceolatis; petiolo alato. Blackw. t. 149. Duham. 4. t. 18. *In Europa et Africa*. \ddag .

9. *P. chinensis* Bunge; fol. deciduis abrupte pinnatis; foliolis 10—12 oblongo-lanceolatis inaequaliter acuminitis membranaceis glabris; fructibus globosis. *In China*. \ddag .

10. *P. mutica* Fisch. fol. deciduis; petiolo pubescenti-scabro anguste marginato; foliolis sub-7-nis aequalibus ovato-oblongis, saepissime obtusatis muticis. *P. Terebinthus* Bieb. *In prov. Tatysch*. \ddag .

5116. SAVIA Willd. (1805).

1. *S. sessiliflora* Willd. Crotom Sw. *In Domingo*. \ddag . Arbuscula fol. alternis ovatis acuminatis integerrimis nervosis glabris; floribus axillaribus subsessilibus.

5117. LEPTONEMA Adr. Juss. (1824).

1. *L. venosum* Adr. Juss. tent. t.
4. *In Madagascar*. \ddag . Frutex fol. alternis subcordato-oblongis integerimis subtus reticulato-venosis petiolis pedunculisque villosissimis; stipulis setaceis.

5118. AMANOA Aubl. (1775).

1. *A. gujanensis* Aubl. guj. t. *In Guiana*. \ddag . Arbor procera; fol. alternis oblongis acutis integerrimis; floribus spicato-globeratiss.

5119. SPINACIA L. (1737).

1. *S. oleracea* L. fol. hastatis; fructibus sessilibus v. spinosis. Lam. ill. t. 814. Schk. t. 324. *In Europa*. \odot .

2. *S. tetrandra* Stev. fol. runcinato-pinnatifidis subdentatis ciliatis; floribus masc. glomeratis pedunculatis 4-andris. *In Armenia*. \odot .

3. *S. divaricata* Turtsch. *In Siberia baic.* \odot .

5120. ACNIDA L. (1737).¹

1. *A. cannabina* L. fol. linearilanceolatis elongatis; caps. laevibus acutangulis. *In Virginia*. \odot .

2. *A. cuspidata* Bert. fol. ovato-lanceolatis acuminato-cuspidatis venoso-lineatis longissime petiolatis; capsulis laevibus obtusangulis. *In Jamaica*. \odot .

3. *A. rhyssocarpa* Michx. fol. ovali-lanceolatis; capsulis rugosis obtusangulis. *In Virginia*. \odot .

5121. CANNABIS L. (1737).

1. *C. sativa* L. Lam. ill. t. 814. Schk. t. 325. Hayne 8. t. 35. *In Persia, in Europa colitur*. \odot . Fol. opposita digitata.

5122. HUMULUS L. (1737).

1. *H. Lupulus* L. E. B. t. 427. Fl. dan. t. 1339. Schk. t. 326. Hayne 8. t. 36. *In Europa*. \ddag . Caulis vo-

Iubilis angulatus scaber. Fol. opposita petiolata cordata 3—5-loba.

HEXANDRIA.

5123. *HYOPHORBE* Gaertn. (1791).

1. *H. indica* Gaertn. 2. t. 120. Mart. Palm. t. 143 et t. 154. Areca lutescens Bory. In ins. Borboniae et Mauritii. ♂. Caud. 30-ped. cylindricus laevigatus basi incrassatus.

5124. *ORANIA* Blume. (1825).

1. *O. porphyrocarpa* Blume in Mart. Palm. t. 157. *O. regalis* Blume Rumph 2. t. 85. In Java. ♂. Caudex teres annulatus. Frondes 6—7-pedales.

5125. *ZALACCA* Reinw. (1825).

○ 1. *Z. Wallichiana* Mart. Palm. t. 118, 119 et 136. pinnis lanceolatis acuminatissimis aut subcincinnosis subtus viridibus; amentis masculis sessilibus 1—2-pollicaribus; bracteis distinctis. *Z. edulis* Wall. pl. as. t. 222—224. In Malacca, Pegu, Sumatra. ♂. 15—20-ped.

2. *Z. Blumeana* Mart. Palm. t. 123 et 159. f. 2. pinnis lanceolatis acuminatis subtus albo-glaucoscentibus; amentis masc. pedunculatis 3—4-pollicaribus; bracteis coadunatis. Rumph 5. t. 57. f. 2. *Calamus Zalacca* Gaertn. t. 139. In Java et Moluccis. ♂.

5126. *BORASSUS* L. (1737).

1. *B. flabelliformis* L. Roxb. cor. t. 71, 72. Mart. Palm. t. 108, 121, 162. Rheede 1. t. 9. Rumph. 1. t. 10. In Coromandelia. ♂. 30—100-ped. Frondes 8—10-pedales.

2. *B. Aethiopum* Mart. Palm. *B. flabelliformis* Thonn. In Africa. ♂. Frons 8—12-ped.

5127. *TAMUS* L. (1737).

1. *T. communis* L. fol. cordatis indivisis. Blackw. t. 487. E. B. t.

91. Schk. t. 327. Nees gen. 2. t. 20. In Europa. ♀.

2. *T. cretica* L. fol. 3-lobis. In Creta. ♀.

5128. *TESTUDINARIA* Lindt. (1836).

1. *T. Elephantipes* Lindl. B. R. t. 921. *Dioscorea* Spr. *Tamus* Herit. In Afr. austr. ♂. Fol. reniformia mucronata nervosa. Truncus crassissimus.

5129. *BRAUNEA* Lour. (1790).

1. *B. menispermoides* Willd. In Ind. or. ♂. Frutex volubilis fol. subcordato-oblongis acuminatis integerimis glabris 5-plinerviis; racemis compositis axillaribus, masc. flor. umbellatis.

5130. *PSELIUM* Lour. (1790).

1. *P. heterophyllum* L. In Cochinchina. ♂. Prut. volubilis.

OCTANDRIA.

5131. *COMMIPHORA* Jacq. (1804).

1. *C. madagascariensis* Jacq. In Madagascar. ♂. Arbor fol. alternis oblongis acutis serratis glabris basi auriculatis; floribus masc. aggregatis subsessilibus.

5132. *DIOSPYROS* Dalech.

a. *Tetradiospyros* DC. Ovarium 4-loculare. Stylus apice 4-fidus. Stamina 8 per paria geminatim connexa. Folia alterna.

1. *D. tetrasperma* DC. ramulis gracilibus subvelutinis; fol. cuneiformibus obtusis glaberrimis margine revolutis; cor. extus sericea obtusa. *D. obovata* Jacq. h. Schoenbr. t. 312. In Jamaica. ♂.

b. *Otogyne* DC. Cal. 4—6-lobus. Stam. 10—13. Ovarium 4-lokulare. Lobi calycis feminae basi auriculati. Fol. alterna et opposita.

2. *D. Whigtiana* Wall. ramis velutinis; fol. oblongis obtusis basi acutis; petiolis velutinis; floribus fem. ferrugineo-velutinis; calycis lobis alatis undulatis. In Ind or. ♂.

3. *D. exsculpta* Hamilt. ferrugineo-tomentosa; fol. late ellipticis; calyce campanulato acute 4—6-lobo; cor. tubo extus piloso. Wight ic. t. 182 et 183. In Bengal. ♂.

4. *D. dubia* Wall. ramulis tomentosis; fol. ovato-ellipticis obtusis subtus petiolisque pubescentibus; calyce utrinque tomentoso; corolla calyce duplo longiore extus pubescente. In Ind. or. ♂.

5. *D. hirsuta* L. ramis foliisque subtus villosis; fol. ellipticis obtusis; floribus axillaribus congestis sessilibus. In Ceylona. ♂.

6. *D. insculpta* Hamilt. ramulis glabris; fol. alternis oblongis acuminate integerrimis lucidis; baccia solitaria 3—4-loculari; calyce 4-fido. In Bengal. ♂.

c. *Eudiospyros* DC. Cal. et cor. 4, 5—6-lobi. Stamina florum masc. 12-plurima. Ovarium 3—10-lokulare.

* Stamina 11—13.

7. *D. Melanoxyton* Roxb. cor. t. 46. gemmis hirsutis; fol. suboppositis oblongis obtusis; calyce acute 4-fido; cor. campanulata calyce 4-plo longiore 4-fida; calyce fem. 5-partito tomentoso. In Ceylona. ♂.

8. *D. cayennensis* DC. ferrugineo-velutina; fol. oblongis acuminatis superne nitidis glaberrimis; calyce masc. turbinato profunde 4-fido lobis undulato-reflexis; corolla sericea. In Cayenna. ♂.

9. *D. Poeppigiana* DC. puberula; fol. lanceolatis apice angustatis obtusis integerrimis ciliatis; pedicellis reflexis; calyce cupuliformi 4-fido lobis late ovato-acutis. In Brasilia. ♂.

10. *D. Paralea* Steud. fol. ellipticas basi obtusis coriaceis junioribus ramulisque ferrugineo-tomentosis; flo-

ribus masc. aggregatis; calyce 4-fido tomentoso. Paralea Aubl. guj. t. 231. In Gujana. ♂.

11. *D. reticulata* Willd. ramis glabris; gemmis sericeis; fol. elliptico-oblongis obtusis basi cordatis coriaceis glabris subtus reticulatis; floribus masc. aggregatis; bracteis calyceque 4-fido sericeo-ferrugineis. In Mauritio. ♂.

12. *D. tessellaria* Poir. cortice nigro; fol. ovato-oblongis obtusis glabris; floribus axillaribus sessilibus; calyce cupuliformi 4-fido extus sericeo lobis obtusis; corolla calyce duplo longiore. In ins. Mauritio. ♂.

13. *D. chrysophyllus* Poir. ramis glabris; fol. ovato-lanceolatis obtusis glaberrimis subtus ferrugineis; calyce fem. solitario extus ferrugineo-pubescente 5-dentato; cor. extus ferrugineo-sericea. In Mauritio. ♂.

** Stamina 14—23.

14. *D. pterocatyx* Boj. fol. ellipticis utrinque angustatis obtusis membranaceis glabris margine revolutis; floribus masc. solitariis subsessilibus; calyce turbinato glabro lobis obtusis; cor. profunde 6-fida. In Mauritio. ♂.

15. *D. Mauritiana* DC. ramis glabris; fol. late ellipticis coriaceis glabris; floribus solitariis subsessilibus; calyce hemisphaerico glabro obscure 4—5-lobo; corolla profunde 4—5-loba calyce duplo longiore. In Mauritio. ♂.

16. *D. angulata* Poir. fol. ovato-obtusis coriaceis glaberrimis superne nitidis subtus venosis breve petiolatis; fructibus 5-angularibus. In Mauritio. ♂.

17. *D. macrocalyx* DC. ramis gemmisque glabris; fol. ellipticis coriaceis glabris; floribus feminis solitariis axillaribus; cor. 5-fida calyce duplo longiore extus sericea. In Mauritio. ♂.

18. *D. nodosa* Poir. fol. ovato-lanceolatis obtusis glabris; floribus feminis axillaribus solitariis; calyce urceolato apice 5-dentato; corolla 5-loba lobis ovatis reflexis; fructu calyce tecto. In Mauritio. ♂.

19. *D. capensis* DC. ramis glabris; calyce masc. campanulato cupuliformi; cor. profunde 5-fida calyce duplo longiore. In P. b. S. ♂.

20. *D. membranacea* DC. fol. oblongis obtusis membranaceis; floribus fem. solitariis; pedunculo apice incrassato calyceque profunde 5-fido extus sericeo. *In Mauritio.* ♂.

21. *D. anonaefolia* DC. ramis gemmisque glabris; fol. elliptico-oblongis obtusis glabris membranaceis; floribus masc. aggregatis subsessilibus; calyce elongato-cupuliformi apice sub-5-lobo; cor. profunde 5-fida extus sericea. *In Mauritio.* ♂.

22. *D. melanida* Poir. fol. ovatis breve petiolatis obtusis cinereis; floribus fem. solitariis; fructibus sessilibus globoso-depressis 10-locularibus; calyce cupuliformi lobis latis reflexis. *In Mauritio.* ♂.

23. *D. Nerandii* DC. ramis gemmisque glabris; fol. ovato-ellipticis obtusis coriaceis glabris; floribus masc. sessilibus; calyce campanulato glabro margine subintegro; corolla profunde 5-fida extus sericea calyce duplo longiore. *In Mauritio.* ♂.

24. *D. obtusifoia* Willd. ramis glabris; fol. oblongis obtusis revolutis nitidis coriaceis; pedicellis brevissimis; calyce 5-fido campanulato lobis ovatis margine reflexis; corolla apice 5-fida constricta. *In Mexico.* ♂.

25. *D. Sapota* Roxb. fol. bifariis oblongis integris obtusis nitidis; pedunc. masc. multifloris; floribus fem. solitariis. *In Ind. or. et ins. Philippinis.* ♂.

26. *D. oblonga* Wall. fol. elliptico-oblongis basi obtusis apice acutis glabris; floribus fem. solitariis; calyce acute 5-fido hirsuto. *In ins. Penang.* ♂.

27. *P. macrophylla* Blume; fol. elliptico-oblongis acuminatis basi rotundatis subcordatis coriaceis ad costam subtus ramulisque tomentosis; racemis axillaribus; floribus 5-fidis. *In Java.* ♂.

*** Flores 4 meri.

1. Cal. 4-fidus v. 4-partitus.

28. *D. Lotus* fol. ovato-acutis v. acuminatis subtus pubescentibus; floribus axillaribus brevissime pedicellatis; calyce extus hispido 4-fido corollae lobis reflexis rotundatis ciliatis. Pall. ross. t. 58. Duham. arb. t. 284. *In China, Caucaso et Europa.* ♂.

29. *D. virginiana* L. fol. ellipticis obtuse acuminatis petiolo nervis marginaque puberulis; racemis axillaribus 1-3-floris; calyce 4-partito lobis lanceolatis. Wats. dendr. t. 146. Michx. arb. t. 24. *In Am. bor.* ♂.

30. *D. Kaki* L. ramis apice tomentosis; fol. ovato-ellipticis acuminatis subtus puberulis, pedunc. masculis 3-floris; petiolo pedicellisque tomentosis; calyce 4-fido pubescente. Kaempf. am. t. 806. *In Japonia et China.* ♂.

31. *D. ciliata* DC. fol. ovato-ellipticis acuminatis ciliatis; calyce 4-partito intus sericeo lobis ovatis obtusis reflexis; cor. 4-fida lobis obtusis. *In Nor. Hispania.* ♂.

32. *D. rugulosa* R. Br. fol. ellipticis acuminatis subtus tomentosis rugosiusculis basi simplici obtusiuscula; floribus 4-fidis. *In Nor. Holl.* ♂.

33. *D. tomentosa* Poir. ramis glabris lucidis cinereis spinescentibus, spinis lateralibus et terminalibus; fol. alternis ellipticis utrinque ramulis petiolisque fulvo-tomentosis; floribus hispidis. *In Tranquebar.* ♂.

34. *D. montana* Roxb. fol. ovato-acutis membranaceis glabris; racemis reflexis petiolo duplo fere longioribus; bracteis lobisque calycis acutis ciliatis. *In Circars.* ♂.

35. *D. orixensis* Willd. ramulis pubescentibus; fol. oblongis basi obtusis acutiusculis supra nitidis subtus mollissime puberulis. *In Ind. or.* ♂.

36. *D. cordifolia* Roxb. cor. t. 50. trunco ramis spinosis; fol. ovato-lanceolatis acutis v. obtusis basi subcordatis subtus pubescentibus; racemis masc. 3-floris; cor. calyce duplo longiore. *In Ind. or.* ♂.

37. *D. punctata* Decaisn. ramulis subpuberulis; fol. ovato-lanceolatis subcordatis acuminatis membranaceis; petiolis pubescentibus; calyce 4-partito lobis ovatis ciliatis; cor. lacinias cordatis. *In ins. Timor.* ♂.

38. *D. frutescens* Blume; fol. oblongis acuminatis basi acutiusculis glabris nitidis; fasciculis florum confertis; floribus 4-fidis. *In Java.* ♂.

39. *D. heterophylla* Wall. fol. obovatis oblongis retusis cordatis glabris; floribus fem. solitariis; lobis calycis reflexis ovatis puberulis; drupa globosa glabra. *Prope Ava.* ♂.

40. *D. chloroxylon* Roxb. cor. t.
49. ramulis tomentosis; fol. elliptico-bovatis obtusis subtus petiolisque tomentosis; floribus fasciculatis sessilibus; calycis 4-partiti lobis extus sericeis. *In monte Orixa.* ȏ.

41. *D. sylvatica* Roxb. cor. t. 47. glabra; fol. elliptico-oblongis acutis; pedunc. masculis multifloris petiolo duplo longioribus; calyce 4-fido lobis ovatis; cor. campanulata 4-fida. *In Circars.* ȏ.

42. *D. ehretioides* Wall. ramulis ramisque ferrugineo-tomentosis; fol. ellipticis glabris subitus ferrugineis membranaceis; racemis compositis; pedunculus 3-chotomis patulus; calyce 4-fido pubescente, lobis obtusis. *Prope Tovoy.* ȏ.

43. *D. philippensis* DC. ramis virgatis ferrugineo-puberulis; fol. ellipticis obtuse acuminatis membranaceis; floribus axillaribus fem. solitariis; lobis calycis 4 sericeis ovato-acutis. *In ins. Philippinis.* ȏ.

44. *D. amoena* Wall. fol. lanceolatis glabris acuminatis; floribus fasciculatis ferrugineo-tomentosis; pedicellis brevissimis; calyce 4-fido tomentoso. *In Silhet.* ȏ.

45. *D. multiflora* Wall. fol. lanceolatis v. ovatis acutis superne glaberrimis subtus pilosis; floribus masc. fasciculatis; calyce 4-fido lobis acutis sericeo-tomentosis; cor. ventricosa. *In Ind. or.* ȏ.

46. *D. lanceaefolia* Roxb. fol. lanceolatis bifariis coriaceis nitidis; floribus masc. sessilibus solitariis cernuis; calyce 4-dentato pubescente; corollae tubo inflato. *In Silhet.* ȏ.

47. *D. stricta* Roxb. ramis tomentosis; fol. lanceolatis longe acuminatis petiolis nervo centrali paginaque inferiore pubescentibus; racemis laterali 3—5-floris. *In Ind. or.* ȏ.

48. *D. grata* Wall. fol. elliptico-lanceolatis obtuse acuminatis superne glabris subtus pilosiusculis; floribus feminine axillaribus solitariis subsessilibus; lobis calycis ovatis ferrugineo-velutinis, intus sericeis. *In Nepalia.* ȏ.

49. *D. squamosa* DC. ramis glabris; fol. ellipticis glaberrimis; floribus masculis geminis sessilibus; bracteis amplio-ovatis margine ferrugineo-tomentosis; calyce campanulato 4—5-fido. *In Madagascar.* ȏ.

50. *D. laevis* Boj. glabra; fol. ellipticis utrinque attenuatis obtusis coriaceis margine revolutis; floribus masculis subsessilibus; calyce campanulato 4-fido lobis acutis. *In Madagascar.* ȏ.

51. *D. chartacea* Wall. glabra; fol. lanceolatis brevissime petiolatis membranaceis; floribus axillaribus ternis sessilibus; calyce longe campanulato 4-fido; corollae lobis ovatis obtusis. *In regno Burmannorum.* ȏ.

52. *D. lucida* Wall. ramis foliisque glabris; fol. ellipticis obtusis v. acutis coriaceis lucidis; floribus fem. ternis; calyce 4-fido ferrugineo-sericeo lobis acutis; fructu sericeo-ferrugineo. *In Singapore.* ȏ.

53. *D. lobata* Lour. fol. ovato-lanceolatis parvis utrinque glabris; floribus axillaribus solitariis tubo corollae 4-gono ventricoso limbo parvo 4-fido; stigmate profunde 4-fido. *In Cochinchina.* ȏ.

54. *D. venosa* Wall. ramis petiolis nervoque centrali subtus pulvrento-tomentosis; fol. elliptico-acuminatis coriaceis subtus glaucescentibus. *In ins. Penang.* ȏ.

55. *D. undulata* Wall. ramis glabris; fol. ellipticis acutis superne nitidis glabris subtus pilosis demum glabris; floribus fem. sessilibus solitariis; fructu globoso ferrugineo-tomentoso. *Prope Amherst.* ȏ.

56. *D. densiflora* Wall. ramis glabris; fol. ellipticis acutiusculis glabris; pedunculis subdivisi pubescensibus; calycis 4-partiti lobis linearilanceolatis extus revolutis; cor. cylindracea extus velutina; pedunc. florum fem. trichotomis. *Prope Marataban.* ȏ.

57. *D. ramiflora* Roxb. ramis foliisque glabris; fol. bifariis lanceolatis acutis rigidis; floribus fasciculatis; pedicellis calyceque nigricanto-tomentosis; calyce campanulato semi-4—6-fido lobis acutis tomentosis. *Wightie. t. 189. In Silhet.* ȏ.

58. *D. foliolosa* Wall. glabra; ramis gracibus; fol. lanceolatis obtuse acuminatis; pedunc. 3—5-floris petiolo duplo longioribus; calyce 4-partito lobis ovatis. *In Ind. or.* ȏ.

59. *D. senegalensis* Perrott.; ramis puberulis gemmis sericeis; fol. ellipticis obtusis coriaceis glabris; floribus fem. solitariis; calyce 4—5-fido extus

ferrugineo-pubescente; lobis ovatis obtusis. In Senegambia. ♂.

60. *D. revoluta* Poir. fol. obovatis obtusis glaberrimis basi acutis; pedunc. axillaribus recurvis; calyce intus ferrugineo-puberulo profunde 4-fido. In Am. austr. ♂.

61. *D. Berterii* DC. ramis glabris; fol. obovato-oblongis glabris coriaceis nitidis; pedunc. fem. 1-floris; calyce fructifero profunde 4-fido sericeo. In prov. St. Marthae. ♂.

62. *D. maritima* Blume; ramis foliisque glabris; gemmis sericeis; fol. oblongo-ellipticis obtusis coriaceis; floribus masc. 3—7 confertis; calyce 4—5-dentato sericeo-puberulo. In Java et Timor. ♂.

b. Calyx flor. masc. elongatus, apice 4-fidus.

63. *D. Ebenum* Retz; ramis foliisque glabris; gemmis sericeis; fol. bifariis oblongis obtusis; bracteis ova-tis hirsutis; calyce masc. campanu-lato 4-fido, lobis rotundatis ciliatis, corolla campanulata 4-plo breviore. Wight ic. t. 188. Rumph. 3. t. 6. In Ind. or. ♂.

64. *D. Ebenaster* Retz; ramis foliis gemmisque glabris; fol. ovato-oblongis obtusis subtus pallidioribus. Circa Calcuttam. ♂.

c. Stamina 24—50.

65. *D. embryopteris* Pers. ramis glabris gemmis sericeis; fol. lanceolatis ellipticisque coriaceis glaberrimis; pedunc. reflexis pubescentibus; calyce 4-lobo extus piloso; cor. campanula-tae lobis ovatis ciliatis. B. R. t. 499. Gaertn. t. 29. Rheeade 3. t. 41. Embryopteris glutinifera Roxb. cor. t. 70. In Ind. or. ♂.

66. *D. discolor* Willd. ramis pilosis; fol. oblongis acutis basi obtusis superne glabris subtus sericeo-pilosis pilis adpressis; pedunc. 3—5-floris hirsutis; cor. cylindrica 4-fida. D. Mabola Lindl. B. R. t. 1139. In ins. Philippinis. ♂.

67. *D. sericea* DC. ramis flavo-pubescentibus; fol. lanceolatis acuminate basi acutis margine revolutis coriaceis subtus dense pubescentibus; floribus fem. solitariis flavo-pubescentibus. In Brasilia. ♂.

68. *D. hispida* DC. ferrugineo-hispida; fol. ellipticis cuspidatis superne puberulis; fructibus sessilibus globosis hirsutissimis calyce 4—5-partito duplo longioribus. In Brasilia. ♂.

69. *D. lanceolata* Poir. fol. au-guste lanceolatis utrinque acutis gla-bris; floribus axillaribus solitariis; pe-dicellis brevibus recurvis; calyce hirsutissimo fulvo recurvo 4-lobo; fructu glabro nitido. In Madagascar. ♂.

70. *D. leucomelas* Poir. ramis glabris; fol. late ovato-ellipticis obtusis cordatis coriaceis glaberrimis; bracteis rotundatis imbricatis extus cinereo-tomentosis; calyce campanu-lato hirsuto apice 6-lobo. In Mauriti-o. ♂.

71. *D. Commersoni* Gaertn. t. 208. fol. floribusque ignotis; bacca ovoidea v. subglobosa mucronata fere medium usque a calyce 5—6-fido arcte am-plexata corticata 10-loculari. In Ma-dagascar. ♂.

72. *D. Boutoniana* DC. fol. obo-vato-ellipticis apice rotundatis basi cuneatis coriaceis glaberrimis superne nitidis; floribus masc. fasciculatis; calyce cupuliformi sublobato; corolla 6-partita calyce duplo longiore. In Mauriti-o. ♂.

73. *D. mespiliformis* Hochst. ra-mulis ferrugineo-puberulis; gemmis acutis sericeis; fol. elliptico-oblongis obtusis coriaceis; pedunc. ferrugineo-tomentosis; calyce sub-4-fido sericeo; cor. semi-4-fida extus sericea; calycis fem. lobis undulatis. In Abyssinia. ♂.

d. *Amuxis* DC. Cal. initio clausus demum irregulariter api-ce ruptus, lobis acutis. Sta-mina plurima.

74. *D. Toposia* Hamilt. glaberri-ma; fol. lanceolatis coriaceis; pedunc. 3—7-floris; calyce globose coriaceo-2—3-lobo; cor. tubulosa 5-loba. In Sithet. ♂.

Species non satis notae.

75. *D. Blancoi* DC. fol. lanceo-latis subtus pilosis glandulis emarginatis aeuminatis; floribus axillaribus; stam. 24—25; stylis 4; fructu magno piloso. In Philippinis.

76. *D. Malacapai* Blanco; fol. alternis ovatis; glandulis sparsis; floribus axillaribus; calyce 4-lobo; fructu 4-loculari, lobulis 1-spermis. *In ins. Philippinis.* ♂.

77. *D. biflora* Blanco; fol. alteris lanceolatis glabris subcoriaceis basi subtus biglandulosis brevissime petiolatis; floribus masc. geminis; calyce campanulato 3—4-lobo; corolla carnosa medio inflata. *In ins. Philippinis.* ♂.

78. *D. pilosanthera* Blanco; fol. alternis lanceolatis glabris coriaceis basi 2—3-glandulosis; petiolis brevissimis; calyce 4—5-lobo lobis extus revolutis; cor. extus pilosa 4-loha. *In ins. Philippinis.* ♂.

79. *D. Caumoi* CC. fol. alternis lanceolatis subtus subpilosis basi biglandulosis; floribus axillaribus sessilibus 8 glomeratis; calycis lobis margine revolutis; corollae lobis reflexis. *D. multiflora* Blancoi. *In ins. Philippinis.* ♂.

cano-tomentosis; stigmatibus binis flabellato-2—3-partitis. E. B. t. 1619. *P. alba* Mill. *In Europa.* ♂.

3. *P. tremula* L. fol. suborbiculatis grosse dentatis utrinque glabrescentibus; petiolis compressis apice biglandulosis; ramulis pilosis. Guimp. t. 201. *In Europa.* ♂.

4. *P. villosa* Lang. fol. ovali-suborbiculatis acuminatis grosse dentatis utrinque petiolisque eglandulosis; ramulis sericeo-villosis. *In Hungaria.* ♂. Arbor 12—20-ped.

5. *P. nigra* L. fol. utrinque acuminatis serratis deltoidibus diametro longitudinali longiore; ramis patentibus. Blackw. t. 248. Guimp. t. 204. *In Europa.* ♂.

6. *P. dilatata* Ait. fol. utrinque glabris acuminatis serratis subdeltoidibus; ramis arrectis virgatis. *P. pyramidalis* Much. *P. fastigiata* Pers. *In Oriente et in Europa culta.* ♂.

7. *P. monilifera* Ait. fol. subcordatis glabris basi glandulosis serraturis cartilagineis hamatis pilosiusculis, nervis patulis; petiolis compressis ramis teretibus. Schk. t. 330. *P. carolinensis* Much. *In Am. bor.* ♂.

8. *P. tremuloides* Michx. Duham. arb. t. 87. fol. parvulis suborbiculatis abrupte acuteque acuminatis serrulatis margine pubescentibus. *P. trepida* Willd. *In Am. bor.* ♂.

9. *P. laevigata* Ait. fol. subrotundo-ovatis acutis leviter cordatis aequaliter adpresso-serratis glabris margine subciliatis; petiolis compressis; ramis teretibus glabris. *P. atheniensis* Hort. *In Am. bor.* ♂.

10. *P. graeca* Ait. fol. subrotundo-ovatis acutis leviter cordatis aequaliter adpresso-serratis glabris margine subciliatis; petiolis compressis; ramis teretibus glabris. *P. atheniensis* Hort. *In Graecia.* ♂.

11. *P. angulata* Ait. fol. cordatis deltoidibus acuminatis obtuse uncinodentatis; ramis alato-angulosis. *P. angulosa* Michx. *In Am. bor.* ♂.

12. *P. grandidentata* Michx. fol. ovali-acuminatis dentibus magnis distantibus eglandulosis; petiolis compressis. *In Am. bor.* ♂.

13. *P. balsamifera* L. fol. ovatis acuminatis adpresso serratis subtus albidis reticulato-venosis; gemmis resuosis. Pall. ross. t. 41. Catesb. car. t. 34. *In Am. bor. et Sibiria.* ♂.

5133. LAGETTA Juss. (1790).

1. *L. lintearia* Lam. fruticosa; fol. ovato-oblongis acutis glabris; racemis paniculatis. Lam. ill. t. 289. Gaertn. t. 215. *In Jamaica.* ♂.

2. *L. funifera* Mart. fruticosa; fol. lanceolatis acutis subtus sericeis; floribus subracemosis. *Daphne brasiliensis* Raddi. *In Brasilia.* ♂.

5134. SHEPHARDIA Nutt. (1822).

1. *S. argentea* Nutt. fol. lanceolatis utrinque dense argenteo-lepidotis. Hook. fl. am. t. 178. *Hippophae Pursh.* *In Am. bor.* ♂.

2. *S. canadensis* Nutt. fol. oblongis suprastellato-pilosis subtus rufo-albidis piloso-lepidotis. *Hippophae* Willd. *In Am. bor.* ♂.

5135. POPULUS L. (1747).

1. *P. alba* L. fol. cordato-subrotundis lobatis dentatis subtus tomentoso-niveis; stigmatibus cruciatis. Reit. et Ab. t. 8. Guimp. t. 202. *P. nivea* W. *In Europa.* ♂.

2. *P. cauescens* Sm. fol. ovali-subrotundis angulato-repandis subtus

14. *P. laurifolia* Ledeb. ic. t. 479. fol. ovatis oblongis acuminatis glanduloso-serrulatis subciliatis pilosiusculis glabris; ramis acute angulatis; germine dense verrucoso. *In Siberia.* ♀.

15. *P. ciliata* Wall. cat. *In Ind. or.* ♀.

16. *P. lobata* Fisch. ♀.

17. *P. marylandica* Bosc. *In Am. bor.* ♀.

18. *P. macrophylla* Lindl. *In Am. bor.* ♀.

ENNEANDRIA.

5136. THALASSIA Banks.

1. *T. ciliata* Koen. fol. confertis retusis ciliato-serrulatis. *Zostera* Forsk. *Ad mare rubrum.* ♂?

2. *T. stipulacea* Koen. fol. geminatis petiolatis; stipulis oppositis conduplicatis. *Zostera* Forsk. *Ad mare rubrum.* 4.

3. *T. testudinum* Koen. fol. sessilibus obtusis multinerviis; stipite descendente radicante. *T. vitrariorum* Pers. *Ad mare rubrum.* 4.

5137. MERCURIALIS Tournef. (1700).

1. *M. annua* L. dodecandra; caule brachiato; fol. ovatis v. lanceolatis aequaliter serratis ciliatisque. E. B. t. 559. Schk. t. 232. Hayne 5. t. 11. *In Europa.* ♂.

2. *M. ambigua* L. dodecandra; caule brachiato; fol. lanceolatis; serraturis paucis ciliisque inaequalibus remotis; floribus verticillatis, femaleis masculisque interruptis. Linn. dec. 1. t. 8. *In Europa.* ♂.

3. *M. orata* Hoppe Regenb. Denkschr. I. t. 4. dodecandra simplex; fol. subsessilibus ovatis ovatifusque dense crenato-serratis. *In Europa.* 4.

4. *M. perennis* L. enneandra simplex; fol. petiolatis ovatis v. cuneato-lanceolatis acutis; radice repente. Hayne 5. t. 10. Fl. dan. t. 400. E. B. t. 1872. *In Europa.* 4.

5. *M. elliptica* Lam. caule suffruticoso brachiato; fol. ellipticis utrinque acutis glabris glanduloso-serratis.

Vent. cels. t. 12. *In Hispan. et Lusitania.* ♀.

6. *M. longifolia* Lam. brachiata; fol. oblongis villosis crenato-serratis viridibus; fructu lanato. ♂.

7. *M. tomentosa* Lam. caule suffruticoso; fol. oblongis tomentosis apice, utrinque serraturis binis. *In Hispania.* ♀.

8. *M. triandra* E. Mey. *In P. b. S.* ♂.

5138. HYDROCHARIS L. (1747).

1. *H. Morsus ranae* L. fol. petiolatis orbiculato-reniformibus membranaceis natantibus. Fl. dan. t. 878. Schk. t. 333. *In Europa.* 4.

2. *H. celttosa* Hamilt. *In Ind. or.* 4.

DECANDRIA.

5139. CARICA L. (1747).

1. *C. Papaya* L. fol. palmatis 7-lobis, lobo intermedio sinuato, faciulis oblongis acutis; floribus masculis corymbosis. Lam. ill. t. 821. B. M. t. 2898—2899. *In Popaya.* ♀.

2. *C. pyriformis* Willd. fol. palmatis 7-lobis, lobo intermedio trilobis; floribus corymbosis; fructu pyriformi. Feuill. per. t. 39. f. 1. *In Peruria.* ♀.

3. *C. microcarpa* Jacq. b. Schoenbr. t. 309 et 310. fol. 3—5-lobis, lobo intermedio 3-lobo; floribus masculis corymbosis. *In Caracas et Chili.* ♀.

4. *C. monoica* Desf. fol. inferioribus integris, caulinis 3-lobis summis 5-lobis subpinnatisidis; floribus monoicis subracemosis. *In Peruria.* ♀.

5. *C. digitata* Spr. fol. digitatis; foliolis septenis oblongis acuminatis integerrimis; truncu spinoso AUBL. gnj. t. 246. *C. spinosa* Pers. *C. heptaphylla* Arrab. *In Brasilia et Guiana.* ♀.

6. *C. pettata* Hook. et Arn. in Beech. voy. t. 98. fol. peltatis orbiculari-cordatis profunde 5-fidis, lobis latissime obovatis acutis dentatis subtus glaucis; floribus masculis glomeratis. *In Mexico.* ♀.

5140. KIGELLARIA L. (1747).

1. *K. africana* L. fol. oblongis inaequaliter serratis. Lam. ill. t. 821. In *P. b. S.* ȏ.

2. *K. integrifolia* Jacq. ic. t. 628. fol. oblongis integerrimis. In *P. b. S.* ȏ.

3. *K. ferruginea* Eckl. et Zeyh. In *Afr. austr.*

POLYANDRIA.**5141. JUNIPERUS L. (1737).**

a. *Caryocedrus* Endl. Semina inter se coalita, putamen trilocular formantia. Folia ternatim verticillata haud decurrentia.

1. *J. drupacea* Labill. pl. syr. 2. t. 8. fol. ternis patulis latiusculi linear-lanceolatis; galbulis axillaribus ovalibus v. subglobosis tota superficie elevato-areolatis demum nigricantibus subglobosis. Loud. arb. f. 2334—2336. In mont. Cassio. ȏ.

b. *Oxycedrus* Endl. Semina inter se non coalita. Folia basi articulata eglandulosa.

2. *J. macrocarpa* Sibth. fruticosa; ramis acutangulis; fol. ternis patentissimis pungenti-acuminatis supra caesiis bisulcis subtus obtuse carinatis; galbulis ovalibus attenuatis tuberculatis caeruleo-pruinosis. Cupan. Pangh. 2. t. 40. In Graecia ȏ.

3. *J. Oxycedrus* L. fruticosa; ramis acutangulis; fol. ternis patentissimis pungenti-acuminatis supra bisulcis subtus acute carinatis; galbulis globosis laevibus folio longioribus badiis pruinosis. Rich. conif. t. 6. f. 1. *J. macrocarpa* Ten. fl. nap. t. 247. In Hispania, Sicilia et Graecia. ȏ.

4. *J. rufescens* Lk. fruticosa ramis obtusangulis; fol. 3-nis patentissimis pungenti-acuminatis supra bisulcis subtus acute carinatis; galbulis globosis folio brevioribus rubris nitidis. Loud. arb. f. 2351 et 2352. In Europa austr. ȏ.

5. *J. hemisphaerica* Presl. fruticosa, ramis obtusangulis; fol. 3-nis patentissimis pungenti-mucronatis supra bisulcis subtus acute carinatis;

galbulis globosis folio brevioribus v. aequalibus rubris nitidis. In Sicilia. ȏ.

6. *J. nana* Willd. fruticosa prostrata; ramis angulatis; fol. 3-nis incurvo-patentibus v. subimbricatis lanceolato-linearibus cuspidatis supra canaliculatis pruinosis subtus obtuse carinatis; galbulis globosis tuberculis breviter acutis divergentibus atris pruinosis. Pall. ross. t. 54. f. 1. *J. canadensis* Loud. arb. f. 2347. In Europa et Siberia. ȏ.

7. *J. communis* L. fruticosa v. arborescens; ramis angulatis; fol. 3-nis patentibus cuspidatis supra canaliculatis subtus obtuse curinatis; galbulis globosis v. ovatis folio duplo brevioribus tuberculis apicis parum prominulis atris pruinosis. Duham. 1. t. 127. Schk. t. 338. E. B. t. 1100. Fl. dan. t. 1119. In Europa, Siberia et Camtschatka. ȏ.

8. *J. rigida* Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 125. arborea, ramis angulatis; fol. ternis patentibus pungentibus subtriangularis superne in sulco linea alba notatis; galbulis globosis folio brevioribus. In Japonia. ȏ.

9. *J. taxifolia* Hook. et Arn. ramis angulatis; fol. ternis linearibus obtusiusculis patulis superne bilineatis subtus ad carinam utrinque sulco laevi exaratis; galbulis globosis folio brevioribus. In Bonin-Sima. ȏ.

c. *Sabina* Endl. Semina inter se hand coalita. Folia opposita verticillata v. rarius sparsa adnato-decurrentia, acicularia v. squamaeformia dorso glandula resinifera notata.

10. *J. prostrata* Pers. caule ramisque prostratis diffusis; fol. ternis oppositisque adpressis acutis v. acuminato-pungentibus acerosis; galbulis subglobosis tuberculatis nigricantibus caesio-pruinosis. In Terra Nora. ȏ.

11. *J. recurva* Hamilt. caule ramisque adscendentibus; fol. omnibus ternis pungenti-acuminatis imbricatis v. patulis; ramulis apice recurvis; galbulis ovatis tuberculis infra apicem tribus acutis atris. Loud. arb. f. 2371. In Nepalia. ȏ.

12. *J. squamata* Don; caule prostrato ramis ramulisque confertissimis teretibus assurgentibus; fol. omnibus 3-nis imbricatis ovato-oblongis

acutis emarcidis persistentibus; galbulis ovatis summo apice umbilicatis rubris. In *Nepalia*. ♂.

13. *J. dururica* Pall. Ross. 2. t. 55. fol. oppositis subulato-acuminatis dorso carinatis saepissime eglandulosis omnibus patulis acutis ramulorum adpresso imbricatis; ramulis fructiferis apice incurvis galbulum ovato-globosum laevem aequantibus. In *Sibiria*. ♂.

14. *J. chinensis* L. fruticosa; fol. oppositis aliis acicularibus subulatis erecto-patentibus aliis squamaeformibus rhombis obtuse acuminatis erecto-adpressis dorso glandula oblonga impressa; ramulis subcylindricis fructiferis strictis galbulo depresso subgloboso longioribus. Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 126, 127. In *China et Japonia*. ♂.

15. *J. pseudosabina* Fisch. fol. omnibus oppositis squamaeformibus rhombis obtusis dorso glandula oblonga impressa notatis ecarinatis arte adpressis; ramulis teretibus, fructiferis demum incurvis galbulo ovato laevi longioribus. In *Altai*. ♂.

16. *J. Sabina* L. fol. oppositis ternisque aliis acicularibus subulatis patentibus aliis squamaeformibus rhombis erecto-adpressis dorso glandula oblonga impressa notatis ecarinatis; ramulis subcylindricis, fructiferis incurvis galbulo globoso laevi brevioribus. Pall. Ross. t. 56. Loud. arb. f. 2359, 2361, 2362. In *Europa, Siberia et Am. bor.* ♂.

17. *J. sabinoides* Griseb. fruticosa v. arborea; fol. ovatis incurvato-acutis eglandulosis glandulosive superne gibboso-3-gonis adpressis demum patulis; ramulis 4-quetris, fructiferis brevissimis; galbulis obovato-ovoideis basi breviter prostratis hinc lateraliibus subsessilibus. Loud. arb. f. 2369. In *Europa austr.* ♂.

18. *J. oophora* Kunze; fruticosa; fol. 4-fariam imbricatis ovatis inflexo-apiculatis dorso supra medium fovea oblonga impressa; galbulis oviformibus erectiusculis rugulosis rufo-fuscis. In *Hispania*. ♂.

19. *J. foetidissimum* Willd. fol. oppositis ternisque aliis acicularibus subulatis patentibus mucronatis aliis squamaeformibus ovatis incurvo-acutis dorso glanduliferis primo adpressis demum patulis; ramis 4-quetris, fruc-

tiferis strictis galbulo globoso laevi brevioribus. J. phoenicea Pall. Ross. t. 57. In *Armenia*. ♂.

20. *J. excelsa* Bieb. fol. oppositis ternisque acicularibus acutis patentibus squamaeformibus ovatis obtusiusculis dorso ecarinatis glandula subrotunda adpressis; ramulis teretibus, fructiferis brevissimis; galbulis subglobosis tuberculatis lateralibus subsessilibus. In *Graecia Arabia et Himalaya*. ♂.

21. *J. procera* Hochst. arborea; fol. oppositis ovatis acuminatis dorso glandula oblonga impressa acicularibus laxe patentibus squamaeformibus adpressis; ramulis teretibus. In *Abyssinia*. ♂.

22. *J. occidentalis* Hook. arborea; fol. oppositis subrotundo-ovatis obtusis dorso convexo glandula oblonga resinifera arte adpressis; ramulis teretibus patentibus. *J. excelsa* Lew. In *Am. bor.* ♂.

23. *J. virginiana* L. arborea; fol. oppositis v. ternatis acicularibus subulatis approximatis patentibus squamaeformibus rhombis acutis muticis v. mucronatis dorso ecarinatis glandula subrotunda arte adpressis; ramulis cylindricis, fructiferis strictis galbulum ovatum laevem v. tuberculatum aequantibus v. superantibus. Michx. arb. t. 5. Rich. conif. t. 6. f. 2. Loud. arb. f. 2357. In *Am. bor.* ♂.

24. *J. mexicana* Schlecht. arborea; fol. oppositis ternisque acicularibus subulatis rigidis patentibus squamaeformibus ovatis acuminatis dorso convexis subcarinatis glandula elliptica impressa; ramulis angulatis strictis, fructiferis erectis galbulos turbinate-subglobosos tuberculatos subaequantibus. *J. Deppeana* Steud. *J. foetida* Spach. In *Mexico*. ♂.

25. *J. flaccida* Schlecht. arborea; fol. acicularibus ternis elongato-subulatis acuminatis patentissimis, squamaeformibus ovato-lanceolatis mucronatis dorso subcarinatis eglandulosis adpressis; ramulis teretibus flacidis; fructiferis strictis galbulo globose laeviusculo brevioribus. *J. foetida* β. *flavida* Spach. In *Mexico*. ♂.

26. *J. bermudiana* L. arborea; fol. oppositis et sparsim approximatis plerisque acrosis subulatis acuminatis undique erecto-patentibus squamae-

formibus oppositis ovatis acutis dorso carinatis eglandulosis; ramis fructiferis strictis galbulo globoso rugoso brevioribus. Loud. arb. f. 2358. Hook. jour. 4. t. 1. In ins. Bermudianis. ♂.

27. *J. tetragona* Schlecht. fruticosa; fol. omnibus oppositis squamaeformibus apice incrassato-gibbis obtusissimis dorso carinatis arcte adpressis; ramulis 4-gonis, fructiferis nutantibus galbulo globoso laevi caesio pruinoso brevioribus. In Mexico. ♂.

28. *J. phoenicea* L. arborescens; fol. omnibus teruatis v. squamaeformibus oppositis ovatis obtusis dorso sulco impresso adpressis; ramulis teretibus, fructiferis galbulo globoso laevi brevioribus. Vent. in Duham. ed. 2. 4. t. 17 et 18. Guss. pl. rar. t. 62. In Europa mediterr. et in Oriente. ♂.

Species dubiae.

29. *J. dealbata* Loud. fol. ternis acicularibus subulatis patentissimis mucronato-pungentibus dorso carinatis facie albo-bilineatis squamaeformibus ovatis acuminatis adpressis dorso glandula oblonga notatis. In Am. bor. ♂.

30. *J. gracilis* Endl. fol. inferioribus ternis superioribus oppositis omnibus angustissime linearibus mucronatis dorso auguste carinatis carina decurrente facie canaliculatis. In Mexico. ♂.

31. *J. cernua* Roxb. fruticosa; ramis gracilibus elongatis nutantibus; fol. ternis mucronatis patentibus. In China. ♂.

32. *J. dimorpha* Roxb. fruticosa; fol. ternis mucronatis patentibus, ramulorum complanatorum oppositis obtusis imbricatis. In China. ♂.

33. *J. aquatica* Roxb. fruticosa fol. solitariis linearibus distinctis haud mucronatis. In China. ♂.

5142. WIDDINGTONIA Endl. (1847).

1. *W. juniperoides* Endl. strobili squamis dorso infra apicem gibbere conico patente superatis, facie planis dispermis. *Cupressus juniperoides* L. In P. b. S. ♂.

2. *W. cyprioides* Endl. strobili squamis dorso infra apicem conico-

mucronatis, facie acute carinalis 10-spermis, seminibus biseriatis. *Thuja* L. In P. b. S. ♂.

3. *W. Commersonii* Endl. strobili squamis muticis, v. vix superne umbonatis, intus carinatis 5-spermis. *Thuja 4-angularis* Vent. *Pachylepis Commersonii* Brongn. In Madagascar. ♂.

5143. ARAUCARIA Juss. (1790).

1. *A. brasiliensis* A. Rich. comosa effusa; ramis elongatis denudatis apice confertim ramosis; fol. caulinis retrorsum imbricatis, omnibus longe acutis pungentibus glaucis; strobili squamis apice recurvis. Lamb. Pin. 2. t. 5. ed. 2. t. 58—60. Ant. con. t. 51—53. In Brasilia. ♂.

2. *A. imbricata* Pav. coma pyramidata conica; ramis horizontalibus v. pendulis foliosis; fol. imbricatis ovato-lanceolatis acutis pungentibus subtus haud carinatis viridibus; strobili squamis acumine incurvo; seminis ala basilari minima. Lamb. Pin. 2. t. 4. ed. 2. t. 56, 57. Loud. arb. t. 2286—2293. Antoin. con. t. 48—50. In Chili. ♂.

3. *A. Bidwilli* Hook. jour. 2. t. 18, 19. ramulis oppositis; fol. planis ovato-lanceolatis pungenti-acuminatis junioribus subsecundis adultioribus unidique patentibus; strobili squamis acumine uncinato reflexo. In Nov. Holl. ♂.

4. *A. Cunninghamii* Ait. fol. subulatis compresso-4-angulis, ramorum sterili remotiusculis patentibus rectis, florigerorum unidique imbricatis introrsum falcatis mucronatis; strobili squamis acumine uncinato incurvo. Loud. arb. f. 2303—2305 et suppl. f. 2603. Antoin. t. 43, 44. *Eutacta* Lk. In Nov. Holl. ♂.

5. *A. excelsa* R. Br. ramulis distiche alternis; fol. subulatis compresso-4-angulis, ramorum sterili remotiusculis patentibus falcatis, florigerorum unidique imbricatis inflexis muticis; strobili squamis acumine uncinato incurvo. Loud. arb. f. 2297—2302. Lamb. Pin. ed. 2. t. 61, 62. *Dombeya excelsa* Lamb. ed. 1. t. 39, 40. In ins. Norfolk. ♂.

5144. DAMMARA Rumph. (1750).

1. D. orientalis Lamb. fol. petiolatis; amentis staminigeris extraaxillaribus; antherarum loculis 6—15 biseriatis crista cuneiformi orbiculari; strobili subglobosi squamis adpressis apice rotundis; seminum ala horizontali. Rumph 2. t. 57. Lamb. ed. 2. t. 54. Pinus Dammara Lamb. Pin. ed. 1. t. 38. In Moluccis. ♂.

2. D. australis Lamb. Pin. ed. 1. t. 6. ed. 2. t. 55. fol. sessilibus; amentis staminigeris axillaribus; antherarum loculis 5—6 uniseriatis crista suborbiculari; strobili obovati v. subturbanati squamis apice patulis acutis; seminum ala deflexa. Loud. arb. t. 2310 et 2311. In Nov. Zeelandia. ♂.

5145. SCIADOPITHYS Sieb. et Zucc. (1846).

1. S. verticillata Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 101 et 102. In Japonia. ♂. Arbor 12—15-ped. Fol. in apice ramorum sessilia 30—40 alterna horizontaliter expansa subfalcata emarginata.

5146. PODOCARPUS Herit. (1810).**a. Flores monoici. Receptaculum carnosum.**

1. P. Nageia R. Br. fol. oppositis subalternis oblongo-lanceolatis utrinque angustatis acutis subtus tantum stomata gerentibus; amentis axillaribus cylindricis; spicis 1—2-floris; semine globoso. Nageia japonica Gaertn. t. 39. Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 135. In Japonia. ♂.

2. P. cuspidata Endl. fol. oppositis ellipticis basi angustatis apice longe cuspidatis acutis, subtus tantum stomata gerentibus. In Japonia. ♂.

3. P. grandifolia Endl. fol. oppositis oblongo-lanceolatis multinerviis calloso-marginalis stomata utrinque gerentibus. In Japonia. ♂.

4. P. latifolia Wall pl. as. rar. t. 30. fol. oppositis ovatis acuminatis multinerviis stomata utrinque gerentibus; amentis staminigeris in fasciculis axillaribus pedunculatis; seminis receptaculo in pedunculo crassiore cylindrico squamoso. Hook. jour. 1. t. 23. In monte Punduae. ♂.

5. P. Blumei Endl. fol. suboppositis late lanceolatis nervosis rigidis. P. latifolia Blume. In Java. ♂.

b. Flores dioeci.*** Species americanae.**

6. P. Setowii Klotsch; fol. elongato-lanceolatis acutis basi angustatis; antherarum crista ovata acuminate deenticulata; pedunculatis fructiferis receptaculum biflorum abortu 1-spermum vix aequantibus. In Brasilia. ♂.

7. P. oteifolia Don. fol. lanceolatis acutis; amentis staminigeris axillaribus solitariis cylindricis; antherarum crista semicirculari integerrima undulata; pedunc. fructiferis filiformibus receptaculum bilobum 1-spermum aequantibus. In Chili. ♂.

8. P. salicifolia Klotsch et Karst. fol. oblongis utrinque angustatis subfalcatis; perulis ovatis acuminatis apice recurvo-squarrosis; antherarum crista semiorbiculari dentato-crenata; pedunculis fructiferis filiformibus receptaculo bilobo 1-spermo longioribus. In Columbia. ♂.

9. P. coriacea Rich. conif. t. 1. f. 3. fol. elliptico-lanceolatis acutis basi angustatis; pedunculis fructiferis receptaculum bifidum 1-spermum aequantibus; seminibus subglobosis oblique obtuse apiculatis. Hook. jour. 1. t. 21. P. antillarum R. Br. P. Yacca Don. In Antillis. ♂.

10. P. Purdieana Hook. ic. t. 624. fol. obovato-oblongis obtusis cum mucrone obtuso basi angustatis; pedunculis fructiferis receptaculo bifido 1-spermo brevioribus. In Jamaica. ♂.

11. P. Lambertii Klotsch; fol. anguste linearibus acutis basi angustatis; amentis staminigeris fasciculatis, perulis dentatis; pedunculis fructiferis receptaculo 1-spermo longioribus. In Brasilia. ♂.

12. P. rigida Klotsch; fol. linearilanceolatis rigidis pungenti-acuminatis; amentis staminigeris abbreviato-cylindricis in pedunculo axillari fasciculatis basi perulatis; perulis integerimis. P. glomerata Don. In Peruria. ♂.

13. P. chitina Rich. conif. t. 1. f. 1. fol. linearilanceolatis acutis subfalcatis; amentis staminigeris termi-

minalibus aggregatis filiformi-gracilibus; pedunculis fructiferis receptaculo 1-spermo multoties longioribus. *P. saligna* Don. In Chile. ♂.

** Species australasicae.

14. *P. Totara* Don; fol. undique patentibus linear-i-lanceolatis pungentia-acuminatis; amentis axillaribus cylindricis elongatis robustis; pedunculis fructiferis axillaribus solitariis receptaculo globoso 1—2-spermo brevioribus. Hook. journ. 1. t. 19. In Nov. Zeeland. ♂.

15. *P. elata* R. Br. fol. undique patentibus elongato-linearibus utrinque angustatis obtusis; pedunc. axillaribus solitariis 1-spermis receptaculum cylindrico-subclavatum aequantibus; seminibus globosis. In Nov. Holl. ♂.

16. *P. spinulosa* R. Br. fol. undique patentibus linearibus utrinque angustatis acuminato-pungentibus margine incrassatis; perulis acutis glomeratis; receptaculo cylindrico-subclavato 1-spermo longioribus. *P. pun-gens* Caley. *P. excelsa* Lodd. In Nov. Holl. ♂.

17. *P. Bidwilli* Hoibr. fol. undique patentibus linear-i-lanceolatis utrinque angustatis mucronatis enerviis; perulis acutis. In Nov. Holl. ♂.

18. *P. laeta* Hoibr. fol. undique patentibus linear-i-subfalcatis mucronatis 1-nerviis subtus juxta nervum utrinque linea glauco-viridi notatis; perulis obtusis. In Nov. Holl. ♂.

19. *P. nivalis* Hook. ic. t. 582. fol. undique patentibus oblongis obtuse apiculatis recurvis basi angustatis margine incrassatis; amentis staminigeris in pedunculo axillari folia superante ternis basi perulatis. In Nov. Zeeland. ♂.

20. *P. Lawrencei* Hook. fol. laxis subdistiche patentibus linearibus utrinque angustatis pungentibus. In Tasmania. ♂.

*** Species asiaticae.

21. *P. chinensis* Wall. fol. linearibus acutiusculis margine revolutis; pedunc. fructiferis axillaribus solitariis receptaculisque squamoso-bracteatis. *Juniperus* Roxb. In China. ♂.

22. *P. nereifolia* R. Br. fol. lanceolatis acuminatis margine revolutis; pedunculis fructiferis axillaribus raccemosis basi bracteatis. *P. macrophylla* Wall. In Nepalia. ♂.

23. *P. macrostachya* R. Br. fol. lanceolatis acuminatis margine revolutis; amentis staminigeris axillaribus crassis involucratis; pedunculis fructiferis axillaribus solitariis. *P. nereifolia* Don. *P. macrophylla* Wall. In Sincapur et ins. Wales. ♂.

24. *P. bracteata* Blume; fol. approximatis linear-i-lanceolatis longe acuminatis margine planis; amentis fasciculatis elongato-filiformibus basi squamis persistentibus. Rumph. 3. t. 26. In Amboina. ♂.

25. *P. macrophylla* Don; fol. linear-i-lanceolatis elongatis obtusis margine planis; gemmis perulatis roseis; amentis staminigeris axillaribus quinis basi bracteatis; pedunc. fructiferis axillaribus solitariis 1-spermis apice bi-bracteolatis. Kaempf. ic. t. 24. Sieb. fl. jap. t. 133 et 134. In Japonia. ♂.

26. *P. japonica* Hort. Bogor. fol. linear-i-lanceolatis elongatis obtusis crasse coriaceis rigidis; gemmis perulatis albidis. In Japonia. ♂.

27. *P. Koraiana* Siebold. ramis erectis virgatis strictis; fol. alternis approximatis exacte linearibns subfalcatis mucronato-pungentibus coriaceis firmis; perulis numerosissimis imbricatis carinatis acuminatis. In Coraea. ♂.

28. *P. amara* Blume; fol. distichis linear-i-lanceolatis margine planis; amentis staminigeris fasciculatis cylindraceis brevibus basi nudis. In Java. ♂.

**** Species capenses.

29. *P. Thunbergii* Hook. journ. 1. t. 22. fol. oblongo-lanceolatis obtusis sphacelato-mucronatis; pedunculis axillaribus solitariis receptaculum angulatum subaequantibus; seminibus elliptico-subrotundis. *P. latifolia* R. Br. In P. b. S. ♂.

30. *P. elongata* Herit. ex Rich. conif. t. 1. f. 2. fol. linear-i-falcatis acutis; pedunculis fructiferis receptaculo tereti bilobo longioribus; seminibus globosis. *P. capensis* Lam. In P. b. S. ♂.

31. *P. Meyeriana* Endl. fol. anguste lanceolato-ellipticis obtusis mucronatis; pedunc. axillaribus solitariis squamosis; receptaculo pedunculo vix crassiore; semine globoso. *In P. b. S.* ♀.

c. Flores dioeci. Receptaculum carnosum nullum.

32. *P. falcata* R. Br. fol. subdistichis linearis-falcatis acutis mucronatis; spicis axillaribus abbreviatis monospermis; semine globoso basi attenuato. *Taxus* Thunb. *In P. b. S.* ♀.

33. *P. taxifolia* H. et B. nov. gen. t. 97. fol. distichis late linearibus obtusis subtus pallidioribus; spicis ramulos axillares terminantibus bi-trifloris abortu 1-spermis; seminibus ovato-globosis umbrinatis. Rich. conif. t. 29. f. 1. *Dacrydium* distichum Don. *In Peruvia.* ♀.

34. *P. andina* Poepp. fol. distichis anguste linearibus acutis subtus glaucis; spicis axillaribus nutantibus bifloris abortu 1-spermis; semine globoso. *P. spicata* Poepp. *In Chile.* ♀.

35. *P. ferruginea* Don; fol. distichis anguste linearibus subfalcatis acutis subtus ferrugineis; amentis axillaribus solitariis; spicis fructiferis axillaribus strictis multibracteatis 1-floris; semine ovali pruinoso. Hook. ic. t. 542. *In Nov. Zeelandia.* ♀.

36. *P. spicata* R. Br. fol. distichis anguste linearibus obtusis subtus glaucis; amentis staminigeris axillaribus spicatis; spicis fructiferis axillaribus laxis polyspermis; seminibus subglobosis. Hook. ic. t. 543. *Dacrydium taxifolium* Lamb. con. II. t. 7. f. 2. *In Nov. Zeelandia.* ♀.

d. Receptaculum carnosum uniflorum, floris secundi ruditamento foliaceo.

37. *P. cupressina* R. Br. fol. aliis lanceolatis spinuloso-mucronatis arcte 5-fariam imbricatis, aliis linearis-lanceolatis aversis falcatis elongatis distiche horizontaliter patentibus; seminibus ramulos breves saepissime cernuos terminantibus. *P. Horsfieldii* Wall. *P. imbricata* Blume. *In Jara.* ♀.

38. *P. dacryoides* A. Rich. fl. nov. zeel. t. 39. fol. omnibus subulatis compresso 4-gonis mucronatis glaucis

aliis laxe imbricatis aliis subdistiche patentibus, seminibus ramulos breves strictos terminantibus. *Dacrydium excelsum* Don. *P. thujoides* R. Br. *In Nov. Zeelandia.* ♀.

39. *P. biformis* Hook. ic. t. 544. fol. undique insertis aliis uncialibus laxe patentissimis linearibus supra planis dorso obscure carinatis, aliis squamaeformibus arcte 5-fariam imbricatis ovato-rhombeis obtusis medio affixis dorso praeprimis superne carinatis. *In Nov. Zeeland.* ♀.

5147. *DACRYDIUM Soland.* (1760).

1. *D. cupressinum* Soland. fol. subulatis squarroso-patentibus v. laxe imbricatis; seminibus in ramorum apice cerino solitariis. Lamb. I. t. 44. ed. 2. t. 69. Rich. conif. t. 2. f. 2. *Thalamia cupressina* Spr. *In Nov. Zeelandia.* ♀.

2. *D. taxifolium* Hook. fil. fol. aliis acicularibus obtusis patentibus aliis ovatis dorso carinatis imbricatis; seminibus in ramulorum apice stricto solitariis. *In Nov. Zeelandia.* ♀.

○ 3. *D. elatum* Wall. fol. aliis acicularibus 4-gonis acutis erecto-patentibus, aliis squamaeformibus ovatis obtusis aut rarius acuminatis arcte adpressis; seminibus infra ramulorum apices solitariis. Hook. journ. 2. t. 2. *Juniperus elata* Roxb. *In Pulo-Penang et in Sumatra.* ♀.

4. *D. Colensoi* Hook. ic. t. 548. fol. dense 4-fariam imbricatis ovato-rhombeis obtusis basi solutis dorso carinatis minute resinoso-punctatis; seminibus infra ramulorum apices solitariis. *In Nov. Zeeland.* ♀.

5. *D. Franklinii* Hook. fit. in jour. of Bot. 4. t. 6. fol. dense 4-fariam imbricatis rhombeo-ovatis subacute dorso carinatis; seminibus in spicam terminalem collectis. *In Tasmania.* ♀.

5148. *PHYLLOCLADUS* Rich. (1840).

1. *P. trichomanoides* Don; phylloidiis distichis verticillatis oblique cuneatis penninerviis lobato-pinnatifidis lobis truncatis dentatis. *P. rhomboidalis* A. Rich. *In Nov. Zeelandia.* ♀.

2. *P. rhomboidalis* Rich. conif. t. 3. f. 2. *phyllodiis distichis rhomboideis flabellatum lineatis inciso-serratis, ramorum infimis connatis adnato-decurrentibus.* *P. asplenifolia* Labill. nov. Holl. t. 221. *P. Billardieri* Mirb. *Thalamia asplenifolia* Spr. *In Tasmania.* Ȣ.

5149. SALISBURIA Smith. (1790).

1. *S. adiantifolia* Smith. Rich. con. t. 3. f. 1 et 3. f. b. Loud. arb. f. 1992. Sieb. jap. 2. t. 136. *In China et Japonia.* Ȣ. Arbor trunco stricto coma pyramidalis. Rami verticillati patentes secundarii penduli. Folia late rhomboideo-subflabelliformia in petiolum angustata coriacea insciso-bifida.

5150. CEPHALOTAXUS Sieb. et Zucc. (1849).

1. *C. pedunculata* Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 38. fol. subdistichis subsessilibus linearis-falcatis cuspidatis medio albo-lineatis; amentis masc. globosis. *Taxus baccata* Thunb. *In Japonia.* Ȣ.

2. *C. umbraculifera* Sieb. msc. ramis primariis verticillatis horizontalibus; secundariis distichis; fol. subdistichis subsessilibus linearis-subfalcatis cuspidatis subtus pallidioribus rigidissimis. *In Japonia.* Ȣ.

3. *C. tardira* Sieb. ramis primariis verticillatis horizontalibus secundariis distichis; fol. subdistichis subsessilibus ovalibus utrinque obtusissimis brevissime mucronatis subtus utrinque juxta nervum medium glanco-linearis remotiusculis rigidissimis. *In Japonia.* Ȣ.

5151. TORREYA Arnott. (18).

1. *T. nucifera* Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 129. fol. subdistichis breviter petiolatis e basi rotundata linearis-falcatis cuspidatis subpungentibus rigidis; amentis staminigeris ovato-cylindricis; floribus gemmuliferis geminis v. ternis in pedunculo brevi-globeratis. *Taxus Gaertn.* t. 91. f. 6. Rich. conif. t. 2. f. 3. *In Japonia.* Ȣ.

2. *T. taxifolia* Arn. fol. subdistichis brevissime petiolatis e basi ro-

tundata linearibus apicem versus attenuatis acuminato-cuspidatis; amenitis staminigeris demum linearibus; floribus seminiferis sessilibus. *Taxus montana* Nutt. *In Am. bor.* Ȣ.

5152. TAXUS Tournef. (1700).

1. *T. baccata* L. fol. linearibus falcatis acuminatis margine vix revolutis; perulis ovatis obtusis ecarinatis. E. B. t. 746. Schk. t. 339. Rich. conif. t. 2. Loud. arb. f. 1981—1991. *In Europa Caucaso et Ind. or.* Ȣ.

2. *T. canadensis* Willd. fol. linearibus subfalcatis cuspidatis margine revolutis; perulis ovatis obtusis subcarinatis. *In Am. bor.* Ȣ.

3. *T. cuspidata* Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 128. fol. linearibus rectis breve cuspidatis; perulis ovatis mucronatis carinatis. *In ins. Jezo.* Ȣ.

4. *T. Wallichiana* Zucc. in Abhand. d. Bair. Acad. 3. t. 5. fol. linearis-falcatis apicem versus attenuatis acutis; perulis carinatis obtusis; alabastri staminiferi bracteis distantibus interioribus longioribus obovato-spatulatis. *T. nucifera* Wall. tent. t. 57. *In Nepalia.* Ȣ.

5. *T. globosa* Schlecht. fol. linearis-falcatis apice cuspidatis mucronatis; perulis acute carinatis obtusis; culpa cylindrico-campanulata; semine depresso-globoso. *In Mexico.* Ȣ.

6. *T. tomentosa* Thunb. fol. oppositis lanceolatis subtus tomentosis. *In P. b. S.* Ȣ.

5153. CYCAS L. (1737).

1. *C. circinalis* L. foliolis lanceolato-linearibus planis; stipite spinuloso; spadicibus fem. paucifloris apice inciso-serrata acuminata terminatis; fructibus ovato-globosis glabris. B. M. t. 2826—2827. Rumph. 1. t. 22—23. *In ins. Motucc.* Ȣ.

1. *C. rerolutus* Thunb. foliolis linearibus mucronatis margine revolutis; stipite angulato spinuloso; spadicibus fem. paucifloris apice folio palmato terminatis. B. M. t. 2963—2964. Rumph. 1. t. 24. *In China et Japonia.* Ȣ.

3. *C. inermis* Lour. foliolis linearibus planis; stipite inermi teretiusculo; spadicibus fem. paucifloris folio

Iaciniato terminatis; fructibus laevisbus. In China et Cochinchina. ♂.

4. *C. media* R. Br. foliolis linearibus acutissimis margine subrevolutis; rachi superne plana; stipite spinuloso; spadicibus fem. paucifloris apice folio dentato terminatis; fructibus ovalibus subangulatis. Miq. Cyc. t. 3. In Nov. Holl. ♂.

5. *C. angulata* R. Br. foliolis muticis supra concaviusculis; rachi ancipte; stipite 4-gono spinuloso; spadicibus fem. 4—10-floris apice subulato folium dentatum superante. In Nov. Holl. ♂.

6. *C. undulata* Gaudich. frondibus pinnatis; foliolis undulatis linearibus acutis. Col. in h. Par. ♂.

7. *C. Thouarsii* R. Br. frondibus pinnatis; pinnis approximatis subimbricatis linearibus falcato-recurvis. In Madagascaria. ♂.

8. *C. Riedlei* Fisch. frondibus pinnatis; foliolis distinctis linearibus mucronatis multinerviis. In Nov. Holl. ♂.

9. *C. glauca* Lk. In Ind. or. ♂.

5154. ZAMIA L. (1737).

1. *Z. angustifolia* Jacq. ic. t. 636. foliolis linearibus integerrimis apice calloso-biemarginatis obtusis; stipite semitereti. In ins. Baham. ♂.

2. *Z. debilis* Ait. foliolis lanceolatis acutis muticis apice serratis; stipite triquetro glabro. Comm. h. t. 58. In Ind. occ. ♂.

3. *Z. furfuracea* Ait. fol. oblongo-lanceolatis acutis versus apicem serratis subtus furfuraceis; stipite teretiusculo inferne spinoso. Trew. Ehrh. t. 26. In Ind. or. ♂.

4. *Z. integrifolia* Ait. foliolis lanceolatis obtusis basi attenuatis apice hinc serrulatis; stipite glabro sub-4-gono. Jacq. ic. t. 635. B. M. t. 1851. In Hispaniola et Florida. ♂.

5. *Z. longifolia* Jacq. fragm. t. 29. foliolis lanceolatis acutis muticis integerrimis; stipite longissimo glabro 4-gono. In Afr. austr. ♂.

6. *Z. media* Jacq. h. Schoenbr. t. 397 et 398. foliolis linear-lanceolatis obtusis sub apice obsolete serrulatis planis; stipite 3-quetro plano. B. M. t. 1838. In Ind. occ. ♂.

7. *Z. muricata* H. et K. foliolis oblongis acuminatis versus apicem serratis laevisbus; stipite muricato. In Nov. Granata. ♂.

8. *Z. pumila* L. foliolis linearibus integerrimis obtusis; stipite tereti basi furfuraceo. B. M. t. 2006. In ins. Baham. ♂.

9. *Z. pygmaea* Sims. B. M. t. 1741. foliolis oblongo-lanceolatis obliquis apice serrulatis; stipite tereti; spadice ovato-nutante. In Ind. occ. ♂.

10. *Z. tenuis* Willd. foliolis linearibus obtusis basi attenuatis apice obsolete 2—2-dentatis margine subrevolutis; stipite triquetro glabro. In ins. Baham. ♂.

5155. ENCEPHALARTUS Lehm. (1834).

1. *E. Friedericii* Guilielmi Lehm. pug. 1834. t. 1—3. caudice lanuginoso; rachi tetragona lanuginosa; pinnis multijugis linearibus mucronatis subtus pilosiusculis; fructu dense tomentoso. In Afr. austr. ♂.

2. *E. Attensteinii* Lehm. I. c. t. 4, 5. caudice glabro; rachi subcylindrica pinnisque lanceolatis acutis glabris nitidis spinoso-mucronatis, dentibus utrinque 3—5-spinosis distantibus divaricatis. In Afr. austr. ♂.

3. *E. cycadifolius* Lehm. caudice glabro, rachi semitereti canaliculata pubescente, pinnis linearibus mucronatis glabriusculis; fructu glabro. Zamia Jacq. fragm. t. 25 et 26. In Afr. austr. ♂.

4. *E. pungens* Lehm. rachi teretiuscula glabra; pinnis rigidis linearisubulatis mucronatis longissimis. Zamia Ait. Till. pis. t. 48. In P. b. S. ♂.

5. *E. tridentatus* Lehm. rachi semitereti canaliculata pinnisque linearibus subsulcatis apice irregulariter inciso-tridentatis glabris. Zamia Willd. In P. b. S. ♂.

6. *E. spiralis* Lehm. caudice glabro; rachi semitereti canaliculata subspirali pinnisque extrorsum falciformibus apice spinoso-3—5-dentatis glabris. Zamia Salisb. In P. b. S. ♂.

7. *E. horridus* Lehm. caudice glabro; rachi tetragona pinnisque pruinoso-glaucis lanceolatis, acutis glabris spinoso-mucronatis superioribus diva-

ricato-3-fidis; fructu glabro. *Zamia* Jacq. fragm. t. 27, 28. In *P. b. S.* ȳ.

8. *E. lanuginosus* Lehm. caudice lanuginoso; rachi tetragona pinnisque viridibus lanceolatis acutis mucronatis glabris medio extus profunde spinosobidentatis. *Zamia* Jacq. fragm. t. 30, 31. In *P. b. S.* ȳ.

9. *E. Lehmanni* Eckl. caudice glabro; rachi subtetragona pinnisque pruinoso-glaucis lanceolatis acutis mucronatis integerrimis glabris. *Zamia* Otto et Dietr. Gartenz. 1836. no. 26. In *Afr. austr.* ȳ.

10. *E. caffer* Lehm. caudice glabro; rachi 4-gona pinnisque lanceolatis acutis mucronatis viridibus glabris, junioribus dente uno altero adultis integris; fructu glabro. *Zamia* Thunb. In *P. b. S.* ȳ.

11. *E. longifolius* Lehm. caudice glabro; rachi 4-gona pinnisque lanceolatis acutis mucronatis integerrimis viridibus glabris; fructu glabro. *Zamia* Jacq. fragm. t. 29. In *P. b. S.* ȳ.

5156. DATISCA L. (1737).

1. *D. cannabina* L. laevis; fol. pinnatis; foliolis 5—8-jugis inaequaliter lanceolato-acuminatis serratis; cornibus fructus abbreviatis. Lam. ill. t. 823. In *Creta*. ȳ.

2. *D. nepalensis* Don; laevis; fol. pinnatis; foliolis 2-jugis ovato-lanceolatis acuminatis serratis; floribus masc. oligandris; cornibus fructus elongatis. In *Nepalia*. ȳ.

3. *D. hirta* L. hirsuta; fol. decursive pinnatis. In *Pensylvania*. ȳ.

5157. CLAEOXYLON Juss. (1823).

1. *C. parviflorum* Juss. tent. t. In *China*. ȳ. Fol. profunde triloba; lobis ovalibus dentatis. Pedunculi petiolo longiores.

5158. HISINGERA Hellen. (1790).

1. *H. nitida* Hellen. act. holm. 1790. t. 2. In *Am. austr.* ȳ. Frutex ramis verrucosis. Folia alterna elliptica coriacea subintegerrima mucronata glaberrima. Pedunculi axillares aggregati.

5159. STYLOCERAS Adr. Juss. (1823).

1. *S. taurifolium* H. et K. dioecum; germinibus bilocularibus. *Trophis* Willd. In *Am. austr.* ȳ.

2. *S. Kunthianum* Adr. Juss. monoecum; germinibus 4-locularibus. In *Quito*. ȳ.

5160. HYAENANCHE Correa.

1. *H. capensis* Pers. *H. globosa* Lamb. *Jatropha globosa* Gaertn. t. 102. In *P. b. S.* ȳ.

5161. ADRIANIA Gaudich. (1826).

1. *A. tomentosa* Gaudich. fol. 3—5-lobis utrinque tomentosis; lobis dentato-crenatis. In *Nov. Holl.* ȳ.

2. *D. glabrata* Gaudich. fol. elliptico-oblongis integris 3-lobisque supra glabriusculis subtus tomentosis; lobis laciniato-crenulatis. In *Nov. Holl.* ȳ.

5162. ACIDOTON Sw. (1797).

1. *A. urens* Sw. Sloane hist. t. 83. f. 1. In *Jamaica*. ȳ. Folia alterna lanceolato-ovata. Flores racemosi.

5163. TREWIA L. (1737).

1. *T. tricuspidata* L. fol. ovatis tricuspidatis denticulatis tomentosis. In *China* et *Cochinchina*. ȳ.

2. *T. nudiflora* L. fol. ovato-oblongis acuminatis integerrimis glabriusculis; pedunc. fem. paucifloris. *T. macrophylla* Roth. In *Ind. or.* ȳ.

3. *T. Inophyllum* Spr. fol. elliptico-oblongis obtusis submucronatis coriaceis integerrimis parallele venosis laevibus; pedunc. paucifloris compressis. *Croton* Forst. In *Nov. Hebrid.* ȳ.

4. *T. hernandifolia* Roth; fol. peltatis subrotundo-acuminatis integerrimis novemnerviis subtus ferrugineo-tomentosis. In *Ind. or.* ȳ.

5. *T. insignis* Steud. In *Java*. ȳ.

5164. MONIMIA Thouars. (1810).

1. *M. rotundifolia* Thouars; fol. subrotundis obtusisstellato-pubescentes.

tibus. *Ambora tomentosa* Bory. In ins. Mascar. ♂.

2. *M. ovalifolia* Thouars; fol. ovali-oblongis utrinque attenuatis. In ins. Mascar. ♂.

5165. PHYTELEPHAS R. et P. (1790).

1. *P. macrocarpus* R. et P. caudice humili; frondibus longissimis pin-natis; capitulis fructuum maximis. Elephantus Willd. In Peruvia. ♂.

2. *P. microcarpus* R. et P. caudice nullo; frondibus longissimis pin-natis; capitulis fructuum parvis. Elephantus Willd. In Peruvia. ♂.

5166. CITROSMA R. et P. (1790).

1. *C. lepidotum* H. et K. densissime argenteo-lepidotum; ramis 4-an-gularibus; fol. obovato-oblongis acu-minatis subdentatis; floribus subdode-candris 5-gynis. In Nor. Granata. ♂.

2. *C. laurifolium* H. et K. ramis teretibus foliisque glaberrimis ternis obovato-oblongis acutis basi rotunda-tis subintegerrimis supra nitidis; flo-ribus 6-andris. In Nor. Granata. ♂.

3. *C. Mutisii* H. et K. ramis teretibus stellulato-pilosis; fol. subqua-ternis breve petiolatis oblongis acu-minatis subcordatis obsolete denticula-tis glabris nervis venisque pilosis; floribus 8-gynis. In Nov. Granata. ♂.

4. *C. petiolare* H. et K. ramis 4-ge-noris foliisque glabris longe petiolat-is quaternis oblongis subacuminatis basi acutis grosse et remote dentatis; floribus 3-gynis. In Nov. Granata. ♂.

5. *C. grandiflorum* H. et K. ramis teretibus hirsuto-hispidis; fol. subovato-oblongis acuminatis auriculatis den-tatis hispido-pilosis; floribus 5-andris. In Peruvia. ♂.

6. *C. macrophyllum* H. et K. ra-mis 4-ge-noris piloso-hirsutis; fol. obo-vatis acutis basi rotundatis irregula-riter dentatis supra glabris subtus molliter tomentoso-hirtis; floribus 5-andris. In Quindiu. ♂.

7. *C. gesnerioides* H. et K. ramu-lis teretibus molliter villosa-tomento-sis; fol. obovatis v. ellipticis subacu-minatis dentatis molliterstellato-pi-losis; floribus 5-gynis. In Quindiu. ♂.

8. *C. echinatum* H. et K. ramis teretibus villosa-tomentosis; fol. ob-

longis breve acuminatis basi acutis dupli-cato-dentatis supra pilosis subtus mol-lissime hirsuto-tomentosis; floribus 4—7-gynis; calycibus echinatis. In Quindiu. ♂.

9. *C. molle* H. et K. ramis sub 4-ge-noris molliter tomentosis; fol. obo-vatis breve acuminatis basi rotunda-tis obsolete dentatis utrinque pubescen-tibus subtus mollibus; floribus poly-gynis. In Nov. Granata. ♂.

10. *C. dubium* H. et K. volubile; ramis teretibus piloso-tomentosis; fol. obovato-oblongis acutis basi rotunda-tis denticulatis utrinque molliter to-men-to-so-pubescentibus; floribus her-maphroditis 4-andris 1-gynis. In Nov. Granata. ♂.

11. *C. sessiliiflorum* H. et K. vo-luble; ramis 4-ge-noris hirsuto-tome-nosis; fol. oppositis subovato-ellipticis acutis basi rotundatis denticulatis his-pido-pubescentibus subtus molliter piloso-tomentosis; floribus conglome-ratis sessilibus polygynis. In Quin-diу. ♂.

12. *C. ovalis* R. et P. fol. oblongo-ellipticis denticulatis staminibus 11-13. In Peruvia. ♂.

13. *C. subinodora* R. et P. fol. lanceolatis dupli-cato-dentatis; floribus 7-andris. In Peruvia. ♂.

14. *C. tomentosa* R. et P. fol. ob-longo-ovatis serrulatis tomentosis; sta-minibus 10-12. In Peruvia. ♂.

15. *C. oblongifolia* R. et P. fol. oblongis acuminatis integerrimis; flo-ribus polyandris. In Peruvia. ♂.

16. *C. alternifolia* Spr. fol. al-ternis obtusis integerrimis subtus vil-losis; calycibus subsessilibus agg-e-gatis tetracarpis. In Brasilia. ♂.

17. *C. brasiliensis* Spr. fol. oppo-sitis oblongis utrinque attenuatis den-ticulatis subtus stellato-pubescentibns; ramis teretibus; calycibus aggregatis tetracarpis. In Brasilia. ♂.

18. *C. paniculata* Spr. fol. alter-nis oblongis opacis glabriusculis acutis integerrimis; ramulis teretibus ferru-gineo-tomentosis; pedunculis panicu-latis elongatis. In Brasilia. ♂.

19. *C. triflora* Spr. fol. oppo-sitis oblongo-lanceolatis utrinque acu-minatis subintegerrimis subtus ramisque teretibus hispidulis; pedunc. trifloris axillaribus divaricatis abbreviatis. In Brasilia. ♂.

20. *C. umbellata* Spr. fol. oppositis lanceolatis utrinque attenuatis argute remote serratis utrinque opacis glaberrimis subtus discoloribus parallele venosis rare dentatis; pedunc. ternis trifloris abbreviatis. *In Brasilia.* ♀.

5167. HEDYCARIA Forst. (1776).

1. *H. dentata* Forst. fol. oppositis oblongis; pedunc. axillaribus. Lam. ill. t. 827. *In Nov. Zeelandia.* ♀.

2. *H. hirsuta* Spr. *In Bengalia.* ♀.

5168. FLACOURTIA Comm. (1790).

1. *F. Ramontchi* Herit. fol. subrotundo-ovalis acutis crenatis. Lam. ill. t. 826. *In Madagascari.* ♀.

2. *F. sapida* Roxb. cor. t. 69. fol. ellipticis repando-serratis basi obtusis apice obtusiusculis. *In Ind. or.* ♀.

3. *F. inermis* Roxb. arborea; fol. ellipticis crenato-serratis nitidis; racemis axillaricus brevibus; floribus hermaphroditis; stylo 5-fido. *In Motuccis.* ♀.

4. *F. sepiaria* Roxb. cor. t. 68. fol. obovato-oblongis repando-serratis. Rheede 2. t. 39. *In Ind. or.* ♀.

5. *F. cataphracta* Roxb. fol. oval-oblongis serratis acuminatis. *In Ind. or.* ♀.

6. *F. flavescentia* Willd. fol. oblongis obtusiusculis serratis basi attenuatis. *In Guinea.* ♀.

7. *F. rhamnoides* Burch. fol. ellipticis subserratis acutiusculis. *In P. b. S.* ♀.

8. *F. edulis* Schum. et Thonn. fol. ovatis subacuminatis serratis glaberrimis; ramis spinosis. *In Guinea.* ♀.

9. *F. japonica* Walp. spinosa rarius inermis; fol. alternis petiolatis e basi rotundata ovatis cuspidatis serrulatis coriaceis glabris; floribus dioecis in ramos simplices dispositis. *F. racemosa* Sieb. et Zucc. fl. jap. t. 88. *In Japonia.* ♀.

10. *F. amara* Spanoghe; caule arboreo; ramis flexuosis spinosis; spinis simplicibus axillaribus rectis; fol. ovato-lanceolatis utrinque acuminatis glabris nitidis serratis; racemis axillaribus multifloris; bacca nigra pisi magnitudine. *In ins. Timor.* ♀.

11. *F. racemosa* Presl. fol. ellipticis acuminatis obtuse dentatis glaberrimis; racemis axillaribus subsessilibus 5—8-floris pubescentibus; calyce 4-partito ciliato; petalis 4 squamaeformibus. *In California.* ♀.

12. *F. tomentosa* Presl. ramulis hirsutis; spinis axillaribus solitariis; fol. lanceolatis subacuminatis utrinque obtusis remote dentatis supra pubescentibus subtus tomentosis; petalis 4 squamaeformibus. *In Am. tropica.* ♀.

5169. CLIFFORTIA L. (1737).

Species omnes capenses.

1. *C. ilicifolia* L. h. Cliff. t. 30. fol. subrotundo-ellipticis amplexicaulibus glabris rigidis apice spinoso-dentatis subtrilobis. Dill. elth. t. 31. f. 34. ♀.

2. *C. cordifolia* Lam. fol. ovatis spina acuminatis semiamplexicaulibus glabris rigidis integrerrimis aut utrinque versus apicem dente spinoso notatis. ♀.

3. *C. tridentata* Willd. fol. oblongo-cuneiformibus integris tridentisque nervosis subtus pubescentibus. ♀.

4. *C. graminea* L. fol. linearibus acuminatis triuviis integrerrimis aut remote setaceo-serratis glabris; stipulis magnis triuviis petiolo adnatis in lobos duos exsertis. ♀.

5. *C. grandifolia* Eckl. et Zeyh. fol. amplexicaulibus imbricatis rigidis late lanceolatis spina acuminatis remote spinoso-dentatis exacte multinerviis. ♀.

6. *C. intermedia* Eckl. et Zeyh. fol. oblongo-lanceolatis spinoso-acuminatis rigidis apice 2—4-spinoso-dentatis utrinque glabris margine pelliculidis vix dentatis. Inter frutices. ♀.

b. Dichopterac DC.

7. *C. odorata* L. fol. ovatis obtusis serratis plicato-venosis subtus villosis. ♀.

8. *C. reticulata* Eckl. et Zeyh. fol. subsessilibus ovatis ovato-rotundatis obtusis basi cordatis subtus reticulato-venosis margine grosse dentato-crenatis crenis mucronatis breve ciliatis. ♀.

9. *C. hirsuta* Eckl. et Zeyh. fol. replicatis ovatis acutis basi subcor-

datis supra nitidis subtus albo-tomentosis margine grosse crenato-dentatis crenis spinescenti-setaceis. ♂.

10. *C. ferruginea* L. fil. fol. ova-tis obtusis basi attenuatis setaceo-serratis striato-venosis glabris. *C. berberifolia* DC. ♂.

11. *C. cuneata* DC. fol. cuneiformibus truncatis apice 3—5-dentatis striato-venosis utrinque glabris. *C. serrata* Thunb. ♂.

c. Bifoliolae DC.

12. *C. crenata* L. foliolis 2—3 orbiculatis adpressis denticulatis septemnerviis glabris. ♂.

13. *C. putchella* L. foliolis binis orbiculatis adpressis multinerviis integris margine suberosulis. ♂.

14. *C. cinerea* Thunb. foliolis connatis ovato-trigonis incano-tomentosis. ♂.

d. Stipulatae Cham.

15. *C. octandra* Cham. in Linnaea 6. p. 350. villosa; foliolo medio cu-neato truncato-tridentato lateralibus ellipticis acutis; stipulis lanceolato-subulatis. ♂.

16. *C. filicaulis* Cham. l. c. humifusa; fol. cuneato-ovovatis triden-tatis margine villoso-ciliatis supra aeniis; floribus monoecis. ♂.

e. Latifoliae DC.

17. *C. ternata* L. foliolis ovali-oblongis acutis omnibus subaequalibus ramulisque pilosis. ♂.

18. *C. trifoliata* L. foliolis fasciculatis venosis pilosis lateralibus lanceolatis integerrimis medio obovato tridentato. Plunk. t. 319. f. 4. ♂.

19. *C. obcordata* L. fil. foliolis aeniis glabris lateralibus rotundato-ellipticis medio obcordato; ramulis subpubescentibus. ♂.

20. *C. dentata* Willd. foliolis obovatis glabris venosis apice subdentatis medio tridentato; ramulis pubescentibus. ♂.

21. *C. obliqua* Spr. foliolis venosis glaberrimis crenulatis lateralibus subrotundis oblique cordatis; medio obcordato; ramulis glabris. ♂.

f. Tenuifoliae DC.

22. *C. propinqua* Eckl. et Zeyh. fol. pseudo-fasciculatis densis; folio-

lis obovato-cuneatis spathulato-cunei-formibus acutiusculis truncatis v. obtusis glaberrimis apice serratis v. inciso-crenatis subtus penninervo-striatis; stipulis setaceis et subulatis. ♂.

23. *C. serpyllifolia* Cham. foliolis ternis cuneato-spathulatis muticis glaberrimis; floribus monoecis. ♂.

24. *C. polypylla* Eckl. et Zeyh. fol. pseudo-fasciculatis densissimis; foliolis oblongo-ovovatis obtusis glabris margine subrevolutis; stipulis parvis capillari-multifidis. ♂.

25. *C. concarifolia* Eckl. et Zeyh. fol. ternis densis; foliolis cuneato-spathulatis acutis intus excavatis utrinque pubescenti-sericeis. ♂.

26. *C. marginata* Eckl. et Zeyh. fol. pseudo-fasciculatis sparsis; foliolis oblongis obtusiusculis paulo complicatis pellucido-marginatis apice subreflexis muticis v. mucronulatis glabris. ♂.

27. *C. drepanoides* Spr. fol. pseudo-fasciculatis approximatis; foliolis oblongo-cuneatis acutiusculis mucronulatis margine subpellucidis saepe subsfalcatis utrinque glabris. ♂.

28. *C. falcata* L. foliolis linearibus mucronatis subsfalcatis fasciculatis ramisque glaberrimis. ♂.

29. *C. sarmentosa* L. foliolis linearibus villosis fasciculatis; ramis velutino-pubescentibus. ♂.

30. *C. phyticoides* Eckl. et Zeyh. caule erecto villoso ramisque brevibus adpressis confertis; fol. fasciculatis densissimis; foliolis lanceolatis margine revolutis apice callosis supra patentim villoso-pubescentibus demum glabris subtus albo-tomentosis inter se patentibus. ♂.

31. *C. eriocephalina* Cham. caule erecto; foliolis coriaceis patentim villosis linear-lanceolatis obtusis marginibus revolutis. ♂.

32. *C. sericea* Eckl. et Zeyh. se-rieo-pubescentis; caule erecto infra glabro; ramis approximatis subappressis; fol. fasciculatis adpressis remotiusculis; foliolis arte oblongo-cuneatis margine subrevolutis apice obtusiusculis callosis. ♂.

33. *C. teretifolia* Thunb. fol. te-reti-subulatis incurvis glabris fasciculatis. ♂.

34. *C. ericaefolia* L. foliolis te-retibus sulcatis glabris fasciculatis. ♂.

35. *C. ruscifolia* L. h. Cliff. t. 31. fol. lanceolatis glabris nervosis spina acuminatis integris aut dente spinoso utrinque notatis. *C. arachnoidea* Lodd. B. Cab. t. 260. ♂.

36. *C. linearifolia* Cham. caule stricto breve pubescente; ramis adpressis; fol. fasciculatis densis; foliolis arcte linearibus obtusiusculis apice callosis margine subrevolutis utrinque glaberrimis. ♂.

37. *C. juniperina* L. foliolis subulatis glabris fasciculatis mucronatis. ♂. Frutex ramosissimus.

38. *C. filifolia* L. foliolis filiformi-trigonis glabris fasciculatis. ♂.

39. *C. leptophylla* Eckl. et Zeyh. caule erecto glabro; ramis adpressis densis; fol. fasciculatis confertis; foliolis filiformi-trigonis subpungentimucronatis glabris incurvis margine parum pellucido-scabris. ♂.

40. *C. strobilifera* L. foliolis linearibus acutis glabris margine scabris, in axilla stipularum fasciculatis. ♂.

longis minoribus nonnullis intermixtis.
In Nov. Granata. 4.

7. *P. villosum* Sibth. fl. gr. t. 942. herbaceum; caulinibus sulcato-angulatis hirtis; foliolis oblongis dentato-incisis. *Circa Bizantium.* 4.

8. *P. garganicum* Ten. herbaceum; pilosum; foliolis subrotundo-ellipticis v. oblongo-lanceolatis profunde dentato-incisis; spicis globosis; floribus androgynis. *In siccis Gargani.* 4.

9. *P. verrucosum* Ehrenb. caulinibus angulosis glaberrimis; foliorum infirmorum foliolis ovatis caulinorum oblongis omnibus inciso-dentatis subtus pilosiusculis; capitulis polygamis; bracteis subrotundis ciliatis; fructibus globosis verrucosis. *In Sinai.* 4.

5171. PERA Mutis. (1784).

1. *P. arborea* Mutis act. holm. 1784. t. 8. *Spixia* Leand. *In Am. trop.* ♂. Folia breve petiolata oblonga v. lanceolata integerrima subtus ferrugineo-lepidota. Pedunculi fasciculati.

5172. MARIALVA Vand. (1771).

1. *M. gujanensis* Chois. fol. ovatis acutis subamplexicaulibus coriaceis 4—6 pollices longis; pedunculis corymboso-dichotomis crassis terminalibus; pedicellis articulatis. Vand. t. 8. f. 6. *Tovomita* Aubl. t. 364. *In Guiana et Brasilia.* ♂.

2. *M. fructipendula* Chois. fol. lanceolatis obtusiusculis 3 pollices longis; pedunculis filiformibus axillaribus terminalibusque 2—3-floris elongatis; pedicellis articulatis. Beauharnoisia R. et P. per. t. 9. *In Peruvia.* ♂.

3. *M. uniflora* Chois. fol. praecedentis; pedunculis axillaribus unifloris vix semipollicularibus. *In Guyana.* ♂.

4. *M. paniculata* Steud. fol. oblongo-lanceolatis dentatis; floribus paniculatis; calyce 4-phyllo. *In Brasilia.* ♂.

5. *M. brasiliensis* Mart. nov. gen. t. 167. fol. late lanceolatis utrinque acutis; pedunculis geminis 1-floris; petalis obtusis. *In Brasilia.* ♂.

6. *M. madagascariensis* G. Don. calyce disepalo; staminibus biserialibus basi connatis; fol. coriaceis ap-

5170. POTERIUM L. (1747).

1. *P. spinosum* L. fruticosum; ramis subvillosis, ultimis in spinas ramosas abeuntibus; fol. glabriusculis serratis; spicis oblongis. Moris. ox. f. 8. t. 18. f. 5. *In Oriente.* ♂.

2. *P. caudatum* Ait. fruticosum; ramis inermibus; petiolis pedunculis foliolisque subtus villosis; spicis elongato-cylindricis. B. M. t. 2341. Coll. rip. t. 40. *In Canariis.* ♂.

3. *P. ancistroides* Desf. atl. t. 251. suffruticosum; ramis angulosis decumbentibus; foliolis 4—5-jugis ovato-subrotundis subtus in nervis villosiusculis. *In Libano.* 4.

4. *P. Sanguisorba* L. herbaceum; caulinibus subangulosis foliisque glabris; foliolis ovato-subrotundis; capitulorum floribus inferioribus masculis superiores femineis. E. B. t. 860. *In Europa.* 4.

5. *P. polygamum* W. et K. hung. t. 198. herbaceum; caulinibus angulatis foliisque glabris; foliolis ovato-oblongis; capitulorum floribus inferioribus masculis meditis hermaphroditis superiores femineis. *In Hungaria.* 4.

6. *P. agrimonifolium* Cav. herbaceum; caulinibus subteretibus foliisque pube glandulosa hirsutis; foliolis ob-

proximatis subverticillatis; pedunculis paucifloris axillaribus. In Madagascar. ♂.

7. *M. calyptata* Steud. fol. late ellipticis obtusiusculis basi cuneatis coriaceis bipollicularibus; floribus axillaribus; pedunculis longis 1-floris demum reflexis; corollis reflexis; stigmate calyptraeformi sessili. Tovomita Schlecht. In Brasilia. ♂.

8. *M. foliosa* Presl. (sub Tovomita) fol. lanceolatis acuminatis integrerrimis basi attenuatis, in ramis sterilibus crebris; floribus paniculatis; calyce 4-sepalo; staminibus biserialibus. In Brasilia. ♂.

9. *M. amazonica* Poepp. et Endl. nov. gen. t. 202. fol. oblongis utrinque acutis; paniculis lateralibus erectis corymbosis; petalis subrotundis; staminibus numerosis biseriatis; stigmatibus 4 distinctis peltatis. In Bras. bor. ad Egam. ♂.

10. *M. microcarpa* Poepp. et Endl. fol. ellipticis utrinque acuminatis; paniculis geminis longe pedunculatis brachiatis fructiferis pendulis; petalis ovatis acutis; staminibus 8 uniseriatis alternis brevioribus; stigmatibus 4 sessilibus. In Peruria. ♂.

11. *M. macrophylla* Poepp. et Endl. fol. ellipticis utrinque acutis; panícula petiolis breviore erecta; pedunculis compressis dilatatis; petalis 8; staminibus multiseriatis numerosis; stigmatibus 4 sessilibus. In Brasilia ad Egam. ♂.

5173. GYROSTEMON Desf. (1806).

1. *G. ramulosum* Desf. ann. Mus. 6. t. 6. fol. linearibus sessilibus. In Nov. Holl. ♂.

2. *G. cotinifolium* Desf. mem. Mus. 8. t. 10. fol. ovatis rotundis petiolatis. In Nov. Holl.

MONADELPHIA.

5174. FEUILLEA L. (1747).

1. *F. punctata* Poir. foliis utrinque v. subtus secus nervos glandulo-punctatis trilobis, lobis lanceolatis subincisis. In Domingo. ♂.

2. *F. tritobata* L. fol. utrinque subglandulosis tripartitis aut 3-fidis, lobis inferiorum obtusis superiorum acutis. In Brasilia. ♂.

3. *F. cordifolia* Poir. fol. eglandulosis cordatis acuminatis indivisis aut subtrilobis subserratis. *F. hederaea* Turp. in dict. sc. nat. le. In Caribaeis. ♂.

4. *F. Javilla* H. et K. fol. eglandulosis subrotundis sinuato-cordatis acuminatis. In Nov. Granata. ♂.

5. *F. tomentosa* Gardn. fol. 5-lobis, lobis integerrimis, inferiorum obtusis superiorum acutis supra pilosopubescentibus subtus tomentosis. In Brasilia. ♂.

5175. CLUYTIA L. (1847).

1. *C. alaternoides* W. h. ber. t. 50. fol. sessilibus linear-lanceolatis acutis; floribus axillaribus solitariis. In P. b. S. ♂.

2. *C. polygonoides* Willd. t. 51. fol. sessilibus obovatis acutis; pedunculis subtrifloris axillaribus. In P. b. S. ♂.

3. *C. daphnoides* Willd. t. 52. fol. subsessilibus lanceolato-obovatis; floribus axillaribus solitariis. In P. b. S. ♂.

4. *C. ericoides* Thunb. fol. subsessilibus linear-lanceolatis acutis crassiusculis; floribus axillaribus geminis. In P. b. S. ♂.

5. *C. tenuifolia* Willd. fol. sessilibus linearibus acutis; floribus axillaribus solitariis. In P. b. S. ♂.

6. *C. polifolia* Jacq. Schoenbr. t. 50. fol. petiolatis linearibus obtusis mucronatis margine revolutis; floribus axillaribus subsolitariis longe pedunculatis. In P. b. S. ♂.

7. *C. pubescens* Thunb. fol. subsessilibus lanceolatis obtusis utrinque cano-pubescentibus; floribus axillaribus subgeminis. In P. b. S. ♂.

8. *C. tomentosa* L. fol. ellipticis obtusis utrinque dense tomentosis; floribus axillaribus solitariis sessilibus. In P. b. S. ♂.

9. *C. heterophylla* Thunb. fol. inferioribus ovatis superioribus lanceolatis glabris. In P. b. S. ♂.

10. *C. pulchella* L. fol. petiolatis ovatis acutiusculis glabris; floribus

subquinis axillaribus. Comm. h. t. 91.
In P. b. S. §.

11. *C. lanceolata* Vahl; fol. ellipticis lanceolatis; floribus lateralibus tomentosis. In Arabia felici. §.

12. *C. hirta* L. fol. cuneiformibus glabris; floribus lateralibus glomeratis hirsutis. In P. b. S. §.

5176. GYNOSTEMMA Blume. (1826).

1. *G. pedatum* Blume; fol. pedatis. In Java. §.

2. *G. simplicifolium* Blume; fol. simplicibus. In Java. §.

5177. MYRISTICA L. (1747).

1. *M. moschata* L. fol. oblongis acuminatis glabris, venis simplicibus; fructu solitario glabro. *M. aromatic* Lam. act. par. 1788. t. 4. Hook. exot. fl. t. 155, 156. Nees Abb. 8. t. 21. In Moluccis. §.

2. *M. otoba* H. et B. fol. oblongis breve acuminatis basi attenuatis glabris; venis simplicibus fructu glabro.

In Nov. Granata. §.

3. *M. philippensis* Lam. fol. ovato-oblongis acutis glabris; venis simplicibus; fructu solitario tomentoso. In ins. Philippinis. §.

4. *M. fatua* Sw. fol. oblongo-lanceolatis subtus stellato-pubescentibus venis simplicibus; fructibus racemosis tomentosis. Pluck. t. 250. f. 6. Blume l. c. t. 59. In Surinamo. §.

5. *M. tomentosa* Thunb. fol. ovatis subtus tomentosis venis simplicibus; fructu solitario oblongo tomentoso Gaertn. t. 41. f. 2. Rheede 4. t. 5. In Moluccis. §.

6. *M. microcarpa* Willd; fol. oblongo-lanceolatis utrinque acutis glabris, venis simplicibus; floribus corimbosis. Rumph. am. 2. t. 7 et 8. In Amboina. §.

7. *M. sativifolia* Willd; fol. lanceolatis venis simplicibus subtus rufovillois; fructibus subracemosis glabris. In Moluccis. §.

8. *M. acuminata* Lam. fol. ovatis acuminatis glabris subtus glaucis; venis ramosis. In Madagascaria. §.

9. *M. madagascariensis* L. fol. oblongo-ellipticis glabris subtus reticulato-venosis; fructibus racemosis

tomentosis. Lam. l. c. t. 8. In Madagascar. §.

10. *M. philippensis* Willd. fol. ovato-oblongis acutis glabris, venis simplicibus; fructu solitario tomentoso. In Philippinis. §.

11. *M. Bicuhyba* Schott; fol. alternis distichis lineari-lanceolatis subtus glaucis; floribus glomerato-racemosis pedicellatis 3-andris. In Brasil. §.

12. *M. glabra* Blume Rumphia. fol. cuneato-oblongis; fructibus ellipsoideis. In Java. §.

13. *M. glauca* Blume in Rumphia t. 60. fol. oblongis utrinque acutis glabris subtus glaucis; floribus 8-10-andris; fructibus ellipsoideis ramulisque ochraceo-pulverulentis. In Java. §.

14. *M. javanica* Blume in Rumphia t. 62. fol. oblongis falcato-acuminatissimis; floribus glomeratis; fructibus globosis glabris. In Java. §.

15. *M. iners* Blume in Rumphia t. 58. fol. oblongo-lanceolatis obtusiusculis glaberrimis; fructibus elongato-ovoideis obsolete ferrugineo-pulverulentis. In Java. §.

16. *M. globularia* Blume in Rumphia t. 64. f. 2. fol. oblongis utrinque attenuatis glabris; floribus paniculatis; fructibus ovoideis semipollicularibus. In Java. §.

17. *M. Horsfieldii* Spr. Blume Rumphia t. 63. fol. ovato-vel elliptico-oblongis acuminatissimis subtus et fructibus elongato-ovoideis stellato-pubescentibus; floribus dense glomeratis. In Java. §.

18. *M. laurina* Blume in Rumphia t. 61. fol. elliptico-oblongis acuminatis subtus glaucis in venis stellato-tomentosis; floribus 8-andris; fructibus elongato-ellipticis rufo-tomentosis. In Java. §.

19. *M. lepidota* Blume in Rumphia t. 57. fol. lanceolatis longe acuminatis basi acutis; floribus fasciculatis; fructibus ramulis foliisque subtus lepidotis. In Java.

5178. ALCHORNEA Sw. (1797).

1. *A. castaneaefolia* Juss. fol. lanceolatis acutis mucronato-serratis utrinque glabris; floribus spicato-paniculatis. Ad Orinocum. §.

2. *A. latifolia* Sw. fol. ovato-acuminatis remote denticulatis. *In Jamaica.* ♀.

5179. NEPENTHES L. (1747).

1. *N. destillatoria* L. fol. sessilibus; ascidiis cylindricis; floribus paniculatis. *Burm. zeyl. t. 17. In Zeytona.* 24.

2. *N. madagascariensis* Poir. fol. sessilibus; ascidiis obverse conicis; floribus paniculatis. *In Madagascar.* 24.

3. *N. Phyllamphora* Willd. fol. petiolatis; ascidiis ventricosis; racemo simplici terminali. *In Moluccis.* 24.

4. *N. ampullacea* Jack. in Wall. cat. *In Ind. or.* 24.

5. *N. cristata* Brongn. *In Madagascar.* 24.

6. *N. gymnamphora* Reinw. *In Java.* 24.

5180. SPHAEROSTEMMA Blume. (1827).

1. *S. axillare* Blume Schizandr. t. 3. fol. ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis; pedunculis axillaribus 1-floris petiolum aequantibus; filamentis exterioribus liberis. *In Java.* ♀.

2. *S. elongatum* Blume Schizandr. t. 5. fol. ovatis acuminatis tenuissime denticulatis; pedunculis axillaribus 1-floris petiolos longe superantibus; filamentis omnibus connatis. *In Java.* ♀.

3. *S. pyrifolium* Blume Schizandr. t. 4. monoecum; fol. subintegerrimis acuminatissimis lanceolatis basi subrotundis; pedunculis axillaribus, medio bracteolatis; staminibus omnibus connatis. *Uvaria* Reinw. *In Java.* ♀.

C L A S S I S XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

Leguminosae : Mimosae.

5181. Entada. Petala 5 distincta. Stam. 10—25, antheris apice glandulosis. Legumen compressum articulatum. Sem. crassa.

5182. Platyhymenia. Cal. campanulatus 5-dentatus sessilis. Petala 5. Stam. 10 antheris glanduliferis. Legumen stipitatum late lineare planum.

5183. Piptadenia. Cal. sessilis campanulatus 5-dentatus. Pet. 5. Stam. 10, antheris glanduliferis. Legumen stipitatum v. sessile late lineare. Sem. compressa, funiculo filiformi appensa.

5184. Stryphnodendron. Cal. sessilis campanulatus 5-dentatus. Pet. 5. Stam. 10 antheris glanduliferis. Legumen lineare compressum crasso-coriaceum ad suturas himarginatum intus carnosum. Sem. transversa funiculo filiformi appensa.

5185. Elephantorrhiza. Flores breviter pedicellati. Cal. breve 5-dentatus. Pet. lanceolata. Stam. 10, antherae glandula substipitata decidua superatae. Legumen compressum suturis constanter clausis, pulpa farctum, in aqua fervida solubile.

5186. Tetrapleura. Flores pedicellati. Cal. brevis 5-dentatus. Petala lanceolata. Stam. 10 antherae glandula substipitata decidua superatae. Legumen obtusum compres-

sum margine aculeatum lignosum, loculis transversis 1-spermis, crista subcarnoso-dura.

5187. Mimosia. Pet. 4—5 in corollam subinfundibuliformem 4—5-fidam connata. Stamina imae corollae aut ovarii stipti inserta numero loborum aequalia 4—15. Legumen compresso-planum articulatum.

5188. Schrankia. Flores superiores hermaphroditi 5—4-meri inferiores masculi. Cal. saepe minimus. Cor. gamopetala membranacea. Stam. 5—10, antherae suborbiculatae. Legumen anguste lineare bivalve undique echinatum.

5189. Leucaena. Cal. tubuloso-campanulatus 5-dentatus. Pet. 5. Stam. 10 antherae subglobosae saepe pilosae. Legumen stipitatum late lineare plano-compressum 1-loculare. Sem. numerosa.

5190. Xylinia. Cal. corolla et stamina fere *Leucaenae*. Legumen sessile oblongo-falcatum compressum utrinque angustatum lignosum, intus inter semina septatum, seminibus transversis funiculo crasso carnoso brevi affixis.

5191. Acacia. Cal. 4—5-dentatus. Pet. 4—5, libera v. coalita. Stam. 10—200. Legumen continuum exsuccum bivalve.

5192. Lysiloma. Cal. campanulatus 5-dentatus. Cor. campanula 5-fida membranacea. Stami. indefinita. Legumen lineare rectum v.

falcatum plano-compressum, margine incrassato integro.

5193. Albizzia. Flores plerumque hermaphroditi. Cal. campanulatus v. tubulosus 5-dentatus. Stam. indefinita basi in tubum coalita. Legumen siccum membranaceum v. chartaceum indehisces.

5194. Zygia. Cal. tubulosus 5-dentatus. Cor. infundibuliformi-tubulosa breviter 5-loba. Stam. plurima connata in tubum spiraliter contortum apice libera. Legumen et habitus *Albizziae*.

5195. Calliandra. Flores plerique hermaphroditi. Cal. campanulatus 5-dentatus saepius striatus. Cor. infundibuliformi-campanulata lacinii striatis v. membranaceis. Stamina indefinita basi in tubum coalita. Legumen linearis-rectum elastice dehiscens epulposum.

5196. Pithecellobium. Cal. campanulatus 2—4-dentatus. Cor. tubulosa v. infundibuliformis. Stam. indefinita corolla multo longiora basi in tubum coalita. Legumen compressum v. planum contortum v. falcatum valvulis coriaceis v. carnosus saepe tortis.

5197. Serianthus. Cal. ample campanulatus. Cor. 5-partita lacinii tubo stamineo adnatis. Stam. monodelpha numerosissima. Legumen oblongum v. ovatum compressum lignosum indehiscens.

5198. Inga. Flores hermaphroditi rarius polygami. Cal. tubulosus v. campanulatus 2—5-dentatus. Cor. tubulosa v. infundibuliformis. Stam. indefinita, basi in tubum coalita. Legumen carnosum v. coriaceum planum tetragonum v. teres rectum v. incurvum vix dehiscens marginibus incrassatis.

5199. Aphonsea. Flores hermaphroditi. Cal. ample tubulosi-campanulatus, 5—8-dentatus. Cor. tubulosa. Stamina numerosissima monodelpha longe exserta. Ovaria plura sessilia. Legumen crassum rectum Sem. funiculo longo appensa.

5200. Didymandra. Cal. 4-partitus. Cor. 4-fida. Stam. 1. biantheriferum. Styli 3 brevissimi. Bacca 3-locularis, 3-sperma.

5201. Ophioxylon. Cal. 2—5-fidus. Cor. 5-fida. Stam. 2—3. Pistillum 1.

5202. Kerneria. Cal. spatha bivalvis. Cor. nulla. Nect. 3-phyllo aristatum. Antherae 6 sessiles. Stylus 1. Bacea 1-sperma.

5203. Ceroxylon. Cal. 3-fidus. Cor. 3-petala. Stam. 1, 2—4. Stigmata 3 sessilia. Drupa monosperma. *Palmae*.

5204. Heritiera. Cal. 5-dentatus. Cor. nulla. Antherae 5—10 sessiles v. in cylindrum connatae. Germ. 5. Styli 5 cohaerentes. Drupae 5 exsuccae alatae. *Bijtneriaceae*.

5205. Parietaria. Cal. 4-fidus. Cor. nulla. Stam. 4. Stylus 1. Sem. 1. *Urticeae*.

5206. Atriplex. Cal. 2—5-phyllus. Cor. nulla. Stam. 5. Stylus bifidus. Sem. 1. *Chenopodeae*.

DIOECIA.

5207. Chrysitrix. Gluma bivalvis. Cor. paleae numerosae. Stamina multa mixtis paleis. Pist. 1. *Gramineae anomatae*.

5208. Breynia. Cal. 6-partitus. Cor. nulla. Antherae 5. Glandulae 5. Stigmata 3. Caps. 5-locularis 5-sperma.

5209. Arctopus. Flores umbellati dioeci. Cor. 5-petala. Styli 2. Stam. 5. Involucra maxima. *Umbelliferae*.

5210. Gleditschia. Cal. 3, 4, 5—8-partitus. Pet. 3, 4—5. Stam. 3, 6—8. Filamenta filiformia basi libera. Legumen plerumque longissimum isthmis interruptum. Sem. in pulpa nidulantia. *Leguminosae*.

5211. Ficus. Receptaculum commune turbinatum conniventi-clausum carnosum. Cal. 3—5-partitus. Cor. nulla. Stam. 3. Pistillum 1. Sem. 1. *Urticeae*.

Polygamia. MONOECIA.

5181. ENTADA Adans. (1763).

1. **E. scandens** Benth. inermis; fol. cirriferis; pinnis 1—2-jugis foliolis 2—5-jugis ovatis obovatisque acuminatis; spicis elongatis longe racemosis. *In Asia, Africa et America*. ♀.

2. **E. africana** Guillem. et Perr. fol. bipinnatis pinnis 2—4-jugis; fo-

liolis 8—15-jugis linearis-oblongis; spicis longissimis 2—4-nis supraaxillaribus. In Senegambia. ♂.

3. *E. polyphylla* Benth. pinnis 4—8-jugis; foliolis 12—20-jugis linearis-oblongis obtusis v. retusis, subtus minute adpresso-pubescentibus; spicis geminis racemosis. In Guiana. ♂.

4. *E. natalensis* Benth. ramulis petiolisque tomentellis, hinc inde uncinato-aculeatis; pinnis 5—7-jugis; foliolis 9—15-jugis oblongis obtusis glabris, petiolo glandulifero; spicis axillaribus paniculatis. Mimosa spicata Mey. In Afr. austr. ♂.

5. *E. myriadenia* Benth. scandens retrorsum aculeata; pinnis 8—12-jugis, foliolis 20—40-jugis oblique oblongis subtus glandulosis, glandula maxima ad basin petioli; floribus 5-andris. In Guiana. ♂.

6. *E. Gandu* Hoffmannsegg fol. cirro furcato terminatis bipinnatis pinnis 1—3-jugis; foliolis ovalibus cum apiculo, supra basin petioli glandula subramentacea; stipulis filiformibus reflexis. Gandu Rumph. V. t. 4. In Java. ♂.

7. *E. Gigalobium* DC. fol. bipinnatis cirro terminatis; pinnis 1—3-jugis oblongis glabris emarginatis; stam. 20—25. In Caribaeis. ♂.

8. *E. Pursaetha* DC. fol. bipinnatis cirrhosis, pinnis 1—2-jugis; foliolis 2—4-jugis glabris ovatis emarginatis; staminibus 10. Rheede 8. t. 32—34. Rumph 5. t. 4. In Motuccis. ♂.

9. *E. monostachya* DC. fol. bipinnatis cirrhosis; pinnis 1—2-jugis; foliolis 4—5-jugis glabris oblongo-ovatis emarginatis; spicis solitariis. Mim. Entada Willd. Rheede 9. t. 77. In Matabaria. ♂.

10. *E. polystachya* DC. leg. t. 61 et 62. fol. bipinnatis demum cirrhosis; pinnis 2—3-jugis; foliolis 7-jugis utrinque glabris ovalibus emarginatis; spicis fasciculatis. Mimosa L. Jacq. am. f. 93. Plum. ed. Burm. t. 12. In Martinica et Guadelupe. ♂.

11. *E. chilantha* DC. fol. bipinnatis pinnis 3—4-jugis; foliolis 7—8-jugis linearis-oblongis subtus pubescentibus; spicis geminis. Mimosa Mey. In Guiana. ♂.

12. *E. Adenanthera* DC. fol. bipinnatis bijugis; foliolis ovatis obliquis glabris; cirris terminalibus. Adenan-

thera scandens Forst. In ins. Malicocco. ♂.

5182. PLATYHYMENIA Benth. (1841).

1. *P. reticulata* Benth. in Hook. journ. 4. p. 334. ramis foliisque laxe pubescentibus demum glabris; pinnis 4—8-jugis, foliolis 10—12-jugis ellipticis retusis reticulato-venosissimis; spica pubescente. In Minos Gaeres. ♂.

2. *P. foliolosa* Benth. ramis petiolisque glabris; pinnis 4—12-jugis, foliolis 12—20-jugis oblongo-ellipticis obtusis retusisque glabris, spica glabra. In Brasilia. ♂.

5183. PIPTADENIA Benth. (1841).

a. *Eupiptadenia* Hook. Legumen continuum valvulis membranaceis brevibus reticulatis.

† Latifoliae; fol. ovatis oblongisve; ovario stipitato villosa.

1. *P. patens* Benth. scandens ramulis petiolisque pubescentibus aculeatis; pinnis 3—4-jugis, foliolis subtrijugis obovatis ciliatis glabrisve; corolla calyce triplo longiore; ovario villosa. In Am. trop. ♂.

2. *P. latifolia* Benth. aculeata; fol. bipinnatis 3—4-jugis; foliolis 2—3-raro plurijugis; floribus spicatis, ramis rachique aculeolatis; foliolis obovato-ellipticis, rachi villosa; legume lineari obtuso. In Brasilia. ♂.

3. *P. taxa* Benth. ramis petiolisque glabris puberulisve; aculeis sparsis parvis; pinnis 2—4-jugis; foliolis 4—7-jugis ovali-vel obovato-ellipticis oblongisve glabris subtus pubescentibus. Mimosa fruticosa fl. flum. I. t. 6. In Brasilia. ♂.

4. *P. gujanensis* Benth. inermis; pinnis 20-jugis; foliolis 20-jugis ellipticis obtusis glabris, glandula convexa ad basin petioli subvelutini; spicis filiformibus solitariis axillaribus. Aubl. guj. t. 357. Acacia DC. In Guiana. ♂.

† Angustifoliae; fol. linearibus; ovario villosa.

5. *P. macradenia* Benth. ramulis petiolisque tomentosis hinc inde aculeo-

Iatis v. linearibus; pinnis 6—18-jugis; foliolis multijugis linearibus falcatis ciliatis; spicis tomentosis. In Brasilia. ♂.

6. *P. nitida* Benth. inermis; ramulis petiolisque puberulis demum glabratris; pinnae 8—10-jugis; foliolis multijugis linearibus vix falcatis nitidis; spicis tomentellis; ovario longe stipitato villosissimo. In Brasilia. ♂.

7. *P. filicoma* Benth. inermis; ramulis petiolisque tomentosis; pinnis 12—20-jugis; foliolis multijugis minimis linearibus nervo marginali; spicis gracilis tomentosis; floribus pubescentibus. In Brasilia. ♂.

8. *P. foliosa* Benth. inermis; ramulis incrassatis angulatis petiolisque ferrugineo-puberulis; pinnis 12—20-jugis; foliolis multijugis oblique oblongo-linearibus falcatis; spicis gracilis tomentosis paniculatis. Ad flum. Amazon. ♂.

9. *P. psilotachya* Benth. inermis; ramulis petiolisque puberulis; pinnis 7—10-jugis; foliolis multijugis oblongo-obovatis obtusis subfalcatis subbinerviis glabris nitidis; spicis gracilis tomentellis. In Guiana. ♂.

10. *P. ramosissima* Benth. ramulis petiolisque puberulis, nervo excentrico; spicis gracilis paniculatis; floribus glabriusculis. In Brasilia. ♂.

11. *P. suareolens* Miquel; hirtella inermis; pinnis 6—10-jugis; foliolis multijugis dimidiato-falcato-linearibus acutis basi truncata sessilibus; spicis axillaribus solitariis v. geminis; floribus adpresso-hirtellis. In Surinamo. ♂.

+++ Subtilifoliae; foliolis linearibus; ovario stipitato glabro.

12. *P. biuncifera* Benth. ramulis foliisque pubescentibus; aculeis infra-stipularibus oppositis recurvis; pinnis 8—10-jugis; foliolis multijugis linearifalcatis obtusis; corolla longa tenui. In Brasilia. ♂.

13. *P. subtilifolia* Benth. fol. bipinnatis; pinnis 5—10-jugis; foliolis 30—45-jugis linearibus subtus puberulis; spicis cylindricis solitariis. Acacia H. et K. In Nov. Granata. ♂.

14. *P. viridiflora* Benth. fol. bipinnatis; pinnis 6—15-jugis; foliolis 15—25-jugis linearis-oblongis subfalcatis subtus puberulis; petiolo 1-rachi

2—3-glandulosis; spicis solitariis. Acacia Kunth imm. t. 25. In Bra-camarcora. ♂.

15. *P. trisperma* Benth. ramulis verrucosis subflexosis; fol. glabriusculis glandula oblonga in petiolo, cupularibus 1—2 inter summas pinnas; foliolis linearibus subfalcatis margine incrassato subciliatis seminibus quadrato-orbiculatis. In Bahia. ♂.

16. *P. communis* Benth. ramulis petiolisque puberulis sparse et raro aculeatis inermibusque; pinnae 5—8-jugis; foliolis multijugis linearibus; spicis ad apices rainorum racemosis; legume linearis. In Brasilia. ♂.

17. *P. rigida* Benth. inermis glabra; pinnis 4—6-jugis; foliolis multijugis linearifalcatis acutis plurinerviis rigidis; spicis axillaribus solitariis; semiinibus anguste alatis. In Brasilia. ♂.

18. *P. pterosperma* Benth. inermis ramis petiolis pubescentibus; pinnae 4—5-jugis; foliolis 8—12-jugis oblongo-linearibus obtusis obliquis subtus puberulis; semiinibus lato-alatis. In Brasilia. ♂.

+++++ Paniculatae; foliolis lati; ovario subsessili glabro.

19. *P. paniculata* Benth. inermis ramis petiolisque tomentellis demum glabratris; pinnis 2—3-jugis; foliolis 4—8-jugis ovali-oblongis v. lanceolato-ovalis obliquis subtus tomentellis; spicis gracilis numerosis canis. In Brasilia. ♂.

b. *Pityrocarpa* Benth. Legumen inter semina magis minusve contractum; valvulis coriacieis siccitate glanduloso-leprosis subrufescens.

20. *P. inaequalis* Benth. inermis glabriuscula; pinnis 1—3-jugis; foliolis 2—5-jugis valde inaequalibus, oblique falcato-ovatis oblongis nitidis glabris; spicis axillaribus; ovario breve stipitato. In Brasilia. ♂.

21. *P. leptostachya* Benth. inermis; ramulis petiolisque ferrugineo-puberulis demum glabris; pinnis 3—4-jugis; foliolis 4—8-jugis oblique falcato-ovatis; spicis axillaribus gracilis. In Brasilia. ♂.

22. *P. moniliformis* Benth. inermis; ramulis petiolisque tomentoso-pubes-

centibus; pinnis 2—4-jugis; foliolis 8—10-jugis oblique oblongis subtrapezoideis, supra nitidis subtus canotonensis; ovario longissime stipitato. In Brasilia. ♂.

23. *P. polystachya* Miquel; leprosotomentella; pinnis 3—4-jugis; foliolis 4—5-vel 7-jugis ovatis v. elliptico-lanceolatis acuminatis, glandulosis, glandulis conicis truncatis v. concavis; spicis paniculatis fusco-tomentosis; ovario albo-hirsuto. In Surinam. ♂.

c. *Niopa* Benth. Legumen inter semina saepius contractum; valvulis membranaceo-coriaceis, extus siccitate glanduloso-leprosis.

24. *P. peregrina* Benth. inermis subglabra; pinnis 13—17-jugis; foliolis 25—30-jugis oblongo-linearibus ciliatis glandula 1 in medio petioli; antheris saepe glandula pedicellata donatis. Acacia H. et K. mim. t. 30. In Nov. Granata. ♂.

25. *P. macrocarpa* Benth. pinnis 10—25-jugis, foliolis 20—40-jugis glabriusculis ciliatis obscure uninerviis pedunc. capitulo 2—3-plo longioribus; floribus puberulis; legumine subfalcato levissime sinuato. In Brasilia. ♂.

26. *P. falcata* Benth. pinnis 10—18-jugis, foliolis 40—60-jugis uninerviis nitidis glabris; capitulis multifloris glabris; legumine falcato crassiusculo subsinuato. In Brasilia. ♂.

27. *P. colubrina* Benth. pinnis 12—15-jugis; foliolis 50—80-jugis uninerviis nitidis margine ciliatis glabris; legumine longe stipitato elongato, marginibus incrassatis. Acacia fl. flum. 11. t. 16. In Brasilia. ♂.

28. *P. microphylla* Benth. canescens-tomentella; pinnis 20—30-jugis; foliolis 50—80-jugis minimis imbricatis obscure 1-nerviis; capitulus multifloris glabris. In Brasilia. ♂.

5184. STRYPHNODENDRON Mart. (1841).

1. *S. barbatiman* Mart. ramulis crassissimis junioribus rufo-tomentellis demum petiolisque glabris; pinnis 5—8-jugis; foliolis 6—8-jugis oblique ovato-orbiculatis concoloribus subtus

barbatis; legumine oblongo-lineari recto. Mimosa fl. flum. 11. t. 7. In Brasilia. ♂.

2. *S. polyphyllum* Mart. fol. bipinnatis, pinnis et pinnulis multijugis; foliolis parvis oblique oblongo-ellipticis subtus rachique puberulis.. In Brasilia. ♂.

3. *S. rotundifolium* Mart. fol. bipinnatis glabris glaucis; pinnis et pinnulis multijugis; foliolis orbicularibus. In Bahia. ♂.

4. *S. discolor* Benth. subglabra; pinnis 5—6-jugis; foliolis 7—8-jugis oblique orbiculatis subtus candidis; spicis folio dimidio brevioribus. In Brasilia. ♂.

5. *S. floribundum* Benth. ramulis angulatis junioribus petiolisque tomentellis; pinnis 12—15-jugis; foliolis 10—20-jugis oblique oblongis subtus puberulis; corolla adpresso pubescente. In Bahia. ♂.

5185. ELEPHANTORRHIZA Benth. (1840).

1. *E. Burchellii* Benth. Acacia elephantorrhiza DC. In P. b. S. ♂. Pinnae 10—12-jugae. Folia 25-juga linearia. Spicae cylindricae.

5186. TETRAPLEURA Benth.

1. *T. Thonningii* Benth. Adenanthera tetraptera Schum. et Thonn. In Guinea. ♂. Arbor alta fol. oppositis bipinnatis, pinnis foliolisque multijugis.

5187. MIMOSA L. (1747).

I. Eumimosae DC.

a. *Sensitivae* DC. Pinnae 1-jugae. Foliola 2-juga majuscula ciliata. Pedunculi solitarii v. gemini. Flores capitati 4-meri.

1. *M. albida* Kunth mim. t. 1. ramis cano-pubescentibus aculeatis; foliolis dimidiato oblongis acutis pubescentibus; capitulis geminis. In Peruvia. ♂.

2. *M. floribunda* Willd. ramis petiolisque pubescenti-pilosus aculeatis-simis; foliolis bijugis subdimidiato-ovatis acutis subtus strigoso-hirtis. Ad Cumanam. ♂.

3. *M. adhaerens* H. et K. ramis hirsutis aculeatis; petiolis villose-pilosis inermibus; foliolis dimidiato-obovatis mucronatis supra adpresso-pilosis subtus hirsuto-sericeis. *Ad Orinocum.* ♂.

4. *M. strigosa* Willd. ramis petiolisque villosi-hispidis et aculeatis; foliolis subdimidiatis ovato-oblongis acutis utrinque strigosis; capitulis subsolitariis. *Ad Orinocum.* ♂.

5. *M. malitiosa* Mart. fruticosa retrorsum spinosa, pubescenti-hirta; foliolis oblique ovato-lanceolatis acutis subtus strigoso-villosis; legumine ferrugineo-villosa margine setoso-aculeato. *In Minas Guares.* ♂.

6. *M. litigiosa* Mart. suffruticosa scandens retrorsum aculeata; foliolis oblique ovato-lanceolatis acutis subtus strigoso-pilosis; bracteolis pectinato-ciliatis; legumine longe setoso. *In Brasilia.* ♂.

7. *M. vellosiana* Mart. suffruticosa retrorsum spinosa; fol. oblique ovato-lanceolatis acutis supra glaberrimis subtus strigosis; legumine glabro margine longe setoso. *M. nivea* fl. flum. 11. t. 33. *In Brasilia.* ♂.

8. *M. obtusifolia* Willd. caule petiolisque aculeatis; foliolis subdimidiato-cordatis ovatis obtusis glabris. *M. fervida* Mart. *In Brasilia.* ♂.

9. *M. rixosa* Mart. suffruticosa retrorsum aculeato-ferrugineo-hirsuta; foliolis oblique obovatis mucronatis utrinque strigoso-pilosis; legumine recto acuminato ferrugineo puberulo, valvulis setosis. *In Brasilia.* ♂.

10. *M. paniculata* Benth. fruticosa debilis aculeis sparsis retrorsis; foliolis oblique obovato-oblongis obtusis strigosis; legumine acuminato subfalcato glabriuscule v. parce setoso. *In Minas Guares.* ♂.

11. *M. debilis* Willd. caule herbaceo simplici subaculeato glabro; foliolis obovatis dimidiato-mucronatis utrinque adpresso-pubescentibus. *In Am. aust.* ○.

12. *M. glaucescens* Benth. suffruticosa inermis glaberrima; foliolis obvato-oblongis obtusis mucronatis margine incrassato serrato-ciliatis utrinque glaucescentibus. *In Brasilia.* ♂.

13. *M. nuda* Benth. suffruticosa inermis glaberrima; foliolis oblique oblongis obtusiusculis margine crasso nudo utrinque glaucescentibus; legu-

mine glaucescente nudo. *In Brasilia.* ♂.

14. *M. angusta* Benth. suffruticosa inermis glabra glaucescens; foliolis oblique linearibus marginatis ciliatis bracteolis corolla brevioribus. *In Brasilia.* ♂.

b. *Modestae* Benth. *Herbae prostratae* v. decumbentes. *Pinnae* 1-jugae. *Foliola* pauci-juga latiuscula marginata setuloso-ciliata.

15. *M. nivea* L. inermis herbacea; fol. conjugato-pinnatis, pinnis 4-jugis; foliolis subrotundis; legumine 1-articulata. Sloane hist. t. 182. f. 7. *In Jamaica.*

16. *M. ursina* Mart. aculeata, longe patentim pilosa; foliolis obliquis ovatis 2—3-nerviis subtus longe hirsutis; legumine pubescente margine setuloso. *In Brasilia.* ○.

17. *M. modesta* Mart. sericeo-pilosa aculeis subrecurvis geminis; stipulis late ovato-lanceolatis; foliolis 4—5-jugis ovatis; pinnis glaucis setuloso-ciliatis; calyce longe ciliato; leguminis articulis 2—4 tomentosis medio echinatis. *In Brasilia.* ○.

c. *Casta* Benth. *Frutices* v. *herbae* sparse aculeatae. *Pinnae* unijugae. *Foliola* plurijuga setuloso-ciliata. *Legumina* nuda v. setosa non tuberculoso-echinata.

18. *M. casta* L. aculeis ramels petiolaribusque sparsis uncinatis; fol. bipinnatis ad apicem petioli 1-jugis; foliolis 4-jugis oblique ovatis acutis adpresso strigosis ciliatis subasperis, leguminis suturis spinosissimis. Comm. hort. t. 28. *In Am. austr.*

19. *M. tricephala* Cham. et Schlecht. fruticosa; aculeis rectis, pubescenti-scabra; foliolis 10—15-jugis oblique ovato-oblongis setuloso-ciliatis subtus strigosis; calyce longe ciliato. *In Mexico.* ♂.

20. *M. retrorsa* Benth. fruticosa divaricato-ramosa aculeis uncinatis retrorsis; caule scaberrimo; foliolis 20—25-jugis oblongo-linearibus falcatis obtusis setuloso-ciliatis; calyce minute ciliato; legumine margine dense aculeato-setoso. *In Brasilia.* ♂.

21. *M. dolens* Vell. fl. flum. 11.
t. 34. suffruticosa patentim spinosa; caule petiolisque glanduloso - hirtis; foliolis 10—12-jugis oblique oblongis obtusis coriaceis setuloso-ciliatis subitus strigosis; calycibus longe ciliatis; legumine dense setoso. *In Brasilia.* ♂.

22. *M. insidiosa* Mart. strigosohispida aculeis patulis rectis armata; foliolis longe acutis coriaceis marginatis ciliatis; capitulis globosis hirtis; calycibus longe ciliatis; legumine dense setoso. *In Brasilia.* ♂.

23. *M. oblonga* Benth. sparse recurvo - aculeata; caule pedunculisque patulo - setosis; foliolis 23—35-jugis linearibus mucronatis coriaceis ciliatis; capitulis cylindraceis; calycibus minutis ciliatis. *In Brasilia.* ♂.

d. *Pectinatae* Benth. Aculei omnes v. nonnulli infrastipulares. Pinna 1-jugae. Foliola plurijuga.

24. *M. orthacantha* Benth. fruticosa glaberrima; pinnis petiolo longioribus; foliolis 8—10-jugis oblique cuneato - oblongis obtusis 1 - nerviis; capitulis globosis glaberrimis; calyce minuto. *In Brasilia.* ♂.

25. *M. pectinata* Kunth mim. t. 2. ramulis aculeatis villoso-hispidis; petiolo communi aculeis subbreviore; foliolis multijugis valde approximatis linearibus acutis margine ciliato-strigosis. *In Quito.* ♂.

26. *M. polycarpa* Kunth t. 3. ramis aculeatis striatis pilosis; petiolo aculeis multo longiore; foliolis multijugis oblongo-linearibus; acutis, supra glbris subtus margineque adpresso-pilosus. *In Peruria.* ♂.

27. *M. Mansii* Mart. decumbens; aculeis parvis sparsis rectis; caule petiolis pedunculisque strigosis; foliolis 20—40-jugis oblique linearibus margine setulosis subtus adpresso pilosis; capitulis ellipticis parvis; calycibus minimis longe ciliatis pappiformibus. *In Brasilia.* 2l. ⊕?

28. *M. xanthocentra* Mart. strigosa; fol. 1-jugis foliolis 20—28-jugis, pinnis linearibus acutis basi oblique cordatis subtus strigosis; capitulis subgeminis globosis; lomentis linearibus subquadratis. *In Brasilia.* 4.

29. *M. longipinna* Benth. ramis virgatis strigosis; pinnis petiolo plures longioribus; foliolis 30—70-jugis linearibus falcatis acutis setuloso-ciliatis adpresso pilosis; capitulis subglobosis; calyce minuto longe ciliato pappiformi; legumine margine longe aculeato-setoso. *In Minas Gaeres.* 4.

e. *Pudicae* Benth. Herbae v. suffruticces aculeis omnibus infrastipularibus armatae. Pinnae 2—4-jugae subdigitatae. Foliola multijuga marginata.

30. *M. pudica* L. caule herbaceo aculeato petiolisque piloso-hispidis; fol. subdigitato-pinnatis; pinnis 4-multijugis; foliolis linearibus. Comm. hort. t. 29. Breyn. cent. t. 18. *In Brasilia.* ⊖.

31. *M. endymionis* Mart. pérennis; glabra; fol. subdigitato-pinnatis 4-foliolatis superioribus 1-jugis, pinnis oblique linearibus acutis margine setulosis; capitulis geminis globoso-ellipticis. *In Bahia.* 4.

32. *M. polydactyla* Bonpl. caulis aculeatis glbris superne pilosis; fol. subdigitato - pinnatis; pinnis 8-multijugis; foliolis linearibus. Kunth mim. t. 5. *In Nov. Guiana.* ♂.

33. *M. digitata* Benth. decumbens; aculeis parvis; pinnis subdigitato 3-4-jugis petiolo duplo longioribus; foliolis 15—20-jugis oblique linearibus acutiusculis subtus adpresso-pilosus; pedunculis petiolo 2—3-plo longioribus; calycibus longe ciliatis pappiformibus. *In Brasilia.* ♂.

34. *M. verecunda* Benth. aculeis rarissimis; caule petiolisque reflexo-hispido; pinnis 2—3-jugis, foliolis 30—60-jugis oblique linearibus adpresso-pilosus ciliatis; calyce longe ciliato pappiformi; leguminibus puberulis margine longe setosis. *In Brasilia.* ♂.

35. *M. rufipila* Benth. caule petiolisque patentim hirsutissimis; pinnis 4—5-jugis; foliolis 20—30-jugis linearibus ciliatis subtus adpresso-pilosus; leguminibus margine setosissimo. *In Brasilia.* ♂.

36. *M. tomentosa* Kunth mim. t. 4. ramis inermibus sericeo-hirsutis; foliolis subdigitato - pinnatis; pinnis 4-multijugis; foliolis oblongo-linearibus subtus villoso-sericeis cano-argenteis. *Ad Orinocum.* ♂.

Pinnae remotiores. Pedunculi longiores.

37. *M. restita* Benth. suffruticosa inermis patentim hirsutissima; petiolo brevissimo; foliolis 3—12-jugis late oblongis obliquis obtusis hirsutis; capitulis globosis; calyce obsoleti. In Brasilia. ♂.

38. *M. elongata* Benth. suffruticosa inermis, hirta; pinnis 3—4-jugis, foliolis 20—30-jugis falcato-lanceolatis acutis ciliatis supra glabris subtus adpresso-pilosis; calyce minuto. In Brasilia. ♂.

39. *M. dispersa* Benth. suffruticosa decumbens, inermis patentim pilosa; pinnis 2—3-jugis, foliolis 6—12-jugis oblique oblongis ciliatis; pedunculis racemosis; capitulis globosis; calyce paleaceo ciliato-laciniato. In Brasilia. ♂.

40. *M. nerrosa* Bongd. prostrata aculeata patentim pilosa; pinnis 1—2-jugis subdistantibus petiolo longioribus, foliolis 6—12-jugis oblique oblongis acutis ciliatis glaucis 3—5-nerviis; calyce paleaceo lacero-ciliato; leguminis margine longe setoso. In Brasilia. ♂.

f. Pedunculosae. Herbae v. suffrutescetes repentes v. prostratae. Pinnae saepe 1-jugae. Foliola multijuga. Pedunculi omnes axillares. Capitula globosa.

41. *M. longipes* Benth. foliolis 12—20-jugis oblique lanceolatis acutiusculis glabris; pedunculis folio sub-duplo longioribus; calyce abbreviato parce ciliato. In Brasilia. ♂.

42. *M. falcipinna* Benth. pinnis petiolo longioribus; foliolis 15—20-jugis oblique oblongis falcatis obtusiusculis margine crassis subtus longe setoso-pilosis; pedunculis folio longioribus; calyce minuto. In Brasilia. ♂.

43. *M. barbigeria* Benth. pinnis petiolo longioribus; foliolis 12—18-jugis falcato-oblongis supra glabris subtus parce pilosis; pedunculis folio subaequifolius; calyce paleaceo laciniato-ciliato; leguminis margine setoso. In Brasilia. ♂.

44. *M. procurrens* Benth. pinnis subdigitato-bijugis petiolo 2—3-plo

longioribus; foliolis 10—15-jugis oblique ovali-oblongis obtusiusculis subtus parce pilosis; pedunculis folio aequifolius; calyce obsoleti longe ciliato. In Brasilia. ♂.

45. *M. marginata* Lindl. inermis hispido-pilosa; fol. conjugato-pinnatis; pedunculo filiformi villosa moncephalo duplo brevioribus; foliolis 13-jugis ovalibus ciliatis; bracteis spatulatis fimbriatis; calyce minuto in setas fiso; petalis 4 connatis. Patria ign. ♂.

46. *M. flagellaris* Benth. parva pilosa; petiolo pinnis breviore; foliolis 4—7-jugis oblique obovatis glabris; pedunc. folio 2—3-plo longioribus; calyce obsoleti, leguminis margine setoso. In Brasilia. ♂.

47. *M. honesta* Mart. fruticulosa; ramulis strictis longe villosis; petiolis pedunculisque villosis foliolis 4-jugis, pinnis inaequilateris ovatis v. obovatis margine incrassato setulosis; bracteis dense villosis. In Brasilia. ♂.

48. *M. paupera* Benth. prostrata tenuis sparse patulo-pilosa; pinnis petiolo brevioribus, foliolis 4—8-jugis falcato-oblongis subtus setosis; calyce minuto subciliato; legumine undique breviter strigoso. In Brasilia. ♂.

49. *M. reptans* Benth. subramosa; petiolo brevissimo; foliolis parvis 12—20-jugis oblique oblongo-linearibus; calyce minuto; legumine strigos-setuloso margine aspero hirto. In Brasilia. ♂.

50. *M. lasiocephala* Benth. procumbens molliter pilosa; petiolo subnullo; foliolis 10—15-jugis oblongo-linearibus ciliolatis; pedunculis folio longioribus; capitulis molliter villo-sissimis; bracteolis corolla longioribus; legumine setuloso. In Brasilia.

Filipedes, glabrae diffusae², caule petiolis pedunculisque filiformibus.

51. *M. multiplex* Benth. ramosissima diffusa tenuis; foliolis 5—8-jugis oblique oblongis ciliolatis; pedunculo tenui petiolum aequante; bracteolis corollam aequantibus. In Brasilia. 4.

52. *M. filipes* Mart. annua tenella glabra; pinnis petiolo filiformi duplo brevioribus; foliolis 4—5-jugis anguste obovatis; pedunculis petiolo breviori-

bus; legumine 7—8-articulato. In *Brasilia*. ♂.

53. *M. diffusa* Benth. glaberrima diffusa tenuissima; pinnis petiolo filiformi vix longioribus; foliolis 20—30-jugis oblique linearibus subfalcatis; pedunculis filiformibus petiolo subaequifolius; bracteolis brevissimis; calyce cupuliformi. In *Brasilia*. ♂.

g. *Polycephala* Benth. Frutices inermes. Capitula parva numerosa secus ramos paniculae ampliae aphyllae subsessilia. Legumen ignotum.

54. *M. taxifolia* Bongd. adpresso strigosa; pinnis 1-jugis; petiolo communi subnullo; foliolis 15—20-jugis oblique linearibus falcatis glaucis ciliatis; calyce paleaceo laciniato-ciliato. In *Brasilia*. ♂.

55. *M. polycephala* Benth. rufo-villosa; pinnis 1-jugis; petiolo communi subnullo; foliolis 30—40-jugis oblique oblongo-linearibus coriaceis utrinque adpresso-villosis; calyce paleaceo longe ciliato. In *Brasilia*. ♂.

h. *Meticulosae* Benth. Aculei nulli. Pinnae 1-jugae. Foliola multijuga rigida bi-plurinervia marginata ciliata. Pedunculi racemosi. Capitula globosa. Bracteolae longe setosae. Legumen planum v. convexum valvulis integris v. articulatis.

a. *Folia coriacea glauca glabra*. Capitula magna.

56. *M. calocephala* Mart. fruticosa; ramulis dense albo-ferrugineo-tomentosis; fol. 1-jugis petiolo multo longioribus; foliolis multijugis linearilanceolatis margine setulosis; petiolis rachique villosis; pedunculis albo-ferrugineo-tomentosis. In *Brasilia*. ♂.

57. *M. hypoglaica* Mart. fruticosa ramulosa; ramulis novellis ferrugineo-hirsutis; fol. 1-jugis; foliolis 30-jugis, pinnis linearilanceolatis acutis parce setuloso-ciliatis; pedunculis ferrugineo-hirsutis; lomenti linearis-acuti articulis ferrugineo-hirtis. In *Bahia*. ♂.

58. *M. Pohlii* Benth. ramis virgatis petiolisque lana longa densa obectis; foliolis 30—40-jugis oblique

oblongo-lanceolatis; capitulis magnis; calyce paleaceo laciniato-ciliato; legumine undique molliter villosissimo. In *Brasilia*. ♂.

59. *M. papposa* Benth. ramis virgatis petiolisque dense strigosis; petiolo brevissimo; foliolis 20—40-jugis oblique oblongo-linearibus falcatis obtusis; racemo elongato polyccephalo nudo; calyce longe ciliato pappiformi; legumine undique molliter villosissimo. In *Brasilia*. ♂.

60. *M. setipes* Benth. sparse setosa; ramis virgatis; petiolo communi brevissimo; foliolis 30—50-jugis oblique lanceolatis acutis; calycibus obsoletis; leguminibus dense setosis inarticulatis. In *Brasilia*. ♂.

61. *M. callosa* Benth. glauca; caule virgato; pinnis petiolo 2—4-plo longioribus; foliolis 30—40-jugis oblique ovato-lanceolatis acutis; calycibus parvis; legumine undique longe setoso. In *Brasilia*. ♂.

62. *M. petiolaris* Benth. caule virgato paucifolio; foliolis 12—20-jugis oblique oblongis subfalcatis obtusis; calyce paleaceo laciniato-ciliato. In *Brasilia*. ♂.

63. *M. nigrescens* Benth. glabra v. setoso-hispida; pinnis petiolo 2—4-plo longioribus; foliolis 10—12-jugis oblique ovali-oblongis obtusis mucronulatis; calycibus ciliatis; legumine undique longe setoso. In *Brasilia*. ♂.

64. *M. rigida* Benth. caule virgato glabriuscule; petiolis strigosis; foliolis 10—12-jugis dimidiato-oblongis falcatis acutis; racemo terminali nudo; bracteis corollas aequantibus; calyce laciniato-setoso. In *Brasilia*. ♂.

b. *Foliola utrinque scabro-hispida non glauca*.

65. *M. rudis* Benth. scabro-hispida; caule virgato; foliolis 5—7-jugis ovato-lanceolatis falcatis utrinque scabro-hispidis; bracteis corollam aequantibus; calyce obsoleto. In *Brasilia*. ♂.

66. *M. asperrima* Benth. scabro-hispida; caule virgato; pinnis petiolo subduplo longioribus; foliolis 7—10-jugis oblique oblongis mucronatis utrinque scabro-hispidis; racemo elongato nudo; bracteolis corollam aequantibus, calyce obsoleto. In *Brasilia*. ♂.

67. *M. radula* Benth. caule virgato; pinus foliorum superiorum sessilibus; foliolis 5—7-jugis oblique ovali-oblongis acutis subfalcatis scabro-hispidis; racemo elongato nudo; calyce paleaceo-laciniato-ciliato. In Brasilia. ♂.

68. *M. calycina* Benth. scabro-hispida; caule virgato; petiolo communis subnullo; foliolis 8—10-jugis oblique ovato-oblongis acutis utrinque scaberimis et strigoso-hispidis; racemo elongato nudo; calyce paleaceo-laciniato-ciliato corolla parum breviore. In Brasilia. ♂.

69. *M. dimidiata* Benth. scabro-tomentella; caule virgato; petiolo communis brevissimo; foliolis 12—15-jugis ovato-lanceolatis falcatis acutis utrinque strigoso-hispidis; racemo subnudo; calyce paleaceo-laciniato-ciliato. In Brasilia. ♂.

70. *M. acerba* Benth. scabro-hispida; foliolis 15—30-jugis oblique oblongis mucronatis; racemo nudo; legumine undique densissime setoso-hispidissimo. In Brasilia. ♂.

71. *M. hirsutissima* Mart. longe hirsuta; foliolis 15—20-jugis petiolo 5-plo longioribus oblique linearibus oblongis obtusis ciliatis; capitulis ellipticis; bracteis linearibus membranaceis longe ciliatis. In Brasilia. ♂.

72. *M. imbricata* Benth. caule virgato crasse molliter pilosissimo; petiolo communis subnullo; foliolis 10—15-jugis imbricatis falcato-oblongis acutiusculis subtus pilosissimis; bracteolis corollam aequantibus; calyce subpaleaceo-laciniato-ciliato. In Brasilia. ♂.

c. Folia supra breviter subtus longe adpresso-pilosa margine tenui. Legumen articulatum.

73. *M. lanata* Benth. longe dense lanata; foliolis 15—20-jugis oblique oblongo-linearibus obtusis supra strigosis subtus longe pilosis; capitulis lanato-hirsutissimis; calycibus longe ciliatis pappiform.; leguminibus longe pilosissimis. In Brasilia. ♂.

74. *M. subvestita* Benth. subramosa, ferrugineo-hirta; foliolis 8—10-jugis oblique obovato-oblongis obtusis subtus longe villosis; legumine

undique ferrugineo-hispido. In Brasilia. ♂.

75. *M. setistipula* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-hirta; petiolo communis brevissimo; foliolis 10—15-jugis oblique oblongis acutiusculis subtus longe adpresso-pilosus; calyce obsoletus; legumine undique ferrugineo-hispido. In Brasilia. ♂.

76. *M. goyazensis* Benth. ramulis strictis petiolisque brevissimis longe pilosis; foliolis 15—30-jugis oblique oblongis acutis adpresso-pilosus; capitulis fasciculatis; calycibus longe ciliatis pappiformibus. In Brasilia. ♀.

77. *M. tremula* Benth. ramulis strictis petiolisque longe hirtis; pinnis petiolo multoties longioribus; foliolis 20—40-jugis oblique oblongo-linearibus adpresso-pilosus; calycibus longe ciliatis pappiformibus. In Brasilia. ♀.

78. *M. stipularis* Bong. ramulis longe barbato-hispidis; stipulis striatis; petiolo brevissimo; foliolis 20—30-jugis oblique oblongis subtus longe sericeo-pilosus; calycibus paleaceis longe ciliato-laceris; legumine margine densissimo setoso. In Brasilia. ♀.

79. *M. subsericea* Benth. longe sericeo-pilosa; ramulis virgatis adpresso strigoso-hispidis; foliolis 25—30-jugis oblique linear-lanceolatis acutis subtus longe sericeis; calycibus paleaceis longe ciliato-laceris; legumine margine densissimo setoso. In Brasilia. ♂.

d. *Foliola rigidula*, supra glabra subtus setosa. Legumen articulatum.

80. *M. brevipes* Benth. strigoso-hirta; foliolis 15—20-jugis oblique lanceolato-oblongis acutis subtus adpresso strigoso-hirtis; capitulis parvis; calyce obsoletus; legumine undique hispido. In Brasilia. ♂.

81. *M. Martii* Mart. ex Benth. caule virgato petiololische brevissimis dense hirta; foliolis 15—20-jugis oblique lanceolato-oblongis subtus hinc strigosis; calyce obsoletus. In Brasilia. ♂.

82. *M. distans* Benth. ramosa piloso-strigosa; foliolis 20—30-jugis falcato-lanceolatis acutis coriaceis subtus strigosis; calyce minuto; legumine

mine undique breve setoso. *In Brasilia.* ♂.

83.? *M. axillaris* Benth. ramis divaricatis strigosis, incanis; pinnis petiolo longioribus; foliolis 20—40-jugis oblique oblongo-linearibus falcatis supra nitidis subtus strigoso-incanis; calyce longe ciliato pappiformi. *In Brasilia.* ♂.

i. *Eriocaules* Benth. Frutices ramosi superne sordide ferrugineo-lanati. Foliola pubescens. Racemi no-glaucoscentia. Racemi breves.

84. *M. pogonophala* Benth. ramulis dense lanatis; foliolis 12—15-jugis oblique oblongis subfalcatis obtusis; capitulis ellipticis ferrugineo-hispidae simis; calyce obsoleto. *In Brasilia.* ♂.

85. *M. erinacea* Benth. ramulis ferrugineo-lanatis; pinnis petiolo plures longioribus; foliolis 10—15-jugis late et oblique oblongis subfalcatis obtusis; capitulis subglobosis utrinque ferrugineo-hirsutissimis; legumine undique dense aculeato-hispido. *In Brasilia.* ♂.

86. *M. eriocaulis* Benth. ramulis tomentoso-lanatis demum scabris; stipulis lato-lanceolatis; foliolis 15—20-jugis oblique oblongis subfalcatis obtusis; subtus tenuiter strigillosis; capitulis ellipticis pubescentibus; calyce paleaceo parce laciniato-ciliato. *In Brasilia.* ♂.

87. *M. fasciculata* Benth. ramulis dense foliatis junioribus adpresso-lanatis demum scabro-hirtis; petiolo communi subnullo; foliolis 20—30-jugis parvis imbricatis oblongo-linearibus obtusis; capitulis subglobosis ferrugineo-hirtis; bracteolis corolla longioribus; calyce minuto breve ciliato; legumine ovato hirsutissimo. *In Brasilia.* ♂.

k. *Myriophyltae* Benth. Frutices suffruticesque inermes. Pinnae multijugae. Foliola parva multijuga. Capitula racemosae. Legumen breve.

88. *M. myriophylla* Bong. strigoso-villosa; pinnis 12—30-jugis; foliolis 30—60-jugis minimis glaucescentibus; capitulis globosis longe racemosis; calyce paleaceo-4-partito; legumine

undique strigoso-setoso. *In Brasilia.* ♂.

89. *M. microptera* Benth. strigosa; pinnis 10—12-jugis; foliolis 15—20-jugis minimis glabris nitidis; capitulis globosis breve racemosis; calyce parvo ciliato pappiformi. *In Brasilia.* ♂.

l. *Obstrigosae* Benth. Fruticuli inermes v. sparse aculeati strigis rigidis hirti. Foliola parva multijuga. Capitula globosa. Leguminis valvae articulatae.

90. *M. parvipinna* Benth. inermis; stipulis setaceis; petiolo subnullo; foliolis 20—30-jugis minimis imbricatis linearibus acutis coriaceis glabris serrulato-ciliatis; calyce minute ciliato. *In Brasilia.* ♂.

91. *M. rupestris* Benth. inermis; stipulis setaceo-acuminatis; petiolo brevissimo; foliolis 30—40-jugis parvis oblongo-linearibus subacutis coriaceis glabris ciliatisque; calyce minuto ciliato; legumine undique strigoso-setosissimo. *In Brasilia.* ♂.

92. *M. subinermis* Benth. subaculeata; stipulis lanceolato-subulatis; petiolo brevissimo; foliolis 20—30-jugis linearibus coriaceis glabris minute serrulato-ciliatis; calyce parvo ciliato. *In Brasilia.* ♂.

93. *M. adpressa* Hook. et Arn. fruticosa aculeata; ramis setis retrorsis fuscis arctissime adpressis; foliis conjugato-pinnatis; pinnis multijugis; foliolis minutis imbricatis linearis-oblongis mucronatis glabris; rachi subtus setis fuscis retrorsum arctissime adpressis; stipulis lato-membranaceis; calyce corollaque 4-fida staminibus 4-plo brevioribus. *In Uruguay.* ♂.

94. *M. Sprengelii* DC. horizontalis aculeata; ramis strigosis, setis deorsum adpressis; pinnis 6-jugis; foliolis subdimidiatis ovato-oblongis nervosis basi ciliatis; floribus axillaribus sessilibus 5-andris. *M. ciliata* Spr. *In Montevideo.* ♂.

95. *M. ramalosa* Benth. sparsim aculeata; petiolo brevissimo; foliolis 6—8-jugis acutiusculis oblongis margine ciliolatis; pedunculis axillaribus; calyce obsoleto; legumine undique strigoso. *In Brasilia.* ♂.

96. *M. sparsa* Benth. aculeata; strigis ramorum rariss., peduncularum crebris; pinnis petiolo 2—3-plo longioribus; foliolis 12—20-jugis oblongo-linearibus subciliatis; calyce obsoleti; leguminis valvulis glabris nudis margine setulosis. In Brasilia. ♂.

97. *M. glabra* Benth. glaberrima glauca; aculeis sparsis; fol. subnudulis; pinnis petiolo subdupo longioribus; foliolis 6—8-jugis oblongo-linearibus vix serrulato-ciliatis; bracteolis corolla multo brevioribus; calyce obsoleti legumine glabro nudo. In Brasilia. ♂.

m. *Lepidotae* Benth. Frutices inermes tomento stellato v. pilis plumosis lepidoti. Capitula in axillis superioribus pedunculata. Legumina plana uni-vel pluriarticulata.

a. Capitula depresso-globosa.

98. *M. involucrata* Benth. ramis floccoso-tomentosis pilis basi plumosis intermixtis; pinnis 1-jugis; foliolis 12—15-jugis linearibus incanis; capitulis involucratis; bracteolis corolla duplo longioribus imbricatis lanceolatis sericeo-ciliatis. In Brasilia. ♂.

99. *M. pilulifera* Benth. lepidoto-tomentosa; stipulis setaceis; pinnis 1-jugis; foliolis 15—30-jugis parvis oblongo-linearibus obtusis incanis; capitulis miuimis globosis; legumine plano tomentoso 6—8-articulato. In Brasilia. ♂.

100. *M. Bonplandii* Benth. ramulis petiolisque lepidoto-tomentosis; stipulis subulatis; pinnis 3—4-jugis; foliois 8—15-jugis parvis oblongis obtusis subincanis; capitulis parvis globosis breve pedunculatis. Acacia lepidota Hook. et Arn. In Uruguay. ♂.

101. *M. eriocarpa* Benth. pilis plumosis v.stellatis lepidota; stipulis subulatis; pinnis 3—4-jugis; foliolis parvis 8—15-jugis oblongis obtusis; capitulis parvis globosis, legumine unarticulata plano lana longa plumosa densissima tecto. In Brasilia. ♂.

102. *M. scabrella* Benth. incano-lepidoto-tomentosa; stipulis obsoletis; pinnis 5—7-jugis; foliolis sub-30-jugis parvis oblongo-linearibus obtusis incanis; legumine coriaceo-ferrugineo-tomentoso. In Brasilia. ♂.

103. *M. auricillatus* Mart. tomento floccoso-plumoso v. stellato ferruginea; pinnis bijugis; foliolis 4—8-jugis oblongis crassis; bracteolis corollas superantibus; legumine floccoso et plumoso-lanato. In Brasilia. ♂.

104. *M. peduncularis* Bong. ex Benth. ramis petiolisque longe et dense setosis; stipulis ciliatis glaucis; pinnis 2—4-jugis; foliolis oblongis utrinque lepidoto-tomentosis; pedunc. folio longioribus; legumine pauci-articulato rufo-tomentoso et plumoso-setoso. In Brasilia. ♂.

105. *M. catothamnus* Mart. lepidoto- et floccoso-tomentosa; pinnis 2—3-jugis; foliolis 12—16-jugis ovato-oblongis obtusis supra glabris nitidis subtus albo-tomentosis; legumine lepidoto-tomentoso. In Minas Guares. ♂.

b. Spicae oblongae v. cylindricae.

106. *M. catodendron* Mart. floccoso-tomentosa; stipulis abbreviatis demum induratis; pinnis 2—3-jugis; foliolis 8—12-jugis ovato-oblongis obtusissimis supra glabris nitidis subtus albo-tomentosis; spicis oblongis densis. In Brasilia. ♂.

107. *M. furfuracea* Benth. rufo-furfuraceo-tomentosa; pilis densissimis stellato-plumosis; pinnis 3—4-jugis; foliolis 10—15-jugis ovatis obtusissimis utrinque lepidoto-tomentosis; spicis dense paniculatis; bracteolis corollam superantibus. In Brasilia. ♂.

108. *M. sordida* Benth. tomento-lepidoto rufa; stipulis setaceis; pinnis 3—4-jugis; foliolis 10—15-jugis oblique ovato-oblongis obtusis utrinque stellato-tomentosis; spicis densis; bracteolis corolla dimidio brevioribus. In Brasilia. ♂.

109. *M. dateoides* Benth. plumoso-tomentosa; pinnis 1-jugis; foliolis 10—18-jugis oblongis obtusis supra incano-subtus lepidoto-tomentosis; spicis cylindricis; bracteolis corollas subaequantibus. In Brasilia. ♂.

110. *M. cylindracea* Benth. plumoso-tomentosa; stipulis setaceis; pinnis sub-5-jugis; foliolis 15—20-jugis oblongis obtusis utrinque lepidoto-tomentosis; spicis cylindricis densis paniculatis. In Brasilia. ♂.

II. *Habbasia* Benth. *Stamina numero petalorum dupla. Valvulae leguminis articulatae.*

1. *Tomentosae* Benth. *Frutices et arbores inermes tomento stellato lepidoti v. canescentes. Pinnae plurijugae. Spicae elongato-cylindricae. Legumen inerme.*

111. *M. verrucosa* Benth. fruticosa, caule petiolisque verrucoso-lepidotis; pinnis 7—9-jugis; foliolis 10—20-jugis oblique ovatis obtusissimis utrinque cano-tomentellis; floribus 4-meris. *In Brasilia.* ♂.

112. *M. Schomburghii* Benth. arborea inermis; fol. bipinnatis; petiolo leproso; pinnis 7—15-jugis; foliolis 15—20-jugis oblique oblongis obtusis glabris; spicis paniculatis; leguminibus coriaceis tomentosis. *In Brasilia.* ♂.

113. *M. pteridifolia* Benth. fruticosa; ramis petiolisque glandulosis lepidoto-tomentosis; pinnis 12—18-jugis; foliolis multijugis parvis oblongis obtusis margine revolutis subtus dense glandulosis; legumine villosissimo. *In Brasilia.* ♂.

114. *M. discolor* Benth. ramulis petiolisque cano-tomentellis glabratrice; pinnis 4—5-jugis; foliolis 15—25-jugis oblongo-linearibus obtusis tomentellis subtus ferrugineis; floribus 4-meris. *Ad Goyaz.* ♂.

2. *Leiocarpae* Benth. *Frutices v. arbores glabri v. tomentosi, aculeis paucis armati. Pinnae plurijugae. Foliola multijuga parva. Spicae elongato-cylindricae. Flores 4-meri.*

115. *M. leiocarpa* DC. subaculeata; fol. inermibus bipinnatis ramisque glabris; pinnis 12-jugis; foliolis multijugis linearibus; leguminibus inermibus glabris articulatis. *A. St. Martinum.* ♂.

116. *M. angustifolia* Benth. sparsa articulata; pinnis 5—6-jugis, setis inter pinnas conicis villosis; foliolis multijugis oblongo-linearibus obtusis puberulis; legumine linearis nitido. *In Brasilia.* ♂.

117. *M. interrupta* Benth. aculeis oppositis infrastipularibus; ramulis petiolisque pubescentibus; stipulis sub-

latis, pinnis 6—9-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus glabriusculis; spicis longis interruptis; ovario villoso; floribus 4-meris. *In Brasilia.* ♂.

3. *Caesalpiniaeefoliae* Benth. Frutices sparsim aculeatae. Pinnae et foliola lata paucijuga. Spicae cylindricae. Legumen inerme.

118. *M. caesalpiniaeefolia* Benth. aculeis uncinatis; pinnis 3-jugis; foliolis trijugis oblique ovatis obtusissimis membranaceis; spicis interruptis; floribus 3-meris. *In Brasilia.* ♂.

119. *M. sericantha* Benth. cano-puberula; pinnis 3-jugis oblique obovatis obtusissimis; spicis gracilibus paniculatis; floribus sericeis 4-meris. *In Brasilia.* ♂.

4. *Glanduliferae* Benth. Aculei parvi retrorsi. Pinnae pauci v. multijugae. Glandula prope basin petioli. Foliola lata. Capitula parva globosa. Legumen margine aculeatum inerme.

120. *M. micrantha* Benth. aculeis in striis longitudinalibus uncinatis minutis; fol. bipinnatis, pinnis 2—3-jugis; foliolis bijugis late ovato-rhombeis obtusissimis; leguminibus glabris laevibus latis. *In Guiana.* ♂.

121. *M. extensa* Benth. glabra; aculeis minimis; pinnis 2—3-jugis distantibus, glandulis petiolorum depresso; foliolis 1-jugis amplis ovato-falcatis acuminatis nitidis; ramis polyccephalis; floribus 4-meris. *In Brasilia.* ♂.

122. *M. trinervis* Desf. glabra, uncinato-aculeata; fol. bipinnatis; pinnis 3—4-jugis; foliolis 8—10 ovali-rhombeis basi 3-nerviis venosis; glandula ad basin petioli. *Breyne cent.* t. 17. *Patr. ign.* ♂.

123. *M. paniculata* Benth. pubescens retrosum aculeata; fol. bipinnatis glandulis conicis; pinnis 5—7-jugis; foliolis 7—11-jugis oblique falcato-rhombeis supra lucidis minute hirtellis; capitulis paniculatis. *In Guiana.* ♂.

5. *Rubricaules* Benth. *Frutices scandentes v. arboreas. Aculei sparsi. Glandulae petiolares nullae. Legumen glabrum vel pubescens nec villosum, margine retrorsum aculeatum v. nudum, articulis 6—8 subquadratis.*

124. *M. oborata* Benth. glabra, aculeis validis retrorsis; pinnis 3—4-jugis foliolis 1—2-jugis oblique obovatis obtusissimis; panicula terminali racemosa; legumine stipitato lato-linearis glabro nudo. *In Brasilia.* ♀.

125. *M. Ceratonia* L. aculeis uncinatis; fol. bipinnatis ramisque glabris; pinnis sub-5-jugis; foliolis obovatis; leguminibus glaberrimis costa uncinato-aculeatis. *Plum. ed. Burm. t. 8. In Domingo.* ♀.

126. *M. montana* Kunth. min. t. 10. ramis aculeatis puberulis; fol. bipinnatis abbreviatis inermibus, partialibus 2—3-jugis, propriis 4—6-jugis; capitulis axillaribus geminis. *In Am. bor. 4.*

127. *M. sepiaria* Benth. fruticosa v. arborea, aculeis rectis validis; pinnis 4—8-jugis, foliolis 20—40-jugis linearibus obliquis subnitidis; panicula ampla polycephala; floribus 4-meris. *In Brasilia.* ♀.

128. *M. oligacantha* DC. aculeis caulinis sub folio solitariis uncinatis; fol. bipinnatis ramisque glabris; pinnis 3—4-jugis; foliolis 3—4-jugis obovatis; leguminibus articulatis in costa vix aculeatis. *Ad St. Martham.* ♀.

129. *M. rubricaulis* Lam. aculeis uncinatis; fol. bipinnatis ramisque glabris; pinnis sub-5-jugis; foliolis 10—12-jugis oblongo-linearibus; glandula oblonga ad basin pinnarum. *M. octandra* Roxb. cor. t. 200. *M. Rottleri* Spr. *In Ind. or.* ♀.

130. *M. hamata* Willd. pubescens aculeata; fol. bipinnatis, pinnis 4-jugis; foliolis 7—8-jugis; pedunculis folio longioribus. *In Ind. or.* ♀.

131. *M. latispinosa* Lam. spinis petiolaribus latissimis compressissimis rectis; fol. bipinnatis eglandulosis; pinnis 12—20-jugis inermibus; foliolis 10—15-jugis elliptico-oblongis. *In Madagascaria.* ♀.

132. *M. emirnensis* Benth. minute tomentoso-puberula; pinnis 6—10-jugis; foliolis 5—8-jugis oblique oblon-

gis obtusiusculis utrinque adpresso-puberulis; legumine late linearis inermis. *In Madagascaria.* ♀.

6. *Sonniantes* Benth. *Frutices v. herbaceae. Pinnae plurijugae. Foliola multijuga parva. Cal. minutus. Corollae laciniae multistriatae. Legumina linearia.*

† Aculeatae.

133. *M. acutiflora* Benth. deuse rufo-hispida; pinnis 4—6-jugis; foliolis multijugis imbricatis linearibus obtusis; corollis acutis; legumine longe stipitato setoso glanduloso hispido. *In Brasilia.* ♀.

134. *M. podocarpa* Benth. aculeolata, viscosa - pubescens glandulosohirta; pinnis 5—10-jugis; foliolis multijugis imbricatis linearibus obtusis; corollis obtusissimis; legumine longe stipitato multiarticulato glandulosohispido. *In Brasilia.* ♀.

135. *M. somnians* Kunth min. t. 7. ramulis aculeatis hispidis; fol. bipinnatis, pinnis 4—5-jugis; foliolis multijugis linearibus glabris, rachi subaculeata; capitulis solitariis. *In Nov. Granata.* ♀.

136. *M. somniculosa* H. et K. ramis pilosis rachique aculeatis; fol. bipinnatis; pinnis 10—12-jugis; foliolis multijugis linearibus acutiusculis glabris; capitulis solitariis. *In Am. tropica.* ♀.

137. *M. quadrijuga* Salzm. glaberrima v. glandulosa; aculeis sparsis; stipulis lanceolato-aculeatis; pinnis 2—4-jugis; foliolis multijugis linearibus obtusis; bracteis parvis; legumine stipitato glabro. *In Brasilia.* ♀.

138. *M. bijuga* Benth. herbacea piloso-glandulifera v. glabra; stipulis ovato-lanceolatis acuminatis; pinnis bijugis; foliolis multijugis linearibus obtusis; bracteis late ovatis corollas aequantibus. *In Brasilia.* ♂.

† Inermes.

139. *M. teptocaulis* Benth. suffruticosa glaberrima v. glanduloso-pilosa; stipulis setaceo-acuminatis; pinnis 1—2-jugis; foliolis multijugis li-

nearibus obtusis; pedunculis glabris filiformibus. In Brasilia. ♂.

140. *M. trijuga* Benth. suffruticosa, glaberrima v. glandulos-pilosa; stipulis lanceolatis setaceo-acuminatis; pinnis 3—4-jugis; foliolis multijugis linearibus obtusis; pedunculis glabris filiformibus. In Brasilia. ♂.

141. *M. viscosa* Willd. ramulis petiolisque inermibus glanduloso-viscosis; fol. bipinnatis pinnis 4-jugis; foliolis multijugis linearibus obtusis glabris; capitulis globosis solitariis. In Brasilia. ♂.

142. *M. lupulina* Benth. fruticosa dense rufo-hirta; pinnis 8—10-jugis; foliolis multijugis linearibus obtusis glabris; legumine sessili linear-i-falcato hirsutissimo. In Brasilia. ♂.

143. *M. lasiocarpa* Benth. rufo-hirta; pinnis 4—8-jugis; foliolis multijugis linearibus obtusis piloso-pubescentibus; corollis pubescentibus; legumine linear-i-ferrugineo-hirto. In Brasilia. ♂.

7. *Asperatae* Benth. Aculei retrorsi. Pinnae multijugae. Foliola multijuga. Corolla membranacea non striata. Legumina linearia multiarticulata glanduloso-strigosa saepe hispidissima.

144. *M. adenocarpa* Benth. fruticosa glanduloso-hirta; stipulis setaceis; pinnis 6—10-jugis; foliolis 10—20-jugis linearibus; calyx brevi nudo; legumine subsessili glandulos-hispido rostrato. In Brasilia. ♂.

145. *M. patulosa* Benth. fruticosa setis longis hispida glanduloso-hirta; stipulis lanceolatis setaceo-acuminatis; pinnis 6—15-jugis; foliolis 30—40-jugis linearibus obtusis ciliatis; calyx truncato parvo; legumine sessili linear-i-falcato viscoso-pubescente. In Brasilia. ♂.

146. *M. asperata* L. fol. bipinnatis, pinnis 8—12-jugis; foliolis multijugis subtus margineque adpresso-setosis; aculeis subuncinatis ad basin pinnarum rectis; pedunculis subgeminis capituli longitudine. DC. leg. t.

63. In Jamaica. ♂.

147. *M. elliptica* Benth. setosohispida; stipulis lato-lanceolatis; pinnis 7—10-jugis; foliolis multijugis linearibus margine ciliatis; capitulis

oblongo-ellipticis; leguminibus hirsutissimis multiarticulatis. In Brasilia. ♂.

148. *M. cinerea* Velloz. fl. flum. t. 35. fruticosa procumbens; ramis pedunculisque adpresso-strigoso-hispidis; pinnis 6—10-jugis; foliolis 20—30-jugis linearibus ciliatis v. nudis; capitulis globosis; calyx minuto; legume 4—10-articulato strigoso. In Brasilia. ♂.

8. *Microcephalae* Benth.

149. *M. microcephala* Bonpl. ramulis petiolisque adpresso-hispidalis; fol. bipinnatis, pinnis 12—14-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus obtusis ciliatis. Kunth. mim. t. 8. *Ad Orinocum*: ♂.

9. *Dormientes* Benth. Herbae v. fructices prostratae. Aculei sparsi. Pedunculi axillares. Capitula globosa v. elliptica. Legumen obovatum v. oblongum 1—3-articulatum setosum.

150. *M. dormiens* Bonpl. ramis dense albido-hirsutis aculeatis; fol. bipinnatis; pinnis 5—7-jugis; foliolis 9—12-jugis linearibus subfalcatis acutis utrinque pubescentibus; capitulis solitariis. In Am. austr. ♂.

151. *M. intermedia* Kunth. mim. t. 6. ramis hispidis rachique aculeatis; fol. bipinnatis pinnis 4—7-jugis; foliolis 9—15-jugis linearibus obtusis glabris. In Caracas. ♂.

152. *M. humilis* Bonpl. ramulis aculeatis hispidis; fol. bipinnatis; pinnis 3—4-jugis; foliolis 6—13-jugis linearibus acutis subtus margineque puberulis; aculeis rectis subulatis; legumine ovato setoso. In Am. med. ♂.

153. *M. strigillosa* Torr. et Gray. prostrata; aculeis parvis, ramulis junioribus strigoso-setosis; stipulis ovatis cordatisque; pinnis 4—6-jugis; foliolis 10—15-jugis linear-i-oblongis ciliatis; calyx minuto; legumine ovato v. oblongo 1—3-articulato setoso. In Am. bor. ♂.

154. *M. camporum* Benth. humilis; ramulis pubescenti-hirtis; aculeis sparsis setaceis; fol. bipinnatis pinnis 2—5-jugis; foliolis multijugis linearibus mucronatis ciliatis; leguminibus

oblongis 2—3-articulatis setoso-hispidis. *In Guiana.* ♀.

III. *Ameria* Benth. *Stamina numero petalorum dupla. Leguminis valvulae indivisae.*

1. *Antrorsae* Benth.

155. *M. antrorsa* Benth. *fruticosa; ramulis crassis 4-gonis petiolis pedunculisque rufo-villosis, aculeis antrorum uncinatis; pinnis 10—15-jugis; foliolis 30—15-jugis parvis linearibus ciliatis; racemo terminali; calyce parvo ciliato; legumine lato-lineari plano villoso.* *In Brasilia.* ♀.

2. *Pachycarpae* Benth. *Frutices inermes setosi. Pinnae plurijugae. Foliola multijuga coriacea nitentia saepius ciliata-setosa. Racemi paniculato-racemosi v. brevissimi. Capitula globosa. Bracteolae setoso-ciliatae. Legumina polysperma setosa.*

156. *M. nitens* Benth. *setis sparsis patentibus; pinnis 2—3-jugis; foliolis linearibus obliquis hinc auriculato-truncatis; paniculae lana aphylla; capitulis hispidis.* *In Brasilia.* ♀.

157. *M. vernicosa* Bong. *setis strigosis brevibus raris; pinnis 4—6-jugis; foliolis linearibus obtusis glabris nudis; racemo oligocephalo fol. breviore; calyce minuto nudo.* *In Brasilia.* ♀.

158. *M. leiocephala* Benth. *setis strigosis sparsis; pinnis 10—15-jugis; foliolis linearibus obtusis glabris subciliatis; racemis paniculato-ramosis, capitulis, bracteolis calyceque glabris.* *In Brasilia.* ♀.

159. *M. selosa* Benth. *setis longis rufis pube brevissima intermixta; pinnis 15—35-jugis; foliolis linearibus ciliatis; racemo elongato polycephalo; capitulis hispidis; calyce minuto longe ciliato.* *In Brasilia.* ♀.

160. *M. Gardneri* Benth. *setis rufis longis densissimis vestita; ramulis crassis; pinnis 15—20-jugis; foliolis oblique linearibus setoso-ciliatis; racemo elongato polycephalo; capitulis hispidissimis; calyce minuto longe ciliato.* *In Brasilia.* ♀.

161. *M. Clauseni* Benth. *setis longis crassis rufis reflexis densissimis;*

ramulis crassis; pinnis 15—20-jugis; foliolis oblique linearibus ciliatis; racemo abbreviato polycephalo; capitulis maximis hispidissimis; legumine oblongo setoso-hispidissimo. *In Minas Geraes.* ♀.

162. *M. pycnocoma* Benth. *setis densis basi crassis retrorsis apice longe piliferis; fol. sub racemo condensatis; pinnis 12—18-jugis foliolis linearibus ciliatis glabris; racemo denso polycephalo; capitulis pilosissimis; calyce parvo longeciliato.* *In Brasilia.* ♀.

163. *M. densa* Benth. *setis densis adpressis; pinnis 20—30-jugis; foliolis parvis oblongo-linearibus utrinque adpresso-pubescentibus; capitulis hirsutis; calyce minuto ciliato.* *In Brasilia.* ♀.

164. *M. foliolosa* Benth. *pilis patentibus subferrugineis glanduliferis que intermixtis; pinnis 20—35-jugis; foliolis parvis oblongis obtusis utrinque pubescentibus; capitulis hirsutis; calyce minuto ciliato.* *In Brasilia.* ♀.

165. *M. platyloma* Benth. *pilis patentibus rufis densis; pinnis 10—16-jugis; foliolis parvis oblongis linearibus obtusis subtus hirsutis; bracteolis setosissimis; legumine oblongo crasso utrinque ferrugineo-hirto margine latissimo.* *In Brasilia.* ♀.

166. *M. pachycarpa* Benth. *caule petiolisque pube ferruginea scabris; pinnis 10—20-jugis linearibus glabris nudis; pedunculis axillaribus folio brevioribus; legumine oblongo crasso utrinque verrucoso, margine lato.* *In Brasilia.* ♀.

3. *Stipulares* Benth. *Frutices divaricato-ramosi glabriuscui. Pinnae pauci-multijugae. Stipellae minimae orbiculatae. Pedunculi axillares. Flores 4-meri. Legumen pubescens v. tuberculatum margine cartilagineo.*

167. *M. bifurca* Benth. *glaberrima nitida inermis; ramis angulatis dichotomis; pinnis 2-3-jugis; foliolis 20-30-jugis alternis oblique ovatis crassiusculis; bracteolis parvis; legumine lineari glabro laevi.* *In Brasilia.* ♀.

168. *M. intricata* Benth. *glabriuscula; aculeis sparsis uncinatis; pinnis 4—6-jugis; foliolis 8—15-jugis*

minimis obovatis, bracteolis minimis.
In Brasilia. ♂.

169. *M. lucidula* Benth. glabra inermis; stipulis lanceolatis acutissimis; pinnis 3—5-jugis; foliolis 8—12-jugis parvis oblongis v. oblongo-linacaribus; bracteolis minimis. *In Brasilia.* ♂.

170. *M. uruguayensis* Hook. fruticosa aculeata aculeis rectis; fol. bi-jugis; pinnis 10—12-jugis; foliolis linear-i-oblongis parvis acutis; stipulis cordatis obtusissimis; staminibus corollam 4-plo excedentibus. *In Uruguay.* ♂.

171. *M. cruenta* Benth. inermis v. subaculeata minute puberula; stipulis ovato-lanceolatis acuminatis; pinnis 1—3-jugis v. 4—5-jugis; foliolis 6—8-jugis oblongis obtusissimis; legumine linear-i-falcato cano-puberulo. *In Brasilia.* ♂.

172. *M. trachycarpa* Benth. aculeis sparsis recurvis; ramis foliisque glanduloso-tomentellis; stipulis brevibus ovatis acutis; pinnis 3—4-jugis; foliolis 6—12-jugis oblongis obtusissimis parvis crassiusculis; legumine linear-i-falcato undique echinato. *In Brasilia.* ♂.

173. *M. bracteolaris* Benth. inermis cano-puberula; pinnis 1—2-jugis; foliolis 3—8-jugis oblique oblongis obtusiusculis; bracteolis subulatis corolla subdupo longioribus. *In Brasilia.* ♂.

4. *Acanthocarpae* Benth. Frutices ramosissimi glabri, pubescentes v. villosi. Stipulae setaceae. Capitula globosa v. cylindrica. Flores 4—5-meri. Calyx obtuse dentatus non ciliatus. Legumen glabrum v. pubescens falcatum margine uncinato-aculeato.

174. *M. bahamensis* Benth. aculeis sparsis recurvis ramis petiolis pedunculisque dense ferrugineo-tomentosis; pinnis 2—4-jugis; foliolis 3—6-jugis obovato-oblongis; floribus 4-meris. *In Bahama.* ♂.

175. *M. mollis* Benth. inermis vel sparse aculeata rufo-villosa; pinnis 4—5-jugis; foliolis 6—10-jugis oblongis acutiusculis utrinque villosis; capitulis globosis; floribus 5-meris; calyce corolla pluries breviore. *In Brasilia.* ♂.

176. *M. quitensis* Benth. minute puberula sparse aculeata; pinnis 6—12-jugis; foliolis 12—20-jugis minimis linearibus acutis; capitulis globosis floribus 5-meris; calyce corolla 4-plo breviore; legumine falcato glabro. *In Brasilia.* ♂.

177. *M. domingensis* Benth. spinis uncinatis saepe nullis; petiolis aculeatis eglandulosis; pinnis 4-jugis; foliolis 7-jugis elliptico-oblongis glabris; capitulis paniculatis; leguminibus inermibus. *Acacia* DC. *In Domingo.* ♂.

178. *M. revoluta* Benth. spinis stipularibus geminis rectis; petiolis inermibus; pinnis 2—3-jugis; foliolis 8—12-jugis oblongis ciliato-scabris; leguminibus plano-compressis falcatis sutura aculeatis. *Acacia* Kunth. mim. t. 26. *In Peruvia.* ♂.

179. *M. acanthocarpa* Benth. spinis geminis rectis; petiolis aculeatis; pinnis 6—8-jugis; foliolis 6—15-jugis oblongis pubescentibus; capitulis geminis; leguminibus plano-compressis falcatis costa utraque aculeatis. *Acacia* DC. *In Nov. Hispania.* ♂.

180. *M. biuncifera* Benth. ramis divaricatis pubescentibus; spinis geminis uncinatis basi puberulis; petiolis inermibus eglandulosis; pinnis 4—6-jugis; foliolis 10—15-jugis parvis oblongis obtusis; capitulis globosis. *In Mexico.* ♂.

181. *M. monancistra* Benth. ramis divaricatis cano-puberulis; spinis ad basin petioli solitariis uncinatis; fol. eglandulosis; pinnis 2—3-jugis; foliolis 5—6-jugis parvis ovali-oblongis subtus puberulis; capitulis globosis solitariis. *In Mexico.* ♂.

182. *M. depauperata* Benth. ramis divaricatis glabriusculis; spinis ad ortum foliorum solitariis uncinatis; stipulis setaceis; fol. inermibus eglandulosis cano-puberulis; pinnis 1—2-jugis; foliolis 2—3-jugis parvis ovato-orbicularibus; pedunculis 1-cephalidis. *In Mexico.* ♂.

183. *M. polyantha* Benth. cano-pubescentis aculeis intra-foliaceis solitariis recurvis; pinnis 2-jugis; foliolis 5—6-jugis oblongis; spicis cylindricis subinterruptis pedunculo longioribus; bracteolis minutis; floribus 4—5-meris; calyce corolla triplo breviore. *In Mexico.* ♂.

5. *Pedunculosae* Benth. Frutices suffruticetesque diffusi. Stipulae cordato-dilatatae. Pedunculi racemosi folio longiores. Capitula globosa. Legumen planum glabrum v. pubescens inerme.

184. *M. brachycarpa* Benth. stri-goso-hispida; stipulis lato-lanceolatis; pinnis 4—6-jugis; foliolis multi-jugis linearibus obtusis; bracteolis ovato-lanceolatis; corollis striatis; legumine obovato-oblongo hispido 2—4-spermo. In Brasilia. ♂.

185. *M. inflexa* Benth. fruticosa ramosissima glabra, v. glanduloso-scabra; stipulis ovatis acutis; pinnis 1-jugis; petiolo communis brevissimo; foliolis 4—7-jugis oblongo-linearibus crassiustculis 2—3-nerviis. In Brasilia. ♂.

186. *M. cordistipula* Benth. fruticosa; caule pedunculisque molliter pubescentibus; fol. glanduloso-pubescentibus; pinnis 3—5-jugis; foliolis 10—15-jugis numerosis oblongis obtusis; pedunculus folio multo longioribus; calycibus bracteolisque ciliatis. In Brasilia. ♂.

187. *M. misera* Benth. suffruticosa; ramis foliisque patentim pilosis hirsutis; pinnis 2—4-jugis foliolis 4—8-jugis obovato-oblongis obtusis; pedunculus folio subdupo longioribus. In Brasilia. ♂.

188. *M. leptantha* Benth. fruticosa; ramis foliisque patentim pilosis et glanduloso-puberulis; stipulis inferioribus cordatis; pinnis 2—4-jugis; foliolis 3—5-jugis pinnis oblongis obtusis; floribus trimeris; legumine linearifalcata glabro. In Brasilia. ♀.

189. *M. gracilis* Benth. suffruticosa procumbens glabriuscula; pinnis parvis distantibus 6—10-jugis; foliolis 4—6-jugis minimis obovato-oblongis; capitulis parvis; pedunculo folio breviore; legumine linearis pubescente. In Brasilia. ♂.

6. *Paucifoliatae* Benth. Suffrutices inermes glabri. Petioli communes longi rigiduli v. phyllodinei; pinnis foliisque paucis v. nullis.

190. *M. paucifolia* Benth. ramis petiolisque tenuibus glaberrimis; pin-

nis parvis 2—3-jugis; foliolis minimis subhijugis obovatis. In Brasilia. ♂.

191. *M. phyllodinea* Benth. suffruticosa glaberrima petiolis phyllodineis anguste linearibus apice mucronatis aphyllis v. pinnis foliisque minimis unijugis instructis. In Brasilia. ♂.

7. *Ephedoideae* Benth. Fruticuli ramulis spinescentibus; fol. minimis v. nullis. Flores 4—5-meri. Legumina linearia plana glabriuscula.

192. *M. Gilliesii* Benth. ramulis striatis puberulis demum glabris apice spinescentibus; fol. raris; petiolo communis brevissimo; pinnis 1-jugis; foliolis parvis 2—4-jugis; legumine linearis pubescente polyspermo. Prosopis globosa Gill. In Chili. ♂.

193. *M. ephedooides* Benth. ramulis striatis glabris apice spinescentibus aphyllis; capitulis sessilibus; legumine linearis glabro. Prosopis Gill. In Chili. ♂.

Species quoad sectiones dubiae.

194. *M. dominicana* Desv. aculeata; fol. conjugato-pinnatis; petiolis aculeatis; pinnis 4-jugis; foliolis dimidiatis latis ovatis strigosis demum nudis. In Domingo. ♂.

195. *M. meticulosa* Mart. herbaea stricta puberulo-hirta; stipulis subulatis ciliatis; fol. 1-jugis foliolis petiolo multo longioribus multijugis; pinnis oblique lanceolato-oblongis subtus setosis; bracteis setoso-ciliatis. In Brasilia. ♂.

196. *M. adhaerens* Mart. scandens puberulo-tomentosa; ramis 4-angulis in angulis aculeatis; fol. bipinnatis, pinnis sub-10-jugis, pinnaulis linearibus multijugis; rhachide villosa glandulosa; capitulis magnis. In Brasilia. ♂.

197. *M. acacioides* Benth. inermis; ramulis verrucoso-glandulosis; fol. bipinnatis; glandula oblonga in medio petioli et 1—2 infra juga suprema; pinnis 20—30-jugis; foliolis multijugis linearibus obliquis; pedicellis fasciculatis; legumine coriaceo articulato glanduloso-verrucoso. In Guiana. ♂.

198. *M. Kermesina* Otto et Dietr. subinermis; fol. bipinnatis 3—6-jugis; pinnis sub-10-jugis; foliolis minutis oblongis nitentibus; petiolis apice sub-pungentibus; capitulis axillaribus pedunculatis globosis. *In Brasilia.* ♂.

199. *M. glaberrima* Schum. et Thonn. inermis; fol. bipinnatis, pinnis bi-sexjugis; foliolis 3—5-jugis rhomboideo-ovatis glaberrimis; pedunculis axillaribus solitariis ternisque; floribus capitato-corymbosis. *In Guinea.* ♂.

200. *M. adiantifolia* Schum. et Thonn. inermis; fol. bipinnatis 7-jugis; fololis 6—14-jugis oblongo-rhombeis apice rotundato villosis; floribus subcapitatis centro masculo. *In Guinea.* ♂.

201. *M. guineensis* Schum. et Thonn. inermis; fol. bipinnatis partialibus 8—10-jugis propriis 12—14-jugis; foliolis ovato-oblongis acutis pilosis; pedunculis pluribus axillaribus; floribus capitato-globosis. *In Guinea.* ♂.

202. *M. pentagona* Schum. et Thonn. aculeata; fol. bipinnatis; partialibus 8—10-jugis propriis 16—40-jugis; foliolis linearibus rotundatis glabris; pedunculis ternis quinisque axillaribus simplicibus uno racemoso; floribus globosis. *In Guinea.* ♂.

203. *M. procumbens* Schum. et Thonn. aculeata hirta fol. bipinnatis, partialibus 10—21-jugis propriis 32-jugis; foliolis linearibus acutis hirtis; floribus globosis; aculeis ramorum petiolorumque rectis, lomentis hirsutissimis. *In Guinea.* ♂.

204. *M. bicolor* Schum. et Thonn. spinosa; fol. bipinnatis, partialibus 8—16-jugis, propriis 12—20-jugis; foliolis linearibus ciliatis; pedunculis solitariis axillaribus; spica cylindrica bicolori; lomentis glabris. *In Guinea.* ♂.

205. *M. adstringens* Schum. et Thonn. spinosa; fol. bipinnatis, partialibus 8—10-jugis; propriis 10—20-jugis; foliolis linearibus villosiusculis glancis; pedunculis articulatis; lomentis longis compressis incano-lomentosis. *In Guinea.* ♂.

206. *M. monilifera* Bertol. fol. conjugatis partialibus 2-jugis; foliolis ellipticis obtusis basi obliquis pilosis; spicis capitatis racemosis; legumin-

bus falcatis strangulato-torulosis velutinis. *In Guatimala.* ♂.

207. *M. pumila* Schlecht. inermis puberula; fol. bipinnatis 3—6-jugis; pinnis 8—10-jugis; foliolis glabris obsolete ciliatis; stipulis filiformibus; petiolis glandulosis; leguminibus curvulis obtusis 10-spermis mucronatis. *In Mexico.* 4.

5188. SCHRANKIA Willd.

a. Flores spicati.

1. *S. macrostachya* Benth. fruticosa; ramulis 4—5-gonis petiolisque molliter pubescentibus; pinnis 14—20-jugis; foliolis multijugis anguste linearibus utrinque puberulis glabrisve. *In Brasilia.* ♂.

2. *S. rhodostachya* Benth. fruticosa; ramulis angulato-striatis petiolisque pubescentibus; pinnis 5—8-jugis; foliolis multijugis linearibus utrinque puberulis v. demum glabratiss. *In Brasilia.* ♂.

3. *S. elata* Mart. et Galeott. caule 5-gono villoso; pinnis quinques petiolatis; foliolis multijugis oblongis mucronatis adpresso villosis; pedunculis villosissimis uncinato-aculeatis. *In Mexico.* ♂. 15—20-ped.

b. Flores globoso-capitati.

4. *S. brachycarpa* Benth. caule 5-gono piloso petiolisque aculeatissimus; pinnis 5—9-jugis, foliolis multijugis; pedunculo brevissimo; leguminibus lineari-falcatis aculeatissimis. *M. indivisa* Mart. *In Brasilia.* ♂.

5. *S. Settoi* Benth. glabra; caule obscure 4—5-gono; pinnis 2—3-jugis; foliolis 10—20-jugis obscure venosis; pedunculo capitulo 2—3-plo longiore; legumine comppresso margine dense aculeato. *In Brasilia.* ♂.

6. *S. leptocarpa* DC. caule 4-gono; pinnis 2—3-jugis; foliolis multijugis; leguminibus longe acuminatis pedunculo decies longioribus; capitulis solitariis geminisve. *In Domingo.* 4.

7. *S. aculeata* Willd. caule 4-gono; pinnis 3-jugis; foliolis multijugis; leguminibus acutis pedunculo paulo longioribus; capitulis solitariis

Mill. ic. t. 182. f. 1. Banks rel. Houst. t. 25. In *Vera Cruz*. 2.

8. *S. uncinata* Willd. caule 5-gono; pinnis 6-jugis; foliolis multijugis; leguminibus apice acuminato-rostratis pedunculo duplo longioribus; capitulis geminis solitariis. *Mimosa horridula* Vent. *Choix*. t. 28. In *Am. bor.* 2.

9. *S. angustata* Torr. et Gray. glaberrima; caule angulato-striato; pinnis 4—6-jugis; foliolis subtus subaveniis; pedunculus folio v. legumine multo brevioribus; legumine tenui subulato-rostrato sparse aculeato. In *Texas*. 2.

5189. LEUCAENA Benth. (1842).

1. *L. glauca* Benth. inermis glabra; pinnis 4—6-jugis; foliolis 12—15-jugis linearibus distantibus acutis subtus glaucis; petiolo subglanduloso; capitulis axillaribus pedunculatis geminis; legumine subsessili. *Acacia* L. A. biceps Willd. A. leucocephala Lk. In *Am. trop.* 2.

2. *L. trichodes* Benth. pinnis 2—3-jugis; foliolis 2—5-jugis ovatis; calyce corolla parum breviore; antheris pilosis. *Mimosa* Jacq. h. Schoenbr. t. 394. In *Antillæ*. 2.

3. *L. canescens* Benth. pubes brevi-canescens; pinnis 1—2-jugis; foliolis 2—3-jugis oblique ovatis obtusis amplis; pedunculus confertis axillaribus racemosive capitulo longioribus. In *Columbia*. 2. Frut. biorgyalis.

4. *L. macrophylla* Benth. glabra; pinnis 2—3-jugis; foliolis 2—4-jugis ovatis acuminatis acutis amplis; pedunc. fasciculatis racemosis. In *Mexico*. 2.

5. *L. pulverulenta* Schlecht. pinnis 15—18-jugis; foliolis multijugis parvis linearis-falcatis obtusiusculis; calyce corolla 4-plo breviore; antheris glabris. In *Mexico*. 2.

6. *L. diversifolia* Benth. pinnis 4—17-jugis; foliolis multijugis parvis linearis-falcatis approximatis nitidis subcoriaceis; calyce corolla dimidio breviore; antheris pilosis. *Acacia* Schlecht. In *Mexico*.

5190. XYLIA Benth. (1840).

1. *X. dolabriformis* Benth. In *Ind. or. et ins. Philipp.* 2. Jng DC. X. xylocarpa Roxb. cor. t. 100. X. lignosa Grah. Arbor. elata. Fol. bipinnata pinnis 1-jugis. Folia 2—6-juga. Pedunc. fasciculati. Capit. globosa tomentosa. Calycis dentes callosi incrassati.

5191. ACACIA L. (1747).

A. *Phyllodinae* Benth. Folia ad petiolas filiformes reducta rarius omnino nulla. Australasicæ.

a. *Aphyllae* Benth. *Phyllodia* nulla.

1. *A. restiacea* Benth. in *Hook. journ.* 1. p. 323. glabra; ramulis substriatis muticis aphyllis; capitulis pedunculatis racemosis multifloris; racemis basi squamis imbricatis suffultis. Ad *Swan River*. 2.

2. *A. spinescens* Benth. glabra; ramulis striatis spinescentibus aphyllis; gemmis squamulatis; capitulis sessilibus 2—6-floris; calyce truncato subdeutato dimidio corollæ breviore. In *Australiæ*. 2.

3. *A. tetragonocarpa* Meisn. in *Lehm. pl. Preiss.* glabra; ramis ramulisque muticis sulcatis; pedunculus 1-cephalis; capitulis 1—3-floris; calyce minuto obtuse 4-lobo; corolla striata 4-fida; legumine acute 4-questro. In *Nov. Holl.* 2.

b. *Alatae* Benth. *Phyllodia* decurrentia.

4. *A. Bossiaeoides* Benth. glaberrima glauca; stipulis parvis lanceolato-semisagittatis; phyllodiis 3-angularibus submuticis 4-angularibus marginatis eglandulosis v. glanduliferis reticulato-venosis longe et late bifarium decurrentibus, cum phyllodio inferiore in alam continuam connatis. In *Nov. Holl.* 2.

5. *A. atala* R. Br. glabra v. hirta; stipulis subspinescentibus; phyllodiis falcato-ovatis longe bifarium decurrentibus margine superiori angulo glandulifero nervo medio mucronato; capitulis 8—15-floris. B. R. t. 396. In *Nov. Holl.* 2.

6. *A. platyptera* Lindl. hispida; stipulis subspinescentibus; phyllodiis falcato - oblongis longe bifarium decurrentibus margine superiore angulo glandulifero nervo centrali in mucronem recurvum excurrende; capitulis 8—15-floris. B.M.t. 3933. *Ad Swan River.* ♂.

7. *A. diptera* Benth. glaucescens; stipulis minutis obsoletis; phyllodiis lanceolatis incurvis parvis longissime bifarium decurrentibus mucronatis eglandulosis; capitulis multifloris. Hk. ic. t. 369. *In Nov. Holl.* ♂.

8. *A. graminea* Lehm. ex Meisn. glabra; stipulis obsoletis; phyllodiis longissimis compresso-filiformibus trifarium angustissime decurrentibus sphacelato-mucronatis muticisve infra medium glandula poriformi munitis 1-nerviis; capitulis solitariis multifloris. *In Nov. Holl.* ♂.

9. *A. dolabriformis* Wendl. stipulis deciduis nullisve; ramis subangulatis; phyllodiis linearibus subfalcatis basi decurrentibus apice oblique emarginato - truncatis, lobo inferiore mucronato pungente. *In Nov. Holl.* ♂.

10. *A. stenoptera* Benth. glaberrima v. scabrella; stipulis parvis lanceolatis; phyllodiis lanceolatis v. linearibus recurvo-falcatis longe et anguste bifarium decurrentibus apice spinescentibus 1-nerviis rigidis eglandulosis; pedunculis brevissimis solitariis; capitulis 6—10-floris. *Ad Swan River.* ♂.

11. *A. brachyptera* Benth. glabra v. scabriuscula; stipulis minimis; phyllodiis linearibus recurvo-falcatis anguste trifarium decurrentibus subulato-spinescentibus 1-nerviis rigidis eglandulosis; pedunculis brevissimis 1-cephalis. *In Nov. Holl.* ♂.

12. *A. incurva* Benth. glabriuscua; phyllodiis linearibus incurvis anguste trifarium decurrentibus spinescentibus 1-nerviis rigidis eglandulosis; pedunc. brevissimis 1-cephalis tomentosis; capitulis 4—8-floris. *In Nov. Holl.* ♂.

13. *A. triptera* Benth. glabra; stipulis subnullis; phyllodiis lanceolatis recurvo-falcatis breve trifarium decurrentibus rigidis striato-multinerviis eglandulosis; spicis cylindricis. *In Nov. Holl.* ♂.

c. *Armatae* Benth. *Stipulae spinescentes. Phyllodia ovato-linearia.*

14. *A. taricina* Meisn. ramis teretibus costato-striatis ramulisque canotomentosis; stipulis setaceo-spinescentibus rectis; phyllodiis 4-gono-filiformibus subrecurvis mucronatis pungentibus 1-nerviis eglandulosis; pedunculis tomentosis 1-cephalis. *In Nov. Holl.* ♂.

15. *A. Suttleworthii* Meisn. hispido-pilosa; ramis teretibus; stipulis minutis setaceis; phyllodiis oblique obovatis v. suborbicularibus undulatis 1-nerviis mucronatis punctato-scabris superiore prope medium glandulifero; capitulis parvis 10—12-floris villosis. *In Nov. Holl.* ♂.

16. *A. smilacifolia* Gardn. sert. pl. t. 3. glaberrima; ramulis angulatis; phyllodiis ovatis acuminatis cordato-dimidiatis marginatis 3—5-nerviis, venis simpliciter ramosis; capitulis multifloris. *In Nov. Holl.* ♂.

17. *A. crassistipula* Benth. hirsuta; ramulis angulatis; stipulis phyllodineis persistentibus; phyllodo stipulis duplo longiore oblongo-linearis falcato flexuoso uncinato; pedunculis 1-cephalis phyllodio subbrevioribus. *Ad Swan River.* ♂.

18. *A. teretifolia* Benth. glaberrima; ramulis angulato-striatis; stipulis subrecurvis; phyllodiis lineariteribus substriatis mucronatis; pedunculis 1-cephalis phyllodio multo brevioribus. *Ad Swan River.* ♂.

19. *A. barbinervis* Benth. pilosopubescens; ramulis angulatis; stipulis minimis setaceis; phyllodiis linearifalcatis flexuosis 1-nerviis mucronato-pungentibus marginibus incrassatis; pedunc. 1-cephalis; capitulis sub-15-floris. *In Nov. Holl.* ♂.

20. *A. aureonitens* Benth. ramulis teretibus hirsutis; phyllodiis linearis oblongis incurvis utrinque acutis mucronato-pungentibus crassis rigidis 1-nerviis marginatis medio minute glanduliferis, phyllodio subaequifolius; capitulis multifloris. *In Nov. Holl.* ♂.

21. *A. Baxteri* Benth. glabra ramulis angulatis; stipulis spinescentibus; phyllodiis lanceolatis v. oblongo-linearibus subundulatis rigidis binnerviis, nervo altero in spinam excurrente altero submarginali; pedunculis

phyllodio 2—3-plo brevioribus. In Nov. Holl. ♂.

22. *A. nervosa* DC. glabra ramulis angulatis; phyllodiis lanceolato-oblongis subundulatis incurvo-falcatis utrinque acutis marginatis supra basin glandulosis; pedunculis phyllodio 2—3-plo brevioribus; capitulis multifloris. In Nov. Holl. ♂.

23. *A. congesta* Benth. ramulis teretibus puberulis saepe spinescentibus; stipulis brevissimis; phyllodiis inaequaliter ovato-oblongis undulatis glabris penninerviis; pedunculis ad nodos congestis; capitulis dense multifloris. In Nov. Holl. ♂.

24. *A. armata* R. Br. ramulis anguste striatis pubescentibus; phyllodiis dimidiatis ovatis v. lanceolatis undulatis glabris penninerviis mucronatis; pedunculis phyllodio vix longioribus; capitulis globosis dense multifloris. Bonpl. malm. t. 55. B. M. t. 1513. B. Cab. t. 49. *A. paradoxa* DC. *A. undulata* Willd. B. R. t. 843. B. Cab. t. 753. *A. ornithophora* Sweet. fl. austr. t. 24. B. Cab. t. 1469. In Nov. Holl. ♂.

25. *A. hybrida* Lodd. B. Cab. t. 1342. resinosa pallida; ramulis vix angulatis glabris v. pubescentibus; stipulis brevissimis; phyllodiis falcato-lanceolatis undulatis apice recurvis glabriusculis uncinato-mucronatis; capitulis dense multifloris. *A. micrantha* A. Dietr. In Nov. Holl. ♂.

26. *A. tristis* Grah. B. M. t. 3420. ramulis striatis puberulis; stipulis setaceo-spinescentibus; phyllodiis oblique lanceolatis incurvo-falcatis vix undulatis 1—2-nerviis recurvo-mucronatis; capitulis globosis dense multifloris; calyce corollam dimidium aequante. In Nov. Holl. ♂.

27. *A. Huegetii* Benth. ramulis teretibus villosis; stipulis setaceis; phyllodiis semiobovatis recurvo-falcatis utrinque acutis subundulatis pubescentibus marginatis eglandulosis spinosis mucronatis; capitulo parvo multifloro pubescente. In Nov. Holl. ♂.

28. *A. idiomorpha* Cunn. ex Benth. ramulis subteretibus cano-villosis; stipulis spinescentibus uncinatis; phyllodiis oblique late ovatis acutis undulatis marginatis cano-villosis eglandulosis spinosis; capitulo multifloro globoso. In Nov. Holl. ♂.

29. *A. obovata* Benth. hispidula; ramulis striatis; stipulis setaceis molibus; phyllodiis obovatis oblongisve undulatis marginatis penniveniis; pedunc. gracilibus glabris phyllodia aequantibus; capit. 6—8-floris glabris. In Nov. Holl. ♂.

30. *A. urophlla* Benth. glabra v. hispidula; ramis angulato-striatis; stipulis setaceo-spinescentibus; phyllodiis petiolatis dimidiato-ovatis obliquis subulato-acuminatis undulatis margine superiore saepius crenato binerviis furcato-venosis glandula prope basin magna; pedunculis racemosis; capitulis paucifloris glabris. In Nov. Holl. ♂.

31. *A. pyrifolia* DC. glabra glauca; ramulis compresso-teretibus; stipulis spinescentibus; phyllodiis ovatis abrupte spinescenti-mucronatis 1-nerviis penniveniis; capitulis parvis multifloris racemosis. In Australasia. ♂.

d. *Triangularares* Benth. Stipulae variae; phyllodia parva angulo inferiore mucronata superiore saepe glandulifero.

32. *A. decipiens* R. Br. glabra; ramulis angulatis; stipulis hinc spinescentibus; phyllodiis triangularibus subtrapezoideisve nervo in spinulam excurrente; capitulis 6—10-floris. B. M. t. 1745 et 3244. *A. incrassata* Hook. ic. t. 370. In Nov. Holl. ♂.

33. *A. divergens* Benth. ramulis pubescentibus subangulatis; phyllodiis triangularibus nervo rectiusculo margini inferiori approximato in spinulam excurrente, lateralibus obscuris v. nullis margine superiore angulo prominente glandulifero; capitulis 8—12-floris. In Nov. Holl. ♂.

34. *A. biflora* R. Br. ramulis pubescentibus vix angulatis; stipulis perique pubescentibus; phyllodiis triangularibus nervo margini inferiori approximato in spinulam excurrente margine superiore glandulifero; pedunculis brevibus; capitulis bifloris. Wendl. diss. 10. t. 2. Rchb. ic. pl. cult. t. 12. f. 2. In Nov. Holl. ♂.

35. *A. triangularis* Benth. ramulis pubescentibus vix angulatis; stipulis deciduis hinc inde spinescentibus; phyllodiis triangularibus subbinerviis nervo in spinulam excurrente secundario glandulifero; pedunc. brevibus; capitulis

bifloris; alabastro obtusiusculo. *In Nov. Holl.* ♂.

36. *A. hastulata* Sm. ramulis teretibus pubescentibus demum glabris; stipulis setaceis persistentibus; phyllodiis parvis crebris cordato-triangularibus hastatisque acuminato-pungentibus glabris, angulo superiore acuto glandulifero; capitulis parvis 3—5-floris. *B. M. t. 3341. In Nov. Holl.* ♂.

37. *A. cuneata* Benth. ramulis angulatis hirtis glabrisve; stipulis setaceo-spinescentibus; phyllodiis cuneato-oblongis apice truncatis glabris glaucis nervo parum excentrico superne recurvo, angulo inferiore acuto glandulifero; pedunc. phyllodium subaequantibus; capitulis 6—10-floris. *In Nov. Holl.* ♂.

38. *A. vomeriformis* Cunn. ex Benth. ramulis teretibus puberulis glabrisve; stipulis setaceis v. obsoletis; phyllodiis triangularibus apice truncato-subbilobis; pedunc. phyllodium brevioribus glabris; capitulis multifloris; alabastro obtusissimo. *In Nov. Holl.* ♂.

39. *A. Gunnii* Benth. breviter puberula; ramulis teretibus; stipulis setaceis obsoletisque; phyllodiis parvis ovato-triangularibus basi cuneatis nervo inferiore in spinulam excurrente angulo superiore obtusissimo rarius glandulifero; pedunculis phyllodium superantibus; capitulis multifloris. *In New South Wales.* ♂.

40. *A. amblygona* Gunn. pubescens; caule tereti; stipulis minimis obsoletisve; phyllodiis falcato-subtriangularibus coriaceis plurinerviis, nervo inferiore obtusissimo eglanduloso; capitulo 10—15-floro glabro. *In Nov. Holl.* ♂.

41. *A. sublanata* Benth. junior lanata demum glabra; ramulis striatis; stipulis setaceis basi subdilatatis deciduis; phyllodiis late falcato-triangularibus coriaceis, angulo inferiore mucronato superiore obtuso glandulifero; pedunc. phyllodium longioribus pubescentibus; capitulis multifloris. *In Nov. Holl.* ♂.

42. *A. deltoidea* A. Cunn. glabra v. puberula; ramis teretibus; stipulis setaceis basi subconnatis; phyllodiis parvis oblique ovato-triangularibus breve mucronatis crassis plurinerviis angulo superiore nudo; pedunculis pubescentibus; calyce profunde et anguste lobato. *In Nov. Holl.* ♂.

43. *A. bidentata* Benth. glabra; ramulis teretibus; stipulis minimis subrecurvis; phyllodiis parvis obovatis crassis, basi obscure binerviis apice bidentatis, dente altero parvo ovato acuto altero lato obtuso rarius glandulifero; calyce sinuato-dentato. *In Nov. Holl.* ♂.

44. *A. obliqua* Cunn. ramulis vix angulatis pubescentibus glabrisve; stipulis minutis; phyllodiis parvis oblique obovatis orbiculatis incurvato-mucronatis crassis glabris 2—4-nerviis; pedunculis gracilibus phyllodium longioribus glabris; capit. 8—10-floris. *In Nov. Holl.* ♂.

45. *A. horridula* Meisn. ex Lehm. ramis teretibus pubescentibus; stipulis setaceis rigidis; phyllodiis patentissimis ovato-vel lanceolato-triangularibus pungenti-mucronatis glabris angulo superiore parum prominente minute glandulifero; capitulis 2—3-floris. *In Nov. Holl.* ♂.

46. *A. Letrobii* Meisn. glaberrima; ramis gracilibus acute angulatis; stipulis obsoletis; phyllodiis oblique oblongis v. subtriangulari-bovatis infra apicem obtusum mucronatis 1-nerviis, margine inferiore prope medium obscure glandulifero; pedunculis aggregatis; capitulis multifloris. *In Nov. Holl.* ♂.

e. *Pungentes* Benth. Stipulae minuta v. nullae. Phyllodia lanceolata v. subulata brevia acuminato-pungentia.

* Capitatae plurinerviae.

47. *A. latipes* Benth. glaberrima; phyllodiis linear-lanceolatis pungentibus basi non angustatis crassis rigidis 3—4-nerviis; pedunculis capitulo multifloro vix longioribus; sepalis liberis anguste spathulatis. *In Nov. Holl.* ♂.

48. *A. cochlearis* Wendl. viscidula glabra v. sublanata; phyllodiis linear-lanceolatis acuminato-pungentibus basi angustatis crassis rigidis 3—4-nerviis; pedunculis capitulo multifloro vix longioribus; sepalis liberis anguste spathulatis. *Mimosa Labill. nov. Holl. t. 234. In Nov. Holl.* ♂.

49. *A. lanigera* Cunn. ramulis angulatis pubescenti-lanatis demum teretibus glabratis viscidulis; phyllodiis

lineari-lanceolatis pungentibus, basi parum angustatis crassis rigidis striato-plurinerviis; pedunculis brevissimis; calyce campanulato dentato. B. M. t. 2922. In New South Wales. ♂.

50. *A. trinervata* Sieb. glabra v. puberula; ramulis angulatis; phyllodiis linearibus crassis rigidis pungenti-mucronatis utrinque 2—5-nerviis basi parum angustatis; pedunc. tenuibus glabris; capitulis parvis multifloris. *A. laxifolia* Cunn. *A. Cunninghamii* G. Don. In Nov. Holl. ♂.

51. *A. genistifolia* Lk. glabra ramulis angulatis; phyllodiis linearibus rigidis pungentibus subtrinerviis basi non angustatis; pedunculis phyllodium aequantibus; legumine longe et angusto lineari compresso glaberrimo. In Nov. Holl. ♂.

52. *A. sulcata* R. Br. glabra; ramulis subangulatis; phyllodiis confertis incurvo-erectis linearis-subulatis profunde falcato-striatis pungentibus; pedunculis tenuibus phyllodium parum brevioribus; legumine arcuato contorto. Wendl. diss. t. 10. B. R. t. 928. In Nov. Holl. ♂.

53. *A. colletioides* Benth. glabra ramulis teretibus; phyllodiis divaricatis linearis-subulatis teretibus rigidis striato-plurinerviis acuminato-pungentibus; pedunculis abbreviatis; legumine linearis coeruleo-contorta glabra; valvis membranaceo-coriaceis. In Nov. Holl. ♂.

54. *A. striatula* Benth. ramulis puberulis leviter angulatis; phyllodiis divaricatis v. recurvis breviter linearis-sulcatis compressis rigidis acuminato-pungentibus striato-plurinerviis pedunc. abbreviatis; capitulis parvis multifloris; sepalis liberis tenuissimis. In Nov. Holl. ♂.

55. *A. sessilis* Benth. ramulis teretibus phyllodiisque arachnoideo-lanatis; phyllodiis confertis breve rigide linearis-subulatis acuminatis subcompressis striato-plurinerviis; capitulis parvis 10—15-floris tomentoso-lanatis sessilibus glomeratis; sepalis liberis angustissimis. In Nov. Holl. ♂.

56. *A. Benthamii* Meisn. glabra; ramulis subteretibus; phyllodiis patulis rigidis linearibus rectis planis acuminato-pungentibus striato-plurinerviis obscure glanduliferis; capitulis multifloris; sepalis liberis angustis. In Nov. Holl. ♂.

** Capitatae, Phyllodia 1-nervia.

57. *A. sicutaeformis* Cunn. ex Benth. glabra; ramulis compresso-teretibus; phyllodiis breve linearibus v. linearis-lanceolatis rigidis pungenti-mucronatis uninerviis aeniis nitidis basi angustatis; pedunc. capitulo multifloro longioribus. Ad lacum Georgii. ♂.

58. *A. diffusa* Lindl. B. R. t. 632. glabra ramulis angulatis; phyllodiis linearibus angustis rigidis crassis pungentibus aeniis; pedunculis subgeminis capitulo 12—20-floro 2—3-plo longioribus; calyce corolla plures breviore. *A. prostrata* B. Cab. t. 631. In Nov. Holl. ♂.

59. *A. cuspidata* Cunn. glabra; ramulis angulatis; phyllodiis linearis-subulatis crassis rigidis pungentibus nervo utrinque prominente sub-4-gonis supra basin saepius glanduliferis; capitulis 12—20-floris. In Nov. Holl. ♂.

60. *A. asparagooides* Cunn. glabra; ramulis subteretibus; phyllodiis linearis-subulatis crassis rigidis pungentibus sub-4-gonis supra basin subangulato-glanduliferis; capitulis solitariis sessilibus multifloris; calyce dimidium corollam aquante. In Nov. Holl. ♂.

61. *A. Brownii* DC. glabra; ramulis subteretibus; phyllodiis linearis-subulatis tenuibus rigidis pungentibus nervo prominente sub-4-gonis; pedunculis gracilibus phyllodium aequantibus; capitulis multifloris canescensibus; calyce sinuato. B. Cab. t. 1333. In Nov. Holl. ♂.

62. *A. sphacelata* Benth. ramulis subteretibus glabris puberulive; phyllodiis linearis-subulatis tenuibus rigidis pungentibus nervo prominente sub-4-gonis; pedunculis phyllodium multo brevioribus; capitulis multifloris glabris; sepalis angustissimis liberis apice sphaelato-subulatis. In Nov. Holl. ♂.

63. *A. juniperina* Willd. ramulis teretibus pubescentibus; phyllodiis linearis-subulatis rigidis glabris pungentibus nervo prominente sub-4-gonis basi latioribus; capitulis multifloris; sepalis subliberis. Vent. malm. t. 64. B. Cab. t. 398. In Nov. Holl. ♂.

64. *A. costata* Benth. ramulis striatis pubescenti-lanatis; phyllodiis breve oblongo-lanceolatis rigidis pungentibus margine superiore valde dilatato

nerviformi; pedunc. phyllodio longioribus; capitulis 10—15-floris; calyce brevi profunde lobato. In Nov. Holl. ♂.

*** Spicatae.

65. *A. ovoidea* Benth. prostrata glabra; ramulis angulato-striatis; phyllodiis divaricatis hinc inde verticillatis linearis-subulatis rigidis pungentibus nervo prominente sub-4-gonis; pedunculis phyllodio brevioribus; spicis ovoideis v. oblongis dense multifloris. In Van Diemenland. ♂.

66. *A. verticillata* Willd. glabra v. pubescens; ramulis angulato-striatis; phyllodiis divaricatis subverticillatis linearis-subulatis rigidis pungentibus basi angustatis; spicis cylindricis densis phyllodia superantibus. Vent. malm. t. 63. B. M. t. 110. A. ruscifolia Cunn. B. M. t. 2195. In Van Diemenland et Nov. Holl. ♂.

67. *A. Oxycedrus* Sieb. ramulis subteretibus pubescentibus; phyllodiis linearis-lanceolatis sparsis subverticillatis acuminato-pungentibus rigidis elevato 3—4-nerviis glabriusculis; spicis cylindricis densis phyllodia superantibus; bracteis orbicularibus. A. taxifolia B. Cab. t. 1225. In Nov. Holl. ♂.

68. *A. Riceana* Hensl. Bot. III. t. 135. glabra; ramulis angulatis; phyllodiis anguste linearibus subulatis sparsis subverticillatisque acuminato-pungentibus univeniis; spicis elongatis gracilibus dissitifloris phyllodia superantibus. A. setigera Hook. ic. t. 116. In Van Diemenland. ♂.

69. *A. axillaris* Benth. glabra v. ramulis minute puberulis subteretibus; phyllodiis anguste linearibus subulatis recurvis rigidis mucronato-pungentibus 1—2-nerviis; spicis brevissimis sessilibus 1—3-floris; bracteolis fuscis floribusque glaberrimis. In Nov. Holl. ♂.

f. *Calamiformes* Benth. Stipula subnulla. Phyllodia subulata elongata non pungentia. Inflorescentia capitata.

70. *A. pugioniformis* Wendl. diss. t. 9. glabra ramulis subangulatis; phyllodiis strictis linearis-filiformibus nervo utrinque prominente tetragonis mucronatis; pedunc. solitariis phyllo-

dio multo brevioribus; capitulis multifloris; sepalis liberis angusto-sphaelatis. A. quinquelateralis DC. In Nov. Holl. ♂.

71. *A. juncifolia* Benth. glabra; ramulis teretibus; phyllodiis strictis v. subpatentibus elongato-subulatis tereti-compressis muticis v. uncinato-mucronatis; pedunculis solitariis geminisve phyllodio multoties brevioribus; sepalis liberis spathulatis. In Nov. Holl. ♂.

72. *A. leptoneura* Benth. glabra v. cano-puberula; ramulis subteretibus; phyllodiis strictis v. flexuosis subulatis tereti-compressis tenuissime striato-multinerviis muticis v. uncinato-mucronatis; pedunculis solitariis geminisve; capitulis multifloris; sepalis liberis anguste spathulatis. In Nov. Holl. ♂.

73. *A. rigens* Cunn. puberula demum glabra; ramulis angulatis; phyllodiis erecto-patentibus linearis-subulatis tereti-compressis rigidis muticis subtrinerviis; pedunculis phyllodio multo brevioribus; calyce sinuato-dentato. In Nov. Holl. ♂.

74. *A. pulverulenta* All. Cunn. glabra; ramulis angulatis; phyllodiis subpatentibus subulatis uncinato-mucronatis tereti-compressis enerviis v. obscure venosis glauco-pulverulentis; pedunculis racemosis v. solitariis phyllodio multo brevioribus; calyce sinuato-dentato. In Nov. Holl. ♂.

75. *A. calamifolia* Sweet in B. R. t. 839. glabra; ramulis subteretibus; phyllodiis elongato-subulatis erectis v. incurvis apice uncinato-setiferis subaveniis compressis; pedunculis racemosis; capitulis multifloris. In Nov. Holl. ♂.

76. *A. extensa* Lindl. glaberrima; ramulis acute angulatis; phyllodiis longissime subulatis uncinato-mucronatis rigidulis nervo utrinque valido tetragonis infra medium glanduliferis; pedunc. solitariis v. racemosis phyllodio multo brevioribus; calyce truncato subdentato. In Nov. Holl. ♂.

77. *A. squamata* Hook. ic. t. 367. glabra subglauca; ramulis subteretibus; phyllodiis subulatis teretibus remotis ramuliformibus tenuissime striatis apice uncinatis; racemis 2—3-cephalidis ante anthesin squamis imbricatis obtectis; calyce corollaque subnullis.

78. *A. Hookeri* Meisn. ramis teretibus puberulis; phyllodiis anguste linearibus rectis v. arcuatis ciliolatis dorso convexo obsolete nervoso-striatis; pedunculis solitariis v. geminis phyllodio subaequalibus. *In Nov. Holl.* ♂.

g. *Brunnioideae* Benth. *Stipulae setaceae* v. *nullae*. *Phyllodia brevia* verticillata v. sparsim *conferta* angusta teretiaque non pungentia.

79. *A. lycopodiifolia* A. Cunn. in Hook. ic. t. 172. pubescenti-hirta subviscosa; ramulis teretibus; stipulis setaceis appressis; phyllodiis verticillatis minimis subulatis apice setiferis hispidis; pedunculis phyllodio longioribus; capitulis multifloris hispidis. *In Nov. Holl.* ♂.

80. *A. galloides* Benth. ramulis teretibus tomentoso-pubescentibus; stipulis setaceis appressis; phyllodiis verticillatis parvis tenuissime subulatis apice recurvo-mucronulatis puberulis; capitulis multifloris hispidis. *In Nov. Holl.* ♂.

81. *A. hippuroides* Heward; flavescenti-pubescentis; ramulis teretibus; phyllodiis verticillatis subulatis teretibus mucronatis molliter hispidis; capitulis 20—30-floris; calyce tenuiter membranaceo corolla hispidula triplo breviore. *In Nov. Holl.* ♂.

82. *A. Baueri* Benth. ramulis teretibus minute puberulis, caeterum glaberrima; stipulis minutis; phyllodiis verticillatis linearis-subulatis teretibus apice uncinatis obtusis; mucrone minimo; capitulis 10—30-floris glabris; calyce dimidium corollae aequante. *In Nov. Holl.* ♂.

83. *A. ericaefolia* Benth. ramulis teretibus pilosis; stipulis minutis; phyllodiis confertis sparsis subulatis teretibus v. margine revoluto compressis obtusis laxe pilosis glabris; pedunculis glabris; capitulis parvis multifloris; sepalis liberis anguste spathulatis. *In Nov. Holl.* ♂.

84. *A. Brunniades* All. Cunn. ramulis teretibus minute puberulis; stipulis minutis; phyllodiis confertis brevibus subulatis teretibus mucronulatis glabris; calyce sinuato-dentato. *In New South Wales.* ♂.

85. *A. conferta* All. Cunn. ramulis teretibus puberulis; stipulis minutis; phyllodiis confertis sparsis anguste linearibus compressis margine revolutis glabris hirtellis; capitulis multifloris parvis; calyce sinuato-dentato. *In New South Wales.* ♂.

h. *Uninerviae* Benth. *Stipulae subnullae*. *Phyllodia* ex ovato ad linearia non pungentia uninervia. *Inflorescentia capitata*.

* ***Latifoliae*; inflorescentia simplici.**

86. *A. setiformis* Cunn. in Hook. ic. t. 189. glaberrima; ramulis teretibus; phyllodiis ovato-orbiculatis acutis undulatis marginatis minute glanduliferis basi oblique truncatis nervo valido in mucronem excurrente; capitulis multifloris. *In New South Wales.* ♂.

87. *A. piligera* Cunn. in B. M. t. 3394. ramulis striatis pedunculisque patentibus-hispidis; phyllodiis ovato-orbiculatis acutis undulatis marginatis minute glanduliferis basi oblique truncatis nervo valido in mucronem excurrente; pedunculis tenuibus multifloris. *In New South Wales.* ♂.

88. *A. undulaefolia* A. Cunn. ramulis pedunculisque pilis reflexis pubescentibus; phyllodiis ovatis acutis undulatis marginatis glanduliferis basi oblique cuneatis mucronatis; pedunculis tenuibus phyllodio longioribus. B. Cab. t. 1844. *A. uncinata* Lindl. B. R. t. 1332. B. M. t. 3394. *In New South Wales.* ♂.

89. *A. disophylla* Benth. molliter villosa; phyllodiis ovali-oblongis falcatis undulatis marginatis saepius minute glanduliferis basi oblique cuneatis nervo in mucronem brevem excurrente; pedunculis phyllodium aequantibus. *In New South Wales.* ♂.

90. *A. hispidula* Willd. ramulis teretibus pedunculisque hispidulis; phyllodiis oblongis falcatis basi cuneatis mucronatis marginibus cartilagineo-denticulatis; capitulis 12—15-floris. B. Cab. t. 823. Hook. ic. t. 161. *Ad Port Jackson.* ♂.

91. *A. anceps* DC. glabra ramulis angulato-ancipitibus; phyllodiis ovato-oblongis basi angustatis apice

obtusis medio 1-nerviis; capitulis solitariis. In Nov. Holl. ♂.

92. *A. elliptica* A. Cunn. glabra glauco-cana; ramulis vix angulatis; phyllodiis obovatis obliquis obtusissimis basi angustatis binerviis subavenuis carnosus; pedunculis solitariis phyllodio brevioribus; calyce truncato. In ins. Dirk Hartog. ♂.

93. *A. Meisneri* Lehm. pl. Preiss. glaberrima glauco-pruinosa; ramulis ancipitibus triquetris; phyllodiis obovato-oblongis subcuneatis oblique submucronato-acutis 1-nerviis penniveniis planis plerumque eglandulosis. In Nov. Holl. ♂.

** *Latifoliae*; capitulis racemosis multifloris v. 4—8-floris.

94. *A. Lindleyi* Meisn. ex Lehm. glaberrima glauca; ramulis subflexuosis acute triquetris lineatis; phyllodiis coriaceis elongato-lanceolatis obtusis basi longe attenuata glanduliferis unnnerviis parallelis pinnato-venosis marginatis; racemis axillaribus; capitulis multifloris; sepalis subliberis. In Nov. Holl. ♂.

95. *A. brachybotrya* Benth. pubescens ramulis subangulatis; phyllodiis oblique obovatis obtusissimis rarius mucronulatis marginulatis eglandulosis 1-nerviis; racemis tomentosis 3—5-cephalis; capitulis multifloris tomentosis. In Nov. Holl. ♂.

96. *A. podalyriaefolia* A. Cunn. tota glauco-pruinosa; raro demum denudata tenuiter pubescens; phyllodiis ovatis obtusis oblique mucronulatis 1—2-glanduliferis; racemis phyllodio 2—3-plo longioribus; capitulis multifloris tomentosis. A. Fraseri Hook. ic. t. 171. In Nov. Holl. ♂.

97. *A. Catayi* A. Cunn. molliter velutino-puberula; ramulis obtuse angulatis; phyllodiis obovato-oblongis obtusis raro submucronatis parum obliquis basi angustatis 1-glandulosis; racemis polycephalis phyllodio multo longioribus. In New South Wales. ♂.

98. *A. vestita* Ker B. R. t. 698. rumulis teretibus hispidulis; phyllodiis falcato-ellipticis oblique aristatis undulatis basi inaequaliter cuneatis 1-nerviis utrinque hispidulis; racemis laxis phyllodio 2—3-plo longioribus;

capit. 10—15-floris. In New South Wales. ♂.

99. *A. cultriformis* Hook. t. 171. glaberrima, junior glauco-pruinosa; ramulis angulatis phyllodiis falcato-oblongis incurvo-oblongis v. triangularibus coriaceis marginatis basi angustatis mucronatis muticisve angulo superiore glandulifero; racemis polycephalis phyllodio multo longioribus. In Nov. Holl. ♂.

100. *A. glaucifolia* Baumann cat. glaberrima glauca inermis; ramis gracilibus subangulatis; phyllodiis triangularibus 1-nerviis penniveniis mucronatis; racemis terminalibus polycephalis; pedunculis brevissimis. In Nov. Holl. ♂.

101. *A. scapuliformis* A. Cunn. glaberrima junior glauco-pruinosa; ramulis angulatis; phyllodiis incurvo-oblongis v. falcato-triangularibus tenuiter coriaceis marginatis basi angustatis mucronulatis muticisve angulo superiore glandulifero; racemis polycephalis phyllodio multo longioribus. In Nov. Holl. ♂.

102. *A. oleafolia* A. Cunn. glaberrima, junior glauco-pruinosa; ramulis angulatis; phyllodiis oblique ovatis ellipticis brevissime mucronatis tenuiter coriaceis marginatis 1-nerviis supra basin angustatis glanduliferis; rachide rigida flexuosa; capitulis 6—8-floris. *A. furfuracea* Don. In New South Wales. ♂.

103. *A. lunata* Sieb. glaberrima; ramulis angulatis; phyllodiis falcato-oblongis brevissime mucronatis tenuiter marginatis minute glanduliferis basi angustatis; racemis phyllodio longioribus; capitulis 4—6-floris. B. R. t. 1352. B. Cab. t. 384. Sweet fl. austr. t. 42. *A. brevifolia* Lindl. B. R. t. 1235. Ad Port Jackson. ♂.

104. *A. celastrifolia* Benth. glaberrima v. glauco-pruinosa; ramulis angulato-triquetris; phyllodiis oblique ovatis obovatisve calloso-mucronatis basi angustatis crasso-coriaceis marginatis infra medium glanduliferis; capitulis brevissime pedunculatis; ovario glabro. Ad Swan River. ♂.

105. *A. myrtifolia* W. glaberrima ramulis angulatis; phyllodiis oblique oblongis falcatisve calloso-mucronatis crassis marginatis nervo incurvo basi angustatis glanduliferis; racemis phyllodio brevioribus; ovario glabro v. pu-

berulo. Sweet fl. austral. t. 49. B. Cab. t. 772. In New South Wales et Van Diemensland. ♂.

106. *A. marginata* R. Br. glaberrima; ramulis angulatis; phyllodiis elongato-lanceolatis incurvo-falcatis utrinque acutis mucronatis crassis marginatis infra medium glanduliferis; ovario villoso. Wendl. diss. t. 5. In Nov. Holl. ♂.

*** *Squamatae*; phyllodiis angustis; capitulis racemosis, racemis junioribus squamis imbricatis obtectis.

107. *A. suareolens* Willd. glaberrima; ramulis triquetris phyllodiis linearibus sublanceolatis obtusis mucronulatis basi longe angustatis crassiulus marginatis 1-nerviis prope basin minute glanduliferis; racemis brevibus; capitulis 6—10-floris; ovario glabro. Labill. nov. Holl. t. 276. B. Cab. t. 730.

108. *A. angustifolia* Wendl. phyllodiis linearibus basi subattenuatis acutis mucronatis 1-nerviis integerimis; capitulis racemosis multifloris; calyce 4-dentato; ovario tomentoso. Mimosa Jacq. h. Schoenbr. t. 391. In Nov. Holl. ♂.

109. *A. subcaerulea* Lindl. B. R. t. 1075. glaberrima; ramulis 3-quertris; phyllodiis oblongo-linearibus sublanceolatis obtusiusculis basi angustatis submarginatis crasso-coriaceis 1-nerviis; racemis phyllodia aequantibus; ovario glabro. In Nov. Holl. ♂.

**** *Falcatae*; phyllodiis elongatis plus minusve recurvo-falcatis uninerviis penniveniis; capitulis racemosis ultra 20-floris.

110. *A. pycnantha* Benth. glaberrima nitida; ramulis teretibus; phyllodiis obtusis v. acutiusculis basi in petiolum longe angustatis coriaceis marginatis glandula majuscula a basi distante; capitulis densissimis ultra 70-floris; ovario hispidulo. In New South Wales. ♂.

111. *A. leiophylla* Benth. glabra nitida; ramulis angulatis; phyllodiis elongato-falcatis obtusiusculis basi in petiolum longe angustatis coriaceis marginatis glandula obscura; racemis

flexuosis; capitulis 20—25-floris; calyce truncato-dentato ciliolato; ovario hispidulo. In Nov. Holl. ♂.

112. *A. falciformis* DC. ramulis subteretibus; phyllodiis glabris longe falcato-oblongis obtusis basi longe angustatis marginatis tenuibus; glandula majuscula a basi remota; racemis polyccephalis tomentosis phyllodio brevioribus; capitulis parvis 20—30-floris; calyce truncato dentato-ciliato corolla hispidula dimidio breviore. *A. adstringens* A. Cunn. In Nov. Holl. ♂.

113. *A. cyanophylla* Lindl. glabra glauco-caesia v. pallida; ramulis vix angulatis; phyllodiis longissime oblongis v. supremis linearibus subfalcatis undulatissive basi longe angustatis tenuiter marginatis obscure glanduliferis; capitulis densis ultra 40-floris; ovario glabro. In Nov. Holl. ♂.

114. *A. saligna* Wendl. phyllodiis linearibus utrinque attenuatis integerimis subnerviis; ramis angulatis glabris; leguminibus inter semina contractis lomentiformibus. Mimosa Labill. t. 235. Ad Port Jackson. ♂.

115. *A. falcata* Willd. glabra; ramulis angulatis; phyllodiis longe falcatis acuminatis basi longe angustatis marginatis tenuibus eglandulosis v. ima basi glanduliferis; racemis polyccephalis; capitulis parvis sub-20-floris; sepals liberis spatulatis; ovario glabro. Wendl. diss. t. 14. B. Cab. t. 1115. Ad Port Jackson. ♂.

116. *A. microbotrya* Benth. glabra glauca; ramulis angulatis; phyllodiis falcato-lanceolatis utrinque longe angustatis acutis tenuiter marginatis prope basin minute glanduliferis; racemis brevibus; capitulis parvis 20-25-floris; calyce membranaceo truncato-dentato ciliolato. Ad Swan River. ♂.

117. *A. myriobotrya* Meisn. glauca? glabra; ramulis subangulatis divaricatis; phyllodiis lineari-lanceolatis utrinque longe attenuatis acutis subfalcatis planis haud marginatis tenuiter uninerviis et penniveniis; racemis patulis polyccephalis; pedunculis patentissimis; sepals spatulatis glabris. In Nov. Holl. ♂.

118. *A. penninerris* Sieb. glabra pallida; ramulis angulatis; phyllodiis oblongis v. oblongo-linearibus acuminatis rectis v. falcatis basi longe angustatis marginatis glandula majuscula

a basi distante; capitulis parvis sub-20-floris; calycibus truncato-dentatis. B. M. t. 2754. A. impressa Cunn. B. R. t. 1115. B. Cab. t. 1319. In New South Wales. ♂.

***** *Crassiusculae*; phyllodiis angustis rectis v. incurvis rarius subfalcatis 1-rarius 2-nerviis penniveniis v. subaveniis; capitulis racemosis multifloris v. rarius 8—10-floris.

119. *A. salicina* Lindl. glabra pallida; ramulis subangulatis; phyllodiis linearibus v. oblongo-lanceolatis obtusis muticis acuminatis basi longe angustatis immarginatis rectis v. parum incurvis subglanduliferis 1-nerviis reticulato-penniveniis; capitulis sub-20-floris; calycibus truncatis. In New South Wales. ♂.

120. *A. hakeoides* A. Cunn. glabra; ramulis subangulatis; phyllodiis linear-i-spathulatis obtusis basi longe angustatis crassiusculis vix immarginatis versus medium glanduliferis reticulato-venosis; capitulis sub-20-floris; sepalis liberis spathulatis. In New South Wales. ♂.

121. *A. gladiiformis* Cunn. glaberrima; ramulis angulatis; phyllodiis longe linear-i-lanceolatis incurvis obtusis mucronulatis basi longe angustatis crassis marginatis nitidis 1-nerviis, glandulis 2—5; racemis phyllodio brevioribus; capitulis multifloris dense imbricatis; sepalis spathulatis ciliatis. In Nov. Holl. ♂.

122. *A. obtusata* Sieb. glaberrima; ramulis angulatis; phyllodiis oblongo-linearibus spathulatis obtusis basi longe angustatis crassis rigidis marginatis 1-nerviis venis inconspicuis; capitulis dense multifloris; calycibus corollisque crassiusculis. In Nov. Holl. ♂.

123. *A. bivenosa* DC. glabra; phyllodiis oblongis obtusis basi subangustatis glaucis sublaevibus basi tenuissime binerviis; capitulis longe pedunculatis; floribus 5-fidis. In Nov. Holl. ♂.

124. *A. xanthina* Benth. glaberrima glauco-caesia, apice aurea; phyllodiis oblongo-lanceolatis mucrone calloso, vel glandula oblique subuncinatis basi angustatis marginatis bi-

nerviis reticulato-penniveniis; calyce sinuato-dentato. In Nov. Holl. ♂.

125. *A. rubida* Cunn. glaberrima; ramulis angulatis; phyllodiis elongato-lanceolatis acutis, calloso-mucronatis basi angustatis uninerviis marginatis glandula basilari; capitulis 10—20-floris ovarioque glabris. A. amoena Sieb. In Nov. Holl. ♂.

126. *A. amoena* Wendl. diss. t. 4. glabra ramulis angulatis; phyllodiis oblique lanceolatis uncinatis basi longe angustatis marginatis 2—3-glanduliferis nitidis 1-nerviis; capitulis 12-floris glabris. In Nov. Holl. ♂.

127. *A. rostellifera* Benth. glaberrima glaucescens; ramulis angulatis; phyllodiis linear-i-lanceolatis recurvo-mucronatis 1-nerviis crassiusculis glandula obscura distante; capitulis 20-floris; calyce truncato tenui nudo. In Nov. Holl. ♂.

128. *A. crassiuscula* Wendl. diss. t. 8. glaberrima; ramulis angulatis phyllodiis linearibus brevissime mucronatis basi longe angustatis 1-nerviis, glandula basilari; racemis phyllodio brevioribus; calyce truncato-dentato ciliato. In Nov. Holl. ♂.

129. *A. ramosissima* Benth. glabra; ramulis angulatis; phyllodiis anguste linearibus obtusis basi longe angustatis 1-nerviis eglandulosis; vel glandula a basi distante; capitulis multifloris; sepalis angustissimis; apice sphacelatis. In Nov. Holl. ♂.

130. *A. nerifolia* Cunn. ramulis angulatis phyllodiisque junioribus tomento farinoso albidis; phyllodiis elongatis subfalcatis calloso-mucronatis 1—3-glandulosis; racemis tomentosis; capitulis parvis multifloris; sepalis distinctis spathulatis. In Nov. Holl. ♂.

181. *A. subulata* Bonpl. malm. t. 45. glabra; ramulis subangulatis; phyllodiis longe et anguste linearibus mucronulatis 1-nerviis glandula obscura; capitulis parvis 12—20-floris; calyce membranaceo sinuato-dentato. In Nov. Holl. ♂.

132. *A. tinifolia* Willd. glabra; ramulis angulatis subtriquetris; phyllodiis breviter et anguste linearibus subulatis obtusis acutis nitidis glanduliferis; capitulis 8—12-floris; ovario glabro. Vent. cels. t. 2. Bonpl. l. c. t. 16. B. M. t. 2168. B. Cab. t. 383. In Nov. Holl. ♂.

133. *A. prominens* Cunn. in B. M. t. 3502. ramulis angulato-triquetris phyllodiisque margine tenuissime puberulis; phyllodiis linear-lanceolatis acutis tenuibus nitidis glanduliferis; capitulis 8—12-floris; ovario glabro. In Nov. Holl. ♂.

134. *A. decora* Rchb. fl. exot. t. 199. ramulis angulatis phyllodiisque glabris junioribus glauco-pruinosis; phyllodiis lanceolatis mucronatis tenuiter marginatis 1-glandulosis; capitulis 20-floris pedunculisque tomentellis. In Nov. Holl. ♂.

135. *A. buxifolia* Cunn. Hook. ic. t. 164. glaberrima; ramulis angulatis; phyllodiis brevibus oblongo-lanceolatis subfalcatis acutis obscure glanduliferis; racemis phyllodia vix excedentibus; capitulis glaberrimis 8—12-floris. In Nov. Holl. ♂.

***** Angustifoliae; inflorescentia simplici.

136. *A. triquetra* Benth. glabra ramulis angulato-triquetris; phyllodiis brevibus linearibus obtusis basi angustatis mucronulatis nervo subcentrali; capitulis parvis 12—20-floris; calyce corolla duplo breviore. In Nov. Holl. ♂.

137. *A. flexifolia* Benth. ramulis subteretibus; tomento brevissimo in-canis; phyllodiis glabris pallidis linearibus obtusis, supra basin glanduliferis et geniculatis; pedunculis brevissimis albo-tomentosis; capitulis 6—8-floris. In Nov. Holl. ♂.

138. *A. dasypylla* Cunn. ramulis teretibus phyllodiisque pubescentibus viscidis; phyllodiis anguste linearibus oblique acutis minute glanduliferis; capitulis 10—15-floris; calyce corolla dimidio breviore. In Nov. Holl. ♂.

139. *A. lineata* Cunn. in B. M. t. 3346. ramulis subteretibus puberullosive; phyllodiis subresinosis glabris apice uncinato-acutis marginatis; capitulis parvis 10—15-floris; calyce corolla dimidio breviore. In Nov. Holl. ♂.

140. *A. acinacea* Lindl. glabra subresinosa; ramulis subangulatis; phyllodiis oblique oblongis subfalcatis obtusis apice minute glanduliferis; pedunculis gracilibus phyllodio sub-longioribus; capitulis parvis 12—20-floris. In Nov. Holl. ♂.

141. *A. erinacea* Benth. glabra; ramulis striatis spinescentibus; phyllodiis parvis oblique obovato-oblongis obtusis v. mucronulatis crassiusculis rigidis 1-nerviis; pedunc. brevibus; capitulis 12—20-floris. In Nov. Holl. ♂.

142. *N. densifolia* Benth. ramulis substriatis phyllodiisque pubescenti-subresinosis; phyllodiis linearibus obtusis brevissime mucronulatis marginatis; pedunculis crassis villosis capitulo multifloro brevioribus. *A. stri-gosa* Lindl. In Nov. Holl. ♂.

143. *A. aspera* Benth. ramulis angulato-striatis phyllodiisque puberulis et punctis resinosis asperulis; phyllodiis oblongo-linearibus obtusiusculis marginatis subfalcatis; pedunculis crassis pubescentibus; bracteolis acuminatis corollam aequantibus. In Nov. Holl. ♂.

144. *A. montana* Benth. viscosissima; phyllodiis oblongis obtusissimis vix calloso-mucronatis glabris binerviis; pedunculis brevibus; bracteis baseos brevissimis fuscis; capitulis parvis multifloris. In Nov. Holl. ♂.

145. *A. exsudans* Lindl. viscosa; ramulis angulato-striatis; phyllodiis oblongo-lanceolatis utrinque angustatis calloso-mucronatis binerviis; pedunculis cano-villosis; bracteolis corollam aequantibus. In Nov. Holl. ♂.

146. *A. verniciflora* Benth. glabra viscosissima; ramulis angulatis, phyllodiis linear-oblängis utrinque angustatis acutis calloso-mucronatis subfalcatis margine glanduliferis; capitulis multifloris. *A. graveolens* B. Cab. t. 1460. B. M. t. 3279. In Nov. Holl. ♂.

147. *A. leprosa* Sieb. ramis angulatis apice tomentellis; phyllodiis anguste linear-lanceolatis calloso-mucronatis glabris viscosa-punctatis margine glanduliferis; pedunculis cano-tomentellis capitulum multiflorum aequantibus. B. R. t. 1441. In Nov. Holl. ♂.

148. *A. dodoneaeifolia* Willd. glabra; resinoso-viscosissima; ramulis angulatis; phyllodiis longe et latiuscule linearibus apice obtusis mucronatis basi longe angustatis margine superiore remote 2—3-glanduliferis; pedunc. tenuibus. Rchb. ic. pl. cul. I. t. 91. In Nov. Holl. ♂.

149. *A. stricta* Willd. glabra resinosa; ramulis angulatis; phyllodiis longe et latiuscule linearibus obtusis

mucronulatis rare glanduliferis basi longe angustatis creberrime et tenuiter penniveniis. B. Rep. t. 53. B. M. t. 1121. B. Cab. t. 99. In Van Diemensland. ♂.

150. *A. ligulata* A. Cunn. glabra v. viscosa; ramulis angulatis; phylloidiis oblongo-linearibus obtusis recurvo-mucronulatis basi angustatis margine glanduliferis venis obscuris; legumine crasso compresso sublignoso. In Dirk Hartogs Island. ♂.

151. *A. erythrocephala* Cunn. ramulis strictis phylloidiisque pubescenti-hirtis resinosis; phylloidiis anguste linearibus apice oblique mucronato-acutis; pedunc. phylloidio multo brevioribus. In Nov. Holl. ♂.

152. *A. dentifera* Benth. in Hensl. Bot. 4. t. 179. glabra; ramulis angulato-striatis; stipulis minutis dentiformibus; phylloidiis longe et anguste linearibus acutis mucronatis; pedunculis tenuibus phylloidio brevioribus; racemis demum foliatis. In Nov. Holl. ♂.

i. *Brachybotryae* Benth. Stipulae subnullae; phyllodia plurinervia; inflorescentia capitata.

153. *A. elongata* Sieb. ramulis angulatis pedunculisque puberulis demum glabratibus; phylloidiis elongato-linearibus crassis rigidis muticis trinerviis striatis; pedunculis subgeminis racemosis; bracteolis spathulatis corolla brevioribus. B. M. 3337. In Nov. Holl. ♂.

154. *A. viscidula* Benth. viscoso-puberula; ramulis angulatis; phylloidiis anguste linearibus breve recurvo-mucronatis subincurvis coriaceis multinerviis; pedunc. subgeminis pubescensibus capitulo viscoso-pubescente brevioribus. In Nov. Holl. ♂.

155. *A. ixophylla* Benth. ramosissima glabriuscula viscosa; phylloidiis anguste oblongo-lanceolatis subfalcatis obtusis; pedunculis puberulis brevissime racemosis; capitulis 20-floris. In Nov. Holl. ♂.

156. *A. translucens* A. Cunn. in Hook. ic. t. 160. glabriuscula pallida; ramulis angulatis; phylloidiis obliqua obovatis incurvis undulatis basi angustatis apice recurvo-translucente

glandulosis; calyce brevissime dentato. In Nov. Holl. ♂.

157. *A. sclerophylla* Lindl. ramosissima glabra; ramulis subteretibus; phylloidiis oblongo-linearibus obtusis mucronulatis basi angustatis subfalcatis crasso-coriaceis striato-multinerviis; capitulis geminis glabris. In Nov. Holl. ♂.

158. *A. farinosa* Lindl. glauco-pruinosa demum glabra; ramis teretibus; phylloidiis linearis - cuneatis incurvis obtusis oblique mucronulatis basi angustatis crasso-coriaceis striato-multinerviis; capitulis 12-20-floris tomento brevissimo albis. In Nov. Holl. ♂.

159. *A. multinervia* DC. humilis ramosissima glabra; ramulis teretibus; phylloidiis linearis-lanceolatis falcato-divaricatis recurvo-mucronulatis glandula impressa a basi distante; capitulis brevissime pedunculatis. In Nov. Holl. ♂.

160. *A. eglandulosa* DC. phylloidiis linearis-lanceolatis basi angustatis utrinque integerimis eglandulosis basi submultinerviis; capitulis solitariis; pedunculis capitulo sublongioribus. In Nov. Holl. ♂.

161. *A. omalophylla* A. Cunn. glabra pallescens ramulis angulatis; phylloidiis oblongo-linearibus falcatis obtusis mucronulatis crasso-coriaceis rigidis obscurae multinerviis; pedunculis racemosis puberulis; capitulis dense multifloris. In Nov. Holl. ♂.

162. *A. pendula* A. Cunn. tomento brevissimo cinerascens; ramulis angulatis; phylloidiis linearis-lanceolatis falcatis acuminatis mucronatis basi longe angustatis crasso-coriaceis rigidis plurinerviis; capitulis parvis 12-20-floris. In Nov. Holl. ♂.

163. *A. coriacea* DC. pube tenuissima adpressa cinerascens; ramulis teretibus; phylloidiis elongato-linearibus subarcuatis obtusiusculis basi longe angustatis crasso-coriaceis multinerviis; legumine moniliformi striato. In Nov. Holl. ♂.

164. *A. stenophylla* Cunn. glabra; ramulis angulatis; phylloidiis longissimis linearibus acuminatis basi longe angustatis coriaceis multinerviis; pedunculis racemosis; capitulis puberulis. In Nov. Holl. ♂.

165. *A. venulosa* Benth. subviscosa; ramulis angulatis molliter villo-

sis; phyllodiis puberulis falcato-oblongis mucronulatis coriaceis multinerviis obscure glandulosis; pedunculis pubescentibus; capitulis multifloris glabrinsculis. *In Nov. Holl.* ♂.

166. *A. cyclopis* A. Cunn. glabra; ramulis angulatis; phyllodiis anguste oblongis rectiusculis, apice obtuso subincurvo basi angustatis coriaceis rigidis multinerviis obscure venulosis; pedunculis racemosis; legumine lato-lineari plano arcuato glabro. *In Nov. Holl.* ♂.

167. *A. melanoxyton* R. Br. glabra ramulis angulatis; phyllodiis falcata-oblongis obtusis v. acutis basi longe angustatis coriaceis rigidis multinerviis venulosis; racemis 2—4-cephalis; capitulis dense multifloris. Wendl. diss. t. 6. B. M. t. 159. B. Cab. t. 630. *In Nov. Holl.* ♂.

168. *A. brevipes* Cunn. in B. M. t. 4358. glabra; ramulis subteretibus; phyllodiis elongato-falcatis mucronatis basi longe angustatis subcoriaceis tenuiter multinerviis venulis raro anastomosantibus; calyce sinuato-dentato corollam dimidium aequante. *In Nov. Holl.* ♂.

169. *A. implexa* Benth. glabra subglaucia; ramulis subteretibus; phyllodiis elongato-falcatis obtusiusculis basi longe angustatis coriaceis multinerviis; capitulis racemosis multifloris; legumine anguste lineari contorto glauco-pruinoso. *In Nov. Holl.* ♂.

170. *A. Simsii* Cunn. glabra; ramulis vix angulatis; phyllodiis linearibus subfalcatis obtusis mucronatis basi longe angustatis tenuibus trinerviis reticulato-venosis; pedunculis racemosis; capitulis multifloris; legumine lato-lineari. *In Nov. Holl.* ♂.

171. *A. laurifolia* Willd. glabra ramulis subteretibus; phyllodiis ovatis v. obovato-oblongis membranaceo-coriaceis multinerviis; capitulis racemosis parvis multifloris; sepalis distinctis; legumine lato-lineari margine alaeiformi. *In Nov. Holl.* ♂.

172. *A. complanata* A. Cunn. glabra; ramulis anciptibus subalatis; phyllodiis ab alis distinctis ovali-oblongis obtusis coriaceis multinerviis; pedunculus solitarius; capitulis multifloris. *A. anceps* Cunn. Hook. ic. t. 167. *In Nov. Holl.* ♂.

173. *A. heteroclita* Meisn. glabra; ramulis angulatis; phyllodiis anguste

linearibus rectiusculis utrinque attenuatis mucrone pungente sulcato-trinerviis glandula supra basin minuta v. nulla; sepalis liberis anguste spatulatis apice sphacelatis. *In Nov. Holl.* ♂.

k. *Juliflorae* Benth. Stipulae subnullae. Phyllodia plurinervia v. uninervia subulata non pungentia. Inflorescentia spicata.

* Subulatae: phyllodiis angustissimis; spicis densis amentiformibus.

174. *A. filifolia* Benth. glabra; ramulis teretibus; phyllodiis longe siliiformibus rigidis teretibus tenuissime striatis mucronatis; spicis ovoides densis solitariis sessilibus. *In Nov. Holl.* ♂.

175. *A. ephedroides* Benth. glabra; ramulis teretibus; phyllodiis elongato-subulatis compresso-teretibus uncinate tenuissima striatis; spicis cylindricis sessilibus. *In Nov. Holl.* ♂.

176. *A. xylocarpa* A. Cunn. glabra subviscosa; ramulis teretibus; phyllodiis linearibus subulatis muticis 1-nerviis; spicis solitariis pedunculatis; legumine lineari crasso compresso lignoso intus septato. *In Nov. Holl.* ♂.

177. *A. arida* Benth. glabra pallida subviscosa; phyllodiis anguste linearibus obtusis planis crassis subtrinerviis; spicis breve pedunculatis densis; legumine lineari crasso compresso basi longe angustato. *In Nov. Holl.* ♂.

178. *A. oncinophylla* Benth. glabra v. resinosa-puberula; ramulis angulatis; phyllodiis elongato-linearibus subulatis rigidis crassiusculis striato-trinerviis glandula prope basin obscura; spicis geminis cylindricis densis; sepalis spatulatis. *In Nov. Holl.* ♂.

** Rectae; phyllodiis rectis; spicis laxis saepissime dissipatis. Ovarium villosum.

179. *A. tinarioides* Benth. glabra v. viscosa; ramulis teretibus dense foliosis; phyllodiis linearibus mucronatis angustatis 1-nerviis; spicis tenuibus multifloris; sepalis anguste spa-

thulatis liberis; legumine anguste linearl continuo. In Nov. Holl. ♂.

180. *A. linearis* Sims. B. M. t. 2156. glabra v. puberula; ramulis angulatis; phyllodiis longe et anguste linearibus 1—3-nerviis basi longe angustatis eglandulosis; spicis gracilibus interruptis phyllodio multo breviribus glabris; calyce 4-dentato. *A. longissima* Wendl. t. 11. B. R. t. 680. In Nov. Holl. ♂.

181. *A. floribunda* Willd. glabra; ramulis angulatis; phyllodiis longe linearibus lanceolatisque utrinque angustatis acutis plurinerviis; racemis gracilibus interruptis; calyce brevidentato. Vent. choix t. 13. *A. angustifolia* B. Cab. 775. In Nov. Holl. ♂.

182. *A. dissitiflora* Benth. glabriuscula; ramulis angulatis; phyllodiis longe linear-lanceolatis mucronatis subcoriaceis 3—5-nerviis reticulatis; racemis gracilibus interruptis; legumine anguste linear. In Van Diemensland. ♂.

183. *A. mucronata* Willd. glabriuscula; ramulis vix angulatis; phyllodiis anguste linear-spathulatis obtusis coriaceis 3-nerviis; spicis interruptis; calyce brevi dentato; legumine anguste linear subtereti. Wendl. diss. t. 12. B. M. t. 2747. In Van Diemensland. ♂.

184. *A. dependens* Cunn. subpubescens; ramulis vix angulatis; phyllodiis anguste oblongis obtusis submucronatis basi angustatis coriaceis multinerviis; spicis interruptis; calyce brevi dentato; legumine anguste linear subtereti. In Van Diemensland. ♂.

185. *A. Sophora* R. Br. glabra; puberula; ramulis angulatis; phyllodiis obovato-oblongis obtusis callosomucronatis coriaceis 3—5-nerviis reticulato-venosis; spicis interruptis; calyce brevi dentato; legumine anguste linear subtereti arcuato. Labill. t. 237. In Van Diemensland. ♂.

186. *A. longifolia* Willd. ramulis angulatis; phyllodiis lanceolatis v. elongato-oblongis mucronulatis basi longe angustatis coriaceis 2—3-nerviis venosis; spicis interruptis; calyce brevissimo dentato; legumine longe linear. Vent. malm. t. 62. B. R. t. 362. B. M. t. 2166. *A. intertexta* DC. In Nov. Holl. ♂.

*** *Falcatae: legumine coriaceo; phyllodiis plus minus foliatis venis crebris parallelis.*

187. *A. doratoxylon* Cunn. glabra subcinerascens; ramulis teretibus; phyllodiis longe linearibus subfalcatis apice recurvis breve acuminatis striato-multinerviis; spicis cylindricis; calyce subdentato pubescente. In Nov. Holl. ♂.

188. *A. acuminata* Benth. flavescenti-pubescentis demum glabra; phyllodiis longe linearibus subfalcatis acuminatis recurvis; spicis subsessilibus cylindricis; sepalis anguste spatulatis profunde liberis pubescentibus. In Nov. Holl. ♂.

189. *A. julifera* Benth. glabra; ramulis subteretibus; phyllodiis anguste falcato-lanceolatis linearibus utrinque longe angustatis marginatis; spicis breve pedunculatis cylindricis densis; sepalis anguste spatulatis lanatis. In Nov. Holl. ♂.

190. *A. delibrata* Cunn. glabra viscidula; ramulis angulatis; phyllodiis anguste falcato-lanceolatis utrinque angustatis immarginatis; spicis breve pedunculatis; legumine linearis plano coriaceo glabro intus continuo. In Nov. Holl. ♂.

191. *A. Leucadendron* A. Cunn. sericeo-incana; phyllodiis falcato-lanceolatis utrinque angustatis crassiusculis coriaceis striato-multinerviis; spicis cylindricis dense imbricatis; calyce tenuissime membranaceo sinuato-dentato. In Nov. Holl. ♂.

192. *A. glaucescens* Willd. puberula cinerascens; ramulis angulato-triquetris; phyllodiis falcato-oblongis utrinque angustatis coriaceis striato-multinerviis; spicis pedunculatis elongato-cylindricis; calyce lanato dentato. B. M. t. 3714. In Nov. Holl. ♂.

193. *A. Cunninghamii* Hook. ic. t. 165. glabra; ramulis angulato-triquetris; phyllodiis amplis falcato-oblongis utrinque angustatis coriaceis striato-multinerviis; spicis elongato-cylindricis; calyce sinuato-dentato. In Nov. Holl. ♂.

194. *A. homomalla* Wendl. diss. t. 13. phyllodiis linear-lanceolatis utrinque attenuatis falcatis homomallis trinerviis basi pubescentibus; spicis geminis in pedunculo axillari solitario; calyce 5-dentato. In Nov. Holl. ♂.

195. *A. plectocarpa* Cunn. glabra subglaucescens; ramulis angulatis subtriquetris; phyllodiis falcato-lanceolatis utrinque longe angustatis tenuiter striato-multinerviis; spicis elongato-cylindricis; calyce sinuato-dentato; leguminis valvulis bullato-flexuosus. *In Nov. Holl.* ♂.

196. *A. leptocarpa* Cunn. glabra; ramulis subteretibus; phyllodiis falcato-lanceolatis utrinque longe angustatis; spicis elongato-cylindricis glabris; calyce sinuato-dentato; legumine anguste linearis subtorulosos. *In Nov. Holl.* ♂.

197. *A. polystachya* Cunn. glabra ramulis subangulatis; phyllodiis longe falcato-oblongis lanceolatis obtuse acuminate basi longe angulatis multinerviis; spicis elongato-cylindricis interruptis glabris; calyce sinuato-dentato. *In Nov. Holl.* ♂.

**** **Falcatae:** *Phyllodia praecedentium*. Legumen latum coriaceum subspiraliter contorto-flexuosum.

198. *A. spirorbis* Labill. cal. t. 69. glabra glaucescens; ramulis vix angulatis; phyllodiis anguste falcato-oblongis obtusis utrinque longe angustatis coriaceis; spicis elongato-cylindricis glabris; calyce sinuato-dentato; legumine compresso glauco. *In Nov. Caledon.* ♂.

199. *A. auriculaeformis* Cunn. glabra cinerascens; ramulis vix angulatis; phyllodiis late falcato-oblongis utrinque acutis subulatis coriaceis; spicis cylindricis gracilibus; calyce 4-5-dentato; legumine lato sinuato undulato. *In Nov. Holl.* ♂.

***** **Falcatae:** legumine lignoso septato, crasso; spicis dense imbricatis.

200. *A. Wickhami* Benth. glabra glauco-caesia; ramulis angulatis; phyllodiis breve ovali-oblongis subfalcatis undulatis apice obliquis saepe glanduliferis coriaceis; spicis parvis cylindricis; calyce dentato corollae dimidium aquante. *In Nov. Holl.* ♂.

201. *A. stigmatophylla* Cunn. glabra v. cano-puberula; ramulis angulatis subcompressis; phyllodiis oblique et anguste oblongis subfalcatis

apice glanduliferis; spicis parvis cylindricis; floribus minimis ante anthesin imbricatis; calyce dentato. *In Nov. Holl.* ♂.

202. *A. toxocarpa* Benth. glabra glaucescens; ramulis subangulatis; phyllodiis falcato-lanceolatis obtusis basi longe angustatis striato-multinerviis; spicis gracilibus cylindricis; floribus minimis imbricatis; legumine lineari-cuneato intus oblique septato. *In Nov. Holl.* ♂.

203. *A. oncinocarpa* Benth. glabra; ramulis teretibus; phyllodiis falcato-oblongis striato-multinerviis; spicis elongatis demum interruptis; legumine lato-lineari apice uncinato crasso plano. *In ins. Melville.* ♂.

204. *A. umbellata* Cunn. canopuberula; ramulis subangulatis; phyllodiis lato-oblongis subfalcatis obtusis undulatis basi angustatis coriaceis multinerviis; spicis sessilibus cylindricis densis; calyce hispido 4-5-fido. *In Cap Flinders.* ♂.

205. *A. autacocarpa* Cunn. canopuberula; ramulis angulatis subtriquetris; phyllodiis falcato-oblongis utrinque angustatis petiolatis multinerviis; spicis pedunculatis cylindricis densis; calyce sinuato-dentato; legumine apice uncinato. *In Nov. Holl.* ♂.

206. *A. calyculata* Cunn. glabra subcinerascens; ramulis compressis; phyllodiis falcato-oblongis obtusiusculis basi angustatis petiolatis multinerviis; spicis pedunculatis cylindricis; calyce dentato villoso. *In Fitzroy Island.* ♂.

207. *A. crassicarpa* Cunn. glabra v. tenuissime cinerascens; ramulis compressis; phyllodiis late falcato-oblongis utrinque angustatis coriaceis tenuiter multinerviis; spicis cylindricis densis; calyce hispido 4-5-fido; legumine oblongo. *In ins. Lizard.* ♂.

208. *A. retinervis* Benth. glabra; ramulis subteretibus; phyllodiis longe falcato-oblongis utrinque longe angustatis petiolatis 3-7-nerviis venis crebris parallelis; calyce hispido 4-5-fido; legumine linearis-falcata. *In ins. Locrosse.* ♂.

209. *A. rotundifolia* Hook. B. M. t. 4041. ramulis angulatis puberulis; stipulis minutissimis squamaeformibus acutis; phyllodiis petiolatis oblique rotundatis mucronatis penninerviis; capitulis racemosis. *In Nov. Holl.* ♂.

210. *A. leucophylla* Lindl. gracilis; ramulis filiformibus angulatis albo-sericeis; phyllodiis linear-lanceolatis falcatis apice uncinatis 2-nerviis densissime sericeis; racemis umbellatis. *In Nov. Holl.* ♂.

211. *A. Erythropus* Ten. inermis stipulis setaceis spinescentibus minimis deciduis; phyllodiis sparsis approximatis linear-subulatis pungentibus punctatis; ramulis puberulis; floribus spicatis; cor. 4-petalis. *In Nov. Holl.*? ♂.

212. *A. microneura* Meisn. ramulis subangulatis phyllodiisque junioribus cinereo-puberulis; phyllodiis anguste linearibus subflexuosis subulato-acuminatis recurvis eglandulosis nervoso-lineatis; spicis ovatis sessilibus. *In Nov. Holl.* ♂.

I. *Dimidiatae* Benth. Stipulae subnullae. Phyllodia obliqua v. falcata dimidiata 2—4-nervia transverse venosa.

* *Inflorescentia capitata.*

213. *A. latescens* Benth. glabra; ramulis angulatis; phyllodiis elongato-falcatis obtusis basi longe angustatis 1—2-glanduliferis; racemis abbreviatis; capitulis multifloris longe pedunculatis. *In Nov. Holl.* ♂.

214. *A. binervata* DC. glabra; ramulis angulatis mox teretibus; phyllodiis falcato-oblongis utrinque longe angustatis 2—3-nerviis glandula majuscula a basi distante; racemis laxis; capitulis 20-floris. *A. umbrosa* B. M. t. 3338. *In Nov. Holl.* ♂.

215. *A. sericata* Cunn. tenuissime puberula; ramulis teretibus; phyllodiis falcato-lanceolatis acuminatis obtusis basi dimidiato-cuneatis 2—4-nerviis legumine oblongo-lineari sublignoso intus septato. *In Nov. Holl.* ♂.

216. *A. flavescentia* Cunn. ramulis angulatis phyllodiisque junioribus lana floccosa flavicantibus; phyllodiis petiolari late falcatis longe acuminatis 3-nerviis reticulato-venosis glandula petiolari majuscula; panicula flavotomentosa. *In Nov. Holl.* ♂.

217. *A. Mangium* Willd. ramulis triquetris; phyllodiis ovatis acutis 3—5-nerviis venosis; legumine falcata. *In Amboyna.* ♂.

** *Inflorescentia spicata.*

218. *A. holosericea* Cunn. canosericio-puberula; ramulis angulatos triquetris; phyllodiis amplis oblique ovato-oblongis basi dimidiato-cuneatis reticulato-venosis; spicis solitariis cylindricis; floribus villosis. *A. neu-rocarpa* Hook. ic. t. 108. *In Nov. Holl.* ♂.

219. *A. dimidiata* Benth. glabrescens; ramulis angulatis; phyllodiis late et oblique ovato-rhombeis tenuissime reticulatis; spicis sessilibus subgeminis cylindricis ultimis paniculatis; floribus glabriusculis. *In Nov. Holl.* ♂.

220. *A. humifusa* Cunn. molliter pubescens; ramulis subteretibus; phyllodiis late et oblique rhombeis dimidiato-truncatis coriaceis nervis 4—5-venis crebris reticulatis validis; spicis sessilibus cylindricis; floribus villosis; legumine pubescente. *In Nov. Holl.* ♂.

221. *A. latifolia* Benth. glaber-ima glauca; ramulis angulato-tri-quetris; phyllodiis oblique ovato-rhombeis basi dimidiato-cuneatis 3—5-nerviis; spicis cylindricis interruptis glabris; calyce minimo. *In Nov. Holl.* ♂.

B. Folia bipinnata.

a. *Botrycephala* Benth. Inermes. *Folia bipinnata.* Capitula rameosa. Pedunculi solitarii.

222. *A. elata* Cunn. aureo-pubesces; fol. amplis; pinnis 2—4-jugis glandula petiolari verrucaeformi; foliolis 8—12-jugis lanceolatis acuminatis sericeis; panicula ampla subaphylla. *In Nov. Holl.* ♂.

223. *A. schinoides* Benth. glabra glauca; caule tereti; pinnis 2—4-jugis glandulis verrucaeformibus; foliolis 15—20-jugis elongato-linearibus subfalcatis obtusis 2—3-nerviis; floribus paniculatis glabris. *In Nov. Holl.* ♂.

224. *A. pruinosa* Cunn. glabra glauca; ramulis teretibus; pinnis 2—3-jugis glandulis verrucaeformibus ad omnia paria pinnarum; foliolis 12—23-jugis oblongis subfalcatis 1—3-nerviis; racemis polycephalis; floribus glabris. *In Nov. Holl.* ♂.

225. *A. spectabilis* Cunn. glaucescens glabra v. hirtella; pinnis 2—5-jugis glandula petiolari depressa obsecura; foliolis 4—8-jugis obovato-oblongis obtusissimis crassiusculis 2—3-

nerviis; floribus paniculatis glabris.
In Nov. Holl. Ȑ.

226. *A. polybotrya* Benth. ramulis teretibus foliisque pubescenti-hirtis; pinnis 2—3-jugis; glandula nulla vel glandulis jugalibus minutis; foliolis 6—8-jugis anguste oblongis obtusis glaucis hirtellis. *In Nov. Holl.* Ȑ.

227. *A. discolor* Willd. ramulis sub-4-gonis petiolisque pubescentibus; pinnis 3—6-jugis; glandula petiolari scutellaeformi; foliolis 10—15-jugis oblongis obtusis glabris subtus pallidis pedunculis pubescentibus; floribus glabris. B. Rep. t. 275. B. M. t. 1750. B. Cab. t. 60. *In Nov. Holl.* Ȑ.

228. *A. maritima* Benth. glaberrima; ramulis angulatis; pinnis 2—3-jugis; glandula petiolari magna scutellaeformi; foliolis 10—15-jugis oblongo-lanceolatis mucronulatis 1-nerviis; racemis axillaribus; floribus glabris; legumine falcata. *In Van Diemenland.* Ȑ.

229. *A. decurrens* Willd. glabra v. puberula; ramulis angulatis alatis; pinnis 5—12-jugis; glandulis verrucaeformibus; foliolis 30—40-jugis confertis linearibus obtusis pubescentibus; floribus racemoso-paniculatis glabris. Vent. malm. t. 61. *In Nov. Holl.* Ȑ.

230. *A. mollissima* Willd. ramulis angulatis petiolisque velutino-pubescentibus; pinnis 8—18-jugis; glandulis verrucaeformibus; foliolis 30—40-jugis confertis linearibus obtusis pubescentibus; floribus paniculatis glabris. *A. decurrens* Lindl. B. R. t. 371. *In Nov. Holl.* Ȑ.

231. *A. dealbata* Lk. ramis obscure angulatis petiolisque cano-puberulis; pinnis 10—12-jugis; glandulis verrucaeformibus; foliolis 30—40-jugis confertis parvis linearibus obtusis cano-puberulis; capitulis paniculatis glabris. B. Cab. t. 1928. *In Van Diemenland.* Ȑ.

232. *A. cardiophylla* Cunn. pubescens; ramulis teretibus v. obscure angulatis; pinnis 12—15-jugis brevibus; glandulis minutis raris; foliolis 6—12-jugis minuiniis ovatis subcordatis hispidis; racemis axillaribus; floribus puberulis. *In Nov. Holl.* Ȑ.

233. *A. leptoclada* Cunn. glaberrima glauca; pinnis 3—5-jugis confertis; glandulis scutellaeformibus plurimis; foliolis 6—10-jugis parvis ob-

longis; racemis axillaribus folio longioribus; capitulis parvis setoso-hispidis. *In Nov. Holl.* Ȑ.

236. *A. pubescens* R. Br. hirsuta; pinnis 3—10-jugis; glandulis minimis raris; foliolis 6—18-jugis linearibus glabris; racemis polycephalis gracilibus glabris. Vent. malm. t. 21. B. M. 1263. Rehb. ic. pl. cult. 1. t. 78. *In Nov. Holl.* Ȑ.

b. *Putchettiae* Benth. *Inermes* v. spinae axillares. Folia bipinnata. Capitula v. spicae axillares; pedunculis in axilla saepe pluribus.

237. *A. pentadenia* Lindl. B. R. t. 1521. *inermis* glabra; ramulis angulatis; pinnis 3—5-jugis distantibus; glandulis scutellaeformibus; foliolis 20—30-jugis oblique ovatis oblongis obtusis; pedunculis brevissime racemosis; capitulis globosis; calyce ciliato. *In Nov. Holl.* Ȑ.

238. *A. nigricans* R. Br. glabra; ramulis angulatis; pinnis 1—2-jugis; petiolo subdilatato glandulifero; foliolis 5—7-jugis in pinna superiore 1—3-jugis obovato-vel linearo-oblongis; pedunculis fasciculatis; capitulis globosis; calyce ciliato. Labill. n. holl. t. 237. B. M. t. 2188. *In Nov. Holl.* Ȑ.

239. *A. obscura* DC. mem. Gen. 4. t. 3. *inermis* pubescenti-hispida; ramulis subangulatis; pinnis 1—2-jugis; petiolo subdilatato glandulifero; foliolis 5—10-jugis ovali-oblongis; pedunculis fasciculatis; capitulis paucifloris; calyce puberulo. *In Nov. Holl.* Ȑ.

240. *A. Mitchellii* Benth. *inermis*; ramulis angulatis petiolisque pubescentibus; pinnis 2—3-jugis glanduliferis; foliolis 3—6-jugis planis glabris nudis; capitulis globosis; legumine stipitato linearis plano valvulis coriacis. *In Nov. Holl.* Ȑ.

241. *A. strigosa* Lk. *inermis*; ramis petiolisque piloso-pubescentibus; pinnis parvis subbijugis; foliolis 1—4-jugis oblongis obtusis margine subrevoluto ciliatis; pedunculis gracilibus glabris; capitulis glaberrimis parvis. *In Nov. Holl.* Ȑ.

242. *A. fagonioides* Benth. glabra v. puberula; spinis axillaribus in ramulos spinescentes abeuntibus; pinnis

1-jugis; foliolis 1—2-jugis late obovatis retusis glaucis; capitulis globosis glabris. *In Nov. Holl.* ♂.

243. *A. pulchella* R. Br. glabra v. hispido-pilosa; spinis axillaribus subulatis; pinnis 1-jugis parvis, petiolo brevi submutico; glandula longe stipitata; foliolis 4—7-jugis obovato-oblongis glabris nudis; capitulis globosis glabris. *In Nov. Holl.* ♂.

244. *A. lasiocarpa* Benth. ramulis hispidis; spinis axillaribus subulatis; pinnis unijugis; petiolo brevissimo longe aristato; glandula breviter pedicellata; foliolis 5—7-jugis linearibus hirtis; legumine flexuoso hirto. *In Nov. Holl.* ♂.

245. *A. hispidissima* DC. ramulis pubescentibus et piloso-hispidissimis; spinis axillaribus subulatis; pinnis 1-jugis; petiolo brevissimo submutico glandula longe stipitata; foliolis 5—7-jugis oblongis v. linearibus obtusis. *In Nov. Holl.* ♂.

246. *A. Cygnorum* Benth. ramulis pubescentibus; spinis axillaribus subulatis saepe deficientibus; pinnis 1-jugis; petiolo brevissimo submutico glandula obsoleta; foliolis 3—7-jugis linearibus marginie revolutis subciliatis. *In Nov. Holl.* ♂.

247. *A. Drummondii* Benth. inermis; sericeo-puberula; stipulis subulatis; pinnis bijugis; foliolis 2—6-jugis oblongo-linearibus glabris; spinis cylindricis folia superantibus. *In Nov. Holl.* ♂.

c. *Gummiferae* Benth. Stipulae spinescentes; aculei nulli; folia bipinnata.

* *Summibracteatae*. Inflorescentia capitata. Bracteae subcapitulo ad apicem pedunculi. Legumen saepius crassum, plus minus farctum, rarius planum coriaceum. Species Americanae et Africanae.

248. *A. pennata* Benth. tomentoso-lanata; spinis rectis; pinnis 20—50-jugis; foliolis 20—30-jugis confertis minimis linearibus obtusis; pedunculis crassis lanatis; capitulis tomentosis. *In Mexico.* ♂.

249. *A. pellacantha* Vogel. caule petiolisque tomentoso-pubescentibus; spinis rectis demum longissimis; pinnis 10—30-jugis; foliolis multijugis parvis linearibus obtusis puberulis; pedunculis crassis tomentosis; legumine crasso velutino. *In Peruvia.* ♂.

250. *A. macrantha* H. et K. puberula; spinis rectis nonnullis longissimis; pinnis 10—30-jugis; foliolis multijugis parvis linearibus obtusis; pedunculis tenuibus; capitulis puberulis; legumine crasso toruloso velutino. *In Am. austr.* ♂.

251. *A. macracanthoides* Bert. tomentoso-pubescentis; spinis rectis minimis v. longissimis; pinnis 12—40-jugis; foliolis multijugis parvis linearibus obtusis puberulis; pedunculis capitulisque tomentosis; legumine lato-lineari crasso tomentoso. *In Jamaica.* ♂.

252. *A. flexuosa* H. et K. glabra v. puberula; spinis rectis parvis v. longissimis; pinnis 12—40-jugis; foliolis multijugis parvis linearibus obtusis glabris; capitulis puberulis; legumine lato-lineari subincurvo coriaceo glabro. *A. obtusa* H. et K. *In Jamaica.* ♂.

253. *A. tortuosa* Willd. tomentoso-pubescentis; spinis rectis validis; pinnis 3—8-jugis; foliolis 10—12-jugis linearibus obtusis puberulis; pedunculis capitulis leguminibusque tomentosis. *A. albida* B. R. t. 1317. *In Jamaica, Mexico et Peruvia.* ♂.

254. *A. atramentaria* Benth. glaberrima glaucescens; spinis brevibus validis; pinnis 2—7-jugis; foliolis 15—20-jugis linearibus obtusis; legumine lineari falcato crasso compresso glabro glauco. *Prosopis adstringens* Gill. et Hook. *In Chili.* ♂.

255. *A. Farnesiana* Willd. glabra v. puberula; spinis tenuibus rectis pinnis 4—8-jugis; foliolis 10—20-jugis linearibus subglabris; legumine cylindrico turgido subincurvo glaberrimo farcto indehiscente. *Farnesia odora* Gasp. *A. edulis* W. *In Am. austr.* ♂.

256. *A. carenia* H. et Ar. pubescentis; spinis rectis; pinnis 5—10-jugis; glandulis depressis parvis; foliolis 10—20-jugis minimis oblongo-linearibus obtusis; legumine crasso incurvo glaberrimo; seminibus con-

fertis. Colla mem. Tor. 37. t. 12.
A. aromatica Poepp. In *Chili*. ♂.

257. *A. cocheacantha* Bonpl. spinis geminis compresso-concavis; ramis glabris; petiolis pedunculisque pubescentibus; pinnis 9—10-jugis; foliolis 19—24-jugis linearibus minutissimis ciliatis; rachi 4-glandulosa; capitulis geminis pedunculatis. Kunth. mim. t. 29. In *Quito*. ♂.

258. *A. choriophylla* Benth. floribus exceptis glaberrima; stipulis minutis spinescentibus nunc obsoletis; pinnis 1—2-jugis glandulis depressis obscuris; foliolis 3—5-jugis oblongo-ellipticis v. ovalibus obtusissimis coriaceis nitidis; capitulis puberulis. In *Bahama*. ♂.

259. *A. acuifera* Benth. glabra spinis subulatis; pinnis 1-jugis; glandula stipitata; foliolis 10—12-jugis oblongis obtusissimis demum coriaceis nitidis; pedunculis folium aequantibus; capitulis glaberrimis; legumine glaberrimo. In *Bahama*. ♂.

260. *A. erioloba* E. Mey. spinis rectis; fol. glabris pallidis; pinnis 3-jugis glandulis ad omnia paria; foliolis 8—10-jugis linear-oblengis obtusis; legumine lignoso indehiscente semilunato tumido surfuraceo intus farcto. In *P. b. S.* ♂.

261. *A. Giraffae* Burch. glaberrima; spinis rectis validis fuscis; pinnis 1—3-jugis; foliolis 9—15-jugis oblongis obtusis crassiusculis; pedunculis fasciculatis; legumine ovali crasso indehiscente. *A. reticulata* Willd. In *P. b. S.* ♂.

262. *A. mauroccana* DC. canotomentosa; spinis subrecurvis; pinnis 3—8-jugis; foliolis 10—20-jugis oblongo-linearibus subnitidis; pedunculis axillaribus; legumine lato-lineari subfalcato margine incrassato. In *Marocco*. ♂.

263. *A. heteracantha* Burch. pubescens; spinis brevibus uncinato-recurvis v. longissimis pubescentibus; pinnis 5—10-jugis; glandulis parvis paucis; foliolis 10—15-jugis oblongo-linearibus; legumine lineari. In *P. b. S.* ♂.

264. *A. Adansonii* Guillemin. et Perrott. ramulis petiolisque canescentibus; spinis parvis rectis; pinnis 10—12-jugis; foliolis 20—30-jugis oblongo-linearibus obtusis glaucis supra nitidis; ca-

pitulis albo-puberulis. *A. adstringens* Schum. et Thonn. In *Senegambia*. ♂.

265. *A. Sieberiana* DC. subtomentella; spinis rectis demum eburneis; pinnis 10—30-jugis; foliolis 20—40-jugis oblongo-linearibus obtusis glabris supra nitidis; pedicellis infra apicem bracteatis; capitulis puberulis. In *Senegambia*. ♂.

** *Medibracteatae* Benth. Inflorescentia capitata. Bracteae versus medium v. supra basin pedunculi in involucellum persistens v. deciduum connatae. Legumen saepius planum coriaceum v. membranaceum rarius turgidum. Species Africanae v. Indicae.

266. *A. nubica* Benth. ramulis petiolisque albidis molliter villosis; spinis brevibus validis rectis; pinnis 6—10-jugis; foliolis 10—15-jugis oblongo-linearibus obtusis pallidis; pedunculis capitulisque tomentosis. In *Nubia*. ♂.

267. *A. planifrons* Wight et Arn. subglabra; spinis brevibus rectis v. recurvis albidis; pinnis 5—6-jugis; petiole ciliato; glandulis minimis rarius nullis; foliolis 10—12-jugis parvis linearibus obtusis glabris; capitulis globosis; legumine linearis contorto. In *Ind. or.* ♂.

268. *A. Roxburghii* Wight et Arn. fruticosa glabra armata; pinnis 6-jugis; foliolis 9-jugis arcte approximatis subimbricatis; aculeis stipularibus saepe folia superantibus basi connatis; staminibus numerosis distinctis. *Mimosa eburnea* Roxb. cor. t. 199. In *Ind. or.* ♂.

269. *A. Jacquemontii* Benth. glaberrima; spinis demum longissimis eburneis; pinnis 2—4-jugis; foliolis 5—10-jugis oblongo-linearibus obtusis crassiusculis; legumine longe stipitato lato-lineari recto glaberrimo. In *Ind. or.* ♂.

270. *A. Aucheri* Benth. pubescentia pallens subflavida; spinis conicis; pinnis 2—3-jugis; foliolis 6—8-jugis linearibus obtusis crassiusculis submarginatis; pedunculis brevissimis; legumine lato-lineari subsessili leviter falcato. In *Oriente*. ♂.

271. *A. hebeclada* Cunn. pilosohispida; spinis conicis subrecurvis; pinnis 3—7-jugis; glandulis parvis; foliolis glabratis; legumine recto flavo oblique striato cavo. *A. stolonifera* Burch. In *P. b. S.* Ȑ.

272. *A. arabica* Willd. glabra v. tomentoso-pubescent; spinis minimis longisve subulatis demum eburneis; pinnis 4—8-jugis rarius 1—3-jugis; foliolis 10—20-jugis oblongo-linearibus obtusis viridibus; legumine linearis moniliformi. Roxb. corom. t. 119. *A. nilotica* Delil. In *Arabia, Senegambia et Ind. or.* Ȑ.

273. *A. gummifera* Willd. glabra; spinis rectis validis; ramulis teretibus; pinnis 1-jugis; foliolis 6-jugis linearibus obtusis; pedunculis axillaribus; capitulis oblongis; legumine linearis plano tomentoso. In *Mogador.* Ȑ.

274. *A. coronillaefolia* Desf. glabra spinis rectis; pinnis 1-jugis petiolo brevissimo vix ullo; glandula sessili; foliolis 5—9-jugis linearibus obtusis subglaucis; capitulis ovalibus pedunculatis. In *Mogador.* Ȑ.

275. *A. robusta* Burch. glabra spinis validis nonnullis elongatis eburneis; pinnis 2—4-jugis remotis; foliolis 8—13-jugis oblongo-linearibus obtusis; capitulus globosis; legumine plano recto continuo nudo bivalvi. In *P. b. S.* Ȑ.

276. *tomentosa* Willd. velutinotomentosa; spinis nunc minutis nunc longissimis validis fuscis; pinnis 10—12-jugis; glandula petiolari oblonga; foliolis 20—30-jugis linearibus obtusis pubescentibus; capitulis tomentosis; legumine falcato-contorto. In *Ind. or.* Ȑ.

277. *A. eburnea* Willd. ferrugineovillosa; spinis rectis nonnullis longis eburneis; pinnis 2—4-jugis parvis glandula petiolari majuscula; foliolis 6—8-jugis linearibus minimis hirtellis; legumine anguste linearis falcata glaberrima. In *Ind. or.* Ȑ.

278. *A. Sayal* Delil. pl. Aeg. t. 52. f. 2. glabra v. ramulis puberulis; spinis conicis v. elongatis eburneis; pinnis 2—5-jugis; foliolis 8—12-jugis oblongo-linearibus; pedunculis basi bracteatis; legumine linearis falcata demum contorto glabro coriaceo. In *Aegypto.* Ȑ.

279. *A. hirtella* E. Mey. ramulis petiolis foliisque hirtellis; spinis rectis subulatis; pinnis 6—8-jugis; glandulis parvis; foliolis 10—15-jugis oblongo-linearibus; legumine stipitato angusto linearis subfalcato plano glabro. In *P. b. S.* Ȑ.

280. *A. fasciculata* Guill. et Perrott. glabra; spinis parvis recurvis; pinnis 3—4-jugis; glandulis parvis; foliolis 8—12-jugis linearibus parvis; pedunculis tenuibus medio bracteatis; capitulis glabriusculis; legumine linearis falcata demum contorto glabro. In *Senegambia.* Ȑ.

281. *A. horrida* Willd. glabra; spinis rectis demum elongatis eburneis; ramulis petiolis pedunculisque trigonis; pinnis 2—5-jugis; foliolis 5—10-jugis oblongo-linearibus obtusis crassiusculis; pedunculis superioribus fasciculato-racemosis; petalis apice revolutis. In *P. b. S.* Ȑ.

282. *A. natalitia* E. Mey. glabra; spinis parvis; ramulis petiolisque subtrigonis; pinnis 2—7-jugis; foliolis 12—30-jugis oblongo-linearibus obtusis crassiusculis; petalis apice revolutis; legumine recurvato crasso coriaceo. *A. clavigera* E. Mey. In *P. b. S.* Ȑ.

283. *A. teucophaea* Willd. spinis rectis; ramis petiolisque tomentellis; pinnis 5—12-jugis; foliolis 12—30-jugis obliquae oblongo-linearibus obtusis rigidis tomentellis; panicula ampla aphylla tomentosa. *A. alba* Willd. In *Ind. or.* Ȑ.

*** *Basibracteatae. Inflorescentia spicata rarius capitata. Bracteae ad basin pedunculi v. nullae. Legumen planum coriaceum v. incrassatum.*

284. *A. sphaerocephala* Cham. et Schlecht. floribus exceptis glaberrima; spinis albidis plerisque inflato-cuneiformibus maximis; pinnis 6—8-jugis; glandula petiolari magna elevata; foliolis laxe 10—20-jugis linearibus obtusis. *Mimosa cornigera* L. In *Mexico.* Ȑ.

285. *A. spadicigera* Cham. et Schlecht. glabra; spinis plerisque inflatis maximis corniformibus; pinnis

3—6-jugis; foliolis 15—20-jugis oblique linearibus obtusis; spicis cylindricis densissime imbricatis; calyce inflato. In Vera Cruz et Panama. ♂.

286. *A. Hindsii* Benth. glabra; spinis brevibus nonnullis maximis inflatis; pinnis 6—15-jugis; glandulis parvis elongatis numerosis; foliolis 12—20-jugis oblique linearibus obtusis; spicis cylindricis; calyce inflato. In Mexico. ♂.

287. *A. rigidula* Benth. glabra; ramis flexuosis verrucosis; spinis rectis subulatis; pinnis 1-jugis; petiolo brevi; foliolis 4—5-jugis ovali-oblongis obtusis mucronatis coriaceis venosis; spicis cylindricis laxis. In Texas. ♂.

288. *A. amentacea* DC. glabra; spinis rectis; pinnis 1-jugis; petiolo brevissimo; foliolis bijugis oblongis; spicis oblongo-cylindricis sessilibus densis amentiformibus. In Mexico. ♂.

289. *A. flexicaulis* Benth. ramis flexuosis albidis petiolisque puberulis demum glabratris; spinis conicis brevibus rectis; pinnis bijugis; glandulis parvis substipitatis; foliolis pinnae extimae 4—6-jugis obovatis membranaceis; spicis cylindricis. In Texas. ♂.

290. *A. albida* Delil. fl. Aeg. t. 52. f. 3. ramis albidis glabriusculis; spinis validis rectis; petiolo glandulifero; pinnis 2—4-jugis; foliolis 7—12-jugis oblique oblongis obtusissimis; spicis laxis; legumine oblongo-lineari subindehiscente. In Aegypto. ♂.

291. *A. saccharata* Benth. ramulis albidis puberulis; spinis brevissimis obsoletisque; petiolo pubescente glandulifero; pinnis 6—8-jugis; foliolis 10—15-jugis oblique oblongo-linearibus obtusis pubescens. In Cayor. ♂.

292. *A. Latronum* Willd. glabriuscula; spinis rectis hinc inde maximis corniformibus; pinnis 2—5-jugis; foliolis 6—15-jugis parvis linearibus obtusis; spicis cylindricis laxis interrumpitis; calyce corolla 4-plo breviore. In Ind. or. ♂.

293. *A. Lahai* Steud. et Hochst. glabriuscula; spinis rectis; pinnis 6—10-jugis glandula parva verruciformi; foliolis 12—20-jugis parvis linearibus obtusis; spicis cylindricis laxis; legumine late oblongo coriaceo glabro. In Abyssinia. ♂.

E. *Fulgares* Benth. Stipulae innocuae. Aculei infrastipulares sparsi v. nulli. Folia bipinnata, petiolo glandulifero. Pedunculi saepius fasciculati.

a. *Diacanthae*. Aculei infrastipulares. Inflorescentia spicata rarius subcapitata.

294. *A. mellifera* Benth. glabra cinerascens; aculeis geminis recurvis; petiolo inermi; pinnis bijugis; foliolis 1-jugis oblique ovato-oblongis obtusissimis retusive; spicis laxis; calyce truncato; legumine ensiformi glabro membranaceo. In Aegypto. ♂.

295. *A. detinens* Burch. glabra; aculeis infrastipularibus geminis recurvis; pinnis subtrijugis; foliolis 1-jugis oblique obovatis obtusissimis; capitulis subglobosis; pedicellis calycem subaequantibus; legumine ovali membranaceo oligospermo. In Afr. austr. ♂.

296. *A. modesta* Wall. pl. as. t. 130. Jacquem. & voy. t. 56. glabra glauca; aculeis geminis subrecurvis; pinnis 2—3-jugis; foliolis 3—5-jugis oblique cuneato-oblongis obtusis; spicis axillaribus laxis; calyce truncato-dentato; legumine lato-lineari glabro. In Ind. or. ♂.

297. *A. laeta* R. Br. glabra glauca; aculeis geminis subrecurvis; petiolo inermi; pinnis subtrijugis; foliolis 3—5-jugis oblique cuneato-oblongis obtusis mucronatis; legumine stipitato latissimo oblongo membranaceo glabro. In Abyssinia. ♂.

298. *A. tenuicularis* Hamilt. glaberrima glaucescens aculeis infrastipularibus geminis subrecurvis; fol. amplis; pinnis 2—3-jugis; foliolis 6—8-jugis oblique obovato-oblongis retusis venosis; floribus sessilibus glabris; calyce dentato-lobato. In Ind. or. ♂.

299. *A. ferruginea* DC. glabriuscula cinerascens; aculeis geminis; pinnis 3—6-jugis; foliolis 10—20-jugis oblongo-linearibus obtusis; spicis axillaribus laxis; calyce pubescente dentato; legumine oblongo-lineari coriaceo indehiscente. In Ind. or. ♂.

300. *A. hamulosa* Benth. glabra cinerascens; aculeis ternis; infrastipularibus geminis rectis; petiolo aculeato; pinnis 2—3-jugis oblique ob-

longis obtusissimis; legumine lato oblongo-lineari membranaceo indehiscente. *In Arabia.* ♀.

301. *A. verec* Guille. et Perrott. fl. seneg. t. 56. aculeis subternis, infrastipularibus geminis subrecurvis; petiolo inermi pubescente; pinnis 3-5-jugis; foliolis 10-15-jugis linearibus obtusis glaucis; spicis folio duplo longioribus; legumine linearis puberula. *In Senegambia.* ♀.

302. *A. Caffra* Willd. subglabra; ramulis fuscis; aculeis geminis recurvis v. nullis; pinnis 8-12-jugis; petiolo inermi; foliolis 15-30-jugis linearibus obtusis subglaucis subtus pilosulis; legumine lato-lineari bivalvi. *In P. b. S.* ♀.

303. *A. Catechu* Willd. albo-puberula; aculeis geminis subrecurvis; pinnis 10-30-jugis; petiolo aculeato v. inermi; foliolis 30-50-jugis linearibus puberulis ciliatis; floribus sessilibus pubescentibus; legumine lato-lineari bivalvi. *Mimosa L.* *In Ind. or.* ♀.

304. *A. catechuoides* Benth. ramulis fuscescentibus; aculeis geminis recurvis; pinnis 10-20-jugis; foliolis 20-40-jugis linearibus ciliato-hispidis; legumine lato-lineari bivalvi. *In Ind. or.* ♀.

305. *A. Sundra* Roxb. corom. t. 225. glaberrima; ramis fusco-nigris; aculeis geminis recurvis parvis; pinnis 10-15-jugis; foliolis 20-30-jugis linearibus; floribus sessilibus glabris; legumine lato-lineari bivalvi. *A. Chundra W.* *In Ind. or.* ♀.

b. *Ataxacanthae*. *Inflorescentia* spicata. Aculei sparsi nonnulli rarius infrastipulares. Spicae supremae saepius racemosae.

306. *A. ataxacantha* DC. aculeis sparsis recurvis; stipulis membranaceis semicordatis acuminatis; pinnis 8-15-jugis; foliolis 20-30-jugis falcato-linearibus ciliatis glabris; spicis elongatis laxis; legumine lato-lineari chartaceo. *In Senegambia.* ♀.

307. *A. macrostachya* Rchb. aculeis sparsis recurvis ramulis petiolisque ferrugineo-villosis; stipulis late-dimidiato-cordatis villosis; pinnis 20-25-jugis; foliolis 20-21-jugis

oblique linearibus adpresso pilosis cihiatis. *In Senegambia.* ♀.

308. *A. grandistipula* Benth. glabra; sparse recurvo-aculeata; stipulis maximis oblique reniformi-cordatis; pinnis 3-6-jugis; foliolis 10-25-jugis falcato-oblongis obtusis ciliatis; spicis ovato-oblongis deusis; legumine amplio lato-lineari plano chartaceo. *In Brasilia.* ♀.

309. *A. lacerans* Benth. ramis petiolisque sparse recurvo-aculeatissimis puberulis; pinnis 20-25-jugis; foliolis 40-70-jugis anguste linearibus rigidulis glabris ciliatis; spicis elongatis laxis; floribus sessilibus puberulis. *In Brasilia.* ♀.

310. *A. bonariensis* Gill. aculeis sparsis recurvis; ramulis petiolisque albicantibus; stipulis setaceis deciduis; pinnis 6-12-jugis; foliolis 20-25-jugis oblique linearibus glabris; spicis cylindricis velutinis; legumine lato-lineari chartaceo. *In Bonaria.* ♀.

311. *A. velutina* DC. velutino-pubescentis demum glabra; aculeis sparsis recurvis; stipulis hinc inde elongatis lineari-spathulatis membranaceis; pinnis 7-11-jugis; foliolis 20-40-jugis linearibus membranaceis; spicis cylindricis pubescentibus. *In Brasilia.* ♀.

c. *Nudiflorae*. *Inermes*. *Inflorescentia* spicata.

312. *A. silenoxyla* Tuss. fl. Antill. t. 21. ramulis petiolisque tomentellis; stipulis obsoletis setaceis; pinnis 10-15-jugis; foliolis 30-70-jugis linearibus obtusis glabris; spicis axillaribus elongatis puberulis. *In Antill.* ♀.

313. *A. nudiflora* Willd. velutino-tomentosa demum glabra; pinnis 4-6-jugis; foliolis 10-16-jugis ovato-ellipticis obtusissimis coriaceis supra nitidis subtus pallidis; spicis elongatis axillaribus; floribus sessilibus pubescentibus. *In Ind. occ.* ♀.

314. *A. acattensis* Benth. tomentella demum glabra; stipulis setaceis rigidis; pinnis 6-10-jugis; foliolis multijugis linearibus obtusis; spicis axillaribus elongatis fasciculatis; floribus sessilibus puberulis. *In Mexico.* ♀.

d. Concinnae. Inflorescentia capitata globosa paniculata. Legumen compressum crasse coriaceum intus transverse septatum inter isthos ad suturam utramque dehiscens.

315. *A. rugata* Hamilt. aculeis numerosis recurvis; ramulis petiolisque tomentosis demum glabris; stipulis cordatis?; pinnis 4—6-jugis; foliolis 12—18-jugis dimidiato-oblongis obtusis utrinque glabris. *In Ind. or.* Ȣ.

316. *A. concinna* DC. aculeis numerosis recurvis; ramulis petiolisque tomentellis demum glabris; stipulis cordatis membranaceis; pinnis 4—6-jugis; foliolis 12—18-jugis dimidiato-oblongis obtusis subtus puberulis. *Mimosa abstergens* Ser. *M. rugata* Lam. *M. Saponaria* Roxb. *Burm. zeyl.* t. 1. *Pluken.* t. 21. f. 6. *In Ind. or.* Ȣ.

317. *A. oxyphylla* Grah. aculeis recurvis; ramulis petiolisque hirtellis demum glabris; stipulis anguste lanceolatis pinnis 6—8-jugis; foliolis 15—20-jugis; dimidiato-oblongis falcatis acutis glabris supra nitidis. *In Ind. or.* Ȣ.

318. *A. polycephala* aculeis numerosis subrecurvis; ramulis petiolisque tomentellis; stipulis cordatis membranaceis; pinnis 6—8-jugis foliolis 20—30-jugis oblique oblongo-linearibus subtus adpresso-puberulis. *In ins. Mauritii.* Ȣ.

319. *A. philippinarum* Benth. aculeis numerosis subrecurvis demum glabris; stipulis parvis lanceolatis; pinnis 10—11-jugis; foliolis 20—30-jugis oblique oblongo-linearibus glabris subtus pilosulis. *In ins. Philipp.* Ȣ.

e. Pennatae. Inflorescentia capitata globosa v. ovoidea paniculata. Legumen lato-lineare planum coriaceum v. chartaceum intus continuum bivalve dehiscens v. rarius tenuius indehiscens.

+ Asiaticae et Africanae.

320. *A. intsia* Willd. scandens aculeis numerosis recurvis; ramulis petiolisque tomentosis demum glabris; pinnis 4—8-jugis, glandulis elevatis; foliolis 8—12-jugis oblique oblongis

obtusis glabris nitidis; capitulis globosis. *In Ind. or.* Ȣ.

321. *A. Kraussiana* Meisn. scandens; aculeis sparsis minimis; ramulis petiolisque puberulis; pinnis 3—4-jugis; glandulis elevatis; foliolis 6—12-jugis oblique ovatis oblongis obtusis glabris; capitulis globosis; ovario longe stipitato. *In Port Natal.*

322. *A. caesia* Wight et Arn. scandens; aculeis sparsis recurvis numerosis; ramulis petiolisque tomentosis; pinnis 8—15-jugis; foliolis 15—40-jugis oblongo-linearibus falcatis acutis supra nitidis; ovario oblongo-villoso. *A. intsioides* DC. *A. Arar* Hamilt. *A. alliacea* Ham. *In Ind. ov.* Ȣ.

323. *A. pennata* Willd. scandens; aculeis sparsis numerosis rectis v. recurvis; ramulis petiolisque tomentosis; pinnis 8—20-jugis; foliolis ultra 30-jugis anguste linearibus glabris v. junioribus subtus sericeis; ovario stipitato viloso; legumine glabro v. rufo-tomentoso. *Mimosa torta* Roxb. *M. ferruginea* Rottl. *M. megaladena* Desv. *journ.* t. 69. *M. prensans* Hook. B. M. t. 3408. *In Ind. or.* Ȣ.

324. *A. pluricapitata* Steud. scandens; aculeis sparsis numerosis parvis, caulinis rectis petiolaribus recurvis; ramulis petiolisque tomentosis; glandulis parvis elevatis; 20—25-jugis; foliolis ultra 30-jugis parvis angusto-linearibus subtus sericeis. *In Ind. or.* Ȣ.

+ Americanae.

325. *A. tamarindifolia* Willd. Jacq. h. Schoenbr. t. 396. scandens glabra; aculeis sparsis subrecurvis; ramis 4-gonis; stipulis amplis late cordatis; pinnis 4—8-jugis; glandulis parvis numerosis; foliolis 10—20-jugis oblique oblongis obtusis; ovario longe stipitato viloso. *In Martinica.* Ȣ.

326. *A. scandens* Willd. aculeis numerosis parvis recurvis; ramis petiolisque rufo-villosis; pinnis 10—20-jugis; glandulis parvis numerosis; foliolis 30—50-jugis parvis linearibus obtusis ciliolatis; legumine angustato rufo-tomentoso. *A. plumosa* Hook. B. M. t. 3366. *In Brasilia.* Ȣ.

327. *A. adhaerens* Benth. repens v. scandens; aculeis numerosis sparsis recurvis; ramis petiolisque villosis; pinnis 10—20-jugis; glandulis

elevato - turbinatis; foliolis 40—60-jugis linearibus obtusis; capitulis in panicula ampla numerosissimis. In Brasilia. ♂.

328. *A. grandisiliqua* Benth. (*Mimosa* fl. flum. 11. t. 37.) repens v. scandens; aculeis numerosis parvis recurvis; ramulis teretibus striatis petiolisque hispido - tomentosis; pinnis 10—25-jugis; glandulis numerosis; foliolis 40—66-jugis linearibus obtusis; capitulis in panicula ampla numerosissimis; legumine basi latissimo. In Brasilia. ♂.

329. *A. Claussenii* Benth. subscandens; aculeis parvis recurvis raris caule tereti striato petiolisque breve tomentosis; pinnis 10—20-jugis; glandulis depressis; foliolis 30—60-jugis parvis linearibus obtusis ciliolatis glabris nitidis; capitulis in panicula ampla numerosissimis. In Brasilia. ♂.

330. *A. micradenia* Benth. scandens; aculeis parvis incurvis raris sparsis; caule tereti striato petiolisque brevissime tomentosis; pinnis 10—15-jugis; glandulis turbinatis v. cylindricis minimis; foliolis 30—50-jugis minimis linearibus ciliolatis glabris nitidis. In Brasilia. ♂.

331. *A. Martii* Benth. glabriusculta; aculeis sparsis subrectis; caule tereti striato; pinnis 15—20-jugis; glandula petiolari maxima; foliolis multijugis linearibus ciliatis glabris nitidis; ovario subsessili viloso. In Brasilia. ♂.

332. *A. paniculata* Willd. inermis; pinnis 20—25-jugis; foliolis 10-jugis linearibus ciliatis; petiolis ramisque pubescentibus; paniculis axillaribus. In Brasilia. ♂.

333. *A. Serra* Benth. scandens; aculeis angulatis creberrimis recurvis confluentibus; pinnis 20-jugis; glandula petiolari magna oblonga; foliolis 50—80-jugis falcato - linearibus subtus puberulis; capitulis paniculatis; ovario longe stipitato. In Brasilia. ♂.

334. *A. recurva* Benth. glabra; aculeis recurvis sparsis; caule subangulato; pinnis 15—20-jugis; glandulis majusculis scutellaeformibus; foliolis multijugis linearibus glabris nitidis; capitulis paniculatis; ovario stipitato glabro. In Brasilia. ♂.

335. *A. tubiflora* Benth. aculeis recurvis sparsis; ramulis petiolisque tomentellis; pinnis 6—9-jugis; glan-

dulis depressis; foliolis 30—50-jugis linearibus glabris subciliatis; corolla tubulosa; ovario stipitato viloso. In Peruvia. ♂.

336. *A. Westiana* DC. arborea; aculeis recurvis sparsis; ramulis petiolisque glabris v. tomentellis; pinnis 6—9-jugis; glandulis scutellaeformibus depressis; foliolis 15—30-jugis oblongo - linearibus; ovario stipitato villosulo; legumine pulveraceo. In Brasilia. ♂.

337. *A. polyphylla* DC. inermis v. sparse aculeata; ramulis sub-4-gonis petiolisque glauco - tomentellis; pinnis 12—20-jugis; glandulis parvis; foliolis 30—50-jugis falcato-oblongis acutis; capitulis paucifloris ample paniculatis; ovario longe stipitato villoso. In Brasilia. ♂.

338. *A. glomerosa* Benth. arborea inermis v. sparse aculeata; pinnis 6—8-jugis; glandulis scutellaeformibus; foliolis 12—25-jugis oblique latoblongis obtusissimis subtus tomentellis 2—3-nerviis; corolla cano-pubescente; ovario longe stipitato villoso. In Brasilia. ♂.

339. *A. striata* H. et K. aculeis rameis sparsis erectis; ramis striatis petiolisque pubescentibus; pinnis 9-jugis; foliolis 13—16-jugis subtus pilosis; capitulis pedunculatis in panicula terminali. In Am. austr. ♂.

340. *A. pteridifolia* Benth. scandens subglabra; aculeis parvis raris; pinnis 2—3-jugis; glandula parva depressa; foliolis 20—30-jugis late linearibus oblique falcatis glabris; capitulis ovoides; ovario longe stipitato villoso. In Brasilia. ♂.

341. *A. Langsdorffii* Benth. inermis; ramis petiolis inflorescentiaque cano - tomentosis; pinnis 4—7-jugis; glandulis scutellaeformi-depressis; foliolis 20—30-jugis oblongis obtusis cano-tomentosis; capitulis parvis densis tomentellis. In Brasilia. ♂.

342. *A. Berlandieri* Benth. inermis; ramis petiolis inflorescentiaque cano-tomentosis; pinnis 10—17-jugis; glandulis scutellaeformi-depressis; foliolis 30—50-jugis linearibus obtusis subtus cano-pubescentibus; panicula incana. In Texas. ♂.

343. *A. ambigua* Vog. inermis puberula demum glabra; pinnis 6-jugis; glandulis scutellaeformibus; foliolis 8—15-jugis oblique ovali-oblongis ob-

tusis; capitulis parvis numerosis in panicula ampla tomentosis. *In Hayti.* ♀.

344. *A. pedicellata* Benth. scandens? aculeis sparsis raris; ramulis glabratissimis; pinnis 4—6-jugis; glandulis parvis orbiculariis; foliolis 6—10-jugis ovali-oblongis utrinque viridibus pubescentibus; capitulis globosis puberulis. *In Brasilia.* ♀.

345. *A. Miersii* Benth. inermis subscandens glabra v. puberula; pinnis 1-jugis; petiolo glandulifero; foliolis 1-jugis amplis ovali-oblique oblongis acuminatis coriaceis; panicula ampla; ovario stipitato glabro. *In Rio de Janeiro.* ♀.

346. *A. furcata* Gill. fruticosa glabra; aculeis minimis sparsis vel validis bifidis; pinnis 2—4-jugis; glandula minuta; foliolis 10—16-jugis oblongis v. linearibus; capitulis globosis longe pedunculatis racemosis. *In Chili.* ♀.

F. Filicinae Benth. *Inermes. Folia bipinnata eglandulosa.*

347. *A. villosa* Willd. ramulis petiolis pedunculisque villosis; pinnis 5—8-jugis; foliolis 12—20-jugis oblongis obtusis glabris v. minute puberulis subtus adpresso pilosis; capitulis ovoido-oblongis; pedunculis axillaribus; floribus glabris; legumine villoso. *A. lophantoides* DC. *In Jamaica et Mexico.* ♀.

348. *A. umbellifera* Kunth. inermis; pinnis 7—10-jugis; foliolis 17—37-jugis linearibus hispido-ciliatis; pedunculis axillaribus umbellulas plurimas gerentibus. *In Mexico.* ♀.

349. *A. filicina* Willd. ramulis petiolis pedunculisque piloso-hirtis; pinnis 5—6-jugis; foliolis 40—60-jugis oblique linearibus acutis glabris ciliolatis; capitulis globosis paniculatis. *In Mexico.* ♀.

350. *A. hirsuta* Schlecht. ramulis petiolis pedunculisque molliter hirsutis; pinnis 10—15-jugis; foliolis 40—60-jugis obliquے linearibus acutis glabris ciliolatis; capitulis globosis ample paniculatis. *In Mexico.* ♀.

351. *A. penicillifera* Lag. inermis; petiolis adpresso pubescentibus eglandulosis immarginatis; pinnis sub-12-jugis; foliolis 20—30-jugis linearibus obtusis ciliatis; capitulis pedunculatis. *In Nova Hispania.* ♀.

352. *A. Cumingii* Benth. ramulis petiolisque adpresso-pubescentibus glabris; pinnis 5—9-jugis v. paucijugis; foliolis 20—25-jugis oblique oblongis obtusiusculis supra glabris subtus pilosis; pedunculis fasciculatis. *In Panama.* ♀.

353. *A. glabrata* Schlecht. glabra v. minute puberula; pinnis 8—20-jugis; foliolis 20—25-jugis oblique linearibus acutis glabris vix ciliolatis; pedunculis in panicula terminali fasciculatis; legumine glabro. *In Mexico.* ♀.

354. *A. cuspidata* Schlecht. subglabra; fol. bipinnatis 2—10-jugis; pinnis 12—22-jugis; foliolis linearibus basi obliquis ciliatis; capitulis pedunculatis solitariis racemosis; leguminibus rectis papyraceis. *In Mexico.* ♀.

355. *A. hirta* Nutt. suffruticosa molliter et sparse hirsuta; pinnis 10—13-jugis; foliolis 20—30-jugis oblongo-linearibus obtusis ciliatis; pedunculis axillaribus racemosis; capitulis globosis glabris. *In Arkansas.* ♀.

356. *A. texensis* Torr. fruticosa glabra; pinnis 4—6-jugis; foliolis 10—20-jugis oblongo-linearibus obtusis; pedunculis axillaribus fasciculatis; capitulis globosis glabris; legumine glabro. *In Texas.* ♀.

357. *A. Hartwegi* Benth. fruticosa ramulis petiolisque pubescenti-villosis; pinnis 12—15-jugis oblongo-linearibus obtusis reticulato-venosis; pedunculis omnibus fasciculatis; legumine villoso. *In Mexico.* ♀.

Species quoad sectiones non semper satis notae vel a Benthamio omnino neglectae.

a. Phyllodineae.

† Flores spicati.

358. *A. moesta* Lindl. B. R. 1846. t. 67. pubescens nigro-viridis; racemulus angulato-striatus; phyllodium adpresso sparsis binervis; oblongis cum mucrone; spicis cylindricis densis phyllodia superantibus. *In Nov. Holl.* ♀.

359. *A. semirverticillata* Knowl. et Westc. glabra; phyllodium semiverticillatis subulato-linearibus pungentibus 1-nerviis; spicis axillaribus soli-

tariis; corollis 4-fidis recurvis. In Nov. Holl. ♂.

360. *A. spathulata* Tausch; phylloidiis obovato-oblongis obtusissimis mucrone obliquo terminatis basi longe attenuatis 4-nerviis ceterum multiner- viis; spicis axillaribus 2-3; ovario albo-lanato. In Nov. Holl. ♂.

†† Flores capitati.

361. *A. Mirbelii* Denh. arborea inermis glabra; ramis teretibus; petiolis linearibus obliquis enerviis falcatis apice obtusis submucronatis; capitulis geminis minimis; floribus intense luteis suaveolentibus; leguminibus planis distortis. In Nov. Holl. ♂.

362. *A. uncinata* Lindl. B. R. t. 1332. stipulis minimis caducis; phylloidiis ovato-oblongis obliquis marginatis apice falcatim mucronatis ramisque pubescentibus; capitulis solitariis. In Nov. Holl. ♂.

363. *A. prominens* Conn. glabra; phylloidiis lineari-lanceolatis acutis patentibus retroso-falcatis tenuissime ciliatis uncinato-mucronatis margine 1-glanduloso; racemis 6-12-cephalis; calycibus 5-partitis. B. M. t. 3502. In Nov. Holl. ♂.

364. *A. clavata* Schlecht. viscidopuberula; phylloidiis ellipticis basi cuneatis apice emarginatis inaequilateris binerviis; capitulis breve pedunculatis 30-40-floris; bracteis ciliatis. In Nov. Holl. ♂.

365. *A. cyclophylla* Schlecht. moliter pubescens; ramulis teretibus; phylloidiis orbiculatis obscure binerviis apice leviter exciso; capitulis 2-4-pedunculatis phyllodia superantibus 12-16-floris; bracteis ciliatis. In Nov. Holl. ♂.

366. *A. retinodes* Schlecht. glaberrima; ramulis 3-gonis; phylloidiis linearibus basi longe attenuatis apice subulato acuto uncinato, 1-nerviis falcatis; racemis axillaribus; capitulis parvis 20-floris; calycis lobis acutis. In Nov. Holl. ♂.

367. *A. squamata* Mors. ann. d'hort. de Gand. 3. t. 134. ramis strictis striatis; stipulis magnis navicularibus margine scarioso brunneo; phylloidiis angustissime linearibus apice obliquis truncatis latere incrassato 1-nerviis integerrimis. In Nov. Holl. ♂.

†† Flores ignoti.

368. *A. Pawlikowskiana* Ohlend. glaberrima; ramulis teretibus robustis junioribus angulatis 3-questris; stipulis binis recurvis caducis; phylloidiis alternis coriaceis acutis 2-poll. latis et 3-5-poll. longis. In Nov. Holl. ♂.

369. *A. Blomei* Ohlend. glaberrima glauca ramulis gracilibus stricte teretibus; phylloidiis obovatis oblongis lunate basi longe attenuatis 1-nerviis 2-poll. longis; stipula nulla. In Nov. Holl. ♂.

b. Bipinnatae inermes.

370. *H. callosa* Bertol. pl. nov. h. Bon. t. 5. fol. bipinnatis partialibus 3-jugis, propriis 6-jugis; foliolis falcatis oblique cordatis tomentosis; spicis terminalibus paniculatis, axillaribus subgeminis. In Antillis. ♂.

371. *A. velutina* Bertol. t. 4. fol. bipinnatis tomentosis partialibus 2-jugis propriis sub-5-jugis foliolis obovato-dimidiatis externis majoribus; capitulis axillaribus gemini globosis.

372. *A. angulosa* Bertol. caule sulcato; fol. eglandulosis bipinnatis; partialibus sub-12-jugis, propriis multi-jugis; foliolis parvis creberrimis oblongo-linearibus dimidiatis oblique acutis ciliatis; racemis spicaeformibus. In Guatimala. ♂.

373. *A. chlorantha* Zuccar. fol. bipinnatis; pinnis 3-6-jugis; foliolis multijugis linearis-cultratis acutis adpresso ciliatis; petiolis eglandulosis; capitulis ovato-globosis paniculatis; staminibus plurimis corolla duplo longioribus. In Mexico. ♂.

374. *A. insularum* Guill. ramis striatulis glabris; pinnis 12-15-jugis oblongo-linearibus subcuneatis glabris; glandula sphaerica umbilicata; capitulis axillaribus solitariis; legume contorta plicata compressissimo. In ins. Societas. ♂.

375. *A. pentadenia* Lindl. B. R. t. 1521. glabra ramis angulatis; pinnis 4-5-jugis; foliolis sub-22-jugis oblongis. utrinque obtusis glandula depressa inter omnes pinnas; capitulis pedicellatis simplicibus axillaribus. In Nov. Holl. ♂.

376. *A. officinalis* Denh. arborea puberula; ramis angulatis; petiolis pubescentibus glanduliferis; glandulis

foveolatis 2 inter omnia paria; fol. partialibus 12—20, propriis multijugis minutissimis linearibus obtusissimis eveniis pubescentibus; capitulis racemoso-paniculatis. In Van Diemens-land. ♂.

377. *A. acutistipula* Mart. fruticosa; ramulis glabrescentibus; fol. bipinnatis, pinnis 5—6-jugis; foliolis 12—20-jugis linearibus obliquis moliter pubescentibus; rachidibus hirsutis glandula tenui villosa; spicis aggregatis. In Brasilia. ♂.

378. *A. filicoma* Mart. arborea; ramis verrucoso-punctatis; fol. subitus margine ciliatis, rachi pubescente, glandula urceolata; foliolis linearibus obtusis; spicis geminis cylindricis; ovario albo-villoso; legumine lirari. In Brasilia. ♂.

379. *A. arcuata* Decaisn. fol. duplato-pinnatis; pinnis 11—14; foliolis 23—25-jugis obtusis glabris; petiolo communi basi et apice glanduloso; pedunc. fructiferis solitariis; leguminibus linearibus arcuatis compressis. In Timor. ♂.

c. Bipinnatae aculeatae.

380. *A. tomentella* Zip. scandens; ramulis lineatis maxime aculeatis, aculeis uncinatis; paniculis petiolisque fulvo-tomentosis; fol. bipinnatis, pinnis 15—20-jugis; foliolis multijugis linearibus minimis; glandula oblonga. In Timor. ♂.

381. *A. Cambelii* Arnott. fruticosa spinosa; fol. bipinnatis pinnis 5—6-jugis approximatis, glandula concava; foliolis 8—10-jugis minutis arce imbricatis crassiusculis oblongis acutis parce pilos; petioli hirsutis; spinis basi connatis; staminibus numerosis discretis. In Mysore. ♂.

382. *A. capensis* Colla; radice perenni lignosa fibrosa; caule arboreo; fol. petiolatis bipinnatis 2—4-jugis, pinnis 6—8-jugis; glandula fusca vix conspicua; foliolis ovato-oblongis obtusis glaucis subtus glanduloso-punctatis. In P. b. S. ♂.

383. *A. Raddiana* Savi; globifera; spinis geminis rectis albis bifidis; fol. pubescentibus bipinnatis; pinnis 4-jugis; foliolis 8—10-jugis oblongo-linearibus obtusis; leguminibus torulosis contortis acutis glabris nervosis. In Aegypto. ♂.

384. *A. Kunthii* Denh. fruticosa v. arborea aculeata glabra; petiolis 1-glandulosis aculeatis; fol. partialibus 10—12, propriis multijugis oblique linearibus acuminatis; panicula elongata stricta; floribus luteolis odoratis. In Nov. Granata. ♂.

385. *A. adenocarpa* Hook. et Arn. glabra; spinis stipularibus parvis gemmam aequantibus; fol. bipinnatis 3—5-jugis glandula oblonga urceolata sessili; pinnis 25—30-jugis; foliolis oblongo-linearibus obtusis; capitulus globosis. In Uruguay. ♂.

386. *A. furcata* Guill. fruticosa glabra spinosa; spinis 2; unica apice furcata; fol. parvis bipinnatis 3-jugis glandula minuta concava; pinnis 7—9-jugis; foliolis oblongis acutiusculis; legumine majusculo oblongo. In Mendoza. ♂.

387. *A. quadriglandulosa* Mart. ramis flexuosis; aculeis parvis recurvis, fol. bipinnatis, pinnis 8—10-jugis; foliolis 20—25-jugis linearibus acutis glabris; glandula urceolari; leguminibus lineari-oblongis polyspermis. In Brasilia. ♂.

388. *A. elegans* Schlecht. subglabra; fol. bipinnatis 7—9-jugis pinnis 22—26-jugis; foliolis ellipticis basi obliquis rotundatis utrinque glabris margine adpresso-ciliatis; capitulus paniculato-racemosus. In Mexico. ♂.

389. *A. stipellata* Schlecht. mollier tomentosa; fol. bipinnatis 5—13-jugis; pinnis 12—34-jugis, petiolo bistipulato; foliolis linearibus, obliquis obtusis subtus pilosis; capitulus racemosus pedunculatis. In Mexico. ♂.

390. *A. setosa* Denh. fruticosa aculeata; aculeis sparsis strictis gracilibus; fol. pinnatis, pinnis 20—30-jugis linearibus obtusis glabris imbricatis sessilibus costa albo-setosis; stipulis linearibus acutis sulcatis; caule ramisque setosis. In? ♂.

391. *A. sericea* Mart. subarmata; ramulis angulatis mollissime setosae sericeo-tomentosis; fol. subsericeis villosis bipinnatis 1—2-glandulosis; pinnis 5—8-jugis; foliolis 30-jugis oblongo-linearibus cultriformibus; floribus dense spicato-racemosis. In Mexico. ♂.

392. *A. adenatheroides* Mart. et Galeott. aculeata; caule sulcato glanduloso-punctato; fol. bipinnatis pinnis 9-jugis; foliolis sub-9-jugis oblique

ovalibus obtusis 3-nerviis pubescentibus; spicis ternis axillaribus; floribus albis 10andris. In Mexico. ♂.

393. *A. cylindriflora* Mart. et Galeott. aculeis uncinatis sparsis; ramis petiolisque glanduloso-pubescentibus; pinnis 3—4-jugis; foliolis 6—8-jugis pubescentibus ovalibus obtusis subtus discoloribus; staminibus 10 albis longe exsertis. In Mexico. ♂.

394. *A. paniculiflora* Steud. ramis 4—5-gonis; pedunculis petiolisque villosis; stipulis minutis setaceis; fol. 10—15-jugis; pinnis 16—20-jugis, foliolis lepidotis, glandula magna peltiformi; panicula ampla multiracemosa. In Surinamo. ♂.

395. *C. canescens* Mart. et Galeott. arborea; ramis contortis subinermibus; ramulis uncinato-aculeolatis; fol. geminis conjugato-pinnatis; foliolis bijugis oblique ellipticis cano-pubescentibus; capitulis axillaribus solitariis albis. In Mexico. ♂.

396. *A. ferox* Mart. et Galeott. spicis geminis connatis validis folia subaequantibus; petiolis pedunculisque pubescentibus; fol. fasciculatis; rachi pubescente; pinnis 4—5-jugis; glandula cupuliformi; foliolis 15—20-jugis oblongo-linearibus obtusis. In Mexico. ♂.

397. *A. hirta* Mart. et Galeott. caule dense rufo-hirsuto; fol. sessilibus approximatis; pinnis sub 20-jugis; foliolis 20—30-jugis minutis oblongis ciliatis; capitulis fasciculatis subquinatis. In Mexico. ♂.

398. *A. obliquifolia* Mart. et Gal. caule glabro; spinis rectis; petiolis pubescentibus apice glandulosis; fol. conjugato-pinnatis; foliolis 1-jugis oblique ovato-oblongis emarginatis nitidis glaberrimis; pedunculis villosis. In Mexico. ♂.

399. *A. tanata* Mart. et Galeott. pubescenti-flavo-lanata; spinis geminis validis; caule arboreo; fol. bipinnatis; pinnis sub-20-jugis; foliolis minutis linearibus multijugis; capitulis axillaribus subfasciculatis. In Mexico. ♂.

400. *A. rufa* Haskarl. fruticosa subscandens; rufo-tomentosa ramis verruculosis; ramulis angulatis; pinnis 4—6-jugis; pinnulis 8—12-jugis obovato oblongis mucronulatis; capitulis racemoso-paniculatis; floribus albis. In Java. ♂.

401. *A. melanochaetes* Zollinger; arborea; spinis geminis; pinnis 3—7-jugis 1—3-glandulosis; foliolis 10—17-jugis glabris; capitulis paniculato-racemosis; pedunculis velutinis. In Java. ♂.

402. *A. similis* Zoll. *A. rufae* similis sed arborea; petiolo glanduloso; foliolis oblongo-linearibus inaequilateralibus; ramulis novellis ferrugineo-subsericeis; stipulis linearibus. In Java. ♂.

403. *A. martinicensis* Presl. arborea sparse aculeata; ramulis striatis; petiolis pubescentibus basi glandula magna peltata; fol. bipinnatis; pinnis 15—20-jugis; foliolis 50—60-jugis linear-oblengis obtusis ciliolatis; capitulis quinis. In Martinica. ♂.

404. *A. pterygocarpa* Hochst. ramulis petiolisque albo-flavescentibus; spinis subulato-coriaceis; glandulis parvis paucis; pinnis 3—4-jugis; foliolis 8—12-jugis oblongo-linearibus obtusis; legumine lato-lineari pubescente. In Abyssinia. ♂.

405. *A. xylocarpa* Hochst. ramulis sulcatis puberulis; spinis parvis conicis; pinnis 15—30-jugis; glandulis parvis; foliolis 20—40-jugis linearibus glabris; legumine lato-lineari subsalcato lineato. In Abyssinia. ♂.

406. *A. abyssinica* Hochst. mollier villosa; spinis conicis tomentosis; pinnis 5—15-jugis; glandulis scutellaeformibus; foliolis 20—30-jugis linearibus ciliato-puberulis. In Abyssinia. ♂.

407. *A. Benthamii* D. ((*A. ferox* Benth.) villosa; aculeis geminis recurvis; petiolo aculeato; glandulis minutis; pinnis 4—6-jugis; foliolis 3—6-jugis oblique obovato-oblongis obtusissimis; legumine oblongo membranaceo. In P. b. S. ♂.

408. *A. Burkei* Benth. villosa; aculeis recurvis; petiolo inermi; pinnis 3—6-jugis; foliolis 5—8-jugis oblique oblongis obtusiusculis; spicis fasciculatis laxis; calycibus puberulis; legumine membranaceo. In P. b. S. ♂.

409. *A. venosa* Hochst. glabra pallida glauca; aculeis geminis minutis; pinnis 4—5-jugis; foliolis 6—8-jugis oblique oblongis obtusiusculis; legumine longe et lato-lineari. In Abyssinia. ♂.

410. *A. eriadenia* Benth. aculeis sparsis raris; ramulis petiolisque tomentoso-villosis; stipulis semicordatis acuminatis villosis; pinnis 6—10-jugis; glandulis conicis villosis; foliolis circa 20-jugis oblique linearibus; spicis elongatis. *In P. b. S.* ♀.

d. Bipinnatae globiflorae inermes.

411. *A. gracilis* Mart. et Galeott. glabra fruticosa; ramis patentibus; fol. bipinnatis; pinnis bijugis; foliolis 5—6-jugis oblique ovato-ellipticis mucronatis; stipulis striatis; capitulis longe pedunculatis fasciculatis; staminibus roseis. *In Mexico.* ♀.

412. *Galeottii* D. (A. elegans Mart. et Galeott.) ramis angulatis petiolisque pubescenti-hirsutis; pinnis sub-15-jugis; petiolis eglandulosis; foliolis 30—45-jugis linearibus obtusis ciliatis; capitulis pedunculatis fasciculatis. *In Mexico.* ♀.

413. *A. mollitcula* Mart. et Galeott. arborea mollitor villosa; pinnis bijugis; foliolis 6-jugis ovato-ellipticis capitulis geminis longe pedunculatis axillaribus; staminibus longe exsertis. *In Mexico.* ♀.

414. *A. insignis* Mart. et Galeott. glabriuscula; pinnis 16—20-jugis; foliolis sub-60-jugis linearibus ciliatis; petiolis eglandulosis puberulis; stipulis ciliatis; capitulis fasciculatis; leguminibus sinuatis papyraceis. *In Mexico.* ♀.

415. *A. rubescens* Mart. et Galeott. subglabra; stipulis linearibus acutis; petiolis canaliculatis puberulis rubris eglandulosis; pinnis 3—5-jugis; foliolis 12—10-jugis oblique ovato-ellipticis obtusis trinerviis; capitulis axillaribus geminis. *In Mexico.* ♀.

416. *A. media* Mart. et Galeott. glabriuscula; fol. 1—2-jugis foliolis sub-10-jugis oblique ellipticis obtusis ciliatis; stipulis lanceolatis; capitulis axillaribus longe pedunculatis paniculatis; staminibus longe exsertis albis. *In Mexico.* ♀.

417. *A. subdimidiata* Splitgerb. pinnis 3—4-jugis; foliolis 8—12-jugis subdimidiato-ovalis acutis glabris; capitulis pedicellatis aggregatis longe racemosis. *In Surinamo.* ♀.

* Species quoad stamina non descriptae igitur dubiae.

418. *A. rostrata* DC. inermis; pinnis 6-jugis; foliolis multijugis linearibus glabris; petiolis pilosis basi glandula urceolari; spicis axillaribus. *Mimosa ignava* H. et K. *In Am. austr.* ♀.

419. *A. macroloba* Willd. inermis; pinnis 16-jugis; foliolis multijugis linearibus falcatis acuminatis basi angulatis; petiolis superne lineis 2 pilosis; spicis filiformibus axillaribus. *In Brasilia.* ♀.

420. *A. pulcherrima* Willd. inermis; pinnis 13-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus obtusis subtus petiolisque pubescentibus; glandula convexa ad basin petioli; spicis axillaribus geminis filiformibus. *In Brasilia.* ♀.

421. *A. dumetorum* DC. caule parce aculeato; ramis sulcatis pubescentibus; fol. bipinnatis; foliolis multijugis minutis linear-ellipticis subtus glanduloso-punctatis; spicis axillaribus geminis staminibus liberis; ovario villoso. *In Brasilia.* ♀.

422. *A. Jupunba* Willd. inermis; pinnis 4—5-jugis; foliolis 6—8-jugis; ovatis obtusis subtus cano-pubescentibus; spicis subcapitatis umbellatis axillaribus. *In Brasilia.* ♀.

423. *A. tenuiflora* Willd. aculeis sparsis incurvis; pinnis 5-jugis; foliolis multijugis ciliatis; petiolis pubescentibus subaculeatis; spicis filiformibus foliorum longitudine. *Ad Caracas.* ♀.

424. *A. nitida* Willd. foliolis bijugis oblongo-lanceolatis utrinque nitidis subtus in venis pilosiusculis; spicis pedunculatis oblongis; corollis villosis. *Inga* Willd. *In Brasilia.* ♀.

425. *A. maurnifera* Schlecht. subglabra; fol. bipinnatis 2—4-jugis; foliolis anguste ellipticis basi obliquis subcordato-rotundis utrinque puberulis; leguminibus stipitatis papyraceis planis glaberrimis. *In Mexico.* ♀.

426. *A. pubescens* Schlecht. ramis flexuosis; aculeis stipularibus subgenminis compresso-subulatis; fol. bipinnatis breve petiolatis 4—5-jugis; pinnis 12—14-jugis; foliolis anguste ellipticis; capitulis axillaribus pluribus; leguminibus stipitatis falcatis compressis. *In Brasilia.* ♀.

427. *A. aurita* Schlecht. tomentella; fol. bipinnatis 20—25-jugis pinnis 30—60-jugis; foliolis linearibus basi obliquis deorsum subauriculatis obtusis glabris margine ciliatis; bracteis oblique cordatis longe acuminatis; capitulis subracemosis. *In Mexico*. ♀.

428. *A. stenostachya* Desv. inermis; ramis subangulatis atro-rufescensibus glabriusculis; fol. duplicato-pinnatis pinnis sub-10-jugis; foliolis 20-jugis linearis-rhombeis subcoriaceis nitidis; spicis geminis axillaribus filiformibus longissime pedunculatis; floribus minutis. *In Guiana*. ♀.

429. *A. Hamiltoni* Desv. inermis; ramis junioribus pubescenti-pilosis; fol. bipinnatis pinnis 5-jugis; foliolis multijugis subremotis linearibus obtusis margine ciliatis; pedunculis elongatis pilosis; spicis subglobosis. *In Jamaica*. ♀.

430. *A. linearis* Desv. caule inermi fruticoso; ramis nodosis striatis pubescentibus; bracteis subinduratis persistentibus; fol. bipinnatis; pinnis sub-5-jugis; foliolis 20-jugis anguste linearibus confertis subciliatis pedunculis elongatis fastigatis. *In Jamaica*. ♀.

431. *A. micrantha* Desv. caule armato arborescente; ramis pubescentibus; fol. bipinnatis; pinnis 10-jugis; propriis multijugis minutissimis pubescentibus; spinis stipularibus; spicis globosis axillaribus nutantibus. *In Guiana*. ♀.

432. *A. selenicarpa* Desv. caule armato; ramis albicanibus glabris; spinis sparsis; fol. bipinnatis; pinnis sub-6-jugis; foliolis sub-15-jugis linearis-rhombeis glaberrimis glaucescentibus; spicis globosis; leguminibus lati replicato-lunatis. *In Guiana*. ♀.

5192. LYSILOMA Benth. (1842).

Flores globoso-capitati.

1. *L. bahamense* Benth. glabrum v. pilosuscum; stipulis amplis falcato-ovatis acutis dimidiatis; pinnis 2—4-jugis; foliolis 10—20-jugis oblique ovatis. *In Bahama*. ♀.

2. *L. Schiedeanum* Benth. glabrum v. pilosuscum; stipulis amplis semicordatis membranaceis pinnis 6—8-

jugis; foliolis multijugis linearibus glabris. *In Mexico*. ♀.

3. *L. auritum* Benth. ramulis petiolis pedunculisque tomentellis; stipulis amplis semicordatis longe acuminatis membranaceis; pinnis 20—25-jugis; foliolis multijugis ciliatis linearibus. *Acacia aurita?* Schlecht. *In Mexico*. ♀.

4. *L. microphyllum* Benth. pubescens; stipulis lanceolatis acuminatis pubescentibus; pinnis 5—8-jugis; foliolis multijugis parvis subtus puberulis. *Acacia arborea* Benth. non Willd. *In Mexico*. ♀.

b. Flores cylindrico-spicati.

5. *L. acapulcense* Benth. ramis junioribus petiolisque pilosulis; stipulis obsoletis; petiolis glandulis depressis; pinnis sub-9-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus glabris. *Acacia* Kunth, mim. t. 24. *In Mexico*. ♀.

6. *L. desmostachyum* Benth. ramulis petiolisque velutino-pubescentibus; stipulis obsoletis; petoli glandulis elevato-conicis; pinnis 7—12-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus adpresso-pilosusculis. *Acacia* Benth. *In Mexico*. ♀.

7. *L. rostratum* Benth. est *A. rostrata* Willd.

5193. ALBIZZIA Durazzini. (1842).

a. Spiciflorae. Pinnae et foliola plurijugae. Spicae cylindricae.

1. *A. fulgens* Benth. (*Acacia* Labill. sert. t. 67.) subglabra pinnis 2—3-jugis; foliolis 3—4-jugis ovali-v. oblongo-rhombeis basi longe angustatis subcoriaceis; spicis elongatis; legume bivalvi falcato. *In Nov. Caledonia*. ♀.

2. *A. granulosa* Benth. (*Acacia* Labill. l. c. t. 66.) ramulis petiolisque puberulis; pinnis 2—6-jugis; foliolis 10—14-jugis rhombo-ovatis basi obliquis; spicis elongatis; legume bivalvi falcato. *In Nov. Caledonia*. ♀.

3. *A. lophantha* Benth. (*Acacia* Willd.) ramulis petiolis pedunculisque velutino-puberulis; glandula in medio petoli; pinnis 8—10-jugis; foliolis

multijugis linearibus obtusiusculis sub-
tus sericeo-puberulus; spicis cylindra-
ceis; legumine recto. *In Nov. Holl.* ♂.

b. *Macrophyllae*. Pinnae 1-juga-
gæ. Foliola paucijuga ampla
pluripollucaria. Capitula glo-
bosa.

4. *A. Incida* Benth. (*Mimosa Roxb.*
Inga Wall.) glabra; foliolis 1-jugis
ovali-oblongis acuminatis penninerviis
nitidis; pedunculis fasciculatis; capi-
tulis 6—10-floris; calyce tubuloso cor.
4-plo breviore; ovario glabro. *In*
Nepalia. ♂.

5. *A. umbrosa* Benth. (*Inga Grah.*)
glabra; stipulis persistentibus; folio-
lis 1—6-jugis amplis ovali-oblongis
acuminatis penninerviis; pedunc. axil-
laribus; capitulis paucifloris globosis;
calyce campanulato corolla 3-plo
breviore. *In Ind. or.* ♂.

c. *Obtusifoliae*. Pinnae 2—6-juga-
gæ. Foliola plurijuga ovata
v. oblonga obtusa. Stipulae
obsoletæ v. deciduae. Capi-
tula globosa.

6. *A. Lebbek* Benth. (*Acacia Willd.*)
puberula; foliolis 5—9-jugis oblique
ovali-oblongis obtusissimis subsessili-
bus; glandula magna prope basin pe-
tioli; pedunculis elongatis racemosis;
capitulis amplis multifloris; legumine
longissimo. *A. speciosa* Willd. *Mi-*
mosa Serissa Roxb. *M. latifolia* Boivin.
Ac. macrophylla Bunge. *In Africa*
et Africa. ♂.

7. *A. rhombifolia* Benth. puberula;
pinnis 2—3-jugis; foliolis 3—6-jugis
ovali-oblongis obtusis; glandula pe-
tiolari nulla; pedunc. fasciculatis; ca-
pitulis multifloris; floribus glabris;
calyce campanulato 5-fido corolla di-
midio breviore; ovario piloso. *In Se-*
negambia. ♂.

8. *A. glaberrima* Benth. vide sub
Acacia glaberrima.

9. *A. ferruginea* Benth. (*Inga*
Gillei. et Perrott.) ferrugineo-velu-
tinæ; stipulis inconspicuis; pinnis
2—5-jugis; foliolis 10—20-jugis ob-
longis obtusis utrinque molliter pu-
bescentibus; glandula magna supra
basin petioli; capit. amplis multiflo-
ris; calyce tubuloso ferrugineo-vil-
loso. *In Senegambia et Abyssinia*. ♂.

10. *A. odoratissima* Benth. (*Acacia*
Wil Id.) puberula; pinnis 3—8-
jugis; foliolis 8—25-jugis late oblon-
gis valde inaequilateris subtus glaucis,
glandula prope basin petioli; panicula
polycephala; floribus sessilibus pu-
bescentibus. *A. micrantha* Boivin. *In*
Ind. or. ♂.

11. *A. lebbekoides* Benth. ramulis
petiolisque pilosulis; pinnis 3—8-jugis;
foliolis multijugis ovato-oblongis
acutis basi obliquis glabris subtus
glaucis; glandula ad basin petioli;
legumine oblongo. *In Timor.* ♂.

12. *A. procera* (*Acacia W.*) ra-
mulis leviter angulatis; fol. juniori-
bus sericeo-pubescentibus; pinnis 3—4-
jugis; foliolis 6—8-jugis ovali-oblon-
gis obtusiusculis, glandula magna ad
basin petioli; panicula laxa; capi-
tulis 15—20-floris; calyce 5-dentato.
Mimosa Roxb. cor. t. 21. *M. coriacea*
Blanco. *In Ind. or. et ins. Philipp.* ♂.

13. *A. Mittetti* Benth. ramulis te-
retibus petiolisque glabris; pinnis 3—6-
jugis; foliolis 4—10-jugis obovato-
oblongis obtusis basi obliquis glabris;
glandula parva prope basin petioli;
panicula laxa; floribus paucis sessili-
bus; calyce dentato; ovario stipitato.
In China. ♂.

14. *A. retusa* Benth. ramulis te-
retibus glabris; pinnis 4—6-jugis; fo-
liolis 6—10-jugis obovato-oblongis
obtusis obliquis glabris, glandula sub-
immersa; panicula laxa; floribus pe-
dicellatis puberulis; calyce truncato
subdentato; ovario stipitato glabro.
In Philippinis. ♂.

d. *Microphyllae* Benth. Pinnae
10—18-jugæ. Foliola multi-
juga linearia párva parum in-
aequilatera. Capitula globo-
sa, 10—20-flora.

15. *A. myriophylla* Benth. ramu-
lis petiolisque pubescentibus; stipulis
indurato-conicis; pinnis 15—18-jugis;
foliolis multijugis parvis oblongo-li-
nearibus falcatis, glandula magna prope
basin petioli; pedunculis fasciculatis;
floribus sessilibus puberulis. *Acacia*
Grah. *In Ind. or.* ♂.

16. *A. amara* Benth. ramulis pe-
tiolisque velutino-pubescentibus; pin-
nis 1—11-jugis approximatis; foliolis
multijugis parvis oblongo-linearibus
falcatis; pedunculis fasciculatis; flori-

bus sessilibus puberulis; ovario stipitato glabro. *Acacia nellyrenza* Wall. *A. Wightii* Grah. *In Ind. or.* ♂.

17. *A. sericophylla* Benth. ramulis petiolisque sericeo-pubescentibus; pinnis 10—30-jugis approximatis; foliolis multijugis parvis imbricatis linearibus utrinque sericeis glandula in petiolo; pedunculis fasciculatis; floribus sessilibus sericeis. *In Abyssinia.* ♂.

e. Falcifoliae Benth. Pinnae plurijugae. Foliola multijuga falcata acuta nervo margini interiori approximato. Capitula globosa.

18. *A. Julibrissin* Boivin. glabra v. pubescens; pinnis 7—11-jugis; foliolis multijugis falcato-oblongis acutis; pedunculis elongatis subracemosis; capitulis amplis multifloris; ovario sessili puberulo. *A. hemu* Willd. *β. mollis* sol. floribusque molliter pubescentibus. *A. mollis* Wall. pl. as. rar. t. 177. *In Ind. or.* ♂.

19. *A. stipulata* Benth. ramulis petiolisque pubescentibus; stipulis amplis membranaceis acuminatis; pinnis 7—20-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus falcatis acutis; capitulis 10—12-floris; floribus sessilibus sericeo-pubescentibus. *M. Smithiana* Wall. *A. marginata* Ham. *In Ind. or.* ♂.

20. *A. Forbesii* Benth. ramulis petiolisque velutino-pubescentibus; stipulis parvis deciduis; pinnis 2—4-jugis; foliolis 10—15-jugis falcato-oblongis obtusis utrinque rufo-sericeis; capitulis axillaribus; floribus sessilibus rufo-sericeis. *In Africa orientali.* ♂.

21. *A. Wightii* Benth. arborea inermis; ramis teretibus glabriusculis; fol. bipinnatis pinnis 9—10-jugis; foliolis 15—25-jugis oblongo-linearibus obtusis glabris subtus glaucis; floribus capitiatis; leguminibus lato-linearibus 6-spermis. *M. pulchella* Roxb. *In Ind. or.* ♂.

5194. ZYGIA R. Brown. (1756).

1. *Z. Brownei* Walp. ramulis petiolisque minute tomentellis; pinnis 2—4-jugis; foliolis 3—4-jugis oblique ovato-rhombeis utrinque glabris exti-

mis majoribus. *Inga Zygia* DC. mem. Leg. t. 65. *In Senegambia.* ♂.

2. *Z. fastigiata* E. Mey. ramis petiolisque ferrugineo-tomentosis; pinnis 5—6-jugis; foliolis 8—15-jugis oblique trapezoideo-oblongis supra glabris subtus pubescentibus ultimis minoribus. *In Senegambia et ad Port Natal.* ♂.

3. *Z. Sassa* Benth. pinnis 3—4-jugis; foliolis 12-jugis oblongo-ovatis; floribus umbellato-paniculatis; staminibus ultra corollam monadelphis. *Sassa* Bruce it. t. 4—5. *Inga Willd.* *In Abyssinia.* ♂.

5195. CALLIANDRA Benth. (1844.)

a. *Macrophyllae* Benth. Pinnae et foliola 1—4-juga. Foliola ultima usque ad 8 poll. longa obliqua inferiora multo minora. Flores sessiles. Cal obtuse et breve 5-dentatus.

1. *C. amazonica* Benth. glabra; stipulis falcato-ovatis acutis membranaceis; pinnis et foliolis 1-jugis; foliolis maximis falcato-ovatis; pedunculis racemoso-paniculatis; calyce glanduloso-ciliato semi-5-fido. *Ad fluvium Amazonum.* ♂.

2. *C. trinervia* Benth. glabra; pinnis 1-jugis; foliolis 1-jugis amplis v. sesquijugis falcato-ovatis obtuse acuminatis nitidis; pedunculis fasciculatis; calyce breve dentato corolla infundibuliformi plures breviore. *In Brasilia.* ♂.

3. *C. carbonaria* Benth. glabra; stipulis lanceolato-subulatis deciduis parvis; foliolis 1-jugis amplis v. tertio minimo sesquijugis falcato-oblongis obtuse acuminatis opacis; pedunculis axillaribus fasciculatis; legumine coriaceo crasso marginato glabro. *In Popaya.* ♂.

4. *C. emarginata* Benth. (*Inga* DC.) glabra; stipulis lanceolato-subulatis parvis; pinnis 1-jugis; foliolis sesquijugis oblique obovato-oblongis dimidiato-cordatis coriaceis 3-nerviis; ped. fasciculatis; calycibus dentatis corolla infundibuliformi 5—6-plo brevioribus. *In Mexico.* ♂.

5. *C. Harrisii* Benth. (*Inga* Lindl.) ramulis puberulis; stipulis parvis falcatis; pinnis 1-jugis; foliolis sesqui-

jugis oblique obovato-falcatis utrinque puberulis reticulato-venosis; pedunc. villosis; calycis dentibus glandulosopilosus. In Mexico. ♀.

6. *C. coriacea* Benth. (*Inga DC.*) glabra?; pinnis 1-jugis; foliolis sesquijugis oblongo-lanceolatis acutiusculis subdimidiatis rigidis coriaceis; pedunculis axillaribus fasciculatis; legumine linearis recto glabro. In Am. austr. ♀.

7. *C. tergemina* Benth. (*Inga Willd.*) glabra; stipulis parvis ovato-lanceolatis; pinnis 1-jugis; foliolis sesquijugis oblique obovato-oblongis obtusis; pedunculis petiolo longioribus; floribus glabris; calycibus minutis; legumine plano glabro. In Ind. occ. ♀.

8. *C. cylindrocarpa* Benth. glabra; stipulis parvis ovato-lanceolatis; pinnis 1-jugis; foliolis sesquijugis oblique obovato-oblongis obtusis; pedunculis petiolum subaequantibus; floribus glabris; leguminis valvulis margine incrassatis. In Brasilia. ♀.

9. *C. canescens* Benth. (*Inga Cham.*) molliter pubescens; stipulis parvis ovato-lanceolatis acutis; pinnis 1-jugis; foliolis sesqui- v. bijugis oblique ocovali-oblongis obtusis 1-nerviis reticulato-venosis; floribus villosis; calyce puberulo tubuloso. In Mexico. ♀.

10. *C. Guildingii* Benth. glaberrima; stipulis ovatis acute acuminate; pinnis 1-jugis; foliolis 2-3-jugis ultimis oblique ovatis inferioribus rhomboides omnibus nitidis; calycibus tubuloso-campanulatis striatis; legumine lignoso falcato basi longe attenuato. In ins. St. Vincentii. ♀.

11. *C. falcata* Benth. ramulis mollier rufo-villosis; stipulis lanceolato-subulatis rigidis striatis; pinnis 1-jugis; foliolis 3-4-jugis falcato-semiovatis 2-3-nerviis subtus dense pubescentibus; calyce campanulato brevissime dentato corolla 4-plo breviore. In Mexico. ♀.

12. *C. mollissima* Benth. (*Inga Kunth.*) ramulis hirto-tomentosis; stipulis ovato-lanceolatis acuminatis; pinnis 1-jugis; foliolis 4-jugis oblique obovatis binerviis utrinque mollissime sericeo-villosis; calyce campanulato acute dentato; legumine hirto-tomentoso. Ad fl. Amazon. ♀.

b. *Laeterientes* Benth. Foliola plurijuja parva vix semipollicaria membranacea lacte virescentia nec nitida. Flores sessiles. Cal. ad medium 5-fidus.

13. *C. capillata* Benth. glabra; stipulis late oblongis obtusis membranaceis striatis; pinnis 2-3-jugis; foliolis 3-4-jugis obovato-ellipticis obliquis; floribus glaberrimis; calyce corolla plus dimidio breviore. In Mexico. ♀.

14. *C. formosa* Benth. (*Acacia Kunth.*) arborea glaberrima; stipulis oblongis v. lanceolatis striatis persistentibus; pinnis bijugis; foliolis 4-6-jugis obovato-ellipticis obliquis; pedunculis filiformibus fasciculatis; floribus glaberrimis. In Mexico. ♀.

15. *C. viridiflora* Benth. ramulis petiolisque glabris vel ad articulationes pilosis; stipulis oblongo-lanceolatis; fol. eglandulosis; pinnis 2-3-jugis; foliolis 5-7-jugis dimidiatis obovato-oblongis membranaceis ciliatis; pedunc. axillaribus filiformibus. In Mexico. ♀.

16. *C. scutellifera* Benth. glabra v. puberula; stipulis linearibus acuminatis; pinnis 2-3-jugis; foliolis 6-9-jugis oblique obovato-oblongis falcatis membranaceis glandula magna scutelliformi; pedunculis filiformibus; floribus glabris; calyce corolla dimidio breviore; legumine glabro. In Brasilia. ♀.

17. *C. filipes* Benth. ramulis petiolisque puberulis; stipulis lanceolato-falcatis; pinnis 3-4-jugis; foliolis 10-16-jugis dimidiato-oblongis falcatis membranaceis mucronulatis glabris; glandulis parvis; floribus glabris. In Brasilia. ♀.

18. *C. tetragona* Benth. ramis 4-gonis petiolisque pilosis; stipulis lanceolatis persistentibus; pinnis 4-6-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus inaequilateris; pedunc. fasciculatis; floribus glabris; legumine glabro. Acacia DC. In Caracas. ♀.

19. *C. portoricensis* Benth. ramulis teretibus petiolisque pubescentibus; stipulis parvis lanceolato-linearibus; pinnis 2-4 v. 5-6-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus glabris ciliatisque; floribus glabris; leguminini-

bus glabris margine incrassatis. A. caracasana Willd. A. alba Colla. A. vespertina Macf. In Mexico et Ind. occ. ♂.

20. *C. anglica* Benth. arborea; ramulis foliisque molliter pubescentibus; stipulis parvis lanceolatis; pinnis 1—2-jugis; foliolis 6—10-jugis oblongo-linearibus utrinque pubescentibus membranaceis; pedunculis tenuibus puberulus petiolo communi longioribus; calyce corolla duplo breviore. In Mexico. ♂.

21. * *C. malacophylla* Benth. tota molliter villosa; stipulis brevissimis; pinnis 1-jugis; foliolis 3—4-jugis oblique obovato-falcatis viridibus membranaceis; pedunculis fasciculatis; calyce profunde 5-fido corolla duplo breviore. In Mexico. ♂.

22. *C. Lambertiana* Benth. (Acacia Don.) inermis; ramis teretibus foliisque puberulo-villosis; pinnis 2—3-jugis; foliolis 9—12-jugis ovali-oblongis utrinque obtusis; petiolo eglanduloso; pedunculis 3—5. In Mexico. ♂.

c. *Pedicellatae* Benth. Foliola Nitidarum v. interdum ampliora fere Macrophyllarum. Flores in umbellula pedicellati numerosi. Filamenta purpurea.

23. *C. obovata* Benth. ramulis rufo-puberulis; stipulis parvis; pinnis 2—3-jugis; foliolis 2—4-jugis obovato-orbiculatis 1-nerviis junioribus ciliatis demum glabris nitidis; floribus breve pedicellatis; calyce turbinato dentato corolla infundibuliformi breviore. In Brasilia. ♂.

24. *C. tubulosa* Benth. ramulis ferrugineo-pubescentibus; stipulis lanceolato-linearibus; pinnis 2—4-jugis, glandula scutelliformi ad basin petioli; foliolis 1—3-jugis oblique obovato-orbiculatis subtus pubescentibus; calyce tubuloso ferrugineo-tomentoso corolla sericeo-villosa dimidio breviore. In Brasilia. ♂.

25. *C. Leptopoda* Benth. glabra v. molliter pilosa; stipulis maximis foliaceis late cordatis multinerviis; pinnis 1-jugis; foliolis 2—4-jugis oblique obovato-falcatis; pedunculis gracilibus flore multoties longioribus. In Brasilia. ♂.

26. *C. pedicellata* Benth. glabra v. ramulis pilosiusculis; stipulis ovali-lanceolatis adpressis postice in spinulam productis; foliolis 4—7-jugis oblongis obtusis; floribus longe pedicellatis glabris; legumine sericeo-villoso; valvulis incrassatis. A. pilosa DC. In Hayti. ♂.

27. *C. umbellifera* Benth. ramulis viscoso-puberulis; stipulis lanceolato-acutis; pinnis 1—3-jugis; foliolis multijugis ovali-oblongis obtusis subciliatis; floribus longe pedicellatis viscidulis; corolla calyce 4-plo longiore In Brasilia. ♂.

d. *Nitidae* Benth. Foliola plura saepius multijuga parva, rarius semipollucaria rigidula supra nitida. Pedunculi axillares vel terminales pauci. Flores capitati sessiles.

* *Pinnae 1-vel rarius bijugae.*

28. *C. haematomma* Benth. (Acacia DC. leg. t. 68.) glabra v. pilosula; stipulis lanceolatis adpressis postice in spinulam productis; foliolis 4—7-jugis oblongis obtusis; pedunc. folio longioribus; calycibus corolla sericeo-pilosa subtriplo-brevioribus; legumine sericeo-villoso. In Domingo. ♂.

29. *C. chilensis* Benth. adpresso pilosa; stipulis lanceolatis acutis rigidis; foliolis 3—5-jugis parvis oblongis obtusis utrinque adpresso-pilosis; calycibus corolla pilosa dimidio brevioribus; legumine adpresso-pubescente; valvulis margine incrassatis. In Chili. ♂.

30. *C. sessilis* Benth. glabra v. pilosa; foliolis oblongis falcatis multijugis; capitulis terminalibus; floribus glabris; calyce 5-dentato corolla dimidio breviore laciniosque corollae striatis. In Brasilia. ♂.

31. *C. squarrosa* Beuth. (Acacia Mart.) ramosissima; ramulis petiolisque pilosulis; stipulis lanceolatis acutis; pinnis 1—2-jugis; foliolis multijugis linearibus obtusis; floribus glabris; calycibus brevissime dentatis corollisque striatis. In Brasilia. ♂.

32. *C. Blancheti* Benth. ramulis petiolisque pilosulis; foliolis multiju-

gis oblongo-linearibus obtusiusculis falcatis; pedunculis petiolo brevissimo multoties longioribus; calyce turbinate corollaque membranacea glabris. *In Brasilia.* ♀.

33. *C. taxifolia* Benth. (*Inga DC.*) petiolis pubescentibus; pinnis 1-jugis; foliolis multijugis oblongis dimidiato-cordatis glabris; capitulis axillaribus solitariis paucifloris breviter pedunculatis. *In Quito.* ♀.

34. *C. brevipes* Benth. ramosissima glabra; pinnis 1-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus falcatis obtusiusculis glabris; pedunc. subfasciculatis; calyce minute 5-dentato ciliolato extus corollaque glabris; legumine glabro, valvulis crasso-marginalis. *In Brasilia.* ♀.

35. *C. purpurea* Benth. (*Inga DC.*) glabra stipulis lanceolatis acutis; pinnis 1-jugis; foliolis 3—7-jugis ovatis v. obovato-oblongis obtusis; floribus glabris; calycibus corolla triplo brevioribus; legumine glabro, valvulis in-crassatis. *In Ind. or.* ♀.

36. *C. surinamensis* Benth. ramulis petiolisque pubescentibus; stipulis lanceolatis; pinnis 1-jugis; foliolis 8—10-jugis oblique obovato-oblongis obtusiusculis coriaceis subciliatis; pedunc. axillaribus petiolo brevissimo multo longioribus; calyce glabro corolla ter breviore. *In Surinamo.* ♀.

37. *C. virgata* Benth. ramis petiolisque vix puberulis; stipulis lanceolato-setaceis; pinnis 1-jugis; foliolis multijugis oblique cordato-lanceolatis mucronatis coriaceis rigidis glabris; calyce dentato corolla ter breviore. *In Brasilia.* ♀.

** Pinnae 2—3-jugae rarius 4-jugae.

38. *C. eriophylla* Benth. ramulis petiolisque tomentoso-lanatis; stipulis linear-lanceolatis rigidis; pinnis 2-3-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus obtusiusculis subtus sericeo-pilosis; pedunculis tenuibus; calycibus minimis. *In Mexico.* ♀.

39. *C. californica* Benth. Bot. of Beech. voy. of the Sulph. t. 11. ramulis petiolisque adpresso-pilosis demum glabris; stipulis lanceolato-subulatis

rigidis; pinnis 2—4-jugis; foliolis 8-15-jugis oblongis obtusiusculis utrinque adpresso-pilosis demum coriaceis nitidis; calycibus corolla pubescente multo brevioribus. *In California.* ♀.

40. *C. Cumingii* Benth. ramulis petiolisque puberulis; stipulis lanceolatis acutis rigidis; pinnis distantibus 2—3-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus glabris; pedunculis tenuibus; calycibus corolla pilosiuscula multo brevioribus. *In Mexico.* ♀.

41. *C. xalapensis* Benth. ramis petiolisque pilosis demum glabratiss.; stipulis lanceolatis acuminatis; pinnis 2—4-jugis distantibus; foliolis multijugis oblique ovali-oblongis obtusis ciliatis; calycibus turbinato-campânulatis corolla 3-plo brevioribus. *In Mexico.* ♀.

42. *C. mertensioides* Benth. (*Inga Nees et Mart.*) prostrata ramis petiolisque hirsutis; stipulis lanceolato-subulatis rigidis; pinnis 2—3-jugis; foliolis 12—15-jugis oblongis subtus villosis 3-nerviis; pedunculis elongatis; calycibus dentatis corolla 3-plo brevioribus. *In Brasilia.* ♀.

43. *C. bicolor* Benth. ramulis petiolisque pilosulis demum glabris; stipulis lanceolatis acutis; pinnis 3—6-jugis; foliolis multijugis parvis linearibus obtusiusculis; calyce ciliolato corolla dimidio breviore; legumine coriaceo margine pilosiusculo. *In Brasilia.* ♀.

44. *C. Tweedii* Benth. Hook. B. M. t. 4188. ramulis petiolisque pilosis; stipulis ovatis acutiusculis; pinnis 3-4-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus acutiusculis ciliatis, subtus pilosis; floribus brevissime pedicellatis molliter pilosis; legumine dense villosa. *In Brasilia.* ♀. Arbor parva.

45. *C. stipulacea* Benth. ramulis petiolisque vix puberulis; stipulis lanceolatis obtusis rigidis; pinnis 3—4-jugis; foliolis 8—12-jugis oblique oblongis subcoriaceis glabris; pedunculis fasciculatis; calycibus glabris; corolla adpresso pubescente triplo brevioribus. *In Guiana.* ♀.

46. *C. fasciculata* Benth. ramulis petiolisque glabris v. hirtellis; stipulis parvis lanceolatis rigidis; pinnis 2—4-jugis; foliolis multijugis falcato-

linearibus glabris; floribus glabris; calycibus 5-dentatis corolla plus triplo brevioribus; legumine liguoso glabro. *In Brasilia.* ♀.

47. *C. Gardneri* Benth. humilis caule foliisque glaberrimis; stipulis parvis lanceolato-setaceis; pinnis bijugis distantibus elongatis; calyce obtuse dentato corolla tomentosa triplo breviore. *In Brasilia.* ♀.

48. *C. abbreviata* Benth. ramulis petiolisque pilosis demum glabris; pinnis bijugis; fol. multijugis ovato-oblongis obliquis falcatis valde inaequilateris; stipulis lanceolatis persistentibus; floribus hirsutissimis. *In Brasilia.* ♀.

*** *Pinnae quadri-vel pluri-jugae. Capitula fasciculato-racemosa.*

49. *C. macrocephala* Benth. ramulis petiolisque pilosis; stipulis lanceolatis persistentibus; pinnis distantibus 3—7-jugis; foliolis multijugis ovali-oblongis obliquis falcatis valde inaequilateris; pedunculis apice bracteatis; floribus rufo-hirsutissimis. *In Brasilia.* ♀.

50. *C. dysantha* Benth. ramulis angulatis pubescentibus; stipulis lanceolatis persistentibus; pinnis 4—6-jugis; foliolis multijugis falcato-oblongis rigidis coriaceis subtus pubescentibus; bracteis late ovato-lanceolatis; floribus hirsutissimis. *In Brasilia.* ♀.

51. *C. viscidula* Benth. ramulis subteretibus petiolisque hirsutissimis; stipulis ovatis deciduis; pinnis 3—5-jugis; foliolis multijugis falcato-oblongis ciliatis; pedunculis glutinoso-villosis; corolla apice hirsutissima. *In Brasilia.* ♀.

52. *C. turbinata* Benth. ramulis teretibus petiolisque pubescentibus; pinnis 8—12-jugis; foliolis multijugis falcato-oblongis ciliatis; floribus breve pedicellatis hirsutissimis; calycebus turbinatis 5-fidis corolla brevioribus. *In Brasilia.* ♀.

53. *C. foliolosa* Benth. ramulis petiolisque pilosis; stipulis oblongis; pinnis 5—9-jugis; foliolis multijugis linearibus acutiusculis; legumine sublignoso dense villosa crasso. *In Brasilia.* ♀.

54. *C. bella* (Acacia Mart.) Benth. ramulis petiolisque tomentoso-puberulis; stipulis parvulis lanceolatis acutis; pinnis 12—15-jugis; foliolis multijugis linearibus acutis; capitulis fasciculatis; calycibus breve dentatis corolla villosa triplo brevioribus. *In Brasilia.* ♀.

55. *C. microphylla* Benth. glabriuscula; stipulis linearis-setaceis; pinnis 15—20-jugis; foliolis multijugis minimis oblongo-linearibus mucronatis; pedunc. crassis; calyce campanulato corolla glabra triplo breviore. *In Brasilia.* ♀.

e. *Racemosae. Pinnae multijugae. Foliola linearia parva 1—2 lin. longa. Capitula longe racemosis, pedunculis brevibus saepe fasciculatis. Filamenta purpurea.*

56. *C. Houstoni* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-pubescentibus; stipulis parvis deciduis; pinnis 7—11-jugis foliolis multijugis oblongo-linearibus subfalcatis; pedunc. longe racemosis; pedicellis floribusque adpresso-hispidis. *Acacia R. Br. t. 98. Inga DC. C. metrosiderifolia Benth. In Brasilia et Mexico.* ♀.

57. *C. grandiflora* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-pubescentibus; pinnis 15—20-jugis; foliolis multijugis parvis oblongo-linearibus obtusiusculis; pedunculis longe racemosis; pedunc. floribusque adpresso-hispidis; legumine crasso villosissimo. *C. callistemone Benth. In Mexico.* ♀.

58. *C. Kunthii* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-pubescentibus; pinnis 15—24-jugis; foliolis multijugis parvis oblongo-linearibus obtusiusculis; pedunc. longe racemosis; pedicellis floribusque hispidissimis; legumine villosissimo. *Inga anomala Kunth mim. t. 22. In Mexico.* ♀.

59. *C. parviflora* Benth. ramulis petiolisque adpresso-puberulis; stipulis superioribus setaceis; pinnis 12—15-jugis; foliolis multijugis minimis linearibus mucronatis; panicula terminali gracili polypephala; legumine lignoso puberulo. *In Brasilia.* ♀.

60. *C. fasciculata* Benth. inermis; fol. conjugato-pinnatis; pinnarum fo-

foliolis 8—10-jugis cultratis binerviis; capitulis axillaribus solitariis; leguminibus linearibus planis acutis glabris. *In Brasilia.* ♀.

Species quoad sectiones incertae.

61. *C. pallens* Benth. in Hook. jour. V. p. 102. pallide puberula; stipulis parvis spinescentibus; pinnis 4—6-jugis; glandulis 1—2 scutellae-formibus v. nullis; foliolis 12—20-jugis oblique oblongo-linearibus pubescentibus; capitulis paniculatis. *In Mexico.* ♀.

62. *C. Hookeriana* Schomburgk; ramulis hirsutis; stipulis ovatis rigidis striatis; pinnis bijugis; foliolis multijugis linearibus obtusis subciliatis glabris rigidis; pedunculis rigidis; legumine coriaceo lignoso puberulo. *In Guiana.* ♀.

63. *C. rigida* Benth. ramulis rufo-villosis; stipulis ovatis acutis striatis; petiolo pilosiusculo; pinnis bijugis; foliolis multijugis oblique linearibus obtusis rigidis glabris subtus glaucis; legumine coriaceo puberulo. *In Guiana.* ♀.

64. *C. linearis* Benth. humilis caespitosa glabra; pinnis bijugis; stipulis setaceis caducis; foliolis 8—12-jugis anguste linearibus coriaceis nitidis; floribus sessilibus glabris; calyce corolla 4-plo breviore. *In Brasilia.* ♀.

65. *C. humilis* Benth. pilosiuscula; stipulis lanceolatis acutiusculis; pinnis distantibus 4—6-jugis; foliolis 8—10-jugis oblongo-linearibus obtusis; calycibus pilosis; legumine hirsuto. *In Zucatecas.* ♀.

66. *C. bracteosa* Benth. pilosiuscula; stipulis lanceolatis foliaceis rigidis; pinnis subbijugis; foliolis multijugis subfalcato-linearibus supra nitidis glabris; pedunculis petiolo duplo longioribus; bracteis amplis foliaceis. *In Brasilia.* ♀.

67. *C. Purdiaei* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-puberulis; stipulis lanceolatis rigidis; pinnis 8—12-jugis; foliolis multijugis oblongo-linearibus obtusiusculis parvis; pedunc. fasciculatis rigidis; calycibus tubulosis. *In Columbia.* ♀.

5196. *PITHECOLOBIUM* Mart. (1840).

a. *Unguiscati* Benth. Stipulae non-nullae spinescentes v. omnes spinescentes. Plinnae 1-jugae v. inaequaliter bijugae. Foliola 1—3-juga. Legumen lineare circinato-contortum, valvulis intus saepe rubris varie tortis. Semina arillo carnoso semiimmersa. Species Americanae. Flores albi v. rosei.

* *Flores spicati.*

1. *P. macrostachyum* Benth. glabrum v. puberulum; stipulis spinescentibus; foliolis oblique ovato-oblongis; spicis elongatis calyce 5-dentato corolla puberula vix triplo breviore. *Inga lanceolata* Kunth mim. t. 15. *In Cumana.* ♀.

2. *P. hymenaeaefolium* Benth. ramulis petiolisque glabris; stipulis spinescentibus; foliolis oblique oblongis glabris; spicis densissimis elliptico-oblongis; floribus adpresso-pubescentibus; ovario piloso. *Inga H. et B.* *In Cumana.* ♀.

3. *P. oblongum* Benth. ramulis petiolisque glabris; stipulis spinescentibus; foliolis oblique ovatis v. ovali-oblongis glabris; spicis cylindraceo-oblongis; floribus adpresso-pubescentibus; ovario glabro. *In Columbia.* ♀.

** *Flores globoso-capitati.*

4. *P. polycarpum* Poepp. et Endl. fusco-vilosum; stipulis minutis spinescentibus; fol. bigeminis; foliolis ovalibus obtuse acuminatis mucronatis basi acutis membranaceis subtus hirti-pilosis; leguminibus irregulariter cochleatis. *Ad Yurinaayuar.* ♀.

5. *P. dulce* Benth. glabrum v. puberulum; stipulis spinescentibus brevibus; foliolis dimidiato-ovatis oblongis obtusis; capitulis canescensibus; ovario villosa. *Inga Willd.* *In Mexico.* ♀.

6. *P. pubescens* Benth. ramulis angulatis petiolisque pubescentibus; stipulis parvis induratis; foliolis oblique ovali-ellipticis oblongis coriaceis pubescentibus; calyce tomentoso 5-dentato corolla tomentosa 4-plo breviore. *Inga DC.* *In Guiana.* ♀.

7. *P. forseux* Benth. Inga Kunth mim. t. 15. ramulis petiolisque glabris; stipulis parvis induratis; foliis oblique oblongis obtusis coriaceis glabris; floribus cano-tomentosis; ovario glabro. *Mimosa rosea* Vahl Ecl. III. t. 25. *In Columbia*. ♂.

8. *P. unguis cati* Benth. ramulis petiolisque glabris; stipulis parvis induratis; foliolis late et oblique obovatis orbiculatisve obtusissimis glabris; floribus glabris v. tomentellis; ovario glabro. *Inga guadelupensis* DC. *In Ind. occ.* ♂.

9. *P. microphyllum* Benth. ramulis petiolisque glabris; stipulis longiuscula spinescentibus; foliolis oblique oblongis ovatisve obtusissimis glabris; floribus glabris; ovario glabro. *Inga H. et K.* *In Guayaquil et Cumana.* ♂.

10. *P. spinifolium* Benth. caule ramosissimo; spinis subconicis; petiolis pubescens glanduliferis; foliis conjugato-pinnatis; foliolis oblique rotundatis nervosis apice recurvato-acuminatis spinulosis; calycibus pubescentibus; legumine tenuiter tomentoso. *Inga Desv.* *In Ind. occ.* ♂.

*** *Pinnae foliolosae bijugae.*

11. *P. circinale* Benth. glabrum; stipulis spinescentibus; foliolis in pinna ultima 2—3-jugis in inferiore 1-jugis obovatis longe mucronatis; floribus minute tomentellis. *Inga circinalis* Willd. *In Ind. occ.* ♂.

12. *P. candidum* Benth. glabrum; stipulis spinescentibus; foliolis bijugis v. 1-jugis oblique obovatis mucronulatis coriaceis; capitulis 6—8-floris; calyce corolla tenui 6—7-plo breviore. *Inga H. et K.* *In Guayaquil.* ♂.

13. *P. excelsum* Mart. ramis pubescentibus; stipulis spinescentibus; foliolis bijugis v. unijugis oblique ellipticis submucronulatis membranaceis puberulis; capitulis globosis longe pedunculatis; calyce corolla tenui puberula octuplo breviore. *Inga Kunth* mim. t. 18. *Ad fl. Magdalena.* ♂.

14. *P. diversifolium* Benth. pubescens; foliolis 2—3-jugis v. 1-jugis obovatis oblongisve utrinque pubescentibus; floribus pubescentibus; calyce corolla 4-plo breviore; ovarii stipite elongato. *In Brasilia.* ♂.

b. *Concordia* Benth. Stipulae nonnullae vel omnes spinescentes, spinae etiam hinc inde axillares. Pinnae 1—2-jugae. Foliola 3—multijuga. Ovarium sessile. Legumen late lineare cochleatum. Species indicae. Flores purpurei.

15. *P. geminatum* Benth. ramulis petiolisque puberulis; foliolis 2—5-jugis cum impari exteriore ad basin pinnae, inaequilateris obovato-oblongis glabris nitidis; calyce corolla glabra 4-plo breviore. *Inga Wight et Arn.* *In Ind. or.* ♂.

16. *P. nitidum* Benth. pubescens; pinnis bijugis; foliolis 4—5-jugis cum impari exteriore ad basin pinnae oblique oblongis mucronatis glabris nitidis; capit. globosis. *Inga Koenigii W. et Ar.* *In Ind. or.* ♂.

17. *P. umbellatum* Benth. puberulum; stipulis parvis pungentibus; spinis hinc inde axillaribus validis; foliolis plerisque 8—10-jugis cum impari ad basin pinnae oblique oblongis obtusis plurinervis glabris; ramulis brevissimis subfasciculatis; capitulis globosis; calyce corolla subtriplo breviore. *Inga umbellata et Concordiana DC.* *In Ind. or.* ♂.

c. *Auaremolemon* Benth. Arbores inermes. Stipulae inconspectae. Pinnae et foliola plurivel multijuga rarissime 1-juga. Pedunc. axillares v. subracemosi. Legumen latum cochleato-contortum. Species Americanae. Flores albi.

18. *P. cochleatum* Mart. glabrum; pinnis sub 1-jugis; foliolis 3-jugis ellipticis acuminatis nitidis; glandula obscura inter omnia paria; floribus pedicellatis glabris; legumine margine exteriore repando. *Inga Willd.* *In Brasilia.* ♂.

19. *P. laetum* Benth. ferrugineo-villosum; pinnis 1—2-jugis; foliolis 1-jugis amplis obovatis v. elliptico-oblongis acuminatis basi subobliquis ad venas villosulis; floribus sessilibus apice rufo-barbatis. *In Brasilia.* ♂.

20. *P. auaremolemo* Mart. glabrum v. glanduloso-puberulum; pinnis 2—3-rarius 4-jugis; foliolis 2—3-jugis ova-

tis v. rhombeis; capitulis globosis; calyce corollo 3-plo breviore; legume late cochleato. *Inga nandinaefolia* DC. M. *cochleocarpa* Gomz. M. *vaga* Arrabida fl. flum. XI. t. 13. In Brasilia. ♂.

21. *P. gunniferum* Mart. glabrum; pinnis 2—5-jugis; foliolis 5—7-jugis anguste ellipticis subtus venosis glaucis; capitulis globosis; floribus pubescentibus; calyce corolla duplo breviore; legumine bis torto. In Brasilia. ♂.

22. *P. trapezifolium* Benth. ferrugineo-tomentellum v. glabrum; pinnis 2—4-jugis; foliolis paucijugis v. 6—8-jugis rhomboe-ovatis valde obliquis; capitulis globosis; floribus/ferrugineo-tomentosis; ovario villoso. *Mimosa Vahl* ecl. 3. t. 28. In Guyana. ♂.

23. *P. Benthamianum* Miquel; puberulum v. glabrum; pinnis 2—3-rarissime 1-jugis; foliolis 2—4-vel 5-6-jugis dimidiato-v. rhomboe-ellipticis v. obovatis obtusis rotundatis coriaceis margine revolutis; capitulis umbellatis; calycibus bracteisque ferrugineo-tomentosis; ovario villoso. In Surinam. ♂.

24. *P. lusorium* Benth. ferrugineo-tomentellum; pinnis 2—5-foliolis 3-6-jugis oblique rhomboe-obovatis glabris; pedunculis rigidis folio longioribus; capitulis ovato-globosis; floribus tomentellis; calyce tubuloso-campanulato brevissime dentato; ovario villoso. *Mimosa fl. flum.* XI. t. 14. In Brasilia. ♂.

25. *P. cyclocarpum* Mart. pinnis 4—9-jugis; foliolis 20—30-jugis exterioribus majoribus acuminatis basi truncatis; glandula in medio petioli; capitulis globosis; legumine margine exteriore sinuato. *In Caracas.* ♂.

26. *P. ficiifolium* Benth. ferrugineo-tomentellum; pinnis 8—12-jugis; foliolis 20—30-jugis oblique falcato-oblengis obtusiusculis glabris v. ciliolatis supra nitidis; capitulis dense globosis; calyce tubuloso ferrugineo-pilos; ovario glabro. *Acacia arborea* Willd. In Mexico. ♂.

27. *P. Langsdorffii* Benth. minute tomentellum; pinnis 5—7-jugis; foliolis 15—25-jugis oblique falcato-oblengis glabris supra nitidis subtus albidis; floribus ferrugineo-tomentellis; staminum tubo inclusio; legumine ar-

cuato margine exteriore sinuato. In Brasilia. ♂.

d. *Clypearia* Benth. Arbores inermes. Stipulae inconspicuae. Pinnae et foliola 1-plurijuga. Glandula in medio v. prope basin petioli. Capitula parva numerosa paniculata. Ovarium stipitatum. Legumen latum cochleato-contortum margine exteriore saepius sinuato.

* Foliola ampla 2—4-juga.

28. *P. bigeminum* Mart. tomentellum demum glabrum; foliolis ovatis oblongis acuminatis demum glabris glandula in medio petioli; calyce corolla duplo breviore 5-dentato; legumine margine exteriore integro. *Mimosa Willd.* *Inga lucida* Wall. In Ind. or. ♂. Arbor elata. — *P. hubatina*: petiolis partialibus eglandulosis. *Inga Wall.* *Mimosa saponaria* Lour. In Pulo Penang.

29. *P. lucidum* Benth. ferrugineo-tomentosum; foliolis ovatis oblongis acuminatis demum glabris glandula in medio petioli; floribus sericeo-pubescentibus in capitulis densis; calyce truncato corolla duplo breviore. *Inga bigeminina* Hook. et Arn. In China ad Macao. ♂.

30. *P. lobatum* Benth. glabrum; foliolis amplis ovali-oblongis v. ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis glandula parva prope basin petioli; floribus puberulis in capitulo 2—3-nis sessilibus; legumine margine exteriore inter semina profunde lobato. *Inga Wall.* *Mim. Iringa Jack.* M. *Diringa Roxb.* In regno Burmannico. ♂.

** Foliola plurijuga. Ovarium villosum.

31. *P. angulatum* Benth. fusco-pubescentis demum glabrum; foliolis 2—3—8-jugis ovato-rhombeis v. ovato-oblengis acuminatis glandula magna ad basin petioli; floribus pedicellatis tomentellis; leguminibus inter semina contractis. *Inga Grah.* *Mim. heterophylla Roxb.* In Ind. or. ♂.

32. *P. Clypearia* Benth. ramulis petiolisque acutangulis; foliolis 3—12-jugis trapezoideo-ovatis obtusis acutisve glandula ad basin petioli; ca-

lyce corolla infundibuliformi triplo breviore; legumine extus sinuato. Inga dimidiata Hook. et Arn. Mim. trapezifolia Roxb. In Sumatra et China. ♀.

33. *P. montanum* Benth. ramulis petiolisque angulatis fusco-pubescentibus; pinnis 7—10-jugis; foliolis 12—20-jugis oblique ovato-oblongis falcatis subtus tomentellis, glandula magna ad basin petioli; floribus tomentellis; legumine extus sinuato. Inga Spanoghe. In Java. ♀.

34. *P. contortum* Mart. ramulis petiolisque teretibus fusco-tomentosis; foliis 12—20-jugis oblique ovato-oblongis obtusis subtus tomentellis; capitulis 3—4-floris; floribus tomentellis; legumine extus sinuato. Inga Wall. In Ind. or. ♀.

35. *P. subacutum* Benth. ramulis petiolisque subteretibus fusco-tomentosis; pinnis 5-7-jugis; foliolis 12-20-jugis oblique trapezoideo-ovatis acutis subtus puberulis; floribus tomentosis. In ins. Philippinis. ♀.

e. *Cathormion* Benth. *Inermia*. Folia Clypariae. Pedunculi in axillis v. in panicula solitarii rarius subfasciculati. Legumen rectum v. cochleato-contortum.

36. *P. moniliferum* Benth. ramulis foliisque junioribus tomentellis; pinnis 1-jugis; foliolis 5—7-jugis oblique ovali-oblongis obtusis subincurvis; floribus glabriusculis; corolla calyce triplo breviore; legumine moniliformi. Inga DC. In ins. Timor. ♀.

37. *P. pruinosum* Benth. primosopuberulum; pinnis irregulariter bijugis; foliolis inaequaliter 3—4-jugis plerisque alternis oblongis v. rhombis; floribus pubescentibus; legumine profunde sinuato. In Nor. Holl. ♀.

38. *P. scutiferum* Benth. glabrum; foliolis 2—3-jugis oblongo-ellipticis v. ovali-oblongis acuminatis glaberrimis; capitulis 2—3-floris; calyce minute dentato corolla subtriplo breviore; ovario glabro. Mimoso Blanco. In ins. Philippinis. ♀.

39. *P. pauciflorum* Benth. glabrum; foliolis 2-jugis ovatis oblongis obtuse acuminatis glaberrimis; calyce corolla 4-plo breviore; ovario stipitato glabro. In ins. Philippinis. ♀.

40. *P. taxiflorum* Benth. glabrum; foliolis 2-jugis ovali-oblongis obtuse acuminatis glabriusculis; glandula in medio petioli; calyce corolla dimidio breviore. Acacia DC. In Timor. ♀.

f. *Caulanthon* Benth. *Inermia*. Stipulae obsoletae v. deciduae rarius persistentes lanceolatae. Pinnae 1—2-jugae. Foliola 1-plurijuga interdum solitaria. Glandulae petiolaris nullae. Pedunculi 1-cephali v. 1-stachyi. Legumen rectum falcatum v. contortum. Species americanæ.

41. *P. unifoliatum* Benth. glabrum; foliolis solitariis ovali-ellipticis obtusissime acuminatis; pedunculis brevisimis; capitulis globosis 10—15-floris; calyce minuto corolla multoties breviore. In Brasilie. ♀.

42. *P. ligustrinum* Benth. glabrum; foliolis 2—3-jugis oblongo-lanceolatis acuminatis basi dimidiatis; pedunculis elongato-spiciferis; calyce corolla glabra infundibuliformi vix triplo breviore. Mimoso Vahl eclog. 3. t. 27. Inga Vahliana DC. In Nov. Grana et ins. Marthae. ♀.

43. *P. divaricatum* Benth. ramulis petiolisque glabriusculis; foliolis 2—3-jugis oblongo-lanceolatis acuminatis basi dimidiatis glabris; capitulis laxis paucifloris; calyce corolla infundibuliformi triplo breviore. In Brasilie. ♀.

44. *P. Cataractae* Benth. glabrum; foliolis 3 oblique lanceolato-oblongis acuminatis basi dimidiato-rotundatis membranaceis; pedunculis brevibus; legumine compresso linearie acuminato. Inga H. et K. Ad *Cataractes Orinocoi*. ♀.

45. *P. glomeratum* Benth. glabrum; foliolis 3 ovato-v. oblongo-lanceolatis acuminatis coriaceis; capitulis multifloris sessilibus subglomeratis; corolla tubulosa calyce glabro multoties longiore. Inga DC. In Guiana. ♀.

46. *P. latifolium* Benth. glabrum stipulis persistentibus lanceolatis acuminatis; foliolis 5 rarius 3 inferioribus alternis extimis oppositis ovato-oblongis v. dimidiatis acuminatis; corollis tubulosis minute puberulis. Inga Willd. In Ind. oec. ♀.

47. *P. Settoi* Benth. glabrum; stipulis minutis; foliolis 3—5-nis remotis oblongis v. ovato-lanceolatis acuminatis basi dimidiato-angustatis; pedunculis supra medium spiciferis; calyce parvo truncato corolla glabra elongata multoties breviore. *In Brasilia.* ♂.

48. *P. Lasiopus* Benth. subpubescentis; stipulis minutis; foliolis 2—3-jugis inaequalibus ovali-oblongis obtuse acuminatis extimis obliquis; floribus pubescentibus; calyce corolla tubulosa multoties breviore. *In Guiana Demerara et Surinam.* ♂.

49. *P. caulinorum* Mart. ramulis petiolisque pubescentibus; stipulis late lanceolatis acutis; foliolis 2—4-jugis ovatis obovatisve subtus pubescentibus; floribus minute puberulis; calyce corolla multoties breviore. *In Brasilia.* ♂.

50. *P. glabratum* Benth. glabrum stipulis parvis; foliolis 2—4-jugis oblique oblongo-lanceolatis v. obovato-oblongis obtusis; floribus vix puberulis; calyce corolla tubulosa multoties breviore. *In Brasilia.* ♂.

51. *P. ramiflorum* Benth. glabrum v. puberulum; stipulis obsoletis; pinnis inaequaliter bijugis; foliolis 5—7-jugis oblique oblongo-rhombeis acuminatis coriaceis nitidis; spicis sessilibus; corolla puberula calyce triplo longiore. *In Bong.* *In Brasilia.* ♂.

g. Samanea Benth. **Arbores inermes.** Stipulae inconspicuae. Pinnae et foliola multijugarius paucijuga. Inflorescentia axillaris v. paniculata. Legumen suberectum v. arcuatum nunquam cochleatum.

* **Axillares.** Capitula majuscula nunc maxima.

52. *P. Saman* Benth. (*Inga Willd.*) pubescens; pinnis 4—6-jugis; foliolis 2—8-jugis ovato-oblongis supra glabris subtus pubescentibus; legume plano, utraque sutura canaliculata. *In Jamaica et Caracus.* ♂.

53. *P. cinereum* Benth. cinereo-pubescentis; pinnis bijugis; foliolis 5—7-jugis oblique ovatis supra glabris subtus pubescentibus reticulatis; capitulis globosis; floribus tomentosis.

Inga H. et K. *In Caracas.* ♂. Arbor maxima.

54. *P. salutare* Benth. ramulis petiolisque tomentosis; pinnis 4-jugis; foliolis 6—9-jugis subrhomboideo-ovatis subtus molliter pubescentibus; capitulis globosis; floribus tomentosis; legumine subtoruloso. *Inga H. et K.* *In Carthagena.* ♂.

55. *P. ferrugineum* Benth. ramulis petiolisque junioribus ferrugineo-tomentosis; pinnis 2—3-jugis; foliolis 6-jugis oblique rhomboeo-ovatis oblongisve coriaceis glabris v. puberulis; floribus ferrugineo-tomentosis. *In Guiana.* ♂.

56. *P. rhombeum* Benth. superne ferrugineo-tomentosum; pinnis 6—8-jugis; foliolis 6—12-jugis oblique rhombeis subcoriaceis glabris v. subtus ad venas puberulis; floribus ferrugineo-puberulis; legumine falcato glabro marginibus incrassatis. *In Brasilia.* ♂.

57. *P. micradenium* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-tomentosis; pinnis 5—8-jugis; foliolis 8—12-jugis oblique rhombeis supra glabris subtus adpresso-puberulis membranaceis; floribus ferrugineo-puberulis; calyce corolla triplo breviore. *In Domingo.* ♂.

58. *P. auriculatum* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-tomentosis; pinnis 5—7-jugis; foliolis 6—10-jugis oblique rhombeis ad angulum interiorem obtuse auriculatis utrinque glabris supra nitidis subtus pallidis; floribus ferrugineo-tomentellis. *In Brasilia.* ♂.

59. *P. adianthifolium* Benth. ramulis petiolisque glabris subglutinosis v. puberulis; foliolis 10—25-jugis oblongis linearibusve valde obliquis hinc basi dilatatis coriaceis nitidis glabris; floribus maximis ferrugineo-tomentellis. *Inga Kunth* mim. t. 21. J. discolor H. et B. *Ad fl. Amazonum.* ♂.

60. *P. Martianum* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-villosis; pinnis 7—9-jugis; foliolis 15—20-jugis oblique oblongo-linearibus falcatis saepe nitidis subtus pallidis glabris v. ciliato-puberulis; legumine elongato arcuato-ferrugineo-tomentoso. *In Brasilia.* ♂.

61. *P. incuriale* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-villosis; pinnis 6—10-jugis; foliolis 15—25-jugis oblique oblongo-linearibus falcatis acutis

subtus rufescentibus margine ciliatis; capitulis densis; floribus ferrugineo-puberulis. Mimosa Arrab. fl. XI. t. 24.
In Brasilia. §.

62. *P. Schomburgkii* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-tomentosis; pinnis 18—20-jugis; foliolis 50—60-jugis parvis linear-i-falcatis subtus ferrugineo-puberulis; glandula petiolaris oblonga; ovario sessili villoso. *In Brasilia.* §.

63. *P. pedicellare* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-tomentellis; pinnis 6—10-jugis; foliolis 20—30-jugis oblongo-linearibus obtusis parum obliquis subtus pubescentibus; glandulis petiolaribus pulvinatis saepe geminis. Inga DC. *In Cayenne.* §.

** *Paniculatae. Flores in capitulis parvis sessiles. Legumen indehiscens. Glandula petiolaris oblonga v. orbiculata.*

64. *P. polycephalum* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-tomentellis; pinnis 8—10-jugis; foliolis 15—25-jugis falcato-oblongis obliquis supra nitidis subtus ferrugineis; floribus ferrugineo-puberulis; ovario pubescente; legumine falcato ferrugineo-tomentoso. *In Brasilia.* §.

65. *P. fragrans* Benth. (Inga Macfd.) glabrum; panicula minute puberula; pinnis 8—10-jugis; foliolis 30—40-jugis oblongo-linearibus falcatis obtusiusculis supra nitidis subtus pallidis; panicula foliosa; ovario tenuissime puberulo flavicante; valvulis inter semina coalitis. *In Jamaica.* §.

66. *P. Berterianum* Benth. glabrum; pinnis 8—12-jugis; foliolis 30—40-jugis anguste linearibus falcatis acutiusculis supra nitidis subtus pallidis; panicula foliosa puberula; ovario sessili puberulo; legumine recto puberulo flavicante. Acacia DC. *In Hayti.* §.

67. *P. multistorum* Benth. glabrum v. puberulum; pinnis 1—4-jugis; foliolis 6—10-jugis oblongo-falcatis v. obliquis basi plurinerviis ciliatis; pedunculis paniculatis; capitulis minimis; ovario glabro. Acacia H. et K. *In Mexico et Guiana.* §.

68. *P. corymbosum* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-tomentosis de-

mum glabratissimis; foliolis 8—12-jugis oblongis obliquis rhombeisque venosis subtus pallidis; floribus in capitulo longe pedicellatis; legumine transverse rimoso. *In Guiana, Surinamo et Cayenne.* §.

69. *P. camosum* Benth. pinnis 3-jugis; foliolis 9—10-jugis ovalibus basi retusis; floribus paniculato-corymbosis; leguminibus acinaciformibus. Inga Willd. *In Jamaica.* §.

h. *Chloroleucon* Benth. Spinae axillares rectae solitariae v. geminae. Stipulae fusco-membranaceae. Pinnae et foliola plurijuga. Capitula subglobosa. Flores sessiles tubulosi. Legumen crassum compressum falcatum transverse septatum.

70. *P. tortum* Mart. glaberrimum; pinnis 3—4-jugis; foliolis 5—9-jugis oblique ovato-oblongis plurinerviis; calyce truncato ore nudo corolla ter breviore. *In Brasilia.* §. Frutex biorgyalis.

71. *P. Vincentis* Benth. ramulis glabriusculis; petiolis puberulis; pinnis 3—4-jugis; foliolis 5—9-jugis oblique oblongis plurinerviis subtus piloso-pubescentibus; calyce 4—5-dentato ore nudo corolla dimidio breviore. *In ins. Vincentii.* §.

72. *P. tenuiflorum* Benth. ramulis petiolisque velutino-pubescentibus; pinnis 3—4-jugis; foliolis 5—9-jugis oblique oblongis plurinerviis utrinque piloso-pubescentibus; calyce minute dentato apice pilosulo. *In Brasilia.* §.

73. *P. Mathewsi* Benth. ramulis petiolisque pubescentibus; pinnis 5—8-jugis; foliolis 15—20-jugis oblique oblongis vix trinerviis supra glabris subtus pubescentibus; calyce truncato corolla triplo breviore. *In Peruvia.* §.

74. *P. dumosum* Benth. ferrugineo-tomentosum; pinnis 3—4-jugis foliolis 9—16-jugis oblique oblongis subtrinerviis sparse pubescentibus; calyce truncato ore pilosulo corolla 3-plo breviore. *In Brasiliu.* §. Frut. 10-ped.

75. *P. parvifolium* Benth. ramulis novellis petiolisque pubescentibus; pinnis 5—9-jugis; foliolis 10—25-jugis oblongis vel linearibus subbinerviis glabris ciliolatis; calyce dentato co-

rolla duplo breviore. *Acacia* Willd. *Inga Marthae* DC. *In Ind. occ.* ♂.

76. *P. foliolosum* Benth. ramulis glabris v. novellis petiolisque pubescentibus; pinnis 7—8-jugis; foliolis multijugis minimis imbricatis oblique oblongis 2—3-nerviis pilosulis; calyce truncata corolla ter breviore. *In Brasilia.* ♀.

77. *P. sericeiflorum* Benth. glabrum; stipulis spinescentibus recurvis; pinnae bijugis; foliolis bijugis oblique obovatis ellipticis rigidis subcoriaceis; capitulis paucifloris ovato-globosis; calyce glaberrimo corollam dense sericeam ter superante. *In Venezuela.* ♀.

78. *P. filamentosum* Benth. glabrum pinnis et foliolis 1-jugis oblique obovatis oblongis coriaceis obtusis; pedunculis elongatis tenuibus; capitulis ovatis; floribus glabris; tubo stamineo inclusu. *In Brasilia.* ♀.

79. *P. turbinatum* Benth. glabrum; pinnis 1-jugis; foliolis 1—2-jugis oblique obovatis v. ovali-oblongis obtusis coriaceis nitidis; pedunculis elongatis; floribus brevissime pedicellatis; calycibus turbinatis corollae dimidium aequantibus. *In Brasilia.* ♀.

80. *P. furcatum* Benth. glabrum v. minute cano-puberulum; pinnis 1-jugis; petiolo communis partialibusque alatis; foliolis 1-jugis obovato-oblongis obtuse acuminatis; spicis ovatis; tubo stamineo longe exerto. *In Mexico.* ♀.

81. *P. longiflorum* Benth. ramulis petiolisque ferrugineo-tomentellis; pinnae sub-5-jugis; foliolis 12—20-jugis oblique rhomboides ad angulum interiorem saepe obtuse auriculatis utrinque glabris ultimis falcato-oblongis; floribus maximis minute ferrugineo-tomentellis. *In Brasilia.* ♀.

82. *P. Timbouva* Mart. glabrum v. pubescens glaucum; pinnis 2—5-jugis; foliolis 10—20-jugis falcato-oblongis dimidiatis mucronato-acutis obliquis 2—3-nerviis venosis; floribus apice puberulis; calyce membranaceo 5-dentato corolla duplo breviore. *Mimosa contortisiliqua* Fl. flum. XI. t.

25. *Enterolobium glaucescens* Mart. *In Brasilia et Jamaicu.* ♀.

83. *P. Blancheti* Benth. ramulis petiolisque minute puberulis; pinnis 2—4-jugis; foliolis 8—12-jugis oblique subrhombo-oblongis obtusis mucronatis obliquis glabris; calyce glabro truncato corolla cano-tomentella dimidio breviore. *In Brasilia.* ♀.

84. *P. ellipticum* Benth. glabrum; pinnis 1-rarius 2—3-jugis; foliolis 4—6-jugis oblongo-v. ovali-ellipticis obtusis inaequilateris basi obliquis coriaceis venosis; floribus sessilibus minute puberulis; calyce corolla dimidio breviore. *In Brasilia.* ♀.

5197. SERIANTHUS Benth. (1843).

1. *S. grundiflora* Benth. *In Ind. or. Otaheiti et ins. Philippinis.* ♀. Arbor inermis ramulis petiolis pedunculisque ferrugineo-tomentellis. Folia bipinnata ampla. Foliola 15—20-juga oblique trapezoido-oblonga obtusa v. retusa 1—3-nervia reticulato-venosa. Flores inter Mimoseas maximis breve pedicellati. Petala lanceolata sesquipollucaria. Filamenta ultra 500 corolla duplo longiora.

5198. INGA Mart. (1840).

a. *Leptinga* Benth. Racemi umbelliformes. Receptaculum globosum. Pedicelli elongati calyce saepe multo longiores rarius calyce ampliore breviores. Flores parvi glabri v. tenuiter puberuli.

1. *I. myriantha* Poepp. et Endl. fl. per. 3. t. 289. ramulis inflorescentiaque tomentellis; fol. glabris; petiolo alato; glandulis maguis; foliolis bijugis elliptico-oblongis acuminatis coriaceis nitidis; tubo stamineo vix exerto. *In Guiana et Peruvia.* ♀.

2. *I. umbratica* Poepp. et Endl. tomentoso-puberula; petiolo interrupte alato; foliolis bijugis amplis ovali-oblongis coriaceis; glandulis magnis; tubo stamineo longe exerto; legume recto plano glabro. *In Peruvia.* ♀.

3. *I. sciadion* Steud. ramulis foliisque glabris; petiolo complete alato; glandulis majusculis; foliolis bijugis

ovatis v. ovali-oblongis breve acuminatis coriaceis nitidis; umbellis brevissime pedunculatis; floribus tomentellis; tubo stamineo breve exserto. *In Surinam.* ♀.

4. *I. brevipes* Benth. superne mollier puberula; petiolo alato; glandulis majusculis; foliolis bijugis ovatis v. oblongis acuminate cordatis coriaceis; umbellis brevissime pedunculatis; floribus tomentosis; tubo stamineo exerto. *In Guiana.* ♀.

5. *I. leptopus* Benth. glabra; petiolo nudo; glandulis parvis v. obscuris; fol. bijugis ovali-ellipticis v. ovato-oblongis coriaceis nitidis; umbellis longiuscule pedunculatis; floribus elongatis glabris; tubo stamineo exerto. *In Peruvia.* ♀.

6. *I. sertulifera* DC. ramulis petiolis pedunculisque ferrugineo-tomentellis; petiolo alato v. nudo glandulis parvis; foliolis bijugis ovatis v. ovato-oblongis coriaceis nitidis glabris umbellis pedunculatis; tubo stamineo subexerto; legumine crasso. *Mimosa coriacea* Pers. *In Guiana et Surinam.* ♀.

7. *I. umbellifera* Steud. (*Mimosa Vahl*) ramulis inflorescentiaque tomentellis; petiolo breve et anguste alato; glandulis scutellatis; foliolis bijugis oblongo-lanceolatis utrinque angustatis coriaceis nitidis; umbellis longe pedunculatis; legumine margine minute tomentello. *In Guiana.* ♀.

8. *I. virgulosa* Desv. ramulis apice tomentosis; petiolo anguste alato; glandulis minutis; foliolis 3—4-jugis parvis ovato-lanceolatis glabris nitidis; umbellis pedunculatis; calyce minuto; tubo stamineo longe exerto. *In Cayenna.* ♀.

9. *I. heterophylla* Willd. glaberrima; petiolo nudo v. anguste alato; glandulis stipitatis parvis; foliolis parvis 1—4-jugis oblongis v. ovato-oblongis acuminate nitidis; floribus glaberrimis tenuibus; tubo stamineo longe exerto. *In Guiana.* ♀.

10. *I. graciliflora* Benth. glaberrima; petiolo nudo; glandulis sessilibus saepè obscuris; foliolis 3-jugis amplis oblongo-ellipticis utrinque acutis subtus ad costam puberulis membranaceis; umbellis in ramis annotinis fasciculatis brevissime pedunculatis; tubo stamineo longe exerto. *In Guiana.* ♀.

11. *I. flagelliformis* Benth. (*Mimosa fl. flum. XI. t. 27.*) glabra; petiolo nudo; glandulis parvis; stipulis falcato-ovatis; foliolis 3—5-jugis oblongo-ellipticis utrinque acutis nitidis coriaceis; pedunculus rigidus elongatus; tubo stamineo corollam aequante. *In Brasilia.* ♀.

12. *I. lateriflora* Miquel; ramulis novellis pedunculisque puberulis; petiolo subcanaliculato, infra juga dilatato; glandulis scutellaeformibus; foliolis 2—3-jugis lanceolato-vel ovato-oblongis attenuato - obtusis coriaceis nitidis; umbellis supra ramulos ternis; calyce apice barbellato corolla 4-plo breviore. *In Surinam.* ♀.

13. *I. quaternata* Poepp. et Endl. glabra; petiolo nudo; glandulis minimis v. nullis; foliolis 4-jugis membranaceis ovato-oblongis acute acuminate basi cuneatis; pedunculus fasciculato-quaternis in panicula terminali pubescente; calyce hispido-pubescente; corolla sericea. *In Brasilia.* ♀.

14. *I. Sellowiana* Benth. glabra; petiolo anguste alato; stipulis linearifalcatis; glandulis parvis; foliolis 2—3-jugis oblongis utrinque angustatis coriaceis nitidis; floribus tubulosis glabris; calyce campanulato parvo corolla 4-plo breviore. *In Brasilia.* ♀.

15. *I. cordistipula* Mart. glabra; petiolo anguste alato; glandulis parvis v. nullis; stipulis late et oblique ovatis; foliolis 1—3-jugis oblongo-lanceolatis utrinque angustatis nitidis; calyce campanulato corolla duplo breviore. *Mimosa plana* fl. flum. XI. t. 10. *In Brasilia.* ♀.

b. *Diadema* Benth. Flores in capitulo globoso longe pedunculato sessiles v. breve pedicellati. Petioli nudi v. angustissime marginati. Glandulae parvae v. obsoletae.

16. *I. nutans* Mart. glabra; foliolis 4—5-jugis ovato-oblongis utrinque angustatis obtusis mucronulatis; pedunculo longo tenui; corolla calyce multoties longiore; tubo stamineo exerto. *Mimosa fl. flum. XI. t. 44.* M. tenuis t. 11. *In Brasilia.* ♀.

17. *I. Diadema* Mart. (*Mimosa fl. flum. XI. t. 45.*) foliolis 4—5-jugis

elliptico-oblongis utrinque angustatis; pedunculo longo tenui; floribus sessilibus. In Brasilia. ♂.

18. *I. schinifolia* Benth. glabra; foliolis parvis 8—12-jugis oblongo-rhombeis subfalcatis; floribus sessilibus tubulosis; calyce ovalo corolla multoties breviore; tubo stamineo inclusu. In Brasilia. ♂.

19. *I. tubifera* Benth. ferrugineo-pubescent; foliolis 6—7-jugis oblique oblongis v. lanceolato-ovatis pubescentibus; pedunculis folio brevioribus; floribus sessilibus; calyce corolla multoties breviore; tubo stamineo subincluso. In Panama. ♂.

20. *I. rufescens* Benth. ferrugineo-villosa; foliolis 4—5-jugis ovali-oblongis basi oblique subcordatis membranaceis pubescentibus; pedunculis folio brevioribus; floribus sessilibus. In Am. austr. prope Varagua. ♂.

21. *I. globulifera* Benth. superne ferrugineo-tomentella; foliolis sub-4-jugis obovali-vel oblongo-ellipticis basi breve cuneatis; pedunculis elongatis; floribus sessilibus; corolla tenuissima calyce puberulo triplo longiore. In Am. austr. ad Veragua. ♂.

22. *I. Iinicui* Schlecht. glabra; foliolis 3-jugis ovali-vel oblongo-ellipticis cuneatis acutiusculis; pedunculis elongatis; corolla calyce puberulo triplo longiore; legumine plano glabro. In Mexico. ♂.

23. *I. Billbergiana* Benth. superne ferrugineo-pubescent; foliolis bijugis ovali-ellipticis basi cuneatis supra nitidis; pedunculis elongatis; floribus sessilibus. Ad Porto bello. ♂.

e. *Burgonia* Benth. Spicae cylindricae. Flores parvi numerosi glabri vel puberuli. Cal. campanulatus corolla pluries brevior. Petioli nudi v. anguste alati. Glandulae sessiles scutellati. Bracteae minutae.

24. *I. tetraphylla* Mart. glabra v. puberula; petiolo angustissime marginato; foliolis bijugis ovatis v. ovato-oblongis obtuse acuminatis coriaceis nitidis; spicis elongatis; tubo stamineo longe exerto. In Brasilia. ♂.

25. *I. guayaquilensis* G. Don; petioli nudis; foliolis bijugis elliptico-oblongis glabris utrinque attenuatis

apice acuminatis; spicis sessilibus solitariis geminiusve. In Guayaquit. ♂.

26. *I. verrucosa* Presl; ramis petiolisque crebre verrucosis; foliolis ellipticis acuminatis coriaceis basi angustatis; glandula urceolata; floribus dense spicatis; corolla calycem duplo superante; tubo stamineo longe exerto. In Brasilia.

27. *I. laurina* Willd. glabra; foliolis bijugis ovatis vel ovato-oblongis obtuse acuminatis coriaceis nitidis; spicis elongatis; calyce corolla 3-4-plo breviore; tubo stamineo inclusu. In Ind. occ. ♂.

28. *I. cylindrica* Mart. glabra vel tomentoso-puberula; foliolis 2—3-jugis anguste oblongis utrinque angustatis; spicis elongatis; calyce corolla 4-plo breviore; tubo stamineo longe exerto. Mimosa fl. flum. XI. t. 9. In Brasilia. ♂.

29. *I. coruscans* H. et B. glabra; foliolis 3-jugis oblongis utrinque angustatis coriaceis nitidis; spicis elongatis; calyce corolla pluries breviore; tubo stamineo vix exerto. Ad fl. Magdalena et in Guiana. ♂.

30. *I. pezizifera* Benth. tomentella; fol. glabris; glandulis maximis peziziformibus; foliolis 4-jugis ovato-oblongis acuminatis coriaceis nitidis; spicis oblongo-cylindricis; calycibus corolla 4-plo brevioribus; tubo stamineo exerto. In Guiana britt. ♂.

31. *I. assimilis* Miquel; ramulis novellis spicisque puberulis; glandulis globoso-urceolatis; foliolis 3—4-jugis glabris lanceolato-oblongis attenuata-ohthus basi acutiusculis subcoriaceis nitidis; spicis aggregatis cylindricis densis; calycibus tomentellis. In Surinam. ♂.

32. *I. polystachya* Benth. glabra v. tomentoso-puberula; foliolis 3—4-jugis ovato-oblongis obtusis v. obtuse acuminatis coriaceis nitidis; spicis numerosis elongatis multifloris; tubo stamineo subexerto. In Brasilia. ♂.

33. *I. tenuifolia* Benth. glabra; foliolis 4-jugis lanceolatis acutis basi angustatis; spicis cylindris; calyce corolla 3-plo breviore; tubo stamineo inclusu. In Brasilia. ♂.

34. *I. marginata* Willd. glabra; petiolo anguste alato; foliolis bijugis elliptico-oblongis acuminatis nitidis; spicis elongatis laxis; calyce corolla pluries breviore; tubo stamineo sub-

exserto; legumine linearis nodoso. *In Guiana.* ♀.

35. *I. Bourgoni* DC. glabra; petiolo sub foliis alato; foliolis 2—3-jugis ovali-oblongis acuminatis nitidis utrinque angustatis membranaceis; spicis elongatis; calyce corolla 3—4-plo breviore; tubo stamineo exerto. *Mimosa* Aubl. guj. t. 358. *Inga alba* DC. *In Guiana.* ♀.

36. *I. semialata* Mart. glabra v. leviter pubescens; petiolo sub foliolis superioribus alato; foliolis 2—3-jugis anguste oblongis membranaceis utrinque angustatis; spicis elongatis; tubo stamineo subexerto. *Mimosa* fl. flum. XI. t. 5. *In Brasilia.* ♀.

37. *I. excelsa* Poepp. et Endl. glabra; petiolo sub foliolis superioribus alato; foliolis bijugis oblongis utrinque angustatis; spicis elongatis; tubo stamineo inclusio; legumine toruloso. *In Brasilia.* ♀.

38. *I. puberula* Benth. hirta-puberula; petiolo anguste alato; foliolis bijugis oblongis utrinque angustatis; spicis elongatis laxis; tubo stamineo inclusio; legumine moniliformi. *In Brasilia.* ♀.

39. *I. pycnostachya* Benth. ramulis petiolisque pilosulis; petiolo alato; foliolis bijugis anguste oblongis longe et obtuse acuminatis utrinque pilosulis; spicis elongatis densis; corolla calyce 4-plo longiore; tubo stamineo inclusio. *In Peruvia.* ♀.

d. *Pseudinga* Benth. Spicae ovatae dense v. longiores basi saepe interruptae. Corolla villosa v. glabra. Legumen planum marginibus elevatis.

* Glabriflorae.

40. *I. sapida* H. et K. glaberrima; petiolo angusto alato; foliolis bijugis elliptico-oblongis acuminatis basi membranaceis; pedunculus brevissimus; spicis ovato-oblongis; floribus parvis; tubo stamineo longe exerto. *In Guiana.* ♀.

41. *I. spinoides* Willd. ramulis hirtis; petiolo inter paria linearis-alato basi nudo; foliolis 4—5-jugis oblongis acuminatis supra nitidis subtus scabriusculis; spicis oblongis brevibus; legumine linearis glabro. *In Caracas.* ♀.

42. *I. albicans* Walp. glaberrima; foliolis bijugis ovato-oblongis utrinque acuminatis coriaceis nitidis; stipulis linearis-lanceolatis falcatis; spicis ovatis densis; calyce tubuloso corollae dimidium aequante. *In Brasilia.* ♀.

43. *I. unijuga* Poepp. et Endl. glaberrima eglandulosa; foliolis 1-jugis oblongis basi valde obliquis coriaceis venoso-marginatis; pedunculus paucifloris; floribus glabris; leguminibus falcatis pubescentibus. *In Brasilia.* Arbor excelsa.

44. *I. hymenaeoides* Desv. foliolis 1—2-jugis ovatis basi obliquis nitidis; petiolis eglandulosis; capitulis axillaris pedunculatis; leguminibus oblongis obtusis rectis margine incrassatis. *In Cayenne.* ♀.

45. *I. capitata* Desv. glaberrima; foliolis bijugis ovatis subacuminatis nitentibus; spicis 2-3 axillaribus ovato-oblongis pedunculatis. *In Cayenne.* ♀.

46. *I. tentiscifolia* Benth. glabra; petiolis obscure marginatis; glandulis nullis; foliolis 2—3-jugis oblongo-lanceolatis obtusis retusive coriaceis supra nitidis; capitulis ovato-globosis densis; floribus tubulosis. *In Brasilia.* ♀.

47. *I. stipularis* DC. foliolis 2—3-jugis ovalibus acutis superne nitidis glaberrimis; stipulis maximis orbicularis persistentibus foliaceis; spicis pedunculatis ovatis. *In Cayenne.* ♀.

48. *I. inaequalis* H. et B. foliolis 4-jugis oblongo-lanceolatis glabris supra nitidis; glandulis intra paria bina superiora; spicis oblongis breve pedunculatis; calycibus corollisque glabris. *Ad Orinocum.* ♀.

49. *I. fraxinea* Willd. foliolis 5-jugis oblongis acuminatis utrinque glabris nitidis; glandulis urceolaribus sessilibus; petiolo pubescente; spicis paniculatis oblongis pedunculatis; calycibus pubescentibus; corolla glabra. *In Brasilia.* ♀.

** *Gymnopodae:* Petiolus apterus. Glandulae scutellatae sessiles. Bracteae calyce multo breviores saepius minuntae v. caducissimae. Corolla sericeo-pubesca v. villosa. Folia glabra v. ferrugineo-tomentella.

50. *I. martinicensis* Presl. symb. t. 42. pubescens; petiolo nudo v. apice

angustissime alato; foliolis bijugis obovatis sparse pilosulis; spinis cylindricis breve pedunculatis; calyce tubuloso strigoso; tubo stamineo inclusio. *Mimosa coriacea* Sieb. In ins. Martinica. ♂.

51. *I. rismiaeifolia* Poepp. et Endl. ramulis teretibus pedunculisque villosi-hirtis ferrugineis; foliolis 3-jugis late ovalibus obtusis basi subcordatis subtus villosis fuscocentibus; spicis hemisphaerico-capitatis longe pedunculatis; corolla strigoso-hirta; staminum tubo exerto. In Peruvia. ♂.

52. *I. lineata* Benth. ramulis petiolis pedunculisque ferrugineo-puberulis; foliolis 3-jugis ovali-ellipticis acuminatis utrinque adpresso-pubescentibus venis numerosis parallelis; spicis ovatis in alabastro subcylindricis; calyce tubuloso campanulato pilosulo. In Peruvia. ♂.

53. *I. Mathewiana* Benth. ferrugineo-puberula; foliolis 5—6-jugis oblongis acuminatis basi longe angustatis ad venas utrinque puberulis cæterum glabris; spicis ovatis; calyce tubuloso pubescente corollae sericeo-villosae dimidium superante. In Peruvia. ♂.

54. *I. paroniana* Benth. ramulis novellis ferrugineo-puberulis demum glabris; stipulis striatis; foliolis 3—4-jugis ovali-v. ellipticis oblongis breve acuminatis subcoriacis; pedunculis fasciculato-paniculatis; spicis ovatis; corolla sericea calyce duplo longiore. In Peruvia. ♂.

55. *I. Riedeliana* Benth. ramulis novellis ferrugineo-puberulis demum foliisque glabris; stipulis parvis deciduis; foliolis 3-jugis ovali-v. elliptico-oblongis breve acuminatis; spicis fasciculato-paniculatis; calyce tubuloso pubescente corollae sericeo-villosae dimidium superante. Ad fl. Amazon. ♂.

56. *I. corymbifera* Benth. ramulis novellis petiolisque ferrugineo-puberulis; foliolis 4-jugis ovali-oblongis acuminatis basi cuneatis subtus puberulis; spicis fasciculato-paniculatis; calyce tubuloso pubescente corollae sericeo-villosae dimidium aequante. In Brasilia. ♂.

57. *I. tenuisfolia* Salzm. inflorescentia ferruginea, foliis subtus albotomentellis; spicis pedunculatis fasciculato-paniculatis oblongis; floribus sessilibus elongato-tubulosis; calyce tubuloso striato corolla sericeo-villosa 3—4-plo breviore. In Guiana et Brasilia. ♂.

58. *I. Humboldtiana* Kunth. ramulis foliisque glabris; foliolis 4-jugis oblongis acutis membranaceis glabris supra nitidis; spicis pedunculatis fasciculato-paniculatis; calyce tubuloso-campanulato adpresso-hispido; corolla sericeo-hirsuta. Ad fl. Magdalena. ♂.

59. *I. juglandinifolia* Willd. ramulis petiolisque ferrugineo-pubescentibus; glandulis nullis; foliolis 3—4-jugis oblongis acuminatis basi angustatis glabris subtus ad venas pubescentibus; spicis in axillis ternis; corollis villosis. In Caracas. ♂.

60. *I. foliosa* Benth. fol. demum glabris; foliolis 5—6-jugis amplis elliptico-oblongis acuminatis subcoriacis nitidis; panicula tomentella; floribus sessilibus; calyce puberulo corollae sericeo-puberulae dimidium subaequante. In Brasilia. ♂.

61. *I. acrocephala* Steud. fol. glabris; foliolis 4-jugis ovali-v. elliptico-oblongis acuminatis nitidis coriaceis; panicula polycephala minute tomentella; floribus sessilibus pubescentibus. In Surinam. ♂.

62. *I. nobilis* Willd. foliolis 3—4-jugis oblongis acutis petiolisque glabris; spicis paniculatis; pedunculis pubescentibus; corollis sericeis. In Brasilia. ♂.

63. *I. leptoloba* Schlecht. puberula; foliolis 3-jugis utrinque lucidis subtus magis puberulis ovato-ellipticis basi acutis cuneatis apice acuminatis; spicis axillaris; corolla pubescente calyce duplo longiore; legumine elevato-marginato. In Mexico. ♂. Fol. maxima.

64. *I. punctata* Willd. foliolis 2—3-jugis oblongis acuminatis coriaceis nitidis supra glabris subtus sparse pilosulis; petiolo strigoso; spicis paniculatis; corollis sericeis villosis. In Martinica et Caracas. ♂.

65. *I. splendens* Willd. foliolis bijugis oblongis acuminatis nitidis utrinque petiolisque glabris; spicis axilla-

ribus geminatis; corollis sericeo-villosis. *In Brasilia.* ♂.

66. *I. leiocalycina* Benth. foliolis bijngis ovali-oblongis acuminatis basi cuneatis nitidis utrinque sparse pilosulis venis petiolisque villosis; pedunculis gracilibus; calycibus glabris corollae sericeo-villosae dimidium aequantibus. *In Guiana.* ♂.

*** *Pilosiusculae.* Petiolus alatus v. marginatus. Glandulae sessiles urceolatae v. scutelliformes. Spicae ovatae v. ovato-globosae. Corolla sericeo-villosa. Foliola nitida juniora utrinque pilosiuscula.

67. *I. multiflora* Benth. petiolo marginato rapisque glabriusculis; foliolis ovali-ellipticis acuminatis coriaceis nitidis; pedunculis fasciculatis tenuibus; spicis ovato-globosis; calyce striato corollae hirsutissimae dimidium aequante. *In Brasilia.* ♂.

68. *I. stenoptera* Benth. rufo-pubescent; petiolo anguste alato; foliolis bijugis oblongis acutis nitidis sparse pilosis demum glabratis; spicis ovato-globosis paucifloris; calyce puberulo corollae hirsutissimae dimidium aequante. *In Brasilia.* ♂.

69. *I. peduncularis* Benth. ramulis pedunculis petiolisque minutissime puberulis; petiolo superne angustissime alato; foliolis bijugis angulis ovatis acuminatis basi cuneatis coriaceis nitidis utrinque sparse pilosis; pedunculis fasciculatis; spicis ovatis; calyce adpresso-piloso corollae sericeo-villosae dimidium aequante. *In Brasilia.* ♂.

70. *I. pilosiuscula* Desv. ramulis petiolisque pilosulis; petiolo alato; foliolis bijugis ovatis v. ovato-oblongis acuminatis coriaceis nitidis; pedunculis fasciculatis; spicis oblongis; calyce tubuloso corollae hirsutissimae dimidium aequante. *Mimosa lucida* Vahl ecl. am. t. 24. *In Guiana et Surinam.* ♂.

71. *I. setigera* DC. rufo-pubescent; petiolo alato; foliolis bijugis amplis ovatis acuminatis coriaceis nitidis utrinque rufo-pilosis; spicis ovatis; calyce tubuloso pilosulo corollae hirsutissimae dimidium aequante; legumine mar-

ginibus elevatis. *I. platycarpa* Benth. *In Essequebo.* ♂.

72. *I. acuminata* Benth. glabra v. pilosiuscula; petiolo late alato; foliolis 2-3-jugis ovato-lanceolatis acuminatis basi cuneatis glabris nitidis; spicis ovato-globosis; calyce tubulos longe acuminato corolla hirsutissima triplo breviore. *In ins. Trinitatis.* ♂.

73. *I. nitida* Willd. ramulis hirtis; petiolo alato; foliolis bijugis oblongo-lanceolatis utrinque nitidis subtus pilosulis; spicis oblongis longe pedunculatis; corollis villosis. *In Brasilia.* ♂.

74. *I. quassiaefolia* Willd. foliolis bijugis ovato-oblongis acuminatis utrinque nitidis glabris; petiolo undique alato; spicis axillaribus pedunculatis; corollis villosis. *In Brasilia.* ♂.

75. *I. chartacea* Poepp. et Endl. ramulis foliisque glabris; petiolo alato; foliolis 3-jugis ovali-vel obovali-ellipticis acuminatis rigidis nitidis; spicis longe pedunculatis subglobosis densis; calyce pilosulo corollae sericeo-villosae dimidium aequante. *In Brasilia.* ♂.

76. *I. maritima* Benth. ramulis pilosulis; petiolo alato; foliolis 2-3-jugis elliptico-oblongis basi obliquis; supra minute pilosulis subtus hirtellis; spicis ovatis in apice ramorum confertis; calyce adpresso-pubescente corolla sericea dimidio breviore. *In Brasilia.* ♂.

77. *I. Feuilleti* DC. petiolo alato; foliolis 3-4-jugis ovali-oblongis utrinque acutis glabris; spicis subgeminis pedunculatis ovatis; leguminibus longissimis linearibus planis glabris. *Pa-cai Feuill.* 3. t. 19. *I. reticulata* Spr. *In Lima.* ♂.

**** *Leptantheae.* Folia et ramuli juniora saltē hirto-pilosa. Petiolus alatus. Glandulae turbinatae v. stipitatae. Spicae ovato-oblongae laxae saepe interruptae. Flores tenues. Calyx tubulosus membranaceus striatus glaber v. adpresso-pilosus. Corolla apice longe pilosa.

78. *I. Poeppigiana* Benth. ramulis subhirsutis; foliolis 3-jugis ovali-

oblongis acuminatis basi oblique rotundatis supra nitidis margine pilosis; spicis sessilibus oblongis; bracteis ovatis ciliatis; calyce corolla duplo breviore. I. *ciliata* Poepp. et Endl.
In Peruria. ♂.

79. *I. platyptera* Benth. pilis ferrugineis hirta; foliolis 2—3-jugis ovali-vel oblongo-lanceolatis supra nitidis subtus hirtis; spicis oblongis pedunculatis; bracteis lanceolatis acuminatis; calyce tubuloso acuminato hirto corolla hirsutissima dimidio breve. *In Brasilia.* ♂.

80. *I. disticha* Benth. ferrugineo-pilosa; foliolis 4—5-jugis ovali-v. anguste oblongis acuminatis membranaceis demum glabris; spicis interruptis distichis; corolla hirsutissima calycem tubulosum strigoso-hispidum subtriplo superante; legumine ferrugineo-hirto. *In Essequibo.* ♂.

81. *I. leptantha* Benth. pilosa; foliolis 2—4-jugis lanceolatis ultimis longissimis acutis; glandulis tenuibus stipitatis; pedunculis gracilibus; bracteis linearibus; calyce tubuloso piloso corolla hirsutissima triplo breve; legumine piano hirsutissimo. *In Brasilia.* ♂.

82. *I. ciliata* Presl symb. t. 58. pilosula; glandulis stipitatis; foliolis plerumque 4—5-jugis oblique ovali-oblongis acuminatis; pedunculis tenuibus; spicis interruptis; bracteis setaceis; corolla hirsuta tenui; legumine hirsuto. I. *caerulescens* Walp. *In Brasilia.* ♂.

***** *Tulpinae.* Folia et ramuli piloso-hirta. Petiolus alatus v. rarius apterus. Glandulae stipitatae turbinatae v. subulatae. Spicae ovatae densae pedunculatae. Bracteae cadiissimae parvae.

83. *I. restita* Benth. dense rufo-villosa; petiolo aperto; glandulis subulato-stipitatis; foliolis 3—4-jugis elliptico-oblongis acutis utrinque villoso; spicis ovatis; calyce tubuloso strigoso dimidium corollae hirsutissimae subaequante; legumine rufo-vilosissimo. *In Brasilia.* ♂.

84. *I. vulpina* Mart. rufo-villosissima; petiolo alato; glandulis sub-

alato-stipitatis; foliolis 2—3-jugis ovatis oblongis acutis basi oblique rotundatis demum bullato-rugosis; spicis ovatis; calyce hirsuto corollam villosam dimidiata superante; legumine hirsutissimo. *In Brasilia.* ♂.

85. *I. barbata* Benth. dense et longo rufo-pilosa; petiolo alato; glandulis subulato-stipitatis; foliolis 3—4-jugis ovatis bullato-rugosis; spicis oblongis; calyce piloso corollae hirsutissimae dimidio breve. *In Brasilia.* ♂.

86. *I. Guillemainiana* Benth. dense rufo-villosa; petiolo a basi alato; glandulis parvis; foliolis 2—4-jugis elliptico-oblongis acutis basi rotundatis utrinque villoso; spicis ovatis oblongis; legumine rufo villoso. *In Brasilia.* ♂.

87. *I. virescens* Benth. hirtella; petiolo inter paria alato; glandulis parvis crasse stipitatis; foliolis 4—5-jugis ovato-lanceolatis membranaceis demum glabris; spicis ovato-oblongis; bracteis minutis; calyce corollam pilosam parce superante. *In Brasilia.* ♂.

88. *I. Catharinae* Benth. rufo-hirta; petiolo alato; glandulis parvis turbinatis; foliolis sub-4-jugis ovali-vel oblongo-ellipticis; spicis ovato-oblongis; bracteis linearibus calyce paulo brevioribus; corolla rufo-villosa. *In Brasilia.* ♂.

***** *Floribundae.* Petiolus alatus. Glandulae magnae scutelliformes. Spicae oblongae v. dissitiflorae. Calyx puberulus. Corolla sericea.

89. *I. floribunda* Benth. glabra vel villoso; petiolo breve et angusto alato; foliolis bijugis ovali-ellipticis nitidis; spicis oblongis interruptis; calyce tubuloso adpresso pubescente dimidiata corollam sericeam aequante. *In Guiana.* ♂.

90. *I. scabriuscula* Benth. ramulis angustatis foliisque minute scabro-puberulis junioribus ferrugineis; foliolis 4—5-jugis oblongis vel ovali-ellipticis acuminatis membranaceis; spicis dissitifloris; calyce puberulo corolla sericea subtriplo breve. *In Surinam.* ♂.

e. Euinga Benth. *Spicae ovatae* densae v. basi interruptae. *Calyx* tubulosus. *Corolla* villosa. *Leguminis margines* valde dilatati sulcato-incrassati. *Petiolum* alatus rarissime apterus. *Glandulae* scutelliformes v. turbinatae. *Flores* $\frac{1}{2}$ -2 poll. longi.

* *Striatae*. Ramuli teretes vel angulati glabri vel velutino-hirti. Bracteae caducae. Calyx membranaceus striatus glaber v. tenuiter pubescens. Corolla setosa vel hirsutissima.

91. *I. setigera* Poepp. et Endl. ramulis teretibus petiolisque rigido-longisetis; foliolis 5-jugis elongato-oblongis acutis supra hispidis subtus glabris; spicis haemisphaericis; calyce infundibuliformi glabro; cor. apice setosa; tubo staminum longissime exerto. In Brasilia. ♂.

92. *I. bullata* Benth. velutino-hirta; petiolo nudo; glandulis turbinatis; foliolis 2-3-jugis ovatis acuminate bullatis subtus pubescenti-hirtis; spicis ovatis; calyce glabro corolla setosa paulo breviore. In Brasilia. ♂.

93. *I. nuda* Salzm. hirtella; petiolo basi anguste alato; glandulis turbinatis; foliolis 3-4-jugis elliptico-oblongis v. ovato-lanceolatis; spicis ovatis; calyce glabriusculo dimidiam corollam dense villosam vix aequante. In Brasilia. ♂.

94. *I. Salzmanniana* Benth. ramulis angulatis foliisque minute scabro-puberulis; petiolo anguste alato; foliolis 4-5-jugis ovali-vel oblongo-ellipticis acuminatis membranaceis; spicis ovato-oblongis; calyce puberulo dimidium corollae sericeo-villosae vix aequante. In Brasilia. ♂.

95. *I. striata* Benth. velutino-villosa; petiolo alato; foliolis 4-5-jugis ovato-vel oblongo-ellipticis acuminatis; glandulis parvis; spicis ovatis oblongis; calyce puberulo dimidiam corollam sericeo-villosam vix aequante. In Brasilia. ♂.

96. *I. Lindeniana* Benth. ramulis angulatis petiolis pedunculisque rufo-hirsutis; petiolo alato; foliolis 3-jugis amplis ovalibus acuminotis supra hir-

sutis subtus velutinis; spica oblonga; calyce tubuloso striato sericeo-piloso dimidio corollae sericeo-villosae breviore. In Mexico. ♂.

** *Calocephala*. Ramuli crassi angulati ut folia glabri v. hispidae. Bracteae majusculae. Cal. membranaceus striatus glaber v. tenuissime pubescens. Corolla longe tubulosa hirsutissima. Foliola ampla semipedalia ad pedalia.

97. *I. bracteosa* Benth. hirtella demum glabra; petiolo nudo; foliolis 3-jugis maximis amplis ovali-ellipticis basi rotundatis; spicis capitatis; bracteis acuminatissimis; calyce longe cylindrico; corolla calyce duplo longiore. In Guiana. ♂.

98. *I. spectabilis* Willd. petiolo nudo v. angustissime marginato; foliolis bijugis ovatis acutis nitidis glabris; spicis oblongis; bracteis ovato-lanceolatis calyces superantibus; calyce tubuloso corolla hispida triplo breviore. Mimosa Vahl act. Hafn. II. t. 10. In Ind. occ. colit. ♂.

99. *I. pruriens* Poepp. et Endl. rufo-hirsuta; ramulis teretibus; foliolis 2-3-jugis amplis rigidissimis elliptico-ovoovatis obtusis rotundatis basi 1-glandulosis; spicis solitariis sessilibus; calyce corollaque hirsutis. In Peruvia. ♂.

100. *I. fastuosa* Willd. ramulis ferrugineo-hirtis; petiolo alato; foliolis 4-5-jugis ovato-oblongis acutis supra nitidis subtus ferrugineo-hirsutis; calyce longe cylindrico corolla hispidissima duplo breviore. In Cacaracis. ♂.

101. *I. macrophylla* H. et B. subhirtella; petiolo alato; foliolis 3-4-jugis amplis ovatis acutis subcordatis; spicis ovatis; calyce magno cylindrico striato corolla sericeo-hirsutissima subduplo breviore. *I. calocephala* Poepp. et Endl. In Brasilia. ♂.

102. *I. heteroptera* Benth. ramulis foliisque demum glabratis; petiolo alato; foliolis 3-jugis amplis ovali-ellipticis longe acuminatis basi valde obliquis; spicis ovato-capitatis; calyce late tubuloso puberulo corolla hirsutissima duplo breviore. In Brasilia. ♂.

103. *I. brachyptera* Benth. hirtella demum glabra; petiolo sub pari supremo breviter alato; glandulis stipitatis; foliolis 3-jugis amplis ovali-ellipticis acute acuminatis; spicis ovatis; bracteis ovatis acutis calyce magno cylindrico vix brevioribus; corolla sericeo-hirsutissima; legumine hirsutissimo. *In Columbia.* ♀.

104. *I. lucida* H. et K. ramulis foliisque glabris; petiolo sub paribus alato; foliolis bijugis amplis ellipticis subacuminatis basi valde inaequalibus nitidis; spicis elliptico-oblongis; bracteis calycem sericum duplo superantibus; corolla lanuginoso-sericea. *Af. fl. Magdalena.* ♀.

105. *I. fulgens* Kunth. pl. leg. t. 11. glabra; foliolis 2—3-jugis amplis ovali-ellipticis utrinque rotundatis coriaceis nitidis; bracteis ovatis acutis calycem tubuloso-campanulatum duplo superantibus; corolla hirsuto-sericea calyce 3—4-plo longiore. *In Nov. Granata.* ♀.

*** *Calycinae. Spicae pauciflorae. Cal. sessilis crasse coriaceus. Corolla villosissima. Legumen crassissimum falcatum villosissimum margine demum exteriore corrugato verrucoso.*

106. *I. calcina* Benth. rufo-pubescentis; foliolis 6—7-jugis oblongo-lanceolatis acuminatis supra glabriusculis subtus ferrugineo-pubescentibus; spicis interruptis paucifloris; calycibus corollam villosam aequantibus. *In Brasilia.* ♀.

107. *I. sessilis* Mart. (*Mimosa Arabida* fl. flum. XI. t. 11.) rufo-velutina; foliolis 5—7-jugis ovato-lanceolatis acuminatis coriaceis; spicis interruptis paucifloris; corolla pilosissima calyce dimidio longiore. *In Brasilia.* ♀.

**** *Erianthae. Omnia Verarum nisi calyces saepius pedicellati et corollae pilis crispis vel implexis lanatae. Petiolus apterus v. lanatus. Glandulae scutellaeformes.*

108. *I. rubiginosa* DC. ferrugineo-velutina; petiolo nudo; foliolis 4—5-jugis ovatis v. ovato-ellipticis acuminatis subtus ferrugineo-velutinis;

calyce sessili campanulato corolla plus triplo breviore. *In Demerara et Guyenne.* ♀.

109. *I. subnuda* Salzm. ferrugineo-pubescentis; petiolo sub paribus ultimis alato; foliolis 3-jugis ovali-vel oblongo-ellipticis acuminatis subtus ferrugineo-pubescentibus; racemis oblongis; calycibus campanulatis corolla triplo brevioribus. *In Brasilia.* ♀.

110. *I. ingoides* Willd. tomentosa; petiolo inter paria alato; foliis plerisque 4-jugis ovali-oblongis acuminatis subtus tomentosis; pedicellis calyce vix brevioribus; calycibus campanulatis tomentosis corolla dimidio brevioribus; legumine subtereti sulcato. *In Antillis Surinamo et Demerara.* ♀.

111. *I. eriantha* Benth. ferrugineo-velutina; petiolo inter paria alato; foliolis plerisque 4-jugis ovatis obtusis v. acuminatis subtus ferrugineo-velutinis; spicis laxis; calycibus corolla 3—4-plo brevioribus. *In Brasilia.* ♀.

112. *I. acutifolia* Benth. ferrugineo-tomentosa; petiolo inter paria alato; foliolis oblongis v. oblongo-lanceolatis acutis parce hirtellis; spicis elongatis; calycibus campanulatis subsessilibus tomentosis corolla calyce duplo longiore. *In Brasilia.* ♀.

113. *I. Berteriana* DC. velutino-tomentosa; petiolo inter paria alato; foliolis 5—7-jugis oblongis basi inaequilateris subtus velutino-pubescentibus spicis ovatis pedunculatis; calyx amplus tubuloso-campanulato tomentoso corolla paulo breviore. *[In Brasilia.]* ♀.

***** *Verae. Calyces tomentosi sessiles v. breve pedicellati. Corolla pilis longis sericeis adpressis v. patentibus nec crispulis vestita. Petiolus alatus. Ramuli, petioli, pedunculi et nervi foliorum in omnibus pube ferruginea brevi vel velutina vestiti.*

* *Calyx sessilis tubulosus 5-7 rarius 4 lin. longus.*

114. *I. vera* Willd. puberula; foliolis 4—5-jugis ovali-ellipticis acuminatis; spicis oblongis v. interruptis paucifloris; bracteis parvis ovatis;

calyce tubuloso ad duas tertias corollae attingente; legumine tereti sulcato. In Jamaica. ♂.

115. *I. eriocarpa* Benth. ferrugineo-puberula; foliolis 5-jugis ovali-vel elliptico-oblongis vix acuminatis; spicis interruptis paucifloris bracteis ovatis parvis; calyce amplio tubuloso; legumine sulcato dense tubuloso. In Mexico. ♂.

116. *I. spuria* Willd. dense ferrugineo-puberula; foliolis 5—6-jugis oblongis acuminatis hirtellis; spicis oblongis interruptis; bracteis linearibus caducissimis; calyce tubuloso; legumine tereti sulcato. Patria? ♂.

117. *I. Cumingiana* Benth. pube brevi subferruginea; foliolis ovali-vel oblongo-ellipticis acutiusculis utrinque scabro-pubescentibus; pedunculis elongatis supra medium interrupte floriferis; bracteis linearibus diu persistentibus; corolla aureo-villosissima. In Peruvia. ♂.

118. *I. xalapensis* Benth. dense pubescens; foliolis 5-jugis oblongis acuminatis; spicis oblongis; bracteis lanceolatis diu persistentibus calyces aequantibus; calyce tubuloso-campanulato ad duas tertias corollae attingente. In Mexico. ♂.

119. *I. uruguayensis* Hook. et Arn. pube ferruginea velutina; foliolis 4-6-jugis oblongis acuminatis; spicis ovatis densis pedunculatis; bracteis parvis ovatis; calyce anguste tubuloso ad duas tertias corollae attingente. In Uruguay. ♂.

120. *I. insignis* Kunth, mim. t. 13. hirto-tomentosa; foliolis 5-jugis ellipticis acuminatis coriaceis glabris nitidis; spicis oblongis densis; bracteis oblongo-spathulatis calyces aequantibus; calyce turbinato-tubuloso hirto-pubescent corolla sericea duplo breviore; legumine 4-angulari tomentoso. In Quito. ♂.

121. *I. pachycarpa* Benth. pube ferruginea velutina; foliolis 4—5-jugis ovali-vel oblongo-ellipticis acuminatis coriaceis nitidis utrinque hirtis; spicis ovatis densis; bracteis lanceolatis; calyce turbinato ferrugineo-velutino dimidium corollae hirsutissimae superante; legumine 4-angulari tomentoso. In Quito. ♂.

** *Calyx pedicellatus* campanulatus raro 4 lineas excedens.

122. *I. taxiflora* Benth. rufo-velutina; foliolis 5-jugis oblongo-ellipticis acuminatis utrinque hirtellis; pedunculis elongatis interrupte floriferis; bracteis parvis caducis; calyce pedicellato tubuloso velutino dimidio corollae villosissimae breviore. In Peruvia. ♂.

123. *I. ornata* Kunth, mim. t. 14. hirto-tomentosa; foliolis 5-jugis oblongis acutis subcoriaceis supra pubescentibus subtus cano-hirtis; spicis oblongis densis; bracteis caducis; calycibus campanulatis corollae sericeo-villosae dimidium aequantibus; legumine longissimo sulcato. In America austr. ♂.

124. *I. bahiensis* Benth. ferrugineo-puberula; foliolis 5-6-jugis ovali-ellipticis oblongis acuminatis utrinque hirtellis; spicis brevibus pedunculatis oblongis; calycibus brevissime pedicellatis campanulatis corolla subtriplo brevioribus. In Brasilia. ♂.

*** *Calyx sessilis* campanulatus, raro 4 lineas excedens.

125. *I. Luschnathiana* Benth. puberulo-ferruginea; foliolis sub-4-jugis ovali-vel obovali-oblongis obtusiusculis; spicis interruptis; bracteis orbicularis parvis; calyce breviter campanulato velutino corolla hirsutissima quintuplo breviore. In Brasilia. ♂.

126. *I. affinis* DC. ferrugineo-velutina; foliolis 4—6-jugis oblongis v. ovali-ellipticis acuminatis v. obtusis; spicis oblongis; calyce sessili velutino corollae sericeo-vilosissimae dimidio breviore; legumine latissime marginato, tomentoso. In Brasilia. ♂.

127. *I. ornifolia* H. et K. ramulis hirto-tomentosis; foliolis 5-jugis lanceolato-oblongis utrinque molliter pilosis supra nitidis; legumine compresso densissime hirto-tomentoso margine incrassato sulcato et undulato. In Quito. ♂.

128. *I. velutina* Willd. fol. pinna-tis 4-jugis; foliolis ovatis acutis utrinque molliter pubescentibus supra nitidis, glandula inter omnia paria; petiolo alato; corollis villosis. In Brasilia. ♂.

129. *I. edulis* Mart. ferrugineo-puberula; foliolis 4—5-jugis oblongo-vel ovali-ellipticis acuminatis membranaceis; pedunculis fasciculatis; spicis oblongis; calyce tubuloso-campanulato corolla subtriplo breviore; legumine tomentoso longo subtereti sultato. *Mimosa Yuga* Arrab. fl. flum. XI. t. 3. *In Brasiliu.* ♂.

130. *I. fasciculata* Poepp. et Endl. ferrugineo-velutina; foliolis 4-jugis ovalibus v. elliptico-oblongis subtus ferrugineo-phberulis; spicis pedunculatis fasciculatis oblongis; calyce tubuloso-campanulato tomentoso corolla sericeo-villosa dimidio breviore; legumine lato demum glabro. *In Peruvia.* ♂.

131. *I. conferta* Benth. tenuiter puberula; foliolis 5—6-jugis ovali-ellipticis oblongis acuminatis; spicis pedunculatis fasciculatis superioribus corymboso-confertis; bracteis ovato-lanceolatis; calyce tubuloso-campanulato tomentoso dimidium corollae sericeo-villosae aequante. *In Peruvia.* ♂.

Species quoad sectiones dubiae.

132. *I. angustifolia* Willd. petiolo alato; glandulis parvis sessilibus; foliolis 4—9-jugis lanceolatis acuminatis utrinque nitidis; legumine lineariter piano glabro. *Ad Bracamores.* ♂.

133. *I. Bonplandiana* H. et K. fol. glabris; petiolo alato; foliolis 5-jugis elliptico-oblongis acutis subcordatis subcoriaceis glabris supra nitidis; floribus spicatis sessilibus; corolla calyce duplo longiore sericea; legumine glabro marginibus incrassatis. *Ad Bracamores.* ♂.

134. *I. thyrsoidea* Desv. foliolis 3-jugis ovatis glabris subtus venosis; petiolo subnudo apice articulationum subalato; ramis angulatis cinereis; floribus thyrsoideis. *In Guiana.* ♂.

135. *I. Thibaudiana* DC. foliolis 4—5-jugis ovato-oblongis acuminatis superne nervo excepto glabris subtus petioli pedunculisque pubescentibus; petiolo apice alato; spicis geminis oblongis subpatentibus; corollis sericeo-pubescentibus. *In Cayenne.* ♂.

136. *I. gladiata* Desv. foliolis 4-jugis obliquis ovatis abrupte acuminatis supra subasperis subtus rugoso-

pubescentibus glandulis maximis culpuliformibus; spicis axillaribus penduculatis; leguminibus compressis falcatis aureo-pubescentibus rostratis. *In Guiana.* ♂.

137. *I. rhoifolia* Willd. petiolo alato foliolis 5-jugis oblongis acuminatis supra hirtis nitidis subtus villosis; ramis ferrugineo-tomentosis. *In Brasiliu.* ♂.

138. *I. sericea* Mart. ramis pubescentibus inermibus apice floribus nudis cauo-tomentosis; fol. duplikato-pinnatis multifoliolatis; pinnis 8—20-jugis, pinnulis 35—45-jugis; foliolis oblongis obtusis margine subciliatis; capitulis 4—5-floris in racemo terminali; staminibus elongatis purpureis. *In Mexico.*

139. *I. laevigata* Mart. et Galeott. foliolis subdimidiato-ovali-ellipticis retusis subnitidis laevigatis; petiolo communis glabro sulcato; pedunculis axillaribus solitariis folium aequantibus; floribus capitato-congestis; corolla 5-fida crocea. *In Mexico.* ♂.

140. *I. speciosa* Mart. et Galeott. purpurco-pubescentis; fol. bipinnatis 6—7-jugis breve petiolatis; foliolis sub-20-jugis oblique ovato-ellipticis acutis subtus adpresso-pilosis; floribus semigloboso-congestis; corolla villosopurpurea calyce campanulato 5-plano breviore; staminibus longe exsertis puniceis. *In Mexico.* ♂.

141. *I. elegans* Mart. et Galeott. molliter hirsuta; fol. bipinnatis, pinna 15—20-jugis; foliolis multijugis imbricatis linearibus dense ciliatis; capitulis subtrifloris pedunculatis thyrsideo-racemosis; pedunculis floribusque albo-sericeis. *In Mexico.* ♂.

142. *I. villosa* Mart. et Galeott. inermis; fol. bipinnatis; pinnis 2—3-jugis; foliolis 15—20-jugis subdimidiato-oblongis sericeo-cano-villosis; capitulis paucifloris axillaribus folio longioribus; staminibus purpureis longe exsertis. *In Mexico.* ♂.

143. *I. nitens* Mart. et Galeott. fol. conjugato-pinnatis, pinnis foliolata gerentibus; foliolis nitidis glaberrimis obliquis oblongis obtusis; staminibus elongatis purpureis. *In Mexico.* ♂.

144. *I. leucantha* Presl. ramis punctatis albidis; spinis petiolaribus rectis; fol. conjugato-pinnatis; foliolis obliquis oblongis v. lanceolatis ob-

tusis glabris membranaceis; capitulis globosis subgeminis racemosis; floribus sericeis. In Martinica. ♂.

145. *I. tenerensis* Zolling. arborea; ramulis velutinis angulatis; pinnis conjugatis; foliolis 5—7 alterius rhomboeō-ovatis; glandulis inter pinnas et foliolum ultimum; umbellis longe pedunculatis; pedicellis filiformibus. In Java. ♂.

146. *I. subfulcata* Zolling. ramulis pedunculisque angulatis tenuissime velutinis; pinnis sub-14-jugis; glandulis sessilibus inter omnia paria; foliolis usque ad 20-jugis supra nitidis subtus villosulis falcato-linearibus acutis; floribus subumbellatis. In Java. ♂.

147. *J. pubiramea* Steud. pubescens; fol. 5-jugis; foliolis linearioriblongis acutis glabris, glandulis interpetiolaribus cupuliformibus; pedunculis umbelliferis multifloris; corollis pubescentibus; staminibus longissimis alte monadelphis. In Surinam. ♂.

148. *I. purpurascens* Hasskrl. fol. bipinnatis; pinnis 11—18-jugis; pinna 15—45-jugis dimidiato-oblongis acutis; glandulis maximis; capitulis pedunculatis in ramis subaphyllis axillaribus; floribus albidis. In Java. ♂.

5199. ALFONSEA Hilar. (1832.)

1. *A. juglandifolia* Hilar. fol. abropte pinnatis; foliolis 4-jugis; racemis longe pedunculatis. Benth. in Hook. journ. V. t. 1. In Brasilia. ♂.

2. *A. densiflora* Benth. fol. glabris; petiolo nudo; foliolis 3—4-jugis oblongis acuminatis coriaceis nitidis planis; spica ovoidea densa pedunculo sublongiore. In Brasilia. ♂.

2. *A. comosa* Benth. hirtella; petiolo superne alato; foliolis bijugis oblongis v. oblongo-ellipticis coriaceis nitidis planis; racemo ovoideo pedunculo subbreviore. In Brasilia. ♂.

4. *A. bullata* Benth. rufo-hispida; petiolo alato; foliolis 3—5-jugis oblongo-lancolatis supra sparse pilosis demum glabris bullatis; spicis densis ovoideis pedunculo sublongioribus. In Brasilia. ♂.

5200. DIDYMANDRA Willd. (1805.)

1. *D. purpurea* Willd. fol. oblongo-lanceolatis acuminatis. Synzyganthera R. et P. In Peruvia. ♂.
2. *D. dentata* Spr. In Brasilia. ♂.

5201. OPHIOXYLON L. (1747.)

1. *O. Serpentinum* L. fol. oppositis ternis 4-visque lanceolatis acuminatis integerrimis glabris. Rumph. 7. t. 16. Wendt in Roem. arch. I. t. 7. f. 2. Wight ic. t. 849. In Zeylona. ♂.
2. *O. majus* Haskrl. In Java. ♂.

5202. KERNERA Willd. (1805.)

1. *K. antarctica* Schult. caulinibus ramosis annulatis; fol. approximato-alternis linearibus truncatis bidentatis; stipula intrafoliacea truncata brevissima. Caulinia R. Br. Ruppia Labill. nov. holl. t. 264. In Nov. Holl. 4.

2. *K. spinulosa* Schult. caule repente; fol. oppositis petiolatis ovali-oblongis integerrimis. Caulinia R. Br. In Nov. Holl. 4.

3. *K. ovalis* Schult. caule repente; fol. oppositis petiolatis ovali-oblongis integerrimis. Caulinia R. Br. In Nov. Holl. 4.

4. *K. serrulata* Schult. fol. linearibus apice rotundatis extrorsum serrulatis; stipula intrafoliacea truncata brevissima. Caulinia R. Br. In Nov. Holl. 4.

5. *K. oceanica* Schult. fol. distichis loriformibus linearibus obtusis basi vaginæ complicatae inarticulatis; rhizomate longissimo dense paleaceo-setoso. Caulinia dict. Sc. nat. cab. 36. Posidonia Spr. Ad mare mediterr. 4.

6. *K. nodosa* Schult.

5203. CEROXYLON.

1. *C. alpinum* et *andicola* H. et K. est Iriatea andicola Mart.

5204. HERITIERA Ait. (1829.)

1. *H. littoralis* Dryand. fol. elliptico-oblongis ovatisque obtusiusculis.

Rheede mal. 6. t. 21. Rumph. amb. 3. t. 63. Balanopteris Tothila Gaertn. t. 99. H. Fomes et minor DC. In Nov. Holl. ♂.

2. *H. attenuata* Wall. fol. lanceolatis acuminatis. In Martabania et Tenasserim. ♂.

5205. PARIETARIA L. (1747).

1. *P. officinalis* L. fol. oblongis utrinque attenuatis integerrimis triplinerviis utrinque pubescentibus; floribus dichotomie glomeratis; involucris 2—3-phylis. E. B. t. 879. Fl. dan. t. 521. Schk. t. 344. Hayne Arzg. 5. t. 12. Sturm 9. In Europa. ♂.

2. *P. diffusa* M. et K. caule procumbente diffuso; fol. ovalibus; glomerulorum ramis 3-floris; involucris 7—9-fidis 3—5-floris; flore medio femineo, lateralibus hermaphroditis. *P. judaea* Schk. t. 346. In Europa et Caucaso. ♀.

3. *P. indica* L. fol. ovato-oblongis acuminatis integerrimis repetito-3-plinerviis scabris; floribus dense glomeratis; involucris diphyllis subulatis elongatis. In Ind. or. 4.

4. *P. debilis* Forst. fol. ovatis obtusiusculis; pedunculis 3-floris; involucro 1—2-phyllo, foliolis linearibus; caule erectiusculo. In Nov. Zeelandia. ♀.

5. *P. lusitanica* L. fol. ovatis acutiusculis integerrimis cauleque pubescentibus; floribus axillaribus aggregatis; involucris 3-floris 6-partitis; laciniis lanceolatis acuminatis. *P. punctata* Willd. *P. cretica* Loisl. Barrel. ic. t. 24. In monte Athos. ♀.

6. *P. cretica* L. fol. rhomboeo-ovatis integerrimis obtusiusculis glabris; floribus aggregatis; involucris 3—5-floris 5-fidis compressis; laciniis lateralibus majoribus. In Graecia. ♂.

7. *P. alsinifolia* Delil. fol. longe petiolatis ovatis obtusiusculis cauleque pubescentibus; floribus inferne subaggregatis superne spicatis; involucro 3-phyllo florem superante; foliolis ovalibus. In Aegypto. ♂.

8. *P. pensylvanica* Mühlens. fol. lanceolatis obtusiusculis 3-plinerviis cauleque pubescentibus; floribus fasciculatis; involucris 1-floris sub-3-phylis florem superantibus; foliolis linearibus. In Pennsylvania. ♂.

9. *P. floridana* Nutt. fol. ovalis obtusis petiolos aequantibus; floribus glomeratis; involucris sub-3-phylis flores aequantibus. In Florida. ♀.

10. *P. polygonoides* Willd. fol. subsessilibus lineari-lanceolatis floribusque glomeratis incano-villosis involucris 4-fidis flores superantibus, laciniis inaequalibus linearibus, Martyn cent. pl. rar. t. 8. In Armenia. ♀.

11. *P. mauritanica* Durieu; erecta ramosa; fol. papyraceis late ovatis basi rotundatis v. cordatis apice subcaudatis punctulatis; cymulis repetitodichotomis multiorbis; floribus masculinis campanulatis; perigonis 4-partitis, laciniis ovatis fimbriato-ciliatis pellucidis. In Algeria. ♂.

12. *P. squalida* Hook. setoso-pubescentis setis basi bulboso-incrassatis; caule prostrato angulatim flexuoso ramoso; fol. parvis breve petiolatis late ovato-cordatis integerrimis utrinque setoso-pubescentibus; floribus glomeratis 3-bracteatis, bracteis oblongis obtusis dorso setosis. In Van Diemenland. ♂.

13. *P. micrantha* Ledeb. ic. fl. ross. t. 22. caulinis caespitosis flaccidis ramosissimis foliisque subcordato-ovatis suborbiculatisve acutiusculis integerrimis pilosiusculis; pedunculis bifidis; involucris 7-phylis 3-floris; foliolis oblongo-linearibus. In Sibiria uralensi. ♂.

14. *P. Soleirolii* Spr. caule repente radicante; fol. obliquis subrotundis pilosis; involucro subnullo; floribus 3—4-fidis. Helxine Requiem. In Corsica. ♂.

15. *P. filiformis* Ten. In ins. Caprae. ♂.

16. *P. gracilis* Lowe ex Steud. In Madera.

5206. ATRIPLEX L. (1747).

Sect. I. *Euatrichlex*. Cal. 3—5-sepalus. Stamina 3—5. Antherae subrotundae.

a. *Dichospermum* Dumort. Flores monoici. Cal. nullus; semen verticale vel 5-phyllo; semen horizontale. Testa subcrustacea. Radicula infera sublateralis vix adscendens.

1. *A. nitens* Rebent. caule angulato-striato ramoso; fol. patulis tri-

angularibus acuminatis supra nitidis subtus lepidoto-argenteis inferioribus subhastatis superioribus deltoideis subauriculatis; bracteis ovatis acuminatis integerrimis reticulatis. Schk. t. 348. A. acuminata W. et K. hung. t. 103. A. micranthum Kar. et Kir. In Europa. Ⓛ.

2. A. Aucheri Moq. in DC. prodr. 13. (1849.) p. 91. fol. alternis trianguli-deltoides obtusis tenuibus supra nitidis subtus leproso-argenteis cinerascentibus supremis lanceolatis; bracteis demum ovatis obtusiusculis integerrimis crassiusculis non reticulatis. In Persia. Ⓛ.

3. A. hortensis L. fol. alternis petiolatis adscendentibus hastato-deltoides cordato-triangularibus acutis integerrimis vel basi grosse dentatis laete viridibus, superioribus ovato-lanceolatis obtusis mucronulatis integerrimis reticulato-venosis. Sturm h. 79. Schk. t. 349. fruct. In Europa et Sibiria. Ⓛ.

4. A. microtheca Moq. subramosa; fol. breve petiolatis adscendentibus ovato-lanceolatis obtusiusculis integerrimis tenuibus subtus farinosis glauca, inferioribus deltoideo-hastatis; bracteis demum rhombo-ovatis acutis integris subscoriaceis. A. veneta Moq. In hort. culta. Ⓛ.

5. A. Olivieri Moq. caule terebratissimo; fol. petiolatis vel sessilibus deltoideo-oblongis v. ovato-lanceolatis obtusis sinuatibus supra glabris subtus farinosis albis. In Persia. Ⓛ. 2-ped. glaberrima alba.

b. *Teuillopsis* Dumort. (*Schizotheca* Mey.) Flores monoici; in feminis omnibus bracteae fructiferae inferne saepius connatae. Cal. nullus et sem. verticale. Testa coriacea. Radicula lateralis adscendens.

* Folia incisa sinuata aut dentata.

6. A. rosea L. caule adscendente angulato ramoso; fol. breve petiolatis alternis rhombis v. rotundato-ovatis obtusis inaequaliter sinuato-dentatis pulvulerulentis incanis subtus argenteis superioribus ovatis; bracteis demum triangulari-rhombeis margine angulato-dentatis subcartilagineis. Fl. dan. t.

1284. A. axillaris et polysperma Ten. A. alba Scop. insubr. t. 8. In Europa, Asia, Africa et Nov. Holl. Ⓛ.

7. A. Pumilio R. Br. caule adscendente ramosissimo; fol. sessilibus divaricatis ovatis obtusis paucidentatis farinoso-squamulosis albidis; bracteis demum ovatis obsolete mucronatis. In Nov. Holl. Ⓛ.

8. A. crassifolia Moq. prostrata vel adscendens; fol. petiolatis trianguli-ovatis subhastatis sinuato-dentatis succulentis; bracteis demum subtripartitis margine denticulatis disco acute tuberculosis carnosis. A. crassifolia C. A. Mey. in Ledeb. ic. t. 42. In Sibiria altaica. Ⓛ.

9. A. laciniata L. patula ramosa; fol. infinitis oppositis, caeteris alternis petiolatis patulis subhastato-deltoides acutis incisis vel profunde dentato-sinuatis supra viridibus subtus argenteo-pulverulentis; bracteis demum rhombeis acutis nervosis cartilagineis. A. laciniatum et Thunbergianum R. et S. Sturm h. 80. A. incisa Bieb. A. recurva Urv. A. diffusa Ten. In Europa et America. Ⓛ.

10. A. Purshiana Moq. adscendens subramosa; fol. petiolatis triangulari-hastatis integris sinuatisque lepidoto-punctatis viridibus; bracteis demum rhomboideis acutis margine integerrimis dorso crassiusculis. A. laciniata Pursh. In Am. bor. Ⓛ.

11. A. micrantha Moq. herbacea ramosa; fol. alternis petiolatis triangulari-subhastatis subintegerrimis crassiusculis cauescentibus; bracteis demum ellipticis v. orbiculatis integerrimis acutis disco laevibus. Ledeb. ic. t. 43. In Sibiria. Ⓛ.

12. A. catolica Rafin. caule prostrato vel adscendente sulcato-angulato valde ramoso; fol. triangulari-hastatis divaricatis sinuato-vel inciso-dentatis tenuibus glaberrimis utrinque laete viridibus; bracteis hastato-deltoides longe acuminatis argute inciso-dentatis foliaceis. A. hastata Koch. Sturm h. 79. Rch. ic. t. 16. In Europa. Ⓛ.

13. A. hastata L. caule erecto sulcato-ramoso; fol. petiolatis triangulari-hastatis latissimis obtusiusculis dentatis v. integerrimis glabris v. subfarinosis utrinque viridibus supremis lanceolatis integerrimis; bracteis demum triangulari-deltoides denticulatis

disco submuricatis. Schk. t. 348. A. *latifolia* Wahlenb. A. *deltoides* E. B. t. 2860. A. *triangularis* Willd. A. *Sackii* Rostk. et Schum. fl. Sedin t. 1. A. *microperma* W. et K. hung. t. 251 non 221. A. *ruderale* Wallr. A. *oppositifolia* DC. In *cultis et ruderatis Europ. et Americ.* Ⓛ.

14. A. *patula* L. caule erecto v. prostrato sulcato ramoso; fol. petiolatis subdeltoido-lanceolatis acutis sub-integris glabris laete viridibus superioribus lanceolatis integerrimis supremis linearibus; bracteis demum hastato-rhombeis denticulatis subcoriaceis. Sturm h. 79. A. *angustifolia* Sm. Var. β . *microcarpa* Koch. — γ . *mixta* Moq. Fl. dan. t. 1285. — δ . *obtusa* Charn. In *Europa, Africa et ins. Azoricis.* Ⓛ.

15. A. *tectorum* L. caule erecto ramosissimo; fol. subpetiolatis linearilanceolatis obtusiusculis tenuibus glabris viridibus inferioribus argute dentatis supremis integerrimis; bracteis demum rhomboe-ovatis integris subcoriaceis. Fl. dan. t. 1287. Sturm h. 79. A. *salina* Desv. A. *serrata* Huds. A. *angustissima* Wallr. In *Europae incultis et maritimis.* Ⓛ.

16. A. *tatarica* L. caule erecto angulato-striato subramoso; fol. petiolatis adsecundentibus deltoideo-lanceolatis acutis dentatis tenuibus vix farinosis viridibus sinuato-dentatis superioribus lanceolatis; bracteis demum rhomboe-ovatis acutis integris haud reticulatis. A. *oblongifolia* W. et Kit. hung. t. 221. sub *microperma*. A. *campestris* Koch et Ziz. In *Germania Hungaria Tataria et Sibir. altaica.* Ⓛ.

17. A. *australasica* Moq. caule erecto angulato-striato subramoso; fol. alternis petiolatis deltoideo-lanceolatis acutis sinuato-dentatis interdum biauriculatis glabris viridibus inferioribus eroso-dentatis superioribus angusto-linearibus integerrimis; bracteis rhombeis denticulatis disco muricatis vel bituberculatis. In *Nov. Holl.* Ⓛ.

18. A. *Gmelini* C. A. Mey. caule herbaceo striato ramoso; fol. petiolatis adsecundentibus oblongo-linearibus in petiolum attenuatis acutis tenuibus glabris pallide viridibus; bracteis demum deltoideis v. ovato-rhombeis acutis integerrimis disco laevibus. β .

zosteraeifolia Moq. *Chenopodium Hook.* In *Sibiria et Kamtschatka.* Ⓛ.

19. A. *flexuosa* Moq. procumbens ramosa; fol. alternis tenuiter petiolatis divaricatis deltoideis sinuato-dentatis vel lanceolatis subintegris tenuibus utrinque viridibus superioribus punctato-farinosis. In *P. b. S.* Ⓛ.

20. A. *virgata* Roth; erecta striata ramosa; fol. petiolatis oblongo-ellipticis basi attenuatis obtusis repando-dentatis subsfuraceis viridi-flavescens; bracteis demum subcordatis mucronatis margine scabriusculis. In *Ind. or.* Ⓛ.

21. A. *semibaccata* R. Br. procumbens ramosissima; fol. petiolatis oblongis v. obovato-oblongis basi attenuatis obtusis apice dentatis carnosis furfuraceo-farinosis subincanis; bracteis demum rhomboe-ovatis integris nervosis basi subhaccatis. In *Nov. Holl.* Ⓛ.

22. A. *denticulata* Moq. herbacea adscendens ramosissima; fol. petiolatis oblongis obtusis apice denticulatis glaucis subtus pulverulentis; bracteis demum rhombeis acutis sub-integris disco inappendiculatis reticulato-venosis membranaceis. In *Nov. Holl.* Ⓛ.

23. A. *Moquiniana* Webb. caule fruticoso erecto ramoso; fol. alternis tenuiter petiolatis orbiculari-ovatis obtusissimis mucronulatis coriaceis furfuraceis incanis; bracteis demum orbiculari-cordatis vel cordato-reniformibus obtusissimis subdenticulatis subcoriaceis. In *Nov. Holl.* Ⓛ.

24. A. *Verreauxii* Moq. erecta subramosa; fol. petiolatis parvulis divaricatis lanceolatis subdeltoides lepidoto-farinosis cinereis inferioribus acute irregulariter denticulatis; superioribus subintegris. In *P. b. S.* Ⓛ.

** Folia integra aut integerima.

25. A. *laevis* Moq. herbacea ramosa; fol. petiolatis divaricatis anguste oblongis v. linearibus acutis integris tenuibus vix pulverulentis viridibus bracteis demum ovatis acutis subdenticulatis trinerviis tenuibus. A. *laeve* C. A. Mey. in Ledeb. ic. t. 41. In *reg. Altaica.* Ⓛ.

26. A. *cana* Moq. fruticosa suberecta ramosissima; fol. suboppositis

sessilibus linearis-oblongis basi attenuatis obtusis integerrimis crassis coriaceis dense lepidotis cinereo-incanis; bracteis demum obovatis apice subtrilobis integerrimis 1—2-tuberculatis tenuibus. Ledeb. ic. t. 46. In Sib. Altaica. ♂.

27. *A. californica* Moq. fruticosa adscendens ramosa; fol. alternis v. fasciculatis sessilibus lanceolatis acutis integerrimis subcoriaceis pulverulentio-furfuraceis cinerascentibus; bracteis demum rhomboe-ovatis acutis integris subcoriaceis. In California. ♂.

28. *A. mollis* Desf. fruticosa obsoleta angulata ramosa; fol. alternis petiolatis lanceolatis obtusiusculis integerrimis carnosus mollibus pulverulentis argenteo-incanis; bracteis demum rotundatis obtusissimis integerrimis v. basi denticulatis membranaceis. In Canariis et Algeria. ♂.

29. *A. obovata* Moq. fruticosa suberecta ramosa; fol. petiolatis parvulis obovatis ellipticis obtusissimis integerrimis crassis coriaceis pulverulentis canis; bracteis demum triangulari-orbiculatis margine superiore inaequilater denticulatis subcoriaceis. In Mexico. ♂.

30. *A. repens* Roth; caule subanguloso ramoso; fol. petiolatis obovato-cuneatis obtusissimis integerrimis densissime lepidotis-furfuraceis flavescenti-incanis; bracteis demum subrotundis margine superiore dentato-cristatis disco tuberculatis inferne crassissimis margine foliaceis. In Ind. or. ♂.

31. *A. parrifolia* Lowe; fruticosa prostrata ramosissima; fol. alternis subpetiolatis oblongis ovatis v. obovatis obtusis integerrimis v. sinuatis tenuibus pulverulentis incanis cinereis; bracteis acutis integerrimis disco tuberculatis coriaceis. In Madera. ♂.

32. *A. prostrata* R. Br. inferne subfruticosa procumbens ramosa; fol. alternis subpetiolatis ovato-lanceolatis v. oblongis obtusiusculis integrisculis tenuibus subtus farinosis cretaceo-albis; bracteis demum ovato-triangularibus acutis integerrimis nervosis subcoriaceis. A. decumbens R. et S. A. hypoleucum Necs. in pl. Preiss. in Nov. Holl. ♂.

33. *A. dimorphostegia* Moq. herbae erecta v. adscendens angulata ramosa; fol. alternis petiolatis ovatis obtusissimis integerrimis carnosus mollibus utriculis minutissimis cristallinis conspersis subtus cinereis; bracteis demum subcordatis integris coriaceis disco muricatis. In Soongaria Arabia Syria et Algeria. ♂.

34. *A. capensis* Moq. fruticosa erecta ramosa; fol. petiolatis ellipticis v. subdeltae obtusissimis integerrimis subcoriaceis pulverulentis canis; bracteis demum rhombis longe acuminatis margine denticulatis subcoriaceis. A. Halimus R. Br. In Nov. Holl. et P. b. S. ♂.

35. *A. Halimus* L. subfruticosa adscendens ramosissima; fol. alternis petiolatis ovatis deltae in petiolum decurrentibus obtusis integerrimis v. subdentatis subcoriaceis dense cano-lepidotis; bracteis demum reniformibus obtusissimis integerrimis coriaceis. In Europ. Afric. et Amer. bor. ♂.

36. *A. Lindleyi* Moq. fruticosa erecta; fol. rhomboe-ovatis integris squamuloso-incanis; bracteis demum ovatis integris squamulosis. In Nov. Holl. ♂.

c. *Dialysex* Moq. Flores dioici; in femineis omnibus bracteae fructiferae inferne aut ultra mediam partem connatae raro liberae; calyx nullus et semen verticale. Testa coriacea. Radicula lateralis adscendens.

37. *A. isatidea* Moq. fruticosa erecta sulcato-angulata ramosa; fol. alternis petiolatis oblongo-ellipticis ovatis v. obovatis in petiolum attenuatis obtusissimis integerrimis crassis coriaceis densissime lepidotis candidissimis; bracteis obovato-oblongis obtusis integerrimis medio 1—2-tuberculatis. A. Halimus v. erecta Necs. in Nov. Holl. ♂.

38. *A. cinerea* Poir. fruticosa erecta ramosa; fol. alternis subpetiolatis anguste oblongis v. lanceolatis in petiolum attenuatis obtusis integerrimis coriaceis incanis utrinque lepidoto-ci-

nereis; bracteis demum rhombeis integerrimis subcoriaceis. A. Halimus Nees in pl. Preiss. In Nov. Holl. ♂.

39. *A. reniformis* R. Br. caule tereti fruticoso ramoso; fol. alternis petiolatis lanceolatis mucronatis integerrimis coriaceis cano-squamulosis; bracteis demum reniformibus obtusissimis integerrimis subreticulatis membranaceis. In Nov. Holl. ♂.

40. *A. hymenotheca* Moq. fruticosa ramosissima; fol. sessilibus parvulis oblongis utrinque attenuatis integerrimis coriaceis lepidoto-farinosis subincanis rubentibus; bracteis demum rhombeis latis integerrimis subcoriaceis. In Nov. Holl. ♂.

41. *A. paludosa* R. Br. suffruticosa procumbens ramosissima; fol. oblongis attenuatis obtusis integerrimis utrinque pulverulentis glauco-incanis; bracteis rhombeo-ovatis vel cordato-deltoides obtusiusculis integerrimis vel basi denticulatis membranaceis. In Nov. Holl. ♂.

42. *A. Drummondi* Moq. suffruticosa adscendens ramosa; fol. petiolatis oblongis v. obovato-oblongis integerrimis subcoriaceis dense lepidoto-furfuraceis canis, superioribus angustioribus acutis; bracteis demum ellipticas coriaceis. In Nov. Holl. ♂.

43. *A. Griffithii* Moq. fruticosa adscendens ramosa; fol. alternis petiolatis rhombeo-ovatis vel ovato-orbicularibus obtusis integerrimis subcoriaceis lepidoto-farinosis incanis; bracteis demum amplis orbiculari-rhombeis obtusissimis integerrimis. In Afghanistan. ♂.

44. *A. peruviana* Moq. herbacea adscendens ramosa; fol. alternis petiolatis ovatis orbicularibus, vel trianguli-ovatis obtusissimis mucronatis subintegris crassiusculis lepidoto-tomentosis incano-cinereis; bracteis oblongo-rhombeis integris disco dentato-appendiculatis coriaceis. In Peruvia. ♂.

45. *A. chinensis* Colla pl. chil. t. 49. fruticosa adscendens ramosa; fol. alternis petiolatis sagittatis v. rhombeo-hastatis basi cuneatis integerrimis tenuibus molibus farinosis cinereis infimis ovatis obtusis, summis lanceolatis integerrimis. In Chili. ♂.

Sect. II. *Obione* Moq. in DC. prodr. 13. (1849) p. 106. Flores monoici vel dioici. Cal. 4—5-phyllos. Stam. 4—5. Antherae ovatae.

* *Bracteae fructiferae inferne coalitae supra distinctae.*
Testa saepius crustacea.

46. *A. lenticularis* C. A. Mey. herbacea adscendens ramosa; fol. alternis petiolatis ovato-lanceolatis obtusis integerrimis vel subsinuatibus glaucofarinosis; bractearum theca pedicellata ovata obtusa subcoriacea integra. Obione fera Moq. in DC. prodr. In Sibiria. ♂.

47. *A. arenaria* Nutt. herbacea adscendens ramosa; fol. alternis sessilibus oblongo-ovatis obtusis integerrimis tenuibus farinosis albidis, superioribus acuminatis; bractearum theca subsessili subcuneata apice truncata margine denticulata disco muricatoappendiculata coriacea. Obione Moq. In Am. bor. ♂.

48. *A. sibirica* L. herbacea adscendens valde ramosa fol. brevissime petiolatis subrhombico-ovatis basi subcuneatis obtusiusculis mucronulatis integris apice subsinuatibus tenuibus pulverulentis canis; bractearum theca pedicellata cuneato-globosa obtusissima muricata spinulis reflexis indurata. Obione muricata Gaertn. t. 126. f. 5. In Sibiria. ♂.

49. *A. graeca* Willd. suffruticosa adscendens ramosa; fol. alternis brevissime petiolatis divaricatis acutis integris crassis coriaceis utrinque lepidoto-farinosis incanis inferioribus hastatis, summis lanceolatis; bractearum theca disco subappendiculata coriacea. Obione Moq. In ins. Paro, Aegypto et Corsica. ♂.

50. *A. Belangeri* Moq. (sub Obione) suffruticosa adscendens ramosa; fol. alternis sessilibus parvulis rhomboideis integris subsinuatibus tenuibus glauco-subtus farinosis et subincanis; bractearum theca sessili cuneato-spatulata apice dilatata denticulata coriacea. In Persia. ♂.

51. *A. glauca* L. suffruticosa procumbens ramosa; fol. alternis sessilibus parvis divaricatis ovatis v. subrotundis obtusissimis integerrimis subcoriaceis pulverulentis glaucis; bractearum theca sessili rhombeo-deltoid-

dea dentata disco dentato-appendiculata. Dill. eth. f. 46. Obione Moq. In Hispania, Arabia, Algeria et Galilia. ♂.

58. *A. imbricata* Moq. (sub Obione) erecta ramosa; fol. sessilibus parvulis patulis imbricatis cordatis acutiusculis integerrimis coriaceis surfuraceis incanis, inferioribus reniformibus superioribus acutis; bractearum theca sessili rhombea acuta margine integra disco bidentata coriacea. In Bolivia. ♂.

53. *A. spinosa* Moq. (sub Obione) fruticosa erecta valde ramosa; ramis spinescentibus fol. subfasciculatis breve petiolatis obovato-orbiculatis obtusissimis, integerrimis lepidotis incanis; bractearum theca sessili rhombea obtusa margine integra disco appendiculata et obsolete nervosa coriacea. Phyllocarpa Nutt. In Columbia. ♂.

54. *A. Konigii* Moq. (sub Obione), fruticosa procumbens subramosa; fol. petiolatis parvis obovato-orbiculari bus obtusissimis integerrimis subcoriaceis lepidotis incanis; bractearum theca subsessili obovata apice obtusissima margine subsinuata subcoriacea. A. cristata Rottl. A. Konigii Wall. In Ind. or. ♂.

55. *A. leucophylla* Moq. (sub Obione), fruticosa procumbens ramosa; fol. brevissime petiolatis orbiculatis vel ellipticis obtusissimis integerrimis crassis coriaceis utrinque lepidoto-incanis; bractearum theca orbiculari-rhombea obtusa margine subdendata disco bicristata coriacea. In California. ♂.

56. *A. rotundifolia* Domb. (Obione Moq.) herbacea adscendens ramosa; fol. alternis v. oppositis breve petiolatis subtenuis obtusissimis obsolete angulato-dentatis tenuibus puberulis glauco-viridibus; bractearum theca subsessili rhomboeoblonga acuta margine sinuata nervosa foliacea. In Peruvia. ♂.

57. *A. Kunthiana* D. suffruticosa procumbens ramosa; fol. obovatis denticulatis subtus tomentosis; bractearum theca orbiculata margine denticulata disco laevi et tuberculo solitario instructa. Obione Kunthiana et muricata Moq. In Am. austr. ♂.

58. *A. microphylla* D.; herbacea adscendens ramosa; fol. alternis breve

petiolatis obovato-cuneatis obtusis mucronatis apice dentatis vel integerimis crassiusculis subtus farinosis glaucis; bractearum theca subrotunda marginata disco muricata. Obione Moq. A. parvifolia Kunth, In Chile. ♂.

59. *A. crispa* Moq. (sub Obione), fruticosa adscendens ramosissima; fol. alternis minutis deltoideis acutis denticulatis vel integerimis subcoriaceis cano-farinosis; bractearum theca sessili cuneata apice grosse dentata subcoriacea. A. Halimus Ritt. In Hispaniola. ♂.

60. *A. undulata* Moq. (sub Obione), fruticosa ramosissima; fol. alternis breve petiolatis oblongis inferne attenuatis obtusis emarginatis integris coriaceis undulato-crispatis; bractearum theca sessili minuta subrhombaea obtusa margine subsinuata dorso grosse tuberculata. In Patagonia. ♂.

61. *A. Lampa* Gill. fruticosa ramosissima; fol. petiolatis divaricatis oblongis inferne attenuatis obtusis profunde sinuato-dentatis crispato-revolutis lepidoto-incanis; bractearum theca ovato-rhombea v. subcordata sinuato-denticulata reticulato-nervosa. Obione Moq. Prope Mendozam. ♂.

62. *A. cristata* H. et I. suffruticosa ramosissima; fol. breve petiolatis parvis oblongis v. obovato-oblongis basi cuneatis mucronatis linaequilater acute denticulatis subtus glaucis farinosis; theca subrotunda obtusa v. acuta grosse dentata disco bicristata indurato-incrassata. Obione Moq. In Am. austr. ♂.

63. *A. microcarpa* Moq. (sub Obione), herbacea procumbens ramosa; fol. alternis subsessilibus parvis ovalibus obtusis integerrimis tenuibus lepidoto-cinerascentibus; bractearum theca subsessili orbiculata apice mucronulata margine subdentata bicristata incrassata. A. ramosissima Nutt. In Am. bor. ♂.

64. *A. patagonica* Moq. (sub Obione), fruticosa adscendens ramosa; fol. petiolatis oblongis basi attenuatis obtusis sinuato-dentatis crassiusculis coriaceis cano-farinosis; theca orbiculato-cordata obtusa integerrima dorso late bicristata. In Patagonia. ♂.

65. *A. coriacea* Forsk. fruticosa procumbens ramosa; fol. subpetiolatis rotundo-ovatis obtusis integerrimis crassis valde coriaceis cano-farinosis;

theca brevissime pedicellata rhombaea truncata 3-dentata tuberculata. Obione Moq. In Aegypto. ♂.

66. *A. verrucifera* Bieb. suffruticosa adscendens ramosa; fol. oppositis petiolatis oblongo lanceolatis v. spatulatis integerrimis argenteis; theca sessili globose obtusissima margine dentata verrucosa coriacea. Obione Moq. In Sibria et Tauria. ♂.

67. *A. Barclayana* Moq. (sub Obione), herbacea; fol. obovatis obtusis v. acutiusculis longe petiolatis mucronulatis integerrimis subcoriaceis cano-farinosis; theca sessili suborbiculari acuminata grosse dentata incrassata. In California. ♂.

68. *A. portulacoides* L. fruticosa procumbens ramosa; fol. oppositis petiolatis ovato-oblongis obtusiusculis integerrimis crassiustculis lepidoto-pulverulentis argenteo-incanis superioribus linearibus acutis; theca brevissime pedicellata obcordato-cuneiformi tridentata coriacea. Obione Moq. In Europa, Syria et Algeria. ♂.

69. *A. canescens* Nutt. suffruticosa erecta simplex; fol. alternis sessilibus oblongis v. linearis - oblongis basi attenuatis obtusis integerrimis tenuibus lepidoto-farinosis canis; theca brevissime pedicellata cuneata apice dentata disco muricata coriacea. Obione Moq. In Am. bor. ♂.

70. *A. occidentalis* Moq. (sub Obione), suffruticosa adscendens ramosissima; fol. lanceolato-oblongis v. oblongo-linearibus obtusis integerrimis coriaceis cano-lepidotis; theca brevissime pedicellata ovata apice paucidentata disco alis 2 magnis margine sinuato-dentatis instructa. Pterochiton Torr. In California. ♂.

71. *A. Coulteri* Moq. (sub Obione), fruticosa erecta ramosa; fol. alternis subsessilibus lanceolatis utrinque attenuatis acutis integerrimis crassiustculis cano-farinosis; theca sessili orbiculari-rhombaea margine dentata. In California. ♂.

72. *A. elegans* Moq. (sub Obione), herbacea erecta ramosa; fol. alternis sessilibus oblongis acutis integris v. remote paucidentatis subundulatis coriaceis lepidoto-farinosis glaucis; theca suborbiculari margine radiatim eleganter dentata. In Mexico. ♂.

73. *A. montervidensis* Spr. suffruticosa ramosa; fol. alternis sessilibus

minutis linearis - oblongis acutiusculis integerrimis argenteis farinosis; bractearum theca subpedicellata obovata denticulata muricato-nervosa coriacea. Obione Moq. In Brasilia, circa Monterideo et in Peruvia. ♂.

74. *A. linifolia* H. et B. suffruticosa ramosissima; fol. alternis subsessilibus anguste linearibus acutis integerrimis subfarinosis glaucis; bractearum theca subrotunda margine denticulata disco bicristata coriacea. Obione Moq. In Am. merid. ♂.

75. *A. polygama* Sess. suffruticosa sultata ramosa; fol. alternis sessilibus patulis argute linearibus acutiusculis integerrimis v. repando-dentatis tenuibus cano-farinosis. *A. salicifolia* Lag. Obione Moq. In Noveland. ♂.

** *Bracteae fructiferae juxta totam longitudinem clausae.*
Testa saepius coriacea.

76. *A. Berlandieri* Moq. fruticosa adscendens ramosissima; fol. subfasciculatis sessilibus oblongis angustis acutis basi attenuatis margine subrevolutis integerrimis glaucis; bractearum theca pedicellata coriacea integerrima. Obione Moq. In Mexico. ♂.

77. *A. Gardneri* Moq. (sub Obione) fruticosa adscendens subramosa; fol. petiolatis oblongis v. obovato-oblongis integerrimis obtusis basi attenuatis coriaceis albo-lepidotis; bractearum theca subsessili cuneiformi apice tridentata. Ad la Platta. ♂.

78. *A. pedunculata* L. herbacea adscendens ramosa; fol. petiolatis alternis ovatis v. obovato-lanceolatis obtusis integerrimis crassiustculis furfuraceis cinereis; bractearum theca longe pedicellata integerrima coriacea. Fl. dan. t. 304. *Halimus* Wallr. Obione Moq. In Europa, Rossia, Tauria. ♂.

Species dubiae.

79. *A. Bocconi* Guss. suffruticosa caespitosa ramosa; fol. oblongo-deltoides basi integris repando-vel sinuato-dentatis subtus cano-lepidotis; bracteis demum deltoideo-hastatis elongatis disco muricato-cristatis. In Sicilia. ♂.

80. *A. elongata* Guss. diffusa herbacea ramosissima; fol. deltoideo-

oblongis, infimis oppositis hastatis integris; bracteis demum rhomboideo-deltoides nervoso-reticulatis. In Sicilia. ♂.

81. *A. farinosa* Dumort. fol. rhombo-hastatis sinuato-dentatis. In arenosis Belgii. ♂.

82. *A. flavescentia* Dumort. heracea prostrata; fol. oppositis hastato-ovatis obtusis dentatis; bracteis fructiferis dentatis cordatis disco nudiusculis. In Belgio. ♀.

83. *A. glomerulifera* Moq. heracea ramosissima; fol. petiolatis oblongo-lanceolatis v. spathulatis obtusis integerim succulentis viridibus; bracteis demum obovato-subrotundis integerrimis tenuibus. In Nov. Holl. ♀.

84. *A. incana* Dietr. herbacea procumbens ramosa; fol. rhombis apicem versus dentibus 1—2 utrinque instructis quandoque integerrimis; bracteis demum rhombis acutis tridentatis. *A. albicans* Willd. In maritimis Hispaniae. ♂.

85. *A. Tauschii* D. decumbens; fol. exquisite hastato-triangularibus paucidentatis crassiusculis sparse lepidotis bracteis demum suborbicularibus disco laevibus tenuibus. *A. lenticularis* Tausch. In? ♂.

86. *A. macrodira* Guss. herbacea erecta ramosa; fol. ovato-lanceolatis basi cuneatis sinuato-dentatis supremis lanceolatis integerrimis; bracteis demum subdeltoido-hastatis apice producto integerrimis disco verrucis lanceolatis instructis. In Sicilia. ♂.

87. *A. microphylla* Willd. fruticosa erecta ramosa; fol. sparsis obtusis. In P. b. S. ♀.

88. *A. obtusa* Willd. herbacea erecta ramosa; fol. oppositis longe petiolatis triangularibus obtusissimis integerrimis subtus glaucescentibus. In Siberia. ♀.

89. *A. philippica* Weinm. fruticosa erecta ramosa; fol. petiolatis rhombis v. ovatis obtusissimis integerimis crassiusculis lepidotis Hab. ? ♀.

90. *A. platysepala* Guss. ramosissima; fol. integris inferioribus mediisque hastatis supremis oblongo-lanceolatis bracteis demum ampliatis triangularibus a basi ad medium acute dentatis tuberculatis v. laevibus. In Sicilia. ♂.

91. *A. plebeja* Carmich. herbacea erecta; fol. rhombo-hastatis obtusis

dentatis; superioribus hastatis lanceolatisque edentulis. In Tristan-d'Aenga. ♂.

92. *A. procumbens* Less. prostrata ramosissima; fol. alternis breviter petiolatis oblongo-ellipticis basi cuneatis obtusis mucronulatis apice sinuato-dentatis lepidoto-incanis; bracteis demum quadrato-rhombeis reflexo-acuminatis. In desert. Uralus. ♂.

93. *A. salicina* Pall. herbacea erecta ramosa; fol. alternis petiolatis lanceolatis inaequaliter remoteque serratis glabris obscure viridibus, radicibus integerrimis. In Siberia. ♂.

94. *A. sictula* Bern. ab Ueria. herbacea erecta ramosa; fol. triangulatis apice obtusis basin versus sinuatis glabris; bracteis? In Sicilia. ♂.

95. *A. Tornabeni* Tineo; herbacea erecta ramosissima; fol. rhombo-ovatis obtusis angulato-dentatis, reliquis deltoideo-oblongis acutiusculis subintegris; bracteis demum rhombis margine utrinque 1—2 obtuse dentatis disco laevibus. In Sicilia. ♂.

96. *A. Veneta* Willd. herbacea erecta; fol. subtus glaucis, inferioribus deltoideo-hastatis subdentatis superioribus deltoideo-lanceolatis subhastatis; bracteis demum rhombis disco dentatis. Circa Veronam. ♂.

97. *A. argentea* Nutt. herbacea erecta; fol. deltoideis subcordatis obtusis integris utrinque argenteis; bractearum theca subpedicellata margino acute dentato. *Obione* Moq. In salcis Missouri. ♂.

98. *A. stylosa* Viv. fruticosa; fol. petiolatis oblongis v. ovato-oblongis basi attenuatis integerrimis tomentosofurfuraceis cinereis; bractearum theca subrotundo-ovata integerrima disco biappendiculata. *Obione* Moq. In Aegypto.

DIOECIA.

5207. CHYSITRIX L. (1747).

1. *C. capensis* L. In P. b. S. q. *Habitus Sisyrichii*. Folia ensiformia equitantia. Scapus compresso-membranaceus, apice spathaceus.

5208. BREYINIA Forst. (1776).

1. *B. disticha* Forst. fol. ovato-ellipticis subtus pallidis; pedunc. cernuis abbreviatis apice incrassatis. *B. axillaris* Spr. *Phyllanthus cernuus* Spr. part. In *Motuccis et Nor. Hebrid.* Ȑ.

2. *B. paniculata* Spr. pedunculis paniculatis nudis axillaribus; fol. perennantibus oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis. In *Ind. or.* Ȑ.

5209. ARCTOPUS L. (1747).

1. *A. echinatus* L. B. R. I. 507. Burm. afr. t. 1. Plukn. t. 272. f. 5. In *P. b. S. 4.* Folia radicalia stellata trifida lobis dentatis ciliato-spinosis. Petala alba.

5210. GLEDITSCHIA L. (1747).

1. *G. triacanthus* L. spinis robustis ima basi compressis caeterum cylindraceo-conicis simplicibus 3-fidive; foliolis linear-oblongis; leguminibus compresso-planis subrotundis polyspermis. Duham. arb. t. 105. ed nov. 4. t. 25. Michx. arb. 2. t. 10. In *Am. bor.* Ȑ.

2. *G. brachycarpa* Pursh; spinis crassis brevibus subternatis; foliolis oblongis obtusis; leguminibus oblongis brevibus. In *Am. bor.* Ȑ.

3. *G. monosperma* Walt. spinis gracilibus subtrifidis paucis; foliolis evato-oblongis acutis; leguminibus plano-compressis subrotundis 1-spermis. Michx. arb. 3. f. 10. In *Am. bor.* Ȑ.

4. *G. sinensis* Lam. spinis robustis conicis, rameis simplicibus ramosive, caulinis fasciculatis ramosis; foliolis ovato-ellipticis obtusis; leguminibus compressis elongatis. DC. mem. 1. t. 1. In *China.* Ȑ.

5. *G. macrantha* Desf. spinis robustis ramosis conicis plurimis; foliolis lanceolatis rigidulis; leguminibus elongatis incrassatis intus pulposis. *Patria ignota.* Ȑ.

6. *G. ferox* Desf. spinis robustis compressissimis 3-fidis; foliolis lanceolatis acutis. *Patria ignota.* Ȑ.

7. *G. caspica* Desf. spinis gracilibus 5-fidis compressis; foliolis elliptico-lanceolatis obtusis. *Ad mare Caspium.* Ȑ.

8. *G. indica* Pers. spinis gracilibus conico-subulatis simplicibus ramosive; foliolis elliptico-oblongis acutiusculis. In *Bengalo.* Ȑ.

9. *G. heterophylla* Bunge; fruticosa; spinis gracilibus conicis ramosis supraaxillaribus; fol. bipinnatis 6—10-jugis; foliolis elliptico-oblongis integerrimis acutiusculis; leguminibus crassis stipitatis 1—3-spermis. In *China.* Ȑ.

5211. FICUS L. (1747).

a. Folia magis minusve cordata serrata lobata vel integrata. Receptacula gemina vel solitaria pedunculata basi constricta tribracteata.

1. *F. Carica* L. fol. cordatis 3—5-lobis repando-dentatis, lobis obtusis supra glabris subtus pubescentibus; receptaculis pyreniformibus glabris. Pluckn. t. 125. Lam. ill. t. 867. Hayne 9. t. 13. In *Europa et Oriente.* Ȑ. De varietatibus cult. vide Gasparini nov. gen. et Miquel in Hook. journ. 7. p. 221.

2. *F. geraniiifolia* Miq. Ic. p. 225. ramis glabris laevibus; fol. subcordatis 5-lobis et dentato-serratis, lobo superiore 3—5-lobo, lateralibus bilobis supra punctato-asperrimis subtus scabro-hirtellis; receptaculis obovato-globosis pedunculoque subpuberulis basi 3-brakteatis. In *Persia.* Ȑ.

3. *F. palmata* Forsk. fol. ovatis obtusinsculis subcordatis vel truncatis integris v. 3-lobis grosse serratis punctato-asperis scabro-pubescentibus; receptaculis obovatis subsessilibus basi in stipitem attenuatis 2—3-brakteatis glabriusculis. Vahl symb. 1. t. 24. In *Arabia.* Ȑ.

4. *F. pseudo-carica* Miq. petiolis pedunculisque tenue pubescentibus; fol. obovato-acuminatis basi late concava 3—5-lobis lobo medio acuminato serratis scabro-hirtellis; stipulis lanceolatis puberulis; receptaculis geminis globosis scabro-puberulis basi bracteis 3 connatis stipitatis. In *Abyssinia.* Ȑ.

5. *F. toxicaria* L. fol. cordatis inciso-lobatis denticulatis supra villosis subtus albis; receptaculis pedunculatis tomentosis. *F. Pandama* Burm. *F. toxica* Thunb. In *Sumatra.* Ȑ.

6. F. repens Willd. fol. cordato-ovatis acutis serratis utrinque scabris subtus hirsutis; receptaculis clavatis involucratis. Wight ic. t. 636. *F. repens et rufescens* Hamilt. In Ind. or. ȳ. *Prope Calcuttam et Assum.* ȳ.

7. F. assamica Miq. repens; petiolis tenuibus elongatis patentim pilosis cordatis ovato-3-angularibus inaequaliter dentatis trilobis; stipulis parvis linearibus; receptaculis axillaribus clavato-pyriformibus longe stipitatis puberulis. *Ad Assam.* ȳ.

8. F. serrata Forsk. fol. oblongis indivisis palmatisque repando-dentatis scabris; receptaculis globosis villosis scaberriinis. In Arabia. ȳ.

9. F. cannabina Lour. fol. caulinis hastatis incisis; rameis ovato-lanceolatis; caule suberecto. In Cochinchina. ȳ.

10. F. morifolia Vahl; fol. 3-partitis scaberriinis lacinii lanceolatis subpinnatifido-angulatis. In Ind. or. ȳ.

11. F. acutiloba Miq. t. 5. ramulis puberulis; fol. petiolatis ovato-oblongis 3—5-lobis basi obtusa trinerviis; lobis acutis denticulatis, medio subsinuato v. grosse dentato, utrinque scabro-hirtellis; receptaculis pyriformibus solitariis pedunculatis 3-bracteatis. In Bombay. ȳ.

12. F. pseudo-sycomorus Decaisn. fol. petiolatis ovato-cordatis acutis v. obtusis grosse dentato-serratis 3-nerviis supra punctato-asperrimis subtus puberulis; receptaculis axillaribus basi involucro 3-partito sustensis. In Sinai. ȳ.

13. F. virgata Roxb. fol. late ovatis acutis basi lata integra vel utrinque 1-dentata serratis membranaceis subtus cano-tomentosis 3-nerviis; receptaculis solitariis v. geminis pyriformibus basi involucro-3-partito cum pedunculo incano-pubescentibus. Wight ic. t. 649. In Ind. or. ȳ.

14. F. Johannis Boiss. fol. ovato-rotundis undulato-denticulatis cordatis 3-partitis lobo medio 3-lobo tuberculato-scabris et tomentello-asperis; receptaculo globoso tomentello rubro. In Persia. ȳ.

15. F. persica Boiss. ramulis rubris; fol. breve petiolatis ovato-rotundis ultra medium 3-partitis, lobo intermedio angusto 3-fido omnibus obtusissimis scabro-hirtellis; receptaculo glabro subgloboso in stipitem longe atte-

nuato oris subhiantis dentibus brevissimis. In Persia. ȳ.

b. Sycidium Miq. Folia oblonga integra v. raro lobata serrata v. integriforma, scabra v. glabra. Receptacula pedunculata axillaria gemina v. solitaria.

* *Scabrae.* Receptacula demum subglobosa, bracteis ad basin verticillatis v. sparsis; folia serrata aut repanda raro integriforma plerumque integra.

○ *16. F. humilis* Roxb. fol. petiolatis ovato-oblongis v. ellipticis basi lata subcordatis apice repando-serratis 3-nerviis; receptaculis geminis obovato-ampullaceis stipitatis scabriusculis. Wight ic. t. 535. In Sumatra. ȳ.

17. F. scabrella Roxb. differt prae-sertim folijs brevijs petiolatis magis serrato-dentatis basi acutiusculis; receptaculis solitariis obovatis basi bracteatis. Wight ic. t. 661. In Chittagong. ȳ.

18. F. hispidissima Wight; fol. petiolatis ellipticis v. elliptico-ovatis longiusculae acuminatis serrato-dentatis utrinque 4-costatis; receptaculis solitariis globosis pedunculatis pubescentibus ore bracteis linearibus sub-erectis subbiseriatis circumdato; pe-dunculo parce bracteolato. In Ind. or. ȳ.

19. F. Politoria Lam. fol. oblongis obtuse mucronatis utrinque asperis; ramis hispidis; receptaculo globo-so spinuloso involucrato. *F. rudis* Pers. In Ind. or. et Madagas-rica. ȳ.

20. F. asperrima Roxb. fol. oblongis acuminatis basi obtusis remote denticulatis rigidis verrucis pilisque scabro-asperrimis subtus tomentoso-pubescentibus trinerviis 3—4-costatis; receptaculis globosis cano-pubescentibus tribracteatis. Wight ic. t. 633. Rhee 3. t. 60. In Malabarria et Bombay. ȳ.

21. F. exasperata Vahl. fol. ovato-oblongis acutis autrorsum dentatis utrinque scaberriinis; receptaculo pe-dunculato globoso piloso apice squamuoso. *F. scabra* Willd. *F. glandu-losa* Hortul. In Guinea.

22. *F. asperifolia* Miq. l. c. Spec. inedscripta. In Guinea. ♂.

23. *F. heterophylla* L. aspero-scabra; fol. membranaceis supra laete viridibus oblongis acutis basi inaequaliter excisis serratis integris trilobis v. sinnato-pinnatifidis polymorphis; receptaculis turbinato-globosis. Wight ic. t. 659. *F. repens* Roxb. *F. canabina* Lour. *F. denticulata* Vahl. In Ind. or. ♂.

24. *F. elongata* Miq. fol. alternis petiolatis membranaceis subpuberulis subtus albicantibus elongato-lanceolatis acutis basi leviter emarginatis; receptaculis obovato-globosis subpuberulis basi constrictis, involucro tripartito. In Ind. or. ♂.

25. *F. quercifolia* Roxb. Wight. ic. t. 616. ex Miq. l. e. In Sumatra. ♂.

26. *F. inconstans* Miq. sparse scabro-pilosa; fol. obovato-oblongis obtuse acuminatis basi obtusis repando-denticulatis integris v. trilobis; receptaculis subglobosis. In Java. ♂.

27. *F. sinuosa* Miq. aspero-scaberrima; fol. breve petiolatis oblongis acuminatis basi lata^o subtruncatis serratis v. sinuato-dentatis supra asperimo-punctatis subtus scaberrimis; receptaculis ovato-globosis basi bracteatis. In ins. Philippinis. ♂.

28. *F. javanensis* Miquel; tota punctato-asperrima; fol. petiolatis elliptico-oblongis inaequilateris acuminatis basi integerrimis subcuneatis grosse dentatis integris v. sinuato-incisis supra viridibus subtus pallidis; receptaculis geminis v. conglomeratis. In Java. ♂.

29. *F. acuminatissima* Miquel; hirta-pubescentia; fol. sessilibus membranaceis oblique lanceolato-oblongis basi inaequali subemarginatis longissime acuminatis apice repando-denticulatis; receptaculis subglobosis setuloso-hirtis. In ins. Philipp. ♂.

30. *F. Lobii* Miquel; puberula; fol. petiolatis anguste oblongis longe acuminatis integerrimis v. serrulato-repandis; receptaculis aggregatis globosis longe stipitatis. In Java. ♂.

31. *F. polycarpa* Roxb. receptaculis aggregatis. Wight ic. t. 632. In ins. Philippinis. ♂.

32. *F. montana* Burm. fol. oblongis repando-serratis; receptaculis minimis. In Ind. or. ♂.

33. *F. ulmifolia* Lam. fol. ovato-oblongis basi inaequalibus acuminatis repando-dentatis utrinque scabris; receptaculo globoso aspero. In Java et ins. Philipp. ♂.

34. *F. asperiuscula* Bonche; fol. breve petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis basi rotundatis 3-nerviis obsolete denticulatis subrugulosis epunctatis supra scabris; receptaculis geminis longe pedunculatis pyriformi-globosis hirtellis. In Ind. or. ♂.

35. *F. scabra* Forst. fol. oblique cordatis ovatis acutis remote dentatis utrinque scabris subtus pubescentibus; receptaculis turbinatis nudis. In ins. Tanna et Namaca. ♂.

36. *F. grossularioides* Vahl; fol. ovatis apice serratis subtus luteo-albicantibus. In Ind. or. ♂.

37. *F. sinuata* Thunb. fol. obovatis acuminatis sinuato-dentatis glabris subtus reticulatis; receptaculis aggregatis globosis subsessilibus. In Ind. or. ♂.

38. *F. Fraseri* Miquel; asperrima; fol. breve petiolatis rigidis verruculis pilisque aspero-scaberrimis ellipticis v. obovato-ellipticis plerisque supra medium trilobo-sinuatis sinibus obtusis, lobis latis ovatis; receptaculis ?. In Nov. Holl. ♂.

39. *F. Cumingii* Miquel; adpresso scabro-hirtella; receptaculis foliisque subtus pilis albis scabris; fol. breve petiolatis lanceolatis acuminatis serratis basi inaequali rotundata in aliis auriculata; receptaculis globosis pedunculatis asperis. In ins. Philipp. ♂.

40. *F. subpanduriformis* Miquel; scabro-puberula; fol. breve petiolatis supra basin panduriformem longe lanceolatis subintegerrimis; pedunculis receptaculisque obovato-globosis scabro-puberulis punctulatisque. In Assamia. ♂.

41. *F. prominens* Wall. fol. sub-petiolatis late ellipticis v. oblongis basi rotundatis crenato-serratis trinerviis et utrinque tricostulatis supra scabris et asperis subtus reticulatis et dense pubescentia. In Prome. ♂.

42. *F. antithetophylla* Steud. ex Miquel l. c. t. 5. f. B. hirtella; fol. petiolatis lanceolato-vel spathulato-oblongis apice rotundatis integerrimis v. subrepandis utrinque aspero-punctulatis subtus lutescentibus; receptacu-

Iis globosis striatis punctulatis basi involucro trilobo. In Abyssinia. ♂.

43. *F. Toka* Forsk. fol. distichis scabris ovato-lanceolatis petiolatis. *In Arabia. ♂.*

44. *F. aspera* Forst. pubescens; fol. breve petiolatis membranaceis oblongis acutis v. acuminatis junioribus denticulatis sensim integerrimis; receptaculis globoso-urceolatis tomentoso-pubescentibus basi pedunculoque sparse bracteatis, bracteis linearibus numerosis connatis. *In ins. Tanna et Nov. Holl. ♂.*

45. *F. orbicularis* Cunningh. pilis verruculisque asperiuscula; fol. ovato-rotundatis acutiusculis marginibus subrepandis breviter setuloso-aculeolatis supra verruculis vitreis asperis sub:us glaucis; receptaculis depresso-globosis asperis. *In Nov. Holl. ♂.*

46. *F. indecora* Miquel; puberula; fol. ovatis v. ovato-ellipticis acutiusculis repando-subdenticulatis asperis subtus glabris pallidis; receptaculis breve pedunculatis subturbinato-globosis asperulis. *In Nov. Holl. ♂.*

47. *F. aculeata* Cunningh. mollier hirtella; fol. late vel ovato-ellipticis rotundato obtusis aculeato-dentatis supra verrucis centro vitreis pilisque rigidis diaphanis asperrimis subaculeolatis subtus glaucis; receptaculis scabris ore prominulo; bracteis glabris membranaceis pluribus. *In Nov. Holl. ♂.*

48. *F. opposita* Miquel; hirtello-pubescentis; fol. ovatis obtusiusculis aequilateris integerrimis supra asperimis subtus luteo-tomentoso-pubescentibus rigide coriaceis; receptaculis subturbinato-globosis puberulis et asperopunctatis breve stipitatis ore prominulo; bracteis parvis obtusis ciliolatis caeterum glabris. *In Nov. Holl. ♂.*

49. *F. pisifera* Wall. ex Miquel; fol. brevissime petiolatis inaequaliter oblongis latere interiore basi angustiore acuminatis inaequaliter serratis caeterum repandis basi integerrimis subtus lutescenti-reticulatis punctulis asperimis; receptaculis confertis punctulatis ore hante. *In ins. Wales.*

50. *F. purpurascens* Desf. ex Miquel; scabriuscule; fol. breve petiolatis late elliptico-oblongis acuminatis obtuse dentatis epunctatis pellucido-reticulatis subtus purpurascen-

bus; receptaculis subrotundo-ellipticis obtusis scabriusculis. *In Java. ♂.*

b. *Cuspidatae* Miquel. Folia oblonga abrupte acuminata integrerrima v. infra apicem grosse dentata v. serrata aut sinu unilaterali excisa, scabra v. glabriuscula. Receptacula in stipitem constricta saepe basi nuda hinc rectius sessilia dicenda.

51. *F. cerasiformis* Desf. ex Miq.; molliter pubescens; fol. inaequaliter oblongis supra glabris nitidis integerrimis; petiolis pubescentibus; receptaculis glabris in stipitem longum constrictis hispido-pubescentibus maturnis aurantiacis. *In Ind. or. ♂.*

52. *F. radicans* Roxb. fol. coriaceo-membranaceis oblongis v. anguste oblongis abrupte longe lineariter acuminatis integerrimis supra nitidis glabris; receptaculis obovato-globosis longe stipitatis puberulo-hispidis. *F. acuminata* Hamilt. *F. eu-ryaelia* h. Berol. *F. caryophylla* h. Leyd. *In Ind. or. et ins. Philipp. ♂.*

53. *F. urophylla* Wall. ex Miq.; ramulis petiolisque subsquamulosis; fol. breve petiolatis ellipticis longe acuminatis nitidis glabris; receptaculis geminis v. fasciculatis globosis v. ellipticis longe stipitatis tribracteatis hispidulis. *In Pulo-Penang. ♂.*

54. *F. rostrata* Lam. fol. ovato-oblongis acuminato-cuspidatis irreguliter repandis glabris; receptaculis aggregatis sessilibus. *In Ind. or. ♂.*

55. *F. cuspidata* Blume; fol. elliptico-lanceolatis longissime acuminatis acumine $\frac{1}{2}$ folii longiore apice repandis v. utrinque unidentatis supra nitidis subtus fuscenscentibus punctulato-asperulis; receptaculis fasciculatis globosis ore perviis substipitatis. *In Ins. Jara. ♂.*

56. *F. raridens* Miquel; ramis laevibus caeterum asperulo-punctatis; fol. oblongis linearis-acuminatis basi acutis integerrimis v. 1-dentatis quandoque lateraliter sinuatibus; receptaculis globoso-urceolatis ore tuhuloso crenulato hante. *In Sumatra. ♂.*

57. *F. trachycarpa* Miquel; scabro-pilosus demum glabris; fol. petiolatis oblongis v. lanceolato-oblongis inaequilateris abrupte-linearis-acuminatis

apice repando-dentatis; receptaculis solitariis breve pedunculatis ovatis scrobiculato-verrucosis basi constrictis tribracteatis. In Ind. or. ♂.

58. *F. pulchra* Wall. glabra; fol. oppositis petiolatis oblongis v. lanceolato-oblongis anguste acuminatis remote dentatis subtus fuscescensibus; receptaculis? In Singapore. ♂.

59. *F. clarata* Wall. glabra; fol. petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis integris v. repandis 4-costatis non reticulatis; receptaculis solitariis obovatis basi constrictis tribracteatis ore bracteis erectis obtusis puberulis clauso. In Nepalia. ♂.

60. *F. salicifolia* Miquel; aspero-puberula; fol. breve petiolatis lanceolatis acuminatis integerrimis v. repandis glabris; receptaculis geminis subglobosis stipitatis basi 3-apice 1-bracteatis. In Assamia. ♂.

61. *F. caudata* Wall. glabra; fol. alternis petiolatis elongato-sublineari-lanceolatis longissime acuminatis infra acumen utrinque 2—3-dentatis membranaceis asperulis; receptaculis axilaribus solitariis. In Ind. or. ♂.

62. *F. uniglandulosa* Wall. glabra; fol. petiolatis cuneato-obovato-oblongis acuminatis integerrimis subtus pallidis; receptaculis geminis v. globerratis parvis globosis ore fere nudis. In Ind. or. ♂.

63. *F. grandifolia* Wall. scabro-pubescent; fol. oblongis petiolatis apice subrotundatis integerrimis supra laevissimis nitidis adultis glaberrimis subtus fusco-pallidis; receptaculis? In Ind. or. ♂. In Penang. ♂.

64. *F. tenuiramis* Kunth in Bouche ind. sem. ramulis gracilibus subflexuosis scabriusculis; fol. lanceolatis acuminatis basi oblique acutis 3-nerviis integerrimis membranaceis epunctatis glabris; receptaculis? In Ind. or. ♂.

65. *F. reticulata* Thunb. fol. ellipticis subangulatis cuspidatis glabris subtus reticulatis; fructibus globosis solitariis. In Ind. or. ♂.

c. *Pallidae* Miquel. Folia oblonga vel dente uno altero ve instructa scabra v. glabra. Receptacula globosa basi in stipitem constricta. *Phylla perigonii* hyalina ciliolata.

66. *F. parasitica* Koen. ex Willd. fol. petiolatis oblongis v. obovato-

oblongis subtus asperulis integerrimis acutis; receptaculis geminis globosis in stipitem tribracteatum constrictis. F. ampelos Wight ic. t. 652. In Ind. or. ♂.

67. *F. perva* Miquel; ramis laevigatis cinerascentibus; fol. petiolatis ramulisque junioribus punctato-asperis oblongis v. anguste ellipticis obtuse acuminatis integerrimis in sicco lutescentibus; receptaculis geminis globosis longe stipitatis asperis basi tribracteatis. In Assamia. ♂.

68. *F. angustata* Miquel; glabra laeviuscula ramulis petiolis foliisque subasperis; fol. coriaceis oblongo-lanceolatis acumiatis basi cuneatis utrinque 4-costatis; receptaculis geminis globosis glabris basi attenuatis. In Ind. or. ♂.

69. *F. cuspidigera* Miquel; ramulis petiolis receptaculisque adpresso-puberulis; fol. lanceolatis petiolatis oblongis anguste acuminatis integerrimis v. repandis; receptaculis axillaribus globosis longe stipitatis basi bracteatis. F. excelsa Wall. F. Chincha Roxb. In Nepalia. ♂.

70. *F. reticulosa* Miquel; glabra laevis; fol. breve petiolatis oblongis apiculatis basi acutis integerrimis rigide coriaceis trinerviis; petiolis transverse rimoso-scabris antice sulcatis; stipulis linearis-lanceolatis; receptaculis globosis basi stipitatis bracteatis. In Ind. or. ♂.

71. *F. philippensis* Miquel; glabra ramulis 3-gonis; fol. brevissime petiolatis subcoriaceis ovato-oblongis longe acuminatis basi in petiolum decurrentibus integerrimis laevissimis glabris utrinque subente punctatis; receptaculis axillaribus solitariis v. geminis stipitatis. In ins. Philippinis. ♂.

72. *F. insularis* Miquel; glabra laevis; fol. breve petiolatis submembranaceis ellipticis v. oblongis abrupte acuminatis; stipulis linearis-lanceolatis acuminatis complauatis; receptaculis solitariis globosis in stipitem longum attenuatis bracteatis. In ins. Loo Choo.

✓ 73. *F. tinctoria* Forst. Miquel l. c. t. 6. f. B. a praecedente foliis lateribus et non acuminatis distinguitur. Receptacula brevissime pedunculata longo stipitata. In Tahiti. ♂.

74. *F. septica* Rumph. amb. 3. t.
96. fol. ovatis acuminatis membranaceis acumine pollicari acuto; stipulis lanceolatis; receptaculis solitariis. In Molluccis. ♂. Praecedentibus arete congrnata sed petiolis multo longioribus satis distinguenda.

d. *Plagiostigma* Miquel. Receptacula pyriformia intus bracteolata et saepe pilosula sessilia. Perigonii phylla 4 v. plura colorata. Stam. 2 — 5. Folia integra integerima glabra v. pubescentia.

75. *F. Gaspurriniana* Miquel; ramulis laevibus; fol. alternis oblongis integerrimis v. apice serratis utrinque punctulatis saepe scabro-ciliatis; receptaculis pyriformibus solitariis ore constricto bracteatis. In Assamia. ♂.

76. *F. Beecheyana* Hook. et Arn. hirtello-puberula; fol. densis ellipticis acuminatis basi cordatis integerrimis; receptaculis pedunculatis ellipticis demum subglobosis basi 3-bracteatis. In ins. Loo-Choo. ♂.

77. *F. pyriformis* Hook. et Arn. fol. petiolatis cuneato-lanceolatis acutis v. acuminatis integerrimis subtus ramulis receptaculisque pubescentibus; receptaculis pyriformibus basi tribracteatis intus inter flores sparse puberulis. In China. ♂.

78. *F. Millesii* Miquel; ramulis petiolisque minute hirtellis; fol. breve petiolatis lanceolatis acuminatis integerrimis subtus glanduloso-punctatibus glabris; receptaculis ovato-pyriformibus pedunculatis in stipite angulato sparse et irregulariter bracteatis. In China. ♂.

79. *F. Fieldingii* Miquel; glaberrima; fol. longe petiolatis oblongis v. lanceolato-oblongis longe et anguste acuminatis basi cuneatis integerrimis vel repandis coriaceis; receptaculis brevissime pedunculatis basi 3-bracteatis ellipsoideis glabris; achenis subtrifloris pallidis; phyllis perigonii parvis. In Assamia. ♂.

80. *F. stipulata* Thunb. ramis radicantibus, junioribus hirtis; fol. oblique ovatis glabris subtus pallidis albidis prominentibus ramulorum fructiferorum ovatis obtusis basi subcordatis; stipulis subtus adpresso pilosis ovato-triangularibus; receptaculis magnis pyriformibus vel turbinatis se-

tosis subviolaceis. *Tenotea heterophylla* Gaspari. In China et Japonia. ♂.

81. *F. pumila* Thunb. fol. ovatis acutis glabris subtus reticulatis; receptaculis pedunculatis ellipticis; caule repente. *Ficus sylvestris* etc. Kaempf. am. 803. *Plagiostigma pumilam* Zucc. In China et Japonia. ♂.

82. *F. erecta* Thunb. fol. oblongis acutis glabris subtus reticulatis; caule decumbente; ramis erectis; receptaculis pedunculatis subglobosis magnitudine *Avellanae*; ramis alternis vel aggregato-umbellatis. In Japonia. ♂.

83. *F. punctulata* Thunb. glabra; fol. oblongis obtusis obsolete entarginatis integerrimis glabris marginibus leviter reflexis subtus impresso-punctatis brevissime petiolatis; receptaculis obovatis magnitudine fere *Caricae*. In Ind. or. ♂.

84. *F. disticha* Blume; glabra; fol. modice petiolatis cuneato-obovatis vel ellipticis apice rotundata retusis v. emarginatis basi acutis coriaceis integerrimis margine subrevolutis subtus punctatis; receptaculis geminis sessilibus pyriformibus basi 3-bracteatis. In Java et Zeylona. ♂.

85. *F. elliptica* Miquel; glabra; fol. breve petiolatis ellipticis subaequilateris apice rotundata obtusis vel retusis subtus punctatis coriaceis integerrimis subrevolutis; stipulis parvis lanceolatis convolutis; receptaculis? In ins. Philippinis. ♂.

86. *F. spathulata* Miquel; glabra; fol. breve petiolatis cuneato-spathulatis apice rotundatis integerrimis subcoriaceis; receptaculis solitariis longe pedunculatis ovato-urceolatis basi tribracteatis ore bracteis plurimis parvis dense repleto. *F. retusa* Wall. Ad Madras. ♂.

87. *F. diversiformis* Miquel; ramulis fuscis petiolis foliisque minute pilosis; fol. breve petiolatis ellipticis v. ovatis obtusis plerumque aequaliter basi cordatis integerrimis integris v. trilobis subtus pallidis; stipulis lanceolatis fuscis membranaceis. In Zeylona. ♂.

88. *F. barbata* Wall. repens radicans; ramis retrorsum villosis; fol. distiche alternis petiolatis ovato-cordatis acute apiculatis integerrimis trinervis supra glabriusculis v. sparse pilosis subtus villosis. In Ind. or. ♂.

89. *F. ovoidea* W. Jack. glabra; ramulis flexuosis transverse rimulosis; fol. breve petiolatis anguste obovato-spathulatis apice rotundatis integerimis coriaceo-membranaceis pellucido-punctulatis opacis; receptaculis geminis longe pedunculatis pyriformibus glabris. *F. viscidifolia* h. Berol. In Ind. or. §.

e. *Podosycea* Miquel. Folia oblonga trinervia integerimis pubescentia. Receptacula axillaria gemina v. infraramularia pedunculata basi longe stipitata tribracteata. Flores fuscescentes monoeci 4—5-phyllo.

90. *F. macropoda* Miquel; mollier cano-pubescentis; fol. alternis vel oppositis basi subemarginatis; receptaculis urecolato-globosis longissime stipitatis pubescentibus. In ins. Philippinis. §.

91. *F. pedunculosa* Miquel; puberula; fol. oblongis obtusiusculis basi subattenuatis integerimis coriaceis laevibus; receptaculis geminis demum glabriusculis stipitem summo aequantibus. In Ind. or. ? §.

f. *Trematosycea* Miquel. Folia oblonga integerimma villosa vel pubescentia vel glabra. Receptacula axillaria v. gloriosa sessilia v. pedunculata basi tribracteata parva hirta v. glabriuscula ore margine elevata subcrenulata cincta. Flores 3—4-phyllo fusi.

92. *F. villosa* Blume; fulvo-tomentosa; fol. ovato-oblongis acuminatis integerimis margine revolutis basi subcordatis. *F. hirsuta* Hook. In Java. §.

93. *F. villipes* Miquel; molliter addresso-villoso-pubescentis; fol. eliptico-oblongis obtusis apiculatis basi truncatis v. cordatis margine revolutis subtus fusco-pubescentibus mox utrinque pustulatis; receptaculis 2—6, globosatis obovatis sessilibus glabris; bracteis 3 medio strigilosis. In Java. §.

94. *F. Spanogheana* Miquel; addresso-villoso-pubescentis; fol. petiolatis elliptico-oblongis obtuse acumi-

natis integerrimis margine revolutis basi acutis subtus reticulatis fusco-pubescentibus demum glabris supra in nervis hirtellis; receptaculis 2—6 globosatis glabris globosis. In Jara. §.

95. *F. lancifolia* Miquel; ramulis petiolisque fusco-hirtellis; fol. brevisime petiolatis lanceolatis v. oblongo-lanceolatis acuminatis basi cordatis denticulatis scabro-pubescentibus; receptaculis sessilibus globosatis pubescentibus. In ins. Philippinis. §.

g. *Kissosycea* Miquel. Folia integerimma coriacea. Receptacula pedunculata subglobosa basi constricta tribracteata. Perigonii phylla fusca nitida. Stigma obliquum.

96. *F. scandens* Roxb. Wight ic. t. 643. *F. fruticosa* Wall. In Sihet et Assamia. §.

97. *F. fruticosa* Roxb. Wight ic. t. 654. Fortasse varietas praecedentis. In Chittagong. §.

98. *F. pyrifolia* Burm. ramis subarticulatis; fol. ovatis acuminatis ciliatis; receptaculis brevissime pedunculatis globosis magnitudine Pisi muricato-punctatis. Rheede 1. t. 26. In Ind. or. §.

h. *Erythrogynne* Miquel.

99. *F. lutescens* Parment; glabra; ramis leviter flexuosis transverse rimulosis; fol. oblongo-lanceolatis acutis integerimis coriaceis subtus impresso-punctulatis; receptaculis longe pedunculatis subpyriformi-globosis: pallide aurantiacis umbone prominulo squamulis 5 clauso. *Erythrogynne lutescens* Vis. In Java. §.

i. *Thamnosycea* Miquel. Folia integerimma glabra costivenia. Receptacula pedunculata globosa bracteis 3 subconnatis monoica. Perigonii fusi phylla 4—3. Stamina 2 filamentis brevissimis.

100. *F. nemoralis* Wall. fol. breve petiolatis oblongis v. ellipticis aequilateris longe acuminatis basi rotundatis integerimis subcoriaceis subtus pallidis glabris; receptaculis laevibus glabris. In Nepatia et Himalaya. §.

101. *F. densa* Miquel; glabra; fol. modice petiolatis ad apices ramorum confertis oblongo-lanceolatis lanceolatisque acute acuminatis integerrimis membranaceis; receptaculis pedunculatis obovatis vel ellipsoideis basi involuci tripartita. *In Ind. or.* ȏ.

k. *Leiosycea* Miquel. Folia oblonga integerima coriacea glabra. Receptacula gemina pedunculata globosa basi tribracteata. Flores dimorphi majores tuberculis insidentes minores foveis. Perigonia 4-phyllo fusca.

102. *F. vasculosa* Wall. *In Tovey et Penang.* ȏ.

l. *Didymophora* Miquel. Folia alterna oblonga integerima glabra. Receptacula sessilia urceolata basi tribracteata. Flores monoici ebracteolati mixti, masc. longe pedicellati perigonio fusco 3-phyllo. Stam. 2 monadelpha antheris ovatis. Fem. brevius pedicellati perigonio consimili. Stigma bicrurum.

103. *F. gemella* Wall. fol. longe acuminatis; receptaculis obovatis intus tuberculatis. *In Ind. or.* ȏ.

m. *Eriosycea* Miquel. Folia alterna longa vel leviter petiolata serrata integra vel lobata hirta vel subtus tomentosa. Receptacula saepius sessilia glabra vel hirta intus bracteolata vel pilosula. Flores fusci 4-phyllo. Stam. 2—1. Stigma obliquum, tubuloso-truncatum vel cochleariforme.

104. *F. gossypina* Wall. fol. longe petiolatis ellipticis ovatis acutis vel acuminatis serratis integris vel trilobis 5-lobis supra sparse pilosis subtus albido-lanatis; receptaculis globosis glabris, bracteis parvis puberulis suffultis. *In Penang.* ȏ.

105. *F. Roxburghii* Miquel; fulvo-hirta; fol. modice petiolatis ovato-rotundis subcordatis subacuminatis serratis ciliatis supra substrigosis subtus incano-tomentosis integris vel 3-lobis;

receptaculis geminis sessilibus ovato-urceolatis. *F. hirsuta* Roxb. Wight ic. t. 670. *F. hirta* Roxb. Wight ic. t. 672. *In Ind. or.* ȏ.

106. *F. hirta* Vahl; hirta; fol. breve petiolatis oblongis acute v. submucronato-acuminatis indivisis v. trilobis basi cordatis ciliatis serratis; receptaculis globosis sessilibus lutescenti-setoso-hispidis. *F. setosa* Hook. et Arn. *In Beech.* voy. t. 49. *In China.* ȏ.

107. *F. setosa* Blume; hispidul-setosa; fol. breve petiolatis subpannulaeformi-oblongis supra medium trilobis serratis supra setuloso-scabris subtus molliter pubescentibus; receptaculis globosis setosis basi bracteis occlusis. *In Java.* ȏ.

108. *F. malabarica* Miquel; adpresso sericeo-hirtella; fol. breve petiolatis supra medium 3-lobis basi attenuatis v. acute integerimis vel serrulatis coriaceis pubescentibus; stipulis elongato-lanceolatis dorso sericeo-villosis; receptaculis globosis pubescentibus basi tribracteatis. *In Malabar.* ȏ.

Species quoad sectionem dubiae v. non descriptae.

109. *F. cornifolia* Kunth et Bouche ind. 1846. glabra; ramulis subtrigonis; fol. longe petiolatis obovato-oblongis acuminatis basi rotundatis cordatis 3-nerviis integerimis subtus pellucide punctulatis supra saturate viridibus; receptaculis longe pedunculatis subglobosis. *In Java.* ȏ.

110. *F. myxaefolia* Kunth et Bouche; ramulis ad nodos sericeo-pilosiusculis; fol. longe petiolatis subrotundo-ellipticis acutis cordatis integerimis membranaceis pellucido-punctatis supra opacis glabris nigro-punctatis subtus pallidioribus; gemmis conico-acuminatis sericeo-pilosis. *Patria?* ȏ.

111. *F. Wassa* Roxb. Wight ic. t. 666. *In Motuccis.* ȏ.

112. *F. symphytifolia* Lam. *In Jara.* ȏ.

113. *F. ampelos* Burm. *In Ind. or.* ȏ.

114. *F. tuberculata* Roxb. Wight ic. t. 651. *In Ind. or.* ȏ.

115. *F. hederacea* Roxb. Wight ic. t. 653. *In Chittagong.* ȏ.

116. *F. sclerophylla* Roxb. *In Chittagong.* ♂.

117. *F. umbonata* Wall. *In Silhet.* ♂.

118. *F. callosa* Willd. diss. t. 4.

5212. *UROSTIGMA* Gasparrini.
(1846).

Ficus auct. plurim. Flores in receptaculo globoso raro basi constricto 3—2-bracteato monoeci bibracteolati sessiles vel pedicellati. Perigonum 3—2-partitum lobis concavis fuscis. Masc. Stamen unicum filamento brevi anthera biloculari ovata vel elliptica loculis connectivo dilatato adnatis. Fem. stylus lateralis stigmata simplici aliis elongato filiformi aliis lanceolato-canaliculato aliis abbreviato convexo v. concavo v. calypratim recurvo. Achenia fuscescentia.

A. *Species Novis Orbis* Miquel. Arbores ingentes v. frutices. Folia plerumque oblonga integrerrima. Receptacula axillaria gemina v. solitaria, involucro bilobo v. diphyllo aetate 4-lobo. Stigma carnosum coloratum.

a. *Grandifoliae*. Folia cordata oblonga costata.

1. *U. nympheafolium* Miquel in Hook. Lond. Journ. IX. 1848. p. 527. fol. cordatis subrotundis mucronatis integrerrimis glabris subtus glaucis. *Ficus L.* *In Am. austr.* ♂. Folia maxima pendula.

2. *U. eximum* Miquel; fol. utrinque glabris amplis cordato-oblongis acutis submembranaceis glaucescentibus. *Ficus Schott. ex Spr.* *In Brasilia.* ♂.

3. *U. doliarium* Miquel; fol. ova-tis obtusiusculis utrinque 14-costatis supra glabris subtus in nervis petiolisque fusco-hirtis. *Ficus Mart.* *In Brasilia.* ♂.

4. *U. petiolare* Miquel; fol. longissime petiolatis ovato-subrotundis acuminatis profunde cordatis integrerrimis coriaceis glaberrimis, basi pilis sericeis barbatis; receptaculis pedunculatis globosis. *Ficus H. et K.* *In Mexico.* ♂.

5. *U. calyptroceras* Miquel; fol. coriaceis longe petiolatis ovato-rotundis basi cordatis 3-nerviis 5—7-costatis subtus tomentello-pubescentibus; receptaculis sessilibus, involucro calyptraeformi, globosis cano-pubescentibus. *In Brasilia.* ♂.

6. *U. fulvum* Miquel; fol. cordato-oblongis obtusis supra glabris subtus fulvo-tomentoso-villosis; ramis villosissimis. *Ficus Spr.* *In Brasilia.* ♂.

7. *U. ellipticum* Miquel; fol. breve petiolatis obovato-ellipticis apice rotundatis vix cordatis supra scabris subtus rubiginoso-tomentosis; receptaculis obovatis pubescentibus, involucro bilobo setuloso-hirto. *Ficus H. et K.* *In Nor. Granata.* ♂.

8. *U. rufum* Miquel; fol. petiolatis ovatis v. ellipticis obtusis v. acutis basi subcordatis utrinque 8—15-costatis supra glabris subtus ramulisque tomentosis; receptaculis geminis globosis albo-tomentellis. *Ficus rufa?* Schott. *In Brasilia.* ♂.

9. *U. Maximilianum* Miquel; fol. oblongis ellipticis v. subovato-ellipticis apice obtusis basi cordatis utrinque 5—8-costatis coriaceis subtus pubescentibus ochraceis; gemmis flavosericeis; receptaculis pedunculatis obovato-globosis ore bracteis abbreviatis latis marginato. *Ficus Mart.* *In Brasilia.* ♂.

10. *U. gummiferum* Miquel; ramulis petiolisque fusco-villosis; fol. oblongis breve acuminatis basi truncatis supra nitidis subtus fuliginoso-tomentellis margine subdenticulatis et fasciculato-ciliolatis. *Ad Guajauit.* ♂.

11. *U. Gardnerianum* Miquel; fol. longe petiolatis late elliptico-subrotundis utrinque obtusissimis coriaceis utrinque 5—6-costatis glabris; receptaculis geminis basi involucro bilobo coriaceo puberulo cinereo-tomentellis, ore crasse tribracteato. *In Brasilia.* ♂.

12. *U. pallidum* Miquel; fol. subcuneato-oblongis glabris laevibus obtusis; fructibus geminis axillaribus subpedunculatis; receptaculis globosis glabris. *Ficus Vahl.* *In ins. Marthae.* ♂.

13. *U. giganteum* Miquel; fol. oblongis breve acuminatis basi rotundatis integrerrimis coriaceis glaberrimis; receptaculis axillaribus geminis glo-

bosis cano-pulverulentis. *Ficus H. et K.* In Nov. Andalusia. ♂.

14. *U. cotinifolium* Miquel; fol. obovato-ellipticis utrinque rotundatis coriaceis glabris; receptaculis axillaribus solitariis v. geminis globosis glabris. *Ficus H. et K.* In Mexico. ♂.

15. *U. hirsutum* Miquel; ramulis molliter pilosis; fol. obovato-oblongis acuminatis basi rotundatis triplinerviis subtus pellucido-punctatis pilosisque. *Ficus Schott.* In Brasilia. ♂.

16. *U. holosericeum* Miquel; fol. late cordatis oblongis acutis subundulatis utrinque villosis ramulis petiolisque fulvo-hirsntis. *Ficus Schott.* In Brasilia. ♂.

17. *U. Gomelleira* Miquel; ferrugineo-hirsutum; fol. ellipticis breve acuminatis integerrimis cordatis herbaceis epunctatis pellucido-reticulatis subtus lutescenti-pilosis. *Ficus Hort.* In Brasilia. ♂.

18. *U. relutinum* Miquel; fol. oblongis acutiusculis integerrimis basi obtusis supra glabris subtus pubescenti-mollibus. In Am. austr. ♂.

19. *U. tomentellum* Miquel; fol. lanceolato-oblongis breve acuminatis basi rotundatis coriaceis supra scabro-pubescentibus subtus subrubiginoso-tomentosis. In Brasilia. ♂.

20. *U. crocatum* Miquel; fol. petiolatis oblongis v. late ellipticis acuminatis basi rotundatis cordatis integerrimis v. subsinuoso-repandis coriaceis subtus croceo-fuscescentibus; receptaculis solitariis glabris. In Brasilia. ♂.

21. *U. cystopodium* Miquel; petiolis crassis transverse fissis; fol. elongato-oblongis abrupte acuminatis basi rotundatis integerrimis subsinuoso-repandis subtus tomentellis utrinque 18—20-costatis; receptaculis solitariis. In Brasilia. ♂.

22. *U. princeps* Miquel; fol. longe petiolatis longe lanceolatis v. obovato-oblongis versus basin longe cuneatis ima basi rotundatis coriaceis subtus sparse pilosis utrinque 12—16-costatis; receptaculis parvis. *Ficus Kunth.* In Brasilia. ♂.

23. *U. catappaefolium* Miquel; glabrum; fol. brevissime petiolatis obovato-oblongis apice rotundatis basi angustatis cordatis coriaceis epunctatis; gemmis couico-acuminatis. *Ficus Kunth et Bouche.* In Martinica. ♂.

24. *U. Neumannii* Miquel; glabrum; ramulis obsolete 3-gonis; fol. petiolatis elongato-oblongis acutis basi rotundatis levissime cordatis integerimis subundatis coriaceis pellucido-reticulatis et punctulatis. *Ficus Cels. F. rigida* Desf. In? ♂. Folia pedalia.

25. *U. ferrugineum* Miquel; ramulis erectis teretibus; petiolis gemmisse ferrugineo-villosis; fol. elongato-subobovato-oblongis acuminatis cordatis 5—7-plinerviis subtus pilosis pellucido-punctatis. *Ficus Desf.* In? ♂.

26. *U. Paraense* Miquel; fol. petiolatis oblongis v. obovato-oblongis acuminatis basi rotundatis supra viridibus nitidis subtus fuscescentibus glabris laevissimis; receptaculis globosis ore bracteis connatis clausis. In Brasilia. ♂.

27. *U. crassinervium* Miquel; fol. subcordato-ellipticis glabris subtus fulvis nervo medio incrassato; receptaculis geminis globosis reticulatis sessilibus. *Ficus Desf.* In Jamaica. ♂.

28. *U. syringaefolium* Miquel; glabrum; fol. ovatis vel ovato-oblongis breve acuminatis cordatis 5-nerviis margine integerrimo undulatis subherbaceis subtus pellucido-punctatis. *Ficus Kunth et Bouche.* F. cordata h. Berol. In Caracas. ♂.

29. *U. leucostichum* Miquel; glabrum; fol. petiolatis v. elliptico-oblongis apiculatis basi truncatis integerrimis 7—9-costatis glabrimis petiolo nervoque subtus coloratis; receptaculis globosis ramulisque albo-maculatis. *Plum. ic. t. 131. f. 3.* In Demerara. ♂.

30. *U. glabrum* Miquel; fol. longe petiolatis ovato-oblongis acutis v. apiculatis cordatis integerrimis coriaceis utrinque laevibus 5—7-nerviis 10-costatis; receptaculis geminis breve pedunculatis globosis glabris. *Ficus Fl. flum.* In Brasilia. ♂.

b. *Folia modicae magnitudinis ovata elliptica v. oblonga tenuiter et breve costulata plexumque glabra. Receptacula vulgo pedunculata.*

31. *U. fagineum* Miquel; glabrum; ramulis subflexuosis fol. breve petiolatis elliptico-oblongis acuminato-cuspidatis basi obtusis v. acutis inte-

gerrimis undulatis coriaceis epunctatis nitidis. *Ficus* Kunth et Bouche. ♂.

32. *U. populneum* Miquel t. c. t. 21. f. A. glabrum; fol. longe petiolatis ovatis v. oblongo-ovatis apiculatis basi rotundatis coriaceis vix reticulatis; receptaculis globosis glabris inox verruculosis. *Ficus* Willd. In *Jamaica et Antigoa*. ♂.

33. *U. lancifolium* Miquel; glabrum; fol. longe petiolatis submembranaceis lanciformibus v. ovato-lanceolatis longe acuminatis basi rotundatis; receptaculis geminis v. solitariis pedunculatis globosis; involucro bilobo glabro. *Ficus* Hook. et Arn. In *Mexico*. ♂.

34. *U. renustum* Miquel; glabrum; ramulis teretibus; fol. elliptico-oblongis acuminatis basi rotundatis integerimis coriaceis pellucido-punctatis supra nigro-viridibus; receptaculis? In *Cuba*. ♂!

35. *U. botryapioides* Miquel; glabrum; ramulis rectiusculis; fol. longe petiolatis ovato-ellipticis acuminatis basi rotundis 7-nerviis integerimis coriaceis pellucido-punctatis subtus pallidioribus. *Ficus* Kunth et Bouche. In *Mexico*. ♂.

36. *U. laevigatum* Miquel; ramulis cinereis glabris; fol. petiolatis cordatis ovatis acuminatis venosis laevissimis; fructibus pedunculatis globosis glabris. *Ficus* Vahl. In *Ind. occ.* ♂.

37. *U. angustifolium* Miquel; glabrum; fol. longe petiolatis oblongo-lanceolatis obtusiusculis acuminatis basi rotundatis integerimis subundulatis subtus glaucis utrinque 8-12-costulatis; stipulis elongatis; receptaculis obovato-globosis apice bracteis elevato-imbricatis occlusis. *F. rhododendrifolia* Kunth et Bouche. *F. oronensis* Desv. In *Demerara et Guyana*. ♂.

38. *U. laurifolium* Miquel; ramis radicantibus tuberculato-cicatratis; fol. oblongo-lanceolatis glabris supra sparse punctatis; fructibus sessilibus solitariis globosis glabris magnitudine Pisi. *Ficus* Lam. *F. virens* Ait. In *Am. austr.* ♂.

39. *U. Schiedeanum* Miquel; glabrum; fol. petiolatis oblongo-lanceolatis obtuse acuminatis basi acutis subcoriaceis subtus pallidis; receptaculis axillaribus solitariis obovatis breve pedunculatis ore contracto hiante.

Ficus ligustrina Kunth. *F. prinoides* Schlecht. In *Mexico*. ♂.

40. *U. erythrostictum* Miquel; glabrum; fol. petiolatis ellipticis oblongisve acuminatis subcuneatis margine incurvo integerrimis coriaceis nitidis supra punctulatis subtus reticulatis; receptaculis pedunculatis obovato-glabris maturis fulvis rubro-maculatis. In *Demerara*. ♂.

41. *U. prinoides* Miquel; glabrum; fol. petiolatis oblongo-lanceolatis acutiusculis supra punctulatis pluricostatis; receptaculis geminis breve pedunculatis deflexis globosis; involucro bilobo. *Ficus* Willd. In *Nor. Granata*. ♂.

42. *U. pedunculatum* Miquel; fol. oblongis acuminatis complicatis integerimis membranaceis glabris; receptaculis geminis breve pedunculatis globosis glabris. *Ficus* H. et K. F. pedunculata Ait. Plukn. t. 178. f.

4. In *Mexico*. ♂.

43. *U. cestrifolium* Miquel; glabrum; fol. petiolatis ellipticis acuminatis basi acutis v. obtusis inaequilateris utrinque punctulatis subtus pallidis; receptaculis pedunculatis solitariis vel geminis globosis; involucro bilobo. *Ficus* Schott. In *Brasilia*. ♂.

44. *U. amazonicum* Miquel; glabrum; fol. petiolatis ellipticis v. subovato-ellipticis obtuse acuminatis basi cordato-rotundatis glabris nitidis subtus fuscescentibus utrinque 6-9-costulatis; receptaculis geminis basi involucro repando suffultis. Ad fl. *Amazonum*. ♂.

45. *U. organense* Miquel; ramis glabris caeterum pubescens; fol. petiolatis ellipticis v. oblongo-lanceolatis basi obtusis coriaceis subtus pallidis venoso-reticulatis; receptaculis geminis involucro calyptaeformi acuto puherulo deciduo inclusis globosis. In *Brasilia*. ♂.

46.? *U. sphaeridiophorum* Miquel; glabrum; fol. brevissime petiolatis coriaceis glabris nitidis lanceolato-oblongis acutiusculis globulo nitido fusco terminatis; receptaculis breve pedunculatis globosis glabris. In *Demerara*. ♂.

47. *U. clusiæfolium* Miquel; puberulum demum glabrum; fol. petiolatis obovatis v. plerumque oblongo-bovatis apice late rotundatis basi angustatis; stipulis ovatis acuminatis; receptaculis solitariis cum involucro

bilobo puberulis. *Ficus* Schott. *In Brasilia.* ♂.

48. *U. enorme* Miquel; fol. petiolatis obovatis apice rotundatis apiculatis basi attenuata truncatis utrinque venulis 4–6 subpatulis flavescens; nervo medio plerumque infra apicem terminato. *Ficus* Mart. *In Brasilia.* ♂.

49. *U. fagifolium* Miquel; ramis glabris cicatricibus annulatis; fol. densis breve petiolatis ellipticis obtusiusculis basi leviter emarginatis obtusis utrinque 5–7-costatis; ramulis petiolis involucrisque villosis. *In Brasilia.* ♂.

50. *U. fuligineum* Miquel; hirtopubescent; fol. densis breve petiolatis ellipticis v. ovato-ellipticis obtuse apiculatis coriaceis utrinque 4-costulatis; receptaculis axillaribus geminis brevissime pedunculatis involucro bilobo v. irregulariter truncato sustensis. *In Brasilia.* ♂.

51. *U. Hartwegii* Miquel; hirtellum; fol. petiolatis obovato-ellipticis apice rotundatis apiculatis integerrimis v. repandis coriaceis; receptaculis sessilibus geminis, involucro bilobo hirtocinctis, ore bractea lata occluso. *In Columbia.* ♂.

52. *U. gardeniaefolium* Miquel; ramulis subtrigonis; fol. elliptico-oblongis acutis basi rotundatis 3-nerviis integerrimis membranaceis rigidis pelliculo-punctatis puberulis. *Ficus* h. Berol. *In Brasilia.* ♂.

53. *U. Salzmannianum* Miquel; glabrum; ramulis abbreviatis; fol. brevissime petiolatis lato-ellipticis obtusis apiculatis integerrimis coriaceis nitidis; receptaculis geminis pedunculatis globosis; involucro obsolete bilobo. *In Bahia.* ♂.

54. *U. Tweedianum* Miquel; glabrum; fol. petiolatis lato-ellipticis obtusis v. rotundatis integerrimis coriaceis 3-nerviis; receptaculis geminis pedunculatis globosis; involucro bilobo. *In oris Lagoae de Loo Potos.* ♂.

55. *U. geminum* Miquel; glabrum; fol. petiolatis ovato-lanceolatis coriaceis acuminatis integerrimis basi obtusis; receptaculis geminis pedunculatis globosis; involucro bilobo. *Ficus* gemina R. et P. *In Peruvia.* ♂.

56. *U. pertusum* Miquel; fol. petiolatis crasse coriaceis oblongo-vel ovato-ellipticis obtusis apiculatis, margine incurvo, venulis numerosis subtus

reticulatis; receptaculis consertissimis obovato-globosis ore concavo; involucro bilobo. *Ficus americana* Aubl. Plum. ic. t. 132. f. 2. *In Ind. occ. et Guiana.* ♂.

57. *U. trigonum* Miquel; fol. elliptico-oblongis obtusis glaberrimis; receptaculis aggregatis globosis involucratis; umbilico triangulare. *Ficus trigona* L. Plum. ic. t. 132. f. 1. *In Surinamo.* ♂.

58. *U. casapiense* Miquel; fol. petiolatis oblongo-lanceolatis subacuminatis basi obtusis integerrimis crasse coriaceis subtus sparse glandulosopilosus; stipulis sericeo-hirtis; receptaculis geminis sessilibus globosis glabris stipulis diu cinctis apice subsulcatis, ore bracteis connatis clauso. *In Peruvia ad Casapi.* ♂.

59. *U. Matheusii* Miquel; glabrum; fol. petiolatis lanceolatis v. elliptico-lanceolatis acuminatis basi obtusis rotundatis integerrimis utrinque glandulosopunctatis laevibus; receptaculis geminis breve pedunculatis basi involucro bilobo cum pedunculis puberulis. *In Peruvia.* ♂.

60. *U. atrox* Miquel; fol. ovatis acutiusculis aequilateris basi profunde cordalis lobis integerrimis membranaceis 9-nerviis subtus in nervis pubescentibus petiolo breviusculo subpeltatum insertis. *Ficus* Mart. *In Brasilia.* ♂.

61. *U. glanduliferum* Miquel; ramulis repentibus appresse puberulis; fol. petiolatis elliptico-vel ovato-lanceolatis integerrimis repando-denticulatis membranaceis glabris subtus fuscescentibus versus margines glanduliferis. *In Brasilia.* ♂.

62. *U. infestum* Miquel; ramis ramulisque repentibus radicantibus foliisque puberulis; fol. ovatis, ovato-ellipticis v. lanceolato-ellipticis utrinque obtusissimis omnibus venulosis subtus fuscescentibus parce glandulosis. *In Brasilia.* ♂.

63. *U. scandens* Lam. fol. cordatis basi inaequalibus subtus venoso-reticulatis; stipulis lanceolatis oppositis; caulibus scandentibus. *In Am. austr.* ♂.

64. *U. maculata* Miquel; fol. oblongis utrinque attenuatis serrulatis parallele venosis asperis; receptaculis globosis asperis. Plum. ic. t. 131. f. 1. *In Domingo.* ♂.

B. Species africanae.

a. Folia ampla v. majuscula
basi majus minus cordata.
Receptacula pedunculata. In-
volucrum 3—6-lobo sub-
truncatum.

65. *U. abutilifolium* Miquel; fol.
longe petiolatis rotundato-cordatis
apiculatis lobis baseos amplis et con-
niventibus coriaceis subtus cano-pu-
berulis 5-nerviis 6-costatis integerri-
mis; receptaculis obovatis pubescenti-
bus. *In Africa.* ♀.

66. *U. catalpaefolium* Miquel; fol.
longe petiolatis cordato-rotundatis ob-
lique acuminatis coriaceis glabris in-
tegerrimis 9—11-nerviis; receptaculis
pedunculatis geminis subglobosis gla-
bris. *In Sennar.* ♀.

67. *U. populifolium* Miquel; fol.
longe petiolatis rotundato-cordatis ab-
rupte acuminatis coriaceis glabris in-
tegerrimis 5-nerviis 10—12-costatis;
stipulis convolutis glaberrimis; re-
ceptaculis geminis pedunculatis glo-
bosis; involucro trilobo. *Ficus vassa*
Forsk. *F. popul.* Vahl symb. 1. t.
22. *In Arabia.* ♀.

68. *U. glulosum* Miquel; fol. longe
petiolatis ovatis obtusis basi cordatis
integerimis 3-nerviis utrinque 4—6-
costatis coriaceis subtus pubescentibus;
involucro 3-lobo repando; receptacu-
lis geminis subsessilibus glabratris.
Ficus Delil. *In Abyssinia et Nubia.* ♀.

69. *U. fazoketense* Miquel; fol.
longe petiolatis elongatis apiculatis
cordatis integerrimis subcoriaceis 3-5-
nerviis utrinque 6—8-costatis subtus
receptaculisque globosis dense pu-
bescentibus. *In regno Fazoket.* ♀.

70. *U. Kotschyianum* Miquel; fol.
longe petiolatis oblongis vel obovato-
oblongis obtusis cordatis integerrimis
coriaceis utrinque 7—8-costatis subtus
pubescentibus; receptaculis globosis
sericeo-pubescentibus. *In Fazoket.* ♀.

71. *U. ovatum* Miquel; fol. ovato-
oblongis acuminatis glabris coriaceis
albo-costatis; involucro calyptrofori
fructifero lacerato-bifido; recep-
taculis ovato-rotundis. *Ficus Vahl.*
In Guinea. ♀.

72. *U. politum* Miquel; glabrum;
ovato-cordatis acuminatis glabris lae-
vibus integerrimis venosis; receptacu-
lis glabris laevibus globosis magnitu-

dine nucis Coryli. *Ficus Vahl.* *In*
Guinea. ♀.

73. *U. calypratum* Miquel; ar-
boreum; fol. oblongo-ovatis acuminatis
glabris coriaceis venosis; involucro
calyptroformi basi circumscisso; re-
ceptaculis globosis sessilibus magni-
tudine Cerasi. *Ficus Vahl.* *In Gui-
nea.* ♀.

74. *U. ingens* Miquel; puberulum;
fol. petiolatis oblongis v. auguste ob-
longis basi cordatis, integerrimis cori-
aceis glabris; costulis utrinque sti-
pulis ovatis acutis parvis rigidis; re-
ceptaculis geminis subsessilibus glo-
bosis. *Ficus Schimperiana* Hochst. *In*
Abyssinia. ♀. *Arbor insignis.*

b. Folia ovata oblonga aut
lanceolata. Receptacula bre-
vissime pedunculata v.
sessilia.

75. *U. xanthophyllum* Miquel; fol.
ovato-oblongis acuminatis cordatis
integerimis coriaceis glabris utrinque
7—10-costulatis; stipulis ovatis acutis
parvis coriaceis convolutis tomentellis;
receptaculis subsessilibus globosis
glabris. *In Abyssinia.* ♀.

76. *U. tuleum* Miquel; arboreum;
fol. ovali-oblongis acuminatis basi
subemarginatis glabris; receptaculis
geminis globosis sessilibus; iuvolucro
4-fido. *In Guinea.* ♀.

77. *U. Hochstetteri* Miquel; sparse
pulverulum; fol. breve petiolatis ellipticis
v. obovato-ellipticis apice rotundatis
basi subemarginatis integerrimis
coriaceis utrinque 5—8-costulatis;
stipulis ovato-acutis tomentellis; recep-
taculis globosis. *In Abyssinia.* ♀.

78. *U. Schimperi* Miquel; ramulis
puberulis; fol. petiolatis ellipticis ob-
tusis integerrimis coriaceis glabris;
receptaculis sessilibus globosis gla-
briusculis ore rimaeformi basi in-
volucro trilobo ciliato puberulo. *In*
Abyssinia. ♀.

79. *U. Burkeri* Miquel; ramulis
pubescenti-hirtellis; fol. petiolatis ro-
tundato-ovatis v. ellipticis apice late
rotundatis v. obtuse attenuatis integ-
errimis subcoriaceis glabris utrinque
7—8-costulatis; stipulis lanceolatis
ciliatis; receptaculis globosis puberu-
lis. *In Africa.* ♀.

80. *U. natalense* Miquel; glabrum;
fol. breve petiolatis obovato-ellipticis

v. ovato-lanceolatis apice rotundatis integerrimis coriaceis subtus pennivenii; receptaculis globosis glabris. *Ficus Kraus.* In P. b. S. ♂.

81. *U. Thunbergii* Miquel; ramulis puberulis; fol. petiolatis ovato-lanceolatis v. oblongo-acutis basi rotundatis v. emarginatis coriaceis glabris subtus impresso-punctatis utrinque 7-8-costulatis; stipulis lanceolatis acuminatis. *Ficus cordata* Thunb. Fic. p. 8. c. ic. In P. b. S. ♂.

82. *U. salicifolium* Miquel; puberulum demum glabrum; fol. longe petiolatis ovato-v. oblongo-lanceolatis acuminatis basi rotundatis coriaceis glabris, costulis venosis utrinque 10—12, supra punctatis; stipulis linearibus puberulis; receptaculis globosis puberulis; involucro trilobo dein circumscisso. *Ficus Vahl* symb. t. 23. *F. indica* Forsk. In Sennaar. ♂.

c. *Folia modica. Receptacula pedunculata.*

83. *U. Thonningii* Miquel; arborea; fol. oblongo-ovalis obtusis glabris; ramulis subvirgatis; receptaculis geminis globosis sessilibus involucro 3-fido. *Ficus Blume.* In Guinea. ♂.

d. *Folia longe petiolata angusta. Receptacula breve pendunculata.*

84. *U. macrocarpum* Miquel in Hook. journ. VI. t. 23. B. fol. ovato-ellipticis apice rotundatis integerrimis glabris supra punctulatis multivenosus; receptaculis geminis globosis basi puberulis, involucro trilobo puberulo. *Ficus Steud.* In Abyssinia. ♂.

85. *U. Dekdekana* Miquel; puberulum; fol. oblongo-lanceolatis obtusiusculis basi cuneatis integerrimis coriaceis glabris pennivenii; stipulis puberulis ciliatis; receptaculis densissimis globosis puberulis, involucro 3-lobo pubescente. *Ficus Tjiela Hochst.* In Abyssinia. ♂.

e. *Folia pennivenia. Receptacula sessilia.*

86. *U. terebrata* Miquel; fol. ellipticis obtusis v. obtuse apiculatis integerrimis, venulis utrinque 8—10

tenerime reticulatis. *Ficus pertusa* Hort. Berol. In ins. Mauritii. ♂.

87. *U. rubrum* Miquel; fol. elliptico-ovatis obtusis longe petiolatis basi acutis venulis utrinque 6—8 subpunctulatis; stipulis ciliolatis; receptaculis geminis sessilibus, stipulis linearibus ciliatis fere involucratis. *F. Lam.* et *F. pyrifolia* Lam. In *Madagascar.* ♂.

88. *U. aggregatum* Miquel; ramis radicantibus; fol. ovalibus obtusis glabris superne punctatis; fructibus globosis aggregatis sessilibus. *Ficus Lam.* In Ind. or. ♂.

C. *Species australasicae. Asiaticis fere conformes sed in quibusdam folia subdenticulatim repanda; receptacula quandoque pedunculata vele basi in stipitem constricta. Involucra phylla 3 vulgo basi connata.*

89. *U. macrophyllum* Miquel; fol. petiolatis ovato-oblongis acutis basi subcordatis integerrimis parallele costatis coriaceis glabris. *Ficus Desf.* In Nov. Holl. ♂.

90. *U. Cunninghamii* Miquel; glabrum; fol. petiolatis late oblongis acuminatis basi rotundata subtruncatis rigide coriaceis integerrimis utrinque 8-costulatis; receptaculis geminis globosis sessilibus basi 3—4-bracteatis. In Nov. Holl. ♂.

91. *U. protixum* Miquel; fol. petiolatis coriaceis glabris oblongis v. ovato-oblongis acuminatis supra petiolum subbicallosis integerrimis vel repando-denticulatis costatis utrinque 6—8; receptaculis globosis basi 3-bracteatis. *Ficus Forst.* In Taiti. ♂.

92. *U. psychotriacefolium* Miquel; glabrum; fol. ellipticis obtuse apiculatis basi cuneatis subintegerrimis coriaceis venulis 6—8; stipulis ovatis acutis glabris; receptaculis subsessilibus globosis glabris. In Nov. Holl. ♂.

93. *U. Fraseri* Miquel; glabrum; fol. petiolatis glabris coriaceis ellipticis v. ovato-ellipticis acuminatis basi acutis versus apicem repandis costulis utrinque 6—8; petiolis 3-gonis an-

ticie sulcatis. In Nov. Holl. ♂.

94. *U. rubiginosum* Gaspar. fol. ellipticis utrinque rotundatis obtusis integerrimis glabris subtus rubiginosopubescentibus; receptaculis sessilibus

geminis pubescentibus. *Ficus australis* Willd. Bot. M. t. 2939. Vent. malm. t. 114. In Nov. Holl. ♂.

95. *U. platypodium* Miquel; glabriuscum; fol. petiolatis coriaceis lato-ellipticis adultis basi rotundatis costulis utrinque 10—12; receptaculis geminis globosis glabris basi 3-bracteatis. *Ficus Cunninghamii*. In Nov. Holl. ♂.

96. *U. puberulum* Miquel; fol. longe petiolatis ovato-ellipticis obtusis basi rotundatis patulo-costiveniis; stipulis lanceolatis convolutis hirtopuberulis; receptaculis pedunculatis ovato-globosis verrucosis ore mammaeformi tribraeatis. In Nov. Holl. ♂.

97. *U. brachypodium* Miquel; puberulum; fol. breve petiolatis elliptico-vel ovato-lanceolatis acutiusculis basi rotundatis coriaceis patulo-costiveniis; receptaculis breve pedunculatis globosis glabris. In Nov. Holl. ♂.

✓ 98. *U. obliquum* Miquel; fol. lanceolatis glaberrimis margine cartilagineis; pedunculis geminis brevissimis; involucris caducis longitudine receptaculi. *Ficus Forst.* In ins. Nomaca et Tanna. ♂.

D. Species asiaticae. Receptacula sessilia vel rarius pedunculata basi semper bracteis tribus sustensa. Stigma in plurisque elongatum paucis abbreviatum.

1. Folia rigidiuscula membranacea vel coriacea cordata vel ovata glabra marginibus undulata.

a. **Receptacula sessilia gemina v. solitaria.**

99. *U. religiosum* Gaspari. Ricerche t. 7. f. 1—5. fol. longe petiolatis ovato-cordatis anguste acuminatis integerrimis v. undulato-repandis sinu baseos lato v. truncato. *Ficus religiosa* L. *F. superstitionis* Lindl. Rheede I. t. 27. Pluken. t. 178. f. 2. In Ind. or. ♂.

100. *U. affine* Miquel; fol. longe petiolatis ovato-rotundatis abrupte longe acuminatis, acumine $\frac{1}{2}$ vel. folium totum aequante basi late truncatis undulato-repandis; receptaculis

junioribus ovatis subtrigonis. *Ficus religiosa* var. *rhyncophylla* Wall. In Bengalia. ♂.

101. *U. courtallense* Miquel; fol. longe petiolatis ovatis aequilateris acuminate cordatis vix repandis coriaceis glabris 3—5-nerviis costulis utrinque 4—5; receptaculis subsessilibus. *U. Lambertiano* et *religioso* accedit. In Courtallum. ♂.

102. *U. cordifolium* Miquel; fol. ovatis modice abrupte acute acuminatis subrepandis vel integerrimis basi rotundata vel truncata ad petiolum leviter protractis costis utrinque circiter 6. *Ficus Roxb.* Wight ic. t. 640. In Ind. or.

b. **Receptacula pedunculata.**

103. *U. Arnottianum* Miquel; fol. longe petiolatis late ovato-cordatis abrupte et acute acuminatis majoribus subundulato-repandis basi profunde cordatis 3—5-nerviis; costulis utrinque 5—6. In Ind. or.

2. **Folia longiuscula petiolata membranacea glabra ovato-vel angusto-oblonga. Receptacula sessilia v. subsessilia.**

104. *U. aegeiophyllum* Miquel; petiolis crassis succulentis; fol. ovato-v. subtriangulari-oblongis abrupte acuminatis v. obtuse apiculatis basi late truncatis integerrimis subundulatis coriaceis nitidis utrinque 7—8-costulatis; receptaculis obovato-globosis. In Bengalia. ♂.

105. *U. Lambertianum* Miquel; fol. longe petiolatis ovato-oblongis v. summis minoribus ellipticis abrupte acuminatis basi truncatis obsolete repando-undulatis subcoriaceis nitidis 4—6-costulatis; receptaculis globosis sessilibus glabris ore bracteatis. *Ficus ovata* Don. In Bombay. ♂.

106. *U. infectorium* Miquel; fol. longe petiolatis membranaceis oblongis v. sublanceolato-oblongis acute acuminatis basi rotundatis integerrimis vel subrepandis costulis utrinque 8—10; receptaculis sessilibus ovato-globosis. *Ficus Roxb.* Wight. ic. t. 665. *F. venosa* Hamilt. In Bengalia. ♂.

107. *U. Wightianum* Miquel; fol. longe petiolatis rigide membranaceis ellipticis obtuse acuminatis utrinque 5—6-costulatis; receptaculis sessilibus obovato-globosis. *Ficus Wightiana* Wall. *In Ind. or.* ♂.

108. *U. pseudobenjamineum* Miq.; tenere puberulum; fol. subcoriaceis ovato-vel late ellipticis obtuse acuminatis in petiolum breve attenuatis nervo marginatis; receptaculis geminis obovato-globosis basi bracteis 3 caducis. *Ficus Benjaminea* Russ. *F. comosa* Roxb. Wight. ic. t. 638. *In Ind. or.* ♂.

109. *U. perseaefolium* Miquel; fol. longe petiolatis lanceolato-vel elliptico-oblongis obtuse acuminatis subundulato-repandis utrinque 5—8-costulatis; receptaculis globosis glabris. *In Ind. or.* ♂.

110. *U. Tjakela* Miquel; fol. longe petiolatis ovato-vel elliptico-oblongis acuminatis basi rotundatis apice undulato-repandis utrinque 10-costulatis coriaceo-membranaceis supra viridis nitidis subtus pallidis; receptaculis sessilibus depresso-globosis glabris. *Rheede* 3. t. 64. *Ficus Burm.* *In Corallatum.* ♂.

3. Folia ut in paragrapho praecedente. Receptacula parva ad axillas defoliatas aggregata pedunculata.

111. *U. caulobotryon* Miquel; fol. longe petiolatis ovato-oblongis acuminatis basi rotundatis integerrimis membranaceo-coriaceis glabris subundulatis utrinque 6—8-costulatis; receptaculis subturbinato-globosis ore arcte clausis bracteis 3 latis sustensis. *In Ind. or.* ♂.

112. *U. caulocarpum* Miquel; fol. longe petiolatis oblongis abrupte acuminatis basi rotundatis integerrimis 12—15-costulatis coriaceo-membranaceis; stipulis perulaceis ovatis imbricatis; receptaculis globosis glabris basi bracteis connatis. *In ins. Philippinis.* ♂.

113. *U. stipulosum* Miquel; fol. petiolatis membranaceis oblongo-ellipticis abrupte acuminatis subtrinerviis venulisque utrinque circiter 8; stipulis maximis membranaceis; receptaculis

globosis basi breve tribracteatis. *In ins. Philippinis.* ♂.

4. Folia longiuscule petiolata angusta glabra. Receptacula sessilia.

114. *U. timorense* Miquel; fol. anguste oblongis breve acuminatis basi acutis subundulato-repandis membranaceis utrinque 6—7-costulatis; gemmis globosis glabris basi tribracteatis. *In Timor.* ♂.

115. *U. amblyphyllum* Miquel; fol. petiolatis oblongo-vel subspathulato-obovatis apice rotundatis retusis integrermis subcoriaceis; stipulis lanceolatis membranaceis; receptaculis depresso-globosis concavo-umbilicatis basi 3-bracteatis. *In Ind. or.* ♂.

116. *U. obtusifolium* Miquel; a praecedente fol. basi haud adeo attenuatis nec ipsa basi emarginatis sed in petiolum sensim continuatis facile distinguitur. *Ficus Roxb.* Wight. ic. t. 662. *In Chittagong.* ♂.

117. *U. reflexum* Miquel; ramis striatis rugosis cinereis recurvis; fol. ellipticis obtusis integrermis; receptaculis globosis. *Ficus Thunb.* *In Ind. or.* ♂.

118. *U. concinnum* Miquel; fol. longe petiolatis lanceolatis rectis v. obliquis integrermis subundulatis venulatis utrinque 15 patulis; stipulis parvis ovatis acuminatis ciliolatis; receptaculis pedunculatis globosis. *In ins. Philippinis.* ♂.

119. *U. parvifolium* Miquel; fol. longe petiolatis ellipticis apice abrupte obtuse apiculatis integrermis versus apicem subundulatis venis utrinque 10—15; receptaculis pedunculatis v. sessilibus. *In ins. Philippinis.* ♂.

120. *U. apiculatum* Miquel; fol. longe petiolatis late ovatis v. ellipticis acuminatis v. apiculatis basi rotundatis vel emarginatis margine undulatis nitidis subtus pallidis costulis utrinque 8—10. *In Ind. or.* ♂.

121. *U. ceylonense* Miquel; glabrum; fol. longe petiolatis ovato-oblongis acuminatis basi rotundatis integrermis subcoriaceis utrinque 10—14-costatis; stipulis maximis lanceolatis; receptaculis parvulis globosis. *In Ceylona.* ♂.

5. *Folia majuscula ovato-cor data 3—5-nervia et pluricosta puberula membranacea integerrima. Receptacula ob ovata pedunculata.*

122. *U. Dathousiae* Miquel; mol liter puberulum demum glabrum; ramis laevigatis annulatis crassis. In Ind. or. ♂.

6. *Folia breve petiolata robusta crasse v. rigide coriacea, juniora pubescentia v. tomentosa cordato-ovata elliptica oblonga integerrima subtus reticulata. Stipulae saepe dense villosae. Receptacula semper sessilia.*

123. *U. benghalense* Gasparr. Ricerche t. 7. f. 14—21. ramis cicatrisatis glabris; fol. ovato-oblongis utrinque obtusis glaberrimis; fructibus globosis geminis. Rheede I. t. 29. Com. hort. t. 62. Hook. journ. Ill. t. 13, 14. In Ind. or. ♂.

124. *U. tomentosum* Miquel; ramis villosis apice tomentosis; fol. oblongis subtus villosis; receptaculis minutis sessilibus tomentosis. Ficus Roxb. Wight. t. 647. F. pubescens Roth. F. mollis Vahl. In Ind. or. ♂.

125. *U. obversum* Miquel; ramis glabris caeterum hirti-tomentosum; fol. oblongo-ellipticis v. obovatis apice rotundatis basi leviter excisis integrerrimis subtus lutescenti-tomentellis utrinque 3—5-costulatis; bracteis latis dorso villoso-hirtis. In Ind. or. ♂.

126. *U. connivens* Miquel; ramulis petiolis stipulisque rufo-tomentosis; fol. longe petiolatis rotundato-obovatis apice rotundatis integrerrimis coriaceis utrinque 2—3-costulatis subtus tomentellis supra punctatis; receptaculis tomentellis ore tribracteatis, basi bracteis latis dorso hirtis. In Ind. or. ♂.

127. *U. dasycarpum* Miquel; l. c. t. 23. B. ramulis receptaculisque dense tomentosis; fol. petiolatis late ovatis v. ellipticis acuminatis cordatis undulato-repandis crasse coriaceis subtus tomentoso-pubescentibus, costulis utrinque 8—10; receptaculis ellipticis ore tribracteatis. In Bombey. ♂.

128. *U. mysorense* Miquel; ferrugineo-tomentosum; fol. ovatis v. ovato-

ellipticis acuminatis integerrimis costulis utrinque 12—15; receptaculis junioribus involuero crasso calyptraeformi cornuto inclusis oblongis. Rheede III. t. 57. Ficus Roth. F. Gonia Hamilt. In Ind. or. ♂.

129. *U. chrysophthalatum* Miquel; puberulum; fol. ovato-v. late-rhombeo-ellipticis integerrimis, costis utrinque 10—12 patulis; stipulis lanceolatis convolutis aureo-sericeo-hirsutis. In Ind. or. ♂.

130. *U. onustum* Miquel; glabrum; fol. oblongis v. obovato-oblongis obtuse acuminatis Integerrimis patulo-multicostatis, costulis utrinque 8; receptaculis geminis v. solitariis basi bracteis 3 latis subpuberulis. Ficus Wall. In Sylhet. ♂.

131. *U. depressum* Miquel; fol. oblongis acuminatis basi rotundatis integrerrimis subtriangularis multicostatis; stipulis elongato-lanceolatis acuminatis glabris; receptaculis ovatis basi 3-bracteatis glabris. Ficus Blume. In Java. ♂.

132. *U. bracteatum* Miquel; fol. oblongo-ellipticis v. obovato-ellipticis rotundatis obtuse apiculatis integrerrimis emarginatis 3—5-nerviis utrinque 5—6-costulatis subtus tomentoso-pubescentibus; receptaculis sessilibus globosis fusco-hirtis. Ficus Wall. In Singapore. ♂.

133. *U. leucocarpum* Miquel; pilosulum demum glabrum; fol. oblongis v. ovato-oblongis obtusiusculis integrerrimis v. obsolete repandis utrinque 6 costulatis; receptaculis pedunculatis obovatis basi tribracteatis albo-puberulis. Ficus Lacor Hamilt. In Ind. or. ♂.

7. *Glabra. Folia crasse vel rigide coriacea elliptica v. oblonga integerrima nitida paucicostulata venulisque cerebria striata. Receptacula sessilia.*

134. *U. xylophyllum* Miquel; fol. dorso-coriaceis oblongis vel oblongo-bovatis obtusis trinerviis et crasse costatis; receptaculis sessilibus oblongis ore prominulo bracteis imbricatis concavis occluso, basi bracteis 3 pubescentibus. Ficus Wall. In Singapore. ♂.

135. *U. elasticum* Miquel; fol. ellipticis acutiusculis coriaceis splendidis margine cartilagineis crassiner viis parallele venosis; receptaculis cylindricis subangulatis, involucro calytraeformi deciduo inclusus. *Ficus Roxb.* Wight ic. t. 663. *Macrophthalma Gasparri*. Ricerche t. 8. F. Taeda et cordata h. Berol. *In Ind. or.* §. Var. *β. latifolium* Miquel. *In Assamia.*

136. *U. rigidum* Miquel; ramis angulatis; fol. oblongis v. lanceolato-oblongis abrupte acuminatis integerimis crassis rigidis utrinque 4—5-crassae-costatis; stipulis ovato-triangularibus acutis coriaceis; receptaculis geminis depresso-globosis, bracteis latis rotundatis involucratis. *In ins. Wales.* §.

137. *U. clusioides* Miquel; fol. longe petiolatis oblongo-ovatis apiculatis integerrimis crasse coriaceis trinerviis venulis utrinque circiter 8; stipulis ovatis acutis coriaceis glabris; receptaculis geminis sessilibus. *In ins. Philippinis.* §.

8. Glabra. Fol. petiolata haud crasse coriacea oblonga, obovata parallele tenuiter multinervia venulis quibusdam paulo fortioribus omnibus tenuissimis striata. Stipulae parvae. Receptacula sessilia.

138. *U. rhododendrifolium* Miquel; fol. oblongo-vel elongato-oblongis breve acuminatis basi acutis v. cuneatis integerrimis rigide coriaceis laevissimis nitidis margine acuto subincurvis; receptaculis geminis subglobosis basi concava 3-bracteatis. *In Assamia.* §.

139. *U. canaliculatum* Miquel; petiolis sub-3-gonis profunde canaliculatis; fol. obovato-oblongis obtuse apiculatis basi acutis coriaceis venulis utrinque 6—8; receptaculis sessilibus globosis vel obovatis apice bracteis 3 occlusis, basi obtuse 3-bracteatis. *In ins. Wales.* §.

140. *U. Tjieta* Miquel; fol. petiolatis oblongis vel elliptico-oblongis apiculatis acutis 3—5-nerviis coriaceis; receptaculis terminalibus aphyllis racemoso-dispositis sessilibus globosis. *Ficus indica* L. F. *amplissima* Sm. Rheeede III. t. 63. *In ins. Philipp.* §.

141. *U. pisiferum* Miquel; fol. petiolatis obovato-oblongis obtuse apiculatis basi attenuatis coriaceis apice undulato-repandis 3—5-nerviis supra aveniis; receptaculis geminis globosis basi bracteis 3 crassis involucratis, ore marginato. *Ficus Hb.* Hook. F. *condaravia* Hamilt. *In Bengal.* §.

142. *U. drupazeum* Miquel; ramis sulcatis glabris; fol. obovatis cuspidatis glabris; petiolis crassis; receptaculis ovatis rugosis sessilibus magnitudine Pruni. *Ficus Thunb.* *In Ind. or.* §.

143. *U. ovoideum* Miquel; differt ab *U. retuso* foliis obovatis vel obovato-ellipticis apice haud adeo dilatatis margine laevi angusto. Partes omnes adultae glabrae. *Ficus Jack.* Rheeede I. t. 26. P. *pyrifolia* Burm. *In Ind. or.* §.

144. *U. retusum* Miquel; fol. subrotundo-ovatis apice dilatato apiculatis vel emarginatis, venulis utrinque circiter 10, reliquis capillaribus reticulatis; petiolis late sulcatis; receptaculis sessilibus; bracteis sulcatis. *Ficus L.* *In Bombay Ind. or.* §.

145. *U. nitidum* Miquel; ramulis subtrigonis; fol. petiolatis ellipticis vel subrhombico-ellipticis apiculatis trinerviis venulosisque coriaceo-membranaceis; stipulis ovato-lanceolatis; receptaculis geminis sessilibus globosis glabris; bracteis 3 obtusis. *Ficus nitida* Thunb. F. *benjamina* Roxb. F. *nitida*, vera et elliptica Hook. F. *rubra* Roth. Rheeede III. t. 55. *In Ind. or.* §.

146. *U. microcarpum* Miquel; ramulis crassiusculis; petiolis teretibus antice sulcatis; fol. ellipticis vel ovalibus retusis apiculatis coriaceis undulatis, supra lente punctulatis; receptaculis axillaribus sessilibus; bracteis dorso puberulis. *Ficus L.* F. *nitida* Blume. F. *littoralis* Blume. F. *leptocarpa* Steud. F. *benjaminea* Thub. F. *nitida* auctt. *In Jara.* §.

147. *U. Benjamineanum* Miquel; ramulis flexuosis debilibus dependentibus; petiolis teretibus; fol. ovatis vel elliptico-ovatis acuminatis pergamaceo-coriaceis margine laevi cinctis venulis capillaribus; receptaculis pisi-formibus sessilibus; bracteis 3 ovatis obtusis dorso sericeo-puberulis. *Ficus L.* F. *pendula* Lk. Rumph III. t. 90. *In Ind. or. et Java.* §.

148. *U. haematoxarpum* Miquel; ramulis tenuibus; junioribus compresso-triangularibus; fol. obtuse acuminatis puberulis. *Ficus* Blume. *In ins. Philipp.* §. *U. benjamino* valde affine.

149. *U. nudum* Miquel; fol. petiolatis ellipticis vel obovato-oblongis acuminatis; perulis ovato-lanceolatis glabris parvis; receptaculis sessilibus globosis; bracteis deciduis. *In ins. Philipp.* §.

150. *U?* *cuneatum* Miquel; fol. breve petiolatis ovalibus basi cuneatis acutis apice retusis integerrimis pergamaceis utrinque nitidis subtus fuscobrunneis subaveniis venulis capillaris; stipulis linearis-lanceolatis membranaceis glabris. *Ficus* Wall. *In Ind. or. Amherst.* §.

9. *Oreosycea* Miquel. Folia breve petiolata oblonga acuminata integerrima costata. Receptacula basi in stipitem constricta.

151. *U. nervosum* Miquel; puberulum; fol. acute acuminatis margine subundulatis costis crassis utrinque 10 patulis; receptaculis globosis longe stipitatis. *Ficus* Roxb. Wight ic. t. 660. *In Sikk.* §.

152. *U. modestum* Miquel; ramulis puberulis; fol. petiolatis rigide coriaceis ovato-ellipticis obtuse acuminatis utrinque 6—12-costatis; receptaculis obovato-globosis adultis glabris. *In Ind. or.* §.

5213. PHARMACOSYCEA Miquel.
(1848).

Flores in receptaculo globoso monoici bracteati. Masc. Perigonum fuscum coriaceum 4-phyllo; phyllis concavis. Stam. 2 antheris oblongis loculis connectivo antice adnatis. Foem. Perig. 4—6-phyllo; phyllis linearibus. Stigmata 2—4-crura, cruribus lanceolatis muricatis saepe introrsum sulcatis. Achenia crustacea.

1. *P. radula* Miquel in Hook. Journ. VII. p. 64. t. 2. B. scabro-puberula ramis glabris fuscescentibus; fol. oblongis ellipticis v. ovato-oblongis supra aspero-punctulatis venulis 10—12; stipulis lanceolatis elongatis convolu-

tis; involucro circumscisso. *Ficus* Willd. F. anthelmintica Rich. *In Am. austr.* §.

2. *P. anthelmintica* Miquel; glabra ramulis petiolisque fuscescentibus; fol. oblongis utrinque acutis trinerviis utrinque 10—12-costulatis coriaceis; stipulis lanceolatis elongatis convolutis; receptaculis globose basi involucro 3-phyllo. *Ficus* Mart. ic. ined. t. 77. F. glabrata H. et K. *In Brasilia.* §.

3. *P. dendroctona* Miquel; fol. obovatis utrinque rotundatis integerimis subcoriaceis rigidis utrinque scabris; receptaculis axillaribus; solitariis vel geminis sessilibus globosis glabriusculis. *Ficus* dendrocida H. et K. *In Am. austr.* §.

4. *P. gujanensis* Miquel; ramis glabris laevibus; ramulis circa stipulas hirtello-annulatis; fol. breve petiolatis oblongis apiculatis basi acutis integerrimis crasse coriaceis subtus aspero-punctatis utrinque 8—10-costulatis; receptaculis longe pedunculatis globosis basi involucro 3-phyllo. *In Demerara.* §.

5. *P. perforata* Miquel; glabra; fol. longe petiolatis lanceolato-oblongis acutis utrinque 10—12-costulatis integerrimis laevibus minute punctulatis; receptaculis breviter pedunculatis globosis basi involucro 3-partito. *In Am. austr.* §.

6. *P. obtusiuscula* Miquel; glabra; fol. petiolatis ellipticis obtusiusculis basi subacutis subpergamaceis glabris minutissime albido-punctulatis utrinque 10—15-costulatis; receptaculis globosis glabris basi breve stipitatis. *In Brasilia.* §.

7. *P. adhatodaefolia* Miquel; glabra; fol. petiolatis oblongis tenuiter coriaceis 3—5-nerviis utrinque 12-costulatis. *Ficus* Schott. *In Brasilia.* P. anthelminticae simillima.

8. *P. vermisuga* Miquel; glabra; fol. petiolatis lato-ellipticis acutiusculis basi rotundatis vel cordatis denticulato-repandis tenuiter coriaceis utrinque 10—12-costulatis; stipulis lanceolatis elongatis; receptaculis pedunculatis glabris basi involucro 3-phyllo. *In Brasilia.* §.

9. *P. grandaera* Miquel; glabra; fol. longe petiolatis late oblongis acuminatis integerrimis marginatis adultis crasse coriaceis subtus punctulatis, utrinque 10—12-costulatis; petiolis

crassis; receptaculis globosis glabris.
In Brasilia. ♂.

10. *P. laurifolia* Miquel; glabra; fol. petiolatis oblongis abrupte acuminate basi rotundatis integerrimis epunctatis utrinque 10-costulatis venulis numerosis; receptaculis globosis basi trilateatis. *In Brasilia.* ♂.

11. *P. Parkeriana* Miquel; glabra laevis; fol. breve petiolatis ellipticis vel obovato-ellipticis abrupte acuminate basi acutis utrinque 10—12-costulatis crasse coriaceis; stipulis ovato-lanceolatis coriaceis glabris, receptaculis pedunculatis globosis basi 3-bracteatis, ore bracteis clauso. *In Demerara.* ♂.

12. *P. oblongata* Kunth et Bouche (sub Fico) glabra; ramulis obsolete 3-gonis; fol. longe petiolatis oblongis v. obovato-oblongis abrupte acuminate basi rotundatis cordatis integerrimis undulatis 5-nerviis pellucido-reticulatis; receptaculis pedunculatis solitariis. *Ficus brasiliensis* Lk. *In Brasilia.* ♂.

13. *P. blanda* Kunth et Bouche (sub Fico.) glabra; ramulis teretiusculis; fol. oblongis apice acuminate subcomplicato subrecurvatis basi obtusa subcordatis integerrimis subtus pellucido-reticulatis; gemmis conico-acuminatis. *In?* ♂.

14. *P. peruviana* Miquel; ramis laevibus; ramulis pilis tenerimis adspersis; fol. petiolatis late ellipticis abrupte obtuse acuminate basi aequali rotundatis utrinque 6—10-costulatis; receptaculis globosis glabris. *In Peruvia.* ♂.

5214. POGONOTROPHE Miquel. (1848.)

Flores in receptaculo globoso basi trilateato intus pilosissimo monoeci vel dioeci cbracteolati sessiles v. pedicellati. Fem. Perigonium 3—5-phyllo. Stylus ex apice laterali crassus, stigmate obliquo submuricato. Masc. Perig. 4-phyllo. Stam. 2 antheris linearibus connectivo apiculatis.

1. *P. assamica* Miquel; fol. longe petiolatis late obovato-ellipticis acuminate integerrimis sursum repando-denticulatis glabriusculis; receptaculis geminis longe pedunculatis. *In Assamia.* ♂.

2. *P. Emodi* Miquel; fol. longe petiolatis ovato-cordatis acutis, lobis baseos rotundatis sinu lato dirematis 5-nerviis et utrinque costulatis membranaceis subtus pallidis. *Ficus Wall.* *In Emodi.* ♂.

3. *P. vagans* Miquel; fruticosa scandens radicans; fol. longe petiolatis late ovatis acuminatis basi leviter cordatis 3—5-nerviis costulisque integerrimis subtus pilosis; receptaculis glabris obovato-globosis basi 3-bracteatis. *Ficus Roxb.* Wight ic. t. 635. *In Chittagong.* ♂.

4. *P. macrocarpa* Miquel; ramulis petiolis foliisque subtus pubescens, his sensim glabratris longe petiolatis ovatis anguste acuminatis basi rotundatis 3—5-nerviis et utrinque 2—3-costulatis supra fugaciter puberulis. *Ficus Wight.* *In Ind. or.* ♂.

5. *P. Wightiana* Miquel; ramis glabris radicantibus; ramulis petiolisque sericeo-puberulis; fol. breve petiolatis ovatis acuminatis basi cordatis integerrimis subtus pilosiusculis utrinque 3-costatis; receptaculis globosis subpedunculatis. *In Ind. or.* ♂.

6. *P. rigida* Miquel; fol. petiolatis ovatis acuminatis integerrimis 6—7-costatis glabris rigide coriaceis laevibus; receptaculis breve pedunculatis obovato-globosis laevibus basi 3-bracteatis. *In Java.* ♂.

7. *P. dasypylla* Miquel; fol. ovatis aequilateris abrupte acuminatis cordatis 3—5-nerviis 4-costatis supra glabriusculis subtus cum petiolis ramulis stipulis receptaculisque rubiginoso-vel cinereo-tomentosis. *In Ceylona.* ♂.

8. *P. ceylanica* Miquel; ramulis pedunculis receptaculisque fusco-hirsutis; fol. ovatis aequilateris acuminatis cordatis margine subrepandis supra laevibus subtus puberulo-hirtis 3—5-nerviis et 2—3-costulatis; receptaculis 3-bracteatis globosis. *In Ceylona.* ♂.

9. *P. javana* Miquel; tomentello-pubescentis; fol. late subovato-ellipticis aequilateris apice rotundatis emarginatis vel truncatis, margine revolutis coriaceis, 3-nerviis utrinque 3—4-costatis supra aspero-punctatis; receptaculis obovato-globosis ore obsolete setis pallidioribus occluso. *In Java.* ♂.

10. P. phaeopoda Miquel; ramulis petiolisque molliter pubescentibus; fol. petiolatis ovato-vel lato-ellipticis basi rotundatis coriaceis integerrimis margine revolutis supra scabro-asperimis subtus incanis; stipulis parvis villosis; receptaculis subglobosis puberulis intus setosis. *In Jura.* ♂.

11. P. reticulata Miquel; hirtello-pubescentis; fol. petiolatis oblongis v. ovato-oblongis acute apiculatis basi rotundatis integerrimis v. obsolete repandis crasse coriaceis 6—8-costulatis supra nitidis; receptaculis ovato-globosis puberulis. *In Ind. or.* ♂.

12. P. pubigera Miquel; ramulis petiolis foliisque utrinque floccosopubescentibus; fol. petiolatis oblongis longe acuminatis basi rotundatis integerrimis membranaceis utrinque 4—5-costulatis; receptaculis ovato-globosis dense tomentellis. *In Nepalia.* ♂.

13. P. verrucosa Miquel; subhirtella; fol. petiolatis ovato-vel oblongo-lanceolatis acuminatis basi rotundatis integerrimis apice subrepandis subtus glaucescentibus; receptaculis basi subconstricta tribracteatis verrucosis. *In Assamia.* ♂.

14. P. glandulifera Miquel; aurantiaco-hirtella; fol. oblongis acuminatis basi rotundatis integerrimis; receptaculis globosis tribracteatis intus longe sericeo-pilosus. *Ficus Wall.* *In Ind. or.* ♂.

15. P? foveolata Miquel; puberulo-hirtella; fol. ovato-oblongis acuminatis basi rotundatis integerrimis v. undulato-repandis utrinque pluricostatis subcoriaceis glabris sublacunoso-punctulatis; receptaculis solitariis obovatis. *In Nepalia.* ♂.

16. P.? ribesioides Miquel; hirtella demum glabrescens; fol. petiolatis oblongo-lanceolatis apiculatis utrinque 3—5-costulatis glabris coriaceis integerrimis; receptaculis sessilibus glabris. *Ficus Wall.* *In Nepalia.*

3-polyphyllo, ovario sessili stylo laterali stigmate elongato.

1. S. antiquorum Gasparr. fol. ovatis obtusis basi cordatis utrinque 4—5-costatis integerrimis repandis vel subangulatis; petiolis ramulisque subhirtellis receptaculis racemosis turbinatis tomentellis. *Ficus Sycomorus L.* *In Aegypto.* ♂.

2. S. rigida Miquel; fol. petiolatis rotundato-ovatis v. ellipticis obtusis cordatis integerrimis utrinque 2—3-costulatis rigide coriaceis supra asperis subtus tenuiter pilosis; stipulis cano-hirtellis receptaculis obovato-urceolatis glabriusculis. *In Sennaar.* ♂.

3. S. trachyphylla Miquel; fol. petiolatis ovatis ellipticis obtusis cordatis integerrimis vel repandis 3-nerviis paucicostatis rigide coriaceis utrinque asperimis subtus lacunoso-reticulatis; stipulis sericeo-hirtis. *Ficus Fenzl.* *In Fazoket.* ♂.

4. S. panifica Miquel in Hook. Journ. VII. t. 3. f. A. fol. ovatis elliptico-v. lanceolato-ovatis acuminatis majoribus inaequaliter et remote dentato-serratis minoribus subintegerrimis coriaceis 3-nerviis; stipulis dense sericeis; receptaculis confertis globosis glabris. *Ficus Delil.* *In Aegypto.* ♂.

5. S. Schimperiana Miquel; fol. rotundato-ovatis acutiusculis basi cordatis apice dentato-serratis coriaceis utrinque glabris 2—3-costatis; stipulis lanceolatis puberulis; receptaculis globosis pedunculo petioloque subsquamulosis. *Ficus vallis Choudae Delil.* *In Abyssinia.* ♂.

6. S. capensis Miquel I. c. VII. t. 3. f. B. fol. ovatis vel ovato-oblongis apice attenuatis basi rotundatis integerrimis caeterum grosse serrato-dentatis coriaceis; receptaculis racemosis subglobosis. *Ficus Thunb.* F. *Lichtensteinii* Link. *In P. b. S. ad Port Natal.* ♂.

7. S. gnaphalocarpa Miquel; hirtella; fol. obovato-ellipticis basi cordatis margine serrato-denticulatis hirto-puberulis; receptaculis obovatis sericeo-hirtellis; involucro 3-phyllo. *Ficus Steud.* *Ad fluvium Tocazze Abyssiniae.* ♂.

8. S.? riparia Miquel; fol. elliptico-vel oblongo-lanceolatis obtusiusculis coriaceis subtus punctulato-aspe-

5215. SYCOMORUS Gasparr. (1846).

Flores in receptaculo turbinato v. pyriformi monoici. Masc. sessiles perigonio 3-phyllo raro diphylllo, staminibus 1 plerumque 2 quandoque 3. Fem. pedicellati v. sessiles, perigonio

ris integerrimis utrinque 4—5-costulatis; stipulis dorso sericeis; receptaculis racemosis ovatis cum pedunculo puberulis. *Ficus Hochst.* In Abyssinia. ♂.

9. *S. Thonningiana* Miquel in Hook. fl. Nigr. *Ad Prom. viride*. ♂.

10. *S. Vogeliana* Miquel inedit. In Fernando Po. ♂.

11. *S. guineensis* Miquel. In Capite Palmas. ♂.

Species dubiae.

12. *S. Sur* Forsk. (sub Fico) fol. lanceolatis repandis glaberrimis basi subcordatis. In Arabia. ♂. *Sycomoro* affinis.

13. *S. lateriflora* Miquel; fol. cordato-ovatis acutis glabris; fructibus globosis pedunculatis. *Ficus Vahl.* *F. morifolia* Lam. In ins. Borboniae. ♂.

14. *S. mauritiana* Miquel; fol. cordato-ovatis subitus tomentosis asperis; ramis fructiferis nudis dependebatibus; receptaculis turbinato-globosis. *Ficus Lam.* *F. obtusata* Lk. In ins. Borboniae. ♂.

15. *S. Forskalii* Miquel; fol. cordato-ovatis serratis utrinque scabris petiolo longioribus. *Ficus Vahl.* *F. morifolia* Forsk. In Arabia. ♂.

16. *S. Taab* Miquel; fol. ovatis petiolatis conjugatis. *Ficus Forsk.* In Arabia. ♂.

17. *S. Chanas* Miquel; fol. cordatis scabris. *Ficus Forsk.* In Arabia. ♂.

18. *S. umbellata* Miquel; fol. exakte cordiformibus acuminatis glabris; pedunculis 3—5 umbellatis. *Ficus Vahl.* In? ♂.

5216. COVELLIA Gasparr. (1846).

Flores in receptaculo subgloboso monoici v. dioici ebracteolati. Fem. nudi vel serius perigonio minuto 3—5-partito instructi. Ovarium obovatum lenticulare compressum, stigmate tubuloso truncato. Masc. in superiori receptaculi parte monandri perigonio 3-partito.

a. Folia alterna basi inaequalia serrata v. dentata scabra.

1. *C. inaequiloba* Miquel; fol. inaequaliter cordatis lanceolatis acumi-

natis scabro-puberulis; stipulis geminis membranaceis puberulis. In Malacca. ♂.

2. *C. cyrtophylla* Miquel; scaberima; fol. petiolatis oblongis inaequaliter cordatis supra aspero-punctatis subtus ramulis receptaculisque scaberrime pubescentibus; receptaculis racemosis. *Ficus Wall.* In Silhet. ♂.

3. *C. dasycantha* Miquel; aurantiaco-tomentella; fol. oblongis acuminate inaequaliter cordatis utrinque 7—costulatis molliter pubescentibus; receptaculis stipitatis pubescentibus. *Ficus obscura* Blume. In Jara. ♂.

4. *C. Zollingeriana* Miquel; dense pubescens; fol. membranaceis oblongis acuminatis basi oblique rotundatis repando-denticulatis utrinque 5—6-costulatis. In Java. ♂.

5. *C. Barclayana* Miquel l. c. t. 7. B. pilosa; fol. petiolatis inaequali-ellipticis acuminatis, acumine late obtuso repando-denticulatis, utrinque 5 costulatis; receptaculis globosis glabris. In Nukanan. ♂.

6. *C. cunia* Miquel; *Ficus Roxb.* Wight ic. t. 648. In Nepalia. ♂.

7. *C. conglomerata* Miquel; *Ficus Roxb.* Wight ic. t. 669. In Chittagong. ♂.

b. Folia opposita scabra serrata v. dentata.

* Omnia opposita.

8. *C. oppositifolia* Gasparr. fol. obovato-oblongis serratis acutis supra scabris subtus hirtis; receptaculis globosis umbilicatis hirtis. *Ficus Roxb.* corom. t. 124. Wight ic. 638. In Ind. or. ♂.

9. *C. hispida* Miquel; fol. petiolatis oblongis breviter acuminatis quandoque repando-serrulatis subtus pellicidis scabro puberulis; receptaculis racemosis villoso-hispidis basi 3-bracteatis. *Ficus L.* In Java. ♂.

10. *C. setulosa* Miquel; fusco-setulosa; fol. petiolatis oblongis anguste acuminatis repando-serrulatis utrinque 6-costulatis; receptaculis hirtello pubescentibus globosis tribracteatis. In Ind. or. ♂.

11. *C. Daemonum* Miquel; setulosohirtella; fol. elliptico-vel subobovato-oblongis acuminatis obtuse dentatis utrinque 3—2-costulatis subtus

punctatis. *Ficus daemona* Koen. Wight
ic. t. 641. *In Ind. or. ♂.*

12. *C. courtallensis* Miquel; fusco-
adpresso sericeo-hirtella; fol. ovatis
ellipticisve cordatis apice serrulatis
vel integerrimis utrinque 3—4-costulati-
tis supra nitidis glabris subtus scabro-
pubescentibus; ramulis dentato-annu-
latis. *In Ind. or. ♂.*

13. *C. Wightiana* Miquel; ramu-
lis fistulosis; fol. longe petiolatis
ovato-oblongis acuminatis basi rotun-
datis utrinque 4—5-costulatis subtus
adpresso-hirtellis membranaceis; re-
ceptaculis globosis pubescentibus. *In
Ind. or. ♂.*

** *Folia opposita et simul
alterna.*

14. *C. vlokameriaefolia* Miquel;
l. c. t. 8. f. A. glabriuscula; fol. pe-
tiolatis coriaceis ovatis vel lanceo-
lato - oblongis acuminatis basi atte-
nuatis utrinque 6—8-costulatis subtus
puberulis; receptaculis globoso-turbi-
natis vertice depresso intus sub ore
bracteatis. *Ficus Wall. F. cunei-
folia* Hook. *In Ind. or. ♂.*

15. *C. assamica* Miquel; scabro-
pubescens; fol. oblongis vel lanceo-
latis utrinque acutis utrinque 5—6-
costulatis subcoriaceis supra setoso-
scabris subtus pallidis punctulatis;
receptaculis globosis obsolete setuloso-
tumidatis. *Ficus laminosa* Hard. *In Ind.
or. ♂.*

16. *C. congesta* Miquel; *Ficus*
Roxb. Wight ic. t. 644. *In Amboi-
na. ♂.*

17. *C. rapiformis* Miquel; *Ficus*
Roxb. Wight ic. t. 637. *In Amboina. ♂.*

c. *Folia alterna latiuscula
aequalia serrulato-dentata.*

18. *C. dasycarpa* Miquel; ramu-
lis scabro-puberulis; fol. oblongis v.
obovato - oblongis acuminatis obtuse
dentatis utrinque 4—5-costulatis sub-
tus molliter cauo-pubescentibus; re-
ceptaculis turbinatis dense tomentosis
bracteis latis hirtis. *Ficus repens*
Hook. *In Ind. or. ♂.*

19. *C. macrophylla* Miquel; *Ficus*
Roxb. Wight. ic. t. 673. *F. Rox-
burghii* Wall. *In Ind. or. ♂.*

20. *C. racemifera* Miquel; *Ficus*
Boxb. Wight ic. t. 639. *In Suma-
tra. ♂.*

d. *Folia alterna angusta. Re-
ceptacula saepe racemosa.*

* *Receptacula turbinata.*

21. *C. glomerata* Miquel; fol. ob-
longis integerrimis acutis basi angu-
statis 3-nerviis venosis glabris; re-
ceptaculis ellipticis calyculatis; pe-
dunculus aggregatis. *Ficus Willd.*
Roxb. corom. t. 123. Wight ic. t. 667.
In Ind. or. ♂.

22. *C. prostrata* Miquel; glabra;
fol. lanceolatis acuminatis membra-
naceis integerrimis utrinque 10-costu-
latis subtus fuscescentibus; recepta-
culis racemosis basi concavo - tri-
bracteatis. *Ficus Wall.* *In Ind. or. ♂.*

23. *C. lanceolata* Miquel; *Ficus*
Roxb. Wight ic. t. 645. *In Ind. or. ♂.*

** *Receptacula subglobosa
laevia.*

24. *C. cuneata* Miquel; l. c. t. 8.
B. adpresso - puberulo - hirtella; fol.
breve petiolatis obovato - vel rhombo-
oblongis acuminatis basi cuneatis cre-
nulato-repandis; receptaculis panicu-
latis intus dense setulosis. *In ins.
Philipp. ♂.*

25. *C. microcarpa* Miquel l. c. t.
9. A. fol. breve petiolatis oblongo-
lanceolatis acuminatis repandis mem-
branaceis; receptaculis paniculatis basi
bracteatis globoso-turbinatis obsolete
costulatis. *In ins. Philipp. ♂.*

26. *C. mollis* Miquel; fol. petiola-
tis lanceolato-oblongis acutis integer-
rimis vel repandis membranaceis sub-
tus receptaculisque molliter pubescenti-
bus. *In Java. ♂.*

27. *C. paniculata* Miquel; ad-
presso - hirtella; fol. breve petiolatis
oblongis longe acuminatis basi acutis
repando-denticulatis glanduloso-punc-
tulatis 6—8-venulosis; receptaculis
fasciculato - racemosis; floribus fem.
basi perigonio tubuloso-vaginatis. *In
Java. ♂.*

28. *C. Webbiana* Miquel; puberula;
fol. confertis petiolatis lanceolatis v.
cuneatis coriaceis integerrimis mar-
gine subundulatis subtus punctulatis;

receptaculis globoso-turbinatis glabris
ore umbilicato-marginatis.

29. *C. Griffithii* Miquel; ramis
repentibus; fol. alternis longe petio-
latis oblongis v. ovatis acuminatis
grosse serrato-dentatis membranaceis
subtus pallidis; receptaculis obovatis
obsolete costulatis et ubique bracteis
obtusis crassis dein tuberculiformibus
subsquamosis. *In Mergui.* ♀.

30. *C. venosa* Miquel; fol. oblon-
go-ovatis integerrimis acutis basi sub-
cordatis supra impresso - punctatis;
receptaculis geminatis pyriformibus
glabris. *Ficus Willd.* hort. berol. t. t.
36. *F. leucotoma* R. et S. *Cystogyne*
leucosticta Gasparr. *In Ind. or.* ♀.
Perigonium floris foeminei monophyl-
lum in modum vesicae pistillum ob-
ducens dein lateraliter dehiscens.

31. *C.?* *costata* Miquel; glabra;
fol. alternis oblongo-ovatis acuminata-
tis basi cordatis subintegerrimis utrin-
que 12-costatis nervis costisque ru-
bentibus; receptaculis globosis tri-
bracteatis puberulis. *In?* ♀.

5217. SYNOECIA Miquel. (1848).

Flores in receptaculo pyriformi-
ebracteolati prorsus nudi monoeci mixti.
Stamina pistillis interposita, pro sin-
gulo pistillo circiter 3—4, filamentis
brevissimis antheris longis biloculari-
bus. Ovarium sessile dimidiatum com-
pressum, stigma longum inaequaliter
bicrure, cruribus filiformibus albis.
Achenia magna orbiculata vel semi-
lunaria lenticularia compressa.

1. *S. diversifolia* Miquel in Hook.
journ. VII. p. 469. t. 9. A. fol. dilata-
tis subtriangulariter ovatis basi cunea-
to - acutis; receptaculis solitariis vel
geminis glabris, bracteis ciliolatis.
Ficus Blume. *In Java.* ♀.

2. *S. falcata* Miquel t. 9. f. B.
repens radicans; ramulis gracilibus
puberulis; fol. breve petiolatis dimi-
diato-oblongis obtusis integerrimis ve-
nulosis glabris subtus punctulatis; re-
ceptaculis magnis ovato-globosis basi
3-bracteatis. *Ficus* Thunb. *F. ma-*
crocarpa Blume. *In Java.* ♀.

SUPPLEMENTUM ad vol. V.

4780 a. *POUROUMA* Aubl. (1775).

Masc. Perigonium tubuloso-turbinatum subintegrum 4-dentatum vel 4-partitum. Stam. 4 filamentis liberis v. connatis, antheris dorso connectivo minimo affixis. Fem. Perigonium oblongum v. ovatum subcarnosum ore integro minimo. Stigma discoideo-peltatum. Fructus perigonio persistente carnosus inclusus crustaceus. Arbores americanae tropicae. *Artocarpeae.*

1. *P. ovata* Trecul. l. c. fol. ovatis v. ovato-lanceolatis integris obtuse acuminatis nitrinque glabris subtus in nervis pubescentibus. *In Brasilia.* ♂.

2. *P. aspera* Trecul; fol. ovatis v. cordatis integris v. 3—5-lobis apice rotundatis obtusissimis v. abrupte acuminatis supra asperis subtus albo-tomentosis. *In Guiana.* ♂.

3. *P. mollis* Trecul; fol. ovatis integris tridentatis v. trifidis basi subcordatis apice acutis supra glabris subtus puberulo-tomentellis. *In Brasilia et Guiana.* ♂.

4. *P. villosa* Trecul; fol. ovatis 3-fidis basi cordatis apice late rotundis leviter marginatis cum acumine supra glabris subtus albo-tomentosis; ramis petiolisque hirsutis. *In Guiana.* ♂.

5. *P. triloba* Trecul; fol. 3-lobis lacinias acuminatis, lacinia media ob-ovata, supra glabris laevigatis subtus

pubescentibus; stipulis villosis. *In Peruvia.* ♂.

6. *P. palmata* Poepp. et Endl. nov. g. t. 141. fol. cordato-rotundis alte 3-partitis, lobis elongatis acutis supra strigosis subtus pubescentibus in nervis adpressissime flavo-pilosis. *In Peruvia.* ♂.

7. *P. acutiflora* Trecul; fol. cordatis 3—5-fidis, lobis acutis breve acuminatis supra glabris laevigatis subtus fusco-villosis. *In Brasilia.* ♂.

8. *P. digitata* Trecul; fol. alte cordatis 3—7-partitis; lobis oblongis acutis acuminatis supra glabris subtus albo-tomentosis in nervis et costis sericeis. *In Brasilia.* ♂.

9. *P. Jussieuana* Trecul; fol. non cordatis 3—5-fidis palmatis; lobis oblongis repandis acutis supra glabris subtus petiolisque albo-tomentosis. *In Peruvia.* ♂.

10. *P. multifida* Trecul; fol. 11-12-partitis; lobis oblongo-lanceolatis v. obovato-acuminatis supra glabris subtus albo-tomentosis. *In Am. austr.* ♂.

11. *P. gujanensis* Aubl. t. 341. fol. trilobis supra glabris subtus cano-tomentosis; stipulis amplexicaulibus amplis conicis; floribus corymbosis. *In Guiana.* ♂.

12. *P. triloba* Klotzsch; ramis angulatis flavo-velutinis; fol. palmato-3-partitis longe petiolatis coriaceis supra glabris subtus hirsutis; lacinias acuminatis. *In Peruvia.* ♂.

4780 b. CONOCEPHALUS Blume.
(1825).

Flores dioici. Masc. Perigonium turbinatum tubulosum 4-fidum v. bipartitum. Stamina 4 rarissime 2, perigonii foliolis opposita. Fem. Perigonium 4-fidum. Stylus brevissimus. Stigma obliquum. Fructus perigonio tectus, chartaceus 2-valvis. *Artocarpeae.*

1. *C. lanceolatus* Trecul; in ann. sc. nat. (3 ser.) 8. p. 87. fol. lanceolatis subtus hirtellis; pedunculo communis masculo ramis secundariis longiore. *In Ind. or.* ȏ.

2. *C. ovatus* Trecul; fol. ovato-subrotundis v. ovatis basi late obtusis et leviter emarginatis apice obtusis v. acutis v. emarginatis; pedunculo communis ramis secundariis sublongiore. *C. suaveoleus* Bennet pl. jav. t. 12. *In Jara.* ȏ.

3. *C. Roxburghii* Trecul; fol. ovato-ellipticis basi rotundatis apice brevissime acuminatis; pedunculo communis masculo ramis secundariis 3—4-plo breviore. *Urtica naucleifera* Roxb. *In Ind. or.* ȏ.

4. *C. pubescens* Trecul; fol. ovatis basi rotundatis apice acutis subtus pubescentibus ramulis petiolis stipulisque puberulis. *In Jara.* ȏ.

5. *C. ellipticus* Trecul; fol. oblongo-ellipticis basi rotundatis rarius attenuatis apice obtusissimis subemarginatis rarius leviter acutis. *In Ind. or.* ȏ.

6. *C. acuminatus* Trecul; fol. rhomboidis v. ovato-rhombeis basi acutis aut obtusis apice sensim acuminatis attenuatis acumine anguste acutissimo. *In Manilla.* ȏ.

7. *C. microphyllus* Trecul; fol. ovalis rotundatis obsolete cordatis apice attenuatis acutis breviter acuminatis, acumine mucronulato. *In Manilla.* ȏ.

8. *C. naucleiflorus* Lindl. B. R. t. 1203. caule radicante scandente; fol. cordatis acutis glabris; capitulis masculis dichotome paniculatis; calyce tubuloso 3-fido; staminibus 3. *In?* ȏ.

4780 c. CUSSAPOA Aubl. (1775).

Masc. Rractcolae spathulatae perigonium cingentes. Perigonium tur-

binato-cylindricum 3-partitum. Stam. 1 vel 2 connata; anthera 2—4-locularis. Fem. Perigonium cylindricum v. urceolatum crassum v. membranaceum apice integrum v. 3-dentatum. Stylus brevis. Stigma capitato-cylindricum. Drupa perigonio inclusa. *Artocarpeae.*

1. *C. ferruginea* Trecul l. c. fol. elliptico-lanceolatis utrinque acutis supra glabris subtus dense ferrugineo-tomentosis; petiolis stipulis ramulisque ferrugineo-villosis. *In Guiana.* ȏ.

2. *C. Fontanesiana* Brongn. ex Trecul; fol. elliptico-lanceolatis basi rotundatis apice acuminatis supra glabris subtus adpresso-puberulis; capitulo fem. solitario. *In Brasilia.* ȏ.

3. *C. latifolia* Aubl. guj. t. 362. fol. ellipticis v. obovatis utrinque rotundatis v. apice acuminatis glaberis; capitulis fem. cymosis. *In Guiana.* ȏ.

4. *C. oralifolia* Trecul; fol. ovatis basi rotundis v. emarginatis apice acutis utrinque glabris; capitulis femineis cymoso-paniculatis. *In Peruvia.* ȏ.

5. *C. microcephala* Trecul; fol. ellipticis ovatis v. obovatis basi sub-emarginatis apice acutis v. obtuse acuminatis supra glabris subtus albo-tomentosis. *In Guiana.* ȏ.

6. *C. asperifolia* Trecul; fol. obovatis v. rotundis utrinque obtusissimis v. emarginatis supra scabris subtus molliter pilosis; capitulis masculis cymosis, fem. solitariis. *In Guiana.* ȏ.

7. *C. hirsuta* Trecul; fol. coriacis obovatis basi rotundis, apice acutis v. acuminatis supra glabris subtus tomentosis ramulis stipulisque hirsutis; capitulis fem. cymoso-corymbosis. *In Peruria.* ȏ.

8. *C. magnifolia* Trecul; fol. amplis rotundato-ovatis basi leviter cordatis apice obtusis v. emarginatis subtus pubescentibus; capitulis fem. cymosis. *In Peruria.* ȏ.

9. *C. villosa* Poepp. et Endl. nov. g. t. 147. fol. ovatis v. cordatis maximis coriacis marginibus sinuatis apice acutis supra glabris subtus albo-tomentosis; ramulis petiolis pedunculisque hirsutis; capitulis masc. cymosis, fem. solitariis. *In Peruria.* ȏ.

10. *C. vellea* Klotzsch in Linnaea 20. p. 527. ramulis petiolisque

dense villosis; fol. maximis cordato-ovatis obtusis coriaceis subtus albido-vellereis; capitulis masculis maximis; pedunculis villosis. *In Peruvia.* ♀.

11. *C. fugifolia* Klotzsch; ramis flavo-fuscis glabris; ramulis petiolisque ferrugineo-tomentosis fol. ellipticis utrinque attenuatis integerrimis subtus lanuginosis; capitulis masc. minimis paniculatis. *In Peruvia.* ♀.

12. *C. setosa* Klotzsch; ramulis longe setosis; fol. obovatis brevissime acutis basi obtusis subtus lanuginoso-villosis; capitulis fem. repetito-umbellatis. *In Peruvia.* ♀.

13. *C. Ruizii* Klotzsch; ramis ramulisque angulatis pubescentibus fuscis; fol. maximis longe petiolatis cordato-suborbiculari apice rotundatis 5-nerviis subtus pubescentibus; capitulis florum fem. maximis racemosis. *In Peruvia.* ♀.

14. *C. puberula* Klotzsch; ramis ramulisque subangulatis ferrugineo-puberulis; fol. ovatis acutis penninerviis margine repandis glabris subtus in costa puberulis; capitulis fem. globosis umbellato-cymosis. *In Peruvia.* ♀.

15. *C. acutifolia* Klotzsch; ramis ramulisque fusco-cinereis glabris; fol. maximis ovato-oblongis acutis integerrimis penninerviis basi obtusis glabris petiolis costaque subtus puberulis. *In Peruvia.* ♀.

Species dubiae.

16. *C. laevigata* Poepp. et Endl. fol. ellipticis utrinque acutis subtus discoloribus petiolisque glaberrimis. *In Peruvia.* ♀.

17. *C. angustifolia* Aubl. guj. t. 363. fol. ovato-oblongis subtus ferrugineis; fructu nigro globoso solitario pedunculato. *In Guiana.* ♀.

1. *T. africana* Decaisn. in ann. sc. nat. (3 ser.) t. 3. f. 86—99 *In Senegambia.* ♀.

pag. 223. ARTOCARPUS.

6. *A. incisa* L. fol. plumatifidis lobis oblongis acutis acuminatis; stylo 2—3-fido. B. M. t. 2869—2871. Sonn. it. t. 57—60. *In Moluccis.* ♀.

7. *A. Blumei* Trecul; fol. ovato-ellipticis utrinque acutis supra strigosis subtus adpresso-pube-centibus. *A. pubescens* Blume. *In Jara.*

8. *A. Chaptasha* Roxb. fol. obovatis v. obovato-rotundis basi integerrimis apice rotundis crenatis brevissime acuminatis supra asperis utrinque pubescentibus. Wight ic. t. 682. *In Bengatia.* ♀.

9. *A. echinata* Roxb. fol. oblongis ellipticis integerrimis basi acutis apice obtusis supra in nervis solum puberulis subtus lanato-sparse pubescentibus. Wight ic. t. 680. *In Ind. or.* ♀.

✓ 10. *A. mariannensis* Trecul; fol. obovato-ellipticis utrinque coarctatis basi acutiusculis apice acuminatis supra glaberrimis subtus solum in nervis et costis pubescentibus. *In Marianis.* ♀.

11. *A. heterophylla* Lam. ramulis teretibus cicatricibus horizontalibus annulatis; fol. obovatis integerrimis v. trilobis acuminatis glabris. *In?* ♀.

12. *A. Lacoocha* Roxb. fol. distichis ovato-ellipticis integris repandis basi rotundis v. subacutis apice abrupte acuminatis supra glabris subtus pubescentibus. Wight ic. t. 681. *In Ind. or.* ♀.

13. *A. Gomeziana* Wall. ex Trecul; fol. distichis ovatis v. ovato-ellipticis integerrimis utrinque late rotundis apice abrupte breviterque acuminatis glaberrimis. *In Ind. or.* ♀.

14. *A. Cumingiana* Trecul; fol. distichis membranaceis oblongis ellipticis integerrimis basi leviter cordatis apice acuminatis supra glabris subtus pubescentibus. *Prope Manillam.* ♀.

15. *A. nitida* Trecul; fol. distichis ovatis v. subobovatis acuminatis saepe inaequilateralibus supra praesertim nitidis; amentis minimis. *Circa Manillam.* ♀.

16. *A. glaucescens* Trecul; fol. distichis oblongo-lanceolatis integer-

4780 d. *TREACLEA* Decaisn. (1846).

Masc. Perianthium tubulosum 3—4-fidum, laciiniis ovato-cordatis ciliato-fimbriatis. Stam. 3—4 filamentis crassiss. Fem. Perianth. 3-phllum v. nullum. Stylus bifidus ramis stigmatosis papilloso. Sem. pendulum testa pergamacea fusca.

rimis basi acutis v. rarius subrotundis apice acumine acuto mucronato desinentibus supra glabris subtus glaucis.

In Java. ♀.

17. *A. lanceolata* Trecul; fol. distichis oblongo-lanceolatis integerimis basi acutis v. rarius subrotundis apice acumine acuto mucronato desinentibus supra glabris subtus glaucis.

In Java. ♀.

18. *A. lanceolata* Trecul; fol. distichis oblongo-lanceolatis integerimis basi subrotundis v. paululum emarginatis apice acuminatis acumine obtuso utrinque nitidis. *In Manilla.* ♀.

19. *A. laevis* Hassk. fol. minoribus pinnatifido-incisis utrinque glaberrimis nervis subtus glabriusculis; lacinias oblongo-lanceolatis acuminatis; amentis masc. cylindricis cernuis, fem. ovoideis. *In Java.* ♀.

20. *A. lanceaefolia* Roxb. fol. late lanceolatis v. oblongis integris acuminatis; fructu terminali sphaerico. Wight ic. t. 679. *In Ind. or.* ♀.

21. *A. venenosa* Zolling. in Flora 1847. p. 471. fol. obovato-oblongis obsolete acuminatis basi cordatis subobliquis integerrimis rigidis glabriusculis; fractibus subglobosis. *In Java.* ♀. Arbor gigantea.

4781a. CUDRANIA Trecul. (1846).

Masc. Perigonum 4-partitum v. 4-sepalum, sepalis oblongis concavis obtusis imbricatis. Stam. 4 filamenta filiformia. Fem. Perigonum 4-sepalum, sepalis oblongis concavis obtusis. Stylus simplex basi denticulo instrutus stigmate filiformi papilloso. Semen testa membranacea tenuissima. Artocarpeae.

1. *C. javensis* Trecul in ann. sc. nat. 8. t. 3. f. 76—85. fol. oblongo-lanceolatis integerrimis basi subrotundis aut acutis apice acuminatis mucronatis utrinque glabris. Rumph. t. 15 et 16. *In Kanaor et Nepal.* ♀.

2. *C. pubescens* Trecul; fol. elliptico-lanceolatis integerrimis utrinque contractis acutis apice acuminatis mucronatis utrinque praesertim infra pubescentibus. *In Java.* ♀.

3. *C. oborata* Trecul; fol. obovatis rarius ellipticis aut ovatis integerrimis basi rotundatis v. acutiusculis apice acutis obtusisve mucronatis utrin-

que sparse puberalis aut glabris. *In Java et ins. Philippinis.* ♀.

4781b. PLECOSPERMUM Trecul. (1846).

Masc. Perigonum turbinatum 4-fidum lacinias in aestivatione imbricatis. Stam. 4, filamentis basi complanatis, antheris dorso filamentorum affixis. Fem. Perigonia inter se connata apice 4-denticulata ore minimo pervia. Stylus filiformis stigmatosus. Capitula fructifera bacciformia.

1. *P. spinosum* Trecul l. c. t. 4. f. 121—126. *In Java.* ♀. Frutex scandens fol. oblongo-lanceolatis, floribus capitatis.

pag. 281 ad ALNUM.

15. *A. firma* Sieb. et Zucc. ramulis angulatis verrucosis; fol. rotundato-ovatis acutis inaequaliter serratis subtus ad nervos pilosis dense glanduloso-punctatis; amentis geminis cylindricis; strobilis ovatis, squamis 5-fidis; samarae alis ampliatis. *In Japonia.* ♀.

16. *A. japonica* Sieb. et Zucc. ramulis angulatis glabris; fol. longe petiolatis rotundato-ovatis v. lanceolatis acuminatis inaequaliter serratis utrinque glabris; amentis fem. racemosis; squamis lignosis 5-fidis resinosis; samaris orbicularibus. *In Japonia.* ♀.

pag. 285 ad ANTHURIUM.

51. *A. decurrens* Poepp. et Endl. nov. g. t. 293. radicans; fol. petiolatis ovato-oblongis acutatis mucronatis basi cuneatis peuinerviis; spatha valde remota ultra medium adnata longe decurrente spadicem excedente. *In Peruvia.* 2.

52. *A. oxycarpum* Poepp. et Endl. radicans; fol. brevissime petiolatis ovali-oblongis acutis longe cuneatis membranaceis nitidis scapum floridum duplo superantibus peuinerviis; petiole pedunculisque 4-angulis; baccis conicis acuminatis. *In Peruvia.* 2.

53. *A. flavescens* Poepp. et Endl. fol. longe petiolatis ellipticis acuminatis basi acutis coriaceis supra nit-

dis penninerviis costa utrinque obtusa; petiolo compresso anguloso; scapo 3-quetro; spatha oblonga deflexa spadicem adaequante. In Peruria. 2.

54. *A. acaule* Poepp. et Endl. fol. peltatis latissime ovatis cordatis membranaceis pedatinerviis; scapo tereti petiolo duplo breviore; spatha approximata oblonga spadicem cylindricum adaequante. In Peruria. 2.

55. *A. breviscapum* Poepp. et Endl. acaule; fol. longe petiolatis subdeltoides hastato-cordatis pedatinerviis, lobis rotundatis; petiolis semiteretibus scapum teretem triplo superantibus; spatha remota ovato-oblonga spadicem ovatum cylindricum excedente. In Peruria. 2.

56. *A. corallinum* Poepp. et Endl. caulescens; fol. longe petiolatis cordato-ellipticis cuspidatis coriaceis nitidis pedati-5-nerviis, costa supra triquetra subtus plana lobis rotundatis; spatha oblongo-lanceolata acuminata spadice cylindrico duplo breviore. In Peruria. 2.

57. *A. nitidum* Benth. caule elongato repente; fol. longissime petiolatis, lamina deflexa deltoidea lanceolata, profunde cordata auriculis rotundatis pedati-nerviis coriaceis supra nitidis; spatha remota oblongo-lanceolata erecta spadice breviore. In Peruria. 2.

58. *A. stipitatum* Benth. caulescens radicans; fol. petiolatis oblongis longe acuminatis basi rotundatis; scapo gracili fol. subbreviore; spatha remota lanceolata deflexa spadice multo breviore. In Popaya. 2.

59. *A. reticulatum* Benth. fol. longe petiolatis lanceolato-oblongis nitidis nervis irregulariter divergentibus, costa dorso rotunda striata; petiolis canaliculatis; spadicibus longe pedunculatis spatha reflexa lanceolata cuspidata longioribus. In Popaya. 2.

60. *A. clarigerum* Poepp. et Endl. caulescens scandens; fol. longe petiolatis digitatis, foliolis novenis sessilibus basi cuneatis pinnatifidis, lacinias subfalcatis; petiolis 4-gonis scapum 3-plo superantibus. In Peruria. 2.

61. *A. Kunthii* Poepp. et Endl. caulescens scandens; foliolis longe petiolatis digitatis 5-7-nis longe petiolatis oblongis acuminatis membrana-

ceis opacis; petiolis 4-gonis scapum dimidio excedentibus. In Peruria. 2.

pag. 286 ad SPATHIPHYLLUM.

3. *S. candidans* Poepp. et Endl. nov. g. t. 295. fol. ellipticis utrinque acutis apice acuminatis; spatha sessili ovali plana spadicem cylindricum dimidio superante; perigonii foliolis connatis. In Brasilia. 2.

4. *S. caudatum* Poepp. et Endl. I. c. t. 296. fol. sagittatis lobis ovato-oblongis; spatha basi convoluta spadicem obtusum decies superante in appendicem longissimam linearem attenuata; perigonio 4-phyllo; antheris sessilibus. In Brasilia. 2.

pag. 288 ad EUTERPEM.

5. *E. andicola* Brongn. in Orbigny voy. III. t. 2. f. 2. et t. 17. a. caudice 12-pedali stricto; vaginis longe aperitis; pinnis concinnis acuminatis; petalis florum masculorum oblongis obtusiusculis roseis. In Bolivie. 2.

6. *E. Haenkeana* Brogn. ex Mart. I. c. t. 2 et 17. B. caudice stricto 13-pedali; frondibus patentibus; vaginis in cylindrum convolutis; pinnis concinnis linearis-lanceolatis utrinque acuminatis; petalis florum masc. flavis oblongis. In Bolivie. 2.

7. *E. precatoria* Mart. in Orbigny t. 8. f. 2 et t. 18. A. caudice stricto (36-pedali); frondibus patentibus; vaginis in cylindrum convolutis; pinnis laxe pendulis linearibus longe acuminatis; spadicibus testaceo-tomentosis; floribus flavis; petalis lanceolatis acutis. In Bolivie. 2.

8. *E. longeruginata* Mart. I. c. t. 12. f. 1 et t. 17. C. caudice 15-pedali stricto; frondibus 5-6 patentibus; vaginis in cylindrum longissimum rachi triplo breviorem convolutis; pinnis linearibus longe acuminatis. In Bolivie. 2.

pag. 288 ad OENOCARPUM.

6. *O. Tarambabo* Mart. I. c. t. 8. f. 3 et t. 18. B. caudice nudo; frondibus distichis; petiolis e vagina augusta lanceolata basi foliosis; pinnis linearis-lanceolatis; petalis oblongo-

lanceolatis acutis; baccis globosis.
Crescit? $\ddot{\text{h}}$.

7. *O. utilis* Klotzsch in Linnaea XX. p. 447. caudice gracili nudo; frondibus sparsis 25-jugis; rachi stipeque fusco-squamulosis; pinnis sessilibus linearibus longissime acuminatis; spathis longissimis; baccis globosis nigris. *In Columbia.* $\ddot{\text{h}}$.

pag. 296 ad GEONOMAM.

23. *G. orbigniana* Mart. in Orbigny voy. t. 11. f. 1 et 22 A. caudice arrudinaceo 3—4-pedali; frondibus terminalibus irregulariter pinnatissis, laciniis linearibus lanceolatis oblongisve acuminatis; spadicibus masc. ramosis ohtusis; calycibus glabris corollas subaequantibus; baccis ovalibus. *In Bolivia.* $\ddot{\text{h}}$.

24. *G. Desmarestii* Mart. l. c. t. 11. f. 2 et t. 22. B. caudice arundinaceo 6-pedali; frondibus pinnatifidis vaginis carinalis; spadicibus simpliciter pauce ramosis; ramis gracilibus remote floriferis; baccis ellipticis. *In Bolivia.* $\ddot{\text{h}}$.

25. *G. Jussieuana* Mart. l. c. t. 15. f. 1. et 23. A. caudice arundinaceo 3-pedali saepe radicante; frondibus pinnatifidis, petiolo laciniis oppositas 8—9-parium lineares subfalcatae sursu. majores superante; spadicis simplicis rachi acuta; baccis in rachi coccinea globosis. *In Bolivia.* $\ddot{\text{h}}$.

26. *G. Brongniartii* Mart. l. c. t. 15. f. 2 et 23. C. caudice brevissimo; frondibus pinnatifidis; petiolo laciniis breviore; laciniis linearis oblongis v. subquadratis acutis; spadice simplici subpedali; calycibus masc. corollas aequantibus; baccis in rachi coccinea subglobosis. *In Bolivia.* $\ddot{\text{h}}$.

27. *G. martinicensis* Mart. caespitosa; caudice mediocri basi radicante; pinnis 3—4-parium late ovatis acutis multinerviis; spatha completa coriacea pedali; spadicibus duplicato-ramosis nutantibus; baccis globosis vertice acuto. *In Martinica.* $\ddot{\text{h}}$.

28. *G. oxycarpa* Mart. dioica; caudice 4-pedali subtoruloso; pinnis 3-parium oppositis late ovatis oblongisve acutis multinerviis petiolo subaequilongis; spathis membranaceis se-

mispithamaeis; baccis conicis acutis. *In ins. Sandominica.* $\ddot{\text{h}}$.

29. *G. plena* Mart. caudice mediocri; frondibus?; spathis duabus coriaceis; spadice composito-ramoso ferrugineo hirsutulo, fovearum divergentia $\frac{3}{2}$ dispositarum labio subintergerrimo. *Ad Maracaibo.* $\ddot{\text{h}}$.

30. *G.?* *Plumeriana* Mart. caespitosa; caudice elato 30-pedali; frondibus terminalibus pinnatis, pinnis numerosis lineari-lanceolatis; spathis coriaceis; spadicis masculi simpliciter multiramosi ramis subultra pedalibus breviter acutis; baccis globosis cerasi magnitudine. *In ins. Sandominica.* $\ddot{\text{h}}$.

31. *G. Poeppigiana* Mart. caudice submediocri; frondibus irregulariter pinnatifidis, laciniis linearibus oblongisve subfalcato-acuminatis; spadicibus ferrugineo-tomentosis simplicibus v. ramosis, ramis mucronatis; calycibus masculis corollas subaequantibus. *In Peruvia.* $\ddot{\text{h}}$.

32. *G. undata* Klotzsch l. c. caudice annulato 26—36-pedali; frondibus magnis crebris flavido-viridibus oblongis apice bifidis irregulariter pinnatifidis plicato-undatis; laciniis longissime acuminatis; spadicibus rugosis ramosissimis cinereis rugosis; baccis oblongis viridi-cinereis. *In Columbia.* $\ddot{\text{h}}$.

pag. 297 ad DESMONCUM.

9. *D. rudentum* Mart. in Orbigny voy. t. 14. f. 3. et t. 26. A. vagina dense setoso-aculeata, aculeis rectis; pinnis 12—15-jugis oblongis acuminatis; rachi aculeis sparsis longis rectis, cirri subinermis hamis inferioribus spathulatis obtusis; spathae aculeis setiformibus rectis. *In Bolivia.* $\ddot{\text{h}}$.

10. *D. tophacanthus* Mart. vaginis rachibus spathisque parce armatis aculeis longis subulatis rectis in spathae interioris apice fasciculatis; pinnis 9—10-jugis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis; cirri innermis hamis 4-jugis subulatis; pedunculo incruci. *In Brasilia.* $\ddot{\text{h}}$.

11. *D. horridus* Splittg. ex Mart. superne dense aculeatus; aculeis basi incrassata alba rectis spadiceo-nigris subulatis; pinnis 10—12-jugis lanceolatis acutis basi acuminatis. *In Surinamo.* $\ddot{\text{h}}$.

12. *D. longifolius* Mart. vaginae aculeis curvis paucioribusque rectis racheos cirrhusque aduncis; pinnis 7—8-jugis subpedalibus lanceolatis utrinque longe acuminatis; cirri hamis 2—3-jugis subulatis. *In Peruria.* ♂.

13. *D. leptospadix* Mart. vagina membranacea ore ciliata et spathis spadiceaque inermibus; petiolo cirri rachique parce adunco-aculeatis; pinnis 4-jugis oblongis v. oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis; cirri gracilis hamis 4-jugis; spadicis rachi filiformi, ramis parvis; drupa oblonga. *In Peruria.* ♂.

pag. 297 ad BACTRIN.

24. *B. infesta* Mart. in Orbigny voy. t. 7. f. 1 et 27. *A. caespitosa;* caudice rachi spathaque aculeatis, aculeis saepe verticillatis; pinnis aggregatis linearibus acuminatis margine nigro-setulosis strictis; spadice tomento castaneo setuloso. *In Bolivia.* ♂.

25. *B. socialis* Mart. l. c. t. 14. f. 2 et 26. *B. caespitosa* aculeata; petiolis spathisque nigro-aculeatissimis; rachibus tomentosis aculeatis; pinnis linearibus acuminatis; drupa elliptico-globosa vertice acuta violacea scabra. *In Brasilia.* ♂.

26. *B. inundata* Mart. l. c. t. 7. f. 3 et 27. *B. caespitosa* elata nigro-aculeata; pinnis aggregatis linearibus acuminatis margine setulosis; drupa depresso-globosa inermi miniata. *In Brasilia.* ♂.

27. *B. Brongniartii* Mart. l. c. t. 7. f. 2 et 28. *A. caespitosa;* caudice subprocero petiolo rachi spathaque aculeatis, aculeis albicanibus; pinnis aggregatis subcrispis lanceolatis acutis ciliato-aculeatis; drupa turbinata vertice acuta nigro-violacea. *In Bolivia.* ♂.

28. *B. faucium* Mart. l. c. t. 6. f. 2 et 28. *B. caudice humili gracili inermi;* frondibus lateralibus terminibusque; vagina fusca aculeata et nigro-setosa; petiolo pedali glabro; pinnis paucis floccoso-pubescentibus margine setuloso-ciliatis cuspidatis. *In Bolivia.* ♂.

29. *B. chaetorachis* Mart. caudice mediocri spathaque aculeatis; frondibus per caudicem sparsis; rachi

nigro-setosa et longe aculeata; pinnis linearibus acuminatis setoso-ciliatis; spadicis ramosi pedunculo dense setoso. *In Surinamo.* ♂.

30. *B. pallidissima* Mart. caespitosa aculeata; aculeis compressis nigro-fuscis tandem pallidis; pinnis in rachi minute hirta aggregatis linearibus acutis vel cuspidatis aculeato-ciliatis; spadice ramoso; spatha griseo-tomentosa parce aculeata aculeis nigro-fuscis; drupa turbinata vertice acuto. *In Surinamo.*

31. *B. Plumeriana* Mart. caespitosa mediocris nigro-aculeata; pinnis linearibus acuminatis; spathae aculeis reversis; spadice ramoso, pedunculo setoso; drupa globosa pisiformi. *Plumier.* t. 43, 44, 45. *In Guadelupe et Martinica.* ♂.

32. *B. mexicana* Mart. caudice submediocri; vagina setosa et aculeata aculeis atris longis; pinnis aggregatis linear-lanceolatis cuspidatis nunc subfalcatis aculeato-ciliatis; spathae aculeis setiformibus atris; drupa turbinata acuta glabra. *In Mexico.* ♂.

33. *B. praemorsa* Mart. caudice humili aculeato; petiolo basi vaginante aculeato; rachi lepidoto-tomentosa inermi pinnis sparsis deltaoides deorsum cuneatis antice praemorsis dente utroque marginali productiore margine aculeolatis. *In Peruria.* ♂.

34. *B. acanthocnemis* Mart. caespitosa; caudice humili arundinaceo inermi; frondibus indivisis furcato-bipartitis; vaginis aculeis nigricantibus; petiolis postice parce aculeolatis, laminae laciniis lineari-oblongis subfalcatis multinerviis, novellis setosis et penicillatis. *In Cayenna.* ♂.

35. *B.?* *acanthophylla* Mart. caudice humili aculeato; fronde indivisa; petiolo aculeato, laminas basi cuneata apice bifido margine inaequaliter eroso inermi rachi et nervis utrinque setaceo-aculeatis petioli nigris laminas fuscis. *In Portorico.* ♂.

36. *B.?* *Pavoniana* Mart. fronde pinnata aculeis longiusculis setisque nigris; pinnis linearibus acuminatis subaequidistantibus extimis connexis setoso-ciliatis subtus glaucis et parce albo-hirtis. *In Portorico.* ♂.

37.? *B. chaetophylla* Mart. petiolo rachique fusco-lepidotis atque aculeis setiformibus nigris; pinnis linearibus longe acuminatis margine et supra in

nervo aculeis setiformibus nigris arcuatis. In Dominica. §.

pag. 299 ad GUILIELMAM.

2. *G. insignis* Mart. in Orbigny voy. 7. t. 10. f. 3 et 29. a. caudice elato dense aculeato; frondibus subtus albidis; spatha aculeis nigro-violaceis dense horrida; filamentis clavatis; drupa et putamine ellipticis. In Bolivia. §.

3. *G. macana* Mart. caudice mediocri aculeato; frondibus?; spatha interiore; drupa parva pisiformi ovato-globosa. In Brasilia. §.

pag. 299 ad MARTINEZIAM.

2. *M. truncata* Brongn. ex Mart. in Orbigny voy. 7. t. 2. f. 1 et 28. C. caudice tenui aculeato (10-pedali); petiolo rachis aculeatis; pinis aggregatis utrinque viridibus; spatha fusiformi elongata et spadicis basi nigro-aculeatis; drupis globosis coccineis. In Bolivia. §.

3. *M. aiphanes* Mart. caudice cocoideo 30-pedali; petiolo rachique aculeatis; pinis latis remotis oppositis 4-jugis subtus albo-tomentosis; spadice sesquipedali; drupis globosis coccineis. *M. aculeata* Klotzsch. In Columbia. §.

pag. 299 ad ACROCOMIAM.

2. *A. Totai* Mart. in Orbigny voy. 7. t. 9. f. 1 et 29. B. frondium petiolis tomentosis et parce aculeatis pinnis crispis linearibus acutis crassiusculis utrinque glabris et viridibus; spatha aculeata; drupa globosa. In Bonaria et Bolivia. §.

3. *A. lasiospatha* Mart. spatha densissime ferrugineo-hirsuta et parce aculeata, aculeis ferrugineis. In Cayenna. §.

pag. 299 ad ASTROCARYON.

11. *A. chonta* Mart. l. c. t. 4. f. 1 et 29. C. aculeatum; caudice 20—30-pedali; pinis linearibus acuminatis subfalcatis subtus albidis rachi margineque nigro-setuloso; drupa elon-

gato - obovata inermi. In Bolivia et Peruvia. §.

12. *A. Huaimi* Mart. t. 13. f. 3 et 30. A. caudice 12-pedali; aculeis caudicis reversis, petioli bipollicularibus erecto-patulis; frondibus erectiusculis pinnis linearibus acuminatis subtus albidis margine setulosis; drupa ovoido-globosa inermi. In Bolivia et Brasilia. §.

13. *A. Paramaca* Mart. acaule frondibus erectiusculis; pinnis linearilanceolatis acuminatis subtus incanis et setulosis; spatha densissime fusco setoso-pellita et nigro-aculeata; spadice ramisque nigro-aculeatis; calyce corolla et drupa nigro-setulosis. In Surinamo. §.

pag. 300 ad COCUM.

16. *C. Yatay* Mart. in Orbigny voy. 7. t. 1. f. 1 et 30. C. caudice mediocri crasso squamoso; petiolo spinoso-serrato; pinnis concinnis rigidis anguste linearibus acuminatis; petalis masculis acutis fem. obtusis; drupis oblongis acutis. In Bonaria. §.

17. *C. australis* Mart. l. c. t. 1. f. 2 et 30. B. caudice elato columnari aequali; frondibus patulis densis crispis; petiolo inermi; pinnis linearibus glaucis; petalis masc. late lanceolatis acutis, fem. obtusis; drupis ovatis. In Bonaria. §.

18. *C. pityrophylla* Mart. l. c. t. 3. f. 2. caudice gracili mediocri v. elato aequali annulis latis cicatrizado; frondibus patulis; petiolo inermi; pinis aggregatis linearibus acuminatis subtus squamulosis. In Bolivia. §.

19. *C. petraea* Mart. l. c. t. 9. f. 2. subacaulis caespitosa; frondibus rigidulis patentibus; petiolo inermi; pinnis linearibus aggregatis viridibus glabris; petalis masculis lanceolatis acutis, fem. lanceolatis acuminatis. In Bolivia.

Ad C. botryophoram Mart. Orbigny voy. 7. t. 4. f. 3 et 30. D.

pag. 301 ad SYAGRUM.

2. *S. amara* Mart. l. c. caudice procero annulato; frondibus densis concinnis; pinis aggregatis linearibus acuminatis; petalis masc. linearis oblongis acutiusculis; floribus fem.

ovato-globosis; drupae ellipticae putamine crasso ovato. In ins. Martinica. ♂.

3. *S. Mikaniana* Mart. S. botryo-phora Mart. et S. comosa Mart. vide pag. 303 sub Coco.

pag. 301 ad DIPLOTHEMUM.

6. *D. Torally* Mart. I. c. t. 15. f. 3. et t. 28. D. caudice elato cicatricibus approximatis spiralibus notato; frondibus erectis; pinnis lanceolato-linearibus utrinque subaequaliter dispositis; floribus masc. 10—5—an- dris; drupis globosis vertice acuto. In Bolivia. ♂.

pag. 301 ad MAXIMILIANAM.

3. *M. crassispatha* Mart. I. c. caudice protero, vertice petiolorum basibus coronato; petiolorum basi crassa ovato-3-gona; pinnis aggregatis; spathis crassissimis; floribus distichis; staminibus petalis anguste lanceolatis duplo brevioribus; drupa ovata obtusiuscula. Ad ins. San-dominicam. ♂.

Ad *M. regiam* Kunth. Mart. Or-bigny voy. 7. t. 15. f. 2 et t. 31. A.

pag. 303 ad CORYLUM.

10. *C. Jacquemontii* Decaisn. in Jacquem. voy. t. 169. fol. petiolatis ovato-rotundis cordatis acuminate duplicato-dentatis glabris; laciinis involucri subfalcatis. In Ind. or. ♂.

pag. 304 ad BETULAM.

25. *B. grossa* Sieb. et Zucc. ramulis resinoso-punctatis angulatis glabris; fol. cordatis ovato-ellipticis acuminate inaequaliter argute serratis; strobilis grossis oblongo-ellipticis; squamis 3-spermis extus hirtis, 3-lo-bis. In Japonia. ♂.

26. *B. carpinifolia* Sieb. et Zucc. ramulis teretibus; fol. cordatis ova-tis superioribus oblongis summis lan-ceolatis longe acuminate argute et inaequaliter serratis; strobilis ovato-ellipticis squamis 3-spermis breve 3-lo-bis. In Japonia. ♂.

27. *B. ulmifolia* Sieb. et Zucc. ramulis pubescentibus; fol. inaequa-liter cordatis ovatis acuminate inae-qualiter et duplicato-falcato-serratis utrinque ad venas pilosis; strobilis cylindricis in pedunculo hirto; squamis profunde trilobis ciliatis obtusis In Japonia. ♂.

28. *B. Jacquemontii* Spach in Jacquem. voy. t. 158. ramulis resi-noso-glandulosis pubescentibus; fol. ovatis v. ovato-lanceolatis cuspidato-acuminatis subbiserratis basi cuneatis v. rotundatis subtus ad axillas nervorum barbatis ad nervos villosis; squamis strobili linearis-3-lo-bis. In Ind. septr. ♂.

pag. 303 ad FAGUM.

5. *F. Solandri* Hook. fil. ic. t. 639. ramis nigro-fuscescentibus; ramulis pubescentibus foliosis; fol. distichis breve petiolatis oblongo-ellipticis utrinque rotundatis integerrimis subtus pubescenti-tomentosis. In Nov. Zeelandia. ♂.

6. *F. Menziesii* Hook. fil. ic. t. 652. ramis brunneis pubescentibus; ramulis fulvo-tomentosis; fol. rhombeo-corda-tis coriaceis rigidis grosse duplicato-crenatis venosis; cupulis 4-partitis fimbriato-squamosis, fimbriis apice in-crassatis. In Nov. Zeelandia. ♂.

7. *F. cliffortioides* Hook. fil. ic. t. 673. ramis nigro-fuscescentibus; ramulis pubescentibus foliosis; fol. distichis parvis ovatis acutis margine integerrimis subtus pubescenti-tomen-tosis. In Nov. Zeelandia. ♂.

8. *F. fusca* Hook. fil. t. 630 et 631. fol. subcoriaceis ovatis acutis grosse serratis basi cuneata integerrima; floribus masc. 3-nis nutantibus pedunculatis; femineis sessilibus; cupulis alatis. In Nov. Zeelandia. ♂.

9. *F. antarctica* Forst. Hook. journ. II. t. 6. Hook. fil. antaret. voy. t. 123. Calucechinus antarctica Hombr. et Jaquinot. voy. au Pol. Sud. t. 14. C. Montagni Hohmbr. et Jacq. t. 8.

10. *F. pumilio* Poepp. et Endl. nov. g. t. 195. Calusparassus Pumi-lio Hombr. et Jacq. t. 8.

11. *F. betuloides* Mirb. mem. mus.

14. t. 4. Hook. fil. I. c. t. 124. Ca-lusparassus Forsteri Hombr. et Jacq. t. 6 et 7.

pag. 305 ad CASTANEAM.

18. *C. crenata* Sieb. et Zucc. fl. jap. t. fol. rotundatis cordatis oblongis acuminatis rotundato-crenatis subtus pubescenti-hirtis glanduloso-punctatis; amentis elongatis gracilibus. *In Japonia.* ♂.

19. *C. stricta* Sieb. et Zucc. ramis ramulisque strictis; fol. petiolatis cordatis oblongis v. oblongo-lanceolatis acuminatis crenatis crenis repando-rotundatis setaceo-mucronatis subtus stellato-pubescentibus et glanduloso-punctatis; amentis strictis cylindricis. *In Japonia.* ♂.

pag. 311 ad QUERCUM.

124. *Q. undulata* Benth. ramis tomentosis; fol. ovato-lanceolatis acutis integerrimis undulatis coriaceis; fructibus sessilibus; cupulae squamis latis adpressis glandeque depresso-globosa tomentosis. *In Guatimala.* ♂.

125. *Q. brachystachys* Benth. ramulis obtuse angulatis lanatis; fol. obovato-oblongis apice sinuato-dentatis, dentibus obtusis v. mucronatis coriaceis rugosis subtus sordide lanatis; fructibus spicatis; cupulis tomentosis. *In Mexico.* ♂.

126. *Q. conspersa* Benth. stellato-puberula; fol. ovatis v. lanceolato-oblongis acuminatis integerrimis v. setaceo-dentatis venis subtus ad axillas barbatis; spicis fructiferis brevisimis; glande parva ovoidea. *In Guatimala.* ♂.

127. *Q. Skinneri* Benth. ramis glabris; gemmis lanatis; fol. ovato-oblongis sinuato-dentatis, dentibus longe aristatis subtus ad axillas venarum barbatis; fructibus sessilibus maximis; glande conoidea lignosa. Hook. ic. t. 402. *In Guatimala.* ♂.

128. *Q. callousa* Benth. ramis tomentoso-hirtis; fol. petiolatis oblongis obtusis sinuato-dentatis repandis, dentibus obtusissimis coriaceis subtus cano-vel ferrugineo-tomentosis lanatis; fructibus interrupte spicatis; squamis cupulae tomentosis. *In Guatimala.* ♂.

129. *Q. Hindsii* Beuth. fol. submembranaceis petiolatis obovato-oblongis basi acutis profunde pinnatifidis glabriusculis; fructibus solitariis;

glande elongata acuminata in cupula squamosa. *In California.* ♂.

130. *Q. Mirbeckii* Durieu; fol. late oblongo-lanceolatis planis membranaceis basi cordatis crenato-lobatis subtus floccoso-tomentosis; floribus femineis racemosis tomentosis; fructu annuo glomerato. *In Andalucia.* ♂.

131. *Q. thirkeana* Koch; fol. oblongis glaberrinis undulatis integris; amentis masculis laevibus; perigonio 8-fido, laciniis ciliatis; staminibus 8. *In Asia minore.* ♂.

pag. 357 ad PHILODENDRON.

32. *P. heterophyllum* Poepp. et Endl. nov. g. t. 297. caulescens scandens radicans; fol. ovato-oblongis acuminatis membranaceis penninerviis oblique striatis; pedunculis geminis; spathis apice ventricosis basi convolutis spadices cylindricos tertia parte foemineos aequantibus. *In Peruvia.* ♀.

33. *P. cruentum* Poepp. et Endl. brevicaule radicans; fol. oblongis utrinque acutis 1-nerviis oblique striatis membranaceis opacis; petiolo alato; spathis axillaribus geminis basi ovalibus medio constrictis acutis. *In Peruvia.* ♀.

34. *P. fibrillosum* Poepp. et Endl. scandens radicans; fol. ellipticis acuminatis membranaceis acutis; pedunculis axillaribus brevissimis; spatha clavata convoluta, spadicem aequante. *In Peruvia.* ♂.

35. *P. guttiferum* Poepp. et Endl. scandens; fol. obovato-oblongis v. oblongis acuminatis penninerviis costato-striatis; petiolis membranaceo-marginalis; spathis solitariis brevissime pedunculatis ovatis ventricosis spadices cylindricos quarta parte foemineos adaequantibus. *In Peruvia.* ♂.

36. *P. alatum* Poepp. et Endl. scandens radicans; fol. ellipticis utrinque rotundatis integris abrupte acuminatis basi cordatis membranaceis; petiolo semitereti latissime linearialato; spathis brevissimis convolutis. *In Peruvia.*

37. *P. membranaceum* Poepp. et Endl. caulescens scandens; fol. ovatis acutis basi rotundata integris costatis membranaceis; petiolo tereti anguste marginato; spathis axillaribus

longe pedunculatis ad medium usque convolutis spadicem interruptum ultra medium superantibus. *In Peruvia.* 2.

38. *P. deltoideum* Poepp. et Endl. scandens radicans fol. latissime deltoideis subtrilobis sinu aperto subhastatis apice acutis, lobis pedato-trinerviis eleganter oblique striatis membranaceis utrinque lucidis; pedunculis fasciculatis; spatha cylindrica convoluta. *In Peruvia.* 2.

39. *P. squamiferum* Poepp. et Endl. caulinibus radicantibus patiolisque dense squamulosis; squamis patulo-deflexis palmatifidis crispis rigidissimis; fol. deltoideis pinnatifido-5-lobis. *In Para.* 2.

pag. 358 ad DIEFFENBACHIAM.

1. *D. seguine* Schott. in Maund. et Hensl. Bot. III. t. 121.

2. *D. macrophylla* Poepp. et Endl. caule erecto; fol. breviter petiolatis ellipticis brevissime acuminatis basi truncatis oblique costatis; pedunculis petiolo brevioribus solitariis. *In Peruvia.* 2.

3. *D. humilis* Poepp. et Endl. caule decumbente radicante; fol. longe petiolatis oblongis acuminatis basi cuneatis nervis lateralibus obliquis tenuissimis; petiolo laminam aequante, pedunculum solitarium duplo superante. *In Peruvia.* 2.

4. *D. obliqua* Poepp. caule erecto; fol. brevissime petiolatis ovalibus inaequilateris basi obtusis senioribus utrinque acutis penniveniis et oblique striato-costatis; pedunculis petiolo di-midio brevioribus fasciculatis ternis. *In Peruvia.* 2.

pag. 359. 4961 b. RHODOSPATHA Poepp. et Endl. (1845).

Spatha cymbiformis persistens. Spadix stipitatus hermaphroditus. Perigonium nullum. Stam. 4-5, filamentis latis planis. Stigma sessile oblongum rima pervium. Baccæ distinctæ 4-loculares, loculis 4-5-spermis. Aroidæ.

1. *R. latifolia* Poepp. et Endl. nov. g. t. 300. fol. ellipticis inaequaliteris, basi rotundata inaequalibus. *In Peruvia.* 2.

2. *R. oblongata* Poepp. et Endl. fol. oblongis inaequaliteris basi acutis. *In Peruvia.* 2.

pag. 359 ad MONSTERAM.

4. *M. amomifolia* Poepp. et Endl. fol. oblongis utrinque acuminatis nervis lateralibus tenuissimis obliquis; spatha sessili ovato-oblonga spadicem superante. *In Peruvia.* 2.

5. *M. obliqua* Miquel; fol. inaequaliteris oblique lanceolato-oblongis acuminatis membranaceis; spatha cucullata cuspidato-acuminata. *In Surinamo.* 2.

6. *M. cuspidata* in Hook. journ. caulescens scandens; fol. oblique ovato-oblongis acuminatis cuspidatis basi rotundatis petiolis late marginato-membranaceis; spatha alba obtusa petiolata spadice breviore. *In Brasilia.* 2.

pag. 360 ad SCINDAPSUM.

12. *S. occidentalis* Poepp. et Endl. caulescens radicans; fol. longe petiolatis profunde pinnatifidis, lobis utrinque 6-7 oblongo-falcatis acutis; pedunculo basi hirsuto; spatha ovali cymbiformi convoluta spadicem aequante; floribus dodecandris. *In Brasilia.* 2.

13. *S. pictus* Hassk. fol. ovato-lanceolatis oblique acutis basi cordatis supra glauci maculis pictis; petiolis primo vaginantibus dein complicatis. *In Jara.* 2.

14. *S. ligulatus* Hassk. fol. ovato-oblongis obliquis acuminatis basi cordatis sericantibus; petiolis brevissimis; ligula maxima oblonga cucullata marcescenti-decidua. *In Java.* 2.

15. *S. angustifolius* Hassk. fol. oblongo-lanceolatis acuminatis; basi inaequalibus subcordatis; petiolis primo vaginantibus e marginibus dein emarcidis deciduis semiteretibus. Calla sylvestris Blume. *In Java.* 2.

pag. 433 ad OLMEDIAM.

3. *O. angustifolia* Poepp. et Endl. nov. g. t. 143. fol. oblongo-lanceolatis longe acuminatis basi inaequaliteris grosse dentatis subtus ramulis-

que asperis; capitulis masculis geminis sessilibus. In Peruvia. ♂.

4. *O. mollis* Poepp. et Endl. l. c. t. 144. ramis teretibus hirsutis; fol. cordato-oblongis acutis integerrimis supra scaberrimis subtus molliter hirsutis; capitulis masc. longe pedunculatis fasciculatis. In Brasilia. ♂.

5. *O. calophylla* Poepp. et Endl. t. 146. fol. obovato-oblongis abrupte acuminatis basi rotundatis inaequilateris coriaceis supra glaberrimis laevigatis subtus scabris; capitulis masc. axillaribus glabris. In Peruvia. ♂.

6. *O. grandifolia* Trecul; fol. obovato-oblongis leviter sinuatis v. remote dentatis basi cordatis v. rotundis angustato-acuminatis utrinque glabris; staminibus globosis mucronatis. In Guiana. ♂.

7. *O. cubensis* Klotzsch in Linnaea 20. p. 523. ramulis glabris albo-cineris; fol. oblongis rigidis obtuse acuminatis integerrimis utrinque glabris subaequilateris basi obtusis; bracteis squamaeformibus orbicularibus. In Cuba. ♂.

8. *O. rigida* Klotzsch; ramulis teretibus fuscis glabris; fol. coriaceis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis utrinque glabris; bracteis late ovatis sericeis margine ciliatis. In Columbia. ♂.

8. *O. Poeppigiana* Klotzsch; ramis teretibus fuscis canescens-asperis; fol. oblongis longe acuminatis inaequilateris grosse dentatis supra glabris subtus undique pubescentiasperis; bracteis acuminatis. *O. aspera* Poepp. et Endl. In Peruvia. ♂:

9. *O. tovarensis* Klotzsch; ramis subcompressis flavo-pubescentibus; fol. oblongis integerrimis linearis-acuminatis supra glabris subtus in nervis hirsutis; involucris fem. solitariis pedicellatis. In Tovar Columbiae. ♂.

pag. 433 post OL MEDIA

**5110 b. PSEUDOLMEDIA Trecul.
(1846).**

Flores masc. in receptaculis involucratis subconcavis aut planis dense confertis. Involucrum polyphyllum. Stam. 3—15 inter bracteolas spathulatas; antheris basi sagittatis rima dehiscentibus. Fem. Involucrum 1-florum polyphyllum, foliolis plurifariam

imbricatis. Perig. 4-denticulatum tubulosum. Stylus bifidus, stigmatibus longe exsertis.

1. *P. havanensis* Trecul. ann. sc. (3 ser.) f. 149—157. fol. oblongo-lanceolatis subinaequilateris basi aequalibus rotundatis v. subacute apice acuminatis glabris utrinque 10—12-costatis. In Cuba. ♂.

2. *P. laerigata* Trecul; fol. oblongo-lanceolatis subinaequilateris basi subinaequalibus acutis apice acuminatis glaberrimis utrinque 15—18-costatis. In Peruvia. ♂.

3. *P. ferruginea* Trecul; ramulis hirtis; fol. oblongo-lanceolatis subinaequilateris basi aequalibus subrotundis v. acutis apice sensim attenuatis acuminatis ciliatis subtus in nervis hirtellis. Olmedia Poepp. et Endl. In Peruvia. ♂.

4. *P. macrophylla* Trecul; ramulis adpresso-pubescentibus demum glabratibus; fol. oblongo-ellipticis basi rotundatis apice subabrupte acuminatis subtus in nervis adpresso-puberulis. In Peruvia. ♂.

5111 c. PEREBEA Aubl. (1775).

Flores masc. ignoti. Fem. in receptaculo involucrato demum reflexo. Involucrum polyphyllum-imbricatum. Perigonium tubulosum 4-dentatum. Stylus terminalis crassus brevis bidentatus, dentibus intus stigmatosis. Fructus perigonio baccato tectus. Artocarpeae.

1. *P. laurifolia* Trecul l. c. t. 5. f. 136—138. fol. coriaceis oblongis saepe subobovatis integerrimis obtuse acuminatis utrinque glaberrimis. In Guiana. ♂.

2. *P. gujanensis* Aubl. guj. t. 361. fol. amplis alternis glabris subsessilibus ovato-oblongis dentatis acutis punctatis; floribus numerosis; fructu coccineo. In Guiana. ♂.

**5111 d. HELICOSTYLIS Trecul.
(1846).**

Flores masc. numerosi in involucro polyphyllo, foliolis deltoideis imbricatis. Perigonium 4-fidum. Stam. 4, filamentis filiformibus antheris extrorsis subsagittatis. Fem. aggregati.

Invol. polyphyllum. Perig. 4-sepalum. Stylus compressus inclusus, stigmata elongata helicoidea. Achenium perigonio inclusum. *Artocarpeae.*

1. *H. Poeppigiana* Trecul. l. c. t. 5. f. 132—135. Olmedia tomentosa Poepp. et Endl. nov. g. t. 145. In *Gujana*. ♂. Folia oblonga integerima utrinque acuta subtus flavo-velutina.

5111e. NOYERA Trecul. (1846).

Flores masc. ignoti. Fem. plurimi in receptaculo plano involucrato congesti. Involutum polyphyllum 4—5-farium. Perigonium urceolatum tubulosum crassum apice poro apertum. Stylus terminalis; stigmata filiformia. Pericarpium indesiscens chartaceum.

1. *N. rubra* Trecul l. c. t. 5. f. 127—131. In *Gujana*. ♂. Arbor ramulis ferrugineo-pilosus. Folia disticha coriacea ovato-oblonga integerrima v. sinuata ferrugineo-rubra. Flores axillares solitarii.

5111f. GYNOCEPHALUM Blume. (1826).

Flores dioici. Masc. Perigon. 4-phylum. Stam. 4 rima longirostrum dehiscentes. Fem. Perig. 4-fidum. Stylus crassus, stigmata bifido. Frutices scandentes. *Artocarpeae.*

1. *G. macrophyllum* Blume; fol. cordatis digitinerviis acutis supra glabris nitidis subtus pallide puberulis; paniculis masculis velutinis albocinereis. In *Java*. ♂.

2. *G. giganteum* Trecul; fol. cordatis digitinerviis acuminatis supra nitidis secus vasorum tractus ferrugineo-villosis subtus molliter villosis, 5-nerviis; paniculis maximis ferrugineo-rubris. *Phytocrene gigantea* Wall. pl. as. rar. t. 216. In *Ind. or.* ♂.

3. *G. bracteatum* Trecul; fol. ovato-cordatis sinuato-dentatis integris subtus villosis; ramis axillaribus; pedunculis racemulorum in bracteam setiformem longissimam desinentibus. *Phytocrene* Wall. In *Ind. or.* ♂.

4. *G. palmatum* Trecul; fol. palmato-cordatis 5-lobis subtus ferrugineo-hirsutis; racemis axillaribus ebracteatis. *Phytocrene* Wall. In *Ind. or.* ♂.

5. *G. oblongum* Trecul; fol. integrermis oblongis utrinque acuminate subtus pubescentibus; racemis brevibus bracteolatis. *Phytocrene* Wall. In *Ind. or.* ♂.

pag. 421 ad CECROPIAM.

4. *C. obtusa* Trecul in ann. sc. nat. (3 ser.) 8. p. 79. fol. peltatis 8—9 lobatis, lobis obovato-rotundis obtusissimis subtus niveo-tomentosis; petiolo albo-tomentoso. In *Brasilia*. ♂.

5. *C. pachystachya* Trecul; fol. peltatis 9—10-lobatis ad petiolum fissis, lobis oblongis angustis sinuato-pinnatifidis supra strigosis subtus niveo-tomentosis. In *Brasilia*. ♂.

6. *C. polystachya* Trecul; fol. peltatis 10-lobis, lobis acutis superioribus alte pinnatifidis inferioribus integris subtus albo-varigatis. In *Peruvia*. ♂.

7. *C. flagellifera* Trecul; fol. peltatis 8—9-lobatis, lobis obovatis inaequilateris supra glabris subtus albo-tomentosis. In *Peruvia*. ♂.

8. *C. acutifolia* Trecul; fol. peltatis 10—11-lobatis lobis elongatis inaequilateris subacuminatis supra adpresso-pilosus subtus albis; ramis fuscis pilosis. In *Peruvia*. ♂.

9. *C. albicans* Trecul; fol. peltatis 12—13-lobatis supra albo-tomentosis subtus inter nervos hirtellos rubentes incanis. In *Peruvia*. ♂.

10. *C. strigosa* Trecul; fol. peltatis 10-lobatis lobis oblongis apice rotundatis brevissime acuminatis supra scaberrimis subtus albo-tomentosis hirtellisque. In *Peruvia*. ♂.

11. *C. angustifolia* Trecul; fol. peltatis 14-lobatis, lobis elongatis angustis integris obtusiusculis v. acutis supra asperis subtus albo-tomentosis. In *Peruvia*. ♂.

12. *C. Goudotiana* Trecul; fol. peltatis 6—7-lobatis, lobis oblongis apice rotundatis supra dense et molliter pubescentibus, demum scabris bullosis subtus tomentosis. In *Nov. Grana- nata*. ♂.

13. *C. membranacea* Trecul; fol. peltatis 8-lobatis membranaceis, lobis acutis, primum utrinque albo-tomentosis dein glabratibus. In *Gujana?*. ♂.

14. *C. Schiedeana* Klotzsch in Linnaea 20. p. 531. fol. palmato-lobatis; lobis oblongis obtusis v. acutis marginie subundulatis supra breviter

tomentosis subtus dense puberulis; spicis fem. quaternatim umbellatis. In Mexico. ♂.

15. *C. Humboldtiana* Klotzsch; fol. palmato-lobatis; lobis oblongo-ovatis apice rotundatis margine undulatis albo-vellereis supra scabris subtus niveo-vellereis, costis arachnoideis; spicis masc. fasciculatis. In Am. austr. ♂.

16. *C. bicolor* Klotzsch; fol. profunde palmato-lobatis, lobis elongato-oblongis brevissime acuminatis margine subrepandis supra scabris subtus albo-tomentosis; spicis fem. quaternatim umbellatis crassis pedunculo villosa longioribus. In Peruvia. ♂.

17. *C. scabra* Klotzsch; fol. profunde palmato-lobatis, lobis ovatis acuminatis margine plicato-repandis supra muricato-sericeis subtus albo-tomentosis; spicis masc. numerosis, pedunc. hirtis spicis 6-duplo brevioribus. In Peruvia. ♂.

18. *C. Ruiziana* Klotzsch; fol. profunde lobatis; lobis ovatis acutis margine plicato-repandis supra glabris subtus albo-tomentosis costis hirsutis; spicis masc. numerosis; spatha albo-villosa; spicis fem. umbellatis longissimis. In Peruvia. ♂.

19. *C. nivea* Poepp. ex Klotzsch; fol. profunde lobatis; lobis obovatis acutis supra rugosis scabris margine repandis subtus niveo-tomentosis costis villosis; spicis masc. numerosis; pedunculis niveo-tomentosis muricato-villosis. In Peruvia. ♂.

20. *C. dentata* Klotzsch; fol. profunde lobatis, lobis ovatis acutis dento-serratis supra hirto-scabris subtus

albo-tomentosis costisque muricato-hirtis; petiolo cylindrico. In Peruvia. ♂.

21. *C. pinnatiflora* Klotzsch; fol. profunde lobatis, lobis ovatis dilatatis aut rotundatis inferne pinnatifidis subtus pubescentibus; spicis masc. numerosis; pedicellis compressis. In Brasilia. ♂.

22. *C. tubulosa* Klotzsch; fol. 11-lobatis peltatis; lobis oblongis v. ovato-lanceolatis margine repandis supra scabris subtus albo-tomentosis; petioli longis sulcato-striatis villosis; spicis fem. crassis. In Peruvia. ♂.

23. *C. digitata* Klotzsch; fol. 14—16-lobatis peltatis coriaceis; lobis oblongis ligulatis acutis integerrimis supra glabris subtus albo-tomentosis; spicis fem. crassis; spatha oblonga extus hirsuta. In Peruvia.

24. *C. sciadophylla* Mart. hb. fol. umbellato-digitatis; foliolis 12—14-lanceolatis basi attenuatis glabris subtus subtilissime reticulatis; amentis fem. umbellatis. In Brasilia. ♂.

25. *C. scabra* Mart. fol. profunde palmato-7—9-partitis; lobis anguste lanceolatis cuspidatis scabris subtus cinereo-tomentosis, amentis masc. 3-nis. In Brasilia. ♂.

26. *C. obtusifolia* Bertol. fol. palmato-5-partitis supra piloso-scabris subtus albo-tomentosis, laciinis obtusissimis margine repando-crispatis. In Guatemala. ♂.

27. *C. argentea?* Vis. fol. peltatis breve 8—9-lobis; lobis late ovatis abrupte acuminatis repando-dentatis supra scabris subtus argenteis in venis hirtis. In? ♂.

Index Generum Classis XX—XXIII.

A.

Acacia 477.
Acalypha 376.
Acanthoglossum 91.
Acanthophippum 91.
Acharia 258.
Aceras 131.
Acianthera 29.
Acianthus 177.
Acidotom 450.
Acnida 434.
Acontias 356.
Acriopsis 76.
Acrocomia 299.
Acropora 90.
Actinostemon 339.
Actinostrobus 390.
Adenoncos 118.
Adenopeltis 224.
Adenogyne 388.
Adenostylis 161.
Adriania 450.
Aeranthus 121.
Aerides 119.
Aetheria 164.
Aetherurus 358.
Aganisia 76.
Aglaonema 358.
Agrostophyllum 123.
Agyneia 383.
Akebia 389.
Albizzia 506.
Albradia 280.
Alchornea 456.

Allemannia 83.
Aleurites 379.
Alfonsea 530.
Alnus 280. 567.
Althenia 223.
Altensteinia 170.
Amanoa 434.
Ambrosia 286.
Ambrosinia 349.
Amorphophallus 353.
Amperea 382.
Anabaena 375.
Anacamptis 129.
Anarthria 422.
Anda 379.
Andrachne 383.
Anectochilus 167.
Angraecum 121.
Anisonema 387.
Ania 74.
Ansellia 111.
Anthericlis 125.
Anthobetus 432.
Anthogonium 183.
Anthochortus 422.
Antherosperma 339.
Anthosteinma 223.
Antidaphne 258.
Anthurium 285. 567.
Aopla 138.
Apaturia 85.
Appendicula 116.
Aporum 46.
Araucaria 444.
Arctopus 539.

Areca 289.
Arethusa 183.
Argothamnia 238.
Arisaema 349.
Arisarum 349.
Aristolochia 195.
Arnottia 146.
Arophyllum 69.
Arundina 74.
Arum 352.
Artocarpus 223.
Artrotaxis 401.
Asaria 185.
Aspasia 75.
Aspegrenia 29.
Astraea 331.
Asterandra 389.
Astrocaryon 299. 570.
Ate 145.
Atriplex 531.
Aviceps 153.
Axyris 258.

B.

Bactris 297. 569.
Balanophora 218.
Baliospermum 332.
Baloghia 382.
Barkeria 72.
Bartholinia 146.
Baskervillea 167.
Batemannia 82.
Batis 433.
Begonia 340.
Benincasa 369.

- Bentinkya 295.
 Betula 303. 571.
 Bia 388.
 Biarum 351.
 Biassolettia 389.
 Bicornella 146.
 Bifrenaria 82.
 Bipinnula 186.
 Biota 391.
 Birchea 118.
 Bletia 73.
 Boeckhia 432.
 Boehmeria 296.
 Bulbophyllum 38.
 Bonatea 145.
 Borassus 435.
 Borya 421.
 Botryanthe 388.
 Brachycoritis 137.
 Brachystachys 331.
 Brassia 110.
 Brassavola 69.
 Braunea 435.
 Breynia 539.
 Briedelia 382.
 Brosimum 413.
 Broussonetia 433.
 Brughtonia 72.
 Bryobium 43.
 Bryonia 363.
 Buccinia 146.
 Burasaja 389.
 Burlingtonia 97.
 Burnettia 173.
 Buxus 258.
- C.**
- Cadetia 29.
 Caladenia 177.
 Caladium 355.
 Calamus 291.
 Calanthe 123.
 Calcearia 182.
 Caleya 182.
 Calla 359.
 Calliandra 508.
 Callitris 390.
 Calochilus 170.
 Calopogon 182.
 Calopsis 428.
 Calypso 92.
 Camarotis 113.
 Cannabis 434.
 Cannomois 431.
 Carex 224.
 Carica 441.
 Carpinus 304.
 Carteretia 32.
 Carya 281.
- Caryota 339.
 Castanea 304. 572.
 Casuarina 218.
 Catasetum 83.
 Cattleya 70.
 Caulinia 222.
 Cecropia 421. 575.
 Centrochilus 132.
 Centropetalum 125.
 Cephalandra 372.
 Cephalanthera 186.
 Cephalocroton 331.
 Cephalotaxus 448.
 Ceratiola 421.
 Ceratocaryon 43.
 Ceratophilus 117.
 Ceratocarpus 223.
 Ceratandra 157.
 Ceratophyllum 313.
 Ceratopsis 158.
 Ceratostylis 117.
 Ceratosicyus 374.
 Cerroxylon 530.
 Chaenanthe 96.
 Chaeradoplectron 158.
 Chaetanthus 431.
 Chamaecyparis 391.
 Chamaerepes 155.
 Cheirostylus 168.
 Chelouanthera 91.
 Chenopodium 173.
 Chiloschista 113.
 Chioglossa 177.
 Chloraea 183.
 Chiropetalum 287.
 Chlorosa 168.
 Chrysoglossum 31.
 Chrysitrix 538.
 Chysis 95.
 Cirraea 76.
 Cirrhopteridium 42.
 Citrosma 451.
 Citrullus 367.
 Cladogynus 385.
 Claeoxylon 450.
 Clarisia 421.
 Cleidion 328.
 Cleodora 331.
 Cleistostoma 115.
 Cleistes 183.
 Cliffortia 452.
 Cluytia 455.
 Cnemidia 167.
 Cnesmone 257.
 Cnidoscolus 381.
 Coccinia 370.
 Cochlia 38.
 Cocos 300. 570.
 Codonorchis 183.
- Coelia 36.
 Coelogyne 36.
 Coeloglossum 137.
 Collabium 53.
 Collignaja 375.
 Colocasia 354.
 Commia 413.
 Commiphora 435.
 Comparettia 97.
 Comptonia 287.
 Conceivebum 43.
 Conocephalus 564.
 Convellia 561.
 Corallorrhiza 33.
 Coriandra 362.
 Cordylestylis 165.
 Coryanthes 181.
 Corycium 154.
 Corylus 303.
 Corypha 296.
 Cranichis 168.
 Cremastra 90.
 Croton 332.
 Crozophora 286.
 Cryne 186.
 Cryptarrhena 98.
 Cryptochilus 96.
 Cryptocryne 349.
 Cryptoglottis 117.
 Cryptomeria 392.
 Cryptopus 121.
 Cryptostylis 170.
 Ctenomeria 331.
 Cucullifera 432.
 Cucamis 360.
 Cucurbita 360.
 Cudrania 566.
 Culcasia 356.
 Cunninghamia 401.
 Cupressus 391.
 Cuspoa 564.
 Cutlauzina 98.
 Cyathoglottis 186.
 Cyclanthera 372.
 Cycas 448.
 Cylindrolobus 75.
 Cycnoches 83.
 Cynorkis 146.
 Cynomorium 218.
 Cypripedium 188.
 Cyrtochilum 106.
 Cyrtonema 362.
 Cyrtopera 95.
 Cyrtopodium 95.
 Cyrtosia 187.
 Cyrtostachys 301.
 Cyrtostylis 177.
 Cytheris 74.
 Cytinus 389.

D.

- Dacrydium 447.
 Dactylostemon 339.
 Dactylostylis 75.
 Daemonorops 294.
 Dalechampia 374.
 Dammara 445.
 Datisca 450.
 Decaisnea 176.
 Dendrobium 47.
 Dendrochilum 35.
 Desmoncus 297. 568.
 Diadenium 97.
 Dichaea 105.
 Dicrypta 83.
 Didymandra 530.
 Didymeles 421.
 Dienia 33.
 Dieffenbachia 358. 573.
 Diglyphosa 43.
 Dilochia 36.
 Dinema 68.
 Diothema 68.
 Diospyros 435.
 Diotis 259.
 Diplocentrum 112.
 Diploconchium 38.
 Diplothemium 301.
 Dipodium 93.
 Disa 149.
 Disorrhinchidium 138.
 Disocarpus 385.
 Disperis 156.
 Dittaxis 382.
 Diuris 173.
 Doritis 91.
 Dorstenia 278.
 Dovea 422.
 Dracunculus 353.
 Drakaea 183.
 Drymodia 75.
 Drypetes 433.
 Dubrueilia 274.
 Dypsis 290.

E.

- Earina 36.
 Ecbalium 367.
 Echioglossum 117.
 Elaeococca 379.
 Elaia 300.
 Elaterium 371.
 Elateriospermum 379.
 Elegia 430.
 Elephantorrhiza 462.
 Embelica 387.
 Empetrum 432.
 Empusa 32.

- Engelhardtia 312.
 Encephalartus 449.
 Encyclia 68.
 Entada 459.
 Epicranthes 43.
 Ephedra 402.
 Ephippium 117.
 Epipactis 163.
 Epidendrum 53.
 Epiphora 83.
 Epiblema 174.
 Epipogium 158.
 Epistephium 187.
 Epistylium 224.
 Eria 44.
 Eriochilus 177.
 Eriocaulon 259.
 Erythropetalum 373.
 Erythrorchis 183.
 Euchidium 382.
 Eucosia 164.
 Eulophia 92.
 Euphorbia 315.
 Euterpe 288. 567.
 Eutropia 331.
 Evelynia 38.
 Excoecaria 256.

F.

- Fagus 304. 571.
 Falkoueria 421.
 Fatuoa 280.
 Fernandezia 104.
 Feuillea 455.
 Ficus 539.
 Flacourtie 152.
 Fleurya 275.
 Forficaria 157.
 Franseria 287.
 Freirea 276.
 Frenula 390.
 Freycinetia 412.
 Friesea 286.

G.

- Galeandra 94.
 Galera 169.
 Garcia 315.
 Gastrodia 158.
 Gastroglossis 31.
 Geiseleria 331.
 Geodorum 91.
 Geonoma 295. 568.
 Georchis 164.
 Gesnouina 276.
 Girardinia 275.
 Gleditschia 539.

- Glochidinopsis 387.
 Glomera 125.
 Glossaspis 132.
 Glossodia 179.
 Glyptostrobus 392.
 Gnetum 401.
 Gomphichis 170.
 Gonatanthus 360.
 Goodyera 164.
 Govenia 83.
 Gramatophyllum 90.
 Grohya 90.
 Guilielma 299. 570.
 Gunuja 113.
 Gussonia 388.
 Gymnanthes 388.
 Gynocephalum 575.
 Gynoon 388.
 Gynostemma 456.
 Gyrostemon 455.

H.

- Habenaria 138.
 Haemaria 165.
 Haplochilus 172.
 Haplostellis 183.
 Harina 291.
 Hartwegia 68.
 Hedycaria 452.
 Hedyosmon 312.
 Helicia 75.
 Helicostylis 574.
 Helotrix 132.
 Helosis 218.
 Hemipilia 136.
 Herminium 138.
 Heritiera 530.
 Hernandia 258.
 Herpysma 167.
 Herschelia 157.
 Hexameria 53.
 Hexadesmia 53.
 Hexadica 286.
 Hexisea 37.
 Hippomane 224.
 Hippophae 433.
 Hisingera 450.
 Holboellia 389.
 Homalomena 358.
 Humulus 434.
 Huntleya 77.
 Hyaeuanche 450.
 Hydrocharis 441.
 Hylophila 166.
 Hyospathe 288.
 Hyophorbe 435.
 Hypolaena 432.
 Hypodiscus 432.
 Hysteria 158.

I.

- Jatropha* 380.
Ipsea 74.
Inga 519.
Jonopsis 96.
Isochilus 68.
Juglans 312.
Julocroton 382.
Juniperus 442.

K.

- Kernera* 530.
Kigellaria 442.
Kirganelia 386.
Kunthia 288.
Kentia 301.

L.

- Laelia* 69.
Lagenaria 369.
Lagetta 440.
Lasia 282.
Lasiogyne 332.
Leucaena 477.
Leochilus 104.
Leopoldinia 288.
Lepanthes 30.
Leptocarpus 430.
Leptoneima 434.
Leptorachis 339.
Leptotes 72.
Lepyrodia 422.
Leucandra 388.
Leucoploeus 432.
Libocedrus 390.
Lilaea 223.
Limodorum 186.
Limatodes 125.
Liparis 33.
Lissochilus 95.
Listera 162.
Lithocarpa 311.
Litorella 258.
Lithoxylon 388.
Livistona 296.
Lophophytum 218.
Loxocarya 422.
Loxostylis 287.
Luffa 369.
Lyginia 422.
Lyperanthus 181.
Lyraea 38.
Lysiloma 506.

M.

- Mabea* 328.
Macdonaldia 176.
Macodes 164.

- Macrodaenia* 98.
Macrolepis 47.
Macrostomium 43.
Madesvallia 96.
Malaxis 33.
Malachdenia 125.
Manihot 328.
Mappa 379.
Maprounea 224.
Marialva 454.
Martinezia 299. 570.
Maxillaria 77.
Maximiliana 301.
Medea 331.
Megaclinium 38.
Melanthesa 387.
Melotria 363.
Mercurialis 441.
Mesanthus 431.
Mesoclastes 37.
Metachilum 47.
Metroxylon 294.
Micranthea 258.
Microcoelia 43.
Microchilus 166.
Micropera 113.
Microsaccus 112.
Microtis 176.
Microstachys 257.
Microstylis 32.
Miltonia 105.
Mimosa 462.
Mithridatea 315.
Mitopetalum 75.
Modeca 373.
Momordica 367.
Monadenia 153.
Monimia 450.
Monomeria 43.
Monotaxis 382.
Monotris 138.
Monstera 359.
Mycaranthes 43.
Myoda 168.
Myriophyllum 301.
Myristica 456.
Mystacidium 123.
Myxanthus 37.

N.

- Najas* 222.
Nanodes 75.
Nepenthes 457.
Nephelaphyllum 33.
Neottia 162.
Nigritella 131.
Nipa 389.
Notylia 96.
Noyeria 575.

O.

- Oberonia* 31.
Ocalia 331.
Oeceoclades 118.
Octomeria 29.
Odontoglossum 106.
Oenia 121.
Oenocarpus 288. 567.
Olmedia 433. 574.
Ommatodium 158.
Oncidium 98.
Oncosperma 301.
Ophioxylon 530.
Ophrys 155.
Orania 435.
Orchis 125.
Oreodoxa 288.
Ornithidium 75.
Ornithocephalus 76.
Orthoceras 173.
Ostrya 304.
Osyricera 30.
Otochilus 35.
Oxyanthera 125.
Oxystophyllum 46.

P.

- Pachites* 137.
Pachyphyllum 104.
Pandanus 410.
Parvataria 389.
Parietaria 531.
Paschanthus 374.
Paxtonia 37.
Pelexia 163.
Peltandra 355.
Pentheia 157.
Pera 451.
Perebea 574.
Peristylus 136.
Perularia 131.
Pesomeria 74.
Phajus 74.
Phalaenopsis 111.
Philodice 258.
Philodendron 356. 572.
Pholidota 36.
Phreatia 44.
Phyllanthus 383.
Phyllocladus 447.
Phymatidium 105.
Physinga 75.
Physosiphon 29.
Phytelephas 451.
Pilumna 76.
Pinanga 301.
Pinus 392.
Piptadenia 461.

Pistacia 434.
Pistia 348.
Pithecolobium 518.
Platanthera 132.
Platanus 312.
Platyhymenia 460.
Platystylis 32.
Plecospermum 566.
Pleurothallis 22.
Plexaure 162.
Plocoglottis 75.
Plukenetia 375.
Podocarpus 415.
Podochilus 118.
Podostachys 331.
Pogonia 182.
Pogonotrophe 585.
Polystachya 47.
Ponera 69.
Ponthieva 168.
Populus 440.
Poterium 454.
Pothos 282.
Pouruma 563.
Pouzolzia 276.
Prasophyllum 171.
Prescottia 169.
Procris 278.
Pseudanthus 301.
Pseudolmedia 574.
Pselium 435.
Psittaglossum 83.
Pterichis 169.
Pterigodium 154.
Pterocarya 312.
Pteroseras 104.
Pterostylis 180.
Ptychochilus 125.
Putranjiva 433.
Pythonium 353.

Q.

Quercus 305. 572.

R.

Remusatica 354.
Restio 422.
Restrepia 31.
Rheananthera 112.
Rhodocoma 422.
Rhodospatha 573.
Rophostemon 170.
Rhynchosarpa 363.
Richardia 359.
Ricinocarpus 382.
Ricinus 381.
Rodrigezia 97.

Rottlera 338.
Rousselia 276.

S.
Saccellium 286.
Saccidium 137.
Saccolabium 113.
Sajorium 331.
Sagittaria 313.
Sagus 294.
Salisburia 418.
Salix 413.
Sarcanthus 118.
Sarcococca 259.
Sarcochilus 76.
Sarotrostachys 258.
Satyridium 152.
Satyrium 147.
Sauromatum 353.
Sauvaglossum 164.
Savia 434.
Scaphioglottis 82.
Scelochilus 29.
Schizocarpum 372.
Schizodium 153.
Schoenorchis 121.
Schoenoxiphium 255.
Schoenodium 427.
Schomburgkia 68.
Schrankia 476.
Sciadopithys 445.
Scindapsus 359. 573.
Scleria 249.
Scleropteris 90.
Scopularia 138.
Seafortia 290.
Sebaatiania 388.
Sechium 373.
Sennefeldera 388.
Sequoja 401.
Serapias 152.
Seraphyta 76.
Serianthus 519.
Serpicula 259.
Shephardia 440.
Siagnanthus 82.
Sycomorus 559.
Sicyos 372.
Siphonia 379.
Sobrallia 187.
Sophronitis 75.
Sparganium 255.
Spathicarpa 358.
Spathiostemon 382.
Spathoglottis 72.
Spathiphyllum 286. 567.
Sphacrostemma 457.
Specinia 29.
Spiculaea 183.

Spinacia 434.
Spiranthes 158.
Splitgerbera 278.
Staberoha 427.
Stauntonia 389.
Stauroglottis 121.
Stelis 30.
Stenia 77.
Stenoglossum 43.
Stenoglottis 146.
Stenoptera 171.
Stenorhynchus 161.
Stephania 413.
Stillingia 224.
Stryphnodendron 462.
Stylium 190.
Styloceras 450.
Stylochaeton 349.
Suripia 91.
Sutrinia 111.
Syagrus 301.
Synaspisma 224.
Synassa 167.
Synoecia 562.
Syngonium 356.

T.

Taeniophyllum 115.
Tamus 435.
Taxodium 392.
Taxus 448.
Telepogon 111.
Testudinaria 435.
Tetramiera 72.
Tetrapeltis 111.
Tetrapleura 462.
Thalassia 411.
Thamnochortus 428.
Thaumuria 276.
Thelasis 125.
Thelygonum 313.
Thelymitra 174.
Thladiantha 373.
Thuja 391.
Thujopsis 391.
Tiglum 331.
Timandra 331.
Tiphonium 252.
Titania 32.
Torreya 448.
Traganthus 282.
Tragia 256.
Treculea 565.
Trewia 450.
Triadica 421.
Trias 43.
Tricera 259.
Tricaryum 258.

Trichoceras 91.
Triceraster 433.
Trichocentrum 82.
Trichoglottis 111.
Trichonidium 76.
Trichophila 96.
Trichosma 72.
Trichosanthes 370.
Trichotosia 75.
Trichostemon 258.
Tripleura 268.
Trizeuxis 76.
Tropidia 167.
Trophis 433.
Tylostylis 74.
Typha 255.
Tryphia 146.

U.
Ulantha 162.
Uncinia 248.
Urena 275.
Urostigma 547.
Urtica 268.

V.
Vallisneria 432.
Vanda 111.
Vanilla 187.

W.
Warrea 77.
Widdringtonia 444.
Willdenowia 431.

X.
Xanthium 287.
Xanthosma 355.
Xylia 477.

Z.
Zalacca 435.
Zamia 448.
Zannichellia 222.
Zehneria 363.
Zeuxine 170.
Zostera 223.
Zosterostylis 170.
Zucca 373.
Zygia 508.
Zygotetalum 94.
Zygostates 83.

Corrigenda in sect. tertia.

- Pag. 37 No. 2288 pro fasciculis lege
fasciculos.
 - 42 - 6 acumatis l. acuminatis.
 - 54 - 96 Mytus l. Myrtus.
 - 55 - 98 rostrate l. rostrata.
 - 58 - 39 obtutis l. obtusis.
 - 64 - 137 glabis l. glabris.
 - 67 - 194 ostusis l. obtusis.
 - 78 - 10 susbtus l. subtus.
 - 86 Decum. barbara l. barbata.
 - 90 b. setifotmis l. setiformis.
 - 92 No. 71 parco l. pube.
 - 100 - 60 obtextis l. obtextis.
 - 103 - 40 obtusangulis l. obtusis.
 - 119 - 3 catyce l. calyce.
 - 140 - 153 lanatis l. lunatis.
 - 155 - 5 suconati l. subconnati.
 - 166 lin. l vato l. ovato.
 - 180 No. 34 fol. 6-natis l. 6-nis.
 - 192 - 17 triparlitis l. tripartitis.
 - 199 - 66 pepunculis l. pedunculis.
 - 209 - 2406 auctus l. aucta.
 - 222 - 25 fugacea l. fugacia.
 - 223 Hunn. fumar. obusis l. obtusis.
 - 251 No. 28 longidutine l. longitudine.
 - 265 Nuphar No. 3 Georya l. Georgia.
 - 272 No. 11 fasciculis l. fasciculus.
 - 277 - 19 tridentatis l. tridentatis.
 - 278 - 33 germunosa l. grumosa.
 - 280 - 50 siricto l. stricto.
 - 295 Rollin. No. 4 orientibus l. oriuntibus.
 - 297 No. 27 l. Mangattensis.
 - 311 Dillen. No. 4 ve l. vel.
 - 321 No. 17 aciniis l. laciniis.
 - 326 - 192 pediceliis l. pedicellis.
 - 327 - 211 foliosis l. foliolis.
 - 333 - 42 pediceilis l. pedicellis.
 - 338 Coptis No. 3 Rhizoma crassa l. crassum.
 - 339 c. Euthalictum l. Euthalictrum.
 - 340 No. 25 creatis l. cuneatis.
 - 347 - 75 pulmoso l. plumoso.
 - 353 Melissa infer. 3-dentato l. 2-dentato.
- 354 No. 2601 Antherae glabra l. glabrae.
 - 361 - 2717 l. constricta.
 - 363 - 2446 Cal. l-fidus l. 4-fidus.
 - 364 - 2766 divaricatae l. divaricati.
 - 367 Acanth. bilocularis l. bilocularis.
 - 368 Ecimatacauth. subtensis l. subdensis.
 - 371 No. 2871 brevis l. breve.
 - 380 - 19 declinata l. declinata.
 - 392 - 93 longioribus l. longiore.
 - 397 - 174 redicutatis l. reticulatis.
 - 425 - 63 in cano l. incano.
 - 431 - 28 ercta l. erecta.
 - 435 - 15 calyce l. calycem.
 - 443 - 27 cranatis l. crenatis.
 - 484 - 71 adscendans l. adscendens.
 - 486 - 5 psrva l. parva.
 - 517 Herpestes No. 2 glaber l. glabra.
 - 532 No. 10 debtatis l. dentatis.
 - 554 - 2 subdilatis l. subdilatalis.
 - 543 - 44 piunasidis l. pinnatifidis.
 - 545 - 10 siriatis l. striatis.
 - 648 - 22 5-fido l. 5-fida.
 - 550 - 49 superanten l. superans.
 - 561 - 89 l. profunde.
 - 564 - 12 terminates l. terminabilis.
 - 577 - 13 pepetiolatis l. petiolatis.
 - 597 - 17 fofolia l. folia.
 - 601 - 10 epicis l. spicis.
 - 604 - 64 scaber l. scabra.
 - 605 Cassel No. 1 calyce l. calyx.
 - 606 No. 2 folo l. folio.
 - 621 - 7 purpuro l. purpura.
 - 633 - 3009 l. petalis unguiculatis.
 - 623 - 23 irregularem l. irregulare.
 - 645 - 7 barbatis l. barbatas.
 - 645 - 15 pulvinis l. pulvinos.
 - 646 - 24 silicula l. siliculae.
 - 671 - post emarginatis dele;
 - 679 Rapistr No. 2 sylo l. stylo.

- Pag. 681 No. 17 trictis l. tristis.
 - 685 - 11 sigmate l. stigmate.
 - 695 - 77 pressis l. adpressis.
 - 702 - 4 pipartitis l. bipartitis.
 - 706 - 6 siliquisquis l. siliquis-
 que.
 - 711 - 62 supero l. superne.
 - 713 - 15 dimidium l. dimidiata.

- Pag. 713 No. 19 angutato l. angulato.
 - 718 - 6 monililibus l. monilibus.
 - — - 7 compressus bimonilif.
 l. compressis submonilif.
 - 721 - 14 dendenticulatis pro den-
 ticulatis.
 - 723 - 43 quatriple l. quadruplo.
 - 728 Raphanus a. istmis pro isthmis.

Corrigenda in sect. quarta.

- P. 734 No. 3091 erecte lege erectae.
 - 744 - 59 plicato l. plicata.
 - 760 - 63 quod l. quoad.
 - 770 - 13 macula atropurpureo l.
 maculo atropurpureo.
 - 772 - 63 ornithob. l. ornithop.
 - 780 - 211 breviore l. brevioribus.
 - 781 - 226 sororinm l. sororium.
 - 786 Fugosia No. 5 ovariis l. ovarii.
 - 787 No. 16 pumilis l. humilis.
 - 791 Azadorachta l. Azadirachta.
 - 792 No. 10 spathulatis pro spatulatis.
 - 796 - 55 subpelta l. subpeltatis.
 - 808 - 11 Colla l. Cola.
 - 813 - 35 purpea l. purpurea.
 - 823 - 53 rotundis l. rotundis.
 - 824 - 53 l. Rosa campestris.
 - 825 - 66 paule l. paulo.
 - 831 - 51 expausa l. expansa.
 - 833 - 88 villossis l. villosis.
 - 836 - 145 glandestinus l. clan-
 destinus.
 - 844 - 70 petiorum l. petiolorum.
 - — - 71 timentosis l. tomentosis.
 - 846 - 99 monifol. l. morifol.
 - 848 - 144 stipilis l. stipulis.
 - 858 - 336 acuminatis l. acumi-
 natis.
 - 862 Gordonia No. 1 l. conoidea.
 - 865 No. 9 post staminibus deleat-
 tur sterilibus ibid. l. venosis.
 - 866 - 9 l. Idatimon et depresso.
 - 871 - 3245 cultraeformes.
 - 873 - 3279 cum vexillo pro carina.
 - 874 - 3309 complatum l. com-
 planatum.
 - 884 - 3466 parvum l. pervium.
 - 885 - 5488 l. monadelpha.
 - 902 - 168 semilia l. similia.
 - 903 - 184 l. linearis.
 - 904 - 203 l. partibus.
 - 911 - 40 l. substricto.

- P. 917 No. 24 longitudine l. latitudine.
 - 922 - 11 l. hirsuta.
 - 925 - 29 post floribus del. bus.
 - 939 - 178 l. maculato.
 - 941 - 53 l. piliformibus.
 - 951 - 56 breviore l. brevioribus.
 - 960 - 6 perplexa l. perplexa.
 - 961 - 24 debumbente l. decum-
 bente.
 - 963 Leobord. No. 2 l. dichotomias.
 - 965 No. 24 l. ornithopoides.
 - 966 - 24 l. orbicularibus.
 - 974 - 58 l. carina.
 - 976 - 4 l. sericeum.
 - 977 - 17 l. subaequante.
 - 985 - 43 gemina l. genuina.
 - 991 - 2 gemma l. genuina.
 - 992 - 6 carina l. carinam.
 - 996 - 32 sermalibus l. termi-
 nalibus.
 - 997 - 55 striati l. striatis.
 - 1001 - 103 β. minus l. foliis.
 - 1002 - 126 l. nervis.
 - 1008 - 7 axillo l. vexillo.
 - 1011 - 2 l. purpura.
 - 1015 - 5 l. puberulo pro puberuli.
 - 1015 - 40 l. cylindracea.
 - 1018 - 53 glaber l. glabra.
 - 1045 - 15 propasta l. prostrata.
 - 1048 - 57 leguminibus l. leguminibus
 - 1053 - 2 deleatur oblongis.
 - 1055 - 13 l. macrocarpa.
 - 1066 - 16 deleatur pilis.
 - 1082 - 147 vasicar. l. vesicaria.
 - 1080 - 250 plumosus l. plumosis.
 - 1098 - 368 folio l. foliolis.
 - 1105 - 39 obtuliusc. l. obtusiusculis
 - 1108 - 73 l. lunatis.
 - 1109 - 92 fotiolis l. foliolis.
 - 1116 - 55 multifloro l. multifloro.
 - 1117 - 68 l. scabris.
 - 1118 - 76 florum l. foliorum.

- 1129 No. 19 l. subbilabiato.
 - 1133 - 40 ereta l. erecta.
 - 1135 - 11 l. leguminibus.
 - 1143 - 15 l. brevioribus.
 - 1148 - 89 l. oblongo.
 - 1154 - 173 fotiolis l. foliolis.
 - 1164 - 7 l. subciliatis.
 - — - 12 l. erectus glaber.
 - 1166 Clitoria No. 4 et 6 lege
glabra.
 - 1169 No. 18 l. fruticulosum.
 - 1171 - 29 l. hirsutum.
 - 1172 Platysema l. volubile.
 - 1174 Cyamops No. 2 lege denti-
culatis.
 - 1181 No. 5 mimmo l. minimo.
 - 1191 - 31 lobies l. lobis.
 - — - 42 del. post ovatis ve.
 - 1199 - 17 l. pubescentibus.
 - 1202 - 57 l. volubilis.
 - — - 61 l. cochleariforme.
 - 1214 - 4 l. arboreus.
 - 1219 - 51 l. subacaulis.
 - 1220 - 6 l. legumine pro legume.
 - 1233 - 87 post floribus del. bus.
 - 1234 - 100 ramoso l. ramosum.
 - — - 101 l. oblongis.
 - 1263 - 3763 l. Anthera.
 - 1269 - 3871 l. ligulatae et No.
3872 l. scariosae.
 - 1275 - 3943 l. acuminatae.
 - — - 16 l. crasso.
 - 1285 - 4206 l. linearis.
 - 1289 - 4288 l. fauce pro sauce.
 - 1296 - 14 l. bifurcata.
 - 1301 - 62 l. araneosa.
 - 1304 - 12 l. paniculatis.
 - 1306 - 50 l. glabriuscula ramosa.
 - 1319 - 37 l. glaucescens.
 - 1325 - 27 l. involucroque.
 - — - 54 l. humile.
 - — - 59 l. sabaudum pro sub-
 - 1333 Scolym. l. caulem.
 - 1334 Hyoser. l. scabra.
 - 1340 Cölest. No. 10 patiolat. l. pe-
tiolatis.
 - 1355 Symblom. oinereo-pub. l. ci-
nereo-pub.
 - 1357 No. 35 raticulatis l. reticulatis.
 - 1358 - 72 pedunculi l. pedunculis.
 - 1361 - 125 glanco l. glauco.
 - 1366 - 234 mollitis l. molliter.
 - 1367 - 245 l. tomentosis.
 - 1385 - 53 l. glabrum pro glabris.
 - 1389 - 123 obscuram l. obscurum.
 - 1391 - 174 globuli l. globulis.
 - 1393 - 203 l. oppositi rameis.
 - 1400 Athanas. ilneari l. lineari.
 - 1402 No. 10 del. squamis scariosis.
 - 1403 Millot. ternissima l. tenuiss.
 - 1413 No. 14 falsa l. salsa.
 - 1414 - 36 suamis l. squamis.
 - 1415 - 8 fastuassa l. fastuosa.
 - 1424 Cirsium a. desinentibus l. de-
sinentes.
 - 1436 Spadon. intidis l. nitidis.
 - 1438 No. 9 post involucro del. fol.
 - 1439 - 14 pauciflorasimus l. pau-
ciflora.
 - 1447 - 57 glaberrimo l. glaberrimo.
 - 1448 - 82 pillularis l. pilularis.
 - 1457 - 25 tortus l. tortis.
 - 1460 - 10 foliosa l. foliosum.
 - 1462 - 36 purpureae l. purpureus.
 - — - 40 scabra l. scaber.
 - 1466 - 23 hirta l. hirtis.
 - 1470 Biot. 2 l. glaberrima.
 - 1482 No. 8 subtenti l. sub lente.
 - 1489 - 6 hispida l. hispidus.
 - 1493 - 11 serico l. sericeo.
 - 1500 - 13 glabra l. glaber.
 - 1503 - 88 l. glabriusculus.
 - 1505 - 125 uniseriali l. unise-
rialis.
 - 1509 - 228 l. tomentosis.
 - 1513 - 313 verticosis l. verticil-
latis.
 - 1517 - 411 hiuc l. hinc.
 - 1518 - 434 l. tomentosis.
 - 1521 - 502 l. fistuloso.
 - 1522 - 535 anceol. l. lanceolatis.
 - 1528 Petast. No. 1 l. inaequaliter.
 - 1532 Crocyd. humilis l. humile.
 - 1540 No. 62 l. Africa austr. pro ac.
 - 1548 - 92 l. lanatis.
 - 1553 - 202 eano l. cano.
 - 1556 - 35 l. domingense.
 - 1561 Artem. No. 13 l. kermesino.
 - 1568 Asteris. l. maritimus.
 - — No. 20 canle l. caule.
 - 1572 Perim. No. 1 l. ovalibus.
 - 1577 l. Xymenesia non Xyminesia.
 - 1586 No. 14 villosum l. villosa.
 - 1587 - 6 lanato l. lanata.
 - 1591 - 25 oblongi l. oblongis.
 - 1599 - 27 l. parthenifolium.
 - — - 30 l. involucrum.
 - 1607 Sphaerom. 3 l. lanuginosa.

Corrigenda in sect. quinta.

- P. 10 No. 4560 major lege majus.
- 13 - 4614 sepala l. sepalis.
- 14 - 4626 plicatum l. plicati.
- 15 - 4645 l. glandulace.
- 18 - 4692 biloba l. biloba.
- 22 - 1 cernoso l. carnos.
- 28 adde 112 P. *articulata* L. rhizo-
- 29 Speclin. No. 5 l. *pusilla*.
- 34 No. 17 anceolatis l. lanceolatis.
- 41 - 64 fiavi l. flavi.
- 42 - 68 subglandulo l. subglandu-
- 7 laeralibus l. lateralibus.
- 44 Eria No. 3 nudio l. medio.
- 45 No. 26 linearis l. linearibus.
- 48 - 8 ungнем l. unguem.
- 11 adonatis l. odoratis.
- 15 obtuo l. obtuso.
- 49 ianceolato l. lanceolato.
- 55 ianceolatis l. lanceolatis.
- 57 l. pseudobulbis pyrifor-
- 58 - 72 laternibus l. lateralibus.
- 60 - 102 sinnosis l. sinuosis.
- 61 - 111 l. fruticoso.
- 62 - 132 l. frutic.
- 139 l. elongato.
- 65 - 179 l. *radicans*.
- 66 - 192 l. quadrata.
- 67 - 203 petailes l. patulis.
- 75 Sophron. viol. columnam l. co-
- lumna.
- 77 Maxill. N. 4 post Lindl. adde fol.
- 80 No. 45 lobii l. lobis.
- 52 calloso l. callosa.
- 68 l. elevatis.
- 71 l. vaginalibus.
- 5 l. macula lutea.
- 11 costricto l. constricto.
- 98 Macradenia No. 1 l. marmorati.
- 101 No. 35 l. 3-dentata.
- 39 l. chartaceis.
- 102 - 54 l. dimidio.
- 59 l. sepal pro sepalis.
- 107 - 12 l. maximis.
- 108 - 27 l. acuminatis.
- 110 - 3 candatis l. caudatis.
- 111 - 15 aute l. ante.
- 114 - 22 obstuo l. obtuse.
- 115 - 28 carnosis l. carnos.
- 118 Podochil. No. 1 l. emarginatis.
- 121 Oenia No. 1 l. obsoleta.
- Oenia No. 2 l. intermedia ob-
- soleta.
- 124 No. 12 post radicali adde;
- 127 - 22 masculis l. maculis.
- — - 37 spica l. spice.
- 129 - 4627 l. Anacamptis.
- 132 - 9 ovario l. ovarii.
- 136 Hemip. No. 1. l. Orchidis.
- 140 No. 24 l. lanceolata.
- — - 25 l. partiti.
- 141 - 29 l. longioribus.
- 143 - 59 intermedia l. intermedio.
- 150 - 9 crenato l. carinato.
- 151 - 19 l. labello pro lamello.
- — - 25 l. supra basin.
- 155 - 5 l. bilobo.
- 156 - 27 l. macula alba.
- 157 Torfic. No. 1 l. Disae lacerae.
- 166 No. 3 denso l. dense.
- 172 - 21 l. longissimo pro lon-
- gissime.
- 173 - 4 l. intermedia.
- 174 - 10 dele laciniis.
- 175 - 6 l. arenaria.
- 180 - 12 sessilis l. sessilibus.
- 184 - 10 acu.s l. acutis.
- 185 - 23 scapis l. scapi.
- Asarca No. 3 l. *acutiflora*.
- 188 Cypripedium 1817 l. 1747.
- No. 1 fusi l. fusci.
- 189 - 14 orbiculri l. orbiculari.
- 190 - 22 l. longissimum cordi-
- formem.
- 191 - 11 l. *melastachys*.
- — - 20 post integerrimis dela;
- et post glabris adde;
- 192 - 26 l. verticillos.
- — - 36 scaris l. scabris.
- 195 - 84 caspitosis l. caespitosis.
- 196 - 16 l. cylindrici.
- — - 24 l. A. *rubicifolia*.
- 197 - 39 dele In.
- 202 - 4810 l. filiformia.
- — - 4803 l. grandes.
- 205 - 4809 erecta l. erectae.
- 208 - 4908 l. sinuatam.
- — - 4912 l. Caps pro Casp.
- 208 - 4918 capillisria l. capillaria.
- 211 - 4954 l. truncatum.
- — - 4977 infructuoso l. anfract.
- 212 - 4981 del. Cor. post dentatus.
- — - 5987 valves l. valvis.
- 315 - 5014 tricocnus l. tricoccus.
- — - 5018 bifidis l. bifidi.
- 218 Casuarina No. 2 l. apicibus.
- 221 No. 28 deleaf. obtusis.

- 222 Caulin. No. 1 l. mollibus.
- — Adenocrepis l. Adenopeltis.
- 227 No. 50 l. ciliato-serratis.
- 235 - 169 l. bidentato.
- 236 - 185 l. ellipticis.
- — - 192 l. gracili.
- 240 - 255 subulatis l. subulata.
- 242 - 304 l. *glaucescens*.
- 255 Spargan. No. 4 nutans l. *nautans* et *natantibus*.
- 261 No. 38 l. pubescentibus.
- 262 - 50 vaginis l. vaginas.
- 263 - 72 triabus l. tribus.
- 664 - 78 l. *leptophyllum*.
- — - 90 masculis l. masculi.
- — - 92 l. linearibus.
- 268 - 148 circuinatis l. circinat.
- 270 - 40 capitulis l. capitatis.
- 271 - 61 l. longepedunculatis.
- 262 - 79 florescens l. floriferis.
- 276 Parietaria 1 tomes l. tomis.
- 277 No. 18 aerratis l. serratis.
- 279 - 8 parvifloris l. paucifloris.
- 283 - 10 l. laterales.
- 284 - 33 l. pedunculis.
- 287 - 6 tomentotis l. tomentosis.
- 292 - 20 l. elongatus.
- 294 - 41 l. destitutus.
- 296 - 4 l. multifidis.
- — Livist. No. 1 l. minoribus pro minores.
- 297 Livist. No. 4 basin l. basi.
- 313 Ceratoph. No. 5 l. ala multi-dentata.
- 320 No. 115 oxatis l. ovatis.
- 322 - 151 l. involuci non involucris.
- 329 - 17 subulatus l. subulatis.
- — - 25 l. bipedalis.
- 330 - 35 dimidiā l. dimidio.
- 332 - 14 l. acutiusculis.
- 333 - 21 albreviatilis l. abbreviatilis.
- 335 - 77 subsssil. l. subsessilibus.
- 336 - 98 l. *maritimum*.
- 337 pro Lithocarpa l. Croton.
- 338 No. 145 l. subsessilibus.
- 341 - 18 l. capsulae.
- 345 - 87 l. quaduensis.
- — - 91 l. maculatis.
- — - 95 l. inaequalibus pro in aeq.
- 349 Cryptocoryne l. (1833).
- 359 Scindapsis l. (1832).
- — No. 8 subclauca l. subclausa.
- 364 - 11 maculis l. masculis.
- 365 - 36 l. attenuata.
- 369 - 3 pedunlatis l. peduncu-latis.
- — - 11 l. cirrhos.
- 381 - 12 l. urentibus.
- 386 - 54 l. attenuatis.
- 392 Pinus No. 1 l. margine pro msrg.
- 399 No. 3 l. staminigeris.
- 394 c Picea l. bracteis inclusis.
- 397 No. 68 l. apophysi.
- — - 106 l. venosum pro venosis.
- 401 - 5062 l. ARTHROTAXIS.
- 403 - 17 l. inclusa.
- 404 Salix l. Anthera.
- 406 No. 5098 Cucull. l. Flos pro flores.
- 407 - 5129 l. nectariferae.
- 408 - 5143 l. elongati pro elongatae.
- 409 - 5151 l. Semen erectum.
- 410 - 5170 l. filiformia.
- — - 5180 l. aggregato.
- 411 - 8 l. margineque pro mar-ginque.
- 412 - 33 digitis l. digitos.
- — - 2 feminis l. feminineis.
- 417 - 43 l. aurantifolia.
- 419 - 75 spice l. apice.
- 420 - 83 l. subrevolutis.
- 421 Cerat. No. 1 l. Gemmularum.
- 424 No. 26 l. mucronatis.
- 431 - 7 l. sepalis pro sopalis.
- 432 Boeckia No. 1 fructibusquas l. fructibusque.
- — Vallsn. No. 3 l. Physcum pro Physidum.
- 434 Spinacia No. 1 post sessilibus adde inermibus.
- 436 No. 9 l. pedicellis.
- 438 - 57 l. nigricanti-
- 440 - 5 deltoideis pro deltoidibns.
- — - 79 l. DC pro CC.
- 442 - 7 l. carinatis pro curinat.
- 443 - 16 l. acicularibus.
- 445 - 2 l. cuspidata.
- 447 - 36 spcis l. spcias.
- 448 Salish. l. inciso pro insciso.

Bei'm Verleger dieses sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Wörterbuch der Synonymen

sämmlicher Pflanzen des Zier-, Gemüse- und Landschaftsgartens in alphabeticischer Folge der Geschlechter und ihrer Arten, zu leichtester und schnellster Auffindung aller verschiedenen Namen sämmlicher Gartenpflanzen, zu Vermeidung von Missverständnissen, Irrungen und Betrügereien bei Kauf, Verkauf und Tausch von Pflanzen und Sämereien.

Von

Ferdinand Freiherrn von Biedenfeld.

Zwei Bände in gross Sedez. Schön geheftet. Ladenpreis beider Bände
 $4\frac{1}{2}$ Rthl., herabgesetzt auf $1\frac{1}{2}$ Rthl. od. 2 fl. 24. kr.

Garten - Jahrbuch

nach **Le bon Jardinier 1846** von Poiteau, Vilmorin, Louis Vilmorin, Audot, Neumann, Pepin und mit Benutzung der deutschen, englischen, französischen und belgischen Hauptquellen für Beschreibung und Cultur aller neueren Pflanzen bis 1846, für Zier-, Landschafts-, Küchen- und Arzneigärtnerie


von

Ferdinand Freiherrn von Biedenfeld.

Mit 8 lithographirten Tafeln der neuesten und geschmackvollsten Formen von Springwasseranlagen für Gärten. 28 Bogen in grösstem Lexicon-Octav mit kleinster Schrift. Ladenpreis 3 Rthl. oder 5 fl. 24 kr.

Der Abonnementenkreis dieses Garten - Jahrbuchs erweitert sich mit jedem Jahrgange mehr und mehr, und von Seiten Derer, welche es vom Anfang an zu besitzen wünschen, gehen dem Verleger häufig Preisermässigungsgesuche zu. In Berücksichtigung derselben, und um Gartenfreunden die Anschaffung des vollständigen Werks zu erleichtern, wird der Preis, jedoch nur auf die Dauer des Jahres 1852 und so weit der kleine Vorrauth reicht, folgendermassen herabgesetzt:

Das Stammwerk, herausgegeben von Ferd. Freihrn. v. Biedenfeld, enthaltend alle neueren Pflanzen bis 1846. Mit 8 lithograph. Tafeln, 28 Bogen im grössten Lexicon-Octav. Geheftet, Ladenpreis 3 Rthl., herabgesetzt auf $22\frac{1}{2}$ Sgr. — Erstes Ergänzungsheft von Herrn Diaconus und Adjunctus J. A. F. Schmidt in Ilmenau, die Jahre 1846, 1847 umfassend. Ladenpreis 15 Sgr., herabgesetzt auf 3 Sgr. — Zweites Ergänzungsheft von demselben, umfasst die neuen Fortschritte und Erweiterungen bis Michaeli 1848. Ladenpreis 25 Sgr., herabgesetzt auf $6\frac{1}{4}$ Sgr. — Drittes Ergänzungsheft, bis Michaeli 1849 gehend, Ladenpreis $27\frac{1}{2}$ Sgr., herabgesetzt auf 7 Sgr. — Also das Stammwerk und die drei ersten Ergänzungshefte von $5\frac{1}{4}$ Rthl. Ladenpreis, auf dessen vierten Theil, nämlich 1 Rthl. $8\frac{3}{4}$ Sgr., wobei zu bemerken, dass das Format so gross und der Druck so raumsparend und compress ist, dass ein Bogen wenigstens so viel Inhalt hat, als 4—5 gewöhnlichen Satzes.



QK97 .D5 c.2 sect.5 gen
Dietrich, David Nat/Synopsis plantarum;



3 5185 00093 2697

