


聖王濟總錄




七十四

庫文閣内			
冊	二	六	漢
内閣文庫			
番號	漢	12609	
冊數	200	(77)	
函號	300	212	





大學東
校典藉
局之印



大德重校聖濟總錄卷第七十四

泄痢門

水瀉

濡瀉

瀉泄

洞泄寒中

驚瀉

論曰內經謂諸厥固泄皆屬於下暴注下迫皆屬於熱蓋為冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱水穀不分濕飲留滯水走腸間禁固不能故令人腹脹下利有如注水之狀謂之注泄世名水瀉

治水瀉不止木香散方

青木香

黃連

去須炒各壹兩

訶梨勒皮

微炒參分

龍骨

兩半

厚朴

去麤皮生薑汁炙令紫剉參分

右五味搗羅為散每服三錢匕空心以粥飲調下日午再服以差為度小兒以意加減服之

治一切水瀉及冷痢厚朴散方

厚朴

去麤皮生薑汁炙令紫剉壹兩

乾薑

半生半炮裂壹兩

陳橘皮

湯浸去白焙參分

白朮

壹兩

甘草

半生半炙半兩

右五味搗羅為散每服三錢匕空心米飲調下如霍亂吐瀉新汲水調下日晚再服

治水瀉腸鳴臍腹撮痛代赭丸方

代赭

煨赤

乾薑

炮

龍骨

各壹兩

附子

炮裂去皮臍參分

右四味搗羅為末研饅飯和丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下日午再服

治水瀉無度腸鳴腹痛肉豆蔻散方

肉豆蔻

去殼為末

生薑汁

白麵

右三味將薑汁和麩作餅子裹豆蔻末煨令黃熟研為細散每服二錢七空心米飲調下日午再服

治水瀉不止礪砂丸方

礪砂

石硫黃

鉛丹

巴豆

去皮心出油

右四味先將巴豆霜研細入諸藥同研細用糯米飯為丸如小豆大水瀉新汲水下丸赤白痢煎乾薑甘草湯放冷下一丸吐瀉煎生薑木瓜湯放冷下一

丸白痢煎乾薑湯放冷下一丸不拘時候

治暴注水瀉日夜無度斗門散方

木橡

去刺

訶梨勒

黃連

右三味等分搗羅為散每服一錢匕米飲調下食前

治水瀉不止木香丸方

木香

草烏頭

肉豆蔻

壹枚大者去殼

胡粉

巴豆

大者染棧去皮

右五味搗羅為細末合研白糯米軟飯和丸如黍米大每服三丸小兒一丸並用冷萊菔湯下

治水瀉不止黑神丸方

杏仁一枚去皮心

杏仁一枚去皮心

大錙墨壹錢

右三味同研極細以糯米粥和丸如林米大每服一

丸冷水下立止甚者再服一丸

治水瀉不止立效丸方

鉛丹炒手

草烏頭壹枚炮裂去臍皮

巴豆參粒去皮心膜出油盡研

右三味先搗烏頭為末與二味同研極勻以麵糊和

丸如菜豆大每服一丸煎陳粟米甘草烏梅湯放溫

冷下

治水瀉杏仁丸方

杏仁湯浸去雙人皮尖米粒

錙墨

巴豆霜各壹錢

右四味同研棗肉和丸如粟米大臨卧新汲水下

丸

治水瀉日痢小腹疼痛玉霜丸方

砒霜研細如粉

黃蠟壹兩

右二味以瓷碗盛重湯煮鎔開以東南柳枝二七莖

各長七寸麤細如筋每用兩莖攪藥又轉一頭攪候

兩頭并黑黃色乃已又取兩莖依前攪七次了將出

藥趁輒作條子收遇病旋於火上烘輒丸如梧桐子
大小兒菜豆大空心新汲水下一丸又轉一丸

治水瀉腸鳴鍼頭丸方

巴豆壹枚去皮膜 杏仁壹枚去皮尖二味皆針割火上燎令存性

右二味同細研約三百轉入大豆末一字再研一百
轉麵糊和丸如鍼頭大每服一丸新汲水下

治水瀉並赤白痢如聖丸方

烏頭端正大者炮裂去皮臍 菘豆

右二味等分擣羅為末新水和丸如菘豆大以丹砂
為衣每服五丸白痢煎乾薑湯下赤痢煎甘草湯下

赤白痢煎乾薑甘草湯下水瀉用新汲水下小兒一
兩丸不計時候

治水瀉方

右用胷州乾棗十枚去核入葇苣子填滿以麻纏却
用炭火燒令烟盡研令細每服一錢半匕煎陳粟米
稀粥飲調下

治水瀉滑腸氣虛久冷如聖丸方

乾薑炮 高良薑 胡椒

蜀椒去目并閉口炒出汗

右四味等分擣羅為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大

每服三十丸早晨空心食前粥飲下
治水瀉不止傷冷虛極黃蠟丸方

硫黃壹兩

右一味研細先鎔黃蠟入硫黃末打勻丸如梧桐子
大每服五丸新汲水下

治水瀉訶梨勒丸方

右取訶梨勒不拘多少以麩裹灰火內炮令赤黃剥
去麩取訶梨勒皮搗羅為末軟飯和丸如梧桐子大
每服二十丸米飲下空腹食前

治暴水瀉不止厚朴散方

厚朴去蠹皮生薑汁炙訶梨勒皮各壹兩甘草炙

黃連去須微炒肉豆蔻去殼白朮炒

乾薑炮赤茯苓去黑皮各參分

石八味搗羅為散每服二錢匕溫米飲調下

治脾胃虛冷腸滑米瀉如休息痢不止木香丸方

木香煨白朮煨肉豆蔻八

丁香各半兩乾薑炮訶梨勒皮煨取

龍骨各壹兩黃連去須參兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心
米飲下三十丸日晚再服

治水瀉蕪黃丸方

蕪黃炒

黃連去須炒

吳茱萸湯洗焙乾炒各參兩

乾薑炮壹兩

枳殼去瓢炒半兩

縮沙蜜貳兩

右六味搗羅為末煮漿水飯和丸如梧桐子大每服

二十九丸溫米飲下

治水瀉腸滑不禁訶梨勒丸方

訶梨勒貳兩以麩裹煨去核取皮并麩為末

乾薑炮

龍骨

赤石脂各壹兩

右四味搗羅為末以稀麩糊丸如梧桐子大每服空

心以米飲下二十九

治水瀉吐噦徧身疼痛訶梨勒丸方

訶梨勒煨去核

鹿茸酥炙去毛

桑根白皮剉

地榆

赤石脂

天雄炮裂去皮臍

龍骨各壹兩半

白芷

黃連去須

桂皮去麩

厚朴去麩皮塗生薑汁炙

白茅根

當歸切焙各壹兩

黃芩去黑心

乾薑炮裂各壹兩

肉豆蔻去殼肆枚

右一十六味搗羅為末爛飯為丸如梧桐子大每服

三十九丸溫米飲下

治水瀉腹痛日夜不止正氣散方

縮沙蜜去皮附子炮裂去皮臍赤石脂

肉豆蔻去殼龍骨 石榴皮焙

甘草炙人參 地榆 大黃

白朮 吳茱萸湯浸焙乾薑炮各

右一十二味搗羅為散每服三錢匕煮粳米飲調下

不拘時以止為度

治水瀉米穀不化晝夜不止白朮丸方

白朮壹兩火乾薑炮壹兩楮葉貳兩生

右三味搗研為末麩糊和丸如菉豆大空心米飲下

廿九

又方

取黃荆葉不限多少陰乾搗羅為散每服以米飲調

下三錢匕

又方

取羊蹄根曬乾刮去皮搗羅為散每服以米飲調下

三錢匕

又方

取熟艾半斤慢火炒令熱布裏坐之冷再炒坐

濡寫

論曰內經曰濕勝則濡寫甲乙經曰寒客下焦傳為濡

寫夫脾為五藏之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客於脾則不能埤助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡寫
治腸胃受濕濡寫不止肉豆蔻散方

肉豆蔻炮去殼

黃連去須炒

訶梨勒炮去核各參分

甘草炙

白朮

乾薑炮

赤茯苓

去黑皮各半兩厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

右八味搗羅為散每服二錢匕空心食前米飲調下

日三

治脾胃傷濕濡寫不止豆蔻散方

肉豆蔻去殼炮伍枚 甘草炙剉壹兩 厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩半
右三味搗羅為散每服二錢匕米飲或湯調下食前
溫服

治腸胃寒濕濡寫腹內疔刺疼痛當歸散方

當歸焙切

木香

乾薑炮

肉豆蔻

去殼炮各半兩訶梨勒炮去核

黃連去須炒各參分

右六味搗羅為散先用水四盞入甘草生薑各一分黑豆一合並半生半炒同煎至二盞去滓分作二服每服用調散三錢匕空心日午服

治濡寫水痢久不止桂附丸方

桂皮去麤 附子炮裂去 乾薑炮

赤石脂各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸

空心食前米飲下日三

治腸胃寒濕濡寫無度嗜臥不食豬苓丸方

豬苓去黑皮 肉豆蔻去殼炮 黃蘗去麤皮

右三味搗羅為末米飲和丸如菉豆大每服十九食

前熟水下

治寒濕傷脾濡寫訶梨勒散方

訶梨勒炮去核 吳茱萸湯浸焙炒 木香

蕪荑炒各半兩 黃連去須炒壹兩

右五味搗羅為細散每服二錢匕空腹陳米飲調服

日再

治腸胃受濕濡寫無度腹痛飲食不化白豆蔻湯方

白豆蔻皮去 訶梨勒炮去核 陳橘皮湯浸去白焙炒

乾薑炮各半兩 厚朴去麤皮生薑汁炙參分

右五味麤搗篩每服五錢匕切薤白三寸水一盞半

煎至七分去滓空心溫服日再

治濡寫暴下不止枳殼湯方

枳殼去瓢麤炒參分 黃連去須炒 厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

甘草炙 阿膠炙燥各半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕米一盞半煎至一盞去滓空心溫服日再

治腸胃寒濕濡寫不止及冷痢色白食不消化附子湯方

附子炮裂去皮臍 甘草炙 阿膠炙燥各半兩

黃連去須炒

右四味剉如麻豆每服五錢匕米一盞半煎至一盞去滓空心溫服日再

治脾胃受濕濡寫不止建脾白朮丸方

白朮 乾薑炮各參分 厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

人參參

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下日再

治寒濕濡寫久不差附子丸方

附子炮裂去皮臍壹兩 甘草炙兩

右二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空心生薑湯下日再

治傷濕濡寫不定厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩半 黃連去須炒壹兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半大棗二枚擘
破煎至一盞去滓空心溫服日再如腹痛加當歸三
分

治濡瀉不止或冷痢無度附子丸方

附子炮裂去皮 高良薑各壹兩 甘草炙剉壹分

右三味搗羅為末陳米煮糊丸如梧桐子大每服二
十九米飲下不拘時服

治濡瀉裏急後重數走圍樗根散方

樗根皮剉壹兩 枳殼去瓢麩炒半兩 甘草炙剉壹分

右三味搗羅為散每服二錢匕粥飲調下食前一服

止

治胃虛泄瀉老人冷瀉建脾湯方

烏頭炮裂去皮臍參分 厚朴去麩生薑汁炙

批甘草炙壹分 乾薑炮壹分

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑二片煎

至七分去滓熱服併二服止

治久患脾泄瀉薑連散方

生薑肆兩 黃連去須壹兩

右二味咬咀如麻豆一處慢火炒令薑赤色去薑取
黃連為細散每服二錢匕空腹臘茶清調下不過二

服差

瀉泄

論曰內經曰清氣在下則生瀉泄又曰久風為瀉泄夫脾胃土也其氣沖和以化為事今清濁交錯風邪之氣得以干胃故沖氣不能化而食物完出夕食謂之瀉以食之難化者尤在於夕故食不化而泄出則謂之瀉泄此俗所謂水穀痢也

治風冷入中瀉泄不止脉虛而細日夜數行口乾腹痛

白朮湯方

白朮

厚朴

去麤皮生薑汁炙

當歸

切焙

龍骨

各壹兩

熟艾

炒半兩

右五味麤搗篩每服四錢匕水一盞入生薑兩片同

煎至七分去滓空心日晚溫服

治腸胃受風瀉泄無度或下黃水腹脇痛悶地榆湯方

地榆

厚朴

去麤皮生薑汁炙

當歸

切焙各

艾葉

炒

吳茱萸

湯浸焙乾炒

高良薑

各半兩

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心日午溫服

治腸胃風冷瀉泄注下腹痛不止乾薑丸方

乾薑

炮

厚朴

去麤皮生薑汁炙

當歸

切焙各

阿膠炙

龍骨各壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九空心棗湯下日午再服

治殮泄米穀完出茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

厚朴去麤皮生薑汁炙

黃連去須炒

乾薑炮半兩

右四味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半煎至八分去滓空心日午溫服

治殮泄水穀不化及諸色痢茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙乾炒

黃連去須炒

右二味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半煎至八分

去滓空心溫服未止再服

治殮泄色白食不消化乾薑丸方

乾薑炮

黃連去須炒

右二味搗羅為末先以酒一升微火煎候可丸即丸如梧桐子大空心米飲下三十九日午再服

治殮泄氣痢腹脹滿不下食華撥散方

華撥半兩

肉豆蔻去殼半生半煨壹兩

乾薑炮半兩

訶梨勒半生半炮去核壹兩

白朮參分

甘草半生半炙半兩

木香半生半壹兩

右七味搗羅為散每服二錢匕空心米飲調下日晚再服

治脾胃氣虛殮泄不止飲食不消雷鳴腹內疔痛桂心

丸方

桂皮去麤

赤茯苓去黑皮

赤石脂各參分

黃連去須炒

麥蘖炒

陳麴炒

石斛去根

乾薑炮

當歸切

人參

附子炮裂去皮臍

蜀椒去目并閉口炒出汗

龍骨各半兩

右二十三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三

十九空心煖酒下日午再服米飲亦得

治泄痢無問老少地榆湯方

地榆剉

甘草炙

酸石榴皮各參分

阿膠半兩

厚朴去麤皮生薑汁炙參分

白石脂研半兩

赤芍藥參分

龍骨兩半

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓空心日午溫服

治腸胃受風久為殮泄下痢嘔逆腹內疔痛高良薑湯

方

高良薑

木香

赤茯苓去黑皮

檳榔

人參

肉豆蔻

吳茱萸

陳橘皮

縮沙蜜

乾薑

白炒

去皮各

右一十味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分

去滓不拘時日三服

治飧泄水穀不分溫脾止腹痛進食豆蔻散方

草豆蔻

乾薑

甘草

高良薑

陳橘皮

湯白

右五味等分剉碎都作一處用胡餅劑裹煨灰內炮

令黃熟取出藥去麩煨羅為散每服二錢匕陳米飲

治赤痢及赤白等痢茯苓丸方

赤茯苓

去麩

當歸

黃蘗

去麩皮

各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

空心米飲下赤白痢加阿膠末一兩

治熱痢香連丸方

木香

黃連

甘草

肉豆蔻

去殼

各壹兩

右四味等分搗羅為末沙糖和丸如梧桐子大每服

十五丸空心米飲下更以意加減

治諸痢久不差黃連丸方

黃連壹兩 去須炒 烏梅肉兩半 炒乾 亂髮灰汁洗淨 燒灰參兩

右三味搗羅為末用蜜二兩半鍊熟入蠟一兩醋二

合羊脂一兩煎令蠟化入前藥末於銅器中重湯熬

令可丸即丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下

日再

治一切痢一黃丸方

黃蘗壹兩 去麤皮 黃連壹兩半 去須炒 羚羊角錢

赤茯苓各半兩 去黑皮

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

空心米飲下日再薑湯亦得

治赤痢兼大腸下血黃連散方

黃連去須炒 黃蘗去麤皮 蜜炙 厚朴去麤皮生薑汁炙

八木香各壹兩

右四味搗羅為散每服三錢匕空心粥飲調下日午

再服

治一切痢疾地榆湯方

地榆 樗皮去麤皮炙 黃連去須炒 各壹兩

當歸切炒 陳橘皮湯浸去白炒 枳殼去瓢炒

桂皮去麤皮 桔梗炒各參分 大腹皮壹兩

甘草炙剉半兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑五片煎至一盞去滓空心溫服

治赤痢不止枳殼散方

枳殼

胡桃各半枚

皂莢不艸者壹挺

右三味就新瓦上以草火燒令烟盡取研極細分為八服每臨卧及二更五更時各一服荆芥茶調下

治赤痢腹痛紫參散方

紫參參

肉豆蔻去殼壹兩

烏賊魚骨去甲貳兩

右三味為細散每服一錢匕食前溫米飲調下

治因冷飲食變成赤痢黃連湯方

黃連去須壹兩

桂去麤皮壹兩

白芷壹兩

赤石脂壹兩

肉豆蔻壹枚煨去殼

地榆壹兩

訶梨勒皮煨壹兩半

黃芩去黑心半兩

附子炮裂去皮臍壹兩半

當歸焙壹兩

黃耆壹兩

吳茱萸洗炒壹兩

右一十二味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至一盞去滓空腹溫服日三

治赤痢腹痛或下純血六神湯方

黃連去須壹兩

車前子各貳兩

地榆

山梔子人

甘草炙剉各半兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

右六味麻黃散每服五錢匕以漿水一盞半煎至八分去滓空心服

諸虛麻痺無不除血氣不和

每服五錢煎至一盞去滓空心服日三

本一十二和使麻黃散煎至一盞去滓入生

黃連散煎至一盞去滓入生

黃連散煎至一盞去滓入生

黃連散煎至一盞去滓入生

黃連散煎至一盞去滓入生

大德重校聖濟總錄卷第七十五

