


幼科準繩卷之八中



疳二

疳腫脹
疳疔
疳癆
疳鼻

虛羸

眼疳
疳渴

疳濕
疳嗽


疳積
疳通

疳熱
疳瀉

漢書門			
一	二	三	四
五	六	七	八
九	十	十一	十二
冊	架	函	號

內閣文庫			
一	二	三	四
五	六	七	八
九	十	十一	十二
架	冊	函	號

內閣文庫	
番號	漢 12549
冊數	78 (63)
函號	301 62



綴じ部(喉部分)の文字等が開きが不鮮明な場所あり

茅先生十黃膏 治小兒疳熱及諸熱鎮心解毒

川鬱金 半兩用皂角參寸巴豆米粒水一椀銚內煮乾不用皂角巴豆

馬牙硝 炙各半兩

寒水石 各壹分 龍腦

麝香 二味隨意入

右件為末鍊蜜為膏次實大每服一丸麥門冬熟

水化下

天竺黃散 治小兒諸熱

天竺黃 川鬱金 用皂角水煎乾 茯苓 去皮

麥門冬 各半兩 蟬蛻 去足 全蠍 去土拾

行走馬脂 八

白僵蠶

各拾肆筒

甘草

壹兩

朱砂

壹分

龍腦

麝香

隨意所入

右件各淨洗研羅爲末每服半錢一錢用蜜熟水

調下

三解牛黃散 治小兒潮熱實熱

白僵蠶

全蠍

去土

防風

白附子

川黃芩

桔梗

川大黃

甘草

白茯苓

人參

川鬱金

用皂角水煎乾

右前件各等分爲末各淨洗細研每服半錢一錢

用薄荷蜜熟水調下

惠眼地黃膏

天竺黃散

一名金兼飲子

二方並見初生門重舌條

形證論檳榔散

檳榔

大黃

蒸

青皮

各貳錢伍分

黑牽牛

壹錢

木香

少許

爲細末薄荷蜜水調下一錢

當歸散

漸熱

三稜散

宿食

蘆薈丸

木門通治條

玉露飲

積熱

聖惠云其候唇口癢痛牙齒峭黑舌上生瘡

腦中乾熱斷肉赤爛頰腫齒疼熱毒熏蒸口多臭氣
○按此即走馬疳之輕而慢者聖惠形容似太過治
法宜清胃散甘露飲內服外用五倍子炒綠礬燒紅
中白等分入米片少許搯牙或加檳榔末殺蟲亦得
譚氏殊聖治小兒大人牙疳諸惡瘡方

黃丹

飛過

乳香

白礬

飛

坯子

各膏

輕粉

麝香

少許

右件為細末看瘡大小臨時用藥先用藥水洗瘡
淨上藥乾摻

聚寶方黃礬散

治大人小兒齒斷宣露骨槽風小

兒急疳斷肉爛惡腫痛

黃礬

壹兩研入甘
鍋燒通赤

生乾地黃

梧桐律

川升麻

各半

乾蝦蟆頭貳枚
炙焦

右五味為末每用半錢乾貼良久吐津甘草水漱

口一兩服立效。一方用熟乾地黃及蟾頭燒灰

劉氏家傳方治小兒口中疳瘡皆下部有蟲燒大麻

子煙熏之

莊氏家傳治小兒牙疳壞爛方

百藥煎

坯子

右各等分為細末羅過貼患處

吳氏家傳青霞散 治小兒口齒疳

蝦蟆壹箇燒灰

甘草炙

青黛各壹分

右研為細末更入真麝少許或兒滿口有瘡臭爛落下牙齒者以雞翎掃上立効凡用先以鹽湯漱口了乾拭用

安師傳治小兒口齒并喉嚨疳瘡如白膜者

用輕粉黃丹等分乳汁和塗瘡上即時如殼退下

治小兒疳蝕動唇齒及瘡生方

蟾頭壹箇大者燒灰麝香半錢

右研勻如粉摻於瘡上立効

治小兒唇口及齒根宣露牙齦生瘡臭爛方

葶藶炒

胡黃連各壹錢

黃丹半兩

右為末每半錢於牙齦上貼之不得嚥津此用

科給員手

秘方治牙疳腐爛及下疳瘡

海巴白者壹箇赤者壹箇銀硃

輕粉各伍分

海螵蛸壹分

真珠貳分

龍骨貳分

共為細末用冷茶漱淨將藥敷上

鼻疳聖惠夫肺氣通於鼻鼻者肺之候若小兒乳食

不調上焦壅滯令疳蟲上蝕於鼻也其候鼻中赤瘻

注

刀

八

非熱多啼皮毛乾焦肌膚消瘦咳嗽上氣下痢無常
鼻平連唇生瘡赤爛故曰鼻疳也

治小兒鼻下赤爛心煩躁鼻中生瘡漸漸轉多及身
上焦躁日夜疼痛急治之方

訶子 貳箇 豆蔻 叁箇 黃連 陸分

防風 半兩 朱砂 壹分

右為末飯丸麻子大每服荆芥湯下三丸

湯氏五福化毒丹 治鼻清膈涼血

玄參 桔梗 去蘆各壹兩 赤茯苓

人參 馬牙硝 青黛

甘草 各壹分 麝香 伍分 一方有龍腦 伍分

右除麝香牙硝另研一處為末次和青黛等煉蜜
丸如芡實大金銀箔為衣薄荷湯化下瘡疹餘毒

磨生犀角水下上焦熱壅口齒鮮血宜露臭氣用
生地黄汁化下食後

澤瀉散 治小兒肺積鼻内生瘡及鼻下赤爛

川澤瀉 川鬱金 生 甘草 炙

山梔子仁 炒各壹分

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢五七歲一錢

黃草湯調下一日二服宜再用青金散傅之

白製枇杷葉散 治鼻疳赤爛

枇杷葉 去毛陰乾壹兩 山梔子 半兩

百部

檳榔 各貳錢半

右為細末每服三錢兒小者二錢更小一錢白湯

調下

田氏治法先用甘草白礬湯洗淨後摻蘆薈黃連黃

檉末日三傳一方用米泔洗黃連末傳日三四

次亦佳

青金散

銅青

白礬 生各壹錢

右為末每用少許傳鼻下

錢乙蘭香散

蘭香葉 菜名燒灰貳錢 銅青 半錢

輕粉 貳字

右為細末令紙着瘡大小乾貼之

張渙石膽散 治鼻疳病疳蟲上蝕於鼻赤癢及連

唇生瘡赤爛

石膽 壹兩

地龍 壹分洗淨

頭髮 燒灰

葇荑子 生用各半兩

右件搗羅為細末入麝香壹錢同研勻每服一字

貼於瘡上

市氏家傳治鼻下赤爛疔方

青黛 壹錢

麝香 少許

熊膽 末半錢

右末睡時貼少許在鼻下

朱氏家傳治小兒鼻下濕癢疔瘡方

右用大棗壹枚去核以白礬壹塊內棗中文武火

煨存性細研塗瘡如瘡乾以麻油調塗

聖惠治小兒鼻疔癢吹鼻蟬殼散

蟬殼 微炒

青黛 細研

蛇蛻皮 灰

滑石

麝香 細研各等分

右件藥搗細羅為散都研令勻每用菉豆大吹入

鼻中日三用之疔蟲盡出

錢氏白粉散 治諸瘡

烏賊魚骨末 叁七

白芨末 貳七

輕粉 壹七

右末先用清漿水洗拭過貼之

龍木論治小兒疔眼外障此眼初患時皆因腦

頭上有瘡或因經日多時瀉痢潛衝疼痛淚出難開

膈間伏熱氣肝風入眼初患此疔時癢澀揉眉咬甲

致令翳生赤腫疼痛淚出難開臉硬白睛遮瞞怕日

合面卧不喜擡頭此疾不宜燒灸頭面恐損眼也切

忌點藥宜服殺疳散退翳丸。聖惠論夫肝開竅於目目者肝之候若小兒內有疳氣肌體瘦羸而藏府挾於風熱壅滯不得宣通因其乳食過多胸膈痰結邪熱之氣上攻於目則令腦熱目癢或赤爛生瘡或生障翳漸漸遮睛久而不差損於眼目故號眼疳也。玉訣云此患先與涼膈後瀉肝次淋洗之即無悞也又云此患小兒肝熱宜瀉肝散蕤仁膏涼膈退熱又云小兒疳眼雀目斑痧入眼者先與利膈退熱凉心經後與疳藥也。龍木論殺疳散

防風

龍腦

牡蠣

白芷

細辛

五味子

各壹兩

右為末每服一錢食後粥飲調下

退翳丸

黑參

防風

細辛

石決明

車前子

桔梗

黃芩

各壹兩半

右為末鍊蜜為丸梧桐子大空心茶下十丸

玉訣瀉肝散

木賊

威靈仙

紫參

家菊花

羌活

蟬蛻去足

大黃生

甘草炙

石決明各等分

腦子少許

右為末每用藥二錢獾豬肝一兩批開去膜摻藥
在內線纏米泔煮熟嚼下

蕤仁膏

蕤仁肆拾玖粒
去皮出油腦子少許

右研成膏用燈心點少許

靈苑糯羊角丸治肝肺壅熱眼生弩肉赤脉澀痛

及赤眼障翳睛疼癢痛羞明及小兒風疳爛陽眼

神妙

糯羊角屑曬乾
脆為末甘草生白何首烏

瓦松以紗綸內洗
去土各壹兩生乾地黃洗

鬱金炮過用地上去
火氣各貳兩

右件六味並細剉曝乾搗羅為細末鍊蜜為丸如

梧桐大每服十五丸用濃煎淡竹葉黑豆湯冷下

食後臨卧服小兒丸如菉豆大每服七丸至十丸

譚氏殊聖退雲散 治小兒疳眼啞喑饒啼不住

草決明 土瓜根 大黃炮

玄參各半甘草炙宣連

砭砭石

井泉石是研各壹分

右細為散每服一錢水一盞同煎至七分五度與

張煥井泉石散治眼疳邪熱攻於眼目漸生翳障

致損睛瞳

井泉石

壹兩

晚蠶沙

夜明砂

各微炒

石決明

各壹分

甘菊花

黃連

去鬚各半兩

右件搗羅為細末每服一錢用米泔一盞入生豬

肝少許煎五分肝爛為度放溫時時服乳食後

胡氏家傳緒膽黃連丸治小兒疳瘦大治肝疳作

眼疾白膜遮睛諸藥不痊者

胡黃連

壹兩

雄黃

細研

夜明砂

細研各等分

豬膽

數箇

麝香

少許不入膽煮

右為末以豬膽汁調藥稀稠得所却入元膽皮內

以線緊緊繫口米泔水煮五七沸取出放冷先以麝

香於乳鉢內研細却入藥一處同研

不用膽皮候只取出藥

細用軟飯為丸如大麻子大每服十九丸者加至

十五丸米飲吞下如疳氣盛須用陳米飲下

治小兒肝藏風熱眼中不見物及有汗方

石決明

各壹分

乳香

各壹分

龍膽

貳分

大黃半兩

右為末每服兩錢用薄荷溫水調下莊氏第十六候用此方

○**疳濕**巢氏云疳濕之病多因久利脾胃虛弱腸胃之間蟲動侵蝕五藏使人心煩懊悶其上蝕者則口鼻齒斷生瘡其下蝕者則肛門傷爛皆難治或因久利或因藏熱嗜眠或好食甘美之食並令蟲動致生此病也。○**聖惠**夫小兒嗜食甘味多而動腸胃間諸蟲致令侵蝕藏府此猶是蠱也凡食五味之物皆入於胃其氣隨其府藏之味而歸之脾與胃為表裏俱象上其味甘而甘味柔潤於脾胃脾胃潤則蟲動蟲動則侵蝕成疳也但蟲因甘而動故名之為疳也若蠱蝕下部則肛門生瘡爛開急者數日便死宜速療之。○夫小兒乳食不節冷熱相垂傷於藏府致疳氣也若脾胃虛弱則哺乳不消大腸虛寒遂變泄痢因其久痢不止腸胃俱虛為水濕所乘腹內蟲動侵蝕下部故名疳痢濕蠱也

千金除熱結腸丸 斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦

雜血肛中瘡爛坐蠱生蟲

黃連

檗皮

苦參

鬼臼

獨活

橘皮

考藥

阿膠各半兩

右八味末之以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸至十丸冬無藍汁可用藍子壹合春蜜和丸

薑蜜湯針治濕蠱

生薑汁伍拾

白蜜叁合

黃連叁兩

右三味以水二升別煮黃連取一升去滓內薑蜜更煎取一升二合五歲兒平旦空腹服四合日三

杏仁湯針治蠱

杏仁伍拾枚

苦酒貳升

鹽壹合

右三味和煮取五合頓服之小兒以意量服

治蟲蝕下部方

胡粉

雄黃

右二味各等分末着穀道中亦治小兒

張漢桃白散 治腸胃俱虛腹內蟲動侵蝕下部疳

痢濕蠱

桃木白皮

黃檗密炙

黃連去鬚炒各壹兩

蛇蛻皮半兩燒灰

乾蝸牛壹分燒灰

青州棗伍拾枚去核燒灰

右件同搗羅為細末入定粉麝香各壹分同研勻每服一字粥飲調下乳食前

如聖丹

神效

刀科八

九

乾蟾

朱枚燒灰

蟬殼 半兩

蚬蛇膽

大棗

去核燒灰各壹分已上搗羅為細末次用

黃丹

定粉

麝香 並細研各壹分

右件同拌勻用好醋一大盞都搗一二百下成膏如黍米大每服五粒至七粒米飲下量兒大小加減或化三兩粒塗患處若蟲出乃愈

錢乙金華散

治小兒一切濕瘡癬疔

黃礬

黃連

各半兩並為細末

黃丹

壹兩火飛

輕粉

壹錢

麝香

壹字別研

左右同研勻先以溫水洗後貼之

化蠱丸

治諸疳生蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹

痛唇口紫黑腸頭濕蠱

燕荑

蘆薈

青黛

川芎

白芷梢

胡黃連

川黃連

蝦蟇灰

各等分

右為末豬膽汁浸糕糊丸麻子大每服一二十九食後臨卧杏仁煎湯下其鼻常用熊膽煎湯筆蘸洗俟前藥各進數服却用青黛當歸赤小豆瓜蒂地榆黃連蘆薈雄黃為末入鼻瘡斂

疳瘡

聖惠夫小兒疳瘡生於面鼻上不癢不痛常有

汗出汁所流處隨即成瘡亦生身上小兒多患之亦是風濕搏於血氣所以不癢不痛故名疔瘡也。錢乙論疔在外鼻下赤爛自擦鼻頭上有瘡不着痂漸透耳生瘡治鼻瘡爛蘭香散諸瘡白粉散二方並見鼻瘡條主之

張漢四珍丹 治諸疔羸瘦毛髮焦黃口鼻生瘡

乾大蟾壹枚去四足 蟾腹內以線縫合用濕紙三兩重裹以泥四面固濟用木炭火燒令干赤為度 放冷去泥搗為細末 麝香壹分 蘆薈半兩

右件都拌勻再研令細以白麩糊和如黍米大每服五粒至七粒粥飲下量兒大小加減

熊膽膏 治疔瘡不差

熊膽 蚺蛇膽 蘆薈各十兩

黃礬壹分瓜州者良已上 麝香

牛黃各壹分 龍腦壹錢並

右件細研勻以井華水三合攪勻盛銀器中重湯煮成膏每用少許塗患處

治小兒一切疔毒有瘡方

苦棟皮伍斤 七姑葉半兩一 甘草
白礬各貳兩 葱白拾莖

右麤搗令勻。用水五斗。煮五七沸。旋旋添洗瘡處。如久患。只兩服立効。
譚氏殊聖。治小兒疳肥瘡。多生頭上。浸淫久不差。及耳瘡等。悉皆治之。

石綠

白芷

各等分

右以生甘草水洗瘡。傅藥自愈。

通治一切疳方 銅壁山人曰。凡治疳。不必細分五疳。但虛則補之。熱則清之。冷則溫之。吐則治吐。利則治利。積則治積。蟲則治蟲。不出集聖丸一方。加減用之。屢試屢驗。

集聖丸

蘆薈

五靈脂

夜明沙

炒

砂仁

橘紅

木香

莪朮

煨

史君子肉

各貳錢

川連

川芎

乾蟾

炙各參錢

當歸

青皮

各壹錢半

因於虛者。加人參貳錢。白朮參錢。去莪朮。青皮。因於熱者。加龍膽草參錢。去砂仁。莪朮。因於吐瀉。下痢者。加白朮貳錢。肉果煨。訶肉各壹錢。伍分。去青皮。莪朮。因於積痛者。加煨三稜。川棟子。肉。

小懷香各貳錢去當歸川芎因於瘡者加鼈甲醋炙叁錢因於蟲者加白蕪荑壹錢伍分川棟子肉貳錢去當歸川芎因於渴者加人參白朮各貳錢去莪朮砂仁

右為細末用雄豬膽汁貳箇和麩糊為丸看大小服米飲送下此方乃十全丹去檳榔白豆仁加黃連夜明砂砂仁不熱不寒補不致滯消不致耗至穩至妥

疳積散 治魁乳病乳夾食大病之後飲食失調平居飲食過飽傷脾致成疳積面黃腹大小便

色如米泔大便瀉黃酸臭頭皮乾枯毛髮無光至目澁羞明睛生雲翳形體骨立夜熱晝涼可矣

哺露等證並用主之

厚朴

厚而紫色有油者佳去籠皮切片生薑自然汁炒熟為末淨壹兩

廣陳皮

去白為末捌錢

粉甘草

去皮淨為末

真蘆薈

淨末各柒錢

蕪荑

真孔林大而多白衣者佳去白衣殼淨末伍錢

青黛

取顏料鋪中淨碎如

佛頭

青色者研淨末叁錢

百草霜

乃山莊人家鍋底研淨末貳錢

旋復花

淨末壹錢半

右件勻和成劑用

每壹歲用藥壹分用燈心湯

早上空腹時調服

服後病即愈當再用肥兒丸

調理如脾氣未實用啓脾丸或大健脾丸如瘡
氣未盡用陳皮壹兩白木香叁錢白茯苓伍錢加
好平胃散叁錢陳米粥湯調服

○瘡眼方 用生雞肝壹具不拘大小雄雌二三歲者只用

半具外去衣內去筋膜研細如麵入瘡積散若干

調極勻加好熟白酒厚薄相和隔湯頓溫熱空心

通口服用甜麴酒少加熟白酒亦佳服至眼開

翳散方止

○瘡瀉痢紅白積滯用散子加黃連薑汁土炒肉果用濃

澄心湯稍加熟蜜少許調服食積成瘡砂仁湯

調服

集驗方治小兒瘡氣不可瘡神効丹

綠礬用火煨通赤取出用礬醋淬過復煨如此叁次

右細研用棗肉和丸如菉豆大溫水下日進二三

服

元和紀用經麝香丸 主小兒瘡瘦面黃髮穗骨立

減食肌熱驚癇疳蟲

麝香研 蘆薈研 胡黃連末

右等分研勻滴水丸黃米大一歲三丸三歲五丸

至七丸人參湯下日三服無比奇効一方胡黃連

肆分餘二物各貳分療疳痢温瘧無比尤驗一名
聖凡疳藥百數無如此者小兒癩癩驚風五疳三
蟲服之立見功效蛇蟲作疾枯瘁久痢不住熱藥
調護最難得法唯此若神經以四味飲黑散紫圓
至聖散五加皮治不能行蜀脂飲并此麝香圓七
方謂之育嬰七寶紫陽道士亦名保子七聖至寶
方專為一書者此是也

靈苑千金丸 治小兒一切疳久服令兒肥狀無疾

川棟子肉

川芎各等分

右同為末豬膽汁和杵為丸如麻子大量兒大小

加減丸數每以飯飲吞下日二服常服三九至二

九張氏家傳丸如菜豆大分五分用朱砂青黛白

定粉光墨蜜陀僧名為五色丸非時進米飲下丸

氏家傳治疳熱下蟲方同用臘月乾豬膽膏為丸

如乾湯化動丸菜豆大十九十五丸肉湯下疳蟲

如髮便看即見稍遲即化

太醫局蘆薈丸 治疳氣羸瘦面色痿黃腹脇脹滿

頭髮作穗採鼻咬甲好喫泥土痢色無定寒熱往

來自瀝口臭齒齲爛黑常服長肌退黃殺疳蟲進

乳食

乾蝦磨 大皂角 以上貳味等分同燒存性為末每末壹兩入後藥

青黛 貳錢半研 蘆薈 研 麝香 研

朱砂 飛研各壹錢

右合研勻湯浸蒸餅為丸如麻子大三歲兒服二十丸不計時候溫米飲下量兒大小加減

錢氏膽礬丸 治疳消癖進食止瀉和胃遣蟲

膽礬 真者壹錢為麤末 綠礬 真者貳兩 大棗 拾肆個去核

好醋壹升 已上四物同熬冷棗爛和後藥

史君子 貳兩去殼 枳實 去穰炒參兩 黃連

河梨勒 去核各壹兩 巴豆 貳柒枚去皮破之

已上五物同炒令黑約三分乾入後藥

夜明砂 壹兩 蝦蟇灰 存五分性壹兩 苦楝根皮 末半兩

已上三物再同炒候乾同前四物杵羅為末却同

前膏和入臼中杵千下如未成更旋入熟棗肉亦

不可多恐服之難化太稠即入溫水可圓即圓如

菘豆大每服二三十丸米飲溫水下不拘時

西京丁左藏蝦蟇丸 肥孩兒常服得效

乾蝦蟇 大者壹枚肚頭爪淨洗酥炙令黃香 陳皮 去白貳錢半

胡黃連 壹兩 鬱金 蕪荑仁 各半兩

右為末於陶器內用豬膽汁和令稀稠得作於

飯上蒸熟為度取出半日丸如菉豆大常服五七

丸陳米飲下

張氏神麩散 治小兒諸般疳

陳橘皮不去白 大黃紙裹炮熟

神麩 各壹錢 桔梗 木川芎

芍藥各壹錢 貳分半 厚朴薑汁製 枳殼去穰 麸炒 白茯苓各貳錢半

人參壹錢半 甘草伍錢

右為細末每服壹錢入薑壹片如茶法煎服無時

治小兒一切疳肌膚消瘦瀉痢不止口鼻生瘡水瀉

不化方

蝦蟆灰存性 白礬 烏鱉魚骨炙

蜜陀僧各貳錢半 麝香壹錢貳分半

右為末煉蜜丸如菉豆大溫水下三丸聖惠方同

但麝香用半兩莊氏第五 候用此方

治小兒一切疳方莊氏第十四 候用此方

蟾頭壹箇 炙 膩粉 豆豉

蕪荑 黃連各貳錢半

右為末軟粟米飯為丸麻子大早晚米飲下三丸

又方莊氏第十七 候用此方及香連丸

蘆薈 胡黃連 朱砂

通治一切疳 力斗八

青黛

麝香各貳錢半

蟾酥少許

右為末飯為丸如芥子大每服空心臨卧温熟水下五七丸

洪州張道人傳治小兒一十二種疳肝疳急疳風疳肉疳脊疳口疳腦疳食疳蛔疳脾疳腎疳心疳定生死有此候者取得蟲青者死黃者可治須服定命丹

木香

夜明沙

麝香各壹分

蟬蛻叁分

胡黃連貳錢

金箔

銀箔各伍分

右件為末米飯丸如麻子大空心米飲下三九日三服忌鹹酸油膩

第一肝疳小兒雖飲乳漸喜食肉尤愛酸醎只服定命丹次服此藥

肉豆蔻叁個

枳殼炒柒錢半

茯苓

胡黃連各半兩

大黃

甘草

丁香

麝香各貳錢

右為末每服壹字米飲下日兩服久者五服効
濱山史君檳榔丸 治小兒食肉太早傷及脾胃水穀不分積滯不化疾作疳痢等候並宜服之

肉苳蔻 壹箇

生檳榔 壹箇

宣連

胡黃連

陳皮

青皮

川棟肉 炒

蕪荑 炒去皮

神麩

麥蘖 並炒

木香

夜明沙 淘淨炒

蘆薈

川芎 各壹錢

麝 壹字

右件為末，續豬膽汁，薄荷為丸。如麻子大，每服三五十丸，溫飯飲下。

議曰：積是疳之母，所以有積不治乃成疳候。又有治積不下，其積存而臟虛成疳，尤重大抵小兒所患疳證，泄瀉無時，不作風候者，何惟疳瀉名熱瀉。其臟腑轉動有限，所以不成風候。雖瀉不風，亦博。它證作渴，虛熱煩躁，下痢腫滿，喘急，皆疳候虛證。古云：疳虛用補虛，是知疳之為疾，不可更利動臟腑。發作之初，名曰疳氣，腹大脹急，名曰疳虛，瀉痢頻併，名曰疳積。五心虛煩，名曰疳熱，毛焦髮穗，肚大青筋，好喫異物，名曰疳極。受病傳臟已極熱發往來，形體枯槁，面無神采，無血色，名曰疳勞，手足細小，項長骨露，尻髻無肉，肚脹臍突，名曰疳食，加嘔噦，頭骨分開，作渴引飲，蟲從口出，名曰疳露，此皆疳候。又因多食生冷甘肥粘膩，積滯中脘，不化，又亦

成疳治疳之法量候輕重理其臟腑和其中脘順其三焦使胃氣溫而納食益脾元壯以消化則臟腑自然調貼令氣脉與血脉相參則筋力與骨力俱健神清氣爽疳消蟲化漸次安愈若以藥攻之五臟踈却腸胃下去積毒取出蟲子雖曰醫瘵卽非治法蓋小兒臟腑虛則生蟲虛則積滯虛則疳羸虛則脹滿何可利下若更轉動腸胃致虛由虛成疳疳虛證候乃作無辜無辜之孩難救矣

胡黃連丸 治嬰兒一切疳候及一切虛痢他藥無功此藥極効

胡黃連

蘆薈

草黃連

肉豆蔻 炮

桂心

人參

朱砂

史君子 去殼

木香

鈞藤

龍齒

白茯苓 以上各壹錢

麝香 壹字 研

右件各生用為細末取獾猪膽貳枚裂汁和末令勻却入袋內盛之用線紮定湯煮半日取出切破袋子加菘苳子錢貳黃丹錢壹二味另研如粉入前藥和勻搗五百杵丸如菘豆大但是疳與痢用粥飲下五七丸子幼者三丸不吃粥飲乳頭令吮能治

新通治一切疳

力斗

百六

一十二種痢及無辜者功效非常

○議曰疳之疾危發由於漸痢之後逆傳自於延久

為初見其輕言之曰常後知其重告之無門是以

痢疳皆由積毒嬌恣口腹因虛以致虛因害而傷

害醫工見有此等自是憂疑病家欲得便甦豈無

性急更遷取活展轉逾深或疳極而腹下痢或熱

盛而加作渴或煩躁四體虛浮或飲食一時嘔吐

常方不能安愈快劑恐越傷和並宜服此

肥肌丸豆治小兒一切疳氣肌瘦體弱神困力乏常服殺蟲消疳開胃進食

黃連去鬚

川椒肉炒

川芎各半

陳皮

香附子

各貳錢半

木香貳錢

右件為末水煮細麵糊為丸如麻子大每服三五

十丸溫飯飲下

○議曰驚疳積痢各分證候用藥今有小兒患疳虛

困又作痢疾二候相加最為惡重疳痢併行臟腑

虛乏之極熱毒差重皆係積之久滯雖曰係積無

積可療乃虛受之然謂其虛補之不及所見其證

不得良方以何對治雖獲其方不審其候亦難療

也良由脉與病同藥與證對醫工運巧扶而起之

必得安樂胡黃連丸無以加矣肥肌良方亦佐勝焉

疳積 漢東王先生論小兒發熱形瘦多渴喫食不長肌肉者謂之疳熱。湯氏云疳熱當服進食丸。方見磨積仍間服化蟲丸後服鼈甲散退熱次服肥兒丸。瘠疳

湯氏鼈甲散 治疳勞骨熱

鼈甲 致肋者湯浸用童便塗炙

黃芪 蜜炙

白芍藥 各壹兩

生熟地黃

地骨皮

當歸

人參 去蘆各

右咬咀每服貳錢水半盞煎服

化蟲丸 治疳熱

白燕羹

黃連

神麩

麥芽 各炒等分

右末糊丸如黍米大空心米飲下豬膽汁尤佳

豬肚丸 治骨蒸疳勞肌體黃瘦

木香 半兩

黃連

生地黃

鼈甲 九肋者湯浸用童便塗炙

銀柴胡 去蘆

青皮 各壹兩

右為末豬肚壹枚入藥於內以線纏之於沙罐內懸胎煮熟取出細研豬肚為丸如麻子大米飲送

下量大小加減不拘時服

龍膽丸治疳病發熱

龍膽草

黃連

史君子肉

青皮各等分

右為末豬膽汁和丸如桐子大每服三十九臨卧熟水下量兒加減

世烏犀丸治小兒疳熱腹内生蟲肚大手足疲弱

丁奚疔羸此方治疳熱如神

黑牽牛貳兩

史君子肉柴錢半

青皮貳兩

雷丸貳錢半

苦楝皮一方不用楝皮用蓋蓋貳錢半

鶴虱各半兩

右同入鍋內炒焦為末麵糊丸黍米大三歲兒二十九米飲下食前

二丁丸治乳癖食癖疳熱

白丁香半兩

丁香

蜜陀僧各壹兩

韶粉壹錢

硫黃叁錢

右為細末糊丸如小豆大三歲兒十九日晡時米飲下飲乳者乳汁下次日當取下惡物熱即隨退加黃鶯屎壹錢尤妙

譚氏殊聖金瓜丸治小兒疳熱身多壯熱黃瘦久

服令肥

黃連 黃蘗 甘草微 青皮各等分

右為末入麝香少許用豬膽壹枚入藥膽內線
紫定入石器中漿水煮五七沸取出風弔一宿丸
如棗豆大每服五七丸米飲下量兒加減玉訣方
同外以朱砂為衣仍治脾疳博濟方同劉氏家傳
方亦同云或添胡黃連若早晨服史君子丸晚服
食瓜丸永無疾消食長肌肉莊氏家傳方同仍加
夜明砂一味等分趙氏方亦同名涼疳藥長沙朱
司理以為有神效

蘆薈丸 治小兒驚熱疳不思食

蘆薈 熊膽 朱砂各貳錢半

青黛朱錢半 訶梨勒煨取肉 叁錢 麝香壹錢

右為末糯米飯為丸如麻子大空心隨歲數與之
用沙糖水嚥下五七丸

茅先生柴胡散 治小兒疳熱四肢如柴不能起止

柴胡 知母 貝母去心

茯苓 茯苓 乾葛

甘草炙各等分

右為末每服用小麥一匙頭藥一匙頭水一盞同

疳積

力斗

一

煎陸分去滓服

六物黃芩湯 治少小腹大短氣熱有進退食不安
穀為之不化

黃芩

大青

甘艸炙

麥門冬 去心

石膏 碎各半兩

桂皮 參錢

右每服參錢水壹盞煎至七分去滓溫服

莊氏青黛丸 治疳熱

青黛 研壹兩

胡黃連

宣連

天竺黃 研各半兩

朱砂 水飛 貳錢半

麝香 研 壹錢

肉豆蔻 貳個

牛黃 半錢研

乾蟾 壹枚 端午日取者酒浸洗去腸肚塗酥炙黃

右件除研藥外為末再同研勻菜豆粉煮糊丸如

芥子大每服空心夜後熟水下三丸恐菜豆粉難

和圓菜豆麵作糊亦得

王氏史君子散 治疳熱

右用史君子 不以曝乾為末空心米飲下大者壹

錢小者半錢取蟲出為度

豬肚黃連丸 治疳熱流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹

或渴

用雄豬肚 淨洗壹具 宣連 淨伍兩 剉細水和潤納肚中線

百病熱

方計

百一

縫放五升粳米上蒸至爛入臼中加少蒸飯搗干

杵丸小桐子大每服二十九米飲下仍服調血清

心之劑佐之凡兒病不出於疳則出於熱熱則生痰常須識此

柴胡飲治骨蒸疳氣五心煩熱日晡轉盛口乾無

一味渴多身瘦曾滿痰緊小便黃色食減神昏

北柴胡去蘆淨洗人參去蘆當歸酒洗

黃芩生用赤芍藥甘草炙各壹兩

大黃生用桔梗去蘆判炒北五味子去

半夏湯煮透去滑各半兩服貳錢水壹盞烏梅壹亞薑貳片煎七分

無時溫服

即疳熱而骨蒸兼諸咳嗽盜汗等證是也湯氏

龍甲散豬肚丸皆對證之藥

乾地黃煎願願治小兒疳勞肺氣熱咳嗽四肢漸瘦

心脉乾

生地黄汁伍兩酥生薑汁

蜜各壹兩鹿角膠半兩

右先以地黄汁入鍋內慢火煎手不住攪約五六

沸下酥又五六沸下蜜次下膠又下薑汁慢火煎

後如稀餲即住火每食後兩度共與壹匙頭忌諸

毒物

王先生雞肉煎丸 治小兒十歲以上疳勞壯熱形

瘦

宣連

去鬚 貳兩

銀柴胡

去蘆 洗淨

秦艽

去土 淨

知母

史君子

肉

干苓

各壹兩

蕪荑

去衣

川鶴虱

各半兩

右為末以黃雌雞壹隻重壹斤許籠之專以大麻

子飼之至五日後宰去毛令淨於臀後開孔去腸

肚淨洗拭乾入前藥末於雞腹內以線縫之取小

籠先以黑豆鋪籠底厚三寸安雞在籠中四傍以

黑豆圍裹上亦以黑豆蓋之自日出蒸至晚候溫

冷取雞去腹中藥及筋骨頭翅以淨肉研勻和得

所如乾入酒麴糊為丸如大麻子及小菘豆大每

服十丸十五二十丸以意加減空心臨卧麥門冬

熟水吞下如小兒疳勞骨熱十五歲以上溫酒下

忌豬肉

張氏三和飲子 治三焦膈塞五藏澁滯氣逆痰涎

米食後惡涎太陽昏痛及治山嵐瘴氣吐逆不美

飲食面色浮黃指甲青黑小兒疳勞吐乳及大人

小兒久病乍安神氣未復寒熱往來並皆救療

紫團人參

參兩半洗到

甘草

壹兩半炙到

綿黃芪

伍兩酒浸壹宿洗淨到

右件三味同入木臼內用木杵擣為麤散每服三

大錢生薑三片水二盞棗三枚同煎八分去滓服

不拘時候

犀角散治小兒骨熱解毒

銀州柴胡

川大黃

甘草

川芎

茯苓

芍藥

麵葛

桑白皮

地骨皮

山梔子仁

黃芩

貝母

右為末每服壹大錢水壹盞入青蒿壹枝小麥拾

粒煎七分溫溫服之大段有患更入麻黃連翹二

味與前藥等分為末煎服之效莊氏第二十一候用此方

鼈血煎治疳勞

蕪荑

柴胡

川芎

各壹兩

人參

半兩

史君子

貳拾壹枚去殼

胡黃連

宣黃連

各柒錢

右用鼈血壹盞吳茱萸壹兩和二黃連淹一宿次

早炒乾去茱萸并血用二連入餘藥末粟米粉糊

丸麻子大食前熟水下

黃連丸 治疳勞

黃連 半兩淨殯 膽汁浸晒 石蓮子

瓜蒌根

杏仁 湯浸去皮焙 烏梅肉 各貳錢

右為末牛膽汁浸糕糊丸麻子大煎烏梅薑蜜湯

下

○瘡渴 聖惠天竺黃散 治小兒疳多渴體熱煩躁少

得睡卧

天竺黃 細研 黃連 去須 馬牙硝

梔子仁 葛根 剉各半兩 甘草 炙微赤剉

牛黃 細研 欬冬花 紫苑 洗去苗土

犀角 屑 土瓜想 半

右件藥搗細羅為散都研令勻不計時候以蜜水調下半錢量兒大小加減服之

治小兒疳熱煩渴不止方

乾蟾頭 貳枚塗酥炙焦黃 蝸牛殼 微炒

胡黃連 葫蘆根 各半兩

右件藥搗細羅為散每服以竹葉湯調下半錢不計時候量兒大小臨時加減服之

五膽丸 聖惠 治小兒渴疳

豬膽 狗膽 牛膽

鯽魚膽

蠟膽已上各壹枚

右件藥四膽汁並入牛膽內在竈北後懸候稍乾可丸卽丸如黍米大每服以新汲水下貳丸以飲水足為度空心午後各壹服更量兒大小加減胡黃連散 治小兒疳熱渴乾瘦

胡黃連

犀角屑各貳錢半

生地黄汁合

羊子肝

壹具研取汁麝香半錢細研

蜜半合

右件藥搗胡黃連犀角細羅為散入麝香研勻以羊肝汁地黄汁蜜等調令勻每服煎竹葉湯調下藥汁壹茶匙量兒大小加減服之

黃連丸

治小兒疳熱瀉渴

黃連

去鬚

天竺黃

半黃

各細研

甘草

炙微赤剉

梔子仁

款冬花

葛根

剉

紫苑

洗去苗

犀角

屑各貳錢半

川朴硝

半兩

竹瀝

貳合

右件藥搗羅為末先用竹瀝拌和更入熟蜜和丸如棗豆大每服以新汲水研破伍丸服之日四五服量兒大小加減

聖惠又方

右用蝸牛參伍拾枚淨盤內以物蓋令行卽有似

銀泥處以膩粉和指取便丸之如黍米大不計時
候以溫湯下貳丸

又方

杏仁

湯浸去皮尖
雙仁貳錢半

膩粉

壹錢

右件藥研杏仁如膏入膩粉相和令勻用麵糊和
丸菜豆大空心以粥飲下叁丸

錢乙龍粉丸

治疳渴

草龍膽

定粉

微炒

烏梅肉

焙秤

黃連

各貳分

右為細末煉蜜丸麻子

飲下壹貳拾丸無時

清香丸

張氏

治小兒疳渴引飲不休肌體羸劣

胡黃連

青黛

朱砂

鶴虱

各等分

右為末攪豬膽汁和丸菜豆大每服叁丸米飲下

劉氏治小兒疳渴方

豬胞

壹箇大者

甘草

壹兩寸斷劈
破入胞內

右以水壹斗煮至叁升去甘草將胞焙乾末之每
服貳錢或叁錢熟水調下大人亦可服

莊氏治小兒渴疳方

右用蛤粉取生大鮎魚壹尾以粉塗頂上刮下涎

入粉同研丸鷄頭大每服壹丸更用活小鮎魚壹尾水半盞浸涎水壹藥注子化下一丸立止便與

和氣散方見壹貳服補之

又方 治疳渴不止

井泉石又名石甘遂 太陰玄精石 馬牙硝

右各等分為末入生硫黃少許每服半錢以生米

泔水調下

吉氏家傳方 可引之直下有批注云云

乾葛 胡黃連 甘艸

黑參 麥門冬去心各等分

右件為末每服壹錢水半盞薑壹片煎服分

治小兒疳渴常服五疳不生方

乾蝦蟆貳枚長流水內刮去肚腸以法酒參升瓶內煮令爛去骨研如粉

黃連淨肆兩別為末 硃砂壹錢半 麝香壹錢研

右先將蝦蟆膏與黃連末同研後更與麝香硃砂

等研勻作丸如菉豆大每服拾丸陳米飲下如患

疳用黃蠟茶清下如難丸入些少酒麵糊不妨

治小兒一切疳熱渴方

蚘蝦蟆大者兩枚 蝸牛蟲半升用井水淘洗淨為度然後用新瓦罐子壹

具入貳物在內用鹽泥固濟了不得透風更進火燒令通赤候冷取出貳物不用罐子

疳疔 百七

大黃

黃連 各半

麝香 貳錢半

右為末，麵糊丸如芥子大，每服參九至伍九，米飲

下 莊氏第十六

治小兒疳渴方

人參

乾葛

黃芩

柴胡

甘草 炮各貳錢半

右為末，每服壹錢，水壹盞，煎五分，去滓，候冷，分為

伍服，每喫藥時，更點鉛白霜，寒水石共研壹字服

之方治疳 莊氏第二十候

惠眼防已丸

治疳嗽不止

漢防已

牽牛子

馬兜鈴

甜葶藶 別研各等分

右為末，煮棗肉為丸，如菉豆大，每服拾九，煎糯米

飲下，與溫肺散相間服

溫肺散

蘇藶根 半兩

甘艸 炙貳錢半

右為末，每服壹錢，蜂蜜熟水調下

小兒肺疳，多是吃着熱米食及病，妳傷損心肺，便生

喘嗽，愚醫不辨冷熱，以藥攻之，變成黃腫，漸覺昏

沉，宜服杏仁散

杏仁散

杏仁

百七

疳積

杏仁

拾肆粒

甘艸

款冬花

各貳錢

麝香

胡黃連

各壹錢

半夏

湯泡玖次半兩

右件為末每服壹字棗湯調下日進貳服

疳積

其候面帶青黃色身瘦肚膨脹頭髮立身熱

肚中微痛此因疳盛而傳為此候治之先用勻氣散

醒脾散

二方並見不乳食

調理二日後下青金丹

癍取疳

積再下勻氣醒脾散補常服保童丸

疳一切即瘡

訣云疳氣腹脹潮熱先與調胃氣後與取虛積藥次

服疳藥

錢乙牛黃丸

治小兒疳積

雄黃

飛研水

天竺黃

各貳錢

牽牛

末

右同再研麵糊為丸粟米大每服叁丸至伍丸食

後薄荷湯下兼治疳消積常服尤佳大者加丸數

張漢禡丸子

治小兒疳氣腹脹如鼓及妳癖食癖

蘿蔔子

壹兩半炒

黑牽牛

壹兩炒

胡椒

貳錢半

木香

菝葜

濕帑裏煨切作片子各半兩

右為細末麵糊為丸黍米大每服貳拾丸煎仙人

骨湯下

乾羅蔔子仙人骨見本編

換骨丹

陳粟米

壹合

陳橘皮

剉

青皮

剉

疳積

力半

百半

黑牽牛

各半

巴豆

去殼貳錢半

右件一處同炒令焦黃色揀去巴豆不用却入木

香半兩為細末麩糊為丸黍米大每服拾丸橘皮

湯下

莊氏參苓散

治小兒因積成疳又致脾胃虛弱不

思飲食

人參

茯苓

川芎

各壹兩

甘草

芍藥

黃芪

各半兩

青皮

去白貳錢半

右為細末每服壹錢漿水壹小盞煎至伍分去滓温

服

香甲丸

治小兒積疳潮熱盜汗羸瘦煩渴手足心

熱服之皆効輕骨長肌

蔡夢祥家壽翁苦黃瘦

不食多汗喜叫哭服之効

木香

貳錢半

鼈甲

去羣襴醋炙

檳榔

史君子肉

柴胡

去蘆

黃連

去鬚各半兩

右為末獾豬膽汁和丸棗豆大每服貳拾丸日中

臨卧米飲下久發潮熱多汗無力者服之即効

趙氏青蒿丸

療小兒久積疳氣日漸羸瘦面黃頭

髮作穗好食土咬指甲捻鼻兼治骨蒸勞熱及取

癩蟲退諸藏積熱小兒常服徧身香為効

白檳榔 壹枚

白蕪荑 肆拾枚

黃連 去須拾肆莖

夜明沙 淘淨貳錢半已上為末

太陰玄精石

麝香 炒

朱砂 各半錢

蘆薈 天竺黃 青黛 各壹錢

右將後七味同研細與前四味一處再研勻令極細取青蒿自然汁慢火熬濃仍用獾豬膽壹枚取汁同搜藥丸如粟米大每服伍丸至柒丸並用米飲下醖醋湯亦得取疔瘰煎醋石榴湯下三十服取盡蟲

吉氏治五疔傷積方

蕪荑 各壹兩 黃連 各壹兩 神麩 半兩

史君子 連殼拾肆箇 鶴虱 少許

末之豬膽調麵糊為丸菜豆大每服拾丸米飲下

青金膏 治疔積

青黛 朱砂 蘆薈

蟾酥 各壹錢 麝香 半錢 蜣螂 壹枚

蛇皮 項後肆寸

右為末水化酥丸如粟米大每服兩丸倒流水送下又水化壹丸注於鼻中須臾眉上白蟲出便安

青難治

豆蔻散 治疳積或冷利腹大脚小身熱面無顏色

肉豆蔻 貳箇 胡黃連 壹錢 史君子 肆枚

青黛 棟根 蕪荑

厚朴 薑汁炙 甘艸 炙各半兩 麝香 少許

夜明沙 壹錢半別研

右末每服壹錢或半錢蜜水或粥飲調下

知母散 治諸般疳積肚脹無時瀉痢或時壯熱狀

如瘥疾大効

知母 青皮 去白焙 柴胡 各貳錢

甘草 炙 紫參 各壹錢 訶子 肉參三枚

右為細末每服壹錢水伍分煎至參分溫服有熱

則退有痢則除有結則通

正傳經驗檳榔丸 治小兒疳病積氣成塊腹大有

蟲等證其効如神

檳榔 壹兩 三稜 燎去毛切醋炒 蓬莪茂 醋炒

青皮 去穰麩炒黃色 陳皮 去白 雷丸

乾漆 炒煙盡 麥蘖麩 炒 神麩 炒黃色

山查肉 各半兩 鶴虱 畧炒 木香 不見火

甘草 炙 胡黃連 各叁錢 蕪荑 水洗淨貳錢半

良薑

陳壁土 炒貳錢

砂仁

壹錢

右為細末醋糊為丸如菜豆大每服參伍拾丸空心淡薑湯下

疳瀉

先用青金丹

癖

取下疳積後用勻氣散

不乳食

香連散乳香散

瀉

調理瀉止服常服保童丸

疳一切

石壁經云疳瀉因不慎飲食或食交乳致然腹中有片子或如雞子又如三二指大所以作瀉糞出如糟毛髮硬面無光或青黃色目多灰視當分水穀乃須溫和藥和氣即瘉若藥熱則作腫而死。婁瀉而多食為蟲疳宜殺蟲藥。瀉而少食為冷疳宜溫藥。

仙人水鑑粉霜丸

治小兒疳一切瀉方

粉霜

白丁香

各壹錢

巴豆

貳枚 不出油

右為末爛飯為丸如小菜豆大每服并華水下貳丸

錢乙二聖丸

治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦成疳宜常服此方

川黃連

去鬚

黃蘗

去麤皮 各壹兩

右為細末將藥末入豬膽內湯煮熟丸如菜豆大每服貳參拾丸米飲下量兒大小加減頻服無時

劉氏胡黃連飲子

治小兒疳熱作瀉無時飲食進

退面黃體黑日漸瘦悴

胡黃連

黃藥子

人參

甘草

白朮微炒

秦艽

柴胡各等分

右各味用淨收咀每服貳錢匕水壹盞嫩桃柳枝各柒寸烏梅少許同煎捌分去滓澄清分作兩分早食後少空一服臨卧再服以小便深赤為驗候小便清住藥便生肌膚能進食飲大抵小兒羸瘦並宜服此十五歲以下皆可服

飛氏黃連丸 治疳瀉疳痢

黃連

削淨洗乾 張為末

大蕪荑仁

乳鉢研細 各等分

右二末一處和勻糯粟米相和煮稀粥為丸小兒豆大量兒大小三歲柒丸至拾丸三歲以上拾伍丸至貳拾丸空心陳米飲下日進三服

錢乙如聖丸 治冷熱疳瀉

胡黃連

白蕪荑

去扇 炒

川黃連

各貳 兩

史君子

壹兩去 殼秤

麝香

別研 半錢

乾蝦蟇

伍枚剉 酒熬膏

右前藥為末用膏丸麻子大每服人參湯下二參歲者伍柒丸以上者拾丸至拾伍丸無時

博濟方胡黃連丸 治小兒疳疾瀉痢

針劑

力斗

巨五

冷熱 瀉

胡黃連

丁香

蜜陀僧

各半兩

肉豆蔻

檳榔

紅雪

壹兩

訶子

貳枚以壹枚煨壹枚生用

右伴七味同研細入麝香貳錢半和勻次入菉豆末少許同水和為丸如麻子大兒三歲以下壹丸三歲以上伍丸孩子腦疳鼻痒及赤爛黃連湯下脾虛羸瘦泄痢四肢虛腫青州棗湯下肝疳眼澁生瘡甘艸湯下骨疳冷地卧愛食土紫蘇茶湯下常服米飲下肺疳上氣急喘橘皮湯下筋疳瀉血鹽湯下疳蟲及瀉無定生蟲湯下

香薷丸

治疳瀉

黃連

炒叁錢

肉豆蔻

木香

訶子肉

砂仁

茯苓

各壹錢

右為末飯為丸麻子大米飲下

錢氏木香丸

治時時下利唇口青白

木香

青黛

檳榔

肉豆蔻

去皮各貳錢半

麝香

另研壹錢半

續隨子

壹兩半炒

蝦蟆

叁箇先用繩繫晒乾燒存性

右為末蜜丸如菉豆大每服叁伍丸至壹貳拾丸

薄荷湯下食前

没石子丸氏錢 治泄瀉白濁及疳痢滑兒腹痛者

木香

黃連

各貳錢半

没石子

壹箇

荳蔻仁

貳個

訶子肉

叁個

右為細末飯和丸麻子大米飲下食前量兒加減

聚寶方黃龍丸 定小兒疳冷瀉

朱砂

研錢

龍腦

半字研

硫黃

壹兩

雄黃

貳錢半

右用甘鍋子一隻盛雄黃在內用盞一隻盛水半

盞坐在鍋子上炭火燒甘鍋其藥飛在盞底上

下與朱砂硫黃同研入嚙子糯米粥丸如黃米大

每服叁丸食前椒湯下

吉氏蘆薈丸 治疳瀉不止不思飲食腹脹

丁香

肉豆蔻

去皮

木香

劉各半兩

右三味用麵裹慢火中煨熟為度取出去麵入蘆

薈壹兩史君子肉

兩半

同為細末稀糊為丸如黍米大

每服拾丸至貳拾丸米飲下

湯氏治休息痢及疳瀉痢遷延日月百藥俱試飲食

不妨便利不止用雞子壹枚打破鎔黃蠟壹塊如指

大以雞子和炒空心喫盡百醫百効無不獲安

本事方治小兒疳痢垂死者取益母草炙食之取足

瘥止甚佳

錢氏大蘆薈丸

本門通治

胡連麝香丸

榆仁丸

並見本門出蟲

良方吳婆散

治小兒疳瀉不止日夜不計遍數漸

漸羸瘦

桃根白皮

黃檗 蜜炙

蕪荑 去皮

黃連

微炒已上各貳錢半

厚朴 薑汁炙

木香

檳榔

丁香 各壹錢

沒石子 壹錢半

棟根白根

壹錢貳分半

右為末每服壹字二歲以上半錢五六歲壹錢用

紫蘇木瓜米飲調下乳食前一日三服予家小兒

曾有患瀉百餘日瘦餘皮骨萬方不差有監兵鍾

離君見之曰何不服吳婆散立可差也乃求方合

與兩三服便効又孫男亦疳瀉勢甚危困兩服遂

定若病深者服一兩日間決差此藥若是疳瀉無

不驗者藥性小溫暴熱瀉者或不相當

丹溪治一富家子年十四歲面黃善啖易飢非肉不

飽泄瀉一月來求治脉之兩手皆大怪不甚瘦倦以

為濕熱當脾困而食少今反形健而多食且不渴予

意其疾必疳蟲作痢也取大便秘視之果蛭虫所為適

往他處有一小兒醫在側教其用治蟲藥治之禁其勿用去積藥約回途當為一看診而止痢也偶勿果至次年春夏之交其瀉復作腹不痛而口乾予曰此去年治蟲而不治疳故也遂以去疳熱之藥濃煎白朮湯下三日而瀉止半月後偶過其家見其子甚瘦予教以白朮為君芍藥為臣川芎陳皮黃連胡黃連入少蘆薈為丸白朮湯服之半月而止禁其勿食肉物三年當自愈

升門經治小兒疳瀉方

右用赤石脂梓羅為末久調半錢

服立差或以京芎等分同服更妙

莊氏家傳治疳瀉久不瘥方

赤石脂

綠礬

石灰

各貳兩

硫黃 半兩

右研勻入罐子內燒令焰碧去火放冷取研每服壹字或半錢煎小黃米飲放冷調下食前服

又方

史君子 炮

五倍子 瓦上炒黃

沒石子

各等分

右為末每服半錢陳米飲調下

疳痢

宮氣方解小兒疳熱疳痢殺蟲用青黛不以多

疳痢

功

疳

少水研服

外臺治疳痢曉夜無度者取樗根濃汁及粟米泔各

一雞子殼許以竹筒吹入下部再度瘥

治疳痢大孔開利不止以黃連末入麝香少許和勻

以竹筒吹入

圖經治疳痢以地榆單煮汁如飴糖與服便已

孟詵療小兒疳痢方

右用樗木根取白皮壹握倉粳米伍拾粒葱白壹

握甘草貳寸炙豉貳合以水壹升煮取半升頓服

之小兒以意服之枝葉皮切用皆同

聖惠治小兒疳痢不止下部痒青黛散

青黛

蟾灰

胡粉

黃連

去須
微炒

麝香

細研各
貳錢半

赤石脂

半兩

訶梨勒皮

壹兩
微煨

右件藥搗羅為散每服以乳汁調下半錢日三四

服量兒大小加減

殺疳丸 治疳痢不止

雄黃

麝香

牛黃

蘆薈

朱砂

各細
研

龍骨

燒令
赤色

蜜陀僧

燒紅
細研

胡黃連

各貳
錢半

青黛

半兩
細研

疳疔

力斗

一重

金箔拾片細研

肉豆蔻貳枚去殼

蟾酥壹錢貳分半熱水化如泥

右件藥搗羅為末入研藥及蟾酥研令勻湯浸蒸餅和丸如黃米大每以溫水下參丸煎黃連苦參湯洗身上用青衣蓋出蟲便瘥

白龍骨丸 治疳痢不止

白龍骨

白石脂

雞屎礬燒令汁盡

黃連去鬚微炒

胡粉微炒

白茯苓

阿膠搗碎炒令黃燥各半兩

右搗羅為末煉蜜和圓如麻子大每服以粥飲下伍丸日三四服量兒大小加減

肉豆蔻丸 治小兒疳痢不喫乳食四肢瘦弱

肉豆蔻去殼壹枚

木香半兩

人參去蘆頭

訶子肉煨

朱砂

麝香並細研各貳錢半

右搗羅為末都研令勻用軟飯和丸如麻子大每服以米飲化下參丸日三四服量兒加減

聖惠黃連散 治小兒疳痢久不瘥肌肉消瘦面黃

髮焦啼叫不常

胡黃連末

白礬燒令汁盡

白龍骨末各半兩

胡粉微炒貳錢半

右件藥同細研為散一歲兒每服以米飲調下壹

字二歲每服半錢隨兒大小量病輕重加減

燕莢丸 治小兒久疳痢不瘥

燕莢末半兩 羊子肝壹具

右先以子肝切作片子以燕莢末摻在肝內線纏合米泔中煮令熟擣爛糯米飯和丸如麻子大每以粥飲下伍丸早晨晚後各一服量兒加減

莊氏第一候瀉膿血日漸瘦是冷熱疳宜服八香丸

方

胡黃連 壹錢 腦 麝 各半 牛黃 壹錢貳分半

蘆薈 壹錢半 蟾酥 伍捻子作 白花蛇 半兩酒浸去骨

蝎稍 貳錢半

右為細末豬膽丸如黃米大每服伍丸米飲下

如患甚仍用生米泔調作散半錢服日三服

治小兒腸鳴瀉痢口鼻乾常有鮮血日夜疼方

白朮 炮 硫黃 各貳錢半 枳殼 炒

胡黃連 當歸 各半兩

右為末每服半錢熟水調下

張道人第二急疳小兒疳痢下赤色膿血下部脫肛雖有精神命在須臾但服此沉香丸方

沉香 人參 蝎

胡黃連

乳香 各壹分

龍骨

甘草 各一分

右件棗肉為丸如麻子大每服參丸米飲下日二服又患七服效

木香丸 治疳痢

黃連 淨參

木香

紫厚朴 薑剉

夜明沙 隔紙炒 訶子肉 炒壹錢

右為末飯丸麻子大乾艾生薑煎湯食前下

疳痢腹瀉白朮散 治小兒疳痢腹脹疔痛日夜三

二十行

白朮 壹兩 微炒

當歸

地榆 並剉 微炒

木香

赤芍藥

甘草 炙半兩

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至伍分去滓不計時候量兒大小分減

胡黃連丸 治小兒疳痢腹痛不止

胡黃連 半兩

沒藥

木香 各貳錢半

右件藥搗羅為末糯米飯和丸如棗豆大每服粥飲下伍丸日三四服量兒大小加減

疳腫脹 治小兒五疳八痢及髮焦黃肚脹手足瘦細

肚上筋脉起指眼鼻涕垂至口咬指甲或下部生

疳腫脹

功

百三

瘡及大小便不通宜此療之

蘆會

夜明沙炒

蛇蛻灰

黃牛角屑各壹

蟾酥許

右為末更入麝香少許煉蜜丸如菜豆大每服叁丸用米飲下服藥間仍用桃柳葉湯浴兒了將青皂衣蓋之更用藥壹丸至貳丸安兒臍中便着醋麵糊與青皂帛貼之候蟲出為度如無蟲但汗出為妙服藥三日後宜減壹丸

治小兒疳氣腹腫有似水氣方

肉豆蔻壹箇

木香炮

麝香

朱砂各壹分

胡黃連半兩

右為末飯丸麻子大米飲下叁伍丸

莊氏第廿八候用此方

吉氏家傳治疳肚如鼓方

蜜陀僧

風化灰各壹錢

黃丹半錢

右為末以豬肉炙壹片用藥半錢蘸上與喫如不會喫乳母嚼與

御苑勻氣散 治脾肺氣逆喘咳面浮胸膈痞悶小

便不利

桑白皮貳兩

淨陳皮壹兩

桔梗炒

甘草炙

赤茯苓各壹兩

藿香半兩

木通

肆兩

薑水煎服

用後天在倒詳腎部天柱倒條

疳氣入陰漢東王先生家寶治小兒疳氣灌入陰黃亮色烏金膏

通草

黃皮

大黃

各貳錢半燒

右各燒存性為末每用壹錢豬膽調成膏於陰上塗如未退煎蛇床子湯洗後再調塗之

杏子牙皂台百士... 冰燕末對水糊于大米對下... 此藥十八

虛羸

母氣不足則羸瘦肉極。巢氏論小兒羸瘦不生肌膚皆為脾胃不和不能飲食故血氣衰弱不能榮於肌膚也。挾熱者即溫壯身熱肌肉微黃其挾冷者即時時下利唇口青白。小兒經諸大病或驚癇或傷寒或溫壯而服藥或吐利發汗病差之後氣血尚虛脾胃猶弱不能傳化穀氣以榮身體故虛羸也。錢氏虛羸冷者木香丸主之。夏月不可服如有證則少服之。熱者胡黃連丸主之。冬月不可服如有證則少

服之虛羸與疳同治也木薛氏云更當審其形

色察其見證如面赤多啼心之虛羸也面青目劓肝

之虛羸也耳前後或耳下結核肝經虛火也頸間肉

裏結核食積虛熱也面黃痞滿脾之虛羸也面白氣

喘肺之虛羸也目睛多白腎之虛羸也仍審相勝而

藥之又寒熱二證不可不辨若腹痛瀉利清白不渴

喜熱此屬寒證雖在夏月宜木香丸身熱煩躁瀉利

焦黃作渴喜冷此屬熱證雖在冬月宜胡黃連丸皆

捨時從證之治法也錢氏論用藥識證云鄭人齋

郎中者家好收藥散施人其子忽藏熱齋自取青金

膏三服併一服而餌之服畢至三更瀉五行其子因

睡齋言子睡多亦驚又與青金膏一服又瀉二行加

口乾而身熱齋言尚有微熱未盡又與青金膏其妻

曰用藥十餘行未安莫生病否召錢氏曰已成虛羸

先多煎白朮散時時服之後用香瓜丸十三日愈柏

散見渴木瓜丸見汗薛氏治一小兒十三歲面赤驚悸發熱

形體羸瘦不時面白噯氣下氣時常停食服保和丸

及清熱等藥余曰面赤驚悸心神怯也面白噯氣心

火虛也大便秘下氣脾氣虛也此皆稟心火虛不能生

脾土之危證前藥在所當禁者不信又服枳朮丸鎮

驚等藥而諸證益甚大便頻數小腹重墜脫肛痰涎
飲食日少余先用六君子湯爲主佐以補心丸月餘
飲食少進痰涎少止又用補中益氣湯送四神而愈
甲姻後病復作墜時至仲冬面白或鰲色手足冷喜
食胡椒薑物腹中不熱脉浮按之微細兩尺微甚乃
用八味丸元氣復而形氣漸充年至二十苦畏風寒
面目赤色發熱吐痰唇舌赤裂食椒薑之物唇口卽
破痰熱愈甚腹中却不熱診其脉或如無或欲絕此
寒氣逼陽於外內真寒而外假熱也仍用八味丸而
諸證頓愈。一小兒八歲面常青色或時色赤日間
目劄夜睡咬牙二年餘矣服清肝降火之藥益甚形
氣日羸求治於余曰肝主五色入心則赤自入則青
蓋肝屬木而生風故肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水
此稟肝腎精血不足虛火內動陰血益虛虛而生風
風自火出故變面赤目劄等證耳非外風也遂用地
黃丸以滋腎水生肝木兩月目劄咬牙悉止又三月
許諸證尋愈而元氣亦充矣凡肝經之證若肝木實
熱生風而自病或肺金實熱而尅木者宜用清肝降
火之劑以瀉其邪氣若肝經風熱而目直等證用柴
胡梔子散以清肝火加味四物湯以養肝血若腎虛

而咬牙諸證用六君子湯以健脾土六味地黃丸以
滋腎水則愈。一小兒脾氣虛弱飲食停滯發熱作
渴燥瀉黃散不時下痢余先用保和丸二服而愈但
不食惡心面青手冷又用六君柴胡升麻四劑面色
痿黃食進手溫惟形體羸甚倦怠發熱小腹重墜
門脫出用補中益氣湯加半夏肉豆蔻二劑而安凡
脾胃之證若發熱作渴飲食喜冷或泄瀉色黃睡不
露睛者屬形病俱實宜用瀉黃散疎導之若發熱口
乾惡冷或泄瀉色白睡而露睛屬形病俱虛宜用異
功散調補之若脾氣下陷者補中益氣湯寒水侮土
者益黃散肝木尅脾者六君加柴胡若目睛微動
熱抽搐吐瀉不食宜用祕旨保脾湯凡小兒諸病先
當調補脾胃使根本堅固則諸病自退非藥所能盡
祛也。一小兒五歲形氣虛羸睡中咬牙夜間遺尿
日間頻數余以為稟腎氣不足用補中益氣湯加補
骨脂地黃丸加鹿茸以補脾腎而痊畢姻後小便頻
數作渴發熱日晡益甚恪服黃檗知母等藥以滋陰
降火後患腎痿卧床年許余因考績北上仍用前藥
喜其慎疾半載而痊。一小兒年十一歲面白或赤
足軟不能久行用地黃丸加鹿茸年許而瘥畢姻後

兩目羞明兩足仍軟用前丸及補中益氣湯而痊後
病復發增口渴足熱頭顙覺開視物覺大此腎虛瞳
人散大而然也服前藥遠房事則愈因不自保終患
百痿而歿仲陽先生云此證屬腦髓不足不能榮養
宜用地黃丸補之有至七八歲或十四五歲氣血既
盛而自合若縱恣色慾戕賊真陰亦不能盡其壽矣
○小兒形瘦不時咳嗽自用參蘇飲一劑更加喘
急驚搐面白或黃余謂此稟脾肺不足而形氣虛羸
因前劑峻利外邪雖去而肺氣益虛肺虛則宜補脾
先用異功散加桔梗釣藤鈎一劑痰喘頓定乃去桔
梗加半夏當歸再劑驚搐亦去又加酸棗仁治之而
安年十五歲發熱痰盛作渴面赤形體羸瘦用他黃
丸加五味子及補中益氣湯各百餘劑而形氣漸壯
若認爲陰火用黃檗知母等藥復傷生化之源其亦
不治者矣。○小兒五歲尚飲乳耳前後頸間至缺
盆以手推尋其筋結小核如貫珠隱於肌肉之間小
便不調面色青黃形氣羸瘦此稟母之肝火爲患用
丸味蘆薈丸五味異功散加山梔柴胡與兒飲之又
以加味逍遙散與母服之尋愈。○小兒患虛羸耳
出穢水左手尺關洪數而無力余爲清肝補腎耳中

虛弱
雖愈未全歛畢。姍後患瘵證。誤服黃檗知母之類。
復傷元氣。不勝寒暑勞役。無日不病。幾至危殆。余大
補脾胃。滋養元氣而愈。一。小兒患證如前。肢體消
瘦。面色痿黃。大便酸臭。此脾虛食積。用四味肥兒丸。
五味異功散治之而愈。一。小兒九歲。吞酸惡食。肌
體消瘦。腹中作痛。余謂食積虛羸也。用保和丸而愈。
後腹中數痛。皆服保和丸。余曰。此因脾胃虛而飲食
所傷也。當調補脾土。以杜後患。不信。後腹痛喜按。余
用五味異功散二劑。因未應。自用平胃散等藥。腹脹
作痛。余仍以異功散。加木香四劑而愈。若屢用攻伐
之劑。陰損元氣。多致虛羸。慎之。

參苓白朮散

方見不
乳食

地黃丸

加肉桂壹兩。名
加減八味丸。

治小兒肝經虛熱。血燥。或風

客淫氣。而患瘵。癰結核。或四肢發搐。眼目抽動。痰
涎上湧。又治腎疝。腦熱。消瘦。手足如冷。寒熱往來。
滑瀉。肚脹。口臭。乾渴。齒齦潰爛。爪黑。面黧。遍身兩
耳生瘡。或兩耳出水。或發熱自汗。盜汗。便血。諸血
失瘖等證。其功不可盡述。即六味地黃丸。
方見腎藏。
補中益氣湯 治中氣虛弱。體疲食少。或發熱煩渴
等證。

人參

黃耆 各壹錢

白朮

甘草

陳皮 各伍分

升麻

柴胡 各貳分

當歸 捌分

右薑棗水煎空心午前服

○愚按前方若因藥剋伐元氣虛損惡寒發熱肢體倦怠飲食少思或兼飲食勞倦頭痛身熱煩躁作渴脉洪大弦虛或微細軟弱右寸關獨甚者宜用之凡久病或過服剋伐之劑虧損元氣而虛證悉具者最宜前湯若母有脾胃不足之證或陰虛內熱致兒為患者尤宜用之

八珍湯

四物四君合用

錢氏異功散

治脾胃飲食少思吐瀉不食凡虛冷

證先與數服以正胃氣

自五味異功散見吐瀉

○愚按前方治脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母脾胃虛兒患此證亦當服之

外臺小品療四五歲兒因食及在胎中宿熱乳母飲食麤惡辛苦乳汁不起兒哺不為肌膚心腹痞滿痿黃瘦瘠四肢痿躄繚戾服之令充悅方

芍藥拾分

黃耆

鼈甲炙

人參各肆分

柴胡捌分

茯苓陸分

甘草參

乾薑各貳分如熟以枳實代

右八味搗篩蜜和為丸如大豆服五丸日二服忌如常法千金有大黃無黃耆服一九一歲以上乳服三丸七歲兒服十九日二聖惠黃耆丸治小兒羸瘦體熱面色痿黃不欲乳食

黃耆剉

赤芍藥

人參去蘆

甘草炙微

胡黃連各半

麥門冬去心

鼈甲塗醋炙微黃去裙襴各壹兩

柴胡去蘆

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大不計時候以粥飲下五丸量兒大小以意加減

秦艸丸治小兒羸瘦體熱心神煩悶小便赤黃

秦艸去苗

桑根白皮剉

枳殼麩炒微黃去瓢

地骨皮

黃耆剉

人參去蘆

赤茯苓

甘草炙微

犀角屑各半兩

龍膽去蘆頭壹分

柴胡參分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大不計時候用粥飲下五丸更隨兒大小增減

麥門冬丸

治小兒雖食不着肌膚羸瘦骨熱小便

赤黃

麥門冬

去心焙壹兩

人參

去蘆頭

黃耆

剉

青蒿子

黃連

去鬚

桑根白皮

剉

枳殼

麩炒微黃去穰

地骨皮

各半兩

柴胡

去苗參分

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如菉豆大不計時候

以熟水研五丸服量兒大小以意加減

燒黃瓜丸

治小兒羸瘦體熱乳食全少

黃瓜

大者壹枚

陳橘皮

湯浸去白瓢焙

黃連

去鬚各半兩

鼈甲

童子小便浸三宿炙微黃去骨備

胡黃連

柴胡

去苗各壹兩

右件藥搗細羅爲散以黃瓜切開頭去瓢內藥末

令滿以切下蓋子蓋之用香麥麩和搜固濟可厚

三分於煨灰火內燒令麩焦黃爲度取出去麩放

冷入麝香壹錢都研和丸如菉豆大每服食前米

飲下七丸更量兒大小以意加減

大黃丸

治小兒胃氣不調不嗜食不生肌肉

大黃

乾地黄

茯苓

當歸

柴胡

杏仁

各叁分

右爲末蜜丸麻子大飲下五丸日進三服

虛羸
豬肚丸 解小兒肌熱時或泄瀉及有積滯不思飲

食肌肉消瘦

鼈甲 壹兩同童子小便并醋共一升熱浸炙盡為度

白朮

薯蕷 各壹兩

胡黃連

人參 去蘆頭

青橘皮

紫苑 去土

桃仁 湯浸去皮尖雙仁

木香

甘草 炙各半兩

柴胡 去蘆頭壹兩

右件藥搗羅為末入在淨豬肚內繫定煮令極爛為度出與藥同杵令黏丸如梧桐子大每服二十丸不計時候溫水飲下

香甲丸 治男子婦人童男室女氣血虛疎肌膚消

瘦百節疼潮作溫五心煩熱四肢逆冷可思飲食

中滿氣滯婦人經血凝澀建脾胃暢神氣充肌膚

澤顏色

柴胡

生乾地黃

京三稜 各叁分

鼈甲 醋煮黃

神麴

杏仁

熟乾地黃

麥蘖 炒各壹兩

牛膝

木香

薑黃

當歸 各半兩

白朮

川芎 各壹分

右為細末白麩糊丸如梧桐子大每服十九空心茶清下或米飲亦得

右八方按熱者宜之

聖惠訶梨勒散 治小兒羸瘦脾胃氣弱挾於宿食

不欲乳食四肢不和

訶梨勒皮

陳橘皮

湯浸去白瓢 焙各半兩

黃耆

人參

去蘆頭

白朮

藿香

桂心

白茯苓

各壹分

甘草

炙微赤 剉半分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞入生

薑少許棗一枚煎至五分去滓溫服日三四服量

兒大小以意加減

溫脾散 治小兒脾氣不和食少無力肌膚羸瘦

訶梨勒皮

人參

去蘆頭 各叁分

白朮

木香

黃耆

剉

白茯苓

藿香

陳橘皮

湯浸去白瓢 焙

桔梗

去蘆頭 各半兩

甘草

炙微赤 剉壹分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞入生

薑少許棗一枚煎至五分去滓不計時候量兒大

小增減溫服

五香煎 治小兒脾胃久虛喫食減少四肢羸瘦

丁香

沉香

木香

藿香

白朮 各壹兩

麝香 參錢細研入

白茯苓

陳橘皮 湯浸去白瓢焙

黃耆 剉各壹兩

訶梨勒皮

甘草 炙微赤剉各半兩

右件藥搗篩爲散以水五升慢火煎至一升以布絞汁却入鍋內煎麝香及蜜三合生薑汁半合棗肉二十枚慢火熬成煎每服以粥飲調下半茶匙量兒大小以意加減

右三方挾冷者宜之
湯氏云小兒疳積其狀漸黃瘦拍背如鼓鳴脊骨如鋸乃積而生熱成疳也宜服蘆薈丸露星膏

蘆薈丸

龍膽草

黃連

蕪荑 去皮先炒黃色次入

前二味一處炒赤色各壹兩

右爲末另入蘆薈壹分和白爛飯丸如黍米大三歲兒服三十九空心米飲送下

露星膏

黃耆 蜜水炙

胡黃連

地骨皮

柴胡 各等分

右爲末煉蜜丸如芡實大隔宿酒浸露一宿次日澄去酒薄荷湯浸服之

錢氏橘連丸 治疳瘦久服消食和氣長肌肉

橘皮 壹兩

黃連 米泔浸一宿壹兩半

右為細末另研入麝香五分用豬膽七箇分藥入

膽內漿水煮候臨熟以針微刺破以熟為度煮粟

米粥和丸如菉豆大每服十九至三十九米飲

下量兒加減無時海藏云黃連苦燥可

一聖丸 治小兒藏府或好或瀉久不愈羸瘦宜常

服

黃連 去鬚

黃檗 去麁皮 各壹兩

右為細末入豬膽內重湯煮熟丸如菉豆大每服

一三三十九米飲下量兒加減頻服無妨

張渙金粟丹 方見內 疳條

香蟾丹 治肌瘦面黃胸高脚細

乾蟾 伍枚 水浸去骨用瓦藏餅壹枚頂頭上取

子以煙息為度取出 胡黃連 貳兩

地上放一宿出火毒 天竺黃

蛇蛻皮 壹兩 地龍 半兩 朱砂 半兩

蟬殼 各壹分已上並 為細末次入

麝香 壹分 右件都一處研勻糯米餅和如黍米大每服十粒

米飲下不拘時候量兒大小加減

萬全方雷丸丹 治小兒一切疳肚脹腹滿手脚枯
細眼目口鼻生瘡身體壯熱痢下泔淀日漸羸瘦
面無光澤

雷丸 生 鶴虱 生 史君子 去殼

胡黃連 微炒 蘆薈 研各半兩 麝香 半錢研入

蟾蜍 壹枚酒浸一宿慢火炙熟去皮足骨焙 木香

肉豆蔻 各壹分 蕪荑 壹兩去皮微炒研入 朱砂 貳錢研細必研為衣

右件藥搗羅為末研合令勻用豬膽四箇取汁
傾入瓷盞中外以重湯煮過和杵為丸如黍米夫
每服五丸至七丸麥門冬熟水下早晨日午空心

臨卧服

孔氏神聖丸 肥小兒疳藥常服永無腸藏之疾

胡黃連 去皮 宣連 去毛 白蕪荑 去皮

木香 蘆薈 各壹錢 史君子 貳拾枚

右除蘆薈一味外五味銀器內用豬膽汁熬成膏
後入蘆薈同丸如菉豆大每服五七粒空心日午

臨卧米湯下神效

豬肚丸 治小兒疳熱而瘦

柴胡 黃連 秦艽 各壹兩淨

蕪荑 貳兩用瓦上焙乾去殼取肉別為末臨時入用

右用豬肚一箇中庸者破開淨洗入前藥三味末於內以酒半餅童子小便一升煮乾春令得所放蕪荑末又春勻丸如桐子大每服二十丸飲下
王氏手集治小兒疳瘦大人五勞七傷方

宣黃連 半斤去鬚及蘆頭為細末 續豬肚 壹箇去脂膜將

黃連末穰在內縫合於三斗米內蒸以米熟軟為度

右件取出爛研丸如粟米大風乾隨兒大小加減日三服三歲兒每服五七丸至十丸大人服如桐子大每服二十丸空心米飲下

趙氏斧槌丸 治小兒疳久服肥白

乾蝦蟆 壹枚 白礬 膽礬

綠礬 各半兩肆味同入礬子內炭火燒礬枯為度 京三稜

石三稜 雞爪三稜 草薺

鶴虱 雷丸 淡蕪荑

黑狗脊 木香 各半兩 沒石子 叁枚

史君子 拾枚 蘆薈 熊膽 各壹錢

右為末醋煮乾棗取肉爛研入少麵糊和藥極熟丸如棗豆大每服柒丸米飲下

玉挂杖散 治小兒疳瘦

黃芪 貳兩 白茯苓 半兩 人參

白朮 各壹兩

右為末以水壹盞藥壹錢煎柒分温服

蘆薈丸 治小兒諸疳羸瘦不生肌肉

蘆薈

木香

紅芍藥

沒石子 各半兩

史君子 去殼

胡黃連 各貳錢半

肉豆蔻 貳錢

人參 壹錢

右為細末入麝香半錢別研令細與藥拌勻蜜水

打麵糊為丸每服拾伍丸米飲下空心食前服

吉氏益兒丸 治小兒一切疳瘦夜多盜汗肌肉熱

人參

白朮

茯苓

柴胡 去苗

甘草 炙

陳皮 去白

鼈甲 醋炙去

京三稜 濕紙裹煨香

右細末煉蜜圓如雞頭實大每服壹丸米飲化食

前日三服

朱氏家傳肥兒丸

白蕪荑 去殼

黃連 去鬚

神麩

麥蘖 各等分

右為末用糞豬膽煮糊圓如大麻子大每服叁拾

丸食前米飲下張氏家傳莊氏家傳方皆同或治

疳積或治疳瘦

六味肥兒丸 治疳多因缺乳食肉太早或患臟腑
胃虛療諸般疳化蟲治黃瘦肚急消疳退疳熱可
常服

黃連

局方加肉豆蔻

陳皮

去白局方去此用木香

神麩

炒局方有史君子

麥蘖

炒各壹兩局方加三稜蓬茂

川棟肉

壹兩炒

白蕪荑

半兩局方去此用檳榔

右為末神麩糊丸麻子大每服參拾丸空心米飲
吞下。詳按前方又治脾疳飲食少思肌肉消瘦
肚大頸細髮稀成穗項間結核發熱作渴精神倦
怠大便酸臭嗜食泥土或口鼻頭生瘡肚見青筋

齧齒下利便白五疳用此丸加乾蟾壹兩蘆薈伍
錢尤妙

秘方肥兒丸 消疳進食

黃連

伍錢

木香

壹錢

神麩

麥蘖

各壹兩並炒

史君肉

煨

肉豆蔻

麵裹煨各伍錢

檳榔

壹枚

蝦蟇

壹箇

白朮

壹兩

右為末麵糊丸如粟米大空心米飲下量兒加減
朱氏家傳治小兒脾疼疳瘦驚積方

右用黃蘗蘗壹箇去瓢用黃連末填滿蒸爛取出
用朴硝末壹錢蓋頭臨夜方取然後露一宿研爛

為丸如小菉豆大每服伍丸熟水下

潔古云小兒疳病肌瘦血氣不足同大人勞瘵之疾
治之。按以潔古此論詳之不拘冷熱虛羸皆用四
君子地黃丸與前藥相兼服為得也。然有胸膈積滯
不受參朮地黃之補者先用清疳取積之藥然後補
劑可施故備載諸方以俟採擇誠以病之變態多端
非執一隅可以御百變若春方三年無病不治者鮮
不以為繁雜矣。

羸瘦不生肌膚

胃脘壯灸壹壯

小兒疳瘦於胃下骨尖上灸參壯灸於脊下端尾

翠骨尾上灸參壯

小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦悴諸方不瘥者取
尾翠骨上三寸骨陷中灸參壯

小兒身羸瘦黃豚腹腫四肢懈惰肩背不舉章門二
穴各灸柒壯

元祐年未六月十六日午後休矣了今日於

城裏雖有嘉慶是祝平因病不能出但於後

行研來休了孝免擾完給平可

三見

