

醫方類聚卷之五十三

傷寒門二十

三因方

傷風證治

足太陽膀胱經傷風有汗惡風不惡寒頭項

強腰脊痛以其脉從巔入絡腦還出別下項

循肩膊內俠脊拄腰中故太陽諸證如是治

之宜桂枝湯

桂枝湯

方見傷寒論注解



足陽明胃經傷風口燥煩渴自汗嗜卧身重
小便難以其脉俠鼻絡目下膈屬胃絡脾俠
臍入氣街故陽明諸證治是治之宜杏子湯
杏子湯治陽明傷風能食得効方惡食口苦咽乾
腹滿微喘發熱惡風自汗嗜卧身重小便難
潮熱而噦其脉浮弦長而數悉主之

杏仁去皮尖半夏湯去滑五味子各二錢半

半芍藥桂心細辛乾姜炮大黃蒸

甘草炙各三錢茯苓四錢

右咬咀每服四錢水一盞半煎至柒分去
滓食前服

足少陽膽經傷風身熱惡風自汗項強脇滿
以其脉起於目兌背脊上抵頭角交出入缺盆
下胸中貫膈絡肝循脇裏出氣街合髀厭中
故少陽諸證如是治之宜柴胡加桂湯
柴胡加桂湯治少陽傷風四五日身熱惡風
頸項強脇下滿手足溫口苦而渴自汗其脉
陽浮陰弦或發汗多亡陽譫語可以此和其

榮衛通其津液自愈

柴胡

壹兩

半夏

湯去滑四錢壹字

甘草

炙叁錢壹字

芍

藥

黃芩

人參

桂

各半兩

得

方

右咬咀每服五錢匕水一盞半姜五片棗

一箇煎七分去滓食前溫

得效方

足太陰脾經傷風自汗胃滿腹痛四肢倦怠以其脉入腹絡胃上膈俠咽連舌本散舌下

故太陰諸證如是治之宜桂枝芍藥湯

桂枝芍藥湯治太陰傷風自汗咽乾胃腹滿

自利不渴四肢倦怠手足自溫其脉弦大而緩者

桂枝

半兩

芍藥

叁兩

右咬咀每服五錢匕水一盞半姜三片棗

一个煎柒分去滓溫服腹痛甚者加大黃

一兩

得效方同

足少陰腎經傷風口燥舌乾咽痛胃滿心煩

自汗腰連胛骨酸痛以其脉貫脊屬腎上貫

肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本故少陰諸證如

是治之宜桂附湯

桂附湯治少陰傷風胃滿心煩咽喉痛自汗

腰疼連脰骨酸痛嘔吐涎沫頭痛其脉沉弦

者

附子生去皮臍桂心 乾姜 芍藥 甘草炙

茯苓 桃仁去皮尖麩炒各一兩

右咬咀每服四錢水二盞煎七分去滓食

前服或咽喉痛加桔梗得效方半兩

足厥陰肝經傷風自汗惡風而勑小腹急滿

以其脉循股入毛中還陰器抵小腹俠胃絡

膽布脇與督脉會故厥陰諸證如是治之宜

八物湯

八物湯治厥陰傷風惡風而勑自汗小腹急

痛寒熱如瘧骨節煩疼其脉尺寸俱微而遲

者

桂心 當歸 川芎 前胡 防風各三分

芍藥 甘草炙 茯苓各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片棗三

个煎八分去滓食前服得效方空心服

傷寒證治

足太陽膀胱經傷寒頭項強腰脊痛無汗惡寒其經絡流注去處與傷風同但脉浮洪緊數為異耳惟足太陽寒水為諸陽主氣故寒先傷之

麻黃湯治太陽傷寒脉浮緊而數頭痛身疼發熱惡寒無汗胃滿而喘者○聖濟總錄治傷寒太陽與陽明合病喘而胃滿者不可下

黃麻去節○傷寒活人書一兩半總錄先以沸湯掠過燥乾三兩玉機微義六

錢桂心各一兩○傷寒指掌圖桂枝六錢二字半總錄去麤皮二兩微義桂

枝四甘草炙半兩○指掌圖三錢一字錢半總錄炙由微義炙二錢

仁二十筒總錄去皮尖雙入七十枚炒微義

二十筒

右吹咀每服五錢水一盞半煎八分去滓

食前服溫服總錄覆取微汗夏則加知母半兩

石膏一兩黃芩一分或汗出後無大熱而

喘者六桂加石膏四兩總錄覆取微汗不須吹咀餘如桂枝

將息法傷寒活人書又云益麻黃湯性熱
唯冬及春兼病人素虛寒者乃用正方夏
至之後服之必發斑黃須加知 ○指掌圖
母半兩石膏一兩黃芩一分

木三升先煮麻黃減半升去上沫內諸藥

煎取一升分三服取汗澹寮方治傷寒頭

痛發熱惡風骨節疼痛喘滿無汗麻黃去

兩參肉桂二兩去皮甘草炙壹杏仁柴十枚去皮

膏右同為麤末入杏仁膏勻每服參錢水

一盞半醫方集成南身經方一盞煎至捌分去滓

溫服以汗出為度若病自汗者不可服不

計時候得效方治足太陽膀胱經發熱頭

痛身疼惡風無汗而喘陽明合病喘而胃

滿太陽病八九日不解以此發汗必衄乃

解及治不得汗發衄陽明脉浮無汗而喘

宜服脉但浮無餘證者與服若不瀉腹滿

加噦者不治麻黃去桂枝二甘草壹杏

仁七十箇右剉散每服五錢水盞半煎八

分去滓食前服覆取微汗夏至後加知母

半兩石膏一兩黃芩一分或汗出後無大

熱而喘者去桂加石膏一兩春冬只依正方

小青龍湯治傷寒表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利小腹滿而喘者

麻黃去節細辛去苗乾姜炮甘草炙桂心得效方桂

若藥兩各參半夏湯去滑五味子各二兩半

右咳咀每服五錢水二盞煎八分去滓食前溫服噎者去麻黃加熟附子一錢若小

便不利小腹滿者加茯苓一錢喘者加杏仁七枚去皮尖○無求子活人書傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也此主之芍藥南陽活人書一分

桂枝去皮乾姜炮甘草炙細辛各一兩半五味子一兩

或加別本半夏一兩半湯洗若渴者去麻

黃膏兩半微利者去麻黃加薤花如一彈

筒炮若小便不利小腹痛者去麻黃加附子半

皮尖麻右剉如麻豆太每服抄五錢匕水

一盞半煮至八分去滓溫服杏仁半夏二
 味或各作一兩一分宜明論麻黃大節湯
 沫焙乾叁錢利者去麻黃加莞花彈子大
 噎者去麻黃加附子二錢炮以清沸熱結
 滯小便不利小腹滿去麻黃加茯苓四
 錢喘者去麻黃加杏仁叁錢去皮尖半
 夏一錢湯洗渴者大半芍藥叁錢細辛叁錢
 夏加括蕞根叁錢芍藥錢細辛錢乾
 薑二錢甘草叁錢桂枝二錢五味子二右剉
 如麻豆大每服五錢水一盞半生薑四片
 煎至七分去滓溫服傷寒指掌圖麻黃芍
 藥細辛乾薑甘草桂枝各一五味子半夏

各八錢 水三升三合半先煮麻黃減七合
 一字 去上沫內諸藥煮取一升去滓分三服
 溫粉凡發汗不欲多多則亡陽宜用此粉撲
 之即愈效如神

白朮 藁本 川芎 白芷

右為末每末一兩入米粉三兩和勻撲之
 得效。傷寒活人書右等分細末一兩入
 方同。米粉三兩和之粉撲周身止汗無藁本亦
 得若汗已出後盡劑服藥者汗出多亡陽

遂惡風煩燥不得眠也無求子活人書南陽活人書傷寒明

理論傷寒指掌圖同

大青龍湯治太陽中風傷寒脉聖濟總錄脉浮緊發

熱惡寒身疼不汗出而煩渴或脉浮緩身不疼

但重乍有輕時或傷寒見風脉傷風見寒脉

麻黃去節桂心 甘草炙各一兩杏仁去皮尖

石膏兩一

右為剉散每服五錢匕水一觥半姜五片

棗一箇煎七分去滓食前服○總錄麻黃

去根節煮桂皮去麤甘草炙判各二兩杏仁去皮尖雙

人四拾枚石膏如雞子大碎右五味咬咀如麻豆大

每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍

碎棗二枚去核同煎至八分去滓温服取

微汗汗多者以温粉粉之

足陽明胃經傷寒身熱目痛而鼻乾不得臥

不惡寒腹滿咽乾口燥而渴其脉流注與傷

風同以陽明主肉故次傳之

太承氣湯治陽明傷寒脉長身熱不惡寒目

疼鼻乾不得臥腹滿咽乾渴大便硬譫語或汗後脉沉實或下利心下堅或已經下其脉按之浮沉尚有力者

大黃酒洗芒消一分厚朴姜製枳實一兩

別炒
去穢

右爲麤末每服五錢水二盞煎八分去滓入消再煎服若脉遲而滑汗出身重時發潮熱并得病二三日無太陽證煩躁心下硬下利後譫語者去芒消名小承氣或發

汗不解蒸蒸發熱溫溫欲吐胃中痛大便反澇及吐利後腹脹厥煩譫語去厚朴枳實入甘草半兩芒消一分煎名調胃承氣或結熱膀胱如狂狀下血小腹急結者去厚朴枳實加桃仁十二箇桂甘草各半兩消一分名桃核承氣

大柴胡湯治證狀大略與大承氣湯同輕則柴胡重則承氣

柴胡四兩黃芩各一兩赤芍藥各一兩夏湯去滑

分枳實麩炒一分

右為麤末每服三大錢水一盞半姜五片棗一枚煎八分去滓食後溫服若內熱裏實身體疼痛是表證未解不可服

足少陽膽經傷寒脅痛耳聾口苦咽乾往來寒熱目眩乾嘔其脈流注與傷風同以少陽主膽屬半表半裏故三傳之

小柴胡湯治少陽傷寒脈弦或沉緊往來寒熱胃脇苦滿默默不欲食心煩喜嘔或渴腹

痛或脇下痞鞭或心悸小便不利或咳有微熱亦有不渴不嘔者又治婦人傷風傷寒經水適斷發熱惡寒晝日明了暮則譫語此為熱入血室其血必結故使如瘧狀得七分熱除脈遲身涼胃滿譫語如結胃狀前刺期門隨其實而取之投此湯即愈又太陽病不解轉入少陽并陽明傷寒脈反弦浮身目悉黃小便難潮熱時噦

柴胡二兩半夏湯去滑六錢一字黃芩 人參 甘

草炙各
叁分

右為剉散每服五錢水一盞半生姜五片
棗一枚煎七分去滓食前服若腹痛去黃
芩加芍藥三分心下悸小便不利加茯苓
一兩若不渴則有微熱去人參加桂三分
若咳嗽去棗加五味子三分乾姜半兩胃
中煩不嘔者去半夏加括蕪實一枚四分
之一若渴去半夏加括蕪根一兩胃中痞
鞭去棗加牡蠣一兩若過經不解日晡發

熱已而微利加芒消一兩

足太陰脾經傷寒手足溫自利不渴腹滿時
痛咽乾其脉流注與傷風同治之各有正方
治中湯治太陰傷寒手足溫自利不渴腹滿
時痛咽乾其脉尺寸俱沉細

人參 乾姜炮 白朮 甘草炙 陳皮 青

皮各等
分

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓
食前服得效
方同

五積散治太陰傷寒脾胃不和及有積聚腹痛

蒼朮

泔浸一宿

桔梗

十兩

陳皮

六兩

甘草

炙

當歸

二兩

川芎

一兩

芍藥

半夏

湯去滑

麻黃

去節

春夏二

乾姜

春

夏

枳殼

湯浸去穰

厚朴

姜製炒

桂心

春

夏

參

兩秋

冬

四兩

右先將前十二味咬咀微炒令香取出當風涼之入後枳殼桂朴三味同為細末每

服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分食

前溫服傷寒手足逆冷自汗不止脉沉細

面青嘔逆加順元散一錢同煎熱服產婦

陣踈難產經三兩日不生胎死腹中或產

母氣乏委頓產道乾澁加順元散水七分

酒三分煎相繼兩服氣血內和即差胎死

者不過三服當下其順元散多少量產母

虛實加減傷寒發熱俠內寒者加葱白二

寸豉七粒同煎相繼服當以汗解

順元散

烏頭炮去皮附子炮去皮天南星炮各一兩木香

兩半

右為末同前法煎此藥治內外感寒脉沉伏遲細手足冷毛髮恂慄傷寒陰證大發一二盃氣和汗出即愈

足少陰腎經傷寒口燥舌乾而渴背惡寒反發熱倦怠其脉流注與傷風同
附子細辛湯治少陰傷寒口中和而背惡寒

反發熱倦怠自汗而渴其脉尺寸俱沉而緊者

麻黃去節細辛 附子炮去皮

右麓末每服四錢水一盞半煎七分去滓

食前服手足厥者去麻黃細辛加乾姜半

兩甘草一分或口燥舌乾而渴宜急下之

得効○玉機微義麻黃附子細辛湯治感

寒脉沉或微細反發熱或但欲寐者麻黃

細辛炙各四錢附子炮二錢右咬咀水煎

足厥陰肝經傷寒煩滿發熱惡寒往來如瘧
或囊縮小腹急痛其脉流注與傷風同本論

建中湯方見心腹
痛門去遠志即是

麻黃桂枝各半湯治厥陰傷寒煩滿發熱惡
寒往來如瘧或囊縮其脉尺寸俱微緩者主
之若脉沉短其囊必縮急以大承氣下之可
保五死一生承氣湯乃利陽明藥耳若病到
厥陰其勢已甚蓋陽明養宗筋為熱毒所攻
乃以承氣湯瀉其能養故利陽以救陰此猶

假虞伐虢圍魏救趙之意也

桂枝四錢芍藥 麻黃去節杏仁十二个甘

草各半

右麤末每服五錢水一盞半煎八分去滓

食前服入姜棗煎亦得

大承氣湯方見足
陽明經

小建中湯方見心
腹痛門

傷寒傳變次序

內經熱論論傷寒云太陽為諸陽主氣傷寒

必先自太陽始至漢諸師凡外所因皆曰太陽病未爲了義足太陽寒水其位居辰戌爲六氣化原故丙辛遁起戊子至辰爲壬辰水而太陽正化居焉在天爲寒在地爲水寒喜歸水故寒必首傷太陽以此例推寒既自太陽入風當自少陽入濕當自陽明入經曰陰爲之主陽與之正別於陽者知病從來別於陰者知死生之期此之謂也或問傳變次序當如何邪然陰陽流行出入次序固有定說

及其中病或喜入或成虛或成兩感或守一經其可拘也但當以脉證分別陰陽表裏盛衰爲治尤不可以日數期也

料簡

有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝切忌不得悞若寒證見風脉風證見寒脉却以麻黃桂枝各半湯古人治傷風熱多寒少惡風脉浮緊無汗用青龍湯蓋先傷風而後傷寒風證尙在而寒脉已行故有是備也若先傷寒

而後傷風寒多熱少不煩躁微厥脈當浮緩弱而自汗卽傷寒見風脈但青龍緊暴不若各半湯平和無悔吝也諸經皆倣此

六經傷寒用藥格法

夫傷寒始自太陽逆傳陽明至于厥陰而止六經旣別治法不同太陽屬膀胱非發汗則不愈必用麻黃者以麻黃生于中牟雪積五尺有麻黃處雪則不聚蓋此藥能通內陽氣却外寒也陽明屬胃非通泄則不愈必用大

黃芒消以利之少陽屬膽無出入道柴胡與半夏能利能汗佐以茯苓非此不解太陰屬脾中州土也性惡寒濕非乾姜白朮不能溫燥少陰屬腎性畏寒燥非附子則不能溫厥陰屬肝藏血養筋非溫平之藥不能潤養此經常之道也後學不知倫類妄意進餌遂致醋亂諸證蜂起夭傷人命可不究辨且三陽病汗下和解人心知之至太陰脾經溫燥不行亦當溫利自陽明出如溫脾圓用大黃者

是也少陰腎經雖用附子復使麻黃則知少陰亦自太陽出厥陰用桂自少陽出明矣及其二陽鬱閉皆當自陽明出故三陰皆有下證如少陰口燥咽乾下利清水太陰腹滿時痛厥陰舌卷囊縮皆當下之學者宜審詳不可率易投也

溫脾圓治久病虛羸脾氣弱食不消喜噫

黃蘗 大麥蘗 炒 吳茱萸 桂心 乾姜

炮 細辛 附子 炮去皮臍 當歸 大黃 蒸 神麩

炒黃連 各一兩

右爲末蜜和元如梧子大每服三十丸空腹酒飲任下

三陽合病脉證治

三陽有合病三陰無合病所謂三陽合者有太陽陽明有少陽陽明白太陽傳至陽明頭疼腰痛者太陽也肌熱目痛鼻乾者陽明也尙惡寒脉必浮大而長浮者太陽脉也長者陽明脉也當隨證調之本太陽證因發汗多

則謔語屬陽明故有太陽陽明也少陽證未罷猶當和解不可便作陽明下之

葛根湯治太陽病項背強兀兀然無汗惡寒

并治三陽合病自利方

葛根一兩麻黃兩桂心兩甘草炙芍藥各

右剉散每服五錢匕水一盞半姜五片棗

一枚煎七分去滓食前溫服三陽合病不

下利但嘔者加半夏六錢得效方同

兩感證論并治法

兩感傷寒者表裏俱病也一日太陽與少陽

俱病頭痛口乾咽滿而渴二日陽明與太陰

俱病腹滿身熱不食譫語三日少陽與厥陰

俱病耳聾囊縮而厥兩病俱作治有先後先

宜救裏藏氣內正急宜攻表救內固宜急而

表亦不可緩也救裏解表各隨諸證而善用

之自非精妙甄別其孰能與於此也

四逆湯方見傷寒論注解

兩感治法料簡

桂枝麻黃皆攻太陽經表藥方各見太陽經
傳如陽明太陰少陽厥陰並可於風寒二方
論中隨證施治

陰毒證治

陰毒為病手足冷腰背強頭疼腹痛或煩渴
精神恍惚額與手背時出冷汗音聲鄭重爪
甲面色青黑多因脾腎虛寒伏陰重感於寒
所致

附子散治陰毒傷寒唇青面黑身重強四肢
冷或因服冷藥過度心腹脹滿昏沉不識人

附子炮去皮桂心半兩當歸無求子活人書

去尾白木各半兩得半夏湯洗去滑

乾姜各一右為末每服三錢水二盞活人書生薑三

片活人書煎六分不以時熱服衣覆取汗

活人書如人行十里未汗再服南

陽活人書與無求子活人書同

返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁頭痛四肢逆

冷面青腹脹脉沉伏者

硫黃通明石研消石別太陰玄精各二兩

姜炮桂心兩各半附子炮半兩無求子活

右用鐵銚先鋪玄精次下消末各一半中

間鋪硫黃末又將二兩得効方餘末蓋上

以小盞合著熟炭火三斤燒令得所勿令

烟出急取瓦盆合著地上四面灰蓋勿令

烟出候冷取出研細入後藥為末同研勻

米糊圓如梧子大每服二三十丸煎艾湯

下頓服汗出為度未退乃大著艾炷灸臍

下丹田氣海更不退則以葱啗熨之得効

下云其法亦治氣虛陽脫體冷無脉氣息

欲絕不省人事及傷寒陰厥百藥不效其

法見○活人書右件藥用生鐵銚先鋪玄

精末一半次鋪消石末一半中間下硫黃

末又著消石蓋硫黃都以玄精蓋下訖用

小盞合著以三斤炭火燒令得所勿令煙

出多急取瓦盆合著地面四向著灰蓋勿

令烟出直候冷取出細研如麵後三味擣

羅爲末與前藥同研令細用軟飯和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸前艾湯下頻服汗出爲度病重則三十丸此方甚驗喘促與吐逆者入口便住服此藥三五服不退便於臍下一寸灸之須是大段日夜不住手灸不限多少壯數灸之仍艾炷勿令小小則不得力若其手足冷小腹硬卽須更於臍下兩邊各一寸各安一道三處臍下灸仍與當歸四逆湯并返陰丹

亦須頻服內外通逐方得解退若遲慢卽便死矣若是陰證加以小腸不通及陰囊縮入小腹絞痛欲死者更於臍下二寸石門穴大段急灸之仍須與返陰丹當歸四逆加吳茱萸生薑湯慎勿與尋常利小便藥也尋常利小便多是冷滑藥此是陰毒氣在小腹所致也世有醫者見小便不通便用炒鹽及裏熱藥於臍下便熨欲望小便通緣陰氣在小腹之間致被熱物熨著

無處出得即便奔上衝心往往有死者南陽

活人書同汞類鈴方右用鐵銚先鋪玄精末次

硝石末一半中間下硫末以餘硝末蓋硫

黃以餘玄精末一半蓋上訖用小琖合著

以炭三斤燒令得所令烟出多急取瓦盆

合地上四向以灰蓋勿令烟出候冷取出

細研後三味為末同研細軟飯和丸梧子

大每服一二十丸艾湯下汗出為度喘促

吐逆入口便住服此煎證未退灸臍下乙

寸不限壯數其人手足冷小腹硬更灸臍

下兩邊各乙寸仍與當歸四逆湯加吳茱

萸生姜湯或陰囊縮入小腹絞痛欲死者

更於臍下三寸石門穴急灸以大艾壯蓋

陰毒証慎勿利其小便也

葱啗熨法治氣虛陽脫體冷無脉氣息欲絕

不省人事及傷寒陰厥百藥不效者

葱一束以索纏如餅餡大傷寒指掌去根

葉唯存白長二寸許得效方許先以火熂一

面令通熱勿至灼人乃以熱處著病人臍
 下上以熨斗盛火熨之令葱餅熱氣透入
 腹中更作三四餅遇一餅壞不可熨即易
 一餅候病人醒手足溫有汗乃差更服四
 逆湯良經驗良方同指掌圖若熨○傷寒
 活人書右用葱以索纏如臂許大聖濟總錄以麻
縷纏如切去根及葉唯存白長二寸許如
盞許大大餅餤先以火煨一面令通熱又勿令灼
 人乃以熱處搭總錄病人臍連臍下其上

以熨斗滿貯火熨之令葱餅中熱氣鬱鬱
 入肌肉中須更作總錄三四餅一餅壞不

可熨又易一餅良久病人當漸醒手足溫
 有汗即差更服四逆湯以溫其內昔曾有
 患傷寒冥冥不知人四體堅冷如石藥不
 可入用此遂差無求子活人書南陽活人
書王氏集驗方永類鈔方

陽毒為病躁熱面赤咽痛身斑色如錦紋下

利赤黃內外結熱舌焦鼻黑類如烟煤妄言
狂走多因腸胃燥熱陽氣獨盛陰氣暴絕妄
服燥藥熱食所致

升麻湯治陽毒傷寒一二日便成陽毒或服
藥吐下後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤
狂言或走或見鬼或下利面赤斑斑如錦紋
咽喉痛下膿血脈大浮數五日可治七日不
可治

升麻 半兩。傷寒活人書 犀角屑 射干

黃芩 人參 甘草 炙各一分

右爲判散每服五錢匕水一盞煎七分去
滓熱服併進三四服溫覆汗出爲度○活
人書右判如麻豆大水三升煎取一升半
去滓飲一湯盞食頃再服溫覆手足出汗
未解重作得效方云甚者大承氣湯除厚
朴加木通甘草人腹皮桃仁各一兩以利
爲效 方見宜明論
梔子仁湯治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

利赤黃內外結熱舌焦鼻黑類如烟煤妄言
在走多因腸胃燥熱陽氣獨盛陰氣暴絕妄
服燥藥熱食所致

升麻湯治陽毒傷寒一二日便成陽毒或服
藥吐下後變成陽毒腰痛煩悶不安面赤
狂言或走或見鬼或下利面赤斑斑如錦紋
咽喉痛下膿血脈大浮數五日可治七日不
可治

升麻 半兩。傷寒活人書 犀角屑 射干

黃芩 人參 甘草 炙各一分

右為剉散每服五錢匕水一盞煎七分去
滓熱服併進三四服溫覆汗出為度。活
人書右剉如麻豆大水三升煎取一升半
去滓飲一湯盞食頃再服溫覆手足出汗
未解重作得效方云甚者大承氣湯除厚
朴加木通甘草人腹皮桃仁各一兩以利
為效 方見宜明論

梔子仁湯治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

梔子仁炒 赤芍藥 大青 知母各一升

麻 黃芩 石膏 杏仁去皮尖 柴胡一兩

半 甘草炙半兩○得效方

升麻以下各半兩 右剉散每服四大錢水一盞姜三片豉二

十粒同煎七分去滓不以時服○無求子

活人書梔子人大青赤芍藥知母各一兩 柴

胡一兩半 川升麻黃芩石膏各貳兩○南

去苗 甘草半兩炙 杏仁貳兩湯浸去皮尖

兩 右件擣為麤末每服抄四錢水一中盞入

生薑半分豉一百粒煎至六分大泮温服

不計時候傷寒活人書同 傷寒指掌圖發狂煩躁

大面赤咽痛熱潮梔子仁赤芍藥大青知母

各一錢 升麻黃芩石膏杏仁各二錢 柴胡一錢

甘草半兩 豉一百粒 水三盞煎至一盞半去滓

分二服袖珍方通口

結胃證治

結胃證者心下堅滿按之石鞭而痛心膈高
起手不得近項強如柔痙狀此本傷寒身熱

醫下之早熱氣乘虛而入痞結不散之所致也若脉浮大皆不可下下之則死尚宜發汗若沉緊者宜以大小陷胃湯量輕重而下之又結胃有不按而痛者有按而痛者有水結在胃脇間但頭汗出者有熱實結者有寒實結者治之不可不知其輕重也各有正方大陷胃湯治傷寒表未解醫反下之鬲內拒痛手不可近短氣煩躁心中懊憹心下鞭大便不通舌燥而渴熱實脉沉而緊又治身無

大熱有小結在胃脇間者

大黃半兩芒消四錢○得甘遂半錢○得右各為末水三盞先煮大黃至一大盞入

消煮鎔下甘遂末煮一沸分二服得利止

○醫方大成治傷寒表証未解而誤下之

則熱畜于裏小便不利身體發黃為結胃

之證脉沉而緊心下痛按之如石手不可

近者此藥主之大黃夫皮一分芒

硝一兩八錢半右咬咀每服五錢水盞半煎八

分去滓再下芒硝煎一二沸入甘遂末温服快利為愈醫方集成南北經方同

小陷胃湯治結胃病正在心按之則痛脉浮滑者

黃連一分半夏一分湯洗去滑六錢○括樓實用不

四分之二○得效方良方一箇用四分之

右為剉散水二盞先煎括樓至盞半人前

藥煎至六分去滓分二服利黃涎沫即安

得效方又云一方加枳實六錢累用有效○醫方

大成治傷寒結胃心下緊滿而痛按之如

石脉浮者是半夏湯洗秤六錢黃連一分括樓實

一故用四分之一右咬咀每服五錢水盞半煮括

樓至一盞却下諸藥取八分去滓温服以

微吐黃涎為愈醫方集成南北經方同

大陷胃圓治得效方此下有熱病發於陽而

反下之熱入因作結胃以下之太早故也其

病項強如柔痙狀下之則和

大黃二兩葶藶炒杏仁去皮炒芒消各三分

右前二味為末將杏仁芒消合研為脂和藥取如彈子大一枚別杵甘遂末一錢匕白蜜一大匕水二盞煎至七分頓服之一宿乃下如不下更服取下為效甘遂性猛宜斟酌虛實入之得效方同

胃痞證治

胃痞證者胃中不和心下堅硬乾嘔惡寒汗出噫氣不除亦有因傷寒身冷醫反下之遂或骨痞

枳實理中圓治傷寒及諸吐利後得效方治胃及傷寒諸吐利後胃痞欲絕膈高起急痛手不得近

枳實去穢炒 茯苓 人參 白朮 乾姜炮

甘草炙各等分

右為末蜜和一兩作四圓熱湯化下渴加

括樓根下利加牡蠣粉各等分醫方大成

經驗方補珍方同得効 ○無求子活人書

茯苓 人參 白朮 乾薑炮 甘草炒各 枳實六

片炙 右搗羅為細末煉蜜為圓如雞子黃

大每服一圓熱湯化下連進二三服

易長指掌

圖胃中豁然渴者加括樓根貳兩下利者

加牡蠣二兩煨之

桔梗枳殼湯治中寒氣痞胃滿欲死

桔梗 枳殼 蘇炒去穢各一分○無求子活人書各一兩

右為剉散每服五錢匕水一盞半煎七分

去滓食前服○無求子活人書右剉如麻

豆大以水二盞煎至壹盞去滓分二服得

效方枳殼 去穢蘇炒 桔梗 去穢蘇炒 甘草 各等分 右剉散

每服五錢水壹盞半煎七分食前服痰多

加半夏生薑有熱加黃芩

三黃湯治傷寒陰證下之太早致心下痞按之輒其脉關上浮者主之若未解未可攻宜先隨風寒二證投桂枝麻黃湯表解已即服此方

大黃 蒸 黃連 黃芩 得効方去心

右為剉散每服五錢沸湯二盞熱漬之一時久去滓分二服暖服或汗出惡寒加附

子別煎汁入一合同服

半夏瀉心湯治心下痞滿而不痛者

半夏湯洗七次黃芩得効方人參得効方

甘草炙乾姜炮各黃連半

右剉散每服五錢得効方水蒸半姜五片

棗一箇煎七分去滓溫服或傷寒中風醫

反下之下利日數十行穀不化腹中鳴心

下痞硬乾嘔心煩者加甘草半兩人參一

兩名甘草瀉心湯或汗出解後胃中不和

心下痞硬乾噎食臭脇下水鳴下利者加

生姜一兩減乾姜一兩餘如正方名生姜

洗心湯得効方此下云一方治痰熱心胃

服參十五圓米飲下特

勞復證治

傷寒新差後不能將攝因憂愁思慮勞神而

復或梳沐洗浴作勞而復並謂之勞復或飲

食不節謂之食服此皆大病後精神血氣腸

胃並虛之所致也論有正方可依證調治唯

犯房室為女勞復多死不治

白朮散方見和劑局方

陰陽易證治

陰陽易者其男子病新差未平復而婦人與之交接得病名曰陽易裏急腰踝連腹內痛婦人病新差未平復而男子與之交接得病名曰陰易身重少氣陰腫入裏腹內絞痛熱上衝骨頭痛不欲舉眼中生花蓋男女病相換易故謂之陰陽易治

燒禪散

方見傷寒論注解

猥鼠糞湯治丈夫傷寒病後女人與之交接

病名陽易

韭根

去青一握約徑寸半猥鼠糞十四枚兩頭尖者是

右二味水一盞煎至半盞

醫方大成集成南北經驗方袖

珍方煎去滓溫溫頓搗粘汗出為効未知

再作○無求子活人書療傷寒病後男子

陰易及諸般勞復韭根

把一大猥鼠糞十四枚兩

者頭尖右二味水二升煎取半升傷寒指掌圖水二盞

煎取七分去滓再煎三沸溫溫盡服必有粘汗出為効未汁再作服南陽活人書傷寒法

發斑證治

傷寒發斑者蓋不當下而下之熱則乘虛入胃常下而失下則胃熱不得泄二者皆能發斑其狀如錦紋赤者易治黑者難治蓋熱毒入胃深也

玄參升麻湯治傷寒失下不當下而下之熱毒在胃發斑如錦紋無求子活人書治傷寒發汗吐下後毒氣不散

表虛裏實熱發於外故身斑如錦紋甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛

玄參 升麻 甘草炙各半兩

右為剉散每服五錢匕水盞半煎七分去

滓溫服溫毒亦能發斑傷寒活人書○醫

方大成右咬咀每服四錢水一盞煎七分

溫服醫方集成南北經驗方補珍方同

壞傷寒證治

壞傷寒者以醫者不辨陰陽錯謬汗下置病

不解壞證亂經又傷寒過經熱留藏府病候
 數變久而不差陰陽無復紀律皆名壞病
 知母麻黃湯治壞傷寒以傷寒差後經久精
 神不守言語錯謬或潮熱頰赤寒熱如瘧昏
 沉不愈皆由汗下不止毒在心包間所致也
 知母兩半麻黃節去甘草炙芍藥中黃芩小桂
 心各半
 右為剉散每服五錢水一盞半煎七分去
 滓溫服日三四服若心煩欲飲水稍稍與

之得効方同○無求于活人書傷寒差後或十
 數日或半月二十日終不惺惺常昏沉似
 失精神言語錯繆又無寒熱鑿或作鬼祟
 或作風疾多般治不差或朝夕潮熱頰赤
 或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心
 胞絡間所致知母一兩半麻黃去節甘草炙芍
 藥黃芩各半桂枝去皮半兩盛暑中右剉
 如麻豆大每服抄五錢方三錢水一盞半
 煎至八分去滓溫服半日可相次二三服

溫覆令微汗若心煩不眠欲飲水當稍稍
與之令胃中和即愈未汗須再服傷寒活
人書得

效方
同

無憂散治傷寒調理失序毒氣內結胃腹脹
滿坐卧不安日久不差狂躁妄語大小便不
通或復吐逆

臈月黃牛膽

以天南星為末入膽內縛令
緊當風避日懸之候乾取用

右為末以人參半兩煎湯七分盞調末二
錢乘熱服連頃更以熱人參湯投之或睡

便溺下黃黑惡物是效

得効
方同

黑奴圓治傷寒調理失序醫所不治及時行
疫病六七日不汗脉洪數面赤目瞪身熱煩
躁狂言欲走大渴或口噤精魂已散但心下
暖幹開口灌藥下咽即活治陽毒發斑

麻黃

去節

大黃

各二兩

芒消

釜底煤

別研

梁塵

別小麥奴

竈突墨

各一兩
別研

右為末煉蜜丸彈子大新汲水研下壹丸
渴者與冷水盡飲之須臾當寒寒竟汗出

便差若日移五尺不汗依前法服一丸差

須病人太渴乃可與之不渴者莫服得效方同

○無求子活人書治時行熱病六七日未

得汗脉洪大或數面赤目脹身體大熱煩

躁狂言欲走大渴甚又五六日已上不解

熱在胃中口噤不能言為壞傷寒豎所不

治為死或人精魂已竭心下纔暖發問其

口灌藥下咽即活兼治陽毒及發斑黃芩

一兩釜底煤研入大黃一兩一分芒消竈突

黑研入梁上塵小麥奴小麥未熟時叢中不

也無此亦麻黃去節泡一貳沸焙乾秤一

得各一兩錄三右件搗羅為細末鍊蜜為圓如彈子

大以新汲水研下傷寒指掌一圓渴者但

與冷水盡足飲之須臾當寒寒竟汗出便

差若日移五尺指掌圖若不汗依前法服

一圓即止須微利此藥須是病人太渴倍

常躁盛渴者乃半匙放溫冷服之須臾躁

止得睡汗出即差

狐惑證治

狐惑證者默默欲眠目不得瞑惡飲食面目乍赤乍白乍黑齒無色舌上白聲啞咽乾此因大病後腸胃空虛三虫求食食入五臟食其喉則為惑其聲啞食下部則為狐其咽乾當看上唇有瘡虫食其藏下唇有瘡虫食其

肝 桃仁湯

桃仁去皮 槐子 碎艾各一兩

右剉散每服五錢水大盞姜三片棗兩枚煎七分去滓食前服之得効方同 ○無求子活

人書治蠶女力切 槐子碎一兩 艾兩 大棗十五

核去 桃仁一兩 尖去 皮右 以水二大盞半煎

一盞傷寒指掌圖 傷寒不發汗變狐惑唇生瘡聲啞桃仁槐

子艾各半兩 棗十五枚 水二大盞半煎至一盞

半分二服

黃連犀角湯治傷寒及諸病後內有瘡出下

黃連犀角湯治傷寒及諸病後內有瘡出下

部傷寒指掌

黃連兩犀角一兩無則烏梅柴木香○得

效方

右為剉散每服五錢水盞半煎七分去滓

食前服王氏集驗方每服三錢○無求子

活人書右以水二大盞永類鈔煎至一

盞半分三服傷寒活人書

雄黃兌散治下部蠱瘡傷寒指掌圖狐

雄黃研青箱子 苦參 黃連各貳分○

二桃仁去皮尖

右為末以生艾搗汁和如棗核大指掌圖

大絲裏內下部扁竹汁更加無求子活人

書得效無艾諸方冬只用絲裏散子內下

部亦得永類鈔

譚語證治

病有言語錯謬者其證有二有虛有實虛則
鄭聲實則譚語傷寒胃實及三陽合病婦人
熱入血室及下利而譚語者皆屬實大小便

利手足逆冷脉微細言語鄭重者皆屬虛寒
治之各有方虛寒當溫之如四逆湯之類胃
實宜下承氣湯婦人熱入血室下小柴胡湯
若譫語而反四逆脉沉細者不治

四逆湯

方見傷寒論注解

柴胡湯

方見少陽經

大承氣湯

方見陽明經

病後虛煩證治

大病後心虛煩悶發熱與傷寒相類但不惡
寒與不頭疼為異汗與人參竹葉湯嘔者橘

皮湯諸病後多有此證各見本門

人參竹葉湯治汗下後表裏虛煩不可攻者

竹葉二人參

甘草炙各二兩

半夏

二兩

石膏

麥門冬各五兩

右為剉散每服五大錢水一盞半姜五片

粳米一撮煎米熟去滓食前服

橘皮湯治動氣在下不可發汗發之反無汗
心中大煩骨節疼痛目運惡寒食則反嘔穀
不得入宜服此方

橘皮一兩 甘草炙半兩 人參一分 竹茹半兩

右剉散每服五錢水一盞得効方 姜三片

棗一箇煎至七分去滓食前服之

君火論

五行各一唯火有二者乃君相之不同相火則麗于五行人之日用者是也至於君火乃二氣之本源萬物之所資始人之初生必投生於父精母血之中而成形精屬腎腎屬水故天一而生水血屬心心屬火故地二而生

火識為玄玄屬水故天三而生水乃太一含三引六之義也亦道生一一生二二生三之數也則知精血乃財成於識以識動則暖靜則息靜息無象暖觸可知故命此暖識以為君火正內典所謂暖識息三連持壽命者是也然其所以謂之君者以不行炎暑象君之德萬物資始象君之化位居少陽象君之政神明出入象君之令故君亦天也天亦君也乾以元亨利正而運行於其上君以德化政

令而輔成於其下天道順序則生長化收藏
不失其時君道助順故進退存亡不失其正
其實皆一理也成象取法雖主配於心腎推
而明之一點精明無物不備是宜君火之用
上合昭昭下合冥冥與萬物俱生而無所間
斷也醫者苟不明此皆墮於術數伎藝與夫
瞽史之用易拘拘於卜筮休咎之中吾見其
大蔽聖人之道未聞有益於天下後世也悲
夫

五運論

夫五運六氣乃天地陰陽運行升降之常道
也五運流行有太過不及之異六氣升降則
有逆從勝復之差凡不合於德化政令者則
爲變青皆能病人故經云六經波蕩五氣傾
移太過不及專勝兼并所謂治化人應之也
或遇變青聿興災沴因鬱發以亂其真常不
德而致折復隨人藏氣虛實而爲病者謂之
時氣與夫感冒中傷天行疫沴類然不同前

哲知夫天地有餘不足違戾之氣還以天地所生德味而平治之經綸昭然人鮮留意恐成湮沒故敘而紀之

五運時氣民病證治

凡遇六壬年發生之紀歲水太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減體重煩冤腸鳴脇支滿甚則忽忽善怒眩冒顛疾為金所復則反脇痛而吐甚則衝陽絕者死
苓朮湯治脾胃感風飧泄注下腸鳴腹滿四

肢重滯忽忽善怒眩冒顛暈或左脇偏疼

白茯苓 厚朴 姜汁製炒 白朮 青皮 乾姜

炮半夏 湯 枳實 去 甘草 炙各 人參

右剉散每服四錢水盪半姜三片棗兩枚

煎七分去滓食前服之 永類鈔方同

凡遇六戊年赫曦之紀歲火太過炎暑流行肺金受邪民病瘧少氣欬喘血溢泄瀉隘燥耳聾中熱肩背熱甚胃中痛脇支滿背髀并兩臂痛身熱骨痛而為浸淫為水所復則反

譫妄狂越欬喘息鳴血溢泄瀉不已甚則大
淵絕者死

麥門冬湯治肺經受熱上氣欬喘咯血痰壅
嗑乾耳聾泄瀉胃脇滿痛連肩背兩臂膊疼
息高

麥門冬去心香白芷 半夏湯洗竹葉

草炙鍾乳粉 桑白皮 紫苑取人參

右剉散每服四錢水盞半姜二片棗一枚

煎七分去滓食前服 永類鈐方同

凡遇六甲年堆阜之紀歲土太過雨濕流行

腎水受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩冤

甚則肌肉痿足痿不收行善瘕脚下痛中滿

食減四肢不舉為風所復則反腹脹溇泄腸

鳴甚則大谿絕者死

附子山茱萸湯治腎經受濕腹痛寒厥足痿

不收腰脰痛行步艱難甚則中滿食不下或

腸鳴溇泄

附子炮去皮山茱萸各一兩木瓜乾各一兩烏梅各半

兩半夏湯洗去滑肉豆蔻各一分丁香類

藿香各一分

右剉散每服四錢水盞半姜錢七片棗一

枚煎七分去滓食前服

凡遇六庚年堅成之紀歲金大過燥氣流行

肝木受邪民病脇小腹痛目赤皆痒耳無聞

體重煩冤胃痛引背脇滿引小腹甚則喘嗽

逆氣背肩尻陰股膝髀膂足痛為火所復

則暴痛肢脇不可反側欬逆甚而血溢太衝絕者死

牛膝木瓜湯治肝虛遇歲氣燥濕更勝脇連

小腹拘急疼痛耳聾目赤欬逆肩背連尻陰

股膝髀膂皆痛悉主之

牛膝酒浸木瓜各一兩芍藥 杜仲去皮姜製

枸杞子 黃松節 鬼絲子酒浸天麻各一分

甘草炙半兩

右剉散每服四錢水盞半姜三片棗一枚

煎七分去滓食前服 永類鈐方同

凡遇六丙年漫衍之紀歲水太過寒氣流行邪害心火民病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛甚則腹大脛腫喘欬寢汗憎風為土所復則反腹滿腸鳴溇泄食不化渴而妄冒甚則神門絕者死

川連茯苓湯 永類鈐方黃連茯苓湯 治心虛為寒冷所

中身熱心躁手足反寒心腹腫病喘咳自汗甚則大腸便血

黃連 茯苓 各一兩 麥門冬 去心 車前子 炒通

草 遠志 去心姜汁製 半夏 湯洗去滑 黃芩

甘草 炙各一分

右剉散每服四錢水盞半姜錢七片棗一枚煎七分去滓食前服

遇六丁年委味之紀歲木不及燥乃盛行民病中清脘脇小腹痛腸鳴溇泄為火所復則反寒熱瘡瘍痲癰腫欬而魀菴蓉牛膝湯治肝虛為燥熱所傷脘脇并小

腹痛腸鳴溏泄或發熱遍體瘡瘍咳嗽肢滿
鼻鼾

肉蓯蓉酒浸牛膝酒浸木瓜乾 白芍藥 熟

地黃 當歸 甘草各等分

右為剉散每服四錢水盞半姜三片烏梅
半箇煎七分去滓食前服筋痿脚弱鎊鹿

角屑同煎永類鈐方同

遇六癸年伏明之紀歲火不及寒乃盛行民
病胷痛脇支滿臂背肩胛兩臂內痛鬱冒矇

昧心痛暴瘖甚則屈不能伸體髀如別為土
所復則反驚溏食飲不下寒中腸鳴泄注腹
痛暴攣痿痺足不能任身

黃芪伏神湯治心虛挾寒心胷中痛兩脇連
肩背肢滿噎塞鬱冒矇昧體髀攣痛不能屈
伸或下利瀉泄飲食不進腹痛手足痿痺不
能任身

黃芪 伏神 遠志去心姜汁淹炒紫河車 酸

棗仁炒各等分

右判散每服四大錢水盞半姜三片棗一
个煎七分去滓食前服永類鈔方同

遇六已年卑監之紀歲土不及風氣盛行民
病飧泄霍亂體重腹痛筋骨繇併肌肉羸酸
善怒為金所復則反胃脇暴痛下引小腹善
太息氣客於脾食少失味

白朮厚朴湯治脾虛風冷所傷心腹脹滿疼
痛四肢筋骨重弱肌肉羸動酸癢善怒霍亂
吐瀉或胃脇暴痛下引小腹善太息食少失味

白朮姜炒厚朴半夏湯洗桂心 藿香 青

皮各三兩乾薑炮甘草炙各半兩

右判散每服四錢水盞半姜三片棗一枚
煎七分去滓食前服之永類鈔方同

遇六乙年從革之紀歲金不及炎火盛行民
病肩背脊重鼾嚏血便注下為水所復則反
頭腦戶痛延及顛頂發熱口瘡心痛
紫苑湯治肺虛感熱咳嗽喘滿自汗衄血肩
背脊重血便注下或腦戶連顛頂痛發熱口

瘡心痛

紫苑茸 白芷 人參 甘草 炙 黃芪

地骨皮 杏仁 去皮尖 桑白皮 炙各等分

右剉散每服四錢水盞半棗一枚姜三片

煎七分去滓食前服之 永類鈐方同

遇六辛年涸流之紀歲水不及濕乃盛行民
病腫滿身重濡泄寒瘍腰膈股膝痛不便
煩寃足痿清厥脚下痛甚則附腫腎氣不行
為木所復則反面色時變筋骨併辟肉腠瘳

目視眩瞶肌肉胗發氣并鬲中痛於心腹
五味子湯治腎虛坐卧濕地腰膝重著疼痛
腹脹滿濡泄無度行步艱難足痿清厥甚則
浮腫面色不常或筋骨併辟目視眩瞶膈中
咽痛

五味子 附子 炮去皮 巴戟 去心 鹿茸 燎去毛

山茱萸 熟地黃 杜仲 製炒各等分

右剉散每服四錢水盞半姜七片塩少許

煎七分去滓食前服之 永類鈐方同

凡六壬六戊六甲六庚六丙歲乃木火土金水太過五運先天六丁六癸六巳六乙六辛歲乃木火土金水不及爲五運後天民病所感治之各以五味所勝調和以平爲期

六氣敘論

夫陰陽升降在天在泉上下有位左右有紀地理之應標本不同氣應異象逆順變生太過不及悉能病人世謂之時氣者皆天氣運動之所爲也今先次地理本氣然後以天氣

加臨爲標有勝有復隨氣主治則悉見病源矣

本氣論

自大寒後至春分厥陰風木爲一主氣 春分至小滿少陰君火爲二主氣 小滿至大暑少陽相火爲三主氣 大暑至秋分太陰濕土爲四主氣 秋分至小雪陽明燥金爲五主氣 小雪至大寒太陽寒水爲六主氣 凡一氣所管六十日八十七刻半爲本氣後

以天之六氣臨御觀其逆從以藥調和使上下合德無相奪倫此天地之紀綱變化之淵源不可不深明之

六氣時行民病證治

辰戌之歲太陽司天太陰在泉氣化運行先天之初氣乃少陽相火加臨厥陰風木民病瘟身熱頭疼嘔吐肌腠瘡瘍二之氣陽明燥金加臨少陰君火民病氣鬱中滿三之氣太陽寒水加臨少陽相火民病寒反熱中癰疽

注下心熱脅悶四之氣厥陰風木加臨太陰濕土風濕交爭民病太熱少氣肌肉痿足痿注下赤白五之氣少陰君火加臨陽明燥金民氣乃舒終之氣太陰濕土加臨太陽寒水民乃慘悽孕死治法用甘溫以平水酸苦以補火抑其運氣扶其不勝
靜順湯治辰戌歲太陽司天太陰在泉病身熱頭痛嘔吐氣鬱中滿脅悶少氣足痿注下赤白肌腠瘡瘍發爲癰疽

白茯苓 木瓜乾 各一兩 附子 炮去皮 牛膝 酒浸

各三分 防風 去核 訶子 炮去核 甘草 炙 乾

姜 炮各半兩

右為剉散每服四大錢水盞半煎七分去滓食前服其年自大寒至春分宜去附子加枸杞半兩自春分至小滿依前入附子枸杞自小滿至大暑去附子木瓜乾姜加人參枸杞地榆香白芷生姜各三分自大暑至秋分依正方加石榴皮半兩自秋分

至小雪依正方自小雪至大寒去牛膝加歸當芍藥阿膠炒各三分

卯酉之歲陽明司天少陰在泉氣化運行後天初之氣太陰濕土加厥陰木此下尅上民病中熱脹面目浮腫善服鮑衄嚏欠嘔吐小便黃赤甚則淋二之氣少陰相火加少陰君火此臣居君位民病癘大至善暴死三之氣陽明燥金加少陽相火燥熱交合民病寒熱四之氣太陽寒水加太陰濕土此下土尅上

水民病暴仆振慄譫妄少氣咽乾引飲心痛
癰腫瘡瘍寒瘧骨痠使血五之氣厥陰風木
加陽明燥金民氣和終之氣少陰君火加太
陽寒水此下剋上民病溫治法宜鹹寒以抑
火辛甘以助金汗之清之散之安其運氣
審平湯治卯酉之歲陽明司天少陰在泉病
者中熱面浮鼻鼾小便赤黃甚則淋或癘氣
行善暴仆振慄譫妄寒瘧癰腫便血

遠志去心姜製炒 紫檀香各屑兩 天門冬去心 山茱

黃各分 白朮 白芍藥 甘草 炙 生姜各兩

右剉散每服四錢水盞半煎七分去滓食
前服自大寒至春分加白茯苓易洗 半夏去滑
紫蘇生姜各半兩自春分至小滿加玄參
白薇各半兩自小滿至大暑去遠志山茱
萸白朮加丹參澤瀉各半兩自大暑至秋
分去遠志白朮加酸棗仁車前子各半兩
自秋分直至大寒並依正方永類鈔方同

寅申之歲少陽相火司天厥陰風木在泉氣
 化運行先天初之氣少陰君火加厥陰木民
 病溫氣拂於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇
 滿膚腠中瘡二之氣太陰土加少陰火民病
 熱鬱欬逆嘔吐胃臆不利頭痛身熱昏憤膿
 瘡三之氣少陽相火加相火民病熱中聾瞶
 血溢膿瘡欬嘔眦眦渴嚏欠喉痺目赤善暴
 死四之氣陽明金加太陰土民病滿身重五
 之氣太陽水加陽明金民避寒邪君子周密

終之氣厥陰木加太陽水民病開閉不禁心
 痛陽氣不藏而欬治法宜鹹寒平其上辛溫
 治其內宜酸滲之泄之瀆之發之
 升明湯治寅申之歲少陽相火司天厥陰風
 木在泉病者氣鬱熱血溢目赤咳逆頭痛脇
 滿嘔吐胃臆不利聾瞶渴身重心痛陽氣不
 藏瘡瘍煩躁

紫檀香 車前子炒 青皮 半夏湯洗 酸棗
 仁 薤白 生薑 甘草炙各半兩

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分去滓
食前服自大寒至春分加白薇玄參各半
兩自春分至小滿加丁香一錢自小滿至
大暑加漏蘆升麻赤芍藥各半兩自大暑
至秋分加茯苓半兩自秋分至小雪依正
方自小雪至大寒加五味子半兩永類鈔方同
丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉氣
化運行後天初之氣厥陰風木加風木民病
血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿二之氣

大火正乃少陰君火加君火民病溫癘盛行
遠近咸若三之氣太陰土加少陽火民病身
重肘腫胃腹滿四之氣少陽相火加太陰土
民病腠理熱血暴溢瘧心腹膜脹甚則浮腫
五之氣陽明燥金民病皮膚寒氣及體終之
氣太陽寒水加寒水民病關節禁固腰膝痛
治法用酸以平其上甘溫治其下以苦燥之
溫之甚則發之泄之贊其陽火令禦其寒
備化湯治丑未之歲太氣濕土司天太陽寒

水在泉病者關節不利節脈拘急身重萎弱
或溫癘盛行遠近咸若或胃腹滿悶甚則浮
腫寒瘧血溢腰腫痛

木瓜乾

茯神

去木各一兩

牛膝

酒浸附子炮去

各三分

熟地黃

覆盆子

各半兩

甘草

一分生薑

三分

右為剉散每服四大錢水盞半煎七分去
滓食前服自大寒至春分依正方自春分
至小滿去附子加天麻防風各半兩自小

滿至大暑加澤瀉三分自大暑直至大寒

並依正方

永類鈔方同

子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉氣
化運行先天初之氣太陽水加厥陰木民病
關節禁固腰腫痛中外瘡瘍二之氣厥陰風
木加少陰君火民病淋目赤氣鬱而熱三之
氣少陰君火加少陽火民病熱厥心痛寒熱
更作欬喘目赤四之氣太陰土加濕土民病
黃痺鼽衄嗑乾吐飲五之氣少陽火加陽明

金民乃康終之氣陽明金加太陽水民病上
腫欬喘甚則血溢下連少腹而作寒中治法
宜鹹以平其上苦熱以治其內鹹以奠之苦
以發之酸以收之

正陽湯治子午之歲少陰君火司天陽明燥
金在泉病者關節禁固腰痛氣鬱熱小便淋
目赤心痛寒熱更作咳喘或鼻鼾噎咽吐飲
發黃瘴喘甚則連小腹而作寒中悉主之

白薇 玄參 川芎 桑白皮炙 當歸

芍藥 旋覆花 甘草炙 生姜各半兩

右為剉散每服四錢水盪半煎七分去滓
食前服自大寒至春分加杏仁升麻各半
兩自春分至小滿加茯苓車前子各半兩
自小滿至大暑加杏仁麻仁各一分自大
暑至秋分加荆芥茵陳蒿各一分自秋分
至小雪依正方自小雪至大寒加紫蘇子
半兩永類鈔方同

巳亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉氣

化運行後天初之氣陽明金加厥陰木民病
 寒於右脇下二之氣太陽水加少陰火民病
 熱中三之氣厥陰木加少陽火民病淚出耳
 鳴掉眩四之氣少陰火加太陰土民病黃瘡
 肘腫五之氣太陰土加陽明金燥濕相勝寒
 氣及體終之氣少陽火加太陽水此下水剋
 上火民病瘟癘治法宜用辛涼平其上鹹寒
 調其下畏火之氣無妄犯之
 敷和湯治巳亥之歲厥陰風木司天少陽相

火在泉病者中熱而反右脇下寒耳鳴淚出
 掉眩燥濕相搏民病黃瘡浮腫時作瘟癘
 半夏湯洗棗子 五味子 枳實炒茯苓
 訶子炮去核 乾姜炮 橘皮 甘草炙各半兩
 右為剉散每服四錢水盞半煎七分去滓
 食前服自大寒至春分加鼠粘子一分自
 春分至小滿加麥門冬去心山藥各一分
 自小滿至大暑加紫苑一分自大暑至秋
 分加澤瀉山梔仁各一分自秋分直至大

寒並依正方永類鈔方同

六氣凡例

凡六氣數起於上而終於下歲半之前自大寒後天氣主之歲半之後自大暑後地氣主之上下交互氣交主之司氣以熱用熱無犯司氣以寒用寒無犯司氣以涼用涼無犯司氣以溫用溫無犯司氣同其主亦無犯異主則少犯之是謂四畏若天氣反時可依時及勝其主則可犯以平為期不可過也

四季疫證治

病者發熱腰痛強急脚縮不伸脰中欲折目中生花或漚漚增寒復熱頸中雙筋牽不得屈伸項直背強眼赤黃欲轉動合口回側病名青筋牽者由春三月其源從厥陰涉足少陽少陽之氣始發少陰之氣始衰陰陽怫鬱於腠理腑臟受厲而生若腑虛則為陰邪所傷故發熱若臟實則為陽毒所損故增寒治青筋牽肝腑臟溫病陰陽毒膽腑虛為陰

邪所傷腰脇強急脚縮不伸脰中欲折目中
生花色蒼蒼者

柴胡去苗五兩 茯苓 梔子仁 半夏湯洗 大青

各三兩 桂心 竹茹 香豉 甘草炙各一兩

右剉散每服五錢水二盞姜五片煎七分
去滓空心温服

治青筋牽肝腑臟温病陰陽毒肝臟實為陽
毒所傷漚漚惡寒翕翕發熱頸外雙筋牽不
得屈伸項直背強眼赤黃轉動則合身回側

色蒼蒼者

玄參一兩 紉辛二兩 杏子仁 黃芩 升麻

芒消各三兩 石膏煨八兩

右為剉散每服五錢水二盞入車前草三
葉淡竹葉七片煎七分去滓空心服

病者脉促身顛掉不能禁或肉熱口乾舌破
咽塞聲嘶病名赤脉攢者以夏三月其病從
少陰太陽之氣相搏而停則榮衛不通皮肉
痛起太陽發動少陰淫邪之氣因而作厲則

臟腑隨時受夏疫病也若腑虛為陰邪所傷則寒戰若臟實為陽毒所侵則肉熱
治赤脉攢心腑臟溫病陰陽毒心臟實則為陽毒所傷肉熱口乾舌破咽塞聲嘶色焦赤者

天門冬去心麥門冬去心車前子炮梔子仁

黃芩升麻寒水石煨甘草炙各等分

右為剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

病者頭重頸直皮肉強痺或蘊而結核起於喉頸之側布熱毒於皮膚分肉之中上散入髮際下貫顛顛隱隱而熱不相斷离病名黃肉隨以四季各十八戊巳日其病從太陰陽明相格寒濕不調關節格滯若腑虛則皮肉強痺若臟實則布毒熱於皮膚
治黃肉隨脾腑臟溫病陰陽毒胃腑虛則為陰邪所傷頭重頸直皮肉強痺膜脹色黃黑者

厚朴

姜制妙一兩半

白朮

陳皮

各一兩

乾姜

炮紫

蘇

甘草

炙

半夏

湯洗各三兩

右為剉散每服五錢水二盞煎七分去滓

食前服

治黃肉隨脾腑臟溫病陰陽毒臟實為陽毒所傷蘊熱結核起於喉頸之側布毒熱於皮膚分肉之中散入髮際下貫顛顛蓄熱不散

色黃者

葛根

蒼朮

泔

升麻

白芷

桔梗

青

皮

各一兩

大黃

半兩

右為剉散每服五錢水二盞煎七分去滓

食前服

病者乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆或體熱發斑喘欬引氣名白氣狸以秋三月源從陽明係手太陰受疫淫邪之氣若腑虛為陰邪所傷則乍寒乍熱臟實為陽毒所傷則體熱發斑

治白氣狸肺腑臟溫病陰陽毒大腸腑虛為

陰邪所傷寒熱互作上氣欬逆大腸飧泄色
皓皓白者

白朮 人參 各一兩 乾姜 炮 麥蘖 炒各三分 白茯苓

苓 五味子 肉豆蔻 草菓 烏梅

甘草 炙各半兩

右為剉散每服五錢水盞半煎七分去滓

食前服

治白氣狸肺腑臟溫病陰陽毒臟實為陽毒
所傷體熱肌膚發斑氣喘引飲色昏白者

紫苑茸 一兩 梔子仁 升麻 前胡 各三分 石

膏 煨半兩 葶蘆 炒一分 杏仁 去皮 甘草 炙各半兩

右為剉散每服五錢水二盞煎七分去滓

食前服

病者裏熱外寒意欲守火而反引飲腰痛欲
折或胃脇切痛類如刀刺不得轉動熱彭彭
服冷多則洞瀉病名黑骨溫以冬三月源從
足太陽少陰相搏蘊積壅塞若腑虛為陰毒
所傷則裏熱外寒若臟實為陽毒所損則彭

彭發熱

治黑骨溫腎腑臟溫病陰陽毒膀胱腑虛為陰邪所傷裏熱外寒煩渴引飲喜火腰脇滿痛小便赤黃面與脚俱黑

附子泡去皮臍茯苓各一兩山茱萸各半細辛各半

麻黃三分山藥澤瀉各半杏仁去皮尖一分

右為剉散每服五錢水兩盞煎七分去滓食前服

治黑骨溫腎腑臟溫病陰陽毒腎臟實為陽

毒所傷腰脇切痛不得轉動大小便秘澀小腹脹食冷則洞泄色熏黑

吳茱萸 黑牽牛炒桃仁去皮尖 葶藶大

黃杜仲去皮剉姜汁制炒絲斷

右為剉散每服五錢水兩盞煎七分去滓食前服

料簡諸疫證治

凡春分以前秋分以後天氣合清寒忽有溫暖之氣折之則民病溫疫春分以後秋分以

前大氣合濕熱忽有清寒之氣折之則民病寒疫治之各有法不可拘以日數汗下此且據方論一體而分既有寒溫二疫風濕亦宜備論如己未年京師大疫汗之死下之死服五苓散遂愈此無宅溫疫也以此爲法每年遇有不正之氣卽當紀而用之假如冬合寒時有溫暖之氣則春必患溫疫春合溫而有清涼之氣則夏必患燥疫夏合熱而有寒氣折之秋必病寒疫秋合清而反淫雨冬必病

濕疫此亦一途而推之更須以時斟酌不可偏執况疫之所興或溝渠不泄瀉其穢惡薰蒸而成者或地多死氣鬱發而成者或官吏枉抑怨讟而成者世謂獄溫傷溫墓溫廟溫社溫山溫海溫家溫竈溫歲溫天溫地溫等不可不究古法辟之川屠蘇酒務成子螢火圓李子建殺鬼煎老君神明散皆辟法惟劉根別傳令於州治太歲六合處穿地深三尺闊亦如之取淨沙三斛實之以醇酒三升沃

其上俾使君祝之此亦消除疫氣之良術所謂太歲六合者歲泄氣之所在故以厭禳敗毒散無求子活人書性涼治傷寒温疫風濕頭痛目昏眩四肢疼痛增寒壯熱項強眼睛痛尋常風眩拘急風痰並宜服之

羌活 獨活 人參 甘草 柴胡 前

胡 茯苓 枳殼炒 川芎 桔梗各等分

右為剉散每服四錢匕水一盞姜三片薄荷五葉煎七分去滓熱服寒多則熱服熱

多則温服傷濕加白朮脚痛加天麻本方為細末亦可點服初虞世究其方知出道藏乃敘云自非異人傑出志與神會則莫之敢為良可歎服煙瘴之地或温疫時行或人多風多痰多氣或處卑濕脚弱此藥不可缺也世人不師故常務作新奇蔽於俗學故備論之此藥治脚氣下注焮熱赤腫加大黃碁子大煎併進兩服立効○活人書羌活獨活前胡柴胡並去苗 芎藭枳殼

麩炒去穢白茯苓桔梗人參各一兩甘草半兩右

件擣羅為細末每服三錢生姜二片水一

盞煎至七分或沸湯點亦可老人小兒亦

宜日三二服以知為度瘴烟之地或溫疫

時行或人多風痰或處卑濕脚弱此藥不

可闕也南陽活人書同

喝起散○管見大全良方治疫疾大便秘小

便赤發熱頭痛煩渴

蒼朮泔浸○大全良麻黃去節荆芥各二兩石

膏兩煨三大黃兩栝樓根 乾葛 芍藥

白芷 甘草各一兩○大全良方炙

右為末每服二錢大全良方三錢 水盞半姜三片

葱白三寸煎至七分食前服大全良方去滓稍熱服無

時○袖珍方治秋冬傷風傷寒發散麻黃

葛根石膏川芎升麻甘草羌活防風等分春

加麻黃夏減麻黃五錢加石膏秋冬依方台

咬咀每服一兩水三盞煎至一盞去滓通

口服不拘時候

入溫家令不相染著

雄黃

右研細水調以筆濃蘸塗鼻竅中與病人同床亦不相染初洗面後及臨臥時點之凡疫家自生惡氣聞之即入上元宮遂散百脉而成斯病宜即以紙撚探鼻嚏之為佳如以雄黃點鼻則自不聞并辟諸惡夢神良○簡易方雄黃研細水調以筆濃蘸塗鼻竅中與病人同床亦不相染初洗面

後及臨臥時點之凡溫家自生惡氣聞之即上入泥丸散入百脉轉相傳染若倉卒

無藥宜即以紙撚探鼻嚏之為佳得効方無藥以

香油抹鼻端及以紙撚探鼻嚏之為佳辛卯年間疫氣盛行

予嘗綉梓勸用此法而活者甚眾經驗良方如無

雄黃以清麻油少許點鼻孔亦可

凡例

夫疫雖以三事鍾成若天行多假六淫反錯鬱折而致之者既有寒溫兩疫風濕其可不

辨但證似傷濕而脉色不同與夫一方相染
 長幼同病卽當作疫治除辟法外治濕用五
 苓散加炙甘草治風用桂枝湯加黃芩無不
 愈者其如淫邪交絡互織當以類推之
 五苓散治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱
 口燥咽乾煩渴引水水入卽吐或小便不利
 及汗出表解煩渴不止者宜服之又治霍亂
 吐利方見諸暑門加甘草一兩炙
 桂枝黃芩湯治風疫脉浮數而不弱頭項疼

腰脊痛發熱惡風其證皆如太陽傷風但脉
 陰不弱相傳染爲異耳

桂枝去皮芍藥 黃芩各兩半得甘草一兩

右剉散每服五錢水盞半姜三片棗一枚
得効方煎至七分去滓食前服
 沃雪湯治傷寒溫疫濕疫熱疫

蒼朮 乾姜炮 甘草各六兩 防風 乾葛
 厚朴製 芍藥各四兩

右為剉散每服三錢半重水兩盞煎七分去滓服

神巧萬全方一

四時傷寒并時氣出汗方

此書摠云四時傷寒者謂

經言溫病熱病皆先受之冬寒之氣將令溫熱之病一例用之其時氣亦然

桂枝散此方自霜降至春分宜用之發汗

桂枝兩一赤芍藥兩一甘草半兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候熱服

青龍散此方自春分至霜降宜用之發汗

蒼朮四兩甘草二兩豬牙皂莢四挺麻黃二兩

右件生用細擣為末每服二錢以水一中盞煎三兩沸不計時候和滓溫服蓋覆令

汗出立效若時氣加犀角二兩入葱白同煎

龜甲散方此時氣用之發汗

龜甲一兩醋塗炙麻黃一兩去桂心一兩赤

芍藥一兩甘草一兩葛根一兩枳殼一兩

微黃厚朴一兩去皮用生薑去瓢自然汁塗炙香熟

右件麤為散每服三錢以水一中盞入豆

豉五十粒煎五分去滓不計時候熱服續

以葱粥投之汗出便愈若未汗再服

又方以皂莢燒作灰研羅為末每服不計時

以新汲水一中盞生薑汁蜜各少許相和

調兩錢服之先用暖水淋浴後服此藥須

臾汗出愈

黃膏丸方

川大黃半兩附子半兩細辛半兩乾薑半兩

椒口者桂心兩巴豆二十一粒

右件細剉以醋浸一宿漉出以臘月猪脂

一斤煎之附子黃色即止濾去滓瓷瓮盛

之傷寒赤色發熱酒服壹丸如梧桐子大

又以摩身數百遍兼治賊風及毒風走注

肌膚之間隨風所在摩之甚良

四時傷寒并時氣發汗後方

桂枝附子湯南陽活人書無求子活太陽病

發汗遂漏不止惡風通真子傷寒括要惡寒小便難四

肢急難以屈伸者宜服之

桂枝一兩炮裂附子一兩炮裂赤芍藥一兩甘草兩

炙微赤到

右件為末每服四錢以水壹中盞入生薑

半分棗三枚煎至五分去滓不計時候熱

服瘴病減桂枝附子一半下皆准此為例

○傷寒括要右為麤末每候四大錢水壹

盞生薑五片棗二枚同煎至七分盞去滓

不拘時候凡稱為散者皆擣羅為散如桂

枝湯者即每用水壹盞姜棗煎六分去滓

不以時候溫服下餘依此無求子活人書

桂枝去皮芍藥各一兩甘草一兩附子炮去皮

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片

棗子壹枚水壹盞半煮至八分去滓溫服

南陽活人書大棗六枚附子半桂枝兩半芍

藥一兩甘草一兩生薑半右剉如麻豆

大每服五錢水壹盞半煮至八分去滓温服

桂枝芍藥湯方發汗後身疼脉沉遲者宜服之

桂枝一兩赤芍藥一兩人參一兩甘草半兩炙

右件為末每服四錢以水壹中盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候熱服

麻黃桂枝湯太陽病脉浮緊無汗發熱身疼

痛入九日不解表證仍在此當復發汗服湯已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也宜服之又大汗後似瘧者亦宜服之

麻黃一兩桂枝一兩赤芍藥一兩甘草一兩

草半兩炙杏仁一兩湯浸去皮尖

右件為末每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎五分去滓不計時候熱服白虎加人參湯方大汗後大渴煩不解脉洪

大者宜服之脉浮發熱無汗表未解宜服之
無大熱口乾煩渴背微惡寒宜服之諸亡血
不可與白虎湯

知母二兩石膏三兩甘草一兩炙人參一兩

右件爲末每服五錢以水壹大盞入粳米

五十粒煎至五分去滓溫服○聖濟總錄

治傷寒服桂枝湯大汗出大煩渴不解脉

洪大者知母兩焙三石膏兩碎八甘草炙一兩糯

米合人參半兩右五味咬咀如麻豆大每

服五錢匕水壹盞半煎至米熟去滓溫服

五苓散陽明病汗出而多渴者不可與猪苓

湯汗多者胃中燥汗少者宜與之利其小便

赤茯苓兩猪苓兩去黑皮白朮兩澤瀉兩桂

心兩

右件爲末每服四錢以水壹中盞入生薑

半分棗子三枚煎五分去滓不計時候熱

服以汗爲度

厚朴散方太陽發汗後如腹脹滿者宜服之

厚朴二兩去皮生人參兩半夏一兩洗甘

草一兩

右件為末每服四錢以水一中盞入生薑

半分煎五分去滓不計時候溫服

茯苓散方太陽汗出不渴者宜服之凡發汗

大過故令大小便難宜服之

赤茯苓兩桂心兩甘草半兩

右件為末每服四錢以水一中盞入生薑

半分棗三枚煎至五分去滓不計時候熱

服

瀉心散方太陽病汗後心下痞滿者宜服之

川大黃一兩炒黃連半兩去鬚

右件細剉和勻每服半兩以水一大盞煎

五分去滓無時服之

甘草大棗湯方發汗後其人臍下悸者欲作

奔豚宜服之

甘草半兩炙茯苓兩桂枝二兩去皮

右杵羅為散每服五錢棗四個以甘爛水

一升煎至七分去滓溫服日三服作甘爛
水法取水二斗置大盆內以杓揚之水上
有珠子五六千顆相逐取用

治四時傷寒并時氣吐方

桃柳心湯方時氣瘴氣宜用之

桃心握一柳心握一甘草三分烏梅槌碎梔子

人三分

右件藥以淡漿水一大盞煎至六分去滓
不計時溫服良久吐未吐再服

四時傷寒并時氣吐後方

理中散方吐後用此和氣

人參兩半藿香兩半白朮三分甘草一分乾薑一分

炮白茯苓一分陳橘皮三分

右件爲細末每服二錢以水一中盞入生
薑半分煎至五分去生薑和滓不計時候
溫服

麻黃散方吐後或壯熱頭疼身體酸疼口苦
心煩宜服之

麻黃三分葛根三分柴胡一兩知母三分赤芍藥
去節一梔子三分石膏一兩陳橘皮半兩生乾
地黃一兩

右為末每服四錢以水一中盞入生薑半
分煎至六分去滓不計時候溫服

四時傷寒并時氣下方

抵聖丸方此方本得之大理寺丞趙天錫用
之近三十年救人不少但傷寒瘟疫病熱病時
行病傳入三陰候服之神驗

麻黃二兩黑牽牛子一兩芫花一兩
去節羌活一兩人參一兩肉桂一兩
生

右件藥搗為末用好香豆豉一升水二升
煮訖一半去豆豉用汁再熬成膏和丸如
彈子大每服一丸用葱白豆豉煎湯一大
盞嚼下或吐或下即愈若有燥糞候難通
者以朴消一錢膩粉半錢同一丸研化用
蜜水調一盞服之立通

水導散方

甘遂 半兩煨白芷半兩

右件為散每服一錢以溫水調服

大承氣湯方陽明病不吐通真子傷寒而煩括要不吐下

者宜服之陽明病其脉遲雖汗出不惡寒其

體必重腹滿而喘有潮熱可攻其裏手足濇

然汗出為大便已堅宜服之傷寒括要此下云陽明病脉實

者陽明病其人多汗津液外出胃中乾燥大

便秘堅堅者則譫語宜服之陽明病譫語妄

言發潮熱其脉滑疾者宜服之陽明病發作

有時汗不解腹滿痛宜服之陽明與少陽合

病而自利脉浮者為順也滑而數者有宿食

宜服之少陰病口燥咽乾宜服之傷寒括要急宜下之

少陰病脉細沉數病在裏不可發宜服之少

陰病其人腹滿不大便者傷寒括要大宜下便堅急者

之

川大黃 一兩剉厚朴 半兩去皮用生枳實

一兩慧 川芒消 一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至五分傷寒括要水一盞煎六分去滓不計時候溫服以利為度

小承氣湯方太陽病吐下發汗後而微煩小便數大便堅宜服之陽明病若汗出多而微惡寒為外未解無潮熱不可與承氣湯若腹滿大便難可與小承氣湯和其胃氣勿令下多傷寒六日煩滿而囊縮此則毒氣在臍可下而愈宜服之

川大黃一兩剉 川芒消一兩 甘草半兩炙

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服

四時傷寒并時氣下後方

柴胡散陽明病外證身熱汗出而不惡寒但惡熱宜服之陽明病脈遲發熱頭眩小便難此欲作穀疸下之必腹滿宜服之 陽明病脇下堅滿大便祕而嘔口燥宜服之 陽明病中風其脈浮大短氣心痛鼻乾嗜臥不得汗一身悉黃小便難有潮熱而噦身前後腫

刺之雖小差外若不解宜服之 傷寒三日
少陽受病口苦乾燥目眩宜服之 少陰病
脇下堅滿乾嘔不能飲食往來寒熱若未吐
下其脉沉緊宜服之 少陽病若已吐下發
汗譫語宜服之 少陽中風兩耳無所聞目
赤胷中滿而煩不可吐下吐下則悸而驚宜
服之 少陰病惡寒而踈時時自煩不欲厚
衣宜服之 少陰病利清水色青者心下必
痛口乾燥者宜服之 傷寒六日陽脉溢陰

脉弦當腹中急痛宜服之 傷寒六日下之
胷滿煩驚小便不利譫語一身不可轉側宜
服之

柴胡二兩枳殼半兩黃芩一兩赤芍藥一兩半夏
一兩洗人去兩

右作爲末每服四錢以水一中盞入生薑
半分棗三枚煎五分去滓不計時候熱服
梔子人散陽明病脉浮咽乾口苦腹滿汗出
而喘不惡寒反惡熱心躁譫語不得眠胃虛

客熱舌燥宜服之 陽明病因下之其外有
熱手足溫者心中煩壅飢而不能食頸有汗
出宜服之 傷寒六日發汗吐下後虛煩不
得眠劇者心神顛倒宜服之 傷寒六七日
太下之後身熱不去心中結痛此爲欲解宜
服之

梔子一兩 甘草一兩

右件杵羅爲散每服四錢以水一中盞入
豆豉五十粒煎至五分去滓不計時候溫

服

四時傷寒并時氣熱不除方

傷寒或發汗或吐下已後熱不除者藏有結
熱也其熱不止脉實大爲難治經曰汗出輒
復熱而脉躁疾狂言不能食病名陰陽交交
者死也謂交合陰陽之氣不分別也太陽病
發汗汗雖出不解不解轉屬陽明宜服麻黃
湯陽明病外證身熱汗出不惡寒但惡熱宜
服柴胡湯

麻黃湯在前汗後方中
柴胡湯在前下後方中

治汗後餘熱不除煩燥恍惚不安宜服人參散方

人參一兩 梔子一兩 藍葉一兩 甘草一兩 白

鮮皮一兩 大青一兩

右件為末每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

四時傷寒并時氣煩燥方

傷寒煩燥者由陰氣少陽氣勝故也少陰病惡寒而拳時自煩欲去其被者可治也若脉

微細沉但欲卧汗出不煩時自吐五六日自利復煩躁不得卧者不可治汗下之後微寒煩或新差強食反發暮煩皆但損穀即愈太陽病發汗已解半日後復煩躁其脉浮可復發其汗汗大出胃乾煩躁其人欲飲水當稍稍與之令胃氣和即愈病三日無大熱而煩躁此陽去入陰宜茯苓湯茯苓湯方在前汗後方中少陰病下利服白通湯止後厥無脉煩躁者宜白通豬苓湯

白通湯方

附子炮 白薑炮

右二味等分爲散每服四錢水一盞葱白煎五分熱服

四時傷寒并時氣譫語方

前大柴胡散亦數候可同

之用

夫實則譫語虛則鄭聲重語也譫語喘者死下痢亦死譫語其脉和者生又身熱脉洪大者生沉細微手足冷者死 傷寒四五日脉

沉喘病沉爲在裏而反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實久而譫語傷寒不解熱氣結在膀胱其人發狂其血自下者卽愈其外未解當解其外外解小腹結者可下之 傷寒脉自浮小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚卽伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重

發其汗加針者四逆湯主之

四逆湯方

在厥逆方中

問曰證象陽按法治之而

增劇厥逆咽中乾兩脚拘急而澹語師日夜
半手足當溫兩脚伸後如師言何以知此答
曰寸口脉浮而大浮爲風大爲虛風則生微
熱虛則兩脛攣病形象桂枝因加附子參其
間增桂令汗出附子溫經無陽故也厥逆咽
中乾煩燥陽明內結澹語煩亂更飲甘草乾
薑湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急重

與芍藥甘草湯爾乃脛伸以承氣湯微溏則
止其澹語故知病可愈

傷寒陽毒方

傷寒陽毒者蓋言陽氣勝而爲毒厲其脉浮
大而數身重頭痛面赤斑斑如錦狂言見鬼
咽喉痛下膿血五日可療七日不可療其邪
治陽毒傷寒毒氣在藏狂言妄語欲走起者
宜服龍膽散方

龍膽草

一兩

鐵粉

二兩

右件爲末每服不計時候以磨刀水調下一錢

傷寒陰毒方

傷寒陰毒者由陰氣獨勝而爲毒厲也其脉沉細四肢逆冷身如被打面黑唇青腹痛咽乾短氣不得息煩滿嘔吐治法以迴陽藥過七日爲難治方見聖惠方

四時傷寒并時氣頭痛方

頭者諸陽之會也今滿而痛者在三陽而風

邪注腦中也或心肺熱亦令頭痛方見聖惠方

四時傷寒并時氣心狂方

傷寒狂者熱邪乘於心絡脉也故心神煩亂或歌或怒或棄衣而走或傷寒脉浮鑿以火劫汗出太過必亡陽亦令心狂少陽病已汗吐下而譫語服柴胡湯若不解此欲爲狂病治心熱狂言恍惚卧不安蓆鉛霜散方

鉛霜分一馬牙消兩一龍腦分一朱砂兩半鐵粉兩一
右件都研令勻細不計時煎竹葉湯放溫

調一錢

四時傷寒并時氣心悸方

悸者心下怔悸也此由飲水過多而然也小便少者必裏急脉浮數者不宜發汗當自汗出而愈汗不出而悸屬前玄武湯少陽中風兩耳無聞目赤胷滿而煩不可吐下吐下則悸而驚宜服柴胡湯少陽不可發汗發汗則譫語譫語屬胃和即愈不和即煩而悸宜服柴胡湯

柴胡湯 柴胡 玄武 二湯方 在前汗後方中

四時傷寒并時氣喘方

傷寒喘者亦飲水過多水停心下故喘或曰水入腎亦喘喘高者死譫語直視無眠者亦死

發汗後不可行桂枝湯汗出而喘無大熱者與麻黃杏仁湯方

麻黃 去節 一兩 杏仁 一兩 去皮 尖 麩 炒 甘草 半兩 炙 石膏 一兩

右為散每服四錢以一盞同煎六分去滓

溫服

太陽病下之微喘者表未解桂枝湯加厚朴
杏人微發其汗 太陽病桂枝證反下之利
遂不止脉促者表未解喘而汗出葛根湯主
之

葛根湯方

葛根一兩 黃芩二兩 黃連一兩 甘草一兩

右為散每服四錢水一盞煎六分去滓溫服

傷寒心下有水氣咳而微喘者宜小青龍湯
上之

小青龍湯方

麻黃二兩去根節 赤芍藥一兩 細辛一兩 桂心一兩 五

味子一兩 乾薑一兩 炮裂一兩 半夏七 湯洗去滑

右件藥持篩為散每服四錢以水一中盞
煎五分溫服

四時傷寒并時氣乾嘔方

乾嘔者熱毒攻於脾胃也或汗後胃中不和

尚有稽熱熱氣上薰心下痞結亦乾嘔不大
陽中風發熱惡寒鼻鳴乾嘔者宜服桂枝湯
其方在前發汗方中太陽表不解心下有水氣乾嘔發
熱或渴或利小腹滿小青龍湯青龍湯方在
前喘方中
太陽與陽明合病而不利但嘔者宜半夏湯
半夏湯方

半夏一兩湯洗七遍葛根二兩桂心一兩麻黃去節一兩芍藥壹兩甘草炙半兩
右爲散每服四錢水一盞入生薑棗煎五

分熱服

四時傷寒并時氣噦方

傷寒服涼藥過多及飲冷水胃氣虛氣逆而成噦凡脉浮革者自腹鳴若渴與水者必噦宜溫之夫病下之後續得下利水穀不止身體疼痛急當救裏宜溫之與治中四逆附子溫藥之輩傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之卽愈
治胃虛嘔噦不止橘皮散方

陳橘皮

半兩

人參

半兩

生薑

一分

右件細剉用水一大盞煎至五分去滓不計時候稍熱服之

四時傷寒并時氣吐血方

夫九竅出血皆同而在上爲逆傷寒吐血者或初熱毒在表發汗而汗不來所致也或內有瘀積亦吐血汗不出嘔血者不可治少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻或從目出者是名下厥渴爲難治

方見聖惠方

四時傷寒并時氣衄血方

衄者鼻出血也肺其竅鼻而所主氣五藏熱則血隨氣行故從鼻出陽明病口燥但漱水而不欲咽者必衄凡衄者不可攻其表欬血而衄汗不出出不至足者不可治太陽病脉浮緊無汗發熱身痛心煩目瞑劇者必衄衄者欲解也宜服麻黃湯

在汗後

方中

陽明病口乾

但漱水不欲咽者必衄也又陽明脉浮發熱口鼻中燥能食者亦衄俱宜黃芩湯

黃芩湯方

黃芩一兩 赤芍藥一兩 甘草半兩

右件為末每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服

治吐血鼻衄不止宜服竹茹散

青竹茹一兩 子芩一兩 蒲黃二錢 伏龍肝末

生藕汁二合

右件先以水一大盞半煎竹茹子芩至一盞去滓下蒲黃等三味攪令勻不計時候

分為三服

又方右以生地黄搗絞汁每服一小盞頻三五服即差

又方右以生藕搗絞取汁每服一小盞入生蜜一匙攪勻服之頻服即止

又方右以伏龍肝水浸取清每服壹小盞服之

四時傷寒并時氣厥逆方

傷寒陰氣獨盛陽氣暴衰逆而不通於手足

故令手足厥冷也。傷寒前發熱者後必厥，厥甚熱亦甚，厥輕熱亦輕。已經下後復發，汗者口必爛，先厥發熱下利，利必自止，止而反汗出，必咽喉痛發熱無汗，利必自止，不止便膿血者，喉不痺也。先厥者不可下，厥候灸之，不反或喘或躁或下，俱不可治，惟微續脈還手足溫者，生。諸四逆厥者不可下之，虛家亦然。傷寒先厥後發熱而利者，必自止，見厥復利。傷寒始發熱六日，厥反九日而利。

凡厥利者當不能食，今反能食者恐為除中。一日食以索餅不發熱者，知胃氣尚在，必愈。恐暴熱來出而復去也。後日脈之其熱續在者，期之旦日夜半愈。所以然者，本發熱六日，厥反九日後發熱三日，并前六日亦為九日，與厥相應，故期之旦日夜半愈。後三日脈之而脈數其熱不罷者，此為熱氣有餘，必發癰膿也。傷寒熱少微厥，指一作頭寒，嘿嘿不欲食，煩躁數日，小便利，色白者，此熱除也。欲

得食其病為愈若厥而嘔胃腸煩滿者其後必便血 病者手足厥冷言我不結胃小腹滿按之痛者此冷結在膀胱闕元也宜灸傷寒發熱四日厥反二日復熱四日厥少熱多者其病當愈四日至七日熱不除者必便膿血 傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣退故為進也 傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也 傷寒五六日不結胃腹濡

脈虛復厥者不可下此亡血下之死 傷寒

脈滑而厥者裏有熱白虎湯主之 在前汗後方中不加

人少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯 少陰

病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕

身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或

咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之如

大汗出熱不去內拘急四肢疼下利厥逆惡

寒者四逆湯主之吐利汗出發熱惡寒四肢

拘急手足逆冷四逆湯主之 少陰病食入

則吐心中温温欲吐手足寒脉弦遲當温之
四逆湯主之已上五證並四逆湯主之
四逆湯方

附子

一兩炮裂去皮臍

乾薑

一兩炮裂

甘草

一兩炙微赤剉

右件為末每服四錢水一中盞入棗三枚煎五分去滓服之

傷寒陽明病反無汗但小便利嘔而欬手足厥其頭必痛宜建中湯

桂心

一兩

白芍藥

一兩

甘草

半兩炙微赤

右件為末每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚同煎五分去滓入米錫半兩和勻不計時候温服

傷寒少陰病其人吐利手足逆煩躁者宜吳茱萸湯

吳茱萸

一兩湯浸七遍焙乾炒

人參

二兩

右件為末每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎五分去滓不計時候熱服治傷寒少陰病下利服白虎湯止後厥逆無

脉煩躁者宜白通猪苓湯

白通猪苓湯方

附子一兩炮裂去皮臍 乾薑一兩炮裂

右件為末每服四錢以水一中盞入葱白二莖煎至五分去滓不計時候熱服

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿不欲食大便硬脉細為陽微結非少陰也與

柴胡人參湯方

柴胡二兩去苗 人參一兩 黃芩一兩 半夏一兩七遍去滑

甘草半斤炙

右件為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚同煎五分去滓不計時熱服

四時傷寒并時氣結胃方

夫病發於陽而鑿下之太早熱氣乘虛痞結於心胃按之痛而寸口脉浮關上脉沉細者是也脉浮大不可下之下之即死舌上白苔滑者為難治其狀如結胃飲食如故時時下利寸脉浮關脉小沉緊名藏結 結胃證

悉具煩躁者亦死 太陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也鑿反下之動數變遲膈內拒痛一云頭痛即眩胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下固硬則為結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗出餘處無浮劑頸而還小便不利身必發黃大陷胃湯主之 傷寒六七日結胃熱實脉沉而緊心下痛按之石硬者大陷胃

湯主之 傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴湯但結胃無大熱者此為水結在胃脅也但頭微汗出者亦大陷胃湯主之大陷胃湯方

川大黃一兩到碎微炒 川芒消兩 甘遂半兩畏令微黃
右件為末每服二錢以水一中盞煎五分去滓不計時候溫服

結胃者項亦強如柔痙狀下之則和宜大陷胃丸方

類聚五十三

九

大黃四兩 葶藶子二兩 芒消一兩 杏仁一兩

皮尖

右四味搗篩三味內杏仁芒消合研如脂和散如彈丸一枚別搗甘遂末一錢白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效

傷寒太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脉微弱者此本有寒故也反下之若利止必作結胃未止者四日復下之此作協熱利

也 太陽病下之其脉促一作縱不結胃者此

為欲解也脉浮者必結胃脉緊者必咽痛脉

弦者必兩脇拘急脉細數者頭痛未止脉沉

緊者必欲嘔脉沉滑者協熱利脉浮滑必下

血 病在陽應以汗解之反以冷水溼之若

灌之其熱被却不得去彌更益煩肉上粟起

意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與

五苓散寒實結胃無熱證者與三物小陷胃

湯白散亦可服 一云三物小白散五苓散方在前汗後

頁卷五十三

九

治傷寒小陷胃病正在心下按之則痛脉浮滑者宜服小陷胃湯方

黃連一兩半夏二兩湯洗七遍一 蘇蘇一

右件並細剉每服半兩以水一大盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

四時傷寒并時氣痞滿方

痞者心下滿也太陽少陰并病脉浮緊下之反入裏則為痞若熱毒乘心心下痞面赤目黃狂言恍惚此為內實宜吐下之若心腹痞

滿按之自軟但氣痞爾不可下傷寒大下後

復發汗心下痞惡寒者表未解也當先解表

表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃

黃連瀉心湯二湯在前發汗後方中傷寒心下痞按之

濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心湯主之心

下痞而與瀉心湯不解者五苓散主之汗後

胃中不和心下痞硬噫食臭腹中雷鳴半夏

瀉心湯主之傷寒發熱汗出不解心下痞硬

嘔吐而下利者大柴胡湯主之瀉心半夏大柴胡三方在

前汗後病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微
 方中浮胃中痞硬氣上衝咽喉不得息者此胃中
 有寒也宜瓜蒂散吐之瓜蒂散在吐方中病脇下素
 有痞連在臍傍痛引小腹入陰筋者此名臧
 結死傷寒中風鑿反下之其人下利日數
 十行穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔
 心煩不得安鑿見心下痞謂病不盡復下之
 其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆
 故使硬也甘草瀉心湯主之方見聖惠方

四時傷寒并時氣霍亂方

傷寒頭痛煩熱惡寒忽吐利此由脾胃氣虛
 冷熱相搏而吐利其者四肢厥冷傷寒其脉
 微瀼者本是霍亂今是傷寒即四五日至陰
 經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也欲
 似大便而反失氣仍不利者此屬陽明也使
 必硬十三日愈所以然者經盡故也不利後
 當便硬硬則能食者愈今反不能食到後經
 中頗能食復過一經能食過之一日當愈不

愈者不屬陽明也吐利止而身痛不休者當
 消息和解其外宜桂枝湯小和之吐利汗出
 發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主
 之既吐且利小便復而大汗出下利清穀內
 寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之吐已下斷
 汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈
 四逆加豬膽湯主之桂枝湯在前發汗方中
 四逆湯在厥逆方中
 吐利發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣故
 也霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五

苓散主之其方在前
 汗後方中寒多不飲水者理中丸
 主之

理中丸方亦有作湯
 加減法

人參 乾薑炮 甘草炙 白朮各三兩

右四物搗篩蜜和為圓如雞子黃大以沸
 湯數合和一圓研碎溫服之日三四夜二
 服腹中未熱益至三四圓然不及湯湯法
 以四物依兩數切用水八升煮取三升去
 滓溫服一升日三服若臍上築者腎氣動

也去朮加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者還用朮悸者加茯苓一兩渴欲得水者加朮足前成四兩半寒者加乾薑足前成四兩半腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被

四時傷寒并時氣自利方

凡傷寒自利亦屬脾胃也傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹者此欲自利也下利有

微熱而渴者今自愈 下利脉數有微熱汗

出今自愈設復緊為未解 一云設脉浮而復緊 下利手

足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反微喘

者死 少陰負趺陽者為順也 下利寸脉

反浮數尺中自濇者必清膿血 下利清穀

不可攻表汗出必脹滿 下利脉沉弦者下

重也脉大者為未止脉微弱數者為欲自止

雖發熱不死 下利脉沉而遲其人面少赤

身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病

人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也
 下利脉數而渴者令自愈設不差必清膿血
 以有熱故也 下利後脉絕手足厥冷晷時
 脉還手足溫者生脉不還者死 傷寒下利
 日十餘行脉反實者死 傷寒脉浮而緩手
 足自溫者繫在太陰太陰當發黃若小便自
 利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十
 餘行必自止以脾家腐穢去故也太陰病脉
 弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減

之以其人胃氣弱易動故也 傷寒自利不
 渴者屬太陰以其藏寒故也宜四逆輩 大
 汗若大下利而厥冷者四逆湯主之 下利
 清穀者裏寒外熱汗出而厥者四逆湯主之
 四逆湯方在 少陰病下利脉微瀉嘔而汗出
 前汗後方中 必數更衣反少者當溫其上
 多厥陰可 下利
 譫語者有燥屎也宜小承氣湯 方在前
 下重者白頭翁湯主之 下利欲飲水者以
 有熱故也亦白頭翁湯主之

白頭翁湯方

白頭翁兩一 黃蘗半一兩 黃連半一兩 秦皮半一兩
右件四味為末每服四錢水一盞煎六分
去滓溫服

治傷寒表熱未除數下之遂夾熱而利利不

止腹痛滿裏表不解者宜服桂心散

桂心兩一 甘草兩一 白朮分三 人參分三 乾薑分三
右件為末每服四錢以水一盞煎六分去
滓溫服

傷寒服湯藥下利不止心下痞硬服瀉心湯
已復以他藥下之利不止鑿以理中丸與之
利益甚理中治中焦此利在下焦赤石脂散
主之如不止當利其小便
赤石脂散

赤石脂兩二 禹餘糧兩二
醋煨
右件二味為末粥飲下三錢

醫方類聚卷之五十三