

醫方類聚卷之九十二

心腹痛門一

論

金匱方

胸痛心痛短氣病脉證治

括蕪薤白白酒湯 括蕪薤口半夏湯

枳實薤白桂枝湯 人參湯 茯苓杏仁

甘草湯 橘枳姜湯 薏苡附子散 桂

姜枳實湯 赤石脂丸 九痛丸



千金方

心腹痛

桂心三物湯 烏頭圓 犀角圓 高良

薑湯 當歸湯 溫中當歸湯 羊肉當

歸湯 溫脾湯 生薑湯 熨蒸法 增

損當歸湯

胃痺

括蕪湯 治中湯 通氣湯 細辛散

蜀椒散 前胡湯 熨背散 下氣湯

檳榔湯

千金月令

海上仙方

心頭痛

聖惠方

治九種心痛方

沉香散 桂心散 當歸散 訶梨勒丸

沉香丸 附子丸

治卒心痛方

麝香散 吳茱萸丸

治諸蟲心痛方

當歸散 石榴皮散 桑白皮散 雷丸

散 鶴蝨丸 檳榔丸

治冷氣心腹痛諸方

桔梗散 木香散 高良薑散 當歸散

桂心散 桃人散 檳榔散 革芨散

麝香丸 內炙丸 阿魏丸

治心腹痛脹滿諸方

前胡散 訶梨勒散 厚朴散 當歸散

桔梗散 木香丸 赤芍藥丸

治久心痛諸方

川椒散 犀角丸 木香丸 艾煎丸

治惡症心痛諸方

鬼箭羽散 木香散 犀角散 檳榔散

當歸散 消石丸

治中惡心痛諸方

大黃散 沉香散 犀角散 雄黃散

白芥子丸

治心痛多唾諸方

前胡散 人參散 白朮散 木香散

人參丸 乾薑丸

治心背徹痛諸方

吳茱萸散 木香丸 川椒丸

治心痛不能飲食諸方

高良薑散 厚朴散 葶澄茄散 人參

散 木香散 丁香丸 木香丸 人參

丸

治心懸急懊痛諸方

木香散 鬱金飲子 桂心散 沉香散

檳榔丸

治心腹相引痛諸方

當歸散 丁香散 吳茱萸散 訶梨勒

丸

治腹痛諸方

當歸散 白荳蔻散 青橘皮散

吳茱萸散 紅苳蔻丸

治胃脇痛諸方

桂心散 桔梗散 半夏散 桃人丸

木香丸

治胃痺諸方

利膈散 麝香丸

治胃痺噎塞諸方

半夏散 吳茱萸散 木香散 射干散

昆布丸

治胃痺心下堅痞緩急諸方

薏苡人散

治胃痺心背痛諸方

吳茱萸散

治心痺諸方

木香散 青橘皮丸

四時纂要

心痛藥

和劑局方

備急圓

心腹痛門 二 附胃脅痛

大全本草

厚朴七物湯

三因方

胃痞證治

栝樓圓 橘皮生薑湯 梔子湯

三因心痛摠治

蜜附湯 麻黃桂枝湯 加味小建中湯

鷄舌香散 訶子散 蘇合香丸

撞氣阿魏丸 倉卒散 失笑散

神巧萬全方

丁香丸

助道方

治脾腎虛冷氣衝心

治脾傷并腹痛

治脾腎虛寒證

是齋醫方

心疾 脾疾

香附散 薑橘元 紫沉煎元 立應散

學究元 手拈散

腹痛

桂香散 玉抱肚 茴香煎元

蒜紅元 五香觸痛元

瓊碎錄

治心痛方

易簡方

建中湯

直指方

心疼證治

沉麝圓 七氣湯 沉香降氣湯

大沉香圓 蘇合香圓 桂枝四七湯

勝金散 靈脂酒 生地黄膏 靈砂丹

薑桂飲 生薑枳殼湯 拈痛圓

嚴氏濟生方

加味七氣湯 愈痛散 蕪荑散 燒脾

散

嚴氏濟生續方

脇痛評治

枳芎散 推氣散 神保圓 肥氣圓

息賁湯

東垣試効方

心胃及腹中諸痛

草豆蔻丸 姜附禦寒湯 麻黃豆蔻丸

益智和中丸 益智調中湯

得効方

心痛 附脾疼

蜜附湯 分心氣飲 加味麻黃湯

加味四七湯 七氣湯 沉香降氣湯

分心氣飲 香蘇散 感應圓

氣針圓 通心飲 卻痛散 紫沉煎圓

加味小建中湯 雞舌香散 玄胡索散

木香勻氣散 蘇合香圓 倉卒散

蕪荑散 手拈散 香附散 訶子散

九痛圓 撞氣阿魏圓 失笑散

浮椒圓 附朮湯 九氣湯 三和散

神保圓 奪命抽刀散 參朮散

加味烏沉湯 大理中圓 神効散

苗薑湯

脇痛

小柴胡湯 神保圓 枳殼煮散

推氣散 枳芎散 枳殼散

腹痛

胃風湯 五積散 香薷散 香蘇散

四順清涼飲 椒附圓 蟠葱散 嘉禾

散 木香勻氣散 木香流氣飲 香蘇

散 神保圓 化蠱圓 當歸建中湯

小理中圓 神保圓

澹軒方

心痛

虫心痛

脾痛

心脾痛

心疼

肘後方

治卒心痛方

治卒腹痛方

玉粉丹

治心腹俱痛方

治卒患胃痺痛方

澹察方

真聖圓

黑金散

大已寒圓

雞舌香散

平胃散

衛生寶鑑

心胃痛及腹中痛

丁香止痛散

失笑散

二薑丸

益智散

茱萸丸

丁香胃脘當心而痛治驗

扶陽助胃湯

聖濟總錄

心腹痛

黃耆湯 獨活湯 當歸湯 桔梗散
 丁香湯 厚朴湯 半夏補心湯 沉麝
 丸 調中丸 芎藭散 小建中湯 桂
 朴散

心腹卒脹痛

高良薑湯 半夏湯 當歸湯 厚朴湯
 吳茱萸丸 枳實散 芫胡湯 檳榔湯
 腹痛

人參湯 當歸湯 芎藭湯 高良薑湯
 人參丸 赤石脂丸 四物加黃耆芍藥
 湯 四物當歸湯 安息香丸

腹內結強

檳榔丸 磨滯丸 丁香皮煮散
 白朮散 木香丸 青橘煮散
 丁香丸 平胃丸

脇肋痛

大黃附子湯 桂心丸 當歸湯

備急四神丸 檳榔丸 葶澄茄湯

脇痛煩滿

木香湯 葶澄茄丸 烏藥湯

木香丸 白朮丸 木香湯

拔粹方

心痛證

金鈴子散 蒿本湯 朮附湯

瑞竹堂方

心氣痛

沒藥玄胡散 應痛丸 蠶沙散

醫方大成

心痛 附怔忡驚悸卒痛

妙香散 降心丹 平補鎮心片

寧志膏 十四友圓 茯苓補心湯

靈砂寧志圓 十補湯 雙補圓

育神散 竜齒湯 定心湯 玉置圓

雄朱圓 人參固本圓 鎮心爽神湯

辰砂遠志圓 益榮湯 竜齒丹

類聚方

茯苓飲子 遠志圓 補心圓 心丹

引神歸舍丹 補心神効圓 歸脾湯

南北經驗方

心痛

八物定志丸 沒藥散

袖珍方

心痛

三皮湯 檳榔散 妙應丸 茯神湯

永類鈴方

心痛

撞氣阿魏丸 驚氣元 壽星元

定志元 蕪荑散 補脾散

脇痛

芎藭湯 枳實散 薏苡仁元 分氣紫

蘇湯 異香散 木通散 三腕散

心腹痛門 三 附胃脇痛

經驗良方

心腹

類聚方

類聚丸

十一

二香散 乳蠟散 暖胃散 應痛散

建脾散 桂香散 正本圓 保壽圓

快膈湯

心腹氣痛

香橘圓 感應丸 鎮心丹

煙霞聖効方

心腹疼痛

奪命散 救苦散 白雲散 檳榔丸

壽親養老書

應痛圓

神効名方

心氣疼痛

山居四要

心疼

新効方

林廣記

木瓜丸

急救仙方

類聚方

七十一

玉機微義

小腹痛

桂枝加芍藥湯 理中丸 小建中湯

真武湯 四逆湯 霹靂散 當歸四逆

湯 桂枝加大黃湯 大陷胃湯 大承

氣湯 黃連湯 芍藥甘草湯 加減小

柴胡湯 四逆散 黃芩芍藥湯

雜方

四物苦楝湯 酒煮當歸丸 增損當歸

丸 苦楝丸 熨法 迴陽丹

心痛

赤石脂丸 九痛丸 倉卒散 木附湯

神砂一粒丹 藁本湯 麻黃豆蔻丸

大陷胃湯 金鈴子散 應痛丸 四神

湯 愈痛散 蘇合香丸 立應散

加味七氣湯 卻痛散 手拈散 沒藥

散 厚朴丸 姜橘丸 感應丸 集效

丸

頁九

類聚

雜方

神靈丹
神靈丹
神靈丹
神靈丹
神靈丹
神靈丹
神靈丹
神靈丹
神靈丹
神靈丹

壽域神方
壽域神方
壽域神方
壽域神方
壽域神方
壽域神方
壽域神方
壽域神方
壽域神方
壽域神方

心痛部
心痛部
心痛部
心痛部
心痛部
心痛部
心痛部
心痛部
心痛部
心痛部

腹痛部
腹痛部
腹痛部
腹痛部
腹痛部
腹痛部
腹痛部
腹痛部
腹痛部
腹痛部

脇部
脇部
脇部
脇部
脇部
脇部
脇部
脇部
脇部
脇部

衛生易簡方
衛生易簡方
衛生易簡方
衛生易簡方
衛生易簡方
衛生易簡方
衛生易簡方
衛生易簡方
衛生易簡方
衛生易簡方

心痛
心痛
心痛
心痛
心痛
心痛
心痛
心痛
心痛
心痛

心痛
心痛
心痛
心痛
心痛
心痛
心痛
心痛
心痛
心痛

金匱鈎玄

心痛

草薺薤丸
當歸龍膽丸

御醫撮要

五京丸

備預白要方

心腹痛腰膈病等方

簡奇方

神仙珍珠散

類聚

餘藥無名者散見本方

食治

鍼灸

導引

心腹痛門

巢氏病源

心痛候

心痛者風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者有久成疹者心為諸藏主而藏神其正經不可傷傷之而痛為真心痛朝發夕死夕發朝死心有支別之絡脈其為風冷所乘不傷於正經者亦令心痛則乍間乍甚故成疹不死人心為火與諸陽會合而手少陰

心經也若諸陽氣虛少陰之經氣逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也又諸藏虛受病氣乘於心者亦令心痛則心下急痛謂之脾心痛也足太陰爲脾之經與胃合足陽明爲胃之經氣虛逆乘心而痛其狀腹脹歸於心而痛甚謂之胃心痛也腎之經足少陰是也與膀胱合膀胱之經足太陽是也此二經俱虛而逆逆氣乘心而痛者其狀下重不自伏時苦泄寒中爲腎心痛診其心脉急者

爲心痛引背食不下寸口脉沉緊若心下有寒時痛關上脉緊心下苦痛左手寸口脉沉則爲陰陰絕者無心脉也苦心下毒痛

久腹痛候

久腹痛者藏府虛而有寒客於腹內連滯不歇發作有時發則腸鳴而腹絞痛謂之寒中是冷搏於陰經今陽氣不足陰氣有餘也寒中久痛不瘥冷入於大腸則變下痢所以然者腸鳴氣虛故也腸虛則泄故變下痢也

心腹痛候

心腹痛者由府藏虛弱風寒客於其間故也
邪氣發作與正氣相擊上衝於心則心痛下
攻於腹則腹痛上下相攻故心腹絞痛氣不
得息診其脉左手寸口人迎以前脉手少陰
經也沉者爲陰陰虛者病苦心腹痛難以言
心如寒狀心腹疔痛不得息脉細小者生大
鞞疾者死心腹痛脉沉細小者生浮大而疾
者死

久心腹痛候

久心腹痛者由寒客於府藏之間與血氣相
搏隨氣下上攻擊心腹絞結而痛藏氣虛邪
氣盛停積成疹發作有時爲久心腹痛也然
心腹久痛冷氣結聚連年積歲日月過深變
爲寒疝

卒苦煩滿又胃脇痛欲死候

此由手少陽之絡脉虛爲風邪所乘故也手
少陽之脉起小指次指之端上循入缺盆布

實中散絡心包風邪在其經邪氣迫於心絡
心氣不得宣暢故煩滿乍上攻於胃或下引
於脇故煩滿而又胃脇痛也若經久邪氣留
連搏於藏則成積搏於府則成聚也

脇痛候

邪氣客於足少陽之絡令人脇痛欬汗出陰
氣擊於肝寒氣客於脉中則血泣脉急引脇
與小腹診其脉絃而急脇下如刀刺狀如飛
尸至困不死左手脉大右手脉小病右脇下

痛寸口脉雙絃則脇下拘急其人漉漉而寒
千金方

心腹痛

寒氣卒客於五臟六腑則發卒心痛胃痺感
於寒微者為欬甚者為痛為泄厥心痛與背
相引善瘕如物從後觸其心身軀僂者腎心
痛也厥心痛腹脹滿心痛甚者胃心痛也厥
心痛如以針錐刺其心心痛甚脾心痛也厥
心痛色蒼蒼如死灰狀終日不得太息者肝

心痛也厥心痛臥若從心間痛動作痛益甚
色不變者肺心痛也真心痛手足清脈節心
痛甚旦發夕死夕發旦死虬心痛心腹中痛
發作腫聚往來上下行痛有休而腹中熱善
涎出是虬咬也以手按而堅持之勿令得移
以大針刺之復久持之蟲不動乃出針心下
不可刺中有成聚不可取於輪腸中有蟲虬
咬皆不可取以小針

胃痺

胃痺之病令人心口堅滿痞急痛肌中苦痺
絞急加刺不得俛仰其胃前皮皆痛手不得
犯胃中幅幅而滿短氣欬唾引痛咽塞不利
習習如癢喉中乾燥時欲嘔吐煩悶白汗出
或徹引背痛不治之數日殺人
夫脉當取太過與不及陽微陰弦卽胃痺而
痛所以然者責甚極虛故也今陽虛知在上
焦所以胃痺心痛者以其人脉陰弦故也平
人無寒熱短氣不足以息者實也

和劑指南

論宿患心腹痛有積塊氣塊癥癖日久發歇
不常者不可取轉宜漸次消磨可與感應圓
溫白圓換積圓蓬煎圓小理中圓少喫數圓
常服漸漸消磨更與和脾散嘉禾散參苓白
朮散四君子湯思食圓建脾湯建中散平胃
散之類助其脾胃久而能去其根 若痛有
休止或往來上下胃中憎悶時吐冷沫中腕
不快嘔逆惡心者恐是虫痛可與集效圓或

九痛圓其九痛丸有利性不可多服 若卒
然心腹暴痛膨急不得息往來攻衝悶絕惡
心者恐是疰忤鬼氣可與蘇合香圓若虛弱
藏寒人可將蘇合香圓捏作餅子用火熨斗
蓋之將藥餅安熨斗上煖令藥極熱以去其
腦子性依法服之 若痛而不休胃膈塞悶
嘔吐不定粥藥不下者可與順氣散送下青
木香圓如無順氣散五積散送下亦得及九
痛圓三稜散大沉香圓

三因方

九痛敘論

夫心痛者在方論則曰九痛內經則曰舉痛
一曰卒痛種種不同以其痛在中腕故摠而
言之曰心痛其實非心痛也若真心痛則手
足青至節若甚旦發晝死晝發夕死不在治
療之數方中所載者乃心主包絡經也若十
二經絡外感六淫則其氣閉塞鬱于中焦氣
與邪爭發為疼痛屬外所因若五臟內動汨

以七情則其氣痞結聚于中腕氣與血搏發
為疼痛屬內所因飲食勞逸觸忤非類使臟
氣不平痞鬲于中食飲遁疰變亂腸胃發為
疼痛屬不內外因治之當詳分三因通中解
散破積潰堅隨其所因無使混濫依經具錄
諸證以備治法云尔

外所因心痛證治

足厥陰心痛兩脇急引小腹連陰股相引痛
手心主心痛徹背心煩掌中熱咽乾目黃赤

脇滿足太陰心痛腹脹滿漚漚然大便不利
鬲閉咽塞手太陰心痛短氣不足以息季脇
空痛遺失無度胃滿煩心足少陰心痛煩劇
面黑心懸若肌胃滿腰脊痛背輪諸經心痛
心與背相引心痛徹背背痛徹心諸府心痛
難以俛仰小腹上衝卒不知人嘔吐泄瀉此
皆諸經諸俞諸府涉邪所致病屬外所因
內所因心痛證治

肝心痛者色蒼蒼如死灰狀終日不得太息

真心痛者手足青至節且發夕死夕發且死
脾心痛者如針錐刺其心腹蘊蘊然氣滿肺
心痛者若從心間起動作痛益甚色不變腎
心痛者與背相引善噤如物從後觸其心身
偃僂胃心者腹脹滿不下食食則不消皆臟
氣不平喜怒憂鬱所致屬內因

不內外因心痛證

久積心腹滿者以飲啖生冷菓實中寒不能
消收結而爲積甚則數日不能食便出乾血

吐利不定皆由積物客於腸胃之間遇食還發名積心痛及其臟寒生虺致心痛者心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止腹熱涎出病屬不內外因方證中所謂九種心痛曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰虫曰注曰去來痛者除風熱冷屬外所因餘皆屬不內外更婦人惡血入心脾經發作疼痛尤甚於諸痛更有卒中客忤鬼擊尸疰使人心痛亦屬不內外因

神巧萬全方

心痛方論

心藏神心者身之主也其正經爲風邪所乘名真心痛旦發夕死夕發旦死心有包絡脉是心之別脉爲風冷所乘亦令心痛然乍輕乍甚其病不至於死又手少陰心之經其氣逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也其心下急痛名脾心痛腹脹而心痛名胃心痛下重而苦泄寒中爲腎心痛又爲九種心

痛一虫二疰三風四悸五食六飲七冷八熱
九往來此皆邪之氣乘於手少陰之絡邪氣
搏於正氣邪正相擊故令心痛診其心脉急
者爲痛引背食不下寸口脉沉緊苦心下寒
時痛關上脉緊心下苦痛左手寸脉沉則爲
陰陰絕者無心脉也苦心下毒痛

直指方

心疼方論

紫之奪朱相去一間耳而毫釐疑似貫霄壤

焉夫心爲五官之主百骸之所以聽命者也
心之正經果爲風冷邪氣所干果爲氣血痰
水所犯則其痛掣背脹脇脅煩咽乾兩目赤
黃手足俱青至節朝發而暮殂矣然心之包
絡與胃口相應往往脾痛連心或陽虛陰厥
亦令心下急痛或他臟之邪亦有客乘於心
者是則心之別脉受焉如所謂九種心痛一
虫二疰三風四悸五食六飲七冷八熱九去
來者皆是也真心果痛不知能愈否乎然則

熱劑之法將何如曰熱者涼之寒者溫之感
受風邪者散之順氣調血逐水豁痰此其要
略耳蘇沉內翰有方目曰沉麝圓片心脾疼
痛隨試輒効他如延胡索五靈脂官桂當歸
乳香沒藥沉香木香等輩皆的對藥也臨機
應變學者亦當察其微

嚴氏濟生方

心痛論治

夫心痛之病醫經所載凡有九種一曰蟲心

痛二曰疰心痛三曰風心痛四曰悸心痛五
曰食心痛六曰飲心痛七曰寒心痛八曰熱
心痛九曰去來心痛其名雖不同而其所致
皆因外感大滯內汨七情或飲啖生冷菓食
之類使邪氣搏於正氣邪正交擊氣道閉塞
鬱于中焦遂成心痛夫心迺諸臟之主正經
不可傷傷之則痛若痛甚手足青過節者則
名曰真心痛真心痛者旦發夕死夕發且死
若乍間乍甚成疹而不死者名曰厥心痛不

過邪氣乘於心支別絡也寸口脉緊心脉甚急皆主心痛又有痛甚而心脉沉伏者有之矣王叔和云心腹痛脉沉細瘥浮大弦長命必殞治法當推其所自而調之痛無不止矣嚴氏濟生續方

心痛評治

夫心痛之病有真心痛有厥心痛心乃五藏六府之所主法不受病其痛甚手足青而冷者名曰真心痛此神去氣竭旦發夕死夕發

旦死或六淫七情之所傷五藏之氣衝逆其痛乍間乍甚成疹而不死者名曰厥心痛此皆邪氣乘於心支別絡也前方論治該載備矣茲得以略大抵痛爲實痛宜下寒宜溫溫利之藥卻痛散主之若婦人血刺心痛倉卒取功效之速立應散主之其諸心痛對前方審處而用之以平爲期

脇痛評治

夫脇痛之病醫經曰兩脇者肝之候又云肝

病者兩脇下痛多因疲極嗔怒悲哀煩惱謀慮驚憂致傷肝藏肝藏既傷積氣攻注攻於左則左脇痛攻於右則右脇痛移逆兩脇則兩脇俱痛久而不愈流注筋脉或腰脚重墜或兩股筋急或四肢不舉漸至脊脅攣急疼痛氣遇風搏則脇下結塊氣遇寒搏則脇肋骨痛下連小腹上引心端大抵諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治神保圓能治之更有肝之積名曰肥氣在左脇下大如覆杯其病左脇

下痛連引小腹足寒轉筋肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯其病喘息奔溢肝積肥氣圓主之肺積息賁湯主之方載后管見大全良方

九種心痛證治

若九腫心痛輕者可與蘇合香圓甚者九痛圓或神保圓用柿蒂燈心煎湯吞下

脇肋刺痛證治

夫脇肋痛者方書所載甚夥僕考尋正經素

病者兩脇下痛多因疲極嗔怒悲哀煩惱謀慮驚憂致傷肝藏肝藏既傷積氣攻注攻於左則左脇痛攻於右則右脇痛移逆兩脇則兩脇俱痛久而不愈流注筋脉或腰脚重墜或兩股筋急或四肢不舉漸至脊脅攣急疼痛氣遇風搏則脇下結塊氣遇寒搏則脇肋骨痛下連小腹上引心端大抵諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治神保圓能治之更有肝之積名曰肥氣在左脇下大如覆杯其病左脇

下痛連引小腹足寒轉筋肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯其病喘息奔溢肝積肥氣圓主之肺積息賁湯主之方載后管見大全良方

九種心痛證治

若九腫心痛輕者可與蘇合香圓甚者九痛圓或神保圓用柿蒂燈心煎湯吞下

脇肋刺痛證治

夫脇肋痛者方書所載甚尠僕考尋正經素

問云少陽所謂心脇痛言少陽盛也 心氣逆則少陽盛心氣害木外鑠肺金故盛者心之所表也九月陽氣盡而陰氣盛故心脇痛也 足少陽脉循脇裏出氣街心主脉循胃出脇故爾火墓於戌故九月陽氣盡而陰氣盛也所謂不可反側者陰氣藏物也物藏則不動故不可反側也是以仲景論傷寒少陽膽經受病者主胃脇痛而耳聾口苦舌乾往來寒熱而嘔者少陽經受病也有此證者宜

小柴胡湯以解之 若身體涼表證罷咳而脅下痛者爲裏有水十棗湯主之若怒極煩惱悲哀太甚傷損肝氣至兩脅骨疼筋脉緊急腰脚重滯兩股筋急兩脅牽痛四肢不能舉漸至脊脊攣急者宜枳殼煮散芎藭湯上之又有諸氣唯膀胱氣脅下痛者最難治神保圓與木通散輒能治之 若因損而脅骨痛者宜以太嶽活血丹先去其血次以驅風療損藥則愈

十形三療

心痛

洒官楊仲臣病心氣痛此人常好飲酒初飲
 三二杯必遶走頓懶兩足三五次其酒稍
 散方能復席飲至前量壹醉必五七次至明
 嘔青黃水數日後變魚腥臭六七日始安戴
 人曰宜涌乃吐蟲一條赤黃色長六七寸口
 日鼻皆全兩目膜滿狀如蛇類以搥淹乾示
 人

東垣試效方

心胃及腹中諸痛論

黃帝鍼經經脉第一云胃病者腹臘脹胃脘
 當心而痛上支兩脅膈咽不通飲食不下取
 三里也又云足太陰脾之脉其支者復從胃
 別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔胃
 脘痛腹脹善噫心下急痛舉痛論云五藏卒
 痛何氣使然曰經脉流行不止還周不休寒
 氣入經稽遲泣而不行客於脉外則血少客

於脈中則氣不通故卒然而痛得炅則痛立止因重感於寒則痛久矣夫心胃痛及腹中諸痛皆因勞役過甚飲食失節中氣不足寒邪乘虛而入客之故卒然而作大痛經言得炅則止炅者熱也以熱治寒治之正也然腹痛有部分藏位有高下治之者亦宜分之如厥心痛者乃寒邪客於心包絡也前人以良姜菖蒲大辛熱之味末之酒醋調服其痛立止此折之耳真心痛者寒邪傷其君也手足

青至節甚則旦發夕死脫痛者太陰也理中建中草豆蔻丸之類主之腹臍痛少陰也四逆湯姜附禦寒湯之類主之少腹痛者厥陰也正陽散迴陽丹當歸四逆之類主之雜證而痛者苦練湯酒煮當歸丸丁香練實丸之類主之是隨高下治也更循各藏部分穴膻而灸刺之如厥心痛者痛如錐鍼刺其心甚者脾心痛也取之然谷大谿餘藏皆然如腹中不和而痛者以甘草芍藥湯主之如傷寒

類聚丸
三十一
悞下傳太陰腹滿時痛者桂枝加芍藥湯主
之痛甚者桂枝加大黃主之夏月肌熱惡熱
脉洪實而痛者黃芩芍藥湯主之又有諸虫
痛者如心腸痛濃作痛腫聚往來上下行痛
有休止腹熱善渴涎出面色乍青乍白乍赤
嘔吐清水者蛟蛸也以手緊按而堅持之無
令得移以鍼刺之久持之虫不動乃出鍼也
或局方中化虫丸及諸取虫之藥量虛實用
不可一例而治

澹察方

心腹痛

心藏神也云云故令心痛

詳見神巧萬全方

王叔和

云心腹痛脉沉細差浮大弦長命必殂盖弦
緊痛必甚浮大與病相反也

詳見萬全方

人患腹痛其狀不一有風痛有熱痛有冷痛
有冷積痛有氣積痛有蟲痛有婦人經脉行
而先腹痛有小兒瘡疹出而先腹痛者滿腹
虛服暖藥無效者此風痛也宜服官局胃風

湯火杵草圓如附子烏頭之類大便秘結小便赤而喜冷飲食者此熱痛也後生宜四順飲老人宜服大麻仁圓皆局方有塊起而腹痛者皆積也冷積則面色瘦瘁脉沉伏宜於暖藥中用巴豆如官局積氣元之類 氣積多噫氣宜服嘉禾散調氣散五膈寬中散如茴香丁香木香沉香之類 食積則多噫酸口出清水惡心宜服京三稜蓬莪朮乾漆之類亦須兼少巴豆若腹中有塊起急以手按

之便不見五更心嘈牙關強硬惡心而清水出及夢中齧齒者此謂之虫痛宜服官局化蟲圓如史君子之類又有室女婦人月經行腹痛此特與諸痛不同只可服四物湯小兒身熱足冷耳及尻骨冷及眼澁者皆瘡疹候必先腹痛蓋疹子先自腸胃中出然後發於外宜服葛根升麻湯及絳煎散之類舒王解痛字云宜通而塞則爲痛此極有理凡痛須通利臟腑乃愈隨冷熱而須用巴豆大黃牽

牛此最要法醫說

醫方大成

心痛

心爲五臟之主一身之所聽命焉宜處安靜不可使有所傷傷之則痛若痛甚手足青過節者是名真心痛旦發夕死夕發旦死非藥物之所能療脉經云脉浮大弦長者死沉細者生凡心痛之疾醫經所載其種有九一曰蟲痛二曰疰痛三曰風痛四曰悸痛五曰食

病六曰飲痛七曰寒痛八曰熱痛九曰來去痛名雖不同其實皆由外感邪氣內傷生冷結聚痰飲停於心胞傷於經絡重則心膈引痛輕則怔忡而已蓋心乃藏血之府憂思勞役大過耗散真血心帝失輔亦能令人怔忡以致膽氣虛怯變生驚悸或因事聞聲卒然戰怯又夢寐之中忽隨層崖精神恍惚如有所見治法宜詳其所因若內外之氣相搏則宜驅散邪氣溫利痰飲心血有所虧損又當

補益其營衛寧其心志壯其膽氣如此調之
病無不愈矣

永類鈐方

心痛

附心脾疼

方論云心痛有九種心為五藏主正經不
可傷若真心痛手足青過節且發晝死晝
發夕死今所載者心有包絡脉是心之別
脉也風冷所乘痛在中脘因名心痛乍輕
乍重未至於死手少陰心之經其炁逆為

陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也心間
急痛為脾心痛腹脹而心痛為胃心痛下
重而苦泄為寒中名腎心痛亦有客忤鬼
炁而心痛者以類求之

脉

病證

治

寸口脉
緊心脉

風肝風邪氣
傳於心母

二陳湯温澹湯加羌活
麥門冬撞炁阿魏元
蘇合香元濟生加
味七氣湯

甚急皆	主心痛	又有痛	甚而心	脉沉伏
寒飲冷臥涼 陰氣入心	熱暑火酒藥 毒入心			
正氣散 二姜元 順	氣木香散楊氏郤痛	散 三因加味建中	湯惡寒發熱而心痛	三因麻黃桂枝湯
	黃連香需散 清心蓮	子飲 獨連湯好茶	塩梅同煎服茶塩利	痰水下小便

者經日	心腹痛	脉沉伏	差脉浮	大弦急	者死
飲水飲痰積 入心	食生冷積中			悸怔忡飲渴 喜怒	
溫膽湯加白朮倍朮元	五套元三因枳朮元	濟生導痰湯茯苓飲	理中湯 治中湯 二陳	湯加砂仁枳殼殼乾	姜青皮
	溫膽湯 酸早仁湯	青州白元子 濟生	加味七氣湯		

虫得肉則止

濟生九痛元蕪黃散石

榴根湯化虫元煎紅

元本事不問新久以

生地黄研汁搜麴作

飢飢出虫而愈甚神

沉香降氣湯 蘇子降

氣湯 冷用抽刀散

蘇合香元 四磨湯

熱用小承氣湯 竹

疰腎氣陰氣
合積滯上
克心宮

去來痰火隨
氣升降

茹湯 濟生愈痛散

治中湯 紅元子 青

州白元子

大病後痰積
或藥攻心

酸早仁湯 温膽湯餘

見怔忡補心門

生五積加三稜莪朮輕

行未盡血忡心痛醋

調紅花散 五積散

婦人脾經痰
血入心

水

佳 濟生加味七氣湯加當歸

婦人心膈疼欲死赤白二芍藥枳實當歸加
 手拈散草菓玄胡索沒藥五靈脂四味甘
 草同等分姜煎再磨沉香木香入服甚效
 又中年婦人病後再感忽心痛連臍下如
 杯硬欲死用大承氣湯太下之久病皆愈
 中藏經九種心痛欲死木香莪朮乾漆炒等
 分細末熱醋湯調一錢一口即止卒心痛

桃仁七箇去皮尖研熟水服又郁李仁三
 七粒細嚼飯湯下痛止呷少鹽湯心痛邪
 留包絡川烏四錢益智仁三錢青皮乾姜
 二錢茴香一錢細末鹽湯下腹痛疰痛寒
 痛七日治治虫痛石榴湯石榴苦練東行
 根各五寸煎湯早起先食炙肉一二片飲
 壹盞虫必下虫有雌雄二條未效再作化
 虫元乾漆炒烟盡雷丸蕪荑等分為末温
 酒調三錢

心脾疼手拈散見前或加乳香等分酒調二錢又良姜三錢五靈脂六錢為末醋湯下又穉跡佛賜方用良姜香附子為末薄鹽米飲下又良姜芍藥剉炒水煎服小烏沉湯入百草霜搗同研煎服濟生燒脾散丁香煮散效心腹俱痛有寒證布裏椒置腹上以火熨椒令汗出良局方雞香散順氣木香散

雜病脅痛

五積散去麻黃加回香青木
 陰陽氣滯 香桃仁橘葉見傷寒門小柴
 邪氣未盡 胡湯 本事芍葛湯枳實散
 濟生枳芍散冷用川練回香
 湯等

六脈 飲食氣鬱 濟生推氣散仁齋分氣紫蘇
 緊弦 連乳痛 湯沉香湯下紅圓子痛連小

腸發欲死新復元通氣散葱
 湯調下神保元兼腫二十四

味流氣飲下神保元外用新
復元通氣去甘草加皂角末
姜汁調貼腫處輕則木香調
氣散下神保元

積氣貫臍 枳朮湯下神保元仁齋直指
有時發作 異香散楊氏牽牛元本事慧
水癖 如苡仁元濃煎葱白湯調枳殼
有物挿 散

玉機微義 腹痛

內經敘腹痛所因

舉痛論云寒氣入經而稽遲泣而不行客於
脉外則血少客於脉中則氣不通故卒然而
痛其痛或卒然而止者或痛甚不可按或按
之痛止或按之無益或喘動應手者或脇肋
與小腹相引而痛者或腹痛引陰股者或卒
然痛死不知人少間復生者或痛而嘔者或
腹痛而後泄者或痛而閉不通者各不同形
按本論具已上病形異候皆寒氣所因甚

詳官玩本文唯痛而閉不通爲熱氣留於小腸腸中痛瘴熱焦渴則堅乾不得出爲熱痛此述病機寒熱皆能爲痛也蓋寒痛者多熱痛者少

脉法

脉經曰脉細小緊急病速進在中腹中刺痛陰弦則腹痛 弦急小腹痛 尺脉緊臍下痛 尺脉伏小腹痛癥疝 尺脉實小腹痛當利之 心腹痛痛不得息脉細小遲者生

堅大疾者死 腹痛脉反浮大而長者死 傷寒論曰傷寒脉陽澁陰弦腹中急痛裏有虛寒

論傷寒腹痛

成無已云陰寒爲邪者則腹滿而吐食不下自利益甚腹自痛太陰証也發汗不解醫反下之因而腹滿時痛者屬太陽也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之東垣曰腹中諸痛皆因勞役過甚飲食失節中

氣不足寒邪乘虛而入客之故卒然而作大痛經言得炆則止炆者熱也以熱治寒治之正也然腹痛有部分臟位有高下治之者宜分之

按已上脉證言諸虛痛矣然邪傳入裏熱結下焦實滿血結硬痛皆實痛也脉經云腹滿按之不痛為虛痛者為實此述病機虛實之異又兼部分高下言也

論腹痛為陰毒所致

詳見傷寒門

論腹痛屬熱

原病式曰熱鬱于內而腹滿堅結痛者不可言為寒也

按丹溪曰腹痛有積熱者或死血食積濕痰皆能作痛脉弦者食脉滑者痰清痰多作腹痛宜分治之詳已上盖言寒熱之分故此論及已後病例皆不之及

論腹痛屬血

成無已曰邪氣聚於下焦則津液不得通血

氣不得行溺或或血留滯於下是生脹滿而鞭痛也若從心下至少腹皆鞭滿而痛者是邪實也須大陷胃湯下之若但少腹鞭滿而痛小便利者則是畜血之證小便不利者則是溺澁之證

論腹痛為疝所致詳見諸疝門

論腹痛為瀉痢詳見諸痢門

論腹痛為積聚所致詳見積聚門

論腹痛為腸癰所致詳見癰疽門

論治腹痛大法

此事難知曰傷寒中脘痛太陰也理中建中黃芪湯之類臍腹痛少陰也四逆真武附子湯之類少腹痛厥陰也重則正陽回陽丹之類輕則用當歸四逆湯太陰連少陰痛甚者當變卜利不止 雜證而痛四物苦棟湯酒者當歸丸之類夏月腹痛肌熱惡熱脉洪疾手太陰足陽明主之黃芩芍藥湯秋腹痛肌寒惡寒脉沉疾足太陰足少陰主之桂枝芍

藥湯四時腹痛芍藥甘草湯主之

按此治法本傷寒與夫寒疝時行治例也然學者觀已上諸病機則脉治思過半矣

心痛

胃脘痛附

諸經敘心痛所因

內經曰五臟卒痛何氣使然曰寒氣客於背俞之脉則血脉泣脉泣則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至則痛止矣重感於寒則痛久矣

鍼經曰足太陰之脉其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫心下急痛 胃病者腹臙脹胃脘常心而痛上支兩脇鬲咽不通 厥心痛者乃寒邪客於心包絡也 真心痛者寒邪傷其君也手足青至節甚則旦發夕死夕發旦死脉經曰愁憂思慮則傷心傷心則苦驚喜忘善怒心傷者其人勞倦卽頭面赤而下重心中痛徹背其脉弦此心臟傷所致也 諸虫

痛者如心腹痛懊懣發作腫聚往來上下行
痛有休作心腹中熱善渴涎出面色乍青乍
白乍赤嘔吐清水者虵咬也以手緊按而堅
持之無令得移以針刺之久持之虫不動乃
出針也

脉法

脉經曰脉陰弦爲心痛 心脉微急爲痛微
大爲心痺引背 短而數心痛 濇則心痛
脉浮大弦長者死沉細者生

論心痛有熱厥寒厥不同

病機要曰諸心痛者皆少陰厥陰氣上衝
也有熱厥心痛者身熱足寒痛甚則煩躁而
吐額自汗出知爲熱也其脉浮大而洪當灸
太谿及崑崙謂表裏俱瀉之是謂熱病汗不
出引熱下利表汗通身而出者愈也灸畢服
金鈴子散則愈痛止服枳朮丸去其餘邪也
有大實心中痛者因氣而食卒然發痛大便
或秘久而注悶心胷高起按之愈痛不能飲

食急以者黃丸利之利後以藁本湯去其邪
也有寒厥心痛者手足逆而通身冷汗出便
溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以木
附湯溫之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急
當救之是知久病無寒暴病非熱也

按此論寒厥熱厥與夫大實心痛及治法
已詳然亦有病久氣血虛損及素作勞羸
弱之人患心痛者皆虛痛也故錢氏曰心
虛者炒塩補之觀圖經衍義中具蠟治心

痛則蠟粉與塩實得之矣但世俗莫知其
妙而先哲不言此例者欲人自求之爾

論心痛分三因

陳無擇云十二經絡外感六淫則其氣閉塞
鬱于中焦氣與邪爭發為疼痛是厥陰心痛
兩脇急引小腹連陰股相引痛手心主痛徹
背心煩掌中熱咽乾目黃赤脇滿足太陰心
痛腹脹滿漚漚然大便秘不利膈閉咽塞手太
陰心痛短氣不足以息季脇空痛遺失無度

胃滿煩心足少陰心痛煩劇面黑心懸若飢
胃滿腰脊痛背輸諸經心痛心與背相引心
痛徹背背痛徹心諸府心痛難以俛仰小腹
上衝卒不知人嘔吐泄瀉此皆諸經諸俞諸
府涉邪所致病屬外所因若五臟內動汨以
七情則其氣痞結聚于中腕氣與血搏發為
疼痛肝心痛者色蒼蒼如死狀終日不得太
息真心痛者云云脾心痛者如針錐刺其心
腹蘊蘊然氣滿肺心痛者若從心間起動作

痛益甚色不變腎心痛者與背相引善噤如
物從後觸其心身偃僂胃心痛者腹脹滿不
下食食則不消皆臟氣不平善怒憂鬱所致
屬內因飲食勞逸觸忤非類使臟氣不平痞
膈于中食飲遁注變亂腸胃發為疼痛或飲
啖生冷菓實中寒不能消散結而為積遇食
還發名積心痛及其臟寒生虵故心痛者所
謂九種心痛曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸
曰虫曰疰曰去來痛者除風熱冷屬外所因

餘皆不內外更婦人惡血入心脾經發作疼
痛尤甚於諸痛更有卒中客忤鬼擊尸疰使
人心痛亦屬不內外因

按此具三因病機甚詳但欠諸經病及九
痛治例欲人自擴充尔然臟病連心心病
連臟及胃腕痛結胃之不同久新淫鬱之
異隨其所甚者為療故宜其無所足之法
也矧有七情九種之致者丹溪先生亦曰
凡心膈之痛須分久新若明知身受寒氣

口食寒物而病於初得之時當用溫散或
溫利之藥若其病得之稍久則成鬱大鬱
則蒸熱熱久必生火原病式中備言之矣
若欲行溫利溫散寧無助火添病耶由是
古方中多以山梔為熱藥之鄉導則邪易
伏病易退熱向安之後若縱恣口味病必
復作凡治此病必要先問平日起居何如
假如心痛有因平日喜食熱物以致死血
留於胃口作痛者用桃仁承氣湯下之若

此等例皆前人所未舉也學者識之

金匱方

胸痺心痛短氣病脈證治

師曰夫脈當取太過不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者責其極虛也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦故也平人無寒熱短氣不足以息者實也胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脈沉而遲關上小緊數括蕤薤白白酒湯主之

括蕤薤白白酒湯方

括蕤實

壹枚

薤白

半升

白酒

七升

右三味同煮取二升分溫再服

胸痺不得臥心痛徹背者括蕤薤白半夏湯主之

括蕤薤白半夏湯方

括蕤實

壹枚

薤白

三兩

半夏

半斤

白酒

壹斗

右四味同煮取四升溫服壹升日三服

胸痺心中痞留氣結在胸脅滿脇下逆搶心

枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

枳實薤白桂枝湯方

枳實四兩厚朴四兩薤白半斤桂枝一斤

一枚栝蒌一枚金方實壹枚

右五味以小五升先煮枳實厚朴取二升

去滓內諸藥煮數沸分溫三服○千金方

右五味咬咀以水七升煮取二升半分再

服仲景方厚朴用肆兩薤白半斤水五升

煮取二升

人參湯方

人參 甘草 乾姜 白朮 各三兩

右四味以水八升煮取三升溫服壹升日

三服

胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之

橘枳姜湯亦主之

茯苓杏仁甘草湯方 千金方名

茯苓 三兩杏仁 五十粒甘草 壹兩

右三味以水壹斗煮取五升溫服壹升日

三服不差更服○千金方峻咀以水壹斗
三升煮取六升去滓為六服日三未瘥再
合服

橘枳姜湯方

橘皮壹斤枳實兩三生姜半斤

右三味以小五升煮取二升分溫再服肘
後千金云治胸痺胸中怫怫如滿噎塞習
習如痒喉中澁唾燥沫

胸痺緩急者薏苡仁附子散主之

薏苡附子散方

薏苡仁兩十五大附子十枚

右二味杵為散服方寸匕日三服

心中痞諸逆心懸痛肘後方心下桂枝生姜

枳實湯主之

桂枝枳實湯方

桂枝各三枳實五生姜兩

右三味以水六升肘後方煮取三升分溫

心三服肘後方加朮二

心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之

赤石脂丸方

蜀椒壹兩一分烏頭壹分附子半兩炮一分乾

姜壹兩一分赤石脂壹兩一分

右五味末之蜜丸如梧子大先食服壹丸

湯下壹丸日三服不知稍加服

九痛丸治九種心痛

附子三兩炮○三因方得效生狼牙壹兩

○三因方得效巴豆壹兩去皮心人參壹兩

方御醫撮乾姜三因方得效吳茱萸各壹兩

炒撮要湯洗七次炒

右六味末之煉蜜丸如梧子大酒下三因

效方澹寮方每服空腹溫酒下強人初服

三九玉機微日三服弱者二九兼治卒中

惡腹脹痛口不能言三因方得效方此下

腫上氣落馬墜車血疾等皆主之忌口如

常法○千金方治九種心痛并療冷衝上

氣落馬墮車血疾等方壹蟲心痛二注心痛三風心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛此之謂九痛附子乾薑各二兩吳茱萸人參巴豆各壹兩生狼毒四兩右六味為末蜜和凡如梧子大空腹服壹丸卒中惡腹脹痛口不能言者二九日一服連年積冷流注心胃者亦服之好好將息神驗嚴氏濟生方治九種心痛腹脇氣脹不欲飲食附子炮去皮臍二兩

乾薑炮吳茱萸炒狼毒剉醋拌人參各壹兩巴豆半兩去殼油去右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三圓熱湯送下不拘時候醫方大成治九種心疼及冷氣攻刺發痛落馬墮車瘀血停滯並宜服之狼毒半兩乾姜炮巴豆去皮心膜人參去蘆○永類鈐方各三兩附子炮去皮吳茱萸湯洗七次右為末煉蜜圓如梧桐子每服壹圓空心溫酒下卒然心腹疴痛鈐方絞痛口不能言者服二

圓立瘥醫方集成

千金方

心腹痛

治寒氣卒客於五臟六腑中則發心痛方

大黃 芍藥 柴胡各四兩 升麻 黃芩

桔梗 朱砂各三兩 鬼箭羽 鬼白 桂心

朴消各二兩

右十一味咬咀以水九升煮取二升七合分三服先分朱砂作三分每服內壹分攪

令勻服之得快利痛不止宜服後方

赤芍藥六兩 桔梗 杏仁各五兩

右三味咬咀以水六升煮取三升分三服

治九種心痛方取當太歲上新生槐枝壹握

去兩頭咬咀以水三升煮取壹升頓服預備

百要力同聖惠方 ○煙霞聖效方急心痛

不可忍者右壹味嫩槐條一握長大一把

水一椀煎七八沸放溫服之大效神效名

方治急心痛并男子小腸氣以新嫩槐枝

一握切去兩頭水二盞煎至一盞去滓分

二服熱服衛生易簡方同

桂心三物湯治心中痞諸逆懸痛方

桂心 生薑各二兩 膠飴斤

右三味取二味咬咀以水六升煮取三升去滓內飴分三服仲景用枳實五枚不用膠飴肘後用枳實五枚白朮二兩為五味

烏頭圓治心痛徹背背痛徹心方

烏頭六銖 附子 蜀椒半兩 乾薑 赤石脂一兩

右五味為末蜜丸如麻子大先食服三九日三不知稍增之范汪不用附子服如梧子丸崔氏用桂半兩為六味○聖惠方

治心背徹痛不可忍烏頭丸方川烏頭半兩

炮裂去皮 附子半兩炮裂去皮 赤石脂壹兩 乾薑兩

炮裂川椒 半兩去目及閉 右件藥搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大不計

時候以醋湯下十丸

治心痛方桃白皮煮汁空腹以意服之肘後方壽

域神方同崔氏用療挂心痛○聖惠方治久心痛不可忍無問男女老少方桃白皮五兩右細剉以水二大盞煎至一盞去滓頓服根皮亦良聖濟總錄治心腹卒脹痛桃白皮湯方桃白皮剉壹兩右一味以水三盞煎取壹盞去滓頓服根皮亦佳

治暴心痛或如中惡口中涎出不可禁止回

回欲此方

苦參十斤

右壹味咬咀以水壹石煮取二斗去滓下苦酒二斗更煎取五升且大黃末熬和汁中煎令可丸併手丸之如梧子大每服以酒一升進三四十九日一當倒腹吐不吐又下利更酒漬苦參二斤浸久彌佳非止暴痛如胛骨齧等痛凡是腹中之疾悉主之又治宿冷血結陰癖類用有效大良治卒中惡心痛方○肘後方治卒心痛

苦參三兩

右壹味咬咀以好酢壹升半煮取八合後

方分再服亦可用水無煮者生亦可用强者頓服老小分二

服○千金月令右以苦參一兩酒壹升半

煮取八合乘熱頓服吐

又方肘後方治

桂心一兩○肘後方八兩

右壹味咬咀以水四升煮取壹升半分二

服肘後方煮取○千金月令主心腹俱痛

方右取桂心三兩切以水一升八合煎取

八合頓服之瓊碎錄卒心腹脹痛短氣欲

死或以絕者桂二兩剉水壹碗頓服

治蟲心痛方鶴蟲備預百要為末蜜和丸如

梧子大服四十九白要方蜜湯下日一服

可加至五十丸慎酒肉

又方鶴蟲壹兩為末以溫酢壹盞和空腹服

之蟲當吐出

又方服漆壹合方見養性門凡蟲心痛皆用

漆主之

五辛湯治心腹冷痛方 聖濟總錄刺痛

細辛 蜀椒 桂心 乾薑 吳茱萸

芍藥 防風 苦參 甘草 乾地黄

當歸 各壹兩 梔子 烏梅 大棗 各二枚

右十四味咬咀以水九升煮取三升分四

服○總錄蜀椒 去目及閉口者炒出汗 乾薑 炮 細辛

去苗 桂皮 去麤皮 熟乾地黄 焙 芍藥 防風 去苦

參 甘草 炙 當歸 切 吳茱萸 水浸一宿 梔子

去核 烏梅 二七枚 右壹十三味麤擣篩每服

三錢匕水壹盞棗二枚擘破煎至七分去

滓溫服日二

犀角圓治心腹久痛積年不定不過膏時
還發甚則數日不能食又便出乾血窮天下
方不能瘥甄立言處此方數日即愈

犀角 麝香 雄黃 桔梗 莽草 鬼

白桂心 芫花 各半兩 甘遂 一兩 光明砂

附子 各六枚 貝齒 五枚 巴豆 二十枚 赤足蜈蚣 二枚

右十四味為末蜜丸如梧子飲服一九日

二漸加至三丸以微利為度古今集驗無雄黃

高良薑湯治卒心腹絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可忍方

高良薑 五兩○衛生寶鑑五錢 厚朴 二兩○寶鑑薑製 當歸

寶鑑 桂心 各三兩○寶鑑官桂各二錢

右四味咬咀以水八升煮取一升八合分三服日二若一服痛止便停不須更服強者為二服劣者分三服○寶鑑右咬咀以

水一升煎取四合強人分作二服劣人作

三服一服痛定止後服對病增損聖惠方

治卒心痛腹脇氣脹不欲飲食高良薑 一兩

半兩 厚朴 二兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟 桂心 壹兩 當歸 壹兩

炒 右件藥搗篩為散每服三錢以水一

中盞煎至六分去滓不計時候熱服

當歸湯治心腹絞痛諸虛冷氣滿痛方

當歸 芍藥 厚朴 半夏 各二兩 桂心

甘草 黃耆 人參 各三兩 乾薑 四兩 蜀椒 壹兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升二合分
四服羸劣人分六服小品方云大冷加附
子一枚

又方治虛冷腹痛不下飲食食復不消臙脹
方

當歸 茯苓各五分 黃耆 紫菀各四分 高良

薑 乾薑各六分 鹿茸 桂心 昆布 肉

蓯蓉 橘皮各三分 甘草二兩 烏頭壹兩 大棗十四

枚 桃人壹伯 地骨皮 法麴 大麥蘖各壹

升

右十八味咬咀以水一斗五升煮取四升

二合分為五服下利加赤石脂龍骨各三

分渴加麥門冬壹升

又方治寒冷腹中痛方小品名吳茱萸湯

當歸二兩 桂心 甘草 人參各壹兩 生薑五兩

半夏 小麥各壹升 吳茱萸二升

右八味咬咀以水壹斗五升煮取三升分

三服日三亦治產後虛冷○聖濟總錄吳

茱萸

水浸壹宿暴乾

人參

去麤皮

半夏

湯洗去滑

當歸

切焙各壹兩

小麥

壹合

甘草

炙別

右七味

麤搗篩

每服三錢匕水一盞半入生薑壹棗大柏

破同煎取八分去滓溫服空心晚食前各

一

又方治冷氣脅下往來衝胃膈痛引脅背悶

當歸

桂心

人參

甘草

吳茱萸

芍藥

大黃

各二兩

茯苓

枳實

各壹兩

乾薑

三兩

右十味咬咀以水八升煮取二升半分二

服日三治尸疰亦佳外臺仲景方無茯苓

枳實

又方治久寒疾胃腹中痛時下利方

當歸

三兩

甘草

柑皮

各二兩

附子

壹兩

乾薑

右五味咬咀以水八升煮取二升分三服

日三

又方治久寒宿疾胃腹中痛短氣時滯下痢

方

當歸 桂心各三兩 乾薑四兩 附子壹兩

右四味咬咀以水八升煮取二升分三服

日三范汪無附子用甘草二兩云虛冷激

痛甚者加黃耆芍藥各二兩

溫中當歸湯治心腹中痛發作腫聚往來上

下痛有休止多熱喜涎出是虺蟲咬也服二

三劑後若不効有異宜改方增損之

當歸 人參 乾薑 茯苓 厚朴 木

香 桂心 桔梗 芍藥 甘草各二兩

右十味咬咀以水八升煮取三升分溫五

服日三不耐木香者以犀角一兩代之

羊肉當歸湯治腹冷絞痛方

羊肉半斤 當歸四分 乾薑 橘皮 黃耆 芍

藥 芎藭 桂心 獨活 防風各三分 吳

茱萸 人參 甘草 乾地黄 茯苓各壹

分生薑六分 大棗三十枚

右十七味咬咀以水壹斗半先煮肉取壹

斗二升出肉次內諸藥煮取三升分三服
日三覆取溫暖

溫脾湯治腹痛臍下絞結繞臍不止方

甘草 附子 人參 芒消 各二兩 當歸

乾薑 各三兩 大黃 五兩

右七味咬咀以水七升煮取三升分服日

三

生薑湯治胃腹中卒痛方

生薑 壹斤 食蜜 八兩 醴 四兩

右三味微火上耗令相得適寒溫服三合

日三

熨蒸法凡心腹冷痛熬塩壹斗熨蒸蠶沙燒

磚石蒸熨取其裏溫暖止蒸土亦大佳

增損當歸湯治心腹蘊蘊然痛方

當歸 升麻 各三兩 芍藥 黃芩 朴消

桔梗 柴胡 各四兩

右七味咬咀以水八升煮取二升半分三服

胃痺

栝萸湯治胃痺病喘息欬唾脘背痛短氣寸脉沉而遲關上小緊數方

栝萸實一枚半夏半升薤白一斤枳實二枚生薑四兩

右五味㕮咀以白截漿一斗煮取四升服一升日三仲景肘後不用生薑枳實半夏

治胃痺候胃中幅幅如滿噎塞習習如癢喉中澀燥唾沫宜此方

橘皮壹斤生薑半斤枳實五枚

右三味㕮咀以水五升煮取二升去滓分再服

治中湯治胃痺方方見霍亂門

通氣湯治胃滿短氣噎塞方

半夏八兩生薑六兩橘皮三兩吳茱萸四十枚

右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服一方用桂二兩無橘皮○聖惠方治胃痺

氣滿噎塞通氣散方半夏二兩湯洗七吳茱

萸一分湯洗七桂心壹兩右件藥擣羅爲

散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓稍熱頻服

細辛散治胃痺達背痛短氣方

細辛 甘草各二兩 枳實 生薑 栝萆實

乾地黄 白朮各三兩 桂心 茯苓各五兩

右九味治下篩酒服方寸匕日三

蜀椒散治胃痺達背方

蜀椒 食茱萸各壹兩 桂心 桔梗各三兩 烏

頭半兩 豉六兩

右六味治下篩食後酒服方寸匕日三

前胡湯治胃中逆氣心痛徹背少氣不食方

前胡 甘草 半夏 芍藥各二兩 黃芩

當歸 人參 桂心各壹兩 生薑三兩 大棗十三

枚 竹葉壹升

右十壹味咬咀以水九升煮取三升分四

服

又方前胡 人參 生薑 半夏 麥門冬

甘草 芍藥 茯苓 錫各三兩 桂心 黃

芩 當歸 各壹兩 大棗 三十枚

右十三味咬咀以水壹斗四升煮取三升去滓分三服

熨背散治胃背疼痛而悶方

烏頭 細辛 聖惠方壹兩 附子 羌活 蜀椒

聖惠方 桂心 各五兩 芎藭 壹兩六銖 聖惠 去目

右七味治下篩帛裹微火炙令暖以熨背上取瘥乃止慎生冷如常法○聖惠方右件藥擣篩為散入少醋拌炒令極熱分三

處用熟帛裹熨背冷即換之

下氣湯治胃腹背閉滿上氣喘息方

大腹檳榔 二十七枚 杏仁 四七枚

右一味咬咀以童子小便三升煎取壹升半分再服曾患氣發輒合服之

檳榔湯主破胃背惡氣音聲塞閉方

檳榔 極大者四枚 小者八枚

右一味二品咬咀以小兒尿二升半煮減一升去滓分三服頻與五劑永定

千金月令

主心痛方右以酢入亂膩髮中布熟灰椀七
重布裏熨又取壹錢塩平之以刀子閉氣

畫竹甲子字三指撮下熱湯中攪頓服之

主心下堅結痛方

甲後方心下堅痛大如椀
邊如旋柁名爲氣分飲水

所結

枳實

七枚
術三兩

右以水壹升煮取半升

肘後方水壹分溫
斗煮取三升

三服又厚朴炙令煙盡搗爲末和生薑作

湯服

主腹痛方右取桂心末三錢匕飲下之

主冷注方右取頭髮灰杏仁熬令紫色等分

擣和少酒丸如梧桐子大酒下三丸

主心腹俱痛方取椒以布裏薄注上

壽域神方以布

裏花椒薄
鋪痛處

以火熨椒令汗出

肘後方同

海上仙方

心頭痛

心頭痛發不堪當急看孫仙海上方匾竹醋

煎連口嚙教人服了便安康

聖惠方

治九種心痛諸方

夫九種心痛者一蟲心痛二疰心痛三風心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九往來心痛謂之九種也此皆諸邪之氣乘於手少陰之絡邪氣搏於正氣邪正交結相擊故令心痛也

治九種心痛面色青心腹妨悶四肢不和宜

服沉香散方

沉香三分 赤芍藥壹斤 醋石榴皮 桔梗三分

頭檳榔壹兩 大腹皮三分 紫雪壹兩

右件藥擣籠羅爲散每服四錢以水壹中
盞入葱白七寸煎至六分去滓不拘時候

稍熱服

治九種心痛多吐腹脹宜服桂心散方

桂心一兩 當歸半兩 剉 食茱萸半兩 赤芍藥半兩

厚朴壹兩 薑汁去麤皮塗生 檳榔壹兩 郁李人一兩

湯浸去皮微炒

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候稍熱服

治九種心痛及冷氣攻兩脇胃背疼痛欲吐宜服當歸散方

當歸壹兩到桔梗壹兩去陳橘皮一兩湯

微炒藥半枳殼壹兩麩炒桂心一人參

焙赤芍藥兩枳殼微黃去瓢

右件藥搗細羅為散不計時候煎生薑棗

湯調下二錢

治九種心痛腹脇氣滯宜服訶梨勒丸方

訶梨勒壹兩煨木香半兩桂心壹兩乾薑半兩

劉川大黃一兩半劉吳茱萸半兩易浸七

附子半兩炮裂去皮臍

右件藥搗羅為末醞醋煮麵糊和丸如梧桐子大不計時候以溫酒下二十九

治九種心痛腹內冷氣積聚宜服沉香丸方

沉香兩半阿魏半兩麩裏煨麝香半兩木香

一丁香壹兩 火前椿兩 乾薑半兩 炮兩 檳榔壹兩

右件藥搗羅為末入麝香同研令勻煎醋

浸蒸餅和丸如棗豆大不計時候以熱酒

嚼下十九

治九種心痛腹脇氣脹不欲飲食宜服附子

丸方

附子二兩 炮裂去皮 乾薑二兩 炮裂剉 巴豆半兩 去皮 研

帶裏壓去油 人參壹兩 去頭 狼毒壹兩 判研 食菜

莫壹兩

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻鍊蜜和

搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以

熱酒下三丸神巧萬全方同

治九種心痛衛生易簡方此 及腹脇氣聚滯

不消方右取乾漆二兩搗碎炒令煙出細

研如粉鍊蜜肘後方易簡方醋煮麵糊 和丸如梧桐子

大不計時候以熱酒下五丸神巧萬全方同肘後方易

簡方每服五丸至七丸 醋湯亦得 ○經驗良方治心痛欲

死者右用乾漆為末瑣碎錄每 水壹盞煎

半蒸入醋半蒸調服之

治九種心痛妨悶方

桂心半兩末○肘後方
壽域神方一分

右以酒壹大盞煎至半蒸去滓稍熱服立

効神巧萬全方同○是齋醫方治心脾痛不可救

者任和卿知縣方右桂心為末白湯點服

酒煎尤妙調亦可急救仙方同

治卒心痛諸方

夫卒心痛者由臟腑虛弱風邪冷熱之氣客

於手少陰之絡正氣不足邪氣勝盛邪正相
擊上衝於心心如寒狀痛不得息故曰卒心
痛也

治卒心痛腹脹去惡氣麝香散方

麝香一兩犀角屑半兩木香半兩

右件藥擣細羅為散入麝香研令勻不計

時候以熱酒調下一錢

治卒心痛腹脇氣滯方

桂心壹兩當歸壹兩剉壹兩蓬莪茂壹兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢神巧萬全方同

又方聖濟總錄治心腹疼痛每發時連臍腹刺痛多吐涎沫

桂心壹兩乾薑壹兩炮

右件藥搗細羅為散不計時候以酒調下

壹錢

治卒心痛氣悶欲絕面色青四肢逆冷吳茱

萸丸方

吳茱萸壹兩湯浸七乾薑壹兩焙桂心壹兩

白朮壹兩檳榔壹兩青橘皮壹兩白瓠壹兩木香壹兩

乾漆壹兩搗碎壹兩當歸壹兩微炒壹兩桔梗壹兩蘆頭壹兩

附子壹兩炮裂壹兩去皮臍

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸

如梧桐子大不計時候以熱酒下二十九

又方聖濟總錄治心腹卒脹痛桂心丸

桂心壹兩川烏頭壹兩炮裂壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

不計時候以醋湯下十九○時後方擣篩

密和為丸一服如梧子大三丸漸加之總錄

每服五丸米飲下漸增至七丸

又方牛薑兩熟乾地黃半兩

右件藥細剉用水一大盞煎至五分去滓

不計時候熱服

又方醖醋膏合○肘後方雞子一枚打破○
壽域神方膏杯

右件藥相和攪令勻煖過頓飲之好酒亦

可用

又方白艾二兩熟者

右以水二大盞煎至一盞去滓分為三服

稍熱服之○肘後方白艾成熟者三升衛生

易簡方以水三升煮取一升去滓頓服之

若為客氣所中者當吐之虫物壽域神方

又方用青布裹塩如彈子大燒令赤都研為

末以熱酒用後方以調頓服之神巧萬全方同○

經驗秘方卒心腹脹痛短氣欲死已絕方

以布裹塩如彈丸燒令赤置一盞酒中化

服得利即愈瑣碎錄同經驗良方又云備

預百要方中寒心腹痛方用古破布帛裹
搥如雞卵許燒烈火中細末以苦酒頓服

又方竈突中墨半盞兩半

右件藥以水壹大盞煎五六沸令搥消去

滓分溫二服當吐之愈未吐更服

又方右用錙底墨以熱小便調下二錢壽域神方

以童子熱小便調下三錢即愈

又方右用蒸大豆或者煮豆以囊盛更番熨痛

處冷復易之神巧萬全方用後方同

治諸蟲心痛諸方

夫人藏腑虛弱風邪冷熱之氣交結成於諸
蟲在於腹胃之間因食甘肥其蟲發作腹中
種聚行動往來若攻於心絡則令心痛無休
息喜吐清水及有涎沫蛔蟲貫於心則殺人
宜速療之也

治諸蟲心痛多吐不食宜服當歸散方

當歸壹兩對 桔梗一兩去 赤芍藥壹兩 陳橘
皮壹兩 湯浸微炒 鶴蝮一人參 蘆頭一兩 桂心一兩

檳榔

二兩

右件藥搗羅羅為散每服四錢以水壹中
煮入生薑半分煎至六分去滓不計時候
稍熱服

治諸蟲心痛不可忍多吐酸水宜服石榴皮

散方

醋石榴皮

一兩

剉

桃符

二兩

剉

胡粉

壹兩

酒

二合

檳

榔末

二錢

右件藥以水二大盞煎前二味至壹盞去

滓下胡粉檳榔酒更煎壹沸稍熱分為三

服

治諸蟲心痛發連臍腹刺痛多吐涎沫宜

服桑白皮散方

桑根白皮

半兩

醋石榴皮

半兩

蕪荑

半兩

厚朴

壹兩

去蘆皮塗牛薑

汁炙令香熟

生薑

壹分

檳榔

末二錢

右件藥細剉以水二大盞煎至壹盞去滓

下檳榔末攪令勻稍熱分為三服

聖濟總錄同

又方醋石榴根一兩桃白皮壹兩陳橘皮壹分湯

瓢高良薑半檳榔一

右件藥細剉和勻每服半兩以水壹大盞煎至五分去滓不計時候稍熱服之

治諸蟲心痛不可忍服之蟲皆利下雷九散方

雷丸 貫衆 狼牙 當歸剉微炒 檳榔

陳橘皮湯浸去白瓢焙 桂心 鶴蝨已上各壹兩

右件藥擣細羅為散每服以蜜湯調下壹錢以利下蟲為度神巧萬全方同

治積年常患諸蟲心痛吐水不能食鶴蝨丸方

鶴蝨 附子炮裂去皮臍 狼牙 檳榔 乾漆

擣碎炒 白木 甘草炙微剉 陳橘皮湯浸去白瓢焙

已上各壹兩 乾薑三分炮裂剉 吳茱萸三分湯浸七遍焙乾微炒

狼毒壹兩半剉碎醋拌炒黃

右件藥擣羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以粥飲下十五丸治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹

滿悶檳榔丸方

檳榔 鶴蝨 桂心 吳茱萸 湯浸七遍 焙乾微炒

陳橘皮 湯浸去壹瓢焙 已上各壹兩

右件藥搗維爲末鍊蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大不計時候以熱酒下三十九

又方鶴蝨壹兩乾漆壹兩搗碎 炒令煙出

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以醋湯下十九神巧萬全方同

又方檳榔壹兩鶴蝨壹兩

右件藥搗細羅爲散不計時候煖大麻人

汁調下二錢

又方東引石榴根壹兩膩粉半錢○神巧萬全方半兩

又右件藥以水壹大盞煎石榴根至五分去

滓調膩粉以利下蟲爲效

又方右以鰻鱧魚淡炙令熟與患人三五兩

喫承差肘後方壽域神方與患人 食一二枚承差飽食彌佳

又方右用熊膽如大豆許細研以溫水和服之立差用後方衛生 易簡方同

又方丁香半亂髮如雞子

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

又方薰陸香兩半

右擣細羅為散每服煖醋一合調下一錢

又方棟樹東南根白皮言兩樹有子者

右細剉以小一大盞煎至五分去滓空腹

頓服

治冷氣心腹痛諸方

夫冷氣心痛者由藏腑虛弱宿有冷疹因外
觸風寒內傷飲冷而致發動邪氣與正氣相
搏隨其上下若上攻於心則心痛或下攻於
腹則腹痛也
治冷氣攻心腹痛脇肋妨悶不思飲食桔梗
散方

桔梗去蘆當歸剉炒赤芍藥 赤茯苓

陳橘皮湯浸去白白朮 葶澄茄 厚朴去

皮塗生薑汁 桂心 草荳蔻去訶梨勒煨

皮檳榔 已上各一兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中
蓋入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不
計時候稍熱服

治冷氣攻心腹痛不可忍木香散方

木香 青橘皮 湯浸去白 赤芍藥 吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒 當歸 剉微炒 檳榔 附子 炮裂剉已上各

壹兩 柴胡 去苗 麝香 三錢細研

右件藥搗麤羅為散入麝香和令勻每服

二錢以水一中蓋煎至六分去滓不計時
候稍熱服

治冷氣不和心腹疔痛或時嘔逆不納飲食

高良薑散方

高良薑 壹兩 桂心 壹兩 芎藭 半兩 丁香 兩 白荳蔻

壹兩 當歸 半兩剉 去皮 微炒

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中
蓋煎至六分去滓不計時候熱服

治冷氣攻心腹痛時復下利當歸散方

當歸剉微炒 乾薑炮裂剉 青橘皮湯浸去白瓢焙 艾葉

炒令香熟已 附子炮裂去皮臍 白朮 厚朴去龜皮塗

上各一兩半 木香半

右件藥搗羅為散每服二錢至三錢水壹

中盞煎至六分去滓不計時候稍熱服之

治冷氣攻心腹痛多嘔不欲食桂心散方

桂心壹兩 高良薑壹兩 當歸壹兩剉微炒 厚朴二兩

去龜皮塗生薑壹兩 草薺壹兩 人參壹兩

汁炙令香熟 頭

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候稍熱服

治冷邪氣攻心腹痛不欲飲食桃人散方

桃人三七枚湯浸去皮 厚朴壹兩塗生薑汁炙

令香人參半兩去蘆頭 陳橘皮壹分易去 麥蘖

半兩檳榔兩 附子壹兩炮裂 桂心壹兩 當歸

壹兩剉微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候稍熱服

治冷氣攻心腹痛少思飲食檳榔散方

檳榔三分當歸壹兩劉蓬莪茂三分吳茱萸壹分

湯浸七遍焙乾微炒阿魏壹分麩裏度木香三分

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢神方

治冷氣攻心腹痛不可忍藁芩散方

藁芩壹分胡椒壹分桂心壹分桃人半兩湯浸去

炒微黃木香兩當歸三分剉炒

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

治積冷氣攻心腹痛四肢多冷面色青黃不

欲飲食麝香丸方

麝香壹分檳榔壹兩陳橘皮壹兩湯浸去肉苳

菑壹兩吳茱萸兩木香壹兩

右件藥先將茱萸以米醋煮一二十沸後

掘一地坵子可安得茱萸先以大火半拌

燒坵子令通赤以米醋半蓋及茱萸入在

坵內用瓷椀蓋之四面以灰擁定勿令泄

氣候冷取出與前藥壹處搗羅為末入麝香和勻用醋煮麪糊和丸如棗豆大不計時候以熱酒下二十九

治久積冷氣攻心腹脹痛或時吐逆下利不思飲食宜服內炙丸方

葶芩兩訶梨勒半兩煨乾薑壹兩炮附子兩半兩炮裂桂心半兩白茯苓半兩人參半兩去皮臍肉芎藭半兩縮沙半兩當歸三分剉木香半兩胡椒半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以生薑醋湯下二十九

治冷氣攻心腹痛久不差面色青黃四肢多冷阿魏丸方

阿魏一兩以醋一兩桂心一兩乾薑壹兩炮附子壹兩炮裂吳茱萸半兩湯浸七兩當歸壹兩剉微炒

右件藥搗羅為末用阿魏膏和搗百餘杵

丸如梧桐子大不計時候以溫酒下二十丸

治心腹痛脹滿諸方

夫心腹痛脹滿者由藏虛而邪氣客之乘於心脾故也足太陰脾之經也脾虛則脹足少陰腎之經也其脉起於足小指之下循行上絡膀胱其直者從腎上入肺其支者從肺出絡於心今虛邪之氣客於三經與正氣相搏積聚在內邪氣并於心脾故令心腹痛而脹

診其脉遲而滑者脹滿也

治久冷胃膈氣滯心腹痛脹滿不能飲食四肢虛乏喫食全少前胡散方

前胡壹兩去蘆頭

陳橘皮

壹兩湯浸去白瓢焙當歸壹兩到微

炒赤茯苓壹兩

白朮壹兩

赤芍藥壹兩桂心壹兩半

夏半兩湯洗七遍去滑乾薑半兩

吳茱萸

半兩湯洗七遍焙乾微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治心腹痛脹滿氣促肩背悶四肢不和少思飲食訶梨勒散方

訶梨勒皮一兩 前胡一兩半 赤茯苓壹兩 陳

橘皮二兩 湯浸去白 紫蘇莖葉壹兩 赤芍藥兩 檳

榔一兩 木香兩半 桂心兩壹

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治冷氣攻心腹脹滿疼痛飲食不消四肢羸

瘦厚朴散方

厚朴壹兩半 去生薑汁 炙令香熟 訶梨勒壹兩半 木

香兩壹 蒼木一兩 枳殼壹兩 麩炒當歸 壹兩剉

桔梗壹兩 去盧頭 陳橘皮二兩 湯浸去白 煎焙

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治心腹痛脇肋氣脹滿不下食當歸散方

當歸剉微炒 赤茯苓 桔梗去盧頭 陳橘皮湯浸

去白人參去蘆頭 高良薑剉 檳榔 桂心已

各一兩 吳茱萸湯浸七 遍焙乾微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中

入棗二枚煎至六分去滓不計時候稍熟

服

治心腹痛脹滿短氣欲絕方

吳茱萸半兩湯浸七 生薑半兩 豉一

右件藥以酒二大盞煎至壹盞三分去滓

不計時候稍熟分為三服○肘後方茱萸

二兩生薑四兩豉三合酒四升煮取二升
分為三服即差

治心腹痛脹滿喘促不欲飲食四肢少力心
神虛煩桔梗散方

桔梗去蘆頭 赤茯苓 枳殼麩炒微 人參去

頭厚朴去蘆皮塗生薑 木香 赤芍藥

陳橘皮湯浸去 桂心 檳榔已上各

右件藥搗細羅為散不計時候以薑棗湯

調下壹錢

治心腹痛脹滿食不消化四肢不和木香丸

木香兩半檳榔兩半赤芍藥兩半枳殼兩半麩炒

訶梨勒壹兩煨桂心兩半陳橘皮壹兩湯浸

吳茱萸壹分湯浸七遍焙乾微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以粥飲下三十九

治心腹痛脹滿臍下有積聚不欲飲食赤芍藥丸方

赤芍藥壹兩當歸兩白朮兩鼈甲壹兩塗醋

去裙襴訶梨勒壹兩半乾薑三分炮人參

三分去肉苳蔻半兩雄雀糞半兩微炒郁李人

盧頭壹兩湯浸去皮微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以溫酒下二十九

治久心痛諸方

夫心為諸藏之主其正經不可傷傷之而痛者則朝發夕死夕發朝死不暇展治其久心

痛者是心之支別絡為風邪冷熱所乘痛也故成疹不死發作有時經久不得差也

治久心痛冷氣積聚四肢不和脣口青時時

惡寒川椒散方

川椒壹兩去目及閉當歸半兩剉川烏頭

牛兩炮裂枳殼半兩麩炒附子半兩炮裂

去皮臍乾薑吳茱萸半兩湯浸七甘草兩

赤剉桂心兩半

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治心痛積年不差發即數日不食及腹中積

聚邪毒氣不散犀角丸方

犀角屑麝香研朱砂細雄黃細桔梗去

頭莽草微鬼臼去鬚附子炮裂去桂心甘

草微芫花醋拌炒乾巴豆二十枚去

裏壓赤足蜈蚣二枚貝齒五枚燒赤

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

擣三二百杵丸如梧桐子大每於食前以
粥飲下二丸

治久心痛經年不止及虻蟲冷氣心痛宜服
木香丸方○玉機微義集效丸治臟腑虛弱
或多甘肥致虻動作心腹絞痛

木香 鶴蟲微義炒 檳榔 訶梨勒用燕

黃壹兩半剉 附子炮裂去 乾薑炮裂剉 川大

黃碎微炒

右件藥擣羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以橘皮湯下三十

丸微義又云婦人醋湯下

治久心痛積年不差及冷氣結塊少思飲食

艾煎丸方

熟艾壹斤 木香 陳橘皮湯浸去 厚朴去

皮塗生薑汁 桃人湯浸去 雙川椒去

及閉口者 山茱萸 乾薑炮裂 栝子入

吳茱萸湯浸七遍 附子炮裂去 白木已上

兩

右件藥除熟艾餘並搗羅為末入桃人和研令勻用醞醋五升熬艾末成膏入諸藥和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三十九

治久心痛不止方

桑黃牛兩 微炙 木香半兩

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下一錢

又方丁香半兩 桂心壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下一錢

治久心痛頻發作不可忍方

小蒜不限多少

右以醞醋爛煮空心隨意食之

治久心痛時發不定多吐清水不下飲食宜服此方

雌黃二兩 細研

右以醋二升下雌黃末慢火煎成膏入乾

蒸餅末和瓦如梧桐子大每服以生薑醋湯下七丸肘後方

治惡症心痛諸方

夫惡症心痛者由人陰陽俱虛氣血不足風寒暑濕不正之氣乘虛入人肌體流注經絡伏留藏腑其邪毒之氣擊於心包故令心痛也

治惡症心痛或疔刺腹脇或肩背痛無常處鬼箭羽散方

鬼箭羽

桃人

湯浸去皮尖雙

赤芍藥

鬼臼

去鬚

陳橘皮

湯浸去白瓢焙

當歸

剉

桂心

柴胡

去苗

朱砂

細研已上各壹兩

川大黃

二兩剉碎微炒

右件藥搗細羅為散入朱砂研令勻每服

不計時候以溫酒調下壹錢

治惡症心痛發歇不定木香散方

木香

半兩

犀角屑

三分

檳榔

一兩

半當歸

半兩剉

桂心

半兩

桃人

皮尖雙

人麩

黃川

大黃

三分剉碎微炒

右件藥搗細羅為散入麝香研令勻每服
不計時候以熱酒調下壹錢

治惡症心痛煩亂不可忍犀角散方

犀角屑壹兩 安息香半兩 檳榔壹兩 沒藥半兩 肉桂

壹兩 去壹兩 麝香壹兩 細研

右件藥搗羅為散入麝香研令勻每服不

計時候以熱酒調下壹錢

治惡症心痛手足逆冷檳榔散方

檳榔一兩 木香三分 高良薑半兩 青橘皮半兩 湯浸

去白桃人半兩 湯浸去皮尖 桂心半兩 雙人雙 炒微黃

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

治惡症脇肋連心刺痛常歸散方

當歸剉碎 木香 檳榔 麝香細研已上 各壹兩

右件藥搗細羅為散入麝香研令勻每服

二錢以童子小便一中盞煎至五分不計

時候和滓濕服

治惡症心腹痛如錐刀所刺脹滿欲死者消

石丸方

消石一兩 川大黃一兩半 碎微炒 巴豆三七枚 去皮心研紙裏壓三分 附子三分 炮裂 藟薑三分 去油去皮臍 石件藥搗羅為末鍊蜜和搗一二百杵凡如麻子大不計時候以粥飲下五丸

治中惡心痛諸方

夫中惡心痛者由人藏腑氣虛精神衰弱為毒邪鬼氣之所中也凡人陰陽理順榮衛和平志清神守則邪不于正若表裏俱虛精神

散失邪毒之氣入於藏腑攻擊於心絡故令心腹刺痛也

治中惡心痛腹脹悶亂大黃散方

川大黃剉碎 赤芍藥 川升麻 鬼箭羽 鬼臼去 桂心 桔梗去蘆 柴胡去苗 川朴消二兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治中惡心痛不可忍沉香散方

沉香半兩赤芍藥半兩醋石榴皮半兩桔梗半兩

半兩去蘆頭檳榔一兩川芒消一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入葱白五寸煎至六分去滓不計時候溫

服

又方赤芍藥一兩桔梗一兩去蘆頭杏仁一兩湯浸微黃

微黃炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治中惡心痛不可忍如蠱毒鬼疰之狀犀角

散方

犀角屑壹分木通壹分姜活壹分黑豆半合甘草壹分

炙微赤牛黃半錢麝香半錢桑根白皮壹分

右件藥細剉都以水二大盞煎至一盞二

分去滓入牛黃麝香攪令勻分溫三服不

計時候服

治中惡心痛氣急脹滿狀欲死雄黃散方

雄黃半兩細研赤小豆半兩瓜蒂半兩

右件藥時細羅為散每服以溫水調下一錢當吐立差良久不吐再服

治中惡心痛悶亂不識人白芥子丸方

白芥子半兩安息香半兩麝香壹錢烏藥半兩桃

人半兩湯浸去皮尖陳橘皮半兩湯浸白紙焙

右件藥搗羅為末入麝香研令勻以湯浸

蒸餅和擣一二百杵丸如梧桐子大不計

時候煎生薑童子小便下十九

治心痛多唾諸方

夫心痛多唾者是停飲乘心之痛也痛在心絡故停水液為心氣通於舌小腸為之腑也其水氣下行入於小腸為溲便則心絡無有停飲也膀胱與腎俱象水膀胱為腎之腑津液上為唾腎氣下通於陰若腑藏平和則水液下流若令熱相衝致腑藏不調津液水飲停積上迫於心令心氣不得宣暢故心痛而多唾也
治心痛氣脹心胃不利痰飲下消多唾前胡

藥類卷之三
九十五

散方

前胡一兩去蘆頭 檳榔兩 半夏半兩湯洗七遍去滑 枳實三分剉 炒微黃 訶梨勒壹兩煨用皮 桂心半兩 赤茯苓三分 陳橘皮壹兩湯浸去白瓢焙 旋復花半兩 吳茱萸湯浸七遍焙 草微炒
右件藥搗麤羅為散每服三錢以小壺中
煮入生薑半分煎至六分去滓不計時候
稍熱服

治心痛痰飲多唾不能食人參散方

人參一兩去蘆頭 赤茯苓壹兩 白朮壹兩 枇杷葉半兩拭去毛 厚朴壹兩半去麤皮塗炙微赤 生薑汁令香熟 桂心壹兩 橘皮壹兩湯浸去白瓢焙 木香三分 桔梗壹兩去蘆頭
右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壺中
盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
溫服

治心痛痰飲多唾腹脹不能下食白朮散方

白朮三分 半夏三分湯洗七遍去滑 檳榔兩 桂心半兩 陳橘皮二分湯浸去白瓢焙 丁香壹分 高良薑半兩 木香

壹分

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中蒸煎至六分去滓不計時候溫服

治心痛多唾不能飲食木香散方

木香三分 吳茱萸壹分湯浸七遍焙乾微炒 當歸三分剉

赤芍藥三分 檳榔兩 乾薑半兩剉 炮兩 細辛半兩 桂

心兩 人參三分去 盧頭

右件藥搗細羅為散不計時候以生薑棗湯調下二錢

治心痛痰飲多唾心腹脹滿不能下食人參

九方

人參半兩去 白朮兩 桂心壹兩 枳殼壹兩 蘇壹兩 黃

去兩 旋復花半兩 半夏壹兩湯洗 厚朴壹兩 麝兩 塗

生薑十炙 赤茯苓兩 前胡壹兩 木香兩

陳橘皮壹兩湯浸 川大黃壹兩半剉 檳榔兩

壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以生薑橘皮湯下

二十九

治心痛多唾清痰胃中不利數數欲嘔食不
消化乾薑丸方

乾薑 半兩炮 桂心 半兩 白礬 半兩熬 半夏 二兩

湯洗七遍去滑 川椒 半兩去目及閉 右件藥搗羅為末鍊蜜和搗壹二百杵丸

如梧桐子大不計時候以生薑湯下十九

治心背徹痛諸方

夫心背徹痛者由人藏腑虛弱腎氣不足積

冷之氣上攻於心心氣既虛為邪所乘則心
與背俱痛而偃僂如物從後所觸其心痛不
可忍故曰心背徹痛也

治冷氣攻心背徹痛吳茱萸散方

吳茱萸 半兩湯浸七遍 檳榔 青兩 人參 壹兩去

半夏 半兩湯洗七遍去滑 肉桂 壹兩去 當歸 壹兩去

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治心背徹痛發歇不定木香丸方

木香半兩附子半兩炮裂去皮臍巴豆一分去皮心

油吳茱萸壹分湯浸七檳榔兩桂心兩麝

香一分細研

右件藥搗羅為末入麝香巴豆令勻醋煮

麪糊和丸如棗豆大不計時候以溫酒下

三丸

治胃中氣滿引心背徹痛川椒丸方

川椒青去目及汗半夏一兩湯洗附子

膏兩炮裂去皮臍

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

不計時候以醋湯下十九神巧萬

治心背徹痛不可忍連腹脇疔刺宜服此方

芫花半兩醋拌川大黃半兩碎微炒

右件藥搗細羅為散每服壹錢以水醋各

半小盞煎五七沸溫溫頓服須臾當吐使

愈未效再服

治心背徹痛宜用此方

藥集

九

川椒 烏頭 神方萬全 桂心 芎藭 細

辛 附子 羌活 已上各壹兩 芫花 二兩○萬全方三兩

半

右件藥並細判用醋拌炒令熱以故帛裏熨痛處冷則易之

治心痛不能飲食諸方

夫心痛而不能飲食者由積冷在內客於脾而乘心絡故也心陽氣也冷陰氣也冷乘於心者則陰陽相乘冷熱相擊故令痛也脾主

消水穀冷氣客之則脾氣冷弱不能勝於水穀也心為火脾為土是母子也俱為邪氣所乘故心痛復不能飲食也

治心痛冷氣結聚不能飲食高良薑散方

高良薑 壹兩 當歸 壹兩 陳橘皮 壹兩

剉 厚朴 二兩 去麤皮塗生 桃人 壹兩 湯浸

人 蘇炒 桔梗 壹兩 去 乾薑 半兩 剉 訶梨勒

一兩 煨 吳茱萸 半兩 湯浸七

右件藥搗篩為散勿服三錢以水壹中盞

類聚

九

煎至六分去滓不計時候稍熱服

治冷熱氣不和心痛腹滿不能飲食厚朴散

厚朴一兩半去籬皮塗 赤茯苓壹兩 陳橘皮壹兩
壹兩 薑汁炙香熟 白朮壹兩 人參壹兩 高良薑壹兩
去白 甄焙白朮 兩人參 盧頭高良薑

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中煮
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候稍熱服

治心腹冷痛全不思食漸加羸弱葶澄茄散

葶澄茄壹兩 白朮壹兩 桂心壹兩 人參壹兩 去黃
壹兩 當歸壹兩 微炒陳橘皮 厚朴壹兩 甘草壹兩

半兩炙 川椒半兩 厚朴壹兩 薑汁壹兩
炙 令川椒 半兩去目及閉 乾薑半兩 炮
香熟 川椒半兩 去汗乾薑 裂剉

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中煮
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候稍熱服

治久冷心痛氣攻兩脇妨悶不能飲食人參散方

人參去蘆頭 白茯苓 桔梗去蘆頭 乾木瓜

白朮 桂心 當歸剉微炒已 訶梨勒

壹兩煨 乾薑半兩炮 吳茱萸半兩湯浸七

用皮 陳橘皮一兩湯浸 白甄焙

右件藥搗細羅為散不計時候以熱粥飲調下壹錢

治心痛不能飲食令人羸瘦少力木香散方

木香去蘆頭 白朮 縮沙去皮 桂心已

各半 青橘皮壹兩湯浸 吳茱萸壹兩湯浸

微炒 白甄焙 吳茱萸七遍焙乾

右件藥搗細羅為散不計時候煎薑棗湯調下壹錢

治心腹冷氣往來疼痛脾胃氣弱不能飲食四肢無力丁香丸方

丁香半兩 胡椒半兩 白朮壹兩 桂心壹兩 人參壹兩

頭木香半兩 白茯苓壹兩 當歸三分剉 乾薑半兩

炮裂

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大不計時候以薑棗湯下三十
丸

治心氣冷痛不能飲食食即妨悶木香丸方

木香壹兩 檳榔壹兩 桂心壹兩 訶梨勒壹兩半 白
術壹兩 當歸壹兩 赤芍藥壹兩 厚朴壹兩 陳橘皮壹兩 白
塗生薑汁神麴 碎二兩 檗皮壹兩 湯浸
多令香熟神麴 碎二兩 檗皮壹兩 湯浸
草荳蔻壹兩半 去皮

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大不計時候以生薑湯下三十
丸

治心痛腹滿痰飲不能食人參丸方

人參壹兩 去壹兩 白朮壹兩 枳殼半兩 麩炒赤茯苓
苓半兩 厚朴壹兩 薑汁炙令香熟 生木香壹兩 訶梨
勒壹兩半 青橘皮半兩 湯浸川大黃 半兩
微檳榔 兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以橘皮湯下二十丸

治心懸急懊痛諸方

夫心與小腸合為表裏俱象於火而火為陽氣也心為諸藏主故正經不受邪若為邪所傷而痛即死若支別絡為風邪所乘而痛則經久成疔其疔懸急懊者是邪迫於陽氣不得宣暢壅瘀生熱故心如懸而急煩懊痛也治心懸急懊痛腹脹四肢煩疼木香散方

木香半兩川朴消壹兩桃人半兩易壹兩皮壹兩

赤芍藥壹兩柴胡壹兩白朮半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治心懸急懊痛鬱金飲子方

鬱金半兩黃芩壹兩芍藥壹兩枳殼壹兩微黃壹兩蘇壹兩

生乾地黄壹兩大腹皮壹兩

右件藥細剉和勻每服一分以水一中盞

人生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治心懸急懊懣痛氣悶築築引兩乳間或如

錐刺桂心散方

桂心半兩吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒赤芍藥兩半當

歸半兩到微炒木香兩半檳榔兩半

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中煮

煎至六分去滓不計時候稍熱服

治心下懸急懊懣痛宜服此方

阿膠二兩搗碎桂心壹兩壹

右件藥細剉以水二大盞煎至壹盞二分

去滓分為三服稍熱服

治心懸急懊懣痛腹脇妨悶不能飲食沉香散

方

沉香 木香 陳橘皮湯浸去白桂心已上各半

檳榔壹兩郁李人壹兩易浸枳殼壹兩炒微黃

去壹兩到微炒訶梨勒壹兩煨

右件藥搗細羅為散不計時候以生薑溫

酒調下壹錢

治心懸急懊痛氣逆不順檳榔丸方

檳榔壹兩赤芍藥半兩枳殼半兩參半兩

去蘆壹兩川大黃壹兩木香壹兩桂心壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如

梧桐子大每服不計時候以溫酒下二十

丸

治心腹相引痛諸方

夫心腹相引痛者是足太陰之經與絡俱虛

為寒冷邪氣所乘也足太陰是脾之脉起於

足大指之端上循屬脾絡胃別上注心經入

於胃絡注於心此二脉俱虛為邪所乘正氣

與邪氣交爭在於經則胃管急痛在於絡則

心下急痛經絡之氣往來邪正相擊在於其

間所以心腹相引痛也其脉太陽脉厥逆筋

急攣心痛引腹痛也

治冷氣相引心腹痛不可忍當歸散方

當歸壹兩檳榔壹兩青橘皮壹兩白甄壹兩

芍藥壹兩 桂心兩 乾薑半兩 炮 吳茱萸壹兩 湯浸

七遍焙 人參壹兩 去 乾微炒 蘆頭

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中煮

煎至六分去滓不計時候稍熱服

治心腹冷氣相引痛或時嘔逆四肢不和少

思飲食漸加無力丁香散方

丁香半兩 檳榔三分 芎藭半兩 桂心半兩 人參半兩 蘆

頭 高良薑半兩 厚朴壹兩 薑汁去麤皮塗生 吳

茱萸壹兩 湯浸七 當歸半兩 微炒

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水一中
蓋入棗二枚煎至五分去滓不計時候稍

熱服

治冷氣攻心腹相引痛四肢逆冷吳茱萸散
方

吳茱萸壹兩 用米醋壹中蓋浸壹宿掘壹

去灰入茱萸及醋用盆六寸 用炭火燒令赤

炒合勿令泄氣 候冷取出小香 半兩 當歸壹兩 微

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下一錢 神巧萬全方同

治心腹相引痛大腸不調水穀難化少思飲食四肢羸瘦訶梨勒丸方

訶梨勒 壹兩煨用皮 木香 半兩 白朮 兩 檳榔 三分 當

歸 三分判 陳橘皮 一兩湯浸去白瓢焙 桂心 三分 附子

三分炮裂 草荳蔻 壹兩去皮 乾薑 半兩炮裂判 神麴

一兩擣碎 微炒甘草 壹分炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大不計時候以熱酒下三十九

治心腹相引恒脹滿痛方

狼毒 一兩判碎醋拌炒 黃附子 一兩炮裂去皮臍

右件藥擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大不計時候以熱酒下三九

又方吳茱萸 牛兩湯浸七遍焙乾 乾薑 半兩 炮裂

到○肘後 附子 牛兩炮裂 細辛 壹兩 人參 兩

去蘆頭○肘後方各二分

右件藥擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大不計時候以熱酒下十五丸 用後方擣篩

大服五丸
日三服

治腹痛諸方

夫腹痛者由腑藏氣虛寒氣客於腹胃募源之間結聚不散正氣與邪氣相擊故痛也其有寒氣搏於陰經者則腹痛而腸鳴謂之寒中是陽氣不足陰氣有餘者也診其寸口脉沉而緊則腹痛尺脉緊臍下痛脉沉遲腹中痛脉來觸觸者小腹痛脉陰弦則腹痛凡腹中有急痛此裏之有病其脉當沉若細而反

浮大散者當愈其人不即愈者必當死以其病與脉相反故也

治傷冷卒腹痛當歸散方

當歸壹兩剉 桂心壹兩 乾薑三分炮 紅苳蔻
壹兩壹兩 木香兩 附子壹兩炮裂

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候稍熱服

治臍痛下利四肢不和白苳蔻散方

白苳蔻三分 訶梨勒壹兩煨 白朮三分 當歸壹兩

三分剉 木香 兩半 乾薑 三分 炮 厚朴 二兩 去
 微炒 生薑汁 吳茱萸 半兩 湯浸 七
 令香熟 湯浸 甘草 壹分 炙
 白飜焙 右件藥 搗篩 爲散 每服 三錢 以水 壹中 蓋
 入棗 三枚 煎至 六分 去滓 不計 時候 稍熟
 服

治腹痛不可忍汗出不能食青橘皮散方

青橘皮 壹兩 湯浸 去白 飜焙 蓬莪茂 三分 附子 壹兩 炮
 臍桂心 壹兩 高良薑 兩 當歸 壹兩 剉 微炒

右件藥 搗細 羅爲散 不計 時候 以熱 酒調

下一錢 神巧萬 全方同

治腹內攪撮痛吳茱萸散方

吳茱萸 半兩 湯浸 七 當歸 壹兩 剉 芎藭 壹
 白荳蔻 半兩 去皮 乾薑 半兩 剉 桂心 兩 赤芍藥
 半兩 木香 兩

右件藥 搗細 羅爲散 不計 時候 以熱 酒調
 下壹錢

治腹痛體冷嘔沫不欲食紅荳蔻丸方

紅苳蔻 半兩 去皮 葶芩 半兩 桂心 半兩 白朮 半兩 當歸 半兩 人參 半兩 去蘆頭 附子 壹兩 炮裂 去皮臍 白苳 三分 湯浸 剉 陳橘皮 三分 湯浸 剉 椒 三分 去目及閉口者 微炒 去汗

右件藥搗羅為末 鍊蜜和搗 三二百杵 丸 如梧桐子大 不計時候 以生薑湯下 三十

心腹痛不止方

桂心 一兩 蓬莪茂 半兩

右件藥搗細羅為散 不計時候 以熱酒調

下壹錢

又方 芸薹葉 壹握 爛搗 絞取汁

右以熱酒壹小盞 調和頓服

又方 當歸 一兩 剉 微炒

右搗細羅為散 不計時候 以熱酒壹盞 調

下壹錢

治胃脇痛諸方

夫胃脇痛者 由膽與肝及腎之支脉 虛為寒

氣所乘故也足少陰膽之經也其支脉從目
 皆下行至胃循脇裏足厥陰肝之經也其支
 脉起足大指叢毛上循入貫膈布脇肋足少
 陰腎之經也其支脉並循行胃脇邪氣乘於
 胃脇故傷其經脉邪氣與正氣交擊故令胃
 脇相引而急痛也診其脉弦而滑弦即為痛
 滑即為實弦滑相搏即胃脇拘急痛也
 治寒氣傷於胃膈引腹脇疼痛拘急桂心散
 方

桂心 壹兩 訶梨勒 壹兩半 附子 炮裂去 白朮

枳殼 麩炒微 桔梗 去蘆 木香 赤芍藥

檳榔 當歸 剉微炒已

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞
 入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
 服

治胃脇虛氣所攻脹悶疼痛宜服桔梗散方

桔梗 壹兩半 鬼箭羽 檳榔 木香 川

大黃 剉碎 赤芍藥 已上各

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中
蓋煎至六分去滓不計時候稍熱服

治胃脇氣不利腹脹急痛半夏散方

半夏壹兩半湯洗 桂心壹兩 檳榔壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中蓋

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服聖濟總錄同

治胃脇氣連心疼痛不可忍桃人丸方

桃人壹兩湯浸去皮尖 當歸壹兩剉 赤芍

藥兩 訶梨勒一兩煨 桂心一兩 蓬莪茂一兩 青

橘皮二兩湯浸 檳榔二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸

如梧桐子大不計時候以溫酒下二十九

治胃脇氣妨悶胃中壅滯大便難腹中痛木

香丸方

木香兩 川大黃二兩剉 枳殼三分麩炒 厚

朴壹兩法 蘆皮壹兩 桃人半兩湯浸 去皮

黃檳榔壹兩 當歸半兩剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗一二百杵丸
如梧桐子大不計時候以生薑湯下二十
丸

治胃脇氣妨悶疼痛方

聖濟總錄
名菜莫丸

吳茱萸

一兩湯浸七遍焙乾微炒

麝香

壹兩細研

當歸

半兩微炒

右件藥搗羅為末入麝香研令勻鍊蜜和
丸如小豆大不計時候以熱酒下二十九

治胃痺諸方

夫寒氣客於五藏六府因虛而發上衝於胃
間則為胃痺胃痺之候者胃中幅幅如滿噎
塞不利習習如痒喉裏澁唾燥沫甚者心強
痞急痛肌肉苦痺絞急如刺不得俛仰胃前
皮肉皆痛手不能犯胃滿短氣欬唾引痛煩
悶白汗出或背脊微痛其脉浮而微者是也
不治數日則殺人爾

治胃痺喘息不通利膈散方

人參

壹兩去蘆頭

前胡

一兩去蘆頭

甘草

半兩炙訶

梨勒皮三分陳橘皮三分湯浸桂心兩半白朮

三分乾薑裂剉赤茯苓兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞入生薑半分煎至五分去滓溫溫頻服之

治胃痺疼痛痰逆心隔不利方

蘇蘇壹枚枳實壹兩麩炒微黃半夏壹兩湯洗七遍去滑

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞入生薑半分薤白五莖煎至五分去滓溫

溫頻服

又方枳實壹兩麩炒微黃厚朴壹兩去蘘皮塗生桂

心三分蘇蘇壹枚

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞入生薑半分薤白五莖煎至五分去滓溫

溫頻服

治胃痺壅悶麝香丸方

麝香一分牛膝一兩犀角屑半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以橘皮湯下壹十九日三四服

治胃痺胃中幅幅如滿噎塞如痒咽喉中澁唾沫方

陳橘皮 二兩湯浸 枳殼 二兩麩炒

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分同煎至六分去滓溫溫頻服

治胃痺強急疼痛方

雄黃 半兩 巴豆 一分去皮心研

右件藥同研令細用軟飯和丸如菜豆大每服以生薑橘皮湯下五丸

治胃痺氣壅滿悶心膈不利方

枳實 二兩麩炒

右件藥擣細羅為散不計時候以清粥飲調下二錢

治胃痺已差復更發者宜服此方

薤根 一斤淨洗去土

右擣絞取汁溫服一小盞 取汁飲之 立愈

治胃痺噎塞諸方

夫藏腑不和氣血虛弱風冷之氣伏留在內
因虛上攻胃膈則令胃中怫怫滿塞習習如
痒氣道壅澁咽喉不利心下痞急欬唾引痛
氣不宣通故令胃中痺悶而噎塞也

治胃痺噎塞心下煩滿半夏散方

半夏壹兩湯洗前胡一兩去蘆頭射干一兩白朮

兩桂心一人參壹兩法枳殼壹兩麩炒

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候稍熱服

治胃痺噎塞不能下食宜服吳茱萸散方

吳茱萸一兩湯浸七半夏一兩湯洗白朮

兩鼈甲壹兩塗醋炙赤茯苓壹兩前胡壹兩

頭青橘皮壹兩湯浸京三稜壹兩桂心壹兩

朴壹兩去麩皮塗生檳榔一枳殼半兩麩

去瓢薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候稍熱服

治胃痺氣噎塞疼悶方

半夏一兩湯洗七遍去滑青橘皮壹兩湯浸去白瓢焙木通壹兩

桂心兩吳茱萸一分湯浸七遍焙乾微炒

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候稍

熱服

治胃痺氣膈噎塞不通脾虛胃冷不能下食

宜服木香散方

木香三分桃人半兩湯浸去尖皮訶梨勒皮雙人麩炒微黃

甘草一分炙枳實三分麩炒微黃乾薑半兩炮

白朮半兩昆布半兩洗陳橘皮三分湯浸鱉

甲三分塗醋炙桂心兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候稍

熱服

治胃痺痰壅噎塞不下食射干散方

射干兩半夏一兩湯洗七遍去滑赤茯苓壹兩桔梗兩

去蘆 青橘皮 三分湯浸 桂心 三分 枳殼 三分
頭 微黃 甘草 三分炙 大腹皮 三分 前胡 三分
去 頭 桑根白皮 三分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
 入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫
 服

治胃痺連心氣悶喉中噎塞唾沫方

細辛 一分 陳橘皮 三分湯浸 赤茯苓 壹兩 枳殼
三分 蘇軾 壹枚 桂心 三分 微黃 去

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞
 入生薑半分煎至五分去滓不計時候稍
 熱細細呷服

治胃痺氣悶喉中噎塞宜服昆布丸方

昆布 三分洗 赤茯苓 三分 枳實 半兩 甘草
壹分炙 半夏 半兩湯洗 乾薑 壹分 木香
微赤 訶梨勒皮 兩 檳榔 三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
 不計時候以溫酒下二十九

治胸痺心下堅痞緩急諸方

夫胸痺心下堅痞者由藏腑不調風冷之氣
攻注於胸膈經絡壅滯氣不宣通則令心中
堅滿咽喉乾燥時欲嘔吐胸背緩急不可俛
仰呼吸短氣欬唾引痛胸中痞急也

治胸痺心下堅痞胃背緩急心腹不利宜服

此方

枳實壹兩 麩兩 木香半兩 前胡一兩 去兩 陳橘皮
壹兩湯浸 赤茯苓壹兩 蘆頭去

右件藥擣篩為散每服五錢以水壹大盞
入生薑半分煎至六分去滓溫溫頻服之
治胃痺心下堅痞胃背緩急疼痛不能下食
宜服此方

半夏壹兩 湯洗七遍 赤茯苓三分 白朮三分 枳實三分
麩炒木香 陳橘皮三分 湯浸桂心 壹兩
腹皮三分 甘草壹兩 炙微赤

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓溫溫頻服之

治胃痺心下堅痞緩急薏苡人散方

薏苡人壹兩附子二兩炮裂甘草一兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓稍熱頻服之

治胃痺心下堅痞緩急氣結不通方

枳殼二兩剉炒桂心一兩前胡一兩去半夏

壹兩湯洗厚朴二兩去薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓稍熱頻服之

治胃痺心膈痞滿肩背緩急痛方

桂心半兩乾薑半兩炮人參三分去細辛三分

吳茱萸三分湯浸貝母三分川烏頭

半兩炮裂 去皮臍

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服以溫酒下十九日三四

服

治胃痺心背痛諸方

夫胸痺心背痛者由臟腑虛寒風冷邪氣積

聚在內上攻胃中而乘於心正氣與邪氣交
爭陽氣不足陰氣有餘陰陽不和邪正相擊
故令心背徹痛也

治胃痺心背痛腹脹氣滿不下食飲吳茱萸

散方

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒桂心半兩高良薑半兩

赤茯苓

壹兩當歸壹兩陳橘皮三分湯浸

檳榔

三分右件藥搗細羅為散每服以熱酒調下二

錢日三四服

治胃痺不得臥心痛徹背方

菰蘆壹枚桂心三分半夏壹兩湯洗

七遍去滑右件藥搗篩為散每服三錢以漿水一中

盞入薤白七莖生薑半分煎至六分去滓

稍熱頻服

治胃痺心背痛短氣方

細辛兩山草半兩炙桂心兩赤茯苓壹兩

熟乾地黄三分枳實三分乾薑三分白朮兩

微炒黃微乾薑裂白朮

三菘 分三

右件藥搗細羅為散每服以熱酒調下二錢日三四服

治胃痺心背痛惡氣所攻音聲閉塞方

檳榔 壹兩 桂心 兩半

右件藥搗細羅為散不計時候煎生薑童子小便調下一錢

又方 川椒 三分 去目及閉食菜萁 兩 桂心 壹兩

桔梗 三分 去頭 豉 兩 川烏頭 半兩 炮裂 去皮臈

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調下壹錢

治胃痺心背痛氣逆胃膈不利飲食難下宜服此方

小草 三分 桂心 三分 川椒 三分 去目及閉乾薑 三分 炮

細辛 三分 附子 半兩 炮裂 去皮臈

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服以粥飲下三十九日三四服

四服

治心痺諸方

夫思慮煩多則損心心虛故邪乘之邪積而不去則時害飲食心中怫怫如滿蘊蘊而痛是謂之心痺診其脉沉而弦者心痺之候也

治心痺心中怫塞而痛不能下食木香散方

木香三分 青橘皮三分湯浸 半夏三分湯洗
枳殼三分麩炒 訶梨勒皮兩 桂心三分 前胡壹兩 去去 五昧子三分

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中蒸

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

治心痺胸中滿塞心中微痛煩悶不能食方

赤茯苓三分 人參參分去蘆頭 半夏三分湯洗 柴胡參分 前胡參分 去去 甘草壹分炙 桂心參分 桃人雙 參參分湯浸 去去 皮皮 尖尖 微微 黃黃

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中蒸入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治心痺滿急刺痛不可俛仰氣促欬唾不利
宜服此方

前胡參分去 木香參分 五味子參分 桔梗參分

頭赤芍藥參分 當歸參分 檳榔參分 青橘皮半兩湯浸

去白

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治心痺胃中氣堅急心微痛氣短促欬唾亦

痛不能食方

枳實參分麩炒微黃 青橘皮一兩湯浸去白瓢焙 桂心參分

辛參分 桔梗參分去

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治心氣虛損邪冷所乘胃膈不塞心中痺痛
食飲不得青橘皮丸方

青橘皮青兩湯浸去白瓢焙 桂心一兩 當歸參分 訶梨勒

皮一兩吳茱萸湯浸七細辛半兩白朮分

赤茯苓分枳殼半兩蘇炒蘿蔔子半兩木分

香分蓬莪茂分檳榔分

右件藥擣羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服以溫酒下三十九日三

四服

四時纂要

三月三日收桃葉曝乾擣篩并華水服壹錢

治心痛

心痛藥取獨頭蒜五顆黃丹二兩午日午時

運化玄樞五月五日午時擣蒜如泥相和黃丹為丸

如雞頭子大曝乾患心痛醋磨壹丸服之

和劑局方

備急圓療心腹諸卒暴百病中惡客忤心腹

脹滿卒痛如刀所刺氣急口噤

乾薑炮一兩煙霞巴豆聖去皮油研効方一兩大

黃雨二

右件為末煉蜜為圓如梧桐子大每服三

圓溫水下不拘時方澹寮同

醫方類聚卷之九十二

