

醫方類聚卷之二百六十四

小兒門 二十六

疹痘 二

永類鈴方

斑疹

斑瘡巢氏名之曰登豆瘡寒多則色赤風多則色白澹寮謂內經及仲景皆不載自魏朝有頭白而根脚赤者俗呼豌豆卽斑瘡也此証發於藏故重水豆發於腑故輕細粟如麻

俗呼麻子即膚疹也又有大者俗謂之芋謂之萍輕重不齊故命名亦異耳許學士傷寒百問云慎不可轉利以傷寒則表實而裏虛瘡疹表虛而裏實傷寒之邪始于皮膚次轉藏府瘡疹之毒蓄於藏府而漸泄於皮膚理傷寒宜解表治疹先解毒若利之則毒氣入裏

傷寒發斑不可下而下之熱乘

虛入胃當下而失下胃熱不得女參升麻湯

泄二者皆能發斑或煩燥譫語喉閉腫痛

瘡疹出得大盛活人犀角地黃活人黑膏

湯無犀角以升麻代解之寮温

毒發斑活人大青四物湯

傷寒熱病十日已上汗活人大青四物湯

吐利後熱不除身斑出

疹証患人發熱温温不止大便微溏所謂

瘡似疹疹似瘡但瘡則熱而不渴疹則熱

而溘脾經受毒深則多喜閉目
活人二十一卷論小兒瘡疹近世孫致中
論小兒疹極奇驗活人方中用大青四物
大青全解毒產山中葉長而尖似馬蓼溫
毒陽病出斑以冬月冒寒氣至春而發表
虛裏實不可汗泄當解毒有陰毒証身重
背強眼痛腹疼厥逆口青黑咽喉不利或
吐脉細沉出赤斑者可治若出黑斑不治
斑疹豆瘡多由冬溫非節之氣所變及四時

時行大小傳染所致冬春之交宜以涼藥時
時疎利先預防之自可輕減其證面色燥唇
臉赤眼睛黃目胞赤四肢亦赤手足冷耳尖
靴鼻俱冷身熱或乍涼乍熱頭痛腰脊痛咳
嗽噴嚏呵欠煩悶搐跳驚悸眼澁昏倦多睡
腹痛小便赤少大便不通不惡寒但惡熱方
其身熱未卽發瘡迨其身涼然後發出三部
脉洪數往來大小不應指而沉疾小兒更視
其耳後有紅脉縷或眼胞赤脉爲的矣其証

略見首尾俱不可輕易汗下攻發止用溫涼
之藥安表和中調氣活血輕清解毒而已其
傳五臟各有病証邪穢之氣入心與血相感
爲斑子血疱色赤而小入脾與涎相感爲疹
子色黃微赤入肝與淚相感爲水疱淚在如
水小而青色入肺與淚相感爲膿疱色白而
肥惟入腎卽變紫黑矣腎在下不受邪穢瘡
疹屬陽本無腎証耳與尻足皆屬腎故猶冷
陽火也腎水勝也若救黑斑先瀉膀胱之腑

而後瀉脾胃之士如小兒則腎主虛不可瀉
尤當瀉其腑則腎邪去矣且小兒亦無補腎
之方但清心肺耳瘡發在肌肉間陽明胃主
肌肉則注瀉胃氣和疹自安矣古人制方言
疹疹曰沫發初覺已發已出已定諄復謹審
其處用先後加減重輕可見朱氏曰已發未
發牙疳疎轉此爲大戒又曰首尾皆不可下
下瀉清久裏氣久又有曰初覺卽疎利以宣
毒又曰已出不可疎利又曰出已定却用利

之今人殊未詳疎與利者暢達流行之謂非
勇承峻下以巴粉爲先者也活人云此藥乃
攻食積耳又有曰首尾証平下之者誤有實
熱証不下者誤首尾有虛寒証不補助者誤
是則疑似之間此証略露切當詳審
醫家察脉問証不可須臾離處用加減藥劑
不可毫髮差凡如發熱不可驟遏但輕解之
熱或退則斑疹不能發若其不退發散太過
表虛而裏實愈鬱冒而攻裏矣至於汗下尤

不可以輕也其証狀與傷寒相似特治法不
同者傷寒所傳從表入裏斑疹所發從裏出
表凡瘡皮厚而色頑濁者發於臟其候重皮
薄而色精明者發於腑其候輕臟熱則爲豆
臉腑熱則爲細疹熱重者瘡亦重熱輕者瘡
亦輕平復以還却可消解餘毒各有先後次
弟也詳著小兒方論
瘡疥表虛而裏實毒蓄於臟腑而漸泄於皮
膚傷寒表實而裏虛邪始于於皮膚次傳臟

腑所以不同疹脉三部洪數往來大小不應指而洪小兒豆瘡乃臟腑穢液之毒發皮肉之間蓋脾主身之肌肉肺主身之皮毛今疹豆出是肌肉皮毛受其病補法當先調和脾肺滋養血氣使脾不虛肺不寒表裏沖和自然易出易靨經云表病裏和故不治而愈也始見小兒壯熱憎寒鼻鳴氣急未明瘡疹之謬妄作傷風傷食治之或以解藥出汗或食藥官導因此表虛難出裏虛難靨

小兒豆瘡二三日始見微微方欲出者如粟米如黍米如菜豆大似水珠光澤明淨者佳小兒豆瘡四日五日其瘡大小不一等根窠紅光澤明淨不必藥稠密陷頂灰白色瀉渴者宜服十一味木香散送下七味肉豆蔻元小兒豆瘡六日七日其瘡肥紅光澤者輕不必藥如身溫氣促口乾腹脹足指冷重十一味木香散加丁香肉桂小兒豆瘡八日九日其瘡長足肥滿蒼爛者

輕不必藥若寒戰悶亂腹脹煩渴氣急咬牙者至重宜十宣味木香散加丁香肉桂如不效急煎十二味異功散救之

小兒豆瘡十日十壹日其瘡當靨瘡痂欲落者欲愈也不必藥若瘡當靨不靨身或熱或不熱肚脹煩渴不可與冰蜜冷物若與之渴而犯急煎木香散救之

醫林方

小兒臍風一證人多苦之世未常有治法諸

書中未明說取宜黃連汁於兒初生未啼哭時灌之能去臍風亦令終身不發癩疹此方傳自古趙張家六世小兒不生瘡疹更無臍風撮口兒在腹中食母穢中物毒生而必有癩疹諸毒氣不出六七日發爲臍風撮口發搐火盛風生用此藥解之去熱毒平陽府洪洞縣集方人嚴天作家兩世不發疹

施圓端效方

小兒癩疹

錢氏曰初覺小兒病斑疹乳母先慎戒臥居
溫涼淨室之中避諸腐穢臊腥之氣飢食渴
飲遷就溫涼瘡端內外肥紅養和守後如或
黑陷到伏蜜如針孔急以化毒活血托瘡之
劑照證平調誠不可緩微則四聖甚則鷄冠
救生猪尾膏極則無比散照錢氏方用之如
升麻葛根湯局方紫草木通湯活人亦可選
用

瘡疹方

惟斑疹病後或發癩餘瘡難發癩矣水勝脾
木歸心故也若涼驚用涼驚丸溫驚用粉紅
丸先發膿疱後發疹子者順先發水疱
後發疹子者逆先發膿疱後發水疱多者
順少者逆先水疱後斑子多者逆少者順
先疹子後斑子者順凡瘡疹只出一般者善
朱彥脩論陳氏用熱藥之過
讀前人之書當知其立言之意苟不知其意
而求適於用不可得也豆瘡之論錢氏爲詳

歷舉源流經絡分明表裏虛實開其治法證
以論辨深得著方垂教之體使後人如求方
圓於規矩較平直於準繩引而伸之觸類而
張之可謂無窮之應用也今人不知致病之
因不求立方之意倉卒壹試設有不應并其
書而棄之近因局方之學久行素問之學不
明類皆喜溫而惡涼喜補而惡解利忽得陳
氏方遂以爲錢論之不及也豈其然乎雖然
陳氏亦可謂善求病情者矣大率歸重於太

陰壽經蓋以手太陰屬肺主皮毛足太陰屬
脾主手足肺金惡寒而易於外感脾土惡濕
而無物不受其用丁香姜桂玉機微所以治
其肺之寒用附朮半夏所以治其脾之濕使
脾與肺果有寒與濕而兼有虛也中病則已
何傷之有今徒見出遲者身熱者泄利者驚
悸者氣急者渴思飲者例與木香散異切散
閒有偶中之效不思膏偏之禍若錢氏方固
未嘗廢細辛丁香白朮參耆輩率有監制輔

佐之藥但其用寒涼者多而於輔助壹法略示端緒微義此下云痴人不可說夢錢氏之意深矣亦將俟觀者而擴充之夫渴者用溫涼藥痒塌者用補藥自陳氏發之迥出前古然其間多用燥熱或未適中恐其進方之際必有挾寒而痘者予嘗會諸家之粹而用之聊陳壹二從予六七歲時出豆身熱微渴自利或敬用木香散加丁香十粒煎予觀其出遲者固因自利而氣弱然察其所下皆臭滯蓋因熱蒸而

下恐未必寒急止之已投膏貼矣與黃連解毒湯加白朮近十貼以解之利止豆亦出其後飢常微熱手足生癢又與涼劑補一月安一人年十七發熱而昏倦甚脉大而似數與參芪歸朮陳皮大料濃煎飲之二十貼豆出又二十貼則膿胞成身無全膚或欲用陳氏本方與之子曰但虛無寒又與前方至六十貼而安至正甲申春暖正月邑間豆疹不越曹家率與陳氏方童幼死者百餘雖曰天數

吾恐人事亦或未之盡也

玉機微義

論癩疹證治

潔古云癩疹之病其為證各異瘡發焮腫於外者屬少陽三焦相火也謂之癩小紅靨行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹凡顯癩證若自吐瀉者慎勿亂治而多吉謂邪氣上下皆出也癩疹並出小兒難禁是以別牛他證也首尾不可下大抵安裏之藥多發

表之藥少祕則微踈之令邪氣不壅併而能作番次使兒易禁也身溫煖者順身涼者逆按此是例陽證發癩宜與小兒門癩論兼

表者證治

論傷寒瘡疹同異

錢氏曰傷寒男體重而黃女面赤喘急憎寒口中氣熱呵欠頓悶項急也瘡疹則腮赤躁多噴嚏悸動昏倦四肢冷傷寒當發散之治疹行溫平有大毒者解毒餘見前說

潔古曰凡傷風則皮澁拘急鼻塞癢疹則睡
中發驚悸呵欠噓噴是爲易識矣

論痘瘡輕重

錢氏曰凡瘡疹發便出盡者必重也瘡夾
疹者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕
外黑裏赤者微重也外白裏黑者大重也瘡
端裏黑點如針孔者勢劇也青乾紫陷腫
汁出不止煩躁熱渴腹脹啼喘大小便不通
者困也凡瘡疹當乳母慎口味凡飢及風寒

歸腎變黑難治也有大熱常利小便有小熱
宜解毒若黑紫乾陷者百祥丸下之不黑者
慎勿下看時月輕重大抵瘡疹屬陽出則春
夏爲順秋冬逆冬月腎旺又盛寒病多歸腎
變黑又當辨春膿疱夏黑陷秋斑冬疹亦不
順也黑者無問何時十難救一其候寒戰噤
牙或身黃腫紫宜急以百祥丸下之復惡寒
不已身冷出汗耳靴反熱者死腎氣大旺也
下後身熱飲水可治脾旺勝腎寒去而溫熱

也 先發膿胞後發疹子者順後發班子者逆 先發水泡後發疹子者逆 先發膿胞後發水泡多者順少者逆 先水泡後班子多者逆少者順 先疹子後班子者順 凡瘡疹只出一般者善 潔古曰一發便密如針頭形勢重者合輕其表而涼其內連翹升麻湯若癩已發密重微喘飲水者有熱證則去風藥微下之若出不快清便自調知其不在表不在裏當微發散用

升麻葛根湯若青乾黑陷身不大熱大小便澁則是熱在內煎大黃湯下宣風散若身表大熱表證未罷不可下若癩疹已出見小熱小便不利當利之已發後有餘毒未散復有身熱瘡腫之類當用茶粉下解毒丸瘡疹已出後有聲音者乃形病氣不病也瘡疹未出先聲音不出者乃形不病而氣病也若瘡未出而聲音不出者是形氣俱病也當清其肺氣常用八風湯并涼膈散去硝黃亦可

論痘瘡用熱藥之誤

丹溪曰讀前人之書云云吾恐人事亦或未
之盡也

詳見瘡疹方

謹按錢氏論痘瘡形色輕重困劇而用藥
已具其端緒矣至潔古又辨所兼之證及
候音聲察形氣爲病而處治治法可謂詳
悉但世俗不深求其意反有疑似丹溪先
生所以言之諛諛也大抵世俗喜溫而惡
涼將錢氏之法不去推充至多疑似如云

不可妄下蓋妄之一字戒慎之意當有可
下之理也若瘡疹初發有因裏實而出不
快渴而脈數便秘煩躁不下可乎有將懨
之際裏實而渴便秘身熱不下可乎或云
首尾俱不可下或指爲吐下瀉不可下
皆非也但自病體虛實不等時令中治法
之異要當適中病情余故錢氏云看時月
此句關係甚妙如冬月盛寒便難例用涼
劑且小兒痘瘡本玉臟之毒所發非止屬

諸痛痒瘡皆出心火之比故陳氏方一出亦多獲効今人用錢氏方亦有致悞者蓋不善用其法之過非製法者之過也宜求手立方本旨矧歲氣時臨災青淺深不同小兒體有虛實之異用藥不可輕舉詳潔古以微下法中佐以風劑是兼升發之意亦慎之也何熱劑與香竄之藥豈可例用乎然有毒入關竅肌骨間邪氣下陷用此而獲生者或有之恐千百而一二也

壽域神方

豆疹部

凡出豆疹房內常燒乳香若無荔枝殼可辟不祥之氣以招生氣告

聖惠方

治斑豆瘡入眼諸方

夫斑瘡入眼者由因患傷寒時行熱病毒氣蒸眼其眼澁痛或有片片黃赤如玳瑁色上似粟顆瘡生是也不可便點藥入眼則使眼

爛其眼當枯也又豆子瘡入眼者眼中有胞
疼痛眼腫不開亦忌點藥候瘡子出眼即漸
差唯宜利脾肺解熱毒平和涼藥稍稍服之
亦可於眼臉上下貼熒藥以散毒氣脫或不
明斯理點諸眼藥則睛胞破膿血俱出便令
震損候瘡子退後點藥無妨也

治斑豆瘡入眼赤澁腫痛或生翳漸長宜服
真珠散方

真珠末壹分 琥珀壹分 牛黃一分 竜腦二分
細研

天竹黃半兩 羚羊角屑壹分 犀角屑半兩 人參

半兩 去蘆頭 川升麻三分 赤茯苓半兩 車前子半兩 赤

芍藥三分 决明子半兩 甘草三分
微赤

右件藥搗細羅爲散入研了藥拌令勻每
於食後煎竹葉湯調下一錢忌炙煨熱麵

神巧萬
全方同

治斑豆瘡入眼疼痛壯熱口乾煩渴宜服柴

胡散方

柴胡壹兩 黃芩壹兩 梔子壹兩 赤芍藥壹兩 川

升麻兩一 麥門冬壹兩 甘草壹兩 玄參壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入淡竹葉二七片煎至六分去滓每於食後溫服

治斑豆瘡入眼口乾心煩宜服黃芩散方

黃芩兩壹 梔子兩一 黃連壹兩 葳蕤兩壹 川升

麻兩壹 麩人兩壹 湯浸兩壹 甘草兩壹 赤皮兩壹

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服

治斑豆瘡入眼體熱心煩少得睡卧宜服防

風丸方

防風兩壹 黃芩兩壹 薤子兩壹 玄參兩壹 知母兩壹

大黃兩壹 人參兩壹 赤茯苓兩壹 甘草兩壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如柏桐子大每於食後煎竹葉湯下二十

九

治斑豆瘡入眼疼痛難開宜服鬱金丸方

類聚

鬱金 梔子 八 黃連 去川大黃 剉碎散

兩石決明 一兩搗碎細研木飛過 蛇蛻皮灰 三錢

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆天每

服不計時候以溫水下十九

治斑豆瘡入眼不退宜用蟬蟩點眼方

蟬蟩 五枚搗 曾青 錢 朱砂 錢

右件藥先研曾青朱砂如粉後入蟬蟩汁

同調令稀稠得所每點少許極妙

治斑豆瘡入眼宜外貼黃藥散方

黃藥 壹兩 木香 壹兩 川大黃 三兩

右件藥搗細羅為散每用好漿水調為膏

攤生絹上貼眼驗上下不得入眼乾即易

之

凡斷乳嬰孩童子患胎豆疾候初覺多似傷

寒而色與四肢俱赤壯熱頭痛腰背疼足多

厥冷眼睛黃色脈息但多洪數絕大不定小

便赤少大便多祕纔覺四肢色候及脈息雖

...

是胗豆疾未攻皮毛穴出者便可以服餌勻
和藏腑踈洩逐下聖濟總錄又云倉公論云
可用椒油劑不可用燥藥不
可用若胗已結在皮毛穴處微微似出即不
可踈洩也或胗出大盛竇穴膿水者却可踈
利也或未與踈轉即且急服紫草飲子方生

易簡方小
兒患疹豆

紫草三兩〇總
錄新者

右件藥細剉以百沸湯壹大盞沃肘後方
易簡方
泡蓋便以物合定勿令紫草氣出放令人體

肘後方作
如人體溫量兒大小溫溫服半合至一合

服此藥瘡子雖出亦當輕爾神巧萬
全方同〇總

錄右壹味細剉先以百沸湯浸便以物合

定勿令紫草氣出放令人體溫凡五十

日至壹百日嬰孩服半藥注子一百五十

日至二百日嬰孩服壹注子一歲至二歲

兒服半合三歲至四歲兒服壹合並於食

前午後服此湯胗豆雖出勢亦輕耳常服

無防直指小兒方紫草飲子紫草一右剉

細百沸湯大椀沃之蓋定勿令氣出逐旋
溫服紫草能導大便發出亦輕煙霞聖効
方治麩豆瘡欲出未出紫草兩右爲細末
每服壹二錢沸湯調蓋定候溫量大小服
之

治小兒胗豆欲令速出宜川胡荽酒方澹寮方酒

散作

胡荽三兩○聖濟總錄半握

右細切以酒二大盞煎令沸總錄百沸沃胡荽

便以物合定不令氣出候冷去滓微微從

頂已下噴背脊及兩脚脅腹令徧勿噴神巧

兼全方於面○澹寮方胡荽本草云可以

七通心竅膏右用切碎瓦器盛之却以酒

二大盞煎令沸沃胡荽仍以器蓋定勿令

泄氣候冷去滓微微徙項以下敷令晝身

遍但除面不敷拔粹方胡荽細切四兩以

好酒二盞煎壹二沸入胡荽再煎少時用

物合定放冷不每吸六兩口微噴從頂至

足勻遍勿噴頭面病人左右常令有胡荽
 卽能辟去汗氣瘡疹出快小兒藥證直訣
瘡疹忌外人及穢觸之物雖不可受風冷
然亦不可擁遏常令衣服得中非虛涼處
坐壽域神方治豆疹將出欲令速出用胡
 荽二三兩切細以酒二盞煎沸沃胡荽便
 以物合定勿令泄氣候冷去粗微微從頂
 以手噴一身令遍除面不噴担用袋盛挂
 帳中餘藥乳母服之衛生易簡方同
 治小兒胗豆出後卽須愛護面目勿令沾染

欲用胡荽酒噴時先用此方塗面上然後方
 可噴四肢大人嬰孩有此疾悉宜用黃蘗膏
 方

黃蘗一兩○小兒藥證直訣 棗豆壹兩半○

方瘡疹方 甘草四兩生用 直訣拔粹

右件藥搗羅爲末再研令細後以生麻油

調如薄膏從耳前眼眶並厚塗日三五遍

直訣拔粹 方三兩次 上塗面後可用胡荽酒噴也早

用此方塗於面上冷不生胗豆也如用此

方塗遲縱出胗豆亦少

治小兒藏腑伏於熱毒未成胗豆疾候四肢

微覺有熱食物似減頭髮乾豎或時額多

微熱宜服生油方聖濟總錄名生油湯劑法扁鵲及倉公用謂之

劑生油膏小蒸以人體總錄如人體溫熟水一小

蒸旋旋傾熟水入油蒸內不住手以杖子

打攪直候入熟水盡更打令勻如密即止

夜卧時三歲前至百日及壹晷內每服二

蜆殼五歲至七歲每服三蜆殼十五歲已

前每服三大蜆殼至半合直至大人總錄存服

五蜆殼許或三大合每日飯後良久與服服了令卧少時如三五服大小便利四肢

熱退則胗豆不復發當自安也每服壹合至二合量大小

增減與服之服後良久令卧少時服三五

服大小便利四肢熱退胗豆不生也

治小兒胗豆瘡入眼并無辜氣入眼蜜蒙花

散方小兒藥證直訣名羊肝散

蜜蒙花三兩直青箱子兩决明子兩車

前子兩

右件藥各搗羅為末每服以蜜蒙花壹錢
直訣 諸藥各半錢直訣 相和令勻用羊
 肝壹大片切破摻諸藥在肝內以濕紙裹
 煨令熟空心量力與食之瘡疹方與直訣同 ○得
 效方治疹豆瘡并諸毒氣入眼昏暗生翳
 膜蜜蒙花壹錢 青箱子决明子車前子各半
 錢右為末白羊肝壹片被開作三片摻藥
 令勻却合作壹片以濕紙裹火煨於地上
 出火毒米泔嚼下空心服經驗良方同管見大全良方無

求子活人以濕紙七重
 裏煨灰火熟空心食之

治小兒胗豆瘡出後欬逆脇痛與食不下赤
 茯苓散方

赤茯苓半兩 甘草半兩 梔子壹分 大青半兩

川升麻兩 枳殼半兩 麩炒微黃 去瓢

右件藥搗羅為散每服一錢以水壹小

盞入苦竹葉壹七片豉三十粒煎至五分

去滓分為三服日三四服看見大小以意

加減

治小兒胗豆瘡及赤瘡子犀角散方

犀角屑壹分龍膽半分去黃耆半兩川大黃

壹分到桑根白皮壹分鈞藤壹分麻黃壹分

石膏兩蘇蘇兩甘草壹分微赤到

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓分溫三服量兒大小加

減服瘡子退後濃摩犀角水塗之更良

治小兒胗豆瘡用蠶後宜服大黃散方

川大黃半兩到黃芩半兩玄參半兩

夫右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓放溫量兒大小分減服

之神巧萬

治小兒熱毒盛發胗豆瘡初發早覺者宜服

此方

川大黃壹兩到碎微炒

右搗羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至

六分濾去滓分爲二服不計時候溫服之

又方黃連一兩去去鬚

右擣篩為散每假壹錢以水壹小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服
 ○拔粹方瀉心湯瀉丁黃連去鬚右為極細末每服一字至半錢壹錢臨卧溫水調下海藏云易老單瀉心湯加減法出於此乃實邪也實則泄其子

又方波斯青黛如棗核大以水調服之
 治小兒胗豆瘡後滅癩諸方

夫小兒傷寒發胗豆瘡者皆是熱毒所為其

病折則瘡愈而毒氣尙未全散故瘡痂雖落其癩猶黯或凹凸肉起所以宜用滅癩消毒之藥以備之
 治小兒熱毒發胗豆瘡初愈宜塗瘡癩方

燕藜子壹兩 梔子人兩 豉兩

右件藥擣細羅為散用醋漿水調如泥每

夜塗瘡上來日以淡漿水洗之

又方胡粉壹兩 膩粉壹分

右件藥相和研令勻入鍊了猪脂拌和如

膏薄薄塗癩上每夜塗之至明以漿水洗

之

又方鷹糞白兩壹衣中白魚二十枚

右件藥細研入白蜜調和如稀飴用塗瘡

癩上

又方牡蠣兩三土瓜根壹兩

右件藥搗細羅為散每夜取二錢用白蜜

調塗面及瘡癩明且以煖漿水洗之

治小兒傷寒熱毒斑瘡疹豆瘡等後減癩膏

方

馬齒莧自然汁壹升鍊成猪脂三兩

右件藥相和以慢火煎成膏日夜塗瘡癩

上

又方羊脰一長用酒一升浸一宿來日牛酥絞濾去汁取羊脰盡去筋膜牛酥

四兩

右件二味入銀銚子內慢火煎三五沸新

絲濾入淨器中盛每夜取塗面上來日用

生甘草壹兩以漿水二大盞煎七八沸去

滓旋温洗面

又方猪脰壹斤天鼠二枚

右二味細切入銚子內煎鍊令天鼠焦絞

濾取膏日夜摩塗瘡癩上

又方鷓鴣糞二兩

右壹味研如粉以鍊了臘月猪脂三合調

攪令勻塗於瘡癩上

又方壽域神方治斑瘡豆瘡心躁眠臥不安

川升麻

右壹味不計多少細剉用水神方煎去滓

取汁以絛沾汁洗拭瘡癩上衛生易簡方與神方同

又方豉一升羊糞一合

右件藥相和以水壹斗煎十餘沸去滓看

冷暖洗浴瘡癩

又方黃蘗二兩細剉

右以水二升煎取壹升去滓摩拭瘡癩上

又方赤小豆末壹兩

右壹味以雞子白調如稀餈塗瘡癩上

又方永類鈴方小兒豆瘡痒不可忍又搔
上好白蜜

右壹味不計多少通身塗瘡痂落無癩方鈴
此下云亦不可臭穢

治小兒胗豆瘡并滅癩痕方

羊髓骨髓壹兩

右鍊之永類鈴方一二沸入輕粉一分研成白膏

於瓷合內盛用塗瘡上滅癩極效

和劑局方

消毒散治小兒疥疹已出未能勻透及毒氣
藥遏雖出不快壯熱狂躁咽膈壅塞睡卧不
安大便秘澀及治大人小兒上膈壅熱咽喉
腫痛胃膈不利

荆芥穗壹兩甘草貳兩牛蒡子壹兩○醫

南北經驗方袖珍方加防風升麻各壹兩半

右為麤末每服一錢大成集成經驗方袖珍方二錢用水

壹盞煎七分去滓溫服食後小兒量力少
少與之如治瘡疹若大便利者不宜服之

烟霞聖效方同 ○小兒藥證直訣治瘡疹未出或

已出未能勻遍又治一切瘡涼膈去痰治

咽痛旁子壹兩又壹本二兩 ○甘草半兩

荆芥穗分壹右同為麤末每服三錢水一盞

半煎至一盞名方七分溫服不拘時按粹方又

此煎所註皆溫平之劑壹法加防風薄荷衛生易簡方治瘡癩

已未出咽喉腫痛用牛蒡子壹兩炒甘草

二錢炙荆芥壹分為粗末每服三錢水壹

盞煎七分去滓溫服

消毒犀角飲方見大方

小兒藥證直訣

紫草散發斑疹

釣藤鈎子各等紫草茸各等

右為細末每服一字或半錢壹錢溫酒調

下無時瘡疹方同

蟬蛻散治斑瘡入眼半年已後壹作者一月

取効

猪懸蹄甲二兩入罐子內塩泥潤濟燒存

性○神効名方衛生易簡方罐

子作甘鍋壽域神方作消銀鍋蟬殼去上用未一兩

右二味研入羚羊角細末壹分拌勻每服一字百日外兒半錢三歲以上壹二錢温水或新水調下日三四夜壹二食後服壹年以外難治瘡疹方同孝忠頃守官江南每置羚羊角輒得山羊角正如石膏寒水石之相易也羚羊角纖細而節紋極密京師僦馬人多用以爲馬嚼鐵是也山羊角麓長又節紋稀當是京師用爲正○醫林方治

瘡癩入眼半年以裏者可治猪鬃蹄甲二

小罐子內鹽泥蟬殼去子取羚羊角末

錢右三味爲細末每服半錢三歲一二錢

新水調下食後日進三服一年以上者難

治瘡癩入眼

昇麻葛根湯治傷寒溫疫風熱壯熱頭痛肢

體痛瘡疹已發未發並宜服之瘡疹方云淋名升麻湯

乾葛細升麻芍藥甘草別炙各四兩

右同爲麤末每服四錢水壹盞半煎至一

盞淵服無時○醫方大成治小兒身熱欲
作疹豆先宜服之白芍藥川升麻各壹分

草五錢乾葛二兩○南北經驗方右咬咀每服

二錢水半盞煎服不拘時醫方集壽域神

方治身熱欲作疹豆用白芍藥升麻乾葛

各六分甘草三分水半盞煎服不拘時衛生

易簡方同

四聖散治瘡疹出不快及到撮王氏集驗方
又云一切惡

紫草茸 木通剉 甘草剉 枳殼麥麩炒 黃

耆切焙各等分

右同為齏末每服壹錢集驗方水壹中盞

前八分溫服無時候瘡疹方同集驗方又

暴發豆疱瘡疹欲作黑陷一切危證或出

不快小便赤瀉心腹脹滿於四聖散中加

藍根散治同前

板藍根壹兩 甘草剉炒三分

右同為細末每服半錢或一錢取雄雞冠

血三兩點同溫酒少許食後同調下三方

無謬勿服瘡疹方同

退陷散醫林方名治瘡疹倒搨黑陷

人无燒存性入射香少許

右每服三錢溫酒少許調下無時神効各

同方○拔粹方小兒癩瘡黑陷者真牙湯人

牙二枚燒存性入麝香少許右為細末用紫草升麻湯

調下玉機微聖濟總錄治小兒斑毒倒厥

發斑方經驗良方名人齒人牙五枚○良方燒灰存

性右燒灰入麝香半字同研為細散分三

服溫酒調下良方又云不壽域神方用人

牙燒灰為末蜜湯調服壹方入麝香少許

溫酒調下二三服簡方同山居四要倒

麝人牙燒灰調服

又方名水調飲子無求子活人書衛生寶鑑

小猪兒尾尖取血三五點研入生龍腦少

許右新水調下食後醫林方神効名方胡

謝方衛生易簡方同○端効方右用生龍腦壹字猴

猪血五點右同研新水下

竜腦膏治小兒伏熱在心昏瞶不省或悞服

熱藥播熱昏昧不知人瘡疹倒撮黑陷

生梅花腦一字或半字研

右取新殺猪心一个取心中血同研作大

丸用新汲水少許化下未省再服如瘡疹

陷伏者温酒化下食後瘡疹方同

甘露飲子治心胃熱瘡疹方咽痛口舌生瘡

并瘡疹已發未發並可又治熱氣上攻牙齦

腫牙齒動搖

生地黃焙熟地黃焙天門冬去心焙麥門冬

去心枇杷葉去毛枳殼去麩炒黃芩拔粹方去心石斛

拔粹方山茵陳甘草炒

牙等分爲麤末每服二錢水壹盞煎八分

食後温服牙齒動搖牙齦腫熱含嗽潔并

服○拔粹方又云海藏云甘露飲爲血劑

調肝散治瘡疹太盛宜服此令不入眼

生犀壹分錯草龍膽半錢黃耆半兩大黃皮

二錢桑白皮自採焙乾釣藤鈎子夫節各一分麻黃夫節各一分

石膏中芫蕪去皮甘草炙各一分

右為麤末每服二錢水一盞煎至半盞食

後時時溫服少許瘡疹方同○拔粹方生犀二錢

半節膽壹錢黃耆半兩大黃二錢桑白皮半兩麻

黃去節鈎藤子一錢石膏半兩芫蕪去皮甘草各

錢二

右為麤末每服二錢水煎食後溫服微利

効玉機微義

三聖散治瘡疹入眼

馬屁勃半兩皂角子十四分蛇皮半兩

右入小罐子內搥泥因濟燒存性研細溫

酒調下二錢食後服瘡疹方同

子肝散治瘡疹入眼成翳

芫蕪根半兩蛇皮二錢

右同為細末用羊子肝壹箇批開入藥末

二錢麻纏定米泔煮熟頻與食之未能食

肝由乳母多食瘡疹方同

仙退散治疥疹入眼成翳

蟬脫末

不以多少

右用水煎羊子肝湯調服二三錢

疥疹方同

煙霞聖效方發瘡子方蟬退

去

右不以多

少為細末每服一二錢沸湯調服蓋定俟

溫量大小服之壽域神方治出豆疹不快

兩日昏翳水煎蟬蛻服之妙衛生易簡方

治小兒出瘡疹不快用蟬殼水煎汁與服

飲甚良

劉提點云疹豆最要大小腑分曉所以錢氏

四聖散用木通枳殼極好若大小腑自流

利則不必苦泥

疹豆發末透宜用四君子湯加黃芪紫草糯

米煎充擊云百病不可損其胃氣故多用

四君子湯及糯米等助其胃氣

劉涿小兒瘡子訣中云疹乎發如膿窠不肯

鱗者但調沙糖水與喫據劉提點

正去亦

會試用但喫沙糖水後多是爬搔了瘡子

成膏片去後來結癥不好

發疹紫草散辛亥樵隱孫先瘡方此下有生字出麻

疹又發豆瘡瘡黑陷亢拱辰出此方愈亢

云錢氏方紫草散有枳殼難服

紫草甘草糯米九云此味極好助胃氣黃芪

右為末水煎

發疹用人齒散極好但錢氏方中用麝香及

酒調難用蓋瘡豆最怕麝香與酒氣觸了

皆用時只是紫草煎湯調下自好不然用

蘇木煎湯

張煥小兒方疹後毒氣攻眼或生翳膜赤脉

之類宜用四物湯加荆穗煎服

疹豆護眼人多用臙脂塗據亢鑿說不如錢

氏方中黃蘗膏好吾家雖不曾用但看幼

幼新書亦說諸家護眼法無出此方也

大全本草

譚氏小兒方療豆瘡癢面靨以蜜陀僧細研

水調夜塗之明旦洗去平復矣

海藥云茅香主兒徧身瘡泡以桃葉同煮浴

之今諸能香其奇妙尤勝舶上來者

子母秘錄治小兒斑瘡疹豆瘡髮灰飲汁服

三錢匕

藥性論云臘月兔肉作醬食去小兒豌豆瘡

臘毛煎湯洗豌豆瘡及毛傅良

譚氏小兒方療豌豆瘡取猪肉爛煮取汁洗

之乾脯亦得

助道方

治小兒瘡疹候

小兒瘡疹最難醫忽然發作未為奇若見數

枚黑點于酒煎紫草灌孩兒

小兒瘡疹如發時根紅活者妙如間有黑

點者乃邪毒歸內可用紫草茸三二錢醇

酒半盞煎至三分濾去滓灌入兒口待發

出為妙

是齋醫方

治瘡疹不透乾黑危困神妙柿楂子末以多

少爲細末每服二錢紫草酒調下小兒量
大小加減徐徐進三兩服卽紅活蘇韜光
云其家累世用此甚佳柿楂子圖經本草
名糖毬兒第二十三卷云惟滁州者入藥
簡易方

活人書鼠粘子湯治小兒瘡疹欲出未能快
透皮膚熱氣上攻咽喉眼赤心煩玉機微義
此下云咽
利嗑不

鼠粘子炒二兩○無求子活
人書拔粹方四兩荆芥穗壹兩
○活

人書拔粹
方二兩甘草炙半兩○活人
書拔粹方壹兩防風壹分
○活
人書拔粹
方半兩

右細末每服二錢沸湯點服食後臨卧日
三服大利咽膈止嗽化痰若春冬間常
服能免瘡疹活人書
瘡癩之患老幼皆宜服
二方治瘡疹未出毒氣壅遏已出未能漏
透壯熱強躁咽膈不利睡卧不安大便閉
澀去鼠粘子用牛蒡子粗末水煎名消毒
散○拔粹方右爲細末沸湯點服臨卧大

利咽喉化痰涎止嗽老幼皆宜 海藏云
 太陽少陽藥也首論濕平者此也 瘡疹微
 義鼠粘子 炒四錢 荆芥穗 二錢 甘草 青錢 防風 半錢
 右為細末沸湯點服去防風名消毒散
 許學士捻金散 活人書名 治小兒麻豆瘡疹
 欲出渾身壯熱情緒不樂飲食不思服此可
 以內消仍令瘡無癢痕

紫草茸 川升麻 糯米 各半兩 甘草 壹分
 右粗末每服二錢水一大盞煎取七分去

滓溫服併滓再煎此療瘡疹奇方 王氏集驗方同
 必用方四聖散治瘡疹出不快透及倒撮一
 切惡候○經驗良方治豆瘡出不快倒靨或
 小便赤澁餘熱不除一切惡候或被風吹復
 不見入皮膚內

紫草茸 木通 去節 甘草 按粹方剉炒 枳殼 夫氣炒
 右等分豉阻每服壹二錢水壹中盞煎取
 八分 煎方每服二錢 去滓溫服不拘時候
醫方大成集南經 桃溪治伏熱胃經

暴發豆疱瘡疹等欲作黑陷一切危證或
 出不快小便赤澀心腹脹滿於四聖散方
 中加黃耆半兩良方等分用水煎服名紫草散
 傷寒者表實而裏虛瘡疹者表虛而裏實
 傷寒之邪始于於皮膚漸次傳於臟腑瘡
 疹之毒始蓄於臟腑而漸次泄於皮膚理
 傷寒之法宜先解表然後攻裏瘡疹之
 理當先消毒然後解肌切不宜轉瀉使毒
 氣轉深變為斑疹或為倒撮其候危矣此

疾亦多因傷寒失於汗下邪毒內蓄或天
 行疫癘長幼相似當隨證以施治焉

直指小兒方

瘡疹證治

參蘇飲

前胡去苗人參去蘆紫蘇葉乾葛洗半夏湯洗

汁以薑製炒茯苓去皮各三分枳殼去穢炒陳皮去白甘

對草去桔梗去

右咬咀每服四錢水蒸半薑七片棗壹箇

煎六分去滓微熱服不拘時

惺惺散治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓去皮細辛去葉桔梗瓜蒌根各人參

去蘆甘草各白朮各川芎等

右爲末每服壹錢水小盞薄荷參葉同煎

肆分溫服如要和氣入生薑煎服不拘時

○拔粹方治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及

氣不和桔梗細辛去葉人參甘草炒白茯苓

去皮白朮括蕞根各一兩右同爲細末每服三

錢水壹盞入薄荷五葉煎至七分溫服如

要和氣入生薑五片同煎用防風壹分用

川芎壹分此又一法海藏云此加減四味

亦各隨經證也瘡疹方治小兒風熱瘡疹

時氣頭痛壯熱目澁多睡咳嗽喘急桔梗

細辛去葉人參切去頂焙甘草剉白茯苓白朮

蕞根各海藏加防風川芎右同爲末每

服二錢水壹盞入薄荷五葉煎至七分溫

服不拘時如要和氣入姜五片同煎一方

用防風壹分川芎壹分易簡方治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目澁多睡咳嗽氣羸鼻塞清涕白木桔梗細辛人參茯苓甘草各一兩右咬咀每服二錢用水壹盞瓜蒌根等分入薄荷三葉煎至半盞時時與服錢氏方謂小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認問服惺惺散小柴胡湯升麻湯不若參蘇飲治諸般發熱不問何證每每用之甚効須逐日

多服以熱退為期不可遽止此數藥均能治瘡惟傷食則大便酸臭水穀不化畏食吐食宜以藥下之先服紫霜圓用代赭石

石脂研各壹兩巴豆三十粒去皮心出油炒研杏仁五十箇去皮尖麩炒切酒浸蒸餅元如黃米大兒生滿月服一元青嵐至三歲並服二元乳汁送下感應圓

仍以參蘇飲與服若發熱耳冷骹冷足冷四肢乍冷乍熱腮赤面赤噴嚏呵欠驚跳不安昏昏多睡皆瘡疹之候也當用溫涼之藥切忌妄下已發未發升麻湯用升麻葛根芍

藥等分甘草減用牛蒡子荆芥等消毒飲分甘草減半白
 煎皆得其宜若三日未見形跡當以生酒
 塗其身上時時看之狀如蚤痕者是也或
 發不透及倒撮黑陷極為利害紫草木通
 甘草枳殼黃耆等分白木煎服名四聖散
 若小兒咽喉疼者用生甘草桔梗等分白
 水煎服名如聖飲 更有小兒頭昏頰赤
 口內熱氣小便赤澁大便祕結此為裏熱
 當服大黃當歸芍藥甘草等分白木煎服

名四順飲若審是瘡疹之證不宜用此

升麻葛根湯治大人小兒瘡疹已發及未發

疑貳之間並宜服之 人參敗毒散方見傷寒

化毒湯瘡豆已發以此消毒

紫草茸各二錢升麻二錢甘草錢半

右剉散每服二錢糯米五十粒同煎旋服

○管見大全良方治小兒瘡豆已出未出

並可服之瘡疹方此下云出嫩紫草川升

麻甘草各半右咬咀無求子活人書

以水二盞糯米五十粒煎至一盞去滓温
服拔粹方右咬咀水二盞粳米五十粒同
煎此乃陽明之藥也瘡疹醫林方右冬等
分到如麻豆大每服二錢水壹盞糯米五
十粒同煎至八分去滓温服玉機微義治
豆瘡已出出不快紫草茸升麻甘草炙口
右咬咀入粳米五十粒水煎

清風散方見大方科諸風門如蟬散末治小兒疹豆或
發透或未透忽面青暴吼是爲風邪所傷

用此主之疹豆證以耳冷尻冷足下冷及
耳後有紅縷驗之然須見心胷間細點如
粟起則爲真是得效方同

加味四聖散治瘡豆出不快及變陷者

紫草茸 木通 南木香 黃耆微炒 川芎

甘草等分

右蘆末煎一錢不時服大便秘加枳殼少
許大便如常加糯米百粒糯米解毒能釀
而發之

又方紫草昔壹分陳皮半

右籠末新汲水煎服

紫草木香湯治瘡出不快大便泄利

紫草 木香 茯苓 白朮等分甘草少

右入糯米煎得效方右散每服二錢水

蓋紫草能利大便木香白朮所以佐之也

紫草木通湯治瘡疹出不快

紫草 人參得效方木通得效方茯苓

糯米等分拔粹方甘草減

右到散煎二錢溫服得效方每服二錢內

虛大便利者可入南木香去紫草承類鈴

○管見大全良方右俊咀每服四錢水煮

半煎至八分去滓分二服無求子活人書

右到如麻豆大每服四錢匕水壹盞中煎

至壹盞去滓溫溫分服拔粹方瘡疹方右

絲為末每服四錢水煎此小便不利之劑也

快班散治瘡豆出不快

紫草 蟬殼得効方去人參 白芍藥各

分木通壹錢甘草炙半錢

右剉散可貳錢得效方温服

絲瓜湯發瘡疹最妙絲瓜連皮燒灰存性百

沸湯調下

犀角地黄湯治瘡出得大盛以此解之方見大方

科聲音門

大連翹湯治瘡疹壯熱小便不通

連翹 瞿麥 荆芥 木通 車前子

赤芍藥 當歸 防風 柴胡 滑石

蟬殼 甘草炒各壹錢 山梔仁 黃芩各半錢

右剉散每服壹錢加紫草煎温服

人參羌活散方見大方治小兒疹豆因服熱

藥多發而不透身體頭面兩目皆腫連日

風搐奮身硬直羌活散并天麻防風圓煎

紫草調服

甘露飲方見大方五苓散方見大方小柴胡

湯方見大方四順清凉飲方見大方大如聖湯

鼠粘子湯 麻黃黃芩湯 桔梗枳殼湯即活

人書 二陳湯 方見大方

甘草散瘡豆略出煩渴不止

粉草 微 栝萹根 等分

右為末煎服壹錢甘草通血脉發瘡豆

烏梅湯瘡豆熱渴

小黑豆 棗豆 各壹合 烏梅 二箇

右咬咀新汲水一椀煎取清汁旋服

木香理中湯即和劑理中加木香甘草乾薑

湯 方見活人書

加味四聖散 方見前 胡荽酒或用酒煎或用熱

酒澆亦得

獨聖散○得效方治疹瘡陷入不發黑色而氣欲絕服此漸蘇紅潤

穿山甲 湯洗淨炒 令焦黃

右末每服半錢入麝少許南木香煎湯調

下或紫草煎湯入紅酒少許調下○經驗

良方川山甲散治豆瘡不發雖遍身黑陷

而氣欲絕亦能漸踈而發紅色右川山甲

燒存性爲末入麝香當門子少許壹歲兒服半錢三歲兒服乙錢用溫酒調下壹服見效永類鈐方神仙痘瘡黑陷不發方川山甲燒灰存性爲末加射香少許一歲半錢三歲一錢溫酒調下壹服神效但日合無魂者不可生矣

盲風散

椰櫚一箇 陳皮 甘草炙各一分 黑牽牛二兩半生半炒

右細末幼者半錢壯者壹錢蜜湯調食前服

甘露飲五福化毒丹方見前

加味宣風散治腎證瘡豆變黑卽宣風散加青皮壹分氣怯者外加南木香壹錢每服壹錢蜜湯調下先下黑糞次下褐糞然後以和胃藥加陳米與之良久糞黃瘡自微出又以竹園尿草煎酒傅其身卽得發起調解散治瘡豆已發或爲風冷所折榮衛不

和或為宿食所傷內氣壅遏以致水硬並主
之

青皮得効方陳皮得効方桔梗得効方枳

殼製○得効方半夏製○得効方川芎木通

得効方乾葛甘草紫蘇等分○得効

去皮節人參減豆豉宜

右判散每二錢薑棗煎服永類鈔方同得

二片棗一枚煎服未效加楂根三寸

不換金正氣散方見傷寒

黃柏膏瘡疹初萌急以此防眼

黃柏去蘆新菜豆紅花甘草生半

右為末麻油調為膏薄塗眼眶四圍頻用

為妙或臘脂傅之亦可若用葫妥酒尤先

護

人參羌活散治瘡疔熱毒攻眼赤腫用菜豆

皮煎湯調下

豆破飲治斑瘡入眼生翳

菊花新菜豆皮真穀精草各壹

右末每服一錢乾柿壹枚粟米泔煮同

煎候米泔盡只喫柿乾日兩枚永類鈔方同○

管見大金良方通聖散治疹豆瘡入眼及

生翳綠豆皮穀精草去根各壹兩白菊花壹兩

以甘菊花代然不如白菊右為細末得効方每服壹大

錢乾柿壹箇生粟米泔一盞共壹處煎候

泔盡只將柿去核喫之無時候一月可喫

三枚日淺者五七日可效遠年者半月餘

日効無求子活人書經驗良方同

螵蛸散斑瘡翳眼調少○

真桑螵蛸膏分炙焦研

右細末入麝少許每服壹錢米泔溫調臨

睡服○管見大金良方撥雲散治疹豆入

眼及生翳真桑螵蛸炙令焦壹兩右礪為細末

入麝香少許研令停清米泔調二錢臨卧

下噴眼無求子活人書同以棗陳其血蘇蘇之熱

治諸眼昏翳風痒方水調下

真杏仁三五七粒水浸去皮尖夏離坐常跟杏仁

右細嚼和津液吞五更端坐常服杏人潤肝去塵滓也

又斑翳方生鱸魚以針刺其血磁器盛之點入翳上自愈

扁鵲油劑方小兒方壹二歲發熱恐成瘡豆以此止之

生麻油入童子小便各半

右逐旅夾和以柳枝類攪令如蜜每服貳蜺散許服畢令卧少時但三四服大小便

利身體熱退即不成瘡豆之證若形跡已露則不可服也

又方以手蘸麻油摩其背背中間亦驗朱氏集驗方

決明散治斑瘡入眼寧鄉寧頭劉氏秘方用之神效

草決明 青箱子 乾葛 槐花 敗荷葉水上者

右細末食後米泔水調下得効方調如四下二錢 五十日得効方此 只服此藥若日子久得効

方若半則眼老睛懸却再合後藥

香白芷 香附子 連翹 甘草 蟬退

右為細末得效方二錢水一盞煎七分得效

方去用此汁調前藥仍忌口得效方仍

浮萍散治斑瘡入眼大人小兒皆可用

浮萍陰乾為末

右每服二錢以生羊子肝半箇入盞子內

以杖子刺碎沒水半合絞取肝汁調下食

後不甚者一服差已傷目者十服差已見

效得效方同蒼朮散治斑瘡入眼

蒼朮 槐花 藁本 蛇退 防風 枳殼

枳殼 白蒺藜 各三錢 黃芩 川芎 各半兩 木賊

甘草 白菊花 各二錢 蟬退 四錢 乳香 沒藥

各半兩 硬石膏 煨 乾葛 兩

右件為細末用白水煎食後服加穀精草

參錢半尤妙

菊花散治豆瘡入眼

菊花散治豆瘡入眼

白菊花

三兩

綠豆殼

蜜蒙花

旋伏花

穀精草

六兩

甘草

各壹兩

右為收咀每服一錢乾柿一枚粟米泔一
盞煎乾盡為度取乾柿食後服

升麻湯治斑瘡錢氏云班瘡未出之初或云
瘡疹或云傷風疑似之間以升麻湯主之
此方通古今用之不知醫幾千百孩兒矣
若欲出而不快出身體遍熱獨耳鼻脚梢
中指冷者此是瘡證無疑急用升麻湯解

加為穩若夫班子已見而身不大熱瘡出
得參差須要托裏急於升麻湯中倍加白
芍藥及加南木香服之則瘡子出得齊無
倒陷之患矣熱盛而瘡出亦齊者於此時
宜以消毒飲子解熱為捷藥方極多而緊
切者此三方為上
加味四物湯治班瘡入目或瘡豆收後方用
有翳膜宜用此藥治之
芎歸尾 芎藥 川芎 蒼朮 白菊花

乾葛 羌活 各等分

右每二錢水壹盞入生地黃少許杵碎同煎半盞量兒大小服之乳食後服忌壹切動風毒物雖愈後忌三二月日方可

蟬菊散治斑瘡入目或病後生翳障

蟬蛻 淨洗去塵土 白菊花 各等分

右為末 得効方 每服二錢水壹盞入蜜少

許同煎乳食後量兒小大與之有驗屢矣

邵倅劉開國大任奉施小兒豆瘡保生方併

論多有人不會醫小兒豆瘡今具捷法印施如信用之者但保十全

大凡小兒未見出瘡先覺發熱而大便閉小便赤未審委為豆證者但與升麻葛根湯及十神湯以解輕其腸胃中之熱毒

若豆瘡既分曉却有三證一曰好證二曰常證三曰危證今逐項具之瘡不透而肚實者可泡紫草湯量大小與之能解毒透肌若肚滑者不用服

好證若乳食與大便如常或一日壹次或
兩日壹次通者此爲好證不冷不熱亦自
愈如要服藥只平和不須服藥自保十全
一常證出豆瘡而大便閉小便赤者此是常
證可多服升麻葛根湯若大便閉至三日
不通者於葛根湯加陳皮壹錢紫蘇葉數
片煎與服之數次又過日不通者宜以真
方四順清涼飲子
熟大黃 赤芍藥 大甘草 真當歸

右四味等分煎與之服一歲兒日服壹錢
重若未通漸加半錢若五歲兒已上每服
二錢重若未通更略加之但要大便通毒
氣出卽安

一危證出豆瘡而腹瀉不已及小便清者此
爲危證用生料四味理中湯加藿香葉數
片及米三十粒濃煎與之頻服待瀉止若
多服而瀉不止者卽於理中湯內加好附
子少許煎與之或又不止則附子更略加

多或又不止只得更向上用藥救之乃得生也

人家小兒出瘡為父母者切忌色慾不得熬油不得出廁仍須忌食一切毒物

活血散治大人小兒豆瘡已出未出煩燥

北白芍藥

不以多少

右一味為細末白湯調下此藥大能活血

止豆瘡脹痛屢用屢効

湘中黃子發方

得効方同

管見大全良方治瘡子出不快白芍藥

玉

微義

右為細末每服一錢酒調服如欲止痛

微義

腹只溫熱湯調服

無求子活人書瘡疹方同

近人添甘

草五分之一拔粹方瘡疹方又云海藏云

張和之治四支出不快如防風大效此正

的太陰藥也經驗良方治豆瘡出不快腹

痛又名芍藥散右白芍藥為末一錢溫湯

調下

紫草飲治豆瘡欲發未發或未透者

紫草 北芍藥 去麻黃 當歸 甘草

右為哎咀白小煎服無時

發痘出後一向作熱服升麻散末一發歸散

山梔子 柴胡 黃芩 赤芍藥 甘草

升麻 干葛 文川 小升麻 風火效此五

右咬咀薄荷湯同煎

人參散治疹痘

麻黃 錢二 芍藥 荆芥 白茯苓 人生

甘草 錢壹

右為末每半錢薄荷湯下

瓜萋散治欲出痘疹

瓜萋 貝母 荆芥

右為末用紫草同煎連三服

管見大全良方

水解散治天行頭痛壯熱一二日兼治疱瘡

未出煩燥或出尚身體發熱

麻黃 去節泡二兩 無末 大黃 黃芩

桂心 甘草 芍藥 各壹

右為細末患者以生熟湯浴訖以暖水調

下二錢相次貳服得汗利便差活人書此

人服二方寸匕此調風實之人三伏中亦宜用之若去大黃即春夏通用

龍腦膏子治時疾發腕且瘡及赤瘡子未透

心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而

陷伏皆宜速治不爾毒氣入腹必死生龍

腦壹錢重細研旋滴猪心血和圓如雞頭

肉大得効方如每服壹圓心煩狂躁者用

紫草煎湯化下若瘡于陷伏者用溫酒化

下少時心神便定得睡瘡疹發透依常將

息取安也無求子活人書同猪尾膏同只川猪尾

血調也

無比散治瘡疹惡候不快及黑應瘡子一切

惡候小兒疳積

牛黃麝香腦子膩粉各壹分○無

聖濟總錄辰砂一兩○活人書

右五味研令極細如有患者小兒壹字大

人半錢水銀少許同小猥猪尾上血三兩

滴新汲水少許同調服光活人書安穩得

睡然後取轉下如爛魚腸蒲萄穗之類涎

臭惡物便安小兒用妳汁一二滴尤妙○

施圓端效方治小兒斑疹倒撮黑陷悶亂

大小便秘腹脹一切瘡毒惡候昏困病活人

方明朱砂錢壹麝香牛黃明片腦臍粉各壹

右研為細末每服壹字至半錢大者一錢

水銀少許獐猪尾血五點新水調下先得

睡寧穩然後轉下爛魚腸蒲桃穗之盡涎

臭惡物便安斑疹出得已定膿血大盛癰
腫作硬不消犀角地黃湯解之

如聖湯拔粹方瘡疹方玉機治小兒瘡疹毒

攻咽喉腫痛

牛蒡子炒苦梗去蘆甘草生各壹兩○得

麥門冬去心中兩○得

右為細末沸湯點二錢得效方細細呷服

入竹葉煎尤炒無求子活○微義右為末

竹葉同煎二三錢

决明散治疹豆瘡入眼

瓜樓根兩半决明子 赤芍藥 甘草炙各壹兩

○無求子活人書各一分經驗良方各二錢半

右爲細末每服半錢蜜湯調服日三〇得

效方决明子赤芍藥各壹錢半瓜根甘草各壹錢

右爲末每服壹錢蜜水調下

蛤粉散治小兒瘡子入眼

穀精草爲蛤粉末

右等分和停每服一錢匕猪肝二兩許批

開糝藥卷了青竹葉裏麻縷縛定水壹碗

煮令熟入收口藥瓶內熏眼候溫取今日

再作不過十日退無求子活人書同○得効方熏

藥真穀精草蛤粉各等分每服二錢水書

和蓋入猪肝二片青竹葉寸灰煎熟先熏後

煎陳氏小兒痘疹方穀精草散治小兒痘

瘡已靨眼目翳膜遮障腫人癢澁淚出久

而不退穀精草一兩生蛤粉二兩爲細末攪

猪肝壹葉用竹刀批作片子糝藥在內用

草繩縛定以瓷器內貯水慢火煮熟令兒

食之不拘時醫方大成集成南北經驗方

桐日醫方大成集成南北經驗方

無求平活人書醫方大成集成南北經驗方

麻黃黃芩湯五味方見傷寒治小兒天行熱氣生腕

豆瘡不快益煩躁昏憤或出尚身疼熱者

升麻黃芩湯五味方見傷寒治小兒時行瘡豆出不

快煩躁不眠加木香壹錢半劉涓子合日

東垣試效方醫方大成集成南北經驗方

消毒救苦湯治癩證悉具消化便令不出如

已稀者再不生癩仲冬立此方隨四時加減

通造化明藥性者能此

麻黃不去根節羌活各五分防風各五分南北經

錢川芎二分細辛一分藁木各五分柴胡各

分○袖珍方已升麻五分葛根一分拔粹

上二味各二錢升麻五分葛根一分拔粹

經驗方瘡疹方二錢黃芩二分酒製○生地

黃二分袖珍方瘡疹方二錢生黃芩壹分○

經驗方瘡疹方二錢黃連叁分酒黃蘗五分紅花

半分○拔粹方油疹方瘡蘇木壹分當歸三分

疹方秘藏經驗方壹分○拔粹方瘡吳茱萸半白木壹分蒼木二分

疹方當歸身○疹方壹分○瘡橘皮壹分連翹○半錢

疹方生甘草疹方三分○瘡者減出大者加

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至壹

盞去滓稍熱服空心食前夫癩疹出者皆

因內傷飲食致令營氣逆故也大禁牽牛

巴豆食藥宜以半夏枳朮九黃益智仁

之類去其青瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡

中驚嚏噴眼澁知必出癩也諸大膿胞小

紅拔粹方癩癰疹三色皆營氣逆而寒覆

其表沉以四味升麻湯加當歸身連翹此

定法也如肺成膿癩先顯喘嗽或氣高而

喘促加人參而補元氣少加黃芩以瀉伏

火如心出小紅癩必先見血溢驚身熱肌

肉腫脉弦洪少加黃芩瘡疹方命門出癩

疹必先骨痛身熱其疼不敢動播少加生

肌黃黃蘗諸癩疹皆為陰證瘡須因內傷

乳食脾胃不足營氣逆行雖火勢內熾陰
覆其外故錢仲陽製四物升麻湯發之如
有傳變證依加減法服之

桔梗湯如癰已出只時時與之快咽喉寬利

有膈

桔梗二錢生甘草一錢○蘭室秘藏炙

右改咀作壹服水二盞煎壹盞不拘時時

時服之○秘藏右為麤末每服三錢水壹

大盞煎至六分去粗火溫時時服之不可

計服數

黍粘子湯如癰子已出稠密身表熱急與此

藥服之防後青乾黑陷

黍粘子炒地骨皮各二錢柴胡一錢炙甘草

一錢連翹二錢當歸身酒洗黃芪各一錢黃芩

壹錢

右咬咀每服參錢水壹盞半煎至一盞去

粗溫服○蘭室秘藏黍粘子炒當歸身酒洗

炙甘草一錢柴胡連翹黃芪黃芩各壹

錢五分 抽骨皮貳右同為籠末每服貳錢水
壹大盞煎至六分去粗溫服腹空服藥畢
且休與乳食拔粹方南北經驗方一

蘭室祕藏

如癩證少具其癩未發乃與升麻湯三五錢
帶熱服之待身表溫和癩疹已顯服藥乃

止

如其身涼其癩未出辨得是癩證無問服數
直候身表溫和及癩瘡已顯然後乃止只

時時與桔梗湯寬胃膈利咽喉方見東垣試效方

如見傷食證又見癩證先與不犯大黃巴豆

藥尅化過再與升麻湯

如食重傷前藥不能過再與犯大黃巴豆藥
過

如大便行當即便與升麻湯服之恐癩子內
陷已後臨時作罪過

如癩子已出稠密身表熱急與下項
麻黃柴胡升麻湯治小兒寒鬱而喘喉鳴腹

中鳴腹滿鼻流清涕脉沉急而數

麻黃已上各一分 草豆蔻仁已上各一分 吳

茱萸 厚朴已上各二分 當歸梢 甘草 柴

胡生黃芩已上各一分 升麻 神麴 蘇木已

各半 全蠍二筒 紅花少許

右判如麻豆大分作二服水一大盞煎至

七分食遠服忌風寒微有汗則効

御藥院方

消毒散治小兒瘡疹已出未能勻透及毒氣

濕暹雖出不快壯熱狂躁咽膈窒塞睡卧不

安大便秘澀及治大人小兒上膈攻熱咽喉

腫痛胷膈不利並宜服之

牛蒡子兩 甘草兩 荆芥穗兩

右為麤末每服膏錢用水壹盞煎至七分

去滓溫服食後小兒量力少少與之如治

瘡疹若大便秘者不宜服之

無價散治班瘡發出不快

人猫猪狗臘晨燒 少許微將蜜水調

百者救生無一死 萬鈹黃金也何銷

右將前四物於臘臘日早晨煙霞聖效方日臘月上辰

未出成貯於銷一鈹銀鍋子內用木炭火

大籠煨令煙盡白色為度但有發瘡似覺

有瘡或發不快倒摧聖效方黑靨一切惡

瘡並皆治之每遇小童但覺瘡證每用藥

壹字用蜜調服萬無一失醫方大成集成南北經驗方承

類鈴方同據此藥工効無名可揚以無價散呼

之○經驗良方化毒散得效方名捷効化毒散治小

兒豆瘡欲發未發便服之緣此藥以毒觸

散毒氣縱然瘡出亦少决無危惡之證此

方活兒之捷法名醫多祕不令病家知之

人猫猪犬臘晨燒壹字將來用蜜調萬可

萬生無壹失千兩黃金價不饒右冬月先

取人猫猪狗糞各等分於高處黃土窖五

日取用却用砂鍋盛蓋蓋泥固濟日乾於

臘月八日煨令通紅取出去火毒研為細

末入麝香少許每用壹字用蜜調勻溫湯

化下或挑少許於舌上用乳汁嚥之

方同

醫林方奪命散治瘡疹倒撮黑陷欲死者
人猫猪犬臍辰燒煙盡灰乾蜜水調每服
壹錢玉機微義治班瘡不出黑陷欲死者
人猫猪犬糞臘月內燒爲灰右爲末每壹
字蜜湯調服量大小與之壽域神方治疹
豆斑瘡出不利并黑陷倒撮嵌下腹脹危
篤欲死者用人猫猪狗四糞治之雖是穢
物其他藥皆不可治莫非此物見效之速

可以返生也人用無疾九歲以下童子者
其猪猫狗皆用末破陽雄者先於重九各
置於靜處飼之以飯勿令雜食過十數日
換盡腸中宿垢方可收其糞陰乾至臘八
日未出時盛在銷銀鍋內用火煨令焰盡
白色爲度研末每服壹字冷蜜水調下壹
服妙衛生易簡方治疹豆癩瘡出不快并
黑陷倒撮嵌入肚腹脹用人猫猪狗屎陰
乾於臘日早晨日未出時盛在甘鍋內煨

火煨令煙盡白色爲度研末每服壹字冷
 蜜水調下壹服卽效無失壹方用此四般
 牙燒灰功用亦同亦治一切惡瘡其効如
 神神效如神而末時濕毒字今蜜水隔不膏
 得效方出出熱亦能除險內服火跟今決盡
 疹瘡疹瘡中除濕火印外其毒剋淨至服八
 表解虛證參蘇飲治瘡疹已發未發潮熱痰
 嗽臉赤手足微冷每服二錢生薑二片葱
 白膏根山楂子根三寸同煎熟服令滓乳

母服 方見大方
科傷寒門

惺惺散治發熱頭痛欲作疹瘡每服壹錢乾
 桑白皮三寸去赤煎湯調不向時服方見傷寒
 熱訂如聖湯治身熱如火頭痛頰赤而紅呵
 欠鼻瘡疹疹已未出時宜服

白芍藥 川升麻 各壹兩 甘草 紫草 各五錢

乾葛 壹兩 木通 五錢 去皮節

右剉散每服二錢水壹中盞入生薑二片
 葱白二根山楂子根三寸同煎熟服壯熱

心煩加人參赤茯苓石膏麥門冬去心

人參羌活散治疹豆因多服熱藥突而不透

身體頭面兩目皆腫連日風搖奮身硬直

方見傷寒

香葛湯治時令不止發為疹瘡解腸胃中一

切熱毒皆可服之

方見大方科傷寒門

三豆飲治天行疹豆活血解毒或覺鄉并有

此訂預防之則不染

赤小豆

黑豆

菘豆

各壹升○南北甘
經驗方各壹斤

草兩半

右淘淨水煮熟逐日空心任意服

濟察方
醫方集

或經驗方袖疹方永類鈴方經驗良方壽
感神方衛生易簡方筋奇方食豆飲汁

已染則輕解未染服之七日醫方大成不

發神方又云吞紅
花子數粒亦可

發出紫草飲治豆瘡欲發未發或未透者

紫草

北芍藥

去蘆麻黃

去節當歸

甘草

各等分

右剉散每服二錢水壹盞煎不拘時服

加味四聖散治瘡豆出不快及變陷倒靨小便赤滯余熱不除一切惡候或被風吹復不見入皮膚肉者

紫草茸治本通法法減減南南赤赤黃黃香香炒炒川川

芎芎甘甘草草人人參參各各等等蟬蟬退退去去足足翼翼十十箇箇

右到散每服二錢水壹盞煎不拘時候溫服大便秘加枳殼少許大便如常加糯米百粒性解毒能釀而發之

紫草木香湯 紫草木通湯

快斑散方前見直人參羌活散治同上方見

活血散力見朱氏

薑附湯治四肢冷極疹瘡黯色不發或泄瀉不止身熱重者不宜服方見大方

黃芩甘草湯治挾熱作疹瘡不出煩燥不得

眠

黃芩七錢赤芍藥 甘草各五錢

右到散每服三錢水壹盞煎溫服若胃中虛冷其人能食飲水即噦脉浮發熱口鼻

中燥或衄加大棗壹枚嘔者加半夏少許
生薑三片煎食少者加人參紅棗煎量大
小加減服

萬金散治瘡疹已出未能勻遍色不紅潤

防風錢三人參蟬退各二錢

右為末蘿蔔煎湯調下經驗良方葡萄湯調下如無蜜葡萄

亦可煎湯服了急用芥子末白湯調如膏塗兒

脚心乾即行傳其毒漸漸復出瘡疹依前

紅活

奇方治瘡疹出不透腹痛甚或黑靨者右以

蟬退二十五箇經驗良方去足翼洗淨為

末每服壹錢熟水調下腹痛立止而出透

神效良方食乳母亦可服壹錢

又方用乾山楂子為細末湯點服立見出透

紅活荔枝殼煎湯溫服亦效○經驗良方

又王光叔傳用乾猴查子肉為末湯調服

立紅活施人累驗又黑陷口渴荔枝殼

煎湯溫服立紅活

藿香正氣散治疹瘡根脚白色冰龜頂淡紅

色而不發加川芎若惡寒加官桂方見大

寒門方見大

龍腦膏子方見管見

救陷加味宣風散治腎虛訂疹瘡變黑

雞心檳榔二箇陳皮去青皮甘草炙各三錢半

黑牽牛二兩半生半炒熟

布為末蜜湯調下氣怯者加南木香壹錢

先下黑糞次下褐糞後以四君子湯加厚

朴木香陳米湯服和胃良久糞黃瘡自微
出又以葫荽煎酒傳其身即發起

獨聖散方見直指五福化毒丹方見

人齒散治瘡豆初出光壯忽然黑陷必頰性

燥氣喘妄語或見鬼神並宜速治不然毒氣

入臟必死白木

人齒燒存性

凡右為末每箇作壹服酒調下不同時每四

靈砂酒治疹瘡黑陷不起以好酒磨化三五

粒服效

民望方治瘡疹漸黑面陷大便不固乳母同

服亦可

人參 白朮 肉豆蔻 麩裏 白茯苓 黃

者各半甘草二錢

右剉散每服二錢經驗良方三錢水壹盞姜二片

三片良方棗壹枚煎五分乳母倍之若大瀉手

足厥冷詳病加炮附子入

催乾犀角地黃湯瘡疹出太盛者以此解之

芍藥 生地黃 牡丹 犀角屑無以升麻代之

右剉散每服二錢水壹盞煎溫服欲乾犀

角飲方見後小驚圓方見驚癇○經驗良方生地

黃二兩牡丹皮真犀角各半兩赤芍藥三錢右咬

咀每服三錢水壹盞煎七分量兒大小溫

煎服玉機微義治瘡疹出大盛便血或鼻衄

犀角壹兩生地黃二兩赤芍三分牡丹皮一兩右咬

咀三歲兒三錢水煎服瘡疹方治瘡疹出

朱而發搐者兼治瘡疹大盛生犀角屑壹兩

如無以升生地黃二兩芍藥八錢牡丹皮附

為粗末每服三錢水煎服熱多者加黃芩

如聖湯方見管見

護眼神應膏治疹瘡正發時可川以防豆花

入眼生翳

黃蘗兩真菜豆粉兩甘草四兩紅花二兩

右為末生清油調塗兩眼四畔用之瘡豆

面上亦少或但用乾胭脂塗抹亦可○經

驗良方護目膏護小兒豆瘡不入眼內黃

藥兩菜豆粉兩甘草四兩紅花二兩右為

末生芝麻清油調塗兩眼外四畔頻頻塗

之面上不生瘡疹若塗川此藥瘡豆亦少

壽域神方用黃栢末甘草末菜豆粉紅花

末生清油調傳眼四邊

加減四物湯治班瘡入目或瘡豆收後

當歸尾 芍藥 川芎 蒼朮 白菊花

乾葛 羌活各等分

右到散每服二錢水一盞入生地黃少許

槌碎同煎半盞量兒大小服之乳食後服
忌一切動風毒物雖愈后忌二三月日方

可

决明散 方見管見
大全良方

羌菊散 經驗良方
名羌蟬散 治疹瘡後毒氣不散生翳

障并治暴赤眼疼翳障著明

羌活 蟬退 去足
翼土 防風 蛇退 菊花

穀精草 木賊 甘草 梔子 白蒺藜

大黃 黃連 沙苑 蒺藜 各半

右為末每服壹錢清米泔温煖調下○良
方右為末每服半錢或一錢白湯調或米

泔調下

奇方治瘡疹入眼用兔屎焙乾為末茶清調

下瘡疹安後方可服 壽域神方
方可止藥 多服即愈

火仍治昏翳 經驗良方

又治豌豆瘡入口痛楚恐傷眼睛浮萍陰乾

為末每服三錢隨兒大小以羊子肝半箇

入盞內以杖刺碎爛投水中合攪取汁調

下食後服不甚者一錢差已傷目者十服

差末未者三錢以羊肝半斤半斤

蜜蒙花散方見聖惠方

决明圓治豆瘡入眼雖赤白障翳膜遮漫黑

睛但得瞳子不陷者可治之

石决明煨川芎各一兩蒼朮半兩米

右為末用兔肝或無以白羯羊肝代之研

爛搜和圓如棗豆大每服二三十圓經驗良方

三十食後臨卧米泔下

又方用穀精草煮白柿喫仍用棗豆根燒灰

淋水以上而清者洗下面濃者服之經驗良方

○急救仙方以谷精草為末以白柿或

猪肝或餵糖點喫壽域神方衛

通聖散方見直指决明散浮萍散治斑瘡入

眼方見眼疾

熏藥方見管見

洗方右以黃連去鬚白滑石銅青用絹帛包

泡湯候温洗

塞耳丹治疹瘡入眼右以水銀一錢國丹五錢同圓作六圓入鎔銀窩中圓瓦上蓋濕紙糊護定用香爐盛炭火燒一日後取出以薄絲裏之疹瘡在右則塞右耳在左塞左耳立見墜下

消毒加味犀角飲治毒氣纏遏壯熱心煩瘡疹雖出未能勻透口舌生瘡不能吮乳

牛蒡子三兩炒 荆芥穗五錢 甘草炙一兩 防風
 川升麻各七錢半 犀角三錢 麥門冬去心 桔梗各蘆去瓦

錢

右到散每服二錢水一盞煎去滓令溫時

時令呷或頻灌之大便利不宜服

射干湯經驗良方名射干鼠粘子湯 治瘡疹後身壯熱大

便堅口舌生瘡咽喉腫痛餘毒未盡

鼠粘子一兩炒 升麻 甘草 射干各三錢半

右到散每服三錢水壹盞煎良方煎六分 溫服

不以時候

連翹飲治瘡疹壯熱小便不通余毒未解

連翹 瞿麥 荆芥 木通 車前子

赤芍藥 當歸去尾 防風 柴胡去鬚 滑石

蟬退 甘草炒各 山梔仁去殼 黃芩各一錢

右剉散每服二錢加紫草煎溫服

五福化毒丹治瘡疹余毒上攻口齒及治蘊

積毒熱驚惕狂燥頰赤咽乾口舌生瘡夜卧

不寧譫語煩渴頭面身體多生瘡癩朱眼等

疾亦名青黛圓

人參半兩 玄參兩 茯苓兩 青黛 甘草各五錢

桔梗兩 牙消枯過 麝香 腦子各半錢壹

有金銀箔

右為末蜜圓每兩作十二圓一歲兒一圓

分四服用薄荷湯下瘡疹上攻口齒涎血

臭氣生地黃自然汁化壹圓用鷄翎刷在

口內熱疳肌肉黃瘦雀目夜不見物陳粟

米泔水化下食後臨睡服

甘露飲解毒殊效方見諸熱

瘡爛成片方右用黃牛糞乾傅膿多痛甚者

乾淨黃土為末傅之瘡漏口中痛不能食者五福化毒丹或生蜜浸漬黃栢取汁啖之為愈凡瘡欲成痂類以面油乳酥清蜜潤之可揭即揭血出無害若乾硬已久必成癢痕如茶醋如猪肝猪血之屬妄與食之則已脫之迹必為之黯慘然而瘡痂已脫肌肉猶嫩不可盥洗太早亦不可以手加之葫荽酒能辟惡氣左右所不可無或蒼朮降真用之亦可日聖瘡七日熱而發

七日泡而乾又七日則平復如瘡舊矣大抵調順血氣溫和脾胃均平冷熱則瘡出為甚易若實實虛虛損不足而益者餘則瘡出為甚難調解之法無以逾此

活血散治疹子出多疼痛及體痛時時叫喚

方見朱氏集驗方

敗草散治瘡疹抓搔成瘡膿血淋漓右用多年蓋屋爛草或羔牖草不以多少曬乾為末乾貼無時若渾身疥破膿水不絕粘沾

衣服難以坐卧可用二三升壽域神方攤
 於席上令兒坐卧少即乾貼以其草經霜
 雪雨露感天地陰陽之氣多善解瘡毒或
 用蕎麥粉荔枝核燒灰摻瘡上亦好經驗良方
 同

糝方治水泡豆瘡

苦參 滑石 蚌粉 輕粉 川白芷各
 分
 右為末乾糝之立效

通治木香散治發瘡疹身熱作渴

木香 大腹皮 人參 桂心 赤茯苓
 去青皮 前胡 阿黎勒 半夏 丁香
 醫方集 甘草 三錢
 成去蘆
 右劉散每服二錢水一盞姜二片醫方大成
南北經驗方袖珍煎空心温服

與功散治豆出欲靨未靨之間頭温手醫方大成

集成南北經驗方神珍方作足冷腹脹渴瀉急服此切不可

與蜜水

木香 常歸各參錢半 官桂去皮 白朮 茯苓各

錢○集成經驗方 陳皮大成集成經驗方 厚朴去麤皮 人參去蘆 肉豆蔻 丁香各二錢半 附

子炮去 半夏姜製各 右判散每服二錢水壹盞姜二片棗二枚

大成集成經驗方珍方 姜五片棗三枚煎服○玉機微義治

小兒痘瘡屬之際頭溫足指冷或腹脹瀉

渴氣促或身不壯熱悶亂不寧卧則哽氣

煩渴咬牙木香參錢半 官桂二錢 當歸三錢 人

參二錢 茯苓二錢 陳皮厚朴二錢 白朮二錢

夏青錢半 丁香肉豆蔻二錢 附子壹錢 右為

粗末每二三錢水煎入姜棗

白朮散治豆已靨身熱不退清神生津除煩

止渴痘疹方瘡疹方名人 人參 白朮 藿香葉 木香 甘草

白茯苓各青兩○瘡 乾葛二兩

右判散每服二錢水壹盞煎醫方大成集

方陸珍 不以時溫服痘疹方瘡疹方每服

參錢水一大盞煎至

參錢水一大盞煎至

參錢水一大盞煎至

參錢水一大盞煎至

參錢水一大盞煎至

參錢水一大盞煎至

參錢水一大盞煎至

陸分
去滓

人參麥門冬散治發熱煩渴

麥門冬一兩 人參去心 甘草炙 陳皮 白木

厚朴姜汁炒 各半兩

右到散每服二錢水壹盞煎醫方大成案成南北經驗

方袖珍方煎陸分

五苓散治小便赤澀加燈心拾莖麥門冬去

心車前子各半錢煎湯調人參湯加枳殼

去穰切少許治大便秘結內煩外熱未効

更加四順清涼飲少許方見大科諸暑門及傷寒門人參

湯即小柴胡湯

四順清涼飲治同下熱實者用方見大方科積熱門

大如聖湯治瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗 甘草 生牛蒡子炒各壹兩 麥門冬去心半兩

右為末每服二錢沸湯點細細呷服入竹

葉五皮煎湯尤妙

枳殼桔梗湯治胃腹脹滿

枳殼炒去瓢 各壹兩

右剉散每服二錢水二盞煎至壹盞分二服

三陳湯治痰壅吐食每服二錢生姜二片烏

梅半箇煎服方見大方科嘔吐門

理中湯治下利嘔逆加木香熟附子每服各

半錢方見大方科泄瀉門

豆蔻圓治疹豆滑泄不止水穀不化

木香 縮砂仁 各三錢 白龍骨 呵子肉 各

兩 赤石脂 七錢 瘡疹方 枯白礬 各七錢半 肉豆蔻 各

兩

右為末麵糊圓如黍米大每服三十圓醫方

大成作至五十圓煎異功散下或瀉水穀

白色淡黃色木香散下方見前○醫方集

珍方同瘡疹方一周歲兒每服三五丸

蘇合香圓治疹瘡為陰邪穢氣所傷亦令變

壞可用醋炭熏後以蘇湯化服解之方見

科諸氣門

捷効化毒散方見御藥院方

二參飲治豆瘡後餘熱不退

柴胡 甘草 炙 黑參 人參 竜膽草 各

錢 麥門冬 去心三錢半

右判散每服三錢水壹盞煎稍熱服不拘時量大小加減

木筆花散治豆瘡出後有餘瘡生塞鼻中不

能睡卧 經驗良方名辛 右用木筆花研為

細末加生麝香少許葱白蘸藥入鼻中數

次即通

滅癩散治豆瘡愈後瘡痂雖落其癩尤黯或

凹或凸用此

韶粉 即水粉 輕粉 壹

右同研勻猪脂油調塗 經驗良方 ○陳氏小

兒痘疹方韶粉散治小兒痘瘡攪愈而毒

氣尚未全散瘡痂雖落其癩猶黯或凹凸

動地當用此藥塗之韶粉 壹錢 輕粉 壹錢

加青黛 神 右相研入煉可猪脂油拌和

如瘡滿塗瘡癩如痘瘡欲落不落當滅

癩痕痒翳骨髓膏右煉入輕粉壹錢研成

白膏堯合盛之塗瘡上如痘瘡痒甚悞

搔成瘡及瘡痂欲落不落用上等白蜜塗

之其痂落亦無紫黑癩痕神妙瘡疹方同

又方白蜜不以多少塗於瘡上其痂易落且

無疤痕亦不臭穢壽域神方同或用升麻同蜜

煎摩痕上并敷食之經驗良方同

懸繭散治豆瘡後身體及肢節上生疔蝕瘡

膿水不絕右以出蛾繭繭不拘多少用白

礬槌碎寒永類鈴方作寒入繭內令滿以炭火燒

候白礬汁掠痘疹方瘡疹方作汗盡取出研細每用

乾貼豆瘡醫方大成集成南北經驗方袖珍方壽域神方衛生易簡方同

內若不早治則潰筋骨以致難治經驗良方

豆桐黑桐合雜豆桐黑桐合雜

單方治瘡疹入眼及昏暗翳尤妙右用兔子

糞焙為末每服用好茶清調下即安須待

疹瘡安后服此經驗良方同

貼藥治小兒赤熱腫唇方同

川大黃 白礬 朴消

右爲末 冷水調作掩子貼目上

澹軒方 爲末 以酒調服 或茶調服 不時安能得

豆瘡不透 服火丹 卻服火丹 亦用此方

豆瘡黑陷 命難延 鯪鯉甲灰 存性 研每服半

錢 加少射溫調溫服 使紅鮮 效驗命

山中秋熟紅楂子 串樹陰乾 旋末之 紫草根

茸煎酒服 豆瘡才透 免憂疑

豆瘡痕

水牛糞治豆瘡痕 燒末研塗 五七番 有更乾

收淨荷葉水調末付也 無癢

豆瘡破後付真酥臘月猪脂亦可塗 但使瘡

間常得潤 自然脫掩 不侵膚

班瘡變色

班瘡色黑 付真酥臘月猪脂入麝研細末 中

錢溫水點 莫教一服便紅鮮

用後方

王氏博濟治瘡疱將出 以牛蒡子炒令熟 杵

為末每服一錢入荆芥二穗水一盞同煎
至七分放溫服如瘡疹已出更服亦妙
譚氏小兒方療小兒面上瘡豆子瘰法黃明
膠慢火炙為末溫酒調服壹錢匕出者服
之無癩未出服之瀉下

治小兒斑瘡豌豆瘡熟煮大豆汁服之佳聖濟

總錄壽域
神方同

又方髮灰飲汁服三錢匕○聖濟總錄頭髮
一兩燒灰右壹味研羅為末湯調服兩字

隨兒大小以意加減

瘡子入眼以仙靈脾葳靈仙等分為末食後
米湯下二錢匕小兒半錢匕

澹寮方

三豆飲治天行疹痘活血解毒或覺鄉井有
此證預防則不染方見得
效方

升麻湯

升麻 乾葛 甘草 赤芍藥
右剉散每服秤五錢重水二盞煎七分去

萍熱服小兒量歲數與之壹方加紫草
鼠粘子散治傷寒斑瘡毒氣盛脉洪盛大便秘澀咽不利或致疼痛語聲不出

鼠粘子炒丹參升麻甘草炙乾薄荷

三葉煎天竹汁煎白芷煎薄荷煎升麻煎甘草炙乾薄荷

右等分每服三錢水二盞半煎至七分去

滓不拘時服此似感風熱而咽疼聲重類

疹證正宜服之

班瘡甚者曰萍宜用煮萍飲

青萍各壹握紫萍淨洗

右煮羹喫三服

小兒瘡疹甚者遍身潰爛膿汁黏衣衾卧睡

不得用臘月黃牛糞日乾燒灰鋪壹寸許

在床土令卧之或瘡大而成片無皮或成

豆癰皆用黃牛糞糝之壹方用苜蓿作末

如前用尤佳一方用麥麩亦如前用如嬰

孩有此證作絹糊床子與之睡為妙

斷續膏治疹子攻眼腫痛不可開

斷續即蟬蛻淨洗

右為細末以薄荷汁調傳一二次便能開

若小兒瘡疹黑靨不出溫熱水調下一錢

經驗良方即出乳母服亦可小兒瘡疹不

得洗面若生水入眼即損眼瘡疹未出認

得是此證分曉急以臙脂塗眼令瘡不入

眼中

瘡疹發於面才膿出急以真酥潤之頗潤為

佳纔有瘡痴便剝去更潤之痴硬不落有

礙肉生遂成癩子此理昭然人多不曉反
諸剝早成癩誤矣

面上疹子欲愈之際用黃蜆煮汁洗而自無

癩痕無蜆以螺螄代用

小兒斑瘡入眼皆由熱重毒氣上攻多因食

毒物所致若瘡子盛發時覺得眼腫痛時

時令開眼看之睛上無瘡即不害事若有

瘡亦須服清涼飲子每日食後一服微利

之瘡子乾後將搗不如法及飲食不謹或

無故眼自痛者即毒氣不盡也輕者清涼
飲重者雄黃解毒團須下三四行然後服
治眼藥只得睛不破無不愈者保生方

衛生寶鑑

治班後小兒眼有翳膜煎竹葉湯同砂糖化

下瀉青丸

拔粹方
壹兩丸

微利為度

白菊花散治疹豆瘡後眼內生翳膜者病淺
貳拾日見効深者壹月必効壹日喫三服

白菊花

菜豆皮

穀精草

去根各
等分

右為末每服壹大錢乾柿一箇生粟米汁
一錢熬米汁盡將柿去帶核食之無時

拔粹方

小兒癩瘡始覺有表證片麻湯

升麻

葛根

甘草

芍藥

各等
分

右為麤末每服二錢水煎

小兒癩出不快者或未出者紫草升麻湯

紫草

煉者升麻

甘草

炙各
半兩

右剉細每服三錢粳米五十粒同煎

小兒癩出欲透皮膚身熱咽喉不利甘草桔
梗升麻湯

甘草半兩桔梗兩升麻兩

右剉細每服二錢水煎

小兒癩疹黑陷方神効名方治

乾胭脂三錢胡桃壹個燒

右為細末煎胡荽酒調藥壹錢服之立効

壽域神方衛
生易簡方同

小兒癩疹黑陷方臈月禿鼻腦子或一介或

二介以好酒調服若乾者以好酒浸少時
化開依上調服立効

治小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相

似未能辨認間服升麻葛根湯惺惺散小

柴胡湯甚驗蓋此數藥通治之不致悞也

惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐宜

以藥下之海藏云傷食宜以藥下之者當

詳其所傷何物生硬寒熱不等不可遽用

巴豆之類大毒之藥下之升麻葛根湯太

陽陽明也惺惺散風熱咽不利脾不和少
 陽渴小便不利也小柴胡湯往來寒熱胃
 脇微痛少陽也然欲知其經當以脉別之
 小兒耳冷靴冷手足乍煖乍涼云云惟劑小
 大不同耳詳見小兒藥證直訣海藏云消毒散太陽
 藥白虎湯治身熱目疼鼻乾不得卧陽明
 藥也正為泄時暑之劑甘露飲子肺腎藥
 中甘桔湯少陰藥也紫雪天門冬麥門冬
 黃芩地黃為血劑玉露散肺腎藥石膏寒

水石為氣劑

升麻葛根湯方見小兒藥證直訣海藏云太陽陽明之

劑黃連山茱萸葛根湯方見小兒藥證直訣海藏云太陽陽明之

瀉青丸方見傷寒海藏云東垣先生治癩後風熱

毒翳膜氣暈遮睛以此劑瀉之大效初覺

易治末煉蜜為丸是也

補肝丸四物湯內加防風羌活等分為細

末煉蜜為丸是也

鎮肝丸瀉青丸去梔子大黃專治肝虛

地黃在治腎虛解廬印眩病也治脉毛而虛

熟地黃錢八山梨錢乾山藥澤瀉牛

丹皮白茯苓各四錢

右為末煉蜜丸如桐子大三歲已下壹二

丸或三五丸空心溫水下

瀉腎丸治脉洪而實前地黃丸熟地黃改生

地黃去山茱萸是也此治左手木部脉若

右尺洪實以鳳髓丹瀉之此地黃丸仲景

八味丸去桂附若加五味子腎氣丸也此

益肺之原以生腎水焉

導赤散泄丙片見傷寒

益黃散補脾

青皮呵子肉甘草各半兩陳皮兩一丁香

錢二

右為細末每服二錢水壹盞煎服海藏

云此劑瀉脾以燥濕

瀉黃散瀉脾熱目黃口不能吮乳

藿香葉七錢山梔子仁兩貳石膏兩半甘草兩叁防

風肆

右剉同蜜酒微炒香為細末每服壹錢至

三錢水壹盞煎清汁服 海藏云此劑瀉

肺熱麻木特洲二錢水壹盞煎服

白朮散

藿香葉 白朮 木香 白朮 甘草

炒人參 各壹兩 乾葛 貳兩

右為末每服壹錢至二錢水煎如飲水者

多煎與之 海藏云四君子湯加減法治

濕勝氣腕泄利太過

生犀湯黃龍湯犀角地黃湯加減法

生犀 錯取末 貳錢 地骨皮 赤芍藥 柴胡

乾葛 剉各壹兩 甘草 半兩

右為末每服壹二錢水煎 海藏云此少

陽陽明相合也

宣風散 瘡疹方治瘡疹身熱煩渴腹滿而喘

便不差者宜風散下之若五七日痲不焦是

內發熱熱氣蒸於皮中故瘡不得焦痲也宜

風散導之用牛犀磨汁解之使熱不生必著痲矣

檳榔二橘皮 甘草各半 牽牛四兩用生

右為極細末三二歲蜜湯調下半錢已上

膏錢食前 易老加防風瘡疹方云又治

身不大熱大小便澀則是熱海藏云與通

在內煎大黃湯下宜風散

通膈丸

大黃 牽牛 木通各等分

右為細末滴水丸粟粒大每服三五十九量虛實加減

異功散溫中和氣治吐泄思食凡小兒虛冷病先與數服以正其氣

人參 茯苓 白朮 甘草 陳皮各等分

右為細末每服二錢水壹盞生姜五片棗

二枚同煎海藏云四君子補脾湯加減

法

涼驚丸瘡疹方治斑疹病後發癩此涼驚之劑熱者用之

草龍膽 防風 青黛研各三錢 龍腦壹錢 鈞藤

末二錢 黃連五錢五分 牛黃瘡疹方 麝香壹字七

瘡疹方
一字七

右為細末麵糊丸粟米大每服壹二十九

瘡疹方每服三五金銀湯下

黃耆散治盜汗

牡蠣燒黃耆生地黃各等分

右為末水煎

連翹散治一切熱兼治瘡疹有痺刺火

連翹防風梔子甘草

右為末水煎王機微海藏云治熱在外而

不厥此少陽藥也瘡疹方同

犀角地黃湯方見脉訣中

潔古老人癩論

癩疹之病其為證各異瘡發焮腫於外者屬少陽三焦相火也謂之癩小紅靨行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹凡顯癩證若自吐瀉者慎勿亂治而多吉謂邪氣上下皆出也大凡瘡疹首尾皆不可下恐妄動而變此謂少陽通表宜和之也當先安裏解毒

次微發之安和解毒須安五臟防風湯是也
如大便不澀者須微發之藥錢氏方中甚多
宜選用之如大過秘宜微利之當歸九棗變
百祥丸是也初知癩疹若使之癩疹併出小
兒難禁是以別生他證也首尾不可下者首
尾上焦尾曰下焦若能吐利猶不可下也便
宜安裏若不吐瀉者先安裏藥三五服如能
食而大便秘結內實者宜疎利之若內虛而
利者宜用裏藥末後壹服調微發之藥服之

大抵安裏之藥多發表之藥少秘則微疎之
令邪氣不壅併而能作審次使兒易禁也身
溫煖者順身涼者逆二者宜多服防風湯和
之安裏若大便實秘能飲食而內實宜當歸
丸微利之
解毒防風湯

防風

兩

地骨皮

兩

黃耆

芍藥

荆芥

枳殼

黍粘子

各半兩

右爲麤末每服四五錢水煎

瘡疹方同

當歸丸

當歸兩半 甘草壹錢 黃連 大黃各二錢半

右先將當歸熬膏子入藥末三味為丸漸

加服之以利為度瘡疹方同

棗變百祥丸治癩疹瘡疹方青 大便秘結

紅牙大戟去骨一兩 青州棗去核三

右用水壹碗同煎至水盡為度去大戟不

用將藥焙乾可和作劑旋丸從少至多以

利為度玉機微義同

桃仁承氣湯治小兒瘡疹結燥百無膏失方見

大方科 傷寒門

生地黃散治癩疹後寒熱往來嗜卧煩燥悶

亂

生地黃 當歸 地骨皮 人參 甘草

赤芍藥

右等分咬咀每服水煎服無時

地黃丸治小兒瘡疹口瘡咽喉腫痛牙疳臭

爛

天門冬 麥門冬 玄參 各三兩 甘草 薄

荷葉 各壹兩 右為細末熬生地黄汁和九櫻桃大每服

壹丸溫蜜水化服

紫草廼癩散小兒癩疹出不快或倒撮毒氣入腹

紫草 葶黃耆 桑白皮 木通 枳殼

白木 各等分

右為齏末每服三錢水酒各半煮麝香少

許同煎

聖濟總錄

小兒瘡疹

小兒稟受純陽府藏蘊熱自內出外隨氣熏蒸散於榮衛肌肉之間留連肉腠或因飲熱乳或因遇時疫熱氣乘其肌肉嫩弱遂變瘡疹微者其邪在府發為細疹狀如蚊喙所螫點點赤色俗號麩瘡甚者其邪在藏發為豆瘡狀如豌豆根赤頭白穴出膿水俗號抱瘡

皆於未發之時先蒸熱如傷寒狀頭痛而赤
目黃徧身皆熱腰背疼痛小便赤色大便或
溇或澀煩渴引飲甚則譫言其脈浮大洪數
審得其證速宜疎利藏腑然亦須詳審若大
便已利或瀉已出者皆不可疎亦不可泄
發其表則瘡空開泄更增斑爛倉公扁鵲常
用油劑草劑其法最妙大率湯劑之用所以
透肌和裏開通中外使胗毒不痛快致壅閉
去其邪毒乃得痊差然食乳嬰孩與童兒瘡

胗治法不同嬰孩之病唯宜調節乳母令氣
血清和乳汁通利最爲要法若初斷乳小兒
則以湯劑和其陰陽調其榮衛既差之後尤
宜利其藏腑以去餘毒此治瘡胗之大法也
大人小兒瘡胗出護眼法右纔覺患以棉花
少許湯浸了令溫洗兩眼晝夕可三兩度
大人以指搵棉花水點眼內旋以帛子拭
之初用眼卽多痛用三上後卽不覺痛不
計大人小兒或患欲退時眼內有餘熱者

亦宜用此法洗點

治小兒未滿百日患痘槐白皮湯浴方不

槐白皮一兩益母草五兩

右二味以水五升煎至三升去滓浴兒了

更取芸薹菜濃煎汁再浴作芸薹菜與乳

母喫亦佳

治小兒斑瘡豌豆瘡青黛散方

青黛研如粉鐵精漿壹升

右二味將青黛為散臨時斟酌鐵漿調之

一百日兒至二百日兒每服一字匕乳前

服壹歲兒至二歲半錢匕食前午後各壹

服隨兒大小以意加減

治瘡疱將出未能勻徧透肌解毒必勝湯方

惡實不拘多少炒熟

右一味籠擣篩每服二錢匕入荆芥三穗

水壹小盞同煎至六分去滓放溫分作三

服如瘡疹已出後與服亦妙

治小兒瘡疱出不快或黑陷木通湯方

木通

枳殼

去瓤 炒

甘草

炙

紫草

半

右四味等分籠擣篩每二錢匕水八分煎至六分去滓分溫三服

治小兒瘡疹欲出不快四味散方

大鯁

乾者 爲末

獾豬乾血

惡實

甘草

炙等分

右四味爲散三歲以下半錢匕五歲以七錢匕煎赤芍藥酒調下不拘時候日夜

各壹服

治小兒斑瘡毒氣不快敗毒湯方

紫草

板藍根

各半

右一味羅擣篩每二錢匕水八分煎至五分去滓分溫二服

治小兒麩豆瘡欲出渾身壯熱情緒不樂不思飲食四妙湯方

紫草

升麻

糯米

各壹兩

甘草

生一分

右四味麩搗篩每二錢匕水一小盞煎至六分去滓分溫二服日三

治小兒瘡疹出遲發毒散方

地龍法防風

右二味等分擣羅為細散每服壹字匕用酒水各少許調下不拘時候

治小兒瘡豆將出人參湯方

人參壹錢葡萄苗壹分林檎壹枚木猴梨七枚

右四味各剉碎以水兩盞煎至一盞去滓

放冷時時令喫

治小兒瘡胗不出青黛散方

青黛螺兒者不拘多少

右一味研為散每服半錢匕新汲水調服

治小兒瘡胗毒氣出不快及觸犯黑色奪命煎法

煎法

牛李子黑熟者

右一味用八月九月內採不計多少沙盆

內研生絹絞取汁銀石器內慢火熬成煎

盛在瓷器內勿令透風煎杏膠湯化一皂

子大與服如人行二十里更進一服其瘡

自然紅色毒氣便慢杏膠只於七月內收

治小兒瘡子不出煩悶驚悸浮萍丸方

浮萍草陰乾晚蠶沙各壹分白薄荷葉各壹分

右三味搗研為末用薄荷自然汁煮麵糊

和為丸如雞頭大每服一丸薄荷湯化下

不拘時

治癩斑瘡千金散方

石榴葉不拘多少

右一味為散每服一字或半錢匕溫水調

下

治小兒出瘡子不透旋出旋焦者龍腦散方

龍腦 牛黃 丹砂 地龍去土取末麝香

乳香 雄黃各壹錢研鱖鯉甲五片燒灰紫草半兩甘

草生到兩木猴梨五枚切焙

右壹十壹味搗研為散用豬尾上血拌勻

入在竹筒子內用油單封裏線纏定於深

坑子內調稀豬糞浸二七日取出淨洗每

服一皂子大龍腦水化下併三服見効

治小兒瘡疹毒氣不出或出後乾黑色服此

雄黃

通明者研水飛

麝香

用當門子為末各半錢匕

右二味同研細只作壹劑一歲兒作三服

溫酒調下

治小兒瘡子倒陷方

白殭蠶

炒蟬殼去土

右二味各三枚同為麈末水壹盞半煎至

半盞去滓分作二服微熱服立出

治小兒瘡胗倒厥黑色及出不快丁香散方

丁香

鹿肉

乾者各半兩

紫草

壹分

右三味搗為細散每服二錢匕酒壹盞入麝香少許同煎至半盞放冷灌之如人行三二里再服立發紅色

治小兒瘡子黑陷不出黑命散方

豬懸蹄甲

半兩蛇蛻皮

三條

鯪鯉甲

一分

猬皮

鷓翅

對蛤粉分

右六味都入在藏瓶內用塩泥固濟燒一宿研為細散壹二歲每服半錢匕豬尾血溫湯調下不出再服

治小兒瘡子黑色人參丸方

人參壹分
為末

右一味用牛李子汁瓷器內熬成膏和為
丸如豌豆大每服壹丸杏膠湯化下不拘
時

治小兒瘡子黑色及出不快神驗散方

鱖鱉甲火炮黃色全地龍去土炒紫草五枚

右三味擣羅為細散每服半錢匕温酒調
下後用衣蓋卽紅色出

治小兒觸著瘡子毒氣入裏瘡變黑色須臾
不救再甦散方

白礬熬令地龍去土炒
各壹分

右三味研為細散每服半錢匕用獾豬尾
上血一椽耳多同新水少許調下不拘時
○經驗良方右為末每服半錢用獾豬尾
上血如龍眼核次同新水少許調服無時
日三服

治小兒斑豆瘡退熱解躁沖和散方

白藥子 各 甘草 各 雄黃 醋淬

右三味搗研為散每服半錢匕量兒大小

加減蜜湯調下

治小兒斑毒不退南朱散方

赤豆 炒 槐花 炒各 麝香 研少許

右三味搗研為散每服一字匕溫酒調下

量兒大小加減

治小兒出瘡解熱方

甘草 生 鐵粉 研 青黛 研各

右三味搗研為末再研勻鍊蜜和丸如雞頭大每服壹丸熟水化下

治小兒胎毒後減癍痕棟實膏方

棟實 去核炒 槐子 各壹兩

右二味並拍碎川狗脂鵝脂各四兩同於

銅鈔內以文武火煎一二十沸去滓入在

瓷合中候凝塗癍痕日二度

又方 蜆子 活者

右一味以淮水或江水養五日旋取此水

洗手面且漸生肉乃無癩痕

又或腫毛

至令中補藥重兼服日二更

除除肉以文火煎一二小時去乾入水

亦三和煎餅食此能除癩

藥方類聚卷之二百六十四

醫方類聚卷之二百六十四

此三和煎餅食此能除癩

藥方類聚卷之二百六十四