



1092953²

黃疸

脚氣

痿

轉筋

喘逆

咳嗽

肺痿肺癰

虛損

瘵症

邪祟

寒熱

吐血衄血

本草類方丙

本草類方卷之三

黃疸第二十七

脾勞黃疸

鐵砂四兩醋炒七次乾漆燒存性二錢香附三錢平胃散五錢為末蒸餅丸梧子大任湯使下

濕熱黃疸

燈草根四兩酒水各半入瓶內煮半日露一夜溫服○集玄方

女勞黃疸

日晡發熱惡寒小腹急大便澀黑額黑滑石石膏等分研末大麥汁服方寸七日三小便大利愈腹滿

女勞黃疸

黃家日晡發熱而反惡寒膀胱急少腹滿目盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時澀此女勞之病非水也自大勞大熱交接後入水所致腹滿者

本草類方

黃疸

雞泊用礬石燒消石熬黃等分為散以大便粥汁和服方寸七日三服病從大小便去小便黃大便黑是其

婦人黃疸

經水不調房事觸犯所致白礬黃蠟各半兩陳橘皮三錢為末化蠟丸梧子大每服五十丸以滋血湯或調經湯下○濟陰方

穀疸勞疸

穀疸因食而得勞疸因勞而得用龍胆一兩苦參三兩為末牛胆汁和丸梧子大先食以麥飲服五九日三服不愈稍增勞疸加龍胆一兩卮子仁三七枚以猪胆和丸

○刪

女勞黃疸

因大熱大勞交接後入水所致身目俱黃發熱惡寒小腹滿急小便難用膏髮煎治之猪膏半斤亂髮雞子大三枚和煎俟髮消藥成矣分再服病從小便中出也○附

後方

五種黃疸

崔元亮海上方云凡黃有數種傷酒發黃誤食鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕日有赤脈益憔悴或面赤惡心者是也秦苑一大兩刺作兩帖每帖用酒半升浸絞取汁空腹服或利便止就中飲酒人易治黃用得力。貞元廣利方治黃病內外皆黃小便赤心煩口乾者以秦苑三兩牛乳一大升煮取七合分溫再服此方出於許仁則又孫真人方

濕熱黃疸

柴胡一兩甘草三錢半作一劑以水一盃加芒硝六錢
秘寶方
孫尚藥
白茅根一握煎至七分任意時時服盡。

婦人血黃

黃茄子竹刀切陰乾為末每服二錢溫酒調下。摘玄方

本草類方

黃疸卷三

二

穀疸食勞

頭眩心拂鬱不妄而發黃由失飢太食胃氣沖薰所致苦參二兩龍胆一合為末牛胆光糖子大生大麥兩升

酒疸黃疾

服五九日三服。肘後方
心下懊痛是脛滿小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致黃者二兩木蘭一兩為末酒服方寸

黃疸腫疾

黎蘆灰中炮為末水服半錢七小性不過數服效

五種黃病

黃疸穀疸酒疸女疸勞疸也黃汗者乃犬汗出入水所致身體微腫汗出如黃蘗汁用生茅根一把細切以猪肉一斤合作羹食。肘後方

白黃色枯

舌縮恍惚若語亂者死當歸白朮二兩木煎入生薑汁蜜和服。三十六黃方

血證黃腫

緣礬四兩百草霜一升炒麪半升為末沙糖和九梧子大每服三四十九食後薑湯

急黃黃疸

下鄭時舉所傳。又方小麥淘淨一斤皂
礬半斤同炒黃為末黑棗肉半斤搗勻米
醋打糊九梧子大每薑湯下
八九十九日三服。簡便方

及內黃腹結不通川蔓菁子搗末水絞汁
服當得嚏鼻中出黃水及下利則愈以子
壓油每服一盞更佳

熱黃便結

○陳藏器本草拾遺
用蘆菁子搗末水和絞汁服少頃當瀉一
切惡物沙石草髮並出。孟詵食療木草

濕熱發黃

生薑時時周身擦之其黃自退也
一方加茵陳蒿尤妙。傷寒捷法

脾病黃腫

青礬四兩煨成赤珠子當歸四兩酒醱浸
七日焙百草霜三兩為末以浸藥酒打糊

丸梧子大每服五丸至七丸溫水下。月
後黃去立效此方祖傳七世。又方綠礬

四兩百草霜五倍子各一兩木香一錢為
末酒煎飛麩丸如梧子大每空心酒下五

本草類方

黃疸 卷三 三

丸。又方平胃散青礬二兩為末醋糊丸
米飲下或加烏沉湯四兩酒糊亦可。潔

古活法
機要

黃疸疾

漆草一把搗汁和酒服不
過三五次即愈。摘玄方

酒黃水腫

黃腫積痛青礬半斤醋一大盞和勻瓦盆
內煨乾為度平胃散烏藥順氣散各半兩

為末醋煮糊丸梧子大每酒或姜湯下二
三十九不思口加錫灰。趙原揚真人濟

急方

黃疸如金

疇葑小便赤用生蔓菁子末煎水
服方寸匕日三服。孫真人食忌

食勞黃病

身日俱黃青礬鍋內安炭服赤米醋拌為
末棗肉和丸梧子大每服二三十丸食後

薑湯下。
救急方

遍身黃疸 茵陳蒿一把 同生薑一塊 搗爛于胸前 四肢日擦之

黃疸內熱 錢丁末酒服三

熱黃疸疾 扁竹搗汁頓服一升 多爭者日再服之 藥性論

急黃病 苦瓠一枚 開孔以水煮之 汁滴入鼻中去黃水

男子酒疸 茵陳蒿四根 卮子七個 大 殼搗爛以百沸白酒一斗 煮取之 秘

茵陳羹 除大熱黃疸傷寒頭痛風熱 煮汁小便 也方

五般急黃 山豆根末水服二錢 若帶蠱氣以酒下

本草類方 黃疸 卷三 四

酒疸尿黃 發黃心懊痛足脛 燒末水服半錢 日一服

火黃身熱 午後却涼身有赤熱 烙手足心背心百 草吳藍一兩木香黃連一

黑黃急病 黑黃面黑黃身 脈入口者死 宜 門心俞用生鬼

傷寒黃疸 乾者為末水服 表熱者宜 經聚美酒

黃疸喘滿 小便白 千金

心

心

心

心

心

心

酒疸脾黃

木鱉子磨醋服一二盞見利效。劉長春濟急方

黃疸如金

蕙苕根煎湯瀝服

黑疸危疾

瓜蒌根一斤搗汁六合頓服隨有黃水從小便出如不出再服。楊起簡便方

酒黃疸疾

散煎卧時服五更瀉下黃物立可名逐黃散。普

散。普

黃疸變黑

醫所不能治用土瓜根汁平旦溫服一

癰黃疸疾

或黃汗染衣涕唾皆黃用好黃蒸二升每夜以水二升浸微暖於銅器中平旦絞汁

牛升極效

腎黃如金

○必效方 萹芎子一合細研水一盞煎五分服。外臺秘要

本草類方

卷三 黃疸

五

食積黃疸

絲瓜連子燒存性為末每服二錢因麪得病麪湯下因酒得病溫酒下連進數服愈

易簡方

黃汗染衣

○衛生 涕唾皆黃用蔓菁子搗末平旦以井華水服一匙日再服加至兩匙以知為度每夜

以帛浸小便逐日看之漸白則瘥不過服五升已來也。外臺秘要

黃疸腫滿

苦壺盧瓢如大棗許以童子小便二合浸之一時取兩酸棗大納兩鼻中深吸氣待

黃水出良。又方用瓢瓢熬黃為末每服半錢日一服十日愈然有吐者當詳之。

傷寒

脾勞黃疸

類要 如聖丸用草血竭羊躑草桔梗蒼朮各一兩甘草五錢為末先以陳醋二盞入鍋下

皂礬四兩煎熬良久下藥末再入白麪不拘多少和成一塊丸如小豆大每服三五

遍身如金

十九空腹醋湯下一日二服數日面色復舊也。乾申秘製。瓜蒂四十九枚丁香四十九枚坩鍋內燒存性為末每用一字吹鼻取出黃水亦可。○經牙追涎。

酒疸發斑

赤黑黃色心下懊痛足腫腫滿小便黃由大醉當風入水所致用木蘭皮一兩黃芪二兩為末酒服方寸。

急黃喘息

心堅硬欲得水喫者瓜蒂二小合赤小豆一合研末暖漿水五合服方寸七。一炊久當吐不吐再服吹鼻。取水亦可。○傷寒類要。

熱病發黃

瓜蒂為末以大豆許吹鼻中輕則半日重則一日流取黃水乃愈。千金翼。

黃疸瘡黃

並取瓜蒂赤小豆丁香各七枚為末吹豆許入鼻少時黃水流隔日一用瘡乃止。

本草類方

○孟詵。食療。氣喘胸滿用不蛀皂莢去皮子醋塗炙焦為末一錢巴豆七枚去油膜以淡醋研好。墨和丸麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下。日三服隔二日增一丸以愈為度。○經

方驗

時行發黃

竹葉五升切小麥七升石膏三兩水一斗半煮取七升細服盡劑愈。肘後方。

房勞黃病

體重不眠眼赤如珠心下塊起若瘕十死一生宜烙舌下炙心俞關元二七狀以婦人內衣燒灰酒服二錢。○三十六黃方。

黃疸初起

柳枝煮濃汁半升。頓服。○外臺秘要。

酒疸諸疸。用田螺將水養數日去泥取出生搗爛入好酒內用布帛濾過將汁飲之日三服自

卷三

六

效。
壽域。

黃疸吐血

病後身面俱黃吐血成盆諸藥不效用螺
十個水漂去泥搗爛露一夜五更取清服
二三次血止即愈一人病此
用之經驗。小山怪證方

濕熱黃疸

蟹燒存性研末酒糊丸如梧桐子大每
服五十九白湯下日服二次。集簡方

三十六黃

急救方用鷄子一顆連殼燒灰研酢一合
和之溫服鼻中蟲出為效身體極黃者不
過三枚神效
外臺秘要

穀疸食黃

用牛胆汁一枚苦參三兩龍胆草一兩為
末和少蜜丸梧子大每姜湯下五十九
用半斤大雄鷄背上破開不去毛帶熱血
合患胸前冷則換之日換數鷄拔去積毒
即愈此鷄有毒人不可食犬
亦不食也。唐瑤經驗方

黃疸困篤

亦不食也。唐瑤經驗方

本草類方

黃疸
卷三

七

濕熱黃病

黃牛糞日乾為末麪糊丸梧子大
每食前白湯下七十九。簡便方

五種疸疾

黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃蘗
汁用豬脂一斤溫熱服日三當利乃愈。
別後方

走精黃病

面目俱黃多睡舌紫甚面裂若瓜甲黑者
死用政半兩牛脂一兩煎過綿裹路舌去
黑皮一重濃煎政湯
飲之。三十六黃方

酒積黃腫

五靈脂末一兩麝香少許飯丸小
豆大每米飲下一丸。普濟方

面目黃疸

雞矢白小豆秫米各二分為末分作
三服水下當有黃汁出也。肘後方

黃疸酒疸

小螺螄養去泥土日
煮食飲汁有效。永類
編

黃疸尿赤

亂髮灰水服一錢日
三次秘方也。肘後

女勞黃疸

氣短聲沉用女人月經和血衣燒灰酒服
方寸匕一日再服三日瘥○孟詵必效方

本草類方

黃疸
卷三

八

本草類方卷之三

脚氣第二十八

寒濕脚氣

磚燒紅以陳吳米泔水淬之乘熱布包三塊用膝夾住綿被覆之三五次愈。扶壽

脚腿紅腫

熱如火灸俗云赤遊風用鐵鏽水釜解之。惠濟方

脚氣衝心

煎沸浸洗。千金方

風氣脚弱

孔公孽二升石斛五兩酒二斗浸服。肘後方

脚氣腫痛

和塗之效。醫方摘要

脚氣痛楚

無名異末化牛皮膠調塗之頻換。衛生易簡方

遠行足趺

水調半夏末塗之一宿即沒也。集簡方

本草類方

脚氣卷三

風冷脚氣

白礬石煨二斤酒三斗漬三日稍稍飲之。肘後方

腫從脚起

鼓汁飲之以滓傳之。肘後方

風毒脚氣

痺弱硫黃末三兩鍾乳五升煮沸入水煎至三升每服三合。又法鍾乳三升煎一升半以五合調硫黃末一兩服厚蓋取汗

勿見風未汗再服將息調理數日更服北

人用此多效亦可煎為丸服。肘後方

脚氣疼痛

湯夜用鹽擦腿膝至足甲淹少時以熱湯泡洗有一人病此曾用驗。急救方

風濕脚氣

石亭脂生用一兩川烏頭生一兩無名異二兩為末葱白自然汁和丸梧子大每服一錢空心淡茶生葱吞

下日一服。端竹堂方

一切脚氣

鹽三升蒸熱分裹近壁以脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸之尤良夜夜用之。食

療本

脚縫出水

好黃丹入花藥石末摻之。談野翁試效方

脚心腫痛

因久行久立致者以水和蚯蚓糞厚傅一次即愈。永顏鈴方

脚樅濕爛

荆芥葉搗傅之。簡便方

雞眼肉刺

枯礬黃丹朴硝等分爲末搽之次日浴二三次即愈。多能鄙事

女人紫足

脫骨湯用杏仁一錢桑白皮四錢水五盞煎三盞入朴硝五錢乳香一錢封口煎化置足于上先重後洗三日一作十餘次後軟若束綿也。閩閩事宜

病後足腫

但節食以養胃氣外用狗脊煎湯漬洗。吳綬蘊要

瀰脚生瘡

荆芥燒灰葱汁調傅先以甘草湯洗之。簡玄方

本草類方

脚氣

十

脚氣腫痛

白芍藥六兩甘草一兩爲末白湯點服。事林廣記

脚氣欲吐

蘇恭曰凡患脚氣人每旦飽食午後少食日晚不食若飢可食或粥若覺不消欲致霍亂者即以高良姜一兩水三升煮一升頓服書即消若辛無者以母姜一兩代之

酒煎服雖不及良姜亦甚效也

風濕脚氣

蘇子高良姜橘皮等分蜜九梧子大每服十丸空心酒下。藥性論

寒濕脚氣

腿膝疼痛行步無力葫蘆巴酒浸一宿焙破故紙炒香各四兩爲末以木瓜切頂去

瓢安藥在內合滿用頂合住簽定爛蒸搗九梧子大每服七十九空心溫酒下。楊

脚氣脛腫

骨疼葫蘆根研碎和酒醋共三分同下合蒸熟封裏腫上一二日即消亦治不仁。藏方

氏家

濕滯足腫

早輕晚重用草烏頭一兩以生姜一兩同研交感一宿各焙乾為末酒糊丸梧子大每服五十九酒下。艾元英如宜方

脚氣冲心

吳茱萸生姜搗汁飲甚良。孟詵方

風毒脚弱

痺滿上氣田舍貧家用此最良拔莫洗劑一斛以水三斛煮取九斗漬麴去滓取一斛漬飲如常釀酒任

遠行脚腫

草烏細辛防風等分為末搽鞋底內如草鞋以水微濕搽之川之可行千里甚妙。

經

脚氣掣痛

或勝間有核生草烏頭大黃木鱉子作末姜汁煎茶調貼之。又法草烏一味為末搗貼之。永類方

本草類方

脚氣

五

脚氣衝心

煩悶不識人以大豆一升水三升濃煮汁服未定再服。廣利方

腰脚疼痛

新胡麻一升熬香杵末日服一小升服至一斗永差溫酒蜜湯姜汁皆可下。千金

丈夫脚冷

不隨不能行者用醇酒三斗水三斗入甕中灰火溫之漬脚至膝常着灰火勿令冷

遠行脚趺

成泡者水調生麩塗之一夜即平。海上

脚氣走痛

羅荷煎湯洗之仍以羅荷晒乾為末鋪襪內。聖濟總錄

脚氣作痛

筋骨引痛驚驚藤即金銀花為末每服二錢熱酒調下。衛生易簡方

脚氣浮腫

心腹脹滿小便澀少馬齒草和少梗米醬汁煮食之。食醫心鏡

脚指濕爛

用蚌蛤粉乾擦之。壽域

脚氣衝心

黍釀一石煮汁入椒目一升更煎十沸漬脚三四度愈。外臺秘要

脚極濕爛

茶葉嚼爛傳之有效。攝生方

脚氣入腹

脹悶喘急用威靈仙末每服二錢酒下痛減一分則藥亦減一分。簡便方

脚氣腫痛

桃花一宿即乾為末每溫酒細呷之一宿即乾。外臺秘要

趾間雞眼

割破出血以血見懸草搗傳之。乾坤秘韞

風毒脚氣

搃之沒指者牽牛子搗末蜜丸小豆大每服五丸生姜湯下取小便利乃止亦可吞

之其子黑色正如核小核。用後方

脚氣腫渴

大麻仁熬香水研取一升再入水三升煮一升入赤小豆一升煮熟食豆飲汁。外

臺秘要

本草類方

脚氣卷三

三

夏月趾腫

不能行走者九月收茄根懸簷下逐日煎湯洗之。簡便

脚氣作痛

白芷芥子等分為末姜汁和塗之效。醫方摘要

脚氣腫急

用木瓜切片囊盛踏之。廣德顧安中患脚氣筋急腫因附舟以足闊一袋上漸

覺不痛乃問舟子袋中何物曰宣州木瓜也及歸製木瓜袋用之頓愈。名醫錄

脚氣張滿

非冷非熱或老人病人病此用檳榔仁為末以檳榔殼煎汁或茶飲蘇湯或豉汁調

服二錢甚利。外臺秘要

脚筋攣

用木瓜數枚以酒水各半煮爛搗膏乘熱貼于痛處以帛裹之冷即換日三五度。

食療本草

寒濕脚氣

川椒二三升疎布囊盛之日以踏脚貴人所用。大全良方

脚膝浮腫

荷葉心葉本等分
湯淋洗之。永類

脚氣衝心

悶亂不識人用
服空心暖小便
服溫酒同
服。廣利

脚氣衝心

或心下結硬腹
五兩去皮尖熬
日食前米飲下
二十九。食療

腰脚風痛

不能履地皂莢子
酥熬香爲末蜜充
子酸棗仁湯下三
十九。千金方

脚氣掣痛

鄉村無藥初發時
布揩去土堯瓦刮
心溫服清泄卽愈
者以烏藥同雞子
瓦礫中煮一日去
雞

本草類方

脚氣
卷三

齒

脚氣壅痛

子切片蘸食以湯
下甚效。永類
以沙牛屎一盞磨
空心暖服。梅脚
腫從脚起

足趾雞眼

作痛作瘡地骨皮
傳之次日卽愈。閩
血竭乳香等分同
藥在內以麩厚裹
子大每溫酒服三
丸忌生冷。奇效
方

新久脚氣

子大每溫酒服三
丸忌生冷。奇效
方

脚指雞眼

先挑破取黑白蠶
縛之數用自愈也。
內穿之。摘玄

脚多汗濕

楊花着鞋及襪

脚氣腫痛

蘇方木鷺鷥藤等分
一斗蒸一斗五升
先熏後洗。普濟
方

脚氣浮腫

心腹滿大小便不通氣急喘息者郁李仁十二分搗爛水研絞汁苡薏搗如粟大一合同煮粥食之
。韋宙獨行方

男婦脚氣

骨節皮膚腫濕疼痛服此進飲食健氣力
不忘事名五加皮九四兩酒浸遠志去心
四兩酒浸並春秋三日夏二日冬四日
乾為末以浸酒為糊九梧子大每服四五

十九空心溫酒下藥酒壞別用
酒為糊。薩謙齋瑞竹堂方

行路足腫

破石墊傷者草鞋浸尿銜內半日以磚一
塊燒紅置鞋于上將足踏之令熱氣入皮
裏即消。
救急方

脚氣濕瘡

極癢有蟲烏桕根為末傅之
少時有涎出良。摘玄方

足趾肉刺

無食子三枚肥皂莢一挺燒存性
為末醋和傅之立效。奇效方

本草類方

脚氣
卷三

五

水氣脚氣

桑條二兩炒香以水一升煎二合每
日空心服之亦無禁忌。聖濟總錄

脚氣腫痛

皂莢赤小豆為末酒醋
調貼腫處。承類方

脚氣風痺

松葉酒治十二風痺不能行服更生散四
劑及衆療不得力服此一劑更能行遠不
過兩劑松葉六十斤細剉以水四石煮取

四斗九升以米五斗釀如常法別煮松葉
汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄
飲之取醉得此酒力者甚眾。千金方

寒濕脚氣

牛皮膠一塊細切麩炒成珠研末
每服一錢酒下其痛立止。萬氏
魚取汁加蒼耳蒼朮尋風藤各半斤煎至

寒濕脚氣

七升去滓以盆盛熏蒸待
濕校洗神效。乾坤生意

脚氣攻注

用生大田螺搗爛傅兩股上便覺冷趁至
足而安又可傅丹田利小便董守約曾用

石效。
押史。

尸脚拆裂

焯膠着布上烘貼之。千金方

陷甲入肉

痛苦用蛇皮一具燒灰雄黃一彈丸同研末先以溫漿洗瘡針破貼之。初虞世方

代指作痛

崔氏云代指乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺冷水中三度卽以羊膽塗之立愈甚效。

外臺方

尸脚拆裂

無冬夏者雞屎煮湯漬半日取瘡乃止。千金

脚底木硬

牛皮膠生姜汁化開調南星末塗上烘物熨之

脚氣脹滿

尿澀取烏犢牛尿一升一日分服消乃止。楊炎南方方

下注脚瘡

鹿角燒存性入輕粉同研油調塗之。集要方

本草類方

御氣

共

脚氣疼痛

羊角一副燒過爲末熱酒調塗以帛裹之取汗永不發也

足指肉刺

刺破以新酒醉和羊腦塗之一合愈。古今錄驗

雞眼作痛

剝去皮以罇雞湯洗之。簡便方

脚氣痺弱

羊乳五升或黃三兩煎取三升每服三合兩服取汗尤良。肘后方

風毒脚氣

以銅器取烏犢牛尿三升飲之小便利則消。肘后

風毒脚氣

豬肝作生膾食之取利

腰痛脚氣

木瓜湯治腰痛脚氣羊肉一脚草菓五枚梗米二升回回豆卽胡豆半升木瓜二斤收汁入砂糖四兩監

少許煮肉食之。正夏

脚跟腫痛

不能着地用黃牛屎入鹽炒熱罨之。王永輔惠濟方。

腳氣風痺

五緩筋急用熊肉半斤切入豉汁中和葱姜椒鹽作臘脂空腹食之。並食醫心鏡

腳氣煩懣

用烏雄雞一隻治如食法入米作羹食。養老書。

消除腳氣

每寅日割手足甲少侵肉去脚氣。外臺秘要。

腳氣成漏

跟有一孔深半寸許其痛異常用人中白煨有水出滴入瘡口。戴原禮證治要訣

老人腳氣

豬肚一枚洗淨切作片以水洗布絞乾和蒜椒醬醋五味常食亦治熱勞。養老方

老人腳氣

日作一服或用豬腎一對以醋蒜五味治食之

○奉親養老方

嵌甲疼痛

血竭末傅之。醫林集要。

本草類方

脚氣卷三

嵌甲

胡桃皮燒灰貼

嵌甲作痛

不能行履者濃煎陳皮湯浸良久甲肉自離輕手剪去以虎骨末傅之即安。醫林

集要

本草類方卷三

痿第二十九

風虛冷痺

諸陽不足及腎虛耳聾益精保神白石英
三兩坩鍋內火煨酒淬三次入瓶中密封
勿洩氣每早溫服一鍾以少飯壓之。一
法磁石火煨醋淬五次白石英各五兩絹
袋盛浸一升酒中五六日溫

風痺暖手

服將盡更添酒。千金翼
鐵砂四兩礶砂三錢黑脚白礬六錢研末
以熱醋或水拌濕油紙裏置袋內任意執
之冷再拌

○聖濟錄

風濕痺痛

手足身體收攝不遂肢節疼痛言語蹇澀
躑躅花酒拌蒸一炊久曬乾為末每以牛

乳一合酒二合調
服五分。聖惠方

本草類方

痿卷三

丈

足蹇筋急

桂末白酒和塗之一日
一上。皇甫謐甲乙經

本草類方卷三

痿第二十九

風虛冷痺 諸陽不足及腎虛耳聾益精保神白石英 三兩坩鍋內火煨酒淬三次入瓶中密封 勿洩氣每早溫服一鍾以少飯壓之。一 法磁石火煨醋淬五次白石英各五兩絹 袋盛浸一升酒中五六日溫 服將盡更添酒。千金翼 鐵砂四兩礶砂三錢黑脚白礬六錢研末 以熱醋或水拌濕油紙裏置袋內任意執 之冷再拌 ○聖濟錄 風濕痺痛 手足身體收攝不遂肢節疼痛言語蹇澀 躑躅花酒拌蒸一炊久曬乾為末每以牛 乳一合酒二合調 服五分。聖惠方 本草類方 痿卷三 丈

本草類方卷三

轉筋第三十

轉筋入腹 釜底墨末和酒服一錢。用後方。

霍亂轉筋 腹痛。木香末一錢。木瓜汁一盞。入熱酒調服。聖濟總錄。

肝虛轉筋 肝臟氣虛。風冷搏于筋。遍體轉筋。入腹不可忍。熱湯三斗。入鹽半斤。稍熱漬之。聖

惠方。

霍亂轉筋 藜葉一升。水三升。煮取汁二升。入香豉一升。更煮一升。半分三服。藥性論。

肝虛轉筋 吐瀉赤藜莖葉切。三合。水一盞。酒三合。煎至四合。分二服。聖惠方。

霍亂轉筋 入腹。殺人以小蒜鹽各一兩。擣傳臍中。灸七壯。立止。聖濟錄。

本草類方 轉筋卷三 尤

霍亂轉筋 白扁豆為末。醋和服。普濟方。

脚肚轉筋 大蒜繫足心。令熱。即安。仍以大蒜水食一瓣。躡生方。

霍亂轉筋 以煖物裹脚後。以柏木片煮湯淋之。經驗方。

足上轉筋 以故綿浸醋中。甑蒸熱。裹之。冷即易。勿停取。瘥止。外臺。

霍亂轉筋 入腹。欲死。生姜三兩。酒一升。煮三兩。沸服。仍以姜膏貼痛處。外臺秘要。

霍亂轉筋 木瓜一兩。酒一升。煎服。不飲酒者。煮湯服。仍煎湯浸青布。裹其足。聖惠。

轉筋學急 松節一兩。剉如米。大乳香一錢。銀石器。慢火炒焦。存一二分。性出火毒。研末。每服一

二錢。熱木瓜酒調下。一應筋病皆治之。孫用和秘寶方。

轉筋入腹 茱萸炒一兩。酒二盞。煎一盞。分二服。得下即安。聖濟錄。

霍亂轉筋 腹痛以苦酒煮絮裹之。聖惠方

霍亂轉筋 入腹無可奈何者以酢煮青布搽之冷則易。千金方

霍亂轉筋 取噓即安。深師方

脚上轉筋 對禹錫續傳信方用蠟半斤銷之塗舊絹帛上隨患夫小調袂乘熱纏脚即當脚心

便着襪裏之冷即易 仍貼兩手心。圖經

霍亂轉筋 故麻鞋底燒赤投酒中煮取汁服。陳藏器本草

霍亂轉筋 煎汁淋之。聖惠方

霍亂轉筋 心腹脹滿未得吐下卮子二七枚燒研熱酒服之立愈。肘後方

脚肚轉筋 蠅咬燒猪脂和傅。肘後

本草類方

卷三

辛

霍亂轉筋 入腹煩悶桑葉一握煎飲一二服立定。聖惠方

霍亂轉筋 入腹痛用敗小梳一枚燒灰酒服永瘥。千金方

霍亂轉筋 垂死者取蒲席一握切漿水一盞煮汁溫服。聖惠方

霍亂轉筋 入腹痛車轂中脂塗是心。千金方

轉筋入腹 其人臂脚直其脉上下微弦用雞矢爲天水六合和方寸匕溫服愈。張仲景方

霍亂轉筋 青銅錢四十九枚木瓜一兩烏梅炒五枚水二盞煎分溫服。聖濟錄

霍亂轉筋 身冷心下微溫者硃砂研二兩蠟三兩和丸着火籠中熏之周圍厚覆勿令烟洩兼

淋下着火令腹微暖良久 膏汗出而甦。外臺秘要

霍亂轉筋 以器盛湯熨之仍令溺器使足底熱微冷則易。嘉祐本草

霍亂轉筋

欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍
中灸鹽上七壯卽甦。救急方

本草類方

轉筋
卷三

五

本草類方卷三

喘逆第三十一

一切艱艱 處州磁器為末發時用二錢以手拈點津液蘸藥點舌下嚥之即效。普濟方

傷水喘急 因年少飲冷水驚恐所致者古文錢七枚洗淨白梅七個水一鍾同浸三宿空心一呷良久得吐效。仁存方

肺虛喘急 連年不息生鍾乳粉光明者五錢蠟三兩化和飯甑內蒸熟研丸梧子大每溫水下

聖濟錄 一丸

熱盛喘嗽 石膏二兩甘草炙半兩為末每服三錢生姜蜜調下。普濟方

痰熱喘嗽 痰湧如泉石膏寒水石各五錢為末每人參湯服三錢。保命集

本草類方 喘逆 卷三 五

定喘下氣 補心腎神祕散用白仙茅半兩米泔浸三宿晒炒開參二錢半阿膠一兩半炒雞臍脰一兩燒為末每服二錢糯

痰氣齁喘 馬蹄香焙研每服二三錢正發時淡醋調下少頃吐出痰涎為驗。普濟方

肺熱氣喘 生茅根一握咬咀水二盞煎一盞食後溫服其者三服止名如神湯。聖惠方

痰嗽喘急 枯梗一兩半為末用童子小便半升煎四合去滓溫服。簡要濟衆方

欬逆短氣 紫蘇葶藶二錢人參一錢水一鍾煎服。普濟方

上氣欬逆 紫蘇葶藶入水研濾汁同粳米煮粥食。簡便方

陽虛氣喘 兩分作四帖每帖以生薑十片流水二盞煎一盞食遠溫服。濟生方

煎一盞食遠溫服。濟生方

煎一盞食遠溫服。濟生方

煎一盞食遠溫服。濟生方

喘急欲絕

上氣鳴息者人參末湯服方寸七日五六服效。肘後方

肺濕痰喘

甜葶藶炒為末。肉丸服。摘玄方

肺壅喘急

不得卧葶藶人棗瀉肺湯主之葶藶炒黃。搗末蜜丸彈丸大每用大棗二十枚水三

升煎取二升乃入葶藶一九更煎取一升。頓服亦主支飲不得息。仲景金匱玉函

喘嗽失音

暴傷寒冷喘嗽失音取芫花連根一虎口。切暴乾令病人以薦自裹脊令灰飛揚入

喘急欲絕

其七孔中當眼淚出口鼻皆辣待芫。根盡乃止其病即愈。古今錄驗

胸喘咳嗽

菴麻子去殼炒熟揀甜者食之須多服。見效終身不可食炒豆。衛生易簡方

風痰喘急

十縷湯用半夏湯洗七個甘草炙皂莢炒。各一錢姜二片水一盞煎七分溫服。和

濟局方

本草類方

喘逆卷三

三五

痰喘氣急

蘇蘇二箇明礬一棗大同燒存性研末。以熟蘿蔔蘸食之藥盡病除。普濟方

失血喘急

吐血下血崩中帶下喘急痰嘔中滿宿瘀。用半夏搗扁以姜汁和麩包煨黃研末米

糊丸梧子大每服三十。九白湯下。直指方

喘息欲絕

菲汁飲。升效

風痰喘逆

凡元欲吐眩暈欲倒半夏一兩雄黃三錢。為末姜汁浸蒸餅丸梧子大每服三十九

姜湯下已吐者加。棊榔。活法機要

忽喘悶絕

絕不能語言瀉流吐逆牙齒動搖氣出轉大。半兩水二盞煎一盞熱。服可安。危氏得效方

肺氣喘急

馬兜鈴二兩去殼及膜酥半兩入盃內。勻慢火炒乾甘草炙一兩為末每服一錢

水一盞煎六分溫呷
或噲之○簡要濟衆

痰氣喘急

生山藥搗爛半枕入甘蔗汁半碗
和勻頓熱飲之立止○簡便單方

上氣喘急

杏仁桃仁各半兩去皮尖炒研用水調上
麩和丸梧子大每服十九度蜜湯下微利
為度○聖

濟總錄

痰氣喘息

蘿藦子同皂莢燒存性等分為末姜汁和
煉蜜丸梧子大每服五七十九白湯下○

簡便

藹喘痰促

遇厚味即發者蘿藦子淘淨蒸熟晒研姜
汁浸蒸餾丸綠豆大每服三十九以日津

嚥下日三服各清
金丸○醫學集成

高年氣喘

蘿藦子炒研為末蜜丸梧子大每
服五十九白湯下○濟生秘覽

本草類方

喘逆
卷二

寒痰藹喘

野園葵研汁和酒
服即佳○集簡方

藹喘痰積

凡天雨便發坐臥不得飲食不進乃肺窻
久積冷痰遇陰氣觸動則發也用此一服

即愈服至七八次即出惡痰數升藥性亦
隨而出即斷根矣用江西淡豆豉一兩蒸

搗如泥入研霜末一錢枯白礬三錢九綠
豆大每用冷茶冷水送下七九甚者九九

小兒五九即高枕仰卧
忌食熱物等○皆效方

久患肺氣

喘急至欬甚者不過二劑永瘥杏仁去皮
尖二兩童子小便浸一日一換夏月三四

換滿半月取出焙乾研細每服一棗大薄
荷一葉蜜一雞子大水一鍾煎七分食後

溫服忌腥物
○勝金方

痰嗽并喘

五味子白礬等分為末每服三錢以生豬
肺炙熟蘸木細嚼白湯下漢陽庫兵黃六

傷寒喘急

病此百藥不效於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發○普濟

哮喘痰嗽

防已人參等分爲末桑白湯服二錢不拘老小

鴨掌散用銀杏一箇麻黃二錢半甘草炙二錢水一鍾半煎入分四時服○又金陵

其人以此起家其方用白果二十一箇炒黃麻黃三錢蘇子二錢款冬花法製半夏

桑白皮蜜炙各二錢杏仁去皮尖黃芩微炒各一錢半甘草一錢水三鍾煎二鍾

痰喘咳嗽

時珍發明洪邁云邁有痰疾因晚對上遣使諭令以胡桃肉三顆生薑三片四時嚼服卽飲湯兩三呷又再嚼桃姜如前數卽靜卧必愈邁還玉堂如旨服之及旦而痰消嗽止又溧陽洪輯幼子病痰喘凡五晝夜不乳食醫以危告其妻夜夢觀音授方

本草類方

喘逆卷二

五

令服人參胡桃湯輯急取新羅人參寸許胡桃肉一枚煎湯一蠟殼許灌之喘志定明日以湯剝去胡桃皮用之喘復作仍連皮用信宿而瘳此方不載書冊蓋人參定喘胡桃連皮能斂肺故也夫洪氏夷堅耶

止言胡桃治痰嗽能斂肺蓋不知其爲命門三焦之藥命門既通則三焦利故

上通于肺而虛寒喘嗽者宜之耳

喘嗽齁啞

不拘大人小兒用糯米泔少許磨茶子滴入鼻中令吸入口服之口咬竹筒少煩涎出如線不過兩三次絕

齁喘痰氣

根屢驗○經驗良方

上氣喘急

苦丁香三箇爲末水調服吐痰卽止○朱氏集驗方

杏仁桃仁各半兩去皮尖炒研用水調生麪和九梧子大每服十九姜蜜湯下微利爲度○聖濟總錄

上氣喘嗽

煩熱食即吐逆用砂糖姜汁等分相和慢煎二十沸每嚥半匙取效

上氣喘急

時有欬嗽茶子百合等分爲末蜜丸梧子大每服七丸新汲水下○聖惠方

吐血喘欬

用青殼羊角二枚炙焦桂末二兩並爲末每服方寸匕糯米飲下日三服○周憲王

普濟方

寒嗽痰喘

白果七個煨熟以熟艾作七丸每果入艾一丸紙包再煨香去艾吃○秘韞方

痰喘氣急

梨剉空納小黑豆令滿留蓋合仕繫定糠火煨熟鴉作餅每日食之至效○摘玄方

老人喘嗽

氣促睡卧不得服此立定胡桃肉去皮杏仁去皮尖生薑各一兩研膏入辣蜜少許和丸彈子大每卧時嚼一

和生薑湯下○普濟方

鹽麪痰喘

柏樹皮去粗搗汁和飛麪作餅烙熟早晨與兒喫三四個待吐下鹽涎乃住如不行

本草類方

喘逆卷三

三

熟茶催之

上氣喘急

○摘玄方 服神效○普濟方

寒痰氣喘

青橘皮一片展開入剛子一個蒨紫定火上燒存性研末姜汁和酒一鍾呷服天台

李翰林用此治莫秀才到口

麪喘不止

輸白皮陰乾焙爲末每旦夜用水五合末二錢煎如膠服○食療本草

喘嗽面浮

并四肢浮者蛤蚧一雌一雄頭尾全者清酒和蜜塗之炙熟紫團人參似人形者半兩爲末化蠟四兩和作六餅每煮糯米薄

粥一盞投一餅攪化細細呷之○普濟

風痰喘嗽

夜不能卧白僵蠶炒研好茶末各一兩爲末每用五錢卧時泡沸湯服○瑞竹堂方

痰喘欬嗽

末以米飲調服一錢日三服○急救方

年深哮喘

雞子畧敲損浸尿缸中三四日煮食能去風痰○集成方

肺風喘促

涎潮眼窠用透明阿膠切炒以紫蘇烏梅肉焙研等分水煎服之○直指

水氣喘促

小便器澀用沙牛尿一斗訶黎皮末半觔先以銅器熬尿至三升入末熬至可丸九梧

火欬喘急

當下水及惡物為效○普濟方
豬蹄甲四十九枚以瓶子盛之安天南星一枚蓋之鹽泥固濟煨烟出為度取出入

勦哮痰欬

錢食後煎桑白皮湯下名黑金散○總錄
一錢○葉氏摘要
貓糞燒灰砂糖湯服

定喘化痰

用豬蹄甲四十九個洗淨每甲納半夏白
礬各一字罐盛固濟煨赤為末入麝香一
錢七每用糯米飲下

本草類方

哮喘逆卷三

三

肺氣勦喘

豬爪甲二枚燒灰研入麝香
一分同研茶服○普濟方

痰勦發喘

貓頭骨燒灰酒服三
錢便止○醫學正傳

遠年肺氣

豬脬一具賦粉一兩磁瓶固濟上留
小窳煨細盡為末每服二錢白水下

痰喘氣急

生山藥搗爛半碗入甘蔗汁半碗
和勻頓熱服之立效○簡便單方

痰喘欬嗽

不能睡卧好茶末一兩白僵蠶一兩為末
放盤內蓋定傾沸湯一小盞臨卧再添湯
點服○瑞

竹堂方

痰喘欬嗽

長皂莢三條去皮子一莢入巴豆十粒一
莢入半夏十粒一莢入杏仁十粒用姜汁

制杏仁麻油制巴豆蜜制半夏一處火炙
黃色為末每用一字安手心臨卧以姜汁
調之喫下神效○
余居士選奇方

欬嗽氣喘

用鯉魚一頭去鱗紙裏炮熟去刺研末同糯米煮粥空心服。心鏡

上氣欬逆

砂仁洗淨炒研生薑連皮等分搗爛熱酒食遠泡服。簡便方

上氣喘急

蓬莪茂五錢酒一盞半煎入分服。保生方

久嗽痰喘

蘿蔔子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅丸麻子大每服三五丸時時津嚥。醫學集成

欬逆上氣

唾濁不得卧皂莢丸用皂莢炙去皮子研末蜜丸梧子大每服一九棗膏湯下日三

夜一服。張仲景方

咳逆上氣

不拘大人小兒以杏仁三升去皮尖炒黃研膏入蜜一升杵熟每食前含之。黠汁。

千金方

本草類方

喘逆卷三

三

欬嗽上氣

大杏仁一升杵熟每食前含之。黠汁。

本草類方卷三

咳嗽第三十二

肺氣咳嗽

猪胆一具苦酒煮食
不過二服。肘后方

卒暴咳嗽

白善上粉白礬一兩為末姜汁糊丸梧
子大臨卧姜湯服一十九。普濟方

卒然咳嗽

釜月土一分或七分搗丸梧
子大每飲下四十九。肘后方

老嗽不止

故茅屋上塵年久着烟火者和石黃欬冬
花婦人月經衣帶為末水和塗茅上待乾
入竹筒中燒烟吸嚙無
不瘥也。陳藏器本草

卒然咳嗽

爐中鉛屑桂心皂莢等分為末蜜丸如
梧子大每飲下十五丸忌葱。備急方

咳嗽熏法

熏黃一兩以蠟紙調捲作筒十枚燒烟吸
嚙取吐止一日一熏惟食白粥七日後以

本草類方

卷三

完

羊肉羹補之

三十年啞嗽

熏黃木香葇芎子等分為末羊脂塗青紙
上以未鋪之竹筒燒烟吸之。崔氏方

肺勞咳嗽

雌黃一兩入瓦合內不固濟坐地上以火
焙之厚二寸以炭一斤簇定頂火煨三分

去一退火出毒為末糖酥和丸粟米大
每日空心杏仁湯下三九。斗門方

肺燥咳嗽

蘇遊鳳髓湯用松子仁一兩胡桃仁二兩
研音和熟蜜半兩枚之每服二錢食後沸

湯點服。

一切勞嗽

胃膈痞滿焚香透膈散用鴉管石雄黃佛
耳草欬冬花等分為末每用一錢安香爐

上焚之以筒吸烟入
喉中日二次。宣明

老小暴嗽

石灰一兩蛤粉四錢為末蒸餅丸豌豆大
焙乾每服三十九溫薑汁下。普濟方

咳嗽不止浮石末湯服或蜜丸服。肘後方。

肺熱咳嗽沙參半兩水煎服之。衛生易簡方。

肺熱咳嗽肺時盛者不灰木一兩半太陰玄精石二兩廿草炙半兩貝母一兩半天南星白礬

水煮過半兩為末每服半錢姜湯下。聖濟錄。

哮喘有聲卧睡不得土米末米醋調時時進一二服。普濟方。

氣熱咳嗽湯服二錢。聖濟錄。

久患喉呷咳嗽喉中作聲不得眠取白前焙搗為末每溫酒服二錢。深師方。

久咳上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫苑半夏

各三兩大戟七合以水一斗漬一宿煮取三升分作數服禁食羊肉餲飴大佳。深

本草類方

咳嗽

三

方師

化痰治嗽

明礬二兩生參末一兩苦醋二升熬為膏子以油紙包收旋丸豌豆大每用一丸放舌下其嗽立止痰即消。定西侯方只用

明礬末醋糊丸梧子大海睡時茶下二三十丸。摘要用明礬半生半燒山巵子炒

黑等分為末姜汁糊為丸如上服。雜興方用白明礬建茶

等分為末湖丸服

老小咳嗽

玄胡索一兩枯礬二錢半為末每服三錢軟傷一塊和舍之。仁存堂方

久近痰嗽

自腎膈下塞停飲至於臍臍用知母貝母一字用姜三片二面蘸藥細嚼嚥下便睡次早必瀉一行其嗽立止壯人乃用之一方不用巴豆

○醫學集成

久嗽氣急

知母去毛切五錢隔紙炒杏仁姜水泡去皮尖焙五錢以水一鍾半煎一鍾食遠溫服次以蘿蔔子杏仁等分爲末米糊丸服五十丸姜湯下以絕根。鄧筆峯雜興方

三焦咳嗽

腹滿不飲食氣不順仙靈脾覆盆子五味子炒各一兩爲末煉蜜丸梧子大每姜茶下二十九

年深咳嗽

聖濟錄
出膿血貫衆蘇方木等分每服三錢水一盞生薑三片煎服日二服。久咳漸成勞

咳嗽膿血

鮮燕食之。聖惠方
咽乾乃虛中有熱不可服涼藥以好黃耆四兩甘草一兩爲末每服二錢點湯服。

止咳化痰

賞方
人參末一兩明礬二兩以醃醋二升熬礬成膏入參末煉蜜和收每以豌豆大一丸

本草類方

咳
卷三

肺虛久嗽

放舌下其嗽即止
痰自消。簡便方
人參末二兩鹿角膠炙研一兩每服三錢用薄荷破湯一盞葱少許入銚子煎一二沸傾入盞內遇咳時溫呷

久嗽不瘥

三五口甚佳。食療本草
紫苑欬冬花各一兩百部半兩搗羅爲末每服三錢姜三片烏梅一個煎湯調下日

肺傷咳嗽

二甚佳。
圖經本草
紫苑五錢水一盞煎七分溫服日三次。衛生易簡方

痰飲咳嗽

含奇丸用曹州葶藶子一兩紙襯炒令黑知母一兩貝母一兩爲末棗肉半兩炒糖一兩半和丸彈丸大每以新綿裹一九

上氣咳嗽

含之。黠津甚者不過三九。篋中方
呷呀息氣喉中作聲唾粘以藍葉水浸搗汁一升空腹頻服須臾以杏仁研汁煮粥

咳嗽上氣

食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方瘥。梅師方
不得臥或遍體氣腫或單面腫鼓足腫並主之葶藶子三升微火熬所以絹袋盛浸清酒五升中冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬月二夜二量其氣力取微利下為度如患急者不待日滿亦可絞服。崔知悌方

寒熱痰嗽

初起者燒姜一塊合煎之。本草衍義
葶根煨存性為末生豆腐蘸三五錢食即效未全可以肥猪肉三片蘸食甚妙。醫

痰哮咳嗽

葶根煨存性為末生豆腐蘸三五錢食即效未全可以肥猪肉三片蘸食甚妙。醫

卒得咳嗽

芫花一升水三升煮汁一升以棗十枚煮汁乾日食五枚必愈。肘後

卒嗽有痰

芫花一兩炒水一升煮四沸去渣白糖入半斤每服棗許勿食酸鹹物。張文仲備

本草類方
咳嗽
卷三

三

肺咳上氣

脈沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升去滓入半夏半升人參白前生薑各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩煎取五升每服五合日三服。張

仲景金匱要畧方

肺虛久嗽

木鱉子欸冬花各一兩為末每用三錢焚之吸烟良久吐涎以茶潤喉如此五六次後服補肺藥一方用木鱉子

年久啞嗽

至三十年者黃芩子木香熏黃等分為末以羊胎塗青紙上撒末于上卷作筒燒烟熏吸之。崔

久嗽不止

有濃血黃芩子五錢淘去浮者煮令芽出炒研真酥一雞子大大棗七枚同煎令酥

盡取棗日食三枚。又方黃芩子三撮吞之日五六度光祿李丞服之神效。孟詵必效

熱痰咳嗽

煩熱面赤口燥心痛脈洪數者小黃芩用半夏天南星各一兩黃芩一兩半為末姜汁浸蒸餅丸梧子大每服五七十丸食後姜湯下。潔古活法機要

久患咳噫

生薑汁半合蜜一匙煎溫呷三服愈。外臺秘要方

濕痰咳嗽

面黃體重嗜卧驚兼食不消脈緩者白朮丸用半夏天南星各一兩白朮一兩半為末薄糊丸梧子大每服五七丸姜湯下。活法機要

氣痰咳嗽

面白氣促酒浙惡寒愁憂不樂脈澹者豆粉丸用半夏天南星各一兩官桂半兩為末糊丸梧子大每服五十丸姜湯下。活法機要

本草類方

咳嗽卷三

肺熱痰嗽

製半夏枯萆仁各一兩為末姜汁打糊丸梧子大每服二三十丸白湯下或以栝萆煎煮丸

上焦熱痰

咳嗽製過半夏一兩片黃芩末二錢姜汁打糊丸綠豆大每服七十九淡姜湯食後服此周憲王親製

天門冬膏

去積聚風痰補肺療咳失血潤五臟殺三蟲伏尸除瘟疫輕身益氣令人不飢以天門冬流水泡過去皮心搗爛取汁砂鍋

文武炭火煮勿令太沸以十斤為率熬至三斤却入蜜四兩熬至滴水不散瓶盛埋土中一七去火毒每日早晚白湯調服一匙若動大便以酒服之。醫方摘要

氣痰咳嗽

玉粉北南星麴半夏麴陳橘皮各一兩為末自然姜汁打糊丸梧子大每服四十九

姜湯下寒痰去橘皮加
官桂。東垣蘭室秘藏

上氣痰嗽

喘促唾膿血以萊菔子一合研
細煎湯食上服之。食醫心鏡

風痰咳嗽

蓋姜三片煎五分溫服每日早午晚各一
服。千金

服。千金

酒痰咳嗽

用此救肺瓜萸仁青黛等分研末姜汁
蜜丸芩子大每嚥一丸。丹溪心法

咳嗽有痰

熟瓜萸十個明礬二兩搗和餅陰乾研末
糊丸梧子大每姜湯下五七十九。醫方

要摘

久咳虛嗽

賈同知百勞散治咳嗽多年自汗用罌粟
殼二兩半去蒂膜醋炒取一兩烏梅半兩

焙為末每服二錢
時白湯下。宣明方

本草類方

咳
嗽
卷三

三四

冷氣咳嗽

結脹者乾姜末熟酒調服半
錢或錫糖丸嚥。姚僧坦方

暴咳

張文仲方用百部根漬酒每溫服一升日
三服。葛洪方用百部生薑各搗汁等分

煎服二合。續十全方用百部藤根搗自
然汁和蜜等分沸湯煎膏嚥。普濟方

治卒咳不止用百部根懸火
上炙乾每含嚥汁勿令人知

肺痰咳嗽

萊菔子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和
芫荽子大綿裹含之嚥汁甚妙。勝金方

虛熱咳嗽

天花粉一兩人參三錢為末
每服一錢米湯下。集簡方

上氣咳嗽

煩滿用猪肉切作鑊子
猪胎煎熟食之。心鏡

三十年嗽

百部根二十斤搗取汁煎如飴服方寸匕
日三服深師加蜜二斤外臺加節一斤。

千金
方

咳嗽不止

蝙蝠去翅足燒研為末一錢食後白湯下。壽域神方

熱咳不止

用濃茶湯一鍾蜜一鍾大熟瓜萋一箇去皮將瓢入茶蜜湯洗去子以盥盛于飯上蒸至飯熟取出時時批

二四匙嚙之。摘玄方

乾咳無痰

熟瓜萋搗爛絞汁入蜜等分加白礬一錢熬膏頻含嚙汁。楊起簡便方

肺熱痰咳

胃膈寒滿用瓜萋仁半夏湯泡七次焙研各一兩姜汁打麵糊丸梧子大每服五十

丸食後姜湯下。嚴用和濟生方

久嗽肺脹

五味二兩粟殼白錫炒過半兩為末白錫丸彈子大每服一丸水煎服。衛生家寶方

方

寒痰咳嗽

燒酒四兩猪脂蜜香油茶末各四兩同浸酒內煮成一處每日挑食以茶下之取效

本草類方

咳嗽卷三

姜

痰咳不止

瓜萋仁一兩文蛤七分為末以姜汁澄濃脚丸彈子大嚙之。摘玄方

卒得咳嗽

桃仁三升去皮杵着器中密封蒸熟日乾絹袋盛浸二斗酒中七日可飲日飲四五合

合

化痰止咳

天羅印絲瓜燒存性為末棗肉和丸彈子大每服一丸溫酒化下。攝生妙用方

上氣咳嗽

胃滿氣喘桃仁三兩去皮尖以水一大升研汁和粳米二合煮粥食之。心鏡

補肺丸

治咳嗽用杏仁二大升山中者不用去雙仁者以童子小便二斗浸春夏七日秋冬

二十七日日連皮尖於砂盆中研濾取汁煮令魚眼沸候軟如麵糊即成以粗布攤曝

之可丸即丸服之食前後總須服三五十九茶酒任下忌向水粥。劉禹錫傳信方

卒得咳嗽

烏雄鷄四隻治如食法酒漬半日飲之。肘後

久嗽不止

穀氣素壯人用之效異粟殼去筋蜜炙爲末每服五分蜜湯下。危氏方

久嗽寒熱

旦夕加重少喜多噴面色不潤忽進忽退積漸少食脉弦緊者杏仁半斤去皮尖童子小便浸七日漉出溫水淘洗砂盆內研如泥以小便三升煎如膏每服一錢熟水

久嗽

下婦人室女服之尤妙。千金方

久嗽不止

生姜五兩錫半升火煎熟食盡愈段侍御用之有效。初虞世必效方

久咳不止

丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風化消各二錢爲末乾噲。攝生方用

久咳不止

五味子一兩真茶四錢晒研爲末以甘草二錢煎膏丸綠豆大每服三十九沸湯下

久嗽不止

愈也。數日即愈。馬勃爲末蜜丸梧子大每服二十九白湯下即愈。普濟方

本草類方

咳

咳

咳

咳

咳

咳

事親。用合州乾姜炮皂莢炮去皮子及蛀者桂心紫色者去皮並搗篩等分鍊白蜜和末

咳

萬三千杵丸梧子大每飲服三丸嗽發即服日三五服禁食葱麵油膩其效如神禹錫在淮南與李亞同幕府李每治人而不

久嗽

出方或謂其客李曰凡人患嗽多進冷藥若見此方用藥熱燥必不肯服故但出藥即多效也試之信然。劉禹錫傳信方

久嗽

金粟丸用葉子唯黃一兩研以紙筋泥固濟小盒九用葉子一個令乾盛藥水調赤石脂封

久嗽

口更以泥封待乾架在地上炭火十斤簇煨候火消三分之一去火候冷取出當如

久嗽

鏡面光明紅色鉢內細研蒸餅九粟米大每服三九五九甘草水服服後睡良久。

久嗽

每服三九五九甘草水服服後睡良久。

久嗽

每服三九五九甘草水服服後睡良久。

久嗽

每服三九五九甘草水服服後睡良久。

勝金方

卒得咳嗽

頌曰崔元亮海上方用好梨去核搗汁一椀入椒四十粒煎一沸去滓納黑錫一大

兩消訖細細含嚥立定。訖曰用梨一顆刺五十孔每孔納椒一粒麵裹灰火烘熟

停冷去椒食之又方去核納酥蜜麵裏燒熱冷食又方切片酥煎食之又方搗汁一

升入酥蜜各一兩地黃汁一升煎成含嚥凡治嗽須喘急定時冷食之若熟食反傷

肺令嗽更劇不可救也若反可作羊肉湯餅飽食之即佳

瘦病咳嗽

猪膽和人湯姜汁橘皮詞梨勒皮同煮汁飲之。拾遺方

咳嗽失聲

白果仁四兩白茯苓桑白皮二兩烏豆半升沙蜜半斤煮熟日乾為末以乳汁半盃

拌溼九蒸九晒丸如綠豆大每服三五十九丸白湯下神效。余居士方

本草類方

咳嗽卷三

上氣咳嗽

猪肪四兩煮百沸以來切和醬醋食之。心鏡

久嗽不止

核桃仁五十個煮熟去皮人參五兩杏仁三百五十個麩炒湯浸去皮研勻入煉蜜丸梧子大每空心細嚼一丸人

參湯下臨卧再服。蕭大尹方

上氣咳嗽

治傷中筋脉急上氣咳嗽者用棗二十枚去核以酥四兩微火煎入棗肉中淬盡酥

取收之常含一枚微燄

久咳不已

鳥梅肉微炒罌粟殼去筋膜蜜炒等分為末每服二錢暈時蜜湯調下

急勞咳嗽

煩熱用桃仁三兩去皮尖猪肝一枚童子小便五升同煮乾於木臼內搗爛入蒸餅和丸梧子大每溫水

下三十九。聖惠方

經年氣嗽

橘皮神麴生姜焙乾等分為末蒸餅和丸梧子大每服三五十九食後夜卧各一服

有人患此服之兼舊患勝

痰氣咳嗽

用香藥去核切砂瓶內浸酒封固一夜煮爛蜜拌勻時時含嚥

卒寒咳嗽

皂莢燒研鼓湯服二錢。千金方

虛熱咳嗽

口乾涕唾用甘蔗汁一升半青梁米四合者粥日食二次極潤心肺。董氏方

久嗽欲死

許明則有效方用厚榆皮削如指大長尺餘納喉中頻出入當吐膿血而愈。古今

驗錄

大腸咳嗽

咳則遺矢者赤石脂禹餘糧湯主之不止神效太乙丹禹餘糧四兩火煨醋淬烏頭

一兩冷水浸一夜去皮臍焙為末醋糊丸梧子大每食前溫水下五丸。聖惠方

久咳羸弱

九尖拒霜葉為末以魚酢蘼食屢效。危氏得效方

本草類方

咳嗽卷三

卒得咳嗽

屋上白螺或白蜆殼搗為末酒服方寸匕。肘后方

氣嗽日久

生訶黎一枚含之嚥汁瘥後口爽不知食味却煎枳榔湯一盃服立便有味此知連州成密方也

○經驗方

上氣咳嗽

腹滿羸瘦者楸葉三斗水三斗煮三十沸去滓煎至可丸如棗大以筒納入下部中立愈。崔元亮

海上集驗方

骨蒸咳嗽

潮熱團魚丸用團魚一個柴胡前胡貝母知母杏仁各五錢同煮待熟去骨甲裙再

煮食肉飲汁將藥焙研為末仍以骨甲裙煮汁和丸梧子大每空心黃芪湯下三十丸日二服服盡仍治參

芪藥調之。奇效方

酒後咳嗽

白燻鷺焙研末每茶服一錢。怪詭奇方

肺虛咳嗽

立效丸治肺虛隔熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷水體倦肌瘦發熱減食喉音嘶不出黃蠟溶濾令淨漿水煮過八兩再化作一百二十九丸以蛤粉四兩為衣養藥每服一九胡桃半箇細嚼溫水下

卒嗽不止

用白蜆殼搗為細末以熟水飲調每服一錢日三服甚效。出急救良方

欽肺劫嗽

百藥煎訶黎勒刺芥穗等分為末姜汁入蜜和丸芡子大時時噙之。丹溪心法

定嗽化痰

末蒸餅丸菘豆大時時乾嚥數丸佳。頤湖醫案

久勞咳嗽

吐臭痰者尋水邊蛇吞青龜未嚥者連蛇打死黃泥同濟煨研空心酒服一二錢至效忌生冷五七日永

本草類方

咳三

十年咳嗽

或二十年醫不效者生龜三枚治如食法去腸以水五升煮取三升浸麴釀秫米四升如常飲之令盡永不發。又方用生龜一枚着炊中令人溺之浸至三日燒研以醇酒一升和末如乾飯頓服須臾大吐嗽震出則愈小兒減半

積年咳嗽

呀呷作聲用蠶魚殼半兩貝母煨一兩桔梗一分牙皂一分去皮酥炙為末煉蜜丸彈子大每含一九嚥汁服三九即吐出惡涎而瘥。聖惠方

咳嗽肺脹

嗽肺丸用五靈脂二兩胡桃仁八個柑子仁半兩研勻滴水和丸九小豆大每服二十丸甘草湯下。普濟

咳嗽不瘥

黃明膠炙研每服一錢入參末二錢薄鼓湯二盞葱白少許煎沸嗽時溫呷三五口即止。食療

堯

咳嗽日久

鷄子白皮炒十四枚麻黃三兩焙爲末每服方寸匕飲下日二。必效方

久嗽上氣

足燒焦研末米飲服之。百一方

咳嗽上氣

積年垂死用葦若子炒熟羊肺切曝等分爲末以七月七日醋拌每夜服二方寸匕

粥飲下隔日一服。千金

久嗽經年

阿膠炒人參各二兩爲末每用三錢豉湯一盞葱白少許煎服日三次。聖濟總錄

卒得咳嗽

升分三服并淡食雞一斗煮取三升

遠年咳嗽

羊脛三具大棗百枚酒五升漬七日飲之。肘后方

久嗽不瘥

水者啖之。張文仲方

久嗽滂唾

肺痿時時寒熱頰赤氣急用童便去頭尾少許五合取大粉甘草一寸四破浸之露

本草類方

卷三

單

一夜去甘草平旦頓服或入甘草末一錢同服亦可一日一劑童子忌食五辛熱物

二十年嗽

猪脛三具大棗百枚酒五升漬之秋冬七日春夏五日絞去滓七日服盡忌鹽

卒得咳嗽

猪腎二枚乾姜三兩水七升煮二升稍服取汗。肘后方

交感土

...

...

...

...

...

...

本草類方卷三

肺癆肺癰第三十三

肺癆久嗽

涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草三兩炙搗為末每日取小便三合調甘草末一錢服之○廣

肺癆多涎

肺癆吐涎沫頭眩小便數而不咳者肺中冷也甘草乾姜湯溫之甘草炙四兩乾姜炮二兩水三升煮一升五合

肺癆唾濁

心胃煩錯取夜合皮一掌大水三升分服○張仲景金匱要畧

肺癆得吐

黃耆二兩為末每服二錢水一中盞煎至六分溫服日三四服○聖惠方

肺癆咳嗽

胃滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者桔梗湯主之桔槲

本草類方

肺癆肺癰

聖

骨蒸肺癆

一兩甘草二兩水三升煮一升分溫再服朝暮吐膿血則瘳○張仲景金匱玉函方不能食者蘇遊蘆根飲主之蘆根麥門冬地骨皮生薑各十兩橘皮茯苓各五兩水二斗煮八升去滓分五服

肺癆咳嗽

取汗乃瘳○外臺秘要
煩滿微熱心胃甲錯葶藶湯用葶藶切二升水二斗煮汁五升入桃仁五十枚薏苡仁瓜瓣各半升煮取二升服當吐出膿血而愈○張仲景金匱玉函方

肺癆咳血

不止用括蘆五十個連殼炮焙烏梅肉五箇焙杏仁去皮尖炒二十一箇為末每用一捻以猪肺一片切薄擦末入內炙熟嚼嚥之日二服○聖濟總錄

肺癆咳嗽

心胃甲錯者以醇苦酒煮薏苡仁令濃微溫頓服肺有血當吐出愈○范汪方

肺癆咳嗽

膿血薏苡仁十兩杵破水三升煎一升酒少許服之○梅師

肺痿咳血 蘿蔔和羊肉或鯽魚 煮熟頰食○普濟方

肺痿咯血 多痰者漢防已葶藶等分爲末 糯米飲每服一錢○古今錄驗

肺痿喘嗽 煎七分細呷○儒門事親 薏苡仁三合搗爛水二大盞一

肺癰咯血 蓋入酒少許分二服○濟生 絞橘葉洗搗絞汁一盞服之

肺癰 吐膿血即愈○經驗良方 上焦不利卒然咳嗽杉木屑一兩皂莢去

肺壅痰滯 皮酥炙三兩爲末蜜丸梧子大每米飲下 十九一日四

服○聖惠方

咳嗽肺痿 嗽出臭膿用淡竹瀝一合服之日三五次 大人小兒咳逆短氣胃中吸吸咳出涕吐

以愈爲度○李 絳兵部手集

本草類方

肺痿肺癰 卷三

聖

久嗽肺癰 宗爽曰久嗽不愈肺積虛熱成癰咳出膿 血曉夕不止喉中氣塞胃膈噎痛用蛤蚧

阿膠鹿角膠生犀角羚羊角各二錢半用 河水三升銀石器內文火熬至半升濾汁

時時仰臥細呷日一服張刑部子 臯病此用樞密况授方服之遂愈

鹿髓煎 治肺痿咳嗽傷重脉絕用鹿髓生地黃汁 各七合酥蜜各一兩杏仁桃仁地黃汁減

半入三味煎如稀餚每合 一匙嘔下日三○聖惠方

肺痿骨蒸 煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下煉蜜及生 地黃汁各五合生薑汁一合不住手攪微

火熬成膏每日空心溫酒調服 一匙或入粥食○飲膳正要

肺損嘔血 并開胃用阿膠炒三錢木香一錢糯米一 合半爲末每服一錢百沸湯點服日一○

普濟

肺破出血

或嗽血不止用海犀膏即水膠一大片炙黃塗酥再炙研末用白湯化三錢服之即止

久嗽肺痿

作燥羊肺湯用羊肺一具洗淨以杏仁柿霜真豆粉真酥各一兩白蜜二兩和勻灌肺中白水煮食

一切肺病

咳嗽膿血不止用好酥五十斤煉三遍當出醍醐每服一合日三服以瘥為度神效

外方

肺痿吐血

黃明膠炙乾花桑葉陰乾各二兩研末每服三錢生地黃汁調下普濟方

肺痿咳嗽

時時寒熱頰赤氣急用童便去頭尾少許五合取大粉甘草一寸四破浸之露一夜

去甘草平旦頓服或入甘草末一錢同服亦可一日一劑童子忌食五辛熱物○姚

本草類方

肺痿肺癰

聖

集驗

本草類方卷三

虛損第三十四

老人虛損

風濕腰肢痺痛慈石三十兩白石英二十兩
兩炮碎窺盛水二斗浸於露池每日取水

作粥食經年氣力強盛

脫陽虛證

頰如童子○養老方
四肢厥冷不省人事或小腹緊痛冷汗

金液丹

氣促炒鹽熨臍下氣海取煖○救急方
固真氣緩丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼

冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷心腹積
乘脇下冷痛腹中諸蟲失精遺尿形羸力

劣腰膝痛弱冷風頑痺上氣衄血咳逆寒
熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔瘻濕蠱生

疥下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疔痔
等用石硫黃十兩研水用瓷盒盛以水和

本草類方

虛損

器

小礬盛水令滿安盒在內用泥固濟慢火
養七日七夜候足加頂火一兩水浸為丸如

出研末每一兩用蒸餅一兩水浸為丸如
梧子大每服三十丸空心米飲服又治傷

寒身冷脈微或吐或利或自汗不止或小便
便不禁併宜服之得身熱脈出為度○惠

民和濟

局方

硫黃盃

此盃配合造化調理陰陽奪天地冲和之
氣乃水火既濟之方不冷不熱不緩不急

有延年却老之功脫胎換骨之妙大能清
上實下升除陰陽通九竅殺九蟲除夢泄

悅容顏解頭風開胃隔化痰凝明耳目
肌膚添精髓調痛墜又治婦人血海枯寒

赤白帶下其法用瓷盃以胡桃擦過用無
砂石硫黃生溶成汁入明礬少許則塵垢

悉浮以杖掠去綿濾過再入盃溶化傾人
盃內盪成盃取出埋土中一夜木賊打光

用之欲紅入硃砂欲青則入葡萄研勻同
煮成每用熱酒二盃清早空心溫服則百
病皆除無
出此方也

紫霞盃

葉石林水雲錄云用硫黃袋盛懸甌內以
紫背浮萍同水煮之數十沸取出候乾研
末十兩用珍珠琥珀乳香雄黃硃砂陽起
石赤石脂片腦紫粉白芷甘松三奈木香
血竭沒藥韶腦安息香各一錢麝香七分
金箔二十片爲末入銅杓中慢火密化以
好樣酒盃一個周圍以粉紙包裹中開一
孔傾硫入內旋轉令勻投冷水中取出每
旦盛酒飲二三盃功同上方昔中書劉景
輝遣勞瘵于太白山中遇一老仙親授
是方服之果愈人能清心
寡欲而服此仙緣可到也

益氣固精

補血黑髮益壽有奇效還筒子半兩艾實
半兩金銀花二兩破故紙酒浸春三夏一

本草類方

虛損
卷三

畧

秋二冬五日焙研末二兩各研末蜜糊丸
梧子大每服五十九空心鹽湯溫酒任下
鄭西泉所傳方

仙靈脾酒

益丈夫興陽理腰膝冷用淫羊藿一斤
酒一斗浸三日逐時飲之○食醬心鏡

脾腎不足

草果仁一兩以醋煎香一兩炒香去醋不
用吳茱萸湯泡七次以破故紙一兩炒香
去故紙不用胡蘆巴一兩以山茱萸一兩
炒香去茱萸不用右三味爲糝酒糊丸梧
子大每服六十九鹽
湯下○百一選方

定心補虛

養血返清丸破故紙炒二兩白茯苓一兩
爲末沒藥五錢以無灰酒浸高一指煮化

和末丸梧子大每服三十九白湯下昔有
人服此至老不衰蓋故紙補腎茯苓補心
沒藥養血三者既壯自
然身安○朱氏集驗方

精氣不固

破故紙青鹽等分同炒為末每服二錢米飲下○三因方

虛勞不足

搗作丸子日日服之

氣短不接

正元散治氣不接續兼治滑泄及小便熱王丞相服之有驗用蓬莪朮一兩金鈴子去核一兩為末入蓬砂一錢煉過研細每服二錢溫酒或鹽湯空心服○孫用和秘

補虛明目

健骨和血蒼朮泔浸四兩熟地黃焙二兩為末酒糊丸梧子大每溫酒下三五十九

房後困倦

人參七錢陳皮一錢水一盞半煎八分食前溫服日再服千金不傳○趙永菴方

人參膏

用人參十兩細切以活水二十盞浸透入銀石器內桑柴火緩緩煎取十盞濾汁再

本草類方

虛損

異

以水十盞煎取五盞與前汁合煎成膏瓶收隨病作湯使丹溪云冬慾之人腎氣衰憊咳嗽不止用生薑橘皮煎湯化膏服之補江鄭見五月患病又患房室忽發昏暈不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰鳴如拽鋸聲小便遺失脉大無倫此陰虧陽絕之證也子令急煎大料人參膏仍與灸氣海十八壯右手能動再三壯唇口微動遂與膏服一盞半夜後服三盞眼能動盡三斤方能言而索粥盡五斤而病止至十斤而全安若作風冷則誤矣一人背疽服內托十宣散已多膿出作嘔發熱六脉沉數有加此潰瘍所忌也遂與大料人參膏入竹瀝飲之參盡一十六斤竹伐百餘竿而安後經旬餘值大風按木瘡起有膿中膏以芎歸橘皮作湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而瘡潰調理乃安若癰疽潰後氣血

勞氣欲絕

俱虛嘔逆不食變症不一者以參耆歸朮等分煎膏服之最妙
麥門冬一兩甘草炙二兩粳米半合棗二枚竹葉十五片水二升煎一升分三服
南陽活人書

坎離丸

滋陰降火開胃進食強筋骨去濕熱白蒼朮剉淨一斤分作四分一分川椒一兩炒一分破故紙一兩炒一分五味子一兩炒一分川芎麩一兩炒只取末研末用藥皮四斤分作四分一斤酥炙一斤人乳汁炙一斤童尿汁炙一斤米泔炙各十二次研末和勻煉蜜丸梧子大每服三十九丸早用酒服午用茶服晚用白湯下○積善堂方
治下元虛敗脚手沉重夜多盜汗縱慾所致此藥壯筋骨益元氣補骨脂四兩炒香兔絲子四兩酒蒸胡桃肉一兩去皮乳香沒藥沉香各研一錢半煉蜜丸如梧子大

本草類方

虛損卷三

晁

每服二三十丸空心鹽湯溫酒任下自夏至起冬至止日一服此乃唐宣宗時張壽太尉知廣州得方于南番人有詩云三年時節向邊隅人信方知藥力殊奪得春光來在手青娥休笑
白髮鬢○和濟方

萬病丸

治男婦五勞七傷一切諸疾杏仁一斗二升童子小便煮七次以蜜四兩拌勻再以童便五升於瓶內重蒸取出日曬夜露數日任意嚼食即愈

交感丹

補虛損固精氣烏髭髮此鐵甕城中先生方也久服令人有子茅山蒼朮刮淨一斤分作四分用酒醋米泔鹽湯各浸七日晒研川椒紅小茴香各四兩炒研陳米糊和丸梧子大每服四十九空
心溫酒下○聖濟總錄

男女虛勞

男子女人五癆七傷下元久冷一切風病四肢疼痛駐顏壯氣烏髭鬚補骨脂一斤

靈芝丸

酒浸一宿晒乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕簸去只取補骨脂為末醋煮麴糊丸如梧子大每服二三十丸

治脾腎氣虛添補精髓通利耳目蒼朮一斤米泔水浸春夏五日秋冬七日逐日換水竹刀刮皮切晒石臼為末棗肉蒸和左梧子大每服三五十九棗湯空心服○奇效良方

男子陽虛

鹿角霜白茯苓等分為末酒糊丸梧子大每服三十九鹽湯下甚有補益○梁氏總要

固元丹

治元臟久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱氣婦人赤白帶下血崩便血等疾以小便頻數為效好蒼朮刮淨一斤分作四分一分小茴香食鹽各一兩同炒一分川椒

本草類方

虛損卷三

吳

補骨脂各一兩同炒一分用烏頭川練子肉各一兩同炒一分用醇醋老酒各半斤同煮乾焙過同炒藥通為末用酒煮糊丸梧子大每服五十九男以溫酒女以醋湯空心下此高司法方也○王璆百一選方

男女血虛

麥門冬三斤取汁熬成膏生地黃三斤取汁熬成膏等分一處濾過入蜜四之一再熬成瓶收每日白湯點服

麥門冬煎

并忌鐵器○醫方摘要
論中益心悅顏色安神益氣令人肥健其方甚駛取新麥門冬根去心搗熟絞汁和自蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴及成溫酒日服之○圖經本草

養正丹

邪輔正助陽接真治元氣虧虛陰邪交蕩心盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心悸胆怯虛煩狂言盜汗腹痛腰痛反胃

吐食霍亂轉筋咳逆又治中風涎潮不省
人事湯氣欲脫四肢厥冷傷寒陰盛自汗
唇青脉沉婦人產後月候不勻帶下腹痛
用黑蓋一隻入黑鈇溶汁次下水銀次下
硃砂末炒不見星少頃乃下硫黃末急攪
有焰酒醋解之取出研末糯粉煮糊九綠
豆大每服二十九鹽湯下四味皆等分此
藥升降陰陽既濟心腎神效不可具述○

和濟局方

虛勞瘦弱

用頗兒必四十枚以水一升熬減
大半去滓及油待凝任食○正要

五勞七傷

虛冷用肥羊肉一腿密蓋
煮爛絞取汁服并食肉

地髓煎

生地黄十斤洗淨搗壓取汁鹿角膠一斤
半生薑半斤絞取汁蜜二升酒四升文武
火煮地黃汁數沸即以酒研紫蘇子四兩
取汁入煎一二沸下膠膠化下姜汁蜜

本草類方

虛損
卷三

晁

再煎候稠瓦器盛之每空心酒
化一七服大補益○千金方

鍾乳酒

安五臟通百節利九竅主風虛補下焦益
精明日鍾乳煉成粉五兩以夾練袋盛之
清酒六升瓶封湯內煮減三之二取出添
滿封七日日飲三合忌房事葱豉生食硬

食○外臺秘要

地黃酒

補虛弱壯筋骨通血脈治腹痛變白髮用
生肥地黃絞汁同麴米封密器中五七日
啓之中有綠汁真精更速亦宜先飲之乃濾

男女虛損

或大病後或積勞汁效更速亦有加羣藥者
呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛咽乾唇
燥或飲食無味多卧少起久者積年輕者
百日漸至瘦削用生地黃二斤麴一斤搗

爛炒乾爲末每空心酒服
方寸匕日三服良少葛洪

地黃煎

補虛除熱治吐血唾血取乳石去癰癩等疾生地黃不拘多少三搗三壓取汁令盡以瓦器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如錫九彈子大每溫酒服一丸日二服。

虛勞困乏

地黃一石取汁酒三斗攪勻煎收日服。必效方。

地黃粥

大能利血生精地黃切二合與米同入罐中煮之候熟以酥二合蜜一合同炒香入內再煮熟食。

瑤玉膏

常服開心益智髮白返黑齒落更生辟穀延年治癰疽癆瘵咳嗽吐血等病乃鐵甕城中先生方也生地黃汁十六斤取汁人參末一斤半白茯苓末三斤白砂蜜十斤濾淨拌勻入瓶內箬封安砂鍋中桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取

本草類方

虛損

奉

起再煮一伏時每以白湯或酒點服一匙丹溪云好色虛人咳嗽唾血者服之甚捷明太醫院逢御服食議加天門冬麥門冬枸杞子末各一斤賜名益壽承真曜仙方加號瓊沉香半兩。

虛勞體痛

天門冬末酒服方寸匕日三服鯉魚。千金方。

鍾乳丸

治丈夫衰老陽絕肢冷少氣減食腰疼脚痺下氣消食和中長肌鍾乳粉二兩兔絲子酒浸焙石劑各一兩吳茱萸黃湯泡七次炒半兩為末煉蜜和九梧子大每服七丸空心溫酒或米湯下日二服服訖行數百步覺胃口熱稍定即食乾飯豆醬忌食粗臭惡食及醋尸穢等氣初服七日勿為陽事過七日乃可行不宜傷多服過半劑覺有功乃續服此曹公卓方也。和濟局方。

補益虛損

極益房勞用蘿蓐四兩枸杞根皮五味子
柏子仁酸棗仁乾地黃各三兩為末每服
方寸匕酒下

鍾乳煎

治風虛勞損腰脚無力補益強壯用鍾乳
粉煉成者三兩以來練袋盛之牛乳一大
升煎減三之一去袋飲乳分二服日一作
不吐不利虛冷人微澹無苦一袋可煮三
十度即力盡別作袋每煎訖須濯盡令通
氣其滓和麵餵雞生子食之此崔尚書方
也○孫黃

人千金翼

秘精益髓

太乙金鎖丹用五色龍骨五兩覆盆子五
兩連花藍四兩未開者陰乾鼓子花三兩
五月五日采之雞頭子仁一百顆並為末
以金櫻子二百枚去毛木日搗爛水七升
煎濃汁一升去滓和藥杵二千下左梧子
大每空心溫鹽湯下三十九服之至百日

本草類方

虛損

聖

元臟傷冷

永不泄如不泄以冷水調車前末半
合服之忌葵菜○薩謙齋瑞竹堂方
經驗方用附子炮去皮臍為末以水
入藥二錢鹽葱姜棗同煎取一盞空心服
去積冷暖下元肥腸益氣酒食無碍○梅
師方二虎九補元臟進飲食壯筋骨用烏
頭附子合四兩醞醋浸三宿切作片子煨
一小坑炭火燒赤以醋三升同藥傾入坑
內用盆合之一宿取出去砂土入青鹽四
兩同炒赤黃色為末醋打麵糊丸如梧子
大空心冷酒下十

陰虛火動

有痰不堪用燥劑者天門冬一斤水浸洗
去心取肉十二兩石白搗爛五味子水洗
去核取肉四兩晒乾不見火共搗丸梧子
大每服二十九茶下日三服○簡便方

七寶美髯丹

烏鬚髮壯筋骨固精氣續嗣延年用赤白
何首烏各一斤米泔水浸三四日斃片括

去皮用淘淨黑豆二升以砂鍋木甑鋪豆
及首烏重鋪蓋蒸之豆熟取出去豆暴
幹換豆再蒸如此九次暴乾爲末赤白茯苓
各一斤去皮研末以水淘去筋膜及浮
者取沉者捻塊以人乳十碗浸勻曬乾研
末牛膝八兩去苗酒浸一日同何首烏第
七次蒸之至第九次止曬乾當歸八兩酒
浸晒枸杞子八兩酒浸晒兔絲子八兩酒
浸生芽研爛晒補骨脂四兩以黑脂麻炒
香並忌鐵器石臼爲末煉蜜丸如彈子大
一百五十丸每日三九清晨溫酒下午時
姜湯下卽時鹽湯下其餘並九梧子大每
日空心酒服一百丸久服極驗忌諸
血無鱗魚蘿蔔葱鐵器○積善堂方
補五臟調六腑令人無病天門冬三十斤
去心搗碎以水二石煮汁一石糯米一斗
細麴十斤如常炊
釀酒熟日飲三盃

天門冬酒

本草類方

虛損

壘

虛勞內熱

下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大
便數少氣咳吸口燥熱淋用大麻仁五合
研水二升煮減半分

滋陰養血

溫補下元三才丸用天門冬去心生地黃
二兩二味用柳甌箬以酒灑之九蒸九晒
待乾秤之人參一兩爲末蒸棗肉搗和丸
梧子大每服三十九丸食前溫酒下日三服

○紫古活
法心要

紫金籐丸

補腎臟暖丹田興陽道減小便填精髓駐
顏色潤肌膚治元氣虛面目黧黑口乾舌
滿夢想虛驚耳鳴目淚腰膝沉重百節酸
疼項筋緊急背狎勞倦陰汗盜汗及婦人
子宮冷久月水不調或多或少赤白帶下
並宜服之用紫金籐巴戟天去心三兩吳
茱萸高良薑肉桂青鹽各二兩爲末酒糊
丸梧子大每溫酒下二十九日三服○和

補益虛羸

鹿骨煎用鹿骨一具枸杞根二升各以水一斗煎汁五升和勻共煎五升日二服。

陽氣虛損

簡便方用兔絲子熟地黃等分為末酒糊丸梧子大每服五十丸氣虛人參湯下氣逆沉香湯下。經驗方用兔絲子酒浸十日水淘杜仲焙研蜜炙一兩以薯蕷末酒洗糊丸梧子大每空酒下五十九。

四神丸

治腎經虛損眼目昏花或雲翳遮睛甘州枸杞子一斤好酒潤透分作四分四兩用蜀椒一兩炒四兩用小茴香一兩炒四兩用胎麻一兩炒四兩用川煉肉一兩炒四兩出枸杞加熟地黃白朮白茯苓各一兩為末煉蜜丸日服。瑞竹堂方。

本草類方

虛損卷三

薑

勞損風濕

陸杭膏用牛髓羊脂各二升白蜜薑汁醎各三升煎三上三下令成膏隨意以溫酒和服之。

補陰丸

丹溪方用龜下甲酒炙熟地黃九蒸九晒各六兩黃柏鹽水浸炒知母酒炒各四兩石器為末以猪春髓和九梧子大每服百丸空心溫酒下一方去地黃加五味子炒。

枸杞煎

治虛勞退虛熱輕身益氣令一切癰疽永不發用枸杞三十斤春夏用莖葉秋冬用根實以水一石煮取五斗以滓再煎取五斗澄清去滓再煎取二斗入鍋煎如飴收之每早酒服一丸。

枸杞酒

外臺秘要云補虛去勞熱長肌肉益顏色肥健人治肝虛衝感下淚用生枸杞子五

強筋補益

升搗破絹袋盛浸好酒二斗中密封勿洩氣二七日服之任性勿醉○經驗方枸杞酒變白耐老輕身用枸杞子二升十月壬癸日而東采之以好酒二升瓷瓶內浸三七日乃添生地黃汁三升攪勻密封至立春後三十日開瓶每空心援飲一盞至立春後髭髮却能變黑勿食蕪荑葱蒜

四聖不老丹用明松脂一斤以無灰酒沙鍋內乘柴火煮數沸竹枝攪稠乃住火傾入水內結塊復以酒煮九遍其脂如玉不苦不澀乃止為細末用十二兩入白茯苓末半斤煉蜜丸如梧子大每空心好酒送下七十二丸須擇吉日修合勿令婦人雞犬見之○松梅丸用松脂以長流水桑柴煮拔三次再以桑灰滴汁煮七次扯拔更以好酒煮二次仍以長流水煮二次色白不

本草類方

虛損

蓄

虛損百病

苦為度每一斤入地黃九蒸末十兩烏梅肉六兩煉蜜九梧子大每服七十九空心鹽米湯下健陽補中強筋潤肌大能益人○白飛霞方外奇方

久服髮白再黑返老還童用女貞實十月上巳日收陰乾用時以酒浸一日蒸透晒乾一斤四兩旱蓮草五月收陰乾十兩為末煉蜜丸未桑椹子三月收陰乾十兩為末煉蜜丸如梧子大每服七八十丸淡鹽湯下若四月收桑椹搗汁和藥七月收旱蓮搗汁和藥即不用蜜矣按時修合慎之○簡便方

五勞七傷

補益方用乾漆柏子仁山茱萸酸棗仁各等分為末蜜丸梧子大每服二七丸溫酒下日二服

補血益精

千金方○千金方
二兩為末煉蜜和丸梧子大每服五十九

五勞七傷

○奇效良方
五月五日采五加莖七月七日采葉九月九日取根治為末每酒服方寸七日三服久服去風

虛勞不足

五加皮枸杞根白皮各一斗水一石五斗煮汁七斗分取四斗浸麴一斗以三斗拌飯如常釀酒法待

益助陽氣

熟任飲。千金方
洗曰丹雄雞冠血和天雄太陽粉作四分桂心二分丸服之

紫芝丸

治虛勞知氣腎脇苦傷手足逆冷或時煩燥口乾目視瞠瞠腹內時痛不思飲食此藥安神保精也紫芝一兩半山芋焙天雄

皮枳實去瓤麩炒各三錢五分生地黃焙麥門冬去心焙五味子炒半夏製炒附子

本草類方

虛損
炒去皮牡丹皮人參各七錢五分遠志去心麥實之二錢五分瓜子仁炒澤瀉各五錢為末蜜丸梧子大每服十五丸漸至三十九丸溫酒下日三服。聖濟總錄

補益虛損

益顏色補下焦虛冷小便頻數瘦損無力用薯蕷於砂盆中研細入銚中以酒一大定熬令香旋添酒一盞攪令勻

杏酥法

空飲之每旦一服。聖惠方
頌曰去風虛除百病搗爛杏仁一石以好酒二石研慮取汁一石五斗入白蜜一斗五升攪勻

酒上酥出即取納瓷器中貯之取其酒滓團如梨大置空屋中作格安之候成節脯狀旦服一枚以前酒下。藏器曰杏酪服之潤五臟去痰嗽生熱喫

又法

俱可若半生半熟服之殺人
宗爽曰治肺燥喘熱大腸秘潤五臟用杏仁去皮研細每一升入水一升半搗稠汁

入生姜四兩甘草一寸銀石器中慢火熬成稀膏入酥二兩同收每夜沸湯點服一匙

補益虛弱

誥曰虛弱人用烏雄雞一隻洗淨五味煮極爛食生卽反損人或五味淹炙食亦良

補虛益損

水芝丹用蓮實半升酒浸二宿以牙猪肚一箇洗淨入蓮在內縫定煮熟取出晒乾

爲末酒煮米糊丸梧子大每服五十丸食前溫酒送下。醫學發明

男女諸虛

孫氏集效方坎離丸治男子婦人諸虛百損小便淋瀝遺精白濁等症黃蘗去皮切

二斤熟糯米一升童子小便浸之九浸九晒蒸過晒研爲末酒煮麵糊丸梧子大每服一百丸

溫酒送下

胡桃丸

益血補髓強筋壯骨延年明目悅心潤肌能除百病用胡桃仁四兩搗膏入破故紙

本草類方

虛損

美

虛勞苦渴

杜仲草薺末各四兩杵勻丸梧子大每空心溫酒鹽湯任下五十九。御藥院方

骨節煩熱或寒用枸杞根白皮切五升麥門冬三升小麥二升水二斗煮至麥熟法

萍每服一升口湯卽飲。千金方

注夏虛病

枸杞子五味子研細滾水泡封三日代茶飲效。衛生方

四精丸

治思慮色慾過度損傷心氣小便數遺精用秋石白茯苓芡實蓮肉各二兩爲末蒸

棗和丸滯子大每服三十丸空心鹽湯送下。永類方

下焦虛冷

脚膝無力陽事不行用羊腎一枚煮爛和米粉六兩鍊成乳粉空腹食之妙。心鏡

補益心腎

仙方椒苓丸補益心腎明目駐顏順氣祛風延年真川椒一斤炒去汗白茯苓十兩

去皮爲末煉蜜丸梧子大每服五十九空心鹽湯下忌鐵器。邵真人經驗方

久病虛羸

不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者用羊胃一枚白木一升切水二斗煮九升分九服日三不過

麋角丸

三劑瘥。張文仲方

補心神安臟腑填骨髓理腰脚能久立聰耳明目髮白更黑貌老還少凡麋角取當年新角連腦頂者為上看角根有所痕處亦堪用脫角根下平者不堪取角五具或四具三具二具一具為一劑去尖一大寸即角長七八寸取勢截斷量把鏟得即於長流水處以竹器盛懸浸十宿如無長流水處即於淨盆中滿着水浸每夜易換軟水將出削去繖皮以剗鏟取白處至心即止以清粟米泔浸兩宿初經一宿即乾握瀝去舊水置新網上曝乾擇去惡物粗骨皮及鏟不勻者以無灰美酒於大磁器中浸經兩宿其藥及酒俱入淨釜中初用武火煮一食久後以文火微煎如蟹目沸

本草類方

虛損 卷三

卷三

以柳木篋徐徐攪不得住手時時添酒以成煎為度煎時皆須平旦下手不得經宿乃看屑如稀膠即以牛乳五升酥一片以次漸下後項藥仍以麋角一條炙令黃為末與諸藥同製之楨桐通草秦芫肉蓯蓉人參兔絲子酒浸兩宿別搗晒乾甘草各一兩右搗為末將膠再煎一食頃似稀稠粥即止火少時投諸藥末相和稠粘堪作丸即以新器盛貯以衆手一時丸梧子大如粘手着少酥塗手其服餌之法空腹以酒下之初服三十丸日加一丸加至五十丸為度日二服至一百日內忌房室服經後多泄氣能食患氣者加枳實青木香各一兩服至二百日面皺光澤一年齒落更生強記身輕若風日行數百里二年令人肥飽少食七十以上服之却成後生三年腸作筋體頽見未明四年常飽不食自見

仙人三十下服之不輟顏一定而不變修合時須在淨室中勿令陰人雞犬孝子等見婦人服之尤佳如飲酒食麵口乾眼澀內熱者卽服三黃丸微利之如此一度發動已後方始調暢也。千金

麋角丸

治五痿皮緩毛痺血脉枯槁肌膚薄者筋骨羸弱飲食不美四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥用麋角屑一斤酒浸一宿大附子生去皮臍一兩半熟地黃四兩用大麥米二升以一半藉底以一半在上以二布中隔覆炊一日取出藥麥各焙爲末以浸藥酒添清酒煮麥粉爲糊和杵三千下丸如梧子大每服五十九食前用溫酒或米湯送下日三服。一方只用麋角銜屑酥炒黃色五兩熟附子末半兩酒糊丸服補諸虛百損用黃健牛肉去筋膜切片河水洗數遍仍浸一宿次日再洗三遍水清

返本丸

本草類方

虛損

堯

爲度用無灰好酒同入罈內重泥封固藥柴文武火煮一晝夜取出如黃砂爲佳焦黑無用焙乾爲末聽用山藥鹽炒過蓮肉去心鹽炒過並去鹽白茯苓小茴香炒各四兩爲末每牛肉半斤入藥末一斤以紅棗蒸熟去皮和搗丸梧子大每空心酒下五十九日三服

小刀圭

韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之用小牛犢兒未交感者一隻臘月初八日或戌巳日殺之去血燭毛洗淨同臟腑不遺分寸大鍋鍋煮之每十斤入黃芪十兩入參四兩茯苓六兩官桂良姜各五錢陳皮三兩甘草蜀椒各二兩食鹽二兩醇酒二斗同煮水以八分爲率文火煮至如泥其骨皆絕碎併濾取稠汁待冷以甕盛之埋于土內露出甕口凡飲食中皆任意食之或以酒調服更妙肥犬及鹿皆可依此法作之

虛勞口乾

千金用羊脂一雞子大醇酒半升棗七枚漬七日食立愈。外臺用羊脂雞子大納

半斤酢中一宿絞汁舍之

異類有情丸

韓氏醫通云此方自製者凡丈夫中年覺衰便可服餌蓋鹿乃純陽龜虎屬陰血氣

有情各從其類非金石草木比也此方用鹿角霜龜板酒洗淨酥塗炙研虎脛骨長

錢鹿茸燻乾酒洗淨酥塗炙研虎脛骨長流水浸七日蜜塗酥炙各二兩四錢水火

煉蜜入獺猪春髓丸條搗丸梧子大每空心鹽湯下五七九十九丸如厚味善飲者加

豬膽汁一二合以膏降火之義

老人虛弱

白羊脊骨一具剉碎水煮取汁枸杞根剉一斗水五斗煮汁一斗五升合汁同骨煮

至五升去骨瓷盒盛之每以一合酒一盞調服。多能鄙事

本草類方

虛損卷三

五

麋角霜丸

補元臟駐顏色用麋角一副水浸七日刮去皺皮鏤為屑盛在一銀瓶內以牛乳汁

浸一日常令乳高二寸如乳耗更添直候不耗用油單紙重密封瓶口別用大麥一

斗安在別瓶內約厚三寸上安麋角瓶更用大麥過圍填實露瓶口不住火蒸一伏

時如鍋內水耗即旋添熱湯須頻看角屑粉爛如麵即住火取出用細篩子濾去乳

焙乾每料八兩附子炮製去皮乾山藥各三兩石為末蒸棗肉和丸如梧子大每服

十五丸至二十丸空心用溫鹽酒送下煉蜜丸亦可。總錄

麋角丸

彭祖丸使人丁壯不老房室不勞損氣力顏色不衰者莫過麋角其法刮為末十兩

用生附子一枚合之雀卵和丸日服二十丸溫酒下二十日大效亦可單熬為末酒

服亦令人不老但性緩不及附子者。彭祖服食經

補益勞損

千金翼崔尚書方鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎減三分之一去袋飲乳日三〇

又方白石英末三斤和黑豆與十歲以上生犢特牛食每日與一兩七日取牛乳或

熱服一升或作粥食其糞以種菜食百無所忌能潤臟腑澤肌肉令人壯健

斑龍丸

治諸虛用鹿茸酥炙或酒炙亦可鹿角膠炒成珠鹿角霜陽起石煨紅酒淬肉菹蓉

酒浸酸棗仁柏子仁黃芪蜜炙各一兩當歸黑附子炮地黃九蒸九焙各八錢辰味

砂半錢各為末酒糊丸梧子大每空心溫酒下五十九〇澹寮

羊肉湯

張仲景治勞傷虛羸及產後心腹痛用肥羊肉一斤水一斗煮汁八升入當歸五

兩黃芪入兩生姜六兩煮取二升分四服胡洽方無黃芪千金方有芍藥〇金匱要

畧

本草類方

虛損卷三

本

五勞七傷

陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切肉菹蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹下葱鹽五味食〇正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五勞

七傷用羊腎三對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉一斤同五味煮成汁下米作粥食之

朱雀湯治心氣勞傷因變諸疾用雄雀一隻取肉炙赤小豆一合人參赤茯苓大棗

心氣勞傷

肉紫石莢小麥各一兩紫苑遠志肉丹參各半兩甘草炙二錢半細到拌勻每服三

錢用水一盞煎六分去滓食遠溫服〇奇效方

治男女因積虛或大病後虛損沉困酸疼

虛損積勞

盜汗少氣喘噎或小腹拘急心悸胃弱多

治也用烏雞雞一頭治如食法以生地黃一斤切飴糖一升納腹內縛定銅器貯于

瓶中蒸五升米熟取出食肉飲汁勿用鹽

一月一作神效。

腎虛精竭

羊腎一雙切于豉汁中以五味米搗作羹粥食。○心鏡

二至丸

補虛損生精血去風濕壯筋骨用鹿角鎊細以真酥一兩無灰酒一升慢火炒乾取

乾慢火炒

乾慢火炒乾取半兩蒼耳子酒浸一宿煮

半斤山藥

半斤山藥白茯苓黃耆蜜炙各四兩當歸

酒浸焙五

酒浸焙五兩肉蓯蓉酒浸焙遠志去心人

參沉香各

參沉香各二兩熟附子一兩通為末酒煮

糯米糊丸

糯米糊丸梧子大每服五十九丸溫酒鹽湯

任下日二服

楊氏家藏方。

補精潤肺

壯陽助胃用煉牛髓四兩胡桃肉四兩杏仁泥四兩山藥末半斤煉蜜一斤同搗成一匙空心服之。○瑞竹方

本草類方

虛損 卷三 空

虛損勞傷

羊腎一枚米一升水一斗煮九升日三服。○肘後方

補益老人

治老人臟腑虛損羸瘦陽氣乏弱雀兒五隻如常法粟米一合葱白三莖先炒雀熟入酒一合煮少時入水二盞下葱米作粥食。○食治方

虛損昏聩

大羊尾骨一條水五碗煮減半入葱白五莖荆芥一握陳皮一兩麵三兩煮熟取汁搜麵作索餅同羊肉四兩煮

虛損勞瘦

用新猪脂煎取一升入葱白一握煎黃平旦服至三日以枸杞一斤水三斗煮汁入

羊肝一具

羊肝一具羊脊膂肉一條連未

半斤着葱

半斤着葱豉作羹食。○千金方

精血耗涸

耳聾目渴腰痛白濁上燥下寒不受峻補者鹿茸酒蒸當歸酒浸各一兩焙為末烏

梅肉煮膏

梅肉煮膏搗丸梧子大每米飲服五十九。○濟生方

病後虛弱

取七歲以下五歲以上黃牛乳一升水四升煎取一升稍稍飲至十日止。外臺方

補益虛寒

外用精羊肉一斤碎白石英三兩以肉包之石英和葱姜作小餛飩子每日空腹以

冷漿水吞一百枚甚補益。千金翼

骨虛勞極

面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊髮落齒枯甚則喜睡用鹿角二兩牛膝酒浸焙

一兩半為末煉蜜丸梧子大每服五十九空心鹽酒下。濟生

白鳳膏

葛可久云治久虛發熱咳嗽吐痰吐血火乘金位者用黑嘴白鴨一隻取血入溫酒

量飲使直入肺經以酒補之將鴨乾搗去毛膈下開竅去腸持淨入大棗肉二升參

苓平胃散末一升縛定用砂囊一箇置鴨在內以炭火慢煨將陳酒一瓶作三次入

之酒乾為度取出食鴨及棗類作取愈。十藥神方

本草類方

虛損

奎

秋石還元丹

久服去百病強骨髓補精血開心益智補暖下元悅色進食久則臍下常如火暖諸

般冷疾皆愈久年冷勞虛憊者服之亦壯盛其法以男子小便十石更多尤妙先搗

音支大鑊一口于空室內上用深瓦甑接鍋口以紙筋杵石灰泥甑縫并鍋口勿令

通風候乾下小便約鍋中七八分以米灶下用焰火煮之若湧出即少添冷小便

候煎乾即入中白也入好罐子內如法固濟入炭爐中煨之旋取二三兩再研如粉

煮棗膏和丸如綠豆大每服五七丸漸加至十五丸空心溫酒或鹽湯下其藥常要

近火或時復養火三五日則功效更大也。經驗良方

虛損風疾

接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之症又治中風不語左癱右緩手足疼痛

動履不便飲食少進諸症用人乳二盞香甜白者為佳以好梨汁一盃和勻銀石器

內頰渡每日五更一服能消痰補虛生血
延壽此乃以人補人其妙無加○攝生衆

方妙

虛損骨蒸

千金方用天靈蓋如梳大炙黃以小五升
煮取二升分三服起死神方也○張文仲
備急方用人頸骨炙三兩麝香十兩為末
搗千杵九梧子大每服七丸飲下日再服

若骨前有青脈出者以針
刺看血色未黑者七日瘥

秋石五精丸

常服補益秋石一兩蓮肉六兩真川椒紅
五錢小茴香五錢白茯苓二兩為末棗肉
和丸梧子大每服三十丸鹽湯溫酒空心
下○秋石法用童男童女潔淨無體氣疾
病者沐浴更衣各聚一處用潔淨飲食及
鹽湯與之忌葱蒜韭姜辛辣鹽腥之物待
尿滿缸以水攪澄取人中白各用陽城瓦
罐鹽泥固濟鐵線紮定打火一炷香連換

本草類方

虛損
卷三

奎

鐵線打七火然後以男女者秤勻和作一
處研開以河水化之隔紙七層濾過仍熬
成秋石其色雪白用潔淨香濃乳汁和成
日晒夜露但乾即添乳汁取日精月華四
十九日數足收貯配藥

補益虛羸

用豬肚一具入人參五兩蜀椒一兩乾姜
一兩半葱白七個粳米半升在內密縫煮
熟食○劉氏保壽堂經驗方

大造丸

吳球云紫河車即胞衣也兒孕胎中臍系
于胞胞系母脊受母之蔭父精母血相合
生成真元所鍾故曰河車雖稟後天之形
實得先天之氣超然非他金石草木之類
可比愚每用此得效用之女人尤妙蓋本

其所自出各從其類也若無子及多生女
月水不調小產難產人服之必至有子危
疾將絕者一二服可更活一二日其補陰

本草類方

虛損 卷三

窩

之功極重百發百中久服耳聰目明鬚髮
 烏黑延年益壽有奪造化之功故名大造
 丸用紫河車一具男用女胎女用男胎初
 生者米泔洗淨新瓦焙乾研末或以淡酒
 蒸熟搗晒研末氣力尤全且無火毒敗龜
 板年久者童便浸三日酥炙黃二兩或以
 童便浸過石上磨淨蒸熟晒研尤妙黃蘗
 去皮鹽酒浸炒一兩半杜仲去皮酥炙一
 兩半牛膝去苗酒浸曬一兩二錢肥生地
 黃二兩半入砂仁六錢白茯苓二兩絹袋
 盛入磁罐酒煮七次去茯苓砂仁不用榨
 地黃為膏聽用天門冬去心麥門冬去心
 人參去蘆各一兩二錢夏月加五味子七
 錢各不犯鐵器為末同地黃膏入酒米糊
 丸如小豆大每服八九十九丸空心鹽湯下
 冬月酒下女人去龜板加當歸二兩以乳
 煮糊為丸男子遺精女人帶下並加牡蠣
 粉一兩○世醫用陽藥滋補非徒無益為

害不小蓋邪火只能動欲不能生物龜板
 黃蘗補陽補陰為河車之佐加以杜仲補
 腎強腰牛膝益精壯骨四味通為足少陰
 經藥古方加陳皮名補腎丸也生地黃涼
 血滋陰得茯苓砂仁同黃蘗則走少陰白
 飛霞以此四味為天一水生水丸也天麥門
 冬能保肺氣不令火炎使肺氣下行生水
 然其性有降無升得人參則鼓動元氣有
 升有降故同地黃為固本丸也又麥門冬
 人參五味子三味名生脈散皆為肺經藥
 此方配合之意大抵以金水二臟為生化
 之源加河車以成大造之功故也一人病
 弱陽事大痿服此二料體貌頓異連生四
 子一婦人年六十已衰僊服此壽至九十
 尤強健一人病後不能作聲服此氣壯聲
 出一人病痿足不任地者半年服此後能
 遠行○諸
 證辨疑

補益勞傷 精敗面黑用菘蓉四兩水煮令爛薄細切研精羊肉分爲四度下五味以米煮粥空

心食。藥性論。

耐老益氣 久服不飢麻子仁二升大豆一升熬香爲末蜜丸日二服。藥性論。

補虛精氣 黃精枸杞子等分搗作餅日乾爲末煉蜜丸梧子大每湯下五十九。方賢奇效良

方

五勞七傷 白羊頭蹄一具淨治更以稻草燒烟薰令黃色水煮半熟納胡椒畢撥乾薑各一兩葱豉各一升再煮去藥食

日一具七日即愈。千金

五勞七傷 吐血咳嗽烏鴉一枚栝樓穰一枚白礬少許入鴉肚中縫紮煮熟作四服。壽域神

方

本草類方

虛損 卷二

藥

五勞七傷 房事衰弱枸杞葉半斤切粳米二合豉汁和煮作粥日食之良。經驗方

男婦勞瘦 青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取升半去滓入器中煎成膏丸如梧子大

每空心及隨時溫酒吞下二十九。斗門方

五勞七傷

五勞七傷

五勞七傷

五勞七傷

五勞七傷

五勞七傷

本草類方卷三

療瘥第三十五

骨蒸勞病

外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑之中必因患後得之骨肉日消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跌腫起石膏十兩研如乳粉水和服方寸七日再以身涼為度。外臺秘要

骨蒸發熱

雄黃末一兩入小便一升研如粉乃取黃理石一枚方圓一尺者炭火燒之三食頃濃淋汁於石上置薄體于上患人脫衣坐之衣被圍住勿令洩氣三五度差。外臺秘要

鬼氣瘥病

停久臭河日日溫服之。集驗方

本草類方

瘥瘥

卷三

勞瘥有蟲

礪砂礪砂兔屎等分為末蜜九梧子大每服七丸生甘草一分新水一鍾搥汁送下自朔至望五更時令病人勿言服之。乾坤秘鑑

尸瘥中惡

子母秘錄用亂髮如雞子大燒研水服。一方用亂髮灰半兩杏仁半兩去皮尖研煉蜜九梧子大每溫酒日下二三十九

傳尸勞瘥

豬腰子一對童子小便二盞無灰酒一盞新瓷甌盛之泥封炭火溫養自戌至子時止待五更初溫熟取開飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦怯者亦可用之蓋以血養血絕勝金石草木之藥也。邵真人經驗方

尸瘥鬼瘥

下部蝕瘡炒鹽布裹坐慰之。藥性論

肝勞生蟲

眼中赤脉吳茱萸根為末一兩半粳米半合雞子白三個化蠟一兩半和丸小豆大

每米湯下三十
丸當取蠱下

冷勞久病

茅香花艾葉四兩燒存性研木粟米飯九
梧子大初以蛇床子湯下二十九至三十
丸微吐不妨後用棗湯

勞瘵熏法

甘松六兩玄參一斤為
末每日焚之。奇效方

燒香治瘵

經驗方用玄參一斤甘松六兩為末煉蜜
一斤和勻入瓶中封閉地中埋罨十日取
出更用灰末六兩煉蜜六兩同和入瓶更
罨五日取出燒之常令開香疾自愈頌曰

骨蒸鬼氣

初入瓶中封固煮一復時破瓶取搗入
蜜別以瓶盛埋地中罨過用亦可熏衣
童子小便五大斗澄清青蒿五斗八九月
棘帶子者最好細剉相和納大釜中以猛
火煎取三大斗去滓漉釜令淨再以微火
煎可二大斗入猪膽一枚同煎一大斗半

本草類方

卷三

瘵

去火待冷以瓷器盛之每欲服時取甘草
二三兩炙熟為末以煎和搗干杵為丸空
腹粥飲下二十九漸加至三

鬼疰勞氣

芥子三升研末絹袋盛入三斗酒
中七日溫服一日三次。廣濟方

骨蒸勞熱

張文仲方用生地黃一斤搗三度絞盡分
再服若利即減之以涼為度。外臺秘要

骨蒸久冷

羊內一斤山藥一斤各爛煮研如
泥下米煮粥食之。飲饈正要

赤電見俗名土瓜焙為末
每酒服一錢。十藥神方

傳尸勞瘵

桃仁一合爛研煎
湯服之。急效方

獨頭蒜一枚和雄黃杏仁研為丸空腹飲
下三九靜坐少時當下毛出即安。孟詵

鬼疰心痛

食療
本草

鬼毒風氣

傳尸鬼氣

咳嗽痰癖注氣血氣不通日漸消瘦桃仁一兩去皮尖梓碎水一升半煮汁入米作

粥空心食之

鬼疰腹痛

不可忍者獨頭蒜一枚香墨如棗大搗和醬汁一合頓服。禾類鈴方

五種尸注

飛尸者遊走皮膚洞穿臟腑每發刺痛變動不常也遁尸者附骨入肉攻鑿血脈每發不可見死尸聞哀哭便作也風尸者淫躍四末不知痛之所在每發恍惚得風雪便作也沉尸者纏結臟腑衝引心脅每發絞切遇寒冷便作也尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每發氣至則大作也並

是身中尸鬼引接外邪宜用葱艾葉煎到數劑煮取濃汁煎稠每服雞子大許溫酒化下一日二三服。財後方

用龜煮取肉和葱椒醬調煮食補陰降火治虛勞失血咯血咳嗽寒熱累用經驗。

勞瘵失血

用龜煮取肉和葱椒醬調煮食補陰降火治虛勞失血咯血咳嗽寒熱累用經驗。

本草類方

卷三

吳球便民食療

尸疰鬼疰

乃五尸之一又挾鬼邪為祟其病變動有三十六種至九十九種大畧使人寒熱淋瀝沉沉默默不知所苦而無處不惡累年積月以至於死死後復傳傍人急以桃仁五十枚研泥水煮取四升服之取吐吐不盡三四日再吐。財後方

用鰻鱺二斤治淨酒二盞煮熱入鹽醋食之。聖惠

治傳尸骨蒸癯瘵肺癆疰疰鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘵血月閉痲痺下腫小兒驚癇客忤大人中風中氣狐狸等症用蘇合香油一兩安息香末

骨蒸勞瘦

治傳尸骨蒸癯瘵肺癆疰疰鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘵血月閉痲痺下腫小兒驚癇客忤大人中風中氣狐狸等症用蘇合香油一兩安息香末

蘇合香丸

治傳尸骨蒸癯瘵肺癆疰疰鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘵血月閉痲痺下腫小兒驚癇客忤大人中風中氣狐狸等症用蘇合香油一兩安息香末

三兩以無灰酒熬成膏入蘇合油內白朮香附子青木香白檀香沉香丁香麝香畢撥訶梨勒煨去核硃砂烏犀角鎊各二兩

龍腦薰陸香各一兩為末以香膏加煉蜜

撥訶梨勒煨去核硃砂烏犀角鎊各二兩龍腦薰陸香各一兩為末以香膏加煉蜜

和成膏蠟紙包收每服旋花梧子大早朝
取井華水溫冷任意化服四九老人小兒

一丸。惠民
和劑局方

冲發心脅刺痛纏綿無時厄子
三七枚燒末水服。肘後方

五尸疰病

最殺勞虫用真川椒紅色者去子及合口
以黃草紙二重隔之炒出汗取放地上以
砂盆蓋定以火灰密遮四旁約一時許為

細末去殼以老酒浸白糕和九梧子大每
服四十丸食前搗湯下服至一斤其疾自

愈此藥兼治諸痺用肉桂煎湯下腰痛用
茴香湯下腎冷用鹽湯下昔有一人病此

遇異人授是方服至二斤吐出一虫如蛇
而安遂名神授丸

。陳言三因方

尸注鬼注

其病變動乃白三十六種至九十九種使
人寒熱淋瀝恍惚默默不的知所苦累年

本草類方

積月以至於死復傳親人宜急治之用桑
樹白皮曝乾燒灰二斗着甑中蒸透以釜

中湯三四斗淋之又淋凡三度極濃澄清
止取二斗以漬赤小豆三斗一宿曝乾復

漬灰汁盡乃止以豆蒸熟或羊肉或鹿肉
作羹進此豆飯初服一升至二升取飽微

者三四斗愈極者七八斗愈病去時體中
自覺疼痛淫淫若根本不盡再為之神效

方也。
肘后方。

尸注中惡

心腹痛刺沉黯錯亂用烏曰根皮煎濃汁
一合調硃砂末一錢服之肘后方無味砂

滄鮫魯散

頌曰胡洽治五尸鬼疰百毒惡氣絞魚皮
炙硃砂雄黃金牙蜀椒細辛鬼曰乾姜莽
草天雄麝香雞舌香各一兩貝母半兩蜈
蚣蚺蜢各炙二枚為末每服半錢溫酒服

類方

頌曰

追勞取蟲

鬼疰用鮫魚皮炙乾角鹿角犀角麝香蜈蚣雄黃硃砂乾姜蜜椒蕤荷根等分為末酒服方寸匕日三服亦可佩

用啄木禽一隻硃砂四兩精豬肉四兩飯令一晝夜將二味和勻餵之至盡以鹽泥固濟煨一夜五更取出破開入銀石器內研末以無灰酒入麝香少許作一服須謹候安排待虫出速鉗入油鍋煎之後服局方

嘉禾散一劑
胡雲翽經驗方

明月丹

治勞瘵追虫用兔屎四十九粒礪砂如兔屎大四十九粒為末生蜜丸梧子大月望前以水浸甘草一夜五更初取汁送下七九有虫下急鉗入油鍋內煎殺三日不下再服。蘇

本草類方

瘵症

三

骨蒸傳尸

用羊肉一掌大煮葱皂荚一尺炙以無灰酒一斤銅鑑內煮三五沸去滓入黑錫一兩令病人先啜肉汁乃服一合當此虫如馬尾為效。外臺

五尸注病

發則痛變無常昏花沉重纏結臙膈上衝心脅即身中尸鬼接引為害也雄黃大蒜各一兩梓瓦彈子大每熱酒服一丸。肘后方

虛勞瘵疾

烏鴉一隻絞死去毛腸入人參片花椒各五錢縫合水煮熟食以湯下鴉骨參椒焙研棗肉丸服。

骨蒸勞傷

與球便民食瘵。豬脊髓一條豬膽汁一枚童便一盞柴胡前胡胡黃連烏梅各一錢茱白七根同煎七分溫服不過三服具效如神。瑞竹堂方

勞極骨蒸

亦名伏連傳尸此方甚驗用人尿小便各一升新粟米飯五升六月六日麴半餅以

餅盛封密室中二七日並消亦無惡氣每旦服一合午再服之神效。張文仲傳急

虛損勞瘵

德生丹用無病婦人乳三酒盃將磁碟晒極熱置乳于中次入麝香末少許木香末二分調勻服後飲濃茶一酒盃即陽敗次日服接命丹接命丹用乳三酒盃如前晒碟盛人乳并人兜末一具調服服畢而膝俱赤如醉思睡只以白粥少少養之。集

方簡

天靈蓋散

追取勞虫天靈二指大以檀香煎湯洗過酥炙一氣呪七遍云雷公神電母聖逢傳尸便須定急急如律令尖板榔五枚阿魏二分麝香三分辰砂一分安息香三分甘遂三分為末每服三錢用童便四升入銀石器內以葱白薤白各三七莖青蒿二握

本草類方

卷三

三

桃枝甘草各二莖五寸長者柳枝桑枝酸榴枝各二莖七寸長同煎至一升分作二次五更初調服前藥一服虫不下約人行十里又進一服天明再進取下虫物名狀不一急擒入油鑊煎之其虫嘴青赤黃色可治黑白色難治然亦可斷傳染之患凡修合先須齋戒于遠處淨室勿令病人聞藥氣及雞犬貓畜孝子婦人一切觸穢之物見之虫下後以白粥補之數日之後夢人哭泣相別是其驗也。上清紫庭仙方取人尿乾者燒令外黑納水中澄清每旦服一小升薄晚服童便一小升以嗟為度既常服可就作坑燒尿三升夜以水三升漬之稍稍減服此方神妙非其人莫浪傳之。外

骨蒸熱勞

臺秘要

河車丸

治婦人瘵疾勞瘵虛損骨蒸等症用紫河車初生男子者一具以長流水中洗淨熟

煮擘細焙乾研山藥二兩人參一兩白茯苓半兩爲末酒糊丸梧子大麝香養七日

每服三五丸溫服鹽湯下○汞類鈴方

尸疰中惡

近死尸惡氣入腹終身不愈用阿魏三兩每用二錢拌麵裹作餛飩十餘枚煮熟食之日三服至三七日永

五尸注痛

腹痛脹急不得喘息上攻心胃旁攻兩脅痛或礫塊涌起用商陸根熬以麝盛更互慰之取效○肘后方

骨蒸煩熱

青蒿一握猪膽汁一枚杏仁四十個去皮尖炒以童子小便一大盞煎五分空心溫服○十便良方

骨蒸發熱

多取諸朽骨洗淨土氣釜煮入桃柳枝各五斗煮枯再入棘針三斗煮減半去滓以

本草類方

卷三 療疰

三

酢漿水和之煮三五沸令患者正坐散髮以湯從頂淋之唯熱爲佳若心悶可少進

冷粥當得大汗出惡氣汗乾乃粉身食鼓粥○拾遺

骨蒸作熱

挑仁一百二十枚留尖去皮及雙仁杵爲丸平且井花水頓服之令盡量飲酒至醉仍須任意喫水隔日一劑百

骨蒸發熱

二歲童便五升煎取一升以蜜三匙和之每服二碗半日更服此後常取自己小便服之輕者二十日重者五十日瘥二十日

後當有虫如蜘蛛在身常出十步內聞病人小便臭者瘥也台州丹仙觀道士張病此自服神驗○孟詵必效

本草類方卷三

邪祟第三十六

精魅鬼病

水銀一兩漿水一升炭火煎滅三分取水銀一豆許神符裹吞之晚又服一二日止

○廣濟方

失心風疾

水銀一兩藕節八個研成砂子丸如芡子大每服二九磨刀水下一二服○經驗方

女人病邪

女人與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者雄黃一兩粉脂二兩溶化以虎爪攪之九

如彈子夜燒於籠中令女坐其上以被蒙之露頭在外不過三劑自斷仍以雄黃人參防風五味子等分為末每日

辟禳魘魔

井水服方寸匕取愈○肘后方以雄黃帶頭上或以棗許繫左腋下終身不魘○張文仲方

本草類方

邪祟卷三

毒

家有邪氣

用真雄黃三錢水一盃以東南桃枝呪酒滿屋則絕迹勿令婦女見知○集簡方

卒中邪魔

雄黃末吹鼻中○集驗方

鬼擊成病

腹中煩滿欲絕雄黃粉酒服一刀圭日三服化血為水也○孫真人千金方

鬼魅

獺肝木每服方寸匕日三○千金翼

本草類方卷三

寒熱第三十七

風熱

痛用雄黃乾姜各等分爲末
啗鼻左痛啗右右痛啗左

骨蒸熱病

芒消末水服方寸匕
日二服良○千金方

虛勞發熱

柴胡人參等分每服三錢
薑棗同水煎服○澹寮方

虛勞客熱

枸杞根爲末白湯調服有
痼疾人勿服○千金方

婦人肌熱

血虛者吃力伽散用白朮白茯苓白芍藥
各一兩甘草半兩爲散姜棗煎服○王壽

外臺
秘要

虛勞發熱

愚魯湯用上黨人參銀州柴胡各三錢大
棗一枚生姜三兩水一鍾半煎七分食遠

本草類方

寒熱
卷三

毒

溫服日再服以愈
爲度○奇效良方

虛勞客熱

麥門冬煎湯類
飲○本草衍義

發熱口乾

小便赤澀取甘蔗去皮嚼汁
燕之飲漿亦可○外臺秘要

血虛發熱

當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤
面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無

力此血虛之候也得於肌困勞役語象白
虎但脈不長實爲異耳若誤服白虎湯卽

死宜此主之當歸身酒洗二錢綿黃芪蜜
炙一兩作一服水二鍾煎一鍾空心溫服

日再服○東
垣蘭室秘藏

服丹發熱

有人服伏火丹藥多腦後生瘡熱氣冉冉
而上一道人教灸風市數十壯而愈仍時

復作又教以陰煉秋石用大豆黃卷煎湯
下遂愈和其陰陽也○王清明餘話方

虛勞寒熱

肢體倦痿不拘男婦八九月青蒿成實時
采之去枝梗以童子小便浸三日晒乾為
末每服二錢烏梅一箇煎湯服○靈苑方

熱勞如燎

地骨皮二兩柴胡一兩為末每服
二錢麥門冬湯下○聖濟總錄

溪毒寒熱

東間有溪毒中人似射工但無物初病惡
寒發熱煩懊骨節強痛不急治生虫食臟
殺人用雄牛膝莖紫色節大者一把以酒
水各一盃同鷓鴣絞汁溫飲日三服○肘後

方

婦人發熱

欲成勞病肌瘦食減經候不調地龍煎用
乾地黃一斤為末煉蜜丸梧子大每酒服
五十九○

骨蒸積熱

保慶集
漸漸黃瘦大黃四分以童子小便五六合
煎取四合去滓空腹分為二服如人行五

本草類方

車再服○
廣利方

寒熱
卷三

寒

婦人勞熱

心忪地黃煎用生乾地黃熟乾地黃等分
為末生薑自然汁入水相和打糊丸梧子
大每服三十九用酒或酒醋茶湯
下亦可日二服覺臍滿虛冷則晨服八味
丸地黃補陰血故也○婦人良方

虛火背熱

虛火上行背內熱如火炙者附
子末津調塗湧泉穴○摘玄方
薑附湯治體虛中寒昏不知人及臍腹冷
痛霍亂轉筋一切虛寒之病生附子一兩

中寒昏困

去皮臍乾薑炮一兩每服三錢水
二鍾煎一鍾溫服○和濟局方

婦人骨蒸

煩熱晝汗口乾引飲氣喘天門冬十兩麥
門冬八兩並去心為末以生地黃三斤取
汁熬膏和丸梧子大每服五十九以
逍遙散去甘草煎湯下○活法機要

諸虛寒熱

冷痰虛熱冷香湯用沉香附子炮等分水一盞煎七分露一夜空心溫服。王好古

醫壘元戎

上氣發熱

因奔越走馬後飲冷水所致者竹葉三斤橘皮三兩水一斗煎五升細服三服一劑

後方

脾勞發熱

有虫在脾中為病令人好嘔者取棗行棗黃根大者一尺大春子八升橘皮二兩三

物咬咀以酒一斗浸一宿微火薄暖之絞去滓平旦空腹服一升取虫下或死或半爛或下黃汁凡作藥時切忌言語。剛繁方

治風勞面色青白肢節沉重脊間痛或寒或熱或燥或噎思食不能食破虫侵蝕證

三木節散

狀多端天靈蓋酥炙研二兩牛黃人中白焙各半兩麝香二錢為末別以樟木瘤節

皂莢木瘤節槐木瘤節各為末五兩每以三錢水一盞煎半盞法滓調前末一錢五

本草類方

寒熱

卷三

更願服取下虫

風熱衝頂

熱問訶黎二枚為末芒硝一錢同入醋中醱令消磨塗熱處。外臺秘要

卒熱勞疾

皂莢續成一尺以土酥一大兩微塗緩炙酥盡搗篩蜜丸梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十丸重者不

過兩劑愈。崔元亮上方

身體發熱

不拘大人小兒用鷄卵三枚白蜜一合和服立瘥。普濟方

急勞疾瘳

日晚卽葉熱驚悸煩渴用獭豬肝一具切絲生甘草末十五兩於鑊中布肝一重炙甘草一重以盡為度取童便五升文武火

煮乾搗爛衆手丸梧子大每空心米飲下

者乾搗爛衆手丸梧子大每空心米飲下

二十九漸加三十九。聖惠方

肺勞風熱

止渴去熱天門冬去皮心煮食或曝乾爲末蜜丸服尤佳亦可洗面○孟詵食療

本草類方

寒熱
卷三

夫

根勞風熱

木蜜丸服尤佳亦可洗面○孟詵食療

本草類方卷之三

吐血衄血三十八

衄血不止

白土末五錢并華水調服
二服除根。瑞竹堂方

衄血不止

葉氏用新汲水隨左右洗足即止累用有
效。一方用冷水啜面。一方冷水浸帛
貼額上以熨斗熨之立止。一方用冷水

一瓶淋射頂上及亞門止或以濕帛貼之

吐血不止

石榴根下地龍糞研末
新汲水服三錢。聖惠

吐血衄血

伏龍肝未半升新水一
升淘汁和蜜服。廣利方

吐血衄血

白膠香蛤粉等分爲末姜
汁調服。玉璆百一選方

吐血瀉血

心腹痛伏龍肝地爐土多年爛壁土等分
每服五錢水二盃煎一盃澄清空心服日

本草類方

卷三
吐血衄血

堯

普濟方

吐血不止

湯上色白瓷器末二錢皂莢子仁煎
下連服三劑即愈。聖濟方

鼻衄不止

許立止。經略方
定州白瓷細末吹少

吐血不止

金墨磨汁同萊菔汁飲或
生地黃汁亦可。集簡方

衄血不止

眩冒欲死濃墨汁滴
入鼻中。梅師方

衄血不止

枯礬末吹之
妙。聖濟方

熱病衄血

出數升者取好墨爲末雞子白丸梧子大
用生地黃汁下一十九少頃再服仍以

蔥汁磨墨滴入鼻內
卽止。外臺秘要

吐血咯血

鍋底墨炒過研細并華水服
二錢連進三服。濟急方

衄血不止 百草霜末吹之立止也

衄血吐血 劉長春經驗方治吐血及傷酒食醉飽低頭損肺臟吐血汗血口鼻妄行但聲未失者用鄉外人家百草霜末糯米湯服二錢○一方百草霜五錢槐花末二兩每服

二錢茅根湯下

鼻衄不止 鈿白霜末新汲水服一字○十全博救方

鼻衄不止 胡粉炒黑醋服一錢卽止○聖惠方

吐血咯血 服一錢○新汲水服一錢○經驗方

卒暴吐血 石灰于刀頭上燒研井水下二錢○普濟方

諸般吐血 砂半兩金箔四片蚯蚓三條同研丸小豆砂兩金箔四片蚯蚓三條同研丸小豆

本草類方 吐血衄血

大每冷酒下二九○聖惠方

膽熱衄血 血上妄行水銀硃砂麝香等分爲末每服半錢新汲水下○宣明方

鼻衄頭痛 心煩石膏牡蠣一兩爲末每新汲水服二錢并滴鼻內○普濟方

吐血損肺 鍊成鍾乳粉每服二錢糯米湯下立止○十便良方

吐血衄血 升搗羅如麩每服一錢白湯下○斗門方

吐血不止 貝母炮研溫漿水服二錢○聖惠方

鼻出衄血 胡索末綿裹塞耳內左衄塞右衄塞左○普濟方

吐血嗽血 肺損者金星石銀星石玄精石不灰木陽起石雲母石等分用坩鍋一箇鋪冬月水

牛糞一二寸鋪藥一層鋪灰二寸又藥一層重重如此以灰蓋之鹽泥固濟用炭一

秤火煨一日夜埋土中一夜取出藥塊去
灰爲末每一兩入龍腦麝香各半錢阿膠
二錢半炒每服一錢糯米

衄血不止

湯下日三服○聖惠方
貝母炮研末漿水服二
錢良久再服○普濟方

花藥石散

治五內崩損噴血出斗升用此治之花藥
石煨存性研如粉以童子小便一鍾男入
酒一半女入醋一半煎溫食後調服三錢
甚者五錢能使瘀血化爲黃水後以獨參
湯補之○葛可

吐血衄血

黃芩三兩水三升煎一升半每溫服一
蓋亦治婦人漏下血○麗安時卒病論
或發或止積熱所致黃芩一兩去中心黑
朽者爲末每服三錢水一盞煎六分渣
溫服○

聖惠方

本草類方

吐血衄血

全

吐血衄血

胡黃連生地黃等分爲末猪胆汁九梧
子大臥時茅花湯下五十九○普濟方
黃連一兩搗散每服一盞水七分入豉二
十粒煎至五分去渣溫服大人小兒皆治

○簡要
濟衆方

吐血不止

紫參人參阿膠炒等分爲末烏梅湯服一
錢一方去人參加甘草以糯米湯服○聖
惠方

吐血衄血

山漆一錢自嚼米湯送下或以五
分加入八核湯○瀨湖集簡方

鼻衄不止

香薷研末水服一
錢○聖濟總錄

鼻衄不止

津調白及末塗山根上仍以
水服一錢立止○經驗方

鼻衄不止

茅根爲末米泔水
服二錢○聖惠方

吐血不止 千金翼用白茅根一握水煎服之
婦人良方用根洗搗汁日飲一合

鼻衄不止 一錢○普濟方
黃芪二錢半紫背浮萍五錢為末

吐血不止 每服一錢姜蜜水下○聖濟總錄
桔梗為末水服方寸七日四

吐血下血 服一加生犀角屑○普濟方
雞蘇莖葉煎汁

吐血下血 飲之○梅師方
桔梗為末水服方寸七日四

鼻出衄血 服一加生犀角屑○普濟方
香附末一錢米飲下

肺破咯血 日二服○百一選方
眩冒欲死青箱子汁三合

鼻衄不止 灌入鼻中○貞元廣利方
丹溪用童子小便調香附末二錢服○澹

氣鬱吐血 寮方治吐血不止莎草根一兩白茯苓半
世血衄血

本草類方 卷三 全

兩為末每服二錢陳粟米飲下

衄血不止 梅師方用雞蘇五合香豉二合同搗控如
棗核大納鼻孔中即止○聖惠方用雞蘇

二兩防風一兩為末每服二錢溫水下仍
以葉塞鼻○普濟方用龍腦薄荷生地黃

等分為末
冷水服

吐血不止 經驗方用荆芥連根洗搗汁半盞服乾穗
為末亦可○聖惠方用荆芥穗為末生地

黃汁調服二錢

口鼻出血 如湧泉因酒色太過者荆芥燒
研陳皮湯服二錢不過二服也

衄血吐血 用鬱金為末井水服二錢甚
者再服○黎居士易簡方

衄血不止 赤芍藥為末水服二錢
錢七○事林廣記

虛勞吐血

甚者先以石灰散止之其人必困倦法當補陽生陰獨參湯主之好人參一兩肥廩

衄血不止

五六枚水二鍾煎一鍾服熱睡一覺即減當歸焙研末每服一錢可久十藥神書

心熱吐血

口乾用刺薊葉及搗根絞取汁每頓服二小盞○聖惠方

男女血病

九仙驅紅散治嘔吐諸血及便血婦人崩中神效用積雪草五錢當歸酒洗卮子仁酒炒蒲黃炒黃連炒條黃芩酒炒生地黃酒洗陳槐花炒各一錢上部加藕節一錢五分下部加地榆一錢五分水二鍾煎一鍾服神效此方得之甚秘此草與本草主治不同不可曉也

○董炳集驗方

衄血不止

薄荷汁滴之或以乾者水煮綿裹塞鼻○許學士本事方

本草類方

卷三 吐血衄血

金

吐血下血

因七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻俱出心肺脈破血如涌泉須臾不救用人參焙側柏葉蒸焙荆芥穗燒存性各五錢為末用二錢入飛羅麩二錢以新汲水調如稀糊服少頃再啜一服

衄血咯血

立止○華陀中藏經
白芍藥一兩犀角末二錢半為末新水服一錢七血止為限○古今錄驗

衄血不止

人參柳枝寒食采者等分為末每服一錢東流水服日三服無柳枝用蓮子心○聖濟總錄

諸失血病

紫蘇不限多少入大鍋內水煎令乾去渣熬膏以炒熟赤豆為末和九梧子大每酒服之○斗門方

男女吐血

地榆三兩米醋一升煮十餘沸去渣澆食前稍熱服一合○聖惠方

吐血不止 天茄子苗半兩人參二錢半爲末 每服二錢新汲水下。聖濟總錄

鼻衄不止 生車前葉搗汁飲之 甚善。圖經本草

衄血不止 燈心二兩爲末入丹砂一錢 米飲每服二錢。聖濟總錄

鼻衄不止 穀精草爲末熟麩湯 服二錢。聖惠方

衄血不止 麥門冬去心生地黃各五 錢水煎服立止。保命集

鼻衄不止 剪金花連莖葉陰乾濃 煎汁溫服立效。指南

吐血衄血 諸方不效者麥門冬去心一斤搗取自然 汁入蜜二合作二服卽止。活人心統

內熱吐血 青黛二錢新汲 水下。聖惠方

吐血不止 白雞冠花醋浸煮七次爲末 每服二錢熱酒下。經驗方

本草類方 卷三 吐血衄血 齒

鼻中衄血 青蒿搗汁服之并塞鼻 中極驗。衛生易簡方

鼻衄不止 就以所出血調白芷末 塗山根立止。簡便方

鼻出衄血 乾地黃地龍薄荷等分爲末 冷水調下。孫兆秘寶方

肺損吐血 或舌上有孔出血生地黃八兩取汁童便 五合同煎熟入鹿角膠炒研一兩分三服

吐血便血 地黃汁六合銅器煎沸入牛皮膠一兩待 化入姜汁半盃分三服便止或微轉一行

聖惠方

男女吐血 綴而草卽地松晒乾爲末每服一二錢 以茅花泡湯調服日二次。衛生易簡

吐血不止 磁器盛入甌蒸令膠消服之。梅師 地黃汁一升二合白膠香二兩以

鼻衄不止 馬蹄決明子末水調貼 胸心止鼻洪。日華

心熱吐衄

脉洪數者生芩汁半升熬至一合入大黃末一兩待成膏丸梧子大每熟水下五丸

至十九。

聖惠方

鼻衄不止

蒼耳莖葉搗汁一
小盞服。聖惠方

鼻血不止

艾灰吹之亦可以艾
葉煎服。聖惠方

忽然吐血

煮二升服或心衄或內崩熟艾三團水五升
煮二升服一方燒灰水服二錢。千金方

肺熱咯血

青餅子用青黛一兩杏仁以牡蠣粉炒過
一兩研勻黃蠟化而作三十餅子每服一
餅以乾柿半個夾定濕昏裏煨香嚼
食粥飲送下日三服。華陀中藏經

鼻衄不止

糊葉搗汁一小盞頓
服即止。聖惠方

諸般血病

水蘆花紅花槐花白雞冠花茅花等分
水二鍾煎一鍾服。萬表積善堂方

本草類方

卷三

金

吐血不止

蘆荻外皮燒灰勿令白為末入蚌粉少許
研勻麥門冬湯服一二錢三服可救一人

○聖
惠方

吐血痔血

向東叢荷根一把搗汁
三升服之。肘後方

鼻衄不止

累醫不效粟殼燒存性研
末粥飲服二錢。聖惠方

肺壅鼻衄

蒼葉燒灰白麩三錢研勻并
花水服二錢。聖濟總錄

衄血不止

枇杷葉去毛焙研末茶
服一二錢日二。聖惠

吐血衄血

治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之大
黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升
熱服取利。張

仲景金匱玉函

肺病吐血

新百合搗汁和水飲之
亦可煮食。衛生易簡

吐血不止

天南星一兩剉如豆大以醋灰汁浸一宿洗焙研末每服一錢以自然銅磨酒調下

○勝金方

吐血刺痛

川大黃一兩為散每服一錢以生地黃汁一合水半盞煎三五沸無時服○簡要濟

方衆

陽虛吐血

生地黃一斤搗汁入酒少許以熟附子一兩五錢去皮臍切片入汁內石器煮成膏

取附片焙乾入山藥三兩研末以膏和搗丸梧子大每空心米飲下三十九丸葛察

判妻苦此疾百藥皆試得此而愈屢發屢效○余居士選奇方

吐血不止

栝樓泥固煨存性研三錢糯米飲服日再服○聖惠錄

鼻衄不止

鯉魚鱗炒成灰每冷水服二錢○普濟方

本草類方

吐血衄血卷三

矣

老幼吐血

蒲黃末每服半錢生地黃汁調下量人加減或人髮灰等分○聖濟總錄

鼻血不止

服藥不應用蒜一枚去皮切如泥作錢大餅子厚豆許左鼻血出貼左足心右鼻

出血貼右足心兩鼻出俱貼之立療○簡要濟衆方

鼻衄不止

服藥不應獨聖散用糯米微炒黃為末每服二錢新汲水調下仍吹少許入鼻中○簡要濟

衆方

鼻衄不止

韭根葱根同搗棗大塞入鼻中頻易兩三度即止○千金方

心熱吐血

頓服立療○廣利方

內損吐血

飛羅麩畧炒以京墨汁或藕節汁調服二錢○醫學集成

大衄血出

口耳皆出者用白麩入鹽少許冷水調服三錢○普濟方

鼻中衄血 諸葛菜生搗汁飲。十便良方

肺熱衄血 蒲黃青黛各一錢新汲水服之。或去青黛入油髮灰等分生地黃汁調下。簡便方

勞心吐血 糯米半兩蓮子心七枚為末酒服孫仲盈云曾用多效或以墨汁作丸服之。澹寮

吐血不止 翻白草每用五七科又咀水二鍾煎一鍾空心服

吐血不止 白藥燒存性糯米飲服三錢。聖惠方

積熱吐血 馬屁勃為末沙糖丸如彈子大每服半丸冷水化下。補珍方

衄血不止 生葛搗汁服三錢即止。聖惠方

少小鼻衄 小勞輒出桑耳然焦搗末每發時以杏仁大塞鼻中數度即可斷。肘後方

鼻衄不止 稀條蘘真麻油人鼻取嚏即愈有人一夕衄血盈盆用此而效。普濟方

本草類方 卷三 止血衄血 全

鼻中出血 酢和胡粉半棗許服。又法用醋和土塗陰囊乾即易之。千金方

鼻血不止 蝸牛焙乾一枚烏賊骨半錢研末吹之。聖濟總錄

鼻衄不止 藕節搗汁飲并滴鼻中

吐血不定 茜根一兩搗末每服二錢水煎冷服亦可和二錢服。周應簡要濟眾方

鼻衄不止 乾姜削尖煨寒鼻中即止

吐血不止 陳紅米泔水溫服一鍾日三次。普濟方

吐血不止 煎藥子一兩水煎服。聖惠方

吐血唾血 蒲黃末二兩每日溫酒或冷水服三錢妙。簡要濟眾方

鼻出衄血 血竭蒲黃等分為末吹之。醫林集要

鼻衄不止

寸金散用牆上土馬驥二錢半石州黃藥子五錢為末新水服二錢再服立止。偽鑑生寶

鼻衄不止

生防已末新汲水服一錢仍以前略之。聖惠方

吐血不止

狗杞根子皮為散水煎。聖濟總錄
紫背浮萍焙半兩黃芪炙二錢半為末每服一錢姜蜜水調下。聖濟總錄

鼻衄不止

黃藥子為末每服二錢煎淡膠湯下良久以新水調麪一匙頭服之兵部手集方
頓服。簡要濟衆方

咯血吐血

百一選方用蒲黃黃藥子等分為末掌中舐之。王侯博濟方用黃藥子漢防已各一兩為末每服一錢小麥湯食後調服一日二服

本草類方

卷三 吐血衄血
九節菖蒲末白麪等分每服三錢新汲水下一日一服。聖濟錄

天

鼻衄不止

粟米粉水煎服之。普濟

吐血燥渴

紅棗白藥各燒存性等分為末糯米飲服或煎湯洗鼻頻頻灌藥令入。經驗良方為末井水丸彈子大每溫水化服一丸。聖濟錄

吐血衄血

鏡面草水沈括酒服。宋氏集驗方
龍鱗碎荔研水飲之。聖濟錄

鼻衄不止

蘆薈搗汁半盞入酒少許熬服并以汁注鼻中皆良或以酒煎沸入蘆薈再煎飲之。衛生易簡方

鼻出衄血

類飲漸二升仍以真麻油或蘿蔔汁滴入之。證治要訣

鼻衄不止

浮萍末吹之。聖惠方

肺疽吐血

因咳辛辣熱物致傷者用紅棗連核燒存性百藥煎煨過等分為末每服二錢米飲下。

吐血不止

嫩荷葉七箇插水服之。聖惠。又方乾荷葉生蒲黃等分為末每服三錢桑白皮煎湯調下。肘後方用經霜敗荷燒存性研末新水服二錢

卒暴吐血

雙荷散用藕節荷蒂各七箇以蜜少許搗爛用水二鍾煎八分去渣溫服或為末丸服亦可。聖惠

勞心吐血

蓮子心七箇糯米二十一粒為末酒服。此臨安張上舍方也。是齋百一方

本草類方

吐血衄血

卷三

肺病咯血

杏仁四十個以黃蠟炒黃研入青黛一錢作餅用柿餅一個破開包藥濕帛裏煨熟食之取效。丹溪方

吐血咯血

荷葉焙乾為末米湯調服二錢一日二服以知為度。聖濟總錄用敗荷葉蒲黃各一兩為末每服二錢

吐血咯血

澹寮方用白膠香銅青各一錢為末入乾柿內帛包煨熟食之。聖惠方用白膠香切片炙黃一兩新綿一兩燒灰為末每服一錢米飲下

吐血下血

肘後用桂心為末水服方寸匕。王璆曰此陰乘陽之症也不可服涼藥南陽趙宣德暴吐血服二次而止

衄血不止

其甥亦以二服而安。宣州大栗七枚刺破連皮燒存性出火毒入麝香少許研勻每服二錢溫水下。聖

鼻出衄血

酢榴花二錢半黃蜀葵花一錢為末每服一錢水一盞煎服效乃止。聖濟錄

卒吐血

先食蒸餅兩三箇以餅子為末白湯服三錢日三服。聖濟總錄

衄血不止

柏葉榴花研末吹之。普濟方

吐血衄血

陽乘于陰血熱妄行宜服四生丸陳日華云屢用得效用生荷葉生艾葉生白葉生地黃等分搗爛丸雞子大每服一九水三盞煎一盞去渣服。濟生方

卒然吐血

辦葉為末每服二錢水一盞煎七分和渣服。簡要濟眾

鼻中衄血

鞋韃燒灰吹之立效。貞元廣利方

嘔血熱極

黃藥蜜塗炙乾為末麥門冬湯調服二錢立瘥。經驗方

本草類方

吐血衄血

鼻中衄血

山厄子燒成吹之屢用有效。黎居士易簡方

吐血不止

白膠香為散每服二錢新汲水調下。簡要濟眾

衄血不止

槐花烏賊魚骨等分半生半炒為末吹之。普濟方

吐血不止

晚桑葉焙研涼茶服二錢只一服止後用補肝肺藥。聖濟總錄

吐血不止

紅綿三寸燒灰水服。聖惠方

吐血不止

槐花燒存性入麝香少許研勻糯米飲下三錢。普濟方

吐血不止

白薄昏五張燒灰水服效不可言。普濟方

咯血唾血

槐花炒研每服三錢糯米飲下仰臥一晷取效。朱氏方

吐血鼻血

楮葉搗汁一二升旋溫飲之。聖惠方

吐血咯血

新綿一兩燒灰白膠切片炙黃一兩每服一錢米飲下。普濟方

吐血咯血

柳絮焙研米飲服一錢。經驗方

吐血衄血

好綿燒灰打麩糊入清酒調服之。普濟方

衄血不止

屏風上故帑燒灰酒服一錢卽止。普濟方

吐血不止

張仲景柏葉湯用青柏葉一把乾姜二片阿膠一挺炙三味以水二升煮一升去渣別絞馬通汁一升合煎服一升綿濾一服盡之。聖惠方用柏葉米飲服二錢或蜜丸或水煎服並良

鼻出衄血

五倍子末吹之仍以末同新綿灰等分米飲服二錢

憂患嘔血

煩滿少氣胸中疼痛柏葉爲散米飲調服二方寸匕。聖惠方

本草類方

吐血衄血

鼻血不止

櫻櫚灰隨左右吹之。黎居士方

吐血不止

驚甲蛤粉各一兩同炒黃熟地黃一兩半晒乾爲末每服二錢食後茶下。聖濟錄

衄血不止

蛤粉一兩羅七遍槐花半兩炒焦研勻每服一錢新汲水調下。楊氏家藏方

吐血衄血

並用龍骨末吹入鼻中昔有人衄血一解衆方不止用此卽斷。三因方

病後常衄

小勞卽作蛆蠅十日止石膏五分爲末酒服方寸匕亦可蜜丸日三服。肘後方

嘔血不止

鱧膠長八寸廣二寸炙黃刮二錢以甘蔗節三十五箇取汁調下。經驗

吐血不止

養脫昏燒存性蜜和丸炙實大含化鹽津。集驗

卒然吐血

鳥賊骨末米飲服二錢。聖惠

鼻衄眩暈

欲死者龍骨末吹之。梅師方

空

鼻衄不止

牛耳中垢車前子末等分和勻塞之良。總錄

鼻血時作

乾鹿血炒枯將酒酌薰二三

口鼻出血

用赤馬糞燒灰溫酒服一錢。鈴方

吐血不止

以鴛鴨肝用生犀角生桔梗一兩為末每酒服二錢。總錄

吐血鼻洪

一升。日華子

吐血咯血

黃明膠一兩切片炙黃新綿一兩燒研每服一錢食後米飲服日再。食療

大衄不止

以耳俱出用阿膠炙蒲黃半兩每服二錢水一盞生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩

乳。聖惠

衄血一月

不止刺羊血熱飲卽瘥。聖惠

本草類方

吐血衄血

卷三

吐血不止

千金翼用阿膠炒二兩蒲黃六合生地黃三升水五升煮三升分服。經驗治大人

小兒吐血用阿膠炒蛤粉各一兩辰砂少許為末藕節搗汁入蜜調服

吐血嘔血

五靈脂一兩盧會三錢研末滴水丸芡子大每漿水化服二丸。又治血妄行入胃

吐不止五靈脂一兩黃芪半兩為末新汲水服二錢

鼻血不止

雞矢取有白色半截者燒灰吹之。唐氏經驗方

衄血不止

黃明膠盪熨貼山根至髮際。三因

衄血不止

錄驗用綿裹白馬屎塞之。千金用赤馬糞絞汁飲一二升並滴鼻內乾者浸水亦可

吐血咯血

五勞七傷用水半盞一枚塗帛上陰乾杏仁煮去皮胡桃仁白蜜各一斤香油四兩

同熬乾為末每空心燒酒服一錢匕。乾坤秘鑑

吐血不止

燒白馬通以水研絞汁一升服。梅師方

衄血不止

聖濟總錄用白帟一張接衄血令滿于燈上燒灰作一服新汲水下勿令病人知。儒門事親就用本衄血帟熬蘸點眼內左點右點左此法大妙

鼻衄不止

五七日不住者人中白新瓦焙乾入麝香少許溫酒調服立效。經驗方

鬼擊吐血

胸腹刺痛鼠屎燒末水服方寸匕不省者灌之。肘後方

鼻衄不止

人尿尖燒灰水服一錢并吹鼻中。千金方

嘔血吐痰

心煩骨蒸者人中黃為末每服三錢茜根并竹瀝姜汁和勻服之。丹溪心法

鼻血眩冒

欲死者亂髮燒研水服方寸匕仍吹之。梅師方

本草類方

吐血衄血

叁

鼻出衄血

刀刮指甲細末吹之即止試驗。簡便方

鼻血不止

血餘燒灰吹之立止永不發男用母髮女用父髮。聖惠用亂髮灰一錢人中白五分麝香少許為末

分麝香少許為末

吐血不止

就用吐出血塊炒黑為末每服三分以麥門冬湯調服蓋血不歸元則積而上逆以血導血歸元則止矣

吳球諸證辨疑

塞鼻止衄

猬皮一枚燒末半錢綿裹塞之。聖惠方

大衄久衄

人中白一團雞子大綿五兩燒研每服二錢溫水服。聖惠方

吐血衄血

用紫金沙即露蜂房頂上實處一兩貝母四錢薑薺三錢為末蜜和丸雷丸大每用

一丸水一小盞煎至五分溫服吐血溫酒調服。雲臺方

吐血不止

乾姜爲末童子小便調服一錢良

鼻血不止

黃根艾葉各一兩烏梅肉二錢半爲末煉蜜丸梧子大每烏梅湯下五十九。本事方

本草通方

吐血衄血
卷三

七

