

壽身小社

86251

四

壽身小補目錄

卷五

婦科總論扼要

調經通論證治 五條指方

崩帶淋漏不止證論 指方

辨白瀉遺淋與帶病不同 指方

辨子嗣要論

種子男女調補證治 指方

認胎脈捷要

認分婦脈指要

胎候養胎分男女要論

安胎證治要論 指方

胎前子懸子氣子腫子淋子癩子瘡諸症 指方

胎漏症治總論 指方

胎動欲墮並屢墮胎 指方

胎不長及鬼胎症治 指方

催生要論 指方

臨產要論大略

胞破產難 指方

胞衣不出 指方

交骨不開產門不閉子宮不收三症 指方

小產要論

小產症治 指方

下胎斷產辨要

下胎 指方

斷產 指方

論產後四禁

產後乍寒乍熱 指方

產後蓐勞症治 指方

產後喘促 指方

產後發瘡俗謂中風症 指方

產後惡露不止 指方

產後血崩 指方

產後乳少及乳不通 指方

乳吹乳妬 指方

乳癰乳岩 指方

乳自流出 指方

前陰各病證治 指方

壽小補卷五

貴疏黃兌楣先生手輯

○○婦科總論扼要

謬云能醫十男子不醫一婦人蓋以婦人之病非男子直切痛快而之女子之病自許多難於直切如夫癸之或前或後顏色之或紫或赤或多或少之類又如似受娠而似無如似無孕而疑有又如下部有癰癧處此等皆其常證又或有溼濁而更有下部許多性異處此其所以難於直切也且陰陽之性一達一伏男子性陽諸達於外女子性陰諸伏於內達則易治而少變故男子之病易治也伏則易變而少變故女子之病難療也更有難者又若大貴婦女復以錦帕蒙其首既不能行望形之色又不能盡切脈之巧使脈有弗合未免多問而問之覺繁必謂醫學不精往往並藥不信殊不知問亦非易能善問昔正非醫之善者不能也所以醫貴能明而不宜行耳吾人讀書稽古貴乎融會貫通每讀愈是先生所論婦科準繩全部千奇百變織悉無遺論證則有一伯餘條用方有三伯餘法可謂至周且備無以復加矣然在垂業岐黃而又勤於讀書者自當專習一經藉醫資資則何幸如之余輯是書原為家庭中全不知醫學為庸醫所惑而欲名譽其身者起見故一切引經繁文立奧深義均不列入使其閥門見山直由捷徑以免望洋之嘆如前部之天真璫要論以及陰陽水火括要諸篇於業儒之暇以餘力而細心推求雖婦

科干病萬態又何難哉茲分類若干各有專條諸爲全之應手而極經驗者其中有古方自製有倣照有
變易無不準繩酌理因時制宜而爲近時之捷要曾規耳

調經通論譜 指方

凡婦產時天癸而下百病不生其有不應時者或先或後先期而至陽太旺也爲血中有熱後期而至
陰不足也爲血不盈經先期者當養陰以抑陽後期至者當補陰以益氣又如腹痛腰痛脚痛在天癸將
行之前者爲血中氣滯當和之散之如腰痛腹痛腳痛在天癸將行之後者爲血中氣虛調之補之至若
色之淡紅者固爲虛卽血之紅紫者亦不得盡爲實宜更看爛瓜豆汁各色諸由脾胃虧損不可妄用苦
寒致成痼疾當屬期之先後閉之久暫下之多覈色之順逆總不外乎寒熱虛實以盡邪矣均列方於按
條查用可也

一調經必貴補脾胃以資血源養營氣以安血室凡虛閉者十有八九實閉者十止一二近時婦科不察
虛實一聞天癸閉塞妄投通利每致血枯經竭而成癰瘕者良可慚也

一經水因虛閉者真脉左必弦細無力右關亦必軟弱精神困倦飲食減少此非閉也譬如小溝之水少
而不能流入大溝何能外溢冥冥滋化源使血左氣運自然行矣當用第六方之八珍湯或第伯一七方
之十全大補湯或第伯六四方之微決建煎均爲極應之劑極應之法前多蓄妙倘妄投破血通利則大

誤矣

一經水因實閉者其人平日體必壯盛飲食必強脈必弦濶者力此有餘之閉也譬猶溝中之水原可外溢而因溝內渣滓堵塞瀉之卽通竟妙於第伯六五方之決滻煎加減法極效若腹痛拒按是瘀阻不行又竊妙於第伯六六方之經驗通瘀飲極效

一經水或先後不對或時多時少或腹腰脚痛或顏色不正或飲食減少此由血虛經亂不足之證也萬不可通利倘妄投剝削必成瘳瘵難治者當補腎扶脾隨時多服久之自然應時而下諸症自除矣宜用第伯一七方十全大補湯或第九六方之五福飲均爲極效之劑且須每日投之數十服後必調矣二房勞太過亦主經事不調此由腎虛經亂宜用第九七方之一陰以孰地倍用極效或用三五方之做歸督元法均屬屬驗

做歸督元法均屬屬驗

一凡秉賦本虛向係嬌柔弱質飲食減少而天癸不調者必他法惟以第一方之大補元煎日服之久之必調屬試驗

崩帶淋漏不止證論

經曰陽搏陰別謂之崩百病始生此言婦女寸口脉大而尺脉小也又曰脾和化血不和化帶疊之有暑赤恐由脾元之不足也淋漓不止者血中之氣虛而不能收攝也凡此等症皆經亂之甚者也其

滋化源必致纏綿日久而見消索一經作瀉飲食難進則難養色矣近時此等之證極多系經驗諸方
皆本乎內經陰陽矣論篇內推求用之雖非古方略遵古法其應驗而大效者不知凡幾也

一崩漏不止者由元氣不足或因勞心過度或因情志不伸或因鬱怒傷肝致令血無所歸氣不能攝其
脈右必浮大而虛左必弦緊而細是無論口渴不渴有熱無熱總宜補血益血活血爲要因名之曰三助
濟生飲卽於第伯六七方內查閱加減處角之百發百中或用第二九四之加減保陰煎妙如崩漏止
後宜用第伯五六方之補陰益氣煎或第五五方之倣歸腎元法多劑調補極爲神效

一帶下有各色如色白者其病在肺宜用第伯五六方之補陰益氣法內加炒梔二錢○如色赤者其病
在心由於思慮過度宜用第六三之遠志湯內加當歸四錢川連錢半炒梔錢半煎後以第九二之益陰
海參丸調補更妙○如色黃者其病在脾宜用第伯三七方之五君子煎內加味法再加炒梔錢半○如
色黑者病在腎宜用第伯八之六味地黃湯或第九七之一陰煎內去牛膝均效總須數十服方能見
功○若氣血俱虛者其人或時作眩暈四肢無力少食懶言則無論所下何色皆以第六之八珍湯曰逐
一劑必得愈劑方見效○氣短神疲喜煖惡涼雨腿發冷者此陽虛下陷無論所下何色皆以第二之壽
脾煎多服極妙此證婦女極多其所以每多難愈者不由於專方服藥致成痼疾果能守方日進必操全
功也

○○辨白濁遺淋與帶病不同 指方

凡婦女病帶出於胞宮精之餘也。淫濁出於膀胱水之濁也。蓋帶病出於脾腎之虛滑而成淫濁多由於膀胱之濕熱而作此其所以有辨也。詳治於左。

一淫濁初起而見熱症宜用第三七方之大分清飲主之。

一初起無熱而窒者宜用第伯四二方之經驗薏米湯或第伯六八方之滑石散均效。

一因怒後肝火旺而爲下流者宜用第五一方之消風百解法主之。

一因服涼藥以致下焦不固者以第伯六九方之草薢分清飲主之。

一因元氣大虛而下陷者惟用第二方之壽脾煎最妙總宜多服。

一通治遺淋淫濁虛證如第伯五六之補陰益氣煎第一九四之加味保陰煎第伯一二三方之做胃關煎均爲應驗守方專服必覓全可。

○○辨子嗣要論

凡人之不生子者不得盡委之於命。有男子不能生子者有女子不能生子者而種子之法諸書所說甚繁徒亂人意以余測悉由於病也。如男子不能生子之病則有精滑精清精冷以及酒色過度強固強留或素有疝氣夢遺等證不得盡譏之於婦人緣男子所在精也。如婦人不能生子之病較之男子尤多則

有血枯血少血熱血寒以及子宮虛冷而爲命門火衰者及衝任氣虛而不能凝結真精者更有氣瘤血
癆癩瘕之類而經期之或先或後顏色之或淡或濃甚至奇恠各色或脾胃虛弱而化爲帶濁淫穢或肝
強脾弱而秉性暴戾或心緒紛紛而素多鬱結致令血海空虛精射空虛陰虛損難以成胎亦不得盡
諉於男子緣女子所重血也則知其在精在血而求子之法男子勿使傷精女子勿令傷血其在精則用
填之益之之法也其在血則用助之活之之法也以此調治則天下之男子婦人再未有不生子者矣宜
細玩而調補之

○○種子男女調補證治 指方

一男子精滑或由用心過度或由房勞過多致令腎虛不能約束焉能生子宜兜塞督氣大補陰精卽以
第伯五六方之補陰益氣煎內去柴胡加生北五味一二錢固脂酒炒三四錢炒龍骨四五錢以補塞之
或用第三五倣歸腎元法加生北五味亦可

一男子精清精冷黃命門火衰焉能望子每有用黑錫丹助春丹之類害人不淺深爲可殺當以陰中求
陽方爲正治宜用第伯五七方之水中取火法內加菟絲子三四錢胡巴酒炒四五錢並將熟地儘可用
至二三兩一劑每日一服百劑後必見精稠精熱充實氣旺矣

一酒色過度強固強留者此自取咎戾余亦莫之如何倘或改悟亦惟以第伯四一之經驗聖門飲及第

伯七十方之大營煎均效

一素有疝氣夢遺等證房事維艱焉能望子乘其未發病之日卽以第伯四三方之全真一氣法去牛膝
加固脂三四錢用核桃肉十枚拌炒黃色煎好臨睡時服之百餘劑必效

一男子陽痿精衰者焉能望子卽以第伯七七方之調元贊育法每早晚一劑數十服後以此方加十倍
作丸每早晚服五錢

一婦人面無潤澤身體瘦弱必然血枯血少經期必然退後來時色淡亦少莫妙於第伯七五方之全
種子湯極其神效

一婦人月事先期而至難於受娠其候必口苦舌焦脣紅易飢經色紅紫者血中有熱也莫妙第伯七六
方之定經抑陽煎均效此余得意之方應驗無數

一婦人實係氣血兩虛體瘦神疲或帶濁過多倦於房事情意冷淡焉能生子則卽以第伯七八之倣毓
麟珠加減法百服投之必能生子均爲屬應種子之方盡於是矣

○○認胎脈提要

凡婦人懷娠者其血留氣聚胞宮內實故脈有滑數倍常此當然之理也然有中年受娠及氣血虛弱之
婦則細小之脉不數者亦有之但於微弱之中亦必有隱隱發動之象此正陰搏陽別之謂也卽受娠之

脉有可辨也又胎娠之脉數而勞損之脉亦數大有相似損脈之數多兼弦濶而胎娠之數必兼和滑此當於幾微申辨其邪氣胃氣之異而再審外證自有顯然可見者再有三部脈而浮沉正等無他病而不月者姪也又認胎脉之象如坎離二卦坎中滿陽在內也其脉內沉實有中滿之象所以爲男離中虛陰在內也其脉多浮虛有虛中虛之象所以爲女以此辨之百無一失且受娠之脉有六象弦堅牢強利滑能六象全則胎必全無妨碍得四象者亦能穩固六象中僅能二三其胎宜謹慎調護稍有不安察其所因而治之可也

○○認分婉脈括要

凡欲產之脉必離經離經者必歇至之脉至時忽止其來大小不勻聲蒙云離經之脉認分明其來大小不調匀或如雀啄屋漏應腰疼腹痛眼生花再拈中指三節跳產在須臾非病

○○胎候養胎分男女要論

五臟論中有奇偶論曰一月如露珠二月如桃花三月男女分四月形象具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂男能動左手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月成氣足且天地之氣始於春而人以應之所以受胎一月名胎胚肝脈養之二月名始胎心包脈養之三月名始胎心包脈養之當此之時形象始化未有成儀因感而變欲子端正莊嚴口談正言身行正事事欲子美玉宜佩白玉欲子賢能宜看詩

晝是謂內象而外感者也四月始成其血脈三焦脈養之五月始成其氣脾脈養之六月始成其筋胃脈養之七月始成其骨肺脈養之有七個月內卽產者其兒元氣薄弱雖然成人疾病必多八月始虛革成大腸脈養之九月始成毛髮督脈養之十月兒於母腹之中受足諸臟氣脉所養然後待時而生此誠至理間有十月已成而不產甚至十三四月而生者此係娠婦氣實多先天之由無足恆異蓋胎有男女懷有向背男胎動在三月陽性早也女胎動在五月陰性遲也女胎背母而懷故母之腹軟男胎面母而懷故母之腹硬此皆得理之談所當察也

○○安症治要論

凡胎之不安者或虛或實或寒或熱必有所因倘無所因再未有胎之不安也故凡胎之不安者察其所因而治之是節所以安胎也時醫徒一味以香附芩連白朮卽爲安胎聖劑未有不誤事者也余以妊娠秉賦之虛實相體施之無不大小咸寧

一胎有因娠婦體素虛弱而不安者其人必多眩暈脉亦細小力薄必得大補元氣助其氣血其胎自安宜用第伯八二方之倣胎元飲主之或用第六方之八珍湯或第伯一七方之十全大補湯又或用第九六方之五福飲皆可擇用如察實宜虛寒之證煮煎剉內加入熟附片二三錢均宜

一胎有因孕婦體本強健或有氣滯氣實而不安者其脉必弦實分大或爲惡阻或爲脹滿等症宜用第

伯八三方之涼胎飲加減法或用第三六方之養陰退陽法或用第三十方之服蠻煎均可選用如察實其而熱之甚者前劑內加入犀角屑二三錢均宜

一安胎有可用之藥而宜慎用者如黃耆白朮人參固爲可用之味其性甚升堤須防閉冒是藥氣之又有全不可用而宜慎用者如瞿麥牛膝神曲之味其性下行皆能墮胎以及野物草藥性異之察見至聞者尤爲禁用又有必不可少之藥而宜斟酌體之強弱而輕重佐之者如陳皮桔壳砂仁蘇梗皆爲善調胎氣之品畧當用之是以受胎無恙起居飲食如常萬萬不可服藥果有不安亦不必他求卽以此數方隨變運用必見太平而易產矣

○○胎前子懸子氣子腫子煩子嗽子淋子癪各證 指方

一子懸證其候胎氣不安湊上胸腹心腸俱疼者是也其脉必右寸實大左關不足宜用第二貳七之紫藥飲或第二貳二八方之芩朮湯亦可

一子氣證其候胎婦數月雙足浮腫或流黃水喘悶不食者是也此由抑鬱感寒其脉必右寸沉實宜用第二貳九方之天仙藤散二三劑卽愈

一子腫證其候胎中挾水遍身浮腫是也此由脾土虛而不能制水其脈必右關虛浮宜用第四五方之扶脾養元法主之

一子煩證其候孕婦五月內心驚膽怯煩悶不休者是也其脈必左寸洪實宜用第貳三十一方之竹葉麥冬湯主之

一子嗽證其候孕婦不時欬嗽者是也此由胎火上衝其脈必右寸洪大有力宜用第貳三十一方之紫苑湯加味法主之

一子淋證其候小便淋漓者是也此由娠婦不謹房勞觸動相火而然其脈必左關虛弱左寸洪數宜用第貳七十方之大營煎或用第三十六方之養陰退陽法均效

一子癇證其候娠婦偶受風寒忽然口角流涎吐沫角弓反張皆不知人是也其脈必左關尺兩部虛弱兩寸畧旺久後必見堅數宜用第二十三方之羚羊角散主之

一子瘡證其候娠婦將次分娩或在八九個月時忽然失音不話者是也此係腎脈養胎之時而胞絡系於腎當此分娩不久賢不系胎絳之系絕其系上貫舌本系絕則不能言不能言則瘡矣凡此者並不傷胎無足恆異不必驚慌不必服藥俟分娩後自能言語倘妄投藥劑反致悞事或常用白茅根泡水當茶或常用阿子敲碎一二個泡水當茶亦可然亦不能開聲不如聽之而已倘滿十個月不分娩又非腎脈養胎即不聲而亦能言矣

凡胎漏有因病後而脾元虧損氣不能攝血者有因秉賦本虛而衝脈氣虛不能貞胎者有因血中有火而血從火亂者有因暴怒傷肝而爲肝火漏血者有因憂鬱悲傷而肺氣下陷者有因負重跌蹣而爲用力漏血者各有所因其漏不一必察其脉尚屬年強方急安之塞之也倘脈過於滑利卽不必他強安塞反變生他證

一病後脾虛不能攝血而漏者其兩關脈必浮弦無力外證必力竭神疲宜用第二方之壽脾煎或用第四五方之扶脾養元法加炒阿膠珠四五錢主之

一秉賦素虛而營氣不足不能束胎而漏者其脉雖滑利而重按無力或弦細而軟宜用第伯八四方之經驗加減固胎煎連曰大劑或第九六方之五福飲內重用熟地再加炒阿膠五錢更妙
一血中有熱胎火內熾而漏者宜用第伯八五方之極效清胎飲甚妙

一因房事下血作痛而胎漏者宜用第六方之八珍湯加炒阿膠八錢艾葉醋炒一錢立效
一因跌蹣觸動而漏者宜用第伯八六方經驗安胎散或第伯五六補陰益氣煎均可立效

○○胎動欲墮並屢墮胎

指方

凡胎動欲墮或因喜怒過度或因飲食誤傷或因氣體虛弱或因房事不謹或因負重跌蹣皆能墮胎倘動之不甚而下血亦微者卽於前之安胎方中隨宜擇用倘動之甚而下血亦多者卽不必勉強塞之

宜用第伯六四方之倣決津煎卽刻投之最爲穩妥若舌黑面赤脹滿吐惡胎曰死矣當救其母以大劑倣決津煎加芒硝四五錢童便一杯熟服則死胎自下後以滋補之劑如第一方之大補元氣煎曰大進內加益母草五錢童便一杯兒服若舌紅面黑是母死也面舌俱黑是母子俱死也又每有婦人易於受孕而亦屢屢三五月墮之者亦無非由於七情失節房勞不謹之故宜於未受孕之前大補氣血既受孕以後諸宜珍重方免滑胎之患倘先以有屢墮胎之病而一經受孕多服第伯八七方之加味固胎煎數十劑最爲珍重無可虞矣

○○胎不長卽兒胎證治

指方

凡胎之不長皆由氣血兩虛間有因鬱怒而氣凝血滯者如果係氣血虛損宜以第伯一七之十全大補湯或第八之人參養營湯或用第一方之大補元氣煎首可擇用倘係兒胎皆屬虛寒之謂亦因元神不足或於邪思妄想凝結而成非真鬼也此田邪氣客之欲補中兼行者莫若第伯六四方之倣決津煎飲效利者莫若第伯四二方之經驗通瘀止痛湯均爲大應

○○臨產要論大暑

一妊娠臨月忽然腹痛時作時止一二日或三五日其胎水少來而痛綿綿不已者名曰弄胎非正產也不必驚慌惟詳以攝之又如一月前或半月前忽然腹痛微無他證名曰試胎亦非正產也果當正產之

痛其痛一陣緊一陣連腰脊痛者當產也蓋腎脈系於腰胞脈系於督故當正產必牽腰痛再娠婦中指本節跳動卽當產也然後服催生藥如第伯九四加味弓歸湯第伯八八方之脫花郎之類此時兒通產門裂道挺進水血全下方可坐草所謂瓜熟蒂落聽其自然而平安也

一產室不宜人多如用穩婆必擇其老成謹慎靜坐房中閒談暢事毋許疾聲慨嘆形色慌張者切不可令產婦草坐草若早坐草兒尚未逼產門而產母用力太早及至兒將出來力竭神疲所以每每有逆產橫生之患皆坐草太早之誤也果係水泡先破血即全出兒逼產門一經著力卽快生此時突腹不出愈妙如胞衣未出萬不可驚嚇卽令產婦以頭髮稍攬其喉中似令作嘔式卽出矣胞實未出卽按胞衣不出條方擇而用之

一產婦腹痛未甚合其在房行動不必多睡產婦行動則氣血舒展產婦嗜卧則氣血凝滯舒展則易生凝滯則難產每見富貴之家產婦過於嬌柔丈夫過於保護而更多產難之患何也其間必預為警鐘預請穩婆於腰腹尙未堅痛以即曰一摩明日一問致令產婦提心吊膽晝非當產之時而使其勇力以致胞破將乾兒尙未能轉身卽以轉身產婦又心慌力竭難產之患豈能免乎

一產室遇寒天必宜溫煖遇熱天必宜清涼溫煖則不受寒清涼則不受熱房內不可燒香點燭妄見鬼神知別家難產之事萬不可使妊娠知覺最為緊要

一臨產不宜燒香問卜反增產婦驚疑總宜若其無事暗地留神自然順利

一產婦分娩時不可過喜凡七情太過皆能大傷且不可令產婦多飲酒醉產則之方產後酒醉則動血令食粥不宜過飽凡硬滯冷物萬不可食

一初次受孕三四月後以新白布一幅束於腰間名曰束胎法不惟使胎氣固竇免胎氣下墜卽次臨產十餘日以前去之則分娩極易全不吃力此法最妙

一初次受孕不可多服補藥初孕氣血尚未虧損若過於溫補反致悞事

以上皆舉其大要總須丈夫節制孕婦自愛毋嬌養太過營養均宜執中養之自然瓜熟蒂落也

○○催生要論 指方

凡催生之藥不宜太早必得試痛數次脉見離經非催生也乃以藥助其氣盈而利導之耳果係將次臨盆宜用第伯八八之脫花煎或第伯八九方加味滑胎則又近時多用第伯九四之加味弓蹄湯均爲妙劑若產婦實係因虛無力急用入參煎湯徐徐服之然後以箭藥接服不必慌張壞亂自然順利而生矣

○○胞破產難 指方

凡產婦胎未順轉而胞先破者或因氣血俱虛胞衣不固或因用力太早亟動所傷若胞破太久而血乾

則產路滯塞必致難生急用第伯八方大料六味地黃湯或第伯八八方脫花煎或第六方之八珍湯均以十劑之料作爲一劑加益母草四五兩濃煎令產婦不時服之亦易得生也倘無他證而亦無危證卽經日不下總以脫花煎日投數服極爲應效萬不可驚慌也

○○胞衣不出 指方

凡胞衣不出或用力太過而氣竭神疲不能傳送者急用大劑之第伯六四方做決滌煎以三服作爲一劑服之又或用第伯八九方加味滑胎煎亦可倘腹脹甚者卽用第伯九十方牛膝散或第伯九一方黑神散第伯九二方經驗滑石散皆救急之方也○一法用產婦髮稍攬入喉中使其嘔吐胞衣卽出○一法用產婦鞋底烘熱熨小腹上下卽出

○○交晉不開產門不閉子宮不收三證 指方

凡交晉不開係陰氣不足氣不能達所以不開宜用第伯九四方加味菖歸湯或第伯一七方十全大補湯而開之大有奇效或第二四五方之開門丹亦妙切不可令穩婆強用手開必致悞事

凡產門不閉由陰氣太虛不能收攝若氣血俱虛者宜用第伯一七方十全大補湯內加北五味二錢搗碎補而飲之如痛而脅軟者宜用第伯九三方薛氏加味道遙散若憂思傷脾而血熱者則又當以第伯九五方加味歸脾湯若暴怒傷肝而動火者卽以第伯九六方之龍膽瀉肝湯臨症察用可也

凡子宮不收而外墜者宜用第伯九七方補中益氣湯內加醋炒白芍三錢飲而舉之或外以黃耆五
六兩煎湯薰洗亦妙

○○小產要論

凡小產因體弱氣虛而產者十僅三四因嗜慾不僅而產者十有六七今以隨孕隨產而切言之蓋胎
一月如露珠二月如桃花三四月而後形體具宜脉全五六月而後筋骨毛髮生方其初受娠亦不過一
滴之元精耳此其橐籥正無依根荄尚無地輩之則固決之則流故凡受娠之後急宜節慾以防泛濫而
少雀縱情固知忌憚雖胎固保全者亦多其有兼人之勇者或恃強而不敗或既敗而復戰當時也主方
欲靜而客不肯休落花與粉蝶齊飛火棗與交梨並逼含汚全流暗波共逐莫知其自昨娠而今日產矣
期日姤而望日產矣隨孕隨產本無形迹蓋明產者胎已成形小產亦覺暗產者小產似水直流靡知故
情強過勇者多無子以強弱自相殘也縱慾不節者多不育以盜損胎元之氣也小產之過宣悉由婦人
之罪哉

○○小產證治 指方

凡小產後亦與大產調理相同仍須去盡惡露宜用第伯九八方生化湯主之倘小產後瘀血心腹疼痛
者又當用第伯九九方川弓當歸湯主之若氣虛而血不止者卽以第二伯方入參黃耆湯上投若小腹

痛甚而脈細微者則又當以第二伯一方煎服之滿月後則須大補元氣宜用第伯五六補陰益氣煎或第六方之八珍湯急爲調補方無後患否則連次小產即成滑胎且更須節慾方能再孕該云貞慾多勇士宜自愛之

○○下胎斷產辨要

下胎斷產本非仁者之事然有婦人臨產腹危或病軀不勝產孕者或中年氣血虛而畏受孕體產者是此二法有不得已而用之故亦不可廢也至若水銀蠶蟲斑蝥之類不惟傷胎且傷母矣用者不可造次均列方於左

○○下胎 指方

凡虛弱人欲下胎者宜用第二伯一方扶羸小品方主之倘婦因病胎不安而宜下者真妙於第二伯四長方桂心散最爲穩妥若胎死腹中則非第二伯五方桂香散不可至若第二伯三方之廣濟下胎方則生胎死胎均可下之若因無故而妄下之或苟合而密下之爲上干天譴不惟絕子滅孫且報施在即目當世世爲禽獸矣

○○斷產 指方

凡欲斷產者因生產太多而氣血過虛者莫如第二伯六方斷產小品方或用第二伯七之千金斷產方

均屬應驗倘有私情而暗昧不明斷產者卽用此方立遭天譴大禍臨身世世不得轉人身也余於此二法特爲弱婦者保命而俗之倘不肖子孫而以爲苟且之用必不冒盛謹之

○論產後四禁

凡斷產之後雖云氣血隨胎而去然以壅滯之餘不過貲護胎蟠從之物去者當去生者旋生不數日必已來復此生化自然之理因有生化不易之方何至產後皆虛孰迷大補氣血要知有虛者有不虛者而妄補固已有壅滯之虛卽虛者而驟補難免阻滯之患此產後不可妄投補劑其禁一也產後偶有寒熱或頭疼身痛或喜熱長寒或喜冷長熱縱有外感現證其由皆因臨盆時非受寒卽受熱當此之時腠理發泄元氣無所主持倘誤爲發汗而元陽既傷於分娩用力之前又後傷於表裡大泄之驚得不隨汗而亡此產後不可妄投表劑其禁二也產後大使多閉以無露去多大腸枯槁津液不足倘妄爲攻下而脾元更傷必致元陰全下不能後還隨下而脫此產後不可妄投下劑其禁三也產後小便多有不利皆由脾中枯槁津液不充而膀胱無所入者卽無所出倘愈利小便愈利愈無愈無愈虛必致腸液乾涸陰先絕此產後不可妄利小便其禁四也但使不犯四禁營衛自和諸證自去卽有病證亦易治此產後第一之要訣也

○產後腹痛諸證

指方

一產後腹痛必問其分娩時惡露多寡倘惡露甚多而爲瘀血未盡作痛者卽以第伯九八方生化湯連日投之俟瘀血盡自然不痛且痛時手不可按或由下衝上此血竇痛也或服生化湯之後繼以第伯六四方之倣快津煎又或用第伯三四方之經驗通瘀止痛湯皆爲最應倘瘀血去亦多而腹猶痛者摩愈按愈稍安得食稍緩飲熱畏寒此血虛痛也仍先以生化湯服二三劑之後卽以第伯一方之殿胞煎日服兩服極爲大驗若問其腹痛而一味爲瘀血不分虛實概投通瘀之劑難免不悞事也

一產後腹痛有惡露未盡始則產婦不覺繼而大意或一二夜產婦卽欲安逸以平時矮枕熟睡致令未盡之瘀上衝作祟忽然腹中堅痛異常甚至牙關緊閉昏迷不知其脉亦伏必細問產婦近身之人詢其原委或大小便俱不通或痛時手不可按此大瘀阻塞不急推之而惡露攻心不可救矣用第十九方之桃仁承氣湯或第伯六五方之倣快津煎加倍分兩濃煎徐徐服之外用姜葱桃仁同搗爛以酒炒極熱全舊綢包好乘熱於臍之上下更遞熨之聞腹內隱隱有响聲人亦漸次明白而宿瘀卽出緩緩以滌粥食之切不可過飽更防停滯

一產後腹痛有瘀血已盡而腹痛綿綿不可止或在六七日以內十日以外者其脉按之虛細外證亦無口渴而大便溏瀉小便清利四肢困倦此由臟氣不足脾腎兩虛宜四雌雞一隻熬清湯去盡油以此湯煎第伯三七方之五君子湯加味法投之或煎第伯貳方之倣胃關湯亦可

一產後腹痛而惡露仍然通利或在嚴寒天氣於分娩時露體受寒或牽引小腹腰脊而刺痛者宜用第一貳五方之加減蟠怒散主之

一產後腹痛而惡露仍通或在暑熱炎天而保護太密受熱作痛或口渴蒸蒸目赤唇紅口臭舌乾脉見洪滑此內熱甚也宜用第伯四五方抽薪飲主之或第三六方之養陰退陽法均效

一產後腹痛惡露仍通或因望子甚切而又生女者或因丈夫喚怨翁姑咀語以致鬱悶而氣滯作痛者牽引兩脇胸膺隱隱刺痛或大疼痛問其所因察其氣滯此氣鬱痛也宜第伯六三之倣排氣飲主之或用第八五方木香調氣散加味法或第伯二六方荔番散又或第伯二七方神香散皆爲對證之方

一產後腹痛或因富貴之家過服參耆保護嬌柔太重而內熱爲大補攻痛者宜用第二六方經驗解毒湯時時赶服緩則不可收矣

○○產後發熱 指方

凡產後發熱其證各異有因受寒發熱者有因受熱發熱者有因陰虛水虧發熱者有因分娩時用力太過勞倦而發熱者有因去血过多眩暈頭亂煩燥而發熱者詳方於左宜細察用

一產後因感寒而發熱者不宜發表宜先用第伯九八方生化湯二劑卽以第貳二五方之加減蟠怒

散主之

一產後因受熱有火而發熱者不宜過用苦寒之劑宜用第伯四五方之抽薪飲或第伯四六方之徒薪飲第伯一貳方清化飲等皆爲穩妥之極

一產後因水虧陰虛發熱者其脉必弦數宜先服生化湯貳三劑俟惡露盡後宜用第伯七三方之五陰煎或第伯五二方之金水六君煎或用第三三方之倣三陰煎皆可擇用

一產後因用力太過勞倦而發熱者其脉必弦細無力宜先服生化湯貳三服後俟惡露已盡卽以第四五之扶脾養元法或用第伯五二之補陰益氣煎內加炮姜一二錢主之

一產後有因去血過多而發熱者亦以生化湯服一二劑之後卽用第伯八方六味地黃湯或第五二之加減一陰煎均宜

一產後惡露已盡而發熱喜飲熱物兼有冷汗者此外熱內寒必宜溫補宜用第伯五七方之水中取火法或第伯四三之全真一氣法或爲應驗如不應急加附片三四錢倘妄投涼藥必悞大事不可不嚴加謹慎也

○○產後乍寒乍熱 指方

一產後乍寒乍熱悉由氣血虛損卽有外感不可發汗經云陽勝則乍熱陰勝則乍寒治之不宜耗散正氣此要訣也

一陰勝而多寒者其脉必緊數無力宜用第貳三方之理陰煎主之

一陽勝而多熱者其脉必浮數無力渴不喜冷宜用第三三方之微三陰煎主之

一陽氣陷入陰中懶言少食乍寒乍熱者宜用第伯五六方補陰益氣煎主之

一陰陽俱虛四肢困倦不渴不食脉虛弱而乍寒乍熱者宜用第六方之八珍湯或第伯二七之十全大補湯或第伯四三之經驗全真二氣法均屬相宜

一血實氣壅而乍寒乍熱者脉必洪數宜用第三之五積散主之○此係產後敗血未盡經云敗血流開諸陰經流閉諸陽經則寒熱所以氣壅而乍寒乍熱也

○○產後勞傷症治 指方

產後風寒也產婦坐草艱難勞心用力太過故曰夢勞其陣或寒熱如瘧或頭疼自汗或眩暈眼花或困倦喘促不思飲食皆其候也凡此皆氣血大虛宜培補元氣爲主如第一方之大補元煎以及第九六方五福散第一七方十全大補湯第貳方壽脾煎皆可酌用

○○產後喘促 指方

凡產後發喘有二乃一以陰虛之極一以寒邪入肺蓋產後大虛血去陰虛孤陽無主腎陰不足而浮越於上此係肝腎無根將脫之兆最爲危症經曰肝苦急急食甘以緩之正此謂也惟當急用第二三四方

做貞元飲卽時速服不必遲疑或用第一方大補元煎均妙倘用破耗化痰開提之藥是速其死耳實因外感而喘者必呼吸氣粗與虛喘之上氣不接下氣之樣大有不同且胸膈必然脹滿脈以浮勞而愈按有力痰亦稠濁而愈效愈多此病在肺也雖然如此亦不得大爲疏散宜以第伯五二方金水六君煎或第四三方加味六安煎均爲對證最妙之方

○○產後發痙

指方○卽俗謂中風

凡產後忽然角弓反張戴眼直視手足抽搐四肢強勁俗謂產後中風然非風也此由元氣虧極血液枯敗之候當問其分娩時有許多惡露分娩後又曾出惡露否再問腹會痛否痛者雖昏迷不知而近身之人無不知之且發痙在分娩一二日是惡露恐未盡也當以第伯九八方之生化湯內加熟地二兩投之再加用第六八方之陰陽交感煎相間服之倘再三日分娩以後而見此證者必得大補氣血或第一方大補元煎或第二三方理陰煎第伯一七方十全大補湯均爲可用倘誤作風痰而妄爲發散消導死無疑矣每遇此證臨時自無害萬勿妄聽旁言致貽後悔

○○產後惡露不止

指方

一產後惡露不止若血色淡紅綿綿不已者此氣血俱虛宜先服第伯九八方之生化湯一二服卽以第一方之大補元煎連日投之

一產後因血熱而惡露不止者其色必深紅或黑紫而外證必咽燥喉乾口苦脣焦宜用第伯壹二方之清化清或用第二六方之經驗抑陰煎均效

一產後因怒氣傷肝惡露不止者此肝血不藏宜服生化湯之後卽以第伯八方之六味地黃湯或第伯二八方之經驗舒肝理氣湯

一產後脾虛而能統血而惡露不止者其候四肢困倦食後脹滿宜用第二方之壽脾煎或第伯五六方之補陰益氣煎均效

男備惡露不止止血二方

一產後去血過多而不能止者無論虛實或用第二三七方倣八參當歸湯或二三八方止血救急湯皆可拿來用之

○○血崩二方 胎前後均可用之

一產後血崩勢危或胎前見此證者卽用第貳三五方七灰散暫止之或用第二三六方之龍骨散均可救急候止後再投滋補之劑

○○產後乳少或乳不通專方

凡產後乳少皆由氣血不足卽不通者亦由乎氣血虛也總莫妙於第二三九方經驗生乳湯百加中

○○乳吹乳姑 指方

凡產後因兒飲乳爲兒口氣所吹致令乳汁不通壅結腫痛甚急治之緩則成癰外用第二四一方之南星散敷之急服第二四十方之連翹金貝煎最妙此治乳吹之法也○如無兒吮乳或兒未曾吮餘乳而蓄結作脹或婦人氣血充實乳房作脹致令腫痛憎寒發熱不急通之必致成癰即用第二四方之麥芽散煎服五消此治乳姑之法也○又治乳吹詩五在第二四方內查用屢效

○○乳癰乳廄兩證 指方

乳癰首卽腫脹日久不消而成也先仍以第二四十方之連翹金貝煎多服數劑再以第四九方人參加減敗毒散服之或用第伯九三方之薛氏加味逍遙散均宜備遇用苦寒之藥日久潰後不斂膿清漬浮則難治矣此治乳癰之大法也○若產後因鬱怒傷肝乳內結核堅硬疼痛肉色如故名曰乳巖致令五心發熱肢體困倦面瘦無血色若漸久漸大內潰洞深終爲難治宜用第四五方扶脾養元法或用第爻八方人參養營湯可延歲月若用消耗危殆速矣○每有孕婦亦有此證名曰內吹凡用藥亦如之然不可用牛膝瞿麥等藥以犯其胎

○○乳自流出 指方

凡產婦乳自流出乃陽明胃氣不固當其有火無火而治之如無火而流不止者宜用第伯一七方子

全大補湯或用第六方八珍湯主之若因血熱而溢者宜用第九八滋陰潤燥法主之若肝經怒上冲而溢者宜用第三二方加減一陰煎主之若乳多脹滿而溢者宜用第二四四方溫乳房熨法最妙倘未癆而乳自流由名曰乳泣必生子不育

Q 前陰各病證治 指方

一婦人陰中忽挺出如菌如芝出甚挺出數寸者名曰陰挺此由胞絡傷損或分娩時用力太過或氣虛下陷或濕熱下注總以升補元氣固塞真陰爲主○如陰虛滑脫者宜用第二四七方倣固陰煎加減法或第三四方倣秘元煎均爲最捷○如氣虛下陷者宜用第伯五六補陰益氣煎主之○如因分娩用力太過而下陷者宜用第二方之善脾煎或第伯九七方補中益氣煎皆效○如係鬱熱下陷者宜用第伯九六方之龍膽鴨肝湯或用第三十方之服鬱煎均爲應驗

一婦人陰中生物大瘻大痛時作寒熱牽引腰痛亦曰陰挺此由房事太過或爲淫慾不遂非禮之爲宜用第二四八方薰洗水陽湯每日薰洗數次仍服前滋補升提之劑不謹再發難治

一婦人陰戶忽然腫大類於陰挺者多虛腫者多熱○如氣陷而腫者以升而清之宜用第伯臺三方清化飲第伯四五方抽薪飲主之○若因分娩受傷而腫者不必治調養自退○若由損傷無關元氣而腫者莫如第二四九桔壳散數次即愈

一婦人陰中癢甚手不可住或流臭水名曰陰慝此由肝脾溼熱陰中有虫宜用第伯九六方龍膽瀉肝湯外用椒茱湯薰洗每日數次卽愈方在第二五十條

一婦人陰中生瘡奇形怪狀或潰黃膿水或時癢時痛床褥呻吟不思飲食經水不調四肢無力此由溼熱下注或七情鬱火而成惟用第二五一方做坊藥薰敷煎極效或第伯四五方抽薪飲亦可每日仍以第二五十椒茱湯薰洗再以第二五二蛇退散末藥洗後乾擦患處約半月卽愈則後百日內不宜更事一婦人陰中清冷有真寒假寒之分倘口不渴肢體無力小便清利或常下白帶脈見遲弱者此真寒證也宜用第伯五六方水中取火法或第四一方經驗人參附桂膏或第伯一七方十全大補湯主之倘口渴心煩小便短赤大便堅實脈見沉數重按有力此溼熱而鬱假寒證也宜用第伯九六方龍膽瀉肝湯或第伯四六方抽薪飲均爲最效

一婦人交接出血而痛者皆由陰氣薄弱腎元不固宜用第伯五六方之補陰益氣煎或用第三八方之做化陰煎加味法均須多服爲妙

壽身小補目錄

卷六

小兒總論

小兒初誕

看初小兒病法

看小兒壽夭法

審察小兒病源法

診小兒脈關諸家筋紋之謬

論小兒變蒸不必盡信說

小兒診治大法

護持嬰兒諸法

小兒補腎論

撮口晴風證法 指方

驚風證論

急驚證治 指方

慢驚要論

摘錄莊在田先生辨慢驚病象 認法十四條○實爲小兒之要

慢驚證治 指方

大驚卒恐證治 指方

驚啼證治 指方

夜啼證治 指方

發熱辨虛實內外要論

發熱虛實證治 指方

摘錄夏禹鑄先生辨熱瘧似驚風傷寒

指方極爲應驗

小兒吐瀉霍亂證治 指方

吐乳症治 指方

疳症 治預防治已方○並指方

盜汗自汗 指方

腹痛腹脹症治 指方

癩癧症治 指方

溺白症治 指方

六部虛實備方 男女老少同用

四季感冒大略備方 男婦老少同用

中興紀事

壽身小補卷六

貴筑黃兌楣先生手輯

○○小兒總論

凡小兒之病古人謂之啞科以其不能言語也謂治之極難治之之法能細心體察而治之又易又易者何能審首數察形色此六字之中而表裏寒熱之症明矣平表裏寒熱而再辨之以虛實則治之非常男子婦人之病態百端也蓋以小兒之病非外感風寒卽內傷乳食外感者必有表症而無裏症如周身發熱無汗清涕搐搦之類是也內傷者必有裏症而無表症如上熱下冷嘔吐泄瀉腹痛驚瘧積聚之類是也熱者必有熱症如口渴煩燥唇紅面赤二便秘結小便或短黃熱熱吮乳口熱驚啼聲雄之類是也寒者必有寒症冷汗無熱小便清利大便溏瀉唇白面白手足發冷虛驚聲雌之類是也於此四者之中而辨以真虛真實假虛假實以小兒如渾沌一團懵然固識治之能得其法投劑立見奇功但小兒柔弱之體氣血未充臟腑嬌嫩卽有實證不宜峻攻今舉世幼科輒謂純陽小兒之體無論其先天之厚薄秉賦之盛衰一經看病非謂氣裏食卽曰寒包火或妄投丸散其所用之散藥無非消散利咽而並施或混養開方所主之方無所補泄升降而齊用更有一種愛子情切者或見其兒黃瘦神疲乳食減少或詢之於庸俗不云發火卽云食積示以肥兒丸保和丸爲父母者徒聽其肥兒保和之美名視爲神聖之

藥而極力投之殊不知肥兒丸多苦寒之味最敗胃氣保和丸多消耗之藥極傷元陰謂其肥兒也而適足以瘦兒謂其保和也而適足以違和耳嗟嗟小兒之元氣無多倘妄聽庸醫徒知去病而不顧其還元今日一破明日一消其有不萎敗者未之有也慎之慎之

○○小兒初誕論

凡小兒初誕飲食未開脾胃未動是誠清虛之腑此時調燮得宜嬰兒必無他證然調燮之法視其父母秉賦之強弱受胎之多寡而開口之法有相體而中者諸云小兒落地口含血塊卽時當用手挖出如屎下卽有毒此理未必盡然夫小兒無非血氣所生獨此一塊而爲毒乎即使嚥之亦必從大便而出試問今之生子者有個個口中之血而落地卽挖出乎如未有挖出者試問能毒幾小兒乎是此說皆無據也總之開口之法莫如相其嬰兒之強弱而用之宜於第六方初生開口法查取斟酌用之實無妄善之至

○○看初生小兒病法

凡看初生嬰兒之病以手捻其頭摸其頸領不作聲者爲無病縱有病以手指探其口雖發聲而微啞指者其病輕若卽發聲不唯指而色或青紅兼紫者此落地受風寒之甚也其病重若牙關堅閉不能納乳牙根硬勁其病極重此驚邪人於膀胱胃經也須急治之且初生嬰兒若見肥胖而面目覺好看此根

本不堅甚非佳兆必易感邪凡父母肥者不可生肥兒父母瘦者亦不可生肥兒生而肥胖其氣必虛一切差懸湯不可多服如面轉微黃則吉兆生兒怯弱其血必虛一切寒涼之劑不可妄投若七日之內肌肉頓肥則必病矣過此以往漸肥者又爲凶兆

○○看小兒壽夭法

凡看小兒以聽聲爲先察色爲次其聲音清亮者壽滋者病散而無出聲者夭○忽然大聲而無病者須細看其身恐有瘡毒又或衣沾針刺之類○臍帶中無血者壽臍帶銀白色者壽短帶紫脹者於斷帶之後捻去紫血可保無虞○額皮寬者壽○乳縫通達色黑者壽初生卵如水泡者險○初生二三日內面轉黃色吉○生下粉白花色者必主臘風而夭○生下皮寬肉瘦五六日頓肥者必有臘風之患○生下皮肉不光者必夭○泣不出聲者夭○舌如豬肝者夭○泣而無淚者夭○口角上上有紫色如蝦鬚者夭○無糞陷者夭○脣肉不生者夭○股肉不生者夭○面無彩色者夭○臍帶短大紫者夭○生下渾身銀白色者夭○生下有齒者大凶不傷父母卽傷自身生下未裹卽撒尿者殺父母湯家財在世一身勞苦

○○審察小兒病源法

凡病有諸內必形諸外小兒之病既不能言語先憑一望次以脈應之斯爲醫理夫望之之法審其

竅鼻黃形色而虛實寒熱已得其大半矣舌乃心之苗紅紫心熱也腫黑心火極也淡白虛也鼻準與牙床乃脾之竅鼻紅燥脾熱也慘黃脾敗也牙床紅腫熱也破爛脾胃火也看爲脾胃之竅紅紫熱也淡白虛也如漆黑首冒將絕也口右址肝風也左扯脾之痰也鼻吼肺之竅乾燥熱也流清涕寒也耳與齒牙腎之竅耳鳴氣不和也齒如黃豆腎將絕也目乃肝之竅勇視而轉睛者風也直視而不轉睛者肝氣絕也以目分言之又屬五臟之竅黑珠屬肝純是黃色凶證也白珠屬肺色青肝風侮肺也淡黃色脾有積滯也老黃色脾有濕熱這證也這首目即黃病也目發黃眉黃赤安卧者黃疽也己食如飢首疽這有五種曰黃疽曰黃胖曰酒疽曰合疽曰女勞疽瞳人屬腎無光彩又兼髮黃腎氣虛也大魚屬大腸破爛肺有風也小魚屬小腸破爛心有熱也上皮屬脾脾腫傷也下皮屬胃青色胃有寒也上下皮睡食累緊露一線縫者脾胃虛極也面有五位五臟各有所屬額屬心離火也左腮屬肝震木也右腮屬肺兌金也鼻之上屬腎坎水也五臟裏也六腑表也小腸心之表小便短黃澁痛心熱也清長而利虛也胃乃脾之表唇紅而吐胃熱也唇淡白而吐胃虛也唇色平常而吐作傷胃論大腸肺之表閉結肺有火也肺無熱而便閉必血枯不可通下脫肛肺虛也膽乃肝之表口苦肝熱也聞聲著嚇肝虛也膀胱腎之表居臍下氣海之右有名無形筋腫筋痛腎水之寒氣入膀胱也面有五色一曰紅紅病在心面紅者熱一曰青青病在肝面青者痛一曰黃黃病在脾面黃者脾傷一曰白白病在肺面白者寒一曰黑黑病在腎面

黑而無潤澤者腎氣敗也望其色若異於平日而苗穀之色與色相符則臟腑之虛實無有不驗矣

○○診小兒脉法並闡諸家看筋紋之謬

通評虛實論曰乳子病熱脈懸小者手足溫則生寒則死乳子病風熱喘鳴肩息者脈質大也緩之則生急剝死此軒岐之診小兒未嘗不重在診脈也亦未嘗不兼證爲言也是小兒形體旣具經脉已全初脫胞胎便有脈息故薛氏診小兒訣云一二至脫三至卒四至爲虛五至損六至和平無疾大人之脈以五至爲和平六至爲數脈太過有病小兒之脈以六至爲和平五至爲虛脉不及有病當詳察之七至八至病勢凶九至十至病勢急十二至死無疑此訣萬中無一失由此觀之而小兒實有脉可辨至若冰鏡訣及全幼心鑑等書乃有察虎口以寅卯辰分風氣命三關以寅關直透辰關十不救一此不過言其病熱極險而余亦治之每多有活者又近時醫家多以筋紋紫色爲風紅爲傷寒青爲驚白爲疳又云青是四足驚赤是水驚黑是人驚黃是雷驚之類豈此一線之色果能辨悉如此無稽之言烏足憑也試問其果有確見歟試問其法果出內經歟又如王損菴之幼科準繩以三關之紋有十三指形白流珠形長珠形還珠形來蛇形去蛇形弓反外形弓反裏形鎗形鍼形魚骨形水字形透關射指形透關射甲形竟不知此形出自何典又曰治之不專執其形而投劑者是諸名形色竟先輩亦有不足憑者也今醫世相傳誦貽害匪輕更有可笑者以筋紋尚有八段錦名色是全不知內經之旨而徒然信口胡猜以惑人耳目

要知小兒之脉非比大人之多端但察其強弱緩急四象强者實弱者虛緩者輕急者重能明此四象則無論小兒諸證隨其病而合其脉將必左右逢源所遇皆通再細心審察苗數之情又何遁情之有哉
○○論小兒變蒸不必盡信說

巢氏云小兒變蒸以長氣血變者上氣蒸者體熱變者變生五臟蒸者蒸養六腑以小兒落地之日起三十二日一變六十四日一蒸一變生腎二變生膀胱三變生心四變生小腸五變生肝六變生膽七變生肺八變生大腸九變生脾十變生胃至五伯七十六日蒸變乃畢兒乃成人每驚寒變時情慾即異輕則發熱微汗其狀似驚重則狀熱脈亂而數或吐或瀉或煩渴燥渴等證輕者五日解重者七八日解又薛立齋曰此證小兒所不免者雖勿藥可也景岳曰小兒變蒸之說古所無也至西晉王叔和一言始之繼自隋唐巢氏以來日相傳演其說益繁然余觀之似有未必盡然者也蓋兒胎月足離懷氣質雖未成實而臟腑皆已完備既生之後凡長養之機則如月如苗一息不容有間百骸齊到自當時異而日不同量復有先彼後此如一變生腎二變生膀胱乃無變必三十二日之理乎又如小兒之病與不病余所見所治者蓋亦不少凡屬違和則不因外感必因內傷未聞有無因而病者是真變蒸之謂哉又見保護嬰兒得宜而自生至長毫無疾病者不少抑又何也雖有暗變之說亦全無憑據余恐臨證者有執述之誤故道其愚昧若此況儒道總不外乎四書聖人所不言者必無是道理醫理總不外乎內經軒岐所不言者

必無是理斷不可以巢氏所云而即奉爲神明者也特詳細表而出之以爲家庭中了然難與俗醫言耳

○○小兒診治大法

小兒之病本不易察但其受病之源多有所因故凡臨證者必先察父母之氣而母氣爲尤切如母多火
者必有火如母多寒者子必有寒母之脾腎不足者亦如之况骨軟行遲齒遲舌遲頸門開大疳熱
脾濕之類多有由於母氣者雖父母之氣俱有所稟但母之氣應在近父之氣應在遠或以一弱一強而
偏一人之氣者皆不可不察至若稍長而縱口縱慾或調攝失宜而自爲病者此又當察其所由辨而
治之如果先天不足而培以後天亦可致毒雖曰先天俱盛而或父母多慾撫養失宜則病變百端雖強
亦天此中機圓理微貴在知常知變也

○○護持嬰兒諸法

凡小兒誕生調和湯水冷熱得宜勿令兒恐寒久浴則傷風夏久浴則傷熱浴時當護其背凡風寒則從
背入所浴之水內用金銀煎者則除驚癇客忤用銅鍊煎者則辟惡氣用桃根黃連甘草煎者則不生瘡
丹毒用麥冬荆芥鉛錫煎者則安心氣至第三日俗謂洗三用桃柳桑槐等樹枝煎湯浴者亦除瘡毒並
辟諸邪至合護持之法細詳於左爲父母者留心鑒之

一小兒平時無病忌服藥餌否則遇疾無效

一浣小兒之衣不可露於星月之下易墮邪祟如遇失收當以醋炭薰過方可衣之古書相傳有鳥名隱飛鳥其鳥純雌無雄遇陰雨飛鳴徘徊其羽置兒衣中令兒作瘡必死化而爲鬼故小兒生至十歲不可夜露

一小兒面紅色蒼者爲外實大便色黃稠膩者爲內實不須妄投藥餌

一兒生六十日後則瞳子成能笑認人切忌生人懷抱勿使見非常異物則防恐嚇百日則任脈成能自反覆一百八十日則尻骨成母當令兒學坐二百四十日則掌骨成母當扶教其匍匐三百日則髓骨成母當扶兒立三百六十日則膝骨成母當扶教兒行則嬰兒養育一定之法也若日捧懷抱重襲綿裹致令筋骨緩弱稍有失護病疾乃生此皆保嬰太過之處也更凡戲謔之物不可恣樂刀劍凶具無使摸捉莫近猿猴近則傷意莫抱鴟雀抱恐傷眼會坐勿久令腰似折行莫令早筋骨柔弱甘肥生冷勿令過餐夜莫吹燈晝莫說鬼睡莫當風坐莫近水笑極與和哭極與喜笑哭後切勿與乳心經有病忌食鹽鹹水尅火也肺經有病忌食焦苦火尅金也肝經有病忌食辛辣金尅木也脾經有病忌食酸味木尅土也腎經有病忌食甘甜土尅水也助其病邪貽害於我五味飢飽勿令太過過甜成疳過飽傷氣過酸傷舌過冷成積過苦耗神過鹹閉氣過辛傷肺過肥益痰淡薄滋味脾強胃充百脈得潤臟腑氣清血實色華病從何生護持得法百子千孫詞雖鄙俚告誡家庭

一剃頭之日須就溫暖處避風及剃頭之後用荳荷葉三片杏仁三粒去皮尖同搗爛用香麻油三四滴
姜汁一二滴以宮粉脃和在小兒頭之上搽可避風邪及一切瘡毒其剃頭日宜擇與兒年命相生之日
如丁未日切不可用又五月初七日大忌剃頭萬不可用

一藏小兒胞衣用潔淨瓦罐裝好置青銅錢一枚於衣口以鑷口用青布扎緊數層擇黃道日或三日後
採其潔淨向陽處入地深埋三四尺用土築堅至兒長壽聰慧不生惡疾倘爲猪狗所食以及無知庸愚
夫婦以置於糞坑者則其兒必貧賤而夭否則一生勞苦惡瘡惡疾必損其身然此皆爲明理者知之而
庸夫俗子不足計也卽諱諱言而亦謂吾輩讀書人何若是之迂拘也天

○○小兒補賢論

觀王節齋曰小兒無補腎法蓋小兒禀父母精血而生男至十六而腎始充既滿之後妄用虧損則可用
藥補之若受胎之時稟之不足則無可補稟之原足又何待補耶嗚呼此言之謬亦甚矣夫二五之精妙
合而凝精合而形始成此形者卽精也精卽形也治精卽所以治形治形卽所以治精也但時有初中則
精有盛衰故小兒於初生之時形體雖成而精氣未裕所以女必十四男必十六而後天癸至天癸既至
精之將盛也天癸未至精之未盛也茲以其未盛而遽謂其無精也可乎且精以至陰之液本於十二經
之生化不過藏之於腎非獨出於腎也論上古天真論曰腎者主水受五臟六腑之精而藏之者也此精

之所原其不止於腎也可知矣王節齋止知在腎而不知在五臟也若調腎精未泄不必補腎則五腎之精其有秉賦之虧人事之傷者豈有其未洩而總皆不必補耶夫小兒之精氣未盛後天之陰不足也父母之多慾水虧先天之陰不足也陰虛不知治本又何藉於人爲以調元贊化乎此本源之理有當深察者如此再以小兒之病氣論之凡小兒之病最多者惟驚風之屬爲惶恐之作則必見反張戴眼斜視抽搐等症此其爲故總由筋急而然蓋血不養筋所以筋急真陰虧損所以血虛此非水衰之明驗乎夫腎主五液而謂血不屬腎吾不信也肝腎之病同一治今筋急爲如此而欲以全腎水而滋肝木吾不信也且太陽少陰相爲表裏其筋行於背脊而爲目之上綱今以反戴眼之證偏多見於小兒而謂非水臟陰虛之病吾更不信也矧以陽邪亢極陰竭則危臟氣受傷腎窮則死此天根生息之機元於小兒最切然則小兒之病其所關於腎氣者非渺而顧可謂小兒無補腎法耶決不信決不信

○○撮口臍風證治 指方

凡初生小兒撮口臍風之證總在三朝七日之內皆由胎中受熱或初生不慎爲風熱所侵遂至撮口撮眼閉舌強啼聲如鴉或聲不能出或口吐白沫或氣喘息每遇撮口之證口鬆稍能吮乳頗易治急用第二六七方保赤散調服或第二六八方龍膽湯一見此證急宜用此二法下之愈後微加補益至七八風者以斷脣之後爲水溼風邪所侵至令腹脹脣腫啼不吮乳甚則發瘡若脣青黑手拳口噤莫不爲

畜節不可治倘口尙能吮乳以第二六九方之保生湯投之或以安心安膽中若膽風燈火之法甚慘耳

○○驚風證治

驚風之證固由於肝而脾腎心肺亦未嘗不病也蓋小兒之真陰未足柔不濟剛故肝邪易動肝邪動則不能生火火即生風風火相搏則血虛血虛則筋急筋急則掉盻反張抽畜強直之類皆肝木之本病也於是肝邪侮土則脾病而爲痰爲吐瀉木盛土衰則肺病而爲喘促爲短氣木火上炎則心病而爲恐叫爲煩熱木火傷陰水不勝火則腎病而無水涸爲血燥爲乾渴爲無汗爲蕭爲痺此驚風未有不傷五臟也治此之法有要存焉一曰風二曰火三曰痰四曰陽虛五曰陰虛但能察其緩急則盡之矣今人鮮明此義不分虛實不察強弱一味驅風概行發散不知外來之風可散而血燥之風不可散也夫小孩之實邪惟痰火爲最而風則次之實治之法止於是矣然邪實者易治王敗者必危蓋陽虛則陰邪不散而元氣不復陰虛則營氣不行而精血何來所以兒病之重重則在虛證虛則竭竭則危治虛之法當辨陰陽陽虛者宜剛宜燥陰虛者宜潤宜溫且善用陽者必於陰中求陰陰陽互爲其根造化相須之妙是不可須臾離也設有謂此非小兒之藥非驚風之藥也此豈小兒不屬陰陽而小兒之體不由氣血乎若此等人開口便見本領言醫卽知醫問烏足與論乾坤合一之道也 痘瘡學

○○急驚證治

指方

凡驚驚之症必由於風寒乳食錯雜以致陰陽紊亂營衛不調或在初生後百日內或在週歲之內或在兩三歲之內者皆有之其候壯熱痰壅竄視反張抽搐顫動牙關緊急口中氣熱頰赤唇紅二便閉結脉浮洪數此肝邪風熱陽盛陰證也凡此皆實邪之盛者莫妙於第二六七方保赤散視兒大小輕則三分重則五七分極爲應驗若痰盛喘急者或第二七十方抱龍丸第二七一方牛黃散第二七二方利驚丸又或用第二七三方抑毒丸作煎劑皆可取用若外感風寒甚重而身熱爲病者當解其表宜用第三方之五積散投之或用第四八方之倣參蘇飲加減法皆可倘惊恐漸退而火而清者用第二七四方安神定驚丸主之○以上皆急驚治標之本倘得痰火稍退速即補其氣血以防虛敗此幼科最要之訣如薛氏云小兒攻伐之藥中病即止不可過劑誠至言也總之治惶恐之法萬萬不可盡用祛風化痰之藥必得於治風化涎劑中仍以熟地八錢爲君以淮藥三四錢佐之以保其元陰若概用消耗必成慢脾症甚至不治每用小兒之藥可不慎歟

○○慢驚要論

凡小兒慢脾之候或一起病即發畜而成慢脾者或因病後失調而成者或先用清散藥法不得泄元氣倍虛而成者或爲用藥攻伐消導致損脾胃而成者又有癥瘕之後爲庸醫所誤名曰掃毒因復傷元氣而成者又或因吐瀉日久脾陽虧敗內寒已極而成者種種慢脾之由無非因一虛症而已然急驚者固

謂實邪亦邪氣之實非正氣之實果正氣實何急驚之有至若慢脾全無實症卽言邪而邪亦虛邪至云
正而正亦微正正既微而尚可以不急救正乎邪既虛而尚可以孟浪驅邪乎今醫每多以驅風化痰爲
治慢脾之聖劑及至腸鳴作瀉不可救藥而後止此等幼科不知幾千萬年作豬狗也總之小兒之實症
無他惟東方之實中央之滯耳蓋東方木實則生火火生風爲熱爲恐中央土實爲濕爲滯而爲痰爲積
如此二者則知所以治實矣若小兒之虛症五臟皆有之如心虛則惕惕不安肺虛則氣促多汗膽虛則
嘔吐暴泄爲不食爲痞滿倦卧爲牙緊流涎爲手足牽動肝虛爲筋急血燥爲抽畜勁強爲斜視目瞪腎
虛則爲二便不逕爲津液枯槁爲聲不出爲戴眼爲肢體厥逆爲火不歸元如此五者則知所以治虛矣
然虛實之證又多有疑似者外症如呆聲低息短面色清減唇淡眼青二便不結脈亦弦細無力此內外
顯然其虛易辨有等外症面赤唇紅二便短少甚至眼赤舌乾脈亦似乎洪大於此等外症雖似實更屬
大虛其兒必係服苦寒之劑太過逼陽於外倘再認火症卽誤殺之矣是知一成慢脾惟有專顧脾胃使
根本完固諸症悉除如毘陵莊在田先生著福幼一書誠爲保赤金針其功莫大實足起死回生然其所
用之方係已成危篤者言之余每治幼兒福幼之方用不到此以其病勢未到此也病勢之未到此者以
其初病之時而施治之法使其病不到此耳噫小兒慢脾之由豈非由於起病時治之不得其法而成哉

○○摘錄莊在田先生辨慢脾病狀

慢脾卽慢驚

一慢脾吐泄脾胃虛寒也

一慢脾身冷陽氣抑遏不出也服涼藥之後往往如此

一慢脾鼻孔煽動真陰失守虛火燥肺也

一慢脾面色青黃及白氣血虛也

一慢脾口鼻中氣冷中寒也

一慢脾大小便清白腎與大腸全無火也

一慢脾昏睡靈精神不足也

一慢脾手足抽筋血不行於四肢也

一慢脾角弓反張血虛筋急也

一慢脾乍寒乍熱陰虛血少陰陽錯亂也

一慢脾汗出如洗陽虛而表不固也

一慢脾手足伸縮血不足以養筋也

一慢脾頸門下陷虛至極也

一慢脾身雖發熱口唇焦裂出血却不喜飲冷水進以寒涼愈增危篤以及所吐之乳所泄之物皆不

甚消化脾胃無火可知唇之焦黑乃真陰之不足也明矣

○○慢驚證治 指方

凡小兒手足忽然微掣吮乳口鬆臥時露睛者卽防成慢脾證卽用第伯三七方五君子煎加味法連進三四劑卽愈○如痰多者急用第二三三方理陰煎投之○如吐泄不止手足抽掣愈動者卽放心大膽以第四十方之經驗回陽湯煎服萬無移緩誤事○如身有微熱在稍緩而泄瀉不止者惟第伯二貳方倣胃闢前極爲大效止此數方則無論極重斷不令人危篤總宜胸有定見無爲庸醫及婦人女子之見妄言驅風化痰推拿燈火必致愈見沉重者倘實係虛篤或先已被苦寒散削之劑誤服太過而十分緊迫則又當以第二九六方莊在田先生逐寒湯驚湯刻卽投之倘病勢重者卽用第三九七方加味理中地黃湯急投切見回春萬不可偏聽近時幼科卑陋不通之語動輒謂小兒純陽之體何能用此等大補大熱之劑亦非治風治痰之藥是出此言者旣已爲無知無識之人偏聽此言尤爲自愚自昧之極爲人父者務其慎諸幸勿自貽伊戚其藥不可增減分兩貫爲萬應之至○再此病一切忌用之藥悉錄於第二九八方中宜熟玩之倘執迷不悟偏聽妄投必悞大事如以吾言爲謬我亦莫如之何也已矣

○○大驚卒恐證治 指方

凡小兒並無他病而忽被大恐或突如被大人高聲喊叫或平空爲木石踏墜振聲或見異物飛禽走獸

或滾落牀下或扒高而跌撲忽見火炎或忽聽炮响皆令兒大慌卒恐致令心膽受傷神氣徒離如作急慢二證治法謬亦甚矣蓋急慢二證一因風熱之感一因脾腎之虛所因不同其證亦異胡可以同日而語也治此之法當以收回神氣爲主宜用第二九九方倣秘旨安神法或第九六方五福飲主之愈後宜用第又八方人參養營湯調補多劑否則心虛膽怯易於受恐不可忽畧

○○驚啼證治

指方

小兒驚啼一證與急慢二驚不同與大嚇卒恐更異蓋慌啼者以小兒肝氣未充膽氣最怯凡耳聞驟聲目視驟色皆能怖其神魂醒時受怖寐時恍惕或振物不安或忽然啼叫亦或會被大嚇而神氣尚未復元者此皆神怯不安之證總宜安神養氣爲主如第三伯方茯神湯或第九六方七福飲或第八方益營湯皆可擇用若煩熱宜用第二六七方保赤散主之○若啼而多淚時哭時止是恍惕啼而無淚聲長不安憂憂戚戚首是腹痛

○○夜啼證治

指方

凡小兒夜啼不能作驚啼治也日間安然一到夜間神即不安而啼者此心氣不足陰盛陽衰宜用第二九九方倣秘旨安神法主之或第九六之七福飲亦佳○如面青手足俱冷腰曲而踡不思乳食者此脾中虛寒宜用第三伯六方經驗理中湯主之○若過傷乳食停滯作痛邪實不虛者宜用第五八方清理

導滌法。若面青手冷心神驚怯而啼者宜用第伯三七方五君子加味法或用第九六方之七福飲內加炮姜五桂各八分。若吐瀉不乳而啼者宜用第伯貳二方倣白關煎主之。若見燈火而愈啼面赤手脣俱紅口中熱氣蒸此心經有火宜用第六六吉方生脈散。若怒氣啼煩熱哭聲雄吭乳不多而口熱啼時手足間有微搐此肝膽熱甚木火相搏者宜用第三伯五柴胡清肝湯。以上審明用藥無不卽愈。若因驚夜啼則又當從前驚啼論治不宜混用倘乳少而啼或黑夜燈滅而啼者則又不可以病治或於第三伯七方燈花散查用亦可。

○○發熱辨虛實要論

凡小兒發熱各有所因不可一概見熱卽表其中有因虛邪有因實邪有因自內之外有因自外之內有直溫宣涼宣補宣泄自有一定不易之理。治隨時施治之法非詳加審察能無誤乎。

一小兒發虛熱邪面色青白氣怯神倦恍惚軟弱口鼻微冷不喜寒涼飲湯安靜泄瀉多尿嘔惡驚惕抱胞喜按乍涼乍渴乍哭乍笑蹙眉聲低手足指冷夜則出汗卧則露睛口張體屈乳食少思眠息緩弱皆爲虛症雖外有熱不可妄用消耗表散劫伐苦寒之劑必得培補正氣而虛邪自退矣。近幼科每謂小兒無虛何堪此補無云補住邪氣竚守寸光之見昧理之談毫足道哉。

一小兒實邪發熱面赤氣粗口瘡唇焦作渴喜冷大便多結小便短黃斑衣露體煩喘暴吐氣長聲雄伸

體而卧轉側不停睡不露睛手足多熱脈息洪數皆爲實證或散邪或清火審真酌用中病即止

一小兒發熱有因自內之外者或因瘡疹麻痘或因麻後痘後元陰受傷或因煙燭血虛或因五臟各傷或因先天不足或因後天失調其中又有陰虛陽虛之辨再未有自內之外而發熱不本於內症者也內症之熱當詳審虛實二字勿忽

一小兒發熱有因自外之內者或因暑熱外侵或因目見耳聞驟時恐嚇或因偶染不正之氣或乳食太過而爲凝風受熱受寒或沐浴當風或遊街遇雨此皆自外之內而發熱者其中尚有半虛半實之症果能小兒強壯外邪難侵內元充足惟由內之不足所以外邪易入果察其內外皆實涼之散之攻之利之中病即止不可過劑倘外邪雖重而素賦素不足者尤當於解散消導之中兼顧其脾胃使免病去而元氣亦傷小孩萌芽嫩葉何堪斧鋤至若苗殿神色當於前諸邪論發熱條內審之

○○發熱虛實症治 指方

一小兒陰虛發熱面唇雖紅並不發渴小便雖黃並不渴手大便雖結並不堅鞭或因素賦本虛或以麻痘後陰虛未會還元或因食病泄瀉或因驚後失調覲覽防其憒驚小兒防其勞損卽俗之謂皇子若凡脈見弦細而弱者是宜用第伯八方六味地黃湯或第二三三方理陰煎或第九六方五福飲之類皆妙一小兒陽虛發熱面白唇青手足身腹均冷間有微微冷汗小便清利大便滯滯眼珠發青神氣困倦乳

食不化飲熱得安飲冷卽吐喜煖畏寒哭聲茲柔清涕冷淚脈見遲細而軟者是也宜用第伯五七方水
中取火法或第伯四一方經驗善哉飲或第伯四三方全真一氣法均妙○倘陽虛之甚者則卽用第三
伯六方參附理中湯或第四十方經驗回陽飲薦爲大效尚須多服數劑不用畏懼

一小兒脾虛發熱唇紅淡白燒熱亦微四肢軟弱困倦大便淡黃而溏小便清長而利乳食半化醒則露
睛口張出根青筋脈見寸口無力右關緩弱者是也宜用第四五方扶脾養元法或用第伯三七方五子
煎加味法或第伯九七方補中益氣湯均須多服

一小兒未及周歲多有大便綠色渾身微熱者間亦有微變蒸之說不必服藥三五日自愈倘日久糞綠
則用第伯三七方六君子湯最爲穩妥

一小兒偶因外感風寒以大人懷抱微微厚蓋令取微汗避風乳母忌童數日不必服藥卽愈總之小兒
表散太過腠理更屬不密容易受邪卽幼科鏡中之天保探微湯爲彼書之第一方動輒卽用若用之
於表實及悞補伏表者偶爲神劑名則小兒稟賦不足一經妄用元氣大傷不可不慎

一小兒飲食內傷並無發熱之症蓋內停飲食或脹或痛或吐或瀉其所以發熱者必外感風寒內傷飲
食內外俱病方發熱也審其裏有內傷兼外感者方可消導卽以第五八方清理導滯法或用第一八八
方大和中飲均妥倘內無停滯而徒因外感發熱妄爲消導者則中氣被傷外邪更屬難解必致令生他

證今之幼科若見小兒發熱卽謂表裏熱不知出自何經獨不思調經論曰邪之生於陽者得之風寒暑生於陰者得之飲食起居陰陽喜怒此自是也蓋邪生於陽方有發熱表證邪生於陰全屬裏症若停滯而又發熱是裏裏俱病以裏邪重而浮越於表故亦有內傷飲食而爲發熱者此證内外表裏全癆爲小兒大證候亦非動微於是也

一小兒傷風受熱受寒必週身有汗鼻流清涕或兼咳嗽或吐乳食口氣靈熱時睡時醒啾唧不安脉見緊甚是也輕者以生姜三大片葱白三個去鬚泡湯服之令取微汗卽愈重者卽用第六二方固元兩解法或第肆貳方固脾解肌法或第四三方加味六安煎均穩妥取效倘大熱而出冷汗畏寒者則莫妙方第五九方倣大溫中飲最佳

一小兒發熱獨耳冷中指冷者須防麻痘另詳麻痘明若周身熱而十指尖冷者須防驚風審指訣五十指稍頭冷襲衆不可當若逢中指熱必定是瘧瘧中指獨自治麻痘疹痘相傳女右男分左分明仔細看以此審之無不應心

○○夏禹鑄先生辨熱瘡似驚風傷寒 指方○極爲應驗

夏禹鑄曰小兒燒熱傷寒每日列晚不增一分不減一分始終毫不間斷祇是平平而燒不抽不驚此乃傷寒燒熱也驚風燒熱似乎傷寒而多一抽搐蓋由筋屬肝肝風動故筋抽肝風入脾脾動痰故驚此乃

驚風燒熱之辨也

熱瘡燒熱雖同而症實有別或飲涼茶淡湯或大哭大叫頭面上必有汗一有汗燒熱即退三分少頃又照原便是熱瘡此一辨也

自早至晚必有一時更甚或眼泛白或手足掣一掣出汗燒熱即退少頃又燒熱每日皆然定是熱瘡此一辨也

喉內必有痰一哭必嘔嘔卽痰出定是熱瘡若驚風之痰盤踞於肺必不到胃何得吐出此一辨也

熱瘡一望而知面色似白非白似黃非黃精彩似倦非倦面皮慘慘而無潤澤毛孔瘻瘞而不直堅兩眼瞧人却像個無病的光景熱瘡燎然此症發於五六七八九月之間則莫妙於第三伯八方之清脾飲無有不效如發壹二日者定要服五六劑發至五六日祇須三四劑亦有悞作驚風傷寒者至十日二十日甚至一月不愈祇須壹二劑切不可以一劑愈遂作別證更方而悞事也

又有熱證一日一發發有定期其候不冷一來祇發熱或自下午起至半夜汗出便解手心肚腹熱不盡解或不自午後發亦不拘定亦宜清脾飲爲主倘兒體瘦弱熱退或弱死去則卽以第三伯九方六君子湯以補脾此禹鑄治小兒熱瘡之法極爲得理如前論熱退弱死去者余有用第四五方扶脾養元法更

應

○○吐瀉霍亂證治 指方

凡小兒吐泄與大人治法雖同然大人能言病源小兒全憑審察此其所以不能不另詳也總之虛寒居八九實熱者十僅二三○如面色青白精神怠倦肢體清涼或吐或泄或吐泄兼作脈或浮大無力者必因寒邪傷胃或乳母悞食生冷致令小兒受病宜用第三伯十方溫胃飲主之或用第三壹一方養中煎甚者用第三伯六方參附理中湯皆妙○如多痰涎吐瀉或兼喘促者用第二三三方理陰煎爲主若謂嘔吐不能用熟地是近時俗醫不通之語也○如偶有所觸雖吐而不甚者卽用第一八貳方安胃飲亦可○如傷食及誤食不宜之物以致嘔吐者宜用第伯二三方和胃飲或用第一八九方小和中飲均可○如停滯嘔吐而兼吐痰者宜用第四三加味六安煎主之或用第一九十九苓丸一陳湯主之○若雖因食滯吐瀉而所吐瀉之物多不運化悉由脾虛而所重在脾不重飲食不宜妄用消伐宜用第四五扶脾養元法或用第二三三方之理陰煎均妙

○○吐乳證治 指方

凡小兒吐乳手足指熱者屬實手足指冷者屬虛此其驗也更須望其神色如有狼狽之狀即是因病犯吐倘小兒乳多而瀦溢者無關病吐不必治也若形色憔悴或食乳卽吐或係虛寒宜用第壹三方之參姜湯最妙○倘小兒自受驚恐或乳母恚怒致兒吐乳青色者宜用第三伯九方之五味異功散C君

母食厚味煎炒飲酒之故而乳熱令兒吐者宜用第三壹三方之東垣清胃飲主之○若母食生冷停滯而乳冷令兒吐者其母宜服第三壹四方之人參養胃湯小兒用第三伯六之理中湯極效皆吐乳之神劑也

○○疳證 指方○治預防治已成

凡疳證在小兒爲五疳在大人卽爲五勞蓋疳者乾也由於脾敗腎虧津液乾涸總屬陰虛假熱之證雖有虫疳蛔疳瘧疳腦疳無虛疳丁奚疳以及疳渴疳瀉疳腫疳勞甚至走馬牙甘口爛齒蝕者諸書治甘之法無不具詳如古方之雄黃散蟾蜍丸蘆薈丸皆爲治甘之聖藥余每見近醫治之以此未得一效可知今人不如古人之重氣厚也蓋小兒其所以成疳者或哺食太早或嗜食甘肥或既飽之後又食生冷或未餐之前而果飴並進或乳母厚味太多又或乳母七情所致又或因麻痘托裏未清而麻痘後餘毒上攻名爲走馬牙甘者其患甚速至此透爛萬爛可治余治其預防或已成者無多取法而取效極應手一小兒或因雜病後或瘧疾後或麻痘後或驚風後日見消瘦面黃眼青食後困倦預防甘證急須調補陰分宜用第伯四二經驗全真一氣法或第三九經驗還元飲每日一劑不可更換必須三四十劑精神必健必能預防其不成疳矣 甘字借用作疳字讀

一小兒不知何時受嘸飲食日減疲倦日甚時見泄瀉懶言惡寒面無光彩預防甘症急宜補脾固使土

旺則四臟相隨而旺宜用第四五方扶脾養元法或第四四方倣參苓白朮散加減法均效必守專方非數十劑不可自保其必不成疳症矣倘一曝十寒未有能生者矣慎之聽之勿貽後悔

一小兒忽然喫土忽然喫炭或久便綠糞或喜飲茶水或咬指甲或挖鼻孔此係肺胃虛火陰不勝陽預防甘症宜用第十七方玉女煎服三四劑後前證稍退卽以第伯七三方五陰煎多服必效

一小兒甘證無論有虫無虫甘之名色亦多而古方所治甘證之劑非謂不善無如今時之小兒真賦更薄非比古人若以古方而施治今日之小兒元氣必不能敵也非獨治之不應亦治之必危倘未有大喘者雖七分沉重急以余自製經驗第三壹五方之濟生湯每日夜各投一服接連投之放心大膽萬勿更換余以此起死回生不知凡幾愈後卽以第伯四一之經驗青娥飲投十餘服多見少而成壯壯而成立者奚啻爲余之喜出望外也多矣

○○盜汗自汗 指方

睡中汗出曰盜汗隨時汗出曰自汗凡小兒自汗盜汗由於腠理不密氣血未充且汗多亡陽若忽畧大概而不治精血必日見消耗元氣日見退敗非慢驚卽甘症將見百病蜂起爲父母者當思患預防治未病莫治已病也治之之法當以益氣補陰爲主使陽氣外固則陰液內藏而汗自止矣

一小兒無故自汗或一飲食卽行大汗此陽虛而衛氣不固宜多服第伯三七方五君子湯加味佐或用

第三宿九方六君子湯或用第又八方八參養營湯均妙絕須數十服方可萬勿妄用寒涼

一小兒卧後即行出汗甚則露睛此陰虛而營氣不固每到上牀睡熟頭汗更甚宜用第伯五十六方補陰益氣煎或第伯一七方十全大補湯或用第三五方做歸陽元法均屬應效總須每日一服愈多愈妙一小兒或因大病後或大吐大泄後或悞服冠伐藥後以致氣虛氣脫大汗而不止者速用第伯一八方經驗參附理中湯放心大膽按連投之方可挽回或用第四十經驗回陽飲大劑進之若已見大喘卽不可治○若角弓反張而又大汗則無論盜汗自汗速用第伯七十方大營煎大劑速投方可挽回倘悞作風治則萬無生矣

一小兒自汗或因心經有熱而爲煩渴者宜用第九七方一陰煎主之外證必唇紅舌尖紅小便短黃者是也

一小兒無論盜汗自汗或因脾胃有火熱汗薰蒸脈見洪滑口渴心煩者宜用第三三方加減一陰煎生之

一小兒汗出而大渴或飲食時頭面大汗而飲食並不減少者此陽明胃熱宜用第三壺七竹葉石膏湯主之倘非實熱者萬不可服必要覓外證唇紅發渴脈見洪滑有力者方可用此

一小兒盜汗多有因麻後痘後元陰大虛者甚至汗後多發潮熱此陰虛虧損已極宜用第一方大補元

前每日兩劑否則難望保全此證近時極多皆由醫之掃毒藥而貽害也

○○腹痛腹脹證治 指方

凡小兒腹脹腹痛多因食積或寒涼傷脾而然經曰病痛有陰也又曰寒氣多也有寒故痛也東垣曰寒脹多熱脹少皆主於脾閏故凡小兒肚脹或痛或脹雖曰積滯多所致然脾氣不虛則運化以時何故作脹是脹必由於虛也若胃氣無傷則腹中和緩必無留滯作痛是痛由於寒也故治痛治脹者必當以健脾緩急爲主若無火證不得妄用寒涼若無堅實拒按等證不得妄用攻藥慎之慎之

一小兒肚脹腹脹或當時作痛惟第三貳一之芍藥桔實丸加減主之或以丸作煎藥亦可又或用第三一大健脾飲或第三十九啟脾飲均可擇用

一小兒偶因傷脾氣促因倦外見腹脹而內不脹者此脾氣虛也宜用第三伯九方五味異功散或第三七方五君子煎加味法主之

一小兒肚脹作脹或畏寒或手足冷或兼嘔吐泄者此脾閏陽氣不足虛寒作脹也宜用第三伯十方溫胃飲或第三方養中煎主之倘面白神疲而又兼泄濁水者則卽以第四十方經驗回陽飲多服

一小兒腹脹或兼喘促泄瀉而又多瘀者此脾胃陽虛不可妄用消導宜以第二貳三理陰煎主之
一小兒腹痛有滯而吐泄者此脾胃氣虛宜用第三伯九方六君子湯或用第二八九方小和中飲均效

一小兒偶因停滯而腹一時大痛而脹者宜用第伯三壹方經驗排氣飲加減法或用第二八八方大和中飲均宜屢試屢效

一小兒偶有宿食不消而爲脹滿者宜用第五八方清理導滯法或用第二八九方小和中飲亦可
一小兒如實有堅積停滯脹痛拒按形氣俱實者宜用第一壹三方赤金豆或第貳二十方伯順丸攻下之中病即止愈後須大補脾胃即以第六方八珍湯或第二方之壽脾煎多服更妙

以上皆大畧如此總之小兒柔嫩之質氣血未充不宜過於消耗雖偶爾停滯暫用推摩不可常恃

凡小兒倍證慢驚童子勞者悉由攻伐太甚致令病入膏肓能隨時以補腎扶脾雖病亦輕即出麻痘不獨稀少亦更無險症矣

○○癲癇證治 指方

癲者喜笑不當顛倒錯亂也多喜罵顛賣爲心志故心熱則喜而爲癲也癇者有風熱有驚邪皆兼虛與痰小兒有五癲五臟各有所屬心癲其聲如羊肝癲其聲如犬脾癲其聲如牛肺癲其聲如雞腎癲其聲如豬發則卒然倒地口角相引手足抽搐口吐涎沫項背反張形如死狀悉由血氣未充形體未實或爲風邪所傷或爲驚性所觸或因胎內七情驚嚇所致凡治五癲皆隨臟象治之以五色丸案以名經藥然發之重者難治病甚者亦難治當詳察之

一心癇面赤目瞪吐舌齶唇心煩氣短其聲如羊者是也如不發熱不口渴爲心虛宜用第三貳三錢氏
養心湯主之如發熱飲冷爲實熱宜用第三二六方虎睛丸如發熱不飲冷暮飲熱湯爲虛熱用第三
七方辰砂妙香散主之

一肝癇面唇俱青兩眼上竄手足痙攣反折其聲如犬者是也熱抽搐有力聲雄氣粗目赤爲實邪宜用
第三二八方瀉青湯主之如抽搐無力聲雌神疲爲虛邪宜用第伯八方六味地黃湯主之

一腎癇面黑目脹口吐涎沫形體如尸其聲如豬者是也腎無泄法宜用第伯八方之六味地黃湯或用
第三五方倣歸腎丸法亦可

一肺癇面如枯骨目白反窺驚跳反折搖頭吐沫其聲如雞者是也宜用第伯五二方之金水六君煎主
之○如面中白色兼黃者工不能生金宜用第三伯九方五味異功散○如面赤者陰火上衝於肺宜用
第伯八方六味地黃湯主之或用第伯七二方四陰煎亦可

一脾癇面黃目直腹滿自利四肢不收其聲如豬者是也均爲脾元不足宜用第三伯九方五味異功散
○如面青泄利飲食少思卽以第三伯九方六君子煎加木香連劑投之

凡癇證發熱抽搐仰卧面色光澤脈浮者病在肺爲陽症病易治身冷不抽搐卧面色黯黑脈沉者病在
臟爲陰證難治凡看此證之法先看耳聾高骨高骨間若有青筋散先抓破出血可免其患此皆元氣不

足之證總宜培補得宜若泛行政伐元氣復傷傷則不時舉動久則成危證多致不救矣

一廁證又有驚癇風癇食癇三種治驚癇用第三貳三方錢氏養心湯或用第三三七方辰砂妙香散亦可○治風癇宜用第二壹七方牛黃散或用第二七二方抑青丸主之○治食癇宜用第三貳方妙聖丸主之

○○瀉白證治 指方

凡小兒小便如米泔或停滯少頃變如泔濁此脾胃溼熱由於飲食不節生冷甘甜之物或小兒或乳母妄投雜食致令傷脾亦有因小兒氣虛下陷而體弱者治之之法雖有虛實之分必以顧脾爲主倘一味以芩連梔柏而過用之再未有不受其害也○若脈兼火證而數者宜用第三七方大分清飲或第伯四二經駢苡米湯主之○若飲食過傷兼脹滿者宜用第三壹九方啟脾主之○若形氣不足黃瘦神疲者宜用第伯九七方補中益氣湯或第三伯九方六君子湯主之○若肝火而移熱於膀胱者必兼痛澀煩熱宜第伯九六方龍膽瀉肝湯或第伯壹貳方清化飲均妥○若脾胃本虛而兼溼熱者宜用第三伯九方四君子湯內加入炒川連八分最效○若祇見瀉白而別無他燒熱煩渴精神亦無困倦者祇宜忌食生冷水果不必服藥或卽用第三貳十方之養元粉調補亦可

○○六部虛實診治備方

方內有用古方加減者有全道古方者有自製多經驗者總之近時男女老幼虛者十居其七八實者十止其三余附脈之虛實而備方之虛實以應之其中用藥權變頗費苦心雖云大醫不無小補

○○心脈實方

附脉

凡心脈實三候有力爲實外證必口苦舌乾煩熱甚則癲狂小便短黃面紅汗熱小兒防急驚妊娠
防墮胎

○○三黃湯

真賦素強又感實熱始用此方小兒則用三分之一不可過濃

式錢

黃連

五錢

黃柏

錢半

黃芩

叁錢

生枝仁

錢半

大黃

燈心十節引

○○竹葉石膏湯加減法

秉賦不甚強而受症實脉實不若以此方主之小兒則用三分之一

生沙參

六錢

麥冬

四錢

川貝

式錢

甘草

壹錢

生石膏 五錢

淡竹葉 十片

粳米一撮爲引

○○經驗方 余治心經實熱之症奏效甚多察定脉息內外相合卽放心大膽用之小兒則以五分之一

犀角稍 五錢

生地 壓兩

王連 叢錢

麥芽 五錢

赤茯苓 三錢

川貝 去心 叢錢

枝子 炒 錢半

甘草 志 錢

灶心土 叢兩泡水

一日兩劑更好

○○心脉虛方 附脉

凡心脉無力爲虛或浮大而軟或沉候模糊或三候俱遲皆爲虛象外症必健忘怔忡因之無力小便清長而利強食

○○倣養心湯加減法

原方內有玉桂余嫌無好桂妨燥有川弓當歸余嫌辛散妨更耗心氣有黃耆恐助虛氣故並易之

屢試屢驗小兒驚後以此方用五分之一投之實好

防黨

五錢

熟地

壹兩

生地

四錢

北五味

十四

茯神

三錢

遠志

五分

麥

三錢

柏子仁

三錢

○○經驗方

棗仁

或錢
炒

蓮子

四十枚
去心引

熟地

壹兩

牛地

五錢
酒炒

炙沙參

八錢

松子仁

三錢

棗仁

或錢
炒

陳皮

五錢
酒炒

炙玉竹

五錢

伏神

四錢
炒

甘草

錢半

生淮藥

五錢

蓮子

四十枚
去心引

益智仁

或錢
酒炒

○○倣薛氏甘露飲加減法

如素係用心人無病時則以此方調攝最妙

淮藥

四錢

生地

五錢

伏苓

卷錢

陳皮

錢半

天冬

式錢

麥冬

卷錢

甘草

錢半

茯神

卷錢

蓮子

四十枚

熟地

壹兩如素不投熟地者以
製首烏壹兩五錢代之

○○肝脈實方

去心引
附脉

凡肝脈三按有力爲實外證必畏寒惡風周身疼痛發熱目脹多氣然亦有生來肝脈實者必無
此等外證此言實者指有病如此而言之故立此方以備取用

○○麻黃湯

壹錢

麻黃

炙

桂枝

錢半

杏仁

五錢

甘草

壹錢

○○桂枝湯

壹錢

桂枝

式錢

生白芍

卷錢

甘草

錢半

善義引

焦於元

卷錢如無於元以
生淮藥五錢代之

杭白菊

錢半
酒炒

青皮

八分
卷錢

當歸

式錢

薄荷

五分

厚樸

炒
錢半

甘草

八分

北柴胡

錢半

雲苓

卷錢

生姜引

式錢

大熟地

四錢
酒炒

白芍

錢半

麥冬

式錢

百合

四錢

炙沙參

五錢

甘草

錢半

○○做追遙湯經驗加減法

少年人相宜男女同

○○三陰煎

老年人相宜男女同

大熟地

壹兩

黨參

五錢

酒芍

二錢

歸身

壹錢

生淮藥

四錢

棗仁

二錢

甘草

錢半

○○脾脈實方
附脉

凡脾脈搏指有力不甚緩爲實外症必四肢浮腫腹痛拒按牙齒常痛善飢善飽唇乾口臭或大便秘結夜難安卧等症

○○竹葉石膏湯

在心脈實方條內○卽古瀉黃散

蘇霍香

錢半

防風

壹錢

枝子仁

二錢

生石膏

五錢

甘草

錢半

○○小承氣湯

此方治大便實結舌胎黃而乾腹脹手足發熱察的確男婦老少皆可用妊娠忌用

生大黃

八錢

桔實

叁錢

厚朴

叁錢

○○經驗保和飲

此方凡脾實者老少姜效極多

焦楂肉

四錢

雲苓

四錢

神曲

錢半

連翹

錢半

菜菔子

壹錢

桔壳

八分

陳皮

錢半

甘草

八分

炒麥芽

叁錢

穀芽

叁錢

燒焦飯團一個

如蜜大
爲引

○○脾脈虛方

附脉

凡脾脈緩而耐按爲脾和緩而無力卽脾虛其外症必時作瀦瀉四肢困倦食後神疲小兒面黃目暗腹大青筋或手足不時潮熱口唇淡白或病後神疲等症

○○四君子湯

黨參

五錢
米炒

真於術

四錢
土炒

雲苓

壹錢
叁錢

炙草

式錢
式錢

前方加熟附片式錢
前方加春砂仁壹錢
○○參白朮散 痘後脾胃不足此方多服實妙男婦老幼均宜

玉桂八分
香附壹錢

名附桂四君子湯
名香砂仁君子湯

黨參

五錢
炙

砂仁

壹錢

雲苓

叁錢

炙草

式錢
式錢

白扁荳

八錢

淮藥

四錢
炒

薏米

七錢

棗皮

式錢
四十粒

真於朮

四錢
土炒

陳皮

錢半
錢半

桔梗

壹錢

蓮子

四十粒
爲引

真於朮

四錢
土炒

江西種述其性橫中如無真於朮
卽以炒真淮藥可加重倍而用之

柴胡

五錢
酒炒

陳皮

錢半
錢半

炙黃芪

四錢

如秉賦不能投黃耆者
即以炙玉竹五錢代之

川升麻

五分

不宜多用如
小兒用三分

白歸身

卷錢
土炒

加熱地壹兩名補陰益氣煎註詳下

凡思慮過度最傷脾元必加入熟地方妙重用至三兩者更好所謂納下不嫌其重也

○○經騎養元粉

男女老幼脾胃虛著以此粉早晚當點心食妙不可言

白扁豆

八兩
去壳

蓮米

四兩
去心

鍋焦

一斤卽
鱠皮

薏米

五兩

白蔻仁

卷錢
去壳

雲苓

四兩
去心

查肉

叁兩
去心

穀芽

四兩
去心

大茨實

五兩

麥牙

卷兩

陳皮

七錢

杏仁

五錢

陳倉老米

式斤

真淮藥

八兩

頂上白灰麵

壹筋

炒黃

壹筋

○○肺脈實方 附脉

除砂仁不見火餘俱炒微黃放地面退去火氣共碾極細末用磁罐收貯吃時用冰糖以開水調之
凡肺脈三候有力或鼓而長其外證必胸膈脹滿咳嗽濃痰鼻乾鼻血夾背汗流或呼吸氣粗眼內
白珠紅絲大便或結而腮發紅口多辛氣甚至吐血

○○經驗加味瀉白散 肺火重者均妙

桑白皮

四錢

天冬

四錢

薏米

七錢

甘草

壹錢

地骨皮

叁錢

真川連

式錢

天冬

叁錢

元參

四錢

川貝

式錢

○○經驗加味清肺飲 凡肺火過重者用此方主之俗云熱傷風以此方服二三劑即愈

真石斛

四錢

麥冬

參錢

荆介

八分

白芷

八分

淡竹葉

十片

王岑

二錢

連翹

二錢

生沙參

五錢

香附

錢半

蘇葉

錢錢

陳皮

二錢

桑白皮

二錢

霜桑葉

錢半

甘草

八分

荆介

八分

麥門冬

二錢

○○肺脈虛方

附脉

凡肺脈三候無力模糊軟弱均係肺虛其候外證必自汗如珠昏迷若倒氣不接續語言謇澁或吐黃色濃痰一動即喘促四肢發麻女子淫帶白濁崩漏小兒面白懶言等證

○○兩儀膠

熟地

壹兩

黨參

八兩

○○參耆湯

人參

叁錢

黃耆

壹兩

○○補中益氣湯

全前

○○經驗金真一氣湯

此方老幼虛羸○如腎虛者加入牛膝麥冬

大熟地

壹兩

炙黨

五錢

真淮藥

五錢

熟附片

錢半

北五味

十四粒

黃耆

四錢

有天生真元尤加三四錢更妙如藥肆中所賣江西種尤萬不可用以資性橫中也近日羸虛多頗

賤方內加入高麗參錢另蒸兌入更妙小兒減半○倘汗出過多以附片不妨用至五味錢酒炒黃耆不妨用至壹兩所謂重病必用重方不必拘泥余以此等症候卽小兒亦有用至五六兩一眼者無不立見奇功所謂膽欲大而心欲細者也○再此方如遇秉賦素弱偶爾外感鼻流清涕頭痛身熱潮熱微汗以此方去五味易麻梗錢半再以臥確杏仁四五錢去皮尖輕則服一劑重則兩劑全愈余屢經驗之百發百中所謂虛人中邪宜托不宜散此卽用托之義尤利於近時耳

○○左歸實方 附脉

凡左歸實須三候有力或鼓指有勁挺之象是外症必小便癃閉或短少澀痛或大便秘結不通眼中如流火甚至羞暎等症或耳閉凡議下者必要尺脈實象方可下之

○○加味地黃湯 腎經有熱小便澀痛或兼赤淋等症

知母

四錢

雲苓

叁錢

澤鴉

錢半

石斛

四錢

黃柏

錢半

淮藥

四錢

木通

四錢

熟地

壹兩

桑皮

壹錢

牛膝

四錢

○○知柏四物湯

腎經有熱或害火眼熱淚而痛大小便不利似閉非閉似結非結

熟地

壹兩

黃柏

錢半

當歸

壹錢

白芍

錢半

知母

錢半

川芎

錢半

大棗

八分

○○經驗加減大承氣湯

余治腎脈實急凡傷寒過度每遇大便實結者審症察脉認其的確無不立效均得回天之功若稍
認不的確實不可孟浪慎之

小生地

錢半

川牛膝

三錢

生大黃

五錢

白姜薑

八分

川厚朴

錢半

全蟬退

十箇

細甘草

錢半

芒硝

三錢

桔實

錢半

如症實在極實者再加入犀角四五錢更妙○此方不在乎老年小兒余曾經治一嚴刺史年近八旬范明府年已七旬又吳荷屋方伯年近六旬衆醫均議陰寒論幾乎爲若輩殺之延余診治余力辨其由卽以此方連進日服三劑不等均得立見奇功余於此者擢髮難數又治年方十餘歲者亦不乏人無不應手總之審厥變症必得十分留神庶幾心有成竹陰陽虛實生死反掌間耳可不慎也哉

○○左腎虛方

附脈

三按無勞甚至模糊緩推尋軟弱而細緩此皆屬虛其外症男子頭聾腰痛心冲兩足無力雙目矇瞓或時流淚或起雲翳夜間尿多遺精敗濁陰囊多癰或齒痛耳痒或喉痛喉乾女子虛帶腰痛限補腎法此極不通之語也殊不知小兒之虛卽由腎天一生水之義其理昭然凡小兒質氣不足不特百病不生更多聰穎一經有病必從腎補無不回春近時以涼藥丸抱龍丸蘇合內消各丸無論小兒之病一概投之稱爲聖藥在先天頗足者施之不過剝其元陰尚不害命倘施之於先天不足者無不殺之冤沉海底余治小兒多有專補腎者以熟地用至貳三兩一劑者立卽見功每從余得小兒活命者不下數千無如執迷不悟者多喪於若輩之手攻之伐之削之及至肚大青筋

肌肉消索或成慢驚或作長瀉必致不可救藥然後從補措手不及悔之晚矣且今時無論男婦老少左腎虛者十有八九右腎虛者十有六七須仔細酌之

○○歸腎丸

大熟地

十兩

伏苓

叁兩

當歸

貳兩

棗皮

壹兩

真淮棗

七兩

杜仲

叁兩

枸杞

貳兩

免絲

叁兩

○○左歸丸

熟地

十五

鹿膠

壹兩

棗皮

壹兩

枸杞

五錢

淮棗

七兩

龜膠

叁兩

牛膝

五錢

枸杞

貳兩

免絲

叁兩

共研末蜜丸如桐子大每服七錢鹽水送下

○○左歸飲

○○左歸飲

熟地

壹兩式
兩亦可

伏苓

叁錢

枸杞

貳錢

淮藥

七錢

棗皮

貳錢
炒

炙草

錢半

○○大補元煎

人參

如遼東參用八分
如高麗參用叁錢

凡用參隨

陰補陰
陽補陽

當歸

參錢酒燉
葛根可用

俱蕊兒服

真防黨參

或用五六錢
以鹽水炒

生淮藥

叁錢或
用壹兩

熟地

壹兩貳兩叁兩均可用
凡補腎之劑
愈重愈妙所謂納下不嫌其重者也

炙甘草

錢半

杜仲

貳錢

枸杞

重者勿用
叁錢虛火

○○經驗補血湯加味法

此方與前各方大有效驗近時對證之神劑其功甚速

生淮藥

七錢或
用壹兩

麥冬

貳錢
志

陳皮

錢半

白芍

錢半
酒炒

川芎

錢半

真石斛

四錢

麥草

錢半

枝仁

八分
炒

當歸

參錢
土炒

伏神

四錢

真防寒

五錢
鹽水炒

棗仁

貳錢

生五味

七枚
熟地

大人用參兩均妙卽或
小兒減半用○如作丸藥卽加十倍用早蓮草熬膠和冬蜜爲丸早晚鹽水開送下此方無論男婦

老少但凡水不足者服之如神如虛而有火者去蜜不用加酒炒洋參要白者爲妙凡虛而多火
者宜用洋參以其能靜陰也

○○右督實方

附脉

凡右督脈重按有力或鼓指挺勁之象或與衆脈且長且大均爲實候其外證必夢遺淋瀝陽物時
舉女子多淫穢小兒多癰疥或動血或喉痛舌腫等症

○○六味地黃湯

熟地

壹兩

伏苓

叁錢

丹皮

貳錢

淮藥

五錢

棗皮

錢半

澤瀉

或錢
鹽水炒

熟地

壹兩

元參

四錢

石斛

叁錢

雲苓

叁錢

丹皮

錢半

澤瀉

錢半

淮山

五錢

麥冬

四錢

綠荳

五錢

丹皮

錢半

○○經驗地黃湯
此方男婦用之無不應手

凡陰虛火重等症必以此方主之其加減隨證斟酌然熟地不宜輕用

熟地

壹兩

生地

五錢

麥冬

四錢

白芍

錢半

牛膝

壹錢

丹參

叁錢

甘草

八分

此方如吐血則加炒黑桑錢半茜根錢半不用甘草其效如神

○○右歸丸

附脉

凡右尺脈三按無力或指模糊或與衆脉獨小獨遲爲真火不足元陽虛也當補火以配水其外證必脾胃吐瀉

○○右歸丸

大熟地

十五

玉桂

四兩

當歸

叁兩

鹿膠

五兩

熟附片

兩

枸杞

叁兩

杜仲

叁兩

棗皮

兩

真淮山

七兩

菟絲

叁兩

再加入參

末蜜九
隨宜研

○○右歸飲

熟附片

五錢

淮山

七錢

棗皮

錢半

玉桂

參錢

枸杞

或錢

川杜仲

參錢

甘草

錢半

大熟地

壹兩

跟乎陰必得以熟地坐重藥力方到

火虧者大見功效以之合丸則加十倍用之

大熟地

或兩

兔絲

參錢

鹿茸

或錢

瑣陽

參錢

果杞

參錢

上玉桂

或錢

淮山

五錢

生姜

八分

準月

或錢

川椒

七分去明
口炒微汗

熟附片

四錢

固脂

或錢核桃

○○
熟附湯

凡陽虛中寒者如冷汗面白或青色發嘔以及房事後精不能收或時時滑精必防脫陽此方可以
救急其功甚速藥味愈少而力自大也

熟附子

壹兩

生附片

五錢

黃耆

鹽水炒

生姜引

右六部虛實診治之方大半皆非拘執古法蓋古方緣爲後學之法則壅繩不是要後學鈔錄陳文也其中卽予之經驗者掛一漏萬茲分類手輯原爲壽兒輩易於入門也所以余自名之曰壽身小補爾輩當爲我會其意也且輯僅五十二方而溫涼補泄虛實寒熱皆統乎其中卽前後用藥亦止八十二味均屬眼前易認之品是以用藥萬不可好偏好奇在乎用之得法雖病態百出卽此數十味能留心推求足堪應手今日醫者每以稀少之藥而逞奇藥肆中又以假藥代之其中黑地殺人實爲可憫此等罪過皆庸醫造之不勝切齒之至

○○四季感冒大暑指方

凡男婦老少皆可用之雖不能十分中窯亦必能漸次退病且病者自己知其身之強弱而方內之補泄亦可自己善爲斟酌小兒減半

○○春三月偶爾感冒如頭疼發熱惡寒或欬嗽或時熱時退以倣參蘇飲加減法主之卽是第四八方必得避風忌油一二劑後熱退稍愈卽以養陰益氣法斟酌主之即是第五十方倘大寒熱身體疼痛或項強脚氣卽用人參加減敗毒散亦可並治癰氣不拘老少皆可用方在第四九條輕則兩劑重則三劑愈後

亦以第五十之方調理

○○夏三月偶爾感冒或發熱而微惡寒頭疼身疼小便短黃咳嗽痰煩悶內熱大便堅硬等證宜用微消風百解法方在第五一條如素陽虛體虧者以做大溫中飲主之方在第五十九條如素陰虛體弱者當以養陰輕解法爲妥方在第六十條

○○傷暑不同○經曰脈虛身熱得之傷暑其證並不惡寒忽然大熱之後而頭目昏花莫名其妙或嘔或嘔或泄不泄昏昏迷迷糊糊壅塞而脈極虛細者是也宜清暑益氣湯加減法主之方在第五十二或八參白虎湯加減法主之亦可方在第十三此男婦老少通用之劑也倘有暑毒霍亂吐泄腹痛頭痛等證無論男婦老少以五物查靈飲更妙方在第五十四愈後調理則以安胃和脾法方在第五十五

○○秋三月偶爾感冒或頭疼發熱口乾舌燥喉痙大便結小便黃宜經驗潤燥法主之方在第五十六如大熱大渴而舌胎乾焦脉洪大而其人昏迷痰壅者此感秋燥之氣而鬱於中焦是又當清熱解燥法主之方在第五十七倘秋天陰雨過多乍涼乍熱而忽經失調發熱頭疼微惡寒不甚渴或溏泄或腹痛須防瘧痢兩證卽以清理導滯法主之方在第五十八俾瘧痢之患卽能堵卻矣古人治未病莫治已病蓋此謂也余經驗甚多勿爲全醫所惑所以醫道宜明而不宜行也行之卽類於庸矣行之則有射利逐功之念如不明說脈證之原委人以爲識見淺薄若詳辨診治之主策人以爲言大而誇言之多寡以聽之是

非直可慨也所以余輯此書至再二至三叮嚀告誠實爲家庭兒輩起見萬勿爲余播揚流顯貽漫爲輕心而庸俗視爲塗貳則更負余之一團心血耳倘至親至好以此書珍重則又不妨來家致錄給存之是更余之厚望也○秋時瘧病另有專條

○○冬三月感冒輕則傷風重則傷寒如屬寒而傷之卽病者卽謂之正傷寒或在乎陽經陰經不外乎六經定法已於傷寒傳變證治辨明立方茲以冬間偶爾感冒尙未成正傷寒者而言之具今日虛者十有八九每一感冒卽大發表無不悞事也甚美愈表愈虛致令虛邪內陷日事纏綿以小事而釀成大禍無不從大表中而成也要知邪從正解治體虛之外感無不神奇邪從汗解治體實之傷風始得效驗邪從正解者用補藥法以托之邪從汗解者用表法以驅之托法者十卽有其七八驅法者十不過二三也其方均在第五九第六十第六一第六二條內須相其體之虛實而酌量用之