

重刊萬方類纂

四

汗出止

杜蒺藜當歸等分爲末米飲每服三錢

巴豆去油如綠豆大三丸以烏金石末一錢調

湯送下即通 虎杖三兩凌霄花沒藥一兩爲末

熱酒每服一錢 腹大如甕氣短欲死虎杖一斤

去頭暴乾切土瓜根汁牛膝汁二斗水一斛浸虎

杖一宿煎取二斗入二汁同煎如餒每酒服一合

日再夜一宿血當下 虎杖煎治女人月經不通

腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重亦治丈夫積聚取

高地虎杖根剉二斛水二石五斗煮取一斗半去

滓入醇酒五升煎如餒每服一合以知爲度 結

成癥塊腹肋脹大欲死牛旁根二斤剉蒸三遍以

生絹袋盛之以酒二斗浸五日每食前溫服一盞

又馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓

熬成膏每服半匙熱酒化下日二服 心腹滯悶

四肢疼痛用赤馬肝一片炙碾每食前熱酒服一

錢通乃止 臍腹積聚疼痛礪砂一兩皂角五挺

去皮子剉爲末以頭醋一大盞熬膏入陳橘皮末

三兩搗三百杵丸梧子大每溫酒下五丸 宿有

風冷留血積聚月水不通菴蒿子一升桃仁二升

酒浸去皮尖碾勻入瓶內以酒二斗浸封五日後

每飲三合日三服帶下少腹滿或經一月再見

者土瓜根散主之土瓜根芍藥桂枝蠶蟲各三兩

為末酒服方寸七日三服或兩三月或半年一

年者用麻子仁一升桃仁二兩研勻熟酒一升浸

一夜日服一升不行至一年臍腹痛腰腿沉重

寒熱往來用芥子二兩為末每服二錢熱酒食前

服數年不通面色痿黃唇口青白腹內成塊肚

上筋起腿脛或腫桃根煎主之用桃樹根牛旁根

馬鞭草根牛膝蓬蘽各一斤剉以水三斗煎一斗

去滓更以慢火煎如飴狀收之每以熱酒調服一

匙萬應丸治女人月經瘀閉不來繞臍寒疝痛

徹及產後血氣不調諸癥瘕等病用乾漆一兩打

碎炒烟盡牛膝末一兩以生地黃汁一升入銀石

器中慢熬俟可丸如梧子大每服一丸加至三

五丸酒飲任下以通為度月經不利血氣上攻

欲嘔不得睡用當歸四錢乾漆三錢炒烟盡為末

煉蜜丸梧子大每服十五丸空心温酒下女人

月水不通臍下堅如盃時發熱往來下痢羸瘦此

為血瘕若生肉瘕不可治也乾漆一斤燒研生地

黃二十斤取汁和煎至可丸丸梧子大每服三九

二

空心酒下 月經久閉蠶沙四兩砂鍋炒半黃色

入無灰酒一壺煮沸澄去沙每温服一盞即通

龍胎治產後餘疾並治女人經閉積年不通同瓦

松景天各少許以水兩盞煎一盞去滓分二服少

頃腹中轉動便下 經脉不通積血不散用烏鴉

散主之烏鴉去皮毛炙三分當歸焙好墨各三分

延胡索炒蒲黃炒水蛭以糯米炒過各半兩

芫青糯米炒過一分為末每服一錢酒下

月經不調 血臟冷痛此方平易捷徑熟附子去皮當

粉炒成珠研末熱酒服即安一方入辰砂末半錢

久而無子乃衝任伏熱也熟地黃半斤當歸二

兩黃連一兩並酒浸一夜焙研為末煉蜜丸梧子

大每服七十九米飲温酒任下 產後月水往來

乍多乍少白狗糞燒末酒服方寸七日三

月信澀滯

二升空心入酒和服 藁荷根細切水煎取

月經逆行

從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用當

歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分温服

其經即通 魚膠切炒新綿燒
灰每服二錢米飲調下即愈

五旬行經

婦人五十後經水不止者作敗血論用茜
根一名過山薑一兩阿膠側柏葉炙黃芩

各五錢生地黃一兩小兒胎髮一枚燒灰分作六
帖每帖水一盞半煎七分入髮灰服之 芩心丸

治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過
多不止用條芩心二兩米醋浸七日炙乾又浸如

此七次為末醋糊丸梧子大每
服七十丸空心溫酒下日二次

通經破血

舊屋陰處五花活者五兩熬膏當歸鬚乾
漆一兩燒烟盡當門子二錢為末棗肉和

丸梧子大每服七
十九丸紅花湯下

經閉驗胎

經水三個月不行驗胎法川芎生為末空
心煎艾湯服一匙腹內微動者是胎不動

者非也

室女經閉

當歸尾沒藥各一錢為末紅花浸酒面北
飲之一日一服 凌霄花為末每服二錢

食前温酒下 茜根一兩煎酒服之一日即通甚

效 用酢榴根東生者一握炙乾水二大盞濃煎

一盞空心服之未通再服 牡鼠屎一兩炒研空

心温酒服二錢 恍惚煩熱者鉛霜半兩生地黃

汁一合調下日三服 血結成塊心腹攻痛質汗

薑黃川大黃炒各半兩為末每服一錢温水下

月水不止 阿膠炒焦為末酒服二錢 羊前左脚脛

骨一條紙裏泥封令乾煨赤入棕櫚灰等

分每服一錢温酒服之 牡蠣煨研米醋搜成團

再煨研末以米醋調艾葉末熬膏丸梧子大每醋

湯下四五十九 側柏葉炙芍藥等分每用三錢

水酒各半煎服室女用側柏葉木賊炒微焦等分

為末每服二錢米飲下 拒霜花蓮蓬殼等分為

末每用米飲下二錢 青竹茹微炙為末每服三

錢水一盞煎服 船茹一斤淨洗河水四升半煮

二升半分二服 瑞蓮散用陳蓮蓬殼燒存性研

末每服二錢熱酒下 五靈脂炒烟盡研每服二

錢當歸兩片酒一盞煎六分熱服三五度取效

紅鷄冠花一味曬乾為末每服二錢空心酒調下

忌魚腥猪肉 箬葉灰蠶紙灰等分為末每服二

錢米飲下 木賊炒三錢水一盞煎七分溫服日一服 生地黃汁每服一盞酒一盞煎服日二次

白芍藥香附子熟艾葉各一錢半水煎服之 梅葉焙櫻櫚皮灰各等分為末每服二錢酒調下

烏龍尾炒烟盡荆芥穗各半兩為末每服二錢茶下 勞損黃瘦暫止復發小勞輒劇者槐耳炒黃

赤石脂各一兩為末食前熱酒服二錢桑黃亦可 日二服桑黃須焙研不必加赤石脂 來無時者

案紙二十張燒灰清酒半升和服頓定冬月用煖酒服之 日漸黃瘦者紫釧末二錢空心白湯下

用黑驢屎燒存性研末麩糊丸梧子大每空心黃酒下五七十九丸神效並治血崩 炒豆紫湯服

之佳方載 產後門

經水過多 赤石脂破故紙一兩為末每服二錢米飲下

婦人月水論 女子陰類也以血為主其血上應太陰下應海潮月有盈虧潮有朝夕月事一月一行與之相符故謂之月水月信月經經者常

也有常軌也天癸者天一生水也邪術家謂之紅

鉛謬名也。女人之經一月一行其常也。或先或後或通或塞其病也。復有變常而古人並未言及者。不可不知。有行期只吐血衄血或眼目出血者是謂逆行。有三月一行者是謂居經。俗名按季。有一年一行是謂避年。有一生不行而受胎者是謂暗經。有受胎之後月月行經而產子者是謂盛胎。俗名垢胎。有受胎數月血忽大下而胎不墮者是謂漏胎。此雖以氣血有餘不足言而亦異于常矣。女子二七天癸至七七天癸絕其常也。有女年十二受孕者有六十餘生二男一女者此又異常之尤者也。學醫者亦宜留心焉。

婦人血氣

紫荊皮為末醋糊丸櫻桃大每酒化服一丸。木通濃煎三五盞飲之即通血氣。

刺痛五靈脂生研三錢酒一盞煎沸熱服又荔枝

核燒存性半兩香附子炒一兩為末每服二錢鹽

湯米飲任下名蠲痛散血氣心痛數年不愈用

人言半分茶末一分白湯調下吐瘀血一塊而愈

血氣遊走作痛及腰痛蓬莪乾漆二兩為末

酒服二錢腰痛核桃酒下腹中刺痛經候不調

用玄胡索去皮醋炒當歸酒浸炒各一兩橘紅二
 兩爲末酒煮米糊丸梧子大每服一百丸空心艾
 醋湯下血氣作痛及下血無時月水不調用華
 菱鹽炒蒲黃炒等分爲末煉蜜丸梧子大每空心
 温酒服三十九兩服即止名二神丸臍下氣脹
 月經不利血氣上攻欲嘔不得睡當歸四錢乾漆
 燒存性二錢爲末煉蜜丸梧子大每服十五丸温
 酒下血氣冷痛攻心鉛二兩石亭脂二兩木香
 一兩麝香一錢先化鉛炒乾入亭脂急炒焰起以
 醋噴之傾入地坑內覆住待冷取研粟飯丸芡子
 大每用二丸熱酒化服取汗或下或通氣即愈如
 大便不通再用一丸入玄明粉五分服婦人不
 會生長血氣疼痛不可忍二聖丸濕漆一兩熬一
 食頃入乾漆末一兩和丸梧子大每服三四丸温
 酒下怕漆人不可服並治丈夫疝氣小腸氣撮痛
 者血氣刺痛紅藍子一升搗碎以無灰酒一大
 升拌子暴乾重搗篩蜜丸梧子大空心酒下四十
 丸又心痛門失笑散血氣攻心痛不可忍蓼
 根洗剉浸酒飲又沒藥末二錢水一盞酒一盞煎
 服血氣脹滿劉寄奴穗實爲末每服三錢酒煎

服不可過多令人吐利此破血之仙藥也 一切

血氣腹痛天仙藤五兩炒焦為末每服温酒調服

婦人久冷血氣攻心痛不止以葉子雌黃二兩

細研醋一升煎濃和丸小豆大每服十五丸醋湯

下 婦人血病用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸

七日三夜一 血化為水也

補血破氣 追氣丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可

桂心各一兩高良薑半兩為末醋糊丸梧子大每淡醋湯下五丸

婦人血塊 土牛膝根洗切焙搗為末酒煎温服極效

二升煮十沸頓服取利 癥瘕門有血癖一條

婦人肌熱血虛者 吃力伽散用白朮白茯苓白芍藥

婦人勞熱心忪 地黃煎用生乾地黃熟乾地黃等分

為末生薑自然汁入水相和打糊丸

梧子大每服三十九用地黄湯下或酒醋茶湯下亦
可日二服覺臟腑虛冷則晨服八味丸地黄性
冷壞脾陰虛則發熱
地黃補陰血故也

婦人發熱

欲成勞病肌瘦食減經候不調地髓煎用
乾地黄一斤爲末煉蜜丸梧子大每酒服

五十
九

婦人骨蒸

載發
熱門

婦人夜熱痰嗽

月經不調形瘦者用瓜蒌仁一兩青
黛香附童尿浸曬一兩五錢爲末蜜

調噲
化之

婦人五心發熱

水仙花乾荷葉赤芍藥等分爲
末白湯每服二錢熱自退也

女子少腹痛

女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰
中切痛連脊間如刀錐所刺不可忍者

疑是鬼疰服諸藥無益其疾轉增審察前狀卽用
此藥其藥用夏五月積雪草正放花時卽采曝乾

搗篩爲糝每服二方寸七和好醋二小合攪勻平旦空腹頓服之每旦一服以知爲度如女子陰冷者卽取前藥五兩加桃仁二百枚去皮尖熬搗爲散以蜜爲丸如梧子大每旦空腹以飲及酒下三十丸日再服以愈爲度忌麻子蕎麥

乾血氣痛

蝸蝠一箇燒存性每酒服一錢卽愈血氣不行上衝心膈變爲乾血氣者用絲瓜

一枚燒存性空心溫酒服 錦紋大黃浸酒曬乾

四兩爲末好醋一升熬成膏丸芡子大臥時酒化

一丸服大便利一二行紅漏自下乃調經仙藥也或加香附

婦人血厥

平居無疾苦忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人眩冒移時方寤此名血厥亦

名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故身

如死氣過血還陰陽復通故移時方寤婦人尤多

此證宜服白微湯用白微當歸各一兩人參半兩甘草一錢半每服五錢水二盞煎一盞溫服

血枯

有病胸脇支滿者妨于食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名

曰血枯得之年少時有所大脫血或醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以四烏賊骨一蘆茹為末丸以雀卵大如小豆每服五丸飲以鮑魚汁飯後藥先所以利腸中及傷肝也三藥並不治血枯而經法用之是

攻其所生所起耳

血結

婦人小腹滿如敦狀小便微難而不渴此為水與血俱結在血室大黃二兩甘遂阿膠各一兩

水一斗半煮半升頓服其血當下

血奔

舊敗蒲蓆燒灰酒服二錢

血運

沒藥末一錢酒服

血勞

憔悴困倦喘滿虛煩噯噯少氣發熱多汗口乾舌澁不思飲食名血風勞油煎散用五加皮牡

丹皮赤芍藥當歸各一兩為末每用一錢水一盞用青錢一文蘸油入藥煎七分溫服常服能肥婦

人

血黃

黃茄子竹刀切陰乾為末每服二錢溫酒調下

婦人血風

虛冷月候不勻或手脚心煩熱或頭面浮腫頑麻用川烏頭一斤清油四兩鹽四兩

鑊內同熬令裂如桑椹色為度去皮臍五靈脂四兩為末搗勻蒸餅丸如梧子大空心溫酒鹽湯下

二十九丸亦治丈夫風疾血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者用喝起草嫩心陰乾為末以

酒服一大錢其功甚效此物善通頂門連腦蓋即蒼耳也烏荊丸並治婦人血風見諸風門頭

痛門女人頭痛條下有血風證一條

婦人惡血

攻聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆燒烟盡半兩水二鍾煎一鍾服琥珀和大黃龍

甲作散酒下方寸匕下惡血婦人腹內血盡即止

婦人氣盛血衰

變生諸證頭運腹滿皆宜抑氣散主之香附子四兩炒茯苓甘草炙各一

兩橘紅二兩為末每服二錢沸湯下

男女血虛

麥門冬三斤取汁熬成膏生地黄三斤取汁熬成膏等分一處濾淨入蜜四之一再

熬成瓶收每日白

湯點服忌鐵器

婦人勞復

病初愈有所勞動致熱氣衝胃手足搐搦拘急如中風狀淡竹青茹半斤栝樓二兩

水二升煎一分二服

婦人百病

諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸梧子大每食前米飲下十五丸

女人諸病

四制香附丸治婦人女子經候不調兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩

醇酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩童子小便浸春三秋五夏一冬七日淘洗淨曬乾搗爛微焙

為末醋煮麩糊丸梧子大每酒下七十丸瘦人加澤蘭赤茯苓末二兩氣虛加四君子料血虛加四

物料香附濟陰丸治婦人月經不調久成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童溲鹽水

酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊和作餅曬乾晚蠶沙半斤炒莪茂四兩酒浸當歸四兩酒

浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十丸米飲下
日二醋附丸治婦人室女一切經候不調血氣

刺痛腹脇膨脹心怔乏力面色痿黃頭運惡心崩
漏帶下便血癥瘕積聚及婦人數墮胎由氣不升

降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮乾搗焙
石白為末醋糊為丸醋湯下又艾附丸治同上香

附子一斤熟艾四兩醋煮當
歸酒浸二兩為末如上丸服

婦人狐瘕

因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被濕
致成狐瘕精神恍惚令人月水不通胸脇

腰背痛引陰中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其瘕
手足成形者殺人未成者可治用新鼠一枚以新

絮裹之黃泥固任入地坎中桑柴燒其上
取出去絮入桂心末六銖為末酒服方寸匕
不過

二服當
自下

鬼胎癥瘕

經候不通荒花根三兩剉炒黃為末每服
一錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈婦

入經脉不通癥塊脹滿腹有鬼胎用葛上亭長五
枚以糙米和炒去翅足研末分三服空心甘草湯

下須與覺臍腹急痛
以黑豆煎湯服當通

婦人無子

立春雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有
子神效 二月丁亥日取杏花桃花陰乾

為末戊子日和井華水服方寸七日三服 白狗
骨煎汁同米煮粥補婦人令有子 上元盜取富

家燈盞置床
下令人有子

子宮虛寒

婦人無子由子宮虛寒下元虛月水不調
或閉或漏或崩中帶下或產後敗血未盡

內結不散用紅娘子六十枚大黃葶藶皂莢各一
兩巴豆一百二十枚為末棗肉為丸如彈子大以

綿裹留繫用竹筒送入陰戶一時許發熱渴用熟
湯一二盞解之後發寒靜睡要安三日方取出每

日空心以鷄子三枚胡椒末二分炒食酒下以
補之久則子宮煖矣 女陰門有婦人陰冷條

婦人黃疸

見黃
疸門

婦人嘈雜

按陳自明云皆血液淚汗變而為痰或言
是血嘈多以猪血炒食而愈蓋以血導血

歸原之意爾此固一說然亦有虬蟲
作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

婦人臍燥

悲傷欲哭象若神靈數欠者大棗湯主之
大棗十枚小麥一升甘草二兩每服一兩

水煎服之
亦補脾氣

夫婦相愛

布穀鳥脚脛骨五月五日收帶之各一男
左女右令夫婦相愛云置水中自能相隨

也
肉私與食之即相愛憐
也 夫婦不和者煮鴛鴦

令婦不妬

取赤黍同薏苡等分為丸常服之 倉庚
為膳療妬 取婦人月水布裏蝦蟆于廁

前一尺入地
五寸埋之

生貴子

虎鼻懸門中一年取熬作屑與婦飲便生貴
子勿令人及婦知知則不驗又云懸于門上

宜子
見虎豹皆取其勇壯之義同也
孫帶印綬此與古者胎教欲

丹參散

治婦人經脉不調或前或後或多或少產前
胎不安產後惡血不下兼治冷熱勞腰脊痛

骨節煩疼用丹參洗淨切曬
為末每服二錢溫酒調下

無極丸

治婦人經血不通赤白帶下崩漏不止腸風
下血五淋產後積血癥瘕腹痛男子五勞七

傷小兒骨蒸潮熱等証其效甚速宜六癸日合之

用錦紋大黃一斤分作四分一分用童尿一盃食

鹽二錢浸一日切曬一分用醇酒一盃浸一日切

曬再以巴豆仁三十五粒同炒豆黃去豆不用一

分用紅花四兩泡水一盃浸一日切曬一分用當

歸四兩入淡醋一盃同浸一日去歸切曬為末煉

蜜丸梧子大每服五十九空心溫

酒下取下惡物為驗未下再服

烏金散

治月經不調
見妊娠門

紫金丸

治久有瘀血月水不調
黃瘦不食見產後門

紫金藤丸

治婦人子宮久冷月水不調或
多或少赤白帶下見男陰門

猪脰酒

治婦人血氣不通逆飯憂
煩四肢無力見痢疾門

烏沉湯

治婦人血氣痛見諸氣門

婦人天癸不通

駒胞衣煨存性為末每服三錢入麝香少許空腹新汲水下不過三服良

女人月經斷絕

甜瓜蔓同使君子各半兩甘草六錢為末每酒服二錢

崩漏

血崩

老母猪屎燒灰酒服一錢 鯽魚一箇長五寸者去腸入血竭乳香在內綿包燒存性研末每

服三錢熱酒調服 蠶黃蠶蛻紙並燒存性晚蠶

沙白殭蠶並炒等分為末入麝香少許每服二錢

用米飲送下日三服甚效 蠶沙為末酒服三五

錢 鳧苳一歲一箇燒存性研末酒服之 黃絹

灰五分椶櫚灰一錢貫眾灰京墨灰荷葉灰各五

分水酒調服即止 凌霄花為末每酒服二錢後

服四物湯 草血竭嫩者蒸熟以油鹽薑淹食之

飲酒一二盃送下或陰乾為末薑酒調服一二錢

一服即止生於磚縫井砌間少在地上也 石花

細茶焙為末舊漆碟燒存性各一匙以碗盛酒放

鍋內煮一滾乃入藥末露一宿侵晨連藥再煮一

滾溫服 新縮砂仁新瓦焙研末米飲服三錢

貫眾半兩煎酒服之立止 三七研末同淡白酒

調一二錢服三服可愈加五分入四物湯亦可

黃芩為細末每服一錢霹靂酒下以秤錘燒赤淬

酒中也崩中多用止血及補血藥此方乃治陽乘

於陰所謂天暑地熱經水沸溢者也 金絲草海
柏枝砂仁花椒蠶退紙舊錦灰等分爲末煮酒空

心服 赭石火煨醋淬七次爲末白湯服 青礬
二兩輕粉一錢爲末水丸梧子大每服二三十丸

新汲水下 血氣痛不可忍遠年近日不瘥者雷
氏木賊散主之木賊一兩香附子一兩朴硝半兩

爲末每服三錢色黑者酒一盞煎紅赤者水一盞
煎和滓服日二服臍下痛者加乳香沒藥當歸各

一錢同煎忌生冷硬物猪魚油膩酒麪 血痢血
崩楮樹皮荆芥等分爲末冷醋調服一錢血崩以

煎七服神效
不可具述

血崩不止

荆芥穗於麻油燈上燒焦爲末每服二錢
童子小便服 夏枯草爲末每服方寸匕

米飲調下 桂心不拘多少砂焗內煨存性爲末
每米飲空腹服一二錢名神應散 槐花三兩黃

芩二兩爲末每服半兩酒一盞銅秤錘一枚桑柴
火燒紅浸入酒內調服忌口 櫻櫚皮燒存性空

心淡酒服三錢一方加煨白礬等分 五靈脂十
兩研末水五盞煎三碗去滓澄清再煎爲膏入神

麩末二兩和丸梧子大每服二十丸空心温酒下
便止極效 五靈脂燒研以鐵秤錘燒紅淬酒調

服以效為度 蠶故紙一張剪研炒焦槐子炒黃
各等分為末酒服立愈 好綿及婦人頭髮共燒

存性百草霜等分為末每服三錢温酒下或加櫻
灰 用白綿子蓮花心當歸茅花紅花各一兩以

白紙裹定黃泥固濟燒存性為末每服一錢入麝
香少許食前好酒服 舊綿絮去灰土一斤新蠶

絲一斤陳蓮房十箇舊炊簞一枚各燒存性各取
一錢空心熱酒下日三服不過五日愈 漆器灰

櫻灰各一錢柏葉煎湯下 烏梅肉七枚燒存性
研末米飲服之日二 胡桃肉十五枚燈上燒存

性研作一服空心温酒調下神效 老絲瓜燒灰
櫻櫚燒灰等分鹽酒或鹽湯服 白扁豆花焙乾

為末每服二錢空心炒米煮飲入鹽少許調下即
效 木苺根四兩酒一盞煎七分空心温服 諸

藥不效服此立止用甜杏仁上黃皮燒存性為末
每服三錢空心熱酒服 崩中晝夜不止丁香二

兩酒二升煎一升分服 連日不止熟艾鷄子大
阿膠炒為末半兩乾薑一錢水五盞先煮艾薑至

萬方類纂四 崩漏二

七

二盞半傾出入膠烊化分二服一日服盡不拘
冷熱用蓮蓬殼荆芥穗各燒存性等分爲末每服
二錢米飲下 香附子赤芍藥等分爲
末鹽一捻水二盞煎一盞食前溫服

崩中垂死 肥羊肉三斤水二斗煮一斗三升入生地
黃一升乾薑當歸三兩煮三升分四服

崩中腹痛 毛蟹殼燒存性
米飲服一錢

傷中崩赤 醪醕杵汁拌酒煎
沸空心服一盞

下血血崩 槐花一兩櫻灰五錢鹽一錢水三鍾煎減
半服 血如山崩或五色漏帶並宜常服

滋血調氣乃婦人之仙藥也香附子去毛炒焦爲
末極熱酒服二錢立愈昏迷甚者三錢米飲下亦

可加
櫻灰

崩中痢下 治婦人崩中及下痢日夜數十起欲死者
以此入腹即活懸鈎根薔薇根柿根藕莖

各一斛剉入釜中水淹上四五寸煮減三之一去
滓取汁煎至可丸丸梧子大每溫酒服十九日三

服

赤白崩中

魚鱘膠三尺焙黃研末同鷄子煎餅好酒食之 舊壺盧瓢炒存性蓮房煨存性等

分研末每服二錢熱酒調服三服有汗為度即止

甚者五服止最妙忌房事發物生冷 毡毛灰酒

服二錢白崩用白毡紅崩用紅毡 不問遠近取

槐枝燒灰食前酒下方寸匕日二服 猪毛燒灰

三錢以黑豆一椀好酒

一椀半煮一椀調服

白崩

扶移皮半斤牡丹皮四兩升麻牡蠣煨各一兩每用一兩酒二鍾煎一鍾食前服

產後血崩

蓮蓬殼五箇香附二兩各燒存性為末每服二錢米飲下日二 菖蒲一兩半酒二

盞煎一盞去滓分

三服食前溫服

女子血崩

及產後血不止月信來多並赤帶下取東引細椿根一大握洗淨以水一大升煮汁

分服

便斷

血崩帶下

赤芍藥香附子等分爲末每服二錢鹽一
拾水一盞煎七分溫服日二服十服見效

漏下

鼈甲醋炙研末清酒服方寸匕日二
止令人黃瘦地榆三兩米醋一升煮十餘沸去

滓食前稍
熱服一合

崩中漏下

常炙猪腎食之 木耳半斤炒見烟爲末
每服二錢一分頭髮灰三分共二錢四分

以應二十四氣好酒調服出汗 桑耳炒黑爲末
酒服方寸匕日三服取效 石韋爲末每服三錢

溫酒服甚效 不止者桃核燒存性研細酒服方
寸匕日三 青黃赤白使人無子好墨一錢水服

日二服又禹餘糧煨研赤石脂煨研牡蠣煨研烏
賊骨伏龍肝炒桂心等分爲末溫酒服方寸匕日

服忌葱蒜又蜂房末三指撮溫酒服之大神
效 赤白用桑蝎燒灰溫酒服方寸匕日二

崩中下血

荷葉燒研半兩蒲黃黃芩各一兩爲末每
空心酒服三錢 大小薊根一升酒一斗

漬五宿任飲亦可酒煎服或生搗汁溫服 小薊
莖葉洗切研汁一盞入生地黃汁一盞白朮半兩

煎減半溫服 陳年蒸餅燒存性米飲服三錢

翻白草根一兩擣碎酒二盞煎一盞服 不止者

用白殭蠶衣巾白魚等分為末并華水服之日二

不問年月遠近用槐耳燒存性為末每服方寸

七溫酒下 晝夜不止用芎藭一兩清酒一大盞

煎取五分徐徐進之一方加生地黃汁二合同煎

小腹痛甚者芍藥一兩炒黃色柏葉六兩微炒

每服二兩水一升煎六合入酒五合再煎七合空

心分為兩服亦可 為末酒服二錢

崩中帶下 椒目炒研細每

溫酒服一鈎

婦人崩中 益智子炒碾細米飲入鹽服一錢 獨勝

散用防風去蘆頭炙赤為末每服一錢以

麩糊酒調下更以麩糊酒投之此藥累經效驗一

方加炒黑蒲黃等分 百草霜二錢狗膽汁拌勻

分作二服 當歸酒下

漏血 亂髮洗淨燒研空心溫酒服一錢 伏龍肝半

兩阿膠蠶沙炒各一兩為末每空肚酒服二三錢

萬方類纂四 崩漏四

七

消即愈
以止為度
水蛭炒為末酒服一錢日二服惡血
槐花燒存性研每服二三錢食前溫酒

阿伽陀丸
治婦人血崩用胡椒紫檀香鬱金茜根小
藥皮等分為末水丸梧子大每服二十九

阿膠
湯下

烏金散
治崩漏見
妊娠門

無極丸
見調
經門

膠艾湯
治漏下見妊娠門
妊娠下血條下

靈脂散
治婦人血崩諸
痛見諸氣門

帶下

赤白帶下

兔皮燒烟盡為末酒服方寸匕以瘥為度
真秋石研末蒸棗肉搗丸梧子大每服

六十九空心醋湯下

煉猪脂三合酒五合煎沸

頓服常炙猪腎食之

羊脰一具以酢洗淨空

心食之不過三次忌魚肉滑物犯之即死

牛角

鯽燒令烟斷附子以鹽水浸七度去皮等分為末

每空心酒服二錢七

白果蓮肉江米各五錢胡

椒一錢為末烏骨雞一隻如常治淨裝木瓜腹煮

熟空心食之

槿根皮二兩切以白酒一盃半煎

一盃空心服之白帶用紅酒甚妙

欖子石菖蒲

等分為末每旦鹽酒温服二錢

韭根搗汁和童

尿露一夜空心温服取效

韭子七升醋煮十沸

焙研末煉蜜丸梧子大每服三十九

空心温酒下

並治男子腎虛冷夢遺

蕎麥炒焦為末鷄子白

和丸梧子大每服五十九鹽湯下日三服

白扁

豆炒為末用米飲每服二錢

石菖蒲破故紙等

分炒為末每服二錢更以菖蒲浸酒調服日一

益母草

酢漿草陰乾為末空心温酒服三錢七

益母草

花開時采搗為末每服二錢食前温湯下 夏枯

草花開時采陰乾為末每服二錢米飲下食前

連皮草果一枚乳香一小塊麩裏煨焦黃同麩研

細每米飲服二錢日二服 苦參二兩牡蠣粉一

兩五錢為末以雄猪肚一箇水三盞煮爛搗泥和

九梧子大每服百丸温酒下 禹餘糧火煨醋淬

乾薑等分赤下乾薑減半為末空心服二錢七

銅錢四十文酒四升煮取二升分三服 水和雲

母粉方寸七服立見神效 桑耳切碎酒煎服

取馬齒莧搗絞汁三大合和鷄子白二枚先温令

熱乃下莧汁微温頓飲之不過再作即愈不問老

稚孕婦悉可服 不止者狗頭燒灰為末每酒服

一錢日三服 多年不止石燕一枚磨水服立效

年深月久不瘥者取白芍藥三兩並乾薑半兩

剉熬令黃搗末空心水飲服二錢七日再服一方

只用芍藥炒黑研末酒服之 香附子赤芍藥等

分為末鹽一捻水二盞煎一盞食前温服 月水

不來者用蛇床子枯白礬等分為末醋麩糊丸彈

子大胭脂為衣綿裏納入陰戶如熱極再換日一
次 下元虛憊者白果蓮肉江米各五錢胡椒一

錢半爲末用烏骨鷄一隻去腸盛藥瓦器煮爛空心食之 臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困用葵花一兩陰乾爲末每空心溫酒服二錢七赤帶用赤葵白帶用白葵 日久黃瘁六脉微瀆伏龍肝炒令烟盡椶櫚灰屋梁上塵炒烟盡等分爲末入龍腦麝香各少許每服三錢溫酒或淡醋湯下一年者半月可安 年深諸藥不能療者用貫眾一箇全用不剉只揉去毛及花萼以好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷爲末米飲空心每服二錢驗

帶下排膿

帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂致臍腹冷痛皆由敗膿血所致須此排膿白

芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍藥白枯礬各半

兩爲末以蠟化丸梧子大每空心及食前米飲下

十九或十五丸俟膿盡乃以他藥補之 野鴿糞

一兩炒微焦白朮麝香各一分赤芍藥青木香各

半兩延胡索炒赤一兩柴胡三分爲末溫無灰

酒空心調服一錢候膿盡卽止後服補子臟藥

帶下脉數

枸杞根一斤生地黃五斤酒一斗煮五升日日服之

白帶

多因七情內傷或下元氣冷所致沙參為末每服二錢米飲調下 百草霜一兩香金墨半兩

研末每服三錢豬肝一葉批開入藥在內紙裏煨熟細嚼溫酒送之 風化石灰一兩白茯苓三兩

為末糊丸梧子大每服二三十丸空心米飲下絕妙並治白淫 白芷四兩以石灰半斤淹三宿去

灰切片炒研末酒服二錢日二服 白鷄冠花曬乾為末每旦空心酒服三錢赤帶用紅者 松香

五兩酒二升煮乾木白杵細酒糊丸如梧子大每服百丸溫酒下 椿根白皮滑石等分為末粥丸

梧子大每空腹白湯下一百丸又椿根白皮一兩半乾薑炒黑白芍藥炒黑黃蘗炒黑各二錢為末

如法丸服 用酒及艾葉煮鷄卵日日食之 白帶不止槐花炒牡蠣煨等分為末每酒服三錢

取效

白帶沙淋

白鷄冠花苦壺盧等分燒存性空心火酒服之

白淫

糙糯米花椒等分炒為末醋糊丸梧子大每服三四十丸食前醋湯下 風化石灰一兩白茯苓

苓三兩為末糊九梧子大每服二三
十九空心米飲下絕妙並治白帶

婦人白濁 滑數虛冷者鹿角屑
炒黃為末酒服二錢

五色帶下 以麩作煎餅七箇安於燒赤黃磚上以黃
瓜樓傳麩上安布兩重令患者坐之令藥

氣入腹薰之當有蟲出如蠶子不過三五度瘥
甌帶煮汁温服一盞日二服 白馬左蹄燒灰酒

服方寸
七日二

血崩帶下 赤芍藥香附子等分為末每服二錢鹽一
捻水一盞煎七分温服日二服十服見效

名如
神散

產後帶下 漏廬一兩艾葉炒四兩為末米醋三升入
藥末一半同熬成膏入後末和九梧子大

每温水下三十九 產後中風絕孕帶下赤白用
羊肉二斤香豉大蒜三兩水一斗煮五升納酥一

升更煮
二升服

室女白帶

因衝任虛寒者用金毛狗脊燎去毛白斂各一兩鹿茸酒蒸焙二兩為末用艾煎醋

汁打糯米糊九梧子大每服五十九空心温酒下日二陳冬瓜仁炒為末每空心米飲下五錢

婦人白沃

經水不利子臟堅僻中有乾血下白物用礬石燒杏仁一分碾勻煉蜜丸棗核大納

入陰中日一易之

紫金藤丸

兼治赤白帶下見男陰門

威喜丸

並治婦人白淫白帶見濁遺門

固元丹

並治婦人赤白帶下血崩見濁遺門

平補固真丹

並治婦人赤白帶下崩漏見濁遺門

無極丸

兼治帶下見調經門

婦人患淋

見諸淋門

妊娠

妊娠熱病

青羊屎研爛塗臍以安胎氣
傅心下及丹田可護胎氣

井底泥取
伏龍肝末一

鷄子許水調服之仍以水和塗臍方
寸乾又上車轄脂隨意酒服大良

安胎清熱

條芩白朮等分炒為末米飲和九梧子大
每服五十九丸白湯下或加神麩丸妊娠調

理以四物去地黃加白
朮黃芩為末常服甚良

胎熱不安

鐵罈散用白藥子一兩白芷半兩為末每
服二錢紫蘇湯下心煩熱入沙糖少許

妊娠咳嗽

車釭一枚燒赤投酒中冷飲
麩炒黃為末沙糖拌丸芡子大每含嚥一

丸神效

妊娠感寒

用鯉魚一頭燒末酒服方寸七令汗出
時行者用大鯽一頭燒灰酒服方寸七無

汗腹中緩痛者以醋服取汗
腹痛乾魚
即鮑魚一枚燒灰酒服方寸七取汗瘥

萬方須纂四 妊娠一

六

妊娠風寒

卒中不省人事狀如中風用熟艾三兩米醋炒極熱以絹包熨腰下良久即甦

妊娠傷寒

壯熱赤斑變為黑斑尿血者用艾葉如鷄子大酒三升煮二升半分為二服又以葱

白一把水三升煮熟服汁食葱令盡取汗大熱煩渴恐傷胎氣用嫩卷荷葉焙半兩蚌粉二錢半

為末每服三錢新汲水入蜜調服並塗腹上名單胎散 妊娠時疾冷胎不動以鷄子七枚納井中

令冷取出打破吞之

妊娠瘡疾

酒蒸常山石膏煨各一錢烏梅炒五分甘草四分水一盞酒一盞浸一夜平日溫服

先因傷寒變成者用高良薑三錢剉以獾猪膽汁浸一夜東壁土炒黑去土以肥棗肉十五枚同

焙為末每用三錢水一盞煎熱將發時服神效

妊娠吐水

酸心腹痛不能飲食人參乾薑炮等分為末以生地黃汁和九梧子大每服五十九

米湯

下

妊娠嘔吐

半夏一兩人參乾薑各一兩為末薑汁麩糊丸梧子大每飲服十九日三服

妊娠吐衄不止

馬勃末濃米飲服半錢

妊娠心痛

不可忍鹽燒赤酒服一撮 心痛煩悶麻子仁一合研水二盞煎六分去滓服

妊娠腰痛

鹿角截五寸長燒赤投一升酒中又燒又浸如此數次細研空心酒服方寸七 牛

屎燒末水服方寸七日三 大豆一升酒三升煮七台空心飲之 如折者銀一兩水三升煎二升

服之 通氣散用破故紙二兩炒香為末先嚼胡桃肉半箇空心溫酒調下二錢此藥神妙

妊娠腹痛

燒車缸脂末納酒中隨意飲 枳殼三兩麩炒黃芩一兩每服五錢水一盞半煎一

盞服若脹滿身重加白朮一兩 大紅棗十四枚燒焦為末以小便服之 月未足如欲產之狀用

知母二兩為末蜜丸梧子大每粥飲下二十九丸

胎損腹痛

冬麻子一升杵碎熬香水二升煮汁分服 孕八九月或墜傷牛馬驚傷心痛用青

竹茹五兩酒一升煎五合服

妊娠患淋

冬葵子一升水三升煮二升分服 熱淋用車前子五兩葵根切一升

二升半分服 熱淋用車前子五兩葵根切一升 以水五升煎取一升半分三服以利為度 妊娠

子淋不得小便滑石末水和泥臍下二寸又猪苓五兩為末熟水服方寸七日三夜二以通為度

妊娠子煩

因服藥致胎氣不安煩不得臥者知母一兩洗焙為末棗肉丸彈子大每服一丸人

參湯下醫者不識此病作虛煩治反損胎氣 口乾不得臥黃連末每服一錢粥飲下或酒蒸黃連

丸亦妙 竹瀝頻頻飲之 茯苓二兩竹瀝一升水四升煎二升分三服不瘥更作之

子癰昏冒

縮砂和皮炒黑熱酒調下二錢不飲者 米飲下此方安胎止痛皆效不可盡述

妊娠惡阻

胎氣不安氣不升降嘔吐酸水起坐不便 飲食不進二香散用香附子一兩藿香葉

甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調下

妊娠中惡

心腹疼痛桔梗一兩剉水一鍾生薑三片煎六分温服

妊娠行經

赤小豆末酒服方寸七日三服

妊娠下血

黃明膠二兩酒煮化頓服之豆醬二升去汁取豆炒研酒服方寸七日三冬蔡

子一升水三升煮二升分服下血不止用桃梟燒存性研水服取瘥又阿膠三兩炙為末酒一升

半煎化服即愈又用阿膠末二兩生地黃半斤搗汁入清酒二升分三服又鹿角屑當歸各半兩水

三盞煎減半頓服不過二服張仲景曰婦人有漏下者有半產後下血不絕者有妊娠下血者並

宜膠艾湯主之阿膠二兩艾葉三兩芎藭甘草各二兩當歸地黃各三兩芍藥四兩水五升清酒五

升煮取三升乃納膠令消盡每温酒一升日三服

漏胎下血

益智仁半兩縮砂仁一兩為末每服三錢空心白湯下日二服雄鷄肝一具切和

酒五合服之黃蠟一兩老酒一碗溶化熱服頃刻即止五倍子末酒服二錢神效蓮蓬殼燒

研麪糊丸梧子大每服百丸湯酒任下日二下
 血不止百一方用生地黄汁一升漬酒四合煮三
 五沸服之不止又服又生地黄為末酒服方寸七
 日一夜一方加乾薑為末二黃丸用生地黄
 熟地黄等分為末每服半兩白朮枳殼煎湯空心
 調下日二服血盡子死葵根莖燒灰酒服方寸
 七日三血下不止血盡則子死用鷄子黃十四
 枚以好酒二升煮如飴服之未瘥再作以瘥為度
 半產漏下 虛寒相搏其脈弦芤旋覆花湯用旋覆花
 三兩葱十四莖新絳少許水三升煮一升

頓服

胎痛

妊婦衝任脈虛惟宜抑陽助陰內補丸用熟地
 黃二兩當歸一兩微炒為末梧子大每温酒下

三十丸

妊娠毒痛

獐牛屎燒灰水服方寸
 七日三並以酢和封

孕中有癰

薏苡仁煮汁吞頻頻飲之
 白香辣者五錢水一盞牛皮膠一片司煎
 洪州烏藥軟

至七分
温服

妊娠下水 黄色如膠或如小豆汁 穠米黃芪 各一兩水七升煎三升分三服

妊娠遺尿 不禁桑螵蛸十二枚 為末分二服米飲下

妊娠尿血 豆醬一大盞熬乾生地黃二兩為末每服 一錢米飲下 阿膠炒黃為末食前粥飲

下二錢 取夫 爪甲燒灰酒服

妊娠尿難 飲食如故用貝母苦參當歸四兩為末蜜 丸小豆大每飲服三九至十九 蕪菁子

末水服方 寸七日二

妊娠下痢 白楊皮一斤水一斗煮取二升分三服 中衣帶三寸燒研水服 羊脂如棊子大

十枚温酒一升服日三 疼痛用烏鷄卵一箇開 孔去白留黃入鉛丹五錢攪勻泥裹煨乾研末每

服二錢米飲下一服愈是男二服愈是女 絞痛 用烏鷄子即前方云入黃丹一錢每服三錢未知

萬方百集四妊娠四

三

熟是下痢白色晝夜三五十行黃蘗厚者蜜炒
令焦為末大蒜煨熟去皮搗爛和丸梧子大每空

心米飲下三五十九
日三服神妙不可述

妊娠血痢

阿膠二兩酒一升
半煮一升頓服

胎產便血

髮灰每飲
服二錢

妊娠浮腫

羌活蘿蔔子同炒香只取羌活為末每服
二錢溫酒調下一日一服二日二服三日

服三

妊娠水腫

大鯉魚一頭醋三升煮乾食日一作
鯉一尾赤小豆一升水二斗煮食飲汁一

頓服盡當下利盡即瘥身重小便不利瀝浙惡

寒起即頭眩用葵子茯苓各三兩為糝飲服方寸

七日三服小便利則愈若轉胞者加髮灰神效又

赤茯苓去皮葵子各半兩為末每服二錢新汲水

下始自兩足漸至喘悶似水足趾出水謂之子

氣乃婦人素有風氣或衝任有血風不可作水妄

投湯藥宜天仙藤散主之天仙藤洗微炒香附子炒陳皮甘草烏藥等分爲末每服三錢水一大盞薑三片木瓜三片紫蘇三葉煎至七分空心服一日三服小便利氣脉通腫漸消不須多服秘方也氣結少腹滿大小便不利已服猪苓散不瘥者用太山赤皮甘遂二兩搗篩白蜜和丸梧子大每服五十九丸得微下仍服猪苓散不下再服之猪苓散見消渴門從脚至腹小便不利微渴引飲猪苓五兩爲末熟水方寸七日三服

腹中鬼哭

黃連煎濃汁母常呷之

孕腹鐘鳴

鼯鼠壤土研末二錢麝香湯下立愈

胎氣不長

同鯉魚肉同鹽棗煮汁飲之

胎氣不安

氣不升降嘔吐酸水香附藿香甘草二錢爲末每服二錢入鹽少許沸湯溫服之

安胎順氣

鐵罩散香附子炒爲末濃煎紫蘇湯服一二錢一加砂仁

萬方真寶回好娠五

三

漏胎傷胎

名曰傷胎赤小豆芽為末温酒服方寸七

日三得效乃止

妊娠因夫所動困絕

以竹瀝飲一升立愈

妊娠慘切

欠如有所憑此治須大棗湯大棗十枚小

麥一升甘草二兩每服一兩水煎服之亦補脾氣又紅棗燒存性酒服三錢亦大棗湯變法也

轉女為男

婦人始覺有孕用原蠶屎一枚并華水服之日三以雄黃一兩絳囊盛之養胎轉

女成男虎鼻懸戶上令生男婦人始覺有孕取弓弩弦一枚縫袋盛帶左臂上則轉女為男

九覺有娠取弓弩弦縛婦人腰下滿百日解却此乃紫宮玉女秘傳方也

墮胎下血

不止桑木中蝎蟲燒末酒服方寸七日二

薑水煎服之又代赭石末一錢生地黃汁半盞調日三五次以差為度又墨三兩火煎昔

火毒沒藥一兩為末每服二錢醋湯下 煩滿用

或一升水三升煮三沸調鹿角末方寸七 當歸

焙一兩葱白一握每服五錢酒一盞半煎入分温

服 小薊葉根益每草五兩水三大盞煮汁一盞

再煎至一盞分

二服一日服盡

墮胎血瘀

不下狂悶寒熱用鹿角屑一兩為末或湯服一錢日三須與血下

墮胎腹痛

血出不止羚羊角燒灰三錢豆淋酒下

頻致墮胎

赤小豆末酒服方寸七日三服 或三四月即墮者於兩月前以杜仲八兩糯米煎

湯浸透炒去絲續斷二兩酒浸焙乾為末以山藥

五六兩為末作糊丸梧子大每服五十九空小米

飲下一方用杜仲焙研棗肉丸糯米飲下 妊娠

胎動兩三月墮預宜服此川續斷酒浸杜仲薑汁

炒去絲各二兩為末棗肉煮爛杵

和丸梧子大每服三十九米飲下

毒藥墮胎

女人服草藥墮胎腹痛者生白扁豆去皮為末米飲服方寸七濃煎汁飲亦可凡服

藥胎氣已傷未墮者或口噤手強自汗頭低似
乎中風九死一生醫多不識作風治必死無疑

生胎欲去

蝮蝎肝蛇脫皮等分以苦酒和勻摩妊婦
臍上及左右令溫胎即下也 生附子為

末淳酒和塗右足心胎下去之 芫花根剝皮以

綿裹點射香套入陰穴三寸即下 牛膝一握搗

以無灰酒一盞煎七分空心服仍以獨根土牛膝

塗麝香挿入牝戶中 小麥麴落胎並下鬼胎

麥蘖一升蜜一升服之即下 大麥芽一升水三

升煮二升分三服神效 治孕婦有病欲去胎下

胎蟹爪散用蟹爪二合桂心瞿麥各一兩牛膝二

兩為末空心溫酒服一錢又番木鱉碾膏納入牝

戶三四寸又蚩蟲十枚炙搗為末酒服胎即下又

鷄子一枚入鹽三指撮服又榆白皮煮汁服二升

婦人斷產

水銀以麻油煎一日空心服棗大一丸永
斷不損人 零陵香為末酒服二錢每服

至一兩即一年絕孕蓋血聞香即散也 白鶴仙

根白鳳仙子各一錢半紫葳二錢半辰砂二錢搗

末蜜和丸梧子大產內三十日以酒半盞服之不

可著牙齒能損牙齒也 白麩一升酒一升煮沸

去滓分三服經水至時前日夜次日早及天明服之
經水行後麤薑子加八四物湯服之能斷產
蠶子故紙一尺燒為末酒服終身不
產 蝙蝠一箇燒碾以五朝酒酒醇調下

紫萍一粒丹 即去風丹並治胎孕有傷見諸風門

烏金散 治胎前產後虛損月經不調崩漏及橫生逆
產用白芷百草霜等分為末以沸湯入童子

小便同醋調服二錢丹溪
加滑石以芎歸湯調之

胎產

胎熱橫悶

生銀五兩葱白三寸阿膠炒半兩水一盞煎服亦可入糯米作粥食

傷胎血結

心腹痛取童子小便日服二升良

婦人胎腫

屬濕熱山梔子一合炒碾每服二三錢米飲下丸服亦可

溫養胎氣

胎至九月消息用猪肚一枚如常着五味煮食至盡

臨產順胎

九月十月服此永無驚恐福胎飲香附子四兩縮砂仁炒三兩甘草炙一兩為末每

服二錢米飲下

榆皮焙為末臨月日三服方寸

七令產極易

取鼠燒末并花水服方寸七日三

令子易產

通明乳香半兩枳殼一兩為末煉蜜

丸梧子大每空

心酒服三十九臨月服之令胎滑

易生又牽牛子

一兩赤土少許碾末覺胎轉痛時

白榆皮煎湯下

一錢又車前子為末酒服方寸七

不飲酒者水調服

又酸漿水和水少許頓服又弓

弩弦燒灰酒服二錢

市門土八月帶之臨產時

酒服一錢易產

胎動不安

木賊去節川芎等分爲末每服三錢水一盞入金銀一錢煎服生地黃搗汁煎沸

入雞子白一枚攪服 鼓汁服妙華佗方也 阿膠炙碾二兩香豉一升葱一升水三升煮取一升

入膠化服 膠艾湯用阿膠炒熟艾葉二兩葱白一升水四升煮一升分服 秦艽甘草炙鹿角膠

炒各半兩爲末每服三錢水一大盞糯米五十粒煎服又方秦艽阿膠炒艾葉等分如上煎服

魚一箇治淨阿膠炒一兩糯米二合水二升入葱薑橘皮鹽各少許煮臠食五七日效

胎動欲產

日月未足者梁上塵竈突墨等分酒服方寸匕又以蛇蛻全者一條絹袋盛遶腰繫

之又取槐樹東引枝令孕婦手握之即易生又蒲黃二錢并華水服

妊娠胎動

下黃水用糯米一合黃芪芎藭各五錢水一升煎八合分服 腹痛急下黃汁用粳

米五升黃芪六兩水七升煎二升分四服又黃芪川芎各一兩糯米一合水一升煎半升分服 忽

川芎各一兩糯米一合水一升煎半升分服

忽

忽

忽

忽

忽

忽

下黃汁如膠或如小豆汁腹痛不可忍者芎根去
黑皮切二升銀一斤水九升煎四升每服以水一
升入酒半升煎一升分作二服一方不用銀已
見黃水者乾荷蒂一枚炙碾為末糯米淘汁一鍾

調服
即安

胎動腹痛

桑寄生一兩半阿膠炒半兩艾葉半兩水
一盞半煎一盞去滓溫服或去艾葉胎

動腹內冷痛薤白一升當歸
四兩水五升煮二升分三服

胎動迫心

作痛艾葉雞子大以頭醋四升煎二升分
溫服胎上衝心葡萄煎湯飲之即下

弩弦繫帶
之立下

胎動欲墮

痛不可忍銀五兩芎根二兩清
酒一盞水一大盞煎一盞溫服

胎動下血

病痛搶心用葱白煮濃汁飲之未死即安
已死即出未效再服一方加川芎一方用

銀器同米煮粥及羹食又生麴餅碾末水和絞汁
服三升或腰痛或搶心或下血不止或倒產子

萬方頂纂四胎產二

乃徐玉神驗方也當歸二兩芎藭一兩為粗末每

服三錢水一盞煎令泣泣欲乾投酒一盞再煎一

沸溫服或灌之如人行五里再服不過三五服便

效下血不絕欲死以淨白蜜蠟雞子大一塊煎

三五沸投美酒半升服立瘥或胎已死百草霜

二錢櫻灰一錢伏龍肝五錢為末每服一二錢白

湯入酒及童尿調下因驚胎動出血取黃連末

酒服方寸匕胎痛下血雞子二枚打破以白粉

和稀食之數傷胎下血不止鯉魚一箇治淨阿

膠炒一兩糯米二合水二升入葱薑

橘皮鹽各少許煮臠食五七日效

妊婦胎動

硃砂末一錢和雞子白三枚勻攪頓服胎

死即出未死即安母欲死子尚在以此

下之水銀硃砂各半兩碾膏以牛膝

半兩水五大盞煎汁入蜜調服半匙

損動胎氣

因跋撲舉重損胎不安或子死腹中者川

芎為末酒服方寸匕須更一二服立出

偶因所觸或跌墮傷損致胎不安痛不可忍者縮砂熨斗內炒熱去皮用仁擣碎每服二錢熱酒調下須臾覺腹中胎動極熱卽胎已安神效

六月孕動

困篤難救者葱白一大握水三升煎一升去渣頓服

胎動半產

卒動不安或腰痛胎轉搶心下血不止或日月未足而欲產並以菖蒲根搗汁一二

升服之

婦人將產

井華水服半升不作運

胎前瘧疾

夜明砂三錢空心溫酒服

胎產下痢

用龜甲二枚醋炙為末米飲服一錢日一臨產下痢梔子燒碾空心熱酒服一匙

甚者不過五服

難產

土蜂兒窠水泡湯飲之取時逢單是男逢雙是女最驗墨一寸末之水服立瘥襍草燒鑊

鑷白芷等分為末每服一錢童尿米醋各半和服見效 水銀二兩先煮後服立出 滑石主產難

服其末 芒消末二錢童子小便溫服無不效者 白芷五錢水煎服之 益母草搗汁七十大合煎

減半頓服立下無新者以乾者一大握水七合煎服 取蓖麻子十四枚每手各把七枚須臾立下

也 鳳仙子二錢碾末水服勿近牙外以蓖麻子隨年數搗塗足心 赤小豆生吞七枚佳 難產

歌云黃金花結粟米實細碾酒下十五粒靈丹功效妙如神難產之時能救急 薑薑菜子也 山槿

核七七粒百草霜為衣酒吞下 柑橘瓢陰乾燒存性碾末酒服二錢 如聖散治胎臍乾澀難產

劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑即下也用黃葵 花焙碾末熟湯調服二錢無花用子半合碾末

酒淘去渣服之 桂末二錢加麝少許酒下 取猪槽上垢土一合和麪半升烏豆二十顆煮汁服

兩手各執石燕一枚立驗 及日月末至而產臨時取夫衣帶五寸燒為末酒服之 視帶最佳

騾蹄燒灰入麝香少許酒服一錢 筆頭灰酒服二錢 蓮花一葉書人字吞之即易產 母丁香

三十六粒滴乳香三錢六分爲末同活兔膽和杵
千下丸作三十六丸每服一九好酒化下立驗名

如意丹 用黃明乳香爲末五錢母猪血和九梧
子大每酒服五丸 用乳香以五月五日午時令

一人在壁內奉乳鉢一童子壁外以筆管自壁
縫中逐粒遞過用鉢內碾細水丸芡子大每服一

丸無灰酒下 明乳香一豆大爲末新汲水一盞
入醋少許令產婦兩手捉石燕念慮藥三遍乃飲

之略行數步卽下 乳香硃砂等分爲末麝香酒
服一錢良久自下 皂角子二枚吞之 路旁破

草鞋鼻子燒灰酒服 鍾馗左脚燒灰水服 箭
幹三寸弓弦三寸燒末酒服 蠶布袋一張蛇蛻

一條入新瓦中以鹽泥固煨爲末以榆白皮湯調
服 蛇蛻泡水浴產門自易 帶海馬於身臨時

燒末飲服并手握之卽易產 魚膠五寸燒存性
爲末温酒服 龜甲燒末酒服方寸匕 鱉甲燒

存性碾末酒服方寸匕立出 眞珠末一兩酒服
立出 銃楔燒灰酒服又辟忤惡邪氣 用鑿柄

承斧處打卷者燒灰淋汁飲或取入鐵孔中木燒
末酒服 手把郎君子便生極驗 牛屎中大豆

萬方頁纂四 胎產四 六

一枚擘作兩片一書父一書子仍合住水吞之立
產臘月兔血以蒸餅染之紙裹陰乾為末每服

二錢乳香湯下勝金方聖妙寸金散用敗筆頭
一枚燒灰碾生藕汁一盞調下立產若母虛弱及

素有冷疾者温汁服之難產第一方兔毫筆頭
三箇燒灰金箔三片以蠟和丸酒服經日不生

雲母粉半兩温酒調服入口即產不順者即順萬
不失一此方已救三五十人三日不出車轄脂

吞大豆許二丸三五日不下垂死及矮小女子
交骨不開者用乾龜殼一箇酥炙婦人頭髮一握

燒灰川芎當歸各一兩每服秤七錢水煎服如人
行五里許再一服生胎死胎俱下數日不出桃

仁一箇劈開一片書可字一片書出字吞之即生
日久氣乏用赤小豆一升以水九升煮取汁入

炙過黃明膠一兩同煎少時一服五合不過三四
服即產婦人產難及橫逆生者乃兒枕破與敗

血裹其子也以勝金散逐其敗血即順矣用鹽豉
一兩以舊青布裹之燒赤乳細入麝香一錢為末

取秤錘燒紅淬酒調服一大盞難產橫生銅秤
錘燒赤淬酒服橫生難產重陽日取高粱根名

爪龍陰乾燒存性碾末酒服二錢卽下產難胎
死橫生倒生用當歸三兩芎藭一兩爲末先以大
黑豆炒焦入流水一盞童便一盞煎至一盞分爲
二服未效再服 蜂蜜真麻油各半盞煎減半服
下立

催生

羚羊角一枚刮尖末酒服方寸匕麝香一錢
水碾服立下 黃蜀葵子四十九粒碾爛溫水

服之良久卽產又方用子焙碾三錢并華水服無
子用根煎汁服取蓖麻子七粒去殼碾膏塗脚

心若胎及衣下便速洗去不爾則子腸出卽以此
膏塗頂則腸自入也 蒲黃地龍洗焙陳橘皮等

分爲末另收臨時各炒一錢新汲水調服立產此
常親用甚妙 開骨膏用猪心血和乳香末丸梧

子大硃砂爲衣面東酒吞一丸未下再服 催生
柞木飲不拘橫生倒產胎死腹中用此屢效用大

柞木枝一尺洗淨大甘草五寸並寸折以新汲水
三升半同入新沙餅內以紙三重緊封文武火煎

至一升半待腰腹重痛欲坐草時溫飲一小盞便
覺下開豁如渴又飲一盞至三四盞下重便生更

無諸苦切不可坐草太早及坐婆亂為也 路旁

破草鞋一隻洗淨燒灰酒服一錢如得左足生男

右足生女覆者兒死側者有驚自然之理也 簸

箕淋水一盞飲數口 蜀葵子二錢滑石三錢為

末順流水服五錢即下 催生散臘月兔腦髓一

箇攤紙上夾勻陰乾剪作符子於面上書生字一

箇候母痛極時用釵股夾定燈上燒灰煎丁香酒

調下 催生丹臘月取兔腦髓一箇塗紙上吹乾

入通明乳香末二兩同碾令勻於臘日前夜安桌

子上露星月下設茶果齋戒焚香望北拜告曰大

道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈佑

助此藥速令生產禱畢以紙包藥露一夜天未明

時以猪肉擣和丸芡子大紙袋盛懸透風處每服

一丸温醋湯下良久未下更用冷酒下一丸即產

乃神仙方也 鐵銃燒赤淋酒入內

孔中流出乘熱飲之即產舊銃尤良

盤腸生產 產時子腸先出產後不收者名盤腸產以

四枚碾膏塗頂心即入 腸乾不上者以磨

刀水少潤腸煎好磁石一盃温服自然收上

催生下胎

不拘生胎死胎蓖麻一箇巴豆一箇麝香一分碾貼臍中并足心又下生胎一月一粒

粒温酒送下 難產胎在腹中并胞衣不下及胎死者葵藜子貝母各四兩為末米湯服三錢少頃

不下再服 白斂生半夏等分為末 滴水丸 梧子大每榆皮湯下五十九

橫生逆產

竈中心對鍋底土細碾每服一錢酒調仍搽母臍中 梁上塵酒服方寸匕 人參

末乳香末各一錢丹砂末五分碾勻雞子白一枚 入生薑自然汁三匙攪勻冷服即母子俱安神效

二錢榆白湯服 蛇蛻炒焦為末向東酒服一刀 圭即順 烏金散見妊娠門 橫產不出車前子

末酒服二錢又兔絲子末酒服二錢一加車前子 等分又重陽日取高粱根名爪龍陰乾燒存性碾

末酒服二錢即下又蜂蜜真麻油各半盞煎減半 服立下 逆生用黃丹塗兒足下又以手中指取

釜下墨交畫兒足下即順又鹽摩產婦腹并塗兒 足底仍急爪搔之又車缸膏畫兒脚底即止 治

逆生須臾不救用蛇蛻一具蟬蛻十四箇頭髮一

握並燒存性分二服酒下仍以小針刺兒足心三七下擦鹽少許即生倒產子死不出當歸末酒

服方寸匕橫產胞衣不下鐵杵燒赤淬酒飲自順鐵斧亦可布鍼二七枚燒赤淬酒七遍服

漏胎難產因血乾澀也用清油半兩好蜜一兩同煎數十沸温服胎滑即下他藥無益以此助

血為效

生產困悶冬葵子一合搗破水二升煮汁半升頓服少時便產昔有人如此服之登廁立撲兒

於廁中也

倒生口噤冬葵子炒黃為末酒服二錢匕效

落胎下血丹參十二兩酒五升煮取三升温服一升一日三服亦可水煮

熱病胎死紅花酒煮汁飲二三盞

胎衣不下井底泥一雞子大井華水服即下 竈下土一寸醋調納臍中續服甘草湯三四合

竈突後黑土三指撮五更酒下 取宅中柱下

土碾末雞子清和服之 取次蔽戶前燒末水服

即下 刺羊血熱飲一小盞極效 痛引腰脊好

墨温酒服二錢 紅花酒煮汁飲二三盞 生地

黃汁一升苦酒三合相和煖服 牛膝八兩葵子

一合水九升煎三升分三服 冬葵子一合牛膝

一兩水二升煎一升服 蒺藜子貝母各四兩為

末米湯服三錢少頃不下再服 括樓實一箇取

子細碾以酒與童子小便各半盞煎七分温服無

實用根亦可 蒲黃二錢井水服之 大豆半升

醇酒三升煮一升半分三服 用赤小豆男七枚

女二七枚東流水吞服之 荷葉炒香為末每服

方寸匕沸湯或童子小便調下或燒灰或煎汁皆

可 皂角棘燒為末每服一錢温酒調下 以本

婦裙覆井上或以所著衣籠竈上 取本婦鞋底

炙熱熨腹上下二七次即下 水煮弓弩弦飲汁

五合或燒灰酒服 蛇蛻用鹽泥固煨碾二錢榆

白湯服 眞珠一兩碾末苦酒服 猪脂一兩水

一盞煎五七沸服之當下 鹿角屑三分為末薑

湯調下 亂頭髮撩結口中 取本婦手足爪甲

萬方百集回胎產七

三

燒灰酒服即令有力婦人抱起將竹筒於胸前趕

下人溺一升入葱薑各一分煎二三沸熱飲便

下惡血冲心用五靈脂半生半炒碾末每服二

錢溫酒下困極腹脹則殺人螻蛄一枚水煮二

十沸灌入下喉即出也上搶心用雀麥一把水

五升煮二升溫服以水入醋少許喫面神效

臘月收兔皮毛燒灰酒服方寸匕治產難及胞衣

不出餘血搶心脹刺欲死者極驗洗兒湯服一

蓋勿令知之

子死腹中

新汲水磨金墨服之朱砂一兩水煮熟

便溫服有猫孕五子一子已生四子死腹中用此

灌之即下又治一牛亦下硃砂當歸各半兩為

末分作二服溫酒調下如人行五里再一服當

歸三兩芎藭一兩為末先以大黑豆炒焦入流水
一盞童便一盞煎至一盞分為二服未效再服
當歸末酒服方寸匕益母草搗熟以暖水少許
和絞取汁頓服之葵子為末酒服方寸匕若口
噤不開者灌之藥下即甦黃葵花焙碾末二錢

無花用子半合碾末酒淘去滓服之紅花酒下

紫金藤葵根各七錢土牛膝三兩土當歸四錢肉

桂二錢麝香三分為末米糊丸梧子大硃砂為衣

每服五十九丸乳香湯下極驗清油和蜜等分入

湯頓服雀麥一把水五升煮二升溫服苦壺

盧燒存性碾末每一錢空心熱酒下桂末二錢

待痛緊時童子小便溫熱調下名觀音救生散亦

治產難橫生加麝香少許酒下比之水銀等藥不

損人取本婦鞋底炙熱熨腹上下二七次即下

水服即下治妊娠胎死真珠末二兩酒服立出

烏雞一隻去毛以水三升煮二升去雞用帛蘸

汁摩臍下自出雌雞糞二十一枚水二升五合

煮之下米作粥食用三家雞卵各一枚三家鹽

各一撮三家水各一升同煎令婦人東向飲之

雞子黃一枚薑汁一合和服當下濕牛糞塗腹

上良鹿角屑三寸匕煮葱豉湯和服立出雄鼠

香當門子一枚桂心末二錢溫酒服即下

屎二七枚水三升煮一升取汁作粥食胎即下

以夫尿二升煮沸飲之子死腹中胞破不生此

方累效救人歲萬數也鬼白不拘多少黃色者去
毛為細末不用篩羅只撚之如粉為度每服一錢

無灰酒一盞煎八分通口服立生如神名一字神
散或產經數日不下者以瞿麥煮濃汁服之

其母欲死水銀二兩吞之立出
肝末三錢水調下 榆白皮煮汁服二升 月數
未足母欲悶絕者用大豆三升以醋煮濃汁頓服

立出 妊娠胎死不出及胞衣不下產後諸疾狼
狽者刺羊血熱飲一小盞極效 死胎在腹及

胞衣不下蟻垤土炒三升囊盛搗心下自出也

瘦胎飲 枳殼四兩甘草二兩為末每服一錢白湯點
服自五月後一日一服至臨月不惟易產仍

無胎中惡病也寇氏言胎壯則子有力易生今服
枳殼蘘反致無力兼子亦氣弱難養此說似覺為

優或胎前氣盛壅滯者宜用之所謂八九月胎必
用枳殼蘇梗以順氣胎前無滯則產後無虛也若

氣稟弱者大非所宜矣 震亨曰難產多見於鬱
悶安逸之人富貴奉養之家古方瘦胎飲為湖陽

公主作也予妹苦於難產其形肥而好坐予思此
與公主正相反也彼奉養之人其氣必實故耗其

氣使平則易產今形肥則氣虛久坐則氣不運當
補其母之氣以紫蘇飲加補氣藥十數貼服之遂

快產

孕婦束胎

白朮枳殼麩炒等分為末燒飯丸梧子大
入月一日每食前溫水下三十九丸胎瘦則

易產也

酸漿實丸

治婦人胎熱難
產見風熱門

濟陰返魂丹

此方求於名醫所得者其效甚妙活人
甚多能治婦人胎前產後諸疾危証用

野天麻又名益母葉似艾葉莖似大麻方梗凹面
四五月節節開花紅紫色如蓼花隨處皆有白
花者不是於端午小暑或六月六日花正開時連
根收采陰乾用葉及花子忌鐵器以石器碾為細
末煉蜜丸如彈子大隨證嚼服用湯使其根燒存
性為末酒服功與黑神散不相上下其藥不限丸
數以病愈為度或丸如梧子大每服五七丸又
可搗汁濾淨熬膏服之胎前臍腹痛或作聲者

萬方頁纂回胎產丸

三

米飲下 胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不止

止當歸湯下 產後以童子小便化下一丸能安

魂定魄血氣自然調順諸病不生又能破血痛養

脉息調經絡並温酒下 胎衣不下及橫生不順

死胎不下經日脹滿心悶心痛並用炒鹽湯下

產後血運眼黑血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不

省人事以童子小便和酒化下 產後結成血塊

臍腹奔痛時發寒熱有冷汗或面垢顏赤五心煩

熱並用童子小便酒下或薄荷自然汁下 產後

惡露不盡結滯刺痛上衝心胸滿悶童子小便酒

下 產後瀉血水以棗湯下 產後痢疾米湯下

產後血崩漏下糯米湯下 產後赤白帶下煎

膠艾湯下 月水不調温酒下 產後中風牙關

緊急半身不遂失音不語童便酒下 產後氣喘

欬嗽胸膈不利惡心吐酸水面目浮腫兩脇疼痛

舉動失力温酒下 產後月內欬嗽自汗發熱久

則變為骨蒸童便酒下 產後鼻衄舌黑口乾童

便酒下 產後兩太陽穴痛呵欠心忪氣短羸瘦

-5 275 45 915" data-label="Text">

不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛並米飲

-105 275 -55 915" data-label="Text">

化下 產後大小便不通煩燥口苦者薄荷湯下

婦人久無
子息温酒下

益母膏

治產婦諸疾及折傷內損有瘀血天陰則痛
神方也三月采益母草連根葉莖花洗擇令

淨於箔上攤暴水乾以竹刀切長五寸勿用鐵刀

置於大鍋中以水浸過二三寸煎煮候草爛水減

三之二濾去濁滓以清汁入釜中慢火煎取一斗如稀

綿濾去瓷瓶封收每取梨大暖酒和服日再服或和

羹粥亦可如遠行即更煉至可丸收之服至七日

則疼漸平復也產婦惡露不盡及血運一

二服便瘥其藥無忌又能治風益心力

千金神造湯

治子死腹中并雙胎一死一生服之令

死者出生者安神驗方也用蟹爪一升

甘草二尺東流水一斗以葦薪煮至二升濾去渣

入真阿膠三兩令烱頓服或分二服若人困不能

服者灌
入即活

入
身
世
正

百
萬
類
纂

產後

產後血運

取醋和產婦血如棗大服之鹿角一
段燒存性出火毒為末酒調灌下即醒

鰾膠燒存性酒和童子小便調服三五錢良蘇

方木三兩水五升煎取二升分服 薑薑子生地

黃等分為末每服三錢薑七片酒水各半蓋童便

半蓋煎七分溫服即甦 韭菜切安瓶中沃以熱

醋令氣入鼻中即省 人參一兩紫蘇半兩以童

尿酒水三合煎服 五靈脂二兩半生半炒為末

每服一錢白水調下如口噤者幹開灌之入喉即

愈 狂言失志用紫鈔一兩為末酒服二錢匕又

騏驎竭一兩碾末每服二錢溫酒調下 血結聚

於胸中或偏於小腹或連於脇肋者四物湯四兩

倍當歸加鬼箭紅花延胡索各一兩為末煎服又

用水蛭炒虫蟲去翅足炒沒藥麝香各一錢為末

以四物湯調下血下痛止仍服四物湯 心悶氣

絕以丈夫小便碾濃墨一升服又紅花一兩為末

分作二服酒二蓋煎一蓋連服如口噤幹開灌之

或入小便尤妙 心悶煩熱用接骨草即蒴藿破

萬方真纂四 產後一

三

如算子一握水一升煎半升分二服或小便出血者服之亦瘥心氣欲絕益母草碾汁服一盞絕

妙又夏枯草搗絞汁服一錢大妙 苧性破血將苧蘇與產婦枕之止血運 五心煩熱氣力欲絕

及寒熱不禁以接骨木破如算子一握用水一升煎取半升分服或小便頻數惡血不止服之即瘥

此木煮之三次其力一般乃起死妙方 惡物冲心四肢冰冷唇青腹脹昏迷紅藥子一兩頭紅花

一錢水二盞婦人油釵二隻同煎一盞服大小便俱利血自下也 身痠直口目向上牽急不知人

取雞子一枚去殼分清以荆芥末二錢調服即安甚敏捷烏雞子尤善 築心眼倒風縮欲死者取

乾荆芥穗搗篩末每用二錢匕童子小便一酒盞調勻熱服立效口噤者挑齒口閉者灌鼻中皆效

近世名醫用之無不如神也 產運已死胸膈微熱亟購紅花數十斤以大鍋煮湯盛三桶於牕格

之下昇婦寢其上熏之湯冷再加有頃指動半日乃蘇蓋血悶也 案紙二十張燒灰清酒半升和服冬月用煖酒立驗已斃經一日者去板齒灌之

亦活 產後血眩風虛精神昏胃荆芥穗一兩三

錢桃仁五錢去皮尖炒為末水服三錢
若喘加杏仁去皮尖炒甘草炒各三錢

產後惡血不止

乾地黃搗末每食前熱酒服一錢連
進三服 七八日不止敗醬當歸各

六分續斷芍藥各八分芎藭竹茹各四分生地黃
炒十二分水二升煮取八合空心服 惡血不盡

或經月半年以升麻三兩清酒五升煮取二升分
半再服當吐下惡物極良 血露不絕鋸截桑根

取屑五指攏以淳酒服之日三服 崩
漏門女子血崩條下并治產後血不止

產後血痛

菴蒿子一兩水一升童子小便二盃煎飲
白雞冠花酒煎服之 血塊大黃末一

兩頭醋半升熬膏丸梧子大每服五丸温醋化下
良久當下 血痛有塊用薑黃桂心等分為末酒

服方寸匕血下盡即愈又黑神散用熟地黃一斤
陳生薑半斤同炒乾為末每服二錢温酒調下並

治經脉行後腹痛不調 血痛欲死
者槐耳半兩為末酒濃煎飲服立愈

產後惡血不下

沒藥血竭末各一錢童子小便温酒
各半盞煎沸服良久再服惡血自下

更不生痛 鍋底墨烟熱酒服二錢 惡物不下

无花當歸等分炒為末調一錢服 惡露不除續

骨木二十兩剉水一斗煮三升分三服即下 血

閉桃仁二十枚去皮尖藕一塊水煎服之良又益

母草汁一小盞入酒一合温服 產後敗血兜枕

塊硬疼痛發歇及新產乘虛風寒內搏惡露不快

臍腹堅脹當歸散用當歸炒鬼箭去中心木紅藍

花各一兩每服三錢酒一大盞煎七分食前温服

產後血悶 清酒一升和生地黃汁煎服 血悶

已死紅花煎湯熏法見上血運條下

產後血瘀 蒲黃三兩水三升煎一升頓服 瘀血不

盡麻子仁五升酒一升漬一夜明旦去滓

服一升不瘥再服一升不吐不下

不得與男子通一月將養如初

產後血多 山漆碾末米湯服一錢 多血不止烏雞

子三枚醋半升酒二升和攪煮取一升分

四服 亡血過多心腹徹痛用貫眾狀如刺蝟者

一箇全用不挫只揉去毛及花萼以好醋蘸濕慢

火炙令香熟候冷為末米 飲空心每服二錢甚效

產後血衝心胸滿喘命在須臾用血竭沒藥各一錢碾細童便和酒調服血滯衝心不下生

薑五兩水八升煮服

產後血攻

或下血不止心悶面青身冷欲絕者新羊血一盞飲之三兩服妙

產後血亂

奔入四肢并違墮以狗頭骨灰酒服二錢甚效

產後血滲

入大小腸車前草汁一升入蜜一合和煎一沸分二服

產後血脹

擣芭蕉根絞汁温服二三合腹痛引脇者當歸二錢乾薑炮五分爲末每服三錢

水一盞煎八分入鹽醋少許熱服

產後血氣

攻心痛惡物不下用竈中心土碾末酒服二錢瀉出惡物立效又心痛門失笑散

血氣逆煩

羚羊角燒末水服方寸匕

產後血渴

飲水不止黃芩麥門冬等分水煎温服無時不煩者新石灰一兩黃丹半錢渴時

萬方須纂可產後三

三

漿水調服一錢

產後鼻衄

荆芥焙碾末童子小便服二錢海上方也

產婦汗血

汚衣赤色葶草搗生汁三升酢二合和合頓服

產後尿血

川牛膝水煎頓服

產後下血

炙桑白皮煮水飲之紫苑末水服五撮下血羸瘦待死蒲黃二兩水二升煎八

合頓服兩濃煎湯一服立妙

瀉血不止乾艾葉半兩炙熟老生薑半膠艾湯治產後下血不絕

見妊娠門妊娠下血條下

產後舌出不收

丹砂傅之暗擲益益作墮地聲驚之即自收

產後目閉心悶

赤小豆生碾東流水服方寸匕不瘥更服

產後口乾舌縮

用雞子一枚打破水一盞攪服

產腸脫下

羌活二兩煎酒服 老鴉蒜即酸頭草一
把以水三盞煎一盞半去渣熏洗甚效

龍葵草一把水煎先熏後洗收乃止 產後子腸
不收搗蓖麻仁貼其丹田一夜即上 用麻油五

斤煉熟益盛令婦坐盆中飯久先用皂角炙去皮
碾末吹少許入鼻作嚏立上 用皂角樹皮半斤

皂角核一合川棟樹皮半斤石蓮子炒去心一合
為粗末以水煎湯乘熱以物圍定坐熏洗之搥乾

便喫補氣丸藥一服仰睡 枳殼煎湯浸之良久
即入也 五倍子末摻之或以五倍子白礬煎湯

熏洗 五靈脂燒烟熏之先以鹽湯洗淨 全蠍
炒碾末口噙水鼻中啗之立效 子腸脫出菜萸

三升酒五升煎二分三服 產後腸脫不能收
拾者樗枝取皮焙乾一握水五升連根葱五莖漢

椒一撮同煎至三升去滓傾盆內乘熱熏洗冷則
再熱一服可作五次用洗後睡少時忌鹽鮮醬麩

發風毒物及用心勞力
等事年深者亦治之

子宮脫下

蓖麻子仁枯礬等分為末安紙上托入仍
以蓖麻子仁十四枚碾膏塗頂心即入

寫方頁裏回產後四

荆芥皂角等分煎湯洗之以鐵漿塗之

子宮不收

名痲疾痛不可忍慈石丸用慈石酒浸煨碾末米糊丸梧子大每臥時滑石湯下四

十九次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒浸半兩鐵粉二錢半當歸五錢為末

產後陰道不閉

或陰脫出石灰一斗熬黃以水二斗投之澄清熏

產後陰脫

絹盛蛇床子蒸熱熨之又法蛇床子五兩烏梅十四個煎水日洗五六次鐵爐中

紫塵羊脂二味和勻布裏炙熱熨推納上燒車缸頭脂納酒中服用驚頭五枚燒碾并華水服

方寸七日三一方加葛根二兩酒服以溫水洗軟用雄鼠屎燒烟熏之即入人屎炒赤為末酒服方寸七日二服慎火草一斤

陰乾酒五升煮汁一升分四服

產後陰腫

桃仁燒碾傅之

產後陰翻

產後陰戶燥熱遂成翻花澤蘭四兩煎湯熏洗二三次再入枯礬煎洗之即安

產婦浮損

小便淋瀝不斷黃絲絹三尺以炭灰淋汁煮至極爛清水洗淨入黃蠟半兩蜜一兩

茅根二錢馬勃末二錢水一升煎一錢空心頓服

服時勿作聲作聲即不效名固浮散 又方產時

傷脬終日不小便只淋瀝不斷用生絲黃絹一尺

牡丹根皮末白及末各一錢水二盃煮至絹爛如

錫服之不

宜作聲

產後腹痛

桂末酒服方寸匕取效

產後腹有塊痛

以酒炒繁縷絞汁溫服又暴乾為末醋糊和丸空腹服五十九取下惡血

產後兜枕作痛

惡露不盡山槿煎汁入沙糖服之立效 五靈脂慢炒碾末酒服二錢

兜枕刺痛黑白散用烏金石燒酒淬七次寒水石煨為末等分每用粥飲服一錢半即止未止再服

兜枕血痕蒲

黃三錢米飲服

產後腹中痒

箭筈及鏃密安所臥席下勿令婦知產中腸痒不可忍針線袋密安所臥禱

寫方頁集四產後五

七

下勿令知之

產後遺尿

猪胞猪肚各一個糯米半升入豚內更以

服一錢匕雞矢燒灰酒服方寸匕遺尿或尿
數桑螵蛸炙半兩龍骨一兩為末每米飲服二錢

產後閉塞

以葱涎調蠟茶末丸百九茶服自通不可
用大黃利藥利者百無一生產後汗多

則大便秘難於用藥惟麻子粥最穩不惟產後可
服凡老人諸虛風秘皆得力也用大麻子仁紫蘇

子各二合洗淨碾細再以水碾濾取汁一盞分二
次煮粥啜之五七日不通不宜妄服藥丸宜用

大麥芽炒黃為末每服三錢沸湯調下與粥間服
出血多以人參麻子仁枳殼麩炒為末煉蜜丸

梧子大每服五十九米飲下虛悶阿膠炒枳殼
炒各一兩滑石二錢半為末蜜丸梧子大每服五

十九溫水下未通再服大小便不通用桃花葵
子滑石檳榔等分為末每空心葱白湯服二錢即

利

產後尿悶不通

陳皮一兩去白為末每空
心溫酒服二錢一服即通

產後諸淋

紫荊皮五錢半酒半水煎溫服
紫草一兩為散每食前用井華水服二

產後淋

錢

淋瀝不通用葵子一合朴硝
八分水一升煎八合下硝服之

產後中風

人虛不可服他藥者一物白鮮皮湯用新
汲水三升煮取一升溫服茵芋五兩木

防已半斤苦酒九升漬一宿猪脂四升同煎三上
三下膏成每服熱摩千遍

脇不得轉交加散用

生地黄五兩碾汁生薑五兩取汁交互相浸一夕
次日各炒黃浸汁乾乃焙為末每酒服一方寸匕

角弓反張口噤不語川烏頭五兩剉塊黑大豆
半升同炒半黑以酒三升傾鍋內急攪以絹濾取

酒微溫服一小盞取汗若口不開拗開灌之未效
加烏雞糞一合炒納酒中服以瘥為度又用大蒜

三十瓣以水三升煮一升灌之即甦又黑豆二升
半同雞矢白一升炒熟入清酒一升半浸取一升

入竹瀝服取汗不省人事口吐涎沫手足癱瘓
當歸荆芥穗等分為末每服二錢水一盞酒少許

童尿少許煎七分灌之下咽即有生意神效
噤身直面青手足反張竹瀝飲一二升即甦
語
瀋四肢拘急羌活三兩為末每
服五錢酒水各一蓋煎減半服

產後中風絕孕

用羊肉二斤香豉大蒜三兩水一
斗煮五升納酥一升更煮二升服

產後不語

用生白礬末一錢熟水調下日一
石菖蒲石蓮肉等分每服五錢水煎服
人參

產後青腫

乃血水積也乾漆大麥蘖等分為末新五
中鋪漆一層蘖一層重重令滿鹽泥固濟

煨赤礬末熱酒調服二錢產後諸疾並宜
及血氣水疾即上方
血虛浮腫澤蘭防已等分
為末每服二

錢醋湯下

產後欬逆

氣亂心煩用乾柿切碎水煮汁呷
日不止欲死者取壁錢窠幕三五個煎汁

呷之良
嘔吐心忡自運用石蓮子兩半白茯苓

一兩丁香五錢為末每米飲服二錢
產後嘔逆

別無他疾者白朮一兩二錢生薑二兩五錢酒水
各二升煎一升分三服
產中虛煩嘔逆安中益

各二升煎一升分三服
產中虛煩嘔逆安中益

氣竹皮丸白微同桂枝一分竹皮石膏三分甘草七分棗肉為大丸每以飲化一丸服有熱者倍白微

產後呃逆

白豆蔻丁香各半兩碾細桃仁湯服一錢少頃再服 氣逆青橘皮為末葱白童子

小便煎

二錢服

產後氣喘

面黑欲死乃血入肺竅危症也用蘇木二兩水兩椀煮一椀入人參末一兩服隨時

加減效不可言 胡桃肉人參各二錢水一盞煎七分頓服

產後心痛

惡血不盡也荷葉炒香為末每服方寸匕沸湯或童子小便調下或燒灰或煎汁皆

可 血氣上衝欲死鬱金燒存性為末二錢米醋一呷調灌即甦 惡血冲心氣悶欲絕桂心為末

狗胆汁九芡子大每熱酒服一丸 雞子煮酒食即安 又心痛門失笑散

產後腹痛

兔頭炙熱摩之即定 五靈脂香附桃仁等分碾末醋糊丸服一百丸或用五靈脂

萬方頂纂四 產後七

聖

末神麴糊丸白朮陳皮湯下 戶限下土熱酒服

一錢 枳實麩炒芍藥酒炒各二錢水一盞煎服

亦可為末服 羌活二兩煎酒服 血不盡者鹿

角燒礮鼓汁服方寸七日二 腹痛兒枕痛天仙

藤五兩炒焦為末每服炒生薑汁童子小便和細

酒調服 及血下不盡麻黃去節為末酒服方寸

匕一日二三服血下盡即止 腹痛欲死因或寒

起者陳蘄艾二斤焙乾搗鋪臍上以絹覆住熨斗

熨之待口中艾氣出則痛自止矣 以芎安腹上

即止痛 腹痛如絞當歸末五錢白蜜一合水一

盞煎一盞分為二服未效再服 如錐刺者敗醬

草五兩水四升煮二升每服二合日三服良 產

後大虛心腹絞痛厥逆用羊肉一斤當歸芍藥甘

草各七錢半用水一斗煮肉取七升入諸藥煮二

產後腹脹

不通轉氣急坐臥不安以麥蘖一合為末

能臥白聖散用商陸根三兩大戟一兩半甘遂炒

一兩為末每服二三錢熱湯調下大便宣利為度

此乃主水
聖藥也

產後脹衝氣噎

薑石代赭石等分爲末醋糊丸
梧子大每服三五十九醋湯下

產後腰痛

乃血氣流入腰腿痛不可轉者敗醬當歸
各八分芎藭芍藥桂心各六分水二升煮

入合分二
服忌葱

產後崩中帶下

各入
本門

產後心腹疝痛

用肥羊肉一斤水一斗煮汁八升入
當歸五兩黃芪八兩生薑六兩煮取

二升分
四服

產後下痢

大荆芥四五穗於蓋內燒存性不得犯油
火入麝香少許以沸湯些須調下此藥雖

微能愈大病不可忽之

蒼耳葉搗絞汁温服半
冬葵子爲末每服二錢入臘茶

中蓋日三四服

一錢沸湯調服日三
多煮薤白食仍以羊腎脂
同炒食之沒石子一個燒存性碾末酒服熱即

萬方頁集四產後八

星

用飲下日二用野雞一隻作餽飽食之赤白

者用紫莧菜一握切煮汁入粳米三合煮粥食之

立瘥也赤白裏急後重腹痛用桃膠焙乾沉香

蒲黃炒各等分為末每服二錢食前米飲下

痢日五十行用桑木裏蠹蟲糞炒黃急以水沃之

稀稠得所服之以瘥為度又痢疾門千金膠蠟

湯白頭翁湯

產後血痢

小便不通臍腹痛生馬齒莧杵汁三合煎沸入蜜一合和服

產後瀉痢

小龍牙根一握濃煎服之甚效即蛇含是也

產後痢渴

烏梅肉二十個麥門冬十二分每以一升煮七合細呷之久病津液枯竭四肢浮

腫口舌乾燥用冬瓜一枚黃土泥厚五寸煨熟絞汁飲亦治傷寒痢渴

產後蓐勞寒熱

用猪腎一對切細片以鹽酒拌之先用粳米一合葱椒煮粥鹽醋調和將

腰子鋪於盆底以熱粥傾於上蓋之如作齋生粥食之

產後虛汗

發熱肢體疼痛亦名尋勞用猪腎一對切水三升梗米半合椒鹽葱白煮粥食或用

猪腎同葱豉和成作臠食之猪膏薑汁白蜜各一升酒五合煎五上五下每服方寸匕黃芪當

歸各一兩麻黃根二兩每服一兩煎湯下小麥麩牡蠣等分爲末以猪肉汁調服二錢日二服

馬齒莧碾汁三合服如無以乾者煮汁淡竹瀝三合煖服須臾再服

產後自汗

壯熱氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪白芍藥酒炒各二錢生薑五片水一盞半

煎七分温服

產後盜汗

嗇嗇惡寒茱萸一雞子大酒三升漬半日煮服牡蠣粉麥麩炒黃等分每服一錢

用猪肉汁調下

產後煩躁

禹餘糧一枚狀如酸饊者入地埋一半緊築炭灰一斤煨之濕土罨一宿打破去外

面石取裏面細者碾水淘五七度日乾再碾萬遍用甘草湯服二錢一服立效

萬方真寶回產後九

聖

產後煩渴

血氣上冲也紫葛三兩水二升煎一升去滓呷之產後口渴用煉過蜜不計多少

熟水調服即止

產後煩悶

乃血氣上冲生地黄汁清酒各一升相和煎沸分二服汗出不識人用羚羊角燒

末東流水服方寸匕未愈再服一方加芍藥枳實等分炒碾末湯服不食者白犬骨燒碾水服方

寸匕蒲黃方寸匕東流水服極良

產後煩熱

逆氣用甘竹根切一斗五升煮取七升去滓入小麥二升大棗二十枚煮三四沸入

甘草一兩麥門冬一升再煎至二升每服五合內虛短氣甘竹茹湯用甘竹茹一升人參甘草伏

苓各二兩黃芩二兩水六升煎二升分服日三服

產後身熱如火

皮如粟粒者桃仁碾泥同臘猪脂敷之壯熱頭痛頰赤口乾唇焦煩渴

昏悶用松花蒲黃川芎當歸石膏等分爲末每服二錢水一合紅花二捻同煎七分細呷

產後寒熱 心悶極脹百病殺羊角燒末酒服方寸匕

產後悶亂 血氣上衝口乾腹痛用生藕汁三升飲之一方用藕汁生地黄汁童子小便等分煎

服

產後悶滿不能食 用小豆二七枚燒碾冷水頓佳

產後迷悶 因怒氣發熱迷悶者獨行散用荆芥穗以新瓦半炒半生為末童子小便服一二錢

若角弓反張以豆淋酒下或剉散童尿煎服極妙蓋荆芥乃產後要藥而角弓反張乃婦人急候得

此證者十存一二而已

產後搐搦 化名雞爪風舒筋散用井泉石四兩另碾天麻酒浸木香各一兩人參川芎官桂丁

香各半兩為末每服三錢大豆淋酒調下出汗即愈 強直者不可便作風中乃風入子臟與破傷

風同用鰾膠一兩以螺粉炒焦去粉為末分三服煎蟬蛻湯下

產後發狂

四物湯加青黛水煎服 狂言血運煩渴 不止生薑附子去毛為末每服二錢薑棗

水煎服

產後顛狂

敗血及邪氣入心如見祟物顛狂用大辰砂一二錢碾細飛過用飲兒乳汁三四茶

匙調濕以紫項地龍一條入藥滾三滾刮淨去地龍不用入無灰酒一盞分作三四次服

產後暈絕

神麴炒為末水服方寸匕 半夏末冷水和丸大豆大納鼻中即愈此扁鵲法也

產後諸虛

發熱自汗人參當歸等分為末用猪腰子一個去膜切小片以水三升糯米半合葱

白二莖煮米熟取汁一盞入藥煎至八分食前温服

產後中寒

遍身冷直口噤不識人白朮一兩澤瀉一兩生薑五錢水一升煎服

傷寒產後血運欲死

用荷葉紅花薑黃等分炒碾末童子小便調服二錢

產後風虛

獨活白鮮皮各三兩水三升煮二升分三服耐酒者入酒同煮

產後風邪

心虛驚悸用猪心一枚豆豉汁煮食之

產後露風

四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡頭不痛者用苦參二兩黃芩一兩生地黃四兩水八

升煎二升分數服

產後嘔水

因怒哭傷肝嘔青綠水用韭菜一斤取汁入薑汁少許和飲遂愈

尋內赤目

生地黃薄切溫水浸貼

產婦面如雀卵色

以羊胆猪胰細辛等分煎二沸夜塗旦以漿水洗之

產婦風瘡

因出風早用猪胆一枚柏子油一兩和敷

風入產戶

新產風入產戶內如馬鞭嘔吸短氣咳嗽者用鯉魚長一尺五寸以尿浸一宿平旦

以木篋從頭貫至尾文火炙熟去皮空心頓食勿用鹽醋

產後諸疾

及胎臟不安杜仲去皮瓦上焙乾木臼搗末煮棗肉和丸彈子大每服一丸糯米飲

下日二服 桃仁煎治婦人產後百病諸氣取桃

仁一千二百枚去皮尖雙仁熬搗極細以温酒一

斗半碾如麥粥納小瓶中麩封入湯中煮一伏時

每服一匙温酒和服日再 地黃酒用地黃汁漬

麩二升淨秫米二斗令發如常釀之至熟封七日

取清常服令相接忌生冷鮮蒜雞猪肉一切毒物

末產先一月釀成夏月不可造 凡產後穢汚不

盡腹滿及產後血運心頭硬或寒熱不禁或心悶

手足煩熱氣力欲絕諸病並用延胡索炒碾酒服

二錢甚效 血運心悶煩熱厭厭氣欲絕心頭硬

乍寒乍熱續斷皮一握水三升煎二升分三服

如人行一里再服無所忌此藥救產後垂死

琥珀散

治產後血運悶絕兒枕痛見金鐵竹木傷門

炒豆紫湯

古方有紫湯破血去風除氣防熱產後兩日尤宜服之用烏豆五升清酒一斗炒令

烟絕投酒中待酒紫赤色去豆量性服之可日夜三盞神驗中風口噤加雞屎白二升和炒投之

豆淋酒

治產後百病或血熱覺有餘血水氣或中風困薦或背強口噤或但煩熱瘕瘕口渴或身

頭皆腫或身痒嘔逆直視或手足頑痺頭旋眼眩
此皆虛熱中風也用大豆三升熬熟至微烟出入
瓶中以酒五升沃之經一日以上服酒一升溫覆
令少汗出身潤即愈口噤者加獨活半斤微微搥
破同沃之產後宜常服
以防風氣又消結血

華陀愈風散

婦人產後中風口噤手足癱瘓如角弓

眼倒築吐瀉欲死用荆芥穗子微焙為末每服三
錢豆淋酒調服或童子小便服之口噤則挑齒灌
之斷噤則灌入鼻中其效如神大抵產後太眩則
汗出而腠理疎則易於中風也此方諸書盛稱其
妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散云藥下可立
待應效陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬方用古老
錢煎湯服名一捻金王貺指迷方加當歸等分水
煎服許叔微本事方云此藥委有奇效神聖之功
一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫
用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用
之果然咎殷產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂
氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴原禮

証治要訣名獨行散賈似
道悅生隨抄呼為再生丹

無極丸

治產後積血癥瘕
腹痛見調經門

蕤薹散

治產後惡露不下血結衝心刺痛將來纔遇
胃寒踏冷其血必往來心腹間刺痛不可忍

謂之血母并治產後心腹諸疾產後三日不可無
此用蕤薹子炒當歸桂心赤芍藥等分每酒服二

錢趕下
惡物

大黃廔蟲丸

治產婦腹痛有乾血用廔蟲二十枚去
足桃仁二十枚大黃二兩為末煉蜜杵

和分為四丸每以一九酒一
升煮取二合溫服當下血也

紫金丸

治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱
頭痛不思飲食又治久有瘀血月水不調黃

瘦不食亦療心痛功與失笑散同以五靈脂水淘
淨炒末一兩以好米醋調稀慢火熬膏入真蒲黃

末和丸龍眼大每服一丸以水與童子小便各半
蓋煎至七分溫服少頃再服惡露即下血塊經閉

者酒磨服之

產後虛羸

黃雌雞一隻去毛背上開破入生百合三枚白粳米半升縫合入五味汁中煮熟開

腹取百合并飯和汁作羹食之并食肉 羊脂二

斤生地黃汁一斗薑汁五升白蜜三升煎如飴温

酒服一盃日三令人肥白健壯 虛羸腹痛冷氣

不調及腦中風汗自出白羊肉一斤切治如常調

和食之

產婦尿秘

見女陰門

產後頭痛

見頭病門氣厥頭痛條下

靈脂散

治婦人產後心腹脇肋腰痛痛見諸氣門

花蕊石散

治產後敗血不盡血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死見金鏃傷門

產後肉線

悉奇異門

乳病

乳汁不下

石膏三兩水二升煮三沸三日飲盡妙
二母散貝母知母牡蠣粉等分為細末每

猪蹄湯調服二錢此祖傳方也
荆三稜三個水

二益煎汁一益洗奶取汁出為度極妙
麥冬去

心焙為末每用三錢酒磨犀角約一錢許溫熱調
下不過二服便下
瓜蒌子淘洗控乾炒香瓦上

翁令白色酒服一錢七合面臥一夜流出
栝樓

根燒存性碾末飲服方寸七或以五錢酒水煎服

土瓜根為末酒服一錢一日二服
木蓮二個

猪前蹄一個爛煮食之并飲汁盡一日即通無子

婦人食之亦有乳也
赤小豆煮汁飲之
萬芑子

菜煎酒服
萬芑子三十枚碾細酒服
萬芑子

一合生甘草三錢糯米粳米各半合煮粥頻食之

絲瓜連子燒存性碾酒服一二錢被覆取汗即

通丙服通乳藥外用木梳梳乳周回百餘遍即

通白殭蠶末二錢酒服少頃以脂麻茶一盞投

之梳頭數十遍奶汁如泉也
穿山甲炮碾末酒

服方寸七日二服外以油梳梳乳即通
用鯉魚

萬方頂纂四乳病一

是

一頭燒末每服一錢酒調下
鼠肉作羹食勿令知之
麝肉煮食勿令婦

汁不行及經絡凝滯奶房脹痛
留蓄作瘡毒者用

葵子炒香縮砂仁等分爲末熱酒服二錢
此藥滋

氣脉通營衛行津液極驗又漏盧二兩半
蛇退十

條炙焦瓜萆十個燒存性爲末每服二錢
温酒調

下夏久以熱羹湯投之以通
爲度

爲度 乾胡荽煎湯飲之

婦人無乳

母猪蹄一具水二斗煮五六升飲之或加
通草六分 母猪蹄四枚水二斗煮一斗

入土瓜根通草漏盧各三兩再煮六升去滓
納葱豉作粥或羹食之或身體微熱有少汗
出佳未通

再作 用羊肉六兩麀肉

八兩鼠肉五兩作臠啖之

婦人乳少

死鼠一頭燒末酒服方寸匕勿令婦知
脂麻炒碾入鹽少許食之 氣少血衰脉

瀦不行故乳少也鍊成鍾乳粉二錢濃煎
漏盧湯調下或與通草等分爲末米飲服
方寸匕日三次

因氣鬱者涌泉散王不留行穿山甲炮龍骨
瞿麥穗麥門冬等分爲末每服一錢熱酒調
下後食

猪蹄羹仍以木梳梳乳一日三次

乳供多兒

野猪脂鍊淨和酒日三服令婦人多乳十日後可供三四兒素無乳者亦下

產後回乳

產婦無子食乳乳不消令人發熱惡寒用大麥藥一兩炒為末每服五錢白湯下甚

良 婦人欲回乳用男子裹足布勒住經宿即止

乳頭破裂

雞矢白炒碾酒服方寸匕三服愈 丁香末傅之 秋月冷茄子裂開者陰乾燒存

性碾末水調塗 燕脂蛤粉為末傅之

乳吹

鼠粘二錢麝香少許温酒細吞下 五月五日櫻箬燒灰酒服二錢即散累效 戶限下土和

雄雀糞暖酒服方寸匕 韭地中蚯蚓屎碾細篩

過米醋調厚傅乾則換三次即愈凉水調亦可

遠志焙碾酒服二錢以滓傅之 貝母末吹鼻中

大效 半夏一個煨碾酒服立愈以末隨左右啗

鼻效 葛蔓燒灰酒服二錢三服效 水調麩煮

糊欲熟即投無灰酒一盞攪勻熱飲令人徐徐按

萬方須纂四乳病二

是

之藥行即膠 赤小豆酒碾温服以滓傳之 陳

皮一兩甘草一錢水煎服即散 猪牙皂角去皮

蜜炙為末酒服一錢 婦人吹奶法如何皂角燒

灰蛤粉和熱酒一盃調八字管教時刻笑呵呵

馬明退燒灰一錢五分輕粉五分麝香少許酒服

蜘蛛一枚麪裏燒存性為末酒服即止神效

穿山甲炙焦木通各一兩自然銅生用半兩為末

每服二錢酒下取效 蛇皮一尺七寸燒末温酒

一蓋服 白丁香半兩為末以温酒服一錢 鼠

屎七粒紅棗七枚去核包屎燒存性入麝香少許

温酒調服 百齒霜以無根水丸梧子大每服三

丸食後屋上倒流水下隨左右暖臥取汗甚效或

以胡椒七粒同百齒霜和丸熱酒下得汗立愈

吹奶寒熱用猪肪冷水浸搗熱即易之立效 掀

痛者鹿角末炒黃為末酒服二錢仍以梳梳之

腫硬疼痛輕則為妬乳重則為乳癰用括樓根末

一兩乳香一錢為末温酒每服二錢

末温酒每服二錢

妬乳

乳癰汁不出內結成腫名妬乳用蜂房燒灰碾

每服二錢水一小蓋煎六分去渣温服 雞矢

每服二錢水一小蓋煎六分去渣温服 雞矢

每服二錢水一小蓋煎六分去渣温服 雞矢

白炒碾酒服方寸匕三服愈 丁香末水服方寸

匕 初起堅紫衆療不瘥柳根皮熟搗火温帛裹

熨之冷更易一宿消 生蔓菁根搗和鹽醋漿水

煮汁洗之五六度良 葵莖及子爲末酒服方寸

匕日二 醋和梁上塵塗之

蒲黃草根搗封之并煎汁飲

乳發

初起者黃蘗末和雞子白塗之乾即易 猪脂

切片冷水浸貼日易四五片甚妙 初起母

猪蹄一雙通草六分綿裹煮羹食之 初起不治

殺人鹿角磨濃汁塗之并令人嚼去黃水隨手即

散

乳癰

丁香末水服方寸匕 蒲黃草根搗封之并煎

汁飲及食之 龍舌草忍冬藤碾爛蜜和傅之

葵莖及子爲末酒服方寸匕日二 馬鞭草一

握酒一盃生薑一塊搗汁服渣傅之 地黃搗敷

之熱即易性涼消腫無不效 五月五日椶箬葉

燒灰酒服二錢即散累效 葱汁一升頓服即散

蒲公英一兩忍冬藤二兩搗爛水二鍾煎一鍾

食前服睡覺病即去矣 一醉膏用石膏煨紅出

火毒碾每服三錢温酒下添酒盡醉睡覺再進一服炙甘草二錢新水煎服仍令人嘔之丹參

白芷芍藥各二兩收咀以醋淹一夜猪脂半斤微火煎成膏去滓敷之貝母末酒服二錢仍令人

吮之即通白芷貝母各二錢為末温酒服之紫蘇煎湯頻服并搗封之用川大黃粉草各一

兩為末好酒熬成膏收之以絹攤貼瘡上仰臥仍先以温酒服一大匙明日取下惡物扁竹根如

殭蠶者同萱草根為末蜜調傅之神效白麩半斤炒即玉簪花取根搗酒服以渣傅之

黃醋煮為糊塗之即消初起堅紫眾療不瘥柳根皮熟搗火温帛裏熨之冷更易一宿消乳癰

已成用新濕鼠屎黃連大黃各等分為末以黍米粥清和塗四邊即散桂心甘草各二分烏頭一

分炮為末和苦酒塗之紙覆住膿化為水神效皂角刺燒存性一兩蚌粉一錢和碾每服一錢温

酒下水楊柳根生搗貼瘡其熱如火再貼遂平蔓荆子炒為末酒服方寸匕渣傅之脂麻炒

焦搗爛以燈蓋內油脚調傅即散山甲炮碾末酒服方寸匕日二服雞矢白炒碾

<p>酒服方寸匕三服愈 <small>牛屎和酒敷之即消 鼠屎七枚碾末温酒服取汗即散 人牙齒燒碾</small></p>	<p>酥調貼之 <small>初發腫痛結硬欲破一服即瘥 來真樺皮燒存性碾無灰酒調服方寸匕即臥覺</small></p>	<p>即瘥也 <small>大熟栝樓一枚熟搗以白酒一斗煮取 四升去渣温服一升日三服 腫大如盃腫痛白</small></p>	<p>薑石末和雞子清傅之乾即易 <small>堅硬者以罐盛 醋燒熱石投之二次温漬之冷則更燒石投之不</small></p>	<p>過三次即愈 <small>寒熱者蔓菁根并葉去土不用水 洗以鹽和搗塗之熱即換不過三五次即瘥 冬月</small></p>	<p>即用根此方已救十數人須避風 <small>潰爛者銀杏 半斤以四兩碾酒服之以四兩碾傅之又靴內年</small></p>	<p>久樺皮燒灰酒服一錢日一服 <small>潰爛見內者猫 兒腹下毛乾鍋內煨存性入輕粉少許油調封之</small></p>	<p>未成者即散已成者即潰痛不可忍者即不疼 <small>神驗不可云喻也用真陳橘皮湯浸去白晒麩炒</small></p>	<p>微黃為末每服二錢麝香調酒下初發者一服見 <small>效名橘香散 堅硬者新葶苈子半匙清水一盞</small></p>	<p>服之不 <small>得嚼破</small></p>
--	---	--	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

乳崑

用穿山甲炮碾末酒服方寸匕日二服因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年

成癰名乳崑不可治也用青皮四錢水一蓋半煎一蓋徐徐服之日一服或用酒服

乳癰

酒下梳垢五丸即退消初發者黃明水膠以濃醋化塗之立消

乳腫

小豆莽草等分為末苦酒和傳佳馬屎塗之立消

乳瘡腫痛

用脂麻炒焦碾末以燈膏油調塗即安

乳汁結毒

產後乳汁不泄結毒者皂角刺蔓荊子各燒存性等分為末每温酒服二錢乳汁

不下條內有兼治經絡凝滯乳房脹痛留畜作癰二條

婦人乳毒

敗龜板一枚燒碾酒服四錢

乳結硬痛

百藥煎末每服三錢酒一蓋煎數沸服之取效鱈魚皮燒灰空心温酒服

勒乳成癰

益母為末水調塗乳上一宿自瘥生擣亦得

產後乳懸

婦人產後兩乳忽長細小如腸垂過小肚痛不可忍危亡須臾名曰乳懸將芎藭當

歸各一斤以半斤剉散於瓦石器內用水濃煎不拘多少頻服仍以一斤半剉塊於病人桌下燒烟令將口鼻吸烟用盡未愈再作一料仍以苧麻子一粒貼其頂心

女陰

女人陰脫

鐵精羊脂布裏炙熱熨推之 白及川烏頭等分爲末絹裏一錢納陰中入三寸腹

內熱即止日用一次 煎羊脂頻塗之 陰脫作痒礬石燒碾空心酒服方寸匕日三 產後門有

脫條

婦人陰挺

茄根燒存性爲末油調在紙上捲筒安入內一日一上 鐵華粉一錢龍腦半錢碾

水調刷

婦人陰痛

青布裏鹽熨之 礬石三分炒甘草末半分 緜裏導之取瘥 絹盛蛇床子蒸熱熨

之又法蛇床子五兩烏梅十四個煎水日洗五六次 牛膝五兩酒三升煮取一升半去渣分三服

產婦陰痛訶黎勒和蠟 燒烟熏之及煎湯熏洗

婦人嫁痛

小戶腫痛也大黃一兩酒一升煮一沸頓服 海螵蛸燒存性酒服

婦人陰腫

甘菊苗搗爛煎湯先熏後洗 作痒者蒜湯洗之效乃止 或生瘡者枸杞根搗水

頻洗 堅痛者枳實半斤 砂炒帛裹髮之冷即易

婦人陰痒

狼牙二兩蛇床子三兩煎水熱洗 墻上爛茅荆芥牙皂等分煎水頻熏洗之 小

煎煮湯日洗三次 蛇床子一兩白礬二錢煎湯 頻洗 桃仁杵爛綿裹塞之 炙猪肝納入當有

蟲出 陰蠶作痒 羊肝納入引蟲

婦人陰蝕

肥猪肉煮汁洗不過三十斤瘥 陰蝕瘡爛者狼牙湯用狼牙三兩水四升煎取半

升以筋纏綿浸湯瀝洗日四五遍 雄雞肝切片納入引蟲出盡良

婦人陰瘡

硫黃末傅之瘥乃止 紫葳為末用鯉魚腦或胆調搽 如蟲咬痒痛者生搗桃葉

綿裹納之日三四易 鯽魚肉炙 油塗婦人陰疳諸瘡殺蟲止痛

婦人陰冷

母丁香末紗囊盛如指納入陰中病即已 五味子四兩為末以口中玉泉和丸兔

屎大頻納陰中取效 陰寒十年無子者用吳茱

萸川椒各一升為末煉蜜九彈子大綿裏納陰中

日再易之但子宮開即有子也 子宮寒冷蛇床

子散取蛇床子仁為末入白粉少許和勻如棗大

綿裏納之自然溫也 王門寬

冷硫黃煎水頻洗 又調經門

婦人陰癩

硬如卵狀隨病之左右取穿山甲之左右

土瓜根芍藥桂枝麝蟲各三

兩為末酒服方寸七日三服

婦人陰吹

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也宜

三枚和煎髮消藥成矣

分再服病從小便出也

產門蟲疽

痛痒不可忍用杏仁去皮燒存

性杵爛綿裏納入陰中取效

婦人轉脬

不得小便用桑螵蛸炙為末飲服方寸匕

日用二 寒水石二兩滑石一兩葵子一

合為末水一斗煮五升時服一升即利 因過忍

小便而致滑石末蒸湯服二錢 一妓病轉脬小

便不通腹脹如鼓數月垂死醫用猪脬吹脹以翎管安上挿入陰孔捻脬氣吹入即大尿而愈亦機

巧妙術也 乾箬葉一兩燒灰 滑石半兩為末每米飲服三錢

產婦尿秘

鼠婦七枚熬 碾末酒服

婦人小便卒不得出者

紫苑為末并華水服三撮 即通小便血者五撮立止

婦人尿血

船茹一斤洗淨河水四升半煮二升半 分二服 衣中白魚二十枚納入陰中

婦人遺尿

桑螵蛸酒炒為末薑湯服二錢 雄雞翎 燒灰酒服方寸匕日三 船故茹為末酒

服三錢 不拘胎前產後白微芍藥 各一兩為末酒服方寸匕日三服

前陰出糞

婦人因生產陰陽易位前陰出糞名交腸 病取舊幪頭燒灰酒服仍間服五苓散分

利之如無幪頭凡舊漆紗帽皆可 代之此皆取漆能行敗血之義耳

婦人疝痛

名小腸氣馬鞭草一兩酒煎 滾服以湯浴身取汗甚妙

育腸氣痛

婦人少腹痛用飲服二錢日二服極效

女人陰血

因交接違禮血出不止青布同髮燒灰納之五倍子末摻之良雄雞冠血塗之

交接陰毒

腹痛欲死猴猪血乘熱和酒飲之胡椒七粒葱心二寸半麝香一分搗爛黃蠟溶

和做成條子插入陰內少頃汗出愈男陰門有陰毒腹痛男女陰毒二條

實女無竅

以鉛作錠逐日紆之久久自開

產門生合不開

用銅錢磨利割開以陳石灰傅之即愈

女人紫足

脫骨湯用杏仁一錢桑白皮四錢水五盃新瓶煎三碗入撲硝五錢乳香一錢封口

煎化置足於上先熏後洗三日一作十餘次後軟若束綿也

纏脚生瘡

荆芥燒灰葱汁調傅先以甘草湯洗之

女人趾瘡

甲內惡肉突出不愈蜈蚣一條焙碾傅之外以南星末醋和傅四圍皂礬日晒夜

露每以一兩煎湯浸洗仍以礬末一兩加雄黃二錢硫黃一錢乳香沒藥各一錢碾勻搽之
名甲

臭田螺
疔又名

婦人足瘡

經年不愈名裙風瘡用男子頭垢桐油調作隔紙膏帖之

補遺

調經門

月水不止

瓜月經太過甜瓜子仁研末去油水調服西

服一錢

婦人血氣

血氣腹脹山豆根研末酒服三錢

崩漏門

血崩

敗蒲扇燒灰酒服一錢

妊娠門

轉女為男

懷妊三月名曰始胎血脉未流象形而變是時宜服藥用斧置床底繫刃向下勿令

本婦知恐不信以雞試之則一窠皆雄也

婦人斷產

剪印紙有印處燒灰水服
一錢即效一云須產後服

胎產門

臨產順胎

五月五日收莧菜和馬齒莧為細末等分
與妊娠人常服令易產也
杵頭糠燒研

水服方寸
七令易產

催生下胎

紅莧入血分善走與馬莧同服
能下胎或煮食之令人易產

橫生逆產

用夫陰毛二七莖燒研
猪膏和丸如豆大吞之

產後門

產後血暈

漆器燒烟
熏之即甦

產後血悶

欲絕者白羊血
熱飲一升即活

產後血脹

悶欲死者水煮蘇
木五兩取濃汁服

產後血渴

蓮子心碾末米飲服二錢立愈

子宮脫下

淡竹根連葉煎湯洗之

產後心痛

產後血刺心痛欲死燂猪湯温飲一盞

產後陰痛

見女陰門

乳病門

婦人無乳

水牛鼻作羹食之不過兩日乳下無限壯人尤效

產後回乳

神麩炒研酒服二錢日二即止甚驗

乳癰

山慈姑葉入蜜搗塗之妙萱草根搗酒服以渣封之

女陰門

女人陰脫

鯽魚頭燒研酒服仍以油調搽

萬方頁裏四補遺二

萬方類纂卷第五

山陰宋穆饌次

臨桂謝元福審正

幼科弟五

小兒諸病

初生不啼

取冷水灌之外以葱白莖細鞭之即啼

初生貼額

頭熱鼻塞者天南星炮為末水調貼額上炙手熨之

初生宜知

猪胆入湯浴之不生瘡疥 浴湯中入鹽少許拭乾以膩粉少許摩其身既不畏風

又散諸氣 益母草五兩煎湯浴之不生瘡疥 初生三日去驚邪辟惡氣以牛黃一豆許以赤蜜

如酸棗許碾勻綿蘸令兒吮之 初生嚼生脂麻綿包與兒啞之其毒自下 初生未可便與朱砂

蜜只以甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以綿染點兒口中可為一蜆殼當吐出胸中惡汁

萬方類纂五 小兒諸病一

此後待兒饑渴更與之令兒智慧無病出痘稀少

初生以黃連煎湯浴之不生瘡及丹毒未出

聲時以黃連煎汁灌一匙令終身不出斑已出聲

者灌之斑雖發亦輕此祖方也初生三日應開

腸胃助穀神者碎米濃作汁飲如乳酪頻以豆許

與兒飲之二七日可與哺慎不得與襍藥也初

生七日助穀神以導達腸胃碾粟米煮粥如飴每

日哺少許初生小兒至滿月以豬乳頻滴之佳

若初生無乳以豬乳代之出月可免驚癇痘疹之

患小兒落地時用橄欖一個燒碾硃砂末五分

和勻嚼生脂麻一口吐唾和藥絹包如棗核大安

兒口中待啞一個時頃方可與乳此藥取下腸胃

穢毒令兒少疾及出痘稀少也初生時以韭汁

少許灌之即吐出惡水惡血永無諸疾初生六

日以硃砂豆大細碾蜜一棗大調與吮

之一日令盡解胎毒温腸胃壯氣血

七日口噤牛黃為末以淡竹瀝化一字灌之更以猪

乳滴之十日內口噤不能吮乳蜘蛛一

枚去足炙焦碾末入猪乳一合和勻分作三服徐

徐灌之神效無比初生口噤不乳用蟬蛻二七

枚全蠟去毒二七枚為末入輕粉末少許乳
汁調灌十日內者用牛口齒草絞汁灌之

初生目閉

由胎中受熱也以熊胆少許蒸水洗之一
日七八次如三日不開服四物加甘草天

花粉下有嬰
兒目濇條

初生無皮

色赤但有紅筋乃受胎未足也用早白米
粉撲之肌膚自生無膚色赤因受胎未

得土氣也取車輦土
碾傅之三日後生膚

初生不乳

咽中有噤物如麻豆許用水銀米粒大與
之下咽即愈百日內小兒無故口青不

飲乳用凌霄花大藍葉芒硝大黃等分為末以羊
髓和丸梧子大每碾一丸以乳送下便可吃乳熱

者可服寒者勿服此方救危
甚多雀屎四枚末之與吮

飲乳不快

似喉痺者以準牛角燒
灰塗乳上嚙下即瘥

吐乳

服用鹹豉七個去皮膩粉一錢同碾丸黍米大每
服三五丸藿香湯下幼兒吐乳不止服此立效

葛方頂纂五小兒諸病二

取田中地龍糞一兩碾末空心以米湯服半錢
不過二三服效 胃寒者白豆蔻仁十四個縮砂

仁十四個甘草生二錢炙二錢為末常摻入兒口
中初生吐乳不止蓬莪茂少許鹽一綠豆許以

乳一合煎三五沸去滓入牛黃兩粟大服之甚效
也又人乳二合蘧籐篾少許鹽二粟大同煎沸入

牛黃米許與服 小兒百日晬內吐乳或糞青色
用年少婦人乳汁一盞入丁香十枚陳皮去白一

錢石器煎一二十沸細細與服 襁褓吐乳欬
久不愈石燕子末以蜜調少許塗唇上日三五次

傷乳 小兒傷乳腹脹煩悶欲睡燒鼠二枚為末日服
二錢湯下 大麥麩生用水調一錢服白麩微

炒亦可

奶癖 凡小兒膈下硬如有物乃俗名奶癖者也只服
温脾化積丸藥不可轉瀉用黃鷹屎一錢密陀

僧一兩船上硫黃一分丁香二十一箇為末每服
一字三歲以上半錢用乳汁或白麩湯調下並不

轉泄一復時取下半錢用乳汁或白麩湯調下並不
炙黑半兩蚬蚶一分木香一分麝香半錢為末每

錢為末每

服一字薄酒調下連喫二服 白芥

初生不尿

子碾末水調攤膏貼之以平為度
人乳四合葱白一寸煎滾分作四服即利
初生便閉甘草枳殼煨各一錢水半盞

煎服

初生尿溢不通車前搗汁入蜜少許灌之
小兒尿閉

乃熱結也用大地龍數條去泥入蜜少許碾傳莖
卵仍燒蠶蛻紙朱砂龍腦麝香同碾少許以麥門

冬燈心煎湯調服 小兒不尿乃胎熱也用大蔥
白切四片用乳汁半盞同煎片時分作四服即通

不飲乳者服之即飲乳若臍四旁有青黑色及口
撮者不可救也 錢氏捻頭散治小兒小便不通

用延胡索苦楝子等分為末每服半錢或一錢以
捻頭湯食前調下如無捻頭以滴油數點代之

初生鎖肚 由胎中熱毒結於肛門兒生之後閉而不
通三日者急令婦人咂兒前後心手足心

并臍七處四五次以輕粉半錢蜜少
許溫水化開時時與少許以通為度

小兒斷臍 即用清油調髮灰傅之不
可傷水臍濕不乾亦傅之

萬方頁幕五 小兒諸病三

三

兒臍不合

車轄脂燒灰傳之

小兒臍瘡

龍骨煨碾傳之燒灰傳之

伏龍肝末傳之不過數次

齏帶

黃蘗末塗之

久不瘥者

馬齒菜燒碾傳之

臍

瘡不乾綿子燒灰傳之

臍瘡出汁久不瘥

蝦蟇

兒臍出汁

赤腫白石脂末熬溫撲之日三度勿揭動

血及膿海螵蛸臍脂為末油調搽之

之小兒臍濕不早治成臍風或腫赤或出水用

當歸末傳之一方入麝香少許一方用胡粉等分

試之最驗若愈後因尿入復作再傳即愈

臍腫

荆芥煎湯洗淨以煨葱刮薄出火毒貼之即消

兒臍血出多啼

白石脂末熬溫撲之日三度勿揭動

香一字摻之

臍腫出汁不止白礬燒灰傳之

猪頰車髓十二銖杏仁半兩碾傅

濕腫久不瘥蜂房燒末傅之效

臍風

白龍膏用天漿子有蟲者一枚真殭蠶炒一枚臍粉少許碾勻以薄荷自然汁調灌之取下毒

物甚效 宣風散治初生斷臍後傷風濕唇青口

撮出白沫不乳用全蠍二十一個無灰酒塗炙為

末入麝香少許每用金銀煎湯調半字服之 獨

頭蒜切片安臍上以艾灸之口中有蒜氣即止

用壁虎後半截焙為末男用女乳女用男乳調勻

入稀雞屎少許摻舌根及牙關仍以手蘸摩兒取

汁出

甚效

臍爛成風

杏仁去皮碾傅

小兒撮口

鹽頭搗貼臍上灸之 艾葉燒灰填臍中

立效 生川烏尖三個全足蜈蚣半條酒浸炙麝

香少許為末以少許吹鼻得嚏乃以薄荷湯灌一

匙 初生大豆芽碾爛絞汁和乳灌少許良 夜

合花枝濃煮汁拭口中并洗之 壁魚兒碾末每

萬方頂纂五 小兒諸病四

四

以少許塗乳令兒吮之但看舌上有瘡如粟米
 大是也以蜈蚣汁刮破指甲碾傅兩頭肉即愈如
 無生者乾者亦可撮口臍風胎熱也用蝸牛五
 枚去殼碾汁塗口取效乃止又方蝸牛十枚去
 殼碾爛入蔣蘿末半分碾勻塗之取效甚良又
 糊猴屎燒末和生蜜少許灌之用硃砂末安小
 瓶內捕活蝎虎一個入瓶中食砂末月餘待體赤
 陰乾為末每薄荷湯服三四分先灸兩乳中三
 壯後用此方大驗用烏驢乳一合以東引槐枝三
 寸長十根火煨一頭出津拭淨浸乳中取乳滴口
 中甚妙不能乳者烏蛇酒浸去皮骨炙半兩麝
 香一分為末每用半分荆芥煎湯調灌之出白
 沫者以艾灸口之上下四壯鯽魚燒碾酒調少許
 灌之仍搯手足兒一歲半則以魚網洗水灌之
 發噤者用生甘草二錢半水一盞煎六分溫服令
 吐痰涎後以乳汁點兒口中鼠負蟲梓絞汁少
 許灌之生杵鼠負及雀甕汁服之一方不能乳
 者先鶚口傍見血以雀甕碾汁塗之或同鼠婦生
 之搗塗

小兒口噤

牙關不開天南星一枚煨熟紙裹斜包剪

生南星同薑汁擦之自開病在咽中如麻豆許

令兒吐沫不能乳食葛蔓燒灰一字和乳汁點之

即瘥驚風不乳白棘燒末水服一錢體熱用

竹瀝二合煖飲分三四服用棘科上雀兒飯糞

子未開口者取內物和乳汁碾灌之又棘剛子五

枚赤足蜈蚣一條燒存性碾勻飯丸麻子大每服

三五丸乳汁下亦可末服一字面黃赤氣喘啼

聲不出由胎氣挾熱流毒心脾故令舌強唇青聚

口發禁用直殭蠶二枚去嘴略炒為末蜜調敷唇

小兒口噤

牙關不開天南星一枚煨熟紙裹斜包剪

生南星同薑汁擦之自開病在咽中如麻豆許

令兒吐沫不能乳食葛蔓燒灰一字和乳汁點之

即瘥驚風不乳白棘燒末水服一錢體熱用

竹瀝二合煖飲分三四服用棘科上雀兒飯糞

子未開口者取內物和乳汁碾灌之又棘剛子五

枚赤足蜈蚣一條燒存性碾勻飯丸麻子大每服

三五丸乳汁下亦可末服一字面黃赤氣喘啼

聲不出由胎氣挾熱流毒心脾故令舌強唇青聚

口發禁用直殭蠶二枚去嘴略炒為末蜜調敷唇

寫于頁裏五小兒諸病五

口中涎沫塗口中及頤上自愈 小兒百日內風
噤口中有物如蝸牛或如黃頭白蟲者薄猪肪擦
之即消 初生口噤
七日十日口禁見前

初生遍身如魚脬 又如水晶破則成水流滲又生者
密陀僧生碾搥之仍服蘇合香丸

小兒胎毒 淡豉煎濃汁與三五口其毒
自下又能助脾氣消乳食

初生吐不止 用蘧條少許同人乳二合鹽二粟許煎
沸入牛黃粟許與服此劉五娘方也

初生胃寒氣欲絕 勿斷臍急烘絮包之將胎衣烘熱
用燈炷於臍下往來燎之暖氣入

腹內氣
回自甦

小兒血眼 兒初生艱難血瘀眦腫遂濺滲其睛不見
瞳人輕則外眇赤腫上下弦爛用杏仁二

枚去皮尖嚼乳汁三五匙入輕粉少許
蒸熟絹包頻點重者加黃連樸硝最良

小兒唇緊 頭垢塗之 人屎灰傅之 雞矢白碾末
傅之有涎易去 烏蛇皮燒灰酥和傅之

疥蟻碾末猪脂和傅之
芥子搗汁曝濃揩破頻塗之
松脂炙化貼之
赤莧搗汁洗之良

葵根燒灰
酥調塗之

脾熱唇瘡
烏蛇皮燒灰
酥和傅之

小兒口緊
不能開口飲食不語即
死蛇蛻燒灰拭淨傅之

小兒舌膜
初生小兒有白膜皮裏舌或遍舌根可以
指甲刮破令血出以燒礬末半綠豆許傅

之若不摘
去兒必啞

小兒夜啼
燒尸場土置枕邊
死人朽棺木燒照即
止伏龍肝末二錢
硃砂一錢麝香少許

為末蜜丸綠豆大每服五丸
粉三豆大日三服
明鑑掛床脚上
硫黃二錢
水服胡

半鉛丹二兩碾勻瓶固煨過埋土中七日取出飯
丸黍米大每服二丸冷水下
前胡搗篩蜜丸小

豆大日服一丸熟水下至五六丸以瘡為度
寄奴半兩地龍炒一分甘草一寸水煎灌少許
劉

萬方領纂五小兒諸病六六

青黛量大小水碾服之 黑牽牛末一錢水調敷
臍上即止 井口邊草私着蓆下勿令母知 邪

熱在心也以燈花二三顆燈心湯調抹乳吮之
乳香一錢燈花七枚為末每服半字乳汁下 仙

人杖置身伴睡良 用本兒初穿毛衫兒放甌內
自不哭也 客忤夜啼用本家厨下燒殘火柴頭

一個削平焦處向上硃砂書云撥火杖撥火杖天
上五雷公差來作神將捉住夜啼鬼打殺不要放

急急如律令書畢勿令人知安立床前脚下男左
女右 甌帶懸戶上即止 五倍子末津調填於

臍內 治小兒一百二十日內夜啼用蟬蛻四十
九個去前截用後截為末分四服鈎藤湯調灌之

普濟蟬花散治小兒夜啼不止狀若鬼崇用蟬
蛻下半截為末一字薄荷湯入酒少許調下或者

不信將上半截為末前湯調下即復啼也 白雄
雞翎翎安席下勿令母知 雞窠草安席下勿令

母知 豬屎燒灰淋汁浴兒并以少許服之 豬
窠中草密安席下勿令母知 絳囊盛狗毛繫兒

背上須狗頸下毛 牛屎一塊安席下勿令母知
馬蹄末敷乳上飲之馬骨燒灰亦可 用虎睛

一隻為散以竹漚調少許與喫
夜啼驚熱用人
耳塞石蓮心人參各五分乳香二分燈花一字丹

砂一分為末每
薄荷湯下五分

腹痛夜啼

牛黃一豆許乳汁化服乃書田字于臍下
樹孔中草暗着戶上即止
蜃蟲炙芍

樂芎藭各二錢為末每用一字乳汁調下
腹痛
面青冷證也用大蒜一枚煨碾日乾乳香五分搗

丸芥子大每服
七丸乳汁下

小兒驚啼

雞矢白燒灰米飲服二字
車轄脂小豆
許納口中及臍中良
黃芩人參等分為

末每服一字水飲下
白玉二錢半寒水石半兩
為末水調塗心下
啼而不哭煩也哭而不啼躁

也用蟬蛻二七枚去翅足為末入硃砂末一字蜜
調與吮之
發歇不定真麝香一字清水調服日

三又臘月縛猪繩燒灰水服少許
狀如物刺用
蝟皮三寸燒末傅乳頭飲兒
亂油髮燒碾乳汁

或酒服
少許良

小兒初生大小便不通

真香油一兩皮硝少許同煎滾冷定徐徐灌入口中服下

通即

小兒胎熱

黑豆二錢甘草一錢入燈心七寸淡竹葉一片水煎初生胎熱或身體黃者以真

牛黃一豆大入蜜調膏乳汁化開時時滴兒口中形色不實者勿多服

小兒胎寒

腹痛汗出用衣中白魚二七枚絹包于兒腹上回轉摩之以愈為度胎寒腹痛啼

哭吐乳大便色青狀若驚搐出冷汗薑黃一錢沒藥乳香二錢為末蜜丸芥子大每服一丸鈞藤煎

湯化下

小兒食土

用乾黃土一塊碾末濃煎黃連湯調下或以黃連汁搜之晒乾與食買市中羊肉

一斤令人以繩繫于地上拽至家洗淨炒炙食或煮汁亦可吃泥及膿肚用膩粉一分沙糖和丸

麻子大空心米飲下一丸良久洩出泥土瘥食土及生物碾綠礬末猪胆汁丸綠豆大每米飲下

五七

小兒邪癩

以麝香碾墨書去邪辟魔四字於額上
小兒癩疾烏猫屎一錢桃仁七枚同煎服

一盞
立瘥

嬰兒瘡疾

無計可施代赭石五枚煨紅醋淬朱砂五
分砒霜一豆大同以紙包七重打濕煨乾

入麝香少許為末香油調一字塗鼻尖上及眉心
四肢神驗 百日兒瘡水鑑仙人歌曰瘡是邪風

寒熱攻直須術治免成空常山刻作人形狀釘在
孩兒生氣宮如金生人金生在已即釘已上木生

人釘亥上火生人釘寅上水土生人釘申上也
鹿角生碾為末先發時以乳調一字服 雞臙脰

黃皮燒存性乳服男用雌女用雄 痺瘡壯熱
不寒黃丹二錢蜜水和服冷者酒服名鬼哭丹

小兒魛病

寒熱如疳用冬瓜扁蓄各四兩水二升煎
湯浴之 以紅紗袋盛夜明砂佩之即繼

病下有小

兒繼病條

萬方須纂五

小兒諸病八

八

小兒傷寒

淡竹瀝葛根汁各六合細細與服百日內患壯熱用鐵鏵一斤燒赤水二斗淬三

七次煎一半入柳葉七片浴之五日以後熱不退用棗葉半握麻黃半兩葱白豆豉各一合童子

小便二鍾煎一鍾分二服取汗傷寒時氣用桃葉三兩水五升煮十沸取汁日五六遍淋之後燒

雄鼠糞二枚服之妙

小兒風寒

蘿蔔子生碾末一錢溫葱酒服之取微汗大效煩熱有痰不省人事荊芥穗半兩

焙麝香片腦各一字為末每茶服半錢大人亦治

小兒身熱

苦參煎湯浴之良石膏一兩青黛一錢為末糕糊丸龍眼大每服一丸燈心湯化

下白芷煮湯浴之取汗避風白芷苗苦參等分煎漿水入鹽少許洗之潮熱往來盜汗用南

番胡黃連柴胡等分為末煉蜜丸芡子大每服一丸至五丸安器中以酒化開更入水五分重湯煮

二三十沸和滓服汗出拘急因中風起丹參半兩鼠屎炒三十枚為末每服三錢漿水下

小兒諸熱

大黃煨熟黃芩各一兩為末煉蜜丸麻子大每服五丸至十丸蜜湯下加黃連名三

黃九

小兒發熱

不拘風寒飲食時行痘疹以葱涎入香油內手指蘸油摩擦小兒五心頭面項背諸

處最能解毒涼肌

小兒多熱

熟湯碾郁李仁如杏酪一日服二合

小兒寒熱

冬瓜炮熟絞汁飲惡氣中人以濕鼓碾丸雞子大以摩臍上及手足心六七遍又

摩心臍上旋旋咒之上破鼓丸看有細毛棄道中即便瘥也及熱氣中人用猪後蹄甲燒灰乳汁

調服一撮日二服

小兒熱病

壯熱煩渴頭痛生地黄汁三合蜜半合和勻時時與服又枯樓根末乳汁調服半錢

口禁體熱竹青茹三兩醋三升煎一升服一合

萬方類纂五小兒諸病九

九

小兒熱渴

蓮實二十枚炒浮萍二錢半生薑少許水煎分三服熱渴久不止葛根半兩水煎

服

小兒風熱

挾風蘊熱體熱太陰元精石一兩石膏七錢半龍腦半兩為末每服半錢新汲水下

昏惰躁悶不能食用消梨三枚切破以水二升煮取汁一升入粳米二合煮粥食之

小兒痰熱

欬嗽驚悸半夏南星等分為末牛膽汁和入胆內懸風處待乾蒸餅丸綠豆大每薑

湯下三五丸

小兒蒸熱

脾虛羸瘦不能飲食用白朮白茯苓白芍藥各一兩甘草半兩為散薑棗煎服

小兒頭熱

鼻塞不通濕地龍糞捻餅貼額上日數易之

小兒腦熱

常欲閉目大黃一分水三合浸一夜一歲

目或太陽痛或目赤腫川芎薄荷樸硝各二錢為末以少許吹鼻中

小兒骨蒸

潮熱減食瘦弱用秦艽炙甘草各一兩每用一二錢水煎服之錢乙加薄荷葉五錢

體瘦心煩天靈蓋酥炙黃連等分碾末每服半錢米飲下日二服十五歲以下遍身如火日漸

黃瘦盜汗欬嗽煩渴柴胡四兩丹砂三兩為末獮

猪胆汁拌和飯上蒸熟丸綠豆大每服一九桃仁

烏梅湯下日三服

又調經門無極丸

小兒渴疾

桑葉不拘多少逐片染生蜜綿繫蒂上繃陰乾細切煎汁日飲代茶

小兒躁渴

粉霜一字大兒半錢蓮花湯調下冬月用蓮肉

小兒盜汗

麻黃根三分故蒲扇灰一分為末以乳服三分日三服仍以乾薑三分同為末三分

撲之龍胆草碾末每服一錢猪胆汁三兩點入

溫酒少許調服身熱者龍胆草防風各等分為

末每服一錢米飲調下

亦可丸服及水煎服

小兒出汗

香瓜丸用黃連胡黃連黃檗川大黃煨熟鱉甲醋炙柴胡蘆薈青皮等分為末用大

高方負纂五小兒諸病十

黃瓜黃色者一個割下頭填藥至滿蓋定簽住慢火煨熟同搗爛入麩糊丸綠豆大每服二三九

者五七丸至十九食後新水下出汗有熱雷丸四兩粉半斤為末撲之自汗盜汗潮熱往來胡

黃連柴胡等分末蜜丸茨子大每用一二九水化開入酒少許重湯煮一二十沸溫服

小兒發黃

土瓜根生搗汁三合與服不過三次皮肉面目皆黃用生栝樓根搗取汁二合蜜

二大匙和勻暖服日一服根搗汁日滴鼻中取黃水取效

小兒黃疸

胡黃連川黃連各一兩為末用黃瓜一個去麩留蓋入藥在內合定麩裏煨熟云麩

搗丸菉豆大每量大小溫水下眼黃脾熱用青瓜萹焙碾每服一錢水半盞煎七分臥時服五更

瀉下黃物立可名逐黃散

小兒煩滿

欲死雞子殼燒末酒服方寸匕

小兒風痰

熱毒壅滯涼心壓驚抱龍丸用牛胆南星一兩入金錢薄荷葉十片丹砂一錢半龍

腦麝香各一字碾末煉蜜丸芡子大每服一九竹
葉湯化下 壅閉語音不出氣促喘悶手足動搖

訶子半生半炮去核大腹皮等分水煎服名二聖
散 小兒痰吐或風壅所致或欬嗽發熱飲食即

嘔半夏泡七次半兩丁香一錢以半夏末水和包
丁香用麪重包煨熟去麪為末生薑自然汁和丸

麻子大每服二三
十九陳皮湯下

小兒噦疾 鹿角粉大豆末等分相和乳調塗乳上飲
之 熱噦牛乳二合薑汁一合銀器文火

煎五六沸
量兒服之

小兒睍嗽 百日內欬嗽痰壅貝母五錢甘草半生半
炙二錢為末沙糖丸芡子大每米飲化下

一丸

小兒欬嗽 生薑四兩煎湯浴之 聲不出者紫苑末
杏仁等分入蜜同碾丸芡子大每服一丸

五味子湯化下 蜂房二兩洗淨燒碾每服一字
米飲下 寒嗽百部丸用百部炒麻黃去節各七

錢半為末杏仁去皮尖炒仍以水略煮三五沸碾
泥入熟蜜和丸皂子大每服二三九溫水下寒

嗽或作壅喘用松子仁五個百部炒麻黃各三分
杏仁四十個去皮尖以少水略煮三五沸化白沙

糖丸芡子大每食後含化十九丸大妙熱嗽甘草
二兩猪胆汁浸五宿炙碾末蜜丸綠豆大食後薄

荷湯下十九丸
名涼膈丸

小兒喘欬

發熱自汗吐紅脉虛無力者人參天花
粉等分每服半錢蜜水調下以瘥為度

小兒痰喘

巴豆一粒杵爛綿裹塞鼻男左女右痰即
自下痰喘欬嗽膈熱久不瘥瓜萸實一

枚去子為末以寒食麩和作餅子炙黃再碾末每
服一錢溫水化下日三服效乃止一兒病痰喘

五晝夜不乳食夜夢觀音授方令服人參胡桃湯
急取新羅人參寸許胡桃肉一枚煎湯一蜺殼許

灌之喘即定明日以湯剥去胡桃皮用之喘復作
仍連皮用信宿而瘳蓋人參定喘胡桃連皮能斂

肺故也痰齶多年海螵蛸末米飲服一錢涎
喘服藥不退者用無雄雞子一個取清入輕粉抄

十錢拌和銀器盛置湯瓶上蒸熟三歲兒盡食當吐痰或泄而愈氣實者乃可用

小兒哮喘

向南墻上年久螺螄為末日晡時以水調成日落時舉手合掌皈依吞之即效 鹽

哮喘麻稽五內燒存性出火毒碾末以淡豆腐蘸食之又大木鱉子三四個磨水飲以雪糕壓下即

吐出痰重者三服效又鼠屎燒碾水酒空心服之一歲一錢

小兒齁喘

活鯽魚七個以器盛令兒自便尿養之待紅煨熟食甚效一女年十歲用此永不發

小兒羸瘦

甘草三兩炙焦為末蜜丸綠豆大每溫水下五丸日二服

小兒癖疾

蒼朮四兩為末羊肝一具竹刀批開撒朮末線縛入砂鍋煮熟搗作丸服 小兒氣

癖三稜煮汁作羹粥與奶母食日亦以棗許與兒食小兒新生百日及十歲以下無問癩熱疰癖等

皆理之秘妙不可具言大效

小兒閃癖

取苦瓠末破者煮令熱解開熨之 頭髮藍黃癩瘰瘦弱者乾林檎脯碾末和醋傅

萬方類纂五 小兒諸病十二

之

小兒虛脹

場氣丸用胡椒一兩蠟尾半兩為末麩糊丸粟米大每服五七丸陳米飲下一加菜

蕪子半兩

小兒腫病

大小便不利黑牽牛白牽牛各二兩炒取頭末并華水和丸綠豆大每服二十九蘿

蔔子煎湯下服并洗之

虛腫頭面陰囊俱浮用使君子一兩

去殼蜜五錢炙盡為末每食後米湯服一錢

小兒痺積

用糞中蛆洗浸曬乾為末入甘草末少許米糊丸梧子大每服五七丸米飲下甚妙

小兒痞積

急性子水菘花子大黃各一兩俱生碾末每味取五錢外用皮硝一兩拌勻將白鵝

鴿一個或白鴨亦可去毛尿剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用線紮定沙鍋內入水三碗重重

紙封以小火煮乾將鴿鴨翻調焙黃色冷定早晨食之日西時疾軟三日大便下血病去矣忌冷物

百日 腹大肌瘦面黃漸成疳疾使君子仁三錢
木鱉子仁五錢為末水丸龍眼大每以一九用雞
子一個破頂入藥在內
飯上蒸熟空心食之

小兒癥病 麝肉二兩切焙蜀椒三百枚炒搗末以雞
子白和丸小豆大每服二三九湯下以知

為度 老鼠肉
煮汁作粥食之

小兒滯下 犂牛角胎燒灰水服方寸匕 赤白者
用鹿角灰髮灰等分水服三錢日二

小兒不語 四五歲不語者赤小豆末酒和敷舌下
小兒語遲伯勞踏枝鞭之即速語

小兒狂語 夜後便發竹
瀝夜服二合

小兒狂躁 畜熱在下身熱狂躁昏迷不食梔子仁七
枚豆豉五錢水一盞煎七分服之或吐或

不吐
立效

小兒中風 手足拘急真珠末水飛一兩石膏末一錢
每服一錢水七分煎四分溫服日三 汗

萬方類纂五 小兒諸病十三

出中風一日頭項腰熱二日手足不屈用慎火草
乾者半兩麻黃丹參白朮二錢半為末每服半錢

漿水調服三
四歲服一錢

襁褓中風 取驢背前交脊中毛一拇指大入麝香豆
許以乳汁和銅器中慢炒為末乳汁和灌

之

小兒中蠱 欲死者甘草半兩水二盞煎五分服當
吐出 下血欲死搗青藍汁頻服之

小兒天行 壯熱頭痛木香六分白檀香三分為末
清水和服仍溫水調塗顛頂上取瘥

小兒行遲 三歲不能行者用此便走五加皮五錢牛
膝木瓜二錢半為末每服五分米飲入酒

二三點
調服

小兒髮遲 陳香薷二兩水一盞煎汁三分入猪脂半
兩和勻日日塗之 兒髮不生楸葉中心

搗汁
頻塗

小兒顛腫 生下即腫者黃檗末水調貼足心

小兒顛陷 乃冷也水調半夏末塗足心 綿烏頭附子並生去皮臍二錢雄黃八分為末葱根

搗和作餅貼陷處 因臟腑壅熱氣血不榮用烏雞骨一兩酥炙黃生地黃焙二兩為末每服半錢

引飲 調下

小兒解顛 顛開不合鼻塞不通天南星炮去皮為末淡醋調緋帛上貼顛門炙手頻熨之效

防風白及柏子仁等分為末以乳汁調塗一日一換 黃狗頭骨炙為末雞子白和塗之 驢頭骨

燒灰和油塗之懸蹄亦可以瘥為度 猪牙車骨煎取髓傳三日 丹雄雞冠上血滴之以赤芍藥

末粉之甚良 蛇蛻熬末以猪頰車髓和塗之日三四易 蟹螯同白及末搗塗以合為度

小兒目瞤 或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點日三五次不痛不礙屢用有效 嫩楸

葉三兩爛搗紙包泥裏燒乾去泥入水少許絞汁銅器慢熬如稀餈蓋合收之每日點之 麩醫未

萬方頭纂五 小兒諸病十四疴

堅不可亂藥宜以珊瑚碾
如粉日少少點之三日愈

小兒目痛

車前草汁和
竹瀝點之

嬰兒目濇

不開或出血蒼朮二錢入猪胆中扎煮將
藥氣熏眼後更嚼取汁與服妙
月內目

閉不開或腫羞明或出血者名慢肝風用甘草一
截以猪胆汁炙為末每用米泔調少許灌之
上

有初生目
閉一條

小兒雀目

仙靈脾根晚蠶蛾各半兩炙甘草射干各
二錢半為末用羊子肝一枚切開摻藥二

錢紮定以黑豆一合米泔一盞煮熟分二次食以
汁送之
至晚忽不見物用羯羊肺一具不用水

洗竹刀剖開入穀精草一撮五罐煮熟日食之屢
效忌鐵器如不肯食炙熟搗作丸綠豆大每服三

十丸茶下
牽牛子末每以一錢用羊肝一片同
麪作角子二個炙熟食米飲下
夜明砂炒碾猪

胆汁和丸綠豆大每米飲下五九一方加黃
芩等分為末米泔煮猪肝取汁調服半錢

小兒赤眼

水調黃連末貼足心甚妙
淡竹瀝點之
或入人乳
羊肝切薄片并水浸貼
茶

調胡黃連末塗手足心即愈
在蓐內者人乳浸
黃檗汁點之
胎赤眼杏仁壓油半雞子殼食鹽

一錢入石器中以柳枝一握緊束碾至色黑以熟
艾一團安碗內燒烘之令氣透火盡即成每點少

許入兩背甚效
玉筋煎治小兒胎赤眼風赤眼
用小兒吐出虻蟲二條磁盒盛之紙封埋濕地五

日取出化為水磁瓶收每日以銅筋點之
胎赤
眼痛鹽綠一分蜜半兩于蚌蛤內相和每夜臥時

漿水洗目炙熱點之能斷根
眼目門有胎赤眼二條

小兒通睛

小兒誤跌或打着頭腦受驚肝系受風致
瞳人不正觀東則見西觀西則見東宜石

南散吹鼻通頂石南一兩藜蘆三分瓜丁五七個
為末每次少許入鼻一日三度內服牛黃平肝藥

小兒鼻塞

頭熱用薰草一兩羊髓三兩銚內慢火熬
成膏去滓日摩背上三四次
鼻塞不通

不能食乳用醞糊二合木香零陵香
各四分湯煎成膏塗顙上并塞鼻中

小兒鼻乾無涕

腦熱也。用黃米粉生礬末各一兩，每以一錢水調貼額上，日二次。

小兒鼻齩

鼻下兩道赤色，有瘡以米泔洗淨，用黃連末傅之，日三四次。

小兒失音不語

取蝦蟇膽汁，點舌上立愈。

小兒齒遲

正旦取屎坑中竹木刮塗之，即生。兒齒不生，雌鼠屎兩頭圓者三七枚，一日一枚。

拭其齒勿食鹹酸，或入麝香少許尤妙。

小兒流涕

是風寒也。白芷末葱白搗丸，小豆大，每茶下二十九丸，仍以白芷末薑汁調塗太陽穴。

乃食熱葱粥取汗。

小兒流涎

脾熱也。胸膈有痰，新桑根白皮搗自然汁塗之，甚效。乾者煎水，又皂莢子仁半兩半。

夏薑湯泡七次，一錢二分為末，薑汁九麻子大，每溫水下五丸。又鹿角屑末米飲服一字。白羊屎

頻納口中，取東行牛口中涎沫塗口中。及頤上自愈。用牛噍草絞汁少少與服。

小兒項軟

乃肝腎虛風邪襲入用附子去皮臍天南星各二錢為末薑汁調攤貼天柱骨內服

瀉青丸

蛇含石一塊煨七次醋淬七次碾鬱金等分為末入麝香少許白米飯丸龍眼大每服一

丸薄荷湯化

服一日一服

天柱骨倒

小兒疳疾及諸病後天柱骨倒乃體虛所致宜生筋散貼之木鱉子六個去殼蓖麻

子六十粒去殼碾勻先包頭擦頂上令熱以津調

藥貼之

小兒久疳體虛不食諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五軟者用白僵蠶直者炒碾每服半錢薄荷酒下名金靈散

小兒龜背

以龜尿摩其胸背久久即瘥 龜尿調紅內消點背上骨節久久自安

小兒心痛

白烏骨雞屎五錢晒碾松脂五錢為末葱頭汁和丸梧子大黃丹為衣每醋湯服五

丸忌生冷硬物

三四日立效

小兒肚痛

曲脚而啼安息香丸用安息香酒蒸成膏沉香木香丁香藿香八角茴香各三錢香

附子縮砂仁炙甘草各五錢為末以膏和
煉蜜丸芡子大每服一丸紫蘇湯化下

小兒腹脹

韭根搗汁和猪助煎服一合間日一服即
愈 胡粉鹽熬色變以摩腹上 黃瘦用

乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸小豆大每米
湯下十九日三服 父母指爪甲燒傅乳上飲之

水氣流腫膀胱實熱小便赤濇牽牛生碾
一錢青皮湯空心下一加木香減半丸服

腹皮青色

不速治須臾死胡粉鹽熬色變以摩腹上
小兒卒然肚皮青黑乃血氣失養風寒

乘之危惡之候也大青
為末納口中以酒送下

小兒氣痛

蓬莪茂炮熟為末
熱酒服一大錢

小兒盤腸氣痛

用蘿蔔子炒黃碾末乳香湯服半錢
延胡索茴香等分炒碾空心米飲

量兒大小與服 沒藥乳香等分為末以木香磨
水煎沸調一錢服立效 內鈞痛以莪茂半兩用

阿魏一錢化水浸一日夜焙碾每服一字紫蘇湯
下 越桃仁半兩草烏頭少許同炒過去草烏入

白芷一錢為末每服半錢苗香葱白酒下
腹痛不止用阿魏為末大蒜半瓣炮熟碾爛和丸
麻子大每艾湯服五丸又用葱湯洗兒腹仍以炒
葱搗貼臍上良久尿出痛止
驚癇門有小兒內

條鈞

小兒疝氣

并內鈞腎氣以葛袋盛鹽於戶口懸之父
母用手撚料盡即愈
寒疝腹痛大汗出

用梨葉濃煎七合分作數服飲之大良
冷疝氣痛膚囊浮腫金鈴子去核五錢吳茱萸二錢半為末酒糊丸黍米大每鹽湯下二三十丸

小兒虻病

羸瘦猪膏服之
棟木皮削去蒼皮水煮汁量大小飲之一方用為末米飲服二錢

一方用根皮同雞卵煮熟空心食之次日蟲下
苦棟皮二兩白蕪荑半兩為末每以一二錢水煎服之
棟根白皮去粗二斤切水一斗煮取汁三升沙鍋成膏五更初溫酒服一匙以蟲下為度

虻痛五靈脂末二錢靈礬火飛半錢每服一錢水一盞煎五分溫服當吐蟲出愈
蛔痛口流涎沫

使君子仁為末米飲五更調服一錢 小兒疳虻

鷓鴣屎乾碾為末炙猪肉蘸食云有奇效 虻咬

心痛面青口中沫出臨死者取扁竹十斤剉以水

一石煎至一斗去渣煎如錫隔宿勿食空心服一

升蟲即下也仍常煮汁作飯食 海上歌云心頭

急痛不能當我有仙人海上方 篇蓄醋煎通口噤

管教時刻便安康 虻蟲噉心腹痛單用鶴蝮碾

末以肥猪肉汁下之五歲一服二分蟲出即止也

小兒蟲病

胃寒危惡證與癩相似者乾漆搗燒烟盡
白蕪荑等分為末米飲服一字至一錢

小兒閉結

猪苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服
襁褓小兒大小便不通并驚熱痰實欲

得滯動者大黃酒浸炒郁李仁去皮碾各一錢滑

石末一兩搗和丸黍米大二歲小兒三九量人加

減白湯下 虛秘葱白三根煎湯調生蜜阿膠末

服仍以葱頭染蜜挿入肛門少頃即通 秘澀枳

殼煨去穰甘草各

一錢以水煎服

小兒脫肛

螺螄二三升鋪在桶內坐之少頃即愈
五倍子為末先以艾絨捲倍子末成筒放

便桶內以五盛之令病者坐於桶上以火點着使藥烟燻入肛門其肛自上隨後將白礬為末復搽肛門其肛自緊再不復脫魚腥草搗如泥先以樸硝水洗過用芭蕉葉托住藥坐之自入也荆芥皂角等分煎湯洗之以鐵漿塗上亦治子宮脫出縮砂去皮為末以猪腰子一片批開搽末在內縛定煮熟與兒食次服白礬丸如氣逆腫喘者不治唇白齒焦久則兩頰光眉赤唇焦啼哭黃瓜蔓一個入白礬五錢在內固濟煨存性為末糊丸梧子大每米飲下二十九

小兒下血

車缸燒赤淬水服 飀帶灰塗乳上飲之 腸風臟毒五倍子末煉蜜丸小豆大每

米飲服二十九 或血痢黃檗半兩赤芍藥四錢為末飯丸麻子大每服一二十九食前米飲下

小兒初生七八日大小便血出乃熱傳心肺不可服涼藥只以生地黄汁五七匙酒半匙蜜半匙和

服之

小兒五疳

不以年月枳實為末煉蜜丸梧子大空心飲下二十九 奶疳蒲黃空心溫酒服方

寸七
日三

小兒遺尿

小豆葉搗汁服之
犬甘草頭煎湯夜夜服之
桂末雄雞肝等分搗丸小豆大温

水調下日二服
膀胱冷也夜屬陰故小便不禁
破故紙炒為末每夜熱湯服五分
少小便床蓄

薇根五錢
煎酒夜飲

小兒尿血

甘草一兩二錢水六合煎二合一歲兒一日服盡
蜀升麻五分水五合煎一合服

之一歲兒
一日一服

小兒淋疾

榭葉三片煎湯服一雞子殼小便即時下
沙淋黑豆一百二十個生甘草一寸

新水煮熟入滑石末乘熱飲之良
血淋雞矢尖
白如粉者炒碾糊丸菘豆大每服三五丸酒下四

五服效
石淋特牛陰頭毛燒灰漿水服一刀圭
日再氣淋宋寧宗為郡王時病淋日夜凡三百

起國醫周措或舉孫琳治之用大蒜淡豆豉蒸餅
三物搗丸令以温水下三十九日今日進二服病

當減三分之一明日亦然三日病除已而果然或問其說琳曰小兒何緣有淋只是水道不利三物皆能通利故也

小兒腎縮

一兒生七日而兩腎縮入醫云此受寒氣

塗其腹仍以蛇床子
燒烟熏其下部而愈

小兒陰潰

腫大不消礪砂一分水碾塗之大
有效用蜥蜴一枚燒灰酒服

小兒陰腫

狐陰莖炙為末空心酒服猪屎五升煮
熱袋盛安腫上地龍連土為末津調傅

之熱者以葱椒湯煖處洗之唾調地黃末傅之外腎
熱者雞子清調或加牡蠣少許陰囊忽虛熱腫

痛以蚯蚓泥生甘草汁入輕粉末調塗之多因
坐地風襲及蟲蟻所吹用蟬蛻半兩煎水洗仍服

五苓散即腫消痛止陰被蚯蚓呵腫令婦人以
吹火筒吹其腫處即消小兒陽明經風熱濕氣

相搏陰莖無故腫或痛縮宜寬此一經自愈廣木
香枳殼麩炒二錢半炙甘草二錢水煎服陰腫

萬方類纂五小兒諸病十九七

赤痛日夜啼叫數日退皮愈而復作用老杉木燒
灰入膩粉清油調傳效 囊腫天花粉一兩炙甘

草一錢半水煎入酒服 卵
腫地龍糞以薄荷汁和塗之

小兒差癩 陰核大小也用杜父魚劈開口咬之七日
即消 小兒卵癩用桃仁炒香為末酒服

方寸匕日二
仍搗傅之

小兒尸疰 勞瘦或時寒熱用鱉頭一枚
燒灰新汲水服半錢日一服

痰熱百病 俗中嫗母為小兒作雞子煎用其父梳頭
亂髮雜雞子黃熬良久得汁與兒服去痰

熱療
百病

小兒中暑 吐泄煩渴穀精草燒存性用器覆
之放冷為末每冷米飲服半錢

小兒暑風 暑毒入心痰塞心孔昏迷搗搗此乃危急
之症非此丸生料瞑眩之劑不能伐之三

生丸用白附子天南星半夏並去皮等分生碾
膽汁和丸黍米大量兒大小以薄荷湯下令兒側

臥嘔出痰
水即甦

小兒破傷風病

拘急口噤沒心草半兩白附子炮三錢半為末每服一字薄荷酒灌下

小兒中水

單以麝香如大豆三枚奶汁調分三四服

小兒吐血

蛇蛻灰乳汁調服半錢

小兒卒死

無故者取葱白納入下部及兩鼻孔中氣通或嚏即活

兒嗜燈花

明宗室一孫嗜燈花但聞其氣即哭索不已診之癖也以殺蟲治癖之藥丸服一料

而愈

小兒繼病

母有娠乳兒病如瘡痂他日相繼腹大或瘡或發他人有娠相近亦能相繼也取

伯勞毛帶之名謂兒羸瘦如

繼病亦作魅病魅乃小鬼之魅鬼也上有小兒魅病條

令兒無疾

雀甕打破取汁與小兒飲令無疾

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

小兒諸瘡

小兒毒瘡

葵根燒末敷之
碾末傅之即瘥

五月五日蟾蜍炙
嚼澤蘭心封之良

脾熱唇瘡

烏蛇皮燒灰
酥和傅之

胎瘡滿頭

用水邊烏柏樹根晒碾
入雄黃少許生油調搽

小兒面上奶疽

用楓香為膏
攤貼之

小兒諸瘡

惡瘡禿瘡蠅蝮瘡浸淫瘡並宜棟
樹皮或枝燒灰傅之乾者猪脂調

小兒惡瘡

皂莢水洗拭乾以少麻油搗爛塗之
瘡滿身面如火燒以黃梁米碾粉和蜜水生

調之以
瘥為度

小兒爛瘡

艾葉燒灰傅之良
初起腫漿似火瘡桃
仁碾爛傅之牛屎燒灰封之滅疤痕

小兒疔瘡

猪牙車骨年久者槌碎
炙令髓出熱取塗之

萬方頂纂五

小兒諸瘡一

三

小兒風瘡

久不愈者菰蔣節燒碾傳之

小兒甜瘡

生於面耳令母頻嚼白米臥時塗之不過三五次即愈 大棗去核填入綠礬燒存

性礪貼之

愈者蛇床子一兩輕粉二錢為細末油調搽之

小兒癩瘡

一名火灼瘡一名火爛瘡菜萸煎酒拭之良

小兒熱瘡

雞子五枚煮熟去白取黃亂髮如雞子大相和於鐵銚中炭火熬之初甚乾少頃即

髮焦乃有液出旋取置枕中以液盡為度取塗瘡上即苦參末粉之神妙

身面皆有如火燒者

赤地利末粉之

小兒燥瘡

一名爛瘡燒鐵淬水中二七遍浴之二三起作漿

小兒膿瘡

遍身不乾用黃檗末入枯礬少許搽之即愈

小兒蟲瘡

榆皮末和猪脂塗綿上覆之蟲出立瘥用舊絹作衣化柏油塗之與兒穿着次日

蟲皆出油上取下熅之有聲是也別以油衣與穿以蟲盡為度

小兒骨瘡 海上方詩云小兒骨痛不堪言出血流膿實可憐尋取水蛇皮一個燒灰油抹傳疼

邊

小兒陰瘡 貓頭骨燒灰傳之即愈 人尿 狼牙草濃煮汁洗之

小兒頭瘡 杏仁燒碾傳之 烏梅燒末生油調塗 樹上乾桃燒碾入膩粉麻油調搽 糯米

飯燒灰入輕粉清油調敷 黑豆炒存性碾水調敷之 以黃泥裹鼓煨熟取碾以葶菜油調敷之

蓼子為末蜜和雞子白同塗之蟲出不作痕 鏡面草日乾為末和輕粉麻油敷之立效 兔絲

苗煮湯頻洗之 絳礬一兩淡豉一兩炒黑膩粉 二錢碾勻以桑灰湯洗淨搽之良 葱汁調膩粉

塗之 雞子黃炒出油入麻油及膩粉末傳之 水磨檳榔晒取粉和生油塗之 吳茱萸炒焦為

末入水粉少許猪脂醋調塗之 枳實燒灰猪脂 調塗 用皮鞋底洗淨煮爛洗訖傳之 又方舊

萬方領纂五 小兒諸瘡二

皮鞋面燒灰入輕粉少許生油調傳 草鞋鼻子

燒灰香油調傳之 蠶蛻紙燒存性入輕粉少許

麻油調敷 龜甲燒灰傳之 蛇蛻燒灰臘猪脂

和傅之 田螺殼燒存性清油調摻之 猪骭骨

中髓和膩粉成劑火中煨香碾末先温鹽水洗淨

敷之亦治肥瘡出汁 猪腰子一個批開去心膜

入五倍子輕粉末等分在內以沙糖和麩固濟炭

火炙焦為末清油調塗 野外久乾牛屎不壞者

燒灰入輕粉麻油調搽 羊糞煎湯洗淨仍以羊

糞燒灰同屋上懸煤清油調塗 久不愈者胡桃

仁皮燈上燒存性益蓋出火毒入輕粉少許生油

調塗一二次愈 浸淫成片者梁上塵和油瓶下

滓以皂莢湯洗後塗之 因傷濕入水成毒膿汁

不止用紅麴嚼罨之甚效 浸濕者名胎風瘡古

松上自有赤厚皮入豆豉少許瓦上炒存性碾末

入輕粉香油調塗之 粘肥者用皂角燒黑為末

去痂傅之不過三次即愈 因傷湯水成膿出水

不止用肥皂燒存性入膩粉麻油調搽 晝開出

膿夜即復合用鯽魚長四寸一枚去腸入附子一
枚去皮碾末填入炙焦碾傅搗蒜封之效 麻子

五升碾細水絞
汁和蜜傳之

小兒禿瘡

白頭翁根搗傳一宿作瘡半月愈
黃蜀葵花大黃黃

芩等分為末米泔淨洗香油調搽
冷泔洗淨以

羊角葱搗泥入蜜和塗之神效
松香五錢猪油

一兩熬搽一日數次數日即愈
瀝青二兩黃蠟

一兩半銅綠一錢半麻油一兩半文武熬收每攤

貼之神效韶腦一錢花椒二錢脂麻二兩為末
醋和榆

以退猪湯洗後搽之楸葉搗汁塗之
醋和榆

白皮末塗之蟲當出大蜈蚣一條鹽一分入油

內浸七日取油搽之極效
鯽魚燒灰醬汁和塗

一用鯽魚去腸入皂礬燒碾搽一用大鯽去腸入
亂髮填滿燒碾入雄黃末二錢先以壺水洗拭生

油調搽

小兒白禿

瓠藤同裹鹽荷葉煎濃汁洗三五次愈
桃

皮五兩煎汁入白麩沐之并服
虎骨末油調塗

之鼠屎瓦煨存性同輕粉麻油塗之
大豆鬻

髑骨各燒灰等分以臘猪脂和塗 牛屎厚封之
猪蹄甲七個每個入白礬一塊棗兒一個燒存

性礬末入輕粉麻油調搽不過五上愈 黑椹入
罌中曝三七日化為水洗之三七日神效 皂角

燒黑為末去痂傳之不過三次即愈 雞窠草和
白頭翁花燒灰臘月猪脂和傳之以醋泔洗淨

紫草煎汁塗之 頭上團團白色以蒜切日搽之
又大蒜亦可 白秃搽痛陳香薷二兩水一盞煎

汁三分入胡粉和塗之須入猪脂半兩 白
秃無髮麻子炒焦碾末猪脂和塗髮生為度

小兒臘梨 頭瘡用葱竹內蛀
蟲搗和牛溺塗之

小兒赤秃 桑椹取汁頻服 以赤馬皮白
馬蹄燒灰和臘猪脂敷之良

小兒頭秃 蕪菁葉燒灰和脂傳之 蔓
菁子末和酢傳之一日三上

小兒眉瘡 小麥麩炒黑碾末酒調傳之 猪頸骨髓
六七枚白膠香二錢同入銅器熬稠待冷

為末麻油調塗 黑驢屎燒碾油調塗 小兒
面湮瘡又名鍊銀瘡見疹癩門眉中練癩條下

小兒面瘡

蛇蛻燒灰臘猪脂和傅之
痛地榆入兩水一斗煎五升温洗之
焮赤腫

小兒月蝕

生於耳後黃連末傅之
榆二錢為末先以鹽湯洗過傅之
薔薇根四兩地
蛇蛻

燒灰臘猪脂和傅之

小兒耳瘡

屠几上垢傅之

耳瘡月蝕

胡粉和土塗之
五日蝦蟇燒末猪膏和傅
龜甲燒灰傅之
五月

灰油和傅之

小兒耳爛

輕粉棗子灰等分碾油調敷

小兒燕窩生瘡

鼠屎碾末香油調搽
又諸瘡門

小兒疇耳

桃仁炒碾綿裹日日塞之
黃末和蠟作挺插之日二易
硫

小兒唇腫

桑木汁塗之即愈

萬方頁纂五 小兒諸瘡四

云

小兒口瘡

羊脂煎薏苡根塗之
羊乳細濾入含之
數次愈
用晚蠶蛾為末貼之妙并治風

疳瘡

及百日內口瘡晚蠶蛾為末入麝香少許
五月五日蝦蟇炙碾末傅之即瘥
勃齊

燒存性

碾末摻之
大栗煮熟日日與食之甚效

寒食麪

五錢硝石七錢水調半錢塗足心男左

女右

大青十八銖黃連十二銖水三升煮一升

服一日

二服以瘥為度
赤葵莖炙乾為末蜜和

含之

黃葵花燒末傅之
細辛末醋調貼臍上

湯瓶

內鹼為末以醋調書十字兩足心驗臥時

書之

釜底墨時時搽之
鐵鏽末水調敷之

沒石子

三分炮甘草一分碾末摻之
月內小兒生

者少許

置乳上吮之入口即啼不過三次
糜爛

者黃丹

一錢生蜜一兩相和蒸黑每以雞毛蘸搽

甚效

又生疏黃水調塗手心足心效即洗去
不

能食乳

剛子一枚連油碾入黃丹少許剃去
顛上

髮貼之

四邊起粟抱便用溫水洗去
乃以菖蒲湯

再洗即

不成瘡神效
通白者白僵蠶炒黃拭去

黃肉毛

碾末蜜和傅之立效
白屑如鷺口不須

服藥以

生天南星去皮臍碾末醋調塗足心男左

女右 赤白口瘡 蟬螬碾汁 頻搽取效
不能吮乳 密陀僧醋調塗 足心瘡 愈洗去

小兒吻瘡

竹瀝和黃連黃檗黃丹傳之 木履尾燻
火中煨熱取拄兩吻各二七遍 髮灰和

猪脂塗之 末敷之

經年欲腐 葵根燒碾傳之 胡粉炒一分黃連半兩為

小兒燕口

兩角生瘡 髮灰三錢 飲汁服 木履尾燻火中

煨熱取拄兩吻各二七遍 箸頭燒灰傳之

小兒鷺口

雞肫黃皮為末 乳服半錢 自內生出可
治自外生入不可 治用食草白鷺下清糞

濾汁入沙糖少許 搽之 或用雄鷺糞 眠倒者 燒灰
入麝香少許 搽之 並效 桑皮汁和胡粉塗之

柘根五兩 剉水五升 煮二升 去渣 煎取五合 頻塗
之 無根弓材亦可 甌帶燒灰 傳舌下 桂末和

薑汁塗之 赤小豆末 醋和塗之 不乳用黍米
嚼汁塗之 白厚如紙 用坯子燕脂以乳汁調塗

之一宿效 男用女乳 女用男乳 白及末 乳汁調
塗足心 滿口白爛 貝母去心為末 半錢水五分

蜜少許煎三沸撇淨抹之日四五度又枯礬一錢
朱砂二分爲末每以少許傳之日三次神驗 馬

牙硝擦舌上日五度 竹瀝同焰硝
點之地雞卽鼠婦碾水塗之卽愈

小兒重舌

鹿角末塗舌下日三 取三家屠肉切指
大摩舌上兒立啼 蛇蛻灰醋調傳之

蜚蠊燒末唾和傳舌上 衣魚燒灰傳舌上 桑
根白皮煮汁塗乳上飲之 柘根五斤剉水五升

煮二升去渣煎取五合頻塗之無根弓材亦可
甌帶燒灰傳舌下 桂末和薑汁塗之 木蘭皮

一尺廣四寸削去粗皮入醋一升漬汁噙之 黃
築浸苦竹瀝時時點之 皂角刺灰入朴硝或腦

子少許漱口摻入舌下涎出自消 嚼粟米哺之
赤小豆末醋和塗之 白及末乳汁調塗足心

馬牙硝塗於舌上下日三 黃丹一豆大安舌下
釜下土和苦酒塗之 竹瀝同焰硝點之

欲死者以亂髮灰半錢調敷舌下不住用之 重
舌涎出水漿不入元精石二兩牛黃硃砂龍腦一

分爲末以鐵針舌上去血
鹽湯漱口摻末嚥津神效

小兒木舌

黃蜀葵花為末一錢黃丹五分傅之
蛇燒灰乳和服少許重舌腫木伏龍肝

末牛蒡汁調塗之
木舌脹大滿口鯉魚肉切片貼之以帛繫定重舌木舌脹大塞口半夏煎醋

含漱之又半夏二十枚水煮過再泡片時乘熱以酒一升浸之密封良久熱漱冷吐之海螵蛸同

雞子黃塗之

小兒舌瘡

飲乳不得白礬和雞子置醋中塗兒足底二七日愈胡粉和猪鬃骨中髓日三傅

之

小兒舌腫

鮮鯽魚切片貼之頻換

小兒重齶

用蛇蛻灰醋調傅之

小兒咽腫

杏仁炒黑碾爛含嚥
痺痛者用鯉魚胆二十枚和竈底土

以塗咽外立效

小兒喉痺 棘針燒灰水服半錢 腫痛
者蛇蛻燒末以乳汁服一錢

小兒楊梅瘡 起於口內延及遍身以土草
麟末乳汁調服月餘自愈

小兒熱癩 井底泥敷其四圍 釜下
土生椒末等分醋和塗之

小兒軟癩 墻上白螺螄殼燒灰入倒掛塵等分油調
塗之 桑螵蛸燒存性碾末油調敷之

大枳殼一個去白磨口平以麩糊抹邊合瘡上自
出膿血盡更無痕也 油麻炒焦乘熱嚼爛敷之

小兒瘰癧 脂麻連翹等分為末頻頻食之 榭樹皮
去粗皮切煎湯頻洗之 榆白皮生搗如

泥封之
頻易

小兒濕瘡 地榆煮濃汁日洗二次 浸淫瘡痛不可
忍發寒熱者刺薊葉新水調傅瘡上乾即

易之 天泡濕瘡百合花
暴乾碾末菜子油塗良

小兒癬瘡 蟾蜍燒灰猪脂和傅 蛇床子杵末
和猪脂塗之 猪脂和輕粉抹之

胎癬小兒頭生瘡手肥處即延生謂之胎癬先以葱鹽湯洗淨用桑木蛀屑燒存性入輕粉等分油

和敷之

眉癬小兒眉毛眼睫因癬退不生用旋覆花天麻苗防風等分爲末洗淨以油調塗之

小兒疥癬白膠香黃檗輕粉等分爲末羊骨髓和傅之藁本煎湯浴之并以浣衣

小兒風疹在皮膚不出及瘡毒取慎火草苗葉五大兩和鹽三大兩同碾絞汁以熱手摩塗日

再上之風疹作痒白礬燒投熱酒中馬尾搵酒塗之

小兒疣目雞肫黃皮擦之自落以針決其四邊取患瘡膿汁傅之忌水三日即潰落也

小兒赤疵生身上者馬尿頻洗之針父脚中取血貼之即落

預免瘡癩凡小兒每年六月六日照年歲吞皂莢子可免瘡癩之患大人亦可吞七枚或二十

一枚

小兒鱗體 皮膚如蛇皮鱗甲之狀由氣血不澀亦曰胎垢又曰蛇體白殭蠶去嘴為末煎湯浴

之一如 蛇蛻

小兒丹毒 寒水石末一兩和水塗之即石膏也 向陽燕窩土為末雞子白和傅 多年竈下

黃土末和屋漏水傅之新汲水亦可雞子白或油亦可乾即易 唾和胡粉從外至內傅之良 燒

鐵淬水飲一合 煨鐵屎碾末猪脂和傅之 生麻油塗之 濃煮大豆汁塗之甚良 水煮棘根

汁洗之 從髀起流下陰頭赤腫出血用鯽魚肉切五合赤小豆末二合搗勻入水和傅之 從兩

股走及身頭用李根燒為末以田中流水和塗之 作瘡出水鼓炒烟盡為末油調傅之 皮膚熱

赤寒水石半兩白土一分為末米醋調塗之 丹腫綠豆五錢大黃二錢為末用生薄荷汁入蜜調

塗 丹從臍起檳榔末油調敷之 丹煩柳葉一斤水一斗煮取汁三升搗洗赤處日七八度

小兒赤丹 用土番黃梁米粉和雞子白塗之 嚼粟米傅之 屋塵和臘猪脂傅之 胡荽汁

塗之

小兒火丹

猪肉切片貼之 桑根白皮煮汁浴之或為末羊膏和塗之 熱如火遶臍即損人

馬莧搗塗

丹毒浸淫走串皮中名火丹以蟻螬搗爛塗之 火瘡丹腫瘡毒鯉魚血塗之立瘥

小兒熱丹

藍澱傅之 白石一分寒水石半兩為末新水調塗

小兒丹瘤

遊走入腹必死初發急以截風散截之白芷寒水石為末生葱汁調塗 木鼈子仁

碾如泥醋調敷之一日三五上效 蓖麻子五個去皮碾末麩一匙水調塗之甚效

小兒赤遊

上下遊行至心即死蒴藿煎汁洗之又菘菜搗傅之即止 赤白遊腫鮮蝦搗碎傅

之

小兒醋瘡

取產死婦人塚上草勿回顧作湯浴之不過三度瘥

驚癩

小兒胎驚

蝨一枚薄荷葉包炙為末入硃砂麝香少許麥門冬煎湯調下一字效 琥珀防風

各一錢硃砂半錢為末猪乳調一字入口中最妙

月內胎驚猪乳同牛乳硃砂少許抹口中甚妙

月內驚風欲死硃砂

磨新汲水塗五心最驗

百日發驚

蚱蟬去翅足炙三分赤芍藥二分黃芩三分水二盞煎一盞溫服

小兒胎癩

琥珀硃砂各少許全蠍一枚為末麥門冬湯調一字服

小兒軀啼

驚癩腹滿大便青白色用柏子仁末溫水調服一錢 小兒五十日以來胎寒腹痛

軀啼弄舌微熱而驚此癩候也猪腎一具當歸一

兩焙以清酒一升煮七合每以杏仁大與熯之日

三夜一 面青腹強是忤客氣新馬糞一團絞汁

灌之 胎寒軀啼發癩白礬煨半日棗肉丸黍米

大每乳下一丸愈乃止最良 胎寒好啼晝夜不

止因此成癩當歸末一小豆大以乳汁灌之日夜

三四度

小兒胎風

手足搐搦用蚤休即草紫河車為末每服半錢冷水下

小兒驚風

仰向後者燈火焯其顛門兩眉際之上下眼翻不下者焯其臍之上下不省人事者

焯其手足心撮心之上下手拳不開口往上下者焯其頂心兩手心撮口出白沫者焯其上下手足心

白殭蠶蠟稍等分天雄尖附子尖各一錢微炮為末每服一字或半錢以薑湯調灌之甚效用蠟

一個頭尾全者以薄荷四葉裹定火上炙焦同碾為末分四服白湯下用大蒜七個去皮先燒紅

地以蒜逐個於地上磨成膏子却以殭蠶一兩去頭足安蒜上碗覆一夜勿令透氣只取蠶碾末每

用嗜鼻口中含水甚效墜涎散用天南星一兩重一個換酒浸七伏時取出安新瓦上週迴炭火

炙裂合濕地出火毒為末入硃砂一分每服半錢荆芥湯調下每日空心一服午時一服生半夏

一錢皂角半錢為末吹少許入鼻名嚏驚散即甦大叫一聲就死者名老鴉驚以散麻纏住脇下

及手心足心以燈火爆之用老鴉蒜曬乾車前子
等分爲末水調貼手心仍以燈心焯手足心及肩
膊眉心鼻
心卽醒也

急慢驚風

五月五日取蚯蚓竹刀截作兩段急跳者
作一處慢跳者作一處各碾爛入硃砂末

和作丸記明急驚用急跳者慢驚用慢跳者每服
五七九薄荷湯下不拘急慢用蠅蜋一枚杵爛

以水一小盞於百沸湯中盪熱去渣飲之乳香

半兩甘遂半兩同碾末每服半錢用乳香湯下小

便亦可吊眼撮口搐搦不定代赭石火燒醋淬

十次細碾水飛日乾每服一錢或半錢煎真金湯

調下連進三服兒脚脛上有赤斑卽是驚氣已出

病當安也無斑點者不可治奪命散治急慢驚

風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此墜下風痰乃治

驚利痰之聖藥也真礞石一兩焰硝一兩同煨過

爲末每服半錢或一錢急驚痰熱者薄荷自然汁

入生蜜調下慢驚脾虛者木香湯入熟蜜調下亦

或雪糕丸綠豆大每服二三丸口眼喎斜搐搦
痰盛用天漿子房去皮生用三枚乾蠍生用七枚

萬方頁纂五 驚癇二

硃砂一錢碾勻飯九粟大每服二九荆芥湯送下
不驚九治小兒因驚氣吐逆作搐痰涎壅塞手
足掣癡眼睛斜視枳殼去穰麩炒淡豆豉等分爲
末每服一字若甚者半錢急驚薄荷自然汁下慢
驚荆芥湯入酒三五點下日三服用青蒿蠹蟲
搗和硃砂汞粉各五分九粟粒大一歲一丸乳汁
服保嬰集云治驚風十不失一其詩云一半硃砂
一半雪其功只在青蒿節任教死去也還魂服時
須用生人血卽上方也牙關緊急不省人事者
鶴蝨草卽杜牛膝根洗淨搗爛入好酒絞汁灌之
良久卽甦仍
以渣傅頂下

小兒急驚

遠年白田螺殼燒灰入麝香少許水調灌
之五福丸用生蚯蚓一條碾爛入五福

化毒丹一丸同碾以薄荷湯少許化下梁國材言

洋州某家專貨此藥一服千金梁傳其方親試屢

驗萬金散蜈蚣一條全者去足炙爲末丹砂輕

粉等分碾勻陰陽汁和丸菘豆大每歲一丸乳

汁下青礞石磨水服昏迷不省人事石綠四

兩輕粉一錢爲末薄荷汁入酒調一字服取吐

搗搗涎盛粉霜二錢白牽牛炒輕粉各一錢為末
每服一字薄荷湯下吐涎為效急驚搗搗丹砂
半兩天南星一個一兩重者炮裂酒浸大蠟三個
為末每服一字薄荷湯下 獼猴屎燒末和生蜜

少許
灌之

小兒慢驚

昏沉或搗烏藥磨水灌之 搗搗涎壅厥
逆川烏頭生去皮臍一兩全蠟十個去尾

分作三服水一盞薑七片煎服 曼陀羅花七朶
重一字天麻二錢半全蠟炒十枚天南星炮丹砂

乳香各二錢半為末每服半錢薄荷湯調下 天
漿子有蟲者白殭蠶乾蠟三物各三枚微炒搗末

煎麻黃湯調服一字日三服加減大有效也 返
魂丹治小兒慢驚及天吊夜啼用蝙蝠一枚去腸

翅炙黃焦人中白乾蠟焙麝香各一分為末煉蜜
丸綠豆大每服乳汁下三丸 慢驚癰癢定魄安

魂益氣用血竭半兩乳香二錢半同搗成劑火炙
溶丸梧子大每服一丸薄荷煎湯化下夏月用人

參湯 發搗帶有陽証者白甘遂末即蚤休一錢
括萸根末一錢同於慢火上炒焦黃碾勻每服一

字煎麝香薄荷湯調下 慢驚虛風用平正附子
 去皮臍生碾為末以白頸蚯蚓於末內滾之候定
 刮蚓上附末丸黃米大每服十九米飲下 心神
 悶亂煩懊筋脉拘急胃虛蟲動反折啼叫用乳香
 半錢胡粉二錢碾勻以白頸蚯蚓生捏去土搗爛
 和丸麻子大每服七丸至十五丸葱白煎湯下
 脾胃伏火勞役不足之證及服巴豆之類胃虛而
 成慢驚者用黃耆湯瀉火補金益土為神治之法
 用炙黃芪二錢人參一錢炙甘草五分
 白芍藥五分水一大盞煎半盞溫服

慢脾驚風

馬芹子丁香白殭蠶等分為末每服一錢
 炙橘皮煎湯下名醒脾散 白附子半兩

天南星半兩黑附子一錢並炮去皮為末每服二
 錢生薑五片水煎服亦治大人風虛止吐化痰甚
 效 小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風痰慢驚天
 南星一個重八九錢者去臍黃土坑深三寸炭火
 五斤煨赤入好酒半盞安南星在內仍架炭三條
 在上候發裂取剉再炒熟為末用五錢天麻煨熟
 碾末一錢麝香一字和勻三歲小兒用半錢以生
 薑防風煎湯調下名天王散亦治久嗽惡心 四

肢厥逆用附子尖一個硫黃棗大一一個蠟稍七個
爲末薑汁麩糊丸黃米大每服十九米飲下亦治
久瀉疳羸此方乃和劑局方碧霞丹變法也非真
慢脾風不可輒用小兒久病後或吐瀉後生驚
轉成慢脾用蠟稍一兩爲末以石榴一枚剉空用
無灰酒調末填入蓋定坐文武火上時時攪動熬
膏取出放冷每服一字金銀薄荷湯調下治吐
利後昏睡生瘋癩慢脾症全蠟白朮麻黃去節等
分爲末二歲以下一字三歲以上半錢薄荷湯下
吐瀉後而成者麻黃長五寸十個去節白朮指
面大二塊全蠟二個生薄荷葉包煨爲末二歲以
下一字三歲以上半錢薄荷湯下利痰奇效用
開元通寶錢背後上下有兩月痕者其色淡黑頗
小以一個放鐵匙上炭火燒四圍上下各出珠子
取出候冷傾入盞中作一服以南木香湯送下或
人參亦可錢雖利痰非胃家所好須以木香佐之
活脾散用羊屎二十一一個炮丁香一百粒胡椒
五十粒爲末每服半錢用六年東日照處壁土煎
湯調下

慢肝驚風 有小兒瀉後眼上三日不乳目黃如金氣將絕有名醫曰此慢驚風宜治肝用水飛

代赭石末每服半錢冬瓜仁煎湯調下果愈

嬰孩驚瘡 風後失瘡不能言肥兒丸用蕪荑炒神麩炒麥蘖炒黃連炒各一錢為末猪膽汁打

糊丸黍米大每服十九木通湯下黃連能去心竅惡血

小兒卒驚 似有痛處不知疾狀用雄鷄冠血少許滴口中妙或用燕窠中糞煎湯洗浴

小兒暴驚 啼哭絕死蜀椒左顧牡蠣各六銖以酢漿水一升煮五合每灌一合

驚風不醒 白鳥骨雄鷄血抹唇上即醒

小兒驚竄 兩眼看地不上者皂角燒灰以童尿浸刮屎柴竹用火烘乾為末貼其額門即甦

小兒驚邪 安息香一豆許燒之自除

小兒驚熱 心肺積熱夜卧多驚鉛霜牛黃各半分鐵粉一分碾勻每服一字竹瀝調下夜卧

多啼硃砂半兩牛黃一分爲末每服一字犀角磨水調下
天竹黃二錢雄黃牽牛末各一錢碾勻
麩糊九粟米大每服三五丸薄荷湯下 鈎藤一兩消石半兩甘草炙一分爲散每服半錢溫水服日三服名延齡散
驚風煩熱慎火草煎水浴之熱驚牛黃一杏仁大竹瀝薑汁各一合和勻與服

烏紗驚風

小兒驚風遍身都烏者急推向下將黃土一椀搗末入久醋一鍾炒熱包定熨之引

下至足刺

破爲妙

驚後瞳斜

小兒驚後瞳人不正者人參阿膠糯米炒成珠各一錢水一盞煎七分溫服日再服

愈乃

止效

小兒驚啼

見諸病門

小兒截驚

以芭蕉汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顙門塗四肢留手足心勿塗甚效

驚風定搐

中分散用蛭蜋一個蜥蜴一條赤足蜈蚣一條各中分之隨左右碾末記定男用左

女用右每以一字吹鼻內搐之吹左即左定吹右即右定也

小兒驚候

小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分硃砂五錢同碾以犀角磨汁調服一錢

小兒驚忤

暴驚卒死中惡用蜀漆炒二錢左顧牡蠣一錢二分漿水煎服當吐痰而愈

馬脾風病

小兒風熱喘促悶亂不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛二錢半輕粉

一角為末每服一字漿水少許滴油一小點抄藥在上沉下去漿灌之名無價散小兒急驚肺脹

喘滿胸高氣急脇縮鼻張悶亂欬嗽煩渴痰潮聲嘎俗名馬脾風不急治死在旦夕白牽牛半生半

炒黑牽牛半生半炒大黃煨枳榔各取末一錢每用五分蜜湯調下痰盛加輕粉一字名牛黃奪命

散

小兒脾風

宜用人參冬瓜仁各半兩南星一兩漿水煮過為末每用一錢水半錢三分溫服

小兒天釣

頭目仰視痰塞內熱用金牛兒卽蟬蛻以漿水煮一日曬乾爲末每用一字冷水調

下驚癇客忤家桑東行根取礮汁服 雲薑子

生烏頭去皮尖各二錢爲末每用一錢水調塗頂

上名塗頂散 多涎搐搦不定錫悛脂一兩水淘

黑汁令盡水銀一分以少棗肉礮不見星牛黃半

分麝香半分礮勻粳米飯九黍米大每服三十二

丸新汲水下名保命丹 目睛上視用壁魚兒乾

者十個濕者五個用乳汁和礮灌之 天釣驚風

翻眼向上用乾蠍全者一個五炒好硃砂三綠豆

大爲末飯九綠豆大外以硃砂少許同酒化下一

丸頓愈 天釣驚風日久不下眼見白睛及角弓

反張聲不出者雙金散主之用大蜈蚣一條去頭

足酥炙用竹刀批開記定左右又以麝香一錢亦

分左右各記明礮末包定每用左邊者吹左鼻右

邊者吹右鼻各少許不可過多若眼未下再吹些

須眼下乃止 天釣驚風發歇不定者用鶴屎炒

礮半錢入牛黃麝香各半錢炒蠍五枚爲末每服

半錢新汲水服

小兒內釣

腹痛用乳香沒藥木香等分水煎服之
多啼銀朱半錢乳香煨蒜各一錢為末碾

丸黍米大半歲五九薄荷湯下

驚風內釣胡椒

木鼈子仁等分為末醋調黑豆末和杵丸綠豆大

每服三四十九荆芥湯下

諸病門

小兒盤腸條下有內釣腹痛數條

角弓反張

南星半夏等分為末薑汁竹瀝灌下一錢
仍灸印堂四肢不遂煩亂欲死鷄矢白

一升清酒五升搗篩合揚千遍乃

飲大人服一升少小五合日二服

小兒驚癇

掣癇用虎睛細碾水調灌之良
不知人嚙舌仰目者犀角濃磨水服之立效為末

亦可

痰癇以竹瀝化熊膽兩豆許服之去心中

涎甚良

喉閉牙噤鉛白霜一字蟾酥少許為末

烏梅肉蘸藥於齦上指之仍吹通關藥良久便開

青黛量大小水碾服之用入蟄蝙蝠一個入

成塊硃砂三錢在腹內以新瓦合煨存性候冷為

末空心分四服兒小分五服白湯下慈石鍊水

飲之發熱用丹參雷丸各半兩猪膏二兩同煎

七上七下瀉去滓盛之每以摩兒身上日三次又

取月候血和青黛水調服一錢入口卽瘥量兒大
小加減 仙人杖是筍欲成竹時立死者色黑如
漆置身伴睡良 嚼舌迷悶仰目牛黃一豆許碾
和蜜水灌之 一百二十種用荆芥穗二兩白礬
半生半枯一兩爲末糊丸黍米大硃
砂爲衣每薑湯下二十九日二服

小兒癩疾

能壓一切熱水銀小豆許安瑗中沉湯內
煮一食頃與服勿仰兒頭恐入腦也 鷄

子黃和乳汁攪服不過三兩枚自定 棘枝上雀

窰碾其間蟲出取汁灌之 用衣中白魚七枚竹

茹一握酒一升煎二合溫服之 用鯨甲炙碾乳

服一錢日二亦可蜜丸服 青羊肝一具薄切水

洗和三味醬食之 殺羊角燒存性以酒服少許

小兒諸癩雄黃硃砂等分爲末每服一錢猪心

血入壑

水調下

小兒風癩

癩癧用辰砂人參蛤粉等分爲末以狼猪
心血和丸綠豆大每服五十九金銀湯下

一日一服大有神效 擊癩戴眼極者日數十發

又治大人賊風莽草雷丸各一鷄子黃大化猪脂

一斤煎七沸去渣摩痛處勿近目及陰日凡三四次
大生石榴一枚割去頂挖孔入全蠟五枚黃泥固濟煨存性爲末每服半錢乳汁調下或防風湯下亦可一云先以微火炙乾漸加大火煨赤候冷去泥取中焦黑者細碾乳汁調半錢灌之便定兒稍大以防風湯調服

小兒牛癩

白牛屎中豆日日服之良

小兒蟲癩

胃寒蟲上諸證危惡與癩相似用白蕪荑乾漆燒存性等分爲末米飲調服一字至

錢一

小兒卒癩

刺白犬血一升食之並塗身上大蜂房一枚水三升煮濃汁浴之日三四次佳

釣藤甘草炙各二錢水五合煎二合每服棗許日五夜三度

小兒癩瘡

癩後瘡不能言以天南星濕紙包煨爲末雄豬膽汁調服二字

癩後虛腫

小兒癩病瘡後血氣上虛熱在皮膚身面俱腫萎蕤葵子龍膽茯苓前胡等分爲末

每服一錢
水煎服

治癩利痰

天南星煨香一兩硃砂一錢為末猪心丸梧子大每防風湯化下一丸

小兒客忤

剪驢膊上旋毛一彈子以乳汁煎飲
牛鼻津和水少許灌之
項強欲死衣魚十

枚碾傅乳上吮之入咽立愈或以二枚塗母手中

掩兒臍得吐下愈外仍以摩項強處又麝香少許

乳汁塗兒口中取效醋調亦可
因見生人所致

取來人顙上髮十莖斷兒衣帶少許合燒碾末和

乳飲兒即愈
中馬毒客忤燒馬尾煙於前每日

熏之瘥乃止
偃啼面青猴猪屎二升水絞汁温

浴之
卒中者燒母衣帶三寸並髮灰少許乳汁

灌之
客忤夜啼用本家厨下燒殘火柴頭一個

削平焦處向上硃砂書云撥火杖撥火杖天上五

雷公差來作神將捉住夜啼鬼打殺不要放急急

如律令書畢勿令人知安立床前脚下男左女右

口不能言桔梗燒碾三錢米湯服之仍吞麝香

豆許又細辛桂心末等分以少許內口中

面青驚痛銅照子鼻燒赤少酒淬過與兒飲

小兒卒忤

馬屎三升燒末以酒三斗煮三沸取汁浴兒避風

小兒哭症

梳垢水服少許

衣被辟驚癩

邕州蠻人選鷺腹毳毛為衣被絮柔暖而性冷嬰兒尤宜之能辟驚癩

神穴丹

治急驚風癩疾天吊疳熱等症用紫色蛇黃四兩煨過獾猪屎二兩小者泥固煨過鐵粉

一兩硃砂半兩麝香一錢為末糯粉糊丸芡子大漆盤曬乾看之每丸有一小穴故名神穴丹每服

一丸薄荷酒化下立甦疳熱冷水化下

紫雪

治小兒驚癩百病見傷寒門

蘇合香丸

治小兒驚癩客忤見瘟疫門

諸瘡

小兒疳疾

土裏蜣螂煨熟與食之 麝香以猪膽和
丸猪肝湯服疳渴者以猪肉湯或燻猪湯

服 端午日取蟾蜍眉脂以硃砂麝香為丸如麻

子大治小孩子疳瘦空心服一丸如腦疳以奶汁

調滴鼻中甚妙 自死蝸殼七個皮薄色黃白者

洗淨不得少有塵滓日乾內酥蜜於殼中以瓷瑣

盛之紙糊瑣面置炊飯上蒸之下饋時即坐甌中

仍裝飯又蒸飯熟取出碾如水淀漸漸與喫一日

令盡取效止 專食蚌粉可以治疳 棘針瓜蒂

等分碾為末吹入鼻中日三次 椿白皮日乾二

兩為末以粟米淘淨碾濃汁和丸梧子六十歲三

四丸米飲下量大小加減仍以一丸納竹筒中吹

入鼻內三度良 木鱉子仁使君子仁等分搗泥

米飲丸芥子大每服五分米飲下一二日服 六

月取糞坑中蛆淘浸入竹筒中封之待乾碾末每

服一二錢入麝香米飲服之又方用蛆蛻米泔逐

日換浸五日再以清水換浸三日曬焙為末入黃

連末等分每半兩入麝香五分以獐猪膽汁和丸

黍米大每服三四十九米飲下神效 諸疔疔積
 及無辜疔一服退熱二服煩渴止三服瀉痢任用
 端午午時豎蠶金眼大腹不跳不鳴者搥死置尿
 桶中候生蛆食盡取蛆入新布袋懸長流水中三
 日新瓦焙乾入麝香少許為末每空心以砂糖湯
 調服一錢或粳米糊為丸每米飲服二三十丸
 諸疔羸瘦熊膽使君子末等分碾勻瓷器蒸溶蒸
 餅丸麻子大每米飲下二十九又久服消食和氣
 長肌肉用陳橘皮一兩黃連以米泔水浸一日一
 兩半碾末入麝三分用猪膽盛藥以漿水煮熟取
 出用粟米飯和丸綠豆大
 每服一二十九米飲下

小兒疔瘡

艾葉一兩水一升煮取四合服 嚼麻子
 傳之日六七度 腎疔鼻疔頭瘡耳瘡久

不瘥者石綠白芷等分為末先以甘草水洗瘡拭
 淨傳之一日愈 遍身或面上生瘡爛成孔白如

大人楊梅瘡用蒸糯米時甑蓬四邊滴下氣水以
 盤承取掃瘡上不數日即效百藥不效者用之神

妙 熬胡粉猪脂和塗 蒲公英搗爛覆之別更
 搗汁和酒煎服取汗 生嚼栗子傳之 身面疔

瘡出黃汁者葵根燒灰和猪脂塗之 馬明退燒

灰三錢輕粉乳香少許先以溫漿水洗淨傅之

羊膽二枚和醬汁灌下部 猪鬃骨中髓和膩粉

成劑火中煨香碾末先溫鹽水洗淨敷之 風疔

蝕瘡白殭蠶炒黃拭去黃肉毛碾末蜜和傅之立

效 齒鼻疔瘡糞蛆有尾者燒灰一錢褐衣灰五

分和勻頻吹

神效無比

一切疔腫

無問去處皆能治之 蠶臺 燒灰醋和傅一日三五度

一切疔毒

夜明砂五錢入瓦瓶內以精猪肉三兩薄 切入瓶內水煮熟了即以肉與兒食飲其

汁取下腹中胎毒次用生薑四兩和皮切炒 同黃連末一兩糊丸黍米大米飲服日三次

小兒五疔

川棟子肉川芎 潮熱肚脹髮焦不可用大黃黃芩 飲下

損傷胃氣恐生別症五靈脂水飛一兩胡黃連五 錢為末雄猪膽汁丸香米大每服一二十九丸米飲

下

五疳八痢

面黃肌瘦好食泥土不思乳食用大乾蟾
蝟一枚燒存性皂角去皮弦一錢燒存性

蛤粉水飛三錢麝香一錢為末糊丸粟米大每空
心米飲下三四十九日二服名五疳保童丸 四

治黃連丸用連珠黃連一斤分作四分一分用酒
浸炒一分用自然薑汁炒一分用吳茱萸湯浸炒

一分用益智仁同炒益智碾末白芍藥酒煮切焙
四兩使君子仁焙四兩廣木香二兩為末蒸餅和

丸綠豆大每服三十九丸米飲
食前下日三服忌猪肉冷水

小兒腦疳

鼻痒毛髮作穗黃瘦用鯽魚膽滴鼻中三
五日甚效 端午日取蟾蜍眉脂以硃砂

麝香為丸如麻子大以
奶汁調滴鼻中甚妙

一切疳眼

赤爛生翳白藥子一兩甘草半兩為末猪
肝一具批開摻末五錢煮熟食之 烏賊

魚骨牡蠣等分為末糊丸皂子大每用一丸
同猪肝一具米泔煮熟食治疳眼流淚者

疳病目矇

不見物用木鱉子仁二錢胡黃連一錢為
末米糊丸龍眼大入鷄子內蒸熟連鷄子

食之為妙

小兒鼻疳

稷襖不拘紅黑燒存性白礬燒枯各一錢尿桶白碱一錢半燒過同碾搽神效

爛膽礬燒烟盡碾末摻之一二日愈赤爛蘭香

葉燒灰二錢銅青五分輕粉二字為末日傳三次

有蟲黃檗二兩冷水浸一宿絞汁溫服疳蟲

餌鼻雄黃芎藭等分碾末臘猪膽和用槐枝點之

又烏牛耳垢敷之小兒鼻蝕熊膽半分湯化抹

之花陰乾為末貼之鼻瘡疳蠹烏賊魚

骨白及各一錢輕粉二字為末搽之

疳蝕口鼻

數日欲盡文蛤燒灰以臘猪脂和塗之唇頰穿者綿裏人屎貼之必有蟲出口

鼻急疳數日欲死以藍澱傳之令遍日十度夜四

度急疳蝕爛腐臭斗子鹽白麩等分為末每以

吹之穿唇透頰銀屑一兩水三升銅器煎一升

日洗三四次口鼻急疳沒石子末吹下部即瘥

口鼻疳瘡銅青枯礬等分碾傳之又方人中白

一錢銅綠三分碾傳之疳蝕口鼻五倍子燒存

性碾末摻之 又穿透者草烏豆燒灰入麝香等
分爲末貼之 牛骨燒灰同猪脂塗之有效

疳蝕腮穿

金鞭散治疳瘡頤穿牙落以抱退鷄子軟
白皮包活土狗一個放入大罌蓋口內草

縛泥固煨過取出碾
末貼之以愈爲度

小兒耳疳

生於耳後腎疳也地骨皮一味煎湯洗之
仍以香油調末搽之 疳瘡月蝕寒食粟

米泔澱傳之良又虎頭骨二
兩搗碎猪脂一斤熬膏塗之

小兒口疳

人中白煨黃礬蜜炙焦爲末等分入冰片
少許以青布拭淨摻之累效 白礬裝入

五倍子內燒過同碾摻之 蔗皮燒碾摻之黃連
蘆薈等分爲末每蜜湯服五分走馬疳入蟾灰等

分青黛減半麝香少許 疳蝕口及下部用飛
廉蒿燒灰搗篩以兩錢七著痛處其痛則忍之若

不痛非疳也下部蟲如馬尾大相纏出無數十日
瘡二十日平復 口中疳瘡欵冬花黃連等分爲

細末用唾津調成餅子先以蛇床子煎湯嗽口乃
以餅子傳之少頃確住其瘡立消也 日疳臭爛

綠雲散用黃檗五錢銅綠二錢為末摻之漱去涎
口瘡風疔小兒病此用柳木蛀蟲屎燒存性為
末入麝香少許搽之襍木亦可 口疔齲爛氣臭
血出不拘大人小兒鉛白霜銅綠各二錢白礬豆
許為末
掃之

小兒牙疔

穉褊不拘紅黑燒存性白礬燒枯各一錢
尿桶白碱一錢半燒過同碾搽神效 雄
黃一錢銅綠二錢為末貼之 鳴嘴膽礬一錢匙
上煨紅麝香少許碾勻傅齒上立效 牙疔出血

大鱖魚一尾去腸留鱗入當歸末
泥固燒存性入煨過鹽和勻日用

走馬牙疔

小兒食肥甘腎受虛熱口作臭息次第齒
黑名曰崩砂漸至齲爛名曰潰槽又或血

出名曰宣露重則齒落名曰腐根用蘭香子末輕

粉各一錢蜜陀僧醋淬碾末半兩和勻每以少許

傅齒及齲上立效內服甘露飲 蠶蛻紙灰入麝

香少許貼之一方加白殭蠶等分 銅青滑石杏

仁等分為末擦之立愈 北棗一枚去核入鴨嘴

膽礬紙包煨赤出火毒碾末傅之追涎 砥石銅

綠等分爲末攤紙上貼之其效如神 砒霜半兩
 醋調如糊盤內盛待乾刮下用粟米大綿裹安齒
 縫來日取出有蟲自死久患者不過三日即愈
 綠礬入鍋內炭火煨紅以醋拌勻如此三次爲末
 入麝香少許溫漿水漱淨搽之 新棗肉一枚同
 黃檗燒焦爲末油和傅之若加砒少許更妙 椽
 斗殼入鹽填滿合定燒透出火毒碾末入麝香少
 許先以米泔漱過搽之 胡桐淚黃丹等分爲末
 搽之 楊花燒存性入麝香少許搽之 鷄肫黃
 皮不落者五枚枯礬五錢碾搽立愈 鷄肫黃
 皮燈上燒存性入枯礬黃檗末等分麝香少許先
 以米泔洗漱後貼之 黑貓頭燒灰酒服方寸七
 以小便盆內白屑取入甕瓶內鹽泥固濟煨
 紅碾末入麝香少許貼之又用婦人尿桶中白垢
 火煨一錢銅綠三分麝香一分和勻貼之尤有神
 效 用鮑魚一個去腸入砒一分生地黃一兩紙
 包燒存性入枯白礬麝香少許爲末搽之 出血
 作臭用蜘蛛一枚銅綠半錢麝香少許杵勻擦之
 無蛛用殼 臭爛出血雄黃豆大七粒每粒以淮
 棗去核包之鐵線穿於燈上燒化爲末每以少許

搽之去涎以愈為度 侵蝕口鼻乾蚤蟄黃泥裹
固煨過黃連各二錢半青黛一錢為末入麝香少
許和礪傅之 疔蝕透骨穿腮生南星一個當心
剗空入雄黃一塊麪裏燒候雄黃作汁以蓋子合
定出火毒去麪為末入麝香少許拂瘡數日甚效
宣露膿血臭氣者胡桐淚一兩枸杞根一升每
用五錢煎水熱漱又胡桐淚葶藶等分礪搽 急
疔蝕齒黃礪青礪半錢白礪燒一錢麝香一分為
末傅之吐涎 五倍子青黛枯礪黃礪等分為末
先以鹽湯漱淨搽之立效 孩兒茶雄黃貝母等
分為末米泔漱淨搽之 馬懸
蹄燒灰入鹽少許搽之甚良

小兒急疔瘡

水調蜈蚣蛇膽塗之 油麻嚼傅之
急疔蝕爛蜈蚣蛇肉作膾食之

小兒疔水

珠子甘遂炒青橘皮等分為末三歲用一
錢以麥芽湯下以利為度忌酸鹹三五日

名水
寶散

小兒脾疔

使君子蘆薈等分為
末米飲每服一二錢

萬石頁纂五 諸疔五

小兒疳積

腹大黃瘦骨立頭生瘡結如麥穗用立秋後大醫蠶去首足腸以清油塗之陰陽瓦

炙熟食之積穢自下連服五六枚一月之後形容改變妙不可言 痞積門有脾癖疳積一條

小兒疳氣

不可療者綠礬煨赤醋淬三次為末棗肉和丸綠豆大每服十九丸溫水下日三疳

氣浮腫黑牽牛白牽牛各半生半炒取末陳皮青皮等分為末糊丸綠豆大每服三歲兒二十九米

湯下常服自消 疳氣攻腎耳聾陰腫牽牛末一錢猪腰子半個去膜薄切摻入內加少鹽濕紙包

煨空心食

小兒冷疳

面黃腹大食即吐者母丁香七枚為末乳汁和蒸三次薑湯服之

小兒熱疳

尿如米泔大便不調糞蛆燒灰襪物與食之 潮熱肚脹髮焦見上五疳條 肥熱

疳疾用胡黃連黃連各半兩 砂二錢半為末入猪膽內扎定以杖子鈞懸於砂 燭內漿水煮一次

久取出碾爛入蘆薈麝香各一分飯和丸麻子大每服五七丸至一二十九丸米飲下 疳熱流注遍

身瘡蝕或潮熱肚脹作渴猪肚黃連丸用猪肚一
酒洗淨宣黃連五兩切碎水和納入肚中縫定放
在五升粳米上蒸爛石臼搗干杵或入少飯同杵
丸綠豆大每服二十九米飲下仍服調血清心之
藥佐之蓋小兒之病不出於疳則出於熱常須識
此疳熱有蟲瘦悴久服充肥用榆仁一兩黃連
一兩為末猪膽汁七枚和入盞內飯上蒸之一日
蒸一次丸蒸乃入麝香半錢湯浸蒸餅和丸綠豆
大每服五七丸至
一二十九米飲下

小兒疳勞

治潮熱往來五心煩躁盜汗咳嗽用鼈血
丸主之以黃連胡黃連各稱二兩以鼈血

一盞吳茱萸一兩同入內浸過一夜炒乾去茱血
碾末入柴胡川芎蕪荑各一兩人參半兩使君子
仁二十個為末煮粟米粉糊和丸如
黍米大每用熟水量大小日服三

疳瘡成漏

膿水不止用羊羔兒骨鹽泥固濟煨過碾
末五錢入麝香雄黃各一錢填瘡口三日

外必合

氣瘦疳瘡

多年不愈者應效散又名托裏散用地骨皮冬月者為末每用紙撚蘸入瘡內頻用

自然生肉更以米飲服二錢一日三服

疳蟲食土

見諸病門

疳瀉疳痢

見吐瀉門

蠍虎丹

治一切疳瘦下痢證候全備及無辜疳毒如邪病者用乾雄蠍虎一個微炙蝸牛殼蘭香

根靛花雄黃麝香各一分龍腦半分各碾為末米醋煮糊丸黍米大每脂麻湯下十九日三服取效

小兒無辜

疳下痢赤白胡粉熟蒸熬令色變以飲服半錢疳病肚脹或時泄痢冷熱不調以

漏蘆一兩杵為末每服一錢以猪肝一兩入鹽少許同煮熟空心頓食之閃癖瘰癧或頭乾黃聾

或乍痢乍瘥諸狀多者大黃煎主之大黃九兩錦紋新實者若微朽即不中用削去皮搗篩為散以

好米醋三升和置瓦盆中于大鐺內浮湯上炭火慢煮候至成膏可丸乃貯器中三歲兒一服七丸

梧子大日再服以下出青赤膿爲度若不下或少稍稍加丸若下多又須減之病重者七八劑方盡根大人亦可用之此藥惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳母亦禁之一加木香一兩半

耳疳出膿汁

見耳病門

小兒吐瀉

小兒嘔吐

不止丁香生半夏各一錢薑汁浸一夜晒乾為末薑汁打麩糊丸黍米大量大小用

薑湯下不定用五倍子二個一生一熟甘草一握濕紙煨過同碾為末每服半錢米泔調下立瘥

壯熱食癆葛粉二錢水二合調勻傾入錫鑊中重湯盪熱以糜飲和食

小兒吐逆

不定虛風喘急白附子藿香等分為末每米飲下半錢不止用黃丹碾末小棗肉

和丸芡子大每以一九針簽於燈上燒過碾細乳汁調下一加硃砂枯礬等分頻併不進乳食手

足心熱用紅麩年久者三錢半白朮麩炒一錢半甘草炙一錢為末每服半錢煎棗子米湯下小

兒飲乳後吐逆不入腹取蘆蠱蟲二枚煮汁飲之嘔逆與兒覘乳不同孔飽後覘出者為覘乳也

小兒吐瀉

丁香橘紅等分煉蜜丸黃豆大米湯化下巴豆一個針穿燈上燒過黃蠟一豆大

燈上燒滴入水中同杵丸黍米大每用五七丸蓮子燈心湯下芹菜切細煮汁飲之不拘多少

注下小便少白龍丸用熟附子五錢白石脂煨龍
骨煨各二錢半為末醋麩糊丸黍米大每米飲量
兒大小服黃色者傷熱也玉露散用石膏寒水
石各五錢生甘草二錢半為末滾湯調服一錢
不拘冷熱驚吐反胃一切吐利諸治不效者二氣
散用硫黃半兩水銀二錢半碾不見星每服一字
至半錢生薑水調下其吐立止或同炒結砂為丸
方見靈砂下脾胃虛寒齊州半夏泡七次陳粟
米各一錢半薑十片水浸半煎八分溫服胃虛
及有痰驚梓朴散用梓州厚朴一兩半夏湯泡七
次薑汁浸半日晒乾一錢以米泔三升同浸一百
刻水盡為度如未盡少加火熬乾去厚朴只碾半
夏每服半錢或一字薄荷湯調下

小兒霍亂

梳垢水服少許尿滓抹乳上服之良
訶黎一枚為末沸湯服一半未止再服

卒起者用白狗屎一丸絞汁服之廁屋戶簾
燒灰飲服一錢取寡婦薦二七莖煮汁服

小兒熱瀉

黃檗削皮焙為末用米湯和丸
粟米大每服一二十丸米湯下

小兒泄瀉 肉豆蔻五錢乳香二錢半生薑五片同炒
黑色去薑碾為膏收旋丸綠豆大每量大

小米飲下 泄瀉
門有老小泄瀉條

小兒滑泄 白龍丸白石脂白龍骨等分為末水
丸黍米大每量大小木瓜紫蘇湯下

小兒脾泄不止 紅棗二十個去核將官粉入內以陰
陽五焙乾去棗碾粉每服三分米湯

下

小兒久瀉 脾虛米穀不化不進飲食温白丸用白朮
炒二錢半半夏麴二錢半丁香半錢為末

薑汁麴糊丸黍米大
每米飲隨大小服之

瀉後不乳 有小兒瀉後眼上三日不乳目黃如金氣
將絕有名醫曰此慢驚風也宜治肝用水

飛代赭石末每服半錢
冬瓜仁煎湯調下果愈

小兒疳瀉 赤石脂末米飲調服半錢立瘥加京芎等
分更妙 吐利白藥子一兩甘草半兩為

萬方真寶 小兒吐瀉二

末豬肝一個批開摻末五錢煮熟食之 令熱不
調胡黃連半兩綿薑一兩炮為末每服半錢甘草

節湯下 水瀉奶疳椒一分去目
碾末酥調少少塗腦上日三度

小兒疳泄下痢 用蝦蟇燒存性
碾飲服方寸匕

小兒下痢 羚羊角中骨燒末飲服方寸匕 林檎構
子同杵汁任意服之 雞臙脰黃皮燒存

性乳服男用雌女用雄 腹大且堅用多垢故衣
帶切一升水五升煮一升分三服 小兒泄痢大

蒜搗貼兩足心
亦可貼臍中

小兒下痢赤白 蜂房燒末飲服五分 用巴豆煨熟
去油一錢同百草霜二錢碾末飛羅

麩煮糊丸黍米大量人用之赤用甘草湯白用米
湯赤白用薑湯下 油麻一合搗和蜜湯服之

雞腸草搗汁一合和蜜服甚良 及水痢雲母粉
半兩煮白粥調食之多時體弱不堪以宣連用

水濃煎和蜜日服五六次 體弱大困者麻子仁
三合炒香碾細末每服一錢漿水服立效 作渴

得水又嘔逆者構葉炙香以飲漿半升浸至水綠
去葉以木瓜一個切納汁中煮二三沸細細飲之
神仙救苦散治小兒赤白痢下日夜百行不止
用罌粟殼半兩醋炒為末再以銅器炒過檳榔半
兩炒赤碾末各收每用等分赤痢
蜜湯服白痢沙糖湯下忌口味

小兒赤痢

搗青藍汁二升分四服

小兒洞痢

木瓜搗汁服之 柏葉煮汁代茶飲之

小兒白痢

似魚凍者白鴨殺取血滾酒泡服即止也

小兒血痢

生馬齒莧菜杵汁三合煎沸入蜜一合和服

小兒水痢

形之不勝湯藥白石脂半兩碾粉和白粥空肚食之

小兒冷痢

蓼葉搗汁服

小兒熱痢

嫩黃瓜同蜜食十餘枚良

高方類纂五小兒吐瀉三

異

小兒秋痢

以粳米煮粥熟時入乾柿末再煮三兩沸食之奶母亦食之

小兒渴痢

冬瓜汁飲之

小兒蠱痢

生芩汁一升二合分三四服立效

小兒久痢

狗頭燒灰白湯服末作餛飩食之

水穀不調枳實搗末飲

服一二錢

久痢赤白用桂去皮以薑汁炙紫黃連以茱萸炒過等分爲末紫蘇木瓜煎湯服之名

金鎖散

小兒刮腸痢疾

禁口閉目至重者精猪肉一兩薄切炙香以膩粉末半錢鋪上令食或置

鼻頭聞香自然要食也

小兒疳痢

地榆煮汁熬如飴糖與服便已宮氣方歌云孩兒襍病變成疳不問強羸女與男

煩熱毛焦鼻口燥皮膚枯槁四肢癱腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澀面黃鼻孔赤穀道開

張不可看此方便是青黛散孩兒百病服之安
薤白生搗如泥以粳米粉和蜜作餅炙熟與食不
過三兩服 肚脹用雞子一個開孔入巴豆一粒
輕粉一錢用紙五十重裹於飯上蒸三度放去
殼碾入麝香少許糊和丸米粒大食後温湯下二
丸至三丸 垂死者益母草嫩葉同米煮粥食之
取足以瘥為度甚佳飲汁亦可 頻數用生薔薇
根洗切煎濃汁細飲以愈為度 取東引細椿根
一大握洗淨以水一大升煮汁分服仍取白皮一
握炙甘草三寸豉兩合水一升煮粳米五十粒葱
白一握煮半升以意服之枝葉功用皆同 困重
者用樗白皮搗粉以水和棗作大餛飩子日晒少
時又搗如此三遍以水煮熟空肚吞七枚重者不
過七服忌油膩熱麪毒物又方樗根濃汁一蜺殼
和粟米泔等分灌下部再度即瘥其驗如神大人
亦宜 羸瘦多睡坐則閉目食不下用蚺蛇胆豆
許二枚煮通草汁碾化隨意飲之并塗五心下部
疔痢欲死新羊屎一升水一升漬一夜絞汁頓
服日午乃食極重者不過三服又新牛屎一升水
一升攪澄汁服不過三服 五疔下痢兔屎炒半

兩乾蝦蟇一枚燒灰為末綿裹
如蓮子大納下部日三易之

小兒痢血

梁州檉皮二十分炙犀角十二分
水三升煮取一升分三服取瘥

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

痘疹

預解痘毒

十二月取兔頭煎湯浴小兒涼熱去毒令
出痘稀 初生小兒十三日以本身剪下

臍帶燒灰以乳汁調服可免痘患或入硃砂少許

雞卵一枚活地龍一條入卵內飯上蒸熟去地

龍與兒食每歲立春日食一枚終身不出痘也

雞卵一枚童便浸七日水煮食之永不長痘

生雞子三五枚浸厠坑內五七日取出煮熟與食

數日再食一枚永不長痘 每至除夜以白鴿煮

炙飼兒仍以毛煎湯浴之則出痘稀少 小兒食

之永不長痘或出亦希用白鴿卵一對入竹筒封

置厠中半月取出以卵白和辰砂三錢九菘豆大

每服三十九三豆飲下毒從大小便出也 遇時

行服此未發內消已發稀少用生玳瑁生犀角各

磨汁一合和勻溫服半合日三服最良 初發時

或未出時以硃砂末半錢蜜水調服多者可少少

者可無重者可輕也 時行暄煖恐發痘瘡用生

麻油一小盞水一盞旋旋傾於油內柳枝攪稠如
蜜每服二三蜆殼大人二合臥時服之三五六服大

便快利瘡自不生矣此扁鵲油劑法也一方用麻
油童便各半盞如上法服 七八月或三伏日或
中秋日剪壺盧鬚如環子脚者陰乾於除夜煎湯
浴小兒則可免出痘 五六月取絲瓜蔓上卷鬚
陰乾至正月初一日子時用二兩半煎湯父母只
令一人知溫浴小兒身面上下以去胎毒永不出
痘縱出亦少也 除夕黃昏時用大烏魚一尾小
者二三尾煮湯浴兒遍身七竅俱到不可嫌鱉以
清水洗去也若不信但留一手或一足不洗遇出
痘時則未洗處偏多也此乃異人所傳不可輕易
白水牛蝨一歲一枚和米粉作餅與兒空腹食
之取下惡糞終身可免痘瘡之患一方用白牛蝨
四十九枚焙綠豆四十九粒硃砂四分九釐碾末
煉蜜丸小豆大以綠豆湯下 消解痘毒紫草一
錢陳皮五分葱白三寸新汲水煎服 扁鵲三豆
飲治天行痘瘡預服此飲疎解熱毒縱出亦少用
菘豆赤小豆黑豆各一升甘草節二兩以水入
升煮極熟任意食豆飲汁七日乃止一方加黃大
豆白大豆名五豆飲 陰陽二血丸治小兒痘瘡
未出者稀已出者減用鹿血兔血各以青紙盛置

灰上晒乾乳香沒藥各一兩雄黃黃連各五錢硃砂麝香一錢爲末煉蜜九菴豆大每服十九空心酒下兒小者減之 蟾宮丸治小兒胎毒遇風寒即發痘疹服此可免雖出亦稀用兔二隻臘月八日刺血於漆盤內以細麪炒熟和九菴豆大每服三十九菴豆湯下每一兒食一劑永安甚效一方加硃砂三錢酒下名兔砂丸 兔血丸小兒服之終身不出痘瘡或出亦稀少臘月八日取生兔一隻刺血和蕎麥麪少加雄黃四五分候乾丸如菴豆大初生小兒以乳汁送下二三九遍身發出紅點是其徵驗也但兒長成常以兔肉啖之尤妙鶴卵預解痘毒每用一枚煮與小兒食之多者令少少者令不出鶴卵亦可 時行瘡疹正發服此則可無患茜根煎汁入少酒飲之 初出或未出多者令少少者令稀老絲瓜近蒂三寸連皮燒存性碾末砂糖水服

痘不快發

快斑散用貫衆赤芍藥各一錢升麻甘草各五分入淡竹葉三片水一盞半煎七分

温服之

湯服之 雞冠血和酒服發痘最佳雞屬翼屬風

萬方類纂五 痘疹二

四

頂血至清至高故也 痘瘡時出不快壯熱狂躁
咽膈壅塞大便秘澁小兒咽喉腫不利若大便秘
者勿服牛蒡子炒一錢二分荆芥穗二分甘草節
四分水一盞同煎至七分溫服已出亦可服名必
散勝

痘疹不快

乾山檀為末湯點服之立出紅活又法猴
櫨五個酒煎入水溫服即出 板藍根一

兩甘草一分為末每服半錢或一錢取雄雞冠血

三二點同溫酒少許調下 用胡荽二兩切以酒

二大盞煎沸沃之以物蓋定勿令洩氣候冷去滓

微微舍噴從項背至足令遍勿喫頭面 蘿蔔子

生碾末米飲服一二錢良 痘疹不快宜用胡荽

酒飲之以辟惡氣床帳上下左右皆宜掛之以禦

汗氣胡臭天癸淫佚之氣一應穢惡所不

可無若兒虛弱及天時陰寒用此最妙

斑痘不快

乳香碾細猪心血和丸芡子大每溫水化
服一丸 珠子七枚為末新汲水調服

斑疹不快

鈞藤鈎子紫草茸等分為末
每服一字或半錢溫酒服

痘瘡稠密

不拘大人小兒生犀於澁器中新汲水磨濃汁冷飲服之

嬰童疹痘

三四日隱隱將出未出色赤便閉者紫草二兩剉以百沸湯一盞泡封勿洩氣待温

時服半合則瘡雖出亦輕大便利者勿用煎服亦可

癩痘煩喘

小便不利者用鱉甲二兩燈心一把水一升半煎六合分二服凡患大小便有血者

中壞也黑黯無膿者十死不治

痘瘡煩渴

粉甘草炙括蕞根等分水煎服之甘草能通血脉發瘡痘也

痘疹煩熱

人中白或老糞缸白垢細爭碾末每白湯或酒服二錢

痘瘡噉氣

用半夏泡七次一升生薑半升水七升煮一升五合分服

痘瘡脹痛

白芍藥為末酒服半錢匕

痘瘡便秘

四五日用肥豬臙一塊水煮熟切如豆大與食自然藏腑滋潤痂疔易落無損於兒

痘瘡作痒

房中宜燒茶烟恆熏之

蟬蛻三七枚甘草炙各一錢水煎服之

癩欲落不落百花香用上等石蜜不拘多少湯和時時以翎刷之其瘡易落自無癢痕

痘爛生蛆

嫩柳葉鋪席上臥之蛆盡出而愈也用猪肉片引出以藜蘆貫眾白歛為末用真

香油調傅之

痘瘡疳蝕

膿水不絕用出了蠶蛾繭以生白礬填滿煨枯為末擦之甚效

痘瘡狂亂

循衣摸床大熱引飲用益元散加硃砂二錢冰片三分麝香一分每燈草湯下二三

服

痘瘡狂躁

心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色赤未透者用龍腦一錢細碾旋以猪心血九芡子大

每服一丸紫草湯下少時心神便定得睡瘡發用獾猪第二番血清半盃酒半盃和勻入龍腦一

分温服良久利下瘀血一二行瘡即紅活此治痘瘡黑靨候惡醫所不治者百發百中

小兒痘疔

雄黃一錢紫草三錢為末胭脂汁調先以

中有疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此

症十死八九惟牛都御史得秘傳此方點之最妙

用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰三分真珠十四

粒炒碾為末以油蘸脂同杵成膏先以簪挑疔破

啞去惡血以少許點之即時變紅活色

痘瘡變黑歸腎用竹園萎草煎酒傳其身即發起

許溫酒服即發紅色如神痘瘡稠密盛即變黑

者用生獐猪血一椀斗龍腦半分溫酒和服乾

黑危困者山檀為末紫草煎酒調服一錢

痘瘡倒陷

胡桃肉一枚燒存性乾胭脂半錢碾勻胡

萎煎酒調服一錢再服取效臘月收人

中白火燉為末溫水服三錢陷者自出陷伏灰

平不長煩躁氣急用天靈蓋燒碾酒服三分一方

入雄黃二分其瘡自然起發痘瘡復陷十二月

取老鴉左翅辰日燒灰用獐猪血和九芡子大每

服一丸以獐猪尾血同温水化服當出也 癩瘕
 倒陷毒氣壅遏於裏則為便血昏睡不醒其證甚
 惡用抱出雞子殼去膜新瓦焙碾每服半錢熱湯
 調下嬰兒以酒調抹唇舌上并塗風池胸背神效
 痘瘡數日陷頂漿滯不行或風寒所阻者宜用
 水楊枝葉無葉用枝五斤流水一大釜煎湯温浴
 之如冷添湯良久照見纍起有暈絲者漿行也如
 不滿再浴之力弱者只洗頭面手足如屢浴不起
 者氣血敗矣不可再浴始出及痒塌者皆不可浴
 痘不行漿乃氣澁血滯腠理固密或風寒外阻而
 然浴令暖氣透達和暢鬱蒸氣血通徹每隨暖氣
 而發行漿貫滿功非淺也若內服助氣血藥藉此
 升之其效更速風寒亦不得而阻之矣直見一嫗
 在村中用此有驗叩得其方行之百發百中慎勿
 易之

痘瘡黑陷

乃心熱血凝也用生玳瑁生犀角同磨汁
 一合入猪心血少許紫草湯五匙和勻温

服臘月收獐猪心血瓶乾之每用一錢入龍腦
 少許碾勻酒服須臾紅活神效無乾血用生血

牛黃二粒硃砂一分碾末蜜浸臙脂取汁調搽一
日一上沉香檀香乳香等分蒸於盆內抱兒於

上熏之即起鐵脚威靈仙炒碾一錢腦子一分

溫水調服取下瘡痂為效意同百祥丸痘瘡黑

陷及出不快或觸穢氣黑陷必勝膏主之牛李子

即鼠李子九月後采黑熟者入砂盆搗爛生絹濾

汁用銀石器熬成膏瓷瓶收貯常令透風每服一

皂子大煎桃膠湯化下如人行二十里再進一服

其瘡自然紅活入麝香少許尤妙如無生者以乾

者為末水熬成膏又一方用牛李子一兩炒碾桃

膠半兩每服一錢水七分煎四分溫服托痘花

蛇散治痘瘡黑陷白花蛇連骨炙勿令焦三錢大

丁香七枚為末每服五分以水和淡酒下神效移

時身上發熱其瘡頓出紅活也四靈無價散治

痘瘡黑陷腹脹危篤者此為刮劑用人糞猫糞猪

糞犬糞等分臘月初旬收埋高燥黃土窖內至臘

八日取出為末入麝香少許碾勻瓷器密封收之一

度取出為末入麝香少許碾勻瓷器密封收之一
歲一字二歲半錢三歲一錢蜜水調下須臾
瘡起此乃以毒攻毒用火化者從治之義也

瘡頭黑凹

蕎麥麩煮食之即發起

痘瘡倒靨

用白狗或黑狗一隻喂以生粟米候下屎取未化米為末入麝香少許新汲水服二

錢 箬葉灰一錢麝香少許酒服 鄭州麻黃去

節半兩以蜜一匙同炒良久以水半升煎數沸去

沫再煎去三分之一去滓乘熱服之避風其瘡復

出也一法用無灰酒煎其效更速一兒病斑瘡風

寒倒靨已困用此一服便出如神 紫背荷葉散

又名南金散治風寒外襲倒靨勢危者萬無一失

用霜後荷葉貼水紫背者炙乾白殭蠶直者炒去

絲等分為末每服半錢用胡荽湯或溫酒調下

濕生蟲為末酒服一字即起 一兒三歲時發熱

七日痘出而倒靨色黑唇口冰冷危症也諸藥不

效遇一士曰有藥可起此疾為經營少許持歸服

之移時即紅潤也求其方乃用狗蠅七枚搗細和

醅酒少許調服爾 及灰白下陷用童子糞乾者

新五煨過每二兩入龍腦一分碾勻每服半錢至

一錢蜜水調下 人牙燒存性入麝香少許溫酒

服半錢 痘瘡方出風寒外襲或變黑或青紫此

倒靨也宜溫肌發散使熱氣復行而斑自出用人齒脫落者不拘多少瓦罐固濟煨過出火毒礮末出不快而黑陷者獷猪血調下一錢因服涼藥血澁倒陷者人麝香溫酒服之其效如神無價散用人牙猫牙猪牙犬牙等分火煨碾末蜜水調服二字小兒痘靨白丁香末入麝少許米飲服一錢

小兒痘毒

小兒將痘發熱失表忽作腹痛及膨脹弩

出也以商陸根和葱白搗傅臍上斑止痘出方免無虞斑痘始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫亂者鬱金一枚甘草二錢半水半盞煮乾去甘草切片焙碾為末入真腦子五分每用一錢以生猪血五七滴新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如癩狀乃瘥此乃五死一生之候也

痘瘡險症

蕭山魏直著博愛心鑑三卷言小兒痘瘡惟有順逆險三證順者為吉不用藥逆者

為凶不必用藥惟險乃悔吝之象當以藥轉危為
安宜用保元湯主之此方原出東垣治慢驚土衰
火旺之法今借而治痘以其內固營血外護衛氣
滋助陰陽作為膿血其證雖異其理則同去白芍
藥加生薑改名曰保元湯炙黃芪三錢人參二錢
炙甘草一錢生薑一片水煎服之險症者初出圓
暈乾紅少潤也將長光澤頂陷不起也既出雖起
慘色不明也漿行色灰不榮也漿定光潤不消也
漿老濕潤不斂也結痂而胃弱內虛也痂落而口
渴不食也痂後生癰腫也癰腫潰而斂遲也凡有
諸証並宜此湯或加芎藭加官桂加糯米以助之詳見本書

痘瘡口噤

齧菜莢一二粒抹之即開取其辛散耳

痘瘡潰爛

以臘月黃牛屎燒取白灰敷之或臥之即
易痂疔而無癍痕 枇杷葉煎湯洗之

蕎麥粉頻頻傳之 濕
爛黑大豆碾末傳之

痘靨發搐

黑陷者用桃膠煎湯飲之或
水熬成膏酒化服之大效

痘瘡不收

墻上白螺螄殼洗淨煨碾摻之 象牙屑
銅銚炒黃紅色為末每服七八分或一錢

白水

痘不落痂

沙糖調新汲水一盃服
之白湯調亦可日二服

痘後生瘡

黃豆燒黑碾末香油調
塗 猪肉煮汁洗之

痘後癰毒

赤小豆末雞子白調塗傳之 三豆膏初
起神效綠豆赤小豆黑大豆等分為末醋

調時時掃
塗即消

痘瘡癍痕

或凸或凹韶粉一兩輕粉一定和碾猪脂
調傳 密陀僧二兩細碾人乳調夜塗旦

洗 羊脬二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之
明且以猪蹄湯洗去 黃明膠炒碾末温酒調服

一錢匕痘已出者服之無癍未出者服之瀉下
痘瘡赤癍雞子一個酒醅浸七日白殭蠶二七枚

和勻措赤塗之甚效 羊筋骨髓煉
一兩輕粉一錢和成膏塗之滅癍

痘瘡入目

猪蹄爪甲燒灰浸湯瀟淨洗之甚妙
白柿日日食之良
癩痘入目雞子殼燒碾

入片腦少許點之又馬屁勃蛇皮各五錢皂角子
十四個為末入罐內鹽泥固濟燒存性碾每温酒

服一錢 痘疹入目仙靈脾威靈
仙等分為末每服五分米湯下

癩瘡入目

不退者曾青一錢丹砂二錢為末瘰螬五
枚搗汁和點 苦實把豆兒即馬錢子半

個輕粉水花銀朱各五分片腦麝香枯礬少許為
末左目吹右耳右目吹左耳日二次 浮萍陰乾

為末以生羊子肝半個同水半盞煮熟搗爛絞汁
調末服甚者不過一服已傷者十服見效 癩疹

入目紫貝一個生碾細末用羊肝切片摻上
紫定米泔煮熟瓶盛露一夜空心嚼食之

痘後目翳

隱澁淚出久而不退用穀精草為末以柿
或猪肝片蘸食一方加蛤粉等分同入猪

肝內煮熟日食之 直往山中東西地上不許回
顧尋兔屎二七粒以雌雄檳榔各一個同磨不落

地井水調服百無一失其效如神 蟬蛻為末每
服一錢羊肝煎湯下日二 左手爪甲刀刮屑末

燈草蘸點翳上三次即出也 石決明火煨碾穀

精草等分為末以猪肝蘸食 痘瘡入目生翳用

兔屎日乾為末每服一錢茶下即安又白菊花殼

精草綠豆皮等分為末每服一錢以乾柿餅一枚

粟米泔一盞同煮候泔盡食柿日食三枚淺者五

七日遠者半月見效 半年以上者一月效一年

者不治用猪懸蹄三兩五瓶固濟煨過蟬蛻一兩

羚羊角一分為末每歲一匙三歲以上三錢溫水

調服一日三服 水銀一錢號丹五錢碾作六丸

坩鍋糊定火煨一日取出薄綿裹之左腎塞右耳

右腎塞左耳自然墜下 痘瘡入目羞明生翳畢

澄茄末吹少許入鼻中三五次效 輕粉黃丹等

分為末左目患吹右耳右目吹左耳即退 蛇蛻

一條洗焙天花粉五分為末以羊肝破開夾藥縛

定米泔水煮食子女及甥皆用此得效真奇方也

痘疹目醫水煮螺螄常食佳 癩疹生醫粉霜

八分朱砂一錢為末水調少許傾入耳內 疹後

生醫鱗魚血點少許入目 痘後目障天花粉蛇

蛻洗焙等分為末羊子肝批開入藥在內米
泔汁煮熟切食一女病此服之旬餘而愈

萬方頂真五痘疹八

五

咽喉痘疹

牛蒡子二錢 桔梗一錢半
粉甘草節七分 水煎服

防痘入目

煎脂膏汁點之 用菘豆七粒令兒自投
井中頻視七遍乃還 白芥子末水調塗

足心引毒歸下

斑痘厥逆

服涼藥多手足厥冷脉微用乾薑炮二錢
半粉甘草炙一錢半水二鍾煎一鍾服

一女病發熱腰痛手足厥逆日加昏悶形證極惡
疑是痘候時暑月急取屠家敗血倍用龍腦和服
得睡須臾一身瘡出而安

小兒癩疹

髮灰飲服三錢

嬰孺風疹

見小兒諸瘡門

痘後風眼

發則兩臉紅爛眵淚用刺蝟膽汁用簪點
入痒不可當二三次即愈尤勝烏鴉胆也

初生小兒臍帶血乘熱點之妙

百祥膏

治嗽而吐青綠水又治痘瘡歸腎紫黑乾陷

不以多少陰乾漿水煮極軟去骨日乾復納原汁

盡焙為末水丸粟米大每服一二丸碾赤脂麻

湯下棗變百祥丸治斑瘡變黑大便閉結用大

戟一兩棗三枚水一盞同煮暴乾去大戟以棗肉

焙丸服從少至多以利為度

多以利為度

萬方類聚

冬以保...

益同煮...

二十...

不...

...

補遺

小兒諸病門

初生宜知

取梅樹根及桃李根煮湯浴之無瘡熱之患

小兒夜啼

燈草燒灰塗乳上飼之
左人畫倒驢挂壁止夜啼

江

小兒嘔逆

取壁錢繭二七枚煮汁飲之

小兒閃癖

黃瓜葉一歲用一葉生按攪汁服得吐下良

小兒中蠱

腹內堅痛面目青黃淋漓骨立取桃寄生二兩為末如茶點服日四五服

小兒失音

卒瘖菖蒲麻油泡湯服

小兒陰腫

被蚯蚓吹腫者取雄鴨涎抹之即消

小兒繼病

生殺白馬取眼與母帶之

小兒拗哭不止

令三姓婦人抱兒于驢槽臥之移時即止勿令人知

小兒諸瘡門

小兒諸瘡

抱出雞卵殼燒灰油調塗頭身諸瘡
骨燒灰和油傅耳瘡頭瘡陰瘡癩疽有漿

如火杓

小兒熱瘡

赤腫蕎麥粉醋調塗之

小兒頭瘡

籬脚朽竹洗淨燒存性入輕粉少許油調塗
頭瘡白禿甘蔗滓燒存性研末烏柏

油調頻塗取瘡燒烟勿令入人目能使暗明

小兒面瘡

面上黃水瘡鯽魚頭燒研醬汁和塗

小兒口瘡

殺羊鬚燒灰和油傅之
白漫桑皮中白汁拭淨塗之

小兒驚口

海螵蛸和雞子黃塗之

小兒丹毒

蕎麥粉醋調塗之
葉搗爛塗之即便消退
慈姑

小兒赤丹

從脚跌起棗根
煎湯頻浴之

小兒熱丹

青黛和水服之

小兒熱毒遊腫

破草鞋和亂髮
燒灰醋調敷之

驚癇門

小兒驚風

緣桑羸七枚
焙研米飲服

角弓反張

小兒瘧風頭及四肢
皆往後以鴨涎滴之

諸疳門

小兒疳瘡

海螵蛸研末敷之

爛弦疳眼

見眼目門風
眼爛弦條下

小兒無辜

夜明砂搗熬為末拌飯與三歲小兒食之治無辜病甚效

小兒吐瀉門

小兒霍亂

土蜂窩炙研乳汁服一錢

痘疹門

痘不快發

絲瓜枯者燒存性入硃砂研末蜜水調服甚效

痘瘡倒靨

猪尾血一匙調龍腦少許新汲水服

痘瘡潰爛

多年牆屋上爛茅擇洗焙乾為末糝之海蝶蛸末敷之

痘後癰毒

雄雞尾毛燒灰和水敷之

痘後目腫

經月不開取龜胆汁點之良