

下

傅青主女科



生化編

目錄

新產治法

生化總論

血暈

厥證

血崩

氣短似喘

寒熱

中風

傷寒疫瘧

類傷寒證

類中風

附瘧

類瘧

汗

盜汗

口渴兼小便不利

妄言妄見



傷食

傷氣

咳嗽

嘔吐

霍亂

水腫

流注

中滿

怔忡驚悸

心痛

腹痛

腰痛

脇痛

徧身痛

小腹痛

瀉

目完穀不化

痢

生外論



生化編

陽曲傅山青主原本

元和陸懋修九芝校訂

新產治法

凡病起於血氣之衰脾胃之虛而產後尤甚是以丹溪論產後必大補氣血爲先雖有他證以末治之斯言盡治產之大旨非眞置他證於不問只是調和氣血爲本而他證第從其末耳夫產後憂驚勞倦氣血暴虛諸證乘虛易入如有氣毋專耗散有食毋專消導熱不可用芩連寒不可用桂附寒則敗血停滯熱則新血崩流至若中虛外感見太陽表證之多



似可汗也在產後而用麻黃則重竭其陽見陽明府證之多  
似可下也在產後而用承氣則重亡陰血耳聾脇痛乃腎虛  
惡露之停休用柴胡譫語出汗乃元弱似邪之證非同胃實  
厥由陽氣之衰無分寒熱非大補不能救逆而回陽瘧因陰  
血之虧不論剛柔非滋榮不能舒筋而活絡乍寒乍熱發作  
無期證似瘧也若以瘧治遷延難愈言語無倫神不守舍病  
似邪也若以邪治危亡可待去血過多而大便燥結肉蕪蓉  
加於生化非潤腸承氣能通去汗過多而小便短澀生化湯  
佐用參芪必助液生津是賴加參生化湯頻服救欲絕之陽  
長生活命丹屢用進垂危之穀癩疝脫肛多是氣虛下陷補

中益氣之方口噤拳攣乃因血燥類風加參生化之劑怔忡  
驚悸生化湯加以定志似邪恍惚安神丸助以歸脾因氣而  
悶滿虛煩生化湯加木香爲佐因食而噯酸惡食六君子加  
麥麩爲良至若蘇木蓬莪青皮枳殼一應耗氣破血之劑汗  
吐宣下之法止可施諸壯人非所宜於產婦大抵新產之後  
先問惡露如何塊痛未除不可遽加參朮腹中痛止補中卽  
可無疑至若亡陽脫汗氣虛喘促頻服加參生化是從權也  
又如亡陰火熱血崩厥暈速煎生化原方是救急也王太僕  
曰治下補下治有緩急緩則道路達而力微急則氣味厚而  
力重故治產當遵丹溪而固本服法宜效太僕以頻加凡付

生死之重寄須著意於極危欲求俯仰之無虧必存心於愛物此雖未盡產證之詳然所開各證皆接近鄉治驗爲據亦未必無小補云

生化總論

吾見夫世之治產者矣血塊未消則用生地紅花以行之蘇木牛膝以攻之其或虛脹則用烏藥香附以順之枳殼厚朴以舒之甚且青枳蓬稜以下氣定喘芩連梔蘖以退熱除煩至於血結之甚用承氣湯下之而愈結汗多便瀉用五苓散通之而愈祕者比比然矣生化湯新產之主劑而血塊之聖藥也凡當新產塊痛未除或有他病總以生化湯爲主隨證

加減不可拘於貼數一晝一夜必連服三四劑服至病退方  
止其在產後一二日間血塊未消而氣血虛脫或暈或厥甚  
且汗出如珠口氣漸冷煩渴喘急則并無論塊痛與否便須  
從權急救於本方中加入人參三四錢及其病勢稍退仍須  
減參而多服原方若其塊痛已消而見如上諸證更當任用  
加參生化不可疑參爲補而畏之也此方處置得宜必無一  
失天曰大生亦曰大化以此名方直無之而不可耳錢氏原  
方本有熟地世人又每用四物湯治產但地黃性寒滯血芍  
藥酸寒無補伐傷生氣殊非萬全得此以代四物并去原方  
之熟地藥至平穩效可立取夫豈有治病礙產治產礙病之



疑哉

生化湯

當歸 八錢

川芎 三錢

桃仁 十四粒去皮尖研

黑薑 五分

炙草 五分

用黃酒童便各半煎服而不回耳

加參生化湯

人參

三錢有倍加至五錢者

川芎 二錢

當歸 五錢

炙草 四分

桃仁 十粒

炮薑 四分

大棗水煎服

如血塊痛甚加肉桂七分渴加麥冬一錢五味十粒汗多

加麻黃根一錢如血塊不痛加炙黃芪一錢以止汗傷飯

食麩食加炒神麩一錢麥芽五分炒傷肉食加山查五箇



砂仁四分炒

血暈

分娩後眼見黑花頭眩昏暈不省人事者非因勞倦甚而氣竭神昏即因大脫血而氣微欲絕此所以神不守舍而為暈也當急服生化湯不拘貼數以施挽救若因其有血塊未消而偏信古方認為惡血搶心輕用無補耗散之劑認為痰火沖上輒用無補消降之方鮮有不誤者

加味生化湯 治產後三等血暈證

川芎 三錢 當歸 六錢 黑薑 四分 桃仁 十粒 炙草 五分

荆芥 四分 炒黑 大棗水煎服



凡勞倦之甚而暈及血脫氣脫汗脫而暈者並宜連進此湯并加人參三四錢決不可疑參爲補而畏之若痰火乘虛泛上而暈於方內加橘紅四分虛甚者亦須加人參總不可用枳朴破氣蓬稜破血等藥卽山查性緩亦能害命不可擅用其或血塊痛甚兼送益母丸或鹿角灰或元胡散或獨勝散凡用消血塊方中病卽止不可過劑從權急救而已

厥證

產後用力過多勞倦傷脾逆冷而厥氣上胸滿氣短似喘呼吸止息違其常度人猶謂是惡露之未淨而敗血爲患也亦

知其為形脫脈去乎此則并非錢數內之芎歸五六分之乾薑所能回陽而復神者必用加參生化湯倍其分兩連進三劑則氣血旺而神自生厥自止矣若服藥而反渴者另用生脈散獨參湯代茶飲之以救臟之燥即四肢逆冷且兼泄痢類傷寒陰證而又難用四逆湯者亦惟倍參生化湯加附子一片以行參歸之力可以止逆亦可以回陽矣立二方於左分先後而施之

加參生化湯 治產後發厥若塊痛未止不可加芩朮

滋榮益氣復神湯 治產後發厥塊痛已除者

人參 三錢 黃芪 一錢 白朮 一錢 當歸 三錢 炙草 四分

傳教書之斗 卷下 生化編 五



何復君方利

陳皮

四分

五味

十粒

川芎

一錢

熟地

一錢

麥芽

一錢

棗一枚水煎服

手足冷加附子五分汗多加麻黃根一錢熟棗仁一錢

妄見加益智柏子仁龍眼肉大便實加肉苁蓉二錢大

抵產後暈厥一證相類但暈在臨盆其證似急於厥而厥

由病變其證實重於暈要知暈有塊痛芪朮不可加厥無

塊痛卽并用地黃可無疑也

血崩

產後血大來審血色之紅紫視形色之虛實如血紫有塊乃當去之敗血也塊盡自止不可論崩若血色鮮紅則是驚傷



心不能生血怒傷肝不能藏血勞傷脾不能統血血不歸經  
當以崩治生化湯行中有補輕則第用原方可耳若汗多氣  
促甚至形脫宜服倍參生化湯以益氣如產後半月外崩又  
宜升舉大補湯治之此證虛極而藥取平穩未能速效須二  
十帖後諸證乃可除也豈櫻灰榆炭之微能為力邪

生血止崩湯 治產後血崩

川芎

錢

當歸

四錢

黑薑

四分

炙草

五分

桃仁

十粒

荆芥

五分

烏梅

五分

蒲黃

五分

棗水煎忌薑椒熱物生

冷

升舉大補湯

滋榮益氣如有塊痛只服前方



黃芪 白朮 陳皮 各四分 人參 二錢 炙草 升麻 各

四分 當歸 熟地 各二錢 麥冬 一錢 川芎 一錢 白芷 四分

黃連 三分 荆芥穗 四分 炒黑

汗多加麻黃根一錢浮麥炒一小撮大便不通加肉苁蓉

一錢禁用大黃有氣磨木香三分痰加貝母六分竹瀝薑

汁少許寒嗽加杏仁十粒桔梗五分知母一錢驚加棗仁

柏子仁各一錢傷飯加神麴麥芽各一錢然麥芽有回乳

之害用者慎之傷肉食加山查砂仁各八分俱加棗水煎

氣短似喘

此因血脫勞甚氣無所歸呼吸止息違其常度不可認為痰



火反用散氣化痰之方當以大補血爲主如無塊卽當於注  
化湯參用參芪白朮并去桃仁而加熟地足冷加熟附子一  
錢更接補氣養榮湯治之

加參生化湯 治分娩下卽患氣短者 引加棗一枚遠

進二三帖後再用後方

補氣養榮湯 治產後氣短促血塊不痛宜服此

黃芪 一錢 白朮 一錢 當歸 四錢 人參 三錢 陳皮 四分

炙草 四分 熟地 二錢 川芎 二錢 黑薑 四分

手足冷加熟附子一錢汗多加麻黃根一錢浮麥一小撮  
渴加麥冬一錢五味子十粒大便不通加肉蓯蓉一錢麻





傷微者女科 卷一  
仁一撮傷麩飯傷肉食加法如前

### 寒熱

凡新產後榮衛俱虛易發寒熱當於生化湯中稍佐辛甘發散之藥產後脾胃俱虛易於停滯當於生化湯中少加扶脾化食之品世人一見身熱便指爲外邪而任意表散一見氣滯便指爲食積而妄行消導者皆非也大抵產後治法先宜行血和血次則補血補氣其大較也至於治熱輕則用茯苓之淡滲重則加乾薑之甘溫或云大熱而招薑何也曰此熱非有餘之熱乃陰虛內生熱耳乾薑能入肺分利肺氣又能入肝分引眾藥生血然必與陰藥同用之其熱自除若偏補

氣而專用參芪亦非至善之歸也

中風

產後中風口眼喎邪此乃氣血虛甚必以大補為主亦於  
化湯中加減左手脈不足補血藥多於補氣藥右手脈不足  
補氣藥多於補血藥切不可用小續命等發散之劑

傷寒疫瘧

產後或患傷寒疫證瘧疾亦須重產輕邪大補氣血治者甚  
勿妄謂外邪未除輒投梔子豉湯柴芩連蘖等藥亦斷不可  
用只頻服生化湯足矣蓋川芎味辛能散乾薑能除虛熱雖  
有便秘煩渴等證只多服生化湯津液一生二便自通若熱



用寒劑愈虛中氣誤甚

類傷寒證

產後七日內發熱頭痛惡寒勿認作傷寒太陽證口苦咽乾耳聾脇痛勿認作傷寒少陽證潮熱有汗譫語便閉勿認作傷寒陽明府胃中燥糞宜下證數證多由勞倦傷脾運化稽遲氣血枯槁腸腑燥涸乃虛證類實當補之證治者慎勿用麻黃湯以治類太陽證柴胡湯以治類少陽證且妄議三承氣湯以治類陽明胃實證也間有少壯產婦妄汗妄下幸而無妨而於虛弱之人亦復妄行汗下多致不救屢見過汗成瘥誤下成膨且有汗脫不禁瀉下不止者危哉婦人良方云

產後大便祕必待腹滿覺脹欲去不能結在直腸者方用猪  
膽汁潤之若日期雖久飲食如常腹中如故只用補劑而已  
昔仲景云亡血家不可發汗丹溪云產後切不可發表前賢  
非謂產後真無傷寒之兼證也亦非謂麻黃柴胡承氣三方  
之必無對證也誠恐後學執偏門而輕產拘成方而誤治耳  
誰知產後真有傷寒生化中芎藭亦能散之乎

加味生化湯 治類傷寒發熱頭痛

川芎 防風 各一錢 當歸 三錢 炙草 四分 羌活 四分

桃仁 十粒 一本無桃仁有黑薑然必無塊痛方可去之

養正通幽湯 治類傷寒大便祕結

川芎一錢 當歸六錢 炙草五分 桃仁十五粒 麻仁二錢

肉蓯蓉

酒洗去甲  
一錢

汗多便實加黃芪一錢麻黃根一錢人參二錢口燥渴加  
人參麥冬各一錢腹滿溢便實加麥冬一錢枳殼六分  
參二錢肉蓯蓉一錢汗出譫語便實乃氣血虛竭精神失  
守宜養榮安神加茯神遠志蓯蓉各一錢人參白朮各二  
錢黃芪白芷各一錢柏子仁一錢大抵產後傷寒由於陰  
陽不和與敗血不散者異敗血不散者亦能作寒作熱而  
時有刺痛宜桃仁歸尾紅花之類陰陽不和者必無刺痛  
雖見頭痛發熱脇痛腰痛大便秘結而產後亡血禁汗禁

下均宜養血通滯以生化湯加減最為穩當矣

類中風

產後氣血暴虛百骸無所濡養忽然口噤牙緊手足筋脈拘  
搐有似中風卽至項強身反絕類二瘕皆當以未治之勿執  
偏門而用治風消痰之方以重虛產婦也治法當先服生化  
湯以生新血三服後卽加參益氣以救血脫如有痰火可少  
佐以橘紅炒芩竹瀝薑汁之類黃蘗黃連切不可並用慎之

天麻丸 治產後中風恍惚語澀四肢不利

天麻 一錢 防風 一錢 川芎 七分 羌活 七分 人參 遠志

柏子仁 山藥 麥冬 各一錢 棗仁 一錢 細辛 四分



瞻星 八分 石菖蒲 一錢 研細末煉蜜丸辰砂為衣清湯

下六七十丸

滋榮活絡湯 治產後血少口噤項強筋搐

川芎 一錢半 當歸 熟地 人參 各二錢 黃芪 茯苓

天麻 各一錢 炙草 陳皮 荆芥穗 防風 羌活

各四分 黃連 八分 姜汁炒

有痰加竹瀝薑汁半夏渴加麥冬葛根有食加山查砂仁  
以消肉食神麩麥芽以消飯食大便閉加肉蓯蓉一錢半  
汗多加麻黃根一錢驚悸加棗仁一錢

附瘧



加減生化湯 治類瘧有汗者

川芎 一錢 當歸 四錢 桂枝 五分 人參 一錢 炙草 五分

羌活 五分 天麻 八分 麻黃根 一錢 附子 一片 羚羊角 八分

無汗去麻黃根加棗仁防風

類瘧

產後寒熱往來每日應期而發其證似瘧而不可作瘧治夫氣血虛而寒熱更作元氣虛而外邪或侵或晝輕夜重或日晡寒熱有似於瘧實非瘧也治當滋榮益氣以退寒熱有汗急宜止或加麻黃根之類若只頭有汗而不及於足此乃孤陽絕陰之危證急當加地黃當歸之類輕者則可暫與生化





湯加羌活防風連鬚葱白數根以散之其柴胡清肝飲等方  
常山草果等藥俱不可用

滋榮養氣扶正湯 治產後寒熱有汗應期發者

人參 二錢 炙黃芪 白朮 川芎 熟地 麥冬

麻黃根 各一錢 當歸 三錢 陳皮 四分 炙草 五分 棗水煎

加減養胃湯 治產後寒熱往來頭痛無汗

炙草 四分 白茯苓 一錢 半夏 八分 川芎 一錢 陳皮 四分

當歸 二錢 蒼朮 一錢 藿香 四分 人參 一錢 薑引煎服

有痰加竹瀝薑汁半夏神麩凡久瘧不愈兼服參朮膏以

助藥力



參朮膏

白朮一斤米泔浸一宿剉焙人參一兩用水六碗煎

碗再煎二次共汁六碗合在一處將藥汁又熬成一碗

空心米湯化半酒盞

汗

凡分晷時汗出由勞傷脾驚傷心恐傷肝也不可卽用歛汗之劑宜服生化湯二三帖以消塊痛隨服加參生化湯以止虛汗若倦甚濺然汗出形色並脫乃亡陽脫汗也汗本亡陽陽亡則陰隨之尤當倍參以救危惡毋拘塊痛若服參芪後汗仍不止及頭出汗而不至腰足者必難救療凡汗出而手

拭不及者不治汗出而復氣喘虛之極也不受補者不治

麻黃根湯 治產後虛汗不止

人參 二錢 當歸 二錢 黃芪 一錢半 白朮 一錢 桂枝 五分

麻黃根 一錢 粉草 五分 牡蠣 研少許 浮麥 一大撮

虛脫汗多手足冷加黑薑四分熟附子一片渴加麥冬一

錢五味十粒肥白人產後多汗加竹瀝一盞薑汁一小匙

以清痰火惡風寒加防風桂枝各五分血塊不落加熟地

三錢晚服八味地黃丸

山萸肉 山藥 丹皮 雲苓 各八錢 澤瀉 五錢

熟地 八錢 五味子 五錢 炙黃芪 一兩



煉蜜爲丸每服三錢宜避風寒汗多小便不通乃亡津液故也勿用利水藥

盜汗

又產後睡中汗出醒來即止猶盜賊人睡而謂之盜汗非汗自至之比雜證論云自汗陽虧盜汗陰虛然當歸六黃湯又非產後盜汗方也惟兼氣血而調治之乃爲得耳

止汗散 治產後盜汗

人參 二錢 當歸 二錢 熟地 一錢半 麻黃根 五分

黃連 五分 浮小麥 一大撮 棗 一枚

又方



牡蠣 煨細末五分  
小麥麩 炒黃研末五分

口渴兼小便不利

產後煩躁咽乾而渴兼小便不利由失血汗多所致治當助脾益肺升舉氣血則陽升陰降水入經而津滋液潤穀入胃而氣長脈行自然便調渴解矣若認口渴為火而用芩連梔藥以降之認小便不利為水滯而用五苓散以通之皆失治也必因其勞者溫之損者益之則庶幾矣

生津止渴益水飲

人參 麥冬 當歸 生地 各三錢  
黃芪 一錢

葛根 一錢  
升麻 炙草 各四分  
茯苓 八分



五味子 十五粒

汗多加麻黃根一錢浮麥一大撮大便燥加肉苁蓉

五分渴甚加生脈散不可疑而不用

妄言妄見

產後之妄言妄見由氣血虛神魂無依也治當論塊痛有無而斟酌於生化原方加參生化之間或補中益氣湯加安神定志丸服至藥力充足其病自愈勿謂邪崇噴以法水每至不救屢治此證服藥至十數帖方效病虛似邪欲除其邪先補其虛古之道也

安神生化湯 治產後塊痛未止妄言妄見



川芎 一錢 柏子仁 一錢 人參 一二錢 當歸 二三錢

茯神 二錢 桃仁 十二粒 黑薑 四分 炙草 四分 益智 八分

陳皮 三分 棗水煎

滋榮益氣復神湯 治產後塊痛已止妄言妄見

黃芪 白朮 麥冬 川芎 柏子仁 茯神

益智 各一錢 人參 熟地 各二錢 陳皮 三分 炙草 四分

棗仁 十粒 五味子 十粒 蓮子 八枚 圓肉 八箇 棗水煎服

產後血崩血脫氣喘氣脫神昏神脫雖有血氣陰陽之分其精散神去一也若指為氣實痰火失之者多矣塊痛未止即用加參生化湯行中有補亦不至於血滯其塊痛止



用升舉大補湯少佐黃連墜火以治血脫所以引血歸經  
也用倍參補中益氣湯少佐附子助參以治氣脫所以攝  
氣歸淵也用滋榮益氣復神湯少佐痰劑以清心火所以  
安君主之官也

### 傷食

產後飲食不節必傷脾胃治當健脾益胃審傷何物加以消  
導之藥生化湯加神麩麥芽以消麩食加山查砂仁以消肉  
積加吳萸肉桂以消寒冷之積虛甚加人參自朮消補兼施  
無有不安者屢見治者惟知速消傷物反損真氣益增滿悶  
可不慎哉





加味生化湯 治血塊未消復傷食積

川芎 二錢 當歸 五錢 黑薑 四分 炙草 五分 桃仁 十粒

審傷何物加法如前

長生活命丹

人參 三錢 煎湯一盞以米飯鍋焦研粉加入三匙鍋焦

粉能引開胃口如服寒藥傷者加薑三大片人參名活

命草鍋焦名活命丹此方會活數十人

如停寒物日久脾胃極弱藥不能運可用揉按法炒神麩

炭之更妙凡誤用消導反絕粥幾日者亦惟此方是宜

傷氣



產後忿怒氣逆胸膈不利血塊又痛宜用木香生化湯塊自  
化而怒自散不相悖也若輕產重氣偏用木香烏藥枳殼  
仁之類則元氣反損益增滿悶又如怒後即食胃弱停悶  
勿用木香檳榔丸流氣引子等方使虛弱愈甚也

木香生化湯 治產後傷氣

川芎 二錢 當歸 六錢 陳皮 三分 黑薑 四分 服時更磨木

香二分沖入

健脾化食散氣湯 治產後傷氣傷食無塊痛者

白朮 二錢 當歸 二錢 川芎 一錢 黑薑 四分 人參 二錢

陳皮 三錢 審傷何物加法詳傷食條



大抵產後忿怒氣逆及飲食停滯二證善治者必以補氣血爲先而少佐以調肝順氣則怒鬱自散少佐以健脾消導則停食自行若專理氣消食非徒無益又害之矣

咳嗽

產後六七日外感風寒咳嗽鼻塞聲重惡寒勿用麻黃嗽而脇痛勿用柴胡當於生化湯加減治之

加味生化湯 治產後外感咳嗽鼻塞聲重

川芎 一錢 當歸 二錢 杏仁 十粒 桔梗 四分 知母 八分

有痰加半夏麴虛弱有汗加人參總之產後不可發汗

加參安肺生化湯 治產後虛弱外感咳嗽痰多

川芎一錢 人參一錢 當歸二錢 橘紅三分 半夏七分

杏仁十粒去皮尖 桑白皮一錢 知母一錢 桔梗四分

甘草四分

痰膩不爽加竹瀝一杯薑汁半匙

嘔吐

產後勞傷臟腑寒邪乘於腸胃則氣逆嘔吐而食不得下又有瘀血未淨而嘔者亦有痰氣入胃胃口不清而嘔者當隨證調之

加減生化湯 治產婦嘔逆不食瘀血未淨者

川芎一錢 當歸三錢 黑薑 砂仁 藿香 各五分



淡竹葉 七片 水煎和薑汁二匙服

溫胃丁香散 治產後七日外嘔逆瘀血已除者

人參 一錢 當歸 三錢 白朮 二錢 黑薑 四分 丁香 四分

陳皮 五分 前胡 五分 藿香 五分 炙草 五分 薑 三片

石蓮散 治產婦嘔吐心沖目眩

石蓮子 去殼去心 一兩半 白茯苓 一兩 丁香 五分 共為細末米

飲下

生津益液湯 治產婦虛弱煩渴多汗嘔吐

人參 麥冬 去心 茯苓 各一兩 炙草 五分 竹葉 七片

浮小麥 一撮 栝樓根 二錢 大棗 二枚



大渴不止加蘆根

霍亂

由產後勞傷氣血臟腑空虛不能運化食物及感冷風所致  
陰陽升降不順清濁亂於脾胃冷熱不調邪正相搏為霍亂  
當視其塊痛之有無而分別治之

生化六和湯

治產後未除血塊而患霍亂者

川芎

二錢

當歸

四錢

黑薑

炙草

陳皮

藿香

各四分

砂仁

六分

茯苓

一錢

薑

二片

附子散

治產後霍亂吐瀉手足逆冷無塊痛者

附子

五分

丁香

四分

黑薑

四分

當歸

二錢

白朮

一錢



陳皮 四分 甘草 四分 共為末粥飲送下二錢

溫中湯 治產後霍亂吐瀉不止無塊痛者

人參 一錢 白朮 一錢半 當歸 二錢 厚朴 八分 黑薑 四分

茯苓 一錢 草果 六分 薑 三片

食不下加砂仁

水腫

產後手足浮腫皮膚見光榮色乃脾虛不能制水腎虛不能行水也豈利水之劑所可治乎大致總以六君子湯五皮飲兩方隨證加入蒼朴陳半香蘇之類無不安者

六君子湯



五皮飲

又有惡露不淨停留胞絡致令浮腫者若概以水氣治之誤矣但服調經散血行而腫自消也

調經散

沒藥

另研 琥珀 另研 各一錢

肉桂

赤芍

當歸

各一錢

右為細末每服五分薑汁酒各少許調服

自愈

流注

產後惡露流於腰臂關節之處或漫腫或結塊久而作痛肢體倦怠急宜用參歸生化湯以消血滯外用葱熨法以治腫





無緩也未成者消已成者潰

參歸生化湯

川芎 一錢半 當歸 二錢 人參 二錢 炙草 五分

黃芪 一錢半 肉桂 五分 馬蹄香 二錢

葱熨法

用葱一握炙熱搗爛作餅敷痛處用厚布二三層以熨

斗熨之

此病若不補氣血節飲食慎起居未有得生者如腫起作痛起居飲食如常是病氣未深形氣未損易治也若漫腫微痛起居倦怠飲食不足最為難治或未成膿未潰氣血



虛也宜服八珍湯增寒惡寒陽氣虛也宜服十全大補湯  
補後大熱陰血虛也宜服四物湯加參朮丹皮嘔逆胃氣  
虛也宜服六君子湯加炮薑乾薑食少體倦脾氣虛也宜  
服補中益氣湯四肢冷逆小便頻數腎氣虛也補中益氣  
湯加益智仁一錢

### 中滿

婦人素弱臨產又勞中氣不足胸膈不利轉運稽遲遂成中  
滿之證多因食傷氣鬱而又惡露停留大便燥結此屬氣血  
兩虛卽當大補氣血若但知傷食當消氣鬱宜散惡露必攻  
便結可下則胃氣反損滿悶益增氣不升降溼熱積久遂成

膨脹若早服生化湯以消塊痛服加參生化湯以健脾胃當無此患也

補中益氣湯 治中氣不足微滿服耗氣藥成脹者

人參 五分 當歸 五分 白朮 五分 白茯苓 一錢 川芎 四分

白芍 四分 木香 二分 萊菔子 四分

健脾湯 治脇下積塊服消導藥成脹者

人參 白朮 當歸 各三錢 茯苓 白芍 神麩

吳萸 各一錢 大腹皮 陳皮 各四分 砂仁

麥芽 各五分

養榮生化湯 腹痛大便不通服下藥成脹者



當歸 四錢  
白芍 一錢  
白茯苓 一錢  
人參 一錢  
白朮 二錢

陳皮 五分  
大腹皮 五分  
香附 五分  
菴蓉 一錢  
桃仁 十粒

凡誤用消食耗氣藥以致絕穀者長生活命丹屢效  
傷食條

### 怔忡驚悸

由產後憂驚勞倦去血過多則心中跳動不安謂之怔忡心中怯怯如人將捕之狀謂之驚悸治此二證惟調和脾胃志定神清其氣自愈如血塊未消宜服生化湯補血行塊不必加安神定志塊消痛止宜服加減養榮湯

當歸 二錢  
川芎 二錢  
扶神 一錢  
人參 一錢  
棗仁 一錢



麥冬 一錢 遠志 一錢 白朮 一錢 黃耆 一錢 圓肉 八枚

陳皮 四分 炙草 四分

薑煎虛煩加竹瀝薑汁去川芎麥冬

養心湯 治產後心血不定心神不安

炙黃芪 一錢 茯神 八分 川芎 八分 當歸 二錢

麥冬 一錢 遠志 八分 柏子仁 一錢 人參 一錢半

炙草 四分 五味 十粒

薑水煎服

心痛

此即胃脘痛也因胃脘在心之下凡勞傷風寒及食冷物每



致作痛俗乃呼為心痛心可痛乎血不足則怔忡驚悸不  
 耳若真心痛手足青至節旦夕死矣治當散胃中之寒氣將  
 胃中之冷物必用生化湯佐祛寒消食之藥無不安者若  
 綿而痛可接而止問無血塊即當加補大凡產後心痛腹痛  
 二證相似都因寒食與氣上攻於心則心痛下攻於腹則腹  
 痛均當用生化湯加肉桂吳萸等溫散之藥也

加味生化湯

川芎 一錢 當歸 三錢 黑薑 五分 肉桂 八分 吳萸 八分

砂仁 八分 炙草 五分

傷寒食加肉桂吳萸傷麪食加神麪麥芽傷肉食加山查

砂仁大便不通加肉苻蓉

腹痛

先問有塊無塊塊痛只服生化湯調失笑散二錢加元胡  
錢無塊則是風冷作痛宜服加減方

加減生化湯

川芎 一錢

當歸 四錢

黑薑 四分

炙草 四分

防風 七分

吳萸 六分

白蔻 五分

桂枝 七分

痛止去之隨傷食物所加如前

腰痛

由女人腎位繫胞腰為腎府產後勞傷腎氣損動胞絡或虛



未復而風乘之也

養榮壯腎湯 治產後感風寒腰痛不可轉

當歸 二錢 川芎 八分 防風 四分 獨活 八分 桂心 八分

杜仲 八分 續斷 八分 桑寄生 八分

生薑三片水煎服兩帖後痛未止屬腎虛加熟地三錢

加味大造丸 治產後日久氣血兩虛腰痛腎弱

胡桃 十二箇 破故紙 八兩酒浸炒 杜仲 一斤薑汁炒去絲

為細末煉蜜丸淡醋湯送六十九

脇痛

乃肝經血虛氣滯之故氣滯四君子湯加青皮柴胡血虛四





物湯加柴胡人參白朮若概用香燥之藥則反傷清和之氣矣

補肝散

山萸

二錢

當歸

二錢

五味

十粒

黃芪

八分

川芎

六分

熟地

一錢半

木瓜

一錢

白朮

一錢

獨活

八分

棗仁

一錢

薑

二片

遍身痛

此因產後氣虛百節開張血脈流散而經絡間血反多阻滯故致筋牽脈引骨節不利腰背不能轉側手足不能動履且見身熱頭痛若誤作傷寒發表出汗則筋脈動蕩手足發冷



變證作矣宜服趁痛散

當歸 一錢  
甘草 八分  
黃芪 八分  
白朮 八分  
獨活 八分

肉桂 八分  
桑寄生 一錢  
牛膝 八分  
薤白 五箇  
薑 三片

小腹痛

產後虛中感寒飲冷其寒下攻小腹作痛又有血塊作痛者  
又產後血虛臍下痛者並治之以加減生化湯

當歸 三錢  
川芎 一錢  
黑薑 四分  
炙草 四分  
桃仁 十粒

前胡 一錢

瀉

產後泄瀉大率氣虛而食積溼滯也氣虛宜補食積宜消溼



滯宜燥誰不知之然惡露未淨未可拘也先服生化湯二三帖化舊生新新血既生然後補氣以消食燥溼以利水便無滯澀虛虛之失矣如痛下清水腹鳴米飲不化者以寒泄治糞水黃赤肛門作痛者以熱泄治飲食過多傷脾成泄氣臭如敗卵者以食積治脾虛少食食下即鳴急盡下所食之物方快者以虛寒泄治之大凡虛瀉昏不識人弱甚形脫之證必用人參二錢白朮茯苓各二錢附子一錢方能回生若脈浮弦按之不鼓即爲中寒此蓋陰先亡而陽欲去速宜大補氣血加附子黑薑以回元陽而況其在產後乎

加減生化湯

治產後塊未消患瀉證

川芎 二錢 茯苓 二錢 當歸 四錢 黑薑 五分 炙草 五分

桃仁 十粒 蓮子 八枚

健脾利水生化湯 治產後塊已除患瀉證

川芎 一錢 茯苓 一錢半 歸身 二錢 黑薑 四分 陳皮 五分

炙草 五分 人參 三錢 肉果 一箇 煨 白朮 一錢 炒 澤瀉 八分

寒瀉加乾薑八分 寒痛加砂仁炮薑各八分 熱瀉加炒黃

連八分 瀉水腹痛米飲不化加砂仁八分 麥芽山查各一

錢 瀉有酸噉臭氣加神麩砂仁各八分 瀉水者加蒼朮一

錢 以燥溼諸瀉俱加升麻酒炒蓮子十粒

完穀不化



此因產後勞倦傷脾而運轉稽遲名曰飧泄產方三日塊未  
消化脾胃衰弱補劑未可遽用者且服生化湯加益智砂仁  
少溫脾氣俟塊消後即加參芪朮補氣肉果木香溫胃升麻  
柴胡清胃氣陳皮荅瀉以利水可也

加味生化湯 治產後三日內完穀不化塊未消者

川芎 一錢 益智 一錢 當歸 四錢 黑薑 四分 炙草 四分

桃仁 十粒 荅荅 一錢半

參荅生化湯 治產後三日內塊已消穀不化者

川芎 一錢 當歸 二錢 黑薑 四分 炙草 五分 人參 二錢

荅荅 一錢 白芍 一錢 益智 一錢 白朮 二錢 肉果 一箇

瀉水多加澤瀉木通各八分腹痛加砂仁八分渴加麥冬  
五味子寒瀉加黑薑一錢木香四分食積加神麴麥芽消  
飯麴砂仁山查消肉食產後瀉痢日久胃氣虛弱完穀不  
化宜溫助胃氣六君子湯加木香四分肉果一箇

中痢

產後七日內外患赤白痢裏急後重最爲難治欲調氣行血  
而推蕩痢邪猶患產後元虛欲滋榮益氣而大補虛弱又慮  
助邪爲患惟生化湯減乾薑而代以木香茯苓則善消惡露  
兼治痢疾並行而不相悖也若七日外有患褐花色後重頻  
併者卽當加補無疑香連丸在所必禁也

加減生化湯

治產後七日內患痢

川芎 二錢

當歸 五錢

炙草 五分

桃仁 十粒

茯苓 一錢

陳皮 四分

木香 三分

磨

紅痢腹痛加砂仁八分如產後久瀉元氣下陷大便不禁

赤痢門如脫色赤者乃脾土真氣虛損宜服六君子湯及補

中益氣湯加木香肉果薑汁色白者屬血虛宜四物湯加

人參荆芥傷麩食宜生化湯加神麩麥芽傷肉食宜生化

湯加山查砂仁赤白痢臍下痛宜當歸川芎桃仁厚朴黃

連肉果甘草

門下晚學生馮汝玖校字



跋

近見有所謂太原傅科者有男科兒科之名爲石耀卿刻於  
光緒己卯前有康衢王道平一序云同治癸亥有邦定羅公  
持以相贈問所從來則曰是平定州孫毓芝所傳藏之笥中  
四十餘年矣因子好女科特爲相示其時有羅正南王書銘  
安敦友亦善此書遂各捐貲刻之因梓人索序爰述其稿之  
所由來板之所由成以待能文之士棄此而重爲之序云云  
時在同治二年十二月耀卿太原人名麗權余謂傅徵君所  
傳醫書只有女科安有所謂男科兒科者玩羅公所言因子  
好女科特爲相示二語明是投其所好使人謂女科外又有





