秘傳經驗痘疹方

859
54

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

859-54

秘傳經驗瘡瘍方

一成實證治括 凡二十首

起發已透漸成膿 毒隨膿化語無凶

或逢空殼及清水 毒氣留連可慮終

已潰潰後自起發之後血化為水水化為膿至此膿已

成矣毒已化矣飲食如常身無所苦可以語人曰

幸無事而吉也若但起發殼中出水者此氣至而

血不隨也或含水色平塌不起者此血至而氣不

隨也或窠囊浮脹中含清水如水泡之狀者此血

氣俱虛不能制毒反為毒逼漸變痒瘡也治此之

起発虛實

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

法血不足者益其榮以四物化毒湯氣不足者益其衛以保元化毒湯氣血俱不足者托其毒固其榮衛使無痒瘡以十全化毒湯藥中病者吉病拂藥者凶亦有飲食如常六腑充實者其見空亮清水之證雖能收斂未免爲瘟毒也不可不早待之

四物化毒湯

如上法焉

川芎　當歸身　生地黃　甘草少許

白芍　麥門冬　牛旁子炒　官桂少許

木通　水煎服

保元化毒湯

人參　黃芪　甘草　當歸

川芎　官桂　牛旁子炒　防風

赤芍　荆芥穗　水煎服

已下脫十全化毒湯諒補　氣血藥中加解毒藥

遍身膿泡毒化盡　外邊只怕生形症

莫言無事使因循　及掌吉凶多不定

瘡瘡至為膿泡此收功之時手足常要和煖過熱

過冷者變也人常要安靜煩燥悶亂者變也六腑

要充實忽吐痢者變也聲要清亮忽瘖啞者變也

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

飲食要漸進忽不食反作渴者變也色要蒼蠟形
要飽滿忽灰白平痛者變也瘡要安和忽痒痛者
變也或觸風寒或犯禁忌或傷飲食或悞湯丸審
而治之可也

四肢溫煖最相宜　寒熱平常勢漸危
拘攣端的是良醫　補瀉中間能謹慎

瘡瘡如終手足常宜和煖不宜太熱太寒太熱則
火甚太寒則水甚水火偏勝則殘矣假如病人六
腑閉結狂妄煩燥口乾作渴其脈洪數沉緊者此
實也宜瀉之手足熱者本病也冷者陽極似陰謂
之陽厥下之勿疑承氣化毒湯主之如病常吐利
其脈沉弱沉細者此虛也宜補之手足冷者本病
也熱者陰極似陽謂之陰躁回陽化毒湯主之

手足寒熱

承氣化毒湯

枳實　厚朴　大黃　酒炒　枳椇
甘草　水煎服

回陽化毒湯

人參　官桂　白茯苓　白朮
甘草　熟附子　水煎服

養漿安靜始為奇　戰惕鳴牙總可疑

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

痛痒燥煩雙足冷　縱然盧扁也難為

凡瘡瘡已成漿或寒戰或咬牙單見一證者可治

蓋寒戰者瘡出太盛表虛而振振動搖也養衛化

毒湯主之咬牙者心肝火旺其牙相戛而鳴也清

神化毒湯主之若寒戰咬牙併作者此陽脫神喪

則不可治矣瘡痛者膿血綳急而脹痛也導赤化

毒湯主之煩燥不止及增昏悶者死吐利而手足

冷者用回陽化毒湯如兼上寒戰咬牙昏悶煩燥

痒瘍者雖盧醫之聖亦何為哉

養衛化毒湯

人參　炙黃芪

當歸　水煎服

桂枝　甘草

清神化毒湯

升麻　生地黃

麥門冬　木通

防風　甘草

水煎服

導赤化毒湯

木通　麥門冬

枝子仁　酒炒　甘草

辰砂　研調　酸棗仁　炒

燈心　水煎服

有膿有血毒歸瘡　只要其人正氣強

莫遣中虛生吐瀉　功虧一簣消詳

寒戰咬牙

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

凡痘瘡成漿之時不宜吐利如吐而無物者乾嘔
也為忌證此衛任之火上冲於胃直犯清道而逆
出之吐而有物者以養胃化毒湯治之其瀉者視
其所出之物如色黃而臭者熱也香蓮化毒湯主
之清冷者寒也理中化毒湯主之瀉久不止者不
論冷熱通以理中化毒湯豆蔻丸兼而治之二方
見上如吐利不止手足冷者附子化毒湯主之或
陳氏木香散異功散皆可選用但二藥猛峻不可
不慎也其有無時溏瀉手足和煖飲食如常者治
之不止亦可言無事也

養胃化毒湯

白朮　陳皮　白茯苓　黃連 炒　姜汁炒　砂仁　水煎服

香連化毒湯

木香　黃連 炒　猪苓　炙甘草　白朮 炒　水煎服

理中化毒湯

人參　甘草　白朮　白茯苓　乾姜　水煎服

附子化毒湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

附子　乾姜　人參　白朮
黃芪　耳草炙　水煎服

身外諸証膿血成　咽喉從此漸和平
反加嗆水聲音啞　咽爛喉穿敢料生

凡痘初出失於調解咽喉以致毒火薰蒸喉舌多
瘡又失於解毒具瘡稠密然外瘡未熟此瘡先熟
至於養漿之時則熟者又先靨矣所以咽喉宜漸
寬平飲食無苦聲音清亮斯為吉也若當此時反
飲水則嗆食谷則噦甚者失聲此內瘡糜爛舌上
成坑咽門腐坯肺管壅寒則至呼吸俱廢飲食卒
絶而死矣亦有先本無瘡內食辛熱之物或誤投
辛熱之藥其後旋生是証者可急用耳桔化毒湯
解之病退者吉不退者凶或有喉門中無疒而暴
啞者此少陰之血不榮於舌也養心化毒湯主之
有聲而不清者此火乘於肺也瀉白化毒湯主之
中病即已不中者勿治

耳桔化毒湯

桔梗　耳草
連翹　水煎入竹瀝服　牛旁子炒　麝香

養心化毒湯

當帰　生地黄　麥門冬　升麻
人參　燈草引水煎服
瀉白化毒湯
桔梗　石膏 煅研　地骨皮　天花粉
耳草　水煎入竹瀝服
陷起平火脚潤紅　窠囊飽滿盡成膿
自然氣色都如式　略見差池便不中
凡瘄瘡養漿之時則平日中陷者盡起頂平者盡
尖自然根脚紅活而窠囊飽滿其色蒼蠟氣如蒸
豆也若色灰白者雖膿之正色亦由氣血不足大

瘄色灰白

神化毒湯主之或因瀉泄而致此者固本化毒湯
主之若氣腥臭者此有濕熱當解其標解肌化毒
湯主之更以益元散薄敷瘡上令無致於潰爛也

固本化毒湯
人參　白朮 炒　耳草 炙　乾姜 炙
官桂　丁香　訶子肉 炒　水煎服

太神化毒湯
人參　白朮 炒　耳草 炙　黄芪 炙
桂 少許　當帰身　赤芍　水煎服

解肌化毒湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

升麻　葛根　連翹　天花粉
赤芍　荆芥穗　耳草　黄栢 酒炒
蒼朮 米泔浸炒　水煎服

益元散

滑石 二兩　甘草 五錢

共為末蜜水調敷焦痛着入臙脂水敷
每怕漿時搔痒攻　用心調護極疲癃
不分乾濕皆出殊不知起發之時其癃未熟
凡瘡至成漿切防瘙痒抓破以泄其氣俗言抓破
出血者吉不出者凶兆　只要成癃有血膿
而內是血故抓破者出血養漿之時其癃已熟而
內是膿故抓破者無血有血無血何足以定吉凶
大抵不宜作痒耳如作痒而人清爽自知其悞抓
破或言其痒欲人拊之者吉作痒而悶乱煩燥語
之不聽禁之不止搖頭扭項手足舞亂者凶也
如其人清爽瘙痒不住者視其形體壯實嘗無吐
瀉者四聖化毒湯主之如元氣瘦弱而有吐瀉者
參歸化毒湯主之已上二証俱用薰法現又要看
其抓破者若復灌爛成瘡則吉破而不灌皮肉焦
黑者反不可治

漿時搔痒

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

四聖化毒湯

木通　當帰尾　赤芍　防風

官桂 少許　水煎服

參帰化毒湯

人參　當帰　黄芪　赤芍

桂枝　白朮　耳草炙　水煎服

正面將膿早破傷　依然瞳灌復成瘡

莫嗟敗面留殘喘　瞳若消時可斷腸

凡視瘡瘡以正面為主蓋五臟精華皆聚於面故也如別處瘡瘡有破損者而正面瘡瘡箇箇完全

反主無事若正而瘡瘡成片破損別處雖完亦何用哉故有破損處復得瞳灌成瘡膿血淋漓却人無事他日雖敗面穿鼻破唇但留殘喘不猶愈於死耶若破損處不灌不瞳其瞳又消而目閉者此毒氣倒陷決不可治

眉心鼻準耳輪邊　唇口諸瘡要活鮮

但有焦枯并黑黤　慢求醫卜早尋棺

凡瘡欲成膿之時眉心鼻準耳輪唇口及兩頰若先有焦枯黑黤者此名倒陷決主凶兆醫之不能禱之無益

漿時焦枯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

待得成漿便要漿　切防乾癟見空囊
是名倒伏多平証　治此雖知各有方
既曰自出現而起發自起發而養漿則到養漿之
時便要成漿如苟養漿而反不見漿依舊平癟與
未起發時相似或只起發内却無水乾枯空虛此
名倒伏謂之倒者膿根在裏也為之伏者毒伏而
不出也又謂之陷者毒出而復入也於此時候人
事清爽飲食如常者別而治之小便少大便秘壯
熱煩渴者宜下之承氣化斑湯 方見 上
脈微弱者宜温之回陽化毒湯 方見 上
苦人事昏悶

寒戰咬牙足冷腹脹喘促者死
額上渾如沸水澆溶溶破爛不堅牢
漸延兩頰都虧損泄盡元陽死莫逃
凡瘡瘡起發養膿額上如沸水所澆之象皮溶易
破不成顆粒大片潰爛此衛氣不主毒火蒸灼漸
延兩頰破損水去而乾似靨非靨則陽脫陰留陡
增燥悶呻吟而死矣
瘡頭有孔膿浸出　結聚成堆雞矢形
此箇未聞人救得　不須醫治費辛勤
凡瘡瘡最要皮囊堅厚包裹完全有瘡頭有孔膿

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

水漏出唯聚乾結其色灰白如天泡瘡及癩頭瘡
之形者或清水非膿無事自破水去而乾黑者此
皆痛氣所為傳染相似俗名漏瘡未有能治者矣
臂膊腰臀久著床　好瘡堅實自無傷
如逢破爛無膿水　未見何人命久長
凡瘡瘡稠密最難為臂膊正背腰臀之間其處久
著床席展轉指摩若非堅牢厚實鮮有不破損者
但破損之處定須灌爛急難成痂苟破爛成片焦
乾黧黑如火燒湯潑之狀者必死又幾見人手足
破爛成丘而不灌者亦難治

略見漿膿緊護持　莫教人物往來馳
邪風穢氣相侵觸　變亂無常悔卻遲
凡瘡瘡起發之後漸漸養漿即須謹飭房戶禁止
人物內者休出外者休入恐防穢獻觸犯其瘡輕
者作痒作痛而變為重重者痒瘙抓搔煩悶而死
故房戶內外常要燒蒼术大黃以避不正之氣今
人只用稻草燒烟亦省易也切不可燒諸香香能
助大透入關門所以忌之其諸厭穢房事最毒酒
次之五辛又次之死屍之氣列於糞穢狐狸之氣
甚於犬羊烈風暴雨亦能為害飲食之間偏寒偏

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

熱者不恣口也天大熱則薄其衣被常令清涼天大寒則厚其蓋覆常令温煖皆調護切要之法不可不知也世事喜用僧道千家誦呪洒水解滌穢厭此借密呪灵章以祛不祥用之無忌但僧道恐有不潔而反為害者解厭之時每以法水與病者飲之此尤害之甚者不知暑月尚可不知寒月飲水失其時令而瘡瘡飲水後多收斂不齊迷而弗悞良可歎也所以醫師僧道必選老成練事之人既能清心寡慾又經歷多自然能寄人之司命也凡被房事及經水生產之穢所犯者以大棗燒烟解之被厭者以生姜燒烟解之被死屍之氣及癘氣所犯者以蒼朮大黃燒烟解之凡為狐臭犬羊厭者燒楓香毬解之凡遇風雨燒蒼朮楓毬避之

膿血淋漓心臟虛　舍空神亂被邪如

妄言譫語難甦醒　養血安神病自除

凡瘡瘡稠密者成漿之時或有昏昏而睡呼之不醒或口中喃喃妄言狂語如被邪之狀時人不知多生驚恐殊不知此由膿血出多心舍空虛神無所依而然法當養血安神其病自安寧神化毒湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

及安神丸生之如服藥不醒反加悶亂者死

寧神化毒湯

人參　當歸身　生地黃　麥門冬
木通　石菖蒲　山梔仁炒　赤茯苓
燈心　水煎服

安神丸

黃連炒一錢　當歸身一錢半　茯神八分　甘草炙五分
遠志去心一錢　石菖蒲一錢　酸棗去殼五分

共為細末猪心血搗爛和丸如粟米大辰砂為衣
燈心湯下

瘡成腹痛是何因　便秘脹中燥糞侵
轉下頓教人爽快　若胃受冷却宜逼

瘡出之初而腹痛者可言毒氣瘡成無膿而腹忽
痛未可言毒也只審其人若向未得大便此燥糞在
裏而痛用大黃化毒湯微利之不可拘於首尾不
可下之說坐以待之反變他證也若因悞食生冷
或飲冷水而痛者可温之温中化毒湯主之中病
即已

大黃化毒湯

升麻　當歸稍　生地黃
麻子仁研

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

桃仁泥　紅花　枳殼　大黃酒蒸
梹榔碾末　水煎入桃仁泥梹榔末同服

溫中化毒湯

丁香　人參　木香　白朮
桂心　丹草炙　白芍炒　砂仁
枳實　陳皮　乾薑炙　水煎服

瘡毒無邪膿血已就可無苦矣忽然
此候多因傷食來　消導轉下無差悞
凡瘡瘡順正表裡無邪膿血已就忽然腹脹滿氣喘促瘡色變又煩燥者必傷食而得也
何以知瘡正故也輕者消導之助脾化毒湯甚者不二丸以所傷之物為引送下再服補中化毒湯

助脾化毒湯

陳皮　半夏　厚朴　枳殼
蘇子炒　羅蔔子炒　梹榔　水煎服

不二丸

蒼朮制二兩　草烏去皮尖一兩　羌活一兩半　杏仁去皮尖四十九粒　巴豆去殼油四十九粒

共為細末神麯糊為丸如皁角子大黃栢碾末為衣每用一丸原物煎湯下補中化毒湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

陳皮　白朮　砂仁
斗草　山查肉　水煎服

瘡瘡盡說待膿成　誰識成膿未足憑
飽滿堅牢誠可愛　塌平淫濕又堪驚

世俗之見只知瘡瘡過了一七起發作膿便言無
事不知成膿之時亦不可憑信無事也若是郭郭
堅厚膿漿飽足其言無事信矣如塌平不飽足淫
濕不堅厚莫言無事乃至十二三日以後尚有變
異即所謂延綿日久而後斃者是矣
除却諸般逆險瘡　且將順証與端祥

緣何到得成膿日　又有凶危不可量

瘡瘡分三等有順有險有逆逆者不可治險者治
之吉不治凶順者不必治今除逆者險者不必論
之只將順而正者既言不必治緣何剋得成漿之
時或反為險或反為逆也蓋由矣如將理犯其禁
忌不應服藥而悞服湯丸喜其輕少而不調護故
令輕者變重此人事害之也又有只出一二粒而
敗形殞命者又癘氣使然豈人能逆料哉

一收靨証治括　九十七首

收靨難拘日數論　但憑稀密實虛分

塌平淫濕收括

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

緩收循序多堅穩　太急須防餘毒侵

凡痘瘡收靨不可以日數拘也大抵痘本稀元氣實者自然易出易靨若瘡本稠密元氣虛者難出難靨也只要循序緩收飲食如常便無他証如收太急此毒火煎敖熏灼氣燥血枯非正收也必發瘟毒生怖証甚則夭亡微則殘形摸目矣

人中上下別陰陽　收靨先於此處良

看是足顱先靨黑　多乆少吉早隄防

人中者任督二脈交會之衝也痘瘡出狀收靨俱要在此部位先見者佳謂陰陽和暢若如額顱手足心先收靨者此邪氣攻心內臟先壞不可藥救

收靨元來要整齊　臭醒爛潰便蹺蹊

中間順逆宜詳審　不可逡巡當局迷

痘瘡收靨貴於整齊乾圓如螺靨者上也頂破膿出結聚如雞矢者次也破損無痂者下也凡遇此等收靨便須詢察曾犯何逆如氣血本實曾誤投以補藥者此邪氣得補反蝕正氣如火灼爛宜用天水散以解其標則邪火退而收靨齊矣如曾多飲冷水濕浸脾胃以致收靨不齊者以除濕湯內滲其濕外燥其表令好收靨也若頭面潰爛其氣

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

醒臭及遍身手足和皮脫去者宜分順逆果膿成
毒化飲食如常更無他苦者順也膿水未成是名
倒靨逆則生變不可量也
天水散
滑石一兩　甘草五錢
共為細末蜜水調鶏翅拂拭瘡上
除濕湯
羌活　蒼朮　防風　朱苓
木通　沢瀉　白朮　赤茯苓

瘡子收時膿自乾　封藏斂束売團圓
莫教腐爛和皮脫　此箇還將倒靨看
瘡先出時一點血血化為水水化為膿膿乾結痂
封藏斂束渾如螺靨此毒從外解也若到膿成之
後不能結痂反成腐爛和皮脫去者此到靨也倒
靨者乃毒氣内入也
但逢倒靨細消詳　復腫翻生却不妨
頭面腫消空不補　毒根深入剥膚牀
凡瘡倒靨者多係中氣不足急用補中托裏之法
其頭面瘡已破者復加腫灌手足遍身原無瘡處

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

又復出一層謂之補空俗呼翻生瘡子是也此正
氣不虧邪氣不留而復出外雖過期延日不為火
害若服補中托裏之後頭面不腫空瘡不補此毒
深入裏即易所謂剝牀以膚切近災者矣安可救
哉

補中托裏散

黃芪　人參　甘草　牛旁子炒
當帰　連翹　薄桂　青皮
木香　水煎服

額面渾如堆屎形　鼻頭黃黑勢猙獰

唇皮揭破多艱苦　嗌水之時又失聲此惡候也

又云

滿面臭爛不成形　寒戰咬牙更失聲
飲食能多幸無事　食難嗌水命終傾

又云

靨時泄利忽頻頻　逆順中間仔細評
膿血痂皮為順候　不分水谷逆堪云

凡收痘之時忽然泄瀉看其所出之物如利下膿
血痂皮者此倒靨之証乃脾強腎弱為順利盡膿
血則愈不可強施治法如利下水谷不分者此腎

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

強脾弱急用陳氏木香散送下萱蔻丸利止則吉
否則凶
過期不靨病遲遲臭爛渾身靨不齊
黏席黏衣多苦楚白龍敗草任扶持
凡痘瘡成膿之後過期不靨渾身潰爛以致黏席
黏衣者用白龍敗草散貼襯鋪付最佳
白龍散
用乾牛糞燒過取中間白者碾飾敷之
敗草散
取多年屋上陳茅取回晒乾碾細成粉飾過鋪放

席上任其展轉蓋此草受霜露之氣最解痘毒
當靨不靨候須諳治發分來有幾般
縱意違師徒自斃臨危方悔恨臍難
其痘瘡當靨不靨須要詳審不可忽略枉人性命
如冬寒之時蓋覆少薄被寒氣鬱遏而不能靨者
以桂枝解毒湯如夏月衣被太厚熱氣薰蒸而不
能靨者宜去其衣被令少清涼以升露解毒湯主
之如一向不大便裏熱太甚不能靨者宜當歸解
毒湯微利之要在斟酌不如膽導法尤佳如泄瀉
氣虛而不能靨者陳氏木香散如曾服藥以致難

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

齲者此只牧齲不齊俗呼為坐漿乾也不須妄治
如元氣素弱以致難齲者以參歸解毒湯主之世
人不知此等關係匪輕視若泛常不早求治法徒
斃生命而已悲哉

桂枝解毒湯

薄桂　赤芍
蟬蛻　水煎服

耳露解毒湯

朱苓　澤瀉
木通　黃芩
參門冬　地骨皮
甘草　官桂
牛旁子　防風

連翹　水煎服

當歸解毒湯

生地黃　當歸身
紫草

膽導法

豬膽一枚以竹管插入膽竅內用線剳定吹令氣滿另以線一根作活線須納住其氣以竹管納谷道中解去活線頭捉令膽汁射入腸中直待氣透去膽便即通矣

麻仁　碾
連翹　水煎服
大黃　酒蒸

參歸解毒湯

黃芪　人參
甘草　水煎服
當歸　牛旁子

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

膿水將乾結靨時　紛紛庸俗久扶持
不知禁忌多翻變　却似為山一簣虧

世俗於痘瘡收靨之時即殺雞以食之或用椒姜之類謂其和煖使瘡易收殊不知雞能動風辛能助火脾胃素強者往往幸免如遇脾虛之人反助火邪以致發瘟傷眼口舌生瘡馴至坯病者多矣可不慎歟又或妄稱痘要溫疹要清涼於天亢熱之時蓋覆重綿致生鬱熱多靨不靨變生異證一向渾身奈旦和　靨時發熱事如何微微發熱乾膿水　太甚焦枯病轉多

痘瘡始末要有微熱不可盡去也若到收靨之時反增太熱發渴煩燥者此毒火在內更防陷伏也急用葛根解毒湯

葛根解毒湯

葛根　天花粉　地骨皮　當帰梢
木通　連翹　丹草　牛旁子
酒芩　柴胡　人參　淡竹葉
水煎服

先曾破損灌成瘡到得收時不斂漿此等頑瘡須急治淋漓膿血久難當

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

凡瘡瘡犯著皮嫩易破者本不治之証如破損之
時重復膿灌者此正氣尚强毒不能入而發於外
至於收靨之時亦當依期乾較設不能靨者此正
氣被邪氣剥削雖能逐邪出外不能逼邪成痂也
急用大補湯治之不可因循反生災戾

大補湯

黄芪　人參　當歸　牛旁子
茸草　連翹　官桂　水煎服
數箇頑瘡不肯收　犯時鮮血却常流
如逢此証休輕視　日久須教一命殂

其瘡瘡破損灌膿作痛不乾膿水者一名疳蝕瘡
但犯著即出血不止又名陽瘡出血乃難治之證
也内服大補湯外用綿熏散數之遂巡不治以致
潰筋傷骨穿膜破空夭人性命者多矣

灌瘡滿面血膿多　敗面傷睛怎柰何
却在良醫施妙手　調和中外救沉痾

如面瘡盡破反復膿灌膿血浸淫者卻防壞眼崩
鼻墜唇敗面也宜服升麻解毒湯可免傷殘之患

升麻解毒湯

升麻　白芷　酒芩　牛旁子

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

連翹　蝉蛻
防風　密蒙花
當帰　水煎服
瘡瘍抓破狀多般　出血乾枯或作坑
搔痒焦疼渾小事　穿皮潰肉使形殘
其瘍瘡孤破者證非一般有破而出血者此陽瘡
出血也宜用當帰涼血湯有破而無水便枯乾者
此陷伏也要瘡下更灌肉下更腫為桂肉服托裏
回生散有破如成坑者此肉陷也急用白龍散數
罨其瘡内服托裡回生散如此三者不知施治徴
則成瘡淹延歲月不能痊可甚則潰筋穿膜殘人
性命也
當帰涼血湯
當帰　紅花　地骨皮　生地黄
酒芩　牛旁子　連翹　黄芪
人参　甘草　水煎服
托裏回生散
黄芪　當帰
甘草　焼人屎
牧厭依期更著痂　或時戦慄或言邪

抓破多般　牧時戦妄

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

三元正氣將回復不請醫巫莫自嗟

常見收靨之時痂皮易淨但或時戰慄者或時語言誕妄者此皆正氣將復不能自持之兆不必憂疑須臾自定

一落痂証治指 凡五首

痂皮應脫都不脫此際誰知還作惡

補脾實表有奇功不可逡巡便棄藥

其瘡收靨痂壳自脫若或黏著皮肉不肯脫落者此表虛也尤當禁忌以調元固表湯主之不可因循致生異變

調元固表湯

黃芪 人參 當歸

蟬蜕 水煎服

收靨之時不落痂皮不脫更加昏睡者此脾胃氣虛蓋脾虛只緣脾胃多虛弱設若痂皮不脫更加昏睡者此脾胃氣虛蓋脾虛則多睡也用調元清神湯戊已者脾也

調元清神湯

黃芪 人參 當歸

白朮 麥門冬 陳皮

炙甘草

酸棗仁

国立国会図書館 タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』 請求記号 859-54

ガラス使用

黃連炒　大棗引水煎服

落痂之後察瘡瘢平整紅鮮自漸安
若是凸凹并黯黑好將數藥拭延遭
其瘡落痂之後瘢痕平整紅活者吉若瘢肉或凸
起或凹陷瘢色或載黑黯者吉凶未可知也用滅
痕散敷之如瘢平色鮮者吉否者凶
滅痕散　蜜陀僧碾細末以乳汁調塗瘡上其瘢
白平白黑色自退密調亦可
瘡痂自落不須忙撏揭須教肌肉傷
此日灌淫何足惜　終身常作血風瘡

凡痘痂欲落之時任其自落不可撏揭有撏揭者
肌膚被傷一時灌痛浸淫固不足惜而終身之害
為血風瘡者蓋有之
瘡落精神漸復初　緣何頭足更遲留
陰陽孤獨如鰥寡　安得同時取次收
凡陽生者以陰成之陰生者以陽成之故經云孤
陽不生孤陰不成又玉函經云孤陽寡陰即不中
譬取鰥夫及寡婦其痘症收靨自人中平分上下
髮際以上陽之陽也謂之孤陽足膝以下陰之陰
也謂之孤陰孤陽寡陰所以瘡之收靨至此二處

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

每每遲留不能便乾故也不可服藥

一餘毒証治括 凡四十二首

瘟後緣何發毒瘟 只因平塌少成膿
毒卸蘊聚難渴散 透吊尋縫出空中

蓋瘟瘡初出之時一點血須臾血化為水水化為膿膿成而毒解矣若瘟出形之後應起發而不起發應作膿而不膿一片空壳狀如蛇皮或平塌破損都無膿水此本死証以脾胃氣強又能飲食亦可引日以致收較只是毒邪蘊蓄於裡不能發洩必尋出路於關門之間透出而為瘟毒也但發二處者可治若流注手足發而不止膿灌不愈者綿延日久而後斃

瘟瘟先要分經絡 解毒調元兼裡托
決膿去毒急旋功 莫待殘形變為惡

凡瘟瘟之發先看在何經絡分氣血多少而治次看人之虛實以解毒托裏為先不可亂施若寒付貼之藥反使毒不得出內潰筋骨如膿未成膿者以必勝膏貼之已成膿者鈹鍼決去其膿用生肌散敷之膿瘍以十六味流氣飲連翹解毒湯治之潰瘍以十全大補湯治之凡見瘟毒即以上法治

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

之不可隱忍因循以成大患微則殘傷肢體必為癈人甚則脫腕腐節以緩須性命也

十六味流氣飲

川芎　當歸尾　赤芍　防風
人參　木香　黃芪　桂心
白芷　桔梗　陳橘皮　厚朴
烏藥　甘草節　紫蘇　枳殼 各四分
水二盞煎七分服

氣血虛而自利者加熟附子
大便堅實者加酒大黃元氣素弱者用此方

連翹解毒湯

連翹　白芷　川芎　當歸尾
赤芍　牛旁子　甘草節　水通節
大黃　川山甲炒　水煎服

太陽經加羌活防風
陽明升麻乾葛　少陽柴胡黃芩　少陰黃連倍木通　太陰官桂防風
厥陰柴胡青皮元氣素強者用此

必勝膏

馬齒莧杵汁　猪膏脂　石蜜　共熬膏塗腫處

十全大補湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

川芎　當歸尾　赤芍　生地黃
人參　白朮　赤茯苓　甘草節
黃芪　桂心　金銀花　白芷
連翹　以上加引經藥煎
生肌散
白芷一錢　龍骨五分　貝母二錢　赤石脂一錢
白芨一錢　共為末敷貼
瘡後緣何變火丹　只因毒火鬱成愁
看他所發歸何部　若過心腎治却難
赤火丹留此惡候也流移紅腫其痛手不可近瘡

瘡之後乃發丹瘤者只因蓄火太甚不能發洩鬱
於肌肉之間故發而為丹從頭上起者過心即死
從足下起者過心腎即死內服玄參化毒湯外用
蜈蚣鍼法以斷之

玄參化毒湯
玄參　當歸尾　生地黃
連翹　石羔　赤芍
防風　荊芥穗　紅花　酒洗
水煎服　木通　地骨皮
蜈蚣鍼法　用馬揑火者三五條放紅腫
庭吮去惡血毒亦從洩也　淡竹葉

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

瘡後發瘡　只因毒火發無盡
縱然發盡無停留　免得耳生乖形證
癮者皮膚間隱隱起成疙瘩也疹者皮閒點點狀
如蚊蚤所咬迹也瘡後乃發癮者由毒氣未得發
盡藏於皮膚之間或癢痒因爬而成者或因受風
風火相持而成者此是正吉兆欲發洩無便停留
以變他疾如發太甚不已者內服防風敗毒散外
用蜆子水洗之如無蜆子以天水散沸拭之
防風敗毒散
升麻　葛根　防風　赤芍

芣草　水煎服
蜆子水　蜆子不拘多少活者以水養五七日旋取其水洗之蜆衣煮湯亦佳
瘡後緣何又發瘡　只因撏掐令膚傷
衝風觸穢無拘束　歲歲逢春害一場
凡瘡瘡收靨之後切忌用手撏掐如犯此忌者必
成血風瘡至逢春時更發遍身膿泡俗呼為瘡風
瘡者是也治宜苦參丸花蛇酒方見別本更宜灸
瘡後緣何瘡不乾　或時血出病難安
只因毒氣藏肌肉　蝕肉傷筋可鼻酸

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

凡瘡靨之後內有不著痂者內蝕肌肉膿血日久不乾或時作痛謂之陽瘡出血又謂之疳蝕瘡壞筋腐骨乃不治之症也但覺瘡當靨不靨即防此證內服太補湯外用綿銼散敷之

大補湯

人參　黃芪　當歸　川芎
白芍　白朮　牛旁子炒　官桂
連翹　甘草　水煎服

綿銼散

出了蛾子綿銼不拘多少每銼入白礬五分在內火煅令枯每一兩加蜜陀僧五錢白芷末二錢以白蜜調敷

瘡後緣何翳膜睛　只因熱毒壅肝經
還睛去翳多奇妙　點洗常令作癈人

小兒出瘡之時先用黃蘗熬膏和臙脂塗眼四圍者正以防斑瘡入眼也斑瘡入眼不在於初多在收靨之時或滿面瘡瘡破爛重復腫灌者膿血膠固毒火鬱蒸內攻於眼其斑入眼又或瘡出已甚成就遲緩醫用辛熱之藥發之亦令斑瘡入眼又於收較之時喜唉辛熱謂之乾漿以致二火相扇

同翳膜

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

亦能令斑瘡入眼在白珠子不必治久當自去惟
在黑輪上或掩童人者急用蜜蒙花散治之切不
可輕用點洗之藥反為大害如童人損破反突出
或陷下者皆不可治也他本瘡後白膜遮精者谷
精草散主之

蜜蒙花散

穀精草五錢 蜜蒙花酒洗五錢 蟬蛻去足翅五錢 埋月砂一兩
共為細末用猪肝一兩竹刀披破用藥一錢擦
在肉水煮肝熟飲汁食肝效

瘡後緣何目畏明 肝虛又帶火邪因

凉肝養血功無比 解便雙眸得見人

凡瘡靨之後兩目不開忌見明者謂之羞明證惟
向暗處則敢開也若向暗中亦不開目者此却防
目中有瘡當如上法救之只羞明者治以凉肝明
目散

凉肝明目散

當歸 龍胆草酒洗 蜜蒙花 柴胡
川芎 防風 酒連 用猪肝煮湯
煎藥服之大便秘者瀉青丸目昏者蝉壳明目散
此方見別本

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

瘡後緣何利膿血
利盡膿血病自除
瘡靨之後忽然便下膿血此由瘡瘡不能正靨和
皮破爛倒陷於內本危證也其人脾胃素強毒不
能留却流入大腸所以膿血從大便出也利盡膿
血有愈最難消詳不可亂治
凡瘡後便下膿血及痂皮者皆名倒靨裡氣素強
不能停畜故膿血痂皮從大便中出也待其自止
待他自止莫疑待
劫澀輕投証轉乖
膿血痂皮一路來
和中清熱施殘著

便下膿血

然後用和中清裏之劑不可便投豆蔻丸及諸劫
澀之藥使毒氣不出留連於腸胃之間必生脹滿
喘呼之病經云無實無虛虛天人性命此之謂
也正猶寇在堂奧之間不先驅走及閉其門安有
不為禍乎勢甚者黃連解毒湯主之膿血盡和中
湯主之

黃連解毒湯

黃連 酒炒　條黃芩 酒炒　枳殼
紅花　酒大黃　甘草
當歸梢
水煎服

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

人參　當歸　甘草　枳殼
木通　水煎服　解毒通腸効若神

瘡症曾無倒靨形　緣何膿血利頻頻
只因毒入大腸裏　如瘡收較之時一齊結靨乾淨竝無倒靨却有便
下膿血者此由其人平日喜食煎煿素有積熱今
因瘡後氣血一虛不能勝積故便膿血也此名滯
下必然腸鳴作痛裏結後重或因瘡出之後飲水
太過多水停作泄熱毒乘虛入裏便下膿血此名
腸垢經云挾熱而利者其腸必垢是也竝宜先與

滯下腸垢

調胃承氣湯以徹其毒次以黃芩湯主之切忌劫
澁如久不止治以香連丸

調胃承氣湯
枳殼　酒大黃　桃榔末　甘草
水煎服

黃芩湯
黃連酒炒　條黃芩酒炒　當歸　川芎
甘草　木香　赤芍
久不止加升麻　腹中痛加酒大黃水煎服
瘡後緣何泄利多　看他所出物如何

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

痂皮膿血則為順水谷無分必夢扣
瘡瘡之後氣血兩虛最怕泄利裡氣不實變生諸
疾也凡有自利看其所下之物痂皮膿血為順少
以四君子湯調之水谷不分為逆以理中四苓湯
主之久不止以豆蔻丸主之方見別本

瘡後緣何嘔噦頻　只因毒氣胃家停
錯喉噎水宜施治　只怕乾噦及失聲

胃之上口名曰賁門納而不出者也凡瘡瘡之後
吐而有聲有物者謂之嘔有物無聲謂之吐有聲
無物謂之噦食谷而吐出者謂之錯喉飲水而噴

噎水呃噦

出者謂之噎水此由熱毒壅塞胃之上口毒火上
炎故令嘔吐咽門閉澁故令錯喉噎水也惟乾噦
症乃胃瘡腐爛不能納谷故時時張口似吐不吐
乃危惡之症也經云水陳者葉必落絃絶者聲必
嘶病深者聲必噦治亦無功亦有咽喉作痛不能
納物而嘔吐者若見失聲此乃咽喉腐壞不可治
矣嘔吐者陳皮竹茹湯主之咽喉痛者耳梗湯主
之

陳皮竹茹湯
陳皮去白　白茯苓　黃連用吳茱萸同炒去萸用連　竹茹

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

水煎服

耳梗湯

耳草　桔梗米汁制　牛旁子炒碾　水煎服

瘄後緣何熱不除　或因毒甚或元虛
調元解毒分投用　引日須教損幼軀

瘄瘡始終不可無熱瘄既收靨則毒解而熱亦常
除矣如熱一向不已非毒氣之餘烈必元氣之素
虛惟以脈證辯之如脈數形勞煩熱者此邪氣實
也知母解毒湯主之如脈遲形怯熱而喜睡者此
正氣虛也黃芪調中湯主之

知母解毒湯

知母　生地黃　軟石膏　地骨皮
酒芩　天花粉　牛旁子　升麻
耳草　淡竹葉　水煎服

黃芪調元湯

黃芪　人參
當歸　大劑水煎服

瘄後渾身一向溫　忽然發熱不同論
內傷外感分投治　此箇真機說與聽

如瘄靨之後一向溫暖和平並無餘熱忽然發熱

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

若又不可以餘毒未解及正氣虛同論也必因外
感風寒其症頭目昏痛發惡寒其脈浮以桂枝解肌
湯主之或因內傷飲食其證腹胜飽悶不喜食其
脈弦滑以補中益氣湯加消導藥主之

桂枝解肌湯

桂枝　赤芍　黃芩　耳草
葛根　柴胡　人參　淡竹葉
水煎服

補中益氣湯

黃芪　人參　白朮　陳皮
枳實　青皮　木香　炒麴
黃連　麥芽麴　耳草　水煎服

瘡後緣何腹裏疼　只因傷食不能安
看他虛實行消導　方顯良工是折肱

若此傷食症也虛則用上補中益氣湯治之如無
吐利腹滿而痛煩燥氣急者以脾積丸下之若未
曾傷食忽然腹滿而痛煩悶不寧者此毒氣入裏
急用雄黃解毒丸利之方見別本不爾漸加喘急手足厥冷則難治矣

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

痘後緣何不喜食　只因傷食食不入
誰知消導是良方　強忍成疳少寧日
一向能食至痘收後反不能食聞食氣則嘔逆者
此必過食所為問其所食何物甚則以原物為引
送下脾積丸微則只以保和丸調之若是隱忍不
求急治久而羸瘦漸成疳勞矣集聖丸主之
正氣將回食漸加　緣何食減却堪訝
不因食壅皮重困　或是中虛病未差
又云
痘後緣何寒熱作　只因正氣多虛弱
忽然生熱或生寒　大補湯丸休執著
凡痘靨之後忽然寒熱大作乍時而寒慄戰惕惡
寒乍時而發熱煩燥者此正氣虛弱故也補中益
氣湯主之
寒熱往來形似瘧　不論早晚如期作
只因脾胃久虛疲　故惹風寒相擊搏
補中益氣湯
黃芪　人參　甘草炙
白朮　升麻　柴胡炒
桂枝　當帰　陳皮　青皮
木香　虛甚者加附

不食寒熱

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

子炮水煎服　六脈沉細如欲絶

瘡後緣何手足厥　治苦乖方自作孽

只因元氣本來虛

凡瘡收靨之後手足厥冷六脈沉細者此因元氣素弱以調元生脈散調元生脈散

木香異攻散以取敗亡也

人參　黃芪炙　甘草炙

當歸　桂枝　麥門冬

瘡後緣何神識昏　如虛甚加熟附子水煎服

終朝喜睡不惺惺

喜睡昏睡

只因毒解神虛倦　氣血和平四體寧

瘡瘡出甚至於收靨之後多有昏昏喜睡者此由毒氣已解其元將復精神疲倦故喜睡也時人不知見其昏睡遽相驚疑醫亦不察形診脈乘人之疑恐赫取利其立心之無常固不足惟然而妄投湯藥實實虛虛悞人性命者不遭陰譴亦倖耳

瘡後緣何不識人　口中錯語似邪侵

只因熱伏心胞絡　治此無差妙入神

其瘡後昏睡者設若連日不醒口中喃喃自語或有醒時精采亦不與人相常形如醉人每多錯語

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

此邪熱入心心惡熱心為君主之官不肯受邪傳於包絡以導赤解毒湯主之安神丸亦佳

導赤解毒湯

木通　生地黃　麥門冬　山梔仁
茯神　石菖蒲　甘草　人參
燈心　水煎服

安神丸

牛黃五分　黃連炒五錢當歸二錢半　山梔仁炒二錢半
芸為細末湯浸蒸餅以猪心血和丸如粟米大硃砂為衣燈心煎水引下

瘡後緣何又發驚只因毒火內攻心清心散火宜驚退發作無休命必傾

瘡出發熱心惡熱候多驚搐此常証也若於收靨之後毒從外解反又發搐者此由瘡發未透毒火內畜經云諸瘡痒痛皆屬於心所以毒火攻心故發搐也然得於瘡靨之後氣血已衰治之甚難只要藥真對病驚搐易退者可治如一發連綿者此死證也又云脾虛肝木乘之動於心火故發驚搐粉紅丸治之方另見

清神散火湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

木通　玄參
黃連　甘草　麥門冬　梔子仁
辰砂調服大便秘者加酒大黃自利者加人參
燈心　水煎去滓碾
瘡後緣何手足攣　只因血少被邪干
神脾養益神仙訣　不遇知音莫浪言
凡瘡靨之後手足忽然拘攣不能伸屈轉運者此
由血少不能養筋又或感風寒濕三氣使之然耳
不可輕用發散及耗其血只補脾養血此秘的法
也當歸桂枝湯主之
當歸桂枝湯

當歸酒洗　川芎　白芍酒炒　黃芪酒炙
甘草炙　薄桂　蒼朮　黃柏酒炒
氣虛加川烏以行經再加人參水煎服如感風寒
甚以致骨節疼者加羌活防風以散之
瘡後緣何咳嗽急　只因火邪流入肺
清金降火氣和平　只怕胃高更肩息
瘡疹之發惟肺受傷至於收靨毒解而宜寧矣若
又咳嗽或喘急者此由毒火流入肺中肺焦葉舉
故令咳嗽喘急者也治宜清金降火寧肺湯主之
久而不已胃高如龜殼更兼肩息不治

拘攣咳嗽

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

寧肺湯
知母　牛蒡子炒　馬兜鈴　地骨皮
杏仁　軟石羔　桔梗　甘草
咳甚加貝母桑白皮蜜水炒　喘者加葶藶子炒
水煎服

瘡後緣何腫滿若只因風濕或水畜
腫多屬肺開鬼門脹甚屬脾潔淨府
凡瘡靨之後或面目虛浮四肢腫滿者此屬於肺
因表虛受濕之氣宜以汗解加味五皮湯主之或
腹膨如鼓目胞微腫者此屬於脾因脾胃素虛飲
水太多以致水畜於中滿而不去又或傷食脾不
能消濕熱內畜宜以利解厚朴湯主之若虛脹者
不可妄攻又宜藥煎子丸主之

加味五皮湯
羌活　五加皮　蒼朮　桂枝
木通　防風　防己　桑白皮
車前　生姜皮　豬苓　燈草
水煎服

厚朴湯　厚朴姜制
蒼朮　陳皮
大腹皮

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

猪苓　茯苓皮　木香
因於水者加澤瀉滑石車前子葶藶
因於食者加神麴山查山稜莪朮枳實
喘者加葶藶子杏仁水煎服
萊菔子丸
萊菔子五錢炒　梔子厚朴水浸過一宿晒乾二錢　白朮去蘆陳土炒一兩
共為細末湯浸蒸餅為丸陳皮湯下
瘡後緣何小便澀　只因膀胱多畜熱
導赤利竅要便清　莫使火邪威壅塞
瘡瘡首尾小便宜清則內無熱如收靨後小便不
利此熱畜膀胱脫導赤散主之
導赤散
木通　甘草梢　瞿麥　車前子
滑石　赤茯苓　淡竹葉　山梔子
燈心　水煎服
瘡後緣何大便難　只因腸胃液津乾
潤腸暗導宜無用　縱有餘邪得保安
瘡瘡始終大便要調一二日一次者上吉至於收
靨後大便鞕結反難者此由瘡出太甚血枯氣不
能潤腸胃津液乾燥故耳潤腸湯主之若因悞服

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

熱藥及食辛燥煎炙之物以致陰血受虧不能潤
滋六腑因而便難者涼血潤腸湯主之

潤腸湯

甘草　當歸梢　生地黃　火麻仁
桃仁泥　水煎服　有熱者加知母石羔

自利加白朮升麻

瘡後緣何汗出烈只因衛弱榮閒熱
清榮和衛汗自除盜汗當歸湯最切

經云衛氣者所以溫肌肉充皮毛肥湊理司開闔
者也瘡疹之出衛氣最傷故干收斂之後衛弱而
汗出也汗常出者謂之自汗睡中汗出而寤則乾
者謂之盜汗皆由衛弱不能斂束玄府榮閒有熱
而為汗澄在內為血在外為汗自汗以黃芪湯盜
汗以當歸湯主之

熱熱渾身汗未休　膚濡髮潤亦堪憂
衛中氣弱榮中熱　若待忘陽治不瘳

黃芪湯

人參　黃芪炙
桂枝　水煎服

當歸湯

耳草　黃連炒

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

當帰　黄芪炙　生地黄　麥門冬
耳草炙　黄連炒　白芍炒　浮小麥
用獖猪心竹刀批開煮湯煎藥服之妙
瘡後緣何吐衄侵　只因毒甚血狂奔
要他血止宜清血　不止終為薙露人
凡瘡收靨之後忽然鼻衄不止者血出於肺也吐
血不止者血出於胃也尿血不止者血出於小腸
也便血不止者血出於大腸也皆由毒入於裏迫
血妄行急以涼血地黄湯止之不止者必死之候
血在身中怕妄行　大邪迫血血離經

鼻中衄出堪調理　便瀉中來禍莫輕
涼血地黄湯
黄連　當帰稍　生地黄　山梔仁
玄參　耳草　衄血加片芩茅花
吐血加知母石膏童便香附
瀉血加木通滑石　便出加秦艽梔子荊芥穗
血不止加炒蒲黄藕節側栢葉　水煎服
瘡後緣何忽吐蚘　只因内熱又常飢
但聞食臭虫應出　嘔吐心煩急早醫
傷寒吐蚘責之臟寒瘡疹吐蚘責之裏熱由熱氣

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

拂鬱於裏久不能食虫無所為熱所逼但聞食臭即上湧吐出也黃連止蚘湯主之若不急治虫無所食則食臟食肛而為狐惑之死証矣

蚘動如從肚利中出 此屬虛寒勿妄攻

若聞食臭虫先出 必從腸胃熱邪壅

黃連湯

黃連 黃栢 烏梅肉 人參

白朮 水煎服 只因辛熱助諸陽

瘡後綠何發口瘡 唇口生瘡怕啞張

牙齦臭爛防穿頰

凡瘡疹後牙齒生瘡時時出血謂之牙宣呼吸息出謂之息露此走馬疳也由熱在陽明急宣蚕退散敷之如唇腫而浮穿鼻破頰潰喉腐肉飲食不出者不治又如唇口生瘡破爛上唇有瘡出食其臟謂之狐下唇有瘡虫食其肛謂之惑由熱在裏虫無所食不肯吐出內食臟腑及肛而外見而唇口也其人好睡默默不欲食其聲啞嗄謂之狐惑証黃連除蠶丸主之如唇落鼻崩牙脫入聲者不治又如舌上生瘡赤者謂之赤口瘡此熱在心脾二經也白者謂之白口瘡又為鵝口瘡此熱在心

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

肺二經也赤瘡用陰陽散白瘡用朱礬散通以洗
心散主之

狐惑之症聲啞嗄牙口生瘡誠可訝
齦根潰爛疳蝕瘡息臭血出名走馬

蚕退紙散

枯礬二錢 尿桶垢一刮以火煅令白二錢 五倍子二錢 蚕退紙二燒
共為細末先以米泔水用蟾蜍虫翻轉蘸水洗
淨敗血後以藥敷之

黄連除蠹丸

黄連二錢 蘆薈一錢 史君子二錢五分炒 蕪荑一錢五分

乾蟬一錢燒二分 加川練子肉二錢 共為細末烏梅肉
洗去黒水杵膏和丸米飲下

陰陽散

黄連二錢 乾姜一錢 共炒研末用地雞即旱虫 擂水
洗淨次敷此藥

朱礬散

朱砂二錢 白礬一錢 共研末先用鵝涎洗之次以
此藥敷之

洗心散

黄連 當歸稍 生地黄 大黄酒洗

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

麻黄　木通　薄荷　茸草加
桔梗加　連翹加　牛旁子加
燈心引水煎服

瘡後緣何不作肌　只因氣血兩相虧
平和丸散宜常服　不可偏傷氣血肌

凡人素常肥實瘡靨之後一旦羸瘦雖能飲食不作肌膚者此由氣血兩虧故也治之宜兼氣血不可偏陽則傷血偏陰則傷氣可矣陽日服參苓白朮丸陰日服當歸益榮丸此不傳之捷要也

參苓白朮丸

人參二錢　白朮二錢　白茯苓二錢　陳皮一錢二分
山藥一錢二分　木香一錢二分　青皮一錢二分　神麴炒一錢二分
茸草一錢二分　山查肉一錢二分　有泄加訶子一錢二分

共為末湯浸蒸餅為丸米飲下

當歸益榮丸

當歸二錢　川芎二錢　黃連一錢五分　廬會一錢二分
使君子肉一錢二分

共為細末湯浸蒸餅為丸米飲下

瘡後緣何多怔疾　問求原日犯何逆
隨其所犯法治之　此是家藏真秘的

羸瘦怔疾

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

凡痘疹收靨之後以漸平復者不須服藥如生諸疾不由瘡疹中來者謂之怪異必先詳問曾服何湯丸啖何飲食有無感冒風寒知犯何逆即以所犯之法治之

痘後渾身肌肉薄如蛇退皮蟬退殼最宜居養忌衝風洗拭動勞諸症作此下二條皆言痘瘡將息法也痘既收靨痂瘡脫去肌肉嫩薄榮衛不密只宜隨其寒暑慎其起居不可衝冒風水之氣若遇卒風暴雨宜謹避之尤不可洗浴身體及梳頭洗面出外行動恐生變症

也

痘後腹中若易腸生硬辛熱莫輕嘗若還貪口渾無忌犯却冲和變內傷

痘靨之後腸胃氣傷凡有飲食熱無灼灼寒熱滄滄尤不可忍饑過飽又恣食肥耳生冷粘粽難化之物使犯腸胃冲和之氣變為內傷貽患於終身者有之可不慎歟

遺括一首附後

痘後那堪卒失音語言不出意沉沉心肺流邪解利清咽喉若痛清涼散

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

秘傳經驗痘疹治法卷之三

婦人瘡疹 凡十二首

女人瘡疹最難醫　分明陰質血先虧
出形起發乾收日　生怕時逢天癸期
經曰小兒女子盻以滋甚以女人陰質血常不足
也蓋痘瘡始終以氣血為主氣以充之血以濡之
一有不足則變生焉所以女子十四以後有出痘
者常恐起發成就之時天癸一行內動其血未免
裏虛恐成陷伏也
發熱適逢經水斷　神識不清多妄誕

婦人瘡疹經斷妄誕

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

血室空虛熱入來　涼血泄肝金莫換

若女子當天行瘟疹發熱之時經水適斷增寒壯熱神識不清妄有所見言語譫誕此為熱入血室血室者衝脈是也肝主之肝藏血衝為血海行經之後血室空虛天行邪熱乘虛入裏肝藏魂開竅於目神不清者魂亂也目妄見者視亂也誕言者肝移熱於心也瀉肝散主之

瀉肝散

羌活　防風　當歸帰　川芎

木通　梔子仁炒　龍膽草酒洗　酒芩

柴胡　便實者加大黃竹葉引水煎服

發熱經行非正期　火邪迫血事堪疑

急須解毒無涼血　莫待中虛却責醫

若發熱之時經水適來却非止經之期此由毒火內甚擾亂血海迫血妄行故月事不以時下也急以涼血地黃湯加解毒藥使熱得越毒得解瘡出經止為度不可遂迎隱忍直待中氣虛弱瘡伏不出即責諸醫用功晚矣

涼血地黃湯

白芍桂炒　當帰稍　生地黃　條黃芩酒炒

経水適来

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

升麻　酒紅花　酒黄連　牛旁子　炒
連翹　茸草　水煎服

發熱適逢經水來　熱邪得出福之胎
如過四日經無盡　又恐中虛有後災
發熱之時經水以期而來此畜血得出熱隨血解
乃吉兆也但至四日其經當止若不止者此亦熱
入血室迫血妄行用涼血地黄湯加人參主之
涼血地黄加人參湯

當帰　川芎　白芍　生地黄
人參　升麻　白朮　酒黄芩

茸草　水煎服

女人経閉為不月　天行瘡疹時發熱
血海滿實毒彌留　治在二陽依秘訣
女子一向經閉未行血海留血至天行瘡疹發熱
之時毒氣拂鬱沖任之間其病必甚然不可攻擊
輕動其血經云二陽之病發心脾女子不月但治
其心脾使毒得洩於外可也瀉火越毒湯主之

瀉火越毒湯

川芎　赤芍　木香
青皮　連翹　桂枝　當帰梢
木通

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

枳殼　茸草　酒紅花　燈心
水煎服

崩漏時時血已枯　鴻而不滿臟中虛
豈堪當此天行病　濟弱扶危救病軀
女子一向崩漏不止氣血已虛若當天行疹痘之
時必不能任其毒先宜大補氣血使裏氣充實毒
不停留易出易靨也十全大補湯主之
十全大補湯
人參　白朮　茯苓　川芎　當歸　耳草　柴胡炒
白芍酒炒　生地黃

青皮　桂　木香　升麻炒
黃芪　水煎服

起發泡漿忽動經　莫將靨穢乍心驚
急防陷伏乘虛起　大補湯丸妙入神

凡痘瘡起發至泡漿數日最宜表裏無病飲食如
常若當此時忽然行經者人但知靨穢以觸正痘
殊不知此乃已之血安得為靨但恐血出裏虛而
生陷伏之變急宜救裏解毒大補湯主之
大補湯
人參　黃芪　耳草　桂心

漿時動經　崩漏不止

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

當帰　川芎　生地黄
木香　青皮　白芍
水煎服

經行暴瘡勢堪驚　血去津枯舌不榮
養血通心言語出　一時聲償重千金

若當起發泡漿之時其經忽行瘡而不能言者此乃血去少陰之脈不能上榮於舌也以當帰養心湯主之待其能言用上太補湯主之

當帰養心湯
人參　當帰身
升麻炒　生地黄酒洗
麥門冬　灯心
水煎服

月事如來變壞瘡　裏虛陷伏豈尋常
補中托裏休遲慢　瘡若回時免損傷

如起發泡漿之時月事大來其瘡應起發而不起發應泡漿而不泡漿頂平形塌或如灰白或成黑陷此皆為陷伏乃壞瘡也急宜補中托裏以調元內托散主之外用胡荽酒噴之其瘡起發膿脹或於空中再出一層此大吉之兆若加膿滿喘急寒戰鬪牙手足厥冷者死之兆也

調元内托散
黄芪　人參
當帰　桂枝

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

木香　青皮　赤芍
川芎　虚者加熟附子　牛旁子 炒
姙娠瘡瘡治應難　水煎服
清熱安胎為秘的　表裏熱煩胎不安
如孕婦出瘡只以清熱安胎為主不可觸動其胎
安胎如聖散主之　胎元觸動命終殘
安胎如聖散
白朮　條黃芩 浣水者　當歸身　砂仁 連殼 炒
枳殼　大腹皮　黑豆 酒次洗三　陳皮
甘草　桑上羊兒膝　水煎服

初發熱加升麻葛根連翹
瘡出太甚加酒連大力子連翹山查
瘡不起發加防風大力子白芍 桂炒
渴加麥門冬知母天花粉
瘡正甚時逢產孽 表裏無邪慎不足
腹痛微微行惡路
大補氣血急施功　孕婦出瘡正當甚時有正產者只以大補氣血
如孕婦出瘡正當甚時有正產者只以大補氣血
為主用大補湯若小腹急痛恐有惡露未盡也微
與行之無妨
大補湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

大人參　當帰　黃芪　熟地黃
川芎　桂心　炙耳草　水煎服
虛甚者加熟附子
腹中不和有滯氣者加青皮木香
黑神散
當帰　熟地黃　川芎　乾姜炒
桂心　蒲黃　香附子童便制　碎木香
青皮　黑豆炒　水酒各半煎服
產後天行出痘瘡　此時平順不須惶
只將大補攸功効　慢向諸書再撿方

凡婦人產後若遇天行出疹痘者此時無胎繫累
不須憂惶只以大補氣血為主大補湯主之
大補湯
人參　黃芪炙　白朮　當帰
川芎　熟地黃　白芍酒炒　白茯苓
官桂　甘草　木香　青皮
水煎服　發熱加酒炒升麻葛根
出太甚加連翹大力子　虛甚者加熟附子
自利加訶子
疹子俗名麻子是也　凡三十一首

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

疹為熱毒屬於心肺與相連毒易侵
咳嗽鼻中清涕出更加兩目淚盈盈
疹痘皆胎毒所發瘡發掀睛於外者屬少陽三焦
相火也謂之斑色小紅而行於皮膚中出者屬少
陰君火也謂之疹五臟心肺相連而位乎上故斑
疹之發惟肺受毒最甚觀其咳嗽鼻涕出則可徵
矣疹子治法宜瀉火清金為主瀉火如芩連梔子
連翹大青玄參之屬清金如知母石膏麥門冬牛
旁子天花粉之屬
太抵冬溫最不祥民多受熱發瘡瘍

如逢斑疹相傳候急與湯丸預解良
春溫夏暑秋涼冬寒此四時之正氣也若冬反暖
則陽氣發洩太早至春必發疹痘之症疹痘雖曰
胎毒未有不由天行而發者故一時傳染彼此皆
出治此之法與疫癘同論
斑疹須明歲氣先勿輕汗下似傷寒
看人虛實施良劑莫犯天和損壽元
大抵疹痘之發與傷寒相似必先明其歲氣如時
令溫暖以辛涼之藥發之暄熱以辛寒之藥發之
太寒以辛溫熱之藥發之時寒時暖以辛平之藥

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

發之不可悞作傷寒妄施汗下反伐天和也經云
必先歲氣毋伐天和此之謂也又要看人虛實如
下腑閉結熱煩太甚者以酒大黃微利之吐利不
止以參歸之類補之經云毋實實毋虛虛損不足
補有餘夭人性命也能如此者謂之良工豈尋常
可能及哉

防風解毒湯 如溫暖之時以此辛涼之藥發之

防風　薄荷　荊芥　石膏
知母　桔梗　甘草　牛旁子
連翹　木通　枳殼　淡竹葉

黃連解毒湯 如曜熱之時以此辛寒之藥發之

防風　荊芥穗　酒黃芩　酒黃連
知母　石膏　桔梗　甘草
大青　玄參　酒黃柏　梔子仁
木通

桂枝解毒湯 如太寒之時以此辛温熱之藥發之

桂枝　麻黃 酒炒　赤芍　防風
荊芥　羌活　甘草　桔梗
人參　川芎　牛旁子　生姜
升麻解毒湯 如時暖時寒以此辛平之藥發之

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

升麻　乾葛　羌活　人參
柴胡　前胡　甘草　桔梗
防風　荊芥穗　牛旁子　赤芍
連翹　淡竹葉

疹喜清涼瘡喜温誰知疹瘡不同論
疹苗瘡實分軽重　首尾調和用意斟
疹瘡皆屬於火大抵疹喜清涼之藥如化斑湯是
也瘡多喜温補之藥如調元湯是也然疹瘡雖皆
胎毒與天行正病相類其實疹只於發黄芥穗但
得毒出則毒便解矣若瘡必待苗而秀秀而實膿
成而後毒解所以治疹者貴慎乎首治瘡者貴慎
乎尾用意調和無忝人之司命

疹毒從來解在初　出形毒解即無憂
腹中脹痛邪猶伏　喘急昏煩命必殂

疹子只怕一時不得出所以要先明歲氣要看時
令寒熱用前發散解毒之藥但發得出則毒盡解
如發不出再作前藥外用胡荽酒煮芎麻和酒遍
身刮之令其毛孔開疹毒得發也如此三四作再
不得出反加腹脹而痛上喘氣急昏眩悶亂煩燥
不寧者必死証也

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

過期不出毒猶藏
刻限必求斑疹露
如疹子淹延不出毛孔閉膚乾勢可惶
於內急以麻黃散發之　麻黃散子是仙方
過期不出勢淹延　毒伏身中出見難
急用透肌休怠慢　豈堪臟腑受熬煎

麻黃　升麻 酒洗　麻黃 蜜酒炒　人中黃　牛旁子 炒去土 炒遲　蟬殼 去足 水煎服

發熱蒸蒸咳嗽頻　涕流鼻孔淚漫睛
面浮眼瞼雙腮赤　此是天行疹毒徵
時行疹子與傷寒相似惟疹子則咳嗽噴嚏鼻流
清涕眼胞瞼其淚汪汪面浮瞼雙腮赤為異耳但
見此候即是疹子宜用前解毒之藥發散之
發熱渾身汗最宜　毋流於鼻不須疑
惟知毒向其中解　血汗俱多又在醫
凡瘡疹發熱自汗出者毒從汗散玄府開疹毒得
出也毋若毒從血解不須遽止若自汗多此為火
迫急與止之經曰奪血者無汗止汗以黃連湯止
血以葶花湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

毒熱薫蒸汗滿身　火邪壅迫血遠經
汗宜表解邪從散　血出榮中毒亦輕

黄連湯
黄連　麥門冬　生地黄　黄柏
黄芩　當帰　黄芪
水煎去滓調敗蒲扇厌服之

芎花湯
當帰　芎花　生地黄　山梔子仁
黄芩　水煎調百草霜服

發熱蒸蒸吐利井　或時滞下作腸鳴
火邪内迫宜清解　法向時行疹毒尋
疹毒發熱之時或吐或利或滞下皆火邪内迫上
行則吐下行則利又甚則裏急後重而為滞下也
法於疹家求之不可作吐利滞下而治吐多以竹
茹石膏湯自利以猪苓湯滞下以黄芩湯主之

竹茹石膏湯
陳皮　半夏　石膏　白茯苓
竹茹　水煎服

猪苓湯
猪苓　澤泄　滑石　赤茯苓

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

芽草　黄連
黄芩湯
黄芩　黄連
木通　枳殻
人参　水煎去渣調水散服之　初加酒大黄微利之
大邪拂鬱咽喉痛　芽桔牛旁湯可用
吹喉惟有十宣良　莫犯金鍼痂增重
疹痘類多咽痛者毒火拂鬱上熏咽喉故令咽膓
而作痛也不可安以鍼去血宜以芽桔牛旁湯十
宣散主之

芽桔牛旁湯
桔梗　芽草　水煎服
升麻
十宣散
黄連一錢　黄芩一錢
硼砂三分　乳香一分
雄黄五分　玄明粉三分
共為極細末每用五氂吹之
熱甚作渴少飲水解毒生津功莫比
若然縱飲不知休　水畜於中災異起

咽痛熱渴

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

瘡疹發熱未有不湯多渴時宜用菜豆芝麻炒米
湯飲之不可與涼水更宜生津解熱人參白虎湯
主之若恣飲冷水恐生水畜之証故水入於肺為
喘為咳宜用葶藶以洩肺中之水水入於脾為腫
為脹為自利水入於胃為嘔為噦為噦為利宜用豬苓
澤瀉茯苓以洩膀胃之水水入於心為悸為驚宜
用木通赤茯苓以洩心下之水水入於肝為脇痛
用芫花以洩肝水水入於腎與膀胱為小便不利
用車前子木通以洩膀胱之水

疹發於心肺受先　口乾咳嗽更心煩

瀉心清肺多奇効　治不遠時病早安

人參白虎湯

知母　人參　石膏　天花粉
葛粉　粳米　麥門冬　淡竹葉
水煎以米熟為度

赤疹渾身似錦紋白斑血少要滋榮
黑斑十死為凶惡解毒消斑用大青

疹子之出渾身如錦紋者化斑湯主之色白者此
血不足也宜養其血益榮湯主之黑斑者十死一
生急用大青湯解之

赤白黒斑

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

一齊湯出莫驚惶　頃刻渾身朱錦妝
似痘出時隨又沒　如斑紅處却成瘡

化斑湯
人參　知母　石膏　牛蒡子
連翹　升麻　地骨皮　淡竹葉
耳草　糯米　水煎服以米熟為度

益榮湯
人參　當帰酒洗　紅花酒洗　赤芍桂水炒
耳草　水煎服

大青湯

出收吉凶

玄參　大青　桔梗　人中黃
知母　升麻　石膏　梔子仁
木通　便秘者加酒大黃

水煎調燒人尿服之

旋出旋收病勢輕　連綿不盡勢堪驚
化斑解毒令消滅　莫使餘邪集病身

疹子之出常以六時即收如子後為陽午後收午後為陰子後即收乃陽生陰成陰生陽成造化自然之妙也凡此旋出旋收者輕若一出連綿至三四日不收者此毒火太甚須用化斑解毒湯使毒

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

發於外裏無餘邪免生後災也

疹邪出盡得安寧　邪未盡時氣不平

拂拂熱煩邪尚熾　頻頻嘔泄毒還蒸

又

疹家出沒合陰陽　出以温和汲以涼

連出不收陽太甚　遲遲間出是陰強

又

疹出渾身似火燒　毒邪壅盛急難消

醒風只許皮膚煖　救裏常宜便溺調

化斑解毒湯

玄參　知母

升麻　大青　石膏

連翹　秘結加大黃　牛旁子　人中黃

淡竹葉

水煎服

疹毒餘邪最作殃　幾曾見此病郎當

一時戾氣傳相似　疫鬼頻催赴北邙

疹毒之出貴先發散以解其毒則無餘邪之為後

災也若不知解之於初使毒得洩停畜於中未有

不為後殃者此乃一時戾氣之染彼此相傳但見

前有病者餘邪之發死而不治則後之為病者証

既相似則亦不可救藥矣此以下皆言餘邪之為

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

病也

疹毒流連熱不除　渾身似火髮毛枯
狂亂漸漸成疳瘡　得遇良工病可甦

疹子既收其毒不解邪火拂鬱渾身發熱晝夜不
退髮枯膚瘁漸成疳瘡以清熱除疳丸主之若不
早治以致瞎則揚睛口鼻氣冷手足厥逆微微瘈
瘲變為慢風不救者多矣

清熱除疳丸

黃連二錢　當歸二錢　龍膽草一錢五分　川芎一錢
青皮　陳皮各一錢五分　使君子一錢二分　乾蟾頭一錢燒

蘆薈一錢五分　共為末神麴糊為丸米湯下

疹毒流連為壯熱煩燥不寧時搐掣
養陰散火責心肝神爽身涼生可訣

如渾身壯熱未至羸瘦但多搐掣煩燥不寧此熱
在心肝二經也以當歸養血湯黃連安神丸間而
服之

當歸養血湯

當歸　川芎　生地黃　麥門冬
木通　甘草　淡竹葉　燈心
山梔仁　水煎服　便秘　加大黃

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

黄連安神丸

黄連二錢　當帰二錢　龍膽草二錢　石菖蒲一錢五分
全蝎七箇　茯神一錢五分　共為細末湯浸蒸餅杵猪
心血丸硃砂為衣燈草湯下

疹毒流連走馬瘡　牙齦臭爛食難嘗
唇瘡聲啞傳狐惑　破頬穿喉旦夕亡
疹毒之後牙齦黒爛曉時血出呼吸氣息名為走
馬疳文蛤散主之若面頬浮腫環口青黒久而穿
頬歯崩唇脱鼻壞者必死証也

文蛤散

雄黄五分　五倍子去虫二錢　枯礬五分　蚕退紙一錢焼灰
共為細末以米泔水洗淨以藥敷上一日三四次
以平為度

化蠶丸

蘆薈　使君子肉　龍膽草各一錢
五灵脂　川練肉各一錢五分　黄連二錢
共為末湯浸蒸餅為丸滾白水下

雄黄散

雄黄一錢　黄栢二錢　麝香半分
共為細末先以艾湯洗之後敷此藥以平為度

走馬牙疳

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

疹毒流連休息痢　晝夜不停真窘急
行氣養血遵格言　禁口滑腸尤可畏
疹前曾有泄痢未用清解至於疹後變為休息痢
不問赤白但裏急後重晝夜無度以黃芩湯主之
河間劉氏曰養其血而痢自止行其氣而後重除
此格言也如壯盛之人內有鬱熱挾食積能食者
須以三黃丸微利之如不肯服煎藥者香橘丸主
之

黃芩湯

黃連　黃芩（條實者當歸　川芎

下利咳血

人參　木香
檳榔　甘草
氣甚者加酒大黃

疹毒流連上氣咳嗽發作百聲終不歇
胸高肩聳血長流　擺手搖頭泉下客

疹子收後微微咳嗽者此餘邪未盡也不須調治
若咳甚氣喘連聲不住者此毒流於肺肺淮葉舉
故為咳也但見胸高如龜殼肩聳而喘血出口鼻
擺手搖頭面色或青或赤或白而枯者皆不可治
也門冬清肺湯主之

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

門冬清肺湯

知母　貝母　天門冬　麥門冬
桔梗　甘草　牛旁子　石膏 煅
杏仁　馬兜苓　糯米　水煎服

疹家禁忌是魚雞　瘡後常過七七朝
鹽醋五辛通是禁　須知爽口是危機

疹家禁忌比痘家禁忌尤甚若誤食雞魚則終身
但遇天行之時又令重出也鹽醋食之令咳不止
五辛食之令生驚熱所以通禁必待四十九日之
後方無禁也

禁忌中惡

疹家禁忌法須防　鹽醋雞魚不可嘗
欲莫從心終是福　物多爽口定為殃

又

疹痘收完幸平復　動止如常飲食足
心腹紋痛忽傾亡　還是氣虛中惡毒

幾見疹痘收完之後出入動止如常忽然心腹紋
痛而死者還是元氣虛弱曾受疫癘之氣外雖無
病裏實虧損所以一發而死也謂之中惡

嬰稚初離胎殼中　遍身點駁似硃紅
此由胎熱為斯候　莫作時行斑疹同

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

859
54

5028

又

發熱蒸蒸便已鞕　皮紅似錦是名斑

莫將疹毒雷同論　笑殺時人一樣觀

秘傳經驗痘疹治法卷之終下

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54

ガラス使用