

赤水玄珠第十四卷目録

癲狂癎門
顫振
癖癡
痓疘門
不得卧　附多卧
煩躁
健忘

赤水玄珠第十四卷

新安生生子孫一奎著輯

癲狂癎門 此三證大旨已於醫旨緒餘中詳言之矣當參看

生生子曰靈樞云癲癎癖癡不知所苦兩蹻之下男陽女陰後人以癲癎為一門者迹此也又曰暴孁癎眩足不任身耿天柱後人言風癎者迹此也

明癲症

書云多喜為癲多怒為狂難經謂重陰者癲重陽者狂

素問厥論篇曰陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言長刺節論篇曰病之初也歲一發不治月一發不治月四五發名曰癲病又通評虛實論篇曰癲疾厥狂久逆之所生也脉搏大滑久自已小堅急死不治虛可治實則死

靈樞癲狂篇曰癲疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚則極已而煩心嘔啼呼喘悸先反僵因而眷痛又有骨癲筋癲脉癲嘔多沃沫氣下泄者不治又曰癲疾者疾發如狂者死不治（據此言疾發如狂者死不治可見癲狂非一病也）

素問奇病論篇黃帝曰人生而有病癲疾者病名何安所得之岐伯曰病名為胎病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發為癲疾（啓玄子註曰癲謂上巔即頭首也）

綱目曰以其病在頭巔故曰巔疾治之者或吐痰而就高越之或鎮墜痰而從高抑之或內消其痰邪使氣不逆或隨風寒暑濕之法用輕劑發

散上焦或針灸頭中脉絡而導其氣皆可使頭
巔脉道流通孔竅開發而不致昏眩也是知癲
癎之癲與厥成癲疾眩冒癲疾之癲一疾也王
註悞分癲為二疾獨孫真人始能一之今特剋
此氣亂頭癲等經文於癲癎篇首使人知疾有
所歸而治有所據也
玉機微義曰按内經言癲而不言癎古方以癲癎
或併言或言風癎或言風癲或言癲狂所指不
一蓋癎病歸于五臟癲病屬之於心故今以風

癎另立一門而癲狂合為一門也
生生子曰按此以風癎另立一門明其不與癲狂
相類則是之矣而云癲狂合為一門今終集考
之並無癲狂門目豈未之補歟
孫兆治相國寺僧玄忽患癲疾半年名醫皆不効
召孫療之孫曰但有醎物儘與食之但待云渴
可來取藥今夜睡着明日便愈也至夜僧果渴
孫乃與酒一角調藥一服與之有頃再索酒與
之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故僧謝

之問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏
浮睡此乃靈苑方中硃砂酸棗仁乳香散也人
不能用耳

辰砂散　治風痰諸癎狂言妄走精神恍惚思慮
迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴目
竈皃不守醫藥無驗

辰砂光明有墻壁者一兩　酸棗仁微炒半兩　乳香半兩

各為末右量患人能飲酒幾何先令恣飲但
勿令吐至靜室中以前藥都作一帖温温酒調
下作一盞調之令頓飲如飲酒素少者但隨
量取醉服藥訖便安置床枕令卧病淺者半
日至一日病深者二三日令家人伺之鼻息
勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺須待其自
醒則神皃定矣萬一驚寤不可淩治正粛吳
公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

經云悲哀動中則傷魂竈傷則狂妄不精不
精則不正此悲哀傷竈而狂當用温藥補魂
之陽仲景方以地黄湯本事驚氣丸之類即

是也

經云喜樂無極則傷魄鬼傷則狂狂者意不存人此喜樂傷鬼而狂當用凉藥補魄之陰辰砂礬金白礬之類是也

濟世方　治失心

礬金七兩須四川蝉肚者乃眞　明礬三兩

為末薄糊為丸桐子大每六十丸湯水任下

昔有婦人癲狂數年不愈後遇至人授此方初服覺心胸中有物脫去神氣洒然耳服頓

甦至人云此病憂驚得之痰畢心竅此藥能去礬痰

明狂症

靈樞癲狂篇曰狂之始生也先自悲也喜怠善怒善恐得之憂飢及狂之發少卧不飢自高賢也自辨智也自貴倨也善罵詈曰夜不休狂言驚善笑好歌樂妄行不休者得之大恐目妄見耳妄聞善呼多食善見鬼神善笑而不發于外者得之有所大喜

林億公曰狂為痰火盛實癲為心血不足狂病宜
大吐下
生生子曰據此言心血不足者乃醫治攻劫太過
以致中氣餒弱而神志不定非癲病一起初便
有此不足症也
丹溪曰神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄
熱當清心除熱如痰逆心竅當去痰寧心大率
多因痰結於心胸間治當鎮心神開痰結亦有
中邪而成此疾者大槩是熱又曰狂病宜大吐
下則除之
素問云陽厥強怒飲以鉄落狂怒出于肝肝屬木
之意予曾用数次果効考本草能治鬼打鬼注
安心神治癲癎鎮心熱狂走除胃膈中
熱氣
痰涎
病能篇帝曰有病狂怒者此病安生岐伯曰生于
陽也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴
折而難決故善怒也病名曰陽厥曰何以知之
曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾
此其候也曰治之奈何曰奪其食即已夫食入

於陰長氣干陽故奪其食即已使之服以生鉄落為飲生鉄落者下氣疾也

夫狂之為病少卧少卧則衛獨行陽不行陰故陽盛陰虛令昏其神得睡則衛得入於陰而陰得衛填則不虛陽無衛助不盛故陰陽均平而愈矣

王海藏治許氏病陽厥狂怒罵詈親疎或哭或歌六脉皆按無力身表如氷后發則叫呼聲高內經云奪其食即已因不與之食乃以大承氣湯下之得臟腑積穢數升狂稍寧數日復發下如此五七次行大便數斗疾瘥身温脉生良愈此保命當歸承氣湯

當歸　大黄各一兩　芒硝七錢　甘草五錢

右每二兩水一大碗姜五片棗十枚煎至一半温服若陽狂奔走罵詈不知親疎此陽有餘陰不足大黄芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加姜棗者胃屬土此引入胃

也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大利為度微緩以爪蒂散入防風末藜蘆末吐之其病立安後用調心散洗心散涼膈散解毒湯等調之安

明癇症

生生子曰癇痰火所致前人有稱為風癇者劉河間謂由熱甚而風燥為其無化涎溢胸膈而癖瘈昏冒僵仆也

東垣曰病癇者涎沫出于口冷汗出于身清涕出于鼻皆陽蹻陰蹻陽蹻督衝四脉之邪上行腎不任煎熬沸騰上行為之也此奇邪為病不係五行陰陽十二經所拘當從督衝二蹻四穴奇邪之法治之

癇症亦從衝任督三脉氣逆而發者當尋此三脉治之○督脉尋長強挾脊間灸之○任脉尋氣海陰交衝脉附足少陰脉上行去中行各五分陰交穴乃任脉陰衝之會

潔古曰晝發灸陽蹻夜發灸陰蹻各二七壯陽蹻

起於跟中循外踝上行入風池申脉穴也陰蹻亦起于跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脉照海穴也

劉宗厚曰癎與瘁畧相類而實不同其病發身軟時醒者謂之癎身強直反張如弓不時醒者謂之瘁癎病随其痰之潮作故有時而醒瘁病比癎為甚而有挾虛者故因其昏冒而遂致亡者多矣

綱目曰癲癎即頭眩痰在膈間則眩微不仆痰溢膈上則眩甚仆倒于地而不知人名之曰癲癎徐嗣伯云大人曰癲小兒曰癎其實一疾也然與中風中寒中暑尸厥等仆倒不同凡癲癎仆時口中作聲將省時吐涎沫省後又復發時作時止而不休息中風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲省時無涎沫後不復發間有發者亦非如癲癎常發狀也

千金方云病先身熱掣瘛驚啼叫喚而後發癎脉浮者為陽癎病在六腑外在肌膚猶易治也病

先身冷不驚掣不啼呼而病發時脉沉者為陰癇病在五臟內在骨髓為難治也劉宗厚謂此論癇之陰陽後世有認為寒熱者悞也蓋此疾皆以痰熱所作而浮在表而淺為陽故云易治入裏而深為陰故曰難治乃表裏淺深之謂非寒熱之謂也

張子和曰夫癇病不至目瞪如愚者用三聖散投之更用火盆于煖室中令汗吐下三法並行次服通聖散百餘日則愈矣至于目瞪愚者不可治內經曰神不守謂神亂也大凡此疾乃肝經有熱吐後可服瀉青丸下之劉宗厚謂多由風痰膠固胸膈上下故大法先宜吐之吐後可用清熱之藥如東垣安神丸守真龍會丸之類皆可服不獨通聖散也痰實在裏不解宜導痰清熱亦不獨瀉青丸也或云風或云驚癇或云癲劉宗厚曰按癇病古方或云風或云驚癇或云癲癇由此疾與中風顛狂急慢驚相類故命名不同也原其所由或在母腹中受驚或因聞大驚

而得蓋小兒神氣尚弱驚則神不守舍舍空則
痰涎歸之或飲食失節脾胃有傷積為痰飲以
致痰迷心竅而作者治法必當尋火尋痰而論
前人多用鎮墜清心之藥固可以治熱可以清
痰若有頑痰膠固者此藥未易驅逐在上者必
先用吐吐後方宜服此更有痰實在裏者亦須
下之隨病輕重而用也或曰癇有陰陽何也予
曰此與急慢驚者可同論也陽癇不因吐下由
其有痰有熱客于心胸之間因聞大驚而作若
盛熱雖不聞驚亦自作也宜用寒藥以攻治之
陰癇亦本于痰熱所作醫以寒涼攻下太過損
傷脾胃變而成陰宜用温平補胃燥痰之藥治
之若曰不因壞症而有陰陽之分則是指痰熱
所客表裏臟腑淺深而言癇病豈本自有陰寒
者哉

丹溪曰癇屬驚與痰不分必分五等大率行痰為主
黄芩黄連瓜蒌半夏南星隨痰火多少治之無
有不愈　有熱以涼藥清其心　此症必用吐

吐後用平肝之藥青代柴胡川芎之類

素問大奇論篇云心脈滿大癎癖筋拳肝脈小急

癎癖筋拳

凡灸癎必須先下之乃可灸不然則氣不通能殺人針則不拘　鳩尾穴必高手乃可下針但宜灸亦不可多壯壯多則令人健忘

心癎面赤心下熱短氣喘息灸巨缺三壯

肝癎面青反視手足搖動灸丘墟三壯

脾癎面黃腹大善利胃脘并脘傍一寸各三壯衝陽隱白

肺癎面白口吐沫灸肺俞少商少陽各三壯

腎癎面黑正直視身不搖如尸厥金戶少海至陰湧泉各三壯刺一分

治癲之劑始治多用攻痰法繼以養心壯神補劑收功

礬丹九　治五癲五癎無拘陰陽冷熱

右用礪鑿一窠可容二兩

虢丹　晉礬各一兩

許先安丹在下次安礬在上以炭五斤煅令炭盡取出研細以不經水猪心血為丸如菉

豆大每服十九至二十九橘皮湯下

元戎二白丸 治癲與癎

白礬一兩以湯麵包蒸熟去麵入輕粉三五分

量虛實加減丸如桐子大每服二三十九生

姜湯下 小兒丸小些

鴟頭丸

皂角五條酥炙 鴟頭一枚燒存性 虎甲五錢研細

右末糯米糊為丸蒸豆大每服十五丸加至

二十丸米飲下

神應丸 治風癲久服其痰隨糞而下

生明礬一兩 膽茶五錢

右末蜜丸桐子大每服三十丸膽茶下

乳硃丹

乳香 硃砂飛

右用乳香熔化拌和硃砂丸如龍眼大每服

一丸以側栢葉浸酒磨化温服

天冬散 治風癲脇痛耳鳴吐逆

天門冬去心皮 乾為末酒調下二錢

寶鑑龍腦安神丸　治男婦五種癲癎無問遠近
發作無時　地骨皮　麥門冬　桑白皮
甘草　人參各二兩　茯神三兩　馬牙硝二錢
射香　氷片各三錢　牛黃五錢　烏犀一兩
硃砂二錢　金箔大者五帖
右細末煉蜜丸彈子大金箔為衣如風癎病
冬月溫水化下夏月凉水化下不拘時二三
歲者日進二服小兒一丸分作二服　虛勞
發熱咳嗽嘔噦新汲水化下

茯苓丸　常服治心疾良驗
人參　石菖蒲　遠志　茯神　茯苓　辰砂
飛　南星　半夏麴　真鉄粉各等分
右末姜汁打糊丸桐子大另用辰砂為衣每
服十九加至三十九夜卧姜湯下

養心湯　治心虛血少驚惕癲癎
黃耆炙　茯苓　茯神　半夏　川歸　川芎各五錢
酸棗仁　栢子仁　五味子　人參
遠志　桂心各二錢半　甘草炙四錢　加姜棗水煎服

加赤茯苓檳榔治停水怔悸
星黃湯 治心風及卽邪祟
南星 大黃 等分水煎服 吐痰
盞珠丸 治心恙及卽邪祟
猪心血 硃砂一兩 乾青靛花一匙
先將猪心血同靛花研勻入硃砂末和丸桐
子大每二十丸茶酒任下 甚者不過三服
治癲癎經驗方 一宗四方
竹茹一錢 半夏麴八分 枳實 橘紅 甘草灸各

五分 山梔炒黑一錢半 玄明粉 灯草各三分 加姜棗水煎服

第二次服方可服三劑又服前方一劑又再服此方三劑

人參一錢半 黃芪五分 歸身一錢 百合二錢半 茯神 酒紅花各二分 姜三片 棗二枚 水煎服

酸棗仁生三分熟酸棗仁四分 麥門冬五分 白芍藥炒過八分 甘草梢三分 貝母 小草各一錢

第三方服前二方半月覺神氣稍完繼服此藥

紫河車一具洗淨砂鍋煮爛入鹽少許與服後

半月勿服藥覺少減又服前方一劑第二方三劑又再服下項丸藥仍將前二藥間服

丸藥方

牛膽南星八錢　眞牛黃四錢　辰砂三錢　眞射香三分

煮甘草膏爲丸芡實大金箔爲衣薄荷湯下九五

清神湯　治痰迷包絡心熟癲疾

茯神　黃連各二錢　酸棗仁炒　石菖蒲　栢子仁內　遠志各一錢　甘草五分　水煎服

痰盛者加南星半夏橘紅瓜蒌竹瀝姜汁

海藏治癲癎狂邪不欲眠自賢自智妄行不休此方能安五臟下心氣

白雄鷄一隻煮熟五味調和作羹粥食之

仲景防己地黃湯　治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脉浮

防己一錢　桂枝　防風各三錢　甘草二錢　右以酒一杯漬一宿絞取汁生地黃二斤蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和勻治心惡無厌效

一酔膏

灰酒二碗香油四兩和勻

用楊柳枝二十條逐條攪一二百下候香油與
酒相入成膏煎至八分灌之熟睡則醒時或吐
下即安矣

治狂之劑

瀉心湯 治心受積熱讝語發狂踰墻上屋
大黃 黃芩 黃連
每四錢水煎服瀉數行然後用安神藥調理

古參丸 治狂發無時披髮大叫殺人不避水火
苦參為末蜜丸梧子大每服十五丸薄荷湯下

調胃承氣湯 治狂方在火熱門
大承氣湯 治陽明大實發狂 方在傷寒門

抱膽丸 治癲狂不定非輕劑所能愈者
水銀二兩 黑鉛一半 辰砂 乳香各一兩
右將鉛入銚內熔化離火畧冷入水銀攪硬
研碎入辰砂乳香乘熱用柳木槌擂勻丸如
芡實大每服一丸灯心湯下病者得睡切莫
驚動覺來即安耳進一丸又方以猪心血為
丸井水吞下用治狂言妄語

牛黃瀉心湯　治心經邪熱狂言妄語心神不安

牛黃　氷片　硃砂各一錢半　大黃生一兩

右末每服三錢生姜蜜水調下

六神散　治發狂此二方皆禁方

寒水石　黃連童便炒各一兩　丹皮三錢　青黛石煅過各五錢　龍膽草各二分　氷片

右末童便調下

鎮心丹　治驚悸自汗心煩短氣喜怒悲惡不自知忘魂失魄狀若神靈所憑及男子遺泄女子帶下

辰砂飛　白礬枯

右末水丸鷄豆大每一丸人參湯下

婦人熱入血室發狂不認人以保命集牛黃膏妙

牛黃二錢半　硃砂　礬金各三錢　丹皮　甘草

氷片各一錢

右末煉蜜丸棗子大新汲水化下

本事方寧志膏　治狂不睡

人參　酸棗仁各一兩　辰砂五錢　乳香二錢半

右末煉蜜丸彈子大每一丸薄荷湯化下

予族弟緣失心與此方服二十丸良愈親舊多傳云服之皆驗

治癎之劑

碧霞丹　治五種癎疾時作擂掣痰涎壅塞牙關緊急心神迷悶目睛上視

石碌研九度飛一兩　附子尖七枚　烏頭尖七枚　蝎梢七枚

右末麵糊丸菉實大每用薄荷湯化下一丸更以酒半合温服之須臾吐出痰涎渙然後隨症治之口噤者斡開灌之

仲景風引湯　除熱治癲癎又治大人風引少小驚癎癖癡日數十發醫所不療又治脚風

大黃　龍骨　乾姜各四兩　桂枝三兩　甘草　牡蠣各二兩　寒水石　赤石脂　白石脂　滑石　石膏　紫石英各六兩

右粗末以韋囊盛之取三指撮井花水三升煮三沸温服一升治風熱發癎呷之無不効不用渣食後量多少

犀角丸　治風癲癎發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末五錢　赤石脂三兩　朴硝二兩　白羊髓一兩　薄荷葉一兩

右末麵糊丸梧子大每服二十丸

至三十九温水下曰三服不拘時如覺痰多
即減數忌油膩煠炙
楊氏家藏五癇丸 治癲癇不問新久並宜服之
南星泡 烏蛇酒浸一宿去皮骨焙乾 白礬各一兩 辰砂二錢
半全蝎二錢去尾炒 半夏去頭炒兩 姜蚕炒兩半 白附子炮半兩 射香三錢 皂角四兩
右先將皂角搗碎水半升揉汁與白礬同熬乾為末入各藥末以姜汁打麵糊丸桐子大
每服三十丸姜湯下

丹溪金丸九 治諸癇
明礬 礬金 防風 牙皂角各一兩 川芎二兩
蜈蚣一條 右末蒸餅糊丸梧子大空心茶下十
五丸一曰除根

錢氏五色丸 治五癇
辰砂五錢 水銀二錢 雄黃飛 珠一兩 鉛三兩同水銀結砂子
右末蜜丸麻子大每四五丸金銀薄荷湯下

三因六珍丹 治風癇失性顛倒欲死或作五畜
等聲掣縱吐沫久而方甦

丹砂五錢 水銀一兩 與水雄黃 鉛二兩 銀結砂子 雌黃 蝱黃 珎珠各一兩 右細末煉蜜丸梧子大每服三五丸 姜棗湯下丸此藥須要搗二三萬杵不然難丸 嚴氏控涎丸 治諸癇久不愈頑涎聚散無時

生川烏 半夏 姜蚕 不炒以生姜自然汁浸一夕各五錢 全蝎 去尾七枚 鉄粉三錢 甘遂二錢半 右生姜自然汁打薄糊為丸菉豆大硃砂為衣每服十五丸食後姜湯下忌甘草此下痰劑也

千金龍膽湯 治嬰兒血脉盛實四肢驚掣發熱并諸驚癇

龍膽草 鉤藤 柴胡 黃芩 桂枝 芍藥 茯苓 甘草各六銖 蝗蟲二枚

大黃一兩 右水一升煮取五合服之

本事人參散 治諸癇并慢脾風神昏痰盛

人參五錢 南星一兩水浸切片以生姜汁并漿煮過性晒乾為末 半夏 南星 菖蒲各三錢 黃芪 鉤藤 細辛各半兩 右每服一錢姜三片水煎服加冬瓜仁少許

斷癇丹 治因驚成癇者

錢蟬退　甘草　桂心　遠志　防風　露蜂房各二錢　杏仁二錢半

許為衣每服二十九棗湯下日二服夜一服

甘遂丸　甘遂不蛀者三錢為細末將猪心剖開入甘遂以線縛定用紙裹數層慢火煨熟不可令焦取甘遂乘潤入辰砂末一錢搗勻作四丸每服一丸猪心煮湯下

蛇黃丸　蛇黃小者二十枚以猪膽汁拌勻入火煆通紅取出地上出火毒研極細　右用狗膽

一枚取汁和粟米飯丸菉豆大每服十五丸溫酒下吐涎乃效

蛇黃丹　治諸癇及小兒急驚風

蛇黃四枚燒紅以醋淬乾　砂另研麝香各五錢　右末稀米糊丸桐子大每服量大小或一二丸或三五丸溫酒米湯任下

當歸龍膽丸　治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸癇搐　即龍會丸　方在脇痛門

補胃燥痰丸　治陰癇服涼藥大過損傷脾胃

白朮二錢 蒼朮 陳皮 半夏 南星 茯苓各一錢 木香一錢 藿香七分 甘草四分 甚者加附子五分 姜五片水煎服

寶鑑沉香天麻丸 治一小兒四歲因長老摩頂受記生人念呪恐懼發搐痰涎有聲目多白睛強項背一時許方醒後每見皂衣人即發多服犀硃腦射鎮墜之藥已四年餘無功又添行步動作神思如痴脉沉弦而急針經云心脉滿大癇癖筋孿病久氣弱多服鎮墜寒凉之劑漩揖正氣故添動作如痴先灸兩蹻各二七壯次服此藥

又肝脉小急蓋小兒神氣尚弱因而被驚神思無依又動于肝肝主筋故癇癖筋孿

沉香 益智 川烏各二錢 天麻 防風 半夏 附子炮各三錢 羌活 甘草 當歸 姜蚕各一錢半 獨活四錢 經云恐則氣下精氣怯而上焦閉以羌活獨活苦温引氣上行又入太陽為引用以為君天麻防風辛温以散之當歸甘草辛甘温

以補氣血之不足養胃氣以為臣附子川烏益智大辛温行陽退陰又治客寒傷胃腎主五液入脾為涎以生姜半夏燥濕化痰沉香辛温躰重氣清去怯安神故以為使　每服五錢生姜三片水煎去渣温服食前三劑愈

劉宗厚曰按癲症本從熱治然亦有壞疝而成陰者如錢仲陽所治王氏子吐瀉諸醫藥下之至虛變慢驚手足瘈瘲而身冷醫漫與八正散錢氏曰不能食而胃中虛若利大小便即死久則脾腎俱虛當身冷而閉目必用益黃散史君子九補脾遂能飲食後又不語錢氏以地黃丸補腎一月而安皆此意也此方用大熱之藥乃從權以救前治之失非常治之道也

蜜陀僧　治暗風癲癇以開痰迷心竅

蜜陀僧成塊者纏以鉄線又用鉄線掛火中煅紅用酒醋一升淬盡出火毒為極細末每服一錢射香湯調下

許學士驚氣丸　發則牙關緊急涎潮昏塞醒則

精神若痴

附子　木香　姜蚕　白花蛇　橘紅　天麻
麻黄　乾蝎　天南星 姜汁浸一夜 各五錢　蘇子一兩
硃砂二錢半 為衣

右為末加氷射少許煉蜜丸如龍眼大每服一丸金銀薄荷湯化下温酒亦可此寻家秘方也一軍人犯法臨刑得釋縛精神頓失如痴與一丸服訖而寐及覺病已失矣一婦因避盜失心數年授此方不終劑而愈又一婦狂厥者十年諸治不驗寻授此方去附子加鉄落亦不終劑而愈鉄粉非但化痰鎮心至如摧抑肝邪特異若多恚怒肝邪大盛鉄粉能制伏之此金制木之意也

顫振門

生生子曰顫振者非寒禁鼓慄乃木火上盛腎陰不充下虚上實實為痰火虚則腎虧法則清上補下

新寨馬叟年五十九因秋欠稅官杖六十得驚氣

成風搐已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人代哺口目張睒脣舌嚼爛抖擻之狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜卧發熱衣被盡褰遍身燥痒中熱而反外寒久欲自盡手不能繩傾產求醫至破其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌耳涌奪則愈矣今已秋寒可三之如未更刺腧穴必愈先以通聖散汗之繼服湧劑則瘥一二升至晚又下五七行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如鷄黃成塊狀如湯熟叟以手顫不能自探妻與代探咽嗌腫傷昏憒如醉約一二時許稍々省又下數行立覺足輕顫減熱亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筯未至三涌病去如濯病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不可以熱劑温之恐反成他病也

生生子曰據戴人此治非真知其爲痰火盛實者

莫敢如此療也木之有餘由金之哀弱病既久恐亦有始同而終異者況吐汗下之後謂絶不必補養得乎病之輕者或可用補金平木清痰調氣之法在人自斟酌之

摧肝丸　鎮火平肝消痰定顫

膽星　鈎籐　黃連酒炒　滑石飛　鉄華粉各一兩　青黛三錢　姜蚕炒五錢　天麻酒洗二兩　辰砂飛五錢　大甘草二錢　右末以竹瀝一碗姜汁少許打糊丸菉豆大食後及夜茶下一錢五分忌鷄羊

本事鈎藤散　治肝厥頭搖眩運能清頭目

鈎藤　陳皮　半夏　麥冬　茯苓各七分　人參　甘菊勿悞用野菊花　防風各五分　石膏一錢　甘草三分

姜二片水煎服

參朮湯　氣虛顫掉

人參　白朮　黃芪各二錢　茯苓　甘草　陳皮各一錢　甚者加附子

水煎服

統旨秘方補心丸　心虛手振

當歸　生地各一兩半　川芎　甘草　人參各一兩

栢子仁　酸棗仁　各二兩　遠志去心二兩半　辰砂飛研三錢　膽星各五錢　金箔二十片　麝香一錢　琥珀三錢　石菖蒲六錢　茯神去皮心七錢　為末餘餅糊丸菉豆大辰砂為衣

每七八十丸津嚥嚥下或姜湯下

統旨秘方定心丸　老人戰動風氣所致及血虛而振　天麻蒸熟　秦艽去芦　全蝎去頭尾　細辛各一兩　熟地　生地　川歸　川芎　芍藥各二兩　防風　荆芥各七錢　白朮　黄芪各兩半　藏霊仙酒洗五錢

為末酒糊丸梧子大每服七八十丸食遠白湯或酒送下

癖癇門

生生子曰癖癖縮也癇伸也伸縮不止手如拽鋸搐之類也汗多不止為虛無汗能食為實

内經曰心脉急甚者為癖癇此心經虛寒治宜補心牛黄散之類

又曰心脉滿大癇癖筋孿此心火實熱也治宜瀉心火涼驚丸主之

又曰肝脉小急亦癇癖筋孿此肝虛也宜續斷丸

主之若肝脉盛宜救脾加減建中湯内經謂脾脉急甚亦為癉癉痙此脾虛肝乘之而癉也故宜實土瀉木之劑建中湯是也

劉河間曰諸熱瞀癉皆屬于火熱勝風搏并于經絡風主動而不寧風火相乘是以瞀癉生矣治以祛風滌熱之劑折其火熱瞀癉立愈若妄加灼艾或飲以發表之劑則死不旋踵矣

東垣人參益氣湯　熱傷元氣四肢困倦手指麻木時く癉痙　黃芪二錢　甘草炙升麻各五分　柴胡六分　五味子三十粒　甘草生五分　人參一錢二分　白芍七分

水煎服

獨活湯　風虛昏瞶不自知覺手足癉痙或為熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

獨活羌活　人參　防風　川歸　細辛　茯苓各五錢　甘草炙二錢半　升麻　桂心　白薇　菖蒲　川芎各一兩

每一兩姜五片煎温服

胃風飲　虛風症能食麻木牙關緊急手足癉痙目肉蠕瞤胃中有風面腫

白芷 一錢二分　升麻 二錢　葛根　蒼术　蔓荊子
川歸身 各一錢　甘草　黍胡　藁本　羌活
草豆仁　黃柏 不去節 各五分　麻黃　姜三片　棗二
枚水煎温服

千金薯蕷丸　腎氣虛弱風氣百疾頭眩驚悸癖
癥　薯蕷 廿八分　當歸 十分　桂心 七分　神曲 炒　熟地黃
人參 各十分　川芎　芍藥　白术　麥冬　杏仁
各六分　甘草 二十分　柴胡　桔梗　茯苓 各五分　鹿角
膠 七分　乾姜　白斂 各三分　防風　黃芩 各六分　大豆

黃卷 七分　大棗 百枚 為膏　右末和棗膏加煉蜜丸如
彈子大空心酒服一丸日三服

續斷丸　肝勞虛寒脇痛脹滿眼昏不食拿縮癖
癥　續斷 酒浸　川芎　川歸　半夏 姜製　橘紅　乾
姜 炮 各一兩　桂心　甘草 炙各五錢

牛黃散　心虛風筋脉牽搐神昏語澁
牛黃　冰片　硃砂　射 各一錢　蟬退　烏蛇肉
各一兩　全蝎 炒　桑螵蛸　羚羊角　天麻

阿膠　防風　甘菊　桂心　細辛　蔓荊子
側子去皮　獨活　犀角各五錢　麻黃七錢半

右為末和勻再研每服一錢荳淋酒下
續命煮散　風氣蕃滿心中昏瞶四肢無力口眼
瞤動或時搐搦或渴或自汗

熟地黃　芍藥　川芎　甘草　遠志　荊芥
半夏各五錢　官桂七錢半　乾薑　葛根
加牡礪一錢半　人參　細辛　葛根

獨活散治風熱化痰
獨活　防風　蕎本　旋覆花　川芎　蔓荊
子各一兩　右每服三錢姜三片水煎服

細辛　石膏　甘草各五錢炙

痙門　附勞風

生生子曰內經云肺移熱于腎傳為柔痙古云
痙勁切之謂也仲景諸公傷寒書皆以為太陽
風濕所致亦有兼陽明經者仲景謂汗下過多
及瘡家發汗過度皆成痙此指外感之邪原係
傷寒家法也陳無擇張子和諸公云亦有風火

痰熱之内因者謂此病多由亡血筋無所營故
邪得以所襲毋溪謂比癇為虛此皆指内傷之
症也觀剛柔二字則亦當有虛實之別大抵剛
者多從外感柔者多從内傷故治斯疾者但明
知從外感而来則用偉寒家法若從雜症而来
則用陳無擇毋溪劉宗厚張子和諸家之法庶
表裏詳盡始無遺此失彼之患矣

内經云諸痙項強皆屬于濕（王注太陽傷濕）又云諸暴強
直皆屬于風（王注陽内營而陰行于外劉宗厚云按内經言

痙肺腎太陽督脉與夫六氣皆能為之大抵皆
主于濕

仲景云太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痙
成無已曰痙者痙也強也千金曰太陽中風重
感寒濕則變痙太陽病發熱無汗為表實則不
當惡寒今反惡寒者則太陽中風重感于寒為
痙病也以表實感寒故曰剛痙
太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔痙
成無已曰太陽病發熱汗出為表虛則當惡寒

其不惡寒者為陽明病今發熱汗出而不惡寒者非陽明証則是太陽中風重感于濕為柔痓也表虛感濕故曰柔痓

太陽病發熱脉沉而細者名曰痓

成無已曰太陽主表太陽病發熱為表病脉當浮大今脉反沉細既不愈則太陽中風重感于湿而為痓也金匱要畧曰太陽病其証備身體強兀兀然脉反沉細此為痓括蔞桂枝湯主之

太陽病發汗太多因致痓

成無已曰太陽病發汗太多則亡陽內經曰陽氣者精則養神柔則養筋陽微不能養筋則筋脉踡急而成痓也

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨搖頭卒口噤背反張者痓病也

成無已曰太陽中風為純中風也太陽中寒為純傷寒也皆不作痓惟是太陽中風重感寒湿乃変為痓也身熱足寒者寒湿傷下也時頭熱面赤目脉赤風傷于上也頭搖風主動也獨頭

搖者頭為諸陽之會風傷陽也若純傷風者身亦為動搖手足為之搐搦此皆內挾寒濕故頭搖也口噤者寒主急也卒口噤者不常噤也有時而緩若風寒相搏則口噤而不時開此皆加之風濕故卒口噤也足太陽之脉起于目內眥上額交巔上其支別者從巔入絡腦還出別下項循肩膊內夾脊抵腰中下貫臀以下至足風寒客于經中則筋脉拘急故頸項強急而背反張也

風病下之則痙濕發汗必拘急

瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痙

劉宗厚曰按此謂汗下而致痙則不專于風寒濕之外傳矣是又因壞證而成也發汗下之太過皆亡津液損血之所由也

劉宗厚曰按痙症屬風寒濕所傷有汗者脉必浮緩無汗者脉必浮緊若其脉沉細者濕所傷也堅直上下行皆緊之象也發汗已其脉如蛇亡津液而無胃氣之象也

子和云吕君王妻年三十病風搐目眩角弓反張數日不食諸醫皆作驚風暗風風癇治之以南星雄黄烏附用之不效戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直搖動風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰不能平木肝木茂而自病因湧風痰二三升次以寒劑下十餘行又以排針刺百會穴出血一杯愈

劉宗厚曰按風搐本與痙症不同而痙症屬濕土極必燕風木動搖之化風搐屬木木極必見金燥緊歛之形要之亦可同論故取此條以證痙病不專風寒濕之所中則痙以風散氣故有三因方云夫人之筋各隨經絡結束于身血氣內虛外為風寒濕熱之所中則痙以風散氣故有汗而不惡寒曰柔痙無汗而惡寒曰剛痙原其所因多由亡血筋無所營故邪得以襲之所以傷寒汗下過多與夫病瘡人及産後致于斯疾者槩可見矣診其脉皆沉伏絃緊但陽緩陰急則久久拘攣陰緩陽急則反張強直二

證各異不可不別
丹溪曰痙切不可作風治蕪用風藥　大率與癇相似比癇為甚為虛宜帶補　多是氣虛有火有痰宜用人參竹瀝之類　一男子二十餘歲患瘖瘡鬱謝後忽患口噤不開四肢強直不能屈時或逆膊腹痛一時陣則冷汗如雨痛定則汗止時作時休其脉絃緊而急如真弦狀向知此子極勤苦意其因勞倦傷血山居多風寒乘虛而感又因瘖瘡其血愈虛當用辛温養血辛凉散風遂以當歸芍藥為君川芎青皮釣藤為臣白朮陳皮甘草為佐桂枝木香黄連為使更加紅花少許服二十帖而安

王海藏云發汗太過多因致痙身熱足寒項強惡寒頭熱面腫目赤頭搖口噤背反張者太陽痙也　若頭低視下手足牽引肘膝相搆陽明痙也　若一目或左右邪視并一手足搐搦者少陽痙也　汗之止之和之下之各隨其經可使必已　在表無汗宜汗之有汗宜止之陽明痙屬

裏宜下之少陽痙半表半裏宜和之所謂各隨其經也

劉宗厚曰謹按傷寒痙病活人以太陽中風又感寒濕而致則專于外邪所傷然仲景亦有汗下過多之戒則又出于壞証所成矣蓋外邪所傷者通宜解散仲景言剛柔活人分陰陽雖知論經絡等諸方詳矣至于治壞証補虛救失之法諸方則亡也又千金謂温病熱入腎中亦為痙小兒病癇熱盛亦為痙若此治法俱未見之也況此二者之外又有血氣本虛之人如產後汗出多而変痙者或因七情怒氣而發痙者或因濕熱内盛痰涎壅遏經絡而作痙者治各不同也大抵傷寒有外邪之可解宜用風藥發散風寒又風藥亦能勝濕耳至于邪熱入腎亦非風藥之所能療也其内證作痙本無外邪前人豈可仍用風藥處治惟宜補血降火敦土平木清痰去濕隨證而用不可不察也

海藏云若汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往来

寒熱脉弦者少陽風痙宜柴胡防風湯

柴胡　防風各一兩　人參　黃芩各五錢　生姜　甘草各六錢半　棗三枚　每服一兩水煎服

若發汗過多發熱頭面搖卒口噤背反張者太陽無陽明也宜去風養血防風當歸散主之

防風　當歸　川芎　地黃　每服一兩水煎

神术湯　治剛痙解利無汗

葛术三錢　甘草一錢　姜蔥水煎服

白术湯　防風二錢　甘草一錢　姜蔥水煎服　治柔痙解利有汗

加桂心黃芪治柔痙解利有汗

白术三兩　防風二兩　甘草一兩　每服五錢姜三片水煎服一日二服漸ゝ汗止為解

仲景葛根湯　太陽無汗而小便少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痙者

葛根四兩　麻黃　生姜各三兩　桂枝　芍藥　甘草各二兩　大棗十二枚　每服五錢煎服取微汗

若發熱無汗惡寒名曰剛痙宜麻黃加獨活防風

湯　麻黃　桂枝各一兩　芍藥三兩　甘草二兩　獨活　防風各一兩　每服一兩水煎温服

瓜蒌桂枝湯　太陽病其証備身體強几几然脉
反沉遲此為柔痓
瓜蒌根　甘草　芍藥各二兩　桂枝　生姜各三兩
大棗十二枚　水九升煎取三升分三服取微汗
汗不出啜粥發之
海藏　治發汗自汗而不惡寒者名柔痓宜桂
枝加川芎防風湯
桂枝　芍藥　生姜各一兩　甘草一兩半　防風　川芎
各一兩　大棗六枚　每服一兩水煎服

凡剛柔二痓皆可與小續命湯　但要識加減法
若柔痓自汗者去麻黄夏間及病有熱者減桂
枝一半冬及初春去麻黄芎
千金續命湯　卒中半身不遂手足拘急不得屈
伸身體冷或智或痴或身強直不語或生或死
狂言不可名狀角弓反張或欲得食或不用食
大小便不利皆療之
人參　桂心　川歸　獨活　黄芩　甘草炙
乾姜炮各七錢半　石膏一兩半　杏仁四十枚　以水九升煮

取三升分温三服日二服無汗者加麻黄
若汗後不解不靜不躁目直視口噤往来寒熱脉
弦者少陽風痙宜柴胡加防風湯
柴胡　防風　各一両　人参　黄芩　各五銭　半夏　六銭　生
姜　甘草　各六銭半　棗　三枚　每服一兩水煎
倉公當歸湯　賊風口噤角弓反張痙証
川歸　防風　各七銭半　獨活　一両半　附子　一枚　細辛　五銭　麻
黄　一両三銭　酒五升煮取三升服一升口不開者
格口納之一服當蘇二服小汗三服大汗
活人八物白朮散　陰痙一二日面腫手足厥冷
筋脉拘急汗不出恐陰氣内傷
麻黄　白朮　茯苓　五味子　羌活　各五銭　桂
心　附子　各三分　良姜　一分　每四銭姜五片水煎服
附子散　陰痙手足厥逆筋脉拘急汗出不止頭
項強直頭摇口噤
桂心　川芎　各三銭　附子　炮　白朮　各一両　獨活　五銭
每三銭棗一枚水煎服
桂心白朮湯　陰痙手足厥冷筋脉拘急汗出不

止　白朮　防風　甘草　桂心　川芎　附子　每五錢姜五片棗二枚水煎温服

丹溪治虛婦因怒手足強直十指如束右手脉弦虛左手脉弦大而強稍堅此風木攻脾土宜速瀉肝氣助肺金補脾土之陰

黃連二錢　南星　白朮　人參　黃芩　天麻　川芎　木通　陳皮　青皮各五錢　甘草一分

水煎入姜汁辣服

肘後方　中風體強直不得屈伸反覆刮枳樹皮細切一升以酒二升浸一宿每日温服半升酒盡再作即枳實攔皮去風濕効

千金方　治口噤手足不隨而手体強直

伏龍肝五升以水七升攪勻取汁飲之

痙痙辭

生生子曰丹溪云痙當作痙傳寫之悞耳改之諸書亦未有能辯之詳註之確者惟郭雍氏云痙與痙當是二病謂昔劉寅氏有言病以時發者謂之痙不以時發者謂之痙似亦未能詳悉厥

後以其所歷見及治之効與不効者反覆考檄
二症之名二字之義栽其用心可謂至懇至懇者
矣然終未能昭著允若故後之人疑其為二症
者不亦宜乎愚按靈素仲景以下諸書云痙云
痓字雖兩般治多雷同殆亦不必犁而為二也
若辯之則愈支離膚見謂痙乃病之名痓乃病
之狀原其有剛柔二種以病發之時而經筋脉
絡僵勁角弓反張故曰痓痓是勁急也是以其
病發之狀象而名之也不然何歷代諸公或以
治痓之方治痓或以治痓之方治痓諸皆能効
治既同而不殊則症當一而不二也焉用分

勞風 即痓之類

冊溪云痓比癇為虛蓋因勞汗遇風內挾太陽寒
濕之邪治亦與痓同法但當視其所勞則知虛
在何臟如房勞則腎虛汗出腠理開風入皮腠
得寒則閉風不能出與水俱行其人當目下腫
如臥蚕之狀戴人云腎主水其經至于目下故
也不禁房室則死明其虛在腎也所以関于太

陽何也太陽主寒其經最在外膝理得寒則閉故太陽先受邪也治宜八物白术散倉公當歸湯

黃芪湯　汗多氣虛發痙

黃芪蜜炙二錢　人參　白术　茯苓　白芍炒各一錢　甘草炙八分　桂枝五分　水煎服

當歸散　血虛及去血過多發痙

當歸酒洗二錢　川芎　熟地　防風　黃芪各一錢　甘草四分　水煎服

芍藥一錢半　甘草

理氣平肝散　七情所傷發痙

烏藥　香附各一錢半　青皮　枳殼　芍藥　川芎　柴胡　木香各一錢　甘草

姜三片水煎服木香磨水二匙加入

清痰湯　痰火攻作項強口噤角張反痙

水煎入竹瀝姜汁各三四匙食遠服

山梔　黃芩　半夏炮　橘紅　茯苓　瓜蔞仁　枳殼　貝母　香附童便浸各一錢　甘草五分

去濕青熟散

白术二錢　蒼术二錢半　澤瀉　茯苓　天花粉　山

梔各一錢 羌活七分 甘草四分 水煎服

芎枳丸 治勞風強上冥視肺熱上壅嗢稠

川芎 枳殼等分 爲末蜜丸桐子大每服三五十丸食後温水下日三服

祛風清金散 肺熱壅盛痰嗢如膿

防風 括蔞根 桔梗 枳殼 旋覆花 川芎各一錢 山梔 黄芩 貝母 瓜蔞仁炒 茯苓 天門冬 麥門冬 橘紅各八分 五味子十五粒 甘草四分 水煎服

生生子曰按内經評熱病論篇帝曰勞風之病何如岐伯曰勞風發在肺下其爲病也使人強上冥視嗢出若涕惡風而振寒此爲勞風之病帝曰治之柰何岐伯曰以救僥仰巨陽引精者三日中年者五日不精者七日欬出清黄涕其狀如膿大如彈丸從口鼻中出不出則傷肺傷肺則死也

引精謂目中之精明引動能辨人與物也

啓玄子註曰勞風生故曰勞風勞謂腎

旁也腎脉者從腎上貫肝膈入肺中故腎勞風生上居肺下也強上好仰也冥視謂合眼視不明也腎精不足外吸膀胱膀胱氣不能上營故使人頭項強而視不明也肺被風薄勞氣上薰故令嗌出若鼻涕狀腎氣不足陽氣内攻勞熱相合故悪風而振寒肺傷則營衛散解鼽不内治故疕林氏謂強上者似角弓反張也冥視者目開不見物也凡痓病皆同不識人或反視斜視也治法當與痓同千金方冥視作目眩

不得卧

靈樞曰病而不得眠者何氣使然岐伯曰衛氣不得入于陰常留于陽悉于陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入于陰則陰氣虛故目不瞑矣

大惑論

黄帝問于伯高曰夫邪氣之客人也或令人目不瞑不卧出者何氣使然伯高曰五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積于胸中出於喉嚨以貫心脉而行呼吸焉營氣者泌其

津液注之於脉化以為血以榮四末内注五臟
六腑以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慓疾而
先行于四末分肉皮膚之間而不休者也晝日
行于陽夜行于陰常從足少陰之分間行于五
臟六腑今厥氣客于五臟六腑則衛氣獨衛其
外行于陽不得入於陰行于陽則陽氣盛陽氣
盛則陽蹻陷不得入于陰陰虛故目不瞑黃帝
曰善治之柰何伯高曰補其不足瀉其有餘調
其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑

陰陽已通其卧立至黃帝曰善此所謂決瀆壅
塞經絡大通陰陽和得者也願聞其方伯高曰
其湯方以流水千里以外者八升揚之萬遍取
其清者五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一升
治半夏五合徐炊令熟勿使過度去滓以飲一
小杯日三稍益以知為度故其病新發者覆
杯則卧汗出則已矣久者三飲而已矣（此去飲之劑也）
内經曰胃不和則卧不安帝曰人之不能偃卧者
何也岐伯曰肺者臟之蓋也肺氣盛則肺大肺

大則不能偃卧

王海藏云膽虛不眠寒也聖惠方酸棗仁炒為末以竹葉湯調服

張子和治一富家婦人因思慮過甚二年不得寐無藥可療其夫求治脉之兩手俱緩此脾受邪也脾主思故也乃與其夫議以怒激之多取其財飲酒數日不處一法而去其婦大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寤自是食其脉得平

此怒勝思法也

水腫病令人不得卧卧則驚：則欬甚此水氣凌肺也

温膽湯治大病後虛煩不得眠或則驚悸極效

丹溪治煩不得眠益元散加牛黄服之

仲景酸棗湯　治虛煩不得眠

酸棗仁二升　甘草一兩　知母　茯苓　川芎各二兩

水八升煮酸棗仁得六升内諸藥煎取三升分温三服一方加生姜二兩

本事鼈甲丸　膽虛不得眠四肢無力

酸棗仁　鼈甲羔活　牛膝　黄芪　人參

五味子 各等分 蜜丸梧子大每四五十丸温酒下
聖惠酸棗地黄湯 骨蒸勞煩心不得眠
酸棗仁 一兩 水一大碗半研絞取汁下米二合煮
粥熟再入地黄汁一合更煮過不計時服之
六物湯治振悸不得眠 四君子加酸棗仁 生姜煎服
許學士珎珠母丸 肝虚内受風邪卧則寬散而
不收狀若驚悸
珎珠母 另研末 三錢 當歸 熟地 各一兩半 人參 茯苓
酸棗仁 栢子仁 犀角 各一兩 沉香 龍齒 各五

錢為末蜜丸梧子大辰砂為衣每四五十丸金
銀薄荷湯下日午及夜服 一方多虎睛一對射香一錢
獨活湯 治同前相兼服
獨活 羌活 人參 前胡 細辛 半夏
酸棗仁 沙參 茯苓 甘草 五味子 各等分
每七錢姜三片烏梅一箇不拘時煎服
紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧
每卧則覺飛揚覺身在牀而神覺離体驚悸多
厭通夕無寐更醫不效予為診視詢之曰醫作

何病治董曰衆皆以為心病予曰以脉言之肝
經受邪非心病也肝氣因虛邪氣襲之肝藏魂
者也遊魂為變平人肝不受邪卧則魂歸于肝
神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以卧則魂
飛揚若離体也肝主怒故小怒則劇董欣然曰
前此未之聞雖未服藥已覺沉痾去體矣顧求
治之予曰公且持此說與衆医議所治之方而
徐質之閱旬日漠至云醫徧議古今方無與病
相對者故予處此二方以贈服一月而病悉除

此方用真珠毋為君龍齒佐之真珠入肝經
為第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛令人例以
為鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其
類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魄西方白虎
金也屬肺而藏魄龍能變化故魄遊而不定虎
能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧者宜以
虎睛治魂魄飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不
失在夫人達之而已

益荣湯　血不足不寐及怔忡驚悸

當歸　黃芪　遠志　酸棗仁　炒　茯神　栢子仁　麥冬　白芍　人參　熬后黃芪各一錢　木香七分　甘草五分　姜三片　棗二枚　水煎服

多卧

黃帝曰人之多卧者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚湿而分肉不解焉其行遲夫胃氣者晝常行于陽夜行于陰故陽氣盡則寐陰氣盡則寤故腸胃大則衛氣行留久皮膚湿分肉不解則行遲留于陰也久其氣不精則目瞑故多卧矣其腸胃小皮膚滑以緩分肉解則衛氣留于陽也久故少瞑焉黃帝曰其非常経也卒然多卧者何氣使然岐伯曰邪氣留于上焦上焦閉而不通已食若飲湯衛氣晉久於陰而不行故卒然多卧焉

大惑篇

海藏曰膽實多睡熟也

生棗湯　治膽熱多睡

生酸棗仁為末茶姜汁調服

又方　生酸枣仁一兩　臙茶二兩　以生姜汁塗炙微焦為末每服二錢水七分煎六分温服

醒睡湯　酸枣仁　沙參各一錢半　麥冬一錢　茯神　甘草各五分　姜一片水煎服

煩躁門

仲景云煩屬肺躁屬腎火入於肺則煩入于腎則躁大抵煩躁皆心火為病火旺則金爍而水虧也惟火獨存故肺腎合而為煩躁又脾經絡于心中心經起于脾中二經相搏濕熱生煩夫煩者擾擾心亂无欲吐忙忡不安成無已曰煩為擾亂而煩躁為憤怒而躁合而言之煩躁為熱也析而言之煩陽也躁陰也煩為熱之甚者

熱之輕者躁為熱陳無擇曰内熱為煩外熱為躁又曰虚煩身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥不渴清又不寐皆虚煩也要黄曰先賢治煩躁療作有屬熱者有屬寒者獨煩而不躁者多屬熱惟悸而煩者為虚寒躁不煩者多屬寒惟火邪者為熱蓋煩者心中煩或

胸中煩皆内熱也躁者身体手足躁擾或裸体不欲近衣或欲坐井中為外熱也内熱者有本之熱故多屬熱外熱者多是無根之火故屬寒生生子曰仲景成無已二公所論煩躁皆為火熱是祖内經夫熱病皆傷寒之類也乃傷寒家語言其邪自外而入至于煩躁皆為熱候予謂躁有陰陽煩有虚實陶節庵曰先煩而悸者為實先悸而煩者為虚又曰煩漸生躁有陰陽虚實之别心熱則煩陽實陰虚腎熱則躁陰實陽虚煩為熱輕躁為熱重此亦傷寒家語也雜症之煩躁又各有虚實寒熱不同須當分别而治虚煩者心中擾亂精神不能任持似脹不脹悒悒悶悶飲食不甘美睡卧不安寧者是也治以養心血鎮火安神之劑如安神丸之類實煩者或心火熾盛或水飲痰涎停于胸膈壅悶不安者是也治以消痰逐飲散邪之劑如梔子豆豉湯蠲飲湯五苓散之類陽躁者煩渴欲飲憤激躁怒二便不利經云諸躁狂越皆屬于火者是也

治如丹溪用妙香丸之類陰躁者渴不欲飲極其躁擾或上熱下寒以為陰盛格陽為陽氣虛僿不能渾入皇甫欲收井中者是也治以理中湯回逆湯之類大抵煩症多屬于虛經曰夏脉者心也其不及令人煩心又云肝腎脾虛皆令人煩多由于虛也當尋傷寒法外之治今録治方于左以備採用

內外俱虛身冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆不得安靜者死　熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌黑焦乾者死

保命集云起卧不安睡不穩謂之煩宜梔豉湯竹葉后膏湯

活人書云但獨熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脉不緊數故知非裏實也不可下病此者內外皆不可攻之必遂煩渴當與竹葉湯若嘔者與陳皮湯一劑不愈再與之孫真人云此法數用有効

陳皮湯　陳皮一兩半　甘草炙一兩　竹茹各五錢　人參一錢半

每服七錢姜三片棗二枚水煎服

淡竹茹湯　心虛悶頭疼短氣內熱不解心中悶亂及產婦心虛鷹悸煩悶欲絶

麥門冬去心二兩半　小麥各二兩半　甘草炙一兩　人參　茯苓各一兩　半夏湯洗二兩　每服四錢姜七片棗二枚淡竹茹一塊水煎服

東垣硃砂安神丸　心亂煩熱怔忡心神顛倒凡欲吐胸中氣亂而熱有似懊憹懊憹之狀皆膈上血中伏熱熏蒸不安宜用權法以鎮陰火之浮行以養上焦之元氣用甘草之甘温補之當歸生地又為長生陰血之聖藥黄連去心煩除湿熱硃砂納浮游而安神明　方見怔忡門

仲景下痢後更煩按之心下濡者為虛煩也梔豉湯主之

丹溪治一女子年二十餘歲在室素強健六月間發煩悶困倦不食發時欲入井六脉皆沉細而弱數兩日後微渴衆以為病暑治不効四五日加嘔而人瘦手心極熱喜在陰處漸成伏脉時

妄語予急製局方妙香丸如桐子大以井水下一丸半日許大便藥已出病無退減遂以射香水洗藥以針穿三竅次日以涼水送下半日許大便下稠痰數升是夜得睡困頓伏枕旬日而愈因記金匱云昔肥而今瘦者痰也遂作此藥治之

妙香丸 丹溪云疏決腸胃制伏木火藥也

辰砂飛 五兩 牛黃 龍腦 麝香 各研 一兩 巴豆 二百五十粒去皮膜炒熟研 九十片 右研勻煉黃蠟六兩入好蜜三分同煉令勻為丸每兩作三十丸如要此藥速行針刺一眼子冷水浸少時服效更速小兒百病丸如菉豆大

遠志湯 治心虛煩熱夜卧不寧及病後虛煩

遠志去心 黃芪 當歸 麥冬 各七錢 甘草 五分 炙各一錢二分 人參 茯神 酸棗仁 炒各一錢 水煎服

竹葉湯 傷寒大病後及霍亂吐瀉後心虛煩悶

竹葉知母 麥冬 人參 茯苓 小

麥　半夏各一兩　甘草五錢　每六錢　姜五片　水煎服

小草湯　虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草　黃芪　川歸各一兩　麥冬　石斛　酸棗仁　人參　甘草各五錢　每六錢　姜五片　水煎服

地仙散　傷寒後伏暑後煩熱不安及虛勞不安

地骨皮二兩　防風一兩　甘草五錢　每六錢　姜五片　水煎服

竹茹麥冬湯　大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不痛不可汗下者　淡竹葉　麥門冬等分　每八錢　水煎

酸棗仁湯　霍亂吐下後增劇虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁一兩七錢半　人參　桂心各二錢半　知母　茯苓各三錢　石膏五錢　甘草二錢　每七錢　姜棗煎服

人參竹茹湯　胃口有熱嘔吐欬逆虛煩不安

人參五錢　半夏一兩　分二帖　加姜七片　陳皮二

錢半竹茹一錢水煎服

竹茹石膏湯　大病後餘熱煩悶

溫膽湯　大病後虛煩不得眠及驚悸

五苓散　水停心下作驚悸煩悶

清心蓮子飲　方見癎閉門

梔子豆豉湯　治卯在上焦

四逆湯

理中湯

健忘門

戴元禮曰健忘者為事有始無終言談不知首尾此以為病之名非比生成之愚頑也

靈樞經曰人之善忘者何氣使然岐伯曰上氣不足下氣有餘腸胃實而心氣虛心則榮衛留于下久之不以時上故善忘也

丹溪心法曰此証皆由憂思過度損其心胸以致神舍不清遇事多忘病在心脾凡思傷脾以故令人轉眄遺忘治之以歸脾湯須兼理心脾神寧意定其証自除也

歸脾湯　思慮過度勞傷心脾健忘怔忡
白朮　茯神　黃芪　酸棗仁各一兩　人參
香各五錢　甘草炙二錢半
眼肉五枚水煎服
定志丸　心氣不定恍惚多忘
遠志　石菖蒲各二兩　人參一兩　白茯苓三兩
右末煉蜜丸梧子大硃砂為衣每服三十丸
米飲下　一方加茯神
加味茯苓湯　痰迷心竅健忘失事
二陳湯加益智仁香附人參姜水煎服
讀書丸　健忘服之日記千萬言
石菖蒲　兎絲子　遠志各一兩　地骨皮二兩　生地
五味子　川芎各一兩　為末薄糊丸梧子大每服
七八十丸臨臥白湯下
孔子大聖枕中湯　常服令人聰明
龜甲　龍骨　遠志　菖蒲　各等分為末酒
服方寸匕日三服
聖惠千金翼同　補心虛治健忘令人耳目聰明

以戊子日服之開心不忘

菖蒲 遠志 各等分為末每服方寸匕常服令人耳目聰明從外見裏令人長生去三百病毒不能為害

二冊丸 安神定志和血治健忘

熟地黃 兩 天門冬 冊 參 各一兩半 茯苓 甘草 各一兩 遠志 人參 各五錢 麥門冬 一兩 右末煉蜜丸梧子大硃砂五錢為衣每服五十丸白湯下

又讀書方

菖蒲遠志桂甘草 水煮去毛 遠志 甘草 各一兩 白茯神 去皮 木 巴戟 天 水煮去心 人參 地骨皮 去心 各三錢

倍煮茯苓糊丸服 地骨人參巴戟天

狀元丸 教子第一方

菖蒲 去毛 遠志 甘草 水煮去心 各一兩 白茯神 去皮 木 巴戟 天 水煮去心 人參 地骨皮 去心 各三錢

讀書日記萬千言

右末用白茯苓去皮二兩糯米二兩共為粉用石菖蒲三錢煎濃湯去渣打糊為丸每食後午時臨睡各服三五十九