

戰時急救法

贈閱



第一冊

五



新國會研究資料室藏

資料整理番號

M13727886

戰時救急法

目錄

戰時救急法目錄	
第一章 兩件最重要的事	一
第二章 救急用品	四
第三章 創傷救急法	七
第四章 止血法	九
第五章 骨折救急法	四
第六章 燙傷救急法	九
第七章 電傷救急法	〇
第八章 人工呼吸法	二
第九章 受傷者搬運法	五

曩時救急法 目錄

戰時救急法

內政部衛生署編

第一章 兩件最重要的事

○……人人必應
具有救急
常識……○

○……人人必應
具有救急
常識……○

在戰爭的時候，軍士們出入於槍林彈雨之中，當然有許多受傷的，那是不必說了。就是老百姓雖沒有加入戰爭，然而流彈所及，遭誤傷的一定也不少。對於這種受傷的人，如果立刻處置得當，然後

再送往醫院或醫師處治療，有許多的性命，是可以挽救回來的。並且經過救急的處置之後，將來治療的手續，可以減少許多的麻煩，將來治療的時間，可以減少許多的日子。所以我們處在這種時候，無論是軍士，是平民，都應該具備這種救急常識。將來萬一人受傷，就可以立時應付，加以適當的處置。不至於將他人的性命，冤枉送掉，也不至於使他人多感受許多冤枉的痛苦。但是我們有一點必須注意，救急常識，只是救一時之

急，雖於根本治療，還是要到醫院或醫師處去。千萬不可有了這種知識，就自以為是萬能，就以爲可以不必往醫院或醫師處治療，那就是根本錯誤了。

○……○
 兩件最
 重要的
 事……○

在戰爭的時候，軍民所受的傷，有刺刀殺傷的，有槍彈射傷的，有砲彈轟傷的，有炸彈炸傷的，還有因房屋倒塌壓傷的，有因房屋起火燒傷的等等。受傷的原因，實在很多，受傷的狀態，也就不一樣。但


是無論受何種傷，都有共同的一點，就是在戰時受傷的人，十有九是皮破血流的。我們對於這種皮破血流的創傷，在急救的時候，就有兩件最重要的事，必須特別注意。第一件就是消毒，第二件就是止血。

○……○
 消 毒……○

什麼叫做消毒呢？原來天地間有一種最微細的生物，爲我們普通目力所不能見的，名叫「微生物」。這種微生物散佈在天地之間，隨處皆有，我們衣服上，皮膚上，都有他們的存在。這種微生物許多都具有

毒性。當我們健康的時候，我們的皮膚，周周整整，蓋滿了全身，這種微生物，是無法

侵入我們體內的。若一旦受傷之後，皮破血流，這種微生物就有了機會，隨時可以侵入我們體內。他們侵入體內以後，毒性發作，小則傷口生膿，重則生病致死。微生物的侵入傷口，有在受傷的時候，直接侵入的。例如受傷的人，躺在地下，他衣服上的微生物，以及泥土中的微生物，都可以直接傳入傷口。也有在受傷之後，間接侵入的。例如受傷之後，旁人替他包裹，如果包裹所用的東西不潔淨，上面有微生物，那就必定會傳入傷口。所以我們最要注意的事，就是設法殺滅這種微生物。因為微生物，許多都是有毒的，所以殺滅微生物，就叫做「消毒」。在救急的時候，一方面對於傷口上，已經直接沾染的微生物，須設法消毒。一方面對於包裹傷口用的東西，以及一切要與傷口接觸的東西，（例如紗布，棉花，鉗子等，）都要先將他上面的微生物，設法消毒，然後方可與傷口接觸。




皮破血流受傷的人，有許多血流不止，遂致立時死亡，這也是最常見的事。所以對於受傷的人，如果出血很凶，必須立刻設法止住，以免喪失性命。至於如何止血的方法，後面再來詳說。

第一章 辦件最重要的事

第二章 救急用品

下列幾種救急用品，極為簡單，人人都應製備一份。



紗布就是一種棉紗織成的布，布質極為稀鬆，各處西藥房都有出售。這種紗布，可以剪成方塊，用幾層貼在傷口，外面再裹以繃帶，以資保護。但是西藥房的紗布，都是整疋的，並且沒有經過消毒的手續。


買來之後，必須自己用剪刀剪成見方五六寸的方塊，然後消毒。消毒的方法，最簡便的，就是將這種剪成方塊的紗布，每一二十塊一包，用粗布包成小包。包口用線縫好，以免鬆散。把這些小包放在蒸飯的蒸籠內，蒸一小時。再取出放在火爐上烤乾。包口用線縫好，再把粗布包打開，將紗布取出。原來微生物最怕的就是熱氣，現在放在蒸籠裏蒸了一小時，紗布上面所有的微生物都蒸死了。要用粗布包的原故，就是恐怕紗布由蒸籠裏取出之後，又沾染了新的微生物。若有粗布包在外面，無論藏在什麼地方，微生物只能沾在粗布上面，決不會侵入布包裏面的紗布上去。



紗布只能貼在傷口上，外面必須另有布帶或布片包裹，方能穩妥不掉。這種包裹用的布帶，叫做繃帶，包裹用的布片，就是三角巾。繃帶是用新的粗布撕成二寸寬三四尺長的長條，可以捲成一捲，隨時備用。用的時候，如果嫌這根繃帶太長，可以隨是撕斷或剪斷。這種繃帶，最好多預備幾捲，有時一兩捲，是不夠用的。繃帶是包裹傷口外面的，不會與傷口直接接觸，可以不必消毒。

三角巾，就是一塊三角形的粗布。這種三角巾使用極為簡便。在戰場上包裹頭部及四肢的傷口，有時是極有用的。三角巾也不必消毒。


有時遇了急變，手邊既無繃帶，又無三角巾的時候，可以將衣服撕成長條，或三角形，或用大手巾摺成三角形，以資應用。



絆創膏，又名叫橡皮膏，正同我們舊式的膏藥一樣，粘性很強。各處西藥房都有發賣。這種絆創膏的用處，也同繃帶及三角巾一樣，將他貼住傷口的紗布，可以固定紗布的位置，使其穩妥不掉。用繃帶或

三角巾包裹傷口，有些地處，有些時候，不甚適用。例如頭部受傷，使用繃帶就不十分方便。腹股被炸彈炸傷，傷口如果很多，三角巾決不適用。若用繃帶，就用三四捲都不夠用。在這一類情形之下，用絆創膏就方便得多了。

絆創膏初買來的時候，多半是一大張一大張的。可以將其撕成三四分寬一二尺長的長條，捲在一根小竹片或筷子上。多撕幾捲，以備應用。用的時候，如果嫌這根絆創膏太長，可以隨時撕斷或剪斷。這種絆創膏，也是不與傷口接觸的，所以不必消毒。



碘酊又名碘酒，是一種深棕色的溶液，係將碘溶於酒精中而成。照中華藥典上的規定，碘酊共有二種：一種是百分之十的碘酊，分量太強，不宜常用。一種是百分之二·五的碘酊，中華藥典上叫做稀碘

酊，是我們救急時最常用的。這種碘酊，消毒的力量極強。無論何種傷口，雖然已經直接沾染了微生物，裝要用紗布蘸了碘酊塗在傷口上，幾分鐘就可以將這些微生物殺死。這種碘酊的拉丁名字，就是 *Tinctura Iodi 2.5%*。開了這個名字，到各處西藥房，都

可以實得測手。普通只要買一百公撮(Cubic Centimeter)，或二百公撮，就可以夠用。上面這幾種東西，一二包紗布，三四捲繃帶，一塊三角巾，四五捲絆創膏，一小瓶碘酒，製備既極容易，佔地又復極小。只要一個小口袋，就可以裝好。在戰事的時候，最好每人預備一份，隨身以備不虞。

第三章 創傷救急法


凡屬皮肉受了損傷，就叫做「創傷」。在戰爭的時候，創傷的原因很多，創傷的形狀，也就不一樣。槍彈射傷的傷口，多半不過是一個小孔。砲彈或炸彈炸傷的，傷口就大得多了，有時甚且將一臂或一腿整部炸去。刺刀傷口，隨刀的大小，和刺的方法而不同。我們對於各種創傷的形狀，暫且不必去管他。無論是何種形狀的創傷，他的救急的方法，總是一樣的。創傷救急的方法，可以分做四步來說。

○救急者本
○身及環境
○的注意

在救急的時候，救急者必須特別鎮靜，千萬不可慌張。必須時時刻刻，將消毒止血兩件最重要的事，記在腦子裏。對於皮破血流的傷口，不可用手指衣服，以及一切沒有消毒的東西，去和他接觸。

。污穢的東西，如泥土等，尤其不可和傷口接近。


凡屬受了傷的人，立時不久就喪去了性命，有許多是由於流血太急，沒有去設法止住的原故。所以對於受傷的人，先要看血流急的緩急。如果血流很緩，就須注意消毒；如果血流太急，那就將消毒放在第二步，先止住了血再說。止血的方法，下面另有專章論及。



如果血流不急，那就先要注意消毒。如果血流太急，那就止住了血之後，也就著手消毒。消毒的方法，就是用消毒的紗布，蘸了碘酊，滿塗傷口上，以及傷口周圍。傷口上塗碘酊，是有一點痛的，但這是救急的一件最重要的事，千萬不可省略。因為從傷口侵入的細菌，如破傷風桿菌侵入能使人致強直病。氣桿菌侵入能使傷部浮腫潰爛甚至使人致死。

如果不是在戰場上，可以從容從事的時候，在止住了血之後，可以先覆一看傷口上有沒有灰塵泥土，以及其他異物的存在。倘若有的，可以用微溫的開水，在傷口上沖洗

幾次，將泥土等沖去。微生物最怕的是火與熱，凡是煮開過了的水，裏面的微生物都是煮死了的。所以在傷口上沖洗，是不會有危險的。若是沒有煮開過的冷水，裏面含的微生物極多，就千萬不可與傷口接觸。但是只可用微溫的開水去沖，千萬不可用手指或其他物件去撥洗。沖洗之後，即行用碘酊消毒（碘酊用百分之二·五成分的最妥。但碘酊歷時太久而變成太濃其色暗紫者，最好棄置不用，另取新的碘酊應用。）若是在戰場上，必不能這樣從容沖洗，止血之後，應即消毒。這種傷口上的灰塵泥土，只好等運到醫院之後，再去洗滌了。




傷口消毒之後，就將粗布包打開，取出幾層消毒的紗布，蓋在傷口上面。外面再用繃帶或三角巾裹好，或用絆創膏貼好。裹繃帶的方法，與裹腿帶相同，不可過鬆，以免紗布脫落。（包紮用的紗布棉花和繃帶愈乾愈好）

用手指在布包中，取紗布的時候，只可夾住紗布一處的邊緣。這一處邊緣，就決不

可與傷口接觸，以免手指上的微生物，沾在紗布上，傳入傷口。這是救急者必須注意的。

第四章 止血法



普通的小傷口，流血很緩，這種流血，不必去止他，他自己也會止住的。流血太急，就必須設法止住。若是傷口流血，一湧一湧的出來，或成一根直線射出，這是大血管流血的症狀，是極危險的，必須止血的要義，就是斷絕血的來源。血是從心裏出來的，由血管運往全身。血管正與橡皮管子一樣，中空而質軟。若用力壓扁，即閉塞不通，血不能由其中流過。所以我們若將心與創傷部分的交通斷絕，就是將連接心與創傷部分的血管壓扁，血就自然會止住了。

如果是上肢出血，就將受傷者的手，向上舉起，用繃帶或三角巾，使極大的氣力，緊緊受傷者的上臂靠肩部處，愈緊愈妙，血就會自然止住（見第一圖）。繃帶必須三四根合在一處，方可着力，不致斷脫。

沒有繩帶的時候，衣襖也可以用。如果繩帶不容易繫緊的時候，最好用一根小圓棍或
滑扇之類的物件，將繩帶絞緊。

第一圖



解圍章 止血法

紮緊上臂，到底紮緊到什麼程度呢？這一點必須特別注意的。無論何人的手腕上，都可以摸得到脈跳的（就在平常醫生看脈的地方）。現在上臂紮緊之後，必須緊得到手腕上摸不着脈跳，方可證明是上臂的血管已經壓扁，流血方才會止住。如果紮住不緊，手腕上仍舊摸着脈跳，那就是血管還沒有壓扁的證據，流血還是不會止住的。救急的時候，必須注意這一點。

紮緊之後，即讓他紮緊，不可再鬆。等到送往醫院或醫師處，再讓醫師來處置。並且在兩小時內，必須送往醫院或醫師處治療。否則肢體因為血流不暢，過時太久，必將發生種種毛病。

施行止血的時候，手指及其他物件，千萬不可與傷口接觸。若必須接觸的時候，可以用幾層消毒的紗布將傷口蓋好，再去接觸。

○……………○
下肢止


○……………○
血法

如果是下肢出血，就使受傷者睡在地上，將其足向上舉起。用繃帶或三角巾 繫緊大腿上部，愈緊愈妙，血也會自然止住（見第二圖）。如在大動脈破裂失血過多的時候，就是用手指直接壓住出血之點，然

後再圍繩紮和消毒的手術。無論何人的脚背上面，也可以摸得著脈跳的。紮緊的時候，必須緊得到脚背上的脈跳摸不著，方能認為血管已經壓扁。流血方才可以止住。紮緊之後，即讓他紮緊，不可再鬆。在兩小時之內，送往醫院或醫師處。

第四章 止血法

第 二 圖



○…………○
骨折救

○…………○
急法

四肢的骨頭，最容易斷。所以我們講骨折救急法，最要緊的，就是四肢的骨折。下列幾點，是必須注意的。

○…………○ (一) 如果是穿破骨折，除了骨斷以外，皮肉必都是破了的。對於這種傷口的處置，與普通一班創傷的處置相同，就是不外乎消毒同止血。前面已經說得很詳細，現在這裏不必再說。


(二) 在穿破骨折，如果骨頭伸出在傷口外面，就讓他是這樣，不要動他，等到醫院之後，再讓醫師去處置。千萬不可將骨頭推入傷口裏面去。因為這種伸出傷口外面的骨頭，總難免不沾染了微生物。在救急時，無論如何消毒，總難於將這些微生物盡行殺死。若冒失將他推入傷口裏面，將來微生物在裏面醞釀作膿，對於治療上要發生無窮的困難。

(三) 若是單純骨折，沒有創傷的時候，就用一塊木板，放在這條肢體下面，用幾條繃帶或三角巾，將這條肢體緊緊的綁在木板上（見第三圖）。如果沒有木板的時候，就是

戰時救急法

手杖，門柵，刀鞘，鎗柄，傘柄，都可以就用（見第三圖）。若連這些物品都沒有，就只好是用木板夾着傷肢貼身纏起，腿骨折斷則以兩腿平行纏在一起。若是穿破骨折，將創傷止血消毒包裹之後，也立時纏在木板上。再行運往醫院或醫師處治療。在纏紮折骨的時候，最要注意的，就是扶托折骨的方法。倘若扶托不得其法，不但枉使患者劇痛難受，而且使內部的神經和血管，有被折骨軋傷糜爛的危險。扶托的方法，分述之如下：

第 三 圖




(一) 臂骨折斷扶托法

(見第四圖)

右手緊握傷部的上端，千萬不要移動。左手緊握傷部的下端，順着臂部原來的形狀，拉作勁直，把牠固定住不使移動。如有提舉這個臂必要的時候，應當將緊握之雙手，緩緩同舉。務令保持一定部位，勿稍移動，然後由另一人施行繃紮。

第四圖



(二) 腿骨折斷扶托法

(見第五圖) 一人面向傷者足部而立，用雙手緊握傷部的上端


，千萬不要移動。另一人面向傷者頭部而立，用雙手緊握傷部的下端，順着腿的原來形

戰時救急法

狀，拉作勁直。把牠固定住不使移動。如有提舉這個腿必要的時候，應當二人同時緩緩舉起，務令保持一定的部位不使移動，然後由第三人施行繃紮。

還有一件要注意的事，就是繃紮折骨和繃紮止血的情形不同。止血的繃紮，要繃紮得緊，直至傷部下端的動脈，（在臂部的傷，指手腕上的動脈。在腿部的傷，指腳背上的動脈）。不再現脈搏爲止。骨折的繃紮，是要繃紮得堅實，而務使傷部下端的動脈，仍有脈搏爲止。否則：全肢有轉成攣縮，或癱痺或竟成癱症的危險。


第五圖



凡是折骨，肢體形狀必定稍有變更，或者稍彎，或者屈曲，或者縮短。對於這種肢體的變形，在救急時，千萬不要去移動他，或拉直他。讓他是這樣變形，不管他如何彎曲，如何縮短，只將他綁在木板上，就得了，因為骨頭斷了的地方，附近必有許多血管及神經。若是外行的人將這條肢體移動或拉直，這根斷骨的尖端，難免不將附近的血管及神經截斷，反致發生重大的危險。因此之故，對於這種變形，千萬不要去移動他或拉直他。只可用木板綁好，運往醫院讓醫師去處理。

第 六 圖

戰時救急法



第六章 燙傷救急法

火焰燒傷的，同沸水沸油燙傷的，都叫做燙傷。燙傷了的皮膚，輕的就發紅起胞，重的就發黑變焦。

撲滅火
焰的方
法

對於燙
傷的注
意

不破皮
的燙傷
救急法

如果火焰正在燒人的時候，火焰若是不大，可以用衣服撲在燒的地方，火焰自會消滅。如果本人衣服已經著火，最好自己蹲往泥地上，在地下打幾個滾，火焰也可消滅。

對於燙傷的皮膚，最要注意。凡屬手指，衣服，以及無論何種物件，都不可與燙傷的地方接觸，以免微生物乘機侵入，

如果是沒有破皮的燙傷，可以立時用幾層消過毒的紗布，蓋在上面，外面再用繮帶或三角巾，鬆鬆的纏好以免紗布脫落。但是纏的時候，千萬注意，不宜太緊，只要紗布不脫落就夠了，以免燙傷的皮膚受

壓。

○……○
破皮的……
燙傷救……
急法

如果是破了皮的燙傷，可以用幾層消過毒的紗布，醃了微溫的或冷的茶汁，蓋在傷口上面。這種茶汁，愈燙愈妙。外面再用繃帶或三角巾鬆鬆的纏好，以免紗布脫落。原來治療破了皮的燙傷，最有效的藥，就是鞣酸。茶葉裏面含有這種鞣酸很不少。茶汁都是用開水沖的，裏面不會含有微生物。所以醃了茶汁敷在傷口上，是燙傷救急最好的辦法。茶葉以愈劣愈妙，茶汁以愈濃愈妙，裏面含的鞣酸就最多。

在內地有兩個古傳的方法，也可以用作急救燙傷的良方：（一）用一份麻油一份石灰水掉勻，浸透紗布敷傷處。（二）用熱的狗油塗抹傷處。既不費錢，又可救急。

第七章 電傷救急法

在戰爭的時候，觸電網受傷的人，必定是不少的。所以對於電傷救急法，也不可不可不說一點。

○.....○
觸電的
○.....○
輕重

凡是觸電的人，電流有通過身體一部分的，有通過身體全部的。事實若是僅僅通過身體一部分，這一部分就發生麻痺，皮膚上就發生燙傷的現象。輕則發紅起泡，重則發黑變焦。電流若是由身體全部通過，

除了皮膚上發生燙傷的現象以外，并且心的跳動加強，心臟就疲於奔命，麻痺而死。觸電死的，都是由於這種原因。

○.....○
輕度觸電救急法
○.....○

若是電流僅通過身體一部分，這種人必定是尙有知覺的，并且必定已經脫離了電流範圍以外。對於這種人救急的處置，不過處置他皮膚上的燙傷而已。處置燙傷的方法，詳見前章。

○.....○
重度觸電救急注
○.....○

若是觸電的人，電流通過身體全部，這個人必定沒有什麼知覺，必定還在電流範圍以內，身體一部，必定還與電絲接觸。對於這種人救急的處置，第一步是要使他脫離電絲接觸，就是要使他脫離電流範圍以外。但是同時救急者本身須要注意，不可自己觸電。最好的方法，是關閉電門。如果

○……○
人工呼吸的方
法

先把受傷者的衣服脫掉，使他仰睡在地上。用枕頭或衣服將他腰部墊高。先叫一人蹲在受傷者的頭部，用雙手端住受傷者的頭，使他仰


上，口部張開，於是空氣可以在口中自由出入。還要看看舌子塞住喉嚨沒有。如果舌子塞住了喉嚨，空氣還是不能出入，必須用手指將舌子拉直，以免他塞住喉嚨。另外一人，雙腿跪在受傷者的大腿兩旁，臉朝着受傷者的頭部，張開兩手（見第七圖）。將兩手放在受傷者的胸膛上，乳房下面，雙手用力將受傷者的胸膛，向地面緊壓，使他胸膛縮小，將肺中的空氣趕了出來（見第八圖）。緊壓的時候，要用很大的氣力，但又不可過猛。口中要緩緩的數一，二，三。然後再把兩手漸漸的放鬆。幾秒鐘之後，又用力在胸膛上向地面緊壓一次。如此一壓一鬆，胸膛就一張一縮。肺中的空氣，就一出一入。不到好久之後，受傷者就可起死回生。施行人工呼吸法，是一件很費氣力的事，千萬不可性急。不可以為施行一二十分鐘之後，受傷者尚未活轉，就認為是沒有救，就放棄不理會他了。須知有些時候，要施行半小時甚或一小時，受傷者的呼吸，方

戰時救急法
回轉來。如果一個人體力不夠時，可以兩三個人輪流施行。

第七圖



第八圖



○……○
簡易的
人工呼
吸法
○……○


最簡易的人工呼吸方法，簡述如下：先把病人伏地而臥，再將一臂向頭上伸直，一臂枕于額下，面向側方，把口張開，再用衣服或軟枕墊高胸部。救者然後向着病人的頭部，膝地跨立，用雙手平按病人的兩傍下胸肋骨，按照時間距離，施行呼吸運動。其法如下：（每分鐘十五次）

第一步動作：（見圖九）身體先向前俯，兩臂伸直，將全身重量，壓在病人下胸的背上，使肺內空氣受壓而出，出氣時當有呼呼之聲，發自口鼻。這樣的動作約需時間二秒鐘。

第二步動作：（見圖十）身體向後回立，兩臂鬆起，不要使病人受任何的壓力，而使肋骨向外回張，以吸收新空氣入肺。這樣的動作約需時間一秒半鐘。


把這兩項動作，來回往復，按準快慢，連續做去，可以把許多垂斃的病人救活過來。只要傷者心臟還在跳動，此法不可放棄。有時須連續工作至二十小時後，纔得回蘇。倘或病人口中唾沫過多，應當隨時擦去，勿使阻礙空氣出入。

圖 九 第



戰時救急法

圖 十 第



二八

第九章 受傷者搬運法


上面講的許多救急法，都是只能應一時之急，至於根本治療，還是要靠醫院及醫師。所以救急之後，必須立即將受傷者搬運往醫院或醫師處去。還有些時候，受傷的地址，太過危險，不能施行救急，必須將受傷者搬運到比較安全的地帶，方能施行救急。因此之故，對於受傷者的搬運方法，也不可不略為一講。

○……○
單人搬
運法
○……○

(一) 如果受傷者神經清醒，兩手沒有受傷，還能用力的時候，就照普通的背法，將受傷者背在背上，使他兩手圍住了搬運者的頸部。


(二) 如果受傷者尚能站起，可以將受傷者的背，對住了搬運者的背，搬運者的兩手伸出肩頭，緊握了受傷者的腋部，將他反背在背上(見第十一圖)。放下來的时候，可以先緩緩蹲下，將右膝跪好，使受傷者坐在地上，然後回轉身來，扶住了受傷者。

圖 一 十 第




(三) 如果受傷者自己完全不能動作，那就要另外用一種搬運法了。受傷的人，多半是睡在地上的。先將他翻轉來，面部朝天，雙手放在兩邊。然後站在受傷者的頸部，將他扶起跪在地上，再將雙手插入他的腋窩，扶他站起來（見第十二圖）。自己將身體屈下，將頭伸在受傷者的右腋下，使受傷者的身體，撲在自己的右肩，再用右手伸在受傷者的胯下（見第十三圖）。將右手由受傷者的胯下繞過來，握住了受傷者的右腕，然後將身體立直，站了起來（見第十四圖）。

第十二圖




第十三圖



第九章 雙傷者搬運法

第 十 四 圖




如果有兩個人來搬運受傷者，就可以將兩人的手交叉做成椅子（見第十五圖），扶受傷者坐在上面（見第十六圖）。

○……○
雙
人
搬
運
法
○……○

第九章 受傷者搬運法



第十五圖



第十六圖

介紹救急圖畫片

此項圖畫，編繪精美，共有十四張。內容將救急上種種之處置方法，詳繪無遺。定價四角，特價七折發行，茲將此圖目錄刊列如下：

1. 暈厥後之處置法
2. 人工呼吸法之一
3. 人工呼吸法之二
4. 手部出血救急法
5. 足部出血救急法
6. 骨折處理法
7. 前臂折處理法之一
8. 前臂折處理法之二
9. 小腿骨折處理法
10. 創傷包裹法
11. 燙傷包裹法
12. 靜脈出血及挫傷包裹法
13. 搬運受傷者方法之一
14. 搬運受傷者方法之二

民國二十二年二月再版五千冊

每冊
定價
五分

著者
內政部衛生署

發行者
內政部衛生署

