

醫學小叢書

皮膚病

祝振綱編著

商務印書館印行

商務印書館呈繳

國立北平圖書館藏

醫學小叢書

皮

祝振綱編著

膚

商務印書館印行

病

目錄

第一編 總論	一
第一章 皮膚之生理	一
第二章 健全與不健全之皮膚	二
第三章 皮膚之清潔法	三
第四章 使用肥皂之注意	五
第五章 使用塗敷劑及撒布劑之注意	七
第六章 皮膚病之預防	八
第二編 各論	一
第一章 因寄生昆蟲及細菌而起之皮膚病	一
第一節 頭虱	〇
第二節 陰毛虱	〇
第三節 衣虱	〇
第四節 臭蟲	一

第五節	疥	二二
第六節	癩風	二三
第七節	頑癬	二四
第八節	黃癬	二五
第九節	寄生性匍行疹	二五
第十節	癩病	二六
第十一節	皮膚結核	二七
第二章	因炎症及皮膚分泌異常而起之皮膚病	二八
第一節	溼疹	二八
第二節	濕爛	二三
第三節	多形滲出性紅斑	二五
第四節	帶狀疱疹	二四
第五節	皮脂漏	二五
第六節	面疱	二七
第七節	癰瘡	二八
第八節	汗疱疹	二九

第九節	凍傷	三〇
第十節	火傷	三〇
第十一節	小兒痒疹	三二
第十二節	蕁麻疹	三三
第十三節	痒疹	三三
第十四節	多汗症	三五
第十五節	腋臭	三六
第十六節	無汗症	三七
第三章	因神經血管障礙而起之皮膚病	三八
第一節	皮膚發痒症	三八
第二節	母斑	三九
第三節	血管腫	三九
第四節	夏日斑及雀斑	四〇
第五節	黃斑	四一
第六節	白斑	四一
第七節	酒皸鼻	四二

第八節	胼胝	四四
第九節	雞眼	四四
第十節	贅疣	四四
第十一節	乾癬（鱗屑癬）	四五
第十二節	魚鱗癬	四六
第十三節	皸裂	四七
第四章	爪甲及毛髮之疾病	四八
第一節	爪甲及爪牀之疾病	四八
第二節	數珠狀毛髮（紡錘狀毛髮）	四八
第三節	裂毛症	五〇
第四節	結節狀裂毛症	五〇
第五節	多毛症	五一
第六節	禿髮症	五二
第七節	頭部糠枇性脫髮症	五四
第八節	早老性及老年禿髮症	五五
第九節	症候的禿髮症	五六

皮膚病


第一編 總論

第一章 皮膚之生理

對於外界之防護 皮膚爲包裹吾人身體之物，其表面常與外界接觸，故對於外界之各種影響首先感受者，即爲皮膚。皮膚對於外界之刺戟，有相當抵抗能力，以保身體，使其不致受傷，蓋身體之第一防線也。

體溫之調節 皮膚又有調節體溫之功用。皮膚表面之血管擴張，則能放散體溫，收縮則反是。

分泌機能 皮膚中有汗腺皮脂腺等物。由汗腺分泌汗液，由皮脂腺分泌皮脂。前者可排泄廢料，後者可使皮膚光滑，且能潤澤皮膚，使其不致乾燥。又因皮脂腺常與毛囊並存，故在毛髮寄生之處，皮脂腺亦多，而皮脂之分泌自亦不少，毛髮之所以得保其光澤而柔韌者，皆皮膚



滋潤之功也。

呼吸作用 體中之水分，多由肺臟與腎臟而排出體外，其一部分則由皮膚蒸發之，同時皮膚且有排泄碳酸氣之功用。然由皮膚吸入之養氣，則爲量極微。

知覺作用 皮膚之主要作用，在司知覺。所謂觸覺器官，即在於皮膚內。除觸覺外，如溫冷、疼痛、壓迫等感覺，亦皆由皮膚面之神經末梢而傳導者也。

第二章 健全與不健全之皮膚

健全之皮膚 如上所述，具有種種生理作用之皮膚，其色澤、光彩及紋理，不獨因人種而異，亦因年齡而有不同。健全之皮膚，以手按之，覺柔滑而有相當之彈力，並帶有脂澤及常態之細皺，其毛髮發生之部位，亦無異狀。

不健全之皮膚 凡有細屑剝落，或無脂澤而粗糙乾燥者，皆非佳良之皮膚。皮膚之色，種種不同，欲定標準，殊非易事。色澤過白，可以透見血管者，係因其菲薄柔弱所致，未必卽爲健全之皮膚。然黑硬而紋理粗大者，亦欠佳良。至於呈褐黃色或帶紫赤色而有黑白色斑紋者，其非健全，自不待言矣。

小兒之皮膚 小兒之皮膚，因未受外界刺激之故，常覺柔嫩潤澤，光滑而少皺裂。
成人及老人之皮膚 年齡漸長，則色素漸多。或患夏日斑，或生面皰、瘰癧、黃斑等。迨

老年人，則皮膚枯燥，脂澤缺乏，色斑增加，往往發生疣贅等小腫瘍，且因皮下組織萎縮，彈力消失之故，皺紋竟甚顯著。除此等生理的變異外，亦常受外界刺激之影響。如氣候、風土及衣食住等一般衛生條件，對於皮膚之健康，皆有影響。茲將皮膚之直接保護法，略述於後。

第三章 皮膚之清潔法

皮膚之衛生及美容法 健全之皮膚，雖未必佳美，然醜陋之皮膚，則不健全者居多。皮膚之衛生法，與美容法不無關係。如用肥皂等使皮膚清潔，在美容上為必要之事，故注意皮膚之衛生，同時亦能達到美容之目的也。

皮膚保護法之最要者，即使其清潔。清潔之法，即用湯水揩拭皮膚或沐浴全身是也。

水之作用 水能使細胞膨脹軟化，並使皮膚上之廢物易於脫落，且能滌除皮膚上所附着之塵埃污垢等。他若皮脂汗液等，亦能溶解而去。湯之作用，較水更著。其溫度對於皮膚之溫度調節上，又不無影響。蓋其溫度能刺激皮膚之神經，以增進其生理機能，繼乃反射及於全身，以促進其新陳代謝也。但過高之溫度（攝氏五十度以上）反危害及身體，故溫浴宜以普通體溫為標準，而用較體溫稍高之溫湯為適當也。

入浴之注意 入浴時宜用肥皂塗擦，並以不甚堅硬之毛刷等摩擦皮膚，然後再用湯水沖洗，俟擦乾身體後，最好另以毛巾強擦一遍。此種辦法，對於皮膚衛生，最為合宜。

藥浴 醫家對於病人，往往以種種藥品投入浴湯中，使之入浴。但此係屬治療方面之事，不再詳述。茲僅就溫泉（即礦泉）之作用，略述如下。

溫泉浴之注意 人體皮膚如無糜爛、創傷，則湯水難以侵入，因之浴湯所含種種藥品，亦不易由皮膚而吸收於體內。故行溫泉浴時，其泉中之成分，亦未能透入皮內，即能透入，其量亦微。世俗之人，往往深信溫泉有莫大之功效，患病時不問其病症之如何，即往溫泉沐浴療治，此實未免誤解。然往溫泉療養，往往確與病體有益者，則因溫泉所在地多係山間，其地空氣新鮮，環境幽靜，且日日入浴，足以促進新陳代謝之機能，同時又得吸收礦泉之蒸氣，故對於恢復期之病人及健康之人，未始無益也。

溫泉與皮膚病 世人以為溫泉所含之藥物，能被吸收於身體而奏效，此其錯誤，前已言之。但溫泉對於皮膚病之病人，卻能直接作用於其患部而奏偉效。然濫用溫泉浴法，亦不無流弊，故所患之皮膚病是否適於溫泉浴治，非與可信之專門醫師商酌不可。蓋皮膚病中往往有因濕潤之刺戟以致病勢增劇者。况溫度較高而含有藥物之溫泉，其更富於刺戟性而能使病症增劇，不尤可慮乎。彼因入浴治療以致病勢增劇之皮膚病患者，吾人固屢見不鮮，而入浴後，股際及全身屢患劇烈之皮膚病者亦復不少。凡此皆因不明浴治之理，濫用高溫度之溫泉浴所致者也。

溫泉之種類 礦泉所含之成分，種種不同。有含鹼性鹽類者，有含硫黃者，有含食鹽、鐵

或炭酸者，尙有含其他物質者。其中對於皮膚病認爲最有效力者，厥惟硫黃泉。硫黃泉中，因其溫度有高低，所含硫黃有多寡，而其效力亦未必一定。要之，急性皮膚病患者，對於任何溫泉，概以不溶爲是。慢性皮膚病，卻不妨用硫黃泉或鈉泉浴治，但高溫亦非所宜耳。

海水浴 沿海之地，每屆暑期，則海水浴非常流行。海水中雖含有鹽分，而對於皮膚卻無甚效力，唯波濤激盪，足以刺戟皮膚神經，而使全身生理機能亢進耳。是故海水浴對於皮膚病，不獨無效，反能增其病勢，如濕疹等病一遇潮濕，卽易惡化，卽其一例也。

第四章 使用肥皂之注意

如前所述，湯水足以清潔皮膚，若同時加用肥皂，則更易清潔矣。

肥皂之種類及其效用 肥皂爲鹼性鹽類與脂肪酸之混合物。其中可分鈉肥皂與鉀肥皂兩種。前者質硬，後者質軟。今將此種肥皂沾水塗皮膚上，卽有溶解脂肪之作用，因之皮膚卽乾燥而失其光澤。又使用肥皂時，皮膚表層之角質，卽膨大鬆弛，而易於剝落，同時塵埃垢污等亦得隨之去盡。

肥皂之選擇法 肥皂之功效雖如此，然濫用之，反易使皮膚變性。東洋人種皮膚堅厚，富於皮脂。婦女之皮膚則柔軟而非薄，皮脂亦較少。此種皮膚，若多用肥皂則光澤全失，乾燥異常，且粗糙易生裂傷，喇致引發濕疹。故皮脂少者，不宜多用肥皂，卽用之，亦宜選擇性質柔

和者爲宜。反之，皮脂多者，則宜多用肥皂，且以性質稍強者爲宜。人體又因部分不同，而皮膚之性質亦異。例如頭部等毛髮叢生之處，皮脂較多，且皮膚堅厚，故可用性質較強之肥皂，時時洗滌之。

所謂肥皂之強弱，乃就其作用而言。性弱而作用緩和者，爲中性鹼肥皂。此種肥皂，最適於常用，但因混有種種雜物，故極少純品。然高價者亦未必即係佳品。吾人認爲適用之肥皂，須具以下各要件。

- (一) 不宜含有製造時所生之種種副產物，及無用之雜質。
- (二) 不宜含鹼類太多。

此二條件，不可不備。但此種肥皂，不獨難以購買，且欲檢定其良否，亦非易事。惟於用後，方得加以定評。如用後皮膚不致乾燥粗糙，即其中不含過量鹼類之明證也。近日國貨中未必無佳良者，但在使用者加以識別可矣，何必求之舶來品耶？

鉀肥皂 此種肥皂，其作用亦因鹼性之強弱而不同。鹼性強者，多供藥用，但欲多去皮脂及塵垢時亦適用之。

藥肥皂 此種肥皂，因其中所含藥品而有種種，如石炭酸肥皂、甘油肥皂、硫黃肥皂、魚鱗脂肥皂等。大抵多爲商人牟利之製品，其所含藥品之分量，均無一定。又石炭酸肥皂，有揮發性，經時之後，漸次消散，即幾無何等效力矣。

第五章 使用塗敷劑及撒布劑之注意

塗敷脂肪之效用 皮膚上塗敷脂肪或香油等物，乃皮膚衛生上所必要者。他若皮脂缺乏，皮膚乾燥而粗糙時，尤爲必要。入浴以後，每星期塗擦一回，最爲相宜，而塗於手掌、足跟及易受摩擦之部位，尤爲重要。如是則皮膚可不受外界之影響，且缺乏皮脂之人，亦得防其逸出，而保滑澤。至皮膚乾燥而落屑較多者，因其水分蒸發甚盛，恐有刺戟皮膚之虞，若時以脂肪塗之，即可免此患矣。

脂肪之種類 塗敷皮膚面之油類及脂肪，種類甚多。有豚脂、羊毛脂、礦脂、杏仁油、洋橄欖油、流動石蠟等，其中加以香料，即可使用。但油類或脂肪之粗惡與陳舊者，常易分解而生脂肪酸，對於皮膚反爲有害，卻不可不注意耳。

撒布劑之功用 皮膚面敷以粉末，亦足爲衛生之一助，於入浴後行之爲佳。撒布粉末，則皮膚可得減少摩擦。皮膚而常分泌汗液及皮脂，若以微細粉末撒布之，則可因其分子引力之作用而吸收淨盡，因之皮脂亦易漏出，且因水分蒸發旺盛，奪去體溫，致皮膚常起冷感。故富於皮脂之面部及充血性之皮膚表面，敷以粉末，效用甚大。

撒布劑之材料 撒布用之粉末有種種。最普通者，則爲澱粉，尤以玉蜀黍澱粉爲最良，或再加氧化鋅，雲母或碳酸鎂等，但含鉛分及水銀成分之粉末切不可用。

白粉之注意 如上所述，塗擦脂肪，撒布粉末，均足保護皮膚。故婦人等用白粉化粧，決非不良習慣。但對於白粉之材料及使用之方法，應加注意。如前述含鉛之白粉，即不宜用。且若粉末塗抹過多，或將填塞於皮孔內，致使毛囊鬱滯，故用時須輕輕撒布，苟能如是，則不獨合化粧之目的，且亦適於衛生之要求也。若祇塗粉末，恐易於脫落，則不妨另加前舉之各種脂肪，以便黏着。

酒精及甘油之塗擦 酒精能保存皮膚之光澤，使之鮮明，且增加活氣，故在皮膚衛生上亦為優秀之塗敷劑。凡富於皮脂及發汗甚多者，每星期可塗擦一回。其塗擦之部分，以腋窩、陰部及皮膚互相接觸處為佳。然皮膚乾燥之人，反有因而失去水分致更乾燥者。故沖淡二三倍用之，最佳。

甘油雖能使皮膚滑澤，然有奪水之作用，故用後易覺灼熱，且使皮膚粗糙而失其光澤，故對於損傷及乾燥之皮膚，均不宜用。用時須加水一半，使其稀薄，或與脂肪類混和，較為適宜。

第六章 皮膚病之預防

皮膚之刺戟與皮膚病 皮膚在身體之外圍，易受種種之刺戟，或為日光所曝，或為風露所侵，或受濕熱寒冷所襲，或為穢物、塵埃、細菌等所污染，或因職業關係，皮膚常與水分或藥

物等相接觸。因此之故，抵抗力素弱之皮膚，遂難堪此等刺戟而發生皮膚病矣。茲將日常最普通之皮膚病預防法略述一二如下。

皮脂分泌之亢進 小兒發育旺盛，其分泌機能亦盛，故皮脂流出獨多。小兒頭部面部等處，所以常患皮脂漏者，卽以此故。成人中頭垢較多者，其結果毛髮常易脫落，亦因皮膚分泌異常故也。欲免此患，平日可用肥皂隨時洗滌，（皮脂甚多時，可用鉀肥皂）或用酒精或脂肪塗擦亦佳。

而飽及其他 春情發動期內，因身體發育旺盛，皮脂分泌甚多，常於面部等處發生而飽及瘡瘡等。但亦有因消化器之異常而起者。他如蕁麻疹等之發生，亦與消化器之異常有關。故欲防此種病症，非先謀消化器之健全不可。至對於皮脂之分泌旺盛，可用前述之局部療法以防之。其他易罹凍瘡等病等，多因血管系本有異狀，且感受外界冷氣而起者也。有此種體質之人，冬季宜用手套、毛襪等，以保護手足之皮膚。

寄生性皮膚病 植物性之細菌，能引發白癬、頑癬、疔、癰、癩風等皮膚等。而疥蟲、毛虱等動物性寄生物，亦能侵害皮膚。欲預防此種寄生性皮膚病，宜常用肥皂等，使皮膚清潔。其上皮剝落及有裂傷之處，易爲細菌所侵入，宜塗脂肪等物以保護之。他若因職業關係其皮膚常與藥品湯水等物相接觸因而引起皮膚病者，非停止其職業，恐難回復健康也。

第二編 各論

第一章 因寄生昆蟲及細菌而起之皮膚病

第一節 頭虱

頭虱爲長約二三耗之暗灰色小昆蟲，通常寄生於頭髮內，亦有寄生於睫毛內者。能發奇癢，因而引起濕疹者有之，又使頭部附近之淋巴腺腫脹者亦有之。頭髮長者尤易患之。婦人生產後及病後因頭部久不洗濯，常易爲此蟲所寄生。

療法 可用煤油或昇汞水洗滌頭髮，其固着於毛髮上之虱卵，可用醋酸洗去之。行此種驅除療法後，如有濕疹，可另行治療，其處方如左。

石油

五〇・〇

秘魯樹脂

三〇・〇

洋橄欖油

五〇・〇

右混和爲塗擦劑

第二節 陰毛虱

陰毛虱形狀較前者爲小，作蟹形，喜食毛根，俗名恥蟲。以寄生於陰毛爲主，亦寄生於睫毛，鬚髯等處者。間有寄生於頭髮內者，此例外也。其症狀爲劇癢，有因而引起濕疹者。有時爲虱之唾腺分泌物所刺戟於胸部或腹部發生青斑者亦有之。

療法 或用水銀軟膏塗擦，或以石油、昇汞醋，（昇汞一，醋三〇〇）洗滌患部。通常經五六日，即可撲滅，然後入浴，以肥皂洗去之。或用左方亦可。

秘魯樹脂

一五・〇

醇精酒精

五〇・〇

右混和爲塗擦劑

第三節 衣虱

衣虱長約三至五榧，寄生於衣。褶襞中，產卵於衣上。常咬傷皮膚，吸入血液，引發劇癢，有時因而引起濕疹或尋麻疹，且留褐色斑痕。成因搔抓過甚，經久而成潰瘍者亦有之。

療法 虱之寄生於衣服上者，可更換衣服，並以熱水殺之。如有濕疹等，可行適當之療法。

第四節 臭蟲

臭蟲晝伏夜動，常窺居於床、榻、家具或壁縫中。人體被咬後覺奇癢，顏面、手足、及其他被咬部分均發尋麻疹。往往又於刺螫部形成小水泡，發赤腫脹。有時不獨刺螫部爲然，即其他體部亦有此種現象。尙有發生淋巴管炎，以致肢體全部腫脹者。但屢被咬螫之人，往往習慣而不覺痛癢焉。

療法 宜時時清理床褥，勤加撲滅。凡壁孔柱隙等易於隱匿蟬卵之處，均可以硝酸注入，或用除蟲菊粉撒布。被咬部分可用酒精水或五—一〇%薄荷腦軟膏塗之。

第五節 疥

疥蟲之雄者，長約〇·二五耗，雌者較大，約〇·四耗。蟲之頭部，常由皮膚表面向皮內斜穿隧道，蟲體在內加以刺戟，該部遂生小水泡及小結節。水泡不久即乾燥。隧道中有微細黑點，即係蟲糞。其後蟲再前進，則水泡復生。隧道之長，幾達一二耗，其終點有微細稍深之白色部分，即蟲體棲留之處，在此蟬卵而生幼蟲，再鑿新隧道，於是其蔓延乃益甚矣。

疥由人與人互相傳播者居多。亦有由犬、馬、家兔等動物而傳播者。尤以溫暖之季節爲顯著。其好發部位，爲手指之兩側，指間之皺襞、指骨關節、腕關節之屈側、肘關節之伸側、及乳房、陰莖、陰囊、腰部、臀部、足部內側等處。

症候 主徵爲局部發庠。尤以夜間在被褥中加溫後爲最劇。又因搔爬之結果，往往引起劇

之濕疹或發生丘疹、膿瘡等。

療法 以鯨魯樹脂或一%「厄披卡林」(codicarin)軟膏，「那夫安爾」(naphthol)軟膏，威爾金生(Wilkinson)氏軟膏等，塗於局部，數日後再行沐浴。疥瘡後所遺之濕疹，可用氧化鋅泥膏或軟膏塗之。

凡患疥者，如就專門醫師，施以適當療法，則甚易治癒(約一星期)。若療法錯誤，則不獨經時長久，且續發之濕疹往往可蔓延全身，甚至續發腎臟炎者亦有之。此外又易傳染於他人。故在發病之初期，即宜速受適當之治療，此點最宜注意。

第六節 癬風

病原 此因一種絲狀菌名曰癬風菌(Microsporon furfur)者而起。性頗頑固，老年人幾無患此者。

症候 本症爲不規則之斑點，呈黃褐色，大如一分或二分銅幣。此種斑點，相集而擴散於胸背部，所占面積甚廣。搔爬之則起非薄之小皮屑，但不覺痒，間亦覺有較微之痒感者。本症發於軀幹者最多，發於四肢者較少，其發生於面部手足者極罕。

療法 或以鎮町塗敷，或用錫肥皂洗滌，或用二——五%「克利沙洛冰」(chrysarobin)軟膏塗擦，或以下列處方亦可。

皮膚病

九

柳酸

五〇〇——三〇〇

無水酒精

一〇〇〇〇

右爲塗敷劑

「那夫妥爾」

五〇〇

綠肥皂

一〇〇〇〇

右爲塗敷劑

第七節 頑癬

病原 此亦由一種絲狀菌名曰斷髮菌 (*Trichophyton tonsurans*) 者面起，經過緩慢。症候 本病發生於鼠蹊部 (股間) 者居多。發汗後最易發生。因發汗浸潤之結果，大腿內乃起一角銀幣大之赤色板狀斑點，其邊緣有濕疹狀之皮疹、小水泡及結痂，中心部漸次褪色，斑疹漸向周圍擴大，普通呈環形，然亦有中心部呈褐色者。有時疹雖消退，而周圍爲鱗屑、痂皮等所蔽，現出紅緣者亦有之。許多斑點，互相融合，蜿蜒如地圖狀，與健康皮膚顯然分界，又因常發奇癢之故，搔痕甚著。疹之蔓延雖緩，然往往有由陰阜而達臍部、會陰部、及肛門周圍者。甚至由臀部延至下腹部及下背部者亦有之。

療法 可用威爾金生 (Wilkinson) 氏軟膏、五%「那夫托爾」軟膏、十倍柳酸酒精。或用下列之處方。

「克利沙洛冰」(chrysarobin)

1.00

「忒老馬替青」(trumaticin)

10.00

右外用

第八節 黃癬

病原 本症不獨爲人類所患之疾病，即鼠、貓、雞、兔等動物，亦皆得互相傳染而發生之。其病原體爲植物性之絲狀菌名曰宜來因氏黃癬菌(Achorio schoenleinii)經過期間甚長。症候 普通發生於頭部，亦有生於無毛部分者，但甚罕耳。凡被侵及之部分，其毛幹周圍常呈微赤色之圓形小斑，由此發生落屑，其後該部即現黃點，漸次增大而成硫黃色之圓板。若蔓延漸盛，則全頭部均爲黃色塊所蔽發鼠臭。同時毛髮中亦因病菌侵入之故，失去光澤，而呈灰色，一若蒙塵者然，且亦易斷裂而漸次脫落。脫毛之後，其癩痕乃成爲有光澤之萎縮性禿頭，從此不能復生毛髮矣。

療法 或用X光線照射。或以1.0%「卑他那夫妥爾」(beta-naphthol)油塗擦數小時，然後洗滌之。或拔去毛髮，以5%「克利沙洛冰」軟膏、鎮靜等之亦可。

第九節 寄生性匍行疹

本病因一種白癬菌而起，而此菌與 *Trichophyton* 同族。其發於頭部者，曰頭部白癬。

症候 頭部白癬，多發生於十五歲以下之小兒。好發於頭部之皮膚，為直徑三至五釐之圓形斑點，有灰白色之微細粉末狀鱗屑被覆之。其髮在皮膚面距離三乃至五耗之處，有灰白色之鞘圍繞之，易於挫折而脫落。經日漸久，則徐向周圍擴大，終成較大於手掌之圓斑而侵及頭部之大半。本症極頑固而難治。

寄生性獨行疹，初為赤色小結節，皮疹大如帽針頭，其上有小鱗屑，及病機增進，乃形成大如一分銅幣或更大之圓形病巢，界限清晰，往往有發生小水泡及膿疱者。此種圓斑之中央部，普遍消退較早；唯周圍之發疹尚存；而呈環狀，其環往往有構成二三重者。本病或侵頭髮部，或發於面部、手部、軀幹等處。本病之病原菌，亦往往有附着於牛、馬、犬、貓等物之身體，而由此傳播者。

療法 對於頭部白癬之治療，務將頭髮拔去，以鉀肥皂洗滌之，並塗以威爾金生氏軟膏，五——一〇%「克利沙洛冰」軟膏，五%「卑他那夫安爾」軟膏。此外用 X 光線治療，亦能奏效。

第十節 癩病

原因 此乃一種慢性傳染病，其病原為癩桿菌。本病之傳染，由久時之直接接觸而起，至血統之遺傳，不過傳其感受性而已。

症候 本症依其局部之症候，得分爲兩種。一曰斑紋癩。即皮膚上生有淡紅色或赤色之圓形或他形狀之斑紋，此部知覺消失而麻痺，此斑漸次擴大，以致侵占廣大之部分者亦有之。一曰結節癩。初與斑紋癩相似，其後該部肥厚，呈結節狀而隆起於皮膚之表面者有之。又自始即生小結節，漸次擴大者亦有之。該部知覺喪失。結節癩若出現於面部，則處處發生不規則之隆起部，而成通常所謂獅子狀顏貌。同時睫毛、眉毛均漸脫落，皮膚呈銅褐色，且帶有一種光澤。又於四肢發生潰瘍，而起崩潰之結節、終達於肌肉骨質、以致手足離斷者，亦有之。此外發癩之部分，變爲白色而成白斑者有之。發生水泡者亦有之。本病經過時間甚長，竟有達十年以上者。其形容轉爲醜陋者多在晚年。

豫後 通常不良，難於全治。若及早施以適當之療法，亦未始不能使症狀減輕，有時令人疑爲幾已全愈者亦有之。

療法 爲豫防計，宜將患者隔離。一面試用「那士汀」(nastin)注射。此外尚有服用大楓子油劑注射，或內服河豚毒(tetrodotoxin)注射，或1%昇汞液注射等療法，均非請專門醫師行之不可。

第十一節 皮膚結核

此因結核菌侵襲皮膚而起，其症狀有種種，亦頑固之疾病也。

症候 皮膚結核有所謂狼瘡者，發生於面部、軀幹或四肢，初為赤色之皮疹，大如麻實，或小豆，生於皮下，經久乃漸次擴大，終成潰瘍，最後結為癩痕，使耳鼻等部變形甚醜。又有所謂皮膚疣贅結核者，此症恰與疣贅相似，局限於皮膚，硬厚而粗糙，發生於手足等處者居多。此外尚有發生許多灰白色或帶紅黃色大如粟粒之結節，後成潰瘍而破壞皮膚者，謂之粟粒結核。好生於口角、口唇、肛門等處。又有大如鵝卵或雞卵之球形腫物發生於皮下，化膿而破壞者，謂之腺病性皮膚腫。在頸部、面部、腋窩等處發生甚多。此等患者多具有腺病性（結核性）體質。

療法 可將腫物剷除，或燒灼而除去之。或用X光照射。此外為使身體強壯起見，可使病人常服魚肝油。亦有須專地療養者。

第二章 因炎症及皮膚分泌異常而起之皮膚病

第一節 濕疹

濕疹為最常見而重要之皮膚病，其症狀有種種。急性症但須治療得法，則治療較早。若療法有誤，則轉為慢性，甚難痊可。故治療濕疹，非賴專家之力不可。

原因 濕疹之原因甚多，外因方面有溫熱、濕氣、日光、電氣等理學的刺戟，摩擦，搔癢

等器械的刺戟、藥劑、尤其防腐劑（石炭酸、昇汞、水銀、黃候粉等）之化學的刺戟，皮膚分泌物（即汗、皮脂或尿囊）分解時所生之刺戟，或植物（櫻草、向日葵等）細菌、寄生蟲等刺戟。內因方面，凡神經系統之異常，血液之異常，體質病、消化器障礙、腎臟疾患等皆屬之。

症候 急性濕疹，以紅斑及腫脹（紅斑期）開始。繼而形成小結節（丘疹期），更進一步，乃生水泡（水期）及炎症達於高度，破裂後乃呈濕潤狀態（濕潤期），於是水泡內容遂化膿而成膿泡（膿泡期），最後乃形成鱗屑（鱗屑期），而復生表皮。以上所述者，為定型之濕疹。然濕疹卻未必俱經過以上各期時。有發生廣泛性紅斑而分泌漿液者。亦有最初即發生散在性或尋簇性丘疹者。其發生狀態，種種不同。

慢性濕疹，忽而再發，忽而輕快，不獨反覆發生上述之各種症狀，且因炎症久續之故，患部皮膚有肥厚乾燥而生裂傷者。皮脂漏性濕疹，為一種混合性之疾患，其症狀有特殊之點，寄生性濕疹多為限制之濕潤性發疹，其病原今尚不明。

濕疹，不問其種類如何，皆發劇癢，而在床中加暖時尤為增劇，往往妨礙睡眠。至其炎症之蔓延亦有種種。或向周圍進行，或發生於身體之遠隔部份，或久存於一局部而不蔓延者亦自之。若在髮部發生許多水泡或膿疱時，則毛髮因濕潤而膠黏，且附近之頸項淋巴腺亦復腫脹。其原因往往為頭虱，故不得不加以注意也。

患全身急性濕疹者，凡頭部、軀幹、四肢等處，皆有濕疹發生，奇癢不堪又因抓皮脫落，

皮膚皸裂而覺疼痛。往往尚有發惡寒發熱。乳兒則在頭部、耳部、前額及頰部，尤易發生鱗狀濕疹。或形成膿疱，與皮脂漏併發。炎症頗強者亦有之。又如小兒及肥胖之人，因兩股間皮膚互相摩擦，或因尿汗之刺激而起濕疹者，亦有之。此稱為間擦性濕疹。

慢性鼻黏膜炎、往往引起慢性濕疹，其後由此惹起丹毒而反覆再發者，亦有之。乳脈之慢性濕疹，頗有疼痛。肥胖之人，臍部發生濕疹，有經久不治者。患糖尿病之濕疹，常發生於肛門及陰部。又手及腕部往往因藥品的刺激等發生所謂職業的濕疹。此外頭、面、乳房、臍、陰部、肛門、關節屈曲部、手足等處，皆為慢性濕疹之好發部位，至於爪甲之濕疹，或由隣近進行，或僅限於爪部，常在爪甲上發生縱走之凹溝及隆起。

療法 對於急性炎症，務必去其原因而施以緩和無刺激之處置。對於慢性濕疹，須按其時期，使用作用較強之藥劑，使其病機一轉。

急性濕疹之有紅斑及有若干濕潤者，宜避免種種種刺戟（洗滌、發汗、濕氣，）用氧化鋅、澱粉、雲母、碳酸鎂、杜松子末等撒布患部。普通之汗疹等，用此即可治愈。

澱粉 五〇・〇

氧化鋅 一〇・〇

右混和為撒布劑

雲母 一〇・〇

澱粉

五〇：一

右混和爲撒布劑

濕潤較甚而水泡較多之時，可用消炎的濕罨法。即將藥液之布片，以壓力按至水不滴下之程度而後貼於患部。（其藥液可用硼酸水、鉛糖水、或醋酸鎂液藥物二〇，〇水五〇，〇或布洛（Bulow）氏液醋酸鉛一〇，〇，明礬二〇，〇，水五〇，〇混和後，沖淡爲五倍）。如有紅斑而腫脹時，麤包亦有卓效。若紅斑以外尚有小結節發生，並鱗屑甚多者，可用下記之軟膏。

氧化鋅

二〇，〇

雲母（或澱粉）

二〇，〇

豚脂或礦脂

五〇，〇（或加柳酸一〇，〇）

右爲泥膏，塗敷後，其上再撒布澱粉。

氧化鋅

三〇，〇

洋橄欖油

六〇，〇

（右爲塗敷劑）

氧化鋅

二〇，〇

豚脂或礦脂

八〇，〇

右爲軟膏

如欲止癢，可於上記之軟膏中，配以「布洛茂可爾」(bromocoll) (二五%)，「土美諾爾」(tumerol) (二——五%)，石炭酸(一——一、五%)，木焦油或薄荷腦(一——一五%)。頭部有結痂堆積時，宜先注以洋橄欖油，然後用水洗滌，再塗硼酸礦脂(二%)或柳酸○·五、礦脂四○·○羊毛脂二○·○之混和軟膏。

對於慢性濕疹，可於上記軟膏中，配以柳酸、「利索爾青」(resorcin) (以上一·五%)，硫黃、魚鰵脂(ichthyol)、或木焦油(以上三%)，供塗擦用。若表皮肥厚，則用黑布拉(Hebra)氏軟膏、「克利沙洛冰」(一乃至三%)、焦性沒食子酸、或「卑他那夫妥爾」(beta-naphthol) (一——三%)軟膏。頑固之症，常用「利索爾青」一○·○、鈉肥皂五○·○、豚脂二○·○合成之軟膏，或用柳酸(五——一○%)軟膏爲剝屑軟膏。或用威爾金生氏軟膏。亦有塗敷鉀鹼汁(五、○對水一○·○)而使之腐蝕者。爪甲之濕疹可試用x光線治療。肛門、陰部之乾性濕疹手足之胼胝性濕疹，可用披克(Heck)氏肥皂硬膏，或用x光線治療。肛門、陰部之乾性濕疹宜用披克氏鉛糖膠劑(雲母、澱粉各二○·○、甘油八·○、鉛糖水八○·○)，一而可內服砒劑。

以上所述，爲專門醫家對於濕疹療法之概要，可作普通醫家之參考，但常人卻不宜妄用。舊醫所謂胎毒，其一部分即濕疹。舊醫議係小兒在母胎內所受之毒或自己體內所生之毒，宜

使外洩，不必療治，且謂治療失宜，瘡毒即將內攻，而成爲重病，可任其自愈云云，其說可備與否。凡有識者，類能知之。其實小兒之濕疹多屬後天後，其由母體而來者卻甚少。蓋幼兒皮膚抵抗薄弱，稍受刺戟，即易起炎症，故兒童較多皮膚病也。

第二節 濕癩

症候 此乃皮膚兩面互相接觸摩擦所致之皮膚炎症，如受汁液，皮脂或尿糞等之刺戟，往往有症狀增惡，而發濕疹，由此轉成水泡或膿疱者。本症發生之部分爲腋窩、鼠蹊部、陰囊、乳房、大腿內面等處。尤以肥胖之人及小兒爲多。

療法 肥胖之成人，當撒布——二%之柳酸、氧化鋅、澱粉、雲母等。對於炎症，宜塗敷氧化鋅泥膏或軟膏等。小兒則放尿時務須注意保持清潔，勿使肌膚爲尿所浸潤。發生炎症之際，宜禁止洗滌。皮膚面赤色不退時，每日須撒布及塗敷藥物數回。此外依照急性濕疹處理之可也。

第三節 多形滲出性紅斑

症候 此症常於春秋兩季氣候變遷之際發生於手足等處，患者手背、足背、腕部及下腿，突然發赤，時覺風濕痛狀之疼痛。其紅斑最初大如小豆，旋即擴大如一分銅幣，或竟達手掌之

大小由皮膚面扁平腫起，其色鮮紅。經二三有則其中央部分起為紫色而稍陷凹焉。惟周圍紅
色。此時往往有發生大小泡者。亦有蔓延及於面部，經鼻並侵及口黏膜者。多半二三星期即
可全愈，不遺後患。

療法 患部可用硼酸水冷罨法。又塗氧化鋅軟膏亦佳。一面可內服「沙羅耳」(salol)。
柳酸鈉等劑。

第四節 帶狀疱疹

症候 其前驅症，往往有神經痛，但亦有並無異狀者。通常沿神經徑路而發生於身體之半
側。最初皮膚面潮紅，繼乃發生太如帽針頭或扁豆之密集性小水泡，二三日後，即變為膿疱，
再經數日，乃乾燥而結痂。然有時亦能合成大水泡。此病多在春季或秋季流行，多不致再發。
亦有非常疼痛者。又有水疱內容混血液或水泡變為壞疽。治愈後遺留斑痕者。尚有侵及口腔
黏膜者。眼之帶狀疱疹，往往能使眼肌麻痺。三叉神經之帶狀疱疹，能起末梢性顏面神經麻
痹。此外在砒素或炭酸氣中毒、傷寒、腦脊髓膜炎、糖尿病、腮腺炎等病之後，往往有發生中
毒性帶狀疱疹者。

療法 宜用硼酸水或醋酸礬水液行冷罨法，或用硼酸軟膏、氧化鋅軟膏塗敷。如有疼痛，
則軟膏內宜加「可卡因」(cocain) 1%。又或用撒布劑。一面可內服「規寧」，柳酸鈉等可安

替匹林」等。

第五節 皮脂漏

症候 皮脂漏因皮脂分泌過多而起，可分爲二種。一爲油性皮脂漏。皮脂流出甚多，一如塗油者然。多發於面部、頭部、胸部等處。一爲乾性皮脂漏。患部之皮脂腺上，附着大小角質性鱗屑，爲皮脂所浸潤而成污穢黃色之痂皮。在面部及頭部，則生白色糠狀鱗屑致使頭髮失其光澤，此稱爲面部及頭部之糠狀疹，俗稱白屑頭者是也。此外往往有使頭髮脫落者，稱爲脂漏性禿髮。

初生兒之皮脂漏，常發於頭部。全部爲黃褐色脂狀之結痂所蔽，引起濕疹，終生膿疱者往往有之。尚有面部亦被侵及，炎症旺盛而濕潤，在哺乳期中繼續不愈者。亦有延及陰阜、胸背等處者。此時略現潮紅，並有脂狀之鱗屑。此外濕疹往往與本症併發，而面疱瘡瘡亦有併發者。

療法 欲除其堆積於頭髮部之結痂，宜澆注洋橄欖油。其結痂較少者，可塗礦脂、羊毛脂或豚脂等配以硼酸、硫黃或柳酸。頭部可常用卸肥皂精洗滌之。面部有高度濕潤時，可施濕毒法。此外用下記之處方亦有效。

沈降硫黃

二〇

第二節 疥瘡

一五

皮膚病

鹽酸

一〇〇

豚脂

三〇〇

羊毛脂

二〇〇

右混合為塗敷劑

柳酸

〇・五

利索爾青

〇・三

礦脂

三〇〇

羊毛脂

二〇〇

右混合為塗敷劑

對於頭部糠秕疹，可試用X光線或其他光線療法。或用下記之酒精劑亦屢見奇效。

柳酸

〇・五

利索爾青

〇・五

安息香酸酞

一〇〇

酒精

一〇〇

甘油

一〇〇

右混合為塗敷劑

第六節 面皰

症候 面皰俗名粉刺。普通自十五六歲至二十五歲左右之青年男女，往往患之。此因皮脂之分泌障礙而起。

本症之發生部位，主在面部，尤以前額、鼻、頰、頤等處爲多。此乃大如蠟針尖乃至兩針頭之小黑點，與皮脂腺口一致。由其側方壓之，即可擠出蠟狀脂肪性之細小栓塞。其主要成分爲皮脂，此外爲混和塵埃及上皮膚。面皰之基底，往往有發生瘰癧之小結節者。亦有二三面皰合成一團者，是爲巨大面皰。

療法 面皰可以面皰匙壓出栓。一面宜常用肥皂洗滌，且以酒精拭之。如下記諸處方均可試用。

硫黃散

炭酸鈣

羊毛脂


右爲軟膏

利索爾膏

卑他那夫奈爾

羊毛脂

慈二編 各附



右爲塗敷劑

沈降硫黃

二〇・〇

酒精

五〇・〇

右爲搽拭劑

柳酸

一・〇

酒精

一〇〇・〇

右爲塗敷或搽拭劑

第七節 癬瘡

原因及症候 本症亦因皮脂分泌過多而起。其發生部位以面部爲主，其次爲軀幹即胸部及背部。此與面皰相同，其發生期亦在春機發動期至二十五歲之間，稱爲青年癬瘡。又往往有與面皰同生者。青年之人，皮脂分泌過盛，面多脂澤，空氣中之塵埃黏着其上，卽易使皮脂腺口閉塞。此時皮脂腺雖閉塞，而其分泌仍在進行，因分泌物積滯之結果，乃形成紅色之小結節，而呈炎症性浸潤。其後亦有化膿者。有時隨處引起毛囊周圍炎，以致形成小膿瘍者亦有之。

癬瘡亦有因種種之內服藥（溴、碘等）而起者，實係一種藥疹。強壯之人，發本症者居多。此外貧血者或患胃腸病者以及患子宮病者，亦有之。

療法 宜改良生活法。如有胃腸障礙，則治療之。常須注意勿使便秘。脂肪質之食物及酒精飲料，務必禁用。一面可用肥皂洗去皮脂，且用硫黃，「利索爾青」，柳酸等軟膏或酒精劑塗擦之。

沈降硫黃

一〇〇

柳酸

二〇〇

氧化鋅

二〇〇

澱粉

二〇〇

美國礦脂

一〇〇

右混和爲泥膏

硫黃乳

五〇〇

甘油

五〇〇

酒精

五〇〇

冰醋

一〇〇

右混和爲泥膏

第八節 汗泡疹

本症俗稱痱子，多汗者易患之。發於夏秋兩季。常於手掌、足蹠、指趾等處，起小水泡疹，頗有癢感。疹之大者，如帽針頭乃至豌豆之大小，內容透明，至消退時乃乾燥而落屑。普通數日即消散，然亦有頻頻再發、且數年之久者。若加以刺戟，則誘起濕疹。

療法 或用硼酸、礦脂或氧化鋅油（氧化鋅二〇・〇洋橄欖油四〇・〇）塗敷，或用硼酸水或布洛氏液搽包。

沈降碗黃

四・〇

氧化鋅

二〇・〇

澱粉

二〇・〇

蒸餾水

一〇〇・〇

甘油

一〇〇・〇

右混合外用

第九節 凍傷

原因 凍傷係因久受寒氣之作用，血管發生變化，該部血液停滯而起。多發生於手、足、耳、鼻等部。貧血及營養不良之人，易為所傷。

症候 凍傷通常分為三種程度如下。

第一度凍傷，甚輕。患部之血管，因寒氣而收縮，呈蒼白色。若寒氣侵襲不已，血管神經遂起麻痺，於是血管乃擴張而變為紫紅色，略見腫脹，而覺奇癢，尤以夜間就寢時為甚。

第二度凍傷，即於淺色之處發生水泡，破後漿液漏出，遂成潰瘍。

第三度凍傷，最重。皮下組織化膿，該部全成壞疽，呈暗褐色，血液循環停止。又因水分蒸發之故，而成爲乾性或濕性壞疽。其甚者往往皮膚骨肉等亦將爛落，良可畏也。

療法 預防之法，即以手套、絨襪及其他防寒物保護肢體。若常與寒氣相觸，即宜竭力加以摩擦，使其血行旺盛。對於第一度凍傷，宜用酒精棉包，厲行溫浴，並用鹹鹵或樟腦鹵塗之。對於第二度者，宜用氯化石灰五·〇、石蠟軟膏一〇〇·〇之混合劑，或用俄國所製之凍瘡軟膏（鹽酸三〇·〇、阿片膏二·五、樟腦一〇·〇、落葉松節油二〇·〇、骨髓四〇·〇。「阿爾泰」(Althea)膏一一〇·〇。其他如三%硼酸礦脂或魚骸脂五·〇，氧化鋅軟膏三〇·〇之合劑等，亦皆好用之，至第三度，則有時須施手術，非速行治療不可。

第十節 火傷

火傷亦分三度：第一度者，皮膚發赤腫脹而疼痛。第二度者，發生水泡，有時化膿，乾後表皮上無疥痕，旋即治癒。第三度者，皮膚全層破壞，除大小水泡外，尚有結痂附着其上。或皮膚化為褐色，乾涸而呈硬板狀，疼痛殊劇，治癒後所留痕痕甚顯著。火傷延及半身以上者，

難免危及生命。

療法 第一度者，可用硼酸水或布洛氏液行冷療法。第二度者，宜塗硼酸軟膏（二%）、柳酸軟膏（一%）、亞麻仁油與石灰水各五〇〇之混合劑。第三度火傷，當延醫師注意治療。

第十一節 小兒疹

普通生後三四個月乃至十二個月之小兒，易生此疹。其皮疹爲鮮紅色之小結節，大如帽針頭以上，或與小豆相若，頗痒。有時發生水泡。多於傍晚或夜間盛發於全身。小兒往往因之不能安睡。其發生部位，軀幹較多，面部甚少。年齡漸長，則漸輕減，亦有反復發生至三四歲始止者。

療法 有時當除去消化器之障礙。夜間被褥不宜過暖。軀幹上宜撒布澱粉類，或用一%柳酸酒精塗敷。此外行硫黃浴等亦可。塗敷劑如下。

氧化鋅軟膏

五〇〇

士美諾爾

二〇〇

右爲塗敷劑

第十二節 蕁麻疹

原因 因蚊、蚤等蟲類之刺螫、植物之刺戟（因蕁麻之毛而起者甚爲明顯，故有此名）及魚、蟹、貝類、葷菌、毒等食物而起。有時亦有因消化機能障礙而發生者。同一食物，食之者或發生本病或否，蓋體質有不同故也。

症候 此爲大小不等之發疹，其大者如一角銀幣，或呈淡紅色，或呈乳白色，在皮膚而稍爲隆起。有驟然發生於身體各部者。但此爲暫時的現象，歷數小時或一日即行消退。有時發疹擴大或融合而呈種種形狀。亦有發生水泡者。痒感甚劇，用手搔爬則益擴大，患者苦之。

療法 宜設法除去其原因。有消化器障礙者，當先行治療。若因食物而起，則宜用瀉劑，以整理其胃腸。對於痒感，宜用一%薄荷腦酒精、一%柳酸酒精、一、五%石炭酸酒精等塗敷，澱粉撒布，或氧化鋅軟膏塗之。

第十三節 痒疹

症候 初期發生於一歲至三歲間之小兒。全身發小丘疹或蕁麻疹狀之皮疹，呈淡紅色，有劇烈之痒感。一旦消失後，仍復發生，持續甚久。四五歲以後，乃呈一定之形狀，於四肢之伸展面，發生小結節無數，尤以下肢爲多。常有劇痒。小結節大如針頭或粟粒，呈灰白色或帶赤

色而略硬，因之皮膚面以手觸之，覺有粗糙之感。其病發症爲表皮肥厚及搔癢之結果所發生之濕疹。發疹消退之後，該處常有色素沉着。發疹之時，往往隨處起淋巴腺腫，尤以鼠蹊腺之腫脹爲甚，此之謂痒疹性橫痃。

要之，本症發生於榮養不良者居多。其經過有二種。一爲輕症痒疹。其皮膚之變狀甚輕，而發疹之蔓延亦不甚，且在發疹消退期間內，皮膚完全恢復如舊。一爲重症痒疹。痒感不絕，濕疹之發生、色素之沉着、搔癢、腺腫等殊爲劇烈，大腿前面之皮膚，因久病之故，肥厚而硬，不易撮捏。痒疹之消長，視患者而不同。或在夏期劇烈，或在冬期旺盛。其經過如爲慢性者，往往亘十年以上。間亦有已達成年而尚不愈者。本症昔時以爲係不治之症，然輕症者有時亦未始不能完全消退焉。

療法 第一須使全身榮養佳良，並宜講究強健之方法。以硫黃溫泉澄治，最爲得宜。亦有內服亞砒酸、石炭酸等藥者，幾亦無甚效果。惟注射砒素劑，有相當之效耳。

外用藥有種種。然以木焦油三・〇或一土美諾爾一三・〇、或硫黃五・〇或一卑他那夫安爾一・〇——三・〇與氧化鋅軟膏混和而塗敷之甚佳。或用種種脂肪如豚脂、羊毛脂、礦脂亦佳。此外尚有用木焦油而塗敷後再行沐浴之方法，此之謂魚油浴。又光線療法，往往有減輕痒感之效。

第十四節 多汗症

原因 生理的多汗症，乃因運動過度或神經性恐怖而起。病理的多汗症，則因衰弱狀態如結核等病而來。此外亦有因交感神經之疾患而發生半身多汗症者。

症候 主症候即發汗過多。其重要者為限於手、足、腋窩、及鼠蹊部之多汗症。足患多汗症者，兩足潤濕，襪常不乾；又因汗液分解而發惡臭，此之謂臭汗症。其後往往引起皮膚之濕爛，剝離及崩潰。手多汗症甚覺不快。其手掌常覺寒冷。又有因他動的充血以致皮膚變為青赤色者。腋窩，鼠蹊及肛門部亦因多汗症而易發糜爛性濕疹。至於頭皮多汗症，則多於強度脫髮之際見之。

療法 輕症者可用柳酸澱粉撒布，或用礬土二。○滑石一○。○之混和劑，或以柳酸五。○硼酸及酒石酸各一○。○氧化鋅、滑石各四○。○之混合劑撒布之亦佳。或用一——六%之過錳酸鉀液浴足，或用過錳酸鉀一三。○礬土一。○滑石五○。○氧化鋅、石灰各一八。○之合劑每晨撒布之亦可。中等程度者，可用五%銘酸塗布，每二星期反覆行之，至治愈為止。或用次沒食子酸鉍及「坦諾仿護」(Tannoforn)撒布。或用過氯化鐵液三○。○甘油一○。○混和塗敷。重症者宜以一○——一五%之「福爾馬林」酒精，或「福爾馬林」液二。○——五。○羊毛脂一五。○礦脂二五。○製為軟膏塗擦之。亦有行光線療法者。對於頭髮部之多汗

症，可用左記之處方洗滌之。

醇精酒精

五〇・〇

安息香醇

七・〇

凡尼林 (vanillin)

〇・〇五

勝利奧忒羅品 (heliotropin)

一五・〇

拉芬德油 (lavander oil)

〇・五

右混和為洗滌劑(用時宜加注意)

第十五節 腋臭

腋臭為多汗症之一種。兼患腋窩多汗者居多。亦有僅發臭氣者。本症患者頗多，最為人所嫌惡，故特記其療法如下。

療法 可用前節之療法。此外清潔實為唯一要義，洗淨患部後，俟其乾燥，再以下列之藥液塗之。

鉻酸水

五%

福爾馬林水

一——一〇%

酒精

一五・〇

霍夫曼氏樹脂油 (Hoffmann's Balsamöl)

一五〇

蒸餾水

一五〇

酒醋

五〇

右爲塗敷劑

剛載劇甚時，宜沖淡而用之，其後再用左記之撒布劑爲佳。

醋酸

一〇〇

酒石酸

三〇〇

硼酸

三〇〇

衣里司根末

四五〇

氯化鋅

四五〇

右爲撒布劑

最後之處方，朝夕各用一回，可反覆行之。然本症頑固異常，稍不經意，便又發惡臭者甚多。

第十六節 無汗症

原因 因先天的汗腺缺損，故因魚鱗癬、乾癬、色素性脫皮症等皮膚病之故，致汗腺發生

機能障礙而起。亦有因神經性疾患（進行性偏側顏面萎縮、脊髓損傷）而起者。

症候 不見汗液之分泌。

療法 幾無治愈之希望。有時可用「匹洛卡品」(pilocarpin)注射。

第三章 因神經血管等障礙而起之皮膚病

第一節 皮膚發痒症

原因 此乃皮膚知覺神經之機能的疾患，其原因不明。

症候 患本症者，其皮膚初無何等變狀，惟全身日夜發痒，苦惱難堪，搔爬不止，以致皮膚上留有爪痕，或表皮脫落。亦有惹起濕疹而發生膿疱者。老人皮膚分泌缺乏，往往為本症所侵襲，此之謂者人性皮膚發痒症。本症又與空氣之溫濕有關。在冬期發生者，謂之冬期發痒症。在夏期發生者，謂之夏期發痒症。此外往往由於月經閉止期、髮鬚狂、躁狂、癩病、脊髓病、腎臟病、黃疸、糖尿病等病人或吸煙者見之。又有所謂局部性發痒症者，祇限於陰部、肛門（肛門發痒）等處，發痒甚劇。

療法 內服用「阿忒羅品」(atropin)等。外塗用五乃至一〇%之薄荷軟膏，一〇%之「福爾壽林」油、四%之石炭酸酒精等。光線療法最為有效。但此種療治非專門家不可耳。

第二節 母斑

原因：先天性即已存在。或於分娩後即行發現。亦有潛伏於皮膚內，至成人後因偶然之機會而發現者。

症候：表面平滑（扁平母斑），或呈丘狀（疣狀母斑），或為毛髮所被覆（有毛母斑）。母斑之色，或褐或黑（色素性母斑）。往往有發生許多者。其大如豆，或如手掌，有時布滿全身，此之謂巨大母斑，或稱獸皮狀母斑。母斑往往又有變性而成惡性腫瘤者。

療法：或將其剷除，或用電器燒灼。小母斑可塗以1%昇汞或棉膠。其他如X光線，雪狀炭酸，及鐳放射等，均能奏效。對於小兒之血管性母斑，以鐳放射為較有效。

第三節 血管腫

症候：單純性血管腫，係先天性腫瘍。有鮮紅色者（鮮紅色母斑），有青紅色者（青赤色母斑）。亦有扁平而呈滑澤者，謂之滑澤性血管腫。不滑澤而表面隆起者，謂之隆起性血管腫。腫瘍之數甚多，其好發部位，除面部頭髮部外，其他部分往往亦發生之。多半隨身體之發育而擴大。亦有中央萎縮而周圍擴張者，謂之蛇行性血管腫。有由皮膚微血管擴張或茂生所致者，謂之血管擴張症。或為斑紋狀，或為線狀。

海綿狀血管腫，或為先天性，或至晚年而發生。此為有彈性之軟性腫物，加以壓迫，則血液他逸，內容空虛，生於外皮或皮下，或漸次蔓延。其表面凹凸不平，大如榛實，或如胡桃，間亦有過之者。由此部分往往發生象皮性肥厚。

療法 雖有電氣療法、燒灼法、雪狀炭酸法、熱氣燒灼法、X光線療法，但皆不如輻射療法之最為有效。腫瘍之大者，宜審其時機，剷除而縫合之。對於海綿狀血管腫，可用酒精或石炭酸注射。蠟放射療法，亦能奏效。

第四節 夏日斑及雀斑

夏日斑生於身體之裸露部分，如面部，尤其鼻與頰部。此外如頸、胸、手、背、四肢內面等處亦有之。此斑因日光之影響而發，為小斑點，大如針頭或過之，呈淡褐色。

雀斑生於面部、手及露出衣外之諸體部。大如針頭，或如小豆。其色或黃或暗褐色。亦有至高年而尚存在者。

療法 塗以流動石炭酸或赫布拉（Hydro）氏夏日斑軟膏（白降汞、次硝酸鉍各五・〇、甘油軟膏二〇・〇）。亦可以三％之過氧化氫液每日塗包兩次（每次三十分鐘）。此外用昇汞〇・〇五、安息香酸前八・〇、薔薇水一二〇・〇之混和液每星期洗滌三次亦佳。

第五節 黃斑

症候 此爲黃褐色之後天性色素斑。或限於一處，或蔓延甚廣。發於面部、額部、眼邊及兩頰。亦有發於受壓之部分者，如婦女束帶之處，卽往往有之。此外因敷貼局部刺戟劑（芥子泥，發瘡膏等）而生者，謂之外傷性黃斑。惡液質之患者，其面部亦常有褐色斑發見，謂之惡液性黃褐色斑。婦女患本症者甚多，是爲子宮性黃斑，患之者往往有月經異常、子宮卵巢之疾患或腺腫症等。

療法 用液狀石炭酸塗敷，將其腐蝕，俾表皮脫落而生健全之皮膚。又用下方亦佳。

昇汞

○·一五

羊毛脂

三·〇

礦脂

三〇·〇

右爲塗敷劑，昇汞可漸次加至二%（但用時宜加注意）。

第六節 白斑

症候 此因後天性皮膚色素缺乏而起。呈斑紋狀，其周圍反見色素增加者居多。其斑紋無定形，或爲圓形，或呈橢圓形，或作多邊形。往往有蔓延而占面積甚大，其邊緣彎曲，如地圖

狀者。亦有既達一定之範圍即不復擴延者。故白斑之發展程度如何，實難臆斷。且此等白斑處所生之毛髮，往往亦缺乏色素，而呈白色。此外尚有生來即缺乏色素者（俗稱洋白人），除全身皮膚均呈白色外，即眼球角膜亦呈白色，紅色之血管往往可於皮外透見之。

療法，白斑為難治之症，雖用種種剌戟劑，如斑蝥精（cantharidin）、「克利沙洛冰」，焦性沒食子酸等塗敷，亦難奏效。但用水銀石英燈或紫外線玻璃燈（uvio-lamp）照射，有時可得良好之結果。

克利沙洛冰

〇・二五〇・五

羊毛脂

二〇・〇

右為塗敷劑

第七節 酒皸鼻

原因 俗名紅鼻。患者多係中年之人。或因消化不良，或因溫度劇變，或因久處戶外，或因飲酒過多而起。婦女有因生殖器疾患等而起本症者。

症候 患部多為鼻、頰、額、頤等處，左右對稱者居多。該部皮膚潮紅，微血管擴張，橫橫分布。往往有兼發痤瘡性小結節及膿疱者。如頭髮部及面部本已有乾性皮脂漏及脂漏性濕疹存在甚久，則皮脂腺口顯見擴張，分泌增加，往往發生惡臭。患者又因頭部充血而覺熱感，並

略有痒感。有時當患部褪色之際，因結節狀新生物即結締組織之增殖而生鼻瘤，且皮脂腺有時亦因而肥大，形成大結節狀暗青色之膨大隆起部，如瘰癧然。

療法 當除去發病之原因。如對於消化不良、婦人生殖器病，循環障礙等病，均宜加以適當之治療。輕症可用左方處置之。

沈降硫黃

三〇——一〇、〇

柳酸

二〇

氧化鋅

二五・〇

澱粉

二五・〇

礦脂

一〇〇・〇

右混和爲泥膏

魚骸脂

二〇

火島膠

五〇・〇

右爲塗敷劑

利索得青

二〇・〇

魚骸脂

三〇

氧化鋅泥膏

三〇・〇

第二編 各論

附錄

有效貼用

其他用燒灼、X光線、鐳放射等療法，使血管潰滅亦佳。對於鼻科，可行分科的療法。

第八節 疥瘡

症候 此為皮膚角質層之限局性扁平厚，漸次移行於健康皮膚。多與職業有關。好發於足踵及手掌。其上皮往往破裂而成皮膚裂創。足趾方面，同時有發汗過多之症狀。

療法 可用三〇——五〇%柳酸硬膏、一〇%焦性沒食子軟膏塗敷。或鐳放射療法。

第九節 雞眼

症候 手掌、指趾及足蹠因受器械的壓迫而起皮膚角層之肥厚，即為雞眼。此種肥厚部分呈釘狀或楔狀，嵌入真皮內甚深，神經末梢受其壓迫，即引起疼痛。

療法 以一〇%柳酸石鹼硬膏，三〇——五〇%柳酸硬膏（柳酸一〇・〇印度大麻膏二・〇酒精一〇・〇彈力火棉膠一〇〇・〇）塗之。鐳療法亦多應用。有時須用外科手術摘除之。

第十節 贅疣

症候 此為半球狀之隆起，性堅硬，大如帽針頭或如豌豆，生於面部、頸部及手上者居多。

表面平坦，或有稍覺疹瘡而出血之裂溝。年少之人，往往於其手背及額部見有平坦柔軟、帶黃褐色或深褐赤色，不隆起於皮膚表面之贅疣，是為少年性平滑贅疣。老人則於面部、背部、手背、足背上發生表面脂漏狀扁平褐色之贅疣，是為老人性贅疣。贅疣可以移植，但其病原不明。

療法 老人性贅疣，用「克利沙洛冰」最佳。

克利沙洛冰

一〇〇

右外用

少年性贅疣可內服亞砷酸或「阿忒羅品」，外用下列之處方。

乳酸

二〇〇

柳酸

三〇〇

火棉膠

五〇〇

右為塗敷劑

堅硬之疣贅，可施電氣分解法。其甚頑強者，可行X光線及鐳放射療法。

第十一節 雀斑（鱗屑癬）

症候 發疹為圓板狀暗赤色之斑點或小結節。大者較扁豈為大，小者如帽針頭大。發疹後

歷若干日，即爲銀白色層積之鱗屑所被覆。若將鱗屑剝去，即有小血滴漏出。其初期爲點狀或點滴狀斑點，是爲點狀或滴狀鱗屑疹。由此向周圍擴大，成大圓板，是爲貨幣狀鱗屑疹。其次中央部消退，漸向周圍作環狀蔓延，是爲環狀鱗屑疹。其蜿蜒如地圖狀者，則爲地圖狀鱗屑疹。如此自頂至踵，皮膚均呈赤色而爲層積之鱗屑所蔽。亦間有附着漸皮者。通常鱗屑疹發生於頭部，軀幹及其他體部，而其好發之部位則爲肘關節及膝關節之伸展面。然亦有發生於手掌足趾者，又有在口腔黏膜上發生限局性白褐色之斑點者，皆例外也。自覺的症狀輕微，不過稍覺發痒耳。

本症有經年餘不變而仍存在者。又有忽然自行消退者。然大抵均爲慢性，往往有互爭數年以上者。

療法 一切症狀，尙易除去，至於再發，則殊難防止。藥劑可用「克利沙洛冰」軟膏（二——五%）或焦性沒食子酸軟膏（三——五%）。此外亦可以木焦油、硫黃、銻石鹼、「卑他那夫安爾」等爲軟膏。又用繡線或X光線照射，亦有效力。行硫黃泉浴亦佳。一面尙可內服亞砒酸。

第十二節 魚鱗癬

症候 此爲先天性疾患，發於四肢之伸展面者最多。其輕症者，在鬚毛之周圍，形成小結節，是爲毛苔癬。其尖端帶有微細之鱗屑。如魚鱗癬在幼兒時代即已擴延，則皮膚粗糙而乾燥。

爲大而且厚之鱗層所蔽，有真珠狀光澤，落屑亦多，是爲單性魚鱗癬或真珠狀魚鱗癬。其後皮膚角質肥厚，皮溝呈深裂，且因固有之色素而呈污綠色，宛如蜥蜴之皮然，是爲蛇皮狀魚鱗癬。凡關節之屈折面，決不致爲本病所侵及，然而面部及頸部，則往往有強度之糠狀落屑，並使汗液之分泌，因而減少。本病之高度者，形成疣狀之角質突起，大如帽針頭或且過之，呈污灰色，皮膚肥厚，似乳頭狀，特稱爲豪猪病。

本病有在胎生時代業已萌發者，是爲胎兒魚鱗癬。然普通均至生後二歲左右始見發生，迨思春期乃達最高度。此外又與遺傳有關係。

豫後 至夏季雖有脫落者。然大抵均不良。

療法 平時全身須常塗脂肪類。其他藥品如「刺索爾青」或柳酸或「那夫安爾」之5%軟膏或硫黃軟膏，均可用以塗擦。又如硫黃皂浴亦佳。內服可用砒素劑或甲狀腺錠劑等。

第十三節 癩裂

癩裂不得謂爲特殊之皮膚病。乃因氣候（如冬季之寒風）濕度（空氣之乾燥）之變化或因職業之關係，兩手常須與水或藥液接觸，以致皮膚乾燥，皮脂不足，上皮遂成粗糙而生皸裂，或脫落。預防之法，宜常塗脂肪類，或用甘油與酒精之混合物塗之亦佳。

柳酸

100

醫長談虎

羊脂

羊毛脂

右為塗敷劑

硼酸

甘油

酒精

水

右為塗敷劑

六〇〇
二〇〇

一〇〇

一〇〇

二〇〇

三〇〇

第四章 爪甲及毛髮之疾病

第一節 爪甲及爪床之疾病

爪甲及爪床之疾病，多為一般疾病之併發症。茲舉其主要者如左。

爪甲濕疹 因在爪床上形成隆起，致爪甲發生橫行之綠條，同時爪溝有疼痛性炎症者屬多。

爪甲白斑 因空氣濕潤之故，爪甲內乃生橫行之雪白條。

惡性爪床炎 此乃結核病人爪緣下形成潰瘍之疾病。其潰瘍有易於出血而流膿者。亦有潰瘍波及爪根者。須受外科的治療。

梅毒性爪床炎 侵襲爪床或爪母。爪床被害者，其爪面之前部呈灰黃色，以明瞭之界線，與健康部相隔離，可無疼痛而剝離之。若侵及爪母，則爪甲失去光澤與色彩而呈黃色，且肥厚脆弱，易於破裂。

對於此等病症，須行福梅毒療法。

爪甲萎縮 先天性者，因先天之梅毒而發。後天性者，繼發於傷寒、脊髓癆、鞏皮症、汎發性皮膚萎縮、慢性濕疹、魚鱗癬及其他慢性皮膚病之後。

爪甲彎曲症 患本病者，爪甲呈鈎狀。此因爪甲過度發育所致，宜受外科手術。

寄生性爪甲病 種類不少。其因寄生性匍行疹而發者，爪甲表面呈黃白色，而為肥厚不整形，裂溝而呈層狀。因有白癬菌之菌絲及芽胞寄生其中，致爪甲肥厚乾燥而易折。其由黃蘚而來者，爪生甲全部肥厚，潤澤而脆弱，生硫黃之斑點，其中可見有宜奈因 (Schauflein) 氏黃癬菌及芽胞焉。

對於此等寄生性疾病，用X光線療法，當能奏效。

爪溝炎 因爪甲之橫徑發育過度而起。患糖尿病者，往往發生本病於大脚趾及小趾。結核病人有因直接接觸而發生本病者。

梅毒性爪癬。因爪側部或後部之丘疹、膿疱、或膠皮腫之潰瘍性崩壞而起。

療法 宜行驅梅毒療法。

爪甲乾燥。患此病者，其爪甲乾燥而不透明，質脆而易破碎。療法 可以X光線治療之。

第五節 數珠狀毛髮（紡錘狀毛髮）

症候 本症甚為罕見。患者毛髮隔數毛或數根即紡錘狀之膨隆節，成爲數珠狀。毛髮乾燥而易於斷碎。或使毛囊孔增生角質，或使頭髮萎縮，終致頭髮稀疏，而成禿頭。

療法 絕無方法，但可試用硫黃、柳酸軟膏塗之。

第五節 裂毛症

症候 婦女長髮之尖端有縱裂而呈羽毛狀者。因毛髮非常乾燥、質脆易碎，而起。療法 以一〇%硫黃軟膏塗擦之。並宜常用香油。

第四節 結節狀裂毛症

症候 發於鬚、髯、陰毛者爲多。頭髮較少。毛幹上生灰白色球狀之微細結節，其數多

者，常有數個結節。該部毛髮分裂，而呈帚狀。

療法 宜常將毛髮洗滌，而行脂肪塗擦法，其處方如下。

蓖麻子油

五〇〇

拉文德油

二〇〇

酒精

一〇〇〇

右爲塗擦劑

氧化鋅

〇・五

昇華硫黃

一〇〇

單軟膏

一〇〇

右爲塗擦劑

五節 多毛病

症候 此指健全皮膚上毛髮發生狀態異常旺盛者而言。多半爲先天性。其毛有遍佈全身者，卽所謂犬人之類。往往尚有齒牙畸形，生殖器早期成熟之現象。女子有僅面部多毛者，爾之面部多毛症。亦間有生鬚如男子者。他如脊柱方面之薦腰部多毛症，往往與開放性脊柱破裂同時發現。又偶有所謂後天性多毛症者，於包紮編帶之體部、神經損傷後或生殖器發生變化

(卵囊囊腫)後往往見之。

療法 用X光線治療，不無危險，故用電器分解較佳。法以平流之陽極置於手上，陰極置於把針器所夾之針上。電流之強度爲二至三毫，通電一分至三分鐘後，即見針刺之處(即毛囊上)發生小泡，此時即可以鉗子將毛拔去。此種方法，雖頗費事，且其百分之五仍不免再發，然在今日甲錳離一之根治療法矣。他如用脫毛膏(水二〇・〇中混和硫化鈣、甘油軟膏、澱粉各一〇・〇)塗至一至三耗厚，經十分至三十分後，將其洗去。或用過氧化氫液洗滌，亦皆姑息療法也。

第六節 秀髮症

原因 恐因營養神經之障礙而起。或謂爲寄生生物性。然不甚傳染，則事實也。

症候 初爲極小之斑點，漸次擴大，其大小種種不一。形成一個或數個界限明瞭之圓形、卵圓形、或不規則形之禿斑。有時左右相稱。其發生部位，以有髮部爲主。有時亦侵及眉毛、鬚鬚、腋毛、陰毛、等。其呈寫性症狀者，並全身毳毛亦將脫落。本病之經過，種種不同。有永爲一小斑而止者，亦有迅速波及全頭者，病之緩急，不能豫知。有時病人自覺知覺異常者亦有之。

療法 爲促進自然治愈起見，可時時以鉀石鹼精洗滌之，且每星期可用一克利沙洛冰或者

再替膏以塗擦數次。其間尚可用種種靈效劑，如巴豆軟膏（巴豆油二、○可脂、白蠟各一、○）塗敷。若因此而發生皮膚炎，則治療後再行反復用之。如禿部在鬚髯上，則宜用5%斑蝥精酒精塗擦之。若為頑症，則行X光線、石英燈、紫外線或鐳等光線療法，當有卓效。

克利沙洛冰

○：三

忒老馬替膏

一〇：〇

右混和後外用

界末

〇：五

規那爾

二：〇

斑蝥酊

五：〇

酒精

一〇〇：〇

右為塗敷劑

又可以下記二方，交互用之。

克利沙洛冰

〇：三——一：〇

礦脂

二〇：〇

羊毛脂

一〇：〇

右為塗敷劑（每朝一回）

虎骨酒

蓖麻子油

畢他那夫安爾

利索爾青

酒精

甘油

存為塗敷劑（每夕一回）

第七節 頭部糠枇性脫髮症

原因及症候 乾性皮脂腺伴鱗屑經時年餘者，往往引起毛髮脫落，因之頭部乃發生光滑之毛髮部分。本症恐因皮脂分泌異常，毛髮之營養受其影響所致。

療法 欲除去鱗屑，宜用鉀肥皂精洗滌之。此外用左方塗敷亦可。

硫黃

柳酸

礦脂

羊毛脂

洋橄欖油

一〇・〇

一〇・〇

一〇・〇

九〇・〇

一〇・〇

一〇・〇

一〇・〇

一〇・五

一〇・〇

一〇・〇

一〇・〇

一〇・〇

一〇・〇

一〇・〇

第... 散劑

炭酸鈉

甘油

水

右為塗敷劑

利索爾青

硼砂

規那爾

酒精

右為塗敷劑

一〇〇〇
二〇〇

一〇〇
二〇〇
〇〇〇

第八節 早老性及老年禿髮症

症候 慮老年禿髮症者，毛髮脫落進行甚速，且尖毛之脫落增多，許多毛髮亦復減細。早老性禿髮於比較的壯年之人見之，即自三十歲前後起，毛髮漸稀少，且並無皮脂漏，而毛髮細瘦或全脫落者也。

本症以遺傳性者為多。然衰弱性疾患，體質異常等亦可成為本症之原因。

療法 有遺傳性者，幼時即宜注意。宜常用酒精類或香油類。此外用可多硫黃軟膏或下藥處方亦可。也可參照前節治療之。

阿摩尼亞士美諾爾 (ammonia-tincture)

五〇〇

綠肥皂

五〇〇

安息香酸酐

三〇〇

礦脂

五〇〇

右混合為塗敷劑

第九節 症候的禿髮症

原因 患衰弱性傳染病時，毛髮之乳頭受病毒之影響，營養不良，往往引起禿髮。多為一時性。

症候 傷寒、猩紅熱、肺炎、盲腸炎、及產褥後，約六星期往往發生汎發性毛髮脫落。尤其梅毒性脫髮，常呈固有之形狀。大抵感染梅毒後半年或一年，乃在後頭及顛顛部發生斑點狀之禿髮。

療法 為促進自然治愈起見，可用各種酒精劑，如前述蘆薈性及其他禿髮症所用者。此外尚有各種處方如下。

硫酸規爾

二〇〇

鞣酸

一〇〇

駱魯樹脂

一〇〇

硼酸羊毛脂軟膏(二%)

五〇〇

右混合外用

抱水克羅拉爾

一〇〇

蓖麻子油

五〇〇

潛水

二〇〇

右爲洗滌劑

梅毒性禿髮，當行驅梅毒療法。其局部可用白降汞塗敷。

中華民國二十三年十月初版
中華民國三十三年十二月渝第一版

(34202) 檢點

小醫書 皮 膚 病 一 冊

滄版熟料紙

定價國幣壹元

印刷地點外另加運費

* 版 翻 *
* 權 印 *
* 所 必 *
* 有 究 *

編 著 者

祝 振 綱

發 行 人

王 雲 五

印 刷 所

商 務 印 書 館

發 行 所

商 務 印 書 館

址

重慶白象街

22/3/34
该馆呈缴

