

詳校官助教李廉

臣紀昀覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十九

明白周王朱橚撰

癩疔門

陰腫痛

消腫

大陰痛者由腎氣虛損為風邪所侵氣流入於腎經與陰氣相擊正邪交爭故令陰痛但冷者則痛扶熱則腫也陰腫者由風熱客於腎經流於陰腎虛不能宣散

故至腫也。陰卒腫痛者蓋亦由腎氣虛弱暴邪氣傳入陰中冷熱相薄故卒然而虛也痛甚則邪勝邪勝則熱勝熱勝則腫皆卒然而作也。

方

沉香散 治陰卒腫不消發歇疼痛

沉香 丹參 赤芍藥 白茯苓微炒 枳殼黃去瓢

赤茯苓去皮各三分 檳榔一兩

右為散每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服

木香散 治陰卒腫痛攻注腹脹滿悶

木香 防風去蘆頭各半兩 赤茯苓去皮 檳榔各兩 香牡丹

澤瀉 郁李仁湯浸去皮微炒各三分

右為散每服二錢溫酒調下一方無郁李仁

丹參散 治陰卒腫或疼痛

丹參 檳榔各一兩 藁香子 青橘皮去白各半兩

右為散每服二錢溫酒一盞調下食前服之

治陰忽腫痛

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

苦楝子

懷香子

沒藥

各一

兩

右為散每服食前熱酒調下二錢

桂枝加味湯 治外腎吊痛自左乳根如蜘蛛絲許吊

縮外腎拘攣不得屈伸其脈沉弦緊澁

右以桂枝湯加澤瀉川烏炮青鹽茴香等分薑棗服

之再用炮附子葫蘆巴酒炒川棟肉炒茴香炒四味

等分為末酒煮積猪腰子去筋膜研細入酒少許為

丸如梧桐子大酒下四五十九食前服

宣胞丸 治外腎腫痛

黑牽牛

一兩半生半熟

青木香

一兩斑貓七箇用香炒香用五箇班貓

川

木通

一兩炒

右為末用酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸酒送

下鹽湯亦可

治陰風冷所傷疼痛

出聖惠方

白蒺藜

微炒去刺

附子

炮製去皮臍

藁香子

微炒

右等分為散每服食前以酒調下二錢

治陰痛不可忍

出聖惠方

硃砂 一兩細研安於照子上掘一坑子燒令通赤後着頭醋一大盞已來澆在坑子內便安照子着裏面盞蓋用四面攤之
木香 一分
肉豆蔻 一分
二七日取出刮取硃砂細研

右都細研糯米飲和丸如梧桐子大每服煎懷子湯下七丸相次三二服取瘥

又方

出聖惠方

銅綠 **苦楝樹向陽根** 剉 **木香** 已上各等分

右為末煮麩糊和丸如梧桐子大不拘時溫酒下五

丸

又方

出聖惠方

苦楝子 三兩 **附子** 炮製去皮臍 **硃砂** 以酒蒸成膏各一兩

右為末以硃砂膏和丸如菜豆大不拘時溫酒下五

丸

雞屎礬散 出聖惠方

治陰腫

雞屎礬 火前茶 龍牙草 各三分

右為散雞子清調塗腫處日三易之

雞翎散 出聖惠方 治陰卒腫 凡吹藥五六次不消却點四五

雞翎 六莖燒灰 蛇牀子 一兩炒

右為散每服一錢溫酒調下如左邊腫即取雞右翎

右邊腫取左翎姚方無蛇牀子

治腫大如斗 凡腫大如斗者用此散調下

用蛇牀子末和雞子黃傅之 凡腫大如斗者用此散調下

又方 治外腎偏大腫痛

用大黃末醋調塗乾即易之

塗傅方 治陰卵卒腫痛

桂 去麤皮一分

右為末煮稀麩糊調塗腫處頻易以效為度一方以

水調塗 凡腫大如斗者用此散調下

黑豆熨方 治久坐卑濕忽陰囊虛腫氣上築

以米醋炒黑豆青布袋盛熨心腹更以椒葱湯淋滌

腰膝厚衣蓋下部然後服諸藥

竹皮湯

出危氏方

治交接勞後陰囊腹痛入腹中藥

右刮竹青皮一升以水三升煮一半去滓分三服立愈

治腫大如斗

用馬齒莧搗取汁塗之

治蚯蚓吹腎囊腫

右用鹽湯洗以炒鹽包熨痛處

治外腎腫硬

以粘衣草為末用津唾勻於內握揉溫熱烙痛處即安

安公青龍 甘草

治陰腫

出本草

用梁上塵醋和塗之

治卒外腎偏疼

出附後方

用皂莢和皮為末調傅之良香

海藻丸

出聖惠方

治虛勞損腎陰疼痛

海藻一兩 洗 肉苁蓉三分 酒浸 去皮炙乾 牡蠣 木香 牛膝

去苗 硫黃研各半兩 懷香子 沉香 天雄炮製去皮 臍各三分

右為末入硫黃都研令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服食前溫酒下三十九鹽湯亦得

冬青湯 治腫不消

冬青葉 小蘗 甘草

右等分煎湯五升瓶盛湯浸三兩時必下煎至

神效方 治腎囊腫大

右用黑牽牛一兩淨炒黃色香熟為度次將船上硫

黃末拌牽牛須要入內不見硫黃將牽牛紙襯放於

地上一宿碾末用宿蒸餅糊為丸每日空心鹽湯下

三十九量證加減苗香理中丸之即愈

雄黃散出聖惠方 治陰腫大如升核痛不可忍

用雄黃一兩碎研綿裹甘草一兩切生用水一斗煮

取二升以洗之忌海藻菘菜千金用礬石二兩 肘後用礬石二兩

治陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠

以取生椒擇之令淨以布帛裹著凡囊令厚半寸須
更熱氣大通日再易之取消瘥一方兼治虛勞陰腫

冷痛黃一兩 祛風散寒黃一兩 祛風散寒黃一兩 祛風散寒黃一兩

礬石丸

出肘後方

治陰中痛

以水煎服下

礬石二分

大黃一分

甘草一分

末

右用綿裹如棗以導之取瘥

治腎囊腫大

出經驗良方

淡豆豉二兩

斑猫四十九箇

去頭足

茴香一兩

炒

大蘇麻一兩

右為散酒糊為丸如梧桐子大每服三十九鹽酒下

治卒陰痛如刺汗出如雨

出千金方

小蒜

韭根

楊柳根

各一斤

二兩 煎至 汁服

右合燒以酒灌之及熱水氣蒸之即愈七 煎服

溲濕湯

出上海上方

治陰腫痛

蒼朮製

乾薑

白朮

白茯苓

陳皮

甘草

各一

右以咀薑棗煎空心服吳松坡嘗有此疾右邊囊腫

先而微疼始服瀉腎之藥其腫痛愈甚續服腎着湯一料而全愈蓋此證因濕氣得之愈利則愈虛也腎着湯見易簡方溲濕湯下注大意去濕之劑也

一方出上海上方治腎囊腫痛

用八角茴香一兩用鹽合炒香熟和鹽分十服細嚼無灰酒送後服茱萸內消丸三兩分作十服空心服

治陰痛方出千金方

甘草 石蜜

右等分為末和乳傅之

男子陰腫如斗大核痛人所不能治者出肘後方

右用蕪菁根搗傅之

有人陰冷冷氣漸入陰囊腫滿恐日夜痛悶兼治虛勞

陰腫大如升核痛又方醋和熟灰熨之出聖惠方

用搗菟菜根傅之

又方出千金方

用金月下土雞子白和傅之一方車前子為末飲服

之

又方 出十金方

用醋和麩炙令熱熨之

又方 出十金方

用煮大蘇根汁服一升日三下過三即愈

治腎囊腫痛

用先以生料五苓散煎七分去滓熱服後以青木香丸一帖用斑猫去頭翅一處微炒帶香黃色去班猫

將藥丸又用鹽搓丸子後煎五苓散一貼加吳茱萸同煎至七分去滓送下前青木香丸服藥後如小便只用手托起陰囊小便了然後放下已上二方孫威儀用效

治男子陰腫

以荏子葉搗和醋封之女人綿裏內三四易

治卒陰腎痛

以燒牛屎末和即傅之乾即易

治陰囊墜腫氣痛

以槐皮煮汁淋之

雄黃洗方 治男子陰腫核痛不能療者

方見本門陰疝腫縮類

馬鞭草散

出肘後方

專治男子陰卒痛腫

右用搗蕪菁根同馬鞭草傅並良

蚯蚓散 治陰腫痛

右為水搗甘草調蚯蚓糞塗

雞糞散

出肘後方

專治男子陰卒腫痛

右用竈中黄土末以雞子黃和傅之蛇床子末和雞

子黃傅之亦良

療男女陰腫

右以綿裹生大豆已搗者內之

治男子陰腫大如升核痛不能治者

出海上方

右搗馬鞭草塗之立效

療陰腫

出海上方

右以鐵精粉傅之

蟾心方 治外囊大心中爆躁陰下濕癢

右吳茱萸煎湯熏洗即愈或以茱萸末置熱水洗亦

可

療虛勞陰腫痛皮膚癢

出聖惠方

右以桃仁去皮尖熬末酒服彈丸許不過三服即瘥

療惡毒痛者陰卵或偏着一邊并療急變痛牽小腸痛

不可忍者

右以茴香草搗取汁飲一升日三四服又取淳傳腫

失笑散

出濟生拔粹方

治腎腫

用荊芥穗一兩朴硝二兩為末蘿蔔同煎湯淋洗

猪肝法 治陰囊癢搔痛悶

右用猪肝炙熱內陰中當有蟲著肝煎

治偏腫

出儒門事親

治茴香下甘遂

右等分為末酒調二錢食前服

又方

出儒門事親

治偏腫

巴戟去心 川棟炒 茴香

右等分為末溫酒調二錢食前服

治陰痛不可忍出儒門事親

吳茱萸二兩湯洗七遍焙乾微炒 檳榔一兩 茴香一兩

右為末醋糊為丸熱酒下十九食前服

治陰癢痛

用車前子以水三升煮三沸去滓洗癢痛處便瘥

夫突若法

導引法 養生方云兩足指向下拄席兩涌泉相枯坐

兩足跟頭兩膝頭外扒手懸前向下盡勢七通去勞損

陰膝冷

小腸氣附論

甲乙經曰少腹控暈引腰脊上衝心肺邪在小腸也又

曰小腸病者小腹痛腰脊控暈而痛夫小腸者連暈系

屬於脊貫肝肺絡心系其經虛不足則風冷乘間而入

邪氣既盛則有厥逆之證其氣上衝肝肺客冷散於背

結於臍控引畢丸上而不下痛引少腹甚則衝於心胃
蓋其經絡之所系屬然也

白小方古小臍對付針事而麻夫小臍各專舉名

救生丹 出御藥院方 治男子婦人小腸元氣上攻心腹痛並

男囊偏腫痛消積聚補丹田

荆三稜 三兩半 乾漆 二兩半 廣茂 硃砂 各二兩 川茴香

破故紙 炒各一兩 葫蘆巴 炒 川苦棟 巴戟 紅豆

縮砂仁 海蛤 當歸 半夏 湯洗七次 硃砂 沒藥

馬蘭花 炒 芫花 醋炒黃色已 水蛭 一錢炒 蛤蚧 一

酥附子 一兩半炮 紅娘子 二錢粳米同炒 粳米 黃色去粳米不用

右為末醋麩糊和丸如梧桐子大每服三五丸空心

食前溫酒下

鹽煎散 治小腸氣吊腹中成陣刺痛治風證

益智仁 白芷 白乾薑 炮 茴香 炒 甘草 炙 天台

烏藥 去心 香附 淨各一兩 青皮 一兩半 檳榔 麻黃 去節 川芎

枳殼 製各半兩

右共為末每服二錢鹽少許水煎食前服

硃砂丸 治控暈小腸氣痛

硃砂

一兩別研細水飛

蓬莪朮

炮

棟實

炒

丁香

華澄茄

肉豆蔻

去殼

檳榔

附子

炮製去皮臍

巴戟天

去心

青橘

皮

湯浸去白焙

懷香子

炒

木香

各半兩

右除硃砂外搗羅為末以酒一升先取硃砂并飛硃砂水一盞同熬及一升入諸藥再熬頻攪候得所丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下加至三十九

木香導氣丸

治男子小腸肚疼一切氣積以補下元

虛冷脾胃不和並皆可服大有神效

木香

乳香

丁香

八角茴香

川棟子

去核破

故紙

葫蘆巴

荆三稜

香附子

甘草

各一兩

杜仲

半兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九至五十九

空心溫酒下鹽湯亦可日進三服

延胡索丸

一名煉陰丹

治小腸受寒控暈小腹陰器下墜腫

脹卵核偏大堅硬疼痛不可忍

延胡索 青橘皮 湯浸去白焙 海藻 湯洗去醃焙乾 葫蘆巴

昆布 湯洗去醃焙乾 馬蘭花 懷香子 炒 棟實肉 炒各一兩 木

香 車 已戟 酒浸切焙一分一作大戟

右為末入硃砂阿魏安息香三味各一分以醋二升

化開去泥土以重湯煮者令成膏和丸菜豆大每服

二十九燒綿灰酒下空心食前服一方入麝香一錢

沒藥一分一方無葫蘆巴

走馬茴香丸 出德生堂經驗方 治男子積年傷憊久冷及小腸

疝瘕氣疾 方見積熱痛冷門痢冷類

復元丸 出朱氏集驗方 治釣腸病

川棟子 二十五箇剉肉作五分一分茴香炒一錢一分陳皮炒一錢一分黑牽牛炒二錢一分

分神麴炒一錢一分已豆炒五分除去已豆破故紙二錢代用

右為細末煮少麩糊為丸取江水井水塘水田水圳

水合煮湯吞下空心服

丁香丸 治控暈上而不下痛引少腹小腸受寒

丁香 木香 狼毒 蜀椒 去目并閉口炒 附子

炮製去皮臍 芍藥 桔梗 炒 乾薑 炮各半兩 細辛 去苗葉一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食前炮

藁香子酒下

通氣散 治小腸疝氣腰腹牽引疼痛及感風寒或因

勞動腰痛并婦人吹奶心氣脾痛瘡癤已潰未潰悉治

有功

穿山甲 剉碎用蛤粉炒 白牽牛 二兩炒 玄胡索 去皮 陳

皮 厚朴 去皮 甘草 炙各一兩 木香 一兩半 舶上硫黃

皮 厚朴 去皮 甘草 炙各一兩 木香 一兩半 舶上硫黃

二兩炒 黑牽牛 半兩炒

右為細末每服二錢空心温酒下病在上者食後

化生丸 治小腸疝氣痛上引腰臍身不能直

木香 三錢半 檳榔 生用 三稜 煨 茂木 煨 川棟子肉 煨

陳皮 芫花 醋炒 青皮 各半兩 已豆 十枚

右陳皮青皮同已豆炒黃去已豆不用為細末麩糊

丸如桐子大空心温酒鹽湯任下三十九丸

乳香丸 治小腸受邪控舉引上下臍腹痛

丹砂研 胡椒 棟實麩炒 當歸切 木通剉 馬藺子

炒各半兩 硃砂研 海蛤各一分 藁香子炒一兩

右為末乳香一分研細以酒煮糊和諸末藥丸如桐

子大每服二十九丸温酒或鹽湯下亦得空心食前服

三茱丸 治小腸氣疼

山茱萸 石茱萸炒 吳茱萸炒 金鈴子去核 青皮

去白炒 舶上茴香炒 馬藺花炒 小兒胎髮煨存性各一兩

右為末酒糊丸如桐子大每服三五十丸鹽湯酒下

此藥復州史君親服得效

蕩疝丸 治小腸疝氣上而不下疼

川棟子炒 茴香炒 破故紙炒各五錢 青皮去白 牽牛頭

末 陳皮去白各三錢 廣茂炮 木香各四錢

右為末酒糊丸如梧桐子大每服四十九丸空心温酒

下

鹽湯丸 治小腸久積寒氣築痛

青皮去白 肉桂去皮 乾薑炮各一錢半 茴香炒 南木香 益

智仁 川烏炮各半錢 甘草炙少許

右以咀每服四錢水一大盞鹽一捻煎七分空心服

加味通心飲 治腎與膀胱實熱小腸氣痛小腸不通

瞿麥穗 木通去皮節 梔子去殼 黃芩 連翹 甘草

枳殼去瓢 川棟子去核各等分

右為散每服五錢水一盞半燈心二十莖車前草五

莖同煎空心溫服

玉藥丹 治小腸氣疼痛不可忍欲絕

青木香七錢半 茴香 蝎稍 陽起石 硃砂湯化去土

火氣 硫黃研細各半兩 白礬生二錢半 黑附子炮去皮臍一兩

右同研酒糊丸如梧桐子大於疾發時秤新綿二錢

半燒灰與藥十五丸同研熱酒調下甚者加至二十

丸即時氣定不上攻須臾即愈久有此疾日服十九

半月後小便中當有如桃膠即疾根除矣

吳茱萸散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛腰曲不伸

吳茱萸

湯洗炒過半兩

棟實

四十枚

沉香

半兩

已豆

半兩

攤令

微破三味

同炒後入棟實黃焦色去已
豆茱萸不用將棟實去核用

木香

馬蘭花

藁

香子

炒各一分

右除已豆茱萸不用外搗羅為散每服二錢炒蔥酒

調下空心夜卧發時服

木香丸 治小腸受寒氣控羣牽痛

木香

一兩

石南

肉苁蓉

酒浸切焙別為末

菖蒲

牛膝

酒浸

切焙別為末

懷香子

炒

棟實

炒各二兩

右除苳蓉牛膝二味別作末外搗羅為末以酒三升

熬苳蓉牛膝成膏和藥丸如梧桐子大每服三十九

空心食前以紙裏蔥白一寸煨熟細嚼溫酒下

懷香子丸 治小腸受邪痛引小腹

懷香子

炒

華澄茄

川棟子

炒各一兩

木香

一兩

葫蘆巴

青皮

各三錢

檳榔

一錢半

右為末酒糊丸如梧桐子大每服四十九丸蔥酒任下

二茱丸

出華陀中方

專治小腸氣痛

石茱萸

吳茱萸

各一兩

金鈴子

取肉并皮一兩

青皮

去穢

上茴香

馬蘭花

三味各等分

右逐味於銀銚內炒令香為末酒糊丸如梧桐子大每疾作鹽酒下三五十九久年不瘥五七服可除病

根

七珍丹

治小腸疝氣一切下部冷疾

木香

知母

焙

小茴香

鹽炒

陳皮

去白

枳殼

去穢

川棟子

甘草

右等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服三五十九空

心鹽酒下

木香散

治小腸受邪控羣牽痛

木香

馬蘭花

各半兩

棟實

巴豆

各三十枚剝去皮同棟實炒候

黑色去巴豆用棟實

右除巴豆不用外搗研為細散每服二錢煎加酒調下鹽湯亦得空心食前服

金鈴丸

出華陀中方

治小腸氣立愈

黑牽牛炒 青皮去白 良薑各等分 川棟子半兩 舶上茴香

半兩 玄胡索一兩

右為末生薑自然汁煮麩糊丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十丸燒綿灰浸酒下不拘時

喝起丸出瑞竹堂方 治小腸氣及腰痛

革薺 杜仲酥炒 葫蘆巴生芝麻炒 破故紙炒 小茴香

已上各一兩 胡桃仁二兩湯鹽水浸一宿

右將胡桃為末同前五味藥末丸如梧桐子大每服

三五十九丸空心鹽湯鹽酒亦可

沉附湯出直指方 治腎虛無陽小腸氣痛頭額小腹外腎時

冷蕪治濕證

附子生一錢 沉香 辣桂 革澄茄 甘草炙各半錢 香

附子一錢

右判為一服薑七片空心煎服

川棟散 治膀胱小腸氣痛臍下撮疼上衝心腹面色

痿黃脚下癰痛四肢倦怠不思飲食夜多漩溺外腎瘻

癢

方見本門
諸疢類

茴香棟實丸

一名控引畢丸
出衛生寶鑑

治控引證主小腸甲乙經

云小腸病結於腰上而不下痛衝心肺所系也

茴香

炒棟實

麩炒

石茱萸

陳皮

馬蘭花

醋炒各一

兩芫花

醋炒半兩

右為末醋麩和丸如梧桐子大每服二十九至三十

丸空心溫酒下食前服

大蒜丸 治一切小腸氣腎囊大

川棟子

取肉炒

破故紙

炒

黑牽牛

炒熟各二兩

玄胡索

一兩

半青木香

南木香揀細青者

右用大蒜每瓣內夾巴豆一粒火內煨熟大蒜令香

去皮巴豆只用大蒜料藥用大蒜者十頭搗細如前

藥末丸如梧桐子大每服四五十丸用鹽酒送下空

心食前服

木香散

出百一選方

治小腸氣

木香

青皮

去白

玄胡索

土茴香

炒

馬樣兒

新瓦上焙

乾

右等分為末每服二錢空心溫酒調服忌滯氣食物如豆腐雞鴨子濕麪薺菜病愈任意食無害

棟實散 治腹受邪控而不舉上而不下疼

川棟子 四兩判 已豆 甘草 各一兩 青鹽 二錢 小茴

香 二錢半炒

右將棟實與已豆一處炒川棟黃色不用已豆前三味一處為末一分溫酒空心調下

治小腸氣或走氣

陳皮 蒼朮 破故紙 木通 牽牛

右等分水二盞煎一盞去滓再煎如或走氣去故紙加枳殼一同煎空心冷服立愈

祕傳茴香湯 出德生堂經驗方 治男子小腸心腹痛下元久冷

婦人血氣刺痛等疾早晨常服大妙

蒼朮 二斤 甘草 炙十兩 茴香 炒一斤半 乾薑 十二兩 鹽 七兩

藥再碾

右為散每服一匙沸湯調服不拘兼治小兒脾瘕泄瀉

一捻金散

出朱氏集驗方

治奔豚小腸諸氣痛不可忍

玄胡索

川棟子

炒

全蝎

炒

舶上茴香

炒各一兩

附子

半兩去皮
臍生用

右為末每服二錢痛作時熱酒調下甚者不過再服

神效

五復丸

治小腸奔豚疝氣膀胱偏墜

青木香丸

海藻丸

消疝丸

內消丸

安腎丸

丸

右前藥以母子大斑猫七箇小者十四箇去翅頭足

與丸子藥同炒以藥微裂為度乘熱以瓦合封一日

夜去斑猫用復元通氣散空心鹽湯或酒調送丸子

五十九立效

立安丸 治小腸氣攻腹作痛

川椒

淡豆豉

各七
十粒

巴豆

十粒去
殼油

斑猫

六箇
去翅

右為末醋糊為餅子用米醋一碗將餅子煮醋乾搜和丸如菘豆大每服十五丸空心冷鹽水下更量虛實加減丸數服

治小腸氣痛不可忍者

出醫方大成

烏藥 搗碎用酒浸一宿

高良薑

茴香

舶上者各一兩

青皮

去皮二兩

右為末每服二錢偶發時熱酒調下又方杏仁一兩舶上茴香一兩蔥白焙乾一兩同為末溫酒嚼胡桃嚥下

治小腸氣痛撞腹面青唇黑欲死者

出本事方

木香

一兩茵陳

羌花

甘遂

各等分

右為末每服二錢水一盞煎七分去滓溫服服此藥

後應犯甘草藥皆不得喫恐與甘遂相反故也其藥甚妙緣處方理屢有效驗

又方

出本事方

川棟子

茴香

川烏

炮

破故紙

各等分各炒令黃色

右焙乾為末酒糊丸如梧桐子大每服二十九鹽湯

溫酒任下忌生冷動氣一切毒物

沉香內消丸

出德生堂
經驗方

治小腸疝氣陰囊腫大或左右

偏腎結核疼痛難忍下元虛冷久而不愈者並主之

沉香

木香

各半
兩

葫蘆巴

酒浸

小茴香

炒各
二兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心

鹽酒鹽湯任下

治小腸下部氣疾藥力雖微其功甚大

大茴香

全蝎

胡椒

吳茱萸

分
傳

右為末每服一錢食前溫酒下忌熱物

治小腸氣

八角茴香

四兩

川椒

金鈴子

蟬蛻

各四
兩

右為末酒糊為丸每服三四十九鹽湯送下

治小腸氣疾

青木香丸

石刻安腎丸

走馬小茴香丸

茱

萸內消丸

右四味各三貼用斑猫四十九箇去了翅足與前藥

一爐炒微黃色去班猫不用止用四味藥每早空心下五十九鹽酒木香湯送

香殼散

出宣明論

治小腸氣臍腹攪痛急陰股中疼悶不省

人事

舶上茴香

用鹽炒

枳殼

各一兩

沒藥

半兩

右為末每服一錢溫酒下不拘時併二三服

如神散

出衛生家寶方

治丈夫婦人小腸氣塊從小腸起至心

膈間痛不可忍及口吐清水

蛤粉

半兩燒過

甘草

半兩

乾葛

一兩

右為末每服二錢沸湯點服極妙

治小腸氣

出本事方

木香

一兩

天南星

良薑與天南星同炒今赤色各半兩

右為末每服二錢無灰酒一盞煎七分入鹽少許空

心連滓熱服

香竭散

出瑞竹堂方

治小腸疝氣陰囊腫痛

乳香

各一錢

蝎稍

各一錢

右為末每服一錢水一盞煎七分入鹽少許空心連

滓熱服

川棟茴香散

一名金鈴散

治小腸疝氣疼痛

方見本門諸疝類

治小腸氣

出經驗良方

全蝎稍

七箇於懷中頻時候暖為末

玄胡索

五錢

川棟子

五箇燒存性

右為末以酒調下半饑飽服之即愈

失笑散

出直指方

治小腸氣痛及諸血痛心腹絞痛婦人血

痛欲死十餘日百藥不驗

川五靈脂

蒲黃

隔紙微炒

加延胡索

各等分

右為末每服二錢酒半盞水半盞煎七分食前服血

痛臨熟入米醋少許一方止用醜酒一合熬藥成膏

水一盞煎七分熱呷服

或不加延胡索

神砂一粒丹 治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子 麝香

薑紅

各一兩

右為末醋麩和丸如酸棗大以硃砂為衣每服一丸

男子酒下婦人醋湯下服罷又服散子

治小腸下部氣疾藥力雖微其功甚大

右用山果子只紅糖毬不拘多少連核晒乾為末却
入大茴香半斤小茴香半斤三味為細末用好酒調
服如腰痛者加胡桃肉細嚼送下立效

小茴香丸 治小腸氣腹痛

茴香 胡椒等分

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒
下

治小腸氣痛

全蝎 茴香炒黃各一兩

右為末醋糊丸如梧桐子大如發時每服五七十九
溫酒下食前服

治小腸氣連臍腹脇肋疼痛

川烏頭一兩炮製去皮臍剉如麥豆大 川棟子半兩搗碎

右和勻每服二錢水酒各半盞煎七分去滓溫服

治小腸氣

枳殼

麩炒去瓢

舶上茴香

各一兩

右為末每服三錢發時空心熱酒調下

治遠年小腸氣醫不瘥者

硫黃 舶上茴香

炒令黃不可犯銅鐵器各等分

右為末每服五錢用熱酒調空心服永除根

木香散

茱萸

揀四箇

桃仁

一百二十粒

右同炒香熟去茱萸不用止將桃仁去皮尖蔥白十

寸細剉沙盆內爛研銀鈔炒香熟用酒二盞浸作一

服熱喫汗便解

奪命丹 治遠年日近小腸疝氣偏墜搐痛臍下脹痛

以致悶滿及外腎腫硬日漸滋長陰間濕癢抓之成瘡

癬並皆治之

一名星斗丸

吳茱萸

一斤去枝梗淨四兩酒浸四兩醋浸四兩鹽湯浸四兩童子小便浸各一宿焙乾

澤瀉

二兩去灰土切作麩片酒浸一宿

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九空心鹽酒

或鹽湯下

馮仲柔苦下奔豚寒氣攻衝小腹引痛四日只一服臟腑微動若失去遂安

飛黃丹 治小腸疝氣疼痛

右用帶毛雀兒取去腸肚將金絲礬細研裝於雀兒肚內滿縫合用桑柴炭緩煨燒成灰研為細末空心用無灰酒調任下惡心入鹽少許年遠者每服二枚近者一枚累效

治小腸氣疝氣疾

小茴香

二兩葱白三兩細切一處炒乾用

破故紙

二兩澤瀉一兩新瓦上一處炒

不用澤瀉

右為末每服溫酒調下食前服

治小腸走氣作痛上氣衝心便墜搐痛

小茴香

一班猫七兩

右將斑猫同茴香炒黃色却不用斑猫將茴香為細末入鹽少許酒調送下青木香丸

全蝎延胡散

治小腸氣痛最良

此人多患昔有賣此藥者其門如市

延胡索

用鹽炒一兩

全蝎

日乾生用一分

右為末每服一錢食前溫酒調下亦治心痛半饑飽

醋湯下 一名奪命散

二聖丸 治丈夫元氣小腸氣撮痛者

右用乾漆一兩為末濕漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯間已來住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞下無時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急開牙關溫酒化一丸灌下必安怕漆人不可服

龍麝散 治小腸氣

右錢子地龍一箇搯去上面泥土用麝香當門子與地龍等分為末平分兩服用無灰酒調下

治小腸氣

八角茴香 茱萸 等分

右用鹽少許將香萸炒令冷空心細嚼溫酒送下

通聖散 出衛生家寶方 治小腸氣痛不可忍

桃仁 六兩去皮尖 硃砂 一兩半去砂石研

右生為末每服一錢煎生葱酒調下一服立止更不
再發

治小腸氣

右胡椒四十九粒巴豆三粒同炒熟去巴豆不用如
小腸氣發時將胡椒一粒空心細嚼熱湯送下

又方

五苓散一撮約
貼一錢重茴香

右件用連根蔥一莖燈心三十莖水一盞半煎七分

小便過即效又加些鹽下

導利散出海上治小腸氣痛不可忍者

以每服用五苓散一貼燈心三十莖酒兩盞煎一盞
放溫服之用被蓋卧小便過立效加連鬚蔥三頭煎

治小腸氣

用酒蒸五苓散入少許燈心下青木香丸一百粒

治小腸氣疼出百一

用曾煨金銀甘錫子槌碎碾令極細每服一錢熱酒

調下空心服

又方 出百一 選方 治至危殆者灌下即愈

用海水團以炭火燒灰存性熱酒調下如無烏賊魚
腸亦可

各半散 出十便 良方 治小腸氣小便不利

以室女或婦人退髮茴香為末將二件各炒一錢七
以無灰熱酒調下如神名五斗安神各半散

又方 出百一 選方

用肥皂獨賢者四十九箇燒存性為細末再研如粉
用陳米飯爛研如膏子丸如梧桐子大每服四十九
茴香煎湯下一方治疝氣細末熱酒調下

去鈴散 治疝氣小腸氣常服安腎實脾

用杜茴香一斤以老生薑二斤取自然汁浸茴香一
夜約薑汁盡入茴香內以好青鹽二兩同炒赤取出
焙燥碾羅為末無灰酒煮糊丸梧子大每日空心食
前服三十九溫酒米飲任下此藥專實脾胃以其有

鹽引入下部遂大治小腸疝氣服之屢有效尋常治
疝氣藥多是疎導久而未有下為害者此藥用薑汁
專一發散而無疎導之言所以妙也郭廷圭知縣云
舊苦此疾歲不下五七發服藥一料病根遂除今已
十五六年不作

治小腸氣年久痼疾一服見效

出存仁方

用蘿蔔子一兩以大斑猫七箇去頭翅足入內同炒
令香以紙裏定候冷去班猫不用為末酒糊丸如梧

桐子大每服十九炒薑湯吞下食前服

木賊散

出瑞竹堂方

治小腸疝氣

木賊

不拘多少去節先以鍋子燒熱取煨火炒

右為末空心熱酒調下沸湯調服亦可

星斗丸

一名吳茱萸丸出朱氏集驗方

治小腸疝氣痛

吳茱萸

二兩酒浸二兩醋浸二兩童子小便浸二兩米泔浸或鹽炒

以分作四處浸一日至二日漉出晒乾碾為細末用
生蘿蔔剖開皮作蓋子取肉空將此藥末裝在內蓋

了用線紮定甑內蒸熟令爛同和為丸空心溫酒下
鹽湯亦得大有神效如遇無蘿蔔時以澤瀉代之用
一兩茱萸四錢一處和丸一方煮麩糊為丸空心下
治小腸疝氣腫不止

鼠粘子

不拘多少銀
器內炒黃

右為末每服五錢熱酒調下揉動

煨棗方

出直
指方

治小腸氣痛不可忍

用班猫一箇去頭足并翅入棗中線繫濕紙包置慢

火中煨令香熟去班猫空腹食棗以桂心葦澄茄煎
湯送下

葫蘆巴散

出直
指方

治小腸攻刺

用葫蘆巴炒一兩為末每服二錢茴香炒紫用熱酒
沃蓋定取酒調下

治小腸氣

用血師一兩米醋一升以火燒血師通赤淬入醋中
以淬竭為度搗羅如麩用湯調下一大錢即瘥如神

血師即代赭石

立神丹 治小腸氣

用香附子不拘多少去毛炒再去毛用無灰酒煮剉碎為細末薄酒糊丸如梧桐子大每服二十九或三十九空心日午鹽湯或酒下

蔥白熨方 治小腸脹小便難不急治則殺人方見小便淋瀝

門小便不通類

芫花方 治小腸氣攻小腹疼痛

芫花醋炒 木通剉 青橘皮去白切 胡椒 大黃煨 辣

桂去麤皮各半兩

右為末酒煮麪糊丸如小豆大丹砂末為衣每服十丸至十五丸空心食前生薑熱酒下

三茱丸出危氏方 治小腸氣外腎腫痛服之病自泄氣中出

川棟子一兩用班猫十四箇好者搗去翅嘴同炒赤色去班猫 黑牽牛一兩炒熟

青皮 青鹽 茴香微炒各三兩 山茱萸 吳茱萸

石茱萸各三兩 破故紙一兩七錢炒香熟

右為末醋麩糊丸如梧桐子大每服三五十九先喫炒桃仁十五箇以酒或鹽湯下空心食前炒茴香酒下亦得周仲舉苦腎癰服此藥得效

已戟散 治小腸疝氣

已戟天去心棟實取肉木香麩炒懷香子炒附子炮製去皮

一兩 各

右為散每服二錢空心温酒調下

棟實散 同前

棟實取肉懷香子炒荆三稜煨蓬莪茂煨

右為散每服一錢葱酒調下

治小腸氣

川棟子一對汶藥二錢乳香八角茴香舶上

茴香各三錢當歸二錢

右以咀好酒煎空心服

又方

紅麩末 菴蔴末 香附末 橘核末

右件熱酒調空心服

降真丸 治小腸氣發動

附子去皮 湯浸 青橘皮去白 木香 芎藭各等分

右為末濃糯米飲丸如梧桐子大每服七丸至十九

生薑湯下日三

白朮散 治小腸氣

白朮 棟實取肉各二兩 青鹽一分

右細剉慢火炒黑色留性搗羅為散每服二錢熱酒

調日三

治小腸氣由小腸內疼痛忽衝入兩肋忽攻腰背小便

黃赤忽即不通大腑秘熱其痛難忍悶絕欲死宜喫此

方一名桃仁膏 出護命方

舶上茴香一兩 半炒 桃仁一兩 炒熟去皮 尖并雙仁者

右先杵茴香一味為細末却入桃仁在內重杵令細

爛每服三錢熱葱酒調下和滓非時喫氣壯盛者服

五錢

救痛散 出衛生家寶方 治小腸疝氣築心疼痛不可忍者

木香 煨 肉豆蔻 麩裏煨 荆三稜 煨 茴香 炒 馬蘭花

醋炒 金鈴子 去核秤 各一兩

右為末每服一大錢熱酒調下如痛時服之立效

鼈甲煎丸 出衛生家寶方 治小腸氣發痛不可忍并結淋此藥

極有應驗

鼈甲 三兩用水浸三日三夜去 桃仁 一百粒湯去

研 硃砂 湯化去石煎 成霜秤三分

已上三味用醞醋四升於盆中慢火熬成膏更入後

藥

厚朴 去皮生薑汁炙 陳皮 去白 神麩 炒 肉桂 去皮各 肉豆蔻

四箇 檳榔 二兩 柴胡 去苗 半兩

右後七味為末再溫前膏和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸以細切生蔥熱酒下忌生冷油膩濕

麩

抵聖碧霞丹 出衛生家寶方 治男子小腸疝氣諸藥不效者

茴香炒 川棟子去皮殼 全蝎糯米炒去足稍刺 北亭去石 銅綠

研 阿魏研 青皮 硫黃 玄胡索 葫蘆巴炒

右等分為末煨葱研為丸如菜豆大每服七丸煨葱

熱酒下立效

附子散出衛生家寶方 治小腸疝氣絕妙

附子一兩炮去皮尖臍 胡椒半兩 川棟子十箇炒去核 舶上茴香

半兩 馬蔞花半兩醋半蓋煮乾

右件為末空心溫酒調下一錢

軟疝丸 治丈夫小腸氣攻刺及脇肋下成塊堅硬不

消婦人血刺血塊攻疰衝心疼痛不可忍者

硝砂一兩半飛研 白礬三分飛研 硫黃一兩飛研細 硃砂一兩飛研細

陽起石一兩用冷水浸七日取出研麩細 當歸半兩 附子二兩生去皮臍 茴

香一兩 木香三分 丁香一分

右為末酒糊丸如菜豆大每服三五丸煨生薑溫酒

下

神仙導氣散 治小腸氣發作疼痛不可忍者并脚氣

等疾

甘遂 二兩 半 木香 一兩半 剉碎

右件入水二升一處文武火熬令乾為細末每服二錢用猪腰子一隻入藥末在內以濕紙裹煨熟細嚼溫米飲下臨卧一更服量虛實加減忌甘草三日

橘核散 治寒濕腰痛小腸氣壯筋骨暖下元

五靈脂 去砂石用醋 少許炒乾 延胡索 破故紙 茴香 炒 鹽

黃菴蔞草 去梗 生用 黑牽牛 生用 橘核 已上七味 各一兩 棠棣子

四兩生用俗語為山果子 川棟子 去核半兩 研生用

右件為細末每服二錢熱酒調下不拘時候

如聖散 治小腸疝氣發作無時疼莫能忍

牛膝 一兩酒浸 一宿焙乾 肉苁蓉 一兩酒浸 一宿焙乾 葫蘆巴 半兩 已乾

半兩 去心 南木香 半兩不見 火晒乾 破故紙 半兩 微炒 桂心 半兩 不見 火

乾山藥 半兩 葶澄茄 半兩 川附子 一兩炮去皮臍 切作散子塊 川烏

頭 半兩炮去皮尖 切作散子塊 黑牽牛 半兩 虻青 三十箇 川棟子 一兩

每箇切作四片酒煮十沸焙乾為末

右將川棟子川附子川烏頭同黑牽牛虵青於銀器
 中慢火炒令黃色火不可緊去牽牛虵青只將附子
 烏頭川棟同前藥為細末酒糊為丸如桐子大每服
 五十九至百丸空心溫酒或鹽湯下華亭人朱其姓
 為吳興稅官日傳此方云妙凡有氣疾皆能治之
 木香飲 治小腸氣痛 詩訣曰小腸氣痛腰先曲無
 淚叫啼空眼哭口乾脚冷上唇乾額上汗珠濕漉漉

川棟子

十箇巴豆七粒炒令土黃色去巴豆八箇香半兩

玄胡索半兩南木

香二錢史君子三錢

右為末米飲調下大人小兒皆用

髮灰酒 治小腸切痛屬小腸病

元豐中丞相王邵公病小腹痛不止聖旨宣差太醫
 攻治終是不效丸藥之至熱硫黃附子五夜又丸用
 之不瘥駙馬張都尉令取婦人油頭髮燒作灰酒服
 二錢即時痛除

尋氣丸 治小腸疝氣偏墜疼痛

甘遂

二錢 炒

石燕子

雌雄各一隻

班猫

三箇去翅足炒

右為細末酒煮麩糊為丸如菜豆大每服三丸麝香

溫酒送下空心食前臨卧服忌熱物一時忌甘草一

日

神效胡桃酒 治小腸氣及婦人外癰

右以好胡桃一枚火內燒成炭細研以薄酒熱調下

絕妙

胡桃丸 治小腸氣

胡桃肉

浸去皮核 研焙為末

破故紙

大棗

煮去皮核 焙二味為末

右件等分拌勻以蜜和丸如梧桐子大食前溫酒下
四五十九一方為散每服二錢酒調下食前服

普濟方卷二百四十九

欽定四庫全書

普濟方卷二百五十

明 周王朱楠 撰

癩疔門

膀胱氣痛 附論

夫治膀胱氣痛不可忍醫者投剛劑其痛尤甚小便三日不通陰陽痞塞惟有待死適遇明醫投五苓散一兩分為三各用葱鬚三根茴香及鹽少許連服中夜下小

便如黑汁三升臍下寬得睡續服硃砂丸數日而安蓋此疾本因虛而得不宜驟補邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄之邪然後補之

方

金鈴丸

出永類驗方

治膀胱腫硬牽引疼痛及小腸氣陰囊

腫毛間水出并能治之

金鈴子肉

五兩

茴香

炒

馬蔞花

炒

海蛤

兔絲子

破故紙

海蒂

各三兩

木香

丁香

各一兩

右為末糊丸如梧桐子大每服二三丸空心食前溫

酒鹽湯任下

蔥白散

出三因方

治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣攻刺

疼痛及治婦人產前腹痛胎不安或血刺者兼能治血臍宿冷百骨節倦痛腹瘦怯弱勞傷帶癖久服盡除但婦人一切疾病宜服

川芎

當歸

枳殼

麩炒去穢

厚朴

薑汁炒

官桂

去皮

青皮

乾薑

炮

茴香

炒

川棟

炒

神麩

炒

麥蘖

炒

三稜

炮

蓬

末

醋浸一宿焙

人參

茯苓

芍藥

木香

炮

乾地黄

各一兩

右為末每服三錢水一盞蔥白三寸煎七分入鹽少許熱服大便秘澀加大黃煎大便秘利則加訶子煎食前服

治膀胱疝氣腎腫陰痛不可忍欲死者

川棟子

十箇

巴豆

五箇

斑猫

十箇一處炒黃去已豆斑猫不用

沒藥

五分

八角茴香

小茴香

五分

枳殼

麩炒五分

右為末三分溫酒送下

葫蘆巴丸

治腎經虛冷膀胱氣痛或陰腫偏墜或小

腹有物如卵上下走痛

方見本門諸疝類葫蘆巴丸

治膀胱氣外腎腫大

破故紙

黑牽牛

二味瓦器內炒大半留小半生

右為末別取大蒜入巴豆濕紙裏煨軟熱巴豆不用以蒜研入藥作劑可丸為度丸如梧桐子大每服三十九丸清茶吞下

青木香丸 治膀胱疝氣腫痛及胸膈噎塞氣滯不行

腸中水聲嘔噦痰涎不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛 六兩炒香搗末三兩 青木香 一兩 補骨脂 炒香 葶澄茄

檳榔 用粟米飯拌以濕紙包火中煨紙焦去飯各二兩

右為末入牽牛末令勻以清水拌和丸如梧桐子大

每服五十九丸溫熱水吞下

又法 出永類驗方

用青木香丸二百粒班猫七箇去頭足翅為末同於

文武火上慢炒令丸子微香以磁碟蓋鉢上頓在冷處少頃去斑猫末取丸每服五十九丸茴香酒下空心服累試之有驗

茴香散 出本事方 治膀胱氣痛

茴香 金鈴子肉 蓬莪茂 荆三稜 各一兩 甘草

半兩

右為末每服二錢熱酒調下又云每發痛甚連日只二三服立定頃在徽城日歛尉宋姓膀胱氣作疼不

可忍醫者以剛劑與之疼愈甚小便不通三日矣下
虛脹心悶予視之見其面赤黑脈洪大予曰投熱藥
太過陰陽痞塞氣不得通為之奈何適有五苓散一
兩許分三服用連鬚葱一莖茴香一撮鹽一錢水一
盞半煎分服中夜下小便如黑汁者一二升臍下寬
得睡翌日診之脈已平矣續以硃砂丸與之數日瘥
大抵此疾因虛得之不可以虛而驟補藥經云邪之
所湊其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄

之邪然後補之是以諸方借巴豆氣者蓋謂此也

牽牛丸

出危氏方

治膀胱有氣服暖藥攻成壅滯作痛

黑牽牛

三錢

大黃

二錢

白礬

一錢

右用巴豆去皮三十粒先入銚炒焦乾去巴豆入衆
藥炒香為末煨大蒜研細為丸茴香湯送下七丸

治男子腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成皆因憂思愁
慮失冷感寒疝氣攻痛有橫痃豎痃臍腹攻脹腰脚沉
重不能舒伸服諸藥不效者宜速療之

香附子一斤已豆

班猫各十五箇

右同一處炒令香熟去已豆班猫用艾葉煎醋打麩

糊為丸如梧桐子大每服三四十九丸用鹽酒下

念珠丸

出衛生家寶方

治膀胱疝氣外腎腫脹痛不可忍

乳香

硃砂各三錢

飛黃蠟一兩

右乳香研細又同硃砂研勻鎔蠟和丸分作一百單

以線穿之露一夕次日蛤粉為衣旋取一粒用乳

香湯吞下頃年有人貨疝氣藥上擔人我二字以為

照日日貨千錢有一國醫多金得之用之良驗

金聖散 治小腸膀胱氣痛不可忍

地蟾

半兩去翅足頭微炒

滑石

一兩硃砂半錢

右為末每服二錢用苦酒調下食前服

金鈴子散

出危氏方

治膀胱疝氣閉塞下元大小便不通疼

痛不可忍服之神效

金鈴子

四十九箇去核剉如麻豆大不得碎細用已豆四十九箇去皮亦不得碎細同炒以

金鈴子深黃為度去已豆不用

茴香

一兩一方用鹽炒

可忍醫者以剛劑與之疼愈甚小便不通三日矣下
 虛脹心悶予視之見其面赤黑脈洪大予曰投熱藥
 太過陰陽痞塞氣不得通為之奈何適有五苓散一
 兩許分三服用連鬚葱一莖茴香一撮鹽一錢水一
 盞半煎分服中夜下小便如黑汁者一二升臍下寬
 得睡翌日診之脈已平矣續以硃砂丸與之數日瘥
 大抵此疾因虛得之不可以虛而驟補藥經云邪之
 所湊其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄

之邪然後補之是以諸方借已豆氣者蓋謂此也

牽牛丸

出危氏方

治膀胱有氣服暖藥攻成壅滯作痛

黑牽牛

錢三

大黃

錢二

白礬

錢一

右用已豆去皮三十粒先入銚炒焦乾去已豆入衆

藥炒香為末煨大蒜研細為丸茴香湯送下七丸

治男子腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成管因憂思愁
 慮失冷感寒疝氣攻痛有橫瘕豎瘕臍腹攻脹腰脚沉
 重不能舒伸服諸藥不效者宜速療之

右不用已豆將二味為末每服二錢食前温酒調下

一名抽刀散蔥白酒空心調服儒門事親

金鈴散出直指方治膀胱小腸氣外腎腫痛方見本門諸症類

治膀胱氣

以葫蘆已懷香子桃仁治膀胱氣甚效配合惟桃仁
麩炒各等分半以酒糊丸半為散每服五七十九空
心食前鹽湯下散以熱米飲調下與丸子相間空心
服日各一二服

治膀胱氣出本事方

青鹽一兩各為麤末白礬一兩各

右用小瓦罐子一隻入藥於內用麻皮縛緊鹽泥如
法堅牢固濟炭五斤煉令通紅盡炭為度取出入鹽
穴內去火毒二宿為末醋糊為丸如菜豆大每服十
丸空心鹽湯下或白湯亦可

金蓮散一名川棟散治膀胱氣痛

已豆三十粒去殼截斷川棟子二十四箇湯浸去皮薄切片

右用麩二合同炒令黃赤去麩與已豆只用川棟為末每服二錢温酒調空心服一方茴香湯下得泄為

效

余閱一切名方無如此方奇特有效

治膀胱氣急宜下氣

出肘後方

右用蕪荑搗和食鹽末二物等分以綿裹如棗大內

下部或即下惡汁并下氣佳

茴香飲

出朱氏集驗方

治膀胱偏墜疝氣

八角茴香

白牽牛

炒

右二味各等分為細末空心酒調下

去斗丸 治膀胱腎腫

局方紅丸

連翹丸

青木香丸

各一貼

右用斑猫二十一箇同藥用磁銚慢火炒令斑猫黃黑色連藥傾在地上去火毒一伏時去斑猫却將藥於袋中置去斑猫屑分作十服空心酒吞服不飲酒或鹽湯下其病雖大如斗亦安

香附子丸

出經良方

治膀胱氣腫痛

香附子

去毛淨洗用米醋煮乾為末醋糊為丸

用木饅頭一箇生薑一小片連皮搗爛同炒入鹽少許將水一大盞煎兩三沸去滓嚥下二十九

治膀胱氣痛

用檳榔二枚一生一熟搗末酒煎服之

療膀胱氣急宜下氣

用高麗昆布一片白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令香熟擘長三寸濶四五寸仍取葱白一莖二

寸切斷擘之令昆布極爛仍下鹽酢豉披摻調和如臃法不鹹酸以生薑橘皮椒末等和宜食粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大效無所忌

蕪金丸

出危氏得效方

治熱入膀胱臍腹上下蕪脇肋疼痛便

燥欲飲水按之痛者

大黃

濕紙裹煨八分

硝石

桂心

甘草

桃仁

四十箇去皮尖

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五七丸至十九米飲下婦人血閉疼痛亦宜服之

茴香酒

出朱氏集驗方

治膀胱偏墜久不愈者

右用燈籠草根渾酒却將茴香炒碾用此酒調下

治膀胱氣痛方

出朱氏集驗方

歙縣尉宋蒲甫膀胱氣作痛不可忍醫者以剛劑與之痛愈甚洩溺不通三日許學士診其脈曰投熱藥太過適有五苓散一兩分作三服各用連鬚葱一莖茴香及鹽少許水一盞半煎七分連服之中夜下小便如黑豆汁一二升臍下寬得睡明日脈已平續用

硃砂丸數服而愈此疾往來皆因腎虛聖惠云腎氣虛風冷所侵流入於腎不能宣散而然也卵脹腸癰難治獨氣癰治之易愈又有寒疝之氣注八癰中名曰狐疝亦屬癰病嚴氏云四癰治法摘核丸主之漫錄於後

黑牽牛

四兩半生用

白朮

半兩

茴香

半兩

澤瀉

二錢

海金沙

二錢

巴戟

半兩

川棟子

半兩

南木香

四錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十七丸薑酢

汁下空心服

治一切丈夫元陽虧弱膀胱小腸虛冷不時氣痛忽衝

心脇疼痛難忍宜服此藥出護命方

益智子去皮淨 蓬莪茂各半兩 茴香 牛膝 山茱萸

牽牛炒熟 續斷 甘草 川芎 菊蘆巴 防風各一

分

右細杵羅為末每服三錢水一盞二分煎兩三沸空心
和滓喫熱湯調下二錢七亦得

腎氣附論

夫腎氣內虛邪熱內入於腎經其脈洪大小便頻數所
出澁少赤濁而痛此不可以牽牛行之治法瞿麥燈心
煎湯調真料五苓散滲泄其邪熱水竇一通勿藥有喜

方

蔥白散出直指方 治腎氣刺痛七氣通用

當歸 川芎 枳殼製 官桂 青皮 川白薑

茴香炒 川棟子 陳皮 紫蘇 三稜煨 蓬朮醋浸

焙一宿白芍藥 茯苓 木香各一兩 人參 沉香

甘草炙各半兩

右為麤末每服三錢 白二寸鹽少許煎服大便秘

加大黃

治腎氣奔豚氣

川山甲半兩 麩炒 木香 海藻焙 茴香各一兩 全蝎十五箇去

稍毒土狗子十箇去翅 頭瓦焙乾 黑牽牛頭末 四兩 香附子去皮 破故

紙麩炒各半兩 吳茱萸一兩 半

右用蘿蔔一箇大者剉去心肉入吳茱萸在內用糯

米一碗同蘿蔔煮熟飯爛為度次將蘿蔔細切入米

飯搗細茱萸晒乾同前藥為細末用前藥與蘿蔔為

丸如梧桐子大每服二十九丸加至三十九丸鹽酒送下

食前服

金鈴子丸出和劑方 治腎氣發動牽引疼痛臍腹弦急攻衝

不定

金鈴子去核炒 四兩 益智仁 葫蘆巴 石菖蒲 破

故紙炒 茴香 已戟去心各二兩 木香 白茯苓去皮 陳

皮去白各一兩

右為末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十九鹽湯溫酒下一用米飲下

治腎氣

半夏 牽牛 舶上茴香 猪苓 木通炒猪苓去木通

不用 蘿蔔子炒牽牛去蘿 石薜茄炒茴香去石 糯米

炒去硃砂不用 硃砂三錢炒糯米 班猫三十箇炒半夏色黃去班

猫不用

右為末酒糊丸如桐子大每服二十九至三十九鹽湯酒送下

金山老艾瓜丸出直指方 治腎氣攻刺及脚氣酸痛通用皆

得效

葫蘆巴慢火炒 牛膝酒浸 舶上茴香酒浸 肉蓯蓉酒浸

焙川續斷 杜仲去麤皮薑製 天麻各二兩 當歸

酒浸沒藥 別研各一兩

右為末以艾去枝梗二兩大木瓜二枚切蓋去穰入艾塞滿蓋定竹針插麻線繫蒸爛研細和藥為丸如梧桐子大每服七十九溫酒鹽湯任下

通氣丸 少陰不足腎氣微少忽為寒折太陽下陷人中腎氣奔迫內動三焦或發熱頭疼咳嗽痰促或右脇牽痛或傳為疹子等證不一其脈左盡沉而弦按之則虛大而澁又治上氣

葫蘆巴炒 杜仲炒斷絲 補骨脂一錢 玄參 三稜各五

羌活 茴香各三錢 川棟子一兩半 麻黃去節二錢 春夏

右為細末麩糊為丸空心薑湯下五七十九或鹽湯下

代灸膏

木香 附子 吳茱萸 蛇床子 馬蘭花各等分

右為細末薑搗熟麩攤開貼痛處

梔子散出直指方 治腎氣虛中有熱小腹外腎肛門俱熱大

小便不通

梔子仁製 枳殼各半兩 北梗 北前胡 青木香

赤茯苓 車前子 甘草各一分

右剉每三錢新汲水煎服壯熱加柴胡大便秘加大黃

柴胡桂枝湯出直指方 治腎氣冷熱不調證

柴胡一兩三錢 人參 桂枝 白芍藥 生薑各半兩

夏黃苓 甘草各三錢

右剉散每服四錢棗一枚水一大盞煎七分溫服

海藻丸 治腎氣

海藻四兩 三稜六兩 茴香九兩 牽牛一兩二錢炒

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服三四十九丸溫鹽水下

青城丸出和劑方 治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛

如折起坐艱難俛仰不利轉側不能或因勞役過度傷於腎經或處卑濕地氣傷腰或墜墮傷損或風寒客搏

或氣滯不散皆令腰痛腰間似有物重墜起坐艱辛悉能治之一方加川續斷桃仁去皮尖玄胡索黑牽牛炒酌量入熟蜜丸亦可服虛極十補湯吞下

胡桃

去皮膜二十箇

蒜

熬膏四兩

破故紙

酒浸炒八兩一方芝麻同炒去芝麻取末

杜仲

去皮薑汁浸炒十六兩

右為末蒜膏為丸每服三十九空心溫酒下婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脈烏髭鬚益顏色一方不用蒜一方或加炒生薑十兩

治木腎

乳香

沒藥

地蟾

虻青

去翅足

有種木腎要知原乳沒將研各二錢 虻青地蟾

二錢半 去翅為末亦同前 共作二十有五粒

能飲酒者飲三傳 空心細嚼一丸下 便如脫俗

做神仙

治腎氣橫豎弦柱痛及外腎腫脹

川椒

二兩

小茴香

生薑

連皮紙包煨各二兩

八角茴香

一箇

右作一服用井水一碗河水一碗無灰酒一碗同煎
至一碗露一夜分為三盞再溫每日空心一服作三
日喫如服畢以手摩臍下覺熱為驗

甘豆湯

出直指方

治腎氣虛中有熱大小便不通

黑豆

三合

甘草

二錢

薑

七片

右作一劑新水煎取清汁服

三仙散

出本事方

治腎氣

蓬莪茂

一兩

茴香

二兩

阿魏

三錢真者

右為末每服二錢溫酒調下

治腎氣衝心

用五苓散一貼去官桂加茴香一撮作一服水二盞
鹽一捻蔥白一根煎七分不拘時服

海浮石散

出直指方

治腎氣熱證小便秘澀黃赤

用海浮石為末每服二錢煎麥門冬赤茯苓湯調下
五苓散

生車前子 竹園萸 赤茯苓 麥門冬 去心 澄心

烏梅

右煎湯調下治腎氣小便不通兼治水結不散暑證

通用

苦楝丸

出三因方

治肝腎氣虛風冷相搏心腹絞痛攻刺腰

背不能禁受流注因氣腫癢疼痛久服養腎活血駐顏

輕身耐老更進飲食

川棟子

十箇剉碎分三處一用已豆二十粒去皮微炒焦黑色去已豆不用又用班猫七箇

炒焦去班猫不用又用海金沙七錢半同炒去海金沙不用

茴香炒破故紙炒

葫蘆巴

炒

木香

炮各一兩

烏藥

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三五十九湯酒任

下

金鈴子丸

出存仁方

治釣腎氣膀胱偏墜痛不可忍

川棟子

五兩剉五分一分用班猫一箇去頭翅炒去班猫一分用茴香三錢鹽半錢炒熱去

鹽留茴香入藥一分用牽牛三錢同炒去牽牛一分用破故紙三錢同炒留破故紙入藥一分用蘿

茴子一錢同炒去蘿茴子不用

右將棟子去核同破故紙茴香焙乾為末酒糊為丸

如梧桐子大每服三十九温酒空心下小腸膀胱腫硬香附子海藻煎湯調下

治腎氣偏墜

伏道艾葉 防風 駱駝糞 蔥子 韭子

右為細末用瓦桶去底安地上內用盤子盛灰以前藥末如裝香篆細細排滿盤內以火燒着却坐於瓦桶上合烟上熏陰囊候烟透徹其囊偏墜即滿補驗腰子散 治腎氣作痛

黑牽牛炒熟 白牽牛炒熟 等分

右為末每服用三錢猪腰一副薄切開縫入川椒五十粒茴香一百粒以牽牛末徧摻入腰中線繫濕紙數重裏煨香熟出火氣燈後空腹嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下惡物即愈

腎氣方

用大七氣湯加炒牽牛煎服

又方

用生薑每多開小孔納以川椒濕紙煨透老酒嚙下
治心痛霍亂腎氣腹腫

用檀香濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處

奪命丹

吳茱萸

半斤分作四分酒醋小便米
泔四處浸三宿取出晒乾

右藥為末加海帶海藻海螵蛸澤瀉等四味同為末
酒糊為丸如梧桐子大每服二三十丸食前酒送下

雄黃丸 治腎氣大便不通酌量輕重

以溫白丸用枳殼散下

白羊肉湯 益腎氣強陽道

用白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑食之三日一
度甚妙

椒附散 治腎氣上攻項背不能轉移

大附子

一枚六錢以上者
炮去皮臍末之

右每服二大錢好川椒二十粒用白麩填滿水一盞
半生薑七片同煎七分去椒入鹽通口空心服本草

方云腎氣自腰夾脊上曹谿穴然後入泥丸宮曹谿穴非精於般運者不能透今逆至此不得通用椒以引歸經則安矣蕭上達椒下達時言椒聊且貽我握椒皆此意也

治卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦宜理小腸氣

用懷香子生搥莖葉汁一合投熱酒一鍾服之

通神丸 治腎氣偏墜疝氣腫痛水流不止兼腎癱此

藥去敗膿勻和下消膜腫脹

大桃仁 二百箇去皮尖研以童子小便一盞半石器文武火熬成膏刮出 真阿魏

三分 乾蝎 十箇全者去毒 真麝香 半錢

右三味研末以桃仁和丸如梧桐子大空心酒下二

丸日進二服

增損腎氣丸 填補止渴泗洲楊吉老傳

乾地黄 二兩 薯蕷 已上各四兩 茯苓 牡丹皮

附子 炮去皮臍 桂心 去皮已上各一兩 山茱萸 五兩

右為細末蜜和為丸如梧桐子大每服十九丸温酒送

下空心食前服

治丈夫腎氣疼痛不可勝忍悶絕欲死諸般氣藥不可
救療緣此氣候胃膈有涎以此投藥不驗但寸關脈氣
覺似洪大却沉伏俱是有涎宜服此方

延胡索 官桂 鼈甲醋炙 檳榔 川芎 半夏

狼毒搥碎醋二碗同羌花土器內煮乾炒黃黑色 木香各一分 羌花 牽

牛各一兩 吳茱萸三錢 當歸 牛膝 大黃醋煮各一分 羌

活半兩

右件藥爛研羌花狼毒二味為末牽牛半夏二味自
作一處杵羅為末所餘衆藥合作一處杵羅為末每

服六錢半羌花狼毒末半錢牽牛半夏末三錢衆藥
末三錢合為一服以水一盞二分生薑二片蔥二枝

瓦鍋內煎兩沸急瀉出和滓空心熱服吐出膠涎即
安若未吐連進服尚未吐即轉下膠痰便得安效若

喫藥了已吐膠涎即便喫後方藥

治丈夫腎氣喫前面方藥取涎出後便宜服此方令安

效

荆三稜

殭蠶

去絲

連翹

羌活

當歸

沉香

延胡索

桑寄生

木香

川芎

各等分

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎兩沸瀉出不拘

時服

治一切丈夫腎氣婦人血氣疼痛不可勝忍面青唇黑
幾於不救大夫則攻擊臟腑腰背拳曲婦人則腹中成
塊結為癥瘕忽驟熱疼痛便至危困忽經年累月痛無

暫停並宜服此此藥神驗不可具述

芫花

四兩

沒藥

麒麟竭

延胡索

蓬莪茂

荆

三稜

牽牛

醋炙焙乾

木香

各半兩

當歸

芍藥

各二兩

狼

毒

半兩槌碎同芫花於土器內醋炒黃微黑色

右先修製芫花狼毒麒麟竭沒藥等末滾令均更爛研

藥亦作一處研如飛塵所餘眾藥共作一處杵羅為

末方將芫花狼毒麒麟竭沒藥等末滾令均更爛研

千百遍每服一錢半氣痛時葱酒調下和滓喫不通

飽食後喫也若是大腑秘熱出後不通唇皮焦赤口中涎溢喫此藥一盞不見效驗自別有方乃上卷中第一方是也

治腎氣受邪相刑於心心既受病先診其腎脈其病證若是腎邪干心即宜先喫此退腎邪散辰戌年六丙年多有此候心有冷病先喫此方

草薢 牛膝 茯苓 石斛 續斷 天靈蓋酥炙
各半 羌活 獨活 木香 川芎各一分

已上細杵羅為末以小便少許化麝香三銖對蜜同煉丸如梧桐子大空心鹽湯下三十九

三仙丹出醫學切問 安和腎氣進美飲食壯陽事

川烏半兩炒 蒼朮三兩米泔水浸 茴香一兩 山藥一兩 金鈴子四兩
去皮 草薢五錢 青鹽 破故紙一兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九溫酒送乾物壓之此藥行四方不伏水土山嵐瘴氣去風濕避寒暑進飲食厚腸胃令人肥長有精神治渾身走

注痛和血脈治積冷去寒疝氣小腸疼添精補髓血
 駐顏壯筋骨身輕體健明目暖水臟行如風語如鐘
 百病不生黑髮鬢此藥延年益壽無干妄方得如持
 長陽之事不可相傳如獨居無婦陽氣豪旺不可當
 如說修真煉性道氣吞靈淫戰行除此藥休言矣大
 有利益所說功效不可具述

玉抱肚温暖丹田薰蒸腎囊藹如春意大有功效

出德生堂

方經驗

川烏 川椒 小茴香 破故紙 葫蘆巴 官

桂 良薑 馬蘭花 白芷 甘松 乾薑 吳

茱萸 川棟子 海藻 青木香 乳香 沒藥

各半 好艾 四兩碾末先鋪在裏肚上後用藥末

右細末用細絹做夾裏肚一腰前檐覆過臍腹下斜
 尖如匾稍棣覆護陰囊別作稍尾以帶抄住於後不
 礙小淨手遇大淨手取下後檐上覆腰與腎堂不及
 腎上裏肚前後檐各鋪綿用前藥末勻摻入綿微洒

以水薄皮紙蓋上綿綴定住翻綿在內如入綿衣縫

纜常用拴裏腰腹護囊使藥氣熏沁功用至神

治丈夫腎氣 方見本門 治腎氣類

育腸氣 附論

夫腎者內藏於精精舍於志與膀胱為表裏俱主於水液其氣貫於小腸而通於陰陽不調臟腑衰損將攝乘失腎氣虛微為邪冷之氣所侵傳注小腸則令小腸連陰疼痛故號育腸氣也

方

葶澄茄散 出聖 惠方 治育腸氣小腹疼痛不可忍

葶澄茄 檳榔 木香 苦梗子 懷香子 硃

砂 細研八 乾蝎 微炒 阿魏 麩裏煨麩 熟為度 吳茱萸 湯浸七 遍焙乾

微炒各 桃仁 三分湯浸去皮尖 雙仁麩炒微黃

右搗羅為末每服不拘時候以熟生薑湯調下二錢

磁石丸 出聖 惠方 治育腸氣久患不瘥

磁石 一兩炒醋淬七遍搗 碎細研水飛過用 硃砂 一兩 木香 一兩 乾蝎 微炒

白礬灰 自然銅 細研 阿魏 研八各 陽起石 三分酒

細研水 飛過 銀末 半

右先研硃砂以醋調塗於銅葉上以新盆蓋七日刮

取綠細研諸藥別搗羅為末同研令勻用醋煮麩糊

和丸如菜豆大每服食前以生薑湯下十九

八仙丸 出聖 惠方 治育腸氣

桃仁 湯浸去皮尖雙 木香 高良薑 剉 青橘皮 湯

去白穰焙 阿魏 麩裏煨麩 脘肭臍 酒刷炙微 桂心 各三分

半 乾蝎 一分 兩 微炒

右搗羅為末用醋浸蒸餅和丸如梧桐子大每服食

前以熱酒下二十九

桃仁丸 出聖 惠方 治育腸氣疼痛不可忍

桃仁 湯浸去皮尖雙 木香 各三 阿魏 麩裏煨 乾蝎 熟為度

微炒 苦楝子 桂心 芫花 醋拌炒黃 檳榔 一

右搗羅為末以醋浸蒸餅和丸如梧桐子大每服不

計時候以熱生薑酒下十九

蚘螂丸 治育腸氣發歇疼痛不可忍

蚘螂 補骨脂各一兩 藿香子 木香 阿魏 馬

蘭花 苦棟子各半兩 桃仁二兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為末以桃仁膏和搜為丸如梧桐子大每服不計

時候以熱酒下十九

沉香散 治育腸氣疼痛

沉香 葫蘆巴 肉豆蔻去殼 桂心 藿香子各半兩

檳榔 木香各二分

右搗羅細為散每服不計時候以溫酒調下二錢

綠雲丹 治育腸氣疼痛手足逆冷

硃砂一兩 硫黃 雄黃 蚘螂 阿魏 青鹽各半兩

右藥同研令勻細入釀醋調令稠塗於銅鑪裏合於淨地上四畔以泥密封經五日後刮取藥細研以醋煮麩糊和丸如粟米大每服不計時候以熱生薑酒

下五丸

藿香散 治育腸氣小腹連陰疼痛

藁香子 苦棟子 炒微黃 檳榔 各一兩 木香 青橘皮

湯浸去白穢 焙各半兩

右為散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎五分和滓不計時候熱服

木香丸 治陰痛

木香 苦棟子 蓬莪茂 藁香子 桂心 各一兩

右為末用生漆和先以生油塗手丸如梧桐子大陰乾每服不計時候以熱酒下十九

阿魏丸 治腎氣

阿魏 硃砂 用酒一大壺與阿魏同熬成膏 苦棟子 炒微黃 附子 炮製

去皮臍 各一兩 木香 三分

右為末入硃砂膏和丸如梧桐子大每服不計時候以熱生薑酒下十九

硃砂丸 治腹痛

硃砂 二兩研為末以醋煎稠塗於多年銅照子上 檳榔 木香 藁香

子 各一兩 沒藥 半兩

右為末入硃砂研令勻以糯米飯和丸如豆大每服不計時候以熱生薑酒下七丸

苦楝子丸 治陰腫

馬蔞花 以磁器內炒令微黃 芫花 醋淬微炒 葫蘆巴 苦楝

子 各半兩

右為末以醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下十丸

硃砂丸 治陰虛

硃砂 一兩 雄黃

右藥同研如粉入頭醋調令稀稠得所青銅錢一百文洗刷令淨後以鹽水煮過揩令乾於淨地上以炭火燒令赤以醋灑過更燒如此三遍淨掃却浮灰鋪錢燒處以雞翎塗藥在錢上取新瓦盆子蓋周迴以濕土壅縫更以水洒週迴常令濕潤如此七日後取出以鋼刀刮下細研同醋煮麩糊和丸如菜豆大每服不計時候以熱生薑酒下十丸

諸癩附論

夫陰癩者由腎氣虛為風冷所侵流入腎經不能宣散故也癩有四種有腸癩有卵癩有氣癩有水癩腸癩卵癩難瘥氣癩水癩針灸易愈也

方

蒺藜丸 治陰癩

蒺藜子

乾地黄

各十分 鹿茸

各十分 白欬

各十分 磁石

十分

研 礬石

煉十分

鐵精

桂心

續斷

各五分

已戟天

芍藥 玄參 通草 升麻 牛膝 寄生 射

干

海藻

如髮者各八分

澤瀉

七分 茯苓

右為末以蜜和為丸如梧桐子大米飲下十九日二漸增至二三十丸忌食生蔥蕪荑生血等物

黃耆丸 治陰癩核腫疼痛

黃耆

二兩 白蒺藜

五兩 微炒去刺

山茱萸

五加皮

檳榔

各二兩 桃仁

湯浸去皮尖雙

海藻

洗去

玄參

各二兩

五

味子

四兩

肉蓯蓉

酒浸一宿刮去皺皮炙乾

牛膝

去苗 赤茯苓

枳殼 麩炒微黃去穰 人參 去蘆頭 續斷 桂心 遠志

去心各一兩 石南 一兩 龍骨 二兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服於

空心及晚食前溫酒下三十九一方無五加皮亦治

陰疝氣攻腫脹

茱萸內消丸 出和劑方 治陰癩偏大上攻臍腹疼痛膚囊腫

脹疝氣為病由腎氣膀胱經虛為邪所襲伏留不去結

成寒疝陰囊偏墜氣刺奔豚疝瘕時發疼痛初發心必

先寒壯熱甚者嘔逆惡心或生瘡瘍時出黃水腰腿沉重足脛腫滿行步艱辛服之內消不動腑臟

大腹皮 川棟 三兩 桂心 五味子 海藻 洗 玄

胡索 各二兩半 茴香 炒 枳實 麩炒 川烏 炮去皮 吳茱萸 一方

青皮 白蒺藜 各二兩 桔梗 橘紅 桃仁 麩炒

木香 一兩 石茱萸 山茱萸 此二茱萸用帶

線縫酒煮乾取出培乾為末各二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服溫酒下三十九木

香流氣飲兼服效一方無白蒺藜枳實橘紅一方有

馬蘭花山藥

白蒺藜丸 出聖 惠方 治陰癩腫大

白蒺藜 微炒 去刺 熟地黄 乾 鹿茸 去毛 塗酥 炙微黃 白欵 各二兩半

磁石 三兩 燒醋淬七遍 細研水飛過 鐵精 細研 桂心 續斷 各一兩 巴

戟 赤芍藥 玄參 木通 海藻 洗去 鹹味 牛膝 去苗

桑寄生 澤瀉 肉蓯蓉 浸一宿 刮去 穢皮 炙乾 各二兩 射干 一兩

半

右藥同研令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每於空心及晚食前温酒下三十丸

治癩丸 出十金方 治陰癩腫大

桃仁 蜘蛛 各五枚 桂心 蒺藜子 地膚子 澤

瀉 防風 五味子 橘皮 茯苓 防葵 芍

藥 各二兩 牡丹皮 細辛 海藻 各一兩 狐陰 一具

右為末蜜和丸如梧桐子大每服十九丸稍加至三十

丸

桃仁丸 出聖惠方 治陰癩腫痛

桃仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 海藻 洗去鹹味各二兩 澤瀉 防風

去蘆頭 防葵 桂心 赤芍藥 青橘皮 湯浸去白穰焙 五

味子 白蒺藜 微炒去刺 地膚子 赤茯苓 細辛

牡丹 各一兩 孤陰 一具炙微黃

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每日空

心及晚食前溫酒下三十九

治陰癩偏大 出聖惠方

白蒺藜 微炒去刺 鹿茸 去毛塗酥炙微黃 白欬 磁石 燒醋淬七遍搗

碎細研水飛過 肉蓯蓉 酒浸一宿刮去皺皮炙乾各二兩 鐵精 細研 桂心

木通 剉 牛膝 去苗 玄參 桑寄生 澤瀉 各半兩 熟乾

地黃 一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食前溫酒下三

十九

橘核丸 出存仁方 治四腫癩病卵核腫脹偏有大小或堅硬

如石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時

出黃水甚則成癰潰爛

橘核炒 海藻洗 昆布洗 海帶洗 川棟肉取肉炒 桃仁

去皮夫炒 厚朴薑炙 木通 枳實炒 玄胡索 桂心

各二兩 木香各半兩 火不見

右為末酒糊丸如梧桐子大每服六十九丸空心鹽湯

酒任下虛寒者加川烏一兩腎腫久不消加硃砂二

錢醋煮旋入有熱帶氣者加黑牽牛大黃各半兩

孤陰丸出聖惠方 治腎氣陰癰腰膝冷痛陰囊腫瘡

狐陰一具炙 木香 白蒺藜微炙 昆布洗去 脛肭洗去

臍酒刷 檳榔各一 石斛去根 桃仁湯浸去皮炙雙

炙黃 牛膝去苗 兔絲子酒浸三日曝別

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如菜豆粒大每於食

前溫酒下二十九至三十九日再服忌熱麪蕎麥猪

魚粘食等物

大戟丸一名麝香 治陰癰腫脹或小腸氣痛出三

大戟去皮剉炒 葫蘆巴四兩 木香一兩 附子炮去皮

舶上茴香

六兩

訶子

煨去核

檳榔

各一兩

川棟

五兩研後入

麝

香半錢別研

右為末獨留川棟以好酒一二升蔥白七枚長四寸

煮川棟子軟去皮核取肉和上件藥丸如梧桐子大

空心溫酒下五七丸至十九薑湯亦得潮發疼痛炒

薑熟酒下十五丸

天雄散

出聖惠方

治癩大便腫痛

天雄

四顆炮製去皮臍

桃仁

半斤湯浸去皮尖雙仁研

川棟子

三十枚

蒟

蘆巴

五兩

胡椒

乾蝎

微炒各一兩

海藻

二兩洗去鹹味

藁香子

三兩

右用酒二斗於銀器內盛日煎二七日曝乾搗細羅

為散入桃仁研令勻每於食前溫酒下二錢

七珍散

出上方

近陳拙存有此證乃小腹赤光而微疼痛

和與此藥服之無效反有所害五苓散加黑牽牛炒茴

香共七味白水同煎服之不愈再與塌氣丸服之

塌氣丸

出上方

治大便腫疼

右黑牽牛分作三分一分用礪砂同炒一分用破故紙同炒一分用剛子同炒各去同炒三味止用牽牛為末糊丸如菉豆大每服七十九空心紫蘇湯下拙存服此二藥其疾愈甚連小腹皆脹滿以此知不可用瀉腎也故錄此以戒將來云

療起躍舉重卒得陰癩

出聖惠方

白朮

五分

地膚子

十分

桂心

一分

右搗末以飲服一匕圭日三忌生蔥桃李雀肉等物

一方溫酒調下

三白散

出和劑方

治膀胱蘊熱風濕相乘陰癩腫脹大小便

不利

白牽牛

畧炒二兩

白朮

半兩

桑白皮

陳皮

木通

各半兩

右為末每服二錢鹽湯調下空心服初進一服未覺再進此藥不損臟氣只導利留滯疝方大率多用熱藥此方唯壅熱證宜服之昔時人患陰囊腫脹累嘗試之有驗愚謂此藥以為瀉腎藥太過爾

抵聖丸

出三因方

治膀胱有熱多因天氣熱而發陰癩腫滿

赤痛大便秘欲飲水按之臍腹痛

續隨子 薏苡仁 郁李子 茵芋 白牽牛各一

錢畧炒

右為末滴水丸如梧桐子大五丸一方用香薑散嚥

黃昏服五更利下惡物效

治腎虛陰癩腰膝冷疼陰囊腫瘡

出聖惠方

孤陰一具炙 海藻洗去鹹味 牡丹各半 桂心三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食前溫酒下十五丸小兒服五丸

治癩卵偏大有氣上下脹痛或行走便發腫

黃蘗剉 牡丹 桂心 防風去蘆頭

右為末每服於食前溫酒下二錢

荔枝散

出危氏方

治腎大如斗不過數劑除根

舶上茴香 青皮 荔枝核

右等分剉散炒出火毒為末酒下二錢日三服

蜘蛛散

一名蜘蛛丸 出三因方

治陰狐癩氣偏有大小時時上下

蜘蛛

十四箇 熬焦

桂心

半兩

右為末蜜丸如梧桐子大米飲下十九丸為散取八分

飲和服日再

治腎虛陰癩腰膝冷疼陰囊腫癢

出聖惠方

漢椒

一兩去目及閉口者微炒去汗

昆布

半兩洗去鹹味

右為末用好酒煮麩糊和丸如梧桐子大每於食前

冷椒湯下十九丸

治癩方

出千金方

用楊柳枝如脚趾大長三尺二十枚水煮令極熱以

故布及羶掩腫處取熱柳枝更互柱之如此取瘡

治陰癩

以取白頭翁根生者不限多少搥之隨徧腫處傳之

一宿當作瘡二十日愈

香附散

出三因方

治癩脹及小腸氣

用香附子不拘多少為末每用酒一盞煎海藻一錢

至半盞撈洗海藻細嚼用所煎酒調香附子末二錢
服一方以海藻為末以熱酒調用尤妙甚者灌之一
方熱酒下荆芥末

治癩卵偏腫痛

用昆布汁咽之一方酒煎服

治水癩偏大上下不定疼痛

以取牡蠣不限多少鹹泥固濟三升煨令火盡冷取
二兩乾薑二兩炮共為細末冷水調稀稠得所塗病

處小便少利即愈

牡丹散 療癩偏大氣脹不能動方

牡丹

桂心

一方作桂枝

防風

鐵精

豉

熬各等分

右為末搗篩酒和方寸服之小兒一刀圭二十日愈
嬰兒以乳汁和大豆許與之大效忌生蔥胡荽一方
以豉汁調下

一方 治病後交病勞復陰癩腫縮入腹絞痛或便不

通

用蚯蚓數條絞汁服之以滓傅囊外即愈

秘傳茱萸內消丸 治腎虛為邪所襲留伏作痛陰癩

偏大或生瘡出黃水

吳茱萸 半酒半醋浸 一宿焙乾 山茱萸 蒸去核 馬蔞花 醋浸 川

棟子 蒸去皮核 官桂 黑牽牛 炒去末 舶上茴香 用鹽炒 延

胡索 畧炒 橘皮 青皮 去白 海藻 浸洗去鹹 炒各一兩 桃仁 浸去皮炒

白蒺藜 炒去刺 木香 各半兩

右為細末酒麪稀糊丸如梧桐子大每服四十九食

前溫酒鹽湯任下

治陰卵瘻疾去熱風可作湯沐

用地膚子與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益

力

橘核丸 治四種癩病卵核腫脹偏有大小或堅硬如

石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時出

黃水甚則成癰潰爛

橘核 炒 海藻 洗 昆布 洗 海帶 洗 川棟子 取肉炒 桃仁

麩炒各厚朴去皮薑製

一兩

炒五錢

右為末酒糊為丸每服七十九空心溫酒鹽湯任下
虛寒甚者加炮川烏一兩腹久不消者加礪砂二錢
醋煮旋入

治癩氣初入陰囊疼痛腫起小腹兩畔相連腰膝處有

兩條絃急疼痛不可勝忍行動阻急於痛處絃上着灸
斷其根脈然後喫此藥大腑熱肩焦赤方可喫

荆芥穗

白蒺藜

去刺各半兩

連翹

羌活

木香

黃耆 防風 蔓荊子 獨活 芍藥 山梔

桑子各一

右細秤羅為末每二錢食後熱酒調下仍是空心喫

後方

荆三稜

白蒺藜

去刺一兩

延胡索

當歸

檳榔

官桂

木香

各半兩

半夏

芫花

牽牛

醋煮狼毒

好醋一椀同芫花於土器內炒令乾微黑色不要焦各四銖

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心熱湯下三十九

大腑冷
方可服

療癩方

右以桃仁搗碎之亦療婦人陰腫乾即易

治男子陰癩

以狸陰莖燒灰東流水服之

治陰卵癩疾

以地膚子作湯沐之

普濟方卷二百五十

總校官候補知府 臣葉佩蓀

校對官學錄 臣常循

謄錄監生 臣許昶