

醫方類聚卷之一百八十三

痔漏門二

和劑局方

痔漏風下血效風門



乳香圓治諸痔下血肛邊生肉或結核腫疼
或生瘡痒痛或大便艱難肛腸脫出又治腸
風下血無問新久及諸癭根在藏腑並能治
之

芫青

去頭足翅同糯米炒以米色
黃為度○醫方集成壹兩
枳殼去穢

炒大黃

蒸葦澄茄
集成已上
牝礪火鶴蝨

炒各半兩。乳香 研白丁香 各壹分

右為末以粟米糊為圓如梧桐子大每服

十圓至十五圓醫方大成集或南止經驗方袖珍方永類鈐方每二

十如治腸風臘茶清下諸痔煎薤白湯下

諸瘻煎鐵屑湯下並食前服衛生寶鑑同

釣腸圓治久新諸痔肛邊腫痛或生瘡痒時

有膿血又治腸風下血及肛門脫出並宜服

之

天南星 生白礬 枯綠礬 方大成各五兩 訶

子煨去白附子生用得効付子生去枳

殼去穢枳實生用雞冠花微炒

栝樓生用蛻皮兩介剉碎確胡桃仁十

及不油者確內燒存性壹十五兩

右為末以醋煮麪糊圓如梧桐子大每服

貳十圓大成三空心臨卧溫酒下醫方集

而經方大成同遠年不苦者服半日見効

糞久服永除根本小可腸風等疾壹貳年內

對者十服瘥永不發動

槐角圓治五種腸風瀉血糞前有血名外痔
 糞後有血名內痔大腸不收名脫肛谷道四
 面弩肉如胗名舉痔簡易方經驗良方鼠痔頭上有孔
 名瘻並皆治之

槐角 去枝梗炒壹兩 枳殼 去瓢炒 黃芩

歸 酒浸壹宿焙 防風 去蘆 地榆 各半斤 ○簡易方

良方已上五味各作兩

右為末酒糊圓如梧桐子大每服三十圓
 得効方五十九 米飲下不拘時 醫方大成集

南北經驗方 此藥治腸風瘡內有虫裏
 珍方作空心 急下膿血止痒痛消腫聚驅濕毒久服永
 除病源

腸風黑散治證與諸痢門腸風黑散同

荊芥 二兩燒 亂髮 壹兩燒 ○槐花 壹兩燒

大壹兩 槐角 壹兩燒 ○枳殼 去瓢二兩 甘

草 兩半 蝟皮 壹兩

右將合燒藥同入甕瓶內黃泥固濟燒存
 三分性出火氣同甘草枳殼搗羅為末每

服二錢水壹盞煎至七分空心溫服溫酒
調下亦得

神應黑丹治證并方

方諸痢門

大全本草

孫尚藥治腸風痔漏如聖散草薜細剉貫衆
逐葉擘下了去土等分搗羅爲末每服二
錢溫酒調下空心食前服

經驗方三峽州傳野雞痔病方用槐柳湯洗
便以艾炙其上七壯以知爲度王及郎中

充西川安撫判官乘驟入洛谷數日而痔
病因是大作如胡荻貫於腸頭其熱如燒
煨火至一驛僵仆無計有主郵者云須灸
卽差及命所使爲槐柳湯熱洗荻上因用
艾灸三五壯忽覺壹道熱氣盛入腸中因
大轉瀉鮮血穢物壹時出至楚痛瀉後遂
失胡荻所在

經驗方患五種痔山豆根水研服
圓經曰槐木上耳取末服方寸匕治大便血

及五痔脫肛等皆常用有殊效者
圓經曰浙中醫工取虎杖根洗去皺皮剉焙
搗篩蜜丸如赤豆陳米飲下治腸痔下血
甚佳

蝟皮穿山甲等分燒存性治痔入肉豆寇壹
半末之空肚熱米飲調二錢服

經驗方痔漏張用九犍牛兒膽蝟膽各壹箇
用膩粉五十文麝香二十文將蝟膽汁膩
粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九

日熟旋取爲丸如大麥用急脚送入瘡內
後追出惡物是驗瘡口漸合生麪蓋瘡內
膏逼出惡物

日華子云野猪生腸風瀉血灸食不過十頓
孟詵云狸骨主痔病作羹臠食之不與酒同
食其頭燒作灰和酒服二錢以主痔之
千金翼治漏方以臘月猪脂紙沾取內瘡孔
中五日五夜三

外臺祕要治痔取駱駝頰下毛燒作灰取半

鷄子大以酒和服之

藥性論鷹頭燒灰和米飲服之治五痔

外臺必要療痔鱧魚腸三具炙令香以絲裹

內穀道中壹食頃以當出魚腸數易之盡

二枚差

外臺祕要虫已食下部肛盡腸穿者取長股

蝦蟆青背者壹枚鷄骨一分燒為灰合吹

下部令深入支云數用大驗

蟻螻燒作末服之主痔病

乘閑方治瀉多時脫肛疼痛黑聖散木蜘蛛

壹箇瓠葉重裹線繫足合子內燒令黑色

存性取出細研入黃丹少許同研凡有上

件疾即先用白礬葱椒煎湯洗浴拭乾後

將藥末摻在軟處帛上將手掌按托入收

之妙

葛氏治腸痔大腸常血杵桃葉壹斛蒸之內

小口器中以下部榻上生蟲自出

孫真人云糞所有血令人面色黃石榴皮杵

末茄子枝煎湯下
圖經曰紫堇草主大小人脫肛每天冷及喫
冷食卽暴痢不止肛則下脫久療不差者
春間收紫堇花二斤暴乾擣爲散加磁毛
末七兩相和研令細塗肛上內入旣內了
卽使人喫冷水於面上卽吸入腸中每日
壹塗藥喫而不過六七度卽差又以熱酒
半升和散壹方寸匕空腹服之且再漸加
至二方寸匕以知爲度若五歲已下小兒

卽以半杏子許散和酒令服之亦作忌生
冷陳倉米等

三因方

脫肛證治

肛門爲肺下口主大腸肺臟實則熱熱則肛
門閉塞腑虛則大腸寒寒則肛門脫出又婦
人產蓐用力過多及小兒叫呼及久利後皆
使肛門滯出
香荆散治肛門脫出大人小兒悉主之

香附子得効方壹兩荆芥穗各等分○得

右為末每用三匙水壹大碗壽或中片衛

人梳煎十散沸淋醫方大成集成或南北

又方用五倍子為末每三錢小二碗煎減半

承通鈔方入白礬壹塊安小桶子內洗之

煎梳半珍方壽域神方生易簡方同

鐵粉散治脫肛歷年不愈鐵粉研細每用少

許摻之按令入即愈

又方用木賊不以多少燒存性

右為細末摻肛門上按之得効方醫方大

驗方神方衛生易簡方同○直指方木賊

散治脫肛不熱木賊燒存性為末摻以帛

按入

五痔證治

五灰散治五痔不問內外牡牝寒溫勞濕悉

主之

驚甲治牡蝟皮治牝猪左起懸蹄甲治腸

蜂房治脉蛇蛻治氣痔各等分

右燒存性隨證倍壹分爲末并花水調二

錢空心臨卧時壹服澹寮方醫方大成集

方承類○直指方五痔散治諸痔不問冷

熟內外鱉甲醋浸蝟皮剉碎猪甲剉碎蜂

房炒各蛇皮壹條燒並右爲末入麝少許

每服壹錢半食前米飲調下

熏法蝟皮方三指熏黃藥大何○得熟艾子

右爲末用甌器以灰實壹半如燒香法安

長桶內坐其上得法方莫薰之烟氣從口

出爲佳凡三度薰永差勿犯風冷忌雞肉

毒物

洗法海桐皮剉蛇床子各壹香南藤剉葱白

切各

右用水壹斗入藥五兩煎減半去滓候溫

著手輕輕洗以絹拭乾壹法止用槐白皮

煎湯淋潔最佳

貼藥蜀葵子半蟬蛻五檳榔壹介並

右用棗三枚取肉研細搜和藥末如覺硬
滴少蜜研成膏量大小貼於病處

腸風

烏連湯治脉痔下血不止量冷熱加減法

黃連

去烏頭炮去皮尖各等分

右為到散每服二錢水壹盞半煎七分去

滓空心服熱則加黃連冷加烏頭

酒連凡治酒痔下血伏暑久治不效

黃連

不以多少燎去鬚酒浸銀器中重湯煮漉出曬乾添酒煮七次止

右為末以餘酒為丸如梧子大每服五十
凡米湯下

加味四君子湯治五痔下血面色萎黃心忪

耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味

人參 茯苓 白朮 甘草 黃芪 木白

扁豆

蒸各等分

右為末每服二錢匕湯點服此方人未之

信服者頗効所謂看不上手面自有奇功

荆芥散治麻痔下血

荆芥穗 槐花 炒焦各一兩 石菖蒲 一兩

右為末米飲調下二錢食前服日二服

白玉丹治久年腸痔下血服百藥不效者

疑水石 不以多少煨和研細水飛再入煨窩中煨

右糯米糊丸如梧子大陳米飲下五十粒

只壹服愈 得効方同

又方單服白梅亦効

衛生十全方

治脫肛大腸下不收用綠桑螺燒存性為末

以猪脂和傅之立愈螺似蝸牛雨後綠桑

樹者佳

治腸風下血

黃牛角心 煨留性 藕節 一分 破熱干大

右二味細末和勻每服三錢食前陳米飲

調下三服効

治便膿血

烏梅 一兩 火煨去核研為末

每服二錢 空良方 米飲調下効

治熱毒下血取生葛根汁并藕節汁等分和

服即止

治大便後有血

荆芥穗

二兩

黃耆

去蘆當歸

槐角子

炒各一兩

根兩半

右同為細末陳米粉糊為丸如梧子大每

服二三十圓食前飯湯吞下

治腸風下血

黃連

九節肥大者

吳茱萸

四兩

酒洗

右貳味同炒令黃連兩頭紫色去茱萸不

用只留五七粒同黃連碾為細末將陳米

壹合炒黃研為粉打糊為元如梧子大每

服四五丸食前陳米飲下立効須忌濕

麵猪肉雞鴨冷水之類並此

治諸痔有効

龜角刺

生用

蝟皮

槐角子

炒

常歸

各等分

取中

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服叁十

粒食前米飲吞下式飲餅干大餅餅卷十

傅痔神膏

槐皮陳槐花各陸錢切練實各陸錢切當歸各陸錢切甘草中

白芷各參錢木鼈子各參錢赤小豆半合

右用猪脂五兩煎候白芷赤黃色絲濾停

冷毛羽刪傅宜煎刺未了立故飛忌熱

治諸痔神效無餘痔比雖愈天收餅干人講

地骨皮須自採真者乳香好者壹錢別研麝香真者

青錢別研

右同為細末每服二錢米飲調下兼用傅

痔上

治痔疾神効

穿山甲肆兩不蛀皂角子壹斤肥猪肉貳兩

細切

右叁件用砂瓶盛以文武火煨煙盡為度

取出為末用烏梅肉為丸如梧桐子大每

服叁十元外留藥末壹半為散子無灰酒

調二錢吞下圓子三服有效

神巧萬全方

諸痔方

治五痔下血不止衆治無效露蜂房凡方

露蜂房

微炙

槐實

黃耆

各兩半

石楠

貫

衆

微炙大川烏

炮去皮

黃礬

火煨

亂髮灰

枳

殼

麩炒黃去瓢

烏蛇

三兩酒浸去皮

骨酥塗

黃

蝟皮

膏枚燒灰

右件爲末煉蜜杵丸如梧桐子大每服三

十九煎桑枝湯下空腹及晚食前服

治痔疾下部痒痛肛邊生肉結如鼠乳腫硬

疼痛宜槲白皮膏塗

槲白皮

五兩

赤小豆

五合

白芷

甘草

木鼈人

各二兩

槐子

練子

當歸

各三兩

右件細剉以猪膏壹斤半以慢火煎候白

芷黃赤色篩濾去滓取滓塗摩痔上

治痔肛邊生鼠乳及大腸疼痛坐臥不得鼈

甲丸方

鼈甲

去裙鬲肉用

附子

炮

赤石脂

烏蛇

酒浸去皮骨炙黃耆去白麩當歸

桂心微炙槐子微炒蝟皮炙令焦黃檳榔

川大黃剉炒已上麝香半兩皂莢十挺不

浸去皮

右為末煉蜜和丸梧桐子大空心食前以

溫粥飲下三十丸

治痔疾生瘡腫痛下血不止地黃丸方

生乾地黃去刺各黃耆三兩兔絲

子酒浸一宿別枳殼去白麩檳榔各一兩烏

蛇酒浸去皮骨用

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸食

前以溫粥飲下

治氣痔脫肛腸胃久冷腹脇虛脹不思飲食

木香散

木香易浸去皮陳橘皮浸

白厚朴去皮薑汁塗肉豆蔻去殼赤石脂各

兩大附子炮三分皂莢壹兩去皮子

右件為末每服二錢以粥飲下食前服

治酒痔大腸中久積熱每下血疼痛葛花散方

葛花 赤小豆花 黃耆 生乾地黄

各一兩 白欬 赤芍藥 黃芩 當歸

兩焙 分 微炒 各三

右件搗羅為末每服二錢煎槐子人湯調

下食前服

治酒痔風熱壅滯大腸下血疼痛宜服黃耆

丸

黃耆 蝟皮 葛根 檳榔 大麻人

已上各 烏蛇 西浸去皮 枳殼 法曬炒白

蒺藜 炒去刺 川大黃 微炒各 皂莢 丁人 半兩

右為末煉蜜和勻丸如梧桐子大每服三

十丸煎桑白皮湯下食前服

治痔疾有頭數年不差宜用此方

鱧魚頭 黃木香 粉脚 白糝 煨令枯

兩 砒霜 研入 麝香 研入 猪牙皂莢 三分炙

右件搗羅為末鎔黃蠟和丸如蓮子實大

用絲裏膏丸內下部中覺腹內欲轉但且忍之待忍不及即上盆子當下惡物每日用之以痔頭消為度

治痔肛邊牛結核發寒熱疼痛不止蛇脫散

蛇脫皮燒天燒蝟皮炙令炙豬後懸蹄甲炙焦各

丹參炙露蜂房炙鼈甲醋炙當歸微炒木香

各三分

右為末每服二錢煎黃耆湯下食前服

治腸風積年不寧羸弱至甚宜服此丸淋人

黃耆子豈升海去浮生薑半斤搗熟乾地

黃耆半斤者後即量之

右噉乾黃耆子杵羅為末與薑汁相和銀

正鍋中以無灰好酒二升泐文武火煎如稍

減即旋添酒都約五升已來熬如餒即止

服次以地黃末相和丸如梧桐子大食前

以溫粥飲下十九

又用槐柳湯洗痔上更以艾灸七壯出傳信

方昔王及即中充西川安撫判官入駱谷

痔疾大炸主郵者傳此法灸七壯覺壹道
又熱氣入腸中因大轉瀉鮮血非常有穢甚
痛楚遂愈

助道方

治男子婦人五痔方
五痔皆因腸痔生忽然疼痛不能懔全蝎三
箇燒香餅礮內煙熏必去根
痔疾之病皆因腸間癖結其證有伍若有
斯證但用全蝎三箇香餅壹個大礮壹個

先盛灰壹半後燒香餅紅并全蝎入在內
又燒煙薰痔此方百發百中其效果然頗異
是齋醫方

合腸風痔漏

脫肛

治腸風下血荆芥散

荆芥穗 悉縮砂仁

右等分爲細末每服三大錢用糯末飲調

治下不拘時候日進三服

治下血遠年不差地榆湯

地榆

洗焙乾刮 卷柄 不去根淨洗

右等分每用壹兩水壹盃以砂瓶子煮數十沸通口服不拘時候大匙以蒜末煨
治腸風葛丞相方椽斗子不以多少用白梅肉以蜜拌和填在椽斗子內候滿兩箇相合鐵線扎定烈火煨存性為細末米飲調

又方

朱解元成言傳其兄子雲知丞與渠及陸子楫提刑皆服之數十年之疾更不得

作右淡豆豉不以多少研令極細人剝淨

大蒜逐旋同研候可元為度元如梧桐子

大遇發時絕早空心用陳米飲先下五寸

元午時再服壹百元以上病安而止可以永

絕根本無所忌廬州彭知錄大辯亦云此

藥甚妙其方所用大蒜先蒸九次然後和

入藥仍以冷薑水送下病止即輟藥

治腸風昌原長老法壹傳平江黃倅維則方

同鷹爪黃連吳茱萸等分新瓦上同炒候

菜萸香熟黑色為度去菜萸不用將黃連

為細末空心溫酒調下二三錢米飲亦得

又方張德明傳胡孫薑不以多少燒存性碾為末

米飲調下或酒下大蒜或蒸山太熱氣味

治臟毒下血久遠不差者鄒珣父運楨方用

大蒜膏枚上面切開作蓋子每膏瓣中插

帶殼巴豆壹粒却蓋了將濕紙三兩重裹

文武灰灰中煨令香熟去巴豆不用將蒜

爛研和九節黃連細末得所為元如梧桐

子大每服貳十元米飲吞下空心服

又方烏梅肉生乾地黃等分煉蜜元如梧桐

子大每服五七元米飲下不拘時候

又方用茶藨蕝葉燒成黑灰研羅極細入麝

香少許空心糯米飲調下

又方五倍子不以多少以鯽魚壹枚約重四

五兩者去腸胃鱗腮以藥置魚腹中入臍

餅以火煨微欲煙盡取出為細末溫酒調

天下萬物本無形公欲識水韻茶同賦不

又方黃連木香等分爲細末臈茶同調下

治腸風親曾見壹婦人服之立效右蜜灸蘿

蔔任意食之

治瀉血

百藥煎

壹兩半兩煨成炭
半兩生用研細

右合和軟飯元如桐子大每服三十元米

飲送下

治下血如猪肝片煎四順飲于下駐車元僧

保俊患此壹服而愈

治下血久不差

地榆

淨洗去
鬚蘆

右搗羅爲細末以糯米糊爲元如小豆大

每服三十元米飲下日進三服

治腸風張德俊監稅傳云是張魏公香白芷

爲細末米飲調下

泊宅編云痔腸風臟毒壹體病也極難得藥

亦緣所以致疾不同雖良藥若非對病個

難膏藥取效常人酒色飲食不節臟腑不

類身身身

三

真身身身

三

血是謂風毒若釋子輩患此多因飲食欠坐體氣不舒而得之乃脾毒也玉渙之知舒州下血不止郡人朝議大夫陳宜父令隨四時取其方栢葉如春取東枝夏取南枝之類燒灰調二服而愈予得方後官贛上以治訛車吳令昇亦卽效堤點司屬官陳逸大夫偶來問疾吳俸告以用陳公之方而安陳君蹙頰曰先人也仍須用側栢尤佳道場慧禪師曰若釋子恐難用此不

若灼艾最妙平立量脊骨與臍平處椎上灸七壯或年深更於椎骨兩傍各壹寸灸如上數無不除根者又予外兄劉向爲嚴椽予過之留飲訝其瘦瘠問之荅曰去歲臟毒作凡半月自分必死得壹藥服之至今無苦問何藥不肯言再三叩始云只這卓子上有之乃是乾柿燒灰飲下貳服本草云日柿治腸僻解熱毒消宿血後有病者宜以求之素問腸僻爲痔曾茂昭通判

之子年十餘歲時嘗苦此凡治腸風藥如地榆之類遍服無効因閱書見此方用之壹服而愈是乾柿燒灰者曾與余合肥同官親說云余不詳書再三思故云只此治酒毒下血多至升斗者盧州郭醫云趙俊臣帥合肥日其婿司馬機宜患此服四物湯每料加炒焦槐花貳兩如常法煎服必止久之不復作効於壹全官處得此方遂安獮猪肚壹枚洗淨入去鬚土了淨黃連

四兩以酒醋各貳升半文武火煮候乾控出將猪肚并黃連壹處研杵極爛元如梧桐子大每服五十元米飲湯下

治下血漢陽章教授傳葱鬚新瓦上炒乾爲細末每服三二錢米飲調下其妙治腸風久而下膿血日數十度者枳實三百元

枳實

槐花

生用各半兩

皂角

刺

壹兩半生用半燒存性

右同搗羅爲細末煉蜜爲元如梧桐子大

約可得三百元每服三十元食前米飲下
酒亦得甚者壹料即安刻字人毛文傳
治腸風張尚書方

牛乾地黄酒浸熟乾地黄酒浸五味子

右等分爲細末煉蜜爲元每服五七十元
酒或湯下

又方梁路分云渠曾告此疾五十四日更十
七藥不效服此壹服而愈云因心氣下血
人可服不用妙香散酒調下

又方石天民編修說濃煎黃連湯下連翹元
或紅元子

又方山賾俗呼爲鼻涕團并肉核燒灰米飲
調下

王嗣康爲蔡昭先處厚朴煎治積年下血韓
縣尉名楚卿傳云乃尊左藏服之作効

厚朴五兩用生薑五兩同擣開白木一大

麥蘖神麴二味各一兩

右爲細末白水麵糊爲元如梧桐子大疾

作空心米飲下壹百元平時三五元嗣
康云腸胃本無血緣氣虛腸薄自榮衛滲
入令用厚朴厚腸胃神麴麥蘖消酒食白
朮導水血自不作也嗣康繼先之父承類
同鈐方

治五種腸風下血糞前有血名外痔糞後有
血名內痔大腸名脫肛穀道四邊有努肉如
乳頭名鼠妳痔有穴腸出血名漏並皆治之
黃牛角鯁一枚白蛇蛻一條蝟皮一兩猪牙皂

角七穿山甲一片鱗七

石並剉碎入砂瓶內以塩泥烟霞聖效封

固候乾先少著火燒令烟出後用大火煨
令通赤為度取出攤冷為末先以胡桃壹

介分四分膏分臨附時細研如糊酒聖効

研如泥調下便睡先引出虫至五更時壹

服次日辰時壹服並三錢藥末久患者不

過三服即効

治酒毒便血經年不差者

橡斗子一兩 槐花一兩二味 白礬一分

右為細末每服二錢温酒調下

治腸風升甫姪曾服有效

魏桑葉燒存性

黑灰

右每服二錢米飲調下更量虛實甚虛人

恐動臟腑

治腸風張上舍傳名阜煎婦人產藥黑神散

調消風散甚妙

治酒毒腸風下血水軍王統領存

大田螺

五介洗淨仰頸火上燒以殼白肉乾為度

右碾為細末只作壹服熱酒調下

洗痔天寧義老

野苧根壹斤 橡斗子壹斤

右共搗碎用水壹斗煮及七分乘熱以盆

盛先薰患處候湯冷熱得所通手洗之冷

天則止藥汁可留煖用三五次甚妙

治外痔如神丹石散魏丞相方

黃丹壹斤 滑石壹斤

右等分爲細末用新汲水調塗日三五上
治痔宋檢法博古傳出本草蝟皮燒灰酒調服之
又方謝表之路分傳

木槿花

右不拘多少採時不得用手以竹筋就窠
子摘以細篾串眼在風頭令乾每用時以
水煎沸數滾用盆盛先以氣噓候通手洗
之甚妙

烏玉丹治腸風痔漏錢文子云傅子葵久病

此任和卿傳方數服而愈

椶櫚二兩亂頭髮二兩皂角二兩雷丸一兩芝麻

一若練根二兩蝟皮四兩牛角鯁三兩制乳

香半兩豬蹄甲後脚者四十九麝香半兩

右除乳麝外用藏瓶或砂合盛以塩泥固

濟周回用火煨烟盡存性不可太過便去

大經驗秘入乳麝再研細用酒打糊元如

梧桐子大空心食前用胡桃洒下二三

元楊氏方名椶櫚元添不虫皂角一兩半

餘同浙東提舉司局方加槐角四兩燒灰
存性槥藤子一兩二錢半炒苦練根減壹
半牛角鯁用四兩猪蹄甲只用二十五個
麝只用二錢芝麻乳麝雷丸苦練根槥藤
子不燒外餘藥各燒灰存性不用藏瓶每
服五十粒京芥茶或温酒米飲任下其賣
頗售

治痔霄川膏醫家賣此藥甚神驗沉仁父司
理傳石赤雄雞壹隻用籠罩餓三日令腹

空移就別處切精猪肉餵之收其糞入甘
鍋子煨通紅存性入腦麝少許瘡乾用生
麻油輕粉調傅濕即乾摻蘇韜光家方用
烏雄雞仍須眼足俱黑者又腦麝外更用
乳香少許赤烏三色更當以問醫者

治痔

蓮子十四草芽茶十四乳香看上一二藥多
少隨意入

右三味一處擣了以紙裹煨透先以黃連
湯洗患處然後以藥生貼之蘇韜光傳于

癰疽疔毒

卷之三

呂子厚右司云病此累年用之立効
 余庚戌除夕痔作時守官合肥難得醫者取
 官局釣腸元一伯二十粒分爲二服熱酒
 併服之中夜腹間微痛下少結糞且起已
 安治證具載本方所以作效速者以服多
 故尔
 洗痔禹錫姪得効方名
 木鱉子木鱉散百藥煎
 右等分爲麤末每服一掬布裏煎湯以桶

盛之蓋上穴一竅先以藥氣薰蒸候通手
 洗之嘗有一婦人患痔已成漏瘡脫肛用
 此而愈

治外痔葱青內刮取涎對停入蜜調勻先以
 木鱉子煎湯薰洗然後傅藥其冷如冰得効
方永類唐仲舉云嘗有一吏人苦此渠族
 弟親合與之早飯前傅午後以榜子來謝
 拜於庭下疾已安矣
 治痔漢陽章教授傳百藥煎碾爲細末每服

三錢煮稀白粥攪勻食之立愈糊元米飲湯下亦得

又方鴨脚草俗呼為耳環草又名碧蟬兒花用手擲軟納患處即愈

又方合肥陳學論行之說名應渠親取效川山甲自尾根盡處數除三鱗不川取第四第五第六鱗橫三行燒存性為末用麝香少許臙茶壹匙同調空心服以澄下濃却傳其瘡處其冷如冰即不痛無不取效

治腸風痔漏神丹錢總領館客輔漢卿傳名

廣

刺蝟皮壹分制鐵器中皂角刺半兩燒存性硫

黃膏臙研○得猪牙皂角半兩去黑皮塗蜜炙白礬

半兩枳殼碎炒黃耆半兩蜜炙附子半兩除去皮

白鷄冠花子壹兩

在為細末酒煮糊為元如梧桐子大每服七元至十元空心食前溫酒下不飲酒用米飲送下久年漏痔服至三四十日肉滿

平安諸痔服之即自消外痔川藥十元同
朱砂細碾蜜調塗之常服永除根本若服
藥覺熱加白雞冠花子壹兩半或貳兩更
加三五元服之臟腑自調勻也

治脫肛馬錫姪

得方名
槐花散

槐花 槐角

右貳味等分炒香黃為細末用羊血蘸藥
灸熱食之以酒送下或云以猪曠去皮蘸

藥灸服

醫方大成集成南北經
驗方衛生易簡方同

瓊碎錄自愈錄本出藥中采川章

治腸風方以香白芷為末米飲調下經驗良方同

又方用銀杏煨熟出火氣每貳箇用薄荷煎

末壹元細嚼米飲下事林廣記同

治腸風臟毒用桃核壹箇燒灰煙末盡研為

末以酒調下

治痔漏用海水煎湯熏洗如無入搗煎亦得

又方善益菜治痔尤佳冰爛研末

又方用冰片腦子頭青碾為細末麻油調傅

又燒枳殼煎枳殼服枳殼為上藥事林廣燒記同者熏煎者洗服者用米飲調之

又方男子婦人通用俱以河水令人洗洗了用腦子和摩風骨塗之

又方用魚腥草其狀三角壹邊青壹邊紅山中多有之取壹握許煎湯熱熏通手洗仍

又以草濕痔即愈然其葉若荇菜多生佛殿陰處以指撚臭與魚腥等也

呪痔誦痔經必自愈經本出釋藏中丞相章

子厚垂為家訓至今子孫用之有驗如誦者當至誠則可

簡易方

未病方水調散治多酒腸風及瀉鮮血

老山梔子

不拘多少去皮研細如油出成團即摩開猛火焙乾手擦細羅

取末磁器盛貯

右末臨發時新汲水調服又治酒毒便

血血濺用麩壹塊濕紙煨碾細空心米飲

木調二錢曾有人使血致危一服而止

本事方槐花散治腸風臟毒

槐花炒栢葉爛杵荆芥穗焙枳殼各等分

右細末清米飲調下二錢空心食前服

又治五痔脫肛浙西搃司方用五倍子不

拘多少為末水四五碗堯瓶盛慢火煎乘

熱重洗名獨行虎散却川海鯁消為細末

塗肛門上名白金散

本事方黃耆圓治久年腸風痔漏

黃耆蜜炙枳殼炒葳靈仙各二兩生熟地黃

續斷炒北礬枯槐角子炮附子炮乾姜炮

連翹炒當歸炒各半兩

右為細末煉蜜圓如梧子大米飲下三十

圓

本事方椿皮圓巢氏病源論腸癖為痔久因

飽食過度房室勞損血氣流溢滲入大腸衝

發於下時便清血腹中刺痛病名脉痔脾

毒腸風本緣衛虛弱風氣進襲因熱乘之使

血氣流散積熱壅遏血滲腸間故大便下血

蒼朮

浸

枳殼

煨炒各二兩

臭椿花

刮去粗皮

焙乾四兩

右為細末醋糊圓如梧子大空心食前米

飲下三十圓

本事方玉屑圓治腸風瀉血久不止

寒食麩

三兩

葳靈仙

一兩

天南星

經浸良方

半

夏

各半兩並生用

○良方姜製

椿根白皮

四兩

槐根白皮

去粗皮

良方

苦練皮

去皮各三兩

三兩

味於九

月後二月前收軟者日

乾用

良方

苦練根四兩

右為末滴水圓如梧子大候乾每服三十

圓水八分盞煎沸下圓子煮令浮以匙抄

取溫湯送下不嚼空心服頃年有人下

血幾盈盆頓爾疲乏諸藥皆不効予曰此

正腸風令服玉屑圓三服即止予苦此疾

三十年蓄下血藥方五十餘品其間或驗

或否或始驗而久不應者或初不驗棄之

再服有驗者未易立談大抵此疾形證不

同對病則易愈如下清血色鮮者腸風也

血濁而色黯者臟毒也肛門射如血線者

蟲痔也亦有膏種下部虛陽氣不升血隨
 氣而降者仲景云脉弦而大弦則為減大
 則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此
 名為革婦人則半產漏下男子則亡血失
 精此下部虛而下血者也若得革脉却宜
 服溫補藥蟲痔宜熏千金方用蝟皮艾者
 伴予嘗用頗得力

本事方蒜連圓治臟毒

醫方大成此
下云下血

鷹爪黃連

為末

獨頭蒜

壹顆煨香熟研
和入白治身熱

右為圓如梧子大每三十圓

嚴氏濟生方
三四十元

陳米飲下

大成每四十一元空心陳米飲下
醫方集成南北經驗方袖珍方

承類鈴方
與大成同

○經驗良方治腸風臟毒黃連

壹兩為
細末

獨頭蒜

五枚煨
香熟

右用蒜爛研和黃

連末丸如梧桐子大每服三十九陳米飲

下

究原方治痔疾下血等證

去之香最出宜川

淡豉

十文
重

大蒜

二枚煨剝去
皮同搗細

右為圓如梧子大每二十圓煎香菜湯下

不拘時候 血遇熱而行故止血多用涼藥然亦有中寒氣虛陰陽不相守血乃妄行者經所謂陽虛陰必走之者是也宜用溫辛藥如乾姜官桂之類中溫則血自歸經也吐瀉痢皆有此證當知之

直指方

一腸風證治

敗毒散不換金正氣散 方並見諸寒門

地榆散治腸風熱證下血

地榆 黃連 茜根 黃芩 伏神 各半兩

梔子仁 豈分

右麤末每服叁錢薤白五寸同煎服又藥

皮湯 方見世瓜 黃連 方見世瓜 阿膠 方見世瓜

酒蒸黃連圓 方見世瓜 黃連 方見世瓜 阿膠 方見世瓜 伏

苓伏神煎湯下治諸下血腹痛痛卽是血

不多服爲佳

附子理中湯 方見諸寒門 理中湯 方見世瓜 內加木

香治虛冷腸風瀉痢

芎歸湯 方見血病門 熱證加伏苓 槐花 冷證加伏

苓木香 方見血病門 熱證加伏苓 槐花 冷證加伏

小烏沉湯

香附 許去皮毛焙貳兩 天合烏藥 去心壹兩 甘草 炒壹

右為末每壹錢 煆點服 得効方空心 枳殼 湯點服

散正方不用加藥 參苓白朮散 方並見諸虛門 四

君子湯 方見黃疸門 四件夾和薑棗煎服治諸

下血

烏荆圓治腸風下血諸風抽掣

川烏頭 壹兩炮 荆芥穗 貳兩

右為末醋麵糊圓如桐子大每服貳十圓

枳殼散下 ○宣明論治腸風痔疾大腸悶

澁川烏頭 二兩 荆芥穗 肆兩 右為末醋麩糊

為丸每服貳參十丸如桐子大溫水下日

三服

不換金正氣散加川芎當歸同煎吞白圓子

方見身體門 治腸風及便血妙

四君子湯加製白扁豆黃耆治腸風五痔下

血痿黃乏力

猪臟圓治大人小兒大便下血日久多食易
 不飢腹不痛裏不急名曰野雞先用海螺蛸
 炙黃去皮取白者為末以木賊草煎湯調
 下服之三以後用淨黃連貳兩剉碎嫩猪
 臟貳尺去肥以黃連塞滿猪臟繫兩頭煮
 十分爛研細添糕糊圓如桐子大每服叁
 五十圓米飲下
 橄欖散治腸風臟毒久不止橄欖核於燈燭

上燒存性研為末每服貳錢用陳米飲食
 前調下

蒜連圓膏名金屑萬應丸治腸風臟毒
方見血病

法製香附方并黑散子治腸風臟毒
方見血病

棕蘭頭髮以皂角水洗刺蝟皮槐角

三牛角鯁肆兩已上生油麻雷圓各

兩苦練根壹兩乳香兩麝香貳錢猪蹄甲肆拾

九箇 榼藤炒香壹兩壹分

右為末酒麴糊圓桐子大每服五十圓食前米飲下

腸風黑散治腸風下血腹痛

敗棕頭髮 木饅頭 木賊各燒存性 槐角

炒枳殼製各壹分 甘草炒烏梅肉 炒各半分

右為末每服貳錢陳米飲乘熱調下

木賊散治腸風下血

木賊去節炒壹兩 木饅頭炒 枳殼製 槐角炒伏

苓 荆芥各半兩

右為末每貳錢濃煎棗湯調下

槐角圓治腸風瀉血脫肛

槐角一兩 防風 地榆 當歸 枳殼製木

賊 伏神各半兩

右末酒麴糊圓桐子大每服三十圓米飲下

真人養臟湯方見泄瀉門 加生槐花治腸風冷熱

不調下血

黑聖散治腸風臟毒痔瘻及諸下血

當歸 川芎 伏苓 地榆 槐花焙敗

棕 艾葉燒存性 百草霜

右件等分爲末每服貳錢食前陳米飲調下

鯽魚方治腸風血痔及下痢膿血大活鯽魚

壹箇不去鱗肚下穿壹孔去其腸穢入透

明白礬壹塊如金橘大以敗棕皮重包外

用厚紙裹先煨令香熟去紙於慰斗內燒

帶生存性爲末每服壹錢空心溫米飲調下

震靈丹方見泄瀉門 玉華白丹方見諸痢門 治臟腑虛

損大腸不收久作腸風下血二藥夾川煎

不換金正氣散加川芎空心嚥下

黃竜圓治傷酒臟毒及暑瀉熱瀉黃連淨八

兩用酒壹大升煮乾研細水麩糊爲圓如

桐子大每服肆五十圓陳米飲湯下

消風散治腸風米飲調下吞烏荆圓酒蒸黃

連圓隨意 方見諸風門

腸風久血方

吳茱萸 淨半兩湯七次炒過 黃連 去鬚七錢

右為末陳米糊圓桐子大每服五十圓陳

米飲下食前服

又方茅花 敗荷葉 敗棕 各半兩 香附 淨

壹兩少鹽和一牛炒焦一半略炒

右為末食前米飲調下貳錢

腸風方

香附 一兩 枳殼 分 當歸 分 川芎 各半兩 槐花

炒甘草一分

右為羅末每服叁錢新水壹盞半薑棗煎

食前服

諸痔證治

清心湯素問云諸痛癢瘡皆屬於心心主血熱諸痔受病之源也此藥止之

黃連 兩 伏神 去微赤伏苓各半兩

右為末煉蜜圓如桐子大每服壹百圓食

俞米飲下患痔只是喫白米稀粥疏其腸

胃方類鈔

黃連阿膠圓治諸痔解熱調血方見咳用枳

殼散送下方見諸或黑煎湯不解寒熱

先用此

追風青判散治諸痔蘊熱腫痛大便不通加

枳殼煎方見脚卷錢漆木壹盞半薑掛煎

清涼飲治諸痔熱證大便秘結

當歸赤芍藥甘草木黃米上蒸

石為鹿朮每服貳錢新水煎服方類鈔

聖圓子諸痔通用

槿藤重一兩者叁猪牙皂角貳兩蝟皮

一箇炙大皂莢刺貳兩燒各沒藥別槐角

令焦麝少

右為末酒麵稀糊圓桐子火每服叁十圓

枳殼散送下

雞峯烏金散治痔漏

穿山甲刺蝟皮黃牛角心各碎猪牙

皂角 槐子 皂莢刺 枳殼 貫衆

阿膠 各等分 再夾和 牛角 蝟皮 山甲 同炒 黑

右為末每服壹錢半用胡桃肉研爛併調酒食前服大腸有熱荆芥泡湯調下漏血不止當歸煎湯調下

蝟皮圓治諸痔出血裏急疼痛

槐花 炒 艾葉 炒 枳殼 製 地榆 當歸 川芎

芎 黃耆 白芍藥 白礬 煨 貫衆 各半

蝟皮 一兩 焦 頭髮 燒 叁錢 各存性 猪後蹄垂甲 拾枚 焦

盈尺皂角 豈錠去法 核醋炙黃

右為細末煉蜜圓桐子大每服五十圓食前米飲下

收痔圓諸痔通用

透明阿膠 炒 黃連 淨 貫衆 各半 盈尺皂角

去弦核 蝟皮 炙 蜂房 炒 蛇皮 略 皂角刺 略

穿山甲 插入熱火 灰中令焦 猪後蹄垂甲 燒已上 各存性 當歸

川芎 槐花 並用貳錢半

右為末米醋煮麵糊圓桐子大每服七十

圓調氣用枳殼散下消血熱荆芥煎湯下
食前服

蠟絲圓治諸痔諸癰惡瘡便毒明白礬煨為

末鎔蠟圓桐子大每服七圓溫熱水下

鈐方

猪甲散治諸痔

猪後蹄垂甲不拘多少
燒存性

右為末陳米飲調貳錢空心服

青蛙圓治諸痔

青色蛙長脚者取壹
箇燒存性

右為末雪糕圓桐子大每服十五圓空心

先喫飯貳匙次以胡桃肉切細煎湯調枳

殼散送下若產婦發痔裏急作疼用黑豆

壹伯粒陳米壹合夾煎湯下亦先喫飯貳

匙

穿山甲散治痔肛邊生鼠乳或成瘡痛

穿山甲橫取後段尾根盡鱉甲半兩酒
處一兩炙焦存性麝

半錢
細研

右為末每服壹錢半用蠟茶半匙夾和沸湯調下防風煎湯調亦得留澤傅痔永魚

空同又方單用穿山甲鼠耳海狗

地榆散治痔生瘡腫痛

地榆 黃耆 枳殼 檳榔 赤芍藥 槐花 羌活 白欽豆

芩 赤芍藥 槐花 羌活 各半 白欽豆

蜂房 甘草 壹分

右剉每服叁錢新水煎服

皂刺圓治痔痛而復癢

皂刺 防風 槐花 蛇床

白礬 白蒺藜 枳殼 羌活 各半 蜂

房 焦 五倍子 各壹分

右為末醋調菜豆粉為糊圓如小豆大每

服五十圓以苦練根煎湯下仍用童子熟

葱尿入白礬末澆洗肛門

皂角煎圓治內痔腸頭裏面生核寒熱往來

滿尺皂角 刺蝟皮 白礬

兩 豬後垂蹄甲 桃仁 川芎

北梗 甘草 蘆炒焦各半兩 薏苡 白芷各一分

右為末煉蜜圓桐子大每五十圓桑白皮

煎湯下仍以藩籬草根煎湯熏洗

芎歸圓治痔下血不止

川芎 當歸 黃耆 神麩炒 地榆 槐

花微炒各半兩 阿膠炒 荆芥穗 木賊 頭髮

燒存性 各十分

右末煉蜜圓桐子大每服五十圓食前米

飲下

乾葛湯治酒痔得効方

白乾葛 枳殼炒 半夏製 伏苓 生乾地

黃 杏仁各半兩 黃芩 甘草各壹分

右剉碎每服三錢黑豆百粒薑五片白梅

壹箇煎服承類鈔方同

橘皮湯治氣痔

橘皮 枳殼炒 川芎 槐花炒各半兩 檳榔

木香 桃仁浸去皮炒 紫蘇莖葉 香附 甘

草各貳錢半

右劉每叁錢薑棗煎服水類鈴方同得效

三片紅棗
二枚煎服

代赭石間治痔變為瘻膿血不止

煨醋磁石煮米醋屯沸白礬煨牡

礪灰龍骨研蝟皮炙皂莢刺燒猪後蹄

垂甲燒各存性赤石脂川椒煨木賊煨蜂房

煨

右件等分細末神麩糊圓小豆大每服五十圓食前艾并生薑煎湯下漏血處以熟

艾揉和血竭塞日三換

荆枳湯治氣滯發痔

荆芥穗枳殼炒槐花白香附四紫蘇莖

葉甘草炙等

右為末每服貳錢米湯調下末

芎歸湯力身血加茯苓槐花微炒治產婦諸

痔方

傅痔方治腸口熱腫朴消貳錢鵬砂半錢末

之乾摻承類鈴

又大黃滑石等分末之并水調傳方同

又朴消五倍子等末傳之方同

止血方明血竭末之傳

通用方猪後蹄垂甲燒灰傳方同

方鴨嘴青騰攀煨無煨字為末用清蜜調

筆傳可以消脫

又雞子壹箇煮熟去黃取白切焙明攀煨自

歛各壹錢同末傳有孔用紙捻燻人

熏洗方槐花荆芥枳殼艾葉小煎入白礬熏

洗末入煎礬少并味煎隨口準煎

又木鱉七枚取仁研出礬末貳錢少水煎熏

兩三次

又藩籬草根煎湯先熏後洗藩籬花似小芙

蓉

又蝟皮三指許艾葉壹團如燒香法置長桶

中坐熏三次凡痔發於肛內者須用熏洗

若腸口腫熱朴消末新汲水調常常淋之

治諸痔方凡痔皆因酒麪炙煨蓄熱傷血惡

血結聚於下焦不得疏通於是下墜而爲痔患痔之人下部留蓄血熱多致大小便不通小腹結急纔得壹通又復閉塞且有漱水之證此下焦留蓄血熱明矣其下焦蓄血亦以尺脉洪盛見之合用逐瘀湯主治須得大小便通快患處卽以明白礬泡湯溫洗仍以葱湯再沃次用桐殼灰穿山甲尾閭灸焦地膽去翅足秫米炒各壹分爲細末入膽礬少許研和酒調以筆蘸傅

少頃痛來以葱湯沃去準壹時許前藥又增些膽礬若痛又以葱湯沃之又等壹時藥中又增些膽礬並加前法壹日三次用前藥其膽礬又以漸加多於第壹日矣後日三次用前藥其膽礬又以漸加多於第壹日矣痛則沃之以葱湯三日以還更不用藥只是明礬泡湯與白湯相間淋洗日三四次十餘日自然成痂如柿乾之狀無膽礬以緣礬代之

逐瘀湯通利大小便收下黑物

川芎 白芷 生乾地黃 赤芍藥 五

靈脂 枳殼 阿膠 蓬莪朮 伏苓

伏神 木通 生甘草 實大黃 桃

仁 各溫去皮焙藥共無禁火以油炒 仁各膏分半

右剉散每叁錢井水壹椀薑叁片蜜叁匙

煎服以利為度瘀血作痛通用

治痔五聖丹

雄黃 葉子雌黃 朴消 緣礬 明白

礬各半兩

右件各別礮碎以銀窩壹入雄黃貳入雌

黃參入朴消肆入緣礬五入白礬圓瓦片

蓋定炭火煨壹日夜看青烟出盡有紅烟

上方好候冷取出紙襯頓地上用盆蓋出

火毒壹日夜入乳香沒藥末各壹錢同研

極細每抄壹匙煎甘草湯調傅外用鷄羽

掃藥末蓋之日貳次夜壹次自然乾硬而

脫逐日須用葱白煎湯入朴消溫洗軟帛

拭乾然後傅藥

治痔猪膽膏猪膽七枚各取汁以建盞盛

炭火熬成膏用單紙攤傅須先用槐根取

白皮煎湯溫洗然後傅藥

薰痔方五倍子日乾如燒香法置長桶內坐

燻患處自然收縮

治痔方紫金皮新水煎食前服

又方白芷末用米飲調食前服

又方赤蜈蚣焙乾為末入腦以津唾調傅青

紗上貼或朴消末摻亦得

又方五倍子焙黃剉碎每用壹兩井水叁大

椀煎乘熱熏洗拭乾爛石膏燒紅椀覆地

出毒細末傅

脫肛證治

蝟皮散治肛門脫出不收

蝟皮

一箇罐內燒令焦黃存性

磁石

半兩法醋煎數沸

粹桂

三錢

鱉頭

一枚慢火炙令焦黃

右細末每服貳錢食前米飲調下仍以破

草鞋底灸上面熨按令入

鼈頭散治脫肛

驚頭 慢火灸 焦黃

右為末塗傅腸頭用軟紙襯輕輕按入仍
以方寸匕食前米飲調下

磁石散治脫肛

磁石 半兩 醋中凡七次

右為末每服壹錢空心米飲調下

香荆散治脫肛

大香附 荆芥穗 各半 縮砂 貳錢

右末每服叁錢食前新水煎數沸即服小

兒通用

釣腸圓治大腸虛冷脫肛不收及腸風諸痔

白礬 枯 綠礬 枯 訶子 煨 枳殼 去瓢 白附

子 生 南星 生 半夏 生 附子 去皮

一 黃瓜 薑 一箇 蠟皮 一箇 雞冠

花 剉炒 胡桃仁 七箇 不用油者

右細末醋煮麩糊圓桐子大每服貳十圓

空心溫酒下或積殼散送下

縮砂湯治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂黃連木賊

右末每貳錢米飲調下

黃連阿膠圓方見咳治腸虛為暑熱所攻脫

肛紅腫肛門熱痛仍以荆芥穗朴消泡湯

溫洗次用薄荷煎鵬砂圓津液調傅

蒲黃膏治脫肛熱痛生蒲黃以猪膏和傅即

按入

桑螺膏治脫肛

桑槁上緣桑螺子燒存性

右末以猪膏和塗兩後緣桑者佳

椽斗膏治脫肛椽斗子燒存性猪脂和傅

獨虎散治脫肛不收五倍子半兩末井水叁

椀入磁瓶內慢火煎半續入朴消荆芥穗

各壹錢乘熱熏洗仍以五倍子末傅之

石灰方治大腸積冷久年脫肛石灰炒熱以

帛包裹肛坐其上冷又別換仍以海螵蛸

未傳

朱氏集驗方

不腸風

枳殼湯治遠年近日腸風下血

枳殼不拘多少燒成黑灰存性羊脛灰為末

右枳殼末五錢羊脛灰末三錢和勻用濃

米飲壹中盞調下空心服五更初壹服如

人行五里再服見效

又方以殼半斤麴炒去糠絲黃芪半斤洗

右為末無時常湯調貳錢若難服以麵糊為丸湯吞下三五丸即愈

芍藥丸治酒毒下血

芍藥炒白雞冠花炒陳槐花

右等分取青蒿根汁煮丸米飲下

黃連丸治腸風下血

黃連常吳茱萸血

右各等分同炒令紫色不得過黑去茱萸

只以黃連壹味軟飯丸如梧桐子大空心

米飲下三五十九日二服更以胃風湯煎

如法吞下同法令紫色不替越其法菜煎

如聖散治腸風下血等疾衛生易簡方治痔漏

草薺細貫衆去土○附後方逐葉孳下了去土

右等分爲細末每服貳錢空心温酒調下

單方治腸風下血或酒痢亦治

大烏梅拾个不去仁用火炒令焦

右爲末五更煮糯米清粥以藥末鋪粥面

喫壹層粥又用藥末喫粥盡爲度以酸味

椽斗散治便血艾韻蘇蘇式畏子頰對列臨

椽斗子壹合內以生硫黃奇之紙裹以鹽泥固濟火煨存性候冷

又右細研空心酒調下二服立效壹錢

洗心散治血痢趙待方

洗心散治血痢

有壹試官入院偶感血痢間有赤白極危

壹醫人用此藥數服而愈蘇蘇式畏子頰對列臨

黃連飲治血痢蘇蘇式畏子頰對列臨

胡黃連烏梅肉煎下土心盛服

右等分爲末臘茶清調下空心温服

聚珍丸治血痢酒痢尤妙

川百藥煎兩半薄荷煎兩貼陳槐花兩半感應

丸壹貼麝香少許白蘇子壹兩

右件拌勻添蜜爲丸男子龍牙草煎湯下

女人生地黃煎湯下

又方黃連兩壹白附子兩半刺蝟皮壹筒厚朴

參錢白礬煨五倍子各半枳殼兩

右件爲細末艾醋湯爲丸男子敗椶灰調

酒女人繇子灰調酒下

柏葉飲治便血

側柏葉多用水煮白礬煨川百藥煎炒蔓荆子

炒

右各等分入乳香末濃米飲下兩服見效

當歸丸治酒毒下血

當歸 芍藥炒白鷄冠花炒陳槐花炒

右等分爲細末青蒿根煮汁爲丸米飲送

下

四神丸治一切大便下血

香白芷性燒存川百藥煎燒烏梅燒

性有

右等分爲末糊爲丸每服五十丸空心米飲下熱水亦得

五痔

荆芥散洗熏痔疾

荆芥 熟艾 木鼈子去殼各半兩 寒水石煨

錢

右咬咀每服用半兩入橘葉四十九皮同煎令香熟却以有蓋桶子於蓋子上開口傾藥汁在內乘熱薰稍溫則以手澆水略洗之仍留汁更可用壹次有效
又方荆芥水洗用明礬爲末以米醋調時復自手指調塗然不可太多後用橘葉炒乾去水氣煎湯熏洗便好二方吉州儒醫范伯英傳
又方治痔疾有頭如雞冠者黃連末傅之即

效更加赤小豆尤佳衛生易簡方同

石膏熟艾散熏痔疾

荆芥木鼈子去殼熟艾各等分軟石膏假錢

右段咀每半兩水三升橘葉五七十皮同

入瓦罐中渾令香熟却用小口酒壺盛藥

坐其口上熏之如藥稍溫略略洗之無時

候其藥汁可作兩日用

木鼈散治痔不以內外洗藥

木鼈子去殼地骨皮紫金皮當歸枳

又穀神蘇蘇木木米米滑滑一一檢檢張張

右用黑豆三合先以豆煮軟水五升煎至

黃四升去滓乘熱熏洗壹方加樟木皮葉壹

方有橘葉皆有效

厚朴剉生薑各五兩切片水兩白朮麥

藥炒神曲炒各乙乙兩兩同同煎煎

右細末麪糊為丸空心米飲下三五十九

陳詠

方

二妙散治痔

四君子湯黃耆建中湯治下血三五

右各壹貼加白扁豆縮砂仁同煎何殿

方金顏妙

血竭散治痔漏痛不可忍真血竭細末用自

津唾調塗

黃芪四君湯治五痔下血四君湯加黃芪白

扁豆薑棗煎服細末尤佳正

又方橄欖核細末陳米飲調二錢服

弔腸丸治脫肛痔石灰炒熟入熱湯內熏痔

候湯溫洗數次却服沉香流氣飲吞弔腸

丸廬陵姚伯源用之有效

單方治諸般痔并脫肛白攀飛過用童子小

便調以雞毛拂上壹日愈三日除根終身

不再作亦不思口

劉寄奴湯治痔疾

劉寄奴五倍子治痔疾不

右等分研為細末空心酒下用其末傳

乳上遂愈或時未空亦下

墨雪膏治痔頭熱腫痛不可忍睡卧不安尚趙

書方

蜒蚰虫壹箇腦下乙撮

右件放在硯上用京墨同磨成水塗上隨

單手無事紙師以童子小

又方丁香參腦子錢一黃栢皮不拘

右為末津液調塗上或香煎或酒煎

倍香膏治痔疾或入熱湯內煎

五倍子燒存性乳香少降真香少

右為末用津液調少許搽痔上其疼立止

治血痔方端午日採躑躅者良用新沙鑊約

盛得壹升水先以花內入水約八分許將

皮紙蜜糊慢火久煎臨疾作時和瓶置之

桶內以手指點破紙竅坐桶上薰凡用三

次庶

蝸牛膏治痔

蝸牛一兩嚴氏濟生方醫方大成集成方南此經方袖珍方永類鈔方南生

易簡方

麝香

凡人疥癩入心或得入肉主

右用冰砂合子盛蝸牛以麝香糝之次早

取汁塗妙

嚴氏濟生方

此藥效驗坐臥驚風

五痔

此藥效驗

蝟皮圓治五種痔漏

凡人小兒入代

猪左足懸蹄

燒灰存性

蝟皮

壹枚燒

黃牛角腮

燒灰存性。醫方大身成南北經驗

衆 槐角子

炒雷丸

雞冠花

槐花炒

油髮灰

黃耆

去蘆 香白芷

當歸

去蘆 枳

殼 去穢 玄參

黃連

去鬚 防風

蘆 鼈甲

醋煮 各半

兩 麝香 別研

右為細末米糊為圓如梧桐子大每服七

十圓加至一百圓空心米飲送下年高虛

弱寒濕痔疾不宜服之

黃耆圓治五痔出血疼痛

服後熱心人不宜

楸藤子

煨用肉

川續斷

酒浸 黃耆

去蘆 貫衆

附子 炮去

黃礬

別研 刺蝟皮

燒 當歸

去蘆 阿

膠蛤粉炒麝香別研一字

右為細末米糊為圓如梧桐子大每服七

黃十圓空心米飲送下氣壯多熱之人不宜

服此

枯礬散治五痔痒多痛少或膿或脹或漏血

不止

白礬粘半腦子壹字別研

右貳味為末先用魚腥草煎湯放溫洗痔

次用藥少許搽患處得効方澹

腸風臟毒

加減四物湯治腸風下血不止

側柏葉洗生地黄去蘆當歸酒浸川芎各壹兩

枳殼去穢炒荆芥穗炒槐花炒甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢得効方三錢水壹盞半醫方大成

集成南北經驗方袖珍方永類鈐方壹盞生薑三片烏梅少許

得効方煎至七分去滓溫服空心食前玉

微義同得効方此下云壹○鈐方又云壹

方四物湯加防風烏梅煎取效其中有加

製香附子者佳

香梅圓治腸風臟毒

烏梅

同核燒
灰存性

香白芷

不見火

百藥煎

燒灰存性

右等分爲末米糊爲圓如梧桐子大每服

七十圓空心用米飲送下

得効方醫方大成集成南北經

驗方袖珍方
永類鈐方同

蝟皮圓治蠱痔下血

前方見

斷紅圓治陽虛臟腑久而腸風痔疾下血不

止或所下太多面色痿黃日漸羸瘦

側柏葉

微炒黃

川續斷

酒浸

鹿茸

燎去毛
醋煮

附子

炮去
皮臍

黃耆

去蘆

阿膠

剉蛤粉炒

當歸

去蘆酒
浸各壹

兩
白礬
兩
枯牛

右爲細末醋煮米糊爲圓如梧桐子大每

服七十圓空心食前用米飲送下

得効方醫方大成

成集成南北經驗方
袖珍方永類鈐方同

嚴氏濟生續方

椿皮圓治腸風瀉血不止

東行椿根白皮

剉焙不
拘多少

右爲細末醋糊爲圓如梧桐子大每服七十圓空心食前用陳米飲送下

修月齋般經後錄

秘傳痔漏良方

原痔者貧富男女皆有證富者酒色財氣貧者擔輕負重皆心肝二血喜則傷心怒則傷肝喜怒無常血浸於大腸到穀道無出路結積成塊出血生乳各有形相婦人陰經後傷冷餘血在心血乃流入大腸亦成痔漏有二

十四證其治則專也

痔證分三八憑君子細看莫教年日久見者膽心寒菱角有形怪蓮花不可觀穿腸並鼠竅酒色兩相下莫愿翻怨 蜂窩亦不寬雌雄同氣血子母及傷盤玄珠由可怪勾腸痛若鑽核桃與流氣見者更心酸栗了如中大雞心在外安珊瑚形可惡那更脫肛難內痔紅不出搭腸裏內盤垂珠更難治日久有雞冠切莫經刀火令君性

命殘用工無半月去病更除根

水澄膏

鬱金 白芨 大黃 黃連 黃芩 防

風 白芷 黃柏 豆粉

右為末水調傅痔四圍好肉上只留痔頭

在外用紙蓋定却用枯藥

神靈枯藥膏

白腦子 壹錢即人言 白礬 四兩二味煨 朱砂 一錢通明者

獐腦 半錢三味後入

右用銅鐵器先將白腦子打碎為末在下

後用礬蓋在上用文武火煨令乾須是毒

物煨之毒盡從烟去然後放在地上火毒

連下後三味却為末用蜜或用自津液調

用篋子調藥搭痔壹日三次上黃水出盡

自然焦黑十日半月日可安

荆芥湯治去舊藥敷上新藥

荆芥 好茶

右為散水煎洗痔

龍石散治痔落盡以此藥收瘡口

龍骨 赤石脂 海螵蛸 白芷 黃丹

血竭 朱砂 各等

右為細末敷

雙金散 干嗎藥 茶 黃丹 三六土 煎水 出

黃連 鬱金 乳香 沒藥 菜豆粉

片腦

右為細末用枯藥後痔忍痛用此敷之即

好

閏腸丸

大黃 枳殼 當歸 二味 麩 裹 煨

右為細末丸如桐子大白湯下用枯藥後

糞門迫急以藥通

導赤散如敷後小便不通用此藥煎服

黃連 黃芩 車前子 木通 滑石

大黃 枳殼 各等

右咬阻水煎服通利小便

十宣散此藥排膿托裏痔落後可服此藥

人參 黃耆 桔梗 當歸 川芎 厚

朴 官桂 防風 白芷 甘草 各等分

右爲細末 溫酒調服

國老湯痔落後用此藥煎水洗用此解了毒

甘草

右壹味 白水煎常常洗洗

換痔藥

磁石 白凡 龍薑 草烏 葱涎

右爲細末 葱涎調搭 卽出付肛門上內痔

卽出

薰藥用陳茄梗牙皂爲散痔在燒煙薰之卽

山

宣明論

痔

香殼凡治濕熱內甚因而飽食腸癖爲諸痔久而成癩速而悉愈之

木香 黃蘗 各叁錢 ○壹本及 枳殼 去穢

厚朴 各半 黃連 壹兩 蛻皮 壹箇 當歸 肆錢 荆芥

藥類彙編

卷之三

穗參錢

右為末麩糊為丸如桐子大每服貳叁十

丸温水下食前日叁服南北經驗方袖珍方日壹服

榼藤子丸治腸風瀉血濕熱內甚因為諸痔

久而不治乃變成瘻

黃耆 枳實必用全書之書枳殼 槐花 荆芥穗

鳳眼草已上各二兩○ 盞藤子壹對 皂子炙

二百簡炙

右為細末麩糊為丸如桐子每服貳叁十

丸空心酒下米飲亦得忌油膩冷猪魚臭血物等

痛 黃耆葛花丸治腸中久積熱痔瘻下血疼

黃耆 葛花 黃赤小豆花 生地黄焙

禮大黃 赤芍藥 黃芩 當歸各叁分 蝟

皮膏 檳榔 白蒺藜 皂角子仁炒各半兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服貳十九至叁十九煎桑白皮湯下食前槐子煎湯

下亦得

南北經驗方
袖珍方同

黃連散治腸風下血疼痛不止

黃連 雞冠花 管眾 川大黃 烏梅

各壹兩 甘草 參分

右為末每服貳錢用溫米飲調下日叁服

不計時候

南北經驗方
袖珍方同

乳香沒藥散治五腫腸風痔瘻無問久新

宜黃連

白礬

各壹兩 穀精草 醋石榴

將黃連白礬碎都入石榴內用元蓋子合

用濕紙壹張裹了後用膠泥拍作餅子裹

石榴以炭火燒通赤取出去溼紙次將穀

精草於銚子內炒焦黃與石榴研細後入

麝香

壹錢 乳香 貳錢 沒藥 壹錢 研細拌勻每服壹

錢熱酒小半盞調下日叁服

木香厚朴湯治痔瘻脫肛腸胃冷腹脇虛脹

不思飲食

木香 陳皮 桂心 桃仁 厚朴

各壹兩 肉豆寇 赤石脂 各半兩 大附片 叁分 皂角子

參兩去皮
子酥煮黃

右為末每服貳錢溫粥飲調下食前

東垣試効方

痔漏論
生氣通天論云因於飽食筋脉橫解腸澀為痔夫大腸者庚也主津本性燥清肅殺之氣本位主收其所司行津以從足陽明旺則生化萬物者也足陽明為中州之土若陽衰亦殞殺萬物故曰萬物生於土而歸於土者是

也以手陽明大腸司其化焉既在西方本位為之害費司殺之府因飽食行房忍泄前陰之氣歸於大腸木乘火勢而侮燥金故火就燥也大便必秘其疾甚者當以苦寒瀉火以辛溫和血潤燥疎風止痛是其治也
秦艸白朮圓治痔疾并痔漏有膿血大便燥硬而作疼痛不可

秦艸

去蘆

當歸尾

半兩酒浸

桃仁

一兩湯浸去

皮尖另研

地榆

錢

枳實

半兩

皂角仁

一兩燒存

性大皮澤瀉

兩白木兩半

痔漏之病乃風熱濕燥爲之也以秦艽當歸尾辛溫和血潤燥踈風止痛桃仁潤血以阜角仁除風燥以地榆破血爲下使以枳實之苦寒補腎以下泄胃實以澤瀉之濕淡滲使氣歸於前陰以補清燥受胃之濕邪也白朮之苦甘以苦補燥氣之不足其甘味瀉火而益元氣也故曰甘寒瀉火乃假枳實之寒也故人用藥爲下焦如瀆又

曰在下者引而竭之多爲大便祕澁以大黃推去之其津血益不足以當歸和血及油潤之劑則大便自然軟利矣宜作剉湯以與之是下焦有熱以急治之之法也以地榆惡人而壞胃故宿食消盡空心作圓服之
右同爲細末和桃仁泥子研勻煎熟湯白麩糊爲圓如雞頭仁大令藥光滑焙乾每服白圓白湯送下空心宿食消盡服之待

少時以美膳壓之忌生冷硬物冷水菜之類并濕麵酒及五痔辛熱大料物之類犯之則藥無驗矣數服而愈藏室秘

腸風痔漏者總辭也分之則異若破者為之痔漏大便大澁必作大痛此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也受病者燥氣也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣而合故人腸頭成塊者濕也作大痛者風也作大便

燥結者主病兼受火邪也去此四者其西方肺主諸氣其體收下亦助病為邪須當破氣藥兼之治法全矣以剉湯與之其効如神速

秦艽蒼朮湯主之秦艽蒼朮湯方

秦艽壹錢澤瀉叁錢蒼朮七介
去苗去錢去錢去錢
藏秘防風叁分秘藏七分大黃少許
藏製桃仁壹錢皮尖半錢皂角仁燒存性
可多用當歸尾壹錢黃蘗去皮酒
錢另研當歸尾壹錢黃蘗去皮酒
細調下當歸尾壹錢黃蘗去皮酒
若大腸頭沉重者濕腸也更加之如天氣
大熱或病人燥熱者喜冷以意加之○寶

鑑四檳榔校身壹分細末調服

右件除檳榔桃仁皂角仁叁味外咬咀如

麻豆大慎勿作末都作壹服水五錢秘藏

煎至一錢二分去滓入檳榔等叁味再上

火煎至壹錢空心候宿食消盡熱服之待

少時以姜饅壓之不犯胃也服藥日忌生

冷硬物冷菜之類及酒濕麵大料物乾薑

之類犯之其藥無効如有白膿加白葵花

五朶去萼青皮半錢不入正藥中同煎又用木

香叁分為細末同檳榔等叁味再上火同

煎依上法服餌古人治此疾多以歲月除

之此藥壹服立愈若病大者再服而愈

七聖圖治大腸疼痛不可忍叔和云積氣生

於脾藏傍大腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦

是莫謾多方立紀綱

羌活兩一檳榔四木香四川芎六桂去皮

兩大黃搗郁李仁浸湯去皮

右件除郁李仁另入外為極細末煉蜜為

圓如桐子大量病人虛實臨時斟酌圓數
 白湯送下蘭室秘藏每服三五丸取人使微
 利壹服而愈切禁多利大便大行其
 痛滋甚大立味

秦朮防風湯治痔漏每日大便時發疼痛如
 無疼痛非痔漏也此藥主之時云前此
 秦朮藥防風當歸身大白朮已上各黃
 藥五楠皮參炙甘草陸紅花少桃仁參寸
 煨大黃參升麻員柴胡貳澤瀉陸上丸同

右件剉如麻豆火都作壹服水參大饑煎
 至壹盞去滓稍熱空心服之避風寒忌房
 事酒濕麵大辛熱物及當風寒處大便蘭
 秘藏同
 常歸郁李仁湯治痔漏大便硬弩大腸下垂
 多血苦痛不能任

皂角仁壹錢另為細末煎成調服郁李仁壹錢麻子仁壹錢
 秦朮壹錢蒼朮錢常歸尾錢澤瀉參煨
 大黃參生地黃半枳實七

右件改咀水叁大盞煎至壹盞去滓空心
 宿食消盡服之忌風寒處大小便藏同
 秦芫羌活湯治痔漏成塊下垂疙瘡不在其
 痒血苦淋下血

麻黃錢半 柴胡錢半 黃芪壹錢 炙甘草錢半 防風壹錢

藁本叁分 細辛少許 紅花少許 羌活壹錢 秦芫壹錢

麻黃錢半 右件判如麻豆大郁作壹服水貳錢煎至

壹錢去滓空心服之忌禁如前藏同

紅花桃仁湯治痔疾經年因飽食筋脉橫解
 腸澼為痔常去其筋脉橫解破血絡是也治
 法當補北方瀉中央

生地黄壹錢 當歸尾半錢 桃仁拾箇 紅花半錢 漢防

已半錢 黃蘗一錢 猪苓半錢 澤瀉捌分 防風半錢

室藏 麻黃貳分 蒼朮陸分 右件判如麻豆大都作壹服水叁大錢煎

至壹錢去滓食前熱服之忌禁如前

秦芫當歸湯治痔漏大使結燥疼痛

秦芎壹錢當歸尾半錢桃仁貳拾箇紅花少許枳實

壹煨肆錢大黃肆錢澤瀉半錢白木半錢皂角仁半錢

右件剉如麻豆大都作壹服水叁大觥煎

至壹觥去滓稍熱服食前蘭室秘藏此下云忌如前

御藥院方

淋瀝藥歲靈仙散治拔粹方治下部痔大腸頭痒痛

或腫悶

歲靈仙各壹兩枳殼衛生寶鑑拔粹方炒

右為麤末每服壹兩水三椀同煎至壹椀

半澄去滓乘熱薰通手浴不拘時候○寶

鑑水壹椀半煎至壹椀去粗熏洗冷再暖

避風洗三次軟帛拭乾傳蒲黃散拔粹方同蒲黃

散見後

淋瀝藥地榆散治疔疔痒或腫

地榆各等分蒴藋各等分荆芥穗各等分苦參各等分蛇床子各等分

右為麤末每用藥壹匙水壹椀煎二三沸

去滓通手避風處熱洗患處衛生寶鑑同

枳殼散治腸風痔瘡便血無數疼痛不可忍

枳殼去麩槐子微炒荆芥穗各半

右為細末每服三錢薄粟米粥調下如人

行壹二里地再用粥壓之油診空心日進

二三服

愈痔散治男子婦人壹切腸風痔漏無問新

久皆可服之立効

南乳香另研槐花微炒木香公商枳殼去麩鶴

虱 華澄茄去白無萸各壹

右為細末如服後先嚼核桃壹介次用熱

酒壹盞調藥二錢空心食前日進二服忌

發熱風動氣等物

槐荆丸治男子婦人腸風痔漏先臟腑後便

血宜服之

槐花微炒荆芥穗去枳殼各壹兩白礬生

薄荷葉 蔚金各半

右為細末水麩糊為丸如梧桐子大每服

六七十九丸空心食前溫粥飲送下日進二服

結陰丹治腸風下血及臟毒下血諸大便下血疾

枳殼去瓢炒 葳靈仙 黃耆 椿根皮

陳皮銜生寶 何首烏 荆芥穗各等分

右為細末酒麪糊內入蜜少許同和丸如梧桐子大每服五十九至七十九食前米飲下○寶鑑右七味為末酒糊丸如桐子

大每服五十九至七十九陳米飲入醋少

許王機微再煎壹貳沸放溫送下拔粹方

驗方同平明服之空腹服之亦妙南北經

榼藤子丸治腸癖下血痔漏結核疼痛

榼藤子壹斤重七錢者酥炙和皮用○承

茴香炒 皂角刺 蝟皮燒存性 枯白礬

白附子炮 枳殼去瓢 黃檗皮焙 乳香

二錢

右件為細末醋麪糊為丸如梧桐子大每

服四五十丸温酒下食前如有痔瘡疼痛
醋研五七丸津唾塗患處醫方人成集或
南北經驗方袖

珍方同

治漏藥

獨角仙壹个河南地分
出火炙去殼 甜葶藶 砒各半
錢同

右為細末煉蜜為錠子每用臨時覩瘡口
大小旋捏作錠任於瘡口內其虫俱出即
時見効

者 金鍼散治久痔及腸風下血疼痛諸藥不差

皂角刺赤紅者炙 破故紙梓碎紙上
香各等分

右件搗羅為細末每服三錢温酒調下食
前服

木香枳殼丸治腸風痔疾下血

木香二兩 商枳殼麩炒
去麩 黃耆 熟乾地黄

當歸 防風各四兩 槐角子壹斤
炒

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每

服三五十丸不拘時候清米飲下溫酒亦得

管仲散治腸風痔瘻

管仲 紅藤 各四兩上好者

右件同為麤末分作四服用絲包作四裹每服壹包上好酒膏升煎至五沸溫服藥滓收著候四服藥滓壹處用水壹碗半熬至五沸用小口器合內盛放被兒內薰著瘡門就熱通手洗如虫于死後便不痒痛

苦葫蘆方治諸痔疼痛不可忍

苦葫蘆子

右壹味每用壹錢水壹升煎十余沸濾去滓薰瘡冷熱得所淋洗隔壹二日淋洗壹次

止血散治腸風下血或在便前或在便後在便前者其血近腎肝血也在便後者心肺血也其血遠此藥並主之

皂角刺 燒灰 胡桃仁 去皮 破故紙 炒 槐花 各壹

兩 右為細末每服三錢清米飲點下溫酒亦

得補珍方同

淋瀝藥治腸風痔疾經久不差痔以成漏瘡

口膿汁涓涓不絕及瘡內有虫痒痛不止並

宜淋洗之如瘡不破者用後効乾止藥塗貼

葳靈仙去荆芥穗土商枳殼炒去乳香

兩鳳眼草二細辛一錢半去苗

右為籠末每用藥三兩水壹大升半同煎

至壹升濾去滓硝熱淋洗患處如冷後再

溫熱更洗壹遍不用如洗罷用絲或熟白

絹揩乾上藥如瘡破後不須上藥只淋洗

諸生寶鑑同

乾上藥如瘡不破用前方淋漂訖用此藥塗

之

馬牙硝別馬勃各半輕粉二錢各半

右為細末如瘡痒痛不破者覩瘡大小用

藥末多少津液調成膏擦於患處日用三

五次

槐角丸治腸風痔疾大便澁滯氣結不通飲食衰少面黃肌瘦或下血不止或在便前或在便後者並宜服之

槐角

一斤製炒令焦熟揀淨穢

黃耆

剉碎

麩殼

麩炒去麩熟乾

地黃

當歸

防風

各四兩

木香

一兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服六七十丸溫米飲送下不拘時候

淋瀝藥雞冠散治五痔肛邊腫痛或生鼠乳

或穿穴或生瘡久而不愈變成漏瘡

雞冠花

鳳眼草

各壹兩

右為麤末每用藥半兩水壹碗米煎五六

沸熱淋瀝患處

衛生寶鑑

寸金錠子治一切痔瘻經久不可者

麝香

輕粉

硫黃

雄黃

雌黃

藤

黃內砒霜

粉霜

黃丹

已上九味各二錢另研

乾

漆

牡蠣

紅藤根

各壹兩

右伴壹山二味為細末燒陳米飯和勻捏

作如大棗核大壹用壹錢子維在肛門內
 可深二寸許放定用新磚求兒兩介燒赤
 醋內蘸過絲果肛門外熨冷即易壹个次
 日大便取下惡物立効

麝香散治下部脫血或瘡痔瘻久不差

麝香 血蝎 各半 蛭皮 壹兩

右先研蛭皮并血蝎為細末次入麝香拌
 勻每服半錢溫酒壹盞調勻食前日進二
 服

熊膽散治痔瘻瘡口不合膿汁清稀腫硬不
 消

熊膽 壹錢 雄黃 半錢 輕粉 半錢 麝香 壹字

右件研為細末乾摻藥瘡口上

得効方

失血

大便下血熱證酒蒸黃連圓治酒毒積熱便

下鮮紅或肛門作熱

友見消

槐角圓治五種腸風瀉血糞前有血名外痔

糞後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面
疔如疔名舉痔頭上有孔名癩並皆治之
方見和劑局方

人參敗毒散治同上每服三錢生姜三片薄

苛葉七皮桑白皮七寸烏梅壹个煎方見傷寒

門

防風散治因食熱物過度風氣蕃盛銷鑠大腸膏脂以致榮衛之血滲流而下此方獨效

羌活 荆芥 防風 枳殼 姜蠶炒去絲

薄荷 各等分

右剉散白水煎空心溫服忌再喫熱物

黃連阿膠圓治同上米飲下方見咳嗽門

加減四物湯治方見嚴氏濟生方

虛證腸風黑散大便鮮血臍腹疼痛裏急後重脫肛酒痢○醫方大成治腸風下血或在糞前糞後並皆治之

荆芥 二兩燒 亂髮 燒 槐花 燒 槐角 燒各一兩 枳殼

二兩燒 甘草 炙 蝟皮 燒各一兩半 ○大成去白炒

右將合燒藥同入瓷瓶內黃泥固濟燒存三分性出火氣同甘草枳殼壹兩搗為末每服二錢白水煎空心服大成每服三錢水一盞煎七分空信服醫方集成有北經溫酒調亦可驗方袖珍方與大成同黑玉丹治丈夫婦人久新腸風痔瘻者床頭痛不可忍者服此不過三四次見効初得此疾發痒或疼穀道周回多生硬核此是痔如破為瘻只下血是風皆因酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病右腸自

有以若不去根本其病不除此藥的効○醫方大成治腸風積熱下血不止

刺蝟皮四兩猪懸蹄二十箇牛角三斤雷

丸一兩槐角壹兩敗棕二兩亂髮皂角水洗淨焙二兩

脂麻一兩苦棟根皮一兩二錢半

右剉碎入瓷罐內燒存性碾為末入麝香

二錢乳香五錢研令和勻用酒打麵糊為

丸如梧子大每服八粒大成先細嚼胡

桃壹枚空心晚食前溫酒吞廿二服大成空心

以溫酒吞下多進得効醫方集成南北病
經驗方補珍方永類鈐方與大成同
其日三服切忌別藥不過三兩日可除根
本驗

加味雙和湯加側栢葉每服三皮炒過生薑
三片棗二枚烏梅壹个煎空心服方見諸
虛門治

同上

卷栢散治臟毒下血神効

卷栢生土石塋上高四五寸根黃如絲莖
細上有黃點子止以栢枝曝乾用
黃耆

右等分爲末每服二錢米飲調下

聖金圓治腸風下血瀉血瓜白芥芥丁香只

百藥煎三兩一兩生一兩
炒焦一兩燒存性

存爲末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空

心米飲下

神丹治腸風痔漏方見是
齋醫方

小烏沉湯方見直
指方

震靈丹玉華白丹治臟腑虛損大腸不收久
作腸風下血二藥夾用每服五十九煎不換

金正氣散加川芎空心燕下方並見

理中湯治同上加水香妙方見霍亂門

香梅圓斷紅圓方並見嚴氏濟生方

冷熱不調黃連香薷散

香薷扁豆厚朴姜製黃連去鬚

右剉散用水煎服每服十粒

香連圓治冷熱不調下血方見泄瀉門

芎歸湯熱加茯苓槐花冷加白茯苓丁香方見

婦人門娠末即佛手散

真人養臟湯治大人小兒冷熱不調便下膿

血魚腦裏急後重方見泄瀉門

消風散米飲調熱者吞酒蒸黃連丸冷者吞

烏荆丸方見諸風門

通治單方治腸風下血百藥不效山裏嵐俗

名鼻涕團取乾者為末米飲調立效

又方栝子十四枚搥破紗囊貯以好酒三盃

煎至八分服之初服反覺加多再服立止

非飲酒而致斯疾以艾葉煎湯服之神效

勝於宅藥

又方生豬臟壹條切控乾以槐花炒乾爲末
填入臍內兩頭線縛了以好米醋於磁石
器內慢火煮爛切片沙鉢內研爛爲丸梧
桐子大每服二十九永類鈴方經驗良方
彈子大日乾每壹元
空煎當歸酒下

又方荆芥穗縮砂仁各等分爲末糯米飲下

脫肛

文蛤散治大腸寒肛門脫出不收用力過多

及小兒叫呼久痢後皆使脫肛

五倍子

右爲末水煎汁浸洗更入白礬蛇床子尤
佳洗後用赤石脂爲末以少許摻在芭蕉
上頻用托入或長尺餘者以兩床相接中
空壹尺以瓷甌盛藥水滿架起與床平令
病者仰卧以其所脫浸在甌中換藥逐日
如此浸縮盡爲度劑局方
鈞腸圓治脫肛方見和

諸痔

冷證釣腸圓治久新諸痔肛邊腫痛或生瘡

痒時有膿血方見和劑局方

黑玉丹治同上方見前

橘皮湯方見直指方

立効圓百藥煎研為末每服三錢煮稀白粥

攪勻服之立愈糊丸米飲下亦可

黑圓子專治久年痔漏下血用之累驗

乾薑 百草霜 各壹兩 木饅頭 二烏梅 收

棕 栢葉 亂髮 各五分醫方大成

右各燒灰存性再入桂心三錢白芷五錢

大或各末醋糊丸梔榔子大空心三

十九米飲下醫方集成南北經驗方袖空

熱證逐瘀湯方見直指方

白玉丹方見三因方

黃連阿膠圓解熱調血枳殼散送下方見泄瀉門及

婦人門

槐角圓治腸風痔瘡內生虫裏急下膿血止

痒痛消腫聚祛濕毒眼之除根方見和劑局方

乾葛湯方見直指方

寬腸圓五灰膏塗痔瘡之後或臟腑秘結下

通者用此藥寬腸五灰膏方見后

黃連枳殼各等分

右為末麵糊丸如梧子大每服五十九空

心米飲下醫方大成集成南北經驗心三

通治秘方治諸痔捷効右用白礬信石各少

許於新瓦上煨過為末再入朱砂末少許

以新汲井水調成膏用舊傘紙上藥隨瘡

大小貼之先川鬱金國川末以鵝翎刷於

瘡四畔圍護恐傷好肉凡上藥貴官人肉

理嬌脆薄少用之愚俗人肉理麤厚稍多

少許用之大抵上藥後多疼不可太過為

妙仍用大青根晚蠶沙煎水洗後再上藥

兼服槐角圓皂角丸臟腑結熱秘甚入正

散加燈心枳殼薄荷葉煎再用大黃茶莽

草荆芥穗防風煎水洗効捌正散方見積熱門

又方用川白芷煮白苧作線快手緊繫痔上

微疼不妨其痔自然乾痿而落七日後安

五灰膏治臟腑壹切蘊毒發為痔瘡不問遠

年近日形似雞冠蓮花核桃牛乳或內或外

並皆治之醫方大成此下云此方親傳之

蕎麥灰七升大減水荆柴荆柴薊柴薊柴

白竹老杉枝

右以四件柴竹截作一尺大成許長以斧

劈破成片各取壹束曬乾於火上燒過置

壘內為炭防為風所化俟燒盡却以水於

壘鍋內煮出炭汁又用酒漏以布帛貫其竅

而置蕎麥灰於酒漏內以所煮炭汁淋之

然後取汁於窩內慢火熬汁約取壹小椀

候冷入石灰國丹調和成膏以瓦瓶貯之

上用石灰傅面不令走氣臨用却去石灰

以冷水調開令病者以水洗淨痔瘡仰臥

搭起壹足先以濕紙於瘡四圍貼護却用

收效必矣大成鈔方却用竹篾挑藥塗痔

如此三四遍要痔瘡如墨樣黑方止以水
洗淨每日常置冷水青盆以葱湯和之
洗三五遍六七日後膿穢出盡其瘡自消
醫方集成此經驗方神珍方與大成同

洗方用槐花荆芥枳殼艾葉以水煎入白礬

熏洗下及除山不令去瘡調出以水

又方黃連下黃芩下京芥下蛇床子各壹側

柏葉四槐條四鏡面草四蚬蚊草各壹

右用新汲水熟煎傾盆內熏候通手却洗

蓮子散煮出廿又八蓮子散出廿又八蓮子散出廿又八

蓮子拾四草芽茶拾四乳香隨上二藥

右三味同擣以紙裏煨透先以黃連湯洗
患處然後以藥生貼之

敷法熊膽膏傅痔極效

熊膽研腦子細

右各少許用井花水調以雞羽拂痔上

枯礬散治五痔痛痒方見嚴氏

消石散右用寒水石朴消為末以津潤手指

點藥敷瘡上立效

又方耳環草壹名碧蟬兒花手榔軟納患處

即愈

又方川山甲白尾根盡處數除三鱗不用取
 第四第五第六鱗橫三行燒存性為末用
 麝香少許臘茶壹匙同調空心服以澄下
 濃者傅瘡上其冷如冰永不痛無不效
 蝸牛散治痔瘡腫脹作熱如火右用蝸牛螺
 壹箇以冰片腦子麝香各少許同入瓦器
 內盛頓逼半日自化成水以少許點瘡上
 立愈

治痔疾大如胡瓜實於腸頭熱如燬灰火發
 則僵仆以柳枝濃煎湯洗後以艾炷灸其
 上三五壯若覺守道熱氣入腸中人瀉鮮
 紅血穢惡壹時至其痛楚瀉後其疾如失
 澹軒方
 等閑壹藥治腸風細麴如錫底墨十錢香附
 同減半白姜俱作末米湯調服可收功
 二桑葉與胡孫姜各自燒灰調米湯更有酒

煎黑神散調消風散亦良方米醋與淨

臟毒下血

燒取包茶部箬研更須少著麝香添旋煎糯

飲空心服臟毒從茲漸脫然

細羅鷹爪好黃連大蒜壹頭煨熟研合和搗

羅吞米飲久踈臟毒自能痊

腸風臟毒

酒浸黃連

五兩

九遍蒸枳殼

壹兩

木香

三錢

同研成

粟米糊元飮飲下腸風臟毒膏時不

脫肛

桑螺之狀若蝸牛雨後常游桑樹頭存性燒

灰為細末猪脂和傅脫肛收

槐花槐角分開炒細末和同治脫肛羊肉蘸

之須炙熟食時酒送即歸肛

淋痔痛

痔病攻疼發有時火燒荔枝核也能醫細研和

麝調新水恰好食前連服之

痔疾百藥煎熏研稀粥調餐三二錢更有壹

般耳摘草手挪傅痔亦能痊二錢更煎壹
 胡桃殼灰攻痔痛火燒秤鍾須通紅壹盃好
 酒淋將過調服二錢隨見功
 木槿開花竹筋收篾穿風浪任乾休痔痛沸
 煎盆盛貯乘熱先熏後洗瘰

熏痔

猪牙皂角并乾葛枳殼熟艾穿山甲慢火小
 缸燒細末坐缸熏痔痔隨納
 傅痔

蝎梢白凡與黃連龍骨燒來等分研津液同
 調塗傅痔不過數次自安然

桑樹蚰蜒雨後收拈來生擣爛如油更浸香
 菜自然汁蘸筆濃塗痔立收
 繫兒姪痔并小肉瘤

淨洗莞花根帶濕木石器中擣取汁繫線一
 條浸壹日繫痔繫痛去如失
 治痔瘡破瘦膿血不止者用棕櫚花晒乾碾
 為細末每服二錢溫米湯調勻服之

肘後方

治患五痔及脫肛諸方

葛氏療腸痔每人便常血礬石熬附子炮各

壹兩二物炮擣末蜜丸酒服如桐子二丸

日三隨增百日則永差不發

又方槐樹上耳取末服方寸匕日三姚同生

易簡方米飲調服

又方山上薔薇根二分枸杞二分末服方寸

匕日三五六日當更小瓶是神藥耳入

轉服差服勿止

又方生地黄壹斤酒壹斗漬三日任意多少

服

又方枳根皮末服一匕日三亦可煮汁常飲

又方鱉甲蝟皮蛇蛻皮蜂房猪左脚懸甲分

等搗篩并朝水服方寸匕日三四亦以傅

瘡上五日止不差更服

又方槐白皮一擔水煮令濃脫衣入中坐浴

當如大便狀冷易不過三虫出止更擣白

皮作屑以粉穀道姚同浸法○衛生易簡
 又方治穀道中虫痒不止用槐白皮濃煮汁
 安盆坐湯之虛其穀道冷更煖良久欲大
 便當虫出不過三度愈或用末綿裏內下
 又部
 又方若下部痒痛如虫齧者方胡粉水銀以
 棗膏和絲裏夜卧道之

又方燒蝟皮傅之燒獺肝服之
 又方擣桃葉一斛蒸之內小口器中以下部

榻上坐虫自出

又方掘地作小坑燒令赤酒沃中擣茱萸三
 升內申及熱板覆開小孔以下部榻土冷
 乃下不過三四度差備預百要方同

又方苦桃皮漏竹苦參等煮汁漬大良燒稻
 入蒿灰汁漬之亦良

又方小豆壹升好苦酒五升煮豆熟出乾乾
 復內苦酒中盡止末酒服方寸七日三度
 小品五痔散赤小豆四分熬黃者三分附子

小二分炮白欬桂心各壹分芍藥黃芩各二
 分七物搗篩酒服方寸七日三血止有驗
 又秘方豆豉十石黃芩五石大黃五石出神效
 又療五痔衆醫所不能療神方雷丸半升熬
 又蜜虫半兩石南草半兩藁本二兩猪後脚
 懸蹄十四枚燒令焦搗下以羊髓脂調下
 先食飲服十五丸日再劇者夜又壹服十
 又四日痒止更八日膿血盡鼠乳悉愈滿六
 十日終身不發也忌魚猪肉大神驗

隱居効驗療五痔龜甲散龜甲二兩蛇蛻皮
 露蜂房猪後脚懸蹄各二兩四物爲散以
 粉和服一七日三息生冷
 又槐皮膏止痛痒血出方槐皮三兩薰陸辛
 夷甘草白芷各半兩巴豆七枚漆子十四
 枚桃仁十枚以猪膏半斤煎至三上三下
 去滓以絲裏膏塞下部日四五止痒痛
 又方緣桑樹螺燒之以猪脂和傅之立縮亦
 可末而粉之

又方猪脂和蒲黃傅上指抑中內但以粉之良

又方熬石灰裹尉之

又療痔神方麝香壹子熊膽壹枚和井朝水

每日壹服壹錢唯忌雞魚備預百要方同

療一切痔浸石英酒內鹿角膠服之

梅師方治痔穀道中蟲痒不止以水銀棗膏

各二兩同研相和撚如棗形狀薄絲片裹

內下部明日蟲出衛生易簡方同若痛者加粉三

大分作丸

集驗方治五痔不以年月日久新積實衛生易簡

方根為末煉蜜丸如桐子大空心飲下二

十九

又方痔疾下血疼痛不止以玩月砂不限多

心慢火熬今黃色為末每二錢入乳香半

錢空心溫酒調下日三四服差砂即兔子

糞是也衛生易簡方同

又治野鷄痔下血腸風明目方嫩槐葉壹斤

蒸如造茶法取葉碾作末如茶法煎呷之

衛生易
節方同

經驗方王峽州傅治野雞痔病方用槐柳湯

洗便以艾灸其上七壯以知為度王及郎

中充西川安撫判官乘驟入洛谷數日而

痔病囚是大作如胡苳貫於腸頭其熱如

塘煨火至壹驛僵仆無計有主郵者云須

灸卽差及命所使為槐柳湯熱洗苳上因

用艾灸三五壯忽覺一道熱氣充入腸中

囚人轉瀉鮮血穢物壹時出至楚痛瀉後

遂失胡苳所在

又方治腸風下血枳實半斤麩炒去瓢絲黃

耆半斤洗判為末米飲時下二錢匕若

難服以糊丸湯下三五丸効

靈苑方治久患腸風痔漏一二十年不差而

色虛黃飲食無味及患臟腑傷損多患泄

瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴

婦人月候湛濁赤白帶下多年不差應是

臟腑諸疾皆主之川石鷲淨洗刷去泥土
 收之在每日空心取壹枚於堅硬無油甌
 器內以溫水磨服之如彈子丸人者壹箇
 分三服大小以此為準晚食更壹服若欲
 作散須先杵羅為末以磁石協去杵頭鐵
 屑後更入堅堯鉢內以硬乳搥研細水飛
 過取白汁如泔乳者澄去水曝乾每服半
 錢至壹錢清飢飲調下溫水亦得此方偏
 治久年腸風痔須常服勿令歇服至及壹

月諸疾皆愈

又方治腸風下血久不止茄蒂燒存性為末

每服食前米飲調三錢匕

袖珍方衛生易簡方備預百要

方同壽域神方調下
 二錢小兒半錢妙

孫川和方治腸風瀉血黃耆黃連等分石為

末麵糊丸如菉豆大每服三十丸米飲下

博濟方治遠年日近腸風下血不止枳殼燒

成黑灰存性羊脛炭為末枳殼末五錢炭

末三錢和勻用濃米飲壹中盞調下空心

服五更初一服如人行五里再服當日見
効

篋中方主腸風莨菪煎取莨菪實壹升治之
暴乾搗篩生薑半斤取汁二物相合銀鍋
中更以無灰酒二升投之上火煎令如稠
餈即旋投酒度用酒可及五升以來即止
煎令可丸大如梧子每旦酒飲過下三丸
增至五七丸止若丸時粘手則菟絲粉觀
隔煎熬切戒火緊則藥易焦而失力矣初

服微熱勿怪疾甚者服過三日當下利疾

去利亦止絕有効

勝金方治大腸痔漏并脫肛以虎脰骨兩節

蜜二兩炙令赤搗末蒸餅丸如桐子大每

服凌晨溫酒下二十九丸隔夜先和大腸後

方服此藥衛生易簡方同

日華子云治腸風瀉血并熱痢及殺疳蟲炒

苦參帶烟出為末飯飲下

外臺秘要療肛門凸出方燒虎骨末水服方

伏寸七日三服良凸出火熱氣骨末水煎式
澹寮方帶眼出惡末煨燻下

日華痔疾皆因風濕血氣滯滯或強張蟲狀
素問云腸澼為痔蓋多由飲食不節情慾耽
著坐卧暑濕久忍大便遂使陰陽不和關膈
壅塞風熱不衝致成痔疾痔者峙也凡澤有
小肉突起皆曰峙九竅有小肉突起皆曰痔
痔有五種曰牡曰牝曰脉曰腸曰氣牡痔者
肛邊腫痛突出壹贅五六日後潰出膿血自

愈牝痔者肛邊發癰數箇如鼠乳狀脉痔者
無頭脉中逆小竅注下清血腸痔者生在腸
內更衣時非按搦乃不入氣痔者遇憂怒則
發肛邊腫疼氣散則愈治之之法最難於得
方不可用生砒毒物甚者又非以毒攻毒則
無得而去乃若割剔燒灸尤當仗藝熟之醫
否則難保其平善也
枳殼除痔圓枳殼除痔圓
大枳殼四兩去穰 大草烏四兩不去皮

右以草烏末納入豬大臟內用醋四五升
 煮乾如未爛更加醋煮十分爛為度餘醋
 些小同擣候臟爛却入前枳殼末再擣均
 圓如梧子大每二三十圓溫米飲送下空
 心臨卧時忌熱飲食片時仍以臭椿皮煎
 湯洗或謂審是熱毒暑氣者合減草烏添
 入橫紋甘草同煮况下血者尤當減草烏
 增入黃連槐花之類當各看斟酌

失血

治腸風臟毒便血等疾

溫州枳殼下以多少

右逐箇刮去穰入去殼巴豆壹粒以線札
 兩片合定銀石器內米醋煮枳爛為度洗
 淨去巴只以枳剉焙為末醋糊為圓菜豆
 大每服三十粒空心蠟茶清吞下病愈住
 服痢疾亦可用初患則留巴少許亦可增
 簡易

人患腸風下血者何也人腸皆有脂裹之厚

則腸實而安腸中本無血緣有風或有熱以消其脂腸遂薄滲入其血初患者必服冷藥而愈服之過當則腸寒而脂愈不生脂其血必再作凡熱者其血必鮮冷者其血必青黑察其冷熱用藥可也

醫

餘

臟毒洛陽女子年四十六七耽飲無度多食魚蟹攝理之方蔑如也以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十謁大便與膿血雜下人腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不效

又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如此已半年餘血氣漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下服涼藥則泄注氣羸粥愈減服溫平藥則病不知將暮歲醫告術窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之才壹服知二服減三服膿血皆定自此不十服其病遂愈後問其方云治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血疼痛多日不差糲

根白皮人參各壹兩爲末每三錢匕空心
溫酒調不飲酒者以溫米飲代忌油膩濕
麪青菜菓子甜物鷄魚蒜等行
臟毒下血右用烏梅肉生地黃等分煉蜜圓
梧子大每服五七圓米飲下不拘時候
泊宅編云痔腸風臟毒壹體病也極難得藥
亦緣所以致疾不同雖良藥若非對病固
難壹槩取效常人酒色飲食不節臟腑下
血是謂風毒若釋子輩患此多因飽食久

坐氣體不舒而得之乃脾毒也王渙之知
舒州下血不止郡人朝議大夫陳宜父令
隨四時取隨其方栢葉如春取東枝夏取
南枝之類燒灰調一錢而愈是齋得方後
官韻上以治二車吳令昇亦卽効提點司
屬官陳逸大夫偶來問疾吳俸告以用陳
公之方而安陳君蹙額曰先人也須用側
栢爲佳道場慧禪師曰若釋子輩恐難用
此不若灼艾最妙平立量脊骨與臍平處

椎下灸七壯或年深更於椎骨兩傍各灸寸灸如止數無不除根者又劉向為嚴椽是齋過之留飲訝其瘦瘠問之荅曰去歲臧毒作凡半月自分必死得一藥服之至今無苦問何藥不肯言再三叩始云只這卓子土有之乃是乾柿燒灰米飲下三錢本草云非柿治腸癖解熱毒消宿血後有病者宜以求之素問云腸癖為痔曾有通判之子年十餘歲時嘗苦此凡治腸風藥

如地榆之類遍服無效因閱書見此方用之亦一服而愈是齊百一選方

衛生寶鑑風香入錢

古腸風痔漏川藥

神應黑玉膏治丈夫婦人久新腸風痔漏大腸頭疼不可忍服此藥不過三四次便效初得此疾發痒或疼敷道周迴多生硬核此是痔破即成漏只下血腸風皆因酒色風氣食五辛過度即成此疾人多以外科塗治不知

病在腸自有藥若不去根本此病不除此藥
 的有神效謂以猪懸蹄貳拾刺蝟皮一兩牛角腮兩貳錢
 敗櫻錢捌亂髮洗淨槐角各陸苦練根錢伍雷
 丸脂麻各肆夫誠人及海洲風疾新大
 右丸味剉碎川瓷罐內燒存性細末入乳
 香貳兩麝香八錢研令勻酒麪糊丸如桐
 子大每服八丸先嚼胡桃一箇以溫酒吞
 下早晚腹空時日貳服甚者三服切忌別

藥不過三日除根藥不效或忌食不極三
 蒲黃散治下部痔漏

蒲黃兩一血竭兩半

右為細末每用少許貼患處拔粹方南北

方衛生易

椿皮散專治血痢及腸風下血此方李舜

卿

教授傳累用有效

椿白皮兩槐角子四兩明白礬貳兩甘草一兩

右為末每服叁錢熱米飲調下神驗不傳
必用全書

痔漏證諸方

洗痔方 葳靈仙 麝末 水煎通手洗之
薰痔方 乾鰻鯉魚 燒烟薰痔 屢屢驗

沃法治腸風下血如注久不差者右唯用市
河水每遇更衣能使冷沃之久沃為佳有

効

單方治腸風下血諸藥不效危急者不過三

服

石榴皮 搗爛乾者亦可

右用茄根煎湯調服

拔粹方

痔疾證

蓋為三焦相火盛而制陽明燥金故木相侮
木主生五虫所以腸中有虫也因多食熱物
脾生大熱若瀉三焦火熱退則使金得氣而
制木木既受制則五虫不生而自愈矣

蒼朮澤瀉丸

蒼朮

去皮四兩

澤瀉

熟

枳實

各取兩

地榆

一兩

桐子

一兩炮

秦艽

二兩

右為末燒飯為丸桐子火食前溫水下

白朮丸

白朮

四兩

澤瀉

二兩

地榆

枳實

炒

皂角子

兩燒存性

右為細末燒飯為丸桐子大米飲或白湯

或溫酒下

腸癖下血

升陽去熱和血湯治腸癖下血作派其血唧

出有力而遠射四散如篩春二月中下二行

腹中大作痛乃陽明氣街熱毒所作也當去

濕毒和血而愈

生地黄

牡丹皮

生甘草

各半

熟甘草

黃耆

各壹錢

當歸身

蒼朮

秦艽

熟乾

地黃

肉桂

各三分

橘皮

二分

升麻

半錢

白芍藥

右咬咀都作壹服水四盞煎至壹盞去滓
稍熱服空心南北經驗方宿食消盡服之

王氏集驗方

治五痔脫肛浙西塩司方五倍子不以多少
為末水四五碗磁瓶盛慢火煎乘熱熏洗
名獨行虎散却用海螵蛸為細末塗肛上
名白金散
治痔瘡瘡焮作朴消壹味溫水泡開勤洗立
効仍用朴消唾調貼患處

又方治痔木鱉子三枚去皮杵碎砂盆內研

如泥以百沸湯煮火碗於盆器中坐上熏

之至通手即洗痔日三四次

又方治痔痛有頭乳方羌花入土根不以多

少水洗淨却入木臼中用水少許絞取汁

於銀銅器內慢火煎成膏將絲線於膏內

度過繫痔繫時微痛喉心燥落時以紙撚

子入膏藥於竅中永除根本衛生易簡方同

治腸風下血黃連丸

黃連 黃蘗 枳殼 川烏頭

右等分細剉川豬大腸壹條盛藥在內縫定爛煮同搗為餅口乾碾為細末入百草霜少許米糊凡如梧桐子大每服五十九空心溫水下

又方黃連百藥煎等分為末米糊丸如棗豆大每服五十九加至壹佰九空心米飲下裏急後重者加枳殼

治熱毒下黑血五內絞痛日夜百行氣絕欲

死黃連湯

黃連壹升 龜骨 白朮各二兩 阿膠 乾薑

當歸 赤石脂各二兩 附子一兩

右咬咀水一斗煮取五升分五服藥入口

即定

治下血日夜七八十行方連藥湯

黃連 黃蘗

等分醇醋三升煮取一半分再服

槐花散治腸風臟毒醫方大成此下云下血

槐花

大成炒

栢葉

煮焙○大荆芥穗

枳殼

成爛并焙

右等分細末清米飲調下二錢空心服方

集成南北經驗方袖珍方永類鈴方與大成同

醫方大成

疳疔漏

和劑方槐角圓治五種痔瘡遠年近日並皆

治之

醫方集成南北經驗方袖珍方同方見和劑局方

本事方薰洗痔方枳殼不拘多少為末每服

二錢水一大椀沙瓶內煎百沸先以薰蒸

而後洗之

醫方集成南北經驗方袖珍方同

脫肛

紫葳膏治臟熱肛門脫出以紫背葳一大握

又名魚腥草搗爛如泥先用朴消水洗淨

肛門用芭蕉葉托入却用藥於臀下貼坐

自然收入

醫方集成南北經驗方袖珍方衛生易簡方同

南北經驗方

下血

張子和方黃連貫衆散治腸風下血

黃連各二雞冠花各二貫衆各二大黃各二烏梅

二甘草三錢炙○袖枳殼炮荆芥各乙

兩珍方一分右為細末二大錢溫米飲下食前

拔粹方當歸和血散治腸澼下血溫毒下血

槐花各六分青皮各六分當歸身各二錢升麻各二錢

芥穗六分川芎四分熟地黄各六分白朮各六分

右為細末每服二三錢清米飲調下食前

袖珍方同

經驗方地骨皮散治腸風痔瘻下血不止

地骨皮 鳳眼根皮並用懸崖中者好去土不用

右二味各等分同炒微青色擣為細末每

服三錢空心溫酒調服忌油膩物食袖珍方同

醫方類聚卷之一百八十三