000381

景岳全書

外科方

卷之二十四

雲南中醫學院藏書

雲南中医学院
藏书之章
图书馆

外科

仙方活命飲 治一切瘡毒未成膿者內消已成膿者能潰散服之

此止痛消毒之聖藥也

川山甲 蛤粉炒黃 白芷 歸尾 皂刺 防風 天花粉 乳香 沒藥 甘草各一錢 金銀花

酒一碗煎數沸服

陳皮各三錢

托裏消毒散 治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰散服之

未成即消已成即
肉不能收斂屬氣
虛者四君子湯
全大補湯爲主屬
氣血俱虛者十
八參隨證
芍藥炒
白芷各七分
甘草各一
右水煎服○陳氏
秘方托裏散治
一切瘡毒始終
通用
連翹各一錢
當歸各五分
川芎
金銀花
枯苓
黃芪各一
皂刺炒各
甘草各一兩半
熟
地
天花
粉

托裏消毒散內
多陳皮方在前
當服不致內陷
歸酒拌
黃芪
臨水
炒
白芍藥
金銀花

無灰酒五茶鍾
入磁器內厚紙封口再用
內盡者煮全藥香
取出分服直
至痊愈○立

齋曰此方藥品平易治毒之功甚大且不動臟腑不傷血氣不問陰陽腫潰屢用屢效真神功托裏散 匹

其功甚捷若一切腫毒或炊痛憎寒壯熱小便秘者先用疎通而後用此

欽及膿清者用峻補

金銀花一名金銀花散○治癰疽發背腸癰乳癰及黃芪 當歸 廿草等分

右用酒水各一鍾煎至一鍾分病上下食前食後服之少頃再服一劑滓敷患處不問老少虛實皆可服若為未潰調服尤妙

參芪托裏散五治瘡瘍氣血俱虛不能起發或腐潰不能收欽及惡寒發熱者

人參 氣虛多用之　黃芪 炙　白朮 炒　當歸 酒炒　茯苓 炒　陳皮 各一錢

熟地　芍藥 炒　川芎 各五錢　酒拌　五味子 炒研

右水煎服

在涼疹七日托裏養營湯七

治癮疹瘡膿毒不化及潰後作痛

人參　黃芪 炙各一錢　當歸 酒拌　川芎 各五錢　白芍藥 炒　白朮 炒各一錢　熟地 二錢　五味子 炒研

水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服

甚效

治癮疹氣虛作渴甚者

黃芪 炙各一錢　人參　麥冬 去心　當歸 酒拌　甘草 炙各五分　阿膠 炒珠　生地 各一錢　五味子 炒研

水二鍾煎七分食遠服

治癮疹血不足之證不作膿

或不潰或潰後發熱或遍身瘙癢消瘦飲食不思睡臥不寧

盜汗不止

黃芪六錢 蜜炒 甘草 大花粉各一錢

水一鍾煎六分頻服之○加人參一錢亦可○若氣血俱虛膿血大泄而作渴或兼發熱者宜用托裏養營湯內補黃芪湯九

治癰毒毋內虛毒不起化及潰後諸虛迭見

黃芪炙 麥冬各一兩 人參 熟地

茯苓 甘草炙各七分 白芍藥各五分 當歸

遠志 官桂各三分

右每服一兩薑棗水煎服

治潰瘍氣血俱虛或瞤熱內熱寒熱往來或托裏當歸湯十

婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等證但瘡瘍氣血虛而發熱者宜服之久服亦收斂瘡口

黃芪 當歸 人參 熟地

川芎 柴胡 芍藥各一錢 甘草 大花粉各五分

右水煎服

托裏健中湯十一

思或作嘔瀉等證

人參　白朮　茯苓各二錢　炙甘草五分　肉桂三分

治瘡瘍元氣虛或因涼藥傷胃飲食少

炮薑錢一　黃芪半錢　炙甘草二錢　半夏各二錢

右薑棗水煎服

托裏溫中湯十二

陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏憒此寒變內陷經絡則不治

附子炮去皮臍二錢　乾薑炒三錢　益志　木香　丁香　茴香　肉桂各一錢

羌活　沉香

右薑水煎服

陳皮各一錢　炙甘草二錢

治中氣虛弱飲食少思或瘡不治脈或潰

托裏益中湯十三

而不欲

人參　白朮　茯苓　炮薑

陳皮　半夏錢各一　木香　炙甘草各五分

右薑棗水煎

托裏温經湯十四

伏營中聚結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭面腫痛欬甚仍宜乾之

麻黃　升麻　人參　白芷　甘草　當歸　防風　芍藥　乾葛

右水二鍾煎一鍾服臥煖處得汗乃散○或加柴胡

托裏益黃湯十五

著未各一錢

治脾土虛寒水反侮去以致飲食少思或

八參　白朮　茯苓
半夏錢各一　炮薑
右㕮咀
托裏清中湯十六
八參　白朮
半夏八分　桔梗
梗七分　甘草五分
右薑棗水煎服
托裏抑青湯十七
八參　白朮
陳皮各一　茯苓
甘草　柴胡
半夏
右薑棗水煎服
托裏營衛湯十八
治瘡瘍外無脓腫內便調和乃邪在經絡
治脾胃虛弱飲食少思等證
八參　白朮
茯苓　陳皮
炙甘草各五分
右㕮咀
托裏清中湯十六
治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等證
八參　白朮
茯苓　丁香
陳皮錢各一　炙甘草
右㕮咀
托裏抑青湯十七
治肝木侮脾脾土虛弱以致飲食少思或

也宜用此藥

人參　黃芪
紅花　柴胡
羌活　防風

右酒水煎服

托裏越鞠湯十九

人參　白朮　各一錢
山梔　川芎
炙甘草五分

右薑棗水煎服

定痛托裏散二十

當歸　甘草炙
栗設去帶炒
沒藥

治瘡瘍酒拌

當歸　連翹　各一錢
黃芩　桂枝七分

治六鬱影響

所傷脾胃虛弱飲食少思等證

陳皮　半夏　各一錢
香附　砂米　各七分

益虛疼痛之聖藥也

白芍藥炒　川芎　各一錢半
肉桂　各一錢

右薑棗水煎服
內托復煎散二
內宜用此托之
人參
芍藥炒
內桂
右先以蒼朮一
之
內托羌活湯二
治臀癰堅硬腫痛兩尺脉緊無力
連翹
白朮炒
茯苓
防己酒炒
斤水五升煎去朮
入藥再煎至二升終日飲
當歸
甘草
黃芩各一錢
地骨皮
防風
黃芪鹽水炒
治瘡瘍咬腫在外其脉多浮邪勝必侵於
羌活
藁本
陳皮各五分
右水酒各一鍾煎入分食前服
黃柏各一錢
防風
當歸尾
肉桂各一錢
黃芪鹽水炒一錢半
白朮米泔浸炒

於患處血氣不能運行久
不能愈遂成漏證
附子 浸炮
肉桂 去皮
黃芪 炒 鹽水炒
當歸 酒拌
桔梗 炒
川芎
厚樸 制各一兩
防風 四錢
右為末每服二錢空心溫酒下或酒糊丸鹽湯下或煉蜜為丸亦可

沖和湯 治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣虛弱失於補托所致
赤小豆 炙甘草
茯苓 白芷
人參 遠志去骨
當歸 川芎
陳皮 各一錢
白芷 各一半
皂角刺 炒
乳汁 二
沒藥 金銀花
黃芪 白朮
茯苓 川芎

黄芪建中湯

人參　黄芪　甘草炙各一錢　桂枝　芍藥各一錢半　生薑一錢　大棗二枚　膠飴一兩

右以水二盞煎一盞去滓入膠飴令消温服治虚勞裏急腹中痛或手足煩熱咽乾口燥

神效散

人參　沒藥　甘草炙各一錢

右水酒各半煎服治一切瘡瘍能托毒散毒其效如神

括蔞生一個半　炒　當歸尾各一兩　甘草二錢

右以酒三碗煎二碗分四服空心食前服五十丸用酒下善消毒活血治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參　白朮　茯苓　麥冬　當歸　陳皮　黄耆炒各五分　甘草炙一錢

右水煎服治潰瘍虚熱無睡少食或嘔氣所觸作痛

黄芪鹽水炒二錢　當歸酒拌
升麻　水一鍾煎三片
黄芪建中湯二入
黄芪蜜炙一
黄芪　桂枝各三
肉桂兩　甘草炙二
參朮補脾湯二九　白芍藥六兩
必服此藥補脾　大棗一枚煎服
八參　内托瘡瘍
右每服一兩薑　諸毒
棗水煎服　治肺疽脾氣虧損久欬吐膿或中滿不食
八參　白朮　茯苓
右薑棗水煎服　麥門冬
當歸　神麴炒
桔梗入分　陳皮各五分
右薑棗水煎服　黄耆炒各一錢
當歸　白朮各二錢
桔梗入分　陳皮一錢
茯苓草五分　黄芪二錢半
麥冬七分　茯苓
北五味四分

參芪補肺湯 三十

痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴小便短澁

八參　當歸
陳皮　白朮
五味子　山藥
茯苓 各一錢　山茱萸各二錢
炙甘草 各五分　熟地黃一錢半　麥門冬

治肺證欬喘短氣或腎水不足虛火上炎

八參　當歸
芍藥 炒　川芎
陳皮 各一錢　貝母
白朮二錢　香附
梔連 各五分　柴胡六分
甘草　茯苓
熟地　

治懷抱抑鬱或氣血損傷四肢頸項等處

八參　當歸
黃芪 鹽水炒　川芎
白朮　山藥
茯苓 各一錢　山茱萸各二錢
炙甘草 五分　熟地黃一錢半　麥門冬

益氣養營湯 二

患腫不問軟硬赤白腫痛或氣血損傷四肢頸項等處膿血發熱作渴小便短澁

右薑水煎服（
地骨皮膿清加
黃芪當歸肌肉
補陰八珍湯三二
八參
當歸
白朮
川芎
熟地
知母 酒炒各
七分
治瘧寒熱陽虛
多汗盜汗氣短頭暈泄瀉
八參
右作二劑水煎
附子理中湯三四
服
治瘧瀉脾胃虛寒或誤行攻伐手足厥冷

黃芪 炙甘草
芍藥 酒炒各
七分
治瘧寒熱或膿血出
白朮 各
錢

飲食不入或腸鳴嘔腹漏唖逆吐瀉

附子　人參　白朮　茯苓　白芍藥各二錢

右水煎服

白朮四錢　附子　制

右水煎服

治四氣流注於足太陰經骨節煩疼腫

拘急自汗短氣小便不利或手足浮腫

防己　桂枝各四錢　炙甘草二錢

治四氣流注於足太陰經骨節煩疼腫

茯苓各三錢　附子炮　白朮　炙甘草

右作二劑水一鍾煎一鍾食遠服

鍾半薑三片煎一鍾食遠服

治瘡瘍鳴氣脫陷嘔吐畏寒泄瀉厥逆

乾薑炒　芍藥炒　人參　茯苓各一錢　附子炮　桂一錢　白朮

四物湯三七 治腫腎虛寒瘡

腐潰或腹痛泄瀉嘔吐欲逆

人參 白朮 甘草炙 附子炮 陳皮 當歸 川芎 各五分 熟地 白芍 各八分

水煎服

柴胡加減八味丸三八 治瘡瘍此自腎水火不能相濟故煩躁作渴甚後及將痊口乾渴甚或舌上生黃或未愈先渴

柴胡 茯苓 酒炒丹皮 山藥 各二錢 山茱萸 牡丹皮 各三錢 澤瀉 各四錢 桂心 一兩 北五味 四兩 炒

酒水煎服如不應倍加萬炲

又陽氣脫陷等證

黃芪 各三錢 乾薑炒 陳皮 當歸 各二錢

多肌膚漸消或腿腫脚先瘦頓止及治口舌生瘡不絕

熟地 八兩 酒浸搗膏 山茱萸 牡丹皮 各三兩 澤瀉 蒸焙 山藥 各四兩 桂心 一兩

服此以降心火滋腎水則諸證

加
右爲細末八一膏加煉蜜少許九桐子大每服六七十九五
更初言語前或空心用鹽湯送下
此卽陳氏加減八味丸
味地黃九三九 治肝腎陰虛
也 方在補陣一三
脣瘡煩氣喘嗽或作渴發熱小便赤澁等證
熟地 山茱萸 白茯苓
澤瀉 牡丹皮 柴胡
北五味子各爲末
等分
右將地黃焙乾搗碎酒拌濕蒸爛杵膏入諸藥和勻加煉蜜爲九
桐子大每服百九十丸空心白湯送下如不應用加減八味九
痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或婦女經水不調胸膈
當歸川芎散 四十 治手足少陽經血虛瘡證或風毒攻注耳內痒
不利脇腹疼痛
當歸 川芎 柴胡 白朮

芍藥 各一兩

蔓荊子 石水煎服

加味敗毒散 四

熱如瘧自汗短氣大小便不

之

羌活 一 治足三陽經執毒流於腑根

獨活 前胡 柴胡 枳殼 茯苓 黃芪 蒼朮 錢各一

甘草 川芎 各五分

水二鍾薑三片煎服

九味羌活湯 四

治瘧瘍風熱鬱遏瘀腫作痛

痛惡寒春強脈浮緊

方在散陣 四四

或遍身作痛或拘急不利及頭

山梔炒一錢 牡丹皮 茯苓 各八分

加味羌活湯 四三

卽前湯加金銀花連翹用解瘡毒

白芷胃風湯 四四

治氣虛風熱面目麻木或牙關緊急眼目瞤動

白芷 各二錢半

升麻 各一錢半

當歸 各一錢半

易根 各八分

草豆蔻 一箇煨去殼

黃柏 炒

蔓荊子 炒

藁本 各八分

羌活 各一錢半

葛根 各一錢半

白芍藥 炒

甘草 炙 各一錢

石水煎服

葛根湯 四五

治時毒發腫痛而硬利調和者

葛根 各一錢半

牛旁子 半生半炒

甘草 炙 各一錢

石水煎服

犀角地黃湯　治胃火血熱妄行吐衄或大便下血

犀角鏡爲末　生地　牡丹皮　芍藥各一錢　升麻各一錢半

黃芩炒

右水煎熟入犀角末服　治時毒或風熱頭面瘟蒲或咽喉不利或

犀角升麻湯四七

鬚疽疔腮等證

犀角鏡　升麻　防風　羌活各半錢　黃芩各一錢　甘草六分

白附子

右水煎服入犀角末服　治心脾壅熱舌上生瘡或木舌重舌或連

玄參升麻湯四八

頰兩邊腫痛或咽痛發斑並治之

元參　升麻　赤芍藥　犀角　甘草各三錢　黃芩各五分

桔梗炒

管仲

升麻水二鍾煎八分入犀角末合
升麻黃連湯 四九 治胃經熱毒腮腫作痛或發寒熱
升麻 黃連 川芎 牛蒡子 治癰疽時毒腫痛焮腫
升麻 白芷 各一錢 治腦疽癰毒邪氣鬱滯不行者
連翹 當歸 各一錢半
白芷 各一錢
連翹 玄參 各三錢
升麻 樸硝 各一兩
白蘞 防風 射干 各一錢半
連翹

秘傳連翹湯 五十 治癰疽時毒腫痛焮腫 羌活連耳後加出梔柴胡
連翹 大黃一兩二錢 甘草炙五錢 苦仁八十個去皮尖同麩炒黃另研
升麻 甘草 各一錢 末香
乳香 沒藥 各一錢半
末香 丁香
黃芪 連翹

五香連翹湯 五一 治腦疽癰毒 每服五七錢水煎服下惡物後服內托之類
乳香 沒藥 各一錢半
末香 丁香
黃芪 連翹

升麻　木通　甘草各一錢

右水煎服

復元通氣散　治乳癰便毒及疝氣亢進腫痛及疝氣

撲損傷閃跌作痛及疝氣亢進腫痛及疝氣

木香　烏上茴香　炒　青皮　陳皮　各等分

白芷　甘草　貝母去心　川山甲炙

右爲末每服三錢温酒調下

當歸散　治乳癰腫痛及一切氣滯腫毒或打

當歸　桑寄生　獨活　蒲黄炒各半兩　辰砂一錢

川山甲炙炒　蚤白率牛用炒　無白芷漏蘆

右爲末每服三錢熱酒調下如不飲酒薄荷醋湯亦可

方

脈流氣飲 五四

胸痞悶咽塞不利
脇腹膨脹嘔吐不食上氣喘急
面目四肢浮腫大小便秘

當歸 川芎 芍藥炒 茯苓
黃芪炙 炙甘草 紫蘇炒 青皮
烏藥 半夏制 桔梗炒 木香
防風 陳皮 枳實麩炒 大腹皮
枳殼麩炒 檳榔 各五分

水二鍾薑三片棗一枚煎六分食遠服

治流注及一切走痛或悲怒氣結腫痛或胸膈痞悶或風寒濕著搏於經絡致成腫塊因色不變或漫腫木腫

當歸酒目 黃芪炙 炒脇木 芍藥

官桂　厚朴　甘草
紫蘇　枳殼　烏藥
檳榔　木香　川芎
右水煎服

陳氏獨聖散　五六
行氣通血也如凡患瘡瘍皆因氣血凝滯宜服香劑蓋香能
香附子　薑汁浸一宿焙乾　防風
研末　此入茶飲之　桔梗炒各七分
右無時以白湯調服二錢〇潰後以昌方小烏沉湯爲允妙

乳香定痛散　五七
治瘡毒損傷血凝氣滯腫痛
乳香　沒藥各另研　羌活　五靈脂
獨活　當歸　川芎　白芷各等分
肉桂　歸尾　膠香酌各半　白芷　白蘞　真綠豆粉

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼薄荷湯或酒送下

手足損痛不能舉動加草烏五錢鹽湯送下

清熱消毒散 五八 治乳癰吹乳並便毒此藥如無前證即服此藥

金銀花 青皮 天花粉 柴胡

殭蚕炒 貝母 當歸 酒拌 白芷 各一錢

水二鍾煎一鍾食遠服如治便毒加大黃二錢煨用忘忘

清熱消毒散 五九 治一切癰疽陽證腫痛發熱作渴

黃連炒 山梔炒 連翹 當歸 甘草 各一錢 川芎 芍藥 生地 各一錢

金銀花二錢

右水煎服

痛痓 黄連消毒散 六

黄連 炒 黄芩
桔梗 葛本
連翹 防風
生地 各四分 陳皮
蘇木

右水煎服

連翹消毒散 六

連翹 二兩 梔子
方涼膈散 大黄
黄芩 各五錢 朴硝 二錢
甘草 半兩 薄荷葉

右每服一兩水煎溫服

治癰疽發腫疼痛或痲木

黄芩 各一分 黄柄
防已 各五分 歸尾 炒
獨活 知母 炒
甘草 各三分 黄芪
澤瀉 各二分

治癰疽實熱諸證○亦名清涼飲亦即局

加味解毒湯六二
治癮疹實熱大痛不止
黃芩炒 黃柏炒
黃連炒 黃芪
當歸酒拌各甘草炙
白芍藥

連翹
梔子炒各一錢
解毒防風湯六三
治瘡疹或痛
黃芪
荊芥各一錢
防風
枳殼炒
地骨皮

水二鍾煎服痛即止

水煎徐徐服
陳解毒防風湯六四
方在瘡疹五六
治瘰癧堅硬氣血無虧宜用之
散腫潰堅湯六五
柴胡
黃芩炒各四分
白芍藥炒
升麻

連翹
乾葛
天花粉
右水煎服
瓜蔞托裏散 六
既潰則生肌
黃瓜蔞一枚碎個忌冬瓜
沒藥三錢
甘草二錢
右用酒三碗煎二碗空心日午臨睡分三服
酒糊丸彈子大
朱砂爲衣
萬金散 六七
一名內托散
血之功
黃柏酒炒
歸尾各二分
乳香各一兩
蘇木五錢
三稜酒炒微炒
龍膽草酒炒
昆布各五分
炙甘草二分
蓬木
卽母酒炒
右治瘡瘍毒盛者未成則易消已成則易潰未潰者有消毒破

括蔞一個 杵碎

右用酒二碗煎一沒藥一錢研

製甘草湯六八

用大甘草一兩炙

按前水浸透再

分空心服嘗有

用大甘草二斤

礶收貯每服一

方治癰疽用生甘草爲末酒調服二錢連進數服自消

二匙酒調眼或

梅花飲子 六九

癰疽初起服之

川芎 乾葛 天花粉 黃芪

烏梅 甘草 蘇木各一兩 忍冬藤四兩

右作四劑水煎服

牛膠散 七十

治癍疹血熱內攻不得發出

牛皮膠 廣中明四兩者

右用酒一碗重湯煮化加酒服至醉不能飲者

明膠飲子 七一

治一切癍疹毒毋

明廣膠 蛤粉炒珠粉

粉甘草 各一兩

橘紅 五錢

右以生甘草煎湯調時時服務使藥氣常在膈間

護心散 七二

治癍疹血熱發狂之毒毋

石决明 研細 牛黃 研 各一兩

麝香 另研 朱砂 另研 各五分

白茯苓 各五錢

白豆蔻 四兩 研末

綠豆 四兩 研末

珠粉 另研

朴硝 另研

右為細末每服三錢白湯調下

綠豆散 七三

治癍疹血熱腫痛飲食如常者大宜用之

綠豆末 一兩

甘草 二兩 生用

人參 一兩

右為細末每服三錢白湯調下

清心內固金粉散 七四

治癍疹血熱發狂之毒毋

金花散 解毒清心流行氣血

雄黃各一錢
氷片五分
右為末每服二錢壹湯調下
蠐螬攀九七四
一名黃蠐九◐治久
疼痛護臟腑神妙
不問老少皆可服之
黃蠐一兩黃色佳者溶開離火入麝末◐一方止用七
錢
白礬一兩明亮淨者研末每服二三錢壹湯調下
右二味和勻加至四五
十九熟水或鹽湯
送下日進三服服至三四兩方止
右二味和勻加至四五服溫酒
其功矣◐加服金石發疽一切癰疽托裏止
調下九效◐
有人遍身生瘡狀如蛇頭名曰蛇頭瘡
之◐治蛇毒咬傷熔化敷塗傷處痛止毒出仍服兩許
◐此方不惟止痛生肌而已其後膜止瀉消毒化膿及治癰

排膿托裏之功甚大

千金化毒丹 治諸惡毒

用白礬三錢糊丸以蕊頭七莖煎湯送下則腫痛俱退再用

仙方活命飲二劑以去其餘毒此本方原用礬末以蕊湯調

服因湯難服故易為丸○一方 治癰疽不問膿潰先用此

藥三服後用消毒藥甚效常治

托裏藥亦愈若金石毒藥發疽者

亦效蓋礬能解

也○一方用礬末五錢硃砂五

分熱酒下亦效此藥托裏固

內止瀉解

毒排膿不動臟腑不傷

其功甚大偏

五福化毒丹 治咽喉牙口瘡

患處更以熱消調末服皆效

瘡毒腫痛並小兒

一切熱毒

玄參 桔便各二兩半 茯苓三兩半
牙硝 青黛各一兩 甘草七錢半
金箔二十片 麝香少許

右爲末煉蜜九茨實大每服一丸溫荷湯化下◉若瘡毒上攻口齒生瘡以生地黃汁化服及用鷄翎掃付患處

奪命丹 七七 治疔瘡發背等證或麻木或嘔吐重者昏憒此藥服之不起者即起不痛者即痛甚痛甚者即止昏憒者即甦嘔吐者即解未成者即消已成者即潰有奪命之功乃惡證中之至寶也

蟬酥酒化 輕粉 麝香各五 枯礬
寒水石炮 銅綠 乳香 沒藥各一錢
硃砂二錢

右爲末用蝸牛或酒糊揭先綠豆大每服二三丸溫酒葱湯

下或用慈白三四寸病者白嚼爛如
酒和蕊送下
外用一九八行五七里汗出
飛龍奪命丹 七
乾蟾酥二錢 化沒藥 乳香 乳香 輕粉 冰片 各五分
雄黃各二錢 硃砂 硃砂 血竭 蜈蚣 各一錢 各一
枯礬各一錢 各一
蝸牛四十九個研爲
蟾蜍白一口 治一切疔瘡毒
瘡出汗則愈神效
寒水石
右各研爲細末取蝸牛蟾酥研勻入諸末熟杵丸綠豆大硃
砂爲衣每服四五丸嚼葱白一口吐在手心將藥包葱內用
温酒吞下須臾汗出或少吐瀉毒
立齋曰前回生丹乃慄悍攻毒之
劑也蓋無經不至無氣不
動者後奪命丹尚緩若食一切禽
獸毒物及瘡疾

毒盛者在內血惡毒證凡宜汗吐者當用前丹有神效若老弱之人或瘡毒稍輕者宜用後丹或爲艮

圓生丹 七九

治神效

切疔毒並有神效

金鄒信 明礬砂 明乳香 不去油 明雄黃 各五分

上紅丹 各五錢 巴豆肉 十五去二 大班猫 頭足翅

南硼砂 各一錢

右爲細末旋取瘡酥和丸麻子大朱砂爲衣每服十五丸好酒下看瘡生上下食前後服飢飲毒氣入腹用此藥能起死回生服時毒腫甚咽喉不通氣散六十

治諸毒

川芎 半夏 大南星 各一錢 藜蘆 五分 無此

半蹲鴟蹋花三錢 牙皂 一錢半 玄參

右爲末用糸瓜絡燃
黯少許入鼻
角川芎北細辛三味即所亦
若通關散爲妙方在
梔子仁湯八
方在寒痺十
九
治發熱狂躁咽
喉腫痛
六味梔子仁湯八
二
治時毒
膿痛大便祕結脈沉數
山梔炒 枳殼 大黃煨 升麻
牛旁子炒 鬱金 等分
右水煎服或爲
細末每服三
錢蜜水調下
清肝益營湯八三
治肝膽小
腸經風熱血燥
筋攣結核或耳
項腋乳脇肋作
痛並一切肝
火之證
山梔 當歸 柴胡 芍藥炒 川芎 各七分 木瓜不犯
錢 茯苓 各一
錢

地
水煎服○大便若秘量加大黃
八參
柴胡各一錢半
水煎服
濟
陰會湯 八五
治瘡毒 純陽
山梔 炒
芍藥 一錢半
甘草 各一錢
水煎服○大便若秘量加大黃
治瘡瘍氣虛
黃芪
白茯苓
清
心湯 八四
即防風通聖散每料加黃連
玫瑰十六
治瘡瘍腫痛發
熱飲冷脉沉實睡語不寧右方
五錢每劑用二兩水煎服方在
白朮二錢
熟地 一錢半
石膏兼煎服
瘡發熱
黃芩 炒
黃連 炒
牡丹皮 二錢三分
金銀花三錢
內熱煩渴不寧
生地黃
石膏煅
地骨皮
知母各錢

味苦參丸 八
苦參 不拘多少爲末
右用水糊丸桐子大每服二三錢溫酒下
陳苦參丸 八八
氏
治遍身搔痒
苦參四兩 玄參 土貞連
獨活 枳殼
梔子 菊花 各一兩
治一切癰疽瘡癤初腫作痛或煩躁
五利大黃湯 八九
大黃 治時毒煩渴便秘脈實而數
黃芩 各二錢
水一鍾半煎
栀子 各一錢半
黃芩 升麻
清涼飲 九十
治癰瘍熱毒熾盛大便秘結

毒散

連翹二兩　黃芩各五錢　大黃　甘草二兩半　山梔子　薄葉

右每服二兩水煎服

宜毒散九一治

大黃煨　白芷各五錢

水二鍾煎一鍾食前服

立齋曰此方乃宣通攻毒之劑蓋脉沉實便秘者毒在應也宜服之其功甚速若脉浮虛者毒在表也不可用醫林集要

方用大黃二斤白芷六兩爲末每服三錢執滿下更用茶清調搽患處名曰萬金散蓋因其功而珍之也

九以便於服亦可隨患者憲兒患背疽堅硬脉沉實乃毒在內用一服大小便下污物再服而消此一葉故

以此嘗驗者
治一切癰疽腫
毒其功不可
盡述

拔毒散 九二

乳香 沒藥 當歸 木鱉子 炒 連翹 各一錢 貝母 各七分 甘草 炙 五分 忍冬藤二錢

右水酒各一鍾煎一鍾食前服之此方攻毒止痛化膿之良劑也屢用屢驗若膿成或已潰者大黃可不用恐泄其真氣則膿者難潰潰者難斂也亦宜有膿雖潰脉仍洪數或沉實者

內疎黃連湯 九三

治瘡瘍發熱而喘大便秘結脉洪而實

黃連 黃芩 各一錢 甘草 一錢半 芍藥 梔子 薄荷 檳榔 大黃 各一錢半

漏蘆 桃仁湯九四 逐瘀血

千金漏蘆湯九六

右每服四五錢薑水煎服

漏蘆 桃仁 炒各三錢 水蛭 炒各三十個

右每服三錢水一盞煎六分空心服

漏蘆湯九五 治腦疽瘡癰瘡成膿貫者

漏蘆 黃芩 大黃 微炒 沉香 各五錢

右每服四五錢薑棗水煎服 治癰瘡發背丹疹時行熱毒赤腫熾痛

蕳地黃五錢 連翹 去足 炒 白蘞 麻黃去節 升麻 柴胡 各兩 粉草

大黃 濕紙裹煨 黃芩 枳殼 麩炒 各兩

右每服五六錢童水煎去柤空
漏蘆升麻湯九七　治時毒頭面
臟腑素有積熱發爲腫毒疙瘩
漏蘆二錢　升麻一錢　牛
一切紅腫惡毒
玄參　藍葉　如無用大黃酒五重用之
牛旁子炒研　苦梗
水煎服大利之結者加芒硝
治腸胃伏火大腸
潤腸丸九八　通之若結在直腸宜用豬膽汁
乾燥或風熱血結宜用此丸
陰若津液不足腑氣
導之蓋腎主五液開竅於二
滋潤則大便通調若
津液不足腑氣
損必當培
補乃忌此藥
桃仁大
尖
大黃炒
皮
麻子仁各一兩一羔活
皂刺
秦
歸尾
九錢各五

右各另研爲末煉蜜或猪膽汁
爲丸桐子大每服三四
十九白湯下若用猪膽汁導而糞不結
燥者須急補元氣

沒藥九九 善逐滯血

當歸二兩 桂心 芍藥 去足 水煎 各三兩 虫 去翅 炒 各一兩 乳香 研 桃仁 去皮尖 各半兩 炒 各三十個

沒藥 各三錢

右爲末猪脂九桐子大每服三
五九空心酷湯下

當歸九 百

行血利水通大便

當歸 半兩

大黃 桂 各一兩半 生半熟

右爲末煉蜜九如彈子大每
服一九空心米飲化下

破棺丹 百三

治瘧熱極汗多
大渴便秘譫語發狂

蓽撥 各二錢

人參 甘草 各二錢

煉蜜九如彈子大每服一
九酒化下白湯亦可

赤芍藥 各三錢

逐瘀黑妙 半錢

忍冬酒子三錢研碎
忍冬藤 鮮者四五兩若乾者止用二兩生用
大甘草 節即
二味入砂鍋內以水二鍾煎至一鍾再入無灰酒一鍾又煎
數沸去相分三服病重者晝夜兩劑至大小便通利爲度另
用忍冬藤研爛入酒少許冤患處
銀花酒 百三 治一切癰疽發背疔瘡喉痺等證
用金銀花藤葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾溫服甚者不過
三五服可保無虞
槐花酒 百四 治癰瘍熱毒最妙
用槐花四五兩炒微黃乘熱入酒二鍾煎十餘滾去粗熟服
未成者三服已成者二服但察其有熱毒未清者皆可
用棉花治濕熱之功最爲神速惟胃寒者不宜服大抵腫

速

蒲公英酒 百五 治乳癰吹乳不問已成未成皆可用

用蒲公英一握搗爛入酒半鍾取酒温服祖貼患處甚者不

過三五服即愈

遠志 百六 能托散諸毒治女人乳癰尤效

遠志淹泡去心 不拘多少用米泔浸洗槌去心

右爲末每服三錢用好酒一鍾調温遲少頃澄清飲之以滓敷

患處

牛膝酒 百七 治楊梅風毒腰痛

牛膝 川产 羌活

村仲 甘草 地骨皮

生地黄 十兩 海桐皮二兩 薏仁各一兩

石吹咀用帛裹入無茨酒浸一七日良月三五日每服一盃
日三五次

消腫酒方

昆布二錢　海藻五錢　沉香　木香各一錢
海螵蛸二末

右爲咀用好酒一升湯煮任意每服一二鍾或浸十餘日亦
可飲

桑枝煎方　大治口渴

取嫩桑枝細切三升炒以水三升煎一升日服三五劑更妙
尤妙抱樸子云療風痺乾燥痛痹筋痛脚氣四肢拘攣上氣咳嗽
久服補肺消食利小便輕身耳目聰明令人無病

神仙戴法方　治癰疽發背一切惡瘡預服則毒氣不入內

麻油一斤銀器內熬十數沸候冷
右用酒兩碗入油五盞通口熱服一日用盡緩則數日服之
○吳安世云吾家三世用之無有不效又聞獵者云凡中藥箭急飲麻油藥毒即消屢用甚驗○按右方凡中藥毒者宜用之以疏通其毒若陰毒及大便不實者乃非所宜

砭法 百一

治丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血瘧盛用細磁器擊碎取有鋒鋩者一塊以節一根劈附頭尖夾之用線縛定兩手指甲輕撮筋尾令磁鋩正對患處約懸寸許再另用筋一根頻擊筋頭令毒血隨刺皆出毒自減退若毒氣入腹膨脹者難治

治咽喉急痛

刺少商穴百十二穴在手大指內側去爪甲角如韭葉刺入二分許以手自瞢

勒至刺處出血即治若重而曲淵成者必須刮患處否則難治

洪元相與鍼法云癰瘍勢炊壽盛血凝不散者宜用此法以殺其勢

治癰初作先以筆管一竹口對瘡頭使頓吮惡血得去其毒毋即散如瘡大須換三四條止以綿節上泥塗之卽止若瘡頭未明以并邊泥塗上先乾處卽是

治一切瘡瘍無有不愈

其法令病人以手附凭几而坐男左女右將手臂竪起惡直曲處橫紋間量起貼肉直上至中指尖盡處截斷爲則不量指甲另用竹扛一條令病人脫去正身騎定前後用兩人扛起令病者脚不着地仍使人扶定勿令偃僕郎將前量竹扛上尾骶骨坐處直貼脊背

量至後盡處記記之此取中之處非灸穴也又用薄篾量男左女右手中指節同身寸法將此寸篾即安前脊中點記處兩橫紋處截為同身寸篾又將此寸篾安前兩邊各開一寸盡處即是灸穴各灸五七壯疽發於右則灸右左則灸左兩邊俱甚則左右皆灸蓋此穴乃心脉所過之處凡二疽皆心火之留滯灸此則心火流通而毒自散矣有起疔回生之功屢試屢驗

神仙隔蒜灸法 百十五

治一切癰疽瘡毒大痛或不痛或麻木及治一疔毒氣臟盛使諸疽癰癤瘡毒從治之法也大有回生之功

膿已潰膿者不能收斂等證如痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散此攻散癰毒從治之法也大有回生之功

痛去皮切三分厚安瘡頭上用艾壯於蒜上灸或三五十壯或二三百壯愈多愈妙未成為害如瘡大用蒜搗爛攤

之五壯換蒜復灸

皆劇消已成者亦殺其大勢不

患處將艾鋪上燒之蒜敗再換或陰毒紫白色不起發不作膿者尤宜多灸仍服托裏之劑如灸後仍不作膿不起發者不治此氣血俱虛不能收斂或風寒襲之以附子餅百十六

治潰瘍氣血虛極也

致血氣不能運行皆令不斂用炮附子去皮臍研末以唾津和爲餅置瘡口上將艾壯於餅上灸之每日灸數壯但令微熱勿令痛如餅乾再用唾津調初務以瘡口活潤爲度

豆豉餅百十七

治瘡瘍腫毒堅硬而不潰及潰而不斂並一切頭瘡惡瘡用江西豆豉餅爲末唾津和作餅子如錢大厚如三文錢置患處以艾壯於餅上灸之如未成者亦殺其大毒如有不效必氣血虛敗也

木香餅百十八

治一切氣滯結腫或痛或閉肭及風寒所傷

作痛並效

右以木香為末生地黃林膏和勻量患處大小作餅置腫處
以熟艾斗熨之

香附

痛用香附為末酒和量瘡毒大小作餅覆患處以熱熨斗熨之
餅百十九治瘰癧瘰流注腫塊或風寒襲於經絡結腫或
未成者內消已成者自潰若風寒濕毒宜用薑汁作餅

神效

治發背不起或痰肉不潰此陽氣虛弱用桑枝燃着吹熄其
火灸患處片時日三五次以助腫潰若腐肉已去新肉
生遲宜灸四畔其陰瘡瘰癧瘰流注臁瘡惡瘡久不
愈者亦宜

焰

用之大抵此法未潰則解毒止疼痛消瘀腫已潰則補陽

氣散餘毒生肌肉若陽證腫痛出毒膏水即內消其日久者用之雖潰亦淺且無苦楚惜愚者不知有此治者亦不肯用此也

神效蒸熨法 一二 治流注結核骨癰鶴膝肢體豐腫塊或痛或不痛或風寒襲於經絡流注腫痛或跌撲損傷體筋攣骨痛之長法或先用隔蒜灸法而行續滯其功甚大用熨以助氣血而餘腫未消最宜用蒸煎湯薰洗傷處亦妙○或敷患處冷即易之再或熱熨數次腫痛即止其效如神○或用葱頭細切杵爛炒熱薄餅盛患處用熟物熨之或鋪葱一大把煮熟包裹其患處亦妙○或用葱二大把煮熟必易餅炙熨爲

雄黃 硃砂 血竭真者 沒藥各 錢

右五味研細未用綿紙搓爲粗
撚約長尺許每撚中入藥三
分裹定以真麻油潤透點灼瘡
圈周圍徐徐照之以漸將撚收
更須將撚猛向外提以外毒氣
出內透瘡中此是手法此藥氣從火頭上
入瘡口上所謂自外而內也
五七條瘡勢漸消可漸減之晝
夜隨氣散自不內侵臟腑初用三條漸加至
廣陵李柱云背瘡所患惟內攻
與外潰耳證屬火熱出勢必傷潰膿者
成不能外散勢必內攻不能中
薬圍解多懼維此二患又陰瘡不
後用薬敷圍追膿止痛毒從孔
起紅量漸如蒸餅
陰瘡一

中大畧也照法日毋一次初
根或五根再
次漸至六七根
者不過六七日腐肉盡化爲
石榴子顯顯
而生此時不必
照圍後不可聽
醫用膏藥貼蓋以
止刮蕊葉量
圍藥如法薰
照待瘡勢大盛
以太乙膏攷
復後膏藥猶不
大要不出十
宣散護心散等
方最爲寒涼恐
惱怒鬱結厚
味所致受病以
非懲念室慾清散托裏治以
又前方初止
切腫毒無不收
醫貴變通神
用撚三根或四根次日用四
止大率看瘡輕重酌撚多寡重
膿從瘡口中陸續湧出新肉如
再照圍藥終始
如一隨瘡勢大
小漸漸收入
止刮蕊葉量
圍藥如法薰
照待瘡勢大盛
以太乙膏攷
復後膏藥猶不
大要不出十
宣散護心散等
方最爲寒涼恐
惱怒鬱結厚
味所致受病以
非懲念室慾清散托裏治以
又前方初止
切腫毒無不收
醫貴變通神
用撚三根或四根次日用四
止大率看瘡輕重酌撚多寡重
膿從瘡口中陸續湧出新肉如
再照圍藥終始
如一隨瘡勢大
小漸漸收入
止刮蕊葉量
圍藥如法薰
照待瘡勢大盛
以太乙膏攷
復後膏藥猶不
大要不出十
宣散護心散等
方最爲寒涼恐
惱怒鬱結厚
味所致受病以
非懲念室慾清散托裏治以
又前方初止
切腫毒無不收
醫貴變通神
而明之存乎其
人耳余不佞善
治背疽其後一
年計愈久則愈
前方即盧扁復
生有望而走耳
攻法無定則
病故留心方術

然未經累驗不輕授人此一方初驗於化南再驗於陳大叅
景由及范中翰舍初其他證候雖應手取效輒
贅其詳於此其傳則道人孫氏今大播廣陵余先
池陽永陽俏云王孝廉良甫爲余言廣陵人有善祕
瘡渠發背神良已求得其禁方矣余識之已曾歲余客廣陵
偶栝腫北于股招所謂善療者照之不膿得愈又館友胡舍
素患發背大如覆盂袖嘈嘈嘈嘈矣延瘍醫至束手待肉腐靡
方可用膏徐長肌肉問其術曰百日果如其
說則舍素將成烏有矣遂急同
之一日痛止三日神清如脫
梓梧釋重負肉腫如盂者日
縮而小蛆未嘗腐也不月餘
膿盡爽然起矣奇矣哉不表
而汗不針而潰不灸而悄蛆不
補而實不下而毒

之針刺不必用也至理歸於易簡大道本在目前所謂不可
不思議者也古今道術入妙者皆如此類並重刻之故爲此
敘
曲梁聶雲翰云戊戌春暮余病疽宜京邸疽據背
初發微若黍粒搔之痛痒悶心寒熱交作甫十
日不一瞬醫方所載逆便結面目
已十犯八九兩絶復甦自分無生手繪後事俱
李省衡所傳與大指授仙方如法熏敷越二日
起色不易方而痊竟就痊距初發浹甘旬歸家出以
踰月重亦不出百日靡不起者蓋余所感毒毋極重勢極大又
治極遲即二三內外科名家皆束手失色以爲從所未聞未
見及試八則取驗更捷蓋感有輕重治有遲急也顧余非此
異方不能起余必死異證非余起死回生不能白此方之神

異余以此方活安忍矣予八以此證危因慮此方莫獲廣沛於天下又慮天下忽視此方而不加篤信或亂於耶功不已出之醫山疑似轉盼間致憾大事而每無及也爰為此方之引

咸林王維英云一壯瘡起如銅錢四圍腫覺退筍中蕾此仙方丙午端陽日余在臂患瘡其大如拳用騎仔邊化為稠膿徐內潰枯同膠鰾每日加法薰許傷串三孔奢外一指日中尖毒內脫落一條共有十三孔奢外一指日收並未再串其原載整樂長安市若不產茅蒼五龍二草且痛且痒即極力趕之初出黃水次出稠膿後流清漿躍息止用金銀花三色敦之乾則覺痛去之不敢並未川生肌

散惟護以大乙青
對無二即照撚十條敷以赴
五條三日頂破膿出不痛
不痒其毒盡散同時有蟲別瘡者
余付此藥薰之隨薰即散
並未成形遁知是古
眞仙方哉持此療瘡大下
無瘡矣余恐世人
又恐因敷藥不全
終始以神此方之
敷藥不用亦可也故備述
洗藥神效散 二三 洗陰
濕諸瘡
蛇床子三兩 朴硝一
右每用二兩水二碗煎數
沸洗瘡拭乾掺生肌藥
雄黃解毒散 二四 治一
切癰腫潰爛毒勢甚者先用此藥
雄黃一兩 寒水石煅一
白礬四兩

右俱爲末用滾湯二碗乘熱入藥末一兩洗患處以太乙膏或神異膏貼之

猪蹄湯 二五

白芷
獨活
用猪蹄一隻水四五碗煮熟去油相取清湯入前藥末一兩許煎十數沸去粗温洗惡肉隨洗而下隨用膏藥貼之○按此湯不必用黃芩或以白蘞易之更佳

生甘草
黃芩
當歸
露蜂房 連子者佳 各五錢
赤芍藥

集香散 二六

白芷 各三錢
防風
甘草 各一錢
藿香
茅香
木香
香附

治一切癰疽初起瘡潰爛去惡肉潤瘡口止痛

右用水三碗煎數沸去粗淋洗患處

立齋曰此乃聞香則行得氣則通也凡瘡

毒將盡未盡宜
川此方津後須
口爲度最忌用
敷藥方一二七

車前草

蒲葵草　金銀花

五瓜龍草

右四味鮮草一
時仍加飛鹽少
許共調爲稠糊
冬時無鮮者用
乾葉爲末陳醋
亦可奏功不必
得即用四味
毒盛者須內服
藥數劑則萬全
秘傳圍藥鐵井欄
一二八

敷一切惡瘡膿盡收斂消腫神效

牛糞灰　晒

燒灰用新磁罐盛之乾處加倍用

鐵線草　艾葉　烏
白斂　貝母　陳小
右爲末用高醋熬熟調藥如糊敷瘡口
氣乾則易之瘡四圍中留錢孔以出毒
大黃搗毒散二
勢盛甚者用飛龍奪命丹等藥出汗無不效

大黃一兩　白芨一兩　朴
半　消
右爲末井水調搽乾則潤之

草烏搗毒散百三十
治一切癰疽腫毒

芙蓉葉　貝母　天花粉　南星等分
草烏　
右爲末用醋調搽四圍中留頭出毒如乾用醋潤之
抑陰散一三一
治瘡瘍元氣虛寒發腫不消或不潰斂或筋
攣骨痛一切冷證

苗烏二兩 南星煨 肉桂五錢

右爲末蒸湯調塗熱酒亦可

抑陽散一二二

天花粉三兩 各洪寶丹○治瘡屬純陽腫

陰陽散一三三

右爲末茶湯調搽患處

紫荆皮炒五兩 治瘡屬半陽

獨活去節炒赤芍藥炒白芷各二兩

右爲末蒸酒調搽

神功散一三四

黄栢炒 黄芩炒各一兩

水調入香油少許搽患處如乾仍用水潤之

右爲末用漱口諸發背癰疽及諸瘡不問腫潰皆效

芙蓉葉　大黃　白芷　黃連　雄黃　南星　金線重樓

右等分爲末密水調敷腫處以翎頻掃之

二黃膏 一三六

黃稍　大黃各等分

右爲末用醋調敷一切腫毒熱浮在外或時氣熱蘊者

五　治大頭瘟腫甚者以此藥敷之

白鮫　黃柏　山茨茹

右爲末用水潤之傳如乾用水潤之

七　治陰疽發背寒邪流注風濕沿痺諸腳

芙蓉霜桑葉　黃芩　芒硝

右爲末用醋調敷涼藥或入元氣虛寒腫色不變久而不潰潰而不

飲或鼓雖風筋攣骨痛一切陰寒冷證皆一藥也

草烏 肉桂各五錢 黃芪 炒各一兩 白芷

右爲末蔥頭煎湯調搽或熱酒調塗

治一切瘡腫不甚熱炒熱積日不消

赤芍藥 炒各二兩 紫荊皮 炒兩 五加皮 去節炒 獨活 三兩 蒼蒲各兩

右爲末蔥頭煎湯調搽

麥飯石膏一三九

治瘡疽初起先以麥飯石膏塗之俟瘡根漸收即敷神異膏飲之但麥飯石膏最難於脩合用神異膏亦效

白麥飯石方如飯團粒粒粘結成塊者即是哲可用也

鹿角 生取帶腦骨者斷之用灰火燒炮畫研極細四兩

黑未子百四十

治癩毒

用羊角連內骨燒存性爲末酒調三錢分上下服之瘡可散

○立齋曰此方未嘗用蓋秘方也或痒或瘡毒此而不治亦乃殺人以羧羊角燒存性研爲極細末以雞子清調塗之甚效本草亦云然

右用米醋調和入砂器煎以竹片不住手攪熬成膏先用猪蹄湯洗患處以鵝翎拂塗四圍乾則以醋潤之若腐爛者用布帛攤貼之○李氏曰麥飯石膏治發背癰疽神妙惜世罕知有患癰不潰而危者全用此膏一夕頓潰九痕始解或有不潰者須用此膏故錄之俾精擇修合以取十全之功也嘗見世間醫者每有妙方秘而不傳或更改以貳人誠可惡也余思洒華麥飯石膏寧死不傳其立心私刻君子鄙之矣

乳香定痛散 治瘡瘍爛潰痛不可忍諸藥不效者

乳香 沒藥各二錢 寒水石 煅 滑石各四錢

爲細末搽敷患處痛卽止此方乳沒性溫佐以寒劑制之故寒熱之痛皆妙

烏金膏 一四二一

治發背中央肉死塗之卽生若初起腫痛用點數處則解未死塗之卽潰若瘡頭痛元氣無虧久不收斂者內有毒根以紙撚蘸維其內有等發背因元氣虛弱或因剋伐元氣虛虧或因用藥損毒氣散漫中黯外赤不腐不潰須服大補之劑中塗三四寸許至五六日間赤黯之界自有裂紋如刀劃之狀中央漸潰漸脫內用純陽之藥以接其元氣庶能收斂若用刀鍼去肉出血則陽隨陰散元氣

愈傷或塗涼藥則毒氣不解氣血愈虛非徒無益適以害之矣○其方用巴豆去殼炒黑研爲膏點腫處或拴塗瘡肉上則自消化或加乳香少許亦可如塗可用若餘毒不欲者以此維之不致成痛透骨丹一四三

此潰膿藥外科不可缺

蠮螉酥　　硼砂　　輕粉

蝸牛二箇　　麝香一分

巴豆仁　各五錢

右先將巴豆研如泥次入蝸牛麝香再研後入各藥研極細以小磁瓶收藏每用少許以乳汁化開先用針刺破瘡口外用清涼膏貼之

頭挑藥米粒許納於瘡口外用清涼膏貼之

治一切頑瘡內有膿管瘀肉或瘡歷結核不

針頭散一四四

輕粉　　麝香

分各五

化瘡口不合宜此藥追餘腐之

乳香

赤石脂

錢五

右為末搽於肉上其肉自化若瘡口小或疼用糯米糊作細條陰乾維入舛以膏藥貼之亦以膏藥貼之內服托裏之藥

管必須用此腐代鍼膏 一四五

乳香 二分 白丁香 真者 巴豆 炒焦 減各五分

右為末熱水調點瘡頭上常以鹹水潤之勿令其乾治膿成不潰者

白丁香 真沒藥 乳香 各一錢

糯米 四十粒 先以磚灰拳大一塊置磁碗內量入井水息以米排入灰中良久候米如水晶狀取出用之如米未就再用灰製

右各另為末然後和勻收貯用時以飯丸如麥粒大每用一粒

蔥蘆膏一兩八

治一切瘡瘡疽發肉突出不問大小長短用蔥蘆一味爲末以

水濕粘瘡頭上其膿自出○九瘡瘍血氣壯實膿成不潰者宜用此藥以溻其易生瘡口易斂若氣血虛損者須用甘温之劑以培根本否則不惟不潰且難收斂若附骨疽反緊要之地當及時針砭出之爲善

三合散一四七

治癰疽不肯作膿

新巴豆肉 明礬

右爲細末紙裹內惡肉自化

立齋曰此方藥性大毒果有惡毒之證宜用腐之取其以毒攻毒也若以陽氣虛不能腐化成膿者宜用大補之劑及灸之

木灸之丹溪云氣由血氣之盛衰使然也

由血氣之盛衰使然也

治一切瘡瘡疽發肉突出不問大小長短用蔥蘆一味爲末以

生猪胎和研如膏塗患處周日易之

生肌散 一四九

治瘡口不合

輕粉 各二錢 黃丹 枯礬 各五錢

右爲細末用猪膽汁拌勻晒乾再研細揀惠處

立齋曰此方乃解毒去腐搜膿生肌藥也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用敷龍骨血竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生反增腐爛耳若此方誠有奇效故附此須候膿少欲生肌時用之

收口糝藥 一五十

李氏云龍遊有患背疽者大潰五臟俱隔膜耳自謂必死用鯽魚去腸實以羯羊羹烘燥爲末乾糝之瘡口自收此出洪氏方屢用有效故附此須候膿少欲生肌時用之

桔梗湯 一五一

治欬嗽吐膿痰中有血胸膈兩脇作痛煩悶

人參白朮湯

人參 五味子 炒青 熟地黃 白朮 炒 茯苓 炙甘草 陳皮 當歸 酒炒

出盜汗羸瘦困乏一切虛損脯癉之證治如大黃用水二鍾量五片煎八分食遠服大便秘者倍之

治氣血勞傷欵膿咯血寒熱往來夜

生脈桔梗湯 一五一

水二鍾煎服

治肺癰欵嗽膿血咽乾多渴大小便赤澁

方如前但少五味葶藶知母地骨皮四味

作渴或出臭濁已成脯癰證

當歸 白朮 炒 桑白皮 炒 百合 芳 各一錢五分 桔梗 炒 貝母 仁 枳殼 麩炒 薏苡 五味子 炒 知母 炒 地骨皮 甜葶藶 杏仁 各五分 黃芪 防己

祛痰炒

桑白皮炒

枳殼炒

紫苑去苗

桔梗炒

黃芪炙

甘草三片煎八分食後服

治肺癰吐膿五心煩熱進問欵嗽加杏仁亦可為末白湯調

四順散 一五四

貝母去心

紫苑去苗

桔梗炒各一錢半

甘草七分

水一鍾半煎七分食遠服

水一鍾半煎八分食後服

治肺癰久不欵嗽

白欵 二味同煎服

合歡皮飲 一五五

用合歡皮

亦名夜合

合歡飲

治飲食過度或煎煿傷肺欵嗽咽乾吐痰不得安臥肺痿等證

紫苑散 一五六

紫苑去苗

桑葉炙

霜

欵冬花

百合蒸焙

哇血喘急脇痛

杏仁去皮尖 各二十枚
蒲黄炒 各一錢
水一鍾半生薑三片煎七分入
阿膠炒酥 粉貝
母去心 半夏製
人參 犀角鎉 甘草炙 各五分
升麻湯一五七
川升麻
黄芩炒
水二鍾煎八分食遠服
治肺癰 胸乳間
桔梗炒 薏
赤芍藥炒 牡
丹皮 生甘草 各一錢
如金解毒散一五八
桔梗一錢
甘草半一錢 黄
山梔炒 各
七分
治肺癰
桔梗一錢
黄芩炒 連炒
水二鍾煎八分徐徐呷之續飲之
解毒之劑也凡發熱煩渴脈洪大者用之即效若脈數欬嗽
不可急服○按此方乃降火
腥臭或吐膿痰宜用桔梗湯

如聖柏黃丸 治肺癰欬而腥臭或唾膿痰不問時候

成否並效肺家之病雖有方惟此力功效甚捷不可忽之

石膏一兩 貝母 百合 霜桑葉 甜葶藶 各五錢

右為末用糊為丸如桐子大每服三五十丸米飲下○柏黃狀如靈芝江南最多北方鮮有

治過食煎煿或飲酒過度致肺癰喘不能臥及肺癰濁唾腥臭

甜葶藶 桔梗 炒 瓜蔞仁 炒 桑白皮 炒 葛根 各一錢

右㕮咀每服八分食後服

甘草升麻湯 治肺癰喘嗽不已往來寒熱自汗

川升麻 甘草 各五分

知母茯苓湯 大一

茯苓 炒 貝母 知母 炒 白朮 五味子 炒 麥門冬 半夏 人參 各一錢

右㕮咀每服三錢水一鍾半生薑三片煎八分食後服

薄荷　桔梗　柴胡　款冬花　各一錢　阿膠　蛤粉　炒　黃芩　炒　各二錢　川芎　五分　水二鍾煎一鍾食遠服

四味排膿散　治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽

綿黃芪　監水炒　白芷　人參　等分　治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽

右爲細末每服三錢食後蜜湯調下

八味排膿散　治腸癰小腹脹痛裏急後重脈滑數或時時下膿

黃芪　炒　當歸酒拌　金銀花　川山甲　蛤粉　炒　白芷　防風　連翹　瓜蔞　各二錢

水二鍾煎八分食前服或爲末每服三錢食後蜜湯調下如膿將盡去川山甲連翹倍當歸加川芎

四一　名瓜子仁湯○治腸癰小腹中疼痛或服

清不食小便
薏苡仁炒 錢
右水煎空心
牡丹皮散一六
服
牡丹皮
天麻
當歸
木香三分
右水煎服
梅仁湯一六六
梅仁九個去
大黃炒
犀角銼各
冬瓜仁研三錢
右水煎入犀角末服
大便秘澁
牡丹皮
苦
研
治腸癰產
後溫婦人虛
弱多有此證
牡丹皮
桃仁去皮尖
各二錢
治腸癰服
八參
白芷
川芎各一
錢
治腸癰服
濡而痛時時下膿
黃芪炒
桃仁去皮尖
官桂
薏苡仁
甘草各五
分
之九

大黃湯一六七

按之則痛肉色如故或瘀赤微腫小便頻數汗出增寒其脈沉緊膿未成者急服之

牡丹皮 各二錢 瓜蔞仁 各三錢 桃仁去皮尖 大黃 煨

水二鍾煎一鍾食前服○本方去瓜蔞即名大黃牡丹湯○立齋曰此方乃行血破血之劑也如發熱自汗惡寒小腹作痛小便如淋脈未數者有效若惡寒其脈遲緊者膿未成宜下之當有血此結熱所成也故用大黃利其小便金匱用大黃牡丹湯者膿未成宜下無前證恐不宜用此方也若已下宜用八味排膿散或艾葉湯治胃脘癰吐膿血

射于湯一六八

射干去毛　山栀仁　赤芍藥一錢半　赤茯苓　升麻各一錢

白朮五分　白水煎服

槐花散一六九　治腸風臟毒下血

槐花炒　荆芥穗　熟地黃　當歸身酒洗半　青皮　白朮炒　升麻各一錢　川芎四分　調下水煎服亦可

陞二一九　方在和

除濕和血湯　百七十

治陽明虛陷濕熱便血腹痛

夏枯草湯　一七

治瘰癧馬

夏枯草　六兩

召已潰未潰或日久漏者

水二鐘煎七分去租食遠服（此生血治瘰癧之聖藥虛甚者當煎濃膏服益善兼十全大補湯加香附

貝母遠志元參
必效散一七三
外以針頭散
此藥服後瘡
南硼砂二
錢輕粉一錢
白檀桷一
個班猫四十個
研同糊
未取鷄子二個
去黃用清調藥份入瘡內以濕
出曝乾研末瘡者每服半錢實
於五更調服如覺小腹痛用益
元散一服其
者一錢用炒
養營湯瘡口
自合○此藥班
大詢其由彼
云因怒而致因

治癮癥氣血
問無虧損癥核不
首先服益氣養營湯數劑後服
湯數劑
麝香五分
巴豆五個
去頭
米炒
去膜

此猫之毒用者勿畏尋於京
師遇一富商項有
痘痕一片頗

二服即退四服一服平旬日而痊永
之乃是必效散固修合濟人無有不效丹溪亦云必效散加
神效瓜蔞散相兼服之自有神效常以二劑兼補劑用之甚
效故録之但此藥雖云峻利然癆瘵之深者非此不能解故
宜用之惟血氣虛者不可一概用恐當其者誤也○又
證用鶏子七個每個入班猫一枚於上蒸熟每日空心食一
個派者甚多若之各書瘵門及本草亦有之然氣血虛者
恐不能治也

射干連翹散 一名七三 治寒熱瘧瘧

射干	連翹
木香	玄參
升麻	前胡
當歸	梔子仁
甘草	赤芍藥
大黄二錢	

水煎食後服

如神散 一七四

杪香末 一兩 白礬三錢

爲末麻油調搽乾漆亦可

遇仙無比丸 一七五

治瘰癧未成膿其人氣體如常宜服二杪消後仍服前湯如潰後有瘀肉者宜用針頭散更不飲亦宜服此丸飲後再服前湯

白朮炒 檳柳 防風

蜜陀僧 郁李仁炮去皮 甘草銼各五錢

爲細末水糊丸梧子大每服二十丸早晚煎甘草檳榔湯下服至月許覺腹中微痛自小便中取下瘰癧毒如魚肚狀已破

黑丑半生半炒取頭末 白丑炒去足翅粗糠炒米不用

凡頂上結囊欲成癤者
可間斷須要時時飲不三
神效開結散一七七 消癤
楠紅 四兩 沉香
湏封固服赤取
出去火毒用
右爲末每服一錢臨臥酒
調徐徐服下患小
滯氣之物須用除
生地黃先一
治之
生地一兩酒
件杵膏 秦九
黃芩
赤芍藥一兩
木香各一 錢 珍珠 四十九粒入
豬肚肉子 四十 砂確內以鹽
九枚用豚豬
生頂
者三五服大者
數劑可愈切忌酸鹹油膩
七八
治師尼
寡婦室女乍寒乍熱而患瘡瘍及
魚際外無寒邪內多鬱火者宜此
柴胡各半
兩

右爲末入地黃膏加煉蜜爲丸桐子大每服三五十九烏梅湯日進二服

外臺昆布丸 治項下結囊欲成癭者

昆布 酒洗 海藻酒洗各等分

右爲末煉蜜丸彈子大含化嚥之

生菟絲散 治三種毒癭

海藻 海帶 昆布

右爲細末飲爲丸桐子大不拘時噙化四五丸

神效瓜蔞散 一名八二 治乳癰及一切癰疽初起痛腫煩悶消膿

瓜蔞仁 當歸酒炒 生粉甘草各半兩 乳香

沒藥各一錢

右用酒煎服長久再服如不能飲以酒水各半煎之如數劑不效宜以補氣血之藥兼服

以四物柴胡升麻白朮茯苓○若肝脾氣血虛弱佐以四君○若肝脾氣血虛損佐以歸脾湯

苦歸柴胡升麻○若憂鬱傷脾氣血虛損佐以歸脾湯

海藻散堅丸 一八二 消肝經痰

海藻 昆布 酒拌炒焦各二兩 小麥醋煮炒乾四兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服二三十丸臨臥白湯送下或嚼

化痰之劑未應宜於此上二方

連翹飲子 一八三 治乳內結核服數劑如不消宜兼服八珍湯初起有表證者宜先解散

連翹 川芎 瓜蔞仁研 皂刺炒

右水煎食遠服

清肝解鬱湯 一八四

柴胡 茯苓 當歸 甘草 各一錢 白朮 牡丹皮 各五分 山梔炒 貝母 各一錢半 川芎 陳皮 各五分 八參 熟地黃 芍藥 炒 桃仁 各一錢半 甘草 五分 卽

治肝經血虛風熱或鬱久傷血乳內結核或爲腫潰不愈九肝膽經血氣不和之病皆宜用此藥

右水煎服

疏活白芷散 一八五

疏活 白芷 荊芥 甘草 軟柴胡 牙皂

治風熱血燥手掌皴裂或頭面生瘡或遍身腫塊或膿水淋漓

黃芩 酒炒
右水煎服
胡麻散 一八六
胡麻子 一兩
二錢苦參
威靈仙
防風
荊芥穗 何首烏 各八錢
石菖蒲 牛蒡子 炒
白蒺藜 蒸炒 炙甘草 各六錢
治風熱瘙疹搔痒
黃連 酒炒 各一錢
甘菊花
蔓荊子
右爲末每服二錢食後薄荷湯調服茶清亦可
治膿腿瘡瘙痛不愈或眼目昏花名腎臟風並
四生散 一八七
治風癬亦癩瘡血風瘡證
黃芪
獨活
白附子 眞者 白蒺藜 等分
右爲末每服二錢用猪腰子一枚批開入藥濕紙包裹煨熟
空心連腰子細嚼鹽湯送下
檳蘇散 一八八
治風濕流注腳膞或痛吐不食

檳榔　木瓜　陳皮
香附　紫蘇各五分
水一鍾半生薑三片葱白三莖煎一鍾空心服
升麻和氣飲一名八九　治風癬瘡瘍熱結大便不通
當歸　半夏製　陳皮各一錢半　枳殼　炙甘草各五分
乾葛　桔梗炒　白芷　甘草各一錢
大黃各五分　升麻三分
右水煎服
當歸飲百九十　治風濕血熱瘧痙痛膿水淋瀉瘡瘍發熱等證
當歸　川芎　生地　黃芪　白芍　烏不見鐵各錢半　防風
黃芪　何首

荆芥　甘草各錢

羌活　當歸　防風　白芷　川芎　升麻　黑豆　生地　赤芍　連翹　甘草　各一錢

右水煎服

羌活當歸散

治風毒血熱頭面生瘡或赤腫或成塊或瘾疹瘙痒膿水淋漓

羌活　當歸　防風　白芷　川芎　荆芥　黑豆　升麻　連翹　甘草　各一錢

右用酒拌晒乾酒煎服

治癬疥

黃連酒炒　黃芩酒炒　連翹　甘草　各一錢

右用酒拌晒乾酒煎服

治癬疥

荆芥　防風　薄荷等分　甘草減半

右爲末蜜水調服三錢不過三五服可淨○或煉蜜丸桐子大每服五十九食遠茶清送下

一掃散　一九二　一九一

烏金散 一九三
敷瞤裏破爛下疳等證
麩炭
紫蘇葉
右等分爲末香油調搽用紫蘇葉包裹之
四 治一切風癬瘙痒膿水淋漓
蛇床子散 一九四
蛇床子 苦參 防風
獨活
荊芥各二錢
枯礬
右爲末麻油調搽
銅綠各一兩二
味另爲末
金黃散 一九五
滑石
敷天泡濕熱等瘡
右等分爲末搽敷○此方
粉甘草 此用當是牛
○嘗以此方如柿礬少半用治肥瘡大效
白粉散 一九六
治諸疳瘡
海螵蛸三分 白及一分
輕粉一分

右爲末先用漿水洗淨乾
滑石散一九七
治小兒天
好滑石
黃柏
乾瘡
右共爲末傳之○仍內服
宜服大連翹飲○一方各
皂刺挑破泡水次付藥神
秘方仙遺糧湯一九八
治
取效
土茯苓
卽名仙遺粮
用鮮者二兩洗淨以木石杓搥碎
當歸
生地
薏仁各八分
金銀花
白蘚皮各七分
皂刺六分
甘草
防風
木通
黃連
連翹各一錢四分
白朮

加燈心一十根用遺糧湯一碗煎一碗食遠服

土茯薢湯一九九 治楊梅瘡及痘瘡濃膿困喉疾惡瘡癰漏潰爛筋骨拘攣疼痛皆妙○

用土茯薢即土茯苓二三兩以水三鍾煎二鍾不拘時徐徐服之○若患久或服攻擊之劑致傷脾胃氣血等證以此一味為主外加對證之藥無不神效

五加皮飲二首 治楊梅綿花瘡白發皆中亦可煮濃酒以治結毒

當歸 木瓜 生地黃 熟地黃

羌活 赤芍 慧仁各一錢 防風 荊芥

甘草 苦參 各五分 殭蠶 大楓藤各七分 五加皮二錢

右㕮咀每服六七錢水二大碗煎一碗食前

溫服渣再煎連肉食之忌生冷魚腥沙氣牛肉茶酒所用

土茯苓忌鐵器○若治瘋毒口服此藥外以此藥煎膏或丹收或粉收貼之

換肌消毒散二百一一名單方

土茯苓五錢或一兩

皂刺

薏仁各一錢半

金銀花各一錢

木瓜不犯鐵器

白蘚皮

甘草五分

初起潰爛濃痺消毒散二百二

○甚者土茯苓用至四五兩更妙

治時瘡肢節攣

姜黃

當歸各一錢半

芍藥二錢

白芷五分

七貼方二百三

治楊梅綿花瘡

右水煎服

土茯苓

獨活各五錢

白芷

防風　忍冬　皂刺
連翹　白鮮皮　五加皮
穿山甲　炒各一錢　生地　木瓜去心忌鐵　荊芥　蟬退去頭足
皂子七個　薏仁三錢　土茯苓四兩　殭蠶炒錢半
右用水四碗煎二碗食遠分二次服之○忌羊茶酒醋房事

茯苓膏二百四

當歸　熟地　生地　甘草去皮　連翹　木通各二錢
土茯苓半斤
右爲粗末用水五六碗熬將半用絹濾去滓再熬成膏晾冷每服一大酒鍾日三服輕者五料重者十料全愈熬藥須用砂鍋○忌房事鷄魚牛肉椒醬等發物

五寶丹二百五 治九種陽
琥珀 珍珠 鍾乳石 飛羅麵 氷片
砂 珠砂 炒過三分半 透明者三分半 用木香甘草
各一錢同煮熟用三
分半臨時加
入水二升煮取汁四碗收貯
聽用○服法每日用土茯苓成塊
者一斤洗淨用石敲碎先
將前相再入水四五碗煮
得汁二碗並入前汁內煮
取汁四碗為一日之用
○若病在上者加木香二錢
苓同煎病
者不得另飲茶湯
湯仍將土茯苓湯時
五寶丹二釐飲
一鏡加四釐體厚者
加六七釐一

日內服盡此湯為度在上飽服在下饑服忌用酒
風動氣之物其毒貼清涼膏或加減掺藥收口若舊
毒服藥後當盡發出無則不發也大忌房事輕者
二七服全愈重者
醫楊梅瘡癘漏方二百六
統才梅瘡癘漏方不問輕深者並效
土茯苓五兩　金銀花一兩　皂刺
半旁　鬱金　當歸各五分　花椒
黑鉛三兩鎔化入水銀五錢乘熱搗為粉分五
另入煎藥用
右咀分作五貼用水二鍾入葱一根煎至一鍾去
粉一分煎至八分食遠服
右鉛粉煎後仍可取起蓋楊梅瘡漏多因服輕粉積毒而成
此以水銀花椒黑鉛仍收引輕粉之毒從類而出也（）此藥

每以五貼爲一料初服一貼
二兩或忍冬藤葉尤妙防風
不透風處先薰後洗自然汗
料四汗之無不全愈患牛肉
燒酒眞妙方也世人珍秘不傳
會膿散二百七十一
獲效故詳識之以濟人也

白芷
乳香
沒藥各一錢
右爲末以當歸四錢用酒水
各一鍾煎一鍾去相量人强弱
或全用或一半調服之○此
藥若嫌太多則減咀爲飲大黃
生加煎服之尤妙

治便毒赤腫

牡蠣煅二百八
當歸酒半
甘草節
滑石炒各一錢
牛

大黃三錢 水二鍾煎一鍾露一宿五更頓服冬月火溫服無論已未潰膿血俱從大便出○此方乃鹹寒導滯之劑若小便秘發熱欣喜最宜用之若勞倦虛弱之人不宜輕用

治便癰內蘊熱毒外挾風邪或交感濕牛黃雙解散二百九

忍精氣以致蓬精交錯壅結癰疽大小便秘先用此藥通解更用調補之劑

肉桂 大黃炒 芍藥 牽牛炒 各一

澤瀉 桃仁去皮尖炒 各二錢 半夏甘草 乾薑炙 各一錢

右分二劑水煎空心食前服

內托羌活湯二百十

治發膏癰腫痛內脈紊亂按之無力者

治法

當歸尾 黃柏各二錢

炙甘草 蒼朮 黃芪鹽水炒 防風

右水酒煎服

加味瀉肝湯二二一 治肝經濕熱不利陰囊腫痛或潰爛皆治之

脫皐丸懸掛或便毒及下疳腫痛或潰爛皆治之

龍膽草 酒炒 當歸稍 車前子炒 生地黃 黃連炒 黃芩炒 澤瀉

芍藥炒 知母酒炒 防風 錢各一

甘草稍五分

加味托裏散二二二 治瘡癰不消不潰

水二鍾煎八分食前服外敷烏金散

黃芪鹽水炒 當歸 川芎 黃柏酒炒 知母酒炒

芍藥炒 麥門冬 八參

金銀花 水二鍾煎八分食前服
加味十全大補湯 治懸癰潰而不斂或發熱飲食少思
人參 製甘草 柴胡 錢各一
當歸 黃芪 鹽水炒 白朮炒 熟地 川芎 芍藥炒 茯苓 甘草炙 肉桂 五味子 褐炒 麥門冬 各五分
水二鍾煎一鍾食前服○並腫黃
五味當歸散 治婦人陰挺 當歸 赤芍藥 五倍子 各二兩 麝香 一錢
柏知母○小便澁加車前子山梔子俱炒用
一劑 治婦人陰虛小便澁赤加酒炒黃

右爲末每服一錢食前溫酒
中益氣湯倍加柴胡升麻兼
下蒲黃炒各半兩辰
砂一錢麝
調下滾湯亦可如
服之○又方用當歸
香小許俱爲末每服二錢酒調

婦
人
陰瘡三二五

治婦人陰
戶生瘡作痒
曰攀
錢各五
麝香一
分

治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水
生地黃
當歸
甘草
黃芩
川
芎各三
錢
黃連五錢
木通
洗患處

場
腫
湯
二一六

右
治
婦人陰
戶生瘡或痒痛或膿水淋漓
雀
玄
黃

甘草
乾
漆各三
錢

治婦人陰
升麻
白芷
用水數碗煎數
沸去粗當
升麻湯二七

瘡漏門

右以水煎服（）更用塌腫湯淋洗之

當歸　川芎　白芷　肉桂　紅花　各二錢

黃連　去蘆毛淨一兩好酒浸一宿撈起陰乾爲末

百草霜　用草茅燒者不用一兩研細

烏梅肉　一兩蒸軟即用前浸黃連酒蒸爛

搗一處爲丸桐子大如太乾仍如前酒搗丸之

空心用酒送下四五十九三旦見效十日全愈

治血痔

地榆　槐花　各一錢

右用地榆爲細末每服二錢七食前米飲調下日三服

槐花散　一百二十

治痔漏下血及膿不止

槐花　微炒　黃連去鬚　地榆

臭樗皮　微炒　各一兩

阿膠炒珠　艾葉　各三錢

右爲細末每用二錢食前
秦艽防風湯二三一 治痔漏
秦艽 防風
黃柏 陳皮
澤瀉各一錢 桃仁去皮
甘草各五分 朮麻
當歸酒拌 白朮
柴胡 大黃煨
紅花
升麻
欽調下
結燥大便作痛
右爲末每服五錢食前
當歸酒下〇此方用黃連猪
臟二味亦名猪臟丸尤效〇一
猪臟丸三二一 治大便痔漏
猪大腸一條乾 以槐花炒爲
末摶入臟內兩頭扎定无器內
米醋煮濃爛 治大便痔漏
米醋糕糊爲丸桐子
右摶和再加
當歸酒下〇此方用黃連猪
方先用海螵蛸炙黃去殼爲

癇

效或後服黃連猪臟丸

療方二三

雄黃五分 白礬半生半熟三錢 五靈脂燒煙斷 五倍子一炒過錢 右爲極細末用紙托貼瘡口上

品錠子二三四

白礬二兩零五分 乳香 沒藥各三錢半

上品 去十八種痔

牛黃三錢 白明礬二兩 白砒一兩三錢

中品 去五漏及瘻花瘤氣

白明礬二兩 白砒一兩 牛黃二錢

下品 治瘧痘氣核疔瘡發背

腦疽諸惡證

沒藥各二錢半

沒藥各三錢半

曰明參 二兩 白朮一兩 乳香 沒藥 各二錢半

牛黃三分 右將朮末入紫泥罐內次用參末蓋之以炭火煅令烟盡取出並各藥俱研極細糸用糯米糊和爲挺子狀如線香陰乾次其根自腐如瘡露在外更用鍾水調搽乾立亦可●嘗有一老媪用此治瘡瘻有果驗惟氣血虛者雖潰去亦不能愈蓋此與肯爲治其方法乃是中品錠子紅瘡內以膏藥貼之其根自腐去盡更搽生肌藥數日即愈人多用之九見其腐去裏皆攻毒去邪之藥也

羊膽膏 二二五

臘月取羊膽一枚入片腦末一分置風處掛乾用時以涼水或加味瀉肝湯若得熊膽膽更佳化開頻敷患處內服魂子泗

如眼痛者點之尤效

水銀棗子膏 二十六

水銀一兩　棗肉二兩

右和研水銀不見星捻如棗核狀薄綿裹內肛門中明日再出若痛加韶粉三分九內之

熊膽膏 二十七

熊膽五分　冰片一分

右研細用井花水調鷄翎掃痔痛極效

蝸牛膏 二十八　傳南

蝸牛一枚負款　麝香各少許

右同研爛以磁器盛次早取汁敷痔上

芫花線 二十九　緊痔漏瘤核

用芫花一握洗淨大木白揚爛加少水絞汁於石器中熳火

前成膏將絲線於膏內度過晾乾以線繫痔當
落以紙撚蘸膏納竅內去根當永除根也
枯痔水澄膏不得使水
線一夜用二百三十治
膏
鄧余
白芨 兩絡一
一方加黃連
石二味爲細末如患內痔侯登厠時溜出在外用溫湯洗淨
側臥於床其痔即出用盞水調藥得中以筆蘸藥上良久然後用後
好肉上留痔在外以紙盡之令藥乾及四散
痔在外以紙盡之令藥乾及四散
温水於紙上潤
仍用筆醮温
四兩
好白礬
生信石 牛錢
硃砂一錢 研極細
右各研爲細末先將砒入
藥泥罐底穴將礬末一
砒盡從烟去止借砒氣於礬內耳將礬爲極細末
有痔頭大小置礬末於掌中乃入硃砂少許以

後塗痔上周遍一日三上看痔頭顏色焦黑為效至夜有黃水出切勿他疑水盡為妙至中夜依然上藥一遍來日三次有小痛不妨換藥時以碗盛溫湯用筆輕洗去舊藥更上新藥仍用護肉荊芥湯洗之三兩日即可增減漸漸取之庶不驚人全在看色增減傅藥厚薄方是活法

此藥只是借祛信之氣又有珠砂能以解之一方士將此二方在京治人多效百金求得之錄於子子雖不見刊傳大抵今人言能取痔者皆此方也其有氣血虛或挾內邪者還當兼治其內庶不有矢

治痔無有不效

明白礬一兩子黃丹五錢飛砂三錢

好信石黃明者如豆大

右用紫泥礶先將晨水煅紅放冷揀淨先研下明礬燒令沸次看礶逼紅烟起為度將礶撥下待冷取研細以磁礶收貯如同研極細欲敷藥先煎甘草烏蝎稍三味再煎後用生麻油調前藥以鵝毛掃淨患處然後用藥敷藥時上每日敷藥三次必須取盡白涎者俱化為黃水如膠汁則未盡此乃臨安曹五方為尚宗取痔連根去淨更搽此藥九五痔皆得效後封貯官至

察使

秘傳正骨丹

此可續筋骨

降真香

治跌打損傷骨折血瘀而傷之重者用

沒藥

蘇木

松節　地龍去土酒浸炒乾　生龍骨各一錢　土狗十個浸油炙乾　右十二味共重八兩八錢同為末每服五錢隨病上下酒調服覺藥自頂門至遍身搜至病所則颯颯風聲而筋骨漸鬆而氣血自知之○服藥後仍須八參白朮黃芪當歸川芎肉桂甘草白芷厚朴以調補元氣

治打折損傷

赤芍藥　川芎　自然銅炒醋炙各一兩　川烏炮　乳香半兩　右為末用黃蠟四兩溶化入前藥攪勻乘手九龍眼大如打傷筋骨及閃漏不甚忍者用一丸熱酒浸開乘熱飲之痛即止

治跌打損傷接續筋骨

沒藥降聖丹三三

當歸 酒炒
蘇木
沒藥 另研
右爲末生薑汁共蜜和九每
自然銅 火煅爲末
各半錢煎至八分空心熱服
各一兩
川芎
乳香 各一兩作四九每服一九用米酒
白芍藥 炒
川烏頭 炮去臍
骨碎補 炙
酢浸十次
生地黃
乳香 別研

脾氣血虛或血虛有熱而不愈者當求其本而治之
十味沒藥丸 出三五
治打撲損傷筋骨疼痛或氣道血虛或
當歸 各一兩
血竭 四錢
自然銅 火煅
乳香 別研
苁蓉 酒浸十次
紅花
川芎
川椒 去目
桃仁 別研
右爲末煉蜜和丸彈子大每
服一丸酒化下○立齋曰接骨散沒藥丸惟元氣無虧者

宜用若鬚氣素快或高年虛弱者必用地黃丸或補中益氣湯以固根本爲善

治打撲損傷腹中痰血脹痛欲死服之血被蓋石散　二三六

化爲水亦能盡述

硫黃　明者四兩

花蓋石一兩

右爲末和勻先用紙筋和鹽泥固濟丹鑵一箇候乾入藥再用紙筋和鹽泥封口安在磚上虛書入卦方位用炭三十斤煅之候鑵冷取出每服一錢童便調下○立齋曰前方若被傷已甚元氣虧損或手足緩弱行步不前動臟腑而妙甚妙

黑丸子　二三七

或跌血連腫或外感風寒肢體作痛或補藥兼服若硫注滕風初結服之自消若潰後氣虛發熱與試

自欽　百草霜　白芍藥各一錢　川烏　南星各三錢　白朮　白茯　骨碎補

赤小豆兩半　白欽六錢一兩　牛膝六錢

當歸各八錢

右各另爲末酒糊丸桐子大每服三四十丸鹽湯溫酒任下

孕婦忌服

九損傷皮肉破裂者以此封之

封口藥二三八

牡蠣煅

右爲細末香油調塗瘡口〇若飲消腫散血合口加血竭乳

赤石脂生研　紅丹上好者等分

珍之

三九　治跌撲瘀血在內胸腹脹滿或大便不

當歸導滯散二

通或喘咳吐血

當歸等分

大黃

若爲末每服三錢溫酒下陽氣虛者須加肉桂
復元活血湯二百四
小腹作痛或痞悶
及便毒初起腫痛
柴胡一錢半 治跌打
大黃酒炒各一錢 損傷瘀血流於
紅花 脇下作痛或
甘草各七分 川山甲炒各一錢 當歸酒拌
右水一鍾半加酒半鍾煎八分食前服之以利爲度
二十去皮尖砂

金瘡方二四一

凡金瘡出血不止用牛膽石灰摻之即止其方單用三七搗爛敷之神效
入風化石灰縣當風候乾用一方單用三七搗爛敷之神效
又方金瘡出血不止少五桔子生爲末乾貼之如不止而血
熱者宜用犀角地黃湯若陰虛或有熱者當補其氣若因怒者當
怯弱者當補其氣若陰虛或有熱者當補其血若素本
平肝若煩熱作渴氣若筋攣搐搦者當養肝

血不應用地鼈虫九以滋腎水
金瘡降眞散二四二
降眞香用節作
三味等分爲末無論諸傷血出不止及久年惡瘡
金瘡灰蛋散二四三
松香
文蛤
出斷折摻破處永縛定神效
石灰細研
雞蛋清以飯爲和
治金瘡
右將灰蛋餅子煆過候冷研細遇金瘡摻之若多年惡瘡以
薑汁調敷○一方單以石灰摻傷處裹定亦血止而愈
龍骨散二四四
龍骨
海螵蛸分各等
赤石脂
治金瘡
五棓子
黃丹
右各研入麝香少許共研勻摻上如乾先以鹽水洗拭乾摻
之

桃花散二四五　治金瘡並一切惡瘡

黃丹　軟石膏等分　研勻如桃花色　摻傷處其血用葱白細切杵爛炒遍

和研勻如桃花色摻傷處其血用葱白細切杵爛炒遍

刀傷跌打經驗方二四六

九刀傷磕損跌撲腫痛或出血用葱白細切杵爛炒遍

處葱炒再易神效○一方以三七搗爛罨之神效余嘗以治前證毒已腥不散

立齋曰醫學綱目稱前方有神效余嘗以治前證毒已腥不散

兎肉不潰佐以健脾胃之藥其功尤捷此內外所以合一也

損傷敷夾法二四七

凡損傷骨折者先須整骨使正隨用川烏草烏等分爲末以

生薑汁調貼之夾定然後服藥無有不效

跌閃腫痛二四八

用生薑蔥白同搗爛炒熱罨之○如熱服而痛者川楝

予加麵炒熱熨
洗損傷方二四九

荊芥

右同煎湯溫洗或止用慈一味煎洗亦可

九傷重者用此法洗然後傅藥

土當歸　生慈切斷三方
用生薑

一百五十

箭鏃竹木刺方一

百一方治竹刺在肉以鐵銚重研敷立效

衍義方治竹木刺入肉嚼牛膝根塗之即出

肘後方治箭鏃入骨以巴豆肉微炒同研勻塗傷處候

生薑

同搗爛炒熱熨瘡傷處

跌打衣棍傷一

五一

陳酒糟各一

斤

蚯蚓十條針刺杵爛敷患處自出

治梭傷二五二

几梭傷手指者用皂礬二兩水四五碗砂鍋內熬濃洗良久即血活痛止不致消爛熬水忌銅鐵器其洗手水過夜即臭惡不可聞

楼癖四方二五三

用川大黃一兩加上好冰片另研俱爲末和勻涼水調如糊攤杖處即時止痛一日後換膏藥貼之

又方加甘草一兩

又方攤藥

大黃 白芷 生半夏 各七錢

右爲末以鮮薑汁調敷乾即再敷以黑處血紅爲度即換貼

膏藥神效

又方

生牛夏
右研一處塗水
諸骨諸物鯁二五
一治諸骨鯁用
苧麻根杵爛先彈子大將所鯁魚
細茶五棓子等分為末吹入口內咽
四
一治魚骨鯁用
鯁咳將鵝毛一足取涎徐徐嚥下
一治稻芒糠穀
物但多食肥羊脂及
一治吞金釘鐵金
銀銅錢等物
味必隨大便
而下
一治吞鐵或針
用餳糖半斤濃煎汁調和服之
一治吞髮繞喉
不出者取自己亂髮燒灰白湯調服一錢
被傷風敷藥二五
南星
半夏
右為末用生薑
薄荷汁調搽患處
地龍等分

蒼耳酒　二五六

九頭面身體困

草一二兩酒水

純用酒煎尤妙

防風湯　二五七

防風

右每服五錢水

羌活

獨活

川芎　等分

煎調服取微散服表藥過多自汗

白朮防風湯　一五八

治破傷風表證未傳入裏重服此

白朮

右每服五七錢水煎服臟腑已和而自汗可服此藥若

黃芪　各一兩

防風　二兩

羌活湯　二五九

治破傷風在半表半裏不可用於

治破傷風外邪初入或風入於臟者神效

破損傷風者頃刻發脹遲則不救速用蒜頭

各半煎服被蓋緩臥少頃即可微

臟腑秘小便赤

而自汗者急以後大黃黃芩湯下之

湯稍緩則邪入

於裏不可用於

羌活
防風
黄芩
甘草 各一
右每服五錢薑水煎日三服

羌活防風湯 二百六十
羌活
防風
芍藥
右咬咀每服五七錢水一鐘半煎八分熱服量病人虚實加減用之

汗加防風白朮各五分
大黄蕾湯 二六
麻黄
細辛
石膏
薄荷
甘草 各四錢
水一鐘半煎八分熱服量病人虚實加減用之

治破傷風初傳在表脉浮緊
菊花
川芎
荆子
羌活
防風
蒼朮
當歸
地榆
細辛 各三錢
右㕮咀每服五錢水一鐘半煎八分熱服量病人虚實加減用之

治破傷風邪傳於裏舌强口噤項背反張
黄芩
白芷
羌活
防風
白朮 各五分

川芎　羌活　黃芩　大黃各一兩

右每服五七錢水煎服

玉真散二六

邪破傷風重者牙關緊急腰背反張並甚大所傷事

天南星湯治打撲金

川芎　羌活　白芷　白附子　防風各等分

右爲末每服三錢用童便調服雖牙關緊急腰背反張者每服二錢溫酒調服若牙關緊急腰背反張並甚大所傷事

三錢用童便調服雖內有瘀血亦名奪命丹○治打撲金

速進二服亦可保全若破傷瘡口及風犬咬傷須用濕口水

或熱童便洗淨隨用生南星爲末掺之或以水調塗之出水

養血當歸地黃湯二六三　治破傷風氣血俱虛發熱頭痛服

此以養氣血祛風邪不拘新舊並可治之

當歸酒拌　川芎

就地　各二錢　芍藥

葉木　防風　白芷　北細辛各一錢

水二鍾煎一鍾食遠服甚者加酒助之

蜈蚣散二六四

蜈蚣一對　鰾膠三錢炒

右為末用防風白朮煎湯調下

破傷風灸法二六五

治跌打損傷破皮虫獸傷破皮膚以致風邪入內牙關緊急腰背反張或遍體痲麻本甚者不知人事宜用蒜搗爛塗傷處將艾壯於蒜上灸之多灸為善仍用膏藥護貼內服玉真散如毒蛇風大咬傷先刺患處去毒血如前法治之足麻木者毛脫落遍身生瘡及癩風瘙痒搔破成瘡並皆治之

海藏逐風丹二六六

治癩病手足浸一宿以水一斤煮汁去渣用砂確一斤取一斤搗成膏和丸如梧桐子大每服二十丸許無灰酒下

烏稍蛇　白花蛇各一條去腸陰乾酒浸取淨肉晒乾爲末

右爲末入前二味和丸桐子大每服六七十丸空心煎通聖散送下乾物壓之日三服間間洛之汗出爲度

通聖散　二六七

皂角刺燒存性　大黃半兩

疎風和血去瘾疹

右爲末二錢早服樺皮散午以羹

局方樺皮散　二六八

樺皮　枳殼各四兩　去穰各四兩

炙甘草半兩　杏仁　今減半取出　二兩去皮尖用水一碗煮

麻湯下瀉青丸　先晚服二聖散

治肺壅風毒遍身癮疹瘙痒

判芥穗　倶燒性各一兩

升麻湯　二六九

治諸風熱瘾肌肉極熱身如蟲行或唇反縮裂

收貯每服二錢食後溫酒調服

升麻三分　八參　茯神　防風
水二鐘薑三片入竹瀝少許煎
羌活　犀角　鎖各一錢　羚羊角一錢　肉桂
青九　寶鑑　醉仙丹二百七十　治瘋風遍身麻木
胡麻子　炒　牛旁子　炒　枸杞子　菟絲子　炒各一兩
白蒺藜　苦參　天花粉　蔓荊子　炒各半兩
右爲細末每一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服二錢茶清調晨午各一服至五七日於牙縫中出眞涎令人如醉或下膿血病根乃去仍量人輕重虛實以用之病重者須先以再造、散下之候元氣將復方用此藥食淡粥時菜及諸魚肉以淡酒蒸熟食之亦可以助藥力
和乎浮萍散　二　治風癬疥癩

浮萍四錢　荊芥　川芎
當歸　赤芍藥　白芷
寶鑑換肌散二七二　一撮煎服汗出爲度
效如神　治癮風久不愈或眉毛脫落鼻梁崩壞其
白花蛇　黑花蛇酒浸名三兩　當歸　川芎
川芎　何首烏不犯鉄器名二錢　白蘚皮
赤芍藥　天門冬去心　甘草
紫參　苦參　胡麻子炒　天麻
白芷　蔓荊子　威靈仙　細辛
菊花　木賊草　不灰木　荊芥穗
定風草即草烏蓋去皮臍　石菖蒲
右各另爲末和勻每服四五錢食後酒調服加飲
次杯尤妙

通天再造散二七三

治大風實熱內壅宜此攻之

鬱金 半兩 炒 大黃 皂刺 各一兩 白丑頭 半兩 炒 各六錢

右爲細末每服五錢曰未出時面東以無灰酒調下晚利下黑頭小蟲病輕者只利臭穢之物●忌葷醒厚味牛年犯則再作不可救此藥服三五次卽愈

回回 治癲風●丹陽荊上舍得癘疾一僧治而求方秘不肯傳館客袁生窺知藏衲衣領中因竊之而繕錄焉

白花蛇一條去頭尾 烏稍蛇一條去頭尾 蝉蛻去苗 生用 各二兩 全蝎 去毒 一兩

防風 去苗 骨生用 金銀花 葉去 枸杞子 各二兩 生地 黃芩 醋浸一日 去鹽味 黃柏 川芎 牛膝 烏藥 何首烏 不犯鐵

苦參 黃連 梔子 槐花 牛蒡子

連翹 天花粉 白蒺藜 威靈仙
荊芥穗 細辛 蔓荊子 金毛狗脊
胡麻子 炒各一兩 去殼淨
右爲末米糊丸桐子大每服五六十丸茶清送下空心午前
臨臥各一服

白花蛇膏二七五錢 荊芥 薄荷葉各三錢
白花蛇肉四兩酒浸 天麻七錢
右爲細末用好酒二升蜜四兩以銀石器熬成膏每温服一
酒杯日三次煎餅壓下於痠處發汗效

治諸風癩疾遍身生瘡

防風 去蘆 天麻 升麻
療數人初服嘔吐者不可疑此方應是仙傳一年中常
服而得愈其效如神

防風天麻丸二七六 白附子 炮
定風草 細辛 去苗 川芎

蔓荊子　玄參　去蘆
秩松二條　威靈仙　川山甲炒　何首烏另搗各二兩

右爲細末同何首烏末拌勻別用刺麻一斤淘淨瞻乾炒香細嚼溫漿水送下不拘時候日三服宜食淡白餚

一百二十日大忌房勞血將息慎口

行藥方二七

大黃　甘草

治癘毒

皂莢牛　槐鄉各一兩

輕粉三錢

右共爲細末每服二錢用白蜜三匙薑汁二匙調服病勢重者七日行一次稍輕者半月一次以三五遍爲度

二十日一次輕者

皂角散二七八

皂角刺燒存性大黄一錢輕粉五分

右為末空心酒調服取下惡物○服藥數口盛縫出血甚

雷丸散二七九

取大風虫

雷丸

水銀

硫黄

雄黄各二錢半用乳鉢入酷

右為細末每服一錢天明溫酒送下

黑虎丹二百八十

治大風諸癩惡瘡毒蟲肉餌形骸壞

天靈蓋三兩八中白

桃仁炮去皮尖各二十一個去頭

川山甲炒半兩

麝香五分

乾蝦蟆燒存性

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九月首五更米飲送下

取虫盡即愈○殺勞蟲通用

苦參酒二八一

治癩風及瘡疥癬最多者

右以好酒二斗浸三日量飲一合日服三次不絕當愈即瘥

硫黃酒二八一

明硫黃研極細 秘漏風諸蟲

右用酒浸密心飲清汁明日添硫黃再研入酒如前飲之

七珍湯二八三

治洗大風

青蒿 芟葉

桑條 槐條 柳條三條俱趁鮮用

右煎水一桶入炒鹽半斤閒日一洗浴密室中以簟席圍之

洗出汗爲妙不過十次愈

烏頭湯二八四

治大風瘡癩

苣鳥 麻黃根 芟葉

朴硝各一兩

地骨皮

右爲粗末用水一椀煎取一鍾於
密室中自用手巾圍搭四肢候湯可浴令汗透
珠徐起或臥片時汗乾着衣避風五日再浴如此三五
次每服換肌丹等藥
敷癍方 二八五
雄黃 硫黃 白礬 各
鼈床子 燒存性 草烏
等分
右爲末用香油或濃蜜水調敷患處
直指洗癍方 二八六
蛇牀 淡浄矢風瘡
荊芥 防風
右作三次煎水洗冷出汗
蒺活 獨活 蒺本 各
右作三次煎水洗冷出汗
梅花白癍 二八七 洛陽花四兩火酒
一兩

用香油二碗入鍋煎黃三
次卽愈◐愚按此方於蛮
熱之然後再加硃砂細末二
錢並雄黃白礬等
收用必玅

臟梨疣二八八

用杏仁百枚炒爲炭入葱白頭
淨然後用此藥探之新舊疣
疣皆可用但勿見風方
好

疣贅二方二八九

大楓子仁
木別仁
蛇床子 各半 水銀三錢研
右先以刀刮去疣痂花椒煎湯洗
之八日卽愈

又方　用猪骨髓和輕粉搗爛罨之過夜即愈

頭面黃水肥瘡　二百九十　治小兒頭面患瘡濃汁者名曰粘瘡當用此方或止用樗丹二味亦可◐水水到即潰者名曰黃水瘡當用後一方

松香　枯礬

右等分為末麻油調傳或加香烟垢更效於香爐盡上刮取用之◐一方用菜豆松香等分為末麻油調傳極效或內服荊防敗毒散等藥◐又方用益元散加枯礬少許以麻油調敷大妙大妙

諸癬疥頑瘡　二九一　治小兒風子　煙墨　水銀

油核桃　大楓子

右四色研勻擦之此治有蟲者大效◐一九無蟲而忽爾生瘡腫痛或湯燬者但以栢油搽之即可愈

耳不腫及不發則頭眼目俱腫而惟額上指尖兩
見赤色者是其證
先將馬桶洗淨用沸湯傾入蓋少傾傾出盆內浴之數次即
退◐再用車前草九里香馬蹄香枸杞苗即雁歧菜同搗爛
和痲油遍身自上而下擦之◐次忌鷄魚生冷多
光燈烟湯氣極須謹愼
又方用生
香附末冷茶調服二三錢即愈
又方檳綠荳水去渣飲三碗妙
九三

紫白癜風歌二般風附子統黃最有功
紫痕白癜
萬汁調勻
茄帝擦
若經三度永無蹤
又歌
紫癜白癜兩般風水銀輕粉最成功

一、鵜取生薑白煎汁只須一擦便無踪

又方 治紫白癜汗斑等風

雄黃 硫黃 黃丹 密陀僧

南星 黃

右爲末先用葱擦患處次用薑蘸藥末擦之擦後淅黑次日

再擦黑散則愈矣

又四神散

雄黃 雌黃 硇黃 明礬

各等分先浴令遍身微汗以薑蘸擦之再以熱湯洗當日

色淡五日除根

汗斑四方 二九四

大黃二錢 枯礬 椒紅各五分

右用猪脂沙糖同搗爛候淅起以細麻布包擦至遍而止数

日即愈或止用硫黃少
次即愈
又方
密陀僧
八言五分
右為末薑汁調
又方
雌黃
雄黃各一
錢
硫黃五分
麝半分
右為末薑汁調用茄蒂醮
浴後薑醮擦三日內不沐妙
又方
硫黃一兩用醋煮半日海螵蛸三
醮擦患處須避風少時
數度即愈
瘡瘍方二九五

八用香油調鐵銹塗之○胃氣實者內服黃連解毒湯○胃氣
弱者以漆毒侵犯中氣致虛多有作嘔不能飲食者宜用六
君加砂仁藿香酒炒芍藥之類○又解漆毒法見因陣三三
五

手足甲疽三九六

凡手足間或因修甲傷肉或因損
置鐵板上煨潮色赤如瘡金色者
湯洗搽

坐板瘡二九七

腫痛多膿者

密陀僧 生礬 大黃

等分爲極細末敷之

神效膏二九八

治膝瘡脚瘡

先看瘡形大小用綿紙裁成四方用小撚釘

在患用
久以好香油二
椒四十九粒煎黑取起
黑又取起再次下黃占二兩輕粉二分
入前紙清浸油內令透不可
枝葱椒煎湯洗瘡令透拭乾乃此膏紙貼
紙蓋護為
又貼之晝十二張無有不愈
隔紙膏二九九
日取下揭去一層復用湯藥洗淨
隔紙膏三九九
治腰瘡神效

黃芪末 五錢 輕粉 銀硃一錢 血竭五分 乳香 銅綠二分 滴乳香一錢

右為細末真香油調成膏攤油單紙上再用油單紙一層以針
刺孔數十掩膏藥上貼之
二味隔紙膏三百 治腰瘡濕毒瘡 一日一易甚者

右爲末用桐油調成膏作隔紙攤
敷劑不愈再服黃芪人參湯
爛腿瘡久不愈方　三百一

用米糖即膠飴也以碗盛於飯鍋內蒸化先用花椒荆芥防
風等藥煎湯洗瘡淨乃將膠貼薄攤瘡上外以軟竹箬蓋定
用絹縛之數日即愈忌口如
凍瘡方　三百二

瀝青末　黃蠟各一兩　麻油二兩

右三味溶化搽患處

湯火六方　三百三

九初被湯火所傷速用冷童便浸草灰二升入鹽少許以淚
水調如稀糊厚搽傷處即覺痛味微鹹爲度用鳥翎掃之連

易數次則火毒散於外必腫痛隨散結矣
方也
又方一治潰爛腫痛者　用生桐油調入中白敷之即愈亦
妙方也
又方　用皂礬研細和以冷水澆傷處其疼立止其腫即消
又方　用大黃芒硝等分為末鷄子清調貼之神效
又方　用石膏末香油調敷即愈
又赤石脂散　治湯火傷肉爛赤痛
赤石脂　寒水石　大黃等分
右為末新汲水調塗
漫火至聖膏三百四
治湯火傷瘡用雞子黃黃銀石器內熬油調胡粉傳之●錦
衣楊永興厨下夜間回祿九時睡此房已死將死者灌以生蘿

•葛汁良久悉愈九遇此患者

湯火上痛散三百五　止痛生肌

大黃末微炒　當歸末等分

右用麻油調搽或敷或摻亦可

小兒丹毒三百六

此毒多生頭面四肢色赤或腫遊走不定甚者宜用前磁鋒砷攻散傳之內服荊防敗毒散

疫法使毒血遇刺皆出更以腹則不治或愈而復發皆因毋或五福化毒丹治之其應如響

食辛辣炙煿以致內熱宜於每藥中加漏蘆煎服或令自服

亦愈

小兒鵝口三百七

鵝口瘡則不能飲乳用髮或飲

凡小兒口內白屑滿口者為

如骨不能脫濃煮栗米湯以綿

紐纏指蘸井水或石上使淨

墨汁煩拭沈去用飛過黃丹搽之

加味太乙膏 三百八 一切瘡瘍並宜貼之先用鴉蔥灸軟

活命飲 以收全功

當歸 生地黃 芍藥 玄參

大黃 各兩 加甘草 四兩

用麻油二斤煎再收

景岳會通膏 三百九 加減

治 九諸瘡癤癰疽瘡塊風氣骨節疼痛無所不

人黃 木別仁

芍藥 生地

羌活 防風

白芷 川烏

南星 半夏

當歸 川芎

麻黃 細辛

荊芥 蒼术

甘草 烏藥

官桂

蒼耳　骨碎補　草烏
皂角　枳殼　三稜
蘿蔔子　水紅花子　巴豆
獨活　桃仁　蘇木
續斷　連翹　紅花
槐花　皂刺　五棓
透骨草（晒乾）　穿山甲　全蝎　艾葉
蜂房（各一）　鮀退（俗一大）　乾薑　蓬木
血餘（一團）　獨蒜（四頭）　單麻子　茄參
右五十四味用麻油五斤浸三日先煎血餘薑蒜枯焦後入餘藥煎黑去滓再收後下細
巴豆（煅去油）　蝼蛄（十四根）　殭蠶　紅花
阿魏（二兩）　蝦蟆（一隻）　木香
藥十味
乳香　沒藥（製各二兩）

丁香
木香各五錢
麝香不拘二錢
右麝香丁香木香三味宜最後下之以上收油法九蒸成熟油一斤下飛淨好紅丹八兩若欲微嫩則止下七兩五錢神異膏三百十一也
治瘧疸瘡毒及將瘥瘡中第一方
麻油二斤
黃丹十二兩
黃蜡半兩
玄參各一兩
如雞子大
蜂房雀一兩
右先以黃蜡杏仁玄參入油煎至將黑乃入黃丹鼠髮蛇蜕蜂房亂髮再煎至黑去柤徐徐下丹慢火熬收黃丹不必拘數但判得中為度凡膏藥用久必至老硬宜少許如硬量和之
治一切瘡瘍潰後宜用之

當歸二兩　白芷　白芨　木別子
黃柏　白斂　乳香　白及
右用麻油十二兩　白膠香各五錢
黃丹五兩半
右用油煎煎六味以槐柳枝順攪油熟丹收然後下乳香等
二味
阿魏膏三二
治一切瘡瘍惡瘡腫連丸
羌活　獨活　亥參　官桂
川山甲　生地黃　兩頭尖
赤芍藥　大黃　白芷　天
木鱉木枚去殼　亂髮一團　槐
右用麻油二斤煎柳桃枝各半
四兩煎藥黑去髮再煎髮化方去相入
上好真正黃丹煎收軟硬得中入後細末攪和成膏
阿魏　芸香

沒藥各一錢　麝香三錢

右九貼膏藥須先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加硃砂膏三二

妙最佳

治一切頑癖破傷者最

麻油一斤　飛丹六兩　冰片三錢　銀一兩　硃砂隹者一兩半飛

好黃蠟四兩

先下油熬數沸下雞子二枚敲開連殼投之熬焦栳去子退火俟油定下水銀五錢再加微火攪熬飯頃即入丹漸收成膏後下黃占再攪候大溫下極細好硃砂一兩五錢攪勻磁罐收貯

神效當歸膏　治一切發背癰疽瘡瘍湯火疼痛等證去腐

攻

當歸　生地　黃芪　白芍藥　三稜　川山甲　桃仁

肉生新肉長效如神凡洗拭換風故故也如用白蠟九好此藥生肌止痛補血續筋故與新肉

相宜

當歸　生地　黃芪　白芍藥　三稜　川山甲　桃仁

右先將當歸地黃各二兩入油二斤熬當歸黃色去滓再煎黑去粗又將二味各八兩煎至微焦復去滓乃入蠟溶化候冷攪勻即成膏矣用塗患處以紙蓋之如有死肉須用利刀剪去則生肌尤速

一瘡膏○專攻瘡塊諸瘡毒

豬脂　當歸　熟地　赤芍藥　蓬朮　巴豆仁

五兩　牛　生　黃　南　朮　別　皇　肉桂

續斷　玄參　萆麻子
白芷　羌活　獨活　大黃
紅花　川烏　草烏　藁木
川芎　防風　杏仁各二兩

右用麻油四十兩浸諸藥三日桑柴火煎成丹收後下細藥

乳香製　沒藥製　各一兩　眞阿魏半兩　麝香三錢

右方於細藥中加臘蒼朮香附各一兩酥炙三錢即名治瘡大成膏

治瘡膏三十六

三稜　蓬朮　大黃　各一兩　杏仁

水紅花子　川山甲　木別仁　獨頭蒜四個　蘿蔔子　透骨草　俱晒乾

右用香油一斤入前藥十味油成以飛丹收之後下細藥

眞阿魏　乳香　沒藥各一兩　麝香三錢

右先示乳汁阿魏三味後下麝香攪勻待冷傾水中凌數日用磁瓶收貯勿使洩氣用時以白布或堅白紙攤貼八九日一換或見大便去膿血勿以爲異亦有不去膿血而自愈者若沽瀉利叫貼臍腹房事生冷○凡貼癥積痞塊先用蒿麥麪和作一圈圍住患處四邊其塊上放皮硝一二三兩蓋厚紙以熨斗熨令熱氣內達然後去硝用膏藥貼之○右原方用白花菜同透骨草另煎膏二三兩攪入膏內收用但白花菜不易故余用獨蒜羅蔔子代之宜矣

瘰癧

淅加連珠不

治頸項瘰癧及腋下初結小核紀經久不疼或成漏證

木別子　木通各兩

硃砂　木香

右先將琥珀等六味爲末其餘藥入油煎熙濾去粗徐入黃丹再煎軟硬得中入前藥成膏貼之

貼瘡琥珀膏三一八　貼瘡塊

水紅花膏三一九　大黃朴硝各一兩爲末以大蒜同搗膏貼之

用水紅花或子或苗每一碗以水三碗用桑柴炭武火熬成膏量瘡大小用紙攤貼以無風寒濕毒所襲筋骨攣痛及濕瘀流注腫不飲酒者白湯下

治風寒濕痺歷節行步疼痛　乳香爲末各一錢　沒藥爲末各一錢　麝香一錢

・・・

先用密陀僧二[illegible]研極細如麪候
氣清乃可止矣用便煮過則貼瘡不痛眼乾
用
用桐油不拘幾斤熬至黑為度每熟油一斤用陀僧六兩
收之於將成膏之頃取起離火候稍涼調膏多少入冷水數
碗徐攪之恐其汚面侯少定即逼去其水再上火熬化復入
水數碗攪逼如前或三次更妙欵後熬淨其水每油一斤再
八官粉二兩熬收其色方黑凡熬此者銅鍋鍋須大方可用
八仙紅玉膏
龍骨 赤石脂 乳香各一錢 沒藥
治諸瘡
右用麻油一兩入當歸五錢煎枯去滓入乳沒畧煎
入黃占五錢溶化定入

永雖貼四止痛排膿發後宜用之

碧油膏三二兩研

桃枝 柳枝 桑枝 槐枝 各二兩

乳香另研 血竭各五錢

右用麻油十兩煎黃丹四兩淨乳香血竭各五錢成後下

黃芪 當歸 夜合樹皮 各一兩

人參 玄參 各一兩

血餘三兩

老鼠一個

細藥

血竭 龍骨 赤石脂 白蠟各五錢

右用麻油一斤煎丹收

保養元氣膏三二六

此膏助元陽補精髓通

腿仔精百勝 待婦人經淨之時去膏 加朱砂 成功 並

治腰脇疼痛
痿痺陰瘡不
舉無子此都
御方也

麻油一斤四兩入甘草二兩先煎六七滾然後下諸藥
生地黃 熟地黃 酒洗 俱 當歸 酒浸 肉蓯蓉 酒洗
遠志肉 鹿茸 酒浸 巴戟子 酒浸 牛膝 酒洗
鹿角膠 虎骨 紫稍花
木別仁 川續斷 大附子 肉桂 各三錢
谷精草 大茴香 細辛 各一錢
右熬成以煮過松子香四兩飛丹半斤收之次下龍骨 煅 赤石脂 各二錢
次下乳香 沒藥 丁香 木香 各一錢
又次下陽起石三錢 麝香五分 研
鴉片錢 各 研酥

又次下黃占五兩 右煎成入井中浸三四日候用 錢紅絹攤貼臍上或腰眼間每貼五六十日收 煮松香法三七 先用松香收膏藥者必用水多煮二三遍去其濕燥之性方可貼瘡不痛若用貼瘀痛者煮過用之方妙

藥如後法

大都松香三斤 用皮硝一碗 水紅花四兩 當歸 生地 各二兩 三稜

大黃 蓬朮 各二兩

右藥七味用水一桶先熬汁去滓淨用煮松香徐徐添入以熬熟藥油五兩即成膏矣 收油之法凡煮過松香一斤入四君子湯三二八 方在補陣一

治瘡瘍脾胃虛弱或因剋伐
補脾胃者諸證自愈若誤用攻
少思或食而難化或欲作嘔
出血吐血便血尤宜用之蓋
症宜於此湯但加當歸脾胃宜
沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂起
六君子湯二二九 方在補陣
治脾胃虛弱或寒涼剋伐腫不消或不潰歛宜服此湯以
出營氣則諸證自愈
加味四君子湯二三三十 方在補陣二
治瘍漏下血面色瘡瘍凡諸氣虛脾虛不能攝血等證
四物湯二三三一 方在補陣八
治瘡瘍血虛發熱或因失血過多因剋伐或因潰後致晡熱內

熱煩燥不安皆宜服之蓋血
四君子加當歸酒炒白朮以益補脾
八珍湯三三二 方在補陣十全大補湯三三三 方在補陣二十
治瘡瘍脾胃損傷惡寒發熱
損膿水清稀久不能愈
十全大補湯三三三 方在補陣二十
治瘡瘍氣血虛弱腫痛不愈
或潰瘍膿清寒熱自汗盜汗食
少體倦發熱作渴頭痛眩暈似中風狀者
補中益氣湯三三四 方在補陣三一
治瘡瘍元氣虛損惡寒發熱
或因乾伐肢體倦怠飲食少思
或不能起發消散生肌收斂兼飲食勞倦頭
作渴脉洪大弦虛或微細軟
歸脾湯三三五 方在補陣三十三
弱

治瘡瘍憂思傷脾血虛發熱
行吐下或健忘怔忡驚悸少
體腫痛大便不調或婦人經
及不能消散潰敗飲等症
獨參湯二三六
治瘡瘍一切失血或膿水出
躁盜血生於氣故血脫者宜
一兩煎十片水煎徐
人參養營湯三三
治瘡瘍脾胃虛損發熱惡寒
面色痿黃汗泄氣食少作
五味異功散三三
治脾胃虛弱飲
君子湯加陳皮

十六

多氣血俱虛惡寒發熱作渴煩
補氣陽生陰長之理也用人參
服
七
方在補
陣二十一
血氣俱虛四體倦怠肌肉消瘦
湯九大病後最宜用此
方在補
陣四

生脈散三三九

治瘧痞腹脹胃氣虛弱不能運化飲食痰涎壅滯或瘧後脾虛不能健運飲食少進

人參　白朮　茯苓　陳皮　半夏　白芍藥　當歸　甘草　乾薑　五味子

水煎服

歸脾湯三四〇

治思慮過度勞傷心脾血虛發熱怔忡驚悸健忘盜汗虛煩不寐或心脾作痛或月經不調或大便不實或血虛發熱或瘡瘍潰後調補氣血

當歸　白朮　茯神　黃芪　龍眼肉　遠志　酸棗仁　木香　甘草　人參

加生薑大棗水煎服

十全大補湯三四一

治氣血俱虛或內傷或外感或瘡瘍潰後調補氣血

人參　白朮　茯苓　甘草　當歸　川芎　白芍藥　熟地　黃芪　肉桂

加生薑大棗水煎服

參朮膏三四二

方在補陣四十五

補陣四五

治氣血俱虛肌體倦怠肌肉消瘦面色萎黃飲食不安睡臥不寧或泄瀉或腫滿或瘧後脾虛不能健運飲食少作渴或口乾喘促或肢

治瘡瘍中氣虛易諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

東垣聖愈湯三四三　方在補陣九一

治脾胃虧損膿水不止或金瘡出血心煩不安眠睡不寧五心煩熱飲食少思

錢氏七味白朮湯三四四　方在小兒七

治瘡瘍膿氣虛弱或因剋伐或因吐瀉口乾作渴飲食少思

陳氏五味子湯三四五　方在補陣五九

治瘡瘍腎水枯涸口燥咽乾喘促虛煩作渴

參附湯三四六　方在補陣十八

治瘡瘍失血過多或膿瘍大泄或寒涼汗下重陽脫陷上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等證急服此湯以救元氣緩則不

八參理中湯三四七　方在熱陣一

治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹作脹或痛或胸膈虛痞飲食不入

六味丸三四八　方在補陣百二

此壯水之劑夫人之生以腎爲主乃天一生水乃九病皆由腎虛而致此方秘瘀氣壅盛欬嗽吐血頭目眩暈引便短少眼花耳聾咽喉糜痛口舌瘡烈齒不堅固腰腿痿軟五臟齊損肝經不足等症尤多用之泛爲痰之聖藥血虛發熱自汗後盜汗便血諸血失瘡此水能生木故也若腎虛發熱之神劑也

八味丸三四九　方在補陣百二

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等症不能飲食少思或飲食而不化瘡瘍潰後久漩

陳氏加減八味丸 三百五十 方在古補丙三

治腎水不足虛火上炎發熱作渴咽喉疼痛口舌生瘡潰爛

還少丹 三五一 方在補陣一三七

治足三陰經虛損致患鶴膝風等證又補脾腎進飲食之良劑也

大防風湯 三五二 方在補陣九九

治足三陰虧損外邪乘虛內虛鶴膝風或附骨疽腫痛或腫而不痛不問已潰未潰用三五劑後更全用調補之劑

薛四神丸 三五三 方在瘧疹十四

治瘡瘍脈緩濇體倦惡寒或腫痛脈浮陰系細用之以散風助陽也

五四

治瘡瘍脾腎虛弱大便不實飲食少思或作泄瀉肚腹作痛不思飲食

五積散三五五

方在散陣三九

治風寒濕毒客於經絡致筋攣骨痛或腰腳疼疼或拘急或身重疼皆治之

二陳湯三五六

方在和陣一

治痰癖中脘停痰嘔吐惡心或頭目不清飲食少思等症

小柴胡湯三五七

方在散陣十九

治肝膽經風熱瘰癧結核或腫痛色赤或寒熱往來或口苦耳聾欬嗽發熱或潮熱身熱默默不欲飲食或怒火旺

小青龍湯三五八

方在散陣

治肝肺受寒欬嗽喘急宜服此表散表邪

八宝敗毒散 三 方在和陣三六

治瘡瘍外有表邪嫩痛寒熱或拘急頭痛脉緊有力不喚金正氣散三百六十

治瘡瘍脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱服此以正脾氣則痰氣自消寒熱不作

加味逍遙散 三六一 方在和陣三二

治瘡瘍肝脾血虛內熱或遍身搔痒寒熱或肢體作痛頭目眩昏重或怔忡類赤白燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或

防風通聖散 三六二 方在攻陣十六

治時毒熱毒便秘熱燥邪實等症若非大滿大實者不可輕

治風熱癮疹瘙痒及婦人血風瘡痒或頭皮腫痒或諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻出清水噴嚏聲重耳作蟬鳴犀角散三六四 方在痘疹六三

治時毒癰瘍熱盛煩躁多渴赤斑等症

黃連解毒湯三六五 方在寒陣一

治瘡瘍煩痛煩躁飲冷脉洪數或發狂言

普濟消毒飲三六六 方在寒陣十三

治天行時毒頭面腫痛或咽喉不利若饑饉之後患此者最宜用之仍當兼固胃氣

梔子清肝散三六七 方在寒陣六十

治三焦足少陽風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱往來

柴胡清肝散三六八 方在寒陣五十九

治鬱痛及肝
熱
加味龍膽瀉肝湯三六九　方在寒陣六四
治肝經濕熱或囊癰便毒下疳懸癰痤瘡作痛或潰爛不愈
或睾丸小便澁滯或婦人陰瘡痒痛作痛或潰爛水
清心蓮子飲三百七十　方在寒陣三二
治膀胱陰虛濕熱玉莖腫痛痛或赤安靜而晝發熱
黃芩清肺飲三七一　方在寒陣三八
治庵瘍肺經陰虛火燥而小便不通
凍瘡清胃散三七二　方在寒陣五四
治胃經積熱唇口腫痛齒齦潰爛煩痛上連頭面或惡寒發

熱

竹葉石膏湯三七三　方在寒陣五

治癰疽胃火盛腫痛作渴

杵葉黃芪湯三七四　方在寒陣七

滋腎丸三七五　方在寒陣七

治瘡瘍腎經陰虛發熱作渴便赤

小便秘熱在下焦血分也最宜此藥經云無陰則陽無以化

若脾肺燥熱所移此當清其化源

方在寒陣百五一

治肝經實熱瘰癧腫痛寒熱或脇乳作痛大便秘結

大薊飲子三七六　方在寒陣百五二

瀉青丸三七七　方在小兒百十五

治肝火下疳潰爛或煩腫作痛小兒疳瘡食積口鼻生

治齒牙龈爛宜清火凉血

玉泰散三七八　方在泰和陣

治瘡毒不部濕熱小便短少

玉林散三十九　方在寒陣百十七

治膀胱有熱水道不通或尿如豆汁或如砂石或如膏油或

熱淋便血

八正散三百八十　方在寒陣百十五

治下疳便毒小便淋漓脉證俱實者

清肺飲三八二　方在和陣三五一

治瘡瘍渴而小便不利方肺經有熱是絶寒水生化之源宜

用此藥以清化源其水自生而便自利

益元散三八三　方在寒陣百十二

治瘡瘍小水不利而生煩熱作渴

四順清涼飲三八三 方在攻陣二五

治奔豚煩躁飲冷炙痛脉實大便秘結小便赤澁

玉燭散三八四

治腫痛發熱大小便秘宜用此行散之若邪實毒

淸便癰初起腫痛發熱大小便秘結小便赤澁

甚者宜桃仁承氣湯

人參平肺散三八五 方在寒陣三七

治火剋肺金傳爲疳瘦欬嗽喘喝喉中痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌

不利

葶藶大棗瀉肝湯三八六 方在和陣百四十

治肺證胸膈痛上氣喘急或身面浮腫鼻塞聲重

枳殼散三八七 方在寒陣百一

治煩熱便血

失笑散三八八

治映撲産後心腹絞痛或不知人事或經行痛成癖
槐角九 三八九 方寒帥一七五
治痔漏腫痛便血脫肛
紫金錠三百九十 方在因帥三百二
治癰疽諸毒
通閑散三九一 方在古田九八
治鼻開牙閉

景岳全書卷之十四 小兒

雲溪行四

大總統申令

茲制定公布法令程式令公布之此令

大總統印

中華民國三年十一月十七日

教令第一百四十一號

公布法令程式令

第一條　法律於經院議決後大總統認爲應依約法第三十四條之規定公布施行者由法制局遵繕法律正本編列法律號數記入法律號數檔册並遵繕公布令連同副本送機要局由機要局將公布令及法律正本呈大總統蓋印國務卿署名記入公布日期公布之

前項法律正本連同公布令由法制局保存副本由機要局送印鑄局依公布日期公布於政府公報

第二條　依約法第十九條公布之教令經大總統核定後由法制局遵繕教令正本編列教令號數記入教令號數檔册並遵繕公布令連同副本送機要局由機要局將公布令及教令正本連同公布令由法制局保存副本由機要局送印鑄局依公布日期公布之

國務卿徐世昌

府公報

依約法第二十條公布之教令除依前二項規定外其須交院追認時由法制局依照原公布之教令全文繕具清本呈請交院追認俟追認文到後由法制局查明應行改編法律號數記入法律號數檔册並遵繕公布令連同副本送機要局依第一條之規定行之

第三條　省單行章程由巡按使決定後依式繕具定本編列省章程號數記入發布之年月日通飭所屬官署並示知地方人民仍於發布後即行繕單呈報大總統查核並咨陳主管各部

其原報章程由法制局分別編入檔册

第四條　道單行章程由道尹決定後依式繕具定本編列道章程號數記入發布之年月日通飭所屬官署并示知地方人民仍於發布後即行繕單詳報於巡按使或都統查核

前項詳報巡按使或都統得依省官制第三條都統署官制第十一條辦理其原報章程由巡按使及道尹得依省官制第三條道官制第三條辦理其原報章程由京兆尹決定後依式繕具定本編列京兆地方章程號數記入發布之年月日

第五條　縣單行章程由縣知事決定後依式繕具定本編列縣章程號數記入發布之年月日

示知地方人民仍於發布後即行繕單詳報巡按使及道尹得依省官制第三條道官制第三條辦理其原報章程由巡按使或都統查核

前項詳報巡按使及道尹得依省官制第三條道官制第三條辦理其原報章程由巡按使或都統查核

第六條　京兆地方各縣巡行詳報京兆尹依前項規定之程序行之

京兆地方章程由京兆尹決定後依式繕具定本編列京兆地方章程號數記入