

内科新説

下

漢書門				
三冊	一函	二函	五六九二號	類

庫	文	閣	內	
九五函	一	三	三七八六四	和書
架	冊	號	類	

內閣文庫	
番號	和 37864
冊數	3 (3)
函號	195 296



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



刻印

文庫部

同治

內科新說卷下

英國醫士合信氏著

江甯管茂材同撰

東西本草錄要

人身血脈運行時有消耗全賴飲食補其缺乏試觀健飯之人精神充足少壯體壯全身功用各司其職百病不生前卷所論致病之成皆端而食物不合或食不滿量亦為諸病之一夫人身一處有病他處易累甚則徧體為之不適譬諸鐘表一齒一軸失度因而處處不靈也然病證紛繁皆有的當之藥可以療治良醫審察病原對證發藥自然奏效但此理精微奧妙非聰明敏哲之人不能習學中土本草所載藥性淡薄者多偶然誤

內科新說

卷下

投其害猶緩、番藥則各有功力、用之得當、取效甚速、苟或誤施、關係非輕、西醫略論已將方劑分門開列、茲更選錄東西藥性合用者、詳述於後、西國藥名、欲用唐字翻、譯甚難、故採用不多。
藥有專治某病、確有速效者、如鐵酒治虛弱、黃證、礪哪信石酒治寒熱、此屢試不爽者也、但此類甚少、須知草木金石各有專長、或補或瀉、或入肝瀉膽汁、或斂汗、或減血、平日講明功用、臨證投之、自然應驗、但病有不能速愈、須緩以圖之者、藥雖對證、未必即瘳、不必因功效稍遲、遂疑而妄易他劑也。
化工妙用、令人以病醫病、試觀寒熱得汗則愈、良醫因製為發表之劑、以助其汗、肺病喘促、痰出則安、良醫因製為嘔吐安肺

之劑、以出其痰、胃病不消化、食物少、愈後時欲食、以補缺乏、良醫因製補劑、以彌其虛、有時他處生病、而此處病勢遂輕、皮肉生病、而臟腑病勢遂減、所以有鈞膿外治等法、有時望生新病、以療舊病、如炎證用減血瀉法、即是此理、醫者於此參悟、自能治療合宜矣。

某藥治某病、其初原由歷試而知、或醫者自服、或用以治病、有效屢試不爽、因而筆之於書、如中國本草是也、又如山泉之下、有硫磺鐵元明粉、人飲其水、即能治病、此理之確者、若專以色香氣味、分配臟腑、則影響無據矣、
藥所以治病、昔人取金石草木之屬、考驗其性情功力、或發汗

或吐、或瀉、或減血、或補血、或補精神、或去風氣、或搓擦皮熱、引
病外出、有此功力、方謂之藥、至於鳥獸蟲魚、間有用以入藥者、
如鹿茸、麝香、猪油、魚膠之類、大抵專取其一物、如鹿取其角、麝
取其蒂、猪取其脂、魚取其膠、是也、若夫猪牛羊肉、及雞鴨魚鮮、
與夫穀果蔬菜、日食所需、養育身體、不得不用、非可治病、卽不
應、概名爲藥、若夫狗馬之肉食之、傷人、龍骨、虎骨、犀牛角、羚羊
角、象牙、象皮、蟾酥、蠶退、龜板、鼈甲、金銀箔、雲母石、磁石、琥珀、珍
珠、白石英、紫石英、滑石、各物、中土所習用、其實毫無功力、又有
污穢之物、如人中黃金汁、人中白、童便、秋石、紫河車、紅鉛、兔屎、
夜明砂、龜尿、鴿糞、怪毒之物、如蛇蠍、蜈蚣、五靈脂、蚯蚓之類、卽

無大害、亦斷無益、皆不應收入本草、醫者切勿妄用、
藥有略具功力、而華人信用過當者、如燕窩、海參、阿膠、鹿膠之
屬、功力止於能潤、不過與猪蹄魚膠雞蛋白等物相似、因其價
貴、奉爲至寶、殊可不必、

唐人有因身虛弱、或年老、買食人乳者、不知人乳止合小兒吮
食、大人應食牛乳、驢乳有益、食人乳毫無功力、徒令乳母母子
俱損、戒之、戒之、

凡用草木入藥、或取其汁、或取其葉、或取其皮、或取其花、或取
其根、或取其果、或取其子、均須曝乾、秤準、雨露中不宜採藥、用
葉應待花已開、果未熟之前、收採用、花應乘新開、收採用、果用

子應俟已熟收採有殼者連殼收採臨用時剝去不論花葉皮
 幹根果並以本年新者為佳陳久則失功力收採後曝乾或烘
 乾貯大玻璃甌或甕中緊塞其口勿著溼勿泄氣勿透光用時
 或作散須篩取細末或作酒須用濃味能消化樟腦之酒將藥
 浸入時常搖動或作水須用雨水蒸水更妙不可用井水若有須泡
 煮者沸後不過一刻即須取起不宜久沸至一切香物如八角
 油薄荷油之類不可煎煮恐泄香氣
 方劑中凡稱散者合幾味而成者也稱末者一味獨研者也
 凡藥須真材方有功力偽者陳壞者概不可用每有人聲色賭
 博揮霍浪費及身病購藥任意不擇希圖價賤愚之甚矣

藥有合二質而成一物或合數質而成一物者如養氣一與輕
 氣二合則為水礮強水與蘇呷合則為元明粉與鐵合則為青
 礬與銅合則為膽礬與啞嚙囉哪合則為白礬鉛與炭氣合則
 為鉛粉與養氣合則為蜜佗僧水銀與硫磺合則為珠砂硫磺
 三與信石一合則為雄黃或人工配合鍊製而成或有產於山
 者蓋造化主配合鍊製者也若以兩物共置一器其性合者則
 相愛而相連性不合者則格拒而不入凡酸味喜與金類相連
 如青礬膽礬是也尤喜與啞嚙囉哪相連啞嚙囉哪者與酸相對之味也
 蘇呷啞呷中土名啞嚙囉哪沙啞摩呢啞中皆有此味與苦相對日
 日淡此華人所知也與酸相對之甘與鹹相對有時酸味已與金類相連及
 味中土無名今用西國名曰啞嚙囉

遇啞味復離去金類而與啞味相連若中有炭氣酸水一入炭氣偏出勢如沸騰
 酸味與啞味相對以色試之可見法用藍色紙須藍草所染若藍石所染者不驗浸入啞味水中其藍不變若浸入酸水中即時變紅試更浸入啞味水中仍返轉藍色又用黃色紙須姜黃草所染若石黃染者不驗浸入酸水中其黃不變若浸入啞味水中即時變為深紅試更浸入酸水中仍返轉黃色凡溺病欲知溺味變酸否法試以草藍紙浸入溺器中若變紅色即知溺味酸也欲知溺中有啞味否試以草黃色紙浸入溺器中若變深紅色即知溺中有啞味也蓋常人溺中酸與啞味配合適中是為無病之溺若偏多偏

少即恐生沙淋也

補劑

藥有以補為用者補精神補腦補腦髓筋即腦氣筋為一類中國稱補火是也有飲者如茶酒之屬蓋腦胃相關故飲入於胃功力能感腦補精神也有齶者如麝香冰片濃醋阿摩尼阿之屬意令由鼻達於腦也或外治有以熱物如芥末等物貼胃位者有搓擦外皮令熱者有下身或兩腳浸入熱水中者有以藥水貯水節射入肛門者諸法意皆主於保護腦氣筋使暖性由腦氣筋而傳及腦腦安即心安而精神亦振也有人傾跌昏暈急用冷水灑面而甦有小兒初生不呼吸亦用水灑或拍背等處而呼

吸大通者、意令腦氣筋遞傳至腦髓、由腦髓而傳至膈內、呼吸功用、即時靈動、大氣一通而復也、凡補精神之藥、卽能補脈、脈絕能復、脈微能有力、蓋補精神卽是補火、故須診定確係虛證、方可少用試之、如果藥與病合、漸次加多、若炎證之類、病屬血多火旺、治應滅血滅火、誤用補劑、關係非輕、凡飲茶酒吸煙、藥皆能令精神即時振作、但能暫而不能久、蓋人之精神、貴得其平、困倦者宜振之、飲茶酒吸煙、藥皆所以振其困倦也、但振之太過、藥力一退、困倦更甚、故吸煙飲酒之人、往往有癮、有癖、如魔鬼之不能驅除、皆精神愈振而愈敗之徵也、善養精神者、調適性情、勿憂怒悲恐、醫者須令信任倚賴、自知望愈、保重

調攝、或時聞快意新聞、最爲有益、或借光熱電氣器機、以醒困、或用水洗面、以安腦氣筋、皆補精神良法也、至若開胃補胃爲一類、如黃連人參之屬、胃健則能食、養育身體、令人壯健、又補血爲一類、如鐵酒之屬、與補胃補火藥合用、則爲全補、大概補胃補血全補、須緩圖見功、非如補精神卽時速效也、草木之類、味苦者多補、如雞、哪、黃連是也、金石之類、味酸者多補、如硝、強、水、酸、醋是也、凡開胃藥多能補胃、胃以健運消化爲補也、久病虛弱人宜出外游玩、宜居通風之室、或以海水澡身、或以冷水洗面、皆能令人身體壯健、勝於服藥、病有宜補不宜補、須辨別準確、如頭痛屬於腦氣筋者、痛在一

處此虛證宜補者也。若身壯熱滿頭皆痛，是血熱血太多為患，切不可補。又如發熱後瀉後，身虛弱，懶於行動，操作言語者，宜補。若初起時困倦無精神，病勢方張，切不可補。久效身虛弱，可補。若肺經炎證，身熱脈數欬嗽，切不可補。餘可類推。今略述補劑一二於後：

補火之劑：樟腦半錢，桂皮酒四錢，八角油或丁香油二錢，薑湯二三錢，薄荷水五兩。能補火補精神，暖胃去風。每服一兩，日二三次。又法：阿摩尼阿或麝或服五釐，至十釐，一二次能保腦補精神。

小兒暖胃之劑：蜜尼沙末二三分或石粉二三分，丁香油

四滴或八角油四滴，鴉片酒五滴，糖水四錢，薄荷水一兩五錢。每服一二錢，每二時服一次。小兒瀉利後，腹內有風氣者，服此能暖胃補胃，去風氣，止腹痛。一法：蜜尼沙或石粉半錢，白糖五分，桂皮散一分半，鴉片酒二滴，至四滴。小兒不可食鴉片，六月以上，八角油二滴至四滴，可略服，但須當心不可誤多。

水一兩六錢，攪和，每服一二錢，日服三次。治小兒腹痛嘔吐瀉泄尿綠色。

補喉之劑：喉病聲低啞，因於喉軟弱無力者，用沒石子酒一錢，水六兩，及胡椒酒四錢，至八錢，漱喉，日二三次，能收斂補喉。傷風喉痛者，用朴硝二錢，蜜四五錢，大麥水六兩，日

漱三四次 或用硼砂二錢 沒藥酒三錢 大蜜三四錢
 水五六兩 日漱三四次
 補胃之劑 黃連水四兩 江浙黃連價貴不易購西 桂皮酒
洋人參功力略同亦可
 二錢 嘸叮二分 如無嘸叮用石粉亦可 大黃末一分 作水 每
 早晚服四分之一兩 日服畢 治胃不消化 有酸水 或用大
 黃 嘸叮 亦可 末 黃連末各一錢 薑末二分 蜜和為丸 五
 十粒 每服二三粒 日服三次 功力亦同
 補散 鐵鏽大黃黃連末各一錢 薑末四分 共研細作三
 十二分 每服一分 日服三三次 能補血 治黃病 腦氣筋痛
 一法 青礬一錢 鹹一分 沒藥一錢 啊囉末半錢 蜜

和分為三十九 日服二三粒 補虛微利 婦人黃證 經不調
 宜之 或用青礬末三分 大黃末半錢 黃連膏一錢
 蜜和分為二十九 每服一二粒 日服二次 治婦人身虛流白
 帶
 收斂之劑 藥有以收斂為用者 或斂汗管之口 或斂血管受傷之口 皆是
 有時在內收斂 如瀉泄服收斂藥 則便結是也 身虛弱久病者
 用之最效 若身熱脈數 有新疾病 證據者 不可收斂 誤用則病
 更劇 淡礬強水收斂而補 最有功力 其次測錫散 鐵散 膽礬
 白礬 鴉片 皆收斂要藥 鴉片合他藥 並用能助藥力 收斂尤多

白礬兒茶散、白礬末一分、兒茶末一分、共研細、每三時服一次、能止瀉、治久瀉、流白帶、一法黃連水一兩、兒茶酒一錢、長悅、哩略末五分、釐或加入鴉片酒二三十滴、自能止內出之血、欬血、吐血、瀉血、皆宜、服三次、水銀吃、哩略散、水銀散五分、釐用、哩略散一分、至一分四釐、釐置舌上、兒茶、水送、嚥、治痢最效、一法吃哩略末二釐、帶白礬六七釐、每二三時服一次、又法、大黃末四分、桂皮散二分、鴉片末二三釐、共研、作六分、每三時服一分、或用石粉、一錢、兒茶酒一錢、或兒茶末一分、鴉片酒半滴、至一二滴、或鴉片膏二釐、每二時服一次、或用吃

哩略散三分、桂皮散二分、攪勻、作四分、每二時服一分、並治久痢瀉泄、能止血、

鉛散 鉛散三四釐、或合鴉片末一二釐、或合吃哩略散一分、

每日早晚服、能止血止瀉、或用鉛散一分、醋二錢、雨水四

兩、腹痛加鴉片酒一錢、或鴉片膏三四釐、作四分、每一分一兩、每二時服一分、

日服二三次、能止血、凡血自肺胃大小腸膀胱出者、並宜服、

一法、鉛散二分、鴉片膏二三釐、甘草末二分、蜜和十二丸、

每半時服一粒、能止瀉止汗、霍亂證將作之先、服之佳、

膽礬鴉片丸 膽礬二三釐 鴉片二三釐 蜜和為丸四粒、

每服一粒、日服二三次、久瀉久痢有膿出者宜之、

白礬兒茶水 喉軟弱聲低不出者用白礬一錢蜜二三錢兒
茶水六兩漱之

發表之劑

病有得汗而減者應用發表之劑蓋發表藥與收斂藥相對其
功力能令皮暖加增皮之精液服此藥後無汗者即得汗汗少
者能令多故發熱肺經炎證身熱傷風風溼等證汗出則病減
並須用此藥助令速出又如瘧證其初血不流佈而聚於內則
發冷而色白而皮皺及血散出則發熱熱則血運愈速而汗生
焉病者得汗後即覺快適此病自醫法也凡天熱暴冷人多不
適是因汗流忽止不更暢出之故又天冷則小便多而汗少天

熱則小便少而汗多蓋小便與汗同此津液有人小便太多聚
膀胱內不得出皮乾口渴服發汗藥能減少小便是令津液由
汗管分泄也凡欲發表者服藥後食熱粥或熱茶水或用熱水
吞吃呷略散十四釐以熱水貯盆內兩腳浸入然後擁厚被安
臥即有多汗夜晚服發表藥汗出更易同時勿被冷風吹襲勿
服酸藥酸則收斂汗不得出也勿瀉勿利小便瀉利則汗少也
勿飲冷水冷水能斂汗也若發表太多欲止之者先將兩手放
出被外擁護勿過密汗即漸止然後用布巾週身拭乾另換乾
淨衣被避風為宜汗出後厚被擁蓋太密溼氣不得出次早
身必軟弱凡皮病如癬疥之類宜冷水洗淨服發表藥 臆

脹得汗則病減。凡瀉劑利小便之劑，皆血多欲減少之意。發表亦是此理。
 瀉與補相對，減血滅火之意。蓋胃小腸大腸中血管甚多，管中之水有時與血相離而泄出，流於大小腸中，或自瀉，或飲藥而瀉，身必軟弱，與發汗同理。更有瀉膽汁，或瀉腸胃中津液者，所宜詳辨藥之功力。有大瀉者，有微利者，有瀉小腸者，有瀉大腸者。有自胃至肛門全瀉者，醫應分別病勢輕重，或大瀉，或微利，斟酌用之。發熱炎證，臃脹中風病，大便秘結，不得不瀉。若身虛者，止應微利，不宜大瀉。大便時而難時而瀉者，亦應微利。婦人

產孕及小兒病證，皆不宜猛瀉。服輕瀉微利之藥可也。

瀉劑 瀉者，以藥推之使出也。凡病有自瀉而愈者，是病自醫也。有自瀉不止而身虛弱委頓者，應服收斂藥止之。若遇應

瀉之病，以藥瀉之，大概三四次無有不止者，不必疑畏。渣

臘末十五釐至二十釐。無渣臘用 迦路米或水銀散五七

釐。桂皮散四五釐。白糖攪和，置舌上，溫水吞送，不久即

瀉水出。或用大黃末二三分，迦路米五七釐，薑末三

四釐，亦可。一法，水銀散五七釐，或迦路米四五釐，置舌上，

大黃末吞送，或以水銀散五七釐，合大黃末一分，蜜糖攪和，

吞嚥，夜晚服，明早服，草麻油六錢至八錢，或元明粉五錢至

八錢，即瀉病未除者，更服二三次可也。若欲速者，服巴豆油一滴，即時大瀉，或用巴豆油二滴，丁香油一滴，大黃末三四釐，共作一粒，吞嚥亦效。身熱脈壯有力，舌根有厚白苔，腹內有風，大便秘結，腦炎、眼炎並宜用瀉法。

微利之劑，微利者，大便難，以藥輔之而出也。法用大黃末二分，桂皮糖一分，薄荷水一兩，服一二次後即瀉。或用大黃末一二分，多至三分元明粉四錢，多至八錢朴硝一分，水二兩，服一二次。一法大黃一錢，水銀散一分，桂皮油或丁香油或八角油四滴，分十四丸，每夜晚食二三粒。小兒身不安，尿色白而臭，用大黃二分，水銀散八釐，桂

皮糖一二分，勻作六分，蜜糖攪和，每二時食一分，半歲以下小兒欲微利者，用大黃末二分，蜜泥沙末四分，如無不用亦可。桂皮糖一分，勻作十分，每二時食一分，桂皮糖作法見後

利小便之劑

小便者，內腎所生，藥之功力能令內腎生多溺，如朴硝之類是也。有時因腦氣筋累內腎而生，如恐懼則小便驟多是也。有時膀胱偪縮而小便亦多，如天熱乍寒，或驟脫衣服，人即欲溺是也。凡患發熱炎證，溺紅而少，是累內腎，法應利小便而愈。朴硝為上，又元明粉多服則利大便，少服則利小便，此外如茯苓、澤瀉、車前子之類，俱可酌用。服藥後多飲茶水，以助藥力，居清涼

之室勿厚著衣被勿食瀉藥勿食發表藥大概汗法難過瀉法而利小便之法又難過汗法也

止痛之劑

藥有以止痛為用者如鴉片之類是也其功力由胃傳入腦令人熟睡忘痛初時少服之一服即應若久而習慣或有鴉片癮者須漸加多方能應驗但多服過度令人頭昏驚跳迷蒙不醒應速服嘔藥不能吞嚥者用水節射入法詳西醫略論大抵小兒半歲以下不可服鴉片頭痛頭重頭熱身熱中風脈數有力及心經有病者皆不可服鴉片若有病患痛苦者用以止痛安臥實有殊功也

止痛用鴉片之劑或鴉片膏或鴉片末或鴉片酒或鴉片水或吃哩啞散或樟腦鴉片水或並見後藥品中

小兒止痛法 小兒半歲以上至一歲者欲略解毒止痛用吃

哩啞散二三釐水銀散二三釐夜晚服次早服大黃末四五

釐令安臥微利一二歲以上可略加增吃哩啞散用三四

釐有風者加八角油一二滴法見後

樟腦鴉片油 樟腦四五錢 橄欖油熱用二兩或花生油 鴉

片酒四錢或鴉片膏一二分 擦痛處良

去痰之劑

痰者肺經所生肺有病則痰多或為喘促或為欬嗽出其痰而

病自愈有服嘔藥即時痰偏出者有用引病外出之法安肺使痰漸減者

潤皮之法

有外用潤皮者如黃臘膏藥猪油草麻子油胡麻子油之類是也亦有內潤臟腑者如牛乳胡麻子水麥漿水藕蓮粉西穀米粥水蜜水糖水雞蛋黃魚膠樹膠猪蹄及一切獸類之膠是也

暖皮之法

此法欲令皮暖溼或用粥渣貼合或用罌粟殼野菊花滾水搗爛貼合或用胡麻子搗爛貼合或用麥糠浸入滾水取起布包瀝去水按貼或用滾水浸麪包去水用牛乳攪和瀝起敷按

去毒氣之法

有地氣之毒有病氣之毒有炭氣之毒屋內宜通風潔淨焚松香乳香之類燃放鞭爆編灑濃醋屋內周圍板壁並用石灰水洗滌能散一切毒氣

此外如調經殺蟲等劑並見後藥品中

藥品

酸醋

番國作酸醋法以各種葡萄酒貯器內不用蓋護任其變壞瀝去渣滓火蒸令濃每八斤蒸取七斤為度亦有用大麥水煮俟其變酸取用者總以清如水無色為佳味以極酸為上中土醋色黑而味薄不堪入藥醋性涼功能收斂止

欬血吐血身體發熱變毒飲酸醋能解之身虛弱牙肉有血
泄出或脚瘡有血泄出飲酸醋能斂之冲鴉片毒者先服嘔
藥吐出後飲酸醋能免鴉片毒喉癰病宜貯熱醋於壺中以
口銜接壺口吸其氣跌打外傷用醋洗能滅熱痛湯火傷皮
未爛者亦可用眼證舊膿炎用醋水洗灰眯目用醋水洗能
消灰解毒凡內服一錢至四錢或助以鉛散服幾次外洗用
濃醋二三兩配酒一兩水數兩若擦皮令熱能引病外出醋
八加入斑登末尤佳

檸檬汁

性涼味酸粵東產者佳暑月身熱用檸檬汁六錢或
用二枚或滾水一斤浸入加白糖一兩冷服最宜蓋檸檬功力能

醃肉不變壞故虛弱人血稀薄有時血自牙肉脚瘡泄出飲
此亦良 檸檬功力與醋略同無檸檬用醋代亦可

磺強水

泰西製磺強水法作密屋上下四方皆用鉛砌取硫
磺九朴硝一下承以水燃燒多次漸成磺強水別有製法詳
其質似油重倍清水色清為佳味酸至極不能嘗試粵東人
因其質似油性烈如火故名之曰火油各物入磺強水中皆
能即時爛壞惟鉛與水銀不能鎔消收藏之法貯玻璃甌周
圍用砂覆護以防傾泄焚物磺強水入清水中清水即時變
熱初製濃者不能入藥入藥者用雨水或蒸五兩八錢貯杯
內取濃磺強水一兩二錢英國水用量法玻璃杯號記度數
水滿第六記為六錢中國用權稱

則當一兩二錢因磺漸漸傾入不可驟防杯裂也磺強水無色無香為上略醬色尚可用功力全補收斂胃弱不消化欬血多汗血崩身虛口津多並宜服淡磺強水每服十滴至三十滴清水和喉爛者用淡磺強水二錢至三錢配水六兩漱之霍亂用淡磺強水三十滴每半時服三次能收斂止大瀉

番舶販來中土者因恐舟中藏貯不慎傾泄焚燒有時用清水攪雜試法稱其輕重便知磺強水定率應重倍過清水磺強水稍重過清水若其中攪雜清水稱之必輕也

元明粉與銅合則為膽礬與鐵合則為青礬皆大有功力之藥價不甚昂中土所宜購備消化諸金石功力磺強水為最酸味中此為首也

鹽強水 作鹽強水法用磺強水十六兩中國權稱鹽十二兩清水

五兩貯於蒸汽器之左邊蒸汽器以玻璃為之圖見博物新編另用清水五兩貯於蒸汽器之右邊以熱砂蒸左邊其汽透過右邊水內是為鹽強水取貯玻璃甌內其色黃其味酸至極上浮煙焰其性烈銷金石功力磺強水為最硝強水次之鹽強水又次之能全補熱病後身虛弱有毒如黃病之類宜之法以鹽強水一兩六錢雨水或蒸水四兩八錢攪和作淡者每用二十滴至六十滴清水和服喉爛用濃鹽強水一二錢清水五兩蜜一兩攪和漱之有效

硝強水 作硝強水法用乾朴硝磺強水等重如磺強水一斤朴硝亦一斤同貯蒸汽器內左邊置熱沙上蒸之其汽透過右邊即成硝

强水因朴硝本係硝强水與哧得吵相連而成今磺强水力大過硝强水哧得吵離硝强水而與磺强水相連故硝强水透過性烈入水銀即時沸騰銷化外科用之能殺浮肉右邊也

但濃者止可外用若欲內服加清水九倍作淡者每用十滴

至三十滴清水和服功力能補解疔毒欲解屋內毒氣用磺强水八錢朴硝四錢

共貯一器其煙焰薰騰能殺毒但衣服易被薰壞宜先收藏

𤑔

𤑔又名哧在樹中以火燒樹成灰復用水和曬

乾即有哧得吵傾出中國名𤑔者是也但此法不甚潔淨須

另合他物為之乃佳味與酸相對合作藥劑能利小便治臃

脹濃者外用殺毒

朴硝

𤑔與硝强水合即成朴硝或產於地或產於古屋牆壁

或人工熬煉而成各國皆有印度最多無香而色白味微苦

功力利小便治臃脹止發狂性涼能去表熱令數脈漸平壯

健人身熱者宜之每服一分至三四分服幾次喉嚨熱略有

炎用朴硝一錢五分至二錢蜜一兩水七兩攪和漱之或用

朴硝一二錢大麥水七兩攪和漱之亦可

蘇呷

燒海草為之與作哧得吵同法亞細亞之西地中海等

處最多西國有人在海邊種植此草專為取蘇呷之用名曰

蘇呷草英國所用蘇呷係從鹽水中取出蓋鹽本係蘇呷與

鹽水合成故用法使之相離而蘇呷出也功用與哧得吵略

同其味與酸相對能改變酸味溺變質有紅沙宜用蘇呷一

二分溫水和服日二次胃不消化酸水流出者宜用嘸啉一分半大黃末桂皮末各七釐飯前半時服酒脚病不消化小兒肚腹有風氣瀉泄均可用一法檸檬汁內加入嘸啉二三分用水一二兩攪和能安胃止嘔

元明粉 嘸啉與磺強水相合而成作鹽強水時磺強水之力甚大鹽強水不能相抵而離去遂與嘸啉相連而為元明粉其性涼能退熱令數脈漸平功力瀉大便秘腹痛皆宜與大黃朴硝合用尤佳每用三錢至六錢溫水四五兩和服食海邊水則瀉因海邊水內有元明粉故也歐羅巴醫士近日不用元明粉用磺強水與嘸啉相連別名曰番

元明粉功力勝過中國元明粉價亦甚賤

鹽 嘸啉鹽強水相連而成中國取鹽法或用海水煮曬或產於池井蓋海水中有鹽故味鹹飲之令人身熱而渴鹽多用能瀉能嘔少用能解毒外用能暖皮膚鴉片毒者用鹽六錢熱水半斤或加入芥末攪和能令嘔出手腳交節痛者用濃鹽水洗身軟弱者海邊澡浴能令人壯健脚瘡臭穢有毒者鹽水洗之良人不食鹽則血質變生瘰癧蛔蟲癩癩諸證食鹹味過多則熱渴牙肉腫出血令身病故鹽不可不食亦不可多食鹹味也

嘸啉 或生於地或生於海邊或生於石一種與磺強水相

連一種與炭氣相連功用微利解酸大便秘結者每服半錢至一錢胃不開不思食者用密呢吵半錢至一錢淡磺強水十滴黃連水或西洋人參一二兩薑酒半錢至一錢或薑末飯前半時服能開胃助消化不令便秘色白質輕功力與蘇呷相同味與酸相對能改變酸味故胃不安吐酸水者宜之湯中有紅粉由於湯質酸者宜之小兒瀉膽汁尿色綠因食乳不合腸胃多酸所致宜用密呢吵粉三四分大黃一分白糖一二錢丁香或八角油五滴滾水一兩五錢攪和每服一勺約二三錢不瀉者不必用大黃但用密呢吵取其能去腹中風氣也無密呢吵用石粉亦可酒脚病用密呢吵粉二分大黃

末七釐桂皮末七八釐同服婦人小兒面生紅點成粒因胃中有酸水宜密呢吵粉與大黃蘇呷同服密呢吵蘇呷洋貴番藥房元明粉價皆不購買甚易

阿摩尼阿鹿茸為峻補之藥因其中有阿摩尼阿峻補功力不在鹿茸而在阿摩尼阿也阿摩尼阿得火則飛故服食鹿茸法應切片浸服若不知此理以火煎煮阿摩尼阿得火飛去則無功力矣鹿茸價貴真者難得西國近年不用鹿茸專取阿摩尼阿功力同而價甚賤平人不難常食取阿摩尼阿有三法一在駱駝尿內一在獸骨內一在火山之麓所產石內與鹽強水相連西人用法令離開取出入藥或作散或作

水散色白而氣濃，功力補火補精神，頭昏顛之即時甦，頭痛因身虛軟弱者亦宜，顛但病人未覺時不可，令久顛防壞鼻肉也，散亦可服食，每用七釐至十釐，老人欬嗽痰多者宜之。

一法阿摩尼阿散，錢黃連膏半錢，如無黃連用大黃，作十粒，每服一二粒，日再服，能補精神，阿摩尼阿酒濃者每服十滴至二十滴，能補火補精神，或用阿摩尼阿丁香桂皮同浸酒，每服三十滴至六十滴，能補火發表，頭昏腦弱者宜之。

外用法，猪油調和擦皮，令紅熱，能引炎外出，與貼斑蝥膏藥同意，或用阿摩尼阿酒三四錢，樟腦一錢，熱油二兩，融合擦皮，大有功力，風溼交節痛及喉病肺病，並宜用此油擦。

收貯玻璃甌內，宜用木塞緊閉甌口，黃臘封固，勿令泄氣為要。

白礬 產於山，色白為上，味澀，功力收斂，內服能止血止瀉，外用能收斂脈管，止血，喉嚨軟音不出者，用白礬五分，水三兩，漱之，眼炎久者，有膿黏連睫毛，用白礬水點入。白礬二三分配水五兩詳

西醫略論 婦人流白帶，用白礬貯水節自陰戶射入，內服止血，用白礬末七釐，至二十釐，滾水和服，每一時服一次，血止即勿服，或用白礬豆蔻各七釐，蜜和作丸二粒，每服一粒，日服二次，並能止血。一法，白礬末二錢半，乳十二兩，熬滾融和，濾去渣，每服半兩至一兩，止瀉用此良，或用暖氣藥桂皮散之。

類同服蓋白礬不宜獨服防嘔吐也。白礬用火燒枯研細末能治瘡毒灑浮肉。白礬入水能澄清渣滓膠紙能令墨水不流染衣令色不退作燭令脂堅皆收斂之功也。

石粉 礬石搥成或牡蠣殼為之並研細末用滾水攪和曬乾去渣滓取其潔白者用之。石粉中有炭氣與噤呢吵嘸啣助脾胃同味與酸相對故能改變酸所生病胃不消化口流酸水者宜之。每服十分至三分小兒腸胃所生津液變酸者亦

可用食瀉藥後瀉不止者用石粉二三錢桂皮末半錢或桂皮酒六兒茶末二錢滾水六兩每服一兩日服三次或用石粉末一二分桂皮散一二分或華撥一分鴉片一二釐共作散亦

能止痛止瀉小兒瀉者減輕服之。一二歲以下小兒忌用鴉片過二歲不忌瘡

不收口或腳瘡不生新皮用石粉研細末灑之良。皮病膿

出或有惡水出者用石粉研細末夏布包撲或猪油調和作

膏貼之。石粉可代噤呢吵嘸啣之用小兒不消化瀉泄者

與牛乳同服能止瀉。石粉又名礬粉

一種燒礬石成灰初次入水則沸騰融合令水化氣此有毒

不可內服止可作灰水與油調和搽湯火傷等證用灰末一

兩雨水一斤貯甌內搖動之二三時後澄清取用。灰水入

迦路米或輕粉中即時變黑蓋迦路米係水銀合鹽強水今

水銀離開鹽強水與灰相連故色黑外用能生肉牙殺疔毒

兒茶 此樹印度新嘉坡等處俱有取其汁曬乾成塊切作四
 方形用以入藥性收斂身虛瀉泄及大小腸血出者宜之或
 作散或作水或作酒作散用兒茶二分桂皮一二分豆蔻一
 二分鴉片一二釐共研末滾水和服能收斂止瀉止痛作水
 用兒茶末二三錢桂皮末一錢滾水六兩沖每服一兩日服
 三四次作酒用兒茶末三兩桂皮末二兩酒一斤半浸入七
 日至十四日每服一錢至二錢或加入鴉片酒二十五滴或
 黃連水或樟腦水和服俱能止瀉止痛大有功力喉嚨軟弱
 語音不響者用兒茶水漱之

蘇木 產於印度新嘉坡等處中國染工用之其性略補而兼

收斂能止瀉法用蘇木一兩清水一斤半煎至一斤或加入桂皮末

一錢每服一兩日服三次多服令大便色紅

石榴 或用殼皮能收斂止久瀉久痢法用殼皮一兩六錢水

一斤半煎至一斤每服半兩至一兩能殺扁蟲每日早晨服

服二三次

沒石子 此樹中國印度俱有用其果入藥能收斂止血欬血

瀉血大小腸血痔瘡白帶俱宜之法用沒石子一兩搗爛水

一斤半煎至一斤每服一兩日服二三次或研細作散每服

一分半至三分日服二次喉軟弱者用沒石子水漱之

外用能止肛門痔瘡痛法用沒石子一錢研極細末鴉片膏

半錢猪油八錢攪和作膏每用半錢搽患處
脚瘡有血亦
可用此油搽

葡萄

生涼能微利利小便身熱發熱者宜之熟者良宜去皮
食因皮難消化也虛弱人食乾者能養身體但乾者連皮恐
多食腸胃生風氣不如新者尤佳

大蒜

化利小便身虛弱者並宜之
耳內腦氣筋軟弱聾者用蒜
汁滴入良

葱

白薤

芥子

功力略同皆能暖胃出痰發表助消

啞囉

此樹產於阿非利加高三四尺其葉多汁以刀割之汁
流出味苦功用暖胃瀉大腸調經殺蟲法用啞囉末半錢大

黃末半錢共作丸十二粒飯前食二粒能助消化免腸胃生

風氣讀書辛勞頭痛便秘婦人子宮懶惰月經不行便秘並

宜之一法啞囉一錢沒藥五分蜜糖和作十八粒每日服二

粒虛弱黃證便秘宜之或用啞囉四分沒藥三分青礬二分

作十二粒或十四粒每服二三粒亦可

阿魏

此樹出波斯國其根多汁色白如乳曬乾則凝結而紅
其臭甚惡功力能去痰去風暴欬喘促腸胃有風氣者宜之
或作丸或作水作丸每服七釐至二十釐作水用阿魏五錢
配滾水一斤漸漸傾入水內色白如乳每服四錢至一兩同
大黃並用尤佳外用阿魏水貯水節內射入肛門能殺直

腸小蟲

大麥水 不能潤腸胃膀胱凡胃痛痢證皆宜之暑月飲此解渴

功力勝茶湯火傷皮熱未破者用大麥研細末灑之良

薏苡仁水 薏苡仁一兩水二斤煮至一斤半加入甘草四五

錢乾葡萄子一兩去渣食治發熱久欬嗽小便不利溺管

痛

八角油 薄荷油 丁香油 或取其子或取其根幹枝葉蒸

釀榨油並能暖氣去風止痛補精神治頭昏大人每用五

滴至十滴濃者止可用三四滴同樟腦水服小兒每用三四滴濃者止可用二

滴三冰糖粉和服以上三種專取芳香為用不可煎煮泄氣

收貯甌內甌口用木塞緊閉周圍更用黃臘封固

桂皮 桂樹產錫蘭山者良中國肉桂味厚可以入藥暖氣

去風補火能助他藥功力 作散用桂皮末八錢白豆蔻六

錢薑末四錢葶撥二錢共研細貯瓶內每用一分至三分滾

水和服 作酒用桂皮末四錢白豆蔻末二錢葶撥薑末各

一錢三分濃酒一斤每服一錢至二三錢溫水和服 作油

法用桂皮搗爛水浸數日蒸釀

桂皮糖 桂皮末肉豆蔻末各八錢丁香四錢白豆蔻二錢石

粉六兩冰糖粉十二兩共研極細攪勻貯瓶內緊塞口勿令

香氣泄每服二分至一錢能補火暖胃 一法桂皮糖二三

分兒茶酒一錢、鴉片酒二十五滴、或鴉片膏三釐、水一兩、腹不痛者不必用。止瀉尤速。小兒腹痛瀉泄者、用大黃末四五釐、大黃少用則收斂。桂皮糖一分、八角油二三滴、或薄荷薑湯一錢、水六錢、能止瀉止痛。

椒 中國有胡椒、川椒、各種、味辣者佳、能暖胃、開胃、喉肉虛弱、音聲不出者、用椒水漱之、四作酒、用胡椒五錢、搗爛、酒十斤、浸十四日、每服三十滴、至一錢、漱喉、用椒酒三三錢、水四兩、煎入酒中、

生薑 暖胃、止嘔吐、止腹痛、或作散、或作水、或作酒、俱可、腹痛用乾者尤佳、作酒、用生薑一兩、酒一斤、每服一錢、至三兩、

暖胃去風、作水、用生薑一錢、熱水六兩、每服一二兩、功力亦同、身熱勿服。

此外中土所習用、如葷撥、肉豆蔻、白豆蔻、草荳蔻、大茴香、小茴香、木香之類、功力大概相同、皆暖氣、開胃、去風、補火之品也。

甘草 潤肺、止欬嗽、與胡麻子水功力略同、或作膏、或作水、用之。

藜蘆 色黑而氣臭、味苦、用其根入藥、功力大瀉、調經、殺蛔蟲、能治發狂、臃脹、或作水、作酒、作膏、俱可用、蘆薈根二錢、或酒或水十二兩、浸十四日、取用、每服八錢、或作末、每服一分、至

內科新說 卷下
二分、身虛弱者不可服、壯健人亦不宜多服、多服令人嘔吐、令胃生炎、甚則腹痛而死、昔年西國甚重此藥、近因此藥有毒、別用他藥、功力與此相同而性善者代之、此藥漸不復用矣、若因多服受患者、急食潤物、如粥渣、胡麻子、生雞蛋黃之類、救之、與救信石毒同意、

胡麻子 胡麻子功專於潤、故治肺病傷風、欬嗽、能潤膀胱、故治溺血、小便辛苦、流白濁等證、法用胡麻子六錢、搗爛、甘草末二錢、入滾水十二兩、浸二時、濾去渣、每服一二兩、服幾次、胡麻子油入石灰水攪和融合、貼湯火傷外皮、令膿自易出、

蜜 蜂釀而成、以蜜自房中取出、色白而潔者為佳、每見中土市賣、蜜中有死蜂、甚污濁、不中用、功力潤腸胃、微利、小兒便秘最宜、但多食令腹痛、或用蜜與甘草末、微火煎凝、捻作銳端、長圓丸藥、納入肛門、導引尿出、尤佳、小兒口瘡、用硼砂末五分、蜜四錢、搽之、

麝香 麝者、麋鹿之屬、產於印度、蒙古、中國高山中、亦有之、有香、帶在臍與龜頭之間、帶長圓形、直徑約二寸、橫徑約一寸、帶有細小口、其香如汁、自帶口射出、帶之周圍多短毛、麝之小者、雖有帶而無毛、其香芳馥、經累年月不變、能開竅、補精神、但價甚昂貴、偽者最多、有己將香汁取去、更用他物塞入、賺

人購買殊不易也。是藥其汁流出乾而凝結取用作藥能散痰
沒藥 此樹產阿喇伯其汁流出乾而凝結取用作藥能散痰
暖胃開胃助消化凡肺病欬嗽氣喘舊證痰不出者用沒藥
二分吃啤幣一分朴硝五分共研作散每二時服一次分四
次服畢婦人經不調黃證虛弱者用沒藥散一錢蘇叻五分
共研細末次加入青礬末五分用蜜和作丸二十四粒每次
服二三粒每日服兩次一法沒藥末六錢濃酒六兩入甌
內浸十四日每用五分清水和漱口治牙肉出血去口中臭
穢

煙草 取葉灑乾燃點可吸或研細末滴入香油可嗅並能補

精神醒困倦安腦安心凡居處溼地及病氣喘證者吸之有
益多吸濃煙令人嘔吐眩暈自汗久吸令人習慣終身不
欲戒華人比比皆是

樟腦 樟樹中國臺灣及日本有之根葉枝幹中俱有汁入滾
水浸泡取出即是樟腦波羅洲所產者為冰片自生樹身中
者尤佳入水中須數月方能消化欲急用者應先入酒中消
化凡酒之濃者以能消化樟腦為上法用樟腦一錢濃酒二
三錢水一斤先將樟腦入酒消化再加入水每服一二兩服
三四次能治欬嗽氣喘舊證又能補火暖胃止痛安腦氣筋
安心心跳腦不安並宜之發熱後身虛弱者宜服樟腦水及

補藥如噠哪鐵酒之類癩狂證夜不能寐者宜合鴉片服或用樟腦作丸散每服四五釐至二分小兒不宜多服止可略服樟腦水外用擦皮令暖能治風溼引痰外出法用樟腦四錢加入松漆油一兩六錢無松漆油用蓖麻油亦可或加入啊摩呢啞鴉片酒亦可冬月搽凍瘡良

金噠哪

此樹產於米利堅之南高可三四丈其皮有紅者有黃者有金黃者取其皮研碎入藥功力全補昔人但知用金噠哪近日用法專取金噠哪精漿名噠哪或譯為桂哪或譯為噠年無異義功力更佳大概新證用噠哪舊證用金噠哪為宜噠哪能治敗禾腐草霉溼之氣故瘡痢欬喘病原因此者宜服痘證

身虛弱者亦宜之欲全補者宜黃金噠哪水法用金噠哪皮五錢搗爛水八兩煮一刻取用每服一至三兩日服二次或用金噠哪皮研細末每服五分至二錢噠哪每服二三釐至二十釐瘡證寒熱將作之先一時豫服噠哪五七釐寒熱退後更服二三釐服兩三日後瘡即止噠哪為大有功力之藥惜止生於米利堅一國各國購買甚多故價昂

野菊花

野生花小者入藥味苦功力開胃略補胃不消化不思食者用野菊花五錢滾水一斤浸一刻濾去渣同薑水冷服每服二三兩每日早晨或飯前服之欲令嘔吐者熱服八兩至一斤煮熱外用能潤皮

橙皮水 橙皮功用補胃去風飲酒過度食物不消化者宜之
法用乾橙皮四錢新檸檬皮二錢丁香末一錢滾水一斤浸
入每服一二兩服二三次

乳香 產於印度等國能消痰近日西醫因其無大功力不甚
用但於病人房內焚燒取其香耳

橄欖油 取橄欖仁榨油性微利諸油惟橄欖油無氣味色最
淨功力最潤西國用作各種膏藥耳內有垢不聰者用橄欖
油滴入鑷去其垢即愈皮肉為毒蟲所噬者用橄欖油擦之
內服潤大便每服二錢至八錢 諸油俱以新者為佳陳者
不用 唐人喜食橄欖或生啖或以糖鹽醋醃製食之此番

人所無也

斑蝥 歐羅巴所產色光亮而綠長六七分闊一二分比中國
所產較小曬乾貯玻璃甌內緊塞其口防蛀壞也其味辣而
臭惡內服能補膀胱利小便小便難因膀胱軟弱無力者宜
之法用斑蝥末二錢濃酒一斤浸入十四日去渣取用每服
十滴至三十滴能助膀胱縮力並治流白濁及婦人白帶舊
證凡膀胱外腎病軟弱者偶用此法醫治則可若平日用以
壯陽恣服無度必致溺血頭昏腹痛嘔吐甚則言語妄亂而
死大有關係 外用作膏能令外皮生炎起泡引病外出法
用斑蝥細末六兩黃臘膏九兩猪油三兩先將黃蠟猪油微

火熬令融合然後離火加入斑蝥末攪令凝結凡用斑蝥膏藥或攤於布或攤於紙外貼助以合口膏藥不令脫令皮生炎起泡有膿流出與放血蟻吮刮痧諸法同意或貼於腳囊主於引病下行亦是此理貼後四時至六時即起泡凡炎證內痛及風溼各證用此法最佳凡貼斑蝥膏藥已歷數日仍欲生膿者換貼淡斑蝥膏藥若病已愈欲令生皮者換貼黃蠟膏藥可也 嬰兒貼二三時即揭去不可久貼

叱哩略 此草產於南米利堅用其根入藥功力嘔發表出痰能治發熱肺病欬喘促瀉利或專用或同鴉片朴硝叱哩略一鴉片朴硝作散每服一分發表服後半時用熱水貯深澡盆兩

腳浸入被擁護食熱稀粥溫覆安臥即有汗出欲令嘔吐者用叱哩略末每服二十釐至三十釐溫水同服服後三刻必嘔欲出痰者服二釐至六釐服幾次痢證每服四釐至六釐水銀散同服

渣臘 產南亞墨利加草之根也氣味芳香功力瀉與大黃同能治大便秘結發狂臃脹殺蛔蟲欲大瀉者夜晚食迦路米或水銀散次早用渣臘一分至三分元明粉三錢薑水同服

巴豆 產於中國印度新嘉坡等處樹不甚高枝葉根幹皆能瀉而功力尤佳在油用巴豆子搗爛榨取每巴豆子一兩可得油四五錢其色紅黃其味辛入口嘗試喉即熱印度人不

知取油每服巴豆子半粒亦能速瀉但恐瀉太過不如服油
 更妥蓋油可以少服或一二滴或三滴若更欲減可用一二
 滴分配大黃丸三四粒作幾次服則每服所用巴豆更少矣
 此藥功力專主大瀉中風腦炎大便秘結肚腹脹服後即時
 大瀉而安若瀉太過者食粥水牛乳大麥水等止之頭昏困
 倦者可略飲酒外用擦肉令生膿粒能引病外出
 草麻油此樹產於亞細亞中國甚多取其子榨取油每十四
 兩可得油三兩其色金黃其臭濃者有功力中國所產臭不
 甚濃功力不及
 印度須加能潤瀉男女小兒皆可服瀉後無關係身虛弱欲
 倍用之令瀉者用此尤宜初生嬰兒屎不出者可服婦人產後大便

難可服痢證欲先瀉去宿物者可服腹痛欲去燥屎者可服
 大人每服五錢至一兩小兒每服一錢至四錢若嫌氣味用
 雞蛋黃攪和同服或八角油一二滴同服

嘒囉嘶

瓜之類也其形如橙色黃味極苦去皮子專取肉六
 兩水四斤微火漸煮三時濾去渣曬乾或烘乾作膏功力能
 瀉與啊囉同 嘒囉嘶勿獨用須與他藥合併作丸每服七
 釐至二分或用嘒囉嘶一錢啞囉一錢大黃一錢丁香油和
 作三十六粒每服一粒微利服至二三粒能略瀉一法嘒
 囉嘶七釐水銀散七釐合作二三粒夜晚服次早即瀉膽汁
 此藥二千年前羅馬國即已通行瀉藥之最著者也

醉仙桃 花葉子刺俱可取用，作膏法用醉仙桃子六兩，溫水四斤，浸兩時取出，搗爛，再入水熬成三斤，曬乾，或火上熬乾作膏。一法用板榨鮮葉出汁，熬作膏。一法花葉子全用榨汁，或曬乾，或熬乾，作膏。番書云：功力補火止痛，令人熟睡。每服二三釐，至七釐，喘促者服五六釐，或用葉曬乾，如用煙葉作煙法，每用半錢至一錢，貯煙筒內燃吸，能即時止喘，或用乾葉與熟菸相合，每服一二分，亦能止喘，但此藥不可多用，能令人昏蒙如醉，作膏藥搽眼，睡周圍，或清水和滴入眼內，能開瞳人，可代啤啦呀哪之用也。

黃連

此樹亞細亞歐羅巴皆有，用其根入藥，西國所產長數

寸，粗如大指，其色內黃而外棕紅，其味甚苦，而初嘗則微甜，功用補胃補血，治胃不消化，不思食，虛弱，黃證，寒熱，瀉利，中土醫書列之瀉心劑中，蓋因多服則略瀉之故，而不知其功力實長於補，與參耆苓朮相同也。或作膏，或作酒，或作水，作膏用黃連三兩，切片，溫水二斤，浸煮，耗去一半，即時濾去渣，曬乾，或貯甌中，用熱沙烘乾，每服七釐，至二分，作酒，用黃連八錢，乾橙皮四錢，白荳蔻二錢，酒一斤，浸入十四日，取用，每服一錢，至三錢，作水，用黃連一錢，切片，加入橙皮一錢，如無亦可，檸檬皮二錢，滾水六兩，沖浸，每服一二兩，日二次，並能開胃補胃，或與桂皮丁香皮同用，亦可，瘧證，虛弱，不思食者，用

黃連酒一兩、雞哪二分、淡磺強水一二錢、如無不、清水十兩、攪和、每服一兩、日服二次、痢證與吃啤略散同用、臌脹與元明粉同用、胃不消化不欲食多汗者、與酸醋淡磺強水鐵酒同用、婦人經不調、身虛弱不思食者、用黃連膏一錢、青礬二分、沒藥一錢、共研作丸、三十粒、每服二三粒、佳、黃連作水、暑月不能經久、過二三日漸壞、江浙以北黃連價昂、或西洋人參亦可、罌粟花、罌粟花產土耳其國者為上、其次則波斯印度、其次則中國、莖高二尺、子在囊中、囊之形圓而扁、徑二三寸、子無功力、囊之殼有汁、將熟時、以刀自下至上淺割小口、夜晚有汁流出、凝結成粒、黏附殼外、收取再割、間日割一次、可割六七

次、收取之汁、積聚器中、融成大塊、即鴉片土也、囊新嫩色綠者、汁尤多、乾老則汁少、汁在殼不在子、故割宜淺、勿令穿破、汁色白似牛乳、曬乾則變棕黑色、作膏法、用鴉片一斤、以水熬煮減半、濾去渣滓、略結如蜜、取用、其味苦、其臭甚惡、入油醋酒中皆易消、能補火、補腦、補精神、令人身安欲睡、止痛止瀉、實為第一有功力之藥、自古醫家即用罌粟殼作水、後世作鴉片、功力十倍、近日西醫推究鴉片功力、在嘔啡啞、用法取出、每一二釐、即可抵鴉片一分、中國尚未知用、數十年來、華人喜用鴉片膏、貯筒中、燃點吸食、番商販至中國、每歲加增、近年不下七八萬箱、初吸令人忘憂快樂、久則成癮、不得

不吸、每有人購買鴉片、破家殺身、亦所不惜、幾如魔鬼、驅之不去、耗財費時、莫此為甚、余勸華人及早痛戒、無食者即無賣者、不必以番商販賣為慮也、歐羅巴諸國、無人吸食、專取鴉片治病、醫士無不悉其功用、華人但知其能治久痢、他病用者甚少、殊為可惜、今特略述其概、一法鴉片膏八錢、桂皮末丁香末各一錢、淡酒一斤、浸十四日、濾去渣、每服二十五滴、至四十滴、止痛安臥、或用鴉片膏一錢、樟腦二錢、濃酒一斤、浸濾如前法、每服一錢、至二錢、止欬嗽、止痛安臥、或但用鴉片末一兩二錢、濃酒一斤、濾去渣、欲補火者、每服二十滴、至三四十滴、欲止瀉者、加入兒茶酒、每服二十五滴、至四十

滴、或與鉛粉桂皮末、草撥同服、能暖胃止痛止瀉、凡人跌仆或被毆打痛劇者、服鴉片膏二三釐、能斂血止痛、不應者、再服一二次、發狂不欲臥者、用鴉片膏四五釐、服二三次、肺病欬嗽瀉痢霍亂風溼疔毒癩證、用鴉片輔助他藥、大有功力、炎證身熱脈數有力者、不可服鴉片、風溼用鴉片膏酒與酸醋連合搽擦良、牙痛用鴉片膏酒或合酸醋或合樟腦油俱可外面搽擦能止痛、鴉片入藥服過度或不合者、令人脈浮數、身體熱、頭痛、舌乾、應食涼藥、勿更服鴉片、多服鴉片、令人不欲食、大抵功力能令胃弱、故有癮者食必少、鴉片膏多服、人即死、如能吞藥、尙可有救、急用精錡嘔散二分、或膽礬一

分、或芥末甜瓜蒂皂角之類、熱水和服、服後一刻、助以溫水、數碗、令即時嘔出、嘔愈速、漸漸出清水、為吉徵、大概服鴉片毒、一時之內、可以救挽、若嘔藥不能吞嚥、急將嘔藥水貯水節、前裝軟長管、圖見西醫略論自喉射入胃、復將胃中毒水抽出、漸能吞嚥、則吉、凡救返後、應食樟腦水濃茶、次日大便秘結者、服草麻油等潤物、鴉片在胃中昏迷時、宜扶掖行走、助合心跳、偏血、不宜睡臥、此藥能助心氣、凡心氣不足、則心跳、偏血、不宜睡臥、罌粟殼搗爛、一兩六錢、滾水二斤、煮一刻、濾去渣、外用能潤皮、止痛、去炎、凡跌撲外傷者、軟布浸絞貼住、不拘眼目肚腹手足各處俱可用、

松香

松樹汁漿流出、用法蒸取其油、名松漆油、所餘凝結成塊者、謂之松香、松香與黃臘猪油作軟膏藥、能助生肉牙、法用松香五、黃臘二、猪油八、微火漸消開、布隔濾去渣、傾入器內、不任手攪、令稠結、皮紅熟者不可貼松香合蜜陀僧作硬膏藥、能合瘡口、治腳瘡爛、法用松香一兩、蜜陀僧三四兩、微火熬攪、離火稍停、成團、攤綢綾或布上取用、此膏功力專在蜜陀僧、雖久貼不致令皮爛、但蜜陀僧潤而不黏、用松香不過欲令黏著、非取其功力也、若取治風溼、則專取松香功用、故須多用松香、少用蜜陀僧、輔以黃臘猪油、略加喇伊蜜的、外貼令皮熱、能引病外出、久貼不妨、

松漆油內服能令大腸熱出大便秘小便殺腸中蛔蟲扁而有節者最效頭昏蒙身虛弱者不宜服外用同樟腦油擦皮令暖能治風溼

苦白木

番名喇
細阿

此樹生南亞墨利加在補藥中價最廉不難購備味極苦開胃略能止瀉去寒熱身虛弱黃證瀉泄寒熱後不思食者宜之法用喇細阿一錢滾水十二兩浸二時或加入桂皮兒茶鴉片酒或與鐵酒連合每服一二兩日服二次大有功力

石沒子

此樹紋理甚堅蟲穿成穴有汁流出成粒卽石沒子也性專收斂止血洗痔瘡脫肛治婦人白帶洗陰戶宜之作

水用石沒子末一兩雨水一斤煮至半斤濾去渣內服每用一兩作膏用石沒子細末一錢黃蠟膏七錢或同鴉片膏一錢攪和每用半錢至一錢搽痔瘡

大黃

此樹中土所產用其根去皮拭淨曬乾色黃者佳大有功力爲歐羅巴各國所交易蓋土耳其所產不多俄羅斯賣與西國者亦係販自中土但粵東市賣作偽者甚多或雜入沙石或有蟲穴用黃末彌塞近日番商鑒別甚精非真者佳者不買矣其味苦而氣香多用則瀉少用則收斂略補胃開胃潤而不猛不論婦人嬰兒軟弱人皆可食食一二刻後小便必黃因入血甚速之故也大黃或作丸或作散末或作酒或

作水各有妙用。同啞囉作丸，每服一粒，能暖胃消食微利。加服二三粒，即瀉。用法用大黃末八錢，啞囉末六錢，沒藥四錢，丁香油數滴，蜜和為丸，每七釐為一粒。胃不消化，腹中有風氣，便秘者宜之。每服二三粒，日服一二次，後漸減服。同迦路米或哥囉嘶作丸，或與元明粉同服，能瀉。或用大黃末五分，啞囉一錢，哥囉嘶膏五分，丁香油數滴，和作二十五粒，每服二三粒。中土瀉藥，但有大黃、元明粉二種，合用可也。凡服瀉藥一次不應，再服以瀉為度。勝於一次驟服大瀉之藥。作散末治痢症，與水銀散、吃啤略散相輔，大有功力。作酒用大黃二兩，甘草六錢，生薑三錢，濃酒一斤半，每服一錢，至四

錢能暖胃補胃，令易消化微利。或與黃連同服尤佳。老人大小便秘者最宜。作水用大黃切片三錢，滾水十二兩，浸一時，濾去渣，每服一兩至三兩。治便結，加入黃連或加入桂皮，治胃弱不思食及食物不消化。余見中國藥方用大黃多過番人，蓋因中國所用大黃不甚新美，不似番人購買皆至佳者，故功力有不同也。茶能補精神，驅睡解渴，功力勝過酒。綠茶功力較紅茶更勝，但多飲令人不寐，不思食，傷胃。故平日飲茶當有常度。番人亦用迦カッサイ非研末，加入牛乳、冰糖粉，滾水沖服，與飲茶同意。酒之品類甚多，與水比較，愈輕愈佳。設一器貯水，滿足重

西一千分貯酒滿足其重僅入百三十分是爲酒之至濃者若重九百三四十分則味較淡作藥猶可用若酒與水等重則不堪用浸藥欲知酒濃淡以樟腦浸試愈濃者消化愈速不能消化者是因酒中有水之故須再蒸去水用之酒之功力能補精神頭昏暈外傷血出多等證飲之佳多飲無度令人狂醉其害與吸鴉片幾同

茯苓

利小便潤膀胱疔毒已愈宜服之能解身內餘毒然無

大功力

硼砂

小兒口生白泡用硼砂一錢蜜糖八錢搽擦俱可

水銀之劑

水銀在朱砂中與硫磺相連取朱砂用法離開硫

磺卽是水銀光亮潔淨活動者爲上水銀不能獨用須與養氣相連入藥昔有人不明此理以爲水銀重墜多服能偏出大便不思入腸迴曲大便豈能偏出且水銀入胃與酸水相連而有毒爲害不小也水銀之劑能補津液令肝生膽汁補吸液管令大小腸生津液內腎生溺解身內毒去炎可以內服可以外用內服或用迦路米無則用水銀散法用水銀三錢石粉五錢乳至一二時漸變灰色全不見水銀爲度能解毒去炎入血瀉肝膽每服五七釐至十四釐但服水銀藥多次後口津多過平日口有銅味齦肉紅腫略痛略潰爛或有血出此是藥與病應病必稍減蓋引病外出以新病療舊病

之理也。此時即宜停服，或減少服之。若兩三日後無此據，病不除，即勿再用。疔毒非此法難治。若毒在身，延累小兒者，服三四釐，服二三次不妨。大便秘結，胃不消化，困倦無精神，病在肝經，膽汁生少者，應用水銀、大黃同服，能瀉肝膽。一法作水銀、藍丸，用水銀二錢、玫瑰花糖三錢、甘草末一錢，共研至不見水銀為度。色變黑是水銀與養氣相連。功力與水銀散相同。每服七釐至一分。迦路米即番輕粉，殺蟲去炎，瀉毒，功力尤勝。水銀散中國輕粉中有石膏，不甚潔，功力大概略同。眼簾炎證，瞳人生肉絲塞住不見，應服迦路米或水銀散。日三次，未塞者能免，新生者能消。外用解疔毒，散癰癥，治癬癩，生

肉牙，則有水銀藍膏。法用水銀四兩、猪油一斤、硫磺末二三錢，乳至不見水銀為度。又有水銀黃膏，法用水銀二兩、濃硝強水二兩，共入玻璃瓶內，即有紅氣升出，俟水銀消盡，將猪油一斤、花生油或豆油八兩熬熱，取已消水銀，傾入熬滾，離火再攪半時，漸漸凝結，取用此為醫治癬癩，大有功力之藥。三仙丹多用去浮肉，解毒少用生肉牙。
鐵之劑 鐵不能獨用，鐵屑鐵鏽中有養氣，可以入藥。合各酸水用，更有功力。補血補虛，開胃止久瀉，作青礬法用鐵屑。
錯鐵之末或打鐵處飛揚之鐵末。立兩六錢，橫強水五兩六錢，水一斤，先用橫強水與水連合，加入鐵屑，微火消鍊，略沸騰，去渣澄定，其

底卽青礬也。餘剩之水，用日光曬，以紙拭乾，亦可得青礬。並宜收貯甌內，每服五釐，至半釐，溫水和服。日三次，功力補收斂，調經殺蟲。作鐵紅散法，用礬十二兩，青礬廿兩，滾水二三斤，攪和，礬強水離鐵與礬相連。礬強水喜與礬仍離鐵而與礬相連也。而爲元明粉，炭氣離礬而出，瀝去水，其下紅末曬乾，取用卽鐵紅散也。功力補血補虛，開胃勝過鐵鏽。每用一分至三分，滾水和，日服二次。一法：鐵紅散二兩四錢，如無鐵紅散，用鐵鹽強水六兩，酒十八兩，先用玻璃器或磁牙各器貯強水，鐵紅散日日搖動，令勻和。日後加入酒，瀝去渣，共貯玻璃甌，勿令泄氣。每服半滴，至三

十滴，漸加至一錢，能補火補血補虛，大有功力。如無鹽強水，用濃醋六兩，鐵鏽或鐵末，鐵屑俱可。一兩，同貯器內，常搖動，令勻和。四日後，用桑皮紙濾去渣，取貯玻璃甌內，緊閉，每服半錢至一錢。一法：沒藥一錢，鱸五分，水七兩，青礬末五分，桂皮酒四錢，冰糖二錢，貯玻璃甌內，每服一兩，日一二次，能開胃補身體。一法：青礬啞囉沒藥各一錢，共研細末，作四十九日服二三粒，或用鐵鏽大黃桂皮散各一分，並能暖胃補益。服鐵劑後，若大便秘結者，糞色必黑，應略服微利藥。婦人經不調，用青礬末三分，黃連膏一錢，桂皮散五分，作二十粒，日服一二粒。

精錡散 磺強水與鐵相連則為青礬與銅相連則為膽礬與
 啊噓囉哪相連則為白礬與精錡相連則為精錡散四者並
 能補能收斂能嘔但功力各有專長論補益則青礬第一精
 錡第二膽礬第三白礬第四論收斂則白礬第一膽礬第二
 青礬第三精錡第四論嘔藥則精錡第一膽礬第二白礬第
 三青礬第四精錡少用則補用三四釐則略補痼多用則嘔
 其功力偏主於嘔大概白礬青礬服至二三分而嘔膽礬服
 一分而嘔精錡服一二分無有不嘔者矣凡嘔藥服後或有
 他患惟精錡雖嘔而不傷人故為嘔藥之上品 此藥大有
 功力番商有售販者價甚廉中土不難購買也

銅之劑 膽礬功力能嘔能補能收斂外用殺浮肉內服一釐
 至二釐補而收斂治發羊鈞久痢 作嘔藥每服七釐至一
 分 眼炎證用膽礬四釐至八釐配水八錢洗
 銅綠係酸水與銅相連而生外用能殺毒銅綠一合松香膏
 藥十五用之或用銅綠細末灑瘡上殺浮肉良
 鉛之劑 鉛不能獨用合養氣一而為蜜佗僧合養氣二而為
 鉛丹合炭氣而為鉛粉合酸水而為鉛散皆有功力 鉛消
 鎔時有風經過其上生沫是養氣與鉛相連者即蜜佗僧也
 作硬膏法用蜜佗僧十八兩研細末橄欖油三斤如無用桐
 水二斤微火緩熬攪至油與蜜佗僧融合水耗乾可略加
務以融合為度

取用攤布上此硬膏獨用無大功力止可剪條合傷口與別種膏合用處甚多蜜佗僧硬膏略加松香六分之一更結能合瘡口大有功力見西醫略論獨用蜜佗僧置火上銷鍊與養氣相連即成紅鉛丹鉛粉色白質重無味是鉛與炭氣相合而成試用火燒去炭氣則色變黃因所餘鉛中有養氣故也再上火燒去養氣則所餘皆鉛矣鉛粉有毒凡鉛製器皿須勤拂拭恐沾水溼生鉛粉也鉛粉與酸水合則沸騰因炭氣即時離出之故鉛粉膏用鉛粉一錢黃臘膏五錢白臘膏更佳或猪油亦可融合搽患處能潤皮收斂令熱者涼溼者乾鉛粉不宜內服止可外用有

時腹痛應服酸水解之鉛散用鉛粉一濃醋十相連中國醋淡須蒸去水方可入藥置磁盆或牙盆內忌用錫器熬鍊不住手攪融用桑皮紙濾去渣滓曬乾或烘乾軟紙壓偏去溼取用色以潔白為上如不白用清水洗後再依此法濾曬一法蜜佗僧末一斤酸醋二斤熬鍊濾曬收用鉛散無毒功力收斂止欬血內服三四五厘日二三次食後或有腹痛者略服酸醋水皮病有水者用鉛散一錢水四兩洗拭眼證須收斂者用鉛散半錢至一錢雨水或蒸或洗或滴入鉛散作膏藥能潤皮止癢法用黃臘膏六兩油十二兩鉛散一錢熬鍊鉛散作丸內服止

血止瀉法用鉛散三四五釐鴉片膏一二釐蜜和爲丸三粒
日服二三粒血止爲度鉛散番藥房有販售者價甚廉
叨叨伊蜜的出於唵啞嘆呢金之類也產婆羅洲番音伊蜜
的華語嘔言此爲大有功力之嘔藥也能發表散痰外用能
令皮熱生膿泡引炎外出其色白無氣味欲嘔者用叨叨伊
蜜的三釐樟腦水或滾水四兩攪和每一刻服四分之一嘔
出卽停服凡肺經有病及炎證用此法發表散痰用叨叨
伊蜜的二釐白糖一錢攪令至勻作八分每半時服一分
滾水和小兒肺病痰多喘促者勻作十分和服欲引炎外
出者用叨叨伊蜜的一錢猪油四五錢攪勻作膏藥每用五

分擦外皮若生紅粒讓過另換一處擦之治交節炎證最效
擦後貼黃臘膏潤皮凡脈浮身熱口渴頭重不寐服他藥
不應者可用叨叨伊蜜的虛弱人不可用其功力與補火相
反也此藥番藥房有販售者價極賤易於購買

信石 有大毒服之令胃熱劇驟生大炎潰爛而死至痛至苦
醫館貯信石器及貯信石酒水之甌須記明毒藥字樣使人
驚心以免誤用有人用信石作殺鼠藥此最不宜恐小兒耍
弄誤入飲食中殺人也信石雖有大毒少用些微入藥大有
功力作信石水母用上等信石一錢二分加鹹二錢加鹹者因
信石獨用不能消兩水一斤微火熬至十二兩鹹與信石融
化故須與鹹相連

合兩俱不見隔紙濾淨是為信石水母每用信石水母一兩加清水十二兩每服一兩日服二三次計每服一兩雨水中僅有信石十二分釐之一耳服後不痛不欲嘔者漸加至一兩五錢至二三兩此水治發寒熱瘧證大有效驗與雞哪同服或與人參黃連蘇木水同服俱可並能治皮病各種癬若服後嘔吐或腹痛者宜減少服或停一二日勿服

各息的

各息的是硝強水與銀相連法用硝強水四錢雨水八錢上等銀六錢火助消化候水耗盡止見乾末用大火熬鍊另用鐵筒粗如筆管烘熱筒內先膏以油令滑將此水傾入略停取出成錠用紙捲包貯玻璃甌內塞口密藏勿令變溼

瘡周圍有浮肉者指取各息的抹平或用各息的三四分配

雨水或蒸水八錢作至濃各息的水用筆搽患處眼炎多膿

者用各息的作水分濃淡三種法用雨水或蒸水八錢濃者

入各息的十四釐稍濃者七八釐淡者四釐用鷲毛管滴入


眼內法詳西醫略論

蜚

一名馬蟻一名水蛭以黃色金邊為上不大不小者合用其性喜吮人血凡患炎證皆因多血停聚故有放血減血諸法但放血須用器機恐中土一時未習若蜚吮則至穩至妥乃華人亦畏忌不用殊可惜也今詳述放蜚之法凡人身內外不論何處熱痛紅腫認定部位先將皮肉洗淨有毛髮處

須剃去洗淨取蜚數條多或一二十條用蜚多少之數量病勢輕重酌之小兒止
須一二條或三四條用軟布將蜚身擦淨放於玻璃杯內如無玻璃杯用磁酒杯亦可
 以杯覆蓋腫處任其噬吮或不用玻璃杯但以布包蜚身
 露其口恣噬近患處俱俟蜚吮飽自然放落不可猛力拔出
 以防傷肉倘久吮不落用鹽或醋少許糝之蜚自縮落炎輕
 者放吮一二次炎重者或放吮多次不妨吮後用熱水助命
 血流出或用潤物如罌粟殼野菊花水之類洗之若欲止血
 用艾絨著吮處以手指按壓即止或糝枯有時孔竅內生
 炎如喉齶子可將蜚放入細竹筒內令噬吮宮等處每一蜚吮出
 之血大概一二錢已吮血之蜚欲養畱再用防其血多脹

死可用鹽少許著蜚口血即吐出鹽太濃壞蜚口更用兩指偏去其血置清
 水內能游泳者可收養再用也不如用醋尤佳



須知去洗淨或無多者...
三四條用軟布將全身擦淨...
可以標覆蓋履處...其喉...
不用...
...



本內...
...

桃樹園三宅氏藏板

老皂館

東都海片

萬屋兵四郎

發行

