



戊寅夏至前三月張硯孫置直於

滇垣民政廳之丁字亭

3180



赤青囊

張硯孫
隨筆

單方隨筆

治瘋狗咬傷(毒)五日內皆可治

棕樹子

雞屎箊

土牛膝 三味同煎


服時加鹽水為引

治小兒疝氣方

老竹子 取一味

治瘡良方

巴豆 不桂枝 不草菓 不麝香 不



上述分量係按比例計算若照步量可貼敷十人至
腐肉多稍多稍少均可但係以原分量者為妥上為搗
為細末其實本不了毒任生泥快用普通膏藥將
藥末貼於脊骨三骨節上（從項上向下敷）須在病
來前一小吋敷貼太早太晚均不宜此方靈驗異乎常法
愈者甚多

治菌毒法

食坦一酸礬各二用少許法水融化點於菌上根不
變色者為毒變紅色者菌之本身有毒變灰色

者有蛇蟲等毒留於菌而移變黑色者其毒甚重也皆不可食

治京半夏法


以洗米濃水泡洗^三日換洗者水一次也者八九次後自脫皮食^不麻口即取而陰乾後可

服用也

普通治半夏法

先以石灰水將新鮮半夏泡一夜再用薑汁

煮熟陰乾六考麻口者括為治毒可服用



治各種瘡癰法

用新鮮南星搗為泥隔布或棉布二層

色於瘡上其毒自乾惟須治後者方百發百中

如已本濃則難消也若新鮮南星用乾者


惟須未治之生南星研為細末用法如上法調

敷亦可

九治南星法

以乾南星截為卷豆大塞滿牛胆中掛有

風處候乾換牛胆再浸如是者換牛胆九個



空者麻性而味特甜可用為治肺癆之為瘰
癧結核亦可治

治婦人小產法

用芎藭麻根糯粳米一物用猪小肚一個洗淨裝好煮

食須在小產日期前一月食之

治肺勞咳血痰方

用雞蛋一新鮮者一個治於臺便中將臺便

每日弄舊換新七日後每日添新蛋一個取泡蛋一

個調作蛋花加白芨粉一匙白糖少許日服一個病輕者

天雨流芳

月重则月解而愈

治吐泻霍乱痢疾水泻方 烟瘁之地均宜

枳术二两 沉香四两 杏仁一斤 烟灰二升 共研为末 盛于

白净布袋中 用酒十斤 浸透 每服一二滴 温开水调


下 妙不可言

治霍乱方

吴茱萸三升 青蒿尖十二升 烟二升 温服

外销乳瘡法

乳初起^瘡 结成一团如核桃大 尚未成脓时 即用元明粉



芳流雨天



五分乳香五分
色束束一團火上烘乘熱熨之即愈
且病人受苦甚多也

法目疾醫案



某君目紅腫視之甚

天雨流芳

之病而脈虛寒用乾姜

一分黃芩五分定參一劑而愈

活臉黃腫案

某君忽於臉上少有腫痛瓜之出黃水漸至滿臉皆

腫痛而大便難乾老師云是脾土敗也大便難者大

腸燥結如用采草干姜山藥黃精各三各一付而愈

治漫性痢疾方

當歸一兩 杭芍一兩 枳殼 魚山渣 木樨柳 赤車前子 赤

菘菝子 赤

紅參

仁

白

加陳皮 赤 姜汁 煎滴

治吐血當時不能診脈者 極者

用韭菜汁少許同人乳一盅蒸服到第百又可斟酌


開單用者以免錯誤也

治產前感冒微惡寒發熱產後數日寒由心起發

頭不疼身不痛

熱不甚不思食則胸中物塞乳房痛兩腋下滯痛結有

小脉皆沉细不寔右寸较大左关较小右关舌满佈灰
色舌有膩胎 彭老师说此病属内气的凶你全是外感
内闭使然用藿香正津散以杏仁二不首白蒲五分一剂病
去大半



白喉驗方

白喉驗方之續論啓

黃豫樵

啟者：白喉一症，古書醫方類聚守古法，多為藥保。僕觀

耐修子所著白喉法圖說微抄掛航所刊白喉驗方告，論証

詳明，立方完善。及觀陶君天雨流芳醫法此病，詳審精密，存

活極多。考以陳君調經審証精確，此見扁所及暨親歷

目睹者，彙積成書，較醫方類聚及明白喉驗方之續論，刊

印流傳，以御者斯世，俾法此病者，去所尚津焉。

白喉驗方之言

陳志素

喉症仙溫病之一，三時行瘟疫病之一，最為危險之症，而其

中白喉一種為尤甚。緣此症初盛於北方，繼倚於上海，近則

港粵一帶，患此者甚多，此症門傳染，相繼死亡，極為可畏

。大抵喉症，本屬險症，而治法不同，其多不斃命。蓋治法第

一忌用發表辛溫，其次禁天南流芳，忌者甚多，因古者此症治

法尚未發明，絕少者，此症，此症喉科專用之藥，均仙最

忌之品，所以治此者，此症不備。自張善吾氏白喉

檀要治法等書，稍去禁服用表藥。然其方如殭蚕、牛蒡子、

馬勃、黃芩等禁忌之藥，仍不能免，故用其方者，仍殺

人為反常。迄耐修子所刊白喉治法為表抉微，將為一概列
明，其中善陰法、肺湯、神仙活命湯、存溫化毒湯三方，並為
將三表，分別輕重次第，治法大備。此書粵省雖有刊
本，惟知之者少，故不日已。其用藥不日法者，論矣，
即便大效不日差，而保用犯忌者一二味，則全無大皆敗。近來
毒者不救者，仍不日法，雖云死生有命，然因用犯忌之藥
而斃，能無遺憾？

上年余妻患喉痛，大發寒熱，骨節疼痛，余以為風
火喉症，服時即用加味甘桔湯，次日熱減，再用原方加減，第

三日抵返，喉亦不痛。余出門遊友人，以彭君掛航所刊喉証
告一得見贈，所叙病狀，與余病証，彷彿相似，去誤服表
藶，急歸家看視，見其喉向，既有白影，而精神如常，並
思食粥，與之甚甘。圖為病已全愈，遂未延醫，然仍未放心，
預備善陰法肺湯兩劑，以備及夜食粥食多，迄未見飽
面色微紅，兩眸炯炯，心似開而不能合，余愈心愈特，為延
醫診視，告以所服之藥，藥曰：「凡你白喉病，此藥服表藶
之理。」考余白喉，始所加方，仍不免有禁忌，為在內。余
決定其服善陰法肺湯，是夜連服兩劑，次晨始能何寐。

芳流雨大

政延乙祭，仍用善陰法肺湯加減，守宜不移，至七日始
全愈。

去年小兒患此症，甚熱有痛，子益微涼，先服甲乙至銀

翹散，次日甚減，再服，^圖再服，^圖三日全愈。下午喉現白點，同


某醫吹喉散甚效，兩而吹，^{天雨流芳}西瓜^霜，忽白點不見，以為吹

破。次日再覺甲乙不^圖，^圖你風火喉症，並苦妨礙，方內犯忌之藥

更多，余不敢使服，往^圖齋視之，告以吹散情形。陶

君愕然，謂你白喉，且不宜破，撤角耐修子所刊善陰法肺

湯，加花胆草、板藍根兩味極將，每日服兩劑，並另配吹

喉散吹之，余相行甚深，此方服前後，不乾糞其甚多，皆黑
色病勢稍減。然白点未退，舌胎黃糙，大便後閉，並覺鼻
塞，舌吐厚，室絳。常時覺有傷風，又以為傷風所致，不能
辨別，惟服終守之。方：白服兩劑，將生地取汁，麥冬易
為天冬，以妨膩滯，三日大便一次，既黑且多，喉向白点
左現右隱，右現左隱，涕不絕，舌胎遂之退淨，計十日病
始全愈。候後保養，用陶隱居所製喉散吹之，其效不立，余
信白喉症之烈，而服為之宜慎也。

芳流雨天

陶君研究西學多年，博考古今，以古書，俱有心得，尤





於是也，輯志詳明，另有吹散外法，如方，倘出原書之外，試難
多人，據云：「原書白填鴨散方固佳，但難於修合，且急切難
備，不可不另重訂，簡易良方，備用。」余見近日喉症盛行，而後
漢者以此皆是，特將原書擇要錄出，並以此方掛航，以
証驗之。將陶君所論及外法，亦方所入，以信諸君，察閱，庶幾
有患此症者，不致為難也。世間好善君子，若能照印傳送，
善友，速速，心極危病，尤為心所佩，而次請者也。

白喉散方續論

黃豫樵

白喉一症，近來諸書，皆取法法頗詳，似覺庸多，但

天南流芳

有方而病家未能深信者有之；或初服药，能有些微效，或因
分量不能照法，因而二三日病势略加，病者即改图别法，以致患
事者有之。知人有此等疑心，故特以信而治之，前十载，第二小受保
善是证，初法以玉润， 为凡邪之病，保用发表药，言
久，其病之度，初则白块自消， 而服药不效，危象已呈，前
法仅七日而逝。此数百年之集法病，因去前者之错，遂执定
方针，连服善阴法肺汤， 而愈。迨後二舍，第六集法病
亦连服善阴法肺汤而愈。今 又以舍强如患此病，初服
善阴法肺汤，未能速效，遂法某以玉润法，亦用善阴法肺汤

加入苦商紫雲之為二三味，且將原方之分量減輕，今日服為三
日喉腫已現，痛亦有加。轉請陳明檢閱生診治，據云：「此白
喉之重症也，在與方服善陰清肺湯之不減分量，更加入煨石
灰、忍冬、連翹等藥，每日服二劑，一連十日之久，其永
果全，但因傷感風邪，再往陳明檢閱生診治，據云：「白喉之症已
愈，今當服除濕化痰藥一劑，必能見效。」惟舌胎蒼而舌心微黑
，陳君曰：「此為妨，當再服善陰清肺湯，加梔子、蓮心二味，必能
全愈矣。」後果如其言而效。隨後小舍林又染是病，亦服善陰
清肺湯數劑而愈。今亦不如之染是症，亦服善陰清肺湯

善陰清肺湯

芳流雨



而金。計家內共親友患此病者，均堅守此方服愈，其不立愈
。却人有見於此，亦特為之廣傳，其善果者，多為刊印認送
，實登人於壽域，而種福也。

喉症發之告



彭掛航

去腊初五，僕之六歲兒患喉症，探視咽喉，探視咽喉，兩邊發

現白快而不痛，着服喉症清肺湯半帖，而喉耳下微腫，神

氣似稍疲倦，且謂此兒科名醫某甲，據謂：

見其神氣疲困，恐有別病，致延兒科名醫某甲，據謂：


喉症他藥不擅，長方吞某乙，而某乙亦近時內外科名醫

天南流芳



僕亦向所崇持者，而於初九往診。據云：「乳鵝喉症」即
吹散，後又貼膏，而所開之方，內有馬勃、天香、牛蒡
、蟬退、荆芥、... 表症... 僕亦... 其共白喉書所列禁忌
諸君相目，而僕不... 又不... 白喉... 如何景多... 且... 醫
僕向所崇持者，... 曰... 祇得任其服食。服前
後，見其在甚動... 而白不再加，至耳下腫者，據云云云
貼膏，... 有水泡起，... 搽淨，毒氣便出。是晚
一... 以為... 效驗，滿得... 甚要... 翌晨再往診
視，據云：「病已退，... 方... 表散，... 甚更... 並... 照

芳流雨



方連服二帖，謹料十二處方服後，到下半夜，微咳之聲，而

方已哑，且覺鼻塞，所見之病，無白喉書中，詳列候服表

者，現敗象之精狀，十是相向。謹將心中，得得無主，既不敢

復往乙，恐再診，而散服食之喉書之方，停頓半天，而

聞其兩耳，恐喉科，且有經，於十四早晨往診。此時次

見神氣尚清，飲食亦動，二為平日，惟似閉氣，息稍喘而

色反紅，抵而攻，至處，一視喉科，未見，便法其不能救，不久南

方。斯時物在行，產事，為腹外某而攻，過於張白，隨子，不

期僅返，食下，而喘急更甚，神氣亦乏。但中藥既已出



此絕望，不能改法，西醫，用下道守方，法，益以新水，洗喉，一夜

本竟至不救。是時，方寸莫亂，祇曉悲傷，既不救，抱死，前某

公，曰，不師，而白喉，書，之，言，又未敢，決，其，死，經，十九日，而回，家

之，中，也，被，其，傳，其，未，喉，初起，時，見，其，喉，內，微，腫，而見，他

喉，食，如，常，飯，後，探，視，喉，內，兩，邊，又，現，白，點，前，於，乙，堅

之，先，而，又，候，及，兩，堅，便，決，生，死，之，方，得，印，往，而，曰，不，復，診

視，據，云，一，時，痧，白，腐，從，急，方，用，薄，荷，連，翹，貝，母，枳

殼，萊，菔，子，而，考，以，天，膚，荷，胡，荊，芥，三，味，林，示，烏，荷，在，內，並

注，重，吹，散，連，診，之，日，據，云，一，病，已，退，無，碍，山，再，診，三，天，而

醫者自刻求年，不敢診視。而少也飲食方少二便，行走嬉戲，
一或常人，無一此病態。但覺喉乾，此是轉化之象，不敢作
問，而改受丁醫，據云脈象年病，喉間白沫，既不阻碍飲
食，亦不要服止法。白沫也。唯口舌心燥，此也。凡此中，俱不
敢略正時刻，反察思惟，此是陰氣所現之象，即此白沫者
詳列種種敗象相宜，故法宜主胸，此其必係白沫無物，
即服善陰法肺湯，以補氣。不料服後，藥氣未行，
而敗象已出，微咳二聲，又復音啞，越夜又作腹痛，後而
氣喘痰湧，斯時不仿其法肺湯之不對，祇思其補救之已



芳流雨



逐、收服白喉毒之方，微覺見功，而服表散為在前，竟
至不可收拾，遂亦不救。

嗚呼慘矣！小兒所服兩藥之方，其薄荷連翹、貝母

、枳殼、萊菔子諸藥，亦與白喉毒者治白喉症多為相同

。奈後以金壽天香、前胡、射干三味示忌之藥，遂至全藥

俱敗，候以毒未除，遂復收注重吹散，其實此證，因病已深

喉間所現白者，其影無多，故宜早陰法清肺湯，理其由

病，引毒下行，方能收效。為腫痛者，似可急痛吹散。至於

白喉初起，飲食與方亦二便皆如常，之者服早陰法清肺湯，

芳流雨天

过十二岁外者，每天最少服二剂，小孩减半，服两天即见
见寒凉，而口常淡，亦不妨碍，再服两天，口中反为是苦
其病便返了。总要执守主药，安心服之，切勿中改，若
主药不效，请服七厘散，则必步僕之累，而有重
扁神曰：至之方，能挽救矣。得法之病起时，其甚痛楚，疏
忽便不知觉，倘服此药，似乎对症，岂意其甚病已深陷
，症到七日，微咳二三日，天雨流芳，第八日有微痛，或鼻
宗流血，或汗出如浆水，其气喘急，至死为甚，故所列之
禁忌最前，确一点一滴，莫不收入口，切勿行庸医考虑味于


其中，为他所译，此处生死关头，务宜审慎，千嘱万嘱

附录舍弟及使婢服养阴清肺汤乃度更生详情寄告

腊月廿六日，僕在空院院中小女时，闻舍下使婢文染是症而

赶回家中，其时家 探得外雨急，遂夜夜守其回

喘其千药不可服，而忍之三日，急購养阴清肺汤服之，是日

连服三斗帖，分早晚 夜夜服，至辰，探视喉间，再多现点

形色如芝蔴，照服清肺汤 也，第三日查看，舌白点星

不多出，而稍觉大苦，且云：口淡，涎水多唾，似觉空，凉，僕

因前误，主之意已决，祇仍照服，不稍少减，迨第四日，其白

天雨流芳

漸退，且大便赤黃，後多瀉瀉沫，而口反見乾燥，至第五日，竟退盡告痊。其喉間所發白點，其地位，顏色雖如常人，而凸起如小泡，隔日又凹回如小洞，後始平復。

總後，余因侍醫，又事斯病，據云：「初二三日微覺畏







寒。初四夜睡後，似喉間略發乾洞。初五日晨，用鏡探視其

內，喉左邊有白塊，為兩粒相連之大，細長方形，白甚

白，是日早晚，服養陰清肺湯一帖。初六日，白塊之下，再發

現白點數粒，色如黃芩如之其麻，是日隨服清肺湯二劑半

早晚各一劑，午服半劑。初七日，右邊又發現白影數點，且左邊

近舌處之黃白條，形如線長，約二三分，而初起之白塊，似粟
 退細少許，是日仍照服兩劑，中晚間覺口淡，似稍寒涼，示
 午腹微痛，頸稍刺痛，在口下連夜微有汗。初八晨，喉內
 之裏層兩邊，皆黃，各二，形如粟，且有小点數粒在傍，近
 四更時，略有微痰，欲犯攻，左白界，天雨流芳，斯時雖甚，往，然鑒於次見小者，又經歷使婢清肺湯之驗，遂決
 其藥力仍不足，執定主義，稍易，是日晨午夜不稍移，多服一劑，
 即易晚大便覺滑，而小便刺痛，大便形色，如搗爛之青菜，
 質浮滑，常有痰沫。初九再進三劑，大便連解四次，形色

如昨，而小便更覺刺痛，而喉間白點，雖總有再出，但前所現
之白塊、白條、白點，均次第退已甚，而勢亦日見減矣。初十
十一兩天，仍將血服，十二日始退去，所起白色之地位，亦如使
婢之凸而後凹，腹中更覺安靜，頭亦不見再刺，至十五方告
安痊。此次舍弟之病，猶幸能早定，又經過次見小女
之失，其婢之經驗，亦有把握，故能毅力堅持，幸服善陰
清肺湯，不敢移多，白帶全收，未敢減點，用特詳情廣
告，俾來新症者，再不至為近時醫師表為所誤，而又可
服善陰清肺湯，初未見其功，而稍覺寒涼，仍屬不礙。

放膽守方服之，最少每天要服二帖，小孩減半，輕者五天，
重者七天，便健以效，切勿心急投醫，致誤生命。嗣是廿餘
日以來，凡諸親友患斯症者，即以養陰清肺湯相告，皆獲
安全，間有守方不效者，服之數劑，亦不效，故不能不
大聲疾呼，急急將此情印出，仍務閱後，庶為傳述，以補
廣告之不及為幸！

養陰清肺湯歌括

養陰清肺白喉功，一兩生地冬冬，元八二甘荷二五，丹皮

貝芍四不同。

神仙活命湯歌括

活命神仙半半相，六元五石三乾槐，甘草一名成兩地，
兜萎藍芍各三施。

除溫化毒湯


荷竹半名化毒湯，二名高貝地銀桑，八分甘木杞名

半，症象輕微服之康。

道宜藥將三奏



三將之中，以正將為宜法，而以極將取其重，次將
取其輕。四居之中，又以鎮潤為宜法，而以消為宜其端



導引利其行。鎮潤至中又以善陰法，肺湯為宜法，而
以他為濟病之偏坡，補方之不足。審定主賓，因症施
治，若網在綱，有條不紊。至於禁忌之藥，亦不可不試
，即保雜之於良藥之中，務使全無俱壞，况專恃
之以為宜法乎？其不現往之敗象，而區測以救死者，
定鮮矣哉？法戒俱備，行道者其詳審焉！

白喉正傳

此任在喉，急下為要，極難極致，惟中下為最
能執其要，此便閉結者，尚須慎用。生土牛膝

生藥店有賣者，但
無生者，用乾者亦可。

上石鎮膏：大生地，元參，煨石膏，麥冬，原糖。

次层润药：天冬，高丽，白芍，丹皮，贝母，薄荷

生甘草。

中层清药：大木通，神曲，炒渣肉，陈皮，砂仁。

下层导药：郁李仁，白芍，泽泻，生土牛膝，老宁丸。

善治法肺汤 日服三剂 若病势愈增 仍照方服 始终守定 不可移易

大生地 一用麦冬 原粒 白芍 厚薄荷 不五 元参 不

川贝母 界丹皮 界生甘草 示

此方乃治白喉之聖药，翼然八柱，顛撲不破，其中

但有鎮润而無消导，至道所谓鎮润为宜，下元自会

通暢，年所期用其隨尊也。分兩劑照原方，不可輕季，
小兒減半，守方服之，自然全愈。切勿中改。後附加味之
法，以便酌用，惟年有在，不必加可也。

出喉間腫甚者，加煆石膏四石。大便燥結，數日不

通者，加青寧丸之不元，物不（凡用青寧丸元明粉，

須沖服，切勿候燥。胸下脹悶者，加神曲不炒渣肉不


。小便短赤者，加大木通。赤白濁者，去母不。痔漏者，

加大冬、石、馬兜鈴不。面赤身熱，或舌胎苔色者，加






銀花、忍、連翹不。

天雨流芳

凡喉间起有白点，在论痛甚不痛，或发空之热，或
畏空，均须照服此方，如能白痰，而伴鹅喉，此方亦
见效，症果后日得也，按不可轻而易之。

白喉，猛将，及痰服禁忌之药，渐见效。
天雨流芳

上层镇药：蛇胆草，生石膏，犀角。

次层润药：瓜蒌，，，，，，。

板蓝根。

中层清药：川厚朴，枳实，莱菔子。

下层导药：生大黄，元明粉。

神仙活命湯

重者日服三劑，俟病稍減，仍服養陰清肺湯。

龍胆草 赤元參 木馬兜 礞石 板藍根 生石膏

桑白菊 杏仁 川芎 柏子 生甘草 不大生地 月瓜 姜 元

生梔子 赤

凡白喉初起，市極疼，自具困，飲水即噎，眼紅，聲啞，白

點之，見口出臭氣者，方可服此方，黃服，或已延誤二三日

，症已危急，或誤服毒藥，現出敗象，非輕劑所能挽

回者，拘須此方以洩其毒。

如舌有芒刺，謔語神昏者，加犀角、錢石。大便閉



塞，胸膈滿悶者，加川厚樸，不枳實，不。便閉甚者，
加萊菔子，不生大黃，不。小便短赤者，加玄母，不，澤
瀉，不，車前子，不。

白喉次


切不可散表，
表則不可救。

上層鎮石：小生地，葛根粉。

次層潤石：生良薑，桑葉，薄荷，桑根，枇杷葉，

紫苑，柿霜。

中層潤石：小木通，枳殼，炒麥芽，淡竹葉。



初起，分別未明，及証之
邪之証皆以此等藥法解之。

下居導為：車前子、燈心、蓮子心。

得溫化毒湯，日服一二劑，如症加重，即服養陰清肺湯。

葛根粉亦全良藥，不枇杷葉三五分，小生地亦冬

桑葉亦小本通，竹葉不貝母，生甘草八分。

白喉初起，症象輕而白不見，即服此方，俟一見白

象，白初起甚微，須細細探看，即改服養陰清肺湯，勿在

誤，如不白，即服此方，如白甚重，表。

如大便閉者，加瓜蒌、不，郁李仁、不。胸下脹悶者，加

炒枳殼、不、炒麥芽、不。小便短赤者，加車前子、不。

，燈心，石。

以上三方加味，各法，均須隨時斟酌，若見二症不甚重者，或於所備二二味中，酌加一味，或減輕分量，庶無偏誤。

白喉一切禁忌之品，白喉初起，發熱居多，往往服法等

可不畏哉

麻黃 誤用者，不可救。

桑白皮 不宜用。

紫荊皮 破血，不可用。

杏仁 苦降，不宜用。

牛蒡子 通十二經，不可用。

山豆根 苦寒，不可用。

射干 妄用者，不可用。

天花粉 不宜用。

羌活 祛風，不可用。

荆芥 不可用。

防风 不可用。

黄芩 过燥不可用。

桔梗 肺虚不宜炸。

柴胡 炸散不可用。

前胡 散散不可用。

升麻 炸散不可用。

僵蚕 炸散不可用。

蝉蜕 炸散不可用。

桂枝 辛散不可用。

薄荷 辛散不可用。

苏叶 不可用。


马勃 不可用。

以列禁忌诸药，柴胡以下，此次所增。玉麟汤中，有

凡诸喉症四字，可知禁忌等药，不独白喉也。

白喉误服禁忌诸药，所现外症败象。白喉症中，但指为不信

之症，而不信体误服禁药所成。



七日滿，白不退。服藥大便不通。頷下發腫不消。

服藥嘔吐不口。音涎自鼻。鼻孔流血。

喉乾無涎。白濁自夜。天度黑暗。

兩目直視。汗出如漿。角弓反張。

痰壅氣喘。汗出如漿。不能下口。

液漲神倦。

乙癸日... 各象... 有用猛力，輕者用正方，以期補救。惟脾泄之症，宜用世秘脾藥，為須另設。

未服藥，大便即泄，用藥地... 麥冬、不丹皮各半炒

麥芽、石元參、石半薄荷、石... 砂仁二粒 研沖

服藥腹瀉不口，用法炒生地、石、麥冬、石、川貝、石

白芍不名生甘草不蒙生一不生。

擇錄陶君勉齋白喉症及經絡良方

一是疝原任時行喉症，由口鼻吸受而素，能由皮毛感

受而入，故不宜用表藥。大凡感冒風寒，宜太陽膀胱經先

受，由表傳裡，故表症未除，不可用表藥為誤。外散之，若邪

倚裏，表証不見，已不宜再用表藥矣。今喉症由口鼻

入，手少陰肺經先受，本經時毒氣，宜能再用表藥為揚

其波乎，此所以表為先宜戒也。

一是疝難由口鼻吸受，肺經先傷，然腸胃亦必先有積熱

厥伏毒，蘊蓄於中，遇有時行病氣，引之而發，程之六地
內先有邪，而後一引即發也。

一 是症雖外受疫邪，內蘊積毒，而其人身體，必陰氣先

傷，陽氣耗散，此其所以宜寒陰為要也。

一 是症雖遇冬溫，春溫之時，氣元早，必有穢濁

氣，因其人陰氣先傷，脾胃虛弱者，遂多患此，良由內邪外

毒，相觸而成，氣機受感，引針，如珀梳者。何使其

人陰氣先傷，脾胃虛感，雖有時疫之氣，未必即病，

或病未必即吐，咳，症因其臟腑受病不同，而現症遂各異。

收治喉症必先明乎氣逆陰陽之消長及經絡臟腑之盛衰
而後施之竟委窮源，變化在握也。

一是症為一爐炭火，用灰壘呈壘，中間開一孔竅，其氣自上升，

炎蒸喉間。至壘上蓋一毒，以為伏也；吸受之邪，如中

間開竅引道也；故其勢急而病不同。故後

法宜鎮之潤之，以保其氣；消之導之，以洩其下，庶可挽救。

善後用發表及諸禁示氣，按開其灰，而助其熱以灰之

有不加割而速者乎。

一是証著陰禁表因矣，後其人因感冒風寒，至多有表病，斯

时仍以治喘为率，禁用非散表药，轻者先用除温化毒汤，自
立散散，二者用羌活附子汤，生地黄，芍药，甘草，大枣，冬
改为天冬，则不致臃滞，且药中有薄荷，或再加葛根，枇杷
叶之類，二者以生风散。

一是证既忌用表散，何以方中
雨流芳
全用薄荷，不去薄荷，荷与秋味，凉
凉，其其他药，年温者，迥不相同，且性质轻浮，仅在肺胃咽喉
之间，散毒驱邪，其他表散，如麻黄者不同。至葛根根，能
解肌，但性味皆凉，阳明胃经正药，其其他温散表药，有别也
一是地初起，往往有恶寒，发热等证，此外感风寒相似，最易误

用表為。石出肺主皮毛，肺金受傷，則惡寒。胃主肌肉，胃邪

蒸則發熱，其外感者，乃疫癘之氣，由口鼻而入，此風寒之

邪，由皮膚而入，雖有發熱惡寒，而其他現症，必不相同。葉天

士溫熱論，蘇一瓢溫熱論等書，於溫熱風寒之症，辨之甚

詳。况喉症乃溫疫之病，更有甚於溫症者乎？凡遇有時行喉

症之際，最宜辨之於慎，慎之於初，不可輕忽而誤投藥也。

一是症初起，往往有前首微痛，或頭痛，或牙痛，而覺心在喉下，喉

間微有痰涎沾着，吞物微有窒碍，起居一切如常，病家

每輕視之，以為無關痛癢，耽延至旬日，病勢已深，甚至

天南流芳

後服忌藥，陡然大腫痛，或鼻衄鼻塞味噎，等症皆
依，斯時如火燎原，再一遊移，則滴水不入，種之敗症皆現
矣，可挽救，故辨症既清，急宜用重藥劑投之，免致危
險來手也。

圖

一是症內服之者，大抵不

芳流雨



之者，外治之法，白濁散固佳，為一時難得，則送行

經之方，總能兩出痰涎，則腫痛自消，切不可執


用數藥，古方中有用加味三黃功散等方外敷，令其外起一

水泡，以為拔毒氣，亦宜實地病勢，切宜慎之。

一是疝忌用刀針，按徐天啟外科正宗曰：喉疝多端，惟熱壅喉腫名通，按喉疝多端，乃用金針刺出，宗與以洩其火。又喉癰生膿，塞住喉管，當用披針洩其膿，降火之者皆可針。圖者，或有不死，亦必發作幾次，而後得根。圖有反本喉痺，而為弱症者，戒之戒之。此徐天啟歷有自言之也。今人於喉疝，不同症重，劫用西法針刺，無不所放也。

一是疝忌煤氣，北方最多此症者，因天寒之時，必用煤炉煤炕，人身中甚多煤毒，遇溫氣即發。南

天南流芳

方雅少用煤炉等而所点之煤氣燈、煤油燈、亦能醞釀
此病，而名流色病，治未病，居處切宜戒此種燈，遇患
此病者，急宜忌用，以免見毒，平時多服解毒煤毒之品，如香
梨、蘿蔔，宜常食，防之也。

一是此病由口鼻呼吸受感，所以
防集於人，此為皮毛經絡

感受之病，不易傳染，凡用吹扇，近來有一種皮球琉璃

管，送物入喉，轉而為病，亦宜為最妙。其治則銅

管之打角亦可，切不用人對吹，既有輕重之不一，且恐傳

染於其人，不可不知也。

吹香徑散

正上梅花冰片一分 去黛三分 白礬朋砂三分

人中白煨一分 西瓜霜相一分 真珍珠三分 真柿霜一分

蝸牛七個 焙黃同

法西瓜霜法

取九月間大西瓜一個 拭淨剝頂為蓋 稍去其瓢 填

入皮硝三四兩 瓜大者可酌量加原量 用疏竹篾籠

束之 將掛簾籠向風處 被杖風吹透 瓜皮外起白霜

即取取入瓶 今為肆用 黃瓜霜代之 力較薄矣。

