

動物解剖叢書

著者

薛德煇

卷 5

蚤



上海新亞書店印行

薛德煥主編

動物解剖叢書

卷 5 盒

定價銀二角

著作者 薛德煥

發行者 陳邦楨

印刷者 中國科學公司
上海福煦路六四九號

發行所 新亞書店
上海四馬路六十號

本書有著作權翻印必究

中華民國二十二年十二月初版

序

本叢書作中等以上的學校還要學習高深動物學者的實習指導或實習參考書之用。

原來動物的解剖，似覺乾燥無味，但是要研究高深的動物學，非有解剖的知識作基礎不可；所以應經過一次的精密觀察和仔細解剖的訓練。

本叢書除解剖以外，對於該動物的分類、習性、發育史，和人生的關係等等，亦約略記述，俾學者解剖一種動物以後，可以得到那動物的全般知識。

在國內的出版界，關於動物學解剖的書籍，很少看見，本叢書的出版，確是一種創舉。為便利學者起見，每種裝訂一冊（最下等的簡單動物，有時或合兩三種裝訂一冊）。

本叢書對於解剖學上重要的術語，以英語為主，拉丁語為副；但為學者練習計，有時以拉丁語為主，英語為副。

在練習解剖的書籍中，照例不應當附圖，因為我國的動物學，正在萌芽時代，又缺乏詳細的參考書籍，所以卷末附許多精確的圖版，供學者的參考。

為解剖者便利計，圖版附在本文之後，俾一面閱覽記載，一面可以和圖對照。解釋圖上名詞的後面，均附原名，學者可以多一次練習使用原名的機會。

本叢書所附一切圖版，均由方洞先生代繪。

本叢書大約有四十卷以上，卷數以出版先後爲序。

薛德煊

蚤

Pulex irritans Linnaeus

預備知識

(1) 分類上的位置 蚤屬於節足動物門 Phylum: Arthropoda, 昆蟲類綱 Class: Insecta, 微翅類目 Order: Aphaniptera (Siphonaptera)、蚤科 Family: Pulicidae, 蚤屬 Genus: Pulex.

(2) 蚤的種類 蚤的種類很多,有人蚤 *Pulex irritans L.* (寄生人體) 印度蚤 *Xenopsylla (Pulex) cheopis Rothschild* (寄生鼠體),鼠蚤 *Ceratophyllus fasciatus Bosc.* (寄生鼠體),貓蚤 *Ctenocephalus felis Bouché*. (寄生貓體),犬蚤 *Ctenocephalus canis Curtis.* (寄生犬體),盲蚤 *Ctenopsylla musculi Duges.* (寄生鼠體). 實驗時,任擇一種.

(3) 蚤的發育史 就人蚤的發育史說:蚤是卵生 Oviparity. 卵 Ovum 為白色,略呈球形,大 $0.7\text{mm} \times 0.4\text{mm}$. 產卵總數約 450—800 個,一次的產卵數,8—12 個. 卵產於地

上、地板上、床上，混入塵埃中而孵化。孵化的日期，在夏季約二日至六日，在冬季約十日；但孵化的日數，視溫度、種類而略有差異。據 Babianī 氏的研究：人蚤在夏季約六日、冬季約十二日而孵化。又據 Pergande 氏的研究：犬蚤、貓蚤，二日乃至四日孵化。幼蟲 Larva 成蛆狀，帶灰白色，長 4 mm，食塵埃中的有機物以爲生，十日到十二日間脫皮四次，在塵埃中造繭，潛於其中，變而爲蛹 Pupa。繭爲白色扁形，因外被塵埃，不易識別。蛹最初帶黃色，終呈褐色。生活史在人蚤須 4—6 週，幼蟲經完全變態 Complete metamorphosis 而成成蟲 Imago。

(4) **蚤的習性** 雌雄都吸收溫血動物——獸類和鳥類——的血液，營寄生生活 Parasitism。宿主 Host 一死，身體冷卻，即他徙而另尋宿主。如吸收的血液中含配斯脫 Pest 菌，便媒介這種病菌。原來配斯脫菌 Bacillus pestis 雖藉蚤的吻管而移植，但含於糞中的菌，有時從毛孔侵入人體，使人感染疾病。蚤在配斯脫鼠吸血，每次可吸收 5000 左右的細菌，菌在腸內繁殖，可生存數十日之久，和蚤糞同時排泄；故從病鼠體上所得的蚤，把蚤糞塗在動物體上，也能感染配斯脫。

(5) **蚤的驅除法** 預防或驅除蚤的發生，地板和棕櫚

應盡量清潔，如用鋼條床墊，便易預防。撒布辟鹽腦 Na-phthalene，除蟲菊粉、片腦油、揮發油等，效果亦很大。

(6) 觀察標本製作法 採集蚤類，用 Chloroform 殺死以後，浸在 10% Potash solution (Caustic potash 35 份溶解於 100 份水中) 一二日，後用水洗去，移於酒精中，到 95% 為止，浸二十四小時後，復移於無水酒精中，次再用 Cedar oil, Turpentine, 或 Xylol(任擇一種)透明，用 Balsam 封之，俟乾燥後，即可用顯微鏡觀察。

身體的構造

1. 身體全部被幾丁質的外骨骼 Exoskeleton (External skeleton)，但體猶軟弱，體側扁，分頭、胸、腹三部。口器成適於螯刺和吸吮的吻管。翅雖缺乏，而三對的腳則很發達。體形從側面觀察，略呈橢圓形，但隨種類不同，略微有些差異。體長雄的平均 1—1.6mm. 雌的 2—3.5mm. 體色帶黃褐色乃至黑褐色。

頭部的觀察

2. 頭部 Caput (Head) 是在身體前方的小部分,和胸部癒合。從側面觀察,略呈三角形。名頭端中央部曰前頭 Frons,左右兩側曰顫 Gena,相當兩單眼的背側的頭頂上部曰頭頂 Vertex,頭部有一對觸角、一對單眼、口器和刷毛櫛。頭部的表面生許多短小的毛,尤其是在單眼直前的毛,更長大而顯著,是曰眼刷毛 Ocular bristle.

3. 觸角 Antenna (Feeler) 起於頭部側面的小窩中,雖極短小,但末端還能認識具節的膨大部分。

4. 單眼 Ocellus (Simple eye) 在頭部的側面,即在觸角的直下,形狀極小。

【註】單眼的發育完全不完全,隨蚤的種類而異;例如

盲蚤 *Ctenopsylla musculi Duges*, 發育便不完全。

5. 口器 Mouth-parts 在頭的下方, 是適於螯刺吸吮的吸收口式 Haustellum, 叫做螯刺性口器 Stinging mouth-parts.

6. 蚤類的口器構造很特殊, 他的主要部分, 是由吻管、小顎和小顎鬚所成, 用高度鏡檢查口器, 得識別下列各部:

A. 大顎 Mandibula (Mandible) 大顎有一對, 呈針狀, 緣具鋸齒, 有時又稱做上顎。

B. 下唇 Labium (Lower lip) 下唇起自大顎基部而在大顎的外側, 比大顎長而粗, 左右各一, 成於五節。

C. 刺舌 Hypopharynx 刺舌(或僅稱之為舌)起自大顎基部而在大顎的內側, 有時認為延長的上唇 Labrum (Upper lip), 因其表面平滑且祇有一個和大顎顯然有別。

以上 A, B, C 三部, 構成吻管 Proboscis.

D. 小顎 Maxilla 小顎在下唇基部, 是呈三角形的小板, 左右各一, 有時又叫下顎。

E. 小顎鬚 Palpus maxillaris 小顎鬚左右各一起自小顎基部, 長而較粗成於四節。

【註】在口器直上有排列成櫛齒狀的暗色剛毛, 叫做剛毛櫛 Ctenidia, 特稱之為頭部剛毛櫛 Head ctenidia — 口部剛毛櫛 Oral ctenidia. 剛毛櫛的有無和所在的位置, 隨種類而異; 例如人蚤 *Pulex irritans L.* 和印度蚤 *P. chaeopis Rothschild*, 便無剛毛櫛。鼠蚤 *Ceratophyllus fasciatus, Bosc.* 的胸部有剛毛櫛 — 胸部剛毛櫛 Thoracic ctenidia. 至於犬蚤 *Ctenocephalus canis Curtis* 猫蚤 *C. felis Bouché*, 口部和胸部都有剛毛櫛, 所以剛毛櫛的有無和數目是分類上重要的標準。

胸 部 的 觀 察

7. 胸部 Thorax (Chest) 是接續頭部的部分, 雖可分前胸 Prothorax, 中胸 Mesothorax 和後胸