婦人大全良方

卷之二十

北京協和醫學院圖書館藏

新編婦人大全良方卷之九

○求嗣門 疾病既無 須和 次之

陳無擇求子論第一

夫有夫婦則有父子婚姻之後必求嗣續故聖人謂不孝有三無後為大者言嗣續之至重也凡欲求子當先察夫婦有無勞傷痼害之屈依方調治使內外和平則婦人樂有子矣

楮尚書 澄 求男論第二

建平奉王妃姬等皆麗無子擇良家未笄女入御又無子問曰求男有道乎澄對曰合男女必當其竒男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰陽完實然後交合則交

而孕孕而育育而為千堅壯強壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣是以交而不孕孕而不育育而早洩未完而傷未實而動所以無子也然婦人有所產皆女者有所產皆男者大王誠能訪求多男婦人婬至宮府有男之道也王曰善弗再暮生六男夫老陽遇少陰老陰遇少陽亦有子之道也

婦人無子論第三

夫婦人無子者其事有三也一者墳墓不嗣二者夫婦年命相尅三者夫病婦疹皆令無子若是墳墓不嗣年命相尅此二者非藥能益若夫病婦疹須將藥餌故得有効也然婦人挾疾無子皆由勞傷血氣生病或月經閉澁或崩漏帶下致陰陽之氣不和經血之行乖候故無子也該其右手閉後尺脉浮浮則為陽陽脉絕無子也尺脉微濇中手得此為絕產也少陰脉即寸俱微弱者則絕產也○又有因將攝失宜飲食不節乘風取冷或勞傷過度致令風冷之氣乘其經血結於子臟子臟得冷故令無子也

千金翼求子方論第四

千金論曰夫婦人之別有方者以其血氣不調胎妊生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者無陰所集常與濕居十曲歲已上陰氣浮溢百想經心內傷五臟外損姿顏

月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絶其中傷墮不可具論生熟二藏虛實交錯惡阨內滿氣脈損竭或飲食無度損傷非一或胎瘡未愈而合陰陽或行步風寒便利旋懸厠之上風從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時節気為病虛實冷熱為患者故與丈夫同也唯懷胎姙孕而挾病者避其毒藥雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜慾多於丈夫感病倍於男子加以慈愛憎嫉妒憂恚淳著堅牢情不自抑所以為病根深療之難差故養生之家特須教子女学此三卷婦人方令其精晓即於倉卒之於何憂畏也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人性命之長務若不通明於此則何以免其損夭者哉故傳曰之徒亦不可不学常宜繕寫一本懷挾隨身以防不意也○又曰人之情性皆頗賢已而疾不及人至於学問則隨情逐物墮於事業詎肯尋一推求至理莫不虛棄光陰沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日昏爾若愚是則徒頗賢已而疾不及人之謬也斯實不遠賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉○又論曰夫欲求子者當先知夫妻夲命五行相生及與德合并夲命不在于休廢死墓中生者則求子必得若其夲命五

行相尅及與刑煞衝破并在于休廢死墓中生者則求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳矣

禁忌法

凡欲要兒子生吉良日交會之日常避丙丁及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏冥日月無光虹蜺地動日月薄蝕此時受胎非止百倍損於父母生子或瘖唖聾瞎頑愚癲狂孿跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中井竈圊厠之側塚墓屍柩之傍皆悉不可夫妻會如法則有福德大智善人降託胎中仍令父母性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中則令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家道滅亡夫福福之驗有如影響此乃必然之理何不再思之

男子受胎時日法

凡男女受胎皆以婦人經絕一日三日五日為男仍遇月宿在貴宿日又以夜半後生氣時寫精者有子皆男必壽而賢明高爵也若以紝絕後二日四日六日寫精者皆女過六日皆不成子又遇旺相日尤吉

推王相日法

春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸

推貴宿日法

正月一日二十六日　二月一日十九日
四日十七日　三月一日十二日
四日十日　四月一日十日
二日十五日　五月一日十三日
八日二日　六月一日十一日
十二日八日　七月一日九日
十二日六日　八月一日七日
十二日四日　九月一日五日
十二日二日　十月一日三日
十二日一日　十一月一日一日
十一日十九日　十二月一日十七日
十一日十七日

甲寅乙卯夏合丙午丁巳秋合庚申辛酉冬合壬子癸亥與上件月宿日合者佳論曰夫人求子者服藥須知次第不可不知其次第者謂男服七子散女服溫胞湯及坐導藥并服瑩石門冬圓則無不効矣不知此者得力鮮焉

七子散　主丈夫風虛目暗精気衰少無子補不足方

牡荊子　五味子　兎絲子
車前子　蒴藋子　山藥
石斛　熟地黃　杜仲
鹿茸　遠志各八　附子

二月四日九日十二日　若春合
五日十七日二十
三日十四日二十七日

蛇床子　天雄各五分　川牛膝　巴戟十二分　蒺蔾二分　鍾乳粉八分　黄耆各五分　山茱萸　桂心十分　白茯苓　人參　川芎各六分

右為細末酒服方寸匕日二服不知加至二七以知為度忌生冷醋滑猪鶏魚蒜油膩不能飲者蜜圓服亦佳一方加覆盆子二両行房法一依素女経女人月信断一日為男二日為女三日為男四日為女以外無子每日午時夜半後行事生子吉餘時生子凶

慶雲散　主丈夫陽気不足不能施化施化無成覆盆子　五味子各二分　兎絲子二分

白朮炒　天雄各九両　桑寄生四両　石斛各三両　麥門冬　紫石英二両

右為細末食後酒服方寸匕日三服素不能飲者米飲調下冷者去桑寄生加細辛四両陽事少而無子者去石斛加檳榔十五箇良

湯胞湯　治婦人主身已来全不産育及断続久不産三十年者　朴硝　大黄並一飯久　厚朴　人參　牡丹皮　當帰　桃仁各三両　細辛　苦梗　赤芍藥　茯苓　桂心

甘草　川牛膝

附子 炮一兩半　蜚虫 炒熟足去翅 水蛭 炒各六十枚

右㕮咀每服四大錢酒水各盞半煎至六分去滓温服空心日三服夜一服少汙必下積血及冷赤瘕如小豆汁斟酌不盡若力弱大段不堪者只一二服止然惡物不盡不得藥力能服盡儘好不爾著坐導藥

坐導藥　治婦人全不產及斷緒服前溫胞湯惡物不盡用此方

皂角 去皮子一兩　吳茱萸 當歸

大黃 蒸　戎鹽

川椒 各二兩　五味子　細辛

乾薑 各三兩一方無茱萸有葶藶苦葅各三分

右為細末以綿袋盛大如指長三寸餘盛藥滿繫袋口內婦人陰中坐卧任意勿行壹小便時去之了後更安一度易新者必下清黃冷汁汁盡止若未見病出亦可至十日安之孕為子宮有冷惡物故令無子但天陰冷則發疼痛須候病出盡方可中藏每日早晚用苦菜湯熏洗外臺秘要云出千金翼子金方無葶藶有矾三分餘齊方同著藥後一日乃服紫石英圓

紫石英圓　又名紫石門冬圓　紫石英　天門冬各三兩

紫蔵

牡蒙 各二兩　粉草 一兩半
川芎　卷柏　桂心
熟地黃 乾　辛夷仁　烏頭炮
當歸　石斛 各三兩　烏賊骨
川牛膝　薯蕷 各二分　桑寄生
人參　牡丹皮　乾薑
厚朴　續斷　食茱萸
細辛 各一分　柏子仁 一兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓溫酒吞下漸加至五十圓慎如藥法絲心録同

延年方療婦人子臟偏僻冷結無子坐導藥

蛇床子　莞花　苓苔等分

右二味為末取棗大紗囊盛如小指長內陰中工作預去住意即著避風冷

內炙圓　廣濟療無子宮暖

麝香二分　川椒 去目炒出汗 十分　皂莢 去皮子酥炙 十分

右為末煉蜜為圓如酸棗大絲裹內產宮中留少綿線出覺生寒不淨下多即抽綿線出却凡藥一日一度換之無問晝夜皆內無所忌

奉柱圓　治婦人無子知在金州范羅言乞以此方試

令婦人服之至四十九日如無子請斬臣一家以令天下何德揚方雖其言似誇然實有異驗

奉芃　柱心

杜仲

防風　厚朴各三分　附子生
白茯苓各一兩半　白薇　乾薑
沙參　白蘞　牛膝　半夏各半兩
人參一兩　細辛二兩一分

右十四味並生碾為細末煉蜜為圓如赤豆大
每服三十圓空心食前醋湯米飲任下未効更
加圓數已覺有孕便不可服至年二十七無
于服此藥十二日便有孕殘藥與石門縣令妻
年三十四斷產已十六年服此藥便有孕又殘
藥與太子中舍文季妻年四十無子服此遂有
孕其効如神不可具述此仙方也

養真圓　治婦人血虛氣憊陰陽不升胎久不成姙
娠者

鹿茸　當歸　肉蓯蓉
兔絲子　覆盆子
紫石英　桑螵蛸各二兩
真琥珀　白芍藥
桑寄生　卷柏
川薑　堅白茯苓
牡蛎　酸棗仁各一兩
人參
鍾乳粉四兩

右為細末酒煮麪糊圓如梧桐子大食前溫酒
吞下五十圓日三服哭後用粥飲壓之屢試甚

驗已上五方並出外臺秘要

白薇圓 療久無子出產

白薇　牡蒙　蔓本各五分
薑黃　當歸　熟地黃各七分
川芎　人參　栢子仁
石斛　柱心　附子炮
五味子　防風　甘草
川牛膝　桑寄生各六分
奉椒二分

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下三十圓
日二服忌生菜葱熱麵蕎麥蒜猪肉魚鴈葵菜
蕪夷薤菜海藻粘食臭物等
禹餘糧八分

地黃湯 又療久無子斷緒小腹冷痛气不調

熟地黃乾　川牛膝　當歸各八分
卷栢　川芎　防風各六分
孛牛子炒　柱心各三分

右吹咀以水六升煮取二升三合去滓分三服
服別和一分牽牛子末服如人行四五里更進
一服以快利止忌同前

千金白薇圓 療月水不利閉塞絶產十八年服此
藥二十八日有子金城太守

白薇　細辛各五分　人參
杜衡　厚朴　牡蒙
半夏　殭蚕　秦艽
當歸　紫菀各三分　川牛膝

沙參
附干

右為末煉蜜圓如梧桐子大先食服三圓不知
稍加至四五圓此藥不長將服覺有娠則止用
大驗忌餳豬羊肉冷水生葱菜

千金翼白薇圓主久無子或斷緒上熱下冷百病
皆療

白薇
川芎
紫石英
藁本
菴閭子
卷柏
蛇床子
車前子
當歸
太一餘糧
石膏
澤蘭葉
乾薑
防風
川椒
覆盆子
白芷
蒲黃
細辛
赤石脂
樛皮
遠志
乾地黃
桃仁
人參
麥門冬
桂心
乾薑
白茯苓
白朮
白蒺藜骨

經心錄茱萸圓療婦人陰寒十年無子者

吳茱萸
川椒
右為末煉蜜圓如彈子大綿裹內陰中日再易

無所下但閉手臟有陰溫即有子也

紫石英圓

紫石英　阿膠　當歸
川芎　赤芍藥　川續斷各一兩
鹿茸　白朮　柱心各半兩
柏子仁二兩　熟地黃一兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大空心溫酒下五十圓漸治虛中有熱頭目旋暈足如履空嘔吐不食月水不調或多或少皆虛候也久服能生髮令人有子更治一切虛悸常若憂思皆心血不足血室虛所致也

溫隱居求嗣保生篇方論第五

普庵京有一焦公因三世無嫡嗣遂為商旅遊蕩谷山尋訪至人問其因果遂至京都見一老僧聲清而遠目視精光請教談論語言甚異故就齋而坐僧曰有何所諭焦曰負家三世無嫡嗣奈何僧曰無嗣者有三一祖宗無德自身無行二夫妻等命恐犯禁忌三精神不守妻妾血寒焦公曰自身無行夫妻等命皆可受持若妻妾血寒有何法術再拜告曰願聞一言僧曰不難先修德後修身三年之後可到五臺山當授異方說畢忽不見焦公自遇老僧之後時時行方便種種作陰功遇人臨難者勿觀音之救苦見物垂死者助上帝之好生行思布德如此三年竟往五臺山尋訪老僧數日

不見方回歸忽見行童手持一書言曰老師傳諸
大夫功成行滿回宅合藥志誠服之富貴子孫隨
意降生焦公曰但得嫡子足矣何望貴子於是
遂生焦負外後負外養子不肖嘆曰有何損德如
是忽遇一道人云汝有憂色何不往五臺山見老
僧焦氏頓首遂往五臺山不
見老僧只見行童曰老師昨日言負外今日到山
如故積德報應皆登科第焦氏拜謝而歸奉行雕
板印施方書不及二十年富貴子孫數人長幷橫
金出入金門後人收得行狀及方受持行用求藥
者獲其子孫皆有德行余躬受此方不敢緘默併
録篇論以告諸賢庶不致堙沒再方具于后

續嗣降生丹

治婦人稟受气弱胎臟虛損子宮冷
憊血寒痼冷難成子息功効如神

當歸 杜仲 龍齒
烏藥 真天台者佳 益智 茯神
石菖蒲 吳茱萸 各一兩半 茯神
川牛膝 奉芃 細辛
苦梗 半夏 防風
白芍藥 各三兩 乾薑 一兩半 炒 附子 一隻重八錢有臍心 川椒 半兩 湯浸
作一窠如彈子大入朱砂一錢重溫麪裹煨

壯蚘子一大匙浸取漳泉二州者却用学堂童
便四十九日一換取出用
右為細末取附子丙炙砂別研為細末糊米糊
為圓如梧桐子大每服三十圓至百圓空心淡
醋湯塩湯皆可下一日二服
此導及瘴男子精寒不固陽事衰弱白濁夢泄
及治婦人血虚帶下脚疲寒熱但是男女諸虚
百損筋力面無顏色飲食少味
並皆治之更有奇効難以具述受持君子宜預
行善及方便却服此掌無不感應
新編婦人大全良方卷之九

新編婦人大全良方卷之十

○胎教門求嗣已明須知次之

妊娠總論第一

凡婦人妊娠十月其說見於古書有不同者多矣
按巢氏病源論婦人妊娠一月名始胚足厥陰脉
養之二月名始膏足少陽脉養之三月名始胎當
此之時血不流行形象始化未有定儀見物而變
欲于端正莊嚴當令男子來牡馬欲生女宜著珠璫施
也欲生男宜操弓矢乘牡馬欲生女宜著珠璫施
環珮觀孔雀欲子賢能宜讀詩
書務和雅手心脉養之四月始受水精以成血脉
于少陽脉養之五月

脉養之六月始受金精以成其筋足陽明脉養之
七月始受木精以成其骨手太陰脉養之八月始
受土精以成層革手陽明脉養之九月始受石精
以成毛髮足少陰脉養之十月五臟六腑関節人
神皆備此其大略也又五臟論有稱智慧者論一
月如珠露二月如桃花三月男女分四月形象具
五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂兒能動左
手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月産
気足更有揄張仲景者亦然又顱顖経云一月為
胎胞精血凝也二月為胎形成胚也三月陽神為
三魂四月陰靈為七魄五月五行分五臟也六月
六律定六腑也七月精関竅通光明也八月元神
具降真靈也九月宮室羅布以定生人也十月受
気足萬象成也今推究數説之理如五臟論者類
皆淺鄙不経徃徃妄託其名至於三藏佛書且語
渉怪誕漫不可考今按顱顖経三卷云中古巫方
所撰隋人巢氏力亦嘗序之今巢氏論婦人姓脈
乃不見言之聖濟経原化篇亦猶取顱顖経更不
言巢氏論者何哉嬰童寶鑑集云小兒方論起自
巫方黄帝云吾不能察幼小賴國有巫方能知小
兒之壽夭耳及觀巢氏論小兒候亦云中古有巫
方立小兒顱顖経以占壽夭世所相傳者有少小
方焉是巢氏論小兒則取於顱顖経則是未盡其
理故不言之若聖濟経者但取其文句不若巢氏

之論其間有胎教之法為可取所以巢氏論妊娠
至三月始胎之時欲令見貴人莊嚴若操弓矢施
環珮觀孔雀讀詩書之類豈非胎教之理乎嘗試
推巢氏所論妊娠脉養之理若足厥陰肝脉也足
少陽膽脉也為二臟腑之經脉之經皆如此且四時之
令必始於春亦故十二經之養始於肝也所以一
月二月手心主心胞絡脉也手少陽三焦脉也屬
火而夏旺所以胎養在三月四月也屬手少陰心
手太陽小腸者以君主之官無為而尊也足太陰
脾脉也足陽明胃脉也屬土而旺長夏所以養胎
而五月六月手太陰肺脉也手陽明大腸脉也屬
金而旺秋所以養胎在七月八月足少陰腎脉也
屬水而旺冬所以養胎在九月又況母之腎臟繫
於胎是母之真氣子之所賴也至十月兒於母腹
之中受足諸臟氣脉所養然後待時而生此論與
徵而有至理餘書所論皆不能及也觀此則知巢
氏之論世更有明之者亦未有過於巢氏之論矣
余因述其說

嫉妒論第二

夫至精絪化一氣方凝胎始受胞胎漸成形質子在
腹中隨母聽聞自妊娠之後則須行坐端嚴性情
和悅常處靜室多聽美言令人講讀詩書陳禮說
樂耳不聞非言目不觀惡事如此則生男女福壽
敦厚忠孝賢明不然則男女阮生則多鄙賤不壽

而思此所謂因外象而内感也昔太任娠文王目不視惡色耳不聽惡言口不誦惡言世傳胎教之道是謂此也前論亦略叙之矣然則婦人有終身無子者何也按巢氏病源云婦人無子者蓋有三焉一者墳墓不嗣二者夫婦年命相尅三者夫疹婦病皆令無子若夫疹婦病可以服藥而後能有子餘皆不可致也今觀是說亦未盡善有人以婦人無子問西京常器之者乃曰女人自少多病服煇藥無節使天癸耗動且早故終身無子又有問裏陽宋大亨者亦然則婦人娠有兩胎者何也按古今方書並無論及此者惟巢氏論云陽施陰化精氣有餘故生二胎且謂成一胎之理其精有幾耶今觀婦人有兩胎者其精神氣字略無小異至於數有兩胎或間成兩胎者有俱男俱女者有一男一女者道藏經云有求于法云婦人月信初止後一日三日五日值男女旺相日陽日陽時交合有子多男若男女稟受皆壯則多于一有怯弱則少于以此推之理可堅見焉又婦人娠男女之別何也按顱顬經云陽盛發陰當孕成男六脉諸經皆舉其陽陰盛發陽當孕成女六脉諸經法云三陽并會則生男三陰并會則生女為洪肘後方云男從父氣女從母氣聖濟經云天之德地之氣陰陽一至和相為流薄於一體因氣而左動則屬陽陽資之則成男因氣而

右動則屬陰陰資而成
女易捅乾道成男坤道成
女此男女之別也凡婬娠有疾投以湯藥有傷胎
破血者之忌何也內經云婦人重身毒之李何岐
伯荅曰有故無殞衰其大半而已也蓋婬婦有疾
不可不投藥也必在醫者審度疾勢輕重量度藥
性高下處以中庸不必多品視其疾勢已衰藥宜
便止則病去毋安于乘損復何懼於攻　治法
受形篇第三　有夫有光楮澄大
男女之合二精交暢陰血先至陽精後衝血閉裏
精精入為骨而男形成矣陽精先入陰血後參精
閉裏血血入居本而女形成矣陽气聚面故男子
面重溺死者必伏陰气聚背故女子背重溺死者
必仰壹獸溺死仰伏皆然陰陽均至非男非女之
身猶血散為蜕胎品胎之兆父少母老產女必羸
母壯父衰生男必弱古之良工首察乎此气受偏
癖與之補之補羸女則養血壯脾補弱男則壯脾
節色羸女宜及時而嫁弱男宜待壯而婚此疾外
所務之本不可不察也

論胎教第四　馬益卿先生

論曰胎教產圖之書不可謂之迂而不加信然亦
不可伊泥之方今俚俗之家與不正之屢將息避
忌略不如儀或藥毒不侑或產於風露既無產厄
于母均安固有之如不利嗣續或驕倨太甚動
必成咎雖鄰家有所興修亦且犯其胎气令兒破

形殞命如刀犯者形必傷泥犯者寡必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣諸如此等驗如反掌福善禍淫猶不可曉

孕元立本章第五

有泰初有泰始渾淪一判既見氣矣故曰泰初既立形矣故曰泰始氣初形始天地相因生生化化品物彰矣故曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生

吴禔註云渾沌未判則氣形俱泯渾沌既判則氣形已分既見氣矣是為太初既立形矣是為太始太初者凡有氣之所本故天得之以統元氣太始者凡有形之所本故地得之以統元形天地交泰相因為禀生生而生者得所以生化化而化者得所以化由物流形而形色名声者彰矣大哉乾元泰初之所寓也故以萬物之資始為言至哉坤元泰始之所寓也故以萬物資生為言惟萬物資始生於乾坤故乾元則兆象至哉坤元然後形無不成

有生之初雖陽予之正育而充之必陰為之主

薛左丞註陰陽離合論曰天覆地載萬物方生未出地者命曰陰處名曰陰中之陰則出地者命曰陰中之陽陽予之正陰為之主王冰謂陽施正氣萬物方生陰為主持群形乃立因形字說始而生之者天也育而充之者人也

移易日改月化無非坤道之代終也

列子周穆篇尹文先生曰因形移易謂之化莊子田子方篇混元曰消息滿虛一晦一明日改月化日有所為而莫見其功易坤卦文言曰地道無成而代有終也地之承天其常成而有終也豈迫於不得已取蓋道之所在萬物失之則死逆之則有生之類聽命於此故無成而代有終者以道言之也

謂之姙陽既受始陰壬之也

壬子謂之姙字說壬一陽也二陰也陽既受始陰壬之而謂之姙解曰壬陽水之王也位在亥子之間陰至亥極矣陽復受始而謂之姙於壬至子然後生

謂之胞已為正陽陰包之也

已正陽也而陰能包之陰與陽更用事故也已者孟夏之月於卦為乾純陽用事故詩謂之正月正月者正陽之月也陰方用事而為物之主則雖正陽亦在所包而退聽焉

謂之肧未成為器猶之坯也

說文瓦未燒者

謂之坯胚婦孕一月也字說坯未成為器猶坯也謂之胎也既食於毋為
口呂也說文胎婦孕三月也字說元胎既食於毋為口呂焉若娠則以時動
也字說女娠以時動若懷則以身依之也字說心所懷則身依焉日未焉
天之德地之氣陰陽之至和相與流薄於一體靈樞
經曰天之在我者德地之在我者氣德流氣薄而生者也唯能順時數謹人事
勿動而傷則生育之道得矣自一月積之至於十月所謂時數也保衛
輔翼有其道防閑忌慎適其宜所謂人事也觀四序之運生長收藏貿
出萬物有儀則咸備而天地之氣未始或虧者蓋
陰陽相養以相濟也陰陽離合論曰天覆地載萬物方生陽予之正陰為之主
故生因春長因夏收因秋藏因冬失常則天地四塞莊子天地篇曰留動而生物物生成理謂之形
形體保神各有儀則謂之性昧者魯不知此乃欲拂自然之理
謬為求息之術方且推生死於五行蘄補養於藥

否以偽勝真以人助天雖或有子孕而不育育而
不壽者衆矣昔人論年老有子者男不過盡八八
女不過盡七七則知氣血在人固自有量夫豈能
逃陰陽之至數哉天真論帝曰有其年已老而有子者何也岐伯曰此其天壽也
度氣脉常通而腎氣有餘也此雖有子男不過盡八八女不過盡七七而天地之精氣皆竭矣註雖
老而生子子壽亦不能過天癸之數

凝形殊稟章第六

天地者形之大也陰陽者氣之大也惟形與氣相
資而立未始偏廢莊子則陽篇太公調曰天地者形之大者也陰陽者氣之大者
也道者為之公氣以形載形以氣元惟氣与形兩者相待故曰相資而立未始偏廢男女構
精萬物化生天地陰陽之形氣寓焉繫辭曰天地絪縕萬物化
醇男女構精萬物化生語七八之數七少陽也八少陰也相

感而流通故女子二七天癸至男子二八天癸至則以陰陽交合而化始故也天癸伯曰女子二七而腎氣盛月事以時下故有子夫二八腎氣溢瀉陰陽和故有能有子丈夫二八之道四六人有為之人之道四六而絕十生理備矣陽化之理語九十之數九老陽也十老陰也男能圍之陽寄於九女能方之則以陰陽相生而成終故也之字說文者說陰寄於十圍之者方之男之陽寄於九無窮之女以足圍之方以圓之陽不足以言道圍之內也圓曰圓也圓曰圓也圓而行婦人家正所以制儀儀而從方婦人外也夫有變也於十而至已女右旋積歲三十而至已女右旋積歲二十而至已為正陽陰實從之自已懷壬男左旋

十月而生於寅女右旋十月而生於申申為三陰寅為三陽而生育之時著矣其稟賦也體有剛柔脈有強弱氣有多寡血有盛衰皆一定而不易也有祥則所夢各應其類是故荊揚薄壤多女雍冀厚壤多男熊羆為男子之祥蛇虺為女子之祥是皆理之可推也荊州其民二男五女雍州其民三女一男揚州其民一男二女冀州其民五男三女詩云維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥胎化之法有所謂轉女為男者亦

十月而生於寅女右旋十月而生於申申為三陰寅為三陽而生育之時著矣其稟賦也體有剛柔脈有強弱氣有多寡血有盛衰皆一定而不易也有祥則所夢各應其類是故荊揚薄壤多女雍冀厚壤多男熊羆為男子之祥蛇虺為女子之祥是皆理之可推也荊州其民二男五女雍州其民三女一男揚州其民一男二女冀州其民五男三女詩云維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥胎化之法有所謂轉女為男者亦

九難曰男生於寅寅為木陽也女生於申申為金陰也揚氏註云寅為木陽也女人之所生也申為金陰也男子之所生也寅申者陰陽之終始也故曰男從左行三十而一變女從右行二十而一變左行至於已為三十年右行至於申為二十年二十年而陰氣衰竭精神去矣男子三十而娶婦懷妊也古人之所以早娶者欲其及陽氣之盛而有子也女子二十而嫁娶也十月而生於已為男已為左行至於申為十月故女

理之自然如食牡鷄取陽精之生於天產者帶雄
黃取陽精之生於地產者（千金方用黃丹參門上雄雞頭又為男丹轉女雄雞補虛溫中通神取雄黃一兩雞蛋一枚去肝補虛益氣盛帶之辛草丹雄雞冠血益陽雄黃人佩之鬼神不能近物不能傷）操弓矢藉矛戈取剛物之見於人事者氣類潛通造化密移必於三月兆形之先蓋方儀則未具陽可以勝陰實女為男理固然也（巢氏論云婦人三月始胎形像始化未有定儀見雄雞而雌物而雙欲得男者操弓矢射雄雞）

氣質生成章第七

具天地之性集萬物之靈陰陽平均氣質圓備咸其自爾然而奇耦異數有衍有耗剛柔異用或殖或羸血榮氣衛不能逃於消息盈虛之理則稟賦之初詎可一槩論是以附贅垂疣駢拇枝指俶儻跛蹙形氣所賦有如此者瘡瘍癰腫聾盲瘖喑瘦瘠疲癃疲瘵氣形之病有如此者然則胚胎造化之始精豉氣實之後保衛輔翼固有道矣（孝經云天地之性人為貴書泰誓曰惟人萬物之靈天有五氣各有所淫地有五味各有所入所入有度量凡所長短柔知戒慎資物為養者理固然也寢興以時出處以節六節藏象論曰天食人以五氣地食人以五味五氣淫肝五味入口藏於肝腥氣淫肺腐氣淫腎臭氣淫脾香氣淫心焦氣淫腎五味入口藏於腎味從之也）霧露風邪不得投間而入因以高明可以周密使密以至調喜怒寡嗜慾（禮記月令仲夏之月可以居高明可以處臺榭仲冬之月可以居室窌則脈實精微論云冬脈不沈奪精厥氣上逆故可以高明可以周密陽氣在上陽氣在下故可以伏藏）時為養者理宜然也以作勞不妄而氣血從之皆所

以保摂妊娠使諸邪不得干焉
不妄作労形汗出則陰陽筋脈和同但骨髄堅固気血皆従天論
曰上古之人其知道者法於陰陽和於術数食飲有節起居有常不
過用之時一失調養則内不足以為身之強気形弗充而疾疢因
中之守外不足以為之強也得守者生失守者死
又曰夫五臓者身之強守也得守者生失守者死
若食免唇缺食犬無声食雞魚而瘡癬之属皆以食物不成之過也
論食乾鯉魚者使人多瘡而病癩痛者何也岐伯曰人生中時其毋有所大驚気上不当
疾病奇胎気病並居得之故今在腹中
帝曰人有身而病下利発大熱腹満不得前後何也岐伯曰此
帝曰人有身而病下利発大熱腹満不得前後何也岐伯曰此
論食乾鯉魚者使人多瘡而病癩痛者何也岐伯曰人生中時其毋有所大驚気上不当
疾病奇胎気病並居得之故今在腹
帝曰人有身而病下利発大熱腹満不得前後何也岐伯曰此
論食乾鯉魚者使人多瘡而病癩痛者何也岐伯曰人生中時其毋有所大驚気上不当
疾病奇胎気病並居得之故今在腹

腎気不足而解顱者巣氏云小児不成大贏瘦生肌膚皆為脾胃不和而贏瘦者巣氏云解顱
腎気不足而解顱者巣氏云小児不成大贏瘦生肌膚皆為脾胃不和而贏瘦者巣氏云解顱
腎気不足而解顱者巣氏云小児不成大贏瘦生肌膚皆為脾胃不和而贏瘦者巣氏云解顱

不能飲食故血気衰弱不能栄於肌膚凡小児不能食不能
不能飲食故血気衰弱不能栄於肌膚凡小児不能食不能
不能飲食故血気衰弱不能栄於肌膚凡小児不能食不能

胎而遇寒冷或生而挟伏熱皆令児不能食故足頭不顧能開結解成脾胃不和而贏瘦也心気虚乏而神不足之属皆以気血不調之過也誠能食飲知所成推而達之五味無所傷誠能於気血知所調推而達之邪気無所乗益乃生育相待而成者通而源栄府云肺主気脈血之府藏遍布諸臓気虚也
胎而遇寒冷或生而挟伏熱皆令児不能食故足頭不顧能開結解成脾胃不和而贏瘦也心気虚乏而神不足之属皆以気血不調之過也誠能食飲知所成推而達之五味無所傷誠能於気血知所調推而達之邪気無所乗益乃生育相待而成者通而源栄府云肺主気脈血之府藏遍布諸臓気虚也
胎而遇寒冷或生而挟伏熱皆令児不能食故足頭不顧能開結解成脾胃不和而贏瘦也心気虚乏而神不足之属皆以気血不調之過也誠能食飲知所成推而達之五味無所傷誠能於気血知所調推而達之邪気無所乗益乃生育相待而成者通而源栄府云肺主気脈血之府藏遍布諸臓気虚也

損藏脈不足則令驚悸悦惚心統是也
損藏脈不足則令驚悸悦惚心統是也
損藏脈不足則令驚悸悦惚心統是也

不因人言天不成
不因人言天不成
不因人言天不成

轉女為男法第八

論曰陽施陰化所以有娠遇三陰所會多生女子
但懐娠三月名曰始胎血脈不流象形而変是時
男女未定故令於未満三月間服薬方術轉令生
男也其法以斧置妊婦床下繫刃向下勿令人知

恐不信者乞待鷄抱卵時依此置窠下一窠盡出
雄雞此雖未試亦不可不知凡受胎三月逐物變
化故古人主胎教能令生子良善長壽忠孝仁義
聰明無疾蓋須十月之因常見好景象毋近邪僻
真良教也如有鬲忤傷胎治各有法〇又自初覺
有娠取弓弩弦縛婦人腰下滿百日去之紫宮玉
女教法也姙娠三月已前取雄鷄尾尖上長毛三
莖潛安婦人卧蓆下勿令知之〇又姙娠絶滿三
手足甲潛安卧蓆下勿令知之〇又取夫髮及
月要男者以雄鴈半兩藏衣中帶之要女者以雌黄
帶之

新編婦人大全良方卷之十

新編婦人大全良方卷之十一

脉例第一

王子亨云若姙娠其脉三部俱滑大而疾則男在左則在右

經云陰搏陽別謂之有子搏者近也陰脉逼近於下陽脉別出於上陰中見陽乃知陽施陰化法當有子又少陰脉動甚者姙子也手少陰屬心主血腎主精精血交會投識于其間則有娠又三部脉浮沉正等無病者有姙也餘病如脉經說　左手尺部浮洪者為男胎也　右手尺部浮洪者為女胎也兩手尺部俱洪者為兩胃俱沉實者為兩女又云中指一跳一止者一月胎二

跳二止者二月胎也

診婦人有妊歌第二

肝為血亏肺為气血為榮亏気為衛陰陽配偶不參差両臟通和皆類例血衰気王定無孕血王気衰應有體陽肝藏血偶者為孕婦匹配生気為衛屬陽肺主気偶合攜精乃有陰也尺微関滑尺帯數流利往来尋尋啄小児之脉已見形数月懐胎猶未覚両手関脉大相應已形亦在前通諮疾為懐女及其脉洪行滑利相應是胎已上脉之帯脉数皆是流利尋尋啄多気少皆是経脉是手帯縦両箇児本即者天賊行乗脉也妻名水曰行縦乗見火在金左行手乗左疾為男右為女流利相通速未去左手脉為懐男児形狀也右手関脉順還三部已順之者母亲也名曰順是気行乗火即三箇已生男児脉也也右手脉順還一寸関尺部皆相應一男一女分形諮脉寸関大尺部遅一謂女也前有三女已順之脉也名曰順是気行乗火即三箇已生男児脉也也右手脉順還一寸関尺部皆相應一男一女分形諮脉寸関大尺部遅一謂女也前有疾相應有是懐一男一女形諮之脉也男一謂女也前有疾為陽関後為陰陽脉相應故懐之脉也男一謂女也前有時子死母身存或即母亡存子命辨此二句之存亡之無法

往来三部通流利滑數相參皆替替陽實陰虚脉得明遍滿胞堂皆逆氣若寸関尺三部通行流利皆替替有力而滑數左手太陽浮大男手是陽実陰虚之脉主遍滿胞堂而不順逆氣為太陽男子脉浮大寸口是懐男子脉沉細女懐脉也是婦也

諸陽為男諸陰女指下分明長記取陽諸

脉皆為男即浮大疾數滑實之類是也當懷男子諸陰脉即沉細之類是也當懷女子三部
沉正等無絶尺內不止真胎婦寸關尺三部脉沉浮正直有等舉按
無絶斷及尺內舉按不止住者真的懷胎婦也夫乗妻兮縱氣霧經云縱者夫乗
妻也水行乗火金行乗水即鬼賤脉也縱氣霧露者露也又上下也謂夫之陽氣乗妻之陰氣縱氣
上下相逐如霧如露潤澤結子也妻乗夫兮横氣助横者妻乗夫也見前註謂
兩傍横氣相任助也子乗毋兮逆氣參逆者子乗毋也謂子氣犯毋氣相乗兮逆
行之氣相參合也毋乗子兮順氣護是毋氣乗於子氣為順氣相護衛也凡胎
聚縱横逆順四氣以業養方乃成形也小兒日足胎成聚身熱脉亂
無所苦婦人懐小兒五箇月是以數足胎成就而結聚也必毋身體壯熱當見脉息强乱非
病若之證謂五月胎已成受火精以成氣故身熱脉乱是無病也汗出不食吐逆
時精神結備其中住謂姙胎受五行精氣以成形章二經以業且毋懐姙至五
月且胎雖成是氣未備故胎氣未安上衛心胞則汗出不食吐逆名曰悪阻佑吁遅飯唯思酸辛之
味以謂胎氣也滑疾不散胎三月姙娠三月若始胎此是未有定儀心包脉養之
故脉見滑疾流利為少氣多血不散為血氣盛則始結為胎也但疾不散五月毋
其脉但疾數而不散者是五箇月懐胎之也弦緊牢强滑者安沉細而
微婦泉路孕婦之脉宜弦緊牢强滑利為安吉之脉若沉細而微謂脉与形不相應故云
死也文雖云太陰沉細又云諸陰為女其説似有相違謂三部脉皆不沉細及微故不同也

驗胎法第三

婦人經脉不行已經三月者欲驗有胎
川芎　細末空心濃煎艾湯調下方寸匕
覺腹内微動則有胎也

胎殺避忌産前將護法第四

一受孕之後切宜避忌胎殺所遊如經云刀犯者
形必傷泥犯者竅必塞打撃者色青黯繫縛者相

拘攣甚至毋殆駭若反掌断不可忽

一月遊胎殺第五

立春在房床　驚蟄在戶單扇　清明在門　雙扇

立夏在竈　芒種在毋身　小暑在竈

立秋在碓　梅京本作三正北方于位　白露在厨厠

寒露在門　立冬在戶及厨　大雪在爐及竈

小寒在房及毋身

十干日遊胎殺第六

甲己日占門　乙庚日占碓磨　丙辛日占井竈

丁壬日占厨廐　戊癸日占米倉

十二支日遊胎殺第七

子丑日占中堂　寅卯辰酉日占厨

巳午日占門　未申日占籬下　戌亥日占房

六甲旬遊胎殺第八

甲子旬遊竈碓　甲戌旬遊正廳

甲申旬遊中庭　甲午旬遊房内

甲辰旬遊房中　甲寅旬遊床下

太史曰遊胎殺第九

每遇癸巳甲午乙未丙申丁酉五日在房内北

庚子辛丑壬寅三日在房内南

癸卯一日在房内西　餘日在房内東

甲辰乙巳丙午丁未四日在房内中　餘日在外無占

六戊六己日在房内中

凡遊在房内不宜於東方位上安牀帳及掃舍皆

又有小兒殺及產母身黃定命皆不
可犯凡姙娠之後將此貼於當眼常照應之切不
可穿鑿修掘務釘擊蘸壁重物屋壓之類犯之重
則胎死腹中母亦不利輕則子受其殃成人之後
必定破形拳攣跛縮瘡瘂犯之極驗

一受孕之後不可食之物切宜忌食非惟有感動
胎气之戒然於物理亦有厭忌者設或不能戒忌
非特延月難產亦能令兒破形毋殞可不戒哉

食雞肉孵出合食令子生寸白蟲
食羊肝令子生多厄

食鯉魚鱠及雞子令兒成疳多瘡
食犬肉令子無聲音
食兔肉令子缺唇（蓋兔乃下雄而子生子則口中吐出是以忌焉）
食鴨子與桑椹同食令子倒生心寒
食雀肉令子不恥多淫
食山羊肉令子多病
食蝦蛛鱉魚令兒瘡瘂
食驢騾馬肉延月難生
食豆醬合雞食之墮胎
食永漿絶產
食蟛蜞黑子
食蟛蜞令子橫生
如此之類無不驗者則知聖人胎教之法

豈非慮有自其然乎

孕婦藥忌謂笋十

虻斑水蛭地膽蟲　烏頭附子配天雄

蜣蜋野葛蝼蛄類　烏喙側子及壺虫

牛黃水銀并巴豆　大戟蛇蜕及蜈蚣

牛膝藜蘆并蔥苡　全石錫粉及雌雄

牙消芒消牡丹桂　蜥蜴飛生及蜚虫

代赭蚱蟬胡粉麝　芜花薇衔草三稜

捉子牽牛并皂角　桃仁蠐螬和茅根

檀根硇砂與乾漆　亭長溲疏茵草中

瞿麥蒺藜茹鼈爪甲　蝟皮赤箭赤頭紅

馬刀石蠶衣魚等　羊夏南星通草同

乾薑荪雞及雞子　驢肉兔肉不須供

切忌婦人產前忌　此歌宜記在心胷

新編婦人大全良方卷之十一

新編婦人大全良方卷之十二

姙娠疾病門 胎教已明須知姙娠疾病故以次之

凡姙娠諸病但忌毒藥餘當對證依法治之

姙娠證月數服藥及將息法第一

千金姙娠一月名始胚大麥毋食醒辛是謂逸胚飲食精熟酸羙受御宜食

又姙娠一月足厥陰脈養不可針灸其經足厥陰內屬於肝肝主節及血一月之內血行忍渋不為力事寢心安靜毋令恐畏

又姙娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞湯方

烏雌雞一隻治如食法吳茱萸一升　茯苓
阿膠各二兩　生薑一斤　甘草各一兩
人參　芍藥各三兩　白朮各三兩
麥門冬五合去心
右十味細切以水一斗二升煮雞取汁六升去
雞下藥煮取三升內酒三升并膠烊盡取三升
去滓溫服一升日三服補胎方
又若曾傷一月胎者當預服補胎方
北細辛一兩　防風二兩　烏梅一升
吳茱萸五合　乾地黃　白朮各二兩
大麥五合　生薑四兩
右吹咀以水七升煮取二升半去滓分溫三服

葛

若寒多者倍細辛茱萸更炙多渴者去細辛茱萸
加栝樓根二兩若有所患去大麥加栢子仁三
合一方有人參一兩忌生菜蓝菜桃李雀肉等
物

妊娠二月名始膏毋食辛臊居处靜處男子勿勞
百節皆痛是謂胎始結
又妊娠二月足少陽脈養不可鍼灸其絕足少陽
內屬於膽膽主精二月之時兒精成於胞裏當謹
護驚動
又妊娠二月始陰陽踈絡有寒多壞不成有熱即
莓卒中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰脊強痛
卒有所下乍寒乍熱艾湯主之方

丹參三兩　當歸　人參
麻黃去節　艾葉　阿膠炙各二兩
甘草炙一兩　大棗十枚擘　生姜六兩

右九味切以酒三升水一斗內藥煮減半去滓內膠煎取參升分溫三服忌海藻菘菜又若曾傷二月胎者當預服黃連湯方

黃連　人參各一兩　吳茱萸
生地黃各五兩　生姜三兩

右五味切以醋漿水七升煮取三升分四服日三夜一每十日一作若頭覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水耳忌豬肉冷水蕪荑一方當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄璋璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

又妊娠三月手心主脈養不可針灸其經手心至內屬於心無悲哀無思慮驚動赤即黃卒籧恐憂怒瞋恚喜頓仆動於經脈腹滿繞臍苦痛腰背痛卒有所下雄雞湯方

茯苓　甘草炙各二兩　黃芩
人參　膠阿各一兩　芎藭
白朮各一兩　麥門冬去心五合
雄雞一隻治如食法

大棗 十二枚擘　生姜 一切　兩

右㕮咀以水一斛五升煮雞減半內藥煮取一
半入清酒三升并膠再煎取二升分二服一日
盡之當温卧忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等一方

又若曾傷三月胎者當預服荻神湯方

荻神　冊參　乾眉各一兩
阿膠　當歸　赤小豆　二十粒　大棗　十二枚擘

右㕮咀酢漿一斛煮取三升分四服七日後服
一劑腰痛者加桑寄生二兩深師方有薤白二
兩麻子一升忌同前

人參　各二兩

右㕮咀酢漿一斛煮取三升分四服七日後服
一劑腰痛者加桑寄生二兩深師方有薤白二
兩麻子一升忌同前

妊娠四月始受水精以成血脈其食稻粳葵羹魚
鴈是謂成血气以通耳目而行經絡

又妊娠四月手少陽脈氣不可針灸其經手少陽
內揄三焦四月之時兒六腑煖成當靜形體和心
志節飲食

又妊娠四月為離經有寒心下愠愠欲嘔胷膈滿
不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急辛中
風寒頭項痛痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來
有時胎上迫胸煖不得安卒有所下菊花湯方

菊花　如大一雞子許　麥門冬　去心　各一兩
阿膠　炙　三兩　麻黃　去節　一兩
當歸　生姜　五兩　甘草　炙　二兩

半夏　洗　名一兩

人參　半兩

大棗十枚擘 右細㕮以水八升煮減一半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫卧當汗以衾撲之護風寒四五日忌羊肉海藻菘菜錫等

又若曾傷四月胎者當預服調中湯方

芍藥四兩　茺蔚子各一兩　柴胡　白朮各三兩　芎藭　甘草各　生李根白皮三兩　生姜四兩

右細切以水一斗煮取三升分四服日三夜一服一方有半夏二兩忌海藻菘菜桃李雀肉

妊娠五月始受水精以成其氣晝起沐浴浣衣居處必厚甚衣嘗朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和菜莫調以五味是謂養氣以定五藏

又妊娠五月足太陰脈養不可針灸其經足太陰內輸於脾五月之時胞胎兒四肢成無大飢無甚飽無食乾燥無自灸熱無大勞倦

又妊娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶煩欲仆卒有所下阿膠湯方

阿膠四兩　旋覆花湯　人參　兩

麥門冬 去心 一升　生姜 六兩　吳茱萸 七合
旋覆花　當歸　芍藥
甘草 炙　黃芩 各二兩

右細切以水九升煮取一半內清酒三升并膠微火煎取三升為四服日三夜一先食再服便愈不差更服忌海藻菘菜

又若曾傷五月胎者當預服安中湯方

甘草 炙　芍藥 各三兩　當歸
人參　乾地黃 各二兩
五味子 五合　生姜 六兩　麥門冬 去心 一升
大麻仁 五合　大棗 三十枚 擘　黃芩 一兩

右細切水七升煮清酒五升煮取三升半分四服

日三夜一七日再服一劑忌如前

安胎當歸湯小品療妊娠五月牽動驚悸胎動不安下在小腹痛引腰胎小便疾下血

當歸　芍藥
人參 各一兩　阿膠
棗 十二箇　艾一把

右細切以酒水各三升合煮至三升去滓內膠令烊分三服腹中當安小便絞也古今錄驗救急同一方有甘草無參棗

妊娠六月始覺金精以成筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走馬食豆鶩鳥猛獸之肉是謂變腠理紐筋以養其力以堅背膂

又妊娠六月足陽明脈養不可針灸其絡足陽明

內屬於胃主其口目皆成謂五
味食甘美無大飽
又姙娠六月孕有所
動不安寒熱往來腹內脹滿
身體瞤聳怖忽有所
下腹痛如欲產手足煩疼方
麥門冬湯

麥門冬 去心 一升
乾地黃 三兩
生姜 大兩
右八味切以水七升煮減半內清酒二升并膠
煎取三升分三服每如人行三四里中間
服忌海藻菘菜蕪荑
豬肉當預服柴胡湯方
又若曾傷六月胎者當預服柴胡湯方

柴胡 四兩
茅蒐 二兩
大棗 三十枚 擘
右十味切以水一斗煮取三升分四服日三夜
一中間進麋粥勿食生冷及堅強之物七日更
服一劑忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等
兩

集驗療姙娠六七月胎不安常處旋覆苓湯 亦名治病
旋覆花 一兩
枳殼
半夏 炙
竹茹
茅蒐 一方有黃芩二兩
生姜 各三兩

茅蒐 一握 一方作 第蔵
茸草 二兩 矢谷
麥門冬 三兩 去心
乾地黃 四兩
生姜 六兩
右十味切以水一斗煮取三升分四服日三夜
一中間進麋粥勿食生冷及堅強之物七日更
服一劑忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等
兩

人參 各一兩
茸草 各二兩
阿膠 四兩
黃芩 二兩
大棗 十枚 擘
右八味切以水七升煮減半內清酒二升并膠
煎取三升分三服每如人行三四里中間
服忌海藻菘菜蕪荑
豬肉當預服柴胡湯方
又若曾傷六月胎者當預服柴胡湯方

右細切以水一斗煮取二升半去滓分五服日
三夜二忌羊肉餅醋桃李雀肉千金同
妊娠七月始受木精以成骨勞身搖肢無使定止
動作屈伸以運血気自此後居處必燥飲食避寒
常食粳稻以密腠理是謂養骨而堅齒
又妊娠七月手太陰脉養不可針灸其経手太陰
肉屬於肺肺主皮毛七月之時児皮毛已成無大
言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲
又妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥
冷脉若傷寒煩熱腹滿短気常苦頭項腰背強
葱白湯方
葱白 十長三四枝 寸 半夏 洗切 麦門冬 去心各一分
生姜 八両
黄耆 酌各三
黄芩 一両
甘草 炙
阿膠 四両
当帰
人参 各一両半
旋覆花 一把
右十一味切以水八升煮減半内清酒三分并
膠煎取四升温服一分日三夜一温卧當汗出
若不出者加麻黄二両煮服如前法若秘後勿
強責汗忌羊肉餅湯海藻菘菜等
杏仁湯若曽傷七月胎者當預服
杏仁 去雙仁尖 甘草 炙 鍾乳 研
乾姜 各二両 麦門冬 去心 吳茱萸 各一分
五味子 粳米 各一合
九味切以水八升煮取三升半分四服日三

在一中間進食七日服一劑忌海藻菘菜
又妊娠八月始覺大生精以成胵草和心靜息無使
气極是謂密腠理光澤顏色
又妊娠八月手陽明脈養不可刺灸其經手陽明
内禹於大腸大腸主九竅八月之時児九竅皆成
無食燥物無轉失食無忌大飢
芍藥湯又妊娠八月中風寒有所犯觸身體尽痛
作寒作熱胎動不安常苦頭脏痛繞脇下寒時時
小便白如米汁或青或黄或使寒慄腰背苦冷痛
而目視茫茫

芍藥四方　人參　當歸
甘草　三兩炙　白朮一兩　白朮一兩　芎朮二兩炙

薤白卅切一升　生姜切四兩
右八味切以水五升酒四升合煮取三升分三
腹日両夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等
葵子湯若曽傷八月胎者當預服

甘草炙　柴胡　白朮各三兩
芎藭　芍藥各二兩　葵子二升
大棗擘二十枚
生姜六兩
右八味切以水九升煮取三升分三服日三一
日服一劑忌海藻菘菜桃李雀肉等
妊娠九月如受石精以成皮毛六腑百節莫不畢
備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才
力

又妊娠九月足少陰脈羞不可針灸其絰足少陰
內屬於腎主續縵九月之時兒脈續縵皆成血
處濕冷血著矣衣
半夏湯又妊娠九月若卒下痢腹滿懸急胎上衝
腰背痛不可轉側短気
半夏洗 麦門冬去心各五合 當帰 呉茱萸
乾姜一両 阿膠二名炙両
右七味切以水九升煮取三升去滓内白蜜八
合微火上温分四服痢即止忌生血物餳
猪腎湯若曽傷九月胎者當預服
猪腎一両 葵子一合
右十味切以水一斗煮腎令熟去腎内諸藥並
取三升半分四服日三夜一十日更一剤忌猪
内冷水蕪荑桃李雀肉酢物等
妊娠十月五臓俱備六腑齊通納天地気於丹田
故使関節人神皆備但候時而生集驗延年同
妊娠悪阻方論第二
夫妊娠阻病者按眥訣産宝方謂之子病業氏病
淖謂之悪阻若婦人宿有風気或有痰
飲既妊娠便有是病其狀顏色如故脈息和煖但

乾姜 白朮 大豆 乾地黄 麦門冬 附子

覺肢體沉重頭目昏眩擇食而聞食気好食酸醎甚者或作寒熱心中憒悶嘔吐痰水胸膈煩滿悒悒不能支持不拘初娠但疾苦有輕重耳輕者不服藥亦不妨重者須以藥療之千金方有半夏茯苓湯茯苓圓二方專治阻病然此二藥比来少有服者以半夏有動胎之性蓋胎初結慶其易散此不可不謹也張仲景傷寒論云婦人傷風續得寒熱入血室有用黄芩湯者小柴胡湯去半夏也此蓋為妊婦而設焉王千秊則有白朮散局方則有人參丁香散用之良驗然三方皆大同而小異揚振則有人參橘皮湯齊士明則有醒脾飲子試之亦效皆不用半夏動胎等藥服者知之

白朮湯治悪阻吐清水甚害干餘日粥漿不入者

白朮 二兩　甘草 一錢　人參 半兩　丁香 半錢

右為細末每服二錢水一盞姜五片煎至七分温服

又

人參橘皮湯治阻病嘔吐痰水

人參 去芦　陳橘紅　白朮

麦門冬 去心各一兩　白茯苓 去皮各半兩　甘草 三錢　厚朴 製

右為粗末每服四錢水一盞半煎竹茹一塊如彈子大生姜三片煎至七分去滓澄清温服空

心食前集驗無麥門冬甘草

人參丁香散治姙婦惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及心腹刺痛

人參半兩　丁香　藿香葉各一分

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓温服無時

又方

人參　丁香　柿蒂各一兩　良薑半兩

右為細末每服二錢抵湯點下無時

醒脾飲子治姙婦阻病嘔逆不食甚者中滿口中無味或作寒熱

博濟方此出王氏

草豆蔻以温紙裹炙中煨用去皮　乾姜　厚朴製各半兩　甘草一兩

右為細末每服二大錢水一大盞棗二箇生姜三片煎至八分去滓呷服病輕者只一二服便能食舊有橘紅二兩治寒塞瘧痢不食後人去橘皮以乾生姜代乾姜治老人氣虛大便秘少津液引飲有奇効產科醫官齊士明依舊用乾姜去橘皮亦名醒脾飲子治阻病極為神驗宜和初在京師校勘

保生湯治婦人經候不行身無病而似病脉滑大而六部俱勻乃是孕婦之脉也精神如故忽聞食臭或但哭一物或大吐或時吐清水此名惡阻切

勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心呕吐加丁香
生姜煎服温隱居方

人參　甘草各一兩　白朮

香附子　烏藥　橘紅各半兩

右㕮咀每服三大錢水一盞半姜五片煎至七
分去滓温服無時或作末水調

古今録驗療惡食

人參四兩　乳汁　甘草各二兩　生姜

枳殼

右切以水六升煮取三升分三服

治妊娠阻病心中懊悶見食嘔吐惡聞食氣肢節
煩疼身體沉重多思嗜卧面黄肌瘦

人參　陳皮各八分　白茯苓

麥門冬　甘草　生姜各十二分

大棗二十箇

右㕮咀以水五升煎取二升温分二服忌菘菜
醋等凡妊娠惡食者以所思食任意食之必
愈一方無棗有半夏竹茹如陳皮方兩
二香散療妊娠胎氣不安氣不分降飲食不美呕
吐酸水起坐覺重宜服之

香附子一兩　藿香葉　甘草各二兩

右㕮細末每服三錢入鹽少許百沸湯點下
近効方療妊娠惡食心中煩懊熱悶呕吐

青竹茹　麥門冬各三兩　前胡二兩

橘皮一两　蘆根一握

右細切以水二大升煮取半升去滓分兩服食
並一服一方無麦門冬用小麦三合體熱四
肢煩熱者加地骨皮醫人夏侯方
李茂翁先生云若左脇弱而吐脘諸藥不止者當
服理血帰厚藥則愈経云無陰則吐是也
治姙娠忌阻吐不止頭痛全不入食脇諸藥無
効者用此藥理血帰厚則愈

人參　甘草　川芎
當帰　京芍藥　丁香　各半兩
白茯苓　白朮　陳皮　各一兩半
枳殻去穰炒　半夏泡洗七次切炒黄　各一分

右㕮咀每服三錢重生姜五片棗二枚並
安胎飲治懷胎三月四月至九箇月日悪阻病者
心中憒悶頭重目眩四肢沉重懶怠不欲執作悪
聞食気欲吹嘔多睡少起嘔逆不食或胎動不
安非時轉動腹疼痛或時下血及妊娠一切疾
病並皆治之

茯苓　當帰
川芎　白朮
甘草
熟地黄
黄耆　白芍藥　半夏泡洗七次切炒
阿膠炒切炒　地榆各等分

右㕮咀每服三錢水盞半生姜四片並至八分

去滓温服無時候一方無半夏地榆有人參桑寄生一方無白术黄耆半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白芍茯苓

婦姙娠痰逆不思食方論第三

夫水飲停積結聚為痰人皆有之方者不能為害多則成病妨害飲食乃至嘔逆婦姙娠之病若嘔逆甚者傷胎也厚痰之由皆胃氣不調或風冷乘之治搏於胃故成斯病也亦惡阻之一端半夏茯苓湯治婦姙惡阻心中憒悶煩燥吐逆頭目昏眩四肢怠惰百節煩疼痰逆嘔吐婦聞食氣好唅喊酸惡寒汗出羸極黄瘦多臥少起不進飲食婦姙婦有疾必生阻病千金以半夏茯苓湯對之此思邈處方之妙也若孕婦羸弱胎孕不牢則動必成咎至在醫者相人強弱以投之又何慮焉

半夏一兩泡七次 茯苓 生姜五兩 甘草半兩炙黄 橘紅三兩 熟地黄三兩 人參 芍藥 川芎各一兩 苦梗

右㕮咀每服四大錢水二盞姜七片煎至七分去滓空心温服並治婦人胎氣不和惡阻吐逆

局方與崔氏無紫蘇細辛有旋覆花一兩有客熱煩渴口瘡去橘皮細辛加前胡知母各三兩腹冷下痢者去地黄加枳壳二兩胃中虚熱

大便秘小便赤渋加大黄三両去地黄加薫荨
一両必半夏雖能動胎若炒過則無妨
半夏茯苓湯張氏方
半夏泡洗七次炒黄 陳皮各二両半 白茯苓三両
甘草四両
縮砂仁一両
右㖞咀每服四銭水二盞姜十片棗一箇烏梅
半箇煎至七分食前温服
茯苓圓治妊娠心中煩悶頭目暈重憎聞食
気吐逆吐痰煩悶顛倒四肢重弱不自勝持服之
即効要先服半夏茯苓湯而剤後服此薬
赤茯苓 人参 桂心
乾姜 半夏泡洗七次炒黄 橘紅略一両

白朮 枳殻各三両 葛根 甘草
右為細末煉蜜為圓如梧桐子大米飲吞下五
十圓日三服一方有麦門冬是海藻菘菜半
肉餳糖桃李蕈肉酢等時後忌生冷味云妊娠
療妊娠心胸支満疼痛逆悪飲食
赤茯苓 前胡 白朮
蘇葉各一両半夏 麦門冬
人参 大腹皮略一両半
右為粗末每服四銭水一盞姜五片煎至七分
去滓温服一方無大腹皮人参有大腹子檳榔

妊娠嘔吐不食並吐痰水
生蘆根十分　擣碎　橘紅四分　生姜六分
擣榔二分
右切以水二盞煮取七合空心熱服
瘴妊娠心胸気滞嘔吐不下飲食心神昏煩曲肢少力
枇杷葉　半夏　麦門冬
人參　各一兩　甘草　各半兩　詞千肉
藿香　各一兩　赤茯苓　枳殻
陳皮　各三分
右吹咀每服三錢水一盞姜三片棗一箇煎至七分去滓温服一方詞千無大棗
集驗瘴婦人妊娠悪阻嘔吐不下食
音竹茹　擣皮　各三兩　生姜
茯苓　各四兩
右細切以水六升煮取二升半去滓分三服不差頓服忌羊肉餳酢等物
柴胡湯古今録驗瘴妊娠不欲食或吐春月所宜服
甘草　柴胡　各二兩　麻黄一兩
食茱萸半兩　大棗十二枚
右細切以水六升煮取三升適寒温服一升日三瘴食噎醋酢熱下気所宜多與上同但秋夏去茱萸加枸杞一升六月加小麦一升石膏三兩秋去石膏加甘草一兩九月去麻黄加乾姜

一兩十月加川芎三分忌海藻菉葽

胎動不安方論第四

凡婦人妊娠胎動不安以日月多少而常墮胎者有雖有胎而月信雖不多常未而胎不損者產寶方云婦人妊娠常胎動不安者由衝任經虛胞門子户受胎不實故也并有飲酒房室過度有所損動不安者有巢氏云婦人衝任二經挾風寒而有胎故不以日月多寡因惊有擊觸而胎動者有喜怒不常气宇不舒傷於心肝觸動血脉衝任經虛乃致胞門不固或因登高上厠風攻脊户入於子宮如此皆令胎動不安也曾有以娠婦月信不絶而胎不損問產科能字古者若曰婦人血盛氣衰其人必肥既娠之後月信常未而胎不動若擾晚進觀之便以為漏胎治之則胎必墮若不作漏胎治則其胎未必墮今推宗古之言誠有旨也巢氏云婦人經閉不利別有所苦者是謂有子以其經血畜之以養胎胎攻之為乳汁也有子之後畜以養胎矣豈可復能散動耶所以然者有娠而月信每至是亦未必因血盛也若謂婦人榮經有風則經血喜動以其風勝則可也既榮經為風所勝則所未者非養胎之血以此辨之若作漏胎治之必服保養補胎之藥且胎不損強以藥滋之乃所謂實實虛虛也其胎終墮宜矣若醫者知榮經有風之理專以一藥治風經信可止或不服藥胎亦

無差然而有胎孕不固而因房室不節先漏而後墮者須作漏胎治之此又不可審也亦有婦人年方壯歲聽醫宮言某藥可服致補煖而使胞門子戶及為藥所搏(胞門子戶張仲景謂之血室)新血不滋舊血不下設或有子不以產晚則必墮中年之後氣宇漸衰必有崩中帶下之疾或日信經期漸覺黃瘦腰背不伸五心煩熱五勞七傷之疾從此而生不獨胞門子戶風寒而生也故千金翼方有非消湯泡正為此疾今之醫者未見有用亦未見有知之者又論婦胎動其由有二一因婦病而胎動但療婦疾其胎自安若胎不堅固自動其婦疾唯當安胎其婦自愈一因勞役氣力或觸冒冷熱或飲食不適或居處失宜輕者轉動不安重者便致傷墮嘗攻婦形色察之婦面赤唇青者兒死婦治唇口青舌赤口中沫出者婦兩邊沫出者子婦但死面青集驗方療婦娘二三月上至八九月胎動不安腹痛已有所下阿方

艾葉　阿膠　當歸

川芎各三兩　甘草一兩

右細切以水八分煮取三分去滓內膠令烊分三服日三千金文仲備急同

刪繁療婦人懷娠胎動不安蔥白(各一分)　阿膠(二兩炙)

香豉(各一

先以水三升煮葱豉取一升去滓入膠再煎令
烊服一日一夜可服三四劑絶心録同

釣藤湯治妊娠八九月胎動不安心腹疗痛面目
青冷汗出氣欲絶此由勞動用力傷胎宮宜急治
之

釣藤　當歸　茯神
人參各一兩　苦梗半兩　桑寄生半兩
右㕮咀每服五大錢水二盞煎至一盞去滓
温服無時候忌猪肉菘菜若煩熱加石膏二兩
半臨産月加桂心一兩

治妊娠胎動不安讀胎法

鯉魚二斤　粳米一升　葱一握

豉

右作臞食之每月一度　姜

治妊娠無故胎動不安腹内紋痛煩悶産室同
當歸　桑寄生各四兩　川芎三分
豉二合

右以水二升煮取一升去滓入膠再煎令烊
方寸豉用銀器盛煎八合下膠空腹温分二服一
銀多少先煎後入藥

阿膠二分　葱莖十四

黄耆湯治胎動不安腹痛下黄汁

糯米一合　黄耆　川芎各一兩

右細剉水一大盞煎至一盞三分温服
産寶方治胎動

艾
右以水四升煮取一升半分為三服
安胎鐵罩散
白芍子一兩
右為細末每服二錢煎紫蘇湯調下或胎動心煩悶入砂糖少許煎
銀苧酒治姙娠胎動欲墮腹痛不可忍方
苧根三兩
右以水一大盞煎至半去滓分温二服
治胎動方 養生必用方 胎動去血腰腹急痛
阿膠 各二兩
青竹茹 各二錢
右以水十盞內銀一斤煮至五盞去銀入上件藥三味煮至二盞半去滓入膠再煎膠烊分温三服空心自早至暮盡未効再作
治姙娠胎動腹內不調致胎不安產室方
艾葉二兩
當歸 乾姜 各三兩
川芎四兩
右以水四升煮取二升分温四服不過兩劑
寄生湯治胎氣常不安治五箇月已後胎不安
桑寄生洗剉
阿膠 各半兩
搗米半兩作粉
右以新汲水三升先下寄生桑皃二味煮至二升去滓次入阿膠攪搗米再煮約有一升止分作

三服空心食前日午服之忌酒醋三五日妳婦
気至五月已後常不安者服之必劾頓見嫉
婦好飲酒食鹹酸五辛胎必動可不知之

治胎動不安

又方　好銀煮取汁
川芎二両
右以水七升煮取二升半分温三服

順氣飲子產前服之安胎

紫蘇葉　葱白一升
草豆蔻　人參
大腹子一両如弱者不用気　茯苓　甘草
右著葱白作羹食之佳

右㕮咀每服三錢水一盞芎根三寸擣末少許
煎至七分去滓温服

癰妊娠後不轉動方

阿膠炙一両　桑寄生半両
右為末以酒一升煮五沸下生鷄卵一枚投酒
中分温二服空心食前一服小品方無寄生有
艾葉只用水煎
文仲安胎寄生湯癰血流下方

桑寄生　白朮各四分　茯苓四分
甘草七分
右切以水五升煮取二升半分三服若人壯者
可加芍藥八分足水二升若胎不安腹痛端坐

有所見加乾姜四分即安忌海藻菘菜酢物桃
李雀肉等雀氏小品絰心肉
奉芪湯治胎動不安指迷方
奉芪　阿膠　艾葉
右等分為粗末每服五錢水二盞糯米百粒煎
至一盞去滓温服
小品療妊娠童下痛引腰脊安胎止痛湯方
當歸　阿膠　乾地黄
黄連　芍藥各一兩　雞子一枚
秫米一升
右七味以水七升擣雞子令相得煮糯米令如
蟹目沸去滓内諸藥煮取三升分四服忌蕪荑
經心録同
又膠艾湯療擣動毋去血腹痛方
膠飴一斤　艾葉一莒
右二味以水五升煮取二升半分三服絰心録
同

妊娠漏胎下血方論第五

夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而絰水時下也此由
衝任脉虚不能約制手太陽少陰之絰血故也衝
任之脉為絰絡之海起於胞内手太陽小腸脉也
手少陰心脉也是二絰為表裏上為乳汁下為月
水有娠之人絰水斷者蹙之養胎擣之以為
乳汁也衝任氣虚則胞内泄不能制其絰血故月

水時下亦名胞漏血盡則人斃矣又有因勞役喜
怒哀懼不節飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母
有宿疾于藏為風冷所乘氣血失度使胎不安故
令下血也

姙娠卒然下血方論第六

夫姙娠卒然有損動或冷熱不調和致傷於胎故
卒痛而下血不止之則胎墮胎也

療姙娠三四箇月腹痛時時下血

續斷二分　艾葉　當歸　各六兩　乾地黃　竹茹　各一兩　雞蘇　各四錢

右㕮咀水一升煎取六合去滓空心再服隔日更
服

療姙娠六七箇月忽胎動下血腹痛不可忍

川芎二分　當歸十二分　寄生四分

右㕮咀水一升煎取六合下清酒半升再煎取八
合分三服如人行五里再服

療濟生安胎胎病漏血腹痛

當歸　川芎　各一兩　人參　大棗二十箇　阿膠炙

右切以水三升酒四升煮取二升半分三服五
日一劑服三四劑無所忌

又療姙娠胎動腰痛及下血安胎

當歸　川芎　各三兩　芎藭　各三

鹿角膠

右細切以水一斗煮取五升空心熱服正方用銀煮水並棗又見腰痛門療妊娠忽下血胎不止衝心手足逆冷用生艾汁二钱入阿膠生蜜各二鉄並至一钱半稍熱服如無生艾濃並熟艾汁亦作一服以水三钱並至一半空心食前頓服治妊娠忽然下血腰痛不可忍（婦人大全良方續）

鹿角鉋細　當歸鉋各半兩　艾葉炙二兩　葱白一升

不過二服即安

又方

阿膠一兩炒　茹艾葉炙半兩

右為細末空心糯米飲調下二钱漏胎下血不止胞乾即死宜急治之

生乾地黃為末酒服方寸匕日三夜一即愈不過三服良

又方

乾地黃切一兩　艾葉炙二兩　阿膠炒一兩　葱白一升

右同並三味以水三升煮取一升半去滓內膠令消盡溫三服以止為度（崔氏療妊娠下血不止血盡子死）

乾地黃切一兩　乾姜半兩

右為末酒服方寸匕日三夜一即愈不

療妊娠無故卒然下血不絕方

阿膠三兩用清酒一升半並取一升頓服

又方治妊娠卒然下血兼治胎衣不下方

右以鐵鍾燒令通赤內酒中如此者三次候溫飲一盞

妊娠驚胎及僵仆方論第七

妊娠驚胎者是懷妊月將滿其胎神識已具或因產之時從高墜下傷損胞絡致血下胎動逐上搶心胎氣絕不醒其母面赤者青口無沫出者兒死母活唇口俱青沫出者子母俱死母活者下血不止胞燥胎枯名芎藭湯治婦人妊娠五七月因出母死子活若下血不止胞燥胎枯名芎藭湯治婦人妊娠五七月因催生神妙佛手散

芎藭 當歸各一兩 川芎 白芍各四兩

右為粗末每服五錢水一大盞煎令汁欲乾投酒一大盞止煎一沸去滓溫服口噤灌之如人行五里再服不過三二服便生一方云此藥兼治胎衣不下方

治傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多按牙去血多昏暈欲倒者以水煎服或先以漏血腹內疼痛加為藥官桂半隨手效詳見通用方

治妊娠因墜倒損胎不轉動腹內疼痛腰重及子死腹中不出須臾三服立下

損去便逐下死出文仲

血上衝心腹滿悶者如湯汁雪救急經心同出量外

又治產前產後體熱敗血腹痛

當歸六兩

右為粗末每服五錢水一大盞煎令汁注飲乾

張氏方等分

川芎一兩為細末以熱酒調服方寸匕日三四
服

治妊娠因失所動胞干金方亦治子煩

右取竹瀝飲一升主煩

治妊娠從高墜下腹痛下血煩悶

黃耆各三兩　生地黃　益母草各一兩　當歸

右㕮咀每服四錢水一盞姜四片煎至六分去
滓無時候

集驗療妊娠二三月上至七八月頓仆失踞胎動
不安傷損胸腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心
短氣下血不止方

乾地黃　當歸　阿膠　川芎各二兩　艾葉各二兩

右以水七升煮取二升半分作三服腹痛甚加
杜仲五加皮各三兩一方無地黃有艾葉一方
無地黃却用生姜自然汁一起地黃汁半合馬
通平合煎成煮去滓入此再煎三沸溫服一方
有人參白茯苓水煎

竹茹酒治妊娠誤有失墮損築胎損疼痛

青竹茹二合　好酒一升　煮三五沸分作三
服即安

秦艽湯療妊娠或因僵仆胎動不安腑腹疼痛出產
科方見前

瘕妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍並治崩
血甚效並治子冒

丹溪心法引卒書
燥作躁

當歸飲治姙娠胎動逼心悶絶煩燥口乾擡生倒
產上衝下築迷悶唇口青黑手冷產寶方有川芎
安散一方無草有川芎厚朴產寶方有川芎

當歸 芎 各二兩 人參 半夏 各一兩 阿膠 炒一兩
右細剉水二升煎三合溫服一劑

連根葱白一握 芎 二兩
右細剉水二升煎至升半去滓下葱再煎
三服一方治胎上逼心熱悶方又治姙娠六七月已後胎動
困篤

葱白二七莖濃煮汁飲之即安若胎已死服之
即出未死即安未効再服

治胎不動胎上逼心方以烏犬血少少飲之當
下

治姙娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白朮 六兩 黃芩 二兩 芍藥 四兩

右水六升煮取二升半分為三服緣胎有水致
痛並易產
文仲葛氏療妊娠辛胎上迫心痛方取芎弦急帶
之立愈
妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛
痛方第九
右以水七升煮取二升分為四服
療妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛
妊娠誤服毒藥傷動胎氣方第十
梗未黃者六兩
奪命圓專治婦人小產下血至多子死腹中其人
妊娠誤服毒藥傷動胎氣方第十
增寒手指唇口仇甲青白面色黃黑或胎上搶心
則悶絕欲死治汙自出喘滿不食或食毒物或誤
服草藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安
已死服之可下此方的係異人傳授至妙
牡丹皮　白茯苓　桂心
桃仁製　赤芍藥
右等分為細末以蜜圓如彈子大每服一圓細
嚼溫醋湯送下速進兩圓至胎腐爛腹中危甚
者立可取出
治婦人服草藥墮孕腹痛方　男女神德遺
白扁豆生去皮為細末米飲調服方寸匕若修
製不及濃煎服亦可解男子女人誤中砒毒
亦治婦人赤白帶下要炒黃為末米飲調下

阿膠散 治妊娠不問月數深淺或因頓仆或因毒藥胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短氣力方

熟地黃二兩　白芍藥　艾葉
當歸　甘草
黃耆各一兩　阿膠一方有川芎

右吹咀每服半兩水一大琖姜三片棗一箇煎至七分去滓溫服無時

妊娠心痛方論第十一

夫妊娠心痛者多是風邪痰飲乘於心之絡絡邪氣搏於正氣交結而痛也若傷心正絡而痛者為真心痛心為帝主之宮統領諸藏不可受邪若傷之朝發夕死夕發朝死若傷心之別絡而痛者則乍安乍甚休作有時也妊娠之人或有病而痛不已者氣乘胞絡傷損子藏也則令胎動凡胎轉移則多不安不安而動於血者則血下也

治妊娠卒心痛氣欲絶

川芎　當歸　（方出寶產）
茯苓
厚朴　等製各方

右水六升煮取二升分為二服忌如前

雷公炮炙論云　心痛欲死急覓延胡

白朮湯 治妊娠卒心痛欲死不可忍者　出古今錄驗

白朮三兩
黃芩一兩半　赤芍藥二兩

右切以水六升煮取二升半分三服平日令盡
微下水令易生忌桃李雀肉
千金療妊娠心痛
青竹茹一升羊脂八兩白蜜三兩
右三味合煎每服棗核大三枚食前頓服日三
服
又方
青竹茹一升酒二升煮取一升半去滓分温頓
服
又方
破雞子一枚調酒服之
又方
大麻子三升研水
橘皮三兩
右為細末煉蜜圓
無時候四方出外要
妊娠心腹痛方
如指頭子大温水下二七圓
豉二兩
論第十二
夫妊娠心腹痛者或由宿有冷疹或新觸風寒皆
由藏虛而致發動也邪正相擊而爭於氣墮氣上
下衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛
也妊娠而痛者邪正二氣交攻於內若不時差者
其痛衝擊胞絡必致
心腹疾痛多是風寒
濕冷疹飲與藏氣相擊故令

腹痛攻傷不已則致胎動也

當歸芍藥散治妊娠腹中絞痛心下急痛及癉產後血暈內虛氣之崩中久痢常服通暢血脈不生癰癤消瘀養胃明目益津

白芍藥半斤　當歸　茯苓
白朮各二兩　澤瀉

右為細末每服二錢食前溫酒調服元和紀用經云木六氣經緯無能怯風補勞養真陽良邪熱絲中安和神志潤澤容色散邪寒瘟癉時氣安期先生賜李少君久餉之藥後仲景增減為婦人懷妊腹痛方本方用芍藥四兩澤瀉茯苓川芎各一兩當歸白朮各二兩亦可以蜜圓

腹出三方

治妊娠心腹痛不可忍

鹽一升燒令赤右以兩指取一撮酒調服癉妊娠先患冷氣急中心腹痛如刀刺

川芎　人參　茯苓
吳茱萸　苦梗　當歸各三兩

厚朴製　芍藥各二兩

右㕮咀以水九升煎取三升分三服氣下即安癉妊娠患腹痛并胎動不安

葱白一升切　阿膠　人參　厚朴

右㕮咀以水七升煎取三升分作三服一方

川芎各二兩　當歸三兩

有甘草無厚朴川芎
香朮散治妊娠五箇月已後常胸腹間気刺滿痛
或腸鳴以至嘔逆減食此由喜思憂慮過度飲食
失節之所致
荊元度寵人有子夫人恐欲逐之逐病醫官王師
復處此方三服而愈後用果驗

廣中莪茂 一兩煨
丁香半兩 粉草一分
右為細末空心塩湯點服一大錢覺胸中如物
按下之狀

草豆蔻散治妊娠心腹常痛嘔食減少四肢不知
全不入食
草果仁 三箇是草豆蔻 陳橘皮 乾地黄
白朮 川芎 當歸 炒 各一分
桂心 乾姜 木香 各半兩
右為細末每服四錢水一盞棗二枚煎至六分
熱服

阿膠散治妊娠胎動腹中疼痛不思飲食
白茯苓 白朮 川芎 當歸 炒 各一分
甘草一分 阿膠 炙 三分 陳皮 一兩
右吹咀每服三錢水一盞姜三片棗一箇煎至
七分去滓温服

治妊娠四五月忽心腹絞痛
大紅棗十四枚燒存性為末以童子小便調下

治妊娠胎動欲落腹痛不可忍

上等銀一分　茅根二分去皮

右以水九升煮銀取二升、入清酒一升同煎茅根取二升分為三服立安

古今錄驗療妊娠腹内冷痛兒胎動

薤白一升　當歸切四兩

右以水五升煮取二升作三服亦治小便服治

千金療妊娠腹中痛方

生地黄三斤擣取汁酒一升合煎減半頓服愈

妊娠中惡方論第十三

走妊娠人忽然心腹刺痛悶絶欲死者謂之中惡

言邪惡之氣中胎傷於人也所以然者血氣自養而為精神之主若氣血不和則精神衰弱故邪毒之氣得以中之妊娠之病亦致損胎也

當歸帰　丁香　川芎各三兩

青橘皮二兩　吳茱萸半兩泡去梗湯三次炒黒

右為細末無時温酒調一錢

又方

生乾地黄二兩　杜仲敲去皮炙　木香各三分

右為細末每服二錢酒調下

又方

苦梗一兩細㕮咀　姜半兩並服

姙娠腰腹及背痛方論第十四

論曰腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷条之則腰痛冷気条虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其痛不止多動胎気婦人腎以擊胞姙娠而腰痛甚者則胎墮也

療姙娠気壅攻腰痛不可忍亟治腹痛

當歸三兩　阿膠二兩名三　甘草二兩名三　葱白一升

右細剉以水七升煮取三升去滓分温五服

紫酒治姙娠腰痛如折

大黒豆二合炒令香熟以酒一大瓶煮取七分去豆空心頓服

通気散治姙娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不以多少毛上炒令香熟為末嚼核桃肉半箇空心温酒調下二錢

療姙娠腰背痛反覆不得赤酒中滓面燒面滓以角碎鹿角為末服亦可

鹿角長寸燒令赤

為度取酒飲之

療姙娠腰疼痛不可忍或連胯痛此先服散

杜仲四兩　五加皮　阿膠炙

防風

北細辛

杏仁八十枚去皮炒

右吹咀以水九升煮取二升去滓下膠作三服

烏雄鷄一隻重二斤以上者治如食法煮取肉

釜毛狗脊　川芎

白芍藥　草薢各三兩

瘴妊娠三二月腰痛不可忍者次服
續斷　杜仲　芎藭　各十分
獨活　狗脊　五加皮　各三兩
萆薢　芎藭　著艾　各八兩
詞子肉　各八兩
右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下四十圓
日三服

瘴鮞動胎以致腰痛脊痛如中矛而急加皮　當歸
杜仲　五加皮　萆薢
芎藭　川芎　各三兩
人參　各三兩
右細剉以水七升煮取二升半分作三服

瘴妊娠三二月及七八月胎動不安或腰肚痛及
血下
川芎　當歸　各四兩　艾葉　一兩
阿膠　各二兩　甘草　一兩
右細以水五升煮取二升去滓分温三服

大地黄圓治產前後腰腹疼一切血疼信效方治
血氣虛曲肢不舉骨髓熱疼
熟地黄一兩　烏梅肉　當歸　各一兩
右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓白湯嚼
下空心

廣濟瘴妊娠胎動腹痛及下血安胎方見前妊娠
中論　下血方

小品芎䓖湯療損動胎腰痛去血胎動向下方

生乾地黃　芎䓖各二兩　當歸

芍藥　阿膠　甘草各一兩

右細切以水六升煮取二升去滓內膠煎烊分

温三服忌海藻菘菜

救急療胎動去血腰腹痛方論第十五見前第四

妊娠小腹痛方論第十

論曰妊娠小腹痛者由胞絡宿有風冷而妊娠血

不通冷血相搏故痛甚亦令胎動也

療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸　川芎各八分　阿膠炙

人參　甘草各六分　芍藥四分　大棗二十箇

茯苓十分

右細切以水四升煮取二升温分三服

妊娠心腹脹滿方論第十六

妊娠心腹脹滿者由腹內夙有寒氣致令停飲

夫妊娠重因觸冷飲發動臭氣相干故令心腹脹滿

也

倉公下氣湯治妊娠心腹脹滿而脇妨悶不下飲

食而肢無力

羌活　赤芍藥　甘草

檳榔　青皮　大腹皮

陳皮　赤茯苓　半夏

桂心　枳殼各半兩　紫蘇葉二兩

右吹咀每服三錢重水一盞煎五片棗一箇並至七分去滓温服無時候　與局方分心気飲大同小異加煙心重

阿梨勒散　療妊娠心腹脹滿気衝胸喜煩悶四肢少力不思飲食

阿梨勒　前胡各一兩　赤茯苓　陳皮　桑白皮各三分　川芎　白朮各半兩　枳殼

右為麁末每服四錢水一盞半煎三片棗子一箇並至七分去滓温服無時

治妊娠心下急気滿切

赤茯苓六分　桑白皮五分　前胡四分

御李仁

右為細末以水一升煮取一半去滓夜卧服

局方枳殼散　及保気散亦妙　方見前論

檀桷各三分

紫蘇飲亦妙　方見十六卷第三論

新編婦人大全良方卷之十二