

外科正宗卷肆

冬



崇川 岐黃 甄毓仁父 纂著

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陰半陽症第五

癰疽五善歌第六

癰疽七症歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆第十一

病有三因 受病主治不
詞論第十二

調理須知第十三

雜忌須知第十四

卷之三

癰疽圖形第十五

附癰疽諸病瘡各于律

癰疽論第十六

疔瘡論第十七

脫疽論第十八

瘰癧論第十九

鬚疽論第二十

咽喉論第二十一

時毒論第二十二

癭瘤論第二十三

肺癰論第二十四

卷之三

流注論第二十五

乳癰論第二十六

附乳岩

附骨疽論第二十七

附鶴膝風

腸癰論第二十八

臟毒論第二十九

下疳論第二十一

翼癰論第二十三

腎癰論第三十五

結毒論第三十七

卷之四

陰瘡論第三十九

疔瘡第四十一

小腹癰第四十三

痔瘡論第三十

魚口便毒論第三十二

懸癰論第三十四

楊梅瘡論第三十六

多骨疽論第三十八

傷寒破頤第四十

瘰癧第四十二

鵝口疽第四十四

龍泉痘虎鬚毒第四十五

石榴痘第四十六

穿骨痘第四十七

大麻風第四十八

翻花瘡第四十九

腋癰第五十

脇癰第五十一

鼻痔第五十二

骨槽風第五十三

紫白癩風第五十四

齒病第五十五

腦漏第五十六

破傷風第五十七

跌撲第五十八

金瘡第五十九

杖瘡第六十

湯火燒第六十一

甲疽第六十二

齒痛第六十三

疔瘡第六十四

天蛇毒第六十五

頭痛第六十六

合谷毒第六十七

鼻出血第六十八

牙縫出血第六十九

血箭血痣第七十

鵝掌風第七十一

腎囊風第七十二

疥瘡第七十三

癩瘡第七十四

血風瘡第七十五

頑癬第七十六

膿窠瘡第七十七

凍風第七十八

火丹第七十九

天泡第八十

肺風粉刺酒皰鼻第廿一

雀斑第廿二

油風第廿三

白屑風第廿四

耳病第廿五

漆瘡第廿六

竹木刺第廿七

瘰癧第廿八

疔瘡第廿九

痰包第三十

癩風第卅一

溼腫第卅二

咬傷第卅三

風犬瘡第卅四

女人面生黧黑斑第卅五

鈕扣風第卅六

祛筋箭第卅七

婦人脚丫作癩第卅八

手足破裂第九十九

眼丹第一百

黑子第一百一

眼胞菌毒第一百二

體氣第一百三

白朮癢第一百四

奶癬第一百五

鱗拱頭第一百六

小兒遺毒爛斑第一百七

螻蛄串第一百八

小兒痘風瘡第一百九

小兒赤遊丹第一百十

走馬疔第一百十一

重舌第一百十二

胎瘤第一百十三

鵝口瘡第一百十四

痘癰第一百十五

痘疔第一百十六

黃水瘡第一百十七

犬人口破第一百十八

鼻田螺第一百十九

牛程躑第一百二十

僵螂蚌第一百二十一

田螺泡第一百二十二

膠痛第一百二十三

陰鼠第一百二十四

葡萄疫第一百二十五

百虫入耳第一百二十六

惡蟲叮咬第一百二十七

人面瘡第一百二十八

喉吞針鐵骨第一百二十九

中砒毒第一百三十

落下須拿法第一百三十一

救自別法第一百三十二

陰毒第一百三十三

失榮症第一百三十四

試知百病死生法第一百三十五

慈惠藥病說第一百三十六

仙方活命
今古不同第一百三十七

拾遺症第一百三十八

唇風第一百三十九

綳縛背瘡第一百四十

癰疽內肉
不合第一百四十一

煉元明粉第一百四十二

取紅鉛法第一百四十三

煉金頂砒法第一百四十四

煉硝石法第一百四十五

取蟾酥法第一百四十六

製附子法第一百四十七

昇白靈藥法第一百四十八

製寒食麩法第一百四十九

逐日人神歌第一百五十

十二時人神歌第一百五十一

屍神歌第一百五十二

製炒諸藥第一百五十三

醫家五戒第一百五十四

醫家十要第一百五十五

開割披針形第一百五十六

汗斑方第一百五十七

重訂外科正宗目次終

新刊外科正宗卷

陰瘡論第二

崇川

陳實功毓仁父

纂著

婦人陰瘡乃七情鬱火傷損肝脾溼熱不注爲患其形固多不一
總由邪火所化也陰中有如挺出一條蛇形只許墜重流水溺
澁者乃腥氣下陷肝火從之朝服補中益氣湯晚服龍膽瀉肝
湯外塗雄黃熬蘆散其患漸收陰中突出如菌子如雞冠四邊
腫痛者乃肝肺脾虛所致先以補中益氣湯加山梔茯苓青皮
清肝補脾兼升中氣更以歸脾湯加山梔川芎茯苓香附陳皮
調理陰戶忽然腫突作痛四旁傷血分濕火下流宜四物湯加
丹皮澤瀉花粉柴胡治之陰中生蟲匿如小蛆者乃心氣鬱而

邪火所化宜四物加黃連膽草木通石菖蒲以通散心竅鬱滯
外以鉅杏散納入陰中陰器外生疙瘩內生細蟲作癢不可忍
者此蟲食二臟腑即死令人多發寒熱與癩瘡相似有此症之
婦人畏羞都不肯說因循日久而黃飢瘦身發寒熱咳嗽生痰
往往不治者多矣如有此症急與逍遙散吞蘆薈丸早晚二服
外用銀杏散綿裹塞入陰中殺蟲止癢半月漸愈陰戶開而不
閉者愛思過也逍遙散歸脾湯俱加柴胡山梔白芍丹皮間服
交接出血者肝虛口火不能藏血四物湯加膽草黃芩山梔柴
胡新交房事傷者珍珠散猪脊髓調搽又婦人久居房
室淫火妄而又下注多致陰中作麤生蟲此

蟲食入內藏陰中
攻刺疼痛臭水淋漓口乾發熱形削不
食有此症者非
終歸於死又名失合症也

陰瘡治驗

一婦人陰器腫痛小水澁滯遇晚寒熱交作此肝經濕熱爲患以
龍膽瀉肝湯三服小水通利又以四物湯兼小柴胡加天花粉
木通炒山梔服之而愈

一婦人無辜發熱月餘忽陰中突出一物如雞冠一片此肝鬱脾
虛所致以補中益氣湯加青皮山梔柴胡黃芩外以甘草白芷
蒼朮紫蘇煎湯每日薰洗十餘日其患漸小仍用前湯倍參朮
月餘而安

十餘日瘰止腫消政瘰
婦人孀居十餘載
在瘰生蟲含忍不說後陰器食爛已食
內臟人形消瘦發熱作渴脉洪浮數方請醫治詢問瘰痛日
久陰器黑腐小水不禁內臟已壞不可用藥彼苦求治予曰瘰
者蟲也痛者損也先用鯽魚數枚以香料摻灸魚熟以絲綿薄
裹納入陰中爽之良久取出紅蟲長者一寸短者五六分細如
絲綿約有二十餘條置溫水中搖擺片時方死彼來歡悅以爲
可治予曰非也再取再有生化無窮強投養血清肝藥終至不
痊而死

陰瘡主治方

清肝滲濕湯

清肝滲濕湯四物
木通滑石銀柴等

澤瀉翹連膽草梔
甘草防風芦薈宜

川芎

當歸

白芍

生地

山梔

黃連

連翹

龍膽草

各一錢

銀柴胡

澤瀉

木通

各六分

滑石

二錢

蘆薈

五分

甘草

三分

防風

八分

水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎八分食前服

涼柴瀉火湯

涼柴瀉火湯
柴胡木通茵陳草

四物山梔知母全
麥冬龍胆大黃煎

治婦人懷抱憂鬱不清致生內熱小水澀滯大便秘結及陰中

火鬱作痛亦如澁林宜此瀉之

川芎

當歸

生地

黃芩

黃連

山梔

木通

柴胡

茵陳

知母

麥冬

各一錢

甘草

五分

大黃

酒炒

加二鍾煎八分空收
以利去大黃

銀杏散 銀杏散內用棗肉為丸
水銀輕粉雄黃尊
陰中作痒效如神

治婦人濕熱下注陰中作癢及內外生瘡並用

杏仁 去皮 輕粉 水銀 鉛製 雄黃 各一錢

右各為細末其和一處每用五分棗肉一枚和丸用絲綿包裏

留一綿條擦線在外用場癢湯煎洗藥裹安入陰內留線在外

恐小便取出再入一日一換重者只四五枚痊愈仍兼服前藥

場癢湯 場痒湯中用苦參歸尾鶴虱同煎洗
狼毒靈仙床二真
搔痒之人笑即生

治症同上以此薰洗之

苦參 威靈仙 蛇床子 當歸尾 狼毒 各五兩 鶴虱草 一兩

外科正宗 卷之四

用河水十碗煎數滾濾清貯盆內乘熱先薰待溫後洗臨洗和
入公猪膽汁二三枚同洗更妙

雄黃蒸蘆散

雄黃蒸蘆散 魚頭 芎歸湯沸乘溫洗

輕粉水片共相求 蛇管雞冠不久留

治婦人陰中突出如蛇或似雞菌樣者並治

雄黃錢一 葱管蒸蘆

一錢碾 細末

輕粉

鱉頭

焙黃色 各一錢

水片二

已上各研極細末和勻再研磁權收貯先用芎歸湯煎洗隨後

搽藥早晚二次其患漸收

芎歸湯

芎歸湯洗陰中痒 白芷甘草並

蛇菌雞冠並此求 薰洗陰瘡盡縮頭

治症同上以此洗之

川芎 當歸 白芷 甘草 龍膽

右各等分每用五錢煎湯浴洗患上隨後搽藥

應用方

內疎黃連湯 透膿散俱見腫瘍門 補中益氣湯 八珍湯

歸脾湯 四物湯 八味丸俱見潰瘍門 逍遙散

小柴胡湯俱見瘰癧門 蘆薈丸 龍膽瀉肝湯 珍珠散俱見疔瘡門

消風散見風疹門 蛇床子湯見腎囊風門

傷寒發頤第四十

傷寒發頤亦名汗毒此因原受風寒用藥發散未盡日久傳化為
執小散以致項之前後結腫疼痛初起身熱口渴者用柴胡葛
根湯清熱解毒患上紅色熱甚者如意金黃散敷之初起身涼

不渴者牛蒡甘桔湯散之患上微熱不紅疼痛者冲和膏和之
腫深不退欲作膿者托裏消毒散已潰氣血虛弱食少者補中
益氣湯以此治之未成者消已成者潰已潰者斂亦為平常王
道之法也用之最穩

柴胡葛根湯

柴胡葛根湯花粉
石膏桔梗併升麻

甘草連翹牛子苓
傷寒願毒效多矣

治願毒表散未盡身熱不解紅腫堅硬作痛者

柴胡

天花粉

乾葛

黃芩

桔梗

連翹

牛蒡子

石膏

甘草

各一分

升麻

三分

水二鍾煎八

拘蒺服

牛蒡甘桔湯

牛蒡甘桔湯升麻
如上一分食遠服

花粉黃連薑木陳
傷寒願毒書承牙

治隕毒表邪已盡耳項結腫微熱不紅疼痛者

牛蒡子

桔梗

陳皮

天花粉

黃連

川芎

赤芍

甘草

蘇木

各一錢

水二鍾煎八分食後服

如意金黃散

托裏消毒散

冲和膏

俱見鐘瘍門

補中

益氣湯

見清瘍門

痼發第四十一

痼發乃天時不正之氣感而發之非毒內作也此患多生於手足

掌心或腰腿臂下紳縮之處漫腫無頭憎寒發熱四肢沉重煩

渴為甚初起宜服萬靈丹發汗解表腫仍不消者必欲作膿托

裏消毒散兼蠟礬丸間服後法俱照癰疽潰瘍法推治為當

萬靈丹

托裏消毒散

蠟礬丸 俱見腫瘍門

癰疽第四十二

癰疽一名野疔川廣烟瘴地面有之初出先作紅點次變黑色腐爛筋骨小者如粟如豆大者如梅如李發無定處初用蟾酥餅膏貼患上寒熱交作者黍米寸金丹或飛龍奪命丹亦可紅腫遊走不定真君妙貼散加雄黃敷自然截住破後脾胃虛弱食少乾嘔者補中益氣湯加黃連麥冬補而不應腫高疼甚惟出清水穢汁者俱為不活症

飛龍奪命丹

即蟾酥元加金頭蜈蚣二條

黍木寸金丹

見腫

補中益氣丹 見潰

小腹癰第四十三

小腹癰乃七情火鬱以致脾虛氣滯而成其患小腹漫腫堅硬肉色不變者熱漸紅者屬陽易治無熱不紅者屬陰難治初起七日以前用艾當腫頂灸七壯膏蓋首尾內服健脾胃養氣血行經補托之劑可保終吉如誤用剋伐攻利涼藥者敗症必出十全大補湯倍加參芪薑附以救之內腐深陷者玉紅膏長肉收斂又補托不應者雖愈終久成漏

十全大補湯

玉紅膏

俱見潰瘍門

鵝口疽第四十四

鵝口疽乃三陰虧損督脈之經濁氣涇痰流結而成其患發在尾

間之穴高骨頭尖初起形似魚脰久則突如鶴嘴朝寒暮熱日
輕夜重潰後稀膿出而無禁又或鮮血出而不停凡發此者壯
年猶可老年為慮初起宜滋陰除濕湯和之已成未潰者和氣
養榮湯托之潰而不斂者滋腎保元湯補之久而成漏者琥珀
蠟礬丸兼先天大造丸服之甚妙

滋陰除濕湯

滋陰除濕湯知母
柴陳貝母兼澤瀉

白芍芍 牡熟地 芩
骨皮 甘草 效多 炙

治鶴口疽初起朝寒暮熱日輕夜重如瘡等症

川芎

當歸

白芍

熟地

各一錢

柴胡

黃芩

陳皮

知母

貝母

各六分

澤瀉

地骨皮

甘草

各五分

水二鍾薑三片煎入分食前服

和氣養榮湯

和氣養榮湯未芪丹皮甘草併沉香

參苓熟地黃陳皮當歸加之分外奇

治前症已成不得內消者宜此藥托之

人參 陳皮 白朮 黃芪 茯苓 丹皮

當歸 熟地 各一 沉香 甘草 各五分

水二鍾煎八分食前服

滋腎保元湯

滋腎保元湯杜仲歸苓黃肉併甘草

參芪朮附桂丹皮棗薑熟地不須屍

人參 黃芪 白朮 茯苓 歸身 桂仲 山萸肉

丹皮 熟地 各一 附子 肉桂 甘草 各五分

水二鍾薑三片棗二枚蓮肉七枚食前煎服

琥珀蠟礬丸

見腫瘍門

先天大造丸

見流注門

龍泉疽虎鬚毒第四十五

此二毒乃腎督二脉分合行佈驟被外邪所搏而成龍泉疽發在
人中之間虎鬚毒生於地角之上初起疙痞次生腫痛漸發寒
熱甚者惡心乾嘔腮項俱腫此穴忌灸初起宜線針挑破患頂
以蟾酥餅放上膏蓋使毒有門而泄四邊焮腫上如意金黃散
敷之內有表症者荆防敗毒散加芩連牛子裏症內疎黃連湯
已成欲其作膿芎歸內托散膿成脹痛者針之卽愈潰膿後只
宜膏藥換貼其口易完此症多生於元氣壯實者故多不必服

藥自愈

芎歸內托散

芎歸內托散陳皮
茯苓甘草銀花等

桔梗花粉與黃芪
虎毒龍泉服最宜

川芎 當歸 陳皮 茯苓 天花粉 桔梗

銀花 黃芪名一甘草五

水二鍾煎八分食後服

如意金黃散

丙疎黃連湯見腫瘍門

荆防敗毒散見時毒門

石榴疽第四十六

石榴疽者乃少陽相火與外濕相搏而成其患生在肘尖上一寸

是也初起一點黃粟小泡根便闊大色紅堅硬腫如覆碗皮破

涎出叠如榴子令人寒戰猶如重瘡初起卽灸九壯丙服蟾酥

丸發汗以解蘊毒灸頂上蟾酥餅貼之膏蓋焮腫處金黃散敷

之內服菊花清燥湯琥珀蠟攀丸煩躁熱甚者護心散金液成

外科正宗 卷之四

九

土丹九日後患上作膿稠黃痰苦稍減表裏症退飲食微進者可保無虞反此為逆潰後元氣虛弱雜症相兼者照癰疽調理

法治之

菊花清燥湯

菊花清燥湯生地
柴芩甘草片麻等

知貝芎歸地骨皮
犀角門冬白芍宜

甘菊二錢川芎

當歸

知母

貝母

白芍

生地

麥門冬

地骨皮

各一錢

升麻

犀角

甘草

柴胡

黃芩

各一錢

水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎入分食後服

蟾酥丸

見步

琥珀蠟礬丸

護心散

如意金黃散

俱見腫

金液戊土丹

見脫

穿踝疽第四十七

穿踝疽乃足三陰濕熱下流停滯而成初起內踝腫痛疼徹骨底
舉動艱辛甚則串及外踝通腫有頭者屬陽易破無頭者屬陰
難潰此二者初起必寒熱交作宜辨防敗毒散加生藤散之日
久膿成痛者針之腐而不斂孔大者玉紅膏培之形體虛弱者
補之此症若不早治久成廢疾

荆芥敗毒散 貝時 毒門

玉紅膏 見腫 瘍門

大麻風第四十八

大麻風症乃天地間異症也但感受不同有體虛之人因驟被陰
陽暴晒露霧風雨之氣所侵感之不覺木經發泄凝滯肌膚積

久必作又有房慾後體虛爲風邪所襲或露臥當風睡眠濕地
或洗浴乘涼希圖快意或風水所招世代留襲此等相感俱能
致之其患先從麻木不仁次發紅斑久則破爛淨腫無膿又謂
皮死麻木不仁肉死刀割不痛血死破爛流水筋死指節脫落
骨死鼻梁崩塌有此五症俱爲不治又曰心受之先損於目肝
受之面發紫泡脾受之遍身如癰肺受之耆毛先脫腎受之足
肉先穿又爲五敗症也總皆風濕相乘氣血凝滯表裏不和臟
腑痞塞陽火所變此其根蒂也初起麻木不仁肌肉未死者宜
萬靈丹洗浴發汗以散凝滯之風後服神應養真丹加白花蛇
等分久服自愈年久肌破肉死者先用必勝散疎通臟腑次服

萬靈丹每日酒化一丸通活血脈服至一月換服苦參丸輕若
十年重者一載漸愈或兼服酒藥忌戒房事厚未動風等件可
保終年不發矣

萬靈丹

見癰疽腫瘍門

治大麻風初起麻木不仁或既久皮膚破裂手足拳攣肢體不
便但未指脫足穿者並宜服之

必勝散

必勝散中用大黃表升砂糖調未服

白牽牛搗共粉霜管教患者漸安康

治大麻風血熱秘結臟腑不通宜用此藥利之

大黃

枳榔

白牽牛

各一錢

粉霜

一錢五分

右各為細末年壯者作五服中年久虛者作七服用生薑四兩

偏汁赤砂糖三錢加水一大杯三味和勻臨睡時腹中稍空頭
 温通口服之即睡至三更遍身麻木如針刺頭目齒縫俱痛此
 藥尋病之功已達行出大小二便或青白黑黃又或紅蟲之類
 此乃病根也一月內服藥三次漸痊猶髮俱生肌膚如舊齒縫
 有血宜漱後藥

漱藥方 漱藥方中有二般
水煎加入些冰片

貫眾黃連 貫眾黃連一處攪
止血川慈甚不女

貫眾黃連各三錢水二鍾煎至半血冰片少許每日陸續漱之
 其血自止兼忌動風油膩之物

苦參丸 苦參丸內藥多般
新久眩風諸症

品味雖將一一刑
將來久服日能安

治大麻風毋分新久穿破貴關老幼皆可服之

苦參斤

大風子兩

荆芥兩

防風

白芷兩

全蝎

何首烏

白附子

枸杞子

威靈仙

當歸

大胡麻

川芎

蒺藜

大皂角

川牛膝

牛蒡子

獨活各五兩

蔓荊子

風藤

羌活

連翹

蒼朮

天麻

杜仲

草烏泡去皮尖

甘草兩

人參兩

杏仁兩

白花蛇片

灸黃兩切

右藥其為細末醋打老米胡為丸梧桐子大每服三四十九溫

酒食前後任下避風忌口為妙

府風藥酒方

麻風酒膝此防壯

苦杞姜秦虎節隨

防風

當歸

虎骨

秦艽

羌活

苦參

牛膝

薑薑

松節 鱉甲 蒼朮 枸杞子 白茅根各兩 三萸麻子仁雨

用好雪酒二十五斤用藥袋盛浸酒內封壇口煮香二枝取起

水內浸一伏時取服數杯自效

雄硫散 雄硫散內鳳凰皮 桃內其和猪胆汁 出巾相兼滑石隨 眉手脫落擦之宜

治大麻風瘡毛鬚髮脫落作癢者宜此藥擦之

雄黃 硫黃 鳳凰 即雞雞殼燒黃 在性各五錢 穿山甲 十片 炒黃 滑石 兩

右各為細末用牛油核桃肉一兩搗爛同公猪膽汁一管宜前

藥和勻用青紗包藥擦之日用三次其髮漸生如舊

又擦麻風病面生紫塊疙瘩方用穿山甲灰炒川椒為末各二錢

生薑汁其大茵根二升調爛用包藥患上如久藥乾加水調藥

亦效忌動風發伏等件

翻花瘡第四十九

翻花者乃頭大而蒂小小者如豆大者若菌無苦無疼皆損每流
鮮血久亦虛人以津調水蠅散遍搽正面上川軟浦紙包裹根
蒂細處用線連紙扎緊十日後其患自落換珍珠散搽之收口
又有根蒂如驚頭棋子樣難扎以前藥搽上用麵糊綿紙封上
二重用心勿動亦以十日外落之搽珍珠散

水蠅散

見癩
瘡門

珍珠散

見下
疔門

腋癰第五十

腋癰俗稱夾癰此肝脾二經爲患肝經血滯脾經氣凝共結爲腫

初起皮色不變漫腫無頭日久方疼乃生寒熱此患難消終必
作之未破者柴胡清肝湯已破者十全大補湯去肉桂加香附
陳皮軟腫脹痛者針之膏貼但此症首尾溫補忌用寒涼也

柴胡清肝湯 見鬚
疔門

十全大補湯 見續
疔門

脇癰第五十一

脇癰多從鬱怒肝火者發之肥胖內實者鮮此症初起宜梔子清
肝湯柴胡清肝湯解鬱瀉火已成把裏消毒散加青皮香之作
已成即針之勿傷內膜已破後入珍湯加丹皮山萸澤瀉瀝滋
腎水又虛勞所得者破流臭水敗腐稀膿補托不應者死

把裏消毒散 見腫
疔門

梔子清肝湯

柴胡清肝湯 俱見
疔門

八珍湯 見潰瘍門

鼻痔第五十二

鼻痔者由肺氣不清風濕鬱滯而成鼻內瘰肉結如榴子漸大下垂閉塞孔竅使氣不得宣通內服辛夷清肺飲外以礪砂散遂日點之漸化為水乃愈兼節飲食斷厚味戒急暴省房慾愈後瘰不再發

辛夷清肺飲 辛夷清肺飲黃芩麥冬甘草與升麻

百合山梔知母稱石膏枇杷葉同一論

治肺熱鼻內瘰肉初如榴子口後漸大閉塞孔竅氣不宜通者服之

辛夷 六分

黃芩

山梔

麥門冬

百合

石膏

知母各一錢 甘草五分 枇杷葉三片 去毛 升麻三分

右水二鍾煎八分食後服

礪砂散 礪砂散內用雄黃 水片再加輕粉良 能消瘰肉自然光

治鼻生瘰肉初如榴子漸大下垂名為鼻痔也

礪砂錢一 輕粉三分 水片五厘 雄黃三分

右其為末用草桔咬毛醮藥勤點痔上日用五六次自然漸化為水而愈

取鼻痔秘法先用回香豆散連吹二次次用細銅筋二根筋頭鑽

一小孔用絲線穿孔內二筋相離五分許以二筋頭直入鼻痔

根上將筋線絞緊向下一扳其痔自然扳落置水中觀其大小

用頭胎髮燒灰同象牙末等分吹鼻因其血自止戒口不發

同香草散

同香草散有奇功為末共吹鼻痔上

加上良薑二味同猶如荆芥一時通

同香草高良薑晒乾等分為末用此先吹鼻痔上二次片時許隨後方行取法其痔自然易脫

骨槽風第五十三

骨槽風初起生於耳前連及腮項痛隱筋骨久則漸漸漫腫寒熱

如瘡牙閉緊閉不能進食此得於鬱怒傷肝致筋骨緊急息慮

傷脾致肌肉腐爛膏梁厚味致膿多臭穢初則堅硬難消久則

瘡口難合初宜艾灸腫項及耳垂下五分各灸七壯膏貼以泄

內毒真君妙貼散敷腫上牙閉內腫用線針刺去惡血水礪散

搽之使內外毒氣得解宜服降火化痰清熱消腫之劑潰後當

托裏藥中加麥冬五味外腐者玉紅膏使水昇火降脾健全清

乃愈又有外腐不合虛熱不退堅腫不消形焦體削者死

清陽散火湯

清陽散火湯翹苓石膏甘草共煎

白芷升麻牛蒡連翹加上蒺藜成

升麻 白芷 黃芩 牛蒡子 連翹 石膏 防風

當歸 荆芥 白蒺藜

各一分 甘草 五分

水二鍾煎八分食後服

中和湯

中和白芍朴芎歸枯梗肉桂助風等

甘草參芪白芷宜藿香姜棗效聖題

治前症已經穿潰洗膿臭穢疼痛不止者服之

人參 黃芪 白朮 白芷 川芎 當歸 甘草

桔梗 白芍各一錢 肉桂 麥冬 藿香各五分

戊二鍾薑三片棗二枚臨服入酒一杯食後服

應用方

真君妙貼散

玉紅膏俱見腫瘍門

水礪散見喉門

紫白癜風第五十四

紫白癜風乃一體二種紫因血滯白因氣滯總由熱體風濕所侵

凝滯毛孔氣血不行所致此皆從外來矣初起毛竅閉而體強

者宜萬靈丹以汗散之次以胡麻丸常服外用蜜陀僧散搽擦

亦可得愈

胡麻丸胡麻丸內用防風苦參獨活石菖蒲

日附威靈甘草同
癩風赤白效神功

治初起皮膚作癢後發癢風漸生開大者

大胡麻兩四 防風 威靈仙 石菖蒲 苦參各一兩

白附子 獨活各一兩 甘草五錢

右為細末新安酒漿浸九桐子大每服二錢形瘦者一錢五分

食後臨臥白滾湯送下忌動風發物海腥煎炒鷄鵝羊肉火酒

等件愈後戒百日

雌雄四黃散雌雄散用石硫黃 川槿皮同白附當 加上雌雄黃為末 管教癩症一時光

治紫白癩風皮膚作癢日漸開大宜用此搽之

石黃 雄黃 硫黃 白附子 雌黃 川槿皮各等分

右為細末新安酒漿浸九桐子大每服二錢形瘦者一錢五分

開藥擦之擦後三日忌下湯水戒鷄鵝牛羊煎炒海腥等物
等不復發

又方 蜜陀僧散 見門

白燬紫癩一般風 雄黃硃砂等分同 茄蒂端來擦患處

不消三日有神功 白茄蛇殼同來擦 管教前患永無踪

肥皂方 一風酒刺窠班方 肥皂甘松山奈燕

皂角 甘松 山奈 白芷 各二錢 蜜陀僧 白附子

樟腦 各一錢 楮實子 藜豆粉 各三錢 右為細末用去淨皮駭肥

齒病第五十五 皂一筋搥勻法擦患上日久自效

齒病者有風有火亦有陽明濕熱俱能致之風痛者遇風發作浮

腫隨後生痛以消風散治之火痛者則齒根必掙扯腮顴陣陣
作痛時發時止以水礪散擦之出涎自愈湯明經溼熱作痛者
其患腮顴浮腫甚者牽引太陽疼連頰頤口中熱氣大便結燥
當宜涼膈散加石膏治之又腫高軟者內必有膿用針刺破出
膿自愈有齒齦腐爛出血不止者內服犀角地黄湯外搽人中
白散又小兒鑽齒疳牙根尖穿出齒根內外芒刺嘴唇作痛用
披針挑破牙齦以手取去木牙出血不止以濕紙換貼二三次
其血自止必兼戒厚味其牙復生如舊

涼膈散

涼膈散中用石膏
黃芩甘草淡竹葉

山苑薄荷其連翹
大黃加之功莫逃

台陽明經熱上攻攻牙根濕頰作腫多痛者

連翹

山梔黃芩

薄荷

甘草五分

大黃錢

朴硝一錢五分

石膏一錢五分

淡竹葉三十片

右水二鍾煎八分入蜜三匙和勻食遠服

清中散

清中散內有丹皮升麻遠與山桃子

生地黃連甘草歸胃經積熱效堪推

治胃經積熱牙齒或牙齦腫痛或牽引頭腦作痛或面熱耳紅

並皆治之

當歸

黃連

生地

山梔

各一錢

牡丹皮

六分

升麻

八分

甘草

五分

右水二鍾煎八分食遠服

華撥散

華撥散中真阿魏蟲牙風痛皆甚

麝香水片共相依官教頃刻樂嘻噫

治風濕蟲牙作腫疼痛如陽明內熱作疼勿用

外科正宗

卷之四

葶撥

真阿魏

各二錢

水片

麝香

各一錢

右為細末每用半豆許擦放牙根痛縫中吐法熱涎溫湯漱之

再搽即愈內有阿魏恐防作吐

又牙疼方

牙疼方中君葶撥飛鹽加人同來點

蟾酥酒化與川椒諸般牙痛一時消

葶撥

錢一

蟾酥

分二

川椒

分五

右共為末用草枯咬毛蘸藥擦點痛牙根上妙

犀角地黄湯

犀角地黄湯芍藥陽明積熱皆堪服

夏兼一味牡丹皮止血還須用此醫

治陽明積熱牙齦腐爛出血不止及諸吐血衄血嘔血通治之

犀角

錢

生地

白芍

牡丹皮

各等分

每五錢水二鍾煎八分不拘時服面色痿黃大便黑者更宜服

之又牙縫中無辜出血者亦妙

止血四生湯

止血四生湯荷葉
用水同煎飲一鍾

生艾側柏地黃列
諸般血症登時歇

生荷葉

生艾

生栢葉

生地黃

各三錢

水二鍾煎一鍾食後溫服臨服入童便一杯更妙

中白散

見口
疔門

消風散

見疥
瘡門

腦漏第五十六

腦漏者又名鼻淵總因風寒凝入腦戶與太陽濕熱交蒸乃成其

患鼻流濁涕或流黃水點七滴七長濕無乾久則頭眩虛暈不

已治以藿香湯主之天麻餅子調之亦可漸愈如日久虛眩不

已內服補中益氣湯六味地黃丸相間服之以滋化原始愈

奇受藿香湯

元來奇受藿香湯
鼻淵腦漏皆堪美

猪胆同功效莫量
不過三服永無殊

治鼻淵黃水濁涕長流致腦戶虛眩不已用藿香連枝奇葉者

五錢水一碗煎七分加公猪膽汁一枚和勻食後通口服之至

重者不過三服如此藥若甚不堪服用藿香末一二兩公猪膽汁

熬稠膏為丸每服二錢食後白滾湯送下亦效

應用方

補中益氣湯

六味地黃丸

俱見遺
傷門

天麻餅子

見頭
疼門

破傷風第五十七

破傷風因皮肉損破腹被外風襲入經絡漸傳入表其患寒熱交

作口噤咬牙角弓反張口吐涎沫入陰則身涼自汗傷處反為

平陷地取其毒內收矣當用萬靈丹發汗令風邪反出次以三
真散患上貼之得膿爲效如汗後前症不退傷處不高漸醒漸
昏時發時止口禁不開語聲不出者終爲死候

玉真散

玉兼散內用南星
還加八麻白附子

白芷防風羌活靈
破傷風症奏效寧

治破傷風牙關緊急角弓反張甚則咬牙縮舌

南星 防風 白芷 天麻 羌活 白附子 各等分

右爲末每服二錢熱酒一錢調服更敷傷處若牙關緊急腰背
反張者每服三錢用熱童便調服雖內有瘀血亦愈至於昏死
心腹尚溫者連進二服亦可保全若治風犬咬傷更用漱口水
洗淨搽傷處亦效

萬靈丹 見腫瘍門

治破傷風牙關緊急角弓反張時昏時止者服

鎮風散 鎮風散用焙鱈膠每服二錢和熱酒

杭粉硃砂礬末調破傷風症自逍遙

治破傷風諸藥不效事在危急者用之必應也

鱈膠 切煨微焙 杭粉 焙黃 皂礬 各一兩炒紅色 硃砂 三錢另研

右為細末每服二錢無灰熱酒調服一切猪羊等風發之昏倒不醒人事者每服三錢二服即愈不發外灸傷處七壯知疼痛乃為吉兆

跌撲第五十八

跌撲者有已破未破之分亡血瘀血之政且如從高墜墜而未

損破破肉者必有瘀血流注臟腑人必昏沉不醒二便必難當
以大成湯通利二便其人自甦不醒獨參湯救之尋常墜墮輕
者以復元活血調湯之又損傷骨節筋斷血流不止獨勝散止
之次凡花蕊石散搽之又有跌斷骨節大損等症此則另有專
門接骨扎縛未及詳註也

大成湯

大成湯內朴硝黃
陳皮厚朴紅花等

蘇木當歸甘草良
木通枳殼其煎嘗

治跌撲傷損或從高墜下以致瘀血流入臟腑昏沉不醒大小
便秘及木朴後瘀血內攻肚腹膨脹結胸不食惡心乾嘔大便
燥結並服之

陳皮 當歸 蘇木 木通 紅花 厚朴 甘草

錢各一

枳殼錢二
大黃錢三
朴硝錢二

石水一碗煎八分不拘時服服後一時不行渣再煎臥服白

蜜三匙亦妙

調中二陳湯

調中二陳湯防風
若為青皮紫蘇實

蘇木歸芪烏藥甘
檳榔木香紅花阿

治前症已服行藥之後當進此藥二三服調之

陳皮 半夏 茯苓 甘草 紅花 川芎 當歸

白芍各八分 防風 檳榔 黃芪 桔梗 青皮 烏藥

蘇木 枳實 黃芩 紫蘇各六分 木香分三

右水二鍾薑三片棗二枚煎八分不拘時服

獨參湯 獨參湯力最其功
此沉不醒人事者

跌難金瘡血不充
惟之入腹起肢腎

此藥損傷或全瘡出血過多昏沉不醒者服人參一兩

水二碗煎一牛不拘時服之渣再煎服其人自甦再用

加川米一合煎湯溫服

花蕊石散

花蕊石散麝檀香
羌龍白芷蛇含石

乳沒辛蘇烏朴當
木降香南星粉霜

治跌撲傷損及金瘡刀箭兵刃所傷斷筋損骨疼痛不止新
不生者並效

乳香 沒藥 羌活 紫蘇 細辛 草烏 蛇含石

厚朴 白芷 降香 當歸 蘇朮 檀香 龍骨 南星

輕粉 銘二麝香 分花蕊 童便煨七
次五錢

右共研極細確收聽用葱湯洗淨用此藥之軟桐紙蓋扎一日

一換神效此藥一時未備可用多骨疽門生肌散代之暫用亦

可取效

玉紅膏 見腫瘍門

治跌撲損傷或金瘡斷損筋骨已經血止疼痛作膿宜用此膏
烈湯洗淨日搽傷處黑膏蓋之

金瘡第五十九

金瘡乃刀刃所傷或有磁鋒割損淺者皮破血流而已深者筋斷
血飛不任皮破者桃花散搽之其血自止筋斷者如黑金刀散
搽托止復又流者此症急用玉紅膏塗傷處膏蓋長肉蓋筋骨

肉力斷新入面色必青外道風寒內忌冷物冬尿無妨有失血

過多者獨參湯入珍湯補助爲要此無外法矣

如聖金刀散

如聖金刀散三礬刃傷損破肌流血

松香細末共加參搽上應知效不難

治刀刃所傷皮被筋斷飛血不止者用松香淨末七兩枯礬

礬各一兩五錢共爲極細末確密收參傷處紙蓋絹扎止俟三

四日後必歎痛作膿換搽生肌散三日三次其疼即止以後三

用葱湯洗之搽玉紅膏長肉生肌避風爲要

桃花散

桃花散是治金瘡止血消瘀肌肉長

須用石灰與大黃慎宜房事刑無妨

治金瘡出血不止用石灰半升同大黃一兩五錢切片同炒石

灰變紅色爲度去大黃篩細搽損上紙蓋絹扎止血後用葱傷

洗淨換搽玉紅膏長肌收斂兼戒口味房事爲要

獨參湯

見跌撲門

入珍湯

見潰瘍門

杖瘡第六十

杖瘡乃良肉受傷之患有已破未破之分正刑酷刑之說已破脫肉者隨杖後以清涼拈痛膏敷之疼腫即消未破瘀血內攻者用針放出內蓄瘀血再以大成湯下之便通自愈如傷處瘀腐已作疼痛者玉紅膏搽之自然癩化生新而愈至於辱刑重刑難受之時宜預服鐵布衫丸方得保身全命也

鐵布衫丸

鐵布衫丸乳沒舖木驚再加無各異

地龍蘇木自然隨救蓋人間苦杖危

治情不由已事出不虞受害一身重刑難免當預服之受刑不

痛亦且保命

自然銅煨七次 當歸根膏 無名異淨土 乳香

木鱉子香油搽殼上 沒梁地龍去頭 蘇木

右人味各等分為細末煉蜜丸如雞頭實大每服三丸預用白

湯送下縱非刑於拷可保無虞

散瘀拈痛膏散瘀止痛膏萃 麻油石灰水共齊

治杖後皮肉損破紅紫青班嫩腫疼痛重墜者用腫瘍門如意

金黃散一兩加樟木三錢碾勻以白石灰一升用水二碗和勻

候一時許用灰上面清水傾入碗內加麻油對分和水以竹節

攪百轉自成稠膏調前藥稀稠得所聽用杖後帶血不用湯洗

將藥通便敷之紙蓋布扎夏月一日冬月二日方用葱湯淋洗

乾淨仍再敷之痛止腫消青紫即退傷重者另搽玉紅膏完口

又方杖刑之後肉不破
將針點破膿血流

瘀血攻疼沒門路
管教患者隨行步

大成湯見路
撲門

治杖後瘀血內攻吐腹膨脹惡心便秘者服之

珍珠散見下
疔門

治杖瘡已經長肉平滿惟不生皮用此搽即愈

湯潑火燒第六十一

湯潑火燒此患原無肉症皆從外來也有湯火熱極逼毒肉攻又

有外傷寒涼極毒入裏外皮損爛者以清涼膏粟殼膏塗之毒

氣入裏煩躁口乾二便秘澁者四順清涼飲下之危破珍珠散

疹之自愈

四順清涼飲 四順清涼飲赤芍
當歸甘草山梔等

防風羌活其連翹
大黃加上熱俱消

治湯發火燒熱極逼毒入裏或外被涼水所灌火毒內攻致生
煩躁內熱口乾大便秘實者服

連翹 赤芍 羌活 防風 當歸 山梔

甘草 各一錢 大黃 炒二錢

右水二鍾燈心二十根煎人分食遠服

嬰粟膏 嬰粟膏醫湯人燒
將凝加上真恒粉 麻油白蠟共煎
塗於患上扁隨消

治湯發火燒皮肉損爛疼苦焮熱起泡流水者麻油四兩嬰粟

花十五朵無花以殼代之浸油內前枯瀝清將油再入杓內下

白蠟三錢熬化傾入礮內待四邊將凝時下真輕粉細末二錢攪勻水內頓冷取起臨用將泡挑破用抵膠挑膏手心中擦化搽患上軟綿紙蓋扎日換二次其疼即止次日將軟綿絕淨腐皮再搽之自愈

珍珠散 見下

治湯潑火燒腐皮已盡疼痛已止用此摻即愈前杖瘡門中石灰水調麻油成膏即清涼膏也搽湯潑火燒亦效

甲宜第六十二

甲疽者或因甲長侵肌又因修甲損傷良肉靴鞋窄小俱易生之

其患為肉裏上指甲腫痛異常難於步履初宜三品一條鎗熱

肉上化盡自愈日久肉堅硬須冰蠶散化之後用珍珠散

搽上必瘥

三品一條鎗

見瘡門

珍珠散

見下瘡門

蘭昏第六十三

蘭昏乃陽明胃經症也因食煎炒過食灸燻又兼思慮暴急痰隨火行留注於昏初結似豆漸大若蠱蘭突腫堅硬甚則作痛攻食妨礙或破血流久則變為消渴消中難治之症初起及已成無內症若用麻子大艾炷灸三壯貼蟾酥餅膏蓋日久漸消內症作渴者早服加減入味丸午服清涼甘露飲以滋化源日久流血不止形体瘦弱虛熱痰生面色驚黑腮頰紅現口乾渴甚

者俱為不治之症也

清涼甘露飲

清涼甘露飲柴芩石斛枳殼甘生地

麥冬犀角共茵陳知母枳殼葉須等

治齒唇膏梁所釀暴怒所結遂成斯疾高突堅硬或損破流血

成虛熱生痰或渴症久作並治

犀角 銀柴胡 茵陳 石斛 枳殼 麥門冬

甘草 生地 黃芩 知母 枇杷葉各二錢

水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎六分食後服

加減入味丸見潰瘍門

蟾酥餅見疔瘡門

瘡癤第六十一

瘡癤皆緣內傷過度氣血黃道結聚而生初起腹中覺有小塊至

動牽引作疾久則漸大或升甚者翕七而動斯時必氣血衰身

飲食感少內服阿魏化痞散外貼乾坤一氣膏祛邪養正氣攻

補自食安

阿魏化痞散 阿魏化痞散芍歸 喬迺大黃在驚甲

白朮紅花赤茯苓 空心還用酒調宜

川芎 當歸 白朮 赤茯苓 紅花 阿魏

驚甲尖 研炙研 各一錢 大黃 酒炒 八錢 蕎麥麩 一兩

右共為末每服三錢空心好酒一茶鍾調稀服三日後腹痛便

出膿血為驗忌生冷脾胃章等件

乾坤一氣膏 一氣膏歸並附破 亦白芍元生熟地 蘇巴達甲續靈脂 桂阿米驚麩沒乳

此膏專治痞疾毋論新久立效又治諸風癱瘓濕痰流注各樣

急瘡百般怪症男子夜夢遺精婦人赤白帶下又男女精寒血冷久無嗣息者並貼之

當歸 白附子 赤芍 白芍 白芷 生地

熟地 穿山甲 木鱉肉 巴豆仁 身麻仁 三稜

蓬朮 五靈脂 續斷 肉桂 元參各兩 乳香

沒藥各一兩 麝香三錢 真阿魏二兩切薄

右咀片用香油五觔存下四呷餘皆人油浸春三夏五秋七冬十期舉桑柴火熬至葉枯細絹濾清每淨油一觔入飛丹十二兩將油入鍋內下丹槐枝攪攘其膏候成端不鍋來用水盆坐

急斬下阿魏化已盡方下乳沒麝香再攪勻乘熱傾入磁

確內分三處盛之隨用湯中頓化痞病紅煨攤貼餘病按法

下攤之有腫者對患貼之男子遺精婦人白帶俱貼丹田諸風

攤癩貼腎俞穴並效

天蛇毒第六十五

天蛇毒一名蛇頭疔也乃心火旺動攻注而成其患指大腫若蛇

頭赫腫焮痛疼及連心甚者寒熱交作腫痛延上腫頂上小艾

炙五壯以雄黃散塗之內服蟾酥丸發汗解毒輕者漸消重者

潰膿甚則腐爛破後腫仍不消者以蟾酥條插入孔內膏蓋自

效腐爛者玉紅膏擦之虛而不斂者兼服補劑

雄黃散雄黃散內用醃酥
四味同來為細末

水片還將輕粉和
水調患處口三塗

治天蛇毒初起紅腫發熱疼痛徹心者宜用之

雄黃明亮者 蟾酥二分 冰片一分 輕粉五分

共為細末新汲水調塗紙蓋日用三次極效

琥酥丸見疥瘡門

王紅膏見腫瘍門

頭痛第六十六

頭痛者風火淫痰四者皆能致之又楊梅瘡毒上攻亦有此症或婦人產後梳洗富風太早亦致之名曰頭風宜用後方毋論病之新久受之真似並效

天府餅子天麻餅子草川烏薄荷細辛松日附

芎藭甘防蒼朮呼雄黃全蝎一同途

相清相風火濕痰上攻及楊梅瘡毒所致兼治頭目昏眩

疥癩疹及治婦人頭風作痛眉稜骨寒牙齒腫痛痰逆惡心京
並皆治之

天麻 草烏湯炮 川芎 細辛 葶朮 甘草

川烏湯炮 薄荷 甘松 防風 白附子去皮

白芷各五 雄黃 全蝎各三

右爲細末寒食麩打糊搗稠如寒豆大捻作餅子每服二三十
餅食後細嚼葱頭湯送下屬火熱痰痛茶湯下甚者日進一甚

忌諸發物

聖散三聖散用開場花

紅檀榴花總一家
頭風偏止染無淮

治男婦頭痛不論偏正新久但夏月欲重綿包裹者並效

開楊花淨未

檣樹花淨未

大楓子用肉去油五分

共研每服六分葱酒調服洗浴發汗自愈

合谷毒第六十七

合谷并俗稱虎口百了也此毒多有疔瘡泡起亦有紅絲走上故有疔名之稱此乎陽明胃經濕毒攻注作癢或熱癢疼初起挑破貼蟾酥餅膏蓋金黃散敷之三日必腫聚必欲作膿搗膏貼之吹腫脹痛者膿已成針之即愈腫甚寒熱者必內外消托

金黃散見腫瘍門

蟾酥見疔瘡門

鼻中出血乃肺經火旺逼血妄行而清鼻竅出也外用紫土散敷

顯頂上丙服羚羊清肺湯亦可自止

羚羊清肺湯

羚羊清肺湯柴芍元地芍歸石膏等

甘藕蒲黃地骨皮板連蘆薈白茅宜

治鼻中無故出血不止及尋常吐血咳血並效

羚羊角

鑄黃連

銀柴胡

元參

石膏

川芎

當歸身

白芍

生地

蒲黃

地骨皮

山梔

各一

蘆薈

甘草

各五分

藕節

白茅根

四兩搗汁用水一棧和絞去渣

用茅根汁一大碗煎七分人童便一杯食後服

紫土散

紫土散須從治法將藥敷於顯頂上

更兼火酒要調稠自然血止不相流

治鼻中無辜出血不止用筒銀煉土新確碾細以火酒調敷顯

門士其血自止此從治之法也

牙縫出血陽明胃經實火上攻而後出也又有胃虛火動腐爛牙根

以生火淡巨常常滲流不已實火清胃散棟果葵塞之虛火蘆薈

夫以中白散服搽自愈

清胃

本清胃散中用石膏
口丹皮加上升麻好

葵塞生地不相饒
陽明胃熱即時消

治胃經有熱牙齒取牙根作腫出血不止並效

黃芩 黃連 生地 丹皮 升麻 石膏

水二八王八分食後服

外果棗治陽明胃經實火已咬血從牙縫流出用棟樹果一箇連

舊醫九

人中白散 見口疳門

血箭血痣第七十

血箭出於心經火盛逼血從毛竅出也血痣由於肝經怒火鬱結其形初起色紅如痣漸大如豆指之血流治血箭以桃花散涼水調敷或金墨塗擦自止血痣須用水蠅散枯去本痣以珍珠散搽之生皮乃愈血甚者內服涼血地黃湯兼戒日味如痊

涼血地黃湯

涼血地黃湯黃連加上元參功更效

常歸甘草山梔全無毒出血即時痊

治血箭血痣內熱甚而逼血妄行出血如飛者

黃連

當歸

生地

山梔

元參

甘草

各等分

水二鍾，六分量，病上下服之。

桃花散

見跌撲門

水蠲散

見瘰癧門

珍珠散

見下疳門

鵝掌風第七十一

鵝掌風由足陽明胃經火熱血燥外受寒涼所凝致皮枯槁又或時癢餘毒未盡亦能致此初起紫斑白點久則皮膚枯厚破裂不已。一礬湯薰洗即愈。

一礬湯

一礬湯中白皂礬先薰後洗油燭照

見茶栢葉在其間鵝掌風痛愈不燥

治鵝掌風皮膚枯厚破裂作痛宜用此湯薰洗輕則不宜越重

越效

白礬

皂礬

各四兩

孩兒茶

五錢

栢葉

半斤

用水十碗同上藥四味煎數滾候用先用桐油搽抹患上以桐油蘸紙撚點著以烟焰向患上薰之危時方將煎湯乘熱將紙桶內手架上用布蓋以湯氣薰之勿令泄氣待微熱傾入盆內薰洗良久一次可愈七日忌下湯水永不再發

腎囊風第七十二

腎囊風乃肝經風濕而成其患作癢善浴熱湯甚者疙瘩頑麻破

流脂水宜蛇床子湯薰洗二次即愈

蛇床子湯

蛇床子湯當歸尾何水同煎薰患處

苦參片加威靈仙腎囊風痒得安然

治腎囊風濕熱為患疙瘩作癢搔之作疼宜洗

蛇床子

當歸尾

威靈仙

苦參

各五錢

外科正宗 卷之四
水五碗煎數滾入盆內先薰待溫浸洗二次愈

狼毒膏

狼毒膏中用大楓
川椒床子硫猪胆

檳榔五倍子相同
油沸投硝一處充

治症同前

狼毒

檳榔

硫黃

五倍子

川椒

楓子肉

蛇床子

各三錢

右爲末用香油一大杯煎滾入皮硝三錢再煎滾次下公猪膽

汁一和勻調前藥搽患上此藥諸癢瘡用之並效

疥瘡論第七十三

夫疥者微芒之疾也發之令人搔手不閑但不知其何以生者瘡

曰吾不根而生無母而成乃稟陰陽氣有濕熱化形常列於

侯華上何如土燄之身可使文人也筆端女停針母牙黃發一
劍施行醫問曰不生於身獨攻於手者又何也疥曰手掌力大
陰涇土所主手心又少陽相火所司土能生我火能化我此生
皆賴涇土陽火所化故生者必自出於手掌醫曰然哉但其形
知動而不知靜能進而不能退自非清氣所化也又脾主滲納
胃主傳化人之飲食未有不從厚味者厚味之中濕熱並化致
生此瘡又清氣隨脉循行濁氣留滯不散停留肌膚積日不解
隨後生熱發癢故癢熱之中濕火混化爲蟲形隨濕化動隨火
化此無情而之有情也既化之後潛隱皮膚展轉攻行發癢鑽
刺化化生化傳遍肢體近則變爲疥癬久則變成頑風多致皮

膚枯槁浸淫血脈搔癢無度得湯方解外以綉球丸搽擦堪爲
止癢殺蟲內服消風散亦可散風涼血必得兼戒口味辛熱莫
殿忌洗熱湯其煩自脫此爲小恙不當陳說爾中之言噫筆而

曰

消風散

消風散內歸生地
胡麻知母牛蒡子

蟬脫荆防蒼苦參
石膏甘草木通行

治風濕浸淫血脈致生癢疥搔癢不絕及大人小兒風熱癩
遍身雲片斑點有有無並效

當歸

生地

防風

蟬蛻

知母

苦參

胡麻

荆芥

蒼朮

牛蒡子

石膏

各一

甘草

木通

各五

水二鍾煎八分食遠服

當歸飲子

當歸飲子芍芍茂甘草何首烏荆芥

生地防風白茯苓諸風瘡痺服之宜

治血燥皮膚作癢及風熱瘡疥搔癢或作疼痛

當歸 川芎 白芍 生地 防風 白茯苓

荆芥 何首烏 各一 黃芪 甘草 各五

水二鍾煎八分食遠服

綉毬丸

綉毬丸內用樟水雄黃脂罌桐子肉

輕粉川椒共水銀諸瘡痒疥擦安

治一切乾濕疥瘡及膿窠爛瘡癢無度者效

樟水 輕粉 川椒 枯礬 水銀

雄黃 各二 楓子肉 一百枚

以上其爲細末同大楓子肉再碾和勻加栢油一兩化開和菜攪勻作丸圓眼大於瘡上擦之

諸瘡一掃光

諸瘡一掃光硫栢水銀楓子樟水等

木鱉味椒砒苦參烟膠栢自礬輕粉

此藥凡治癢瘡不論新久及身上下或乾或濕異類殊形但多癢少痛者並宜用之俱名有效

苦參

黃柏

各一斤

烟膠

升

木鱉肉

蛇床子

點紅椒

明礬

硫黃

楓子肉

樟水

水銀

輕粉

各三兩

白砒

五錢

共爲細末熟豬油二觔四兩化開入藥攪勻作丸龍眼大磁瓶

收貯用時搽擦患上次即愈

洗癩瘡方
洗用糠方以二瓶
河水煎湯頓沐浴

苦參猪膽共相攪
管教諸痒卽當安

苦參半觔切片用河水三四瓢煎藥數滾
水二瓢住火片時
濾去渣臨洗和公猪膽汁四五枚攪勻
淋洗癢上三日一洗三
次亦可痊愈

癩瘡論第七十四

癩瘡者風熱濕毒相聚而成有新久之別
內外之殊新者只用三香膏乳香法紙貼之
自愈稍久紫黑者以解毒紫金膏搽扎漸
可又年久頑癩皮肉烏黑下陷臭穢不堪者
用蜈蚣蝮法去風毒化癩腐方可得愈
外癩多服四生丸內癩多服腎氣丸妙

三香膏

三香膏內乳松香
葱湯薰洗方貼扎

輕粉油調紙內藏
何拘新久爛癩瘡

三番臙初起多疼少癢未經受風紫黑者宜用

乳香

松香

控粉

各等

右為細末香油調稠用夾紙一面以針密刺細孔將藥夾搽紙
內先以葱湯洗淨將紙有孔一面對瘡貼之三日一換自效忌
房事煎炒

乳香法紙

乳香法紙有奇功
功在控粉相協力

疼痛臙瘡欲此逢
三朝一換笑顏濃

治臙瘡作痛不愈先用乳香碾細末一兩聽用以呈文油紙

張每紙一張攤平篩乳香末二錢五分勻篩紙上雙折捲一

潤將捲紙復作三折兩頭以線扎之用甘草一兩二錢水三碗

將捲過藥紙浸入甘草湯內上用重物壓之煮數滾取起紙來

削去扎線將紙攤開桌上每張用輕粉三錢摻乳香上用棕糊
刷排刷相勻提起藥紙帶濕以無藥一面對板壁上貼之陰乾
收用臨時隨患大小剪紙多少先用溫湯洗瘡隨將紙有藥一
面對瘡貼之絹扎三日一換自然止痛生肌如貼後內無水出
不必換貼自愈

蜈蚣錢

蜈蚣錢治久頑癩
甘草加上同熬就

獨活桐油白芷煎
傾入瘡中黑腐痊

治癩瘡多年黑腐臭爛作疼諸藥不效者用桐油二兩獨活白

芷甘草蜈蚣各一錢入油內煎滾先將癩上洗淨用白麵水調

作圈圍在瘡之四邊母令泄氣走油將腳放平以茶匙挑油漸

漸乘熱加滿待油溫取去已後腐肉風毒自然脫下用解毒紫

金膏搽上紙蓋絹扎三日一換

解毒紫金膏 見結毒門

治臙瘡母論新久及頑瘡年久不用者並用之

四生丸

四生丸療久臙瘡地龍白附薑蚕等

骨節多疼舉動妨草烏靈脂莫相忘

治外臙血風頑瘡骨節疼痛不能舉動或行步不前或渾身疼

癢或麻痺不仁或生斑並效

地龍 去土

薑蚕 炒去絲

白附子

五靈脂

草烏

去皮尖炮各等分

右為細末米糊丸桐子大每服三四十九丸食前茶酒任下

腎氣丸

見肺癰門

血風瘡第七十五

血風癩乃風熱濕熱血毒三者交感而生所則搔癢無與不流
水自漸沿開甚者內服消風散加牛膝黃柏外搽解行不黃散
或如意金黃散俱可敷之如年久紫黑堅硬氣血不行者川
砒去黑血以神燈照法薰之以解鬱毒次以前藥敷之方效
解毒雄黃散

治風濕流注腿腳致生血風頑瘡紫黑癢癢者

雄黃兩 硫黃兩

右二味共碾細末栢油調搽紙蓋之三日一換

如意金黃散

見腫瘍門

治症同前用公猪膽汁調稠敷患上油紙蓋花勿動待其目

脫後色紅再敷之以色白爲度

神燈照法

見腫瘍門

治年久紫黑血風頑瘡流水作癢不絕先用葱湯洗淨患上點火以燈焰薰之每薰二搥爲度

涼血消風散

見疥瘡門

頑癬第七十六

頑癬乃風熱淫蟲四者爲患發之大小圓斜不一乾濕新久之批風癬如雲朶皮膚嬌嫩抓之則起白屑濕癬如蟲形搔之則有汁出頑癬抓之則主然不痛牛皮癬如牛項之皮頑硬且堅抓之始朽禾馬皮癬微癢白點相連向皮癬白斑相簇此等諸症

引取汗發散久者服首烏丸蠟礬丸外擦土大黃膏用椶皮散選而用之亦可漸效

引取汗發散久者服首烏丸蠟礬丸外擦土大黃膏用椶皮散選而用之亦可漸效

土大黃膏上大黃膏用白礬川椒三味研成末

硫黃八兩共加參頭癩搽之效不難

治乾涇頑癬不論新久但皮膚頑厚串走不定惟癢不痛者

硫黃八兩

生礬四兩

點紅川椒二兩

若各末用土大黃根搗汁和前藥調成膏碗貯新癬抓損擦之

多年頑癬加醋和擦如日久藥乾以醋調搽牛皮癬用穿山甲抓損擦妙

頑癬必效方頑癬必效川地皮

輕粉雄黃巴豆宜陰陽水和海狗皮

治多年頑癬諸藥薰擦搽洗不效者用之即愈

川槿皮四兩輕粉

雄黃各四錢

百藥煎四錢五倍全用一錢

外科正宗

巴豆去油 錢五分
大黃二兩
海桐皮二兩

右為極細末用陰陽水調搗敷藥必待自落

又頑癬方頑癬方中川權皮再加七個楓子肉
玃猶輕粉各相宜新筆塗將患處醫

川權皮錢一分
斑蝥七個
大楓子七個

河井水共一鍾煎一半露一宿筆蘸塗之

頑癬浮萍丸浮萍丸內用蒼耳草蒼赤黃芩共替參酒丸服下可回春

紫背浮萍 蒼朮 蒼耳草各二兩 元參四兩

黃芩 蒼朮各一兩 釣藤一兩 蒼耳草二兩

共為末酒煨丸白滾湯每服二錢隨病上下服

膿窠第七十七

膿窠瘡乃肺經右執腕經右緣一氣交感其患先從水泡作癢後

變膿泡作疼所成膿窠瘡也甚者清熱散風涼血除溼治之涼

血清風散是也外以蛇床子散或諸瘡一掃光搽之亦效兼戒口味自愈

蛇床子散

蛇床子散用黃丹大黃加上松香末

輕粉枯礬楓肉良麻組調治溼膿瘡

治膿窠瘡生於手足遍身根硬作膿癢痛非常

蛇床子

大風子

肉松香

枯礬

各一

黃丹

大黃

各五錢

輕粉三錢

右為細末麻油調搽溼爛者乾搽之

膿窠又方

膿窠方中用石膏加上枯凡能燥溼

黃柏黃丹輕粉錢搽之痛痒即時消

黃柏

兩以公猪膽汁搽之火上炙三錢

石膏

兩輕粉錢

黃丹

枯礬

各三錢

右爲末麻油調搽溼者乾疹

應用方

涼血消風散 諸瘡一掃光 俱見疥瘡門

凍風第七十八

凍風者凡肉寒極氣血不行謂肌死患也初起紫斑久則變黑腐

爛作膿者以碧玉膏主之生肌斂口

碧玉膏 見結毒門

治凍風皮肉損爛膿血淋漓疼痛不止者用之

獨勝膏 獨勝膏來最散寒 凍風凍耳一般安 六月每逢三六日 搽之冬凍不相干

治凍風凍眼凍耳每遇冬寒則發六月初六十六二十六日用

疥癩搗膏日中曬熱在於遇冬所發之處擦之忌下湯水一
共擦三次不發又每常凍風用茄根同葱煎湯浸洗再不重發

火丹第七十九

火丹者心火妄動三焦風熱乘之故發於肌膚之表有乾溼不同
紅白之異乾者色紅形如雲片上起風粟作癢發熱此屬心肝
二經之火治以涼心瀉肝化斑解毒湯是也溼者色多黃白大
小不等流水作爛又且多疼此屬脾肺二經溼熱宜清肺瀉脾
除溼胃苓湯是也腰脇生之肝火妄動各日纏腰丹柴胡清肝
湯外以柏葉散如意金黃散敷之

化斑解毒湯

化斑解毒湯石膏
黃連升麻牛蒡等

元參知母共蓮翹
甘草人中黃更高

治三焦風熱土攻致生火丹延及遍身癢痛者

元參 知母 石膏 人中黃 黃連 升麻 連翹

牛勞子 各等分 甘草 五

水二鍾淡竹葉二十片煎八分不拘時服

除溼胃苓湯

除溼胃苓湯陳皮 防風澤瀉猪苓等

草補二木滑山樞 木通薄桂赤苓居

治脾肺二經溼熱壅遏致生火丹作爛疼痛者

防風 蒼朮 白朮 赤茯苓 陳皮 厚朴 猪苓

山梔 澤瀉 木通 滑石 各一錢 甘草 薄桂 各三分

水二鍾燈心二十根煎八分食前服

栝葉散

栝葉散中蚯蚓糞

赤豆大黃共輕粉

白木 赤茯苓 山梔 茵陳 麥門冬 生地 黃芩

枳殼 蒼木 澤瀉 連翹 甘草 元明粉 各等分

水二鍾竹葉燈心各二十件煎入分食前服

胡粉散 胡粉散治天泡瘡 蛤粉共研細末 梳粉輕粉石膏黃

治天泡紅腫發熱急脹疼痛用針挑破搽此藥

梳粉 一 輕粉 石膏 煨 蛤粉 各三

其研極細搗乾患上用此搽之或用絲瓜葉搗汁調搽亦好如

冬月無此用染布青缸汁調搽

石珍散 石珍散中服石膏 青黛再添黃和末 還兼輕粉不相饒 將來一搽即然消

治天泡日久作爛疼痛不已膿水淋漓者宜用

石膏煨

輕粉各一兩

青黛

黃柏未

各三

右共研細甘草湯洗淨以此藥摻之其疼即止

肺風粉刺酒皰鼻八十一

肺風粉刺酒皰鼻三名同種粉刺屬肺皰鼻屬脾總皆血熱鬱滯

不散所謂有諸內形諸外宜真君妙貼散加白附子敷之內服

枇杷葉丸黃芩清肺飲

枇杷葉丸

枇杷葉丸天花粉
肺風粉刺併皰鼻

甘草黃芩酒泛丸
三症吞之俱可安

治肺風粉刺鼻皰初起細色久則肉飽發腫者

枇杷葉去毛刺

八兩

黃芩

酒炒
四兩

甘草

一兩

天花粉

四兩

共為末新安酒泛丸桐子大每服一錢五分愈後併臨睡時

治三焦火甚致生火丹作瘡或作痛癢及遍身

側柏葉炒黃為末五不

蜥蜴韭菜山肉者作

黃柏

大黃各五不

赤豆輕粉各三不

右為細末新汲水調搽

遷腰火丹川寶紗一張燒化存性研為細末用米醋調稀雞翎蘸

塗患上一日三次即愈忌食發物

如意金黃散見腫場門

治火丹不論新久癢痛用新汲水調敷靛汁亦好

天泡第八十

天泡者入心火妄動脾溼隨之有... 上下不同... 也

上休者風熱多於溼熱宜涼血散風下休者

溼溼為先外用胡粉散石珍散擦之自愈此不

紫癩難痊

解毒瀉心湯

解毒瀉心湯芩連
山梔滑石元參草

荆防牛子石膏全
木通知母共相煎

治心經火旺酷暑時臨珍生大泡發及遍身者

黃連

防風

荆芥

山梔

黃芩

滑石

元參

知母

牛勞子

石膏各一

甘草

木通各五

水二鍾燈心二十根煎八分食後服

清脾甘露飲

清脾甘露飲茵陳
麥冬澤瀉蒼朮葶

木地龍芩梔赤苓
元明粉草其燈心

治瘰癧瘰癧乃生天泡下體多面疼痛者

滾湯茶湯俱可送下忌火酒煎炒

黃芩清肺飲

黃芩清肺飲芩丹
連翹乾葛天花粉

赤芍防風生地隨
薄荷紅花粉刺施

治症同前

凡芎

當歸

赤芍

防風

生地

乾葛

天花粉

連翹

紅花

各

一黃芩

仁

薄荷

五

水二鍾煎八分食後服用酒一杯過已

真君妙貼散

見腫
瘍門

治肺風粉刺齩鼻紅赤紫腫早晚用涼水調敷

雀斑第八十二

雀斑乃腎水不能榮華於土火帶結而為斑當以六味地黃凡以

小科正集

滋化源外以玉容丸早晚擦洗漸愈

玉容丸

玉容丸用羌獨松
芫蕪椒檀香藁本

荆礬辛奈芷麻風
陸僧紅棗菊花逢

治男婦雀斑酒刺及身体皮膚粗糙並用此洗

甘松 山奈 細辛 白芷 白藜 白芨 防風 荆礬

姜蚕 山梔 藁本 天麻 羌活 獨活 陀僧 柏礬

檀香 川椒 菊花 各一 紅棗肉 七

七枚

以上細末用法淨弦膜肥皂一片同搥作丸如秋冬加生蜜五錢如皮膚麤稿加牛骨髓三錢早晚洗之肌膚自然榮潔如玉

溫潤細膩

玉肌散同生藥豆

滑石白芷研成就

一切風溼雀斑酒刺白屑風皮膚作癢者並效

菜豆半斤 滑石 白芷 白附子

各一

共為細末每用三匙早晚洗面時湯調洗患上

六味地黃丸

見肺癰門

油風第八十三

油風乃血虛不能隨氣榮養能膚故手髮根空脫落成片皮膚光
亮癢如蟲行此皆風熱乘虛攻注而然治當神應養真丹服之

外以海艾湯薰洗並效

海艾湯

海艾湯中甘菊花 防風薄荷藿香加
甘松葉木 蔓荊子 荊芥同煎效可誇

治油風血虛風熱所致皮膚光亮髮脫落者

海艾 菊花 薄荷 防風 藁本 藿香

甘松 蔓荊子 荊芥穗 各二

用水五六碗同藥煎數滾連渣共入厥口鉢內先將熱氣薰面
候湯溫蘸洗之留藥照前可洗

神應養真丹 兒鶴膝 風門

治風寒暑溼襲於三陽部分以致血脉不能榮運肌膚虛癢發
生眉髮脫落皮膚光亮者服之

白屑風第八十四

白屑風多生於頭面耳項髮中初起微癢久則漸生白屑翳翳飛

起脫之又生此皆起於熱空當風風所熱化治當消風散而以

玉肌散接洗次以膏歸膏潤之髮中作癢有脂水者宜翠雲散
擦之自愈

祛風換肌丸

換肌丸用石菖蒲
廿草靈仙蒼不等

牛膝胡麻參首烏
芎歸花粉共相須

治白屑風及紫白癜風頑風頑癬溼熱瘡疥一切諸瘡搔癢無
度日久不絕愈之又發宜服之

威靈仙

石菖蒲

何首烏

苦參

牛膝

蒼朮

大胡麻

天花粉

名等分

甘草

川芎

當歸

減牛

右爲末新安酒泛丸棗豆大每服三錢白湯送下忌牛內火酒

等發物

消風散

見癩瘡門

翠雲散

見楊梅瘡門

玉肌散

見雀
斑門

潤肌散

見自脫
瘡門

耳病第八十五

耳病內三蕉肝風妄動而成大人由虛火實火之分小兒有胎熱胎風之別虛火者耳內蟬鳴或兼重听出水作癢外無炊腫此屬虛火妄動之症也四物湯加牡丹皮石菖蒲及腎氣丸王之寶火者耳根耳竅俱腫甚則寒熱交作疼痛無時宜柴胡清肝湯治之又有耳挺結於竅內氣脈不通用痛不止以梔子清肝湯為治外用黃線藥插入挺肉縫俟化盡乃愈小兒胎熱或浴洗水灌竅中亦致其竅作痛生膿初起月間不必搽藥治早項內生腫候毒盡自愈如月外不瘳以紅綿收治之則安矣

紅綿散
紅綿散內用枯礬
見耳內流膿痰

麝香膠脂在其間
二搽將來換笑顏

治耳內流膿腫痛已消膿尚不止方用此搽之

枯礬

上白乾

胭脂仁麝香

一分五釐

共研極細末磁罐收貯先用綿裹絞盡耳內膿涇綿裹滾藥送

入耳底自愈

聰耳蘆薈丸

聰耳蘆薈丸木香
山梔青黛南星等

茶歸胆草與大黃
共麝香皮共此良

治肝膽有火耳內蟬鳴漸至重行不聞声息者

蘆薈

大黃

蒸熟

青黛

柴胡

各五分

龍膽

茵歸

山梔

青皮

黃芩

各一兩

木香

仁

南星

仁

麝香

五分

右為末神麵糊為丸茶豆大每服二十一丸食後薑湯送下日

眼三次漸效

柴胡清肝湯

龍子清肝湯俱見

四物湯見瀉

腎氣丸見肺

漆瘡第八十六

漆瘡由來白異有感而弗感也俗稱木生人感之非也但漆乃辛

熱火象有毒之物人之皮毛腠理不密故感其毒先發為癢抓

之漸似癩疹出現皮膚傳遍肢體皮破爛斑流水作痛甚者寒

熱交作宜韭菜汁調三白散燻之服化斑解毒湯忌浴熱水兼

戒口味不然變為頑風癩癩愈而又發者多矣

三白散 三白散中輕粉調

石膏 梳粉不須饒

木粉兩 石膏 輕粉五錢

各為末 莖菜汁調敷 紙蓋如無菜汁 涼水調敷

化斑解毒湯 見火舟門

竹木刺第八十七

竹木刺外入之患有軟硬之分 淺深之異 軟淺者以針頭撥見刺形 拔出則愈 硬深難出者用蠟蝟搗爛塗刺上一時許其刺自然吐出 取去之則愈矣

花蕊不散 見跌撲門

治竹木刺傷腸腫痛流膿以葱湯洗淨用此搽之

痊癩瘡第八十八

外科正統

疥癩者密如撒粟尖如芒刺癢痛非常渾身草刺此因熱休見風
毛竅所閉宜服消風散洗用苦參湯甚者皮損匝而成瘡以鵝

黃散軟絹帛蘸藥撲之

苦參湯

苦參湯用大苦蒲
臨洗再加猪胆汁

河水煎來患上瘡
有教猪痒自然瘥

治疥癩瘡作癢抓之又疼坐如芒刺難以安睡用苦參四兩大

菖蒲二兩蒲水五瓠同煎數滾添水二瓢蓋片時臨洗和八公

猪膽汁四五枚淋洗患上下二三次全愈愈後避風忌食發物

鵝黃散

鵝黃散用真豆粉
滑石相煎研細末

黃栢又將輕粉稱
收乾止痛遂人心

治疥癩瘡作癢抓之皮損隨後又疼用此撲之

菜豆粉一骨石五
黃百三
經分二右為細末以軟絹帛

外科 卷之四 四七 文光堂

諸藥撲於患上止痛收斂

消腫散 瘡門

疔瘡第八十九

疔瘡乃風熱溼痰所生有冬溫後天時不正感發傳染者多兩腮

腫痛初發寒熱以柴胡葛根湯散之外敷如意金黃散在裏內

熱口乾二便不利者四順清涼飲利之表裏俱解腫仍不消必

欲作膿托裏消毒散膿成者即針之體虛人兼服補托自愈

柴胡葛根湯 見傷寒發煩門

四順清涼飲 見湯潑門

痰包第九十

痰包乃痰飲爭火流行凝注舌下結而靨腫綿軟不硬有妨言語

作痛不安用利剪當包剪破流出黃痰若蛋清稠粘難斷擦盡

以冰礪散搽之內服二陳湯加黃連黃芩薄荷數服忌煎炒

火酒等件

加味二陳湯

加味二陳湯牛下
芩連薄荷重三片

茯苓甘草共陳皮
痰飲生來服此宜

治痰飲流注古下發腫作漏針刺已破者服之

陳皮

半夏

茯苓

甘草

黃芩

各八分

黃連

薄荷 各五分

水二鍾薑三片煎八分食前服

水礪散

見喉門

癩風第九十一

癩風乃湯研涇挑沸腫於肌表或外受風寒侵襲而成其患初起

水泡作癢成瘡破流脂水瘡至徹骨久則成片傳及遍身好浴
熱湯形如風癩初起上体多者防風通聖散去稍黃加葱頭三
莖發汗以散外毒下体多者去麻黃以攻內毒久服祛風換肌
丸初服消風清燥湯外搽諸瘡一掃光成片流水者真君妙貼
散皮膚頑厚有蟲者麥飯散搽之

消風清燥湯

消風清燥湯生地
芍藥川芎白芍

蟬蛻防丹花共連
苦參甘草與靈仙

川芎

當歸

白芍

生地

防風

黃芩

黃連

天花粉

蟬蛻

苦參

靈仙

各一分
甘草五分

水二鍾煎八分食後服

應用方

防風通聖散 見別毒門

祛風換肌丸 見自居風門

真君妙貼散 見腫場門

諸瘡一掃光 見疥瘡門

淫腫第九十二

淫腫者皆脚氣受傷之病或飲食後驟受風寒所侵或飢渴時候

冷生冷所滯寒積於中食不尅化其患胸膈不寬小水不利因

日浮腫漸至徧身此上傷不能生化之故也宜用二蛟散疏通

緣上溫養脾元其小水自利浮腫自消此方百發百中之妙

二蛟散

二蛟散內用皮硝淫腫糖湯明服下

陳光三年要妙集如絞行水且去消

治生冷惱怒傷脾致胸膈不寬小水不利面目四肢浮腫諸藥

不效用三年老黃木炒焦黃色為末提淨苦硝三兩錦內溶化

炒草芥末每用一平杯和勻再碾極細大人壯實者每服三不

小兒十步上下者一不二分俱用赤砂糖三茶匙和自滾湯半

茶鍾空心調服至午大便一次至晚再便一次其疾久從眼胞

消起日久元氣虛者與加味胃苓湯間服至重者不過五服愈

加味胃苓湯加味胃苓湯木苓澤瀉豬苓併厚朴

參查芍半藿香陳甘草香附效如神

治脾胃受傷胸膈不寬兩脇膨脹小水不利面目四肢浮腫者

服之

陳皮

茯苓

白朮各一

白芍各一

藿香

人參

厚朴

山查

澤瀉

半夏各五

甘草

豬苓各三

香附

女人如

蓋三片燈心二十粒水

咬傷第九十三

人咬為患良肉受傷但齒乃陽明胃經有餘臟腑多火多熱生穴
於此凡食經此無不燍爛下咽又飲食炙燍之毒無不侵襲故
傷人癰腫其痛異常臭膿腐爛痛徹連心是感牙之毒也初咬
時一日內衆徹熱小便浸傷去洗淨牙黃疼血咬孔上蟾酥餅
貼之膏蓋後出微膿漸愈如咬時未經此法致腫痛癰發疼甚
者亦與童便浸洗挹乾用籠紙燃酥麻油點火用烟焰薰腫痛
上良久方住以解牙毒仍以蟾酥條插入孔內膏蓋候腫消時
換玉紅膏擦之長肉完口如有雜症相兼者孔隨症而治

蟾酥餅條見片磨門

葱白甘草湯葱白甘草湯容易每日常將頻洗之

玉紅膏見腫傷門
咬瘀疼、痛兼臭穢
消痰散腫功全備

治咬傷、爛腫、疼痛、膿血淋漓、臭穢腐爛者，用葱白二兩、粉草五錢、水三碗，煎至二碗，每日洗淨傷處，瘀腐膿血方用玉紅膏搽之，里膏蓋漸愈。

風犬傷第九十四

風犬乃朝夕露臥非時不正之氣所感，故心受之其舌外出，肝受之其目昏朦，脾受之其涎自佈，肺受之其音不出，腎受之其尻下拖，此五臟受毒成爲風犬。乃稟陰陽肅殺之氣，故經此必致傷人。隨咬卽服救生散，小便中行出血片，忌諸口味發物，赤白

等俱不可見百日乃安治之遲者毒大而小便難出必攻臟腑
久則成形腹脹政急人聲若大眼神露白者俱為不治有愈後
復犯前禁觸之仍死

救生散

救生散用七斑薑
杭粉一錢同作末

惟肝全身翅足饒
空心酒服效偏高

治風犬咬傷用生斑薑七個去頭翅足杭粉一錢同研空心溫
黃酒調服一時許小便行出血片白脂乃惡物也如便疼煎作
草湯飲之自利如毒未盡次早再一服以小便清白方為毒盡
一方治風犬咬有效其人頂中必有紅髮一根急須拔去以追風
如聖散敷傷處抽毒氣服救生散

追風如聖散追風如聖散坊風

川草烏苦薄荷同

治風犬咬傷隨用敷之其毒即可拔出

細辛

防風

川烏

薄荷

草烏

川芎

白芷

蒼木各一兩

雄黃四錢

錢

共為末溫酒調敷傷處以紙蓋扎早晚換二次

風犬傷之要靜居

諸麻赤豆大葷祛

百日之中都忌見

敢教患者樂年餘

女人面生蠶黑斑第九十五

黑黑斑者水虧不能制火血弱不能華肉以致火燥結成斑黑色
枯不澤朝服腎氣丸以滋化源早晚以玉容丸洗面斑上日久
漸退兼戒憂思動火勞傷等件但此生於夫主不利疑事不決

者常有之

腎氣丸 見肺癰門

玉容丸 見雀瘡門

鈕叩風第九十六

鈕叩風皆原風涇凝聚生瘡久則搔癢如癬不治則沿漫項背當

以水硫散擦之甚者服消風散亦妙

水硫散

水硫散內用川椒 蘿蔔內藏煨熟藥

朝腦生髮豈可饒 還將緒脂共相調

硫黃 兩一

樟冰

川椒

生髮

錢各一

共為末先用白蘿蔔一個摳空其內將藥填滿腹將原皮蓋之

症紙包三四層灰火內煨半時許待冷取開用藥同熟猪油調

獨藥患上自愈

枯筋箭第九十七

枯筋箭乃憂鬱傷肝肝無榮養以致筋氣外發初起如芥豆大枯
點微高日久破裂趨出筋頭縫鬆枯槁多生胸乳門宜用絲藥
線齊根繫緊七日後其患自落以珍珠散搽之其瘻自收兼成
口味不發

絲藥線

見瘻
疔門

婦人腳丫作癢第九十八

婦人腳丫作癢乃從三陽風溼下流凝結不散故先作癢而後生
溼爛又或足底灣曲之處癢溼皆然

珍珠散

見下
疔門

枯礬散

枯礬散中煨石膏
四未將來為未搽

黃丹輕粉不相饒
腳了溼痒即時消

枯礬 五錢

石膏 煨

輕粉

黃丹

各三錢

右為末溫湯洗淨搽藥即愈

手足皸裂第九十九

手足皸裂破裂老乾枯之象氣血不能榮養故也因熱肌驟被風寒所逼凝滯血脈以致皮膚漸粘漸穢乃主破裂日襲於風風熱相乘故多作痛以玉肌散洗擦潤肌膏潤之甚者兼服當歸飲子為妙

玉肌散 見雀斑門

潤肌膏 見自疥瘡門

當歸飲子 見疥瘡門

眼乃脾經有風胃經多熱其結爲腫風多者則浮腫易消熱甚者則堅腫難散初起宜用金黃散敷之有表症者荆防敗毒散裏症者清胃散加大黃刺之如後不散必欲作膿宜換膏貼之膿成者卽針之遲則眼頭自破此乃睛明穴內穴難斂者成漏者多

荆防敗毒散

見時毒門

青胃散

見牙縫出血門

金黃散

見腫瘍門

黑子第一百一

黑子痣名也此腎中濁氣混滯於陽陽氣收束結成黑子堅而不故凡人生此終爲不吉面部不善者去之宜細銅管將痣套入孔內撚六七轉今痣入管一拔便去有痣浮淺不能拔者用針

挑損痣上搽水蛭散少許糊紙蓋之三日自脫或灰米膏點之亦可落後珍珠散乾搽生皮而愈忌醬醋無斑

灰米膏用成塊火灰礮水調稠將白川米插入灰內留半米在外片時許候米熟用米點痣上可落矣

水蛭散

見瘰癧門

珍珠散

見下疳門

眼胞菌毒第一百二

菌毒者乃脾經蘊熱凝結而成其患眼胞內生出如菌頭大帶小漸長垂出甚者眼翻流淚亦致昏矇治宜用軟綿紙蘸水磨之眼胞上少頃用左手大指中佃於患根右手以披針尖頭齊根

初下血出不方意用藥雲從磨農塗之其血自止內服涼膈清

馳飲二服仍忌海腥煎炒相薑火酒等件不發

涼膈清脾飲

涼膈清脾飲薄荷黃芩赤芍連翹等

荆防生地石膏圖甘草山折豈可無

防風

荆芥

黃芩

石膏

山梔

薄荷

赤芍

連翹

生地

甘草

水二鍾燈心二十根煎八分食後服

翠雲錠治服胞菌毒用針割後之杭粉五兩銅絲末一兩輕粉

一錢共研極細用黃連一兩同川米百粒水一碗煎一半再熬

折去二分和藥作錠陰乾臨用清水小許淨硯上磨濃雞翎蘸

搽患上又治爛弦風眼或暴亦腫痛者搽更效

體氣第一百三

體氣一名胡氣此因父母有所傳滋者又有胡胎而受生者故不
 脫本來氣質凡此腋下多有棕紋數孔出此氣味當以五香散
 擦之內用蒜肚時常作饌食之亦可解其氣味可漸而退此法
 常敢效也

五香散

五香散內用沉檀
 加土鼻香功更捷

還有零零併木香
 敢效體氣不相妨

沉香

檀香

木香

零零香

各三錢

麝香

三錢

共為細末每用五釐津調搽擦兩腋下三日一次或用香末二
 錢緝袋盛貯桂於腋下亦效

蒜肚方用公猪肚一具入大蒜囊四十九枚去殼入肚內以線扎

口水為一匙調用益借蘇其道而食之氣味佳者用真眼模一

人內同煮肚爛去蝦蟆大蒜用熱酒食之洗浴發汗避風二日
其氣頓改

白禿瘡第一百四

白禿瘡因剃髮腠理司開外風襲入結聚不散致氣血不漸反肉
乾枯發爲白禿久則髮落根無榮養如禿斑乾枯作癢者內必有蠱
湖以薑蘇潤肌膚常擦其髮漸生禿斑乾枯作癢者內必有蠱
宜用麥餞散搽之蟲死風散髮生可愈後忌動風發物等件

麥餞散

見疽風
瘡門

治禿瘡頭生脫落白斑如癬瘡痂壘壘疊起癢甚猶若蠱行熬
湯洗淨瘡痂潔淨用麻油調搽以毡帽戴之隨後作疼發腫忍

之三日後其痂漸漸而脫愈之後不復作其髮一生戒諸發物

諸瘡一掃光見疥瘡門

治禿瘡髮脫作癢本藥一錢加倒桂麝二分加燈窩宿油調搽

自愈

潤肌膏

潤肌膏內用麻油能揉禿瘡枯槁色

紫草當歸一處投加之黃蠟效應收

治禿瘡乾枯白斑作癢髮脫麻油四兩當歸五錢紫草一錢同

熬藥粘濾清將油再熬加黃蠟五錢化盡傾入碗內頓冷搽擦

思漸愈

奶癩第一百五

奶癩見在治中女食五辛父食炙煎煎熱具見生後頭面遍身發

為奶癩流脂成片睡臥不安搔癢不絕以蚊蛤散治之或解毒

雄黃散甚則翠雲散妙

蚊蛤散

蚊蛤散中輕粉末香油調搽嬰兒癩

川椒倍于妙須將乳母食調

蚊蛤兩

點紅川椒兩

輕粉五錢

先將蚊蛤打成細塊鍋內炒黃色次下川椒同炒黑色烟起為

度人確內封口存性次日入輕粉碾為末確收貯香油調搽奶

母戒口為妙

解毒雄黃散

見血風瘡門

翠雲散

青缸汁調搽見楊梅瘡門

膳拱頭第一百六

蟾拱頭俗名腦猪是也患小而稟受悠遠皆父精母血蓄毒而成

生後受毒者只發一次其患腫高破之又腫皆稟受時原有衣膜相裏毒雖出而膜未除故愈又發腫甚膿熟者用針刺破以三品一條鎗插入孔內化盡肉膜自愈又有不腫而不收口者此必佩襲患口宜敗銅散搽之兼戒口味自愈

敗銅散

敗銅散效為何因性熱亦能收溼水

銅錫鉛礪總化成一乾再不復回津

治蟾拱頭已破後膿水不乾愈之又發久不收口用化銅舊確為未洗淨患上香油調搽忌口

三品一條鎗

見特毒門

小兒遺毒爛斑第一百七

毒乃未生前在於胞胎稟受因父母傷每處受餘毒未盡精血

孕成故既生之後熱湯洗浴烘薰衣物外熱觸動內毒必發於肌膚之表先出紅點次成爛斑甚者口角穀道眼眶鼻面皮肉俱壞多妨乳哺啼叫不安初治宜早內與士茯苓湯調入中黃末每日數次共飲四五分外用解毒紫金丹磨塗患上效者可保十中三四進延毒甚爛斑遍身不乳者百中難活一二此由根蒂受毒之深故也

人中黃治小兒諸胎毒痘疹黑陷內收唇焦口乾風熱斑疹赤遊丹毒兼治大人傷寒陽症發狂或諸惡瘡毒氣入裏口燥咽乾煩渴悶亂中諸疔草河腫等毒諸般急病無有不效用毛竹一段兩頭留節一頭鑽一小孔用粉草磨爲細末從孔灌滿以木

條塞紫孔眼用磚扎之沉八大糞池內一年取起長流水浸一
日帶竹風乾磁攪收貯大人每服二錢小兒每服三四分涼水
調服小兒胎毒爛斑土茯苓湯調服尋常熱病入應病藥中調
服即效

真君沙點散

見腫瘍門

治小兒胎毒皮肉腐爛疼痛不安用此敷即效

解毒紫金丹

見疔瘡門

蜈蚣串第一百八

蜈蚣串者乃得於思慮傷脾氣鬱結所生是疾氣血澆薄者多

蓋四肢屬脾土其患多生於兩手初起骨中治疼漸生漫腫堅

硬不熱不紅手背及內關前後連腫數塊不能轉側日久如
豆腐漿汁滲通諸竅日夜相留腫痛仍在患者面黃肌瘦二食
減小久則寒熱交作內疰並出首尾俱宜益氣養榮湯加味遊
遙散調和氣血扶助脾胃其中可生者十有三二矣補而不應
氣血瀝盡而亡者多

益氣養榮湯

加味道遙散

見瘰
瘕門

小兒痘風瘡第一百九

痘風瘡因痧痘後毒發未盡留熱肌膚復被外風侵入其患先從
細瘡作癢次漸沿開成片脂水生痂搔之無度因用麥餞散擦
之兼戒口味避風自愈

麥餞散

麥餞散搽痘風瘡
用椒生熟枯礬末

硫黃白信要相當
調用麻油一擦尤

治小兒痘風作癩叠叠成片甚則頑麻不知痛用小麥一升炒
枯黃色乘熱入鉢內和硫黃四兩白砒一兩細末攪勻待冷取
起加烟膠半觔川椒三兩生枯礬各二兩共碾細末臨用葱湯
洗淨用麻油調搽油紙蓋孔三日一換三次愈

小兒赤遊丹第一百十

赤遊丹受毒於未生前發症於有生後蓋身在胞胎皆賴父精母
血藉以生養父母不能節其慾多致淫火猖熾胎必侵受又不
能戒諸厚味以及炭火烘薰重衣叠褥往往受熱子無弗有及
致生後熱身先谷共薰衣物燭四內毒而前發之時先發身熱

喘叫驚搐次生紅腫光亮發熱瞬息遊走發無定處先從頭額起者各天奪丹以升麻葛根湯母子同服餘皆起於腹背流入四肢者輕起於四肢流入胸腹者重有此總皆先投惡血爲要惡血之後先用精豬肉縫片貼之一時許換如意金黃散用水芭蕉根搗汁調敷甚者日換二次內以大連翹飲消毒犀角飲五福化毒丹毒氣入裏腹脹堅硬不乳者紫雪散下之三日後身漸徹涼砭血之處肉便軟活聲清腹軟乳哺如常者順反此爲逆

升麻葛根湯

升麻葛根湯芍藥木通甘草連翹等

柴胡黑山梔莫逃丹毒遊行效最高

治丹毒身體發熱面紅氣急喘叫驚搐等症服

升麻 乾葛 白芷 柴胡 黃芩 山梔 各一錢

木通 甘草 各五分

水二鍾煎八分不拘時母子同服

天連翹飲

大連翹飲梔芍歸 荆防甘麥柴芩等

車前飛滑石膏隨 蠅蛻木通牛蒡宜

治小兒丹毒發熱痰涎壅盛一切諸瘡疹疹頸項生核或傷風傷寒時行發熱等症並宜服之

連翹 瞿麥 滑石 車前子 牛蒡子 赤芍

山梔 木通 當歸 防風 黃芩 柴胡

甘草 荆芥 蟬蛻 石膏 各五分

水二鍾燈心二十根煎八分母子同服

消風犀角散
遠用燈心為引便
赤遊丹腫効神功

治小兒丹毒身熱氣促啼叫驚搐不寧等症服

犀角散 防風錢名一 甘草五 黃連三

右水二錢燈心二十根煎四分徐徐服之

紫雪散

紫雪拾羊犀角共
元參沉香甘草
升麻寒水石膏膏條
硝片硃砂金箔洗

治小兒赤遊丹毒甚者毒氣入裏肚腹膨脹氣急不乳即宜此

藥救之又治傷寒熱燥發狂及外科一切蓄毒在內煩躁口乾

恍惚不寧等症

升麻 寒水石 石膏 犀角 拾羊角略一

元參一 沉香 木香各五 甘草八

水五碗同藥煎至一碗濾清再煎滾投提淨朴硝三兩六錢微
火漫煎水氣將盡欲凝結之時傾入碗內下硃砂水片各二錢
金箔一百張各預研細和勻碗頓水內俟冷凝成雪也大人每
用一錢小兒二分十歲者五分徐徐撫之卽効病重者加一錢
亦可以用淡竹葉燈心湯化服

針砭法

針乏之法絕世奇
角頭復向針上敲

赤澀丹頂用相宜
出血還須精肉醫

治少兒赤遊丹毒紅赤癩腫遊走不定須砭之用披針鋒尖向
患上以烏木重筋在針上面擊之密砭去血多者爲妙血紅者
輕紫者重黑者死砭畢溫湯洗淨用乾精猪肉縫大片貼砭處

一時并方換如意金黃散水芭蕉根搗汁調敷

如意金黃膏

見門

治小兒赤遊丹毒紅如硃熱如火走如雲散乃遍身不定者用
水芭蕉根搗汁調敷如蜜亦可

五福化毒丹

見胎

走馬疳第一百十一

走馬牙疳其患迅速不可遲延故也其患多在痧痘餘毒所由又
有雜病熱甚而成者其患牙根作爛隨便黑腐作臭甚者牙齒
脫落齙齙黑朽不數日間以致穿腮破唇誠爲不治初起宜用
蘆薈消疳飲外用人中白散或水研散二藥擦之取去黑腐肉
見紅肉血流者爲吉如取時頑肉不脫腐爛漸開嫩腫外散臭

味不止更胡身熱不退者俱為不治

蘆薈消疳飲 蘆薈消疳飲薄荷升麻牛蒡羚羊角

元參甘草共柴胡梔子黃連竹葉扶

治小兒走馬牙疳身熱氣齙牙齦腐爛氣味作臭以及穿腮破唇者並服之

蘆薈 銀柴胡 胡黃連 川黃連 牛蒡子 元參

桔梗 山梔 石膏 薄荷 羚羊角 各八分

甘草 升麻 各三分

水二鍾淡竹葉十片煎六分食後服

人中白散 人中白散樽功奇冰片薄荷研細末

黃栢兒茶青黛口疳搽上病輕離

治小兒口疳走馬牙齦腐爛臭極効

人中白藥者白煨紅二兩

孩兒茶一兩黃柏

薄荷一兩青黛六分

冰片五分

共再研極細先用溫湯漱淨吹藥疔上用六七日吹藥涎外流為吉內收涎毒人裏為凶

牙疳五不治

口臭涎穢者一不治 黑動發脫者二不治 牙落無血者三

治穿腮破唇四不治 用藥不効者五不治

水礪散見咽喉門

重舌第一百十二

大人小兒重舌乃心火妄動發之當以線針點刺患上令出惡血

內服解毒瀉心湯外以水糊散搽之又有紫舌木舌亦山心火而發用飛鹽加水片少許勤搽出涎自愈又有痰氣結於舌上成核作痛硬强者用線針點破出血用水糊散搽之服後藥

黃連瀉心湯 瀉心湯用與茶連甘草連翹薄荷葉

荆芥山梔牛蒡先木通加效如神仙

治大人小兒心火妄動結成重舌木舌紫舌張腫堅硬語言不利者並宜服之

黃連 山梔 荆芥 黃芩 連翹 木通

薄荷 牛蒡子 各 甘草 五

水二鍾燈心二十根煎入分食後服

針刺法治重舌木舌紫舌脹等疾腫脹疼痛硬屈不語又兼舌限

在齒白縫盡處作腫疼肉塗塞口禁難開俱用此法刺之用
麤線針扎在筋頭上在患處點刺出血紅紫毒輕紫黑毒重患
甚者數十點皆可血盡溫湯漱之甚者金鎖匙輕者冰硼散搽
帶上流去熱涎內服涼膈散清涼飲俱可選用

金鎖匙

冰硼散

涼膈散

四順清涼飲

俱見咽
喉門

胎癰第一百十三

胎癰者初生小兒頭上胸乳間腫起大者加餵小似梅李此皆胎
中瘀血凝滯而成雖候見滿月外方可用針刺或內加赤豆汁
則安內五福化毒丹

五福化毒丹

五福化毒丹連桔
元參照草牙痛片

青黛
人參赤茯苓
甘草
林
破
金
鎖
匙

治小兒蘊積胎毒以及諸瘡癰疹傷風斑症口舌生瘡痰涎壅
盛謔言煩燥夜睡不寧者並効

元參

桔根

赤茯苓

一人參

黃連

龍膽草

青黛

牙硝

各一兩

甘草

五錢

冰片

五分

硃砂

三金箔

二錢

石為末煉蜜丸芡實大每服一九薄荷燈心湯化服皮治瘡泥
後餘毒上攻口齒涎血臭穢以生地黄汁化下如無地黄竹葉
燈心湯亦可川

鵝口瘡第一百十四

鳩口瘡皆心脾二經胎熱上攻致滯口皆生白瘡為疔甚則咽間
叠叠腫起致難乳哺多生啼斗以青紗一餘裹筋頭上蘸新

搽去自胎以淨為度重手出血不妨隨以冰硼散搽之內服

涼膈之藥

水硼散 見咽
喉門

涼膈散 見齒
病門

痘癰第一百十五

痘癰乃源痘清漿不足毒流於脾肺二經致手腳胸背結成漫腫

大如桃李此多發在收靨之後身涼不渴者為吉有此不必內

消宜太乙膏貼上俟膿熟針之元氣虛弱者兼服保元湯助脾

健胃為要

保元湯

保元湯力効無窮
甘草參芪兼白朮

救困扶危立大功
棗薑加上起痰塵

治痘癰出膿之後脾胃虛弱膿清不斂者服之

人參

黃芪

白朮各一

甘草三

薑一片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

痘疥第一百十六

痘疥乃痘毒升發不盡留痘心肝二經者發之初生紫點次日變黑赤淺者浮高而潤毒甚者深陷而焦其發多出於七朝上下將靨之際又生於臀毒流足身濕疤潤音清月吉發在肚腹腰腎身熱色枯声啞者凶凡見此者急用針刺疥根搗人蟾酥條候四邊裂縫疥搖動者用刀割去搽玉紅有生肌完口如針無血插藥乾枯不變膿者終爲不治但此症疔有餘首尾俱宜加

荆芥山梔甘草

花粉知母共蕩
焯心竹葉難忘

鼠粘子

天花粉

知母

荆芥

山梔各六分

甘草分

水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎服

身熱加柴胡黃芩

有痰加麥冬貝母

咽啞加元參枯梗

痲枯加當歸生地

便秘加蜂蜜元明粉

昏憤加黃連硃砂

八珍湯

見潰瘍門

治痘片落後氣血虛弱膿水出多不能生肌收斂宜服之

蟾酥條

見疥瘡門

玉紅膏

見腫瘍門

黃水瘡第一百十七

黃水瘡於頭而耳項忽生黃色破流脂水頃刻沿鬚多生痛癢此

因日晒風吹暴感溼熱或因內食溼熱之物風動火生者有之

治宜蛤粉散擦之必愈

蛤粉散

蛤粉散治黃水瘡

膿水沿開痒痛當水調敷上即時良

蛤粉

石膏

服各一兩

輕粉

黃柏

生破各五

共為細末涼水調搽冬月麻油調亦好

真君妙貼散

見腫揚門

治黃水瘡癢痛脂水亦效

大人破第一百十八

口破者有虛火實小之分色淡色紅之別虛火者色淡而自封細

點其者陷露龜絞肝虛不消此因思慮傷脾多醒少睡虛火動

而發之四物湯加黃柏知母皮肉症以為引導從治法也

以柳花散搽之實火者色紅而滿口爛府甚者腮舌俱腫脈實日乾此因膏梁厚味醇酒炙燻心火妄動法之宜涼膈散外搽赴筵散吐涎則愈如口舌生瘡舌乾黃木作渴者加減八味丸以滋化源俱禁水漱

柳花散

柳花散內君黃栢冰片加之為末吹

青黛肉桂相兼續虛陽口破功奇速

黃栢

淨末一兩

青黛

錢三

肉桂

錢二

冰片

分二

各為細末共再研磁確取貯每用少許吹之

赴筵散

赴筵散內栢芩連細辛加之各等分

梔子乾薑一處攪吹搽口破即安然

黃連

黃栢

黃芩

梔子

乾薑

細辛

各等分

為末吹患上

四物湯 見癩瘡門

涼膈散 見咽喉門

加減八味丸 癰疽潰瘍門

臭田螺第一百十九

臭田螺乃足陽明胃經溼火攻注而成此患多生足指腳根隨起

白班作爛先癢後痛破流臭水形似螺厝甚者腳而俱腫惡寒

發熱先宜甘草湯洗淨貼蟾酥餅三日三枚後用珍珠散豬脊

髓調搽膏蓋煖腫上真君妙貼散敷之其腫漸消戒便步履

蟾酥餅 見疥癩門

珍珠散 見疔疔門

真君妙貼散 見癰疽癰瘍門

牛程躓第一百二十

牛程躓程途奔急熱腳下水見風以致滯血枯結成頑硬皮肉

榮斷不旋斬生腫痛腫高突尖起腳行走久則破裂膿水相

流每日温湯力出豚牛角散又有肉膿功注又頑難破者以大線針眼頭挑破出膿乃寬硬皮敲破者剪而去之肉不生者玉紅膏長之肉滿不生皮者珍珠散搽上生皮乃愈

牛角散

牛角散中牛角燒木力加上水龍骨

松香麩粉不相饒相兼牛髓搗同調

牛角尖

燒灰

水龍骨

松香

麩粉

各等分

共為末牛角髓調搽虛弱者兼服十全大補湯

玉紅膏

見腫瘍門

珍珠散

見下府門

僵蠅蛙第一百二十一

僵蠅蛙多生手指節中不紅不熱腫如蠟腹乃于少陰痰氣凝滯而生初起不疼日久方痛痛久方癢腫仍不消蟾酥餅膏貼漸

作稀膿近者一載遠者三年此屬體弱者有之內兼補劑免變

癩瘰之病

蟾酥餅見疔瘡門

田螺泡第一百二十二

田螺泡多生手足忽如火燃隨生紫白黃泡此脾經風濕攻注不久漸大脹痛不安線針挑破泄去毒水大乙膏蓋挑破又生者內服解毒瀉脾湯可愈

解毒瀉脾湯解毒瀉脾湯牛子石膏甘草黃芩等

防風蒼木共山梔木通燈草瀉心脾

防風

牛子

山梔

石膏

黃芩

蒼木

甘草

木通各一

水二鍾燈心二十根煎八分量病食前服之

太乙膏

見腫瘍門

蟾酥條

見疔瘡門

玉紅膏

見腫瘍門

賸痛第一百二十三

賸者皆起於手足乃風寒氣鬱於皮毛致血不榮於肌表謂皮稿則多痛似無皮之狀是賸苦生焉將患上葱湯浸洗良久隨以潤肌膏擦之就暖勿只風冷自愈又每久逢冬即發者須三伏時晒搗爛大蒜間擦三次不再發謂寒因熱治其理甚明矣

陰風第一百二十四

陰風又名八腳蟲也乃肝腎二經濁氣而成生此不為清吉銀查散津調擦之內服六味地黃丸每斤加蜜炒黃柏一兩蘆薈五

錢以清化源愈後不發

銀杏無憂散

銀杏無憂散麝香
雄黃狼毒兼蘆薈

水銀輕粉杏仁強
調擦何愁藥不良

水銀製

杏仁去皮

搗膏

輕粉

雄黃

狼毒

蘆薈

各一

麝香分一

除水銀杏仁膏餘藥共碾篩細入上二味再研勻先用土葛蒲煎湯洗之用針挑去虱孔隨用津唾調擦使藥氣入內愈不復

生切忌牛犬蟹肉

六味地黄丸

見肺
庭門

葡萄疫第一百二十五

葡萄疫其患後生小兒感受四時不正之氣鬱於皮膚不散結成

大小黃藥散 黑色者 破在 補 位 面 乃 爲 肺 症 自 無 表 裏

邪毒傳胃牙根出血久則虛人斑漸方退初起宜服并羊散清

熱涼血久則胃脾湯滋益其內又有牙根腐爛者人中白散

羚羊角散

羚羊角散用知母 甘草麥冬淡竹葉

黃芩牛芳與元參 止血清斑功效靈

羚羊角

防風

麥冬

元參

知母

黃芩

牛旁

名八 分

甘草

二 分

水二鍾淡竹葉十片煎六分食遠服

胃脾湯

胃脾湯內甘草陳 扶神白木併遠志

麥冬五味北沙參 脈虛自汗服康寧

白木

扶神

陳皮

遠志

麥冬

沙仁

各六 分

五味子

甘草

各五 分

水二鍾煎八分食遠服虛弱自汗者去沙參加入參黃芪各伍

人中白散

見口疳門

百蟲入耳第一百二十六

百蟲入耳乃偶然誤入之如蠅蚊細蟲入耳以麻油敷點滴入竅中蟲亦自死取出如蜈蚣蜜鋒等大蟲入者以肉炙香安耳邊其蟲聞香自出有蟲夜間暗人者切勿驚慌响叫逼蟲內攻宜正坐點燈光向耳竅其蟲見光自出對面有人見其蟲不出

惡蟲叮咬第一百二十七

惡蟲乃各稟陰陽毒種而生見之者勿觸其惡且如蜈蚣用錫蝎蜂尾惡蛇以舌螫人自出有意附毒害人必自知其惡也凡有

所傷各尋類而推治

蜈蚣咬傷、疼、腫、驟發、用蟾酥餅磨濃塗傷處、用鹿紙擦、蘇麻油點
火用烟焰薰之、疼腫自消、又方用雄雞糞搗水塗之、又方用頭
垢擦傷處、以燃焰薰之

蜈蚣咬雄二種、雄者螫人痛在一處、雌者痛牽徧體、用井底泥敷

痛處、乾則易之一時、無泥取新汲水、以青布隨痛處搭之、溫則

再易、又方五月五日用黃蠟二兩溶化、將凝時投雄黃硃砂、

來各三錢、和勻捏成餅、窩仍用貓兒眼草、口汁端午時滴入窩

內、陰乾愈久愈佳、復捏成塊、蜜收、臨用一米許刺針尖上、以燈

焰化開、滴正螫處、疼即止

蛇毒傷人用雄黃末河葉搗汁調敷腫上內用半枝連搗爛取汁

二兩熱酒四兩和汁服之蓋汗為効仍用渣敷傷處亦妙又方

隨傷即用端午收採蒼耳草末五錢水煎一鍾熱服蓋汗即安

如無端午收採者使用常日採取陰乾煎服一兩發汗亦効

寸蛇青色扁形尖尾短足紅口者毒輕青口者毒重以舌齧人

其青最惡初螫時用雄黃末一錢生礬二錢杓內溶化將筋頭

點藥傷處冷則易之連點七次遂愈毒氣入裏者解毒紫金丹

酒磨服一錢蓋汗即愈遲延毒走腫痛者麻油焙薰之亦瘳

河純毒血毒中人舌麻心悶白茅根搗汁冷飲子毒中人昏悶服

張口禁雜言金解之非不能也

人面瘡第一百二十八

口瘡古言有生者近世之罕聞矣其生病異而受之必異其象
全似人面眼鼻俱全多生膝上亦有臂患者據方書皆云積冤
所致先須清心懺悔改過自新然後方服十六味流氣飲外用
貝母爲末敷之乃聚眉閉口次用生肌斂口藥亦可得愈矣

十六味流氣飲

見流注明

慎吞針鐵骨哽咽喉第一百二十九

慎吞針刺哽咽疼痛者用亂麻筋一團搓龍眼大以線穿繫兩線
頭在外湯浮急吞下咽頃刻扯出其針頭必刺入麻中同出如
不中節再吞再扯以出爲度慎吞銅物者多食葶薺化堅爲軟

若吞鐵骨之物腸中不能轉動覺墜者多食青菜猪脂自然送
入大腸從糞同出諸骨哽喉用玉簪花根八錢各隨所犯之肉
爲引煎湯服之轉出乃愈又諸骨哽於咽下不能外出者烏龍
針推之骨下則安矣

烏龍針治骨哽於咽下難出者用細鐵線燒軟雙頭處用黃蠟作
丸龍眼大髮鐵線頭上外用絲綿裹之推入咽內哽骨處其骨
自然順下矣不下再推

文方治諸骨哽喉玉簪花根切片煎湯漱之徐徐吐出其骨自軟
再用乾飯噉之白下

砒毒者陽精大毒之物服之令人臟腑乾涸皮膚紫黑氣血乖逆
敗絕則死初服知覺早者大蘭根葉搗汁灌之輕則可解無蘭
處以生菜豆同水研爛以水灌之多則爲效如不解者以金汁
灌之必甦甦後如顛不語者每日以菘豆水飲之毒盡則愈
取金汁法用大毛竹一連二節用刀劈去外青一半用磚扎節中
沉入大糞池內一年後取起以長流水浸一日取起鑽開節孔
內蓄糞清磁罐收貯凡遇有中砒毒河鮑傷寒陽毒發狂疥瘡
痧症毒氣入裏煩躁口乾渴欲飲水脈大有力者並宜此藥

落下顏拿法第一百三十一

落下顏者氣虛之故不能收束閉竅也患者平身正坐以兩手托

住下頰左右大指入口內納槽牙上端緊下頰力往肩下擦開
關竅向腦後送上卽投關竅隨用絹條塊頰於頂上半時許去
之卽愈

救自刎斷喉法第一百三十二

自刎者乃迅速之變須救在早遲則額冷氣絕必難救矣初刎時
氣未絕身未冷急用絲線縫合刀口搽上桃花散多搽爲要急
以線紙四五層蓋刀口藥上以女人舊布裹腳將頭擡起周圍
纏繞五六轉扎之患者仰臥以高枕枕在腦後使項鬱而不直
刀口不開冬夏避風衣被覆暖待患者氣從口鼻通出以薑五

片人參二錢用米一合煎湯或稀粥每口隨使食之接補元氣

三日後急手解去前藥用桃花散搽刀口上仍急纏扎扎二日
急用濃葱湯軟絹蘸洗傷處搥乾用牴腳挑玉紅膏放手心上
捺化捺於傷口處再用舊棉花薄片蓋之外用長黑膏貼裹周
圍交孔不脫近喉刀口兩傍再用黑膏長四寸濶二寸豎貼膏
上兩頭粘貼好肉庶不脫落外再用絹條圍裹三轉針線縫頭
冬月三日夏月二日每用葱湯洗搥換藥自然再不疼痛其肉
漸從兩頭長合內服八珍湯調理月餘如大便結燥用豬膽套
法不可利藥利之雙額俱斷者百日單漸者四十日必收功完
下此法曾治強盜郭忠皂隸沙萬家人屢興俱雙額齊斷將危
者用之全活單額傷斷者十餘人治之俱保無虞矣

王紅膏 見腫瘍門

桃花散

如聖金刀散 見金瘡門

八珍湯 見潰瘍門

陰毒第一百三十三

陰毒乃純陰無陽被天時寒冷肅殺之氣侵入肌膚沉於骨髓致氣不能升血不能行凝滯經絡疼痛切骨初起不腫不熱朝輕暮重不則作腫漸紅爛斑黑腐臭水淋漓穢氣薰蒸腐爛漸開終久必死一人年三十歲冬月隔港與鄰婦私交房事方畢忽婦夫回慌忙隔港赴水而走熱身受寒五日後小腹大響陰痛不腫日夜响叫至一月後谷道傍生一爛斑黑腐倒陷諸藥不效至半月大響連黑腐爛作臭乾腐無膿十日大臍俱壞黑敗而死也又一八年四十歲夏月好飲火酒至夜赤身露臥手膊

連背隆疼難忍一月後肩發爛一塊周圍微硬色如紐棗和
漸延開半月後手膊半背其成黑靨臭穢不堪一月不食而死
一人中年肥胖亦冬夏好飲火酒飲後隨躄涼水方臥一日頸
項作疼微腫堅硬如石三月外項大如頭石硬不熱此陰毒也
辭不可治後請別醫治之項同身大乃異症不食而死又一人
夜夢城隍拘見責打二十喊叫其妻喚醒隨後受刑處癩腫作
痰青紫急脹視之真棒毒也用針刺破流血碗許外肉腐爛
作疼調理兩月而安此亦陰毒故附記之後人可閱

失榮症第一百三十四

失榮者先得後失始富終貧亦有雖居富貴其心或因六欲不遂

損傷中氣鬱火相凝隧痰失道停結而成其患多生肩之已上
初起微腫皮色不變日久漸大堅硬如石推之不移按之不動
半載一年方生陰痛氣血漸衰形容瘦削破爛紫斑滲流血水
或腫泛如蓮穢氣薰蒸晝夜不歇半生疙瘩愈久愈大越潰越
堅犯此俱為不治予立二方曾治數人雖不獲全愈而不天札
速死者誠緩命藥也

和榮散堅丸

和榮散堅歸地參
丹酸遠栢併龍齒

扶陳木附具南星
蘆薈硃砂與角沉

治失榮症堅硬如石不熱不紅漸腫漸大者服

歸身

熟地

扶神

香附

人參

白木

橋經各二具母

南星

酸棗仁

遠志

腦子仁

丹皮

龍齒

角尖二兩煨亦可

蘆薈

角沉分

硃砂六錢
為衣

右為細末煉蜜丸桐子大每服八十九食後用合歡散根皮煎

湯送下患者若改往從新澹薄甘命其中有得愈者十中一二

否則難脫然也

飛龍阿魏化堅膏

治失榮症及瘦瘠乳岩癰癥結毒初起堅硬如石皮色不紅日

久漸大或疼不疼但未破者俱用此貼用蟾酥丸菜末一料加

金頭蜈蚣五條炙黃去頭足研末同入熬就乾坤一氣膏二十

四兩化開攪和重湯肉頓化紅段攤貼半月一換輕者漸消重

者亦可停止常貼保後無虞矣

試知百病死生法第一百三十五

死生非神聖用能洞其機閔疾病無明醫亦不能決其凶吉否則使人疑或決斷不常予異授呂祖一枝梅真仙方也不敢私秘一例刊註以傳概世云

呂祖一枝梅堪誇呂祖一枝梅
雄麝銀珠砂熊脂

芭荳芽蘇靈脂隨
哉托知生不改移

治大人男婦小兒新久諸病生死難定七則明藥莢實大一餅貼印堂之中點管香一枝香盡去藥日後一時許藥處有紅斑暈色腫氣飛散謂紅霞捧口病雖危篤其人不死如貼藥處一時後無腫無紅皮肉照舊不變謂白雪漫野病雖輕淺終歸車

路小兒急慢驚風一切老幼痢疾俱貼之紅腫即愈此方用之
可預知生死也

硃砂三錢

銀硃

一錢五分

五靈脂

三錢

麝香

三分

蓖麻仁

五分

雄黃

芭荳仁

各五錢
不去油

右各研細於端午日淨室中午時共研加油臘脂為膏磁金收
藏勿經婦女人手臨用荳大一圓捏餅貼印堂中其功立見用
過餅送入河中

造孽報病說第一百三十六

怪症出於非端事必因乎有據感應篇曰若開如是花必結如是
果一黃冊書手每至甲首家務要殺雞一隻洗娘頭尾一歲二

熟下鄉殺雞不許其數一朝數盡口中生出如菌大小六枚填其浦口湯水難下視之乃孽疾也辭不可治又請一醫用刀割文有日又生如舊延至六十口肌膚盡削存骨如柴而死○一竿鎗戶傷殘生鳥假如每日十命一歲共計三千六百盡屬死於無辜况其雛子不得生者多矣彼生子三人俱至六七歲遍身先發紅點癢痛異常數日後點如鑽趨腐爛流血口稱百鳥相隊令人趕打不去至月外氣血瀝盡俱亡予後勸解燒毀竿矢合族持齋六十二歲生一子方得長成而立○一人五十餘歲家衆養雞十餘隻一朝衆雞齊叫彼怒之將衆雞兩腳齊折安檻上剝斷其雞亂命飛跳血盡而俱死一年後足生脫疽筋

骨節打流血不止合妾將刀割去腳骨瀝盡氣而亡○一高
家置窩弓兼養鷹犬五十後方生一子二歲左之頭角生孔一
處俱已露骨視之乃孽病也不敢言其不治奉上海方修合用
之無效請衆醫治之強投藥欲延至三歲而歿其人後遭橫事
死於非命○一莊家獵事爲樂五十後遍身生塊破後腐爛見
骨素知彼養鷹之報予曰欲治其病先當杜養鷹犬然後施治
則可彼從之內服益氣養榮之藥外用甘草當歸煎洗仍茶王
紅膏長肌完口三月餘而愈二年復後養鷹犬又一年六月內
得患陰症而歿次子十歲赴水而死已上數條係平的實皆出
於不仁慘戮生靈之報也一訟師作申興訟破衆家私傷殘骨

肉不計其數一日大腿腫痛堅硬如石疼痛異常欲以繩繫足高懸梁上其疼乃止如放下疼卽如故予知孽報辭不可治似此兩月日至午時親友四人相看忽聞廳內大嚮一聲其腫卽歸大臀腫如巴斗其腿卽消臀腫痛不著厲將布兜懸挂其疼方可又兩月百苦而終又一年其妻遍身發腫如癩作癢非常破流脂水其時孟冬天氣常欲赤身相露其癢稍止如著衣被其癢卽生如蟲攻刺予知孽報亦辭之後至隆冬赤身流水而死此異常之報也所謂逆天害理雖由已古往今來放過誰無漏矣

古人朴實其七情于涉者少而從風寒暑溼外感凝滯者又胃人
仙方活命飲攻散所滯之腫服此得效者十常八九乃患者五
臟不虛耳今人穿鑿太過七情煩攪過背而內臟無有不傷每
見此症曾服過此藥其瘡必不起發脾胃再無不損若瘡不起
發脾胃傷敗患者豈有得生至此自干天命今之治法不論首
尾標本先必固脾胃次行托藥謂本立而道生病無不活予見
如此幸同道者察焉

拾遺症第一百三十八

拾遺者因條欵分門遺失未及細詳但本病立門以正病爲主而
從病故有失焉今查補註以便觀治之鼻疔生於鼻內痛引腦

門不能運氣脹寒鼻竅甚者昏腮俱腫○牙疔生於牙縫之中
頂高突起痛連腮項破則流血○黑疔生於耳竅之內黑硬腐
爛破流血水疼及腮破以上之症俱先針刺次行發汗仍照疔
類調治○喉癰生於陽外正中腫痛妨碍飲食紅腫發熱必欲
潰膿軟而脹痛者針之內服補托之藥玉紅膏搽貼長肌完口
又有腐潰內通湯水隨孔出者曾治數人俱亦無妨○疔疽生
在膊上連肩通腫長堅而硬○疔疽生在當手動脈之處腫痛
寒熱痛徹手脾舉動不便○鳳疔疽發在兩目之間形長皮赤
痛引腦戶二目合縫先腫發熱○透腦疽發在額上髮際之間
多發寒熱頭疼如研不可忍耐先用萬靈丹發汗解散風邪次

宜治凡○附陰疽生在內踝上三寸初生小泡漸生赤腫破流
血水痛亦徹骨不能步履○咬骨之發在大腿內股不腫不紅
痛徹骨隨初宜雷火針針入內服萬靈丹酒調服效○陰疽生
於右腿夾縫之下三寸痛連陰子小腹亦疼○元疽生於左腿
夾縫之下三寸漫腫連陰疼及大腿○淵疽發在脇下初起不
紅堅硬久則破潰有聲如嬰兒啼狀膏蓋無聲去膏仍有異哉
難治之症也○玉枕疽生在腦後枕骨中堅而難潰痛引肩項
鼻熱氣壅此太陽膀胱溼熱凝滯而成大抵以上之症有名而
生者鮮矣初起有表症者便宜解表有裏症者卽與通利潰後
宜補托久則宜收斂此爲一定治法不可混亂妄投藥餌致其

危亡也

唇風第一百三十九

唇風陽明胃火上攻其患下唇發癢作腫破裂流水不疼難愈宜

銅粉丸泡洗內服六味地黃丸自愈

銅粉丸

銅粉丸中輕粉礬黃連膏子同冰片

銅青官粉與麝香爛眼唇風頷刻良

銅青五錢

官粉三錢

明礬一錢五分

輕粉一錢五分

麝香一分五厘

冰片一分五厘

黃連二兩切片煎稠膏

右共為細末黃連膏丸如芡實大每用一丸湯泡紙蓋每洗頗

熱上面清水勤洗之其患自愈

繡繹背瘡第一百四十

至於發背對口大疔等疾已潰流膿時冬夏宜納帛四五層放貼膏藥外再用綿布見方八寸四角用蛇皮細帶紮之安蓋絹上以帶扎在前層綿實瘡上庶使瘡中暖氣不泄易於腐潰洗瘡時預備二糊更換務要患肉暖氣烘烘此法最善故亦補之

癰疽肉肉不合法第二百四十一

癰疽對口大瘡內外腐肉已盡惟結痂膿時肉肉不粘連者用軟綿帛七八層放患上以絹扎緊將患處睡實數次內外之肉自然粘連一片如長生成之肉矣有患口未完處再搽王紅膏其肉自平矣。

煉元明粉法第一百四十二

冬至後用潔淨朴硝十斤用水一斗五升白蘿蔔五斤打碎同硝
入鍋內煮化候湯滾足撈去蘿蔔將竹絲箕以綿紙二層攤鋪
箕內架在新缸上以硝湯徐入箕內候折再添以湯濾盡爲度
將缸搭在天井露三日其硝結在缸邊傾去餘水瀝乾爲止將
硝取下再用砂鍋頓炭爐上將硝一碗化開煎滾以銅匙鏟攪
將成凝結時鏟入小魚酢罐內上空寸許再下硝煉如此已畢
每一罐下用三丁品字樣釘入地上畱寸半在外將罐淨頓釘
頭上用瓦片蓋口周圍用段磚砌百眼壚圍遠離罐寸半許將
著炭火入壚內四圍底火頂火一概相護候罐硝紅爲度次日
取出硝來預用大綿紙攤在牆頭陰土上將硝碾細用絹篩篩

在紙上一錢厚再不許多將門窗俱已關閉不許與人見之三日後其硝自然復活色白如粉輕虛成片將鉢盛取紙蓋之上再用亂紙寸許以收潮氣庶不凝結此品最能降火化痰清利臟腑怪症服之可蠲狂躁用之即愈搜除百病安斂心神況此服之不傷元氣惟久病瀉痢者不宜大人每服三四錢小兒五分至一錢皆可用白滾湯或葱湯空心化服候行二三次隨飲稀粥自然爽快精神調和臟腑津液頓生百病如失又煨過補石六兩加硃砂三錢青黛一錢水片一錢五分共碾細末照前篩紙上再用紙蓋一層四邊以戒尺壓緊勿令走氣候三日外取苾密收文各陽春紫雲最治失心忘志顛癩健忘小兒急

慢大人異症每服五分至一錢俱用淡竹葉燈心湯化服屢有
奇效不可盡述元明粉乃神仙保命服食每一斤如此熟甘草
末二兩熬湯化服二三錢令八悅澤容顏輕身耐老矣

取紅鉛法第一百四十三

女子十四歲而天癸至此陰中之真陽氣血之元稟遇此將行時
兩頰先若桃花之狀陽獻陰藏其經只在半月之裏必來預用
白綿紬一尺五寸洗淨時常用綿帶一條束臍下綿紬兩尖頭
前後繫帶上中間常兜陰器小便解一頭便罷卽繫之經至盡
染紬上取初至紅鉛一顆大如魚眼紅色明亮如珠此爲接命

至寶隨與好酒一不知服一時後如醉不醒口以人乳飲之一

日後白麩已後能絕房事者延壽一紀餘經換細塊取陰乾浸
正白童便內片時其經自然脫下取置磁盤內陰乾聽用如不
昇煉者謂之全紅鉛亦可補益虛勞接續命脈如次服已後但
未破者俱可取聚陰乾磁盞昇煉色如紫霜一般合入三元
丹內人乳服之接命長年卻除百病此方神秘不宜輕泄故不
可傳但取紅鉛之女生平愛惜飽暖適時無拘束爲上

煉金頂砒法第一百四十四

用鉛一斤小罐內炭火煨化招白砒二兩於化洋鉛上煉烟盡之
度取起冷定打開金頂砒結在鉛面上取下聽用

煉硝石法第一百四十五

用潔淨朴硝半觔礶內炭火鎔化煎乾煨紅雀火冷之取出卽成
礶石礶收聽用利實火不利虛火也

取蟾酥法第一百四十六

用蟾不拘大小其酥俱有用潤銅鐻鐻蟾屑稜高肉土微緊拔出
酥來凝聚鐻裏多則括下陰乾聽用其取過之蟾避風二日仍
送青草園中自然不傷其生如取之便見風下水俱成破傷風
顛狂而死

製附子法第一百四十七

大附子一兩之外方用隨數幾枚以童便浸滄三寸每日換便浸

至夏三冬五再換童便煮盡二香爲度去皮臍線穿險乾或

中腦硬亦可收藏聽用

昇白靈藥法第一百四十八

水銀二兩用鉛二兩化開投入水銀聽用火硝二兩綠礬二兩明礬二兩一礪爲末投入以丙化開炒乾同水銀礪細入泥護陽成礮內土用鐵盞蓋之以鐵梁鐵塊左右用燒熟軟鐵線上下扎緊用紫土鹽泥如法固口要烘十分乾燥爲要架三釘上砌百眼爐中先加底火二寸點香一枝中火點香一枝頂火點香一枝隨用小礮安滾湯在傍以筆蘸湯搽探盞內常溼勿乾候三合已畢只火礮待次日取起開出藥求如粉凝結盞底上刮下靈藥收藏聽用凡瘡久不收口用此研細擦上少許其口易

完者入於一概收斂藥中用之其功奇甚捷

製寒食麵法第一百二十九

用白麵一觔外再以麵半觔調稠厚捍成薄片二塊將前麵包合於中周圍捏緊合口於清明正日蒸熟掛透風處陰乾用麵包藏勿經女手越久越效

逐日人神歌第一百五十

初一十一二十一一大擗鼻杜手小指初二二十二外踝髮際外踝位初三三十三股內牙齒足股肝初四十四二十四腰間胃院陽明手初五五十五口舌遍身陽明足初六十

六二十六手掌腕前又初七二十七內踝氣冲及在

膝初八十八二十八腕股內併在陰初九

在足膝脛後初十二十三十四腰背內踝足

傳針灸莫犯為吉

十二時人神歌第一百五十一

子暎丑腰寅在日


卯面辰頭巳手熟

午胸未腹申在心

酉背戌頭亥股續

尻神歌訣第一百五十二

屍神圖



此神農所置一歲起坤

二歲震逐年順飛九宮

週而復始行年到處則

所主症切忌針灸切勿

犯之否則變生他病慎

右九宮屍神歌

一屍神所在有根由 坤內外蹀聖人留 震宮牙端分明記

巽位還居乳口頭 中宮肩骨連屍骨 面目還從乾上遊

手膊兌宮難砭灸 艮宮腰項也須休 離宮膝脇針難下

坎肘還連肚脚求 爲醫精曉尸神訣 萬病無干禁忌憂

十子日不宜用針犯之病多反覆

甲不治頭乙耳喉 丙肩丁背與心求 戊己腹脾庚腰肺

辛膝壬當腎脛收 癸日不宜針手足 十干不犯則無憂

製炒諸藥第一百五十三

別方諸藥未註炮炙今開於後凡藥必遵雷公炮炙八藥乃效如

未製生藥八煎不為治病反為無益譬如人食餽饌不用烹生

食者豈不害人當熟思之

人參色明亮堅實
為主轉難不堪

生地黃酒浸
熟地黃酒蒸

黃芩鹽水炒
甘草消毒生用
酸棗仁研炒

五味子炒
肉蓯蓉去鱗酒浸
牛膝洗

當歸酒洗
白芍醋炒
白茯苓去刺

香附童便炒
柴胡去蘆
黃芩酒炒

龍膽草酒炒
知母鹽水炒

貝母去心
疎皮去白

天門冬湯泡法心

白朮米泔炒

白朮米泔炒

破故紙炒

元參去根

黃連解毒生用

瓜蒌仁去油

防風去蘆

麥門冬去心

蒼朮木泔炒

遠志湯淘去心微炒

破故紙炒

元參去根

黃連解毒生用

瓜蒌仁去油

防風去蘆

乾薑炒黑

附子童便

牛夏水煎

川烏湯洗

草烏湯泡去皮尖

已戟湯泡二心微炒

南星煨有為末牛胆內者

威靈仙去根

仙茅米泔浸蒸去皮

三稜湯泡

澤瀉煮

大黃實人用虛人多用

海藻酒洗

是布酒洗切絲

牡蠣去枯

王不留行炒

牛蒡子炒碾

連翹去心碾

金銀花去梗

牽牛生用炒用

地骨皮去槓

肉桂去皮

茯苓去皮

枸杞子去蒂

琥珀布包碾研如麪細

山梔碾炒

黃柏鹽水炒

山茱萸去核

杜仲鹽水拌炒斷絲

桑皮蜜水炒

辛夷去蒂

乳香去油

沒藥去油

枳殼炒

厚朴姜汁製炒

已薑去油

皂莢去皮

五倍子去妙

蓮肉泡去皮心

山查去核

石膏煨碾末

礞砂透明白色

黃丹水飛炒紫

犀角朱鑱末

蟬蛻去土

蜈蚣炙去頭足

石決明煨

紅鉛法註未卷

桃仁泡去皮尖

雄黃透紅明亮

砒石色明亮者生煨兩用

龍角朱鑱用

斑蝥用米炒去翅足

斑蝥去翅足

蛭虻翻去腹上

珍珠豆腐內煮去殼未

杏仁洵去皮尖

硫黃去

牛黃色

龍齒煨存性

姜蠶去絲微炒

田螺去殼

田螺去殼

苦硝湯煮提淨

礞砂淨明潔白

自然銅醋煨七次

麝香去手皮

蜂蜜煉去自洗

全蝎酒洗去毒

牡蠣煨研

人中白煨研

以上藥品... 本書內應用製炒炮炙者錄之... 不炮炙者未錄

醫家五戒第一百五十四

一戒凡病家大小貧富人等請視病者，便可行之，勿得遲延，壓藥欲往而不往，不爲平易藥，金母論輕重有無，當盡力一例施與，自然生意日增，毋傷方寸。

二戒凡視婦女及孀婦尼僧人等，必候侍者在傍，然後入房診視，倘傍無件，不可自看，假有不便之患，更宜真誠規視，雖對內人，不可談此因閨闈故也。

三戒不得出脫病家珠珀珍貴等送家，合藥以虛存假，換如果該用，合彼自製人之倘服不效，自無疑謗，亦不得稱讚彼家物色。

之好，凡此等非君子也。

四戒凡爲醫者不可行樂登山攜酒遊玩又不可片時離去店中
凡有抱病主者必當親視用意發藥又要依經寫出藥帖必不
可枉

撰藥方受人駁問

五戒凡娼妓及私賂家請看亦當正已視如長家子女不可他意
兒戲以取不正視畢便回貧窘者藥金可望病愈只可與藥不
可再去以圖邪淫之報

醫家十要第一百五十五

要先知儒理然後方知醫業或臨或外勤讀先古明醫確論之
書須且夕手不釋卷一一參明融統幾變印之在心慧之於目

凡仁症時自無差謬矣

三要選買藥品必遵雷公炮炙藥有秘方修合者又有因病隨時加減者湯散宜近備丸丹須預製膏藥愈久愈靈線藥越陳越異藥不吝珍終久必濟

三要凡鄉井同道之士不可輕侮傲慢與人切要謙和謹慎年尊者恭敬之有學者師事之驕傲者遜讓之不及者薦拔之如此自無謗怨信和爲貴也

四要治家與治病同人之不惜元氣斲喪太過百病生焉輕則支離身體重則喪命治家若不固根本而奢華費用太過流蕩口生輕則無積重則貧窘

五要人之受命於天不可負天之命凡欲進取當知彼心願否休
認天道順逆凡順取人緣相慶逆取子孫不吉爲人何不輕利
遠害以防還報之業也

六要凡里中親友人情除婚喪疾病慶賀外其餘家務至於饋送
來往之禮不可求奇好勝凡食只可一魚一菜一粥省費二則
惜祿謂廣求不如儉用

七要貧者之家及遊食僧道衙門差役人等凡來看病不可要他
藥錢只當奉藥再遇貧難者當量力微贈方爲仁術不然有藥
而無火食者其命亦難

八要凡有所禁隨其大小便當置買生藥以爲根本不可收買玩

語及不緊物件浪費錢財又不可做大銀會酒有妨生意必當
一例禁之自絕謗怨

九要凡店中所用各樣物具俱要精備齊整不得臨時缺少又古
今前賢書籍及近時名公新刊醫理詞說必其參閱以進學問
此誠爲醫之本務也

十要凡奉官衙所請必當速去毋得意緩要誠意恭敬告明病源
開具方藥病愈之後不得圖求屬禮亦不得言說民清致生罪
戾聞不近公自當守法

以上五戒一要乃保身保家守成之法故直言而不文當置於座
右朝夕一覽若有賢能子孫倘遵而行之則可以成家立業若

不所信必有飢寒不足之憂凡人何不預听直待臨時追悔進退
兩難將何及矣

開割披針喉針形第一百五十六

披針古之多用馬啣鐵爲之此性耐不鋒利用之多難入肉今
以鋼鐵選善火候鐵工造之長二寸濶二分半圓梗扁身劍脊
鋒尖兩邊芒利用之藏手不覺入肉深淺自不難也如膿深欲
其口大直針進而斜針出割開外肉口則大矣喉針長六寸細
楛扁頭鋒尖刺喉膿血者皆善

打斑方 蜜陀僧散 石黃 硫黃 雄黃

蛇床子 各二
蜜陀僧 一
爲末醋調服 上

終